

ΙΩΑΝΝΟΥ Κ. ΤΖΟΥΦΛΑ - ΜΑΡΙΑΝΘΗΣ Ι. ΤΖΟΥΦΛΑ



ἀριθμητική
γεωμετρία
δ' δημοτικού

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ - ΑΘΗΝΑ 1979

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής



135 136 - 139 113 - 146

145 - 138 137 - 143 144 - 20

239 ΜΑΡΙΑ ΒΕΡΑΝΑ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ - ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
Δ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

141 149 -

508
~~335~~

9540

4064

2524

17070

195580

Μέ απόφαση τής Έλληνικῆς Κυβερνήσεως τά διδασκτικά βιβλία
τοῦ Δημοτικοῦ, Γυμνασίου καί Λυκείου τυπώνονται ἀπό τόν Ὀρ-
γανισμό Ἐκδόσεως Διδακτικῶν Βιβλίων καί μοιράζονται ΔΩΡΕΑΝ.

ΑΡΧΙΜΗΤΙΚΗ ΤΕΡΜΕΤΡΙΑ
Δ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Με απόφαση της Ελληνικής Κυβερνήσεως τα διδακτικά βιβλία του Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου επιλέγονται από τον Υπουργό Έκδοσης Διδακτικών Βιβλίων και χορηγούνται ΔΩΡΕΑΝ

ΙΩΑΝΝΟΥ Κ. ΤΖΟΥΦΛΑ – ΜΑΡΙΑΝΘΗΣ Ι. ΤΖΟΥΦΛΑ

Μαρία

Κεφαλά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ - ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

Δ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Ακέραιοι αριθμοί

1. Έννοια του αριθμού - Αριθμητική

Όταν συμβαίνει να ταξινομήσουμε με αυτόκινητο είναι φανερό πως θα χρειαστούν οι αριθμοί ως εργαλείο.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ 1979

ΙΩΑΝΝΟΥ Κ. ΤΣΟΥΦΛΑ - ΜΑΡΙΑΝΘΗΣ Ι. ΤΣΟΥΦΛΑ

Μαθηματικά

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ - ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
Δ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ 1979

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο

1. Έννοια του αριθμού – Αριθμητική
2. Αριθμοί και ψηφία.
3. Άξιοσημείωτα σύνολα άκεραίων
4. Αρίθμηση.
5. Σύγκριση άκεραίων αριθμών
6. Αρίθμηση κατά τό δεκαδικό σύστημα.
7. Αριθμογραφία θέσεως.

Άκεραιοι αριθμοί

1. Έννοια του αριθμού – Αριθμητική

Όταν σχεδιάζετε να ταξιδέψετε με αυτοκίνητο είναι φανερό, πως θα άκουστούν οι παρακάτω έρωτήσεις:



Εικ. 1

1. Πόσο μακριά;
2. Πόσες ώρες;
3. Μέ πόση ταχύτητα;
4. Πόσοι θά είμαστε;

Γιά νά δώσετε σωστές άπαντήσεις στις παραπάνω έρωτήσεις, χρειάζεστε **άριθμούς**.

Μέ άλλα λόγια οι έκφράσεις: 300 χιλιόμετρα, 4 ώρες, 90 χιλιόμετρα τήν ώρα, θά είμαστε 5 άνθρωποι, είναι **άριθμοί**.

Ό κλάδος τών μαθηματικών πού άσχολείται μέ τούς άριθμούς λέγεται **άριθμητική**.


Βλέπετε; ➔

"Έννοια τού άριθμού έχετε, όταν πρόκειται ν' άπαντήσετε στην έρώτηση: Πόσα;

Έρωτήσεις:

Στις παρακάτω έρωτήσεις ν' άπαντήσετε μέ άριθμούς:

- 1) Πόσα παράθυρα έχει ή τάξη σας;
- 2) Πόσες πόρτες έχει τό αυτοκίνητό σας;
- 3) Πόσες λάμπες φωτίζουν τήν τάξη σας;
- 4) Πόσες τάξεις έχει τό σχολείο σας;




Είκ. 2. Έδώ εικονίζεται ό πρωτόγονος άνθρωπος σέ μία προσπάθεια νά δώσει άπάντηση στην έρώτηση: πόσα;

2. Άκέραιοι άριθμοί καί ψηφία

"Άς πάρουμε ένα κουτί πού θάζουμε θόλους. Άν είναι άδειο,


τότε λέμε πώς τό κουτί περιέχει μηδέν βόλους. Αυτό τό παρα-
σταίνουμε μέ τό σύμβολο: (0) μηδέν.



Εικ. 3

“Αν δέν είναι άδειο, του παίρνουμε
τούς βόλους, τόν ένα μετά τόν άλλο,
καί τούς τοποθετούμε πάνω στό τρα-
πέζι.

Παρακάτω εικονίζουμε τά σύνολα
των βόλων, πού σχηματίζονται σέ κάθε
νέα τοποθέτηση ενός νέου βόλου.



Όνόματα

αριθμών: μηδέν· ένα δύο τρία τέσσερα πέντε έξη έπτά

Ψηφία: 0 1 2 3 4 5 6 7

Τίς τρεις τελείες τίς βάζουμε γιά νά δηλώσουμε, πώς οί αριθμοί συνεχί-
ζονται χωρίς τέλος.

Οί έννοιες πού χαρακτηρίζουν τά σύνολα των βόλων είναι
άκέραιοι αριθμοί. Σ' αυτούς δίνουμε τά όνόματα: μηδέν, ένα,
δύο, τρία, ... καί τούς συμβολίζουμε μέ: 0, 1, 2, 3, ... πού λέγονται
ψηφία. Καί όπως κάθε νέα συλλογή έχει ένα βόλο παραπάνω,
έτσι καί κάθε νέος άκέραιος αριθμός, πού αριθμεί τή συλλογή
αυτή, έχει μία μονάδα παραπάνω.

Άπό έδω καταλαβαίνουμε πώς οί **αριθμοί** είναι ποσοτικές έν-
νοιες.

Καί τά **ψηφία** χρησιμοποιούνται γιά νά γράφονται οί αριθμοί.

Βλέπετε; ♣

Αριθμοί είναι ποσοτικές έννοιες καί όχι
λέξεις ή σύμβολα πού τά χρησιμοποιούμε
γιά νά παρασταίνουμε αυτές τίς έννοιες.

“Άλλο τό όνομα του αριθμού καί άλλο αριθμός.


Παραδείγματα:

“Όπως κάθε μία από τις παρακάτω εικόνες παρασταίνει:



“Ένα γράμμα, Μιά γλάστρα, Μιά όμπρέλα, “Ένα παράθυρο.

“Έτσι καί μέ τήν αριθμητική έκφραση: π.χ. 77 συμβολίζουμε έναν αριθμό πού έκτιμᾶ ἕνα πλήθος 77 ἀντικειμένων.



Εικ. 4. Στόν παραπάνω πίνακα σημειώνεται ή εξέλιξη τών Ἰνδο-αραβικῶν συμβόλων ἀπό τό 800 μ.Χ. μέχρι σήμερα.

3. Γνωρίζετε ότι:

Τά αριθμητικά σύμβολα πού έχετε γιά νά μαθαίνετε, νά γράφετε, νά διαθάζετε καί νά τά χρησιμοποιείτε στους άριθμητικούς ύπολογισμούς είναι γνωστό, πώς οι Ίνδοί τά χρησιμοποιούσαν από τό 350 πρό Χριστού (π.Χ.);

ΟΤΙ: Άργότερα τά διδάξαν οι Άραβες στους Εύρωπαίους;

Γι' αυτό πιθανόν όνομάστηκαν καί **Άραβικοί άριθμοί**.


Τά σύμβολα αυτά δέν τελειοποιήθηκαν σέ όρισμένο χρόνο ή τόπο.

Αυτά έξελίχθηκαν μέ συνεχή ανάπτυξη καί πιθανόν τελειοποιήθηκαν στήν περίοδο του τελευταίου αιώνα.

4. Άπαρίθμηση:

Ή πράξη πού κάνουμε, γιά νά βρούμε τό πλήθος (τόν άριθμό) τών θόλων του κουτιού, στό μάθημα της σελίδας 6, λέγεται **άπαρίθμηση** ή **καταμέτρηση** τών θόλων, του κουτιού. Κάθε θόλος είναι καί μία **άκέραια μονάδα**.

Κατά τόν ίδιο άκριβώς τρόπο έργαζόμαστε, όταν θέλουμε ν' άπαριθμήσουμε τά πράγματα (στοιχεία) ενός άλλου συνόλου, όπως στό παράδειγμα της εικόνας: τά παπάκια.



Εικ. 5

Άπαριθμώ τά παπάκια καί βρίσκω πώς είναι 12. Τό κάθε παπάκι είναι μία άκέραια μονάδα.


Τά πράγματα (στοιχεία), πού άποτελούν τό σύνολο, λέγονται **μονάδες**. Κι όπως τά σύνολα άποτελούνται από πράγματα (στοιχεία), έτσι καί οι άκέραιοι άριθμοί, πού μετρούν τά στοιχεία του συνόλου, άποτελούνται από **μονάδες**. Έξαιρείται μόνον ό **άκέραιος άριθμός μηδέν (0)** πού αντίθετα, φανερώνει πώς λείπει κάθε μονάδα.

Προβλήματα:

1. Για να πάρουμε 10 δραχμές, πόσες μονάδες θα προσθέσουμε στις 7 δραχμές, στις 5 δραχμές, στις 4 δραχμές;
2. Για να πάρουμε 10 γραμμάρια, πόσες μονάδες πρέπει να προσθέσουμε στα 5 γραμμάρια, στα 8 γραμμάρια, στα 9 γραμμάρια;
3. Ποιά μονάδα θα χρησιμοποιήσουμε για την άριθμηση: αγοριών ή κοριτσιών; και ποιά μονάδα θα χρησιμοποιήσουμε για να άριθμήσουμε: 1) καναρίνια, 2) κόττες, 3) καναρίνια και κόττες σά σύνολο;

5. Γνωρίζετε ότι:


Ἡ ἰδέα τῆς καταμέτρησης ἢ ἀπαρίθμησης τῶν στοιχείων ἑνός συνόλου εἶναι τόσο παλιά, ὅσο καί ὁ πολιτισμός; Τό σχέδιο εἰκονίζει τόν παλιό ἄνθρωπο ν' ἀπαριθμεῖ τά πρόβατα τοῦ κοπαδιοῦ του.



Εἰκ. 6

Ὄταν τό πρῶτὶ τά πρόβατα ἐφευγαν ἀπ' τό μαντρί, γιά κάθε πρόβατο ὁ βοσκός ἐθαζε κατά μέρος ἕνα χαλίκι. Ἔτσι σχημάτιζε ἕνα σωρό ἀπὸ χαλίκια. Στὴν ἐρώτηση: πόσα πρόβατα εἶχε, ἔδειχνε τό σωρὸ τῶν χαλικίων. Ὄταν τό κοπάδι γύριζε τό θράδου στό μαντρί, γιά κάθε πρόβατο ἐπαιρνε ἕνα χαλίκι ἀπὸ τό σωρὸ.

Ἐάν μετὰ τὴν εἴσοδο ὄλων τῶν προβάτων δέν ἔμενε κανένα χαλίκι στό σωρὸ, γνώριζε πῶς τά πρόβατά του γύρισαν ὅλα.




Εικ. 7

Σύγχρονες μέθοδοι

Στήν εικόνα βλέπετε μία σύγχρονη ηλεκτρονική ύπολογιστική μηχανή. Έκτελεί τις 4 πράξεις χωρίς λάθος και με ταχύτητα πολύ μεγάλη.


6. Άριθμηση κατά το δεκαδικό σύστημα

1. Δέκα άκεραιες μονάδες κάνουν μία δεκάδα.




Εικ. 8

2. Δέκα δεκάδες κάνουν μία εκατοντάδα.



Εικ. 9

3. Δέκα εκατοντάδες κάνουν μία χιλιάδα.



Εικ. 10

4. "Αν σέ κάθε δεκάδα προσθέσουμε τούς αριθμούς από τό 1 ως τό 9, τότε θά σχηματίσουμε όλους τούς άκέραιους αριθμούς από τό 10 ως τό 100, όπως φαίνεται στην εικόνα:

Μέ άλλα λόγια:

"Ας πούμε πώς έχουμε τόν αριθμό 54. Για νά τόν εκφράσουμε, άρκει νά πούμε πρώτα τίς μονάδες πού έχουν οί δεκάδες του, δηλαδή πενήντα. "Υστερα νά πούμε τίς άπλές μονάδες του, δηλαδή τέσσερα. "Έτσι ο αριθμός 54 εκφράζεται: πενήντα τέσσερα.



Εικ. 11

5. "Αν σέ κάθε έκονοντάδα προσθέσουμε τούς άκέραιους αριθμούς από τό 1 ως τό 99, τότε θά σχηματίσουμε όλους τούς άκέραιους από τό 100 ως τό 1000, όπως τό παράδειγμα τής εικόνας:



Εικ. 12

Μέ άλλα λόγια:

"Ας πούμε πώς έχουμε τόν αριθμό 354. Για νά τόν εκφράσουμε, άρκει νά πούμε πρώτα τίς μονάδες πού έχουν οί έκονοντάδες του, δηλαδή τρακόσια. "Έπειτα νά πούμε τίς μονάδες πού έχουν οί δεκάδες του, δηλαδή πενήντα. Καί τέλος νά πούμε τίς άπλές μονάδες του, δηλαδή τέσσερα. "Έτσι ο αριθμός 354 εκφράζεται: τρακόσια πενήντα τέσσερα.

7. Αριθμογραφία θέσεως

Οί αριθμοί είναι άπειροι. Δέν έχουν τέλος. "Αν ήταν ανάγκη νά παρασταίνουμε κάθε αριθμό μέ τό δικό του σύμβολο, θά χρεια-

ζομασταν άπειρα σύμβολα. Αυτό όμως είναι **άδύνατο**. Εύτυχως πού ξγινε μιά πολύ μεγάλη επινόηση καί: "Όμως μέ τά 24 γράμματα του άλφαβήτου γράφουμε όλες τίς λέξεις έτσι καί μέ τά **έννέα** αριθμόσημα: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 πού λέγονται **σημαντικά** ψηφία, καί μέ τό (0) **μηδέν** μαζί, γράφουμε όλους τούς αριθμούς.

Η επινόηση αυτή βασίζεται καί στή συμφωνία ότι: τό ίδιο ψηφίο, ανάλογα μέ τή θέση, πού θά έχει μέσα στόν αριθμό, νά δηλώνει, **μονάδες, δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες** κ.τ.λ. Μέ άλλα λόγια:

1. "Ένας άκέραιος αριθμός νά γράφεται μέ ένα ή περισσότερα ψηφία τό ένα δίπλα στ' άλλο, όπως π.χ. 978. Τό πρώτο ψηφίο από τά δεξιά (τό 8) σημαίνει άπλές μονάδες. Τό δεύτερο, πάντα από δεξιά (τό 7) σημαίνει δεκάδες, τό τρίτο (τό 9) σημαίνει εκατοντάδες.

2. "Αν δέν υπάρχουν μονάδες μιās τάξεως, νά γράφουμε τόν αριθμό μηδέν (0).

Παραδείγματα:

1) 'Ο αριθμός 347 ν' αποτελείται από 3 4 7
 εκατοντάδες ← ↑ ↑
 δεκάδες ← ↑
 άπλές μονάδες ← ↑

2) 'Ο αριθμός 805 ν' αποτελείται από 8 0 5
 εκατοντάδες ← ↑ ↑
 δεκάδες ← ↑
 άπλές μονάδες ← ↑

Εδώ παρατηρούμε, πώς ό μηδέν στόν αριθμό 805, παρόλο ότι παρασταίνει μηδέν δεκάδες, ώστόσο δέν παραλείπεται, γιατί έτσι μόνον ό 8 θά κατέχει τήν τρίτη θέση, δηλαδή τή θέση τών εκατοντάδων. Ένώ αν παραλείπαμε τόν μηδέν, τότε ό 8 θά θρισκόταν στή δεύτερη θέση, όπου είναι ή θέση τών δεκάδων. Δηλαδή θά ήταν 85.

"Όπως φαίνεται από τά παραπάνω παραδείγματα, κάθε ψηφίο του αριθμού έχει δύο αξίες:

1) Τήν **άξία θέσεως** μέσα στόν αριθμό. Δηλαδή: Στην πρώτη

από τὰ δεξιά θέση νά παρασταίνοι ἀπλές μονάδες. Στή δεύτερη από δεξιά πρὸς τ' ἀριστερά θέση νά παρασταίνοι δεκάδες. Στὴν τρίτη από δεξιά πρὸς τ' ἀριστερά θέση νά παρασταίνοι ἑκατοντάδες, καί

2) Ἐχει τὴν **ἀπόλυτη ἀξία**, πού εἶναι ἡ ἀριθμητικὴ τοῦ ἀξία. π.χ. στὸν ἀριθμὸ 222 ὁ 2 ἔχει ἀπόλυτη ἀξία 2 καὶ ἀξία θέσεως, στὴν πρώτη από τὰ δεξιά θέση 2 ἀπλές μονάδες, στή δεύτερη, πάντα από δεξιά, 2 δεκάδες καὶ στὴν τρίτη 2 ἑκατοντάδες.

Βλέπετε; ♦

Ἡ θέση στὸν ἀριθμὸ καθενὸς από τὰ ψηφία 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, καὶ 9 προσδιορίζει καὶ τὸ μέγεθος τοῦ ἀριθμοῦ.

Μέ τὴν παραπάνω συμφωνία γράφουμε κατὰ σειρά τὰ ψηφία τῶν διαφόρων μονάδων τοῦ ἀριθμοῦ ἀπὸ ἀριστερά πρὸς τὰ δεξιά, χωρὶς νά εἶναι ἀνάγκη νά σημειώνουμε στό καθένα τὸ εἶδος τῶν μονάδων.

Παραδείγματα:

1. Ἄντι τοῦ: 4 ἑκατοντάδες καὶ 7 δεκάδες καὶ 0 μονάδες ἢ 4E καὶ 7Δ καὶ 0M, γράφουμε: 470.

2. Ἄντι τοῦ: 3 χιλιόμετρα = 3 χιλιάδες μέτρα, γράφουμε: 3.000 μ.

3. Νά ἀναλυθοῦν στίς μονάδες τῶν διαφόρων τάξεων οἱ ἀριθμοί: 374 καὶ 604.

Ἀπάντηση:

$$3E + 7Δ + 4M = 374$$

$$6E + 0Δ + 4M = 604$$

4. Νά βρεῖτε τοὺς ἀριθμοὺς πού ἀντιπροσωπεύουν οἱ ἐκφράσεις:

α). $2E + 0Δ + 3M$

β). $3E + 0Δ + 2M$

γ). $5Δ + 0Δ + 0M$

Απάντηση:

α). $2E + 0Δ + 3M = 203$

β). $3E + 0Δ + 2M = 302$

γ). $5Δ + 0Δ + 0M = 500$

Προβλήματα:

- Νά αναλυθούν στις μονάδες διαφόρων τάξεων οι αριθμοί:
18, 79, 120, 408, 500, 196, 666, 999.
- Νά βρείτε τους αριθμούς που αντιπροσωπεύουν οι εκφράσεις:
 $3Δ + 2M$
 $2E + 6Δ + 4M$
 $5E + 0Δ + 0M$
 $9E + 6Δ + 9M$
- Ένας αριθμός είναι τριψήφιος. Ποιάς τάξεως μονάδες παρασταίνει το πρώτο ψηφίο από αριστερά;
- Πόσες δεκάδες υπάρχουν στην εκατοντάδα;
- Πόσες εκατοντάδες υπάρχουν στη χιλιάδα;
- Γράψτε τό $500 + 50 + 5$ σέ άπλή μορφή.
Τί δηλώνουν τά τρία 5 στον αριθμό που έχετε γράψει σέ άπλή μορφή;
- Σκεφθείτε τον αριθμό 77. Ποιά είναι ή σημασία του αριστερού 7, καί ποιά ή σημασία του δεξιού 7;
- Σκεφθείτε τον αριθμό 556. Ποιά ή σημασία καθενός από τά 5;
- Οι αριθμοί: 20 καί ο αριθμός 2, έχουν τό ψηφίο 2.
Ποιά ή σημασία κάθε 2;
- Οι αριθμοί 54 καί 45 έχουν τά ίδια ψηφία. Ποιά ή σημασία των ψηφίων 5 καί 4 στους αριθμούς;
- Στή γραφή των αριθμών 683 καί 386 χρησιμοποιούνται τά ίδια ψηφία.
Ποιά ή αιτία που οι αριθμοί έχουν διαφορετική άξια;
- Ο αριθμός 767 έχει μόνο δύο διάφορα ψηφία. Έχουν τά δύο 7 τήν ίδια σημασία;
- Αν αλλάξετε τή θέση των ψηφίων, 3 καί 7 στον αριθμό 973, θά πάρετε μικρότερο ή μεγαλύτερο αριθμό;
- Όμοια αν αλλάξετε τή θέση των ψηφίων 9 καί 7 στον αριθμό 970, θά πάρετε αριθμό μικρότερο ή μεγαλύτερο;
Δικαιολογείστε τίς απαντήσεις σας.
- Οι Όλυμπιακοί άγώνες άρχισαν στην Όλυμπία τό 776 π.Χ.
Ποιό από τά δύο 7 έχει τή μεγαλύτερη άξια καί γιατί;
- Διαβάστε τον αριθμό 101. Πώς άπαγγέλλεται καθένα από τά 1;
- Διαβάστε τον αριθμό 67. Πώς άπαγγέλλεται ο 6 καί πώς ο 7;

22. Διαβάστε τόν αριθμό 709. Πώς απαγγέλεται ό 9 καί πώς ό 7; καί πώς ό μηδέν;
23. Στόν αριθμό 700, άφού δέν υπάρχουν δεκάδες καί μονάδες, γιατί δέν παραλείπονται τά μηδενικά;
24. Φανταστείτε τόν αριθμό 507. Ποιά ή σημασία τοῦ μηδενός; Άφού ό αριθμός δέν έχει δεκάδες, γιατί δέν παραλείπεται ό αριθμός μηδέν;
25. Ό Κώστας σκέφθηκε, ότι στόν αριθμό 120 δραχμές, δέν υπάρχει λόγος-νά γραφτεί τό μηδέν, γιατί δέν αντιπροσωπεύει τίποτα. Έτσι έγραψε 12. Έγραψε σωστά ή λάθος καί γιατί;

Βλέπετε; ♣

Τό ψηφίο μηδέν (0) πού γράφεται μέσα στόν αριθμό, κρατά τ' άλλα ψηφία στή σωστή τους θέση καί δηλώνει ότι λείπουν οι μονάδες τής θέσεως πού κατέχει.




Είκ. 13. «Ή κόρη μας θάζει κάτω τά άγόρια στήν αριθμητική».

8. Γνωρίζετε:

Πώς διαμορφώθηκε τό δεκαδικό σύστημα ἀριθμῆσεως;

Τό σχέδιο πού ἀκολουθεῖ, εἰκονίζει τόν παλαιό ἄνθρωπο, σέ μιά προσπάθεια νά ἀπαντήσῃ στήν ἐρώτηση πόσα;



Εἰκ. 14.


“Ὅπως βλέπετε ἀντιστοιχοῦσε σέ κάθε δάχτυλο τοῦ χεριοῦ του καί ἓνα βέλος. Κι ἂν τά βέλη ἦταν περισσότερα ἀπό τά δάχτυλά του π.χ. κατά ὀκτώ, ἔδειχνε ὄλα τά δάχτυλα καί τῶν δυό χεριῶν του καί σέ συνέχεια ἔδειχνε πάλι ἄλλα ὀκτώ δάχτυλα. Αὐτό πού λέμε σήμερα δέκα ὀκτώ.

Ἐδῶ λοιπόν βλέπουμε, ὅτι τό πρῶτο ἀριθμητικό βοήθημα τοῦ ἀνθρώπου ἦταν τά δάχτυλα τῶν χεριῶν του. Αὐτά σχηματίζουν ἓνα πρότυπο, ἀξιοσημειωτο καί ἀπλό σύνολο πού σ' αὐτό ἀντιστοιχεῖ ὁ ἀριθμός δέκα. Μέ τό σύνολο αὐτό διαμορφώθηκε πιθανόν καί τό δεκαδικό μας σύστημα ἀριθμῆσεως.

9. Δεκαδική ἀρίθμηση στά ρολόγια πού μετροῦν τήν κατανόληση ρεύματος καί νεροῦ:

Παρακάτω εἰκονίζεται τό «καντράν» ἑνός ἠλεκτρικοῦ με-

τρητή της Δ.Ε.Η. Αυτό αριθμεί την κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος.



Εικ. 15

Η λειτουργία του βασίζεται στην παρακάτω αρχή.

1. Τό «καντράν» πού σημειώνεται με 1 αριθμεί τις μονάδες.
2. Τό καντράν πού σημειώνεται με 10 αριθμεί τις δεκάδες.

Δηλαδή όταν ο δείκτης του 1 κάνει μία ολόκληρη στροφή, ο δείκτης του 10 μετατοπίζεται κατά έναν αριθμό.

3. Τό καντράν 100 αριθμεί τις εκατοντάδες. Δηλαδή όταν ο δείκτης πού σημειώνει τις δεκάδες, κάνει έναν ολόκληρο γύρο, ο δείκτης των εκατοντάδων μετατοπίζεται κατά έναν αριθμό. "Όμοια καί γιά τά άλλα «καντράν».

4. Όταν πρόκειται νά διαβάσουμε την κατανάλωση, αρχίζουμε από τό άριστερό «καντράν» πρós τά δεξιά, καί διαβάζουμε τό μικρότερο αριθμό, όταν ο δείκτης βρίσκεται ανάμεσα σέ δύο αριθμούς. Στο καντράν της εικόνας, ή κατανάλωση είναι 558.

Προβλήματα:


26. Πόσα ψηφία έχει ένας αριθμός άν τό πρώτο από τ' άριστερά ψηφίο εκφράζει εκατοντάδες;
26. Πόσοι μονοψηφιοί αριθμοί υπάρχουν;
27. Πόσοι τριψηφιοί αριθμοί υπάρχουν, ανάμεσα στον 100 καί 200, πού τό ψηφίο των εκατοντάδων τους είναι 1;
29. Πόσοι διψηφιοί αριθμοί υπάρχουν, πού τό ψηφίο των δεκάδων είναι 4;

10. Συγκεκριμένοι αριθμοί

Ἡ μητέρα αγόρασε σήμερα ἀπὸ τὴν ἀγορὰ: 2 κιλά λαχανικά, 1 κιλό κρέας, 3 πακέτα μακαρόνια καὶ 8 αὐγά.

Ἐδῶ βλέπουμε πῶς οἱ ἀκέραιοι ἀριθμοὶ πού χρησιμοποιοῦμε γιὰ νὰ περιγράψουμε τὰ ψώνια τῆς μητέρας, δὲ φανερώνουν μόνο τὸ **πλῆθος** τῶν μονάδων τῶν εἰδῶν πού αγόρασε ἡ μητέρα, ἀλλὰ καὶ τὸ **εἶδος** τῶν μονάδων.

Οἱ ἀριθμοὶ αὐτοὶ ὀνομάζονται **συγκεκριμένοι**.



Εἰκ. 16

11. Ἀφηρημένοι ἀριθμοί

Στὸ μάθημα τῆς ὠδικῆς γιὰ νὰ ἀρχίσουν ὅλοι μαζί οἱ μαθητές ἡ δασκάλα δίνει τὸ σύνθημα: 1, 2, 3.

Ἐδῶ βλέπουμε πῶς οἱ ἀριθμοὶ 1, 2, 3 πού χρησιμοποιεῖ ἡ δασκάλα γιὰ ν' ἀρχίσει τὸ τραγούδι δὲ δηλώνουν κανένα εἶδος μονάδων. Τοὺς ἀριθμοὺς αὐτοὺς τοὺς λέμε **ἀφηρημένους**.

Βλέπετε; ♣

Οι αριθμοί που δηλώνουν τό είδος των μονάδων που αντιπροσωπεύουν, λέγονται **συγκεκριμένοι** και αυτοί που δέ δηλώνουν κανένα είδος μονάδων, λέγονται **άφηρημένοι**.

Προβλήματα:

30. Από τούς παρακάτω αριθμούς ποιοί είναι οί συγκεκριμένοι και ποιοί οί άφηρημένοι;
5 τετράδια, 8 μολύβια, 20 αυτοκίνητα, 7, 8, 15.
31. Γράψτε δύο συγκεκριμένους και δύο άφηρημένους αριθμούς.

12. Όμοιιδείς και έτεροειδείς αριθμοί

1. Η αίθουσα διδασκαλίας έχει 2 παράθυρα από δεξιά και 3 παράθυρα από άριστερά.
2. Η τάξη μου έχει 20 αγόρια και 12 κορίτσια.
Στό πρώτο παράδειγμα που οί αριθμοί αναφέρονται στό ίδιο πράγμα (είδος) λέγονται **όμοιιδείς**.
Στό δεύτερο παράδειγμα, που αναφέρονται σέ διαφορετικά πράγματα (είδη) λέγονται **έτεροειδείς**.

Προβλήματα:

32. Γράψτε δύο όμοιιδείς και δύο έτεροειδείς αριθμούς.
33. Από τούς αριθμούς: 11 βιβλία, 7 τετράδια, 3 αυτοκίνητα Φιάτ, 6 αυτοκίνητα Φόρντ, 18 βιβλία μαθηματικών, 6 πρόχειρα τετράδια, ποιοί είναι όμοιιδείς και ποιοί έτεροειδείς;
34. Νά συμπληρώσετε τίς τελείες μέ λέξεις, ώστε οί αριθμοί νά γίνουν:
1) όμοιιδείς και 2) έτεροειδείς.
5, 8, 7, 6

13. Άξιοσημείωτα σύνολα αριθμών

1. Φυσική σειρά των αριθμών. Άκέραιοι αριθμοί.

Οί άφηρημένοι αριθμοί: 1, 2, 3, ...

αποτελοῦν μία διάταξη μέ τή σειρά πού δίνονται, πού λέγεται: **φυσική σειρά τῶν ἀριθμῶν.**

Τό χαρακτηριστικό αὐτῆς τῆς σειράς εἶναι, ὅτι ἀρχίζει ἀπό τόν ἀριθμό 1 καί συνεχίζεται πρὸς τά δεξιὰ χωρίς τελειωμό. Καί ὁ ἀριθμός πού προηγείται ἔχει μία μονάδα λιγότερη ἀπό αὐτόν πού ἀκολουθεῖ.

Δηλαδή: $1, 2 = 1 + 1, 3 = 2 + 1, 4 = 3 + 1, \dots$

2. Σύνολο ἀκεραίων ἀριθμῶν:

Οἱ ἀφηρημένοι ἀριθμοί:

0, 1, 2, 3, ...

ἀποτελοῦν τό σύνολο τῶν **ἀκεραίων** ἀριθμῶν τῆς ἀριθμητικῆς.

14. Ἄλλα εἶδη ἀκεραίων ἀριθμῶν

1. Ἄρτιοι (ζυγοί) ἀριθμοί:

Οἱ ἀκέραιοι ἀριθμοί πού ἔχουν γιά τελευταῖο ψηφίο:

2, 4, 6, 8, καί 0

ὀνομάζονται ἄρτιοι ἢ ζυγοί ἀριθμοί.

Δεχόμαστε καί τόν ἀκέραιο ἀριθμό μηδέν (0) σάν ἄρτιο.

2. Περιττοί ἀριθμοί:

Οἱ ἀκέραιοι ἀριθμοί πού ἔχουν γιά τελευταῖο ψηφίο:

1, 3, 5, 7, καί 9

ὀνομάζονται περιττοί ἀριθμοί.

Προβλήματα:

35. Γράψτε ὅλους τούς ἄρτιους μεταξύ 20 καί 30.

36. Γράψτε ὅλους τούς περιττούς μεταξύ 9 καί 17.


37. Ἡ Μαρία εἶχε μία σακουλίτσα μέ καραμέλες. Ἀπό αὐτές ἔδωσε ἴσο ἀριθμό σέ καθένα ἀπό τά δύο ἀδέρφια τῆς καί τῆς ἔμεινε μία καραμέλα.

Ὁ ἀριθμός πού φανερώνει πόσες καραμέλες εἶχε ἡ σακουλίτσα εἶναι ἄρτιος ἢ περιττός;

38. Ἀπό τούς ἀκεραίους 0, 1, 2, ..., 15

Πόσοι εἶναι σέ πλῆθος οἱ ἄρτιοι (ζυγοί) καί πόσοι οἱ περιττοί καί ποιοί εἶναι οἱ περισσότεροι;


39. Τί διαφέρει τό σύνολο τῶν φυσικῶν ἀπό τό σύνολο τῶν ἀκεραίων ἀριθμῶν;



Εικ. 17. «Δέν είναι καί τόσο κουτός στήν ἀριθμητική. Ὑπολόγισε ἀκριβῶς, πόσες ὥρες μαθημάτων μένουσ ὡς τίς διακοπές».

15. Σύγκριση ἀκεραίων ἀριθμῶν

Ἴσοι ἀκέραιοι ἀριθμοί. Διάφοροι ἀριθμοί.



Εικ. 18

Οι συλλογές πού εικονίζονται, έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Έχουν τό ίδιο πλήθος αντικειμένων:

Ο αριθμός τών δαχτύλων είναι ίσος μέ τούς αριθμούς πού εκφράζουν: τά καθίσματα, τά φλυτζάνια καί τά βιβλία.

Είναι φανερό πώς κι οι αριθμοί πού εκφράζουν τό πλήθος τών αντικειμένων τών συλλογών αύτών, έχουν τό ίδιο πλήθος μονάδων.

Οί αριθμοί, πού έχουν τό ίδιο πλήθος μονάδων, λέγονται **ίσοι αριθμοί**. π.χ. Ο αριθμός τών δαχτύλων τής εικόνας είναι ίσος μέ τόν αριθμό τών καθισμάτων κι αύτός ίσος μέ τόν αριθμό τών φλυτζανιών καί τών βιβλίων.

Τό σύμβολο πού χρησιμοποιούμε γιά νά δηλώσουμε ισότητα είναι: (=), πού διαβάζεται: «είναι ίσον μέ...».

Βλέπετε; ♣


“Ισοί είναι οι αριθμοί πού έχουν τό ίδιο πλήθος μονάδων.

Όταν δύο αριθμοί δέν είναι ίσοι, λέμε ότι είναι **διάφοροι**. Αυτό συμβολίζεται: $5 \neq 6$ καί διαβάζεται: «ό 5 είναι διάφορος τού 6».

16. Παρατηρήσεις

Παρατηρήστε τήν παρακάτω εικόνα κι εξηγήστε τίς παρακάτω προτάσεις:

1. Υπάρχουν τόσα παιδιά όσα καί τά τετράδια;
2. Υπάρχουν λιγότερα παιδιά από τά μολύβια;
3. Υπάρχουν περισσότερα παιδιά από τά στυλό;
4. Σέ ποιά σχέση βρίσκονται οι αριθμοί πού προσδιορίζουν τά παραπάνω σύνολα;
5. Κάνετε καί σεις συγκρίσεις μέ αντικείμενα τής εικόνας.




Εικ. 19

17. Άνιστοι άκέραιοι άριθμοί.

Παρακάτω εικονίζεται μία συλλογή από γυάλες και μία συλλογή από έτικέτες.

Βλέπουμε ότι σέ κάθε γυάλα άντιστοιχεί μία έτικέτα, και μάς περισσεύουν και έτικέτες.



Εικ. 20. Ο άριθμός τών γυαλιών είναι μικρότερος του άριθμού τών έτικετών.

Μέ άλλα λόγια οι συλλογές δεν έχουν τό ίδιο πλήθος αντικειμένων. Είναι φανερό ότι και οι αριθμοί που εκφράζουν τό πλήθος τών αντικειμένων τών συλλογών αὐτῶν δεν έχουν τό ίδιο πλήθος μονάδων. Οι αριθμοί που δεν έχουν τό ίδιο πλήθος μονάδων ὀνομάζονται ἄνισοι αριθμοί.

Βλέπετε; ▶

Οι αριθμοί που δεν έχουν τό ίδιο πλήθος μονάδων, λέγονται ἄνισοι αριθμοί. Καί ἀπό δύο αριθμούς, αὐτός που έχει τίς λιγότερες μονάδες, λέγεται μικρότερος τοῦ ἄλλου.

Σῶς θυμίζουμε ἀκόμα πῶς ἀπό δύο ἄνισους ἀκέραιους ἀριθμούς, ὁ μικρότερος πρόηγεῖται στή φυσική σειρά τών ἀριθμῶν: 1, 2, 3, ...

Παραδείγματα:

Ὁ 5 εἶναι μικρότερος ἀπό τόν 8, γιατί στή φυσική σειρά τών ἀριθμῶν: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ... ὁ 5 γράφεται πρῖν ἀπό τό 8. Συμβολικά τό παρασταίνουμε: $5 < 8$.

Τό σύμβολο $<$ διαβάζεται: εἶναι μικρότερος τοῦ...

Ὅμοια: $8 > 5$

Τό σύμβολο $>$ διαβάζεται: εἶναι μεγαλύτερος τοῦ...

Οἱ γραφές: $8 > 5$

$5 < 8$

Ὄνομάζονται ἄνισότητες.

Προβλήματα:

40. Γράψτε ὅλους τοὺς ἀριθμούς, που εἶναι μικρότεροι τοῦ 4.
 41. Γράψτε ὅλους τοὺς ἀριθμούς που εἶναι μεγαλύτεροι τοῦ 6 ἀλλά μικρότεροι τοῦ 9.
 42. Ὑπάρχει ἀριθμός μεγαλύτερος τοῦ 7 καί μικρότερος τοῦ 6;
 43. Νά βρεῖτε ἕναν ἀριθμό που νά μὴν εἶναι ἴσος μέ τόν 7.
- Ὁ ἀριθμός που χρησιμοποίησατε εἶναι μεγαλύτερος ἢ μικρότερος τοῦ 7;

Χρησιμοποιείστε τα σύμβολα $<$ ή $>$.

44. Ἡ Κατίνα εἶπε: «Μαρία ἔχω 5 κούκλες». Ἡ Μαρία ἀπάντησε: «Ἐχω περισσότερες κούκλες ἀπὸ σένα, ἀλλὰ σέ ἀριθμὸ μικρότερο ἀπὸ 7». Νά βρεῖτε πόσες κούκλες εἶχε ἡ Μαρία.
45. Πόσοι ἀριθμοὶ ὑπάρχουν μεγαλύτεροι τοῦ μηδενός καὶ μικρότεροι τοῦ 2;
46. Νά γραφοῦν ὅλοι οἱ διψήφιοι ἀριθμοὶ, οἱ μικρότεροι τοῦ 69 πού βρίσκονται μὲ τὴν ἐξῆς συμφωνία: Τὸ ψηφίο τῶν δεκάδων νά εἶναι κατὰ μονάδα μεγαλύτερο ἀπὸ τὸ ψηφίο τῶν μονάδων.
47. Ποιὸς ὁ μικρότερος ἀκέραιος μὲ 2 ψηφία; καὶ ποιὸς μὲ 3;
48. Ποιὸς ὁ μεγαλύτερος ἀκέραιος μὲ 2 ψηφία; καὶ ποιὸς μὲ 3;
49. Ποιὸς εἶναι ὁ πῖο μεγάλος ἀριθμὸς πού μπορεῖτε νά παρουσιάσετε μὲ τὴ χρήση τῶν παρακάτω ψηφίων, μὲ τὴ συμφωνία ὅτι κάθε ψηφίο θά τὸ χρησιμοποιήσετε μιά καὶ μόνον φορά.
2, 3 1, 0, 4, 3, 0, 5

Προβλήματα ἐπαναλήψεως:

50. Πόσους διψήφιους ἀριθμούς μποροῦμε νά γράψουμε μὲ τὰ ψηφία 7 καὶ 8. Νά τοὺς βάλετε κατὰ σειρά μεγέθους μὲ τὴ χρήση τοῦ κατάλληλου συμβόλου.
51. Πόσους τριψήφιους ἀριθμούς μποροῦμε νά γράψουμε μὲ τὰ ψηφία 4, 3, 5; Νά τοὺς βάλετε κατὰ σειρά μεγέθους.
52. Γράψτε τὸ μεγαλύτερο ἀκέραιο, ἀφοῦ χρησιμοποιήσετε μόνο μιά φορά τὰ ψηφία: 1 καὶ 9
53. Γράψτε τὸ μικρότερο τριψήφιο ἀκέραιο, ἀφοῦ χρησιμοποιήσετε τὰ ψηφία: 6, 0 καὶ 1 μόνο μιά φορά.
54. Γράψτε τὸ μεγαλύτερο καὶ ὕστερα τὸ μικρότερο ἀκέραιο, ἀφοῦ χρησιμοποιήσετε μόνο ἀπὸ μιά φορά τὰ ψηφία: 8, 0 καὶ 9.
55. Σημειώστε στοὺς παρακάτω ἀριθμούς τὴν ἀξία θέσεως κάθε ψηφίου του: 156, 324, 617, 304.
56. Ποιά εἶναι ἡ ἀξία θέσεως τοῦ ψηφίου 1 στὶς παρακάτω περιπτώσεις: 71, 174, 11, 100, 19.
57. Ποιά εἶναι ἡ σημασία τοῦ ἀριθμοῦ μηδέν (0) στοὺς ἀριθμούς: 301, 200, 120.
58. Ὁ 400 ἔχει: ἑκατοντάδες, δεκάδες, μονάδες.
59. Μεταξὺ τῶν ἀριθμῶν 20 καὶ 30, πόσοι ἀριθμοὶ γράφονται μὲ δύο διάφορα ψηφία;

18. Κάνετε αυτοεξέταση

Στήν αριστερή στήλη σημειώνουμε τούς όρους, καί στή δεξιά τή σημασία τους. Ἀφοῦ αντιγράψετε στό τετράδιό σας σέ μία στήλη τούς ἀριθμούς ἀπό 1 ἕως τό 10, νά γράψτε δίπλα τό γράμμα πού ἀντιπροσωπεύει τήν ὀρθή ἀπάντηση στή δεξιά στήλη.

- | | |
|---|---|
| 1. Ἀριθμός | α. Εἶναι τό σύνολο: 1, 2, 3, 4, ... |
| 2. Ἀπαρίθμηση τῶν πραγμάτων μιᾶς συλλογῆς | β. Ποσοτική ἔννοια. |
| 3. Ἴσοι ἀκέραιοι | γ. Ἡ ἐργασία πού γίνεται γιά τήν εὔρεση τοῦ ἀριθμοῦ, πού δηλώνει τό πλήθος τῶν πραγμάτων μιᾶς συλλογῆς. |
| 4. Ἄνισοι ἀκέραιοι | δ. Ὅσοι ἔχουν τό ἴδιο πλήθος μονάδων. |
| 5. Συγκεκριμένοι ἀριθμοί | ε. Ὅσοι μετροῦν ὁμοειδή ποσά. |
| 6. Ἀφηρημένοι ἀριθμοί | στ. Ὅσοι συνοδεύονται ἀπό τό εἶδος τῶν μονάδων τους. |
| 7. Ὅμοιοειδείς ἀριθμοί. | ζ. Ὅσοι δέν δηλώνουν κανένα εἶδος μονάδων. |
| 8. Φυσικοί ἀριθμοί. | η. Εἶναι τό σύνολο: 0, 1, 2, 3, 4... |
| 9. Ἀκέραιοι ἀριθμοί. | θ. Οἱ ἀριθμοί πού ἀριθμοῦν συλλογές, πού δέν ἔχουν τό ἴδιο πλήθος πραγμάτων. |
| 10. Ἐτεροειδείς ἀριθμοί | ι. Ὅσοι μετροῦν ἕτεροειδή ποσά. |

Βαθμός ἐπιτυχίας = (Πλήθος ὀρθῶν ἀπαντήσεων) × 4.

Ποῦ κατατάσσεστε	Ἄριστα	Καλά	Μέτρια	Ὄχι ικανοποιητικά
	40 - 34	34 - 26	26 - 20	κάτω ἀπό 20

19. Γιά νά θυμηθεῖτε τό λεξιλόγιό σας

Στήν ἀριστερή στήλη γράφουμε τούς ὅρους καί τά σύμβολα, καί στή δεξιά τούς κανόνες.

Ἄφου ἀντιγράψετε στό τετράδιό σας τούς ἀριθμούς ἀπό 1 ἕως 8 σέ μιά στήλη, γράψτε δίπλα σέ κάθε ἀριθμό τό γράμμα τῆς δεξιᾶς στήλης, ποῦ ἀντιστοιχεῖ στήν ὀρθή ἀπάντηση.

- | | |
|--|---|
| 1. > | α. Ἡ θέση τοῦ ψηφίου μέσα στόν ἀριθμό |
| 2. ἀριθμός | β. Γιά νά δηλωθεῖ ὅτι δέν ὑπάρχουν μονάδες μιᾶς τάξεως. |
| 3. ἀξία θέσεως ψηφίου | γ. Πολλαπλασιασμό μέ τόν 10 |
| 4. χρήση τοῦ μηδενός | δ. Εἶναι μεγαλύτερος τοῦ... |
| 5. < | ε. Εἶναι μικρότερος τοῦ... |
| 6. = | στ. Εἶναι ἴσος μέ... |
| 7. μετάθεση ψηφίου σέ ἀριθμό μιά θέση πρὸς τά ἀριστερά σημαίνει: | ζ. Τά 10 δάχτυλα τῶν χειρῶν τοῦ ἀνθρώπου |
| 8. ἀρχή τοῦ δεκαδικοῦ συστήματος ἀριθμῆσεως | η. Ἡ ἔννοια μέ τήν ὁποία ὀρίζουμε μιά ποσότητα. |

$$\text{Βαθμός ἐπιτυχίας} = (\text{πλήθος ὀρθῶν ἀπαντήσεων}) \times 4$$

Ποῦ κατατάσσεστε;	Ἄριστα	Καλά	Μέτρια	Ὄχι ικανοποιητικά
	32 - 28	28 - 24	24 - 20	κάτω ἀπό 20

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο

Πρόσθεση
Αφαίρεση
Πολλαπλασιασμός
Διαίρεση
Πώς θα λύσω
ένα πρόβλημα

Οι τέσσερις αριθμητικές πράξεις

20. Οι αριθμοί μέχρι τό 1000

Όταν μās δοθοῦν δύο ή και περισσότεροι αριθμοί, μπορούμε απ' αυτούς νά κατασκευάσουμε άλλους μέ τέσσερις τρόπους, πού τούς λέμε **αριθμητικές πράξεις** και έχουν τά ονόματα: **Πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός και διαίρεση**. Στά παρακάτω θά αναπτύξουμε τίς πράξεις αυτές αρχίζοντας από τήν εύκολότερη, τήν πρόσθεση.

Πρόσθεση

21. Άθροισμα αριθμῶν

ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΕΤΕ
ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

$$\begin{array}{r} 25 \\ \text{προσθετέοι:} \quad +17 \\ \hline \text{ἄθροισμα:} \quad 42 \end{array}$$



Εικ. 21

25 μαθητές της τετάρτης τάξεως και 17 μαθητές της πέμπτης, ανέβηκαν στο λεωφορείο, για να πάνε εκδρομή. Πόσοι είναι όλοι οι μαθητές, που ανέβηκαν στο λεωφορείο;

Αριθμούμε τους μαθητές που είναι μέσα στο λεωφορείο και τους βρίσκουμε 42.

Ο αριθμός 42 μαθητές λέγεται **άθροισμα** των αριθμών 25 μαθητές και 17 μαθητές, που λέγονται **προσθετέοι**.

Η πράξη με την οποία βρίσκουμε το άθροισμα, λέγεται **πρόσθεση**.

Την πρόσθεση σημειώνουμε με το σύμβολο (+), που διαβάζεται: **και ή σύν**.

Γράφουμε δηλαδή: 25 μαθητές + 17 μαθητές = 42 μαθητές.

Ή με άφηρημένους αριθμούς: $25 + 17 = 42$.

Βλέπετε; ♣

Στην πρόσθεση δίδονται **δύο** αριθμοί και απ' αυτούς ζητάμε να βρούμε έναν τρίτο αριθμό, που να περιέχει μόνο τις μονάδες των δύο αριθμών.

Με την παραπάνω ιδιότητα η πρόσθεση χαρακτηρίζεται σαν μία **διμελής** πράξη.

Τους αριθμούς 5 θρανία και 4 βιβλία **δέν** μπορούμε να τους προσθέσουμε, γιατί **δέν** είναι **όμοιοι**.

Μέ άλλα λόγια στην πρόσθεση, όταν οι προσθετέοι είναι συγκεκριμένοι, οφείλουν να είναι και **όμοιοι**.

Άσκηση:


60. Να κατασκευάσετε στο τετράδιό σας ένα σχήμα όπως το παρακάτω που να έχει 12 θυρίδες. Μετά στην πρώτη γράψτε το 0, στη δεύτερη το 1, και σε συνέχεια να συμπληρώνετε τις θυρίδες με το άθροισμα των αριθμών των δύο προηγούμενων θυρίδων.

0	1										
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

22. Πρόσθεση περισσότερων από δύο αριθμῶν.

Πρόβλημα:

Στὴ γιορτὴ τοῦ Νίκου, ὁ πατέρας τοῦ ἀγόρασε ἓναν κουμπάρα. Γιά νά τόν «ἀσημώσουν» τὰ τέσσερα ἀδέρφια του, τοῦ ἔρριξαν, ὁ πρῶτος 3 δραχμές, ὁ δεύτερος 7, ὁ τρίτος 8, καί ὁ τέταρτος 9 δραχμές. Πόσες δραχμές ἔχει ὁ κουμπάρας τοῦ Νίκου;



Εἰκ. 22

Γιά νά λύσουμε τὸ πρόβλημα αὐτό, θά κάνουμε πρόσθεση. Εἶπαμε ὅμως παραπάνω, πῶς στήν πρόσθεση παίρνουν μέρος μόνο δυὸ προσθετέοι, καί γι' αὐτὸ τὴν ὀνομάσαμε διμελὴ πράξη.

Τώρα παρουσιάζεται πρόβλημα μέ περισσότερους ἀπὸ δύο προσθετέους. Πῶς πρέπει νά ἐργαστοῦμε, γιά νά ὑπολογίσουμε τὸ ἄθροισμα:

$$3 + 7 + 8 + 9 = 27$$

Παρατηροῦμε, πῶς:

Βῆμα πρῶτο: $3 + 7 = 10$

Βῆμα δεύτερο: $\dots\dots 10 + 8 = 18$

Βῆμα τρίτο: $\dots\dots\dots 18 + 9 = 27$.

Στὴν πράξη, δηλαδὴ αὐτὴ κάνουμε συνεχεῖς προσθέσεις, παίρνοντας τοὺς ἀριθμοὺς δυό - δυό.

Πρακτικὰ ὅμως ἀκολουθοῦμε τὴ μέθοδο τοῦ **πηδήματος** ἀπὸ τόν ἓνα ἀριθμὸ στὸν ἄλλο.

Μέ ἄλλα λόγια τὸ μάτι πηδᾷ ἀπὸ τόν ἓνα ἀριθμὸ στὸν ἄλλο μέ **κανονικὸ ρυθμὸ**, καί λέμε:

$$\begin{array}{ccccccc} & 3 & + & 7 & + & 8 & + & 9 \\ & \underbrace{\hspace{1.5cm}} & & \underbrace{\hspace{1.5cm}} & & \underbrace{\hspace{1.5cm}} & & \\ \longrightarrow & 10 & & 18 & & 27 & & \end{array}$$

Γιά νά προσθέσουμε περισσότερους ἀπὸ δυὸ ἀριθμοὺς, προσθέτουμε τόν πρῶτο μέ τόν δεύτερο, τὸ ἄθροισμα μέ τόν τρίτο, τὸ νέο ἄθροισμα μέ τόν τέταρτο καί ἐξακολουθοῦμε μέ τὸν ἴδιο τρόπο, μέχρι νά ἐξαντληθοῦν ὅλοι οἱ προσθετέοι.

Άσκησης:

60. Νά κάνετε τις παρακάτω προσθέσεις με τη μέθοδο του πηδήματος και με προσπάθεια νά διατηρήσετε έναν κανονικό ρυθμό.

1. $8 + 5 + 3 + 8 + 5 + 7 + 9 + 3 = 58$

2. $7 + 4 + 2 + 9 + 5 + 4 + 1 + 6 = 38$

3. $6 + 5 + 1 + 3 + 7 + 8 + 4 + 6 = 40$

Μπορούμε νά κάνουμε πρόσθεση και με αντίθετη διεύθυνση. Από τὰ δεξιά πρὸς τ' ἀριστερά με τὸν ἴδιο κανονικὸ ρυθμὸ. Π.χ.

$$\begin{array}{cccccccc} 9 & + & 5 & + & 9 & + & 4 & + & 8 & + & 7 & + & 6 & + & 2 & + & 1 \\ \hline 51 & 42 & 37 & 28 & 24 & 16 & 9 & 3 \end{array}$$

Άσκησης:

61. Νά κάνετε τις παρακάτω προσθέσεις με τη μέθοδο του πηδήματος και με κανονικό ρυθμό αρχίζοντας ἀπὸ τὰ δεξιά πρὸς τ' ἀριστερά.

1. $6 + 8 + 5 + 9 + 7 + 8 + 5 + 3 = 41$

2. $7 + 9 + 3 + 6 + 9 + 8 + 6 + 8 = 57$

3. $4 + 7 + 9 + 2 + 8 + 4 + 5 + 9 = 51$

63. Νά κάνετε στὸ τετράδιό σας ἕνα σχῆμα, ὅπως τὸ παρακάτω πού νά ἔχει 9 θυρίδες. Στὴν πρώτη νά γράψετε τὸ 0, στὴ δεύτερη τὸ 1, καὶ στὴν τρίτη τὸ 2. Σέ συνέχεια γράψτε τὸν ἀριθμὸ πού βρίσκετε ἂν προσθέσετε τοὺς τρεῖς προηγούμενους ἀριθμοὺς.

0	1	2						
---	---	---	--	--	--	--	--	--

64. Ὅμοιο με 9 θυρίδες καὶ νά τοὺς προσθέσετε ἀνά τέσσερις.

1	1	2	3					
---	---	---	---	--	--	--	--	--

13. Ἡ τεχνικὴ τῆς προσθέσεως

Ὁ Νίκος εἶχε 308 γραμματόσημα Ἑλληνικά καὶ τοῦ ἔδωσε ὁ θεῖος του 173 Ἀμερικανικά, 78 Ἀγγλικά καὶ 235 διάφορα ἄλλα

γραμματόσημα. Πόσα γραμματόσημα έχει όλα όλα ο Νίκος;

Για νά βρούμε πόσα γραμματόσημα έχει όλα όλα ο Νίκος πρέπει νά βρούμε έναν αριθμό πού νά έχει τόσες μονάδες, όσες έχουν οι αριθμοί 308, 173, 78, και 235. Δηλαδή πρέπει νά τούς προσθέσουμε.

Άλλά για νά γίνει αυτό πρέπει νά θυμηθούμε, πώς οι αριθμοί σχηματίζονται από μονάδες διαφόρων τάξεων. Δηλ.: απλές μονάδες, δεκάδες, εκατοντάδες.

Γι' αυτό γράφουμε τούς αριθμούς τόν έναν κάτω από τόν άλλο έτσι, ώστε οι μονάδες νά είναι κάτω από τις μονάδες, οι δεκάδες κάτω από τις δεκάδες, και οι εκατοντάδες κάτω από τις εκατοντάδες. Καί εκτελούμε τήν πρόσθεση έτσι:

Ή πράξη γίνεται πρακτικά έτσι:

M	Δ	E
3	0	8
1	7	3
	7	8
2	3	5
7	9	4

308

173

+ 78

235

794

Άθροισμα: →

Πρώτο βήμα: Προσθέτουμε τούς αριθμούς στη στήλη τών μονάδων. Τό άθροισμα 24 αναλύεται σε δύο δεκάδες και τέσσερις μονάδες. Γράφουμε τις 4 μονάδες στη στήλη τών μονάδων, και «**κρατούμε**» τό 2 για τή στήλη τών δεκάδων.

Δεύτερο βήμα: Τό άθροισμα στη στήλη τών δεκάδων είναι 17 και 2 τό «**κρατούμενα**» 19 δεκάδες, πού αναλύονται σε μία εκατοντάδα και 9 δεκάδες. Γράφουμε τό 9 στη στήλη τών δεκάδων και «**κρατούμε**» 1 εκατοντάδα για τή στήλη τών εκατοντάδων.

Τρίτο βήμα: Τό άθροισμα στη στήλη τών εκατοντάδων είναι 6 εκατοντάδες και 1 τό «**κρατούμενο**» 7. Γράφουμε τό 7 στη στήλη τών εκατοντάδων.

Άπάντηση: Ό Νίκος έχει όλα - όλα 794 γραμματόσημα.

Όταν πρόκειται νά προσθέσουμε αριθμούς, τούς γράφουμε τόν έναν κάτω από τόν άλλο έτσι, ώστε οί μονάδες κάθε τάξεως νά βρίσκονται στην ίδια στήλη. Μετά προσθέτουμε αρχίζοντας από τή στήλη τών μονάδων καί προχωρούμε πρὸς τ' ἀριστερά γράφοντας στην κάθε στήλη τό ἄθροισμα τών μονάδων τῆς κάθε τάξεως. Προσέχουμε νά προσθέτουμε τό «κρατούμενο», ἂν ὑπάρχει, στή στήλη του.

Βλέπετε; ♦

Μαθαίνετε διασκεδάζοντας:

66. Οί φυσικοί αριθμοί πού εἶναι γραμμένοι στίς κυψέλες τών τετραγώνων ἔχουν τοποθετηθεῖ ἔτσι ὥστε: κάθε ὀριζόντια σειρά νά ἔχει τό ἴδιο ἄθροισμα, μέ τό ἄθροισμα κάθε κατακόρυφης στήλης· καί τό ἴδιο μέ τό ἄθροισμα κάθε διαγώνιας. Μπορεῖτε νά τό ἐπαληθεύσετε;

Τά τετράγωνα αὐτά λέγονται «μαγικά τετράγωνα»

4	55	34
61	31	1
28	7	58

76	11	156
161	81	1
6	151	86

Ἀσκήσεις:

65. Νά κάνετε τίς προσθέσεις ὀριζόντια καί κάθετα.

$$45 + 35 + 70 + 66 =$$

$$27 + 43 + 52 + 44 =$$

$$53 + 21 + 72 + 25 =$$

$$36 + 54 + 63 + 32 =$$

$$67 + 24 + 15 + 12 =$$


ΜΕΛΕΤΑΣ ΣΩΣΤΑ ΟΤΑΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΣ ΝΑ:

1. Εἶσαι μακριά ἀπό τηλεόραση καί συζητήσεις καί διαθέτεις ἄρκετό χρόνο.
2. Μελετᾶς προσεκτικά καί πάντοτε μέ χαρτί καί μολύβι.
3. Καταλαβαίνεις τά σύμβολα, τούς ὅρους καί ἐπεξηγηματικά παραδείγματα τοῦ μαθήματος.

23. Ιδιότητες της προσθέσεως

Πρώτη ιδιότητα. (Μεταθετική).

Στό διπλανό ντόμινο, αν προσθέσουμε τά σημεία καί τῶν δυό θυρίδων, αρχίζοντας από τά σημεία τῆς ἀριστερῆς θυρίδας, ἔχουμε:



Εικ. 23

$$4 + 5 = 9$$

Ἄν ἀρχίσουμε τήν πρόσθεση ἀπό τά σημεία τῆς δεξιᾶς θυρίδας, θά ἔχουμε:

$$5 + 4 = 9$$

Ἄπό τά παραπάνω βλέπουμε πῶς:

$$4 + 5 = 5 + 4$$

Μποροῦμε ν' ἀλλάξουμε τή σειρά τῶν δυό προσθετέων καί νά τοῦς προσθέσουμε μέ ὅποια σειρά θέλουμε χωρίς τό ἄθροισμα ν' ἀλλάξει.

Βλέπετε; ♦

Λέμε, τότε πῶς ἡ πρόσθεση ἔχει τή μεταθετική ιδιότητα.

Ἄσκήσεις (χωρίς χαρτί καί μολύβι)

66. Νά συμπληρωθοῦν οἱ ἐκφράσεις:

$$32 + 12 = 12 + \dots$$

$$70 + 90 = \dots + 70$$

$$11 + 17 = 17 + \dots$$

24. Δοκιμή τῆς προσθέσεως

Γιά νά κάνουμε τήν πράξη τῆς δοκιμῆς τῆς προσθέσεως, ἀκολουθοῦμε δυό τρόπους:

Πρώτος τρόπος.

Βασίζεται στην ιδιότητα της αντιμεταθέσεως. Άλλάζουμε τη σειρά των προσθετών και τους προσθέτουμε πάλι. Ή τους προσθέτουμε από τα πάνω προς τα κάτω και ύστερα από τα κάτω προς τα πάνω. Αν βρούμε τό ίδιο άθροισμα, λέμε πώς ή πράξη είναι σωστή.

Σήμερα έχουν διαδοθει ηλεκτρονικές αριθμομηχανές που κάνουν προσθέσεις χωρίς λάθος και πολύ σύντομα.

Δεύτερος τρόπος.

Συχνά γίνεται χρήση και της δοκιμής **μέ τον 9**.

Π.χ.

$$\begin{array}{r} 326 \\ 427 \\ \hline 753 \end{array} \rightarrow \begin{array}{l} 3 + 2 + 6 = 11 \\ 4 + 2 + 7 = 13 \\ 7 + 5 + 3 = 15 \end{array} \rightarrow \begin{array}{l} 1 + 1 = 2 \\ 1 + 3 = 4 \\ 1 + 5 = 6 \end{array} \downarrow$$

Πρέπει τά δυό άκραιο άθροίσματα: $2 + 4$ και $1 + 5$ νά συμφω-
νούν. Όπως έδω δίνουν άθροισμα τόν αριθμό 6.

Βλέπετε; ♦

Δοκιμή μιας πράξεως είναι μία άλλη πράξη ή και πράξεις, που κάνουμε για νά βεβαιω-
θούμε πώς ή πρώτη πράξη που κάναμε, εί-
ναι σωστή.

Α' Ασκήσεις και προβλήματα:

Νά κάνετε τίς παρακάτω προσθέσεις και τίς δοκιμές τους, αφού βά-
λετε τόν ένα κάτω από τόν άλλο.

- | | | |
|----------------------|---------------------|--------------------------------|
| 68. $845 + 56 + 4$ | 73. $432 + 12 + 8$ | 78. $109 + 801 + 6$ |
| 69. $362 + 89 + 8$ | 74. $809 + 53 + 7$ | 79. $119 + 210 + 4 + 87$ |
| 70. $349 + 101 + 11$ | 75. $33 + 309 + 6$ | 80. $104 + 5 + 106 + 7 + 108$ |
| 71. $811 + 11 + 4$ | 76. $612 + 16 + 5$ | 81. $121 + 120 + 9 + 122 + 23$ |
| 72. $409 + 3 + 6$ | 77. $328 + 607 + 4$ | 82. $222 + 23 + 224 + 225 + 3$ |

83. Πόσοι μαθητές φοιτούν στην τετάρτη τάξη, όταν στην τρίτη που είναι 23 λιγότεροι φοιτούν 31 μαθητές; Α

25. Πότε κάνουμε πρόσθεση

Μερικά προβλήματα της αριθμητικής περιέχουν λέξεις, πού μās λένε, πώς πρέπει νά κάνουμε πρόσθεση χωρίς ν' αναφέρεται ή λέξη: **Πρόσθεση.**

Οί ένδεικτικές λέξεις είναι: "Όλα όλα, έν όλψ, σύνολο, όλα μαζί κ.τ.λ.


Νά λύσετε τά παρακάτω προβλήματα βρίσκοντας τίς ένδεικτικές λέξεις.

Προβλήματα:

84. Είναι 218 χιλιόμετρα ή απόσταση Ἀθηνών - Λαμίας, 120 χιλιόμετρα Λαμία - Λάρισα καί 170 Λάρισα - Θεσσαλονίκη. Πόση είναι όλη ή απόσταση Ἀθηνών - Θεσσαλονίκης;
85. Όταν ό πατέρας του Νίκου έκανε ένα ταξίδι, ξόδεψε για μία μέρα: για φαγητό 205 δρχ., για εισιτήρια 199 δρχ. καί για μικροδαπάνες 35 δρχ. Πόσες δραχμές ξόδεψε όλες όλες;
- † 86. Ο θείος Κώστας για συντήρηση του αυτοκινήτου του αγόρασε μερικά νέα ανταλλακτικά καί πλήρωσε: για μπουζί 240 δραχμές, για πλατίνες 175 δραχμές, για φίλτρο λαδιού 118 δραχμές καί για φίλτρο άέρος 120 δραχμές. Πόσα ξόδεψε όλα όλα;
- † 87. Από ένα ντεπόζιτο νερό καταναλώθηκαν τήν πρώτη ήμέρα 255 κιλά νερό. Τή δεύτερη 209 κιλά καί τήν τρίτη 301 κιλά. Πόσα κιλά θέλει για νά ξαναγεμίσει τό ντεπόζιτο;
88. Ένας μαθητής χρωσάει σέ δυό συμμαθητές του τό ίδιο χρηματικό ποσό. Παρατηρεί, πώς άν μέ τά χρήματα πού έχει, ξοφλήσει τόν ένα θά του περισσεύουν καί 23 δραχμές. Καί πώς για νά ξοφλήσει καί τόν άλλο, του χρειάζονται άκόμα 17 δραχμές. Πόσες δραχμές είχε;

26. Ίδιότητα δεύτερη. (Του ουδέτερου στοιχείου)

Στό διπλανό ντόμινο, άν άθροίσουμε τά σημεία καί τών δυό θυρίδων, θά έχουμε: άν άρχίσουμε τήν πρόσθεση από τά σημεία τής άριστερης θυρίδας:



Εικ. 24

$$0 + 5 = 5$$

“Αν αρχίσουμε από τὰ σημεῖα τῆς δεξιᾶς θυρίδας θὰ ἔχουμε.

$$5 + 0 = 5$$

Βλέπετε; ♦

Ὁ ἀκέραιος ἀριθμὸς 0 σ' ὁποιοδήποτε ἀριθμὸ καὶ ἂν προστεθεῖ δὲν τὸν μεταβάλλει.

Ἀπὸ τὴν παραπάνω ιδιότητα, πού ἔχει ὁ ἀκέραιος ἀριθμὸς μηδέν, ὀνομάζεται **οὐδέτερο στοιχείο** στὴν πρόσθεση.

27. Ἰδιότητα τρίτη. (Προσεταιριστική)


Πρόβλημα:

Ἔχουμε τρία καλάθια μέ μήλα. Τὸ πρῶτο μέ 25 μήλα. Τὸ δεύτερο μέ 18, καὶ τὸ τρίτο μέ 42 μήλα. Πόσα μήλα ἔχουν καὶ τὰ τρία καλάθια μαζί;

Πρέπει νά βροῦμε τὸ ἄθροισμα:

$$25 + 18 + 42$$

Βλέπουμε πώς:



Εἰκ. 25

1) Ἄν ἀδειάσουμε σ' ἓνα τρίτο καλάθι, πρῶτα τὸ πρῶτο καὶ τὸ δεύτερο μαζί καὶ μετὰ τὸ τρίτο, θὰ ἔχουμε:

$$(25 + 18) + 42 = 85 \text{ μήλα.}$$

2) "Αν άδειάσουμε τό δεύτερο καί τό τρίτο μαζί καί μετά τό πρώτο, θά έχουμε:

$$(18 + 42) + 25 = 85 \text{ μ\η\lambda\alpha.}$$

Άπό αυτά συμπεραίνουμe πώς:

$$(25 + 18) + 42 = (18 + 42) + 25$$

Βλέπετε; †

Σέ μία πρόσθεση πολλών αριθμών, αν αλλάξουμε τή σειρά τών προσθετέων, τό άθροισμα δέν αλλάζει.

Παρατήρηση:

Στίς παραπάνω έκφράσεις γράψαμε: $(25 + 18)$, αντί του 43. Χρησιμοποιήσαμε δηλαδή τήν παρένθεση, γιά νά δηλώσουμε, ότι ή πράξη έχει γίνει. Τό ίδιο κάναμε καί πιό κάτω. Γράψαμε: $(18 + 42)$, αντί του 60. Όταν δηλαδή βάλουμε μερικούς προσθετέους μέσα σέ παρένθεση φανταζόμαστε πώς ή πράξη έχει γίνει.

Άσκήσεις:

89. Μπορείς νά βρεις ένα διψήφιο αριθμό, πού τό άθροισμα τών ψηφίων του νά είναι 8 καί τό ψηφίο τών δεκάδων του νά είναι επίσης 8;
90. Μπορείς νά βρεις έναν αριθμό πού τό άθροισμα τών ψηφίων του νά είναι 5 καί τό ψηφίο τών εκατοντάδων του νά είναι επίσης 5;

28. Άποτελέσματα τών ιδιοτήτων

Η μεταθετική καί ή προσεταιριστική ιδιότητα μπορούν νά μās βοηθήσουν νά υπολογίσουμε πιό γρήγορα ένα άθροισμα από πολλούς αριθμούς.

Παράδειγμα:

1ο). Πώς θά υπολογίσουμε γρήγορα τό παρακάτω άθροισμα, χωρίς νά βάλουμε τούς προσθετέους τόν ένα κάτω άπ' τόν άλλο;
 $28 + 35 + 2 + 15$

Μπορούμε νά εργαστούμε μέ τό νοῦ μας: $(28 + 2) + (35 + 15)$
 $= 30 + 50 = 80$

2ο). Παρόμοια μπορούμε νά εργαστούμε καί γιά τό ἄθροισμα:
 $17 + 11 + 2 + 23 + 29 + 18 = (17 + 23) + (11 + 29) + (2 + 18) =$
 $40 + 40 + 20 = 100.$

Άσκήσεις:


Νά ὑπολογιστοῦν μέ τόν πιό εὔκολο δυνατό συνδυασμό τά ἀθροί-
σματα, ὅπως στά προηγούμενα παραδείγματα:

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 91. $45 + 55 + 100$ | 94. $225 + 68 + 32$ |
| 92. $130 + 400 + 270$ | 95. $502 + 260 + 140$ |
| 93. $153 + 28 + 247$ | 96. $416 + 313 + 87$ |

Όμοια στίς ἀσκήσεις:

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 97. $57 + 100 + 43$ | 100. $84 + 213 + 16$ |
| 98. $235 + 150 + 65$ | 101. $137 + 250 + 63$ |
| 99. $127 + 254 + 473$ | 102. $244 + 235 + 256$ |

103. Νά ὑπολογιστεῖ μέ τόν πιό εὔκολο δυνατό τρόπο τό ἄθροισμα.



104. Όμοια: $91 + 82 + 73 + 54 + 65 + 36 + 27 + 38 + 19$

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΣΗΣ

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. $5+7 = 7+5$ | Μεταθετική |
| 2. $9+0 = 9$ ἢ $0+9 = 9$ | Τοῦ οὐδέτερου στοιχείου. |
| 3. $(5+4)+6 = (4+6)+5$ | Προσεταιριστική |

ΠΟΤΕ ΣΧΕΔΙΑΖΕΙΣ ΣΩΣΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΟΥ.

Όταν εἶσαι βέβαιος, πώς κατανόησες τό προηγούμενο, πρίν προχωρήσεις στό ἐπόμενο.


Όταν σέ κάθε θήμα σου χρησιμοποιεῖς τοῦς κανόνες γιά ὁδη-
γούς καί

Όταν ἐλέγχεις καί ἐπαληθεύεις τήν ἐργασία σου.

29. Αφαίρεση

Έννοια

Μέσα σέ ένα κιβώτιο έχουν τοποθετηθεῖ 12 μπουκάλια μεταλλικοῦ νεροῦ. Ἄν βγάλουμε ἀπό τό κιβώτιο 4 μπουκάλια, πόσα μπουκάλια θά μείνουν σ' αὐτό;



Εἰκ. 26

Εἶναι φανερό, πώς ὁ ἀριθμὸς πού ἀναζητᾶμε, εἶναι αὐτὸς πού πρέπει νά προστεθεῖ στὸν 4, γιὰ νά μᾶς δώσει τὸν 12.

Δηλαδή: $4 + \quad = 12$

Αὐτὸν τὸν ἀριθμὸ τὸν συμβολίζουμε: $12 - 4$ καὶ γράφουμε:

$$12 - 4 = \quad ;$$

Ἀριθμοῦμε τὰ μπουκάλια πού ἀπέμειναν στό κιβώτιο καὶ τὰ βρίσκουμε 8.

Μέ ἄλλα λόγια ὁ ἀριθμὸς $12 - 4$ εἶναι ὁ ἴδιος μέ τὸν ἀριθμὸ 8. Αὐτὸ γράφεται:

$$12 - 4 = 8$$

Δηλαδή, ὅπως μπορούμε ν' αὐξήσουμε κάθε ἀριθμὸ, ἂν τοῦ προσθέσουμε κι ἄλλες μονάδες ἔτσι μπορούμε καὶ νά τὸν ἐλαττώσουμε, ἂν τοῦ **παραλείψουμε μερικές μονάδες**. Ἡ πράξη πού κάνουμε γιὰ νά ἐλαττώσουμε ἕναν ἀριθμὸ κατὰ τόσες μονάδες,

όσες έχει ένας άλλος αριθμός που μας δίνεται, λέγεται **άφαιρηση**.

Ο αριθμός 12, που ελαττώνεται, λέγεται **μειωτέος**.

Ο αριθμός 4 που αφαιρείται, λέγεται **άφαιρετέος**.

Τό έξαγόμενο, που βρίσκουμε, έδω τό 8, λέγεται **υπόλοιπο** ή **διαφορά**.

Τήν άφαιρηση τή συμβολίζουμε μέ τό (-) που διαβάζεται: πλήν ή μείον.

Παρατηρήσεις:

1. Παρατηρούμε πώς:

$12 - 12 = 0$: ή διαφορά δύο ίσων αριθμών είναι ο αριθμός μηδέν.







2. $12 - 15$ δέν γίνεται. Γιά νά γίνει μία άφαιρηση, πρέπει ο άφαιρετέος νά είναι μικρότερος ή ίσος από τό μειωτέο.

3. 15 μήλα - 10 μήλα = 5 μήλα. Έπίσης $15 - 10 = 5$.

Δηλαδή στην άφαιρηση πρέπει ή και οι τρεις (μειωτέος, άφαιρετέος, υπόλοιπο) νά είναι συγκεκριμένοι και όμοιοιδεις ή και οι τρεις άφηρημένοι.

30. Η τεχνική τής αφαιρέσεως

Πρόβλημα: Η δασκάλα άνοιξε ένα δέμα μέ 75 τετράδια. Από

Στήλη των δεκάδων	Στήλη των μονάδων	Δεκάδες	Μονάδες
		7	5
		2	3
		5	2

αυτά μοίρασε 23 στους μαθητές τῆς τάξεως. Πόσα ἔμειναν;
"Ἐμειναν $(75 - 23)$ τετράδια = 52 τετράδια

Μέ τό παραπάνω πρόβλημα πρέπει νά ὑπολογίσουμε τό $75 - 23$.

Διάταξη τῆς πράξεως:

$$\begin{array}{r} \Delta.Μ. \quad 75 = 7 \text{ δεκάδες} + 5 \text{ μονάδες} \\ -23 = 2 \text{ δεκάδες} + 3 \text{ μονάδες} \\ \hline 52 = 5 \text{ δεκάδες} + 2 \text{ μονάδες} \end{array}$$

1) Πῶς γίνεται μέ κρατούμενα:

$$\begin{array}{r} \Delta.Μ.74 = 7 \text{ δεκάδες} + 4 \text{ μονάδες} = 7 \text{ δεκάδες} + 14 \text{ μονάδες} \\ 18 = 1 \text{ δεκάδα} + 8 \text{ μονάδες} = 2 \text{ δεκάδες} + 8 \text{ μονάδες} \\ \hline 56 = 5 \text{ δεκάδες} + 6 \text{ μονάδες} \end{array}$$

Ἐπειδή στίς μονάδες $8 > 4$, γι' αὐτό προσθέτουμε στίς μονάδες, δέκα μονάδες (μία δεκάδα) καί μετά τήν προσθέτουμε σάν κρατούμενο στίς δεκάδες τοῦ ἀφαιρετέου.

Βλέπετε; ♦

"Όταν πρόκειται νά ἀφαιρέσουμε δύο ἀκέραιους, γράφουμε τό μικρότερο κάτω ἀπό τό μεγαλύτερο, μέ τίς μονάδες κάθε τάξεως στήν ἴδια στήλη. Ἀρχίζοντας τήν ἀφαίρεση ἀπό τά δεξιά, γράφουμε, σέ κάθε στήλη, τή διαφορά τῶν μονάδων κάθε τάξεως πού ἀφαιροῦμε. Ἄν σέ μία στήλη ἡ ἀφαίρεση δέν γίνεται, τότε αὐξάνουμε τό ψηφίο τοῦ μειωτέου κατά 10 μονάδες τῆς τάξεως αὐτῆς καί ὕστερα αὐξάνουμε κατά 1 τό ἀκόλουθο πρὸς τ' ἀριστερά ψηφίο τοῦ ἀφαιρετέου.

31. Δοκιμή τής αφαιρέσεως

Από τις σχέσεις $25 - 20 = 5$ και $20 + 5 = 25$ παρατηρούμε πώς αν στο υπόλοιπο προσθέσουμε τόν αφαιρετέο, τότε βρίσκουμε τό μειωτέο. Δηλαδή:

$$(Μειωτέος) = (αφαιρετέος) + (υπόλοιπο)$$

Έτσι κάνουμε και τή δοκιμή τής αφαιρέσεως.

Ακόμα βλέπουμε πώς: $25 - 5 = 20$. Δηλαδή:

$$(Μειωτέος) - (Υπόλοιπο) = Αφαιρετέος.$$

Παραδείγματα:

Ένα σχολείο έχει 587 μαθητές. Απ' αυτούς 235 είναι αγόρια. Πόσα είναι τά κορίτσια;

Θά κάνουμε μιά αφαίρεση.

	Δοκιμή α	Δοκιμή β
587 μειωτέος	235 αφαιρετέος	587 μειωτέος
-235 αφαιρετέος	+352 υπόλοιπο	-352 υπόλοιπο
<u>352 υπόλοιπο</u>	<u>587 μειωτέος</u>	<u>235 αφαιρετέος</u>

Απάντηση: τά κορίτσια είναι 352.

Άσκήσεις:

Νά γίνουν οί αφαιρέσεις καί οί δοκιμές τους.

105.	$\begin{array}{r} 42 \\ -21 \\ \hline \end{array}$	106.	$\begin{array}{r} 53 \\ -7 \\ \hline \end{array}$	107.	$\begin{array}{r} 84 \\ -53 \\ \hline \end{array}$
108.	$\begin{array}{r} 754 \\ -397 \\ \hline \end{array}$	109.	$\begin{array}{r} 539 \\ -294 \\ \hline \end{array}$	110.	$\begin{array}{r} 724 \\ -248 \\ \hline \end{array}$
111.	$\begin{array}{r} 653 \\ -179 \\ \hline \end{array}$	112.	$\begin{array}{r} 701 \\ -613 \\ \hline \end{array}$	113.	$\begin{array}{r} 824 \\ -57 \\ \hline \end{array}$

Νά συμπληρωθούν οί τελείες μέ ψηφία, πού λείπουν στίς παρακάτω αφαιρέσεις:

$$\begin{array}{r}
 114. \quad 3.7 \quad + \quad 115. \quad 38 \quad + \quad 116. \quad 940 \\
 \underline{-8.} \quad \quad \quad \underline{-52} \quad \quad \quad \underline{-190} \\
 138 \quad \quad \quad 376 \quad \quad \quad 720
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 117. \quad 3.6 \quad 118. \quad 27 \quad 119. \quad 625 \quad 120. \quad \dots \\
 \underline{-19} \quad \quad \quad \underline{-} \quad \quad \quad \underline{-} \quad \quad \quad \underline{-324} \\
 17 \quad \quad \quad 19 \quad \quad \quad 432 \quad \quad \quad 547
 \end{array}$$

Β'

121. Νά συμπληρωθούν οι τελείες με τούς κατάλληλους αριθμούς.
 $29 - 16 = 15 - ;$ (Υπόδειξη: $29 - 16 = 13$. Έτσι $13 = 15 - 2$)
 $42 - ; = 37 - 17$
 $54 - 14 = ; - 18$

122. Νά βάλετε στην τελεία τό μεγαλύτερο δυνατό αριθμό έτσι, ώστε νά αληθεύουν οι σχέσεις:
 $26 + ; < 35$ (Υπόδειξη: $26 + 8 = 34 < 35$)
 $; + 59 < 83$ (Υπόδειξη: πρέπει ; + 59 = 82 < 83)
 $- 6 < 18$
 $12 - ; < 9$

123. Νά βρείτε τό μικρότερο άκέραιο έτσι, ώστε:
 $; - 28 > 25$ (Υπόδειξη: Πρέπει ; - 28 = 26 > 25)
 $44 - ; > 27$

124. Νά βάλετε τό σύμβολο πού άρμόζει < ή > στις παρακάτω περιπτώσεις:
 $84 - 19 \dots 84 - 25$ (Υπόδειξη: $> ή <$)
 $72 - 16 \dots 80 - 16$
 $91 - 31 \dots 91 - 48$

125. Συμπληρώστε τόν αριθμό πού λείπει στις παρακάτω περιπτώσεις:
 $; - 38 = 119$
 $212 - ; = 109$
 $; - ; = 0$
 $; - ; = 5$

126. Στην άφαίρεση δύο αριθμών ισχύει ή ιδιότητα τής αντιμεταθέσεως:
 Νά κάνετε αριθμητικό παράδειγμα.


32. Πώς θά λύσεις ένα πρόβλημα

Γιά νά λύσεις ένα πρόβλημα, πρέπει:

1. Νά τό διαβάσεις άργά καί προσεκτικά, ώστε νά τό καταλάβεις πολύ καλά, γιά νά είσαι ίκανός ν' άπαντās μέ εύκολία στις

- έρωτήσεις:
- Τι μου ζητείται νά βρω;
 - Τι μου δίνεται;
 - Τι πράξεις πρέπει νά κάνω γιά νά φτάσω στήν άπάντηση;
2. Νά κάνεις σωστά τίς πράξεις.
3. Νά συγκρίνεις τήν άπάντηση μ' εκείνη, πού έχεις έκτιμήσει. Έδω πρέπει νά σημειωθεί πώς, όταν κάθε ένέργειά σου είναι προσχεδιασμένη, ή εργασία προχωρεί μέ άνεση. Ή δέ Ικανότητα νά εργάζεσαι μέ ένα πρόγραμμα, είναι μιά άπ' τίς πολυτιμότερες άρετές, πού πρέπει ν' αναπτύξεις.

Παραδείγματα:



Μέσα σ' ένα άδειο βαρέλι, πού χωράει 685 κιλά κρασί, άδειάσαμε δύο άλλα, πού τό ένα περιείχε 285 κιλά καί τ' άλλο 205 κιλά. Πόσο κρασί χωρεί άκόμα τό βαρέλι;

Τί πρέπει νά κάνετε:

1. Νά βρείτε πρώτα, πόσα κιλά κρασί περιέχουν καί τά δύο μικρά βαρέλια, πού άδειάσαμε.

$$\begin{array}{r} 285 \\ +205 \\ \hline 490 \end{array}$$

Εικ. 27

2. Ν' αφαιρέσετε αυτό πού βρήκατε άπ' τόν αριθμό, πού δηλώνει, πόσο κρασί χωράει τό μεγάλο βαρέλι.

$$\begin{array}{r} 685 \\ -490 \\ \hline 195 \end{array}$$

Άπάντηση: "Ωστε χωράει άκόμη 195 κιλά.

32α. Πότε κάνετε άφáιρεση

Μερικά προβλήματα περιέχουν λέξεις ή εκφράσεις, πού μās λένε πώς πρέπει νά κάνουμε **άφáιρεση**, χωρίς ν' αναφέρεται ή

λέξη άφαίρεση.

Τέτοιες ένδεικτικές λέξεις είναι: πόσο μένει, πόσο διαφέρει, πόσα λείπουν, πόσο ύπολείπεται, πόσο αύξήθηκε κ.τ.λ.

Στά προβλήματα πού ακολουθούν νά επισημάνετε τίς ένδεικτικές λέξεις, καί νά τά λύσετε.

Προβλήματα:

127. Ο Περικλής γεννήθηκε τό 490 π.Χ. καί πέθανε τό 429 π.Χ. Πόσα χρόνια έζησε;
128. Ο Παρθενώνας, ναός τής Αθηνάς προστάτιδας τής Αθήνας, είναι έργο τών αρχιτεκτόνων Ίκτινού καί Καλλικράτη, σέ στενή συνεργασία μέ τό Φειδία. Η κατασκευή του άρχισε τό 447 π.Χ. καί τό έργο τελείωσε τό έτος 438 π.Χ. Πόσα χρόνια κράτησε ή κατασκευή του;
129. Σέ μία περίοδο έκπτώσεων ένα φόρεμα πουλήθηκε 679 δρχ., ενώ ή κανονική του τιμή ήταν 932 δρχ. Τί ποσό τής κανονικής τιμής ήταν ή έκπτωση;
130. Ένας διψήφιος αριθμός άρχίζει μέ τό ψηφίο 8. Γράφουμε ανάμεσα στά ψηφία του τόν αριθμό 0. Πόσο μεγαλώνει ο αριθμός;
131. Ένας βοσκός έχει 350 πρόβατα. Πόσα πρέπει νά πουλήσει γιά νά του μείνουν 269;
132. Ένας πατέρας ήταν 27 έτών, όταν γεννήθηκε ο γιός του. Πόσων έτών ήταν ο γιός του, όταν ο πατέρας ήταν 72 έτών;
133. Δίνεται ο αριθμός 576. Ποιόν αριθμό παίρνετε αν γράψετε τά ψηφία του μέ αντίστροφο σειρά; Πόσο διαφέρουν οι αριθμοί;
134. Στην πρόσθεση: $178 + 289 + 97$
Ένας μαθητής δέν ύπολόγισε τά κρατούμενα. Πόση διαφορά θήκε;
135. Μιά διαδρομή 803 χιλιομέτρων πρέπει νά τή διανύσει ένα αυτοκίνητο σέ δύο ήμέρες. Αν τήν πρώτη μέρα διανύσει 369 χιλιομέτρα, πόσα μένουν γιά τή δεύτερη μέρα;
136. Αν αλλάξετε τή θέση τών ψηφίων 8 καί 3 στόν αριθμό 583 θά πάρετε αριθμό μικρότερο ή μεγαλύτερο, καί πόσο;
137. Αν αλλάξετε τή θέση τών ψηφίων 4 καί 7 στόν αριθμό 470, θά πάρετε αριθμό μικρότερο ή μεγαλύτερο καί πόσο;
138. Σ' ένα εργοστάσιο εργάζονται 90 άτομα, άνδρες, γυναίκες καί παιδιά. Αν οι άνδρες καί τά παιδιά είναι 60, ενώ οι γυναίκες καί τά παιδιά είναι 50, πόσοι είναι οι άνδρες, πόσες οι γυναίκες καί πόσα τά παιδιά;

Προβλήματα προσθέσεως και αφαιρέσεως

139. Μιά σάλα κινηματογράφου διαθέτει 850 θέσεις. Σέ μία παράσταση πουλήθηκαν 250 εισιτήρια γιά τόν έξώστη και 522 εισιτήρια γιά τήν πλατεία. Έχει άλλες θέσεις άδειανές και πόσες;
140. Ένα λεωφορείο 40 θέσεων ήταν «πλήρες» κατά τήν αναχώρηση. Στήν 1η στάση κατέβηκαν 9 επιβάτες, στή 2η στάση κατέβηκαν 9, αλλά ανέβηκαν 11 νέοι επιβάτες. Στήν 3η στάση κατέβηκαν 14, αλλά ανέβηκαν 7 νέοι επιβάτες. Ή 4η στάση ήταν τό τέρμα. Όλοι οί ενδιάμεσοι επιβάτες ταξίδεψαν μέχρι τέρμα. Πόσοι επιβάτες κατέβηκαν και πόσοι εφθασαν στό τέρμα;
141. Γιά νά αγοράσω ένα βιβλίο άξίας 980 δραχμών έβγαλα από τόν κουμπαρά μου 312 δραχμές. Μου έδωσε και ό πατέρας μου 510 δραχμές και τίς υπόλοιπες ό παππούς μου. Πόσες μου έδωσε ό παππούς;
142. Στίς γυμναστικές επιδείξεις πήραν μέρος 4 σχολεία. Τό α΄ είχε 183 μαθητές. Τό β΄ 23 περισσότερους από τό α΄ και 11 λιγότερους από τό γ΄. Άν όλοι οί μαθητές ήταν 821, πόσοι ήταν οί μαθητές του δ΄ σχολείου;
143. Ένας αύγοπώλης είχε 875 αύγά. Από αυτά πούλησε τήν πρώτη μέρα 217, τήν άλλη 49 περισσότερα από τήν πρώτη και τήν τρίτη 75 λιγότερα από τή δεύτερη. Πόσα αύγά του έμειναν;
144. Ένας περιπεριούχος είχε στό συρτάρι του 974 δραχμές. Από αυτές έδωσε σέ ένανάντιπρόσωπο έργοστασίου, πού κάνει σοκολάτες 525 δραχμές. Σέ λίγο αγόρασε κάποιος είδη άξίας 317 δραχμών. Πόσες δραχμές έχει στό συρτάρι του ό περιπεριούχος;

33. Πολλαπλασιασμός

Έννοια

Πόσα λουλουδάκια εικονίζονται στίς 4 άνθοδέσμες;



Εικ. 28

Γιά να υπολογίσουμε τά λουλούδια, πού εικονίζονται στίς 4 ανθοδέσμες, θά έργαστούμε κατά δύο τρόπους:

Πρώτος τρόπος:

Θά προσθέσουμε τούς αριθμούς πού αντιπροσωπεύουν τό πλήθος τών λουλουδιών κάθε δέσμης:

$$6 \text{ λουλούδια} + 6 \text{ λουλούδια} + 6 \text{ λουλούδια} + 6 \text{ λουλούδια} = 24 \text{ λουλούδια}$$

Δεύτερος τρόπος

Έπειδή ή πρόσθεση αύτή έχει τό χαρακτηριστικό νά έχει όλους τούς προσθετέους ίσους, συμφωνούμε νά τή γράφουμε πύ άπλά καί πύ σύντομα, έτσι:

$$6 \times 4 = 24 \text{ (Διαβάζεται : 6 επί 4)}$$

καί νά λέμε πώς τό 6 **πολλαπλασιάζεται** μέ τό 4.

Ή σύντομη εκτέλεση μιās τέτοιας πρόσθεσης λέγεται **πολλαπλασιασμός**.

Ό αριθμός 24, πού είναι τό εξαγόμενο του πολλαπλασιασμού λέγεται **γινόμενο** καί οι αριθμοί 6 καί 4 **παράγοντες** του γινόμενου.

Ό αριθμός 6 πού επαναλαμβάνεται σάν προσθετέος λέγεται **πολλαπλασιαστέος**.

Καί ό αριθμός 4, πού δηλώνει πόσες φορές επαναλαμβάνουμε τόν πολλαπλασιαστέο λέγεται **πολλαπλασιαστής**. Τό σημείο του πολλαπλασιασμού είναι τό (x) επί.

Κι όταν αναζητούμε τό γινόμενο δύο αριθμών, **κάνουμε πολλαπλασιασμό**.

Βλέπετε; ♦

Πολλαπλασιασμός λέγεται ή σύντομη εκτέλεση μιās προσθέσεως μέ ίσους προσθετέους.

Άσκησης

145. Νά γράψετε σέ μορφή γινομένου τά άθροίσματα:

$$8 \text{ κιλά} + 8 \text{ κιλά} + 8 \text{ κιλά} + 8 \text{ κιλά} =$$

$$11 + 11 + 11 + 11 + 11 + 11 =$$

$$25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 =$$

$$17 + 17 + 17 + 17 =$$

$$1 + 1 + 1 + 1 + 1 =$$

$$0 + 0 =$$

β) Νά γράψετε σε μορφή άθροίσματος τά γινόμενα:

$$(15 \text{ τετράδια}) \times 3, \quad 7 \times 4, \quad 105 \times 7, \quad 12 \times 11.$$

34. Είδος του γινομένου


Νά βρεθούν τά έξαγόμενα: 1) 14×5 καί 2) $(6 \text{ μέτρα}) \times 4$

$$1) \quad 14 \times 5 = 14 + 14 + 14 + 14 + 14 = 70$$

$$2) \quad (6 \text{ μέτρα}) \times 4 = 6 \text{ μέτρα} + 6 \text{ μέτρα} + 6 \text{ μέτρα} + 6 \text{ μέτρα} = 24 \text{ μέτρα.}$$

Άπό τά παραπάνω διαπιστώνουμε, πώς:

- 1) "Όταν ό πολλαπλασιαστέος είναι συγκεκριμένος, τότε τό γινόμενο είναι άριθμός συγκεκριμένος καί όμοειδής μέ τόν πολλαπλασιαστέο καί
- 2) "Ό πολλαπλασιαστής είναι πάντοτε άφηρημένος άριθμός, γιατί δηλώνει πόσες φορές έπαναλαμβάνουμε τόν πολλαπλασιαστέο



Εικ. 29

“Ό Πυθαγόρας ένας άπό τούς μεγαλύτερους “Ελληνες φιλόσοφους γεννήθηκε στή Σάμο τό 580 π.Χ. Αύτός καί οί μαθητές του έδωκαν μεγάλη ώθηση στήν ανάπτυξη τών μαθηματικών, ιδιαίτερα τής Γεωμετρίας.

35. Πολλαπλασιασμός μονοψηφίων αριθμών

Πίνακας του Πυθαγόρα.

Τό γινόμενο δύο μονοψηφίων αριθμών π.χ. του 7×8 δέν είναι δύσκολο νά τό μάθουμε καί νά τό υπολογίζουμε «άπέξω». Τό μαθαίνουμε από τόν «πίνακα του Πυθαγόρα» πού ή χρήση του είναι άπλή.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
7	14	21	28	35	42	49	56	63	70
8	16	24	32	40	48	56	64	72	80
9	18	27	36	45	54	63	72	81	90
10	20	30	40	50	60	70	80	90	100

Εικ. 30

Τό γινόμενο τῶν ἀριθμῶν π.χ. 9×8 βρίσκεται στή διασταύρωση τῆς γραμμῆς, πού ἀρχίζει ἀπό τό 9 καί τῆς στήλης πού ἀρχίζει ἀπό τό 8, καί εἶναι 72.

Ἀσκήσεις καί προβλήματα:

146. Νά συμπληρωθοῦν τά ἐρωτηματικά ἔτσι, πού οἱ ἀριθμοί νά γίνουν συγκεκριμένοι:

$$(48 \text{ κιβώτια}) \times 9 = 432 ;$$

$$(134;) \times 5 = 670 \text{ δρχ.}$$

$$(25;) \times 6 = 150 \text{ μέτρα}$$

$$(45 \text{ κιλά}) \times 8 = 360;$$

Νά βάλετε τίς παρακάτω προσθέσεις σέ μορφή πολλαπλασιασμοῦ, πού νά ζητεῖται τό γινόμενο.

147. $25 \text{ λίτρα} + 25 \text{ λίτρα} + 25 \text{ λίτρα} + 25 \text{ λίτρα} + 25 \text{ λίτρα} = ;$

148. $109 \text{ δραχμές} + 109 \text{ δραχμές} + 109 \text{ δραχμές} = ;$

149. $56 \text{ μέτρα} + 56 \text{ μέτρα} + 56 \text{ μέτρα} + 56 \text{ μέτρα} + 56 \text{ μέτρα} = ;$

150. $5 \text{ χιλιόμετρα} + 5 \text{ χιλιόμετρα} + 5 \text{ χιλιόμετρα} = ;$

151. Ἡ κυκλική πίστα δοκιμῆς τῶν αὐτοκινήτων ἔχει μήκος 27 χιλιόμετρα. Ἡ δοκιμὴ τῶν αὐτοκινήτων γίνεται σέ 9 στροφές. Ποιά ἀπόσταση διατρέχουν;


152. Ἐνα νόμισμα τῆς μιᾶς δραχμῆς ζυγίζει 6 γραμμάρια. Ποιό εἶναι τό βάρος ποσοῦ 9 δραχμῶν;

Ἰδιότητες τοῦ πολλαπλασιασμοῦ

36. 1η Ἰδιότητα: «Μεταθετική» ἢ «ἐναλλακτική».

Πόσες εἶναι οἱ μαργαρίτες τῆς εἰκόνας;

Τίς ὑπολογίζετε μέ δύο τρόπους:



Εικ. 31

Πρώτος τρόπος

Έχετε 5 μαργαρίτες σε 4 σειρές:

$$5 + 5 + 5 + 5 = 5 \times 4 = 20 \text{ μαργαρίτες}$$

Δεύτερος τρόπος

Έχετε 4 μαργαρίτες σε 5 στήλες:

$$4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 4 \times 5 = 20 \text{ μαργαρίτες.}$$

Αν συγκρίνετε τα δύο έξαγόμενα βλέπετε πώς: $5 \times 4 = 4 \times 5$

Βλέπετε; ♣

Τό γινόμενο δύο αριθμών δεν αλλάζει, όταν αλλάξετε τη σειρά των παραγόντων του.

Η ιδιότητα αυτή είναι η μεταθετική

Παραδείγματα:

α) $7 \times 1 = ;$, $1 \times 7 = ;$, β) $0 \times 5 = ;$, $5 \times 0 = ;$, γ) $0 \times 0 = ;$;

Απαντήσεις: α) $7 \times 1 = 1 \times 7 = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 7$

β) $5 \times 0 = 0 \times 5 = 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0$

γ) $0 \times 0 = 0$ (τό δεχόμαστε)

Από τὰ παραπάνω συμπεραίνουμε εύκολα, πώς:

α) Τό γινόμενο αριθμού μέ τή μονάδα ίσοῦται μέ τόν ἴδιο τόν ἀριθμό.

β) Τό γινόμενο μέ τό μηδέν ίσοῦται μέ τό μηδέν.

Άσκήσεις:

153. Νά συμπληρωθοῦν οἱ τελείες μέ τούς κατάλληλους ἀριθμούς ἔτσι, ὥστε:

α) $4 \times 1 = 1 \times \dots$

δ) $4 = 1 + \dots = 1 \times \dots$

β) $1 \times 20 = 20 \times \dots$


ε) $3 = 1 + \dots = \dots \times \dots$

γ) $8 \times \dots = 8$

στ) $\dots \times 9 = 0$

37. Πρόσθεση καί πολλαπλασιασμός (Ἐπιμεριστική ιδιότητα)

Μπορεῖτε νά ὑπολογίσετε τό πλήθος τῶν ἀγοριῶν καί τῶν κοριτσιῶν τῆς εἰκόνας;



Εἰκ. 32

Βλέπουμε πώς σέ κάθε τραπέζι, κάθονται 3 ἀγόρια καί 2 κορίτσια. Γιά νά βροῦμε τόν ἀριθμό ὄλων τῶν παιδιῶν, ἐργαζόμαστε κατά δύο τρόπους, ὀριζόντια καί κάθετα, ὅπως φαίνεται στόν παρακάτω πίνακα.

	Αριθμός κοριτσιών	Αριθμός αγοριών	Αριθμός παιδιών
1ο τραπέζι	2	3	(2 + 3)
2ο τραπέζι	2	3	(2 + 3)
Σύνολο παιδιών	$2 \times 2 +$	$3 \times 2 =$	$(2 + 3) \times 2$

Δηλαδή: $(2 + 3) \times 2 = (2 \times 2) + (3 \times 2)$

Η ιδιότητα αυτή λέγεται **έπιμεριστική ιδιότητα του πολλαπλασιασμού ως προς την πρόσθεση**:

Βλέπετε; ♣

Γιά να πολλαπλασιάσουμε άθροισμα με αριθμό μπορούμε να πολλαπλασιάσουμε τον αριθμό με καθένα από τους προσθετέους του άθροισματος κι ύστερα να προσθέσουμε τά γινόμενα πού βρήκαμε.

Παραδείγματα:

- $(3 + 7) \times 8 = 3 \times 8 + 7 \times 8 = 24 + 56 = 80$
- $(12 + 1) \times 3 = 12 \times 3 + 1 \times 3 = 36 + 3 = 39$
- $(10 + 3) \times 5 = 10 \times 5 + 3 \times 5 = 50 + 15 = 65$

Άσκησης:

154. Νά γίνει εφαρμογή της παραπάνω έπιμεριστικής ιδιότητας στις άσκησης:

(α) $(3 + 9) \times 8$, (β) $(12 + 8) \times 4$, (γ) $(4 + 10) \times 6$, (δ) $(1 + 7) \times 9$.

155. Άφου βάλετε στή θέση της τελείας τόν κατάλληλο αριθμό, νά βρείτε τό έξαγόμενο.

$(10 + 0) \times 5 = 50 + 15 =$
 $0(10 + 9) \times 8 = 80 + \dots =$
 $0(10 + 7) \times 7 = \dots + 49 = 0$

38. Τεχνική του πολλαπλασιασμού

1. Πολλαπλασιαστής μονοψήφιος: – Χωρίς κρατούμενα

Νά βρεθεί τό γινόμενο: $23 \times 3 = :$

Βλέπουμε πώς:

$$23 \times 3 = (2 \text{ δεκάδες} + 3 \text{ μονάδες}) \times 3 \\ = 6 \text{ δεκάδες} + 9 \text{ μονάδες} = 69$$

Διάταξη τής
πράξεως:

$$\begin{array}{r} 23 \\ \times 3 \\ \hline 69 \end{array}$$

Λέμε: 3 επί 3 = 9, γράφουμε τό 9 στή στήλη τών μονάδων.
Ύστερα: 3 επί 2 = 6, γράφουμε τό 6 στή στήλη τών δεκάδων

2. Μέ κρατούμενα:

Νά βρεθεί τό γινόμενο: 114×4

Βλέπουμε πώς:

$$114 \times 4 = (1 \text{ έκ.} + 1 \text{ δεκ.} + 4 \text{ μον.}) \times 4 \\ = 4 \text{ έκ.} + 4 \text{ δεκ.} + 1 \text{ δεκ.} + 6 \text{ μον.} \\ = 4 \text{ έκ.} + 5 \text{ δεκ.} + 6 \text{ μον.} = 456$$

Διάταξη τής
πράξεως:

$$\begin{array}{r} 114 \\ \times 4 \\ \hline 456 \end{array}$$

Λέμε: 4 επί 4 = 16, γράφουμε τό 6 στή θέση τών μονάδων καί «κρατούμε» 1.
Ύστερα: 1 επί 4 = 4 καί ένα τό «κρατούμενο» = 5, γράφουμε τό 5 στή θέση τών δεκάδων.
Ύστερα: 1 επί 4 = 4 γράφουμε τό 4 στή θέση τών εκατοντάδων.

3. Όμοια: 187×5

Βλέπουμε πώς:

$$\begin{aligned}187 \times 5 &= (1 \text{ \acute{e}\kappa.} + 8 \text{ \delta\epsilon\kappa.} + 7 \text{ \mu\omicron\nu.}) \times 5 \\ &= 5 \text{ \acute{e}\kappa.} + 40 \text{ \delta\epsilon\kappa.} + 35 \text{ \mu\omicron\nu.} \\ &= 5 \text{ \acute{e}\kappa.} + 4 \text{ \acute{e}\kappa.} + 3 \text{ \delta\epsilon\kappa.} + 5 \text{ \mu\omicron\nu.} \\ &= 9 \text{ \acute{e}\kappa.} + 3 \text{ \delta\epsilon\kappa.} + 5 \text{ \mu\omicron\nu.} = 935\end{aligned}$$

Διάταξη τής
πράξεως:

$$\begin{array}{r}187 \\ \times 5 \\ \hline 935\end{array}$$

Λέμε: 5 επί 7 = 35 γράφουμε τό 5 στή θέση τών μονάδων καί «κρατούμε» 3. Ύστερα: 5 επί 8 = 40 καί 3 τό «κρατούμενο» 43. Γράφουμε τό 3 στή θέση τών δεκάδων καί «κρατούμε» 4. Ύστερα: 1 επί 5 = 5 καί 4 τό «κρατούμενο» 9. Γράφουμε τό 9 στή θέση τών εκατοντάδων.

Άσκησης:

156. Νά βρείτε τά έξαγόμενα:

$18 \times 2 = \quad 17 \times 3 = \quad 36 \times 7 =$

$24 \times 4 = \quad 27 \times 5 = \quad 45 \times 6 =$

$157 \ 215 \times 4 = \quad 134 \times 5 = \quad 204 \times 3 =$

$136 \times 2 = \quad 233 \times 3 = \quad 120 \times 6 =$

Πολλαπλασιασμός διψήφιου μέ διψήφιο

39. Άπλές περιπτώσεις

1) Πολλαπλασιασμός μέ τό 10, 20, 30 κ.τ.λ.

1ο Παράδειγμα: $10 \times 49 = (1 \text{ δεκάδα}) \times 49 = 49 \text{ δεκάδες} = 490$
μονάδες

2ο Παράδειγμα: $50 \times 18 = (5 \text{ δεκάδες}) \times 18 = 90 \text{ δεκάδες} = 900$
μονάδες

3ο Παράδειγμα: $20 \times 30 = (2 \text{ δεκάδες}) \times 30 = 60 \text{ δεκάδες} = 600$
μονάδες

Βλέπετε; ♦

α) Για να πολλαπλασιάσουμε αριθμό με το 10 γράφουμε δεξιά του αριθμού ένα μηδέν.

β) Όταν ο ένας ή και οι δύο παράγοντες τελειώνουν σε μηδενικά, τότε κάνουμε τον πολλαπλασιασμό, χωρίς τα μηδενικά και στα δεξιά του γινομένου γράφουμε τα μηδενικά, που έχουν οι παράγοντες.

2). Να βρεθεί το γινόμενο: 26×24

Έχουμε:

$$\begin{array}{r}
 26 \times 24 = (2 \text{ δεκ.} + 6 \text{ μον.}) \times 24 \\
 = 48 \text{ δεκ.} + 144 \text{ μον.} \\
 = 4 \text{ έκ.} + 8 \text{ δεκ.} + 1 \text{ έκ.} + 4 \text{ δεκ.} + 4 \text{ μον.} \\
 = 5 \text{ έκ.} + 12 \text{ δεκ.} + 4 \text{ μον.} \\
 = 5 \text{ έκ.} + 1 \text{ έκ.} + 2 \text{ δεκ.} + 4 \text{ μον.} \\
 = 6 \text{ έκ.} + 2 \text{ δεκ.} + 4 \text{ μον.} = 624
 \end{array}$$

Λέμε: 4 επί 6 = 24 γράφουμε το 4 στη θέση των μονάδων και «κρατούμε» 2.

Ύστερα: 2 επί 6 = 12 και 2 τα «κρατούμενα» 14. Γράφουμε το 14 στη θέση των δεκάδων.

Ύστερα: 2 επί 4 = 8. Γράφουμε το 8 στη θέση των δεκάδων.

Μετά 2 επί 2 = 4. Γράφουμε το 4 στη θέση των εκατοντάδων.

Μετά προσθέτουμε τα μερικά γινόμενα και βρίσκουμε: 624

40. Δοκιμή του πολλαπλασιασμού

1) Προσθέτουμε τα ψηφία του πολλαπλασιαστέου

$4 + 2 = 6$ και το άθροισμα το γράφουμε στο πάνω άριστερό μέρος του σταυρού.

2) Τό ίδιο κάνουμε και στον πολλαπλασιαστή $6 + 2$

$= 8$. Τό 8 τό γράφουμε στο πάνω δεξιό μέρος του σταυρού.

3) Πολλαπλασιάζουμε τα δύο ψηφία $8 \times 6 = 48$ ($8 + 4 = 12$), $2 + 1 = 3$, τό γράφουμε στο κάτω μέρος του σταυρού.

4) Τέλος προσθέτουμε τα ψηφία του γινομένου $6 + 2 + 4 = 12$,

6	8
3	3

(2 + 1 = 3). Τό 3 τό γράφουμε στό κάτω δεξιό μέρος τοῦ σταυροῦ. "Όταν τά δύο κάτω ψηφία εἶναι τά ἴδια, ἡ πράξη ἔγινε χωρίς λάθος.

Ἀσκήσεις:

158. Νά βρεῖτε τά γινόμενα:

- 1) 37×10 2) 89×10 3) 63×10 4) 80×5
 5) 35×20 6) 140×6 7) 200×3 8) 440×2
 9) 40×20 10) 190×7 11) 110×8 12) 35×20

159. Νά βρεῖς τά γινόμενα καί νά κάνεις τίς δοκιμές στά παρακάτω:

- 1) 33×27 2) 38×26 3) 22×41 4) 12×47

159) Κατά πόσες θέσεις μετακινεῖται ὁ 9 στόν ἀριθμό 49, ὅταν τόν πολλαπλασιάσουμε μέ τό 10; καί κατά πόσες τό 4;

Βλέπετε; ▶

Ἡ ἀξία ψηφίου πολλαπλασιάζεται μέ τό 10, κάθε φορά πού τό ψηφίο μετακινεῖται κατά μία θέση πρὸς τά ἀριστερά.

Χρήση τοῦ πολλαπλασιασμοῦ στή λύση προβλημάτων

Προβλήματα

1ο. Μέ ἓνα φύλλο βιβλιοδετικού χαρτιοῦ, ὁ βιβλιοδέτης βιβλιοδετεῖ 4 βιβλία. Πόσα βιβλία βιβλιοδετεῖ μέ 3 φύλλα βιβλιοδετικού χαρτιοῦ;

φύλλα



καλύμματα



Εἰκ. 33

καλύμματα μέ ἓνα φύλλο φύλλα καλύμματα
 $4 \times 3 = 12$

"Ἐτσι βλέπουμε, πῶς κάνουμε $(4 \text{ καλύμματα}) \times 3 = 12 \text{ καλύμματα}$.

2ο. Πρὶν ἀναχωρήσει γιὰ διακοπές ὁ πατέρας τοῦ Κώστα,

αγόρασε 3 φίλμς μέ 36 «πόζες», τό καθένα. Πόσες φωτογραφίες μπορεί νά βγάλει μέ αυτά τά φίλμς;

Είναί φανερό πώς θά βγάλει 3 φορές τό 36 πόζες

ή $(36 \text{ πόζες}) \times 3 = 108 \text{ πόζες}$.


Στά δυό παραπάνω προβλήματα μάς δίνουν τήν τιμή τής μιās μονάδας καί μάς ζητοῦν τήν τιμή τών πολλῶν μονάδων καί γιά νά βροῦμε τά ζητούμενα, πολλαπλασιάσαμε τήν τιμή τής μιās μονάδας μέ τήν τιμή τών πολλῶν μονάδων.

Βλέπετε; ♦

“Όταν μάς δίνεται ή τιμή τής μιās μονάδας καί ζητοῦμε τήν τιμή τών πολλῶν μονάδων, κάνουμε πολλαπλασιασμό.

Προβλήματα:


161. “Ένα δοχείο μαρμελάδα ζυγίζει 12 κιλά. Πόσο ζυγίζουν 25 ὅμοια δοχεῖα;
162. “Ένα κιλό λάδι πωλεῖται 94 δραχμές. Πόσο κοστίζει ένα δοχείο 8 κιλῶν;
163. Πόσα ποτήρια εἶναι 27 δωδεκάδες;
164. 32 μαθητές τής τετάρτης τάξεως πήγαν ἐκδρομή καί ὁ καθένας πλήρωσε γιά εἰσιτήριο 29 δραχμές. Πόσες δραχμές πλήρωσαν ὅλοι;
165. “Ένας ἔμπορος ἀγόρασε 26 δοχεῖα μέλι. Τό κάθε δοχείο περιείχε 22 κιλά. Πόσα κιλά μέλι ἀγόρασε;
166. “Ένας μελισσοκόμος πούλησε ἕνα δοχείο μέλι τῶν 19 κιλῶν πρὸς 52 δραχμές τό κιλό. Πόσα χρήματα πήρε;
167. 60 μαθητές παρακολούθησαν μιὰ σχολική θεατρική παράσταση, καί καθένας πλήρωσε εἰσιτήριο 14 δραχμές. Πόσα πλήρωσαν ὅλοι;
168. “Ένα αὐτοκίνητο τρέχει 90 χιλιόμετρα τήν ὥρα. Σέ 8 ὥρες πόσα χιλιόμετρα θά διανύσει;
169. Γράψτε μέσα στά αὐγά ἀριθμούς ἔτσι, ὥστε κάνοντας τίς πράξεις πού εἶναι σημειωμένες ὀριζόντια καί κάθετα νά ἔχετε τό ἀποτέλεσμα 10.



41. 3η Ίδιότητα: Προσεταιριστική

Πολλαπλασιασμός περισσότερων αριθμών.

Πώς θα υπολογίσουμε τις χορεύτριες της εικόνας;



$$(2 \times 3) + (2 \times 3) + (2 \times 3) + (2 \times 3)$$

Πρώτος τρόπος:

- 1ο. Υπολογίζουμε τις χορεύτριες της πρώτης σειράς: 3×4
 - 2ο. Υπολογίζουμε τις χορεύτριες της δεύτερης: 3×4
- Δηλαδή οι χορεύτριες και των δύο σειρών είναι: $2 \times (3 \times 4)$

Δεύτερος τρόπος:

- 1ο. Υπολογίζουμε τις χορεύτριες της πρώτης στήλης: (2×3)
 - 2ο. Υπολογίζουμε τις χορεύτριες της δεύτερης στήλης: (2×3)
 - 3ο. Υπολογίζουμε τις χορεύτριες της τρίτης στήλης: (2×3)
 - 4ο. Υπολογίζουμε τις χορεύτριες της τέταρτης στήλης: (2×3)
- Δηλαδή και στις 4 στήλες οι χορεύτριες είναι: $(2 \times 3) \times 4$
- Τά παραπάνω εξαγόμενα και μέ τούς δύο τρόπους είναι τά ίδια. Είναι: $(2 \times 3) \times 4 = 2 \times (3 \times 4)$.

Βλέπετε; ♣

Για να υπολογίσουμε τό γινόμενο τριών αριθμών, μπορούμε: Τά γινόμενο των δύο πρώτων να τό πολλαπλασιάσουμε μέ τόν τρίτο, ή τό γινόμενο των δύο τελευταίων να τό πολλαπλασιάσουμε μέ τόν πρώτο.

Γι' αυτό λέμε, πώς στο γινόμενο τριών αριθμών ισχύει η προσεταιριστική ιδιότητα.

Ύστερα από τὰ παραπάνω: Μπορούμε τὸ γινόμενο τριῶν ἀριθμῶν νὰ τὸ γράφουμε χωρὶς παρενθέσεις.

Ύπολογισμὸς τοῦ γινομένου πολλῶν παραγόντων

Νὰ ὑπολογιστεῖ τὸ γινόμενο:

$$3 \times 5 \times 4 \times 7 \times 2$$

Ύπολογίζεται ὅπως σημειώνεται παρακάτω:

$$\begin{array}{r} 3 \\ \times 5 \\ \hline 15 \end{array} \rightarrow \begin{array}{r} 15 \\ \times 4 \\ \hline 60 \end{array} \rightarrow \begin{array}{r} 60 \\ \times 7 \\ \hline 420 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 420 \\ \times 2 \\ \hline 840 \end{array}$$

Γιὰ νὰ ὑπολογίσουμε τὸ γινόμενο περισσοτέρων τῶν 3 παραγόντων, πολλαπλασιάζουμε τὸν πρῶτο μὲ τὸ δεύτερο, τὸ γινόμενο μὲ τὸν τρίτο, τὸ νέο γινόμενο μὲ τὸν τέταρτο καὶ ἐξακολουθοῦμε μέχρις ὅτου ἐξαντληθοῦν οἱ παράγοντες.

Βλέπετε; ♣

Ἀσκήσεις - Προβλήματα:

170. Νὰ ὑπολογιστοῦν, χωρὶς χαρτί καὶ μολύβι, τὰ γινόμενα:
- 1) $8 \times 10 \times 10$ 2) $2 \times 3 \times 4 \times 10$ 3) $2 \times 4 \times 20 \times 2$
4) $2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6$ 5) $0 \times 9 \times 16$ 6) $16 \times 9 \times 0$
171. Τρεῖς ἄνθρωποι ἔχουν ὁ καθένας 3 παιδιὰ, τὸ κάθε παιδί ἔχει 3 βιβλία καὶ τὸ κάθε βιβλίο 3 τόμους. Πόσους τόμους ἔχουν ὅλα μαζί τὰ παιδιὰ;
172. Κάθε μία ἀπὸ τίς 4 πλευρές τοῦ σχολείου μας ἔχει 6 παράθυρα καὶ κάθε παράθυρο ἔχει 8 τζάμια. Πόσα τζάμια ἔχουν ὅλα τὰ παράθυρα;

173. 4 κιβώτια περιέχουν βιβλία. 'Αν τό καθένα έχει 8 δέματα καί κάθε δέμα έχει 8 βιβλία, πόσα βιβλία έχουν;

42. Διάρσηση

"Εννοια

ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΕΤΕ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

Διαιρετέος \rightarrow 36 $\left| \begin{array}{l} 4 \\ \leftarrow \end{array} \right.$ Διαιρέτης

Υπόλοιπο \rightarrow 0 $\left| \begin{array}{l} 9 \\ \leftarrow \end{array} \right.$ Πηλίκο

Πρόβλημα:

Ο Κώστας άδυνατεί νά μεταφέρει τό φορτίο τών 36 βιβλίων - άναγνωστικών τής Δ' τάξεως. Αύτά γιά νά μεταφερθοῦν πιά εύκολα, πρέπει νά χωριστοῦν σέ 4 ίσα μέρη, γιά νά μεταφερθοῦν από 4 παιδιά, έτσι πού τό καθένα από τά 4 παιδιά νά μεταφέρει τόν ίδιο αριθμό βιβλίων. Από πόσα βιβλία πρέπει νά αποτελείται καθένα από τά ίσα μέρη;




Εικ. 35

Γιά νά βροῦμε πόσα βιβλία θά μεταφέρει κάθε παιδί, πρέπει νά βροῦμε, πόσες φορές χωράει ό 4 στόν 36. Πρέπει δηλαδή νά

πάρουμε αρχικά 4 βιβλία και νά δώσουμε σέ κάθε παιδί από ένα, όποτε θά μείνουν 32 βιβλία. Νά πάρουμε πάλι άλλα 4 βιβλία και νά δώσουμε από ένα σέ κάθε παιδί, και νά συνεχίσουμε, έως ότου ξεξαντηθούν όλα τά βιβλία. Όπως φαίνεται στή διπλανή εικόνα, τό κάθε παιδί θά μεταφέρει 9 βιβλία. Όσες φορές δηλαδή θά αφαιρέσουμε τόν 4 από τό 36.

Λύσαμε, λοιπόν, τό πρόβλημα μέ 9 συνεχείς αφαιρέσεις.



Εικ. 36

"Αν όμως ζητούσαμε νά βρούμε, πόσες φορές χωράει ό 7 στόν 938, θά έπρεπε νά κάνουμε πολλές αφαιρέσεις και σέ πολύ χρόνο.

"Όπως, όμως, τήν πρόσθεση πολλών ίσων προσθετών τή σημειώνουμε σύντομα μέ ένα πολλαπλασιασμό, έτσι και τήν αφαίρεση πολλών ίσων αφαιρετών θά τή σημειώνουμε σύντομα μέ μία νέα πράξη πού τή λέμε **διαίρεση**.

ΒΛΕΠΕΤΕ; †

Διαίρεση λέγεται ή πράξη πού κάνουμε γιά νά βρούμε σύντομα, πόσες φορές τό πολύ χωράει ένας αριθμός μέσα σέ έναν άλλον καί τί περισσεύει, αν περισσεύει.

Παράδειγμα: Πόσες φορές χωράει ό 8 στόν 35; Μέ 4 συνεχείς αφαιρέσεις βρίσκουμε πώς χωράει 4 φορές καί μένει καί 3 υπόλοιπο.

43. Γραφή τής διαιρέσεως

Ό αριθμός 36, στό παραπάνω παράδειγμα, είναι ό διαιρετέος καί ό 4 ό διαιρέτης.

Τή διαίρεση σημειώνουμε μέ τό σύμβολο (:), πού διαβάζεται **διά** καί τό γράφουμε μεταξύ διαιρετέου καί διαιρέτη έτσι:

$$36 : 4 = 9$$

Ό 9 είναι πηλίκο.

Έδω πρέπει νά σημειωθεί, πώς ό διαιρετέος πρέπει νά είναι πάντοτε μεγαλύτερος ή ίσος από τό διαιρέτη, γιά νά είναι δυνατή ή διαίρεση.

Επίσης, όπως στόν πολλαπλασιασμό, έτσι καί στή διαίρεση λέμε συχνά, πώς διαιρώ τό 36 μέ τό 4 αντί νά λέμε **διά** τοῦ 4.

44. Άτελής καί τέλεια διαίρεση

Στή διαίρεση $54 : 9$ τό πηλίκο είναι 6 καί τό υπόλοιπο μηδέν. Δηλαδή δέν υπάρχει υπόλοιπο. Αὐτή λέγεται **τέλεια**. Στή διαίρεση $25 : 4$ τό πηλίκο είναι 6 καί τό υπόλοιπο 1. Ἡ διαίρεση αὐτή πού ἔχει υπόλοιπο, λέγεται **άτελής**.

45. Σχέση μεταξύ: διαιρετέου, διαιρέτη, πηλίκου καί υπόλοιπου.

Στή διαίρεση: $58 : 7$, πού τό πηλίκο είναι 8 καί τό υπόλοιπο 2 παρατηρούμε, πώς: $58 = (7 \times 8) + 2$

Όμοια στη διαίρεση $36 : 4 = 9$ παρατηρούμε πώς: $36 = 4 \times 9$
Δηλαδή: (Διαιρετέος) = (διαιρέτης) \times (πηλίκo) + (ύπόλοιπο)

ΒΛΕΨΕΤΕ; ♣

Σέ κάθε διαίρεση ó διαιρετέος είναι ίσος μέ τό γινόμενο του διαιρέτη, επί τό πηλίκo, σύν τό υπόλοιπο (άν υπάρχει).

Άπό τό παραπάνω γίνεται φανερό, πώς μέ τή **διαίρεση θρίσκου** μέ τό **μεγαλύτερο άκέραιο**, πού τό γινόμενό του μέ τό **διαιρέτη** δέν ξεπερνά τό **διαιρετέο**.

Άσκήσεις καί προβλήματα:

174. Νά βρείτε νοερά, μέ τή χρήση του Πυθαγόρειου πίνακα τά παρακάτω πηλίκα καί υπόλοιπα.

1) $72 : 9 =$ 2) $63 : 7 =$ 3) $28 : 7 =$ 4) $35 : 5 =$

5) $60 : 7 =$ 6) $62 : 8 =$ 7) $79 : 9 =$ 8) $27 : 4 =$

10) $36 : 5 =$

175. Άπό τήν ισότητα $216 = 12 \times 18$ πώσες καί ποιές διαιρέσεις παίρνετε; (Ύπόδειξη: Διαιρετέος = (διαιρέτης) \times (πηλίκo)).

176. Νά βρείτε τό μισό στους παρακάτω αριθμούς (διαίρεση διά 2).

120, 80, 162, 184, 206, 228, 308, 494, 286, 240, 244.

177. Νά βρείτε τό τρίτο καθενός άπό τους αριθμούς (διαίρεση διά 3).

180, 90, 120, 150, 240, 600, 279, 339, 930, 366.

178. Νά συμπληρωθούν οι ισότητες: 1) ... = $11 \times 12 + 7$,

2) $227 = 13 \times 17 + \dots$ (Ύπόδειξη: (Διαιρετέος) = (Διαιρέτης) \times (Πηλίκo) + Ύπόλοιπο).

179. Στή διαίρεση πού έκανε ένας μαθητής διά 17 έγραψε πηλίκo 5 καί υπόλοιπο 23. Έγραψε σωστά; Μπορείτε νά τό διορθώσετε;

180. Ποιές τιμές μπορεί νά πάρει τό υπόλοιπο τής διαίρεσως διά 5;

181. Άν τό γινόμενο δύο αριθμών είναι 81 καί ό ένας άπό αυτούς είναι 9, ποιός είναι ό άλλος;

182. Μέ ποιόν αριθμό πρέπει να πολλαπλασιασθεί ό 7, για νά δώσει γινόμενο τόν 63;

183. Για νά γίνει τέλεια, μιά άτελής διαίρεση, ποιόν αριθμό πρέπει νά αφαιρέσουμε άπό τό διαιρετέο;

184. Ίσχύει ό νόμος τής άντιμεταθέσως στή διαίρεση;

43. Ἡ τεχνική τῆς διαιρέσεως

1. Διαιρέτης μονοψήφιος

Πρόβλημα:

Ἐνας φιλάνθρωπος μοίρασε 438 δραχμές σέ 6 φτωχούς.
Πόσα πήρε κάθε φτωχός;

Παρατηροῦμε, πώς:

$438 \text{ δραχμές} = 4 \text{ κατοστάρικα} + 3 \text{ δεκάρικα} + 8 \text{ δραχμές.}$

Δέν μπορεί ὅμως νά μοιράσει τά 4 κατοστάρικα στά 6 πρόσωπα. Μπορεῖ ὅμως νά τά ἀντικαταστήσει μέ 40 δεκάρικα. Θά ἔχει τότε νά μοιράσει: 43 δεκάρικα στά 6 πρόσωπα.

Τό πηλίκο $43 : 6$ εἶναι 7 καί μένει ὑπόλοιπο 1 δεκάρικο.

Βλέπουμε, λοιπόν, πώς κατά τήν πρώτη διανομή κάθε φτωχός πήρε 7 δεκάρικα καί

ὑπολείπονται γιά διανομή:

$1 \text{ δεκάρικο} + 8 \text{ δραχμές} = 18 \text{ δραχμές.}$

Τό πηλίκο $18 : 6$ εἶναι 3 καί τό ὑπόλοιπο μηδέν.

Κατά τή δεύτερη, λοιπόν, διανομή κάθε ἕνας ἀπό τούς 6 φτωχούς πήρε 3 δραχμές.

Ὡστε κάθε φτωχός θά πάρει: $7 \text{ δεκάρικα} + 3 \text{ δραχμές} = 73 \text{ δραχμές.}$

Πρακτικά γίνεται ὅπως παρακάτω:

1ος μερικός διαιρετέος ὁ 43	→ 438	6	πηλίκο)
	−42	73	
2ος μερικός διαιρετέος	→ 18		
	−18		
ὑπόλοιπο	→ 0		

Πρακτικά λέμε:

Ἐνα ψηφίο ἔχει ὁ διαιρέτης (τόν 6), ἕνα χωρίζουμε καί ἀριστερά τοῦ διαιρετέου (τόν 4). Τό 6 στό 4 δέ χωράει, γι' αὐτό χωρίζουμε κι ἄλλο ψηφίο, τό 3, πού τώρα γίνεται 43.

Ὁ 43 λέγεται πρῶτος μερικός διαιρετέος. Κι ἐξακολουθοῦμε νά λέμε: τό 6 στό 43 χωράει 7. Γράφουμε τό 7 σάν πρῶτο ψηφίο τοῦ πηλίκου, καί τό γινόμενο $6 \times 7 = 42$, ἀφαιρούμενο ἀπό τό 43 ἀφήνει ὑπόλοιπο ἕνα (1).

Κατεβάζουμε καί τό ψηφίο, τοῦ διαιρετέου 8, πού τότε γίνεται 18. Ὁ 18 εἶναι ὁ δεύτερος μερικός διαιρετέος. Κι ἐξακολου-

θοῦμε νά λέμε τό 6 στό 18 χωράει 3 φορές. Γράφουμε τό 3 σάν δεύτερο ψηφίο τοῦ πηλίκου καί τό γινόμενο $6 \times 3 = 18$ ἀφαιρούμενο ἀπό τό 18, ἀφήνει ὑπόλοιπο μῆδέν. Ἔτσι θρῖσκουμε πηλίκο 73 καί ὑπόλοιπο μῆδέν.

3. Δοκιμή τῆς διαιρέσεως

Ἡ δοκιμή βασίζεται στόν κανόνα:

$$(\text{Διαιρετέος}) = (\text{Διαιρέτης}) \times (\text{πηλίκο}) + (\text{ὑπόλοιπο}).$$

Γιά τήν προηγούμενη διαίρεση ἔχουμε:

$$\begin{array}{r} 73 \\ \times 6 \\ \hline 438 \end{array}$$

Ἐπειδῆ θρήκαμε τό διαιρετέο, ἡ πράξη εἶναι σωστή.

Ἐδῶ πρέπει νά σημειώσουμε, πῶς τό ὑπόλοιπο πρέπει πάντοτε νά εἶναι μικρότερο ἀπό τό διαιρέτη.

Διαίρεση μέ ὑπόλοιπο καί ἡ δοκιμή τῆς.

$$\begin{array}{r|l} 839 & 7 \\ 13 & 119 \\ 69 & \times 7 \\ 6 & \hline & 833 \\ & + 6 \\ & \hline & 839 \end{array}$$

Ἀσκήσεις:

Νά γίνουν οἱ διαιρέσεις καί οἱ δοκιμές τους:

$$185. \quad 512 : 4, \quad 631 : 3, \quad 658 : 5, \quad 748 : 6.$$

$$186. \quad 969 : 8, \quad 824 : 9, \quad 985 : 5, \quad 666 : 5.$$

Νά συμπληρωθοῦν οἱ ἰσότητες:

$$187. \quad ; \times 5 + 35 = 410,$$

$$188. \quad ; \times 8 = 280$$

$$189. \quad \dots \begin{array}{r} 9 \\ 7 \overline{) 99} \end{array}$$


[Ὑπόδειξη: (Διαιρετέος) = (διαιρέτης) \times (πηλίκο) + (ὑπόλοιπο)].

44. Διαίρεση μετρήσεως

1ο πρόβλημα:

Σ' ἓνα ἄλμπουμ πρόκειται νά ταξινομήσουμε 72 φωτογραφίες.

Σέ κάθε σελίδα τοποθετούμε 6 φωτογραφίες. Πόσες σελίδες θά μᾶς χρειαστοῦν:



Εικ. 37

Εἶναι φανερό, πῶς θά μᾶς χρειαστοῦν τόσες σελίδες, ὅσες φορές ὁ 6 χωράει στόν 72. Θά κάνουμε δηλαδή διαίρεση: $72 : 6$. Εὐκόλα βρίσκουμε πηλίκο **12 σελίδες** καί ὑπόλοιπο μηδέν.

Ἐδῶ ἔχουμε διαίρεση μέ διαιρετέο (72 φωτογραφίες) καί διαιρέτη (6 φωτογραφίες) συγκεκριμένους καί ὁμοειδεῖς. Βλέπουμε ὅμως, πῶς τό εἶδος τοῦ πηλίκου δέν ὀρίζεται ἀπό τό εἶδος τοῦ διαιρετέου ἢ τοῦ διαιρέτη, ἀλλά ἀπό τήν ἐκφώνηση τοῦ προβλήματος. Ἡ διαίρεση αὐτή εἶναι: **μέτρηση** καί τό πηλίκο λέγεται **λόγος**.

Βλέπετε; ♣

Ὅταν ὁ διαιρετέος καί ὁ διαιρέτης εἶναι συγκεκριμένοι καί ὁμοειδεῖς, ἡ διαίρεση εἶναι **μετρήσεως**.

Πότε κάνουμε διαίρεση μετρήσεως

Ὅπως φαίνεται στό παραπάνω παράδειγμα, διαίρεση μετρήσεως κάνουμε, ὅταν ξέρουμε: τήν τιμή τῆς μιᾶς μονάδας (6 φωτογραφίες στή μιά σελίδα), τήν τιμή τῶν πολλῶν μονάδων (72 φωτογραφίες) καί ζητοῦμε τό πλῆθος τῶν μονάδων, πού ἀντιστοιχοῦν στήν τιμή αὐτή.

Προβλήματα:

190. Ἐνα μέτρο κορδέλα ἀξίζει 9 δραχμές. Μὲ 108 δραχμές πόσα μέτρα ἀγοράζουμε:

191. Νά διατυπώσεις ένα πρόβλημα, πού νά ζητείται τό πλήθος τών μονάδων.


$$(\text{πλήθος μονάδων}) = (\text{τιμή πολλών μονάδων}) : (\text{τιμή μίας μονάδας})$$

192. Μοιράστε 18 σοκολάτες καί δώστε από τρεις σέ κάθε παιδί. Σέ πόσα παιδιά τίς μοιράσατε;
193. Στό προηγούμενο πρόβλημα τί πράξη θά κάνετε; Ποιόν θά βάλετε σάν διαιρετέο; Ποιόν σάν διαιρέτη; Τό πηλίκο πρός ποιόν εἶναι ὁμοειδές; Τί διαίρεση εἶναι;
194. Ἐνας χωρικός ἔβαλε 135 κιλά λάδι σέ δοχεῖα τών 9 κιλῶν. Πόσα δοχεῖα χρησιμοποίησε;
195. Πόσα τάλτρα κάνουν 775 δραχμές;

45. Διαίρεση μερισμοῦ

2ο Πρόβλημα:

Ἐνας αὐγοπώλης θέλει νά τοποθετήσει σέ 8 αὐγουλιέρες 248 αὐγά. Πόσα αὐγά θά βάζει σέ κάθε αὐγουλιέρα;



Εἶναι φανερό, πώς θά βάλει σέ κάθε αὐγουλιέρα τόσα αὐγά, ὅσες φορές χωράει τό 8 στό 248.

Ἄν κάνουμε τή διαίρεση $248 : 8$, βρίσκουμε πώς σέ κάθε αὐγουλιέρα θά τοποθετήσει 31 αὐγά.

Εἰκ. 38

Συμπεράσματα:

Στό πρῶτο πρόβλημα γνωρίζαμε τήν τιμή τῆς μίας μονάδας (6 φωτογραφίες), τήν τιμή τών πολλών μονάδων (72 φωτογραφίες) καί ζητοῦμε νά βροῦμε τό πλήθος τών μονάδων, πού ἀντιστοιχεῖ στήν τιμή τών πολλών μονάδων.

Στό δεύτερο πρόβλημα: Γνωρίζουμε την τιμή τῶν πολλῶν μονάδων καί ζητοῦμε την τιμή τῆς μιᾶς μονάδας.

Ἐδῶ παρατηροῦμε, (προβλ. παράγραφο 42) πῶς ὁ διαιρετέος (36 βιβλία) καί ὁ διαιρέτης (4 παιδιά) εἶναι **συγκεκριμένοι** ἀλλά **έτεροειδείς** τό δέ πηλίκο ὁμοειδές μέ τό διαιρετέο.

Τή διαίρεση αὐτή τή λέμε **μερισμοῦ** καί τό πηλίκο λέγεται καί **μερίδιο**.

Βλέπετε; ♦

Ὅταν ὁ διαιρετέος καί ὁ διαιρέτης εἶναι συγκεκριμένοι καί έτεροειδείς, τότε ἡ διαίρεση εἶναι **μερισμοῦ**.

46. Πότε κάνουμε διαίρεση μερισμοῦ

Ὅπως φαίνεται στό προηγούμενο παράδειγμα, διαίρεση μερισμοῦ κάνουμε: Ὅταν γνωρίζουμε την τιμή τῶν πολλῶν μονάδων (36 βιβλία) καί ζητοῦμε την τιμή τῆς μιᾶς μονάδας (τό μερίδιο πού ἀντιστοιχεῖ στό κάθε παιδί γιά μεταφορά).

Προβλήματα:

196. Νά μοιραστοῦν 135 τετράδια σέ 9 μαθητές. Πόσα τετράδια θά πάρει ὁ καθένας;
197. Στό προηγούμενο πρόβλημα τί πράξη θά κάνετε; Ποῖόν ἀριθμό θά πάρετε σάν διαιρετέο; Τό πηλίκο πρός ποιόν εἶναι ὁμοειδές. Τί διαίρεση εἶναι;
198. Νά διατυπώσετε ἕνα πρόβλημα μέ τούς ἀριθμούς 63 καί 9, πού νά ζητεῖται ἡ τιμή τῆς μιᾶς μονάδας.
199. Μιά μητέρα μοίρασε ἐξ ἴσου 450 δραχμές στά 5 παιδιά της. Πόσα ἔδωσε στό καθένα;
200. Νά διατυπώσεις ἕνα πρόβλημα, πού νά ζητεῖται ἡ τιμή τῆς μιᾶς μονάδας.
(Ἡ τιμή μιᾶς μονάδας) = (τιμή πολλῶν μονάδων) : (πλήθος μονάδων)
201. Τά 8 μέτρα ὑφασμα ἔχουν 248 δραχμές. Πόσο ἔχει τό 1 μέτρο;
202. Ἐνα αὐτοκίνητο σέ 7 ὥρες διέτρεξε μιά ἀπόσταση 735 χιλιόμετρα. Πόσα χιλιόμετρα ἔτρεχε τήν ὥρα;

- † 203. 972 κιλά πορτοκάλια πρόκειται να συσκευαστούν για αποστολή σε 9 κιβώτια. Πόσα πορτοκάλια θα πάρει τό κάθε κιβώτιο;
- † 204. 896 αυγά πρόκειται να συσκευαστούν σε 8 κιβώτια ίσα. Πόσα αυγά πρέπει να χωρεί τό κάθε κιβώτιο;
205. 6 κιβώτια μέ ίσο αριθμό κιλών μήλων περιέχουν 618 κιλά. Πόσα κιλά περιέχει τό κάθε κιβώτιο;
206. 5 βιβλία αριθμητικής έχουν όλα μαζί 440 φύλλα. Πόσα φύλλα έχει τό κάθε βιβλίο καί πόσες σελίδες;
207. "Αν ένα αυτοκίνητο γιά να τρέξει ένα διάστημα 826 χιλιομέτρων χρειάζεται 7 ώρες, πόσα χιλιόμετρα αναλογούν στην ώρα;
208. Μιά χαρτοβιομηχανία πρέπει να παραδώσει στην επιχείρηση μιάς εφημερίδας, 36 ρολά χαρτί γιά τήν έκδοση τής εφημερίδας. Τό αυτόκίνητο, πού διαθέτει ή βιομηχανία γιά τή μεταφορά, έχει τή δυνατότητα να μεταφέρει τό πολύ 9 ρολά χαρτί. "Αν ή μεταφορά γίνεται σε απόσταση 48 χιλιομέτρων, ποιά απόσταση θά διανύσει τό αυτόκίνητο;
209. "Ένα αυτοκίνητο γιά να διατρέξει ένα διάστημα 840 χιλιομέτρων, χρειάστηκε 8 ώρες. Πόσα χιλιόμετρα διέτρεξε τήν ώρα; αν δεχθούμε ότι κάθε ώρα διέτρεχε ίσο διάστημα;
210. Μιά θρύση γεμίζει σε 8 ώρες μιά άδεια δεξαμενή, πού χωρεί 888 κιλά νερό. Πόσα κιλά νερού ρίχνει τήν ώρα;
211. "Από δύο σιδηροδρόμους ό ένας διατρέχει 675 χιλιόμετρα σε 9 ώρες. "Ένας άλλος σιδηρόδρομος διατρέχει 480 χιλ. σε 6 ώρες. Ποιός είναι ταχύτερος; καί πόσα χιλιόμετρα τήν ώρα;
212. "Ένας χωρικός πούλησε 70 κιλά πατάτες πρós 8 δραχμές τό κιλό. Πόσα κιλά λάδι θά πάρει πρós 80 δραχμές τό κιλό;
213. "Η Μαρία έχει 94 δραχμές καί ή Έλένη 68 δραχμές. Πόσες δραχμές πρέπει να δώσει ή Μαρία στην Έλένη, γιά να έχουν ίσα χρήματα; καί πόσα γιά να έχει ή Μαρία 10 δραχμές περισσότερα;

47. Ειδικές περιπτώσεις διαιρέσεων

1. "Από τίς ισότητες: (Διαιρετέος) = (Διαιρέτης) × (πηλίκιο)

$$1) 7 = 7 \times 1$$

$$2) 7 = 1 \times 7$$

$$3) 0 = 5 \times 0$$

Συμπεραίνουμε: 1) $7 : 7 = 1$

$$2) 7 : 1 = 7$$

$$3) 0 : 5 = 0$$

Βλέπετε; ♦

- 1) Κάθε αριθμός διαιρούμενος με τον εαυτό του δίνει πηλίκο 1.
- 2) Κάθε αριθμός διαιρούμενος με τη μονάδα δίνει πηλίκο τον εαυτό του.
- 3) Όμηδέν, όταν διαιρεθεί με φυσικό αριθμό, δίνει πηλίκο μηδέν.

2. Ή διαίρεση: $3 : 0 =$; είναι δυνατή;

Παρατηρούμε ότι τό $3 : 0$ μάς λέει, πώς πρέπει να βρούμε σάν πηλίκο έναν αριθμό, πού αν πολλαπλασιασθεῖ με τό μηδέν, να δίνει τό 3. Αυτό όμως είναι αδύνατο (γιατί); (Σελίδα 54 παράδειγμα β. γ).

Άρα: διαίρεση φυσικοῦ αριθμοῦ με τό μηδέν είναι αδύνατος.

3. Προβλήματα:

1. Αν μοιραστούν 20 τετράδια σε 3 παιδιά, πόσα θά πάρει τό καθένα;
 2. Αν μοιραστούν διπλάσια (40) τετράδια σε διπλάσια (6) παιδιά πόσα θά πάρει τό καθένα;
 3. Αν μοιραστούν τριπλάσια (60) τετράδια σε τριπλάσια (9) παιδιά, πόσα θά πάρει τό καθένα;
- Τί παρατηρεῖτε;

Βλέπετε; ♦

Αν πολλαπλασιάσουμε ἢ διαιρέσουμε καί τό διαιρετέο καί τό διαιρέτη με τόν ἴδιο φυσικό αριθμό, τό μέν πηλίκο παραμένει ἀμετάβλητο, τό δέ ὑπόλοιπο (αν ὑπάρχει) πολλαπλασιάζεται ἢ διατηρεῖται με τόν ἴδιο φυσικό αριθμό.

Άσκησης:

214. Να γίνουν οἱ διαιρέσεις: (Ύπόδ.: (πηλίκο) × (διαρέτης) = Διαιρετέος)

1) $0 : 3$

2) $8 : 8$

3) $\dots \times 8 = 0$

4) $9 : 9$

5) $0 : 9$

6) $\dots \times 8 = 8$

7) $\dots \times 3 = 3$

8) $27 : 27$

$6 : 6 =$
 $897 : 5 =$

$0 : 5 =$
 $7 : 0 \neq$
 $0 : 8 =$
 $12 : 0 =$

$5 : 5 =$
 $35 : 35 =$
73

Άσκησης για επανάληψη των 4 πράξεων:

215. Νά κάνετε τις παρακάτω πράξεις:

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1) $109 + 101 + 105$ | 11) 48×13 |
| 2) $201 + 102 + 5$ | 12) 37×18 |
| 3) $506 + 114 + 93$ | 13) 39×17 |
| 4) $409 + 201 + 52$ | 14) 41×22 |
| 5) $309 + 108 + 69$ | 15) 84×11 |
| 6) $735 - 602$ | 16) $839 : 5$ |
| 7) $809 - 344$ | 17) $966 : 3$ |
| 8) $999 - 99$ | 18) $934 : 6$ |
| 9) $960 - 609$ | 19) $806 : 7$ |
| 10) $532 - 50$ | 20) $564 : 8$ |

216. Νά συμπληρώσετε τούς αριθμούς που σημειώνονται με τελείες στις παρακάτω περιπτώσεις:

- 1) $672 : \dots = 7$, 2) $\dots : 9 = 16$, 3) $\dots \times 8 = 880$, 4) $595 : \dots = 35$

217. Γράψτε όλους τούς πολλαπλασιασμούς δύο άκεραίων που έχουν γινόμενο:

- 1) 16, 2) 20, 3) 46, 4) 56, 5) 64

Προβλήματα για επανάληψη των 4 πράξεων

218. Κατά τή διάρκεια του ταξιδιού του ο κ. Δαφνόπουλος παρατήρησε ότι τό αυτοκίνητό του διέτρεξε απόσταση 189 χιλιόμετρα. Πόσα χιλιόμετρα έχει νά διατρέξει ακόμα, γιά νά καλύψει μιά απόσταση 306 χιλιομέτρων:
219. Σέ μιά θεατρική παράσταση ήταν 905 άτομα. Από αυτά 118 ήταν παιδιά καί τ' άλλα άνδρες καί γυναίκες. Οί άνδρες ήταν 37 περισσότεροι από τίς γυναίκες. Πόσοι ήταν οί άνδρες καί πόσες οί γυναίκες;
220. Όδηγώντας μέσα στήν πόλη μέ πυκνή κυκλοφορία ο κύριος Δαφνόπουλος διαπίστωσε, πώς χρησιμοποίησε 24 λίτρα καύσιμα καί διέτρεξε απόσταση 360 χιλιομέτρων. Πόσα χιλιόμετρα ταξίδεψε μέ ένα λίτρο καύσιμα:
221. Ένας γυαλοπώλης πούλησε μιά δωδεκάδα πιάτα καί πήρε 660 δραχμές. Από αυτές 168 ήταν κέρδος. Πόσο είχε αγοράσει τό ένα:
222. Ένα πλοίο έκανε ένα ταξίδι σέ 21 ώρες. Τίς πρώτες 11 ώρες έπλεε μέ 15 μίλια τήν ώρα. Τίς υπόλοιπες ώρες έπλεε μέ 17 μίλια. Πόσα μίλια ήταν όλο τό ταξίδι του:

223. "Ενας μανάβης αγόρασε μήλα πρὸς 340 δραχμὲς τὰ 10 κιλά καὶ τὰ πούλησε πρὸς 250 δραχμὲς τὰ 5 κιλά. "Αν πούλησε 60 κιλά μήλα πόσες δραχμὲς κέρδισε;
224. Δυὸ πεζοπόροι φίλοι, πού τὰ χωριά τους ἀπέχουν 36 χιλιόμετρα, ξεκίνησαν τὴν ἴδια ὥρα ὁ καθένας ἀπὸ τὸ χωριὸ του καὶ βαδίζουν μέχρι νὰ συναντηθοῦν. "Αν ὁ πρῶτος βαδίζει 5 χιλιόμετρα τὴν ὥρα καὶ ὁ δεῦτερος 4, σέ πόσες ὥρες θὰ συναντηθοῦν καὶ σέ ποιά ἀπόσταση ἀπὸ τὸ χωριὸ τοῦ πρῶτου;
225. Κάποιοι ταχυδρόμοι εἶχε στὴν τσάντα του 108 ἐπιστολὲς συστημένες καὶ ἀπλές. Οἱ ἀπλές ἦταν κατὰ 30 περισσότερες ἀπὸ τίς συστημένες. Πόσες ἦταν οἱ ἀπλές καὶ πόσες οἱ συστημένες;
226. Μιά πωλήτρια γραμματοσήμων εἶχε χρεωθεῖ 290 γραμματόσημα τῶν 2 δραχμῶν καὶ τῶν 5 δραχμῶν. Τὰ γραμματόσημα τῶν δύο δραχμῶν ἦσαν 20 λιγότερα ἀπὸ τὰ γραμματόσημα τῶν 5 δραχμῶν. Πόσες δραχμὲς θὰ εἰσπράξει ἀπὸ τὴν πώλησὴ τους;
227. Τὸ λεωφορεῖο μὲ τὸ ὅποιο γύρισε ὁ Γιώργος ἀπὸ τὴν πόλη εἶχε 52 ἐπιβάτες πού ὁ καθένας πλήρωσε εἰσιτήριο 19 δραχμῆς. Ἀπὸ τὰ χρήματα τῶν εἰσιτηρίων ὁ ὁδηγὸς ἐπλήρωσε 712 δραχμὲς γιὰ τὴ λήπανση τῆς μηχανῆς τοῦ αὐτοκινήτου. Πόσα χρήματα τοῦ ἔμειναν;
228. "Ενας χωρικός πούλησε 11 κιλά λάδι πρὸς 88 δραχμὲς τὸ κιλό καὶ μὲ τὰ χρήματα πού πήρε αγόρασε 3 μέτρα ὕφασμα πρὸς 219 δραχμῆς τὸ μέτρο. Πόσα χρήματα τοῦ περίσσεψαν;
229. "Ενας βιβλιοπώλης αγόρασε 7 δωδεκάδες μολύβια πρὸς 11 δραχμῆς τὸ ἓνα. Πόσα ρέστα θὰ πάρει ἀπὸ ἓνα χιλιάρικο;
230. "Ενα αὐτοκίνητο διανύει μιά ἀπόσταση σέ 4 ὥρες. "Αν ἔτρεχε μὲ ταχύτητα 30 χιλιόμετρα τὴν ὥρα περισσότερο, θὰ διέτρεχε τὴν ἀπόσταση σέ 3 ὥρες. Πόσα χιλιόμετρα εἶναι ὅλη ἡ ἀπόσταση;
231. Μιά κυρία αγόρασε 45 κουτιά γάλα καὶ πλήρωσε 765 δραχμῆς. Πόσα ἔδωσε, μιά ἄλλη κυρία πού αγόρασε 33 κουτιά γάλα τῆς ἴδιας ποιότητος;
232. "Ενας γυαλοπώλης ἐπρόκειτο νὰ πούλησει ποτήρια πρὸς 5 δρχ. τὸ ἓνα. Κατὰ τὴ μεταφορὰ ὁμως τοῦ ἔσπασαν 20 καὶ πούλησε τὰ ὑπόλοιπα πρὸς 9 δραχμῆς τὸ ἓνα, μὰ δὲ ζημιώθηκε. Πόσα ποτήρια πούλησε;
233. Μὲ 850 δραχμῆς αγόρασε κάποιος 9 κιλά λάδι καὶ πήρε ρέστα 22 δραχμῆς. Πόσο αγόρασε τὸ κιλό τὸ λάδι;
234. Γιὰ 3 μέτρα ὕφασμα καὶ γιὰ τὴν ἐξόφληση χρέους 65 δραχμῶν, ἔδωσε κάποιος 950 δραχμῆς. Πόσο τιμᾶται τὸ μέτρο τοῦ ὕφασματος;
235. 7 κιλά ζάχαρη ἀξίζουν 66 δραχμῆς ἀκριβότερα ἀπ' τὰ 4 κιλά. Πόση

- είναι ή τιμή του ενός κιλοῦ;
236. Ὁ πατέρας του Κωστάκης είναι 39 ἐτῶν. Ὁ Κωστάκης είναι 9 ἐτῶν καί ή ἀδερφή του 5 ἐτῶν. Μπορεῖτε νά βρεῖτε, ποιά θά είναι ή ηλικία του πατέρα, ὅταν τά δύο παιδιά θά ἔχουν ἀθροισμα ηλικίας 50 ἐτῶν;
237. Ἐνας φιλόπληθος θέλει νά μοιράσει ἕνα χρηματικό ποσό σέ φτωχοῦς. Παρατηρεῖ ὅμως, πῶς ἂν δώσει σέ καθένα ἀπό 70 δραχμές, θά του περισσέψουν 150 δρχ. Ἄν δώσει στόν καθένα ἀπό 80, θά του λείπουν 100 δρχ. Πόσοι εἶναι οἱ φτωχοί καί πόσο ἦταν τό χρηματικό ποσό;
238. Ἐνας ἔμπορος ἀγόρασε ἕνα τόπι ὑφασμα πρὸς 160 δραχμές τό μέτρο. Ὑπελόγησε ὅμως, ὅτι, ἂν τό πλήρωνε 175 δρχ. τό μέτρο, θά του ἔλειπαν 900 δρχ. Πόσο ἦταν τό μήκος του ὑφάσματος;
239. Θέλω νά μοιράσω 400 δραχμές σέ τρεῖς ἀνθρώπους, ἔτσι πού ὁ β' νά λάβει 25 δραχμές περισσότερες ἀπό τόν α', καί ὁ γ' 50 δραχμές περισσότερες ἀπό τόν β'. Πόσες θά δώσω στόν καθένα;
240. Πρόκειται 336 μαθητές νά μεταφερθοῦν σέ ἐκδρομή μέ αὐτοκίνητο. Ἄν μεταφερθοῦν μέ 7 αὐτοκίνητα, πόσα παιδιά θά τοποθετηθοῦν σέ καθένα, καί πόσα ἂν σέ 8 αὐτοκίνητα;
241. Σέ κάποιο μαθητή δόθηκαν 50 προβλήματα γιά λύση. Συμφωνήθηκε νά ἀμείβεται μέ 2 μονάδες γιά κάθε πρόβλημα, πού θά λύνει καί νά χάνει μιά μονάδα γιά κάθε πρόβλημα, πού δέ θά λύνει. Ὅταν ἐργάστηκε καί στά 50 προβλήματα, εἶχε κερδίσει 79 μονάδες. Σέ πόσα προβλήματα ἔδωσε λύση;

ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΟΤΑΝ:

1. Ἀναβάλετε τήν μελέτη σας γιά ἀργότερα.
2. Δέν ἀκολουθεῖτε τίς ὁδηγίες καί τούς κανόνες.
3. Σταματᾶτε τή μελέτη σας πρὶν κατανοήσετε ὅλα τά μέρη του θέματος.
4. Δέ ρωτᾶτε γιά τά πράγματα πού δέν καταλαβαίνετε καί
5. Ὅταν μπαίνετε σέ πειρασμό νά δανειστεῖτε τίς λύσεις ἀπό φίλους σας ἢ ἀπό βιβλία.

Τό τετράγωνο
Τό ὀρθογώνιο
Τό τρίγωνο
Ὁ κύκλος


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο

Ἐπίπεδα σχήματα


48. Τό τετράγωνο

Ἔννοια


Βλέπουμε τό τετράγωνο στά πλακάκια τῆς κουζίνας ἢ τοῦ μπάνιου, στό τετραγωνισμένο τετράδιο ἀριθμητικῆς, στά καρτέ κεντήματος, στή σκακιέρα πού εἰκονίζεται κ.τ.λ.



Εἰκ. 39



Εἰκ. 40




Εἰκ. 41

49. Πῶς θά κατασκευάσετε ἕνα τετράγωνο


Πρῶτος τρόπος

Διπλώνετε ἕνα φύλλο τοῦ τετραδίου σας, ὅπως τό βλέπετε στήν εἰκόνα:



Εἰκ. 42

Δεύτερος τρόπος:



Εικ. 43


Μέ τη βοήθεια του κανόνα και του γνώμονα, όπως βλέπετε στην παραπάνω εικόνα.

Παρατηρήσεις:


Παρατηρήστε τό τετράγωνο, πού κατασκευάσατε:



Εικ. 44



Εικ. 45 Άλλος τρόπος σύγκρισης πλευρών και γωνιών του τετραγώνου.




1. Πόσες γωνίες έχει και πόσες πλευρές;
 2. Νά μετρήσετε τό μέγεθος τών γωνιών του μέ τη βοήθεια του γνώμονα.
 3. Νά βρείτε τό μήκος κάθε πλευράς μέ τό ύποδεκάμετρο.
- Τό τετράγωνο πού κατασκευάσα, έχει γωνίες και πλευρές, πού κάθε μία έχει μήκος εκατοστά.

ΒΛΕΠΕΤΕ; ♦

Τό τετράγωνο έχει 4 πλευρές ίσες μεταξύ τους και 4 γωνίες ίσες μεταξύ τους.

50. Περίμετρος τετραγώνου

Τό μήκος καί τό πλάτος είναι οί διαστάσεις τοῦ τετραγώνου.



Εικ. 46

Ὁ φράχτης πού εἰκονίζεται, ἀκολουθεῖ τό περίγραμμα τοῦ τετραγώνου τοῦ οἰκοπέδου. Γιά νά βροῦμε τό μήκος τοῦ σύρματος τοῦ φράχτη πρέπει νά βροῦμε τό ἄθροισμα τῶν μηκῶν τῶν πλευρῶν τοῦ τετραγώνου δηλ. τήν **περίμετρο** τοῦ τετραγώνου.

Βλέπετε; ♦

Περίμετρος τετραγώνου λέγεται τό ἄθροισμα τῶν μηκῶν τῶν πλευρῶν τοῦ τετραγώνου.

Παράδειγμα:

Ἡ πλευρά τοῦ τετραγώνου τοῦ οἰκοπέδου πού εἰκονίζεται, εἶναι 30 μέτρα. Πόση εἶναι ἡ περίμετρος τοῦ τετραγώνου;

$$30\mu + 30\mu + 30\mu + 30\mu = 30\mu \times 4 = 120 \text{ μέτρα.}$$

Πρακτικές ἐργασίες

242. Νά ὀνομάσετε ἀντικείμενα, πού νά ἔχουν τό σχῆμα τετραγώνου.


243. Μέ τό διαβήτη νά έξακριβώσετε πώς όλες οί πλευρές του τετραγώνου είναι ίσες.
244. Μέ τή γωνία ενός φύλλου τετραδίου νά διαπιστώσετε, πώς όλες οί γωνίες του τετραγώνου είναι ίσες.

Προβλήματα


245. Ἡ μητέρα σου γύρω από 12 πετσετάκια του τσαγιού, σχήματος τετραγώνου μέ πλευρά 25 ἑκατοστομέτρων ξραψε δαντέλλα πλάτους 1 ἑκατοστού. Πόσο ήταν τό μήκος τῆς δαντέλλας πού χρησιμοποίησε;
246. Πόση είναι ἡ περίμετρος τετραγωνικού κήπου μέ πλευρά 35 μέτρα; Ἐάν πρόκειται νά τόν φράξουμε μέ δύο σειρές ἀγκαθωτό σύρμα, πού τό μέτρο του κοστίζει 6 δραχμές πόσο θά πληρώσουμε;
247. Ἡ περίμετρος τετραγωνικού κήπου είναι 100 μ. Πόση είναι ἡ πλευρά του;

51. Τό ὀρθογώνιο


Βλέπουμε τό ὀρθογώνιο στά φύλλα του τετραδίου μας, στά γραμματόσημα, στά κάδρα του σαλονιού μας, στίς ὄψεις τῶν χαρτοκιβωτίων, συσκευασίας κ.τ.λ.



Εικ. 47



Εικ. 48




Εικ. 49

Παρατηρήστε: Τό εξώφυλλο του τετραδίου σας:

1. Πόσες γωνίες ἔχει;
2. Νά βρεῖτε τό μέγεθος κάθε γωνίας μέ τή βοήθεια του γνώμονα.
3. Πόσες πλευρές ἔχει; Νά βρεῖτε μέ τή βοήθεια του ὑποδεκάμετρου σας τό μήκος κάθε πλευράς.
4. Νά σημειώσετε τ' ἀποτελέσματα τῶν μετρήσεων.
Τό ὀρθογώνιο ἔχει ... γωνίες ... καί τίς πλευρές ἀνά δύο ... ἴσες.



Εικ. 50. Τό Ὄρθογώνιο ἔχει 4...
καί 4 γωνίες... μεταξύ τους.



Εικ. 51 Ἄλλος τρόπος συγκρίσεως
γωνιῶν καί πλευρῶν τοῦ
ὀρθογωνίου.


ΒΛΕΨΕΤΕ; ♦

Τό ὀρθογώνιο ἔχει 4 γωνίες ἴσες μεταξύ
τους καί τίς ἀπέναντι πλευρές ἀνά δύο
ἴσες.

52. Περίμετρος ὀρθογωνίου

Τό μήκος καί τό πλάτος τοῦ ὀρθογωνίου εἶναι οἱ διαστάσεις
τοῦ.

Ἡ φράχτης πού εἰκονίζεται, ἀκολουθεῖ τό περίγραμμα τοῦ



Εικ. 52

ὀρθογωνίου κήπου. Γιά νά βροῦμε τό μήκος τοῦ σύρματος, πού
θά χρειαστεῖ γιά περίφραξη πρέπει νά βροῦμε τήν **περίμετρό**

του. Δηλαδή να βρούμε το άθροισμα των μηκών των πλευρών του.

Αν οι διαστάσεις του είναι 35 μέτρα το μήκος του και 28 μέτρα το πλάτος του, τότε η περιμέτρος του είναι:

$$\begin{aligned} 35\mu + 28\mu + 35\mu + 28\mu &= (35 \times 2) + (28 \times 2) \\ &= (35\mu + 28\mu) \times 2 = 126\mu. \text{ (Γιατί;)} \end{aligned}$$

Εδώ σημειώνουμε, πώς το $35\mu + 28\mu$ είναι η **ήμιπερίμετρος** του ὀρθογωνίου.

Πρακτικές εργασίες


248. Να δείξετε ἀντικείμενα, πού ἔχουν σχῆμα ὀρθογωνίου.
249. Να δείξετε τό μήκος καί τό πλάτος τοῦ τετραγώνου σας καί νά τό μετρήσετε.
250. Νά κατασκευάσετε ἕνα τετράγωνο μέ πλευρά 4 ἑκατοστόμετρα καί κατόπιν ἕνα ὀρθογώνιο μέ 6 ἑκατοστόμετρα μήκος καί 4 ἑκατοστόμετρα πλάτος. Μετά νά βρεῖτε τίς διαφορές τους.

Προβλήματα:

251. Πόσο σύρμα θά χρειαστεῖ, γιά νά περιφράξουμε ἕνα χωράφι σχήματος ὀρθογωνίου, ὅταν τό μήκος του εἶναι 201 μέτρα καί τό πλάτος του 247 μέτρα.
252. Ἐνας ὀρθογώνιος κήπος ἔχει πλάτος 17 μέτρα καί μήκος διπλάσιο ἀπ' τό πλάτος του. Ἄν τόν περιφράξουμε μέ ἀγκαθωτό σύρμα μέ 9 δραχμές τό μέτρο, πόσα θά πληρώσουμε;
253. Ἡ αὐλή τοῦ σχολείου μας ἔχει σχῆμα ὀρθογώνιο μέ μήκος 64 μ. καί πλάτος 36 μ. Αὐτή περιβάλλεται ἀπό ἕναν τοῖχο, καί ἔχει εἴσοδο 6 μέτρων. Πόσο εἶναι τό μήκος τοῦ τοίχου;

53. Τό τρίγωνο

Βλέπουμε τό τρίγωνο στά σχήματα πού εἰκονίζεται:



ὄψιν. Ὁ γνῶμονας 90° ὅν ἰσότητι ἴσο. Εἰκ. 53 οἱ γ. ἰσοσκελῆς ὄψιν

“Έχει τρεις πλευρές.” Αν σημειώσουμε στο τετράδιό μας τρία σημεία Α, Β και Γ και τὰ ενώσουμε με τρία **εὐθύγραμμα τμήματα**, θά πάρουμε μία τριγωνική **κλειστή τεθλασμένη γραμμή**.

Αὐτό τὸ σχῆμα, πού θά ἔχει τρεις πλευρές είναι τὸ **τρίγωνο**.

Τὰ σημεία Α, Β καὶ Γ, εἶναι οἱ **κορυφές** τοῦ τριγώνου καὶ τὰ εὐθύγραμμα τμήματα ΑΒ, ΒΓ, ΓΑ εἶναι οἱ **πλευρές** του.

Βλέπετε; ♣


Τρίγωνο εἶναι τὸ σχῆμα, πού σχηματίζεται ἀπὸ μία κλειστή τριγωνική τεθλασμένη γραμμή.

Εἶδη τριγώνων με κριτήριο τὴν πλευρά


3 πλευρές ἴσες

2 πλευρές ἴσες


ἄνισες πλευρές



Ἴσόπλευρο



Ἴσοσκελές



Σκαληνό

Εἰκ. 54


Βλέπετε; ♣

Τὸ τρίγωνο πού ἔχει 3 πλευρές ἴσες λέγεται **ισόπλευρο**.

Τὸ τρίγωνο πού ἔχει δύο πλευρές ἴσες λέγεται **ισόσκελές**.

Τὸ τρίγωνο πού ἔχει ἄνισες πλευρές λέγεται **σκαληνό**.

54. Περίμετρος του τριγώνου



Για να βρούμε την περίμετρο ενός τριγώνου, πρέπει να βρούμε το άθροισμα των μηκών των πλευρών του.

Στό σχέδιο που εικονίζεται η περίμετρος του τριγώνου είναι:

$$30\mu + 35\mu + 45\mu = 110 \text{ μέτρα}$$


Εικ. 55

Βλέπετε; ♣


Περίμετρος τριγώνου ονομάζεται το άθροισμα των μηκών των πλευρών του.

Άσκησης


254. Να υπολογίσετε τις περιμέτρους των τριγώνων που εικονίζονται:



Η περίμετρος είναι:



Η περίμετρος είναι:



Η περίμετρος είναι:

Εικ. 56

255. Να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας:

Μήκος πλευρών	Περίμετρος
45 εκ., 75 εκ., 45 εκ.
32 παλ., 63 παλ., 47 παλ.
15 μ., 15 μ., 15 μ.

256. Νά συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας:

Ίσοπλευρα τρίγωνα		Ίσοσκελή τρίγωνα		
Μία πλευρά	Περίμετρος	Μία τῶν ἴσων πλευρῶν	Τρίτη πλευρά	Περίμετρος
6 ἑκατ.	5 ἑκατ.	3 ἑκατ.
.....	30 μ.	10 μ.	4 μ.
9 παλ.	24 μ.	78 μ.

55. Ὁ κυκλικὸς δίσκος, ὁ κύκλος καὶ τὰ στοιχεῖα του

Ὁ τροχὸς εἶναι μιά ἀπὸ τίς σπουδαιότερες ἀνακαλύψεις τοῦ ἀνθρώπου.

Ὁ τροχὸς χρησιμοποιεῖται στά ποδήλατα, στ' αὐτοκίνητα, στά τρένα, στά ἀεροπλάνα, στά ἐργαστήρια, καί σέ πολλές ἄλλες ἐφαρμογές.

Θέλετε νά μάθετε μερικά ἀπὸ τὰ μαθηματικά τοῦ τροχοῦ; Τό σχῆμα πού ἔχει κάθε ὄψη τοῦ τροχοῦ τό ὀνομάζουμε κυκλικὸ δίσκο.



Εἰκ. 57



Εἰκ. 58




Εἰκ. 59

Κυκλικὸς δίσκος εἶναι ἡ βάση τοῦ ποτηριοῦ πού εἰκονίζεται ὀπως καί ἡ βάση ἑνός κάδου κ τ. λ.

Στοιχεία του κυκλικού δίσκου

Ἡ γραμμὴ στὴν ὁποία τελειώνει ὁ κυκλικὸς δίσκος ὀνομάζεται **κύκλος**.



Κύκλους γράφουμε μέ τό ὄργανο πού λέγεται **διαβήτης**. Τό σημείο πού στηρίζουμε τό διαβήτη, γιά νά γράψουμε τόν κύκλο, ὅπως φαίνεται καί στό σχέδιο, ὀνομάζεται **κέντρο** τοῦ κύκλου.

Τό εὐθύγραμμο τμήμα πού ἔχει τό ἓνα ἄκρο του στό κέντρο τοῦ κυκλικοῦ δίσκου καί τό ἄλλο σέ ἓνα σημείο τοῦ κύκλου, ὀνομάζεται **ἀκτίνα** τοῦ κυκλικοῦ δίσκου ἢ τοῦ κύκλου. Π.χ. ἡ ΟΑ εἰκ. 60.

Εἰκ. 60. Ἀπό τόν τρόπο τῆς κατασκευῆς βλέπουμε:

1. ὅλες οἱ ἀκτίνες εἶναι ἴσες
2. ὅλες οἱ διαμέτροι εἶναι ἴσες




Εἰκ. 61

Καί τέλος τό εὐθύγραμμο τμήμα πού ἔχει τά ἄκρα του ἐπάνω στόν κύκλο καί περνᾷ ἀπό τό κέντρο, ὀνομάζεται **διάμετρος** τοῦ κύκλου ἢ τοῦ κυκλικοῦ δίσκου. Π.χ. ΑΒ στὴν εἰκ. 59.


Άσκησης:

257. Ονομάστε σώματα, πού εικονίζουν κύκλο και κυκλικό δίσκο.
258. Νά δείξετε σέ ένα νόμισμα τόν κυκλικό δίσκο και τόν κύκλο, κατόπιν μέ αυτό νά χαράξετε έναν κύκλο.
259. Νά μετρήσετε τήν ακτίνα και τή διάμετρο ενός ποτηριού.
260. Μέ τό ψαλίδι νά κόψετε ένα χάρτινο κυκλικό δίσκο ακτίνας 3 εκατ. Νά χαράξετε μιά διάμετρο. Νά διπλώσετε τόν κύκλο κατά μήκος τής διαμέτρου. Νά συγκρίνετε τά δύο μέρη. Τί θλέπετε;
261. Μέ τό ίδιο κέντρο νά χαράξετε τρεις κύκλους μέ ακτίνες 2, 3 και 4 εκατοστόμετρα. Νά χαράξετε ύστερα από μιά ακτίνα τους.
262. Πόση είναι ή διάμετρος ενός κύκλου, πού έχει ακτίνα 5 εκατοστών και πόση ή ακτίνα ενός άλλου κύκλου, πού έχει διάμετρο 12 εκατοστών;
263. Σημειώστε στό χαρτί σας ένα σημείο A. Πώς μπορείτε νά βρείτε τό κέντρο ενός κύκλου, πού έχει ακτίνα 4 εκατοστόμετρα και περνάει από τό A;
264. Νά γραφεί τό όνομά τους:



Εικ. 62

265. Πόσα σχήματα παρατηρείτε;



Εικ. 63


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο

Οι αριθμοί πέρα από τό 1000

Έννοια, αίσθητοποίηση, σειρά τάξεως, γραφή και άπαγγελία τών χιλιάδων καί τών πολυψηφίων. Ανάλυση.

56. Έννοια

Οι αριθμοί πέρα από τό χίλια σχηματίζονται μέ τήν ίδια **συμφωνία**, πού σχηματίσατε τούς αριθμούς από τό 1 ως τό 999. Δηλαδή όπως:




Έτσι καί 10 χιλιάδες κάνουν μία **δεκάδα χιλιάδων** ή μονάδες 5ης τάξεως.

Στόν πίνακα πού ακολουθεί, αισθητοποιούμε τόν τρόπο, πού σχηματίζονται οί αριθμοί από τό χίλια ως τό δέκα χιλιάδες.

1 χιλιάδα	+ 1 χιλιάδα	= 2 χιλιάδες	= 2.000
2 χιλιάδες	+ 1 χιλιάδα	= 3 χιλιάδες	= 3.000
3 χιλιάδες	+ 1 χιλιάδα	= 4 χιλιάδες	= 4.000
4 χιλιάδες	+ 1 χιλιάδα	= 5 χιλιάδες	= 5.000
5 χιλιάδες	+ 1 χιλιάδα	= 6 χιλιάδες	= 6.000
6 χιλιάδες	+ 1 χιλιάδα	= 7 χιλιάδες	= 7.000
7 χιλιάδες	+ 1 χιλιάδα	= 8 χιλιάδες	= 8.000
8 χιλιάδες	+ 1 χιλιάδα	= 9 χιλιάδες	= 9.000
9 χιλιάδες	+ 1 χιλιάδα	= 10 χιλιάδες	= 10.000

Εικ. 67

“Αν βάλουμε ανάμεσα από δύο συνεχόμενες χιλιάδες τούς αριθμούς από 1 ως τό 999, θά έχουμε όλους τούς αριθμούς από 1.000 ως 10.000 π.χ.



Εικ. 69

57. Πώς γράφονται οι αριθμοί ως τής δέκα χιλιάδες;

‘Η συμφωνία πού εφαρμόζεται γιά τή γραφή τών αριθμών από τό 1 ως τό 1.000, ισχύει καί γιά τή γραφή τών αριθμών από τό 1.000 ως τό 10.000 δηλαδή:

Στό άκρο δεξιό του αριθμού γράφονται οι άπλές μονάδες καί συνέχεια πρós τ’ άριστερά οι δεκάδες, έκατοντάδες, χιλιάδες ή μονάδες 4ης τάξεως. π.χ. ό αριθμός 7.835 αποτελείται από:

- 7 χιλιάδες
- 8 έκατοντάδες
- 3 δεκάδες
- 5 μονάδες

"Όμοια ό αριθμός 8.079 αποτελείται από:

- 8 χιλιάδες
- 0 εκατοντάδες
- 7 δεκάδες
- 9 μονάδες

58. Πώς διαβάζεται ένας αριθμός με περισσότερα από 3 ψηφία.

Ό αριθμός 5.749 διαβάζεται: πέντε χιλιάδες-έπτακόσια-σάρντα-έννέα. Χωρίζουμε δηλαδή τόν αριθμό σέ τριψηφία μέρη, αρχίζοντας άπ' τά δεξιά πρós τ' άριστερά καί διαβάζουμε πρώτα τίς χιλιάδες καί μετά όλο μαζί τό τριψηφίο τμήμα, δίνοντας σέ κάθε ψηφίο τό όνομα τών μονάδων πού άντιπροσωπεύει.

Άσκήσεις

266. Υπολογίστε τά εξαγόμενα:

$$9.000 + \begin{cases} 1 = 9.001 \\ 2 = \\ 3 = \\ 4 = \\ 5 = \\ 6 = \\ 7 = \\ 8 = \\ 9 = \end{cases}$$

$$9.000 + \begin{cases} 10 = 9.010 \\ 20 = \\ 30 = \\ 40 = \\ 50 = \\ 60 = \\ 70 = \\ 80 = \\ 90 = \end{cases}$$


$$9.000 + \begin{cases} 100 = 9.100 \\ 200 = \\ 300 = \\ 400 = \\ 500 = \\ 600 = \\ 700 = \\ 800 = \\ 900 = \end{cases}$$

267.

10.000	1.000 =	11.000	9999 + 1 =	10.000	7005 + 5 =	7.010
	2.000 =		8009 + 1 =		8069 + 11 =	
	3.000 =		7006 + 4 =		9085 + 15 =	
	4.000 =		1870 + 30 =		6079 + 1 =	
	5.000 =		2005 + 25 =		4050 + 100 =	
	6.000 =		4007 + 100 =		8060 + 60 =	
	7.000 =		8070 + 30 =		9450 + 50 =	
	8.000 =		10000 - 100 =		10000 - 10 =	
	9.000 =					

268. Γράψτε τόν αριθμό $5.000 + 500 + 50 + 5$ σέ άπλή μορφή. Τί δηλώνουν τά τέσσερα 5 στόν αριθμό πού έχετε γράψει σέ άπλή μορφή;

269. Γράψτε σε άπλή μορφή τούς αριθμούς:
- α) $6000 + 500 + 20 + 3 = 6523$ β) $9000 + 400 + 80 + 7$
 γ) $8000 + 800 + 80 + 8$ δ) $600 + 300 + 40 + 4$
 ε) $8000 + 100 + 10 + 1$ στ) $500 + 200 + 20 + 5$
270. Γράψτε σε άπλή μορφή τούς αριθμούς:
- α) $8 \times 1000 + 4 \times 100 + 5 \times 10 + 6 \times 1 = 8456$
 β) $9 \times \text{E} + 1 \Delta + 1 \Delta + 7 \text{M}$
 γ) $8 \times 1000 + 0 \times 100 + 0 \times 10 + 4 \times 1$ δ) $6 \text{X} + 0 \text{E} + 0 \Delta + 0 \text{M}$
271. Νά αναλυθούν σε μονάδες, διαφόρων τάξεων οι αριθμοί:
 4749, 8008, 9520, 4078, 1001, 9999.
 (Ύπόδειξη: 'Ο αριθμός 4237 αναλύεται σε $4\text{X} + 2\text{E} + 3\Delta + 7\text{M}$)
272. Νά αναλυθούν σε χιλιάδες και μονάδες οι αριθμοί:
 5478, 7811, 4075, 8888, 1002, 6578
 (Ύπόδειξη: 'Ο αριθμός 6732 έχει 6 χιλιάδες + 732 μονάδες).
273. Νά αναλυθούν σε εκατοντάδες και μονάδες οι αριθμοί:
 7447, 8049, 4444, 8008, 6001, 7080
 (Ύπόδειξη: 'Ο αριθμός 4420 αναλύεται σε 44 εκατοντάδες και 20 μονάδες).
274. Πόσες μονάδες, δεκάδες, εκατοντάδες χιλιάδες έχουν οι αριθμοί: 6472, 6211, 5055, 6712, 4224, 5564, 3399
 (Ύπόδειξη: Για να τις βρούμε, απαγγέλλουμε τον αριθμό μέχρι του ψηφίου των μονάδων ή δεκάδων ή εκατοντάδων ή χιλιάδων π.χ. ο αριθμός 4652 έχει 4652 μονάδες, 465 δεκάδες, 46 εκατοντάδες, 4 χιλιάδες).
275. Ποιά ή αξία θέσεως του 2 στους αριθμούς:
 3672, 6325, 4257, 2676, 2007, 6028, 2222.
276. Αφοῦ χρησιμοποιήσετε τά παρακάτω ψηφία μόνο μία φορά, νά γράψετε τό μεγαλύτερο αριθμό, πού μπορείτε νά σχηματίσετε: 4, 9, 0, 6.
277. Σέ ποιά διάταξη πρέπει νά τοποθετηθούν τά πρόσωπα Α, Β, Γ, καί Δ για νά σχηματίσουν τά ψηφία τους τό μεγαλύτερο δυνατό αριθμό:



Εικ. 70

καί ποιά θέση πρέπει νά έχουν, για νά μάς σχηματίσουν τό μικρότερο:

59. Οί αριθμοί ως τό 100 χιλιάδες

Όπως μέ τήν επανάληψη τής χιλιάδας 10 φορές κάνουμε τή δεκάδα χιλιάδων ή μονάδων 5ης τάξεως, έτσι καί μέ τήν επανάληψη 10 φορές τής δεκάδας χιλιάδων, δηλαδή τής μονάδας 5ης τάξεως, κάνουμε τήν έκατοντάδα χιλιάδων ή μονάδα 6ης τάξεως. Στόν πίνακα πού ακολουθεῖ, βλέπετε αναλυτικά, πώς σχηματίζονται οί αριθμοί από 10 ως τό 100 χιλιάδες.

10 χιλιάδες + 10 χιλιάδες =	20 χιλιάδες =	20.000
20 χιλιάδες + 10 χιλιάδες =	30 χιλιάδες =	30.000
30 χιλιάδες + 10 χιλιάδες =	40 χιλιάδες =	40.000
40 χιλιάδες + 10 χιλιάδες =	50 χιλιάδες =	50.000
50 χιλιάδες + 10 χιλιάδες =	60 χιλιάδες =	60.000
60 χιλιάδες + 10 χιλιάδες =	70 χιλιάδες =	70.000
70 χιλιάδες + 10 χιλιάδες =	80 χιλιάδες =	80.000
80 χιλιάδες + 10 χιλιάδες =	90 χιλιάδες =	90.000
90 χιλιάδες + 10 χιλιάδες =	100 χιλιάδες =	100.000


Εικ. 71

“Αν ανάμεσα από δύο συνεχόμενες δεκάδες χιλιάδων βάλω τούς αριθμούς από 1 ως τό 9999 θά ἔχω ὅλους τούς αριθμούς από 10 ως τίς 100 χιλιάδες.

60. Πώς γράφονται οί αριθμοί από 10 χιλιάδες ως 100 χιλιάδες

Οί αριθμοί από 10 χιλιάδες ως 100 χιλιάδες γράφονται μέ τήν ἴδια συμφωνία, πού γράφονται κι οί αριθμοί από 1 ως 10.000. Δηλαδή: στό ἄκρο δεξιό γράφονται οί μονάδες καί συνέχεια πρὸς τ' ἄριστερά οί δεκάδες, έκατοντάδες, χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδων, έκατοντάδες χιλιάδων, ἢ μονάδες 6ης τάξεως. “Αν δέν ὑπάρχουν μονάδες μιᾶς τάξεως βάζουμε τό μηδέν.

π.χ. ὁ αριθμός: 63578 ἀποτελεῖται ἀπό: 63578



“Αν ανάμεσα από δύο διαδοχικές δεκάδες χιλιάδων βάλουμε τούς αριθμούς από 1 ως 9999, θα έχουμε όλους τούς αριθμούς από 10000 ως 100.000.

61. Πώς διαβάζονται οι αριθμοί από 10 χιλιάδες ως 100 χιλιάδες

Ο αριθμός π.χ. 65.278 διαβάζεται:

έξηντα πέντε χιλιάδες διακόσιες εβδομήντα οκτώ μονάδες.

Χωρίζουμε, δηλαδή, τόν αριθμό σε τριψήφια μέρη, αρχίζοντας από τὰ δεξιά πρὸς τ' ἀριστερά του καὶ κατόπιν διαβάζουμε χωριστά κάθε μέρος αρχίζοντας ἀπὸ τὰ ἀριστερά πρὸς τὰ δεξιά σὰν νὰ ἦταν ἕνας ἀριθμὸς. Διαβάζοντας χαρακτηρίζουμε τὸ κάθε μέρος μὲ τ' ὄνομα τῶν μονάδων τοῦ τελευταίου ψηφίου του.

Παραδείγματα:

234.657, διακόσιες τριαντατέσσερις χιλιάδες ἑξακόσιες πενήντα ἑπτὰ μονάδες.

34.987, τριάντα τέσσερις χιλιάδες, ἑννιακόσιες ὀγδόντα ἑπτὰ μονάδες.

Ἀσκήσεις:

278. Νά βρεθοῦν:

$$10.000 + \begin{cases} 1000 = \\ 3000 = \\ 5000 = \\ 7000 = \\ 9000 = \end{cases} 10.000 + \begin{cases} 20000 = \\ 40000 = \\ 60000 = \\ 80000 = \\ 90000 = \end{cases} 100.000 - \begin{cases} 2000 = \\ 4000 = \\ 6000 = \\ 8000 = \\ 10000 = \end{cases} 98.000$$

279. $10009 + 1 = 32000 + 7000 =$
 $10090 + 10 = 47000 + 3000 =$
 $17000 + 10 = 57000 + 3000 =$
 $25000 + 500 = 67000 + 3000 =$

280. Νά γραφοῦν σὲ ἀπλή μορφή οἱ ἀριθμοί:
 $60000 + 400 + 70 + 8, 70.000 + 600 + 40 + 3$

281. Ἀφοῦ γραφεῖ σὲ ἀπλή μορφή ὁ ἀριθμὸς
 $80000 + 800 + 80 + 8,$
 νά ἀναγνωριστῆ ἡ ἀξία θέσεως τοῦ 8.

282. Νά αναλυθοῦν στίς μονάδες τῶν διαφόρων τάξεων οἱ ἀριθμοί:
99999, 787878, 454545, 696969.
283. Νά τοποθετηθοῦν τά πρόσωπα Α, Β, Γ, Δ, καί Ε σέ τέτοια σειρά, πού ὁ ἀριθμός πού θά σχηματίζεται νά εἶναι: 1) ὁ μικρότερος δυνατός καί 2) ὁ μεγαλύτερος δυνατός.



Εἰκ. 72

Οἱ ἀριθμοί ὡς τό ἑκατομμύριο

62. Πῶς σχηματίζονται:

Ἄν πάρω τήν ἑκατοντάδα χιλιάδων σάν νέα μονάδα, τότε μέ τήν ἐπανάληψή της 10 φορές θά κάνω τό ἑκατομμύριο ἢ **μονάδα** 7ης τάξεως.

Στόν πίνακα πού ἀκολουθεῖ, βλέπετε ἀναλυτικά πῶς σχηματίζονται οἱ ἀριθμοί.

$$100 \text{ χιλιάδες} + 100 \text{ χιλιάδες} = 200 \text{ χιλιάδες} = 200.000$$

$$200 \text{ χιλιάδες} + 100 \text{ χιλιάδες} = 300 \text{ χιλιάδες} = 300.000$$

$$300 \text{ χιλιάδες} + 100 \text{ χιλιάδες} = 400 \text{ χιλιάδες} = 400.000$$

$$400 \text{ χιλιάδες} + 100 \text{ χιλιάδες} = 500 \text{ χιλιάδες} = 500.000$$

$$500 \text{ χιλιάδες} + 100 \text{ χιλιάδες} = 600 \text{ χιλιάδες} = 600.000$$

$$600 \text{ χιλιάδες} + 100 \text{ χιλιάδες} = 700 \text{ χιλιάδες} = 700.000$$

$$700 \text{ χιλιάδες} + 100 \text{ χιλιάδες} = 800 \text{ χιλιάδες} = 800.000$$

$$800 \text{ χιλιάδες} + 100 \text{ χιλιάδες} = 900 \text{ χιλιάδες} = 900.000$$

$$900 \text{ χιλιάδες} + 100 \text{ χιλιάδες} = 1 \text{ ἑκατομμύριο} = 1.000.000$$

63. Πῶς γράφονται οἱ ἀριθμοί ὡς τό ἑκατομμύριο.

Κι ἐδῶ οἱ ἀριθμοί ἀκολουθοῦν τήν ἴδια συμφωνία γραφῆς. Δηλαδή: στό δεξιό ἄκρο τοῦ ἀριθμοῦ γράφονται οἱ μονάδες καί συνέχεια πρὸς τ' ἀριστερά: δεκάδες, ἑκατοντάδες, χιλιάδες, δε-

κάδες χιλιάδων, εκατοντάδες χιλιάδων, **εκατομμύριο** ή μονάδα 7ης τάξεως.

π.χ. ο αριθμός: 587423 αποτελείται από:

5 εκατοντάδες χιλιάδων

8 δεκάδες χιλιάδων

7 χιλιάδες


4 εκατοντάδες

2 δεκάδες

3 μονάδες

Έάν ανάμεσα από δύο συνεχόμενες εκατοντάδες χιλιάδων βάλουμε τούς αριθμούς από 1 ως 99999, θά έχουμε όλους τούς αριθμούς από 100 χιλιάδες ως τό εκατομμύριο. Όπως ο αριθμός: πεντακόσιες ένδεκα χιλιάδες διακόσιες είκοσι τρείς μονάδες. Δηλαδή 511.223 μονάδες.

64. Πώς διαβάζονται οί αριθμοί ώς τό εκατομμύριο



Εικ. 73

Γιά νά διαβάσουμε έναν αριθμό, τόν χωρίζουμε, αρχίζοντας από δεξιά πρός τ' άριστερά, σέ τριψήφια μέρη, δηλαδή σέ **περιόδους**, καί κατόπιν διαβάζουμε κάθε τμήμα χωριστά, αρχίζοντας άπ' τ' άριστερά, δίνοντας τό όνομα τών περιόδων. π.χ. ο αριθμός 23.549.708 διαβάζεται: 23 εκατομμύρια, 549 χιλιάδες, 708 μονάδες.

Άσκήσεις:

284. Νά γραφοῦν σέ άπλή μορφή οί αριθμοί:

$$32.000.000. + 563.000 + 700 + 80 + 8$$

285. Νά βρεθούν τὰ ἐξαγόμενα:

$$100.000 + \left\{ \begin{array}{l} 10.000 = 110.000 \\ 20.000 = \\ 30.000 = \\ 40.000 = \\ 50.000 = \\ 60.000 = \\ 70.000 = \\ 80.000 = \\ 90.000 = \end{array} \right.$$

286.

$$100.000 + \left\{ \begin{array}{l} 100.000 = \\ 200.000 = \\ 300.000 = \\ 400.000 = \\ 500.000 = \\ 600.000 = \\ 700.000 = \\ 800.000 = \\ 900.000 = \end{array} \right.$$

287.

$$1.000.000 - \left\{ \begin{array}{l} 10.000 = 990.000 \\ 20.000 = \\ 30.000 = \\ 40.000 = \\ 50.000 = \\ 60.000 = \\ 70.000 = \\ 80.000 = \\ 90.000 = \end{array} \right.$$

288.

$$1.000.000 - \left\{ \begin{array}{l} 100.000 = 900.000 \\ 200.000 = \\ 300.000 = \\ 400.000 = \\ 500.000 = \\ 600.000 = \\ 700.000 = \\ 800.000 = \\ 900.000 = \end{array} \right.$$

289* Νά αναλυθοῦν στὶς μονάδες διαφόρων τάξεων τους οἱ ἀριθμοί:
678409, 949049, 804809, 700049, 803308.

290. Νά γραφοῦν ὀλόγραφα καὶ ἀριθμητικά οἱ ἀριθμοὶ ποὺ ἀναλύονται.
 $5E/X + 6 \Delta/X + 7 M/X + 3E + 7\Delta + 6M$

(Ὑπόδειξη: Τὸ σύμβολο E/X σημαίνει ἑκατοντάδες χιλιάδων.

Τὸ σύμβολο Δ/X σημαίνει δεκάδες χιλιάδων.

Τὸ σύμβολο M/X σημαίνει μονάδες χιλιάδων.

Τὸ σύμβολο E σημαίνει ἑκατοντάδες.

Τὸ σύμβολο Δ σημαίνει δεκάδες.

Τὸ σύμβολο M σημαίνει μονάδες.

291. Νά γραφοῦν ὀλόγραφα καὶ ἀριθμητικά οἱ ἀριθμοὶ ποὺ ἀναλύονται.

$$4 E/X + 0 \Delta/X + 0 M/X + 4 E + 5 \Delta + 6 M$$

$$5 E/X + 4 \Delta/X + 3 M/X + 4 E + 0 \Delta + 0 M$$

65. Οἱ ἀριθμοὶ ἀπὸ ἓνα ἑκατομμῦριο καὶ πάνω.

Πῶς σχηματίζονται:

Ἄν τὸ ἓνα ἑκατομμῦριο τὸ ἐπαναλάβουμε 10 φορές, θά κά-
νουμε μιά δεκάδα ἑκατομμυρίων ἢ **μονάδα 3ης τάξεως**.

“Αν τή μονάδα τής 8ης τάξεως τήν ἐπαναλάβουμε 10 φορές, θά κάνουμε μιὰ ἑκατοντάδα ἑκατομμυρίων ἢ **μονάδα** 9ης τάξεως. “Αν προχωρήσουμε μέ τόν ἴδιο τρόπο, θά κάνουμε μονάδες: 10ης, 11ης ... κλ. τάξεων, ὅπως φαίνεται στόν πίνακα τής σελίδας ... 95.

66. Πῶς διαβάζονται οἱ πολυψήφιοι ἀριθμοί

Τούς χωρίζουμε σέ τριψήφια τμήματα, δηλαδή σέ περιόδους, ἀρχίζοντας ἀπ’ τὰ δεξιὰ πρός τ’ ἀριστερά καί κατόπιν διαβάζουμε τόν ἀριθμό, ἀρχίζοντας ἀπ’ τ’ ἀριστερά πρός τὰ δεξιὰ. “Όταν διαβάζουμε τὰ τμήματα, δίνουμε τά ὀνόματα τῶν περιόδων τους, π.χ. ὁ ἀριθμός 5.542.367.951 διαβάζεται:

5 δισεκατομμύρια, 542 ἑκατομμύρια, 367 χιλιάδες 951 μονάδες.

Γιά καλύτερη κατανόηση παρακολουθήστε τόν παρακάτω πίνακα:

περίοδος τρισεκατομ- μυρίων			περίοδος δισεκατομ- μυρίων			περίοδος ἑκατομμυ- ρίων			περίοδος χιλιάδων			περίοδος μονάδων			Διαβάζεται
Ε	Δ	Μ	Ε	Δ	Μ	Ε	Δ	Μ	Ε	Δ	Μ	Ε	Δ	Μ	
														1	“Ένα
														1	δέκα
												1	0	0	ἑκατό
											1	0	0	0	χίλια
									1	0	0	0	0	0	δέκα χιλιάδ.
								1	0	0	0	0	0	0	ἑκατό χιλ.
							1	0	0	0	0	0	0	0	ἕνα ἑκατομ.
						1	0	0	0	0	0	0	0	0	10 ἑκατομ.
															100 ἑκατομ.
															1 δισεκατομ.

Άσκησης:

292. Οι παρακάτω αριθμοί νά αναλυθούν στις μονάδες των διαφόρων τάξεών τους.

524.793, 80.808.088, 5.697.489.911, 875.497.023.

294. Νά διαβάσετε τους αριθμούς:

48.502.000, 89.970.324, 105.409, 101.010.111

67. Έλληνική και Ρωμαϊκή γραφή των αριθμών*

Οι άρχαιοι Έλληνες χρησιμοποιούσαν τό δεκαδικό σύστημα γραφής των αριθμών. Έγραφαν τούς αριθμούς μέ (27) σύμβολα, πού τά σημειώνουμε στόν πίνακα πού άκολουθεϊ:

Ίνδοαραβικά σύμβολα	Έλληνικά σύμβολα	Ρωμαϊκά σύμβολα	Ίνδοαραβικά σύμβολα	Έλληνικά σύμβολα	Ρωμαϊκά σύμβολα	Ίνδοαραβικά σύμβολα	Έλληνικά σύμβολα	Ρωμαϊκά σύμβολα
0	-	-						
1	α´	I	10	ι´	X	100	ρ´	C
2	β´	II	20	κ´		200	σ´	
3	γ´	III	30	λ´		300	τ´	
4	δ´	IV	40	μ´		400	υ´	
5	ε´	V	50	ν´	L	500	φ´	D
6	στ´	VI	60	ξ´		600	χ´	
7	ζ´	VII	70	ο´		700	ψ´	
8	η´	VIII	80	π´		800	ω´	
9	θ´	IX	90	ϋ´		900	ϖ´	
						1000	α	

Εικ. 74

Οι Ρωμαίοι χρησιμοποιούσαν τά σύμβολα, πού σημειώνουμε στόν ίδιο πίνακα μέ τούς έξής κανόνες:

1. Κάθε αριθμός, πού γράφεται άριστερά μεγαλύτερου του, αφαιρείται άπ' αυτόν.
2. Κάθε αριθμός, πού γράφεται δεξιά μεγαλύτερου του, προστίθεται σ' αυτόν.

* Προαιρετικά.

3. Όμοια ψηφία πού επαναλαμβάνονται, προσθέτονται.

Τά Έλληνικά καί Ρωμαϊκά σύμβολα χρησιμοποιούνται καί σήμερα στά κεφάλαια τών βιβλίων. Τά ρωμαϊκά σέ μερικά ρολόγια καί άλλοϋ.

Στήν Έλληνική καί Ρωμαϊκή γραφή τών αριθμών δέν υπήρχε τό σύμβολο μηδέν (0), γιατί δέν υπήρχε ή αριθμογραφία τής θέσεως.

Ή χρησιμοποίηση τοϋ μηδενός είναι μία από τίς εύφυέστερες έπινοήσεις τοϋ ανθρώπινου λογικοϋ, πού συνετέλεσε καί στήν προαγωγή τοϋ σύγχρονου πολιτισμοϋ.

ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΛΕΤΑΣ

Ή κυριότερη αρχή γιά νά μελετήσεις μαθηματικά είναι:

Νά γνωρίζεις τόν τρόπο λύσεως όρισμένων ειδών προβλημάτων.

Καί γιά νά λύσεις ένα πρόβλημα, άκολούθησε τήν παρακάτω πορεία:

Βήμα 1ο: Διάβασε (διάβασε πολλές φορές άν είναι απαραίτητο) τό πρόβλημα προσεχτικά γιά νά είσαι σέ θέση νά γνωρίζεις:

α. Τί πρόκειται νά βρεις

β. Τί στοιχεία σοϋ δίδονται

γ. Τί επιπλέον στοιχεία, άν χρειάζονται, μπορείς νά χρησιμοποιήσεις.

Βήμα 2ο. Κάνε ένα σχέδιο τοϋ προβλήματος, άν μπορείς. Γράψε στήν κατάταξη όλα όσα γνωρίζεις γύρω από τό πρόβλημα.


Βήμα 3ο. Άποφάσισε ποιά πράξη ή συνδυασμό πράξεων πρέπει νά κάνεις, γιά νά βρεις τήν άπάντηση.

Βήμα 4ο. Κάνε μέ μεγάλη προσοχή τίς απαραίτητες πράξεις.

Βήμα 5ο. Νά σκεφθείς, άν ή άπάντηση πού βρήκες είναι ίκανοποιητική καί κατόπιν νά κάνεις τόν έλεγχο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο

Πρόσθεση
Αφαίρεση
Πολλαπλασιασμός
Διαίρεση



Εικ. 75

Οί 4 πράξεις μέ πολυψήφιους αριθμούς

68. Αριθμητικές πράξεις

Όπως και μέ ολιγοψήφιους αριθμούς, έτσι και μέ πολυψήφιους, όταν μάς δοθούν δύο ή περισσότεροι αριθμοί, μπορούμε απ' αυτούς νά κατασκευάσουμε άλλους μέ τέσσερις τρόπους. Τούς τρόπους αυτούς ονομάζουμε **αριθμητικές πράξεις**. Οί πράξεις αυτές έχουν τά όνόματα: **Πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός και διαίρεση**.

Αυτές οί πράξεις μέ πολυψήφιους αριθμούς γίνονται, όπως και μέ τούς ολιγοψήφιους. Έδώ γιά νά τίς θυμηθείτε θ' αρχίσουμε πάλι από τήν πιό άπλή. Τήν πρόσθεση:

69. Πρόσθεση

Ο πρώτος όροφος μιᾶς πολυκατοικίας δίνει ἐνοίκιο: 17.800 δραχμές. Ο δεύτερος 21.050, ο τρίτος 32.300 καὶ ὁ τέταρτος 38.850. Πόσο ἐνοίκιο δίνουν ὅλοι οἱ ὄροφοι μαζί;



Εικ. 76

ΓΙΑ ΝΑ ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

	“Όροι	17.800
	ἢ	21.050
προσθετέοι		32.300
		+38.850
ἄθροισμα	→	<u>110.000</u>

“Όπως καὶ στοὺς ὀλιγοψήφιους, ἔτσι κι ἐδῶ, πρέπει νά θροῦμε ἕναν ἀριθμό, πού νά ἔχει τόσες μονάδες, ὅσες ἔχουν ὅλοι μαζί οἱ ἀριθμοί: 17.800, 21.050, 32.300, 38.850. Ἡ πράξη πού κάνουμε στίς περιπτώσεις αὐτές εἶναι ἡ **πρόσθεση**.

Ἡ τεχνική τῆς προσθέσεως καί ἡ δοκιμή τῆς εἶναι αὐτή, πού ἀναπτύχθηκε στό 2ο Κεφάλαιο.

Γράφετε, δηλαδή, τούς ἀριθμούς τόν ἕναν κάτω ἀπό τόν ἄλλον, ἔτσι ὥστε οἱ μονάδες τῆς ἴδιας τάξεως νά βρεθοῦν στήν ἴδια στήλη.

Στήν ἐκτέλεση τῆς πράξεως πρέπει:

1. Νά βρεῖτε τό ἄθροισμα τῶν ψηφίων στή στήλη τῶν μονάδων.
2. Νά βρεῖτε πόσες μονάδες ἔχει καί πόσες δεκάδες αὐτό τό ἄθροισμα.
3. Νά γράψετε τίς μονάδες στή στήλη τους καί νά «κρατεῖστε» τίς δεκάδες.
4. Νά προσθέσετε τό κρατούμενο μαζί μέ τά ψηφία τῶν δεκάδων καί νά συνεχίσετε πρός τ' ἀριστερά μέ τόν ἴδιο τρόπο.
5. Νά κάνετε τή δοκιμή, ὅπως καί στούς ὀλιγοψήφιους.

70. Ὅριζόντια πρόσθεση

Στήν ὀριζόντια-πρόσθεση ἐφαρμόζουμε τή μέθοδο τοῦ **πηδήματος** ἀπό τόν ἕναν ἀριθμό στόν ἄλλον. Κατά τήν ἐφαρμογή τῆς τό μάτι πηδάει ἀπ' τόν ἕναν ἀριθμό στόν ἄλλον μέ κανονικό ρυθμό.

π.χ. $9 + 5 + 4 + 8 + 9 + 2 + 1 + 6 = 44$

71. Δοκιμή τῆς προσθέσεως

Ὅπως καί στούς ὀλιγοψήφιους, ἔτσι καί ἐδῶ, ἡ δοκιμή γίνεται μέ δύο τρόπους:

1. Δοκιμή διὰ τοῦ 9

Παραδείγματα: Νά βρεθεῖ τό ἄθροισμα:

$$2329 \longrightarrow 16 \longrightarrow 1 + 6 = 7$$

$$38318 \longrightarrow 23 \longrightarrow 2 + 3 + 5 \downarrow \text{ἄθροισμα}$$

$$5277 \longrightarrow 21 \longrightarrow 2 + 1 = 3 \quad 2$$

$$82436 \longrightarrow 23 \longrightarrow 2 + 3 = 5$$

$$\underline{128360} \longrightarrow 20 \longrightarrow 2 + 0 = \boxed{2}$$

ἄθροισμα 2

Πρέπει τὰ δύο ἀκραία ἀθροίσματα πού δείχνουν τὰ θέλη νά συμφωνοῦν.

2ος τρόπος:

Ν' ἀλλάξετε τή σειρά τῶν προσθετέων καί νά βρίσκετε τό ἴδιο ἀθροισμα, ὅταν ἡ πράξη ἔγινε χωρίς λάθος.

Ἀσκήσεις:

295. Νά ὑπολογιστοῦν τὰ ἀθροίσματα:

1462 μέτρα	13091	12372	89765
<u>763 μέτρα</u>	42603	67	8765
	<u>241</u>	5417	101
		<u>9</u>	<u>18</u>

296. Νά κάνετε τίς παρακάτω προσθέσεις «Ὄριζόντια» καί «κάθετα» καί τίς δοκιμές τους.

$$23512 + 818 + 8 + 899 =$$

$$208 + 7707 + 12509 + 7423 =$$

$$250409 + 1011 + 3201 + 6512 =$$

$$12 + 1002 + 812 + 303 =$$

297. Ἀφοῦ βάλετε τόν ἕναν κάτω ἀπό τόν ἄλλον, νά βρεῖτε τὰ ἀθροίσματα καί νά κάνετε τίς δοκιμές στίς παρακάτω περιπτώσεις:

1) $26893 + 72811 + 4509 + 603$

2) $3781 + 16893 + 611 + 88$

3) $45 + 62587 + 7098 + 512$

4) $678506 + 87 + 809 + 506$

298. Ὁμαδοποιήστε ἀνά δύο τοὺς παρακάτω ἀριθμούς:

1654, 231, 4137, 2985, ἔτσι ὥστε νά ἔχουμε:

1) Μιά πρόσθεση χωρίς κρατούμενα.

2) Μιά πρόσθεση μέ κρατούμενο πού νά μεταφέρεται στίς δεκάδες.

3) Μιά πρόσθεση μέ κρατούμενο πού νά μεταφέρεται στίς ἑκατοντάδες.

4) Μιά πρόσθεση μέ κρατούμενο πού νά μεταφέρεται στίς δεκάδες καί ἄλλο κρατούμενο πού νά μεταφέρεται στίς ἑκατοντάδες.

Προβλήματα προσθέσεως:

299. Ἀπό τήν 1 Ἰανουαρίου τοῦ ἔτους 480 π.Χ. κατά τό ὁποῖο ἔγινε ἡ ναυμαχία τῆς Σαλαμίνας μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1978 πόσα ἔτη ἔχουν περάσει;

300. Ένας όρειβάτης ύπολογίζει πώς, αν άνεβεί 1468 μέτρα άκόμη, θά βρεθεί στην κορυφή του Όλυμπου. Πόσο είναι τό ύψος του Όλυμπου, αν ο όρειβάτης βρίσκεται σέ ύψος 1450 μέτρων;
301. Μιά δεξαμενή περιέχει 132.500 κιλά νερό. Για νά γεμίσει χρειάζεται άκόμα 9999 κιλά νερό. Πόσο νερό χωράει ή δεξαμενή;
302. Οί Όλυμπιακοί άγώνες άρχισαν τό 777 π.Χ. Πόσα χρόνια πέρασαν μέχρι τό 1978;
303. Η μάχη του Μαραθώνα έγινε τό έτος 490 π.Χ. Πόσα χρόνια πέρασαν μέχρι τό 1978;
304. Ένας έμπορος άγόρασε έμπόρευμα άξίας 132.000 δραχμές. Πόσο πρέπει νά τό πουλήσει για νά κερδίσει 28.000 δρχ.;
305. Ένας έμπορος πούλησε μία άνδρική ένδυμασία 5.212 δραχμές μέ ζημία 712 δραχμές. Πόσο του κόστισε;
306. Στίς έκπτώσεις ένας έμπορος πούλησε ραπτομηχανή, αντί 8.050 δραχμές, μέ ζημία 1002 δραχμές. Πόσο του κόστισε;
307. Ένας έμπορος πούλησε τόν πρώτο μήνα 7.963 κιλά έμπόρευμα και πήρε 270.742 δραχμές. Τό δεύτερο μήνα πούλησε 8.763 κιλά έμπόρευμα και πήρε 297.942 δραχμές και τόν τρίτο μήνα πούλησε 12.356 κιλά έμπόρευμα και πήρε 420.104 δραχμές. Πόσα κιλά έμπόρευμα πούλησε και πόσες δραχμές πήρε;
308. Ένας φιάνθρωπος διέθεσε ένα χρηματικό ποσό σέ τρεις φτωχές οικογένειες, μέ τήν έντολή: ή πρώτη νά πάρει 42.375 δραχμές, ή δεύτερη 13.500 δραχμές περισσότερες άπ' τήν πρώτη και ή τρίτη 21.580 περισσότερες άπ' τή δεύτερη. Πόσα πήρε ή δεύτερη και πόσα ή τρίτη οικογένεια και πόσα χρήματα διέθεσε ο φιάνθρωπος;
309. Όταν γεννήθηκε ένα παιδί, ή μητέρα του ήταν 22 χρόνων κι ο πατέρας του ήταν 11 χρόνια μεγαλύτερος άπ' τή μητέρα του. Τώρα τό παιδί είναι 18 έτών. Πόσων χρόνων είναι ο πατέρας του και πόσο ή μητέρα του;
310. Ό Πυθαγόρας γεννήθηκε 285 χρόνια πριν τή γέννηση του Άρχιμήδη, που αύτός πέθανε τό έτος 212 π.Χ. σέ ηλικία 75 χρόνων. Πόσα χρόνια πέρασαν μέχρι σήμερα άπ' τή γέννηση του Πυθαγόρα;
311. Ένα χρηματικό ποσό μοιράστηκε σέ τρία πρόσωπα. Τό πρώτο έλαβε 65.090 δραχμές. Τό δεύτερο 28.700 δραχμές περισσότερες άπ' τό πρώτο και τό τρίτο 18.760 δραχμές περισσότερες άπ' τό δεύτερο. Πόσο ήταν τό χρηματικό ποσό;

72. Άφαίρεση

Τήν 1η Ιανουαρίου, μία πόλη άριθμούσε 147.255 κατοίκους: Στο τέλος του έτους ο πληθυσμός άνέβηκε σέ 148.132 κατοίκους. Πόση είναι ή αύξηση του πληθυσμού τής πόλεως;



Εικ. 77

ΓΙΑ ΝΑ ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

Μειωτέος	→	148132
Άφαιρετέος	→	<u>147255</u>
Υπόλοιπο	→	877

Είναι φανερό πώς, όταν θέλουμε να βρούμε «πόσο **αύξη-
θηκε**» κάνουμε αφαίρεση.

Η τεχνική της αφαιρέσεως και η δοκιμή της είναι αυτή, πού αναπτύχθηκε στο 2ο κεφάλαιο.

Γράφετε, δηλαδή, τούς αριθμούς τό μικρότερο κάτω από τό μεγαλύτερο, έτσι ώστε οι μονάδες να βρίσκονται στην πρώτη στήλη, οι δεκάδες στη δεύτερη, οι εκατοντάδες στην τρίτη κτλ. γιατί έτσι θά βρεθούν οι όμοιοι αριθμοί στην ίδια στήλη, πού μπορούμε να τούς αφαιρέσουμε, επειδή άλλως δέν μπορούμε να κάνουμε αφαίρεση.

Στην έκτέλεση της αφαιρέσεως λέτε: 5 από 2 δέν αφαιρείται, 5 από 12, 7, γράφετε τόν 7 και «κρατάτε» τόν 1.

Γιατί «κρατάτε» τόν 1;

Προσθέτετε, σέ συνέχεια, τό κρατούμενο στίς δεκάδες καί επαναλαμβάνετε τά ίδια καί γιά τίς άλλες στήλες.

Τά υπόλοιπα πού βρίσκετε κάθε φορά από τίς συνεχόμενες αφαιρέσεις στίς στήλες, είναι τά ψηφία του υπόλοιπου των δύο αριθμών. Στο παράδειγμα τό υπόλοιπο είναι: 877 κάτοικοι.

73. Δοκιμή τής αφαιρέσεως

1. Μπορείτε νά προσθέσετε τό υπόλοιπο μέ τόν αφαιρετέο, όποτε νά βρείτε τό μειωτέο.

αφάρηση $\begin{array}{r} 2517 \\ - 631 \\ \hline 1886 \end{array}$	δοκιμή $\begin{array}{r} 1886 \\ + 631 \\ \hline 2517 \end{array}$
--	---

2. Μπορείτε νά αφαιρέσετε τό υπόλοιπο άπ' τό μειωτέο, όποτε πρέπει νά βρείτε τόν αφαιρετέο.

Αφαίρεση $\begin{array}{r} 8746 \\ - 5412 \\ \hline 3334 \end{array}$	Δοκιμή $\begin{array}{r} 8746 \\ - 3334 \\ \hline 5412 \end{array}$
--	--

3. Μπορείτε, όπως καί στήν πρόσθεση, νά γίνει καί ή δοκιμή μέ τό 9

$$\begin{array}{l} 7549 \longrightarrow 7 + 5 + 4 + 9 = 25 \longrightarrow 2 + 5 = \boxed{7} \\ -3278 \longrightarrow 3 + 2 + 7 + 8 = 20 \longrightarrow 2 \\ \hline 4271 \longrightarrow 4 + 2 + 7 + 1 = 14 \longrightarrow 1 + 4 = 5 + \boxed{7} \end{array}$$

Έάν όπως φαίνεται στό παράδειγμα, οι μονοψήφιοι, πού προκύπτουν άπ' τόν αφαιρετέο καί τό υπόλοιπο, έχουν άθροισμα ίσο μέ τό άθροισμα των ψηφίων του μειωτέου, ή πράξη είναι σωστή.

Άσκήσεις καί προβλήματα:

312. Νά γίνουν οι αφαιρέσεις στίς παρακάτω περιπτώσεις καί οι δοκιμές τους:
- | | |
|---------------------|------------------------|
| $356300 - 184684$ | $52574408 - 9730230$ |
| $7831355 - 4338743$ | $804375000 - 62700000$ |
313. Νά συμπληρωθούν οι τελείες μέ ψηφία στίς παρακάτω περιπτώσεις:

69873.6	.230.
4411	- 9845	- 2.9.	- 354.0
2576	18667	1564	1.50

314. Σέ μιά ἀφαίρεση ὁ μειωτέος εἶναι 5786 καί ὁ ἀφαιρετέος εἶναι ἴσος μὲ τὸ ὑπόλοιπο. Ποῖός ὁ ἀφαιρετέος καί ποῖό τὸ ὑπόλοιπο;
315. Ἡ Ἑλληνικὴ ἐπανάσταση ἐγίνε τό 1821. Πόσα χρόνια πέρασαν ἀπὸ τότε;
316. Ἡ ἀνακάλυψη τῆς τυπογραφίας ἐγίνε ἀπ' τὸ Γουτεμβέργιο τό 1436. Πόσα χρόνια πέρασαν ἀπὸ τότε;
317. Ποῖός ἀριθμὸς ἂν προστεθεῖ στὸν 78412, θά δώσει τὸν 84509;
318. Ἐνας ἀγόρασε ἓνα αὐτοκίνητο 378.450 δραχμῆς καί σ' ἓνα χρόνο τὸ πούλησε 403.400. Πόσα κέρδισε;
319. Τὸ ἄθροισμα δύο ἀριθμῶν εἶναι 12.518 καί ὁ ἓνας ἀπ' αὐτοὺς εἶναι ὁ 7.007. Ποῖός εἶναι ὁ ἄλλος;
320. Τρία βαρέλια γεμάτα λάδι περιέχουν: τὸ α' 107 κιλά, τὸ δεύτερο 6 κιλά περισσότερο ἀπ' τὸ α' καί τὸ τρίτο 9 κιλά λιγότερο ἀπ' τὸ δεύτερο. Πόσα κιλά λάδι ἔχουν καί τὰ τρία βαρέλια;
321. Ὁ Κώστας θέλει ν' ἀγοράσει ἓνα ποδήλατο ἀξίας 2.850 δρχ. Μέσα στὸν κουμπαρά του ἔχει 730 δραχμῆς. Πόσα πρέπει νά συμπληρώσει ὁ πατέρας του;
322. Μιά ὁμάδα τουριστῶν ἔκανε τῆς διαδρομῆς τῆς μ' αὐτοκίνητο. Τὴν πρώτη μέρα διάνυσε 883 χιλιόμετρα, τὴν δευτέρη 429 χιλιόμετρα, τὴν τρίτη 476 καί τὴν τέταρτη 329 χιλ. Στὸ τέλος τῆς διαδρομῆς τὸ «κοντέρ» ἔδειχνε 29.187 χιλιόμετρα. Τί ἔδειχνε πρὶν ἐκινήσουν καί τί στὸ τέλος κάθε ἡμερησίας διαδρομῆς;
323. Τὸ ἄθροισμα τριῶν ἀριθμῶν εἶναι 1.870. Δυὸ ἀπ' αὐτοὺς ἔχουν ἄθροισμα 1.585 κι ἓνας ἀπ' αὐτοὺς εἶναι ὁ 632. Νά βρεθοῦν οἱ τρεῖς ἀριθμοί.
324. Τὸ ἄθροισμα δύο ἀκέραιων ἀριθμῶν εἶναι 50 καί ἡ διαφορά τους 15. Νά βρεθοῦν οἱ ἀριθμοί.

Ἀσκήσεις καὶ προβλήματα προσθέσεως καὶ ἀφαιρέσεως

325. Μιά δεξαμενὴ περιέχει 22.785 κιλά νερό. Ἀφαιροῦμε ἀρχικὰ 3.070 κιλά νερό, κατόπιν 6.060 κιλά νερό καί ὕστερα ἀνοίγουμε τὴν κἀνουλα ἀπ' τὴν ὁποία χύθηκαν 9.090 κιλά νερό. Πόσα κιλά νερό περιέχει ἀκόμα ἡ δεξαμενὴ;
326. Σέ μιά οἰκογένεια ὁ πατέρας κερδίζει τὸ χρόνο 298.800 δραχμῆς, ἡ μητέρα κερδίζει 28.700 λιγότερα, καί τὰ δύο παιδιά κερδίζουν: ὁ μὲν πρῶτος 32.550 λιγότερα ἀπ' τὸν πατέρα κι ὁ ἄλλος 29.580 λιγότερα ἀπ' τὴν μητέρα. Πόσα εἰσπράττει ὅλη ἡ οἰκογένεια;

327. Δύο αδελφοί πήραν απ' τόν πατέρα τους 20.000 δραχμές με τήν έντολή ό μεγαλύτερος νά πάρει 4.000 δραχμές περισσότερες απ' τό μικρότερο. Πόσες δραχμές θά πάρει ό καθένας;
328. Σ' ένα σχολείο φοιτούσαν 100 μαθητές, άγόρια καί κορίτσια καί νήπια. Τ' άγόρια καί τά νήπια ήταν 70. Τά κορίτσια καί τά νήπια ήταν 40. Πόσα ήταν τ' άγόρια, πόσα τά κορίτσια καί πόσα τά νήπια;
329. Ένας βιβλιοπώλης άγόρασε βιβλία άξιας 5.875 δραχμές καί τετράδια άντί 2.850 δραχμές. Κατά τήν πώληση εισέπραξε καί απ' τά δύο 10.500 δραχμές. Πόσα κέρδισε;
330. Ένας παντοπώλης άγόρασε καφέ καί ζάχαρη καί πλήρωσε 16.800 δραχμές. Άπ' τόν καφέ εισέπραξε 12.850 δραχμές κι απ' τή ζάχαρη 9.090 δραχμές. Κέρδισε ή ζημιώθηκε καί πόσα;
331. Οί περιουσίες δύο αδελφών διαφέρουν κατά 301.402 δρχ. Έάν ό πλουσιότερος έχει 903.508 δραχμές, ποιά είναι ή περιουσία του άλλου καί πόσο διαφέρει απ' τήν περιουσία τής αδελφής του πού είναι 412.618 δραχμές;
332. Ό πληθυσμός τών Νομών τής Θεσσαλίας είναι 696.384 κατοίκους. Άπ' αυτούς ό Νομός Μαγνησίας έχει 162.285 κατοίκους. Ό Νομός Τρικάλων 142.781 κατοίκους, καί ό Νομός Καρδίτσας 153.542 κατοίκους. Πόσους κατοίκους έχει ό Νομός Λαρίσης;
333. Δύο συνεταιριοι ζημιώθηκανσέ μιá επιχείρηση, ό Α' 583.000 δραχμές καί ό Β' 585.000 δραχμές. Έτσι τό κεφάλαιο πού έμεινε καί στους δύο μαζί ήταν 917.000 δραχμές. Άν τό άρχικό κεφάλαιο του Α' ήταν 785.000, ποιό ήταν τό κεφάλαιο του Β';
334. Ένας έμπορος άγόρασε έμπόρευμα άξιας 136.500 δραχμές. Πούλησε ένα μέρος απ' αυτό καί εισέπραξε 141.500 δραχμές, ενώ ή άξια εκείνου πού έμεινε, ήταν 33.500 δραχμές. Ζητείται τό κέρδος του έμπορου.
335. Ποιόν αριθμό πρέπει νά προσθέσουμε στόν 7.408, γιά νά πάρουμε αριθμό πού άποτελείται από 8 όκτάρια;
336. Ποιόν αριθμό πρέπει ν' αφαιρέσετε από τόν 8.888, γιά νά πάρετε τόν 6.666;
337. Έέλει κάποιος ν' αγοράσει ένα αυτοκίνητο άξιας 257.000 δρχ. Άν όμως είχε άκόμα 46.500 δραχμές θά τό άγόραζε καί θά του περισσευαν καί 12.500. Πόσα χρήματα είχε;
338. Η Μαρία σήμερα είναι 18 έτών καί ή μητέρα της 42 έτών. Όταν φθάσει στην ήλικία τής μητέρας της, πόσων έτών θά είναι εκείνη;
339. Δύο αδελφοί πρόκειται νά μοιραστούν μιá κληρονομιά 1.165.800 δραχμές. Σύμφωνα μέ τή διαθήκη ό μεγαλύτερος έπρεπε νά πάρει 252.400 δραχμές περισσότερες απ' τό μικρότερο. Πόσα θά πάρει ό καθένας;

74. Καί μιά ιδιότητα τῆς ἀφαιρέσεως

Ἐκείνη ἡμέρα ὁ Πέτρος εἶχε 7.000 δραχμές καί ὁ Κώστας 5.000 δραχμές·

α) Πόσο διαφέρουν τά χρήματα τῶν δύο ἀδερφῶν.

β) Ἐάν ὁ πατέρας τοῦς δώσει ἀπό δύο χιλιάδες στόν καθένα, πόσο θά διαφέρουν τά χρήματά τους;

γ) Ἐάν πληρώσουν χρέος καί δώσουν ἀπό 3.000 δραχμές ὁ καθένας πόσο θά διαφέρουν τά χρήματά τους;

Ἀπαντώντας

α) θά διαφέρουν $7.000 - 5.000 = 2.000$ δρχ.

β) θά διαφέρουν $(7.000 + 2.000) - (5.000 + 2.000) = 2.000$ δραχμές

γ) θά διαφέρουν $(7.000 - 3.000) - (5.000 - 3.000) = 2.000$ δραχμές.

Βλέπετε; ♣

Ἐάν στό μειωτέο καί τόν ἀφαιρετέο μιᾶς ἀφαιρέσεως προσθέσουμε ἢ ἀφαιρέσουμε τόν ἴδιο ἀριθμό, ἡ διαφορά δέν ἀλλάζει.

Στήν ιδιότητα αὐτή βασίζεται καί ἡ πράξη τῆς ἀφαιρέσεως μέ κρατούμενα (Γιατί!).

75. Γιά νά θυμηθεῖτε τίς ιδιότητες

Ποῖόν ἀριθμό πρέπει νά τοποθετήσουμε, γιά νά συμπληρώσουμε τίς ἰσότητες; Καί ν' ἀναφέρετε τήν ιδιότητα πού ἐφαρμόζετε:

1. $10 + 6 = 6 +$;

2. $134 + 17 = 17 +$;

3. $(4 + 6) + 8 = 4 + (6 +$;)

4. $(8 + 3) + 2 = 8 + ($; $+ 2)$

5. $3 + (2 + 1) = (3 +$;) $+ 1$

6. $8 + (10 + 7) = (8 + 10) +$;


7. $5 + 0 = 0 +$;

8. $(6 - 4) = (6 + 2) - (4 +$;)

9. $20 - 16 = (20 - 4) - (16 -$;)

10. $(50 -$;) $= (50 - 10) - (30 - 10)$

11. Ἴσχύει ὁ νόμος τῆς ἀντιμεταθέσεως στήν ἀφαίρεση;



Εικ. 78 'Εδῶ δέν ἰσχύει ὁ νόμος τῆς ἀντιμεταθέσεως.

76. Πολλαπλασιασμός

Πρόβλημα 1ο

"Ένα ποδήλατο ἀξίζει 2.558 δραχμές. Πόσο ἀξίζουν τὰ 156 ὅμοια ποδήλατα;

'Εδῶ γνωρίζουμε τὴν τιμὴ τῆς μιᾶς μονάδας καὶ θέλουμε νά βροῦμε τὴν τιμὴ τῶν πολλῶν ὁμοειδῶν μονάδων. Θά κάνουμε πολλαπλασιασμό:

$$2558 \times 156$$

77. Ἡ τεχνικὴ τοῦ πολλαπλασιασμοῦ

Παρατηροῦμε πῶς:

1. Ὁ πολλαπλασιαστής 156 ἀναλύεται σὲ 1 ἑκατοντάδα, 5 δεκάδες καὶ 6 μονάδες.
2. Ὄταν ὁ ἀριθμὸς 2558 πολλαπλασιάζεται μέ τό 6, τό γινόμενο: 15348 παρασταίνει μονάδες.
3. Ὄταν ὁ 2558 πολλαπλασιάζεται μέ τό 5, τό γινόμενο: 12790 παρασταίνει δεκάδες.

Ἐδῶ πρέπει νά προσέξουμε ποῦ θά τοποθετήσουμε τίς δεκάδες. Δηλαδή τό ψηφίο μηδέν τοῦ 12790 γράφεται στή στήλη τῶν δεκάδων.

4. Ὄταν ὁ 2558 πολλαπλασιάζεται μέ τόν 1 τό γινόμενο: 2558 παρασταίνει ἑκατοντάδες.

Ἐδῶ πρέπει νά προσέξουμε τήν τοποθέτηση τοῦ τελευταίου ψηφίου 8 τοῦ ἀριθμοῦ 2558 νά βρεθεῖ στή στήλη τῶν ἑκατοντάδων.

		2558
		<u>156</u>
6 ποδήλατα πρὸς 2558	→	15348
5 δεκάδες ποδ. πρὸς 2558	→	12790
1 ἑκατ. ποδήλ. πρὸς 2558	→	<u>2558</u>
Ἔθροισμα:	→	397048

78. Δοκιμὴ τοῦ πολλαπλασιασμοῦ

Ἐνα κατάστημα ἠλεκτρικῶν εἰδῶν πούλησε σ' ἓνα ἐξάμηνο 375 ἠλεκτρικὲς κουζίνες πρὸς 7465 δραχμὲς τῆ μία. Πόσα εἰσέπραξε;

Κι ἐδῶ γνωρίζουμε τήν τιμὴ τῆς μιᾶς μονάδας καὶ ζητοῦμε τήν τιμὴ τῶν πολλῶν ὁμοειδῶν μονάδων. Θά κάνουμε πολλαπλασιασμό. Ἐκτέλεση τῆς πράξεως:

Δοκιμὴ (ὅπως καὶ στό α' μέρος)

7465	$7 + 4 + 6 + 5 = 22 \rightarrow 2 + 2 = 4$
<u>× 375</u>	$3 + 7 + 5 = 15 \rightarrow 1 + 5 = 6$
37325	$24 \rightarrow 4 + 2 = 6$
52255	
<u>22395</u>	
2799375	$\rightarrow 2 + 7 + 9 + 9 + 3 + 7 + 5 = 42 = 4 + 2 = 6$

Ἀσκήσεις καὶ προβλήματα:

Ὁμάδα Α'

Νά ἐκτελεστοῦν οἱ πολλαπλασιασμοὶ καὶ νά γίνουν οἱ δοκιμὲς τους:

340. 233×124 356×245 892×423

341. 2526×336 3742×157 5112×433

342. Ποιὰ ἡ ἀξία 53 μέτρων ὕφασμα μέ 718 δραχμὲς τό μέτρο;

342. Ποιό είναι το βάρος 53 σάκων εμπορεύματος με 125 κιλά βάρος κάθε σάκου;

344. Ποιά είναι η αξία 236 λαμπατέρ προς 618 δραχ. τό ένα;

Όμάδα Β'

345. Ένας εργάτης παίρνει 22.500 δραχμές τό μήνα, πόσα παίρνει σέ ένα χρόνο;

346. Μιά αγελάδα κατεβάζει 23 κιλά γάλα τήν ημέρα. Πόσα κιλά γάλα κατεβάζει σέ ένα έτος τών 365 ημερών καί πόσο 18 όμοιες αγελάδες;

347. Ένας εργάτης παίρνει γιά έργασία μιās ώρας 135 δραχμές. Αν έργαστει 8 έβδομάδες καί σέ κάθε έβδομάδα οι έργάσιμες ημέρες είναι 6, πόσα χρήματα θά πάρει αν σέ κάθε εργάσιμη ημέρα εργάζεται 7 ώρες;

348. Γιά τόν πλουτισμό τής βιβλιοθήκης του σχολείου αγοράστηκαν 466 τόμοι βιβλίων. Από αυτούς, 72 αγοράστηκαν προς 268 δραχμές ό ένας, 57 προς 265 δραχ. ό ένας, 78 προς 428 δραχ. ό ένας καί οι υπόλοιποι προς 312 δραχμές ό ένας. Πόσο στοίχισε η αγορά τών βιβλίων;


349. Ένας έμπορος αγόρασε από μία φρουταγορά, μπανάνες προς 77 δραχμές τό κιλό. Τήν επόμενη έβδομάδα, τίς ίδιες μπανάνες αγόρασε προς 56 δραχμές τό κιλό. Ποιά η διαφορά τιμής γιά μία αγορά 185 κιλών; (Υπόδειξη: Μπορείτε νά χρησιμοποιήσετε δύο τρόπους, γιά νά βρείτε τήν απάντηση).

Πρόβλημα 2ο

Νά υπολογίσετε τήν αξία 205 τηλεοράσεων προς 11.575 δραχμές τή μία.

Άφου γνωρίζετε τήν αξία τής μιās τηλεοράσεως καί ζητάτε τήν αξία τών πολλών, θά κάνετε πολλαπλασιασμό:

$$11575 \times 205$$



Εικ. 80

Βλέπουμε πώς:

1. Ο πολλαπλασιαστής 205 αναλύεται σε:
5 μονάδες και
2 εκατοντάδες.
2. Όταν ο αριθμός 11.575 πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό 5, πού παρασταίνει μονάδες, τό γινόμενο 57.875 παρασταίνει μονάδες.
3. Όταν ο αριθμός 11.575 πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό 2, πού παρασταίνει εκατοντάδες, τό γινόμενο 23.150 παρασταίνει εκατοντάδες.
4. Προσέξτε τήν τοποθέτηση του ψηφίου 0, του αριθμού 23.150. Γράφεται στή στήλη των εκατοντάδων.
Πρακτικά γίνεται έτσι:

$$\begin{array}{r} 11.575 \\ \times 205 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 5 \text{ μονάδες τηλεοράσεων προς } 11.575 \longrightarrow 57.875 \\ 2 \text{ εκατοντάδες τηλεοράσεων, προς } 11.575 \longrightarrow 23150 \\ \text{άξια } 205 \text{ τηλεοράσεων} \longrightarrow 2.372.875 \end{array}$$

Άσκησης:

Νά βρεθούν τά έξαγόμενα καί νά γίνουν οί δοκιμές τους:

$$\begin{array}{l} 350. 3789 \times 105, \quad 2057 \times 309, \quad 25372 \times 206, \quad 8099 \times 503 \\ 351. 2549 \times 101, \quad 609 \times 609, \quad 7808 \times 108, \quad 6549 \times 203 \end{array}$$

Προβλήματα:

352. Ποιά ή αξία 58 στυλό προς 506 δραχμές τόν ένα;
353. Ποιά είναι τό βάρος 108 σάκων σταφίδας των 50 κιλών;
354. Νά συμπληρωθούν οί παρακάτω πολλαπλασιασμοί:


$$\begin{array}{r} .3.15 \\ \times 8 \\ \hline 6.7320 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4.3. \\ \times 9 \\ \hline 40824 \end{array}$$

355. Έπαληθεύστε τήν ισότητα των 8 γινομένων, πού παίρνουμε από τόν πολλαπλασιασμό των αριθμών: μιās σειράς ή μιās στήλης ή μιās διαγωνίου.

32	64	2
1	16	256
128	4	8

79. Συντομεύσεις του πολλαπλασιασμού



Εικ. 81

Πόσο στοιχίζουν 72 ψυγεία προς 8.000 δραχμές τό καθένα;

$$\begin{aligned}72 \text{ ψυγεία αξίζουν: } & 8.000 \times 72 = \\ & = 8 \text{ χιλιάδες} \times 72 \\ & = 576 \text{ χιλιάδες (γιατί);} \\ & = 576.000 \text{ δραχ.}\end{aligned}$$

Πρόβλημα 3ο

Πόσο στοιχίζουν 700 ρολόγια προς 800 δραχμές τό ένα:

$$\begin{aligned}\text{Τό γινόμενο } 800 \times 700 & = (8 \text{ \acute{e}κατοντάδες}) \times 700 \\ & = 5.600 \text{ \acute{e}κατοντάδες} \\ & = 560.000 \text{ δραχ.}\end{aligned}$$



Εικ. 82

Αυτό μπορούμε νά τό βροῦμε άμέσως, άν παραλείψουμε τά μηδενικά, πολλαπλασιάσουμε τούς άριθμούς πού άπομένουν καί δεξιά του γινομένου γράψουμε τά μηδενικά.

Νά βρείτε τά γινόμενα:

- 1) $100 \times 5 = (1 \text{ \acute{e}κατ.}) \times 5 = 5 \text{ \acute{e}κατοντάδες} = 500 \text{ μονάδες.}$
- 2) $1000 \times 25 = (1 \text{ χιλιάδα}) \times 25 = 25 \text{ χιλιάδες} = 25.000 \text{ μονάδες.}$
- 3) $10.000 \times 45 = (1 \text{ δεκάδα χιλιάδων}) \times 45 = 45 \text{ δεκάδες χιλιάδων} = 45.000 \text{ μονάδες.}$

Βλέπετε; ♣

“Όταν άριθμός πολλαπλασιάζεται μέ τό 10, 100 ή 1.000 κ.τ.λ. άρκει νά γραφτούν δεξιά του άριθμου, όσα μηδενικά άκολουθοῦν τή μονάδα.

Άσκησης:

Νά βρεθοῦν τὰ γινόμενα:

356. $444 \times 100 =$; $8875 \times 1000 =$;
357. $3000 \times 5 =$; $4000 \times 12 =$;
358. $5000 \times 600 =$; $10000 \times 10 =$;
359. $4 \times 30000 =$; $90 \times 6000 =$;

Άσκησης καί προβλήματα ἐπί τοῦ πολλαπλασιασμοῦ

Νά βρεθοῦν τὰ γινόμενα:

Ὁμάδα Α'

360. $375 \times 208 =$; $527 \times 700 =$; $649 \times 403 =$;
361. $4028 \times 203 =$; $7800 \times 600 =$; $3807 \times 4050 =$;
362. Ποιό εἶναι τὸ βάρος 108 σάκων λιπάσματος τῶν 50 κιλῶν;
363. Πόση εἶναι ἡ ἀξία 65 φωτογραφικῶν μηχανῶν πρὸς 805 δρχ. ἡ κάθε μία;
364. Ποιό εἶναι τὸ ἔσοδο σέ 300 ἡμέρες ἐργασίας ἐνός ἐργάτη μέ ἡμερομίσθιο 900 δραχμές;
365. Πόσο στοιχίζει μιὰ ἐγκυκλοπαίδεια 24 τόμων πρὸς 705 δραχμές τὸν τόμο;

Ὁμάδα Β'

366. Μιά μητέρα ἀγόρασε 3 λάμπες πρὸς 805 δραχμές τῆ μία. Πόσα ρέστα θά πάρει, ἂν δώσει 3 χιλιοδραχμα;
367. Μιά κοινότητα ἀγόρασε γιὰ τὸ σχολεῖο της 65 θρανία πρὸς 1.005 δραχμές τὸ ἕνα καί 3 πίνακες πρὸς 700 δραχμές τὸν ἕναν. Ποιό εἶναι ὅλο τὸ ποσό πού ἔδωσε γιὰ τὴν ἀγορά;
368. Ἐνα ἐργοστάσιο ἀποστέλλει 162 κιθῶτια μέ ἐμπόρευμα. Κάθε ἄδειο κιθῶτιο ζυγίζει 15 κιλά, καί χωράει 100 κιλά ἐμπόρευμα. Ποιό εἶναι τὸ ὕλικό βάρος τοῦ ἐμπορεύματος;
369. Σ' ἕνα χρόνο ἕνας ἐργάτης ἐργάστηκε τίς 105 ἡμέρες μέ ἡμερομίσθιο 608 δραχμές καί τίς ὑπόλοιπες 208 μέρες μέ ἡμερομίσθιο 1.000 δραχμές. Πόσα πῆρε ὅλα - ὅλα;
370. Γιὰ μιὰ σχολικὴ παράσταση πουλήθηκαν 107 εἰσιτήρια τῶν 150 δραχμῶν τὸ καθένα, 105 εἰσιτήρια τῶν 200 δραχμῶν τὸ καθένα καί 102 εἰσιτήρια τῶν 300 δραχμῶν τὸ καθένα. Πόσα εἰσπράχθηκαν ὅλα - ὅλα;
371. Ἐνα λεωφορεῖο ἐξυπηρετεῖ μιὰ γραμμὴ μήκους 103 χιλιομέτρων. Ποιὰ ἀπόσταση διανύει, ὅταν κάνει 6 φορές τὴν διαδρομὴ τὴν ἑβδομάδα; Καί πόση ἀπόσταση διανύει σέ 15 ἑβδομάδες;

80. Διαίρεση (Μέ διαιρέτη διψήφιο)

ΓΙΑ ΝΑ ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

437	25	← Διαιρέτης
25	17	← Πηλίκο
187		
175		
12		← 'Υπόλοιπο

Οι πό άπλές περιπτώσεις διαιρέσεως

Διαίρεση μέ τό 10 ή 100 ή 1.000.

Πρόβλημα:

Νά μοιραστούν 375 δραχμές σέ 10 ανθρώπους.

Γιά νά βρω, πόσα θά πάρει καθένας, πρέπει νά βρω τό πηλίκο:

$$375 : 10$$

'Αλλά $375 = 37$ δεκάρικα + 5 δραχμές.

Είναι φανερό, πώς άν μοιράσω τά 37 δεκάρικα ή 370 δρχ. σέ 10 ανθρώπους ό καθένας θά πάρει 37 δραχμές. Δηλ. στή διαίρεση $375 : 10$, τό πηλίκο είναι 37 καί τό υπόλοιπο 5.

"Όμοια στή διαίρεση:

$4785 : 100$, τό πηλίκο είναι 47 καί τό υπόλοιπο 85.

'Επίσης στή διαίρεση $7854 : 1.000$, τό πηλίκο είναι 7 καί τό υπόλοιπο 854.

Βλέπετε; ▶

"Όταν έχετε νά διαιρέσετε έναν αριθμό μέ τό 10, 100, 1.000, χωρίζετε από τά δεξιά του διαιρετέου τόσα ψηφία, όσα μηδενικά έχει ό διαιρέτης. 'Ο αριθμός πού αποτελούν τά ψηφία, πού μένουν, είναι τό πηλίκο, κι ό αριθμός πού αποτελούν τά ψηφία, πού χωρίζετε είναι τό υπόλοιπο.

Άσκησης (χωρίς χαρτί και μολύβι)

372. Ποιό μήκος είναι 10, 100, 1.000 φορές μικρότερο άπ' τό χιλιόμετρο;
373. 12.859 δραχμές πόσα δεκάρικα είναι, πόσα εκατοστάρικα και πόσα χιλιάρικα;
374. 1.000 άτομα παρακολούθησαν μιά θεατρική παράσταση. "Αν ή επιχείρηση πήρε 225.000, πόσο στοιχίξε τό κάθε είσιτήριο;
375. Νά συμπληρωθεί ό πίνακας:

Αριθμοί	διά 10		διά 100		διά 1.000	
	πηλίκο	υπόλοιπο	πηλίκο	υπόλοιπο	πηλίκο	υπόλοιπο
561379	56137	9	5613	79	561	379
87456	8745	6	874	56	87	456
103107	10310	7	1030	7	103	107
457686	45768	6	4576	86	457	686

81. Όταν ό διαιρετέος και ό διαιρέτης τελειώνουν σέ μη-δενικά.

Πρόβλημα 1ο: \triangleleft $\frac{12000}{3}$ \rightarrow ΜΑΡΙΑ \wedge

30 σχολικές σάκες στοιχίζουν 12.000 δραχμές. Πόσο στοιχίζει μία σάκα;

Άπάντηση:

Η κάθε σάκα στοιχίζει $12.000 : 30$.

Παρατηρούμε, πώς 10 φορές λιγότερες σάκες, δηλαδή 3 σάκες, πρέπει νά στοιχίζουν 10 φορές λιγότερες δραχμές. Δηλαδή 1.200 δρχ.

Δηλ.: 3 σάκες στοιχίζουν 1.200 δραχμές
ή 1 σάκα στοιχίζει $1.200 : 3 = 400$ δραχμές.

Πρόβλημα 2ο

300 σχολικές σάκες στοιχίζουν 120.000 δραχμές: Πόσο στοιχίζει ή μία σάκα;

Απάντηση:

Η μία σάκα στοιχίζει $120.000 : 300$

Παρατηρούμε πώς 100 φορές λιγότερες σάκες (δηλαδή 3 σάκες), πρέπει να στοιχίζουν και 100 φορές λιγότερες δραχμές. Δηλαδή 1.200 δρχ.

Δηλ.: 3 σάκες στοιχίζουν 1.200 δραχμές

ή 1 σάκα στοιχίζει $1.200 : 3 = 400$ δραχμές.

Βλέπετε; ▶

“Όταν ο διαιρετέος και ο διαιρέτης τελειώνουν σε μηδενικά, μπορούμε να διαγράψουμε τόν ίδιο αριθμό μηδενικών κι απ’ τούς δύο, χωρίς τό πηλίκο, (πού θά βρούμε) νά μεταβληθεϊ.

Άσκήσεις (χωρίς χαρτί και μολύβι)

376. Πόσα μηδενικά μπορούμε να παραλείψουμε κι απ’ τό διαιρετέο κι απ’ τό διαιρέτη στίς παρακάτω διαιρέσεις;

$420 : 60$, $2.500 : 50$, $28.000 : 7.000$, $36.000 : 4.000$

377. Ένας μαθητής έγραψε 800 λέξεις σε 40 λεπτά τής ώρας. Πόσες λέξεις έγραψε σε ένα λεπτό;

378. Μιά ώρα διαιρείται σε 60 πρώτα λεπτά. Πόσες ώρες είναι 1.800 λεπτά;

Β' Γραπτά

389. Νά βρεθούν τά εξαγόμενα:

$960 : 40$, $3.900 : 300$, $75.000 \mu : 5.000$,


$51.000 \delta\rho\chi. : 3.000$, $84.000 \text{ γραμμάρια} : 70$.

380. Σε 15 σελίδες ενός βιβλίου υπάρχουν 8.400 λέξεις. Έάν είναι γνωστό πώς κάθε σελίδα έχει 40 σειρές, πόσες λέξεις υπάρχουν σε κάθε σειρά;

381. Άτμόπλοιο τρέχει 10 μίλια τήν ώρα. Πόσες ώρες θά κάνει απ’ τόν Πειραιά ως τό Βόλο, πού απέχει 190 μίλια; Κι αν αναχωρήσει στίς 9 τό πρωί, ποιά ώρα θά φθάσει στό Βόλο;

382. Ένας αγόρασε μιά ηλεκτρική κουζίνα μέ 16.200 δραχμές, και θά τήν πληρώσει ύστερα από 90 μέρες. Πόσα πρέπει νά αποταμιεύει τή μέρα;

82. Διαίρεση δύο όποιωνδήποτε αριθμών.



Εικ. 83

“Ένας έμπορος γυαλικών αγόρασε 67 ζυγαριές κουζίνας και έδωσε 17.755 δρχ. Πόσο του στοιχίσε κάθε ζυγαριά;

Γιά να βρούμε, πόσο του στοιχίσε κάθε ζυγαριά, πρέπει να υπολογίσουμε τό πηλίκο:

$$17.755 : 67$$

Γιά να βρούμε τό πρώτο ψηφίο του πηλίκου, αποχωρίζουμε από τό διαιρετέο τόσα ψηφία απ’ τ’ άριστερά, ώστε να βρίσκουμε αριθμό, πού αν διαιρεθεί μέ τό διαιρέτη να δίνει μονοψήφιο πηλίκο.

Στό παράδειγμα αποχωρίζουμε τό 177 και μοιράζοντάς το σέ 67 ίσα μέρη βρίσκουμε πηλίκο 2 (γιατί $2 \times 67 = 134$, ενώ $3 \times 67 = 201$) και υπόλοιπο 43 εκατοντάδες.

Μένει λοιπόν να μοιράσουμε 4.355 δραχμές, σέ 67 ίσα μέρη.

Χωρίζουμε πάλι τίς 435 δεκάδες και διαιρούμε μέ τό 67. Έχουμε πηλίκο 6 δεκάδες και υπόλοιπο 33 δεκάδες, πού μαζί μέ τίς 5 μονάδες κάνουν 335 μονάδες, πού θά μοιραστούν πάλι σέ 67 ίσα μέρη.

Διαίρεση	Δοκιμή
$\begin{array}{r l} 17755 & 67 \\ 134 & 265 \\ \hline 4355 & \\ 402 & \\ \hline 335 & \\ 335 & \\ \hline 000 & \end{array}$	$\begin{array}{r} 265 \\ \times 67 \\ \hline 1855 \\ 1590 \\ \hline 17755 \end{array}$

Τό πηλίκο του 335 διά του 67 είναι 5 ($4 \times 67 = 268$, αλλά $5 \times 67 = 335$ και τό υπόλοιπο 0).

Βλέπετε; ♣

Κάθε διαίρεση πού έχει πηλίκο πολυψήφιο, χωρίζεται σέ δύο ή πολλές διαδοχικές διαιρέσεις μέ πηλίκα μονοψήφια.

Από τὰ παραπάνω γίνεται φανερό, πώς ἡ ἐκτέλεση μιᾶς διαιρέσεως ἀνάγεται στὴ διαδοχικὴ ἐκτέλεση διαιρέσεων μὲ μονοψήφιο πηλίκο.

Στὸ παραπάνω παράδειγμα: $17.755 : 67$

Διαίρεση 1η

$$\begin{array}{r|l} 177 \text{ ἑκατ.} & 67 \\ \hline 134 & 2 \text{ ἑκατ.} \\ \hline 43 \text{ ἑκατ.} & \end{array}$$

Διαίρεση 2η

$$\begin{array}{r|l} 435 \text{ δεκ.} & 67 \\ \hline 402 & 6 \text{ δεκ.} \\ \hline 33 \text{ δεκ.} & \end{array}$$

Διαίρεση 3η

$$\begin{array}{r|l} 335 \text{ μον.} & 67 \\ \hline 335 & 5 \text{ μον.} \\ \hline 0 \text{ μονάδες} & \end{array}$$

Δηλαδή τὸ τελικὸ ὑπόλοιπο εἶναι μηδέν (τελεία διαίρεση) καὶ τὸ τελικὸ πηλίκο = 2 ἑκατ. + 6 δεκάδες + 5 μονάδες = **265 δρχ.** καὶ γιὰ συντομία σημειώνουμε τὴ διαίρεση ὅπως παραπάνω.

Δοκιμή:

$$(\text{Διαιρέτης}) \times (\text{Πηλίκο}) + \text{Ἵπόλοιπο} = \text{Διαιρετέος.}$$

$$\text{Ἐδῶ } 265 \times 67 = 17.755$$

Ἀσκήσεις:

Νὰ κάνετε τὶς παρακάτω διαιρέσεις καὶ τὶς δοκιμὲς τους.

383. $10089 : 19$

1989 : 17

8464 : 92

384. $1225 : 35$

✓ $9477 : 243$

✓ $623946 : 57$

385. $725730 : 34 =$

✓ $379512 : 54 =$

✓ $284875 : 85 =$

386. Νὰ βρεῖτε τὸ διαιρετέο στὶς παρακάτω διαιρέσεις:

$$\dots \begin{array}{r|l} & 47 \\ \hline 21 & 89 \end{array}$$

$$\dots \begin{array}{r|l} & 85 \\ \hline & 703 \end{array}$$

$$\dots \begin{array}{r|l} & 92 \\ \hline 23 & 47 \end{array}$$

387. Νὰ συμπληρώσετε τὶς παρακάτω πράξεις:

$$\dots \times 37 = 13875, \quad \dots \times 85 = 31790, \quad \dots \times 39 = 13767.$$

388. 85 ὅμοια ἀντικείμενα ἀξίζουν 7.225 δραχμὲς. Πόσο ἀξίζει τὸ ἓνα;

389. Τὸ γινόμενο δύο ἀριθμῶν εἶναι 99.102 καὶ ὁ ἓνας ἀπ' αὐτοὺς εἶναι ὁ 1.194. Ποῖός εἶναι ὁ ἄλλος;

Προβλήματα:

390. Μὲ ἓνα σύνολο 1.296 μολυβιῶν, πόσα κουτιά τῶν 36 μολυβιῶν μποροῦμε νὰ γεμίσουμε;

391. Ἐνας ἔμπορος ἀγόρασε 17 δίσκους μὲ 2.975 δραχμὲς. Πόσο τοῦ

στοιχίζει κάθε δίσκος; Για να κερδίσει 45 δραχμές από κάθε δίσκο, πόσα πρέπει να εισπράξει από την πώληση;

392. Σε 30 ημέρες 25 αγελάδες καταναλώνουν 7.500 κιλά χόρτο. Πόσο χόρτο καταναλώνει κάθε αγελάδα την ημέρα;
393. Δύο οικογένειες κληρονόμησαν από ένα συγγενή τους 2.350.000 δραχμές με την έντολή του διαθέτη: η μία οικογένεια να πάρει τριπλάσια της άλλης. Πόσα πήρε η κάθε μία;
394. Αγόρασε κάποιος πρόβατα κι αρνιά με 84.000 δραχμές. Αγόρασε τα πρόβατα προς 1.250 δραχμές τό ένα και τ' αρνιά προς 1.375 δραχμές τό ένα. Όσα όμως ήταν τα πρόβατα, τόσα ήταν και τ' αρνιά. Πόσα αγόρασε από κάθε είδος;
395. Σ' ένα σχολικό χρόνο, μοιράσθηκαν από την Κυβέρνηση, σε 547.650 μαθητές των ανώτερων τάξεων στα Δημοτικά σχολεία 4.928.850 βοηθητικά βιβλία δωρεάν. Πόσα βοηθητικά βιβλία πήρε ο κάθε μαθητής;

83. Συντομίες στή διαίρεση

Σε μερικά προβλήματα διαιρέσεως δεν υπάρχει υπόλοιπο π.χ. τό 25 είναι δυνατό να διαιρεθεί με τό 5, χωρίς ν' αφήνει υπόλοιπο, αλλά τό 25 δεν διαιρείται ακριβώς με τό 2.

Όταν γνωρίζετε αν ένας αριθμός είναι δυνατό να διαιρείται με τό 2, 3, 5, 9, τότε συντομεύετε την εργασία σας.

Προβλήματα:

Διαιρώντας βρείτε.

1ο). Ποιοί από τούς αριθμούς, πού είναι γραμμένοι παρακάτω, διαιρούνται ακριβώς με τόν 2;

26, 854, 723, 15, 92, 1108, 500, 77, 101, 4089.

Κοιτάξτε τό τελευταίο ψηφίο των αριθμών και φτιάξτε έναν κανόνα.

Βλέπετε; ♣

Οί αριθμοί πού τελειώνουν σε 0, 2, 4, 6 και 8, δηλαδή οί άρτιοι είναι αυτοί πού διαιρούνται ακριβώς με τό 2.

2ο). Διαιρώντας βρείτε, ποιοί απ' τούς αριθμούς, πού είναι γραμμένοι παρακάτω, διαιρούνται ακριβώς με τό 5;

32, 105, 96, 84, 250, 3615, 61, 119, 8845, 27.

Κοιτάξτε τό τελευταίο ψηφίο του αριθμού καί φτιάξτε έναν κανόνα, πού νά λέτε, πότε ένας αριθμός είναι διαιρετός διά 5.

Βλέπετε; ♦

Οί αριθμοί πού τελειώνουν στό 0 ή 5 διαιρούνται μέ τό 5 άκριβώς.

3ο) Διαιρώντας βρείτε, ποιοί άπ' τούς αριθμούς: 1500, 86, 8217, 7840, 53, 100 διαιρούνται μέ τό 3 ή 9. Έλέγξτε τόν κανόνα πού φτιάξατε.

Βλέπετε; ♦

Ένας αριθμός διαιρείται μέ τό 3 ή τό 9 όταν τό άθροισμα τών ψηφίων του σχηματίζει αριθμό πού νά διαιρείται άκριβώς μέ τό 3 ή τό 9.

Άσκήσεις:

396. Βρείτε τό άθροισμα τών ψηφίων στόν αριθμό 4.611. Είναι τό άθροισμα διαιρετό μέ τό 3; Είναι ό αριθμός 4.611 διαιρετός μέ τό 3;
397. Βρείτε τό άθροισμα τών ψηφίων στόν αριθμό 20.614. Είναι τό άθροισμα διαιρετό μέ τό 3; Είναι ό αριθμός διαιρετός μέ τό 3;
398. Είναι ό αριθμός 46.575 διαιρετός μέ τό 3 ή μέ τό 9; Γιατί;
399. Ποιοί άπ' τούς αριθμούς:
408, 426, 792, 800, 900, 702, 4.050, 1505, 1.135
είναι διαιρετοί μέ τό 2, ποιοί μέ τό 3, ποιοί μέ τό 5 καί ποιοί μέ τό 9;

84. Διαίρεση μετρήσεως καί διαίρεση μερισμού

“Όσα είπαμε στό α' μέρος γιά τά είδη διαιρέσεως, μετρήσεως καί μερισμού, τά ίδια εφαρμόζονται καί σέ πολυψήφιους αριθμούς.


Προβλήματα:

Νά χαρακτηρίσετε, άν είναι διαίρεση μετρήσεως ή διαίρεση μερισμού στά παρακάτω προβλήματα καί άφου λυθούν νά κάνετε τίς δοκιμές τους.

400. Ένας έμπορος άγόρασε 78 μέτρα ύφασμα μέ 8.814 δραχμές. Πόσο άγόρασε τό μέτρο του ύφάσματος;

401. Ένα οικόπεδο πουλήθηκε προς 10.500 δρχ. τό τ.μ. (τετραγωνικό μέτρο) αντί 8.463.000 δραχμές. Πόσα τετραγωνικά μέτρα ήταν τό οικόπεδο;
402. Ένα ραδιόφωνο αγοράστηκε 1.890 δραχμές, και θά έξοφληθει σέ 18 μηνιαίες δόσεις. Πόσες δραχμές είναι ή κάθε δόση;
403. Ένας αυτοκινητιστής συμφώνησε νά μεταφέρει άπ' τή Νάουσα στήν Άθήνα 4.386 κιθώτια μήλα. Πόσους δρόμους θά κάνει, άν σέ κάθε δρόμο μεταφέρει 258 κιθώτια;
404. Ένας υπάλληλος παίρνει μισθό γιά ένα χρόνο 151.475 δραχμές. Πόσες δραχμές παίρνει τή μέρα; (1 χρόνος = 365 μέρες).
405. Ένας γεωργός έσπειρε 138 στρέμματα σιτάρι και πήρε 30.774 κιλά. Πόσα κιλά σιτάρι πήρε άπό κάθε στρέμμα;

85. Πώς θά λύσετε ένα πρόβλημα



Εικ. 84

Ένας έμπορος άγόρασε 400 άριθμομηχανές προς 350 δραχμές τή μία. Πούλησε 280 και πήρε τά λεπτά, πού έδωσε ν' άγοράσει τίς 400 άριθμομηχανές και 14.000 δραχμές άκόμα. Πόσο πούλησε τή μία άριθμομηχανή;

Γιά νά λύσετε τό πρόβλημα αυτό πρέπει ν' άπαντήσετε στίς έρωτήσεις:

1. Τί σās ζητά νά προσδιορίσετε τό πρόβλημα;
2. Πόσα χρήματα πλήρωσε ό έμπορος;
3. Πόσα χρήματα εισέπραξε άπό τήν πώληση;
4. Τί πρέπει νά κάνετε, γιά νά φθάσετε στή σωστή άπάντηση;

2. Πόσα χρήματα πλήρωσε γιά τήν άγορά τών άριθμομηχανών;	350 × 400
Πλήρωσε γιά τήν άγορά 140.000 δρχ.	140.000
3. Πόσα χρήματα εισέπραξε άπό τήν πώληση τών 280 άριθμομηχανών:	140.000 + 14.000
	154.000

4. Πόσο πούλησε κάθε αριθμομηχανή.	154.000	280
Κάθε αριθμομηχανή τήν πούλησε 550 δραχμές.	140 000	550

Απάντηση: Τήν κάθε αριθμομηχανή τήν πούλησε 550 δραχμές

Σύνθετα προβλήματα τῶν τεσσάρων πράξεων:

406. Τά 58 κιλά τυρί άξιζουν 5.452 δραχμές. Πόσο άξιζουν τά 23 κιλά;
407. Έμπορος πούλησε 63 μ. ύφάσματος άντί 6.489 δραχμές. Άπ' τήν πώληση κέρδισε 1.575 δραχμές. Πόσο είχε αγοράσει τό μέτρο;
408. Η άπόσταση Γῆς - Ήλιου είναι 150.000.000 χιλιόμετρα. Τό φώς διανύει 300.000 χιλιόμετρα στό δευτερόλεπτο. Πόσα δευτερόλεπτα χρειάζεται τό φώς νά φθάσει άπ' τόν Ήλιο στήν Γῆ;
409. Η Γῆ, κατά τήν περιφορά της γύρω άπό τόν Ήλιο, διανύει σ' ένα μήνα (30 ήμέρες) 75.168.720 χιλιόμετρα. Πόσα χιλιόμετρα διανύει τήν κάθε μέρα;
410. Η άπόσταση τῆς Σελήνης άπ' τή Γῆ είναι 378.675 χιλιόμετρα. Ένα διαστημόπλοιο, πού διατρέχει 420.750 μέτρα στό λεπτό, σέ πόσες ώρες θά φθάσει άπό τή Γῆ στή Σελήνη;
411. Ένας τεχνητός δορυφόρος, πού κινείται μέ σταθερή ταχύτητα διέτρεξε σέ 35 δευτερόλεπτα 42.375 μέτρα περισσότερα, άπ' όσα είχε διατρέξει σέ 20 δευτερόλεπτα. Ποιά είναι ή ταχύτητά του σέ χιλιόμετρα ανά ώρα;
412. Μιά μοδίστρα εισπράττει 3800, δραχμές τή μέρα καί ξοδεύει 2500 δραχμές. Μετά πόσο χρόνο θά έξοικονομήσει 45.500 δραχμές, για ν' αγοράσει μία ραπτομηχανή;
413. Έμπορος άγόρασε 235 μέτρα ύφάσματος, άντί 17.625 δρχ. Πόσο πρέπει νά πουλήσει όλο τό ύφασμα, για νά κερδίσει 18 δραχμές τό μέτρο;
414. Γεωργός όφείλει στήν Άγροτική Ίράπεζα 155.675 δραχμές. Πούλησε 275 κιλά λάδι πρός 85 δραχμές τό κιλό καί μέ τά χρήματα πού πήρε έξόφλησε ένα μέρος του χρέους. Συμφώνησε τά υπόλοιπα νά τά πληρώσει σέ 18 μηνιαίες δόσεις. Πόσες δραχμές είναι κάθε δόση;
415. Έμπορος άγόρασε ύφασμα μέ 625 δραχμές τά 5 μέτρα καί τό πούλησε μέ 1.885 δραχμές τά 13 μέτρα. Άπ' τήν πώληση κέρδισε 1.100 δραχμές. Πόσα μέτρα άγόρασε;
416. Έμπορος άγόρασε τυρί πρός 88 δραχμές τό κιλό καί τό πούλησε

πρός 105 δραχμές τό κιλό. 'Απ' τήν πώληση κέρδισε 1.071 δραχμές.
Πόσα κιλά τυρί αγόρασε;

417. Δύο άνθρωποι αγόρασαν μαζί 76 κιλά λάδι πρὸς 85 δραχμές τό κιλό.
'Αλλά ὁ ἕνας πλήρωσε 340 δραχμές παραπάνω ἀπ' τόν ἄλλο. Πόσα
κιλά πήρε ὁ καθένας καί πόσα χρήματα ἔδωσε;
418. Γεωργός πούλησε 637 κιλά σιτάρι μέ 5.096 δραχμές. Κατόπιν ἀγό-
ρασε κριθάρι μέ 4.550 δραχμές. "Αν τό κιλό τοῦ κριθαρίου ἦταν κατά
μιὰ δραχμὴ φτηνότερο, πόσα κιλά κριθάρι αγόρασε;
419. Μιά νοικοκυρά αγόρασε πιάτα καί πλήρωσε 732 δραχμές. "Αν ἀγό-
ραζε ὁμως 4 πιάτα ἀκόμα, θά πλήρωνε 976 δραχμές. Πόσα πιάτα
αγόρασε;
420. "Ενας αγόρασε ποτήρια νεροῦ καί πλήρωσε 576 δραχμές. "Αν ἀγό-
ραζε 8 λιγότερα θά πλήρωνε 288 δραχμές. Πόσο αγόρασε τό κάθε
ποτήρι καί πόσα ποτήρια αγόρασε;
421. Μιά νοικοκυρά αγόρασε 24 πιάτα φαγητοῦ καί 18 πιάτα φρούτου καί
πλήρωσε ὅλα ὅλα 2.454 δραχμές. Κάθε πιάτο φαγητοῦ ἦταν ἀκριβό-
τερο ἀπὸ κάθε πιάτο φρούτου κατά 6 δραχμές. Πόσο αγόρασε τό
κάθε πιάτο τοῦ φαγητοῦ καί πόσο τοῦ φρούτου;
422. Πατέρας καί γιός παίρνουν μαζί ἡμερομίσθιο 1.525 δραχμές. "Αν γιά
τόν ἴδιο ἀριθμὸ ἡμερομισθίων πάρουν ὁ μὲν πατέρας 10.200 δρα-
χμές, ὁ δὲ γιός 8.100 δραχμές, ποῖο εἶναι τό ἡμερομίσθιο τοῦ καθε-
νός;
423. "Ενας ἔμπορος αγόρασε ἓνα τόπι ὕφασμα καί πλήρωσε 33.750 δραχ-
μές. "Όταν τό πούλησε πήρε 37.500 δραχμές καί κέρδισε 75 δραχ-
μές τό μέτρο. Πόσα μέτρα ἦταν ὅλο τό ὕφασμα;
424. Σέ 34 οἰκογένειες μοιράστηκε μιὰ οἰκοπεδικὴ ἔκταση σέ ἴσα οἰκό-
πεδα καί οἱ 23 οἰκογένειες πήραν 5.750 τετραγωνικά μέτρα. Πόσα
τετραγωνικά μέτρα ἦταν ἡ ἔκταση;
425. Γιά τήν ἐργασία 10 ἡμερῶν, 12 ἐργάτες καί 15 ἐργάτριες πήραν
239.250 δραχμές. "Αν κάθε ἐργάτης παίρνει τήν ἡμέρα 160 δραχμές
περισσότερο ἀπὸ κάθε ἐργάτρια, ποῖο τό ἡμερομίσθιο καθενός;
426. Τό εἰσιτήριο τοῦ τρένου Λαμία - 'Αθήνα εἶναι 317 δραχμές τῆς α'
θέσεως καί 195 τῆς β' θέσεως. "Αν 160 ἐπιβάτες πλήρωσαν 36.690
δραχμές, πόσοι ἐπιβάτες ἦσαν στήν α' θέση καί πόσοι στή β';
427. 'Υπάλληλος ὑπολογίζει πῶς, ἂν ξεθεύει τό μήνα 26.200 δραχμές, θά
ἔχει ἔλειμμα 6.200 δραχμές τό μήνα. Πόσες δραχμές πρέπει νά ξε-
θεύει τό μήνα, γιά νά τοῦ περισσεύουν 5.300 δραχμές;
428. "Ενα πιλοῖο μέ ταχύτητα 16 μιλίων τήν ὥρα διέτρεξε τήν ἀπόσταση
ἀνάμεσα σέ δύο λιμάνια σέ 14 ὥρες. Μέ ποιά ταχύτητα ἔπρεπε νά
κινηθεῖ, γιά νά φθάσει 6 ὥρες νωρίτερα;


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο

Έννοια
Γραφή - Ανάγνωση
Κάθετες εύθειες
Παράλληλες εύθειες
Ταινία

Δεκαδικοί αριθμοί

86. Ρόλος τῶν δεκαδικῶν ἀριθμῶν

“Όταν θέλετε νά αγοράσετε ἕνα ἀντικείμενο, τότε ἡ ἀξία του πιθανόν νά ἐκφράζεται μέ ἕναν ἀκέραιο ἀριθμό δραχμῶν. Πολύ συχνά ὅμως δέ συμβαίνει αὐτό. Ἔτσι ἕνα λίτρο π.χ. βενζίνη, ἀξιζει περισσότερες ἀπό 21 δραχμές καί λιγότερες ἀπό 22.




Εἰκ. 85

Αὐτή τήν ἀνάγκη καλύπτει ἕνα νέο εἶδος ἀριθμῶν πού ὀνομάζονται **δεκαδικοί ἀριθμοί**. Γιά τό λόγο αὐτό ἡ μονάδα νομισμάτων (ἡ δραχμή) χωρίζεται σέ 10 ἴσα μέρη, πού λέγονται δεκάρες. Ἔτσι ἡ τιμή τοῦ λίτρου τῆς βενζίνης ἀν εἶναι 21 δραχμές καί 6 δεκάρες, θά γράφεται: 21,6 καί θά διαβάζεται 21 καί 6 δέκατα δραχμές.

Ὅμοια πολλά μεγέθη ὅταν μετρηθοῦν, τά μέτρα τους ἐκφράζονται μέ δεκαδικούς ἀριθμούς, ὅπως μήκη, βάρη κ τ. λ.

Τό χαρακτηριστικό αὐτῶν τῶν μεγεθῶν εἶναι πῶς δέ σχηματίζονται ἀπό ξεχωρισμένα μέρη. Π.χ. τό μήκος τῆς αἵθουσας διδασκαλίας εἶναι:

6 μέτρα καί 28 ἑκατοστά, ἢ σέ δεκαδική γραφή: 6,28 μ. πού διαβάζεται 6 καί 28 ἑκατοστά τοῦ μέτρου.




Εικ. 86

Οι μονάδες απ' τις οποίες γίνονται οί δεκαδικοί αριθμοί λέγονται: **δεκαδικές μονάδες**.

Βλέπετε; ♣

Δεκαδικοί είναι ένα νέο είδος αριθμών, όχι ακέραιων, πού ανάμεσα στα ψηφία τους υπάρχει ένα «κόμμα».


87. Έννοια τής δεκαδικής μονάδας



Μέτρο



Παλάμη



Έκατοστόμετρο




Χιλιοστό

Εικ. 87

1. Τί μέρος του μέτρου είναι μία παλάμη, τί ένας δάκτυλος και τί μία γραμμή;
2. Τί μέρος του κιλού είναι ένα γραμμάριο;



Εικ. 88



Εικ. 89

3. Τί μέρος του εκατοστάριку είναι ένα δεκάριку, και τί μία δραχμή;

Τό 1 δέκατο, 1 εκατοστό, 1 χιλιοστό λέγονται **δεκαδικές** μονάδες. Κι όπως τό μέτρο, τό κιλό, τό κατοστάριку, έτσι και κάθε μονάδα, χωρίζεται σέ 10, 100 ή 1000 ίσα μέρη, κι είναι:

Τό 1 δέκατο: δεκαδική μονάδα πρώτης τάξεως

Τό 1 εκατοστό: δεκαδική μονάδα δεύτερης τάξεως

Τό 1 χιλιοστό: δεκαδική μονάδα τρίτης τάξεως

Παρατηρούμε άκόμα πώς:

1 μονάδα = 10 δέκατα

1 δέκατο = 10 εκατοστά

1 εκατοστό = 10 χιλιοστά

Βλέπετε: ▶

Οί δεκαδικές μονάδες είναι ταξινομημένες έτσι, ώστε ή δεκαδική μονάδα μιάς τάξεως να είναι 10 φορές μεγαλύτερη άπ' τή δεκαδική μονάδα τής άμέσως έπομένης προς τά δεξιά τάξεως.

Άσκήσεις (χωρίς χαρτί και μολύβι)

429. Ποιά είναι:

τό ένα δέκατο του δεκάριку;


τό ένα δέκατο του είκοσάδραχμου;

- τό ένα δέκατο της δραχμής;
 τό ένα δέκατο του έκατοντάδραχμου;
430. Ποιό είναι:
 τό 1 δέκατο του μέτρου;
 τό 1 δέκατο της παλάμης;
 τό 1 δέκατο του έκατοστού του μέτρου;
 τό 1 χιλιοστό του μέτρου;
431. Ποιό είναι τό χιλιοστό του κιλού;
432. Τί μέρος του δακτύλου είναι ή μιά γραμμή, καί τί μέρος του μέτρου ή 1 παλάμη;


88. Έννοια δεκαδικού αριθμού

Προβλήματα:

1. Από πόσες δεκαδικές μονάδες αποτελείται τό γραμμοσκιασμένο μέρος;




Εικ. 90




Εικ. 91

2. Από πόσα χιλιοστά αποτελείται τό μήκος του ελάσματος που βρίσκεται ανάμεσα στους δύο βραχίονες του «θερνιέρου»;
3. Τί μέρος του δεκάρικου είναι οι έξι δραχμές;



Εικ. 92



Εικ. 93

4. Τί μέρος του μέτρου είναι το μήκος του τμήματος (α);

Οί αριθμοί: 3 δέκατα

23 χιλιοστά του μέτρου

6 δέκατα του δεκάριου

6 εκατοστά του μέτρου

λέγονται **δεκαδικοί αριθμοί**.

Κι όπως οι άκεραιοί αριθμοί γίνονται από την επανάληψη της άκεραιοι μονάδας, έτσι και οι δεκαδικοί γίνονται από την επανάληψη της δεκαδικής μονάδας. Π.χ. ο 3 δέκατα, γίνεται από την επανάληψη της δεκαδικής μονάδας 1 δέκατο 3 φορές.

Κι ο αριθμός 23 χιλιοστά από την επανάληψη του 1 χιλιοστού 23 φορές. Άκόμα παρατηρούμε πώς, ο αριθμός 23 χιλιοστά του μέτρου, αποτελείται από 2 εκατοστά και 3 χιλιοστά.

Όμοια ο αριθμός: 5,234 χιλιοστά αποτελείται από:

5 άκεραιο, 2 δέκατα, 3 εκατοστά και 4 χιλιοστά.

Βλέπετε; ♦

Όπως οι άκεραιοί, έτσι και οι δεκαδικοί σχηματίζονται από μονάδες διαφόρων τάξεων, και κάθε δεκαδικός αποτελείται από 2 μέρη, από ένα άκεραιο μέρος κι από ένα δεκαδικό μέρος, που χωρίζονται με ένα κόμμα.

Οί δεκαδικοί αριθμοί που γράψαμε ως τώρα, ακολουθούνται κι από ένα όνομα. Δηλαδή είναι συγκεκριμένοι.

Όποια όμως και αν είναι η ονομασία τους, οι αριθμητικές τους ιδιότητες που θ' αναφέρουμε παρακάτω, είναι πάντα ίδιες. Μπορούμε λοιπόν για συντομία να παραλείψουμε την ονομασία αυτή και ν' ασχοληθούμε με τους αντίστοιχους άφηρημένους αριθμούς.

Άσκησης (χωρίς χαρτί και μολύβι)

433. Τί μέρος της δραχμής είναι 2 και τί 3 δεκάρες;

434. Τί μέρος του δεκάδικου είναι 6, 7 ή 8 δραχμές;
 435. Τί μέρος του κατοστάρικου είναι 3, τί 8 και τί 12 δραχμές;


89. Πώς γράφονται οι δεκαδικοί αριθμοί

Όπως στους άκέραιους έτσι και στους δεκαδικούς αριθμούς η θέση του ψηφίου καθορίζει και την αξία του.

Δηλαδή: κάθε ψηφίο που είναι αριστερά άλλου ψηφίου παρασταίνει μονάδες 10 φορές μεγαλύτερες απ' εκείνο. Κατά συνέπεια κάθε ψηφίο, που είναι γραμμένο στα δεξιά άλλου ψηφίου παρασταίνει μονάδες 10 φορές μικρότερες απ' εκείνο.

Ο παρακάτω πίνακας μας διευκολύνει, ώστε να τοποθετήσουμε κάθε ψηφίο στη σωστή του θέση, ανάλογα με τις μονάδες που παρασταίνει.

Τό μηδέν συμπληρώνει την τάξη, που δέν έχει μονάδες, και τό κόμμα (,) χωρίζει τό άκέραιο απ' τό δεκαδικό μέρος του αριθμού.



Εικ. 94

Παραδείγματα:


1. Τό πλάτος του μαυροπίνακα είναι 2 μέτρα, 8 παλάμες, 4 δάκτυλοι, 3 γραμμές.

Αυτό γράφεται 2, 843 μέτρα. Ή πιό άπλά: 2,847 μ.

Ή επίσης τό ίδιο σέ παλάμες γράφεται: 28,43 παλάμες. Ή πιό άπλά 28,43 π.

Όμοια τό ίδιο γράφεται σέ δάκτυλους: 284,3 δάκτυλοι. Ή πιό άπλά: 284,3 δ.

Ή άκόμα τό ίδιο γράφεται: 2.843 γραμμές.



Εικ. 95

2. Ή άπόσταση δύο δένδρων του κήπου μας είναι: 22 μέτρα, 2 παλάμες, 2 δάκτυλοι.

Αυτό γράφεται: σέ μέτρα 22,22 μ.

– Σέ παλάμες: 222,2 π.

– Σέ γραμμές: 2222 γ.

3. Τό πάχος μιās διπλωμένης έφημερίδας είναι: 3 χιλιοστά του μέτρου. Αυτό γράφεται: 0,003 μ.

Βλέπετε; ♦

Βάζουμε τό κόμμα γιά νά δηλώσουμε, πώς:
ή πρώτη θέση άριστερά άπ' τό κόμμα σημαίνει μονάδες, πού χρησιμοποιούμε γιά τή μέτρηση, κι ή πρώτη άπ' τά δεξιά άπ' τό κόμμα θέση, σημαίνει δέκατα τής μονάδας αútης.

Οί δεκαδικόί άριθμοί πού έχουν σαν άκέραιο μέρος τό μηδέν, όπως:

0,3, 0,075, 0,5 λέγονται **γνήσιοι** δεκαδικόί άριθμοί.

Ένώ οί δεκαδικόί άριθμοί:

3,5, 27,8, 6,075 πού τό άκέραιο μέρος τους δέν είναι μηδέν λέγονται **μικτοί** δεκαδικόί άριθμοί.

Άσκήσεις (χωρίς χαρτί καί μολύβι)

436. Ποιό μέρος του δεκαδικού άριθμού γράφεται άριστερά καί ποιό δεξιά άπ' τό κόμμα;

437. Ποιές δεκαδικές μονάδες γράφονται στην πρώτη θέση μετά τό κόμμα, ποιές στη δεύτερη καί ποιές στην τρίτη;

438. Σέ ποιά θέση γράφονται τά έκατοστά καί σέ ποιά τά χιλιοστά;

439. Ποιές δεκαδικές μονάδες γράφονται στην τρίτη θέση μετά τό κόμμα;

440. Νά γραφεί ή άξία θέσεως του ψηφίου 2 στους άριθμούς:

432,678	3267,563
726,345	15,342
896,250	0,020

441. Νά γραφοῦν οί άριθμοί:

- 1) ένα δέκατο
- 2) τέσσερα δέκατα
- 3) έξήντα πέντε έκατοστά
- 4) όκτακόσια τριάντα-δύο χιλιοστά
- 5) έξι χιλιοστά

- 6) 12 χιλιοστά
7) 7 και 3 εκατοστά
8) 23 και 5 χιλιοστά
442. Νά γραφούν οι αριθμοί:
4 δεκάδες, 7 μονάδες, 6 δέκατα, 5 χιλιοστά
2 μονάδες, 3 εκατοστά, 4 χιλιοστά
7 δέκατα, 8 χιλιοστά

90. Πώς διαβάζεται ένας δεκαδικός αριθμός

1. Διαβάζουμε χωριστά τό άκέραιο μέρος και λέμε τή λέξη κόμμα. Έπειτα διαβάζουμε τό δεκαδικό μέρος του αριθμού σαν νά ήταν κι αυτό άκέραιος, και λέμε τό όνομα του τελευταίου δεκαδικού ψηφίου.

π.χ.: 'Ο αριθμός: 7,055 διαβάζεται: έπτά κόμμα και 55 χιλιοστά. 'Ομοια ό αριθμός: 2,84 διαβάζεται: δύο κόμμα και 84 εκατοστά. 'Η όρθότερα: δύο άκέραιος και 84 εκατοστά.

2. Διαβάζουμε πρώτα τό άκέραιο μέρος και μετά τά δεκαδικά ψηφία και καθένα μέ τ' όνομά του.

π.χ.: 'Ο 4,756 διαβάζεται 4 άκέραιος και 7 δέκατα, 5 εκατοστά, και 6 χιλιοστά.

3. Διαβάζουμε τόν αριθμό σαν νά ήταν άκέραιος μέ τό όνομα του τελευταίου δεκαδικού ψηφίου.

π.χ.: 'Ο αριθμός 7,32 διαβάζεται: 732 εκατοστά και ό αριθμός 54,2 διαβάζεται: 542 δέκατα.

Βλέπετε; ♦

Γιά νά διαβάσουμε ένα δεκαδικό αριθμό διαβάζουμε:

- Πρώτα τό άκέραιο μέρος και μετά όλο τό δεκαδικό μαζί μέ τ' όνομα του τελευταίου δεκαδικού ψηφίου, ή
- 'Όλα μαζί, σαν άκέραιο, μέ τ' όνομα του τελευταίου δεκαδικού ψηφίου ή
- Πρώτα τόν άκέραιο και μετά κάθε δεκαδικό ψηφίο μέ τ' όνομά του.

Άσκησης (χωρίς χαρτί και μολύβι)

443. Νά διαβάσετε με τόν πρώτο τρόπο τούς δεκαδικούς αριθμούς:
0,61 11,04 7,35 23,008
0,005 0,44 222,22 3,036.
444. Νά διαβάσετε με τόν δεύτερο τρόπο τούς παρακάτω δεκαδικούς αριθμούς:
6,32 8,12 5,07 2,009 4,09.
445. Νά διαβάσετε με τόν τρίτο τρόπο τούς δεκαδικούς αριθμούς:
0,415 1,589 3,007 8,80 7,090

91. Ο ρόλος του μηδενός στους δεκαδικούς αριθμούς

Προβλήματα:

446. Ένας μαθητής έγραψε τόν αριθμό 25 χιλιοστά, έτσι: 0,25. Πώς έπρεπε νά τόν γράψει;
Γιατί πρέπει νά βάλουμε τό μηδέν ανάμεσα στό κόμμα καί τό 2;
447. Τί σημαίνει τό μηδέν στόν αριθμό: 47,308;
Γιατί δέν παραλείπεται;
448. Έχει ό αριθμός: 0,25 τήν ίδια αξία μέ τόν αριθμό 0,025; Άφού τό μηδέν σημαίνει «τίποτε», γιατί τό γράφουμε;
449. Χρειάζονται τά μηδενικά στόν αριθμό: 0,700, καθώς καί στόν αριθμό: 0,007;
Έξηγηστε, γιατί πρέπει νά γράφουμε τά μηδενικά στή δεύτερη περίπτωση, ενώ στήν πρώτη μπορούμε νά τά παραλείψουμε;
450. Ποιά μηδενικά είναι άπαραίτητα στόν αριθμό: 9,030 καί γιατί;

Βλέπετε; ♦

1. Όπως στους άκέραιους έτσι καί στους δεκαδικούς, τό ψηφίο μηδέν μπαίνει για νά δηλώσει τήν άπουσία μονάδων μιάς όρισμένης τάξεως.
2. Άν στά δεξιά ενός δεκαδικού αριθμού γράψουμε ένα ή περισσότερα μηδενικά, ή αξία (τό μέγεθος) του αριθμού δέν αλλάζει.

Σύμφωνα με τὰ παραπάνω, κάθε ἀκέραιο ἀριθμό μπορούμε νά τόν γράφουμε μέ δεκαδική μορφή. Ἀρκεῖ δεξιά τοῦ ἀριθμοῦ νά γράφουμε ἕνα κόμμα καί δεξιά ἀπό τό κόμμα ἕνα ἢ περισσότερα μηδενικά.

$$\text{π.χ.: } 12 = 12,0 = 12,00 = 12,000.$$

92. Σύγκριση τῶν δεκαδικῶν ἀριθμῶν

Ποῖός ἀπ' τούς δεκαδικούς: 31,45 καί 31,457 εἶναι μεγαλύτερος;

Ὅπως παρατηρήσαμε παραπάνω, ἡ ἀξία τοῦ δεκαδικοῦ ἀριθμοῦ δέ μεταβάλλεται, ἂν στά δεξιά τοῦ γράψουμε μηδενικά.

Αὐτό μᾶς ὀδηγεῖ στό συμπέρασμα πῶς μπορούμε πάντοτε νά παρουσιάσουμε δύο δεκαδικούς ἀριθμούς μέ τό ἴδιο πλῆθος δεκαδικῶν ψηφίων.

Ἡ σύγκριση στή συνέχεια τῶν δύο δεκαδικῶν ἀριθμῶν, ἀνάγεται στή σύγκριση ἀκέραιων ἂν παραλείψουμε τό κόμμα.

Στό παράδειγμά μας παρατηροῦμε:

$$31,450 \text{ καί } 31,457$$

ἢ

$$31450 < 31457$$

Ἀσκήσεις:

451. Στούς παρακάτω ἀριθμούς καταργήστε τὰ μηδενικά πού δέν εἶναι ἀπαραίτητα, χωρίς ν' ἀλλάξει ἡ ἀξία τοῦ ἀριθμοῦ:

1,500 χιλιόμετρα, 3,020 κιλά, 16,40 μέτρα, 28,040 μέτρα.

452. Ποιό ποσό εἶναι μικρότερο: 7 δέκατα ἢ 800 χιλιοστά;

453. Ποιό ποσό εἶναι μεγαλύτερο: 5 δέκατα τοῦ κιλοῦ ἢ 400 χιλιοστά;

454. 60 ἑκατοστά τοῦ κιλοῦ μέ πόσα χιλιοστά ἀντιστοιχοῦν;

(Ἐπόδειξη: $0,60 = 0,600$. Γιατί;)

455. Τά 8 δέκατα τοῦ μέτρου μέ πόσα χιλιοστά ἀντιστοιχοῦν;

456. Τά 700 χιλιοστά τοῦ κιλοῦ πόσα ἑκατοστά καί πόσα δέκατα εἶναι;

457. Τά 8 δέκατα τοῦ κιλοῦ πόσα χιλιοστά εἶναι;

458. Νά συγκρίνετε τά 3 δέκατα, τά 30 ἑκατοστά, τά 300 χιλιοστά.


459. Τί μέρος τοῦ μέτρου εἶναι τά 500 χιλιοστά;

460. Νά συγκρίνετε τά 0,5 τοῦ μέτρου μέ τά 0,30 τοῦ μέτρου.

92. Κάθετες εϋθειες, παράλληλες εϋθειες - ταινία

Μέ τή βοήθεια ενός φύλλου τοϋ τετραδιου μας μέ διπλώσεις.

1. Διπλώνουμε ένα φύλλο τοϋ τετραδιου μας.
2. Ξαναδιπλώνουμε αυτό τό φύλλο έτσι, πού νά συμπέσει επάνω στον έαυτό του τό πρώτο τσάκισμα, όπως φαίνεται στο σχέδιο.




Εικ. 96

Οι εϋθειες γραμμές πού θά φανούν στά τσάκισματα είναι κάθετες εϋθειες.

Λέμε ακόμα πώς οι εϋθειες αυτές σχηματίζουν όρθες γωνίες.

Στό σχέδιο εικονίζεται ό γνώνμονας πού μέ τή βοήθειά του χαράσσουμε κάθετες εϋθειες.




Εικ. 97

Στό σχέδιο εικονίζεται ό τρόπος πού μπορούμε νά χαράζουμε μία εϋθεια κάθετη σέ μία άλλη, μέ τό γνώνμονα.




Εικ. 98

Παρακάτω εικονίζεται ό τρόπος πού χαράσσεται μία εϋθεια κάθετη σέ μία άλλη, όταν περνά από όρισμένο σημείο.




Eik. 98a

Στήν εικόνα βλέπετε πώς να χαράσσετε **παράλληλες** εύθειες με τη βοήθεια του κανόνα και του γνώμονα. Επίσης βλέπετε, πώς, οί κάθετες στήν ίδια εύθεία, είναι παράλληλες.



Eik. 99



Eik. 100

Τό τμήμα AB τής κοινής καθέτου των δύο παραλλήλων ϵ_1 και ϵ_2 ονομάζεται πλάτος τής ταινίας.


Τήν ταινία τή βλέπουμε:

Σ' ένα ολόκληρο φύλλο τετραδίου, στά εισιτήρια των λεωφορείων, στά χαρτονομίσματα, στίς διάφορες κορδέλες κ τ λ., άν όλα αυτά τά τοποθετήσουμε πάνω στό τραπέζι ή στό θρανίο.

Άν κόψουμε ένα φύλλο τετραδίου σέ ταινίες, κατά μήκος των γειτονικών γραμμών του, θά πάρουμε ταινίες του ίδιου πλάτους.

Άσκησης:

461. Νά χαράξετε δύο ευθείες α και β κάθετες μεταξύ τους. Μετά νά χαράξετε μία ευθεία κάθετη στην α και μία ευθεία κάθετη στην β . Τί μπορούμε νά πούμε γιά αυτές τίς νέες ευθείες; Ποιά έννοια σάς δίνει τό σχήμα πού κατασκευάσατε;




Εικ. 101

462. Μέ τό γνώμονα χαράξετε δύο κάθετες ευθείες α και β . Χαράξετε μία ευθεία γ παράλληλη πρός τήν α και μία ευθεία δ παράλληλη πρός τήν β .

Τί μπορούμε νά πούμε γιά τίς ευθείες γ και β , δ και γ , γ και δ ;

463. Χαράξετε μία ταινία. Μετά χαράξετε μία κάθετη στίς άκμές τής ταινίας.

Τό μήκος του τμήματος AB όρίζει τό πλάτος τής ταινίας, δώστε τό μήκος σέ χιλιοστά του μέτρου.



Εικ. 102

464. Χαράξετε μία ταινία μέ πλάτος 4 έκατοστόμετρα.

ΟΤΑΝ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

1. Μή σταματάτε. Συνεχίστε τή μελέτη σας έστω και μέ άργό ρυθμό.
2. Βεβαιωθείτε ότι αντίληφθήκατε τό θέμα.
3. Έπιχειρήστε νά φτιάξετε ένα εύκολο πρόβλημα πού νά μοιάζει μέ αυτό. Λύστε το και άκολουθήστε τήν ίδια πορεία και γιά τό δύσκολο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο

Πρόσθεση
Αφαίρεση
Πολλαπλασιασμός
Παραλληλόγραμμα
Διαίρεση

Οί 4 πράξεις με δεκαδικούς αριθμούς

93. Γενικά

Όπως και με τούς άκεραίους έτσι και με τούς δεκαδικούς αριθμούς, όταν μᾶς δοθούν δύο ή περισσότεροι δεκαδικοί, μπορούμε ἀπ' αὐτούς νά κατασκευάσουμε ἄλλους, μέ 4 τρόπους.

Τούς τρόπους αὐτούς τούς λέμε: **ἀριθμητικές πράξεις**. Οἱ πράξεις αὐτές ἔχουν τά ὀνόματα: **πρόσθεση, ἀφαίρεση, πολλαπλασιασμός καί διαίρεση**.

Ἀρχίζουμε πάλι ἀπό τήν πρόσθεση πού εἶναι καί ἀπλούστερη.

94. Πρόσθεση

Πρόβλημα 1ο

Τά δύο πεζοδρόμια σέ ἓνα δρόμο ἔχουν πλάτη τό καθένα 3,8 μέτρα καί τό κατάστρωμα τοῦ δρόμου ἔχει πλάτος 12,82 μέτρα. Πόσο εἶναι τό πλάτος ὅλου τοῦ δρόμου;

Γιά νά λύσουμε τό πρόβλημα πρέπει νά προσθέσουμε καί τούς τρεῖς ἀριθμούς: $3,8 + 12,82 + 3,8$.

Παρατηροῦμε ὅμως, πῶς ἐπειδή μόνον ὁμοειδεῖς ἀριθμούς μπορούμε νά προσθέσουμε, γι' αὐτό πρέπει νά τούς διατάξουμε ἔτσι, ὥστε νά βρεθοῦν τά κόμματα στήν ἴδια στήλη, πού τότε οἱ μονάδες τῆς ἴδιας τάξεως θά βρεθοῦν στήν ἴδια στήλη. Μετά νά κάνουμε τήν πράξη, ὅπως καί μέ τούς ἀκεραίους ἀριθμούς.

Η διάταξη γίνεται έτσι:

Έκατοντάδες	Δεκάδες	Μονάδες	κόμμα	Δέκατα	έκατοστά	Χιλιοστά
	3	.	8			
1	2	.	8	2		
	3	.	8			
2	0	.	4	2		



ή απλά
$$\begin{array}{r} 3,8 \\ 12,82 \\ 3,8 \end{array}$$

πλάτος του δρόμου \rightarrow $\frac{20,42}{3,8}$ μέτρα Εικ. 103

Πρόβλημα 2ο

Γιά να κάνει την ηλεκτρική εγκατάσταση σέ μιά κατοικία ένας ηλεκτρολόγος, χρησιμοποίησε τρία κομμάτια καλώδιο. Τό πρώτο κομμάτι είχε μήκος 46,5 μέτρα. Τό δεύτερο 8,375 μέτρα καί τό τρίτο 47 μέτρα. Πόσο μήκος καλώδιο χρησιμοποίησε;

Λύση:

$$\begin{array}{r} 46,5 \\ 8,375 \\ 47 \\ \hline 101,875 \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{ή πιό απλά} \\ 46,500 \\ 8,375 \\ 47,00 \\ \hline 101,875 \end{array}$$

Από τά παραπάνω διαπιστώνουμε πώς:

1. Αν μερικοί προσθετέοι έχουν λιγότερα δεκαδικά ψηφία, γιά να τούς κάνουμε ισάριθμους τά συμπληρώνουμε μέ μηδενικά.
2. Καί κάθε άκέραιο τόν γράφουμε σέ δεκαδική μórφή μέ ισάριθμα μηδενικά σάν δεκαδικά ψηφία.

Βλέπετε; ♣



Γιά να προσθέσουμε δεκαδικούς αριθμούς, τούς γράφουμε τόν ένα κάτω από τόν άλλο, έτσι ώστε τά κόμματα να βρίσκονται στην ίδια στήλη. Κάνουμε τήν πρόσθεση όπως και στους άκεραίους και στό έξαγόμενο βάζουμε τό κόμμα στό στήλη του.

Παρατηρήσεις:

1. Ἡ δοκιμή τῆς προσθέσεως γίνεται όπως και στους άκεραίους.
2. Ὄταν από τούς αριθμούς πού προσθέτουμε κάποιος εἶναι συγκεκριμένος, τότε πρέπει κι ὄλοι οἱ άλλοι νά εἶναι συγκεκριμένοι και ὁμοειδεῖς.
3. Σέ ὄσους προσθετέους λείπουν στό τέλος ψηφία τάξεων πού ἔχουν άλλοι, γράφουμε στίς θέσεις τους μηδενικά.

Ἀσκήσεις και προβλήματα:

465. Νά εκτελεστοῦν οἱ προσθέσεις και νά γίνουν και οἱ δοκιμές τους.
- $$132,5 + 72,06 + 87,8$$
- $$24,004 + 3,008 + 4,04$$
- $$105,05 + 92,103 + 75,6$$
- $$0,002 + 0,03 + 0,040$$
466. Τό βάρος του Κώστα εἶναι 68,450 κιλά και του Νίκου 56,830 κιλά. Πόσα κιλά ζυγίζουν και οἱ δύο μαζί;
467. Ἐνα μηχανουργεῖο αγόρασε 3 θαρέλια πετρέλαιο γιά τήν κίνηση τῆς μηχανῆς του. Τό α' ζυγίζει, χωρίς τό δοχεῖο: 244,560 κιλά, τό β' 168,050 κιλά και τό τρίτο 135,50 κιλά. Πόσα κιλά πετρέλαιο αγόρασε;
468. Γιά τήν κατασκευή τριῶν ένδυμασιῶν χρειάστηκαν: γιά τήν α' 1,65 μέτρα. Γιά τή β' 2,38 μέτρα και γιά τήν γ' 2,50 μ. Πόσα μέτρα χρειάζονται και οἱ τρεῖς μαζί;
469. Ἐνας ἔμπορος κέρδισε από τά μεταξωτά ὑφάσματα: 13.567,60, από τά βαμβακερά 118.567,80 και από τά μάλλινα 99904,3. Πόσες δραχμές κέρδισε ἀπ' ὄλα;
470. Ἐνα κατάστημα πούλησε τή μιá μέρα 27,75 μ. από ένα τόπι ὑφασμα, τήν ἄλλη μέρα πούλησε 15,5 μ. και του ἔμειναν 19 μ. Πόσο ἦταν τό μήκος του ὑφάσματος;
471. Δύο αὐτοκίνητα ξεκίνησαν τήν ἴδια ὠρα τό ένα από Λαμία πρὸς Ἀθήνα και τό άλλο από Ἀθήνα πρὸς Λαμία. Ὄταν συναντήθηκαν τό

ένα είχε διατρέξει 95,75 χιλιόμετρα, και το άλλο 24,5 χιλιόμετρα περισσότερα. Πόση είναι η απόσταση Λαμίας - Αθηνών;

472 Ένας αγρότης είχε δύο σακιά λίπασμα. Από το πρώτο πήρε 17,60 κιλά και από το δεύτερο 13 κιλά περισσότερο και το έρριξε στο χωράφι του. Το υπόλοιπο λίπασμα που έμεινε και στα δύο σακιά ήταν 69,40 κιλά. Πόσα κιλά λίπασμα είχαν και τα δύο σακιά;

95. Άφαιρηση

Ο Γιώργος είχε 25,50 δραχμές και πλήρωσε για ένα παγωτό 7,20 δραχμές. Πόσα του έμειναν;

Για να βρούμε πόσα του έμειναν πρέπει να αφαιρέσουμε από τις 25,50 που είχε, τις 7,20 που έδωσε για το παγωτό.

Παρατηρούμε όμως, πώς επειδή μόνο όμοιεις αριθμούς μπορούμε να αφαιρέσουμε, γι' αυτό πρέπει να τους διατάξουμε έτσι, ώστε να βρεθούν τα κόμματα στην ίδια κατακόρυφη στήλη, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, γιατί μόνο έτσι οι μονάδες της ίδιας τάξεως, δηλαδή όμοιεις με όμοιεις, θα βρεθούν στην ίδια στήλη.

Μετά κάνουμε την άφαιρηση, όπως και στους άκεραίους, προσέχουμε μόνο στο εξαγόμενο να βάλουμε το κόμμα στη στήλη του.

Έκατοντάδες	Δεκάδες	Μονάδες	κόμμα	Δέκατα	Έκατοστά	Χιλιοστά
3	2	5	,	5	0	
		7	,	2	0	
3	1	8	,	3	0	

Πρακτικά η πράξη γίνεται έτσι:

$$\begin{array}{r} 325,50 \leftarrow \text{Μειωτέος} \\ - 7,20 \leftarrow \text{Άφαιρετέος} \\ \hline 318,30 \leftarrow \text{Υπόλοιπο} \end{array}$$

Απάντηση: του έμειναν 318,30 δραχμές.

Άλλα παραδείγματα:

Να βρεθούν τα υπόλοιπα: $132,5 - 8,475,$

$$35,05 - 8,$$

$$5,06 - 0,004$$

$$1). \quad \begin{array}{r} 132,5 \\ - 8,475 \\ \hline 124,025 \end{array} \quad \eta \quad \begin{array}{r} 132,500 \\ - 8,475 \\ \hline 124,025 \end{array} \quad 2). \quad \begin{array}{r} 35,05 \\ - 8 \\ \hline 27,05 \end{array} \quad \eta \quad \begin{array}{r} 35,05 \\ - 8,00 \\ \hline 27,05 \end{array}$$

$$3). \quad \begin{array}{r} 5,06 \\ - 0,004 \\ \hline 5,056 \end{array} \quad \eta \quad \begin{array}{r} 5,060 \\ - 0,004 \\ \hline 5,056 \end{array}$$

"Όπως βλέπετε στα παραδείγματα, αν ένας από τους αριθμούς δεν έχει τό ίδιο πλήθος δεκαδικών ψηφίων με τόν άλλο, συμπληρώνουμε με μηδενικά.

Κάνουμε τήν αφαίρεση, όπως και με τούς άκέραιους, αρκεί νά γράφουμε τά κόμματα στήν ίδια στήλη. 'Εάν ό ένας άπ' τούς δυό δεν έχει τό ίδιο πλήθος δεκαδικών ψηφίων με τόν άλλο, συμπληρώνουμε με μηδενικά.

Βλέπετε; ▶

Ἡ δοκιμή γίνεται, όπως στους άκέραιους.

$$\text{π.χ.} \quad \begin{array}{r} 13,52 \\ - 8,30 \\ \hline 5,22 \end{array} \quad \begin{array}{r} 8,30 \\ + 5,22 \\ \hline 13,52 \end{array} \quad \eta \quad \begin{array}{r} 13,52 \\ - 5,22 \\ \hline 8,30 \end{array}$$

Ἀσκήσεις καί προβλήματα:

473. Νά γίνουν οί αφαιρέσεις με τίς δοκιμές τους.

$$2,08 - 1,05 \quad \rightarrow \quad 10,006 - 6,003$$

$$5,65 - 4,32 \quad \rightarrow \quad 18,015 - 4$$

$$11,736 - 0,014 \quad \rightarrow \quad 58,426 - 39,18$$

474. Αγόρασε κάποιος 5,05 μ. ύφασμα γιά ένα κουστούμι καί ένα παλτό.

"Αν τό κουστούμι χρειάζεται 2,80 μέτρα πόσα χρειάζεται τό παλτό;

475. Δύο αυτοκίνητα ξεκίνησαν από τήν Ἀθήνα γιά τή Λάρισα τήν ίδια ώρα καί από τό ίδιο σημείο. Τό πρώτο κινείται με ταχύτητα 98,5 χιλιόμετρα τήν ώρα καί τό θ' 86,5. Πόσο θά απέχουν ύστερα από μιά ώρα καί πόσο ύστερα από 2;

476. Ένας εργάτης πρόκειται ν' άνοίξει μιά σούδα μήκους 37,65 μ. Τίς 2 πρώτες μέρες έσκαψε τά 18,20 μ. Πόσα μέτρα μένουν άκόμα;

477. Ποιόν αριθμό πρέπει να προσθέσουμε στον 353,25 για να βρούμε τον αριθμό 412,500;

478. Ένας μανάβης αγόρασε 4 καφάσια μήλα. Το α' ζυγίζει 24,750 κιλά, το δεύτερο 1,300 κιλά περισσότερα από το πρώτο και το γ' 2,300 λιγότερο απ' το δεύτερο και το δ' 0,600 κιλά λιγότερο απ' το γ'. Πόσο ζυγίζει το καθένα και πόσο όλα μαζί;

Προβλήματα προσθέσεως και αφαιρέσεως:

479. Μιά νοικοκυρά πλήρωσε για καφέ 86,40 δραχμές. Για ζάχαρη 21,60 δραχμές και για διάφορα άλλα τρόφιμα 158,70 δραχμές. Πόσα πλήρωσε, και τί ρέστα θα πάρει από ένα πεντακοσάριο;

480. Ένας μαθητής, για να πληρώσει τα βιβλία που αγόρασε απ' το βιβλιοπωλή, του έδωσε ένα πεντακοσάριο. Ο βιβλιοπώλης του ζήτησε 22,50 δραχμές ακόμη και του επέστρεψε ένα κατοστάριο. Πόσο άξιζαν τα βιβλία;

481. Δύο αδέρφια μαζεύουν χρήματα, για να αγοράσουν ένα ποδήλατο που πουλιέται 2.800 δραχμές. Ο Κώστας μάζεψε 1.080,80 και ο Νίκος 909,50. Πόσες δραχμές θα ζητήσουν να συμπληρώσει ο πατέρας;

482. Ένας μανάβης είχε 4 τελάρα μήλα που ζύγιζαν 86,300 κιλά. Πούλησε τό πρωί 36,800 κιλά και τό απόγευμα 27,300 κιλά. Πόσα του έμειναν;

483. Ο πατέρας έφυγε για τήν αγορά με 1.000 δραχμές. Απ' αυτές έδωσε για κρέας 208,50 δραχμές, για φρούτα 106,80 δρχ. και για διάφορα άλλα ψώνια 112,60 δραχμές. Πόσες δραχμές του έμειναν;



484. Η Μαρία αγόρασε 3 μέτρα κορδέλα. Απ' αυτή έκοψε 0,75 μ. για τά μαλλιά, κι έδωσε και μισό μέτρο στην αδερφή της. Πόσα μέτρα της έμειναν;

485. Η μητέρα αγόρασε ένα μπουκάλι γάλα 6,80 δραχμές, και ένα κιλό τυρί 86,50 δραχμές. Πόσα ρέστα θα πάρει από ένα κατοστάριο;

96. Πολλαπλασιασμός και διαίρεση δεκαδικού αριθμού με 10, 100, 1.000

A'. N' αντιγράψετε στο τετράδιό σας και νά συμπληρώσετε τις παρακάτω μετατροπές:

Μέτρα	Παλάμες	Εκατοστά	Χιλιοστόμετρα
35,6			
	46,95		
		87,6	
			1,485



Νά βρείτε τούς πολλαπλασιαστές και διαιρέτες, κατά τη φορά του βέλους (→)

Όπως βλέπετε από τόν παραπάνω πίνακα:
 Για νά πολλαπλασιάσετε δεκαδικό αριθμό με 10 μετατοπίζετε τό κόμμα **μιά** θέση πρὸς τὰ δεξιά.

Για νά πολλαπλασιάσετε δεκαδικό αριθμό με 100, μετατοπίζετε τό κόμμα **δύο** θέσεις πρὸς τὰ δεξιά.

Για νά πολλαπλασιάσετε δεκαδικό αριθμό με 1.000, μετατοπίζετε τό κόμμα **τρεις** θέσεις πρὸς τὰ δεξιά.

➤ Για νά διαιρέσετε δεκαδικό αριθμό με 10, μετατοπίζετε τό κόμμα **μία** θέση πρὸς τ' ἄριστερά.

Για νά διαιρέσετε δεκαδικό αριθμό με 100, μετατοπίζετε τό κόμμα **δύο** θέσεις πρὸς τ' ἄριστερά.

Για νά διαιρέσετε δεκαδικό αριθμό με 1.000, μετατοπίζετε τό κόμμα **τρεις** θέσεις πρὸς τ' ἄριστερά.

Άσκησης:

486. Νά εκτελεστούν οι πράξεις:

$$57,80 \times 10$$

$$100 \times 0,00785$$

$$357,5 \times 100$$

$$362,300 \times 100$$

$$100 \times 0,1821$$

$$2,4 \times 10$$

487. Νά γίνουν οι διαιρέσεις:

$$27,5 : 10$$

$$137,5 : 100$$

$$3571,5 : 100$$

$$0,25 : 10$$

$$2,4 : 100$$

$$25,35 : 100$$


Προβλήματα:

488. Μιά πετσέτα φαγητού χρειάζεται 0,55 μ. ύφασμα. Πόσα μέτρα του ίδιου ύφασματος θά χρειαστούν για α) 10 πετσέτες και β) για 100 πετσέτες;

489. 100 κιλά ρύζι κοστίζουν 2.780 δραχμές. Πόσο κοστίζει τό 1 κιλό;

490. Ένας βιβλιοπώλης πούλησε 1.000 μολύβια και πήρε 7.800 δραχμές. Πόσο πούλησε τό ένα;

97. Τί είναι παραλληλόγραμμο και ποιά τά είδη του



Εικ. 104

1. Στά σχέδια πού βλέπετε, έχει γραμμοσκιαστεί τό κοινό μέρος δύο ταινιών. Αυτό τό κοινό μέρος τών δύο ταινιών λέγεται παραλληλόγραμμο.


2. Τό παραλληλόγραμμο Β σχηματίζεται από τό κοινό μέρος δύο καθέτων ταινιών διαφόρου πλάτους. Αυτό ονομάζεται **όρθογώνιο**.
3. Τό παραλληλόγραμμο Δ σχηματίζεται από τό κοινό μέρος δύο καθέτων ταινιών του ίδιου πλάτους. Αυτό ονομάζεται **τετράγωνο**.
4. Τό παραλληλόγραμμο Γ σχηματίζεται από τό κοινό μέρος δύο ταινιών του ίδιου πλάτους καί όχι καθέτων. Αυτό ονομάζεται **ρόμβος**.

Μέ τό διαβήτη μας διαπιστώνουμε πώς:

1. Οί άπέναντι πλευρές του παραλληλόγραμμου είναι ίσες.
2. "Όλες οί πλευρές του ρόμβου καί του τετραγώνου είναι ίσες μεταξύ τους.
3. "Αν σέ ένα διαφανές χαρτί αποτυπώνουμε τή γωνία του παραλληλόγραμμου καί τήν τοποθετήσουμε στην άπέναντί της κατάλληλα, διαπιστώνουμε πώς οί άπέναντι γωνίες παραλληλόγραμμου είναι ίσες.


Τί διαφέρει τό τετράγωνο από τό ρόμβο

Τό τετράγωνο



Εικ. 105

Ο Ρόμβος



Εικ. 106

- | | |
|--|---|
| 1. "Έχει όλες τις πλευρές του ίσες. | 1. "Έχει όλες τις πλευρές ίσες. |
| 2. "Έχει όλες του τις γωνίες όρθές καί κατά συνέπεια ίσες. | 2. "Έχει μόνο τις άπέναντι γωνίες ίσες. |

Άσκήσεις καί προβλήματα

(πρός επανάληψη των τετραπλεύρων)

Γνωρίζουμε ότι:

Ἡ περίμετρος τοῦ τετραγώνου μέ πλευρά 4 μ. εἶναι: $4\mu. + 4\mu. + 4\mu. + 4\mu. = 16\mu.$

Ἡ περίμετρος τοῦ ὀρθογώνιου μέ μήκος 6 μ. καί πλάτος 4 μ. εἶναι: $4\mu. + 6\mu. + 4\mu. + 6\mu. = 20\mu.$

Υπενθυμίζουμε ἀκόμα πῶς περίμετρος ἑνός σχήματος ὀνομάζεται τό ἄθροισμα τῶν μηκῶν τῶν πλευρῶν του.

Ἀσκήσεις:

491. Συμπληρώστε τόν πίνακα.

Γιά μονάδα μήκους νά θεωρεῖται τό ἑκατοστόμετρο.

Ὅρθογώνιο	A	B	Γ	Δ	E	Z	H
Μήκος	28	320	90			249	267
πλάτος	13	204		129	241	97	
περίμετρος			420	836	1318		918

492. Ὅμοια

Τετράγωνο	A	B	Γ	Δ
Πλευρά	20		128	
Περίμετρος		80		360

493. Ὄταν διπλασιάσουμε, τριπλασιάσουμε, ἢ τετραπλασιάσουμε τίς διαστάσεις ὀρθογώνιου τί παθαίνει ἡ περίμετρος; Χρησιμοποιήστε ἀριθμητικά παραδείγματα.

494. Μιά πλευρά ἑνός ὀρθογώνιου εἶναι 100 μέτρα καί ἡ γειτονική της εἶναι 70 μέτρα. Πόση εἶναι ἡ περίμετρος του;

495. Ἡ πλευρά ἑνός ρόμβου εἶναι 5 μ. Πόση εἶναι ἡ περίμετρος του;

496. Ἡ περίμετρος ρόμβου εἶναι 60 μέτρα. Πόση εἶναι ἡ πλευρά του;

Ἀσκήσεις (χωρίς χαρτί καί μολύβι)

Νά διακρίνετε, ἂν οἱ παρακάτω προτάσεις εἶναι ἀληθεῖς ἢ ὄχι:

497. Κάθε ὀρθογώνιο εἶναι παραλληλόγραμμο;

498. Κάθε παραλληλόγραμμο εἶναι ρόμβος;

499. Κάθε τετράγωνο είναι ὀρθογώνιο; Καί κάθε ὀρθογώνιο εἶναι τετράγωνο;
500. Κάθε ρόμβος εἶναι τετράγωνο; Καί κάθε τετράγωνο εἶναι ρόμβος;
501. Κάθε παραλληλόγραμμο εἶναι ὀρθογώνιο;
502. Κάθε ρόμβος εἶναι παραλληλόγραμμο;

98. Πολλαπλασιασμός δεκαδικοῦ ἀριθμοῦ μέ ἀκέραιο

Πρόβλημα:

Ἐνα τοῦβλο ζυγίζει 2,450 κιλά.
Πόσο ζυγίζουν τά 45 τοῦβλα;

Ἐδῶ ξέρουμε τήν τιμή τῆς μιᾶς μονάδας καί ζητᾶμε τήν τιμή τῶν πολλῶν μονάδων. Θά κάνουμε πολλαπλασιασμό. Θά πολλαπλασιάσουμε τό 2,450 μέ τό 45.

Γιά νά ὑπολογίσουμε τό γινόμενο:
 $2,450 \times 45$



θά κάνουμε τά παρακάτω βήματα:

Εἰκ. 107

Βῆμα 1ο. Μετατρέπουμε τά κιλά σέ γραμμάρια (Μέ ποιό ἀριθμό πρέπει νά πολλαπλασιάσουμε)

$$2,450 \times 1.000 = 2.450 \text{ γραμμάρια.}$$

Βῆμα 2ο. Μέ πολλαπλασιασμό θά ὑπολογίσουμε τό βάρος τῶν 45 τοῦβλων.

$$2.450 \times 45 = 110.250 \text{ γραμμάρια.}$$

Βῆμα 3ο. Θά μετατρέψουμε τά 110.250 γραμμάρια σέ κιλά. (Μέ ποιόν ἀριθμό πρέπει νά διαιρέσουμε;)

$$110.250 : 1.000 = 110,250 \text{ κιλά.}$$

Ἀπάντηση: Τά 45 τοῦβλα ζυγίζουν: 110,250 κιλά.

Πρακτικά ἡ πράξη γίνεται, ὅπως σημειώνεται παράπλευρα.

2,450	→	Πολλαπλασιαστέος
45	→	Πολλαπλασιαστής
<hr/>		
12250		
9800		
<hr/>		
110,250	→	Γινόμενο

Δηλαδή:

Γράφουμε τόν πολλαπλασιαστή κάτω από τόν πολλαπλασιαστέο, σάν νά ήταν άκεραίοι. Μετά κάνουμε τόν πολλαπλασιασμό όπως ξέρουμε. "Όταν τελειώσουμε χωρίζουμε από τά δεξιά πρὸς τ' ἀριστερά τοῦ τελικοῦ γινομένου τόσα δεκαδικά ψηφία, ὅσα δεκαδικά ἔχει, ὁ δεκαδικὸς παράγοντας.

"Άλλα παραδείγματα:

$$\begin{array}{r} 1) \quad 0,4937 \quad 2) \quad 12 \\ \quad \quad \quad 2 \\ \hline \quad \quad 0,9874 \quad \quad \quad 0,003 \\ \hline \quad \quad \quad \quad \quad \quad 0,036 \end{array}$$

Βλέπετε; ♦

"Όταν ἔχουμε νά πολλαπλασιάσουμε δεκαδικό ἀριθμὸ μέ ἀκεραίο ἐκτελοῦμε τὴν πράξη, ὅπως ξέρουμε μέ τοὺς ἀκεραίους. Χωρίζουμε σέ συνέχεια ἀπὸ τά δεξιά τοῦ γινομένου τόσα δεκαδικά ψηφία ὅσα ἔχει ὁ δεκαδικὸς παράγοντας.

"Η δοκιμὴ γίνεται ὅπως στοὺς ἀκεραίους.

Άσκήσεις:

Στὶς παρακάτω περιπτώσεις ἔχει γίνει ὁ πολλαπλασιασμός. Μπορεῖτε νά βάλετε τὸ κόμμα στὴ σωστὴ του θέση:

$$\begin{array}{ll} 503. & 0,079 \times 3 = 237 \\ 505. & 49,78 \times 24 = 119472 \\ 507. & 6,118 \times 39 = 238602 \end{array} \quad \begin{array}{ll} 504. & 412 \times 0,008 = 3296 \\ 506. & 0,459 \times 17 = 7803 \\ 508. & 37,37 \times 23 = 85951 \end{array}$$

Άσκήσεις καὶ προβλήματα:

509. Νά ὑπολογίσετε τά γινόμενα: $7,346 \times 0,008$, $0,42 \times 0,7$, $2,765 \times 0,0004$.
510. Πόσο κρασί μᾶς χρειάζεται γιὰ νά γεμίσουμε 200 μπουκάλια κρασί τῶν 0,75 λίτρων;
511. Ποιὸ εἶναι τὸ βάρος 300 λίτρων λαδιοῦ, ἂν τὸ κάθε λίτρο ζυγίζει 0,910 κιλά;
512. Ποιὸ εἶναι τὸ βάρος 35 ρολῶν σύρμα σιδερένιο, ὅταν τὸ κάθε ρολὸ ζυγίζει 4,600 κιλά;
513. Πόσο ζυγίζουν 45 σάκοι σιταριοῦ, ὅταν ὁ καθένας ζυγίζει 75,500 κιλά;

514. Ποιό είναι τό βάρος 32 όμοίων κιβωτίων, όταν τό καθένα ζυγίζει 37,600 κιλά;

99. Πολλαπλασιασμός δεκαδικών αριθμών

Πρόβλημα:

Ποιό είναι τό βάρος σιδηροσωλήνα 2,16 μέτρων μήκους, όταν τό μέτρο ζυγίζει 3,5 κιλά;

Έδω γνωρίζουμε τό βάρος του 1 μέτρου καί ζητάμε τό βάρος 2,16 μέτρων. Θά κάνουμε πολλαπλασιασμό:

$$3,5 \text{ κιλά} \times 2,16$$

Γιά νά υπολογίσουμε τό παραπάνω γινόμενο θά προχωρήσουμε όπως παρακάτω:

Βήμα 1ο. Μετατρέπουμε τά 2,16 μέτρα σε έκατοστά. (Μέ ποιό αριθμό πρέπει νά πολλαπλασιάσουμε;)

$$2,16 \times 100 = 216 \text{ έκατοστά}$$

Βήμα 2ο. Βρίσκουμε τό βάρος του 1 έκατοστομέτρου μέ διαίρεση. (Μέ ποιό αριθμό πρέπει νά διαιρέσουμε;)

$$3,5 : 100 = 0,035 \text{ κιλά}$$

Βήμα 3ο. Υπολογίζουμε τέλος τό βάρος των 216 έκατοστών, άφού ξέρουμε τό βάρος του 1 έκατοστομέτρου, μέ πολλαπλασιασμό.

$$0,035 \times 216 = 7,560 \text{ κιλά}$$

πού αυτό είναι καί τό βάρος των 2,16 μέτρων πού ζητάμε. Δηλαδή: $3,5 \times 2,16 = 7,560$ κιλά. Πρακτικά όμως τό γινόμενο υπολογίζεται πιό εύκολα, όπως τό σημειώνουμε πιό κάτω.

3,5	→ Πολλαπλασιαστέος	"Άλλο παράδειγμα:
2,16	→ Πολλαπλασιαστής	
210		
35		
70		
7,560	→ Γινόμενο	
		0,0045
		0,7
		0,00315

"Υστερα άπ' τά παραπάνω βλέπουμε πώς:

Γιά νά πολλαπλασιάσουμε δύο δεκαδικούς αριθμούς θαδίζουμε έτσι:

Βήμα 1ο. Πολλαπλασιάζουμε τούς αριθμούς χωρίς κόμματα.

Βήμα 2ο. Μετρούμε τά δεκαδικά ψηφία πού έχουν καί οί δύο δεκαδικοί πού πολλαπλασιάσαμε.

Βήμα 3ο. Μετρούμε άπ' τό δεξιό του γινομένου τό ίδιο πλήθος ψηφίων καί βάζουμε ανάμεσα τό κόμμα.

Βήμα 4ο. "Αν τό γινόμενο έχει λιγότερα ψηφία άπ' τά δεκαδικά πού μετρήσαμε, τότε γράφουμε πρós τ' άριστερά του αριθμού τόσα μηδενικά όσα είναι τά ψηφία πού λείπουν κι ένα επί πλέον, σάν άκέραιο μέρος.

Παραδείγματα:

$$\begin{array}{r} 1,35 \\ \times 4,8 \\ \hline 1080 \\ 540 \\ \hline 6,480 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0,09 \\ \times 0,3 \\ \hline 0,027 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8,09 \\ \times 30,8 \\ \hline 6472 \\ 2427 \\ \hline 249,172 \end{array}$$

Παρατήρηση: 'Η δοκιμή γίνεται όπως καί στους άκεραίους.

Άσκήσεις:

515. Νά τοποθετήσετε τό κόμμα στή σωστή του θέση στους πολλαπλασιασμούς:

$$0,7 \times 0,3 = 21$$

$$0,07 \times 0,8 = 56$$

$$0,16 \times 4 = 64$$

$$1,5 \times 7 = 105$$

$$1,5 \times 3,5 = 525$$

$$3,6 \times 0,5 = 180$$

516. Νά βρείτε τά γινόμενα καί νά γίνει ή δοκιμή τους.

$$0,47$$

$$19,37$$

$$4,95$$

$$\times 0,23$$

$$\times 40,8$$

$$\times 0,2$$

Προβλήματα:

517. Σέ μία μαθητική κατασκήνωση υπολογίζεται, πώς σέ κάθε μαθητική αναλογεί 0,760 κιλά ψωμί. Πόσα κιλά θά χρειαστούν άν ή κατασκήνωση έχει 375 μαθητές.
518. Από ένα κιλό άλεύρι γίνονται 1,58 κιλά ψωμί. Πόσα κιλά ψωμί γίνονται μέ 32,5 κιλά άλεύρι.
519. Ένας έμπορος άγόρασε 20 δωδεκάδες κάλτσες πρós 17,5 δρχ. τό ζευγάρι. Άπ' τήν πώληση εισέπραξε 5.520 δραχμές. Κέρδισε, καί πόσα;
520. Δύο αυτοκίνητα ξεκίνησαν συγχρόνως από τήν πόλη Α πρós τήν πόλη Β. Τό πρώτο μέ ταχύτητα 100,5 χιλιόμετρα τήν ώρα καί τό θ' μέ

- 97,5 χιλιόμετρα τήν ώρα. Ύστερα από 2,5 ώρες πόσα χιλιόμετρα θά έχει διανύσει τό καθένα καί πόσο θ' απέχουν;
521. Ο ήχος διατρέχει μέσα στό νερό 1.517,03 μέτρα στό δευτερόλεπτο. Σέ 3,4 δευτερόλεπτα πόσο διατρέχει;
522. Ένός ανθρώπου τό βήμα έχει μήκος 0,58 τοῦ μέτρου. Ἄν κάμει σέ κάθε πρώτο λεπτό 18 βήματα, σέ 5,5 λεπτά πόσα μέτρα θά διατρέξει;

99. Διαίρεση τῶν δεκαδικῶν ἀριθμῶν

100. Διαίρεση δεκαδικοῦ μέ ἀκέραιο

1η Περίπτωση. (Ὁ διαιρετέος μεγαλύτερος ἀπό τό διαιρέτη)
Πρόβλημα:

Μέ 19,60 μέτρα ὕφασμα ράβονται 7 ἀνδρικά κοστούμια. Μέ πόσα μέτρα ράβεται τό κάθε κοστούμι;

Ἐδῶ ξέρομε μέ πόσα μέτρα ράβονται 7 κοστούμια καί ζητᾶμε νά μάθουμε μέ πόσα μέτρα ράβεται τό 1 κοστούμι.

Θά κάνουμε διαίρεση μερισμοῦ.

$$19,60 : 7$$

Γιά νά μπορέσουμε ὁμως νά κάνουμε τή διαίρεση αὐτή, τρέπουμε τά μέτρα σέ δακτύλους ἢ ἑκατοστά. (Μέ ποιόν ἀριθμό πρέπει νά πολλαπλασιάσουμε;).


Τά 19,60 μέτρα = 1.960 ἑκατοστά. Τώρα ἔχουμε νά διαίρουμε ἀκεραίους.

1960		7
56		280
00		
19,60		7
56		2,80
00		

Ἀπάντηση: Κάθε ἀνδρικό κοστούμι χρειάζεται 280 ἑκατοστά ἢ 2,80 μέτρα.

Πρακτική ἐργασία

Πρακτικά ἐργαζόμαστε, ὅπως καί στή διαίρεση μέ ἀκεραίους. Μόνο, πού ὅταν φθάσουμε στό κόμμα, θά σημειώσουμε κόμμα καί στό πηλίκο καί ὕστερα συνεχίζουμε τή διαίρεση.



Εἰκ. 108

2η Περίπτωση. (Ό διαιρετέος μικρότερος από τό διαιρέτη)

Πρόβλημα:

Νά μοιραστούν 2,575 κιλά καφέ σέ 5 φτωχές οικογένειες. Πόσα κιλά θά πάρει ή κάθε οικογένεια;

2,575		5
07		0,515
25		
0		

Καί έδω θά κάνουμε διαίρεση μερισμοῦ. Θά μοιράσουμε τά 2,575 κιλά καφέ σέ 5 οικογένειες.

Είαι φανερό πώς κάθε οικογένεια θά πάρει λιγότερο από 1 κιλό. Μέ άλλα λόγια τό πηλίκο είναι μικρότερο τής άκεραίας μονάδας. Γι' αυτό βάζουμε (0), στό πηλίκο καί συνεχίζουμε, όπως ξέρουμε μέ τούς άκεραίους.

"Όστε ή κάθε οικογένεια θά πάρει 0,515 κιλά καφέ.

Βλέπετε; ▶

Για νά διαιρέσουμε δεκαδικό μέ άκέραιο, κάνουμε τή διαίρεση σάν νά ήταν άκέραιοι, μόλις όμως τελειώσει ή διαίρεση του άκεραίου μέρους του διαιρετέου βάζουμε στό πηλίκο κόμμα (,) καί συνεχίζουμε, όπως ξέρουμε. Μόνο όταν ό διαιρετέος είναι μικρότερος από τό διαιρέτη, τότε βάζουμε μηδέν κόμμα (0,) καί συνεχίζουμε τήν πράξη.

Άλλο παράδειγμα

Πρόβλημα:

Νά μοιράσουμε σέ 8 κορίτσια 3 μέτρα κορδέλα. Πόσα μέτρα θά πάρει κάθε κορίτσι;

Θά κάνουμε διαίρεση μερισμοῦ. Θά μοιράσουμε τά 3 μέτρα κορδέλα στό 8 κορίτσια.

3,000		8
60		0,375
40		
0		

3 : 8

8/4 25/5 18/3 16/4

Ἐδῶ ἔχουμε διαίρεση δύο ἀκεραίων, πού ὁ διαιρέτης εἶναι μεγαλύτερος ἀπό τό διαιρετέο.

Στίς περιπτώσεις αὐτές, γράφουμε τό διαιρετέο σέ μορφή δεκαδικοῦ.

Δηλαδή στά δεξιά τοῦ ἀκεραίου γράφουμε κόμμα (,) καί σέ συνέχεια μηδενικά τόσα, ὅσα δεκαδικά ψηφία, πρέπει νά ἔχει τό πηλίκο.

Ἦστε γράφουμε στό πηλίκο: μηδέν κόμμα (0,) καί συνεχίζουμε ὅπως ξέρομε.



Εικ. 109

Δοκιμή τῆς διαιρέσεως

Ἡ δοκιμή γίνεται ὅπως στούς ἀκεραίους.

Παράδειγμα:

Νά γίνει ἡ διαίρεση καί ἡ δοκιμή τῆς.

Διαιρετέος	→	41,50	7	5,92	←	διαιρέτης
		65		20		πηλίκο
		20		6		
Ἰσόλοιπο	→	6				

Δοκιμή
5,92
× 7
41,44
+ 0,06
41,50

Ἀσκήσεις καί προβλήματα:

523. Νά βρεῖτε τά πηλικά καί νά κάνετε τίς δοκιμές τους:

- | | | | |
|--------------|---------------|---------------|----------------|
| 1) 7,4 : 2 | 5) 54,18 : 8 | 9) 1,64 : 12 | 13) 0,75 : 7 |
| 2) 9,6 : 4 | 6) 95,49 : 9 | 10) 0,458 : 8 | 14) 57,51 : 27 |
| 3) 8,36 : 3 | 7) 76,32 : 3 | 11) 24 : 35 | 15) 0,134 : 67 |
| 4) 14,32 : 5 | 8) 54,72 : 12 | 12) 0,03 : 6 | 16) 9 : 12 |

524. Ὁ μάγειρας μιᾶς ταβέρνας ἔχει νά μαγειρέψει 9,540 κιλά κρέας. Ἄν τό κόψει σέ 53 μερίδες, πόσο εἶναι τό θάρος κάθε μερίδας;

525. Ἐνας ἐργάτης πήρε 12163,5 δραχμές γιά 17 μέρες ἐργασίας. Πόσο ἦταν τό μεροκάματο;

526. Μέ 8,160 κιλά καφέ κάνουμε 102 φακελάκια. Πόσο ζυγίζει τό κάθε φακελάκι;

527. Μέ 33,60 δραχμές αγοράζω 12 αὔγά. Πόσο αγοράζω τό ἕνα;

101. Μιά ιδιότητα του ηηλίκου δύο αριθμῶν

Πρόβλημα:

- Νά μοιραστούν: 1) 6 τετράδια σέ 2 παιδιά
2) 60 τετράδια σέ 20 παιδιά
3) 600 τετράδια σέ 200 παιδιά

Πόσα τετράδια πρέπει νά πάρει τό κάθε παιδί σέ κάθε περίπτωση; Τί παρατηρείτε;

Βλέπετε; ♣

Όταν καί ὁ διαιρετέος καί ὁ διαιρέτης πολλαπλασιαστούν μέ 10, 100, ἢ 1.000, τό ηηλικό δέ μεταβάλλεται.

102. Διαίρεση ἀκέραιου μέ δεκαδικό

Πρόβλημα: Γιά τήν παροχή νερού σέ κατοικία χρειάστηκε νά κόψουμε ἓνα νεροσωλήνα σέ κομμάτια μήκους 0,75 μέτρου. Σέ πόσα κομμάτια θά κοπεῖ ὁ νεροσωλήνας;

Γιά νά βροῦμε σέ πόσα κομμάτια θά κοπεῖ ὁ νεροσωλήνας, θά πρέπει νά κάνουμε διαίρεση μετρήσεως: $9 : 0,75$


Ἡ διαίρεση ὅμως μέ διαιρέτη δεκαδικό δέ γίνεται. Γιά νά γίνει πρέπει, χωρίς ν' ἀλλάξει τό ηηλικό, νά κάνουμε τό διαιρέτη ἀκέραιο. Γι' αὐτό, ὅπως μάθαμε, πολλαπλασιάζουμε διαιρέτη καί διαιρετέο μέ τό 100.

Μέ ἄλλα λόγια, γιά νά γίνει ὁ διαιρέτης ἀκέραιος πρέπει νά μεταθέσουμε τό κόμμα δύο θέσεις πρὸς τά δεξιά καί νά θάλουμε δύο μηδενικά δεξιά τοῦ διαιρετέου. Τότε ἀντί νά ἔχουμε:

$$9 : 0,75 \text{ ἔχουμε } 900 : 75,$$

πού γίνεται ὅπως ξέροουμε

900	75	"Ὡστε θά κοπεῖ σέ 12 κομμάτια
150	12	
00		



Εικ. 110

Βλέπετε; ♣

Η διαίρεση άκεραιου με δεκαδικό δέ γίνεται. Γι' αυτό σβήνουμε τό κόμμα του δεκαδικού διαιρέτη και γράφουμε στο τέλος του διαιρετέου τόσα μηδενικά, όσα δεκαδικά ψηφία έχει ο διαιρέτης.

Παραδείγματα:

$$\begin{array}{r|l} 480 & 6,4 \\ \hline & \end{array} \quad \text{ή} \quad \begin{array}{r|l} 4800 & 64 \\ \hline 320 & 75 \\ 00 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 3879 & 0,75 \\ \hline & \end{array} \quad \text{ή} \quad \begin{array}{r|l} 387900 & 75 \\ \hline 129 & 5172 \\ 540 & \\ 150 & \\ 00 & \end{array}$$

Η δοκιμή γίνεται όπως στη διαίρεση δεκαδικού με άκεραίο.

Άσκησης και προβλήματα:

528. Νά βρεθούν τά πηλικά και νά γίνουν οι δοκιμές τους στις διαιρέσεις:

$$\begin{array}{l} 540 : 6,4 \\ 900 : 7,5 \\ 441 : 1,8 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 3402 : 6,3 \\ 3879 : 0,75 \\ 785 : 2,5 \end{array}$$

528α. Ο πατέρας του Κώστα αγόρασε 2,80 μέτρα ύφασμα και πλήρωσε 1.680 δραχμές. Πόσο αγόρασε τό μέτρο;

528β. Ο Νίκος αποταμιεύει 125,50 δραχμές τήν ήμέρα. Σέ πόσες μέρες θά συγκεντρώσει ποσό 18.825 δραχμές γιά ν' αγοράσει τηλεόραση;

528γ. Πόσες μέρες πρέπει νά εργαστεί μιά εργάτρια μέ μεροκάματο 508,50 δραχμές γιά ν' αγοράσει ήλεκτρική κουζίνα πού έχει αξία 10.170 δραχμές;

103. Διαίρεση αριθμού με: 0,1 ή 0,01 ή 0,001

Αν εφαρμόσουμε τά παραπάνω σέ διαίρεση μέ διαιρέτη τόν 0,1 ή τόν 0,01 ή τόν 0,001, τότε θά έχουμε:

$$α) 37,45 : 0,1 = 374,5 : 1 = 374,5$$

$$\beta) 2,475 : 0,01 = 247,5 : 1 = 247,5$$

$$\gamma) 0,0025 : 0,001 = 2,5 : 1 = 2,5$$

Γιά να διαιρέσουμε έναν αριθμό με 0,1 ή 0,01 ή 0,001, αρκεί να τον πολλαπλασιάσουμε αντίστοιχα με 10 ή 100 ή 1.000.

Βλέπετε;

Άσκησης:

529. Να γίνουν οι διαιρέσεις:

$$3,3 : 0,001$$

$$0,90 : 0,1$$

$$3,747 : 0,001$$

$$0,003 : 0,01$$

104. Διαίρεση δεκαδικού με δεκαδικό

Πρόβλημα:

“Ένα αυτοκίνητο διέτρεξε απόσταση 517,500 χιλιόμετρα σε 4,5 ώρες. Μέ πόσα χιλιόμετρα κινήθηκε την ώρα;

Έδω ξέρουμε πώς σε 4,5 ώρες διέτρεξε 517,500 χιλιόμετρα και ζητάμε να μάθουμε με πόσα χιλιόμετρα κινήθηκε τη μιά ώρα. Θά κάνουμε διαίρεση μερισμού:

$$517,500 : 4,5$$

‘Η διαίρεση όμως με δεκαδικό διαιρέτη δέ γίνεται. Για να γίνει πρέπει να τρέψουμε, χωρίς βλάβη του πηλίκου, τό δεκαδικό διαιρέτη σε άκεραίο. Γι’ αυτό πολλαπλασιάζουμε τό δεκαδικό διαιρέτη και τό διαιρετέο με τό 10.

Μέ άλλα λόγια σθήνουμε τό κόμμα του διαιρέτη, ώστε να γίνει άκεραίος και για να μήν αλλάξει τό πηλίκο μεταθέτουμε πρós τά δεξιά τό κόμμα του διαιρετέου μιά θέση.

Έτσι έχουμε:

$$517,500 : 4,5 \text{ ή } 5175,00 : 45 \begin{array}{r} 5175 \quad | \quad 45 \\ 67 \quad \quad | 115 \\ 225 \quad \quad | \\ \hline 00 \end{array}$$

“Οστε θά κινηθεί με 115 χιλ. την ώρα.

Άλλο παράδειγμα:

$$376,5 : 0,06 \text{ ή } 37650 : 6 = 6.275.$$

Αν ο διαιρέτης είναι δεκαδικός, η διαίρεση δέ γίνεται. Αυτό σβήνουμε τό κόμμα του διαιρέτη, ώστε νά γίνει άκέραιος. Μετά μεταφέρουμε τό κόμμα του διαιρετέου τόσες θέσεις πρός τά δεξιά, όσα δεκαδικά ψηφία έχει ό διαιρέτης. Αν ό διαιρετέος έχει λιγότερα δεκαδικά ψηφία από τό διαιρέτη συμπληρώνουμε μέ μηδενικά.

Βλέπετε;

Όταν ή διαίρεση δύο άκέραιων είναι άτελής, βάζουμε στό ηλίκο ένα κόμμα. Ύστερα βάζουμε στά δεξιά του ύπολοίπου μηδέν καί συνεχίζουμε τή διαίρεση.

Άσκήσεις καί προβλήματα:

530. $7,25 : 4,2$ $\sqrt{10,2 : 5,2}$ $\sqrt{14,2 : 3,8}$ $7,88 : 0,02$ $\sqrt{8,93 : 2,2}$
 $0,37 : 0,03$ $\sqrt{12,8 : 3,2}$ $756,5 : 0,03$ $\sqrt{4,95 : 0,05}$

531. Κάποιος άγόρασε 2,8 μέτρα ύφασμα καί πλήρωσε 1.872,50 δρχ. Πόσο άγόρασε τό μέτρο;

532. Ένα αυτοκίνητο σέ 4,5 ώρες έτρεξε 407,25 χιλιόμετρα. Πόσα χιλιόμετρα έτρεξε σέ μία ώρα;

533. Γιά ένα μαντήλι χρειάζομαστε 0,35 μέτρα ύφασμα. Πόσα μαντήλια θά φτιάξουμε μέ 71,40 μέτρα ύφασμα;

534. Ένας έβαλε στό ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου του βενζίνη πρός 21,60 τό λίτρο καί πλήρωσε 561,60 δραχμές. Πόσα λίτρα έβαλε;

535. Τό κιλοβάτ του ηλεκτρικού στοιχίζει 1,8 δραχμές. Κάποιος πλήρωσε 941,40 δραχμές. Πόσα κιλοβάτ είχε καταναλώσει;

536. Γιά μία παιδική ένδυμασία χρειάζομαστε 1,8 μέτρα ύφασμα. Πόσες όμοιες ένδυμασίες θά φτιάξουμε μέ 66,6 μέτρα από τό ίδιο ύφασμα;

537. Ένας άγόρασε 8,35 μέτρα κορδέλα καί έδωσε 150,30 δραχμές. Πόσο άγόρασε τό μέτρο;

Προβλήματα διαφόρων πράξεων (Άκέραιων καί δεκαδικών)

538. Ένας κτηνοτρόφος πούλησε 52,200 κιλά τυρί πρός 103 δραχμές τό κιλό. Από τά χρήματα πού πήρε έδωσε γιά ν' άγοράσει λάδι 4.894,10 δραχμές καί μέ τά υπόλοιπα άγόρασε άλεύρι πρός 15,50 δραχμές τό κιλό. Πόσο άλεύρι άγόρασε;

539. Ένας χωρικός πούλησε 546 κιλά σιτάρι πρός 8,80 δραχμές τό κιλό,

308 κιλά λάδι πρὸς 95,50 δραχμὲς τὸ κιλό, 72 κιλά μέλι πρὸς 156,80 δραχμὲς τὸ κιλό καὶ ἓνα μοσχάρι 12.500 δραχμὲς. Ἀπὸ τὰ χρήματα πού πῆρε πλήρωσε στὴν Ἀγροτικὴ Τράπεζα 36.500 γιὰ ἐξόφληση χρέους. Πόσα τοῦ ἔμειναν;

539. Μιά σκάλα ἔχει ὕψος 1,76 μέτρα καὶ ἔχει 8 σκαλοπάτια. Πόσα μέτρα ὕψος ἔχει κάθε σκαλοπάτι;

540. Ἐνας φούρναρης πούλησε 306,50 κιλά ψωμί πρὸς 14,50 δρχ. τὸ κιλό καὶ 204,5 κιλά ψωμί ἄλλης ποιότητος πρὸς 18,50 δραχμὲς τὸ κιλό.

Πόσα εἰσέπραξε;

541. Ὁ πατέρας ἀγόρασε 1,750 κιλά κρέας πρὸς 105,50 δραχμὲς τὸ κιλό.

Πόσα πλήρωσε;

542. Ἐνας ἔμπορος ἀγόρασε 38,5 μέτρα ὕφασμα πρὸς 508 δραχμὲς τὸ μέτρο. Ἀπὸ τὴν πώληση εἰσέπραξε 2.256 δραχμὲς. Πρὸς πόσο πούλησε τὸ μέτρο; Καὶ πόσα κέρδισε;

543. Μία νοικοκυρά ἀγόρασε 18 κιλά μαλλιά. Στὸ πλύσιμο ἔχασαν τὸ μισὸ τοῦ βάρους τους καὶ στὸ λανάρισμα ἄλλα 0,50 κιλά. Πόσα κιλά τῆς ἔμειναν;

544. Ἀγόρασε κάποιος μολύβια πρὸς 2,75 δραχμὲς τὸ ἓνα. Ἄλλα σὲ κάθε δωδεκάδα ἔπαιρνε ἓνα σάν δῶρο. Ἔδωσε γιὰ τὴν ἀγορά 825 δραχμὲς. Πόσα μολύβια πῆρε σάν δῶρο;

545. Ἀγόρασε κάποιος 55 μέτρα ὕφασμα πρὸς 125,5 δραχμὲς τὸ μέτρο. Πούλησε κατόπιν ἓνα μέρος πρὸς 276,10 δραχμὲς τὸ μέτρο καὶ παρατήρησε πῶς τὸ ὑπόλοιπο τοῦ ἔμεινε κέρδος. Πόσα μέτρα ἦταν τὸ ὑπόλοιπο;

546. Ἐνας ἀγόρασε 6 δοχεῖα λίπος πού τὸ καθένα περιεῖχε 15 κιλά καὶ πλήρωσε 6.912 δραχμὲς. Πόσο πρέπει νὰ πουλήσει τὸ κιλό γιὰ νὰ τοῦ μείνει κέρδος ἓνα δοχεῖο;

547. Κάποιος ἀγόρασε λάδι καὶ πλήρωσε 4.162,50 δραχμὲς. Ἐάν ὁμοῦς ἀγόραζε 7 κιλά λιγότερο θὰ πλήρωνε 3.515 δρχ. Πόσο πλήρωσε τὸ κιλό;

548. Ἐνας ἀγόρασε δύο δοχεῖα λάδι καὶ πλήρωσε 2.775 δραχμὲς ἐν 92,50 δραχμὲς τὸ κιλό. Τὸ ἓνα δοχεῖο εἶχε 6 κιλά λιγότερο ἀπ' τὸ ἄλλο. Πόσα κιλά εἶχε τὸ κάθε δοχεῖο;

549. Δύο τεμάχια ὑφάσματος ἔχουν τὸ ἴδιο μῆκος καὶ πουλήθηκαν 3.595,5 δρχ. Τὸ μέτρο τοῦ α' πουλήθηκε 80,50 δρχ. καὶ τοῦ β' 60,50 δραχμὲς. Πόσα μέτρα ἦταν τὸ καθένα;


550. Ἐνας κτηνοτρόφος πούλησε τυρὶ καὶ πῆρε 7.055,50 δραχμὲς. Ἄν ὁμοῦς πουλοῦσε τὸ τυρὶ 7,50 δραχμὲς ἀκριβότερα θὰ κέρδιζε ἐπὶ πλέον 513,75 δραχμὲς. Πόσα κιλά πούλησε καὶ πρὸς πόσο πούλησε τὸ κιλό;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο

Μέτρηση επιφανείας
Κλάσματα
Κύβος
Παράλληλεπίπεδο
Σφαίρα
Κύλινδρος

105. Μέτρηση επιφανειών

Τό αγροτικό σπίτι του Δαφνόπουλου, πού εικονίζεται, έχει έναν κήπο μπροστά και μία αύλη πίσω. Ο Δαφνόπουλος θέλει να εξακριβώσει, ποιά είναι μεγαλύτερο: ο κήπος ή η αύλη; Αυτό δέν είναι εύκολο νά τό εξακριβώσει.



Είκ. 111

Ακόμα, ο γειτονικός κήπος, πού φαίνεται στην εικόνα, είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος από τόν κήπο του Δαφνόπουλου;

Ο κήπος του Δαφνόπουλου, ή αύλη του, ο κήπος του γείτονα είναι επιφάνειες.

Παρουσιάζεται συχνά ή ανάγκη νά συγκρίνουμε επιφάνειες καί νά γνωρίσουμε, ποιά είναι μεγαλύτερη καί ποιά μικρότερη.


Για να απλουστέψουμε τη σύγκριση, αντιστοιχίζουμε στην επιφάνεια έναν αριθμό, που να εκφράζει το **μέτρο** της, που λέγεται **έμβαδο** της επιφάνειας. Με άλλα λόγια βρίσκουμε πόσες φορές χωράει μία τετραγωνική μονάδα και τὰ μέρη αὐτῆς, μέσα σὲ μία ἐπιφάνεια.

Για τὴ μέτρηση τῶν ἐπιφανειῶν ἀρχίζουμε ἀπὸ τὶς πιὸ ἀπλές που εἶναι τὸ ὀρθογώνιο καὶ τὸ τετράγωνο.

105α. Ἐμβαδὸν ὀρθογωνίου

Πρόβλημα: Νὰ ὑπολογιστεῖ τὸ ἔμβαδὸν ὀρθογωνίου μὲ μῆκος 6 ἑκατοστά καὶ πλάτος 3 ἑκατοστά.

Πρόκειται μὲ ἄλλα λόγια νὰ συγκρίνουμε ἓνα τετράγωνο μὲ πλευρά 1 ἑκατ. καὶ ἓνα ὀρθογώνιο μὲ **διαστάσεις** 6 ἑκατ. μῆκος καὶ 3 ἑκατ. πλάτος.



Εἰκ. 112

Ἐπάνω στό μῆκος τοῦ ὀρθογωνίου παίρνομε συνεχιστὰ τὸ 1 ἑκατ. 6 φορές καὶ 3 φορές στό πλάτος του. Τὰ σημεῖα που διαίρουν τότε τὶς πλευρές σὲ τμήματα 1 ἑκατ., τὰ συνδέομε μὲ παράλληλες εὐθεῖες πρὸς τὶς πλευρές τοῦ ὀρθογωνίου. Ἔτσι ἡ ἐπιφάνεια τοῦ ὀρθογωνίου διαίρεῖται σὲ τετραγωνάκια τοῦ 1 τετραγωνικοῦ ἑκατοστομέτρου, ὅπως φαίνεται στό σχῆμα.

Ἄς μετρήσουμε πόσα εἶναι.

Τρεῖς σειρές ἀπὸ 6 τετραγωνάκια ἢ κάθε μιά κάνουν:

$$3 \times 6 = 18 \text{ τετραγωνάκια}$$

Ἡ ἐπιφάνεια τοῦ ὀρθογωνίου εἶναι $3 \times 6 = 18$ τετρ. ἑκατ.

Βλέπετε;


Για νὰ ὑπολογίσουμε τὸ ἔμβαδο ὀρθογωνίου, μετροῦμε τὸ μῆκος καὶ τὸ πλάτος μὲ τὴν ἴδια μονάδα μήκους καὶ πολλαπλασιάζουμε τοὺς δύο ἀριθμούς που βρίσκουμε.

Τό έμβαδό θά έκφράζεται στή μονάδα έπιφάνειας πού χρησιμοποιήσαμε. Π.χ. άν χρησιμοποιήσαμε τό έκατοστόμετρο γιά μονάδα μήκους, τότε τό έμβαδό θά έκφράζεται σέ τετραγωνικά έκατοστόμετρα.

Άν χρησιμοποιήσαμε γιά μονάδα μήκους τό μέτρο, τότε τό έμβαδό θά έκφράζεται σέ τετραγωνικά μέτρα.

Παράδειγμα:

Ό στίβος του Παναθηναϊκού Σταδίου έχει σχήμα όρθογωνίου, μέ μήκος 204 μέτρα καί πλάτος 35 μέτρα. Νά βρείτε τό έμβαδό του.



Εικ. 113

Έδώ γιά μονάδα μήκους χρησιμοποιήσαμε τό μέτρο. Τό έμβαδό του θά είναι:

$$204 \times 35 = 7.140 \text{ τετραγ. μέτρα}$$

Ό στίβος λοιπόν του Παναθηναϊκού Σταδίου έχει έμβαδό:
7.140 τετραγωνικά μέτρα.


Άντίστροφος ύπολογισμός

Υπολογίστε τό πλάτος, πού πρέπει νά δώσουμε σ' ένα ὀρθογώνιο μέ μήκος 15 ἑκατοστά, γιά νά ἔχει ἔμβαδό 180 τετραγωνικά ἑκατοστά.

Τό γινόμενο τοῦ πλάτους, πού ζητοῦμε ἐπί τό δοσμένο μήκος 15 ἑκατοστά εἶναι 180 τετρ. ἑκατοστά.

Ἐπομένως τό πλάτος θά εἶναι τό πηλίκο τοῦ 180 δια τοῦ 15.

Δηλαδή: $180 : 15 = 12$ μέτρα




Εἰκ. 114

106. Ἐμβαδό τετράγωνου

Νά βρεθεῖ τό ἔμβαδό τετράγωνου μέ πλευρά 6 ἑκατ.

Ὅπως καί στό ὀρθογώνιο, ἔτσι καί ἐδῶ, πρέπει νά συγκρίνουμε τά δύο τετράγωνα μέ πλευρές 1 ἑκατοστό τό ἕνα καί 6 ἑκατοστά τό ἄλλο.



Εἰκ. 1.15

Μέ ἄλλα λόγια θά βροῦμε πόσες φορές τό πρῶτο τετράγωνο μέ πλευρά 1 ἑκατοστό περιέχεται στό δεύτερο τετράγωνο μέ πλευρά 6 ἑκατοστά.

Παίρνουμε σέ κάθε πλευρά τοῦ μεγάλου τετραγώνου, 6 φορές συνέχεια, 1 ἑκατ., κι ἔτσι τή διαιροῦμε σέ 6 ἴσα τμήματα.

Συνδέουμε τά διαιρετικά σημεῖα μέ παράλληλες εὐθεῖες πρὸς τίς πλευρές τοῦ τετράγωνου, ὅπως φαίνεται στό σχῆμα.

Τό τετράγωνο ἔτσι διαιρεῖται σέ τετραγωνάκια, πού τό καθένα ἔχει ἐπιφάνεια 1 τετραγωνικό ἑκατοστό.

Ἄς μετρήσουμε, τώρα, πόσα τετράγωνα εἶναι:

Είναι 6 σειρές, από 6 τετραγωνάκια ή κάθε μία κάνουν:

$$6 \times 6 = 36 \text{ τετραγωνάκια.}$$

Όστε η επιφάνεια του τετραγώνου είναι: $6 \times 6 = 36$ τετρ. έκατοστά.

ΒΛΕΠΕΤΕ; ▶

Γιά νά βρούμε τό έμβαδό ενός τετράγωνου, μετρούμε τήν πλευρά του μέ μιά μονάδα μήκους καί πολλαπλασιάζουμε τόν αριθμό πού βρίσκουμε μέ τόν έαυτό του.

Όπως στό όρθογώνιο, έτσι κι έδω τό έμβαδό του τετραγώνου θά έκφράζεται σέ τετρ. έκατοστά, αν χρησιμοποιήσουμε γιά μονάδα μήκους τό 1 έκατ. Σέ τετραγωνικά μέτρα, αν γιά μονάδα μήκους χρησιμοποιήσουμε τό μέτρο.

106a. Τετραγωνικό έκατοστόμετρο, τετραγωνική παλάμη, τετραγωνικό μέτρο.

Δέν είναι άρκετό όμως νά γνωρίζουμε μόνο τόν αριθμό των τετραγωνιδίων, πού περιέχονται σ' ένα όρθογώνιο ή τετράγωνο, γιά νά γνωρίσουμε τήν επιφάνειά του. Πρέπει νά γνωρίζουμε καί τό μέγεθος κάθε τετραγωνιδίου.

Τό τετράγωνο πού έχει πλευρά 1 έκατοστόμετρο λέγεται **τετραγωνικό έκατοστόμετρο** (συμβολίζεται: τ.έ.).

Τό τετράγωνο πού έχει πλευρά μιά παλάμη, λέγεται **τετραγωνική παλάμη** (τ.π.).

Τό τετράγωνο πού έχει πλευρά 1 μέτρο, λέγεται **τετραγωνικό μέτρο** (τ.μ.).

Τό τετραγωνικό μέτρο είναι **άρχηκή** μονάδα μετρήσεως, των έπιφανειών.

Τίς μονάδες μετρήσεως έπιφανειών τίς περιλαβαίνουμε στόν άκόλουθο πίνακα.

	Τετράγωνα πού έχουν πλευρά	Μονάδα επιφάνειας	Συμβολισμός
Άρχική μονάδα	1 μέτρο	τετραγωνικό μέτρο	τ.μ.
πολλαπλάσια	1 χιλιόμετρο	τετραγωνικό χιλιόμετρο	τ.χ.
Υποπολλαπλάσια	1 παλάμη	τετρ. παλάμη	τ.π.
	1 δάκτυλος	τετρ. δάκτυλος	τ.δ.
	1 γραμμή	τετρ. γραμμή	τ.γ.

Προβλήματα:

551. Ο Παρθενώνας έχει μήκος 69,51 μέτρα και περίμετρο 200,74 μέτρα. Νά βρείτε τό έμβαδό του δαπέδου του.
552. Τό Θησεϊό έχει πλάτος 13,72 μέτρα και περίμετρο 90,98 μ. Νά βρείτε τό έμβαδό του.
553. Μία νοικοκυρά θέλει νά στρώσει μέ τάπητα τό σαλόνι της, πού έχει σχήμα όρθογωνίου μέ πλάτος 4,20 μέτρα και μήκος 5,40 μέτρα. Πόσα μέτρα από τόν τάπητα θά χρειαστεί, άν αυτός έχει πλάτος 2,70 μέτρα;
554. Η περίμετρος τετραγώνου είναι 60,24 μέτρα. Πόσο είναι ή πλευρά του και πόσο τό έμβαδό του;

Άσκήσεις:

Μέ χαρτονάκι

555. Νά κατασκευάσετε ένα τετράγωνο μέ πλευρά 1 έκατοστόμετρο και νά άποκόψετε.
556. Νά κατασκευάσετε ένα τετράγωνο μέ πλευρά 1 παλάμη και νά τό άποκόψετε.
557. Νά χαράξετε στόν πίνακα ή στό έδαφος ένα τετράγωνο μέ πλευρά 1 μέτρο.
558. Από πόσα τετραγωνίδια άποτελείται 1 τετράγωνο, κατασκευασμένο σέ τετραγωνισμένο φύλλο τετραδίου, μέ πλευρά 4 διαιρέσεις, 6 διαιρέσεις, 7 διαιρέσεις;
559. Από πόσα τετραγωνίδια άποτελείται, ένα τετράγωνο κατασκευασμένο σέ τετραγωνισμένο φύλλο τετραδίου, μέ μήκος 8 διαιρέσεις και πλάτος 8 διαιρέσεις;



560. Ένα τετράγωνο έχει πλευρά 5 έκατ. Τό τετραγωνίζουμε μέ διάστημα 1 έκατ. Από πόσα τετραγωνικά έκατοστόμετρα άποτελείται;
 561. Από πόσα τετραγωνικά έκατοστόμετρα άποτελείται ένα τετράγωνο μέ περίμετρο 16 έκατοστόμετρα;

107. Κλάσματα

Γενικά: Μιά από τίς σημαντικότερες έπινοήσεις του άνθρώπου είναι ένας νέος αριθμός, πού όνομάζεται: **κλάσμα**. Τό κλάσμα τό χρησιμοποιούμε γιά νά δείξουμε τό μέρος ενός πράγματος.

Γιά νά δηλώσουμε π.χ. πώς ένα από τά 3 μέρη τής τούρτας, πού εικονίζεται, τό έχουμε πάρει, χρησιμοποιούμε τό κλάσμα: **ένα τρίτο**.

Στό σχέδιο εικονίζεται ένα χωράφι πού δέν έχει διαιρεθεί σέ ίσα μέρη καί μία τούρτα, πού έχει διαιρεθεί σέ **ίσα μέρη**.




Εικ. 116

Όταν ένα όλο διαιρεθεί σέ ίσα μέρη, τότε καθένα από τά ίσα μέρη του, παίρνει τό όνομα: **κλασματική μονάδα**.

Στήν περίπτωση τής τούρτας, πού έχει διαιρεθεί σέ τρία ίσα μέρη, καθένα μέρος είναι: τό ένα τρίτο τής όλης τούρτας.

Όταν τό όλο δέ διαιρείται σέ ίσα μέρη τότε καθένα από τά μέρη του δέν έχει χωριστό όνομα, όπως στήν περίπτωση του χωραφιού.

Σύμφωνα μ' αυτά μπορούμε νά λέμε:



Εικ. 117

Τό τετράγωνο είναι διαιρεμένο σε 4 ίσα μέρη. Τό γραμμοσκιασμένο μέρος είναι τό 1 τέταρτο του τετραγώνου.

Έδω είναι τά 2 μέρη του τετράγνου. Δηλ. 2 τέταρτα του τετραγώνου.

Έδω είναι τά 3 μέρη ή τά 3 τέταρτα του τετραγώνου.

Οί ποσότητες: ένα τέταρτο, δύο τέταρτα, τρία τέταρτα, είναι κλάσματα του όλου τετραγώνου.

Αυτά τά κλάσματα μπορούν νά γραφούν έτσι:

ένα τέταρτο: $\frac{1}{4}$ ή $1/4$, δύο τέταρτα: $\frac{2}{4}$ ή $2/4$, τρία τέταρτα: $\frac{3}{4}$ ή $3/4$.

Οί δύο αριθμοί πού αποτελούν τό κλάσμα λέγονται: **ὄροι** του κλάσματος. Π.χ. στό κλάσμα $\frac{3}{4}$ οί αριθμοί 3 καί 4 είναι οί ὄροι του.

Ὁ ἀριθμός πού γράφεται κάτω από τή γραμμή λέγεται **παρονομαστής** του κλάσματος. Π.χ. ὁ 4 είναι ὁ παρονομαστής του $3/4$.

Ὁ ἀριθμός πού γράφεται πάνω από τή γραμμή λέγεται **ἀριθμητής** του κλάσματος.

Ὁ παρονομαστής δηλώνει σε πόσα ίσα μέρη χωρίσαμε τήν **ἀκεραία μονάδα** καί ὁ ἀριθμητής πόσα πήραμε ἀπ' αὐτά.

Τό $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{5}$, ... είναι κλασματικές μονάδες καί, ὅπως οί ἀκέραιοι ἀριθμοί γίνονται ἀπό τήν ἐπανάληψη τῆς ἀκεραίας μονάδας, ἔτσι καί οί κλασματικοί ἀριθμοί γίνονται ἀπό τήν ἐπανάληψη τῆς κλασματικῆς μονάδας.

Γιά νά διαβάσουμε ένα κλάσμα διαβάζουμε πρῶτα τόν ἀριθμητή καί μετά τόν παρονομαστή του. Π.χ. τά κλάσματα:

$\frac{5}{6}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, διαβάζονται: πέντε ἕκτα, ένα δεύτερο, ένα τρίτο.

Άσκησης:


562. Νά γραφοῦν μέ ψηφία τὰ κλάσματα: τέσσερα πέμπτα, ἑπτὰ ὄγδοα, τέσσερα ἔνατα, καί σέ κάθε κλάσμα νά σημειώσετε ποιός εἶναι ὁ ἀριθμητής καί ποιός ὁ παρονομαστής του.
563. Νά διαιρέσετε ἕνα σπάγκο σέ 7 ἴσα μέρη. Τί μέρος τοῦ σπάγκου ἀντιπροσωπεύουν τὰ 2, 3, 4, 5 μέρη του.
564. Τί μέρος τῆς ἡμέρας εἶναι 1 ὥρα, 5 ὥρες, 7 ὥρες. (Ἡμέρα = 12 ὥρες).
565. Σημειώστε τό κλάσμα τοῦ ὄλου πού ἀντιπροσωπεύει τό γραμμοσκιασμένο μέρος στίς παρακάτω περιπτώσεις, καί μετά τό λευκό μέρος.



Εἰκ. 118

566. Γράψτε σέ μορφή κλάσματος τοῦ μέτρου: 3 παλάμες, 55 δακτύλους, 116 γραμμές.
567. Γράψτε σέ μορφή κλάσματος τοῦ κιλοῦ τά: 300 γραμμάρια, 700 γραμμάρια.

108. Δεκαδικά κλάσματα




Εἰκ. 119

Τό μέτρο διαιρεῖται σέ 10 παλάμες. Κάθε παλάμη εἶναι: $\frac{1}{10}$ τοῦ μέτρου καί 3 παλάμες τά $\frac{3}{10}$ τοῦ μέτρου.



Εἰκ. 120

Τό μέτρο έχει 100 δάκτυλους. Κάθε δάκτυλος είναι τό $\frac{1}{100}$ του μέτρου καί 45 δάκτυλοι $\frac{45}{100}$ του μέτρου.



Εικ. 121


Τό μέτρο διαιρείται σέ 1.000 γραμμές. Κάθε γραμμή είναι τό $\frac{1}{1000}$ του μέτρου καί 615 γραμμές, τό $\frac{615}{1000}$ του μέτρου.

Τά κλάσματα, πού έχουν παρονομαστή 10, 100, 1000, ... λέγονται **δεκαδικά** κλάσματα.

Τά άλλα κλάσματα λέγονται **κοινά** κλάσματα.

109. Σύγκριση κλασμάτων μέ τήν άκέραια μονάδα

1η Περίπτωση:



Εικ. 122

Τό γραμμοσκιασμένο μέρος παρασταίνει τό:

$$\frac{1}{4}$$

του όλου

$$\frac{2}{3}$$

του όλου

$$\frac{3}{5}$$

του όλου

$$\frac{1}{2}$$

του όλου

“Όλα τά παραπάνω κλάσματα είγαι μικρότερα από τήν άκέραια μονάδα καί λέγονται **γνήσια**.”

Βλέπετε; ♣

“Ένα κλάσμα είναι μικρότερο άπ' τήν άκέραια μονάδα, όταν ό άριθμητής του είναι μικρότερος άπ' τόν παρονομαστή του.”

2η Περίπτωση:



Εικ. 123

Τό γραμμοσκιασμένο μέρος παρασταίνει τά:

$\frac{5}{5}$	$\frac{3}{3}$	$\frac{4}{4}$	$\frac{4}{4}$
του όλου	του όλου	του όλου	του όλου

“Όλα τά παραπάνω κλάσματα είναι ίσα μέ τήν άκέραια μονάδα καί λέγονται **κοινά** κλάσματα.

Βλέπετε; ♦

“Ένα κλάσμα είναι ίσο μέ τήν άκέραια μονάδα, όταν ό άριθμητής του είναι ίσος μέ τόν παρονομαστή του.

3η Περίπτωση:



Εικ. 124

Τό γραμμοσκιασμένο μέρος παρασταίνει τά:

$\frac{4}{3}$	$\frac{5}{4}$	$\frac{3}{2}$	$\frac{7}{5}$
του όλου	του όλου	του όλου	του όλου

“Η 1 καί $\frac{1}{3}$ του όλου, 1 καί $\frac{1}{4}$ του όλου, 1 καί $\frac{1}{2}$ του όλου, 1 καί $\frac{2}{5}$ του όλου.

“Όλα τά παραπάνω κλάσματα είναι μεγαλύτερα άπό τήν άκέραια μονάδα καί λέγονται **κοινά** κλάσματα.

“Ένα κλάσμα είναι μεγαλύτερο από την άκεραία μονάδα, όταν ο αριθμητής του είναι μεγαλύτερος από τον παρονομαστή του.

Βλέπετε; ♣

Άσκησης:

568. Νά συμπληρωθούν οι τελείες με αριθμούς, ώστε τα κλάσματα να γίνουν ίσα με την άκεραία μονάδα.

$$\frac{\dot{\quad}}{5} = \frac{\dot{\quad}}{7} = \frac{9}{\dot{\quad}} = \frac{13}{\dot{\quad}} = \frac{\dot{\quad}}{17} = \frac{45}{\dot{\quad}}$$

569. Τί πρέπει να προσθέσετε στους αριθμητές σε καθένα από τα παρακάτω κλάσματα, ώστε να γίνουν ίσα με τη μονάδα;

$$\frac{3}{4} \quad \frac{5}{6} \quad \frac{1}{3} \quad \frac{4}{5} \quad \frac{6}{12}$$

570. Τί πρέπει να αφαιρέσουμε από τους αριθμητές από τα παρακάτω κλάσματα, ώστε να γίνουν ίσα με την άκεραία μονάδα;

$$\frac{4}{3} \quad \frac{5}{4} \quad \frac{6}{5} \quad \frac{9}{8} \quad \frac{19}{18}$$

571. Γράψτε τρία κλάσματα μικρότερα από τη μονάδα, με παρονομαστή 7.

572. Γράψτε τρία κλάσματα μεγαλύτερα από τη μονάδα, με παρονομαστή 11.

110. Σύγκριση κλασμάτων

Παρακάτω εικονίζονται κλάσματα γλυκῶν καί βούτυρου.



Είκ. 125

‘Ο Κώστας πήρε τό $\frac{1}{3}$ τῆς τούρτας ‘Ο Νίκος πήρε τά $\frac{2}{3}$ τῆς τούρτας ‘Η Μαρία πήρε τό $\frac{1}{4}$ τοῦ βούτυρου

Μπορούμε νά συγκρίνουμε τά κομμάτια τῶν 3 παιδιῶν; Δη-
λαδῆ τά κλάσματα;


Εἶναι εὐκόλο νά συγκρίνουμε τά κομμάτια τοῦ Κώστα καί τοῦ
Νίκου. Δέν μπορούμε, ὅμως νά συγκρίνουμε τό μερίδιο τῆς Μα-
ρίας μέ τά μερίδια τοῦ Κώστα καί τοῦ Νίκου, γιατί τῆς Μαρίας
προέρχεται ἀπό ἄλλο μέγεθος, (εἶδος).

Βλέπετε ; ♦

Μπορούμε νά συγκρίνουμε μόνο κλάσματα
πού προέρχονται ἀπό τό αὐτό μέγεθος.

Ἄνισα κλάσματα:

Τά $\frac{3}{5}$ τῆς τούρτας πού εἰκο-
νίζεται, εἶναι ἓνα κλάσμα μεγα-
λύτερο ἀπό τά $\frac{2}{5}$ τῆς τούρτας.



Εἰκ. 126


Βλέπετε ; ♦

Ἐάν δύο κλάσματα ἔχουν τόν ἴδιο παρο-
νομαστή, μεγαλύτερο εἶναι ἐκεῖνο πού ἔχει
τό μεγαλύτερο ἀριθμητή.

Οἱ δύο ἴσες τούρτες ἔχουν διαιρεθεῖ σέ διαφορετικά ἴσα
μέρη: ἡ πρώτη σέ 3 ἴσα μέρη καί ἡ δεύτερη σέ 4 ἴσα μέρη.

Τό $\frac{1}{3}$ τῆς πρώτης εἶναι μεγα-
λύτερο ἀπό τό $\frac{1}{4}$ τῆς δεύτερης.
Δηλαδή:

$$\frac{1}{3} > \frac{1}{4}$$



Εἰκ. 127

Βλέπετε; ▶

Όταν δύο κλάσματα έχουν τον ίδιο αριθμητή, μεγαλύτερο είναι εκείνο που έχει τό μικρότερο παρονομαστή.

111. Ίσοδύναμα κλάσματα

Παρακάτω εικονίζεται η ίδια άκέραια μονάδα διηρημένη σε διάφορα ίσα μέρη:



Εικ. 128

Χωρίζεται στα δύο. Χωρίζεται στα 4. Χωρίζεται στα 8. Χωρίζεται στα 16.

Η τιμή του γραμμοσκιασμένου κλάσματος δεν έχει αλλάξει.

$$\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{4}{8} = \frac{8}{16}$$

Τά κλάσματα αυτά ονομάζονται **ίσοδύναμα**. Άκόμα βλέπουμε, πώς:

$$\frac{2}{4} : 2 = \frac{1}{2} \quad \frac{4}{8} : 4 = \frac{1}{2} \quad \frac{8}{16} : 8 = \frac{1}{2}$$

καί ότι:

$$\frac{1 \times 8}{2 \times 8} = \frac{8}{16} \quad \frac{2 \times 4}{4 \times 4} = \frac{8}{16} \quad \frac{4 \times 2}{8 \times 2} = \frac{8}{16}$$

Όταν πολλαπλασιάσουμε, ή διαιρέσουμε τους δύο όρους ενός κλάσματος με τον ίδιο αριθμό, παίρνουμε ένα κλάσμα ίσοδύναμο με τό πρώτο.

Βλέπετε; ▶

Άσκησης:

573. Νά τακτοποιήσετε τά παρακάτω κλάσματα σέ σειρά μεγέθους:

$$\frac{4}{7} \quad \frac{6}{7} \quad \frac{1}{7} \quad \frac{5}{7} \quad \frac{2}{7}$$

574. Όμοια:

$$\frac{8}{17} \quad \frac{7}{17} \quad \frac{12}{17} \quad \frac{1}{17} \quad \frac{9}{17} \quad \frac{11}{17}$$

575. Νά συμπληρωθούν οι ισότητες:

$$\frac{1}{3} = \frac{\quad}{6} \quad \frac{3}{7} = \frac{\quad}{14} \quad \frac{2}{3} = \frac{6}{\quad} \quad \frac{5}{7} = \frac{15}{\quad}$$

576. Νά βρείτε τρία κλάσματα ισοδύναμα μέ τό: $\frac{3}{5}$ ή $\frac{4}{7}$ ή $\frac{9}{11}$

112. Άπλοποίηση κλάσματος

Τό κλάσμα $\frac{10}{15}$ είναι ισοδύναμο μέ τό κλάσμα $\frac{2}{3}$. Όπως φαίνεται στό σχέδιο.



Είκ. 129

Μπορούμε όμως και χωρίς τό σχέδιο νά έπαληθεύσουμε την ισότητα, αν διαιρέσουμε καί τους δύο όρους του πρώτου μέ τόν 5. Η πράξη πού κάνουμε λέγεται **άπλοποίηση** του κλάσματος.

Βλέπετε;

Άπλοποίηση, είναι ή πράξη πού κάνουμε, για νά βρούμε ένα κλάσμα ίσο μέ τό αρχικό, αλλά μέ μικρότερους όρους.

113. Όμώνυμα καί έτερόνυμα κλάσματα



Είκ. 130

Άπό τά κλάσματα $\frac{3}{5}$ καί $\frac{2}{3}$ δέν μπορούμε νά ξέρουμε ποιά είναι τό μεγαλύτερο, γιατί δέν έχουν ούτε τόν ίδιο αριθμητή, ούτε τόν ίδιο παρονομαστή. Για νά μπορέσουμε νά τά συγκρί-

νουμε, πρέπει να τα τρέψουμε σε άλλα, ίσα μ' αυτά, αλλά με τον ίδιο παρονομαστή.

Γι' αυτό διαιρούμε τη μονάδα σε τόσα ίσα μέρη που να περιλαμβάνει και τους δύο παρονομαστές. Δηλ. σε 15 ίσα μέρη.



Εικ. 131

Έτσι το $\frac{3}{5}$ γίνεται $\frac{9}{15}$:

$$\frac{3}{5} = \frac{3 \times 3}{5 \times 3} = \frac{9}{15}$$

καί τό $\frac{2}{3} = \frac{2 \times 5}{3 \times 5} = \frac{10}{15}$

Τώρα τα κλάσματα $\frac{9}{15}$ και $\frac{10}{15}$ έχουν τον ίδιο παρονομαστή και μπορούμε εύκολα να τα συγκρίνουμε.

Τα κλάσματα που έχουν τον ίδιο παρονομαστή, λέγονται **ὁμώνυμα**. Αὐτά που δέν έχουν τον ίδιο παρονομαστή, λέγονται: **ἑτερώνυμα**:

Βλέπετε; ▶

Γιὰ νὰ τρέψουμε 2 ἑτερώνυμα κλάσματα σέ ὁμώνυμα, πολλαπλασιάζουμε τούς δύο ὄρους καθενός, μέ τόν παρονομαστή τοῦ ἄλλου.

Ἀσκήσεις:

577. Νά γίνουν ὁμώνυμα τά κλάσματα:

$\frac{1}{2}$ καί $\frac{3}{5}$, $\frac{3}{4}$ καί $\frac{2}{3}$

578. Ὅμοια: $\frac{8}{9}$ καί $\frac{2}{5}$, $\frac{4}{5}$ καί $\frac{4}{6}$

579. Ὅμοια: $\frac{7}{8}$ καί $\frac{4}{5}$, $\frac{7}{8}$ καί $\frac{6}{7}$

580. Ὅμοια: $\frac{12}{17}$ καί $\frac{13}{21}$, $\frac{25}{47}$ καί $\frac{32}{33}$

581. Ποιό ἀπό τά κλάσματα: $\frac{37}{57}$, $\frac{42}{51}$ εἶναι μικρότερο;

582. Ποιό ἀπό τά κλάσματα εἶναι μεγαλύτερο; $\frac{11}{13}$, $\frac{9}{11}$

114. Ο κύβος

Τόν κύβο βλέπουμε: στα ζάρια, στα ξύλινα παιδικά παιχνίδια, ή σέ μερικά κιβώτια συσκευασίας.



Εικ. 132



Εικ. 133




Εικ. 134

Πόσες έδρες έχει ό κύβος:


“Έδρες στόν κύβο λέγονται τά τετράγωνα, πού τόν περιορίζουν.

Πόσες άκμές έχει ό κύβος:

“Άκμές λέγονται οί πλευρές τών τετραγώνων.



“Ο κύβος



“Έχει 6 έδρες πού είναι ίσα τετράγωνα



“Έχει 12 άκμές ίσες μεταξύ τους




“Έχει 8 κορυφές


Εικ. 135

Νά βρείτε τό μέγεθος κάθε γωνίας τών έδρών του, άν τίς συγκρίνετε μέ τήν όρθή.

Στό σχέδιο βλέπετε, πώς μπορείτε νά κατασκευάσετε κύβο από χαρτόνι.



Εικ. 136



Εικ. 137

Άσκησης:

583. Η άκμή του κύβου είναι 5 εκατ. Πόσο μήκος έχουν όλες οι άκμές μαζί;
584. Όλες οι άκμές ενός κύβου έχουν μήκος 312 εκατ. Πόσο είναι το μήκος της άκμης του;
585. Πόσους κύβους χρειαζόμαστε, άκμης 2 εκατ. για να κατασκευάσουμε 1 κύβου άκμης 4 εκατοστών;
586. Για να δέσεις αυτό το κυβικό πακέτο που εικονίζεται, με κλωστή, πόσα μέτρα κλωστή θα σου χρειαστούν;



Εικ. 138


115. Όρθογώνιο παραλληλεπίπεδο

Τό σχήμα που έχει τό κουτί μέ τά σπέρτα, τά περισσότερα χαρτοκιβώτια συσκευασίας, τά κλειστά βιβλία, τό κουτί μέ τίς κιμωλίες καί άλλα, είναι τό σχήμα του όρθογωνίου παραλληλεπίπεδου.



Εικ. 139

Τά στερεά αυτά περιορίζονται από 6 ὀρθογώνια, πού λέγονται ἔδρες τοῦ παραλληλεπίπεδου.



Εἰκ. 140


Ἐνα ὀρθογώνιο παραλληλεπίπεδο ἔχει **3 διαστάσεις**: Τό **μήκος**, τό **πλάτος** καί τό **ῦψος**.

Οἱ ἀπέναντι ἔδρες του εἶναι ἴσα ὀρθογώνια.

Οἱ ἀκμές του εἶναι ἀνά 4 ἴσες.

Πρακτικές κατασκευές:

Παρακάτω δείχνουμε πῶς, ἀπό ἕνα χαρτονάκι, μπορούμε νά κατασκευάσουμε ἕνα ὀρθογώνιο παραλληλεπίπεδο.




Εἰκ. 141

Άσκησης πρακτικές:

587. Νά κατασκευάσετε με χαρτονάκι ένα ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο με διαστάσεις 75 χιλιοστά, 45 χιλιοστά και 35 χιλιοστά του μέτρου.

588. Πόσο μήκος κλωστής θα χρειαστείτε, γιά νά δέσετε τό πακέτο πού εικονίζεται;



Εικ. 142




Εικ. 143

589. Στο σχέδιο 143, πού εικονίζεται, βλέπετε πώς κατασκευάζεται ένα παραλληλεπίπεδο, μέ τό ύψος του, ίσο πρὸς τό πλάτος του. Μπορείτε νά βρείτε τίς διαστάσεις του; τό άθροισμα όλων τῶν άκμῶν του, καθώς και τό έμβαδόν του χαρτονιού πού χρησιμοποιήσατε;

Ἡ σφαίρα

Γενικά: Ἐνα μπαλόνι, μιά μπάλα παιγνιδιού πίκκ - πόγκ ἢ τένις ἢ ποδόσφαιρου ἢ μπάσκετ - μπῶλ ἢ ένός βόλου δίνουν τήν εικόνα τῆς σφαίρας.



Εικ. 144

116. Ὁ κύλινδρος

Τό στερεό πού εικονίζεται παρά πλευρά, ὀνομάζεται **κύλινδρος**. Τόν κύλινδρο τόν βλέπουμε: σ' ἓνα στρογγυλό ἄξυστο μολύβι, στά κουτιά μέ γάλα ἐβαπορέ, καί σέ πολλά ἄλλα ἀντικείμενα.

Πῶς παράγεται ἓνας κύλινδρος:

Παίρνουμε ἓνα ὀρθογώνιο ἀπό ξύλο ἢ ἀπό χαρτόνι ἢ ἀπό λαμαρίνα καί στερεώνουμε τή μιά του πλευρά ἐπάνω σ' ἓνα σύρμα ἢ ξύλο ὅπως δείχνει τό παράπλευρο σχῆμα (α). Περιστρέφουμε κατόπιν τό σύρμα ἢ τό ξύλο γύρω ἀπό τόν ἑαυτό του, ὅσο μπορούμε πιό γρήγορα.

Ἔτσι θά παρατηρήσουμε πῶς ἡ γρήγορη περιστροφή του δίνει τήν εἰκόνα τοῦ κυλίνδρου. Σχ. (β).

Ἐπειδή ὁ κύλινδρος παράγεται μέ τήν περιστροφή τοῦ ὀρθογώνιου, γύρω ἀπό μιά τῶν πλευρῶν του, λέγεται καί **στερεό ἀπό περιστροφή**.

Τό εὐθύγραμμο τμήμα ΔΕ λέγεται **ὑψος** τοῦ κύλινδρου.

Ἐπίσης τό ΔΕ λέγεται καί **ἄξονας** τοῦ κύλινδρου.

Ἡ πλευρά ΑΓ πού στίς διάφορες θέσεις της **γεννάει** τήν κυρτή (παράπλευρη) ἐπιφάνεια τοῦ κύλινδρου, λέγεται καί **γενέτειρα** τοῦ κύλινδρου.



Τά ἐπίπεδα μέρη τοῦ κύλινδρου πού εἶναι κυκλικοί δίσκοι λέγονται **βάσεις** τοῦ κύλινδρου.

Ἀσκήσεις:

590. Ὄνομάσετε ἀντικείμενα πού νά ἔχουν σχῆμα κύλινδρου.
591. Πόσες βάσεις ἔχει ἓνας κύλινδρος καί ποιοί τό σχῆμα τους;
592. Γιατί ὁ κύλινδρος λέγεται καί **ἀπό περιστροφή στερεό**;
593. Τί ὀνομάζεται **γενέτειρα** τοῦ κύλινδρου καί γιατί;

Προβλήματα γιά γενική ἐπανάληψη:

594. Κάποιος πού ρωτήθηκε, σέ ποιά ἡλικία πέθανε ὁ πατέρας του, εἶπε:



είμαι 47 χρόνων και ήμουν 19, όταν ο πατέρας μου είχε τη σημερινή μου ηλικία. Ο πατέρας μου πέθανε όταν γεννήθηκε ο γιός μου, πού σήμερα είναι 11 ετών. Σέ ποιά ηλικία πέθανε;

595. Από τρεις εργάτες ο Α΄ παίρνει ήμερομίσθιο 31,50 δρχ. περισσότερες από τό Β΄ και 38,50 περισσότερες από τόν Γ. Άν τό ήμερομίσθιο του Β΄ είναι 795 δραχ., ποιά είναι τά ήμερομίσθια του Α΄ και Γ΄;

596. Ένας έμπορος αγόρασε έμπορεύματα αξίας 204.506,80 δρχ. Άφου πούλησε ένα μέρος εισέπραξε 212.506,80 δρχ. Άν ή αξία των υπόλοιπων ήταν 37.500 δρχ., νά υπολογιστεί τό κέρδος.

597. Μεταξύ των μαθητών ενός σχολείου έγινε έβανος για συγκέντρωση ενός χρηματικού ποσού. Άν ο καθένας έδινε 15 δραχμές, θά έλειπαν 105 δρχ., αν όμως έδιναν 20 δρχ. θά περισσευαν 110 δρχ. Πόσοι ήταν οι μαθητές, και τί ποσό ήθελαν νά συγκεντρώσουν;

598. Ένας έμπορος αγόρασε ένα τόπι ύφασμα και πλήρωσε 7.440 δρχ. Όταν τό πούλησε, πήρε 9.000 δρχ. κι έτσι είχε κερδίσει 26 δρχ. τό μέτρο. Πόσα μέτρα ήταν τό ύφασμα;

599. Η απόσταση Γής - Σελήνης είναι 388.675 χιλιόμετρα. Ένα διαστημόπλοιο, πού τρέχει μέ ταχύτητα 13.000 μέτρα τό δευτερόλεπτο, σέ πόσες ώρες θά φτάσει στό φεγγάρι;

600. Ένας έμπορος αγόρασε 96 μέτρα ύφασμα, πρός 204,50 δραχμές τό μέτρο. Από αυτά πούλησε τό τέταρτο, πρός 298,50 δρχ. τό μέτρο και τό υπόλοιπο, πρός 267,50 δραχμές τό μέτρο. Πόσα κέρδισε;

601. Ένας έμπορος κατασκεύασε 43 όμοια φορέματα, από ένα τόπι ύφασμα, και του περίσσεψαν 8,25 μέτρα. Πόσα μέτρα ήταν όλο τό τόπι, αν για κάθε φόρεμα χρησιμοποιήθηκαν 2,25 μέτρα ύφασμα;

602. Ένας γυαλοπώλης αγόρασε 144 ποτήρια. Στη μεταφορά του έσπασαν 12 ποτήρια και τά υπόλοιπα τά πούλησε πρός 20,50 δραχμές τό ένα και κέρδισε 474 δραχμές. Πόσες δραχμές είχε αγοράσει τό κάθε ποτήρι;

603. Ένας τυρέμπορος αγόρασε 20 δοχεία τυρί, πού τό καθένα είχε 20 κιλά τυρί, πρός 90,50 δραχμές τό κιλό. Όταν τό πούλησε κέρδισε 3.244 δραχμές. Πόσο πούλησε τό κάθε κιλό, αν τό τυρί είχε και 12 κιλά φύρα;


604. Ένας φρουτέμπορος πούλησε 555 κιλά πορτοκάλια πρός 12,50 δραχμές τό κιλό. Μέ τά χρήματα πού πήρε αγόρασε λεμόνια, πού τά πούλησε 27,50 δραχμές τό κιλό και κέρδισε 3.375 δραχμ. Πόσα κιλά ήταν τά λεμόνια;

605. Ένας γεωργός πούλησε 512 κιλά θαμβάκι, πρός 27.50 δραχμές τό κιλό, μέ τά χρήματα πού πήρε αγόρασε 2,80 μέτρα ύφασμα για ένα κουστούμι του και του έμειναν και 11.525 δραχμές. Πόσες δραχμές

606. Ένας έμπορος αγόρασε 108 μέτρα ύφασμα, πρὸς 203 δραχμὲς τὸ μέτρο. Μὲ τὸ ὑφασμα αὐτὸ, κατασκεύασε ὅμοια φορέματα, πού γιὰ τὸ καθένα χρειάστηκε 2,25 μέτρα. Πόσο πρέπει νὰ πουλήσει τὸ καθένα ἀπὸ τὰ φορέματα, γιὰ νὰ κερδίσει 12.252 δραχμὲς;
607. Ένας έμπορος αγόρασε 250 πιάτα πρὸς 51,60 δραχμὲς τὸ ἕνα. Ὅταν πούλησε μερικά πρὸς 64,50 δραχμὲς τὸ ἕνα, εἶδε πὼς τὰ πιάτα πού τοῦ ἔμειναν ἦταν κέρδος. Νὰ βρεθεῖ πόσα πιάτα τοῦ ἔμειναν.
608. Ένας έμπορος αγόρασε 4 σακιά σιτάρη, πού τὸ καθένα ζυγίζε 58 κιλά. Πούλησε τὰ 3 σακιά, πρὸς 6,40 δραχμὲς τὸ κιλό καὶ εἶδε πὼς τὸ ἕνα σακὶ τοῦ ἔμεινε κέρδος. Πόσο εἶχε ἀγοράσει τὸ κιλό τὸ σιτάρη;
609. Ένας μανάβης αγόρασε 285 κιλά πορτοκάλια, πρὸς 18,50 δραχ. τὸ κιλό, καὶ μῆλα πού γιὰ νὰ τ' ἀγοράσει πλήρωσε διπλάσιο ποσό καὶ 1.470 δραχμὲς ἀκόμα. Πόσες δραχμὲς πλήρωσε, γιὰ τὰ πορτοκάλια καὶ τὰ μῆλα;
610. Ένας έμπορος αγόρασε 50 δοχεία τυφί, πού τὸ καθένα εἶχε 20 κιλά τυφί, πρὸς 90,50 δραχμὲς τὸ κιλό. Ὅταν τὸ πούλησε κέρδος 3.244 δραχμὲς. Πόσο πούλησε τὸ καθὲν ὀνόματι καὶ τὸ τυφί εἶχε καὶ 12 κιλά φρέσκο.
611. Ένας φρουτιέμπορος πούλησε 255 κιλά πορτοκάλια πρὸς 12,50 δραχμὲς τὸ κιλό. Μὲ τὰ χρήματα πού πήρε ἀγόρασε λεμόνια, πού τὸ πούλησε 27,50 δραχμὲς τὸ κιλό καὶ κέρδισε 3.375 δραχμὲς. Πόσο κιλά λεμόνια ἀγόρασε;
612. Ένας γεωργὸς πούλησε 512 κιλά βρώμη πρὸς 27,50 δραχμὲς τὸ κιλό, καὶ τὸ χρήμα πού πήρε ἀγόρασε 2,80 μέτρα ὑφασμα πρὸς 11,252 δραχμὲς τὸ μέτρο. Πόσο κέρδισε;

Πίνακας συμβόλων: ΘΜΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Σύμβολο	Σημασία είτε ονομασία συμβόλων
M	Σημαίνει μονάδες
Δ	Σημαίνει δεκάδες
E	Σημαίνει εκατοντάδες
X	Σημαίνει χιλιάδες
M/X	Σημαίνει μονάδες χιλιάδων
Δ/X	Σημαίνει δεκάδες χιλιάδων
E/X	Σημαίνει εκατοντάδες χιλιάδων
+	«σύν» σύμβολο τής προσθέσεως
-	«πλήν» σύμβολο αφαιρέσεως
x	«έπί» σύμβολο πολλαπλασιασμού
:	«διά» σύμβολο διαιρέσεως
=	«ίσοῦται μέ...», «είναι ἴσο μέ...»
<	«είναι μικρότερο από...»
>	«είναι μεγαλύτερο από...»
≠	«είναι διάφορο από...»
()	τή χρησιμοποιούμε για νά δηλώσομε μιά όλότητα
Δ	διαιρετέος
δ	διαιρέτης
π	πηλίκιο
υ	ύπόλοιπο



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΑΚΕΡΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

	σελ.
Έννοια του αριθμού - αριθμητική	1
Άκεραιοι αριθμοί καί ψηφία	2
Γνωρίζετε ότι:	3
Απαρίθμηση	4
Γνωρίζετε ότι:	4
Αρίθμηση κατά τό δεκαδικό σύστημα	5
Αριθμογραφία θέσεως	6
Γνωρίζετε ότι:	11
Συγκεκριμένοι καί αφηρημένοι αριθμοί	12
Όμοιοειδείς καί έτεροειδείς αριθμοί	13
Άξιοσημείωτα σύνολα αριθμών	14
Άλλα είδη άκέραιων	14
Σύγκριση άκέραιων	16
Ίσοι αριθμοί	16
Άνισοι αριθμοί	17
Προβλήματα έπαναλήψεως	19
Κάνετε αύτοεξέταση	20
Γιά νά θυμηθείτε τό λεξιλόγιό σας	21

ΟΙ 4 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1000
ΠΡΟΣΘΕΣΗ

Άθροισμα δύο αριθμών	22
Πρόσθεση περισσότερων από δύο αριθμών	23
Ή τεχνική της προσθέσεως	25
Ίδιότητες της προσθέσεως	26
Δοκιμή της προσθέσεως	27
Πότε κάνουμε πρόσθεση	28
Ίδιότητες της προσθέσεως	29
Τοῦ οὐδέτερου στοιχείου καί προσεταιριστική	30
Άποτελέσματα τῶν ιδιοτήτων	30
Περίληψη τῶν ιδιοτήτων	31

ΑΦΑΙΡΕΣΗ

Έννοια	32
Ή τεχνική τῆς ἀφαιρέσεως	33
Δοκιμή τῆς ἀφαιρέσεως	34
Πῶς θά λύσετε ἓνα πρόβλημα	36
Πότε κάνετε ἀφαίρεση	37
Προβλήματα προσθέσεως καί ἀφαιρέσεως	38

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ

Έννοια	39
Πολλαπλασιασμός μονοψηφίων	40
Πυθαγόρειος πίνακας	40
Πυθαγόρας	41
Ίδιότητες	41
Μεταθετική ιδιότητα	42
Έπιμεριστική ιδιότητα	43
Τεχνική τοῦ πολλαπλασιασμοῦ	44
Πολλαπλασιασμός διψήφιου μέ διψήφιο	45
Δοκιμή τοῦ πολλαπλασιασμοῦ	46
Χρήση τοῦ πολλαπλασιασμοῦ στή λύση προβλημάτων	47
Προσεταιριστική ιδιότητα	48

ΔΙΑΙΡΕΣΗ

Έννοια	50
Γραφή τῆς διαιρέσεως	52
Άτελής καί τέλεια διαίρεση	52
Σχέση: διαιρετέου, διαιρέτη, πηλίκου καί υπόλοιπου	52
Ἡ τεχνική τῆς διαιρέσεως	53
Δοκιμή τῆς διαιρέσεως	54
Διαίρεση μετρήσεως	55
Διαίρεση μερισμοῦ	56
Πότε κάνουμε διαίρεση μερισμοῦ	57
Εἰδικές περιπτώσεις	59
Προβλήματα γιά ἐπανάληψη τῶν 4 πράξεων	60

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΧΗΜΑΤΑ

Τό τετράγωνο	64
Περίμετρος τετράγωνου	65
Τό ὀρθογώνιο	66
Περίμετρος ὀρθογώνιου	67
Τό τρίγωνο	69
Περίμετρος τριγώνου	70
Κύκλος	71

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ 1000

Πῶς διαβάζονται οἱ ἀριθμοί	74
Οἱ ἀριθμοί ὡς τό 100 χιλιάδες	76
Πῶς γράφονται οἱ ἀριθμοί	77
Πῶς διαβάζονται οἱ ἀριθμοί	77
Οἱ ἀριθμοί ὡς τό ἑκατομμύριο	78
Πῶς γράφονται καί πῶς διαβάζονται	79
Οἱ ἀριθμοί πέρα ἀπό τό ἑκατομμύριο	81
Πῶς διαβάζονται	81
Ἑλληνική καί Ρωμαϊκή γραφή	82

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο

ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕ ΔΕΚΑΔΙΚΟΥΣ

Πράξεις με πολυψήφιους	84
------------------------------	----

ΠΡΟΣΘΕΣΗ

Ή τεχνική	85
Δοκιμή	86

ΑΦΑΙΡΕΣΗ

Δοκιμή	89
Μιά ιδιότητα της αφαιρέσεως	92
Για να θυμηθείτε τις ιδιότητες	93

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ

Ή τεχνική του	94
Δοκιμή	94
Συντομείες του πολλαπλασιασμού	96

ΔΙΑΙΡΕΣΗ

Διαίρεση με τό 10 ή 100 ή 1000	99
Όταν ο διαιρετέος και διαιρέτης τελειώνουν σέ μηδέν (0)	100
Διαίρεση όποιωνδήποτε αριθμών	101
Συντομίες στή διαίρεση	103
Διαίρεση μετρήσεως - μερισμού	105
Πώς θά λύσετε ένα πρόβλημα	105
Προβλήματα επί των 4 πράξεων	106

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο

ΔΕΚΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

Ρόλος των δεκαδικών αριθμών	109
Έννοια της δεκαδικής μονάδας	110
Έννοια δεκαδικού αριθμού	111
Πώς γράφονται οί δεκαδικοί αριθμοί	113
Πώς διαβάζονται	115
Ρόλος του μηδενός στους δεκαδικούς	116
Σύγκριση δεκαδικών αριθμών	117
Κάθετες εύθειες, παράλληλες εύθειες, ταινία	118

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο
ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕ ΔΕΚΑΔΙΚΟΥΣ

Γενικά	121
Πρόσθεση	121
΄Αφαίρεση	123
Πολλαπλασιασμός και διαίρεση δεκαδικού με 10, 100 ή 1000	125
Τί είναι παραλληλόγραμμο και ποιά τά είδη του	126
Ρόμβος	127
Τί διαφέρει τό τετράγωνο από τό ρόμβο	127
Πολλαπλασιασμός δεκαδικού με άκέραιο	129
Πολλαπλασιασμός δεκαδικών αριθμών	130
Διαίρεση τών δεκαδικών	132
Δοκιμή τής διαίρεσης	133
Διαίρεση άκέραιου με δεκαδικό	134
Διαίρεση αριθμού με 0,1 - 0,01 - 0,001	135
Διαίρεση δεκαδικού με δεκαδικό	136
Μέτρηση έπιφανειών	139
΄Εμβαδόν όρθογώνιου	139
΄Εμβαδόν τετράγωνου	141

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο

ΚΛΑΣΜΑΤΑ

Γενικά	143
Δεκαδικά κλάσματα	145
Σύγκριση κλασμάτων με τήν άκέραια μονάδα	146
Σύγκριση κλασμάτων	148
΄Ανισα κλάσματα	149
΄Ισοδύναμα κλάσματα	149
΄Απλοποίηση κλάσματος	150
΄Ομώνυμα και έτερώνυμα κλάσματα	151
΄Ο κύβος	152
Τό όρθογώνιο παραλληλεπίπεδο	153
΄Η σφαίρα	154
΄Ο κύλινδρος	155
Προβλήματα για γενική επανάληψη	156

190

Address Page

Address Page

215E

27

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: ΕΙΡΗΝΗ ΝΟΜΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο
ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕ ΔΕΚΑΔΙΚΟΥΣ

Γενικά	120
Πολλαπλασιασμός	121
Αφαίρεση	122
Πολλαπλασιασμός με διαίρεση δεκαδικού με 10, 100, 1000	125
Τι είναι παραλλαγή αριθμού και ποια τα είδη του	126
Ρόμβος	127
Τι διαφέρει το τετράγωνο από το ρόμβο	127
Πολλαπλασιασμός δεκαδικού με ακέραιο	128
Πολλαπλασιασμός	129
Διαίρεση των δεκαδικών	130
Δοκιμή της διαίρεσης	131
Διαίρεση ακεραίου με δεκαδικό	134
Διαίρεση ακεραίου	135
Διαίρεση δεκαδικού	136
Μέτρηση επιφανείων	138
Εμβαδόν ορθογώνιου	139
Εμβαδόν τετραγώνου	141

746320 β 23

874250 Γ 36

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο

ΚΛΑΣΜΑΤΑ

Γενικά	143
Δεκαδικά κλάσματα	145
Σύγκριση κλασμάτων με την ακεραία μονάδα	146
Σύγκριση κλασμάτων	148
Άθροισμα κλάσμων	149
Ποσόναμα κλάσμων	149
Απλοποίηση κλάσμων	150
Ομώνυμα και ετερόνυμα κλάσματα	151
Ο κλάσμος	152
Το ορθογώνιο παραλληλόγραμμο	153
Το τετράγωνο	154



024000025633

ΕΚΔΟΣΗ Α', 1979 (VIII) — ΑΝΤΙΤ. 240.000 — ΣΥΜΒΑΣΗ : 3202/31-3-79

ΕΚΤΥΠΩΣΗ - ΒΙΒΛΙΟΔ.: «ΑΤΛΑΝΤΙΣ - Μ. ΠΙΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ» Α.Ε.

~~27750,50~~

$$\begin{array}{r} 111 \\ 27750 \div 9,25 \phi \\ \hline = 000 / 30 \text{ κδα} \end{array}$$

~~$30 \div 2 =$~~

~~$30 \div 2 = 15 \text{ κδα}$~~

~~$15 - 6 = 9$~~

~~$30 - 6 = 24$~~

~~$24 \div 2 = 12 \text{ κδα}$~~

~~$12 + 6 = 18$~~

~~_____~~

