

# ΑΛΓΕΒΡΑ

ΝΕΙΔΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

Καθηγητοῦ τῆς Πτυχίας, θεοφ.

(Συμπληγωθεῖσα διὰ τοῦ μερικοῦ περὶ Ημερογράφων κ.τ.λ.  
ἐκ τοῦ έργου τοῦ Καθηγητοῦ Α. ΑΛΓΟΠΟΥΛΟΥ)

ΔΙΑ ΤΑΣ ΑΝΩΤΤΡΑΣ ΤΑΞΙΣ ΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΣΧΟΛΙΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ  
ΕΝ ΔΙΗΚΑΙΩ 1969



$$\begin{array}{r} 20 \\ 10 \\ \hline 200 \end{array}$$

17148



# ΑΛΓΕΒΡΑ

*Λεῖψις ἐπὶ λεῖψιν πολλαπλασιασθεῖσα ποιεῖ  
ὑπαρξῖν, λεῖψις δὲ ἐπὶ ὑπαρξῖν ποιεῖ λεῖψιν.  
(Πλὴν ἐπὶ πλὴν ἵσον σύν, πλὴν ἐπὶ σύν ἵσον πλὴν).*

*Διοφάντου Ἀριθμητικῶν Α'*


# ΑΛΓΕΒΡΑ

ΝΕΙΛΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου

(Συμπληρωθεῖσα διὰ τοῦ κεφαλαίου περὶ Η αριθμών κ.τ.λ.  
ἐκ τοῦ ἔργου τοῦ Καθηγητοῦ A. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ)

ΔΙΑ ΤΑΣ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ  
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1960



## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι

### Α'. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ \* ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΙΣ ΑΥΤΗΣ

§ 1. 'Η "Αλγεβρα είναι κλάδος της Μαθηματικής 'Επιστήμης, όπως και ή 'Αριθμητική, ἀλλ' είναι γενικωτέρα αὐτῆς, ἀσχολεῖται δὲ κατὰ τρόπον γενικὸν μὲ τὴν λύσιν ζητημάτων, τὰ ὅποια ἀναφέρονται ως ἐπὶ τὸ πλεῖστον εἰς γενικοὺς ἀριθμοὺς (τοὺς ὅποιούς χρησιμοποιεῖ ἐνίστε καὶ ή 'Αριθμητική, καθὼς π.χ. διὰ τὴν παράστασιν ἐνὸς χρηματικοῦ κεφαλαίου Κ, τοῦ τόκου Τ κ.τ.λ.).

§ 2. Εἰς τὴν "Αλγεβραν χρησιμοποιοῦνται κυρίως, ἐκτὸς τῶν ἀραβικῶν συμβόλων, 0, 1, 2, 3, 4... κ.τ.λ., γράμματα τοῦ ἀλφαρήτου διὰ τὴν παράστασιν ἀριθμῶν ἢ ποσοστήτων. Λέγομεν π.χ. α δραχμαί, ἀντὶ νὰ εἶπωμεν εἰς ὡρισμένος ἀριθμὸς δραχμῶν. 'Η τοιαύτη χρησιμοποίησις τῶν γραμμάτων είναι μὲν αὐθαίρετος, δυνάμεθα δηλαδὴ νὰ παραστήσωμεν ὡρισμένον ἀριθμὸν ἢ ὡρισμένην ποσότητα μὲ ἐν γράμμα, τὸ α π.χ. ἢ τὸ β ἢ τὸ γ κ.τ.λ., ἀλλὰ τὸ ὡρισμένον αὐτὸ γράμμα, τὸ ὅποιον χρησιμοποιεῖται καθ' ὅλην τὴν ἔκτασιν τοῦ ζητήματος, παριστάνει τὸν αὐτὸν

\* 'Η λέξις "Αλγεβρα ὁφεῖται τὴν προέλευσίν της εἰς τὸν τίτλον ἐνὸς ἀρχαιοτάτου ἀραβικοῦ μαθηματικοῦ βιβλίου «AL—JEBR W'AL MUGABALAH».

'Ως πρὸς τὴν ἔξειδιν τῆς 'Αλγέβρας διακρίνομεν κυρίως τρεῖς περιόδους.

Κατὰ τὴν πρώτην περίοδον, ἡ ὅποια καλεῖται **ρητορική**, ἐπικρατεῖ ἡ χρήσις λέξεων καὶ τῆς ἀφήγησεως, χωρὶς νὰ χρησιμοποιῶνται σύμβολα. Κατὰ τὴν περίοδον αὐτὴν συχνὴ μόνον ἐπαναληπτικὴ ἀφήγησις ἀσκεῖ τὸν ἀσχολούμενον μὲ τὸ μάθημα τῆς 'Αλγέβρας. Εἰς τὸ κατώτατον αὐτὸ στάδιον τῆς ἀναπτύξεως τοῦ μαθήματος αὐτοῦ παρέμειναν καὶ αὐτοὶ οἱ "Ἐλληνες μέχρι τοῦ Iou aiῶνος μ. Χ., ἐνῷ οἱ 'Αραβεῖς, οἱ ἀρχαῖοι 'Ιταλοί καὶ Γερμανοί παρέμειναν μέχρι τοῦ 13ου αἰῶνος μ.Χ.

'Η δευτέρα περίοδος ἔξειδιν τῆς 'Αλγέβρας, ἡ ὅποια καλεῖται **συγκεκομμένη**, ἀρχίζει ἀφ' ὅτου μερικαὶ ἐκφράσεις ἥρχισαν νὰ παρουσιάζωνται συγκε-

άριθμὸν ἢ τὴν αὐτὴν ποσότητα. Κατὰ συνήθειαν, ἡ ὁποία ἐπεκράτησε, χρησιμοποιοῦνται τὰ πρῶτα μικρὰ γράμματα τοῦ (έλληνικοῦ ἢ ἔνος) ἀλφαριθμοῦ, τὰ α, β, γ, δ..., διὰ τὴν παράστασιν γνωστῶν ἀριθμῶν ἢ ποσοτήτων, τὰ δὲ τελευταῖς χ, ψ, ω, φ,... διὰ τὴν παράστασιν ἀγνώστων ἢ ζητουμένων ποσοτήτων. Π.χ. λέγομεν: ἂν α ὁκάδες ἐμπορεύματός τινος τιμῶνται β δραχμάς, καὶ ζητῶμεν τὴν τιμὴν γ ὁκάδων τοῦ αὐτοῦ ἐμπορεύματος, παριστάνομεν τὸν ζητούμενον ἀριθμὸν π.χ. μὲν χ καὶ θὰ ἔχωμεν ὅτι  $\chi = \frac{\beta}{\alpha} \cdot \gamma$  δρχ.

Ἐνίστε χρησιμοποιοῦμεν εἰς τὴν Ἀλγεβραν διαδοχικὰ γράμματα διὰ τὴν παράστασιν ἰσαριθμῶν δόμοις δῶν ἀριθμῶν ἢ ποσοτήτων. Π.χ. λέγομεν: ἂν ποσὸν Α δραχμῶν μερισθῇ εἰς τέσσαρα πρόσωπα ἀναλόγως τεσσάρων διαφόρων ἀριθμῶν, π.χ. τῶν κ, λ, μ, ν καὶ ζητῶνται τὰ μερίδια αὐτῶν, παριστάνομεν τὰ ζητούμενα μερίδια π.χ. μὲν χ, ψ, z, ω καὶ θὰ ἔχωμεν:

$$\chi = \frac{Α.κ}{κ+λ+μ+ν}, \quad \psi = \frac{Α.λ}{κ+λ+μ+ν}, \quad z = \frac{Α.μ}{κ+λ+μ+ν}, \quad \omega = \frac{Α.ν}{κ+λ+μ+ν}.$$

Ἐνίστε χρησιμοποιοῦμεν ἐν μόνον γράμμα μὲν δείκτας μικροὺς ἀκεραίους ἀριθμοὺς 1, 2, 3... (ἢ μὲν ἔνα, δύο, τρεῖς τόινους).

κομμέναι εἰς βιβλία. Πρῶτος ἐκπρόσωπος τῆς περιόδου αὐτῆς είναι δ "Ελλην μαθηματικὸς Διόφαντος τῆς Ἀλεξανδρείας τὸ δεύτερον ἥμισυ τῆς τρίτης ἑκατονταετρίδος μ.Χ., δ ὁποῖος ἔχρησιμοποίησε σημαντικὴν συντομίαν εἰς μαθηματικὰς ἐκφράσεις εἰς τὸ ἔργον του περὶ Ἀλγέβρας, θεωρεῖται δ' οὗτος καὶ θεμελιωτῆς αὐτῆς.

Ἡ τρίτη περίοδος τῆς Ἀλγέβρας χαρακτηρίζεται ως συμβολικὴ. Πρῶτοι οἱ ἀρχαῖοι Αἰγύπτιοι παρουσιάζονται χρησιμοποιοῦντες μερικούς συμβολισμούς εἰς τὰς μαθηματικὰς ἐκφράσεις, αἱ ὁποίαι παρελήφθησαν καὶ ἐπεξετάσθησαν βαθμηδὸν ὑπὸ τῶν Ἰνδῶν.

Κατὰ τὰ μέσα τοῦ 15ου αἰώνος μ.Χ. φαίνεται πλέον ἐπικρατοῦσα ἡ συμβολικὴ γραφὴ τῆς Ἀλγέβρας καὶ τῶν Μαθηματικῶν ἐν γένει. Οὕτω τὸ 1494 χρησιμοποιοῦνται ὡς σύμβολα ὑπὸ τοῦ Ἰταλοῦ LUCA PACIOLI γράμματα τοῦ ἀλφαριθμοῦ τὰ + καὶ -. Ἡ γενικωτέρα καὶ εύρυτέρα δημος χρησιμοποίησις τοῦ συμβολισμοῦ διείλεται εἰς τὸν Γάλλον F. VIÉTE (1591), ἡ ὁποία συνεπληρώθη κατὰ τὴν ἐποχὴν δύο διαστήμαν μαθηματικῶν, τοῦ Γερμανοῦ LEIBNITZ καὶ τοῦ Ἀγγλοῦ NEWTON. Οὕτοι συνετέλεσαν σπουδαίως δχι μόνον εἰς τὴν μεγάλην προσαγωγὴν τῶν Μαθηματικῶν ἐν γένει, ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν διεθνοποίησίν των, μὲ τὴν χρησιμοποίησιν συμβόλων διεθνοῦς μορφῆς.

διὰ τὴν παράστασιν ἀριθμῶν ἢ ποσοτήτων. Π. χ. ἂν τοκίσῃ τις τρία διάφορα ποσά μὲ ἀντίστοιχα διάφορα ἐπιτόκια καὶ θέλωμεν νὰ εῦρωμεν πόσα χρήματα θὰ λάβῃ ἐν ὅλῳ (ἀπὸ κεφάλαια καὶ τόκους) μετὰ π.χ. ἐν ἕτοι, παριστάνομεν τὰ τοκιζόμενα κεφάλαια π. χ. μὲ  $\alpha_1$ ,  $\alpha_2$ ,  $\alpha_3$ , τὰ ἐπιτόκια π. χ. διὰ τῶν  $t_1$ ,  $t_2$ ,  $t_3$  καὶ τὸ ζητούμενον ποσόν διὰ τοῦ χ.

$$\text{Ούτω θὰ } \text{ἔχωμεν } \chi = \alpha_1 \cdot \left(1 + \frac{t_1}{100}\right) + \alpha_2 \cdot \left(1 + \frac{t_2}{100}\right) + \alpha_3 \cdot \left(1 + \frac{t_3}{100}\right).$$

Εἰς τὴν Ἀλγεβραν χρησιμοποιοῦμεν τὰ γνωστὰ σύμβολα ἐκ τῆς Ἀριθμητικῆς, τὸ + (σύν) διὰ τὴν πρόσθεσιν ἀριθμῶν ἢ ποσοτήτων, τὸ - (πλὴν ἢ μεῖον) διὰ τὴν ἀφαίρεσιν, τὸ × ἢ · (ἐπὶ) διὰ τὸν πολλαπλασιασμόν, τὸ : (διὰ ἢ πρὸς) διὰ τὴν διαιρέσιν, ἐπίσης τὸ √ (ριζικὸν) διὰ τὴν ἔξαγωγὴν τῆς (τετραγωνικῆς) ρίζης κ.τ.λ. καθὼς καὶ ἄλλα σύμβολα, περὶ τῶν διποίων θὰ γίνη λόγος εἰς τὰ ἐπόμενα.

"Οταν ἐν ζήτημα ἐκτίθεται μὲ τὴν χρησιμοποίησιν τῶν συμβόλων καὶ τῶν ἑκφράσεων τῶν χρησιμοποιουμένων ὑπὸ τῆς Ἀλγεβρας, τότε λέγομεν συνήθως ὅτι τὸ ζήτημα ἐκτίθεται μὲ τὴν γλῶσσαν τῆς Ἀλγέβρας ἢ μὲ ἀλγεβρικὴν γλῶσσαν ἢ καὶ ἀπλῶς ἐκτίθεται ἀλγεβρικῶς.

### Α σ κήσεις

1. "Αν 10 δικάδες ἐμπορεύματος τιμῶνται 10 000 δραχμάς, πόσον τιμῶνται 120 δικάδες αὐτοῦ; Λύσατε τὸ πρόβλημα καὶ ἀκολουθώς νὰ τὸ γενικεύσετε χρησιμοποιοῦντες γενικοὺς ἀριθμοὺς (γράμματα) καὶ νὰ λύσετε τὸ γενικευμένον πρόβλημα.

2. Δίδονται οἱ ἀριθμοὶ 5,  $\frac{3}{4}$ , 13,5. Ποιοι είναι οἱ ἀντίστροφοί των; Γενικεύσατε τὸ πρόβλημα, χρησιμοποιοῦντες γράμματα καὶ λύσατε αὐτό.

3. Γράψατε τρεῖς ἀριθμοὺς γενικοὺς καὶ εὗρετε τὰ διπλάσιά των, τὰ τριπλάσιά των, τὰ νιπτλάσιά των.

4. Διδέται εἰς ἀριθμὸς π. χ. ὁ α. Πᾶς παριστάνονται τὰ  $\frac{5}{8}$ , τὰ  $\frac{\mu}{v}$  αὐτοῦ;


5. Σημειώσατε τὸ ἀθροισμα δύο ἀριθμῶν α καὶ β, τὴν διαφορὰν τοῦ δευτέρου ἀπὸ τὸν πρῶτον, τὸ γινόμενόν των, τὸ πηλίκον τοῦ πρώτου διὰ τοῦ δευτέρου.

6. Γράψατε μὲ τί ισοῦται τὸ κεφάλαιον Κ δρχ., τὸ διποίον, τοκιζόμενον ἐπὶ Χ ἐτη πρὸς E%, δίδει τόκον T καὶ εὗρετε πόσον είναι τὸ Κ διαν, ἀντὶ τῶν X, E, T, θέσετε ὡρισμένους ἀριθμούς.

### B'. ΘΕΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ \*

**§ 3.** Καθώς γνωρίζομεν ἐκ τῆς Ἀριθμητικῆς, μέτρησις ἐνὸς ποσοῦ ἢ μεγέθους λέγεται ἡ σύγκρισις αὐτοῦ μὲν ἀλλο ὅμοειδές του, τὸ ὅποιον θεωρεῖται ως μονάς μετρήσεως. Τὸ ἔξαγόμενον τῆς μετρήσεως ἐνὸς ποσοῦ ἢ μεγέθους εἶναι ἀριθμός τις, ὁ ὅποιος λέγομεν ὅτι παριστάνει τὴν τιμὴν τοῦ μετρηθέντος ἢ αὐτὸ τὸ μετρηθέν.

Ἐστω εὐθεία τις ( $\epsilon$ ), ἐπὶ τῆς ὅποιας διακρίνομεν δύο φοράς (σχ. 1), μίαν τὴν ἀπὸ τοῦ σημείου αὐτῆς π.χ. Ο πρὸς τὸ σημεῖον τῆς  $A$ , τὴν ὅποιαν καλοῦμεν **θετικὴν** φορὰν καὶ ἄλλην ἐκ τοῦ Ο πρὸς τὸ σημεῖον τῆς  $G$ , τὴν ὅποιαν καλοῦμεν **ἀρνητικὴν** φοράν.



Καλοῦμεν **θετικὸν** μὲν τμῆμα τῆς ( $\epsilon$ ) πᾶν μέρος αὐτῆς, ἃν θεωρῆται διαγραφόμενον ὑπὸ κινητοῦ κατὰ τὴν θετικὴν φοράν, **ἀρνητικὸν** δέ, ἃν κατὰ τὴν ἀρνητικήν. Οὔτως, ἐπὶ τῆς εὐθείας ( $\epsilon$ ) διακρίνομεν τμήματα αὐτῆς θετικά ως τὰ  $OA$ ,  $OB$ ,  $AB$  καὶ ἀρνητικά ως τὰ  $OG$ ,  $OD$ ,  $GD$ . Τὰ μὲν θετικὰ τμήματα τῆς εὐθείας μετρούμενα ὑπὸ τῆς μονάδος μετρήσεως (ἥτοι ὑπὸ ἐνὸς τμήματος θετικοῦ, τὸ ὅποιον ὁρίζομεν αὐτοβούλως), ἔστω τοῦ  $OA$ , παριστῶνται ὑπὸ ἀριθμῶν, τοὺς ὅποιους καλοῦμεν **θετικούς**, τὰ δὲ ἀρνητικὰ ὑπὸ ἀριθμῶν, τοὺς ὅποιους καλοῦμεν **ἀρνητικούς**. Πρὸς παράστασιν τῶν τιμῶν ποσῶν ἥ μεγεθῶν, τὰ ὅποια διακρίνομεν εἰς θετικά καὶ ἀρνητικά, μεταχειριζόμεθα τοὺς καλουμένους θετικούς καὶ ἀρνητικούς ἀριθμούς, καὶ δεχόμεθα ὅτι :

Εἰς ἔκαστον θετικὸν ἀριθμόν, παριστάνοντα τὴν τιμὴν ποσοῦ ἥ μεγέθους τινὸς θετικοῦ, ἀντιστοιχεῖ εἰς ἀρνητικὸς ἀριθμὸς παριστάνων τὴν τιμὴν ἀρνητικοῦ ποσοῦ ἥ μεγέθους ἀντιστοίχου τοῦ θετικοῦ. Καὶ ἀντιστρόφως : Εἰς ἔκαστον ἀρνητικὸν ἀριθμόν, παριστάνοντα ἀρνητικὸν ποσὸν ἥ μέγεθος, ἀντιστοιχεῖ εἰς θετικός, ἃν τὰ ποσὰ ἥ μεγέθη ἐπιδέχωνται ἀντίθεσιν.

Οἱ τοιοῦτοι ἀντίστοιχοι πρὸς ἀλλήλους ἀριθμοὶ λέγομεν ὅτι

\* 'Ο "Ελλην μαθηματικός Διόφαντος (τῆς 'Αλεξανδρείας) ἔχρησιμοποίησεν ἀρνητικούς ἀριθμούς.

έχουν τὴν ἴδιότητα ὅτι έχουν τὸ αὐτὸ μὲν πλῆθος μονάδων, ἀλλ’ ἔκαστος χαρακτηρίζεται ὡς ἀντίθετος τοῦ ἄλλου. Π.χ. ἔστω ὅτι εἰς τὸν ἀριθμὸν 6 δρχ. δίδομεν τὸ γνώρισμα ὅτι εἶναι κέρδος ἐνὸς ἀνθρώπου, ἔχομεν δὲ καὶ ἄλλον ἀριθμὸν 6 δρχ., ὁ ὅποιος παριστάνει ζημίαν τοῦ αὐτοῦ ἀνθρώπου. Οἱ δύο αὐτοὶ ἀριθμοὶ 6 δρχ. κέρδος καὶ 6 δρχ. ζημία τοῦ ἀνθρώπου αὐτοῦ θεωροῦνται ὡς ἀντίθετοι ἀριθμοί.

“Ομοιόν τι συμβαίνει καὶ εἰς ἄλλας περιπτώσεις. Π.χ. ἂν διανύσῃ τις ἐπ’ εύθείας ὁδοῦ, ἀπὸ ἐν ὥρισμένον σημεῖον αὔτης, ἔνα ἀριθμὸν μέτρων, π.χ. 200 μ., πρὸς τὴν θετικὴν φορὰν τῆς εύθείας (ἔστω πρὸς βορρᾶν) καὶ ἔπειτα τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν 200 μ. πρὸς τὴν ἀντίθετον φορὰν (ἔστω πρὸς νότον) ἀπὸ τὸ σημεῖον, εἰς τὸ ὅποιον ἔφθασε προηγουμένως καὶ ἐπὶ τῆς αὔτης εύθείας, τότε οἱ ἀριθμοὶ αὐτοὶ 200 μ. πρὸς θετικὴν φορὰν καὶ 200 μ. πρὸς ἀρνητικὴν φορὰν τῆς εύθείας λέγονται ἀντίθετοι ἀριθμοί.

Γενικώτερον δεχόμεθα ὅτι εἰς ἔκαστον ἐκ τῶν μέχρι τοῦδε γνωστῶν ἀριθμῶν τῆς Ἀριθμητικῆς (ἀκεραίων, κλασματικῶν, ἀσυμμέτρων) ἀντιστοιχεῖ εἰς ἄλλος ἀντίθετος αὐτοῦ, καὶ διὰ νὰ ἐκφράσωμεν συμβολικῶς τὴν ἀντίθεσιν δύο τοιούτων ἀριθμῶν γράφομεν πρὸ τοῦ ἐνὸς ἐκ τούτων, τοῦ μέχρι τοῦδε γνωστοῦ, τὸ σύμβολον + (σύν), πρὸ δὲ τοῦ ἄλλου, τὸ σύμβολον — (πλήν). Τὸ σύμβολον + τιθέμενον πρὸ τοῦ ἀριθμοῦ (ἀριστερά του) λέγεται θετικὸν πρόσημον (ἢ σῆμα), τὸ δὲ — ἀρνητικὸν πρόσημον (ἢ σῆμα). Οὕτως οἱ ἀντίθετοι ἀριθμοί, ἔκαστος τῶν ὅποιων ἔχει 6 μονάδας, γράφονται + 6 καὶ — 6, ἀπαγγέλλονται δὲ ὡς ἔξῆς: σύν ἔξ καὶ πλήν ἔξ. Συνήθως παραλείπεται τὸ + εἰς τὴν ἀρχὴν τοῦ ἀριθμοῦ. Ἐπομένως, ὅταν εἰς ἀριθμὸς τῆς Ἀριθμητικῆς δὲν ἔχῃ πρὸ αὐτοῦ σύμβολον, ὑποτίθεται ὅτι ἔχει τὸ +.

Κατὰ ταῦτα, οἱ ἀντίθετοι ἀριθμοὶ + 6 καὶ — 6 γράφονται καὶ οὕτως: 6 καὶ — 6. ‘Ομοίως, ἀντίθετοι εἶναι οἱ ἀριθμοί:

23 καὶ — 23, οἱ  $\frac{3}{5}$  καὶ  $-\frac{3}{5}$ , οἱ 6,15 καὶ — 6,15, οἱ — 5 καὶ 5, οἱ — 3,6 καὶ 3,6 κ.τ.λ.

“Αν εἰς ἀριθμὸς παριστάνεται π.χ. μὲ α, ὁ ἀντίθετός του παριστάνεται μὲ — α.

**§ 4.** Δύο ή περισσότεροι άριθμοί λέγονται **διμόσημοι**, αν έχουν τὸ αὐτὸ πρόσημον ( εἴτε τὸ + εἴναι εἴτε τὸ - ). Οὕτως διμόσημοι λέγονται οἱ άριθμοὶ + 3, + 12, ἐπίσης οἱ 5, 23,5, 15, 17, 3, καθώς καὶ οἱ - 7, -  $\frac{3}{4}$ , -  $2\frac{1}{2}$ , - 6.

Δύο άριθμοί λέγονται **έτερόσημοι**, ἐὰν ὁ μὲν εἰς ἔχῃ πρόσημον + η̄ οὐδὲν τοιοῦτον, ὁ δὲ ἀλλος τὸ -. Οὕτως οἱ άριθμοὶ + 8 καὶ - 3 λέγονται έτερόσημοι. Όμοιως έτερόσημοι λέγονται οἱ - 15 καὶ +  $\frac{5}{9}$ , οἱ 2,15 καὶ -  $6\frac{3}{4}$ , οἱ 7 καὶ - 12.

Οἱ μὲν άριθμοί, οἱ ὅποιοι ἔχουν τὸ αὐτὸ πρόσημον + (η̄ οὐδὲν τοιοῦτον), λέγονται **θετικοὶ άριθμοὶ**, οἱ δὲ ἔχοντες τὸ - λέγονται **ἀρνητικοὶ άριθμοὶ**, καὶ ὑποτίθεται ὅτι, αν οἱ θετικοὶ παριστάνουν ποσὰ η̄ μεγέθη θετικά, οἱ θρητικοὶ θὰ παριστάνουν θρητικὰ τοιαῦτα, αν τὰ παριστώμενα ποσὰ ἐπιδέχωνται ἀντίθεσιν. Οἱ θετικοὶ καὶ θρητικοὶ άριθμοὶ καὶ τὸ 0 ( μηδὲν ) λέγονται μὲν δινομα **σχετικοὶ** ( πρὸς διάκρισιν ἀπὸ τοὺς κατωτέρω καλουμένους ἀπολύτους άριθμούς ). "Ωστε :

Καλοῦμεν θετικὸν άριθμὸν οίονδήποτε άριθμὸν ( τῆς 'Αριθμητικῆς ) διάφορον τοῦ μηδενὸς 0, ἔχοντα τὸ πρόσημον + η̄ οὐδὲν τοιοῦτον. Καλοῦμεν θρητικὸν άριθμὸν οίονδήποτε άριθμὸν ( τῆς 'Αριθμητικῆς ), διάφορον τοῦ 0, τοῦ ὅποίου τὸ πρόσημον εἴναι τὸ - .

"Οταν λέγωμεν, ἔστω άριθμὸς α, ὁ τοιοῦτος άριθμὸς δύναται νὰ εἴναι θετικὸς η̄ θρητικὸς η̄ καὶ μηδέν.

**§ 5.** Καλοῦμεν **ἀπόλυτον άριθμὸν** η̄ **ἀπόλυτον τιμὴν** η̄ καὶ **μέτρον** ἐνὸς θετικοῦ μὲν άριθμοῦ η̄ τοῦ 0 αὐτὸν τὸν άριθμόν, ἐνὸς θρητικοῦ δὲ τὸν ἀντίθετόν του ( θετικόν ). Οὕτως οἱ **ἀπόλυτοι άριθμοὶ** τῶν άριθμῶν + 3, + 5, +  $\frac{1}{2}$ , + 0,45 εἴναι οἱ 3, 5,  $\frac{1}{2}$ , 0,45, τῶν δὲ - 1, -  $4\frac{3}{4}$ , - 8,5 εἴναι οἱ 1,  $4\frac{3}{4}$ , 8,5· τοῦ 0 **ἀπόλυτος** εἴναι τὸ 0. Τῶν σχετικῶν άριθμῶν - 6, + 2, - 3,5, -  $3\frac{1}{2}$  **ἀντίστοιχοι** **ἀπόλυτοι** εἴναι οἱ 6, 2, 3,5,  $3\frac{1}{2}$ .

Τὴν **ἀπόλυτον τιμὴν** η̄ τὸ μέτρον ἐνὸς άριθμοῦ π.χ., τοῦ - 5, σημειώνομεν συμβολικῶς οὕτως : | - 5 |, η̄τοι τὸ σύμβολον παρα-

στάσεως τῆς ἀπολύτου τιμῆς εἶναι δύο μικραὶ εὐθεῖαι | |, μεταξὺ τῶν δύο οὐδείων γράφεται ὁ ἀριθμός. Γράφομεν λοιπὸν  $|-5| = 5$ . Όμοιώς ἔχομεν  $|+6| = 6$ ,  $|-7 \frac{1}{2}| = 7 \frac{1}{2}$  κ.τ.λ.

Ἐν γένει τὴν ἀπόλυτον τιμὴν ἀριθμοῦ α παριστάνομεν οὔτως:  $|\alpha|$ . Καὶ ἂν μὲν ὁ α εἶναι θετικὸς ἢ 0, τότε  $|\alpha| = \alpha$ , ἐὰν δὲ εἶναι α ἀρνητικὸς τότε  $|\alpha| = -\alpha$ .

Δύο σχετικοὶ ἀριθμοὶ λέγονται ἀπολύτως ἵσοι ἢ ἀπολύτως ισοδύναμοι, ἂν αἱ ἀπόλυτοι τιμαὶ αὐτῶν εἶναι ἵσαι ἢ ισοδύναμοι, καθὼς π.χ. οἱ 5 καὶ -5, καὶ συμβολίζομεν τοῦτο οὕτως:  $|5| = |-5|$ . Ἐπίστης οἱ  $3 \frac{1}{4}$  καὶ  $-\frac{13}{4}$  εἶναι ἀπολύτως ισοδύναμοι, διότι  $|3 \frac{1}{4}| = |-\frac{13}{4}|$ . "Ωστε :

**Οἱ ἀντίθετοι ἀριθμοὶ εἶναι ἀπολύτως ἵσοι.**

Τὸ σύμβολον τῆς μὴ ισότητος (καὶ τῆς μὴ ισοδυναμίας) δύο ἀριθμῶν εἶναι τὸ  $\neq$  καὶ ἀπαγγέλλεται : **διάφορον**. Ἡτοι, ἂν ὁ σχετικὸς ἀριθμὸς α δὲν εἶναι ἵσος (οὔτε ισοδύναμος) πρὸς ἄλλον β, συμβολίζομεν αὐτὸν οὕτως:  $\alpha \neq \beta$  καὶ ἀπαγγέλλομεν, α διάφορον τοῦ β.

Γενικῶς, ἂν δύο σχετικοὶ ἀριθμοί, π.χ. α καὶ β, εἶναι ἀπολύτως ἵσοι, γράφομεν  $|\alpha| = |\beta|$ .

**§ 6. "Ισοι ἢ ισοδύναμοι** λέγονται δύο ἀριθμοί, ἂν εἶναι ὁμόσημοι καὶ ἔχουν ἵσας ἢ ισοδυνάμους ἀπολύτους τιμάς, καθὼς π.χ. οἱ 3 καὶ  $\frac{6}{2}$ , οἱ -4 καὶ  $-\frac{12}{3}$ , διότι ἔχουν τὸ αὐτὸν πρόσημον, αἱ δ' ἀπόλυτοι τιμαὶ αὐτῶν εἶναι ἵσαι, π.χ. τῶν 3 καὶ  $\frac{6}{2}$ , καθὼς καὶ τῶν -4 καὶ  $-\frac{12}{3}$ , σημειώνομεν δὲ τοῦτο μὲ τὸ σύμβολον = (ἵσον) τιθέμενον μεταξὺ αὐτῶν, ἦτοι γράφομεν  $3 = \frac{6}{2}$ , ἐπίστης  $-4 = -\frac{12}{3}$ . Σημειωτέον διὰ νὰ τρέψωμεν ἑτερωνύμους κλασματικοὺς ἀριθμούς εἰς ἀντιστοίχους ισοδυνάμους αὐτῶν ὁμωνύμους, ἀρκεῖ νὰ τρέψωμεν εἰς ὁμωνύμους τὰς ἀπολύτους των τιμάς καὶ νὰ διατηρήσωμεν τὰ πρόσημα αὐτῶν. Οὕτω π.χ., ἀντὶ τῶν  $\frac{1}{2}, -\frac{3}{4}, -\frac{1}{8}$ , δυνάμεθα νὰ ἔχωμεν τοὺς ισοδυνάμους τῶν  $\frac{4}{8}, -\frac{6}{8}, -\frac{1}{8}$ .

Α σκήσεις

7. Εύρετε ποσά έπιδεχόμενα άντιθεσιν, και ἀριθμούς άντιθέτους παριστάνοντας (ταῦτα ἐνεργητικὸν και παθητικὸν ἐπιχειρήσεως, κέρδος και ζημία, περιουσία και χρέος, μέλλων χρόνος και παρελθόν χρόνος κ.τ.λ.).

8. Ποῖοι εἶναι οἱ ἀντίθετοι τῶν ἀριθμῶν 5, 12, -3, -8,  $\frac{3}{4}$ ,  $\frac{5}{9}$ ,  $\frac{2}{7}$ ,  $-\frac{4}{9}$ , 6,15, 7,45, 0,12, -34,85.

9. Γράψατε τρεῖς διαφόρους δόμοσήμους ἀριθμούς και τρεῖς μὴ δόμοσήμους. Γράψατε δύο ἀντίθέτους ἀριθμούς και τὰς ἀπολύτους τιμάς των.

10. Ποῖαι αἱ ἀπόλυτοι τιμαὶ τῶν 3, -13, -15, 28, -3,5,  $13\frac{5}{8}$ ,  $-\frac{7}{9}$ , 17,2, -42,18,  $-\frac{6}{9}$ ,  $2\frac{1}{5}$ . Συμβολίσατε αὐτάς.

11. Σημειώσατε τὰς ἀπολύτους τιμάς τῶν σχετικῶν ἀριθμῶν  $\alpha$ ,  $-\alpha$ ,  $-\beta$ ,  $+\beta$ .

12. Εύρετε δύο ισους ἢ ισοδυνάμους πρὸς τὸν  $-\frac{1}{2}$ , τὸν  $\frac{1}{5}$ , τὸν 2, τὸν 6 και τὸν -3.

13. Δίδονται οἱ ἀριθμοὶ 6, -2,5, -6,15,  $-3\frac{1}{4}$ . Εύρετε δι' ἑκαστον αὐτῶν ἔνα ισοδύναμόν του.

14. Ἐπὶ τίνος εὐθείας λαμβάνομεν ἀπό τίνος σημείου αὐτῆς Ο τὰ θετικὰ τμήματά της ΟΑ, ΟΒ, ΟΓ.., και παριστάνομεν αὐτὰ μὲ τοὺς θετικοὺς ἀριθμοὺς 1, 2, 3, 4,...,ἀν τὰ ΑΒ, ΒΓ εἶναι ισα μὲ τὸ ΟΑ. Πῶς θὰ παρασταθοῦν τὰ ΟΑ', ΟΒ', ΟΓ',... ισα ἀπολύτως μὲν πρὸς τὰ προηγούμενα, ἀλλ' ἔχοντα φορὰν ἐπὶ τῆς εὐθείας ἀντίθετον τῆς ΟΑ ;

15. Εύρετε τὰ μεγέθη ἐπὶ τῆς αὐτῆς ὡς ἄνω εὐθείας, τὰ ὅποια θὰ παριστάνουν οἱ ἀριθμοὶ  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{2}{5}$ ,  $\frac{3}{5}$ , 0,45, καθὼς και οἱ ἀντίθετοι τούτων.

#### 1. ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

**§ 7.** "Εστω εὐθεία τις  $x'$ . Ἐπ' αὐτῆς λαμβάνομεν ἐν σημεῖον, ἔστω τὸ Ο, τὸ ὅποιον ὁρίζομεν ἐκ τῶν προτέρων νὰ παριστά-

E'	D'	G'	B'	A'	θ'	,	1	2	3	4	5	6		x
x'	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	θ	A	B	G	D	E	x

$\Sigma x. 2$

νη τὸ μηδὲν (0). Ὁρίζομεν ὡς θετικὴν μὲν φορὰν ἐπ' αὐτῆς π.χ. τὴν ἐκ τοῦ Ο πρὸς τὸ x, ὡς ἀρνητικὴν δὲ τὴν ἐκ τοῦ Ο πρὸς τὸ  $x'$ .

"Αν λάβωμεν τὸ εὐθύγραμμον τμῆμα ΟΘ ώς μονάδα μετρήσεως καὶ τὸ μῆκος αὐτοῦ ἵσον πρὸς 1 μ. π.χ., τότε τὸ μὲν τμῆμα ΟΘ θὰ λέγωμεν ὅτι παριστάνεται ὑπὸ τοῦ ἀριθμοῦ + 1, ὁ δὲ ἀριθμὸς οὗτος θὰ λέγωμεν ὅτι παριστάνεται ὑπὸ τοῦ τμήματος ΟΘ (σχ. 2).

"Ἄσ τὸ ποιηθέσωμεν ὅτι ὁδοιπόρος διατρέχει δύο μέτρα ἐπὶ τῆς Οχ ἀπὸ τὸ Ο. Θὰ παριστάνωμεν τὸν δρόμον αὐτὸν μὲ τὸ τμῆμα ΟΑ, τὸ ὅποιον ἔχει μῆκος δύο μονάδων τῆς εὐθείας x'x. Ἀνάλογα παρατηροῦμεν, ἀν καὶ ἄλλος ὁδοιπόρος διατρέξῃ δύο μέτρα ἀπὸ τοῦ Ο ἐπὶ τῆς Οχ'. 'Ο δρόμος αὐτὸς θὰ παριστάνεται ὑπὸ τοῦ τμήματος ΟΑ'. Οὕτω προχωροῦντες δυνάμεθα νὰ παριστάνωμεν τοὺς σχετικοὺς ἀριθμοὺς μὲ τμήματα τῆς εὐθείας x'x, τὴν ὅποιαν καλοῦμεν εὐθεῖαν τῶν ἀριθμῶν ἡ ἄξονα ἡ καὶ εὐθεῖαν τῶν τετμημένων, τοῦ μήκους αὐτῶν μετρουμένου ἀπὸ ὥρισμένου σημείου ταύτης, π.χ. ἀπὸ τοῦ Ο, τὸ ὅποιον καλεῖται ἀρχὴ ἡ ἀφετηρία ἐπὶ τοῦ ἄξονος. Τὸ μῆκος τμήματος παριστάνοντος ὥρισμένου ἀριθμὸν εἶναι ἵσον μὲ τόσας μονάδας μήκους, ὅσας ἔχει ὁ διοθεὶς ἀριθμός. Κατὰ ταῦτα, ἀν θέλωμεν νὰ παραστήσωμεν ἐν χρονικὸν διάστημα, π.χ. μετὰ δύο ἔτη (+ 2 ἔτη), λαμβάνομεν ἐκ τοῦ σημείου Ο ἐπὶ τῆς ἐν λόγῳ εὐθείας ἐν τῷ τμήμα ΟΑ ἔχον μῆκος δύο μονάδων καὶ τὸ τμῆμα αὐτὸ ΟΑ λέγομεν ὅτι παριστάνει τὸ διάστημα + 2 ἔτῶν. 'Ομοίως χρονικὸν διάστημα πρὸ 3 ἔτῶν (- 3 ἔτη) παριστάνεται ὑπὸ τοῦ τμήματος ΟΒ' τῆς εὐθείας, ἔχοντος (ἀπόλυτον) μῆκος 3 μονάδων.

"Ἐάν δύο ὁδοιπόροι ἀναχωροῦν ἀπὸ τὸ αὐτὸ σημεῖον εὐθείας, ἔστω τὸ Ο, καὶ διευθύνωνται ἐπ' αὐτῆς ἀντιθέτως, ὁ μὲν εἰς μὲ ταχύτητα π.χ. 5 χλμ. πρὸς τὴν θετικὴν φοράν, ὁ δὲ πρὸς τὴν ἀρνητικὴν φορὰν μὲ ταχύτητα 4 χλμ., ἡ μὲν ταχύτης τοῦ πρώτου θὰ παριστάνεται ὑπὸ τοῦ τμήματος π.χ. ΟΔ, ἵσον μὲ 5 μονάδας μήκους καὶ κειμένου ἐπὶ τοῦ θετικοῦ μέρους τῆς εὐθείας τῶν τετμημένων, ἡ δὲ ταχύτης τοῦ δευτέρου ὑπὸ τοῦ τμήματος ΟΓ', ἀντιθέτου φορᾶς τοῦ πρώτου καὶ ἔχοντος μῆκος (ἀπολύτως λαμβανόμενον) ἵσον πρὸς 4 μονάδας μήκους.

"Ἀνάλογα παρατηροῦμεν διὰ τὴν παράστασιν ἀριθμῶν τῆς θερμοκρασίας ἀνω ἡ κάτω τοῦ μηδενὸς εἰς τὸ θερμόμετρον κ.τ.λ.

Δυνάμεθα νὰ παραστήσωμεν τοὺς σχετικοὺς ἀριθμοὺς καὶ

μὲ σημεῖα τῆς εὐθείας τῶν ἀριθμῶν. Πράγματι, ἂν όρισωμεν τὸ σημεῖον π.χ. Θ, ἄκρον τοῦ τμήματος αὐτῆς ΟΘ ἔχοντος μῆκος + 1, ὅτι παριστάνει τὴν + 1, εύρισκομεν ὅτι τὰ σημεῖα Α, Β, Γ,... παριστάνουν τοὺς ἀριθμοὺς + 2, + 3, + 4,... ἐὰν τὰ Α, Β, Γ,... εἰναι τὰ ἄκρα τῶν τμημάτων ΟΑ, ΟΒ, ΟΓ,..., τῶν ὅποιων τὰ μήκη εἰναι ἀντιστοίχως ἵσα μὲ + 2, + 3, + 4,...

Ἐάν ἐκ τοῦ Ο καὶ πρὸς τὴν ἀντίθετον φορὰν τῆς προηγουμένης, τὴν ἐκ τοῦ Ο πρὸς x', λάβωμεν ὁμοίως τὸ τμῆμα ΟΘ' μὲ μῆκος (ἀπολύτως λαμβανόμενον) μιᾶς μονάδος, τὸ Θ' θὰ παριστάνῃ τὸ - 1. Κατ' ἀνάλογον τρόπον εύρισκομεν τὰ σημεῖα Α', Β', Γ',... τὰ ὅποια παριστάνουν τοὺς ἀριθμοὺς - 2, - 3, - 4,... (σχ. 2).

Ομοίως εύρισκομεν τὸ σημεῖον, τὸ ὅποιον παριστάνει ἔνα κλασματικὸν ἀριθμόν, π.χ. τὸν  $\frac{1}{2}$ . Πρὸς τοῦτο λαμβάνομεν ἐπὶ τῆς εὐθείας τῶν ἀριθμῶν τμῆμα αὐτῆς μὲ μῆκος ἵσον πρὸς τὸν διθέντα ἀριθμόν, π.χ. ἵσον μὲ  $\frac{1}{2}$  τῆς μονάδος μήκους, καὶ πρὸς τὴν φορὰν Οχ μὲν ἀπὸ τὸ Ο, ἐὰν ὁ διθεὶς ἀριθμὸς εἰναι θετικός, πρὸς τὴν Οχ' δὲ ἂν εἰναι ἀρνητικός. Τὸ μέρος Οχ τῆς εὐθείας x'x λέγεται **θετικὸν μέρος** τῆς εὐθείας τῶν τετμημένων καὶ ἐπ' αὐτοῦ κείνται πάντα τὰ σημεῖα, τὰ ὅποια παριστάνουν τοὺς θετικοὺς ἀριθμοὺς καὶ τὸ μηδέν. Τὸ Οχ' τῆς εὐθείας x'x λέγεται **ἀρνητικὸν μέρος** (ἢ ήμιευθεία Οχ') καὶ ἐπ' αὐτοῦ κείνται πάντα τὰ σημεῖα, τὰ ὅποια παριστάνουν τοὺς ἀρνητικοὺς ἀριθμοὺς καὶ τὸ μηδέν. Ἡ φορὰ ἐκ τοῦ Ο πρὸς τὸ x λέγεται θετική, ἢ δὲ ἐκ τοῦ Ο πρὸς τὸ x' ἀρνητική, ἐκάστη δὲ σημειοῦται μὲ ἐν βέλος, παρακείμενον εἰς τὴν ἀντιστοίχον ήμιευθείαν καθὼς εἰς τὸ σχ. 1.

## 2. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚ ΤΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ

**§ 8.** Δεχόμεθα ὅτι : Πᾶς ἀπόλυτος ἢ θετικὸς ἀριθμὸς τῆς 'Αριθμητικῆς δύναται νὰ γίνῃ ἐκ τῆς μονάδος ἢ ἐξ ἑνὸς τῶν μερῶν αὐτῆς, διὰ τῆς ἐπαναλήψεως αὐτῆς ὡς προσθετέουν.

$$\text{Π.χ } \circ 3 = 1 + 1 + 1. \text{ 'Ο } 2 - \frac{3}{5} = 1 + 1 + \frac{1}{5} + \frac{1}{5} + \frac{1}{5}.$$


Καθ' ὅμοιον τρόπον δεχόμεθα ὅτι :

Πᾶς ἀρνητικὸς ἀριθμὸς δύναται νὰ γίνῃ ἐκ τῆς ἀρνητικῆς μονάδος ή ἐξ ἑνὸς τῶν μερῶν αὐτῆς διὰ τῆς ἐπαναλήψεως αὐτῆς ως προσθετέου.

Οὕτω δεχόμεθα π.χ. ὅτι  $\dot{\delta} - 3$  γίνεται ἐκ τῆς  $-1$ , ἐὰν τὴν ἐπαναλάβωμεν τρεῖς φοράς. 'Ο  $-\frac{3}{5}$  π.χ. γίνεται ἐκ τοῦ  $\frac{1}{5}$  τῆς  $-1$ , ἐὰν ἐπαναλάβωμεν αὐτὸν τρεῖς φοράς.

Ἐστω ἀρνητικός τις ἀριθμός, π.χ.  $\dot{\delta} - 4$ , ὅστις παριστάνει ἀρνητικόν τι μέγεθος, π.χ. τὸ  $O\Gamma'$  ἐπὶ τῆς εὐθείας  $x'x$ , μετρηθὲν ὑπὸ τῆς μονάδος μετρήσεως, ἐστω τῆς  $O\Theta$ . Τὸ ἔξαγόμενον τῆς μετρήσεως ταύτης τοῦ  $O\Gamma'$  ὑπὸ τῆς  $O\Theta$  παριστάνομεν μὲν  $\frac{O\Gamma'}{O\Theta} = -4$  (σχ. 3).

Ἄλλὰ τὸ  $O\Gamma'$  γίνεται ἐκ τοῦ  $O\Theta'$  (δηλαδὴ ἐκ τοῦ  $O\Theta$  ἀφοῦ ἀντικατασταθῆ νπὸ τοῦ  $O\Theta'$ ) καθὼς καὶ  $\dot{\delta}$  ἀριθμὸς  $-4$  ἐκ τῆς ἀρνη-



Σχ. 3

τικῆς μονάδος  $-1$ , διὰ τῆς ἐπαναλήψεως αὐτῆς τέσσαρας φοράς.

Ἐκ τούτου ὁδηγούμενοι δεχόμεθα ὅτι :

Πᾶς ἀρνητικὸς ἀριθμὸς δύναται νὰ γίνῃ ἀπὸ τὴν θετικὴν μονάδα, ἐὰν ἀλλάξωμεν τὸ πρόσημον αὐτῆς καὶ ταύτην ἢ μέρος ταύτης ἐπαναλάβωμεν ως προσθετέον.

Οὕτω δεχόμεθα ὅτι  $\dot{\delta} - 7$  γίνεται ἐκ τῆς  $+1$ , ἐὰν πρῶτον λάβωμεν τὴν ἀντίθετον αὐτῆς  $-1$  καὶ αὐτὴν ἐπαναλάβωμεν ἐπτὰ φοράς ως προσθετέον. 'Ο  $-\frac{3}{8}$  γίνεται ἀπὸ τὴν  $+1$ , ἐὰν πρῶτον λάβωμεν τὴν ἀντίθετον αὐτῆς  $-1$  καὶ τὸ ὅγδοον ταύτης ἐπαναλάβωμεν τρὶς ως προσθετέον.

### \* Α σ κ ἡ σ ε ις

16. Πῶς σχηματίζεται ἕκαστος τῶν ἀριθμῶν  $-5, -6, -10, -20, -50$  ἐκ τῆς ἀρνητικῆς μονάδος καὶ πῶς ἐκ τῆς θετικῆς;

17. Πῶς σχηματίζεται ἕκαστος τῶν ἀριθμῶν  $-\frac{3}{4}, -\frac{5}{8}, -\frac{4}{9}$  ἐκ τῆς ἀρνητικῆς, καὶ πῶς ἐκ τῆς θετικῆς μονάδος;

18. Πῶς σχηματίζεται ἐκ τῆς θετικῆς μονάδος ἕκαστος τῶν ἀριθμῶν 0,4, 0,45, 0,385, 1,25 καὶ πῶς ἕκαστος τῶν ἀντιστοίχων ἀντιθέτων αὔτῶν;

### Γ'. ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΤΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

#### 1. ΠΡΟΣΘΕΣΙΣ

**§ 9.** "Εστω ὅτι εἶ; ἐμπόρος ἔκέρδισεν ἀπὸ τὴν ἐπιχείρησίν του ἐντὸς μιᾶς ἡμέρας 15 000 δρχ. καὶ ἄλλην ἡμέραν ἔκέρδισε 40 000 δρχ.

Προφανῶς ἔκέρδισεν ἐν ὅλῳ 55 000 δρχ. "Αν παραστήσωμεν τοὺς διθέντας ἀριθμούς ἀλγεβρικῶς, ἦτοι μὲ + 15 000 δρχ. καὶ + 40 000 δρχ., θὰ καλοῦμεν ἀθροισμα αὐτῶν τὸ ( 15 000 + 40 000 ) δρχ. = 55 000 δρχ. "Αν ἔχωμεν δύο ἄλλους ὁμοσήμους ἀριθμούς π.χ. - 35 καὶ - 15, θὰ καλοῦμεν ἀθροισμα τούτων τὸν ἀριθμὸν - ( 35 + 15 ), ἦτοι τὸν - 50.

'Εκ τούτων ὁδηγούμενοι δίδομεν τὸν ἔξῆς ὀρισμόν :

**Καλοῦμεν ἀθροισμα δύο ὁμοσήμων σχετικῶν ἀριθμῶν, τὸ ἀθροισμα τῶν ἀπολύτων τιμῶν των μὲ πρόσημον τὸ πρόσημον τῶν ἀριθμῶν.**

"Εστω ὅτι ἐμπόρος μίαν ἡμέραν ἔζημιώθη ἀπὸ μίαν πώλησιν 50 000 δρχ. καὶ ἐντὸς τῆς αὐτῆς ἡμέρας ἔκέρδισεν ἀπὸ μίαν ἄλλην πώλησιν 15 000 δρχ. Ἀπὸ τὰς δύο αὐτὰς πωλήσεις ὁ ἐμπόρος ἔζημιώθη ( 50 000 - 15 000 ) δρχ. "Ητοι ἔζημιώθη 35 000 δρχ. "Αν παραστήσωμεν τοὺς διθέντας ἀριθμούς ἀλγεβρικῶς, ἦτοι μὲ - 50 000 δρχ. τὴν ζημίαν καὶ μὲ + 15 000 δρχ. τὸ κέρδος, θὰ καλοῦμεν ἀθροισμά των τὸν ἀριθμὸν - ( 50 000 - 15 000 ) δρχ. = - 35.000 δρχ. Όμοίως θὰ λέγωμεν ὅτι τὸ ἀθροισμα π.χ. + 40 καὶ -30 εἶναι δ + ( 40 - 30 ) = + 10. "Ητοι :

**Καλοῦμεν ἀθροισμα δύο ἔτεροσήμων σχετικῶν ἀριθμῶν τὴν διαφορὰν ( τῆς μικροτέρας ἀπὸ τὴν μεγαλυτέραν ) τῶν ἀπολύτων τιμῶν μὲ πρόσημον τὸ τοῦ ἀριθμοῦ τοῦ ἔχοντος τὴν μεγαλυτέραν ἀπόλυτον τιμήν.**

"Αν δύο ἀριθμοὶ εἶναι ἀντίθετοι, τὸ ἀθροισμά των εἶναι τὸ μηδέν.

Π.χ. τὸ ἀθροισμα τῶν - 40 καὶ + 40 εἶναι τὸ 0.

"Εστω ὅτι ἔχομεν τοὺς ἀριθμούς π.χ. + 24 καὶ 0. "Επειδὴ ἡ ἀπόλυτος τιμὴ τοῦ 0 εἶναι 0, ἔπειται ὅτι τὸ ἀθροισμα + 24 + 0 = +24,

τὸ -6+0=-6, τὸ ἄθροισμα τῶν 0 καὶ -25 ισοῦται μὲ -25 κ.τ.λ.  
”**Ητοι :**

Τὸ ἄθροισμα δύο ἀριθμῶν, ἐκ τῶν ὁποίων ὁ εἰς εἶναι μηδέν,  
ισοῦται μὲ τὸν ἄλλον ἐκ τῶν δύο ἀριθμῶν.

‘Η πρᾶξις, μὲ τὴν ὁποίαν εὐρίσκομεν τὸ ἄθροισμα δύο ἥ καὶ  
περισσοτέρων σχετικῶν ἀριθμῶν, λέγεται πρόσθεσις, συμβολί-  
ζεται δὲ ὅπως καὶ εἰς τὴν Ἀριθμητικὴν μὲ τὸ + (σὺν ἥ καὶ) τιθέ-  
μενον μεταξὺ τῶν ἀριθμῶν, οἱ ὁποίοι λέγονται προσθετέοι.

Διὰ νὰ ἀποφεύγεται ἥ σύγχυσις μεταξὺ τοῦ συμβόλου +  
τῆς προσθέσεως καὶ τοῦ προσήμου + ἥ — τῶν προσθετέων ἀρι-  
θμῶν, συνήθως τίθεται ὁ ἀριθμὸς μὲ τὸ πρόσημόν του ἐν παρενθέ-  
σει, οὕτω δὲ ἐμφανίζεται ἔκαστος ἀριθμὸς μὲ τὸ πρόσημόν του ὡς  
ἐν ὅλον. Κατὰ τὰ ἀνωτέρω ἔχομεν :

$$\begin{aligned} (+5) + (+3) &= (+8) = +8 = 8, \quad (-6) + (+10) = (+4) = +4 = 4, \\ &\quad (-8) + 0 = (-8) = -8, \\ (+8) + (-9) &= (-1) = -1, \quad (+7) + 0 = (+7) = +7 = 7, \\ &\quad 0 + (-9) = (-9) = -9. \end{aligned}$$

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω ἔπειται ὅτι, ἀν  $\alpha$  καὶ  $\beta$  παριστάνουν δύο  
σχετικούς ἀριθμούς, θὰ ἔχωμεν  $\alpha + \beta = \beta + \alpha$ .

Διότι εἰς τοὺς ἀνωτέρω δρισμούς οὐδεὶς πιοτρισμὸς τίθεται  
ποιος ἐκ τῶν δύο προσθετέων θὰ τεθῇ πρῶτος, τὸ δὲ ἄθροισμα  
ἥ ἡ διαφορὰ τῶν ἀπολύτων τιμῶν των δὲν ἔξαρταται ἀπό τὴν  
σειρὰν ἥ ἀπό τὴν θέσιν τῶν ἀριθμῶν.

Κατὰ ταῦτα, τὸ νὰ προστεθῇ ἀριθμὸς π.χ.  $\beta$  εἰς τὸν  $\alpha$ , δηλα-  
δὴ νὰ εύρεθῃ τὸ  $\alpha + \beta$ , εἶναι τὸ αὐτὸ μὲ τὸ νὰ προστεθῇ ὁ  $\alpha$  εἰς τὸν  
 $\beta$ , ἥτοι μὲ τὸ νὰ εύρεθῃ τὸ ἄθροισμα  $\beta + \alpha$ .

**§ 10.** Διοθέντων περισσοτέρων τῶν δύο σχετικῶν ἀριθμῶν,  
π.χ. τῶν  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ ,  $\delta$  κ.τ.λ. καλοῦμεν ἄθροισμα τούτων καὶ παρι-  
στάνομεν μὲ  $\alpha + \beta + \gamma + \delta$  τὸν ἀριθμόν, τὸν ὁποῖον εύρισκομεν,  
ἀν εύρωμεν τὸ ἄθροισμα τῶν  $\alpha$  καὶ  $\beta$ , εἰς τὸ ἔξαγόμενον προσθέ-  
σωμεν τὸν  $\gamma$ , εἰς τὸ νέον ἔξαγόμενον προσθέσωμεν τὸν  $\delta$  κ.τ.λ.

Σημειώνομεν μὲ ( $\alpha + \beta$ ) τὸ εύρισκόμενον ἄθροισμα τῶν  $\alpha$  καὶ  
 $\beta$ , ἥτοι θέτομεν  $\alpha + \beta = (\alpha + \beta)$ .

Οὕτως ἔχομεν  $\alpha + \beta + \gamma = (\alpha + \beta) + \gamma$ .

Παριστάνομεν μὲ ( $\alpha + \beta + \gamma$ ) τὸ εύρισκόμενον ἄθροισμα τῶν

$\alpha, \beta, \gamma$ . ήτοι θέτομεν  $\alpha+\beta+\gamma=(\alpha+\beta+\gamma)$  και  $(\alpha+\beta+\gamma)=\alpha+\beta+\gamma$  και έχομεν

$$\alpha+\beta+\gamma+\delta=(\alpha+\beta)+\gamma+\delta=[(\alpha+\beta)+\gamma]+\delta=(\alpha+\beta+\gamma)+\delta.$$

Ούτω λοιπόν έχομεν  $\alpha+\beta+\gamma=(\alpha+\beta)+\gamma=(\alpha+\beta+\gamma)$ ,  
 $\alpha+\beta+\gamma+\delta=(\alpha+\beta)+\gamma+\delta=[(\alpha+\beta)+\gamma]+\delta=(\alpha+\beta+\gamma)+\delta$ .

$$\alpha+\beta+\gamma+\delta=(\alpha+\beta+\gamma)+\delta=(\alpha+\beta+\gamma+\delta).$$

$$\alpha+\beta+\gamma+\delta+\epsilon=(\alpha+\beta+\gamma+\delta)+\epsilon.$$

Κατά τὰ ἀνωτέρω έχομεν καὶ  $(\alpha+\beta)+\gamma=\alpha+\beta+\gamma$  κ.τ.λ.

$$\text{Π.χ. } (-3)+(+5)=+2=2,$$

$$(-3)+(+5)+(+7)=(+2)+(+7)=+9=9,$$

$$\text{ἄρα καὶ } (-3)+(+5)+(+7)+(+1)=(+9)+(+1)=10.$$

*Παρατίθησις.* Όταν οἱ διὰ τὴν πρόσθεσιν ὄριζόμενοι ἀριθμοὶ δὲν δίδωνται μὲν γράμματα, διὰ νὰ σημειώσωμεν τὸ ἀθροίσμα των, δεχόμεθα πρὸς εὐκολίαν νὰ γράφωμεν αὐτοὺς κατὰ σειρὰν τὸν ἓνα μετὰ τὸν ἄλλον καὶ ἔκαστον μὲ τὸ πρόσημόν του, παραλείποντες τὸ σύμβολον τῆς προσθέσεως. Οὖτω π.χ., ἀντὶ νὰ έχωμεν τὸ  $(+4)+(+7)+(-6)+(-7)+(+1)$ , γράφομεν τὸ  $+4+7-6-7+1$  καὶ εύρισκομεν

$$+4+7-6-7+1=11-6-7+1=+5-7+1=-2+1=-1.$$

Όμοιώς, ἀντὶ π.χ. τοῦ  $(-4)+\left(+\frac{2}{3}\right)+\left(-\frac{4}{9}\right)+(-2)$ , γράφομεν  $-4+\frac{2}{3}-\frac{4}{9}-2$  καὶ εύρισκομεν  $-4+\frac{2}{3}-\frac{4}{9}-2=-3\frac{1}{3}-\frac{4}{9}-2=-\frac{10}{3}-\frac{4}{9}-2=-\frac{30}{9}-\frac{4}{9}-2=-\frac{34}{9}-\frac{18}{9}=-\frac{52}{9}=-5\frac{7}{9}$ .

### Ασκήσεις καὶ προβλήματα

Ο μάς πρώτη. Νὰ εύρεθοῦν τὰ ἀθροίσματα :

- α')  $5+(+3) \quad \beta') (+7)+(+1,4) \quad \gamma') (+4)+(+6)+(+8)$
- δ')  $\frac{4}{9}+\left(+\frac{2}{3}\right) \varepsilon') \left(+7\frac{1}{3}\right)+\left(+3\frac{1}{5}\right) \sigma') (+3)+\left(+4\frac{1}{2}\right)+\left(+8\frac{1}{4}\right)$
- ζ')  $(-4)+(-6) \quad \eta') (-10)+\left(-8\frac{1}{2}\right) \quad \theta') (-4)+\left(-3\frac{1}{2}\right)+\left(-7\frac{1}{3}\right)$
- ι')  $\left(-\frac{2}{3}\right)+\left(-\frac{5}{8}\right) \quad \alpha') (-4,5)+(-5,3) \quad \beta') (-4)+(-5)+(+8)+\left(-3\frac{1}{2}\right)$

Όμάς δευτέρα. 20. Νὰ εύρεθοῦν νὰ ἔξαγόμενα :

$$\begin{array}{lll} \alpha') -5+3 & \beta') +5-8-7+3 & \gamma') -3-\frac{1}{2}+5\frac{1}{4}-2\frac{1}{5} \\ 8') -3-5+6-7-8 & \epsilon') -3+5\frac{1}{2}-3+4-7 \text{ στ'}) +4-8-6+7\frac{1}{2}-8\frac{1}{2}-9 \\ \zeta') -3,5+7,4-8,5+6\frac{1}{2}-\frac{3}{4} & \eta') -\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\frac{1}{5}-0,25+3,7. \end{array}$$

Όμάς τρίτη. 21. Κερδίζει τις 234 000 δρχ., ἐπειτα χάνει 216 400 δρχ. Κερδίζει πάλιν 215 700 δρχ. καὶ χάνει ἑκ νέου 112 000 δρχ. Γράψατε τοὺς δοθέντας ἀριθμούς ἀλγεβρικῶς καὶ εὔρετε ἀν ἑκέρδισεν ἢ ἔχασε τελικῶς καὶ πόσον.

22. "Εμπορος αὐξάνει τὸ ἐνεργητικόν του κατὰ 128 000 δρχ., τὸ δὲ παθητικὸν κατὰ 312 400 δρχ. Γράψατε τοὺς δοθέντας ἀριθμούς ἀλγεβρικῶς καὶ εὔρετε ποίαν μεταβολὴν παθαίνει τὸ κεφάλαιόν του.

23. Σῶμα θερμανθὲν ἀπὸ Ο° ἔλαβε θερμοκρασίαν 17,6°. Ἐπειτα ἐψύχθη κατὰ 19,1° καὶ τέλος ἐθερμάνθη κατὰ 3,1°. Γράψατε τοὺς δοθέντας ἀριθμούς ἀλγεβρικῶς καὶ εὔρετε ἀν ηύξήθη ἢ ἡλαττώθη τελικῶς ἢ ἀρχική του θερμοκρασία καὶ πόσον.

24. "Εμπορος ἔχει εἰς τὸ ταμεῖον του 250 000 δρχ. Όφειλει μὲν εἰς διαφόρους 174 500 δρχ., 136 000 δρχ., καὶ 19 450 δρχ., τοῦ ὀφείλου δὲ 34 000 δρχ., 14 500 δρχ. καὶ 29 000 δρχ. Γράψατε τοὺς δοθέντας ἀριθμούς ἀλγεβρικῶς καὶ εὔρετε τὸ ἀθροισμά των. Τί ποσὸν θὰ τοῦ μείνῃ, ἀν εἰσπράξῃ καὶ πληρώσῃ τὰ ὀφειλόμενα;

25. "Εμπορος εἶχεν 180 000 δρχ. καὶ ἐπλήρωσεν 120 000 δρχ., εἰσέπραξεν 74 000 δρχ., ἐπλήρωσε 14 800 δρχ. καὶ εἰσέπραξε 39 400 δρχ. Γράψατε τοὺς δοθέντας ἀριθμούς ἀλγεβρικῶς καὶ εὔρετε τὸ ἀθροισμά των. Τί ποσὸν τοῦ ἔμεινεν ἢ πόσην ζημιάν ἔχει;

26. Κινητὸν ἀνεχώρησεν ἀπὸ ἐν σημεῖον Ο ὠρισμένης εύθειας καὶ διήνυσεν ἐπ' αὐτῆς διάστημα + 58,4 μ., ἐπειτα ἀπὸ τὴν θέσιν αὐτὴν - 19,3 μ. ἐπὶ τῆς εύθειας, ἀπ' ἕκει + 23,7 μ. καὶ πάλιν ἀπὸ τὴν τελευταίαν θέσιν - 95,8 μ. πάντοτε ἐπὶ τῆς εύθειας. Ποία είναι ἢ ἀπόστασις τῆς τελευταίας θέσεώς του ἀπὸ τὸ Ο ;

### I. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΣΕΩΣ

§ 11. Τὸ ἀθροισμα σχετικῶν ἀριθμῶν δὲν μεταβάλλεται, ἀν ἀλλαχθῇ ἢ θέσις τῶν προσθετέων.

"Εστω τὸ ἀθροισμα τῶν σχετικῶν ἀριθμῶν α, β, γ, δ.

"Ἐχομεν:  $\alpha+\beta+\gamma+\delta=(\alpha+\beta)+\gamma+\delta=(\alpha+\beta+\gamma)+\delta$ . 'Αλλ' εἴναι  $\alpha+\beta=\beta+\alpha$ , ἄρα καὶ  $(\alpha+\beta)=(\beta+\alpha)=\beta+\alpha$ . 'Επομένως  $\alpha+\beta+\gamma+\delta=(\alpha+\beta)+\gamma+\delta=(\beta+\alpha)+\gamma+\delta=(\beta+\alpha+\gamma)+\delta=\beta+\alpha+\gamma+\delta$ . 'Ομοίως ἔχομεν :

$$\alpha + \beta + \gamma + \delta = (\beta + \alpha + \gamma) + \delta = \delta + (\beta + \alpha + \gamma) = \delta + \beta + \gamma + \alpha.$$

Έκ τῶν ἀνωτέρω ἔπειται ὅτι :

Εἰς τὸ ἄθροισμα σχετικῶν ἀριθμῶν δυνάμεθα νὰ ἀντικαταστήσωμεν τινὰς ἐξ αὐτῶν μὲ τὸ ἄθροισμά των, καὶ ἀντιστρόφως.

Διότι, ἂν θέλωμεν π.χ. νὰ ἔχωμεν

$$\alpha + \beta + \gamma + \delta + \epsilon = (\alpha + \gamma + \epsilon) + \beta + \delta$$

παρατηροῦμεν ὅτι δυνάμεθα νὰ θέσωμεν

$$\alpha + \beta + \gamma + \delta + \epsilon = \alpha + \gamma + \epsilon + \beta + \delta = (\alpha + \gamma + \epsilon) + \beta + \delta. \quad \text{Ωστε :}$$

Τὸ ἄθροισμα τῶν σχετικῶν ἀριθμῶν ἔχει τὰς αὐτὰς ἰδιότητὰς μὲ τὸ ἄθροισμα τῶν ἀριθμῶν τῆς Ἀριθμητικῆς, ἢτοι ισχύει ὁ νόμος τῆς ἀλλαγῆς τῶν θέσεων τῶν προσθετέων καὶ τῆς ἀντικαταστάσεως μερικῶν ἐξ αὐτῶν μὲ τὸ ἄθροισμά των.

Έκ τῶν προηγουμένων ἔπειται ἐπίσης ὅτι :

Διὰ νὰ προσθέσωμεν περισσοτέρους τῶν δύο μὴ ὁμοσήμους ἀριθμούς, δυνάμεθα νὰ προσθέσωμεν χωριστὰ τοὺς ἔχοντας τὸ πρόσημον +, χωριστὰ τοὺς ἔχοντας τὸ —, οὕτω δὲ προκύπτουν δύο ἑτερόσημοι ἀριθμοί, τοὺς δόποίους προσθέτομεν ὡς ἀνωτέρω καὶ τὸ ἄθροισμα τούτων παριστάνει καὶ τὸ ἄθροισμα τῶν δοθέντων ἀριθμῶν.

Κατὰ ταῦτα, διὰ τὸ ἄθροισμα π.χ.

$$-3 + (-5) + (+2) + (+3) + (-7) + (+6)$$

ἢ διὰ τὸ ἴσον του  $-3 - 5 + 2 + 3 - 7 + 6$  ἔχομεν :

$$-3 - 5 - 7 = -15, \quad +2 + 3 + 6 = 11 \quad \text{καὶ τέλος} \quad -15 + 11 = -4,$$

ἢτοι :

$$-3 - 5 + 2 + 3 - 7 + 6 = -4$$

$$\text{ἢ } (-3) + (-5) + (+2) + (+3) + (-7) + (+6) = (-4) = -4.$$

Ομοίως διὰ τὸ ἄθροισμα π.χ.

$$(+4) + (-5) + 0 + \left(-\frac{4}{5}\right) + (+6)$$

ἢ διὰ τὸ ἴσον του  $4 - 5 + 0 - \frac{4}{5} + 6$  ἔχομεν :

$$4 - 5 + 0 - \frac{4}{5} + 6 = 4 + 0 + 6 - 5 - \frac{4}{5} = 10 - 5 \frac{4}{5} = 4 \frac{1}{5}.$$

Ομοίως ἔχομεν π.χ.

$$-6 + 4 + \frac{1}{7} - \frac{1}{5} + 2 = 4 + \frac{1}{7} + 2 - \frac{1}{5} - 6 = \frac{43}{7} - \frac{31}{5} = \frac{215}{35} - \frac{217}{35} = -\frac{2}{35}.$$

Κατὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῆς πράξεως αὐτῆς δὲν εἶναι ἀνάγκη νὰ γρά-

φωμεν χωριστά ὅλους τοὺς ἐνδιαμέσους θετικούς καὶ ὅλους τοὺς ἀρνητικούς προσθετέους, ἀλλὰ σχηματίζομεν κατ' εὐθεῖαν τὰ μερικὰ ἀθροίσματα τῶν θετικῶν καὶ ἀρνητικῶν καὶ ἀκολούθως τὸ τελικὸν ἀθροισμα τούτων. π.χ.  $+3+0-1-2+1-6+4=8-9=-1$ ,

$$2-1+6-\frac{1}{3}+5-\frac{1}{4}-2=13-3\frac{7}{12}=9\frac{5}{12}.$$

\*Ἐπίσης ( ἀν εὔκολυνώμεθα ) εύρισκομεν τὸ ἔξαγόμενον προσθέσεως σχετικῶν ἀριθμῶν, προσθέτοντες εἰς τὸν πρῶτον προσθετέον τὸν δεύτερον, εἰς τὸ ἔξαγόμενον τὸν τρίτον κ.τ.λ. καὶ γράφομεν τὸ τελικὸν ἀθροισμα χωρὶς νὰ γράφωμεν τὰ ἐνδιάμεσα ( μερικὰ ἔξαγόμενα ).

Π.χ. διὰ τὸ  $3-5+6-7+2-1$  λέγομεν  $+3-5$  ἵσον  $-2$  ( χωρὶς νὰ τὸ γράφωμεν ), ἀκολούθως λέγομεν  $-2+6$  ἵσον  $+4$  ( χωρὶς νὰ τὸ γράφωμεν ) καὶ ἐν συνεχείᾳ λέγομεν  $+4-7$  ἵσον  $-3$ : ἀκολούθως λέγομεν  $-3+2$  ἵσον  $-1$ , ἀκολούθως  $-1-1$  ἵσον  $-2$ . \*Ἄρα, λέγομεν, τὸ ζητούμενον ἀθροισμα εἶναι  $-2$ .

## II. ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΙΣ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΟΣ

**§ 12.** Δυνάμεθα νὰ ἀπεικονίσωμεν γεωμετρικῶς τὴν πρόσθεσιν τῶν σχετικῶν ἀριθμῶν ἐπὶ τοῦ ἄξονος τῶν τετμημένων Διὰ νὰ παραστήσωμεν π.χ. τὸ ἀθροισμα  $-8+(+3)$ , ἀναχωροῦμεν ἀπὸ τὸ σημεῖον ἔστω  $A$ , τὸ ὄποιον παριστάνει τὸν  $-8$  ἐπὶ τοῦ ἄξονος καὶ προχωροῦμεν πρὸς τὰ δεξιὰ αὐτοῦ κατὰ  $+3$  μονάδας μήκους. Τὸ οὕτως εύρισκόμενον σημεῖον, ἔστω  $B$ , παριστάνει τὸ ἀθροισμα  $-8+(+3)=-5$  ( σχ. 4 ).



Σχ. 4

Διὰ νὰ εύρωμεν τὸ σημεῖον, τὸ ὄποιον παριστάνει π.χ. τὸ ἀθροισμα  $-4+(+8)$ , ἀναχωροῦμεν ἀπὸ τὸ σημεῖον τοῦ ἄξονος, τὸ ὄποιον παριστάνει τὸν  $-4$ , ἔστω τὸ  $\Gamma$ , καὶ προχωροῦμεν πρὸς τὰ δεξιὰ αὐτοῦ κατὰ ὅκτω μονάδας μήκους, ὅτε εύρισκομεν τὸ σημεῖον, ἔστω  $\Delta$ , παριστάνον τὸ  $-4+8=+4$ .

"Ασκησις

27. Εύρετε τά κατωτέρω ἔξαγόμενα κατά τὸν συντομώτερον τρόπον καὶ ἀπεικονίσατε αὐτά :

$$\alpha') -3 + 5 - 8 - 7 - 11 - 15 + 6 + 0 - 3 \quad \beta') 16 - 53 + 47 - 5 - 6 - \frac{1}{2} + \frac{2}{5} + 11$$

$$\gamma') -\frac{4}{5} + \frac{2}{8} - \frac{3}{4} - 5 - 7 - 2 + 1 - 13 \quad \delta') -13,5 + 17,18 - 5,6 - 7,8 - 15$$

$$\epsilon') -\frac{1}{2} + \frac{1}{4} - 5 \frac{1}{4} - 25,4 - 2.$$

2. ΑΦΑΙΡΕΣΙΣ

**§ 13.** "Εστωσαν π.χ. δύο σχετικοὶ ἀριθμοὶ + 7 καὶ - 5. Σχηματίζομεν τὸ ἄθροισμα (+7) + (+5), τὸ ὁποῖον εύρισκεται, ἂν εἰς τὸν (+7) προσθέσωμεν τὸν (+5), ἀντίθετον τοῦ (-5). "Αν εἰς τὸ ἄθροισμα αὐτὸν (+7) + (+5) προσθέσωμεν τὸν δεύτερον ἐκ τῶν δοθέντων ἀριθμῶν, τὸν -5, θὰ εὕρωμεν

$$(+7) + (+5) + (-5) = (+7)$$

ἵτοι τὸν πρῶτον ἀριθμὸν ἐκ τῶν δοθέντων. Ἐν γένει :

Δοθέντων δύο σχετικῶν ἀριθμῶν, ὑπάρχει εἰς τρίτος σχετικὸς ἀριθμός, ὁ ὁποῖος, προστιθέμενος εἰς τὸν ἔνα τῶν δοθέντων, δίδει τὸν ἄλλον.

Πράγματι, ἂν α, β εἶναι δύο δοθέντες σχετικοὶ ἀριθμοὶ καὶ θέλωμεν νὰ εὕρωμεν ἀριθμόν, ὁ ὁποῖος προστιθέμενος εἰς τὸν β π.χ. νὰ δίδῃ ἄθροισμα τὸν α, σχηματίζομεν τὸ ἄθροισμα α + (-β) ἀπὸ τὸν πρῶτον καὶ τὸν ἀντίθετον τοῦ δευτέρου β, τὸν -β. Παρατηροῦμεν τώρα ὅτι αὐτὸς ὁ ἀριθμὸς α + (-β) εἶναι ὁ ζητούμενος. Διότι, ἂν αὐτὸς προστεθῇ εἰς τὸν β, θὰ εὕρωμεν  
 $\beta + \alpha + (-\beta) = \alpha + (-\beta) + (+\beta) = \alpha$ , ἐπειδὴ εἶναι  $(+\beta) + (-\beta) = 0$ .

Παρατηρητέον ὅτι :

Δοθέντος οἰουδήποτε σχετικοῦ ἀριθμοῦ, ὑπάρχει εἰς καὶ μόνον ἀριθμός, ὁ ὁποῖος, προστιθέμενος εἰς τὸν δοθέντα, δίδει ἄθροισμα τὸν ίδιον. Ὁ ἀριθμὸς αὐτὸς εἶναι τὸ 0.

Πράγματι, ἔχομεν π.χ.  $\alpha + 0 = \alpha$ ,  $\beta + 0 = \beta$  κ.τ.λ. Διὰ τοῦτο λέγομεν ὅτι :

Τὸ μηδὲν εἶναι ὁ ἀριθμός, ὁ ὁποῖος, προστιθέμενος εἰς οἰονδήποτε ἄλλον, δίδει ἄθροισμα τὸν ἄλλον.

**§ 14.** Καλοῦμεν διαφορὰν σχετικοῦ ἀριθμοῦ β ἀπὸ ἄλλον α, τὸν ἀριθμόν, δὲ δόποιος, προστιθέμενος εἰς τὸν β, δίδει ἀθροισμά τὸν α.

‘Ο ἀριθμὸς αὐτός, κατὰ τὰ ἀνωτέρω, εἶναι δὲ  $\alpha + (-\beta) = \alpha - \beta$ .

“Ωστε, ἡ διαφορὰ τοῦ β ἀπὸ τὸν α εἶναι α - β. Ἐκ τούτων παραστηροῦμεν ὅτι :

‘Η διαφορὰ α μεῖον β εὑρίσκεται, ἐν εἰς τὸν α προσθέσωμεν τὸν ἀντίθετον τοῦ β.

‘Η πρᾶξις, μὲ τὴν δόποιαν εύρισκομεν τὴν διαφορὰν σχετικοῦ ἀριθμοῦ β ἀπὸ ἄλλον α, καλεῖται ἀφαίρεσις· δὲ α καλεῖται μειῶσις, δὲ β ἀφαιρετός, τὸ δὲ σύμβολον τῆς ἀφαιρέσεως εἶναι τὸ - (πλήν), τιθέμενον μεταξὺ τῶν α καὶ β, ἥτοι γράφομεν α - β.

Παραδείγματα :  $(+8) - (+5) = (+8) + (-5) = (+3) = 3$ ,  
 $(-5) - (-6) = (-5) + (+6) = 1$ ,  $(-3) - 0 = (-3) + 0 = (-3) = -3$ .

$$\begin{aligned} - \left( -\frac{2}{3} \right) - \left( +\frac{1}{6} \right) &= \left( -\frac{2}{3} \right) + \left( -\frac{1}{6} \right) = \left( -\frac{4}{6} \right) + \left( -\frac{1}{6} \right) = \left( -\frac{5}{6} \right) = -\frac{5}{6} \\ 0 - (-7) &= 0 + (+7) = (+7) = +7 = 7, \quad 0 - (+5) = 0 + (-5) = (-5) = -5. \end{aligned}$$

**§ 15.** Παρατήρησις. ‘Η διαφορὰ ἀριθμοῦ τινος π.χ. α ἀπὸ τὸ 0 ίσουται μὲ 0 - α = -α, ἥτοι μὲ τὸν ἀντίθετον τοῦ α. Ἀρα :

‘Ενῶ εἰς τὴν Ἀριθμητικὴν ἡ ἀφαίρεσις ἀριθμοῦ τινος διαφόρου τοῦ 0, π.χ. τοῦ 3 ἀπὸ τὸ 0, εἶναι ἀδύνατος, μὲ τὴν χρησιμοποίησιν τῶν ἀρνητικῶν ἀριθμῶν ἡ ἀφαίρεσις αὗτη καὶ πᾶσα δομοία εἶναι δυνατή.

$$\text{Π.χ. } 0 - (+3) = 0 + (-3) = -3, \quad 0 - (+1) = 0 + (-1) = -1, \\ 0 - 4 = -4, \quad 0 - (+3,25) = 0 + (-3,25) = -3,25.$$

**§ 16.** Αἱ ιδιότητες τῆς ἀφαιρέσεως ἀριθμῶν τῆς Ἀριθμητικῆς ἀληθεύουσιν καὶ διὰ τὴν ἀφαίρεσιν σχετικῶν ἀριθμῶν, ἀποδεικνύονται δὲ εὐκόλως.

‘Α σκήσεις καὶ προβλήματα

‘Ο μάς πρώτη. 28. Νὰ εύρεθοῦν αἱ διαφοραί:

$$\alpha') 8 - (-4) \quad \beta') - 18 - (+19) \quad \gamma') - 14 - (-7) \quad \delta') 0,9 - (-9,13)$$

$$\epsilon') 2,25 - (-1,65) \quad \sigma\tau') 2 \frac{5}{6} - \left( -3 \frac{1}{3} \right) \quad \zeta') 9 \frac{1}{7} - \left( -7 \frac{1}{3} \right)$$

η') Δείξατε ότι είναι  $\alpha - \beta = (\alpha + \gamma) - (\beta + \gamma)$ .

'Ομάς δευτέρα. 29. Εύρετε τὰ ἔξαγόμενα τῶν κάτωθι πράξεων :

$$\alpha') 120+19-(-18) \quad \beta') -17-(-4)+(+8) \quad \gamma') -5 \frac{1}{2} + \left( -6 \frac{1}{4} \right) - \left( -\frac{1}{5} \right)$$

δ') Δείξατε ότι είναι  $\alpha - \beta = (\alpha - \gamma) - (\beta - \gamma)$ .

30. Εύρετε τὰ ἔξαγόμενα τῶν κάτωθι πράξεων :

$$\alpha') 2-7 \quad \beta') 8-10 \quad \gamma') 1,5-2,2 \quad \delta') 15-230 \quad \epsilon') 1,25-9,65$$

στ') Δείξατε ότι είναι  $\alpha - (\beta + \gamma) = (\alpha - \beta) - \gamma$ .

'Ομάς τρίτη. 31. Ανέξανει τις τὸ ἐνεργητικόν του καὶ ἐλαττώνει τὸ παθητικόν του κατὰ 1 564,20 δρχ. Τίνα μεταβολὴν παθαίνει ἡ περιουσία του ;

32. Ἐλαττώνει τις τὸ ἐνεργητικόν του κατὰ 15 484,3 δρχ. καὶ αύξανει τὸ παθητικόν του κατὰ 162 384,70 δρχ. Ποίαν μεταβολὴν παθαίνει ἡ περιουσία του ;

33. Ἀναχωρεῖ τις ἔκ τινος ὀρισμένου σημείου A. Βαδίζει ἐπ' εὐθείας ὁδοῦ 238 μέτρα πρὸς τὰ δεξιά καὶ φθάνει εἰς τὸ σημεῖον B. Πόσα μέτρα πρέπει νὰ βαδίσῃ ἔκ τοῦ B πρὸς τὰ ἀριστερά ἵππι τῆς αὐτῆς εὐθείας, διὰ νὰ φθάσῃ εἰς τὸ σημεῖον Γ, ἀπέχον ἀπὸ τοῦ A 4 846 μέτρα ;

34. Χάνει τις 15 016,3 δρχ. Πόσα πρέπει νὰ κερδίσῃ διὰ νὰ ἔχῃ 8 958,65 δρχ. περισσοτέρας τῶν δισων εἶχεν ἀρχικῶς :

### I. ΑΛΓΕΒΡΙΚΑ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ

**§ 17.** "Εστω τὸ  $(+5)-(+3)-(-4)$ . Διὰ νὰ εὔρωμεν αὐτὸ ἀρκεῖ ἀπὸ τὸ  $(+5)$  νὰ ἀφαιρέσωμεν τὸ  $(+3)$ , ὅτε εύρισκομεν  $(+2)$ . Ἀπὸ τὸ ἔξαγόμενον τοῦτο  $(+2)$  νὰ ἀφαιρέσωμεν τὸ  $(-4)$  καὶ εύρισκομεν  $(+2)-(-4)=(+2)+(+4)=+6$ .

Ἡ ἀνωτέρω ἔκφρασις καὶ ἄλλαι παρόμοιαι λέγονται ἀλγεβρικὰ ἀθροίσματα. Ήτοι :

'Αλγεβρικὸν ἀθροίσμα λέγεται μία ἀκολουθία προσθέσεων καὶ ἀφαιρέσεων, αἱ ὅποιαι σημειώνονται ἐπὶ σχετικῶν ἀριθμῶν.

**§ 18.** "Εστω τὸ ἀλγεβρικὸν ἀθροίσμα  $\alpha-(+\beta)+(-\gamma)-(-\delta)$ . Θὰ δείξωμεν ὅτι τοῦτο ἰσοῦται μὲ  $\alpha-(\beta)+(-\gamma)+(\delta)$ .

#### Διότι

$$\text{Διὰ τὴν εὔρεσιν τοῦ } \alpha-(+\beta)+(-\gamma)-(-\delta)$$

$$\text{Διὰ τὴν εὔρεσιν τοῦ } \alpha+(-\beta)+(-\gamma)+(+\delta)$$

1) Ἐπὸ τὸ α θὰ ἀφαιρέσωμεν τὸ (+ β).

2) Εἰς τὸ ἔξαγόμενον, τὸ δόποιον θὰ εύρεθῇ, θὰ προσθέσωμεν τὸ (−γ).

3) Ἐπὸ τὸ νέον ἔξαγόμενον θὰ ἀφαιρέσωμεν τὸ (−δ).

Ἐπομένως είναι :  $\alpha - (+\beta) + (-\gamma) - (-\delta) = \alpha + (-\beta) + (-\gamma) + (+\delta)$ .

"Ητοι, ἐν ἀλγεβρικὸν ἀθροισμα δύναται νὰ τραπῆ εἰς ἄλλοισον του ἀθροισμα σχετικῶν ἀριθμῶν, καὶ ἀντιστρόφως. Π.χ.

$$\alpha + (-\beta) + (+\gamma) + (-\delta) = \alpha - (+\beta) + (+\gamma) - (+\delta).$$

Ἐκ τούτων παρατηροῦμεν ὅτι :

"Οταν εἰς ἀλγεβρικὸν ἀθροισμα ἀριθμός τις ἔχῃ πρὸ αὐτοῦ τὸ + τότε ὁ ἀριθμὸς αὐτὸς προστίθεται, ἐνῷ ὅταν ἔχῃ πρὸ αὐτοῦ τὸ —, τότε ἡ ἀφαιρεῖται ὁ ἀριθμὸς αὐτὸς ἢ προστίθεται ὁ ἀντίθετός του.

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω ὁδηγούμενοι δεχόμεθα ὅτι, ἂν α είναι ἀριθμός τις (διάφορος τοῦ 0), τὸ +α παριστάνει τὸν α, ἐνῷ τὸ −α παριστάνει τὸν ἀντίθετον τοῦ α. Οὕτως ἔχομεν:  $+(+5) = +5$ ,

$$-(+7) = -7, \quad +(-3) = -3, \quad -(-6) = 6.$$

Ἡ ἀνωτέρω συνθήκη δύναται νὰ ἐκφρασθῇ καὶ ως ἔξης :

Δύο διαδοχικὰ σύμβολα εἰς ἀλγεβρικὸν ἀθροισμα ἐκ τῶν + καὶ — δύνανται νὰ ἀντικατασταθοῦν μὲ ἐν μόνον, τὸ + μέν, ἂν τὰ δύο διαδοχικὰ σύμβολα είναι τὰ αὐτά, μὲ τὸ — δέ, ἂν τὰ διαδοχικὰ σύμβολα δὲν είναι τὰ αὐτά.

"Ητοι: 1) "Αν τὰ διαδοχικὰ σύμβολα (εἰς ἀλγεβρικὸν ἀθροισμα) είναι μὲ τὴν σειρὰν + +, θὰ ἀντικατασταθοῦν μὲ +.

2) "Αν τὰ διαδοχικὰ σύμβολα (εἰς ἀλγεβρικὸν ἀθροισμα) είναι μὲ τὴν σειρὰν — —, θὰ ἀντικατασταθοῦν μὲ +.

3) "Αν τὰ διαδοχικὰ σύμβολα (εἰς ἀλγεβρικὸν ἀθροισμα) είναι μὲ τὴν σειρὰν + −, θὰ ἀντικατασταθοῦν μὲ −, καὶ

1) Εἰς τὸ α θὰ προσθέσωμεν τὸ (− β)· ἀλλὰ τοῦτο είναι τὸ αὐτὸ μὲ τὸ νὰ ἀφαιρέσωμεν ἀπὸ τὸ α τὸ (+ β) (κατὰ τὸν ὄρισμὸν τῆς ἀφαιρέσεως).

2) Εἰς τὸ ἔξαγόμενον, τὸ δόποιον θὰ εύρεθῇ, θὰ προσθέσωμεν τὸ (−γ).

3) Εἰς τὸ νέον ἔξαγόμενον θὰ προσθέσωμεν τὸ (+ δ)· ἀλλὰ τοῦτο είναι τὸ αὐτὸ μὲ τὸ νὰ ἀφαιρέσωμεν ἀπὸ τὸ ἔξαγόμενον τὸ (−δ).

4) "Αν τὰ διαδοχικὰ σύμβολα ( εἰς ἀλγεβρικὸν ἄθροισμα ) εἶναι μὲ τὴν σειρὰν — + , θὰ ἀντικατασταθοῦν μὲ — .

$$\text{Οὕτως ἔχομεν } (+3) - (-6) + (-8) - (+7) - (-1) = \\ (+3) + (+6) + (-8) + (-7) + (+1) = 3 + 6 - 8 - 7 + 1 = 10 - 15 = -5$$

**§ 19.** Καλοῦμεν **ὅρους** ἀλγεβρικοῦ ἄθροισματος τοὺς ἀριθμούς, οἱ ὁποῖοι τὸ ἀποτελοῦν, ἔκαστος τῶν ὅποίων ἔχει τὸ πρόσημόν του + ή — .

Οὕτως εἰς τὸ ἀλγεβρικὸν ἄθροισμα  $\alpha - \beta + \gamma - \delta - \epsilon$  οἱ ὅροι του εἶναι  $\alpha$ ,  $-\beta$ ,  $\gamma$ ,  $-\delta$ ,  $-\epsilon$ . Κατὰ ταῦτα :

Πᾶν ἀλγεβρικὸν ἄθροισμα εἶναι ἄθροισμα τῶν ὅρων του.

$$\text{Π.χ. τὸ } (+5) - (-4) + \left( +\frac{2}{5} \right) - (-8) \text{ εἶναι ἄθροισμα τῶν } (+5), \\ -(-4), \left( +\frac{2}{5} \right), -(-8), \text{ ἥτοι τῶν } +5, +4, +\frac{2}{5}, +8 \text{ καὶ ἔχομεν} \\ (+5) - (-4) + \left( +\frac{2}{5} \right) - (-8) = 5 + 4 + \frac{2}{5} + 8 = 17 + \frac{2}{5} = 17 \frac{2}{5}.$$

Συμφώνως μὲ τὰς ἴδιότητας διὰ τοὺς προσθετέους μιᾶς προσθέσεως σχετικῶν ἀριθμῶν, ἔχομεν ὅτι :

Εἰς ἀλγεβρικὸν ἄθροισμα δυνάμεθα νὰ ἀλλάξωμεν τὴν θέσιν τῶν ὅρων του. Π.χ. εἶναι  $\alpha - \beta + \gamma - \delta + \epsilon - \eta = \epsilon - \beta + \gamma - \eta + \alpha - \delta$ .

Εἰς ἀλγεβρικὸν ἄθροισμα δυνάμεθα νὰ ἀντικαταστήσωμεν μερικοὺς ὅρους του μὲ τὸ ἄθροισμά των, καὶ ἀντιστρόφως, δυνάμεθα εἰς ἀλγεβρικὸν ἄθροισμα νὰ ἀντικαταστήσωμεν ἕνα ὅρον μὲ τὸ ἄθροισμα ἄλλων, τῶν ὅποίων αὐτὸς εἶναι ἄθροισμα.

"Ητοι :

'Ισχύει καὶ δι' ἀλγεβρικὸν ἄθροισμα ὃ νόμος τῆς ἀλλαγῆς τῆς θέσεως τῶν προσθετέων καὶ τῆς ἀντικαταστάσεως προσθετέων διὰ τοῦ ἄθροισματός των.

$$\text{Π.χ. } -(-5) + (-7) - (+4) = 5 - 7 - 4 = (5 - 7) - 4 = -2 - 4 = -6, \\ 10 - (+7) + (-3) = (7 + 3) - (+7) + (-3) = 7 + 3 - 7 - 3 = 10 - 10 = 0.$$

'Αφοῦ ἀλγεβρικὸν ἄθροισμα δύναται νὰ τραπῇ εἰς ἄλλο ἵσον του ἄθροισμα σχετικῶν ἀριθμῶν καὶ ἀντιστρόφως, ἐπεταί ὅτι :

Διὰ νὰ προσθέσωμεν ἀλγεβρικὸν ἄθροισμα εἰς σχετικὸν ἀριθμόν, ἀρκεῖ νὰ προσθέσωμεν εἰς τὸν σχετικὸν ἀριθμὸν τοὺς ὅρους τοῦ ἄθροισματος, ἔκαστον ὅπως εἶναι εἰς τὸ ἄθροισμα.

$$\text{Π.χ. } \alpha + (\beta - \gamma + \delta - \epsilon) = \alpha + \beta - \gamma + \delta - \epsilon.$$

Διὰ νὰ προσθέσωμεν δοθέντα ἀλγεβρικὰ ἀθροίσματα, ἀρκεῖ νὰ σχηματίσωμεν ἐν ἀλγεβρικὸν ἀθροισμα μὲ ὅρους τῶν δοθέντων ἀθροισμάτων καὶ ἔκαστον ὅπως εἶναι εἰς τὸ δοθὲν ἀθροισμα, εἰς τὸ ὄποιον ὑπάρχει.

$$\text{Π.χ. } (\alpha + \beta - \gamma + \delta) + (-\epsilon + \zeta - \eta) = \alpha + \beta - \gamma + \delta - \epsilon + \zeta - \eta.$$

**§ 20.** "Οταν εἰς δοθὲν ἀλγεβρικὸν ἀθροισμα ἀλλάξωμεν τὰ πρόσημα τῶν ὅρων του, προκύπτει ἀλγεβρικὸν ἀθροισμα ἀντίθετον τοῦ δοθέντος (ἢτοι τὸ ἔξαγόμενόν του θὰ εἶναι ἀριθμὸς ἀντίθετος τοῦ ἔξαγομένου ἀριθμοῦ ἐκ τοῦ δοθέντος ἀθροίσματος).

Διότι, διὰ νὰ εὔρωμεν τὸ ἔξαγόμενον τοῦ δοθέντος ἀλγεβρικοῦ ἀθροίσματος, θὰ εὔρωμεν τὸ ἀθροισμα τῶν θετικῶν ὅρων του, ἕστω δὲ ἡ ἀπόλυτος τιμὴ τούτου A. Ἐπειτα θὰ εὔρωμεν τὸ ἀθροισμα τῶν ἀρνητικῶν ὅρων του, καὶ ἕστω ἡ ἀπόλυτος τιμὴ τούτου B. "Αν μὲν εἶναι A μεγαλύτερον τοῦ B, τὸ δοθὲν ἀθροισμα ἰσοῦται μὲ + (A - B). "Αν δὲ εἶναι τὸ A μικρότερον τοῦ B, τὸ δοθὲν ἀθροισμα ἰσοῦται μὲ - (B - A).

"Αν εἶναι A = B, τότε τὸ δοθὲν ἀθροισμα εἶναι ίσον μὲ 0.

"Οταν ἀλλάξωμεν τὸ σῆμα ἑκάστου ὅρου τοῦ δοθέντος ἀλγεβρικοῦ ἀθροίσματος, οἱ θετικοὶ ὅροι θὰ γίνουν ἀρνητικοὶ καὶ οἱ ἀρνητικοὶ θὰ γίνουν θετικοί. Εἰς τὸ νέον αὐτὸν ἀθροισμα, τὸ ἀθροισμα τῶν θετικῶν ὅρων του θὰ ἔχῃ ἀπόλυτον τιμὴν B, τὸ δὲ τῶν ἀρνητικῶν ὅρων αὐτοῦ θὰ ἔχῃ ἀπόλυτον τιμὴν A.

"Αν λοιπὸν εἶναι ό A μεγαλύτερος τοῦ B, τὸ ἔξαγόμενον (τοῦ νέου ἀθροίσματος) θὰ ἰσοῦται μὲ - (A - B), ἀν δὲ τὸ A εἶναι μικρότερον τοῦ B, τὸ ἐν λόγῳ ἀθροισμα ἰσοῦται μὲ + (B - A). ἀν δὲ εἶναι A = B, τὸ ἀθροισμα ἰσοῦται μὲ 0.

Παρατηροῦμεν λοιπὸν ὅτι, καὶ κατὰ τὰς δύο περιπτώσεις τὸ ἔξαγόμενον τοῦ δι' ἀλλαγῆς τοῦ προσήμου τῶν ὅρων προκύπτοντος ἀθροίσματος εἶναι ἀντίθετον τοῦ ἔξαγομένου τοῦ δοθέντος ἀθροίσματος, ὅταν δὲ A = B, ἔχομεν ἔξαγόμενον 0, τὸ ὄποιον ἔχει ἀντίθετον τὸ 0.

**§ 21.** Διὰ νὰ ἀφαιρέσωμεν ἀλγεβρικὸν ἀθροισμα ἀπὸ σχετικὸν ἀριθμόν, ἀρκεῖ νὰ προσθέσωμεν εἰς τὸν ἀριθμὸν τοὺς

όρους τοῦ ἀθροίσματος καὶ καθένα μὲ ήλλαγμένον τὸ πρόσημον.

Π.χ. ἔχομεν  $-\alpha - (\beta - \gamma + \delta) = -\alpha - \beta + \gamma - \delta$ .

Διότι (κατὰ τὸν δρισμὸν τῆς ἀφαιρέσεως) ἀρκεῖ νὰ προσθέσωμεν εἰς τὸ  $-\alpha$  τὸ ἀντίθετον τοῦ  $\beta - \gamma + \delta$ , τὸ ὅποιον εἶναι, ὡς ἀνωτέρω εἴδομεν, τὸ  $-\beta + \gamma - \delta$ .

**§ 22.** Ἐνίστε παραλείπομεν παρένθεσιν, ἐντὸς τῆς ὅποιας ὑπάρχει ἀθροίσμα ἀριθμῶν, καὶ ἂν μὲν πρὸ αὐτῆς ὑπάρχῃ τὸ  $+$ , γράφομεν τοὺς ὄρους τοῦ ἀθροίσματος ἕκαστον μὲ τὸ πρὸ αὐτοῦ σῆμα, ἂν δὲ πρὸ αὐτῆς ὑπάρχῃ τὸ  $-$ , τότε γράφομεν τοὺς ὄρους τοῦ ἀθροίσματος, ἀλλ’ ἕκαστον μὲ ἀντίθετον τοῦ πρὸ αὐτοῦ προσήμου. Π.χ. ἔχομεν :

$$+(3-5+6-7)=3-5+6-7, \quad (-\alpha-\beta+\gamma-\delta)=-\alpha-\beta+\gamma-\delta,$$

$$-(3-5+6-7)=-3+5-6+7, \quad -(-\alpha-\beta+\gamma-\delta)=\alpha+\beta-\gamma+\delta.$$

Αντιστρόφως. Ἐνίστε εἰς ἀλγεβρικὸν ἀθροίσμα γράφομεν τοὺς ὄρους του ἐντὸς παρενθέσεως (ἢ ἀγκυλῶν [ ]), καὶ ἂν μὲν πρὸ αὐτῆς θέσωμεν τὸ  $+$ , ἕκαστος ὄρος ἐντὸς αὐτῆς θὰ ἔχῃ τὸ πρόσημον, τὸ διποίον ἔχει καὶ εἰς τὸ δοθὲν ἀθροίσμα, ἂν δὲ θέσωμεν πρὸ αὐτῆς τὸ  $-$ , ἕκαστος τῶν ἐντὸς αὐτῆς ὄρων θὰ ἔχῃ τὸ ἀντίθετον ἔκείνου, τὸ διποίον ἔχει εἰς τὸ δοθὲν ἀθροίσμα.

Π.χ. ἔχομεν  $-3+5-7-8+15-6=-3+5-7+(-8+15-6)$

$$-3+5-7-8+15-6=-3+5-7-(8-15+6)$$

$$\alpha+\beta-\gamma+\delta-\epsilon=\alpha+\beta+(-\gamma+\delta-\epsilon),$$

$$\alpha+\beta-\gamma+\delta-\epsilon=\alpha+\beta-(\gamma-\delta+\epsilon).$$


## II. ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΙΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ \*Η ΚΑΙ ΑΛΓΕΒΡΙΚΟΥ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΟΣ

**§ 23.** Δυνάμεθα νὰ ἀπεικονίσωμεν γεωμετρικῶς τὴν ἀφαίρεσιν τῶν σχετικῶν ἀριθμῶν ἐπὶ τῆς εύθείας τῶν ἀριθμῶν ὡς ἔξῆς.

Ἐστω ὅτι ἔχομεν τὴν διαφορὰν  $-4 - (+5) = -4 - 5 = -9$ .

Εύρισκομεν τὸ σημεῖον, τὸ ὅποιον παριστάνει τὸ  $-4$ , ἐστω τὸ Α, ἐπὶ τῆς εύθείας τῶν ἀριθμῶν καὶ προχωροῦμεν ἐπ’ αὐτῆς ἀριστερὰ αὐτοῦ κατὰ 5 μονάδας, ὅτε εύρισκομεν, ἐστω τὸ σημεῖον Β'

τὸ δόποιον παριστάνει τὴν διαφορὰν  $-4-(+5)=-9$  (σχ. 5). Διὰ νὰ παραστήσωμεν τὴν διαφορὰν π.χ.  $-7-(-4)=-7+4=-3$ , προχωροῦμεν ἐκ τοῦ σημείου, ἔστω  $\Delta$ , ἐπὶ τῆς εὐθείας τῶν ἀριθμῶν, τὸ δόποιον παριστάνει τὸν  $-7$  κατὰ τέσσαρας μονάδας πρὸς τὰ δεξιὰ αὐτοῦ ἐπὶ τῆς εὐθείας καὶ εύρισκομεν σημεῖον, ἔστω  $\Gamma$ , παριστάνον τὴν διαφορὰν  $-3$ .



Κατ’ ἀνάλογον τρόπον ἐργαζόμεθα διὰ νὰ παραστήσωμεν ἀλγεβρικὸν ἀθροισμα ἐπὶ τῆς εὐθείας τῶν ἀριθμῶν.

### Α σ κ ή σ εις

35. Εὑρετε τὰ κάτωθι ἔξαγόμενα καὶ παραστήσατε αὐτὰ γεωμετρικῶς.

$$\alpha') 2 - 3 + 5 - 7 - 6 + 7 - 11 \quad \beta') -3 - 2\frac{1}{2} + 4 - 8 - 7 - \frac{4}{5}$$

$$\gamma') (-4 + 5 - 8) + (3 - 2 - 7 + 4) \quad \delta') \left( -\frac{1}{2} + \frac{1}{3} - 4 \right) + \left( \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + 5 - 8 \right)$$

$$\epsilon') \left( 3 - 5 - 6 - 7\frac{1}{2} - 3 \right) - \left( 2 - 6 + 4 - \frac{1}{2} \right) \text{στ'}) - \left( 3\frac{1}{2} - 4 - 6 \right) + 7 - \left( 3 - \frac{1}{2} + \frac{1}{8} - 3 \right).$$

36. Εἰς τὸ  $3 - 5 - 4 + 7 - 8 - 1 - 15$  θέσατε μόνον τοὺς ὄρους τρίτον πρέμπτον καὶ ἔκτον ἐντὸς παρενθέσεως καταλλήλως, ώστε πρὸ αὐτῆς νὰ τεθῇ τὸ  $+$  καὶ ἔπειτα πρὸ τῆς ἄλλης παρενθέσεως τὸ  $-$ .

37. Εἰς τὸ ἀθροισμα  $-6\frac{1}{2} + 7 - 12 - 7 + 5 - \frac{3}{4}$  θέσατε μόνον τοὺς ὄρους πρώτον, τρίτον καὶ τελευταῖον καταλλήλως ἐντὸς παρενθέσεως, ώστε πρὸ αὐτῆς νὰ τεθῇ τὸ  $-$ , καὶ ἔπειτα πρὸ τῆς ἄλλης παρενθέσεως νὰ τεθῇ τὸ  $+$ .

### 3. Π Ο Λ Λ Α Π Λ Α Σ Ι Α Σ Μ Ο Σ

§ 24. Πολλαπλασιασμὸς σχετικοῦ ἀριθμοῦ α ἐπὶ ἄλλον β λέγεται ἡ πρᾶξις, μὲ τὴν δόποιαν σχηματίζεται ἐκ τοῦ α τρίτος ἀριθμός, ὅπως ὁ β δύναται νὰ σχηματισθῇ ἐκ τῆς θετικῆς μονάδος καὶ τῶν μερῶν αὐτῆς.

Οἱ διθέντες ἀριθμοὶ λέγονται παράγοντες (ό α πολλαπλα-

**σιαστέος καὶ ὁ β πολλαπλασιαστής).** Ό προκύπτων ἀριθμὸς ἐκ τοῦ πολλαπλασιασμοῦ λέγεται γινόμενον, τὸ δὲ σύμβολον τῆς πράξεως εἶναι τὸ • ἢ τὸ × (ἐπὶ), τιθέμενον μεταξὺ τῶν παραγόντων. Οὕτως ὁ πολλαπλασιασμὸς τῶν α καὶ β συμβολίζεται μὲ α × β ἢ α · β, τὸ δὲ γινόμενον αὐτῶν μὲ αβ. "Οταν ὁ εἰς τῶν παραγόντων εἶναι 0, τὸ γινόμενον δρίζεται ἵσον μὲ 0. "Ητοι π.χ.  $\alpha \cdot 0 = 0, 0 \cdot \alpha = 0, (-3) \cdot 0 = 0, 0 \cdot (7) = 0, 0 \cdot 0 = 0.$

a') Πῶς πολλαπλασιάζομεν ἀριθμὸν ἐπὶ ἄλλον θετικόν.

Κατὰ τὰ ἀνωτέρω, τὸ γινόμενον π.χ. τοῦ (+4) ἐπὶ ἄλλον π.χ. τὸ (+3), ἀνάγεται εἰς τὴν εὔρεσιν τρίτου ἀριθμοῦ, ὁ ὅποιος σχηματίζεται ἐκ τοῦ πρώτου (+4), ὅπως ὁ δεύτερος (+3) δύναται νὰ σχηματισθῇ ἀπὸ τὴν +1. Ἐπειδὴ τὸ  $(+3)=1+1+1$  θὰ ἔχωμεν  $(+4) \cdot (+3) = (+4) + (+4) + (+4) = +12.$

'Ομοίως  $(-8) \cdot (+3) + (-8) = (-8) + (-8) = -24.$

Π.χ. τὸ  $(-9) \cdot \frac{3}{4}$  σημαίνει νὰ εὔρωμεν τὸ τέταρτον τοῦ  $-9$  καὶ τοῦτο νὰ πολλαπλασιάσωμεν ἐπὶ 3. "Ητοι ἔχομεν :  $(-9) \cdot \frac{3}{4} = -\frac{9}{4} \cdot 3 = \left(-\frac{27}{4}\right) = -6\frac{3}{4}.$  Ἐπομένως :

Τὸ γινόμενον σχετικοῦ ἀριθμοῦ ἐπὶ ἄλλον θετικὸν ἔχει ἀπόλυτον μὲν τιμὴν τὸ γινόμενον τῶν ἀπολύτων τιμῶν τῶν παραγόντων, πρόσημον δὲ τὸ τοῦ πολλαπλασιαστέου.

b') Πῶς πολλαπλασιάζομεν ἀριθμὸν ἐπὶ ἄλλον ἀρνητικόν.

"Εστω ὅτι ζητεῖται τὸ γινόμενον  $(+8) \cdot (-3).$

Τὸ (-3) δύναται νὰ γίνῃ ἐκ τῆς +1, ἐὰν λάβωμεν τὴν ἀντίθετόν της  $-1$  καὶ ταύτην ἐπαναλάβωμεν ώς προσθετέον τρίς. "Αρα, διὰ νὰ εύρωμεν τὸ γινόμενον  $(+8) \cdot (-3)$  θὰ λάβωμεν τὸν ἀντίθετον τοῦ (+8), δηλαδὴ τὸν (-8), καὶ τοῦτον θὰ ἐπαναλάβωμεν τρίς ώς προσθετέον. "Ητοι θὰ εἴναι :

$(+8) \cdot (-3) = (-8) \cdot (+3) = (-8) + (-8) + (-8) = -24.$

Διὰ τὸν αὐτὸν λόγον λέγομεν ὅτι  $(-8) \cdot (-3) = (+8) \cdot 3 = 24.$  "Αρα :

Τὸ γινόμενον σχετικοῦ ἀριθμοῦ ἐπὶ ἄλλον ἀρνητικὸν ἔχει ἀπόλυτον μὲν τιμὴν τὸ γινόμενον τῶν ἀπολύτων τιμῶν τῶν παραγόντων, πρόσημον δὲ τὸ ἀντίθετον τοῦ πολλαπλασιαστέου.

$$\text{Π.χ. είναι } (+9) \cdot \left(-\frac{5}{6}\right) = -\frac{45}{6}, \quad (-5) \cdot (-6) = 30:$$

Έκ τῶν προηγουμένων συνάγομεν τὸν ἔξῆς γενικὸν κανόνα:

**§ 25.** Διὰ νὰ πολλαπλασιάσωμεν δύο σχετικοὺς ἀριθμούς, πολλαπλασιάζομεν τὰς ἀπολύτους τιμῶν των καὶ τὸ γινόμενον λαμβάνομεν μὲ τὸ + μὲν ἂν οἱ παράγοντες είναι ὅμοσημοι, μὲ τὸ — δὲ ἂν είναι ἑτερόσημοι.

**§ 26.** Έκ τῶν ἀνωτέρω ἐπεται ὅτι  $\alpha\beta = \beta\alpha$ . Διότι κατὰ τὴν εὔρεσιν τοῦ γινομένου τῶν ἀπολύτων τιμῶν τῶν δύο παραγόντων  $\alpha, \beta$  είναι ἀδιάφορον ποιος ἐκ τῶν παραγόντων λαμβάνεται κατὰ σειρὰν πρῶτος ἢ δεύτερος. Ἐπομένως, ὁ νόμος τῆς ἀντιμεταθέσεως τῶν παραγόντων (δι' ἀριθμοὺς τῆς Ἀριθμητικῆς) ἴσχυει καὶ διὰ δύο σχετικοὺς παράγοντας.

**§ 27.** Γινόμενον πολλῶν παραγόντων ὄριζομεν καθὼς καὶ εἰς τὴν Ἀριθμητικήν.

$$\text{Π.χ. } 3 \cdot (-5) \cdot (-4) = [3 \cdot (-5)] \cdot (-4) = (-15) \cdot (-4) = 60.$$

$$\text{Ἐν γένει ἔχομεν: } \alpha\beta\gamma = (\alpha\beta)\cdot\gamma$$

$$\alpha\beta\gamma\delta = (\alpha\beta)\gamma\cdot\delta = (\alpha\beta\gamma)\cdot\delta = (\alpha\beta\gamma\delta)$$

$$\begin{aligned} \text{"Ητοι: } \alpha' \text{ } (-3) \cdot (+5) \cdot (-2) \cdot (-1) \cdot (-5) = (-15) \cdot (-2) \cdot (-1) \cdot (-5) \\ = (+30) \cdot (-1) \cdot (-5) = (-30) \cdot (-5) = +150. \end{aligned}$$

$$\beta' ) \text{ } (-3) \cdot (-2) \cdot (-1) \cdot (+5) = (+6) \cdot (-1) \cdot (+5) = (-6) \cdot (+5) = -30$$

Έκ τούτων παρατηροῦμεν ὅτι :

Τὸ γινόμενον πολλῶν παραγόντων ἔχει ἀπόλυτον μὲν τιμὴν τὸ γινόμενον τῶν ἀπολύτων τιμῶν τῶν παραγόντων, πρόσημον δὲ τὸ + μὲν ἂν τὸ πλῆθος τῶν ἀρνητικῶν παραγόντων είναι ἀρτιος ἀριθμὸς ἢ 0, τὸ — δὲ ἂν τὸ πλῆθος τῶν ἀρνητικῶν παραγόντων είναι ἀριθμὸς περιττός.

Είναι φανερὸν ὅτι τὸ γινόμενον πολλῶν ἀλγεβρικῶν παραγόντων δὲν μεταβάλλεται, ἂν ἀλλαχθῇ ἡ θέσις τῶν παραγόντων.

"Αν εἴς τῶν παραγόντων γινομένου πολλῶν παραγόντων είναι 0, τὸ γινόμενον είναι 0.

$$\text{Π.χ. } (+5) \cdot (-3) \cdot 0 \cdot (+6) = (-15) \cdot 0 \cdot (+6) = 0 \cdot (+6) = 0.$$

## ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΠΙ + 1 Η ΕΠΙ - 1

**§ 28.** Παρατηροῦμεν ότι, πολλαπλασιασμός ἀλγεβρικοῦ ἀριθμοῦ ἐπὶ + 1 μὲν σημαίνει αὐτὸν τὸν ἀριθμόν, ἐπὶ - 1 δὲ τὸν ἀντίθετόν του. Οὕτως ἔχομεν  $\alpha \cdot (+1) = \alpha$ ,  $\alpha \cdot (-1) = -\alpha$ .

$$1 \cdot (+\alpha) = (+\alpha) \cdot (+1) = +\alpha,$$

$$(-1) \cdot (+\alpha) = (+\alpha) \cdot (-1) = (-\alpha) \cdot (+1) = -\alpha,$$

$$(-1) \cdot (-\alpha) = (-\alpha) \cdot (-1) = (+\alpha) \cdot (+1) = +\alpha,$$

$$\text{Π.χ. εἴναι: } (-4) \cdot 1 = 1 \cdot (-4) = (-1) \cdot 4 = -4, \quad (+5) \cdot 1 = 1 \cdot (+5) = 5,$$

$$(-5) \cdot (-1) = (-1) \cdot (-5) = +5, \quad \frac{7}{5} \cdot (-1) = (-1) \cdot \left( +\frac{7}{5} \right) = -\frac{7}{5}.$$

Αἱ ιδιότητες τοῦ γινομένου ἀριθμῶν τῆς Ἀριθμητικῆς ἀληθεύουσιν καὶ ὅταν οἱ παράγοντες εἴναι σχετικοὶ ἀριθμοί, ἡ ἀπόδειξις δὲ εἴναι εὐκολος.

Οὕτω π.χ., ἂν εἴναι  $\alpha = \beta$ , θὰ εἴναι καὶ  $\rho\alpha = \rho\beta$ , ὅρους  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\rho$  εἴναι οἰοιδήποτε ἀριθμοί.

## 'Α σ κ ή σ ε τ ί

'Ο μὰς πρώτη. 38 Νὰ εύρεθοῦν τὰ γινόμενα:

$$\alpha') (-5) \cdot (+8) \qquad \beta') (+18) \cdot (-4) \qquad \gamma') (-7) \cdot (+15).$$

$$\delta') (-7) \cdot (-7) \qquad \epsilon') (8,4) \cdot (-6,6) \qquad \sigma') (-9,8) \cdot (8,5) \cdot (4,3) \cdot (2,3).$$

ζ') Δείξατε ότι  $\alpha \cdot \beta \cdot \gamma = \gamma \cdot \alpha \cdot \beta \cdot \delta$ , δταν  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ ,  $\delta$  είναι σχετικοὶ ἀριθμοί.

'Ο μὰς δευτέρα. [39] 'Ομοίως εύρετε τὰ ἔξαγόμενα τῶν κάτωθι πράξεων:

$$\checkmark \alpha) (-3,9) \cdot (-7,6) \qquad \checkmark \beta) (+9,46) \cdot (-3,5)$$

$$\checkmark \gamma) (-9) \cdot (-7) \cdot (-3) \qquad \checkmark \delta) \left( +4 \frac{1}{2} \right) \cdot \left( -3 \frac{1}{6} \right) \cdot (-6,8).$$

[40] 'Ομοίως τά:

$$\checkmark \alpha') (-16) \cdot 14 \cdot \left( -\frac{2}{3} \right) \cdot \left( -3 \frac{3}{8} \right) \qquad \checkmark \beta) (-3,1) \cdot (+6) \cdot (+8) \cdot (-7)$$

$$\checkmark \gamma) (+7) \cdot (-4) \cdot (+8) \cdot (+5) \qquad \checkmark \delta) 0,6 \cdot \left[ (+9,74) - 0,9 \cdot (+6,5) \right] \cdot 0,3.$$

[41] Εύρετε τὰ ἔξαγόμενα:

$$\checkmark \alpha') (-3) \cdot (-4,1) \cdot (-2) + 8 \cdot (-2,4) \cdot (-5)$$

$$\checkmark \beta) (-5,1) \cdot (-3,2) \cdot (-1) - 12 \cdot (-3,2) \cdot (-4) \cdot (-7) - 20.$$

$$42. \text{Εύρετε τά: } \alpha') \frac{5}{8} \cdot \left( -\frac{3}{5} \right) \cdot \left( -\frac{1}{4} \right) \cdot (2+5-8)$$

$$\beta') (-32) \cdot \left( -\frac{1}{2} + \frac{1}{3} - 0,4 \right) - \frac{4}{5} \left[ 0,01 + 0,01 \cdot (-5,4) \right]$$

43. Εύρετε τὸ  $0,53 \cdot (-1,2) \cdot (-3-4) + 19 \cdot (-0,45)$ .

44. Εύρετε τά :

$$\alpha') (-5) \cdot (-8)$$

$$\beta') \left(-\frac{53}{4}\right) \cdot 1 \quad \gamma') \left(-1 \frac{1}{3}\right) \cdot \left(-\frac{3}{5}\right)$$

$$\delta') (-3) \cdot (-5) \cdot 4 \cdot 0$$

$$\varepsilon') (-3) \cdot 6 \cdot 0 \cdot (-7)$$

στ') Δείξατε δότι είναι  $\alpha \cdot \beta \cdot \gamma \cdot \delta \cdot \varepsilon = (\alpha \cdot \varepsilon) \cdot \beta \cdot \gamma \cdot \delta$ , δηπου  $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \varepsilon$  είναι σχετικοί ἀριθμοί.

ζ') Δείξατε δότι  $(\alpha\beta\gamma) \cdot (\delta\varepsilon\zeta) = \alpha \cdot \beta \cdot \gamma \cdot \delta \cdot \varepsilon \cdot \zeta$ , δηπου οι παράγοντες  $\alpha, \beta, \gamma$  και οι  $\delta, \varepsilon, \zeta$ , είναι σχετικοί ἀριθμοί.

#### 4. ΔΙΑΙΡΕΣΙΣ

**§ 29.** Ως γνωστόν, ἀντίστροφος ἀριθμὸς π.χ. τοῦ 5 (τῆς Ἀριθμητικῆς) καλεῖται τὸ  $\frac{1}{5}$ , ὁ δηποτος, πολλαπλασιαζόμενος ἐπὶ τὸν 5, δίδει γινόμενον  $\frac{1}{5} \times 5 = 1$ . Ἐστω σχετικὸς ἀριθμὸς  $\alpha$ , διάφορος τοῦ μηδενός. Τὴν ἔκφρασιν διάφορος θὰ παριστάνωμεν μὲ τὸ σύμβολον  $\neq$ , θὰ γράψωμεν δὲ  $\alpha \neq 0$  καὶ θὰ ἀπαγγέλλωμεν: α διάφορον τοῦ μηδενός. Καλοῦμεν ἀντίστροφον τοῦ  $\alpha$  ( $\neq 0$ ) τὸν ἀριθμόν, δηποτος ἔχει ἀπόλυτον τιμήν ἀντίστροφον τῆς ἀπόλυτου τιμῆς τοῦ  $\alpha$  καὶ πρόσημον τὸ αὐτὸν μὲ τὸ τοῦ  $\alpha$ , ἢτοι τὸν  $\frac{1}{\alpha}$ . Π.χ. ἀντίστροφος τοῦ  $-\frac{1}{8}$  είναι  $-\frac{1}{8}$ , τοῦ  $-6$   $\delta - \frac{1}{6}$ , τοῦ  $-3,4$   $\delta - \frac{1}{3,4} = -\frac{10}{34} = -\frac{5}{17}$ , τοῦ  $+1$   $\delta + 1$  καὶ τοῦ  $-1$   $\delta - 1$ .

Τὸ γινόμενον σχετικοῦ ἀριθμοῦ ( $\neq 0$ ) ἐπὶ τὸν ἀντίστροφόν του ισοῦται μὲ 1. Π.χ. τὸ γινόμενον  $8 \cdot \frac{1}{8} = \frac{8}{8} = 1$ , τοῦ  $-\frac{1}{8} \cdot (-8) = +\frac{8}{8} = +1$  κ.τ.λ.

Διοθέντων δύο σχετικῶν ἀριθμῶν  $\alpha$  καὶ  $\beta$  (ἐνῶ είναι  $\beta \neq \alpha$ ) ὑπάρχει τρίτος σχετικὸς ἀριθμός, δηποτος, πολλαπλασιαζόμενος ἐπὶ τὸν  $\beta$ , δίδει γινόμενον τὸν  $\alpha$ .

Πράγματι, ἂν παραστήσωμεν μὲ γ τὸν ζητούμενον ἀριθμόν, πρέπει νὰ ἔχωμεν  $\gamma \cdot \beta = \alpha$ . Πολλαπλασιάζομεν τοὺς ἵσους αὐτοὺς ἀριθμούς ἐπὶ  $\frac{1}{\beta}$ , δῆτε λαμβάνομεν :

$$\gamma \cdot \beta \cdot \frac{1}{\beta} = \alpha \cdot \frac{1}{\beta} \quad \text{ἢ} \quad \gamma \cdot \left(\beta \cdot \frac{1}{\beta}\right) = \alpha \cdot \frac{1}{\beta}, \quad \text{ἢ} \quad \gamma = \alpha \cdot \frac{1}{\beta} = \frac{\alpha}{\beta}.$$

Καὶ τῷ ὅντι, ἃν πολλαπλασιάσωμεν τὸν γ ἢ τὸν ἵσον του  $\frac{\alpha}{\beta}$  ἐπὶ β, ἔχομεν  $\frac{\alpha}{\beta} \cdot \beta = \alpha \cdot \frac{\beta}{\beta} = \alpha$ .

**§ 30.** Διαιρεσις σχετικοῦ ἀριθμοῦ α δι' ἄλλου β ( $\neq 0$ ) λέγεται ἡ πρᾶξις, μὲ τὴν ὁποίαν εὑρίσκεται τρίτος σχετικὸς ἀριθμὸς γ, ὁ ὁποῖος, πολλαπλασιαζόμενος ἐπὶ τὸν β, δίδει γινόμενον τὸν α.

Ἐκ τῶν διθέντων ἀριθμῶν ὁ α λέγεται διαιρετέος, ὁ β διαιρέτης, καὶ ὁ ζητούμενος γ πηλίκον, τὸ δὲ σύμβολον τῆς διαιρέσεως εἶναι τὸ (: ) (διὰ ἢ πρὸς) καὶ γράφεται μεταξὺ τῶν α καὶ β. Τὸ πηλίκον τοῦ α : β συμβολίζομεν καὶ μὲ  $\frac{\alpha}{\beta}$ , λέγεται δὲ ἡ παράστασις αὐτὴ κλασματικὴ ἢ ἀλγεβρικὸν κλάσμα μὲ ἀριθμητὴν τὸν α καὶ παρονομαστὴν τὸν β, καὶ εἶναι  $\frac{\alpha}{\beta} = \alpha \cdot \frac{1}{\beta}$ .

Ἐστω ὅτι ζητεῖται τὸ πηλίκον π.χ. (+8):(+2). Παρατηροῦμεν ὅτι ὁ ζητούμενος ἀριθμὸς θὰ ἔχῃ πρόσημον +. Διότι τὸ γινόμενον τοῦ ζητούμενού ἀριθμοῦ ἐπὶ τὸν διαιρέτην (+2) πρέπει νὰ εἶναι θετικόν, ἀφοῦ ὁ διαιρετέος (+8) εἶναι θετικός. Ἐπειδὴ δὲ ἡ ἀπόλυτος τιμὴ τοῦ πηλίκου πολλαπλασιαζομένη ἐπὶ 2 πρέπει νὰ δίδῃ γινόμενον 8, θὰ εἶναι ἵση μὲ 8:2 = 4.

"Ητοι ἔχομεν (+8):(+2)=(+4).

Ἐστω ὅτι ζητεῖται (+8):(-2). Ο ζητούμενος ἀριθμὸς θὰ ἔχῃ τὸ πρόσημον -. Διότι τὸ γινόμενον αὐτοῦ ἐπὶ τὸν διαιρέτην (-2) πρέπει νὰ εἶναι θετικόν, ἐπειδὴ δ διαιρετέος (+8) εἶναι θετικός.

"Αρα ἔχομεν : (+8):(-2)=(-4).

'Ἐπίσης εύρισκομεν, σκεπτόμενοι ὅμοιως ὅτι εἶναι :

$$(-8):(-2)=+4, \quad (-5):2=-\frac{5}{2}=-2\frac{1}{2}. \quad \text{"Αρα :}$$

Τὸ πηλίκον τῆς διαιρέσεως δύο διθέντων σχετικῶν ἀριθμῶν ἔχει ἀπόλυτον τιμὴν τὸ πηλίκον τῶν ἀπολύτων τιμῶν τοῦ διαιρετοῦ διὰ τοῦ διαιρέτου, καὶ πρόσημον θετικὸν μὲν ἂν οἱ διθέντες ἀριθμοὶ εἶναι ὅμόσημοι, ἀρνητικὸν δὲ ἂν εἶναι ἑτερόσημοι.

$$\text{Παραδείγματα : } (-5):(+6)=-\frac{5}{6}, \quad \left(-\frac{1}{2}\right):\left(+\frac{5}{6}\right)=$$

$$-\frac{1}{2}:\frac{5}{6}=\left(-\frac{1}{2}\right)\cdot\frac{6}{5}=-\frac{6}{10}=-\frac{3}{5}, \quad (-15):(-5)=+\frac{15}{5}=+3.$$

Η διαίρεσις άριθμού διά τοῦ 0 εἶναι ἀδύνατος. Διότι, ἃν π.χ. ἔχωμεν τὴν διαίρεσιν  $(-6):0$ , ζητεῖται ἀριθμός, ὁ ὅποιος, πολλαπλασιαζόμενος ἐπὶ 0, δίδει γινόμενον τὸ -6. Τοῦτο ὅμως εἶναι ἀδύνατον, διότι πᾶς ἀριθμός πολλαπλασιαζόμενος ἐπὶ 0 δίδει γινόμενον 0.

Ἄλλ' οὐδὲ νὰ δημιουργήσωμεν νέον εἶδος ἀριθμῶν εἶναι δυνατόν, ὥστε νὰ καταστήσωμεν τὴν διαίρεσιν διά τοῦ 0 δυνατήν. Διότι, ἃν π.χ. ὑπῆρχε νέος τοιοῦτος ἀριθμός, ἔστω ὁ  $\alpha$ , ὁ ὅποιος θὰ εἶναι πηλίκον τοῦ -6:0, θὰ ἔχωμεν  $-6=0\cdot\alpha$ . Ἐάν πολλαπλασιάσωμεν τοὺς ἴσους τούτους ἐπὶ τὸν αὐτὸν ἀριθμόν, ἔστω τὸν 5, προκύπτουν ἵσοι. Ἡτοι  $-6\cdot5=0\cdot\alpha\cdot5$ . Ἀλλάσσοντες τὴν θέσιν τῶν δύο τελευταίων παραγόντων, εύρισκομεν  $-6\cdot5=0\cdot5\cdot\alpha=0\cdot\alpha$  (ἐπειδὴ εἶναι  $0\cdot5=0$ ). Ἀλλὰ τὸ μὲν  $-6\cdot5=-30$ , τὸ δὲ  $0\cdot\alpha=-6$  (ἔξ ύποθέσεως), ἄρα θὰ ἔχωμεν  $-30=-6$ , τὸ ὅποιον εἶναι ἀδύνατον.

Η διαίρεσις τοῦ 0 διά τινος ἀριθμοῦ ( $\neq 0$ ) δίδει πηλίκον 0. Οὕτω π.χ.  $0 : (-7)=0$ . Διότι εἶναι  $0\cdot(-7)=0$ .

Αἱ ἴδιότητες τῆς διαίρεσεως ἀριθμῶν τῆς Ἀριθμητικῆς ἀληθεύουσαν καὶ ὅταν οἱ ἀριθμοὶ εἶναι ἀλγεβρικοί, ἀποδεικνύονται δὲ εὐκόλως.

### Α σ χ ή σ ε ι ξ

Ο μὰς πρώτη: 45 Νὰ εύρεθοῦν τὰ πηλίκα:  
 $\alpha') (+2) : (-7) \quad \beta') (-45) : (+9) \quad \gamma') (-49) : 49 \quad \delta') (-1944) : (-36)$   
 $\epsilon') (+0,95) : (+0,5) \quad \sigma\tau') (-349) : 1,8 \quad \zeta') (-1425) : (-32,1)$   
 η') Νὰ δειχθῇ ὅτι  $\alpha : \beta = (\alpha\cdot\gamma) : (\beta\cdot\gamma)$ , ἀν τὰ  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  εἶναι σχετικοὶ ἀριθμοί.

Ο μὰς δευτέρα: 46. Εὕρετε τὰ ἔξαγόμενα:

$$\alpha') 3 \frac{2}{3} : \left( -1 \frac{4}{9} \right) : 8 \quad \beta') (-9,6) : 0,7 : 6 \frac{1}{2}$$

$$\gamma') (-1) : 4 : (-3) : \left( -\frac{1}{3} \right) : (+2)$$

47. Ομοίως τὰ:

$$\alpha') (-34) : (-9-8) \quad \beta') (-18) : 9-(-4) : 2 \quad \gamma') (-25) : (-5) : (-5) : (-5)$$

48. Νὰ εύρεθῇ ὁ διγνωστός  $x$ , ὡστε νὰ εἴναι:

$$\alpha') (-40) \cdot x = 160 \quad \beta') (-6) \cdot x = 24 \quad \gamma') 12 \cdot x = 48$$

$$\delta') (-3) \cdot x = (-15) \quad \epsilon') (31,4) \cdot x = -18,84 \quad \sigma\tau') \left( -\frac{36}{7} \right) \cdot x = \frac{7}{12}.$$

49. Νὰ δειχθῇ ὅτι:

$$\alpha') \alpha : \beta = (\alpha : \rho) : (\beta : \rho), \text{ εἴναι } \alpha, \beta, \rho \text{ εἶναι σχετικοὶ ἀριθμοί } (\rho \neq 0).$$

$$\beta') (\alpha\beta\gamma) : \alpha = \beta\gamma \quad \gamma') \alpha : (\beta + \gamma) = (\alpha : \beta) : \gamma.$$

### Δ'. ΚΛΑΣΜΑΤΑ ΑΛΓΕΒΡΙΚΑ \*

**§ 31.** Τὰ κλάσματα μὲν ὅρους σχετικοὺς ἀριθμούς, τὰ δὲ ὅποια καλοῦμεν ἀλγεβρικὰ κλάσματα, ἔχουν τὰς ἴδιότητας τῶν κλασμάτων μὲν ὅρους ἀριθμοὺς τῆς Ἀριθμητικῆς, ἀποδεικνύονται δὲ αὐταὶ εὐκόλως καὶ διὰ τοῦτο ἀναγράφομεν κατωτέρω τῆς κυριωτέρας ἐξ αὐτῶν.

1η. Πᾶς σχετικὸς ἀριθμὸς α π.χ. δυνατὸν νὰ θεωρηθῇ ὡς κλάσμα μὲ παρονομαστὴν 1, διότι  $\frac{\alpha}{1} = \alpha$ .

2α. Ἐὰν εἰς κλάσμα ὁ παρονομαστὴς του εἶναι ἵσος μὲ τὸν ἀριθμητήν του, τὸ κλάσμα ἰσοῦται μὲ 1, ἢτοι ἔχομεν  $\pi.\chi. \cdot \frac{\alpha}{\alpha} = 1$ .

3η. Δυνάμεθα νὰ πολλαπλασιάσωμεν ἢ νὰ διαιρέσωμεν τοὺς ὅρους κλάσματος ἐπὶ τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν ( $\neq 0$ ) χωρὶς νὰ μεταβληθῇ ἢ ἀξία τοῦ κλάσματος.

$$\text{Ούτως ἔχομεν } \pi.\chi. \cdot \frac{\alpha}{\beta} = \frac{\alpha \cdot \gamma}{\beta \cdot \gamma}, \quad \frac{\alpha}{\beta} = \frac{\left( \frac{\alpha}{\gamma} \right)}{\left( \frac{\beta}{\gamma} \right)}, \quad \gamma \neq 0.$$

4η. Δυνάμεθα νὰ ἀλλάξωμεν τὰ πρόσημα τῶν δύο ὅρων κλάσματος χωρὶς νὰ μεταβληθῇ ἢ ἀξία τοῦ. Διότι ἀλλαγὴ τῶν σημάτων τῶν δύο ὅρων τοῦ κλάσματος εἶναι τὸ αὐτὸ μὲ τὸν πολλαπλασιασμὸν ἐκάστου ὅρου ἐπὶ (-1).

Ούτως ἔχομεν π.χ.

$$\frac{-1}{-2} = \frac{1}{-2}, \quad \frac{-3}{-5} = \frac{-3}{5}, \quad \frac{-4}{-5} = \frac{4}{5}, \quad \frac{-\frac{4}{9}}{-\frac{2}{3}} = \frac{\frac{4}{9}}{\frac{2}{3}} = \frac{4}{9} \cdot \frac{3}{2} = \frac{2}{3}.$$

5η. Δυνάμεθα νὰ ἀπλοποιήσωμεν ἔν κλάσμα διὰ διαιρέσεως τῶν ὅρων του μὲ τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν ( $\neq 0$ ), ἢν διαιροῦνται ἀκριβῶς.

$$\begin{aligned} \text{Ούτως ἔχομεν } \pi.\chi. - \frac{6}{4} &= -\frac{6 \cdot 2}{4 \cdot 2} = -\frac{3}{2}, & \frac{4\sqrt{5}}{-5\sqrt{2}} &= \frac{4\sqrt{5} \cdot \sqrt{2}}{-5\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}} = \\ &= \frac{4 \cdot \sqrt{5} \cdot \sqrt{2}}{-10} = -\frac{2\sqrt{10}}{5}, & \frac{\alpha \cdot \beta \cdot \gamma}{\alpha \cdot \delta} &= \frac{\beta \cdot \gamma}{\delta}, & \frac{4 \cdot \alpha \cdot \beta}{\alpha \cdot \delta \cdot \gamma} &= \frac{4 \cdot \beta}{\delta \cdot \gamma}. \end{aligned}$$

\* Πρῶτος ὁ Ἑλλην μαθηματικὸς Διόφαντος ( τῆς Ἀλεξανδρείας ) ἔδωκεν αὐτοτελῆ σημασίαν εἰς τὰ κλάσματα.

6η. Διοθέντων κλασμάτων (περισσοτέρων) τοῦ ένδος μὲ διαφόρους παρονομαστάς, δυνάμεθα νὰ εύρωμεν ίσάριθμα αὐτῶν καὶ ἀντιστοίχως ἵσα πρὸς αὐτά, ἔχοντα τὸν αὐτὸν παρονομαστήν, ἢν πολλαπλασιάσωμεν τοὺς ὅρους ἑκάστου τῶν διοθέντων μὲ τὸ γινόμενον τῶν παρονομαστῶν τῶν ἄλλων.

$$\text{Π.χ. } \text{ἔχομεν διὰ τὰ κλάσματα } \frac{\alpha}{\beta}, \frac{\alpha_1}{\beta_1}, \frac{\alpha_2}{\beta_2}$$

$$\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\alpha \cdot \beta_1 \cdot \beta_2}{\beta \cdot \beta_1 \cdot \beta_2}, \frac{\alpha_1}{\beta_1} = \frac{\alpha_1 \cdot \beta \cdot \beta_2}{\beta_1 \cdot \beta \cdot \beta_2}, \frac{\alpha_2}{\beta_2} = \frac{\alpha_2 \cdot \beta \cdot \beta_1}{\beta_2 \cdot \beta \cdot \beta_1},$$

εἶναι δὲ τὰ εύρεθέντα δόμωνυμα.

Είναι φανερόν, ὅτι δυνάμεθα νὰ τρέψωμεν διοθέντα ἐτερώνυμα κλάσματα εἰς δόμωνυμα, διὰ τῆς χρησιμοποιήσεως τοῦ ἐλαχίστου κοινοῦ πολλαπλασίου τῶν παρονομαστῶν των (ἄν εἶναι τοῦτο σκόπιμον).

7η. Τὸ γινόμενον δύο κλασμάτων εἶναι κλάσμα μὲ ἀριθμητὴν τὸ γινόμενον τῶν ἀριθμητῶν καὶ παρονομαστὴν τὸ τῶν παρονομαστῶν τῶν διοθέντων.

$$\text{Π.χ. } \text{ἔχομεν } \frac{\alpha}{\beta} \cdot \frac{\gamma}{\delta} = \frac{\alpha \cdot \gamma}{\beta \cdot \delta}, \quad \frac{\alpha}{\beta} \cdot \gamma = \frac{\alpha}{\beta} \cdot \frac{\gamma}{1} = \frac{\alpha \cdot \gamma}{\beta}.$$

8η. Διὰ νὰ διαιρέσωμεν ἀριθμὸν διὰ κλάσματος ἀρκεῖ νὰ πολλαπλασιάσωμεν ἐπὶ τὸ ἀντίστροφον κλάσμα τοῦ διοθέντος.

$$\begin{aligned} \text{Οὕτως } \text{ἔχομεν } \frac{\gamma}{\left(\frac{\alpha}{\beta}\right)} &= \gamma \cdot \frac{\beta}{\alpha} = \frac{\gamma \cdot \beta}{\alpha}, \quad \left(\frac{\alpha}{\beta}\right) : \left(\frac{\alpha'}{\beta'}\right) = \frac{\left(\frac{\alpha}{\beta}\right)}{\left(\frac{\alpha'}{\beta'}\right)} = \\ &= \frac{\alpha}{\beta} \cdot \frac{\beta'}{\alpha'} = \frac{\alpha \cdot \beta'}{\beta \cdot \alpha'}, \end{aligned}$$

$$1: \frac{\alpha}{\beta} = \frac{1}{\left(\frac{\alpha}{\beta}\right)} = \frac{\beta}{\alpha}, \quad \frac{\alpha}{\beta} : \gamma = \frac{\left(\frac{\alpha}{\beta}\right)}{\gamma} = \frac{\left(\frac{\alpha}{\beta}\right)}{\left(\frac{\gamma}{1}\right)} = \frac{\alpha}{\beta} \cdot \frac{1}{\gamma} = \frac{\alpha}{\beta \cdot \gamma}.$$

### Α σ ρ η σ εις

50. Εύρετε τὰ ἔξαγόμενα τῶν

$$\frac{-25}{-15} \quad \frac{-3}{48} \quad \frac{-121}{-4.11} \quad \frac{5}{-8} \cdot \frac{4}{-9} \cdot \frac{1}{2} \quad \frac{3}{-2} \cdot \frac{-8}{5} \cdot \frac{2}{-11} \cdot \frac{11}{-120}$$

51. Τρέψατε εἰς δόμωνυμα τὰ ἐπόμενα κλάσματα μὲ τὸ ἐλάχιστον κοινὸν πολλαπλασίον τῶν παρονομαστῶν των:

$$\alpha') \quad -\frac{2}{3}, \quad -\frac{5}{8}, \quad -\frac{1}{2}, \quad \delta') \quad -\frac{3}{8}, \quad -\frac{4}{25}, \quad \frac{2}{9}, \quad \frac{1}{3}$$

$$\beta') \quad -\frac{3}{4}, \quad -\frac{4}{9}, \quad \frac{1}{2}, \quad \frac{3}{5} \quad \epsilon') \quad -\frac{5}{7}, \quad \frac{4}{21}, \quad -\frac{2}{3}, \quad -\frac{5}{8}, \quad \frac{1}{2}$$

$$\gamma') \quad -\frac{11}{15}, \quad -\frac{32}{45}, \quad \frac{2}{3}, \quad \frac{7}{5} \quad \sigma') \quad -\frac{1}{2}, \quad \frac{1}{3}, \quad -\frac{5}{6}, \quad -\frac{7}{8}, \quad \frac{1}{4}$$

## Ε'. ΠΕΡΙ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΑΛΓΕΒΡΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

### 1. ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕ ΕΚΘΕΤΑΣ ΑΚΕΡΑΙΟΥΣ ΘΕΤΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

**§ 32.** Καθώς ( εἰς τὴν Ἀριθμητικὴν ) τὸ γινόμενον παραγόντων ἵσων μὲ ἔντι ἀριθμόν, π.χ.  $3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3$ , καπλοῦμεν **τετάρτην δύναμιν** τοῦ 3 καὶ παριστάνομεν αὐτὸ μὲ τὸ  $3^4$ , οὕτω καὶ τὸ γινόμενον ἵσων παραγόντων, π.χ. τὸ  $(-5) \cdot (-5)$ , καλεῖται **δευτέρα δύναμις** τοῦ  $(-5)$  καὶ παριστάνεται μὲ τὸ  $(-5)^2$ . Όμοιώς τὸ  $(-3) \cdot (-3)$  λέγεται δευτέρα δύναμις τοῦ  $(-3)$  καὶ παριστάνεται μὲ τὸ  $(-3)^2$ . Τὸ  $(+9) \cdot (+9) \cdot (+9)$  παριστάνεται μὲ  $(+9)^3$  καὶ λέγεται τρίτη δύναμις τοῦ  $(+9)$ . Τὸ  $(-7) \cdot (-7) \cdot (-7) = (-7)^3$  καὶ λύγεται τρίτη δύναμις τοῦ  $(-7)$ . Ἐν γένει :

Καλοῦμεν δύναμιν ἐνὸς σχετικοῦ ἀριθμοῦ, τὸ γινόμενον παραγόντων ἵσων μὲ αὐτὸν τὸν ἀριθμόν.

‘Ο μὲν ἀριθμός, ὁ ὄποιος ἐκφράζει τὸ πλῆθος τῶν ἵσων παραγόντων τοῦ γινομένου καλεῖται **ἐκθέτης τῆς δυνάμεως**, ὁ δὲ ἀριθμός, τοῦ ὄποιου ἔχομεν τὴν δύναμιν λέγεται **βάσις τῆς δυνάμεως**. Ἡ δευτέρα δύναμις ἐνὸς ἀριθμοῦ λέγεται καὶ **τετράγωνον** τοῦ ἀριθμοῦ, ἡ δὲ τρίτη δύναμις καὶ **κύβος** τοῦ ἀριθμοῦ. Κατὰ ταῦτα ἔχομεν ὅτι  $(-7)^2 = (-7) \cdot (-7) = 49$ ,  $(-5) \cdot (-5) \cdot (-5) \cdot (-5) = (-5)^4$ .

$$\left(-\frac{1}{2}\right)^3 = \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{8}.$$

Ἐν γένει, τὸ  $\alpha^{\mu} = \underbrace{\alpha \cdot \alpha \cdot \alpha \cdots \alpha}_{\mu \text{ παραγόντες}}$  ὅπου τὸ  $\alpha$  φανερώνει σχετικὸν ἀριθμόν, τὸ δὲ μ ἀκέραιον καὶ θετικόν. Τὸ  $\alpha^{\mu}$  καλεῖται **μιοστὴ** ( $\mu^{\text{η}}$ ) δύναμις τοῦ  $\alpha$ .

Κατὰ ταῦτα ἔχομεν :

$(-1)^0 = (-1) \cdot (-1) = 1$ ,  $(-1)^{2v} = +1$ ,  $(-1)^{2v+1} = -1$ , ὅπου τὸ ν παριστάνει ἀριθμὸν ἀκέραιον θετικόν. Ἡτοι :

Πᾶσα δύναμις τῆς  $-1$  μὲν ἐκθέτην ἀρτιον ἀριθμὸν ισοῦται μὲν  $1$ , μὲν ἐκθέτην δὲ περιττὸν ισοῦται μὲν  $-1$ .

Ἐπομένως εἶναι  $(-1)^v = \pm 1$  καὶ εἶναι  $+1$  μὲν ἂν ν ἀρτιος,  $-1$  δὲ ἂν ν περιττός.

### Α σ κήσεις

52. Εὕρετε τὰ ἔξαγόμενα τῶν κάτωθι δυνάμεων:  
 $\alpha')$   $(-6)^3$     $\beta')$   $(-9)^2$     $\gamma')$   $(+8)^5$     $\delta')$   $(-3)^3$     $\epsilon')$   $(-7)^5$     $\sigma\tau')$   $(-1)^3$

53. Δείξατε διὰ παραδειγμάτων ότι πᾶσα δύναμις ἀρνητικοῦ ἀριθμοῦ, ἔχουσα ἐκθέτην ἀρτιον καὶ θετικόν, εἶναι ἀριθμὸς θετικός· περιττὸν δὲ ἐκθέτην ἔχουσα εἶναι ἀρνητικός.

## 2. ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ $\alpha^1$ ΚΑΙ $\alpha^0$ ΩΣ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

**6 33.** Κατὰ τὸν ὄρισμὸν τῆς δυνάμεως ἀριθμοῦ ἔχομεν ότι π.χ.

$$\alpha^5 = \alpha \cdot \alpha \cdot \alpha \cdot \alpha \cdot \alpha, \quad \alpha^4 = \alpha \cdot \alpha \cdot \alpha \cdot \alpha, \quad \alpha^3 = \alpha \cdot \alpha \cdot \alpha, \quad \alpha^2 = \alpha \cdot \alpha$$

Ἐκ τούτων διακρίνομεν ότι, ὅταν ὁ ἐκθέτης μιᾶς δυνάμεως τοῦ α ἐλαττοῦται κατὰ μονάδα, τὸ γινόμενον, τὸ ὅποιον ὄριζει τὴν δύναμιν ταύτην διαιρεῖται δι' ἐνὸς τῶν ἵσων παραγόντων αὐτοῦ. Ἀν δεχθῶμεν ότι τοῦτο ἴσχυει καὶ δι' ἐκθέτας (ἀκεραίους) μικροτέρους τοῦ 2, θὰ ἔχωμεν ότι  $\alpha^{2-1} = (\alpha \cdot \alpha) : \alpha$ .

Ἄλλα τὸ  $\alpha^{2-1}$  ισοῦται μὲν  $\alpha^1$ , τὸ δὲ  $(\alpha \cdot \alpha) : \alpha = \mu \epsilon \alpha$ . Ἀρα εἶναι  $\alpha^1 = \alpha$ . Τοῦτο δόδηγει εἰς τὸν ἔσχης ὄρισμὸν τοῦ  $\alpha^1$ .

Ἡ πρώτη δύναμις ἐνὸς ἀλγεβρικοῦ ἀριθμοῦ ισοῦται μὲν αὐτὸν τὸν ἀριθμόν.

Κατ' ἀναλογίαν πρὸς τ' ἀνωτέρω, θὰ ἔχωμεν ότι  $\alpha^{1-1} = \alpha : \alpha = 1$ , ἀλλὰ ό  $\alpha^{1-1} = \alpha^0$ . Ἀρα εἶναι  $\alpha^0 = 1$ , ὅταν εἶναι τὸ  $\alpha \neq 0$ .

Οὕτως ἔχομεν τὸν ἔσχης ὄρισμὸν τοῦ  $\alpha^0$ :

Τὸ  $\alpha^0$ , ὅπου τὸ  $\alpha$  εἶναι ἀριθμός  $\tau i s \neq 0$ , ισοῦται μὲν τὴν μονάδα.

Κατὰ ταῦτα ἔχομεν :

$$(-3)^0 = 1, \quad 47^0 = 1, \quad (-10)^0 = 1, \quad \left(-\frac{3}{5}\right)^0 = 1$$

$$(-2)^1 = -2, \quad \left(-\frac{3}{5}\right)^1 = -\frac{3}{5}, \quad 4,3^1 = 4,3$$

### 3. ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

**§ 34.** Γνωρίζομεν (έκ της 'Αριθμητικῆς) ὅτι :

Τὸ γινόμενον δύο δυνάμεων ἐνὸς ἀριθμοῦ εἶναι δύναμις αὐτοῦ ἔχουσα ἐκθέτην τὸ ἀθροισμα τῶν ἐκθετῶν τῶν παραγόντων.

'Η ιδιότης αὗτη ἰσχύει καὶ ἂν ἡ βάσις εἶναι σχετικὸς ἀριθμός, οἱ δὲ ἐκθέται θετικοὶ καὶ ἀκέραιοι. Πράγματι, ἐὰν ἔχωμεν τὸ γινόμενον π.χ.  $\alpha^3 \cdot \alpha^2$  θὰ εἶναι  $\alpha^3 = \alpha \cdot \alpha \cdot \alpha$ ,  $\alpha^2 = \alpha \cdot \alpha$  καὶ ἐπομένως τὸ

$$\alpha^3 \cdot \alpha^2 = \alpha \cdot \alpha \cdot \alpha \cdot \alpha \cdot \alpha = \alpha^6.$$

'Ομοίως εύρισκομεν ὅτι π.χ. εἶναι  $x^4 \cdot x^2 = x^6$  καὶ ἐν γένει τὸ γινόμενον  $\alpha^{\mu} \cdot \alpha^{\nu}$ , ὅπου μ καὶ ν εἶναι ἀκέραιοι καὶ θετικοὶ ἀριθμοὶ τὸ δὲ α σχετικὸς τις ἀριθμός, ἰσοῦται μὲν  $\alpha^{\mu+\nu}$ .

Διότι ἔχομεν ὅτι  $\alpha^{\mu} = \underbrace{\alpha \cdot \alpha \cdot \alpha \cdot \alpha \dots \alpha}_{\mu \text{ παράγοντες}}, \alpha^{\nu} = \underbrace{\alpha \cdot \alpha \cdot \alpha \cdot \alpha \dots \alpha}_{\nu \text{ παράγοντες}}$

ἐπομένως εἶναι  $\alpha^{\mu} \cdot \alpha^{\nu} = \underbrace{\alpha \cdot \alpha \dots \alpha}_{\mu \text{ παράγοντες}} \cdot \underbrace{\alpha \cdot \alpha \dots \alpha}_{\nu \text{ παράγοντες}} = \alpha \cdot \alpha \cdot \alpha \dots \alpha = \alpha^{\mu+\nu}.$

'Ομοίως ἀποδεικνύεται ὅτι τὸ γινόμενον  $\alpha^{\mu} \cdot \alpha^{\nu} \cdot \alpha^{\rho} \dots \alpha^{\lambda} = \alpha^{\mu+\nu+\rho+\dots+\lambda}$ , ὅπου τὸ α εἶναι σχετικὸς τις ἀριθμός, τὰ δὲ μ, ν, ρ, ...λ ἀκέραιοι καὶ θετικοί.

'Εκ τῶν ἀνωτέρω ἔπειται ὅτι :

Τὸ γινόμενον ὄσωνδήποτε δυνάμεων ἐνὸς σχετικοῦ ἀριθμοῦ εἶναι δύναμις τοῦ αὐτοῦ ἀριθμοῦ, ἔχουσα ἐκθέτην τὸ ἀθροισμα τῶν ἐκθετῶν τῶν παραγόντων.

#### "Α σ κ η σ ις

- 54.** Εύρετε τὰ ἔξαγόμενα τῶν κάτωθι δυνάμεων :
- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> α') $(-2)^2 \cdot (-2)^3$ | <input type="checkbox"/> β') $(-3)^4 \cdot (-3)^2$   | <input type="checkbox"/> γ') $(-5)^2 \cdot (-5)^3$ |
| δ') $(1,5)^3 \cdot (1,5)^2$                        | <input type="checkbox"/> ε') $\left(-\frac{1}{2}\right)^2 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)^3 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)^4$ |  |
| στ') $(-5,1)^3 \cdot (5,1)^4$                      | <input type="checkbox"/> ζ') $(0,5^6 \cdot 0,5^{10}) \cdot 0,5^3$  |  |

\* 'Η 4η δύναμις ἀριθμοῦ καλεῖται ὑπὸ τοῦ Διοφάντου εἰς τὸ ἔργον του « 'Αριθμητικὰ βιβλία » VI, καθὼς καὶ ὑπὸ τοῦ "Ἡρωνος, δυναμοδύναμις, ἡ 5η δύναμις καλεῖται δυναμόκυβος, ἡ 6η κυβόκυβος, τὸ  $\frac{1}{x^2}$  λέγεται ἀριθμοστόν,

τὸ  $\frac{1}{x^3}$  δυναμοστόν, τὸ  $\frac{1}{x^4}$  κυβοστόν, καὶ τὸ  $\frac{1}{x^5}$  κυβοκυβοστόν.

**§ 35.** Εστω ὅτι  $\zeta$  ητοῦμεν τὸ  $[(-5)^3]^2$ . Τοῦτο ἴσοῦται  $(-5)^3 \cdot (-5)^3 = (-5)^{3+3} = (-5)^{3 \cdot 2}$ .

Εστω ὅτι θέλομεν νὰ εὔρωμεν τὸ  $(2^3)^2$ . Τοῦτο σημαίνει νὰ σχηματίσωμεν τὸ γινόμενον δύο παραγόντων ἵσων μὲ τὸ  $2^3$ , ἥτοι τὸ  $2^3 \cdot 2^3 = 2^{3+3} = 2^{3 \cdot 2}$ . Ομοίως εύρισκομεν ὅτι εἶναι  $(\alpha^3)^4 = \alpha^{3 \cdot 4}$  καὶ ἐν γένει ὅτι  $(\alpha^u)^v = \alpha^{u \cdot v}$ , ὅπου α μὲν εἶναι σχετικός τις ἀριθμός, μ καὶ ν δὲ ἀκέραιοι καὶ θετικοὶ ἀριθμοί.

Ἐκ τούτων ἔπειται ὅτι :

Αν δύναμις τις ἀριθμοῦ ἀλγεβρικοῦ ὑψωθῆ εἰς δύναμιν, προκύπτει δύναμις τοῦ αὐτοῦ ἀριθμοῦ ἔχουσα ἐκθέτην τὸ γινόμενον τῶν δύο ἐκθετῶν.

### Άσκήσεις

**55.** Εύρετε τὰ ἔξαγόμενα τῶν :

$\alpha)$ $[( -2 )^2]^3$	$\beta)$ $[( -3 )^2]^2$	$\gamma)$ $[( -1 )^2]^3$
$\delta)$ $[( -1 )^3]^3$	$\epsilon')$ $\left[ \left( -\frac{3}{5} \right)^2 \right]^2$	$\sigma\tau')$ $\left[ [ ( -10 )^2 ]^3 \right]^5$

56. Εύρετε τὰ ἔξαγόμενα τῶν :

$\alpha')$ $[(0,2)^2]^4$	$\beta')$ $[(0,4)^2]^2$	$\gamma')$ $[(1,5)^2]^3$
$\delta')$ $[(0,5)^2]^3 \cdot [( -3 )^4]^2$ , $\left[ \left( -\frac{4}{5} \right)^2 \right]^3$	$\epsilon')$ $\left[ [ ( -5 )^2 ]^3 \right]^2$	$\sigma\tau')$ $\left[ \left[ \left( -\frac{4}{5} \right)^2 \right]^3 \right]$

**§ 36.** Εύκολως ἀποδεικνύεται ὅτι :

Διὰ νὰ ὑψώσωμεν γινόμενον σχετικῶν παραγόντων εἰς δύναμιν, ἀρκεῖ νὰ ὑψώσωμεν ἔκαστον τῶν παραγόντων τοῦ γινομένου εἰς τὴν δύναμιν αὐτὴν καὶ νὰ πολλαπλασιάσωμεν τὰ ἔξαγόμενα ταῦτα.

Πράγματι ἔχομεν ὅτι (ἄν τὸ ν εἶναι ἀκέραιος καὶ θετικὸς ἀριθμὸς)  $(2 \cdot 3)^2 = (2 \cdot 3) \cdot (2 \cdot 3) = (2 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 3) = 2^2 \cdot 3^2$

$$[(-5) \cdot (-3)]^3 = (-5) \cdot (-3) \cdot (-5) \cdot (-3) \cdot (-5) \cdot (-3) = \\ = (-5) \cdot (-5) \cdot (-5) \cdot (-3) \cdot (-3) \cdot (-3) = (-5)^3 \cdot (-3)^3$$

καὶ γενικῶς ὅτι

$$\begin{aligned} (\alpha \cdot \beta \cdot \gamma)^v &= (\underbrace{\alpha \cdot \beta \cdot \gamma}_{n \text{ παράγοντες}}) \cdot (\underbrace{\alpha \cdot \beta \cdot \gamma}_{n \text{ παράγοντες}}) \cdots (\underbrace{\alpha \cdot \beta \cdot \gamma}_{n \text{ παράγοντες}}) = \\ &= \underbrace{\alpha \cdot \alpha \cdot \alpha \cdots \alpha}_{n \text{ παράγοντες}} \cdot \underbrace{\beta \cdot \beta \cdot \beta \cdots \beta}_{n \text{ παράγοντες}} \cdot \underbrace{\gamma \cdot \gamma \cdot \gamma \cdots \gamma}_{n \text{ παράγοντες}} = \alpha^v \cdot \beta^v \cdot \gamma^v \end{aligned}$$

§ 37. Ἐπίστης ἀποδεικνύεται εὐκόλως ὅτι :

Κλάσμα, τοῦ δοποίου οἱ ὅροι εἶναι σχετικοὶ ἀριθμοί, ὑψοῦται εἰς δύναμιν, ἐὰν ἔκαστος τῶν ὅρων του ὑψωθῇ εἰς τὴν δύναμιν ταύτην.

$$\text{Οὕτως ἔχομεν } \left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^{\mu} = \frac{\alpha^{\mu}}{\beta^{\mu}}, \text{ διότι τὸ}$$

$$\left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^{\mu} = \frac{\alpha}{\beta} \cdot \frac{\alpha}{\beta} \cdot \frac{\alpha}{\beta} \cdots \frac{\alpha}{\beta} = \underbrace{\frac{\alpha \cdot \alpha \cdot \alpha \cdots \circ}{\beta \cdot \beta \cdot \beta \cdots \beta}}_{\mu \text{ παράγοντες}} = \frac{\alpha^{\mu}}{\beta^{\mu}}$$

ὅπου τὸ μ φανερώνει ἀριθμὸν ἀκέραιον καὶ θετικόν, τὰ δὲ α καὶ β ἀριθμοὺς σχετικούς.

### "Α σ κ η σ τις

57. Εὑρετε τὰ ἔξαγομενα τῶν κάτωθι δυνάμεων :

$$\alpha') [(-2) \cdot (-3)]^2$$

$$\beta') [(+1) \cdot (-2)]^4$$

$$\gamma') [(-1) \cdot (-2) \cdot (-3)]^2$$

$$\delta') [2 \cdot 3 \cdot (-4) \cdot (-2)]^2$$

$$\epsilon') [(-2) \cdot (-3) \cdot 4 \cdot 1 \cdot 0,5]^3$$

$$\sigma') [(-1) \cdot (-2) \cdot (+3)]^3$$

$$\zeta') \left[ \left( -\frac{5}{8} \right) \cdot \left( \frac{2}{3} \right) \right]^3$$

$$\eta') \left[ \left( \frac{5}{8} \right) \cdot \left( -\frac{4}{9} \right) \right]^2$$

$$\theta') \left[ (-5)^2 \cdot (-6)^3 \cdot \left( -\frac{5}{9} \right) \right]^2$$

$$\iota') \left[ \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{9} \cdot \left( -\frac{1}{2} \right) \right]^2$$

$$\iota\alpha') \left[ 2 \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{2}{9} \cdot (-0,1) \right]^2$$

$$\iota\beta') \left[ \frac{2}{5} \cdot \frac{4}{9} \cdot \frac{-3}{7} \cdot 0,4 \right]^3$$

$$\iota\gamma') \left[ \left( \frac{3}{4} \right)^2 \cdot \left( \frac{\alpha}{\beta} \right)^3 \cdot \left( -\frac{4}{9} \right)^3 \right]^4$$

§ 38. Ἐστω ὅτι θέλομεν νὰ εὕρωμεν τὸ πηλίκον τῆς δυνάμεως  $2^5$  διὰ τῆς  $2^2$ . Γνωρίζομεν (ἐκ τῆς Ἀριθμητικῆς) ὅτι τὸ πηλίκον τοῦτο  $2^5 \cdot 2^2 = 2^{5-2} = 2^3$ . Ἡτοι ὅτι :

Τὸ πηλίκον δύο δυνάμεων ἔνδος ἀριθμοῦ εἶναι δύναμις τοῦ αὐτοῦ ἀριθμοῦ, ἔχουσα ἐκθέτην τὴν διαφορὰν τῶν ἐκθετῶν τοῦ διαιρετέου μεῖον τοῦ διαιρέτου.

Ἡ ἴδιότης αὗτη ἰσχύει καὶ ὅταν ἡ βάσις τῶν δυνάμεων εἶναι σχετικός τις ἀριθμός, οἱ ἐκθέται ἀκέραιοι καὶ θετικοί, ἐκ τούτων δὲ ὁ τοῦ διαιρέτου μεγαλύτερος ἢ ἵσος μὲ τὸν τοῦ διαιρέτου. Οὕτω τὸ πηλίκον

$$(-5)^4 : (-5)^2 = \frac{(-5) \cdot (-5) \cdot (-5) \cdot (-5)}{(-5) \cdot (-5)} = (-5) \cdot (-5) = (-5)^2 = (-5)^{4-2}$$

δύοις τό  $(-3)^6 : (-3)^3 = \frac{(-3) \cdot (-3) \cdot (-3) \cdot (3) \cdot (-3) \cdot (-3)}{(-3) \cdot (-3) \cdot (-3)} =$

$$(-3) \cdot (-3) \cdot (-3) = (-3)^3 = (-3)^{6-3}.$$

\* Έν γένει τό πηλίκον

$$\alpha^{\mu} : \alpha^{\nu} = \frac{\alpha^{\mu}}{\alpha^{\nu}} = \frac{\overbrace{\alpha \cdot \alpha \cdot \alpha \cdots \alpha}^{\mu \text{ παράγοντες}}}{\underbrace{\alpha \cdot \alpha \cdot \alpha \cdots \alpha}_{\nu \text{ παράγοντες}}} = \overbrace{\alpha \cdot \alpha \cdot \alpha \cdots \alpha}^{\mu - \nu \text{ παράγοντες}} = \alpha^{\mu - \nu}$$

ὅπου  $\alpha$  παριστάνει σχετικὸν τινα ἀριθμὸν καὶ  $\mu$ ,  $\nu$  θετικοὺς καὶ ἀκεραίους, δὲ  $\mu$  εἶναι μεγαλύτερος ἢ ἵσος μὲ τὸν  $\nu$ .

*Παρατήρησις.* Ἡ εἰς τὴν § 34 σημασία τῶν  $\alpha^0$  καὶ  $\alpha^1$  προκύπτει καν ἀν ύποθέσωμεν ὅτι ἵσχυε ἡ θεμελιώδης ιδιότης τοῦ γινομένου δυνάμεων τοῦ αὐτοῦ ἀριθμοῦ, θεωρουμένων τῶν  $\alpha^0$  καὶ  $\alpha^1$  ὡς δυνάμεων τοῦ  $\alpha$ . Πράγματι, ἔχομεν τότε  $\alpha^0 \cdot \alpha^{\mu} = \alpha^0 + \mu = \alpha^{\mu}$ . \* Εὰν δὲ διαιρέσωμεν τὰ ἵσα  $\alpha^0 \cdot \alpha^{\mu}$  καὶ  $\alpha^{\mu}$  διὰ τοῦ  $\alpha^{\mu}$ , εὑρίσκομεν ὅτι εἴναι  $\alpha^0 = 1$ .

\* Όμοίως ἔχομεν  $\alpha^1 \cdot \alpha^{\mu} = \alpha^{1+\mu} = \alpha^{\mu} \cdot \alpha$ , καὶ διαιροῦντες τὰ ἵσα ταῦτα διὰ τοῦ  $\alpha^{\mu}$  ἔχομεν  $\alpha^1 = \alpha$ .

### \* Α σ κ η σ ει τ ζ

58. Νὰ εύρεθοῦν τὰ γινομένα:

$$\alpha') x^5 \cdot x^3 \quad \beta') \psi^3 \cdot \psi^4 \quad \gamma') x^6 \cdot x \quad \delta') (-x^4)^2 \quad \epsilon') (-\beta^5)^3 \quad \sigma\tau') x^2 \cdot x \\ \zeta') x^{2v} \cdot x \cdot (-x)^{2v} \quad \eta') x^{2v-1} \cdot x \cdot (-x) \quad \theta') x^{2v} \cdot (-x)^3 \quad \iota') x^{2v-1} \cdot x^{2v} \\ \cdot \psi^{3\mu-1} \cdot \psi^2.$$

59. Όμοίως τά:

$$\alpha') (4\alpha\beta)^2 \quad \beta') (-3x\psi)^3 \quad \gamma') (5x^2)^2 \quad \delta') (-x\psi\omega)^1 \quad \epsilon') \left(-\frac{2}{3}x^2\psi\right) \\ \sqrt{\sigma\tau'} \left(-\frac{1}{5}x\psi^2\right)^3 \quad \zeta') \left(-\frac{3}{4}x^2\right)^0 \quad \eta') \left(\frac{5}{8}x^{2v}\right)^n \\ \theta') \left(\frac{5}{8}x^2\psi\right)^3 \cdot (4\alpha\beta)^0 \cdot (3\alpha^2\beta^3)^2.$$

60. Νὰ εύρετε τά:

$$\alpha') 2^5 : 2^3 \quad \beta') (-2)^5 : (-2)^3 \quad \gamma') (-7)^9 : (-7)^5 \\ \delta') (-3)^5 : (-3)^2 \quad \epsilon') \left(-\frac{3}{7}\right)^5 : \left(-\frac{3}{7}\right)^3 \quad \sigma\tau') (-5,3)^6 : (-5,3) \\ \zeta') [(-3) \cdot 5 \cdot 7] : (-3 \cdot 5 \cdot 7)^4 \quad \eta') [(-1) \cdot (-3) \cdot 5 \cdot 7]^1 : [(-1) \cdot (-3) \cdot 5 \cdot 7]^5$$

#### 4. ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕ ΕΚΘΕΤΑΣ ΑΚΕΡΑΙΟΥΣ ΑΡΝΗΤΙΚΟΥΣ

**§ 39.** \*Εστω ότι θέλομεν νὰ εύρωμεν τί παριστάνει τὸ σύμβολον  $\alpha^{-1}$ , ὅπου τὸ  $\alpha$  εἶναι σχετικὸς τις ἀριθμὸς  $\neq 0$ .

\*Αν δεχθῶμεν ότι ἡ θεμελιώδης ἴδιότης τοῦ γινομένου δύο δυνάμεων τοῦ αὐτοῦ ἀριθμοῦ ἵσχει καὶ ὅταν ὁ εἰς ἐκθετῶν εἴναι ἀρνητικὸς ἀριθμὸς π.χ.  $o = -1$ , θὰ ἔχωμεν  $\alpha^1 \cdot \alpha^{-1} = \alpha^{1-1} = \alpha = 1$ .

Διαιροῦντες τὰ μέλη τῆς ἴστοτητος  $\alpha^1 \cdot \alpha^{-1} = 1$  διὰ τοῦ  $\alpha^1$ , εὑρίσκομεν  $\alpha^{-1} = \frac{1}{\alpha^1}$ .

Καθ' ὅμοιον τρόπον ἔχομεν  $\alpha^{-2} = \frac{1}{\alpha^2}$ ,  $\alpha^{-3} = \frac{1}{\alpha^3}$  καὶ γενικῶς  $\alpha^{-v} = \frac{1}{\alpha^v}$ , ὅπου τὸ  $v$  παριστάνει ἀκέραιον καὶ θετικὸν ἀριθμόν, τὸ δὲ  $\alpha$  σχετικὸν  $\neq 0$ . \*Ἐκ τούτου ὁδηγούμενοι δίδομεν τὸν ἔξιτην ὀρισμὸν τῆς σημασίας δυνάμεως μὲ ἀκέραιον ἀρνητικὸν ἐκθέτην.

Δύναμίς τις ἀριθμοῦ ( $\neq 0$ ), μὲ ἐκθέτην δοθέντα ἀκέραιον ἀρνητικὸν ἀριθμόν, παριστάνει αλάσμα ἔχον ἀριθμητὴν μὲν τὴν μονάδα, παρονομαστὴν δὲ τὴν δύναμιν τοῦ αὐτοῦ ἀριθμοῦ ἔχουσαν ἐκθέτην τὸν ἀντίθετον τοῦ δοθέντος.

$$\text{Κατὰ ταῦτα εἶναι: } 5^{-1} = \frac{1}{5^1} = \frac{1}{5}, \quad 5^{-2} = \frac{1}{5^2} = \frac{1}{25}, \\ \left(\frac{1}{4}\right)^{-2} = \frac{1}{\left(\frac{1}{4}\right)^2} = \frac{1}{\frac{1}{16}} = 16, \quad \left(-\frac{1}{2}\right)^{-3} = \frac{1}{\left(-\frac{1}{2}\right)^3} = \frac{1}{-\frac{1}{8}} = -8.$$

Γενικῶς  $\alpha^{-|v|} = \frac{1}{\alpha^{|v|}}$ , ἔνθα  $v$  σχετικὸς ἀκέραιος ἀριθμός.

**§ 40.** Αἱ ἴδιότητες τῶν δυνάμεων μὲ ἐκθέτας θετικοὺς καὶ ἀκεραιοὺς ἀριθμοὺς ἀληθεύουν καὶ ἀποδεικνύονται εὐκόλως καὶ ὅταν οἱ ἐκθέται εἶναι οἰοιδήποτε ἀκέραιοι σχετικοὶ ἀριθμοί.

$$\text{Οὕτω π.χ. } \text{ἔχομεν } \alpha^3 \cdot \alpha^{-5} = \alpha^3 \cdot \frac{1}{\alpha^5} = \frac{1}{\alpha^2} = \alpha^{3-5}$$

$$\alpha^{-3} \cdot \alpha^{-5} = \frac{1}{\alpha^3} \cdot \frac{1}{\alpha^5} = \frac{1}{\alpha^8} = \alpha^{-8} = \alpha^{-3-5}$$

$$\alpha^{-|\mu|} : \alpha^{-|v|} = \frac{1}{\alpha^{|\mu|}} : \frac{1}{\alpha^{|v|}} = \frac{1}{\alpha^{|\mu|}} \cdot \alpha^{|v|} = \alpha^{|v|} \cdot \alpha^{-|\mu|} = \alpha^{|v|-|\mu|} = \alpha^{-|\mu| - (-|v|)}$$

$$\text{*Ἐπίσης } \text{ἔχομεν ότι } (\alpha \cdot \beta)^{-|v|} = \frac{1}{(\alpha \cdot \beta)^{|v|}} = \frac{1}{\alpha^{|v|} \cdot \beta^{|v|}}, \text{ ὅπου } v \text{ παριστάνει σχετικὸν ἀριθμὸν ἀκέραιον.}$$

**Παρατήρησις.** Μετά τὴν παραδοχὴν τῶν δυνάμεων μὲν ἐκθέτας ἀρνητικὸν ἀκεραίους, ἡ ἴδιότης τοῦ πηλίκου δύο δυνάμεων τοῦ αὐτοῦ ἀριθμοῦ μὲν ἐκθέτας ἀκεραίους ισχὺει πάντοτε, ἀνευ οὐδεμιᾶς ἐξαιρέσεως (δηλαδὴ καὶ ὅταν ὁ ἐκθέτης τοῦ διαιρετέου εἴναι μικρότερος ἀπὸ τὸν τοῦ διαιρέτου). Οὕτω π.χ. ἔχομεν:

$$\alpha^5 : \alpha^7 = \frac{\alpha^5}{\alpha^7} = \frac{1}{\alpha^2} = \alpha^{-2} = \alpha^{5-7}.$$

$$\text{Όμοίως } \alpha^{-2} : \alpha^3 = \frac{1}{\alpha^2} : \alpha^3 = \frac{1}{\alpha^2 \cdot \alpha^3} = \alpha^{-5} = \alpha^{-2-3}.$$

### Ἄσκησις

61. Νὰ εύρεθοῦν τὰ ἑξαγόμενα τῶν κάτωθι δυνάμεων:

$$5^{-3}, (3,5)^{-2}, 7^{-2}, 20^{-2}, \left(\frac{3}{4}\right)^{-2}, \left(-\frac{1}{8}\right)^{-2}, (-1)^{-2v}, (-1)^{-(2v+1)}$$

$$62. \text{Όμοίως τῶν: } (-1)^{-3}, (-0,01)^{-4}, \frac{1}{2^{-3}}, \frac{1}{5^{-2}}, \frac{1}{(-7)^{-1}}$$

63. Θέσατε κατωτέρω ὃπου  $x = 1, -2, -3$  καὶ εύρετε μὲν τί ισοῦνται τὰ ἑξαγόμενα τῶν: α')  $5x^{-1} + 7x + 3x^{-1}$  β')  $\left(\frac{1}{3}\right)^{2x-2} + \left(\frac{1}{2}\right)^{3x-1} - \left(\frac{1}{4}\right)^{4x}$

$$64. \text{Νὰ εύρεθῇ μὲν τί ισοῦνται τὰ: } 2^5 \cdot 2 \cdot 2^3 \cdot 2^{-2}, 4^{-3} \cdot 4^3, \left(-\frac{2}{3}\right)^{-3}, \left(\frac{1}{0,1}\right)^{-3}$$

65. Όμοίως τῶν:

$$\text{α') } \alpha^{-2} \cdot \alpha^{-4} \cdot \alpha^0 \cdot \alpha^5 \quad \text{β') } 2^3 \cdot 20 \cdot 24 \cdot 2^{-8} \quad \text{γ') } (7^{-8} \cdot 7^{-9}) \cdot 3^{-3} \quad \text{δ') } (2\alpha\beta)^{-3}$$

$$\text{ε') } x^v \cdot x^{2v} : x^v \quad \text{στ') } 5^2 \cdot 5^{-4} \quad \zeta') (3\alpha^{-3} \cdot \beta^{-2} \cdot \gamma^{-4})^{-2} \cdot (-2\alpha^2 \cdot \beta^{-2})^2$$

66. Εύρετε τὰ:

$$\alpha') 5 \cdot 2^3 + 7 \cdot 2^3 - 9 \cdot 2^3 + 13 \cdot 2^3 - 11 \cdot 2^{-3}$$

$$\beta') 4 \cdot 6^3 - 5 \cdot (-6)^3 + 7 \cdot (-6)^3 + 9 \cdot (-6)^3 + 13 \cdot 6^3$$

$$\gamma') 5 \cdot 2^4 - 3 \cdot 2^6 - 7 \cdot 2^5 + 8 \cdot 2 + 11 \cdot 2^6$$

$$\delta') 0,75 \cdot \alpha^5 - 0,5 \cdot \alpha^4 - 0,9 \cdot \alpha^6 + 0,7 \cdot \alpha^4 + 0,8 \cdot \alpha^5 - 1,2 \cdot \alpha^4, \text{ διατ } \alpha = 5$$

67. Εύρετε τὰ:

$$\alpha') 32 \cdot 4^{-3} \quad \beta') 81 \cdot 3^{-3} \quad \gamma') \frac{2^{-5}}{4^{-3}} \quad \delta') \frac{3^{-6}}{9^{-3}} \quad \epsilon') \frac{10^{-3}}{10^{-2}} \quad \sigma\tau') \frac{(-6)^{-2}}{(-9)^{-2}}$$

$$\zeta') \frac{(-10)^{-5}}{(-15)^{-2}} \quad \eta') \frac{5}{5^{-2}} + \frac{10}{10^{-1}} + \frac{-10^2}{10^{-3}} - 100^2$$

### ΣΤ'. ΠΕΡΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

**§ 41.** Γνωρίζομεν (ἐκ τῆς Ἀριθμητικῆς) ὅτι ἂν δύο ἀριθμοὶ είναι ἄνισοι, π.χ. οἱ 5 καὶ 8, σημειώνομεν τὴν σχέσιν τῶν αὐτῶν μὲν τὸ 5 < 8 ἢ 8 > 5, ἡ ὅποια καλεῖται ἄνισότης, τὸ δὲ σύμβολον τῆς

ἀνισότητος είναι τὸ  $\langle \cdot \rangle$ . Γνωρίζομεν ἐπίστης ὅτι, ἂν εἰς ἀνίσους (θετικούς) ἀριθμούς προσθέσωμεν ἵσους, ἡ ἀνισότης δὲν μεταβάλλει φοράν. Δεχόμενοι ὅτι ἡ ἴδιότης αὐτὴ ἰσχύει καὶ ὅταν ὁ προστιθέμενος ἀριθμὸς είναι σχετικός, ἔχομεν, προσθέτοντες τὸν  $-5$  π.χ. εἰς τοὺς δύο ἀνίσους ἀριθμούς  $5$  καὶ  $8$ , ὅτι  $5 + (-5) < 8 + (-5)$  ἢ  $0 < 3$ . Εὰν εἰς τοὺς αὐτοὺς ἀνίσους ἀριθμούς  $5$  καὶ  $8$  προσθέσωμεν τὸν  $-8$ , θὰ ἔχωμεν  $5 + (-8) < 8 + (-8)$  ἢ  $-3 < 0$ .

Τὸ  $0$  εἶναι μικρότερον μὲν παντὸς θετικοῦ ἀριθμοῦ, μεγαλύτερον δὲ παντὸς ἀρνητικοῦ.

Οὕτως, ἂν ὁ σχετικὸς ἀριθμὸς  $\alpha$  εἶναι θετικός, θὰ συμβολίζωμεν τοῦτο μὲν  $\alpha > 0$ , ἂν δὲ τὸ  $\alpha$  εἶναι ἀρνητικός ἀριθμός, θὰ συμβολίζωμεν τοῦτο μὲν  $\alpha < 0$ . Κατὰ ταῦτα εἶναι πάντοτε  $|\alpha| > 0$ ,  $-|\alpha| < 0$ .

**§ 42.** Ἐστω ὅτι ἔχομεν τὴν ἀνισότητα  $5 > 0$ . Εὰν εἰς τοὺς ἀνίσους  $5$  καὶ  $0$  προσθέσωμεν τὸ  $(-7)$  π.χ., εύρισκομεν  $5 + (-7) > 0 + (-7)$  ἢ  $-2 > -7$ . Εκ τούτου καὶ ἄλλων παραδειγμάτων ὀδηγούμενοι ὁρίζομεν ὅτι :

Ἐκ δύο ἀρνητικῶν ἀριθμῶν μεγαλύτερος εἶναι ὁ ἀπολύτως μικρότερος, ἐνῷ εἶναι γνωστὸν ὅτι, ἐκ δύο θετικῶν μεγαλύτερος εἶναι ὁ ἀπολύτως μεγαλύτερος.

**§ 43.** Ἐστω ὅτι ἔχομεν τὴν ἀνισότητα  $8 > 0$ . Εὰν εἰς τοὺς ἀνίσους  $8$  καὶ  $0$  προσθέσωμεν π.χ. τὸν  $-3$ , εύρισκομεν  $8 + (-3) > 0 + (-3)$  ἢ  $5 > -3$ .

Ορίζομεν λοιπὸν ὅτι πᾶς θετικὸς ἀριθμὸς εἶναι μεγαλύτερος παντὸς ἀρνητικοῦ, π.χ.  $+5 > -13, +0,3 > -25$ .

**§ 44.** Λέγομεν ὅτι σχετικός τις ἀριθμὸς εἶναι μεγαλύτερος μὲν ἄλλῳ, ἂν ἡ διαφορὰ τοῦ δευτέρου ἀπὸ τοῦ πρώτου εἴναι θετική, μικρότερος δὲ ἂν εἶναι ἀρνητική.

Κατὰ ταῦτα, ἂν δύο σχετικοὶ ἀριθμοὶ  $\alpha$  καὶ  $\beta$  εἶναι ἀνισοί, καὶ ὁ  $\alpha$  μεγαλύτερος τοῦ  $\beta$ , σημειώνομεν τὴν σχέσιν ταύτην συμβολικῶς μὲν  $\alpha > \beta$  ἢ  $\beta < \alpha$ , ἡ διαφορὰ καλεῖται ἀνισότης καὶ τότε ἡ διαφορὰ  $\alpha - \beta$  εἴναι θετικὸς ἀριθμός. Οἱ ἀριθμοὶ  $\alpha$  καὶ  $\beta$  λέγονται μέλη τῆς ἀνισότητος. Παρατηρητέον ὅτι ἂν  $\alpha > \beta$ , ὁ  $\beta$  εἶναι μικρό-

τερος του α, ητοι είναι  $\beta < \alpha$ . Διότι, άν  $\alpha - \beta =$  θετικός, τό  $(\beta - \alpha) =$  ἀρνητικός ἀριθμός. Διὰ ταῦτα αἱ ἀνισότητες  $\alpha > \beta$  καὶ  $\beta < \alpha$  λέγονται **ἰσοδύναμοι**.

Κατὰ τ' ἀνωτέρω, δοθέντων σχετικῶν ἀριθμῶν δυνάμεθα νὰ τοποθετήσωμεν αὐτοὺς κατὰ σειράν, ὡστε νὰ βαίνουν ἀπὸ τοῦ μικροτέρου πρὸς τὸν μεγαλύτερὸν τῶν. Π.χ. άν ἔχωμεν τοὺς σχετικοὺς ἀριθμοὺς  $+5, -\frac{2}{3}, +6, -7, -15, +\frac{3}{4}, 0, -1, -6$ , ἔχομεν τὴν κατωτέρω τοποθέτησιν αὐτῶν, παρατηροῦντες ὅτι ὁ μικρότερος εἶναι ὁ  $-15$  καὶ ὁ μεγαλύτερος ὅλων ὁ  $+6$ .

$$-15 < -7 < -6 < -1 < -\frac{2}{3} < 0 < +\frac{3}{4} < +5 < +6.$$

### ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

**§ 45.** "Εστωσαν αἱ ἀνισότητες  $\alpha > \beta$  καὶ  $\gamma > \delta$ , ὅτε θὰ ἔχωμεν κατὰ τὰ ἀνωτέρω  $\alpha - \beta =$  θετικός ἀριθμός καὶ  $\gamma - \delta =$  θετικός ἀριθμός.

Παρατηροῦμεν ὅτι, ἀφοῦ  $\alpha - \beta$  είναι θετικός ἀριθμός, καὶ  $\gamma - \delta$  δόμοις θετικός, τὸ  $\alpha - \beta + \gamma - \delta$  θὰ είναι θετικός, ητοι, τὸ  $(\alpha + \gamma) - (\beta + \delta) =$  θετικός. Ἐπομένως είναι καὶ  $\alpha + \gamma > \beta + \delta$ .

"Ἐκ τούτων ἐπεται ὅτι :

"Ἐὰν εἰς ἀνίσους ἀριθμοὺς προσθέσωμεν ἀνίσους, οὕτως ὡστε ὁ μεγαλύτερος νὰ προστεθῇ εἰς τὸν μεγαλύτερον καὶ ὁ μικρότερος εἰς τὸν μικρότερον, ἡ ἀνισότης δὲν μεταβάλλει φοράν.

Οὕτω π.χ. άν ἔχωμεν τὰς  $-5 > -12$  καὶ  $-3 > -10$ , προσθέτοντες τοὺς μεγαλυτέρους καὶ τοὺς μικροτέρους χωριστά, εὑρίσκομεν :

$$-5 - 3 > -12 - 10 \quad \text{ἢ} \quad -8 > -22.$$

**§ 46.** "Εστω ὅτι ἔχομεν  $\alpha > \beta$ , ὅτε θὰ είναι  $\alpha - \beta =$  θετικός.

"Ἐπειδὴ είναι  $(\alpha + \gamma) - (\beta + \gamma) =$  θετικός, ἐπεται ὅτι  $\alpha + \gamma > \beta + \gamma$ .

"Ητοι :

"Ἄν εἰς ἀνίσους σχετικοὺς ἀριθμοὺς προσθέσωμεν τὸν αὐτὸν σχετικὸν ἀριθμόν, ἡ ἀνισότης δὲν μεταβάλλει φοράν.

"Ἐὰν είναι  $\alpha > \beta$ ,  $\gamma < \delta$ , θὰ είναι  $\alpha - \gamma > \beta - \delta$ . Διότι ἔχομεν  $\alpha - \beta =$  θετικός ἀριθμός,  $\delta - \gamma =$  θετικός ἀριθμός. 'Αλλ' είναι  $(\alpha - \beta) + (\delta - \gamma) =$  θετικός ἀριθμός  $= \alpha - \beta + \delta - \gamma = (\alpha - \gamma) - (\beta - \delta) =$  θετικός ἀριθμός, ἄρα  $\alpha - \gamma > \beta - \delta$ . π.χ.  $+5 > -2, -9 < -4$  καὶ  $5 + 9 > -2 + 4 \quad \text{ἢ} \quad +14 > +2$ .

"Αν δοθοῦν ἀνισότητες σχετικῶν ἀριθμῶν, π.χ.  $\alpha > \beta$ ,  $\gamma > \delta$ ,  $\epsilon > \zeta$ ,  $\eta > \theta$ , θὰ εἶναι καὶ  $\alpha + \gamma + \epsilon + \eta > \beta + \delta + \zeta + \theta$ .

Διότι εἶναι  $\alpha - \beta =$  θετικὸς ἀριθμός,  $\gamma - \delta =$  θετικὸς ἀριθμός.  $\epsilon - \zeta =$  θετικὸς ἀριθμός,  $\eta - \theta =$  θετικὸς ἀριθμός. "Αρα  $(\alpha - \beta) + (\gamma - \delta) + (\epsilon - \zeta) + (\eta - \theta) =$  θετικὸς ἀριθμὸς ἢ  $\alpha - \beta + \gamma - \delta + \epsilon - \zeta + \eta - \theta =$  θετικὸς ἢ  $(\alpha + \gamma + \epsilon + \eta) - (\beta + \delta + \zeta + \theta) =$  θετικός, δηλαδὴ  $\alpha + \gamma + \epsilon + \eta > \beta + \delta + \zeta + \theta$ . Π.χ. εἶναι  $+5 > 0$ ,  $+6 > -15$ ,  $-8 > -20$ , ἄρα  $+5 + 6 + (-8) > 0 + (-15) + (-20)$  ἢ  $+3 > -35$ .

**§ 47.** "Εστω ὅτι ἔχομεν  $\alpha > \beta$ , ὅτε εἶναι  $\alpha - \beta =$  θετικὸς ἀριθμός. "Αν  $\lambda > 0$  καὶ πολλαπλασιάσωμεν τὰ δύο ταῦτα ἵσα ἐπὶ  $\lambda$ , θὰ ἔχωμεν  $(\alpha - \beta)\lambda =$  θετικὸς  $\times$  θετ. = θετικὸς ἀριθμός, ἢ  $\alpha\lambda - \beta\lambda =$  θετικὸς ἀριθμός. 'Επομένως εἶναι αλ  $\geq \beta\lambda$ .

"Εστω τώρα ὅτι εἶναι  $\lambda < 0$ . "Αν τὰ ἵσα  $\alpha - \beta =$  θετικὸς ἀριθμός, πολλαπλασιάσωμεν ἐπὶ τὸν ἀρνητικὸν  $\lambda$ , θὰ εὔρωμεν  $(\alpha - \beta)\lambda =$  θετικὸς  $\times$  ἀρν. = ἀρνητικὸς ἀριθμός. 'Επομένως εἶναι αλ -  $\beta\lambda =$  ἀρν. ἦτοι αλ  $< \beta\lambda$ . "Ητοι :

'Ἐὰν τὰ μέλη ἀνισότητος πολλαπλασιάσωμεν ἐπὶ θετικὸν μὲν ἀριθμόν, ἢ ἀνισότης δὲν μεταβάλλει φοράν, ἐπὶ ἀρνητικὸν δὲ ἀντιστρέφεται.

Ούτως ἐκ τῆς ἀνισότητος  $-5 > -8$  ἔχομεν  $-5.4 > 8.4$ , ἤτοι  $-20 > -32$ , ἐνῷ ἐκ τῆς  $6 < 10$  εὐρίσκομεν μὲν πολλαπλασιασμὸν ἐπὶ  $-2$  τὴν  $6 \cdot (-2) > 10 \cdot (-2)$  ἢ  $-12 > -20$ . "Αν  $\alpha < \beta$ , εἶναι  $\alpha \cdot [-|\lambda|] > \beta \cdot [-|\lambda|]$ .

'Ἐκ τῆς ἀνωτέρω ἰδιότητος ἔχομεν ὅτι :

'Ἐὰν τὰ μέλη ἀνισότητος πολλαπλασιάσωμεν ἐπὶ  $-1$ , ἢ ἀνισότης ἀντιστρέφεται.

Π.χ. ἐκ τῆς  $3 < 5$  ἔχομεν  $3 \cdot (-1) > 5 \cdot (-1)$  ἢ  $-3 > -5$ .

**§ 48.** 'Ἐὰν εἶναι  $\alpha > \beta$ , θὰ εἶναι καὶ  $\alpha^{\mu} > \beta^{\mu}$ , ἀν οἱ  $\alpha$  καὶ  $\beta$  εἶναι θετικοί ἀριθμοί, τὸ δὲ μ ἀκέραιος θετικός. Πρὸς τοῦτο παρατηροῦμεν πρῶτον ὅτι, ἀν ἔχωμεν  $\alpha > \beta$  καὶ  $\gamma > \delta$ , εἶναι δὲ οἱ  $\alpha, \beta, \gamma, \delta$  θετικοί, θὰ εἶναι καὶ  $\alpha \cdot \gamma > \beta \cdot \delta$ . Διότι ἀφοῦ εἶναι  $\alpha > \beta$  καὶ  $\gamma > \delta$ , θὰ ἔχωμεν ὅτι

$\alpha - \beta =$  θετ. ἀριθ. ἢ  $\alpha = \beta +$  θετ. ἀριθ.

$\gamma - \delta =$  θετ. ἀριθ. ἢ  $\gamma = \delta +$  θετ. ἀριθ.

Πολλαπλασιάζοντες τὰς τελευταίας ἴσοτήτας κατὰ μέλη εύ-

ρίσκομεν  $\alpha\gamma = \beta\delta + \beta \cdot$  θετικόν  $+ \delta \cdot$  θετ.  $\times$  θετικόν. Δηλαδή :  
 $\alpha\gamma - \beta\delta =$  θετικός δριθμός. 'Επομένως είναι  $\alpha\gamma > \beta\delta$ .

Κατά ταῦτα, ἐπειδὴ εἰναι  $\alpha > \beta$ , θὰ ἔχωμεν κατά τὰ ἀνωτέρω :  
 $\alpha \cdot \alpha > \beta \cdot \beta \quad \text{ή} \quad \alpha^2 > \beta^2$ . 'Ομοίως εύρισκομεν  $\alpha^3 > \beta^3$  καὶ γενικῶς  $\alpha^\mu > \beta^\mu$ ,  
 $(\mu > 0)$ .

'Εὰν εἰναι  $\alpha > \beta$ , θὰ εἰναι  $\alpha^{-\mu} < \beta^{-\mu}$ , ἢν  $\alpha$  καὶ  $\beta$  εἰναι θετικοὶ  
 δριθμοί, τὸ δὲ  $\mu$  ἀκέραιος θετικός.

Διότι, ἀφοῦ εἰναι  $\alpha > \beta$ , ἢν πολλαπλασιάσωμεν τὰ μέλη ταύ-  
 της ἐπὶ  $\frac{1}{\alpha\beta}$ , εύρισκομεν  $\frac{\alpha}{\alpha\beta} > \frac{\beta}{\alpha\beta} \quad \text{ή} \quad \frac{1}{\beta} > \frac{1}{\alpha} \quad \text{ή} \quad \alpha^{-1} < \beta^{-1}$ . 'Ομοίως εύ-  
 σκομεν  $\alpha^{-2} < \beta^{-2}$ , καὶ γενικῶς  $\alpha^{-\mu} < \beta^{-\mu}$ ,  $(\mu > 0)$ .

Οὕτως ἢν  $|\alpha| > |\beta|$ , θὰ εἰναι  $|\alpha|^{\mu} > |\beta|^{\mu}$  καὶ  $|\alpha|^{-\mu} < |\beta|^{-\mu}$ .

### 'Α σ ρ η σ εις

68. Δείξατε ὅτι, ἔὰν τὰ μέλη ἀνισότητος εἰναι δριθμοὶ θετικοὶ καὶ τὰ ὑψώσω-  
 μεν εἰς τὴν αὐτὴν δύναμιν μὲ ἐκθέτην δρητικόν, ἡ ἀνισότης ἀντιστρέφεται. Τι  
 συμβαίνει, ἢν οἱ δριθμοὶ εἰναι ἀρνητικοί ;

69. α') Δείξατε ὅτι, ἔὰν εἰναι  $\alpha > 1$ , θὰ εἰναι καὶ  $\alpha\mu < 1$ , ἢν τὸ  $\mu < 0$ .

β') 'Εὰν εἰναι  $0 < \alpha < 1$ , θὰ εἰναι  $\alpha\mu > 1$ , ἢν τὸ  $\mu < 0$ .

γ') 'Εὰν εἰναι  $\alpha < 1$ , θὰ εἰναι  $\alpha^{-3} < \alpha^{-2} < \alpha^{-1} < \alpha^0 < \alpha < \alpha^2 < \alpha^3$ .

70. Δείξατε ὅτι, ἢν εἰναι  $\alpha > 0$ , ἀλλὰ  $\alpha < 1$ , θὰ εἰναι καὶ  
 $\alpha^{-3} > \alpha^{-2} > \alpha^{-1} > \alpha^0 > \alpha > \alpha^2 > \alpha^3$ .

71. Νὰ εύρεθοῦν τὰ πηλίκα καὶ ποία ἀνισότης συνδέει αὐτά, τὰ προκύπτον-  
 τα ἐκ τῆς διαιρέσεως τῶν μελῶν τῆς  $-8 > -23$  διὰ  $2, -\frac{1}{5}, -0,58$ .

72. Νὰ εύρεθῇ διὰ τίνας τιμάς τοῦ  $x$  ίσχύουν αἱ

$-5x < 30, 3x < 39, (-3) \cdot (-2) \cdot x > -4,8 \cdot (-22)$ .

73. Νὰ εύρεθῇ τίνας τιμάς πρέπει νὰ ἔχῃ τὸ  $x$ , ίνα ίσχύῃ ἡ ἀνισότης

$$\frac{3}{4} \cdot x < -\frac{5}{8}, -0,6x < -32, -0,8(-3) \cdot x < 120 \cdot \frac{4}{5},$$

$$(-\frac{2}{3}) \cdot (-0,6) \cdot x < -\frac{2}{5} \cdot (0,4) \cdot (-0,2).$$

### Περίληψις περιεχομένων Κεφαλαίου I.

'Ορισμὸς τῆς 'Αλγέβρας

καὶ συντόμος ιστορικὴ ἐπισκό-  
 πησις αὐτῆς (διάκρισις τριῶν  
 περιόδων ἀναπτύξεως τῆς 'Αλ-

Σύμβολα

+ (σύν ἢ καὶ) προσθέσεως  
 - (πλὴν) ἀφαίρεσεως  
 + σῆμα ἢ πρόσημον θετ. δριθμ.

γέβρας· περίοδος ρητορική, συγ- — σῆμα ἡ πρόσημον ἀρν. ἀριθμ. κεκομένη, συμβολική).

Διόφαντος. "Ελλην μαθη- | $\alpha$ | ἀπόλυτος τιμὴ ἀλγ. ἀριθμ. α.  
ματικὸς (Ἄνω αἰῶνα π.Χ.), ὁ | $\alpha$ | = θετικὸς ἀριθμὸς  
θεμελιωτὴς τῆς Ἀλγέβρας. — | $\alpha$ | = ἀρνητικὸς ἀριθμὸς  
= Ἰσον, ≠ διάφορον

Θετικοὶ καὶ ἀρνητικοὶ ἀρι- θμοί, | $\alpha$ | θετικός, — | $\alpha$ | ἀρνητικός.

Όρισμὸς ἀλγεβρικῶν ἡ σχε- + . + = +, - . - = +, + . - = -,  
τικῶν ἀριθμῶν (τὸ σύνολον τῶν - . + = -  
θετικῶν, ἀρνητικῶν καὶ τὸ 0). + : + = +, - : - = +, + : - = -,  
- : + = -

Όρισμὸς ἀθροίσματος σχετικῶν ἀριθμῶν. Ἰδιότητες τῆς προσθέσεως.

- 1)  $\alpha + \beta = \beta + \alpha$ , 2)  $\alpha + \beta + \gamma + \delta = \beta + \delta + \alpha + \gamma = \dots$   
3)  $\alpha + \beta + \gamma + \delta = (\delta + \beta) + \gamma + \alpha = \dots$  4)  $\alpha + (\beta + \gamma) + \delta = \alpha + \beta + \gamma + \delta$ .

Ο δρισμὸς τῆς ἀφαιρέσεως σχετικοῦ ἀριθμοῦ  $\beta$  ἀπὸ ἀλλον  $\alpha$ , ἦτοι  $\alpha - \beta$ ,  $0 - \alpha = -\alpha$ .

Ἀκολουθία δύο συμβόλων + ἢ - : ἂν εἴναι τὰ αὐτὰ = +,  
ἄν ἀντίθετα = -.

Όρισμὸς ἀλγεβρικοῦ ἀθροίσματος  $\alpha - (+\beta) - (+\gamma) - (-\delta) = \alpha - \beta - \gamma + \delta$ .

Τοῦτο τρέπεται εἰς ἀθροίσμα σχετικῶν ἀριθμῶν  $\alpha - \beta - \gamma + \delta = \alpha + (-\beta) + (-\gamma) + (+\delta)$ .

Δι' ἀλγεβρικὸν ἀθροίσμα ἰσχύουν αἱ ἴδιότητες τῆς προσθέσεως. Σημασία παρενθέσεως ἢ ἀγκύλης μὲν προσθετέους ἐντὸς αὐτῆς  $\alpha - (\beta - \gamma + \delta) = \alpha - \beta + \gamma - \delta = \alpha + (-\beta + \gamma - \delta)$ .

Πολλαπλασιασμὸς δύο σχετικῶν ἀριθμῶν. Τὸ γινόμενον δύο διμοσήμων εἶναι θετικόν. Τὸ γινόμενον δύο ἑτεροσήμων εἶναι ἀρνητικόν. Ἰδιότητες τοῦ γινομένου σχετικῶν ἀριθμῶν.

- 1)  $\alpha \cdot \beta = \beta \cdot \alpha$  ( νόμος τῆς ἀλλαγῆς τῆς θέσεως τῶν παραγόντων ).  
2)  $(\alpha + \beta + \gamma)ρ = \alphaρ + \betaρ + γρ$  ( ἐπιμεριστικὸς νόμος ).  
3)  $\alpha\beta\gamma \cdot \delta = (\alpha\beta) \cdot \gamma\delta = (\alpha\gamma) \cdot \beta\delta$ . 4)  $\alpha \cdot (\beta\gamma) \cdot \delta = \alpha\beta\gamma\delta$ .  
 $\alpha \cdot 0 = 0 \cdot \alpha = 0$ ,  $\alpha \cdot 1 = \alpha$ ,  $\alpha \cdot (-1) = -\alpha$ .

Διαιρεσις σχετικοῦ ἀριθμοῦ  $\alpha$  δι' ἀλλού  $\beta$  ( $\neq 0$ ) =  $\alpha : \beta = \frac{\alpha}{\beta}$

Τό πηλίκον δύμοσήμων σχετικῶν ἀριθμῶν εἶναι θετικόν, τό πηλίκον ἑτεροσήμων εἶναι ἀρνητικόν.

Διαίρεσις διὰ τοῦ 0 εἶναι ἀδύνατος.

Όρισμὸς δυνάμεως σχετικοῦ ἀριθμοῦ.

$$\alpha^{|\mu|} = \alpha \cdot \alpha \dots \alpha, \quad |\mu| \text{ παράγοντες}$$

$$\alpha^{-|\mu|} = \frac{1}{\alpha^{|\mu|}}, \quad \alpha^{\mu} \cdot \alpha^{\nu} = \alpha^{\mu+\nu}, \quad \mu, \nu \text{ ἀκέραιοι ἀριθμοί.}$$

$$\alpha^0 = 1, \quad (\alpha \neq 0), \quad \alpha^1 = \alpha, \quad (-1)^{2\nu} = +1, \quad (-1)^{2\nu+1} = -1,$$

$$(-1)^{\nu} = \pm 1 (+ \text{ ἂν } \nu \text{ ἀρτιος, } - \text{ ἂν } \nu \text{ περιττός})$$

$$\alpha^{\mu} : \alpha^{\nu} = \alpha^{\mu-\nu}, \quad \mu, \nu \text{ σχετικοὶ ἀκέραιοι.}$$

Ανισότητες μεταξὺ σχετικῶν ἀριθμῶν.

$$|\alpha| > 0, \quad -|\alpha| < 0, \quad \text{ἄν } \alpha - \beta > 0, \quad \alpha > \beta, \quad \text{ἄν } \alpha > \beta, \quad \gamma > \delta, \quad \text{τότε } \alpha + \gamma > \beta + \delta, \quad \text{ἄν } \alpha > \beta, \quad \text{τότε } -\alpha < -\beta, \quad \text{ἄν } \alpha > \beta, \quad \alpha|\lambda| > \beta|\lambda|, \\ \text{ἄν } \alpha > \beta, \quad \alpha \cdot (-|\lambda|) < \beta \cdot (-|\lambda|).$$

$$\begin{array}{l} y = \frac{1}{2} \\ x = -2 \end{array}$$

$$x^2 - xy + x^2$$

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΙ

### Α'. ΠΕΡΙ ΑΛΓΕΒΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ

§ 49. Ἐλγεβρικὴ παράστασις καλεῖται τὸ σύνολον ἀριθμῶν ἢ γραμμάτων ( χρησιμοποιουμένων ὑπὸ τῆς Ἐλγέβρας πρὸς παράστασιν ἀριθμῶν ἢ ποσοτήτων ) ἢ ἀριθμῶν καὶ γραμμάτων συνδεομένων μὲν ἀλγεβρικὰ σύμβολα τῶν πράξεων.

Ἐὰν δοθοῦν οἱ σχετικοὶ γενικοὶ ἀριθμοὶ π.χ.  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ , καὶ προστεθοῦν οἱ  $\alpha$ , καὶ  $\beta$ , εἰς δὲ τὸ ἄθροισμα τούτων προστεθῆ ὁ  $\gamma$ , θὰ ἔχωμεν ( ὡς γνωστὸν, ) ἔξαγόμενον  $(\alpha+\beta)+\gamma$ , τὸ δποῖον λέγεται καὶ ἀλγεβρικὸς τύπος.

Ἐὰν ἀπὸ τὸ ἄθροισμα τῶν  $\alpha$  καὶ  $\beta$  ἀφαιρεθῆ ὁ  $\gamma$ , θὰ ἔχωμεν  $(\alpha+\beta)-\gamma$ , τὸ δποῖον ἐπίσης καλεῖται ἀλγεβρικὸς τύπος.

Τὸ  $\alpha-(\beta-\gamma)$  λέγεται ἀλγεβρικὸς τύπος, φανερώνει δὲ ὅτι ἀπὸ τὸν ἀριθμὸν  $\alpha$  θὰ ἀφαιρεθῆ ἡ διαφορὰ  $\beta-\gamma$ .

Π.χ. τὸ ἄθροισμα  $\alpha+\alpha+\alpha$  παριστάνομεν συντόμως μὲ τὸν ἀλγεβρικὸν τύπον 3α. Ὁμοίως γράφομεν ἐπίσης  $\frac{\alpha+\alpha+\dots+\alpha+\mu\alpha}{\mu \text{ προσθετέοι}}$

$$\text{τὸ δὲ } \underbrace{-\alpha-\alpha-\alpha\dots-\alpha}_{\nu \text{ προσθετέοι}} = -n\alpha, \text{ τὸ } -\frac{\alpha}{3}-\frac{\alpha}{3}-\frac{\alpha}{3}-\frac{\alpha}{3}-\frac{\alpha}{3} = -\frac{5}{3}\alpha$$

Τὰ διάφορα σύμβολα, τὰ δποῖα μεταχειρίζόμεθα εἰς τὴν Ἀλγεβραν διὰ νὰ παραστήσωμεν τὸ πρόσημον ἐνὸς ἀριθμοῦ, τὸ σὺν (+) ἢ τὸ πλήν (-), τὸ γινόμενον (·), τὸ πηλίκον (:), τὸ ἄθροισμα (+), τὴν διαφορὰν (-), τὴν τετραγωνικὴν ρίζαν (✓) ἀριθμῶν, τὸ ισον (=), τὸ διάφορον ( $\neq$ ), τὸ μεγαλύτερον (>) κ.τ.λ. καλοῦμεν ἀλγεβρικὰ σύμβολα.

Οὔτως ἀλγεβρικαὶ παραστάσεις είναι αἱ :  $(\alpha+\beta)$ ,  $6\alpha+\beta-8\gamma$ ,  $\alpha$ ,  $5\alpha$ ,  $\beta\cdot\gamma$ ,  $\alpha+\beta-(\gamma+\delta)$ ,  $(-5-3):6+13-10$ ,  $6\alpha^2-\alpha$ .

Ἐκ τούτων ἡ  $\alpha+\beta$  φανερώνει τὸν ἀριθμόν, ὁ δποῖος προκύπτει ἐὰν εἰς τὸν  $\alpha$  προστεθῇ ὁ  $\beta$ . Ἡ  $\alpha+\beta-(\gamma+\delta)$  φανερώνει τὸν ἀριθμόν, ὁ δποῖος προκύπτει ἐὰν εἰς τὸν  $\alpha$  προστεθῇ ὁ  $\beta$  καὶ ἀπὸ τὸν ἄθροισμα  $\alpha+\beta$  ἀφαιρεθῇ τὸ  $\gamma+\delta$ . Ἡ παράστασις α παριστάνει τὸν ἀριθμὸν  $\alpha$ , κ.τ.λ.

**§ 50.** Δύο ἀλγεβρικαὶ παραστάσεις λέγονται ισοδύναμοι, ἐὰν προκύπτῃ ἡ μία ἀπὸ τὴν ἄλλην διὰ τῆς ἐφαρμογῆς τῶν ίδιοτήτων τῶν πράξεων. Οὕτω π.χ. αἱ  $\alpha^2 + \alpha\beta$  καὶ  $\alpha(\alpha + \beta)$  εἶναι ισοδύναμοι. Διότι, ἂν εἰς τὴν δευτέραν ἐκτελέσωμεν τὸν πολλαπλασιασμὸν τοῦ  $\alpha$  ἐπὶ τὸ  $(\alpha + \beta)$ , εύρισκομεν τὴν πρώτην  $\alpha^2 + \alpha\beta$ . ἐπίσης αἱ  $\alpha + \beta$  καὶ  $\beta + \alpha$  εἶναι ισοδύναμοι. Τὴν ισότητα δύο ισοδύναμῶν ἀλγεβρικῶν παραστάσεων καλοῦμεν **ταύτοτητα** καὶ σημειώνομεν αὐτὴν ἐνίστε καὶ μὲ τὸ σύμβολον  $\equiv$  τιθέμενον μεταξὺ τῶν ισοδύναμων παραστάσεων, π.χ.  $\alpha^2 + \alpha\beta \equiv \alpha(\alpha + \beta)$ ,  $\alpha + \beta \equiv \beta + \alpha$ , ἀπαγγέλλομεν δὲ οὔτως,  $\alpha^2$  σὺν  $\alpha\beta$  ισοδύναμον τοῦ  $\alpha$  ἐπὶ  $\alpha$  σὺν  $\beta$ , τὸ  $\alpha$  σὺν  $\beta$  ισοδύναμον τοῦ  $\beta$  σὺν  $\alpha$ .

### 1. ΕΙΔΗ ΑΛΓΕΒΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ

**§ 51.** Ἀλγεβρικὴ παράστασις λέγεται **ρητή** \*, ἐὰν ἐπὶ οὐδενὸς τῶν γραμμάτων της εἶναι σημειωμένη ρίζα τις. Καθὼς αἱ :

$$\alpha, \quad 3\alpha\sqrt{3}, \quad \frac{\alpha}{\gamma} + \alpha\beta \quad \frac{x}{3\sqrt{13}} + \psi.$$

Παράστασις ἀλγεβρικὴ λέγεται **ἄρρητος** \*, ἐὰν δὲν εἶναι ρητή. Π.χ. αἱ  $\alpha + \sqrt{\beta}$ ,  $\alpha - \sqrt{\alpha^2 - \beta}$ ,  $6\sqrt{x} + \psi$  εἶναι παραστάσεις ἄρρητοι.

Ἀλγεβρικὴ παράστασις λέγεται **ἀκέραια**, ἐὰν δὲν περιέχῃ διαίρεσιν δι' ἔνὸς ή καὶ περισσοτέρων τῶν γραμμάτων της· π.χ. αἱ παραστάσεις  $\alpha + \beta$ ,  $8\alpha^3 - \frac{3}{4}\alpha^2\beta + \gamma$ ,  $\frac{4}{5}\alpha^2$  λέγονται ἀκέραιαι.

Κλασματικὴ λέγεται μία ρητὴ παράστασις ἀλγεβρική, ἀν περιέχῃ διαίρεσιν τούλαχιστον δι' ἔνὸς τῶν γραμμάτων της, π.χ. αἱ κατωτέρω :  $\frac{\alpha}{\beta}$ ,  $\frac{12\alpha^2 - \beta}{\alpha + \beta}$ ,  $\frac{3\alpha^2}{5} + \frac{\beta^2}{\alpha^2}$ ,  $\frac{\alpha + \beta}{\alpha - \beta}$ ,  $3\alpha^{-2}$  λέγονται **κλασματικαὶ** η ἀλγεβρικὰ **κλάσματα**, ἐπειδὴ ἡ πρώτη περιέχει διαίρεσιν διὰ τοῦ  $\beta$ , η δευτέρα διὰ τοῦ  $\alpha + \beta$ , η τρίτη διὰ τοῦ  $\alpha^2$  κ.ο.κ.

### \*Α σ κή σ εις

74. Τίνες ἔκ τῶν κάτωθι παραστάσεων εἶναι ρηταί ; ἄρρητοι ; ἀκέραιαι ; κλασματικαί ; Διατί ;

\* Εἰς Θεόδωρον τὸν Κυρηναῖον ὀφείλονται αἱ ὀνομασίαι **ρητή**, **ἄρρητος**.

$$\alpha') 9\alpha^2\beta - \alpha\beta^2 \quad \beta') \sqrt{28\alpha^2\beta} \quad \gamma') 8\sqrt{x\psi} - 9\alpha \quad \delta') \frac{\alpha}{\beta} + \frac{19\beta^2}{\gamma}$$

75. Αι παραστάσεις  $\alpha')$   $\sqrt{\alpha^2}$   $\beta')$   $\sqrt{(\alpha + \beta)^2}$   $\gamma')$   $\frac{7\gamma}{\sqrt{\delta^3}}$  είναι ρηται ή άρητοι.

76. Αι κατωτέρω παραστάσεις είναι άκέραιαι ή κλασματικά: Διατί;

$$\alpha') \frac{9\alpha^2\beta}{5\alpha} \quad \beta') \frac{16\alpha(\alpha - \beta)^2}{(\alpha - \beta)} \quad \gamma') \frac{6\gamma^2 \cdot x \cdot \psi^2}{5\gamma \cdot x \cdot \psi^2} \quad \delta') \frac{3\alpha^2 + \beta}{\alpha\beta}.$$

## 2. ΠΕΡΙ ΜΟΝΩΝΥΜΩΝ

**§ 52.** Μονώνυμον λέγεται ἀλγεβρική παράστασις, εἰς τὴν ὅποιαν οὔτε πρόσθεσις οὔτε ἀφαίρεσις εὑρίσκεται σημειωμένη.

Π. χ. αἱ παραστάσεις:  $\alpha, -6x\psi^2, \frac{3}{7}\alpha.\beta.\gamma.\delta, -\frac{8\alpha\beta}{9\gamma\delta}$  λέγονται μονώνυμα.

'Ακέραιον λέγεται ἐν μονώνυμον, ἔὰν μόνον πολλαπλασιασμὸν ἐπὶ τῶν γραμμάτων του περιέχῃ. 'Εὰν δὲ περιέχῃ καὶ διαίρεσιν τούλαχιστον δι' ἐνὸς τῶν γραμμάτων του, λέγεται κλασματικὸν μονώνυμον. Οὕτως, ἐκ τῶν ἀνωτέρω μονωνύμων τὰ μὲν τρία πρῶτα είναι άκέραια, τὸ δὲ τελευταῖον κλασματικόν.

Ρητὸν λέγεται ἐν μονώνυμον, ἂν δὲν ἔχῃ ρίζαν εἰς ἐν τούλαχιστον τῶν γραμμάτων του. Οὕτω τὰ  $\frac{3\alpha^2\beta}{\gamma}, \sqrt{5}\alpha^2\beta$  είναι ρητὰ μονώνυμα.

"Αρρητον λέγεται ἐν μονώνυμον, ἂν δὲν είναι ρητόν.

'Εὰν εἰς τὸ μονώνυμον ὑπάρχῃ ἀριθμητικός τις παράγων, γράφεται οὗτος πρῶτος καὶ λέγεται (**ἀριθμητικὸς**) συντελεστὴς τοῦ μονωνύμου. Οὕτως, εἰς τὰ ἀνωτέρω μονώνυμα οἱ συντελεσταὶ κατὰ σειρὰν είναι οἱ:  $1, -6, \frac{3}{7}, -\frac{8}{9}$ .

Τὸ ἄλλο μέρος τοῦ μονωνύμου δύναται νὰ λέγεται **κύριον ποσὸν** αὐτοῦ, είναι δὲ αὐτό, εἰς τὰ ἀνωτέρω μονώνυμα κατὰ σειρὰν

$$\alpha, x\psi^2, \alpha.\beta.\gamma.\delta, \frac{\alpha\beta}{\gamma\delta}.$$

Εἰς τὰ μονώνυμα, τὰ (**φαινομενικῶς**) μὴ ἔχοντα (**ἀριθμητικὸν**) συντελεστὴν, ἐννοοῦμεν τοιοῦτον τὸν = 1, ή - 1. Π.χ. τοῦ

α ( ἀριθμητικὸς ) συντελεστής εἶναι  $+1$ , διότι ὁ α δύναται νὰ γράφῃ  $1 \cdot \alpha$ , ἐνῷ τοῦ  $-\alpha$  εἶναι ὁ  $-1$ , ἐπειδὴ γράφεται  $-1 \cdot \alpha$ .

\*Ἀν ὑπάρχουν περισσότεροι τοῦ ἐνὸς ἀριθμητικοὶ παράγοντες εἰς ἓν μονώνυμον, ἀντικαθιστῶμεν αὐτοὺς μὲ τὸ γινόμενόν των, τὸ ὅποιον γράφεται ὡς πρῶτος παράγων αὐτοῦ καὶ εἶναι ὁ ἀριθμητικὸς συντελεστής τοῦ μονωνύμου. Οὕτως, ἂν ἔχωμεν  $\alpha^2\beta - \frac{4}{5}\gamma^3$ , γράφομεν  $(-1) \cdot \frac{4}{5} \alpha^2\beta \cdot \gamma^3$  ή  $-\frac{4}{5} \alpha^2\beta\gamma^3$  καὶ ὁ  $-\frac{4}{5}$  εἶναι ὁ ἀριθμητικὸς συντελεστής τοῦ μονωνύμου τούτου.

Καλοῦμεν συντελεστὴν ἐνὸς γράμματος ( ἢ τοῦ γινομένου περισσοτέρων παραγόντων μονωνύμου ) τὸ γινόμενον τῶν ἄλλων παραγόντων αὐτοῦ, π.χ. εἰς τὸ  $\alpha^3\chi^2$ , συντελεστὴς τοῦ  $\chi^2$  εἶναι ὁ  $\alpha^3$ , εἰς τὸ  $-3\alpha^2\beta\chi\psi$  συντελεστὴς τοῦ  $\chi\psi$  εἶναι τὸ  $-3\alpha^2\beta$ .

Δύο μονώνυμα λέγονται ἀντίθετα, ἂν διαφέρουν μόνον κατὰ τὸ σῆμα τῶν ( ἀριθμητικῶν ) συντελεστῶν αὐτῶν, ὡς τὰ  $25\alpha^2$  καὶ  $-25\alpha^2$ .

Βαθμὸς ἀκεραίου μονωνύμου ὡς πρὸς ἓν γράμμα του καλεῖται ὁ ἐκθέτης, τὸν ὅποιον ἔχει τὸ γράμμα τοῦτο εἰς τὸ μονώνυμον.

Π.χ. τοῦ  $7\alpha^3\beta$  ὁ βαθμὸς ὡς πρὸς τὸ α εἶναι 3, ὡς πρὸς τὸ β ὁ 1, τοῦ  $\frac{3}{4}\alpha^3\beta^2\gamma$  ὁ βαθμὸς ὡς πρὸς τὸ α εἶναι 3, ὡς πρὸς τὸ β ὁ 2, καὶ ὡς πρὸς τὸ γ ὁ 1.

\*Ἐὰν ἐν μονώνυμον δὲν περιέχῃ γράμμα τι, θὰ λέγωμεν ὅτι ὁ βαθμὸς του ὡς πρὸς τὸ γράμμα αὐτὸν εἶναι 0. Π.χ. τὸ μονώνυμον  $3\alpha^2$  εἶναι 0 βαθμοῦ ὡς πρὸς τὸ β. Διότι δυνάμεθα νὰ γράψωμεν ἀντὶ τοῦ  $3\alpha^2$  τὸ  $3\alpha^2\beta^0$ , ἐπειδὴ εἶναι  $\beta^0 = 1$ . Καὶ τῷ ὅντι, εἶναι  $3\alpha^2\beta^0 = 3\alpha^2 \cdot 1 = 3\alpha^2$ .

Βαθμὸς ἀκεραίου μονωνύμου ὡς πρὸς περισσότερα τοῦ ἐνὸς γράμματα του, λέγεται τὸ ἀθροισμα τῶν ἐκθετῶν, τοὺς ὅποιους ἔχουν τὰ γράμματα αὐτὰ εἰς τὸ μονώνυμον.

Π.χ. τὸ μονώνυμον  $\frac{3}{4}\alpha^2\beta^3\gamma$  εἶναι πέμπτου βαθμοῦ ὡς πρὸς τὰ γράμματα α καὶ β, τετάρτου βαθμοῦ ὡς πρὸς τὰ β καὶ γ, τρίτου ὡς πρὸς τὰ α καὶ γ, καὶ ἕκτου ὡς πρὸς τὰ α, β, γ.

Α σ κ ή σ εις

77. Εύρετε τὸν συντελεστὴν καὶ τὸ κύριον ποσὸν ἐκάστου τῶν κάτωθι μονωνύμων :

$$\begin{array}{llll} \alpha') 3\alpha\beta^3 & \beta') -5\alpha^4\beta^5 & \gamma') -\alpha & \delta') -3x\psi^3 \\ \epsilon') 2x^2 & \sigma') -\frac{4}{5}x^3 & \zeta') -\frac{x^3}{4} & \eta') 0,1 \cdot x^2 \\ \theta') -4,56x^3 & i') -\frac{3}{4}\alpha^2 & i\alpha') -\frac{5}{8}\alpha^2\beta \cdot (-8)\beta^2 & \end{array}$$

78. Ὁμοίως τὸν (ἀριθμητικὸν) συντελεστὴν τῶν κάτωθι, καθὼς καὶ τὸν συντελεστὴν τοῦ α, τοῦ  $x^3$ , τοῦ  $\beta^2$ :

$$\alpha') \frac{5}{8}\alpha\beta \quad \beta') -\frac{x}{3} \quad \gamma') -\frac{21}{4}x^3 \quad \delta') 3,4x^2 \quad \epsilon') \frac{5}{6}\alpha\beta^2$$

79. Ὁμοίως τῶν κάτωθι, τὸν (ἀριθμητικὸν) συντελεστὴν καὶ τὸν συντελεστὴν τοῦ α, τοῦ  $x$ , τοῦ β, τοῦ ψ, τοῦ  $x^2$ :

$$\begin{array}{lll} \alpha') 2 \cdot (-3) \cdot 4\psi \beta') -25\alpha \cdot 6 \cdot \beta & \gamma') 2 \left(-\frac{4}{3}\right)x \cdot (-7)\psi & \delta') \frac{3\alpha^2\beta}{4\alpha\gamma} \\ \epsilon') -\frac{4x}{\psi} \quad \sigma') -\frac{5x^2}{\psi^2} & \zeta') -\frac{2}{5}x^2 \cdot \left(-\frac{3}{8}\right)\psi & \eta') \frac{2}{3}x \cdot (-4) \cdot (3\alpha\chi). \end{array}$$

80. Τίνος βαθμοῦ εἶναι καθὲν τῶν κάτωθι μονωνύμων ὡς πρὸς α, ὡς πρὸς β, ὡς πρὸς γ, ὡς πρὸς α καὶ β, ὡς πρὸς α, β, γ;

$$\alpha') 15\alpha^2\beta\gamma^2 \quad \beta') 121\alpha^3\beta^2\gamma \quad \gamma') -24\alpha\beta^3\gamma^4 \quad \delta') -13\alpha^2\beta^2\gamma^4$$

81. Ορίσατε ποιῶν ἐκ τῶν ἀνωτέρω μονωνύμων τῶν ἀσκήσεων 79 εἶναι ἀκέραια καὶ δρίσατε τίνος βαθμοῦ εἶναι καθέν: α') ὡς πρὸς α, β') ὡς πρὸς β, γ') ὡς πρὸς x, δ') ὡς πρὸς ψ, ε') ὡς πρὸς α καὶ β, στ') ὡς πρὸς x καὶ ψ.

### I. ΟΜΟΙΑ ΜΟΝΩΝΥΜΑ

§ 53. Δύο ἢ περισσότερα μονώνυμα λέγονται ὅμοια, ἐὰν ἔχουν τὸ αὐτὸ κύριον ποσόν, διαφέρουν δὲ κατὰ τοὺς (ἀριθμητικοὺς) συντελεστάς των (ἄν διαφέρουν). Οὕτω τά μονώνυμα  $6\alpha, -\frac{2}{7}\alpha, -23\alpha$  εἶναι ὅμοια, ὡς διαφέροντα μόνον κατὰ τοὺς (ἀριθμητικοὺς) συντελεστάς των. Ἐπίστης τὰ  $-\frac{39}{47}\beta, 6\beta, -17\beta$  εἶναι ὅμοια, διὰ τὸν αὐτὸν λόγον, καθὼς καὶ τὰ  $12\alpha^2\beta, -15\alpha^2\beta, 23\alpha^2\beta, -\alpha^2\beta$ , ὡς ἔχοντα τὸ αὐτὸ κύριον ποσὸν  $\alpha^2\beta$ .

Μονώνυμα λέγονται ὅμοια, ὡς πρὸς ἐν ἢ περισσότερα γράμματα αὐτῶν, ἄν ἔχουν τὰ γράμματα ταῦτα μὲ τοὺς αὐτοὺς ἐκθέτας.

Ούτω τὰ μονώνυμα  $5\alpha^2\beta\gamma$ ,  $-6\alpha^2\beta\delta^2$ ,  $218\alpha^2\beta\delta$  είναι όμοια ὡς πρὸς τὰ γράμματα αὐτῶν α καὶ β.

## II. ΠΡΟΣΘΕΣΙΣ ΜΟΝΩΝΥΜΩΝ

**§ 54.** Καλούμεν **ἀθροισμα** δοθέντων μονωνύμων (ἢ καὶ ἀλγεβρικῶν παραστάσεων) τὴν ἀλγεβρικὴν παράστασιν, ἢ ὅποια προκύπτει, ὅταν γράψωμεν τὰ δοθέντα μονώνυμα (ἢ τὰς δοθέσας παραστάσεις) τὸ ἐν παρὰ τὸ ἄλλο, καθὲν μὲ τὸ πρὸ αὐτοῦ σῆμα.

Οὔτως ἢ πρόσθεσις τῶν μονωνύμων  $4\alpha^2$ ,  $-15\beta^2$ ,  $\frac{6}{\gamma^2}$  δίδει ὡς ἀθροισμα τὸ  $4\alpha^2 - 15\beta^2 + \frac{6}{\gamma^2}$ .

Ἡ πρᾶξις, μὲ τὴν ὅποιαν εύρισκομεν τὸ ἀθροισμα τῶν ἐν λόγῳ μονωνύμων (ἢ ἀλγεβρικῶν παραστάσεων), λέγεται **πρόσθεσις** αὐτῶν.

**§ 55.** Τὸ ἀθροισμα δοθέντων όμοιων μονωνύμων είναι μόνώνυμον όμοιον πρὸς αὐτά, ἔχον συντελεστὴν τὸ ἀλγεβρικὸν ἀθροισμα τῶν συντελεστῶν τῶν δοθέντων.

Ἐστω π.χ. ὅτι ζητοῦμεν τὸ ἀθροισμα τῶν όμοιων μονωνύμων  $3\alpha$  καὶ  $4\alpha$ . Παρατηροῦμεν ὅτι τοῦτο είναι τὸ  $3\alpha+4\alpha$ , τὸ ὅποιον = μὲ  $(3+4)\alpha$ . Διότι, ἀν ἐκτελέσωμεν τὸν πολλαπλασιασμὸν τοῦτον (κατὰ τὸν ἐπιμεριστικὸν νόμον), εύρισκομεν  $(3+4)\alpha = 3\alpha+4\alpha$ .

Ἐπίστης ἔχομεν π.χ.  $-3\alpha+4\alpha+\frac{2}{3}\alpha-13\alpha=(-3+4+\frac{2}{3}-13)\alpha$ , καὶ, ἐπειδὴ είναι  $-3+4+\frac{2}{3}-13=-12+\frac{2}{3}=-\frac{36}{3}+\frac{2}{3}=-\frac{34}{3}$ , ἔπειται ὅτι ἔχομεν ἔξαγόμενον τὸ  $-\frac{34}{3}\alpha$ .

Τὸ ἀθροισμα π. χ. τῶν  $-\frac{3}{4}\alpha^2$ ,  $\frac{5}{8}\alpha^2$ ,  $4\alpha^2$ ,  $-7\alpha^2$  είναι :

$$-\frac{3}{4}\alpha^2+\frac{5}{8}\alpha^2+4\alpha^2-7\alpha^2=\left(-\frac{6}{8}+\frac{5}{8}-3\right)\alpha^2=\left(-\frac{1}{8}-3\right)\alpha^2=-3\frac{1}{8}\alpha^2.$$

Ομοίως ἔχομεν ὅτι τὸ ἀθροισμα π.χ. τῶν  $\Psi^2\chi$ ,  $-3\chi^2\Psi$ ,  $7\chi^2\Psi$ ,  $-\frac{4}{9}\chi^2\Psi$  είναι :

$$\chi^2\Psi-3\chi^2\Psi+7\chi^2\Psi-\frac{4}{9}\chi^2\Psi=\left(1-3=7-\frac{4}{9}\right)\chi^2\Psi=\left(5-\frac{4}{9}\right)\chi^2\Psi=4\frac{5}{9}\chi^2\Psi.$$

Καθ' όμοιον τρόπον εύρισκομεν ὅτι τὸ ἀθροισμα τῶν όμοιών μονωνύμων  $+2\alpha^2\beta, -6\alpha^2\beta, +13\alpha^2\beta, -\alpha^2\beta$  είναι :

$$2\alpha^2\beta - 6\alpha^2\beta + 13\alpha^2\beta - \alpha^2\beta + (2-6+13-1)\alpha^2\beta = 8\alpha^2\beta.$$

Ἡ ἀνωτέρω πρᾶξις μεταξὺ τῶν όμοιών μονωνύμων, μὲ τὴν ὅποιαν ἀντικαθιστῶνται αὐτὰ μὲ ἐν τοιοῦτο ἵσον μὲ τὸ ἀθροισμά των, καλεῖται ἀναγωγὴ όμοιών μονωνύμων.

### \*Α σ κή σ εις

82. Νὰ εύρεθοῦν τὰ ἔξαγόμενα τῶν κάτωθι πράξεων :

$$\begin{array}{lll} \alpha') 9\mu + 4\mu & \beta') -10\mu + (-6\mu) & \gamma') -4\mu + 6\mu \\ \epsilon') 8\alpha + \alpha + 9\alpha & \sigma') -7\rho + (6\rho - 3\rho) & \zeta') 7x + (-8x) + 6x + x \\ \eta') 9\alpha + (-6\alpha + \alpha) & \theta') -x + 9x + [(-6x) + 9x] \end{array}$$

83. Εύρετε τὸ ἔξαγόμενον τῶν :

$$\begin{array}{ll} \alpha') 3x^2 - 5x^2 + 8x^2 - 3x^2 & \beta') 4\alpha x^8 - 4\beta x^8 - 5\gamma x^8 \\ \gamma') 3\alpha^2\beta x^2 - 2\alpha^2\beta x^3 - 6\alpha^2\beta x & \delta') 4x\psi^8 - 5x^2\psi^8 + 3x^3\psi^8 - 10x^4\psi^8 \\ \epsilon') \frac{5}{2} x^2 + 3\alpha x - \frac{7}{2} & \alpha^2 - 2x^2 + \alpha x + \frac{1}{2} \alpha^2 \end{array}$$

84. Ἐκτελέσατε τὴν ἀναγωγὴν μεταξὺ τῶν όμοιών μονωνύμων ἐκ τῶν κάτωθι καὶ εὕρετε τὸ ἀθροισμά των :

$$7 \frac{3}{4} x^2\psi, -x, 19 \frac{3}{8} \phi^2, 1,75x, 8 - \frac{3}{8} \psi,$$

$$5 \frac{5}{12} x, -1, 125\psi, -0,25x^2\psi, 0,625\phi^2.$$

85. Νὰ γίνη ἡ ἀναγωγὴ μεταξὺ τῶν όμοιών μονωνύμων ἐκ τῶν κάτωθι :

$$\begin{array}{l} \alpha') 3\alpha^2\beta, -8\chi\psi^3, 3\alpha^2\beta, 32x\psi^3, 0,35\alpha^2\beta, -0,25\chi\psi^3, -0,5\alpha^2\beta, \\ \beta') 30x\psi^2, -24\alpha^2\beta^3\gamma, 16x\psi^2, -12,3\alpha^2\beta^3\gamma, -0,75\alpha^2\beta^2\gamma, \\ \gamma') -6\alpha^2\beta\gamma, 12\alpha^2\beta\gamma, -7\alpha^2\beta\gamma, -3,6\alpha^2\beta\gamma, 0,3\alpha^2\beta\gamma, 7,5\alpha^2\beta\gamma. \end{array}$$

### 3. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΛΓΕΒΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ

**§ 56.** Καλοῦμεν ἀριθμητικὴν τιμὴν ἀλγεβρικῆς παραστάσεως, τὸ ἔξαγόμενον τὸ προκύπτον, ἐὰν τὰ εἰς τὴν παράστασιν ὑπάρχοντα γράμματα ἀντικαταστήσωμεν μὲ ἀριθμοὺς ὥρισμένους καὶ ἐκτελέσωμεν τὰς πράξεις, αἱ ὅποιαι σημειοῦνται εἰς αὐτήν.

(Ὑποτίθεται ὅτι αἱ τιμαὶ τῶν γραμμάτων θὰ είναι τοιαῦται, ὥστε δὲ μὲν παρονομαστὶς τῆς παραστάσεως, ἐὰν ἔχῃ τοιοῦτον, νὰ μὴ λαμβάνῃ τὴν τιμὴν μηδέν, ἢ δὲ ὑπὸ τὴν τετραγωνικὴν ρίζαν ποσότης νὰ λαμβάνῃ τιμὴν θετικήν).

Οῦτως, έάν είναι  $\alpha=3$ , ή παράστασις  $4\alpha$  έχει τήν τιμήν  $4 \cdot 3 = 12$ .

Ή παράστασις  $\alpha^4 = \alpha \cdot \alpha \cdot \alpha \cdot \alpha$ , όταν  $\alpha=3$ , έχει τήν τιμήν  $3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = 81$ .

Έάν είναι  $\alpha=5$ ,  $\beta=6$ ,  $\gamma=7$ , ή παράστασις  $\frac{9}{14} \alpha \cdot \beta \cdot \gamma$  έχει τήν τιμήν  $\frac{19}{4} \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7 = 135$ .

Έάν είναι  $\alpha=-2$ ,  $\beta=1$ ,  $\gamma=5$ , ή παράστασις  $3\alpha^2 + 2\gamma - 5\beta$  έχει τήν τιμήν  $3(-2)^2 + 2 \cdot 5 - 5 \cdot 1 = 12 + 10 - 5 = 17$ .

Έάν είναι  $x=2$ ,  $\psi=3$ ,  $\omega=4$ , ή παράστασις  $\frac{8x^2\psi}{3\omega^3}$  έχει τήν τιμήν  $\frac{8 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3}{3 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4} = \frac{1}{2}$

Δύο όλγεβρικαί παραστάσεις ίσοδύναμοι δίδουν ίσους όριθμούς, όταν τὰ γράμματά των ἀντικατασταθοῦν μὲ τὰς αὐτάς, ἀλλὰ διποιασδήποτε τιμάς.

Π.χ. αἱ  $\alpha+\beta$  καὶ  $\beta+\alpha$  είναι ίσοδύναμοι παραστάσεις καὶ δίδουν ίσους όριθμούς, ἂν τεθῇ π. χ.  $\alpha=4$ ,  $\beta=-5$ , ότε  $\alpha+\beta = 1-5 = -4 = -5+1$ .

### Α σ κή σ εις

86. Νά εύρεθοῦν τὰ έξαγόμενα τῶν κάτωθι πράξεων καὶ αἱ τιμαὶ διὰ τὰς σημειουμένας τιμάς τῶν γραμμάτων :

$$\begin{array}{ll} \alpha') -6x + 7\psi + (-3x), & \text{όταν είναι } x=3, \psi=4 \\ \beta') -9x + (-7\psi) + (-3\psi) + (-6x), & \text{όταν είναι } x=3, \psi=-4 \end{array}$$

87. Νά εύρεθῇ ή ἀριθμητικὴ τιμὴ τῶν παραστάσεων :

$$\begin{array}{ll} \alpha') \alpha^3 - 6\alpha\beta + \beta^3, & \text{όταν είναι } \alpha=2, \beta=6 \\ \beta') \frac{(\alpha+\beta)(\alpha-3\beta)}{6\alpha-2\beta}, & \text{όταν είναι } \alpha=2, \beta=5. \end{array}$$

88. Νά εύρεθῇ ή ἀριθμητικὴ τιμὴ τῶν παραστάσεων :

$$\begin{array}{ll} \alpha') (\alpha+\beta) \cdot [\alpha^2 - (\beta^2 - 6\alpha\gamma)], & \text{όταν είναι } \alpha=-5, \beta=2, \gamma=-3 \\ \beta') \sqrt{\alpha^3 - 2\beta - 4\gamma - 2} / 4\alpha^2 + \beta \cdot (\alpha + \gamma), & \text{όταν είναι } x=9, \beta=-4, \gamma=3 \end{array}$$

89. Έάν τεθῇ  $\phi(x)=3x$ , νά δειχθῇ ότι είναι  $\phi(2) \cdot \phi(4) = \phi(6)$

90. Έάν τεθῇ  $\phi(x)=4x^2+4x-3$  καὶ  $\psi(x)=9(x+8)$ , δείψατε ότι  $\phi(5)=\psi(5)$

91. Έάν  $\phi(x, \psi, z)=(x+\psi+z)(x+\psi-z)(x-\psi-z)$ , δείξατε ότι :

$$\phi(0, 1, 2) + \phi(0, -1, -2) = 0.$$

## 4. ΠΕΡΙ ΠΟΛΥΩΝΥΜΩΝ

**§ 57.** Καλοῦμεν πολυώνυμον τὸ ἀλγεβρικὸν ἄθροισμα μονωνύμων ( τὰ ὅποια δὲν εἶναι πάντα ὅμοια ).

Π.χ. τὸ  $\frac{3\alpha\beta}{\gamma} + 5\alpha^3 - \frac{6\alpha^2\beta}{3\beta} + 15$  εἶναι πολυώνυμον καὶ εἶναι ἄθροισμα τῶν μονωνύμων  $\frac{3\alpha\beta}{\gamma}, \quad 5\alpha^3, -\frac{6\alpha^2\beta}{3\beta}, \quad 15.$

"Ἐν πολυώνυμον λέγεται ρητόν, ἐὰν ἕκαστον τῶν προσθετέων του μονώνυμον εἶναι ρητόν.

"Ακέραιον λέγεται ἐν πολυώνυμον, ἐὰν ὅλοι οἱ προσθετέοι του εἶναι ἀκέραια μονώνυμα. "Ἄρρητον λέγεται ἐν πολυώνυμον, ἐν τούλάχιστον εἰς τῶν προσθετέων του εἶναι μονώνυμον ἄρρητον, καὶ τέλος κλασματικὸν λέγεται, ἐὰν τούλάχιστον εἰς τῶν προσθετέων του εἶναι κλασματικὸν μονώνυμον.

Οὕτω τὸ  $3\alpha^2 + 5\alpha\beta - 13\gamma^2$  λέγεται ἀκέραιον πολυώνυμον, εἶναι δὲ ἄθροισμα τῶν μονωνύμων :  $3\alpha^2, 5\alpha\beta, -13\gamma^2$ .

Τὸ  $\frac{3}{4}x^2\psi + \frac{5}{8} + \frac{x^3}{\psi} - \frac{4}{9}\psi^2 + 6$  λέγεται ρητὸν πολυώνυμον.

Τὸ  $\sqrt{x} + 4x^{42} - 6\sqrt{x-7}$  λέγεται ἄρρητον πολυώνυμον.

Όμοίως τὸ  $\frac{3}{4x} - \frac{5}{8}x^2 + \frac{4}{9} + \frac{x}{\psi} - 7$  λέγεται κλασματικὸν πολυώνυμον.

"Ἔκαστον μονώνυμον πολυωνύμου λέγεται καὶ ὄρος αὐτοῦ, δύναται δὲ εἰς ὄρος νὰ εἶναι ἀριθμός τις σχετικός.

Εἰς τοιοῦτος ὄρος δύναται νὰ ὑποτεθῇ ὅτι ἔχει γράμματα καὶ καθὲν μὲ ἐκθέτην μηδέν, ἢ νὰ θεωρηθῇ ὡς μονώνυμον βαθμοῦ 0 ὡς πρὸς οἰαδήποτε γράμματα.

"Ορος πολυωνύμου λέγεται συνήθως θετικὸς μὲν ἐὰν ἔχῃ ἀριθμητικὸν συντελεστὴν θετικόν, ἀρνητικὸς δὲ ἐὰν ἔχῃ ἀρνητικὸν ἀριθμητικὸν συντελεστήν.

Πολυώνυμον ἀκέραιον λέγεται διώνυμον μέν, ἐὰν ἔχῃ δύο ὄρους, καθὼς τὰ  $\alpha + \beta, \alpha^2 + \beta^2, \chi^2 + 6$ , τριώνυμον δέ, ἐὰν ἔχῃ τρεῖς ὄρους, καθὼς τὰ  $\chi^2 + \lambda\chi - 8, \alpha + \beta - \gamma, \alpha^2 + 2\alpha\beta + \beta^2$ .

**§ 58.** Διθέντος ἀκέραιον πολυωνύμου καλοῦνται ὅμοιοι ὄροι τὰ ὅμοια μονώνυμα αὐτοῦ.

Διθέντος ἀκέραιου πολυωνύμου μὲ δόμοίους ὅρους δυνάμεθα ν' ἀντικαταστήσωμεν αὐτοὺς μὲ τὸ ἀλγεβρικὸν ἄθροισμά των.

Οὕτω π.χ. εἰς τὸ ἀκέραιον πολυώνυμον  $6\alpha\psi^3 + \frac{3}{5}\alpha\psi^3 - 2\alpha^3\psi - \psi^4 - 7\alpha\psi^3 + 2\alpha^2\psi^2$  οἱ ὅροι  $6\alpha\psi^3$ ,  $\frac{3}{5}\alpha\psi^3$ ,  $-7\alpha\psi^3$  εἶναι δόμοιοι καὶ ἔχουν ἀλγεβρικὸν ἄθροισμα  $(6 + \frac{3}{5} - 7)\alpha\psi^3 = -\frac{2}{5}\alpha\psi^3$ . Ἀντικαθιστῶμεν λοιπὸν εἰς τὸ δοθὲν πολυώνυμον τοὺς τρεῖς δόμοίους ὅρους του μὲ τὸ  $-\frac{2}{5}\alpha\psi^3$  καὶ ἔχομεν, ἀντὶ τοῦ διθέντος, τὸ ἀκέραιον πολυώνυμον  $-\frac{2}{5}\alpha\psi^3 - 2\alpha^3\psi - \psi^4 + \alpha^2\psi^2$ , τὸ ὅποιον λέγεται ἀνηγμένον πολυώνυμον τοῦ διθέντος καὶ εἶναι ἰσοδύναμον αὐτοῦ.

Τὴν ἰσοδυναμίαν συμβολίζομεν ἐνίστε καὶ μὲ τὸ  $\equiv$  (σύμβολον τῆς ταύτητος), ἥτοι θέτομεν :

$$6\alpha\psi^3 + \frac{3}{5}\alpha\psi^3 - 7\alpha\psi^3 - \psi^4 - 7\alpha\psi^3 + 2\alpha^2\psi^2 \equiv -\frac{2}{5}\alpha\psi^3 - 2\alpha^3\psi - \psi^4 + 2\alpha^2\psi^2.$$

$$\cdot \text{Ομοίως } \text{ἔχομεν π.χ. } 5x^3\psi + x^4 - 3x^3\psi + 2x^4 - 5x^2\psi^2 + x^3\psi - 2x^2\psi^2 \equiv (1+2)x^4 + (5-3+1)x^3\psi + (-5-2)x^2\psi^2 \equiv 3x^4 + 3x^3\psi - 7x^2\psi^2.$$

**59.** Βαθμὸς ἀκέραιου πολυωνύμου ως πρὸς ἓν γράμμα του λέγεται ὁ μέγιστος τῶν ἔκθετῶν, τοὺς ὅποιους ἔχει τὸ γράμμα τοῦτο εἰς τοὺς ὅρους τοῦ πολυωνύμου. Ἐὰν ὁ ἔκθετης οὗτος εἴναι 1, 2, 3, τὸ πολυώνυμον λέγεται πρώτου, δευτέρου, τρίτου... βαθμοῦ ως πρὸς τὸ γράμμα τοῦτο. Οὕτω τὸ  $3\alpha^2 - 5\alpha\beta\gamma - 12\gamma^3$  εἶναι δευτέρου βαθμοῦ ως πρὸς α καὶ τρίτου ως πρὸς γ, πρώτου δὲ ως πρὸς β.

Βαθμὸς ἀκέραιου πολυωνύμου ως πρὸς δύο, τρία... γράμματα αὐτοῦ, καλεῖται ὁ μέγιστος τῶν βαθμῶν τῶν μονωνύμων του ως πρὸς τὰ γράμματα ταῦτα.

Οὕτω τὸ  $3x^2 - 2\chi\psi + 2\chi - 7$  εἶναι δευτέρου βαθμοῦ ως πρὸς τὰ χ καὶ ψ. Τὸ  $5\alpha^2 - 3\alpha\beta^2\gamma + 13\beta\gamma$  εἶναι τετάρτου βαθμοῦ ως πρὸς α, β, γ καὶ τρίτου ως πρὸς β, γ.

Ἐστω τὸ ἀκέραιον πολυώνυμον  $8\chi + \chi^2 + 16$ . Ἐὰν γράψωμεν αὐτό, ώστε οἱ ἔκθέται τοῦ γράμματος χ νὰ βαίνουν αὐξανόμενοι ἀπὸ ὅρου εἰς ὅρον, δηλαδὴ ως ἔξῆς  $16 + 8\chi + \chi^2$ , λέγομεν ὅτι τὸ πολυώνυμον τοῦτο εἴναι διατεταγμένον κατὰ τὰς ἀνιούσας δυνάμεις τοῦ γράμματος χ. Ομοίως, ἐὰν γράψωμεν αὐτό, ώστε οἱ

ἐκθέται τοῦ χ νὰ βαίνουν ἐλαττούμενοι ἀπὸ ὅρου εἰς ὅρον, δηλαδὴ οὕτω:  $\chi^2 + 8\chi + 16$ , λέγομεν ὅτι τοῦτο εἶναι διατεταγμένον κατὰ τὰς κατιούσας δυνάμεις τοῦ γράμματος χ.

Ἐν γένει πᾶν πολυώνυμον δύναται νὰ διαταχθῇ ὡς τὸ ἀνωτέρω κατὰ τὰς ἀνιούσας ἢ τὰς κατιούσας δυνάμεις ἐνὸς γράμματος αὐτοῦ.

### "Α σ κ η σ ις

92. Τὰ κάτωθι πολυώνυμα τίνος βαθμοῦ είναι ὡς πρὸς α, ὡς πρὸς χ; ὡς πρὸς α καὶ χ; Διατάξατε αὐτὰ κατὰ τὰς ἀνιούσας δυνάμεις τοῦ α καὶ τὰς κατιούσας τοῦ χ μετὰ τὰς δυνατὰς ἀναγωγάς.

$$\alpha') 3\alpha^2x^4 - 6\alpha x^5 - 28\alpha^3x^3 + 27\alpha^5 + x^5 - 54\alpha^5x + 9\alpha^5x^2$$

$$\beta') -3x^6 - \alpha^6 + 7\alpha x^5 + 27\alpha^5x + 0,7\alpha^4x^2 - 0,7\alpha^2x^4 - \alpha^3x^3$$

$$\gamma') 16x^6 + \frac{2}{3} \alpha x^5 + 15\alpha^3x + 7\alpha^6 - 7\alpha^6 - 7\alpha^4x^2 + \frac{1}{12} \alpha^2x^4 - 11\alpha^3x^3$$

$$\delta') -2\alpha^5x - 3x^6 + 13\alpha^5x + 3\alpha^6 - \frac{5}{2} \alpha^2x^4 + 6\alpha^3.$$

## B'. ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΟΛΥΩΝΥΜΩΝ

### 1. ΠΡΟΣΘΕΣΙΣ ΠΟΛΥΩΝΥΜΩΝ

§ 60. Καλοῦμεν ἄθροισμα διθέντων πολυωνύμων τὸ πολυώνυμον τὸ ἔχον ὡς ὅρους, τοὺς ὅρους τῶν διθέντων καὶ ἔκαστον μὲ τὸ σῆμα του.

Τὸ ἄθροισμα π.χ. τῶν  $3\alpha^2\chi + \beta^3 + 6 + \alpha^4$  καὶ  $-\beta^3 - 8 + 2\alpha^4 + 2\alpha^2\chi$ , τὸ ὁποῖον παριστάνομεν καὶ ὡς ἔξῆς:

$$(3\alpha^2\chi + \beta^3 + 6 + \alpha^4) + (-\beta^3 - 8 + 2\alpha^4 + 2\alpha^2\chi)$$

είναι τὸ πολυώνυμον  $3\alpha^2\chi + \beta^3 + 6 + \alpha^4 - \beta^3 - 8 + 2\alpha^4 + 2\alpha^2\chi$ .

Ἐπειδὴ ὑπάρχουν ὅμοιοι ὅροι εἰς τὸ ἔξαγόμενον τοῦτο, ἐκτελοῦντες τὴν ἀναγωγὴν αὐτῶν, εύρίσκομεν ἔξαγόμενον τὸ  $5\alpha^2\chi + 3\alpha^4 - 2$ .

Ἡ πρᾶξις, μὲ τὴν ὁποίαν εύρίσκομεν τὸ ἄθροισμα διθέντων πολυωνύμων, λέγεται πρόσθεσις αὐτῶν.

Ομοίως εύρίσκομεν τὸ ἄθροισμα καὶ περισσοτέρων τῶν δύο πολυωνύμων, (τὰ ὁποῖα πρὸς εὔκολίαν ὑποθέτομεν ἀνηγμένα), ἐκτελοῦμεν δὲ ἀναγωγὴν τῶν δόμοίων ὅρων εἰς τὸ ἔξαγόμενον, ἐὰν ὑπάρχουν τοιούτοι.

Συνήθως, όταν πρόκειται νὰ εύρωμεν τὸ ἄθροισμα (ἀνηγμένων) πολυωνύμων, ἔχόντων μεταξύ των ὁμοίους ὅρους, γράφομεν τὸ ἐν κάτωθεν τοῦ ἄλλου, ώστε οἱ ὁμοίοι ὅροι νὰ εύρισκωνται εἰς τὴν αὔτὴν στήλην (καθ' ὃσον τοῦτο εἶναι δυνατὸν) διὰ νὰ εύκολύνεται ἡ ἀναγωγὴ τούτων. Οὕτω π. χ., ἐὰν ζητοῦμεν τὸ ἄθροισμα τῶν πολυωνύμων

$$\begin{aligned} & 5\alpha^5 - 4\alpha^4\beta^2 + 8\alpha^4\beta - 7\alpha\beta^4\gamma^2 + 2\alpha^2\beta^3\gamma + \gamma^3 \\ & 2\alpha^2\beta^3\gamma + 6\alpha^5 - 12\alpha^4\beta + 2\alpha^3\beta^2 - \alpha\beta^4\gamma^2 - 3\gamma^3 \\ & 2\alpha^2\beta^3\gamma + 6\alpha^5 - 12\alpha^4\beta + 2\alpha^3\beta^2 - \alpha\beta^4\gamma^2 - 3\gamma^3 \\ & - 2\alpha^5 - 6\alpha^4\beta + 9\alpha^3\beta^2\gamma - 12\alpha^3\beta^2 + \alpha\beta^4\gamma^2 - 7\gamma^3 \end{aligned}$$

γράφομεν πρῶτον αὐτὰ ὡς ἔξης :

$$\begin{aligned} & 5\alpha^5 + 8\alpha^4\beta - 4\alpha^3\beta^2 + 2\alpha^2\beta^3\gamma - 7\alpha\beta^4\gamma^2 + \gamma^3 \\ & 6\alpha^5 - 12\alpha^4\beta + 2\alpha^3\beta^2 + 2\alpha^2\beta^3\gamma - \alpha\beta^4\gamma^2 - 3\gamma^3 \\ & - 2\alpha^5 - 6\alpha^4\beta - 12\alpha^3\beta^2 + 9\alpha^2\beta^3\gamma + \alpha\beta^4\gamma^2 - 7\gamma^3 \end{aligned}$$

\*Ακολούθως κάμνομεν τὴν ἀναγωγὴν ὁμοίων ὅρων, τῶν κειμένων εἰς τὰς αὐτὰς στήλας καὶ εύρισκομεν ἔξαγόμενον

$$9\alpha^5 - 10\alpha^4\beta - 14\alpha^3\beta^2 + 13\alpha^2\beta^3\gamma - 7\alpha\beta^4\gamma^2 - 9\gamma^3$$

\*Ομοίως ὡς ἀνωτέρω ὅριζομεν τὴν πρόσθεσιν ἀλγεβρικῶν παραστάσεων.

### "Α σ κ η σ ι 5

**[93]** Νὰ προστεθοῦν τὰ κάτωθι πολυώνυμα :

<input checked="" type="checkbox"/> 2α - 5β + 2γ	2α + 3β + γ	- 3α - 2γ
<input checked="" type="checkbox"/> 2x <sup>2</sup> - 2xψ + 3ψ <sup>2</sup>	-x <sup>2</sup> + 5xψ + 4ψ <sup>2</sup>	x <sup>2</sup> - 2xψ - 6ψ <sup>2</sup>
<input checked="" type="checkbox"/> 2αβ + 3αγ + 6αβγ	-5αβ + 2βγ - 5αβγ	3αβ - 2βγ
δ') $\frac{2x^2}{3} + \frac{1}{3}x\psi - \frac{1}{4}\psi^2$	-x <sup>2</sup> - $\frac{2x\psi}{3} + 2\psi^2$	$\frac{2x^2}{3} - x\psi - \frac{5}{4}\psi^2$
ε') $\frac{5x^2}{8} - \frac{x\psi}{3} + \frac{3\psi^2}{8}$	$-\frac{3x^2}{4} + \frac{14x\psi}{15} - \psi^2$	$\frac{x^2}{2} - x\psi + \frac{\psi^2}{5}$

### 2. ΑΦΑΙΡΕΣΙΣ ΑΛΓΕΒΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ

**§ 61.** Καλοῦμεν ἀφαίρεσιν ἀλγεβρικῆς παραστάσεως, ἔστω Β ἀπὸ ἄλλης Α, τὴν εὗρεσιν τρίτης Γ, ἡ ὅποια προστιθεμένη εἰς τὴν Β δίδει ἄθροισμα τὴν Α. Τὸ ἔξαγόμενον Γ τῆς ἀφαίρεσεως λέγεται διαφορὰ τῶν Α καὶ Β.

Διὰ νὰ ἀφαιρέσωμεν μονώνυμόν τι ἀπὸ δοθεῖσαν παράστασιν, ἀρκεῖ νὰ προσθέσωμεν εἰς ταύτην τὸ ἀντίθετον τοῦ δοθέντος.

Διότι, έάν π.χ. θέλωμεν νὰ εύρωμεν τὴν διαφορὰν τοῦ  $-\alpha^2$  ἀπὸ τοῦ  $\alpha^3\psi$  καὶ παραστήσωμεν αὐτὴν μὲν δ, θὰ εἴναι

$$\delta = \alpha^3\psi - (-\alpha^2).$$

Ἄλλὰ κατὰ τὸν ὄρισμὸν τῆς ἀφαιρέσεως θὰ εἴχωμεν

$$\delta + (-\alpha^2) = \alpha^3\psi$$

Προσθέτοντες εἰς τὰ ἵσα τὸ  $\alpha^2$  εύρισκομεν δ +  $(-\alpha^2)$  +  $\alpha^2 = \alpha^3\psi + \alpha^2$  καὶ μετὰ τὴν ἀναγωγὴν τῶν  $-\alpha^2$  καὶ  $\alpha^2$ , εἴχομεν  $\delta = \alpha^3\psi + \alpha^2$ .

Ομοίως εύρισκομεν δ̄τι ἡ διαφορὰ π.χ. τοῦ  $\alpha^2\beta$  ἀπὸ τοῦ  $3\alpha^2\beta + 6\alpha\beta^2 - \beta^3$  εἴναι  $3\alpha^2\beta + 6\alpha\beta^2 - \beta^3 - \alpha^2\beta = 2\alpha^2\beta + 6\alpha\beta^2 - \beta^3$ .

Έάν ζητεῖται π.χ. ἀπὸ τὸ πολυώνυμον  $\alpha^3\chi - \alpha^2\psi + \alpha^3$  ν' ἀφαιρεθοῦν περισσότερα τοῦ ἑνὸς μονώνυμα, εστω τὰ  $\alpha^2\chi, -3\alpha^2\psi^3, -\alpha^4 2\alpha\psi^2$  ἡ ἀφαιριοῦμεν ἀπὸ τὸ δοθὲν πολυώνυμον τὸ πρῶτον μονώνυμον, ἀπὸ τὸ ἔξαγόμενον τὸ δεύτερον καὶ ἀκολούθως ἀπὸ τὸ νέον ἔξαγόμενον τὸ τρίτον καὶ οὕτω καθεξῆς ἡ ( συντομώτερον ) προσθέτομεν εἰς τὸ δοθὲν πολυώνυμον τὸ ἀθροισμα τῶν πρὸς ἀφαιρέσιν δοθέντων μονωνύμων, ἔκαστον μὲν ἀντίθετον σῆμα. Ἡτοι εἴχομεν κατὰ ταῦτα :

$$\alpha^3\chi - \alpha^2\psi + \alpha^3 - \alpha^2\chi + 3\alpha^2\psi^3 + \alpha^4 - 2\alpha\psi^2.$$

Διὰ νὰ ἀφαιρέσωμεν ἀπὸ δοθείσης παραστάσεως δοθὲν πολυώνυμον, γράφομεν κατόπιν αὐτῆς τοὺς ὅρους τοῦ ἀφαιρετέου, καθένα μὲ τὸ ἀντίθετον πρόσημόν του.

Ἡ ἀπόδειξις γίνεται καθ' ὅμιοιν τρόπον, καθὼς καὶ ἀνωτέρω, Οὔτως ἡ διαφορὰ τοῦ  $3\alpha^2\chi - 9\alpha^3\chi^2 - 6\alpha^2\chi^2$  ἀπὸ τοῦ  $9\alpha^2\chi + 18\alpha^3\chi^2 - \alpha^2\chi^2$ . τὴν δόποιαν σημειῶνομεν ὡς ἔξης :

$$(9\alpha^2\chi + 18\alpha^3\chi^2 - \alpha^2\chi^2) - (3\alpha^2\chi - 9\alpha^3\chi^2 - 6\alpha^2\chi^2)$$

$$\text{εἴναι } 9\alpha^2\chi + 18\alpha^3\chi^2 - \alpha^2\chi^2 - 3\alpha^2\chi + 9\alpha^3\chi^2 + 6\alpha^2\chi^2$$

καὶ μετὰ τὴν ἀναγωγὴν τῶν ὁμοίων ὅρων

$$6\alpha^2\chi + 27\alpha^3\chi^2 + 5\alpha^2\chi^2.$$

Ἐάν εἴχωμεν νὰ ἀφαιρέσωμεν ἀπὸ δοθὲν πολυώνυμον ἄλλο τοιοῦτο, ἐν πρώτοις δι' ἔκαστον εύρισκομεν τὸ ἴσοδύναμον αὐτοῦ ἀνηγμένον, ἔάν δὲ εἴχουν μεταξύ των ὁμοίων ὅρων, συνήθως διατάσσομεν ταῦτα κατὰ τὰς δυνάμεις τοῦ αὐτοῦ γράμματος καὶ γράφομεν τὸν ἀφαιρετέον ὑπὸ τὸν μειωτέον, καθὼς καὶ εἰς τὴν πρόσθεσιν, ἀλλὰ μὲν ἡλλαγμένα τὰ πρόσημα τῶν ὅρων των.

Οὔτω π.χ. ἔάν ζητοῦμεν τὴν διαφορὰν τοῦ

$$9\alpha^3 - 8\alpha^2\beta + 5\alpha\beta^2 - 7\beta^3 \text{ ἀπὸ τοῦ } 7\alpha^2 + 2\alpha^2\beta + 9\alpha\beta^2 - 11\beta^3 - 4\gamma^2,$$

$$\begin{aligned} \text{γράφομεν} \quad & 7\alpha^3 + 2\alpha^2\beta + 9\alpha\beta^2 - 11\beta^3 - 4\gamma^2 \\ & - 9\alpha^3 + 8\alpha^2\beta - 5\alpha\beta^2 + 7\beta^3 \end{aligned}$$

καὶ ἐκτελοῦντες ἀναγωγὴν τῶν διαιρέσιων ὅρων εὑρίσκομεν τὴν διαφορὰν

$$-2\alpha^3 + 10\alpha^2\beta + 4\alpha\beta^2 - 4\beta^3 - 4\gamma^2.$$

### Α σ κ ή σ εις

94 α') Νὰ εύρεθῇ ἡ διαφορὰ τοῦ  $4x^2 + 3x\psi + 3\psi^2$  ἀπὸ τὸ  $x^2 - x\psi + 2\psi^2$

β') Νὰ ἀφαιρεθῇ ἀπὸ τὸ  $\alpha^3 + 3\alpha^2\beta + 3\alpha\beta^2 + \beta^3$  τὸ  $\alpha^2 - 3\alpha\beta - 3\beta^2 - \beta^3$

γ') Ἀπὸ τὸ  $\alpha^2x^2 + 4\alpha\psi - 3\alpha\beta\psi^2$  τὸ  $4\alpha\beta\psi^2 - 5\alpha\psi - 2\alpha^2$

δ') Ἀπὸ τὸ  $10\alpha^4 - 15\beta\nu - \gamma\rho + 5\delta\lambda$  τὸ  $-9\alpha^4 + 2\beta\nu - \gamma\rho - 5\delta\lambda$

ε') Ἀπὸ τὸ  $4\psi^2 + x^2 - 4x\psi - 3x + 4$  τὸ  $\psi^2 + x^2 + 2x\psi - 4\psi - 2x$

95. Νὰ ἀφαιρεθῇ ἀπὸ τὸ  $2,5x^2 + 3\alpha x - \frac{7}{9}\alpha^2$  τὸ  $2x^2 - \alpha x - 0,5\alpha^2$

96. Νὰ ἀφαιρεθῇ ἀπὸ τὸ  $\frac{x^2}{4} - 6x + \frac{9}{15}$  τὸ  $-\frac{x^3}{4} + \frac{x^2}{8} - \frac{3x}{9} - \frac{1}{5}$ .

### 3. ΠΕΡΙ ΠΑΡΕΝΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΚΥΛΩΝ

**§ 62.** Τὸ ἀθροισμα τὴν διαφορὰν δύο πολυωνύμων παριστάνομεν, ώς εἰδομεν, κλείοντες ἔκαστον αὐτῶν ἐντὸς παρενθέσεως (ἢ ἀγκύλης) καὶ συνδέοντες ταύτας μὲ τὸ + ἢ - τῆς πράξεως.

Π.χ. τὸ ἀθροισμα τῶν  $2\alpha^2 + 3\alpha\beta - \beta^2$  καὶ  $-\alpha^2 - \alpha\beta + \gamma$  παριστάνομεν μὲ  $(2\alpha^2 + 3\alpha\beta - \beta^2) + (-\alpha^2 - \alpha\beta + \gamma)$

καὶ ἴσοῦται τοῦτο μὲ  $2\alpha^2 + 3\alpha\beta - \beta^2 - \alpha^2 - \alpha\beta + \gamma$

Ἡ διαφορὰ τῶν αὐτῶν παραστάσεων παριστάνεται μὲ

$$(2\alpha^2 + 3\alpha\beta - \beta^2) - (-\alpha^2 - \alpha\beta + \gamma)$$

καὶ ἴσοῦται μὲ  $2\alpha^2 + 3\alpha\beta - \beta^2 + \alpha^2 + \alpha\beta - \gamma$ .

Ἐκ τούτων ἔπειται ὅτι :

Ἐὰν μὲν πρὸ παρενθέσεως ἢ ἀγκύλης, ἐντὸς τῆς ὁποίας ἔχομεν ὅρους, ὑπάρχῃ τὸ +, δυνάμεθα νὰ τὴν παραλείψωμεν χωρὶς νὰ μεταβάλωμεν τὰ πρόσημα τῶν ἐντὸς αὐτῆς ὅρων, ἐὰν δὲ ὑπάρχῃ τὸ -, τὴν παραλείπομεν, ἀφοῦ προηγουμένως ἀλλάξωμεν τὸ πρόσημον καθενὸς τῶν ἐντὸς αὐτῆς ὅρων.

$$\text{Οὕτως ἔχομεν } \alpha - (\beta - \gamma + \delta) = \alpha - \beta + \gamma - \delta.$$

Διότι τὸ -, τὸ πρὸ τῆς παρενθέσεως, σημαίνει νὰ ἀφαιρεθῇ τὸ  $\beta - \gamma + \delta$  ἀπὸ τὸ  $\alpha$  καὶ, κατὰ τὰ ἀνωτέρω, ἀρκεῖ νὰ προσθέ-

σωμεν είς τὸ α τοὺς ὅρους τῆς παρενθέσεως, καθένα μὲ ἡλλαγμένον τὸ πρόσημόν του.

Όμοίως ἔχομεν :

$$\begin{aligned} \alpha - [-(\beta + \gamma) + (\alpha - \beta) - \gamma + \alpha] &= \alpha + (\beta + \gamma) - (\alpha - \beta) + \gamma - \alpha = \\ &= \alpha + \beta + \gamma - \alpha + \beta + \gamma - \alpha = -\alpha + 2\beta + 2\gamma. \end{aligned}$$

Αντιστρόφως, δυνάμεθα νὰ θέτωμεν ὅρους ἀθροίσματος ἐντὸς παρενθέσεως ή ἀγκύλης, καὶ ἂν μὲν θέτωμεν τὸ σῆμα + πρὸ ἀύτης ἔκαστος ὅρος διατηρεῖ τὸ σῆμα του ἐντὸς ταύτης, ἀν δὲ τὸ -, οἱ ὅροι γράφονται ἔκαστος μὲ ἡλλαγμένον τὸ σῆμα του ἐντὸς αύτῆς. Οὕτω π.χ. ἔχομεν :

$$\alpha - \beta - \gamma = \alpha + (-\beta - \gamma) = \alpha - (\beta + \gamma).$$

### Ασκήσεις .καὶ προβλήματα

Ο μὰς πρώτη. 97. Νὰ εύρεθοῦν τὰ ἔξαγόμενα τῶν κάτωθι πράξεων καὶ αἱ τιμαὶ των διὰ τὰς σημειουμένας τιμὰς τῶν γραμμάτων :

$$\alpha') 3x - (7x - 5\psi) \quad \text{δταν } x = \psi = 3.$$

$$\beta') 3x + 6\psi - 9\omega + (14x - 7\psi + 9\omega) \quad \text{δταν } x = 6, \psi = 3, \omega = 4.$$

$$\gamma') \theta - (\mu - v) \quad \text{ἐὰν εἴναι } \theta = x + 9\psi - 6\omega, \mu = 4x - 7\psi + 2\omega, v = x + \psi + \omega.$$

Ο μὰς δευτέρη. 98. Ἐκτελέσατε τὰς κατωτέρω πράξεις, ὥστε νὰ ἔξαλειφθοῦν αἱ παρενθέσεις καὶ αἱ ἀγκύλαι καὶ εύρετε τὰς τιμὰς τῶν ἔξαγομένων διὰ τὰς διδούμενας τιμὰς τῶν γραμμάτων :

$$\alpha) \alpha - [\alpha - [\alpha - (\alpha - 1)]]$$

$$\text{δταν } \alpha = 1$$

$$\beta') 5,8\alpha^2 - 8,2\alpha^2 - (\alpha^2 - 0,4) + 0,6$$

$$\text{δταν } \alpha = 2$$

$$\gamma) -[-(-x)] - [-(-\psi)]$$

$$\text{δταν } x = \psi = -1$$

$$\delta) -[+[+(-x)] - [-[+(-x)]]]$$

$$\text{δταν } x = 2$$

$$\epsilon) -[-(-(\beta + \gamma - \alpha))] + [-(-(\alpha - \beta + \gamma))]$$

$$\text{δταν } \alpha = 1, \beta = 0, \gamma = -1.$$

99. Δίδονται τὰ πολυώνυμα

$$2-2x+7x^3-x^4+x^5, \quad x+2x^2-3x^3+4x^4-x^5 \quad \text{καὶ } x^2+2x^3-3x^4+4x^5.$$

Νὰ εύρεθῇ : α) τὸ ἀθροίσμα αὐτῶν, β') τὸ ἀθροίσμα τῶν δύο πρώτων καὶ ἀκολούθως η διαφορά τούτου ἀπὸ τοῦ τρίτου, γ') νὰ προστεθῇ η διαφορὰ τοῦ δευτέρου ἀπὸ τοῦ πρώτου εἰς τὸν τρίτον.

Ο μὰς τρίτη. 100. Γράψατε καταλλήλως τὰς κατωτέρω παραστάσεις, ὥστε οἱ ὅροι των ἀπὸ τοῦ δευτέρου καὶ ἔξις νὰ εἴναι εἰς παρένθεσιν η ἀγκύλην' ἔχουσαν πρὸ αύτης : α') τὸ σῆμα +, β') τὸ σῆμα - :

$$x^2+7x^2-3x-5, \quad -5x^4-(3x^3-8x^2)-6x+9, \quad 13x-16x^2+19x^3-14\alpha+5\gamma$$

101. Νὰ εύρεθοῦν τὰ

$$\alpha) x+\psi+\omega+\phi, \quad \beta') x-\psi-\omega+\phi, \quad \gamma') \psi-(x+\omega-\phi), \text{ δταν τεθῇ :} \\ x=3\alpha^2-2\alpha\beta+5\beta^2, \quad \psi=7\alpha^2-8\alpha\beta+5\beta^2, \quad \omega=9\alpha^2-5\alpha\beta+3\beta^2, \quad \phi=11\alpha^2-3\alpha\beta-4\beta^2.$$

Ο μὰς τετάρτη. 102. Εἰς τὴν πρώτην τάξιν σχολείου τινὸς φοιτοῦν αἱ μαθηταί, εἰς τὴν δευτέραν β ὀλιγώτεροι, εἰς δὲ τὴν τρίτην 2β ὀλιγώτεροι τῶν

εις την πρώτην. Πόσους μαθητὰς ἔχουν ἐν ὅλῳ αἱ τρεῖς τάξεις; Πόσους ἔχουν αἱ δύο πρῶται τάξεις περισσοτέρους τῆς τρίτης;

103. Ἐκ δύο ἀνθρώπων Α καὶ Β, ὁ Α ἔχει χ δρχ. καὶ οἱ δύο ὄμοι μ. δρχ. Ἀν ὁ Α δώσῃ εἰς τὸν Β 3 δρχ., πόσας θὰ ἔχῃ ἕκαστος;

104. Ὁ Β ἔχει τριπλασίας δρχ. ἢ ὁ Α, ὁ Γ διπλασίας τοῦ Β, ὁ δὲ Α ἔχει μ δρχ. Πόσας ἔχουν καὶ οἱ τρεῖς;

#### 4. ΓΙΝΟΜΕΝΟΝ ΑΚΕΡΑΙΩΝ ΜΟΝΩΝΥΜΩΝ

**§ 63.** Καλοῦμεν γινόμενον δοθεισῶν ἀλγεβρικῶν παραστάσεων τὴν παράστασιν, ἡ ὁποία ἔχει παράγοντας τὰς δοθείσας παραστάσεις.

Ἡ πρᾶξις, μὲ τὴν ὅποιαν εύρισκομεν τὸ γινόμενον ἀλγεβρικῶν παραστάσεων λέγεται πολλαπλασιασμὸς αὐτῶν.

Ἐστω ὅτι θέλομεν νὰ εύρωμεν τὸ γινόμενον τῶν μονωνύμων  $5\alpha^2\beta^2\gamma$  καὶ  $3\beta\gamma^2$ . Κατὰ τὸν δρισμὸν τὸ γινόμενόν των, τὸ ὅποιον σημειώνομεν οὕτω: ( $5\alpha^2\beta^2\gamma$ ). ( $3\beta\gamma^2$ ), ίσοῦται μὲ  $5\alpha^2\beta^2\gamma \cdot 3\beta\gamma^2$ . Ἀλλὰ τοῦτο εἴναι γινόμενον τῶν ἀλγεβρικῶν παραγόντων τῶν μονωνύμων καὶ ἔὰν ἀλλάξωμεν τὴν θέσιν αὐτῶν θὰ ἔχωμεν

$$5\alpha^2\beta^2\gamma \cdot 3\beta\gamma^2 = 5 \cdot 3 \cdot \alpha^2 \cdot \beta^2 \cdot \beta \cdot \gamma \cdot \gamma^2 = 15\alpha^2\beta^3\gamma^3.$$

Ἐκ τούτων καὶ ἄλλων ὄμοιών παραδειγμάτων ὁδηγούμενοι λέγομεν ὅτι:

Διὰ νὰ εύρωμεν τὸ γινόμενον ἀκεραίων μονωνύμων, πολλαπλασιάζομεν τοὺς ἀριθμητικοὺς συντελεστάς των καὶ δεξιὰ τοῦ γινομένου των γράφομεν καθένα γράμμα, ὑπάρχον εἰς τὰ δοθέντα μονώνυμα, μὲ ἐκθέτην τὸ ἀθροισμα τῶν ἐκθετῶν, τοὺς ὄποιους ἔχει τοῦτο εἰς τὰ δοθέντα.

Είναι φανερὸν ὅτι ὁ βαθμὸς τοῦ γινομένου μονωνύμων ὡς πρὸς ἐν ἣ περισσότερα γράμματά του, ίσοῦται μὲ τὸ ἀθροισμα τῶν βαθμῶν τῶν παραγόντων του ὡς πρὸς τὰ γράμματα αὐτά. Π.χ. τὸ  $(5\alpha^2\beta\gamma) \cdot (-2\alpha\beta^2\gamma^3\delta) = -10\alpha^3\beta^3\gamma^4\delta$  εἴναι βαθμοῦ ὡς πρὸς α, β, γ, δ  $4+7=11$ , ὅπου 4 εἴναι ὁ βαθμὸς τοῦ πρώτου παράγοντος καὶ 7 ὁ τοῦ δευτέρου ὡς πρὸς τὰ α, β, γ, δ.

#### Ἄσκήσεις

105. Νὰ εύρεθοῦν τὰ γινόμενα

$$\alpha') x^7 \cdot (-x^3) \cdot \psi^6 \cdot \psi^4 \quad \beta') (-x^4 \cdot x) \cdot \alpha^3 \cdot \alpha^5 \cdot \alpha^2 \quad \gamma') (x^2)^3 \cdot (\beta^3)^4 \quad \delta') x^v +^2 \cdot x^v \cdot x$$

$$\varepsilon') x^{3v+1} \cdot x \cdot x^{2v-2} \cdot x^2, \quad \sigma\tau') (-7x\psi\omega) \cdot (4x^2\psi^2), \quad \zeta') (-x \cdot \psi \cdot \omega) \cdot (x^2 \cdot \psi^2 \cdot \omega^2).$$

$$106. \text{ Εύρετε τὰ } \alpha' ) (-2,5\alpha^2\beta x)^2, \quad \beta' ) (-0,3\alpha\beta\gamma^2)^3, \quad \gamma' ) (-2\alpha\beta^2\gamma x^2)^4$$

107. Εύρετε τὰ

$$\alpha') \alpha x, \quad (\alpha^2x-1), \quad \beta') (-xv-1 \cdot \psi\mu-3) \quad (-xv-1 \cdot \psi\mu-1), \quad \gamma' \text{ Πῶς ύψοῦμεν μονώνυμον εἰς τὸ τετράγωνον ἢ εἰς τὸν κύβον ἢ εἰς δύναμιν μέ άκέραιον ἐκθέτην; Π.χ. μὲ τί ισοῦται τὸ  $(6\alpha\beta^2)^2$ , τὸ  $\left(\frac{3}{4} x^3\psi\right)^3$ , τὸ  $(25\alpha^2\beta^2\gamma)^5$ ;$$

## 5. ΓΙΝΟΜΕΝΟΝ ΠΟΛΥΩΝΥΜΟΥ ΕΠΙ ΜΟΝΩΝΥΜΟΝ

**§ 64.** "Εστω ὅτι θέλομεν νὰ εῦρωμεν τὸ γινόμενον  $(\alpha^2-3\alpha\beta+\beta^2) \cdot 2\alpha$ .

'Επειδὴ τὸ πολυώνυμον εἶναι ἄθροισμα τῶν ὅρων του, θὰ χωρευει  $(\alpha^2-3\alpha\beta+\beta^2) \cdot 2\alpha = [\alpha^2 + (-3\alpha\beta) + \beta^2] \cdot 2\alpha$ .

'Επειδὴ ἔχομεν πολλαπλασιασμὸν ἀθροίσματος σχετικῶν ἀριθμῶν ἐπὶ ἄλλον ἀριθμόν, εύρισκομεν ὅτι τὸ ἀνωτέρω γινόμενον ισοῦται μὲ  $\alpha^2 \cdot 2\alpha + (-3\alpha\beta) \cdot 2\alpha + \beta^2 \cdot 2\alpha = 2\alpha^3 - 6\alpha^2\beta + 2\alpha\beta^2$ .

'Ομοίως εύρισκομεν ὅτι :

$$(5\alpha^2\beta - 3\alpha\beta^2 + 7\beta^3) \cdot (-3\alpha\beta) = -15\alpha^3\beta^2 + 9\alpha^2\beta^3 - 21\alpha\beta^4. \text{ "Ωστε :}$$

Διὰ νὰ πολλαπλασιάσωμεν πολυώνυμον ἐπὶ μονώνυμον, πολλαπλασιάζομεν καθένα τῶν ὅρων τοῦ πολυωνύμου ἐπὶ τὸ μονώνυμον καὶ προσθέτομεν τὰ ἔξαγόμενα.

'Ἐὰν ἔχωμεν νὰ πολλαπλασιάσωμεν μονώνυμον ἐπὶ πολυώνυμον, δυνάμεθα νὰ ἐναλλάξωμεν τὴν θέστιν τῶν παραγόντων (θεωροῦντες τὸ πολυώνυμον ὡς ἓνα σχετικὸν ἀριθμόν, ἐπειδὴ εἶναι ἄθροισμα τῶν ὅρων αὐτοῦ) καὶ οὕτω θὰ ἔχωμεν νὰ πολλαπλασιάσωμεν πολυώνυμον ἐπὶ ἀκέραιον μονώνυμον. Π. χ. τὸ γινόμενον

$$\alpha \cdot (\beta + \gamma - \alpha) = (\beta + \gamma - \alpha) \cdot \alpha \text{ καὶ τοῦτο} = \alpha\beta + \alpha\gamma - \alpha^2.$$

## Α σκήσεις καὶ προβλήματα

'Ο μὰς πρώτη. 108. Νὰ εύρεθοῦν τὰ κάτωθι γινόμενα καὶ τῶν ἔξαγόμενων αἱ ἀριθ. τιμαὶ διὰ τὰς διδομένας τιμὰς τῶν γραμμάτων.

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| α') $3\alpha(\alpha^2-4\alpha x+x^2)$   | δταν $x=-1, \alpha=2$   |
| β') $(3\alpha+7\beta)\alpha - (9\beta-5\alpha)\beta$  | » $\alpha=2, \beta=-3$  |
| γ') $(3\alpha^2+7\beta^2)\alpha\beta - (9\alpha^2-8\beta^2)\alpha\beta$                                       | » $\alpha=-1, \beta=-2$ |
| δ') $(3\alpha^2\beta^3+7\beta^2) \cdot 3\alpha^2\beta^2 - (9\alpha^3\beta^3-8\beta^2) \cdot 2\alpha^2\beta^3$ | » $\alpha=-1, \beta=-2$ |

‘Ο μάς δευτέρα. 109. Λύσατε τὰ ἔξης προβλήματα :

Ἐκ τίνος τόπου ἀναχωροῦν συγχρόνως δύο ταχυδρόμοι προχωροῦντες ἐπ’ εὐθείας πρὸς ἀντιθέτους φοράς. ‘Ο α’ διανύει καθ’ ἡμέραν α+μ χλμ. καὶ ὁ β’ 2 χλμ. διλγώτερα τοῦ α’. Πόσον θὰ ἀπέχουν μετὰ τὴν ἡμέραν;

110. Τὸ ἄθροισμα τῶν ψηφίων διψηφίου τινὸς ἀριθμοῦ εἶναι α. Τὸ ψηφίον τῶν μονάδων του εἶναι μ. Πότε καὶ πόσον θὰ αὐξηθῇ ὁ ἀριθμὸς ἐάν έναλλάξωμεν τὴν θέσιν τῶν ψηφίων του;

111. Ἐκ τίνος τόπου ἀναχωρεῖ ταχυδρόμος διανύων 30 χλμ. ἡμερησίως. μ. ἡμέρας βραδύτερον ἀναχωρεῖ ἐκ τοῦ αὐτοῦ τόπου ἄλλος διανύων γ χλμ. ἡμερησίως καὶ διευθύνεται πρὸς τὸν α’. Πόσον θὰ ἀπέχουν μετὰ τὴν ἡμέραν ἀπὸ τῆς ἀναχωρήσεως τοῦ α’;

## 6. ΓΙΝΟΜΕΝΟΝ ΠΟΛΥΩΝΥΜΩΝ

**§ 65.** Καλοῦμεν γινόμενον δύο πολυωνύμων τὸ πολυώνυμον τὸ προκύπτον ἐκ τοῦ πολλαπλασιασμοῦ αὐτῶν, ἢτοι τὸ ἔχον παράγοντας τὰ δύο πολυώνυμα.

Ἐπειδὴ ἔκαστον πολυώνυμον εἶναι ἄθροισμα τῶν ὅρων του, ἐπεται δὲ :

Διὰ νὰ εὕρωμεν τὸ γινόμενον δύο πολυωνύμων, ἀρκεῖ νὰ πολλαπλασιάσωμεν καθένα ὥρον τοῦ πολλαπλασιαστέου ἐπὶ πάντας τοῦ πολλαπλασιαστοῦ καὶ νὰ προσθέσωμεν τὰ ἔξαγόμενα.

Διὰ νὰ εὕρωμεν τὸ γινόμενον δύο ἀκεραίων πολυωνύμων συνήθως διατάσσομεν αὐτὰ κατὰ τὰς κατιούσας ἢ ἀνιούσας δυνάμεις τοῦ αὐτοῦ γράμματός των καὶ ἀκολούθως ἐκτελοῦμεν τὸν πολλαπλασιασμόν, πρὸς εύκολίαν εἰς τὴν ἀναγωγὴν τῶν ὀμοίων ὅρων, ὡς φαίνεται εἰς τὰ ἑπόμενα παραδείγματα.

$$\begin{array}{ll} \text{1ον. } ^{*}\text{Εστω δὲ } \zeta\text{ητοῦμεν τὸ γινόμενον} & (2x^2-x+3)(x-4). \\ \text{Γράφομεν} & 2x^2-x+3 \\ & \quad x-4 \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} (1) \text{ μερικὸν γινόμενον} & 2x^3-x^2+3x \\ (2) \quad " \quad " & -8x^2+4x-12 \\ (3) \text{ τελικὸν} \quad " & 2x^2-9x+7x-12 \end{array}$$

Τὰ (1), (2) εύρισκονται ἐκ τοῦ πολλαπλασιασμοῦ τοῦ πολλαπλασιαστέου ἐπὶ  $x$  καὶ ἐπὶ  $-4$ , λέγονται δὲ μερικὰ γινόμενα.

Τὸ (3) προκύπτει ἐκ τῆς προσθέσεως τῶν (1) καὶ (2) καὶ λέγεται τελικὸν γινόμενον.

$$\begin{array}{rcl}
 \text{2ον. } \text{'Εστω τὸ γινόμενον } (4x^5 - 3x^4 + x^2 - 1)(x^3 - x + 2). \quad \text{'Ομοίως} \\
 \text{ώς ἀνωτέρω ἔχομεν} & & \\
 & 4x^5 - 3x^4 + x^2 - 1 & \\
 & \underline{x^3 - x + 2} & \\
 4x^8 - 3x^7 & + & x^5 & - x^3 \\
 & - 4x^6 & + 3x^5 & - x^3 & + x & \\
 & + 8x^5 & - 6x^4 & + 2x^2 & - 2 & \\
 4x^8 - 3x^7 - 4x^6 + 12x^5 - 6x^4 - 2x^3 + 2x^2 + x - 2 & & & & \text{μερικὸν γινόμενον} \\
 & & & & \gg \gg \\
 & & & & \text{τελικὸν} & \gg
 \end{array}$$

**§ 66.** Ἐκ τῶν ἀνωτέρω παρατηροῦμεν ὅτι τὸ γινόμενον τοῦ α' ὅρου  $4x^5$  τοῦ πολλαπλασιαστέου ἐπὶ τὸν α' ὅρον  $x^3$  τοῦ πολλαπλασιαστοῦ δίδει τὸν α' ὅρον  $4x^8$  τοῦ γινομένου. Ὁμοίως τὸ γινόμενον τῶν δύο τελευταίων ὅρων αὐτῶν — 1 καὶ 2 δίδει τὸν τελευταίον ὅρον — 2 τοῦ γινομένου. Ἐπομένως :

"Οταν οἱ παράγοντες γινομένου δύο ἀκεραίων πολυωνύμων (ἀνηγμένων) εἰναι διατεταγμένοι κατὰ τὰς κατιούσας ἢ τὰς ἀνιούσας δυνάμεις ἐνὸς γράμματός των, τὰ γινόμενα τῶν ἀντιστοίχων ἄκρων ὅρων (τῶν πρώτων καὶ τελευταίων) δίδουν τοὺς ἀντιστοιχους ἄκρους ὅρους τοῦ γινομένου, διατεταγμένου δόμοίως ὡς πρὸς τὸ αὐτὸν γράμμα.

"Αρα τὸ γινόμενον δύο ἀκεραίων πολυωνύμων θὰ ἔχῃ τούλαχιστον δύο ὅρους καὶ δὲν δύνανται νὰ εἰναι μονώνυμον.

**§ 67.** Ο βαθμὸς τοῦ γινομένου δύο ἀκεραίων πολυωνύμων ώς πρὸς τὸ αὐτὸν γράμμα των ἴσοῦται μὲ τὸ ἀθροισμα τῶν βαθμῶν τῶν παραγόντων.

### 'Α σκήσεις

112. Εὗρετε τὰ κάτωθι γινόμενα καὶ τὰ ἔξαγόμενα τῶν διθέντων ώς καὶ τῶν ἔξαγομένων διὰ τὰς διδομένας τιμᾶς τῶν γραμμάτων :

$$\begin{array}{lll}
 \alpha') (x^2 + 4x + 3)(1 - x^2) & & \text{ἄν τεθῇ ὅπου } x = -1 \\
 \beta') (x^2 + 2x + 2)(x^2 - 5x + 3) & \gg \gg \gg & x = -1 \\
 \gamma') (x^3 - 2x^2 + 8)(x^2 - 2x - 2) & \gg \gg \gg & x = 3 \\
 \delta') (3\alpha^2 - 2\alpha + 5\alpha^3 - 1)(\alpha - 3 - 4\alpha^2) & \gg \gg \gg & \alpha = 3
 \end{array}$$

113. Ὁμοίως :

$$\begin{array}{ll}
 \alpha') (4\alpha^{2v+4} + 6\alpha^v + 3 + 9\alpha^2)(2\alpha^{v+4} - 3\alpha^3) \\
 \beta') (x^{12} - x^4\psi^2 + x^6\psi^4 - x^8\psi^6 + \psi^8)(x^3 + \psi^2)
 \end{array}$$

$$\begin{aligned} \gamma') & (\alpha\mu - \beta \cdot \alpha^{\mu-1} \cdot x + \gamma \cdot \alpha^{\mu-2} \cdot x^2) (x^2 - \mu + \beta \cdot \alpha^{1-\mu} \cdot x - \gamma \cdot \alpha^{\mu} \cdot x) \\ \delta') & [x\alpha(\beta^{-1}) + \psi\beta(\alpha^{-1})] [x\alpha(\beta^{-1}) - \psi\beta(\alpha^{-1})] \\ \varepsilon') & (x^4 + x^3 - x^2 + x + 1) (x-1) (x+2) (x+1) \\ \sigma') & (2\alpha + \beta - 3\gamma) (2\alpha + \beta + 3\gamma) (\beta - 3\gamma - 2\alpha), \\ \text{θέτοντες είς δλα δπου } & \alpha=1, \quad \beta=2, \quad x=\psi=-1. \end{aligned}$$

## 7. ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΟΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΙ

### § 68. Παραστάσεις τῆς μορφῆς

$$(\alpha + \beta)^2, (\alpha - \beta)^2, (\alpha + \beta) \cdot (\alpha - \beta), (\alpha + \beta)^3, (\alpha - \beta)^3, \dots$$

παρουσιάζονται συχνά καὶ εἶναι καλὸν νὰ γνωρίζωμεν ἀπὸ μηῆμης τὰ ἔσαγόμενα τὰ εύρισκόμενα, ἐὰν εἰς ἑκάστην ἔξ αὐτῶν ἐφαρμόσωμεν τὸν κανόνα τοῦ πολλαπλασιασμοῦ. Οὕτως ἔχομεν :

$$1\text{ov. } (\alpha + \beta)^2 = (\alpha + \beta) \cdot (\alpha + \beta) = \alpha^2 + \alpha\beta + \alpha\beta + \beta^2 = \alpha^2 + 2\alpha\beta + \beta^2.$$

$$2\text{ov. } (\alpha - \beta)^2 = (\alpha - \beta) \cdot (\alpha - \beta) = \alpha^2 - \alpha\beta - \alpha\beta + \beta^2 = \alpha^2 - 2\alpha\beta + \beta^2. \text{ Ήτοι :}$$

Τὸ τετράγωνον τοῦ ἀθροίσματος δύο σχετικῶν ἀριθμῶν, ἵσοῦται μὲ τὸ τετράγωνον τοῦ πρώτου ἀριθμοῦ σὺν τὸ διπλάσιον γινόμενον τῶν ἀριθμῶν ἢν εἶναι ὁμόσημοι ἢ πλὴν τὸ γινόμενον αὐτό, ἢν εἶναι ἑτερόσημοι, σὺν τῷ τετραγώνῳ τοῦ δευτέρου ἀριθμοῦ.

$$3\text{ov. } \text{Ἐπίστης εύρίσκομεν : } (\alpha + \beta)\alpha - \beta = \alpha^2 + \alpha\beta - \alpha\beta + \beta^2 = \alpha^2 - \beta^2. \text{ Ήτοι}$$

Τὸ ἀθροίσμα δύο ἀριθμῶν ἐπὶ τὴν διαφοράν των, ἵσοῦται μὲ τὴν διαφοράν τοῦ τετραγώνου τοῦ μειωτέου πλὴν τὸ τετράγωνον τοῦ ἀφαιρετέου.

$$4\text{ov. } \text{Ἐπίστης εὐκόλως εύρισκομεν ὅτι : } (\alpha + \beta)^3 = (\alpha + \beta)^2 \cdot (\alpha + \beta) \\ = (\alpha^2 + 2\alpha\beta + \beta^2) \cdot (\alpha + \beta) = \alpha^3 + 3\alpha^2\beta + 3\alpha\beta^2 + \beta^3.$$

$$5\text{ov. } \text{Ἐὰν εἰς τὴν τελευταίαν ἴσοτητα γράψωμεν } -\beta \text{ ἀντὶ τοῦ } +\beta, \text{ προκύπτει } (\alpha - \beta)^3 = \alpha^3 + 3\alpha^2(-\beta) + 3\alpha(-\beta)^2 + (-\beta)^3$$

$$\text{ἢ } (\alpha - \beta)^3 = \alpha^3 - 3\alpha^2\beta + 3\alpha\beta^2 - \beta^3.$$

Εὐκόλως εύρισκομεν δι' ἐκτελέσεως τῶν πράξεων ἀκόμη ὅτι :

$$6\text{ov. } (\chi + \alpha)(\chi + \beta) = \chi^2 + (\alpha + \beta)\chi + \alpha\beta.$$

$$7\text{ov. } (\chi + \alpha)(\chi + \beta)(\chi + \gamma) = \chi^3 + (\alpha + \beta + \gamma)\chi^2 + (\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha)\chi + \alpha\beta\gamma$$

$$8\text{ov. } (\alpha^2 + \beta^2)(\chi^2 + \psi^2) - (\alpha\chi + \beta\psi)^2 = (\alpha\psi - \beta\chi)^2.$$

$$9\text{ov. } (\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2)(\chi^2 + \psi^2 + \zeta^2) - (\alpha\chi + \beta\psi + \gamma\zeta)^2 = \\ = (\alpha\psi - \beta\chi)^2 + (\beta\zeta - \gamma\psi)^2 + (\gamma\chi - \alpha\zeta)^2$$

Αἱ δύο ἀνωτέρω ἴσοτητες 8 καὶ 9 λέγονται ταύτοτητες τοῦ Lagrange.

Α σχήσεις

114. Δείξατε ότι είναι  $(\alpha^2 + \beta^2)(\gamma^2 + \delta^2) = (\alpha\gamma + \beta\delta)^2 + (\alpha\delta - \beta\gamma)^2 = (\alpha\gamma - \beta\delta)^2 + (\alpha\delta + \beta\gamma)^2$ .
115. Έάν τεθῇ  $x = 2\psi + 3\omega$ , δείξατε ότι είναι  $x^3 - 8\psi^3 - 27\omega^3 - 18x\psi\omega = 0$ .
116. Έάν τεθῇ  $\alpha + \gamma = 2\beta$ , δείξατε ότι είναι  $(\alpha - \beta)^2 + 2\beta^2 + (\beta - \gamma)^2 = \alpha^2 + \gamma^2$ .
117. Έάν τεθῇ  $x + \psi = 1$ , δείξατε ότι είναι  $x^3(\psi + 1) - \psi^3(x + 1) - x + \psi = 0$ .
118. Έάν τεθῇ  $x = \alpha - \beta$ , θά είναι  $(x - \alpha)^2 + (x - \alpha)(2\beta - \gamma) - \beta\gamma + \beta^2 = 0$ .
119. Έάν τεθῇ  $\phi(x_1) = 3x_1^2 - x_1 + 1$ , δείξατε ότι είναι  $\phi(x_1 + 1) - \phi(x_1) - 2\phi(0) = 6x_1$ .
120. Έάν τεθῇ  $\phi(x) = 3x^2 + 7x$  καὶ  $\psi(x) = 6x + 10$ , δείξατε ότι είναι  $\alpha'(\phi(x + 1) - \phi(x)) = \psi(x)$ ,  $\beta'(\psi(x + 1) - \psi(x)) = 6$ .
121. Έάν  $\alpha + \beta + \gamma = 2\tau$ , δείξατε ότι  $\alpha'(\tau - \alpha)^2 + (\tau - \beta)^2 + (\tau - \gamma)^2 = \alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 - \tau^2$ ,  $\beta'(\tau - \alpha)^3 + (\tau - \beta)^3 + (\tau - \gamma)^3 + 3\alpha\beta\gamma = \tau^3$ ,  $\gamma'2(\tau - \alpha)(\tau - \beta)(\tau - \gamma) + \alpha(\tau - \beta)(\tau - \gamma) + \beta(\tau - \alpha)(\tau - \gamma) + \gamma(\tau - \beta)(\tau - \alpha) = \alpha\beta\gamma$ .
122. Δείξατε ότι  $\alpha^4 + \beta^4 + (\alpha + \beta)^4 = 2\alpha^2\beta^2 + 2(\alpha^2 + \beta^2)(\alpha + \beta)^2$ .
123. Όμοιως:  $\alpha^5 + \beta^5 = (\alpha^3 + \beta^3)(\alpha^2 + \beta^2) - \alpha^2\beta^2(\alpha + \beta)$ ,  $\beta'(\psi - \omega)^3 + (x - \psi)^3 + 3(x - \psi)(x - \omega)(\psi - \omega) = (x - \omega)^3$ .
124. Όμοιως:  $(\alpha^2 - \beta^2)^2 + (2\alpha\beta)^2 = (\alpha^2 + \beta^2)^2$ .
125. Όμοιως:  $x^2(\psi - \omega) + \psi^2(\omega - x) + \omega^2(x - \psi) + (\psi - \omega)(\omega - x)(x - \psi) = 0$ .

### 8. ΔΙΑΙΡΕΣΙΣ ΑΚΕΡΑΙΩΝ ΜΟΝΩΝΥΜΩΝ

**§ 69.** Λέγομεν ότι άκέραιον τι μονώνυμον είναι διαιρετὸν δι' άλλου, ἂν δύναται νὰ εύρεθῇ τρίτον τοιοῦτο, τὸ ὅποιον πολλαπλασιαζόμενον ἐπὶ τὸ β' δίδει γινόμενον τὸ α'. Τὸ οὖτως εύρισκόμενον μονώνυμον καλεῖται πηλίκον τῆς διαιρέσεως τῶν δύο διθέντων, τὰ ὅποια λέγονται διαιρετέος καὶ διαιρέτης.

\*Εστω ότι ζητοῦμεν τὸ πηλίκον τοῦ  $24\alpha^7$  διὰ τοῦ  $8\alpha^5$ , τὸ ὅποιον σημειώνομεν οὔτως  $24\alpha^7 : 8\alpha^5$ .

\*Έὰν παραστήσωμεν τὸ πηλίκον μὲν Π, θὰ ἔχωμεν κατὰ τὸν δρισμὸν  $\Pi.8\alpha^5 = 24\alpha^7$ . Διαιροῦντες τὰ ἵσα ταῦτα διὰ τοῦ 8, εύρισκομεν  $\Pi.\alpha^5 = 24\alpha^7 : 8$  ἢ  $\Pi.\alpha^5 = 3\alpha^7$ . Διαιροῦντες καὶ τὰ ἵσα αὐτὰ διὰ τοῦ  $\alpha^5$ , ἔχομεν  $\Pi = 3\alpha^7 : \alpha^5 = 3\alpha^{7-5} = 3\alpha^2$ , ἦτοι  $\Pi = 3\alpha^2$ .

\*Όμοιώς εύρισκομεν π.χ. ότι  $20\alpha^5\beta^6 : (-4\alpha\beta^5) = -5\alpha^4\beta$ .

\*Ἐκ τούτων παρατηροῦμεν ότι :

"Ινα γινόμενόν τι σχετικῶν παραγόντων είναι διαιρετὸν δι' άλλου, ἀρκεῖ νὰ περιέχῃ τοὺς παράγοντας αὐτοῦ καὶ καθένα μὲ ἐκθέτην ἵσον ἢ μεγαλύτερον.

Προσέτι ὅτι :

Διὰ νὰ εύρωμεν τὸ πηλίκον τῆς τοιαύτης διαιρέσεως δύο ἀκεραίων μονωνύμων, διαιροῦμεν τὸν ( ἀριθμητικὸν ) συντελεστὴν τοῦ διαιρετέου διὰ τοῦ ( ἀριθμητικοῦ ) συντελεστοῦ τοῦ διαιρέτου καὶ δεξιὰ τοῦ πηλίκου τούτου γράφομεν τὰ γράμματα τοῦ διαιρετέου καθέν μὲ ἐκθέτην ἵσον μὲ τὴν διαφορὰν τῶν ἐκθετῶν, τοὺς ὅποιους ἔχει εἰς τὸν διαιρετόν καὶ διαιρέτην.

**§ 70.** Ἐὰν ὁ διαιρετός δὲν διαιρῆται ( ἀκριβῶς ) διὰ τοῦ διαιρέτου, παραλείπομεν τοὺς κοινοὺς παράγοντάς των, ἐὰν ὑπάρχουν, καὶ σχηματίζομεν κλάσμα ἔχον ἀριθμητὴν τὸν μένοντα ὡς διαιρετέον καὶ παρονομαστὴν τὸν μένοντα ὡς διαιρέτην. Εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτῆν λέγομεν ὅτι τὸ πηλίκον τῶν δοθέντων μονωνύμων εἶναι **κλασματικὸν** ἢ παράστασις **κλασματική**. Οὕτω διὰ τὴν διαιρεσιν  $20\alpha^2\beta^2\gamma^4 : -5\alpha\beta^3\gamma^7$  παραλείπομεν τοὺς κοινοὺς παράγοντας 5, α, β<sup>2</sup>, γ<sup>4</sup> τοῦ διαιρέτου καὶ διαιρετέου καὶ θὰ ἔχωμεν :

$$4\alpha : -\beta\gamma^3 = \frac{4\alpha}{-\beta\gamma^3} = -\frac{4\alpha}{\beta\gamma^2}.$$

### "Α σ κη σις

126. Νὰ εύρεθοῦν τὰ πηλίκα τῶν κάτωθι διαιρέσεων

α') $9\mu^4\psi^5 : -3\mu^2\psi^2$	β') $-121x^5\psi^5 : 11x^2\psi$	γ') $0,5x^2\psi^3 : -0,2x\psi$
δ') $0,45\alpha^2\beta^3\gamma^4 : 0,9\beta^3\gamma^3$	ε') $-12\mu^4\nu^5 : 16\mu^4\nu$	στ') $4\alpha\beta^4 : 0,25\alpha\beta^5\gamma\delta^4$
ζ') $\frac{7}{9}\alpha^6\beta^4\gamma^2 : 0,8\alpha^6\beta^5.$		

### 9. ΔΙΑΙΡΕΣΙΣ ΠΟΛΥΩΝΥΜΟΥ ΔΙΑ ΜΟΝΩΝΥΜΟΥ

**§ 71.** Καλοῦμεν **διαιρέσιν** δοθέντος πολυωνύμου ( διαιρετέου ) διὰ μονωνύμου ( διαιρέτου ) τὴν πρᾶξιν, μὲ τὴν ὅποιαν εύρισκομεν ( ἄν ύπάρχῃ ) πολυώνυμον ( πηλίκον ), τὸ ὅποιον πολλαπλασιαζόμενον ἐπὶ τὸν διαιρέτην δίδει γινόμενον τὸν διαιρετόν.

Ἐπειδὴ πᾶν πολυώνυμον εἶναι ἄθροισμα τῶν ὄρων του, ἐπεται ὅτι :

Διὰ νὰ διαιρέσωμεν πολυώνυμον ( διαιρετὸν ) διὰ μονωνύμου, ἀρκεῖ νὰ διαιρέσωμεν καθένα ὄρον του διὰ τοῦ μονωνύμου καὶ νὰ προσθέσωμεν τὰ ἔξαγόμενα.

Κατά ταῦτα ἔχομεν :

$$(1) (7\alpha^2\beta^3 + 6\alpha^3\beta^2 - 15\alpha^3\beta^3) : \alpha\beta = 7\alpha\beta^2 + 6\alpha^2\beta - 15\alpha^2\beta^2$$

$$(2) (42\alpha\chi - 48\alpha\psi + 18\alpha\omega) : (-6\alpha) = -7\chi + 8\psi - 3\omega$$

$$(3) (-80\alpha^6 - 24\alpha^{10}) : 8\alpha^3 = -10\alpha^2 - 3\alpha^7$$

Ἐὰν πολυώνυμον διαιρῆται διὰ μονωνύμου, θὰ ἰσοῦται μὲ τὸν διαιρέτην ἐπὶ τὸ πηλίκον τῆς διαιρέσεως αὐτῶν. Οὕτως ἔχομεν διὰ τὰ ἀνωτέρω παραδείγματα :

$$(1) 7\alpha^2\beta^3 + 6\alpha^3\beta^2 - 15\alpha^3\beta^3 = \alpha\beta \cdot (7\alpha\beta^2 + 6\alpha^2\beta - 15\alpha^2\beta^2)$$

$$(2) 42\alpha\chi - 48\alpha\psi + 18\alpha\omega = (-6\alpha) \cdot (-7\chi + 8\psi - 3\omega)$$

$$(3) -80\alpha^6 - 24\alpha^{10} = 8\alpha^3 \cdot (-10\alpha^2 - 3\alpha^7) = -8\alpha^3 \cdot (10\alpha^2 + 3\alpha^7)$$

Ἐκ τούτων ἔπειται ὅτι :

“Αν πάντες οἱ ὄροι δοθέντος πολυωνύμου ἔχουν κοινόν τινα διαιρέτην, δυνάμεθα νὰ θέσωμεν αὐτὸν ἐκτὸς παρενθέσεως ώς παράγοντα γινομένου, τοῦ δόποίου ὁ ἄλλος παράγων εἶναι τὸ πηλίκον τοῦ δοθέντος πολυωνύμου διὰ τοῦ τεθέντος ἐκτὸς τῆς παρενθέσεως κοινοῦ παράγοντος.

Π.χ. εἰς τὸ ἀνωτέρω πρῶτον πολυώνυμον ώς κοινὸς διαιρέτης ἐλήφθη τὸ  $\alpha\beta$  καὶ ἐτέθη ἐκτὸς παρενθέσεως εἰς τὸ  $\beta'$  μέλος τῆς (1). Εἰς τὸ δεύτερον πολυώνυμον ἐλήφθη ώς διαιρέτης τὸ  $-6\alpha$  καὶ εἰς τὸ τρίτον τὸ  $-8\alpha^3$  καὶ ἐτέθησαν ἐκτὸς τῶν παρενθέσεων εἰς τὰ δεύτερα μέλη τῶν (2) καὶ (3).

### Ἄσκήσεις

127. Νὰ εύρεθοῦν τὰ πηλίκα τῶν κάτωθι διαιρέσεων καὶ νὰ τραπῇ ἀκολούθως ὁ διαιρέτος εἰς γινόμενον δύο παραγόντων. Ἐπαληθεύσατε καὶ τὰς ἰσότητας, αἱ ὄποιαι θὰ προκύψουν διὰ τὰς σημειουμένας τιμάς τῶν γραμμάτων :

$$\alpha') (14x^3\psi^2 - 28x^4\psi^2) : (2x^2\psi^2) \quad \text{ὅταν } x=2, \psi=-2$$

$$\beta') (x+\psi)(\alpha+\beta) : (x+\psi) \quad \Rightarrow \quad x=\psi=4, \alpha=\beta=1$$

$$\gamma') (8\alpha^4\beta^3 - 16\alpha^3\beta^3 + 24\alpha^2\beta^4 - 12\alpha^2\beta^2) : (-4\alpha^2\beta^2) \quad \Rightarrow \quad \alpha=3, \beta=2$$

$$\delta') (x^{\mu+2}\psi^{\nu} + 2x^{\mu+1}\psi^{\nu+1} - x^{\mu}\psi^{\nu+2}) : x^{\nu} \cdot \psi^{\nu} \quad \Rightarrow \quad x=4, \psi=1, \mu=\nu=-1$$

128. Νὰ τραποῦν εἰς γινόμενα δύο παραγόντων τὰ

$$\alpha') \alpha\chi + \beta\chi, \beta') 49\alpha\beta + 63\alpha, \gamma') 56x\psi - 72x\omega, \delta') 0,35\alpha\beta - 0,49\alpha\gamma,$$

$$\epsilon') 2,3\alpha^4\beta^6 - 2,5\alpha^5\beta^4, \sigma') \alpha^3x^3\psi + 3\alpha^2\beta x^2\psi + 3\alpha\beta^2x\psi^2 - x\psi^4,$$

$$\zeta') 12 \frac{2}{3} \alpha^2\beta - 14,25\alpha^4\beta^5 - 15 \frac{5}{6} \alpha^5\beta^6 + 11 \frac{1}{12} \alpha^6\beta^4$$

**§ 72.** Καλοῦμεν διαιρέσιν ( ἀκεραίου ) πολυωνύμου ( διαιρετού ) διὰ ( ἀκεραίου ) πολυωνύμου ( διαιρέτου ) τὴν πρᾶξιν, μὲ τὴν δόποιαν εύρισκομεν, ἃν ὑπάρχῃ, τρίτον πολυώνυμον ( πηλίκον ), τὸ δόποιον πολλαπλασιαζόμενον ἐπὶ τὸν διαιρέτην δίδει γινόμενον τὸν διαιρετέον.

\*Εστω ὅτι θέλομεν νὰ διαιρέσωμεν τὸ  $\alpha^3 + 3\alpha^2 + 3\alpha + 1$  διὰ τοῦ  $\alpha + 1$ .

Παρατηροῦμεν ὅτι, ἐπειδὴ τὰ πολυώνυμα εἶναι διατεταγμένα κατὰ τὰς κατιούσας δυνάμεις τοῦ α, ὁ πρῶτος ὄρος τοῦ πηλίκου ( μὲ τὸν μεγαλύτερον ἔκθετην τοῦ α ), τὸν δόποιον ζητοῦμεν, πολλαπλασιαζόμενος ἐπὶ τὸν πρῶτον ὄρον α τοῦ διαιρέτου, πρέπει νὰ δίδῃ τὸν πρῶτον ὄρον τοῦ διαιρετέου α<sup>3</sup>. \*Ἐπομένως ὁ πρῶτος ὄρος τοῦ πηλίκου θὰ εἶναι  $\alpha^3 : \alpha = \alpha^2$ . Ἀλλὰ τὸ  $\alpha^2$  δὲν δύναται νὰ εἶναι ὀλόκληρον τὸ πηλίκον. Διότι, ἐὰν ἐκτελέσωμεν τὴν δοκιμὴν τῆς διαιρέσεως αὐτῆς, εύρισκομεν

$$\alpha^2(\alpha+1) = \alpha^3 + \alpha^2.$$

Τοῦτο ἀφαιρούμενον ἀπὸ τὸν διαιρετέον δίδει

$$(\alpha^3 + 3\alpha^2 + 3\alpha + 1) - (\alpha^3 + \alpha^2) = 2\alpha^2 + 3\alpha + 1.$$

Πρέπει λοιπὸν εἰς τὸν εύρεθντα πρῶτον ὄρον τοῦ πηλίκου νὰ προστεθῇ παράστασίς τις ἀκόμη, ἡ δόποια πολλαπλασιαζομένη ἐπὶ  $\alpha + 1$  νὰ δίδῃ  $2\alpha^2 + 3\alpha + 1$ . \*Ητοι πρέπει νὰ διαιρέσωμεν ἀκόμη τὸ  $2\alpha^2 + 3\alpha + 1$  διὰ τοῦ  $\alpha + 1$ . \*Ἔχομεν πάλιν νὰ διαιρέσωμεν δύο πολυώνυμα. Ἀλλ' ἡ διαιρεσίς αὗτη εἶναι ἀπλουστέρα τῆς δοθείσης, διότι ὁ διαιρετέος ταύτης εἶναι προφανῶς ἀπλούστερος. \*Ἐπαναλαμβάνομεν τὴν αὐτήν πορείαν καὶ διὰ τὴν διαιρέσιν αὐτήν καὶ εύρισκομεν ὅτι ὁ πρῶτος ὄρος τοῦ πηλίκου αὐτῆς εἶναι  $2\alpha^2 : \alpha = 2\alpha$ . \*Ἐὰν τὸ γινόμενον τοῦ  $2\alpha$  ἐπὶ τὸν διαιρέτην  $\alpha + 1$ , δηλαδὴ τὸ  $2\alpha \cdot (\alpha + 1) = 2\alpha^2 + 2\alpha$ , ἀφαιρέσωμεν ἀπὸ τὸν διαιρετέον  $2\alpha^2 + 3\alpha + 1$ , εύρισκομεν ὑπόλοιπον  $(2\alpha^2 + 3\alpha + 1) - (2\alpha^2 + 2\alpha) = \alpha + 1$ .

Παρατηροῦμεν ὅτι δὲν εύρεθη ὀλόκληρον τὸ πηλίκον ἀλλ' ὅτι πρέπει νὰ διαιρέσωμεν ἀκόμη τὸ  $\alpha + 1$  διὰ τοῦ  $\alpha + 1$ .

\*Ἀλλὰ τὸ πηλίκον τῆς νέας αὐτῆς διαιρέσεως εἶναι 1, τὸ δὲ

\* \*Η διαιρεσίς πολυωνύμου δὲν παρουσιάσθη πρὸ τοῦ 16ου αἰῶνος.

ύπόλοιπον 0. "Ωστε τὸ πηλίκον τῆς δοθείσης διαιρέσεως εἶναι  $\alpha^2 + 2\alpha + 1$ , τὸ δὲ ύπόλοιπον 0.

Συνήθως ἔκτελοῦμεν τὴν διαιρέσιν ὡς ἀκολούθως :

Γράφομεν τὸν διαιρετέον, δεξιὰ αὐτοῦ τὸν διαιρέτην, κάτωθεν τούτου τὸ πηλίκον καὶ ὑπὸ τὸν διαιρετέον τὰ γινόμενα ἐκάστου ὅρου τοῦ πηλίκου ἐπὶ τὸν διαιρέτην μὲν ἀντίθετον πρόσημον καὶ προσθέτομεν. Εἰς τὴν αὐτὴν στήλην γράφομεν καὶ τὰ ἐκάστοτε ύπόλοιπα ἀφαιρέσεων.

( διαιρετέος )	$\alpha^3 + 3\alpha^2 + 3\alpha + 1$	$\alpha + 1$ ( διαιρέτης )
	$- \alpha^3 - \alpha^2$	<hr/>
πρῶτον μερικὸν ύπόλοιπον	$2\alpha^2 + 3\alpha + 1$	$\alpha^2 + 2\alpha + 1$ ( πηλίκον )
	$- 2\alpha^2 - 2\alpha$	<hr/>
δεύτερον μερικὸν ύπόλοιπον	$\alpha + 1$	$\alpha + 1$ ( 2 )
	$- \alpha - 1$	<hr/>
τελικὸν ύπόλοιπον	0	( 3 )

Αἱ παραστάσεις (1), (2) λέγονται μερικὰ ύπόλοιπα τῶν μερικῶν διαιρέσεων, τὸ δὲ τελευταῖον, τελικὸν ύπόλοιπον τῆς ὅλης διαιρέσεως.

**§ 73.** 'Ἐν γένει διὰ τὴν διαιρέσιν δύο ἀκεραίων πολυωνύμων, ὅταν εἶναι δυνατή ἡ διαιρέσις, ἀποδεικνύεται ὅτι :

α) 'Εὰν δὲ διαιρετέος καὶ διαιρέτης εἶναι διατεταγμένοι \* κατὰ τὰς κατιούσας (ἢ τὰς ἀνιούσας) δυνάμεις τοῦ αὐτοῦ γραμματός των, διὰ νὰ εὑρωμεν τὸν πρῶτον ὅρον τοῦ πηλίκου, διατεταγμένου ὅμοιως, ἀρκεῖ νὰ διαιρέσωμεν τὸν πρῶτον ὅρον τοῦ διαιρετέου διὰ τοῦ πρώτου ὅρου τοῦ διαιρέτου.

Διότι ἔστω  $\Delta + \Delta' + \Delta'' + \dots$  τὸ ἄθροισμα τῶν ὅρων τοῦ διαιρετέου καὶ  $\delta + \delta' + \delta'' + \dots$  τῶν τοῦ διαιρέτου, διατεταγμένων π.χ. κατὰ τὰς κατιούσας δυνάμεις τοῦ αὐτοῦ γράμματός των. Παριστάνομεν μὲν  $\Pi + \Pi' + \Pi'' + \dots$  τὸ ἄθροισμα τῶν ὅρων τοῦ

\* 'Η διάταξις πολυωνύμων κατὰ τὰς ἀνιούσας ἡ κατιούσας δυνάμεις γράμματός των διὰ τὴν διαιρέσιν αὐτῶν, συναντᾶται τὸ πρῶτον εἰς τὸ ἔργον τοῦ NEWTON «Arithmetica Universalis» (1707). Τὸ 1760 παρουσιάζεται τὸ θέμα βελτιώμενον ἀπὸ διδακτικῆς πλευρᾶς.

πηγλίκου διατεταγμένου όμοιώς ως πρός τὸ αύτὸ γράμμα. Κατὰ τὸν ὄρισμὸν τῆς διαιρέσεως ἔχομεν ὅτι

$$\Delta + \Delta' + \Delta'' \dots = (\delta + \delta' + \delta'' + \dots) \cdot (\Pi + \Pi' + \Pi'' \dots)$$

Ἄλλὰ τὸ γινόμενον  $\delta \cdot \Pi$  τοῦ δευτέρου μέλους τῆς ἰσότητος ταύτης παριστάνει τὸν ὄρον, ὃ ὁποῖος ἔχει τὸν μεγαλύτερον ἐκθέτην τοῦ γράμματος, ώς πρός τὸ ὄποιον ὑπετέθησαν διατεταγμένα τὰ πολυνόμια, ἐπομένως θὰ ἴσοῦται μὲ τὸν πρῶτον ὄρον  $\Delta$  τοῦ πρώτου μέλους. Ἡτοι ἔχομεν ὅτι :  $\delta \cdot \Pi = \Delta$  καὶ  $\Pi = \Delta : \delta$ , ἡτοι τὸ  $\Pi$  εἶναι πηγλίκον τοῦ  $\Delta$  διὰ τοῦ  $\delta$ . Ἀρα :

Διὰ νὰ εύρωμεν τὸν α' ὄρον τοῦ πηγλίκου τῆς διαιρέσεως δύο ( ἀκεραίων ) πολυνομίων διατεταγμένων κατὰ τὰς κατιούσας δυνάμεις ἐνὸς γράμματός των, ἀρκεῖ νὰ διαιρέσωμεν τὸν α' ὄρον τοῦ διαιρετέου διὰ τοῦ α' ὄρου τοῦ διαιρέτου.

Θὰ συμβῇ τὸ αὐτό, ἂν τὰ τρία πολυνόμια ( τοῦ διαιρετέου, διαιρέτου καὶ πηγλίκου ) εἶναι διατεταγμένα κατὰ τὰς ἀνιούσας δυνάμεις τοῦ αὐτοῦ γράμματός των. Εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν οἱ πρῶτοι κατὰ σειρὰν ὄροι των θὰ εἶναι οἱ τοῦ κατωτάτου βαθμοῦ καὶ ὁ ὄρος τοῦ κατωτάτου βαθμοῦ τοῦ διαιρετέου θὰ ἴσοῦται μὲ τὸ γινόμενον τοῦ ὄρου κατωτάτου βαθμοῦ τοῦ διαιρέτου ἐπὶ τὸν τοῦ κατωτάτου βαθμοῦ τοῦ πηγλίκου.

β) Ἐὰν ἔχωμεν ἔνα ἡ περισσοτέρους κατὰ σειρὰν ἐκ τῶν πρώτων ὄρων τοῦ πηγλίκου, καὶ τὸ γινόμενον αὐτῶν ἐπὶ τὸν διαιρέτην ἀφαιρέσωμεν ἀπὸ τὸν διαιρέτον, εὑρίσκομεν διαφοράν, ἡ ὁποία καλεῖται μερικὸν ὑπόλοιπον τῆς διαιρέσεως. Ἀν τούτου, διατεταγμένου όμοιώς, διαιρεθῇ ὁ πρῶτος ὄρος διὰ τοῦ πρώτου ὄρου τοῦ διαιρέτου, θὰ δώσῃ τὸν ἐπόμενον ὄρον τοῦ πηγλίκου.

Διότι, ἂν παραστήσωμεν μὲ  $\Pi$  μὲν τὸν πρῶτον ὄρον τοῦ πηγλίκου ( ἡ τὸ ἄθροισμα τῶν γνωστῶν κατὰ σειρὰν ἐκ τῶν πρώτων ὄρων αὐτοῦ ), μὲ  $P$  τὸ ἄθροισμα τῶν λοιπῶν ὄρων τούτου, μὲ  $\Delta$  τὸν διαιρέτην καὶ μὲ  $\Delta'$  τὸν διαιρέτην ( διατεταγμένων ὅλων όμοιώς ), θὰ ἔχωμεν  $\Delta = \Delta' \cdot (\Pi + P) = \Delta' \cdot \Pi + \Delta' \cdot P$ . Ἀφαιροῦντες τὸ  $\Delta' \cdot P$  ἀπὸ τὰ ἵσα, εὑρίσκομεν  $\Delta - \Delta' \cdot \Pi = \Delta' \cdot P$  ( τὸ ὄποιον καλοῦμεν μερικὸν ὑπόλοιπον τῆς γενομένης διαιρέσεως ). Ἀλλ' ἐκ τῆς ἰσότητος αὐτῆς ἔπειται  $(\Delta - \Delta' \cdot \Pi) : \Delta' = P$ . Δηλαδὴ τὸ  $P$ , ἡτοι οἱ λοιποὶ ὄροι τοῦ πηγλίκου, θὰ εύρεθοῦν ἀν διαιρέσωμεν τὸ

Δ-Δ'.Π διὰ τοῦ διαιρέτου Δ'. Κατὰ τὴν προηγουμένην πρότασιν, ἂν διαιρέσωμεν τὸν πρῶτον ὅρον τοῦ Δ-Δ'.Π διὰ τοῦ πρώτου ὅρου τοῦ Δ', θὰ εὑρωμεν τὸν πρῶτον ὅρον τοῦ Ρ, ἢτοι τὸν ἀμέσως ἐπόμενον μετὰ τὸν Π, ὅρον τοῦ πηλίκου.

**§ 74.** Καλοῦμεν πρῶτον μερικὸν ὑπόλοιπον τῆς διαιρέσεως δύο πολυωνύμων τὸ εύρισκόμενον, ἔαν ἀφαιρέσωμεν ἀπὸ τὸν διαιρέτον τὸ γινόμενον τοῦ διαιρέτου ἐπὶ τὸν πρῶτον ὅρον τοῦ πηλίκου.

Δεύτερον μερικὸν ὑπόλοιπον, τῆς ἐν λόγῳ διαιρέσεως λέγεται τὸ εύρισκόμενον, ἔαν ἀπὸ τὸ πρῶτον μερικὸν ὑπόλοιπον ἀφαιρέσωμεν τὸ γινόμενον τοῦ διαιρέτου ἐπὶ τὸν δεύτερον ὅρον τοῦ πηλίκου. Κατ' ἀνάλογον τρόπον ὁρίζομεν τρίτον μερικὸν ὑπόλοιπον, τὸ ὅποιον εύρισκεται, ἄν ἀφαιρέσωμεν τὸ γινόμενον τοῦ διαιρέτου ἐπὶ τὸν τρίτον ὅρον τοῦ πηλίκου ἀπὸ τὸ δεύτερον μερικὸν ὑπόλοιπον καὶ οὕτω καθ' ἔξῆς.

"Αν τὸ τελευταῖον ὑπόλοιπον διαιρέσεως εἶναι 0, ἡ διαιρέσις λέγεται τελεία, ἄλλως λέγεται ἀτελής.

**§ 75.** Ἐν γένει ἔστω ὅτι πρόκειται νὰ διαιρέσωμεν ἐν ( ἀκέραιον ) πολυωνύμον Δ διὰ τοῦ Δ', διατεταγμένα κατὰ τὰς κατιούσας δυνάμεις τοῦ αὐτοῦ γράμματός των, καὶ ὅτι ὁ διαιρετός δὲν εἶναι βαθμοῦ κατωτέρου τοῦ διαιρέτου ὡς πρὸς τὸ γράμμα τοῦτο. Καὶ ὅταν δὲν γνωρίζωμεν ἄν ἡ διαιρέσις αὐτῶν εἶναι τελεία, ἀρχίζομεν τὴν ἐκτέλεσιν αὐτῆς κατὰ τὸν ἀνωτέρω τρόπον καὶ θὰ εὑρωμεν μίαν σειρὰν ὅρων τοῦ πηλίκου καθὼς καὶ μίαν σειρὰν πολυωνύμων, τὰ ὅποια θὰ εἶναι πρῶτον, δεύτερον κ.τ.λ. μερικὰ ὑπόλοιπα τῆς διαιρέσεως. 'Ο βαθμὸς τῶν ὑπολοίπων, ὡς πρὸς τὸ ἐν λόγῳ γράμμα, θὰ βαίνῃ ἐλαττούμενος. Διότι μετὰ τὴν εὔρεσιν τοῦ πρώτου ὅρου τοῦ πηλίκου καὶ τοῦ πρώτου ὑπολοίπου π.χ. δὲν θὰ ὑπάρχῃ εἰς αὐτὸ ὁ πρῶτος ὅρος τοῦ διαιρετέου. 'Επειδὴ ὁ πρῶτος ὅρος τοῦ πηλίκου, πολλαπλασιαζόμενος ἐπὶ τὸν πρῶτον ὅρον τοῦ διαιρέτου, δίδει γινόμενον ἵσον μὲ τὸν πρῶτον ὅρον τοῦ διαιρετέου, ὅταν ἀφαιρέσωμεν τὸ γινόμενον τοῦ πρώτου ὅρου τοῦ πηλίκου ἐπὶ τὸν διαιρέτην ἀπὸ τὸν διαιρετόν, οἱ ὅροι τοῦ ἀνωτέρου βαθμοῦ δὲν θὰ ὑπάρχουν εἰς τὴν διαφοράν, ἢτοι

τὸ πρῶτον ὑπόλοιπον θὰ εἴναι βαθμοῦ κατωτέρου τοῦ διαιρέτου. Ὁμοίως τὸ γινόμενον τοῦ δευτέρου ὄρου τοῦ πηλίκου ἐπὶ τὸν διαιρέτην, ἀφαιρούμενον ἀπὸ τὸ πρῶτον ὑπόλοιπον, δίδει τὸ δεύτερον ὑπόλοιπον βαθμοῦ κατωτέρου τοῦ πρώτου ὑπολοίπου, τοῦ ὅποιον ὁ πρῶτος ὄρος, διαιρούμενος διὰ τοῦ πρώτου ὄρου τοῦ διαιρέτου, δίδει τὸν δεύτερον ὄρον τοῦ πηλίκου.

‘Ομοίως προχωροῦντες παρατηροῦμεν ὅτι ὁ βαθμὸς ἑκάστου ὑπολοίπου εἴναι μικρότερος τοῦ προηγουμένου του τούλαχιστον κατὰ μίαν μονάδα.

‘Ομοίως παρατηροῦμεν ὅτι, ἀφοῦ εὔρωμεν ὄρους τινὰς τοῦ πηλίκου, ἃν θέλωμεν νὰ συνεχίσωμεν τὴν πρᾶξιν, πρέπει καὶ ἀρκεῖ ὁ πρῶτος ὄρος τοῦ ἀντιστοίχου ὑπολοίπου νὰ εἴναι διαιρετὸς διὰ τοῦ πρώτου ὄρου τοῦ διαιρέτου. Πρὸς τοῦτο, πρέπει ὁ πρῶτος ὄρος τοῦ ὑπολοίπου τούτου νὰ μὴ εἴναι βαθμοῦ κατωτέρου τοῦ βαθμοῦ τοῦ διαιρέτου. Ἐπειδὴ οἱ βαθμοὶ τῶν διαδοχικῶν ὑπολοίπων βαίνουν ἐλαττούμενοι, θὰ καταλήξωμεν μετά τινας πράξεις ἢ εἰς ὑπόλοιπον μηδὲν ἢ εἰς ὑπόλοιπον βαθμοῦ κατωτέρου τοῦ διαιρέτου.

Ἐπομένως, διθέντων δύο ἀκεραίων πολυωνύμων ὡς πρὸς χ, π.χ. τῶν  $\Delta$  καὶ  $\Delta'$ , μὲν βαθμὸν τοῦ  $\Delta$  ὅχι κατώτερον τοῦ βαθμοῦ τοῦ  $\Delta'$  ὡς πρὸς τὸ αὐτὸν γράμμα των χ, ὑπάρχει ἐν πολυώνυμον ἔστω  $\Pi$ , τοιοῦτον ὥστε, νὰ εἴναι τὸ  $\Delta-\Delta'\cdot\Pi$  πολυώνυμον ἀκέραιον ὡς πρὸς χ καὶ βαθμοῦ κατωτέρου τοῦ  $\Delta'$ . Τὸ  $\Pi$  εὐρίσκεται, ταὶ, ἃν ἐκτελέσωμεν τὴν πρᾶξιν τῆς διαιρέσεως τοῦ  $\Delta$  διὰ τοῦ  $\Delta'$  ὡς ἀνωτέρω ἔξετέθη.

‘Αν τεθῇ  $\Delta-\Delta'\cdot\Pi=Y$ , θὰ εἴναι  $\Delta=\Delta'\cdot\Pi+Y$ . Τὰ οὕτως εὐρίσκομενα  $\Pi$  καὶ  $Y$  καλοῦνται πηλίκον καὶ ὑπόλοιπον τῆς μὴ τελείας ἢ ἀτελοῦς ταύτης διαιρέσεως. Ἐὰν τὸ  $Y=0$ , ἔχομεν περίπτωσιν τελείας διαιρέσεως.

‘Εκ τῶν ἀνωτέρω παρατηροῦμεν ὅτι εἰς μὲν τὴν τελείαν διαιρεσιν ἔχομεν ὅτι :

‘Ο διαιρετός ισοῦται μὲ τὸν διαιρέτην ἐπὶ τὸ πηλίκον. Εἰς δὲ τὴν ἀτελῆ ὅτι :

‘Ο διαιρετός ισοῦται μὲ τὸν διαιρέτην ἐπὶ τὸ πηλίκον σὺν τῷ ὑπολοίπῳ.

Έστω π.χ. ότι θέλομεν νὰ διαιρέσωμεν τὸ  
 $x^4 - 2x^3 - 7x^2 - 19x - 8$  διὰ τοῦ  $x^2 - 4x - 2$   
 Κατά τὰ ἀνωτέρω, ἐκτελοῦντες τὴν διαιρεσιν, ἔχομεν :

(διαιρετέος) πρῶτον μερικὸν ὑπόλοιπον  δεύτερον μερικὸν ὑπόλοιπον  τελικὸν ὑπόλοιπον	$  \begin{array}{r}  x^4 - 2x^3 - 7x^2 - 19x - 8 \\  - x^4 + 4x^3 + 2x^2 \\  \hline  2x^3 - 5x^2 - 19x - 8 \\  - 2x^3 + 8x^2 + 4x \\  \hline  3x^2 - 15x - 8 \\  - 3x^2 + 12x + 6 \\  \hline  - 3x - 2  \end{array}  $	$x^2 - 4x - 2$ (διαιρέτης) $x^2 + 2x + 3$ (πηλίκον)
---	--	--

Ἐπειδὴ τὸ ὑπόλοιπον  $-3x - 2$  εἶναι βαθμοῦ μικροτέρου τοῦ βαθμοῦ τοῦ διαιρέτου  $x^2 - 4x - 2$ , ἐπεται ότι δὲν ὑπάρχει ἀκέραιον μονώνυμον ἢ πολυώνυμον, τὸ ὅποιον πολλαπλασιαζόμενον ἐπὶ τὸν διαιρέτην  $x^2 - 4x - 2$ , νὰ δίδῃ γινόμενον τὸ  $-3x - 2$ . Διὰ τοῦτο πρέπει νὰ διακρόψωμεν τὴν διαιρεσιν ταύτην καὶ τὸ  $-3x - 2$  εἶναι τὸ ὑπόλοιπον τῆς ἀτελοῦς ταύτης διαιρέσεως, τὸ δὲ  $x^2 + 2x + 3$  πηλίκον αὐτῆς.

**§ 76. Παρατηρήσεις.** Πολυώνυμόν τι δὲν εἶναι διαιρετὸν δι' ἄλλου καὶ τῶν δύο διατεταγμένων ὁμοίως ὡς πρὸς ἓν γράμμα των :

1ον. "Οταν ὁ α' ὄρος τοῦ διαιρετέου ἢ ἐνὸς ἐκ τῶν εύρισκομένων μερικῶν ὑπολοίπων δὲν εἶναι διαιρετὸς διὰ τοῦ α' ὄρου τοῦ διαιρέτου.

2ον. "Οταν ὁ τελευταῖος ὄρος τοῦ διαιρετέου δὲν εἶναι διαιρετὸς διὰ τοῦ τελευταίου ὄρου τοῦ διαιρέτου.

3ον. "Οταν εἶναι διαιρετὸς μὲν ὁ α' ὄρος καὶ ὁ τελευταῖος τοῦ διαιρετέου διὰ τοῦ α' καὶ τοῦ τελευταίου ὄρου τοῦ διαιρέτου ἀντιστοίχως, ἀλλὰ κατὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῆς πράξεως δὲν εύρισκομεν ὑπόλοιπον 0.

### 'Α σκήσεις καὶ Προβλήματα

Όμὰς πρώτη. 129. Νὰ γίνουν αἱ ἔξῆς διαιρέσεις μετὰ τῶν δοκιμῶν των :  
 α')  $(2x^3 - 7x^2 - 7x + 4) : (2x - 1)$       β')  $(6x^3 + 2x^2 + 11x + 10) : (3x - 2)$

$$\begin{array}{ll} \gamma') (x^4+x^2+1):(x^2+x+1) & \delta') (x^3-6x^2+12x-8):(x^2-4x+4) \\ \epsilon') (10x^5-21x^4-10x^2-40x):(5x^2-3x+8) & \boxed{\sigma\tau'} (1+\alpha^5+\alpha^{10}):(a^2+a+1) \\ \zeta') (\alpha^4+\beta^4):(a^2-2\alpha\beta+\beta^2) & \boxed{\eta'} (1-6x^5+x^6):(1-2x+x^2) \\ \theta') (x^5-41x-120):(x^2+4x+5). \end{array}$$

Ό μάς δε υπότερα. 130. Νὰ γίνουν αἱ κάτωθι διαιρέσεις :

$$\alpha') (x^{3v}-3x^{2v}\psi^v+3x^v\psi^{2v}-\psi^{3v}):(x^v-\psi^v),$$

$$\beta') (9\alpha^x+3\alpha^{4x}+14\alpha^{3x}+2):(\alpha^{2x}+5\alpha^x+1),$$

$$\gamma') (x^{8v}-\psi^{8p}):(x^{5v}-x^{4v}\psi^p+x^{3v}\psi^{4p}-\psi^{5p}),$$

$$\delta') (\alpha^{4\mu}+4\alpha^{2\mu}x^{2v}+16x^{4v}):(\alpha^{2\mu}+2\alpha^{\mu}x^v+4x^{2v}),$$

$$\epsilon') (x^{\mu+v}\psi^v-4x^{\mu+v-1}\psi^{2v}-27x^{\mu+v-2}\psi^{3v}+42x^{\mu+v-3}\psi^{4v}):\\ (x^{\mu}+3x^{\mu-1}\psi^v-6x^{\mu-2}\psi^{2v}).$$

Ό μάς τηρίτη. 131. Δείξατε ότι διαιρέματα τοῦ πηλίκου δύο ἀκεραίων ( $\alpha$ -νηγμένων) πολυωνύμων ίσουται μὲ τὴν διαφορὰν τοῦ βαθμοῦ τοῦ διαιρετέου πλὴν τὸν τοῦ διαιρέτου. Ἐξηγήσατε τοῦτο μὲ τρία διάφορα παραδείγματα.

### 85 11. ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ ΔΙΑΙΡΕΣΕΩΣ ΠΟΛΥΩΝΥΜΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΟΣ ΤΟ $x$ ΔΙΑ ΤΟΥ $x \pm \alpha$ Η ΔΙΑ ΤΟΥ $\alpha x \pm \beta$

**§ 77.** Ἔστω π.χ. ότι θέλομεν νὰ εὕρωμεν τὸ ύπόλοιπον τῆς διαιρέσεως  $(x^3-3x^2+3x+2):(x-1)$ .

Ἐὰν μὲρος παραστήσωμεν τὸ πηλίκον καὶ μὲ τὸ υ τὸ ύπόλοιπον τῆς πράξεως, θὰ ἔχωμεν

$$(x^3-3x^2+3x+2) = \rho(x-1)+\upsilon \quad (1)$$

Τὸ ύπόλοιπον υ δὲν περιέχει τὸ  $x$  εἰς τὴν διαιρέσιν ταύτην διότι ό διαιρέτης εἶναι πρώτου βαθμοῦ ως πρὸς  $x$  (τὸ δὲ ύπόλοιπον εἶναι βαθμοῦ κατωτέρου τοῦ διαιρέτου).

Η σχέσις (1) ισχύει διὰ πᾶσαν τιμὴν τοῦ  $x$ , ἀρα καὶ διὰ τὴν  $x=1$ . Θέτοντες εἰς αὐτὴν  $x=1$ , εύρισκομεν

$$1^3-3 \cdot 1^2+3 \cdot 1+2=\upsilon, \text{ οὗτοι } \upsilon=3.$$

Τὸ ἔξαγόμενον τοῦτο δυνάμεθα νὰ ἐπαληθεύσωμεν καὶ ἐάν ἐκτελέσωμεν τὴν διαιρέσιν.

Ἐν γένει ἔστω ότι  $P(x)$  παριστάνει τὸν διαιρετέον, τὸ δόποιον ύποτιθεται ότι εἶναι πολυωνύμον περιέχον τὸ  $x$ , τὸ  $\rho(x)$  τὸ πηλίκον καὶ τὸ υ τὸ ύπόλοιπον τῆς διαιρέσεως διὰ τοῦ  $(x-\alpha)$ , τὸ δόποιον δὲν θὰ περιέχῃ τὸν  $x$ .

Θὰ δείξωμεν ότι τὸ υ εἶναι ἴσον μὲ  $P(\alpha)$ , δηλαδὴ μὲ τὸ ἔξαγόμενον τὸ προκύπτον ἐὰν εἰς τὸ πολυωνύμον τοῦ διαιρετέου γράψωμεν ἀντὶ τοῦ  $x$ , τὸ  $\alpha$ , οὗτοι τὴν τιμὴν, διὰ τὴν δόποιαν τὸ  $x-\alpha$  λαμβάνει τὴν τιμὴν 0.

Πράγματι ᔁχομεν ὅτι  $\Pi(x) = \rho(x) \cdot (x - \alpha) + u$ .

Ἐάν θέσωμεν ὅπου  $x$  τὸ  $\alpha$  λαμβάνομεν :

$$\Pi(\alpha) = \rho(\alpha) \cdot (\alpha - \alpha) + u \quad \text{ἢ} \quad \Pi(\alpha) = \rho(\alpha) \cdot 0 + u = u.$$

Ἐστω ἡ διαιρέσις  $(x^6 - \alpha^6) : (x + \alpha)$ .

Τὸ ὑπόλοιπον εύρισκεται, ἐὰν εἰς τὸν διαιρετέον θέσωμεν ἀντὶ τοῦ  $x$ , τὸ  $(-\alpha)$ , ἢτοι τὴν τιμὴν τοῦ  $x$ , διὰ τὴν ὁποίαν τὸ  $x + \alpha$  λαμβάνει τὴν τιμὴν 0. Διότι τὸ  $x + \alpha = x - (-\alpha)$ . Ὡστε ἀντὶ τῆς δοθείστης διαιρέσεως ᔁχομεν τὴν  $(x^6 - \alpha^6) : [x - (-\alpha)]$ . Ἐάν κάμωμεν τὴν ἀντικατάστασιν  $x = (-\alpha)$  εἰς τὸν διαιρετέον, εύρισκομεν ὅτι τὸ ὑπόλοιπον εἶναι  $(-\alpha)^6 - \alpha^6 = \alpha^6 - \alpha^6 = 0$ .

Ἐκ τούτων ἐπεται ὅτι :

Διὰ νὰ εὔρωμεν τὸ ὑπόλοιπον τῆς διαιρέσεως πολυωνύμου περιέχοντος τὸ  $\chi$ , διὰ τοῦ  $\chi \pm \alpha$ , ἀρκεῖ νὰ θέσωμεν ὅπου  $\chi$  τὸ  $- \alpha$  ἢ τὸ  $\alpha$  εἰς τὸ πολυώνυμον καὶ νὰ εὔρωμεν τὴν τιμὴν τούτου, ἢτοι νὰ θέσωμεν τὴν τιμὴν τοῦ  $\chi$ , διὰ τὴν ὁποίαν μηδενίζεται τὸ  $\chi \pm \alpha$ .

Οὕτω τὸ ὑπόλοιπον τῆς διαιρέσεως  $(x^4 + \alpha^4) : (x + \alpha)$  εἶναι τὸ  $(-\alpha)^4 + \alpha^4 = \alpha^4 + \alpha^4 = 2\alpha^4$ .

Όμοιώς δεικνύεται ὅτι, τὸ ὑπόλοιπον τῆς διαιρέσεως τοῦ πολυωνύμου  $\Pi(x)$  διὰ  $\alpha x + \beta$  εύρισκεται, ἀν τεθῇ εἰς τὸν διαιρετέον ἡ τιμὴ  $x = -\frac{\beta}{\alpha}$ , διὰ τὴν ὁποίαν μηδενίζεται τὸ  $\alpha x + \beta$ . Διότι, ἀν  $\Pi(x)$  παριστάνῃ τὸν διαιρετέον,  $\rho(x)$  τὸ πηλίκον καὶ υ τὸ ὑπόλοιπον τῆς διαιρέσεως αὐτῆς, θὰ ᔁχωμεν

$$\Pi(x) = \rho(x) \cdot (\alpha x + \beta) + u.$$

Θέτοντες  $x = -\frac{\beta}{\alpha}$  εἰς τὴν ἴσοτητα αὐτήν, εύρισκομεν

$$\Pi\left(-\frac{\beta}{\alpha}\right) = \rho\left(-\frac{\beta}{\alpha}\right) \cdot (-\beta + \beta) + u = u, \quad \text{ἢτοι } \Pi\left(-\frac{\beta}{\alpha}\right) = u.$$

**§ 78.** Ἐκ τῶν προηγουμένων συνάγομεν ὅτι :

Πολυώνυμον τι  $\Pi(\chi)$  εἶναι διαιρετὸν διὰ τοῦ  $\alpha \chi \pm \beta$ , ἀν τὸ  $\Pi\left(\pm \frac{\beta}{\alpha}\right)$  εἶναι ἵσον μὲ 0.

Οὕτω τὸ  $x^\mu - \alpha^\mu$  εἶναι διαιρετὸν διὰ τοῦ  $x - \alpha$ , διότι τὸ ὑπόλοιπον τῆς διαιρέσεως ταύτης εἶναι  $\alpha^\mu - \alpha^\mu = 0$ , ( $\alpha \neq 0$ ).

Τὸ  $x^{\mu} + \alpha^{\mu}$  δὲν διαιρεῖται διὰ τοῦ  $x - \alpha$ , διότι τὸ ὑπόλοιπον τῆς διαιρέσεως ταύτης εἶναι  $\alpha^{\mu} + \alpha^{\mu} = 2\alpha^{\mu} \neq 0$ .

Τὸ  $x^{\mu} - \alpha^{\mu}$  διαιρεῖται μὲν διὰ τοῦ  $x + \alpha$ , ὅταν τὸ μ ἄρτιος ἀριθμός, ἀλλὰ δὲν διαιρεῖται δι' αὐτοῦ, ὅταν τὸ μ εἶναι περιττός.

Διότι, εἰς μὲν τὴν πρώτην περίπτωσιν τὸ ὑπόλοιπον εἶναι  $(-\alpha)^{\mu} - \alpha^{\mu} = \alpha^{\mu} - \alpha^{\mu} = 0$

εἰς δὲ τὴν δευτέραν εἶναι  $(-\alpha)^{\mu} - \alpha^{\mu} = -2\alpha^{\mu} \neq 0$ .

Τὸ  $x^{\mu} + \alpha^{\mu}$  διαιρεῖται μὲν διὰ τοῦ  $x + \alpha$ . ὅταν τὸ μ εἶναι περιττός, διότι τὸ ὑπόλοιπον εἶναι  $(-\alpha)^{\mu} + \alpha^{\mu} = -\alpha^{\mu} + \alpha^{\mu} = 0$ , ἀλλ' ὅταν τὸ μ εἶναι ἄρτιος, διότι τότε τὸ ὑπόλοιπον εἶναι  $(-\alpha)^{\mu} + \alpha^{\mu} = \alpha^{\mu} + \alpha^{\mu} = 2\alpha^{\mu} \neq 0$ .

### Α σ ρ η σ ε ι ζ

Ο μάς πρώτη. 132. Εὗρετε τὰ ὑπόλοιπα τῶν κάτωθι διαιρέσεων χωρὶς νὰ ἐκτελεσθῇ ἡ διάρεσις.

$$\alpha') (2x^2+x-9) : (x-2)$$

$$\beta') (x^2+6x+7) : (x+2)$$

$$\gamma') (x^4+17x^3-68x-33) : (x-0,5)$$

$$\delta') (27x^3+1) : (3x+1)$$

Ο μάς δευτέρα. 133. Εὗρετε τὰ ὑπόλοιπα τῶν κάτωθι διαιρέσεων χωρὶς νὰ ἐκτελεσθοῦν αἱ διαιρέσεις.

$$\alpha') (81x^4-256) : (3x-4)$$

$$\beta') (8\alpha^3+\beta^3) : (2\alpha+\beta)$$

$$\gamma') (32x^5+343) : (2x+3)$$

$$\delta') (64x^6-1) : (2x+1)$$

$$\epsilon') (1+x^2) : (1+x)$$

$$\tau') (\alpha^{10}+\beta^{10}) : (\alpha^2+\beta^2)$$

$$\zeta') (\alpha^{12}-\beta^{12}) : (\alpha^4-\beta^4)$$

$$\eta) (x^{16}+\psi^{16}) : (x^8+\psi^8)$$

$$\theta') (x^{15}+\psi^{10}) : (x^3+\psi^2)$$

$$\iota') (x^{18}-\psi^{18}) : (x^6-\psi^6).$$

Ο μάς τρίτη. 134. Εὗρετε τὰ ὑπόλοιπα τῶν κάτωθι διαιρέσεων χωρὶς νὰ ἐκτελεσθοῦν αἱ διαιρέσεις.

$$\alpha') (\psi\mu^{\nu}-1) : (\psi^{\nu}-1) \quad \beta') (\mu^8-\nu^{12}) : (\mu^2-\nu^3) \quad \gamma') \alpha^{2\nu}+\mu+\beta^{2\nu}+\mu) : (\alpha+\beta)$$

$$\delta') (\psi^{12}-\omega^4) : (\psi^8+\omega)$$

$$\epsilon') (x^{14}-1) : (x^{\pi}-1).$$

### 12. ΠΗΛΙΚΑ ΤΩΝ ΔΙΑΙΡΕΣΕΩΝ ( $x^{\mu} \pm \alpha^{\mu}$ ) : ( $x \pm \alpha$ )

**§ 79.** Εστω ὅτι ἔχομεν τὴν διαιρέσιν τοῦ  $x^{\mu} - \alpha^{\mu}$  ἢ τοῦ  $x^{\mu} + \alpha^{\mu}$  διὰ τοῦ  $x - \alpha$ , ὅπου  $\mu > 0$  καὶ ἀκέραιος. Εὰν ἐκτελέσωμεν τὴν πρᾶξιν, εὑρίσκομεν πηλίκον τὸ  $x^{\mu-1} + \alpha x^{\mu-2} + \alpha^2 x^{\mu-3} + \alpha^3 x^{\mu-4} + \dots + \alpha^{\mu-1}$  καὶ ὑπόλοιπον 0 διὰ τὴν πρώτην περίπτωσιν,  $2\alpha^{\mu}$  δὲ διὰ τὴν δευτέραν.

Ομοίως εὑρίσκομεν διὰ τὴν διαιρέσιν  $(x^{2\mu} - \alpha^{2\mu}) : (x + \alpha)$  ως πηλίκον  $x^{2\mu-1} - \alpha x^{2\mu-2} + \dots - \alpha^{2\mu-1}$  καὶ ὑπόλοιπον 0.

Διὰ τὴν διαιρεσιν  $(x^{2v+1} + \alpha^{2v+1}) : (x+\alpha)$  εύρισκομεν πηλίκον  $x^{2v} - \alpha x^{2v-1} + \dots + \alpha^{2v}$  καὶ ὑπόλοιπον 0.

Διὰ τὴν διαιρεσιν  $(x^{2v+1} + \alpha^{2v+1}) : (x+\alpha)$  εύρισκομεν πηλίκον  $x^{2v} - \alpha x^{2v-1} + \dots + \alpha^{2v}$  καὶ ὑπόλοιπον  $-2\alpha^{2v+1}$ .

Κατὰ ταῦτα ἔχομεν :

$$(x^4 - \alpha^4) : (x-\alpha) = x^3 + \alpha x^2 + \alpha^2 x + \alpha^3$$

$$(x^6 - \alpha^6) : (x+\alpha) = x^5 - \alpha x^4 + \alpha^2 x^3 - \alpha^3 x^2 + \alpha^4 x - \alpha^5$$

$$(x^3 + \alpha^3) : (x-\alpha) = x^2 + \alpha x + \alpha^2 \quad \text{καὶ ὑπόλοιπον } 2\alpha^3$$

$$(x^3 + \alpha^3) : (x+\alpha) = x^2 - \alpha x + \alpha^2$$

**§ 80.** Λέγομεν ὅτι πολυώνυμόν τι εἶναι ὁμογενὲς βαθμοῦ τινὸς ὡς πρὸς ώρισμένα γράμματά του, ἐὰν πάντες οἱ ὅροι του εἰναι τοῦ αὐτοῦ βαθμοῦ ὡς πρὸς τὰ γράμματα ταῦτα. Π.χ. τὸ  $x^3 + 5\alpha x^2 - 12\alpha x^2 + \alpha^3$  εἶναι ὁμογενὲς γ' βαθμοῦ ὡς πρὸς τὰ  $\alpha$  καὶ  $x$ . Τὸ  $5x\psi - 8x^2 + 4\psi^2$  εἶναι ὁμογενὲς β' βαθμοῦ ὡς πρὸς τὰ  $x$  καὶ  $\psi$ .

\*Ομογενὲς γραμμικὸν λέγεται πολυώνυμόν τι ὡς πρὸς ώρισμένα γράμματα αὐτοῦ, ἐὰν εἶναι ὁμογενὲς α' βαθμοῦ ὡς πρὸς αὐτά, π.χ. τὸ  $3\alpha x - 5\beta\psi + 8\gamma\omega$  ὡς πρὸς τὸ  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  ἢ ὡς πρὸς τὰ  $x$ ,  $\psi$ ,  $\omega$ .

Οὕτω τὰ ἀνωτέρω πηλίκα τῶν διαιρέσεων  $(x^{\mu} \pm \alpha^{\mu}) : (x \pm \alpha)$  εἶναι πολυώνυμα ὁμογενῆ καὶ βαθμοῦ  $\mu - 1$  ὡς πρὸς  $x$  καὶ  $\alpha$ .

Π.χ. τὸ πηλίκον τῆς διαιρέσεως  $(x^4 - \alpha^4) : (x - \alpha)$  εἶναι τὸ  $x^3 + \alpha x^2 + \alpha^2 x + \alpha^3$  ὁμογενὲς πολυώνυμον γ' βαθμοῦ ὡς πρὸς  $x$  καὶ  $\alpha$ .

### Α σκήσεις

135. Εὕρετε τὰ πηλίκα καὶ τὰ ὑπόλοιπα τῶν κάτωθι διαιρέσεων ἀπὸ μνήμης

$$\alpha') (x^3 + \beta^3) : (\alpha + \beta) \quad \beta') (\alpha^3 - \beta^3) : (\alpha - \beta) \quad \gamma') \alpha^2 - \beta^2 : (\alpha + \beta)$$

$$136. \alpha') (x^3 + 3\alpha^2\beta + 3\alpha\beta^2 + \beta^3) : (\alpha^2 + 2\alpha\beta + \beta^2)$$

$$\beta') (x^3 - 3\alpha^2\beta + 3\alpha\beta^2 - \beta^3) : (\alpha^2 - 2\alpha\beta + \beta^2)$$

137. Εὕρετε ἀπὸ μνήμης τὰ πηλίκα καὶ ὑπόλοιπα τῶν διαιρέσεων

$$\alpha') (x^6 + \psi^6) : (x + \psi) \quad \beta') (x^6 - \psi^6) : (x - \psi) \quad \gamma') (x^3 + \psi^3) : (x + \psi)$$

$$\delta') (x^8 + \psi^8) : (x + \psi) \quad \epsilon') (x^7 + 1) : (x + 1) \quad \tau') (x^3 + \alpha^3) : (x - \alpha)$$

138. Εὕρετε τίνων διαιρέσεων τῆς μορφῆς  $(x^{\mu} \pm \alpha^{\mu}) : (x \pm \alpha)$  εἶναι τέλεια πηλίκα τὰ κάτωθι :

$$\begin{array}{lll} \alpha') x^2 + \alpha x + \alpha^2 & \beta') x^2 - x + 1 & \gamma') x^3 + x^2 + x + 1 \\ \delta') \alpha^3 + \alpha^2 \beta + \alpha \beta^2 + \beta^3 & & \epsilon') x^4 - \alpha x^3 + \alpha^2 x^2 - \alpha^3 x + \alpha^4 \end{array}$$

139. Εύρετε τὸ πηλίκον τῆς διαιρέσεως ( $\alpha^5v - \beta^5v$ ) : ( $\alpha v - \beta v$ ), χωρὶς νὰ ἐκτελέσητε τὴν πρᾶξιν (τὸ  $v$  ὑποτίθεται ἀκέραιος  $> 0$ ).

140. Ὁμοίως τῆς διαιρέσεως (7p + 1) : 8, ἀν τὸ  $p$  εἶναι θετικὸς ἀριθμός καὶ καὶ περιττός. Παρατηρήσατε ὅτι  $7 = 7 + 1$ . Εύρετε καὶ ἄλλα τοιαῦτα παραδείγματα τελείων διαιρέσεων.

141. Δεῖξατε ὅτι τὸ  $(\alpha + \beta + \gamma)^{\mu} - \alpha^{\mu} - \beta^{\mu} - \gamma^{\mu}$  διαιρεῖται διὰ τῶν  $\alpha + \beta$ ,  $\alpha + \gamma$ ,  $\beta + \gamma$ , ὅταν τὸ  $\mu$  εἶναι περιττός καὶ θετικὸς ἀριθμός.

142. Δεῖξατε ὅτι ἵνα ἀκέραιον πολυώνυμον ὡς πρὸς  $x$ , διαιρῆται διὰ τοῦ  $(x-\alpha)(x-\beta)(x-\gamma)$ , ( $\alpha \neq \beta \neq \gamma$ ), πρέπει καὶ ἀρκεῖ νὰ διαιρῆται διὰ  $x-\alpha$ , διὰ τοῦ  $x-\beta$  καὶ διὰ τοῦ  $x-\gamma$ .

### 13. ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΑΚΕΡΑΙΑΣ ΑΛΓΕΒΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΙΣ ΓΙΝΟΜΕΝΟΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

**§ 81.** Ἐστω μονώνυμον ἀκέραιον, π.χ. τὸ  $24\alpha^2\beta^3\gamma$ .

Ἐὰν τὸν ἀριθμὸν 24 ἀναλύσωμεν εἰς τοὺς πρώτους του παράγοντας, θὰ εὑρῷμεν ὅτι εἶναι  $24 = 2^3 \cdot 3$ . Ἀρα τὸ  $24\alpha^2\beta^3\gamma = 2^3 \cdot 3\alpha^2 \cdot \beta^3 \cdot \gamma$ . Παρατηροῦμεν ὅτι οἱ παράγοντες τοῦ ἀνωτέρω μονωνύμου εἶναι οἱ 2, 3,  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ . Ἡ ἀνάλυσις λοιπὸν ἀκεραίου τινὸς μονωνύμου, ἔχοντος (ἀριθμητικὸν) συντελεστὴν ἀκέραιον ἀριθμόν, γίνεται εὐκόλως, διότι πρὸς τοῦτο ἀρκεῖ νὰ ἀναλύσωμεν τὸν (ἀριθμητικὸν) συντελεστὴν του εἰς πρώτους παράγοντας.

Τούναντίον, ἡ τροπὴ πολυωνύμου τινὸς εἰς γινόμενον παραγόντων κατὰ τρόπον μᾶλλον ἀπλοῦν, εἶναι δυνατὴ εἰς ὥρισμένας περιπτώσεις καὶ ἐκ τούτων ἀναφέρομέν τινας κατωτέρω.

*Ιη περίπτωσις.* Ἐὰν πάντες οἱ ὄροι τοῦ πολυωνύμου εἶναι γινόμενα, τὰ ὅποια ἔχουν κοινὸν τινα παράγοντα, τρέπεται τοῦτο εὐκόλως εἰς γινόμενον παραγόντων.

Οὕτω τὸ  $\alpha + \beta\mu - \gamma\mu = \mu(\alpha + \beta - \gamma)$ .

‘Ομοίως τὸ  $\mu\alpha + \mu = \mu(\alpha + 1)$ .

‘Επίσης τὸ  $2x^3 + 6x\psi = 2x(x + 3\psi)$ .

Εἰς τὴν περίπτωσιν ταύτην λέγομεν ὅτι θέτομεν τὸν κοινὸν παράγοντα ἐκτὸς παρενθέσεως.

### Α σκηνις

143. Τρέψατε εις γινόμενα τὰς κάτωθι παραστάσεις

- |  |   |
|--|---|
| α') $8\alpha^2\beta - 6\alpha^3 + 4\alpha\beta$                                      | β') $4\alpha x^2\psi - 82\psi^2 - 4x\psi$                                       |
| γ') $8\alpha^3\beta^2\gamma^2 - 4\alpha^2\beta^3\gamma^3 + 2\alpha^2\beta^2\gamma^3$ | δ') $15\alpha^3x - 10\alpha^3\psi + 5\alpha^3\omega$                            |
| ε') $\alpha^3\gamma\psi^3 + 2\alpha^2\gamma^2\psi^2 - \alpha^2\gamma\psi^2$          | στ') $3\beta^3\gamma^3 + 2\beta^2\gamma^2 - 6\beta\gamma^3$                     |
| ζ') $x^2\psi^2\omega^2 - x^3\psi^3\omega^3 + x^2\psi^3\omega$                        | η') $\alpha\beta^2\gamma^3 - 2\alpha^2\beta^2\gamma + 3\alpha^2\beta^3\gamma^2$ |
| θ') $6\alpha^2 - 12\alpha^3$   | ια') $8x^2\psi^2 + 16x\psi\omega - 24x^2\psi^2\omega^2$                         |
| ι') $3x^2 - 7x^4$  |   |

2α περίπτωσις. Ἐάν εἰναι δυνατὸν νὰ διαταχθοῦν οἱ ὅροι πολυωνύμου καθ' ὁμάδας, ώστε εἰς ἑκάστην τούτων νὰ ὑπάρχῃ ὁ αὐτὸς παράγων, τότε τρέπεται ἐν γένει τοῦτο εἰς γινόμενον παραγόντων.

Π.χ. τὸ πολυωνυμον  $\alpha\gamma + \alpha\delta + \beta\gamma + \beta\delta$  εἶναι ίσον μὲν  $(\alpha\gamma + \alpha\delta) + (\beta\gamma + \beta\delta) = \alpha(\gamma + \delta) + \beta(\gamma + \delta) = (\alpha + \beta)(\gamma + \delta)$ .

### Α σκηνις

144. Νὰ τραποῦν εἰς γινόμενα παραγόντων αἱ κάτωθι παραστάσεις

- |  |  |
|--|--|
| α') $\alpha x^2 + \alpha^2 x + \alpha + x$                                 | β') $x^3 - x^2\omega - x\psi^2 + \psi^2\omega$                                 |
| γ') $\alpha\beta x - \alpha\psi + \gamma\delta x - \gamma\delta\psi$       | δ') $\alpha x^2 - \beta x^2 + \alpha - \beta$                                  |
| ε') $\alpha^2\gamma \pm \beta^2\delta \pm \beta^2\gamma + \alpha^2\delta$  | στ') $\alpha^2\gamma + \alpha\gamma^2 \pm \alpha\beta\gamma \pm \beta\gamma^2$ |
| ζ') $1 + \gamma - \gamma^2 x\psi - \gamma^3 x\psi$                         | η') $6x^3 - 10x\psi^3 - 15\psi^4 + 9x^2\psi$                                   |
| θ') $2x(x-\psi) - 6\alpha(x-\psi)$   | ι') $x^3 + 2(x^2 - 1) - 1$   |
| ια') $\alpha x + \beta x - \gamma x + \alpha\psi + \beta\psi - \gamma\psi$ | ιβ') $\alpha^5 + 2(\alpha^3 + 1) + 1$  |

3η περίπτωσις. Ἐάν τριώνυμόν τι ίσουται μὲν τέλειον τετράγωνον διωνύμου, τρέπεται εἰς γινόμενον παραγόντων. Οὕτω τὸ

$$x^2 + 2x\psi + \psi^2 = (x + \psi) \quad (x + \psi) = (x + \psi)^2.$$

Όμοιώς ἔχομεν

$$16\alpha^2 - 24\alpha\beta + 9\beta^2 = (4\alpha - 3\beta)^2 = (4\alpha - 3\beta)(4\alpha - 3\beta).$$

Ἐπίσης ἔχομεν

$$x^4 - 2x^2\psi + \psi^2 = (x^2 - \psi)^2 = (x^2 - \psi)(x^2 - \psi).$$

### Α σκηνή σεις

145. Νὰ τραποῦν εἰς γινόμενα παραγόντων αἱ κάτωθι παραστάσεις

- |  |  |                           |
|--|--|---------------------------|
| α') $\mu^2\nu^2 \pm 16\mu\nu\alpha^2 + 64\alpha^4$ | β') $\alpha^2\beta^4\gamma^6 \pm 2\alpha\beta^2\gamma^5x^8 + x^{16}$ | γ') $x^6 \pm 34x^3 + 289$ |
| δ') $(x+\psi)^2 - 4\omega(x+\psi) + 4\omega^2$     | ε') $(\alpha - \beta)^2 - 6(\alpha - \beta)\gamma^3 + 9\gamma^6$     |                           |
|  | στ') $(\phi + \omega^2)^2 + 8\phi + 8\omega^2$                       |                           |

4η περίπτωσις. Ἐάν διώνυμόν τι εἴναι διαφορὰ δύο τετρα-

γώνων, τρέπεται εἰς γινόμενον τοῦ ἀθροίσματος ἐπὶ τὴν διαφορὰν τῶν τετραγωνικῶν ριζῶν τῶν διθέντων τετραγώνων καθ' ἣν τάξιν εύρισκονται τὰ διθέντα τετράγωνα.

$$\text{Οὔτως } \ddot{\chi}\text{ομεν } 16x^2 - 9\psi^2 = (4x + 3\psi)(4x - 3\psi).$$

$$\text{'Ομοίως τὸ } 25 - 16\alpha^2 = (5 + 4\alpha)(5 - 4\alpha).$$

### "Α σ κ η σ ι ζ

146. Νὰ τραποῦν εἰς γινόμενα αἱ κάτωθι παραστάσεις

$$\begin{array}{lll} \alpha') \alpha^2\beta^2 - 1 & \beta') 4\alpha^2 - 49\beta^2 & \gamma') 121\alpha^2 - 36\beta^2 \\ \varepsilon') 81\alpha^3\beta^2 - \gamma^4 & \sigma') 4\alpha^2\gamma - 9\gamma^3 & \zeta') 20\alpha^3\beta^2 - 5\alpha\beta^2 \\ \theta') 1 - 400x^4 & \iota') 4x^{16} - \psi^{20} & \iota\alpha') 9x^2 - \alpha^6 \\ & & \iota\beta') 16x^{17} - 9x\psi^4. \end{array}$$

5η περίπτωσις. Ἐνίστε δυνάμεθα νὰ διατάξωμεν τοὺς ὄρους τοῦ διθέντος πολυνομού καθ' ὅμαδας, οὕτως ὥστε αἱ ὅμαδες αὗται νὰ δύνανται νὰ γραφοῦν ὡς διαφορὰ τετραγώνων δύο παραστάσεων. Οὔτως ἐπανερχόμεθα εἰς τὴν προηγουμένην περίπτωσιν. Π.χ. ἔχομεν ὅτι:  $\alpha^2 - 2\alpha\beta + \beta^2 - 9\gamma^2 = (\alpha^2 - 2\alpha\beta + \beta^2) - 9\gamma^2 = (\alpha - \beta)^2 - 9\gamma^2 = (\alpha - \beta + 3\gamma)(\alpha - \beta - 3\gamma)$ . Όμοίως  $12\alpha\beta + 9x^2 - 4\alpha^2 - 9\beta^2 = 9x^2 - (4\alpha^2 - 12\alpha\beta + 9\beta^2) = 9x^2 - (2\alpha - 3\beta)^2 = (3x - 2\alpha + 3\beta)(3x + 2\alpha - 3\beta)$ .

### "Α σ κ η σ ι ζ

146. Νὰ τραποῦν εἰς γινόμενα παραγόντων αἱ κάτωθι παραστάσεις

$$\begin{array}{ll} \alpha') \beta^2 - x^2 + 4\alpha\alpha - 4\alpha^2 & \beta') \alpha^2 - x^2 - \psi^2 - 2x\psi \\ \gamma') \alpha^2 + \beta^2 + 2\alpha\beta - 16\alpha^2\beta^2 & \delta') 4x^2 - 9\alpha^2 + 6\alpha - 1 \\ \varepsilon') x^4 - x^2 - 2x - 1 & \sigma') 2x\psi - x^2 + \alpha^2 - \psi^2 \\ \zeta') \alpha^{4v} + 2\alpha^{2v}\beta^{2v} - \gamma^{2v} + \beta^{4v} & \eta') x^{2v} - 2x^{2v}\psi^v + \psi^{2v} - 4\omega^{2v} \\ \theta') \alpha^2 + \beta^2 - \gamma^2 - \delta^2 + 2\alpha\beta - 2\gamma\delta & \iota') \alpha^2 - x^2 + 2(\alpha\beta - 3x\psi) + \beta^2 - 9\psi^2 \\ \iota\alpha') \alpha^2 - \beta^2 - \gamma^2 + \delta^2 - 2(\alpha\delta - \beta\gamma) & \iota\beta') 4(\alpha\delta + \beta\gamma)^2 - (\alpha^2 - \beta^2 - \gamma^2 + \delta^2)^2 \end{array}$$

6η περίπτωσις. Ἐὰν ἡ διθεῖσα παράστασις εἴναι τῆς μορφῆς  $\alpha^4 + \alpha^3\beta^2 + \beta^4$ , παρατηροῦμεν ὅτι:

$$\alpha^4 + \alpha^3\beta^2 + \beta^4 = \alpha^4 + 2\alpha^2\beta^2 + \beta^4 - \alpha^2\beta^2 = (\alpha^2 + \beta^2)^2 - \alpha^2\beta^2 = (\alpha^2 + \beta^2 - \alpha\beta)(\alpha^2 + \beta^2 + \alpha\beta).$$

$$\text{Π.χ. } \tauὸ x^4 + x^2 + 1 = x^4 + 2x^2 + 1 - x^2 = (x^2 + 1)^2 - x^2 = (x^2 + 1 - x)(x^2 + 1 + x).$$

7η περίπτωσις. Ἐὰν ἡ διθεῖσα παράστασις εἴναι τῆς μορφῆς  $x^2 + \beta x + \gamma$  καὶ τὸ μὲν  $\beta$  εἴναι τὸ ἀλγεβρικὸν ἀθροίσμα δύο ἀρι-

θμῶν, εἴστω τῶν  $\rho$  καὶ  $\rho'$ , τὸ δὲ γ τὸ γινόμενον τῶν αὐτῶν ἀριθμῶν,  
θὰ ἔχωμεν  $\beta = \rho + \rho'$ ,  $\gamma = \rho\rho'$ . Ἀρα :

$$\begin{aligned} x^2 + \beta x + \gamma &= x^2 + (\rho + \rho')x + \rho\rho = x^2 + \rho x + \rho'x + \rho\rho' = \\ (x^2 + \rho x) + (\rho'x + \rho\rho') &= x(x + \rho) + \rho'(x + \rho) = (x + \rho)(x + \rho'). \end{aligned}$$

Π. χ. ἐὰν ἔχωμεν τὸ τριώνυμον  $x^2 + 8x + 15$ , παρατηροῦμεν  
ὅτι εἶναι  $8 = 5 + 3$  καὶ  $15 = 3 \cdot 5$ . Διὰ τοῦτο ἔχομεν :

$$x^2 + 8x + 15 = (x + 3)(x + 5).$$

8η περίπτωσις. Ἐὰν ἡ δοθεῖσα παράστασις εἶναι τῆς μορφῆς  
 $\alpha x^2 + \beta x + \gamma$ , δυνάμεθα νὰ τρέψωμεν αὐτὴν εἰς γινόμενον φέρον-  
τες πρῶτον αὐτὴν εἰς τὴν προηγουμένην μορφήν, ήτοι γράφοντες  
αὐτὴν οὕτως:  $\alpha \left( x^2 + \frac{\beta}{\alpha} x + \frac{\gamma}{\alpha} \right)$ , ὅτε ἀρκεῖ νὰ τραπῇ εἰς γινόμε-  
νον παραγόντων τὸ  $x^2 + \frac{\beta}{\alpha} x + \frac{\gamma}{\alpha}$ . Ἀλλὰ δυνάμεθα νὰ ἔργασθῶ-  
μεν καὶ ως ἔξῆς :

Γράφομεν  $\alpha x^2 + \beta x + \gamma = \frac{1}{\alpha} (\alpha^2 x^2 + \alpha \beta x + \alpha \gamma)$ . Θέτομεν  $\alpha x = \omega$ ,  
ὅτε ἔχομεν, ἀντὶ τῆς δοθείσης παραστάσεως, τὴν  $(\omega^2 + \beta \omega + \alpha \gamma)$ .

Ζητοῦμεν τώρα νὰ τρέψωμεν τὸ  $\omega^2 + \beta \omega + \alpha \gamma$  εἰς γινόμενον.  
Ἐστω λοιπὸν ὅτι εύρεθη  $\omega^2 + \beta \omega + \alpha \gamma = (\omega - \rho_1)(\omega - \rho_2)$ . Θέτομεν  
 $\omega = \alpha x$  καὶ εύρισκομεν  $(\alpha x - \rho_1)(\alpha x - \rho_2)$ , ἅρα ἡ δοθεῖσα παράστα-  
σις τρέπεται εἰς τὴν  $\frac{1}{\alpha} (\alpha x - \rho_1)(\alpha x - \rho_2)$ .

Ἐστω π.χ. ἡ παράστασις  $3x^2 - x - 2$ .

Γράφομεν αὐτὴν ως ἔξῆς :  $\frac{1}{3} (3 \cdot 3x^2 - 3x - 3 \cdot 2)$ . Ἐὰν γρά-  
ψωμεν ἀντὶ  $3x$  τὸ  $\omega$ , δηλαδὴ ἂν θέσωμεν  $3x = \omega$ , εύρισκομεν  
 $3x^2 - x - 2 = \frac{1}{3} (\omega^2 - \omega - 6)$

Ἀναλύομεν τὸ  $\omega^2 - \omega - 6$  εἰς τὸ  $(\omega - 3)(\omega + 2)$  καὶ οὕτω θὰ ἔ-  
χωμεν :  $3x^2 - x - 2 = \frac{1}{3} (\omega - 3)(\omega + 2)$ .

Γράφομεν ἀντὶ τοῦ  $\omega$  τὸ ἴσον αὐτοῦ  $3x$  καὶ ἔχωμεν :

$$\frac{1}{3} (3x - 3)(3x + 2) = \frac{3}{3} (x - 1)(3x + 2) = (x - 1)(3x + 2)$$

Ἔτοι :  $3x^2 - x - 2 = (x - 1)(3x + 2)$ .

9η περίπτωσις. Ἐὰν ἡ δοθεῖσα παράστασις εἶναι ἄθροισμα ἡ

διαφορὰ δύο κύβων, ἀναλύεται εἰς γινόμενον ἐπὶ τῇ βάσει τῆς διαιρέσεως πολυωνύμου διὰ τοῦ  $x+\alpha$  ἢ τοῦ  $x-\alpha$ . Οὕτω π.χ. τὸ  $\alpha^3-\beta^3$  διαιρεῖται διὰ τοῦ  $\alpha-\beta$  καὶ δίδει πηλίκον  $\alpha^2+\alpha\beta+\beta^2$ .

\*Ἐπομένως εἶναι :  $\alpha^3-\beta^3=(\alpha-\beta)(\alpha^2+\alpha\beta+\beta^2)$ .

\*Ομοίως τὸ  $\alpha^3+\beta^3$  διαιρεῖται διὰ τοῦ  $\alpha+\beta$  καὶ δίδει πηλίκον  $\alpha^2-\alpha\beta+\beta^2$ . \*Ἀρα εἶναι  $\alpha^3+\beta^3=(\alpha+\beta)(\alpha^2-\alpha\beta+\beta^2)$ .

Κατὰ ταῦτα τὸ  $x^6+\psi^9=(x^2+\psi^3)(x^4-x^2\psi^3+\psi^6)$ .

Τὸ  $(x-\psi)^3+\omega^3=(x-\psi+\omega)[(x-\psi)^2-(x-\psi)\omega+\omega^2]=(x-\psi+x)(x^2+\psi^2-2x\psi-x\omega+\psi\omega+\omega^2)$ .

### \*Α σ κ ή σ εις

*Ο μὸς πρώτη.	147.	Νὰ τραποῦν εἰς γινόμενα αἱ κάτωθι παραστάσεις
α') $9\alpha^4+26\alpha^2\beta^2+25\beta^4$	στ')	$\alpha^8+\beta^4$
β') $4x^4-21x^2\psi^2+9\psi^4$	ζ')	$\alpha^4+\alpha^2\psi^2+\psi^4$
γ') $\lambda^4+\lambda^2+1$	η')	$25x^4+31x^2\psi^2+16\psi^4$
δ') $4\alpha^4-13\alpha^2+1$	θ')	$\alpha^4+4\beta^4$
ε') $4x^4-37x^2\psi^2+9\psi^4$	ι')	$9\alpha^8-15\alpha^4+1$

*Ο μὸς δευτέρα.	148.	*Ἐπίσης νὰ τραποῦν εἰς γινόμενα αἱ κάτωθι παραστάσεις
α') $4x^2+13x+3$	δ')	$x^3\pm 64$
β') $6x^2+17x+12$	ε')	$343\pm x^3$
γ') $11\alpha^2-23\alpha\beta+2\beta^2$	στ')	$\alpha^3\pm 343$

*Ο μὸς τρίτη.	149.	Νὰ ἀναλυθοῦν εἰς γινόμενα αἱ κατωτέρω παραστάσεις διὰ συνδυασμοῦ τῶν ἀνωτέρω ἑκτεθεισῶν περιπτώσεων
α') $(x+\psi)^2-1-x\psi(x+\psi+1)$	β')	$\alpha^4-\beta^4+2\alpha\beta(\alpha^2-\beta^2)$
γ') $(x^2-4)^2-(3x-2)(x+2)^2$	δ')	$\alpha^2\gamma^2+\beta\gamma-\alpha^2\gamma-\beta$
ε') $x(2+x)-\psi(2+\psi)$	στ')	$\alpha^3-\beta^3+\alpha^2\beta-\alpha\beta^2-\alpha+\beta$
ζ') $4x+4\alpha\psi+x^2-4\alpha^2-\nu^2+4$	η')	$x^4\psi^4-4x^2+4-\psi^2-4x^2\psi^2+4x\psi$
θ') $x^2\psi+3x\psi^2-3x^3-\psi^3$	ι')	$\alpha\beta(x^2+1)+x(\alpha^2+\beta^2)$
ια') $\pi\nu(\mu^2+1)+\mu(\pi^2+\nu^2)$		

### 14. ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΚΟΙΝΟΣ ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ ΚΟΙΝΟΝ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΟΝ ΑΚΕΡΑΙΩΝ ΛΑΓΕΒΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ

§ 82. Καλοῦμεν μέγιστον κοινὸν διαιρέτην (μ. κ. δ.) δοθέντων ἀκεραίων μονωνύμων μὲν ἀριθμητικούς συντελεστὰς ἀκεραίους, τὸν μ.κ.δ. τῶν κυρίων ποσῶν των, μὲ συντελεστὴν τὸν μ.κ.δ. τῶν συντελεστῶν των.

\*Ο κανὼν τῆς εὑρέσεως τοῦ μ.κ.δ. ἀκεραίων ἀριθμῶν (τῆς \*Α-

ριθμητικής) δι' ἀναλύσεως αὐτῶν εἰς πρώτους παράγοντας, ισχύει καὶ διὰ τὴν εῦρεσιν τοῦ μ.κ.δ. ἀκεραίων σχετικῶν ἀριθμῶν ἡ παραστάσεων, μὲ συντελεστὰς ἀκεραίους, ὅταν αὗται τρέπωνται εἰς γινόμενα, καὶ ἡ ἀπόδειξις γίνεται ὁμοίως. Οὔτω ὁ μ.κ.δ. τῶν  $6\alpha^2\beta^3 = 2 \cdot 3 \cdot \alpha^2\beta^3$ ,  $9\alpha^3\beta^2 = 3^2 \cdot \alpha^3\beta^2$ ,  $16\alpha^4\beta^3 = 2^4 \cdot \alpha^4\beta^3$ , εἶναι τὸ  $\alpha^2\beta^2$ .

Ο μ.κ.δ. τῶν  $\alpha^2 - \alpha\beta = (\alpha - \beta)\alpha$ ,  $\alpha^3 - 2\alpha^2\beta + \alpha\beta^2 = \alpha(\alpha - \beta)^2$  καὶ  $\alpha^3 - \beta^3 = (\alpha - \beta)(\alpha^2 + \alpha\beta + \beta^2)$  εἶναι τὸ  $\alpha - \beta$ .

**§ 83.** Καλοῦμεν ἐλάχιστον κοινὸν πολλαπλάσιον (ἐ.κ.π.) ἀκεραίων μονωνύμων μὲ ἀριθμητικοὺς συντελεστὰς ἀκεραίους, τὸ ἐ.κ.π. τῶν κυρίων ποσῶν αὐτῶν, μὲ συντελεστὴν τὸ ἐ.κ.π. τῶν συντελεστῶν του.

Ο κανὼν τῆς εύρεσεως τοῦ ἐ.κ.π. ἀκεραίων ἀριθμῶν (τῆς Ἀριθμητικῆς) δι' ἀναλύσεως εἰς πρώτους παράγοντας ισχύει καὶ διὰ τὴν εῦρεσιν τοῦ ἐ.κ.π. ἀκεραίων σχετικῶν ἀριθμῶν ἡ καὶ ἀκεραίων ἀλγεβρικῶν παραστάσεων (μὲ συντελεστὰς ἀκεραίους), ὅταν αὗται τρέπωνται εἰς γινόμενα, ἡ δὲ ἀπόδειξις γίνεται ὁμοίως. Οὔτω τὸ ἐ.κ.π. τῶν  $18\alpha^3\beta^2 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot \alpha^3\beta^2$ ,  $9\alpha\beta^2 = 3^2 \cdot \alpha\beta^2$ ,  $12\alpha\beta = 2^2 \cdot 3\alpha\beta$ , εἶναι τὸ γινόμενον  $2^2 \cdot 3^2 \alpha^3\beta^2 = 36\alpha^3\beta^2$ .

### Α σκήσεις

150. Νὰ εύρεθῇ ὁ μ.κ.δ. τῶν παραστάσεων  
 α')  $121\alpha^2$ ,  $168\alpha^4\beta^2$   
 β')  $36\alpha^3x$ ,  $28x^3\psi$   
 γ')  $(x-1)^2$   $(x+2)^3$ ,  $(x-1)$   $(x+3)^3$   
 δ')  $35x^2(\mu+v)^2$ ,  $(\mu+v)^3$ ,  $20x^3(\mu+v)^2$   $(\mu-v)^2$ ,  $45x^4(\mu+v)^3$   $(\mu-v)^3$   
 ε')  $x^3+2x^2-3x$ ,  $2x^3+5x^2-3x$   
 στ')  $1-x$ ,  $(1-x^2)^2$ ,  $(1-x)^3$   
 ζ')  $x^4+\alpha x^3+\alpha^3 x+\alpha^4$ ,  $x^4+\alpha^2 x^2+\alpha^4$
151. Νὰ εύρεθῃ τὸ ἐ.κ.π. τῶν παραστάσεων  
 α')  $18x(\alpha+2\beta)^2$ ,  $9x\psi(\alpha+2\beta)^2(\alpha-2\beta)$ ,  $18x^2\psi^2(\alpha-2\beta)^2$   
 β')  $3x^4+3x$ ,  $5x^3-5x$ ,  $10x^2+10x$   
 γ')  $14\alpha^4(\alpha^3-\beta^3)$ ,  $21\alpha^2\beta^2(\alpha-\beta)^2$ ,  $6\alpha^3\beta(\alpha-\beta)(\alpha^2-\beta^2)$   
 δ')  $\mu^3\nu-\mu\nu^3$ ,  $\mu^2+\mu\nu-2\nu^2$ ,  $\mu^2-\mu\nu-2\nu^2$   
 ε')  $x^4-(\pi^2+1)x^2+\pi^2$ ,  $x^4-(\pi+1)^2x^2+2(\pi+1)\pi x-\pi^2$

## Γ'. ΠΕΡΙ ΑΛΓΕΒΡΙΚΩΝ ΡΗΤΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ

**§ 84.** Καθώς τὸ πηλίκον τῆς διαιρέσεως δύο σχετικῶν ἀριθμῶν παριστάνεται μὲ κλάσμα ἔχον ἀριθμητὴν τὸν διαιρετέον καὶ παρονομαστὴν τὸν διαιρέτην, οὕτω καὶ τὸ πηλίκον δύο ἀλγεβρικῶν παραστάσεων, π.χ. τῶν ἀκεραίων τοιούτων  $-5\alpha^2 + \beta^3$  καὶ  $8\gamma^3 + 9\alpha$  παριστάνεται μὲ τὸ ἀλγεβρικὸν κλάσμα  $\frac{-5\alpha^2 + \beta^3}{8\gamma^3 + 9\alpha}$ .

Τοῦτο, ως καὶ πᾶν κλάσμα, τοῦ δποίου οἱ ὄροι εἰναι ἐν γένει ἀκέραια πολυώνυμα, λέγεται ρητὸν ἀλγεβρικὸν κλάσμα.

### 1. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΡΗΤΩΝ ΑΛΓΕΒΡΙΚΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ

**§ 85.** Ἐπειδὴ οἵαιδήποτε καὶ ἀν εἰναι αἱ ἀκέραιαι ἀλγεβρικαὶ παραστάσεις, αἱ ἀποτελοῦσαι τὸν ἀριθμητὴν καὶ παρονομαστὴν ρητοῦ ἀλγεβρικοῦ κλάσματος, οἱ ὄροι αὐτοῦ παριστάνουν σχετικοὺς ἀριθμοὺς (διὰ τὰς τιμὰς τῶν γραμμάτων των, διὰ τὰς δποίας δὲν μηδενίζεται ὁ παρονομαστὴς των) ἐπεται ὅτι καὶ τὰ κλάσματα ταῦτα ἔχουν τὰς ἴδιότητας τῶν ἀλγεβρικῶν κλασμάτων.

Οὕτως, ἐὰν τοὺς ὄρους ἀλγεβρικοῦ τινὸς κλάσματος πολλαπλασιάσωμεν ἢ διαιρέσωμεν μὲ τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν ( $\neq 0$ ), ἡ ἀξία του δὲν μεταβάλλεται.

$$\text{Κατὰ ταῦτα } \frac{57\alpha^3\beta\gamma^2}{38\alpha^2\beta^3\gamma^4} = \frac{3 \cdot 19\alpha^3\beta\gamma^2}{2 \cdot 19\alpha^2\beta^3\gamma^4} = \frac{3\alpha}{2\beta\gamma^2}.$$

Στηριζόμενοι εἰς τὴν ἀνωτέρω ἴδιότητα δυνάμεθα ἐνίστε νὰ τρέψωμεν δοθὲν ἀλγεβρικὸν ρητὸν κλάσμα εἰς ἄλλο ἰσοδύναμον μὲ αὐτὸ καὶ ἔχον ὄρους ἀπλουστέρους τοῦ δοθέντος. Πρὸς εὔκολίαν χρησιμοποιοῦμεν, ἀν εἰναι δυνατόν, τὸν μ.κ.δ. τῶν ὄρων του, τρέποντες αὐτούς εἰς γινόμενα, ἀν εἰναι δυνατόν.

**§ 86.** Ἀπλοποίησις ἀλγεβρικοῦ τινὸς ρητοῦ κλάσματος λέγεται ἡ εὔρεσις ἀλλού κλάσματος ἰσοδύναμου του καὶ ἔχοντος ὄρους ἀπλουστέρους. Ἡ ἀπλοποίησις καὶ τῶν ρητῶν κλασμάτων ἀνάγεται εἰς τὴν ἀντίστοιχον ἀπλοποίησιν τῶν ἀλγεβρικῶν τοιούτων. Ήτοι :

Διὰ νὰ ἀπλοποιήσωμεν ρητὸν ἀλγεβρικὸν κλάσμα, διαι-

ροῦμεν τοὺς ὅρους του διὰ τινος κοινοῦ διαιρέτου των τρέποντες τούτους εἰς γινόμενα, ἀν εἶναι δυνατόν,

Οὕτως ἔχομεν π.χ. διὰ τὸ κλάσμα

$$\frac{\alpha^2+8\alpha+15}{\alpha^2+5\alpha+6} \text{ ἔχομεν } \frac{\alpha^2+8\alpha+15}{\alpha^2+5\alpha+6} = \frac{(\alpha+5)(\alpha+3)}{(\alpha+2)(\alpha+3)} = \frac{\alpha+5}{\alpha+2}.$$

Τοῦτο εὐρέθη, ἀφοῦ πρῶτον οἱ ὅροι τοῦ δοθέντος ἐτράπησαν εἰς γινόμενα καὶ ἀκολούθως οἱ ὅροι τοῦ προκύψαντος ἰσοδυνάμου κλάσματος διηρέθησαν διὰ τοῦ κοινοῦ διαιρέτου τῶν ὅρων του, ἥτοι μὲ τὸ  $\alpha + 3$ .

**§ 87.** Ἀνάγωγον λέγεται ἔν κλάσμα, τοῦ ὅποίου οἱ ὅροι δὲν ἔχουν κοινὸν παράγοντα καὶ ἐπομένως δὲν ἀπλοποιεῖται. Ο κανὼν καθ' ὃν τρέπεται ἀλγεβρικὸν κλάσμα εἰς ἀνάγωγον ἴσχύει καὶ διὰ τὰ ἀλγεβρικὰ ρητὰ κλάσματα καὶ πρὸς εὐκολίαν χρησιμοποιεῖται ὁ μ.κ.δ. τῶν ὅρων του, ἑκάστου τούτων τρεπομένου εἰς γινόμενον παραγόντων (ἄν εἶναι δυνατόν). Οὕτως ἔχομεν π.χ.

$$\frac{4\alpha^2\beta^2\gamma}{6\alpha\beta^2\gamma^2} = \frac{2^2\cdot\alpha^2\beta^2\gamma}{2\cdot3\alpha\beta^2\gamma^3} = \frac{2\alpha}{3\gamma^2} \text{ (μ.κ.δ. εἶναι ὁ } 2\alpha\beta^2\gamma).$$

Ἐπίσης εὐρίσκομεν ὅτι

$$\frac{\alpha^2-1}{\alpha^2-\alpha} = \frac{(\alpha-1)(\alpha+1)}{\alpha(\alpha-1)} = \frac{\alpha+1}{\alpha} \text{ (ό μ.κ.δ. εἶναι τὸ } \alpha-1).$$

Ἐπίσης εὐρίσκομεν

$$\frac{(x+\alpha)^2-\beta^2}{(x+\beta)^2-\alpha^2} = \frac{(x+\alpha+\beta)\cdot(x+\alpha-\beta)}{(x+\alpha+\beta)\cdot(x+\beta-\alpha)} = \frac{x+\alpha-\beta}{x+\beta-\alpha}$$

(μ.κ.δ. ὁ  $x+\alpha+\beta$ ).

### "Α σκην σις

152)

$\alpha')$	$\frac{16\alpha^2\beta^2}{18\alpha\beta^2}$	$\beta')$	$\frac{45\alpha^2\beta^2\gamma^2}{9\alpha^2\beta^2\gamma}$	$\gamma')$	$\frac{46x^2\psi^2}{39x^3\psi^5}$	$\delta')$	$\frac{98x\psi-24\psi^3}{24x^2-32x\psi}$
$\xi')$	$\frac{x^3-\psi^3}{x^2-\psi^2}$	$\sigma)$	$\frac{x^2-\psi^2}{x^3+\psi^3}$	$\zeta')$	$\frac{x^4-6561}{x^2-81}$	$\pi')$	$\frac{\alpha\beta\gamma+9\beta\gamma-5\gamma^2}{2\alpha\beta\delta\rho+18\beta\delta\rho-10\gamma\delta\rho}$
$\theta')$	$\frac{\alpha\chi+\beta\psi+\alpha\psi+\beta\chi}{\alpha\psi+2\beta\chi+2\alpha\chi+\beta\psi}$	$\iota')$	$\frac{\alpha\beta}{(\gamma-\alpha)(\gamma-\beta)}$	$\beta\gamma$	$\frac{\gamma\alpha}{(\alpha-\beta)(\alpha-\gamma)}$	$\beta\gamma$	$\frac{\alpha\beta\gamma+9\beta\gamma-5\gamma^2}{2\alpha\beta\delta\rho+18\beta\delta\rho-10\gamma\delta\rho}$
$\iota\alpha')$	$\frac{\alpha(\alpha-\beta)^2+4\alpha^2\beta+\beta(\alpha+\beta)^2}{\alpha(\alpha-\beta)+2\alpha\beta+\beta(\alpha+\beta)}$	$\iota\beta')$	$\frac{x^3+2x^2+2x+1}{x^3+3x^2+3x+1}$				

**§ 88.** Διὰ νὰ τρέψωμεν εἰς ἰσοδύναμά των ὅμώνυμα ἀλ-

γεβρικά ρητά κλάσματα, έργαζόμεθα όπως και διὰ τὰ ἀριθμητικὰ κλάσματα.

"Εστωσαν π. χ. τὰ κλάσματα  $\frac{\beta}{6\alpha}$ ,  $\frac{\alpha}{9\beta}$ ,  $\frac{1}{4\alpha^2\beta}$ ,  $\frac{1}{18\alpha^3\beta^3}$ . Τὸ ἐ. κ. π. τῶν παρονομαστῶν εἶναι τὸ  $3^2 \cdot 2^2 \cdot \alpha^2 \cdot \beta^3$ . Διαιροῦντες αὐτὸ δι' ἔκάστου τῶν παρονομαστῶν εύρίσκομεν κατὰ σειρὰν  $6\alpha\beta^3$ ,  $4\alpha^2\beta^2$ ,  $9\beta^2 \cdot 2$ .

"Εὰν πολλαπλασιάσωμεν τοὺς ὄρους ἔκάστου τῶν δοθέντων κλασμάτων κατὰ σειρὰν ἐπὶ τὰ πηλίκα ταῦτα, εύρίσκομεν (ἰσοδύναμα τῶν δοθέντων) τὰ ὅμώνυμα κλάσματα

$$\frac{6\alpha\beta^4}{36\alpha^2\beta^3}, \quad \frac{4\alpha^3\beta^2}{36\alpha^2\beta^3}, \quad \frac{9\beta^2}{36\alpha^2\beta^3}, \quad \frac{2}{36\alpha^2\beta^3}.$$

"Εστωσαν τὰ κλάσματα

$$\frac{1}{4(\alpha^3 + 3\alpha^2\beta + 3\alpha\beta^2 + \beta^3)}, \quad \frac{5}{8(\alpha^2 + 2\alpha\beta + \beta^2)(\alpha - \beta)}, \quad \frac{9}{5(\alpha^2 - 2\alpha\beta + \beta^2)}.$$

Τρέπομεν τοὺς παρονομαστὰς τούτων εἰς γινόμενα καὶ ἔχομεν, ἀντὶ τῶν δοθέντων κλασμάτων, τὰ ἔξῆς ἰσοδύναμα τῶν ἀντιστοίχων

$$\frac{1}{4(\alpha + \beta)^3}, \quad \frac{5}{8(\alpha + \beta)^2(\alpha - \beta)}, \quad \frac{9}{5(\alpha - \beta)^2}. \quad (2)$$

Τὸ ἐ.κ.π. τούτων εἶνας  $8 \cdot 5(\alpha + \beta)^3(\alpha - \beta)^2$ . Τὰ πηλίκα τούτων δι' ἔκάστου τῶν παρονομαστῶν εἶναι κατὰ σειρὰν  $2 \cdot 5(\alpha - \beta)^2$ ,  $5(\alpha + \beta)(\alpha - \beta)$ ,  $8(\alpha + \beta)^3$ . Πολλαπλασιάζοντες τοὺς ὄρους τῶν ἀνωτέρω κλασμάτων (2) ἐπὶ τὰ πηλίκα αὐτὰ ἀντιστοίχως, εύρισκομεν τὰ ἰσοδύναμα τῶν δοθέντων κλασμάτων

$$\frac{2 \cdot 5(\alpha - \beta)^2}{8 \cdot 5(\alpha + \beta)^3(\alpha - \beta)^2}, \quad \frac{5 \cdot 5(\alpha + \beta)(\alpha - \beta)}{8 \cdot 5(\alpha + \beta)^3(\alpha - \beta)^2}, \quad \frac{9 \cdot 8(\alpha + \beta)^3}{5 \cdot 8(\alpha + \beta)^3(\alpha - \beta)^2}.$$

### "Α σκηνιστικός

153. Νὰ τραποῦν εἰς ὅμώνυμα τὰ κάτωθι κλάσματα μὲ κοινὸν παρονομαστὴν τὸ ἐ.κ.π. τῶν παρονομαστῶν τῶν δοθέντων

$$\alpha') \quad \frac{1}{x^2+1}, \quad \frac{1}{x}, \quad \frac{1}{x-1}, \quad \frac{1}{x+1}. \quad \beta') \quad \frac{\mu}{3x^2\psi^2}, \quad \frac{\nu}{8x\psi^3}, \quad \frac{\rho}{9x^4\psi^3}, \quad \frac{6}{24x^2\psi^2}.$$

$$\gamma') \quad \frac{\alpha^2}{(x^2-4)(x-1)}, \quad \frac{\alpha}{(x+2)(x+1)}, \quad \frac{3}{x^2-4x+3}.$$

$$\delta') \quad \frac{x^2}{\rho(\alpha\mu+\mu^2)}, \quad \frac{x}{\rho^2(\alpha^2-\alpha\mu)}, \quad \frac{1}{\rho^3(\alpha^2-\mu^2)}.$$

2. ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ  $\frac{0}{0}$  ΚΑΙ  $\frac{\alpha}{0}$

**§ 89.** Καθώς είδομεν εἰς τὰ προηγούμενα, ἂν τύχῃ νὰ ἔχωμεν διαιρεσιν τοῦ  $0 : 0$ , τὸ πηγάκιον εἶναι ἀόριστον, δηλαδὴ τὸ πηγάκιον δύναται νὰ εἴναι οὐσδήποτε σχετικὸς ἀριθμός, ἔστω  $\alpha$ , διότι  $\alpha \cdot 0 = 0$ . Διὰ τοῦτο, ὅταν καὶ οἱ δύο ὅροι ρητοῦ κλάσματος λαμβάνουν τὴν τιμὴν  $0$  δι’ ὧρισμένας τιμὰς τῶν γραμμάτων των, ἡ τιμὴ τοῦ κλάσματος διὰ τὰς τιμὰς ταύτας θεωρεῖται ὅτι εἴναι ἀόριστος.

Ἐστω π.χ. τὸ κλάσμα  $\frac{x^2 - \alpha^2}{x - \alpha}$ . Ἐν θέσωμεν εἰς αὐτὸν  $x = \alpha$  εύρισκομεν  $\frac{\alpha^2 - \alpha^2}{\alpha - \alpha} = \frac{0}{0}$ . Διὰ τοῦτο ἡ παράστασις  $\frac{x^2 - \alpha^2}{x - \alpha}$ , ὅταν  $x = \alpha$ , παρουσιάζεται ὡς ἀόριστος διὰ τὴν τιμὴν  $\alpha$  τοῦ  $x$ .

Παρατηροῦμεν ὅμως ὅτι, ἂν εἴναι τὸ  $x \neq \alpha$ , ἔχομεν  $\frac{x^2 - \alpha^2}{x - \alpha} = x + \alpha$ , καὶ ἂν εἰς τοῦτο τεθῇ  $x = \alpha$ , ἔχομεν ἔξαγόμενον  $2\alpha$  καὶ ὅχι  $\frac{0}{0}$ . Ἡ εύρεθείσα αὐτὴ τιμὴ  $2\alpha$  εἴναι καὶ ἡ (ἀληθῆς) τιμὴ τοῦ κλάσματος  $\frac{x^2 - \alpha^2}{x - \alpha}$ , ὅταν  $x = \alpha$ . Διὰ ταῦτα, ὅταν συμβαίνῃ ρητὸν ἐν γένει ἀλγεβρικὸν κλάσμα νὰ γίνεται  $\frac{0}{0}$  διὰ τινα διθέσαν τιμὴν γράμματός του, ἵνα εύρωμεν τὴν ἀληθῆ τιμὴν του, ἀντικαθιστῶμεν τὴν τιμὴν τοῦ γράμματος εἰς τὸ προκῦπτον ἐκ τοῦ διθέντος μετὰ τὴν ἀπλοποίησιν τῶν ὅρων του. Ἐὰν καὶ εἰς τὸ προκῦπτον κλάσμα παρουσιάζεται παρόμοιον φαινόμενον, ἐργαζόμεθα καὶ ἐπ’ αὐτοῦ ὄμοίως.

Ἀν θέλωμεν τὴν τιμὴν π.χ. διὰ τὸ  $\frac{\alpha^3 - 3\alpha^2 + 3\alpha - 1}{\alpha^3 - 4\alpha^2 + 5\alpha - 2}$ , ὅταν  $\alpha = 1$ , παρατηροῦμεν ὅτι οἱ ὅροι τούτου, ὅταν  $\alpha = 1$ , λαμβάνουν ἕκαστος τὴν τιμὴν  $0$ . Ἀλλὰ καὶ ἐκ τούτου διακρίνομεν ὅτι οἱ ἐν λόγῳ ὅροι διαιροῦνται διὰ τοῦ  $\alpha - 1$  (ἀφοῦ, ὅταν  $\alpha = 1$ , μηδενίζονται).

Διαιροῦμεν λοιπὸν ἕκαστον τῶν ὅρων του μὲν  $\alpha - 1$  καὶ εύρισκομεν τὸ ἴσοδύναμον κλάσμα τοῦ διθέντος  $\frac{\alpha^2 - 2\alpha + 1}{\alpha^2 - 3\alpha + 2}$ . Παρατηροῦμεν ὅτι καὶ τούτου οἱ ὅροι ἔχουν τὴν τιμὴν  $0$  ἕκαστος, ὅταν  $\alpha = 1$ . Καὶ τούτου οἱ ὅροι διαιροῦνται διὰ τοῦ  $\alpha - 1$ , καὶ ἐκτελοῦντες τὰς

διαιρέσεις εἰς ἕκαστον τῶν ὅρων, εύρισκομεν τὸ ἴσοδύναμον κλάσμα  $\frac{\alpha-1}{\alpha-2}$ .

Θέτομεν εἰς τοῦτο  $\alpha = 1$  καὶ εύρισκομεν  $\frac{0}{1-2} = 0$ . Αὐτὴν εἶναι ἡ ἀληθής τιμὴ τοῦ διθέντος κλάσματος, ὅταν  $\alpha=1$ .

"Οταν ἔργαζόμεθα ώς εἰς τὰ προηγούμενα παραδείγματα καὶ εύρισκομεν, ἀντὶ τοῦ διθέντος κλάσματος, ἴσοδύναμόν του, διὰ τὸ δποῖον δὲν ὑπάρχει διὰ τὰς θεωρουμένας τιμὰς τῶν γραμμάτων, ἀόριστος τιμὴ τούτου, τότε λέγομεν ὅτι αἱρομεν τὴν ἀοριστίαν τοῦ διθέντος κλάσματος.

"Αν διθὲν ἀλγεβρικὸν κλάσμα δὲν εἶναι ρητόν, τότε δὲν ἔχομεν ώρισμένον ἀπλοῦν κανόνα διὰ νὰ ἄρωμεν τὴν ἀοριστίαν του. 'Αλλὰ συνήθως ἐπιδιώκομεν ( ἂν εἶναι δυνατὸν ) νὰ εὕρωμεν ἴσοδύναμον κλάσμα τοῦ διθέντος μὲ ρητὸν παρονομαστὴν καὶ νὰ ἐπιτύχωμεν δόμοίως τὴν ἀποβολὴν τῆς ἀοριστίας. Π.χ.  $\frac{\alpha-5}{\sqrt{\alpha-1}-2}$ , ὅπου

$\alpha = 5$ , λαμβάνει τιμὴν ἀόριστον. Πολλαπλασιάζομεν λοιπὸν τοὺς ὅρους τοῦ κλάσματος ἐπὶ  $\sqrt{\alpha-1} + 2$ , ὅτε λαμβάνομεν τὴν ἴσοδύναμον παράστασιν τοῦ διθέντος

$$\frac{(\alpha-5)(\sqrt{\alpha-1}+2)}{\alpha-5} = \sqrt{\alpha-1} + 2$$
. Αὗτη, ὅταν  $\alpha = 5$ , λαμβάνει τὴν τιμὴν 4, ἡ δόποία εἶναι καὶ ( ἀληθής ) τιμὴ καὶ τοῦ διθέντος κλάσματος, ὅταν  $\alpha = 5$ .

**§ 90.** Ἡ παράστασις  $\sqrt{\alpha-1}+2$  λέγεται **συζυγής** τῆς  $\sqrt{\alpha-1}-2$ .

'Ἐν γένει δύο διώνυμα λέγονται **συζυγῆ**, ὅταν οἱ πρῶτοι ὅροι αὐτῶν εἶναι ἵσοι οἱ δὲ δεύτεροι ἀντίθετοι· δηλαδὴ ὅταν εἶναι τῆς μορφῆς  $A+B$  καὶ  $A-B$ .

Π.χ. αἱ  $-\beta+\sqrt{\beta^2-4\alpha y}$  καὶ  $-\beta-\sqrt{\beta^2-4\alpha y}$  εἶναι συζυγῆ διώνυμα ἡ συζυγεῖς παραστάσεις.

**§ 91.** "Εστω ὅτι ζητεῖται ἡ τιμὴ τοῦ κλάσματος  $\frac{9x^3}{x-2}$ , ὅταν  $x = 2$ . "Αν ἀντικαταστήσωμεν εἰς αὐτό, τὸ  $x$  μὲ τὸ 2, εύρισκομεν

$$\frac{9 \cdot 2^3}{2-2} = \frac{9 \cdot 8}{0} = \frac{72}{0}$$

Έκ τούτου παρατηροῦμεν ότι ένιστε ή τιμή ἀλγεβρικοῦ ρητοῦ κλάσματος διά τινα δοθεῖσαν τιμὴν γράμματός τινος λαμβάνει μορφὴν κλάσματος μέν, ἀλλ' ἔχοντος παρονομαστὴν τὸ 0 καὶ ἀριθμητὴν ώρισμένον τινὰ ἀριθμὸν  $\neq 0$ .

Ἐν γένει εστω ότι ή τιμὴ κλάσματός τινος είναι ή  $\frac{\alpha}{0}$ , ὅπου α παριστάνει ἀριθμόν τινα ώρισμένον ( $\neq 0$ ). Εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν λέγομεν ότι :

Ἡ παράστασις  $\frac{\alpha}{0}$  οὐδεμίαν ἔχει ἔννοιαν η ότι ή τιμὴ τοῦ  $\frac{\alpha}{0}$  εῖναι ἀπολύτως μεγαλυτέρα παντὸς ἀριθμοῦ θετικοῦ ( ὅσον-δήποτε μεγάλου ).

Καὶ ότι μὲν τὸ  $\frac{\alpha}{0}$  δὲν ἔχει καμμίαν ἔννοιαν φαίνεται ἐκ τούτου ότι οὐδεὶς ἀριθμὸς ὑπάρχει, ὅστις πολλαπλασιαζόμενος ἐπὶ 0 δύναται νὰ δώσῃ γινόμενον τὸ α, ἀφοῦ τὸ 0 ἐπὶ οίονδήποτε ἀριθμὸν πολλαπλασιαζόμενον δίδει γινόμενον 0.

Ἐξ ἄλλου ὅμως ἂν ὁ παρονομαστὴς ἐνὸς κλάσματος ἔχοντος ἀριθμητὴν ώρισμένον  $\alpha \neq 0$  ἐλαττοῦται, τότε τὸ κλάσμα αὐξάνεται ἀπολύτως. Οὕτω π.χ. τὸ  $\frac{\alpha}{0,001} = 1000\alpha$ , ἐνῷ τὸ  $\frac{\alpha}{0,0001} = 10000\alpha$ , εἶναι δὲ τὸ δεύτερον τοῦτο μεγαλύτερον τοῦ προηγουμένου του, ἐνῷ ὁ παρονομαστὴς τούτου είναι μικρότερος τοῦ προηγουμένου του.

Οὕτως, ὅσον ὁ παρονομαστὴς ἐλαττώνεται καὶ πλησιάζει νὰ γίνη 0, τόσον ή τιμὴ τοῦ κλάσματος γίνεται ἀπολύτως μεγαλυτέρα καὶ τείνει νὰ ὑπερβῇ πάντα θετικὸν ἀριθμόν. "Αν συμβαίνῃ τοῦτο διὰ τὸ  $\frac{\alpha}{0}$  τότε λέγομεν ότι τὸ  $\frac{\alpha}{0}$  τείνει εἰς τὸ θετικὸν ἄπειρον η εἰς τὸ ἀρνητικὸν ἄπειρον, καθ' ὅσον είναι τὸ α > 0 η τὸ α < 0. Τὸ θετικὸν η ἀρνητικὸν ἄπειρον παριστάνομεν μὲ τὸ σύμβολον  $\pm \infty$  ( θετικὸν η ἀρνητικὸν ἄπειρον ).

Διὰ τοῦτο πάντοτε εἰς πᾶσαν διαίρεσιν ὑποθέτομεν τὸν διαιρέτην διάφορον τοῦ 0.

### "Ἄσκησις

154. Νὰ εύρεθοῦν αἱ τιμαὶ τῶν κάτωθι κλασμάτων διὰ τὰς σημειουμένας τιμὰς τῶν γραμμάτων.

$$\alpha') \frac{x^3 + 2x^4}{x}, \text{ δταν } x=0, \beta') \frac{\psi^4 - \alpha^4}{\psi^2 - \alpha^2}, \text{ δταν } \psi=\alpha, \gamma') \frac{x^2 - \alpha^2}{x^3 - \alpha^3}, \text{ δταν } x=\alpha,$$

$$\delta') \frac{\alpha^4 - \beta^4}{\alpha^2 - \beta^2}, \text{ δταν } \alpha=\beta, \epsilon') \frac{(x^2 + 2\alpha x + \alpha^2)(x-\alpha)}{x^2 - \alpha^2}, \text{ δταν } x=\alpha,$$

$$\sigma') \frac{x^4 - \alpha^4}{x - \alpha}, \text{ δταν } x=\alpha, \zeta') \frac{x^2 - 3x + 5}{x^2 - 2x + 1}, \text{ δταν } x=1, \eta') \frac{\alpha^3 + 1}{\alpha^2 - 1}, \text{ δταν } \alpha=1,$$

$$\theta') \frac{\sqrt[3]{\alpha} \cdot \sqrt{\alpha - \beta} + \sqrt{\alpha^2 - \beta^2}}{\sqrt{\alpha^2 - \beta^2} + \alpha^2 (\alpha - \beta)}, \text{ δταν } \alpha=\beta.$$

### 3. ΠΡΟΣΘΕΣΙΣ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΙΣ ΑΛΓΕΒΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ

**§ 92.** Ό κανών τής προσθέσεως καὶ ἀφαιρέσεως ἀριθμητικῶν ἀλγεβρικῶν κλασμάτων ἴσχύει καὶ διὰ τὴν πρόσθεσιν καὶ ἀφαίρεσιν ρητῶν ἀλγεβρικῶν κλασμάτων.

Ἄν τὰ δοθέντα ρητὰ ἐν γένει κλάσματα εἰναι ἔτερώνυμα, τρέπομεν αὐτὰ εἰς ὁμώνυμα μὲ τὸ ἐ.κ.π. τῶν παρονομαστῶν ( ἀφοῦ τρέψωμεν τούτους εἰς γινόμενα ) καὶ ἀκολούθως ἔκτελοῦμεν τὴν πρόσθεσιν, ὅπως καὶ εἰς τοὺς κλασματικοὺς ἀριθμούς.

\*Ἐστω π.χ. διτὶ ζητοῦμεν τὸ ἄθροισμα  $\frac{2\alpha+3\beta}{2\alpha-3\beta} + \frac{2\alpha-3\beta}{2\alpha+3\beta} + \frac{2(4\alpha^2+9\beta^2)}{4\alpha^2-9\beta^2}$ . Τὸ ἐ.κ.π. τῶν παρονομαστῶν εἰναι τὸ  $4\alpha^2 - 9\beta^2 = (2\alpha + 3\beta)(2\alpha - 3\beta)$ . Τὰ πηλίκα τούτου δι' ἐκάστου τῶν παρονομαστῶν εἰναι κατὰ σειρὰν  $2\alpha + 3\beta$ ,  $2\alpha - 3\beta$  καὶ 1. Πολλαπλασιάζομεν τοὺς ὅρους ἐκάστου κλάσματος ἐπὶ τὰ πηλίκα αὐτὰ ἀντιστοίχως καὶ εύρισκομεν

$$\frac{(2\alpha+3\beta)^2}{4\alpha^2-9\beta^2} + \frac{(2\alpha-3\beta)^2}{4\alpha^2-9\beta^2} + \frac{2(4\alpha^2+9\beta^2)}{4\alpha^2-9\beta^2} = \frac{(2\alpha+3\beta)^2 + (2\alpha-3\beta)^2 + 2(4\alpha^2+9\beta^2)}{4\alpha^2-9\beta^2}.$$

### \*Α σ κή σ εις

155. Νὰ εύρεθοῦν τὰ ἔξαγόμενα τῶν κάτωθι πράξεων καὶ αἱ τιμαὶ αὐτῶν, καθὼς καὶ τῶν διδομένων διὰ τὰς σημειουμένας τιμὰς τῶν γραμμάτων

$$\alpha') \frac{2}{2x+5} + \frac{4}{3x+17} - \frac{2(5x+12)}{(2x+5)(3x+17)}, \quad \text{δταν } x=2,$$

$$\beta') \frac{\alpha\beta}{(\alpha-\beta)(\alpha-\gamma)} - \frac{\alpha\gamma}{(\beta-\gamma)(\beta-\alpha)} + \frac{\beta\gamma}{(\beta-\alpha)(\gamma-\beta)}, \quad \text{δταν } \alpha=1, \beta=-1, \gamma=2,$$

$$\gamma') \frac{1-2x}{3(x^2-2x+1)} + \frac{1+x}{2(x^2+1)} + \frac{1}{6(x+1)}, \quad \text{δταν } x=2,$$

$$\delta') \frac{\alpha^2 + \alpha\gamma}{\alpha^2\gamma - \gamma^3} - \frac{\alpha^2 - \gamma^2}{\alpha^2\gamma + 2\alpha\gamma^2 + \gamma^3} + \frac{28}{\gamma^2 - \alpha^2} - \frac{3}{\alpha + \gamma},$$

$$\epsilon') \frac{x^3\psi - x\psi^3}{x^6 - \psi^3} + \frac{x}{x^3 - \psi^3} - \frac{\psi}{x^3 + \psi^3},$$

$$\sigma') \frac{x^2 - (2\psi - 3\omega)^2}{(3\omega + x)^2 - 4\psi^2} + \frac{4\psi^2 - (3\omega - x)^2}{(x + 2\psi)^2 - 9\omega^2} + \frac{\omega^2 - x^2}{x + \omega},$$

$$\zeta') \frac{x}{x - \psi} - \frac{\psi}{x + \psi} - \frac{x^2}{x^2 + \psi^2} + \frac{\psi^2}{\psi^2 - x^2},$$

$$\eta') \frac{\alpha^3 + \beta^3}{\alpha^4 - \beta^4} - \frac{\alpha + \beta}{\alpha^2 - \beta^2} - \frac{1}{2} \cdot \left( \frac{\alpha^2 - \beta^2}{\alpha^2 + \beta^2} - \frac{1}{\alpha - \beta} \right).$$

156. Έαντον ότι  $\phi(x) = x+2$ ,  $\pi(x) = x^2+2x+4$ ,  $\psi(x) = x-2$  και  $\omega(x) = x^2-2x+4$ , δείξατε ότι είναι  $\frac{\pi(x) \cdot \omega(x)}{\phi(x) \cdot \omega(x) - \pi(x) \cdot \psi(x)} = \frac{x^4 + 4x^2 + 16}{16}$ .

#### 4. ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΙΣ ΑΛΓΕΒΡΙΚΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ

**§ 93.** Ό κανών τοῦ πολλαπλασιασμοῦ ἀλγεβρικῶν κλασμάτων ἴσχυει καὶ διὰ τὰ ρητὰ ἀλγεβρικὰ κλάσματα. Οὕτω π.χ.

$$\text{ἔχομεν } \frac{12x^2\psi}{7\omega^2} \cdot \frac{14\omega^2\phi}{3x\psi^2} = \frac{12x^2\psi \cdot 14\omega^2\phi}{7\omega^2 \cdot 3x\psi^2} = \frac{12 \cdot 14x^2\psi\omega^2\phi}{7 \cdot 3x\psi^2\omega\phi^2} = \frac{8x\omega}{\psi\phi}.$$

Παρατηρέοντας ότι εἰς γινόμενον κλασμάτων δυνάμεθα νὰ ἀπλοποιοῦμεν τὸν ἀριθμητήν ἐνὸς τῶν παραγόντων, μὲ τὸν παρονομαστὴν ἐνὸς ἐξ αὐτῶν πρὸ τῆς ἐκτελέσεως τῆς πράξεως τοῦ πολλαπλασιασμοῦ, ἀν τοῦτο είναι δυνατὸν (τρέποντες πρὸς εὔκολίαν τοὺς ὄρους τῶν κλασμάτων εἰς γινόμενα). Π.χ. είναι

$$\frac{\alpha+x}{\alpha-x} \cdot \frac{\alpha-x}{\alpha^2+x^2} = \frac{\alpha+x}{\alpha^2+x^2}.$$

$$\text{Ἐπίσης } \frac{x(\alpha+x)}{\alpha(\alpha-x)} \cdot \frac{\alpha^2(\alpha-x)^2}{x^2(\alpha+x)^2} = \frac{x(\alpha+x)}{\alpha(\alpha-x)} \cdot \frac{\alpha^2(\alpha-x)(\alpha-x)}{x^2(\alpha+x)(\alpha+x)} = \frac{\alpha(\alpha-x)}{x(\alpha+x)}.$$

Ό κανὼν διαιρέσεως ἀριθμοῦ διὰ κλασματικοῦ ἀριθμοῦ ἴσχύει καὶ διὰ τὴν διαιρέσιν ἀλγεβρικῆς παραστάσεως δι' ἀλγεβρικοῦ ρητοῦ κλάσματος ἐν γένει. Οὕτω π.χ. τὸ

$$\frac{12\alpha^2}{\beta^2} \cdot \frac{3\alpha\beta^2}{10} = \frac{12\alpha^2}{\beta^2} \cdot \frac{10}{3\alpha\beta^2} = \frac{120\alpha^2}{3\alpha\beta^4} = \frac{40\alpha}{\beta^4}.$$

$$\text{Τὸ } \frac{15(\alpha+\beta)}{22(\alpha-\beta)} : \frac{5(\alpha+\beta)^2}{11(\alpha-\beta)} = \frac{15(\alpha+\beta)}{22(\alpha-\beta)} \cdot \frac{11(\alpha-\beta)}{5(\alpha+\beta)^2} = \frac{3}{2(\alpha+\beta)}.$$

Α σκήνη σεις καὶ προβλήματα

Ο μάς πρώτη. 157. Νὰ εύρεθοῦν τὰ ἔξαγόμενα

$$\alpha') \frac{\alpha x + \alpha\psi}{yx - y\psi} \cdot \frac{yx^2 - y\psi^2}{\beta x + \beta\psi} \quad \beta') \frac{3x^2 - 6x\psi + 3\psi^2}{x + \psi} \cdot \frac{x^3 + \psi^3}{6(x - \psi)},$$

$$\gamma') \left(1 + \frac{x^4 - 2x^2\psi^2 + \psi^4}{4x^2\psi^2}\right) (x^4 - 2x^2\psi^2 + \psi^4),$$

$$\delta') \left(\frac{\alpha\gamma + \beta\gamma + \alpha\delta + \beta\delta}{\alpha\gamma - \beta\gamma - \alpha\delta + \beta\delta}\right) \cdot \left(\frac{\alpha\gamma - \beta\gamma + \alpha\delta - \beta\delta}{\alpha\gamma + \beta\gamma - \alpha\delta - \beta\delta}\right), \quad \epsilon') \frac{\alpha^2 + 2\alpha\beta}{\alpha^2 + 4\beta^2} \cdot \frac{\alpha\beta - 2\beta^2}{\alpha^2 - 4\beta^2},$$

$$\sigma') \left(\alpha^4 - \frac{\alpha^2}{x^2}\right) \cdot \frac{\alpha^2x^2 + \alpha\beta x^2}{\alpha x + 1} \cdot \frac{\alpha x}{\alpha^2 - \beta^2},$$

$$\zeta') \left(\alpha + 1 + \frac{1}{\alpha}\right) \cdot \left(\alpha - 1 + \frac{1}{\alpha}\right) \cdot \frac{\alpha^2(\alpha^2 - 1)}{\alpha^6 - 1},$$

$$\eta') \left(2 + \frac{\mu}{\mu - 3}\right) \left(\frac{9 - \mu^2}{4 - \mu^2}\right) \left(\frac{2 - \mu}{\mu^2 + \mu - 6}\right) - \left(\frac{2}{\mu + 2}\right)$$

Ο μάς δευτέρα. 158. Ἐχει τις 5λ δρχ. Ἐκ τούτων ἔξιδεύει πρῶτον τὸ τρίτον, ἔπειτα τὸ ἑβδόμον καὶ τέλος τὰ  $\frac{4}{9}$  τοῦ ἀρχικοῦ ποσοῦ. Πόσα τοῦ ἔμειναν;

159. Ἐχει τις  $\beta - 1$  δραχμάς καὶ ἔξιδεύει τὸ τέταρτον αὐτῶν καὶ  $\frac{3}{7}$  τοῦ ὑπολοίπου. Πόσα τοῦ ἔμειναν;

160. Ἐχει τις α δραχμάς καὶ ἔξιδεύει πρῶτον 90 δραχ. καὶ ἔπειτα τὰ  $\frac{4}{9}$  τοῦ ὑπολοίπου. Πόσαι δρχ. τοῦ μένουν;

161. Ἐχει τις γ δραχμάς καὶ χάνει πρῶτον τὰ δύο ἑβδοματα αὐτῶν, ἔπειτα τὰ δύο πέμπτα τοῦ ὑπολοίπου καὶ 1 δραχμήν. Πόσαι δραχμαι τοῦ ἔμειναν;

162. Ἀπὸ μίαν βρύσην τρέχουν 7 δκ. ὅπατος εἰς 5δ. Ἀπὸ δλλην 9 δκ. εἰς 4δ Πόσαι δκάδες θὰ τρέξουν καὶ ἐκ τῶν δύο, ἐὰν ἡ μὲν πρώτη τρέχῃ, ἐπὶ τδ, ἡ δ ἀλλη ἀνοιχθῇ 2δ βραδύτερον, κλείσουν δὲ συγχρόνως;

Ο μάς τρίτη. 163. Νὰ εύρεθοῦν τὰ ἔξαγόμενα τῶν κάτωθι πράξεων καὶ αἱ τιμαὶ αὐτῶν, καθὼς καὶ τῶν διδομένων διὰ τὰς σημειουμένας τιμὰς τῶν γραμμάτων των

$$\alpha') \frac{12x\psi^2}{7\alpha^2\beta} : \frac{8x^2\psi}{25\alpha\beta^2}, \quad \beta') \frac{12\alpha^2}{5\beta^2\gamma^3} : \frac{3\alpha\beta^2}{10\gamma^2}, \quad \text{ὅταν } x = \psi = 1, \alpha = 2, \beta = \gamma = 3,$$

$$\gamma') \alpha^3 : \left(\alpha^2 : \frac{\alpha}{\beta}\right), \quad \delta') \frac{9\gamma^2}{28\alpha^3\beta^2} : \left(\frac{7\gamma^2}{12\alpha^2\beta} : 4\beta^2\gamma\right), \quad \text{ὅταν } \alpha = \beta = \gamma = -3,$$

$$\epsilon') \frac{\alpha}{\alpha^3 + \beta^3} : \left(\frac{\alpha^2}{\beta^2} - \frac{\alpha}{\beta} + 1\right), \quad \sigma') \left(\frac{\alpha^2 - \beta^2}{x^2 - \psi^2}\right) : \left(\frac{\alpha^4 - \beta^4}{x^4 - 2x^2\psi^2 + \psi^4}\right),$$

$$\zeta') \frac{\alpha^2 + \alpha x + \alpha\psi + x\psi}{\alpha^2 - \alpha x - \alpha\psi + x\psi} : \frac{\alpha^2 - \alpha x + \alpha\psi - x\psi}{\alpha^2 + \alpha x - \alpha\psi - x\psi}, \quad \text{ὅταν } \alpha = 1, x = \psi = 3,$$

$$\begin{aligned} \eta') & \left( \frac{2x}{x^2+1} + \frac{2x}{x^2-1} \right) : \left( \frac{x}{x^2+1} - \frac{x}{x^2-1} \right), \\ \theta') & \left[ \frac{\alpha^3}{\beta^3} - \frac{\beta^3}{\alpha^3} - 3 \left( \frac{\alpha^2}{\beta^2} + \frac{\beta^2}{\alpha^2} \right) + 5 \right] : \left( \frac{\alpha}{\beta} - 1 - \frac{\beta}{\alpha} \right)^2, \\ \iota') & \left[ \frac{x-\alpha}{(x+\alpha)^2} + \frac{x+\alpha}{(x-\alpha)^2} \right] : \left[ \frac{1}{(x+\alpha)^2} - \frac{1}{x^2-\alpha^2} + \frac{1}{(x-\alpha)^2} \right], \\ \iota\alpha') & \left( \frac{\alpha}{\alpha+2\beta} + \frac{\alpha}{\alpha-2\beta} \right) : \frac{2\alpha^2}{\alpha^2-4\beta^2}. \end{aligned}$$

\*Ο μάς τετάρτη. 164. "Εχει τις α δραχμάς. Τό ποσόν τοῦτο αύξανει κατά τὸ πέμπτον οὔτοι. "Εξοδεύει τὰ 0,25 τῶν δσων οὔτως ἔχει καὶ αύξανει δσα τοῦ μένουν κατά τὰ 0,5 αύτῶν. Πόσα ἔχει εἰς τὸ τέλος;

165. \*Έχων τις α δραχμάς, τάς αύξανει κατά τὰ 0,25 αύτῶν. "Εξοδεύει ἔπειτα 5 000 δραχμάς καὶ τὸ ὑπολειφθὲν αύξανει κατά τὰ 0,25 αύτοῦ, ἔξοδεύει δὲ πάλιν 5 000 δραχμάς. Πόσας δραχμάς ἔχει εἰς τὸ τέλος;

166. Χωρικός τις ἔφερεν εἰς τὴν ἀγορὰν  $16\alpha + 30$  αὐγὰ πρὸς πώλησιν. "Ἐν πρώτοις ἐπώλησε τὰ 0,5 τῶν δσων ἔφερε καὶ ἐν αὐγὸν ἐπὶ πλέον ἔπειτα ἐκ τοῦ ὑπολοίπου τὰ 0,5 καὶ ἀκόμη ἐν αὐγόν. "Ομοίως ἐπώλησε καὶ διὰ τρίτην καὶ τετάρτην φοράν. Πόσα αὐγὰ τοῦ ἔμειναν εἰς τὸ τέλος;

## 5. ΣΥΝΘΕΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ

**§ 94.** Δοθὲν κλάσμα λέγεται σύνθετον, ἐὰν τουλάχιστον εἰς τῶν ὅρων του δὲν εἶναι ἀκέραιος ἀριθμὸς ἢ ἀκέραιά ἀλγεβρικὴ παράστασις. Ἀπλοῦν λέγεται ἐν κλάσμα, ὅταν δὲν εἶναι σύνθετον.

Οὕτω τὸ κλάσμα  $\frac{3x}{4x-1}$  εἶναι σύνθετον, διότι ὁ παρονομαστής αύτοῦ εἶναι κλασματικὴ παράστασις.

"Ἐπειδὴ πᾶν κλάσμα εἶναι πηλίκον τῆς διαιρέσεως τοῦ ἀριθμητοῦ διὰ τοῦ παρονομαστοῦ του, ἔπειται ὅτι ἔχομεν

$$\frac{3x}{4x-1} = 3x : \frac{4x-1}{4\psi} = 3x \cdot \frac{4\psi}{4x-1} = \frac{12x\psi}{4x-1}.$$

"Ἐν γένει :

"Ινα κλάσμα σύνθετον καταστήσωμεν ἀπλοῦν, ἀρκεῖ νὰ διαιρέσωμεν τὸν ἀριθμητήν του διὰ τοῦ παρανομαστοῦ του.

Συντομώτερος τρόπος διὰ νὰ καταστήσωμεν σύνθετόν τι κλάσμα ἀπλοῦν εἶναι ὁ ἔξῆς :

Εύρισκομεν τὸ ἐ.κ.π. τῶν παρονομαστῶν τῶν κλασμάτων τοῦ

άριθμητοῦ καὶ τοῦ παρονομαστοῦ τοῦ διθέντος κλάσματος καὶ ἐπ' αὐτὸ πολλαπλασιάζομεν τοὺς δύο δρους τοῦ διθέντος κλάσματος.

\*Ἐστω π.χ. τὸ κλάσμα  $\frac{\frac{\alpha}{x} - \frac{\alpha}{\alpha+x}}{\frac{x}{\alpha-x} + \frac{x}{\alpha+x}}$ . Τὸ ἔκπ. τῶν  $\alpha-x$  καὶ  $\alpha+x$

εἶναι τὸ γινόμενον αὐτῶν  $(\alpha-x)(\alpha+x)$ . Πολλαπλασιάζοντες τοὺς δρους τοῦ διθέντος κλάσματος ἐπὶ τὸ γινόμενον τοῦτο, εὑρίσκομεν

$$\frac{\alpha(\alpha+x)-\alpha(\alpha-x)}{x(\alpha+x)+(\alpha-x)x} = \frac{\alpha^2+\alpha\alpha-\alpha^2+\alpha\alpha}{\alpha x+x^2+\alpha x-x^2} = \frac{2\alpha x}{2\alpha x} = 1.$$

### "Α σ ρ η σ ε ι σ

167. Νὰ τραποῦν εἰς ἀπλᾶ τὰ κάτωθι κλάσματα καὶ νὰ εύρεθοῦν αἱ τιμαὶ τῶν διὰ τὰς σημειουμένας τιμὰς τῶν γραμμάτων.

$$\alpha') \frac{\frac{x}{\mu} + \frac{\psi}{\mu}}{\frac{\omega}{\mu}}, \quad \beta') \frac{\frac{2\mu+\nu}{\mu+\nu} + 1}{1 + \frac{\nu}{\mu+\nu}}, \quad \gamma') \frac{\frac{\alpha+\beta}{\alpha-\beta} - 1}{\frac{\alpha-\beta}{\alpha+\beta} + 1}, \quad \delta') \frac{\frac{x+1}{x-1}}{x - \frac{1}{x}},$$

ὅταν  $x = \psi = \omega = \mu = 4, \nu = 2, \alpha = 3, \beta = 1$ .

$$\epsilon') \frac{\frac{x+\psi}{x+\psi+1}}{\frac{x+\psi+1}{x+\psi-\psi}}, \quad \sigma') \frac{\left(x-\psi-\frac{4\psi^2}{x-\psi}\right) \left(x+\psi-\frac{4x^2}{x+\psi}\right)}{3(x+\psi)-\frac{8x\psi}{x+\psi}},$$

ὅταν  $x=2, \psi=1$ .

168. Νὰ ἀπλοποιηθοῦν τὰ κόλασματα

$$\alpha) \frac{\frac{\alpha-\beta}{\beta-\gamma} - \frac{\beta-\gamma}{\alpha-\beta}}{\frac{\alpha-\beta-1}{\alpha-\beta} - \frac{\beta-\gamma-1}{\beta-\gamma}}, \quad \beta') \frac{\frac{1-(x\psi-\psi\omega)^2}{(x\psi-1)^2-\psi^2\omega^2}}{\frac{(\psi\omega-1)^2-x^2\psi^2}{(x\psi-\omega\psi)^2-1}}, \quad \gamma') \frac{\frac{x+1}{x} - \frac{\psi-1}{\psi} + \frac{\omega+1}{\omega}}{1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{\psi} + \frac{1}{\omega}},$$

169. Ἐάν τεθῇ

$$\phi(x) = \frac{x-1}{x+1} \text{ καὶ } \phi(\psi) = \frac{\psi-1}{\psi+1}, \text{ εὗρετε τὸ } \frac{\phi(x)-\phi(\psi)}{1+\phi(x)\cdot\phi(\psi)}$$

Περίληψις περιεχομένων Κεφαλαίου II.

Ορισμὸς ἀλγεβρικῆς παραστάσεως (ἀκεραία, κλασματική, ρητή, ἀρρητος παράστασις).

Σύμβολα :  $\sqrt{-}$  ριζικόν, = ταυτότητος ή ίσοδυναμίας ἀλγεβρικῶν παραστάσεων.

Ίσοδύναμοι παραστάσεις. Όρισμός ταυτότητος παραστάσεων  
 $\alpha + \beta = \beta + \alpha,$   
 $\alpha^2 + 2\alpha\beta + \beta^2 = (\alpha + \beta)^2$

(αἱ ταυτότητες ἀληθεύουν δι' οἰασδήποτε τιμᾶς τῶν γραμμάτων τῶν).  
 Ἀριθμητικὴ τιμὴ ἀλγεβρικῆς παραστάσεως.

Όρισμός μονωνύμου, διωνύμου, πολυωνύμου ( ἀκέραιον, κλασματικόν, ρητόν, ἄρρητον μονώνυμον ἢ πολυώνυμον ).

Ἀριθμητικὸς συντελεστὴς μονωνύμου, συντελεστὴς μονωνύμου ὡς πρὸς γράμμα του ἢ ὡς πρὸς γινόμενον παραγόντων του.

Όμοια μονώνυμα ( ἀντίθετα μονώνυμα ). Ἀναγωγὴ ὁμοίων μονωνύμων. Αἱ 4 πράξεις μὲ μονώνυμα.

Βαθμὸς ἀκέραιου πολυωνύμου πρὸς ἐν ἢ περισσότερα γράμματά του. Όμοιεν ἀκέραιον πολυώνυμον ὡς πρὸς γράμματά του.

Όμοιεν γραμμικόν. Διατεταγμένον ἀκέραιον πολυώνυμον κατὰ τὰς ἀνιούσας ἢ κατιούσας δυνάμεις γραμμάτων του. Ἀνηγμένον ( ἀκέραιον ) πολυώνυμον.

Αἱ 4 πράξεις μὲ ( ἀκέραια ) πολυώνυμα καὶ μονώνυμα ἢ μὲ πολυώνυμα.

Αἱ πράξεις στηρίζονται ἐπὶ τῶν πράξεων καὶ ἰδιοτήτων τῶν ἀλγεβρικῶν ἀθροισμάτων.

Διαίρεσις ( ἀκέραιον ) πολυωνύμου δι' ἄλλου διατεταγμένου ὁμοίως. Εύρισκομεν τὸν α' ὄρον τοῦ πηλίκου ἐκ τῆς διαιρέσεως τοῦ α' ὄρου τοῦ διαιρετέου διὰ τοῦ α' ὄρου τοῦ διαιρέτου. Εὕρεσις τῶν λοιπῶν ὄρων τοῦ πηλίκου μετὰ τὸν α' ὄρον.

Σχέσις διαιρετέου, διαιρέτου, πηλίκου καὶ ὑπολοίπου. Σχέσις ὑπολοίπου καὶ διαιρέτου ὡς πρὸς τὸν βαθμόν των.

### Ἄξιοσημείωτοι ταυτότητες.

- 1)  $(\alpha \pm \beta)^2 = \alpha^2 \pm 2\alpha\beta + \beta^2$
- 2)  $(\alpha \pm \beta)^3 = \alpha^3 \pm 3\alpha^2\beta + 3\alpha\beta^2 \pm \beta^3$
- 3)  $(x + \alpha)(x + \beta) = x^2 + (\alpha + \beta)x + \alpha\beta$
- 4)  $(x + \alpha)(x + \beta)(x + \gamma) = x^3 + (\alpha + \beta + \gamma)x^2 + (\alpha\beta + \alpha\gamma + \beta\gamma)x + \alpha\beta\gamma$
- 5)  $(x^2 + \psi^2)(\alpha^2 + \beta^2) - (\alpha x + \beta\psi)^2 = (\alpha\psi - \beta x)^2$
- 6)  $(x^2 + \psi^2 + \omega^2)(\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2) - (\alpha x + \beta\psi + \gamma\omega)^2 =$   
 $= (\alpha\psi - \beta x)^2 + (\beta\omega - \gamma\psi)^2 + (\gamma x - \alpha\omega)^2.$

Αἱ δύο τελευταῖαι λέγονται ταυτότητες τοῦ Lagrange.

· Υπόλοιπον υ διαιρέσεως πολυωνύμου  $\Pi(x):(x \pm \alpha)$  είναι  
 $u = \Pi(\mp\alpha)$

· Υπόλοιπον υ διαιρέσεως πολυωνύμου  $\Pi(x) : (\alpha x \pm \beta)$  είναι

$$u = \Pi(\mp \frac{\beta}{\alpha})$$

Πηλίκον (π) διαιρέσεως

$$(x^{\mu} - \alpha^{\mu}) : (x - \alpha) = x^{\mu-1} + \alpha x^{\mu-2} + \alpha^2 x^{\mu-3} + \dots + \alpha^{\mu-1}$$

Πηλίκον (π) διαιρέσεως

$$(x^{2v+1} + \alpha^{2v+1}) : (x \pm \alpha) = x^{2v} \mp \alpha x^{2v-1} + \dots + \alpha^{2v}$$

Τροπή ἀκεραίας ἀλγεβρικῆς παραστάσεως εἰς γινόμενον παραγόντων ( διάκρισις ἐννέα περιπτώσεων ).

· Ορισμὸς ρητοῦ ἀλγεβρικοῦ κλάσματος ( μὲν ὄρους ἀλγεβρικὰς παραστάσεις ).

Παραστάσεις τῶν ὅποιών ἡ τιμὴ παρουσιάζεται ως ἀόριστος  $\frac{0}{0}$ . Ἀρσις τῆς ἀοριστίας. Συζυγεῖς παραστάσεις  $A + B$  καὶ  $A - B$ ,

$\sqrt{A} + \sqrt{B}$  καὶ  $\sqrt{A} - \sqrt{B}$ .

· Ορισμὸς συνθέτου κλάσματος, ἀπλοποίησις αὐτοῦ.

### ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΙΙ

#### Α'. ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΜΕ ΕΝΑ ΑΓΝΩΣΤΟΝ

##### 1. ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ

**§ 95.** "Εστω ότι έχομεν τὴν ἰσότητα  $3x=15$ . Παρατηροῦμεν ότι, όταν τὸ  $x$  γίνη 5, ή ἰσότης ἐπαληθεύεται. Πράγματι, όταν  $x=5$ , εἶναι  $3 \cdot 5=15$ , ητοι  $15=15$ . Διὰ πᾶσαν ἄλλην τιμὴν τοῦ  $x$  ή ἐν λόγῳ ἰσότης δὲν δίδει ἀριθμὸν ἵσους, ητοι δὲν ἀληθεύει. Όμοιώς παρατηροῦμεν ότι ή  $3x=12$  ἀληθεύει διὰ μόνην τὴν τιμὴν  $x=4$ . Εὰν ξέν ἄλλου εἰς τὴν ἰσότητα  $\alpha+\beta=\beta+\alpha$  ἀντικαταστήσωμεν τὸ  $\alpha$  καὶ  $\beta$  δι' οἰωνδήποτε ἀριθμῶν π.χ. μὲ  $\alpha=1$  καὶ  $\beta=3$  ή μὲ  $\alpha=5$  καὶ  $\beta=-7$ , παρατηροῦμεν ότι προκύπτουν ἀριθμοὶ ἵσοι ἀντιστοίχως, ητοι  $4=4$  εἰς τὴν πρώτην περίπτωσιν καὶ  $-2=-2$  εἰς τὴν δευτέραν περίπτωσιν. Έκ τούτου συνάγομεν ότι ὑπάρχουν ἰσότητες ἀλγεβρικῶν παραστάσεων, αἱ ὅποιαι ἐπαληθεύονται μόνον, όταν τὸ γράμμα ή ὡρισμένα γράμματά των λάβουν ἀρμοδίας τιμάς καὶ ἄλλαι, αἱ ὅποιαι ἀληθεύουν διὰ πάσας τὰς τιμάς τῶν γραμμάτων των. Τὰς πρώτας καλοῦμεν **ἔξισώσεις** τὰς δὲ ἄλλας **ταυτότητας**. "Ωστε:

"**Έξισωσις** λέγεται ή ἰσότης ή ὅποια ἀληθεύει μόνον όταν ἐν γράμμα ή ὡρισμένα γράμματα αὐτῆς λάβουν ἀρμοδίας τιμάς.

Καλοῦμεν **ἀγνώστους** ἔξισώσεως τὰ γράμματά της, τὰ ὅποια πρέπει νὰ λάβουν ὡρισμένας τιμάς, διὰ νὰ ἀληθεύῃ αὗτη.

**§ 96.** Τιμαὶ τῶν ἀγνώστων λέγονται οἱ ἀριθμοὶ (ἢ αἱ ποσότητες), οἱ ὅποιοι ἀντικαθιστῶντες τοὺς ἀγνώστους ἐπαληθεύουν τὴν ἔξισωσιν· λέγονται δὲ αὗται καὶ **ρίζαι** αὐτῆς. Συνήθως παριστάνομεν τοὺς ἀγνώστους ἔξισώσεως μὲ τελευταῖα γράμματα τοῦ ἀλφαριθμοῦ  $x, y, w$  κ.τ.δλ.

\* Ή χρῆσις ἔξισώσεως πρώτου βαθμοῦ μὲ ἐνα ἀγνώστον ἐμφανίζεται τὸ πρῶτον εἰς τὸ βιβλίον τοῦ Αιγυπτίου Ahmes, ἀλλὰ μόνον μὲ παραδείγματα. Ή ἐπιστημονική διαμόρφωσις τοῦ ζητήματος ὀφείλεται εἰς τὸν "Ελληνα Διόφαντον καὶ τὸν "Ηρωνα (ιον αἰῶνα π.χ.).

Λύσις δὲ ἔξισώσεως λέγεται ἡ εὕρεσις τῶν ριζῶν τῆς.

**§ 97.** Δύο ἔξισώσεις λέγονται **ἰσοδύναμοι**, ἐὰν ἔχουν τὰς αὐτάς ρίζας, ἤτοι : ἐὰν πᾶσα ρίζα τῆς α' ἔξισώσεως εἶναι ρίζα καὶ τῆς β' καὶ πᾶσα τῆς β' εἶναι καὶ τῆς α'.

Αἱ ἑκατέρωθεν τοῦ σημείου τῆς ισότητος παραστάσεις λέγονται μέλη αὐτῆς (πρῶτον καὶ δεύτερον). Ἐκαστον μέλος ἔξισώσεως εἶναι ἐν γένει ἀθροισμα προσθετέων, ἐκαστος τῶν δποίων λέγεται **ὅρος** τῆς ἔξισώσεως.

**§ 98.** Ἐξίσωσίς τις λέγεται ἀριθμητικὴ μέν, ἐὰν οὐδεὶς τῶν ὅρων της περιέχῃ γράμματα ἐκτὸς τῶν ἀγνώστων, ἔγγράμματος δὲ ἐὰν δὲν συμβαίνῃ τοῦτο. Οὔτως ἡ  $8x + 12x = 3 - 4x$  εἶναι ἀριθμητική, ἐνῷ ἡ  $3x - 5a = 8\beta + 2$  εἶναι ἔγγράμματος.

**§ 99.** Μία ἔξισωσις λέγεται **ἀκεραία**, ἀν οἱ ὅροι της εἶναι παραστάσεις ἀκέραιαι ὡς πρὸς τοὺς ἀγνώστους τῆς, καθὼς π.χ. ἡ  $\alpha \sqrt{\alpha - \beta} x^2 - 2\beta x = \gamma$ .

**Κλασματικὴ** λέγεται μία ἔξισωσις, ἀν τουλάχιστον εἴς τῶν ὅρων της εἶναι κλασματικὴ παράστασις ὡς πρὸς τοὺς ἀγνώστους τῆς, π.χ. ἡ  $\frac{3}{x+1} - \frac{7}{x^2-1} + 4 = 0$

**Ρητὴ** μὲν λέγεται μία ἔξισωσις, ἀν οὐδεὶς τῶν ὅρων της ἔχῃ ρίζαν ἐπὶ τῶν ἀγνώστων τῆς. **Άρρητος** δέ, ἀν δὲν εἶναι ρητή, π.χ. ἡ  $\sqrt{x^2 + 2} = 6$  εἶναι ἄρρητος.

**§ 100.** Θ' ἀποδεῖξωμεν τὴν ἔντης ἴδιότητα τῶν ἔξισώσεων :

'Εὰν εἰς τὰ δύο μέλη ἔξισώσεως προσθέσωμεν (ἢ ἀφαιρέσωμεν) τὴν αὐτὴν ποσότητα, προκύπτει ἔξισωσις **ἰσοδύναμος**.

Πράγματι ἔστω π.χ. ἡ ἔξισωσις  $8x = 32$ . (1)

'Εὰν εἰς τὰ μέλη αὐτῆς προσθέσωμεν π.χ. τὸν 6, προκύπτει ἡ  $8x + 6 = 32 + 6$  (2), ἡ δποία εἶναι **ἰσοδύναμος** μὲ τὴν (1).

Διότι ἡ (1) ἔχει τὴν ρίζαν 4, ἐπειδὴ εἶναι  $8 \cdot 4 = 32$  (1'). 'Αλλ' ἀν εἰς τοὺς ἵσους τούτους ἀριθμούς προσθέσωμεν τὸν 6, προκύπτουν ἀριθμοὶ **ἴσοι**  $8 \cdot 4 + 6 = 32 + 6$  (2'). Θέτομεν εἰς τὴν (2)  $x = 4$  καὶ εύρισκομεν ἐκ μὲν τοῦ α' μέλους  $8 \cdot 4 + 6$ , ἐκ δὲ τοῦ β'  $32 + 6$ .

Αλλὰ τὰ ἔξαγόμενα αὐτὰ εἶναι ίσα, ώς εἴδομεν (2'). "Αρα ἡ ρίζα 4 τῆς (1) εἶναι καὶ τῆς (2). Καὶ ἀντιστρόφως. Ἡ (2) ἔχει τὴν ρίζαν 4, διότι ὅταν τεθῇ  $x=4$  εἰς αὐτήν, εύρισκομεν  $8 \cdot 4 + 6 = 32 + 6$  (2'). "Αν δὲ ἀπὸ τούς ίσους αὐτοὺς ἀριθμούς ἀφαιρέσωμεν τὸν 6, ἔχομεν  $8 \cdot 4 - 6 = 32$  (1'). Θέτομεν εἰς τὴν (1) τὴν ρίζαν τῆς (2)  $x=4$  καὶ εύρισκομεν ἐκ μὲν τοῦ α' μέλους της  $8 \cdot 4$ , ἐκ δὲ τοῦ β' 32. 'Αλλ' αὔτοι οἱ ἀριθμοὶ εἶναι ίσοι (1'). "Ητοι ἡ ρίζα τῆς ἔξισώσεως (2) εἶναι ρίζα καὶ τῆς (1). 'Ομοίως ἀποδεικνύεται ἡ ίδιοτης καὶ διὰ πᾶσαν ἔξισωσιν, ώς καὶ ὅταν προστίθεται παράστασις περιέχουσα τὸν ἄγνωστον.

### § 101. Μεταφορὰ ὅρου ἀπὸ τὸ ἔν μέλος τῆς ἔξισώσεως εἰς τὸ ἄλλο.

"Εστω ἡ ἔξισωσις  $x-\beta=\alpha$ .

'Εάν εἰς τὰ μέλη αὐτῆς προσθέσωμεν τὸν β, λαμβάνομεν τὴν ίσοδύναμον ἔξισωσιν τῆς δοθεῖστης  $x-\beta+\beta=\alpha+\beta$  ἢ  $x=\alpha+\beta$ . Τὸ αὐτὸν ἔξαγόμενον προκύπτει καὶ ἐάν εἰς τὴν δοθεῖσαν ἔξισωσιν μεταφέρωμεν τὸ  $-\beta$  ἐκ τοῦ α' μέλους εἰς τὸ β' μὲ τὸ ἀντίθετόν του πρόσημον. 'Ομοίως ἐκ τῆς ἔξισώσεως  $x+\beta=\alpha$  λαμβάνομεν  $x=\alpha-\beta$ , ἀν μεταφέρωμεν τὸ β εἰς τὸ β' μέλος μὲ ἀντίθετον αὐτοῦ πρόσημον. "Αρα :

α') Εἰς πᾶσαν ἔξισωσιν δυνάμεθα νὰ μεταφέρωμεν ὅρον τινὰ ἐκ τοῦ ἑνὸς μέλους εἰς ἄλλο μὲ ἡλλαγμένον τὸ πρόσημον του.

'Εκ τούτου ἔπειται ὅτι :

"Αν ὅρος τις ὑπάρχῃ εἰς τὰ δύο μέλη ἔξισώσεως μὲ τὸ αὐτὸν πρόσημον, δυνάμεθα νὰ τὸν παραλείψωμεν, ὅτε ἡ προκύπτουσα ἔξισωσις εἶναι ίσοδύναμος πρὸς τὴν δοθεῖσαν.

"Εστω ἡ ἔξισωσις  $y-x=\alpha-\beta$ . (3)

'Εάν μεταφέρωμεν καθένα ὅρον αὐτῆς εἰς τὸ ἄλλο μέλος της μὲ ἀντίθετον πρόσημον, εύρισκομεν :  $\beta-\alpha=x-y$  ἢ  $x-y=\beta-\alpha$  (4)

'Η (4) προκύπτει ἐκ τῆς (3) καὶ ἐάν ἀλλάξωμεν τὸ πρόσημον καθενὸς τῶν ὅρων αὐτῆς. "Ωστε :

β') 'Εάν ἀλλάξωμεν τὰ σήματα πάντων τῶν ὅρων ἔξισώσεως, προκύπτει ἔξισωσις ίσοδύναμος.

Προφανῶς ἔχομεν ὅτι ἡ ἔξισωσις  $A=B$ , ὅπου τὰ A, B παριστά-

νουν τὰ δύο μέλη αὐτῆς, εἶναι ἵσοδύναμος μὲ τὴν  $A - B = B - B$  ή μὲ τὴν  $A - B = 0$ .

\*Ἐκ τῶν προηγουμένων ἔπειται ὅτι :

γ') Δοθείσης ἔξισώσεως δυνάμεθα νὰ εὔρωμεν ἵσοδύναμόν της τῆς μορφῆς  $A=0$ , ἢν μεταφέρωμεν καταλλήλως δόλους τοὺς δόρους τῆς δοθείσης εἰς τὸ α' μέλος της καὶ παραστήσωμεν αὐτὸ μὲ  $A$ .

**§ 102.** Θὰ ἀποδείξωμεν τώρα τὴν ἔχης ἴδιότητα τῶν ἔξισώσεων :

\*Ἐὰν τὰ δύο μέλη ἔξισώσεως πολλαπλασιάσωμεν ἢ διαιρέσωμεν ἐπὶ τὴν αὐτὴν (γνωστὴν) ποσότητα ( $\neq 0$ ) προκύπτει ἔξισωσις ἵσοδύναμος.

\*Ἔστω π.χ. ἡ ἔξισωσις  $7x=35$  (1). Λέγομεν ὅτι ἡ  $\frac{7x}{3}=\frac{35}{3}$  (2) εἶναι ἵσοδύναμος μὲ τὴν (1). Διότι ἡ ρίζα τῆς (1) εἶναι ἡ  $x=5$ , ἐπειδὴ διὰ  $x=5$  ἔχομεν  $7 \cdot 5=35$ . Θέτομεν  $x=5$  εἰς τὴν (2) καὶ εύρισκομεν ἀπὸ μὲν τὸ α' μέλος της  $\frac{7.5}{3}$ , ἀπὸ δὲ τὸ β' τὸ  $\frac{35}{3}$ . Οἱ ἀριθμοὶ αὐτοὶ εἶναι ἴσοι, διότι προκύπτουν ἀπὸ τοὺς ἴσους  $7 \cdot 5$  καὶ  $35$ , ἀφοῦ διαιρεθοῦν διὰ τοῦ  $3$ . Ἐπομένως ἡ ρίζα  $x=5$  τῆς (1) εἶναι ρίζα καὶ τῆς (2). Ἀντιστρόφως παρατηροῦμεν ὅτι ἡ (2) ἔχει τὴν ρίζαν  $5$ , διότι ἂν τεθῇ εἰς αὐτὴν  $x=5$ , εύρισκομεν  $\frac{7.5}{3}=\frac{35}{3}$ . Ἀλλὰ οἱ  $7 \cdot 5$  καὶ  $35$  εἶναι ἴσοι διότι προκύπτουν ἀπὸ τοὺς ἴσους  $\frac{7.5}{3}$  καὶ  $\frac{35}{3}$ , ἂν πολλαπλασιασθοῦν ἐπὶ  $3$ . Οὕτω καὶ ἡ (1) ἔχει τὴν ρίζαν  $x=5$ .

\*Ἐν γένει, ἔστω ἡ ἔξισωσις τῆς μορφῆς  $A=B$  ἢ ἡ ἵσοδύναμος αὐτῆς  $A-B=0$ . Ἀν πολλαπλασιάσωμεν τὰ μέλη της ἐπὶ  $\lambda$  ( $\neq 0$ ), λαμβάνομεν τὴν  $\lambda(A-B)=0$ , ἡ ὅποια εἶναι ἵσοδύναμος τῆς δοθείσης. Διότι πᾶσα ρίζα τῆς  $A-B=0$  ἐπαληθεύει αὐτήν, ἀλλ' ἐπαληθεύει καὶ τὴν  $\lambda(A-B)=0$ , διότι  $\lambda \neq 0$  καὶ  $A-B=0$ . Ἀλλὰ καὶ πᾶσα ρίζα τῆς  $\lambda(A-B)=0$ , εἶναι καὶ τῆς  $A-B=0$ , ἀφοῦ  $\lambda \neq 0$ , ἥτοι ἡ ρίζα αὐτὴ εἶναι καὶ ρίζα τῆς  $A=B$ .

Παρατηρητέον ὅτι, ἐπειδὴ ὅταν πολλαπλασιάσωμεν τὰ μέλη ἔξισώσεως ἐπὶ  $0$ , προκύπτει  $0=0$ , ἡ δὲ διαιρεσίς διὰ τοῦ  $0$

είναι αδύνατος, έπειτα ότι ή άνωτέρω ίδιότης δὲν ισχύει, όταν δύναμις, μὲ τὸν δόποῖον πολλαπλασιάζομεν ἢ διαιροῦμεν τὰ μέλη ἔξισώσεως, εἶναι ἢ γίνεται 0. Διὰ τοῦτο, ἂν δύναμις πολλαπλασιάστης ἢ διαιρέτης εἶναι παράστασις περιέχουσα γράμματα διάφορα τῶν ἀγνώστων τῆς δοθείσης ἔξισώσεως, ή προκύπτουσα ἔξισώσις εἶναι ίσοδύναμος μὲ τὴν δοθείσαν μόνον διὰ τὰς τιμὰς αὐτῶν τῶν γραμμάτων, αἱ δόποιαι δὲν μηδενίζουν τὴν παράστασιν, π.χ. ἂν δύναμις πολλαπλασιάστης ἢ διαιρέτης εἶναι  $\alpha - \beta$ , πρέπει νὰ εἶναι  $\alpha - \beta = 0$  (σημειώνομεν αὐτὸ καὶ οὕτως  $\alpha \neq \beta$ ). Διότι, ἂν εἶναι  $\alpha - \beta = 0$ , ἐπανερχόμεθα εἰς τὴν προηγουμένην ἔξετασθείσαν περίπτωσιν.

"Ἄν δύναμις πολλαπλασιάστης ἢ διαιρέτης εἶναι παράστασις ἔχουσα ἕνα ή περισσοτέρους ἀγνώστους τῆς δοθείσης ἔξισώσεως, ή προκύπτουσα ἔξισώσις δὲν εἶναι πάντοτε ίσοδύναμος μὲ τὴν δοθείσαν. Π.χ. ή ἔξισώσις  $3x=4$  καὶ ή προκύπτουσα ἐκ ταύτης μὲ πολλαπλασιάσμὸν τῶν μελῶν της ἐπὶ  $(x-2)$ , ἦτοι ή  $3x(x-2) = 4(x-2)$  δὲν εἶναι ίσοδύναμοι. Διότι ή  $\beta'$  ἔχει καὶ τὴν ρίζαν 2 (καθὼς φαίνεται, ἂν θέσωμεν ἀντὶ τοῦ  $x$  τὸ 2 εἰς αὐτήν), ἐνῷ ή  $\alpha'$  δὲν τὴν ἔχει.

'Εξ ἄλλου, ἂν ἔχωμεν π.χ. τὴν ἔξισώσιν  $(x+5)(x-4)=0$  καὶ διαιρέσωμεν τὰ μέλη της διὰ  $x+5$ , εύρισκομεν τὴν  $x-4=0$ , ή δόποια δὲν ἔχει τὴν ρίζαν  $x=-5$  τῆς δοθείσης.

## 2. ΑΠΑΛΟΙΦΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΟΜΑΣΤΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΣ

**§ 103.** Καλοῦμεν ἀπαλοιφὴν τῶν παρονομαστῶν ἔξισώσεως τὴν εὑρεσιν ίσοδυνάμου πρὸς αὐτὴν ἔξισώσεως ἀνευ παρονομαστῶν.

"Ἐστω ή ἔξισώσις  $\frac{x}{3} - \frac{x-1}{11} = x-9$ .

'Ἐὰν τὰ δύο ἵσα πολλαπλασιάσωμεν ἐπὶ τὸ ἐ.κ.π. τῶν παρονομαστῶν 3 καὶ 11, δηλαδὴ ἐπὶ 33 καὶ ἀπλοποιήσωμεν, λαμβάνομεν τὴν  $11x-3x+3=33x-297$ . 'Η ἔξισώσις αὗτη εἶναι ἀπηλλαγμένη παρονομαστῶν καὶ ίσοδύναμος μὲ τὴν δοθείσαν. 'Ενγένει:

'Ἐὰν δοθεῖσα ἔξισώσις εἶναι κλασματικὴ (ρητή), δυνάμεθα νὰ εύρωμεν ίσοδύναμόν της ἀκεραίαν, ἐὰν πολλαπλασιάσω-

μεν τὰ μέλη αὐτῆς ἐπὶ τὸ ἐ.κ.π. τῶν παρονομαστῶν της καὶ ἀπλοποιήσωμεν τοὺς ὅρους τῶν κλασμάτων.

Πράγματι, ὃν ὑποθέσωμεν ὅτι τὸ β' μέλος μιᾶς τοιαύτης ἔξισώσεως εἶναι τὸ μηδέν, δυνάμεθα νὰ θέσωμεν τὸ α' μέλος αὐτῆς ὑπὸ τὴν μορφὴν  $\frac{A}{B}$ , ἀντὶ δὲ τῆς δοθείσης ἔξισώσεως νὰ ἔχωμεν τὴν  $\frac{A}{B} = 0$  (1), ὅπου A, B εἶναι πολυώνυμα ἀκέραια ως πρὸς τοὺς ἀγνώστους. "Αν δι' οὐδεμίαν τιμὴν τῶν ἀγνώστων μηδενίζωνται συγχρόνως τὸ A καὶ B, τότε διὰ νὰ εἶναι  $\frac{A}{B} = 0$ , ἀρκεῖ νὰ εἶναι A=0 (2), ὅτε αἱ (1) καὶ (2) εἶναι ἴσοδύναμοι. "Αν ὅμως ὑπάρχουν τιμαὶ τῶν ἀγνώστων, δι' ἐκάστην τῶν δοπίων μηδενίζεται τὸ A καὶ τὸ B, τότε αἱ τιμαὶ αὐταὶ ἐπαληθεύουν τὴν (2), ἀλλὰ δυνατὸν νὰ μὴ ἐπαληθεύουν τὴν (1). Διότι διὰ τὰς τιμὰς αὐτὰς τὸ  $\frac{A}{B}$  παρουσιάζεται ὅτι ἔχει τιμὴν ἀόριστον καὶ ἡ ἀληθὴς τιμὴ του δύναται νὰ μὴ εἶναι μηδέν.

"Εστω π.χ. ἡ ἔξισωσις :  $\frac{x-4}{x-5} - \frac{x-5}{x-6} = \frac{x-7}{x-8} - \frac{x-8}{x-9}$  (2). Τὸ ἐ.κ.π. τῶν παρονομαστῶν εἶναι (x-5) (x-6) (x-8) (x-9). Πολλαπλασιάζοντες τὰ μέλη τῆς ἔξισώσεως ἐπὶ τὸ ἐ.κ.π. καὶ ἀπλοποιοῦντες εὐρίσκομεν : (x-4) (x-6) (x-8) (x-9) - (x-5)<sup>2</sup> (x-8) (x-9) - (x-7) (x-5) (x-6) (x-9) + (x-8)<sup>2</sup> (x-5) (x-6) = 0, ἡ ὁποία εἶναι ἀκέραια καὶ ἴσοδύναμος μὲ τὴν δοθεῖσαν, διότι δὲν ὑπάρχει τιμὴ τοῦ x ἐπαληθεύουσα αὐτὴν καὶ τὴν (x-5) (x-6) (x-8) (x-9) = 0.

Πρὸς συντομίαν διὰ τὴν ἀπαλοιφὴν τῶν παρανομαστῶν ἀρκεῖ νὰ πολλαπλασιάζωμεν καθένα ἀριθμητὴν τῶν ὅρων τῆς ἔξισώσεως ἐπὶ τὸ πηλίκον τοῦ ἐ.κ.π. διὰ τοῦ παρονομαστοῦ τοῦ ὅρου τούτου καὶ νὰ παραλείπωμεν τοὺς παρονομαστάς. Π. χ. διὰ τὴν ἔξισωσιν  $\frac{3x}{4} - \frac{2x-1}{5} - 1 = \frac{2}{3}$  παρατηροῦμεν ὅτι ἐ.κ.π. τῶν παρονομαστῶν της εἶναι τὸ 60 καὶ τὰ 15, 12, 60, 20 εἶναι τὰ ἀντίστοιχα πηλίκα τοῦ 60 διὰ καθενὸς τῶν παρονομαστῶν 4, 5, 1, 3. Ἐπὶ τὰ πηλίκα αὐτὰ θὰ πολλαπλασιάσωμεν τοὺς ἀντιστοίχους ἀριθμητὰς τῶν ὅρων, χωρὶς νὰ λάβωμεν ὑπ' ὄψιν πλέον τοὺς παρονομαστάς. Μετὰ τὴν ἔκτελεσιν τῶν πολλαπλασιασμῶν εύρίσκομεν τὴν ἔξισωσιν  $45x - 24x + 12 - 60 = 40$ .

**§ 104.** Καλοῦμεν βαθμὸν ἔξισώσεως τῆς μορφῆς  $A=0$ , τῆς ὅποιας τὸ πρῶτον μέλος εἶναι (ἀκέραιον ἀνηγμένον) πολυώνυμον, περιέχον ἔνα ἢ περισσοτέρους ἀγνώστους, τὸν βαθμὸν τοῦ πολυωνύμου τούτου ὡς πρὸς τοὺς ἀγνώστους. Π.χ. ἡ  $3x^2 - 6x + 2 = 0$  εἶναι β' βαθμοῦ ὡς πρὸς  $x$ , ἡ  $3x^2\psi - 4\psi^2 + 2x - 1 = 0$  εἶναι γ' βαθμοῦ ὡς πρὸς  $x$  καὶ  $\psi$ , ἡ  $2x - 3 = 0$  εἶναι α' βαθμοῦ ὡς πρὸς  $x$ .

### 3. ΛΥΣΙΣ ΕΞΙΣΩΣΕΩΣ Α' ΒΑΘΜΟΥ ΜΕ ΕΝΑ ΑΓΝΩΣΤΟΝ

**§ 105.** "Εστω ὅτι θέλομεν νὰ λύσωμεν τὴν ἔξισωσιν

$$3x - 7 = 14 - 4x.$$

'Εὰν τὸν ὄρον  $-4x$  μεταφέρωμεν καταλλήλως εἰς τὸ α' μέλος, τὸ δὲ  $-7$  εἰς τὸ β', εύρισκομεν τὴν ίσοδύναμον ἔξισωσιν τῆς διθείστης

$$3x + 4x = 14 + 7.$$

'Εκτελοῦντες εἰς τὸ α' καὶ β' μέλος αὐτῆς τὴν ἀναγωγὴν τῶν ὁμοίων ὄρων, εύρισκομεν  $7x = 21$ . 'Εὰν τὰ μέλη ταύτης διαιρέσωμεν διὰ τοῦ συντελεστοῦ 7 τοῦ  $x$ , προκύπτει ἡ  $x = 3$ , ἡ ὅποια εἶναι ίσοδύναμος μὲ τὴν διθείσαν καὶ ἀληθεύει, ὅταν  $x = 3$ . "Ἄρα καὶ ἡ ρίζα τῆς διθείστης ἔξισώσεως εἶναι ἡ 3.

"Εστω ἡ ἔξισωσις  $\frac{x}{3} - \frac{x-1}{11} = x - 9$ .

Διὰ νὰ λύσωμεν ταύτην, εύρισκομεν ίσοδύναμον αὐτῆς ἀνευ παρονομαστῶν. Πολλαπλασιάζομεν τοὺς ὄρους ταύτης κατὰ σειρὰν ἐπὶ 11, 3, 33, 33 (ὅπου τὸ 33 εἶναι τὸ ἐ.κ.π. τῶν παρονομαστῶν τῆς) καὶ εύρισκομεν  $11x - 3x + 3 = 33x - 297$ .

'Εργαζόμενοι ἐπ' αὐτῆς ὡς ἀνωτέρω, εύρισκομεν  $x = 12$ . 'Εκ τούτων συνάγομεν ὅτι :

Διὰ νὰ λύσωμεν ἔξισωσιν πρώτου βαθμοῦ μὲ ἔνα ἀγνωστὸν, 1ον ἀπαλείφομεν τοὺς παρονομαστὰς αὐτῆς, ἔὰν ἔχῃ (ἥτοι εύρισκομεν ίσοδύναμον αὐτῆς ἀνευ παρονομαστῶν), 2ον ἔκτελοῦμεν τὰς σημειωμένας πράξεις εἰς τὴν ίσοδύναμον, 3ον χωρίζομεν τοὺς ὄρους, οἱ ὅποιοι ἔχουν τὸν ἀγνωστὸν, ἀπὸ τοὺς μὴ ἔχοντας αὐτὸν εἰς τὴν νέαν ἔξισωσιν γράφοντες τοὺς μὲν εἰς τὸ ἐν μέλος, τοὺς δὲ εἰς τὸ ἄλλο μέλος, 4ον ἔκτελοῦμεν ἀναγωγὴν τῶν ὁμοίων ὄρων καὶ 5ον διαιροῦμεν τὰ μέλη τῆς τελευταίας ἔξισώσεως μὲ τὸν συντελεστὴν τοῦ ἀγνώστου.

Α σκήσεις

Νὰ λυθοῦν καὶ νὰ ἐπαληθευθοῦν αἱ κάτωθι ἔξισώσεις :

$$170. \alpha') x+17=8x+1, \quad \beta') 5x-4=38-x.$$

$$171. \alpha) 6x+25=31+2x, \quad \beta) 4(3x+5)-60=2x.$$

$$172. \alpha') 11(2x-15)-x=6, \quad \beta') \alpha x=\alpha+1+x.$$

$$173. \alpha') 4\alpha^2 x-1=x+2\alpha, \quad \beta') \beta x+\alpha x=1.$$

$$174. \alpha) \frac{3x-1}{4}-\frac{2x+1}{3}-\frac{4x-5}{5}=4, \quad \beta) 2-\frac{7x-1}{6}=3x-\frac{19x+3}{4}.$$

$$175. \frac{5x+1}{3}+\frac{19x+7}{9}-\frac{3x-1}{2}=\frac{7x-1}{6}.$$

$$176. 11-\left(\frac{3x-1}{4}+\frac{2x+1}{3}\right)=10-\left(\frac{2x-5}{3}+\frac{7x+1}{8}\right).$$

4. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΞΙΣΩΣΕΩΣ  $\alpha x + \beta = 0$

**§ 106.** Ἐὰν ἀπὸ δοθεῖσαν ἀκεραίαν ἥ κλασματικὴν (ρητὴν) ἔξισώσιν ὡς πρὸς τὸν ἄγνωστον  $x$  μετὰ τὴν ἀπαλοιφὴν τῶν παρονομαστῶν, τὴν μεταφορὰν πάντων τῶν ὅρων εἰς τὸ πρῶτον μέλος καὶ τὴν ἀναγωγὴν τῶν δύοιν τῶν ὅρων προκύπτῃ ἔξισώσις πρώτου βαθμοῦ ὡς πρὸς τὸν ἄγνωστον  $x$ , αὕτη θὰ ἔχῃ τὴν μορφὴν  $\alpha x + \beta = 0$ , ὅπου τὰ  $\alpha$ ,  $\beta$  εἶναι ἀριθμοὶ γνωστοὶ ἢ παραστάσεις γνωσταί.

Οταν λέγωμεν θὰ διερευνήσωμεν τὴν ἔξισώσιν  $\alpha x + \beta = 0$ , ἐννοοῦμεν ὅτι θὰ ζητήσωμεν νὰ ἀπαντήσωμεν εἰς τὰς ἔξῆς ἐρωτήσεις :

1ον. Ἡ ἔξισώσις αὕτη ἔχει μίαν ρίζαν ἥ δύναται νὰ ἔχῃ καὶ περισσοτέρας ἥ καὶ οὐδεμίαν ;

2ον. Τί πρέπει νὰ εἶναι τὰ  $\alpha$  καὶ  $\beta$ , διὰ νὰ ἔχῃ μίαν ρίζαν καὶ τί διὰ νὰ ἔχῃ περισσοτέρας ἥ οὐδεμίαν ;

Ἐκ τῆς  $\alpha x + \beta = 0$  εύρισκομεν τὴν ἴσοδύναμόν της  $\alpha x = -\beta$

1ον. Ἀν εἶναι  $\alpha \neq 0$ , θὰ ἔχωμεν  $x = -\frac{\beta}{\alpha}$ , ἥτοι ἡ τιμὴ τοῦ  $x$  εἶναι ὡρισμένη καὶ λέγομεν ὅτι ἡ δοθεῖσα ἔξισώσις ἔχει μίαν μόνην ρίζαν ἥ μίαν μόνην λύσιν.

2ον. Ἐὰν εἶναι  $\alpha = 0$  καὶ  $\beta \neq 0$ , θὰ ἔχωμεν  $0x = -\beta$  ἥ  $0 = -\beta$ , τὸ ὅποιον εἶναι ἀδύνατον, ἐπειδὴ ὑπετέθη  $\beta \neq 0$ . Εἰς τὴν περίπτωσιν αὕτην λέγομεν ὅτι ἡ δοθεῖσα ἔξισώσις εἶναι ἀδύνατος ἥ ὅτι οὐδεμίαν ἔχει λύσιν.

Ἐστω π.χ. ἡ ἔξισώσις  $\frac{x}{2} - 3 - \frac{x}{3} = 1 + \frac{x}{6} - \frac{1}{3}$ . Ἀντ' αὐτῆς

εύρισκομεν τὴν ισοδύναμον της  $3x - 18 - 2x = 6 + x - 2$  ἢ τὴν  $0 \cdot x = 22$  ἢ  $0 = 22$ , ἡ οποία εἶναι ἀδύνατος, ἅρα καὶ ἡ δοθεῖσα εἶναι ἀδύνατος.

Ζον. Ἐὰν εἶναι  $\alpha = 0$  καὶ  $\beta = 0$ , θὰ ἔχωμεν ὅτι  $0x = 0$  ἢ  $0 = 0$  καὶ προφανῶς τὸ  $x$  δύναται νὰ λάβῃ οἰανδήποτε τιμήν. Λέγομεν δὲ ὅτι ἡ δοθεῖσα ἐξίσωσις εἶναι **ταυτότητας** πρὸς  $x$  ἢ ὅτι εἶναι **ἀόριστος**.

**§ 107. Παρατήρησις.** "Οταν τὸ  $\alpha$  εἶναι θετικὸν καὶ ἐλαττούμενον πλησιάζῃ διηνεκῶς πρὸς τὸ  $0$ , τότε λέγομεν ὅτι ὁ συντελεστὴς τοῦ  $x$  τείνει εἰς τὸ  $0$ , συμβολίζομεν δὲ αὐτὸν οὔτως  $\alpha \rightarrow 0$ .

Ἄλλὰ τότε, ἂν τὸ  $\beta$  εἶναι ὡρισμένος ἀριθμὸς  $\neq 0$ , τὸ  $\frac{\beta}{\alpha}$  διηνεκῶς αὐξάνεται ἀπολύτως καὶ λέγομεν ὅτι τείνει εἰς τὸ  $+\infty$  μέν, ἂν εἶναι  $\beta > 0$ , εἰς τὸ  $-\infty$  δέ, ἂν εἶναι  $\beta < 0$ , λέγομεν δὲ τότε ὅτι ἡ ρίζα τῆς ἐξίσωσεως τείνει εἰς τὸ θετικὸν ἢ τὸ ἀρνητικὸν ἀπειρον, καθ' ὅσον  $\beta < 0$  ἢ  $\beta > 0$ .

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΞΙΣΩΣΕΩΣ  $\alpha x + \beta = 0$

**§ 108.** Πρὸς εὐκολίαν παραθέτομεν τὸν κατωτέρω πίνακα τῶν περιπτώσεων τῆς λύσεως τῆς ἐξίσωσεως τοῦ πρώτου βαθμοῦ  $\alpha x + \beta = 0$ .

Iov. "Αν εἶναι  $\alpha \neq 0$ , ύπαρχει μία ρίζα, ἡ  $x = -\frac{\beta}{\alpha}$ .

Ζον. "Αν εἶναι  $\alpha = 0$ ,  $\beta \neq 0$  δὲν ύπαρχει ρίζα.

"Οταν εἶναι  $\beta \neq 0$  καὶ ὡρισμένον, ἀλλὰ τὸ  $\alpha$  εἶναι θετικὸν καὶ  $\rightarrow 0$ , ἡ ρίζα τείνει πρὸς τὸ  $+\infty$ , ἂν  $\beta < 0$  ἢ εἰς τὸ  $-\infty$ , ἂν  $\beta > 0$ .

Ζον. "Αν εἶναι  $\alpha = 0$ ,  $\beta = 0$  ἡ ἐξίσωσις εἶναι ἀόριστος. ἀληθεύει μὲ κάθε  $x$ .

**Α σ κήσεις**

"Ο μὰς πρώτη. 177. Εὑρετε τὰς ρίζας τῶν κάτωθι ἐξίσωσεων :

$$\alpha') \frac{3}{2}x - 5 + x = \frac{x-10}{2} + 2x,$$

$$\beta') 2x - 5 = \frac{x+7}{2} + \frac{3x}{2},$$

$$\delta') \frac{x}{\alpha} + \frac{x}{\beta} + 1 = \frac{(\alpha + \beta)x + \alpha\beta}{\alpha\beta},$$

$$\epsilon') \frac{x}{3} - \frac{x}{5} - 3 = 2x - 7,$$

$$\gamma') \frac{x-\alpha}{2} + \frac{x+\beta}{3} = \frac{5x}{6} - 1,$$

$$(\sigma\tau') \frac{x}{3} + \frac{x}{2} + 5 = \frac{5x}{6} + 2.$$

178. Ποιας σχέσεις πρέπει νὰ πληροῦν τὸ α καὶ β, ἵνα ἡ  $\frac{\alpha x - \beta}{3} + \frac{x}{2} = 3x - \alpha$ , ἔχη μίαν λύσιν, οὐδεμίαν ἢ εἰναι ἀόριστος.

$$179. \text{Προσδιορίσατε τὸ } \alpha, \text{ ὥστε } \eta \frac{\alpha x - 1}{3} + \frac{x + 1}{2} = 4 \text{ νὰ εἰναι ἀδύνατος.}$$

‘Ο μὰς δευτέρα. 180. Νὰ γίνη ἡ λύσις καὶ ἡ ἐπαλήθευσις τῶν ἔξισώσεων:  $\alpha') 27x - 5(2x - 4) = 6(3x - 5) + 5(2x - 1)$ ,

$$\beta') \frac{2(3x - 5)}{3} - \frac{25(x + 2)}{12} = \frac{5(3x + 2)}{2} + 33$$

$$\gamma') x - \left( \frac{x}{2} - \frac{2x}{3} \right) - \left( \frac{3x}{4} + \frac{2x}{3} \right) - \frac{5x}{6} = 65$$

$$\delta') \left( x + \frac{1}{3} \right)^2 = \left( x + \frac{1}{2} \right) \left( x - \frac{1}{6} \right),$$

$$\epsilon') \frac{1}{(x-1)(x-2)} - \frac{1}{(x-1)(x-3)} + \frac{19}{(x-3)(x-4)} = \frac{19}{(x-2)(x-4)},$$

$$\sigma\tau') \frac{1}{x^2} - \frac{1}{(x-2)^2} - \frac{4(x-1)}{x^2(x-2)^2} + \frac{4}{x^2(x-2)} = 0.$$

‘Ο μὰς τρίτη. 181. Λύσατε καὶ ἐπαληθεύσατε τὰς ἔξισώσεις:

$$\alpha') (\alpha + \beta)x + \alpha(\alpha - \beta)x = 2\alpha^2, \quad \beta') (\alpha^2 + \beta^2)x + 2\alpha\beta x = \alpha^3 + \beta^3,$$

$$\gamma') 2\mu(x - \mu) - 2\nu(v - x) = (\mu + v)^2 - (\mu - v)^2,$$

$$\delta') (x + 1)^2 - \alpha(5 - 3\alpha - 2x) = (x - 2\alpha)^2 + 5, \quad \epsilon') \frac{x}{\alpha} + \frac{x}{\alpha + \beta} = 2\alpha + \beta,$$

$$\sigma\tau') \frac{\beta x + \alpha}{2\alpha^2\beta} + \frac{x - 1}{3\beta^2} = \frac{2\beta^2 + 5\alpha^2}{6\alpha^2\beta(\alpha - \beta)}, \quad \zeta') \frac{\alpha x^2 + \beta x + \gamma}{\alpha_1 x^2 + \beta_1 x + \gamma_1} = \frac{\alpha x + \beta}{\alpha_1 x + \beta_1},$$

$$\eta') \frac{8\alpha}{(x+2)^2} + \frac{8\beta}{(x-2)^2} - \frac{(\alpha + \beta)x^4}{(x^2 - 4)^2} = -(\alpha + \beta).$$

## 5. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΥΣΙΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

**§ 109. Πρόβλημα** λέγεται πρότασις, εἰς τὴν ὅποιαν ζητεῖται νὰ εὑρεθῇ ἐν ἣ περισσότερα ὄγνωστα ἔξαρτώμενα ἀπὸ ἄλλα γνωστὰ ἢ δεδομένα. Τὰ διδόμενα καὶ τὰ ζητούμενα τοῦ προβλήματος εἰναι ἐν γένει σχετικοὶ ἀριθμοί, τὰ δὲ περιεχόμενα εἰς αὐτὸ ποσά μετρούμενα μὲ τὴν μονάδα αὐτοῦ ἔκαστον παριστάνονται μὲ ἀριθμούς.

**§ 110. Λύσις** ἐνὸς προβλήματος λέγεται ἡ εὕρεσις τῶν ζη-

τουμένων ἀγνώστων αύτοῦ, τὰ ὅποια παριστάνομεν συνήθως μὲν γράμματα χ,ψ,ω,.., τὰ δὲ γνωστά μὲν ἀριθμοὺς η̄ μὲν γράμματα α,β,γ,.....

Διὰ νὰ λυθῆ ἐν πρόβλημα, πρέπει τὰ ζητούμενα αύτοῦ νὰ πληροῦν ὡρισμένας τινάς ἀπαιτήσεις, τάς ὅποιας καλοῦμεν ὄρους τοῦ προβλήματος. Ἐκείνους ἐκ τῶν ὄρων, οἱ ὅποιοι ὁρίζουν τὰς σχέσεις, τὰς ὅποιας πρέπει νὰ ἔχουν τὰ ζητούμενα πρὸς τὰ δεδομένα, καλοῦμεν **ἐπιτάγματα**.

Τὰ ἐπιτάγματα γίνονται γνωστὰ κατὰ τὴν διατύπωσιν τοῦ προβλήματος· π.χ. εἰς τὸ πρόβλημα :

Νὰ εύρεθῇ ὁ ἀριθμός, τοῦ ὅποίου τὸ διπλάσιον νὰ τὸν ὑπερβαίνῃ κατὰ 6. Τὸ ἐπίταγμα εἶναι ὅτι : τὸ διπλάσιον εἶναι μεγαλύτερον αύτοῦ κατὰ 6.

Ἐπομένως, ἂν ὁ ζητούμενος ἀριθμὸς παρασταθῇ μὲν  $x$ , τὸ διπλάσιον αύτοῦ θὰ εἶναι  $2x$ . Ἐπειδὴ δὲ τὸ  $2x$  θὰ ὑπερβαίνῃ τὸ  $x$  κατὰ 6, πρέπει αἱ δύο παραστάσεις  $2x$  καὶ  $x + 6$  νὰ εἶναι ίσαι. Οὕτως ἔχουμεν τὴν ἔξισωσιν  $2x = x + 6$ , ἐκ τῆς ὅποιας εύρισκομεν  $x = 6$ .

Ἐνίστε ὁ ζητούμενος ἀριθμὸς παριστάνει τὴν τιμὴν ποσοῦ τινός, τὸ ὅποῖον ἔνεκα τῆς φύσεως τοῦ προβλήματος ὑπόκειται εἰς ὄρους τινάς, τοὺς ὅποίους πρέπει νὰ πληροῖ. Τοὺς τοιούτους ὄρους καλοῦμεν **περιορισμούς**. Π.χ. ἂν διὰ τῆς λύσεως προβλήματός τινος ζητῆται τὸ πλῆθος ἀνθρώπων, δυνάμεθα ἐκ τῶν πρότερων νὰ εἴπωμεν ὅτι ὁ ζητούμενος ἀριθμὸς πρέπει νὰ εἶναι ἀκέραιος καὶ θετικός.

Ἐν γένει διὰ τὴν λύσιν προβλήματος τινος ἐργαζόμεθα ὡς ἔξῆς :

1ον. Εύρισκομεν τὴν ἔξισωσιν η̄ τὰς ἔξισώσεις τοῦ προβλήματος καὶ τοὺς περιορισμοὺς αύτοῦ, ἐκ τῶν ὅποίων αἱ πρῶται ἐκφράζουν τὰς σχέσεις τὰς συνδεούσας τὰ ζητούμενα μὲν τὰ δεδομένα αύτοῦ.

2ον. Λύομεν τὴν ἔξισωσιν η̄ τὰς ἔξισώσεις καὶ οὕτως εύρισκομεν τίνες εἶναι οἱ ἀριθμοί, οἱ ὅποιοι δύνανται νὰ λύσουν τὸ πρόβλημα.

3ον. Ἐξετάζομεν ἂν οἱ ἐκ τῆς λύσεως εὑρεθέντες ἀριθμοὶ πληροῦν καὶ τοὺς περιορισμοὺς τοῦ προβλήματος.

I. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΝ

**§ 111. α')** Τὸ τετραπλάσιον ἀριθμοῦ τινος εἶναι ἵσον μὲ τὸν ἀριθμὸν αὐξηθέντα κατὰ 60. Ποῖος εἶναι ὁ ἀριθμός;

"Εστω ὅτι  $x$  εἶναι ὁ ζητούμενος ἀριθμός. Τὸ τετραπλάσιον αὐτοῦ θὰ εἶναι  $4x$ , τὸ δὲ  $x + 60$  παριστάνει τὸν ἀριθμὸν ηὔξημένον κατὰ 60. Κατὰ τὴν διατύπωσιν τοῦ προβλήματος πρέπει νὰ εἶναι  $4x = x + 60 \quad \text{ἢ} \quad 3x = 60$ . Λύοντες τὴν ἔξισωσιν αὐτὴν εύρισκομεν  $x = 20$  καὶ ἡ λύσις εἶναι δεκτή.

**β')** Τὸ ἄθροισμα δύο ἀριθμῶν εἶναι 25, τὸ δὲ ἔξαπλάσιον τοῦ μεγαλυτέρου ἐλαττωθὲν κατὰ τὸ τετραπλάσιον τοῦ μικροτέρου δίδει 50. Ποῖοι εἶναι οἱ ἀριθμοί;

"Ἐὰν παραστήσωμεν μὲ  $x$  τὸν μεγαλύτερον τῶν ἀριθμῶν, ὁ μικρότερος θὰ εἶναι  $25 - x$ , τὸ ἔξαπλάσιον τοῦ μεγαλυτέρου  $6x$ , τὸ δὲ τετραπλάσιον τοῦ μικροτέρου  $4(25 - x)$ . Ἐπειδὴ κατὰ τὴν διατύπωσιν τοῦ προβλήματος ἡ διαφορὰ  $6x - 4(25 - x)$  πρέπει νὰ εἶναι ἵση μὲ 50, θὰ ἔχωμεν τὴν ἔξισωσιν  $6x - 4(25 - x) = 50 \quad \text{ἢ} \quad 6x + 4x - 100 = 50$ , ἐκ τῆς ὁποίας εύρισκομεν  $x = 15$ . Ἀρα οἱ ἀριθμοὶ εἶναι 15 καὶ  $25 - 15 = 10$ .

**γ')** Νὰ εύρεθῇ ὁ ἀριθμός, ὁ ὁποῖος προστιθέμενος εἰς τὸν δρούς τοῦ  $\frac{7}{11}$  κάμνει αὐτὸν ἵσον μὲ  $\frac{1}{4}$ .

"Αν παραστήσωμεν μὲ  $x$  τὸν ζητούμενον ἀριθμόν, θὰ ἔχωμεν:  $\frac{7+x}{11+x} = \frac{1}{4}$ , ἐκ τῆς λύσεως τῆς ὁποίας εύρισκομεν  $x = -5 \frac{2}{3}$ , ἢ δὲ λύσις εἶναι δεκτή.

### Προβλήματα

182. Νὰ εύρεθῇ ὁ ἀριθμός, τοῦ ὁποίου τὸ διπλάσιον αὐξηθὲν κατὰ 5 ίσοῦται μὲ τὸ τριπλάσιον αὐτοῦ μείον 19.

183. Εύρετε ἀριθμὸν τοιοῦτον, ὥστε τὸ τετραπλάσιον αὐτοῦ ἐλαττούμενον κατὰ 2 νὰ ίσουται μὲ τὸ τριπλάσιον του σὺν 17.

184. Νὰ εύρεθῇ ἀριθμός, ὁ ὁποῖος προστιθέμενος εἰς τὸν δρούς τοῦ  $\frac{6}{17}$  τὸ κάμνει ἵσον μὲ  $\frac{1}{3}$ .

185. Νὰ εύρεθῇ ἀριθμός, ὁ ὁποῖος προστιθέμενος εἰς τὸν  $-5, 6, 8$  δίδει ἀριθμούς, ἐκ τῶν δύο ὁποίων οἱ δύο πρῶτοι ἔχουν λόγον ἵσον πρὸς τὸν λόγον τοῦ τρίτου πρὸς τὸν ζητούμενον.

186. Νὰ εύρεθῇ ὁ ἀριθμός, ὁ ὅποιος ἐλαττούμενος κατά τὸ  $\frac{1}{3}$  αὐτοῦ καὶ κατὰ 4 γίνεται ἴσος μὲ τὰ  $\frac{5}{6}$  αὐτοῦ μεῖον 8.

187. Ποῖον ἀριθμὸν πρέπει νὰ ἀφαιρέσωμεν ἀπὸ τοὺς ὅρους τοῦ  $\frac{29}{42}$  διὰ νὰ γίνῃ ἴσον μὲ 0,5;

188. Ποῖος εἶναι ὁ ἀριθμός, τοῦ ὅποιου τὰ  $\frac{2}{3}$  καὶ τὰ  $\frac{3}{4}$  κάμνουν 170;

## II. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΘΕΤΙΚΟΣ

§ 112. α') 'Ο Ἰωάννης ἔχει τετραπλάσια μῆλα ἢ ἡ Μαρία καὶ οἱ δύο δὲ μαζὶ ἔχουν 45. Πόσα ἔχει ἔκαστος ;

*Περιορισμός.* Προφανῶς οἱ ζητούμενοι ἀριθμοὶ πρέπει νὰ εἶναι θετικοί.

"Αν μὲ x παραστήσωμεν τὰ μῆλα τῆς Μαρίας, τὰ τοῦ Ἰωάννου θὰ παρασταθοῦν μὲ τὸ  $4x$  καὶ τῶν δύο μὲ τὸ  $4x+x$  καὶ πρέπει νὰ εἶναι  $4x+x=45$ , ἐκ τῆς ὅποιας εὐρίσκομεν  $x=9$ . "Ητοι ἡ Μαρία εἶχεν 9 καὶ ὁ Ἰωάννης  $4 \cdot 9 = 36$  μῆλα καὶ ἡ λύσις εἶναι δεκτή.

β') 'Ορθογωνίου τινὸς ἢ μὲν βάσις εἶναι 4 μ. μεγαλυτέρα τῆς πλευρᾶς τετραγώνου ίσοδυνάμου πρὸς αὐτό, τὸ δὲ ὑψος 3 μ. μικρότερον. Νὰ εύρεθοῦν αἱ διαστάσεις αὐτοῦ.

*Περιορισμός.* Οἱ ζητούμενοι ἀριθμοὶ πρέπει νὰ εἶναι θετικοί.

'Ἐὰν μὲ x παραστήσωμεν τὴν πλευρὰν τετραγώνου, τὸ ἐμβαδὸν αὐτοῦ θὰ εἶναι  $x \cdot x = x^2$ . 'Η βάσις τοῦ ὀρθογωνίου θὰ παρασταθῇ τότε μὲ x + 4, τὸ ὑψος του μὲ x - 3 καὶ τὸ ἐμβαδόν του εἶναι  $(x+4)(x-3)$ . Πρέπει νὰ εἶναι :  $(x+4)(x-3)=x^2$  ἢ  $x^2+4x-3x-12=x^2$ . 'Εκ τῆς λύσεως ταύτης εὐρίσκομεν  $x=12$ .

"Ωστε ἡ μὲν βάσις τοῦ ὀρθογωνίου ἔχει μῆκος  $12+4=16$  μ., τὸ δὲ ὑψος  $12-3=9$  μ. καὶ ἡ λύσις εἶναι δεκτή.

γ') 'Ο Α ἔκτελεῖ ἐν ἔργον εἰς 7 ἡμέρας. 'Ο Β ἔκτελεῖ αὐτὸν εἰς 5 ἡμέρας. 'Ἐὰν ἔργασθοῦν καὶ οἱ δύο μαζί, εἰς πόσας ἡμέρας θὰ ἔκτελέσουν τὸ ἔργον ;

'Ἐὰν μὲ x παραστήσωμεν τὸν ζητούμενον ἀριθμὸν (ὁ ὅποιος πρέπει νὰ εἶναι θετικὸς καὶ μικρότερος τοῦ 5), παρατηροῦμεν ὅτι, ἀφοῦ εἰς x ἡμέρας ἔκτελοῦν καὶ οἱ δύο μαζὶ ἔργαζόμενοι τὸ ἔργον,

εις μίαν ήμέραν θά έκτελούν τὸ  $\frac{1}{x}$  τοῦ ἔργου. Ἐφοῦ ὁ A εἰς 7 ήμέρας έκτελεῖ τὸ ἔργον, εἰς 1 ήμέραν θά έκτελῃ τὸ  $\frac{1}{7}$ . Ὁ B έκτελεῖ εἰς 1 ήμέραν τὸ  $\frac{1}{5}$  τοῦ ἔργου. Καὶ οἱ δύο μαζὶ εἰς μίαν ήμέραν έκτελοῦν τὸ  $\frac{1}{7} + \frac{1}{5}$  τοῦ ἔργου. Ἐπομένως πρέπει νὰ εἶναι  $\frac{1}{7} + \frac{1}{5} = \frac{1}{x}$  ή  $5x + 7x = 35$ , ἐκ τῆς ὅποιας εύρισκομεν  $x = 2\frac{11}{12}$ .

“Ωστε καὶ οἱ δύο μαζὶ ἔργαζόμενοι θὰ έκτελέσουν τὸ ἔργον εἰς  $2\frac{11}{12}$  ήμέρας καὶ ἡ λύσις εἶναι δεκτή.

### Π ρ ο β λ ή μ α τ α

189. \*Εχει τις 100 ὀκάδας οίνου τῶν 9,50 δρχ. κατ' ὄκαν. Πόσον οίνον τῶν 9 δρχ. κατ' ὄκαν πρέπει νὰ ἀναμίξῃ, διὰ νὰ κοστίζῃ, ἡ ὄκα τοῦ μίγματος 9,2 δρχ.;

190. Δύο κινητὰ ἀναχωροῦν ἐκ δύο τόπων συγχρόνως κινούμενα διμελῶς καὶ ἀντιθέτως, ὁστε νὰ συναντηθοῦν. Τὸ μὲν διανύει 5 χλμ. τὴν ὁραν, τὸ δὲ 5,5 χλμ. Εἰς τίνα ἀπόστασιν ἀπὸ τὸν πρῶτον τόπον θὰ συναντηθοῦν, ἀν ἡ ἀπόστασις τῶν τόπων εἶναι 60 χλμ. ;

191. 40 ὀκάδες ἀλμυροῦ ὑδατος περιέχουν 3,4 ὀκ. ἀλατος. Πόσον καθαρὸν ὅνδρο πρέπει νὰ ρίψωμεν εἰς αὐτό, ἵνα 30 ὀκ. τοῦ νέου μίγματος περιέχουν 2 ὀκ. ἀλατος ;

192. Πόσον κοστίζει ἐν κτῆμα, ἀν τὰ τρία πέμπτα τῆς ὁξίας αὐτοῦ σύν 250 000 δρχ. ἀποτελοῦν τὰ τρία τέταρτα αὐτῆς μεῖον 200 000 δρχ;

193. Ἀτμάμαξα διανύουσα 48 χλμ. τὴν ὁραν ἀνεχώρησεν 20π βραδύτερον ἀλλης (ἐκ τοῦ αὐτοῦ τόπου) καὶ διευθυνομένη ὁμοίως, συνητήθη δὲ μὲν αὐτὴν μετά 2 ὥρας καὶ 20π μετά τὴν ἀναχώρησίν της. Ποία εἶναι ἡ ταχύτης τῆς ἀλλης ;

194. Κρουνὸς πληροὶ δεξαμενὴν εἰς 12 ὥρας, ἀλλος πληροὶ αὐτὴν εἰς 10 ὥρας καὶ τρίτος πληροὶ αὐτὴν εἰς 30 ὥρας. “Αν καὶ οἱ τρεῖς ἀνοιχθοῦν συγχρόνως, εἰς πόσον χρόνον θὰ πληρωθῇ ἡ δεξαμενή”;

195. “Υπηρέτης λαμβάνει ἐπίσιον μισθὸν 6 000 δρχ. καὶ μίαν ἐνδυμασίαν.” Αν διὰ 8 μῆνας ἔλαβε 5 000 δρχ, πόσον ἐτιμᾶτο ἡ ἐνδυμασία :

### III. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΚΕΡΑΙΟΣ ΘΕΤΙΚΟΣ

#### § 113. α') Δέκα ἀτομα, ἄνδρες καὶ γυναῖκες, ἐπλήρωσαν

500 δρχ. "Αν έκαστος τῶν ἀνδρῶν ἐπλήρωσεν 60 δρχ. καὶ έκάστη τῶν γυναικῶν 40 δρχ, πόσοι ἡσαν οἱ ἄνδρες καὶ πόσαι αἱ γυναῖκες ;

Περιορισμός. Παρατηρητέον ὅτι οἱ ζητούμενοι ἀριθμοὶ πρέπει νὰ είναι ἀκέραιοι καὶ θετικοί, ἃλλως ἡ λύσις δὲν δύναται νὰ είναι δεκτή.

"Αν μὲ  $x$  παραστήσωμεν τὸν ἀριθμὸν τῶν γυναικῶν, ὁ τῶν ἀνδρῶν θὰ είναι  $10-x$ . "Ολοι οἱ ἄνδρες ἐπλήρωσαν  $60(10-x)$  δρχ, ὅλαι δὲ αἱ γυναῖκες  $40x$  δρχ.

Πρέπει νὰ είναι  $60(10-x)+40x=500$ , ἐκ τῆς ὅποιας προκύπτει  $x=5$  γυναῖκες, ὅπότε οἱ ἄνδρες, είναι  $10-5=5$ , ἡ δὲ λύσις είναι δεκτή.

β') "Απὸ 80 ἀτομα, ἄνδρες, γυναῖκες καὶ παιδιά, αἱ μὲν γυναῖκες ἡσαν τὰ 0,8 τῶν ἀνδρῶν, τὰ δὲ παιδιὰ τὰ ἑπτὰ πέμπτα τῶν ἀνδρῶν. Πόσοι ἡσαν οἱ ἄνδρες, γυναῖκες καὶ παιδιά ;

"Αν  $x$  παριστάνῃ τὸν ἀριθμὸν τῶν ἀνδρῶν, ὁ τῶν γυναικῶν θὰ είναι  $0,8x$  καὶ ὁ τῶν παιδιῶν  $\frac{7}{5}x$ . "Αρα πρέπει νὰ είναι  $x+0,8x+\frac{7}{5}x=80$ , ἐκ τῆς ὅποιας εύρισκομεν  $x=25$ .

"Ωστε οἱ ἄνδρες ἡσαν 25, αἱ γυναῖκες  $25 \cdot 0,8 = 20$  καὶ τὰ παιδιὰ  $25 \cdot \frac{7}{5} = 35$ , ἡ δὲ λύσις είναι δεκτή.

### Προβλήματα

196. Εἰς μίαν ἐκλογὴν μεταξὺ δύο ύποψηφίων ἐψήφισαν 12 400 ἐκλογεῖς καὶ ἔλαβεν ὁ ἐκλεγεὶς 5 153 ψήφους περισσοτέρας τοῦ ἀποτυχόντος, εὐρέθησαν δὲ καὶ 147 λευκαὶ ψῆφοι. Πόσας ψήφους ἔλαβεν ἕκαστος ;

197. Ἐὰν ὅμιλός τις εἴχε τὸ ἔβδομον τῶν μελῶν του ὀλιγώτερον τῶν ὅσων ἔχει, θὰ είχεν 120 μέλη. Πόσα μέλη ἔχει ;

198. Τὸ τριπλάσιον τοῦ πέμπτου ἀκέραιον τινὸς ἀριθμοῦ ηὔξημένον κατὰ 7 δίδει τὸ 34. Ποιὸς είναι ὁ ἀριθμός ;

199. Τίς είναι ὁ ἀκέραιος ἀριθμός, τοῦ ὅποιον τὸ τρίτον αὔξηθὲν κατὰ 2 δίδει τὸ 23 ;

200. Νὰ εύρεθῇ ἀκέραιος ἀριθμὸς, ὁ δόποιος διαιρούμενος διὰ 7 ἡ διὰ 9 ἀφίνει ύπόλοιπον 3, τὰ δὲ πηλίκα διαφέρουν κατὰ 4.

201. Είχε τις πορτοκάλια καὶ ἐπώλησε τὰ τρία πέμπτα αὐτῶν ἡγόρασεν ἐπειτα 33 πορτοκάλια καὶ είχεν οὕτως 9 περισσότερα τῶν ὅσων είχεν ἐξ ἀρχῆς. Πόσα είχε ;

IV. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Ο ΑΦΝΩΣΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ  
ΜΕΤΑΞΥ ΟΡΙΩΝ

**§ 114. α')** Ἡ ήλικιά ἐνδεκατοντάριας πατρὸς εἶναι τριπλασία τῆς τοῦ υἱοῦ του. Πρὸ 8 ἔτῶν ἡ ήλικιά τοῦ πατρὸς ἥτο τετραπλασία τῆς τοῦ υἱοῦ τού. Ποῖαι αἱ ήλικιαι των;

"Ἄν μὲν  $x$  παρασταθῇ ἡ ήλικιά τοῦ υἱοῦ εἰς ἔτη, ἡ τοῦ πατρὸς θὰ εἶναι  $3x$  ἔτη, πρέπει δὲ οἱ ἀριθμοὶ  $x$  καὶ  $3x$  νὰ εἶναι θετικοὶ καὶ νὰ μὴ ὑπερβαίνουν τὴν δυνατήν ἀνθρωπίνην ήλικιαν.

Πρὸ 8 ἔτῶν ἡ ήλικιά τοῦ μὲν υἱοῦ ἥτο  $x-8$  ἔτη, τοῦ δὲ πατρὸς  $3x-8$  ἔτη καὶ πρέπει νὰ εἶναι  $3x-8=4(x-8)$ , ἐκ τῆς λύσεως τῆς ὁποίας εύρισκομεν  $x=24$ . Ἀρα ἡ ήλικιά τοῦ μὲν υἱοῦ εἶναι 24, τοῦ δὲ πατρὸς  $24 \cdot 3 = 72$  ἔτη καὶ ἡ λύσις εἶναι δεκτή.

**β')** Ἐκ δύο ἀνθρώπων, ὁ μὲν ἔχει 1800 δρχ. καὶ δαπανᾷ 50 δρχ. καθ' ἑκάστην ήμέραν, ὁ δὲ ἔχει 1000 δρχ. καὶ δαπανᾷ 30 δρχ. ήμερησίως. Μετὰ πόσας ήμέρας θὰ ἔχουν ἵσα ποσά;

"Ἄν δη τούμενος ἀριθμὸς παρασταθῇ μὲν  $x$ , δὲ μὲν θὰ δαπανήσῃ 50x δρχ. καὶ θὰ τοῦ μείνουν  $(1800-50x)$  δρχ, δὲ 30x καὶ θὰ τοῦ μείνουν  $(1000-30x)$  δρχ." Αρα πρέπει νὰ εἶναι:  $1800-50x=1000-30x$ , ἐκ τῆς ὁποίας εύρισκομεν  $x=40$ . Ἀλλ' ἡ λύσις αὗτη ἀπορρίπτεται, διότι μετὰ 40 ήμέρας καὶ οἱ δύο ἀνθρωποι δὲν θὰ ἔχουν τίποτε.

### Προβλήματα

202. Ὁ Ἑλλην μαθηματικός, συγγραφεὺς τῆς Ἀλγέβρας, Διόφαντος ἔζησε τὸ ἕκτον τῆς ζωῆς του ὡς παιδίον, τὸ δωδέκατον αὐτῆς ὡς νεανίας, τὸ ἑβδομον αὐτῆς μετὰ τὸν γάμον του καὶ πέντε ἔτη ἀκόμη, διετέλεσεν υἱόν, δὲ ὁποῖος ἔζησε τὸ ημισυ ἡ δύσον δὲ πατέρη του. ἔζησε δὲ διόφαντος ἀκόμη 4 ἔτη μετὰ τὸν θάνατον τοῦ υἱοῦ του. Πόσα ἔτη ἔζησεν διόφαντος;

203. Ἐχει τις ήλικιαν τριπλασίαν τῆς κόρης του· αἱ ήλικιαι καὶ τῶν δύο εἶναι 28 ἔτη διλιγώτερον τοῦ διπλασίου τῆς ήλικιας τοῦ πατρός. Πόσην ήλικιαν ἔχει ἕκαστος;

204. Τρεῖς ἀδελφοὶ ἔχουν δύομοι ήλικιαν 24 ἔτῶν, ἐνῷ ἕκαστος εἶναι κατὰ δύο ἔτη μεγαλύτερος τοῦ ἀμέσως ἐπομένου του. Ποῖαι εἶναι αἱ ήλικιαι των;

205. Είναι τις 40 ἔτῶν καὶ ἔχει θυγατέρα 16 ἔτῶν· πότε ἡ ήλικιά τῆς θυγατρός θὰ εἶναι ἡ ἥτο τὸ τρίτον τῆς ήλικιας τοῦ πατρός;

206. Τρεῖς ἀριθμοὶ ἔχουν ἀθροισμα 70. Ὁ δεύτερος διαιρούμενος διὰ τοῦ πρώτου δίδει πηλίκον 2 καὶ ὑπόλοιπον 1. Ὁ τρίτος διαιρούμενος διὰ τοῦ δευτέρου δίδει πηλίκον 3 καὶ ὑπόλοιπον 3. Ποιοὶ εἶναι οἱ ἀριθμοί;

207. 16 ἐργάται ἐκτελοῦν τὰ δύο πέμπτα ἔνδες ἐργου ἐργαζόμενοι 9 ἡμέρας ἐπὶ 4 ὥρας καθ' ἐκάστην. Πόσας ὥρας πρέπει νὰ ἐργάζωνται 15 ἐργάται καθ' ἡμέραν, διὰ νὰ τελειώσουν τὸ ἔργον εἰς τρεῖς ἡμέρας;

208. Πατήρ τις εἶναι 58 ἑτῶν καὶ ἔχει υἱὸν 28 ἑτῶν. Μετὰ πόσα ἔτη ὁ πατήρ θὰ ἔχῃ ἡλικίαν διπλασίαν τῆς τοῦ υἱοῦ του;

209. Διψηφίου ἀκεραίου ἀριθμοῦ τὸ ψηφίον τῶν μονάδων εἶναι διπλάσιον τοῦ τῶν δεκάδων. Ἐάν ἐναλλάξωμεν τὴν θέσιν τῶν ψηφίων του, προκύπτει ἀριθμὸς μεγαλύτερος τοῦ πρώτου κατά 36. Ποιος εἶναι ὁ ἀριθμός;

210. Τὸ ἀθροισμα τῶν ψηφίων διψηφίου ἀριθμοῦ εἶναι 12. Ἐάν ὁ ἀριθμὸς ἐλαττωθῇ κατά 18, προκύπτει ὁ δι' ἐναλλαγῆς τῶν ψηφίων του εύρισκόμενος ἀριθμός. Ποιος εἶναι ὁ ἀριθμός;

## V. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΑ

**§ 115. α')** Πατήρ εἶναι  $\alpha$  ἑτῶν, ὁ δὲ νίος αὐτοῦ  $\beta$  ἑτῶν. Πότε ἡ ἡλικία τοῦ πατρὸς θὰ εἶναι ἡ ἡτο τριπλασία τῆς τοῦ υἱοῦ.

Ἐστω διτὶ τὸ ζητούμενον θὰ γίνη μετὰ  $x$  ἔτη. Τότε ὁ πατήρ θὰ εἶναι  $\alpha+x$  ἑτῶν καὶ ὁ νίος  $\beta+x$  ἑτῶν. Πρέπει δὲ νὰ εἶναι :

$$\alpha+x=3(\beta+x) \quad (1) \quad \text{καὶ } x>0.$$

Ἄν τὸ ζητούμενον εἴχε γίνει πρὸ  $x$  ἑτῶν, ὁ πατήρ θὰ ἡτο τότε  $\alpha-x$ , ὁ δὲ νίος  $\beta-x$  ἑτῶν. Πρέπει δὲ νὰ εἶναι :

$$\alpha-x=3(\beta-x) \quad (2) \quad \text{καὶ } x>0.$$

'Αλλ' ἡ ἔξισωσις (2) προκύπτει ἀπὸ τὴν (1), ἀν τὸ  $x$  ἔκεινης γίνη  $-x$ . Τοῦτο φανερώνει διτὶ αἱ ἀρνητικαὶ ρίζαι τῆς (1) εἶναι αἱ θετικαὶ τῆς (2) καὶ ἐπομένως ἡ (1) εἶναι ἡ γενικὴ ἔξισωσις τοῦ προβλήματος.

Εἰς τὰς θετικὰς ρίζας τῆς (1) ἀντιστοιχεῖ λύσις τοῦ προβλήματος πραγματοποιουμένη εἰς τὸ μέλλον· εἰς τὰς ἀρνητικὰς ρίζας τῆς (1) ἀντιστοιχεῖ λύσις τοῦ προβλήματος πραγματοποιηθεῖσα εἰς τὸ παρελθόν.

$$\text{Λύοντες τὴν (1) εύρισκομεν } x = \frac{\alpha - 3\beta}{2}.$$

'Αντίστοιχοι ἡλικίαι εἶναι, τοῦ μὲν πατρὸς  $\alpha + \frac{\alpha - 3\beta}{2}$  δηλ.  $\frac{3(\alpha - \beta)}{2}$  τοῦ δὲ νιοῦ  $\beta + \frac{\alpha - 3\beta}{2} = \frac{\alpha - \beta}{2}$  ἑτῶν, αἱ ὅποιαι εἶναι θετικαί, διότι ὑποτίθεται  $\alpha > \beta$ .

"Ωστε ή τιμή τοῦ  $x$  γίνεται δεκτή.

Καὶ ἂν μὲν  $\alpha - 3\beta > 0$ , εἶναι  $x > 0$  καὶ τὸ ζητούμενον θὰ συμβῇ εἰς τὸ μέλλον. "Αν  $\alpha - 3\beta < 0$ , εἶναι  $x < 0$  καὶ τὸ ζητούμενον συνέβῃ εἰς τὸ παρελθόν. "Αν  $\alpha - 3\beta = 0$ , εἶναι  $x = 0$  καὶ τὸ ζητούμενον συμβαίνει εἰς τὸ παρόν.

**β')** "Αν ή ἡλικία τοῦ Πέτρου εἶναι  $\alpha$  καὶ τοῦ Παύλου  $\beta$  ἔτῶν, πότε ήτοῦ Πέτρου θὰ εἶναι η̄ ήτο μιπλασία τῆς τοῦ Παύλου;

"Υποτίθεται ότι  $\alpha, \beta, \mu$  εἶναι θετικοί καὶ  $\mu \neq 1, \alpha \neq \beta$ . "Εστω ότι τὸ ζητούμενον θὰ γίνη μετά  $x$  ἔτη.

Πρέπει νὰ εἶναι  $\alpha + x = \mu(\beta + x)$  (1) καὶ  $x > 0$ .

"Αν τὸ ζητούμενον εἶχε γίνει πρὸ  $x$  ἔτῶν, πρέπει νὰ εἶναι :

$\alpha - x = \mu(\beta - x)$  (2) καὶ  $x > 0$ .

'Αλλ' ἐπειδὴ ή (2) προκύπτει ἐκ τῆς (1) ἐὰν τὸ  $x$  ἑκείνης γίνη  $-x$ , συνάγεται ότι αἱ ἀρνητικαὶ  $rίζαι$  τῆς (1) εἶναι αἱ θετικαὶ τῆς (2) καὶ συνεπῶς ή (1) εἶναι ή γενική ἐξίσωσις τοῦ προβλήματος.

'Η (1) ισοδυναμεῖ πρὸς τὴν  $(\mu - 1)x = \alpha - \mu\beta$ , ἐκ τῆς δποίας, ἐπειδὴ  $\mu - 1 \neq 0$  διότι ύποτίθεται  $\mu \neq 1$ , εύρισκομεν  $x = \frac{\alpha - \mu\beta}{\mu - 1}$ .

'Αντίστοιχοι ἡλικίαι εἶναι, τοῦ μὲν Πέτρου  $\alpha + \frac{\alpha - \mu\beta}{\mu - 1}$  δηλ.  $\frac{\mu(\alpha - \beta)}{\mu - 1}$  τοῦ δὲ Παύλου  $\beta + \frac{\alpha - \mu\beta}{\mu - 1}$  δηλ.  $\frac{\alpha - \beta}{\mu - 1}$  ἔτῶν, αἱ δποίαι πρέπει νὰ εἶναι θετικαὶ καὶ νὰ μὴ ύπερβαίνουν τὰ ὅρια τῆς ἀνθρωπίνης ἡλικίας.

*Διερεύνησις.* "Επειδὴ  $\mu \neq 1$  ἐξ ύποθέσεως, διακρίνομεν τὰς ἑξῆς περιπτώσεις : "Εστω  $\mu > 1$ : τότε πρέπει νὰ εἶναι  $\alpha > \beta$ , διὰ νὰ εἶναι θετικαὶ αἱ ἡλικίαι  $\frac{\mu(\alpha - \beta)}{\mu - 1}, \frac{\alpha - \beta}{\mu - 1}$ . "Άλλως, τὸ πρόβλημα εἶναι ἀδύνατον.

Καὶ ἂν μὲν εἶναι καὶ  $\alpha > \mu\beta$  θὰ εἶναι  $x > 0$  καὶ τὸ ζητούμενον θὰ συμβῇ εἰς τὸ μέλλον. "Αν  $\alpha < \mu\beta$ , θὰ εἶναι  $x < 0$  καὶ τὸ ζητούμενον συνέβῃ εἰς τὸ παρελθόν, ἀν δὲ  $\alpha = \mu\beta$ , θὰ εἶναι  $x = 0$  καὶ τὸ ζητούμενον συμβαίνει εἰς τὸ παρόν.

"Εστω  $\mu < 1$ : τότε πρέπει νὰ εἶναι  $\alpha < \beta$  διὰ νὰ εἶναι θετικαὶ αἱ ἀνωτέρω ἡλικίαι, θὰ συμβαίνουν δὲ τὰ ἀντίθετα ἀν  $\alpha > \mu\beta$  ή  $\langle \mu\beta$ .

**γ')** "Απὸ τόπον A ἀναχωρεῖ κινητὸν κινούμενον ἐπὶ εὐθείας AΓ διαλῶς μὲ ταχύτητα τὸ μέτρων κατὰ  $1^{\text{st}}$  πρὸς τὴν φορὰν AΓ'. Μετὰ  $\alpha^{\text{st}}$  ἀναχωρεῖ ἀπὸ τόπον B κείμενον μὲτρα ὅπισθεν τοῦ A, ἄλλο κινητὸν κινούμενον διαλῶς πρὸς τὴν αὐτὴν

φοράν μὲ τὸ πρῶτον καὶ μὲ ταχύτητα τ' μέτρων κατὰ 1<sup>5</sup>. Πότε θὰ συναντηθοῦν τὰ δύο κινητά;

'Υποτίθεται ὅτι τ'>τ, διότι ἄλλως οὐδέποτε τὸ δεύτερον θὰ φθάσῃ τὸ πρῶτον.

'Εστω ὅτι θὰ συναντηθοῦν μετὰ x δευτερόλεπτα, ἀπὸ τῆς ἀναχωρήσεως τοῦ πρώτου. Τότε, χρόνος κινήσεως εἶναι τοῦ μὲν πρώτου x τοῦ δὲ ἄλλου x-α δευτερόλεπτα. Διανυθέντα διαστήματα κατὰ τοὺς χρόνους αὐτούς εἶναι τῷ μέτρῳ ὑπὸ τοῦ πρώτου καὶ τ'(x-α) ὑπὸ τοῦ ἄλλου. Πρέπει τὸ β' διάστημα νὰ ὑπερβαίνῃ τὸ πρῶτον κατὰ μ μέτρα, δῆλον. πρέπει νὰ εἶναι τ'(x-α)=tx+μ (1) καὶ x>0.

Λύοντες τὴν ἔξισωσιν αὐτὴν καὶ ἔχοντες ὑπ' ὅψιν ὅτι  $t'-t \neq 0$ , διότι τ'>τ ἐξ ὑποθέσεως, εὑρίσκομεν  $x = \frac{\mu + t'\alpha}{t' - t}$ .

'Η τιμὴ αὐτὴ εἶναι καὶ θετική, ἀφοῦ τ'>τ ἐξ ὑποθέσεως καὶ μ, τ', α ἐπίσης θετικά. 'Επομένως γίνεται δεκτή.

### Προβλήματα

'Ομάς πρώτη (Γενικά). 211. 'Εργάτης τελειώνει ἔργον τι εἰς α ἡμέρα, δεύτερος εἰς β ἡμέρα. Εἰς πόσας ἡμέρας τελειώνουν τὸ ἔργον καὶ οἱ δύο μαζὶ ἐργαζόμενοι;

212. Οἱ μὲν ἐμπρόσθιοι τροχοὶ ἀμάξης ἔχουν περιφέρειαν μήκους α μέτρων, οἱ δὲ ὀπίσθιοι β μέτρων. Ποίαν ἀπόστασιν θὰ διανύσῃ ἡ ἀμάξα, ἢν οἱ ἐμπρόσθιοι κάμψουν ν περιστροφάς περισσοτέρας τῶν διποσθίων;

213. Δαπανᾶ τις τὸ νιοστὸν τοῦ εἰσοδήματος του διὰ τροφὴν, τὸ  $\frac{1}{\alpha}$  αύτοῦ διὰ κατοικίαν, τὸ  $\frac{1}{\beta}$  δι' ἐνοίκιον, τὸ  $\frac{1}{\gamma}$  δι' ἄλλα ἔξοδα καὶ τοῦ περισσεύουν μ δραχμαῖ. Ποιὸν εἶναι τὸ εἰσόδημά του; (μερική περίπτωσις  $\nu = 3$ ,  $\alpha = 4$ ,  $\beta = 6$ ,  $\gamma = 8$ ,  $\mu = 30\,000$ ).

214. Ταξιδιώτης θέλει νὰ διανύσῃ α χιλιόμετρα εἰς η ἡμέρας. Μετὰ ταξείδιον β ἡμερῶν λαμβάνει ἐντολὴν νὰ ἐπιστρέψῃ γ ἡμέρας ἐνωρίτερον. Πόσον διάστημα δφείλει νὰ διανύσῃ καθ' ἡμέραν; (μερική περίπτωσις  $\alpha = 300$ ,  $\eta = 18$ ,  $\beta = 7$  καὶ  $\gamma = 3$ ).

215. Ποσόν τι α διενεμήθη μεταξύ τῶν A, B, Γ, εἰς τρόπον, ὥστε τὸ μέρος τοῦ A πρὸς τὸ μέρος τοῦ B ἔχει λόγον ισον μὲ μ : ν, τὸ δὲ τοῦ B πρὸς τὸ τοῦ Γ ισον μὲ ρ : λ. Τίνα τὰ τρία μέρη;

216. Δύο κεφάλαια ἐτοκίσθησαν τὸ μὲν πρὸς ε<sup>θ</sup>/<sub>0</sub>, τὸ δὲ πρὸς ε'<sup>θ</sup>/<sub>0</sub> καὶ δίδουν ἐτήσιον τόκον τ. Τίνα τὰ κεφάλαια ἢν τὸ ἀθροισμά των εἶναι K;

217. Ἐργάτης τελειώνει ἐν ἔργον εἰς 2 ἡμέρας, ἀλλος εἰς ν ἡμέρας καὶ τρίτος εἰς  $(\mu + \frac{\nu}{2})$ . ἡμ. Εἰς πόσας ἡμέρας θὰ τελειώσουν τὸ ἔργον ἐργαζόμενοι καὶ οἱ τρεῖς μαζὶ;

218. Κεφάλαιον τι προεξοφλούμενον διὰ ν ἡμέρας μὲν ἔξωτερικήν ύφαίρεσιν πρὸς 2% ύφισταται ἔκπτωσιν α δραχμῶν περισσότερον ή ἂν προεξωφλείτο μὲ ἔ-σωτερικήν ύφαίρεσιν. Ποιῶν εἶναι τὸ κεφάλαιον;

‘Ο μᾶς δ ευτέρα 219. Χωρική ἐπώλησε τὸ ἡμισυ τῶν αὐγῶν, τὰ ὅποια είχε καὶ ἡμισυ αὐγόν, χωρὶς νὰ θραύσῃ κανέν. Ἔπωλησε πάλιν τὸ ἡμισυ τῶν ὑπόλοιπων καὶ ἡμισυ αὐγόν, χωρὶς νὰ θραύσῃ κανέν. Τρίτη καὶ τετάρτην φοράν ἐπώλησεν δμοίως. Πόσα εἶχεν ἐξ ἀρχῆς, ἂν εἰς τὸ τέλος τῆς ἔμεινεν 1 αὐγόν;

220. Χωρική ἐσκόπευε νὰ πωλήσῃ δσα αὐγὰ εἶχε πρὸς 1,50 δρχ. ἔκαστον. Ἐπειδὴ ἔσπασαν 3, ἐπώλησε τὰ ὑπόλοιπα πρὸς 1,60 δρχ. ἔκαστον καὶ δὲν ἔζημιώθη. Πόσα εἶχεν ἐξ ἀρχῆς:

221. Βρύσις πληροὶ δεξαμενὴν εἰς τρεῖς ὥρας· ἀλλη τὴν πληροὶ εἰς 4 ὥρας καὶ τρίτη εἰς 6 ὥρας. Εἰς πόσας ὥρας τὴν πληροῦν, ἀν ρέουν καὶ αἱ τρεῖς συγχρόνως;

‘Ο μᾶς τρίτη (Κινήσεως). 222. Ἐκ τίνος τόπου ἀνεχώρησε πεζὸς διατρέχων 60 χλμ. καθ' ἡμέραν. Μετὰ 4 ἡμέρας ἀναχωρεῖ ἐκ τοῦ αὐτοῦ τόπου ἀλλος μὲ τὴν ἐντολὴν νὰ φθάσῃ τὸν πρῶτον εἰς 8 ἡμέρας. Πόσα χιλιόμετρα πρέπει νὰ διευθύσῃ αὐτὸς καθ' ἡμέραν;

223. Ἐξ δύο τόπων ἀπεχόντων 525 χιλμ. ἀναχωροῦν δύο ταχυδρόμοι διευθυνόμενοι πρὸς συνάντησίν των. Ἐάν ὁ μὲν εἰς διανύῃ 50 χλμ, ὁ δὲ ἀλλος 55 χλμ. καθ' ἡμέραν, πότε θὰ συναντήσουν;

224. Ἀπὸ σημείου Α κινεῖται εὐθυγράμμως σῶμά τι διανύον 32 μ. εἰς 4δ καὶ διευθύνεται πρὸς Β. Μετὰ 3δ ἀναχωρεῖ ἐκ τοῦ Α ἀλλο σῶμα πρὸς τὴν φορὰν ΑΒ κινούμενον καὶ διανύον 60 μέτρα εἰς 5δ. Πότε καὶ ποῦ θὰ συναντήσῃ τὸ πρῶτον σῶμα;

225. Ἀπὸ τόπου Α ἀναχωρεῖ ἀμάξιστοιχία καὶ διευθύνεται πρὸς τὸν Β διανύοντα 30 χλμ. καθ' ὥραν. Μίαν ώραν βραδύτερον ἀναχωρεῖ ἐκ τοῦ Α διευθυνομένη πρὸς τὸν Β ἀμάξιστοιχία διανύοντα 50 χλμ. καθ' ὥραν. Μετὰ πόσας ὥρας καὶ εἰς ποιάν ἀπόστασιν ἀπὸ τὸν Α θὰ φθάσῃ ἡ δευτέρα τὴν πρώτην;

226. Ποδηλάτης ἀναχωρεῖ ἀπὸ τίνος τόπου διανύων 12 χλμ. τὴν ώραν. Τρεῖς ὥρας βραδύτερον ἀναχωρεῖ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ τόπου ἀλλος διανύων 16 χλμ. τὴν ώραν. α') Πότε θὰ προηγήσται ὁ πρῶτος τοῦ δευτέρου 12 χλμ; β') Πότε θὰ προηγήσται ὁ δεύτερος τοῦ πρώτου 50 χιλιόμετρα;

227. Τὴν 10ην πρωινὴν ώραν ἀναχωρεῖ ποδηλάτης ἀπὸ τόπου Α διανύων 12 χλμ. καθ' ώραν. Ποιάν ώραν πρέπει ν' ἀναχωρήσῃ δεύτερος ἐκ τοῦ Α, ὥστε διανύων 16 χλμ. καθ' ώραν νὰ φθάσῃ τὸν πρῶτον εἰς τρεῖς ὥρας;

228. Ἀπὸ σημείου περιφερείας κύκλου ἀναχωροῦν δύο κινητὰ καὶ διανύουν ἀντιστοίχως α<sup>θ</sup> καὶ β<sup>θ</sup> (αβ) εἰς 1 δ. Πότε θὰ συναντηθοῦν, ἀν διευθύνωνται α') ἀντιθέτως, β') πρὸς τὴν αὐτὴν φοράν;

229. Ἀπὸ σημείου περιφερείας ἀναχωροῦν δύο κινητὰ διανύοντα ταύτην εἰς

χρόνους  $\tau_1$  καὶ  $\tau_2$  ( $\tau_1 > \tau_2$ ). Πότε θὰ συναντηθοῦν διὰ 1ην, 2αν,...νην φοράν, ἀν κινοῦνται πρὸς τὴν αὐτήν ἢ τὴν ἀντίθετον φοράν;

230. Μετὰ πόσην ὥραν ἀπὸ τῆς μεσημβρίας συμπίπτουν οἱ δεῖκται τῶν ὡρῶν καὶ τῶν πρώτων λεπτῶν ὥροιογίου;

231. Πότε μετὰ μεσημβρίαν οἱ αὐτοὶ δεῖκται (τοῦ προηγουμένου προβλήματος) σχηματίζουν ὁρίθην γωνίαν. διὰ 1ην, 2αν, 3ην, τελευταίαν φοράν;

232. Πότε μετὰ τὴν μεσημβρίαν οἱ δεῖκται τοῦ προηγουμένου προβλήματος σχηματίζουν γωνίαν  $\alpha^{\circ}$  διὰ 1ην, 2αν, 3ην ... τελευταίαν φοράν;

233. Πότε μετὰ μεσημβρίαν ὁ δεῖκτης τῶν δευτερολέπτων διχοτομεῖ τὴν γωνίαν τῶν δύο ἄλλων διὰ 1ην φοράν;

234. Κύων διώκει ἀλώπεκα, ἡ ὁποία ἀπέχει τοῦ κυνὸς 60 πηδήματα αὐτῆς. "Οταν αὐτῇ κάμην 9 πηδήματα, ὁ κύων κάμνει 6." Άλλα τρία πηδήματα αὐτοῦ ἰσοδυναμοῦν μὲ 7 ἑκείνης. Μετὰ πόσα πηδήματα αὐτοῦ θὰ τὴν φθάσῃ ὁ κύων;

## B'. ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

### 1. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΣ

**§ 116. α')** Ταξιδεύων τις λαμβάνει μαζί του 350 000 δρχ. καὶ ἔξοδεύει καθ' ἡμέραν 8 000 δρχ.

Ἐάν ταξιδεύσῃ ἐπὶ δύο ἡμέρας, θὰ ἔξοδεύσῃ  $8\,000 \cdot 2$  δρχ., ἐὰν ἐπὶ τρεῖς, τέσσαρας ἡμέρας, θὰ ἔξοδεύσῃ  $8\,000 \cdot 3$  δρχ.,  $8\,000 \cdot 4$  δρχ. καὶ ἐπὶ x ἡμέρας, θὰ ἔξοδεύσῃ  $8\,000 \cdot x$  δρχ., θὰ τοῦ μείνουν δὲ καὶ  $350\,000 - 8\,000x$  δρχ.

Καθὼς βλέπομεν, θὰ εὑρωμεν πόσαι δραχμαὶ θὰ τοῦ μείνουν, ἀν γνωρίζωμεν πόσας ἡμέρας διήρκεσε τὸ ταξείδιον. Ἐάν παραστήσωμεν μὲ ψ τὸν ἀριθμὸν τῶν δραχμῶν, αἱ ὁποῖαι θὰ τοῦ μείνουν μετὰ x ἡμέρας, θὰ ἔχωμεν ὅτι  $\psi = 350\,000 - 8\,000x$  δρχ. καὶ ἐὰν εἰναι τὸ x = 5, τὸ ψ =  $350\,000 - 8\,000 \cdot 5 = 350\,000 - 40\,000 = 310\,000$  δρχ.

**β')** Εἰς ποδηλάτης διήνυσεν 21 χλμ. διὰ νὰ φθάσῃ εἰς ἔνα ωρισμένον τόπον. Ἀπὸ τοῦτον ἔξηκολούθησε τὸν δρόμον του καὶ διήνυσε 17 χλμ. καθ' ὥραν.

Μετὰ x ώρας διήνυσε 17x χλμ. ἀπὸ τὸν τόπον, ἀπ' ἀρχῆς δὲ ἐν ὅλῳ  $21 + 87x$  χλμ. Ἐάν παραστήσωμεν μὲ ψ τὸν διανυθέντα δρόμον, θὰ ἔχωμεν ὅτι  $\psi = 21 + 17x$ . (1)

Ἐάν γνωρίζωμεν πόσας ώρας ἔξηκολούθησε τὸν δρόμον του ἀπὸ

τὸν ὡρισμένον τόπον, δηλαδὴ ἀν γνωρίζωμεν τὴν τιμὴν τοῦ  $x$ , δυνάμεθα νὰ εὔρωμεν τὴν τιμὴν τοῦ  $\psi$  ἐκ τῆς ἴσοτητος (1).

Π.χ. ἂν τὸ  $x=2$ , θὰ ἔχωμεν  $\psi=21+17\cdot2=21+34=55$ . Ἀν εἴναι  $x=3$ , τότε  $\psi=21+17\cdot3=21+51=72$ .

Αἱ ποσότητες  $x$  καὶ  $\psi$ , αἱ ὁποῖαι λαμβάνουν διαφόρους τιμὰς εἰς καθὲν τῶν ἀνωτέρω προβλημάτων, λέγονται μεταβληταί. Ἐνῷ αἱ ποσότητες, αἱ ὁποῖαι ἔχουν μίαν καὶ τὴν αὐτὴν τιμὴν εἰς ἐν πρόβλημα, λέγονται σταθεραί. Π.χ. τὸ ποσὸν τῶν χρημάτων, τὸ ὅποιον ἔλαβεν ὁ ἀνωτέρω ταξειδιώτης μαζί του καὶ ἡ ἀπόστασις, τὴν ὅποιαν διήνυσεν ὁ ποδηλάτης κατ' ἀρχὰς, διὰ νὰ φθάσῃ εἰς τὸν ὡρισμένον τόπον, εἴναι σταθεραὶ ποσότητες.

Εἰς καθὲν τῶν ἀνωτέρω προβλημάτων ἡ μεταβλητὴ ποσότης  $\psi$  συνδέεται μὲ τὴν  $x$  οὕτως, ὥστε, ὅταν δύσωμεν εἰς τὴν  $x$  τιμὴν τινα ὡρισμένην, εύρισκομεν καὶ τὴν τιμὴν τῆς  $\psi$ . Ἡ μεταβλητὴ  $x$ , εἰς τὴν ὅποιαν δίδομεν αὐθαιρέτως τὴν τιμὴν, τὴν ὅποιαν θέλομεν, καλεῖται ἀνεξάρτητος μεταβλητή, ἡ δὲ  $\psi$ , τῆς ὅποιας ἡ τιμὴ ἔξαρταται ἐκ τῆς τιμῆς τῆς  $x$ , καλεῖται συνάρτησις τῆς  $x$ . Ἐν γένει :

Ἐὰν δύο μεταβληταὶ  $x$  καὶ  $\psi$ , συνδέωνται μεταξύ των κατὰ τοιοῦτον τρόπον, ὥστε εἰς καθεμίαν δοθεῖσαν τιμὴν τῆς  $x$  νὰ εὔρισκωμεν ἀντιστοίχους τιμὰς τῆς  $\psi$ , τότε ἡ  $\psi$  θὰ λέγεται συνάρτησις τῆς  $x$ , ἡ δὲ  $x$  ἀνεξάρτητος μεταβλητή.

Κατὰ ταῦτα ἡ ἐπιφάνεια τοῦ κύκλου είναι συνάρτησις τῆς ἀκτίνος αὐτοῦ. Διότι ἀν μὲ  $x$  παραστήσωμεν τὴν ἀκτίνα τοῦ κύκλου καὶ  $\psi$  τὸ ἐμβαδόν του, θὰ ἔχωμεν ὅτι εἴναι  $\psi=\pi x^2$  καὶ τὸ μὲν πτ εἴναι ἀριθμὸς ὡρισμένος (ἴσος μὲ 3,141 μὲ προσέγγισιν), τὸ δὲ  $\psi$  εύρισκεται, ὅταν δοθῇ εἰς τὸ  $x$  ὡρισμένη τις τιμή. Όμοίως τὸ ἐμβαδὸν τοῦ τριγώνου τοῦ ἔχοντος βάσιν ὡρισμένην  $\alpha$ , είναι συνάρτησις τοῦ ὑψους αὐτοῦ. Διότι ἔχομεν ὅτι  $\psi=\frac{1}{2}\alpha x$ , ἀν τὸ  $x$  παριστάνη τὸ ὕψος τοῦ τριγώνου καὶ τὸ  $\psi$  τὸ ἐμβαδὸν αὐτοῦ.

### Ἄσκήσεις

235. Εὔρετε παραδείγματα ἔξαρτήσεως δύο ποσῶν, τὰ ὁποῖα παρουσιάζονται εἰς τὸν κοινὸν βίον, ἐκ τῶν ὁποίων τὸ ἐν νὰ είναι συνάρτησις τοῦ ἄλλου (χρόνος, ἔργασία καὶ ἀμοιβή, ὅξια ἐμπορεύματος καὶ βάρος κ.τ.λ.).

236. Εὔρετε παραδείγματα συναρτήσεων ἐκ τῆς Φυσικῆς (τὸ διανυόμενον

διάστημα καὶ ἡ ταχύτης εἰς τὸ κενὸν, τὸ διάστημα καὶ ἡ ταχύτης κ.τ.λ.). Ὁμοίως ἐκ τῆς Γεωμετρίας.

**§ 117. Πίνακες τιμῶν συναρτήσεως.** Εστω μία συνάρτησις  $\psi$ , ἡ ὁποία είναι ἵστη μὲν  $13+5x$ . Ἡτοι ἔστω ὅτι ἔχομεν  $\psi=13+5x$ . (1)

Ἐὰν εἰς τὴν ἀνεξάρτητον μεταβλητὴν  $x$  δώσωμεν κατὰ σειρὰν τὰς τιμὰς  $0, 1, 2, 3, \dots$  δυνάμεθα νὰ εὔρωμεν τὰς ἀντιστοίχους τιμὰς τῆς  $\psi$ , ἀν θέσωμεν εἰς τὴν (1) ἀντὶ τοῦ  $x$  τὰς τιμὰς του. Οὕτως ἔχομεν ὅτι :

$$\text{ὅταν εἴναι } x = 0, \text{ τὸ } \psi = 13 + 5 \cdot 0 = 13,$$

$$\text{ὅταν εἴναι } x = 1, \text{ τὸ } \psi = 13 + 5 \cdot 1 = 18,$$

$$\text{ὅταν εἴναι } x = -2, \text{ τὸ } \psi = 13 + 5 \cdot (-2) = 3.$$

‘Ομοίως διὰ τὴν συνάρτησιν  $\psi=144-6x$  ἔχομεν ὅτι :

$$\text{ὅταν εἴναι } x = 0, \quad \psi = 144 - 6 \cdot 0 = 144,$$

$$\text{ὅταν εἴναι } x = -1, \quad \psi = 144 + 6 \cdot 1 = 150.$$

Ἐν γένει, ἐὰν δοθῇ μία συνάρτησις π.χ. ἡ  $\psi$  μιᾶς ἀνεξαρτήτου μεταβλητῆς, ἔστω τῆς  $x$  καὶ διὰ δοθείσας τιμὰς τοῦ  $x$  γράψωμεν, τὰς ἀντιστοίχους τιμὰς τῆς  $\psi$ , καθὼς εἰς τὰ ἀνωτέρω παραδείγματα, λέγομεν ὅτι σχηματίζομεν πίνακα τῶν τιμῶν τούτων τῆς συναρτήσεως αὐτῆς.

### Α σκήσεις

237. Σχηματίσατε διὰ τὰς τιμὰς  $x = 1, 2, 3, 4, 5, -1, x = -2, -3, -\frac{1}{2}$  τὸν πίνακα τῶν τιμῶν τῶν κάτωθι συναρτήσεων :

$$\alpha') \psi = 3x + 5, \beta') \psi = 8x - 25, \gamma') \psi = x, \delta') \psi = -x.$$

238. ‘Ομοίως τῶν κάτωθι συναρτήσεων :

$$\alpha') \psi = \frac{3}{4} x - 62, \quad \beta') \psi = \frac{x^2}{2} - 3x - 7.$$

$$239. \text{‘Ομοίως τῶν } \alpha') \psi = \frac{4}{19} x^2 + \frac{3}{3} x + 9, \beta') \psi = 600 - 35x + \frac{13}{15} x.$$

### 2. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΙΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΣ

**§ 118.** Καθὼς τοὺς σχετικοὺς ἀριθμοὺς παριστάνομεν μὲ σημεῖα τῆς εὐθείας τῶν ἀριθμῶν ἢ τοῦ ἄξονος τῶν τετμημένων οὕτω δυνάμεθα νὰ παριστάνωμεν μὲ σημεῖα τὰ ζεύγη τῶν τιμῶν

τῆς ἀνεξαρτήτου μεταβλητῆς καὶ συναρτήσεως ταύτης. Ἐστω ὅτι ἔχομεν τὴν συνάρτησιν  $\psi = 2x + 1$ . (1)

Ἐئαν δώσωμεν εἰς τὴν  $x$  τὴν τιμὴν 1 ἔχομεν  $\psi = 2 \cdot 1 + 1 = 3$ .


Λαμβάνομεν τὸν ἄξονα τῶν τετμημένων  $x'$  καὶ ἐπ' αὐτοῦ εύρισκομεν τὸ σημεῖον Θ (ὅπου  $O\Theta = 1$ ), τὸ ὁποῖον παριστάνει τὴν τιμὴν  $x = 1$ . Τὴν τιμὴν τῆς  $\psi$  θὰ παριστάνωμεν κατ' ἀνάλογον τρόπον μὲ ἐν σημείον μιᾶς ἄλλης εὐθείας  $\psi'$ , τὴν ὁποίαν λαμβάνομεν συνήθως κάθετον ἐπὶ τὴν  $x'$  εἰς τὸ σημεῖον 0. Ταύτης τὸ μὲν Οψίναι τὸ τμῆμα τῶν θετικῶν τιμῶν τῆς  $\psi$ , τὸ δὲ Οψ' τὸ τῶν ἀρνητικῶν (σχ. 6).

Οὔτως ἡ τιμὴ τῆς  $\psi = 3$  θὰ παριστάνηται ὑπὸ τοῦ σημείου  $P$  τῆς Οψί, ἐνῷ εἶναι ( $OP = 3$ ). Ἐάν ἐκ τοῦ Θ φέρωμεν παράλληλον πρὸς τὴν Οψί καὶ ἐκ τοῦ  $P$  πρὸς τὴν  $Ox$ , αἱ εὐθεῖαι αὗται τέμνονται εἰς ἐν σημεῖον, ἔστω τὸ  $M$ . Θὰ λέγωμεν ὅτι τὸ σημεῖον  $M$  παριστάνει τὸ ζεῦγος τῶν τιμῶν τοῦ  $x = 1$  καὶ  $\psi = 3$  τῆς συναρτήσεως  $\psi = 2x + 1$ . Καθ' ὅμοιον τρόπον εύρισκομεν τὸ σημεῖον τὸ παριστάνον τὸ ζεῦγος τῶν τιμῶν  $x = 2$  καὶ  $\psi = 2 \cdot 2 + 1 = 5$ , ἡ ὁποία εὐρίσκεται ἐκ τῆς (1), ἐὰν θέσωμεν ὅπου  $x$  τὸ 2. Τοῦτο παριστάνεται ὑπὸ τοῦ σημείου  $M'$ , τὸ ὁποῖον εἶναι ἡ τομὴ τῆς εὐθείας  $\Pi_2 M'$ , παραλλήλου πρὸς τὴν Οψί ἐκ τοῦ σημείου  $P_2$  τῆς  $x'$ , παριστάνοντος τὸν ἀριθμὸν  $x = 2$  καὶ τῆς  $\Sigma M'$ , παραλλήλου πρὸς τὴν  $Ox$  ἐκ τοῦ σημείου  $\Sigma$ , τοῦ παριστάνοντος τὴν τιμὴν  $\psi = 5$ . Διὰ τὴν τιμὴν  $x = -2$  ἔχομεν ἐκ τῆς (1)

$$\psi = 2 \cdot (-2) + 1 = -4 + 1 = -3.$$

Εύρισκομεν δὲ τὸ σημεῖον  $\Pi'_2$  ἐπὶ τῆς  $x'$ , τὸ  $P'$  ἐπὶ τῆς  $\psi'$  καὶ τὸ  $M''$  τομὴ τῆς ἐκ τοῦ  $\Pi'_2$  παραλλήλου πρὸς τὴν  $\psi'$  καὶ τῆς ἐκ τοῦ  $P'$  παραλλήλου πρὸς τὴν  $x'$ , τὸ ὁποῖον παριστάνει τὸ ζεῦγος τῶν τιμῶν  $x = -2$ ,  $\psi = -3$  τῆς  $x$  καὶ τῆς συναρτήσεως (1).

'Ἐν γένει καθέν ζεῦγος τῶν ἀντιστοιχουσῶν τιμῶν τῆς ἀνεξαρτήτου μεταβλητῆς καὶ τῆς συναρτήσεως θὰ παριστάνηται μὲ ἐν σημεῖον, τὸ ὁποῖον εἶναι τομὴ δύο εὐθειῶν παραλλήλων πρὸς



Σχ. 6

τὰς εύθειας  $x'x$  καὶ  $\psi'\psi$ . Ἐκ τούτων ἡ μὲν παράλληλος πρὸς τὴν  $\psi'\psi$  ἔγεται ἐκ τοῦ σημείου τοῦ παριστῶντος τὴν τιμὴν τοῦ  $x$  ἐπὶ τῆς εύθειας  $x'x$ , ἡ δὲ πρὸς τὴν  $x'x$  ἐκ τοῦ σημείου τοῦ παριστῶντος τὴν τιμὴν τῆς  $\psi$  ἐπὶ τῆς εύθειας  $\psi'\psi$ .

Δυνάμεθα ταχύτερον νὰ εὔρωμεν τὸ ἐν λόγῳ σημεῖον ὡς ἑξῆς :

Ἐκ τοῦ σημείου τῆς  $x'x$  (ἢ τῆς  $\psi'\psi$ ) τοῦ παριστῶντος τὴν τιμὴν τῆς  $x$  (ἢ τῆς  $\psi$ ) φέρομεν τμῆμα εύθειας παράλληλον πρὸς τὴν εὐθεῖαν  $\psi'\psi$  (ἢ τὴν  $x'x$ ) καὶ ἵσον μὲ τόσας μονάδας μήκους, ὅση εἶναι ἡ τιμὴ τῆς  $\psi$  (ἢ τῆς  $x$ ) πρὸς τὰ ἀνω μὲν (ἢ δεξιά), ἀν ἡ τιμὴ τῆς  $\psi$  (ἢ τῆς  $x$ ) εἶναι θετική, πρὸς τὰ κάτω δὲ (ἢ ἀριστερά), ἀν εἶναι ἀρνητική.


Ἐάν ἔχωμεν τὴν συνάρτησιν  $\psi = 2x - 3$ , ὅταν  $x = 1$ , θὰ εἶναι  $\psi = 2 \cdot 1 - 3 = -1$ . Εύρισκομεν τὸ σημεῖον, τὸ ὁποῖον παριστάνει

τὸ ζεῦγος τῶν τιμῶν 1, καὶ -1 τῆς  $x$  καὶ  $\psi$ , ἐάν ἀπὸ τὸ σημεῖον τὸ παριστάνον τὴν τιμὴν -1 τῆς  $\psi$  ἐπὶ τοῦ Οψ' φέρωμεν τμῆμα εύθειας παράλληλον τῆς Οχ καὶ ἵσον μὲ 1. Τὸ σημεῖον τοῦτο σημειώνομεν μὲ (1, -1) εἰς τὸ σχ. 7.

Ομοίως, ὅταν  $x = 2$ , θὰ εἶναι  $\psi = 2 \cdot 2 - 3 = +1$ . Τὸ δὲ σημεῖον (2, 1) παριστάνει τὸ ζεῦγος τῶν τιμῶν 2 καὶ 1 κ.ο.κ.

Τὴν εὐθεῖαν  $x'x$  καλοῦμεν συνήθως ἄξονα τῶν  $x$  ἢ τῶν τε-

τμημάτων, τὴν δὲ εὐθεῖαν  $\psi'\psi$  ἄξονα τῶν  $\psi$  ἢ τῶν τεταγμάτων, τοὺς δύο δὲ ἄξονας μὲ ἐν ὄνομα ἄξονας τῶν συντεταγμάτων  $x$  καὶ  $\psi$ . Συνήθως λαμβάνομεν τὸν ἄξονα τῶν  $x$  ὄριζόντιον, τὸν δὲ τῶν  $\psi$  κάθετον ἐπὶ τὸν πρῶτον. Τὴν τιμὴν τῶν  $x$  καὶ  $\psi$  καλοῦμεν ἀντιστοίχως τετμημένην καὶ τεταγμένην τοῦ σημείου τοῦ παριστάνοντος τὸ ζεῦγος τῶν δύο τούτων τιμῶν καὶ τὰς δύο δὲ μὲ ἐν ὄνομα καλοῦμεν συντεταγμένας τοῦ σημείου.



Σχ. 7

Α σ κ ή σ εις

240. Παραστήσατε μὲ σημεῖα τὰ ζεύγη τῶν τιμῶν τῆς  $x$  καὶ ψ τῶν κάτωθι συναρτήσεων διὰ τὰς σημειουμένας τιμάς τοῦ  $x$ :


$$\alpha') \psi = x + 2, \beta') \psi = \frac{1}{2} x + 1, \gamma') \psi = \frac{2}{4} x - 2, \text{ δταν } x = 0, 1, 2, -1, -2.$$

$$241. \psi = \frac{3}{4} x - \frac{2}{5} x^2, \quad \text{δταν } x = 0, 1, 3, 4.$$

$$242. \alpha') \psi = \frac{1}{2} x^2 - x^3, \beta') \psi = -\frac{3}{4} x^2 + 5, \text{ δταν } x = 0, -1, -2, 2, 3.$$

**§ 119. Ηαρατίγησις.** Τὸν ἀνωτέρῳ τρόπῳ τῆς παραστάσεως ζεύγους τιμῶν μεταχειρίζονται συχνὰ διὰ νὰ συγκρίνουν μεταξὺ των πλῆθος παρατηρήσεων. Ἐστω π.χ. ὅτι γνωρίζομεν τὴν θερμοκρασίαν, τὴν ὁποίαν δεικνύει τὸ θερμόμετρον τὴν 8ην πρωινὴν ὥραν καθ' ἡμέραν ἐπὶ ἔνα μῆνα. Λαμβάνομεν ἐν ὥρισμένον τμῆμα ὡς μονάδα μήκους, ἡ ὁποία θὰ παριστάνῃ τὴν μίαν ἡμέραν ἐπὶ τοῦ ἄξονος τῶν  $x$ , ἔστω ἵστον μὲ 0,01 μ. Ἐπίσης ἔνα ἄλλο ἐπὶ τοῦ ἄξονος τῶν  $\psi$ , ἔστω τὸ 0,01 μ, τὸ ὁποῖον θὰ παριστάνῃ τὸν ἔνα βαθμὸν (ἢ περισσοτέρους) τοῦ θερμομέτρου. Ἀφοῦ εὔρωμεν τὰ σημεῖα, τὰ ὁποῖα παριστάνουν τὰ ζεύγη τῶν τιμῶν (τῶν ἡμερῶν τοῦ μηνὸς καὶ τῶν ἀντιστοίχων βαθμῶν τοῦ θερμομέτρου), συνδέομεν τὰ διαδοχικὰ σημεῖα ἀπὸ τοῦ πρώτου καὶ ἔξῆς μὲ τμήματα εύθειῶν. Ἡ γραμμὴ, τὴν ὁποίαν οῦτως εύρισκομεν, δίδει μίαν εἰκόνα τῶν μεταβολῶν τῆς θερμοκρασίας κατὰ τὸν θεωρούμενον μῆνα.

Ἡ γραμμὴ αὕτη καλεῖται συνήθως γραμμὴ τῆς θερμοκρασίας τοῦ ἐν λόγῳ μηνός. Καθ' ὅμοιον τρόπῳ ἀπεικονίζομεν τὴν μεταβολὴν



Σχ. 8

τῆς θερμοκρασίας τοῦ σώματος ἐνὸς ἀσθενοῦς, παρατηροῦντες αὐτὴν π.χ. δις τῆς ήμέρας (τὴν πρωίαν καὶ ἑσπέραν συνήθως) καὶ λαμβάνοντες τὸν μέσον ὄρον των, διὰ νὰ ἔχωμεν τὴν μέσην θερμοκρασίαν τῆς ήμέρας. Τὴν γραφμήν, τὴν ὅποιαν οὕτω θὰ εύρωμεν, καλοῦμεν συνήθως γραφμὴν τοῦ πυρετοῦ τοῦ ἀσθενοῦς.

Ταύτας κατασκευάζομεν συνήθως ἐπὶ τετραγωνισμένου χάρτου, ἐνίστε δὲ παραλείπονται οἱ ἀξόνες, ώς εἰς τὸ ἀνωτέρω σχῆμα. Π.χ. ἂν ἡ θερμοκρασία ἐνὸς τόπου κατά τινα ήμέραν δίδεται ώς ἔξης :

ώρα	7	-3°	ώρα	13	5,7°
»	8	-1,5°	»	14	6°
»	9	1°	»	15	5°
»	10	3°	»	16	4°
»	11	4°	»	17	3°
»	12	5°	»	18	2,4°

ἀπεικονίζεται αὗτη γραφικῶς ὑπὸ τοῦ ἀνωτέρω σχήματος 8.

Αντιστρόφως ἐνίστε ἐκ τῆς ἀπεικονίσεως τῆς μεταβολῆς μιᾶς μεταβλητῆς ἐννοοῦμεν τὴν πορείαν τῶν ἀριθμητικῶν τιμῶν τῆς μεταβλητῆς, καθὼς π.χ. ἐκ τῆς ἀνωτέρω εἰκόνος τῆς μεταβολῆς τῆς θερμοκρασίας ἀσθενοῦς.

### Α σ κ ή σ ε ις

243. 'Η μέση μηνιαία θερμοκρασία μιᾶς πόλεως είναι διὰ τοὺς μῆνας ἐνὸς ξετοὺς κατά σειρὰν  $4^{\circ}, -2,3^{\circ}, +3,3^{\circ}, +6,5^{\circ}, +13^{\circ}, +16,6^{\circ}, +17,8^{\circ}, +19,5^{\circ}, +13,9^{\circ}, +9^{\circ}, +3,1^{\circ}, -2,6^{\circ}$ .

Λάβετε ὡς μονάδα μὲν μετρήσεως τοῦ μηνὸς ἐπὶ τοῦ ἀξονος τῶν  $x$  τὸ  $0,01\mu$  ὡς μονάδα δὲ μετρήσεως ἐνὸς βαθμοῦ ἐπὶ τοῦ ἀξονος τῶν  $\psi$  ἐπίσης τὸ  $0,01\mu$ . Εὔρετε τὴν γραφμήν τῆς θερμοκρασίας τῆς πόλεως.

244. 'Η αύξησις τοῦ πληθυσμοῦ μιᾶς πόλεως κατὰ τὸ 1890 ἦτο 54 χιλιάδες καὶ κατὰ τὰ ἐπόμενα ἔτη κατὰ σειρὰν μέχρι τοῦ 1903 ἦτο 56, 46, 38, 32, 35, 37, 48, 52, 87, 79, 69, 90, 97 χιλιάδες. Λάβετε ὡς μονάδα μῆκος πρὸς παράστασιν τοῦ ἔτους ἐπὶ τοῦ ἀξονος τῶν  $x$  καὶ τῆς χιλιάδος ἐπὶ τοῦ ἀξονος τοῦ  $\psi$  τὸ  $0,05\mu$ . Απεικονίσατε τὴν πορείαν τῆς αύξησεως τοῦ πληθυσμοῦ τῆς πόλεως.

### 3. ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΣ $\psi = \alpha x + \beta$

§ 120. 'Η συνάρτησις  $\psi = \alpha x + \beta$ , ὅπου τὸ  $\alpha$  εἶναι σταθε-

ρά τις ποσότης  $\neq 0$  καὶ  $\beta = 0$ , παριστάνει εύθεϊαν γραμμήν διερχομένην διὰ τῆς ἀρχῆς τῶν ἀξόνων Ο.

Διότι ἔστω πρῶτον τὸ  $\alpha > 0$ , π.χ.  $\alpha = 1$ , ὅτε ἡ συνάρτησις εἶναι  $\psi = x$ . Ἐὰν εἰς τὴν  $x$  δώσωμεν κατὰ σειρὰν τὰς τιμὰς  $0, 1, 2, 3, 4, \dots$  (1), τὸ  $\psi$  λαμβάνει τὰς τιμὰς  $0, 1, 2, 3, 4, \dots$  (2).

Ἐὰν σημειώσωμεν ἐπὶ τοῦ ἄξονος τῶν  $x$  (σχ. 9) τὰ σημεῖα τὰ παριστάνοντα τὰς τιμὰς (1) τῆς  $x$  καὶ τὰ σημεῖα ἐπὶ τοῦ ἄξονος τῶν  $\psi$  τὰ παριστάνοντα τὰς τιμὰς (2) τῆς  $\psi$ , παρατηροῦμεν ὅτι, τὰ σημεῖα τὰ παριστάνοντα τὰ  $\zeta$ ύγη τῶν τιμῶν  $(0,0)$ ,  $(1, 1)$ ,  $(2, 2), \dots$  κείνται ἐπὶ μιᾶς εὐθείας γραμμῆς, ἔστω τῆς ΟΓ.


Διότι ἔστω ὅτι  $M_1$  εἶναι τὸ σημεῖον μὲ συντεταγμένας  $(1, 1)$  καὶ  $M_2$  τὸ σημεῖον μὲ συντεταγμένας  $(2, 2)$ . Συνδέομεν τὸ  $0$  μὲ τὰ  $M_1$  καὶ  $M_2$  δι' εὐθυγράμμων τμημάτων  $OM_1$ ,  $OM_2$ . Παρατηροῦμεν ὅτι εἶναι γωνία  $xOM_1 = \gamma$ ων  $xOM_2$ , ἅρα τὰ σημεῖα  $O$ ,  $M_1$ ,  $M_2$  κείνται ἐπὶ εὐθείας, δηλαδὴ ἡ  $OM_1M_2$ , εἶναι εὐθεία γραμμή. Ἐὰν εἰς τὸ  $x$  δώσωμεν τὰς τιμὰς  $-1, -2, -3, \dots$ , εύρισκομεν ὅτι τὸ  $\psi$  λαμβάνει τὰς τιμὰς  $-1, -2, -3, \dots$ , τὰ δὲ σημεῖα, τὰ ὅποια παριστάνουν τὰ  $\zeta$ ύγη  $(-1, -1)$ ,  $(-2, -2), \dots$ , κείνται ἐπὶ τῆς εὐθείας ΟΓ', ἡ ὅποια εἶναι προέκτασις τῆς ΟΓ. Ἐπομένως ἡ συνάρτησις  $\psi = x$ , παριστάνει τὴν εὐθεῖαν  $\Gamma\Gamma'$  (σχῆμα 9).

Ἐστω ὅτι εἶναι τὸ  $\alpha < 0$ , π.χ.  $\alpha = -2$ , ὅτε ἔχομεν  $\psi = -2x$ . Εύρισκομεν καθ' ὅμοιον τρόπον δύο ἡ περισσότερα σημεῖα θέτοντες π.χ.  $x=0$ , ἔπειτα  $x=1, x=-1, \dots$  Οὗτω δὲ παρατηροῦμεν ὅτι ἡ συνάρτησις  $\psi = -2x$  παριστάνει εὐθεῖαν  $\Gamma\Gamma'$  διερχομένην διὰ τοῦ σημείου  $O$ .


Ομοίως ἐργαζόμεθα, ἐὰν τὸ  $\alpha$  ἔχῃ ἄλλην οἰανδήποτε τιμὴν θετικὴν ἡ ἀρνητικὴν καὶ παρατηροῦμεν ὅτι ἡ συνάρτησις  $\psi = \alpha x$  παριστάνει εὐθεῖαν γραμμήν διερχομένην διὰ τοῦ  $O$ .

**§ 121.** Τὴν συνάρτησιν  $\psi = \alpha x + \beta$  (ἄν εἶναι  $\alpha, \beta \neq 0$ ) δυνάμεθα νὰ ἀπεικονίσωμεν γραφικῶς, ἐὰν εἰς τὴν τεταγμένην ἑκάστου σημείου τῆς εὐθείας, τὴν ὅποιαν παριστάνει ἡ  $\psi = \alpha x$ , προσθέσωμεν τὴν ποσότητα  $\beta$ . Ἀλλὰ τοῦτο σημαίνει νὰ μεταφέρωμεν τὴν εὐθεῖαν  $\psi = \alpha x$  παραλλήλως πρὸς ἑαυτὴν ἐνω τὴν κάτω, καθ' ὅσον τὸ  $\beta$  εἶναι ἀριθμὸς θετικὸς ἡ ἀρνητικός. Ἐπομένως ἡ συνάρτησις  $\psi = \alpha x + \beta$  παριστάνει εὐθεῖαν γραμμήν (σχ. 10).

Η έξισωσις  $\psi = \beta$  παριστάνει τὰ σημεῖα τὰ ἔχοντα τεταγμένην β. Προφανῶς ταῦτα κείνται ἐπ' εὐθείας παραλλήλου πρὸς τὸν ἄξονα τῶν  $x$  καὶ ἀπεχούσης ἀπόστασιν  $\beta$  ἀπ' αὐτοῦ. Ἀρα, ἡ έξισωσις  $\psi = \beta$  παριστάνει εὐθεῖαν γραμμὴν παραλληλού πρὸς τὸν ἄξονα τῶν  $x$ .



Σχ. 9



Σχ. 10

Όμοιώς εύρισκομεν ὅτι ἡ  $x = \alpha$  παριστάνει εὐθεῖαν παράλληλον πρὸς τὸν ἄξονα τῶν  $\psi$  καὶ ἀπέχουσαν ἀπόστασιν  $\alpha$  ἀπὸ αὐτόν.

Η  $\psi = 0$  παριστάνει τὸν ἄξονα τῶν  $x$ , ἡ δὲ  $x = 0$  τὸν ἄξονα τῶν  $\psi$ . Η έξισωσις  $\psi = x$  παριστάνει τὴν εὐθεῖαν, ἡ ὁποία διχοτομεῖ τὴν γωνίαν  $xO\psi$ , ἡ δὲ  $\psi = -x$  τὴν διχοτομοῦσαν τὴν γωνίαν  $x'\O\psi$  (σχ. 9).

### Α σκήσεις

Εὕρετε τὰς εὐθείας, τὰς ὁποίας παριστάνουν αἱ κάτωθι συναρτήσεις :

$$245. \alpha') \psi = 3x, \quad \beta') \psi = x+3, \quad \gamma) \psi = 0,5x.$$

$$246. \alpha') \psi = x - \frac{2}{3}, \quad \beta') \psi = \frac{x}{2} - x, \quad \gamma') \psi = -\frac{5x}{6} - \frac{1}{8}$$

$$247. \alpha') \psi = -\frac{3}{2}, \quad \beta') \psi = 5 - 2x, \quad \gamma') \psi - 3 = \frac{x-1}{2}.$$

#### 4. ΓΡΑΦΙΚΗ ΛΥΣΙΣ ΤΗΣ ΕΞΙΣΩΣΕΩΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ

**§ 122.** "Εστω μία έξισωσης τοῦ α' βαθμοῦ π.χ.  $\dot{\eta} 3x - 15 = 0$  (1)

'Εάν τὸ πρῶτον μέλος αὐτῆς παραστήσωμεν μὲ ψ, ἔχομεν τὴν συνάρτησιν  $\psi = 3x - 15$ . Θέτομεν π.χ.  $x = 0$ , ὅτε εύρισκομεν  $\psi = -15$ . Θέτομεν  $x = 1$ , ὅτε εύρισκομεν  $\psi = 3 \cdot 1 - 15 = -12..$


Οὕτως ἔχομεν τὰ σημεῖα  $(0, -15)$  καὶ  $(1, -12)$  τῆς εύθείας. Ἀρα δυνάμεθα νὰ κατασκευάσωμεν αὐτὴν (σχ. 11). Εύρισκομεν τὸ σημεῖον, εἰς τὸ δόποιον ἡ εύθεια αὐτὴ τέμνει τὸν ἄξονα τῶν  $x$ , ἥτοι τὴν τετμημένην τοῦ σημείου αὐτοῦ. Οὕτως εύρισκομεν ὅτι τὸ ἐν λόγῳ σημεῖον ἔχει τετμημένην 5. Αὐτὴ εἶναι ἡ ρίζα τῆς δοθείσης έξισώσεως, διότι εἰς αὐτὴν ἀντιστοιχεῖ τεταγμένη  $\psi = 0$ . "Ωστε ρίζα εἶναι ὁ 5. Τοῦτο ἐπαθεύομεν καὶ μὲ τὴν λύσιν τῆς δοθείσης έξισώσεως. Ἐκ τούτου καὶ ἀλλων δόμοιων παραδειγμάτων συνάγομεν ὅτι :

Διὰ νὰ εύρωμεν τὸ σημεῖον τὸ παριστάνον τὴν ρίζαν έξισώσεως α' βαθμοῦ  $\alpha x + \beta = 0$ , ἀρκεῖ νὰ κατασκευάσωμεν τὴν εύθειαν, τὴν δόποιαν παριστάνει ἡ συνάρτησις  $\psi = \alpha x + \beta$  καὶ νὰ εύρωμεν τὴν τομὴν ταύτης καὶ τοῦ ἄξονος τῶν  $x$ .

#### Γ'. ΠΕΡΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΜΕ ΕΝΑ ΑΓΝΩΣΤΟΝ

**§ 123.** "Εστω π. χ. ἡ ἀνισότητς  $3x > 15$ . Προφανῶς ἀληθεύει αὗτη μόνον, ὅταν τὸ  $x$  λάβῃ τιμὴν μεγαλυτέραν τοῦ 5, ἐνῷ ἡ  $\alpha^2 + \beta^2 > 2\alpha\beta$  ἀληθεύει δι' οἵασδήποτε τιμὰς τῶν  $\alpha$  καὶ  $\beta$ , διαφορετικὰς μεταξύ των. Π.χ. ἂν εἶναι  $\alpha = 2$  καὶ  $\beta = 1$ , ἔχομεν :  $2^2 + 1^2 > 2 \cdot 2 \cdot 1$ , ἡ 5>4.

"Οπως τὰς ίσότητας, αἱ ὅποιαι ἔχουν γράμματα, διακρίνομεν εἰς ταυτότητας καὶ εἰς έξισώσεις, οὕτω καὶ τὰς ἀνισότητας, αἱ ὅποιαι ἔχουν γράμματα, διακρίνομεν εἰς δύο εἰδῆ : 'Εκείνας ἐκ



Σχ. 11

τούτων, αἱ ὅποιαι ἀληθεύουν δι' οἰασδήποτε τιμᾶς τῶν γραμμάτων των καὶ ἔκείνας, αἱ ὅποιαι ἀληθεύουν μόνον ὅταν ὥρισμένα γράμματά των λαμβάνουν καταλλήλους τιμᾶς. Τὰς πρώτας καλοῦμεν ταυτότητας ἀνιστήτων ἡ λέγομεν ὅτι αὔται ἀντιστοιχοῦν εἰς ταυτότητας ίσοτήτων, ἐνῷ αἱ ἄλλαι ἀντιστοιχοῦν εἰς ἔξισώσεις (τῶν ίσοτήτων) καὶ ίσχύουν ὑπὸ συνθήκας.

Καλοῦμεν ἀγνώστους ἀνισότητος τὰ γράμματα αὐτῆς, τὰ ὅποια πρέπει νὰ λάβουν καταλλήλους τιμᾶς διὰ νὰ ἀληθεύῃ αὕτη.

**Λύσις** ἀνισότητος λέγεται ἡ εὑρεσις τῶν τιμῶν τῶν ἀγνώστων αὐτῆς, διὰ τὰς ὅποιας ἀληθεύει αὕτη.

Δύο ἀνισότητες λέγονται **ισοδύναμοι**, ἐὰν ἀληθεύουν διὰ τὰς αὐτὰς τιμᾶς τῶν ἀγνώστων αὐτῶν, ἢτοι ἂν οἰασδήποτε τιμὴ ἀγνώστου ἐπαληθεύουσα τὴν μίαν ἐκ τῶν δύο ἐπαληθεύῃ καὶ τὴν ἄλλην.

Αἱ ιδιότητες τῶν ἔξισώσεων ίσχύουν καὶ δι' ἀνισότητας μὲν ἀγνώστους, ἀποδεικνύονται δὲ εύκόλως μὲ τὴν βοήθειαν τῶν ίδιοτήτων τῶν ἀνισοτήτων, μὲ τὴν παρατήρησιν ὅτι :

"Αν ἀλλάξειμεν τὰ πρόσημα πάντων τῶν ὅρων μιᾶς ἀνισότητος ἡ ἐν γένει, ἀν πολλαπλασιάσωμεν τὰ μέλη αὐτῆς ἐπὶ ἀριθμὸν ἀρνητικὸν, προκύπτει ἀνισότης ίσοδύναμος μὲν τῆς δοθείσης, ἀλλ' ὑπὸ τὸν ὅρον νὰ ἀντιστραφῇ ἡ φορὰ αὐτῆς.

Π.χ. ἡ  $3x - 5 > 6x$  εἶναι ίσοδύναμος μὲ τὴν  $-3x + 5 < -6x$ , ἡ ὅποια προκύπτει ἀπὸ τὴν δοθεῖσαν, ἀν τὰ μέλη της πολλαπλασιασθοῦν ἐπὶ  $-1$ . Διὰ τοῦτο ἐπιδιώκομεν κατὰ τὴν ἀπαλοιφὴν τῶν παρονομαστῶν ἀνισότητος νὰ πολλαπλασιάζωμεν τὰ μέλη αὐτῆς ἐπὶ θετικὴν ποσότητα π.χ. ἐπὶ τὸ κατάλληλον τετράγωνον ποσότητος.

Κατὰ ταῦτα δυνάμεθα ἀντὶ δοθείσης ἀνισότητος μὲ ἀγνώστους νὰ θεωροῦμεν ίσοδύναμόν της τῆς μορφῆς  $A > 0$ , ὅπου  $A$  εἶναι ἀκέραιον πολυώνυμον ὡς πρὸς τοὺς ἀγνώστους τῆς ἀνισότητος.

**Βαθμὸς** ἀνισότητος, τῆς ὅποιας τὸ μὲν ἐν μέλος εἶναι ἀκέραιον πολυώνυμον ὡς πρὸς τοὺς ἀγνώστους αὐτῆς, τὸ δὲ ἄλλο εἶναι  $0$ , λέγεται ὁ βαθμὸς τοῦ πολυωνύμου ὡς πρὸς τοὺς ἀγνώστους· π.χ. ἡ ἀνισότης  $3x^2 - 5x + 1 < 0$  εἶναι β' βαθμοῦ ὡς πρὸς  $x$ .

Διὰ τὴν λύσιν ἀνισότητος τοῦ α' βαθμοῦ ἐργαζόμεθα κατ' ἀναλογίαν πρὸς τὴν λύσιν ἔξισώσεως πρώτου βαθμοῦ.

"Εστω π.χ. πρὸς λύσιν ἡ ἀνισότης  $2x + 3 - (x + 1) > 5$ . Ἐχομεν τὴν ίσοδύναμόν της  $2x + 3 - x - 1 > 5$ . Ἐκ ταύτης με-

τὰ τὴν μεταφορὰν τῶν 3 καὶ  $-1$  εἰς τὸ δεύτερον μέλος καὶ τὴν ἀναγωγὴν, ἔχομεν τὴν ἰσοδύναμον τῆς δοθείσης  $x > 3$ . Ἀρα πάντες οἱ ἀριθμοί, οἱ δόποιοι εἰναι μεγαλύτεροι τοῦ 3, ἐπαληθεύουν τὴν δοθεῖσαν ἀνισότητα.

Ἐστω πρὸς λύσιν καὶ ἡ ἀνισότης  $x + \frac{x}{4} > \frac{x}{5} - 4$ . Ἀπαλείφομεν τοὺς παρονομαστὰς πολλαπλασιάζοντες τὰ ἀνισα μέλη ἐπὶ  $4 \cdot 5 = 20$  καὶ λαμβάνομεν τὴν ἰσοδύναμον τῆς δοθείσης  $20x + 5x > 4x - 80$ . Ἐκ ταύτης εύρισκομεν τὴν ἰσοδύναμον αὐτῆς  $25x - 4x > -80$  ἢ τὴν  $21x > -80$ , ἐκ τῆς δόποιας εύρισκομεν  $x > -\frac{80}{21}$ . Ἐκ ταύτης συνάγομεν ὅτι πάντες οἱ ἀριθμοὶ οἱ μεγαλύτεροι τοῦ  $-\frac{80}{21}$  εἰναι λύσις τῆς δοθείσης ἀνισότητος.

Ἐν γένει ἡ ἀνισότης μὲν ἔνα ἄγνωστον  $\alpha'$  βαθμοῦ μετὰ τὴν ἀπαλοιφὴν τῶν παρονομαστῶν, τὴν μεταφορὰν ὅλων τῶν ὅρων τῆς εἰς τὸ πρῶτον μέλος καὶ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν σημειουμένων πράξεων, ἀνάγεται εἰς τὴν μορφὴν  $\alpha x + \beta > 0$ , ὅπου,  $\alpha$ ,  $\beta$  ὑποτίθενται γνωσταὶ ποσότητες. Αὐτὴν εἰναι ἰσοδύναμος μὲ τὴν  $\alpha x > -\beta$ . Ἐὰν μὲν εἰναι  $\alpha > 0$ , εύρισκομεν τὴν ἰσοδύναμον τῆς  $x > -\frac{\beta}{\alpha}$ , ἐὰν δὲ εἰναι  $\alpha < 0$ , ἔχομεν τὴν  $x < -\frac{\beta}{\alpha}$ . Ἀν εἰναι  $\alpha = 0$ , ἡ δοθεῖσα ἀνισότης  $\alpha x + \beta > 0$  γίνεται  $\beta > 0$ , ἐπαληθευομένη διὰ πᾶσαν τιμὴν τοῦ  $x$ , ἀν εἰναι τὸ  $\beta > 0$ , δηλαδὴ ἡ δοθεῖσα ἀνισότης εἰναι τότε ταυτότης ἀνισότητος. Ἀν διμως εἰναι  $\beta < 0$ , ἡ ἀνισότης εἰναι ἀδύνατος.

### Α σκήνη σεις

Ο μὰς πρώτη. 248. Νὰ λυθοῦν αἱ κάτωθι ἀνισότητες :

$$\alpha') -3x > \frac{5}{3}, \quad \beta') -4x - 9 > 0, \quad \gamma') 0,5x + 5 > 0,$$

$$\delta') -9x - 18 < 0, \quad \epsilon') 9x + 7 > 0, \quad \sigma') -7x - 48 > 0,$$

$$\zeta') 0,6x - 5 > 0,25(x - 1), \quad \eta') -9x + 32 > 0, \quad \theta') 0,5x - 1 > 0,7x - 1,$$

$$\iota') (x+1)^2 < x^2 + 3x - 5. \quad \iota\alpha') \frac{x-3}{x-4} > 0.$$

249. Εῦρετε τοὺς ἀκεραίους ἀριθμοὺς τοὺς ἐπαληθεύοντας τὰς ἀνισότητας  $2x + 3 < 4$  καὶ  $x - 5 > -8$ .

250. Δύο σημεῖα A καὶ B ἀπέχουν ἀπόστασιν  $(A B) = 2y$ . Τρίτον σημεῖον

έχει θέσιν τοιαύτην, ώστε νά είναι  $(AM) + (BM) = 2\alpha$ , δηλαδή  $\alpha > \gamma$ . Πώς μεταβάλλονται αἱ ἀποστάσεις  $(AM)$  καὶ  $(BM)$ , ἂν τὸ Μ κινῆται ἐπὶ τοῦ ἐπιπέδου  $ABM$ ;

251. Δύο κινητὰ ἀναχωροῦν συγχρόνως ἐκ τῶν σημείων  $A$  καὶ  $B$ , διευθύνονται δὲ πρὸς συνάντησίν των. "Ἄν ἡ ταχύτης των μεταβάλληται μεταξὺ τῶν  $T_1$  καὶ  $T_2$  τοῦ ἑνὸς καὶ  $T_2$  καὶ  $T_1$  τοῦ ἄλλου, μεταξὺ τίνων χρόνων θά γίνη ἡ συνάντησις καὶ εἰς τίνα ἀπόστασιν ἀπὸ τοῦ  $A$ , ἂν είναι  $(AB) = \alpha$ .

'Ο μὰς δευτέρα. 252. α') 'Εάν ἀπὸ τὰ μέλη ισότητος ἀφαιρέσωμεν τὰ μέλη ἀνισότητος, προκύπτει ἀνισότης ἀντίστροφος τῆς δοθείσης.

$$\beta') 'Εάν είναι \alpha \beta > 0 \text{ καὶ } \alpha \neq \beta, \text{ δείξατε } \text{ὅτι } \text{είναι } \frac{\alpha}{\beta} + \frac{\beta}{\alpha} > 2.$$

253. 'Εάν τὰ μέλη ισότητος, τὰ ὅποια είναι θετικά, διαιρέσωμεν μὲ τὰ μέλη ἀνισότητος, προκύπτει ἀνισότης ἀντίστροφος τῆς δοθείσης, ἂν τὰ μέλη αὐτῆς είναι ὅμοσημα' ἀλλως, ἡ φορὰ τῆς ἀνισότητος δὲν μεταβάλλεται.

254. Λύσατε τὴν κάτωθι ἀνισότητα μὲ ἀγνωστον τὸν  $x$ ,

$$\frac{\kappa x + v}{\alpha + \beta} - \frac{\kappa x - \lambda}{\alpha - \beta} < \frac{\mu x - v}{\alpha - \beta} + \frac{\kappa x - \lambda}{\alpha + \beta},$$

ἔάν είναι  $(\alpha^2 - \beta^2)(\beta\mu + \alpha\kappa) < 0$ , ἢ  $> 0$ .

255. α') Δείξατε ὅτι είναι  $\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 > \alpha\beta + \alpha\gamma + \beta\gamma$  ἂν  $\alpha, \beta, \gamma$  δὲν είναι δῆλοι ίσοι.

$$\beta') "Αν \alpha, \beta, \gamma \text{ είναι τὰ μήκη τῶν πλευρῶν τριγώνου, θά είναι } \alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 < 2(\alpha\beta + \alpha\gamma + \beta\gamma).$$

### Περίληψις περιεχομένων Κεφαλαίου III.

‘Ορισμὸς ἔξισώσεως, ἀγνώστων ἔξισώσεως, ριζῶν ἔξισώσεως. ‘Ορισμὸς λύσεως μιᾶς ἔξισώσεως. ‘Ἐπαλήθευσις ἔξισώσεως. ‘Εξίσωσις ἀριθμητική, ἐγγράμματος, ρητή, ἀκεραία, κλασματική (ώς πρὸς τοὺς ἀγνώστους αὐτῆς).

‘Ισοδύναμοι ἔξισώσεις (ἄν πᾶσα ρίζα ἐκάστης τῶν ἔξισώσεων είναι ρίζα καὶ τῶν ἄλλων). ‘Ιδιότητες τῶν ἔξισώσεων :

1ον. αἱ ἔξισώσεις  $A = B$ ,  $A + \lambda = B + \lambda$  είναι ίσοδύναμοι,

2ον αἱ ἔξισώσεις  $A = B$ ,  $A\rho = B\rho$  ( $\rho \neq 0$ ) είναι ίσοδύναμοι.

‘Ορισμὸς ἀπαλοιφῆς παρονομαστῶν ἔξισώσεως. ‘Αναγωγὴ ἔξισώσεως εἰς τὴν μορφὴν  $A = 0$ . ‘Ορισμὸς βαθμοῦ ἔξισώσεως (ώς πρὸς τοὺς ἀγνώστους τῆς). Λύσις ἔξισώσεως πρώτου βαθμοῦ  $\alpha x + \beta = 0$ ,  $x = -\beta/\alpha$  (ἄν  $\alpha \neq 0$ ), ἀδύνατος ἂν  $\alpha = 0$ ,  $\beta \neq 0$ , ἀριστος ἂν  $\alpha = 0$ ,  $\beta = 0$ .

‘Ορισμὸς προβλήματος, ἐπιτάγματος, περιορισμοῦ. Διάκρι-

σις γενικοῦ προβλήματος ἀπό ἀριθμητικοῦ. Ὁρισμὸς διερευνήσεως προβλήματος.

‘Ορισμὸς σταθερᾶς καὶ μεταβλητῆς ποσότητος. ‘Ορισμὸς συναρτήσεως τοῦ  $x$  (παραδείγματα ἐκ τῆς ἀριθμητικῆς, τῆς Γεωμετρίας, τῆς Φυσικῆς).

Πίναξ τιμῶν συναρτήσεως καὶ ἀνεξαρτήτου μεταβλητῆς.

‘Απεικόνισις τιμῶν συναρτήσεως. Τετμημένη, τεταγμένη (συντεταγμέναι σημείου). ”Ἄξονες συντεταγμένων (όρθογώνιοι).

Γραφικὴ παράστασις τῆς ἔξισώσεως  $\psi = \alpha x$  (εὐθεῖα διερχόμένη διὰ τῆς ἀρχῆς τῶν ἀξόνων).

Γραφικὴ παράστασις τῆς ἔξισώσεως  $\psi = \alpha x + \beta$  (εὐθεῖα τέμνουσα τὸν ἄξονα τῶν  $\psi$  εἰς τὸ σημεῖον  $(0, \beta)$  καὶ τὸν ἄξονα τῶν  $x$  εἰς τὸ σημεῖον  $(-\beta : \alpha, 0)$ ).

Γραφικὴ παράστασις τῆς  $x = \alpha$  (εὐθεῖα παράλληλος τοῦ ἄξονος τῶν  $\psi$ ).

Γραφικὴ παράστασις τῆς  $\psi = \beta$ . (εὐθεῖα παράλληλος τοῦ ἄξονος τῶν  $x$ ). Ἡ  $x = 0$  παριστάνει τὸν ἄξονα  $\psi$ , ἡ  $\psi = 0$  τὸν ἄξονα τῶν  $x$ , ἡ  $\psi = x$  τὴν διχότομον εὐθεῖαν τῆς γωνίας  $xO\psi$  τῶν ἀξόνων, ἡ  $\psi = -x$  τὴν διχοτόμον τῆς γωνίας  $x' O\psi$ .

Γραφικὴ λύσις ἔξισώσεως πρώτου βαθμοῦ.

‘Ανισότητες πρώτου βαθμοῦ μὲ ἔνα ἄγνωστον. (‘Ορισμὸς ἀνισότητος, ταυτότητος ἀνισότητος, ἀγνώστων ἀνισότητος, λύσεως ἀνισότητος, ίσοδυνάμων ἀνισοτήτων, βαθμοῦ ἀνισότητος) Λύσις τῆς ἀνισότητος  $\alpha x + \beta > 0$ .

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙV

### Α'. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ

**§ 124.** "Εστωσαν δύο ἔξισώσεις πρώτου βαθμοῦ, ἑκάστη τῶν ὅποιων ἔχει δύο ἀγνώστους  $x$  καὶ  $\psi$  καὶ ἕκαστον εἰς πρῶτον βαθμόν, αἱ

$$x + \psi = 10, \quad x - \psi = 2.$$

Αὗται ἀληθεύουν διὰ τὴν αὐτὴν τιμὴν ἑκάστου τῶν ἀγνώστων  $x = 6$  καὶ  $\psi = 4$ : λέγομεν τότε ὅτι ἀποτελοῦν σύστημα δύο ἔξισώσεων μὲν δύο ἀγνώστους. Ἐν γένει:

Καλοῦμεν σύστημα ἔξισώσεων τὸ σύνολον δύο ἢ περισσοτέρων ἔξισώσεων, τὰς ὅποιας ἐπαληθεύουν αἱ αὐταὶ τιμαὶ τῶν ἀγνώστων αὐτῶν.

Ἐάν αἱ ἔξισώσεις συστήματος περιέχουν τοὺς ἀγνώστους εἰς πρῶτον βαθμόν, λέγεται τοῦτο σύστημα πρωτοβαθμίων ἔξισώσεων ὡς πρὸς τοὺς ἀγνώστους αὐτοῦ.

Καλοῦμεν λύσιν συστήματός τινος ἔξισώσεων τὴν εὕρεσιν τῶν τιμῶν τῶν ἀγνώστων αὐτῶν, αἱ δόποιαὶ ἐπαληθεύουν τὰς ἔξισώσεις τοῦ συστήματος.

Δύο ἢ περισσότερα συστήματα ἔξισώσεων λέγονται ἰσοδύναμα, ἐάν ἐπαληθεύωνται διὰ τὰς αὐτὰς τιμὰς τῶν ἀγνώστων, ἥτοι ἂν πᾶσαι αἱ λύσεις ἑκάστου ἐκ τῶν συστημάτων αὐτῶν εἶναι λύσεις καὶ δῆλων τῶν ἄλλων.

Εἰναι φανερὸν ὅτι, ἐάν εἰς σύστημα ἀντικαταστήσωμεν μίαν ἢ περισσότερας τῶν ἔξισώσεων αὐτοῦ δι' ἰσοδυνάμων των, προκύπτει σύστημα ἰσοδύναμον. Κατὰ ταῦτα τὸ τυχὸν σύστημα

$$A_1 = B_1, \quad A_2 = B_2, \quad A_3 = B_3,$$

ὅπου τὰ  $A_2$ ,  $B_2, \dots$ , παριστάνονται τὰ μέλη τῶν ἀντιστοίχων ἔξισώσεων, εἶναι ἰσοδύναμον μὲν τὸ σύστημα

$$A_1 - B_1 = 0, \quad A_2 - B_2 = 0, \quad A_3 - B_3 = 0.$$

Λέγομεν ὅτι ἔξισωσίς τις εἶναι λελυμένη ὡς πρὸς ἓνα τῶν ἀγνώστων αὐτῆς, π.χ. πρὸς τὸν  $x$ , ἀν εἶναι τῆς μορφῆς  $x = A$ , ὅπου τὸ  $A$  δὲν περιέχει τὸν ἄγνωστον  $x$ .

### 1. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

**§ 125. α')** Θὰ ἀποδείξωμεν τὴν ἔξῆς ἰδιότητα τῶν συστημάτων :

Ἐὰν εἰς σύστημα ἔξισώσεων προσθέσωμεν δύο ἢ περισσοτέρας αὐτῶν κατὰ μέλη καὶ ἀντικαταστήσωμεν μίαν τῶν προστεθεισῶν μὲ τὴν προκύπτουσαν, εὑρίσκομεν σύστημα ἰσοδύναμον μὲ τὸ δοθέν.

$$\text{Ἐστω π.χ. τὸ σύστημα } \begin{cases} 2x - 3\psi = 1, \\ x + \psi = 3. \end{cases} \quad (1)$$

Ἄν προσθέσωμεν τὰς (1) κατὰ μέλη καὶ ἀντικαταστήσωμεν τὴν μίαν, ἔστω τὴν πρώτην, ἐκ τῶν προστεθεισῶν μὲ τὴν προκύπτουσαν  $2x + x - 3\psi + \psi = 1 + 3$ , εὑρίσκομεν τὸ σύστημα

$$\begin{cases} 2x + x - 3\psi + \psi = 1 + 3 \\ x + \psi = 3, \end{cases} \quad (2)$$

τὸ δποῖον λέγομεν ὅτι εἶναι ἰσοδύναμον μὲ τὸ (1). Διότι παρατηροῦμεν ὅτι αἱ τιμαὶ  $x = 2$  καὶ  $\psi = 1$  ἐπαληθεύουν τὸ (1) καὶ τιθέμεναι εἰς αὐτὸ δίδουν ἔξαγομενα τοὺς ἵσους ἀριθμούς.

$$\begin{cases} 2 \cdot 2 - 3 \cdot 1 = 1, \\ 2 + 1 = 3. \end{cases} \quad (1')$$

Ἄν τὰς ἰσότητας αὐτὰς τῶν ἀριθμῶν προσθέσωμεν κατὰ μέλη, εὑρίσκομεν  $2 \cdot 2 + 2 - 3 \cdot 1 + 1 = 1 + 3$ .  $(2')$

Ἀντικαθιστῶμεν τώρα καὶ εἰς τὸ σύστημα (2) τὰ  $x$  καὶ  $\psi$  μὲ τὸ 2 καὶ 1, εὑρίσκομεν δὲ ἀπὸ τὰ πρῶτα μέλη τῶν ἔξισώσεων αὐτοῦ  $2 \cdot 2 + 2 - 3 \cdot 1 + 1$  καὶ  $2 + 1$ . Ἀλλ' οἱ ἀριθμοὶ αὐτοὶ εἶναι ἴσοι: ἀντιστοίχως μὲ  $1 + 3$  καὶ 3, ὡς φαίνεται εἰς τὴν (2') καὶ τὴν δευτέραν τῶν (1'). Ἐπομένως αἱ τιμαὶ τῶν  $x$  καὶ  $\psi$ , αἱ ἐπαληθεύουσαι τὸ (1), ἐπαληθεύουν καὶ τὸ (2). Ὁμοίως ἀποδεικνύεται ὅτι αἱ τιμαὶ τοῦ  $x$  καὶ  $\psi$ , αἱ ἐπαληθεύουσαι τὸ (2), ἐπαληθεύουν καὶ τὸ (1). Ἀρα τὸ (1) καὶ (2) εἶναι ἰσοδύναμα.

Καθ' ὅμοιον τρόπον ἀποδεικνύεται ἡ ἰδιότης καὶ διὰ πᾶν ἄλλο σύστημα.

β') Θὰ ἀποδείξωμεν καὶ τὴν ἔξῆς ἰδιότητα :

Ἐὰν εἰς σύστημα ἔξισώσεων μία ἔξ αὐτῶν εἶναι λελυμένη ὡς πρὸς ἓνα τῶν ἀγνώστων καὶ ἀντικαταστήσωμεν αὐτὸν μὲ

τὴν τιμὴν του εἰς τὰς ἄλλας (ἢ εἰς τινας μόνον), εύρισκομεν σύστημα ἵσοδύναμον πρὸς τὸ διθέν.

$$\text{"Εστω π.χ. τὸ σύστημα } \begin{cases} x = 2\psi + 1 \\ x - \psi = 2, \end{cases} \quad (1)$$

τοῦ ὅποιου ἡ πρώτη ἔξισωσις εἶναι λελυμένη ὡς πρὸς  $x$ . Ἐάν τὴν τιμὴν  $2\psi + 1$  τοῦ  $x$  ἀντικαταστήσωμεν εἰς τὴν δευτέραν ἔξισωσιν,

$$\text{εύρισκομεν τὸ σύστημα } \begin{cases} x = 2\psi + 1 \\ 2\psi + 1 - \psi = 2, \end{cases} \quad (2)$$

τὸ ὅποιον λέγομεν ὅτι εἶναι ἵσοδύναμον μὲ τὸ (1). Διότι παρατηροῦμεν ὅτι αἱ τιμαὶ  $x = 3$ ,  $\psi = 1$  ἐπαληθεύουν τὸ (1) καὶ τιθέμεναι εἰς αὐτὸ δίδουν ἔξαγόμενα τοὺς ἴσους ἀριθμούς

$$3 = 2 \cdot 1 + 1, \quad 3 - 1 = 2. \quad (1')$$

"Αν τὰς αὐτὰς τιμὰς τῶν  $x$  καὶ  $\psi$  θέσωμεν εἰς τὸ (2), εύρισκομεν ἐκ μὲν τῆς πρώτης ἔξισωσεως τοῦ συστήματος αὐτοῦ ἴσους ἀριθμούς, διότι εἶναι αὐτὴ ἡ πρώτη τοῦ (1), ἐκ δὲ τοῦ πρώτου μέλους τῆς δευτέρας τοῦ συστήματος (2) προκύπτει ὁ ἀριθμὸς (2')  $2 \cdot 1 + 1 - 1$  ἢ ὁ  $3 - 1$ , ἐπειδὴ τὸ  $2 \cdot 1 + 1$  ἴσοῦται μὲ τὴν τιμὴν  $3$  τοῦ  $x$ . Ἐπομένως τὸ ἔξαγόμενον (2') ἴσοῦται μὲ 2, ὡς φαίνεται καὶ ἐκ τῆς δευτέρας τῶν (1')." Ἀρα αἱ τιμαὶ τοῦ  $x$  καὶ  $\psi$ , αἱ ἐπαληθεύουσαι τὸ (1), ἐπαληθεύουν καὶ τὸ (2). Ὁμοίως δεικνύεται ὅτι αἱ τιμαὶ τῶν  $x$  καὶ  $\psi$ , αἱ ἐπαληθεύουσαι τὸ (2), ἐπαληθεύουν καὶ τὸ (1). Ἀρα τὰ (1) καὶ (2) εἶναι ἵσοδύναμα.

"Ομοίως ἀποδεικνύεται ἡ ἴδιότης καὶ διὰ πᾶν ἄλλο σύστημα.

## 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΛΥΣΕΩΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΔΥΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΜΕ ΔΥΟ ΑΓΝΩΣΤΟΥΣ

### I. ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΑΛΟΙΦΗΣ ΔΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΘΕΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ

**§ 126.** "Εστω ὅτι θέλομεν νὰ λύσωμεν π.χ. τὸ σύστημα

$$\begin{cases} 2x + 3\psi = 8 \\ 3x + 4\psi = 11. \end{cases} \quad (1)$$

Ἐπιδιώκομεν πρῶτον νὰ μετασχηματίσωμεν τὰς διθείσας ἔξισωσεις (ἢ μίαν ἐξ αὐτῶν) εἰς ἄλλας ἵσοδυνάμους τούτων εἰς τρόπον, ὥστε οἱ συντελεσταὶ τοῦ ἔνδος τῶν ἀγνώστων των π.χ.

τοῦ  $x$  νὰ είναι ἀντίθετοι. Πρὸς τοῦτο πολλαπλασιάζομεν τὴν πρώτην ἔξισωσιν (ἥτοι τὰ μέλη αὐτῆς) ἐπὶ τὸν 3 (συντελεστὴν τοῦ  $x$  εἰς τὴν β' ἔξισωσιν) καὶ τὴν δευτέραν ἐπὶ τὸν -2 (ἀντίθετον τοῦ συντελεστοῦ τοῦ  $x$  εἰς τὴν πρώτην). Τὸν πολλαπλασιασμὸν τοῦτον σημειώνομεν γράφοντες παραπλεύρως ἑκάστης τῶν ἔξισώσεων τὸν ἀριθμόν, ἐπὶ τὸν ὅποιον πολλαπλασιάζομεν τὰ μέλη αὐτῆς, ὡς κατωτέρω.

$$\left\{ \begin{array}{rcl} 2x + 3\psi & = & 8 \\ 3x + 4\psi & = & 11 \end{array} \right| \begin{array}{l} 3 \\ -2 \end{array} \quad (1)$$

καὶ εύρισκομεν τὸ σύστημα  $\left\{ \begin{array}{rcl} 6x + 9\psi & = & 24 \\ -6x - 8\psi & = & -22 \end{array} \right. \quad (2)$

Προφανῶς τὰ συστήματα (1) καὶ (2) είναι ίσοδύναμα. Προσθέτομεν τώρα τὰς ἔξισώσεις τοῦ (2) κατὰ μέλη καὶ εύρισκομεν  $\psi = 2$ . Ἡ ἔξισωσις αὗτη μὲν μίαν τῶν προστεθεισῶν τοῦ (2) ἥ μὲν μίαν τοῦ (1), ἔστω τὴν πρώτην, ἀποτελεῖ σύστημα ίσοδύναμον πρὸς τὸ

(2) καὶ τὸ (1). Δηλαδὴ τὸ σύστημα  $\left\{ \begin{array}{rcl} 2x + 3\psi & = & 8 \\ \psi & = & 2 \end{array} \right. \quad (3)$  είναι ίσοδύναμον πρὸς τὸ δύναμον πρὸς τὸ δοθέν.

Ἄρκει λοιπὸν νὰ λυθῇ τὸ (3) καὶ αἱ τιμαὶ τῶν  $x$  καὶ  $\psi$ , αἱ ὅποιαι θὰ εὑρεθοῦν, θὰ ἐπαληθεύουν καὶ τὸ (1).

Ἄλλ' ἐπειδὴ ἔχομεν τὴν τιμὴν τοῦ  $\psi = 2$ , ἀντικαθιστῶντες εἰς τὴν ἔξισωσιν  $2x + 3\psi = 8$  τὸ  $\psi$  μὲ τὸ 2, εύρισκομεν  $2x + 3 \cdot 2 = 8$ , ἐκ τῆς ὅποιας εύρισκομεν  $x = 1$ . Ὁστε αἱ τιμαὶ τῶν  $x$  καὶ  $\psi$  είναι αἱ  $x = 1$ ,  $\psi = 2$ . Πράγματι, ἀν θέσωμεν εἰς τὸ (1) ἀντὶ τοῦ  $x = 1$  καὶ  $\psi = 2$ , παρατηροῦμεν ὅτι αἱ ἔξισώσεις ἐπαληθεύονται.

Οἱ ἀνωτέρω τρόπος τῆς λύσεως συστήματος λέγεται μέθοδος ἀπαλοιφῆς διὰ τῶν ἀντιθέτων συντελεστῶν ἢ διὰ τῆς προσθέσεως.

Διότι δι' αὐτῆς ἐπιτυγχάνομεν α') νὰ μετασχηματίσωμεν τὰς ἔξισώσεις εἰς ίσοδυνάμους των, ὡστε οἱ συντελεσταὶ ἐνὸς τῶν ἀγνώστων αὐτῶν νὰ είναι ἀντίθετοι καὶ β') διὰ τῆς προσθέσεως τούτων κατὰ μέλη νὰ προκύπτῃ μία ἔξισωσις μὲν ἕνα μόνον ἄγνωστον, ἥτοι ἀπαλείφομεν τὸν ἄλλον ἄγνωστον.

Διὰ νὰ μετασχηματίσωμεν τὰς δύο ἔξισώσεις δοθέντος συστήματος εἰς τρόπον, ὡστε οἱ συντελεσταὶ τοῦ ἐνὸς τῶν ἀγνώστων νὰ είναι ἀντίθετοι, ἀρκεῖ νὰ πολλαπλασιάσωμεν ἀντιστοίχως τὰ

μέλη τῶν ἔξισώσεων ἐπὶ τὰ πηλίκα τοῦ ἑ.κ.π. τῶν ἀπολύτων τιμῶν τῶν συντελεστῶν τοῦ ἐν λόγῳ ἀγνώστου δι' ἕκάστου ἔξ αὐτῶν λαμβανομένων καταλλήλως τῶν προσήμων αὐτῶν.

$$\text{Π. χ. } \text{ἄν } \text{ἔχωμεν } \text{τὸ } \text{σύστημα } \begin{cases} 12x + 5\psi = 17 \\ -8x + 7\psi = -1 \end{cases} \quad (1'')$$

τὸ ἑ.κ.π. τῶν 12 καὶ 8 εἰναι τὸ 24. Πολλαπλασιάζομεν τὴν πρώτην τῶν ἔξισώσεων ἐπὶ  $24 : 12 = 2$  καὶ τὴν δευτέραν ἐπὶ  $24 : 8 = 3$

$$\begin{array}{r|l} 2 & 12x + 5\psi = 17 \\ 3 & -8x + 7\psi = -1 \end{array}$$

καὶ λαμβάνομεν τὸ κατωτέρω σύστημα (2'') ἵσοδύναμον πρὸς τὸ

$$\text{δοθὲν } (1'') \quad \begin{cases} 24x + 10\psi = 34 \\ -24 + 21\psi = -3 \end{cases} \quad (2'')$$

Διὰ προσθέσεως τῶν ἔξισώσεων τοῦ (2'') κατὰ μέλη προκύπτει ἡ ἔξισωσις  $31\psi = 31$ , ἐκ τῆς δόποιας εύρισκομεν  $\psi = 1$  καὶ ἀκολούθως ἔργαζόμενοι ὡς ἀνωτέρω, εύρισκομεν  $x = 1$ .

### Ἄσκησεις

Ο μὰς πρώτη. 256. Νὰ λυθοῦν τὰ ἐπόμενα συστήματα καὶ νὰ γίνῃ ἡ παλήθευσις μετὰ τὴν εύρεσιν τῶν τιμῶν τῶν ἀγνώστων

$$\alpha') \begin{cases} 3x + 4\psi = 10 \\ 4x + \psi = 9 \end{cases} \quad \beta') \begin{cases} \frac{x}{6} + \frac{\psi}{4} = 6 \\ \frac{x}{4} + \frac{\psi}{6} = \frac{17}{3} \end{cases} \quad \gamma') \begin{cases} \frac{x}{13} - \frac{\psi}{7} = \\ = 6x - 10\psi - 8 = 0 \end{cases}$$

257. α')  $\begin{cases} 6\psi - 5x = 18 \\ 12x - 9\psi = 0 \end{cases}$

β')  $\begin{cases} 7,2x + 3,6\psi = 54 \\ 2,3x - 5,9\psi = 22 \end{cases}$

258. α')  $\begin{cases} (x+5)(\psi+7)-(x+1)(\psi-9)=12 \\ 2x + 10 - (3\psi + 1) = 0 \end{cases}$  β')  $\begin{cases} 0,3x - 0,2\psi = 0,01 \\ 1,2x - 0,6\psi = 0,6 \end{cases}$

259.  $\begin{cases} \alpha x + \beta \psi = \alpha^3 + 2\alpha^2\beta + \beta^3 \\ \beta x + \alpha \psi = \alpha^3 + 2\alpha^2\beta - \beta^3 \end{cases}$  260.  $\begin{cases} \frac{x}{3} + \frac{\psi}{4} = 3x - 7\psi - 37 = 0 \end{cases}$

261.  $\left\{ \frac{x+3}{5} = \frac{8-\psi}{4} = \frac{3(x+\psi)}{8} \right.$

262.  $\begin{cases} \frac{x}{0,2} + \frac{\psi}{0,5} = 12,3 \\ \frac{x}{0,6} + \frac{\psi}{0,8} = 5,5 \end{cases}$

Ο μάς δευτέρα. Νὰ λυθοῦν και ἐπαληθευθοῦν τὰ ἐπόμενα συστήματα :

$$263. \begin{cases} \alpha x + \beta \psi = \alpha^2 + 2\alpha\beta - \beta^2 \\ \beta x + \alpha \psi = \alpha^2 + \beta^2 \end{cases}$$

$$264. \begin{cases} (\alpha + \beta)x + (\alpha - \beta)\psi = \alpha^2 + \beta^2 \\ (\alpha - \beta)x + (\alpha + \beta)\psi = \alpha^2 - \beta^2 \end{cases}$$

$$265. \begin{cases} \alpha(x - \psi) + \beta(x + \psi) = 4\alpha\beta \\ (\alpha - \beta)x - \beta\psi = \alpha\psi \end{cases}$$

$$266. \begin{cases} \alpha(x + \beta) = 2\beta\psi \\ \beta(x + \alpha) - \beta^2 = \beta\psi \end{cases}$$

$$267. \begin{cases} (\alpha + \beta)x - \alpha\psi = \alpha^2 \\ \beta x - (\alpha - \beta)\psi = \beta^2 \end{cases}$$

## II. ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΑΛΟΙΦΗΣ ΔΙ' ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

§ 127. Ξεστω π. χ. πρὸς λύσιν τὸ σύστημα.

$$\begin{cases} 2x + 3\psi = 8 \\ 3x + 4\psi = 11. \end{cases} \quad (1)$$

Διὰ νὰ λύσωμεν αὐτό, δυνάμεθα νὰ ἔργασθῶμεν και ὡς ἔξῆς :

Ἄπομονώνομεν τὸν ψ, τῶν ἀγνώστων π.χ. τὸν x, εἴστω εἰς τὴν πρώτην τῶν ἔξισώσεων. Ήτοι λύομεν αὐτὴν ὡς πρὸς x θεωροῦντες τὸν ψ ὡς γνωστόν. Οὕτω λαμβάνομεν  $x = \frac{8-3\psi}{2}$ .

Αὗτη μὲν τὴν ἄλλην τῶν ἔξισώσεων τοῦ (1) ἀποτελοῦν τὸ κατωτέρω σύστημα (2) ισοδύναμον πρὸς τὸ δοθὲν (1)

$$\begin{cases} x = \frac{8-3\psi}{2} \\ 3x + 4\psi = 11. \end{cases} \quad (2)$$

Τὴν τιμὴν τοῦ x τῆς πρώτης τῶν ἔξισώσεων τούτων ἀντικαθιστῶμεν εἰς τὴν δευτέραν τῶν ἔξισώσεων τοῦ (1) ή τοῦ (2) και εύρισκομεν  $3 \cdot \frac{8-3\psi}{2} + 4\psi = 11$ , ή δόποία μετὰ τῆς προηγουμένης ἀποτελεῖ σύστημα ισοδύναμον πρὸς τὸ (2) και τὸ (1).

Λύομεν τὴν τελευταίαν ταύτην ὡς πρὸς τὸ ψ και εύρισκομεν  $\psi = 2$ .

Διὰ νὰ εύρωμεν τὴν τιμὴν τοῦ x ἀντικαθιστῶμεν τὸ ψ μὲ τὸ 2 εἰς μίαν τῶν δοθεισῶν ή εἰς τὴν  $x = \frac{8-3\psi}{2}$ , δτε εύρισκομεν  $x = \frac{8-6}{2} = 1$ .

Τὸν ἀνωτέρω τρόπον τῆς λύσεως συτήματος καλοῦμεν συνήθως μέθοδον ἀπαλοιφῆς διὰ τῆς ἀντικαστάσεως.

## Α σχήσεις

268. Λύσατε τὰ κάτωθι συστήματα καὶ ἐπαληθεύσατε αὐτά :

$$\alpha') \begin{cases} 7x = 18 + \frac{5\psi}{3} \\ 0,75x + 2\psi = 15 \end{cases}$$

$$\beta') \begin{cases} x = \alpha + \psi \\ \lambda x + \mu \psi = v \end{cases}$$

$$\gamma') \begin{cases} \alpha x = \alpha^2 - \beta \psi \\ \alpha x - \beta \psi = \beta^2 \end{cases}$$

$$269. \alpha') \begin{cases} \psi = 3\alpha - \frac{x}{2} \\ \frac{2\psi}{5} - x = 2\beta \end{cases}$$

$$\beta') \begin{cases} x = 4\alpha - \psi \\ \frac{x+\psi}{3} - \frac{x-\psi}{2} = \alpha \end{cases}$$

$$\gamma') \begin{cases} \frac{x}{9} = \frac{\psi}{3} \\ 2x + 3\psi = 5 \end{cases}$$

## III ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΑΛΟΙΦΗΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΙΣΕΩΣ

§ 128. "Εστω ὅτι ἔχομεν πρὸς λύσιν τὸ σύστημα.

$$\begin{cases} 2x + 3\psi = 8 \\ 3x + 4\psi = 11 \end{cases} \quad (1)$$

Διὰ νὰ λύσωμεν αὐτὸ δυνάμεθα νὰ ἐργασθῶμεν καὶ ὡς ἔξῆς: "Απομονώνομεν τὸν ἕνα τῶν ἀγνώστων π.χ. τὸν  $x$  εἰς τὴν πρώτην καὶ εἰς τὴν δευτέραν ἔξισωσιν τοῦ συστήματος. "Ητοι λύομεν κάθε μίαν τῶν ἔξισώσεων τούτων ὡς πρὸς τὸ  $x$  θεωροῦντες τὸν  $\psi$  ὡς γνωστὸν καὶ εὑρίσκομεν ἐκ μὲν τῆς πρώτης  $x = \frac{8-3\psi}{2}$ , ἐκ δὲ τῆς δευτέρας  $x = \frac{11-5\psi}{3}$ .

"Ἐπειδὴ αἱ δύο αὐταὶ τιμαὶ τοῦ  $x$  πρέπει νὰ εἰναι ἴσαι, ἔχομεν τὴν ἔξισωσιν  $\frac{8-3\psi}{2} = \frac{11-5\psi}{3}$ , ἢ ὅποια μὲ μίαν ἐκ τῶν διθεισῶν ἀποτελοῦν σύστημα ἰσοδύναμον πρὸς τὸ διθέν. Λύομεν τὴν ἔξισωσιν ταύτην καὶ εὑρίσκομεν  $\psi = 2$ . Διὰ νὰ εὕρωμεν τὴν τιμὴν τοῦ  $x$ , ἐργαζόμεθα καθὼς καὶ εἰς τὰ προηγούμενα παραδείγματα καὶ εὑρίσκομεν  $x = 1$ .

Τὸν τρόπον τοῦτον τῆς λύσεως συστημάτων καλοῦμεν συνήθως μέθοδον ἀπαλοιφῆς διὰ τῆς συγκρίσεως.

Παρατίθησις. Καθὼς διακρίνομεν ἐκ τῶν ἀνωτέρω, ὅταν λέγωμεν ὅτι μεταξὺ δύο ἔξισώσεων ἐνὸς συστήματος ἀπαλείφομεν τὸν ἕνα ἀγνώστον, ἐννοοῦμεν μὲ αὐτὸ ὅτι ἐκφράζομεν τὸ ὅτι αἱ δύο ἔξισώσεις ἀληθεύουν διὰ τὰς αὐτὰς τιμὰς τοῦ ἐν λόγῳ ἀγνώστου.

Α σ κ ή σ εις

Όμάς πρώτη 270. Νὰ λυθοῦν τὰ κάτωθι συστήματα καὶ νὰ γίνῃ ἡ ἐπαλήθευσις αὐτῶν :

$$\alpha') \begin{cases} 3x + 5\psi = 20 \\ 3x + 10\psi = 0 \end{cases} \quad \beta') \begin{cases} \frac{x}{\alpha} + \frac{\psi}{\beta} = 1 \\ \frac{x}{\alpha} - \frac{\psi}{\beta} = 1 \end{cases} \quad \gamma') \begin{cases} \alpha x - \beta \psi = \gamma(\alpha - \beta) \\ x + \psi = \gamma \end{cases}$$

$$\delta') \begin{cases} \frac{x}{\alpha + \beta} + \frac{\psi}{\alpha - \beta} = 2\alpha \\ \frac{x - \psi}{2\alpha\beta} = \frac{x + \psi}{\alpha^2 + \beta^2} \end{cases} \quad \epsilon') \begin{cases} x + \psi = \alpha + \beta \\ \beta x + \alpha \psi = 2\alpha\beta \end{cases} \quad \sigma\tau') \begin{cases} (x : \alpha) - (\psi : \beta) = \alpha^2\beta \\ (x : \alpha^2) + (\psi : \beta^2) = -\beta \end{cases}$$

Όμάς δευτέρα 271. Νὰ λυθοῦν τὰ κάτωθι συστήματα διὰ τῆς καταλληλοτέρας μεθόδου καὶ νὰ γίνῃ ἡ ἐπαλήθευσις αὐτῶν :

$\alpha')$	$2(x+2\psi)=3(2x-3\psi)+10$	$\beta')$	$(5x+7\psi):(3x+11)=13:7$
$2(2x-\psi)=8(3\psi-x)+3$	$(11x+27):(7x+6\psi)=19:11$		
$\gamma')$	$(\alpha+\beta)x+(\alpha-\beta)\psi=2\alpha\beta$	$\delta')$	$\alpha x+\beta\psi=\alpha^2$
	$(\alpha+\gamma)x+(\alpha-\gamma)\psi=2\alpha\gamma$		$\beta x+\alpha\psi=\beta^2$

$$\epsilon') \begin{cases} \frac{x}{\alpha+\beta} - \frac{\psi}{\beta-\alpha} = \alpha^2\beta \\ \frac{x}{\alpha^2+\beta^2} + \frac{\psi}{\beta^2-\alpha^2} = -\beta^2 \end{cases} \quad \sigma\tau') \begin{cases} \alpha x + \beta \psi = \alpha^2 \\ \alpha x - \beta \psi = \beta^2 \end{cases}$$

$$\zeta') \begin{cases} \alpha x + \beta \psi = \gamma \\ \lambda x - \mu \psi = \delta \end{cases} \quad \eta') \begin{cases} \frac{13}{x+2\psi+4} + \frac{3}{4x-7\psi+6} = 0 \\ \frac{3}{6x-5\psi+1} - \frac{15}{3x+2\psi+5} = 0 \end{cases}$$

Όμάς τρίτη 272. Νὰ λυθοῦν καὶ νὰ ἐπαληθευθοῦν τὰ συστήματα :

$\alpha')$	$2(3x-\psi)=3(4\psi+x)+5$	$\beta')$	$\alpha x+1=\alpha x+\beta\psi$	$\gamma')$	$\frac{3}{x} + \frac{4}{\psi} = \frac{10}{x\psi}$
	$3(x-3\psi)=5(3\psi-x)$		$\beta\psi+1=\alpha\psi+\beta x$		$\frac{5}{3x} + \frac{3}{4\psi} = 12x\psi$

$$\delta') \begin{cases} (\alpha^2 + \beta^2)x + (\alpha^2 - \beta^2)\psi = 2\alpha^2\beta^2 \\ (\alpha^2 + \gamma^2)x + (\alpha^2 - \gamma^2)\psi = 2\alpha^2\gamma^2 \end{cases} \quad \epsilon') \begin{cases} \frac{x}{\alpha+\beta} + \frac{\psi}{\alpha-\beta} = \frac{1}{\alpha-\beta} \\ \frac{x}{\alpha-\beta} + \frac{\psi}{\alpha+\beta} = \frac{1}{\alpha+\beta} \end{cases}$$

$$\sigma\tau') \begin{cases} \frac{0,1}{x+7\psi+5} + \frac{3,5}{7x-9\psi+19} = 0 \\ \frac{3,5}{6x-5\psi+3} - \frac{0,9}{0,1x-4,5\psi-1} = 0 \end{cases} \quad \zeta') \begin{cases} \gamma x + \alpha \psi = \alpha(\beta+1) + \gamma(\beta-1) \\ x = \frac{\alpha(\beta-\gamma\psi) + \gamma(2\alpha\beta - \gamma)}{\alpha\gamma} \end{cases}$$

## 3. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ

$$\begin{cases} \alpha x + \beta \psi = \gamma \\ \alpha_1 x + \beta_1 \psi = \gamma_1 \end{cases} \quad (1)$$

**§ 129.** Ύποθέτομεν ότι οι συντελεσταί τῶν ἀγνώστων δὲν εἶναι ὅλοι μηδενικοί. Δυνάμεθα νὰ ὑποθέσωμεν ότι  $\alpha \neq 0$ .

Τότε ἡ πρώτη ἔξισωσις τοῦ συστήματος, λυομένη πρὸς  $x$ , τοῦ ὅποιου ὁ συντελεστὴς εἶναι  $\neq 0$ , δίδει  $x = \frac{\gamma - \beta \psi}{\alpha}$ .

Καὶ ὅταν ἡ τιμὴ αὐτὴ τοῦ  $x$  εἰσαχθῇ εἰς τὴν δευτέραν ἔξισωσιν, ἡ ἔξισωσις αὐτὴ γίνεται  $\alpha_1 \frac{\gamma - \beta \psi}{\alpha} + \beta_1 \psi = \gamma_1$ , ἡ ὅποια ἰσοδυναμεῖ μὲν τὴν  $(\alpha \beta_1 - \alpha_1 \beta) \psi = \alpha \gamma_1 - \alpha_1 \gamma$ .

Οὕτω, τὸ σύστημα (1) ἰσοδυναμεῖ πρὸς τὸ σύστημα

$$\begin{aligned} x &= \frac{\gamma - \beta \psi}{\alpha} \\ (\alpha \beta_1 - \alpha_1 \beta) \psi &= \alpha \gamma_1 - \alpha_1 \gamma \end{aligned} \quad (2)$$

Διακρίνομεν τώρα δύο περιπτώσεις:

1ον.  $\alpha \beta_1 - \alpha_1 \beta \neq 0$ . Ἡ δευτέρα ἔξισωσις τοῦ (2) θὰ ἔχῃ τότε μίαν μόνην λύσιν, τὴν  $\psi = \frac{\alpha \gamma_1 - \alpha_1 \gamma}{\alpha \beta_1 - \alpha_1 \beta}$ .

Ἡ τιμὴ αὐτὴ τοῦ  $\psi$  εἰσαγομένη εἰς τὴν πρώτην ἔξισωσιν τοῦ (2) δίδει τὴν ἀντίστοιχον τιμὴν τοῦ  $x$ , τὴν  $x = \frac{\gamma \beta_1 - \beta \gamma_1}{\alpha \beta_1 - \alpha_1 \beta}$ .

Οὕτω, τὸ σύστημα (2), καὶ συνεπῶς καὶ τὸ ἰσοδύναμον πρὸς αὐτὸ (1) ἔχει μίαν λύσιν, εἰς τὴν θεωρουμένην περίπτωσιν.

Παρατηροῦμεν ὅμως, ότι ὅταν  $\alpha \beta_1 - \alpha_1 \beta \neq 0$  ἀποκλείεται νὰ εἶναι μηδενικοί ὅλοι οἱ συντελεσταί τῶν ἀγνώστων καὶ ἐπομένως παρέλκει ἡ ὑπόθεσις τοῦ νὰ μὴ εἶναι οἱ συντελεσταί τῶν ἀγνώστων ὅλοι μηδενικοί.

Ἡ παραστασις  $\alpha \beta_1 - \alpha_1 \beta$  λέγεται ὁρίζουσα τοῦ συστήματος (1). Δυνάμεθα λοιπὸν νὰ λέγωμεν:

Ἄν ἡ ὁρίζουσα τοῦ συστήματος (1) εἶναι  $\neq 0$ , τὸ σύστημα ἔχει μίαν μόνην λύσιν.

2ον.  $\alpha \beta_1 - \alpha_1 \beta = 0$ . Εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν ἡ δευτέρα ἔξισωσις τοῦ (2) γίνεται μὲν κάθε  $\psi$ ,  $0 = \alpha \gamma_1 - \alpha_1 \gamma$ .

Καὶ ἂν μὲν εἶναι πράγματι ἡ  $\alpha \gamma_1 - \alpha_1 \gamma$  ἵση μὲν μηδέν, ἡ δευτέρα ἔξισωσις τοῦ (2) ἀληθεύει μὲν κάθε  $\psi$  καὶ οὕτω τὸ σύστημα (2) ἀνάγεται εἰς μόνην τὴν  $x = \frac{\gamma - \beta \psi}{\alpha}$ .

Αύτή έχει άπειρους λύσεις, διότι δυνάμεθα νὰ δώσωμεν τυχοῦσαν τιμὴν εἰς τὸν  $\psi$  καὶ νὰ εύρεθῇ ἐκ τῆς ἀνωτέρω ἐκφράσεως τοῦ  $x$ , ἡ ἀντίστοιχος τιμὴ τοῦ  $x$ .

Διὰ τοῦτο λέγομεν ὅτι τὸ σύστημα (2) καὶ συνεπῶς καὶ τὸ ισοδύναμόν του (1) εἶναι ἀόριστον.

"Αν ὅμως ἡ παράστασις  $\alpha\gamma_1 - \alpha_1\gamma \neq 0$ , ἡ δευτέρα ἔξισωσις τοῦ (2) εἶναι ἀδύνατος, ὅπότε καὶ τὸ σύστημα (2) καθὼς καὶ τὸ (1) εἶναι ἀδύνατον.

"Οταν ὅμως εἶναι  $\alpha\gamma_1 - \alpha_1\gamma \neq 0$ , τότε  $\alpha\gamma_1 \neq \alpha_1\gamma$ . Καὶ διαιροῦντες διὰ τοῦ  $\alpha$ , τὸ ὅποιον εἶναι  $\neq 0$ , εύρισκομεν ὅτι  $\gamma_1 \neq \frac{\alpha_1\gamma}{\alpha}$ , ὅπότε  $\beta\gamma_1 \neq \frac{\alpha_1\gamma\cdot\beta}{\alpha}$ .

"Ἄρα καὶ  $\beta\gamma_1 - \beta_1\gamma \neq \frac{\alpha_1\beta\gamma}{\alpha} - \beta_1\gamma$ .

δηλ.  $\beta\gamma_1 - \beta_1\gamma \neq \gamma \frac{(\alpha_1\beta - \alpha\beta_1)}{\alpha}$  ἥτοι  $\beta\gamma_1 - \beta_1\gamma \neq 0$

διότι  $\frac{\gamma(\alpha_1\beta - \alpha\beta_1)}{\alpha} = 0$ , ἀφοῦ  $\alpha_1\beta - \alpha\beta_1 = 0$  ἐξ ὑποθέσεως.

Όμοίως συλλογιζόμενοι εύρισκομεν, ὅτι ἂν  $\alpha\gamma_1 - \alpha_1\gamma = 0$ , τότε καὶ  $\beta\gamma_1 - \beta_1\gamma = 0$

"Ωστε:

"Οταν ἡ ὁρίζουσα τοῦ συστήματος (1) εἶναι μηδενική, χωρὶς νὰ εἶναι μηδενικοὶ ταύτοχρόνως καὶ ὅλοι οἱ συντελεσταὶ τῶν ἀγνώστων, τὸ σύστημα εἶναι ἡ ἀόριστον ἡ ἀδύνατον. Καὶ ἀόριστον μὲν θὰ εἶναι ὅταν εἶναι ταύτοχρόνως μηδενική καὶ μία οἰαδήποτε ἐκ τῶν παραστάσεων  $\alpha\gamma_1 - \alpha_1\gamma$  ἡ  $\beta\gamma_1 - \beta_1\gamma$ , ἀδύνατον δὲ ὅταν μία ἐκ τῶν παραστάσεων αὐτῶν εἶναι  $\neq 0$ .

*Παρατήρησις I.* Εἶναι δυνατὸν ἡ λύσις ἐνδές γενικοῦ προβλήματος νὰ ὁδηγήσῃ εἰς σύστημα δύο πρωτοβαθμίων ἔξισώσεων καὶ νὰ εἰσαχθῇ ἡ ὑπόθεσις ὅτι ὅλοι οἱ συντελεσταὶ τῶν ἀγνώστων εἶναι μηδενικοί. Τότε τὸ (1) γίνεται  $0 = \gamma$

$$0 = \gamma_1.$$

μέ κάθε  $x$  καὶ κάθε  $\psi$ .

Καὶ τότε φαίνεται ὅτι ἂν οἱ  $\gamma, \gamma_1$  εἶναι μηδενικοὶ καὶ οἱ δύο, τὸ σύστημα ἀληθεύει μέ κάθε  $x$  καὶ κάθε  $\psi$ .

Λέγομεν ὅτι εἶναι ἀόριστον μὲ πλήρη ἀοριστίαν. "Αν ὅμως εἶς ἐκ τῶν  $\gamma$  ἡ  $\gamma_1$  εἶναι  $\neq 0$ , τὸ σύστημα εἶναι ἀδύνατον.

*Παρατήρησις II.* Ἡ παράστασις  $\alpha\beta_1 - \alpha_1\beta$  εύρισκεται ὡς ἔξης:

Γράφονται αἱ ἔξισώσεις ὡστε οἱ συντελεσταὶ τοῦ αὐτοῦ ἀγνώστου νὰ εἶναι εἰς τὴν αὐτὴν στήλην. Τότε πολ/ζονται οἱ συντελεσταὶ αὐτοὶ τῆς πρώτης, ἕκαστος ἐπὶ τὸν διαγωνίων ἀπέναντι τῆς δευτέρας καὶ ἀπὸ τὸ πρῶτον γινόμενον ἀφαιρεῖται τὸ δεύτερον.

Κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον εύρισκονται καὶ οἱ ἀριθμηταὶ τῶν τύπων τῶν ἀγνώστων  $x$ ,  $\psi$ , ἀφοῦ πρῶτον μεταφερθοῦν εἰς τὸ πρῶτον μέλος καὶ οἱ ὄροι οἱ ἀνεξάρτητοι τῶν ἀγνώστων.

Διὰ τὸν καταρτισμὸν τοῦ ἀριθμητοῦ ἑκάστου ἀγνώστου θὰ παραλείπεται νοερῶς ἡ στήλη αὐτοῦ τοῦ ἀγνώστου καὶ θὰ πολ/-ζωνται οἱ ὄροι τῆς ἐπομένης στήλης, ἕκαστος ἐπὶ τὸν διαγωνίων ἀπέναντι τῆς ἀλλῆς στήλης, παραλειπομένου τοῦ ἀγνώστου ποὺ περιέχεται εἰς τὴν μίαν ἔξι αὐτῶν τῶν στηλῶν, ἀπὸ τὸ πρῶτον δὲ γινόμενον θὰ ἀφαιρεῖται τὸ δεύτερον. Παρονομαστής εἶναι ἡ ὁρίζουσα τοῦ συστήματος. Π.χ. "Εστω τὸ σύστημα

$$0,3x + 0,1\psi = 1,2$$

$$2x - 5\psi = 5,6$$

Μεταφέροντες ὅλους τοὺς ὄρους εἰς τὸ πρῶτον μέλος ἔχομεν

$$0,1x + 0,1\psi - 1,2 = 0$$

$$2x - 5\psi + 5,6 = 0$$

$$\text{Τοῦτο ἀληθεύει ὅταν } x = \frac{0,1 \cdot 5,6 - (-5) \cdot (-1,2)}{0,3 \cdot (-5) - 2 \cdot (0,1)} = \frac{-5,44}{-1,7} = 3,2$$

$$\psi = \frac{-1,2 \cdot 2 - 0,3 \cdot 5,6}{0,3 \cdot (-5) - 2 \cdot (0,1)} = \frac{-4,08}{-1,7} = 2,4.$$

$$\text{ΛΥΣΙΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ } \begin{cases} \alpha x + \beta \psi = \gamma \\ \alpha_1 x + \beta_1 \psi = \gamma_1 \end{cases}$$

**§ 130.** Ἀνακεφαλαιοῦντες τὰ ἀνωτέρω παρατηροῦμεν ὅτι διὰ τὴν λύσιν ἐνὸς ἔγγραμάτου συστήματος δύο πρωτοβαθμίων ἔξισώσεων μὲ δύο ἀγνώστους εύρισκομεν τὴν ὁρίζουσαν αὐτοῦ. Καὶ τότε, λαμβάνοντες τὴν περίπτωσιν, κατὰ τὴν ὅποιαν ἡ ὁρίζουσα αὐτὴ εἶναι  $\neq 0$  θὰ ἔχωμεν ὑπ' ὅψιν ὅτι τὸ σύστημα ἔχει μίαν μόνον λύσιν, τὴν ὅποιαν δυνάμεθα νὰ καταρτίσωμεν κατὰ τὴν ἀνωτέρω μηχανισμὸν. (Παρατ. II).

\*Ἐπειτα λαμβάνομεν τὴν περίπτωσιν κατὰ τὴν ὅποιαν, ἡ ὁρίζουσα τοῦ συστήματος εἶναι μηδενικὴ καὶ εύρισκομεν τὰς τιμάς, αἱ ὅποιαι τὴν μηδενίζουν. Ἀντικαθιστῶντες τότε εἰς τὸ σύστημα

τὰ γράμματα μὲ τὰς τιμὰς αὐτάς, ἀναγνωρίζομεν εύκόλως ἂν αἱ δύο ἔξισώσεις ἀνάγονται εἰς μίαν, ὅπότε ἔχομεν ἀοριστίαν, ἢ ἂν εἶναι ἀσυμβίβαστοι, ὅπότε τὸ σύστημα εἶναι ἀδύνατον.

Ἐφαρμογή. Ἐστω τὸ σύστημα  $\lambda x + \psi = 2$   
 $x + \psi = 2\lambda$ .

Μεταφέροντες ὅλους τοὺς ὅρους εἰς τὸ πρῶτον μέλος, ἔχομεν τὸ ισοδύναμον σύστημα  $\lambda x + \psi - 2 = 0$   
 $x + \psi - 2\lambda = 0$

Ορίζουσα τοῦ συστήματος εἶναι  $\lambda - 1$ .

Ιον. Ἐὰν  $\lambda - 1 \neq 0$ , τὸ σύστημα ἔχει μίαν μόνην λύσιν,

$$\begin{aligned} \text{τὴν } x &= \frac{-2\lambda + 2}{\lambda - 1} = \frac{-2(\lambda - 1)}{\lambda - 1} = -2 \\ \psi &= \frac{-2 + 2\lambda^2}{\lambda - 1} = \frac{2(\lambda^2 - 1)}{\lambda - 1} = 2(\lambda + 1). \end{aligned}$$

Ιον. Ἐὰν  $\lambda - 1 = 0$ , τότε  $\lambda = 1$  καὶ τὸ σύστημα γίνεται, ἂν τεθῇ ἀντὶ  $\lambda$  τὸ 1,  $x + \psi = 2$   $x + \psi = 2$

Ἡτοι τὸ σύστημα ἀνάγεται εἰς μίαν μόνην ἔξισωσιν:  
 τὴν  $x + \psi = 2$  καὶ ἀληθεύει ὅταν  $x = 2 - \psi$  ὅπου  $\psi$  αὐθαίρετος.

Εἶναι ἐπομένως ἀόριστον.

Παρατήρησις. Ποσότης τις, ὡς π.χ. ἡ  $\lambda$ , ἡ ὁποία δύναται νὰ λαμβάνῃ διαφόρους τιμὰς εἰς μίαν ἢ περισσοτέρας ἔξισώσεις ἀνεξαρτήτως τῶν τιμῶν τῶν ἀγνώστων, καλεῖται παράμετρος.

### Ἄσκησεις

Ο μὲς πρώτη 273. Νὰ λυθοῦν τὰ κάτωθι συστήματα καὶ νὰ διερευνηθοῦν διὰ τὰς διαφόρους τιμὰς τοῦ λ :

$$\begin{array}{lll} \alpha') \begin{cases} \lambda x + \psi = 2 \\ x + \lambda \psi = 2\lambda + 1 \end{cases} & \beta') \begin{cases} \lambda x - 2\psi = \lambda \\ (\lambda - 1)x - \psi = 1 \end{cases} & \gamma') \begin{cases} x + (3\lambda - 1)\psi = 0 \\ \lambda \psi - 4x = \lambda - 4 \end{cases} \\ \delta') \begin{cases} \psi = \lambda + 2x \\ 3\psi - \lambda = x + 3 \end{cases} & \epsilon') \begin{cases} x + \psi = \lambda \\ \lambda x + \psi = 1 \end{cases} & \sigma\tau') \begin{cases} (\lambda^2 - 1)x - \psi = \lambda \\ 2x - \psi = \lambda - 1 \end{cases} \end{array}$$

274. Τίνα τῶν κάτωθι συστημάτων ἔχουν μίαν λύσιν, εἶναι ἀόριστα ἢ ἀδύνατα;

$$\begin{array}{lll} \alpha') \begin{cases} 3x - 5\psi = 2 \\ -3x + 5\psi = 7 \end{cases} & \beta') \begin{cases} 2x + 7\psi - 4 = 0 \\ 5x + 21\psi - 12 = 0 \end{cases} & \gamma') \begin{cases} \frac{x}{2} + \frac{\psi}{3} = 1 \\ 7x + 2\psi = 6 \end{cases} \\ \delta') \begin{cases} \frac{x}{3} + \frac{\psi}{4} = -1 \\ \frac{2x}{3} + \frac{\psi}{2} = 5 \end{cases} & \epsilon') \begin{cases} 2\alpha x - \beta\psi = 3 \\ \frac{\alpha x}{2} - \frac{\beta\psi}{6} = 2 \end{cases} & \sigma\tau') \begin{cases} \frac{x}{\alpha} + \frac{\psi}{\beta} = 1 \\ \beta x + \alpha\psi = \alpha\beta \end{cases} \end{array}$$

Όμάς δευτέρα α. 275. Λύσατε και διερευνήσατε τά κατωτέρω συστήματα:

$$\alpha') \begin{cases} 2x - 3\psi = 5\beta - \alpha \\ 3x - 2\psi = \alpha + 5\beta \end{cases} \quad \beta') \begin{cases} \alpha(x - \psi) + \beta(x + \psi) = 4\alpha\beta x \\ (\alpha - \beta)x - \beta\psi = \alpha\psi \end{cases}$$

$$\gamma') \begin{cases} 3x - \psi = 2(\alpha + \beta)^2 \\ 3\psi - x = 2(\alpha - \beta)^2 \end{cases} \quad \delta') \begin{cases} \alpha(x - \psi + \beta) + \beta^2 = \beta\psi \\ \alpha(\psi - \alpha - \beta) + \beta x = \beta\psi \end{cases}$$


$$\epsilon') \begin{cases} \frac{x}{x - \alpha} + \frac{\psi}{\psi - \beta} = 2 \\ \alpha x + \beta\psi = 2\alpha\beta \end{cases} \quad \sigma') \begin{cases} x + \psi = \frac{2\beta\gamma(\alpha^3 - 2\alpha^2\beta + 3\alpha^2\gamma)}{\alpha\beta\gamma - 2\beta^2\gamma + 3\beta\gamma^2} \\ \alpha(x - \alpha^2) + \beta(\psi + \beta^2) = \alpha\beta(\alpha + \beta) + (\alpha - \beta)\gamma \end{cases}$$

#### 4. ΓΡΑΦΙΚΗ ΛΥΣΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΥΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΜΕ ΔΥΟ ΑΓΝΩΣΤΟΥΣ

**§ 131.** "Εστι ωτὸ σύστημα  $\begin{cases} 3x - 2\psi = 6 \\ x - 2\psi = 4 \end{cases}$  (1)

Λύοντες αὐτὸ εύρισκομεν  $x = 1$ ,  $\psi = -\frac{3}{2}$ . Τὸ σημεῖον, τὸ ὅποιον παριστάνει τὸ ζεῦγος τῶν τιμῶν  $(1, -\frac{3}{2})$ , κεῖται ἐπὶ ἔκαστης τῶν εὐθειῶν  $\epsilon_1$  καὶ  $\epsilon_2$ , τὰς ὅποιας παριστάνουν αἱ ἔξισώσεις τοῦ συστήματος. Ἐπομένως αἱ συντεταγμέναι τοῦ σημείου τῆς τομῆς  $M$  τῶν εὐθειῶν  $\epsilon_1$  καὶ  $\epsilon_2$  ἐπαληθεύουν τὸ σύστημα (1).

"Ἄρα διὰ νὰ λύσωμεν ἐν σύστημα α' βαθμοῦ δύο ἔξισώσεων μετὰ δύο ἀγνώστων γραφικῶς, ἀρκεῖ νὰ εὔρωμεν τὰς συντεταγμένας τοῦ σημείου τῆς τομῆς  $M$  τῶν εὐθειῶν τῶν παριστανομένων ὑπὸ τῶν ἔξισώσεων τοῦ συστήματος (σχ. 12).



Σχ. 12

τὸν  $A$  διὰ τοῦ αὐτοῦ δρόμου ὡς ὁ ἵππεύς. Ποίαν ὥραν καὶ

'Ἐφαρμογαὶ. 1η) 'Ιππεύς ἀναχωρεῖ τὴν 6ην πρωινὴν ὥραν ἐκ τοῦ τόπου  $A$ , διὰ νὰ μεταβῇ εἰς τὸν  $B$ . 'Ημίσειαν ὥραν βραδύτερον ἀναχωρεῖ ἐκ τοῦ  $B$  ποδηλάτης διευθύνομενος πρὸς


είς ποίαν ἀπόστασιν ἀπὸ τοῦ Α θὰ συναντηθοῦν, ἂν ὁ μὲν ἵππεὺς διανύῃ 10 χλμ. τὴν ὥραν, ὁ δὲ ποδηλάτης 14 χλμ. τὴν ὥραν καὶ ἡ ἀπόστασις ΑΒ εἶναι 35 χλμ.

Παριστάνομεν τὰς ὥρας μὲ σημεῖα τοῦ ἄξονος τῶν x καὶ τὰς ἀποστάσεις μὲ σημεῖα τοῦ ἄξονος τῶν ψ (τῶν ἀξόνων τεμνομένων ἐνταῦθα εἰς τὸ Α). Δεχόμεθα ὅτι ἔκάστη ὑποδιαιρεσις ἐπὶ τοῦ ἄξονος τῶν x θὰ παριστάνη χρόνον διαφέροντα κατὰ 1 ὥραν τῆς παρακειμένης τῆς καὶ ἔκάστη ἐπὶ τοῦ ψ κατὰ 5 χλμ. Οὕτω μετὰ 1 ὥραν ἀπὸ τῆς ἀναχωρήσεώς του ὁ ἵππεὺς θὰ εὐρίσκηται εἰς θέσιν παριστανομένην ὑπὸ τοῦ Μ ἔχοντος τετμημένην 7 ὥρ. καὶ τεταγμένην 10 χλμ., ἐνῷ ἡ πορεία του παριστάνεται ὑπὸ τῆς εὐθείας ΑΜ.

Ἡ θέσις τοῦ ποδηλάτου κατὰ τὴν ἀναχώρησίν του παριστάνεται ὑπὸ τοῦ σημείου Λ (6,5, 35) καὶ εἰς τὸ τέλος 1 ὥρ. μετ' αὐτὴν ὑπὸ τοῦ Ν μὲ τεταγμένην 35–14=21 χλμ. Ἡ πορεία τούτου παριστάνεται ὑπὸ τῆς εὐθείας ΛΝ. Τὸ σημεῖον τῆς συναντήσεως τῶν δύο κινητῶν ἐπὶ τοῦ δρόμου ΑΒ παριστάνεται ὑπὸ τοῦ σημείου Ρ (7,75 ὥρ, 17,5 χλμ.). Ἐρα ἡ συνάντησις θὰ γίνη εἰς τὰς 7 ὥρ. 45 καὶ εἰς ἀπόστασιν 17,5 χλμ. ἀπὸ τοῦ Α (σχ. 13).

2) Ποδηλάτης ἀναχωρεῖ τὴν 5ην πρωινὴν ὥραν ἐκ τόπου Ρ διευθυνόμενος πρὸς τὸν Μ διανύων 16 χλμ. τὴν ὥραν καὶ σταθμεύων πάντοτε ἐπὶ 30λ μετὰ ἀπὸ πορείαν 1 ὥρας. Ζητεῖται : α') ποίαν ὥραν θὰ ἔχῃ διανύση 48 χλμ. ἀπὸ τοῦ Ρ, β') ποίαν ὥραν καὶ εἰς ποίαν ἀπόστασιν ἀπὸ τοῦ Ρ θὰ συναντηθῇ μὲ αὐτοκίνητον ἀναχωρῆσαν ἐκ τοῦ Ρ τὴν 7ην ὥραν 30λ πρωινήν, τὸ διποῖον κινεῖται πρὸς τὴν αὐτὴν διεύθυνσιν διανύον 40 χλμ. τὴν ὥραν.


Ἐργαζόμενοι καθὼς καὶ εἰς τὸ προηγούμενον πρόβλημα παρατηροῦμεν ὅτι ὁ δρόμος τοῦ ποδηλάτου ἀπὸ τῆς 5ης ὥρας μέχρι



Σχ. 13

τῆς 6ης ώρας παριστάνεται ύπο τοῦ εύθυγράμμου τμήματος ΡΑ (σχ. 14), δύπου τὸ Ρ παριστάνει τὴν ἀρχὴν τῶν ἀξόνων. Οἱ δρόμοι ἀπὸ τῆς 6,5ης ώρας μέχρι τῆς 7,5ης ώρας παριστάνεται ύπο τοῦ

ΒΓ καὶ ἀπὸ τῆς 8ης μέχρι τῆς 9ης ώρας ύπο τοῦ ΔΕ. Τὰ εὐθύγραμμα ΑΒ, ΓΔ, EZ (παράλληλα τοῦ ἀξονος τῶν x) ἀντιστοιχοῦν πρὸς τοὺς χρόνους τῶν σταθμεύσεων. Οὕτως ἡ ὅλη πορεία μετὰ σταθμεύσεων τοῦ ποδηλάτου παριστάνεται ύπο τῆς τεθλασμένης γραμμῆς ΡΑΒΓΔΕΖ. Ἡ ἀπόστασις 48 χλμ. ἀντιστοιχεῖ εἰς τὸ σημεῖον Ε ἔχον τετμημένην 9 ώρας. Ἀρα τὴν 9ην ώραν θὰ ἀπέχῃ ὁ ποδηλάτης 48 χλμ. ἀπὸ τοῦ Ρ.



Σχ. 14

Ἡ πορεία τοῦ αὐτοκινήτου δίδεται ύπο τῆς εὐθείας ΗΝ, ἐνῷ ἔχομεν Η (7,5, 0), καὶ τέμνει ἡ ΗΝ τὴν τεθλασμένην γραμμὴν εἰς τὸ σημεῖον Ν ἔχον τετμημένην 8,5 ώρας καὶ τεταγμένην 40 χλμ. Ἐπομένως ἡ συνάντησις θὰ γίνη τὴν 8ην ώραν 30<sup>λ</sup> εἰς ἀπόστασιν 40 χλμ. ἀπὸ τοῦ τόπου Ρ.

### Προβλήματα γραφικῶν κατασκευῶν

276. Παραστήσατε γραφικῶς ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ σχήματος τὰς πορείας α') ἐνὸς αὐτοκινήτου καὶ μιᾶς ἀμαξοστοιχίας, β') μιᾶς δευτέρας ἀμαξοστοιχίας καὶ μιᾶς τρίτης. Τὰ μὲν δύο πρῶτα κινητὰ ἀναχωροῦν ἐκ τοῦ αὐτοῦ τόπου Ρ, τὰ δὲ δύο ἄλλα ἐκ τοῦ Μ. Τὸ αὐτοκίνητον ἀναχωρεῖ τὴν 13ην ώραν 5λ καὶ φθάνει εἰς τὸν Μ τὴν 15ην ώρ. 57λ μὲ σταθμεύσεις 5λ, 4λ, 2λ, 1λ εἰς ἑκαστὸν τῶν ἐνδιαιμέσων σταθμῶν Α, Β, Γ, Δ, Ε. Ἡ ἐκ τοῦ Ρ ἀμαξοστοιχία ἀναχωροῦσα τὴν 15ην ώραν 25λ φθάνει εἰς τὸν Μ ἀνεύ σταθμεύσεως τὴν 16ην ώρ. 5λ. Ἡ ἐκ τοῦ Μ ἀναχωροῦσα τὴν 13ην ώρ. 20λ φθάνει εἰς τὸν Ρ τὴν 16ην ώρ. 45λ μετὰ σταθμεύσεως 2λ, 3λ, 4λ, 5λ εἰς τοὺς ἐνδιαιμέσους σταθμοὺς Δ, Γ, Β, Α. Ἡ τρίτη ἀμαξοστοιχία ἀναχωροῦσα ἐκ τοῦ Μ τὴν 14ην ώραν φθάνει εἰς τὸν Ρ τὴν 15ην ώραν 55λ μετὰ σταθμευσιν 3λ

εις τὸν Α. Ἡ ἀπόστασις PM είναι 131 χλμ., ἡ δὲ τῶν ἐνδιαμέσων σταθμῶν ἀπὸ τοῦ P είναι 51 χλμ., 66 χλμ., 80 χλμ., 95 χλμ., 122 χλμ., καὶ αἱ κινήσεις ὑποτίθενται ὁμολασί. Εὗρετε γραφικῶς ποῦ συναντῶνται τὰ κινητὰ ἀνὰ δύο καὶ νὰ γίνουν αἱ πρέπουσαι ἐπαληθεύσεις.

277. Ἐκ δύο προσώπων τὸ ἔν ἔχει 63 500 δρχ, τὸ ἄλλο 125 000 δρχ. Κατ' ἔτος τοῦ μὲν α' αὐξάνεται τὸ ποσὸν κατὰ 8 000 δρχ, τοῦ δὲ β' ἔλαττοῦται κατὰ 12 500 δρχ. Μετὰ πόσα ἔτη αἱ περιουσίαι των θὰ είναι ἵσαι; Νὰ λυθῇ γραφικῶς καὶ νὰ ἐπαληθευθῇ δι' ὑπολογισμοῦ.

278. Δύο ποδηλάται A καὶ B ἀναχωροῦν ὁ μὲν ἐκ τοῦ τόπου M τὴν 8ην ὥραν, ὁ δὲ ἐκ τοῦ N τὴν 9ην ὥραν 48λ καὶ διευθύνονται πρὸς συνάντησιν ὁ εἰς τοῦ ἀλλού. 'Ο Α συναντᾷ τὸν B τὴν 11ην ὥραν καὶ φθάνει εἰς τὸν N τὴν 13ην ὥραν. 'Αν ἡ ἀπόστασις MN είναι 60 χλμ, νὰ εύρεθῇ ὁ χρόνος, καθ' ὃν ὁ B φθάνει εἰς τὸν M καὶ ἡ ταχύτης ἐκάστου ποδηλάτου. 'Η λύσις νὰ γίνῃ γραφικῶς καὶ νὰ ἐπαληθευθῇ διὰ τοῦ ὑπολογισμοῦ.

279. Μία τροχιοδρομίκη γραφιμὴ AB μῆκος 8 χλμ. διατρέχεται κατὰ δύο ἀντιθέτους φορὰς ὑπὸ διαμεζῶν, αἱ διποῖαι αἱ αναχωροῦν ὅντα 10λ διανύουσαι 12 χλμ. τὴν ὥραν περιλαμβανομένων καὶ τῶν σταθμεύσεων. 'Η πρώτη ἀναχώρησις ἐκ τῶν A καὶ B γίνεται συγχρόνως τὴν 6ην ὥραν. Πεζοπόρος ἀναχωρεῖ ἐκ τοῦ A τὴν 8ην ὥραν 15λ διευθυνόμενος πρὸς τὸ B μὲ ταχύτητα 4 χλμ. τὴν ὥραν. Νὰ εύρεθῇ α') πόσας διαμέσας θὰ συναντήσῃ ἐρχομένας ἐκ τοῦ B, β') πόσαις διαμέσαις ἐρχόμεναι ἐκ τοῦ A θὰ τὸν συναντήσουν. 'Η λύσις νὰ γίνῃ γραφικῶς καὶ ἡ ἐπαληθευσις λογιστικῶς.

280. Εὗρετε τὸ σημείον τῆς τομῆς τῶν εὐθειῶν :

$$\alpha') \quad 2x + 3\psi = 1, \quad \text{καὶ} \quad \psi - 3x = 4.$$

$$\beta') \quad 0,3x + 0,1\psi = 1,2 \quad \Rightarrow \quad 2x - 5\psi + 5,6 = 0.$$

$$\gamma') \quad 0,4x + 0,3\psi - 0,45 = 0, \quad \Rightarrow \quad 1,6x + 0,4\psi + 1 = 0.$$

$$\delta') \quad \frac{x-1}{3} = \frac{\psi+4}{7} \quad \Rightarrow \quad x - 2\psi = 0.$$

$$\varepsilon') \quad \frac{x-\psi}{3} - \frac{\psi-x}{7} + 1 = 10, \quad \Rightarrow \quad x - 7\psi = 0.$$

$$\sigma') \quad \frac{1}{x} - \frac{2}{\psi} = \frac{2}{x\psi}, \quad \Rightarrow \quad x + \psi = 3.$$

## 5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΑΓΝΩΣΤΟΥΣ

**§ 132.** 'Εάν ἔχωμεν ἐν σύστημα τριῶν ἐξισώσεων πρωτοβαθμίων μὲ τρεῖς ἀγνώστους π.χ. τὸ

$$\begin{cases} x + 2\psi + 3\omega = 14 \\ 2x + \psi + \omega = 7 \\ 3x + 2\psi + 2\omega = 13 \end{cases} \quad (1)$$

Δυνάμεθα νὰ λύσωμεν αὐτὸ μὲ μίαν ἀπὸ τὰς μεθόδους, τὰς ὅποιας ἔγνωρίσαμεν. Οὕτω μὲ τὴν μέθοδον ἀπαλοιφῆς διὰ τῶν ἀντιθέτων συντελεστῶν ἀπαλείφομεν π.χ. τὸν  $x$  μεταξὺ τῶν δύο πρώτων ἔξισώσεων τῶν (1) καὶ ἔχομεν:

$$\begin{array}{r} 2 \mid x+2\psi+3\omega=14 \\ -1 \quad 2x+\psi+\omega=7 \\ \hline 3\psi+5\omega=21 \end{array}$$

Ἐὰν ἀντικαταστήσωμεν μίαν τῶν δύο πρώτων ἔξισώσεων τοῦ διθέντος συστήματος (1), ἔστω τὴν δευτέραν, μὲ τὴν οὔτως εύρεθεῖσαν  $3\psi+5\omega=21$ , προκύπτει σύστημα ἰσοδύναμον πρὸς τὸ διθέν, τὸ

$$\left\{ \begin{array}{l} x+2\psi+3\omega=14 \\ 3\psi+5\omega=21 \\ 3x+2\psi+2\omega=13 \end{array} \right. \quad (2)$$

Ἀπαλείφομεν τώρα τὸν  $x$  μεταξὺ τῆς πρώτης καὶ τρίτης τῶν (2) καὶ ἔχομεν

$$\begin{array}{r} 3 \mid x+2\psi+3\omega=14 \\ -1 \quad 3x+2\psi+2\omega=13 \\ \hline 4\psi+7\omega=29 \end{array}$$

Δυνάμεθα νὰ ἀντικαταστήσωμεν τὴν πρώτην ἢ τὴν τρίτην ἔξισώσιν τοῦ (2) μὲ τὴν προκύψασαν  $4\psi+7\omega=29$ . Ἐάς ἀντικαταστήσωμεν τὴν τρίτην καὶ ἔχομεν τὸ κατωτέρω σύστημα (3) ἰσοδύναμον πρὸς τὸ (2) καὶ τὸ (1)

$$\left\{ \begin{array}{l} x+2\psi+3\omega=14 \\ 3\psi+5\omega=21 \\ 4\psi+7\omega=29 \end{array} \right. \quad (3)$$

Μεταξὺ τῶν τελευταίων ἔξισώσεων τοῦ (3) ἀπαλείφομεν τὸν  $\psi$  καὶ εύρισκομεν  $\omega=3$ . Ἀντικαθιστῶμεν τὴν μίαν ἐκ τῶν δύο τελευταίων τοῦ (3), ἔστω τὴν τρίτην, μὲ τὴν  $\omega=3$  καὶ ἔχομεν τὸ κατωτέρω σύστημα (4)

$$\begin{array}{l} x+2\psi+3\omega=14 \\ 3\psi+5\omega=21 \\ \omega=3 \end{array} \quad (4)$$

τὸ ὅποιον εἶναι ἰσοδύναμον πρὸς τὰ προηγούμενα. Ἀντικαθιστῶμεν

τὸ ω μὲ τὴν τιμὴν του εἰς τὴν δευτέραν τῶν ἔξισώσεων (4) καὶ εύρισκομεν τὴν τιμὴν τοῦ  $\psi=2$ . Τέλος, ἐὰν τὰς τιμὰς τοῦ ω καὶ ψ ἀντικαταστήσωμεν εἰς τὴν πρώτην τοῦ (1) ἢ τοῦ (4), εύρισκομεν εὐκόλως καὶ τὴν τιμὴν τοῦ  $x=1$ . Ἐάρα αἱ τιμαὶ τῶν ἀγνώστων είναι  $x=1$ ,  $\psi=2$  καὶ  $\omega=3$ .

Τὸ ἀνωτέρω σύστημα (1) λύομεν καὶ δι' ἀπαλοιφῆς μὲ ἀντικαταστασιν ὡς ἔξῆς: Λύομεν τὴν μίαν τοῦ (1), ἔστω τὴν πρώτην, ὡς πρὸς τὸν ἕνα τῶν ἀγνώστων π.χ. ὡς πρὸς  $x$  θεωροῦντες τοὺς ἄλλους δύο ὡς γνωστούς. Οὕτως εύρισκομεν τὴν ἔξισώσιν

$$x=14-2\psi-3\omega \quad (2')$$

Αὔτὴ μὲ τὰς δύο ἄλλας ἔξισώσεις τοῦ (1) ἀποτελοῦν σύστημα ἰσοδύναμον πρὸς αὐτό. Τὴν τιμὴν ταύτην θέτομεν εἰς τὰς ἄλλας δύο ἔξισώσεις τοῦ (1) καὶ οὕτως εύρισκομεν τὰς κάτωθι δύο ἔξισώσεις

$$\begin{cases} 2(14-2\psi-3\omega)+\psi+\omega=7 \\ 3(14-2\psi-3\omega)+2\psi+2\omega=13 \end{cases}$$

$$\text{καὶ μετὰ τὴν κατάλληλον διάταξιν } \begin{cases} 3\psi+5\omega=21 \\ 4\psi+7\omega=29 \end{cases}$$

Αὗται μὲ τὴν (2') ἀποτελοῦν σύστημα ἰσοδύναμον πρὸς τὸ δοθέν. Ἐκ τῶν δύο τελευταίων ἀνωτέρω ἔξισώσεων εύρισκομεν, κατὰ τὰ γνωστά, τὰς τιμὰς τῶν ψ καὶ ω, ἦτοι  $\psi=2$  καὶ  $\omega=3$ . Ἀκολούθως τὰς τιμὰς τούτων ἀντικαθιστῶμεν εἰς τὴν (2') καὶ εύρισκομεν τὴν τιμὴν τοῦ  $x=1$ .

Τὸ δοθὲν σύστημα (1) δυνάμεθα νὰ λύσωμεν εὐκόλως καὶ δι' ἀπαλοιφῆς ἀγνώστων μεταχειριζόμενοι τὴν μέθοδον τῆς συγκρίσεως.

### Ἄσκησις

281. Λύσατε τὸ ἀνωτέρω σύστημα (1) διὰ τῆς μεθόδου ἀπαλοιφῆς διὰ συγκρίσεως.

$$\text{§ 133. } \text{Ἐστω πρὸς λύσιν τὸ σύστημα } \begin{cases} 4x-5\omega+2\phi=0 \\ 3x+2\omega+7\phi=28 \quad (1) \\ x-\omega+2\phi=5 \end{cases}$$

Διὰ νὰ λύσωμεν τὸ σύστημα αὐτὸ δυνάμεθα νὰ ἔργασθῶμεν ὡς ἔξῆς: Πολλαπλασιάζομεν τὰ μέλη τῆς μὲν πρώτης ἔξισώσεως ἐπὶ  $\kappa_1$ , τῆς δὲ δευτέρας ἐπὶ  $\kappa_2$  καὶ προσθέτομεν τὰ ἔξαγόμενα κατὰ μέλη,

μὲ τὰ μέλη ἀντιστοίχως τῆς τρίτης ἔξισώσεως, ὅτε λαμβάνομεν τὴν  $(4\kappa_1 + 3\kappa_2 + 1)x - (5\kappa_1 - 2\kappa_2 + 1)\omega + (2\kappa_1 + 7\kappa_2 + 2)\phi = 28\kappa_2 + 5$ . (2)

Αὔτη μὲ τὰς δύο πρώτας, π.χ. τοῦ δοθέντος συστήματος, ἀποτελοῦν σύστημα ἰσοδύναμον αὐτοῦ. Ἀν θέσωμεν ἵσον μὲ 0 ἕκαστον τῶν συντελεστῶν τῶν ω καὶ φ τῆς ἀνωτέρω ἔξισώσεως (2),

$$\begin{cases} 5\kappa_1 - 2\kappa_2 + 1 = 0 \\ 2\kappa_1 + 7\kappa_2 + 2 = 0 \end{cases} \quad (3)$$

καὶ λύοντες τό σύστημα αὐτὸν ὡς πρὸς  $\kappa_1$  καὶ  $\kappa_2$ , εύρισκομεν

$$\kappa_1 = -\frac{11}{39}, \quad \kappa_2 = -\frac{8}{39}.$$

Εἰσάγομεν τὰς τιμὰς αὐτὰς εἰς τὴν ἀνωτέρω ἔξισώσιν (2) καὶ εύρισκομεν  $\left(-\frac{44}{39} - \frac{24}{39} + 1\right)x = -\frac{224}{39} + 5$  καὶ  $x = 1$ .

Ἀν θέσωμεν τοὺς συντελεστὰς τῶν  $x$  καὶ φ τῆς ἀνωτέρω ἔξισώσεως (2) ἵσον μὲ 0 ἕκαστον, θὰ ἔχωμεν

$$\begin{cases} 4\kappa_1 + 3\kappa_2 + 1 = 0 \\ 2\kappa_1 + 7\kappa_2 + 2 = 0 \end{cases} \quad (4)$$

Ἐκ τῆς λύσεως τοῦ συστήματος (4) εύρισκομεν

$$\kappa_1 = -\frac{1}{22}, \quad \kappa_2 = -\frac{3}{11}.$$

Ἀντικαθιστῶντες τὰς τιμὰς αὐτὰς εἰς τὴν (2), εύρισκομεν

$$\left(-\frac{5}{22} + \frac{6}{11} + 1\right)\omega = \frac{84}{11} - 5 \text{ καὶ } \omega = 2.$$

Όμοιώς ἐργαζόμεθα διὰ τὴν εὑρεσιν τῆς τιμῆς τοῦ φ καὶ εύρισκομεν, ἀν θέσωμεν ἵσον μὲ 0 ἕκαστον τῶν συντελεστῶν τοῦ  $x$  καὶ ω τῆς (2), τὸ σύστημα

$$\begin{cases} 4\kappa_1 + 3\kappa_2 + 1 = 0 \\ 5\kappa_1 - 2\kappa_2 + 1 = 0 \end{cases} \quad (5)$$

ἐκ τῆς λύσεως δὲ τούτου εύρισκομεν  $\kappa_1 = -\frac{5}{23}$ ,  $\kappa_2 = -\frac{1}{23}$  καὶ τέλος  $\phi = 3$ .

Ἡ μέθοδος αὗτη, ἡ ὅποια εἶναι γενικωτέρα τῆς μεθόδου ἀπαλοιφῆς ἀγνώστου διὰ τῶν ἀντιθέτων συντελεστῶν, δύναται νὰ ἐφαρμοσθῇ διὰ τὴν λύσιν συστήματος καὶ μὲ περισσοτέρους τῶν τριῶν ἀγνώστους, καλεῖται δὲ μέθοδος τοῦ Bézout.

**§ 134.** Έν τέλει διὰ νὰ λύσωμεν σύστημα μ ἔξισώσεων πρωτοβαθμίων μὲ μ ἀγνώστους, ἀπαλείφομεν μεταξὺ τῆς πρώτης τῶν δοθεισῶν καὶ ἑκάστης τῶν μ—1 ἀλλων ἔξισώσεων ἵνα καὶ τὸν αὐτὸν ἀγνώστον. Οὕτω προκύπτουν μ—1 νέαι ἔξισώσεις μὲ μ—1 ἀγνώστους. Αὗται μὲ τὴν πρώτην τῶν δοθεισῶν ἀποτελοῦν σύστημα ἰσοδύναμον πρὸς τὸ δοθέν. Εἰς τὸ σύστημα τοῦτο ἐργαζόμεθα ὅμοίως λαμβάνοντες τὰς νέας μ—1 ἔξισώσεις αὐτοῦ ἀπὸ τῆς δευτέρας καὶ ἔξῆς. Οὕτω προκύπτουν μ—2 ἔξισώσεις μὲ μ—2 ἀγνώστους. Αὗται μὲ τὰς δύο πρώτας ἔξισώσεις τοῦ δευτέρου συστήματος ἀποτελοῦν σύστημα ἰσοδύναμον πρὸς τὸ δοθέν. Οὕτω προχωροῦντες θὰ εὑρωμεν σύστημα ἰσοδύναμον πρὸς τὸ δοθέν μὲ μ ἔξισώσεις. Ἐκ τῶν ἔξισώσεων τούτων ἡ τελευταία θὰ ἔχῃ ἓνα ἀγνώστον, ἡ προτελευταία δύο, ἡ πρὸ αὐτῆς τρεῖς καὶ οὕτω καθ' ἔξῆς, ἡ δὲ πρώτη θὰ ἔχῃ μ ἀγνώστους. Λύοντες τὴν τελευταίαν εύρισκομεν τὴν τιμὴν τοῦ ἑνὸς ἀγνώστου. Εἰσάγομεν τὴν τιμὴν τούτου εἰς τὴν προτιγουμένην ἔξισωσιν καὶ λύομεν αὐτὴν ὡς πρὸς τὸν ἄλλον ἀγνώστον, προχωροῦμεν ὅμοίως εἰς τὴν ἀμέσως προτιγουμένην ἔξισωσιν καὶ οὕτω καθ' ἔξῆς μέχρι τῆς πρώτης, ὅτε εύρισκομεν τὰς τιμὰς ὅλων τῶν ἀγνώστων.

### Α σ κ ḥ σ ε ι ζ

Ο μὰς πρώτη. 282. Νὰ λυθοῦν καὶ ἀπαληθευθοῦν τὰ κάτωθι συστήματα:

$$\alpha') \begin{cases} 2x+7\psi-11\omega=10 \\ 5x-10\psi+3\omega=-15 \\ -6x+12\psi-\omega=31 \end{cases} \beta') \begin{cases} \frac{x+2\psi}{5x+6\omega}=\frac{1}{20} \\ \frac{3\psi+4\omega}{x+2\psi}=\frac{11}{4} \\ x+\psi+\omega=12 \end{cases} \gamma') \begin{cases} x-2\psi+3\omega-3\phi=-16 \\ \psi-2\omega+3\phi-4x=8 \\ \omega-2\phi+3x-4\psi=-4 \\ \phi-2x+3\psi-4\omega=-8 \end{cases}$$

$$\delta') \begin{cases} x-\psi+\omega=7 \\ 2x=\omega \\ 8\psi=5\omega \end{cases} \epsilon') \begin{cases} 3x+6\psi-2\omega+9\phi=20 \\ 4\psi-6x+5\omega-5\phi=-5 \\ 2\omega-3x+8\psi-3\phi=-1 \\ 9\phi+10\psi+3\omega-4x=23 \end{cases} \sigma') \begin{cases} 0,5x+0,3\psi=0,15 \\ 0,4x-0,2\omega=-0,22 \\ 0,3\psi+0,4\omega=0,95 \end{cases}$$

$$\zeta') \left\{ x + \frac{\Psi}{2} = \psi + \frac{\omega}{3} = \omega + \frac{x}{4} = 100 \right.$$

Ο μὰς δευτέρα. 283. Νὰ λυθοῦν τὰ κάτωθι συστήματα:

$$\alpha') \begin{cases} \alpha x+\psi+\omega=\alpha^2 \\ x+\alpha\psi+\omega=3\alpha \\ x+\psi+\alpha\omega=2 \end{cases} \beta') \begin{cases} \alpha x+\psi=(\alpha+\beta)(\alpha+1) \\ \psi-\omega=\gamma \\ x+(\alpha+\beta)\omega=(\alpha+\beta)(\alpha+\beta+1) \end{cases}$$

$$\gamma') \begin{cases} \alpha x + \beta \psi + \gamma \omega = 3\alpha \beta \gamma \\ \frac{x}{\alpha-1} = \frac{\psi}{\beta-1} = \frac{\omega}{\gamma-1} \end{cases} \quad \delta') \begin{cases} \alpha x = \beta \psi = \gamma \omega \\ x' + \psi + \omega = \frac{\alpha \beta + \beta \gamma + \alpha \gamma}{\alpha \beta \gamma} \end{cases}$$

$$\epsilon') \begin{cases} x + \alpha(\psi + \omega) = \kappa \\ \psi + \beta(\omega + x) = \lambda \\ \omega + \gamma(x + \psi) = \mu \end{cases} \quad \sigma') \begin{cases} x + \kappa \psi + \lambda \omega = \alpha \\ \psi + \kappa \omega + \lambda x = \beta \\ \omega + \kappa x + \lambda \psi = \gamma \end{cases}$$

$$\zeta') \begin{cases} x + \psi + \omega = 0 \\ (\beta + \gamma)x + (\gamma + \alpha)\psi + (\alpha + \beta)\omega = 0 \\ \beta \gamma x + \alpha \gamma \psi + \alpha \beta \omega = 1 \end{cases} \quad \eta') \begin{cases} x + \psi + \omega = 1 \\ \alpha x + \beta \psi + \gamma \omega = \kappa \\ \alpha^2 x + \beta^2 \psi + \gamma^2 \omega = \kappa^2 \end{cases}$$

## 6. ΛΥΣΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΤΕΧΝΑΣΜΑΤΩΝ

**§ 135.** Ενίστε πρὸς λύσιν συστήματός τινος πρὸ τῆς ἐφαρμογῆς τῶν γνωστῶν μεθόδων μεταχειρίζόμεθα τεχνάσματά τινα στηριζόμενα ἐπὶ τῶν θεμελιώδων νόμων καὶ τῶν ἴδιοτήτων τῶν πράξεων. Τὸ εἶδος τῶν τεχνασμάτων αὐτῶν δὲν εἶναι ὠρισμένον καὶ φανερὸν διὰ κάθε σύστημα, ἀλλ᾽ ἔξαρτᾶται ἐκ τῆς συνηθείας καὶ τῆς δεξιότητος τοῦ νοῦ περὶ τὴν λύσιν.

Οὕτω π.χ. πρὸς λύσιν τοῦ συστήματος  $\begin{cases} x + 6\psi + 7\omega = 30 \\ x: \psi: \omega = 6: 8: 3 \end{cases}$  (1)

γράφομεν τὰς δευτέρας ἔξισώσεις ὡς ἔξης:  $\frac{x}{6} = \frac{\psi}{8} = \frac{\omega}{3}$ , ὅτε θὰ εἴναι  $\frac{x}{6} = \frac{6\psi}{48} = \frac{7\omega}{21} = \frac{x+6\psi+7\omega}{75} = \frac{30}{75} = \frac{2}{5}$ . Ἐκ τούτων εύρίσκομεν  $\frac{x}{6} = \frac{2}{5}$  καὶ  $x = \frac{12}{5}$ ,  $\frac{6\psi}{48} = \frac{2}{5}$ ,  $\psi = \frac{2 \cdot 48}{5 \cdot 6} = \frac{16}{5}$ ,  $\frac{7\omega}{21} = \frac{2}{5}$ ,  $\omega = \frac{2 \cdot 21}{5 \cdot 7} = \frac{6}{5}$ .

Τὸ αὐτὸν ἀνωτέρω σύστημα δυνάμεθα νὰ λύσωμεν καὶ ὡς ἔξης:

Θέτομεν  $\frac{x}{6} = \frac{\psi}{8} = \frac{\omega}{3} = \tau$ . Ἐκ τούτων εύρίσκομεν  $x = 6\tau$ ,  $\psi = 8\tau$ ,  $\omega = 3\tau$ . Τὰς τιμὰς τῶν  $x, \psi, \omega$  θέτομεν εἰς τὴν πρώτην τῶν δοθεισῶν ἔξισώσεων καὶ εύρισκομεν  $6\tau + 6 \cdot 8\tau + 7 \cdot 3\tau = 30$  ἢ

$$75\tau = 30, \quad \tau = \frac{30}{75} = \frac{2}{5}.$$

$$\psi = 8\tau = 8 \cdot \frac{2}{5} = \frac{16}{5}, \quad \omega = 3\tau = 3 \cdot \frac{2}{5} = \frac{6}{5}.$$

Έστω πρὸς λύσιν τὸ σύστημα

$$\left\{ \begin{array}{l} x + \psi = 5 \\ \psi + \omega = 8 \\ \omega + \phi = 9 \\ \phi + \tau = 11 \\ \tau + x = 9 \end{array} \right. \quad (2)$$

Προσθέτομεν τὰς ἔξισώσεις κατὰ μέλη καὶ εύρίσκομεν

$$2x + 2\psi + 2\omega + 2\phi + 2\tau = 42, \text{ ἄρα } x + \psi + \omega + \phi + \tau = 21.$$

Προσθέτομεν κατὰ μέλη τὴν πρώτην καὶ τρίτην τῶν ἔξισώσεων τῶν (2) καὶ εύρίσκομεν  $x + \psi + \omega + \phi = 14$ . Τὰ μέλη ταύτης ἀφαιροῦμεν ἀπὸ τὰ τῆς προηγουμένης καὶ εύρισκομεν  $\tau = 21 - 14 = 7$ . Θέτομεν εἰς τὴν τετάρτην  $\tau = 7$  καὶ εύρισκομεν  $\phi + 7 = 11$ , ἄρα  $\phi = 4$ . Θέτομεν εἰς τὴν τελευταίαν  $\tau = 7$  καὶ εύρισκομεν  $7 + x = 9$ , ἄρα  $x = 2$ . Θέτομεν εἰς τὴν πρώτην  $x = 2$  καὶ εύρισκομεν  $\psi = 3$ . Θέτομεν εἰς τὴν δευτέραν  $\psi = 3$  καὶ εύρισκομεν  $\omega = 5$ .

Έστω ἀκόμη πρὸς λύσιν τὸ σύστημα

$$\left\{ \begin{array}{l} x + \psi + \omega = 15 \\ x + \psi + \tau = 16 \\ x + \omega + \tau = 18 \\ \psi + \omega + \tau = 30 \end{array} \right. \quad (3)$$

Προσθέτομεν κατὰ μέλη τὰς ἔξισώσεις τοῦ διθέντος συστήματος καὶ εύρισκομεν  $3(x + \psi + \omega + \tau) = 79$ , ἄρα

$$x + \psi + \omega + \tau = \frac{79}{3} \quad (4)$$

Αφαιροῦμεν τὰ μέλη τῆς πρώτης τῶν διθεισῶν ἔξισώσεων ἀπὸ τὰ μέλη τῆς (4) καὶ εύρισκομεν  $\tau = \frac{79}{3} - 15 = \frac{79 - 45}{3} = \frac{34}{3}$ .

Αφαιροῦμεν τὰ μέλη τῆς δευτέρας τῶν διθεισῶν ἔξισώσεων ἀπὸ τὰ τῆς (4) καὶ εύρισκομεν  $\omega = \frac{79}{3} - 16 = \frac{79 - 48}{3} = \frac{31}{3}$ .

Αφαιροῦμεν τὰ μέλη τῆς τρίτης τῶν διθεισῶν ἔξισώσεων ἀπὸ τὰ τῆς (4) καὶ εύρισκομεν  $\psi = \frac{79}{3} - 18 = \frac{79 - 54}{3} = \frac{25}{3}$ .

Τέλος ἀφαιροῦμεν ἀπὸ τὰ μέλη τῆς (4) τὰ τῆς τελευταίας τῶν διθεισῶν καὶ εύρισκομεν  $x = \frac{76}{3} - 30 = \frac{79 - 90}{3} = -\frac{11}{3}$ .

## Α σ κ ή σ εις

Όμάς πρώτη. 284. Νὰ λυθοῦν τὰ κάτωθι συστήματα :

$$\alpha') \begin{cases} \frac{x}{6} = \frac{\psi}{3} = \frac{\omega}{18} \\ 3x + 2\psi + \omega = 34 \end{cases} \quad \beta') \begin{cases} \frac{1}{x} + \frac{1}{\psi} = 5 \\ \frac{x}{2} + \frac{\psi}{3} = 2x\psi \end{cases} \quad \gamma') \begin{cases} \frac{x}{\alpha} = \frac{\psi}{\beta} = \frac{\omega}{\gamma} = \frac{\varphi}{\delta} \\ \alpha x + \beta \psi + \gamma \omega + \delta \varphi = \frac{\alpha}{\beta} \end{cases}$$

$$\delta') \begin{cases} \frac{1}{x} + \frac{1}{\psi} = \frac{1}{12} \\ \frac{1}{\psi} + \frac{1}{\omega} = \frac{1}{20} \\ \frac{1}{\omega} + \frac{1}{x} = \frac{1}{15} \end{cases} \quad \left( \text{ε'}) \quad \begin{array}{|c|c|c|} \hline & \frac{\alpha}{x} + \frac{\beta}{\psi} - \frac{\gamma}{\omega} = \lambda & \\ \hline & \frac{\alpha}{x} - \frac{\beta}{\psi} + \frac{\gamma}{\omega} = \mu & \sigma \tau') \begin{cases} \mu x = \nu \psi = \rho \omega \\ \alpha x + \beta \psi + \gamma \omega = \delta \end{cases} \\ \hline & - \frac{\alpha}{x} + \frac{\beta}{\psi} + \frac{\gamma}{\omega} = \nu & \\ \hline \end{array} \right)$$

$$\zeta') \begin{cases} \psi \omega + x \omega + x \psi = 12x\psi\omega \\ 3\psi\omega - 4x\omega + 5x\psi = 15x\psi\omega \\ 4\psi\omega - 3x\omega + 2x\psi = 12x\psi\omega \end{cases} \quad \boxed{\eta') \begin{cases} \frac{1}{3x-2\psi+1} + \frac{1}{x+2\psi-3} = \frac{5}{12} \\ \frac{1}{x+2\psi-3} - \frac{1}{3x-2\psi+1} = \frac{1}{12} \end{cases}}$$

$$\theta') \begin{cases} x + \alpha \psi + \alpha^2 \omega + \alpha^3 = 0 \\ x + \beta \psi + \beta^2 \omega + \beta^3 = 0 \\ x + \gamma \psi + \gamma^2 \omega + \gamma^3 = 0 \end{cases} \quad \iota') \begin{cases} \frac{x\psi}{5x+4\psi} = 3 \\ \frac{\psi\omega}{3\psi+5\omega} = 7 \\ \frac{\omega x}{2\omega+3x} = 6 \end{cases} \quad \iota\alpha') \begin{cases} 3x + 7\psi = 23x\psi \\ 3\omega + 8x = 38x\omega \\ 5\psi - 6\omega = 2\psi\omega \end{cases}$$

Όμάς δευτέρα. 285. Λύσατε τὰ κάτωθι συστήματα :

$$\alpha') \begin{cases} (\rho + \mu)x - (\rho - \mu)\psi = 2\nu\rho \\ (\mu + \nu)\psi - (\mu - \nu)\omega = 2\mu\rho \\ (\nu + \rho)\omega - (\nu - \rho)x = 2\mu\nu \end{cases} \quad \gamma') \begin{cases} 3\psi\omega + 2x\omega - x\psi = x\psi\omega \\ 30\psi\omega + 12x\psi - 18x\omega = 13x\psi\omega \\ 18x\psi + 24\psi\omega - 42x\omega = 5x\psi\omega \end{cases}$$

$$\beta') \begin{cases} (\omega + x)\mu - (\omega - x)\nu = 2x\omega \\ (x + \psi)\nu - (x - \psi)\rho = 2x\psi \\ (\psi + \omega)\rho - (\psi - \omega)\mu = 2\psi\omega \end{cases}$$

$$\delta') \begin{cases} \frac{10}{2x+3\psi} - \frac{7}{2x-3\omega} = -4 \frac{7}{8} \\ \frac{2}{2x+3\psi} - \frac{45}{5\psi-4\omega} = -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{3} \left( \frac{4}{2x-3\omega} \right) - \frac{15}{5\psi-4\omega} = 0 \end{cases}$$

Όμας τρίτη. 286. Έξηγήσατε τήν διερεύνησιν τοῦ συστήματος

$$\begin{cases} \alpha x + \beta y = \gamma \\ \alpha_1 x + \beta_1 y = \gamma_1 \end{cases}$$

γραφικῶς, ἢτοι τί σημαίνει γεωμετρικῶς τὸ δτὶ τὸ σύστημα ἐπιδέχεται μίαν λύσιν, ἀπειρον πλῆθος λύσεων ἢ δτὶ εἰναι ἀδύνατον.

287. Τί σημαίνει γεωμετρικῶς τὸ δτὶ τρεῖς ἔξισώσεις μὲ δύο ἀγνώστους  $x$  καὶ ψ ἐπαλήθευονται διὰ τάς αὐτάς τιμάς τῶν ἀγνώστων αὐτῶν;

## 7. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ

§ 136. Λέγομεν δτὶ πρόβλημά τι εἰναι πρωτοβαθμίου συστήματος ὡς πρὸς δύο ἢ περισσοτέρους ἀγνώστους, ἀν ἡ λύσις αὐτοῦ ἀνάγεται εἰς τήν λύσιν συστήματος πρωτοβαθμίων ἔξισώσεων μὲ δύο ἢ περισσοτέρους ἀγνώστους. Διὰ τήν λύσιν τοιούτου προβλήματος σχηματίζομεν τάς ἔξισώσεις αὐτοῦ ἐπὶ τῇ βάσει τῶν ἐπιταγμάτων, λύομεν τὸ σύστημα αὐτῶν καὶ ἔξετάζομεν, ἀν ἡ λύσις πληροὶ τοὺς περιορισμοὺς τοῦ προβλήματος, ἵνα αὐτη εἰναι δεκτή.

### I. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΔΥΟ ΑΓΝΩΣΤΟΥΣ

α') "Αν ὁ  $A$  δώσῃ 10000 δρχ. εἰς τὸν  $B$ , θὰ ἔχῃ οὗτος τριπλάσια τοῦ  $A$ . Εὰν ὁ  $B$  δώσῃ 20000 δρχ. εἰς τὸν  $A$ , θὰ ἔχῃ ὁ  $A$  διπλάσια τοῦ  $B$ . Πόσας δρχ. ἔχει ὁ καθείς ;

Περιορισμός. Οἱ ζητούμενοι ἀριθμοὶ πρέπει νὰ εἰναι θετικοί.

"Εὰν μὲ  $x$  παραστήσωμεν τάς δραχ. τοῦ  $A$  καὶ ψ τάς τοῦ  $B$ , δώσῃ δὲ 10000 δρχ. ὁ  $A$  εἰς τὸν  $B$ . τὰ μὲν ἀπομένοντα χρήματα εἰς τὸν  $A$  θὰ εἰναι  $(x-10000)$  δραχμαί, τὰ δὲ τοῦ  $B$  θὰ εἰναι  $(\psi+10000)$  δραχμαί καὶ θὰ ἔχωμεν  $3(x-10000)=\psi+10000$ .

"Εὰν ὁ  $B$  δώσῃ 20 000 δρχ. εἰς τὸν  $A$ , θὰ εἰναι  $x+20000=2(\psi-20000)$ .

$$\begin{aligned} \text{"Ωστε ἔχομεν τὸ σύστημα} & | 3(x-10000) = \psi+10000 \\ & | x+20000 = 2(\psi-20000), \end{aligned}$$

ἐκ τῆς λύσεως τοῦ ὅποιου εύρισκομεν  $x=28000$  δρχ.  $\psi=44000$  δρχ. καὶ ἡ λύσις εἰναι δεκτή.

β') Νὰ εὑρεθῇ διψήφιος ἀριθμὸς τοῦ ὅποιου τὸ ἀθροισμα τῶν ψηφίων εἶναι 10, ἐὰν δὲ ἐναλλάξωμεν τὰ ψηφία του νὰ προκύπτη τὸ τριπλάσιον τοῦ ἀριθμοῦ.

Περιορισμός. "Αν μὲ ψ παραστήσωμεν τὸ ψηφίον τῶν δεκάδων καὶ μὲ  $x$  τὸ τῶν μονάδων τοῦ ἀριθμοῦ, ὁ ἀριθμὸς θὰ εἰναι  $10\psi+x$ , τὰ δὲ  $x$  καὶ ψ πρέπει νὰ εἰναι ἀκέραιοι μονοψήφιοι  $> 0$ .

Κατά τὰ ἐπιτάγματα θὰ ἔχωμεν τὸ σύστημα

$$\begin{cases} x+\psi=10 \\ 10\psi+x=3(10x+\psi). \end{cases}$$

ἐκ τῆς λύσεως τοῦ όποίου εύρισκομεν  $\psi=8\frac{1}{18}$ ,  $x=1\frac{17}{18}$ . Ἐπομένως ἡ λύσις ἀπορρίπτεται, ἵνα τὸ πρόβλημα εἶναι ἀδύνατον.

γ') Δύο κινητὰ ἀναχωροῦν συγχρόνως ἐκ τοῦ αὐτοῦ σημείου καὶ θὰ ἀπέχουν τὸ ἐν τοῦ ἄλλου 12 μέτρα μέν, ἐὰν κινηθοῦν ἐπὶ 12<sup>δ</sup> πρὸς τὴν αὐτὴν φοράν, 204 μέτρα δέ, ἐὰν πρὸς ἀντιθέτους φοράς. Πόση εἶναι ἡ ταχύτης καθενὸς (κινουμένου ὁμαλῶς);

"Εστω  $x$  μέτρα ἡ ταχύτης τοῦ α' καὶ  $\psi$  μέτρα ἡ τοῦ β' κατὰ δευτερόλεπτον. Μετὰ 12<sup>δ</sup> τὸ α' θὰ διατρέξῃ  $12x$  μ. καὶ τὸ β'  $12\psi$  μ. ἡ δὲ ἀπόστασις αὐτῶν θὰ εἶναι  $(12x-12\psi)$  μ. ἐὰν ἔχουν τὴν αὐτὴν φοράν καὶ  $(12x+12\psi)$  μ. ἐὰν τὴν ἀντιθέτον. Κατὰ τὰ ἐπιτάγματα θὰ ἔχωμεν τὸ σύστημα

$$\begin{cases} 12x-12\psi=12 \\ 12x+12\psi=204 \end{cases} \text{ ἢ τὸ ἴσοδύναμον } \begin{cases} x-\psi=1 \\ x+\psi=17 \end{cases}$$

Ἐκ τῆς λύσεως τούτου εύρισκομεν  $x=9$  μ.,  $\psi=8$  μ. καὶ ἡ λύσις εἶναι δεκτή.

δ') "Ἔχει τις οἷνον δύο ποιοτήτων· τῆς μὲν α' ἡ ὀκᾶ τιμᾶται α δρχ, τῆς δὲ β', β δρχ. Πόσας ὀκάδας πρέπει νὰ λάβῃ ἕξ ἑκάστης ποιότητος, ὥστε νὰ σχηματίσῃ κράμα μ ὀκάδων τιμώμενον γ δρχ. κατ' ὀκᾶν ( χωρὶς κέρδος ἢ ζημίαν );

"Εστω ὅτι θὰ λάβῃ  $x$  ὀκάδας ἐκ τῆς πρώτης ποιότητος καὶ  $\psi$  ἐκ τῆς δευτέρας. Θὰ ἔχωμεν προφανῶς τὸ σύστημα

$$\begin{array}{l} x+\psi=\mu \\ \alpha x+\beta\psi=\gamma\mu \end{array}$$

$$\text{Ἐκ τῆς λύσεως τούτου εύρισκομεν } x=\frac{(\beta-\gamma)\mu}{\beta-\alpha}, \psi=\frac{(\gamma-\alpha)\mu}{\beta-\alpha}.$$

Διερεύνησις. "Ινα ὑπάρχῃ μία μόνη λύσις, πρέπει  $\beta-\alpha\neq 0$  ἢ  $\beta=\alpha$ . Καὶ ἂν εἴναι  $\beta>\alpha$ , πρέπει νὰ εἴναι  $\alpha<\gamma<\beta$ , ὥστε αἱ τιμαὶ τῶν  $x$  καὶ  $\psi$  νὰ εἴναι θετικαί. "Αν εἴναι  $\beta<\alpha$ , πρέπει νὰ εἴναι  $\beta<\gamma<\alpha$ , διὰ τὸν αὐτὸν λόγον. "Αν εἴναι  $\beta=\alpha$ , τὸ πρόβλημα εἶναι ἀδύνατον. ἄλλως τε τότε δὲν δύναται νὰ γίνῃ λόγος περὶ μίγματος."

"Ἐν γένει διὰ νὰ ἐπιδέχηται λύσιν τὸ πρόβλημα, πρέπει νὰ εἴναι  $\beta>\gamma>\alpha$  ἢ  $\beta<\gamma<\alpha$ .

### Προβλήματα

- ✓ 288. Παιδίον λέγει εἰς ἄλλο : «Ἐάν μου δώσῃς τὸ ἡμισυ τῶν μῆλων σου, θὰ ἔχω 40 μῆλα». Τὸ δὲ ἄλλο ἀπαντᾷ : «Δός μου σύ τὸ ἡμισυ τῶν ἴδικῶν σου, διά νὰ ἔχω 35». Πόσα μῆλα εἶχε καθέν;
- ✓ 289. Νὰ εὔρεθοῦν δύο ἀριθμοὶ, ἐκ τῶν ὅποιων ὁ α' εἶναι τριπλάσιος τοῦ β' καὶ τὸ διπλάσιον τοῦ α' μείον τὸ τριπλάσιον τοῦ β' νὰ ισοῦται μὲ 42.
- ✓ 290. Νὰ εὔρεθοῦν δύο ἀριθμοὶ τοιοῦτοι, ὥστε τὸ διπλάσιον τοῦ πρώτου μείον τὸ τριπλάσιον τοῦ δευτέρου νὰ ισοῦται μὲ 5 καὶ τὸ διπλάσιον τοῦ πρώτου μείον 25 νὰ ισοῦται μὲ τὸ δεκαπενταπλάσιον τοῦ δευτέρου.
- ✓ 291. Οἱ ἱέρων τῶν Συρακουσῶν ἔδωκε νὰ τοῦ κατασκευάσουν στέφανον ἀπὸ χρυσὸν βάρους 7 465 γραμ. "Ινα εὐρη ὁ Ἀρχιμήδης, ἐρωτηθεὶς μήπως ὁ χρυσοχόος ἀντικατέστησε χρυσὸν δι' ἀργύρου, ἐβύθισε τὸν στέφανον εἰς ὄνδωρ καὶ ἔχασεν οὕτος 467 γραμ. τοῦ βάρους του. Γνωστοῦ ὄντος ὅτι ὁ χρυσὸς χάνει εἰς τὸ ὄνδωρ τὰ 0,052 καὶ ὁ ἀργυρὸς 0,095 τοῦ βάρους του, πόσος ἦτο ὁ χρυσὸς τοῦ στεφάνου καὶ πόσος ὁ ἀργυρὸς;
- ✓ 292. Δίδει ὁ Α εἰς τὸν Β μ δρχ. καὶ ἔχει ὁ Β νιπλάσια τοῦ Α. Δίδει ὁ Β εἰς τὸν Α μ δρχ. καὶ ἔχει ὁ Α νιπλάσια τοῦ Β. Πόσα εἴχεν ἔκαστος ἐξ ἀρχῆς;
- ✓ 293. Δύο κινητὰ ἀπέχοντα α μέτρα μεταξύ των κινοῦνται ὀμαλῶς καὶ ἀντιθέτως ἀναχωρήσαντα συγχρόνως. "Οταν μετὰ τὸ δευτερόλεπτα συνητηθῆσαν τὸ ἐν εἰχε διατρέξει β μέτρα περισσότερα τοῦ ἄλλου. Ποίας ταχύτητας είχον;
294. Ἐκ δύο τόπων ἀπεχόντων α μέτρα ἀναχωροῦν συγχρόνας δύο κινητὰ κινούμενα ὀμαλῶς. "Αν μὲν κινοῦνται ἀντιθέτως, συναντῶνται μετὰ λ₁ ὥρας, ἀν δὲ πρὸς τὴν αὐτὴν φοράν, συναντῶνται μετὰ λ₂ ὥρας. Ποίας ταχύτητας είχον;
295. α ἀνδρες καὶ γυναῖκες ἐπλήρωσαν ἐν δλῳ β δρχ. Ἐκ τῶν ἀνδρῶν ἔκαστος ἐπλήρωσε γ δρχ. καὶ ἐκ τῶν γυναικῶν ἐκάστη δ δρχ. Πόσοι ἦσαν οἱ ἀνδρες καὶ πόσαι αἱ γυναῖκες; Μερική περίπτωσις  $\alpha=7$ ,  $\beta=260$ ,  $\gamma=50$ ,  $\delta=30$ .

### II. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΑΓΝΩΣΤΟΥΣ

§ 137. α') Νὰ εύρεθῇ τριψήφιος ἀριθμός, τοῦ ὅποιου τὸ ἄθροισμα τῶν ψηφίων εἶναι 21 καὶ τὸ ἄθροισμα τῶν ἄκρων ψηφίων διπλάσιον τοῦ μεσαίου· ἐὰν ἐναλλάξωμεν τὰ ψηφία τῶν ἐκατοντάδων καὶ δεκάδων του, ὁ ἀριθμὸς ἐλαττώνεται κατὰ 90.

Ἐὰν μὲν x παραστήσωμεν τὸ ψηφίον τῶν ἐκατοντάδων, μὲ ψ τῶν δεκάδων καὶ μὲ ω τὸ τῶν μονάδων (ἐνῷ τὰ x, ψ, ω πρέπει νὰ εἶναι ἀκέραιοι θετικοὶ μονοψήφιοι), ὁ ἀριθμὸς παριστάνεται μὲ  $100x + 10\psi + \omega$  καὶ θὰ ἔχωμεν τὸ σύστημα

$$\left| \begin{array}{l} x+\psi+\omega=21 \\ x+\omega=2\psi \\ 100x+10\psi+\omega-90=100\psi+10x+\omega, \end{array} \right.$$

ἐκ τῆς λύσεως τοῦ ὁποίου εύρισκομεν  $x=8$ ,  $\psi=7$ ,  $\omega=6$ . Ἐφαντούμενος ἀριθμὸς εἶναι δὲ 876.

β') 'Ο Α καὶ δὲ Β μαζὶ ἐργαζόμενοι τελειώνουν ἐν ἔργον εἰς 5 ἡμέρας, δὲ Α καὶ δὲ Γ εἰς 6 ἡμέρας, δὲ δὲ Β καὶ Γ εἰς 5,5 ἡμέρας. Εἰς πόσας ἡμέρας καθεὶς μόνος τῶν Α, Β, Γ δύναται νὰ ἐκτελέσῃ τὸ ἔργον;

Περιορισμός. Οἱ ζητούμενοι πρέπει νὰ εἶναι θετικοί.

Λύσις. Ἐστωσαν  $x$ ,  $\psi$ ,  $\omega$  οἱ ζητούμενοι ἀριθμοί. 'Ο Α εἰς μίαν ἡμέραν θὰ ἐκτελέσῃ τὸ  $\frac{1}{x}$  τοῦ ἔργου, δὲ Β τὸ  $\frac{1}{\psi}$  καὶ δὲ Γ τὸ  $\frac{1}{\omega}$ .

Ἐφαντούμενοι οἱ Α καὶ Β εἰς μίαν ἡμέραν ἐκτελοῦν τὸ  $\frac{1}{x} + \frac{1}{\psi}$  τοῦ ἔργου καὶ αὐτὸς εἶναι ἵσον μὲν  $\frac{1}{5}$  αὐτοῦ. Διότι ἀφοῦ εἰς 5 ἡμέρας ἐκτελοῦν τὸ ἔργον, εἰς μίαν ἡμέραν ἐκτελοῦν τὸ  $\frac{1}{5}$  τοῦ ἔργου. "Ωστε ἔχομεν  $\frac{1}{x} + \frac{1}{\psi} = \frac{1}{5}$ .

Όμοιώς ἐργαζόμενοι εύρισκομεν τὸ σύστημα:

$$\left| \begin{array}{l} \frac{1}{x} + \frac{1}{\psi} = \frac{1}{5} \\ \frac{1}{x} + \frac{1}{\omega} = \frac{1}{6} \\ \frac{1}{\psi} + \frac{1}{\omega} = 5,5 \end{array} \right. \quad (1)$$

Προσθέτοντες τὰς ἀνωτέρω ἔξισώσεις κατὰ μέλη καὶ διαιροῦντες τὰ ἔξαγγόμενα διὰ 2 εύρισκομεν  $\frac{1}{x} + \frac{1}{\psi} + \frac{1}{\omega} = \frac{181}{660}$ .

Αφαιροῦντες ἀπὸ αὐτῆς τὴν πρώτην τῶν (1) εύρισκομεν  $\frac{1}{\omega} = \frac{49}{660}$ . Ἐφαντούμενος ἀπὸ αὐτῆς τὴν πρώτην τῶν (1) εύρισκομεν  $\omega = \frac{660}{49} = 13\frac{23}{49}$ .

Όμοιώς εύρισκομεν  $\psi = 9\frac{21}{71}$  καὶ  $x = 10\frac{50}{61}$ .

### Προβλήματα

'Ομδεῖς πρώτη. 296. Τρεῖς ἄνθρωποι εἶχον ποσόν τι χρημάτων ἕκαστος καὶ συνεφώνησαν κατὰ σειρὰν νὰ διπλασιάστη καθεὶς τὰ χρήματα τῶν δύο ἄλλων. Εἰς τὸ τέλος εύρέθη ἕκαστος μὲν 1600 δρχ. Τί ποσὸν εἶχεν ἕκαστος κατ' ἀρχάς;

297. Τρεῖς ἄνθρωποι ἡγόρασαν κτῆμα ἀντὶ 64 000 δρχ. Ὁ πρῶτος θὰ ἥδυνατο νὰ πληρώσῃ ὀλόκληρον τὸ ποσόν, ἀν ὁ δεύτερος τοῦ ἔδωδε τὰ  $\frac{5}{8}$  τῶν ὅσων εἶχεν. Ὁ δεύτερος θὰ ἥδυνατο νὰ πληρώσῃ τὸ ποσόν, ἀν ὁ τρίτος τοῦ ἔδιδε τὰ  $\frac{8}{9}$  τῶν ίδικῶν του. Ὁ τρίτος διὰ νὰ πληρώσῃ, τοῦ ἔλλειπε τὸ ἡμισυ τῶν ὅσων εἶχεν ὁ πρῶτος καὶ τὰ  $\frac{3}{16}$  τῶν ὅσων εἶχεν ὁ δεύτερος. Πόσα εἶχεν ἔκαστος;

298. Τρεῖς γυναίκες πωλοῦν αύγα. Ἐάν ἡ πρώτη ἔδιδε τὸ  $\frac{1}{7}$  καὶ ἡ τρίτη τὸ  $\frac{1}{13}$  τῶν ίδικῶν της εἰς τὴν δευτέραν, θὰ εἴχον καὶ αἱ τρεῖς τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν αύγῶν.

Ἐάν καὶ αἱ τρεῖς ἔξ ἀρχῆς εἴχον 360 αύγα, πόσα εἶχεν ἔκαστη;

299. Νὰ εὐρεθῇ τριψήφιος ἀριθμός, τοῦ ὁποίου τὸ ἀθροισμα τῶν ψηφίων είναι 17, τὸ ψηφίον τῶν ἑκατοντάδων είναι διπλάσιον τοῦ ψηφίου τῶν μονάδων, καὶ ὅταν ἀφαιρεθῇ ἡ π' αὐτοῦ ὁ 396, εύρισκομεν τὸν ἀριθμὸν τὸν προκύπτοντα δι' ἐναλλαγῆς τῶν ψηφίων του. Ποιὸς είναι ὁ ἀριθμός;

300. Νὰ εὐρεθοῦν τρεῖς ἀριθμοὶ τοιοῦτοι, ὡστε ὁ πρῶτος καὶ τὸ ἡμιάρθροισμα τῶν δυο ὅλων νὰ είναι 120, ὁ δὲ δεύτερος καὶ τὸ δέκατον πέμπτον τῆς διαφορᾶς τοῦ τρίτου ἀπὸ τοῦ πρώτου νὰ Ισοῦται μὲ 62, τὸ δὲ ἀθροισμα τῶν τριῶν νὰ Ισοῦται μὲ 190.

Ο μὲς δ ε υ ρ ἡ ρ α. (Διάφορα). 301. Ἐχει τις κεφάλαιον 54000 δρχ. καὶ ὅλο 65000 δρχ, λαμβάνει δὲ κατ' ἔτος τόκον 3840 δρχ, καὶ ἐκ τῶν δύο. Ἐάν τὸ πρῶτον ἐτοκίζετο πρὸς τὸ ἐπιτόκιον τοῦ δευτέρου καὶ ἀντιστρόφως, θὰ ἔλξει μέριδαν 55 δρχ. περισσοτέρας ὡς τόκον ἡ πρίν. Ποιᾶ τὰ ἐπιτόκια;

302. Ποσὸν 8100 δρχ. νὸ μοιρασθῇ εἰς τρία πρόσωπα, ὡστε τὰ μερίδια τῶν μὲν αἱ καὶ β' νὰ είναι ὡς 2 : 3, τῶν δὲ β' καὶ γ' ὡς 3 : 4. Ποιᾶ τὰ μερίδια;

303. Ἀγοράζει τις δύο εἰδη ὑφασμάτων, ἐκ τοῦ μὲν πρώτου 5 μ, ἐκ δὲ τοῦ δευτέρου 6 μ, ἀντὶ 1220 δρχ. Ἐπειδὴ δὲ ἔμπορος ἐνήλλαξε τὰ δύο εἰδη, ἔζημιώθη ὁ ἀγοραστής 20 δρχ. Πόσον ἐτιμάτο τὸ μέτρον καθενὸς εἰδούς;

304. Δύο δυνάμεις ἐνεργοῦσαι ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ σημείου διμορφόπως μὲν ἔχουν συνισταμένην 16kg, ἀντιρρόπως δὲ 2kg. Πόση είναι ἡ ἐντασις καθεμιᾶς τούτων;

305. Ὁ Α λέγει εἰς τὸν Β : δός μου 10 ἐκ τῶν μήλων σου καὶ θὰ ἔχω 1,5 τῶν ίδικῶν σου. Ὁ Β ἀπαντᾷ : δός μου 10 ἐκ τῶν ίδικῶν σου, διὰ νὰ ἔχω τετραπλάσια τῶν ίδικῶν σου. Πόσα είχεν ὁ καθεῖς;

Ο μὲς στρίτη. (Κινησεως). 306. Ἐκ δύο σημείων ἀπεχόντων 1500 μ. ἀναχωροῦν συγχρόνως δύο κινητὰ διμάλως καὶ ἀντιθέτως κινούμενα. Ὄταν συνηντήθησαν τὸ πρῶτον εἶχε διατρέξει 300 μ. περισσότερον τοῦ ὅλου. Ποιὸς είναι ὁ λόγος τῶν ταχυτήτων των;

307. Ἀπὸ δύο τόπων ἀπεχόντων δ μ. ἀναχωροῦν δύο κινητὰ καὶ συναντῶνται μετὰ  $t_1$  δ. Ἐάν μὲν τηξάνετο ἡ ταχύτης τοῦ πρώτου κατὰ  $\lambda\%$ , ἡ δὲ τοῦ δευτέρου ἡλαττώνετο κατὰ  $\lambda_1\%$ , θὰ συνηντῶντο μετὰ  $t_2$  δ. Ποιᾶ είναι αἱ ταχύτητες αὐτῶν; Νὰ γίνη διερεύνησις.

308. 'Από τῶν ἄκρων τόξου κύκλου 45° κινοῦνται ἐπ' αὐτοῦ δύο κινητά ἀντιθέτως καὶ συναντῶνται μετὰ 3δ. 'Ἐὰν κινοῦνται πρὸς τὴν αὐτὴν φορὰν συναντῶνται μετὰ 5δ. Πόσων μοιρῶν τόξον διαινύει καθέν κινητὸν εἰς 1δ.;

'Ο μάς τε τά ρτη. 309. Νὰ εύρεθῇ διψήφιος ἀριθμός, τοῦ ὅποίου τὸ ψηφίον τῶν δεκάδων είναι δύο τρίτα τῶν τοῦ μονάδων. "Ἄν γραφοῦν τὰ ψηφία αὐτοῦ κατ' ἀντίστροφον τάξιν, προκύπτει ἀριθμὸς κατὰ 18 μεγαλύτερός του.

310. Νὰ εύρεθῇ τριψήφιος ἀριθμός περιεχόμενος μεταξύ 400 καὶ 500, τὸ δέ τῶν δεκάδων είναι τὸ τρίτον τοῦ ἀθροίσματος τῶν δύο δλλων, τὸ δὲ τῶν δεκάδων είναι τὸ ἥμισυ τοῦ ἀθροίσματος τῶν δύο δλλων. "Ἄν γραφοῦν τὰ ψηφία του κατ' ἀντίστροφον τάξιν, προκύπτει ἀριθμὸς κατὰ 198 μεγαλύτερος αὐτοῦ.

311. Νὰ εύρεθῇ τριψήφιος ἀριθμός, τοῦ ὅποίου τὸ μὲν ψηφίον τῶν ἑκατοντάδων είναι τὸ τρίτον τοῦ ἀθροίσματος τῶν δύο δλλων, τὸ δὲ τῶν δεκάδων είναι τὸ ἥμισυ τοῦ ἀθροίσματος τῶν δύο δλλων. "Ἄν γραφοῦν τὰ ψηφία του κατ' ἀντίστροφον τάξιν, προκύπτει ἀριθμὸς κατὰ 198 μεγαλύτερος αὐτοῦ.

312. 'Εὰν παρεμβάλωμεν μεταξὺ τοῦ ψηφίου τῶν μονάδων καὶ δεκάδων διψηφίους ἀριθμοῦ τὸ 4, τὸ ἀθροίσμα τῶν δύο ἀριθμῶν είναι 604. 'Εὰν διατρέσωμεν τὸν δεύτερον ἀριθμὸν διὰ τοῦ πρώτου, εύρισκομεν πηλίκον 9 καὶ ὑπόλοιπον 34 Νὰ εύρεθῇ ὁ ἀριθμός.

#### Περίληψις περιεχομένων Κεφαλαίου IV.

'Ορισμὸς συστήματος ἔξισώσεων ( σύνολον δύο ἢ περισσοτέρων, ἔξισώσεων, τὰς ὅποιας ἐπαληθεύουν αἱ αὐταὶ τιμαὶ τῶν ἀγνώστων).

'Ορισμὸς τῆς λύσεως συστήματος ἔξισώσεων.

'Ορισμὸς ίσοδυνάμων συστημάτων ( ἂν πᾶσαι αἱ λύσεις οἰσοδήποτε ἔξι αὐτῶν είναι λύσεις καὶ τῶν δλλων συστημάτων ).

'Ιδιότητες τῶν συστημάτων.

$$\text{Iov} \quad \text{Tὰ συστήματα π.χ.} \quad A = B, \quad A_1 = B_1 \quad A_2 = B_2 \\ A = B, \quad A_1 = B_1, \quad A_1 + A_2 = B_1 + B_2$$

είναι ίσοδύναμα.

2ον Τὰ συστήματα π.χ.

$$A(x, \psi, \omega) = B(x, \psi, \omega), \quad x = \varphi(\psi, \omega), \quad \Gamma(x, \psi, \omega) = \Delta(x, \psi, \omega)$$

$$A[\varphi(\psi, \omega), \psi, \omega] = B[\varphi(\psi, \omega), \psi, \omega], \quad x = \varphi(\psi, \omega),$$

$$\Gamma[\varphi(\psi, \omega), \psi, \omega] = \Delta[\varphi(\psi, \omega), \psi, \omega]$$

είναι ίσοδύναμα.

'Ορισμὸς βαθμοῦ συστήματος ἔξισώσεων ( ὡς πρὸς τοὺς ἀγνώστους του ).

Λύσις συστήματος δύο ἔξισώσεων μὲν δύο ἀγνώστους α' βα-

θμοῦ ( μέθιδος ἀπαλοιφῆς διὰ τῶν ἀντιθέτων συντελεστῶν ἀγνώστου, δι' ἀντικαταστάσεως, διὰ συγκρίσεως ).

$$\text{Διερεύνησις τοῦ συστήματος} \left\{ \begin{array}{l} \alpha x + \beta \psi = \gamma \\ \alpha_1 x + \beta_1 \psi = \gamma_1 \end{array} \right.$$

$$\begin{aligned} \text{"Αν } \alpha\beta_1 - \alpha_1\beta \neq 0 \text{ μία λύσις} \\ x &= \frac{\gamma\beta_1 - \gamma_1\beta}{\alpha\beta_1 - \alpha_1\beta} \\ \psi &= \frac{\alpha\gamma_1 - \alpha_1\gamma}{\alpha\beta_1 - \alpha_1\beta} \end{aligned}$$

"Αν  $\alpha\beta_1 - \alpha_1\beta = 0$  τὸ σύστημα εἶναι ἡ ἀδύνατον ἢ ἀόριστον.

Τί ἐννοοῦμεν ὅταν λέγωμεν «ἀπαλείφομεν ἔνα ἄγνωστον π.χ. μεταξὺ δύο ἔξισώσεων».

'Ορισμὸς τῆς παραμέτρου μιᾶς ἔξισώσεως, χρησιμοποίησις αὐτῆς διὰ τὴν διερεύνησιν ἔξισώσεως ἢ συστήματος ἔξισώσεων.

Γραφικὴ λύσις συστήματος δύο πρωτοβαθμίων ἔξισώσεων μὲ δύο ἀγνώστους ( κατασκευὴ τῶν παριστανομένων εὐθειῶν καὶ τομὴ αὐτῶν ).

Λύσις συστήματος μὲ τὴν μέθοδον τοῦ Bézout.

Λύσις συστήματος μὲ ἔξισώσεων πρώτου βαθμοῦ μὲ μὲν ἀγνώστους. Λύσις συστημάτων α' βαθμοῦ μὲ τεχνάσματα.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ V

### A'. ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΡΙΖΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

§ 138. Καλούμεν δευτέραν, τρίτην, ..., νιοστήν ( ή νιοστῆς τάξεως ) ρίζαν δοθέντος ἀριθμοῦ, τὸν ἀριθμόν, ὃ ὅποιος ὑψούμενος εἰς τὴν δευτέραν, τρίτην, ..., νιοστήν δύναμιν δίδει τὸν δοθέντα.

Τὴν δευτέραν\*, τρίτην, ..., νιοστήν ρίζαν ἐνὸς ἀπολύτου ἀριθμοῦ π.χ. τοῦ α συμβολίζομεν μὲν  $\sqrt{\alpha}$ ,  $\sqrt[3]{\alpha}$ , ...,  $\sqrt[n]{\alpha}$  καὶ εἶναι κατὰ τὸν ὄρισμὸν  $(\sqrt[n]{\alpha})^n = \alpha$ ,  $(\sqrt[3]{\alpha})^3 = \alpha$ , ...,  $(\sqrt[n]{\alpha})^n = \alpha$ .

Τὸ σύμβολον  $\sqrt[n]{\alpha}$  λέγεται **ρίζικόν**, ή ὑπ' αὐτὸ ποσότης **ὑπόρριζος ποσότης**, ὃ δὲ ἀριθμός, ὃ ὅποιος δεικνύει τὴν τάξιν τῆς ρίζης τῆς ὑπορρίζου ποσότητος, λέγεται **δείκτης τῆς ρίζης**. Οὕτως εἰς τὴν παράστασιν  $\sqrt[n]{\alpha}$  ὑπόρριζος ποσότης εἶναι τὸ α καὶ δείκτης ὃ ν. Εἰς τὴν τετραγωνικὴν ρίζαν ἐννοεῖται δείκτης ὃ 2.

Ρίζα τις λέγεται ἀρτίας ή περιττῆς τάξεως, ἢν δὲ δείκτης αὐτῆς εἶναι ἀριθμὸς ἄρτιος ή περιττός. Οὕτως αἱ ρίζαι  $\sqrt[3]{\alpha}$ ,  $\sqrt[5]{\alpha}$  εἶναι τάξεως περιττῆς, αἱ δὲ  $\sqrt{2}$ ,  $\sqrt[6]{3}$ ,  $\sqrt[8]{5}$  εἶναι τάξεως ἀρτίας.

#### 1. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΡΙΖΩΝ

§ 139. Ἀποδεικνύμεν πρῶτον τὴν ἔξῆς βοηθητικὴν πρότασιν.

"Ἄν αἱ μιοσταὶ δυνάμεις δύο ὁμοσήμων ἀριθμῶν εἶναι ἔσαι, οἱ ἀριθμοὶ εἶναι ἔσοι.

---

\* 'Ο Rafaello Bombelli τὸ 1572 εἰς τὸ βιβλίον τοῦ «Algebra» ἔκαμε χρῆσιν τῶν  $\sqrt{-\alpha}$ ,  $-\sqrt{-\alpha}$ .

Διότι, ἂν π.χ. είναι  $\alpha^{\mu} = \beta^{\mu}$ , ὅπου μ είναι ἀκέραιος καὶ θετικὸς καὶ α, β δύμσημοι, θὰ ἔχωμεν  $\alpha^{\mu} : \beta^{\mu} = 1$ , ἢ

$$\left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^{\mu} = 1, \text{ ἄρα } \frac{\alpha}{\beta} = 1, \text{ ἀφοῦ } \frac{\alpha}{\beta} \text{ είναι θετικός, καὶ συνεπῶς } \alpha = \beta.$$

**§ 140. α')** Πᾶς θετικὸς ἀριθμὸς ἔχει δύο μὲν ρίζας ἀρτίας τάξεως ἀντιθέτους, μίαν δὲ περιττῆς τάξεως ( θετικήν ).

Διότι ἀφ' ἐνὸς μὲν θετικὸς ἢ ἀρνητικὸς ἀριθμὸς ὑψούμενος εἰς ἀρτίαν δύναμιν δίδει ἔξαγόμενον θετικὸν ἀριθμόν, ἐνῷ ἀφ' ἐτέρου μόνον θετικὸς ἀριθμὸς ὑψούμενος εἰς περιττὴν δύναμιν δίδει ἔξαγόμενον θετικὸν ἀριθμόν.

'Εκ τῶν δύο ρίζῶν μιᾶς ἀρτίας τάξεως θετικοῦ ἀριθμοῦ, ἡ θετικὴ συμβολίζεται κατὰ συνθήκην μὲ τὸ οἰκεῖον ρίζικὸν ἄνευ προσήμου, ἡ δὲ ἀρνητικὴ μὲ τὸ αὐτὸ ρίζικὸν ἔχον ἀριστερὰ τὸ πρόσημον —. Οὕτω, ἂν α είναι θετικὸς ἀριθμός, τὸ σύμβολον  $\sqrt{\alpha}$  σημαίνει: ἡ θετικὴ τετραγωνικὴ ρίζα τοῦ α. 'Η ἀρνητικὴ τετραγωνικὴ ρίζα τοῦ α συμβολίζεται μὲ τὸ —  $\sqrt{\alpha}$ .

**β')** Πᾶς ἀρνητικὸς ἀριθμὸς ἔχει μόνον μίαν ρίζαν περιττῆς τάξεως, ἀρνητικήν, οὐδεμίαν δὲ ἀρτίας τάξεως.

Διότι μόνον ἀρνητικὸς ἀριθμὸς ὑψούμενος εἰς περιττὴν δύναμιν δίδει ἔξαγόμενον ἀρνητικὸν ἀριθμόν, ἐνῷ οὐδεὶς ἐκ τῶν γνωστῶν ἀριθμῶν ( θετικὸς ἢ ἀρνητικὸς ) ὑψούμενος εἰς δύναμιν ἀρτίαν δίδει ἔξαγόμενον ἀρνητικὸν ἀριθμόν.

"Εστω π.χ. ἡ  $\sqrt{-8}$ . Αὔτὴ είναι  $-2$ , διότι είναι  $(-2)^3 = (-2) \cdot (-2)^2 = -8$ . Παρατηροῦμεν ὅμως ὅτι είναι  $\sqrt[3]{-8} = 2$ , διότι είναι  $2^3 = 2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$ . 'Επομένως ἔχομεν  $\sqrt{-8} = -\sqrt{8}$ .

\* 'Η εὑρεσις τῆς κυβικῆς ρίζης ἀριθμοῦ ἐδημιουργήθη κατὰ τὰ μέσα τῆς ἕκατονταετηρίδος π.Χ. κυρίως ἀπὸ τὴν ἀναζήτησιν τῆς λύσεως τοῦ προβλήματος τοῦ διπλασιασμοῦ τοῦ κύβου, τὸ ὅποιον καλεῖται « Δῆλιον πρόβλημα »,

δηλαδὴ τῆς εύρεσεως τοῦ  $x$ , ὥστε νὰ είναι  $x^3 = 2a^3$  ἢ  $x = a\sqrt[3]{2}$  καὶ τοῦ προβλήματος τῆς τριχοτομήσεως μιᾶς οἰασδήποτε γωνίας. Τὰ προβλήματα αὐτά, καθὼς καὶ τὸ τοῦ τετραγωνισμοῦ τοῦ κύκλου, ἀπησχόλησαν ὅχι μόνον τοὺς μαθηματικοὺς τῆς παλαιᾶς ἐποχῆς, ἀλλὰ καὶ τοὺς τότε μορφωμένους κύκλους, ἐπὶ πλέον δὲ καὶ διασήμους μαθηματικούς ὅλων τῶν προηγμένων χωρῶν. 'Απεδείχθη ὅτι τὰ προβλήματα αὐτά δὲν είναι δυνατὸν νὰ λυθοῦν μὲ μαθηματικὴν ἀκρίβειαν καὶ μάλιστα μόνον μὲ τὴν χρησιμοποίησιν τῶν κυρίως γεωμετρικῶν ὀργάνων τοῦ κανόνος καὶ τοῦ διαβήτου.

Ἐκ τούτου καὶ ἄλλων ὁμοίων παραδειγμάτων συνάγομεν ὅτι :

Ἡ ρίζα περιττῆς τάξεως ἀρνητικοῦ ἀριθμοῦ, εἶναι ἀρνητική καὶ ἀπολύτως ἵστη μὲ τὴν ρίζαν τῆς αὐτῆς τάξεως τοῦ ἀντιστοίχου ἀπολύτου ἀριθμοῦ.

### Α σ κή σ εις

313. Δείξατε ὅτι πᾶσα ρίζα τῆς 1 εἶναι  $+1$  ή  $-1$ . Διατί ; Πᾶσα ρίζα τοῦ 0 εἶναι 0. Διατί ;

$$314. \text{Εὔρετε τὰ ἔξαγόμενα τῶν } \sqrt[3]{9}, \sqrt[3]{36}, \sqrt[3]{\pm 125}, \sqrt[3]{+64}.$$

$$315. \text{Εὔρετε τὰ } 3\sqrt{-4}, \alpha + \sqrt{\alpha^2}, \alpha + \sqrt{\beta^2}.$$

$$316. \text{Ἡ ισότης } \sqrt[3]{\alpha^3} = \alpha \text{ πότε εἶναι ἀκριβής ; Διατί ;}$$

$$317. \text{Ἡ ισότης } \sqrt[3]{(\alpha^2)^3} = \alpha^2 \text{ εἶναι ἀκριβής καὶ διατί ;}$$

$$318. \text{a') Εὔρετε τὸ ἔξαγόμενον } \sqrt[4]{4} + \sqrt[3]{16} + \sqrt[5]{-27} - \sqrt[3]{-32}.$$

$$\text{'Ομοίως τὰ : b') } \sqrt[3]{4} + \sqrt[3]{8} - \sqrt[3]{16}, \quad \gamma') \sqrt[3]{27} - \sqrt[3]{-32}, \quad \delta') \sqrt[3]{(\alpha\beta)^3},$$

$$\epsilon') \sqrt[3]{x^4\psi^4}, \quad \sigma') \sqrt[3]{36} + \sqrt[3]{-8}, \quad \zeta') \sqrt[3]{125} - \sqrt[3]{64}, \quad \eta') (3 + \sqrt[3]{2})(3 - \sqrt[3]{2}), \quad \theta') \sqrt[3]{\alpha}.$$

§ 141. "Ινα ρίζα ἀπολύτου ἀριθμοῦ ὑψωθῇ εἰς δύναμιν, ἀρκεῖ νὰ ὑψωθῇ ἡ ὑπόρριζος ποσότης εἰς τὴν δύναμιν ταύτην.

Λέγομεν δηλαδὴ ὅτι εἶναι  $(\sqrt[m]{\alpha})^p = \sqrt[m]{\alpha^p}$ . (1) Διότι ἂν τὰς παραστάσεις αὐτάς ὑψώσωμεν εἰς τὴν μ δύναμιν, εύρισκομεν ἔξαγόμενα ἵσα, ἅρα καὶ οἱ ἀριθμοὶ αὐτοὶ (ώς ὁμόσημοι) εἶναι ἵσοι. Πράγματι εἶναι

$$\left[ (\sqrt[m]{\alpha})^p \right]^{\mu} = (\sqrt[m]{\alpha})^{p\mu} = \left[ (\sqrt[m]{\alpha})^{\mu} \right]^p = \alpha^p \text{ καὶ } (\sqrt[m]{\alpha^p})^{\mu} = \alpha^p.$$

*Παρατίλησις.* Ἡ ἀνωτέρω ἴδιότης δὲν ἀληθεύει ἀν πρόκειται διὰ τὴν ἀρνητικὴν ρίζαν ἑκάστης ἀρτίας τάξεως θετικοῦ ἀριθμοῦ. Διότι τότε, ἀν ὑψωθῇ ἡ ρίζα αὐτὴ εἰς ἀρτίαν δύναμιν γίνεται θετικὸς ἀριθμός, ἐνῷ ἀν ὑψωθῇ μόνον τὸ ὑπόρριζον εἰς αὐτὴν τὴν δύναμιν, μένει ἀριστερὰ τοῦ ριζικοῦ τὸ πρόσημον — καὶ ἔχομεν ἀρνητικὸν ἀποτέλεσμα.

Κατωτέρω τὴν ὑπόρριζον ποσότητα θὰ ὑποθέτωμεν θετικήν, ἐκ τῶν δύο δὲ ριζῶν ἑκάστης ἀρτίας τάξεως θετικοῦ ἀριθμοῦ θὰ θεωροῦμεν μόνον τὴν θετικήν.

§ 142. "Αν είς τὸν δείκτην τῆς ρίζης καὶ τὸν ἐκθέτην τῆς δυνάμεως ὑπορρίζου ποσότητος ( θετικῆς ) ὑπάρχῃ κοινὸς παράγων, δυνάμεθα νὰ τὸν παραλείψωμεν.

Π.χ. εἴναι  $\sqrt[3]{\alpha^{5 \cdot 2}} = \sqrt[3]{\alpha^5}$  ἀν α>0. Διότι ὑψοῦντες τὰ μέλη τῆς ισότητος αὐτῆς εἰς τὴν  $3 \cdot 2$  δύναμιν εὑρίσκομεν ἵσα ἔξιγόμενα, ἅρα καὶ οἱ ἀριθμοὶ αὐτοὶ ὡς ὁμόσημοι εἴναι ἴσοι . Πρόγυματι ἔχομεν  $(\sqrt[3]{\alpha^{5 \cdot 2}})^{3 \cdot 2}$  =  $\alpha^{5 \cdot 2}$  καὶ  $(\sqrt[3]{\alpha^5})^{3 \cdot 2} = (\alpha^5)^2 = \alpha^{5 \cdot 2}$ . Όμοιώς ἔχομεν  $\sqrt[\mu]{\alpha^{\rho \mu}} = (\sqrt[\mu]{\alpha^\rho})^\mu = \alpha^\rho$ . Καὶ ἀντιστρόφως :

Δυνάμεθα νὰ πολλαπλασιάσωμεν τὸν δείκτην τῆς ρίζης καὶ τὸν ἐκθέτην τῆς ὑπορρίζου ποσότητος ( θετικῆς ) ἐπὶ τὸν αὐτὸν ἀριθμόν.

Ἡ ἀπόδειξις τῆς ιδιότητος αὐτῆς γίνεται ὅπως καὶ τῆς προηγουμένης.

§ 143. "Αν είς τὴν ὑπόρριζον παράστασιν ὑπάρχῃ παράγων θετικὸς μὲ ἐκθέτην διαιρετὸν διὰ τοῦ δείκτου τῆς ρίζης, δύναται νὰ ἔξαχθῇ οὗτος ἐκτὸς τοῦ ριζικοῦ, ἀφοῦ ὁ ἐκθέτης διαιρεθῇ διὰ τοῦ δείκτου.

Π.χ. εἴναι  $\sqrt[\mu]{\alpha^\mu \cdot \beta} = \alpha \cdot \sqrt[\mu]{\beta}$  ἀν α>0. Διότι ἔχομεν  $(\sqrt[\mu]{\alpha^\mu \cdot \beta})^\mu = \alpha^\mu \cdot \beta$  καὶ  $(\alpha \cdot \sqrt[\mu]{\beta})^\mu = \alpha^\mu \cdot (\sqrt[\mu]{\beta})^\mu = \alpha^\mu \cdot \beta$ . Καὶ ἀντιστρόφως :

Παράγων τις θετικός ἐκτὸς τοῦ ριζικοῦ δύναται νὰ είσαχθῇ ἐντὸς αὐτοῦ, ἀν ὑψωθῇ εἰς τὴν δύναμιν τὴν ὄριζομένην ὑπὸ τοῦ δείκτου τῆς ρίζης.

Π.χ. εἴναι  $3 \cdot \sqrt[3]{2} = \sqrt[3]{3^2 \cdot 2} = \sqrt[3]{18}$ ,  $\alpha \cdot \sqrt[\mu]{\beta} = \sqrt[\mu]{\alpha^\mu \cdot \beta}$  καὶ ἡ ἀπόδειξις γίνεται ὁμοίως, ὡς ἀνωτέρω.

### "Α σκηνισ

319. Απλοποιήσατε τὰς κάτωθι παραστάσεις :

$\alpha) \sqrt[3]{\alpha^5}, \sqrt[3]{\alpha^6}, \sqrt[5]{\alpha^{25}}, \sqrt[v]{\alpha^{2v}}, \sqrt[5]{\alpha^4}, \sqrt[3]{\alpha^5}.$

$\beta) \sqrt[5]{9^{10}}, \sqrt[11]{8^{22}}, \sqrt[v]{\alpha^{4v}}, \sqrt[2v+1]{\alpha^{4v+2}}.$

$\gamma') \sqrt[3]{64^2}, \sqrt[9]{125^4}, \sqrt[5]{\pm 32^3}.$

$$\delta') \sqrt[3]{(\alpha^2 - 2\alpha\beta + \beta^2)^3}, \quad \sqrt[3]{(\alpha^2 + 4\alpha\beta + 4\beta^2)^4}, \quad \sqrt[3]{(4\alpha^2 + 20\alpha\beta + 25\beta^2)^5}.$$

$$\epsilon') \sqrt[3]{(\alpha^3 + 3\alpha^2\beta + 3\alpha\beta^2 + \beta^3)^2}, \quad \sqrt[3]{(8\alpha^3 + 12\alpha^2\beta + 6\alpha\beta^2 + \beta^3)^3}.$$

$$\sigma') 7 : \sqrt[3]{7}, \quad 11 : \sqrt[3]{11}, \quad \alpha : \sqrt[3]{\alpha}, \quad (\alpha + \beta) : (\sqrt[3]{\alpha + \beta}), \quad (\alpha - 1) : \sqrt[3]{\alpha - 1}.$$

§ 144. Διὰ νὰ ἔξαγάγωμεν τὴν ρίζαν ἀλλης ρίζης ποσότητος τινος θετικῆς, ἀρκεῖ νὰ πολλαπλασιάσωμεν τοὺς δείκτας τῶν ριζῶν καὶ νὰ ἀφήσωμεν ὡς ὑπόρριζον ποσότητα τὴν αὐτήν.

Π.χ. εἶναι  $\sqrt[3]{\sqrt[3]{\alpha}} = \sqrt[4]{\alpha}$ . Διότι ἂν αἱ δύο αὐταὶ παραστάσεις ὑψωθοῦν εἰς τὴν 4·3 δύναμιν, δίδουν ἵσα ἔξαγόμενα, ἅρα καὶ αἱ παραστάσεις αὐταὶ ( ὡς παριστάνουσαι ἀριθμοὺς ὁμοσήμους ) εἶναι ἵσαι. Πράγματι ἔχομεν :

$$\left( \sqrt[3]{\sqrt[3]{\alpha}} \right)^{4 \cdot 3} = \left( \sqrt[3]{(\sqrt[3]{\alpha})^3} \right)^4 = (\sqrt[3]{\alpha})^3 = \alpha \text{ καὶ } (\sqrt[3]{\alpha})^{4 \cdot 3} = \alpha.$$

§ 145. Ρίζας θετικῶν ἀριθμῶν μὲ διαφόρους δείκτας δυνάμεθα νὰ τρέψωμεν εἰς ἄλλας ἵσας πρὸς αὐτὰς μὲ τὸν αὐτὸν δείκτην.

Ἐστωσαν π.χ. αἱ ρίζαι  $\sqrt[3]{\alpha}, \sqrt[3]{\beta}, \sqrt[3]{\gamma}$  ὅπου  $\alpha, \beta, \gamma$ , θετικοί. Ἐπειδὴ τὸ ἐ.κ.π. τῶν δεικτῶν 2, 3, 4 τῶν ριζῶν εἶναι δ 12, ἀν τοὺς δείκτας τῶν ὑπορρίζων καὶ τοὺς δείκτας τῶν ριζῶν πολλαπλασιάσωμεν κατὰ σειρὰν ἐπὶ 6, 4, 3, ἀντὶ τῶν διθέντων λαμβάνομεν τὰ ἵσα τῶν ἀντιστοίχως

$$\sqrt[12]{\alpha^6}, \quad \sqrt[12]{\beta^4}, \quad \sqrt[12]{\gamma^3}.$$

Ἐν γένει, ἡ τροπὴ ριζικῶν εἰς ἄλλα ἔχοντα τὸν αὐτὸν δείκτην γίνεται καθώς καὶ ἡ τροπὴ τῶν ἑτερωνύμων κλασμάτων εἰς ὁμώνυμα.

Π.χ. τὰ  $\sqrt[\mu]{\alpha}$  καὶ  $\sqrt[\nu]{\beta}$  τρέπονται εἰς τὰ  $\sqrt[\mu\nu]{\alpha^\mu}$  καὶ  $\sqrt[\mu\nu]{\beta^\mu}$ . Τὰ  $\sqrt[\nu]{\alpha^\mu}$ ,  $\sqrt[\nu]{\beta^\mu}$  τρέπονται εἰς τὰ  $\sqrt[\mu\nu\rho]{\alpha^{\mu\rho}}$ ,  $\sqrt[\mu\nu\rho]{\beta^{\mu\rho}}$  κ.ο.κ.

§ 146. Τὸ γινόμενον ἢ τὸ πηλίκον ριζῶν θετικῶν ἀριθμῶν μὲ τὸν αὐτὸν δείκτην ἴσουται μὲ ρίζαν τοῦ γινομένου ἢ τοῦ πηλίκου τῶν ὑπορρίζων ποσοτήτων καὶ μὲ δείκτην τὸν τῶν παραγόντων.

$$\text{Π.χ. } \sqrt[\mu]{\alpha} \cdot \sqrt[\mu]{\beta} \cdot \sqrt[\mu]{\gamma} = \sqrt[\mu]{\alpha\beta\gamma}. \text{ Διότι, ἀν αἱ ( ὁμόσημοι ) αὐταὶ πα-}$$

παραστάσεις ύψων θούν είς τὴν μ δύναμιν, δίδουν ἔξαγόμενα ἵσα.

Πράγματι ἔχομεν  $(\sqrt[\mu]{\alpha} \cdot \sqrt[\mu]{\beta} \cdot \sqrt[\mu]{\gamma})^{\frac{1}{\mu}} = (\sqrt[\mu]{\alpha})^{\frac{1}{\mu}} \cdot (\sqrt[\mu]{\beta})^{\frac{1}{\mu}} \cdot (\sqrt[\mu]{\gamma})^{\frac{1}{\mu}} = \alpha \cdot \beta \cdot \gamma$ .

καὶ  $(\sqrt[\mu]{\alpha \cdot \beta \cdot \gamma})^{\frac{1}{\mu}} = \alpha \cdot \beta \cdot \gamma$ . Όμοιώς ἔχομεν  $\sqrt[\mu]{\alpha} : \sqrt[\mu]{\beta} = \frac{\sqrt[\mu]{\alpha}}{\sqrt[\mu]{\beta}} = \sqrt[\mu]{\frac{\alpha}{\beta}}$ ,

ἡ δὲ ἀπόδειξις γίνεται δύοις. Κατὰ ταῦτα ἔχομεν :

$$\sqrt{2} \cdot \sqrt{3} \cdot \sqrt{5} = \sqrt{30}, \quad \sqrt{32} : \sqrt{2} = \sqrt{32:2} = \sqrt{16} = 4.$$

**§ 147. α')** Εάν θέλωμεν νὰ εύρωμεν τὸ γινόμενον ἡ τὸ πηλίκον ρίζικῶν ἔχόντων διαφόρους δείκτας καὶ θετικὰ ἡ ἀπόλυτα ὑπόρριζα, τρέπομεν αὐτὰ εἰς ἄλλα ἵσα των, ἔχοντα τὸν αὐτὸν δείκτην καὶ ἀκολούθως ἐφαρμόζομεν τὴν ἀνωτέρω ἰδιότητα. Οὕτω θὰ ἔχωμεν π.χ.

$$\sqrt[4]{5} \cdot \sqrt{2} = \sqrt[12]{5^3 \cdot 2^4} = \sqrt[12]{5^3 \cdot 2^4}, \quad \sqrt[3]{20^2} : \sqrt[6]{5} = \sqrt[6]{20^4} : \sqrt[6]{5^3} = \sqrt[6]{20^4} : \sqrt[5]{3}.$$

Ἡ ἔξαγωγὴ τῆς ρίζης κλάσματος ἀνάγεται εἰς τὴν ἔξαγωγὴν τῆς ρίζης ἀκεραίας παραστάσεως ἐν γένει, ἀν τοὺς ὅρους τοῦ κλάσματος πολλαπλασιάσωμεν ἐπὶ κατάλληλον ἀριθμόν, ὥστε ὁ παρονομαστής νὰ ἔχῃ ὑπόρριζον ποσότητα δύναμιν μὲ ἐκθέτην τὸν δείκτην τῆς ρίζης. Οὕτως ἔχομεν π.χ.-

$$\sqrt[4]{\frac{5}{8}} = \sqrt[4]{\frac{5}{2^3}} = \sqrt[4]{\frac{5 \cdot 2}{2^4}} = \sqrt[4]{\frac{10}{2^4}} = \frac{\sqrt[4]{10}}{\sqrt[4]{2^4}} = \frac{\sqrt[4]{10}}{2}$$

Γενικῶς, ἂν ὁ παρονομαστής κλάσματικὴς παραστάσεως ἔχῃ ρίζικόν, πολλαπλασιάζοντες τοὺς ὅρους αὐτῆς ἐπὶ κατάλληλον παράστασιν, δυνάμεθα νὰ μετατρέψωμεν τὴν δοθεῖσαν εἰς ἄλλην μὲ παρονομαστὴν ἄνευ ρίζικοῦ. Π.χ. ἂν ἔχωμεν τὴν παράστασιν  $\frac{\gamma}{\alpha + \sqrt{\beta}}$  καὶ πολλαπλασιάσωμεν τοὺς ὅρους αὐτῆς ἐπὶ τὴν συζυγῆ παράστασιν τῆς  $\alpha + \sqrt{\beta}$ , ἡτοι ἐπὶ τὴν  $\alpha - \sqrt{\beta}$ , (ἐνῷ ὑποτίθεται  $\alpha - \sqrt{\beta} \neq 0$ ), εὑρίσκομεν

$$\frac{\gamma}{\alpha + \sqrt{\beta}} = \frac{\gamma(\alpha - \sqrt{\beta})}{(\alpha + \sqrt{\beta})(\alpha - \sqrt{\beta})} = \frac{\gamma(\alpha - \sqrt{\beta})}{\alpha^2 - \beta}$$

### Α σκήσεις

320. Νὰ ἀπλοποιηθοῦν αἱ κάτωθι παραστάσεις :

$$\alpha') \sqrt{54} + 3\sqrt{54} - \sqrt{6}.$$

$$\beta') \sqrt{45\alpha^3} + \sqrt{124\alpha^3} - \sqrt{320\alpha^3},$$

$$\gamma') \sqrt{\frac{114 \cdot 5}{7^2}} + \sqrt{\frac{122 \cdot 5^3}{7^3 \cdot 13^4}} \cdot 13^2 - \sqrt{\frac{112 \cdot 13^2}{7 \cdot 5^2}}.$$

321. Εις τάς κάτωθι παραστάσεις δ' πρό τοῦ ριζικοῦ παράγων νὰ είσαι χθῆ καταλλήλως ἐντὸς αὐτοῦ:

$$\alpha') x\sqrt{x-1}, \quad \beta') 3\sqrt{5}, \quad \gamma') \alpha\sqrt{\frac{\beta}{\alpha}}, \quad \delta') 2\sqrt{\frac{6}{2}}, \quad \epsilon') 7\sqrt{\frac{1}{49}}.$$

322. Νὰ τραποῦν αἱ κάτωθι ρίζαι εἰς ισοδυνάμους αὐτῶν ἔχούσας ἑλάχιστον κοινὸν δείκτην:

$$\alpha') \sqrt{\alpha} \cdot \sqrt[3]{\alpha}, \quad \beta') \sqrt[4]{\alpha}, \quad \gamma') \sqrt[6]{\alpha}, \quad \delta') \sqrt[12]{\gamma}, \quad \epsilon') \sqrt[3]{\alpha}, \quad \eta') \sqrt[6]{\beta}, \quad \zeta') \sqrt{\gamma}.$$

323. Νὰ γίνῃ ἀπλοποίησις τῶν ριζῶν:

$$\alpha') \sqrt[4]{64}, \quad \beta') \sqrt[6]{48}, \quad \gamma') \sqrt[3]{64}, \quad \delta') \sqrt[2\mu]{\alpha\mu}.$$

324. Νὰ εύρεθοῦν τὰ γινόμενα:

$$\alpha') \sqrt{5} \cdot \sqrt{20}, \quad \beta') \sqrt{4} \cdot \sqrt{2}, \quad \gamma') \sqrt[3]{5} \cdot \sqrt[4]{30}, \quad \delta') \sqrt[4]{\alpha^2} \cdot \sqrt[5]{\alpha}, \\ \epsilon') \sqrt{x}\psi \cdot \sqrt{\frac{\psi}{x}}, \quad \sigma') \sqrt[3]{2\alpha} \cdot \sqrt[4]{5\alpha\beta} \cdot \sqrt[3]{3\beta}, \quad \zeta') \sqrt[3]{5} \cdot \sqrt[3]{2}.$$

325. Νὰ εύρεθοῦν τὰ πηγίκα:

$$\alpha') \sqrt[3]{24} : \sqrt[3]{2}, \quad \beta') \sqrt[3]{7000} : \sqrt[3]{875}, \quad \gamma') \sqrt[3]{x^4} : \sqrt[3]{x}, \quad \delta') \sqrt[3]{6\alpha^4} : \sqrt[3]{2\alpha}.$$

326. Νὰ εύρεθῇ τό: α')  $(\sqrt{\alpha} + \sqrt{\beta} - \sqrt{\gamma})^2$ , β')  $(2\sqrt{x} + 8\sqrt{x^2}) \cdot \sqrt{x}$

$$\gamma') (\sqrt[3]{\alpha} + \sqrt[4]{\alpha} - \sqrt[4]{\alpha}) \cdot \sqrt[4]{\alpha}.$$

327. Τὰ κάτωθι κλάσματα νὰ τραποῦν εἰς ισοδύναμα αὐτῶν μέρη τούς παρονομαστάς.

$$\alpha') \frac{3}{\sqrt{2}}, \quad \beta') \frac{1+\sqrt{3}}{\sqrt{3}}, \quad \gamma') \frac{\alpha}{\sqrt[3]{\beta}}, \quad \delta') \frac{4\sqrt{2}}{\sqrt[3]{\beta}}, \quad \epsilon') \frac{x-\sqrt{x^2-1}}{x+\sqrt{x^2-1}}.$$

## 2. ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕ ΕΚΘΕΤΑΣ ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥΣ

**§ 148.** Ἐστω ὅτι ἔχομεν τὸν  $\alpha^{\frac{1}{2}}$ , ὅπου τὸ α παριστάνει ἀριθμόν τινα θετικόν. Ορίζομεν ὅτι τὸ  $\alpha^{-\frac{1}{2}}$  παριστάνει τὴν θετικὴν τετραγωνικὴν ρίζαν τοῦ α, ἥτοι θέτομεν  $\alpha^{-\frac{1}{2}} = \sqrt{-\alpha}$ , ὅτε  $(\sqrt{-\alpha})^2 = \alpha$ , ἕπει  $(\alpha^{-\frac{1}{2}})^2 = \alpha$ .

Κατὰ ταῦτα :

$$4^{\frac{1}{2}} = \sqrt{4} = 2, \quad 9^{\frac{1}{2}} = \sqrt{9} = 3.$$

"Αν δοθῇ τὸ  $\alpha^{\frac{1}{v}}$ , ἐνῷ εἶναι  $v > 0$  καὶ ἀκέραιος, ὁρίζομεν ὅτι  $\alpha^{\frac{1}{v}} = \sqrt[v]{\alpha}$ , ὑποθέτοντες ὅμως  $\alpha > 0$  δταν ὡς  $v$  εἶναι ἄρτιος, ὅτε ἔχομεν  $(\alpha^{\frac{1}{v}})^v = (\sqrt[v]{\alpha})^v = \alpha$ , ἀρα  $(\alpha^{\frac{1}{v}})^v = \alpha$ .

"Αν ἔχωμεν τὸ  $\alpha^{\frac{\mu}{v}}$ , ἐνῷ εἶναι  $\mu$  καὶ  $v$  ἀκέραιοι καὶ θετικοί, θέτομεν  $\alpha^{\frac{\mu}{v}} = \sqrt[v]{\alpha^\mu}$ , ὑποθέτοντες  $\alpha > 0$  ὃν  $v$  ἄρτιος, ὅτε ἔχομεν  $(\alpha^{\frac{\mu}{v}})^v = (\sqrt[v]{\alpha^\mu})^v = \alpha^\mu$ , ἥτοι :  $(\alpha^{\frac{1}{v}})^\mu = \alpha^\mu$ .

'Εξ ἀλλου παρατηροῦμεν ὅτι τὸ

$$\alpha^{\frac{\mu}{v}} = \alpha^{\frac{\mu \cdot 1}{v}} = \alpha^{\frac{1}{v} \cdot \mu} \quad \text{ἢ } \alpha^{\frac{\mu}{v}} = (\alpha^\mu)^{\frac{1}{v}} = \left(\alpha^{\frac{1}{v}}\right)^\mu, \quad \text{ἥτοι } \alpha^{\frac{\mu}{v}} = \sqrt[v]{\alpha^\mu} = \left(\sqrt[v]{\alpha}\right)^\mu.$$

'Η τελευταία ισότης ισχύει ἀνευ περιορισμοῦ, ἐπειδὴ θεωροῦμεν ἐκ τῶν δύο ριζῶν ἑκάστης ἄρτιας τάξεως μόνον τὴν θετικήν.

$$\text{Οὕτως ἔχομεν } 100^{\frac{3}{2}} = \sqrt{100^3} = \sqrt{1\,000\,000} = 1000.$$

'Εκ τῶν ἀνωτέρω δόδηγούμενοι δίδομεν τὸν ἔξῆς ὁρισμὸν τῆς δυνάμεως σχετικοῦ ἀριθμοῦ μὲν ἐκθέτην θετικὸν κλάσμα.

'Η δύναμις ἀριθμοῦ μὲν ἐκθέτην κλάσμα ἔχον ὄρους ἀκεραίους καὶ θετικοὺς παριστάνει ἢ τὴν ρίζαν τὴν ἔχουσαν δείκτην τὸν παρονομαστὴν τοῦ κλάσματος καὶ ὑπόρριζον τὸν ἀριθμὸν μὲν ἐκθέτην τὸν ἀριθμητὴν τοῦ κλάσματος ἢ τὴν δύναμιν μὲ βάσιν τὴν ρίζαν τοῦ ἀριθμοῦ τὴν ἔχουσαν δείκτην τὸν παρονομαστὴν τοῦ κλάσματος καὶ μὲ ἐκθέτην τὸν ἀριθμητὴν αὐτοῦ.

**§ 149.** "Αν ὡς ἐκθέτης τῆς  $\alpha^{\frac{1}{v}}$  ἀντικατασταθῇ μὲ τὸν ίσοδύναμόν του  $\frac{\mu\rho}{v\rho}$  τοῦ  $\rho$  παριστάνοντος ἀριθμὸν ἀκέραιον καὶ θετικόν, εἶναι δὲ ἐπὶ τιλέον καὶ ὡς α θετικός, θὰ ἔχωμεν

$$\alpha^{\frac{\mu}{v}} = \alpha^{\frac{\mu\rho}{v\rho}}, \quad \text{διότι εἶναι } \alpha^{\frac{\mu}{v}} = \sqrt[v]{\alpha^\mu} \quad (\S \, 148)$$

$$\text{ἀλλὰ καὶ } \alpha^{\frac{\mu\rho}{v\rho}} = \sqrt[v]{\alpha^{\mu\rho}} \quad (\S \, 148)$$

$$= \sqrt[v]{\alpha^\mu} \quad (\S \, 141).$$

Η ισότης αυτή σύμως δὲν ἀληθεύει ἂν  $\alpha < 0$ . Οὖτω π.χ.  
 $(-2)^{\frac{1}{3}} \neq (-2)^{\frac{2}{6}}$ , διότι  $(-2)^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{-2} = -\sqrt[3]{2} < 0$ , ἐνῷ  $(-2)^{\frac{2}{6}} = \sqrt[6]{(-2)^2} = \sqrt[6]{4} > 0$ .

Καθ' ὅμοιον τρόπον δυνάμεθα νὰ δείξωμεν καὶ ἄλλας ιδιότητας τῶν ριζῶν, καθώς καὶ νὰ τρέψωμεν ρίζας εἰς ἄλλας ἔχούσας τὸν αὐτὸν δείκτην, ὑποθέτοντες σύμως τὴν βάσιν α θετικήν πρὸς ἀποφυγὴν χονδροειδῶν σφαλμάτων.

**§ 150. α')** "Εστω ὅτι θέλομεν νὰ ὄρισωμεν τὸ  $\alpha^{-\frac{1}{2}}$ . Δεχόμενοι τοῦτο ως δύναμιν τοῦ α καὶ ὑποθέτοντες ὅτι ἡ ιδιότης τοῦ γινομένου τῶν δυνάμεων τοῦ αὐτοῦ ἀριθμοῦ ισχύει καὶ ὅταν οἱ ἐκθέται εἰναι θετικοὶ ἢ ἀρνητικοὶ κλασματικοὶ ἀριθμοί, ἔχομεν

$$\alpha^{+\frac{1}{2}} \cdot \alpha^{-\frac{1}{2}} = \alpha^{+\frac{1}{2}-\frac{1}{2}} = \alpha^0 = 1.$$

Διαιροῦντες τὰ ἵσα μέλη τῆς ισότητος  $\alpha^{\frac{1}{2}} \cdot \alpha^{-\frac{1}{2}} = 1$  διὰ τοῦ  $\alpha^{\frac{1}{2}}$ , εὑρίσκομεν  $\alpha^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{\alpha^{\frac{1}{2}}} = \frac{1}{\sqrt{\alpha}}$ , ἥτοι  $\alpha^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{\alpha}}$ . Όμοίως εὑρίσκο-

μεν  $\alpha^{-\frac{1}{v}} = \frac{1}{\alpha^{\frac{1}{v}}} = \frac{1}{\sqrt[v]{\alpha}}$  (ὅπου τὸ ν εἶναι θετικὸς καὶ ἀκέραιος ἀρι-

θμός). Καὶ γενικῶς  $\alpha^{-\frac{\mu}{v}} = \frac{1}{\alpha^{\frac{\mu}{v}}} = \frac{1}{\sqrt[v]{\alpha^{\mu}}}$  (ἄν τὰ μ καὶ ν εἶναι θετικοὶ

καὶ ἀκέραιοι ἀριθμοὶ διάφοροι τοῦ 0). "Ητοι :

Η δύναμις ἀριθμοῦ ( $\neq 0$ ) μὲ ἐκθέτην δοθὲν ἀρνητικὸν κλάσμα παριστάνει κλάσμα ἔχον ἀριθμητὴν μὲ τὴν μονάδα παρονομαστὴν δὲ δύναμιν τοῦ αὐτοῦ ἀριθμοῦ ἔχουσαν ἐκθέτην τὸν ἀντίθετον τοῦ δοθέντος.

Οὖτω π.χ. ἔχομεν

$$\alpha^{-\frac{5}{6}} = \frac{1}{\alpha^{\frac{5}{6}}} = \frac{1}{\sqrt[6]{\alpha^5}}, \quad 4^{-\frac{3}{2}} = \frac{1}{4^{\frac{3}{2}}} = \frac{1}{\sqrt{4^3}} = \frac{1}{\sqrt{64}} = \frac{1}{8}.$$

στ') Τὸ δριὸν τῆς νῆς δυνάμεως ποσότητος μεταβλητῆς ισοῦται μὲ τὴν νὴν δύναμιν τοῦ δρίου τῆς μεταβλητῆς.

Διότι ἂν εἴναι  $\sigma\varphi x = \alpha$ , θὰ ἔχωμεν  $\sigma\varphi(x^\nu) = \sigma\varphi(x \cdot x \cdots x) = \sigma\varphi x \cdot \sigma\varphi x \cdots = (\sigma\varphi x)^\nu = \alpha \cdot \alpha \cdots \alpha = \alpha^\nu$ , ἢτοι  $\sigma\varphi(x^\nu) = (\sigma\varphi x)^\nu = \alpha^\nu$ .

ζ') Τὸ δριὸν τῆς νῆς ρίζης μεταβλητῆς τινος ποσότητος ισοῦται μὲ τὴν νὴν ρίζαν τοῦ δρίου τῆς μεταβλητῆς.

η') Ἐὰν δύο μεταβληταὶ ποσότητες λαμβάνουν ἵσας τιμὰς ἀντιστοίχως καὶ ἐκάστη ἔχῃ δρῖον, τὰ δριὰ τῶν εἶναι ἵσα.

"Εστω ὅτι αἱ μεταβληταὶ  $x, \psi$  λαμβάνουν ἵσας τιμὰς ἀντιστοίχους καὶ  $\sigma\varphi x = \alpha$ ,  $\sigma\varphi \psi = \beta$ , τότε εἴναι  $\alpha = \beta$ , ἢτοι  $\sigma\varphi x = \sigma\varphi \psi$ .

θ') Ἐὰν αἱ ἀντιστοίχοι τιμαὶ μεταβλητῶν ποσοτήτων ἔχουν σταθερὸν λόγον, ἐκάστη δὲ τούτων ἔχῃ δρῖον ( $\neq 0$ ), ὁ λόγος οὗτος ισοῦται μὲ τὸν λόγον τῶν δρίων τῶν

"Εστωσαν  $x, \psi$  δύο μεταβληταὶ ποσότητες καὶ  $\sigma\varphi x = \alpha (\neq 0)$ ,  $\sigma\varphi \psi = \beta (\neq 0)$ . "Αν εἴναι  $\frac{x}{\psi} = \rho$  σταθερόν, τότε εἴναι  $\frac{\beta}{\alpha} = \rho$ , ἢτοι:  
 $\rho = \frac{\alpha}{\beta} = \frac{\sigma\varphi x}{\sigma\varphi \psi}$ .

#### Γ'. ΠΕΡΙ ΑΣΥΜΜΕΤΡΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

**§ 154.** "Εστω ὅτι ζητεῖται ἡ τετραγωνικὴ ρίζα τοῦ 2. Αὗτη δὲν εἴναι ἀκέραιός τις ἀριθμός. Διότι,  $1^2 = 1$  καὶ  $2^2 = 4$ . 'Αλλ' οὔτε ὑπάρχει ἄλλος τις ἀριθμὸς ἐκ τῶν μέχρι τοῦδε γνωστῶν, τοῦ ὅποιού τὸ τετράγωνον ισοῦται μὲ 2. Διότι, ἂν ὑποθέσωμεν ὅτι ὑπάρχει τοιοῦτος ἀριθμὸς δεκαδικὸς κοινὸς ἡ περιοδικός, αὐτὸς δύναται νὰ παρασταθῇ μὲ κλάσμα ἀνάγωγον, εστω δὲ τοῦτο τὸ  $\frac{\lambda}{\mu}$ . Τότε θὰ εἴναι  $\frac{\lambda^2}{\mu^2} = 2$ , τὸ ὅποιον εἴναι ἀδύνατον, ἐπειδή, ἀφοῦ τὸ  $\frac{\lambda}{\mu}$  εἴναι ἀνάγωγον, τὸ  $\frac{\lambda^2}{\mu^2}$  εἴναι ἀνάγωγον καὶ δὲν δύναται νὰ ισοῦται μὲ 2.

Τὰ αὐτὰ παρατηροῦμεν καὶ διὰ τὴν  $\sqrt{5}$ , τὴν  $\sqrt{7}$  κ.τ.λ.

'Αναζητοῦντες τὴν  $\sqrt{2}$  σχηματίζομεν τοὺς ἀριθμοὺς 1.1, 1.1, 2.1, 3...1.7·1.8·1.9·2 καὶ σχηματίζομεν ἀκολούθως τὰ τετράγωνα τούτων 1·1·21·1.44·1.69·2.25... Παρατηροῦμεν ὅτι οὐδὲν ἐκ τῶν τετραγώνων αὐτῶν ισοῦται μὲ τὸν 2 καὶ ὅτι ὁ 2 περιέχεται μεταξὺ

τῶν 1,96 καὶ 2,25, τετραγώνων τῶν 1,4 καὶ 1,5 δύο διαδοχικῶν τῶν ἀνωτέρω ἀριθμῶν. Ἡτοι εἰναι 1,4<sup>2</sup><2<1,5<sup>2</sup>.

Σχηματίζουμεν τώρα τοὺς ἀριθμοὺς 1,4· 1,41· 1,42· 1,43·..... 1,49· 1,5. Ἐπειδὴ δ 2 δέν δύναται νὰ ἰσοῦται μὲ τὸ τετράγωνον ἐνὸς ἐκ τούτων, περιέχεται μεταξὺ τῶν τετραγώνων δύο διαδοχικῶν ἐκ τῶν ἀριθμῶν αὐτῶν. Πράγματι ἀν σχηματίσωμεν τὰ τετράγωνα τῶν ἀριθμῶν τούτων, εύρισκομεν ὅτι εἴναι 1,41<sup>2</sup><2<1,42<sup>2</sup>. Ἐπομένως ἡ  $\sqrt{2}$  περιέχεται μεταξὺ 1,41 καὶ 1,42. Ὄμοιώς προχωροῦμεν καὶ εύρισκομεν ὅτι ἡ  $\sqrt{2}$  περιέχεται μεταξὺ τῶν 1,414 καὶ 1,415, ἐνῷ οἱ ἀριθμοὶ αὐτοὶ διαφέρουν κατὰ ἓν χιλιοστόν. Ἀν προχωρήσωμεν ἀκόμη, εύρισκομεν ὅτι ἡ  $\sqrt{2}$  περιέχεται μεταξὺ δύο ἀριθμῶν, οἱ ὄποιοι διαφέρουν κατὰ ἓν δέκατον χιλιοστοῦ, ἓν ἑκατοστὸν χιλιοστοῦ καὶ οὕτω καθεξῆς.

Ἐν γένει λοιπόν, ἀν προχωρήσωμεν ὁμοίως, θὰ εὔρωμεν ὅτι ἡ  $\sqrt{2}$  περιέχεται μεταξὺ δύο ἀριθμῶν, οἵτινες διαφέρουν ἀπολύτως κατὰ μίαν δεκαδικήν μονάδα τῆς τελευταίας τάξεως, τὴν δόποιαν περιέχουν καὶ ἐπομένως ἡ διαφορὰ αὐτῇ δύναται νὰ γίνῃ ὅσον θέλομεν μικρὰ (ἀν ἔξακολουθήσωμεν ἀρκούντως). Ἀρα, ἑκαστος τῶν δύο τούτων ἀριθμῶν κατὰ μείζονα λόγον θὰ διαφέρῃ ἀπολύτως ἀπὸ τὸν ἀριθμὸν τὸν παριστάνοντα τὴν  $\sqrt{2}$  κατὰ ποσότητα ὅσον καὶ ἀν θέλωμεν μικράν. Διὰ τοῦτο λέγομεν ὅτι ἡ  $\sqrt{2}$ =μὲ ὅριον ἐνὸς τῶν ὧν ἄνω εύρισκομένων ἀριθμῶν, ἥτοι θεωροῦμεν ὡς  $\sqrt{2}$  τὸν ἐνα ἐκ τῶν ὧν ἀνωτέρω εύρισκομένων ἀριθμῶν· ἔχει δὲ αὐτὸς ἀπειρα δεκαδικὰ ψηφία μὴ περιοδικά, διότι ἀλλως ὁ ἀριθμὸς αὐτὸς θὰ ἡδύνατο νὰ παρασταθῇ μὲ κλάσμα, τὸ ὄποιον εἴναι ἀδύνατον.

Τὸν ἀριθμὸν αὐτόν, ὁ ὄποιος παριστάνει τὴν  $\sqrt{2}$  καλοῦμεν **ἀσύμμετρον**.

Τοιούτους ἀριθμοὺς εύρισκομεν καὶ εἰς τὴν Γεωμετρίαν κατὰ τὴν μέτρησιν τῶν καλούμενων ἀσυμμέτρων μεγεθῶν πρὸς τὴν μονάδα μετρήσεως αὐτῶν.

Ἐν γένει καλοῦμεν ἀσυμμέτρους ἀριθμοὺς ἐκείνους, οἵτινες ἔχουν ἀπειρον πλῆθος δεκαδικῶν ψηφίων μὴ περιοδικῶν. Καὶ εἴναι θετικοὶ ἡ ἀρνητικοί, ἀν ἔχουν πρὸ αὐτῶν τὸ σῆμα + (ἢ οὐδὲν πρόσημον) ἡ τὸ -. Συμμέτρους δὲ καλοῦμεν τοὺς μέχρι τοῦδε γνωστοὺς ἀριθμούς (ἀκεραίους ἢ κλασματικούς ἐν γένει).

Κατά ταῦτα ἡ  $\sqrt{2}$  εἶναι ἀριθμὸς ἀσύμμετρος, ὁ 1,41421 κατὰ προσέγγισιν ἐνὸς ἑκατοντάκις χιλιοστοῦ. Ὄμοιῶς οἱ ἀριθμοὶ 2, 14159... καὶ 2,71828... εἶναι ἀσύμμετροι (ἔχοντες ἄπειρα δεκαδικὰ ψηφία μὴ περιοδικά).

Καθὼς γνωρίζομεν ἐκ τῆς Ἀριθμητικῆς, δεχόμεθα συνήθως ὅτι οἱ σύμμετροι ἀριθμοὶ δύνανται νὰ γίνουν ἀπὸ τὴν μονάδα ἢ καὶ ἀπὸ τὰ μέρη αὐτῆς 0,1. 0,01. 0,001.... διὰ τῆς ἐπαναλήψεως αὐτῶν ὡς προσθετέων, πρὸς δὲ ὅτι ὑπάρχουν κλάσματα, τὰ ὃποῖα εἶναι ἵσα μὲν ἀριθμούς ἔχοντας μὲν ἄπειρον πλῆθος δεκαδικῶν ψηφίων, τὰ ὃποῖα ὅμως ἐπαναλαμβάνονται ἀπὸ τίνος καὶ ἔξῆς δμοίως καὶ κατὰ τὴν αὐτὴν τάξιν. Οἱ τοιοῦτοι ἀριθμοὶ λέγομεν ὅτι σχηματίζονται διὰ τῆς ἐπαναλήψεως ὡς προσθετέων τῶν (ἄπειρων τὸ πλῆθος) δεκαδικῶν μονάδων 0,1. 0,01. 0,001 κ.τ.λ.

Κατ' ἀνάλογον τρόπον δεχόμεθα ὅτι :

Σύνολον πλήθους ἐκ τῶν αὐτῶν ἀπείρων δεκαδικῶν μονάδων, ἐξ ἔκαστης τῶν ὃποίων δὲν εἶναι περισσότεραι τῶν ἐννέα, θεωροῦνται ὡς ἀριθμοί, ὀσαδήποτε καὶ ἀν εἶναι τὰ ψηφία, διὰ τῶν ὃποίων γράφονται οὕτοι.

Καὶ μετὰ τὴν παραδοχὴν τῶν ἀσυμμέτρων ἀριθμῶν δεχόμεθα ὅτι διατηροῦνται οἱ δρισμοὶ τῶν πράξεων ἐπ' αὐτῶν, ὡς καὶ ἐπὶ τῶν συμμέτρων, δεικνύεται δὲ ὅτι εἶναι δυνατή ἡ πρόσθεσις, ἡ ἀφαίρεσις, ὁ πολλαπλασιασμὸς (καὶ ἡ ὑψώσις εἰς δύναμιν) καὶ ἡ διαίρεσις δύο οἰωνδήποτε ἀριθμῶν αἰ:β ( $\beta \neq 0$ ). Ἐπίσης δεικνύεται, ὅτι ἰσχύουν καὶ ἐπ' αὐτῶν αἱ θεμελιώδεις ίδιότητες τῶν πράξεων.

Εἰς τὰς πράξεις τῶν ἀσυμμέτρων ἀριθμῶν παραλείπομεν τὰ δεκαδικὰ ψηφία αὐτῶν ἀπό τίνος καὶ ἔξῆς. Οὕτως ἔχομεν συμμέτρους ἀριθμούς, οἱ ὃποιοι εἶναι μόνον κατὰ προσέγγισιν ἵσοι μὲ τοὺς ἀσυμμέτρους. Ἐπὶ τῶν συμμέτρων δὲ τούτων ἐκτελοῦμεν τὰς πράξεις κατὰ τοὺς γνωστοὺς κανόνας.

Ἀριθμός τις θετικὸς σύμμετρος (γραμμένος ὡς δεκαδικὸς) λέγεται μεγαλύτερος ἀλλού τοιούτου, ὁ ὃποιος λέγεται μικρότερος τοῦ πρώτου, ἀν περιέχῃ τὸ σύνολον τῶν μονάδων ἑκάστης δεκαδικῆς τάξεως τοῦ δευτέρου καὶ ἀλλας ἀκόμη, καθὼς ὁ 2,5349 εἶναι μεγαλύτερος τοῦ 2,53438956.

**§ 155.** Δύο ἀριθμοὶ θετικοὶ σύμμετροι λέγονται ἵσοι, ἀν πᾶς

άριθμός ἀκέραιος ή κλασματικός, δύο όποιος είναι μικρότερος του ἐνὸς ἐκ τούτων, είναι μικρότερος καὶ τοῦ ἄλλου. Οὕτως οἱ ἀριθμοὶ 1 καὶ 0,999... είναι ἵσοι. Διότι ἔστω ἀριθμός της μικρότερος τῆς 1 π.χ. δύο  $\frac{1}{147}$ . Αὐτὸς είναι μικρότερος καὶ τοῦ  $\frac{999}{1000}$ , ἐπειδὴ δὲ μὲν  $\frac{999}{1000}$  διαφέρει ἀπὸ τὴν 1 κατὰ  $\frac{1}{1000}$ , δὲ  $\frac{147}{148}$  κατὰ  $\frac{1}{148}$ , ἥτοι περισσότερον. ‘Επομένως δύο  $\frac{147}{148}$ , δύο όποιος είναι μικρότερος του 0,999, είναι ἀκόμη μικρότερος καὶ τοῦ 0,9999... ‘Ομοίως δεικνύεται καὶ τὸ ἀντίστροφον τούτου· δύσαδήποτε δὲ ψηφία του 0,99999... καὶ ἀν λάβωμεν, προκύπτει ἀριθμός μικρότερος τῆς μονάδος, ἅρα είναι 1=δριον 0,9999.... καὶ θέτομεν 1=0,999... καὶ 0,01=0,009999... κ.τ.λ.

Κατὰ ταῦτα δύο ἀριθμοὶ θετικοὶ σύμμετροι γραμμένοι ὡς δεκαδικοὶ θὰ είναι ἵσοι : 1ον. “Ἄν πάντα τὰ δεκαδικὰ ψηφία των τῆς αὐτῆς τάξεως είναι τὰ αὐτὰ ἢ 2ον ἀν τινὰ μὲν ψηφία των ἀπὸ τοῦ πρώτου καὶ ἐφ’ ἔξῆς είναι κατὰ σειρὰν τὰ αὐτὰ καὶ τὸ ἀμέσως ἐπόμενον ψηφίον τούτων τοῦ ἐνὸς ἀριθμοῦ διαφέρει ἀπὸ τὸ ἀντίστοιχόν του (τῆς αὐτῆς τάξεως) τοῦ ἄλλου κατὰ μονάδα, τὰ δὲ ἐπόμενα ψηφία τοῦ μὲν ἔχοντος τὸ μικρότερον ἐκ τῶν ἀνίσων ψηφίων είναι πάντα 9, τοῦ δὲ ἄλλου πάντα είναι 0 (τὰ δόρια καὶ παραλείπονται).” Άν δὲν συμβαίνῃ τοῦτο, οἱ ἀριθμοὶ είναι ἀνισοί. Οὕτω π.χ. οἱ ἀριθμοὶ 3,1539999. καὶ 3,154 θεωροῦνται δτὶ είναι ἵσοι, καθὼς καὶ οἱ 0,54327 καὶ 0,54326999, ἐνῷοι 3,1452... καὶ 3,1478... είναι ἀνισοί καὶ 3,1478...>3,1452...

*Παρατηρήσεις. α')* Μὲ τὴν βοήθειαν τῶν προηγουμένων δυνάμεθα νὰ δρίσωμεν τὴν ἴσοτητα καὶ ἀνισότητα καὶ μὲ ἀσυμμέτρους ἀριθμούς. Π.χ. ἐκ τῶν ἀσυμμέτρων 3,14153... καὶ 3,141298... δὲ α' είναι μεγαλύτερος τοῦ β'.

*β')* Οἱ ἀριθμοὶ  $\alpha + \sqrt{\beta}$  καὶ  $\gamma + \sqrt{\delta}$ , δηπου  $\alpha, \gamma$  σύμμετροι οἱ δὲ  $\beta, \delta$  θετικοὶ καὶ σύμμετροι ἀλλὰ μὴ τέλεια τετράγωνα είναι ἵσοι μόνον δτὰν  $\alpha = \gamma$  καὶ  $\beta = \delta$ .

Πράγματι. ‘Η ἴσοτης  $\alpha + \sqrt{\beta} = \gamma + \sqrt{\delta}$  ἴσοδυναμεῖ πρὸς τὴν  $(\alpha - \gamma) + \sqrt{\beta} = \sqrt{\delta}$ . ‘Επομένως, διὰ νὰ ἀληθεύῃ πρέπει δύπωσδήποτε νὰ είναι  $((\alpha - \gamma) + \sqrt{\beta})^2 = \delta$ , δηλ.  $(\alpha - \gamma)^2 + \beta + 2(\alpha - \gamma)\sqrt{\beta} = \delta$  ἢ  $2(\alpha - \gamma)\sqrt{\beta} = \delta - \beta - (\alpha - \gamma)^2$ . “Άν ἥτο  $\alpha \neq \gamma$ , δυνάμεθα νὰ διαιρέσωμεν τὰ δύο μέλη διὰ  $\alpha - \gamma$  καὶ συμπεραίνομεν δτὶ θὰ ἔπρεπε νὰ ἀλη-

Α σ κ ή σ εις

$$328. \text{Τί σημαίνει } \alpha') \alpha^{\frac{3}{2}}; \quad \beta') \alpha^{\frac{1}{42}}; \quad \gamma') \alpha^{-\frac{3}{8}}; \quad \delta') 32^{-\frac{1}{4}} \cdot \frac{3}{12};$$

$$329. \text{Εύρετε τά: } \alpha') \left(3-2-\frac{1}{3}\right) \cdot \left(3-2-\frac{1}{2}\right), \quad \beta') \left(\alpha+\beta-\frac{1}{2}\right) \cdot \left(\alpha-\beta-\frac{1}{2}\right), \\ \gamma') \left(2^{-\frac{1}{2}}+3^{-\frac{1}{2}}\right) \cdot \left(2^{-\frac{1}{2}}-3^{-\frac{1}{3}}\right), \quad \delta') \left(2^{-\frac{1}{2}}+3^{-\frac{1}{2}}+1\right)^2,$$

$$\varepsilon') \alpha^{0,8} \cdot \alpha^{1,4} \cdot \alpha^{-0,2}, \quad \sigma\tau') x^{\frac{3}{4}} : x^{-\frac{2}{3}}, \quad \zeta') x^{-\frac{2}{3}} : x^{\frac{4}{5}}, \quad \eta') \alpha^{4,2} : \alpha^{-0,8} \\ \theta') \alpha^{-1,4} : \alpha^{1,2}, \quad \iota') 8^{\frac{4}{5}} \cdot 4^{-\frac{1}{5}}.$$

$$330. \text{Όμοιώς τά: } \alpha') \left(\alpha^{-\frac{1}{2}}\right)^{\frac{1}{4}}, \quad \beta') \left(\alpha^{\frac{2}{3}}\right)^{-\frac{3}{4}}, \quad \gamma') \left(\alpha^{-\frac{5}{6}}\right)^{-\frac{4}{5}} \cdot \alpha^{-\frac{3}{4}}$$

$$\delta') 25^{\frac{3}{2}} \cdot 16^{-\frac{3}{4}}, \quad \varepsilon') 49^{-\frac{2}{2}} \cdot 9^{-\frac{5}{2}}, \quad \sigma\tau') 49^{-\frac{3}{2}} \cdot 5^{-\frac{4}{3}} : 256^{\frac{3}{4}} \cdot 256^{-\frac{1}{2}}, \\ \zeta') \frac{36^{-\frac{5}{2}} + 166^{-\frac{4}{2}}}{8^{-\frac{5}{3}} + 27^{-\frac{4}{3}}}, \quad \eta') \frac{125^{-\frac{2}{3}} + 49^{\frac{6}{2}}}{144^{-\frac{3}{2}} - 64^{\frac{2}{2}}}.$$

331. Νά τραποῦν αἱ κάτωθι παραστάσεις εἰς ίσοδυνάμους τῶν μέ ρητοὺς παρονομαστάς.

$$\alpha') \frac{x+\sqrt{\psi}}{x-\sqrt{\psi}}, \quad \beta') \frac{\alpha\sqrt{\beta} + \beta\sqrt{\alpha}}{\alpha + \sqrt{\beta}}, \quad \gamma') \frac{x\psi}{\sqrt{\psi^3 - \sqrt{x\psi^2}}}, \quad \delta') \frac{\sqrt{\alpha+\beta} + \sqrt{\alpha-\beta}}{\sqrt{\alpha+\beta} - \sqrt{\alpha-\beta}} \\ \varepsilon') \frac{4\sqrt{5}-20}{\frac{2}{3}\sqrt{10}-5\sqrt{\frac{1}{2}}}, \quad \sigma\tau') \frac{5-\sqrt{2}}{1+\sqrt{2}}, \quad \zeta') \frac{8\sqrt{12}-12\sqrt{6}}{4\sqrt{3}}, \quad \eta') \frac{6}{1+\sqrt{2}}$$

3. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΙΖΗΣ ΜΟΝΩΝΥΜΩΝ

**§ 151.** Γνωρίζομεν ὅτι, διὰ νὰ ὑψωθῇ γινόμενον παραγόντων εἰς δύναμιν τινα, ἀρκεῖ νὰ ὑψωθῇ ἔκαστος τῶν παραγόντων εἰς τὴν δύναμιν ταύτην καὶ νὰ πολλαπλασιασθοῦν τὰ ἐξαγόμενα. Κατὰ ταῦτα, ἐπειδὴ τὸ τετράγωνον μονωνύμου τινὸς εὑρίσκεται, ἀν διπλασιάσωμεν τοὺς ἐκθέτας τῶν παραγόντων αὐτοῦ, ἐπεται ὅτι :

Διὰ νὰ εὕρωμεν τὴν τετραγωνικὴν ρίζαν ἀκεραίου τινὸς μονωνύμου ἀρκεῖ νὰ διαιρέσωμεν τοὺς ἐκθέτας τῶν παραγόντων αὐτοῦ διὰ τοῦ 2.

$$\text{Οὔτως ἔχομεν } \sqrt{25\alpha^4\beta^2\gamma^6} = 25^{\frac{1}{2}} \cdot (\alpha^4)^{\frac{1}{2}} \cdot (\beta^2)^{\frac{1}{2}} \cdot (\gamma^6)^{\frac{1}{2}} = 5\alpha^2\beta\gamma^3. \\ \text{Όμοιώς } \sqrt{16\alpha^2\beta^4} = 4\alpha\beta^2$$

Καθ' ὅμοιον τρόπον ἔξαγεται καὶ ἡ τετραγωνικὴ ρίζα κλασματικοῦ μονωνύμου, ἐὰν ἔξαχθῇ ἡ ρίζα ἑκάστου τῶν δρων αὐτοῦ.

Οὕτω π.χ. ἔχομεν  $\sqrt{\frac{9\alpha^6\beta^2\gamma^4}{16\delta^2\epsilon^4}} = \frac{3\alpha^3\beta\gamma^2}{4\delta\epsilon^2}$

Ἐὰν παράγοντός τινος δὲν ἔξαγηται ἡ τετραγωνικὴ ρίζα ἀκριβῶς (δηλαδή, ἂν ὁ ἐκθέτης του δὲν διαιρῆται διὰ 2), ἀφήνομεν ἐπ' αὐτοῦ σημειωμένην τὴν πρᾶξιν ἣ ἐὰν εἴναι δυνατόν, ἀναλύομεν αὐτὸν εἰς παράγοντας, ὥστε νὰ ἔξαγηται ἡ ρίζα τουλάχιστον ἐνὸς

Οὕτω π.χ. ἔχομεν  $\sqrt{24\alpha^2\beta^2\gamma} = \sqrt{4 \cdot 6 \cdot \alpha^2\beta^2\gamma} = 2\alpha\beta\sqrt{6\beta\gamma}.$

### Α σκήσεις

332. Νὰ εύρεθῇ ἡ τετραγωνικὴ ρίζα τῶν ἔξης μονωνύμων :

$$\alpha') \quad 64\alpha^4\gamma^2\beta^8, \quad \beta') \quad \frac{4}{9}\alpha^2\beta^2\gamma, \quad \gamma') \quad \frac{3\alpha^3\beta^3\delta^5}{4\alpha^4}, \quad \delta') \quad \frac{32\alpha^2\beta^4\gamma^2}{45\delta^4\epsilon^6},$$

$$\epsilon') \quad \frac{125}{64}\alpha^3\beta^4\gamma^6, \quad \sigma') \quad \frac{9\alpha^2\gamma^4}{64\alpha^4\beta^2}, \quad \zeta') \quad \frac{3\alpha^2\beta^3\gamma\eta^6}{16\epsilon^3\delta^3\theta^8},$$

333. Νὰ εύρεθῃ ἡ κυβικὴ ρίζα τῶν ἔξης μονωνύμων :

$$\alpha') \quad 8\alpha^6\beta^9\gamma^9, \quad \beta') \quad -64\alpha^6\beta^3\gamma^9, \quad \gamma') \quad -\frac{8\alpha^3\beta^5\gamma^6}{27\delta^3\epsilon^2}, \quad \delta') \quad \frac{8\alpha^3\beta\gamma^6}{2^{-4}\epsilon^4}$$


### Β'. ΠΕΡΙ ΟΡΙΩΝ

**§ 152.** Όρισμός. α') Μέγεθος ἡ ποσότης λέγεται μεταβλητὴ μὲν, ἀν λαμβάνη διαφόρους τιμάς, σταθερὰ δέ, ἀν μένη ἀμετάβλητος, ἐνῷ ἄλλαι, μετὰ τῶν ὅποιών συνδέεται, μεταβάλλονται. Π. χ. ἡ ἀκτὶς ἐνὸς κύκλου, τὸ ἀθροισμα τῶν γωνιῶν τριγώνου τινὸς εἴναι σταθερὰ ποσότητες, ἐνῷ τὸ μῆκος τόξου κύκλου ἡ ἡ ἀξία ἐνὸς ἐμπορεύματος ἔξαρταται ἀντιστοίχως ἀπὸ τὴν ἀκτῖνα τοῦ κύκλου ἡ ἀπὸ τὴν τιμὴν μιᾶς μονάδος αὐτοῦ.

β') Λέγομεν ὅτι ποσότης τις μεταβλητὴ λαμβάνουσα ἀπειρον πλῆθος τιμῶν ἔχει ὄριον ἡ τείνει εἰς ποσότητά τινα σταθεράν ἐὰν αἱ τιμαὶ τῆς μεταβλητῆς ἀπό τινος καὶ ἐφ' ἔξης ἀπολύτως θεωρούμεναι, διαφέρουσιν ἑκάστη τῆς σταθερᾶς κατὰ ποσότητα, ὅσον θέλομεν μικράν.

Ἐὰν συμβαίνῃ τοῦτο, ἡ σταθερὰ αὕτη ποσότης λέγεται ὄριον τῆς μεταβλητῆς.

Παραδείγματα : 1ον. 'Υποθέτομεν ότι ἐν κινητὸν Μ, κινούμενον ἐπὶ τῆς εὐθείας ΑΒ (σχ. 15) ἀναχωρεῖ ἐκ τοῦ Α διευθυνόμενον πρὸς τὸ Β καὶ διαγράφει εἰς 1<sup>ο</sup> τὸ ἥμισυ τῆς ΑΒ, φθάνει δὲ εἰς τὸ σημεῖον Μ' κείμενον εἰς τὸ μέσον τῆς ΑΒ.



Σχ. 15

Κινούμενον δμοίως φθάνει μετὰ 1<sup>ο</sup> ἀκόμη εἰς τὸ Μ'' μέσον τῆς Μ'Β', μετὰ 1<sup>ο</sup> φθάνει εἰς τὸ μέσον Μ''' τῆς Μ''Β καὶ προχωρεῖ δμοίως. Εἶναι φανερὸν ότι τὸ κινητόν, προχωροῦν οὕτω πρὸς τὸ Β, πλησιάζει αὐτὸ διηνεκῶς, ἀλλ' οὐδέποτε φθάνει εἰς τὸ Β. 'Η ἀπόστασις τοῦ σημείου Α ἀπὸ τὸ κινούμενον σημεῖον εἶναι ποσότης μεταβλητή, τῆς ὁποίας ἡ τιμὴ αὐξάνεται διηνεκῶς καὶ πλησιάζει τὴν σταθερὰν ἀπόστασιν ΑΒ, ἔχει δηλαδὴ ὅριον τὴν ΑΒ. Τουναντίον ἡ ἀπόστασις τοῦ σημείου Β ἀπὸ τὸ κινούμενον σημεῖον εἶναι ἐπίσης μεταβλητὴ ποσότης, ἀλλ' αἱ τιμαὶ της ἐλαττοῦνται κατὰ τὴν κίνησιν καὶ πλησιάζουν διηνεκῶς τὸ 0, ἦτοι ἔχει ὅριον τὸ 0.

2ον. "Εστω ὁ δεκαδικὸς ἀριθμὸς 0,3333....., ὁ ὁποῖος δύναται νὰ γραφῇ καὶ οὕτω  $\frac{3}{10} + \frac{3}{100} + \frac{3}{1000} + \dots$

'Η τιμὴ ἑκάστου τῶν κλασμάτων τούτων μετὰ τὸ πρῶτον εἶναι τὸ  $\frac{1}{10}$  τοῦ προηγουμένου του. 'Επομένως, ὅταν θεωροῦμεν τὰ κλάσματα ταῦτα, δυνάμεθα προχωροῦντες ἀρκούντως νὰ εὔρωμεν ἐν κλάσμα, τὸ ὁποῖον εἶναι ὅσον θέλομεν μικρόν. "Ητοι αἱ τιμαὶ τῶν διαδοχικῶν τούτων κλασμάτων ἐλαττοῦνται καὶ ἔχουν ὅριον τὸ μηδὲν (θεωρούμεναι ὡς ἐν ἄπειρον πλῆθος τιμῶν).

Τὸ ἄθροισμα κλασμάτων τινῶν ἐκ τούτων εἶναι, ὡς γνωστὸν ἐκ τῆς Ἀριθμητικῆς, μικρότερον τοῦ  $\frac{3}{9} = \frac{1}{3}$  καὶ ὅσον περισσοτέρους ὅρους προσθέτομεν τόσον πλησιάζομεν πρὸς τὸ  $\frac{1}{3}$ .

Διὰ νὰ δείξωμεν ότι ποσότης τις μεταβλητὴ x (λαμβάνοντας ἄπειρον πλῆθος τιμῶν) ἔχει ὅριον ποσότητά τινα σταθερὰν αἱ ἀρκεῖ νὰ δείξωμεν ότι ἡ διαφορὰ μεταξὺ τῶν τιμῶν τῆς μεταβλητῆς καὶ τῆς σταθερᾶς ἀπό τινος αὐτῶν καὶ ἔξης :

α') Δύναται νὰ γίνῃ ἀπολύτως μικροτέρα οἶουδήποτε ἀριθμοῦ θετικοῦ δύσονδήποτε μικροῦ.

β') 'Η διαφορὰ αὐτὴ δὲν δύναται νὰ γίνῃ (ἀπολύτως) ἵση μὲ τὸ μηδέν.

Συμβολίζομεν τὸ ὅτι ὄριον τῆς  $x$  εἶναι τὸ  $\alpha$  ἐξῆς :

$$\text{ορ}x = \alpha \quad \eta \quad x \rightarrow \alpha.$$

### ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

§ 153. α') 'Εὰν τὸ ὄριον μεταβλητῆς τινος  $x$  εἶναι τὸ 0, τὸ  $\text{ορ}(\lambda x)$ , ὅπου  $\lambda$  εἶναι ποσότης σταθερὰ ( $\lambda \neq 0$ ), εἶναι ἵσον μὲ 0.

Διότι ἀφοῦ αἱ τιμαὶ τοῦ  $x$  δύνανται νὰ γίνουν ἀπό τινος καὶ ἐφ' ἔξῆς, ἀπολύτως θεωρούμεναι, δύσονδήποτε μικραὶ καὶ τὰ γινόμενα αὐτῶν ἐπὶ λ θὰ ἔχουν τὴν αὐτὴν ἴδιότητα.

β') Τὸ ὄριον τοῦ ἀθροίσματος πεπερασμένου ἀριθμοῦ μεταβλητῶν ποσοτήτων  $x, \psi, \omega, \dots$  ἰσοῦται μὲ τὸ ἀθροισμα τῶν ὁρίων τῶν προσθετέων.

\*Ἐστω ὅτι τὰ ὄρια τῶν  $x, \psi, \omega, \dots$  εἶναι ἀντιστοίχως,  $\alpha, \beta, \gamma, \dots$  Τότε δεικνύεται ὅτι τὸ ὄριον  $(x + \psi + \omega + \dots) = \text{ορ}x + \text{ορ}\psi + \text{ορ}\omega + \dots = \alpha + \beta + \gamma + \dots$ , ἀν τὰ  $x, \psi, \omega, \dots$  εἶναι πεπερασμένα τὸ πλῆθος.

γ') 'Εὰν ὄριον μεταβλητῆς τινος  $x$  εἶναι  $\alpha$ , τὸ ὄριον τοῦ  $\lambda x$ , ὅπου  $\lambda$  εἶναι σταθερά τις ( $\neq 0$ ) εἶναι ἵσον μὲ  $\lambda\alpha$ .

Διότι ἀφοῦ  $\text{ορ}x = \alpha$ , θὰ εἶναι  $\text{ορ}(x - \alpha) = 0$ , ἐπομένως τὸ  $\text{ορ}(\lambda(x - \alpha)) = 0$ , ἥτοι  $\text{ορ}(\lambda x - \lambda\alpha) = 0$ , δηλαδὴ  $\text{ορ}(\lambda x) = \lambda\alpha$ .

δ') 'Εὰν τὸ ὄριον μεταβλητῆς τινος  $x$  ἰσοῦται μὲ  $\alpha$ , τὸ ὄριον τοῦ  $\frac{x}{\lambda}$ , ὅπου  $\lambda$  εἶναι ποσότης σταθερὰ ( $\neq 0$ ), ἰσοῦται μὲ  $\frac{\alpha}{\lambda}$ .

Διότι εἶναι  $\frac{x}{\lambda} = \frac{1}{\lambda} \cdot x$  καὶ  $\text{ορ} \frac{x}{\lambda} = \text{ορ} \frac{1}{\lambda} \cdot x = \frac{1}{\lambda} \cdot \alpha = \frac{\alpha}{\lambda}$ .

ε') Τὸ ὄριον γινομένου δύο  $\eta$  περισσοτέρων (πεπερασμένων τὸ πλῆθος) μεταβλητῶν ποσοτήτων ἰσοῦται μὲ τὸ γινόμενον τῶν ὁρίων των.

\*Ἐστω ὅτι  $x$  καὶ  $\psi$  εἶναι μεταβληταὶ ποσότητες καὶ  $\alpha, \beta$  τὰ ὄριά των ἀντιστοίχως. Θὰ εἶναι τότε  $\text{ορ}(x \cdot \psi) = \text{ορ}x \cdot \text{ορ}\psi = \alpha \cdot \beta$ .

'Η ἴδιότης ἴσχυει καὶ διὰ περισσοτέρους παράγοντας, ἀλλὰ πεπερασμένους τὸ πλῆθος.

θεύη ή  $V\bar{\beta} = \frac{\delta-\beta-(\alpha-\gamma)^2}{\alpha-\gamma}$ . Τοῦτο σημαίνει ότι θὰ ἔπρεπε νὰ είναι  
ό ἀσύμμετρος ἀριθμὸς  $V\bar{\beta}$  ἵσος μὲν α σύμμετρον  $\frac{\delta-\beta-(\alpha-\gamma)^2}{\alpha-\gamma}$ , πρᾶγμα  
ἀδύνατον. Κατ' ἀνάγκην λοιπὸν πρέπει νὰ είναι  $\alpha=\gamma$ . Καὶ τότε  
διὰ νὰ είναι ἵσοι οἱ  $\alpha+V\bar{\beta}$ ,  $\gamma+V\bar{\delta}$  πρέπει νὰ είναι καὶ  $V\bar{\beta}=V\bar{\delta}$   
καὶ συνεπῶς  $\beta=\delta$ , ἀφοῦ  $\beta$ ,  $\delta$  θετικοί. Τοῦτο δὲ καὶ ἀρκεῖ προφανῶς.

### 'Α σ κ ή σ εις

334. Δείξατε ότι, ἀφοῦ δὲν ὑπάρχει ἀριθμὸς ἀκέραιος, τοῦ ὅποίου ἡ τρίτη  
δύναμις ἰσοῦται μὲν 7, δὲν ὑπάρχει τοιοῦτος οὔτε κλασματικὸς καὶ ότι ὑπάρχει  
ἀσύμμετρος. Εὗρετε τοῦ ἀριθμοῦ αὐτοῦ (κατὰ τὰ ἀνωτέρω) τὸ ἀκέραιον μέρος  
καὶ τὰ τρία πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία.

335. Δείξατε κατ' ἀναλογίαν ότι, ἂν ἀριθμὸς ἀκέραιος θετικὸς δὲν ἔχῃ ως  
νιοστὴν ρίζαν (ν ἀκέραιος καὶ θετικὸς) ἀκέραιον, δὲν ἔχει οὔτε κλασματικὸν ἀλλ'  
ἔχει ἀσύμμετρον ἀριθμόν.

336. Δείξατε ότι είναι ορ  $3,567999\dots=3,568$

Ποῖος ἐκ τῶν  $18,1557\dots$  καὶ  $18,145291\dots$  είναι μεγαλύτερος καὶ διατί;

337. Εὗρετε τὸ ἄθροισμα τῶν  $3\ 14124\dots\ 0\ 68456\dots\ 1,72354\dots$  καὶ  $12,53652$   
μὲν προσέγγιστιν δεκάκις χιλιοστοῦ.

338. Εὗρετε τὸ  $\sqrt{19}\pm\sqrt{3}$  μὲν προσέγγισιν χιλιοστοῦ.

339. Εὗρετε τὴν διαφορὰν  $3,542754\dots - 6,37245\dots$  μὲν προσέγγιστιν δεκάκις  
χιλιοστοῦ.

340. Εὗρετε τὴν διαφορὰν  $\sqrt{5}-\sqrt{2}$  καὶ τὴν  $\sqrt{2}-\sqrt{7}$  μὲν προσέγγισιν χιλιο-  
στοῦ.

### Δ'. ΠΕΡΙ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΓΑΔΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

§ 156. Καθὼς εἰδομεν, οἱ ἀρνητικοὶ ἀριθμοὶ δὲν ἔχουν ρίζαν  
ἀρτίας τάξεως. "Αι θέλωμεν νὰ ἔχουν καὶ οἱ ἀρνητικοὶ τετραγωνικὴν  
ρίζαν, παραδεχόμεθα νέον εἶδος ἀριθμῶν, οἱ δόποιοι νὰ γίνωνται  
ἀπὸ νέαν μονάδα, τῆς δόποιας τὸ τετράγωνον ὁρίζομεν ἵσον μὲ—1,  
Τοὺς νέους τούτους ἀριθμοὺς θὰ καλοῦμεν φανταστικούς, τοὺς δὲ  
μέχρι τοῦδε γνωστοὺς πρὸς διάκρισιν θὰ καλοῦμεν πραγματικούς.  
Τὴν τετραγωνικὴν ρίζαν τῆς ἀρνητικῆς μονάδος καλοῦμεν φαντα-  
στικὴν μονάδα καὶ τὴν παριστάνομεν μὲ τὸ σύμβολον\* i, τὴν δὲ

\* Ο συμβολισμὸς  $i=\sqrt{-1}$  ἔχρησιμοποιήθη τὸ πρῶτον ὑπὸ τοῦ Γερμανοῦ  
μαθηματικοῦ F. Gauss, ἀλλ' ὁ Euler (1777) εἰσήγαγεν ὄριστικῶς τὴν παρά-  
στασιν αὐτῆν.

ἀντίθετόν της μὲ  $-i$ . Οὔτως ἂν ἔχωμεν  $x^2 = -1$ , ὁρίζομεν τὸ  $x^2 = -1 = i^2$  καὶ  $x = \sqrt{-1} = i$ , εἶναι δὲ κατὰ σειρὰν  $i^2 = -1$ ,  $i^3 = i^2 \cdot i = -1 \cdot i = -i$ . Ἐκ τῆς  $i$  ἡ μέρους αὐτῆς δεχόμεθα ὅτι σχηματίζονται διὰ τῆς ἐπαναλήψεως ὡς προσθετέου οἱ φανταστικοὶ ἀριθμοί.

$$\text{Π. χ. } \text{ἔχομεν } \text{ὅτι } 2i = i + i, \quad 3i = i + i + i, \quad \frac{4}{9}i = \frac{1}{9}i + \frac{1}{9}i + \frac{1}{9}i \\ + \frac{1}{9}i.$$

Κατ' ἀνάλογον τρόπον δεχόμεθα ὅτι σχηματίζονται καὶ οἱ χαρακτηρίζόμενοι ὡς ἀρνητικοὶ φανταστικοὶ ἀριθμοὶ ἐκ τῆς  $-i$ , ὅπως καὶ οἱ ἀρνητικοὶ πραγματικοὶ ἐκ τῆς  $-1$ , ἡ ἐκ τῆς  $+1$ , ἐάν ἀλλάξωμεν τὸ σῆμα της. Π.χ. εἴναι  $-4i = (-i) + (-i) + (-i) + (-i)$ .

Οὔτω, κάθε ἀρνητικὸς ἀριθμὸς ἔχει δύο ρίζας, φανταστικὰς μὲ ἀντίθετα πρόσημα. Π.χ. ὁ  $-25$  ἔχει τετραγ. ρίζαν τοὺς  $5i$  καὶ  $-5i$  διότι  $(5i)^2 = 25i^2 = 25 \cdot (-1) = -25$ . Καὶ  $(-5i)^2 = (-5)^2 \cdot i^2 = 25 \cdot (-1) = -25$ .

Ἐκ τῶν δύο τετραγ. ρίζῶν ἀρνητικοῦ ἀριθμοῦ, ἡ ἔχουσα πρόσημον  $+$  ὀνομάζεται πρωτεύουσα τετραγωνικὴ ρίζα τοῦ ἀριθμοῦ καὶ συμβολίζεται μὲ τὸ οἰκεῖον ριζικὸν χωρὶς πρόσημον ἀριστερά, ἂν ὁ ἀριθμὸς δὲν εἴναι τέλειον τετράγωνον. Οὔτω ὁ συμβολισμὸς  $\sqrt{-2}$  σημαίνει: ἡ πρωτεύουσα τετραγ. ρίζα τοῦ  $-2$  καὶ ἔχομεν  $\sqrt{-2} = i\sqrt{2}$ .

Παρατηροῦμεν ὅτι αἱ τετραγωνικαὶ ρίζαι ἀρνητικῶν ἀριθμῶν εἴναι αἱ τετραγ. ρίζαι τοῦ ἀντιθέτου ἀριθμοῦ συνοδευόμεναι μὲ τὸ σύμβολον  $i$ .

**§ 157.** Καὶ διὰ τὸ νέον τοῦτο σύστημα τῶν ἀριθμῶν δεχόμεθα ὅτι ισχύουν οἱ θεμελιώδεις νόμοι τῶν πράξεων: ἥτοι ὁ νόμος τῆς ἀλλαγῆς τῆς θέσεως τῶν προσθετέων ἡ τῶν παραγόντων, ὁ νόμος τῆς ἀντικαταστάσεως τινῶν ἐξ αὐτῶν μὲ τὸ ἄθροισμά των καὶ ἀντιστρόφως καὶ ὁ ἐπιμεριστικὸς νόμος.

Τὸ ἀλγεβρικὸν ἄθροισμα πραγματικοῦ καὶ φανταστικοῦ ἀριθμοῦ καλεῖται μιγαδικὸς ἀριθμὸς ἢ ἀπλῶς μιγάς.

Οὔτως οἱ  $7+6i$ ,  $3-5i$ ,  $-8+5i$ ,  $-9-7i$  εἴναι μιγαδικοὶ ἀριθμοί.

**§ 158.** Ἡ γενικὴ μορφὴ τοῦ μιγαδικοῦ ἀριθμοῦ εἴναι  $\alpha + \beta i$  ἢ συμβολικῶς  $(\alpha, \beta)$ , ἥτοι ὑποτίθεται ὅτι εἴναι  $(\alpha, \beta) = \alpha + \beta i$ . "Αν

είναι  $\alpha=0$ , τότε  $(0,\beta)=\beta i$ , ήτοι φανταστικός άριθμός. Άν είναι  $\beta=0$ , τότε  $(\alpha, 0)=\alpha$ , ήτοι πραγματικός άριθμός. Ό  $(0,0)=0$ .

**§ 259.** Δύο μιγάδες, ἕκαστος τῶν ὅποιων λέγεται ἐνίστε καὶ ἀπλῶς φανταστικός, λέγονται συζυγεῖς ἐὰν διαφέρουν κατὰ τὸ πρόσημον τοῦ φανταστικοῦ μέρους αὐτῶν. Π. χ. οἱ  $7+3i$  καὶ  $7-3i$  λέγονται συζυγεῖς (μιγάδες), καθὼς καὶ οἱ  $-5i$  καὶ  $5i$ , καὶ ἐν γένει οἱ  $(\alpha, \beta)$  καὶ  $(\alpha, -\beta)$  είναι συζυγεῖς φανταστικοί άριθμοί, ὅπου  $\alpha$  καὶ  $\beta$  είναι πραγματικοί άριθμοί οἰοιδήποτε.

### 1. ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΓΑΔΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

**§ 160.** Ή πρόσθεσις καὶ ή ἀφαίρεσις τῶν φανταστικῶν καὶ μιγάδων άριθμῶν γίνεται καθώς καὶ τῶν πραγματικῶν καὶ δίδει σύθησισμα πραγματικὸν ή φανταστικὸν ή μιγαδικὸν άριθμὸν ή μηδέν.

Π.χ. είναι :  $8i+5i=13i$ ,  $(0,\beta)+(0,\delta)=0+\beta i+0+\delta i=0+(\beta+\delta)i=(\beta+\delta)i$ . Όμοιως  $-17i-6i=-23i$ ,  $5+3i+6-3i=11$ ,  $18i-5i=13i$ , ἐνῷ  $15i-15i=0$ ,  $(0,\beta)-(0,\beta)=\beta i-\beta i=0$ .

Ο πολλαπλασιασμὸς φανταστικῶν άριθμῶν δίδει γινόμενον πραγματικὸν άριθμόν, ἐὰν τὸ πλῆθος τῶν φανταστικῶν παραγόντων είναι ἄπτιον. Οὕτως ἔχομεν ὅτι :

$$(0,1) \cdot (0,1) = i \cdot i = i^2 = -1, \quad (-i) \cdot (-i) = (-i)^2 = i^2 = -1, \\ \text{η } (-0,1)^2 = (-i) \cdot (-i) = i^2 = -1, \quad (0,1)^3 = i^3 = i^2 \cdot i = -1 \cdot i = -i, \\ (0,1)^4 = i^4 = i^2 \cdot i^2 = (-1) \cdot (-1) = +1.$$

$$\text{Γενικῶς είναι } (0,1)^{4v} = i^{4v} = (i^4)^v = 1, \quad i^{4v+1} = i^{4v} \cdot i = 1 \cdot i = i, \\ (0,1)^{4v+2} = i^{4v+2} = i^{4v}i^2 = 1 \cdot (-1) = -1, \\ (0,1)^{4v+3} = i^{4v+3} = i^{4v}i^3 = 1 \cdot (-i) = -i.$$

Η διαίρεσις καὶ τῶν φανταστικῶν άριθμῶν θεωρεῖται, ὡς συνήθως, ἀντίστροφος πρᾶξις τοῦ πολλαπλασιασμοῦ, είναι δὲ

$$(0,\alpha) : (0,\beta) = \alpha i : \beta i = \frac{\alpha i}{\beta i} = \frac{\alpha}{\beta}, \\ (\alpha,0) : (0,\beta) = \alpha : \beta i = \frac{\alpha}{\beta i} = \frac{\alpha i}{\beta i^2} = -\frac{\alpha}{\beta} i.$$

**§ 161.** Η ἔφαρμογὴ τῶν τεσσάρων πράξεων ἐπὶ μιγάδων άριθμῶν δίδει ἔξαγόμενα ἐν γένει μιγάδας άριθμούς. Οὕτως ἔχομεν ὅτι :

$$(\alpha, \beta) + (\gamma, \delta) = (\alpha + \beta i) + (\gamma + \delta i) = \alpha + \gamma + (\beta + \delta)i = (\alpha + \gamma, \beta + \delta),$$

$$\begin{aligned}
 (\alpha, \beta) - (\gamma, \delta) &= (\alpha + \beta i) - (\gamma + \delta i) = \alpha - \gamma + (\beta - \delta)i = (\alpha - \gamma, \beta - \delta), \\
 (\alpha, \beta) \cdot (\gamma, \delta) &= (\alpha + \beta i) (\gamma + \delta i) = \alpha\gamma + \beta\gamma i + \alpha\delta i + \beta\delta i^2 = \\
 &= \alpha\gamma - \beta\delta + (\beta\gamma + \alpha\delta)i = (\alpha\gamma - \beta\delta, \beta\gamma + \alpha\delta). \\
 (\alpha, \beta) : (\gamma, \delta) &= (\alpha + \beta i) : (\gamma + \delta i) = \\
 &= \frac{\alpha + \beta i}{\gamma + \delta i} = \frac{(\alpha + \beta i)(\gamma - \delta i)}{(\gamma + \delta i)(\gamma - \delta i)} = \frac{\alpha\gamma + \beta\delta + (\beta\gamma - \alpha\delta)i}{\gamma^2 + \delta^2} = \left( \frac{\alpha\gamma + \beta\delta}{\gamma^2 + \delta^2}, \frac{\beta\gamma - \alpha\delta}{\gamma^2 + \delta^2} \right).
 \end{aligned}$$

## 2. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΓΑΔΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

**§ 162.** Τὸ ἀθροισμα δύο συζυγῶν μιγάδων ἀριθμῶν εἶναι ἀριθμὸς πραγματικός.

$$\text{Οὕτω τὸ ἀθροισμα: } (\alpha, \beta) + (\alpha, -\beta) = (\alpha + \beta i) + (\alpha - \beta i) = \\
 \alpha + \beta i + \alpha - \beta i = 2\alpha = (2\alpha, 0).$$

**§ 163.** Εὰν ζητῆται τὸ γινόμενον τῶν συζυγῶν  $(\alpha, \beta)$ ,  $(\alpha, -\beta)$ , ἢτοι τῶν  $\alpha + \beta i$  καὶ  $\alpha - \beta i$ , ἔχομεν  $(\alpha + \beta i) \cdot (\alpha - \beta i) = \alpha^2 - (\beta i)^2 = \alpha^2 + \beta^2 = (\alpha^2 + \beta^2, 0)$ . Ἡτοι :

Τὸ γινόμενον δύο συζυγῶν μιγάδων ἀριθμῶν εἶναι πραγματικὸς ἀριθμὸς καὶ ἰσοῦται μὲ τὸ ἀθροισμα τῶν τετραγώνων τῶν πραγματικῶν ἀριθμῶν τοῦ ἐνὸς τούτων.

Καλοῦμεν μέτρον μιγάδος ἡ φανταστικοῦ ἀριθμοῦ, ἔστω τοῦ  $(\alpha, \beta) = \alpha + \beta i$ , τὴν (θετικήν) τετραγωνικὴν ρίζαν τοῦ γινομένου τοῦ διθέντος καὶ τοῦ συζυγοῦς αὐτοῦ  $(\alpha, -\beta) = \alpha - \beta i$ . Κατὰ ταῦτα τὸ μέτρον τοῦ  $(\alpha, \beta) = \alpha + \beta i$  καὶ τοῦ  $(\alpha, -\beta) = \alpha - \beta i$  εἶναι τὸ  $\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}$ , τοῦ  $(0, \beta) = \beta i$  καὶ τοῦ  $(0, -\beta) = -\beta i$  εἶναι τὸ  $\sqrt{\beta^2} = |\beta|$ . Π.χ. τὸ μέτρον  $(4, -3) = 4 - 3i$  εἶναι τὸ  $\sqrt{4^2 + 3^2} = \sqrt{25} = 5$ , τοῦ  $(0, \pm 3) = \pm 3i = 0 \pm 3i$  τὸ  $\sqrt{3^2} = 3$ .

**§ 164.** Εὰν δύο μιγάδες ἀριθμοὶ  $(\alpha, \beta) = \alpha + \beta i$  καὶ  $(\gamma, \delta) = \gamma + \delta i$  εἶναι μεταξύ των ἵσοι, θὰ ἔχωμεν  $\alpha + \beta i = \gamma + \delta i$ .

Ἐκ τῆς ἴσοτητος ταύτης προκύπτει  $(\alpha - \gamma) + (\beta - \delta)i = 0$   
 ἡ  $(\alpha - \gamma) = -(\beta - \delta)i = (\delta - \beta)i$ .

Ψυοῦντες εἰς τὸ τετράγωνον τὰ δύο ἵσα  $\alpha - \gamma$  καὶ  $(\delta - \beta)i$ , εύρισκομεν  $(\alpha - \gamma)^2 = (\delta - \beta)^2 \cdot i^2 = (\delta - \beta)^2 \cdot (-1) = -(\delta - \beta)^2$ .

Ἄλλ' ἡ ἴσοτης αὐτὴ ἀληθεύει μόνον, ὅταν εἶναι  $\alpha = \gamma$  καὶ  $\beta = \delta$ , ὅποτε καὶ τὰ δύο μέλη εἶναι ἵσα μὲ 0, ἐνῷ εἰς πᾶσαν ἄλλην περιπτωσιν θὰ ἔχωμεν ὅτι θετικός τις ἀριθμὸς ἴσουται μὲ ἀρνητικόν, τὸ ὅποιον εἶναι ἀδύνατον. Ἐκ τούτων συνάγομεν ὅτι :


Ἐὰν δύο μιγάδες ἀριθμοὶ εἶναι ἵσταται τῶν θὰ εἶναι χωριστὰ ἵσταται πραγματικὰ καὶ τὰ φανταστικὰ μέρη αὐτῶν καὶ ὅτι μία ἰσότης μεταξὺ δύο μιγάδων ἀριθμῶν ἄγει εἰς δύο ἰσότητας μὲ πραγματικούς ἀριθμούς.

### 3. ΣΗΜΕΙΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΜΙΓΑΔΑΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

**§ 165.** Καθὼς οἱ πραγματικοὶ ἀριθμοί, ἀν θέλωμεν, ὁρίζουν σημεῖα καὶ παριστάνονται ὑπὸ αὐτῶν, οὕτω καὶ οἱ φανταστικοὶ καὶ οἱ μιγάδες ἀριθμοὶ δύνανται νὰ ὁρίζουν σημεῖα καὶ παριστάνονται ὑπὸ αὐτῶν ὡς ἔξῆς :

Λαμβάνομεν τοὺς ἄξονας τῶν συντεταγμένων καὶ ὁρίζομεν ὅτι τὸ ἄκρον τμήματος τοῦ ἄξονος τῶν ψ μήκους μιᾶς μονάδος ἀρχομένου ἀπὸ τοῦ Ο καὶ πρὸς τὴν φορὰν Οψ παριστάνει τὴν φανταστικὴν μονάδα i. Κατ' ἀνάλογον τρόπον ὁρίζομεν τὰ σημεῖα, τὰ ὅποια παριστάνουν τοὺς ἀριθμοὺς  $2i$ ,  $3i \dots \beta i \dots (\beta > 0)$ , ἀν λάβωμεν ἀπὸ τοῦ Ο τμῆμα ἵστον μὲ 2, 3, ..., β, ... μονάδας μήκους πρὸς τὴν φορὰν Οψ, τὰ ὅποια λέγομεν ὅτι ὁρίζονται ὑπὸ τῶν φανταστικῶν τούτων ἀριθμῶν. Ἐὰν λάβωμεν τὰ ἀντίστοιχα σημεῖα πρὸς τὴν φορὰν Οψ', θὰ λέγωμεν ὅτι αὐτὰ ὁρίζονται ὑπὸ τῶν ἀριθμῶν  $-i$ ,  $-2i$ ,  $-3i, \dots, -\beta i, \dots$  καὶ παριστάνουν τοὺς ἀριθμοὺς τούτους (σχ. 15α).

Διὰ νὰ εὔρωμεν τὸ σημεῖον, τὸ ὁριζόμενον ὑπὸ μιγάδος τινὸς ἀριθμοῦ, π.χ. ὑπὸ τοῦ  $(3,4) = 3+4i$ , εύρισκομεν τὸ σημεῖον  $A_3$  ἐπὶ τῆς x'x τὸ παριστάνον τὸν ἀριθμὸν 3, τὸ  $B_4$  παριστάνον τὸν  $4i$  ἐπὶ τῆς ψ'ψ καὶ ἀκολούθως σχηματίζομεν τὸ ὀρθογώνιον  $OA_3GB_4$ , τούτου δὲ ἡ τετάρτη κορυφὴ Γ εἶναι τὸ ζητούμενον σημεῖον, τὸ ὅποιον παριστάνει τὸν ἀριθμὸν  $(3,4) = 3+4i$ . Καθὼς βλέπομεν, τὸ σημεῖον Γ ἔχει τετμημένην 3 καὶ τεταγμένην 4. Ἐν γένει, θὰ λέγωμεν ὅτι ὡς μιγάδας ἀριθμὸς  $(\alpha, \beta) = \alpha + \beta i$  παριστάνεται ὑπὸ τοῦ σημείου ἢ ὅτι ὁρίζει τὸ σημεῖον, τὸ ὅποιον



έχει τετμημένην α καὶ τεταγμένην β ὡς πρὸς ἀξονας χ'χ καὶ ψ'ψ.

**Σημείωσις.** Καλούμεν **ὅρισμα** τοῦ μιγάδος π.χ.  $(3,4)=3+4i$  τὴν γωνίαν, τὴν ὄποιαν σχηματίζει ἡ εὐθεῖα  $Ox$  μὲ τὸ εὐθύγραμμον τμῆμα  $OG$ , τὸ ὄποιον συνδέει τὴν ἀρχὴν τῶν ἀξόνων καὶ τὸ σημεῖον τὸ παριστάνον τὸν ἀριθμὸν  $(3,4)=3+4i$ . Κατ' ἀνάλογον τρόπον τὸ ὅρισμα τοῦ  $(\alpha,\beta)=\alpha+\beta i$  εἶναι ἡ γωνία, τὴν ὄποιαν σχηματίζει ἡ  $Ox$  μὲ τὸ εὐθύγραμμον τμῆμα  $OM$ , ἀν τὸ  $M$  παριστάνη τὸν  $(\alpha,\beta)=\alpha+\beta i$ .

### Α σ κή σ εις

341. Παραστήσατε μὲ σημεῖα τοὺς μιγάδας :

$$\alpha') 2-0,74i \quad \beta') 5+3i \quad \gamma') 6-3i, \quad \delta') -0,75-0,62i \quad \epsilon') (2,4)=2+4i \\ \sigma') (3,-4), \quad \zeta') (2,-0,64), \quad \eta') (5,2), \quad \theta') (-6,-3).$$

342. Εύρετε τὰ ἀθροίσματα, διαφοράς, γινόμενα, πηλίκα τῶν ἀνωτέρω αὐτῶν ἀριθμῶν ἀνὰ δύο.

343. Νὰ εύρεθοιν τὰ ἔξαγόμενα τῶν κάτωθι πράξεων καὶ νὰ παρασταθοῦν αὐτὰ διὰ σημείων :

$$\alpha') (5,3) \cdot (7,3), \quad \beta') (2,2)^2, \quad \gamma') (2,-7) \cdot (9,-2), \quad \delta') (6,7) \cdot (6,-7).$$

344. ‘Ομοιώς τῶν κάτωθι :

$$\alpha') (11,8) \cdot (11,-8), \quad \beta') (14,15) \cdot (14,-15), \quad \gamma') (3+i\sqrt{2}) \cdot (4-3i\sqrt{2}), \\ \delta') (8-7i\sqrt{3}) : (5+4i\sqrt{3}).$$

### Περίληψις περιεχομένων Κεφαλαίου V.

**V** Σύμβολον θετικῆς τετραγωνικῆς ρίζης.

**‘Ορισμὸς νιοστῆς ρίζης σχετικοῦ ἀριθμοῦ.**

‘Ιδιότητες τῶν ριζῶν. 1ον. ‘Αν  $\alpha^{\mu} = \beta^{\mu}$ , μ ἀκέραιος καὶ θετικὸς καὶ  $\alpha \beta > 0$ , τότε  $\alpha = \beta$ . 2ον. Πᾶς ἀριθμὸς  $|\alpha|$  ἔχει δύο ρίζας ἀρτίας τάξεως ( ἀντιθέτους ). 3ον. Πᾶς ἀριθμὸς  $-|\alpha|$  ἔχει μίαν ρίζαν περιττῆς τάξεως, οὐδεμίαν δὲ ἀρτίας.

Δυνάμεθα νὰ πολλαπλασιάσωμεν τὸν δείκτην τῆς ρίζης καὶ τὸν ἐκθέτην τῆς ύπορριζου ποσότητος τῆς μὲ τὸν αὐτὸν ἀριθμόν, ὅταν ἡ ύπορριζος ποσότης εἶναι θετική. ‘Εξαγωγὴ ρίζης ἀλλης ρίζης ποσότητος τίνος θετικῆς. Τροπὴ ριζῶν μὲ διαφόρους δείκτας εἰς ἄλλας ἵσας μὲ τὸν αὐτὸν δείκτην. Γινόμενον ἡ πηλίκον ριζῶν, ὅταν τὰ ύπορριζα εἶναι θετικά.

‘Ορισμὸς δυνάμεως μὲ κλασματικὸν ἐκθέτην.

Περὶ δρίων. Πότε λέγομεν  $\sigma\alpha x=0$  ή  $\sigma\alpha x=\alpha(\neq 0)$ .

Ιδιότητες τῶν δρίων: ἂν  $\sigma\alpha x=0$ , τότε  $\sigma\alpha(\lambda x)=0$ ,  $\lambda=\sigma\alpha$  οὐταθερόν, ἂν  $\sigma\alpha x=\alpha$ , τότε  $\sigma\alpha(\lambda x)=\lambda\alpha$ .  $\sigma\alpha(x+\psi+\omega+\dots+\beta\phi)=\sigma\alpha x+\sigma\alpha\psi+\sigma\alpha\omega+\dots+\sigma\alpha\phi$ ,  $\sigma\alpha(x\cdot\psi)=\sigma\alpha x\cdot\sigma\alpha\psi$ , δριον ( $x:\psi$ ) =  $\sigma\alpha x : \sigma\alpha\psi$ , ( $\text{ἄν } \sigma\alpha\psi \neq 0$ ),  $\sigma\alpha(x^\nu)=(\sigma\alpha x)^\nu$ ,  $(\sigma\alpha\sqrt[\nu]{x})=\sqrt[\nu]{\sigma\alpha x}$ .

‘Ορισμὸς ἀσυμμέτρου ἀριθμοῦ (παριστανομένου ὑπὸ μορφὴν δεκαδικοῦ μὲ ἄπειρα τὸ πλῆθος δεκαδικὰ ψηφία μὴ περιοδικά).

‘Ορισμὸς φανταστικοῦ ἀριθμοῦ.

$$i^2 = -1, \quad i^3 = -i, \quad i^4 = 1.$$

‘Ορισμὸς μιγαδικοῦ ἀριθμοῦ.  $\alpha + \beta i = (\alpha, \beta)$ .

‘Ορισμὸς συζυγῶν φανταστικῶν ἀριθμῶν  $(\alpha, \beta)$  καὶ  $(\alpha, -\beta)$ .

Πράξεις μὲ μιγάδας ἀριθμούς:

$$1\text{ον } (\alpha, \beta) + (\gamma, \delta) = (\alpha + \gamma, \beta + \delta) \quad 2\text{ον. } (\alpha, \beta) - (\gamma, \delta) = (\alpha - \gamma, \beta - \delta).$$

$$3\text{ον } (\alpha, \beta) \cdot (\gamma, \delta) = (\alpha\gamma - \beta\delta, \beta\gamma + \alpha\delta). \quad 4\text{ον } (\alpha, \beta) : (\gamma, \delta) =$$

$$\left( \frac{\alpha\gamma + \beta\delta}{\gamma^2 + \delta^2}, \frac{\beta\gamma - \alpha\delta}{\gamma^2 + \delta^2} \right).$$

Ιδιότητες μιγάδων ἀριθμῶν:

$$1\text{ον } \text{ἄν } (\alpha, \beta) = 0, \text{ τότε } \alpha = 0, \beta = 0. \quad 2\text{ον } (\alpha, \beta) \cdot (\alpha, -\beta) = \alpha^2 + \beta^2.$$

‘Ορισμὸς μέτρου μιγάδος. Μέτρον τοῦ  $(\alpha, \beta)$  εἶναι τὸ  $\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}$ . Γεωμετρικὴ παράστασις μιγάδος  $(\alpha, \beta)$  διὰ σημείου τοῦ ἐπιπέδου τῶν ἀξόνων  $xOy$  μὲ συντεταγμένας  $\alpha, \beta$ .

‘Ορισμὸς δρίσματος μιγάδος ἀριθμοῦ.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VI

### Α'. ΠΕΡΙ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΒΑΘΜΟΥ \*

**§ 166.** Ἡ γενικὴ μορφὴ τῆς ἔξισώσεως δευτέρου βαθμοῦ μὲνα ἀγνωστὸν τὸν  $x$  εἶναι ἡ  $\alpha x^2 + \beta x + \gamma = 0$  (1), ὅπου τὰ  $\alpha, \beta, \gamma$  παριστάνουν ἀριθμοὺς πραγματικούς ἢ παραστάσεις γνωστάς, καλοῦνται δὲ συντελεσταί, τὸ δὲ  $\gamma$  καὶ σταθερὸς ὅρος τῆς (1) ἢ τοῦ τριῶνūμου  $\alpha x^2 + \beta x + \gamma$ . Ὅποτιθεται ὅτι εἶναι  $\alpha \neq 0$ , διότι ἂν  $\alpha = 0$ , τότε ἡ (1) θὰ ἥτο α' βαθμοῦ.

Ἡ (1) λέγεται πλήρης, ἐὰν οἱ  $\alpha, \beta, \gamma$  εἶναι διάφοροι τοῦ μηδενὸς [ συμβολίζομεν δὲ τοῦτο οὕτως :  $(\alpha, \beta, \gamma) \neq (0, 0, 0)$  ]. Ἀν εἶναι  $\beta = 0$ , ἡ (1) ἡ τὰ ἔχη τὴν μορφὴν  $\alpha x^2 + \gamma = 0$ , ἂν  $\gamma = 0$ , γίνεται  $\alpha x^2 + \beta x = 0$ , ἂν δὲ εἶναι  $\beta, \gamma = 0$ , ἡ (1) θὰ εἶναι τῆς μορφῆς  $\alpha x^2 = 0$ .

Ἐκάστη τῶν ἀνωτέρω τριῶν τελευταίων μορφῶν λέγεται ἔξισώσις μὴ πλήρης.

Αἱ ρίζαι ἔξισώσεως λέγονται σύμμετροι ἢ ἀσύμμετροι, ἂν αὗται εἶναι ἀριθμοὶ σύμμετροι ἢ ἀσύμμετροι. Αἱ ρίζαι ἔξισώσεως λέγονται πραγματικαὶ ἢ φανταστικαὶ (ἢ μιγαδικαί), ἂν εἶναι ἀριθμοὶ πραγματικοὶ ἢ φανταστικοὶ (ἢ μιγάδες).

#### 1. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ

**§ 167.** Ἐὰν ἔξισώσεως ὑψώσωμεν τὰ μέλη εἰς τὸ τετράγωνον, προκύπτει ἔξισωσις ἔχουσα τὰς ρίζας τῆς διθείσης καὶ τῆς προκυπτούσης ἐκ τῆς διθείσης, ἂν ἀλλάξωμεν τὸ σημεῖον τοῦ ἐνὸς τῶν δύο μελῶν αὐτῆς.

Ἐστω ἡ ἔξισωσις  $A=B$  (1), ὅπου τὰ  $A$  καὶ  $B$  παριστάνουν τὰ δύο μέλη αὐτῆς. Ἐὰν ταύτης ὑψώσωμεν τὰ μέλη εἰς τὸ τετράγωνον, προκύπτει ἡ ἔξισωσις  $A^2=B^2$  (2).

\* Τὰς ἔξισώσεις δευτέρου βαθμοῦ μὲνα ἀγνωστὸν ἀνέπτυξε τὸ πρῶτον ὁ Ἑλλην μαθηματικὸς Διόφαντος.

Θὰ δείξωμεν ὅτι αὗτη ἔχει τὰς ρίζας τῆς  $A=B$  καὶ τῆς  $A=-B$ .

Πράγματι πᾶσαι αἱ ρίζαι τῆς (1) εἶναι ρίζαι καὶ τῆς (2). Διότι, ἀν εἰς τὴν (1) θέσωμεν ἀντὶ τῶν ἀγνώστων τὰς ρίζας αὐτῆς, θὰ ἔχωμεν ὅτι ἡ οὕτω προκύπτουσα τιμὴ τοῦ  $A$  εἶναι ἵση μὲ τὴν διοίωση προκύπτουσαν τιμὴν τοῦ  $B$ . Ἀρα καὶ (ἡ τιμὴ τοῦ  $A$ )<sup>2</sup> = (μὲ τὴν τοῦ  $B$ )<sup>2</sup>. Παρατηροῦμεν τώρα ὅτι ἡ (2) εἶναι προφανῶς ισοδύναμος μὲ τὴν  $A^2-B^2=0$ , ἡ δόποια γράφεται καὶ οὕτως  $(A-B)(A+B)=0$ . Ἰναὶ αὗτη ἐπαληθεύηται, πρέπει καὶ ἀρκεῖ εἰς τῶν παραγόντων  $A-B$  ἢ  $A+B$  νὰ εἶναι ἴσος μὲ 0. Ἐάν μὲν εἶναι  $A-B=0$ , ἐπαληθεύεται ἡ (1), ἀν δὲ εἶναι  $A+B=0$ , ἐπαληθεύεται ἡ  $A=-B$ . Ἀρα ἡ  $A^2=B^2$  ἔχει τὰς ρίζας τῆς  $A=B$  καὶ τῆς  $A=-B$ .

## 2. ΛΥΣΙΣ ΤΗΣ ΕΞΙΣΩΣΕΩΣ $\alpha x^2+\gamma=0$

**§ 168.** Ἔστω πρὸς λύσιν ἡ ἔξισώσις  $5x^2-48=2x^2$  (1)

Ἐκ ταύτης εύρισκομεν εὐκόλως τὴν ισοδύναμόν της  $3x^2=48$ , ἡ τὴν  $x^2=16$ . Αὕτη προκύπτει ἐκ τῆς  $x=4$ , ἀν ὑψώσωμεν τὰ μέλη της εἰς τὸ τετράγωνον. Ἀρα ἡ  $x^2=16$  ἔχει τὰς ρίζας  $x=4$  καὶ τῆς  $x=-4$ . Δηλαδὴ αἱ ρίζαι τῆς (1) εἶναι αἱ 4 καὶ -4.

Ἐν γένει πρὸς λύσιν τῆς ἔξισώσεως  $\alpha x^2+\gamma=0$  (ἐνῷ εἶναι  $\alpha \neq 0$ ) ἔχομεν τὴν ισοδύναμόν της  $\alpha x^2=-\gamma$  ἡ τὴν  $x^2=-\frac{\gamma}{\alpha}$ . Ἐπειδὴ αὕτη προκύπτει ἀπὸ τὴν  $x=\sqrt{-\frac{\gamma}{\alpha}}$ , ἀν τὰ μέλη της ὑψώσωμεν εἰς τὸ τετράγωνον, αἱ ρίζαι ταύτης, ἄρα καὶ τῆς  $\alpha x^2+\gamma=0$ , εἶναι αἱ  $x=\pm\sqrt{-\frac{\gamma}{\alpha}}$ .

Ἐάν εἶναι  $-\frac{\gamma}{\alpha} > 0$ , αἱ ρίζαι θὰ εἶναι πραγματικαί, ἐνῷ ἀν  $-\frac{\gamma}{\alpha} < 0$ , θὰ εἶναι φανταστικαὶ συζυγεῖς.

Δηλαδὴ ἀν παραστήσωμεν μὲ  $\rho_1$ ,  $\rho_2$  τὰς ρίζας θὰ εἶναι

$$\rho_1=\sqrt{-\frac{\gamma}{\alpha}}, \quad \rho_2=-\sqrt{-\frac{\gamma}{\alpha}} \quad \text{εἰς τὴν } \alpha' \text{ περίπτωσιν, εἰς δὲ τὴν } \beta'$$

$$x=\pm\sqrt{-\frac{\gamma}{\alpha}}=\pm\sqrt{(-1)\frac{\gamma}{\alpha}}=\pm\sqrt{i^2\frac{\gamma}{\alpha}},$$

$$\text{ητοι } \rho_1=i\sqrt{\frac{\gamma}{\alpha}}, \quad \rho_2=-i\sqrt{\frac{\gamma}{\alpha}}.$$

\*Έστω π.χ. ή έξισωσις  $5x^2 + 25 = 0$ . Είναι  $\alpha = 5$ ,  $\gamma = 25$  και  
 $x = \pm\sqrt{-5}$  δηλ.  $x = \pm i\sqrt{5}$ .

*Παρατήρησις.* Η έξισωσις  $\alpha x^2 = 0$ , όπου  $\alpha \neq 0$ , προφανῶς εἶχει  
 ρίζαν τὴν  $x=0$ .

### \*Α σ κ ἡ σ ε ι ζ

345. Νὰ λυθοῦν και ἐπαληθευθοῦν αἱ ἔξισώσεις :

$$\alpha') 4x^2 - 3 = x^2 + 6, \quad \beta') 9x^2 - 0,2 = 3x^2 + 15, \quad \gamma') 9x : 4 + (x-9) : x = 1.$$

347. \*Ομοίως αἱ :

$$\alpha') \frac{x^2 - \alpha^2}{5} - \frac{x^2 - \beta^2}{2} = \frac{1}{3}, \quad \beta') (x+7)(x-7) = 32, \quad \gamma') 7(2x+5)(2x-5) = 44.$$

$$\delta') 8 \left( 3x + \frac{1}{2} \right) \left( 3x - \frac{1}{2} \right) = 946, \quad \varepsilon') x^2 - 12 - 2\sqrt{11} = 0.$$

346. \*Ομοίως αἱ :

$$\alpha') \left( \frac{2x}{3} \right)^2 - \left( \frac{3x}{5} \right)^2 = 171, \quad \beta') (7+x)(9-x) + (7-x)(9+x) = 76,$$

$$\gamma') \frac{1+x^2}{1-x^2} - \frac{1}{1-x^4} = \frac{1-x^2}{1+x^2}.$$

### 3. ΛΥΣΙΣ ΤΗΣ ΕΞΙΣΩΣΕΩΣ $\alpha x^2 + \beta x = 0$

§ 169. \*Έστω πρὸς λύσιν ή έξισωσις  $3x^2 + 5x = 0$  (1)

Γράφομεν αὐτὴν οὕτω:  $x(3x+5)=0$ . Τὸ γινόμενον  $x(3x+5)$  γίνεται 0, δταν ὁ εἰς τῶν παραγόντων αὐτοῦ εἴναι ίσος μὲ 0. Δηλαδή, δταν εἴναι  $x=0$  και δταν  $3x+5=0$ .

\*Ἐκ ταύτης εύρισκομεν  $x = -\frac{5}{3}$ . \*Ἐπομένως αἱ ρίζαι τῆς (1) είναι 0 και  $-\frac{5}{3}$ .

\*Ἐν γένει, ἔστω ή μὴ πλήρης έξισωσις  $\alpha x^2 + \beta x = 0$  (ἐνῷ είναι  $\alpha \neq 0$ ). Γράφομεν αὐτὴν οὕτω:  $x(\alpha x + \beta) = 0$ , ἐκ τῆς δόποιας προκύπτει δτι αἱ ρίζαι τῆς διοθείσης είναι αἱ 0 και  $-\frac{\beta}{\alpha}$ .

### \*Α σ κ ἡ σ ε ι ζ

348. Νὰ λυθοῦν και ἐπαληθευθοῦν αἱ ἔξισώσεις: α')  $6x^2 - 8x + 7x^2 = 12x - 8x$ .

$$\beta') \frac{3}{4}x^2 = \frac{7x}{3} - \frac{x}{3}$$

$$\delta') \frac{x}{\alpha^2 - \beta^2} - \frac{x}{\alpha + \beta} = \frac{x^2 - x}{\alpha - \beta},$$

$$349. \text{ Όμοιως αι: } \alpha') 1,6x^2 - 0,8x + 1,7x^2 = 1,2x - 8x, \quad \beta') 2,2x^2 - 7x = 1,4x.$$

$$\gamma') \frac{x^2}{\alpha} + \frac{x}{\alpha} = \frac{x^2 + \alpha x}{\alpha \beta},$$

$$\varepsilon') \frac{(\alpha - x)^4 - (x - \beta)^4}{(\alpha - x)^2 - (x - \beta)^2} = \frac{\alpha^4 - \beta^4}{\alpha^2 - \beta^2}.$$

#### 4. ΛΥΣΙΣ ΤΗΣ ΕΞΙΣΩΣΕΩΣ $\alpha x^2 - \beta x + \gamma = 0$

**§ 170.** Διὰ νὰ λύσωμεν τὴν ἔξισωσιν  $\alpha x^2 + \beta x + \gamma = 0$  (1) ( $\alpha \neq 0$ ), θεωροῦμεν τὴν ἰσοδύναμόν της  $\alpha x^2 + \beta x = -\gamma$ .

Προσπαθοῦμεν τώρα νὰ καταστήσωμεν τέλειον τετράγωνον τὸ πρῶτον μέλος ταύτης. Πολλαπλασιάζομεν τὰ μέλη της ἐπὶ  $4\alpha$  καὶ προσθέτομεν εἰς αὐτὰ τὸ  $\beta^2$ , δῆτα εύρισκομεν τὴν  $4\alpha^2x^2 + 4\alpha\beta x + \beta^2 - \beta^2 - 4\gamma$ , ἢ ὅποια γράφεται καὶ οὕτω:  $(2\alpha x + \beta)^2 = \beta^2 - 4\gamma$ .

Αὕτη εἶναι ἰσοδύναμος μὲ τὴν (1), προκύπτει δὲ ἀπὸ τὴν  $2\alpha x + \beta = \sqrt{\beta^2 - 4\gamma}$ , ἀν ύψωσωμεν τὰ μέλη της εἰς τὸ τετράγωνον. ἄρα ἔχει τὰς ρίζας τῶν  $2\alpha x + \beta = \pm \sqrt{\beta^2 - 4\gamma}$ .

Ἐκ τούτων εύρισκομεν  $x = \frac{-\beta \pm \sqrt{\beta^2 - 4\gamma}}{2\alpha}$ . Ἡτοι, ἀν καλέσωμεν  $\rho_1$  καὶ  $\rho_2$  τὰς ρίζας τῆς (1), θὰ ἔχωμεν

$$\rho_1 = \frac{-\beta + \sqrt{\beta^2 - 4\gamma}}{2\alpha}, \quad \rho_2 = \frac{-\beta - \sqrt{\beta^2 - 4\gamma}}{2\alpha}.$$

Ἐφαρμόζοντες τοὺς τύπους τούτους εύρισκομεν τὰς ρίζας οἰασδήποτε μορφῆς ἔξισώσεως τοῦ β' βαθμοῦ.

Ἐστω πρὸς λύσιν ἡ ἔξισωσις  $3x^2 - 5x + 2 = 0$ .

Εἴναι τὸ  $\alpha = 3$ , τὸ  $\beta = -5$  καὶ τὸ  $\gamma = 2$ . Ἐπομένως εύρισκομεν  $\rho_1 = \frac{5 + \sqrt{25 - 24}}{6}, \quad \rho_2 = \frac{5 - \sqrt{25 - 24}}{6}$ . Ἡτοι  $\rho_1 = 1$  καὶ  $\rho_2 = \frac{2}{3}$ .

Ἐστω πρὸς λύσιν ἡ ἔξισωσις  $4x^2 + 25 = 0$ .

Ἐχομεν  $\alpha = 4$ ,  $\beta = 0$ ,  $\gamma = 25$ . Ἐπομένως εύρισκομεν

$$\rho_1 = \frac{\sqrt{-4 \cdot 4 \cdot 25}}{2 \cdot 4}, \quad \rho_2 = \frac{-\sqrt{-4 \cdot 4 \cdot 25}}{2 \cdot 4} \quad \text{ἢ} \quad \rho_1 = \frac{4 \cdot 5 \cdot i}{2 \cdot 4} = \frac{5}{2}i, \quad \rho_2 = -\frac{5}{2}i.$$

#### \*Α σ κ ή σ εις

Ο μὰς πρώτη. 350. Λύσατε καὶ ἐπαληθεύσατε τὰς ἔξισώσεις:

$$\alpha') 3x^2 - 3x = 8, \quad \beta') 3x^2 - \frac{2}{3}x = 25, \quad \gamma') x^2 - \frac{3}{4}x = 3x + 1, \quad \delta') x^2 - x - 2 = 0.$$

351. Όμοιως τάς : α')  $x^2 - 12x - 1 + 27 = 0$ , β')  $9x^2 - 21x - 1 + 12 = 0$ ,  
γ')  $(x-1)(x-2) = 0$ , δ')  $x^2 = \sqrt{3}(2x - \sqrt{3})$ , ε')  $\sqrt{3}x^2 + \sqrt{17}x + \sqrt{5} = 0$ ,  
στ')  $(x-1)^2 - (3x+8)^2 = (2x+5)^2$ , ζ')  $(6x-1)^2 + (3x+4)^2 - (5x-2)(5x+2) = 53$ ,  
η')  $\left(\frac{1}{x}\right)^2 + \left(\frac{1}{x}\right) \cdot \left(\frac{1}{x-1}\right) - \left(\frac{1}{x-1}\right)^2 = 0$ , θ')  $\frac{x(2x+8)}{2} - \left(\frac{x}{2}\right)^2 = 320$ ,  
ι')  $x + \frac{1}{x} = 2(1 + \sqrt{5})$ .

Όμας δευτέρα. 352. Λύσατε και ἐπαληθεύσατε τάς ἔξισώσεις :

α')  $x^2 + 9\alpha x - 10\alpha^2 = 0$ , β')  $x^2 - 2\alpha x - 3\alpha^2 = 0$ , γ')  $x^2 = 5\alpha(10\alpha + x)$ ,  
δ')  $x(x+\alpha) = \alpha^2\beta(\beta-1)$ , ε')  $x^2 - 2(\alpha+8)x + 32\alpha = 0$ , στ')  $x^2 - 2(\alpha+\beta)x + 4\alpha\beta = 0$ ,  
ζ')  $x + \frac{1}{x} = \alpha + \beta + 1$ , η')  $\frac{(2x-\beta)^2}{2x-\alpha+\beta} = \beta$ , θ')  $\left(\frac{\alpha x}{\beta}\right)^2 - \frac{1}{\gamma} \left(2\alpha x - \frac{\beta^2}{\gamma}\right) = 0$ ,  
ι')  $\frac{\alpha^2 + \alpha x + x^2}{\alpha^2 - \alpha x + x^2} = \frac{\alpha^2 + 1}{\alpha^2 - 1}$ , ια') Δείξατε ότι, ίνα αἱ ἔξισώσεις  $\alpha x^2 + \beta x + \gamma = 0$ ,  
 $\alpha_1 x^2 + \beta_1 x + \gamma_1 = 0$  ἔχουν μίαν ρίζαν κοινήν, πρέπει (καὶ ἀρκεῖ) νὰ ἔχωμεν  
 $(\alpha\beta_1 - \alpha_1\beta)(\beta\gamma_1 - \beta_1\gamma) = (\gamma_1\alpha - \gamma\alpha_1)^2$ . (Αν  $\rho_1$  ἡ κοινὴ ρίζα, εὑρετε τὰ  $\rho_1^2$ ,  $\rho_1$  ἐκ τῶν  
 $\alpha\rho_1^2 + \beta\rho_1 + \gamma = 0$ ,  $\alpha_1\rho_1^2 + \beta_1\rho_1 + \gamma_1 = 0$ , καὶ ἀν εὑρεθῆ  $\rho_1^2 = \kappa$ ,  $\rho_1 = \lambda$ , θέσατε  $\lambda^2 = \kappa$ ).  
Όμας τρίτη. 353. α') Εάν δ συντελεστής τοῦ  $x^2$  τῆς ἔξισώσεως  $[\beta']$   
βαθμοῦ εἶναι τέλειον τετράγωνον ἀκέραιον, προσθέτομεν εἰς τὰ μέλη αὐτῆς τὸ  
τετράγωνον τοῦ πηλίκου τοῦ συντελεστοῦ τοῦ  $x$  διὰ τοῦ διπλασίου τῆς τετρα-  
γωνικῆς ρίζης τοῦ συντελεστοῦ τοῦ  $x^2$  κ.τ.λ. Λύσατε οὕτω τὴν ἔξισωσιν

$$4x^2 - 23x = -30.$$

β') Εάν δ συντελεστής τοῦ  $x^2$  δὲν εἶναι τέλειον τετράγωνον, πολλαπλασιάσ-  
σιάζομεν τὰ μέλη τῆς ἔξισώσεως ἐπὶ κατάλληλον ἀριθμόν, ὥστε δ συντελε-  
στής τοῦ  $x^2$  νὰ γίνη τέλειον τετράγωνον κ.τ.λ. Λύσατε οὕτω τὴν ἔξισωσιν  
 $-3x^2 + 5x = 2$ .

**§ 171.** Ἐνίστε λύομεν τὴν ἔξισωσιν β' βαθμοῦ δι' ἀμέσου  
ἀναλύσεως τοῦ τριωνύμου αὐτῆς εἰς γινόμενον παραγόντων, ἀν  
τοῦτο εἶναι δυνατὸν νὰ γίνη εὐκόλως. Ἐστω π.χ. ὅτι ἔχομεν τὴν  
ἔξισωσιν  $x^2 + 7x - 60 = 0$ . Τρέποντες τὸ πρῶτον μέλος αὐτῆς εἰς γι-  
νόμενον παραγόντων ἔχομεν τὴν  $(x+12)(x-5) = 0$ . Ἀλλ' ίνα  
τὸ γινόμενον τοῦ πρώτου μέλους ισοῦται μὲ 0, ἀρκεῖ  $x+12=0$   
ἢ  $x-5=0$ , ἐκ τῶν ὁποίων εύρισκομεν  $x=-12$ ,  $x=5$ .

Μὲ τὴν προηγουμένην πορείαν δυνάμεθα ἐνίστε νὰ εὔρωμεν  
τὰς ρίζας καὶ ἔξισώσεως ἀνωτέρου τοῦ δευτέρου βαθμοῦ. Π.χ. ἀν  
ἔχωμεν τὴν ἔξισωσιν  $x^3 - x^2 - 6x = 0$ , γράφομεν αὐτὴν οὕτω:  $x(x^2 - x - 6) = 0$   
ἢ  $x(x-3)(x+2) = 0$ . Αὗτη δὲ ἔχει ρίζας τὰς  $x=0$ ,  $x=3$ ,  $x=-2$ .

Ἐστω ἔξισωσις  $x^3 - 8 = 0$ . Ἀντ' αὐτῆς ἔχομεν τὴν ίσοδύναμόν

της  $x^3 - 2^3 = 0$ , ή τήν  $(x-2)(x^2+2x+4)=0$  καὶ θὰ ἔχωμεν τὰς ρίζας, ἀν λύσωμεν τὰς ἔξισώσεις  $x-2=0$ ,  $x^2+2x+4=0$ . Ἐκ τῆς πρώτης ἔχομεν  $x=2$ , ἐκ δὲ τῆς δευτέρας  $x=-1 \pm i\sqrt{3}$ .

### Α σ κ ἡ σ εις

Νὰ λυθοῦν αἱ κάτωθι ἔξισώσεις διὰ τροπῆς τοῦ πρώτου μέλους ἑκάστης εἰς γινόμενον παραγόντων :

$$354. \alpha') x^3 - x^2 - 2x = 0, \quad \beta') 4x^3 - 4x^2 - x + 1 = 0, \quad \gamma') x^3 + 9x^2 + 27x + 27 = 0.$$

$$355. \alpha') x^3 + \alpha x^2 + \alpha x + 1 = 0, \quad \beta') x^3 - \lambda x^2 + 2\lambda x - (\lambda + 1) = 0,$$

$$\gamma') x^3 + 8 + 3(x^2 - 4) = 0.$$

$$356. \alpha') x^3 + \alpha x^2 + \alpha x + \alpha^2 = 0, \quad \beta') x^4 + 4x^3 + 4x^2 + x = 0,$$

$$\gamma') \alpha^4(\alpha + x)^4 - \alpha^4 x^4 = 0.$$

$$357. \alpha') x^5 - x^4 - x + 1 = 0, \quad \beta') x^6 - 12x^4 + 48x^2 - 64 = 0,$$

$$\gamma') x^3 + \alpha x \pm (\alpha + 1) = 0.$$

### 5. ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΛΥΟΜΕΝΑΙ ΜΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥΣ

**§ 172.** Ἐνίστεται ἔξισώσεις τινὲς β' βαθμοῦ ή καὶ ἀνωτέρου ἀνάγονται εἰς τὴν λύσιν ἀπλουστέρων ἔξισώσεων β' βαθμοῦ μὲ τὴν χρησιμοποίησιν βοηθητικῶν ἀγνώστων. Ἐστω π.χ. ή ἔξισωσις

$$(x^2 - 5x)^2 - 8(x^2 - 5x) - 84 = 0.$$

Διὰ τὴν λύσιν αὐτῆς θέτομεν  $x^2 - 5x = \omega$ , ὅπε εὑρίσκομεν  $\omega^2 - 8\omega - 84 = 0$ .

Ἐκ τῆς λύσεως ταύτης εὑρίσκομεν  $\omega = 4 \pm 10$ , οὗτοι  $\omega_1 = 14$ ,  $\omega_2 = -6$ .

Ἀντικαθιστῶμεν τὰς τιμὰς τοῦ  $\omega$  εἰς τὴν ἔξισωσιν  $x^2 - 5x = \omega$  καὶ ἔχομεν τὰς ἔξισώσεις  $x^2 - 5x = 14$ ,  $x^2 - 5x = -6$ . Ἐκ τῆς λύσεως ἑκάστης τούτων εύρίσκομεν  $x = 7$  καὶ  $x = -2$  ἐκ τῆς α' καὶ  $x = 3$ ,  $x = 2$  ἐκ τῆς β'. Ἀρα αἱ ρίζαι τῆς δοθείσης ἔξισώσεως είναι  $-2, 2, 3, 7$ .

### Α σ κ ἡ σ εις

Νὰ λυθοῦν αἱ κάτωθι ἔξισώσεις :

$$358. (6x-1)^2 - 11(6x-1) + 28 = 0. \quad 359. 2(x-7)^2 + 4(x-7) - 2 = 0.$$

$$360. (x+1)^2 + 2 \frac{(x^2 - 0,25)}{2x-1} + 0,5 = 8,75. \quad 361. (2x-\alpha)^2 - \beta(2x-\alpha) - 2\beta^2 = 0.$$

$$362. (3x-2\alpha+\beta)^2 + 2\beta(3x-2\alpha+\beta) = \alpha^2 - \beta^2. \quad 363. (x^2+3)^2 - 7(x^2+3) - 60 = 0.$$

$$364. (x^2+7x)^2 - 6(x^2+7x) - 16 = 0. \quad 365. (x^2-7x)^2 - 13(x^2-7x+18) + 270 = 0.$$

$$366. \left(2x+4-\frac{3}{x}\right)\left(2x-\frac{3}{x}+2\right) - 35 = 0. \quad 367. \left(\frac{x-1}{2x+3}\right)^2 - \frac{26}{5}\left(\frac{x-1}{2x+3}\right) + 1 = 0.$$

6. ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΤΩΝ ΡΙΖΩΝ ΤΗΣ  $\alpha x^2 + \beta x + \gamma = 0$ 

§ 173. Έάν παραστήσωμεν μὲ ρ, καὶ  $\rho_1$  τὰς ρίζας τῆς ἔξι-σώσεως  $\alpha x^2 + \beta x + \gamma = 0$ , θὰ ἔχωμεν, ὡς εἶδομεν

$$\rho_1 = \frac{-\beta + \sqrt{\beta^2 - 4\alpha\gamma}}{2\alpha}, \quad \rho_2 = \frac{-\beta - \sqrt{\beta^2 - 4\alpha\gamma}}{2\alpha}.$$

Παρατηροῦμεν δτι, ἔάν εἶναι τὸ  $\beta^2 - 4\alpha\gamma > 0$ , αἱ ρίζαι εἶναι πραγματικαὶ καὶ καὶ ἀνισοὶ.

Έάν τὸ  $\beta^2 - 4\alpha\gamma = 0$ , αἱ ρίζαι εἶναι πραγματικαὶ καὶ ἰσαὶ μὲ  $-\frac{\beta}{2\alpha}$ .

Έάν εἶναι τὸ  $\beta^2 - 4\alpha\gamma < 0$ , αἱ ρίζαι εἶναι μιγάδες ἐν γένει, ἐπειδὴ δὲ τὸ  $\beta^2 - 4\alpha\gamma$  γράφεται καὶ οὕτω  $-(4\alpha\gamma - \beta^2) = i^2(4\alpha\gamma - \beta^2)$ , ἐπεταὶ ὅτι εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν αἱ ρίζαι εἶναι συζυγεῖς φανταστικαὶ, ἦτοι :

$$\rho_1 = \frac{-\beta + i\sqrt{4\alpha\gamma - \beta^2}}{2\alpha}, \quad \rho_2 = \frac{-\beta - i\sqrt{4\alpha\gamma - \beta^2}}{2\alpha}.$$

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω συνάγομεν τὸν ἔξις πίνακα :

1ον. Έάν εἶναι  $\beta^2 - 4\alpha\gamma > 0$ , αἱ  $\rho_1, \rho_2$  εἶναι πραγματικαὶ καὶ ἀνισοὶ.

2ον. Έάν εἶναι  $\beta^2 - 4\alpha\gamma = 0$ , αἱ  $\rho_1, \rho_2$ , εἶναι πραγματικαὶ καὶ ἰσαὶ μὲ  $-\frac{\beta}{2\alpha}$ .

3ον. Έάν εἶναι  $\beta^2 - 4\alpha\gamma < 0$ , αἱ  $\rho_1, \rho_2$  εἶναι μιγάδες (ἢ φανταστικαὶ) συζυγεῖς.

Ἐστω π.χ. ἡ ἔξισωσις  $x^2 - 5x + 6 = 0$ .

Εἶναι  $\alpha = 1$ ,  $\beta = -5$ ,  $\gamma = 6$ ,  $\beta^2 - 4\alpha\gamma = 25 - 24 = 1$ . Ἐπομένως αἱ ρίζαι αὐτῆς εἶναι πραγματικαὶ καὶ ἀνισοὶ.

Ἐστω ἡ ἔξισωσις  $3x^2 - 12x + 12 = 0$ .

Εἶναι  $\alpha = 3$ ,  $\beta = -12$ ,  $\gamma = 12$ ,  $\beta^2 - 4\alpha\gamma = 144 - 144 = 0$ . Ἀρα αἱ ρίζαι αὐτῆς εἶναι πραγματικαὶ καὶ ἰσαὶ.

Διὰ τὴν ἔξισωσιν  $2x^2 - 3x + 4 = 0$  εἶναι  $\alpha = 2$ ,  $\beta = -3$ ,  $\gamma = 4$ ,  $\beta^2 - 4\alpha\gamma = 9 - 32 = -23$ . Ἀρα αἱ ρίζαι ταύτης εἶναι μιγάδες συζυγεῖς.

### Α σκήσεις

‘Ο μὰς πρώτη. 368. Νὰ προσδιορισθῇ τὸ εἶδος τῶν ριζῶν τῶν κάτωθι ἔξισώσεων χωρὶς νὰ λυθοῦν :

$$\alpha') x^2 - 15x + 16 = 0, \quad \beta') x^2 + 4x + 17 = 0, \quad \gamma') x^2 + 9x - 7 = 0,$$

$$\delta') x^2 - 3x - 21 = 0, \quad \epsilon') x^2 = 1 - 7x, \quad \sigma\tau') 2x + 3 = x^2.$$

369. Δείξατε ότι αἱ ρίζαι τῶν κάτωθι ἔξισώσεων εἶναι πραγματικά, ἀν οἱ ἀριθμοὶ  $\alpha, \beta, \gamma, \delta$  εἶναι πραγματικοί:

$$\alpha') \frac{\alpha^2}{x-\gamma} + \frac{\beta^2}{x-\delta} = 1, \quad \beta') \alpha^2 x^2 + \beta \gamma x - (\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2) := 0.,$$

$$\gamma') x^2 = \pi(x + 2\pi), \quad \delta') \frac{\alpha}{x-\alpha} \frac{\beta}{x-\beta} \frac{\gamma}{x-\gamma} = 0.$$

370. Δείξατε ότι, ἔὰν αἱ ρίζαι τῆς  $\alpha x^2 + 2\beta x + \gamma = 0$  εἶναι πραγματικά, τό αὐτὸ θὰ συμβαίνῃ καὶ διὰ τὴν  $x^2 + 2(\alpha + \beta + \gamma)x + 2\beta(\alpha + \gamma) + 3\alpha\gamma = 0$ .

371. Ἐὰν ἡ  $\alpha x^2 + 2\beta x + \gamma = 0$  ἔχῃ ρίζας πραγματικάς, δείξατε ότι καὶ ἡ ἔξισώσης  $\beta^2 x^2 - \alpha\gamma(x-1)^2 + \alpha\gamma - 1 = 0$  ἔχει ρίζας πραγματικάς.

372. Δείξατε ότι αἱ ρίζαι τῶν κάτωθι ἔξισώσεων εἶναι ρηταί, ἐφ' ὅσον καὶ οἱ ἀριθμοὶ  $\alpha, \beta, \gamma, \delta$  εἶναι ρητοί :

$$\alpha') x^2 - 5\alpha x + 4\alpha^2 = 0, \quad \beta') x(x+2\beta) - 24\beta^2 = 0, \quad \gamma') \alpha\beta\gamma x^2 - (\alpha^2\beta^2 + \gamma^2)x + \alpha\beta\gamma = 0.$$

$$373. \text{Όμοιώς τῶν: } \alpha') (\alpha + \beta + \gamma)x^2 - 2(\alpha + \beta)x + (\alpha + \beta - \gamma) = 0, \\ \beta') (4\alpha^2 - 9\gamma^2\delta^2)x^2 + 4\alpha(\gamma^2 + \beta\delta^2)x + (\alpha\gamma^2 + \beta\delta^2)^2 = 0.$$

374. Δείξατε ότι αἱ κάτωθι ἔξισώσεις ἔχουν συμμέτρους ρίζας, ἐφ' ὅσον καὶ οἱ ἀριθμοὶ  $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ , καὶ εἰναι ἀριθμοὶ σύμμετροι :

$$\alpha') x^2 = \alpha^2(2\alpha^2 - x), \quad \beta') 2x^2 + (y+4)x + 2y = 0, \quad \gamma') 2\gamma x^2 - \alpha\beta(x-2\delta) = 4\gamma\delta x, \\ \delta') 2x^2 + (6\alpha - 10\kappa)x - 30\alpha\kappa = 0.$$

375. Δείξατε ότι ἡ ἔξισώσης  $x^2 + px + k = 0$  ἔχει συμμέτρους ρίζας, δταν :

$$\alpha') k = \left(\frac{\pi+\lambda}{2}\right) \left(\frac{\pi-\lambda}{2}\right) \quad \beta') \pi = \lambda + \frac{k}{\lambda} \text{ μὲλος.}$$

376. Δείξατε ότι αἱ ρίζαι τῶν κάτωθι ἔξισώσεων εἶναι φανταστικά ἀν α, β γ εἶναι πραγματικοὶ ἀριθμοὶ  $\neq 0$  καὶ  $\beta \neq \gamma$ .

$$\alpha') \alpha^2\beta x^2 - 2\alpha\beta x + 2\beta = 0, \quad \beta') x^2 + 2\alpha x + \alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 = 0$$

$$\gamma') x^2 - 2\sqrt{\alpha\beta}x + 17\alpha\beta = 0, \quad \delta') x^2 \pm 2\alpha x + \alpha^2 + \beta^2 - 2\beta\gamma + \gamma^2 = 0.$$

377. Δείξατε ότι ἡ ἔξισώσης  $(\alpha x + \beta)^2 + (\alpha_1 x + \beta_1)^2 = 0$  ἔχει ρίζας φανταστικάς ἔὰν  $\beta\alpha_1 - \alpha\beta_1 \neq 0$ .

378. Ἐὰν αἱ ρίζαι τῆς ἔξισώσεως  $\alpha x^2 + 2\beta x + \gamma = 0$  εἶναι φανταστικά δείξατε ότι καὶ αἱ τῆς  $\alpha x^2 + 2(\alpha + \beta)x + 2\beta + \gamma + \alpha = 0$  εἶναι ἐπίσης φανταστικά.

379. Δείξατε ότι ἔὰν αἱ ρίζαι τῆς ἔξισώσεως  $8\alpha^2 x(2x-1) + \beta^2 = 0$  εἶναι φανταστικαὶ αἱ τῆς  $4\alpha^2 x^2 + \beta^2(4x+1) = 0$  θὰ εἶναι πραγματικαὶ καὶ ἀνισοὶ.

‘Ο μάς δευτέρας (380) Διὰ τίνας τιμάς τοῦ μ αἱ κατωτέρω ἔξισώσεις ἔχουν ρίζας πραγματικάς καὶ ίσας ;

$$\alpha') 2\mu x^2 + (5\mu + 2)x + 4\mu + 1 = 0, \quad \beta') 0,5\mu x^2 - (2\mu - 1)x = 3\mu - 2,$$

$$\gamma') (\mu + 1)x^2 + 3(\mu - 1)x + \mu - 1 = 0, \quad \delta') (2\mu - 3)x^2 + \mu x + \mu - 1 = 0.$$

## 7. ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΚΑΙ ΡΙΖΩΝ ΤΗΣ $\alpha x^2 + \beta x + \gamma = 0$

**§ 174.** Ἐκ τοῦ τύπου τῶν ριζῶν τῆς ἔξισώσεως  $\alpha x^2 + \beta x + \gamma = 0$

$$\text{έχομεν : } \rho_1 = \frac{-\beta + \sqrt{\beta^2 - 4\alpha\gamma}}{2\alpha}, \quad \rho_2 = \frac{-\beta - \sqrt{\beta^2 - 4\alpha\gamma}}{2\alpha}. \quad (1)$$

Έάν μὲν τὰς ισότητας αὐτὰς προσθέσωμεν κατὰ μέλη, εύρισκομεν  $\rho_1 + \rho_2 = \frac{-2\beta}{2\alpha} = -\frac{\beta}{\alpha}$ , έάν δὲ τὰς πολλαπλασιάσωμεν κατὰ μέλη, εύρισκομεν  $\rho_1\rho_2 = \frac{(-\beta + \sqrt{\beta^2 - 4\alpha\gamma})(-\beta - \sqrt{\beta^2 - 4\alpha\gamma})}{4\alpha^2}$

Εἰς τὸν ἀριθμητὴν τοῦ κλάσματος ἔχομεν νὰ πολλαπλασιάσσωμεν τὰς συζυγεῖς ποσότητας  $-\beta + \sqrt{\beta^2 - 4\alpha\gamma}$ ,  $-\beta - \sqrt{\beta^2 - 4\alpha\gamma}$ , ήτοι τὸ ἀθροισμα ἐπὶ τὴν διαφορὰν τῶν  $-\beta$  καὶ  $\sqrt{\beta^2 - 4\alpha\gamma}$ , ἐπομένως τὸ γινόμενον αὐτὸν εἶναι  $\beta^2 - (\beta^2 - 4\alpha\gamma) = 4\alpha\gamma$ . Ἀρα ἔχομεν  $\rho_1\rho_2 = \frac{4\alpha\gamma}{4\alpha^2} = \frac{\gamma}{\alpha}$ . Π.χ. τῆς ἔξισώσεως  $3x^2 - 5x + 6 = 0$  τὸ μὲν ἀθροισμα τῶν ριζῶν εἶναι  $\frac{5}{3}$ , τὸ δὲ γινόμενον  $\frac{6}{3} = 2$ .

**§ 175.** Δοθέντος τοῦ ἀθροίσματος καὶ τοῦ γινομένου δύο ἀριθμῶν, δυνάμεθα νὰ εὕρωμεν αὐτοὺς διὰ τῆς λύσεως ἔξισώσεως β' βαθμοῦ.

Πράγματι, ἂν  $\beta$  εἶναι τὸ ἀθροισμα καὶ γ τὸ γινόμενον τῶν ἀριθμῶν, αἱ ρίζαι τῆς ἔξισώσεως  $x^2 - \beta x + \gamma = 0$  θὰ εἶναι οἱ ζητούμενοι ἀριθμοί. Διότι, ἂν  $x$  παριστάνῃ τὸν ἕνα ἀριθμόν, δ ἄλλος θὰ εἶναι  $\beta - x$ . Οὕτω θὰ ἔχωμεν  $x(\beta - x) = \gamma$  η  $x^2 - \beta x + \gamma = 0$ . (1)

Ο εἰς τῶν δύο ἀριθμῶν εἶναι μία τῶν ριζῶν τῆς ἔξισώσεως (1). Ο ἄλλος ἀριθμὸς θὰ εἶναι κατ' ἀνάγκην ἡ ἄλλη ρίζα τῆς (1), διότι τὸ ἀθροισμα τῶν δύο ριζῶν αὐτῆς εἶναι  $\beta$ , δσον καὶ τὸ ἀθροισμα τῶν δύο ἀριθμῶν. Π.χ. ἂν τὸ ἀθροισμα τῶν ἀριθμῶν εἶναι  $-4$  καὶ τὸ γινόμενον  $-45$ , οἱ ἀριθμοί θὰ εἶναι ρίζαι τῆς  $x^2 + 4x - 45 = 0$ , ήτοι αἱ  $5$  καὶ  $-9$ .

**§ 176. Παρατήρησις.** Τὸ ἀθροισμα τῶν ριζῶν τῆς ἔξισώσεως  $\alpha x^2 + \beta x + \gamma = 0$  ίσοῦται μὲν  $-\frac{\beta}{\alpha}$ . Αν τὸ  $\alpha$  τείνῃ εἰς τὸ  $0$ , ἀλλὰ  $\beta \neq 0$ , ἡ ἔξισωσις ἀνάγεται εἰς τὴν  $\beta x + \gamma = 0$ , τῆς δόποίας ἡ ρίζα εἶναι  $-\frac{\gamma}{\beta}$ . Ή ἄλλη ρίζα τῆς δοθείσης ἔξισώσεως θὰ τείνῃ εἰς τὸ  $\pm\infty$ . Πράγματι

ἐπειδὴ τὸ  $-\frac{\beta}{\alpha}$  τείνει εἰς τὸ ( $\pm$ ) ἀπειρον, ἡ δὲ μία ρίζα τῆς ἔξισώσεως τείνει εἰς τὸ  $-\frac{\gamma}{\beta}$ , ἡ ἄλλη θὰ τείνῃ εἰς τὸ  $\pm \infty$ .

### A σκήσεις

Όμάς πρώτη. 381. Νὰ εύρεθῇ τὸ ἀθροισμα καὶ τὸ γινόμενον τῶν ριζῶν τῶν κάτωθι ἔξισώσεων χωρὶς νὰ λυθοῦν :

$$\alpha') \quad 2x^2 - 4x - 3 = 0 \qquad \beta') \quad 3x^2 + 8x - 12 = 0, \qquad \gamma') \quad x^2 - 7x + 10 = 0.$$

$$382. \text{Όμοιως τῶν :} \quad \alpha') \quad x^2 + 2\alpha x = 3\alpha^2, \qquad \beta') \quad x^2 - 4\alpha x = -3\alpha^2.$$

383. Εὗρετε τὴν ἄλλην ρίζαν τῶν ἔξισώσεων :

$$\alpha') \quad x^2 - 5x + 6 = 0, \qquad \text{ἄν ἡ μία εἶναι } 2,$$

$$\beta') \quad x^2 - \frac{10}{3}x + 1 = 0, \qquad \text{ἄν ἡ μία εἶναι } \frac{1}{3},$$

$$\gamma') \quad x^2 - (\alpha + \beta)x + \alpha\beta = 0, \qquad \text{ἄν ἡ μία εἶναι } \alpha.$$

Όμάς δευτέρα. 384. α') "Αν  $\rho_1, \rho_2$  εἶναι ρίζαι τῆς  $\alpha x^2 + \beta x + \gamma = 0$  εὕρετε τὸ  $\rho_1 - \rho_2$  διὰ τῶν α β γ.

β') Νὰ εύρεθῇ τὸ  $\rho_1^2 + \rho_2^2$  τῶν ριζῶν  $\rho_1, \rho_2$  τῆς  $\alpha x^2 + \beta x + \gamma = 0$  καὶ ἀκολούθως τὸ  $\rho_1^3 + \rho_2^3$  διὰ τῶν συντελεστῶν τῆς ἔξισώσεως.

385. Εὗρετε τὸ ἀθροισμα, τὸ γινόμενον, τὴν διαφοράν, τὸ ἀθροισμα τῶν τετραγώνων καὶ τῶν κύβων τῶν ριζῶν τῆς  $x^2 + px + q = 0$ , χωρὶς νὰ λυθῇ αὐτῇ.

386. Εὗρετε τὸ ἀθροισμα τῶν τετραγώνων τῶν ριζῶν τῶν κάτωθι ἔξισώσεων χωρὶς νὰ λυθοῦν αὐταὶ :

$$\alpha') \quad x^2 - 9x + 10 = 0, \qquad \beta') \quad x^2 + 5x - 7 = 0, \qquad \gamma') \quad 3x^2 + 7x - 6 = 0.$$

387. Προσδιορίσατε τὸ λ, ὅστε τὸ ἀθροισμα τῶν τετραγώνων τῶν ριζῶν τῆς ἔξισώσεως  $x^2 + (\lambda - 2)x - (\lambda + 3) = 0$  νὰ εἴναι μ.

388. Ποιά σχέσις πρέπει νὰ ὑπάρχῃ μεταξὺ τῶν β καὶ γ, ἵνα αἱ ρίζαι τῆς ἔξισώσεως  $x^2 + \beta x + \gamma = 0$  ἔχουν λόγον λ.

389. Εὗρετε σχέσιν τῶν α, β, γ, ἵνα αἱ ρίζαι τῆς ἔξιώσεως  $\alpha x^2 + \beta x + \gamma = 0$  εἶναι ἀνάλογοι τῶν μ καὶ ν.

390. Προσδιορίσατε τὰ β καὶ γ, ὅστε ἡ διαφορὰ τῶν ριζῶν τῆς ἔξισώσεως  $x^2 + \beta x + \gamma = 0$  εἴναι 4, τῶν δὲ κύβων τῶν 208.

391. Προσδιορίσατε τὸν ν, ὅστε αἱ ρίζαι τῆς ἔξισώσεως  $(\alpha - \beta)x^2 + 2(\alpha^2 - \beta^2)x + \nu = 0$  νὰ εἴναι ίσαι ἡ νὰ ἔχουν γινόμενον 1.

392. Ποίαν τιμὴν πρέπει νὰ ἔχῃ τὸ γ, ὅστε αἱ ρίζαι τῆς ἔξισώσεως  $3x^2 - 10x + \gamma = 0$  νὰ εἴναι μιγαδικαὶ; Νὰ ἔχουν γινόμενον -0,75;

393. Προσδιορίσατε τὸ γ, ὅστε αἱ ρίζαι τῆς ἔξισώσεως  $x^2 - 8x + \gamma = 0$  νὰ πληροῦν τὰς ἔξισης σχέσεις. α')  $\rho_1 = \rho_2$ , β')  $\rho_1 = 3\rho_2$ , γ')  $\rho_1 \rho_2 = \pm 1$ .

394. Τὸ αὐτὸ διὰ τὰς σχέσεις: α')  $3\rho_1 = 4\rho_2 + 3$ , β')  $\rho_1^2 + \rho_2^2 = 40$ .

8. ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΗΜΟΥ ΤΩΝ ΡΙΖΩΝ ΤΗΣ  $\alpha x^2 + \beta x + \gamma = 0$ 

**§ 177.** Διθείστης τῆς ἔξισώσεως  $\alpha x^2 + \beta x + \gamma = 0$ , δυνάμεθα νὰ διακρίνωμεν, ποῖον εἶναι τὸ πρόσημον ἐκάστης τῶν ριζῶν αὐτῆς, ἂν εἶναι πραγματικαὶ, χωρὶς νὰ λύσωμεν τὴν ἔξισώσιν. Πρὸς τοῦτο παρατηροῦμεν ὅτι, ἀφοῦ εἶναι  $\rho_1 \rho_2 = \frac{\gamma}{\alpha}$  καὶ  $\rho_1 + \rho_2 = -\frac{\beta}{\alpha}$ , ἔπειται ὅτι ἔχομεν τὸν ἔξῆς πίνακα.

Πρόσημα τῶν ριζῶν τῆς ἔξισώσεως  $\alpha x^2 + \beta x + \gamma = 0$ .  
ἀν  $\beta^2 - 4\alpha\gamma > 0$ .

1ον. "Αν εἶναι  $\frac{\gamma}{\alpha} > 0$ , αἱ ρίζαι εἶναι ὁμόσημοι· θετικαὶ μὲν ἂν εἶναι καὶ  $-\frac{\beta}{\alpha} > 0$ , ἀρνητικαὶ δέ ἂν εἶναι τὸ  $-\frac{\beta}{\alpha} < 0$ .

2ον. "Αν εἶναι  $-\frac{\beta}{\alpha} < 0$ , αἱ ρίζαι εἶναι ἑτερόσημοι· ἀπολύτως μεγαλυτέρα ἢ θετικὴ μὲν, ἂν εἶναι καὶ  $-\frac{\beta}{\alpha} > 0$ , ἢ ἀρνητικὴ δέ, ἂν τὸ  $-\frac{\beta}{\alpha} < 0$ .

3ον. "Αγ. εἶναι  $\frac{\gamma}{\alpha} = 0$ , ἢ μία ρίζα εἶναι ἵση μὲ 0, ἢ δὲ ἄλλη μὲ  $-\frac{\beta}{\alpha}$ .

"Εστω π. χ. ἢ ἔξισωσις  $x^2 + 8x + 12 = 0$ .

"Έχομεν  $\beta^2 - 4\alpha\gamma = 64 - 48 = 16 = \text{θετικός}$ . "Αρα αἱ ρίζαι  $\rho_1$  καὶ  $\rho_2$  εἶναι πραγματικαὶ. Ἐπειδὴ δὲ  $\rho_1 \rho_2 = 12 > 0$  καὶ  $\rho_1 + \rho_2 = -8 < 0$ , θὰ εἶναι ἀρνητικαὶ.

*Τὰς ρίζας αὐτῶν τὰς οὐτουτας Α σκήσεις*

395. Εύρετε τὸ σῆμα τῶν ριζῶν τῶν κάτωθι ἔξισώσεων, χωρὶς νὰ λυθοῦν αὐταὶ:

(α) $x^2 - 8x + 12 = 0$ ,	(β') $6x^2 - 15x - 50 = 0$ ,	(γ') $7x^2 + 14x - 1 = 0$ .
396. Όμοιως τῶν ἔξῆς:		
(α') $7x^2 - 5x - 1 = 0$ ,	(β') $x^2 - 3x - 4 = 0$ ,	(γ') $3x^2 - 4x - 2 = 0$ ,
(δ') $x^2 - 3x + 2 = 0$ ,	(ε') $x^2 + 3x + 1 = 0$ ,	(στ') $5x^2 - 15x - 1 = 0$ .

9. ΤΡΟΠΗ ΤΡΙΩΝΥΜΟΥ  $\alpha x^2 + \beta x + \gamma = 0$   
ΕΙΣ ΓΙΝΟΜΕΝΟΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ  $x$

**§ 178.** "Εστω ὅτι ζητεῖται νὰ τραπῆῃ τὸ τριώνυμον  $\alpha x^2 + \beta x + \gamma$

εις γινόμενον παραγόντων. "Αν  $\rho_1, \rho_2$  είναι αἱ ρίζαι τῆς  $\alpha x^2 + \beta x + \gamma = 0$ , αἱ ὄποιαι λέγονται καὶ ρίζαι τοῦ δοθέντος τριώνυμου, θὰ είναι

$$\rho_1 + \rho_2 = -\frac{\beta}{\alpha}, \quad (1) \qquad \rho_1 \rho_2 = \frac{\gamma}{\alpha}. \quad (2)$$

"Υποθέτοντες τὸ  $\alpha \neq 0$  γράφομεν τὸ τριώνυμον ὡς ἔξῆς :

$$\alpha x^2 + \beta x + \gamma = \alpha(x^2 + \frac{\beta}{\alpha}x + \frac{\gamma}{\alpha}).$$

"Αντικαθιστῶντες τὸ  $\frac{\beta}{\alpha}$  μὲ τὸ ἵσον αὐτοῦ  $-(\rho_1 + \rho_2)$  ἐκ τῆς (1)

καὶ τὸ  $\frac{\gamma}{\alpha}$  μὲ τὸ  $\rho_1 \rho_2$  ἐκ τῆς (2) εύρισκομεν ὅτι :

$$\begin{aligned} \alpha x^2 + \beta x + \gamma &= \alpha[x^2 - (\rho_1 + \rho_2)x + \rho_1 \rho_2] = \alpha(x^2 - \rho_1 x - \rho_2 x + \rho_1 \rho_2) = \\ &= \alpha[(x - \rho_1)x - \rho_2(x - \rho_1)] = \alpha(x - \rho_1)(x - \rho_2). \end{aligned}$$

"Ητοι τὸ  $\alpha x^2 + \beta x + \gamma = \alpha(x - \rho_1)(x - \rho_2)$ .

Διακρίνομεν τώρα τὰς ἔξης περιπτώσεις :

1ον. "Αν αἱ ρίζαι  $\rho_1$  καὶ  $\rho_2$  είναι πραγματικαὶ καὶ ἄνισοι, θὰ ἔχωμεν  $\alpha x^2 + \beta x + \gamma = \alpha(x - \rho_1)(x - \rho_2)$ .

2ον. "Αν είναι  $\rho_1 = \rho_2$ , θὰ ἔχωμεν  $\alpha x^2 + \beta x + \gamma = \alpha(x - \rho_1)^2$ .

3ον. "Αν είναι  $\rho_1 = \lambda + \delta i$ ,  $\rho_2 = \lambda - \delta i$  ( μιγάδες συζυγεῖς )

θὰ ἔχωμεν  $x - \rho_1 = (x - \lambda) - \delta i$ ,  $x - \rho_2 = (x - \lambda) + \delta i$ , καὶ

$$\alpha(x - \rho_1)(x - \rho_2) = \alpha[(x - \lambda) - \delta i][(x - \lambda) + \delta i] = \alpha[(x - \lambda)^2 + \delta^2].$$

"Αρα :  $\alpha x^2 + \beta x + \gamma = \alpha[(x - \lambda)^2 + \delta^2]$ . "Ητοι :

Τὸ τριώνυμον  $\alpha x^2 + \beta x + \gamma$  τρέπεται εἰς γινόμενον μὲν τοῦ  $\alpha$  ἐπὶ δύο πρωτοβαθμίους παράγοντας ὡς πρὸς  $x$ , ἀν αἱ ρίζαι τῆς ἔξισώσεως  $\alpha x^2 + \beta x + \gamma = 0$  είναι πραγματικαὶ καὶ ἄνισοι, εἰς γινόμενον δὲ τοῦ  $\alpha$  ἐπὶ ἓν τέλειον τετράγωνον ἢ ἐπὶ τὸ ἀθροϊσμα δύο τετραγώνων, ἀν αἱ ρίζαι τῆς ἔξισώσεως είναι ἵσαι ἢ μιγάδες ( συζυγεῖς ).

Π.χ. διὰ τὸ  $2x^2 - 3x - 2$ , τοῦ ὄποιου αἱ ρίζαι είναι 2 καὶ -0,5, ἔχομεν  $2x^2 - 3x - 2 = 2(x - 2)(x + 0,5)$ .

Διὰ τὸ  $2x^2 - 12x + 18$ , τοῦ ὄποιου αἱ ρίζαι είναι ἵσαι μὲ 3, ἔχομεν  $2x^2 - 12x + 18 = 2(x - 3)^2$ .

## 10. ΕΥΡΕΣΙΣ ΤΡΙΩΝΥΜΟΥ Β' ΒΑΘΜΟΥ ΕΚ ΤΩΝ ΡΙΖΩΝ ΑΥΤΟΥ

**§ 197.** "Οταν δοθοῦν αἱ ρίζαι  $\rho_1, \rho_2$  ἐνὸς τριώνυμου β' βαθμοῦ ὡς πρὸς  $x$ , τοῦτο θὰ ἴσοῦται μὲ  $(x - \rho_1)(x - \rho_2) = x^2 - (\rho_1 + \rho_2)x + \rho_1 \rho_2$

πολλαπλασιασμένον τὸ πολὺ ἐπὶ παράγοντά τινα σταθερόν. Ἡτοι δυνάμεθα νὰ εῦρωμεν τὸ τριώνυμον τοῦτο ( παραλειπομένου τοῦ σταθεροῦ παράγοντος ) ἐκ τῶν ρίζῶν αὐτοῦ.

Π.χ. τὸ τριώνυμον, τὸ ἔχον ρίζας τὰς 3 καὶ  $\frac{1}{2}$ , θὰ είναι ίσον μὲ  $(x-3)$   $\left(x-\frac{1}{2}\right) = (x-3)\left(\frac{2x-1}{2}\right) = \frac{2x^2-7x+3}{2}$ , τὰ δὲ 3 καὶ  $\frac{1}{2}$  θὰ είναι ρίζαι τῆς ἑξισώσεως  $2x^2-7x+3=0$ .

### Άσκησεις

Ο μὰς πρώτη 397. Νὰ τραποῦν εἰς γινόμενα τὰ τριώνυμα :

$$\begin{array}{lll} \alpha') x^2-9x+18, & \beta') x^2+4x+3, & \gamma') 2x^2+3x-2, \\ 8') 2x^2+12x+18, & \epsilon') x^2-4x-5, & \sigma') x^2-5x+6. \end{array}$$

398. Νὰ ἀπλοποιηθοῦν τὰ κάτωθι κλάσματα :

$$\begin{array}{lll} \alpha') \frac{x^2-5x+6}{x^2-7x+10}, & \beta') \frac{x^2+4x+3}{x^2-4x-5}, & \gamma') \frac{x^2+10x+21}{2x^2+12x+18}. \end{array}$$

Ο μὰς δευτέρη 399. Εὗρετε ἑξισώσιν β' βαθμοῦ μὲ συντελεστὰς ἀκεραίους ἔχουσα ρίζας :

$$\alpha') 3 \text{ καὶ } 0,5, \quad \beta') 3 \pm \sqrt{2}, \quad \gamma') 4 \pm \sqrt{5}, \quad \delta') \pm i\sqrt{2},$$

$$\varepsilon') \alpha \pm \beta, \quad \sigma') \alpha \pm i\sqrt{\beta}, \quad \zeta') \alpha \pm i\sqrt{\beta}, \quad \eta') \alpha \pm \sqrt{\alpha}.$$

400. Σχηματίσατε τὰς ἑξισώσεις τὰς ἔχουσας ρίζας τὸ ἀθροισμα καὶ τὸ γινόμενον τῶν ρίζῶν τῶν κάτωθι ἑξισώσεων :

$$\alpha') \frac{2x-5}{9x} - \frac{8x}{x-15} = 3,$$

$$\beta') x^2 = \sqrt{3}(2x - \sqrt{3}),$$

$$\gamma') x^2 + \beta \left( \frac{x-\alpha}{\frac{1}{\alpha} - \frac{1}{\beta}} \right) = 2\alpha\beta(x - \alpha\beta).$$

401. Σχηματίσατε τὴν ἑξισώσιν τὴν ἔχουσαν ρίζας τὰ τετράγωνα τῶν ρίζῶν τῆς ἑξισώσεως  $\sqrt{3}x^2 + \sqrt{17}x + \sqrt{5} = 0$ .

402. Σχηματίσατε τὰς ἑξισώσεις τὰς ἔχουσας ρίζας τοὺς κύβους τῶν ρίζῶν τῶν ἑξισώσεων : α')  $2x(x-\alpha)=\alpha^2$ , β')  $x^2+\alpha x=\alpha^2\beta(\beta+1)$ .

403. Σχηματίσατε τὴν δευτεροβάθμιον ἑξισώσιν, γνωστοῦ δῆτας ὅτι ὁ συντελεστὴς τοῦ δευτεροβάθμιου δρου τῆς είναι 7, τοῦ πρωτοβάθμιου -14 καὶ ἡ μία τῶν ρίζῶν -5.

404. Εὰν  $x_1, x_2$  είναι αἱ ρίζαι τῆς ἑξισώσεως  $\alpha x^2 + \beta x + \gamma = 0$  ἢ τῆς  $x^2 + \pi x + \kappa = 0$ , σχηματίσατε τὰς ἑξισώσεις τὰς ἔχουσας τὰς κάτωθι ρίζας :

$$\alpha') x_1^2, x_1^2, \quad \beta) -x_1^2, -x_2^2, \quad \gamma') x_1^2 x_2, x_1 x_2^2, \quad \delta') x_1 + 2x_2, 2x_1 + x_2,$$

$$\epsilon') x_1 - 2x_2, x_2 - 2x_1, \quad \sigma) x_1^2 + x_2, x_1 + x_2^2, \quad \zeta') \frac{x_1 + x_2}{2x_2}, \frac{x_1 + x_2}{2x_1},$$

$$\eta') \alpha x_1^2 + \beta x_1 x_2 + \gamma x_2^2, \gamma x_1^2 - \beta x_1 x_2 + \alpha x_2^2, \quad \theta') \frac{x_1}{x_2^3}, \frac{x_2}{x_1^3}.$$

405. Έάν  $x_1, x_2$  είναι ρίζαι της έξισώσεως  $\alpha x^2 + \beta x + \gamma = 0$ , ύπολογίσατε τὴν τιμὴν τῶν παραστάσεων χωρὶς νὰ λυθῇ ἡ έξισώση :

$$\alpha') (\alpha x_1 + \beta)^2 + (\alpha x_2 + \beta)^2, \quad \beta') (\beta x_1^2 + \gamma) (\beta x_2^2 + \gamma),$$

$$\gamma') (\gamma x_1 + \beta)^{-2} + (\gamma x_2 + \beta)^{-2}.$$

406. Έάν  $x_1, x_2$  είναι αἱ ρίζαι τῆς έξισώσεως  $5x^2 - 12x + 1 = 0$ , ύπολογίσατε τὴν τιμὴν τῆς παραστάσεως  $x_1^3 - x_1^2 x_2 + x_1 x_2^2 - x_2^3$ , χωρὶς νὰ λυθῇ ἡ έξισώση.

407. Έάν  $x_1, x_2$  είναι ρίζαι τῆς έξισώσεως  $x^2 - 2x - 35 = 0$ , ύπολογίσατε τὴν τιμὴν τῆς παραστάσεως  $\frac{x_1 + x_2}{x_1} - \frac{x_1 + x_2}{x_2}$ , χωρὶς νὰ λυθῇ ἡ έξισώση.

### 11. ΠΡΟΣΗΜΑ ΤΟΥ ΤΡΙΩΝΥΜΟΥ $\alpha x^2 + \beta x + \gamma$ ΔΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑΣ ΤΙΜΑΣ ΤΟΥ $x$

**§ 180.** Ἐστω τὸ τριώνυμον  $\alpha x^2 + \beta x + \gamma$  καὶ ὅτι τὸ  $x$  λαμβάνει πραγματικὰς τιμάς. Ἄν αἱ ρίζαι αὐτοῦ  $p_1, p_2$  είναι πραγματικαὶ καὶ ἀνισοὶ ( ἔστω δὲ ὅτι είναι  $p_1 < p_2$  ), θὰ ἔχωμεν

$$\alpha x^2 + \beta x + \gamma = \alpha(x - p_1)(x - p_2).$$

α') Ἐστω ὅτι αἱ τιμαὶ τοῦ  $x$  είναι μικρότεραι τοῦ  $p_1$ , ἐπομένως καὶ τοῦ  $p_2$ . Τότε τὸ  $x - p_1, x - p_2$  είναι ἀρνητικά, τὸ δὲ  $(x - p_1)(x - p_2)$  ( ὡς γινόμενον ἀρνητικῶν παραγόντων ) είναι θετικόν, καὶ τὸ  $\alpha(x - p_1)(x - p_2)$  θὰ ἔχῃ τὸ πρόσημον τοῦ  $\alpha$ .

β') Ἐστω ὅτι αἱ τιμαὶ τοῦ  $x$  είναι μεγαλύτεραι τοῦ  $p_2$ , ἐπομένως καὶ τοῦ  $p_1$ . Τότε τὰ  $x - p_1$  καὶ  $x - p_2$  είναι θετικά, ἐπίσης καὶ τὸ  $(x - p_1)(x - p_2)$  είναι θετικόν, τὸ δὲ γινόμενον  $\alpha(x - p_1)(x - p_2)$  θὰ ἔχῃ τὸ πρόσημον τοῦ  $\alpha$ .

γ') Ἐστω ὅτι αἱ τιμαὶ τοῦ  $x$  είναι μεγαλύτεραι τοῦ  $p_1$ , ἀλλὰ μικρότεραι τοῦ  $p_2$ , ἥτοι  $p_1 < x < p_2$ . Τότε τὸ μὲν  $x - p_1$  είναι θετικόν, τὸ  $x - p_2$  ἀρνητικόν, τὸ δὲ  $(x - p_1)(x - p_2)$  είναι ἀρνητικὸν ( ὡς γινόμενον δύο ἑτεροσήμων παραγόντων ), ἀρα τὸ  $\alpha(x - p_1)(x - p_2)$  ἔχει πρόσημον ἀντίθετον τοῦ  $\alpha$ .

δ') Ἐστι τὸ  $\alpha$  καὶ  $p_1$  καὶ  $p_2$  είναι ἵσαι ἡ μιγάδες ἀριθμοὶ ἐν γένει, διὰ πᾶσαν τιμὴν τοῦ  $x$  πραγματικὴν καὶ διάφορον τῶν ριζῶν τὸ τριώνυμον ἔχει τὸ πρόσημον τοῦ  $\alpha$ . Διότι, ἂν μὲν είναι  $p_1 = p_2$  τὸ  $\alpha x^2 + \beta x + \gamma = \alpha(x - p_1)^2$ . Ἡτοι ἔχει τὸ πρόσημον τοῦ  $\alpha$  διὰ κάθε  $x \neq p_1$ . Ἐν δὲ αἱ ρίζαι είναι μιγάδες ἐν γένει, τὸ  $\alpha x^2 + \beta x + \gamma$  τρέπεται εἰς γινόμενον τοῦ  $\alpha$  ἐπὶ τὸ ἄθροισμα δύο τετραγώνων, ἐπομένως ἔχει τὸ πρόσημον τοῦ  $\alpha$ . Ἐκ τῶν ἀνωτέρω συνάγομεν ὅτι :

"Οταν τὸ καὶ λάβη τιμὴν πραγματικὴν κειμένην ἐκτὸς τῶν ριζῶν τοῦ τριωνύμου  $\alpha x^2 + \beta x + \gamma$ , τὸ τριώνυμον ἔχει τὸ πρόσημον τοῦ  $\alpha$ , ἐνῷ διὰ τιμὴν τοῦ καὶ κειμένην μεταξὺ τῶν ριζῶν ἔχει πρόσημον ἀντίθετον τοῦ  $\alpha$ .

### Α σκήσεις

408. Διὰ ποίας πραγματικὰς τιμὰς τοῦ καὶ τὰ κάτωθι τριώνυμα θὰ ἔχουν τιμὰς θετικάς; ἀρνητικάς;

$$\alpha') 2x^2 - 16x + 24, \quad \beta') -2x^2 + 16x - 24, \quad \gamma') 2x^2 - 16x + 32, \quad \delta') 0,75x^2 - 6x + 1.$$

$$\epsilon') x^2 - 7x - 1, \quad \sigma') x^2 + x - 1, \quad \zeta') 2x^2 - 6x - 3,$$

409. Όμοιως τὰ τριώνυμα:

$$\alpha') -2x^2 - 16x - 32, \quad \beta') 2x^2 - 16x + 40, \quad \gamma') -2x^2 + 16x - 40, \quad \delta') -x^2 - 3x + 2.$$

## 12. ΘΕΣΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΡΙΖΑΣ ΤΡΙΩΝΥΜΟΥ

**§ 181.** Δοθέντος τοῦ τριωνύμου  $\alpha x^2 + \beta x + \gamma$  καὶ ἀριθμοῦ πραγματικοῦ ἔστω  $\lambda$ , ζητοῦμεν νὰ εὔρωμεν τὴν θέσιν αὐτοῦ ὡς πρὸς καθεμίαν τῶν ( ὑποτιθεμένων πραγματικῶν ) ριζῶν τῆς ἔξισώσεως  $\alpha x^2 + \beta x + \gamma = 0$ , χωρὶς νὰ λυθῇ αὐτῆ.

Παραστηροῦμεν ὅτι, ὅταν τεθῇ  $x = \lambda$  εἰς τὸ τριώνυμον, ἐάν τὸ  $\alpha\lambda^2 + \beta\lambda + \gamma$  ἔχῃ πρόσημον ἀντίθετον τοῦ προσήμου τοῦ  $\alpha$ , τότε αἱ ρίζαι εἶναι πραγματικαὶ καὶ ἀνισοί, ὃ δὲ λ περιέχεται μεταξὺ τούτων.

Ἐὰν δομως τὸ  $\alpha\lambda^2 + \beta\lambda + \gamma$  ἔχῃ τὸ πρόσημον τοῦ  $\alpha$ , τότε ὁ λ κεῖται ἐκτὸς τῶν ριζῶν τοῦ τριωνύμου, ἔστω  $\rho_1, \rho_2$  ( ἐνῷ ὑποτίθεται  $\rho_1 < \rho_2$  ). Μένει νὰ εὔρωμεν ἂν ὁ λ εἶναι μικρότερος τῆς μικροτέρας  $\rho_1$  η μεγαλύτερος τῆς μεγαλυτέρας  $\rho_2$ .

Πρὸς τοῦτο ἀρκεῖ νὰ εὔρεθῇ ἂν εἶναι μικρότερος η μεγαλύτερος ἀπὸ ἀριθμόν, ὃ ὅποιος νὰ περιέχηται μεταξὺ τῶν ριζῶν. Διότι ἂν εἶναι μικρότερος ἀπὸ τοιοῦτον ἀριθμόν, τότε δεδομένου ὅτι εἶναι ὁ λ ἐκτὸς τῶν ριζῶν, θὰ εἶναι προφανῶς πρὸ αὐτῶν. Ἐνῷ ἂν εἶναι μεγαλύτερος τοιούτου ἀριθμοῦ, θὰ εἶναι ὁ λ μετὰ τὰς ρίζας.

Ἀριθμὸς δομως περιεχόμενος μεταξὺ τῶν ριζῶν  $\rho_1, \rho_2$  εἶναι ὁ  $-\frac{\beta}{2\alpha}$  δηλ. τὸ ἡμιαθροίσμα αὐτῶν, διότι ἐκ τῆς  $\rho_1 < \rho_2$  προκύπτουν αἱ  $2\rho_1 < \rho_1 + \rho_2$  καὶ  $\rho_1 + \rho_2 < 2\rho_2$ , δηλ.  $2\rho_1 < \rho_1 + \rho_2 < 2\rho_2$ , διότε  $\rho_1 < \frac{\rho_1 + \rho_2}{2} < \rho_2$ .

\*Αν λοιπὸν εἶναι  $\lambda < -\frac{\beta}{2\alpha}$ , δηλατεῖται πρὸ τῶν ρίζῶν, καὶ ἀν  $\lambda > -\frac{\beta}{2\alpha}$ , δηλατεῖται μετὰ τὰς ρίζας.

\*Εκ τούτων δρίζεται ἡ θέσις τοῦ λ ως πρὸς τὰς ρίζας.

*Παραδείγματα.* 1ον. \*Εστω ὅτι δίδεται τὸ τριώνυμον  $x^2 + 3x - 2$  καὶ ζητοῦμεν νὰ εύρωμεν τὴν θέσιν τοῦ  $-1$  π.χ. ως πρὸς τὰς ρίζας τοῦ τριωνύμου, χωρὶς νὰ εύρεθοῦν αὗται.

Εύρισκομεν πρῶτον τὸ σημεῖον τοῦ  $(-1)^2 + 3(-1) - 2$ . Τοῦτο δίδει ἔξαγόμενον  $1 - 3 - 2 = -4$ , δηλαδὴ ἐτερόσημον τοῦ συντελεστοῦ  $1$  τοῦ  $x^2$  εἰς τὸ δοθὲν τριώνυμον. \*Αρα ὁ  $-1$  περιέχεται μεταξὺ τῶν ρίζῶν τοῦ δοθέντος τριωνύμου.

\*Εστω ὅτι διὰ τὸ αὐτὸ τριώνυμον ζητοῦμεν τὴν θέσιν π.χ. τοῦ ἀριθμοῦ  $1$  ως πρὸς τὰς ρίζας του, χωρὶς νὰ εύρεθοῦν αὗται. Εἶναι  $1^2 + 3 \cdot 1 - 2 = 2$ , δηλαδὴ δύμόσημον τοῦ συντελεστοῦ  $1$  τοῦ  $x^2$ . \*Ἐπειτα παρατηροῦμεν ὅτι αἱ ρίζαι εἶναι πραγματικαὶ καὶ ἀνισοὶ, διότι  $\Delta = 9 + 8 > 0$ . Τὸ ήμιάθροισμα τῶν ρίζῶν εἶναι  $-\frac{3}{2}$ . Καὶ ἐπειδὴ  $1 > -\frac{\beta}{2\alpha} = -\frac{3}{2}$ , δηλατεῖται μετὰ τὰς ρίζας, δηλ. μεγαλύτερος τῆς μεγαλυτέρας ρίζης.

2ον. \*Εστω τὸ τριώνυμον  $-3x^2 + 2x + 1$  καὶ ὅτι ζητοῦμεν τὴν θέσιν τοῦ  $0$  ως πρὸς τὰς ρίζας του, χωρὶς νὰ εύρεθοῦν αὗται.

Θέτομεν  $x = 0$  εἰς τὸ τριώνυμον καὶ εύρισκομεν  $-3 \cdot 0^2 + 2 \cdot 0 + 1 = 1$ , ἥτοι ἔξαγόμενον ἐτερόσημον τοῦ  $\alpha = -3$  συντελεστοῦ τοῦ  $x^2$  εἰς τὸ δοθὲν τριώνυμον. \*Αρα τὸ  $0$  περιέχεται μεταξὺ τῶν ρίζῶν τοῦ τριωνύμου. Διὰ τὸ αὐτὸ τριώνυμον, ἀν ζητοῦμεν τὴν θέσιν τοῦ ἀριθμοῦ  $2$ , ἔχομεν  $-3 \cdot 2^2 + 3 \cdot 2 + 1 = -12 + 6 + 1 = -5$ , ἥτοι δύμόσημον τοῦ  $\alpha = -3$ . \*Ἐπειτα εύρισκομεν ὅτι αἱ ρίζαι εἶναι πραγματικαὶ καὶ ἀνισοὶ, διότι  $\Delta = 4 + 12 > 0$ . \*Αρα τὸ  $2$  κεῖται ἐκτὸς τῶν ρίζῶν τοῦ τριωνύμου. Εἶναι  $-\frac{\beta}{2\alpha} = -\frac{2}{2(-3)} = \frac{1}{3}$  καὶ  $2 > \frac{1}{3}$ , ἀρα τὸ  $2$  εἶναι μετὰ τὰς ρίζας, δηλ. μεγαλύτερον τῆς μεγαλυτέρας ρίζης τοῦ τριωνύμου.

### \*Α σ κήσεις

410. Τίς ἡ θέσις τῶν  $1, 7, 5, -5, -1$  ως πρὸς τὰς ρίζας τῶν ἔξισώσεων:  
 $\alpha') x^2 + 3x - 4 = 0$ ,       $\beta') 2x^2 + 7x - 1 = 0$ ,       $\gamma') x^2 - 4x + 3 = 0$ .

411. Εύρετε τὴν θέσιν τοῦ ἀριθμοῦ α')  $\frac{3}{4}$  β') -1, γ') 0,5 οὐδὲ δ') -0,25 ως πρὸς τὰς ρίζας ἑκάστου τῶν τριωνύμων:

$$\alpha') 2x^2 - 6x + 1,$$

$$\delta') \frac{x^2}{2} - \frac{x}{3} - 1,$$

$$\zeta') \frac{x^2}{4} - \frac{x}{2} - 1,$$

$$\beta') -x^2 + x - 4,$$

$$\epsilon') 3x^2 + 6x - 4,$$

$$\eta') 4x^2 - 7x + 1,$$

$$\gamma') 7x^2 - 4x - 1,$$

$$\sigma\tau') -x^2 - 7x - 2,$$

$$\theta') 0,5x^2 + 0,6x - 1.$$

### 13. ΕΥΡΕΣΙΣ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΡΙΖΩΝ ΤΗΣ ΕΞΙΣΩΣΕΩΣ $\alpha x^2 + \beta x + \gamma = 0$ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΙΝ

**§ 182.** Εάν, ὅταν  $x=\lambda_1$  καὶ  $x=\lambda_2$  ( ὅπου οἱ  $\lambda_1$ ,  $\lambda_2$  εἰναι ἀριθμοὶ πραγματικοὶ καὶ διάφοροι μεταξύ των ), τὸ  $\alpha x^2 + \beta x + \gamma$  λαμβάνη τιμὰς ἔτεροςήμους, τότε ἡ ἔξισωσις  $\alpha x^2 + \beta x + \gamma = 0$  ἔχει ρίζας πραγματικὰς καὶ ἀνίσους ἐπειδὴ, ὃν αἱ ρίζαι ἡσαν ἴσαι ἢ μιγαδικαὶ τὸ  $\alpha x^2 + \beta x + \gamma$  οὐδέποτε θὰ ἥλλαζε πρόσημον, ὥστε νὰ ἐλάμβανε τιμὰς ἔτεροςήμους: πάντοτε θὰ ἥτο ὁμόσημον τοῦ  $\alpha$  (§180 δ'). Μεταξύ δὲ τῶν  $\lambda_1$  καὶ  $\lambda_2$  περιέχεται μία τῶν ριζῶν τῆς ἔξισώσεως  $\alpha x^2 + \beta x + \gamma = 0$ . Διότι, ὃν  $\rho_1$  καὶ  $\rho_2$  εἰναι αἱ ρίζαι τοῦ τριωνύμου  $\alpha x^2 + \beta x + \gamma$ , ἐπειδὴ διὰ  $x=\lambda_1$ ,  $x=\lambda_2$  αἱ τιμαι τοῦ τριωνύμου εἰναι ἔτερόσημοι ἐξ ὑποθέσεως, μία ἐκ τῶν τιμῶν αὐτῶν θὰ εἰναι ὁμόσημος τοῦ  $\alpha$  καὶ ἡ ἄλλη ἔτερόσημος τοῦ  $\alpha$ .

Ἄρα, εἰς ἐκ τῶν  $\lambda_1$ ,  $\lambda_2$  θὰ εἰναι ἐντὸς τῶν ριζῶν καὶ ὁ ἄλλος ἐκτὸς αὐτῶν.

Οὕτω ὃν  $\lambda_2 > \lambda_1$  καὶ  $\rho_2 > \rho_1$  θὰ ἔχωμεν ἡ τὴν διάταξιν  $\rho_1 \lambda_1 \rho_2 \lambda_2$  ἢ τὴν  $\lambda_1 \rho_1 \lambda_2 \rho_2$  ἐκ τῶν ὁποίων φαίνεται ὅτι μεταξὺ  $\lambda_1$ ,  $\lambda_2$  περιέχεται μία μόνον ρίζα, εἴτε ἡ  $\rho_2$  εἴτε ἡ  $\rho_1$ .

Ἐπὶ τῆς ἰδιότητος αὐτῆς στηριζόμενοι ἐργαζόμεθα ώς ἔξῆς, διὰ νὰ εὑρωμεν τὰς ( πραγματικὰς ) ρίζας ἔξισώσεως κατὰ προσέγγισιν ( ὃν δὲν εύρισκωνται ἀκριβῶς ).

\*Ἐστω ἡ ἔξισωσις  $8x^2 - 2x - 3 = 0$ .

Θέτομεν ἀντὶ τοῦ  $x$  δύο ἀριθμοὺς ( πραγματικούς ), ὥστε τὰ ἔξαγόμενα, τὰ ὅποια θὰ εὕρωμεν ἐκ τῆς ἀντικαταστάσεως τοῦ  $x$  εἰς τὸ  $8x^2 - 2x - 3$ , νὰ εἰναι ἔτερόσημα. Ὅταν  $x=0$ , εύρισκομεν -3, ὅταν  $x=1$ , εύρισκομεν 3. Ἐπομένως μεταξὺ 0 καὶ 1 περιέχεται μία

ρίζα τῆς ἔξισώσεως. Λαμβάνομεν τώρα τὴν μέσην τιμὴν μεταξὺ τοῦ 0 καὶ 1, δηλαδὴ θέτομεν  $x=0,5$ , δτε εύρισκομεν  $2-4=-2$  ἐπομένως ἡ ἀνωτέρω ρίζα περιέχεται μεταξὺ τοῦ 0,5 καὶ τοῦ 1. Ἡ μέση τιμὴ μεταξὺ τοῦ 0,5 καὶ 1 είναι 0,75 καὶ ἀντικαθιστῶντες εἰς τὴν δοθεῖσαν ἔξισώσιν  $x=0,75$  εύρισκομεν δτι ἡ τιμὴ αὐτῆς τοῦ  $x$  είναι ρίζα τῆς ἔξισώσεως. "Οταν  $x=-1$ , ἔχομεν  $8+2-3=7$ . Ἀρα ἡ ἄλλη ρίζα περιέχεται μεταξὺ 0 καὶ -1. (Προσεγγίσατε περισσότερον, ἢ εὔρετε αὐτήν). Τὸν τρόπον αὐτὸν τῆς εύρεσεως πραγματικῶν ριζῶν κατὰ προσέγγισιν δυνάμεθα νὰ ἐφαρμόσωμεν ὅμοιως καὶ εἰς ἔξισώσεις ἀνωτέρου βαθμοῦ.

### "Α σκηνις

412. Εύρετε μὲ προσέγγισιν τὰς πραγματικάς ρίζας τῶν κάτωθι ἔξισώσεων διὰ τῆς μεθόδου τῆς προσεγγίσεως (ἐάν δὲν εύρισκωνται ἀκριβῶς καὶ μὲ εύκολίαν).

$$\begin{array}{lll} \alpha') x^2-5x+3=0, & \beta') 3x^2-6x+2+0, & \gamma') 2x^2+3x-8=0, \\ \delta') x^3-3x^2+5x-1=0, & \epsilon') 2x^2+6x-5=0, & \sigma\tau') x^3+x-1=0, \\ \zeta') x^4-3x^3+4x^2-3=0, & \eta') x^4-3x^2-x+1=0. \end{array}$$

### 14. ΛΥΣΙΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΒΑΘΜΟΥ

**§ 183.** Πᾶσα ἀνισότης τοῦ δευτέρου βαθμοῦ ὡς πρὸς ἓνα ἄγνωστον, ἔστω τὸν  $x$ , είναι ἐν γένει τῆς μορφῆς  $\alpha x^2+\beta x+\gamma > 0$ , ἢ  $\alpha x^2+\beta x+\gamma < 0$ , ( ὅπου ὑποτίθεται δτι είναι  $\alpha \neq 0$  ).

Ἡ δευτέρα μορφὴ ἀνάγεται εἰς τὴν πρώτην, ἀν ἀλλάξωμεν τὰ σήματα πάντων τῶν ὅρων, δτε ἡ ἀνισότης ἀντιστρέφεται. "Ωστε πᾶσα ἀνισότης τοῦ δευτέρου βαθμοῦ δύναται νὰ θεωρηθῇ δτι είναι τῆς μορφῆς  $\alpha x^2+\beta x+\gamma > 0$ , ὅπου τὸ  $\alpha$  δύναται νὰ είναι θετικὸν ἢ ἀρνητικόν.

Διὰ νὰ λύσωμεν τὴν ἀνισότητα  $\alpha x^2+\beta x+\gamma > 0$  (1) παρατηροῦμεν δτι, ἀν παραστήσωμεν μὲ  $\rho_1$ ,  $\rho_2$  τὰς ρίζας τοῦ τριωνύμου τῆς (1) καὶ ὑποθέσωμεν δτι είναι πραγματικαὶ καὶ ἀνισοὶ ( ἔστω  $\rho_1 < \rho_2$  ), θὰ ἔχωμεν  $\alpha x^2+\beta x+\gamma = \alpha(x-\rho_1) \cdot (x-\rho_2)$ . Ζητοῦμεν νὰ εὕρωμεν τὰς τιμὰς τοῦ  $x$ , διὰ τὰς ὅποιας τὸ  $\alpha(x-\rho_1)(x-\rho_2)$  είναι θετικόν.

"Αν είναι τὸ  $\alpha > 0$ , τὸ ἀνωτέρω γινόμενον, ὡς γνωστόν, γίνεται θετικὸν διὰ  $x < \rho_1$ , καὶ  $x > \rho_2$ . Ἀρα αἱ τιμαὶ τοῦ  $x$ , αἱ ἐπαληθεύουσαι τὴν

άνισότητα, είναι πάντες οι πραγματικοί άριθμοι οι μικρότεροι τῆς μικροτέρας ρίζης  $\rho_1$  καὶ οἱ μεγαλύτεροι τῆς μεγαλυτέρας  $\rho_2$  τοῦ τριώνυμου.

\*Αν είναι  $\alpha < 0$ , τότε διὰ τὰς τιμὰς τοῦ  $x$ , αἱ ὅποιαι περιέχονται μεταξὺ τῶν  $\rho_1$  καὶ  $\rho_2$ , τὸ γινόμενον  $\alpha(x-\rho_1)(x-\rho_2)$  ἔχει σῆμα ἀντίθετον τοῦ  $\alpha$ , δηλαδὴ θετικόν. Ἐπομένως αἱ τιμαὶ τοῦ  $x$  αἱ ἐπαληθεύουσαι τὴν (1) είναι πάντες οἱ πραγματικοί άριθμοί, οἱ δόποιοι περιέχονται μεταξὺ  $\rho_1$  καὶ  $\rho_2$ .

\*Αν αἱ ρίζαι  $\rho_1$  καὶ  $\rho_2$  είναι ίσαι καὶ είναι τὸ  $\alpha > 0$ , τότε διὰ πᾶσαν τιμὴν τοῦ  $x$  διάφορον τῆς ρίζης τοῦ τριώνυμου τὸ γινόμενον  $\alpha(x-\rho_1)^2$  είναι θετικόν. Δηλαδὴ τότε πάντες οἱ πραγματικοί άριθμοι ἐκτὸς τῆς  $\rho_1$  ἐπαληθεύουν τὴν ἀνισότητα.

\*Αν ὅμως είναι τὸ  $\alpha < 0$ , ἡ ἀνισότης δὲν ἐπαληθεύεται διὰ καμμίαν τιμὴν πραγματικήν τοῦ  $x$ . Διότι τότε είναι  $\alpha x^2 + \beta x + \gamma = \alpha(x-\rho_1)^2$  καὶ ἀφοῦ τὸ  $\alpha$  είναι ἀρνητικόν, τὸ  $\alpha(x-\rho_2)^2$  είναι ἀρνητικὸν διὰ πᾶσαν πραγματικὴν τιμὴν τοῦ  $x$ , ἐκτὸς τῆς  $\rho_1$ , διὰ τὴν δόποιαν μηδενίζεται.

\*Αν αἱ ρίζαι  $\rho_1, \rho_2$  είναι μιγάδες ἐν γένει, ἡ ἀνισότης ἐπαληθεύεται διὰ πᾶσαν μὲν πραγματικὴν τιμὴν τοῦ  $x$ , ἀν είναι  $\alpha > 0$ , δι’ούδεμίαν δέ, ἀν είναι  $\alpha < 0$ . Διότι τὸ τριώνυμον τῆς (1) ἴσοῦται μὲ τὸ γινόμενον τοῦ  $\alpha$  ἐπὶ τὸ ἄθροισμα δύο τετραγώνων, ἥτοι ἔχει τὸ σημεῖον τοῦ  $\alpha$  διὰ πᾶσαν πραγματικὴν τιμὴν τοῦ  $x$ .

\*Εστω π.χ. ὅτι ζητεῖται νὰ λυθῇ ἡ ἀνισότης  $x^2 - 2x + 8 > 0$ .

Αἱ ρίζαι τοῦ τριώνυμου  $x^2 - 2x + 8$  είναι μιγάδες καὶ είναι  $\alpha = 1 > 0$ . \*Αρα ἡ ἀνισότης ἀληθεύει διὰ πᾶσαν πραγματικὴν τιμὴν τοῦ  $x$ .

\*Εστω πρὸς λύσιν ἡ ἀνισότης  $x^2 - x - 6 > 0$ .

Αἱ ρίζαι τοῦ τριώνυμου  $x^2 - x - 6$  είναι αἱ  $-2$  καὶ  $3$  καὶ τὸ  $\alpha = 1 > 0$ . Ἐπομένως αἱ πραγματικαὶ τιμαὶ τοῦ  $x$  αἱ ἐπαληθεύουσαι τὴν ἀνισότητα είναι αἱ  $x > 3$  καὶ  $x < -2$ .

### § 184. \*Εστω ὅτι ἔχομεν π.χ. τὴν ἀνισότητα.

$$x(x^2 - 3x + 2) (2x^2 + 7x + 3) (x^2 + x + 1) > 0. \quad (1)$$

Παρατηροῦμεν ὅτι τὸ  $x^2 + x + 1$  ἔχει ρίζας φανταστικάς, ἀρα ἔχει τιμὴν θετικήν δι’ οἰανδήποτε πραγματικὴν τιμὴν τοῦ  $x$ . Ἐπομένως ἡ δοθεῖσα ἀνισότης είναι ίσοδύναμος μὲ τὴν ἐπομένην

$$x(x^2 - 3x + 2) (2x^2 + 7x + 3) > 0. \quad (2)$$

Ό ο πρώτος παράγων  $x$  μηδενίζεται όταν  $x=0$ , ό δεύτερος  $x^2-3x+2$ , όταν  $x=1$ ,  $x=2$  καὶ ό τρίτος παράγων  $2x^2+7x+3$ , όταν  $x=-\frac{1}{2}$ ,  $x=-3$ .

Αἱ πέντε αὐταὶ τιμαὶ τοποθετούμεναι κατὰ σειρὰν μεγέθους εἰναι  $-3 < -\frac{1}{2} < 0 < 1 < 2$ .

α') "Οταν  $x < -3$ , ό πρώτος παράγων τῆς ἀνισότητος (2) εἶναι ἀρνητικός, ό  $(x^2-3x+2)$  θὰ ἔχῃ τὸ σῆμα τοῦ συντελεστοῦ τοῦ  $x^2$ , όταν  $x < 1$ , ἐπομένως καὶ όταν  $x < 3 < 1$ , τὸ  $x^2-3x+2$  θὰ ἔχῃ τὸ πρόσημον θετικόν. Όμοιως ό τρίτος παράγων τῆς ἀνισότητος (2) ό  $2x^2+7x+3$ , όταν  $x < -3$ , θὰ ἔχῃ τὸ πρόσημον τοῦ συντελεστοῦ τοῦ  $x^2$ , ἦτοι θετικόν. "Οθεν τὸ γινόμενον τῶν τριῶν παραγόντων τῆς (2) εἶναι ἀρνητικόν.

β') "Οταν εἶναι  $-3 < x < -\frac{1}{2}$ , ό πρώτος παράγων εἶναι ἀρνητικός ό δεύτερος θετικός ( διότι τὸ  $x$  ἔχει τιμὴν κειμένην ἐκτὸς τῶν ριζῶν του ) καὶ ό τρίτος εἶναι ἀρνητικός ( διότι ό  $x$  ἔχει τιμὴν κειμένην μεταξὺ τῶν ριζῶν του ). Ἐπομένως τὸ γινόμενον τῶν τριῶν παραγόντων εἶναι θετικόν.

γ') "Οταν εἶναι  $-\frac{1}{2} < x < 0$ , ό πρώτος παράγων εἶναι ἀρνητικός οἱ ἄλλοι δύο θετικοὶ καὶ τὸ γινόμενον τῶν τριῶν ἀρνητικόν.

δ') "Οταν  $0 < x < 1$ , ό πρώτος παράγων εἶναι θετικός, ό δεύτερος θετικός καὶ ό τρίτος θετικός, ἅρα τὸ γινόμενόν των εἶναι θετικόν.

ε') "Οταν ληφθῇ  $1 < x < 2$ , ό πρώτος καὶ τρίτος παράγων τῆς ἀνισότητος (2) εἶναι θετικοί, ό δεύτερος ἀρνητικός, ἅρα τὸ γινόμενον τῶν τριῶν παραγόντων ἀρνητικόν.

στ') Τέλος ἀν ληφθῇ  $x > 2$ , οἱ τρεῖς παράγοντες τῆς (2) εἶναι θετικοὶ καὶ τὸ γινόμενον εἶναι θετικόν.

Ἐκ τούτων ἔπειται ότι ή δοθεῖσα ἀνισότης ἐπαληθεύεται, όταν  $-3 < x < -\frac{1}{2}$  η όταν  $0 < x < 1$  η όταν  $x > 2$ .

Ἐν γένει, ἀν ἔχωμεν ἀνισότητα τῆς μορφῆς  $A \cdot B \cdot Γ > 0$ , όπου  $A, B, Γ$  παριστάνουν πολυώνυμα ώς πρὸς  $x$  πρώτου τοῦ δευτέρου βαθμοῦ, εύρισκομεν πρῶτον διὰ τίνας τιμάς τοῦ  $x$  ἕκαστον τῶν  $A, B, Γ$  γίνεται θετικὸν καὶ διὰ τίνας γίνεται ἀρνητικόν. Τοῦτο εύρισκομεν βοηθούμενοι ἀπὸ τὰς ρίζας ἔκαστου τῶν  $A, B, Γ$ .

Άκολούθως έκ τῶν τιμῶν τοῦ  $x$  κρατοῦμεν ώς λύσεις τῆς ἀνισότητος ἐκείνας, διὰ τὰς ὅποιας τὸ γενόμενον  $A \cdot B \cdot \Gamma$  γίνεται θετικόν.

**§ 185.** "Αν ἔχωμεν ἀνισότητα τῆς μορφῆς  $\frac{A}{B} > 0$ , ἀνάγομεν αὐτὴν εἰς τὴν ἰσοδύναμόν της ἀνισότητα τῆς μορφῆς  $A \cdot B > 0$ , ἢν πολλαπλασιάσωμεν τὰ ἀνισα ἐπὶ  $B^2$ , ὅτε λαμβάνομεν  $\frac{A \cdot B^2}{B} > 0$  ἢ  $A \cdot B > 0$ , τὴν ὅποιαν ἔξετάζομεν κατὰ τὰ ἀνωτέρω.

Δυνάμεθα ὅμως νὰ ἔξετάσωμεν χωριστὰ πότε εἶναι  $A > 0$  καὶ  $A < 0$ , καθὼς καὶ πότε εἶναι  $B > 0$  καὶ  $B < 0$  καὶ ἀκολούθως νὰ κρατήσωμεν ἐκείνας ἐκ τῶν τιμῶν τοῦ  $x$ , διὰ τὰς ὅποιας τὸ  $\frac{A}{B}$  εἶναι θετικόν.

"Εστω π.χ. πρὸς λύσιν ἡ ἀνισότης  $1 + \frac{x-4}{x-3} > \frac{x-2}{x-1}$ .

"Εξ αὐτῆς ἔχομεν τὴν ἰσοδύναμόν της  $1 + \frac{x-4}{x-3} - \frac{x-2}{x-1} > 0$  ἢ τὴν  $\frac{(x-3)(x-1) + (x-4)(x-1) - (x-2)(x-3)}{(x-3)(x-1)} > 0$ , καὶ μετὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν πράξεων καὶ τὴν ἀναγωγὴν τῶν ὁμοίων ὅρων (εἰς τὸν ἀριθμητὴν) ἔχομεν τὴν  $\frac{x^2-4x+1}{(x-3)(x-1)} > 0$ .

Αἱ ρίζαι τοῦ  $x^2-4x+1$  εἶναι  $2 \pm \sqrt{3}$ , αἱ δὲ τοῦ παρονομαστοῦ τῆς τελευταίας ἀνωτέρω ἀνισότητος αἱ 1 καὶ 3. Θέτοντες  $x=1$  εἰς τὸν ἀριθμητὴν τῆς ἀνισότητος εύρισκομεν ἔξαγόμενον  $-2 < 0$ . "Αρα τὸ 1 περιέχεται μεταξὺ τῶν ριζῶν τοῦ ἀριθμητοῦ. Θέτομεν  $x=3$  εἰς τὸν ἀριθμητὴν τῆς ἀνισότητος καὶ εύρισκομεν  $9-12+1=-2 < 0$ . "Αρα ἡ ρίζα 3 τοῦ παρονομαστοῦ περιέχεται μεταξὺ τῶν ριζῶν τοῦ ἀριθμητοῦ. Οὕτως ἔχομεν  $2-\sqrt{3} < 1 < 3 < 2+\sqrt{3}$ .

Παρατηροῦμεν τώρα ὅτι, ὅταν εἶναι  $x < 2-\sqrt{3}$ , ἢ  $x > 2+\sqrt{3}$  ὁ ἀριθμητὴς καὶ ὁ παρονομαστὴς τῆς ἀνωτέρω ἀνισότητος εἶναι θετικοί, ἤτοι αὐτῇ ἐπαληθεύεται. "Επίσης ὅτι, ὅταν  $1 < x < 3$  καὶ οἱ δύο ὅροι εἶναι ἀρνητικοί, ἀρα τὸ κλάσμα  $\frac{x^2-4x+1}{(x-3)(x-1)}$  εἶναι θετικὸν καὶ ἡ ἀνισότης ἐπαληθεύεται. "Ενῷ ὅταν  $2-\sqrt{3} < x < 1$  ἢ  $3 < x < 2+\sqrt{3}$ , ἡ ἀνωτέρω ἀνισότης δὲν ἐπαληθεύεται, διότι οἱ ὅροι τοῦ κλάσματος εἶναι ἑτερόσημοι καὶ ἐπομένως τὸ κλάσμα γίνεται ἀρνητικόν.

**Α σ κ ή σ εις**

Όμάς πρώτη. 413. Νὰ λυθοῦν αἱ κάτωθι ἀνισότητες :

$$\alpha') x^2 + 3x - 4 > 0, \quad \beta') x^2 + 3x - 6 > 0, \quad \gamma') \frac{x^2}{2} - \frac{3x}{4} < -2.$$

414. Εύρετε τὰς τιμὰς τοῦ  $x$  τὰς ἐπαληθευόσας τὰς δύο ἀνισότητας :

$$\alpha') x^2 - 12x + 32 > 0 \text{ καὶ } x^2 - 13x + 22 < 0, \quad \beta') x^2 - 3x + 2 > 0 \text{ καὶ } 4x^2 + 5x + 1 < 0.$$

415. Νὰ λυθοῦν αἱ ἀνισότητες :

$$\alpha') \frac{(x-1)(x-2)}{(x-3)(x-4)} > 1, \quad \beta') \frac{x^2 - 3x + 2}{x^2 + 3x - 2} > 0, \quad \gamma') 3 + \frac{1}{3-x} > \frac{1}{5x+1}.$$

Όμάς δευτέρα. 416. Νὰ λυθοῦν αἱ κατωτέρω ἀνισότητες, ἂν εἶναι  $\alpha < \beta < \gamma < \delta$  :  $\alpha') (x-\alpha)(x-\beta)(x-\gamma) > 0, \beta') (x-\alpha)(x-\beta)(x-\gamma)(x-\delta) > 0$ .

417. Νὰ λυθοῦν αἱ ἀνισότητες :

$$\alpha') 4x^3 - 10x^2 + 18x < 0, \quad \beta') 3x^3 - 5x^2 + 2x > 0, \quad \gamma') x^3 - x^2 + 4x > 0.$$

418. Μεταξὺ τίνων ἀριθμῶν πρέπει νὰ περιέχηται ὁ  $\mu$ , ἵνα ἡ ἔξισωσις,  $μx^2 + (\mu-1)x + 2\mu = 8$  ἔχῃ ρίζας πραγματικάς ; μιγάδας ;

419. Ποιάν τιμὴν πρέπει νὰ ἔχῃ ὁ  $\lambda$ , ἵνα ἡ  $x^2 + (2\lambda + 1)x - 19$  ἐπαληθεύηται διὰ πᾶσαν πραγματικὴν τιμὴν τοῦ  $x$  ;

**15. ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙΩΝΥΜΟΥ  $αx^2 + βx + γ$   
ΔΙΑ ΠΑΣΑΣ ΤΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑΣ ΤΙΜΑΣ ΤΟΥ  $x$**

**§ 186. α')** Εστω π.χ. τὸ τριώνυμον  $7x^2 - 5x + 6$ .

"Αν παραστήσωμεν αὐτὸ μὲ ψ, θὰ ἔχωμεν τὴν συνάρτησιν

$$\psi = 7x^2 - 5x + 6 \tag{1}$$

"Αν τὸ  $x$  ἀντικαταστήσωμεν μὲ μίαν τιμὴν πραγματικὴν π.χ. μὲ  $x = 3$ , τὸ τριώνυμον λαμβάνει τὴν τιμὴν  $7 \cdot 3^2 - 5 \cdot 3 + 6$ .  $(2)$

"Αν εἰς τὴν (1) θέσωμεν ἀντὶ τοῦ  $x$  τὴν τιμὴν  $3 + \epsilon$ , ὅπου τὸ  $\epsilon$  παριστάνει ποσότητά τινα πραγματικήν, θὰ ἔχωμεν ὡς τιμὴν τοῦ  $\psi$  τὴν  $\psi = 7(3 + \epsilon)^2 - 5(3 + \epsilon) + 6 = 7(3^2 + 2 \cdot 3\epsilon + \epsilon^2) - 5 \cdot 3 - 5\epsilon + 6 = (7 \cdot 3^2 - 5 \cdot 3 + 6) + 7 \cdot 2 \cdot 3\epsilon + 7\epsilon^2 - 5\epsilon$ .  $(3)$

"Εὰν ἀπὸ τὴν τιμὴν αὐτὴν (3) τοῦ  $\psi$  ἀφαιρέσωμεν τὴν προγομνένην τιμὴν αὐτοῦ (2), εύρισκομεν διαφορὰν τὴν

$$7(3 + \epsilon)^2 - 5(3 + \epsilon) + 6 - 7 \cdot 3^2 + 5 \cdot 3 - 6 = 7 \cdot 2 \cdot 3\epsilon + 7\epsilon^2 - 5\epsilon. \tag{4}$$

"Αν τώρα ύποθέσωμεν ὅτι τὸ  $\epsilon$  εἰναι ποσότης ὅσον θέλομεν μικρὰ ἀπολύτως, τότε καὶ ἡ ποσότης (4) γίνεται ὅσον θέλομεν μικρὰ (ἀπολύτως). Διότι ἔκαστος τῶν ὅρων τῆς περιέχει τὸ  $\epsilon$ , τὸ δόποιον δυνάμεθα νὰ ἐλαττώσωμεν, ὅσον θέλομεν (ἀπολύτως). Πα-

ρατηροῦμεν λοιπὸν ὅτι εἰς ἐλαχίστην ( ἀπολύτως ) μεταβολὴν τῆς τιμῆς 3 τοῦ  $x$  ἀντιστοιχεῖ ἐλαχίστη ( ἀπολύτως ) μεταβολὴ τῆς συναρτήσεως (1). Διὰ τοῦτο λέγομεν ὅτι :

Τὸ τριώνυμον (1) εἶναι συνεχὲς ὡς πρὸς  $x$  ἢ συνεχῆς συνάρτησις τοῦ  $x$  διὰ τὴν τιμὴν τοῦ  $x=3$ .

’Αλλ’ οἰανδήποτε πραγματικὴν τιμὴν καὶ ἀν θέσωμεν ἀντὶ τοῦ  $x$  εἰς τὴν (1), εύρισκομεν ὅτι τὸ τριώνυμον εἶναι συνεχῆς συνάρτησις τοῦ  $x$  διὰ πᾶσαν τοιαύτην τιμὴν τούτου.

’Ομοίως εύρισκομεν ὅτι πᾶν τριώνυμον τῆς μορφῆς  $\alpha x^2 + \beta x + \gamma$  εἶναι συνεχῆς συνάρτησις διὰ πᾶσαν πραγματικὴν τιμὴν τοῦ  $x$ .

Καθ’ ὅμιοιν τρόπουν δρίζομεν τὴν συνέχειαν οἰασδήποτε συνάρτησεως τοῦ  $x$ . ”Αν δὲ συνάρτησίς τις δὲν εἶναι συνεχῆς διὰ τινα τιμὴν τοῦ  $x$ , λέγεται ἀσυνεχῆς διὰ τὴν τιμὴν αὐτῆν.

’Εκ τούτων ἔπειται ὅτι, ὅταν τὸ  $x$  μεταβάλλεται ἀπό τινος πραγματικῆς τιμῆς  $\lambda$  εἰς ἄλλην μ λαμβάνον συνεχῶς τὰς ἐνδιαμέσους τιμὰς τὰς κειμένας μεταξὺ τῶν  $\lambda$  καὶ  $\mu$ , τὸ τριώνυμον θὰ μεταβάλλεται ἀπό τῆς τιμῆς  $\alpha\lambda^2 + \beta\lambda + \gamma$  εἰς τὴν τιμὴν  $\alpha\mu^2 + \beta\mu + \gamma$  λαμβάνον τιμὰς ἐν συνεχείᾳ.

β’) ’Εὰν μεταβλητή τις  $x$  λαμβάνῃ ἀπειρον πλῆθος πραγματικῶν τιμῶν, αἱ ὁποῖαι ὀπό τινος καὶ ἔξῆς ὑπερβαίνουν πάντα ἀριθμὸν θετικὸν ( δσονδήποτε μεγάλον ), τότε λέγομεν ὅτι αὗτη **τείνει εἰς τὸ θετικὸν ἀπειρον** ( $+\infty$ ) καὶ τὸ σημειώνομεν μὲ  $\rightarrow\infty$ . ’Εὰν δὲ αἱ τιμαὶ αὐτῆς ἀπό τινος καὶ ἐφ’ ἔξῆς εἶναι μικρότεραι παντὸς ἀριθμοῦ ἀρνητικοῦ ( δσονδήποτε μικροῦ ), λέγομεν ὅτι ἡ  $x$  τείνει εἰς τὸ ἀρνητικὸν ἀπειρον ( $-\infty$ ) καὶ τὸ σημειώνομεν μὲ  $x\rightarrow-\infty$ .

”Εστω τὸ τριώνυμον  $\alpha x^2 + \beta x + \gamma$ , ὅπου  $\alpha \neq 0$ . Θέλομεν νὰ εῦρωμεν πῶς μεταβάλλεται τοῦτο, ὅταν τὸ  $x$  μεταβάλλεται ἀπὸ  $-\infty$  μέχρι  $+\infty$  λαμβάνον ἐν συνεχείᾳ πάσας τὰς ἐνδιαμέσους πραγματικὰς τιμάς. Γράφομεν τὸ τριώνυμον ὡς ἔξῆς :

$$\begin{aligned} \alpha x^2 + \beta x + \gamma &= \alpha \left( x^2 + \frac{\beta}{\alpha} x + \frac{\gamma}{\alpha} + \frac{\beta^2}{4\alpha^2} - \frac{\beta^2}{4\alpha^2} \right) = \alpha \left[ \left( x + \frac{\beta}{2\alpha} \right)^2 + \frac{\gamma}{\alpha} - \frac{\beta^2}{4\alpha^2} \right] \\ &= \alpha \left[ \left( x + \frac{\beta}{2\alpha} \right)^2 - \frac{\beta^2 - 4\gamma}{4\alpha^2} \right]. \end{aligned}$$

Παρατηροῦμεν ὅτι, ἀν μὲν εἶναι  $\alpha > 0$ , τὸ τριώνυμον θὰ ἔχῃ τὸ πρόσημον τῆς ποσότητος, ἡ ὁποία εἶναι ἐντὸς τῶν ἀγκυλῶν· ἀν δὲ εἶναι  $\alpha < 0$ , θὰ ἔχῃ τὸ ἀντίθετον πρόσημον αὐτῆς.

1ον. "Εστω ότι είναι τὸ  $\alpha > 0$ . "Οταν τὸ  $x \rightarrow -\infty$ , τὸ  $(x + \frac{\beta}{2\alpha})^2 \rightarrow +\infty$ , ἐὰν δὲ ἀπ' αὐτοῦ ἀφαιρεθῇ ὁ ὠρισμένος ἀριθμὸς  $\frac{\beta^2 - 4\alpha\gamma}{4\alpha^2}$ , μένει διαφορά, ἡ ὁποία τείνει εἰς τὸ  $+\infty$ .

"Ωστε, ὅταν  $x \rightarrow -\infty$ , τὸ τριώνυμον τείνει εἰς τὸ  $+\infty$ .

"Εὰν τὸ  $x$  αὐξάνεται συνεχῶς ἀπὸ τοῦ  $-\infty$  λαμβάνον τιμὰς μικροτέρας τοῦ  $-\frac{\beta}{2\alpha}$ , τὸ  $x + \frac{\beta}{2\alpha}$  είναι ἀρνητικόν, ἀλλὰ τὸ τετράγωνον αὐτοῦ  $(x + \frac{\beta}{2\alpha})^2$  είναι θετικόν καὶ ἐλαττοῦται συνεχῶς.

"Οταν τὸ  $x$  γίνῃ  $-\frac{\beta}{2\alpha}$ , τὸ  $x + \frac{\beta}{2\alpha}$  γίνεται 0, τὸ δὲ τριώνυμον γίνεται  $-\alpha \cdot \frac{\beta^2 - 4\alpha\gamma}{4\alpha^2}$ . "Οταν τὸ  $x$  αὐξάνεται ἀπὸ τῆς τιμῆς  $-\frac{\beta}{2\alpha}$  συνεχῶς τείνον εἰς τὸ  $+\infty$ , ἡ ποσότης  $x + \frac{\beta}{2\alpha}$  είναι θετική καὶ αὐξάνεται συνεχῶς ἀπὸ τὸ 0 τείνουσα εἰς τὸ  $+\infty$ .

"Ἄρα καὶ ἡ τιμὴ τοῦ τριώνυμου αὐξάνεται συνεχῶς ἀπὸ τῆς τιμῆς  $-\alpha \cdot \frac{\beta^2 - 4\alpha\gamma}{4\alpha^2}$  τείνουσα εἰς τὸ  $+\infty$ .

2ον. "Εστω ότι είναι τὸ  $\alpha < 0$ . "Οταν τὸ  $x \rightarrow -\infty$ , τὸ τριώνυμον τείνει εἰς τὸ  $-\infty$ , διότι τὸ μὲν  $(x + \frac{\beta}{2\alpha})^2$  τείνει εἰς τὸ  $+\infty$ , ἀλλὰ τὸ γινόμενον  $\alpha (x + \frac{\beta}{2\alpha})^2 \rightarrow -\infty$ , ἐπειδὴ είναι  $\alpha < 0$ .

"Οταν τὸ  $x = -\frac{\beta}{2\alpha}$ , τὸ τριώνυμον γίνεται  $-\alpha \cdot \frac{\beta^2 - 4\alpha\gamma}{4\alpha^2}$ .

"Οταν τὸ  $x \rightarrow +\infty$ , τὸ τριώνυμον τείνει πάλιν εἰς τὸ  $-\infty$ , ἔνεκα τοῦ ότι είναι  $\alpha < 0$ . "Ητοι :

"Οταν τὸ  $\alpha > 0$  καὶ τὸ  $x$  μεταβάλλεται συνεχῶς ἀπὸ  $-\infty$  ...  $-\frac{\beta}{2\alpha} \dots +\infty$ , τὸ τριώνυμον ἐλαττοῦται συνεχῶς ἀπὸ  $+\infty$  μέχρι τοῦ  $-\frac{\beta^2 - 4\alpha\gamma}{4\alpha}$  καὶ ἐπειτα αὐξάνεται συνεχῶς μέχρι τοῦ  $+\infty$ , ὅταν δὲ είναι τὸ  $\alpha < 0$ , διὰ τὴν αὐτὴν συνεχῆ μεταβολὴν τοῦ  $x$ , τὸ τριώνυμον αὐξάνεται συνεχῶς ἀπὸ  $-\infty$ , γίνεται  $-\frac{\beta^2 - 4\alpha\gamma}{4\alpha}$  καὶ ἐλαττοῦται πάλιν συνεχῶς μέχρι  $-\infty$ .

γ') "Οταν μία τῶν τιμῶν, τὰς ὁποίας λαμβάνει μεταβλητὴ ποσότης, είναι μεγαλυτέρα πασῶν τῶν ὄλλων πλησίον τιμῶν αὐτῆς, τότε λέγομεν ότι αὗτη είναι μέγιστον τῆς μεταβλητῆς.

Τουναντίον, έὰν μία τῶν τιμῶν μεταβλητῆς ποσότητος εἶναι μικροτέρα τῶν ἄλλων γειτονικῶν τιμῶν αὐτῆς, καλοῦμεν αὐτὴν ἐλάχιστον τῆς μεταβλητῆς.

δ') Ἐκ τῶν ἀνωτέρω παρατηροῦμεν ὅτι :

Ἐὰν εἶναι τὸ  $\alpha > 0$ , τὸ τριώνυμον  $\alpha x^2 + \beta x + \gamma$  ἔχει ἐλάχιστον, ὅταν  $x = -\frac{\beta}{2\alpha}$ , εἶναι δὲ ἡ ἐλαχίστη τιμὴ του ἡ  $-\frac{\beta^2 - 4\alpha\gamma}{4\alpha}$ .

Ἐὰν εἶναι τὸ  $\alpha < 0$ , τὸ τριώνυμον ἔχει μέγιστον, ὅταν  $x = -\frac{\beta}{2\alpha}$ , εἶναι δὲ ἡ μεγίστη τιμὴ του ἡ  $-\frac{\beta^2 - 4\alpha\gamma}{4\alpha}$ .

Ἐστω π.χ. τὸ τριώνυμον  $3x^2 - 6x + 7$ . Τὸ  $\alpha = 3 > 0$ . ἀρα τὸ τριώνυμον ἔχει ἐλάχιστον, ὅταν  $x = -\frac{\beta}{2\alpha} = \frac{6}{6} = 1$ .

Θέτοντες  $x = 1$  εύρισκομεν ὅτι τὸ ἐλάχιστον τοῦ τριωνύμου εἶναι 4.

### "Α σ κη σις

420. Δι' ἕκαστον τῶν κάτωθι τριωνύμων νὰ εύρεθῇ τὸ μέγιστον ἢ ἐλάχιστον καὶ διὰ τίνα τιμὴν τοῦ  $x$  συμβαίνει τοῦτο :

$$\begin{array}{lll} \alpha') -x^2 + 4x + 3, & \beta') 19x^2 - 7x + 3, & \gamma') x^2 - 7x - 13, \\ \delta') 15x^2 + x - 7, & \epsilon') -x^2 + 3 + 3x - 6, & \sigma') 9,5x^2 - 0,25x - 2. \end{array}$$

### 16. ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΣ $\psi = \alpha x^2 + \beta x + \gamma$

**§ 187.** "Ἐστω τὸ τριώνυμον  $\alpha x^2 + \beta x + \gamma$  ( ὅπου εἶναι  $\alpha \neq 0$ ). Διὰ νὰ παραστήσωμεν γραφικῶς τὴν μεταβολὴν αὐτοῦ θέτομεν

$$\psi = \alpha x^2 + \beta x + \gamma \quad (1)$$

καὶ διακρίνομεν δύο περιπτώσεις, ὑποθέτοντες ὅτι ἕκαστον ζεῦγος τῶν τιμῶν τοῦ  $x$  καὶ  $\psi$  παριστάνεται μὲ ἐν σημείον ἔχον τετμημένην τὴν τιμὴν τοῦ  $x$  καὶ τεταγμένην τὴν τιμὴν τοῦ  $\psi$  ὡς πρὸς ἄξονας ὀρθογωνίους  $x'$ O $x$  καὶ  $\psi'$ O $\psi$ .

1ον. "Οταν εἶναι τὸ  $\alpha > 0$ .

Γνωρίζομεν ὅτι, ὅταν τὸ  $x$  αὔξανεται συνεχῶς ἀπὸ  $-\infty$  μέχρι  $-\frac{\beta}{2\alpha}$ , τὸ  $\psi$  ἐλαττοῦται συνεχῶς ἀπὸ  $+\infty$  μέχρι τοῦ  $\frac{4\alpha\gamma - \beta^2}{4\alpha}$ .

Διὰ τοῦτο λέγομεν ὅτι ἡ ἔξισωσις (1) παριστάνεται μὲ μίαν καμπύλην γραμμήν, τῆς ὅποιας ἕκαστον σημεῖον ἔχει τετμημένην καὶ τεταγμένην ἀντιστοίχους τιμὰς τῶν  $x$  καὶ  $\psi$  τῆς ἔξισώσεως (1). \*Ητοι

ή έν λόγω γραμμή θά έχη ένα κλάδον συνεχή (άνευ διακοπῆς τινος), ό δόποιος θά άρχιζη άπό έν σημείον, τὸ δόποιον κεῖται εἰς τὴν γωνίαν ψθ' καὶ εἶναι πολὺ μεμακρυσμένον (τετμημένην  $x \rightarrow -\infty$  καὶ τεταγμένην  $\psi \rightarrow +\infty$ ), κατερχόμενος δὲ διέρχεται άπό τὸ σημεῖον A (ἄνω ἡ κάτω τῆς O $\psi$ ), ἔχον

$$\text{τετμημένην } -\frac{\beta}{2\alpha}, \text{ τεταγμένην } \delta \epsilon$$

$$\frac{4\alpha y - \beta^2}{4\alpha} \text{ (σχ. 16),}$$

"Οταν τὸ x άπό τῆς τιμῆς  $-\frac{\beta}{2\alpha}$  αύξάνεται συνεχῶς τείνον εἰς τὸ  $+\infty$ , ἡ ἔξισωσις (1) λέγομεν ὅτι παριστάνει ἄλλον συνεχῆ κλάδον γραμμῆς, ό δόποιος ἀνέρχεται άπό τὸ σημεῖον A καὶ ἀπομακρύνεται πρὸς έν σημεῖον πολὺ μεμακρυσμένον, τὸ δόποιον κεῖται εἰς τὴν γωνίαν xOψ, μὲ τετμημένην καὶ τεταγμένην τεινούσας εἰς τὸ  $+\infty$ .


'Εκ τῶν ἀνωτέρω ἔπειται ὅτι ἡ ἔξισωσις (1), ὅταν τὸ α εἶναι θετικόν, παριστάνει τὴν καμπύλην ΒΑΓ (σχ. 16).

**2ον.** "Οταν εἶναι τὸ α < 0.

Εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτήν, ὅταν τὸ x αύξάνεται συνεχῶς άπό  $-\infty$  μέχρι τοῦ  $-\frac{\beta}{2\alpha}$ , τὸ ψ αύξάνεται συνεχῶς άπό  $-\infty$  μέχρι τοῦ  $\frac{4\alpha y - \beta^2}{4\alpha}$ .


'Επομένως διὰ τὰς τιμὰς αὐτὰς ἡ ἔξισωσις (1) παριστάνει ένα συνεχῆ κλάδον ό δόποιος άρχιζει άπό έν σημείον πολὺ μεμακρυσμένον καὶ κείμενον εἰς τὴν γωνίαν x'Οψ', τοῦ δόποιου ἡ τετμημένη καὶ τεταγμένη τείνουν εἰς τὸ  $-\infty$ , καταλήγει δὲ εἰς τὸ σημεῖον A' (ἄνω ἡ κάτω τῆς O $\chi$ ), τοῦ ὁποίου ἡ μὲν τετμημένη ἰσοῦται μὲ  $-\frac{\beta}{2\alpha}$ , ἡ δὲ τεταγμένη μὲ  $\frac{4\alpha y - \beta^2}{4\alpha}$  (σχ. 17).

"Οταν τὸ x αύξάνεται συνεχῶς άπό  $-\frac{\beta}{2\alpha}$  μέχρι τοῦ  $+\infty$ , τὸ τριώνυμον ,ἄρα καὶ τὸ ψ, ἐλαστοῦται συνεχῶς άπό  $\frac{4\alpha y - \beta^2}{4\alpha}$  μέχρι τοῦ  $+\infty$  καὶ ἡ ἔξισωσις (1) διὰ τὰς τιμὰς αὐτὰς λέγομεν ὅτι παριστάνει



Σχ. 16

συνεχῆ κλάδον (καμπύλης) γραμμῆς, ό όποιος κατέρχεται άπό τὸ σημεῖον  $A'$  καὶ ἀπομακρύνεται πρὸς ἐν σημεῖον πολὺ μεμακρυσμένον κείμενον εἰς τὴν γωνίαν  $xOy'$  μὲ τετμημένην καὶ τεταγμένην τεινούσας εἰς τὸ  $+\infty$  καὶ  $-\infty$  (σχ. 17).



σχ. 17

τριωνύμου, ὅταν τεθῇ εἰς αὐτὸν  $x=\rho_1$ , ἢ  $x=\rho_2$ , ἔχομεν  $\psi=0$ .

Ἐκ τούτου ἔπειται ὅτι ἡ καμπύλη τέμνει τὸν ἄξονα τῶν  $x$  εἰς τὰ σημεῖα τὰ ἔχοντα τετμημένας  $\rho_1$  καὶ  $\rho_2$ . Ἐν τὰ  $\rho_1$  καὶ  $\rho_2$  είναι φανταστικοὶ ἢ μιγάδες ἀριθμοί, ἡ καμπύλη (πραγματικῶς) δὲν τέμνει τὸν ἄξονα τῶν  $x$ .

Δυνάμεθα νὰ εῦρωμεν σημεῖα τῆς καμπύλης θέτοντες  $x=1, 2, 3, \dots$ , ὅτε εύρισκομεν  $\psi=\alpha+\beta+\gamma$ ,  $\psi=4\alpha+2\beta+\gamma$ ,  $\psi=9\alpha+3\beta+\gamma, \dots$  Οὕτως εύρισκομεν τὰ σημεῖα τῆς καμπύλης.

$$(1, \alpha+\beta+\gamma), (2, 4\alpha+2\beta+\gamma), (3, 9\alpha+3\beta+\gamma), \dots$$

Ἐπίσης θέτομεν  $x=-1, -2, -3$  καὶ εύρισκομεν ἄλλα σημεῖα τῆς καμπύλης, Ἐν θέλωμεν, θέτομεν  $x$  ἵσον μὲ ἄλλας τιμὰς π.χ.  $x=\pm 0,1, \pm 0,2, \dots$   $x=\pm 2,1, \pm 2,2, \dots$  καὶ εύρισκομεν ἄλλα σημεῖα τῆς καμπύλης.

**§ 188. Παρατήρησις.** Ἡ καμπύλη, τὴν όποιαν παριστάνει ἡ ἔξισωσις (1), καλεῖται παραβολὴ, τῆς όποιας ἡ θέσις ἀλλάσσει μετὰ τοῦ προσήμου τοῦ  $\alpha$  καὶ τῶν συντελεστῶν τοῦ τριωνύμου.

*Ἐφαρμογή.* Ἐστω τὸ τριώνυμον  $\psi=x^2-5x+4$ . ἔχομεν

$$\psi=x^2-5x+4+\frac{25}{4}-\frac{25}{4}=\left(x-\frac{5}{2}\right)^2+4-\frac{25}{4}=\left(x-\frac{5}{2}\right)^2-\frac{9}{4}.$$

Οταν τὸ  $x$  αὐξάνεται συνεχῶς ἀπό  $-\infty$  μέχρι τοῦ  $\frac{5}{2}$ , τὸ  $\left(x-\frac{5}{2}\right)^2$

έλαττοῦται συνεχῶς ἀπὸ  $+\infty$  μέχρι τοῦ 0, τὸ δὲ ψ ἔλαττοῦται συνεχῶς ἀπὸ  $-\infty$  μέχρι τοῦ  $-\frac{9}{4}$ . Οὕτως ἡ καμπύλη ἔχει συνεχῆ κλάδον

Γ'Α ἀρχόμενον ἀπὸ σημείον μὲτα τημημένην καὶ τεταγμένην τεινούσας εἰς τὸ  $-\infty$  καὶ  $+\infty$  καὶ φθάνει εἰς τὸ σημεῖον  $A\left(\frac{5}{2}, -\frac{9}{4}\right)$  (σχ. 18).

Όταν τὸ  $x$  αὔξάνεται συνεχῶς ἀπὸ  $\frac{5}{2}$  μέχρι τοῦ  $+\infty$ , τὸ  $(x - \frac{5}{2})^2$  αὔξάνεται συνεχῶς ἀπὸ τοῦ 0 μέχρι τοῦ  $+\infty$ , τὸ δὲ ψ αὔξάνεται συνεχῶς ἀπὸ  $-\frac{9}{4}$  μέχρι τοῦ  $+\infty$ . Ἡ καμπύλη λοιπὸν ἔχει καὶ δεύτερον συνεχῆ κλάδον ΑΓ, δὸποιος ἀνέρχεται ἐκ τοῦ σημείου  $A\left(\frac{5}{2}, -\frac{9}{4}\right)$  καὶ ἀπομακρύνεται εἰς τὸ ἄπειρον μέχρι τοῦ σημείου, τὸ δὸποιον ἔχει συντεταγμένας τεινούσας εἰς  $+\infty$ .

Όταν  $x=0$ , τὸ ψ εἶναι ἵσον μὲ 4. Ἀρα ἡ καμπύλη τέμνει τὸν ἄξονα τῶν ψ εἰς τὸ σημεῖον  $\Gamma'$   $(0,4)$ . Ἡ καμπύλη τέμνει τὸν ἄξονα τῶν  $x$  εἰς τὰ σημεῖα  $(1,0)$  καὶ  $(4,0)$ , ἐπειδὴ εἶναι  $\rho_1=1$  καὶ  $\rho_2=4$ .


Διὰ νὰ εὑρωμεν καὶ ἄλλα σημεῖα τῆς καμπύλης θέτομεν π.χ.  $x=2$  καὶ εύρισκομεν  $\psi=4-10+4=-2$ ,  $x=-2$ , ὅτε  $\psi=4+10+4=18$ ,  $x=3$ , ὅτε  $\psi=9-15+4=-2$ ,  $x=-3$ , ὅτε  $\psi=9+15+4=28$ .

Οὕτως ἔχομεν ὡς σημεῖα τῆς καμπύλης τά :

$$(2,-2), (-2,18), (3,-2), (-3,28).$$

**Παρατήσις.** Ἡ εὗρεσις τῶν σημείων, εἰς τὰ ὅποια ἡ ὑπὸ τῆς ἔξισώσεως  $\psi=\alpha x^2+\beta x+\gamma$  παριστανομένη γραμμὴ τέμνει τὸν ἄξονα τῶν  $x$ , θὰ δρίσῃ τὰ σημεῖα αὐτὰ μὲ τὰς τετμημένας των. Ἄλλ' αὖταὶ θὰ εἶναι ρίζαι τοῦ τριωνύμου  $\alpha x^2+\beta x+\gamma$ , ἐπειδὴ θὰ ἔχωμεν  $\psi=0$ .

Ἡ εὗρεσις τῶν ριζῶν τῆς ἔξισώσεως αὐτῆς κατὰ τὸν τρόπον



Σχ. 18

αύτόν, δηλαδή όταν κατασκευάσωμεν τὴν καμπύλην  $\psi = \alpha x^2 + \beta x + \gamma$  καὶ εύρωμεν τὰς τετμημένας τῶν σημείων τομῆς τῆς καμπύλης μὲ τὸν ἄξονα τῶν  $x$ , λέγεται γραφικὴ λύσις τῆς ἔξισώσεως  $\alpha x^2 + \beta x + \gamma = 0$

### Α σ κ ή σ εις

'Ο μὰς πρώτη . 421. Νὰ ἔξετασθῇ γραφικῶς ἡ μεταβολὴ τῶν συναρτήσεων εἰς ἄξονας ὀρθογωνίους :

$$\alpha') \psi = x^2 - x - 3,$$

$$\gamma') \psi = 2x + \frac{x^2}{4},$$

$$\beta') \psi = 3x^2 - 7x + 3,$$

$$\delta') \psi = -\frac{3}{4}x^2 + \frac{2}{5}x - 1.$$

422. Νὰ λυθῇ γραφικῶς ἡ ἔξισωσις  $x^2 - 7x + 11 = 0$  (θέσατε  $\psi = x^2 - 7x + 11$ )

'Ο μὰς δευτέρα . 423. Νὰ κατασκευασθῇ ἡ γραμμή, τὴν δποίαν παριστάνει ἡ ἔξισωσις  $x^2 + \psi^2 = 25$  εἰς ἄξονας ὀρθογωνίους.

424. Νὰ κατασκευασθοῦν εἰς ἄξονας ὀρθογωνίους αἱ γραμμαὶ  $\psi = x^2$ ,  $x = \psi^2$  καὶ νὰ δειχθῇ δτὶ ἔχουν μίαν μόνην κοινὴν χορδὴν.

425. Εύρετε γραφικῶς εἰς ἄξονας ὀρθογωνίους τὰς συντεταγμένας τῶν κοινῶν σημείων τῶν  $8\psi = x^2$  καὶ  $x = -\psi^2$ .

426. Εύρετε τὰς γραφικὰς παραστάσεις εἰς ἄξονας ὀρθογωνίους τῶν  $\psi = x^2$  καὶ  $\psi = 8x^2$  καὶ συγκρίνατε αὐτὰς μεταξὺ των.

427. Εύρετε τὴν τομὴν τῶν γραμμῶν εἰς ἄξονας ὀρθογωνίους  $x^2 + \psi^2 = 100$  καὶ  $x + \psi = 5$ .

17. ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΣ  $\psi = \frac{\alpha x + \beta}{\gamma x + \delta}$

**§ 189.** \*Εστω πρῶτον ἡ  $\psi = \frac{1}{x}$ . (1)


Θέτομεν εἰς τὴν (1)  $x = 1, 2, 3, 4, \dots$  καὶ εύρισκομεν  $\psi = 1, \frac{1}{2},$

$\frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots$  Λαμβάνομεν ἄξονας ὀρθογωνίους  $x'$ Ox, ψ' Oψ (σχ. 19) καὶ τὰ εὐθύγραμμα τμήματα 0θ, θO ψ ἐπὶ τῶν Ox καὶ Oψ παριστάνοντα τὸ  $+1$  ἐπὶ ἑάστου ἄξονος. Ακολούθως εύρισκομεν τὰ σημεῖα, τὰ δποία ἔχουν συντεταγμένας  $(1, 1), (2, \frac{1}{2}), (3, \frac{1}{3}), (4, \frac{1}{4}), \dots$ , εστωσαν δὲ αὐτὰ κατὰ σειρὰν τὰ  $M_1, M_2, M_3, M_4, \dots$  (σχ. 19).

Παρατηροῦμεν ὅτι, ὅταν τὸ x λαμβάνῃ τιμὰς θετικὰς αὐξανομένας, τὸ ψ λαμβάνει τιμὰς θετικὰς καὶ ἐλαττουμένας, ὅταν δὲ τὸ  $x \rightarrow \infty$ , τὸ ψ  $\rightarrow 0$ . Τὸ σημεῖον, τὸ δποίον ἔχει συντεταγμένας

$(x \rightarrow +\infty, \psi \rightarrow 0)$  τείνει νὰ είναι ἐπὶ τοῦ ἄξονος  $Ox$ , ἀλλ' εἰς ἀπειρον ἀπόστασιν ἀπὸ τὸ  $0$ . Θέτομεν τώρα εἰς τὴν (1)  $x = \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots$  καὶ εύρισκομεν  $\psi = 2, 3, 4, \dots$ , ἀκολούθως δὲ εύρισκομεν τὰ σημεῖα μὲ συντεταγμένας  $(\frac{1}{2}, 2), (\frac{1}{3}, 3),$

$(\frac{1}{4}, 4), \dots$ , ἔστωσαν δὲ αὐτὰ κατὰ σειρὰν τὰ  $M_{\frac{1}{2}}, M_{\frac{1}{3}}, M_{\frac{1}{4}}, \dots$



Σχ. 19

Παρατηροῦμεν ὅτι, ὅταν τὸ  $x$  λαμβάνῃ τιμὰς θετικὰς ἐλαττουμένας, καὶ τὸ  $\psi$  λαμβάνει τιμὰς θετικάς, ἀλλ' αὐξανομένας ὅταν δὲ  $x \rightarrow 0$ , τὸ  $\psi \rightarrow +\infty$ . Τὸ σημεῖον μὲ συντεταγμένας  $(x \rightarrow 0, \psi \rightarrow +\infty)$  τείνει νὰ είναι ἐπὶ τοῦ ἄξονος  $O\psi$ , ἀλλ' εἰς ἀπειρον ἀπόστασιν ἀπὸ τὸ  $O$ . Θέτοντες εἰς τὴν (1)  $x = \alpha > 0$  εύρισκομεν  $\psi = \frac{1}{\alpha} > 0$ . Ἡ ἔξισωσις

λοιπὸν (1) λέγομεν ὅτι παριστάνει μίαν γραμμὴν διερχομένην ἀπὸ τὰ σημεῖα  $M_1, M_2, M_3, M_4, \dots, M$  ( $x \rightarrow +\infty, \psi \rightarrow 0$ ), καθὼς καὶ ἀπὸ τὰ σημεῖα  $M_{\frac{1}{2}}, M_{\frac{1}{3}}, M_{\frac{1}{4}}, \dots, M'$  ( $x \rightarrow 0, \psi \rightarrow +\infty$ ) καὶ ἔχει τὸ σχ. 19.

Θέτομεν εἰς τὴν (1)  $x = -1, -2, -3, \dots, x \rightarrow -\infty$  καὶ εύρισκομεν ὅτι  $\psi = -1, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{3}, -\frac{1}{4}, \dots, \psi \rightarrow 0$  (ἀπὸ ἀρνητικὰς τιμὰς). Οὕτως ἔχομεν τὰ σημεῖα

$$P_{-1}(-1, -1), P_{-2}\left(-2, -\frac{1}{2}\right), P_{-3}\left(-3, -\frac{1}{3}\right), \dots, P(x \rightarrow -\infty, \psi \rightarrow 0),$$

κείνται δὲ τὰ σημεῖα αὐτὰ ἐπὶ τῆς γραμμῆς, τὴν δόποίαν παριστάνει ἡ (1), ἐνῷ τὸ σημεῖον ( $x \rightarrow -\infty, \psi \rightarrow 0$ ) τείνει νὰ είναι ἐπὶ τοῦ  $Ox$ .

Θέτομεν εἰς τὴν (1)  $x = -\frac{1}{2}, -\frac{1}{3}, -\frac{1}{4}, \dots, x \rightarrow 0$  (ἀπὸ ἀρνητικὰς τιμὰς), ὅτε εύρισκομεν  $\psi = -2, -3, -4, \dots, \psi \rightarrow -\infty$ . Τὰ ση-

μεία  $P - \frac{1}{2}$ ,  $P - \frac{1}{3}$ ,  $P - \frac{1}{4}, \dots$ ,  $P (x \rightarrow 0, \psi \rightarrow -\infty)$  κείνται έπι τῆς γραμμῆς, τὴν ὅποιαν παριστάνει ἡ (1).

Οὕτω λοιπὸν λέγομεν ὅτι ἡ γραμμή, τὴν ὅποιαν παριστάνει ἡ (1), ἀποτελεῖται ἀπὸ δύο μέρη, τὰ ὅποια καλοῦνται κλάδοι τῆς γραμμῆς, τὸ ἐν τῶν ὅποιών κεῖται ἐντὸς τῆς γωνίας  $xO\psi$ , ἐπὶ τοῦ ὅποιου κείνται καὶ τὰ σημεῖα  $M_2, M_3, \dots, M_{\frac{1}{2}}, M_{\frac{1}{3}}, \dots$  καὶ τὸ ὄπλο ἐντὸς τῆς γωνίας  $x' O\psi'$ , ἐπὶ τοῦ ὅποιου κείνται καὶ τὰ σημεῖα  $P_{-2}, P_{-3}, \dots, P_{-\frac{1}{2}}, P_{-\frac{1}{3}}, \dots$  εἰναι δὲ διὰ  $x = \alpha < 0$  τὸ  $\psi = \frac{1}{\alpha} < 0$ .

Ο ἄξων τῶν  $x$  καλεῖται ἀσύμπτωτος τῆς γραμμῆς, τὴν ὅποιαν παριστάνει ἡ (1), ἐπειδή, ὅταν σημείου κειμένου ἐπὶ τῆς γραμμῆς τὸ  $x \rightarrow +\infty$ , τὸ σημεῖον αὐτὸ τείνει νὰ πέσῃ ἐπὶ τοῦ  $Ox$ , καθὼς ἐπίσης, ὅταν  $x \rightarrow -\infty$  τοῦ σημείου κειμένου ἐπὶ τῆς γραμμῆς, τὸ ἐν λόγῳ σημεῖον τείνει νὰ πέσῃ ἐπὶ τοῦ  $Ox'$ .

Διὰ τὸν αὐτὸν λόγον καὶ ὁ ἄξων τῶν  $\psi$  λέγεται ἀσύμπτωτος τῆς ἐν λόγῳ γραμμῆς. Καλεῖται δὲ οὕτως ἐπειδή, ὅταν σημείου κειμένου ἐπὶ τῆς γραμμῆς τὸ  $x \rightarrow 0$  (ἐκ θετικῶν τιμῶν), τὸ σημεῖον τείνει νὰ πέσῃ ἐπὶ τοῦ  $O\psi$  καὶ ὅταν σημείου ἐπὶ τῆς γραμμῆς τὸ  $x \rightarrow 0$  (ἀπὸ ἀρνητικῶν τιμῶν), τὸ σημεῖον τείνει νὰ πέσῃ ἐπὶ τοῦ  $O\psi'$ .

Κατὰ ταῦτα λέγομεν ὅτι ἡ (1) παριστάνεται ἀπὸ δύο κλάδους, οἱ ὅποιοι θεωροῦνται ως ἐν ὅλον, ως μία γραμμή, ἡ ὅποια καλεῖται ὑπερβολή, οἱ δὲ ἄξονες τῶν συντεταγμένων εἰναι ἀσύμπτωτοι αὐτῆς καὶ λέγονται ἄξονες τῆς ὑπερβολῆς αὐτῆς.

Καθ' ὅμιον τρόπον εὐρίσκομεν τὴν παράστασιν π. χ. τῆς  $\psi = \frac{2}{x}$ , τῆς  $\psi = -\frac{2}{x}$  καὶ ἐν γένει τῆς  $\psi = \frac{\beta}{x}$ , ὅπου  $\beta > 0$  ή  $\beta < 0$ , καλεῖται δὲ πᾶσα γραμμὴ παριστανομένη ὑπὸ τῆς τοιαύτης ἔξισώσεως ὑπερβολή, ἡ ὅποια ἔχει ἀσυμπτώτους τοὺς ἄξονας τῶν συντεταγμένων.

### Α σ κ ή σ εις

428. Εὗρετε τὴν γραφικὴν παράστασιν τῶν συναρτήσεων :

$$\alpha') \psi = -\frac{1}{x}, \quad \beta') \psi = \frac{2}{x}, \quad \gamma') \psi = -\frac{2}{x},$$

$$\delta') \psi = \frac{3}{x}, \quad \epsilon') \psi = -\frac{3}{x}, \quad \sigma') x\psi = 10.$$

Όμοιως τῶν :

$$\alpha') \quad x = \frac{1}{\psi}, \quad \beta') \quad x = -\frac{1}{\psi}, \quad \gamma') \quad x = \frac{2}{\psi}, \quad \delta') \quad x = -\frac{5}{\psi}, \quad \epsilon') \quad x\psi = -4.$$

**§ 190.** "Εστω ἡ συνάρτησις  $\psi = \frac{x+1}{x-1}$  (1)

Γράφομεν αὐτὴν ως ἔξης :  $\psi(x-1) = (x+1)$  ἢ  $x\psi - \psi - x - 1 = 0$ . Θέτομεν εἰς αὐτὴν  $x = x_1 + \alpha$ ,  $\psi = \psi_1 + \beta$ , δῆποι τὸ  $\alpha$  καὶ  $\beta$  δὲν ἔχουν ὀρισθῆναι καὶ εύρισκομεν  $(x_1 + \alpha) \cdot (\psi_1 + \beta) - (\psi_1 + \beta) - (x_1 + \alpha) - 1 = 0$

$$\text{ἢ } x_1\psi_1 + \alpha\psi_1 + \beta x_1 + \alpha\beta - \psi_1 - x_1 - \alpha - \beta - 1 = 0$$


$$\text{ἢ } x_1\psi_1 + (\beta - 1)x_1 + (\alpha - 1)\psi_1 + \alpha\beta - \alpha - \beta - 1 = 0. \quad (2)$$

Προσδιορίζομεν τώρα τὰ  $\alpha, \beta$  οὕτως, ώστε ἡ (2) νὰ μὴ ἔχῃ ὅρους περιέχοντας μόνον τὸν  $x_1$ ,  $\psi_1$  καὶ ἔκαστον εἰς πρῶτον βαθμόν. Διὰ τοῦτο θέτομεν τὸν συντελεστὴν  $(\beta - 1)$  τοῦ  $x_1$  καὶ τὸν  $(\alpha - 1)$  τοῦ  $\psi_1$ , ἔκαστον ἵσον μὲν 0. Οὕτω θέτομεν  $\alpha - 1 = 0$ ,  $\beta - 1 = 0$  καὶ εύρισκομεν  $\alpha = 1$ ,  $\beta = 1$ .

Τοιουτορόπως ἡ (2) γίνεται  $x_1\psi_1 + 1 - 1 - 1 - 1 = 0$  (3)

$$\text{ἢ } x_1\psi_1 = 2 \quad (4)$$

"Εστωσαν  $x'$ Ox,  $\psi'$ Oψ οἱ ἄξονες τῶν συντεταγμένων. Εύρισκομεν τὸ σημεῖον μὲ συντεταγμένας (1, 1), ἔστω τοῦτο  $O_1(1, 1)$ .



Σχ. 20

Διὰ τοῦ  $O_1$  φέρομεν εὐθείας παραλλήλους πρὸς τοὺς ἄξονας, ἔστω τὰς  $x'_1 O_1 x_1$  (παράλληλον τοῦ ἄξονος  $x'$ Ox) καὶ  $\psi'_1 O_1 \psi_1$  (παράλληλον τοῦ ἄξονος  $\psi'$ Oψ) (σχ. 20).

Παρατηροῦμεν ότι ή ἔξισωσις (4) γράφεται καὶ ώς ἔξῆς :

$$\Psi_1 = \frac{2}{x_1} \quad (5)$$

Ἐὰν λοιπὸν ληφθοῦν ώς ἄξονες συντεταγμένων αἱ εὐθεῖαι  $x_1' O_1 x_1$ ,  $\psi_1' O_1 \psi_1$  καὶ ἀναφέρεται εἰς τοὺς ἄξονας αὐτοὺς ἡ (5), αὕτη παριστάνει ὑπερβολὴν μὲ ἀσυμπτώτους της τοὺς ἄξονας αὐτοὺς  $x_1' O_1 x_1$ ,  $\psi_1' O_1 \psi_1$ . Ἀλλ’ ἡ ἐν λόγῳ ὑπερβολὴ εἶναι ἡ ἴδια καὶ ἀν ἔχωμεν ἄξονας τοὺς  $x' O x$ ,  $\psi' O \psi$ .

Ἐπομένως ἡ ἀνωτέρω ἔξισωσις (1) παριστάνει ὑπερβολὴν μὲ ἀσυμπτώτους τοὺς νέους ἄξονας  $x_1' O_1 x_1$ ,  $\psi_1' O_1 \psi_1$ . Παρατηροῦμεν ότι ἔκαστον σημείον τοῦ ἄξονος  $x_1' O_1 x_1$ , ἔχει τεταγμένην ώς πρὸς τοὺς ἄξονας  $x' O x$ ,  $\psi' O \psi$  ἵσην μὲ 1, διὰ τοῦτο ὁ ἄξων  $x_1' O_1 x_1$  ἔχει ἔξισωσιν  $\psi=1$  ώς πρὸς τοὺς ἄξονας  $x' O x$ ,  $\psi' O \psi$ . Ἐπίσης ἔκαστον σημείον τοῦ ἄξονος  $\psi_1' O_1 \psi_1$  ἔχει τετμημένην  $x=1$  ώς πρὸς τὸ ἀρχικὸν σύστημα τῶν ἀξόνων.

**§ 191.** Ἐστω τώρα ἡ συνάρτησις  $\Psi = \frac{\alpha x + \beta}{\gamma x + \delta}$  (1) ἀναφερομένη πρὸς ἄξονας ὁρθογωνίους  $x' O x$ ,  $\psi' O \psi$ .

Ἄν ἐκτελέσωμεν τὴν διαίρεσιν  $(\alpha x + \beta) : (\gamma x + \delta)$ , θὰ εὗρωμεν πηλίκον  $\frac{\alpha}{\gamma}$  καὶ ὑπόλοιπον  $\beta - \frac{\alpha \delta}{\gamma} = \frac{\beta \gamma - \alpha \delta}{\gamma} \neq 0$ , ἀν  $\beta \gamma - \alpha \delta \neq 0$ .

$$\text{Οὕτω θὰ ἔχωμεν } \Psi = \frac{\alpha x + \beta}{\gamma x + \delta} = \frac{\alpha}{\gamma} + \frac{\beta \gamma - \alpha \delta}{\gamma(\gamma x + \delta)} = \frac{\alpha}{\gamma} + \frac{\beta \gamma - \alpha \delta}{\gamma^2 \left( x + \frac{\delta}{\gamma} \right)},$$

$$\text{ἢτοι } \Psi = \frac{\alpha}{\gamma} + \frac{\beta \gamma - \alpha \delta}{\gamma^2 \left( x + \frac{\delta}{\gamma} \right)}.$$

$$\text{Γράφομεν τοῦτο ώς ἔξῆς: } \Psi - \frac{\alpha}{\gamma} = \frac{\beta \gamma - \alpha \delta}{\gamma^2 \left( x + \frac{\delta}{\gamma} \right)}.$$

$$\text{Θέτομεν τώρα } x + \frac{\delta}{\gamma} = x_1 \text{ καὶ } \Psi - \frac{\alpha}{\gamma} = \Psi_1, \text{ ἢτοι}$$

$$x = x_1 - \frac{\delta}{\gamma}, \quad \Psi = \Psi_1 + \frac{\alpha}{\gamma}.$$

$$\text{Οὕτως, ἀντὶ τῆς δοθείσης ἔξισώσεως, ἔχομεν τὴν } \Psi_1 = \frac{\beta \gamma - \alpha \delta}{\gamma^2 \cdot x_1}$$

$$\text{ἢ } x_1 \Psi_1 = \frac{\beta \gamma - \alpha \delta}{\gamma^2} \quad (2) \text{ ἢ } x_1 \Psi_1 = u_1, \text{ ἀν τεθῇ } \frac{\beta \gamma - \alpha \delta}{\gamma^2} = u,$$

Εύρισκομεν τὸ σημεῖον μὲ συντεταγμένας  $\left(-\frac{\delta}{\gamma}, \frac{\alpha}{\gamma}\right)$ , ἔστω τοῦτο  $O_1\left(-\frac{\delta}{\gamma}, \frac{\alpha}{\gamma}\right)$  καὶ δι' αὐτοῦ φέρομεν εὐθείας  $x_1'O_1x_1$ ,  $\psi_1'O_1\psi_1$  ἀντιστοίχως παραλλήλους πρὸς τοὺς ἄξονας τῶν συντεταγμένων  $x'Ox$ ,  $\psi'O\psi$ .

Οὕτως ἡ  $\psi_1 = \frac{v_1}{x_1}$  ἀναφερομένη πρὸς τοὺς νέους αὐτοὺς ἄξονας  $x_1'O_1x_1$ ,  $\psi_1'O_1\psi_1$ , παριστάνει ὑπερβολὴν μὲ ἀσυμπτώτους τοὺς ἄξονας αὐτούς. Ἡ δοθεῖσα συνάρτησις (1) ἀναφερομένη πρὸς ἄξονας τοὺς ἀρχικοὺς  $x'Ox$ ,  $\psi'O\psi$  παριστάνει τὴν ὑπερβολὴν μὲ ἀσυμπτώτους τοὺς νέους ἄξονας, ἦτοι τὰς εὐθείας μὲ ἔξισώσεις ὡς πρὸς τοὺς ἀρχικούς ἄξονας  $x = -\frac{\delta}{\gamma}$ ,  $\psi = \frac{\alpha}{\gamma}$ .

Παρατηρητέον ὅτι, ἀν εἶναι  $\beta\gamma - \alpha\delta = 0$ , τότε θὰ ἔχωμεν τὴν ἔξισωσιν  $\psi = \frac{\alpha}{\gamma}$ , ἡ ὁποία παριστάνει εὐθεῖαν παράλληλον τοῦ ἄξονος τῶν  $x$ , τέμνουσαν τὸν ἄξονα τῶν  $\psi$  εἰς τὸ σημεῖον  $(0, \frac{\alpha}{\gamma})$ .

"Αν εἶναι  $\gamma = 0$  καὶ  $\alpha, \beta, \delta \neq 0$ , ἔχομεν  $\psi = \frac{\alpha x + \beta}{\delta} = \frac{\alpha}{\delta}x + \frac{\beta}{\delta}$ , δηλαδὴ  $\psi = \frac{\alpha}{\delta}x + \frac{\beta}{\delta}$ , ἡ ὁποία παριστάνει εὐθεῖαν τέμνουσαν τὸν ἄξονα τῶν  $x$  εἰς τὸ σημεῖον  $(-\frac{\beta}{\alpha}, 0)$ , τὸν δὲ ἄξονα τῶν  $\psi$  εἰς τὸ σημεῖον  $(0, \frac{\beta}{\delta})$ .

*Παράδειγμα.* Ἐστω ἡ συνάρτησις  $\psi = \frac{3x - 5}{6x + 7}$  ὡς πρὸς ἄξονας ὀρθογωνίους.

"Ἐχομεν  $\alpha = 3$ ,  $\beta = -5$ ,  $\gamma = 6$ ,  $\delta = 7$ ,

$$\frac{\alpha}{\gamma} = \frac{3}{6}, \quad \frac{\delta}{\gamma} = \frac{7}{6}, \quad \frac{\beta\gamma - \alpha\delta}{\gamma^2} = -\frac{30 + 21}{36} = -\frac{51}{36} = -\frac{17}{12}.$$

"Ἄρα ἔχομεν τὴν ἔξισωσιν  $x_1\psi_1 = -\frac{17}{12}$  ὡς πρὸς νέους ἄξονας  $x_1'O_1x_1$ ,  $\psi_1'O_1\psi_1$ . Ἡ ἀρχὴ τῶν νέων ἄξόνων ἔχει συντεταγμένας ὡς πρὸς τοὺς ἀρχικούς ἄξονας  $(-\frac{7}{6}, \frac{1}{2})$ , ἡ δὲ δοθεῖσα ἔξισωσις παριστάνει ὑπερβολὴν μὲ ἀσυμπτώτους τοὺς ἄξονας, οἱ ὁποίοι ἀγονται ἀπὸ τὸ σημεῖον  $O_1\left(-\frac{7}{6}, \frac{1}{2}\right)$  παράλληλοι πρὸς τοὺς ἀρχικούς.

"Α σ κ η σ i s

430. Νὰ γίνῃ ἡ γραφική παράστασις τῶν συναρτήσεων :

$$\alpha') \quad \psi = \frac{2x - 1}{2x + 1}, \quad \beta') \quad \psi = \frac{2x - 3}{4x + 1}, \quad \gamma') \quad x = \frac{2\psi - 4}{3\psi + 1}$$

$$\delta') \quad x = \frac{2}{\psi + 4}, \quad \epsilon') \quad x = \frac{-3\psi + 4}{2\psi + 1}, \quad \sigma\tau') \quad x\psi + 2x - 3\psi + 1 = 0.$$


---

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VII

### A'. ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΑΝΑΓΟΜΕΝΑΙ ΕΙΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ Β' ΒΑΘΜΟΥ

#### 1. ΔΙΤΕΤΡΑΓΩΝΟΙ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

**§ 192.** Καλοῦμεν ἔξισωσίν τινα μὲν ἓνα ἄγνωστον ( ἔστω τὸν  $x$  ) διτετράγωνον, ἔάν, μετὰ τὴν ἀπαλοιφὴν τῶν παρονομαστῶν, τὴν μεταφορὰν τῶν ὅρων εἰς τὸ πρῶτον μέλος καὶ τὰς ἀναγωγάς, ἔχη τὴν μορφὴν  $\alpha x^4 + \beta x^2 + \gamma = 0$ , ( $\alpha \neq 0$ ) (1)

\*Ἐστω πρὸς λύσιν ἡ διτετράγωνος ἔξισωσις  $x^4 - 25x^2 + 144 = 0$ . Ἀν τὸ  $x^2$  ἀντικαταστήσωμεν μὲν τὸ  $\psi$  καὶ ἐπομένως τὸ  $x^4$  μὲν τὸ  $\psi^2$ , θὰ ἔχωμεν τὴν ἔξισωσιν  $\psi^2 - 25\psi + 144 = 0$ .

Λύοντες ταύτην εύρίσκομεν  $\psi = \frac{25 \pm 7}{2}$ , ἢτοι τὰς ρίζας αὐτῆς  $\psi_1 = 16$  καὶ  $\psi_2 = 9$ .

\*Ἀρα εἰναι  $x^2 = 16$  καὶ  $x^2 = 9$ , ἐξ ὧν εύρισκομεν ως ρίζας τῆς δοθείσης  $x = \pm 4$  καὶ  $x = \pm 3$ .

\*Ἐν γένει πρὸς λύσιν τῆς ἔξισώσεως (1) ἀντικαθιστῶμεν εἰς αὐτὴν  $x^2 = \psi$ , ὅτε θὰ εἰναι  $x^4 = \psi^2$ , καὶ ἀντὶ τῆς (1) ἔχομεν τὴν ἔξισωσιν  $\alpha\psi^2 + \beta\psi + \gamma = 0$  (2)

\*Ἐάν λύσωμεν τὴν (2), θὰ εὕρωμεν τὰς τιμὰς τοῦ  $\psi$  καὶ ἔστωσαν αὗται αἱ  $\psi_1$  καὶ  $\psi_2$ . Διὰ νὰ εὕρωμεν τὰς ρίζας τῆς (1), δηλαδὴ τὰς τιμὰς τοῦ  $x$ , θέτομεν εἰς τὴν ισότητα  $x^2 = \psi$ , ὅπου  $\psi$  τὰς τιμὰς αὐτοῦ  $\psi_1$ ,  $\psi_2$ , ὅτε ἔχομεν τὰς ἔξισώσεις  $x^2 = \psi_1$ , καὶ  $x^2 = \psi_2$ , ἐκ τῶν ὅποιων εύρισκομεν  $x = \pm \sqrt{\psi_1}$  καὶ  $x = \pm \sqrt{\psi_2}$ . \*Ητοι αἱ τιμαὶ τοῦ  $x$  εἰναι αἱ

$$\sqrt{\psi_1}, -\sqrt{\psi_1}, \sqrt{\psi_2}, -\sqrt{\psi_2}.$$

\*Αλλ' αἱ τιμαὶ  $\psi_1$  καὶ  $\psi_2$  εἰναι, καθὼς γνωρίζομεν, αἱ

$$\psi_1 = \frac{-\beta + \sqrt{\beta^2 - 4\alpha\gamma}}{2\alpha}, \quad \psi_2 = \frac{-\beta - \sqrt{\beta^2 - 4\alpha\gamma}}{2\alpha}.$$

•Επομένως, όταν παραστήσωμεν μὲν  $\rho_1, \rho_2, \rho_3$  καὶ  $\rho_4$  τὰς ρίζας τῆς (1), θὰ ἔχωμεν :

$$\rho_1 = \sqrt{\frac{-\beta + \sqrt{\beta^2 - 4\alpha\gamma}}{2\alpha}}, \quad \rho_2 = -\sqrt{\frac{-\beta + \sqrt{\beta^2 - 4\alpha\gamma}}{2\alpha}},$$

$$\rho_3 = \sqrt{\frac{-\beta - \sqrt{\beta^2 - 4\alpha\gamma}}{2\alpha}}, \quad \rho_4 = -\sqrt{\frac{-\beta - \sqrt{\beta^2 - 4\alpha\gamma}}{2\alpha}}.$$

Πλαστικά. 1ον. •Εστω πρὸς λύσιν ἡ διτετράγωνος ἑξίσωσις  $x^4 - 10x^2 = -9$ . •Έχομεν  $\alpha = 1, \beta = -10, \gamma = 9$ .

$$•\text{Επομένως } \rho_1 = \sqrt{\frac{10 + \sqrt{64}}{2}} = 3, \quad \rho_2 = -3, \quad \rho_3 = 1, \quad \rho_4 = -1.$$

2ον. •Εστω ἡ ἑξίσωσις  $x^4 - 3x^2 + 2 = 0$ . •Έχομεν  $\alpha = 1, \beta = -3, \gamma = 3$ .

$$•\text{Επομένως εἶναι } \rho_1 = \sqrt{\frac{3 + \sqrt{9 - 8}}{2}} = \sqrt{2}. \quad \rho_2 = -\sqrt{2}, \quad \rho_3 = 1, \quad \rho_4 = -1.$$

### Α σ κ ἡ σ εις

431) Νὰ λυθοῦν αἱ κάτωθι ἑξίσωσεις :

$$\text{(α')} 9x^4 + 1 = 10x^2, \quad \text{(β')} x^4 - 26x^2 = -25, \quad \text{(γ')} 10x^4 - 21 = x^2,$$

$$\text{(δ')} (x^2 - 5)^2 + (x^2 - 1)^2 = 40, \quad \text{(ε')} x^2 + 9x^{-2} = 6,25, \quad \text{(στ')} 9 + x^{-4} - 10x^{-2} = 0,$$

$$\zeta') \frac{1}{x} + \frac{1}{x + \frac{2}{x}} = \frac{x}{2}, \quad \eta') \frac{(x+2)(x-2)}{5} = \left(\frac{2}{x}\right)^2$$

$$\theta') \frac{(x^2 + 1)(x^2 + 2)}{5} - \frac{(x^2 - 1)(x^2 - 2)}{2} = 3.$$

$$432. \text{ α')} \alpha x^4 - (\alpha^2 \beta^2 + 1)x^2 + \alpha \beta^2 = 0, \quad \beta') \alpha^4 + \beta^4 + x^4 = 2(\alpha^2 \beta^2 + \alpha^2 x^2 + \beta^2 x^2),$$

$$\gamma') 4(x^4 + \gamma^6) - 17\gamma^3 x^2 = 0, \quad \delta') \alpha^2(\alpha^2 - 2x^2) + \beta^2(\beta^2 - 2x^2) + x^4 = 0.$$

$$433. \text{ α')} \alpha^2 \left[ 1 \pm \left( \frac{\beta}{x} \right)^2 \right] = \beta^2 + x^2, \quad \beta') \frac{1}{3} \left( \frac{1}{x} \right)^2 \left( \frac{1}{x^2} - 2\beta \right) = \left( \frac{\beta}{\alpha} \right)^2,$$

$$\gamma') \left[ 59 - 2 \left( \frac{x}{\alpha} \right)^2 \right] \left( \frac{x}{\alpha} \right)^2 = 225, \quad \delta') x^4 - 2(\mu^2 v^2 + \rho^2)x^2 + (\mu^2 v^2 - \rho^2)^2 = 0,$$

$$\varepsilon') x^4 - \alpha \beta \gamma (\alpha + \beta \gamma) x^2 + (\alpha \beta \gamma)^3 = 0.$$

2. ΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΤΡΙΩΝΥΜΟΥ  $\alpha x^4 + \beta x^2 + \gamma$  ΕΙΣ ΓΙΝΟΜΕΝΟΝ  
ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

**§ 193.** "Αν θέλωμεν νὰ τρέψωμεν τὸ τριώνυμον  $\alpha x^4 + \beta x^2 + \gamma$  εἰς γινόμενον πρωτοβαθμίων παραγόντων, παρατηροῦμεν ὅτι, ἀν τεθῇ  $x^2 = \psi$ , θὰ ἔχωμεν ἀντὶ τοῦ δοθέντος τὸ  $\alpha\psi^2 + \beta\psi + \gamma$ . "Αν αἱ ρίζαι τούτου παρασταθοῦν μὲ  $\psi_1$ ,  $\psi_2$ , θὰ εἶναι  $\alpha\psi^2 + \beta\psi + \gamma = \alpha(\psi - \psi_1)(\psi - \psi_2)$ . ἄρα, ἀν τεθῇ εἰς τοῦτο  $\psi = x^2$ , θὰ ἔχωμεν  $\alpha(x^2 - \psi_1)(x^2 - \psi_2) = \alpha(x - \sqrt{\psi_1})(x + \sqrt{\psi_1})(x - \sqrt{\psi_2})(x + \sqrt{\psi_2})$ .

Ἐπομένως, ἀν  $\rho_1, \rho_2, \rho_3, \rho_4$  παριστάνουν τὰς ρίζας τοῦ δοθέντος τριώνυμου (ἥτοι τεθῇ  $\sqrt{\psi_1} = \rho_1, -\sqrt{\psi_1} = \rho_2, \sqrt{\psi_2} = \rho_3, -\sqrt{\psi_2} = \rho_4$ ), θὰ ἔχωμεν  $\alpha x^4 + \beta x^2 + \gamma = \alpha(x - \rho_1)(x - \rho_2)(x - \rho_3)(x - \rho_4)$ , ἥτοι τὸ διτετράγωνον τριώνυμον  $\alpha x^4 + \beta x^2 + \gamma$  τρέπεται εἰς γινόμενον τοῦ α ἐπὶ τέσσαρας πρωτοβαθμίους παράγοντας ὡς πρὸς  $x$ .

Π.χ. ἀν ἔχωμεν τὸ τριώνυμον  $x^4 + x^2 - 12$ , ἐπειδὴ εἶναι  $\alpha = 1, \beta = 1, \gamma = -12$ , εύρισκομεν  $\psi_1 = 3, \psi_2 = -4$ . Ἐάρα  $\rho_1 = \sqrt{3}, \rho_2 = -\sqrt{3}, \rho_3 = 2i, \rho_4 = -2i$ , ἥτοι κατὰ τάξιν μεγέθους αἱ ρίζαι τοῦ τριώνυμου (αἱ πραγματικαὶ μόνον διότι αἱ φανταστικαὶ δὲν διακρίνονται κατὰ μέγεθος) εἶναι  $-\sqrt{3}, \sqrt{3}, -2i, 2i$  καὶ τὸ τριώνυμον εἶναι ἵσον μὲ  $(x + \sqrt{3})(x - \sqrt{3})(x + 2i)(x - 2i)$ .

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω ἐπεται ὅτι δυνάμεθα νὰ εὔρωμεν τὸ διτετράγωνον τριώνυμον, ὅταν γνωρίζωμεν τὰς τέσσαρας ρίζας του. "Αν αῦται εἶναι π.χ.  $\rho_1, \rho_2, \rho_3, \rho_4$ , τὸ τριώνυμον θὰ εἶναι τὸ  $(x - \rho_1)(x - \rho_2)(x - \rho_3)(x - \rho_4)$  πολλαπλασιασμένον ἐπὶ σταθερόν τινα παράγονσα.

Π.χ. τὸ τριώνυμον μὲ ρίζας  $-\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, -i, i$  θὰ εἶναι τὸ προκύπτον ἐκ τοῦ α  $\left( x + \frac{3}{3} \right) \left( x - \frac{2}{3} \right) (x + i)(x - i)$  μετὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν πράξεων, ὅπου τὸ α παριστάνει σταθερόν τινα παράγοντα.

**Α σ κ ή σ ε ις**

"Ο μ ἀς π ρ ὡ τ η. 434. Νὰ τραποῦν τὰ ἐπόμενα τριώνυμα εἰς γινόμενα πρωτοβαθμίων παραγόντων:

α')  $4x^4 - 10x^2 + 4$ , β')  $7x^4 - 35x^2 + 28$ , γ')  $\alpha^2\beta^2\psi^4 - (\alpha^4 + \beta^4)\psi^2 + \alpha^2\beta^2$ ,  
δ')  $\psi^4 - 4\alpha\beta\psi^2 - (\alpha^2 - \beta^2)^2$ , ε')  $\lambda^4\psi^4 + \lambda^2(\alpha^2 - \beta^2)\psi^2 - \alpha^2\beta^2$ , στ')  $\psi^4 - (\alpha + 1)\alpha\psi^2 + \alpha^3$

435. Εύρετε τὴν διτετράγωνον ἔξισωσιν, ἢ ὅποια ἔχει ρίζας :
- α')  $\pm 3, \pm 1$ , β')  $\pm \alpha, \pm \sqrt{\alpha}$ , γ')  $\pm 05, \pm 4i$ , δ')  $\pm 3, \pm i$ .  
 'Ο μὰς δευτέρας α. 436. Εύρετε τριώνυμα ἔχοντα ὡς ρίζας τάς :
- α')  $\pm i$  καὶ  $\pm \frac{2}{3}$ , β')  $\pm 0,2$  καὶ  $\pm 0,75$ , γ')  $\pm \alpha, \pm 2\alpha$ , δ')  $\pm (\alpha-i), +\alpha+i$ , ε')  $\pm 0,75$  καὶ  $\pm 2i$ , στ')  $\pm 2, \pm 3i$ .

'Ο μὰς τρίτης 437. Εύρετε τὸ πρόσημον τοῦ τριώνυμου  $\alpha x^4 + \beta x^2 + \gamma$ , ὅταν τὸ  $x$  εἴναι ἑκτὸς τῶν (πραγματικῶν) ρίζῶν αὐτοῦ  $\rho_1, \rho_2, \rho_3, \rho_4$  (ἄν εἴναι  $\rho_1 < \rho_2 < \rho_3 < \rho_4$ ), δηλ. ἄν  $x < \rho_1$  ή  $x > \rho_4$  καὶ ὅταν τὸ  $x$  κείται μεταξὺ δύο ρίζῶν, δηλ. ἄν εἴναι  $\rho_1 < x < \rho_2, \rho_2 < x < \rho_3$ , καὶ  $\rho_3 < x < \rho_4$ . (Διακρίνατε δύο περιπτώσεις, ὅταν εἴναι  $\alpha > 0$  καὶ ὅταν  $\alpha < 0$ ). Ἐξετάσατε τὴν περίπτωσιν καθ' ἥν αἱ δύο ρίζαι π.χ. αἱ  $\rho_3, \rho_4$  εἴναι συζυγεῖς φανταστικαὶ ἢ μιγαδικαὶ καὶ ὅταν καὶ αἱ τέσσαρες ρίζαι εἴναι φανταστικαὶ ἢ μιγαδικαὶ, διότι δύο είναι συζυγεῖς καὶ αἱ ἄλλαι δύο πάλιν συζυγεῖς).

438. α') Διερευνήσατε ὡς πρὸς τὰς πραγματικὰς τιμὰς τοῦ λ τὴν ἔξισωσιν  $(\lambda-2)x^4 + 4(\lambda+3)x^2 + \lambda - 1 = 0$ .

$$\beta') \text{Όμοιώς τὴν } \text{ἔξισωσιν } x^4 - (3\lambda + 4)x^2 + (\lambda + 1)^2 = 0.$$

439. Εἰς τὴν ἔξισωσιν  $2x^2 - (\lambda^2 + 1)x + \lambda^2 + 3 = 0$  ποίαν τιμὴν πρέπει νὰ ἔχῃ τὸ λ, διὰ διαφέρουν αἱ ρίζαι κατὰ 1 ;

### 3. ΤΡΟΠΗ ΔΙΠΛΩΝ ΤΙΝΩΝ ΡΙΖΙΚΩΝ ΕΙΣ ΑΠΛΑ

**§ 194.** "Εστω πρὸς λύσιν ἢ διτετράγωνος ἔξισωσις  $x^4 - 6x^2 + 1 = 0$ . Επειδὴ εἴναι  $\alpha = 1, \beta = -6, \gamma = 1$ , ἔχομεν ὡς ρίζας

$$\pm \sqrt{\frac{6+\sqrt{36-4}}{2}} = \pm \sqrt{\frac{6+\sqrt{32}}{2}} \pm \text{καὶ} \pm \sqrt{\frac{6-\sqrt{32}}{2}}.$$

Παρατηροῦμεν ὅτι κατελήξαμεν εἰς παραστάσεις μὲ διπλᾶ ριζικὰ τῆς μορφῆς  $\sqrt{A \pm \sqrt{B}}$ .

Ζητοῦμεν νὰ μάθωμεν, πότε είναι δυνατὸν τὰς τοιαύτας παραστάσεις νὰ τρέψωμεν εἰς ἄλλας ἴσοδυνάμους αὐτῶν μὲ ἀπλᾶ ριζικά.

$$\text{Θὰ δείξωμεν ὅτι } \sqrt{A \pm \sqrt{B}} = \sqrt{\frac{A+\Gamma}{2}} \pm \sqrt{\frac{A-\Gamma}{2}} \quad (1)$$

ἄν εἴναι  $A > 0$  καὶ τὸ  $A^2 = B$  είναι (τέλειον τετάργωνον), ἔστω  $= \Gamma^2$ .

"Ἄσ ύποθέσωμεν ὅτι  $\sqrt{A \pm \sqrt{B}} = \sqrt{\psi} + \sqrt{\omega}$  (2) ὅπου ψ, ω θετικοὶ σύμμετροι καὶ ὁ εἰς τούλάχιστον μὴ τέλειον τετράγωνον.

Τότε ἡ (2) ἴσοδυναμεῖ μὲ ἐκείνην, τὴν ὅποιαν εύρισκομεν τετραγωνίζοντες τὰ μέλη της, δηλ. μὲ τὴν

$$A + \sqrt{B} = \psi + \omega + 2\sqrt{\psi\omega} \quad (3)$$

‘Αλλ’ ή (3), εις τὴν δόποίαν οἱ  $A$ ,  $\psi + \omega$  εἶναι σύμμετροι ὁ δὲ  $B$  θετικὸς καὶ  $\sqrt{B}$  δισύμμετρος, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀληθεύῃ παρὰ μόνον ἔὰν εἶναι :

$$\begin{aligned} A &= \psi + \omega \\ B &= 4\psi\omega \end{aligned} \quad (4) \quad (\S \ 155. \text{Παρ. } \beta').$$

Τότε θὰ ἀληθεύῃ καὶ ή  $\sqrt{B} = 2\sqrt{\psi\omega}$  καὶ ἐν συνεχείᾳ  
 ή  $A - \sqrt{B} = \psi + \omega - 2\sqrt{\psi\omega} = (\sqrt{\psi} - \sqrt{\omega})^2$ .

Συνεπῶς θὰ ἀληθεύῃ καὶ ή

$$\sqrt{A - \sqrt{B}} = |\sqrt{\psi} - \sqrt{\omega}|$$

Διὰ νὰ τραποῦν λοιπὸν αἱ παραστάσεις τῆς μορφῆς  $\sqrt{A \pm \sqrt{B}}$   
 ὅπου  $A > 0$   $B > 0$  εἰς ίσοδυνάμους μὲ ἀπλᾶ ριζικὰ πρέπει καὶ ἀρ-  
 κεῖ νὰ ἀληθεύῃ τὸ σύστημα (4), τὸ δόποιον ίσοδυναμεῖ πρὸς τό :

$$\begin{aligned} A &= \psi + \omega \\ \frac{B}{4} &= \psi\omega \end{aligned} \quad (5)$$

μὲ  $\psi$ ,  $\omega$  θετικοὺς καὶ συμμέτρους.

Λύσεις τοῦ συστήματος (5) εἶναι αἱ ρίζαι τῆς ἔξισώσεως

$$x^2 - Ax + \frac{B}{4} = 0 \quad (6)$$

Αἱ ρίζαι αὐτῆς ὅμως εἶναι πραγματικαὶ καὶ ἄνισοι ὅταν  
 $A^2 - B > 0$ .

Θὰ εἶναι καὶ σύμμετροι, ὅταν  $A^2 - B$  εἶναι τέλειον τετράγωνον.

Τέλος, ἐπειδὴ ἔχουν γινόμενον  $\frac{B}{4}$  θετικόν, ἀφοῦ  $B > 0$ , θὰ εἶναι  
 καὶ θετικαί, ὅταν τὸ  $A$ , ἀθροισμα τῶν δύο ριζῶν, εἶναι θετικόν.

“Ωστε: αἱ παραστάσεις τῆς μορφῆς  $\sqrt{A \pm \sqrt{B}}$  τρέπονται εἰς  
 ίσοδυνάμους μὲ ἀπλᾶ ριζικά, ὅταν  $A > 0$  καὶ τὸ  $A^2 - B$ , δηλαδὴ τὸ  
 γινόμενον τοῦ ὑπορρίζου ἐπὶ τὸ συζυγές, εἶναι τέλειον τετρά-  
 γωνον.

Ἐπειδὴ αἱ ρίζαι τῆς (6) εἶναι αἱ  $\frac{A + \sqrt{A^2 - B}}{2}, \frac{A - \sqrt{A^2 - B}}{2}$ , ὅταν  
 $A^2 - B$  εἶναι τέλειον τετράγωνον π.χ. ἵσον μὲ  $\Gamma^2$ , γράφονται  $\frac{A + \Gamma}{2}$ ,  
 $\frac{A - \Gamma}{2}$  καὶ ἔχομεν τοὺς τύπους μετατροπῆς :

$$\sqrt{A \pm \sqrt{B}} = \sqrt{\frac{A+\Gamma}{2}} \pm \sqrt{\frac{A-\Gamma}{2}},$$

διότι αἱ ἀνωτέρω ρίζαι ἀντιπροσωπεύουν τοὺς ψ καὶ ω καὶ εἶναι ἡ  $\frac{A+\Gamma}{2}$  ἡ μεγαλυτέρα. Κατὰ ταῦτα, διὰ τὴν παράστασιν  $\sqrt{6 \pm \sqrt{32}}$ , ὅπου τὸ γινόμενον τοῦ ὑπορρίζου ἐπὶ τὸ συζυγὲς εἶναι  $36 - 32 = 4$  καὶ συνεπῶς ἡ θετικὴ τετραγωνικὴ ρίζα αὐτοῦ ἴση μὲ 2 θὰ ἔχωμεν

$$\sqrt{6 \pm \sqrt{32}} = \sqrt{\frac{6+2}{2}} \pm \sqrt{\frac{6-2}{2}} = \sqrt{4} \pm \sqrt{2} = 2 \pm \sqrt{2}$$

"Εστω ἀκόμη ἡ παράστασις  $\sqrt{2 + \sqrt{3}}$ .

Εἶναι  $(2+\sqrt{3})(2-\sqrt{3}) = 4 - 3 = 1$  καὶ  $\sqrt{1} = 1$ . Ἐπομένως θὰ ἔχωμεν

$$\sqrt{2 + \sqrt{3}} = \sqrt{\frac{2+1}{2}} + \sqrt{\frac{2-1}{2}} = \sqrt{\frac{3}{2}} + \sqrt{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2}(\sqrt{6} + \sqrt{2})$$

### "Α σκηνισ

440. Τρέψατε τὰς κάτωθι παραστάσεις εἰς ἄλλας ἔχούσας ἀπλᾶ ριζικά :

- |   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| α') $\sqrt{5 + \sqrt{24}}$ ,                        | β') $\sqrt{7 + 4\sqrt{3}}$ ,                         | γ') $\sqrt{8 + 4\sqrt{3}}$ ,   | δ') $\sqrt{\alpha^2 + \beta + 2\alpha\sqrt{\beta}}$ , |
| ε') $\sqrt{2\alpha + 2\sqrt{\alpha^2 - \beta^2}}$ , | στ') $\sqrt{\alpha + \beta - 2\sqrt{\alpha\beta}}$ , | ζ') $\sqrt{\frac{\alpha^2}{4} + \frac{\gamma}{2}\sqrt{\alpha^2 - \gamma^2}}$ , |   |
| η') $\sqrt{x + x\psi - 2x\sqrt{\psi}}$ ,            |  | θ') $\sqrt{3 + \sqrt{5}}$ .  |   |

### 4. ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΜΕ ΡΙΖΙΚΑ Β' ΤΑΞΕΩΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΑΥΤΗΣ

**§ 195.** "Εστω π.χ. ἡ ἀρρητος ἔξισωσις  $5 - x = \sqrt{x - 5}$ , ἡ δποία ἔχει εἰς τὸ ἐν μέλος της ριζικὸν β' τάξεως μὲ ὑπόρριζον παράστασιν ἔχουσαν τὸν ἄγνωστον x.

"Αν ὑψώσωμεν τὰ δύο μέλη της εἰς τὸ τετράγωνον, εύρισκομεν  $(5-x)^2 = x-5$ , ἡ δποία εἶναι ἵσοδύναμος μὲ τὴν  $(x-5)^2 - (x-5) = 0$  ἥ μὲ τὴν  $(x-5)(x-5-1) = 0$  ἥ τὴν  $(x-5)(x-6) = 0$ . Αὕτη ἔχει τὰς

ρίζας  $x=5$  και  $x=6$ . Έκ τούτων μόνον ή  $x=5$  έπαληθεύει τήν δοθείσαν έξισωσιν, ένδη ή  $x=6$  έπαληθεύει τήν  $5-x=-\sqrt{x-5}$ .

Έξισωσίς τις λέγεται μὲ τετραγωνικὴν ρίζαν ή μὲ ριζικὸν δευτέρας τάξεως, ἀν (μετὰ τὴν ἀπαλοιφὴν τῶν παρονομαστῶν, τὴν μεταφορὰν τῶν ὅρων εἰς τὸ ἐν μέλος καὶ τὰς ἀναγωγὰς) ἔχῃ τουλάχιστον ἐν ριζικὸν μὲ δείκτην 2 καὶ οὐδὲν μὲ δείκτην ἀνώτερον τοῦ 2, ὑπὸ τὸ δόποιον ὑπάρχει ὁ ἄγνωστος.

$$\text{Έστω ή } \text{έξισωσις } 4 + \sqrt{x^2 + 5} = x - 1. \quad (1)$$

Διὰ νὰ λύσωμεν αὐτήν, ἐπιδιώκομεν νὰ ἀπαλλαγῶμεν ἀπὸ τὸ ριζικόν, δηλαδὴ νὰ εὔρωμεν ἄλλην έξισωσιν χωρὶς ριζικόν. Πρὸς τοῦτο ἀπομονώσομεν τὸ ριζικόν, δηλαδὴ μετασχηματίζομεν τὴν έξισωσιν εἰς ἄλλην, ή δόποια νὰ ἔχῃ εἰς τὸ ἐν μέλος αὐτῆς μόνον τὸ ριζικόν. Οὕτως ἔχομεν

$$\sqrt{x^2 + 5} = x - 1 - 4 \text{ ή } \sqrt{x^2 + 5} = x - 5 \quad (1')$$

·Ψυοῦντες τὰ μέλη ταύτης εἰς τὸ τετράγωνον λαμβάνομεν

$$x^2 + 5 = (x - 5)^2 \text{ ή } x^2 + 5 = x^2 - 10x + 25 \text{ ή } 10x = 20 \quad (2)$$

$$\text{ή δόποια } \text{ἔχει τὰς ρίζας τῆς (1) καὶ τῆς } -\sqrt{x^2 + 5} = (x - 5) \quad (3)$$

Λύοντες τὴν (2) εύρίσκομεν  $x=2$ . Ἀντικαθιστῶντες τὴν  $x=2$  εἰς τὴν (1) εύρίσκομεν ὅτι δὲν έπαληθεύεται, ένδη έπαληθεύεται ή (3).

·Έστω ἀκόμη ή έξισωσις μὲ ριζικὰ β' τάξεως

$$\sqrt{x+5} + \sqrt{2x+8} = 7 \quad (1)$$

·Ψυοῦντες εἰς τὸ τετράγωνον εύρίσκομεν (ἀφοῦ ἀπομονώσωμεν τὸ νέον ριζικὸν)  $2\sqrt{(x+5)(2x+8)} = 36 - 3x$ .

·Ψυοῦντες πάλιν εἰς τὸ τετράγωνον εύρίσκομεν

$$4(x+5)(2x+8) = (36-3x)^2$$

καὶ μετὰ τὰς πράξεις καὶ τὴν ἀναγωγὴν εύρίσκομεν

$$x^2 - 288x + 1136 = 0.$$

Αἱ ρίζαι ταύτης εἶναι 4 καὶ 284. Θέτοντες διαδοχικῶς  $x=4$  καὶ  $x=284$  εἰς τὴν δοθεῖσαν (1) εύρίσκομεν ὅτι μόνον ή 4 τὴν έπαληθεύει, ένδη ή 284 εἶναι ρίζα τῆς  $2\sqrt{(x+5)(2x+8)} = -(36-3x)$ .

·Έκ τῶν ἀνωτέρω ἔπεται ὅτι :

Διὰ νὰ λύσωμεν έξισωσιν μὲ ριζικὸν β' τάξεως, ἀπομονώνομεν αὐτό, ὥστε ύψοῦντες τὰ μέλη τῆς νέας έξισώσεως εἰς τὸ τετράγωνον νὰ λαμβάνωμεν έξισωσιν χωρὶς ριζικόν· ἀκολούθως

λύομεν τὴν ἔξισωσιν ταύτην καὶ δοκιμάζομεν, ἂν αἱ ρίζαι τῆς εἶναι ρίζαι τῆς δοθείσης.

**§ 196.** Ἐν γένει ἔαν, διὰ νὰ εὔρωμεν ἀπὸ δοθεῖσαν ἄρρητον ἔξισωσιν ἄλλην ρητήν, κάμνωμεν διαδοχικὰς ὑψώσεις εἰς τὸ τετράγωνον, τότε ἡ τελικῶς προκύπτουσα ἔξισωσις ἔχει τὰς ρίζας τῶν πρώτων μελῶν των (τοῦ δευτέρου ἐκάστης μέλους ὑποτιθεμένου 0).

Ἐστω π.χ. ὅτι ἔχομεν ἔξισωσιν τῆς μορφῆς

$$\sqrt{A} + \sqrt{B} + \sqrt{C} = 0 \quad (1)$$

ὅπου τὰ A, B, C περιέχουν τοὺς ἀγνώστους τῆς ἔξισώσεως.

Δυνάμεθα νὰ εὔρωμεν ἔξι αὐτῆς ἄλλην ρητήν ἔξισωσιν ὡς ἔξης :

Ἄπὸ τὴν δοθεῖσαν λαμβάνομεν τὴν ἰσοδύναμόν της.

$$\sqrt{A} + \sqrt{B} = -\sqrt{C}.$$

Ὑψώνομεν τὰ μέλη αὐτῆς εἰς τὸ τετράγωνον καὶ εύρίσκομεν  $A+B+2\sqrt{AB}=\Gamma$ , καὶ ἀντ' αὐτῆς ἔχομεν τὴν ἰσοδύναμόν της  $2\sqrt{AB}=\Gamma-A-B$ .

Ὑψώνομεν τὰ μέλη αὐτῆς εἰς τὸ τετράγωνον καὶ εύρίσκομεν τὴν  $4AB=A^2+B^2+\Gamma^2-2\Gamma AB+2AB-2B\Gamma$

ἢ τὴν ἰσοδύναμον ταύτης  $A^2+B^2+\Gamma^2-2\Gamma AB-2AB-2B\Gamma=0$  (2)

Ἡ (2) ἔχει τὰς ρίζας τῶν ἔξης τεσσάρων ἔξισώσεων

$$\left. \begin{array}{l} \sqrt{A} + \sqrt{B} + \sqrt{C} = 0, \quad \sqrt{A} - \sqrt{B} - \sqrt{C} = 0 \\ \sqrt{A} - \sqrt{B} + \sqrt{C} = 0, \quad \sqrt{A} + \sqrt{B} - \sqrt{C} = 0 \end{array} \right\} \quad (3)$$

Ἀν πολλαπλασιάσωμεν ταύτας κατὰ μέλη εύρίσκομεν τὴν (2). Πράγματι, ἔχομεν ἀπὸ τὰς δύο πρώτας ἔκ τῶν (3) μὲ πολλαπλασιασμὸν τῶν μελῶν των  $A-(\sqrt{B}+\sqrt{C})^2=0$

$$\text{ἢ } (A-B-\Gamma)-2\sqrt{B}\Gamma=0 \quad (4)$$

Μὲ πολλαπλασιασμὸν τῶν μελῶν τῶν δύο τελευταίων ἔκ τῶν (3) εύρισκομεν  $(A-B-\Gamma)+2\sqrt{B}\Gamma=0$  (5)

Ἀν δὲ πολλαπλασιάσωμεν κατὰ μέλη τὰς (4) καὶ (5), εύρισκομεν τὴν (2).

Παρατηρητέον ὅτι, ἂν ἔχωμεν τὴν ἔξισωσιν  $A=B$  καὶ ὑψώσωμεν τὰ μέλη της π.χ. εἰς τὴν μὴν δύναμιν, ὅτε λαμβάνομεν τὴν

$A^{\mu} = B^{\mu}$ , αύτη έχει τάς ρίζας της  $A=B$  μόνον, σταν τὸ μ είναι περιπτώς δάριθμός, ἐνῷ σταν τὸ μ είναι ἄρτιος ἢ  $A^{\mu} = B^{\mu}$  έχει τάς ρίζας της  $A=B$  καὶ της  $A=-B$  (ύποτιθεμένου ὅτι χρησιμοποιοῦμεν μόνον πραγματικούς δάριθμούς).

Εἰς περίπτωσιν καθ' ἥν τὸ ἐν μέλος δοθεῖσης ἔξισώσεως είναι 0, ἢ προκύπτουσα ἔξισωσις μετὰ τὴν ὑψωσιν τῶν μελῶν της δοθεῖσης εἰς δύναμιν οἰανδήποτε έχει τάς ρίζας της δοθεῖσης. Διότι διὰ νὰ είναι π.χ. ἢ δύναμις  $A^{\mu}$  ἵση μὲ 0, πρέπει νὰ είναι  $A=0$ . Δηλαδὴ πᾶσα ρίζα της  $A^{\mu}=0$ , είναι ρίζα καὶ της  $A=0$ , καὶ ἀντιστρόφως

$$\text{Έστω } \text{ἢ } \text{ἔξισωσις } \sqrt{x+15} + \sqrt{x} = 15.$$

Υψώνομεν τὰ μέλη της εἰς τὸ τετράγωνον καὶ εύρισκομεν τὴν

$$x+15+2\sqrt{x^2+15x}+x=225.$$

ἢ τὴν ισοδύναμον ταύτης  $2\sqrt{x^2+15x}=210-2x$

$$\text{ἢ } \sqrt{x^2+15x}=105-x$$

Υψώνομεν τὰ μέλη ταύτης εἰς τὸ τετράγωνον καὶ εύρισκομεν

$$x^2+15x=11025-210x+x^2$$

ἢ τὴν ισοδύναμόν της  $225x=11025$  καὶ  $x=49$ . Θέτομεν εἰς τὴν δοθεῖσαν  $x=49$  καὶ εύρισκομεν ὅτι ἐπαληθεύεται.

**§ 197.** Γενικώτερον, σταν δοθεῖσα ἔξισωσις είναι ἄρρητος, δυνάμεθα μὲ ὑψώσεις τῶν μελῶν της εἰς καταλλήλους δυνάμεις νὰ εὑρωμεν ἔξισωσιν, τῆς δόποιας ἢ λύσις νὰ είναι εὔκολος, ἀλλ' αύτη δὲν είναι πάντοτε ισοδύναμος της δοθείσης,

$$\text{Έστω } \text{π.χ. } \text{ἢ } \text{ἔξισωσις } \sqrt[4]{x-3} + x+3 = x+5.$$

Απομονώνομεν τὸ ριζικὸν καὶ εύρισκομεν  $\sqrt[4]{x-3}=2$ . Υψώνομεν εἰς τὴν 4ην δύναμιν καὶ εύρισκομεν  $x-3=16$  καὶ  $x=19$ .

Πρέπει νὰ θέσωμεν  $x=19$  εἰς τὴν δοθεῖσαν ἔξισωσιν, διὰ νὰ βεβαιωθῶμεν, ἀν είναι ρίζα αὐτῆς τὸ 19. Πράγματι παρατηροῦμεν ὅτι ἢ  $x=19$  ἐπαληθεύει καὶ τὴν δοθεῖσαν ἔξισωσιν.

### Α σ κ ή σ εις

441. Νὰ λυθοῦν αἱ ἐπόμεναι ἔξισώσεις :

$$\alpha') 2\sqrt{x+8}=28, \quad \beta') \sqrt[3]{3x+7}=3, \quad \gamma') \sqrt[3]{4x-40}=10,$$

$$\delta') \sqrt{x+9} = 5\sqrt{x-3},$$

$$\epsilon') \sqrt[3]{10x-4} = \sqrt[3]{7x+11}.$$

442. Όμοιως αι ἔσης ἔξισώσεις :

$$\alpha') \sqrt{32+x} = 16 - \sqrt{x}, \quad \beta') \sqrt{\frac{15}{4} + x} = \frac{3}{2} + x, \quad \gamma') \sqrt{x} - \sqrt{x-5} = \sqrt{5},$$

$$\delta') \sqrt{x+20} - \sqrt{x-1} = 3,$$

$$\epsilon') \sqrt{x+15} - 7 = 7 - x - 13,$$

$$\sigma') \frac{\sqrt{x}-3}{\sqrt{x}+3} = \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-2},$$

$$\zeta') \frac{1+\sqrt{1-x}}{1-\sqrt{1-x}} = 3.$$

443. Νὰ λυθοῦν αι ἔπομεναι ἔξισώσεις :

$$\alpha') \sqrt{\alpha+\sqrt{x}} + \sqrt{\alpha-\sqrt{x}} = \sqrt{x},$$

$$\beta') \frac{\sqrt{x-\alpha} + \sqrt{x-\beta}}{\sqrt{x-\alpha} - \sqrt{x-\beta}} = \frac{2x-\alpha-\beta}{2\alpha},$$

$$\gamma') \sqrt{x^2+3x+10} - x = 2,$$

$$\delta') 6x - \sqrt{(3x+4)(12x-23)} = 4,$$

$$\epsilon') \sqrt{x+7} - \sqrt{x+5} = 2,$$

$$\sigma') \sqrt{29x+6} + \sqrt{29x-9} = 15,$$

$$\zeta') 9x-2 = 5/\sqrt{6x^2-7x-8},$$

$$\eta') \sqrt{8x+13} - 8\sqrt{x^2-11x+14} = 9,$$

$$\theta') \sqrt{13+\sqrt{7+\sqrt{3+\sqrt{x}}}} = 4,$$

$$\iota') \sqrt{1-\sqrt{1-x}+\sqrt{x}} = 1,$$

$$\tau\alpha') \sqrt[3]{x-\alpha} + \sqrt[3]{x+\alpha} - 1 = \sqrt[3]{x^2-\alpha^2}$$

444. Όμοιως αι κύτωθι :

$$\alpha') \sqrt[3]{x+\sqrt{x+19}} = \sqrt[3]{8x+45},$$

$$\beta') \sqrt[3]{x} + \sqrt[3]{x-1} + \sqrt[3]{x+2} = 0,$$

$$\gamma') (1-\alpha x) \sqrt{1+\beta x} = (4+\alpha x) \sqrt{1-\beta x}, \quad \delta') \sqrt{\alpha x-1} = 4 + 0,5 \sqrt{\alpha x-0,5}$$

## 5. ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ

**§ 198.** α') ἔξισωσίς τις μὲν ἔνα ἀγνωστον (τῆς δόποίας τὸ μὲν δεύτερον μέλος εἶναι μηδέν, τὸ δὲ πρῶτον εἶναι ἀκέραιον πολυώνυμον διατεταγμένον κατὰ τὰς δυνάμεις τοῦ ἀγνώστου) λέγεται ἀντίστροφος, ἀν οἱ συντελεσταὶ τῶν ὅρων τῆς, τῶν ἀπεχόντων ἵσον ἐκ τῶν ἄκρων, εἶναι ἵσοι ἢ ἀντίθετοι, ὅταν τὸ πολυώνυμον εἶναι ἀρτίου βαθμοῦ· ὅταν ὅμως τὸ πολυώνυμον εἶναι ἀρτίου βαθμοῦ, οἱ ἐν λόγῳ συντελεσταὶ πρέπει νὰ εἶναι μόνον ἵσοι ὅταν τὸ πολυώνυμον ἔχῃ μεσαῖον ὅρον, ἢ μόνον ἀντίθετοι, ὅταν τοῦτο δὲν ἔχῃ μεσαῖον ὅρον.

Οὕτως ἡ ἔξισωσις  $\alpha x^3 + \beta x^2 + \beta x + \alpha = 0$  καλεῖται ἀντίστροφος τοῦ τρίτου βαθμοῦ, καθώς καὶ ἡ  $\alpha x^3 + \beta x^2 - \beta x - \alpha = 0$ .

\* Ἡ ἔννοια τῆς ἀντίστροφου ἔξισώσεως διφεύλεται κυρίως εἰς τὸν A. De Moivre (1667-1754), Γάλλον μαθηματικὸν μετανάστην εἰς Λονδίνον.

Η έξισωσις  $\alpha x^4 + \beta x^3 + \gamma x^2 + \beta x + \alpha = 0$  και ή  $\alpha x^4 + \beta x^3 - \beta x - \alpha = 0$  καλούνται άντιστροφοί τοῦ τετάρτου βαθμοῦ.

Παρατηρητέον ὅτι, ἂν εἰς έξισωσιν άντιστροφον, π.χ. εἰς τὴν  $\alpha x^4 + \beta x^3 + \gamma x^2 + \beta x + \alpha = 0$ , τεθῇ  $\frac{1}{x}$  ὅπου  $x$  και ἀπαλείψωμεν τοὺς παρονομαστὰς τῆς προκυπτούσης  $\frac{\alpha}{x^4} + \frac{\beta}{x^3} + \frac{\gamma}{x^2} + \frac{\beta}{x} + \alpha = 0$ , προκύπτει ἡ ἀρχικῶς δοθεῖσα έξισωσις.

Ἐκ τούτου ἔπειται ὅτι, ἂν έξισωσις άντιστροφος ἔχῃ ρίζαν ἀριθμόν τινα,  $\neq 1$  θὰ ἔχῃ ρίζαν και τὸν άντιστροφὸν τοῦ ἀριθμοῦ αὐτοῦ.

Θὰ δείξωμεν κατωτέρω ὅτι ἡ λύσις τῶν άντιστρόφων έξισώσεων τρίτου, τετάρτου και πέμπτου βαθμοῦ ἀνάγεται εἰς τὴν λύσιν έξισώσεων β' βαθμοῦ.

β') Διὰ νὰ λύσωμεν τὴν  $\alpha x^3 + \beta x^2 + \beta x + \alpha = 0$ , παρατηροῦμεν ὅτι, ὅταν  $x = -1$ , ἐπαληθεύεται. Ἐάρα τὸ πρῶτον μέλος ταύτης διαιρεῖται διὰ τοῦ ( $x+1$ ). Ἀν ἐκτελέσωμεν τὴν διαιρεσὶν τοῦ  $\alpha x^3 + \beta x^2 + \beta x + \alpha$  διὰ τοῦ  $x+1$ , εύρισκομεν πηλίκον τὸ  $\alpha x^2 + (\beta - \alpha) x + \alpha$ . Ἐπομένως ἔχομεν

$$\alpha x^3 + \beta x^2 + \beta x + \alpha = (x+1) [\alpha x^2 + (\beta - \alpha) x + \alpha] = 0.$$

Ἡ μία ρίζα τῆς δοθείσης έξισώσεως είναι προφανῶς ἡ  $x = -1$ , αἱ δύο ἄλλαι· θὰ εύρεθοῦν, ἂν λύσωμεν τὴν έξισωσιν τοῦ δευτέρου βαθμοῦ  $\alpha x^2 + (\beta - \alpha) x + \alpha = 0$ .

γ') Διὰ νὰ λύσωμεν τὴν έξισωσιν  $\alpha x^3 + \beta x^2 - \beta x - \alpha = 0$ , παρατηροῦμεν ὅτι ἐπαληθεύεται διὰ  $x = 1$ . Ἐάρα τὸ πρῶτον μέλος αὐτῆς διαιρεῖται διὰ  $x-1$ . Ἀν κάμωμεν τὴν διαιρεσὶν, εύρισκομεν ὅτι  $\alpha x^3 + \beta x^2 - \beta x - \alpha = (x-1) [\alpha x^2 + (\alpha + \beta) x + \alpha]$ .

Είναι φανερὸν ὅτι ἡ μὲν μία ρίζα τῆς δοθείσης έξισώσεως είναι ἡ  $x = 1$ , αἱ δὲ δύο ἄλλαι θὰ εύρεθοῦν, ἂν λύσωμεν τὴν έξισωσιν τοῦ δευτέρου βαθμοῦ  $\alpha x^2 + (\alpha + \beta) x + \alpha = 0$ .

$$\delta') \text{Ἔστω } \text{ἡ } \text{έξισωσις } \alpha x^4 + \beta x^3 - \beta x - \alpha = 0.$$

$$\text{Γράφομεν αὐτὴν ὡς } \text{έξης: } \alpha(x^4 - 1) + \beta x(x^2 - 1) = 0.$$

$$\text{ἢ } \alpha(x^2 - 1)(x^2 + 1) + \beta x(x^2 - 1) = 0 \text{ ἢ } (x^2 - 1)[\alpha(x^2 + 1) + \beta x] = 0.$$

Είναι φανερὸν ὅτι δύο μὲν ρίζαι ταύτης, ἄρα και τῆς δοθείσης, θὰ εύρεθοῦν ἐκ τῆς λύσεως τῆς έξισώσεως  $x^2 - 1 = 0$ , αἱ δὲ δύο ἄλλαι ἐκ τῆς λύσεως τῆς έξισώσεως  $\alpha(x^2 + 1) + \beta x = 0$ .

ε') "Εστω ή έξισωσις  $\alpha x^4 + \beta x^3 + \gamma x^2 + \beta x + \alpha = 0$  (1)

Διαιρούμεν τὰ μέλη αὐτῆς διὰ τοῦ  $x^2$  ύποθέτοντες τὰς τιμὰς τοῦ  $x \neq 0$  καὶ εύρισκομεν  $\alpha x^2 + \beta x + \gamma + \frac{\beta}{x} + \frac{\alpha}{x^2} = 0$

$$\text{η } \alpha \left( x^2 + \frac{1}{x^2} \right) + \beta \left( x + \frac{1}{x} \right) + \gamma = 0 \quad (2)$$

Θέτομεν  $x + \frac{1}{x} = \psi$  ὅτε  $\left( x + \frac{1}{x} \right)^2 = \psi^2$  η  $x^2 + \frac{1}{x^2} + 2 = \psi^2$  καὶ  $x^2 + \frac{1}{x^2} = \psi^2 - 2$ .

"Αν ἀντικαταστήσωμεν εἰς τὴν έξισωσιν (2) τὰς τιμὰς τῶν  $x^2 + \frac{1}{x^2}$  καὶ  $x + \frac{1}{x}$ , εύρισκομεν  $\alpha(\psi^2 - 2) + \beta\psi + \gamma = 0$ , ή ὅποια εἶναι  $\beta'$  βαθμοῦ ως πρὸς  $\psi$ . "Αν λύσωμεν τὴν έξισωσιν αὐτήν, εύρισκομεν ἐν γένει δύο τιμὰς τοῦ  $\psi$ , τὰς ὅποιας ἡς παραστήσωμεν μὲν  $\psi_1$  καὶ  $\psi_2$ .

"Αντικαθιστῶμεν κάθε μίαν τῶν τιμῶν τοῦ  $\psi$  εἰς τὴν  $x + \frac{1}{x} = \psi$  καὶ ἔχομεν  $x + \frac{1}{x} = \psi_1$  καὶ  $x + \frac{1}{x} = \psi_2$  η  $x^2 - x\psi_1 + 1 = 0$ ,  $x^2 - x\psi_2 + 1 = 0$ ,

ἥτοι δύο έξισώσεις δευτέρου βαθμοῦ ως πρὸς  $x$ . "Εὰν λύσωμεν αὐτάς, θὰ εὑρωμεν τὰς τέσσαρας ρίζας τῆς διθείστης έξισώσεως (1).

στ') "Εστω ή ἀντίστροφος έξισωσις πέμπτου βαθμοῦ

$$\alpha x^5 + \beta x^4 + \gamma x^3 + \gamma x^2 + \beta x + \alpha = 0.$$

Αὕτη, ὅταν τεθῇ  $x = -1$ , ἐπαληθεύεται, ἄρα ἔχει τὴν ρίζαν  $x = -1$  καὶ τὸ α' μέλος τῆς διαιρεῖται διὰ τοῦ  $x + 1$ . Ἐκτελοῦντες τὴν διαιρεσιν εύρισκομεν πηλίκον.

$$\alpha x^4 + (\beta - \alpha)x^3 + (\alpha - \beta + \gamma)x^2 + (\beta - \alpha)x + \alpha.$$

Τοῦτο τιθέμενον ίσον μὲν 0, δίδει ἀντίστροφον έξισωσιν τετάρτου βαθμοῦ, τὴν ὅποιαν γνωρίζομεν νὰ λύσωμεν.

ζ') "Αν ἔχωμεν πρὸς λύσιν τὴν έξισωσιν.

$$\alpha x^6 + \beta x^4 + \gamma x^3 - \gamma x^2 - \beta x - \alpha = 0,$$

παραστηροῦμεν ὅτι αὗτη ἔχει ρίζαν  $x = 1$ , ἄρα τὸ πρῶτον μέλος τῆς διαιρεῖται διὰ  $x - 1$ . Τὸ πηλίκον τῆς διαιρέσεως τιθέμενον ίσον

\* Η ἀντικατάστασις  $x + \frac{1}{x} = \psi$  ἐγένετο τὸ πρῶτον ὑπὸ τοῦ Γάλλου Lagrange.

\*\* Τὸ δνομα ἀντίστροφος έξισωσις ὀφείλεται εἰς τὸν Euler (1707–1781).

με τὸ 0 δίδει τὴν ἀντίστροφον ἔξισωσιν

$$\alpha x^4 + (\alpha + \beta)x^3 + (\alpha + \beta + \gamma)x^2 + (\alpha + \beta)x + \alpha = 0,$$

ἡ ὅποια εἶναι ἀντίστροφος δ' βαθμοῦ καὶ γνωρίζομεν νὰ λύσωμεν.

*Παραδείγματα.* 1ον. Ἐστω ἡ ἔξισωσις

$$6x^4 - 35x^3 + 62x^2 - 35x + 6 = 0.$$

Γράφομεν αὐτὴν ὡς ἔξῆς : (ὑποθέτοντες τὰς τιμὰς τοῦ  $x \neq 0$ ).

$$6\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) - 35\left(x + \frac{1}{x}\right) + 62 = 0.$$

$$\text{Θέτομεν } x + \frac{1}{x} = \psi, \text{ δτε εύρισκομεν}$$

$$6(\psi^2 - 2) - 35\psi + 62 = 0 \quad \text{ἢ} \quad 6\psi^2 - 35\psi + 50 = 0.$$

Αἱ ρίζαι αὐτῆς εἶναι αἱ  $\frac{5}{2}$  καὶ  $\frac{10}{3}$ . Ἐπομένως αἱ ρίζαι τῆς δο-

θείσης ἔξισώσεως θὰ εύρεθοῦν, ἐὰν λύσωμεν τὰς ἔξισώσεις

$$x + \frac{1}{x} = \frac{5}{2} \text{ καὶ } x + \frac{1}{x} = \frac{10}{3} \quad \text{ἢ} \quad \text{τὰς } 2x^2 - 5x + 2 = 0 \text{ καὶ } 3x^2 - 10x + 3 = 0.$$

Αἱ ρίζαι τούτων εἶναι αἱ 2 καὶ  $\frac{1}{2}$ , 3 καὶ  $\frac{1}{3}$ . Ἀρα, ἀνὰ δύο οἱ ἀριθμοὶ εἶναι ἀντίστροφοι.

2ον. Ἐστω ἡ ἔξισωσις  $x^4 + x^3 + x^2 + x + 1 = 0$ .

$$\text{Γράφομεν αὐτὴν οὕτω : } \left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) + \left(x + \frac{1}{x}\right) + 1 = 0.$$

Θέτομεν  $x + \frac{1}{x} = \psi$ , δτε  $x^2 + \frac{1}{x^2} = \psi^2 - 2$ , καὶ ἀντικαθιστῶντες εἰς τὴν ἀνωτέρω εύρισκομεν  $\psi^2 - 2 + \psi + 1 = 0$  ἢ  $\psi^2 + \psi - 1 = 0$ .

Αἱ ρίζαι αὐτῆς εἶναι  $\frac{-1+\sqrt{5}}{2}, \frac{-1-\sqrt{5}}{2}$ . Ἀρα, αἱ ρίζαι τῆς δοθεί-

σης ἔξισώσεως θὰ εύρεθοῦν ἐκ τῆς λύσεως τῶν ἔξισώσεων

$$2x^2 + (1 - \sqrt{5})x + 2 = 0, \quad 2x^2 + (1 + \sqrt{5})x + 2 = 0.$$

'Α σ κ ἡ σ εις

445. Νὰ λυθοῦν αἱ κάτωθι ἔξισώσεις :

$$\alpha') x^3 + x^2 + x + 1 = 0, \quad \beta') x^3 + x^2 - x - 1 = 0, \quad \gamma') x^3 + 3x^2 + 3x + 1 = 0,$$

$$\delta') x^3 + 3x^2 - 3x - 1 = 0, \quad \epsilon') x^3 + 2x^2 + 2x + 1 = 0, \quad \sigma\tau') x^8 - 3x^2 - 3x + 1 = 0,$$

$$\zeta') x^3 - 2x^2 + 2x - 1 = 0, \quad \eta') 3x^3 - 7x^2 - 7x + 3 = 0, \quad \theta') 2x^4 + 5x^3 - 5x - 2 = 0,$$

$$\iota') 5x^4 + 26x^3 - 26x - 5 = 0, \quad \iota\alpha') x^4 - 4x^3 + 4x - 1 = 0,$$

$$\iota\beta') x^4 + x^3 - 4x^2 + x + 1 = 0, \quad \iota\gamma') 3x^4 + x^3 - 24x^2 + x + 3 = 0$$

$$\text{ιδ}') \quad 2x^4 + x^3 - 17x^2 + x + 2 = 0, \quad \text{ιε}') \quad x^4 - 5x^3 + 8x^2 - 5x + 1 = 0, \\ \text{ιστ}') \quad x^4 - 2x^3 + 2x^2 - 2x + 1 = 0.$$

446. Όμοιως νά λυθοῦν αι κάτωθι ἔξισώσεις :

$$\alpha') \quad \frac{(x^2+1)^2}{(x^2+x+1)(x+1)^2} = \frac{25}{1813}, \quad \beta') \quad x^5 = \frac{135x-78}{135-78x}, \quad \gamma') \quad x^4 = \frac{11x-6}{6x-11}, \\ \delta') \quad \frac{x^2(x+1)}{(x^2+1)(x^3+1)} = \frac{4}{15} \quad \varepsilon') \quad \frac{(x^2-x+1)^2}{x^4-x^3+x^2-x-1} = \frac{9}{13}.$$

## 6. ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΔΙΩΝΥΜΟΙ

**§ 199.** Έστω ή ἔξισώσις  $x^4 - 1 = 0$ . Άντης αὐτῆς ἔχομεν τὴν ἴσοδύναμον  $x^4 = 1$ . Παρατηροῦμεν δτι αὗτη ἔχει προφανῶς τὴν ρίζαν  $x=1$ , ἔχει δὲ καὶ τὴν  $x=-1$ , διότι  $(-1)^4 = 1$ .

Έστω ή  $x^3 + 1 = 0$ . Θεωροῦμεν τὴν ἴσοδύναμον τῆς  $x^3 = -1$ . Παρατηροῦμεν δτι ή  $-1$  εἰναι ρίζα τῆς ἔξισώσεως, ἐπειδὴ  $(-1)^3 = -1$ . Έκάστη τῶν ἀνωτέρω ἔξισώσεων ἔχουσα δύο δρους εἰς τὸ α' μέλος της (τοῦ β' μέλους δντος 0) καλεῖται διώνυμος ἔξισώσις.

Ἐξισωσιν διώνυμον καλοῦμεν ἐν γένει μίαν ἔξισωσιν ὡς πρὸς ἓνα ἀγνωστὸν π.χ. τὸν  $x$ , ἀν ἔχῃ μόνον δύο δρους εἰς τὸ α' μέλος της (τοῦ β' ὑποτιθεμένου 0). Πᾶσα διώνυμος ἔξισωσις εἰναι τῆς μορφῆς  $\alpha x^k + \beta x^\lambda = 0$  (1), δπου κ.λ, εἰναι ἀριθμοὶ ἀκέραιοι καὶ θετικοὶ ( $\alpha, \beta \neq 0$ ) πραγματικοί. Εάν εἰναι  $k > \lambda$  γράφομεν τὴν (1) ὡς ἔξης :  $x^\lambda (\alpha x^{k-\lambda} + \beta) = 0$

Αὗτη ἔχει τὴν ρίζαν  $x=0$  καὶ τὰς ρίζας τῆς  $\alpha x^{k-\lambda} + \beta = 0$ . Θέτομεν πρὸς εὐκολίαν  $k-\lambda = v$ ,  $-\frac{\beta}{\alpha} = \gamma$  καὶ οὕτως ἔχομεν τὴν ἔξισωσιν  $x^v = \gamma$ . Διὰ τὴν λύσιν ταύτης παρατηροῦμεν δτι :

α') Άν τὸ  $v$  εἰναι ἀρτιος ἀριθμός, ή ἔξισώσις ἔχει τουλάχιστον δύο ρίζας (πραγματικάς), ἀν εἰναι  $\gamma > 0$ .

Διότι, ὡς γνωστόν, ἀν π.χ.  $\tau\theta\pi v = 2\lambda$ , θὰ ἔχωμεν  $x^{2\lambda} = \gamma$ . Άλλ' αὐτὴ προκύπτει ἀπὸ τὴν  $x^\lambda = \sqrt[\lambda]{\gamma}$ , ἀν τὰ μέλη ταύτης ὑψώσωμεν εἰς τὸ τετράγωνον. Άρα ἔχει τὰς ρίζας τῆς  $x^\lambda = \sqrt[\lambda]{\gamma}$  καὶ τῆς  $x^\lambda = -\sqrt[\lambda]{\gamma}$ . Οὔτως αἱ ρίζαι τῆς  $x^v = \gamma$  εἰναι αἱ  $x = \sqrt[\lambda]{\gamma} = \sqrt[\lambda]{\gamma}$ ,  $x = -\sqrt[\lambda]{\gamma} = -\sqrt[\lambda]{\gamma}$ , ἀν τὸ  $\gamma > 0$  καὶ τὸ  $v = 2\lambda$  (ἀρτιος).

Άλλ' ἀν εἰναι  $\gamma < 0$ , ή ἔξισώσις  $x^v = \gamma$  δὲν ἔχει καμμίαν πραγματικὴν ρίζαν. Πράγματι παρατηροῦμεν δτι, ἐν ὅσῳ τὸ  $v$  εἰναι ἀρτιος ἀριθμός, ἔχομεν  $(-|x|)^v = |x|^v > 0$ .

β') "Αν τὸ ν εἶναι ἀριθμὸς περιττὸς καὶ τὸ γ>0, ή ἔξισωσις ἔχει μόνον θετικὴν ρίζαν, ἐπειδὴ πᾶσα δύναμις ἀριθμοῦ μὲ ἐκθέτην περιττὸν ἀριθμὸν ἔχει τὸ σῆμα τοῦ ἀριθμοῦ. 'Επομένως μόνον θετικὸς ἀριθμὸς ὑψούμενος εἰς τὴν νιοστὴν περιττὴν δύναμιν δίδει ἔξαγόμενον θετικόν, δηλαδὴ ή ἔξισωσις ἔχει μίαν πραγματικὴν ρίζαν τὴν  $\sqrt{\gamma}$  εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτήν. 'Εὰν εἴναι γ<0, ή ἔξισωσις ἔχει μόνον ἀρνητικὴν ρίζαν, διότι ἂν τεθῇ τὸ -x<sub>1</sub> ἀντὶ τοῦ x, θὰ ἔχωμεν  $(-x_1)^v = \gamma$ , ή  $(x_1)^v = -\gamma$ .

Οὕτως ἐπανήλθομεν εἰς τὴν προηγουμένην περίπτωσιν, διότι εἴναι -γ>0, ή δὲ ἔξισωσις  $(x_1)^v = -\gamma$  ἔχει μίαν μόνον πραγματικὴν ρίζαν τὴν  $\sqrt[-v]{-\gamma}$ , ἀρα ή δοθεῖσα ἔξισωσις ἔχει τὴν ρίζαν  $x = \sqrt[-v]{-\gamma}$ .

*Παραδείγματα.* 1ον. 'Η ἔξισωσις  $x^6-1=0$  ἔχει ρίζας (πραγματικὰς) τὰς  $x=\pm 1$ , ἀρα τὸ  $x^6-1$  διαιρεῖται διὰ τοῦ  $(x+1)(x-1)=x^2-1$ . 'Εκτελοῦντες τὴν διαιρεσιν  $x^6-1$  διὰ τοῦ  $x^2-1$ , εύρισκομεν πηλίκον  $x^4+x^2+1$ . "Αρα αἱ ἄλλαι ρίζαι τῆς δοθείστης ἔξισώσεως θὰ εύρεθοῦν ἐκ τῆς λύσεως τῆς διτετραγώνου ἔξισώσεως  $x^4+x^2+1=0$ , τῆς ὅποιας αἱ ρίζαι εἴναι φανταστικά.

2ον. 'Η ἔξισωσις  $x^3+8=0$  ἔχει μίαν ρίζαν (πραγματικὴν) τὴν  $x = \sqrt[3]{-8} = -2$ . "Αρα τὸ  $x^3+8$  διαιρεῖται διὰ τοῦ  $x+2$ . Τὸ πηλίκον τῆς διαιρέσεως αὐτῆς εἴναι  $x^2-2x+4$ . "Αρα αἱ ἄλλαι ρίζαι τῆς δοθείστης ἔξισώσεως θὰ εύρεθοῦν ἐκ τῆς λύσεως τῆς ἔξισώσεως  $x^2-2x+4=0$ .

3ον. 'Η ἔξισωσις  $x^4+16=0$ , ή  $x^4=-16$  δὲν ἔχει ρίζαν (πραγματικὴν), ἐπειδὴ ἀρτία δύναμις πραγματικοῦ ἀριθμοῦ εἴναι ἀριθμὸς θετικός.

### Άσκήσεις

447. Νὰ λυθοῦν αἱ κάτωθι ἔξισώσεις :

$$\alpha') x^3 \pm 343 = 0, \quad \beta') 8x^3 \pm 125 = 0,$$

$$\delta') \frac{x^2+x+1}{x^2-x+1} = \frac{7}{9} \cdot \frac{x+1}{x-1},$$

$$\gamma') x^3 \pm 1331 = 0,$$

$$\epsilon') \frac{2-x^2}{2+x^2} = \frac{x^8-4x^2+9}{x^3+4x^2+9},$$

$$\sigma\tau') \frac{9x^3+7}{2} - \left[ x^3 - \frac{(x^3-2)}{7} \right] = 36.$$

448. Νὰ λυθοῦν αἱ κάτωθι ἔξισώσεις :

$$\alpha') x^5 - (x^3+8)(x^2+5) + 4x^2(x+2) + 32 = 0, \quad \beta') \frac{9x^3+20}{96} = \frac{4x^3+12}{5x^3-4} + \frac{x^3}{4}.$$

449. Όμοιως αἱ κάτωθι :

$$\alpha') \frac{1}{1-\alpha\gamma} + \frac{1}{1-\alpha-\gamma} = \left(\frac{\alpha}{x}\right)^3, \quad \beta') (1-\alpha\gamma)^{-1}x^3 + \frac{(1-\alpha-\gamma)^{-1}}{x^{-3}} = 1.$$

$$\gamma') x^4 \pm 1 = 0 \text{ (γράψατε } x^4 + 2x^2 + 1 - 2x^2 = 0), \quad \delta') x^6 \pm 1024 = 0, \quad \epsilon') x^5 \pm 1 = 0,$$

$$\sigma\tau') x^6 \pm 729 = 0, \quad \zeta') x^{2v+1} \pm 1 = 0, \quad \eta') x^7 \pm 1 = 0, \quad \theta') x^{2v} \pm 1 = 0,$$

$$\iota') x^4 \pm 256 = 0 \text{ (θέσατε } x = 4\psi), \quad \alpha') x^5 \pm 3125 = 0, \quad \iota\beta') x^{10} \pm 1 = 0.$$

$$\iota\gamma') x^6 \pm 1 = 0, \quad \iota\delta') x^4 \pm 14641 = 0, \quad \iota\epsilon') x^{12} \pm 1 = 0.$$

## 7. ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΟΝ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ

**§ 200.** α') "Εστω πρὸς λύσιν ἡ ἔξισωσις  $3|x| - 5 = 0$ , ὅπου  $|x|$  παριστάνει τὴν ἀπόλυτον τιμὴν τοῦ ἀγνώστου  $x$ , τοῦ ὀποίου ζητοῦμεν νὰ εὑρωμεν τὰς τιμὰς τὰς ἐπαληθευούσας τὴν δοθεῖσαν ἔξισωσιν.

"Ἐκ τῆς δοθείσης ἔξισώσεως ἔχομεν τὴν ἰσοδύναμον αὐτῆς  $3|x| = 5$ , καὶ  $|x| = \frac{5}{3}$ . Ἡ τιμὴ  $x = \frac{5}{3}$  ἐπαληθεύει τὴν δοθεῖσαν, καθὼς καὶ  $\bar{x} = -\frac{5}{3}$ , διότι  $\left| -\frac{5}{3} \right| = \frac{5}{3}$ . "Ωστε ἡ δοθεῖσα ἔχει ρίζας τὰς  $\pm \frac{5}{3}$ , ταύτας δὲ ἔχει καὶ ἡ  $\left(x - \frac{5}{3}\right)\left(x + \frac{5}{3}\right) = 0$ . Ἐπομένως ἡ δοθεῖσα εἶναι ἰσοδύναμος μὲ τὴν  $\left(x - \frac{5}{3}\right)\left(x + \frac{5}{3}\right) = 0$  ἢ τὴν  $x^2 = \frac{25}{9}$ .

"Εστω ἡ ἔξισωσις  $\alpha|x| + \beta = 0$  ( $\alpha, \beta \neq 0$ ) (1)

"Ἀν  $\alpha, \beta$  εἰναι ὁμόσημοι, ὅτε  $\alpha\beta > 0$ , τότε τὸ πρῶτον μέλος τῆς (1) εἰναι (πάντοτε) θετικὸν ἢ ἀρνητικόν, ἥτοι  $\neq 0$ , ἐπομένως ἡ (1) οὐδεμίαν λύσιν ἔχει ὡς πρὸς  $x$ .

"Ἀν εἰναι  $\alpha\beta < 0$ , θὰ ἔχωμεν ἐκ τῆς (1),  $|x| = -\frac{\beta}{\alpha} > 0$ . Οὕτως ἡ (1), (ἐὰν  $\alpha\beta < 0$ ), ἔχει ρίζας τὰς  $-\frac{\beta}{\alpha}$  καὶ  $\frac{\beta}{\alpha}$ , ἃρα εἰναι ἰσοδύναμος μὲ τὴν  $x^2 = \frac{\beta^2}{\alpha^2}$ .

*Παράδειγμα.* "Εστω ἡ ἔξισωσις  $-4|x| + 12 = 0$ .

"Ισοδύναμει πρὸς τὴν  $|x| = 3$  καὶ αὐτὴ εἰναι ἰσοδύναμος μὲ τὴν  $x^2 = 3^2$ .

β') "Εστω πρὸς λύσιν ἡ ἔξισωσις

$$\alpha|x| + \beta x + \gamma = 0, (\alpha, \beta, \gamma \neq 0) (2)$$

"Αν θέλωμεν νά είναι  $x > 0$ , έπειδή  $|x| = x$ , ή (2) γράφεται και ούτως  $\alpha x + \beta x + \gamma = 0$  (2'), έκ της όποιας εύρισκομεν  $x = \frac{-\gamma}{\alpha + \beta}$  (άν είναι  $\alpha + \beta \neq 0$ ). Ή τιμή αύτή ίκανοποιεῖ τὴν  $x > 0$  αν είναι  $-\frac{\gamma}{\alpha + \beta} > 0$  ή  $\frac{\gamma}{\alpha + \beta} < 0$ , ή  $\gamma(\alpha + \beta) < 0$ .

"Αν θέλωμεν νά είναι  $x < 0$ , τότε έπειδή  $|x| = -x$ , ή (2) γράφεται ούτω  $-\alpha x + \beta x + \gamma = 0$  (2''). έκ της όποιας εύρισκομεν  $x = -\frac{\gamma}{\beta - \alpha}$ , (άν  $\beta - \alpha \neq 0$ ). Αύτή ίκανοποιεῖ τὴν  $x < 0$  αν είναι  $-\frac{\gamma}{\beta - \alpha} < 0$ ,

$$\text{ή } -\gamma(\beta - \alpha) < 0, \text{ ή } \gamma(\beta - \alpha) > 0$$

"Αρα, αν  $\alpha \neq -\beta$  και  $\gamma(\alpha + \beta) < 0$ , ή (2) έχει ρίζαν τὴν  $x_1 = -\frac{\gamma}{\alpha + \beta} > 0$ , αν δὲ είναι  $\gamma(\beta - \alpha) > 0$ , τότε έχει τὴν  $x_2 = -\frac{\gamma}{\beta - \alpha}$ , αν  $\alpha \neq \beta$ .

"Αν  $\alpha = \beta$ , τότε έχει ρίζαν τὴν  $x = -\frac{\gamma}{2\alpha}$  αν  $\alpha\gamma < 0$ .

*Παρατήρησις.* Διὰ  $x = 0$ , ή (2) δὲν ἐπαληθεύεται, αν είναι  $\gamma \neq 0$ .

"Αν  $\gamma = 0$ ,  $\beta = 1$ , ή (2) γίνεται  $\alpha|x| + x = 0$  (3) και  $|x| = -\frac{x}{\alpha}$ , ἀλλ' έπειδή είναι  $|x| = x$ , ὅταν είναι  $x > 0$  και  $|x| = -x$  ὅταν είναι  $x < 0$ , έπειται ὅτι ή  $|x| = -\frac{x}{\alpha}$  ἀνάγεται εἰς τὴν  $x = -\frac{x}{\alpha}$  μὲν κατὰ τὴν  $\alpha'$  περίπτωσιν ( $x > 0$ ), εἰς τὴν  $x = \frac{x}{\alpha}$  δὲ κατὰ τὴν  $\beta'$  ( $x < 0$ ), έχουν δὲ αὗται μόνον ρίζαν  $x = 0$ , αν είναι  $\alpha^2 \neq 1$ . "Αν  $\alpha = +1$ , τότε ή  $|x| = -\frac{x}{\alpha}$  γίνεται  $|x| = -x$  και έχει ρίζαν πᾶσαν ἀρνητικὴν τιμὴν τοῦ  $x$  και τὴν  $x = 0$ . "Αν  $\alpha = -1$ , έχομεν  $|x| = x$  και αὕτη έπαληθεύεται διὰ πᾶσαν θετικὴν τιμὴν τοῦ  $x$  και διὰ  $x = 0$ .

*Παραδείγματα.* 1ον. "Εστω ή ἔξισωσις  $2|x| + 3x - 4 = 0$ .

"Έχομεν  $\alpha = 2$ ,  $\beta = 3$ ,  $\gamma = -4$ ,  $\gamma(\alpha + \beta) = -20 < 0$ . "Αρα ή ἔξισωσις έχει τὴν ρίζαν  $x = \frac{-\gamma}{\alpha + \beta} = \frac{4}{5}$ .

2ον. "Εστω ή ἔξισωσις  $-2|x| + x + 1 = 0$ .

Είναι  $\alpha = -2$ ,  $\beta = 1$ ,  $\gamma = 1$ ,  $\gamma(\alpha + \beta) = 1 \cdot (-2 + 1) = -1$ , αρα  $x = \frac{-1}{1 - 2} = 1$  είναι ρίζα της ἔξισώσεως. 'Αλλ' είναι και  $\gamma(\beta - \alpha) = 1(1 + 2) = 3 > 0$  αρα  $x = -\frac{1}{3}$  είναι ρίζα της ἔξισώσεως.

ΛΥΣΙΣ ΤΗΣ ΕΞΙΣΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ  $|x|^2 + 2\beta|x| + \gamma = 0$ , ( $\beta, \gamma \neq 0$ )

**§ 201.** Διὰ τὴν λύσιν τῆς ἀνωτέρω ἔξισώσεως θέτομεν  $|x| = \omega$  καὶ εύρισκομεν  $\omega^2 + 2\beta\omega + \gamma = 0$ ,  $\omega = |x| = -\beta \pm \sqrt{\beta^2 - \gamma}$ . Ἰνα αὗτη καὶ ἡ δοθείσα ἔξισώσις ἔχῃ λύσιν πραγματικήν, πρέπει,  $\beta^2 - \gamma > 0$  ἐπὶ πλέον δὲ ἂν εἰναι  $-\beta \pm \sqrt{\beta^2 - \gamma} > 0$ , ἔχομεν τέσσαρας ρίζας ἀνὰ δύο ἀντιθέτους. Διότι ἂν τεθῇ  $-\beta + \sqrt{\beta^2 - \gamma} = \kappa_1 > 0$  καὶ  $-\beta - \sqrt{\beta^2 - \gamma} = \kappa_2 > 0$ , αἱ ρίζαι τῆς δοθείσης ἔξισώσεως εἰναι αἱ  $x_1 = \kappa_1$ ,  $x_2 = -\kappa_1$ ,  $x_3 = \kappa_2$ ,  $x_4 = -\kappa_2$ .

"Αν  $\beta^2 - \gamma = 0$  καὶ  $-\beta > 0$ , ἔχομεν  $|x| = -\beta$  καὶ αἱ  $x_1 = -\beta$ ,  $x_2 = \beta$  είναι ρίζαι τῆς δοθείσης ἔξισώσεως.

*Παραδείγματα.* 1ον. "Εστω ἡ ἔξισώσις  $|x|^2 - 8|x| + 7 = 0$ .

Εύρισκομεν  $|x| = 4 \pm \sqrt{4^2 - 7} = 4 \pm 3$ , ἥτοι  $|x| = 7$  καὶ  $|x| = 1$ , ἄρα  $x_1 = -7$ ,  $x_2 = 7$ ,  $x_3 = 1$ ,  $x_4 = -1$  είναι αἱ ρίζαι τῆς δοθείσης ἔξισώσεως.

2ον. "Εστω ἡ ἔξισώσις  $|x|^2 - 10|x| - 24 = 0$ ,  $|x| = 5 \pm \sqrt{25 + 24} = 5 \pm 7$ , ἥτοι  $|x| = 12$ ,  $|x| = -2$ . Οὕτως ἔχομεν μόνον δύο ρίζας τὰς  $x_1 = 12$ ,  $x_2 = -12$ , διότι ἡ  $|x| = -2$  είναι ἀδύνατος.

3ον. "Εστω ἡ ἔξισώσις  $|x|^2 + 10|x| + 24 = 0$ ,  $|x| = -5 \pm \sqrt{25 - 24} = -5 \pm 1$ , ἄρα προκύπτει  $|x| = -4$ ,  $|x| = -6$  καὶ ἡ ἔξισώσις δὲν ἔχει ρίζαν. Τοῦτο διακρίνει τις ἀμέσως, διότι τὸ πρῶτον μέλος τῆς ἔξισώσεως είναι θετικὸν διὰ πᾶσαν τιμὴν τοῦ  $x$  (πραγματικήν).

*Παρατήρησις.* Κατὰ τὰ ἀνωτέρω δυνάμεθα νὰ εὔρωμεν καὶ τὴν λύσιν συστημάτων ἔχόντων ἀπολύτους τιμὰς τῶν ἀγνώστων των.

### Α σ κ ή σ ε ι σ

450. Νὰ εύρεθοῦν αἱ ρίζαι τῶν κάτωθι ἔξισώσεων.

$$\alpha') 3|x|-7=0, \quad \beta') -6|x|+5=0, \quad \gamma') \frac{3}{4}|x|=-1, \quad \delta') 2|x|+7x-3=0,$$

$$\epsilon') |x|+x+4=0, \quad \sigma') |x|+x-4=0.$$

451. Νὰ λυθοῦν αἱ κάτωθι ἔξισώσεις :

$$\alpha') |x|^2 - 5|x| - 3 = 0, \quad \beta') |x|^2 - 5|x| + 6 = 0, \quad \gamma') 4|x|^2 - 5|x| - 1 = 0,$$

$$\delta') |x|^2 - \frac{3}{4}|x| - 2 = 0.$$

452. Εξετάσατε τὴν ἔξισώσιν  $a|x| + x + \gamma = 0$ , ( $a, \gamma \neq 0$ ), παρατηροῦντες δτι είναι  $a|x| = -(y+x)$ ,  $a^2x^2 = (y+x)^2$ .

## Β'. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΒΑΘΜΟΥ

**§ 202.** Καλοῦμεν σύστημα (έξισώσεων) δευτέρου βαθμοῦ τὸ ἀποτελούμενον ἀπὸ μίαν ἔξισωσιν β' βαθμοῦ καὶ ἀπὸ οἰονδήποτε ἀριθμὸν ἔξισώσεων α' βαθμοῦ μὲν ἰσαρίθμους ἀγνώστους τῶν ἔξισώσεών του.

"Εστω πρὸς λύσιν τὸ σύστημα β' βαθμοῦ  $x-\psi=5$ ,  $x\psi=-4$ .

'Έκ τῆς α' τούτων ἔχομεν  $\psi=x-5$ , εἰσάγοντες τὴν τιμὴν αὐτὴν εἰς τὴν β' λαμβάνομεν  $x(x-5)=-4$ , ἐκ τῆς ὅποιας εύρίσκομεν τὴν ίσοδύναμόν της  $x^2-5x+4=0$ . Λύοντες ταύτην εύρίσκομεν  $x=1$ ,  $x=4$ . 'Αντικαθιστῶμεν τὰς τιμὰς αὐτὰς εἰς τὴν  $\psi=x-5$  καὶ εύρισκομεν  $\psi=-4$ ,  $\psi=-1$ . "Ωστε αἱ τιμαὶ τῶν ἀγνώστων εἰναι  $x=1$  καὶ  $4$ ,  $\psi=-4$  καὶ  $-1$  ἀντιστοίχως.

'Εκ τῶν ἀνωτέρω παρατηροῦμεν ὅτι, ὅταν ἔχωμεν σύστημα β' βαθμοῦ μὲ δύο ἔξισώσεις καὶ δύο ἀγνώστους, λύομεν ὡς πρὸς τὸν ἔνα ἀγνώστον τὴν ἔξισωσιν τοῦ α' βαθμοῦ, ἀντικαθιστῶντες δὲ τὴν τιμὴν αὐτὴν εἰς τὴν ἄλλην ἔξισωσιν, ἀγόμεθα εἰς τὴν λύσιν ἔξισώσεως δευτέρου βαθμοῦ μὲ ἔνα ἀγνώστον. Μετὰ τὴν λύσιν τῆς ἔξισώσεως αὐτῆς εύρισκομεν τὰς τιμὰς καὶ τοῦ ἄλλου ἀγνώστου.

'Ἐν γένει, ἀν ἔχωμεν σύστημα β' βαθμοῦ μὲ ν ἔξισώσεις καὶ ν ἀγνώστους, εύρισκομεν σύστημα ίσοδύναμον μὲ τὸ δοθὲν καὶ εὐκολώτερον πρὸς λύσιν ὡς ἔξῆς : Λύομεν τὰς ( $v-1$ ) ἔξισώσεις τοῦ συστήματος, αἱ ὅποιαι εἰναι α' βαθμοῦ, ὡς πρὸς μόνον τοὺς  $v-1$  ἀγνώστους αὐτοῦ καὶ εύρισκομεν τὰς τιμὰς μόνον τῶν  $v-1$  ἀγνώστων ἐκφραζομένας συναρτήσει τῆς ἀπομενούσης ἀγνώστου, ἔστω τῆς  $x$ . 'Ακολούθως εἰσάγομεν τὰς τιμὰς τῶν  $v-1$  ἀγνώστων εἰς τὴν μοναδικὴν ἔξισωσιν β' βαθμοῦ τοῦ δοθέντος συστήματος. Οὕτω θὰ εύρεθῇ ίσοδύναμος ταύτης β' βαθμοῦ ὡς πρὸς  $x$ , ἥ ὅποια λυομένη δίδει τὰς τιμὰς τοῦ  $x$ . 'Αντικαθιστῶμεν τὰς οὕτως εύρισκομένας τιμὰς τοῦ  $x$  εἰς τὰς ἐκφράσεις τῶν  $v-1$  ἄλλων ἀγνώστων καὶ θὰ εὑρωμεν καὶ τὰς τιμὰς τούτων.

*Παραδείγματα.* 1ον. "Εστω τὸ σύστημα  $x+\psi=\alpha$ ,  $x\psi=\gamma$  (1)

'Έκ τῆς πρώτης τῶν ἔξισώσεων εύρισκομεν  $\psi=\alpha-x$  (2). Εἰσάγοντες τὴν τιμὴν αὐτὴν τοῦ  $\psi$  εἰς τὴν δευτέραν τῶν ἔξισώσεων (1) εύρισκομεν  $x(\alpha-x)=\gamma$  ἥ  $x^2-\alpha x-\gamma=0$  (3). 'Η ἔξισωσις (3) ἔ-

χει ἐν γένει δύο ρίζας, ἔστω τὰς  $x_1, x_2$ . Θέτομεν ἀντὶ τοῦ  $x$  τὰς τιμάς του εἰς τὴν ἔξισωσιν (2) καὶ εύρισκομεν ἐν γένει δύο τιμάς διὰ τὸ  $\psi$ , ἥτοι τὰς  $\psi = \alpha - x_1 = \psi_1, \psi = \alpha - x_2 = \psi_2$ . Οὖτως ἔχομεν δύο ζεύγη λύσεων τοῦ δοθέντος συστήματος, τὰ  $x = x_1, \psi = \alpha - x_1 = \psi_1$  καὶ  $x = x_2, \psi = \alpha - x_2 = \psi_2$ .

\*Ἐπειδὴ ὅμως εἶναι [ἔνεκα τῆς (3)]  $x_1 + x_2 = \alpha$ , ἐπεται ὅτι  $\alpha - x_1 = x_2, \alpha - x_2 = x_1$ . ἄρα τὰ ζεύγη τῶν λύσεων τοῦ (1) εἶναι τὰ  $x = x_1, \psi = x_2$  καὶ  $x = x_2, \psi = x_1$ .

3ον. \*Ἐστω τὸ σύστημα  $x - \psi = \beta, x\psi = \gamma$  (1'). Εύρισκομεν  $\psi = x - \beta$  καὶ εἰσάγοντες τὴν τιμὴν αὐτὴν τοῦ  $\psi$  εἰς τὴν  $\beta'$  τῶν (1') εύρισκομεν  $x^2 - \beta x - \gamma = 0$ . (2')

\*Η ἔξισωσις αὐτὴ ἔχει ἐν γένει δύο ρίζας, ἔστω τὰς  $x = x_1, x = x_2$ . ἐπομένως ἔχομεν  $x = x_1, \psi = x_1 - \beta$  καὶ  $x = x_2, \psi = x_2 - \beta$ .

\*Ἐπειδή, ἔνεκα τῆς (2'), εἶναι  $x_1 + x_2 = \beta$ , εύρισκομεν ὅτι τὰ ζεύγη τῶν λύσεων τοῦ (1') εἶναι τὰ  $x = x_1, \psi = -x_2$  καὶ  $x = x_2, \psi = -x_1$ .

3ον. \*Ἐστω τὸ σύστημα  $x^2 + \psi^2 - \rho^2 = 0, \alpha x + \beta \psi + \gamma = 0$  (1). Υπόθετομεν  $\beta \neq 0$  καὶ εύρισκομεν ἐκ τῆς  $\beta'$  τοῦ (1)  $\psi = -\frac{\gamma + \alpha x}{\beta}$  (2). Εἰσάγομεν τὴν τιμὴν αὐτὴν εἰς τὴν  $\alpha'$  τῶν (1) καὶ εύρισκομεν

$$(\alpha^2 + \beta^2)x^2 + 2\alpha\gamma x + \gamma^2 - \beta^2\rho^2 = 0. \quad (3)$$

"Ινα αἱ ρίζαι τῆς (3) εἶναι πραγματικαί, πρέπει νὰ ἔχωμεν  $\alpha^2\gamma^2 - (\alpha^2 + \beta^2)(\gamma^2 - \beta^2\rho^2) \geq 0$  ή  $\gamma^2 \leq (\alpha^2 + \beta^2)\rho^2$ .

\*Ἐὰν πληροῦται ἡ συνθήκη αὐτῆ, θὰ εύρωμεν δύο τιμάς τοῦ  $x$  πραγματικάς, ἔστω τὰς  $x_1, x_2$  καὶ ἀκολούθως δύο τιμάς τοῦ  $\psi$ , ἥτοι θὰ ἔχωμεν τὰ έξῆς ζεύγη λύσεων τοῦ (1)

$$x = x_1, \psi = -\frac{\alpha x_1 + \gamma}{\beta} \text{ καὶ } x = x_2, \psi = -\frac{\alpha x_2 + \gamma}{\beta},$$

τὰ ὅποια περιορίζονται εἰς ἐν μόνον, ἀν εἶναι  $\gamma^2 = (\alpha^2 + \beta^2)\rho^2$ .

\*Ἀν αἱ ρίζαι τῆς (3) εἶναι φανταστικαί, θὰ συμβαίνῃ τὸ αὐτὸ καὶ διὰ τὰς τιμάς τοῦ  $\psi$ .

$$4ον. *Ἐστω τὸ σύστημα \begin{cases} x^2 + \psi^2 + \omega^2 = 14 \\ x + \psi + \omega = 6 \\ x - \psi + \omega = 0. \end{cases} \quad (1)$$

\*Ἐκ τῶν δύο τελευταίων ἔξισώσεων εύκολως εύρισκομεν  $2\psi = 6$ , ἄρα  $\psi = 3$ , ὅτε ἐκ τῆς  $\gamma'$  τῶν δοθεισῶν εύρισκομεν  $\omega = 3 - x$ . Εἰσάγοντες τὰς τιμάς τῶν  $\psi$  καὶ  $\omega$  εἰς τὴν πρώτην τῶν (1) εύρισκομεν

$$x^2 + 9 + (3-x)^2 = 14 \quad \text{η} \quad x^2 - 3x + 2 = 0 \quad (2)$$

Έκ ταύτης εύρισκομεν  $x=1$ ,  $x=2$ . Ούτως εύρισκομεν όκολού-θως  $\omega=2$ ,  $\omega=1$  και ἔχομεν τὰς ἔξης τριάδας λύσεων τοῦ (1)  $x=1$ ,  $\psi=3$ ,  $\omega=2$  και  $x=2$ ,  $\psi=3$ ,  $\omega=1$ .

### Α σ κ ή σ εις

Νὰ λυθοῦν τὰ κάτωθι συστήματα :

453.  $\alpha') \begin{cases} 12x\psi + 13\psi^2 = 25 \\ 4x - 3\psi = 1 \end{cases} \quad \beta') \begin{cases} (x+\psi)(2x+3\psi) = 180 \\ x-2\psi = 3 \end{cases}$   
 $\gamma') \begin{cases} x^2 - x\psi + 4\psi^2 = 1,5 \\ x - \psi = 1,25 \end{cases} \quad \delta') \begin{cases} (2-x)(9+\psi) = 91 \\ x+\psi = 9 \end{cases}$   
 $\epsilon') \begin{cases} x^2 + 2(x\psi - 24) + \psi^2 = 0 \\ x - \psi = 1 \end{cases} \quad \sigma') \begin{cases} x\psi - 7(3x-\psi) + 3 = 0 \\ 2x-\psi = 0 \end{cases}$   
 $\zeta') \begin{cases} x(\psi+1) + 4 = 0 \\ \psi(x+1) + 9 = 0 \end{cases} \quad \eta') \begin{cases} 5 = 19 \frac{1-\psi-\psi^2}{1-x-x^2} \\ 2x-3\psi = 2 \end{cases} \quad \theta') \begin{cases} \frac{x+1}{x-1} = \frac{9}{2} \\ \frac{x-10}{x+10} + 1 = 0 \end{cases}$
454.  $\alpha') \begin{cases} \left(\frac{x}{\alpha}\right)^2 + \left(\frac{\psi}{\beta}\right)^2 = 2 \\ \alpha\psi + \beta x = 0 \end{cases} \quad \beta') \begin{cases} \alpha x^2 + (\alpha + \beta)x\psi + \beta\psi^2 = 0 \\ \alpha x - \beta\psi = 2\alpha\beta \end{cases}$   
 $\gamma') \begin{cases} \left(\frac{x}{\alpha}\right)^2 + \left(\frac{\beta}{\psi}\right)^2 = 1 \\ \frac{x}{\beta} - \frac{\psi}{\alpha} = 0 \end{cases} \quad \delta') \begin{cases} (2\alpha\beta - \beta)x^2 + (2\alpha + \beta)\psi^2 = 4\alpha^3 \\ x + \psi = 2\alpha \end{cases}$   
 $\epsilon') \begin{cases} x^2 + 2\alpha\psi^2 = \alpha^2 + 1 \\ x + \alpha\psi = 1 \end{cases} \quad \sigma') \begin{cases} 2x^2 - 3x\psi = 15\alpha - 10\alpha^3 \\ 3x + 2\psi = 12\alpha - 13 \end{cases}$   
 $\alpha') \begin{cases} (x+\alpha)^2 - (\psi-\beta)^2 = 4(\alpha^2 - \beta^2) \\ x-\psi = \alpha + \beta \end{cases} \quad \beta') \begin{cases} (x+\alpha)^2 + (\psi + \beta)^2 = 4(\alpha^2 + \beta^2) \\ x + \psi = \alpha + \beta \end{cases}$   

456.  $\alpha') \begin{cases} x^2 - x\psi = 2\alpha\beta + 2\beta^2 \\ x\psi - \psi^2 = 2\beta(\alpha - \beta) \end{cases} \quad \beta') \begin{cases} (\beta x^2 + \alpha\psi^2)(\alpha^3 + \beta^3) = \alpha\beta\gamma^2 \\ \alpha x + \beta\psi = \gamma \end{cases}$   
 $\gamma') \begin{cases} \psi^2 = \frac{\alpha}{2} \left( x - \frac{\alpha}{2} \right) \\ (x+1)x + \psi^2 = \frac{\alpha}{4}(5\alpha + 4) \end{cases}$

Ἐπίστης τὰ κατωτέωρ -

457.  $\alpha') \begin{cases} \psi^2 + 2\alpha \left( x^2 - \frac{\alpha}{2} \right) = 0 \\ x^2 + 2\alpha\psi^2 = \alpha \left( \alpha + \frac{1}{2} \right) \end{cases} \quad \beta') \begin{cases} \psi^2 = 2\alpha(\lambda + 1) \left( x + \frac{\alpha\lambda}{2} \right) \\ 2\alpha x = \left( \frac{\psi}{\lambda + 1} \right)^2 \end{cases}$

$$\begin{array}{ll}
 \gamma') \left\{ \begin{array}{l} \frac{\alpha^2}{x^2} + \frac{\psi^2}{2\beta^2\gamma^2x} = 2 \\ \psi^2 = \beta^2\gamma^2x \end{array} \right. & \delta') \left\{ \begin{array}{l} \psi - x = 2\beta \\ \frac{x^2}{\alpha - \beta} + \frac{\psi^2}{\alpha + \beta} = x + \psi \end{array} \right. \\
 458. \quad \alpha') \left\{ \begin{array}{l} \beta^2x^2 - \alpha^2\psi^2 = \alpha^2\beta^2 \\ \left(\frac{\beta x}{\alpha}\right)^2 = 2\gamma \left(\psi + \frac{\beta^2 - \gamma^2}{2\gamma}\right) \end{array} \right. & \beta') \left\{ \begin{array}{l} \left(\frac{x}{\alpha}\right)^2 (\beta\gamma)^2 x + \psi^2 = 2\beta^2\gamma^2x \\ \left(\frac{\psi}{\beta\gamma}\right)^2 = x \end{array} \right. \\
 459. \quad \alpha') \left\{ \begin{array}{l} \alpha\psi^2 - 2\beta^2 \left(x + \frac{\alpha}{2}\right) = 0 \\ \alpha\psi^2 + 2\beta^2 \left(x - \frac{\alpha}{2}\right) = 0 \end{array} \right. & \beta') \left\{ \begin{array}{l} \alpha(\psi^2 - \beta^2) - 2\beta^2x^2 = 0 \\ 2 \frac{x^2}{\alpha} + \frac{\psi}{2\sqrt{2}} = \frac{\alpha + \beta}{2} \end{array} \right. \\
 \gamma') \left\{ \begin{array}{l} \left(\frac{x}{\alpha + \beta}\right)^2 + \left(\frac{\psi}{\alpha - \beta}\right)^2 = x \\ \psi^2 = \left(\frac{\alpha - \beta}{\alpha + \beta}\right)^2 x \end{array} \right. & \\
 460. \quad \alpha') \left\{ \begin{array}{l} x^2 + \psi^2 = 100 \\ x : \psi = 3 : 5 \end{array} \right. & \beta') \left\{ \begin{array}{l} x^2 - \psi^2 = 56 \\ x : \psi = 9 : 5 \end{array} \right. \\
 \gamma') \left\{ \begin{array}{l} 24\psi(x - 5\psi) = (x + 2\psi)(5x - 60\psi) \\ 5x^2 - 12\psi^2 = 32 \end{array} \right. & \\
 461. \quad \alpha') \left\{ \begin{array}{l} x^2 + x\psi + \psi^2 = 76 \\ (x + \psi) : (x - \psi) = 5 : 2 \end{array} \right. & \beta') \left\{ \begin{array}{l} x^2 - x\psi + \psi^2 = 91 \\ (x + \psi) : (x - \psi) = 8 : 3 \end{array} \right. \\
 \gamma') \left\{ \begin{array}{l} (x + 4)^2 = x\psi \\ \psi^2 = (\psi + 9)(x + 4) \end{array} \right. & \delta') \left\{ \begin{array}{l} (x^2 + \psi^2)(x + \psi) = 1080 \\ (x^2 + \psi^2)(x - \psi) = 540 \end{array} \right. \\
 \epsilon') \left\{ \begin{array}{l} (x^2 - \psi^2)(2x - 3\psi) = 192 \\ (x^2 - \psi^2)(3x + \psi) = 1344 \end{array} \right. & 
 \end{array}$$

**§ 203.** Ή λύσις συστημάτων  $\beta'$  ή καὶ ἀνωτέρου βαθμοῦ ἀνάγεται συνήθως εἰς τὴν λύσιν ἔξισώσεων  $\alpha'$  καὶ  $\beta'$  βαθμοῦ, ἀλλὰ δὲν ὑπάρχει ὠρισμένος κανὼν διὰ τὴν λύσιν. Ως ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἐπιδιώκεται ἡ λύσις τῶν ἀπλουστέρων ἐκ τῶν ἔξισώσεων ὡς πρὸς ἀριθμὸν τινα ἀγνώστων συναρτήσει τῶν λοιπῶν. Τὰς οὕτως εύρισκομένας τιμὰς ἀντικαθιστῶμεν εἰς τὰς λοιπὰς ἔξισώσεις καὶ ἐπιδιώκομεν νὰ εύρωμεν μίαν μόνον ἔξισώσιν  $\beta'$  βαθμοῦ μὲν ἕνα ἀγνώστον, τὴν ὁποίαν δυνάμεθα νὰ λύσωμεν, ὅτε διευκολύνεται καὶ ἡ εὑρεσίς τῶν τιμῶν τῶν λοιπῶν ἀγνώστων.

*Παραδείγματα.* 1ον. "Εστω προς λύσιν τὸ σύστημα  
 $x^3 + \psi^3 + 2x^2 - \psi = 9$   
 $x + \psi = 3.$

<sup>3</sup>Έκ τῆς δευτέρας εύρισκομεν  $\psi=3-x$ . Εἰσάγοντες τὴν τιμὴν αὐτὴν τοῦ ψ εἰς τὴν πρώτην ἔξισωσιν εύρισκομεν  $x^3+(3-x)^3+2x^2-3+x=9$  ή τὴν  $11x^2-26x+15=0$ . Λύοντες αὐτὴν εύρισκομεν  $x_1=1, x_2=\frac{15}{11}$ . ἀκολούθως δὲ εύρισκομεν καὶ  $\psi_1=2, \psi_2=\frac{18}{11}$ .

Οὕτως ἔχομεν τὰ ἔξις ζεύγη  $x_1=1, \psi_1=2, x_2=\frac{15}{11}, \psi_2=\frac{18}{11}$ .

2ον. <sup>3</sup>Εστω τὸ σύστημα  $x^2+\psi^2=\alpha^2, x\psi=\beta^2$ .

Προσθέτομεν κατὰ μέλη τὴν πρώτην τῶν δοθεισῶν καὶ τὴν  $2x\psi=2\beta^2$ , ὅτε εύρισκομεν  $(x+\psi)^2=\alpha^2+2\beta^2$ . <sup>3</sup>Αφαιροῦμεν ἀπὸ τῆς πρώτης τῶν δοθεισῶν τὰ μέλη τῆς  $2x\psi=2\beta^2$  καὶ εύρισκομεν  $(x-\psi)^2=\alpha^2-2\beta^2$ , ἀκολούθως εύρισκομεν  $x+\psi=\pm\sqrt{\alpha^2+2\beta^2}, x-\psi=\pm\sqrt{\alpha^2-2\beta^2}$ , καὶ ἀναγόμεθα εἰς τὰ συστήματα :

$$\begin{aligned} x+\psi &= \sqrt{\alpha^2+2\beta^2} & x+\psi &= -\sqrt{\alpha^2+2\beta^2} & x+\psi &= -\sqrt{\alpha^2+2\beta^2} \\ x-\psi &= \sqrt{\alpha^2-2\beta^2} & x-\psi &= -\sqrt{\alpha^2-2\beta^2} & x-\psi &= -\sqrt{\alpha^2-2\beta^2} \end{aligned}$$

εὐκόλως λύομενα.

<sup>3</sup>Ἐνίστε εἰς σύστημα δύο ἔξισώσεων μὲδύο ἀγνώστους β' βαθμοῦ ὡς πρὸς ἑκαστὸν τῶν ἀγνώστων, οἱ συντελεσταὶ τῶν ὅρων τοῦ β' βαθμοῦ ὡς πρὸς τοὺς ἀγνώστους ἔχουν τὸν αὐτὸν λόγον. Τότε διὰ καταλλήλου ἀπαλοιφῆς τῶν ἴσοβαθμίων τούτων δυνάμεων τῶν ἀγνώστων, εύρισκομεν ἔξισωσιν α' βαθμοῦ ὡς πρὸς τοὺς δύο ἀγνώστους. Αὔτη μὲδίαν τῶν δοθεισῶν ἔξισώσεων τοῦ συστήματος ἀποτελοῦν σύστημα β' βαθμοῦ ὡς πρὸς τοὺς ἀγνώστους τοῦ δοθέντος συστήματος. Οὕτως ή λύσις τοῦ δοθέντος συστήματος ἀνάγεται ἐνίστε εἰς τὴν λύσιν ἀπλουστέρου συστήματος β' βαθμοῦ.

*Παραδείγματα.* 1ον. <sup>3</sup>Εστω πρὸς λύσιν τὸ σύστημα

$$\begin{cases} 3x^2-5x\psi+4\psi^2-8x+7\psi=8 \\ 9x^2-15x\psi+12\psi^2+11x-3\psi=12. \end{cases}$$

<sup>3</sup>Απαλείφομεν τὸ  $x^2$  μεταξὺ τῶν δύο ἔξισώσεων καὶ εύρισκομεν  $35x-24\psi=-12$ , ή δόποια μὲδίαν τῶν δοθεισῶν ἀποτελοῦν σύστημα δευτέρου βαθμοῦ ὡς πρὸς  $x, \psi$ , τὸ δόποιον λύεται κατὰ τὰ ἀνωτέρω.

$$2ον. <sup>3</sup>Εστω τὸ σύστημα \left\{ \begin{array}{l} x^2+2x\psi-6\psi^2=208 \\ x\psi-2\psi^2=16. \end{array} \right.$$

Διαιροῦντες τάς ἔξισώσεις τοῦ συστήματος κατὰ μέλη εύρισκομεν

$$\frac{x^2+2x\psi-6\psi^2}{x\psi-2\psi^2} = \frac{208}{16} \quad \frac{\frac{x^2}{\psi} + 2 \frac{x}{\psi} - 6}{\frac{x}{\psi} - 2} = \frac{26}{2} = 13.$$

‘Η ἔξισωσις αὐτὴ εἶναι β’ βαθμοῦ ὡς πρὸς  $\frac{x}{\psi}$ . Λύοντες αὐτὴν εύρισκομεν τιμὰς τοῦ  $\frac{x}{\psi}$ , ἀρα δυνάμεθα νὰ ἐκφράσωμεν τὸ ψ π. χ. συναρτήσει τοῦ x καὶ ἀκολούθως ἥ οὕτως εύρισκομένη πρωτοβάθμιος ἔξισωσις ὡς πρὸς x, ψ μὲ μίαν τῶν δοθεισῶν ἀποτελοῦν σύστημα δευτέρου βαθμοῦ ὡς πρὸς x, ψ, τὸ ὄποιον λύεται κατὰ τὰ ἀνωτέρω.

3ον. Ἐστω τὸ σύστημα  $x^3 + \psi^3 = 9$ ,  $x + \psi = 3$ . Ὅψοῦντες τὰ μέλη τῆς β’ ἔξισώσεως εἰς τὴν τρίτην δύναμιν εύρισκομεν  $x^3 + 3x^2\psi + 3x\psi^2 + \psi^3 = 27$ .

Ἐνεκα τῆς πρώτης τῶν δοθεισῶν ἥ ἀνωτέρω γίνεται  $3x\psi(x + \psi) = 27 - 9 = 18$  καὶ ἐνεκα τῆς δευτέρας τῶν δοθεισῶν αὐτὴ γίνεται  $x\psi = 2$ . Αὐτὴ μὲ τὴν δευτέραν τῶν δοθεισῶν ἀποτελοῦν σύστημα β’ βαθμοῦ ὡς πρὸς x, ψ, τὸ ὄποιον λύεται κατὰ τὰ ἀνωτέρω.

### \*Α σ κ ἡ σ εις

‘Ο μὰς πρώτη. 462. Νὰ λυθοῦν τὰ συστήματα :

$$\alpha') \begin{cases} x^2 - x\psi = 14 \\ x\psi - \psi^2 = 10 \end{cases} \quad \beta') \begin{cases} x^2 + \psi^2 = 73 \\ x\psi - \psi^2 = 15 \end{cases} \quad \gamma') \begin{cases} x^2 + \psi^2 = 157 \\ x\psi = 66 \end{cases}$$

$$\delta') \begin{cases} x^2 + \psi x = 125 \\ x\psi = 50 \end{cases} \quad \epsilon') \begin{cases} x^2 + \psi x = 169 \\ x\psi = 60 \end{cases} \quad \sigma\tau') \begin{cases} x^2 + \psi^2 = \frac{25}{36} \\ 3x\psi = 1 \end{cases}$$

$$\zeta') \begin{cases} x^2 + x\psi + \psi = 121 \\ x^2 + x\psi + x = 126 \end{cases} \quad \eta') \begin{cases} x^2 + x\psi = 187 \\ \psi^2 + x\psi = 102 \end{cases}$$

463. ‘Ομοίως τὰ κάτωθι :

$$\alpha') \begin{cases} x^2 + 9\psi^2 = 136 \\ x - 3\psi = 4 \end{cases} \quad \beta') \begin{cases} 4(x + \psi)^2 - 5(x + \psi) = 50 \\ 5(x - \psi)^2 + 6(x - \psi) = 11 \end{cases} \quad \gamma') \begin{cases} x^3 - \psi^3 = 7 \\ x - \psi = 1 \end{cases}$$

$$\delta') \begin{cases} x^3 - \psi^3 = \alpha \\ x - \psi = \beta \end{cases} \quad \epsilon') \begin{cases} x^4 + \psi^4 = 17 \\ x + \psi = 3 \end{cases} \quad \sigma\tau') \begin{cases} x^4 + \psi^4 = \alpha \\ x + \psi = \beta \end{cases}$$

$$\zeta') \begin{cases} x^4 + \psi^4 = \lambda \\ x - \psi = \mu \end{cases} \quad \eta') \begin{cases} x^5 + \psi^5 = \alpha \\ x + \psi = \beta \end{cases}$$

‘Ο μὰς δευτέρα. 464. Νὰ λυθοῦν τὰ κάτωθι συστήματα :

$$\alpha') \begin{cases} x + \psi = 21 - \sqrt{x\psi} \\ x^2 + \psi^2 = 257 \end{cases} \quad \beta') \begin{cases} 2(x^2 + \psi^2) + 7(x + \psi)^2 = 1049 \\ 3x^2\psi^2 - \left(2 + \frac{1}{2}\right)x\psi = 275 \end{cases}$$

$$\gamma') \begin{cases} x + \psi + \sqrt{x + \psi - 2} = 14 \\ \frac{x^2\psi^2}{2} - \frac{3x\psi}{4} = 175,5 \end{cases}$$

$$\delta') \begin{cases} (x^2 + \psi^2)(x - \psi) = 41 \\ x\psi(x - \psi) = 30 \end{cases}$$

465. Όμοιως τὰ ἔξῆς :

$$\alpha') \begin{cases} x^2 + \psi^2 = \sqrt{x^2 + \psi^2 + 273} \\ \frac{x}{\psi} + \frac{\psi}{x} = 4 + \frac{1}{4} \end{cases}$$

$$\beta') \begin{cases} x^2 - \psi^2 = 21(x - \psi) \\ \frac{x-3}{\psi} = 4 \cdot \frac{x\psi - 1}{x\psi + 2\psi} \end{cases}$$

$$\gamma') \begin{cases} \frac{2(x + \psi) - 7}{5(x + \psi - 4)} = \frac{5}{6} \cdot \frac{-2}{x + \psi} \\ x : \psi = 40\psi : (x + 3\psi) \end{cases}$$

466. Ἐπίσης τὰ κάτωθι :

$$\alpha') \begin{cases} x^3 + \psi^3 = 973 \\ (x - \psi)^2 - 7(x + \psi) = 90 - x\psi \end{cases}$$

$$\beta') \begin{cases} \sqrt{x}(\sqrt{x^3} + \sqrt{\psi^3}) = 273 \\ x \sqrt{x\psi} + \psi^2 = 364 \end{cases}$$

$$\gamma') \begin{cases} x\psi = 72, x^2 + \psi^2 + \omega^2 = 289 \\ x + \psi + \omega = 29 \end{cases}$$

467. Ἐπίσης τά :

$$\alpha') \begin{cases} x^2 - \psi \sqrt{x\psi} = 585 \\ \psi^2 = x\sqrt{x\psi} - 234 \end{cases}$$

$$\beta') \begin{cases} x^2 + \psi^2 = 40 \\ x\psi = \omega \\ x + \psi = 8 \end{cases}$$

$$\gamma') \begin{cases} x^2 + \omega^2 - x(\psi + \omega) = 25 \\ \omega^2 + \psi^2 - \psi(x + \omega) = 16 \\ x^2 + \psi^2 - \omega(x + \psi) = 9 \end{cases}$$

## 1. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΒΑΘΜΟΥ

**§ 204.** Καλοῦμεν προβλήματα ἔξισώσεων δευτέρου βαθμοῦ τὰ προβλήματα τῶν ὁποίων ἡ λύσις ἀνάγεται εἰς τὴν λύσιν ἔξισώσεων ἢ συστημάτων δευτέρου βαθμοῦ. Διὰ τὴν λύσιν τοιούτων προβλημάτων ἀκολουθοῦμεν πορείαν ὁμοίαν πρὸς ἑκείνην τὴν ὁποίαν ἡ κόλουσθήσαμεν καὶ διὰ τὴν λύσιν προβλημάτων τῶν ἔξισώσεων πρώτου βαθμοῦ.

**1ον.** Τίνος ἀριθμοῦ τὸ ἄθροισμα τοῦ τριπλασίου τοῦ τετραγώνου αὐτοῦ καὶ τοῦ διπλασίου τοῦ ἀριθμοῦ ηὑξημένον κατὰ 1 ισοῦται μὲ 86;

**Λύσις.** Ἔστω  $x$  ὁ ζητούμενος ἀριθμός. Ἐπειδὴ τὸ τετράγωνον τοῦ  $x$  εἶναι τὸ  $x^2$ , τὸ μὲν τριπλάσιον τοῦ τετραγώνου αὐτοῦ θὰ εἶναι  $3x^2$ , τὸ δὲ διπλάσιον τοῦ ἀριθμοῦ εἶναι τὸ  $2x$ . Ἐπομένως θὰ ἔχωμεν τὴν ἔξισωσιν  $3x^2 + 2x + 1 = 86$ . Λύοντες ταύτην εύρισκομεν  $x = 5$  καὶ  $x = -\frac{17}{3}$ .

2ον. Διὰ τίνος ἀριθμοῦ πρέπει νὰ διαιρέσωμεν τὸν 96, ἵνα τὸ πηγλίκον ὑπερβαίνῃ κατὰ 4 τὸν διαιρέτην;

Λύσις. "Αν μὲ  $x$  παραστήσωμεν τὸν ζητούμενον ἀριθμόν, θὰ ἔχωμεν  $\frac{96}{x} - x = 4$  ή  $x^2 + 4x - 96 = 0$ . Λύοντες αὐτὴν εύρίσκομεν  $x = 8$  καὶ  $x = -12$ .

3ον. Τὸ γινόμενον τῶν ὅρων κλάσματος εἶναι 120. Οἱ ὅροι θὰ ἥσαν ἴσοι, ἐὰν ἀφηροῦμεν 1 ἀπὸ τὸν παρονομαστὴν καὶ προσθέτομεν 1 εἰς τὸν ἀριθμητὴν. Ποῖοι εἶναι οἱ ὅροι τοῦ κλάσματος;

Λύσις. "Εὰν μὲ τὸ  $x$  παραστήσωμεν τὸν ἀριθμητὴν τοῦ κλάσματος ὁ παρονομαστής του θὰ εἶναι  $\frac{120}{x}$  καὶ θὰ ἔχωμεν  $x+1 = \frac{120}{x} - 1$  ή  $x^2 + x = 120 - x$  ή  $x^2 + 2x - 120 = 0$  καὶ ἐκ τῆς λύσεως εύρισκομεν  $x = 10$  καὶ  $x = -12$ . Επομένως οἱ ὅροι τοῦ κλάσματος θὰ εἶναι οἱ 10 καὶ 12 ή -12 καὶ -10.

4ον. Ποιος εἶναι ὁ ἀριθμός, τοῦ ὅποίου τὰ 0,75 αὐξανόμενα κατὰ 1 δίδουν τὸ 16 διγρημένον διὰ τοῦ ἀριθμοῦ, τὸ ὅποιον ἀποτελοῦν τὰ 0,8 τοῦ ζητουμένου πλὴν 15;

Λύσις. "Αν μὲ  $x$  παραστήσωμεν τὸν ζητούμενον ἀριθμόν, θὰ ἔχωμεν τὴν ἔξισωσιν  $0,75x + 1 = \frac{16}{0,8x - 15}$ , ἐκ τῆς ὅποίας εύρισκομεν  $x = 20$  καὶ  $x = -\frac{31}{12}$ .

5ον. Νὰ εὑρεθοῦν δύο ἀκέραιοι ἀριθμοὶ περιττοὶ διαδοχικοὶ τοιοῦτοι, ὡστε ἡ διαφορὰ τῶν τετραγώνων αὐτῶν νὰ εἶναι 8 000.

Λύσις. "Εστωσαν  $2x - 1$  καὶ  $2x + 1$  οἱ ἀριθμοὶ οὗτοι. Κατὰ τὴν διατύπωσιν τοῦ προβλήματος θὰ ἔχωμεν  $(2x+1)^2 - (2x-1)^2 = 8\,000$ , ή  $8x = 8\,000$  καὶ  $x = 1\,000$ . Επομένως οἱ ζητούμενοι ἀριθμοὶ θὰ εἶναι 2 001 καὶ 1 999.

6ον. Τρεῖς ἀριθμοὶ εἶναι ἀνάλογοι τῶν 3, 2, 5 καὶ τὸ ἀθροϊσμα τῶν τετραγώνων αὐτῶν εἶναι ἵσον μὲ 342· νὰ εὑρεθοῦν οἱ ἀριθμοί.

Λύσις. "Αν παραστήσωμεν μὲ  $x$ ,  $\psi$ ,  $\omega$  τοὺς ζητουμένους ἀριθμούς, θὰ ἔχωμεν  $x^2 + \psi^2 + \omega^2 = 342$ . Επειδὴ δὲ οἱ  $x$ ,  $\psi$  καὶ  $\omega$  εἶναι

ἀνάλογοι τῶν 3, 2 καὶ 5 θὰ εἶναι  $\frac{x}{3} = \frac{\psi}{2} = \frac{\omega}{5}$ . Ἐκ τούτου ἔχομεν, ἀν παραστήσωμεν τοὺς ἴσους λόγους μὲ ρ,  $x=3\cdot\rho$ ,  $\psi=2\cdot\rho$ ,  $\omega=5\cdot\rho$ .

Ἀντικαθιστῶντες τὰς τιμὰς ταύτας εἰς τὴν πρώτην ἔξισωσιν εύρισκομεν  $9\rho^2 + 4\rho^2 + 25\rho^2 = 342$ , ἐκ τῆς ὧδης εύρισκομεν  $\rho = \pm 3$ . ἄρα οἱ ἀριθμοὶ εἶναι οἱ  $\pm 9$ ,  $\pm 6$ ,  $\pm 15$ .

7ον. Ἐγευμάτισαν 15 ἀτομα· οἱ ἀνδρες ἐπλήρωσαν 360 δρχ. ἐν δλω καὶ αἱ γυναικες ὅμοιως 360 δρχ. Πόσοι ήσαν οἱ ἀνδρες καὶ πόσαι αἱ γυναικες καὶ πόσα ἔξιδευσαν ὁ καθείς, ἐὰν κάθε γυνὴ ἐδαπάνησεν 20 δρχ. δλιγάτερον καθενὸς ἀνδρός;

Λύσις. Ἐστω  $x$  ὁ ἀριθμὸς τῶν ἀνδρῶν, ὅτε  $15-x$  θὰ εἶναι ὁ ἀριθμὸς τῶν γυναικῶν. Ἡ δαπάνη καθενὸς μὲν ἀνδρὸς θὰ εἶναι  $\frac{360}{x}$ , καθεμιᾶς δὲ γυναικὸς  $\frac{360}{15-x}$  δραχ.

Πρέπει νὰ εἶναι  $\frac{360}{15-x} = \frac{360}{x} - 20$  καὶ  $x$  θετικὸς καὶ  $< 15$ . Λύοντες εύρισκομεν  $x^2 - 15x + 270 = 0$  καὶ  $x = \frac{51 \pm 39}{2} = \frac{45}{6}$ .

Ἐκ τῶν δύο τιμῶν ἡ  $x=45$  ἀποκλείεται διότι δὲν εἶναι  $< 15$ . Ωστε εύρισκομεν 6 ἀνδρες καὶ  $15-6=9$  γυναικας. Ἀκολούθως εύρισκομεν ὅτι ἕκαστος ἀνήρ ἐδαπάνησε 360:  $6=60$  δρχ., ἕκαστη δὲ γυνὴ ἐδαπάνησε 360:  $9=40$  δρχ.

8ον. Εἰς κύκλον διαμέτρου 25 μ. νὰ ἐγγραφῇ ὁρθογώνιον, τοῦ ὧδη οὐ αἱ πλευραὶ νὰ ἔχουν διαφορὰν 17 μ.

Λύσις. Ἄν μὲ  $x$  καὶ  $\psi$  παραστήσωμεν τὰς διαστάσεις τοῦ ὁρθογώνιου, θὰ ἔχωμεν  $x-\psi=17$ ,  $x^2+\psi^2=25^2=625$ .

Ἐκ τῆς λύσεως τοῦ συστήματος τούτου εύρισκομεν  $x=24$  καὶ  $\psi=7$ .

9ον. Δίδεται τρίγωνον ΑΒΓ. Νὰ προσδιορισθῇ σημεῖον Δ ἐπὶ τῆς πλευρᾶς ΑΒ, ὥστε, ἂν ἀπὸ τούτου ἀχθῇ παράλληλος ΔΕ πρὸς τὴν ἀπέναντι τῆς κορυφῆς Α πλευράν, νὰ χωρίζεται τὸ τρίγωνον εἰς δύο μέρη ἰσοδύναμα.

Λύσις. Παριστάνομεν μὲ α τὸ μῆκος τῆς πλευρᾶς ΑΒ καὶ μὲ  $x$

τὴν ζητουμένην ἀπόστασιν (ΑΔ). Παρατηροῦμεν ὅτι, ἀφοῦ ἡ ΔΕ εἶναι παράλληλος τῆς ΒΓ, τὰ τρίγωνα ΑΒΓ καὶ ΑΔΕ εἶναι ὅμοια, ὡς ἔχοντα τὰς γωνίας αὐτῶν ἀνὰ μίαν ἵσας. Ἐπομένως τὰ ἐμβαδὰ τούτων θὰ εἶναι ἀνάλογα τῶν τετραγώνων τῶν μηκῶν τῶν ὁμολόγων πλευρῶν των. "Ητοι θὰ εἶναι  $\frac{(\text{ΑΔΕ})}{(\text{ΑΒΓ})} = \frac{x^2}{\alpha^2}$ . 'Αλλ' ὁ λόγος αὐτὸς πρέπει νὰ ἰσοῦται μὲ  $\frac{1}{2}$ , κατὰ τὴν διατύπωσιν τοῦ προβλήματος. Ἡτοι πρέπει νὰ εἶναι  $\frac{x^2}{\alpha^2} = \frac{1}{2}$  καὶ  $x^2 = \frac{\alpha^2}{2}$ ,  $x = \frac{\alpha\sqrt{2}}{2}$ , ἐπειδὴ πρέπει  $x > 0$ .

### Προβλήματα

468. Νὰ εὑρεθοῦν δύο ἀριθμοί, τῶν δοπίων τὸ ἀθροισμα, τὸ γινόμενον καὶ τὸ πηλίκον νὰ είναι ἵσα.

469. Νὰ εὑρεθῇ ἀριθμὸς τοῦ δοπίου τὰ 0,5 αὐξανόμενα κατὰ 5 δίδουν, τὸν 35,1 διηγημένον διὰ τοῦ ἀριθμοῦ, τὸν δοποῖον ἀποτελοῦν τὰ 0,3 τοῦ ζητουμένου μεῖον 2,5.

470. Νὰ εὑρεθοῦν δύο ἀκέραιοι διαδοχικοί περιττοὶ ἀριθμοί τοιοῦτοι, ὡστε τὸ ἀθροισμα τῶν τετραγώνων των νὰ είναι 202.

471. Νὰ εὑρεθοῦν τρεῖς διαδοχικοί ἀκέραιοι ἀριθμοί τοιοῦτοι, ὡστε τὸ γινόμενον αὐτῶν νὰ ἰσοῦται μὲ τὸ πενταπλάσιον τοῦ ἀθροισματός των.

472. Νὰ χωρισθῇ ὁ 27 εἰς δύο μέρη τοιαῦτα, ὡστε τὸ τριπλάσιον τοῦ τετραγώνου τοῦ πρώτου καὶ τὸ πενταπλάσιον τοῦ τετραγώνου τοῦ δευτέρου νὰ ἀποτελοῦν τὸν 1 620.

473. Νὰ εὑρεθοῦν αἱ διαστάσεις ὀρθογωνίου ἔχοντος διαγώνιον 17 μ. καὶ ἐμβαδὸν 120 μ.

474. Εἰς κύκλον διαμέτρου 25 μ. νὰ ἐγγραφῇ ὀρθογώνιον, τοῦ δοπίου αἱ πλευραὶ ἔχουν λόγον 3 : 4.

475. Ἡ διαφορὰ δύο ἀριθμῶν εἶναι 14 καὶ τὸ γινόμενόν των 1 632. Ποιοι εἶναι οἱ ἀριθμοί;

476. Ποιος εἶναι ὁ ἀριθμός, ὁ δοποῖος ἐλαττούμενος κατὰ τὸ πενταπλάσιον τῆς τετραγωνικῆς ρίζης του γίνεται 500;

477. Ἡρωτήθη τις ποιά εἶναι ἡ ἡλικία του καὶ ἀπεκρίθη: Τὸ τετράγωνον τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ἑτῶν τῆς ἡλικίας μου ἰσοῦται μὲ τὸ δεκαεξαπλάσιον τῆς ἡλικίας, τὴν δοπίαν θὰ ἔχω μετὰ 12 ἔτη. Ποιά εἶναι ἡ ἡλικία του;

478. Δύο κρουνοί, ρέοντες συγχρόνως, πληροῦν δεξαμενὴν εἰς 18 ὥρας. Εἰς πόσας ὥρας ἔκαστος δύναται νὰ τὴν πληρώσῃ, ἀν ὁ εἰς τούτων χρειάζεται μόνος 27 ὥρας ἐπὶ πλέον τοῦ ἄλλου μόνου;

479. Νὰ εὑρεθοῦν αἱ διαστάσεις ὀρθογωνίου ισοδυνάμου πρὸς τετράγωνον ἔχον πλευρὰν 99 μ., καὶ ἐκ τῶν δοπίων ἡ μία εἶναι ἐννέα δέκατα ἔκτα τῆς ἄλλης.

480. Νὰ εύρεθοῦν αἱ διαστάσεις (βάσις καὶ ὑψος) ὁρθογωνίου τριγώνου, ἃν ἡ ὑποτείνουσα αὐτοῦ εἴναι 51 μ. καὶ ὁ λόγος τῶν δύο ἀλλων του πλευρῶν δέκτῳ δέκατα πέμπτα.

## 2. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΑ

1ον. (*Τῆς χρυσῆς Τομῆς*).<sup>\*</sup> Δοθεῖσαν εὐθεῖαν νὰ χωρίσωμεν εἰς μέσον καὶ ἄκρον λόγον.

Ἄνσις. "Ἄς παραστήσωμεν μὲ α τὸ μῆκος τῆς δοθείσης εὐθείας  $AB$  καὶ ἄς θεωρήσωμεν ἀρχὴν αὐτῆς τὸ  $A$ . "Εστω  $\Gamma$  τὸ σημεῖον διαιρέσεως. Θέτομεν  $A\Gamma=x$  ὅπότε  $B\Gamma=\alpha-x$ , καὶ πρέπει νὰ ἔχωμεν  $\frac{\alpha}{x} = \frac{x}{\alpha-x}$  ἦτοι  $x^2 + \alpha x - \alpha^2 = 0$ . Ἐκ τῆς λύσεως ταύτης εύρισκομεν

$$x = \frac{-\alpha \pm \sqrt{5\alpha^2}}{2} = \frac{-\alpha \pm \alpha\sqrt{5}}{2} = \frac{\alpha(\pm\sqrt{5}-1)}{2}.$$

*Διερεύνησις.* Αἱ δύο ρίζαι τῆς ἔξισώσεως εἴναι πραγματικαὶ καὶ μὲ σήματα ἀντίθετα, ἐπειδὴ τὸ γινόμενον αὐτῶν εἴναι  $-\alpha^2$ . Παρατηροῦμεν ὅτι ἡ  $\sqrt{5}$  περιέχεται μεταξὺ τῶν 2 καὶ 3. Ἐπομένως ἡ ρίζα ἡ ἀντιστοιχοῦσα εἰς τὸ σῆμα + τοῦ ριζικοῦ θά εἴναι θετικὴ καὶ μικροτέρα τοῦ  $\alpha$ , ἀρα δίδει τὴν ζητουμένην λύσιν. Ἡ ἀλληρία ἀπορρίπτεται ως ἀρνητική. "Ωστε ἔχομεν  $x = \frac{\alpha(\sqrt{5}-1)}{2}$ . Τὸ σημεῖον  $\Gamma$  κεῖται πέραν τοῦ μέσου τῆς  $AB$ , ἀπὸ τοῦ  $A$ , διότι τὸ  $x$  ἔχει τιμὴν μεγαλυτέραν τοῦ  $\frac{\alpha}{2}$ .

2ον. Σῶμά τι ἐρρίφθη κατακορύφως πρὸς τὰ ἄνω (εἰς τὸ κενὸν) μὲ ἀρχικὴν ταχύτητα  $\alpha$ . Μετὰ πόσον χρόνον θὰ φθάσῃ εἰς ὕψος  $u$ ;

Ἄνσις. Καθὼς γνωρίζομεν (ἐκ τῆς Φυσικῆς), τὸ σῶμα κινεῖται πρὸς τὰ ἄνω μὲ κίνησιν δύμαλῶς ἐπιβραδυνομένην. "Αν λοιπὸν παραστήσωμεν μὲ τὸν ζητούμενον χρόνον, θὰ ἔχωμεν τοὺς ἔξῆς τύπους γνωστοὺς ἐκ τῆς Φυσικῆς

$$u = \alpha t - \frac{1}{2} gt^2, \quad \tau = \alpha - gt \tag{1}$$

\* Ἡ ὀνομασία **Χρυσῆ τομὴ** ἐπεκράτησεν, ἐπειδὴ ἡ τομὴ αὐτὴ θεωρεῖται ως ἀρχὴ τοῦ ὀραίου εἰς τὴν ζωγραφικήν, ἀρχιτεκτονικήν καὶ τὴν πλαστικὴν τέχνην.

ὅπου την παριστάνει τὴν ταχύτητα τοῦ κινητοῦ κατὰ τὴν στιγμὴν  $t$  καὶ  $g$  τὴν ἐπιτάχυνσιν ίσην μὲ 9,81 μ. (κατὰ προσέγγισιν).

Ἐκ τῆς πρώτης ἔξισώσεως εύρίσκομεν  $gt^2 - 2at + 2u = 0$  (2) ἐκ τῆς λύσεως ἐ αὐτῆς τὴν τιμὴν τοῦ  $t$ .

*Διερεύησις.* Ἡ συνθήκη διὰ νὰ εἶναι αἱ ρίζαι τῆς (2) πραγματικαὶ εἶναι  $a^2 - 2gu \geq 0$  ή  $u \leq \frac{a^2}{2g}$ . Ἐπομένως  $u = \frac{a^2}{2g}$  εἶναι τὸ μέγιστον ὑψος, εἰς τὸ ὄποιον δύναται νὰ φθάσῃ κινητόν, ἀν ριφθῇ μὲ ταχύτητα ἀρχικήν  $a$ . Ἐάν εἶναι  $u = \frac{a^2}{2g}$ . αἱ ρίζαι τῆς (2) εἶναι ίσαι μὲ  $\frac{a}{g}$ . Ἐπομένως τὸ κινητὸν χρειάζεται  $\frac{a}{g}$  χρόνον, διὰ νὰ φθάσῃ εἰς τὸ μέγιστον ὑψος. Εἰς τὸ ἀνώτατον αὐτὸν σημεῖον θὰ ἔχῃ τὸ κινητὸν ταχύτητα ίσην μὲ 0.

Πράγματι, ἀντικαθιστῶντες εἰς τὴν δευτέραν τῶν ἔξισώσεων (1) τὸ  $t$  μὲ τὸ  $\frac{a}{g}$  εύρίσκομεν ἔξιγόμενον 0, ἥτοι  $t = a - \frac{ag}{g} = 0$ .

Ἐάν εἶναι  $u < \frac{a^2}{2g}$ , αἱ δύο ρίζαι τῆς πρώτης τῶν (1) εἶναι πραγματικαὶ, ἀνισοὶ καὶ θετικαὶ, δὲ τύπος, δὲ ὄποιος δίδει αὐτὰς, εἶναι δ  $t = \frac{a \pm \sqrt{a^2 - 2gu}}{g}$ . Αἱ δύο αὗται τιμαὶ τοῦ  $t$  ἀρμόζουν εἰς τὸ πρόβλημα. Διότι τὸ σῶμα διέρχεται δύο φοράς δι' ἑκάστου σημείου κειμένου ἐπὶ τῆς εύθειας, τὴν ὄποιαν παριστάνει τὸ ὑψος  $u$ , μίαν ἀνερχόμενον καὶ μίαν κατερχόμενον.

Παρατηροῦμεν ὅτι ἡ μὲν μία τῶν τιμῶν τούτων τοῦ  $t$  εἶναι μεγαλυτέρα, ἡ δὲ ἄλλη μικροτέρα τοῦ  $\frac{a}{g}$  κατὰ  $\frac{\sqrt{a^2 - 2gu}}{g}$ . Εἶναι εὔκολον νὰ ἴδωμεν ὅτι αἱ ταχύτητες [δηλαδὴ αἱ τιμαὶ τοῦ  $t$  τῆς δευτέρας τῶν (1)] εἶναι ἀντίθετοι. Ἀν τεθῇ  $u = 0$ , θὰ ἔχωμεν  $t = 0$ , καὶ  $t = \frac{2a}{g}$ . Τὸ  $\frac{2a}{g}$  παριστάνει τὸν χρόνον, κατὰ τὸν ὄποιον τὸ κινητὸν ἐπαναπίπτει εἰς τὸ σημεῖον, ἐκ τοῦ ὄποίου ἀνεχώρησεν. "Οθεν δὲ χρόνος, καθ' ὃν γίνεται ἡ ἀνάβασις, ἵσοῦται μὲ τὸν χρόνον, καθ' ὃν γίνεται ἡ κατάβασις τοῦ κινητοῦ.

3ον. Νὰ εύρεθῃ τὸ βάθος φρέατος, ἀν ἐπέρασσαν  $t^6$  ἀφ' ὅτου ἀφέθη νὰ πέσῃ λίθος ἐκ τοῦ στομίου αὐτοῦ, μέχρις ὅτου ἥκού-

σθη ό ήχος ό παραχθεὶς ἐκ τῆς πτώσεως τοῦ λίθου εἰς τὸν πυθμένα τοῦ φρέατος (ή ἀντίστασις τοῦ ἀέρος παραβλέπεται).

Λύσις. Παριστάνομεν μὲν  $x$  τὸ βάθος τοῦ φρέατος καὶ μὲ τὴν ταχύτητα τοῦ ήχου εἰς τὸν ἀέρα. Ὁ χρόνος τὸ ἀποτελεῖται ἀπὸ δύο μέρη. 1ον. Ἀπὸ τὸν χρόνον  $t_1$ , τὸν ὅποιον χρειάζεται ό λίθος διὰ νὰ πέσῃ. 2ον. Ἀπὸ τὸν χρόνον  $t_2$ , τὸν ὅποιον χρειάζεται ό ήχος διὰ νὰ ἀνέλθῃ ἐκ τοῦ πυθμένος τοῦ φρέατος εἰς ἀπόστασιν  $x$ .

\*Ἐχομεν τὸν ἔξις τύπον (ἐκ τῆς Φυσικῆς)  $x = \frac{1}{2} gt_1^2$ , ό ὅποιος δίδει τὸ διάστημα, ὅταν δίδεται ό χρόνος κατὰ τὴν ὁμαλῶς ἐπιταταχυνομένην κίνησιν, ὅποια είναι καὶ ή κίνησις κατὰ τὴν πτῶσιν τοῦ λίθου. \*Ἐκ ταύτης προκύπτει  $t_1 = \sqrt{\frac{2x}{g}}$  (1)

\*Ἐκ τοῦ  $x = \tau t_2$ , ό ὅποιος δίδει τὸ διάστημα ἐκφραζόμενον μὲ τὴν ταχύτητα τὸ καὶ τὸν χρόνον  $t_2$  κατὰ τὴν ὁμαλὴν κίνησιν τοῦ ήχου, εύρισκομεν  $t_2 = \frac{x}{\tau}$ . \*Ἐχομεν λοιπὸν τὴν ἔξισωσιν:

$$\sqrt{\frac{2x}{g}} + \frac{x}{\tau} = t, \text{ η } \sqrt{\frac{2x}{g}} = t - \frac{x}{\tau} \quad (2)$$

\*Ἐκ ταύτης εύρισκομεν ὑψοῦντες εἰς τὸ τετράγωνον καὶ διατάσσοντες κατὰ τὰς κατιούσας δυνάμεις τοῦ  $x$

$$gx^2 - 2t(gt+\tau)x + gt^2t^2 = 0 \quad (3)$$

\*Ἐπειδὴ τὸ  $t_1$  είναι θετικὸν καὶ τὸ κατὰ τὴν (1) καὶ (2) ἴσον αὐτοῦ  $t - \frac{x}{\tau}$  πρέπει νὰ είναι θετικόν, ἢ τοι  $t - \frac{x}{\tau} > 0$  η  $x < \tau t$  (4)

\*Ινα αἱ ρίζαι τῆς (3) είναι πραγματικαὶ καὶ ἄνισοι, πρέπει νὰ είναι θετικὸν τὸ  $t^2(gt+\tau)^2 - g^2t^2t^2$  η τὸ  $t^3(gt+2\tau)$  > 0, τὸ ὅποιον πράγματι συμβαίνει. \*Ἐξ ἀλλου παρατηροῦμεν ὅτι τὸ μὲν γινόμενον τῶν ριζῶν, είναι  $t^2t^2$ , τὸ δὲ ἀθροισμα αὐτῶν  $\frac{2t(gt+\tau)}{g}$ , τὰ ὅποια είναι θετικά. \*Ἐπομένως αἱ ρίζαι είναι θετικαί. \*Ἀλλ' ἐπειδὴ πρέπει νὰ είναι, κατὰ τὴν (4), τὸ  $x < \tau t$  καὶ τὸ γινόμενον τῶν ριζῶν είναι  $t t \cdot \tau t$  είναι δὲ αὗται ἄνισοι, ἔπειται ὅτι ή μία τῶν ριζῶν είναι μεγαλυτέρα τοῦ  $t t$  καὶ ή ἀλλη μικροτέρα τούτου, η ὅποια καὶ θὰ είναι δεκτὴ διὰ τὸ πρόβλημα, διὰ νὰ πληροῦται η ἀνισότης (4). \*Ἐκ τῆς λύσεως τῆς (3) εύρισκομεν τὴν ζητουμένην τιμήν, η ὅποια ἀντιστοιχεῖ εἰς τὸ σῆμα — τοῦ ριζικοῦ. \*Ητοι ἔχομεν  $x = \frac{\tau}{g} [gt + \tau - \sqrt{\tau(\tau+2gt)}]$ .

### Προβλήματα

Όμάς πρώτη. (Γενικά). 481. "Αν πολλαπλασιάσωμεν τὸ μιστὸν μέρος ἐπὶ τὸ νιοστὸν μέρος ἐνὸς ἀριθμοῦ, εύρισκομεν α. Ποῖος είναι ὁ ἀριθμός; (Διερεύνησις).

482. "Αν πολλαπλασιάσωμεν τὸ μιπλάσιον ἐπὶ τὸ νιπλάσιον ἐνὸς ἀριθμοῦ, εύρισκομεν τὸν ἀριθμὸν α. Ποῖος είναι ὁ ἀριθμός; (Διερεύνησις).

483. Κεφάλαιον α δρχ. δίδει τόκον τ δρχ, ἐὰν ὁ ἀριθμὸς τῶν ἔτῶν τῆς διαρκείας τοῦ δανείου είναι κατὰ δ μεγαλύτερος τοῦ ἐπιτοκίου. Νὰ εύρεθῇ ἡ διάρκεια τοῦ δανείου. (Διερεύνησις μερικὴ περίπτωσις  $\alpha = 5400, \delta = 2, t = 1296$ ).

484. Κεφάλαιον α δρχ. ἔφερε τόκον τ δρχ. καὶ θὰ ἔδιδε τὸν αὐτὸν τόκον, ἂν ἐτοκίζετο μὲν ἐπιτόκιον εἰς δλιγώτερον, ἀλλ’ ἐπὶ μ ἔτη περισσότερα. Νὰ εύρεθῇ τὸ ἐπιτόκιον. (Διερεύνησις μερικὴ περίπτωσις  $\alpha = 2100, \epsilon = 1, \mu = 1, t = 420$ ).

485. 'Εκ δύο κεφαλαίων τὸ ἐν ἥτο κατὰ δ μικρότερον, ἀλλ’ ἐτοκίσθη μὲν ἐπιτόκιον κατὰ ε μεγαλύτερον τοῦ ἄλλου καὶ ἔφερε τόκον ἐπὶ ν<sub>1</sub> ἔτη τ<sub>1</sub> δρχ. ἐνῶ τὸ ἄλλο εἰς ν<sub>2</sub> ἔτη ἔφερε τ<sub>2</sub> δρχ. Νὰ εύρεθοῦν τὰ κεφάλαια. (Διερεύνησις μερικὴ περίπτωσις  $\delta = 6000, \epsilon = 1, \nu_1 = 6, \nu_2 = 5, t_1 = 9000, t_2 = 7200$ ).

486. 'Ηγοράσθη ὑφασμα ἀντὶ α δραχ. 'Εάν ἕκαστον μέτρον τούτου ἐτιμᾶτο β δρχ. δλιγώτερον, θὰ ἡγοράζοντο γ μέτρα ἐπὶ πλέον. Πόσα μέτρα ἡγοράσθησαν καὶ πρὸς πόσας δρχ. τὸ μέτρον; (Διερεύνησις).

487. Διδεται τριγώνων μὲν πλευρὰς α, β, γ. Νὰ εύρεθῇ μῆκος τοιοῦτον, ώστε, ἀν αἱ πλευραὶ τοῦ αὐξηθοῦν ἡ ἐλαττωθοῦν κατ’ αὐτό, νὰ είναι δυνατὴ ἡ κατασκευὴ ὀρθογωνίου τριγώνου.

488. Νὰ εύρεθῇ ἐπὶ (ἀπεράντου) εύθειας ΑΒ σημεῖον, ώστε νὰ φωτίζεται ἐξ ἵσου ἀπὸ δύο φωτεινάς ἐστίας κειμένας εἰς τὰ σημεῖα Σ, Σ' τῆς εύθειας, ἀν ἡ ποσότης τοῦ φωτός, τὸ ὅποιον δέχεται μία ἐπιφάνεια ἀπὸ φωτεινῆς ἐστίας, είναι ἀντιστρόφως ἀνάλογος τοῦ τετραγώνου τῆς ἀποστάσεως αὐτῆς ἀπὸ τῆς ἐστίας. (Διερεύνησις).

489. Νὰ ἔγγραφῇ εἰς ἡμικύκλιον τραπέζιον ἔχον περίμετρον 2τ.

490. Δοθέντος τριγώνου ὀρθογωνίου ΑΒΓ νὰ εύρεθῇ ἐπὶ τῆς ὑποτείνουσῆς αὐτοῦ ΒΓ σημεῖον Μ τοιοῦτον, ώστε α') τὸ ἀθροισμα τῶν τετραγώνων τῶν ἀποστάσεων του ἐκ τῶν τριῶν κορυφῶν νὰ είναι ἵσον μὲ k<sup>2</sup>. β') τὸ γινόμενον τῶν ἀποστάσεων αὐτοῦ ἀπὸ τῶν καθέτων πλευρῶν νὰ ἴσοιται μὲ λ<sup>2</sup>. γ') τὸ ἀθροισμα τῶν τετραγώνων τῶν ἀποστάσεων του ἀπὸ τῶν δύο καθέτων πλευρῶν του νὰ ἴσοιται μὲ μ<sup>2</sup>. (Διερεύνησις).

491. Νὰ εύρεθοῦν αἱ πλευραὶ ὀρθογωνίου τριγώνου α') ἀν δοθῇ ἡ ὑποτείνουσα καὶ τὸ ἀθροισμα λ τῶν δύο ἄλλων πλευρῶν του, β') ἡ ὑποτείνουσα καὶ τὸ ὑψος υ τὸ ἀντιστοιχοῦν εἰς αὐτήν, γ') ἡ περίμετρος 2τ καὶ τὸ ὑψος υ τὸ ἀντιστοιχοῦν εἰς τὴν ὑποτείνουσαν.

Όμας δευτέρα. 492. Ποῖος είναι ὁ μικρότερος ἐκ δύο ἀριθμῶν διαφέροντων κατὰ 3, ἀν ἔχουν γινόμενον 54;

493. Ποιος άκέραιος άριθμός είναι κατά 29 μικρότερος τοῦ τετραγώνου τοῦ κατά μονάδα μικροτέρου αύτοῦ;

494. Εύρετε δύο άριθμούς έχοντας γινόμενον, 2, ἀν τὸ ἀθροισμα τῶν ἀντιστρόφων αὐτῶν ίσοῦται μὲ 1  $\frac{5}{12}$ .

495. Εύρετε κλάσμα, τοῦ δποίου δ ἀριθμητής είναι κατὰ 4 μικρότερος τοῦ παρονομαστοῦ. Ἐάν αὔξηθῇ δ ἀριθμητής κατὰ 7 καὶ ἐλαττωθῇ δ παρονομαστῆς κατὰ 5, διαφέρει τοῦ προηγουμένου κατὰ 1  $\frac{1}{15}$ .

496. Ἐπλήρωσέ τις 1600 δρχ. διὰ καφέ, 1800 δρχ. διὰ τείον, ἔλαβε δὲ 40 χιλιογρ. καφέ ἐπί πλέον τοῦ τείου. Πόσον ἔκστιζε τὸ χιλιόγραμμον τοῦ καφέ, ἀν τοῦ τείου ἔκστιζε 50 δρχ. ἐπί πλέον;

497. Εἰς ἑκδρομὴν αἱ γυναῖκες ἡσαν 3 δλιγάτεραι τῶν ἀνδρῶν. Ἄν οἱ μὲν ἄνδρες ἐπλήρωσαν ἐν δλῷ 1750 δρχ. αἱ δὲ γυναῖκες 800 δρχ., πόσοι ἡσαν οἱ ἄνδρες καὶ αἱ γυναῖκες, ἐάν καθεῖς τῶν ἀνδρῶν ἐπλήρωσε 50 δρχ. περισσότερον ἢ καθεμία γυνή;

498. Εἰς 27 ἄνδρας καὶ γυναῖκας ἐπληρώθησαν 2100 δρχ. διὰ τοὺς ἄνδρας καὶ 4200 δρχ. διὰ τὰς γυναῖκας. Πόσαι ἡσαν αἱ γυναῖκες, ἀν καθεμία ἐπληρώνετο 150 δρχ. δλιγάτερον τοῦ ἀνδρός;

499. Νὰ εύρεθῇ ἀριθμὸς ἀκέραιος, τοῦ δποίου τὸ ἀθροισμα μὲ τὴν τετραγωνικὴν ρίζαν αὐτοῦ είναι 272.

‘Ο μὰς τρίτη. (Γεωμετρικὰ). 500. Πόσον είναι τὸ πλῆθος σημείων, μεταξὺ τῶν δποίων δυνάμεθα νὰ φέρωμεν 78 εὐθείας συνδεούσας αὐτὰ ἀνὰ δύο;

501. Ποιον ἐπίπεδον κυρτὸν πολύγωνον ἔχει 104 διαγωνίους;

502. ‘Εκ δύο ἐπιπέδων πολυγώνων τὸ α' ἔχει 6 πλευράς ἐπί πλέον τοῦ β' καὶ τρεῖς καὶ ἐν τρίτον φοράς περισσοτέρας διαγωνίους· πόσας πλευράς ἔχει καθέν;

503. ‘Ἐάν αἱ πλευραὶ τετραγώνου αὔξηθοῦν κατὰ 3 μ, τὸ ἐμβαδὸν τοῦ νέου θᾶ είναι 2,25 φοράς τοῦ ἀλλού. Πόση είναι ἡ πλευρὰ αὐτοῦ;

504. Πόσον είναι τὸ μῆκος τῶν πλευρῶν δρθιογωνίου τριγώνου έχοντος ἐμβαδὸν 150 μ<sup>2</sup>, ἀν δ λόγος τῶν καθέτων πλευρῶν αὐτῶν είναι 0,75;

505. ‘Ισοσκελοῦς τριγώνου ἡ μὲν βάσις είναι κατὰ 19 μ. μεγαλυτέρα τοῦ ὑψους του, ἕκαστον δὲ τῶν σκελῶν του κατὰ 8 μ. μεγαλύτερον τοῦ ὑψους του. Πόση είναι ἡ βάσις καὶ πόσον τὸ ὑψός του;

506. Τίνες αἱ διαστάσεις δρθιογωνίου έχοντος ἐμβαδὸν 192 μ<sup>2</sup>, ἀν διαφέρουν κατὰ 4 μ;

507. Ρόμβου ἡ μὲν πλευρὰ ἔχει μῆκος 17 μ, αἱ δὲ διαγώνιοι έχουν διαφορὰν 14 μ. Πόσον μῆκος ἔχει ἡ μικροτέρα διαγώνιός του;

508. Ποϊαὶ αἱ διαστάσεις δρθιογωνίου ἐγγεγραμμένου εἰς κύκλον ἀκτίνος 12,5 μ, ἀν ἡ διαφορὰ αὐτῶν είναι 17 μ;

509. Εύρετε τὰς πλευράς δύο τετραγώνων έχόντων ἀθροισμα ἐμβαδῶν 8 621 μ<sup>2</sup>, ἀν τὸ γινόμενον τῶν διαγωνίων αὐτῶν είναι 8 540.

‘Ο μὰς τετάρτη. (Συστημάτων). 510. Δύο κρουνοὶ ρέουν συγχρό-

νως καὶ πληροῦν δεξαμενὴν εἰς 2,4 ὡρας. ‘Ο β’ μόνος χρειάζεται 2 ὡρας ἐπὶ πλέον τοῦ α’. Εἰς πόσον χρόνον ἔκαστος τὴν πληροὶ μόνος;

511. Δύο ἐπιχειρηματίαι κατέθεσαν δμοῦ 20 000 δρ, δ α' διὰ 2 μῆνας καὶ δ β' διὰ 8 μῆνας. ‘Ο μὲν α' ἐλαφεν ἐν δλῷ 18 000 δρχ., δ δὲ 9000. Πόσα ἔκέρδισεν ἔκαστος;

512. Δύο κεφάλαια ἔχοντα ἀθροισμα 30 000 δρχ. ἔτοκίσθησαν πρὸς 6% Τὸ μὲν α' ἔμεινε 4 μῆνας ἐπὶ πλέον καὶ ἔδωκε τόκον 1 280 δρχ, τὸ δὲ β' 840 δρχ. Ποῖα τὰ κεφάλαια;

513. Νὰ εύρεθοιν τέσσαρες ἀριθμοὶ ἀποτελοῦντες ἀναλογίαν, ἀν τὸ ἀθροισμα τῶν τετραγώνων αὐτῶν εἰναι 62,5 καὶ δ μὲν α' ὑπερβαίνει τὸν β' κατὰ 4, δ δὲ γ' τὸν δ' κατὰ 3.

514. Εὔρετε διψήφιον ἀριθμόν, δ ὅποιος διαιρούμενος μὲν διὰ τοῦ γινομένου νου τῶν ψηφίων αὐτοῦ δίδει πέντε καὶ ἐν τρίτον, ἐλαττούμενος δὲ κατὰ 9 δίδει τὸν προκύπτοντα ἀριθμὸν δι' ἀντιστροφῆς τῆς σειρᾶς τῶν ψηφίων αὐτοῦ.

515. Εὔρετε τριψήφιον ἀριθμόν, τοῦ διποίου τὸ μὲν β' ψηφίον εἰναι μέσον ἀνάλογον τῶν δύο ἀλλων, δ δὲ λόγος τοῦ ἀριθμοῦ πρὸς τὸ ἀθροισμα τῶν ψηφίων τούτου εἰναι ὡς 124:7. Δι' ἀντιστροφῆς τῆς σειρᾶς τῶν ψηφίων αὐτοῦ προκύπτει δ ἀριθμὸς ηγήσημένος κατὰ 594.

516. Εὔρετε τρεῖς ἀριθμούς, ἀν δ β' εἰναι μέσος ἀνάλογος τῶν ἀλλων, τὸ ἀθροισμα αὐτῶν εἰναι 21 τῶν δὲ τετραγώνων των 189.

517. Εἰς δεξαμενὴν τρέχει τὸ ὄνδωρ βρύσεως ἐπὶ τρία πέμπτα τοῦ χρόνου, καθ' δν ἀλλη βρύσις μόνη θὰ τὴν ἐπλήρωνε. Κλείεται ἡ α' βρύσις καὶ ἀνοίγεται ἡ β' μέχρις δτου πληρωθῆ ἡ δεξαμενή. ‘Εὰν καὶ αι δύο ἡνοίγοντο μαζὶ θὰ ἐπληροῦτο εἰς 6 ὡρας, θὰ ἔτρεχον δὲ ἐκ τῆς α' τὰ δύο τρίτα τοῦ ἐκ τῆς β', ἀφ' δτου ἐκλείσθη ἡ α'. Εἰς πόσον χρόνον καθεμία βρύσις πληροὶ τὴν δεξαμενὴν;

‘Ο μὰς πέ μ π τ η. (Φυσικῆς). 518. Πόσον χρειάζεται λίθος διὰ νὰ πέσῃ εἰς τὸν πυθμένα φρέατος βάθους 44,1 μ. αφίεμενος ἐκ τοῦ στομίου αὐτοῦ; (Παραβλέπεται ἡ ἀντίστασις τοῦ ἀέρος).

519. Πόσον χρόνον χρειάζεται λίθος ριπτόμενος ἀνω κατακορύφως (εἰς τὸ κενόν), ἵνα ἀνέλθῃ εἰς ὑψος 122,5 μ. καὶ καταπέσῃ;

520. Πόσην ἀρχικὴν ταχύτητα πρέπει νὰ δώσωμεν εἰς λίθον, ἀν ριφθῇ κατακορύφως ἀνω (εἰς τὸ κενόν), ἵνα ἀνέλθῃ εἰς ὑψος 122,5 μ;

521. Πότε θὰ φθάσῃ εἰς ὑψος 1 460 μ. σφαῖρα ριπτομένη κατακορύφως πρὸς τὰ ἀνω (εἰς τὸ κενόν) καὶ ἀναχωροῦσα μὲ ἀρχικὴν ταχύτητα 185 μ;

522. Ποίαν πίεσιν ἔχασκει σφαῖρα 41 χιλιογράμμων ἐπὶ κεκλιμένου ἐπιπέδου, ἐὰν Ισορροπῇ δύναμιν 9 χιλιογράμμων;

523. ‘Επὶ πόσα δευτερόλεπτα κυλίεται σφαῖρα ἐπὶ κεκλιμένου ἐπιπέδου εἰς μῆκος 39,3 μ. καὶ ὑψος 10 μ. ἐκ τῶν ἀνω πρὸς τὰ κάτω;

#### Περίληψις περιεχομένων κεφαλαίου VII.

‘Ορισμὸς διτετραγώνου ἔξισώσεως  $\alpha x^4 + \beta x^2 + \gamma = 0$ , ( $\alpha \neq 0$ ).  
‘Αναγωγὴ αὐτῆς εἰς τὴν  $\alpha \psi^2 + \beta \psi + \gamma = 0$ , ( $x^2 = \psi$ ), ρίζαι της αι

$$\rho_1, \rho_2 = \pm \sqrt{\frac{-\beta + \sqrt{\beta^2 - 4\alpha\gamma}}{2\alpha}} \quad \rho_3, \rho_4 = \pm \sqrt{\frac{-\beta - \sqrt{\beta^2 - 4\alpha\gamma}}{2\alpha}}$$

$\alpha x^4 + \beta x^2 + \gamma = 0$  ( $x - \rho_1$ ) ( $x - \rho_2$ ) ( $x - \rho_3$ ) ( $x - \rho_4$ ),  $\rho_1, \rho_2, \rho_3, \rho_4$ , αι ρίζαι του τριωνύμου.

Τό πρόσημον του τριωνύμου σπουδάζεται με τήν χρησιμοποίησιν του άνωτέρου γινομένου.

Τροπή διπλῶν ριζικῶν  $\sqrt{A \pm \sqrt{B}}$  εἰς ἀπλᾶ,

$$\sqrt{A \pm \sqrt{B}} = \sqrt{\frac{A+\Gamma}{2}} \pm \sqrt{\frac{A-B}{2}}, \text{ ἢ } \Gamma^2 = A^2 - B.$$

Έξισώσεις μὲν ριζικὰ β' καὶ άνωτέρας τάξεως. Απομόνωσις του ριζικοῦ καὶ ἀπαλλαγὴ ἀπ' αὐτοῦ, ὅτε ἡ προκύπτουσα ἔξισωσις ἔχει τὰς ρίζας τῆς δοθείσης καὶ τῆς συζυγοῦς αὐτῆς.

Αν δοθεῖσα ἔξισωσις εἶναι ἐν γένει ἄρρητος, ύψοῦμεν τὰ μέλη της εἰς καταλλήλους δυνάμεις, ἵνα προκύψῃ ἔξισωσις ἀπηλλαγμένη ριζικῶν, ἀλλ' αὗτη δὲν εἶναι ἐν γένει ἵσοδύναμος τῆς δοθείσης. πρέπει νὰ δοκιμάζωμεν, ἢν αἱ ρίζαι αὐτῆς ἐπαληθεύουν καὶ τὴν δοθείσαν.

Ορισμὸς ἀντιστρόφου ἔξισώσεως. Αἱ γ' βαθμοῦ

$$\alpha x^3 + \beta x^2 - \beta x - \alpha = 0, \quad \alpha x^3 + \beta x^2 + \beta x + \alpha = 0$$

ἔχουν ἡ α' τὴν ρίζαν  $x=1$  καὶ ἡ β' τὴν  $x=-1$ , ἀνάγονται δὲ εἰς τὴν λύσιν ἔξισώσεων β' βαθμοῦ (μετὰ διαίρεσιν τῶν μελῶν τῶν ἔξισώσεων διὰ  $x-1$ ,  $x+1$  ἀντιστοίχως).

Διὰ τὴν λύσιν τῆς  $\alpha x^4 + \beta x^3 + \gamma x^2 + \beta x + \alpha = 0$  τὴν θέτομεν ὑπὸ τὴν μορφὴν  $\alpha \left( x^2 + \frac{1}{x^2} \right) + \beta \left( x + \frac{1}{x} \right) + \gamma = 0$  καὶ  $x + \frac{1}{x} = \psi$ , ὅτε ἀνάγεται εἰς τὴν λύσιν ἔξισώσεων β' βαθμοῦ.

Η  $\alpha x^4 + \beta x^3 - \beta x - \alpha = 0$  ἔχει ρίζας τὰς  $x=1$ ,  $x=-1$  καὶ ἀνάγεται εἰς ἔξισωσιν β' βαθμοῦ μετὰ τὴν διαίρεσιν τοῦ α' μέλους διὰ τοῦ  $x^2 - 1$ .

Η  $\alpha x^5 + \beta x^4 + \gamma x^3 \pm \gamma x^2 \pm \beta x \pm \alpha = 0$  ἔχει τὴν ρίζαν  $x=\mp 1$  καὶ ἀνάγεται εἰς ἀντίστροφον ἔξισωσιν δ' βαθμοῦ.

Ορισμὸς διωνύμου ἔξισώσεως  $\alpha x^\kappa + \beta x^\lambda = 0$ , ( $\alpha, \beta \neq 0$ ),  $\kappa, \lambda$  ἀκέραιοι θετικοί.

Τίθεται ὑπὸ μορφὴν  $x^\lambda (\alpha x^{\kappa-\lambda} + \beta) = 0$ , ( $\kappa > \lambda$ ) καὶ ἔχει ρίζας  $x=0$

καὶ τὰς τῆς  $\alpha x^{\kappa-\lambda} + \beta = 0$  ή τῆς  $x^\nu = \gamma$ ,  $(\gamma = -\frac{\beta}{\alpha}, \kappa-\lambda=\nu)$ . Διακρίνομεν περιπτώσεις  $\alpha'$ ) ἀν  $\nu=2\lambda_2$ ,  $\beta')$  ἀν  $\nu=2\lambda_2+1$ .

Λύσις τῆς ἔξισώσεως  $\alpha|x|+\beta=0$ , είναι λισθάναμος μὲ τὴν  $x^2=\frac{\beta^2}{\alpha^2}$  ἀν  $\alpha\beta<0$ , ἐνῷ ἀν  $\alpha\beta>0$  δὲν ἔχει ρίζαν.

Λύσις τῆς ἔξισώσεως  $\alpha|x|+\beta x+\gamma=0$ ,  $(\alpha, \beta, \gamma \neq 0)$ . Ἐν  $\gamma(\beta-\alpha)>0$ , ή  $\gamma(\alpha+\beta)<0$ , ἔχομεν μίαν λύσιν δι' ἑκάστην περίπτωσιν.

Λύσις τῆς ἔξισώσεως  $\alpha|x|^2+\beta|x|+\gamma=0$ ,  $(\alpha \neq 0)$ . Η  $|x|^2+2\beta|x|+\gamma=0$  ἔχει 4 ρίζας ἀνὰ δύο ἀντιθέτους, ἀν  $\beta^2-\gamma>0$  καὶ  $(-\beta \pm \sqrt{\beta^2-\gamma})>0$ .

Ορισμὸς συστήματος ἔξισώσεων  $\beta'$  βαθμοῦ (ἀν ἔχῃ μόνον μίαν ἔξισωσιν  $\beta'$  βαθμοῦ καὶ τὰς ἄλλας  $\alpha'$  βαθμοῦ).

Λύσις συστήματος ἔξισώσεων  $\beta'$  βαθμοῦ ή ἀνωτέρου (μὲ δύο ή περισσοτέρους ἀγνώστους).

Προβλήματα ἔξισώσεων καὶ συστημάτων  $\beta'$  βαθμοῦ (ἀριθμητικά, γενικὰ καὶ μὲ διερεύνησιν).

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VIII

### Α'. ΠΕΡΙ ΠΡΟΟΔΩΝ

#### 1. ΠΡΟΟΔΟΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΙ

§ 205. Ἀριθμητικὴ πρόοδος\* καλεῖται διαδοχὴ ἀριθμῶν, ἕκαστος τῶν ὅποιών γίνεται ἐκ τοῦ προηγουμένου του διὰ τῆς προσθέσεως τοῦ αὐτοῦ ἀριθμοῦ. Οἱ μὲν ἀποτελοῦντες τὴν πρόοδον ἀριθμοὶ λέγονται ὄροι αὐτῆς, ὁ δὲ προστιθέμενος ἀριθμός εἰς καθένα ὅρον διὰ νὰ δώσῃ τὸν ἐπόμενον αὐτοῦ, καλεῖται διαφορὰ ἢ λόγος τῆς προόδου.

"Ἄν μὲν ἡ διαφορὰ τῆς προόδου εἴναι ἀριθμὸς θετικός, οἱ ὄροι βαίνουν αὔξανόμενοι καὶ ἡ πρόοδος λέγεται αὔξουσα, ἔὰν δὲ εἴναι ἀρνητικὸς ἀριθμὸς, οἱ ὄροι βαίνουν ἐλαττούμενοι (φθίνοντες) καὶ λέγεται φθίνουσα. Π.χ. ἡ διαδοχὴ τῶν ἀριθμῶν 1, 2, 3, 4,... 48 εἴναι πρόοδος ἀριθμητικὴ αὔξουσα μὲ διαφορὰν 1, καθὼς καὶ ἡ 1, 3, 5,... 53 μὲ διαφορὰν 2, ἡ δὲ 35, 30, 25,..., 0 εἴναι φθίνουσα μὲ διαφορὰν —5.

"Ἐὰν μὲν αἱ παραστήσωμεν τὸν πρῶτον ὄρον ἀριθμητικῆς προόδου καὶ μὲ ω τὴν διαφορὰν αὐτῆς, ὁ δεύτερος, τρίτος,... ὄρος θὰ παριστάνεται μὲ α+ω, α+2ω, α+3ω, α+4ω,... (1) "Ἄρα:

"Ἐκαστος ὄρος ἀριθμητικῆς προόδου ἴσοῦται μὲ τὸν πρῶτον ὄρον αὐτῆς, αὐξηθέντα κατὰ τὸ γινόμενον τῆς διαφορᾶς ἐπὶ τὸν ἀριθμὸν τοῦ πλήθους τῶν προηγουμένων αὐτοῦ ὄρων.

Οὕτως ὁ ὄρος τῆς προόδου (1) ὁ ἔχων π.χ. τὴν τριακοστὴν τάξιν ἴσοῦται μὲ α+29ω, ὁ τὴν ἔξηκοστὴν πέμπτην τάξιν μὲ α+64ω κ.τ.λ. Ἐκ τῶν ἀνωτέρω παρατηρούμενον ὅτι :

"Οταν δοθῇ ὁ πρῶτος ὄρος καὶ ἡ διαφορὰ ἀριθμητικῆς προ-

\* Ἡ χρῆσις ἀριθμητικῶν προόδων χρονολογεῖται ἀπὸ 2 000—1 700 π.Χ. εἰς τὸ βιβλίον Ἀριθμητικῆς τοῦ Αἰγυπτίου Ahmes μὲ τὸ πρόβλημα νὰ χωρισθοῦν 100 ἀρτοὶ εἰς 5 πρόσωπα, ὥστε τὰ μερίδια τὰ ἀποτελοῦν ἀριθμητικὴν προόδον.

όδου, δυνάμεθα νὰ εύρωμεν σίασδήποτε τάξεως ὅρον αὐτῆς, καὶ λέγομεν ὅτι τότε ἡ πρόοδος εἶναι ὠρισμένη.

Ἐάν ν παριστάνῃ τὸ πλῆθος τῶν ὅρων τῆς (1) καὶ τ τὸν ἔχοντα τὴν νιοστὴν τάξιν ὅρον αὐτῆς, οἱ προηγούμενοι τούτου θὰ εἶναι  $n-1$  τὸ πλῆθος καὶ θὰ ἔχωμεν  $\tau = \alpha + (n-1)\omega$  (2)

"Αν ἡ (2) λυθῇ ὡς πρὸς  $\omega$ , εύρισκομεν  $\omega = \frac{\tau - \alpha}{n-1}$ . "Αν ἡ (2) λυθῇ ὡς πρὸς  $\alpha$ , εύρισκομεν  $\alpha = \tau - (n-1)\omega$ , ἀν δὲ λυθῇ πρὸς  $n$ , εύρισκομεν  $n = 1 + \frac{\tau - \alpha}{\omega} = \frac{\omega + \tau - \alpha}{\omega}$ , πρέπει δὲ νὰ εἶναι τὸ  $n$  ἀριθμὸς ἀκέραιος.

Παρατηρητέον ὅτι ἡ διαφορὰ ἀριθμητικῆς προόδου μὲ ὅρους  $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \dots$ , δίδεται ὑπὸ τῶν  $\beta - \alpha, \gamma - \beta, \delta - \gamma, \dots$

Ἐπομένως ἀν παραστήσωμεν τὴν διαφορὰν αὐτὴν μὲ  $\omega$ , θὰ ἔχωμεν  $\omega = \beta - \alpha, \omega = \gamma - \beta$  καὶ προσθέτοντες αὐτὰς κατὰ μέλη εύρισκομεν  $2\omega = \gamma - \alpha$ , ἀρα  $\omega = \frac{\gamma - \alpha}{2}$ .

*Παραδείγματα.* 1ον. Ὁ ὅρος, ὁ ἔχων τὴν δεκάτην τρίτην τάξιν εἰς ἀριθμητικὴν πρόοδον μὲ πρῶτον ὅρον 3 καὶ διαφορὰν 5, ίσοῦται μὲ  $3 + (13-1)5 = 3 + 12 \cdot 5 = 3 + 60 = 63$ .

2ον. Ἐστω ὅτι ζητεῖται ἡ ἀριθμητικὴ πρόοδος, τῆς ὄποιας ὁ ὅρος τῆς δεκάτης τάξεως εἶναι 31 καὶ τῆς εἰκοστῆς 61. Ἐχομεν ὅτι ὁ δέκατος εἶναι  $\alpha + 9\omega = 31$ , ὁ εἰκοστὸς  $\alpha + 19\omega = 61$ , ἀφαιροῦντες δὲ ἐκ τῆς β' ίσότητος τὴν  $\alpha'$  εύρισκομεν

$$10\omega = 61 - 31 = 30 \quad \text{ἢ} \quad 10\omega = 30 \quad \text{καὶ} \quad \omega = 3.$$

Ἐπομένως εἶναι  $\alpha + 9 \cdot 3 = 31$  καὶ  $\alpha = 4$ . Ἀρα ἡ πρόοδος εἶναι 4, 7, 10, 13,.....

#### I. ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ ΟΡΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ

**§ 206.** Διθέντων δύο ἀριθμῶν ζητεῖται νὰ παρεμβάλωμεν μεταξύ των ἄλλους, οἱ ὄποιοι μετὰ τῶν διθέντων νὰ ἀποτελοῦν ἀριθμητικὴν πρόοδον.

Ἐάν α καὶ τ εἶναι οἱ διθέντες ἀριθμοὶ καὶ ν τὸ πλῆθος τῶν παρεμβληματικῶν, τὸ πλῆθος τῶν ὅρων τῆς σχηματισθησούμενης πρόοδου θὰ εἶναι  $n+2$ , ὁ πρῶτος ὅρος α καὶ ὁ τελευταῖος τ. Ἐπομένως

θὰ έχωμεν  $\tau = \alpha + (v+1)\omega$ , ἀν τὸ ω παριστάνη τὴν διαφορὰν τῆς προόδου. Ἐπομένως ἐκ τῆς ἴσοτητος αὐτῆς εύρίσκομεν  $\omega = \frac{\tau - \alpha}{v+1}$ . Οὕτω σχηματίζεται ἡ πρόοδος ἐκ τοῦ α, τοῦ τελευταίου τὸρου καὶ ἐκ τῆς διαφορᾶς αὐτῆς.

"Ἄν π.χ. ζητήται μεταξὺ τῶν 1 καὶ 4 νὰ παρεμβληθοῦν 16 ἀριθμοί, ὥστε μετ' αὐτῶν νὰ ἀποτελέσουν πρόοδον ἀριθμητικήν, ἔχομεν  $\alpha=1$ ,  $\tau=4$ ,  $v=16$ ,  $\omega = \frac{4-1}{16+1} = \frac{3}{17}$  καὶ ἡ ζητουμένη πρόοδος εἶναι ἡ  $1, 1\frac{3}{17}, 1\frac{6}{17}, \dots, 4$ .

### Α·σκήσεις

524. Διὰ τὰς κάτωθι ἀριθμητικὰς προόδους εὔρετε ποῖαι εἶναι αὕξουσαι, ποῖαι φθίνουσαι καὶ διατί;

α') 3, 5, 7, 9...      β') -15, -10, -5, 0, 5...      γ') 0,5, 1,5, 2,5...  
δ') 0,75, 1,125, 1,5... ε') 68, 64, 60...      στ') -5, -5,3, -5,6, -5,9....

525. Εύρετε τὸ δέκατον τὸρον τῆς α') 9, 13, 17...      β') -3, -1, 1...

γ') τὸν ὅγδον τῆς α,  $\alpha+3\beta$ ,  $\alpha+6\beta$ ...

526. Εύρετε τὴν ἀριθμητικὴν πρόοδον μὲν τὸρον τῆς δεκάτης τάξεως 231 καὶ τῆς εἰκοστῆς 2 681.

527. Εύρετε τὴν διαφορὰν τῆς προόδου, μὲν α' τὸρον α καὶ νιοστὸν τ. Μερικὴ περίπτωσις  $\alpha=0,2$ ,  $\tau=3,2$  καὶ  $v=6$ .

528. Εύρετε τὸν α' ἐκ 10 τὸρων προόδου μὲν διαφορὰν 0,75 καὶ τελευταίον 6,25.

529. Εύρετε τὸ πλῆθος τῶν τὸρων προόδου μὲν α' τὸρον 3, τελευταίον 9 καὶ διαφορὰν 2.

530. Εύρετε τὸν τὸρον τῆς εἰκοστῆς τάξεως μὲν α' τὸρον 6,35 καὶ διαφορὰν -0,25.

531. Μεταξὺ τῶν 4 καὶ 25 νὰ παρεμβληθοῦν 6 ἀριθμοί, ὥστε νὰ σχηματίσῃ ἀριθμητικὴ πρόοδος.

532. Μεταξὺ τῶν 1 καὶ 2 νὰ παρεμβληθοῦν 9 ἀριθμοί, ὥστε νὰ ἀποτελέσουν πρόοδον ἀριθμητικήν.

533. Ὡρολόγιον κτυπᾷ τὰς ὡρας ἀπὸ τῆς πρώτης μέχρι τῆς δωδεκάτης. Πόσα κτυπήματα κάνει τὸ ἡμερονύκτιον;

### II. ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΡΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ

**§ 307.** Διὰ νὰ εύρωμεν τύπον δίδοντα τὸ ἄθροισμα τῶν τὸρων ἀριθμητικῆς προόδου ἔχούστης ὡρισμένον ἀριθμὸν τὸρων, στηριζόμεθα (πρὸς εὐκολίαν) εἰς τὴν ἔξῆς ἴδιότητα:

Εἰς πᾶσαν ἀριθμητικὴν πρόοδον, μὲν ὡρισμένον πλῆθος ὅρων, τὸ ἄθροισμα δύο ὅρων ἵσον ἀπεχόντων ἀπὸ τῶν ἀκρων ὅρων ἵσοῦται μὲν τὸ ἄθροισμα τῶν ἀκρων ὅρων.

Πράγματι, ἔστω ἡ πρόοδος  $\alpha, \beta, \gamma, \dots, \kappa, \lambda, \tau$ , (1) ἡ διαφορὰ αὐτῆς ω καὶ τὸ πλήθος τῶν ὅρων  $n$ . Ἐχομεν ὅτι  $\beta = \alpha + \omega, \gamma = \alpha + 2\omega, \tau = \lambda + \omega$  καὶ  $\tau = \kappa + 2\omega$ . Ἐπομένως  $\lambda = \tau - \omega$  καὶ  $\kappa = \tau - 2\omega$ . Προσθέτοντες κατὰ μέλη τὰς  $\beta = \alpha + \omega$  καὶ  $\lambda = \tau - \omega$ , εὑρίσκομεν  $\beta + \lambda = \alpha + \tau$ . Όμοιώς ἐκ τῶν  $\gamma = \alpha + 2\omega$  καὶ  $\kappa = \tau - 2\omega$  εὑρίσκομεν  $\gamma + \kappa = \alpha + \tau$  κ.ο.κ., ἦτοι  $\alpha + \tau = \beta + \lambda = \gamma + \kappa \dots$

Ἄσ παραστήσωμεν τὸ ἄθροισμα τῶν ὅρων τῆς προόδου μὲ Σ, ἦτοι:  $\Sigma = \alpha + \beta + \gamma + \dots + \kappa + \lambda + \tau$ , ὅτε εἶναι καὶ  $\Sigma = \tau + \lambda + \kappa + \dots + \gamma + \beta + \alpha$ .

Προσθέτοντες αὐτὰς κατὰ μέλη εὑρίσκομεν :

$$\begin{aligned} 2\Sigma &= (\alpha + \tau) + (\beta + \lambda) + (\gamma + \kappa) \dots + (\tau + \alpha) \\ \text{η} \quad 2\Sigma &= (\alpha + \tau)n. \quad \text{Ἐπομένως } \Sigma = \frac{(\alpha + \tau)n}{2} \quad (2). \quad \text{Ἡτοι :} \end{aligned}$$

Τὸ ἄθροισμα τῶν ὅρων ἀριθμητικῆς τινος προόδου μὲ ὡρισμένον πλῆθος ὅρων ἵσοῦται μὲ τὸ ἡμιάθροισμα τῶν ἀκρων ὅρων τῆς ἐπὶ τὸν ἀριθμὸν τοῦ πλήθους τῶν ὅρων αὐτῆς.

Ἐάν εἰς τὴν (2) γράψωμεν ἀντὶ τοῦ τὸ ἵσον αὐτοῦ  $\alpha + (n-1)\omega$ , ὅπου ω παριστάνει τὴν διαφορὰν τῆς προόδου, εὑρίσκομεν\*

$$\Sigma = \frac{[\alpha + \alpha + (n-1)\omega]n}{2} = \frac{2\alpha + (n-1)\omega}{2} \cdot n, \quad \text{ἢτοι } \Sigma = \frac{2\alpha + (n-1)\omega}{2} \cdot n.$$

π.χ. ἂν ζητῆται τὸ ἄθροισμα τῶν δέκα πρώτων ὅρων τῆς 2, 5, 8, ..., ἔχομεν  $\alpha = 2, \omega = 3, n = 10$ , καὶ  $\Sigma = \frac{(2 \cdot 2 + 9 \cdot 3) \cdot 10}{2} = \frac{31 \cdot 5}{1} = 155$ .

\**Ἐφαυμογή.* Νὰ εὑρεθῇ ἀριθμητικὴ πρόοδος μὲ 3 ὅρους, τῶν ὁποίων τὸ μὲν ἄθροισμα εἶναι 33, τὸ δὲ γινόμενον 1 287.

"Αν μὲ καὶ παραστήσωμεν τὸν  $\beta'$  ὅρον τῆς προόδου καὶ μὲ ω τὴν διαφορὰν τῆς, οἱ τρεῖς ὅροι θὰ εἶναι  $x - \omega, x, x + \omega$ , τὸ ἄθροισμα τούτων  $x - \omega + x + x + \omega = 3x = 33$ , ἅρα  $x = 11$ . τὸ γινόμενον τῶν τριῶν ὅρων  $(x - \omega)x(x + \omega) = (x^2 - \omega^2)x$ .

"Ἐχομεν λοιπὸν  $x(x^2 - \omega^2) = 1 287$ . Θέτοντες  $x = 11$  εὑρίσκομεν

\* Οἱ τύποι  $\Sigma = n(\alpha + \tau)/2, \tau = \alpha + (n-1)\omega, \Sigma = \alpha n + [n\omega(n-1)]/2$  ἀναφέρονται τὸ πρῶτον εἰς τὸ βιβλίον Synopsis parlamariorum τοῦ W. Jones.

$$11(121-\omega^2)=1\ 287, \quad 121-\omega^2=117, \quad \omega^2=121-117=4, \quad \omega^2=\pm 1/4,$$

$$\omega=\pm 1.$$

"Αρα ή ἀριθμική πρόοδος είναι 9, 11, 13 ή 13, 11, 9. Γενικώτερον, όταν είσι παρόμοια προβλήματα ἔχωμεν περιπτὸν πλῆθος ὅρων καὶ χρησιμοποιοῦμεν τὸ ἀθροισμά των, παριστάνομεν τὸν μεσαῖον ὅρον μὲν x π.χ., τὴν διαφορὰν μὲν ω, ἐνῷ ἂν τὸ πλῆθος τῶν ὅρων είναι ἀρτιος ἀριθμός, παριστάνομεν τοὺς δύο μεσαίους διαδοχικούς ὅρους μὲν x-ω καὶ x+ω, ἥτοι ή διαφορὰ παριστάνεται μὲν 2ω, ὅτε εὐκόλως εὑρίσκουμεν τὴν παράστασιν καὶ ἄλλων ὅρων τῆς προόδου.

*Παραδείγματα.* 1ον. Ζητοῦνται πέντε ὅροι ἀριθμητικῆς προοόδου, τῶν ὁποίων τὸ μὲν ἀθροισμα είναι α, τὸ δὲ γινόμενον γ. Παριστάνομεν κατὰ σειρὰν τὸν τρίτον ὅρον μὲν x, τὴν διαφορὰν μὲν ω, ὅτε ἔχομεν τοὺς ὅρους x-2ω, x-ω, x, x+ω, x+2ω. Ἐπομένως θὰ είναι ἀφ' ἐνὸς μὲν x-2ω+x-ω+x+x+ω+x+2ω=α ή 5x=α, x=α/5, ἀφ' ἑτέρου ἔχομεν (x-2ω)(x-ω)x(x+ω)(x+2ω)=γ ή x(x²-ω²)(x²-4ω²)=γ. Θέτομεν x=α/5, ὅτε α/5(α²/25-ω²)(α²/25-4ω²)=γ.

'Η ἔξισωσις αὐτὴ είναι διτετράγωνος ὡς πρὸς ω καὶ λύοντες αὐτὴν εὑρίσκουμεν τὰς τιμὰς τοῦ ω καὶ ἀκολούθως ἔχομεν τοὺς ζητουμένους ἀριθμούς.

2ον. Ζητοῦνται τέσσαρες ὅροι ἀριθμητικῆς προοόδου μὲν ἀθροισμα α καὶ γινόμενον γ.

Παριστάνομεν τοὺς ὅρους μὲν x-3ω, x-ω, x+ω, x+3ω, ὅτε θὰ ἔχωμεν x-3ω+x-ω+x+ω+x+3ω=α καὶ x=α/4. Ἀφ' ἑτέρου ἔχομεν (x-3ω)(x-ω)(x+ω)(x+3ω)=γ ή (x²-ω²)(x²-9ω²)=γ. Θέτομεν x=α/4 καὶ εὑρίσκουμεν (α²/16-ω²)(α²/16-9ω²)=γ.

Αὕτη λυομένη δίδει τὰς τιμὰς τοῦ ω, ἀκολούθως δὲ εὑρίσκουμεν τοὺς ζητουμένους ἀριθμούς.

3ον. "Εστω ὅτι ζητεῖται τὸ ἀθροισμα τῶν ἀκεραίων θετικῶν ἀριθμῶν ἀπὸ τοῦ 1 μέχρι τοῦ ν, ἥτοι τὸ 1+2+3+4+...+ν\*. "Αν

\* 'Η σχολὴ τῶν Πυθαγορείων (6η καὶ 5η ἑκατονταετηρίς π.Χ.) ἔγνωριζε τοὺς τύπους 1+2+3+...+ν=n(n+1)/2, 2+4+6+...=2n=n(n+1), 1+3+5+...+2n-1=n².

$\Sigma_1$  παριστάνη τὸ ζητούμενον ἀθροισμα, θὰ ἔχωμεν  $\Sigma_1 = \frac{(1+v)v}{2}$ .

40v. Ἐστω ὅτι ζητεῖται τὸ ἀθροισμα τῶν ν πρώτων διαδοχικῶν περιττῶν ἀριθμῶν 1, 3, 5, 7...,  $(2v-1)$ , ἤτοι τὸ  $1+3+5+7+\dots+2v-1$ . Ἡ διαφορὰ τῆς προόδου εἶναι 2, ὁ πρῶτος δρος 1 καὶ ὁ τελευταῖος  $2v-1$ . Ἀρα ἔχομεν  $1+3+\dots+2v-1 = \frac{v(1+2v-1)}{2} = v^2$ .

### Ἄσκήσεις καὶ προβλήματα

Ο μὰς πρώτη. 534. Νὰ εύρεθῇ τὸ  $1^2+2^2+3^2+\dots+v^2$ .

Παρατηροῦμεν ὅτι  $(\alpha+1)^3=\alpha^3+3\alpha^2+3\alpha+1^3$ . Θέτομεν  $\delta$ ιαδοχικῶς  $\alpha=0, \alpha=1, \alpha=2, \alpha=3, \dots \alpha=v$  εἰς τὴν Ισότητα αὐτήν καὶ προσθέτοντες τὰς προκυπτούσας Ισότητας κατὰ μέλη, εύρίσκομεν μετά τὴν ἀπλοποίησιν

$$(v+1)^3=3(1^2+2^2+\dots+v^2)+3(1+2+\dots+v)+v+1.$$

\*Αν παραστήσωμεν μὲν  $\Sigma_3$  τὸ ζητούμενον ἀθροισμα, θέσωμεν δὲ  $\Sigma_2=1+2+\dots+v$ , εύρισκομεν  $(v+1)^3=3\Sigma_3+3\Sigma_2+v+1$  ἢ  $\Sigma_3=\frac{v(v+1)(2v+1)}{6}$ .

535. Νὰ εύρεθῇ τὸ  $1^3+2^3+3^3+\dots+v^3=\Sigma$ . Λαμβάνομεν τὴν Ισότητα  $(1+\alpha)^4=\alpha^4+4\alpha^3+6\alpha^2+4\alpha+1$ . Θέτομεν  $\alpha=0, \alpha=1, \alpha=2, \dots, \alpha=v$  καὶ προχωροῦμεν δμοίως, δπως καὶ διὰ τὴν εὑρεσιν τοῦ  $\Sigma_3$  ύποθέτοντες γνωστὰς τὰς τιμὰς  $\Sigma_2, \Sigma_3$ .

536. Πόσον εἶναι τὸ ἀθροισμα α') τῶν 25 πρώτων διαδοχικῶν ἀκεραίων ἀριθμῶν; β') τῶν 30 πρώτων διαδοχικῶν περιττῶν ἀριθμῶν; ;γ) τῶν 40 πρώτων διαδοχικῶν ἀκεραίων ἀριθμῶν;

537. Εύρετε τὸ ἀθροισμα πάντων τῶν ἀκεραίων ἀριθμῶν ἀπὸ -1 μέχρι τοῦ -v.

538. Πόσον εἶναι τὸ πλῆθος τῶν δρων ἀριθμητικῆς προόδου μὲ α' δρον 12, τελευταῖον 144 καὶ ἀθροισμα αὐτῶν 1 014;

539. Ποια εἶναι ἡ διαφορὰ ἀριθμητικῆς προόδου ἐκ 14 δρων, ἢν ὁ α' εἶναι 8 καὶ τὸ ἀθροισμα 567.

540. Ποια εἶναι ἡ διαφορὰ ἀριθμητικῆς προόδου μὲ 16 δρους, τῆς δποίας δ τελευταῖος δρος εἶναι 63 καὶ τὸ ἀθροισμα 728;

541. Πόσον εἶναι τὸ πλῆθος τῶν δρων ἀριθμητικῆς προόδου μὲ ἀθροισμα 456, διαφορὰν -12 καὶ τελευταῖον δρον 15;

542. Πόσον δξίζει ἐμπόρευμα, δη πληρώνεται εἰς 12 δόσεις καὶ τὴ α' δόσις εἶναι 100 δραχμάς, ἢ β' 150 δρ, ἢ γ' 200 δρ. κ.ο.κ.;

543. \*Αν ὁ 2ος καὶ ὁ 7ος δρος ἀριθμητικῆς προόδου ἔχουν ἀθροισμα 92, ὁ δὲ 4ος καὶ 11ος 71, τίνες εἶναι οἱ τέσσαρες δροι;

544. Ποια εἶναι ἡ ἀριθμητικὴ προόδος μὲ 12 δρους, ἢν τὸ ἀθροισμα τῶν τεσσάρων μέσων δρων εἶναι 74, τὸ δὲ γινόμενον τῶν ἄκρων 70;

545. Εύρετε τοὺς πέντε δρους ἀριθμητικῆς προόδου ἔχοντας γινόμενον 12 320 καὶ ἀθροισμα 40.

\*Ο μάς δευτέρα 546. Νὰ εύρεθῇ ὁ νιοστὸς ὅρος καὶ τὸ ἀθροισμα τῶν νπρώτων ὅρων τῆς προόδου  $1, \frac{v-1}{v}, \frac{v-2}{v}, \frac{v-3}{v}, \dots$

547. Νὰ εύρεθοῦν τέσσαρες ἀκέραιοι ἀριθμοὶ ἀποτελοῦντες ἀριθμητικὴν πρόοδον, ἀν τὸ ἀθροισμά των εἶναι 20 καὶ τὸ ἀθροισμα τῶν ἀντιστρόφων των εἶναι  $1, \frac{1}{24}$ .

548. Δεῖξατε ὅτι εἶναι  $\Sigma_1^2 = \Sigma_3$ , ὅταν  $\Sigma_1 = 1+2+\dots+v$ ,  $\Sigma_3 = 1^3 + 2^3 + \dots + v^3$ .

549. Εὑρετε τὸ  $1^2 + 4^2 + 7^2 + \dots + (3v-2)^2$ . (Χρησιμοποιήσατε τὴν Ισότητα  $(3\alpha-2)^2 = 9\alpha^2 - 12\alpha + 4$  καὶ θέσατε  $\alpha = 1, 2, \dots, v$ ).

550. Εὑρετε τὸ ἀθροισμα τῶν τετραγώνων τῶν ν πρώτων διαδοχικῶν περιττῶν ἀριθμῶν. (Χρησιμοποιήσατε τὴν Ισότητα

$$(2\alpha-1)^2 = 4\alpha^2 - 4\alpha + 1 \text{ θέτοντες } \alpha = 1, 2, \dots, v).$$

551. Εὑρετε τὸ ἀθροισμα  $1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 4 + \dots + v(v+1)$ . (Χρησιμοποιήσατε τὴν Ισότητα  $\alpha(\alpha+1) = \alpha^2 + \alpha$  θέτοντες  $\alpha = 1, 2, \dots, v$ ).

552. Εὑρετε τὸ ἀθροισμα τῶν τετραγώνων τῶν ν πρώτων διαδοχικῶν ἀρτίων ἀριθμῶν.

## 2. ΠΡΟΟΔΟΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑΙ

**§ 208. Γεωμετρικὴ πρόοδος \*** καλεῖται διαδοχὴ ἀριθμῶν, ἕκαστος τῶν ὅποιων γίνεται ἐκ τοῦ προηγουμένου του μὲ πολλαπλασιασμὸν ἐπὶ τὸν αὐτὸν ἀριθμόν.

Οἱ μὲν ἀποτελοῦντες τὴν πρόοδον ἀριθμοὶ λέγονται **ὅροι** αὐτῆς, ὁ δὲ ἀριθμὸς, ἐπὶ τὸν ὅποιον πολλαπλασιάζεται ὅρος τις, διὰ νὰ δώσῃ τὸν ἐπόμενον αὐτοῦ, λέγεται **λόγος** τῆς προόδου.

Ἐὰν μὲν ὁ λόγος τῆς προόδου **ἀπολύτως** θεωρούμενος εἶναι μεγαλύτερος τῆς 1, οἱ ὅροι **ἀπολύτως** θεωρούμενοι βαίνουν αὔξανόμενοι καὶ ἡ πρόοδος λέγεται (**ἀπολύτως**) **αὔξουσα**, ἐὰν δὲ ὁ λόγος **ἀπολύτως** θεωρούμενος εἶναι μικρότερος τῆς 1, οἱ ὅροι **ἀπολύτως** θεωρούμενοι βαίνουν ἔλασττούμενοι (**φθίνοντες**) καὶ ἡ πρόοδος λέγεται (**ἀπολύτως**) **φθίνουσα**.

Κατὰ ταῦτα, ἡ διαδοχὴ τῶν ἀριθμῶν 1, 2, 4, 8, 16....., 64 ἀποτελεῖ πρόοδον γεωμετρικὴν αὔξουσαν μὲ λόγον 2.

Ομοίως οἱ ἀριθμοὶ  $-5, -10, -20, -40, -80, \dots$  ἀποτελοῦν γεωμετρικὴν πρόοδον (**ἀπολύτως**) αὔξουσαν μὲ λόγον τὸν 2, ἐνῷ οἱ  $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \dots$  καὶ οἱ  $-2, -\frac{2}{3}, -\frac{2}{9}, -\frac{2}{27}, \dots$

\* Αἱ γεωμετρικαὶ πρόοδοι ἐμφανίζονται τὸ πρῶτον εἰς τὸ βιβλίον Ἀριθμητικῆς τοῦ Αἰγυπτίου Ahmes, ὃπου ζητεῖται νὰ προστεθοῦν οἱ ἀριθμοὶ  $7, 49, 343, 2401, 16807$  καὶ εύρισκεται ἀθροισμα 19 607.

ἀποτελοῦν ( ἀπολύτως ) φθινούσας γεωμετρικὰς προόδους μὲ ἀντι-  
στοίχους λόγους τοὺς  $\frac{1}{2}$  καὶ  $\frac{1}{3}$ .

"Αν μὲ α παραστήσωμεν τὸν πρῶτον ὅρον γεωμετρικῆς τίνος προόδου καὶ μὲ ω τὸν λόγον αὐτῆς, ὁ ὅρος ταύτης ὁ ἔχων τὴν β· τάξιν θὰ εἶναι ω, ὁ ἔχων τὴν γ' τάξιν θὰ παριστάνεται ὑπὸ τοῦ α· ω· ω = ω<sup>2</sup> κ.ο.κ., ὥστε ἡ πρόοδος θὰ παριστάνεται οὕτως :

$$\alpha, \omega, \omega^2, \omega^3, \omega^4, \dots$$

'Εκ τούτων βλέπομεν ὅτι :

"Οταν δοθῇ ὁ πρῶτος ὅρος, ὁ λόγος καὶ τὸ πλῆθος τῶν ὅρων γεωμετρικῆς προόδου, τότε ἡ πρόοδος δύναται νὰ θεωρῆται ὠ-  
ρισμένη.

'Επίστης παρατηροῦμεν ὅτι :

'Ο τυχῶν ὅρος γεωμετρικῆς προόδου ισοῦται μὲ τὸν α'  
ὅρον αὐτῆς ἐπὶ τὴν δύναμιν τοῦ λόγου, τὴν ἔχουσαν ἐκθέτην  
τὸν ἀριθμὸν τῶν προηγουμένων αὐτοῦ ὅρων.

'Εὰν μὲ τα παραστήσωμεν τὸν ὅρον τῆς νιοστῆς τάξεως γεωμετρικῆς προόδου ἔχούσης α' ὅρον α καὶ λόγον ω, θὰ ἔχωμεν  $\tau = \alpha \cdot \omega^{n-1}$ .

'Έκ ταύτης εύρισκομεν  $\alpha = \frac{\tau}{\omega^{n-1}}$ , καὶ  $\omega = \sqrt[n-1]{\frac{\tau}{\alpha}}$ . Π.χ. ὁ ἔχων τὴν  
δεκάτην τάξιν ὅρος τῆς προόδου 2, 6, 18, ... εἶναι 2.3<sup>o</sup>, διότι εἶναι  
 $\alpha=2$ ,  $\omega=3$ ,  $n=10$ .

"Αν οἱ διαδοχικοὶ ὅροι γεωμετρικῆς προόδου παρασταθοῦν μὲ  
α, β, γ, δ,..., λ, τ καὶ ὁ λόγος της μὲ ω, θὰ ἔχωμεν  $\beta=\alpha\omega$ ,  $\gamma=\beta\omega$ , ...,  
ἄρα  $\omega = \frac{\beta}{\alpha} = \frac{\gamma}{\beta} = \dots = \frac{\tau}{\lambda}$  καὶ  $\alpha = \frac{\beta}{\omega}$ ,  $\beta = \frac{\gamma}{\omega}$ ...,  $\lambda = \frac{\tau}{\omega}$ . "Αρα  
 $\beta=\alpha\omega$ ,  $\beta=\frac{\gamma}{\omega}$  καὶ  $\beta^2=\alpha\gamma$ .

**§ 209.** Τὸ γινόμενον δύο ὅρων γεωμετρικῆς προόδου ισάκις  
ἀπεχόντων ἐκ τῶν ἄκρων ὅρων ισοῦται μὲ τὸ γινόμενον τῶν  
ἄκρων ὅρων.

"Εστω ἡ γεωμετρικὴ πρόοδος μὲ ὅρους κατὰ σειρὰν α, β, γ, δ,...,  
κ, λ, τ, καὶ λόγον τὸν ω.

"Ἐχομεν  $\left\{ \begin{array}{l} \beta=\alpha\omega \\ \lambda=\frac{\tau}{\omega} \end{array} \right.$ . Πολλαπλασιάζοντες τὰς ισότητας αὐτὰς κατὰ

μέλη, εύρισκομεν  $\beta\lambda = \alpha\tau$ . Ἐπίσης ἔχομεν  $\begin{cases} \gamma = \alpha\omega^2 \\ \kappa = \frac{\tau}{\omega^2} \end{cases}$  καὶ μετὰ τὸν πολλαπλασιασμὸν τούτων κατὰ μέλη  $\gamma\kappa = \alpha\tau$ . Οὕτως ἔχομεν  $\alpha\tau = \beta\lambda = \gamma\kappa$ .....

Παρατηρητέον ὅτι, ἐὰν τὸ πλῆθος τῶν ὄρων εἴναι ἀριθμὸς περιττός, τότε θὰ ὑπάρχῃ εἰς ὄρος ἀπέχων ἕξ ἵσου ἐκ τῶν ἄκρων ὄρων, ὁ ὅποιος θὰ εἴναι μεσαῖος ὄρος τῆς προόδου (ώς ἐκ τῆς θέσεώς του). "Αν παρασταθῇ αὐτὸς μὲν  $\mu$ , θὰ εἴναι κατὰ τὰ ἀνωτέρω

$$\mu\mu = \beta\lambda = \alpha\tau \quad \text{ή} \quad \mu^2 = \alpha\tau \quad \text{καὶ} \quad \mu = \sqrt{\alpha\tau}.$$

### I. ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ ΟΡΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ

**§ 210.** Δίδονται δύο ἀριθμοὶ  $\alpha, \beta$  καὶ  $\zeta$  ητεῖται νὰ παρεμβάλωμεν μεταξὺ αὐτῶν  $n$  ἄλλους, οἱ ὅποιοι μετὰ τῶν διθέντων  $n'$  ἀποτελοῦν γεωμετρικὴν πρόοδον.

Ἐάν παραστήσωμεν μὲν  $\omega$ , τὸν λόγον τῆς προόδου, ἡ ὅποια θὰ σχηματισθῇ, ἐπειδὴ τὸ πλῆθος τῶν ὄρων αὐτῆς θὰ εἴναι  $n+2$ , ὁ τελευταῖος ὄρος  $\beta = \alpha\omega^{n+1}$ . Ἐκ τῆς ισότητος αὐτῆς εύρισκομεν :

$$\omega^{n+1} = \frac{\beta}{\alpha} \quad \text{καὶ} \quad \omega = \sqrt[n+1]{\frac{\beta}{\alpha}}$$

(ἄν  $n+1 = \text{ἀρτιος}$ , πρέπει  $\frac{\beta}{\alpha} > 0$ , διὰ νὰ ἔχωμεν ὄρους πραγματικοὺς ἀριθμούς). Ἐπομένως ἡ  $\zeta$  ητουμένη πρόοδος θὰ εἴναι

$$\alpha, \alpha\sqrt[n+1]{\frac{\beta}{\alpha}}, \alpha\sqrt[n+1]{\left(\frac{\beta}{\alpha}\right)^2}, \dots$$

Π.χ. ἂν  $\zeta$  ητῆται νὰ παρεμβληθοῦν ἐννέα ἀριθμοὶ μεταξὺ τῶν 1 καὶ 2, οἵτινες μετὰ τῶν διθέντων  $n'$  ἀποτελοῦν γεωμετρικὴν πρόοδον, ἔχομεν  $n = 9$  καὶ  $\omega = \sqrt[10]{2} - 2^{\frac{1}{10}}$ . Ἐπομένως ἡ πρόοδος εἴναι  $1, 2^{\frac{1}{10}}, 2^{\frac{2}{10}}, 2^{\frac{3}{10}}, \dots$

### 'Α σκήσεις

553. Ποῖαι ἐκ τῶν κάτωθι προόδων εἴναι αὔξουσαι, ποῖαι φθίνουσαι καὶ διατί ;  
 $\alpha')$  5, 10, 20, ...    $\beta')$  3, -6, 12, ...    $\gamma')$  7, -28, 112...    $\delta')$  135, 27, 5, 4.....

$$\epsilon') \frac{32}{81}, \frac{16}{27}, \frac{8}{9}, \dots \sigma') -4, \frac{8}{3}, -\frac{16}{9}, \dots$$

554. Νὰ εύρεθῇ δ ὅρος τῆς ἑβδόμης τάξεως τῆς γεωμετρικῆς προόδου 2, 6, 18, ...  
 555. Νὰ εύρεθῇ δ λόγος γεωμετρικῆς προόδου μέ πρῶτον ὅρον 9 καὶ πέμπτον τὸν 144.

556. Νὰ εύρεθῇ δ λόγος τῆς προόδου, ὅταν δ πρῶτος ὅρος τῆς εἶναι 2, ὁ τελευταῖος 512 καὶ τὸ πλήθος τῶν ὅρων 9.

557. Νὰ εύρεθῇ δ πρῶτος ὅρος γεωμετρικῆς προόδου, τῆς ὀποίας δ τελευταῖος ὅρος εἶναι 156,25, δ προτελευταῖος 62,5 καὶ τὸ πλήθος τῶν ὅρων 6.

558. Πόσον εἶναι τὸ πλήθος τῶν ὅρων γεωμετρικῆς προόδου, τῆς ὀποίας δ πρῶτος ὅρος εἶναι 6, δ δεύτερος 12 καὶ δ τελευταῖος 3 072;

559. Εἴναι δυνατόν νὰ εύρεθῇ τὸ πλήθος τῶν ὅρων γεωμετρικῆς προόδου μὲ α' ὅρον 23,75, λόγον -0,925 καὶ τελευταῖον -7,375 ;

560. Εύρετε τὸ πλήθος τῶν ὅρων γεωμετρικῆς προόδου ἔχούστης τετάρτης τάξεως ὅρον 13, ἔκτης 117 καὶ τελευταῖον 9 477.

561. Εύρετε τὸν λόγον γεωμετρικῆς προόδου, ἔχούστης τρίτης τάξεως ὅρον τὸν 12 καὶ ὄγδόν τὸν 384.

## II. ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΡΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ

**§ 211.** "Εστω ἡ γεωμετρικὴ πρόοδος  $\alpha$ ,  $\alpha\omega$ ,  $\alpha\omega^2$ , ...,  $\alpha\omega^{n-1}$  ἐκ τῶν ὅρων. Ἐὰν ζητοῦμεν τὸ ἄθροισμα τῶν ὅρων αὐτῆς καὶ παραστήσωμεν αὐτὸν μὲ  $\Sigma$ , θὰ ἔχωμεν \*

$$\Sigma = \alpha + \alpha\omega + \alpha\omega^2 + \dots + \alpha\omega^{n-1} \quad (1)$$

Ἐὰν πολλαπλασιάσωμεν τὰ μέλη ταύτης ἐπὶ  $\omega$ , ἀφαιρέσωμεν δὲ ἀπὸ τὸ ἔξιγόμενον  $\Sigma\omega = \alpha\omega + \alpha\omega^2 + \dots + \alpha\omega^n$  τὴν (1) (κατὰ μέλη), προκύπτει  $\Sigma\omega - \Sigma = \alpha\omega^n - \alpha \cdot \Sigma \cdot (\omega - 1) = \alpha\omega^n - \alpha$ , ἐκ τῆς ὀποίας εύρισκομεν διαιροῦντες τὰ ἵσα διὰ τοῦ  $\omega - 1$  (τὸ ὅποιον ὑποτίθεται  $\neq 0$ , δηλαδὴ  $\omega \neq 1$ )

$$\Sigma = \frac{\alpha\omega^n - \alpha}{\omega - 1} \quad (2)$$

"Αν εἰς τὴν ἴσοτητα ταύτην θέσωμεν τὸ τὸ ἀντὶ τοῦ  $\alpha\omega^{n-1}$ , τὸ δ-

\* 'Η Γενικὴ ἄθροιστις ὅρων γεωμετρικῆς προόδου ὀφείλεται εἰς τοὺς "Ελληνας κατ' ἐπέκτασιν τῆς ἀναλογίας  $a:x=x:y$ , ἔχρησιμοποιεῖτο δὲ τὸ πρῶτον ἡ  $\alpha$ , αβ αβ<sup>2</sup>... Γενικωτέρα μορφὴ ἄθροισεως παρουσιάζεται τὸ πρῶτον εἰς τὸ ἔργον «Algorithmus de Integrals» (1410) τυπωθὲν ἐν Παδούῃ (1483) καὶ ἐν Βενετίᾳ (1540) ὑπὸ τοῦ Ἰταλοῦ Prosdocio de Beldomanti, δ ὀποῖος ἔχρησιμοποιήσε τὸν τύπον  $a + a\omega + a\omega^2 + \dots + a\omega^{n-1} = a\omega^{n-1} + (a\omega^{n-1} - a) \cdot (\omega - 1)$ , διχὶ μὲ σύμβολα, ἀλλὰ μὲ παραδείγματα μόνον. Γενικὸν τύπον προσθέσεως ὅρων γεωμετρικῆς προόδου δίδει ὁ Γάλλος E. Viète (1540–1603, Παρίσιοι).'

ποῖον παριστάνει τὸν τελευταῖον ὅρον τῆς (1), θὰ ἔχωμεν τὸ ζητούμενον ἄθροισμα

$$\Sigma = \frac{\alpha\omega^{v-1} \cdot \omega - \alpha}{\omega - 1} = \frac{\tau\omega - \alpha}{\omega - 1} \text{ καὶ } \frac{\alpha\omega^v - \alpha}{\omega - 1} = \frac{\alpha}{1-\omega} - \frac{\alpha\omega^v}{1-\omega} \quad (3)$$

Τὸ ἔξαιγόμενον τοῦτο δυνάμεθα νὰ εῦρωμεν καὶ ὡς ἑζῆς :

$$^*\text{Έχομεν } \alpha + \alpha\omega + \alpha\omega^2 + \dots + \alpha\omega^{v-1} = \alpha(1 + \omega + \omega^2 + \dots + \omega^{v-1}).$$

Γνωρίζομεν ὅτι τὸ  $1 + \omega + \omega^2 + \dots + \omega^{v-1}$  εἶναι τὸ πηλίκον τῆς διαιρέσεως  $(\omega^v - 1)$ : ( $\omega - 1$ ), ἀρα :

$$\alpha + \alpha\omega + \alpha\omega^2 + \dots + \alpha\omega^{v-1} = \alpha \frac{\omega^v - 1}{\omega - 1} = \alpha \frac{1 - \omega^v}{1 - \omega} = \frac{\alpha}{1 - \omega} - \frac{\alpha\omega^v}{1 - \omega}.$$

### III. ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΑΠΕΙΡΩΝ ΟΡΩΝ ΦΘΙΝΟΥΣΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ

**§ 212.** "Αν ὑποθέσωμεν ὅτι ἡ δοθεῖσα γεωμετρικὴ πρόοδος εἶναι φθίνουσα\* μὲν ἀπειρον πλῆθος ὅρων, δηλαδὴ ὅτι ἔχομεν τὴν γεωμετρικὴν πρόοδον (1')  $\alpha, \alpha\omega, \alpha\omega^2, \dots$  (ἐπ' ἀπειρον), ἐνῷ τὸ  $\omega$  εἶναι ἀπολύτως  $< 1$ , τότε τὸ  $\omega^n$  θὰ εἶναι ἀριθμὸς πολὺ μικρός, ὅταν τὸ  $n$  εἶναι πολὺ μεγάλος (θετικός). "Οταν δὲ τὸ  $n$  ὑπερβαίνῃ πάντα δοθέντα θετικὸν ἀριθμὸν καὶ τείνῃ εἰς τὸ  $\infty$ , τὸ  $\omega^n$  καθὼς καὶ τὸ  $\alpha\omega^n$  γίνεται ἀπολύτως μικρότερον παντὸς θετικοῦ ἀριθμοῦ καὶ λέγομεν ὅτι **τείνει** εἰς τὸ 0.

"Ἐὰν λοιπὸν τὸ ἄθροισμα τῶν  $n$  πρώτων ὅρων τῆς προόδου τὸ  $\Sigma = \frac{\alpha\omega^n - \alpha}{\omega - 1}$  γράψωμεν οὕτω :  $\Sigma = \frac{\alpha - \alpha\omega^n}{1 - \omega} = \frac{\alpha}{1 - \omega} - \frac{\alpha\omega^n}{1 - \omega}$  καὶ ὑποθέσωμεν ὅτι τὸ  $n \rightarrow \infty$ , ὅτε λέγομεν ὅτι προσθέτομεν τοὺς ἀπείρους ὅρους τῆς προόδου, ἐπειδὴ τὸ μὲν  $\frac{\alpha}{1 - \omega}$  εἶναι ἀριθμὸς ὥρισμένος, τὸ δὲ  $\alpha\omega^n \rightarrow 0$ , θὰ ἔχωμεν ὡς ἄθροισμα τῆς (1') τὸ  $\frac{\alpha}{1 - \omega}$ , δηλαδὴ ἔχομεν :  $\alpha + \alpha\omega + \dots + \alpha\omega^{v-1} = \frac{\alpha}{1 - \omega}, \omega < 1, n \rightarrow \infty$ . "Ητοι :

Τὸ ἄθροισμα τῶν ἀπείρων τὸ πλῆθος ὅρων φθινούσης γεωμετρικῆς προόδου ισοῦται μὲν αλάσμα, ἔχον ἀριθμητὴν μὲν τὸν

\* Ἡ φθίνουσα γεωμετρικὴ πρόοδος  $1 + \frac{1}{4} + \left(\frac{1}{4}\right)^2 + \left(\frac{1}{4}\right)^3 + \dots$ , ἐμφανίζεται τὸ πρῶτον ὑπὸ τοῦ "Ἐλληνος μαθηματικοῦ" Ἀρχιμήδους (287–212 π.Χ., Συρακοῦσαι).

πρῶτον ὅρον, παρονομαστὴν δὲ τὴν μονάδα ἡλαττωμένην κατὰ τὸν λόγον τῆς προόδου.\*

Κατὰ ταῦτα τὸ ἀθροισμα τῶν ἀπείρων ὅρων τῆς  $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{2^2}, \dots$  εἰς τὴν ὁποίαν εἴναι  $\omega = \frac{1}{2}$  καὶ  $\alpha = 1$ , εἴναι  $\frac{1}{1 - \frac{1}{2}} = 2$ . Τὸ ἀθροισμα τῶν ἀπείρων ὅρων τῆς προόδου  $4, 2, 1, \frac{1}{2}, \dots$  εἴναι  $\frac{4}{1 - \frac{1}{2}} = 8$ .

### Α σκήσεις καὶ Προβλήματα

Ο μὰς πρώτη 562. Νὰ εύρεθῇ τὸ ἀθροισμα τῶν ὅρων γεωμετρικῆς προόδου, εἰς τὴν ὁποίαν εἴναι :

α')  $\alpha=25$ ,  $\omega=-3$ ,  $v=7$ . β')  $\alpha=7$ ,  $\tau=5103$ ,  $v=7$ . γ')  $\tau=0,0625$   $\omega=0,5$ ,  $v=13$ .

563. Πόσον είναι τὸ πλῆθος τῶν ὅρων γεωμετρικῆς προόδου μὲν

α')  $\alpha=4$ ,  $\omega=4$  καὶ ἀθροισμα  $\Sigma=5460$ . β')  $\alpha=4,6$ ,  $\omega=108$ ,  $\Sigma=54\ 155,8$ .

γ')  $\alpha=5$ ,  $\tau=1\ 280$ ,  $\Sigma=2\ 555$ .

564. Νὰ εύρεθῇ τὸ ἀθροισμα ἑκάστης τῶν ἔπομένων προόδων, αἱ ὁποῖαι ἔχουν ἀπείρους ὅρους :

α')  $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{2}{9}, \dots$  β')  $\frac{1}{4}, \frac{1}{16}, \frac{1}{64}, \dots$  γ')  $2, -1\frac{1}{3}, \frac{8}{9}, \dots$  δ')  $0,8686\dots$

565. Εὕρετε τὸ ἀθροισμα τῶν ὅρων τῶν γεωμετρικῶν προόδων, αἱ ὁποῖαι προκύπτουν, ἀν μεταξὺ α') τῶν 13,7 καὶ 3507,2 παρεμβληθοῦν 7 γεωμ. μέσοι, β') τῶν 48,6 καὶ 0,2 παρεμβληθοῦν 4 γεωμ. μέσοι.

566. Νὰ εύρεθῇ ὁ πρῶτος ὄρος καὶ τὸ ἀθροισμα τῶν ὅρων γεωμετρικῆς προόδου, εἰς τὴν ὁποίαν  $\tau=384$ ,  $\omega=2$ ,  $v=8$ .

567. Νὰ εύρεθῇ τὸ ἀθροισμα α')  $\frac{1}{2} + \frac{2}{4} + \frac{3}{8} + \frac{4}{16} + \dots$  (ἐπ' ἀπειρον).  
 (Παρατηρήσατε ὅτι είναι  $\frac{1}{2} + \frac{2}{4} + \frac{3}{8} + \frac{4}{16} + \dots = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \dots +$   
 $+ \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \dots + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \dots + \frac{1}{16} + \dots$  ἐπ' ἀπειρον).  
 β')  $\frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}-1} + \frac{1}{2-\sqrt{2}} + \frac{1}{2} + \dots$  (ἐπ' ἀπειρον).

\* Ο Stifel (1544) εἰς τὸ ἔργον του «Arithmetica Integra» ἔθεωρησε τὸ ἀθροισμα ὅρων γεωμετρικῆς προόδου  $1\frac{1}{2} + 1 + \frac{2}{3} + \frac{4}{9} + \frac{8}{27} + \frac{16}{81}$  καὶ προσέθεσε πεπερασμένον πλῆθος ὅρων.

\* Ο μάς δευτέρα. 568. \*Αν είναι  $\alpha > \beta > 0$ , νά εύρεθοῦν τὰ ἀθροίσματα  
 $\alpha') \alpha^\nu + \beta\alpha^{\nu-1} + \beta^2\alpha^{\nu-2} + \dots \quad \beta') \alpha + \beta + \frac{\beta^2}{\alpha} + \frac{\beta^3}{\alpha^2} + \dots$

569. Εις τετράγωνον ( ḥ ισόπλευρον τρίγωνον ) μὲ μῆκος τῆς πλευρᾶς του α, συνδέομεν τὰ μέσα τῶν πλευρῶν αὐτοῦ καὶ εύρισκομεν νέον τοιοῦτον. Τὸ αὐτὸ ἐπαναλαμβάνομεν εἰς τὸ νέον τοῦτο καὶ οὕτω καθεξῆς. Νὰ εύρεθῇ τὸ ἀθροίσμα τῶν ἐμβαδῶν καὶ τῶν περιμέτρων τῶν ἀπτείρων τούτων τετραγώνων ( ḥ τριγώνων ).

570. Εις κύκλον μὲ μῆκος τῆς ἀκτῖνος ρ ἔγγραφομεν τετράγωνον, εἰς τοῦτο κύκλον, εἰς τὸν κύκλον τετράγωνον κ.ο.κ. Νὰ εύρεθῇ τὸ ἀθροίσμα τῶν ἐμβαδῶν τῶν ἀπτείρων τούτων κύκλων καὶ τετραγώνων.

571. Νὰ εύρεθοῦν αἱ γωνίαι τετραπλεύρου, ἀν ἀποτελοῦν γεωμετρικὴν πρόσδον καὶ ḥ τετάρτη εἶναι ἐνεαπλασία τῆς δευτέρας.

572. Νὰ μερισθῇ ḥ 221 εἰς τρία μέρη ἀποτελοῦντα γεωμετρικὴν πρόσδον, τῆς ὁποίας ὁ γ ὅρος νὰ ὑπερβαίνῃ τὸν α' κατὰ 136.

573. Τὸ μὲν ἀθροίσμα τριῶν διαδοχικῶν ὅρων γεωμετρικῆς προόδου είναι 248, ḥ δὲ διαφορὰ τῶν ἄκρων ὅρων είναι 192. Τίνεις οἱ τρεῖς ὅροι ;

574. Δείξατε ὅτι τὸ γινόμενον τῶν ὅρων γεωμετρικῆς προόδου μὲ ν ὅρους καὶ ἄκρους ὅρους α καὶ τ ἰσοῦται μὲ  $\sqrt{(\alpha)^v}$ .

### 3. ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ

**§ 213.** Καλεῖται ἀρμονικὴ πρόοδος διαδοχὴ ἀριθμῶν, ἃν οἱ ἀντίστροφοι τούτων κατὰ τὴν αὐτὴν τάξιν ἀποτελοῦν ἀριθμητικὴν πρόοδον. Π.χ. ἐπειδὴ οἱ ἀριθμοὶ 1, 3, 5, 7... ἀποτελοῦν ἀριθμητικὴν πρόοδον, οἱ ἀντίστροφοι αὐτῶν 1,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{5}$ ,  $\frac{1}{7}$ ... λέγομεν ὅτι ἀποτελοῦν ἀρμονικὴν πρόοδον.

‘Ομοίως οἱ 1,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{4}$ ... ἀποτελοῦν ἀρμονικὴν πρόοδον, ἐπειδὴ οἱ 1, 2, 3,... ὁρίζουσιν ἀριθμητικὴν πρόοδον.

Ἐὰν α, β, γ είναι τρεῖς διαδοχικοὶ ὅροι ἀρμονικῆς προόδου καὶ οὐδεὶς ἔξ αὐτῶν είναι 0, οἱ  $\frac{1}{\alpha}$ ,  $\frac{1}{\beta}$ ,  $\frac{1}{\gamma}$  θὰ είναι διαδοχικοὶ ὅροι ἀριθμητικῆς προόδου καὶ θὰ ἔχωμεν  $\frac{1}{\beta} - \frac{1}{\alpha} = \frac{1}{\gamma} - \frac{1}{\beta}$  ἢ  $\frac{2}{\beta} = \frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\gamma}$  καὶ  $\beta = \frac{2}{\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\gamma}}$ .

‘Ο β καλεῖται μέσος ἀρμονικὸς τῶν α, β, γ, είναι δὲ καὶ  $\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\gamma} = \frac{2}{\beta}$  ἢ  $\beta\gamma + \alpha\beta = 2\alpha\gamma$ ,  $\alpha\gamma - \beta\gamma = \alpha\beta - \alpha\gamma$ ,  $(\alpha - \beta)\gamma = (\beta - \gamma)\alpha$  καὶ  $\frac{\alpha}{\gamma} = \frac{\alpha - \beta}{\beta - \gamma}$

"Αν δοθοῦν δύο ἀριθμοὶ π.χ.  $\alpha$ ,  $\beta$  καὶ ζητεῖται νὰ παρεμβληθοῦν μεταξὺ αὐτῶν ν ἀριθμοί, οἱ ὅποιοι μετὰ τῶν δοθέντων νὰ ἀποτελέσουν ἀρμονικὴν πρόοδον, παρατηροῦμεν ὅτι οἱ ἀριθμοὶ  $\frac{1}{\alpha}$ ,  $\frac{1}{\beta}$  θὰ εἰναι οἱ ἄκροι ὅροι ἀριθμητικῆς προόδου μὲ ν+2 ὅρους, ἐκ τῶν ὅποιων οἱ  $\frac{1}{\alpha}$ ,  $\frac{1}{\beta}$  εἰναι οἱ ἄκροι καὶ οἱ ἐνδιάμεσοι αὐτῶν εἰναι οἱ ἀντίστροφοι ἀριθμοὶ τῶν ζητουμένων. Εύρισκομεν τὸν λόγον, ἔστω ω ,

$$\text{τῆς } \frac{1}{\beta} - \frac{1}{\alpha} \text{, σχηματίζομεν τοὺς } \text{ὅρους τῆς ἀριθμητικῆς προόδου καὶ οἱ ἀντίστροφοι αὐτῶν εἰναι οἱ } \\ \text{ζητούμενοι ἀριθμοί. Π.χ. ὁ ἐπόμενος τοῦ ὅρου } \frac{1}{\alpha} \text{ τῆς ἀριθμητικῆς } \\ \text{προόδου εἰναι ὁ } \frac{1}{\alpha} + \left( \frac{1}{\beta} - \frac{1}{\alpha} \right) : (n+1) = \frac{1}{\alpha} + (\alpha - \beta) : (n+1)\alpha\beta, \text{ ὁ } \\ \text{δὲ ἀντίστροφος τούτου ἀριθμὸς εἰναι ὁ μετὰ τὸν πρῶτον ὅρος τῆς } \\ \text{ἀρμονικῆς προόδου.}$$

### Α σ κ ḥ σ ε ι ες

575. Εύρετε τὴν ἀρμονικὴν πρόοδον μέ ὅρους, τῆς δποίας οἱ δύο πρῶτοι ὅροι εἰναι α') 1,  $\frac{1}{2}$ . β')  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{4}$ . γ') 1,  $\frac{1}{3}$ .

576. Μεταξὺ τῶν ἀριθμῶν 0,25 καὶ 0,025 νὰ παρεβληθοῦν 18 ἀριθμοί, ὡστε μετὰ τῶν δοθέντων νὰ ἀποτελέσουν ἀρμονικὴν πρόοδον.

## B'. ΠΕΡΙ ΛΟΓΑΡΙΘΜΩΝ

**§ 214.** Καλοῦμεν λογάριθμον ἀριθμοῦ τινὸς  $A$  ὡς πρὸς βάσιν τὸν ἀριθμὸν 10, τὸν ἐκθέτην τῆς δυνάμεως τοῦ 10, ἡ ὅποια ἰσοῦται μὲ τὸν  $A^{\alpha}$ . "Ητοι ἂν εἰναι  $10^{\alpha} = A$ , τὸ  $\alpha$  λέγεται λογάριθμος τοῦ  $A$  ὡς

\* Καλοῦμεν νεπέριον λογάριθμον ἀριθμοῦ τὸν λογάριθμον αὐτοῦ ὡς πρὸς βάσιν τὸν ἀσύμμετρον ἀριθμόν, δ ὅποιος παριστάνεται μὲ τὸ γράμμα  $e$  καὶ εἰναι  $e=1+\frac{1}{1}+\frac{1}{1.2}+\frac{1}{1.2.3}+\dots$  (ἐπ' ἀπειρον) ἢ  $e=2,718281828\dots$  'Ο ε δὲν εἰναι ρίζα ἀλγεβρικῆς ἔξισώσεως καὶ διὰ τοῦτο λέγεται καὶ ὑπερβατικὸς ἀριθμὸς ( ως καὶ ὁ ἀριθμὸς  $\pi=3,14159\dots$ ). 'Η ἐφεύρετις τῶν νεπερίων λογαρίθμων ὁρεῖται εἰς τὸν John Napier (1614), δόλιον δὲ βραδύτερον ὁ Briggs (1624) ἐδημοσίευσε πίνακας δεκαδικῶν λογαρίθμων ἀπὸ 1 μέχρι 20 000.

Μία ἔξισωσις λέγεται ἀλγεβρική, ἀν τὸ πρῶτον μέλος της εἰναι ἀκέραιον πολυώ-

πρὸς βάσιν  $10^{\frac{1}{v}}$  ἀπλῶς λογάριθμος τοῦ A καὶ σημειώνεται συμβολικῶς ὡς ἔξῆς :  $\alpha = \log A$  ή  $\log A = \alpha$ , ἀπαγγέλεται δὲ ἡ ἴσοτης αὕτη οὔτως:

‘Ο λογάριθμος τοῦ A εἶναι ἵσος μὲν α.

Ἐπειδὴ εἶναι  $10^0 = 1$  καὶ  $10^1 = 10$ , ἐπεταί στι :

Δογάριθμος τοῦ μὲν 1 εἶναι τὸ 0, τοῦ δὲ 10 ἡ 1.

Θὰ δεῖξωμεν τώρα στι :

Διοθέντος ἀριθμοῦ θετικοῦ ὑπάρχει εἰς μόνον λογάριθμος αὐτοῦ.

Iov. Ἐστω ἀριθμὸς A  $> 1$ . Λαμβάνομεν ἕνα ἀκέραιον καὶ θετικὸν ἀριθμὸν ν καὶ σχηματίζομεν τοὺς ἀριθμοὺς  $0, \frac{1}{v}, \frac{2}{v}, \frac{3}{v}, \dots$  καὶ τὰς δυνάμεις  $10^0, 10^{\frac{1}{v}}, 10^{\frac{2}{v}}, 10^{\frac{3}{v}}, \dots$ , αἱ ὅποιαι ἀποτελοῦν πρόσδον γε-

ωμετρικὴν αὔξουσαν, ἐπειδὴ εἶναι  $10^{\frac{1}{v}} > 1$  (διότι ἂν ἦτο  $10^{\frac{1}{v}} \leq 1$  ὑψοῦντες τὰ ἄνισα αὐτὰ εἰς τὴν v δύναμιν, θὰ εἴχομεν  $10 \leq 1$ ). Οἱ δροὶ τῆς προσόδου ταύτης βαίνονται αὐξανόμενοι ἀπὸ τοῦ α' καὶ ἔξῆς, καὶ ἂν μὲν τύχῃ εἰς ἕξ αὐτῶν νὰ ἴσοῦται μὲν τὸν A, ὁ ἐκθέτης τῆς δυνάμεως ταύτης εἶναι ὁ λογάριθμος τοῦ A, ἀν δὲ δὲν συμβαίνῃ τοῦτο, θὰ περιέχεται ὁ A μεταξὺ δύο διαδοχικῶν ὅρων τῆς προσόδου, ἔστω τῶν  $10^{\frac{\mu}{v}}$  καὶ  $10^{\frac{\mu+1}{v}}$ , ἥτοι θὰ εἶναι  $10^{\frac{\mu}{v}} < A < 10^{\frac{\mu+1}{v}}$ .

Οἱ δύο οὗτοι ἀριθμοί, μεταξὺ τῶν ὅποιων περιέχεται ὁ A, διαφέρουν κατὰ  $10^{\frac{\mu+1}{v}} - 10^{\frac{\mu}{v}} = 10^{\frac{\mu}{v}} \cdot 10^{\frac{1}{v}} - 10^{\frac{\mu}{v}} = 1^{\frac{\mu}{v}} (10^{\frac{1}{v}} - 1)$ .

‘Αλλ' ἡ διαφορὰ αὐτὴ δύναται νὰ γίνη μικρότερα παντὸς ἀριθμοῦ θετικοῦ, ἂν λάβωμεν καταλλήλως τὸ v. Διότι τὸ  $10^{\frac{1}{v}} - 1$  δύναται νὰ γίνη ἀπολύτως μικρότερον παντὸς ἀριθμοῦ θετικοῦ, ὅταν τὸ v ὑπερβαίνῃ κατάλληλον ἀριθμόν. Τοῦτο συμβαίνει, διότι τὸ  $10^{\frac{1}{v}}$  διηνεκῶς ἐλαττοῦται, ὅταν αὔξανεται τὸ v, πλησιάζει δὲ τὸ  $10^{\frac{1}{v}}$  πρὸς τὴν 1,

νυμον ὡς πρὸς τοὺς ἀγνώστους αὐτῆς, ἐνῷ τὸ δεύτερον μέλος της εἶναι μηδέν. ‘Η ρίζα ἀλγεβρικῆς ἔξισώσεως πραγματικὴ ἡ μιγαδικὴ λέγεται ἀλγεβρικός ἀριθμός.

Οἱ ἀλγεβρικοὶ ἀριθμοὶ δύνανται νὰ εἶναι ρητοὶ ἡ ἀσύμμετροι, ἀλλὰ δὲν ἐπεται στι κάθε ἀσύμμετρος εἶναι ἀλγεβρικὸς ἀριθμός. Παράδειγμα οἱ ἀνωτέρω ἀριθμοὶ ε καὶ π.

ὅταν τὸ ν τείνη εἰς τὸ  $\infty$ . Ἀφοῦ λοιπὸν οἱ δύο ἀριθμοί, μεταξὺ τῶν ὅποιών περιέχεται ὁ  $A$ , διαφέρουν ἀπολύτως κατὰ ποσότητα ὃσον θέλομεν μικράν ( ὅταν λάβωμεν τὸ ν ἀρκούντως μέγα ), κατὰ μείζονα λόγον ὁ  $A$  θὰ διαφέρῃ ἀπολύτως ἀπὸ ἕκαστον τῶν ἀριθμῶν τούτων κατὰ ποσότητα ὃσον θέλομεν μικράν. Ἡτοι εἶναι ὁ  $A$  ὅριον ἑκάστου τῶν ἀριθμῶν αὐτῶν.

Δυνάμεθα λοιπὸν νὰ λάβωμεν ( κατὰ προσέγγισιν ) τὸν  $A$  ἵσον μὲ ἕκαστον τῶν ἀριθμῶν τούτων ( ὅταν τὸ ν ληφθῇ ἀρκούντως μέγα ) ἢτοι νὰ θέσωμεν  $A = 10^{\frac{\mu}{v}}$ , ὅτε εἶναι  $\log A = \frac{\mu}{v}$  ἢ  $10^{\frac{\mu+1}{v}} = A$ , ὅτε  $\log A = \frac{\mu+1}{v}$ . Οἱ δύο οὗτοι λογάριθμοι τοῦ  $A$  διαφέρουν κατὰ  $\frac{1}{v}$ , τὸ ὅποιον τείνει εἰς τὸ 0, ὅταν τὸ ν τείνῃ εἰς  $\infty$ .

2ον. Ἐστω ὅτι εἶναι  $0 < A < 1$ . Παρατηροῦμεν ὅτι θὰ εἶναι  $\frac{1}{A} > 1$ .

Ἐπομένως ὁ  $\frac{1}{A}$  θὰ ἔχῃ λογάριθμον, ἐστω τὸν  $\frac{\kappa}{\lambda}$ , δηλαδὴ θὰ εἶναι  $\frac{1}{A} = 10^{\frac{\kappa}{\lambda}}$ . Ἀντιστρέφοντες τὰ ἵσα, θὰ ἔχωμεν  $A = \frac{1}{10^{\frac{\kappa}{\lambda}}} = 10^{-\frac{\kappa}{\lambda}}$ , ἐπομένως  $\log A = -\frac{\kappa}{\lambda}$ . Λέγομεν τώρα ὅτι εἰς μόνος λογάριθμος τοῦ  $A$  ὑπάρχει. Διότι, ἐὰν εἰχομεν π.χ.  $v = \log A$  καὶ  $\rho = \log A$ , θὰ ᾖ το  $10^v = A$ ,  $10^\rho = A$ , καὶ  $10^v = 10^\rho$ , ἥπα καὶ  $10^{v-\rho} = 1$ , ἐπομένως  $v-\rho=0$  ἢ  $v=\rho$ .

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω ἐπεται ὅτι :

Πᾶς ἀριθμὸς  $A > 0$  ἔχει ἔνα μόνον λογάριθμον, θετικὸν μὲν ἢ  $A > 1$ , ἀρνητικὸν δὲ ἢ  $A < 1$ .

Παρατηρήσεις. 1η. Ἀρνητικὸς ἀριθμός τις δὲν ἔχει ( πραγματικὸν ) λογάριθμον, ἐπειδὴ δι' οὐδεμίαν ( πραγματικὴν ) τιμὴν τοῦ  $x$  ἡ δύναμις  $10^x$  δίδει ἔξαγόμενον ἀρνητικόν, διότι τὸ  $10^{|x|} = \theta$  ετ. ἀριθμός, τὸ  $10^{-|x|} = \frac{1}{10^{|x|}} = \frac{1}{10^{\theta \text{ετ.}}} = \theta$  ετικὸς ἀριθμός.

2α. Ἀριθμός τις σύμμετρος α δύναται νὰ θεωρηθῇ ὡς λογάριθμος τοῦ  $10^\alpha$ , εἶναι δὲ οὕτος ὁ μόνος, ὅστις ἔχει λογάριθμον τὸν  $\alpha$ .

3η. Πᾶσα δύναμις τοῦ 10 μὲ ἐκθέτην ἀριθμὸν σύμμετρον ἔχει λογάριθμον τὸν σύμμετρον τοῦτον ἐκθέτην, πᾶς δὲ ἄλλος ἀριθμὸς ἔχει λογάριθμον ἀσύμμετρον ἀριθμόν.

Διότι, ጳν είχε λογάριθμον σύμμετρον ἀριθμόν, θὰ ἦτο οὗτος ἵσος μὲ δύναμιν τοῦ  $10^{\log}$  σαν ἐκθέτην τὸν σύμμετρον τοῦτον, τὸ ὅποιον ἀντίκειται εἰς τὴν γενομένην ὑπόθεσιν.

Οἱ ἀριθμοὶ  $10^0, 10^1, 10^2, 10^3, \dots, 10^n$ , ὅπου ν ἀκέραιος, ἔχουν ἀντιστοίχως λογαρίθμους  $0, 1, 2, 3, \dots, n$ .

Οἱ ἀριθμοὶ  $10^{-1}, 10^{-2}, 10^{-3}, \dots, 10^{-n}$  ἢ οἱ ἵσοι τῶν ἀντιστοίχως  $0,1, 0,01, 0,001, \dots, 0,00\dots\dots, 01$  ἔχουν ἀντιστοίχως λογαρίθμους  $-1, -2, -3, \dots, -n$ .

### 1. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΘΜΩΝ

**§ 215. α')** 'Ο λογάριθμος γινομένου ἀριθμῶν ἰσοῦται μὲ τὸ ἀθροισμα τῶν λογαρίθμων τῶν παραγόντων αὐτοῦ.

"Εστω ὅτι εἶναι λογ $A=\alpha$ , λογ $B=\beta$ , λογ $G=\gamma$ , Θὰ δείξωμεν ὅτι λογ( $A \cdot B \cdot G$ )= $\alpha+\beta+\gamma=\log A+\log B+\log G$ .

Διότι κατὰ τὸν ὄρισμὸν τῶν λογαρίθμων ἔχομεν

$$10^\alpha = A, \quad 10^\beta = B, \quad 10^\gamma = G$$

καὶ πολλαπλασιάζοντες τὰ ἵσα ταῦτα κατὰ μέλη εὑρίσκομεν

$$10^\alpha \cdot 10^\beta \cdot 10^\gamma = A \cdot B \cdot G \quad \text{ἢ} \quad 10^{\alpha+\beta+\gamma} = A \cdot B \cdot G.$$

'Αλλ' ἡ ἴσότης αὕτη ὁρίζει ὅτι :

$$\log(A \cdot B \cdot G) = \alpha + \beta + \gamma = \log A + \log B + \log G.$$

Κατ' ἀνάλογον τρόπον δεικνύεται ἡ ἴδιότης καὶ διὰ περισσοτέρους παράγοντας.

Συνήθωσ, ὅταν δοθῇ ἀκέραιος ἀριθμός, ἀναλύομεν αὐτὸν εἰς γινόμενον πρώτων (ἢ μὴ) παραγόντων καὶ ἐπὶ τοῦ γινομένου αὐτῶν ἐφαρμόζομεν τὸν ἀνωτέρω κανόνα περὶ λογαρίθμου γινομένου.

Π.χ. ἔχομεν λογ420=λογ (3.5.7.4)=λογ3+λογ5+λογ7+λογ4.

**β')** 'Ο λογάριθμος πηλίκου δύο ἀριθμῶν ἰσοῦται μὲ τὸν λογάριθμον τοῦ διαιρετέου μεῖον τὸν λογάριθμον τοῦ διαιρέτου.

"Εστω ὅτι εἶναι λογ $A=\alpha$ , λογ $B=\beta$ . Θὰ δείξωμεν ὅτι λογ  $\frac{A}{B} = \log A - \log B$ . Διότι κατὰ τὸν ὄρισμὸν τῶν λογαρίθμων ἔχομεν  $10^\alpha = A, 10^\beta = B$ , διαιροῦντες δὲ τὰς ἴσότητας κατὰ μέλη εὑρίσκομεν  $\frac{10^\alpha}{10^\beta} = \frac{A}{B}$  ἢ  $10^{\alpha-\beta} = \frac{B}{A}$ . 'Αλλ' ἡ ἴσότης αὕτη ὁρίζει ὅτι :

$$\log \frac{A}{B} = \alpha - \beta = \log A - \log B.$$

$$\text{Ούτως ἔχομεν π.χ. } \log 5 \frac{2}{3} = \log \frac{17}{3} = \log 17 - \log 3.$$

γ') Ο λογάριθμος οίασδήποτε δυνάμεως ἀριθμοῦ ισοῦται μὲ τὸν ἐκθέτην τῆς δυνάμεως ἐπὶ τὸν λογάριθμον τῆς βάσεως αὐτῆς.

"Εστω ὅτι εἶναι  $\log A = \alpha$  καὶ ὅτι ἔχομεν τὴν δύναμιν  $A$  μὲ ἐκθέτην μὲ οἰνδήποτε. Θὰ δεῖξωμεν ὅτι  $\log A^\mu = \mu \cdot \log A$ .

Διότι, ἐπειδὴ εἶναι  $\log A = \alpha$ , θὰ ἔχωμεν  $10^\alpha = A$  καὶ ύψοῦντες τὰ ἵσα εἰς τὴν μὲ δύναμιν εύρισκομεν  $(10^\alpha)^\mu = A^\mu$  ἢ  $10^{\mu\alpha} = A^\mu$ . Ἀλλὰ ἡ ισότης αὐτῇ δρίζει ὅτι  $\log A^\mu = \mu \cdot \alpha = \mu \cdot \log A$ .

$$\text{Κατὰ ταῦτα } \text{ἔχομεν } \log A^{\frac{1}{v}} = \frac{1}{v} \log A \text{ ἢ } \log \sqrt[v]{A} = \frac{\log A}{v}, \text{ ἥτοι:}$$

δ') Ο λογάριθμος ρίζης ἀριθμοῦ ισοῦται μὲ τὸν λογάριθμον τοῦ ὑπορρίζου, διηρημένον διὰ τοῦ δείκτου τῆς ρίζης.

ε') "Εὰν εἶναι  $A, B$  δύο ἀριθμοὶ (θετικοὶ) καὶ  $A > B$ , θὰ εἶναι καὶ  $\log A > \log B$ , ἐὰν ἡ βάσις τῶν λογαρίθμων εἶναι μεγαλυτέρα τῆς μονάδος. Διότι ἀφοῦ εἶναι  $A > B$ , θὰ ἔχωμεν διαιροῦντες τὰ ἄνισα μὲ  $B$ ,  $\frac{A}{B} > 1$ . Ἀλλ' ἀφοῦ ὁ  $\frac{A}{B}$  εἶναι  $> 1$  ἔχει λογάριθμον θετικόν, ἥτοι ἔχομεν  $\log \frac{A}{B} > 0$ , ἢ  $\log A - \log B > 0$ , ἀρα  $\log A > \log B$ .

### "Α σ κ η σ τις

577. Νὰ δειχθῇ ἡ ἀλήθεια τῶν κάτωθι ισοτήτων:

$$\alpha') \log 15 = \log 3 + \log 5,$$

$$\beta') \log 55 = \log 5 + \log 11,$$

$$\gamma') \log 2 \frac{1}{3} = \log 7 - \log 3,$$

$$\delta') \log 49 = 2 \log 7,$$

$$\epsilon') \log \sqrt{20} = (\log 20) : 2,$$

$$\sigma') \log \sqrt[3]{647^3} = 3(\log 647) : 2,$$

$$\zeta') 6 \log 32 = \log 32^6,$$

$$\eta') \log 5 + \log 7 + \log 4 = \log 140.$$

### 2. ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΘΜΟΥ

§ 216. Καλοῦμεν χαρακτηριστικὸν λογαρίθμου τινὸς τὸν μικρότερον ἐκ δύο διαδοχικῶν ἀκεραίων, μεταξὺ τῶν ὃποιών περιέχεται ὁ λογάριθμος αὐτός.

"Εστω ἀριθμός τις, περιεχόμενος μεταξὺ τοῦ 1 καὶ 10 π.χ. ὁ 7.

'Ἐπειδὴ  $1 < 7 < 10$ , ἔχομεν  $\log 1 < \log 7 < \log 10$  ἢ  $0 < \log 7 < 1$ . "Η-

τοι ό λογάριθμος άριθμοῦ περιεχομένου μεταξύ 1 καὶ 10 ἔχει χαρακτηριστικὸν 0.

"Αν ἀριθμός τις περιέχεται μεταξύ τῶν 10 καὶ 100, π.χ. ὁ 47, ἐπειδὴ  $10 < 47 < 100$ , θὰ ἔχωμεν λογ10 < λογ47 < λογ100 ἢ  $1 < \log 47 < 2$ . "Ητοι πᾶς τοιοῦτος ἀριθμός ἔχει λογάριθμον μὲν χαρακτηριστικὸν 1 κ.ο.κ. Ἐπειδὴ ὅμως πᾶς ἀριθμὸς περιεχόμενος α') μεταξύ 1 καὶ 10 ἔχει ἀκέραιον μέρος μονοψήφιον, β') μεταξύ 10 καὶ 100 ἔχει ἀκέραιον διψήφιον κ.ο.κ., ἐπεται ὅτι :

**Τὸ χαρακτηριστικὸν τοῦ λογαρίθμου ἀριθμοῦ A > 1 ἔχει τόσας ἀκέραιας μονάδας, ὅσον εἰναι τὸ πλῆθος τῶν ψηφίων τοῦ ἀκέραιον του μέρους ἡλαττωμένον κατὰ 1.**

Π.χ. τὸ χαρακτηριστικὸν τοῦ λογ235 εἰναι 2 τοῦ 12,4 εἰναι 1, τοῦ 3 835,24 εἰναι 3 κ.τ.λ.

"Εστω τώρας ἀριθμός τις περιεχόμενος μεταξύ τῶν 0,1 καὶ 1, π.χ. ὁ 0,34. Ἐπειδὴ εἰναι  $0,1 < 0,34 < 1$ , ἔχομεν λογ0,1 < λογ0,34 < λογ1 ἢ  $-1 < \log 0,34 < 0$ . "Ητοι ὁ λογάριθμος παντὸς τοιούτου ἀριθμοῦ περιέχεται μεταξύ τῶν διαδοχικῶν ἀκέραιών—1 καὶ 0 καὶ ἔχει συνεπῶς χαρακτηριστικὸν —1.

"Αν ἀριθμὸς περιέχεται μεταξύ τῶν 0,01 καὶ 0,1 π.χ. ὁ 0,047, ἐπειδὴ εἰναι  $0,01 < 0,047 < 0,1$  θὰ ἔχωμεν λογ0,01 < λογ0,047 < λογ0,1 ἢ  $-2 < \log 0,047 < -1$ , ἥτοι ὁ λογάριθμος παντὸς τοιούτου ἀριθμοῦ περιέχεται μεταξύ τῶν διαδοχικῶν ἀκέραιών —2 καὶ —1 καὶ ἔχει χαρακτηριστικὸν τὸν —2.

"Ἐπειδὴ ὅμως πᾶς ἀριθμὸς περιεχόμενος α') μεταξύ 0,1 καὶ 1, ὅταν γραφῇ ως δεκαδικός, θὰ ἔχῃ ἕνα μηδενικὸν εἰς τὴν ἀρχήν, β') μεταξύ 0,01 καὶ 0,1, ὅταν γραφῇ ως δεκαδικός, θὰ ἔχῃ δύο μηδενικὰ εἰς τὴν ἀρχὴν μαζὺ μὲν τὸ μηδενικὸν τοῦ ἀκέραιου μέρους κ.ο.κ., ἐπεται ὅτι :

**Τὸ χαρακτηριστικὸν τοῦ λογαρίθμου ( θετικοῦ ) ἀριθμοῦ A (1 γεγραμμένου ως δεκαδικοῦ ἔχει τόσας ἀρνητικὰς μονάδας, ὅσα καὶ τὰ μηδενικὰ ποὺ ἔχει εἰς τὴν ἀρχὴν μαζὺ μὲν τὸ μηδενικὸν τοῦ ἀκέραιον μέρους.**

Π.χ. τὸ χαρακτηριστικὸν τοῦ λογ0,3 εἰναι —1, τοῦ λογ0,0147 ὁ —2, τοῦ λογ0,0076 ὁ —3 κ.τ.λ.

'Αντιστρόφως, ἐκ τῶν προηγουμένων ἐπεται ὅτι :

"Αν τὸ χαρακτηριστικὸν τοῦ λογαρίθμου ένδεικνει Ἀ εἰναι

θετικὸν ἢ ο, ὁ ἀριθμὸς Α θὰ ἔχῃ τόσα ψηφία εἰς τὸ ἀκέραιον μέρος, ὅσαι εἶναι αἱ μονάδες τοῦ χαρακτηριστικοῦ ἀν αὐξηθοῦν κατὰ 1.

"Αν τὸ χαρακτηριστικὸν τοῦ λογαρίθμου τοῦ Α εἶναι ἀρνητικόν, ὁ Α γραφόμενος ὡς δεκαδικὸς θὰ ἔχῃ τόσα μηδενικὰ εἰς τὴν ἀρχὴν μαζὶ μὲ τὸ μηδενικὸν τοῦ ἀκεραίου μέρους, ὅσαι καὶ αἱ ἀρνητικαὶ μονάδες τοῦ χαρακτηριστικοῦ του.

Οὔτως, ὃν τὸ χαρακτηριστικὸν τοῦ λογαρίθμου ἀριθμοῦ εἶναι 3, τὸ ἀκέραιον μέρος τοῦ ἀριθμοῦ ἔχει τέσσαρα ψηφία· ὃν τὸ χαρακτηριστικὸν εἶναι 0, τὸ ἀκέραιον μέρος τοῦ ἀριθμοῦ ἔχει ἐν ψηφίον· ἀν τὸ χαρακτηριστικὸν εἶναι -2, ὁ ἀριθμὸς εἶναι δεκαδικὸς μὲ 2 μηδενικὰ εἰς τὴν ἀρχὴν μαζὶ μὲ τὸ μηδενικὸν τοῦ ἀκεραίου μέρους.

**§ 217.** "Εστω ὅτι εἶναι  $10^{\alpha} = A$ . "Αν πολλαπλασιάσωμεν τὰ ἵσα ταῦτα ἐπὶ δύναμιν τινα τοῦ 10, ἔστω τὴν  $10^{\beta}$ , θὰ ἔχωμεν  $10^{\alpha} \cdot 10^{\beta} = A \cdot 10^{\beta}$  ἢ  $10^{\alpha+\beta} = A \cdot 10^{\beta}$ , καὶ κατὰ τὸν ὄρισμὸν τῶν λογαρίθμων ἔχομεν ὅτι  $\log(A \cdot 10^{\beta}) = \alpha + 3$ . 'Αλλ' ἔχομεν  $\alpha = \log A$ . 'Επομένως εἶναι  $\log(A \cdot 10^{\beta}) = \alpha + 3 = \log A + 3$ .

'Ομοίως, ὃν διαιρέσωμεν π.χ. διὰ τοῦ  $10^{\beta}$  τὰ μέλη τῆς ισότητος  $10^{\alpha} = A$ , εύρισκομεν ὅτι  $\log(A : 10^{\beta}) = \log A - 3$ . "Ητοι :

"Εὰν ἀριθμός τις πολλαπλασιασθῇ ( ἢ διαιρεθῇ ) ἐπὶ τὸν 10, 100, 1000,... ὁ λογάριθμος αὐτοῦ αὐξάνεται ( ἢ ἐλαττοῦται ) κατὰ 1, 2, 3,... δηλ. κατὰ ἀκέραιον ἀριθμὸν καὶ ἐπομένως μόνον τὸ χαρακτηριστικὸν αὐτοῦ μεταβάλλεται.

'Ἐκ τούτων ἔπειται ὅτι :

"Εὰν δύο ἀριθμοὶ ἔχουν τὰ αὐτὰ ψηφία καὶ κατὰ τὴν αὐτὴν τάξιν, διαφέρουν δὲ μόνον ὡς πρὸς τὴν θέσιν τῆς ὑποδιαστολῆς, οἱ λογάριθμοι αὐτῶν διαφέρουν μόνον κατὰ τὰ χαρακτηριστικὰ αὐτῶν.

Π.χ. ὁ λογάριθμος	τοῦ	5	εἶναι	0,69897
	τοῦ	50	εἶναι	1,69897
	τοῦ	500	εἶναι	2,69897
ὁ λογάριθμος	τοῦ	0,5	εἶναι	-1+0,69897
	τοῦ	0,05	εἶναι	-2+0,69897 κ.λ.π.

**Α σκήσεις**

578. Νὰ εύρεθῇ τὸ χαρακτηριστικόν : α') λογ35. β') λογ4 513.  
 γ') λογ9,5, δ') λογ0,80, λογ0,0003, λογ800, λογ8 000,  
 ε') λογ0,00132, λογ132, λογ1 320, στ') λογ397,451, λογ3 974,51, λογ39,  
 ζ') λογ  $\frac{13}{3}$ , η') λογ  $\frac{1}{50}$ , θ') λογ62  $\frac{2}{3}$ , ι') λογ2  $\frac{1}{7}$ , λογ0,5, λογ40.

579. Πόσα ἀκέραια ψηφία ἔχει ἀριθμός, τοῦ ὅποιου ὁ λογάριθμος ἔχει χαρακτηριστικὸν 3, 5, 7, 1, 0, 12;

580. Ποία εἶναι ἡ τάξις τοῦ πρώτου σημαντικοῦ ψηφίου μετά τὴν ὑποδιαστολὴν τοῦ ἀριθμοῦ, τοῦ ὅποιου ὁ λογάριθμος ἔχει χαρακτηριστικὸν -1, -2, -3, -5, -9;

581. Ὁ λογάριθμος τοῦ 80 εἶναι 1,90309. Ποίοι ἀλλοι ἀριθμοὶ ἔχουν τὸ αὐτὸ δεκαδικὸν μέρος τῶν λογαρίθμων των;

582. Ποίον γνώρισμα ἔχει ὁ ἀριθμός, τοῦ ὅποιου ὁ λογάριθμος εἶναι ὁ 0,70586, δ 1,70586, δ -1+0,70586, δ -2+0,70586, δ -3+0,70586, καὶ διατί;

**3. ΤΡΟΠΗ ΑΡΝΗΤΙΚΟΥ ΔΕΚΑΔΙΚΟΥ ΕΙΣ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΡΝΗΤΙΚΟΝ  
ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΘΜΩΝ**

**§ 218.** Ἐκ τοῦ ὁρισμοῦ τοῦ χαρακτηριστικοῦ τοῦ λογαρίθμου ἀριθμοῦ τίνος προκύπτει, ὅτι ὁ λογάριθμος ὑπερβαίνει τὸ χαρακτηριστικόν του, ἀλλ᾽ ἡ διαφορὰ εἶναι μικροτέρα τοῦ 1. Ἡ διαφορὰ αὐτὴ ἐκφράζεται συνήθως μὲν δεκαδικὸν ἀριθμὸν (κατὰ προσέγγισιν) καὶ λέγεται δεκαδικὸν μέρος τοῦ λογαρίθμου εἶναι δὲ θετικὸς ἀριθμός.

Ἐπειδὴ τῶν μικροτέρων τῆς 1 (θετικῶν) ἀριθμῶν ὁ λογάριθμος εἶναι ἀρνητικός, τρέπομεν αὐτὸν εἰς ἄλλον ἵσον του μὲν ἀρνητικὸν μόνον τὸ ἀκέραιον μέρος.

Ἐστω π.χ. ὁ (ὅλως) ἀρνητικός λογάριθμος ἀριθμοῦ τίνος  
 $-2,54327$ . ἦτοι ὁ  $-2-0,54327$ .

Ἐὰν εἰς αὐτὸν προσθέσωμεν τὸν -1 καὶ τὸν +1, εύρισκομεν  
 $-2-1+1-0,54327 = -3+1-0,54327 = -3+1,00000$

$$\begin{array}{r} 0,54327 \\ \hline -3+0,45673 \end{array}$$

τὸν ὅποιον γράφομεν  $\overline{3,45673}$ . δηλαδὴ γράφομεν τὸ -ύπερανω τοῦ ἀκέραιου μέρους, ἵνα δηλώσωμεν ὅτι τοῦτο μόνον εἶναι ἀρνητικόν.

Ὑπὸ τὴν μορφὴν αὐτὴν φαίνεται ὅτι χαρακτηριστικὸν τοῦ λογαρίθμου εἶναι τὸ ἀκέραιον μέρος -3, διότι ὁ λογάριθμος περιλαμβάνεται μεταξὺ τῶν διαδοχικῶν ἀκέραιών -3 καὶ -2 καὶ δεκαδικὸν μέρος τοῦ λογαρίθμου τὸ ἀναγραφόμενον δεκαδικὸν μέρος, διότι τοῦτο εἶναι ἡ διαφορὰ ποὺ προκύπτει ἀν ἀπὸ τὸν λογάριθμον  $-3+0,45673$  ἀφαιρεθῆ τὸ χαρακτηριστικὸν αὐτοῦ -3.

Παρατηροῦμεν ὅτι διὰ νὰ τρέψωμεν λογάριθμον ἀρνητικὸν εἰς ἐν μέρει ἀρνητικόν, αὐξάνομεν τὴν ἀπόλυτον τιμὴν τοῦ ἀκεραίου κατὰ 1 καὶ γράφομεν τὸ — ὑπεράνω τοῦ ἔξαγομένου, δεξιὰ δὲ τούτου γράφομεν ὡς δεκαδικὰ ψηφία τὰς διαφορὰς τῶν δεκαδικῶν ψηφίων τοῦ δοθέντος, τοῦ μὲν τελευταίου ( σημαντικοῦ ) ἀπὸ τὸ 10, τῶν δὲ ἄλλων ἀπὸ τὸ 9.

**Παρατήρησις.** Αἱ πράξεις ἐπὶ τῶν λογαρίθμων γίνονται, καθὼς καὶ οἱ ἐπὶ τῶν δεκαδικῶν σχετικῶν ἀριθμῶν, μὲ παραλλαγάς τινας, ὅταν οἱ λογάριθμοι ἔχουν ἀρνητικὸν χαρακτηριστικόν, καὶ οἱ ὁποῖαι φαίνονται ἐκ τῶν κατωτέρω παραδειγμάτων.

**Πρόσθεσις.** Ἐστω ὅτι ζητεῖται π.χ. τὸ  $2,57834 + \overline{1},67943$ . Τοὺς μὲν δεκαδικοὺς προσθέτομεν ὡς συνήθως, ὅταν δὲ φθάσωμεν εἰς τὴν πρόσθεσιν τῶν ἀκεραίων λέγομεν: 1 τὸ κρατούμενον καὶ 2 = 3 καὶ —1 = 2 Οὕτως εύρισκομεν ἀθροισμα 2,25777.

Ἐστω ὅτι ζητεῖται τὸ ἀθροισμα

$$\overline{2},85643 + 2,24482 + \overline{3},42105 + \overline{1},24207$$

Γράφομεν τοὺς προσθέτους ὡς κατωτέρω πρὸς εὐκολίαν καὶ ἀκολούθως προσθέτομεν τὰ ψηφία ὡς συνήθως

$$\overline{2},85643$$

$$\overline{2},24482$$

$$\overline{3},42105$$

$$\overline{1},24207$$

$$\overline{3},76437$$

Οταν φθάσωμεν εἰς τὴν πρόσθεσιν τῶν ἀκεραίων λέγομεν: 1 τὸ κρατούμενον καὶ —1 = 0 καὶ —3 ἵσον —3 καὶ 2 ἵσον —1 καὶ —2 ἵσον —3. Οὕτω δὲ εύρισκομεν ἀθροισμα  $\overline{3},76437$ .

**Αφαίρεσις.** Ἐστω ὅτι ζητεῖται ἡ διαφορὰ  $\overline{5},67893 - \overline{8},75928$ . Τοὺς μὲν δεκαδικοὺς ἀφαιροῦμεν ὡς συνήθως, ὅταν δὲ φθάσωμεν εἰς τοὺς ἀκεραίους λέγομεν: 1 τὸ κρατούμενον καὶ —8 ἵσον —7, διὰ τὴν ἀφαίρεσιν γίνεται +7 καὶ σὺν —5 ἵσον 2. Ἐπομένως ἡ διαφορὰ εἶναι 2,91965.

**Πολλαπλασιασμὸς ἐπιάκεραιον.** Ἐστω ὅτι ζητοῦμεν τὸ  $\overline{5},62893 \cdot 3$ . Ἐχομεν  $\overline{5},62893 \cdot 3 = -5 \cdot 3 + 0,62893 \cdot 3 = -15 + 1,88679 = \overline{14},88679$ .

**Διαίρεσις διὸ ἀκεραίου.** Ἐστω ὅτι ζητοῦμεν τὸ πηλίκον π.χ. τοῦ  $\overline{5},62891:3$ . Παρατηροῦμεν ὅτι εἶναι  $\overline{5},62891:3 = (-5 + 0,62891):3 = (-5 - 1 + 1 + 0,62891):3 = (-6 + 1,62891):3 = -2 + 0,54297 =$

=2,54297. Έπειδή ό  $\overline{\text{άρνητικός}}$   $\overline{\text{άκεραιος}}$  τοῦ διαιρετέου δὲν διαιρεῖται  $\overline{\text{άκριβῶς}}$  διὰ τοῦ διαιρέτου,  $\overline{\text{άφαιροῦμεν}}$  ἀπ' αὐτὸν καὶ προσθέτομεν περαιτέρω τὰς  $\overline{\text{ἀπαιτουμένας}}$  μονάδας, οὐα καταστῇ διαιρετός, καὶ  $\overline{\text{άκολούθως}}$   $\overline{\text{έκτελοῦμεν}}$  τὴν διαιρεσιν.

$$\begin{aligned} \text{Όμοίως διὰ τὴν διαιρεσιν π.χ. } & \overline{4,67837:9} \text{ εἶχομεν } \overline{4,67837:9} = \\ & = (-4+0,67837):9 = (-4-5+5+0,67837):9 = \\ & = (-9+5,67837):9 = -1+0,63093 \text{ ή } \overline{1,63093}. \end{aligned}$$

### Α σκήσεις

583. Νὰ προστεθοῦν οἱ ἀριθμοὶ 2,34987,  $\overline{6,97852}$ , 9,82057.  
 584. Νὰ  $\overline{\text{άφαιρεθῇ}}$  δ  $\overline{3,98090}$  ἀπὸ  $\overline{8,30457}$ , δ  $\overline{9,93726}$  ἀπὸ τὸν  $\overline{3,86565}$ .  
 585. Νὰ πολλαπλασιασθῇ δ  $\overline{9,30942}$  ἐπὶ 3, 7, 42.  
 586. Νὰ εύρεθοῦν τὰ πηλίκα μέ 5 δεκαδικὰ ψηφία τοῦ  $\overline{9,93642}$  διὰ 8, 9, 12.

#### 4. ΛΟΓΑΡΙΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΙΝ

**§ 219.** Καλοῦμεν λογάριθμον ἀριθμοῦ κατὰ **προσέγγισιν μονάδος** ή κατὰ **προσέγγισιν 0,1** ή **0,01** ή **0,001...** τὸν μικρότερον τῶν ἐκθετῶν δύο δυνάμεων τοῦ 10, μεταξὺ τῶν ὃποιών περιέχεται ὁ ἀριθμός, καὶ οἵτινες (ἐκθέται) διαφέρουν κατὰ 1 ή 0,1 ή 0,01 ή 0,001...

Οὕτως ἔὰν εἶχωμεν  $10^p < A < 10^{p+1}$  (ἐνῷ τὸ ρ εἶναι ἀκέραιος), τὸ ρ λέγεται λογάριθμος τοῦ A κατὰ προσέγγισιν μονάδος· ἡτοι τὸ ρ εἶναι τὸ ἀκέραιον μέρος τοῦ λογαρίθμου τοῦ A.

"Αν εἶχωμεν  $10^{\frac{x}{10}} < A < 10^{\frac{x+1}{10}}$ , τὸ  $\frac{x}{10}$  λέγεται λογάριθμος τοῦ A κατὰ προσέγγισιν 0,1 κ.ο.κ.

"Εστω ὅτι  $\zeta$  ητεῖται ὁ λογA κατὰ προσέγγισιν 0,1. "Αν παραστήσωμεν τὸν  $\zeta$  ητούμενον ἀριθμὸ μὲ  $\frac{x}{10}$ , θὰ εἶχωμεν

$$10^{\frac{x}{10}} < A < 10^{\frac{x+1}{10}}$$

'Ψοῦμεν τὰ ἄνισα εἰς τὴν δεκάτην δύναμιν καὶ εύρισκομεν

$$10^x < A^{10} < 10^{x+1}$$

'Αλλ' ἐκ τῆς σχέσεως ταύτης παρατηροῦμεν ὅτι τὸ x εἶναι τὸ ἀκέραιον μέρος τοῦ λογαρίθμου τοῦ  $A^{10}$ .

Όμοιώς έργαζόμεθα, όντας ζητούμεν τὸν λογάριθμον ἀριθμοῦ κατὰ προσέγγισιν 0,01 ή 0,001 ... Ἐπομένως :

Διὰ νὰ εὔρωμεν τὸν λογάριθμον ἀριθμοῦ κατὰ προσέγγισιν 0,1 ή 0,01. . . , ἀρκεῖ νὰ υψώσωμεν τὸν ἀριθμὸν εἰς τὴν 10ην ή εἰς τὴν 100ην . . . δύναμιν, τοῦ ἔξαγομένου δὲ νὰ εὔρωμεν τὸ ἀκέραιον μέρος τοῦ λογαρίθμου αὐτοῦ καὶ τοῦτο νὰ διαιρέσωμεν διὰ 10 ή 100 . . .

Κατὰ ταῦτα δυνάμεθα νὰ εὔρωμεν τὸ ἀκέραιον μέρος καὶ ὁσαδήποτε δεκαδικὰ ψηφία τοῦ λογαρίθμου ἐνὸς ἀριθμοῦ. Π.χ. ὃν δοθῆ ἀριθμός τις A καὶ θέλωμεν νὰ εὔρωμεν δύο δεκαδικὰ ψηφία τοῦ λογαρίθμου του, υψώνομεν τὸν A εἰς τὴν 100ην δύναμιν καὶ εύρισκομεν τὸ χαρακτηριστικὸν τοῦ A<sup>100</sup>, δηλαδὴ τὸ πλῆθος τῶν ἀκεραίων ψηφίων τοῦ A<sup>100</sup> ἥλαττωμένον κατὰ μονάδα καὶ αὐτὸ τὸ χαρακτηριστικὸν θὰ τὸ θεωρήσωμεν ὡς σύνολον ἑκατοστῶν τοῦ ζητουμένου λογαρίθμου.

## 5. ΠΕΡΙ ΛΟΓΑΡΙΘΜΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

**§ 220.** Ἐνῷ, ὡς εἴδομεν, δυνάμεθα νὰ εὔρωμεν τὸ ἀκέραιον μέρος καὶ ὁσαδήποτε δεκαδικὰ ψηφία θέλομεν τοῦ λογαρίθμου ἐνὸς ἀριθμοῦ, ἐν τούτοις ή μέθοδος αὐτὴ εἶναι λίαν μακρὰ καὶ ἐπίμονος. Διὰ τοῦτο ὑπάρχουν πίνακες, οἱ δόποιοι λέγονται λογαριθμικοὶ πίνακες, περιέχοντες τοὺς λογαρίθμους τῶν ἀκεραίων ἀριθμῶν ἀπὸ τῆς μονάδος καὶ ἔξῆς μέχρι τινός. Ἐπειδὴ τὸ χαρακτηριστικὸν λογαρίθμου δοθέντος ἀριθμοῦ εύρισκεται εὐκόλως, οἱ πίνακες περιέχουν ἑκάστου λογαρίθμου τὸ δεκαδικὸν μέρος μὲ ἀρκετὰ δεκαδικὰ ψηφία.

Συνήθως μεταχειρίζόμεθα πίνακας μὲ πέντε δεκαδικὰ ψηφία, ή δὲ διάταξις αὐτῶν φαίνεται ἐκ τοῦ ἐπομένου πίνακος (ληφθέντος ἐκ τῆς γαλλικῆς ἐκδόσεως τοῦ J. Dupuis).

Τὸ μὲν σύνολον τῶν δεκάδων τῶν ἀριθμῶν εἶναι γραμμένον εἰς τὴν πρώτην στήλην, εἰς τὴν κορυφὴν τῆς ὅποιας ὑπάρχει τὸ γράμμα N (Nombres), τὸ δὲ ψηφίον τῶν μονάδων αὐτῶν εἰς τὴν ὄριζοντίαν σειρὰν μετὰ τὸ N. Ο λογάριθμος ἑκάστου ἀριθμοῦ εύρισκεται εἰς τὴν διασταύρωσιν τῆς γραμμῆς τοῦ ψηφίου τῶν μονάδων καὶ τοῦ συνόλου τῶν δεκάδων τοῦ ἀριθμοῦ.

Ἐπειδὴ πολλοὶ ἐφεξῆς ἀριθμοὶ ἔχουν τὰ δύο πρῶτα ψηφία τῶν

λογαρίθμων αύτῶν κοινά, γράφονται ταῦτα ἀπαξ μόνον καὶ νοοῦνται ἐπαναλαμβανόμενα τὰ αὐτά, μέχρις ὅτου ἀλλαχθοῦν.

Ο ἀστερίσκος, ὁ δποῖος ἐνιαχοῦ ἀπαντᾷ εἰς τοὺς πίνακας, σημαίνει ὅτι τὰ παραλειπόμενα δύο πρῶτα ψηφία ἥλλαξαν καὶ πρέπει νὰ λάβωμεν τὰ ἀμέσως ἐπόμενα. Κατὰ ταῦτα ἔχομεν ὅτι: λογ500=2,69897, λογ5000=3,69897, λογ5017=3,70044, λογ5063=3,70441, λογ5129=3,71003.

N	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>500</b>	69897	906	914	923	932	940	949	958	966	975
1	984	922	*001	010	*018	027	*036	*044	053	*062
2	70070	079	088	096	105	114	122	131	140	148
3	157	165	174	183	191	200	209	217	226	234
4	243	252	260	269	278	286	295	303	312	321
5	329	338	346	355	364	372	381	389	398	406
6	415	424	432	441	449	458	467	475	484	492
7	501	509	518	526	535	544	552	561	569	578
8	586	595	603	612	621	629	638	646	655	663
9	672	680	689	697	706	714	723	731	740	749
<b>510</b>	757	766	774	783	791	800	808	817	825	834
1	842	851	859	768	876	885	893	902	910	919
2	927	935	944	952	961	969	978	986	955	*003

Τοὺς λογαριθμικοὺς πίνακας μεταχειρίζόμεθα κατὰ τὰς ἑξῆς δύο περιπτώσεις :

1ον. "Οταν δοθέντος ἀριθμοῦ τινος θέλωμεν νὰ εὕρωμεν τὸν λογάριθμον αὐτοῦ.

2ον. "Οταν δοθέντος λογαρίθμου τινὸς θέλωμεν νὰ εὕρωμεν τὸν ἀντιστοιχοῦντα εἰς αὐτὸν ἀριθμόν.

Ιη περίπτωσις. α') 'Ἐὰν ὁ δοθεὶς ἀριθμὸς δὲν ἔχῃ περισσότερα τῶν τεσσάρων ψηφία, τὸ δεκαδικὸν μέρος τοῦ λογαρίθμου αὐτοῦ ὑπάρχει εἰς τοὺς πίνακας καὶ εύρισκομεν αὐτὸ ὡς εἰδομεν ἀνωτέρῳ.

β') "Ἐστω ὅτι ὁ δοθεὶς ἀριθμός, τοῦ ὄποιού ζητεῖται ὁ λογάριθμος, ἔχει δύο ψηφία περισσότερα τῶν τεσσάρων, π.χ. ὁ 507356.

Τὸ χαρακτηριστικὸν τοῦ ζητούμενου λογαρίθμου εἶναι 5, χωρίζοντες δὲ τὰ τέσσαρα πρῶτα ψηφία δι' ὑποδιαστολῆς, ἔχομεν τὸν

άριθμὸν 5073,56. Ἐπειδή, ώς εἶναι γνωστόν, τὸ δεκαδικὸν μέρος τοῦ λογαρίθμου τοῦ ἀριθμοῦ τούτου καὶ τοῦ διθέντος εἶναι τὸ αὐτό, ἔπειται ὅτι ἀρκεῖ νὰ εὑρωμεν τὸ δεκαδικὸν μέρος τοῦ λογαρίθμου τοῦ ἀριθμοῦ 5073,56. Ἀλλ’ αὐτὸς περιλαμβάνεται μεταξὺ τῶν 5073 καὶ 5074. Ἀρα καὶ ὁ λογάριθμος τοῦ 5073,56 θὰ περιέχεται μεταξὺ τῶν λογαρίθμων τῶν ἀριθμῶν 5073 καὶ 5074. Ἐκ τῶν πινάκων εύρισκομεν ὅτι  $\lambda\circ\gamma 5073=3,70526$  καὶ  $\lambda\circ\gamma 5074=3,70535$ .

Ἡ διαφορὰ τῶν δύο τούτων λογαρίθμων εἶναι 9 ἑκατοστὰ τοῦ χιλιοστοῦ. Τώρα δεχόμεθα ὅτι :

Αἱ μεταβολαὶ τῶν λογαρίθμων εἶναι ἀνάλογοι πρὸς τὰς μεταβολὰς τῶν ἀριθμῶν (κατὰ προσέγγισιν, ὅταν αἱ μεταβολαὶ τῶν ἀριθμῶν εἶναι μικρότεραι τῆς μονάδος) καὶ ἀντιστρόφως.

Παρατηροῦμεν λοιπὸν ὅτι, ὅταν ὁ ἀριθμὸς ἀπὸ 65073 αὔξηθῇ κατὰ 1 καὶ γίνῃ 5074, ὁ λογάριθμος αὔξανεται κατὰ 9 μονάδας τῆς πέμπτης δεκαδικῆς τάξεως. Ὅταν ὁ ἀριθμὸς αὔξηθῇ κατὰ 0,56 διὰ νὰ γίνῃ 5073,56, ὁ λογάριθμος αὐτοῦ θὰ αὔξηθῇ κατὰ  $9 \times 0,56 = 5,04$  ἥ κατὰ 5 περίπου ἑκατοστὰ τοῦ χιλιοστοῦ.

“Ωστε πρέπει εἰς τὸν λογάριθμον 3,70526 νὰ προσθέσωμεν 5 ἑκατοστὰ τοῦ χιλιοστοῦ, ἵνα ἔχωμεν τὸν λογάριθμον τοῦ 5073,56 Ἐκτελοῦντες τὴν πρόσθεσιν εύρισκομεν ὅτι  $\lambda\circ\gamma 5073,56 = 70531$ . Ἀρα ὁ  $\lambda\circ\gamma 507356 = 5,70531$ .

Ἐάν ὁ διθεὶς ἀριθμὸς εἶναι 5,07356, τὸ μὲν χαρακτηριστικὸν τοῦ λογαρίθμου αὐτοῦ θὰ εἶναι 0, τὸ δὲ δεκαδικὸν μέρος τούτου θὰ εἶναι τὸ αὐτὸ πρὸς τὸ τοῦ λογαρίθμου τοῦ 507356. Ἐπομένως θὰ ἔχωμεν  $\lambda\circ\gamma 5,07356 = 0,70531$ .

*2a περίπτωσις, α'* Ἐάν τὸ δεκαδικὸν μέρος τοῦ διθέντος λογαρίθμου εύρισκεται εἰς τοὺς πίνακας, σχηματίζομεν τὸν ἀριθμόν, ὁ ὁποῖος ἔχει ψηφίον τῶν μονάδων, τὸ εύρισκόμενον εἰς τὴν ἀρχὴν τῆς στήλης, εἰς τὴν ὅποιαν εύρισκεται τὸ δεκαδικὸν μέρος, καὶ σύνολον δεκάδων ὁ ἀριθμός, ὁ εύρισκόμενος εἰς τὴν ἀρχὴν (ἀριστερὰ τῆς γραμμῆς, εἰς τὴν δόποιαν εύρισκεται τὸ δεκαδικὸν μέρος).

Π.χ. ἂν ὁ διθεὶς λογάριθμος εἶναι 3,70140, τὸ δεκαδικὸν μέρος 0,70140 εύρισκεται εἰς τὸν ἀνωτέρῳ πίνακα καὶ ὁ ἀντίστοιχος ὀριθμὸς εἶναι ὁ 5 028. Ἐπειδὴ τὸ χαρακτηριστικὸν εἶναι 3, ὁ ἀντίστοιχος ἀριθμὸς ἔχει τέσσαρα ἀκέραια ψηφία· ἄρα εἶναι ἀκριβῶς ὁ 5 028.

Καθ' ὅμοιον τρόπον εύρισκομεν ὅτι εἰς τὸν λογάριθμον π.χ. 1,70552 ἀντιστοιχεῖ ὁ ἀριθμὸς 0,5076. Εἰς τὸν λογάριθμον 0,70995 ἀντιστοιχεῖ ὁ ἀριθμὸς 5,128.

β') "Εστω ὅτι δίδεται π.χ. ὁ λογάριθμος 2,70169 καὶ ζητεῖται ὁ ἀντιστοιχῶν εἰς αὐτὸν ἀριθμός. Παρατηροῦμεν ὅτι τὸ δεκαδικὸν μέρος τοῦ διθέντος λογαρίθμου ἀναζητούμενον εἰς τοὺς πίνακας εὐρίσκεται μεταξύ τοῦ 0,70165 καὶ τοῦ 0,70174, εἰς τοὺς δόποιούς ἀντιστοιχοῦν οἱ ἀριθμοὶ 5 031 καὶ 5 032· καὶ οἱ μὲν λογάριθμοι τούτων διαφέρουν κατὰ 9 μονάδας τῆς πέμπτης δεκαδικῆς τάξεως, οἱ δὲ ἀριθμοὶ κατὰ 1.

Τώρα σκεπτόμεθα ὡς ἔξῆς :

"Αν ὁ λογάριθμος τοῦ 5 031, δ ὁ δόποιος εἶναι 3,70165, αὐξηθῇ κατὰ 9 μονάδας τῆς πέμπτης δεκαδικῆς τάξεως ὁ ἀριθμὸς αὐξάνεται κατὰ 1. "Αν ὁ λογάριθμος αὐξηθῇ κατὰ 4 μονάδας τῆς πέμπτης δεκαδικῆς τάξεως καὶ γίνῃ 3,70169, ὁ ἀριθμὸς θὰ αὐξηθῇ κατὰ  $\frac{4}{9}$  τῆς μονάδος, ἢτοι κατὰ 0,44.... "Ωστε ὁ ἀριθμός, τοῦ δόποιού τὸ δεκαδικὸν μέρος εἶναι 0,70169, θὰ εἶναι ὁ 5031,44... ἐπειδὴ τὸ χαρακτηριστικὸν τοῦ διθέντος λογαρίθμου εἶναι 2, ὁ ἀντίστοιχος ἀριθμὸς ἔχει τρία ἀκέραια ψηφία. "Αρα εἶναι ὁ 503,144.

### Α σ κ η σ εις

587. Νὰ εύρεθοῦν οἱ λογάριθμοι τῶν ἀριθμῶν :

0,003817, 1,141, 0,0845, 107,3, 1 203, 13,07, 0,0004124.

588. Νὰ εύρεθοῦν οἱ λογάριθμοι τῶν ἀριθμῶν :

Ⓐ) 95,348. Ⓑ) 6,8372. Ⓒ) 0,98629. Ⓓ)  $968\frac{3}{8}$ , Ⓔ) 0,0364598.

Ⓒ) 6,3347. Ⓑ) 326,537 Ⓒ) 5278,37. Ⓓ) 15389,45.

589. Νὰ εύρεθῇ ὁ χ ἐκ τοῦ δεδομένου κατωτέρω λογαρίθμου αὐτοῦ :

Ⓐ)  $\log x = 0,63147$ . Ⓑ)  $\log x = 1,72127$ . Ⓒ)  $\log x = 0,68708$ .

Ⓓ)  $\log x = 3,92836$ . Ⓑ)  $\log x = 4,38221$ . Ⓒ)  $\log x = 3,70032$ .

### 6. ΕΦΑΡΜΟΓΑΙ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΘΜΩΝ

§ 221. Μὲ τὴν χρῆσιν τῶν λογαρίθμων δυνάμεθα νὰ ἀναγάγωμεν τὸν πολλαπλασιασμὸν ἀριθμῶν εἰς τὴν πρόσθεσιν ἄλλων ἀριθμῶν,

τὴν διαίρεσιν ἀριθμῶν εἰς τὴν ἀφαίρεσιν, τὴν ὑψωσιν εἰς δύναμιν εἰς πολλαπλασιασμὸν καὶ τὴν ἔξαγωγὴν ρίζης εἰς διαίρεσιν.

Πράγματι, ἐν ζητούμεν π.χ. τὸ γινόμενον δύο ἢ περισσοτέρων ἀριθμῶν, εύρισκομεν τοὺς λογαρίθμους τῶν ἀριθμῶν τούτων καὶ προσθέτομεν τούτους. Τὸ ἄθροισμα, τὸ δποῖον θὰ εὔρωμεν, θὰ εἴναι ὁ λογάριθμος τοῦ γινομένου τῶν ἀριθμῶν. Εύρισκομεν ἀκολούθως ἐκ τοῦ εύρεθέντος λογαρίθμου τὸν ἀντιστοιχοῦντα εἰς τοῦτον ἀριθμόν. Οὗτος θὰ παριστάνῃ προφανῶς τὸ ζητούμενον γινόμενον.

1ον. Νὰ εύρεθῇ τὸ γινόμενον  $-908,4 \times 0,05392 \times 2,117$ .

Ἐὰν παραστήσωμεν τὴν ἀπόλυτον τιμὴν τοῦ γινομένου μὲ x καὶ λάβωμεν τοὺς λογαρίθμους τῶν ἵσων, εύρισκομεν

$$\lambda\text{oy}_x = \lambda\text{oy}908,4 + \lambda\text{oy}0,05392 + \lambda\text{oy}2,117.$$

Ἐκ τῶν πινάκων ἔχομεν ὅτι

$$\lambda\text{oy}908,4 = 2,95828, \quad \lambda\text{oy}0,05392 = 2,73175, \quad \lambda\text{oy}2,117 = 0,32572$$

Μὲ πρόσθεσιν τούτων προκύπτει ὅτι  $\lambda\text{oy}_x = 2,01575$ .

Ο ἀντίστοιχος ἀριθμός τοῦ λογαρίθμου τούτου εἴναι ὁ 103,693, ἐπειδὴ δὲ τὸ ζητούμενον γινόμενον εἴναι ἀρνητικόν, θὰ εἴναι τοῦτο -103,693.

2ον. Νὰ εύρεθῇ ὁ x, ἐὰν εἴναι  $x = \frac{7,56 \times 4667 \times 567}{899,1 \times 0,00337 \times 23435}$ .

Ἐὰν λάβωμεν τοὺς λογαρίθμους τῶν δύο ἵσων, ἔχομεν

$$\lambda\text{oy}_x = \lambda\text{oy}7,56 + \lambda\text{oy}4667 + \lambda\text{oy}567$$

$$-\lambda\text{oy}899,1 - \lambda\text{oy}0,00337 - \lambda\text{oy}23435$$

Ἐκ τῶν πινάκων εύρισκομεν

$$\lambda\text{oy}7,56 = 0,87852 \quad \lambda\text{oy}899,1 = 2,95381$$

$$\lambda\text{oy}4667 = 3,66904 \quad \lambda\text{oy}0,00337 = 3,52763$$

$$\lambda\text{oy}567 = 2,75358 \quad \lambda\text{oy}23435 = 4,36986$$

Μετὰ τὴν πρόσθεσιν τῶν ἀνωτέρω εύρισκομεν

$$\lambda\text{oy}7,56 + \lambda\text{oy}4667 + \lambda\text{oy}567 = 7,30114$$

$$\lambda\text{oy}899,1 + \lambda\text{oy}0,00337 + \lambda\text{oy}23435 = 4,85130$$

Μετὰ τὴν ἀφαίρεσιν προκύπτει  $\lambda\text{oy}_x = 2,44984$  καὶ εύρισκοντες τὸν ἀντίστοιχον τούτου ἀριθμὸν ἔχομεν  $x = 281,73$ .

3ον. Νὰ εύρεθῇ ἡ τετραγωνικὴ ρίζα τοῦ 0,000043461.

Ἐὰν θέσωμεν  $x = \sqrt{0,000043461}$  καὶ λάβωμεν τοὺς λογαρίθμους

τῶν Ἰσων, εύρισκομεν λογ $x = \frac{1}{2} \log 0,000043461$  ή λογ $x = \frac{1}{2} \cdot \overline{5,63810}$

ή λογ $x = \overline{3,81905}$ , ἐκ τοῦ ὀποίου ἔπειται  $x = 0,0065925$ .

4ον. Νὰ εύρεθῇ ἡ τιμὴ τοῦ  $x$  ἐκ τῆς Ἰσότητος  $81^x = 10$ .

Λαμβάνοντες τοὺς λογαρίθμους τῶν Ἰσων ἔχομεν

$\log 81^x = \log 10$ , ή  $x \cdot \log 81 = \log 10 = 1$ .

"Αρα  $x = \frac{1}{\log 81}$  ή  $x = \frac{1}{1,90849} = \frac{100000}{190849} = 0,52397$ . Ἡτοι  $x = 0,52397$ .

### Άσκησεις

590. Νὰ εύρεθοῦν τὰ ἔξαγόμενα τῶν κάτωθι παραστάσεων διὰ τῶν λογαρίθμων: α') 0,4326<sup>3</sup>, β')  $\sqrt[3]{12}$ , γ')  $\sqrt[5]{0,07776}$ , δ')  $\sqrt[5]{13}$ ,

ε')  $-875,6348 \times 62,82407$ , στ')  $\sqrt[125]{3696} : 0,0893462$ .

591. Νὰ εύρεθῃ τὸ μῆκος τῆς περιφερείας κύκλου, τοῦ ὀποίου ἡ διάμετρος ἔχει μῆκος 2,51075 δακτύλους.

592. Νὰ παρεμβληθοῦν 8 ἀριθμοὶ μεταξὺ τῶν 12 καὶ 23437500, ὥστε νὰ ἀποτελεσθῇ γεωμετρικὴ πρόοδος.

593. Νὰ εύρεθῇ ἡ διάρκεια τῆς πτώσεως σώματος πίπτοντος εἰς τὸ κενὸν ἄνευ ἀρχικῆς ταχύτητος ἀπὸ ὑψους 4 810 μ. τῆς κορυφῆς τοῦ Λευκοῦ ὄρους.

### 7. ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΒΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΘΜΩΝ

§ 222. "Αν ἔχωμεν  $\alpha^x = A$ , τὸ  $x$  καλεῖται λογάριθμος τοῦ  $A$  ὡς πρὸς βάσιν  $\alpha$  καὶ σημειώνεται συμβολικῶς λογ $\alpha A=x$ .

"Εστω ὅτι ζητοῦμεν τὸν λογάριθμον τοῦ  $A$  ὡς πρὸς ἄλλην βάσιν, ἔστω  $\beta$ .

Λαμβάνοντες τοὺς λογαρίθμους ὡς πρὸς  $\beta$  τῶν μελῶν τῆς Ἰσότητος  $\alpha^x = A$  εύρισκομεν λογ $\beta$  ( $\alpha^x$ ) = λογ $\beta A$  ή  $x \cdot \log \alpha = \log \beta A$ . Θέτοντες ἀντὶ τοῦ  $x$  τὸ Ἰσον του λογ $\alpha A$ , εύρισκομεν λογ $\alpha A \cdot \log \beta = \log \beta A$ . Ἡτοι :

"Οταν γνωρίζωμεν τὸν λογάριθμον ἀριθμοῦ ὡς πρὸς βάσιν  $\alpha$  π.χ. καὶ θέλομεν τὸν λογάριθμόν του ὡς πρὸς βάσιν  $\beta$ , πολλαπλασιάζομεν τὸν γνωστὸν λογάριθμον ( ὡς πρὸς βάσιν  $\alpha$  ) ἐπὶ τὸν λογάριθμον τῆς βάσεως  $\alpha$  ὡς πρὸς τὴν βάσιν  $\beta$ .

Κατὰ ταῦτα, ἂν ἔχωμεν τοὺς λογαρίθμους τῶν ἀριθμῶν ὡς πρὸς βάσιν 10, εύρισκομεν τοὺς νεπερίους λογαρίθμους αὐτῶν ( ὡς πρὸς βάσιν τὸν e), ἂν τοὺς γνωστοὺς λογαρίθμους των πολλαπλασιάσω-

μεν ἐπὶ λογ<sub>ε</sub> 10 καὶ ἀντιστρόφως ἐκ τοῦ νεπερίου λογαρίθμου ἐνὸς ἀριθμοῦ εύρισκεται ὁ λογάριθμος αὐτοῦ ὡς πρὸς βάσιν 10 μέ πολλαπλασιασμὸν τοῦ νεπερίου ἐπὶ λογ<sub>10</sub>.

Παρατηρητέον ὅτι εἶναι λογ<sub>β</sub> α·λογ<sub>α</sub> β=1. Διότι ὡς ἀνωτέρω εἶναι λογ<sub>β</sub>Α=λογ<sub>α</sub>Α·λογ<sub>β</sub> καὶ ὁμοίως λογ<sub>α</sub>Α=λογ<sub>β</sub>Α·λογ<sub>α</sub>β καὶ πολλαπλασιάζοντες τὰς ἴσοτητας αὐτὰς κατὰ μέλη εύρισκομεν λογ<sub>β</sub>Α·λογ<sub>α</sub>Α=λογ<sub>β</sub>Α·λογ<sub>α</sub>Α·λογ<sub>β</sub>α·λογ<sub>α</sub>β ἢ 1=λογ<sub>β</sub>α·λογ<sub>α</sub>β

$$\text{Ἐπομένως εἶναι καὶ } \lambda\log_{\beta}\alpha = \frac{1}{\lambda\log_{\alpha}\beta}.$$

Κατὰ ταῦτα, ἂν γνωρίζωμεν τὸν λογάριθμον ( ὡς πρὸς βάσιν 10) τοῦ ἀριθμοῦ  $e=2,718281828\dots$ , δυνάμεθα νὰ εὔρωμεν ἀπὸ τὸν λογάριθμον τοῦ ἀριθμοῦ ὡς πρὸς βάσιν 10 τὸν νεπέριον λογάριθμὸν του μὲ πολλαπλασιασμὸν τοῦ λογαρίθμου του ἐπὶ τὸν  $\frac{1}{\lambda\log_{10}e}$ , ὁ ὅποιος ἴσοῦται μὲ 0,434294481...

**Σημείωσις.** Καλοῦμεν συλλογάριθμον ἀριθμοῦ τινος τὸν λογάριθμον τοῦ ἀντιστρόφου του ἀριθμοῦ.

Οὗτως εἶναι συλλογα=λογ<sub>α</sub>=λογ<sub>β</sub> α=−λογ<sub>α</sub>. Ἡτοι ὁ συλλογάριθμος ἀριθμοῦ ἴσοῦται μὲ τὸν ἀντίθετον τοῦ λογαρίθμου τοῦ ἀριθμοῦ.

### Γ' ΠΕΡΙ ΕΚΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΘΜΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ

**§ 223.** Καλοῦμεν ἔκθετικὴν ἔξισωσιν τὴν ἔξισωσιν, εἰς τὴν ὅποιαν ὁ ἄγνωστος ὑπάρχει εἰς τὸν ἔκθέτην δυνάμεως, ἔχουσης βάσιν ἀριθμὸν τινα ἢ παράστασιν γνωστὴν  $\neq 0$ .

Π.χ. ἔκθετικὴ ἔξισωσις εἶναι αἱ  $5^{x^2-2x+2}=1$ ,  $\alpha^{x^2+3}=\alpha^2$ .

Τὰς μέχρι τοῦδε γνωστὰς ἔξισώσεις καλοῦμεν ἀλγεβρικὰς πρὸς διάκρισιν αὐτῶν ἀπὸ τῶν ἔκθετικῶν .

**Λύσις** ἔκθετικῆς ἔξισώσεως λέγεται ἡ εὔρεσις τῶν τιμῶν τῶν ἄγνωστων αὐτῆς, αἱ ὅποιαι τὴν ἐπαληθεύουν.

Ἡ λύσις ἔκθετικῆς ἔξισώσεως ἀνάγεται ἐνίστε εἰς τὴν λύσιν ἀλγεβρικῆς. Τοῦτο γίνεται κυρίως, ὅταν δυνάμεθα νὰ εὔρωμεν ἔξισωσιν ἰσοδύναμον τῆς διθείσης μὲ ἐν μέλος της τὴν 1, τὸ δὲ ἄλλο δύναμιν ἀριθμοῦ τινος ἢ παραστάσεως γνωστῆς  $\neq 0$ , τῆς ὅποιας ὁ ἔκθέτης περιέχει ἄγνωστον τῆς διθείσης ἔξισώσεως.

"Εστω πρός λύσιν π.χ. ή έκθετική έξισωσις  $3^{3x} = \frac{1}{27}$ .

Πολλαπλασιάζοντες τὰ μέλη ταύτης ἐπὶ 27 εύρισκομεν  $3^{3x} \cdot 27 = 1$  ή  $3^{3x} \cdot 3^3 = 1$  ή  $3^{3x+3} = 1$  ή  $3^{3x+3} = 3^0$  (έπειδὴ  $3^0 = 1$ ).

'Εκ ταύτης ἔχομεν (έπειδὴ ίσαι δυνάμεις ίσων βάσεων  $\neq 1$  θὰ ἔχουν καὶ έκθέτας ίσους)  $3x+3=0$ , ἐξ ἣς εύρισκομεν  $x=-1$ .

"Εστω πρός λύσιν ή έξισωσις  $2^{x-1} - 2^{x-3} = 3^{x-3} + 3^{x-4}$ .

'Απ' αὐτὴν εύκόλως εύρισκομεν  $\frac{2^{x-1} - 2^{x-3}}{3^{x-3} + 3^{x-4}} = \frac{2 \cdot 2^{-1} - 2 \cdot 2^{-3}}{3 \cdot 3^{-3} + 3 \cdot 3^{-4}} = 1$

$$\text{ή } \frac{2^x \cdot \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{8}\right)}{3^x \cdot \left(\frac{1}{27} + \frac{1}{81}\right)} = \frac{\frac{3}{8}2^x}{\frac{4}{81}3^x} = \frac{3 \cdot 81 \cdot 2^x}{4 \cdot 8 \cdot 3^x} = \frac{3^5 \cdot 2^x}{2^5 \cdot 3^x} = \frac{2^x \cdot 2^{-5}}{3^x \cdot 3^{-5}} = \frac{2^{x-5}}{3^{x-5}} = 1$$

$$\text{ή } \left(\frac{2}{3}\right)^{x-5} = 1 = \left(\frac{2}{3}\right)^0, \text{ ἐξ } \text{ής } \text{ἔχομεν } x-5=0 \text{ καὶ } x=5.$$

"Εστω ἀκόμη πρός λύσιν ή έκθετική έξισωσις  $\alpha^{(\beta-x)x} = \alpha^x$ , ἐνῷ ύποτίθεται ὅτι εἶναι τὸ  $\alpha \neq \tauῆς 1$ . Διὰ νὰ εἶναι τότε αἱ δύο δυνάμεις τοῦ  $\alpha$  ίσαι πρέπει καὶ ἀρκεῖ νὰ εἶναι οἱ έκθέται αὐτῶν ίσοι.

"Εξισοῦντες τοὺς έκθέτας τῶν δυνάμεων τοῦ  $\alpha$  ἔχομεν

$$(\beta-x)x=x \quad \text{ἢ} \quad x^2+x-\beta x=0,$$

ἐκ τῆς λύσεως δὲ ταύτης εύρισκομεν  $x=0$  καὶ  $\beta-1$ .

**§ 224.** Κατ' ἀνάλογον τρόπον δρίζεται καὶ σύστημα έκθετικῶν έξισώσεων μὲ δύο η περισσοτέρους ἀγνώστους, καθὼς καὶ ή λύσις αὐτοῦ.

"Εστω πρός λύσιν τὸ σύστημα  $\begin{cases} \alpha^x \cdot \alpha^\psi = \alpha^3 \\ \frac{\alpha^x}{\alpha^\psi} = \frac{1}{\alpha^2} \end{cases}$  ὅσον  $\alpha \neq 0$  καὶ  $\alpha \neq 1$

Γράφομεν αὐτὸν ὑπὸ τὴν μορφὴν

$$\begin{cases} \alpha^{x+\psi} = \alpha^3 \\ \alpha^{x-\psi} = \alpha^{-2} \end{cases} \quad \text{Τοῦτο ἀληθεύει ὅταν} \begin{cases} x+\psi=3 \\ x-\psi=-2 \end{cases}$$

ἐκ τῆς λύσεως τοῦ ὅποιου εύρισκομεν  $\psi = \frac{5}{2}$  καὶ  $x = \frac{1}{2}$ .

'Ενίοτε ή λύσις έκθετικῆς έξισώσεως η συστήματος τοιού-

των έξισώσεων άνάγεται εις τὴν λύσιν ἀλγεβρικῶν έξισώσεων μὲ τὴν βοήθειαν τῶν λογαρίθμων.

"Εστω π.χ. πρὸς λύσιν ἡ έξισωσις  $2x^2 - 9x - 24 = 4096$ .

Λαμβάνοντες τοὺς λογαρίθμους τῶν ἵσων ἔχομεν

$$(x^2 - 9x - 24) \cdot \log 2 = \log 4096.$$

Διαιροῦντες τὰ ἵσα ταῦτα διὰ λογ2 εύρισκομεν

$$x^2 - 9x - 24 = \frac{\log 4096}{\log 2} = \frac{3,61236}{0,30103} = 12.$$

"Ητοι  $x^2 - 9x - 24 = 12$ , ἐξ ἣς  $x = 12$  καὶ  $x = -3$ .

"Εστω πρὸς λύσιν τὸ σύστημα  $\begin{cases} 3^x \cdot 4^\psi = 3981312 \\ 2^\psi \cdot 5^x = 400000 \end{cases}$

Λαμβάνοντες τοὺς λογαρίθμους τῶν ἵσων εύρισκομεν τὸ ἰσόδυναμον σύστημα πρὸς τὸ δοθέν  $\begin{cases} x \cdot \log 3 + \psi \cdot \log 4 = \log 3981312 \\ \psi \cdot \log 2 + x \cdot \log 5 = \log 400000 \end{cases}$

Θέτοντες  $\log 4 = \log 2^2 = 2 \log 2$  καὶ πολλαπλασιάζοντες τὰ μέλη τῆς δευτέρας έξισώσεως ἐπὶ 2 εύρισκομεν

$$x \cdot \log 3 + 2\psi \cdot \log 2 = \log 3981312$$

$$2\psi \cdot \log 2 + 2x \cdot \log 5 = \log 400000$$

"Εάν τὴν πρώτην τούτων ἀφαιρέσωμεν ἀπὸ τὴν βευτέραν, εύρισκομεν  $x(2\log 5 - \log 3) = 2\log 400000 - \log 3981312$ , ἐκ τῆς ὁποίας ἔχομεν  $x = \frac{2\log 400000 - \log 3981312}{2\log 5 - \log 3}$ , μετὰ δὲ τὴν εὗρεσιν τῶν λογαρίθμων καὶ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν πράξεων εύρισκομεν  $x = 5$ .

"Αντικαθιστῶντες τὴν τιμὴν ταύτην τοῦ x εἰς τὴν δευτέραν τῶν δοθεισῶν έξισώσεων εύρισκομεν

$$2^\psi = \frac{400000}{5^5} = \frac{4 \cdot 10^5}{5^5} = \frac{2^2 \cdot 2^5 \cdot 5^5}{5^5} = 2^7,$$

ἐκ τῆς ὁποίας ἔχομεν  $2^\psi : 2^7 = 1$  ἢ  $2^{\psi-7} = 1 = 2^0$  καὶ  $\psi - 7 = 0$ ,  $\psi = 7$ .

**§ 225.** Καλοῦμεν λογαριθμικὴν έξισωσιν τὴν ἔχουσαν λογαρίθμους τῶν ἀγνώστων αὐτῆς. Όμοίως ὁρίζεται καὶ σύστημα λογαριθμικῶν έξισώσεων.

"Εστω πρὸς λύσιν τὸ σύστημα τῶν λογαριθμικῶν ἔξισώσεων

$$\begin{cases} 2\log \psi - \log x = 0,12494 \\ \log 3 + 2\log x + \log \psi = 1,73239. \end{cases}$$

Τὴν δευτέραν τῶν ἔξισώσεων τούτων γράφομεν καὶ ὡς ἔξῆς:  
 $2\log x + \log \psi = 1,73239 - \log 3 = 1,73239 - 0,47712 = 1,25527.$

Μεταξὺ ταύτης καὶ τῆς πρώτης τῶν διοθεισῶν ἀπαλείφομεν τὸ λογχ καὶ εύρισκομεν τὴν ἔξισωσιν 5 λογψ = 1,50515 καὶ μετὰ τὴν διαιρέσιν τῶν ἵσων διὰ 5 εύρισκομεν λογψ = 0,30103, ἔξῆς καὶ ψ = 2. Ἀντικαθιστῶντες τὴν τιμὴν ταύτην εἰς μίαν τῶν διοθεισῶν. εύρισκομεν τὴν τιμὴν τοῦ x = 3.

### Α σκήσεις

Νὰ λυθοῦν αἱ κάτωθι ἔξισώσεις :

$$594. \alpha') \alpha^x + \mu = \alpha^{2x}, \quad \beta') \alpha^3x + 2 = \alpha^x + 4, \quad \gamma') \gamma^{2-5x} = \gamma^x + 3.$$

$$\delta') \beta(2x+1)(3x+4) = \beta(3x+1)(2x+5), \quad \epsilon') (\alpha^4)(x+3) = \alpha^x + 2.$$

$$595. \alpha') \alpha^2x + 3 \cdot \alpha^3x + 4 = \alpha^4x + 5, \quad \beta') 2^{2x} = 32, \quad \gamma') (-2)^x = 16.$$

$$\delta') 5^{2x} + 7 \cdot 5^x = 450, \quad \epsilon') \sqrt[5]{\alpha} = \alpha^x, \quad \sigma\tau') 2^{x+3} + 4^{x+1} = 320.$$

$$596. \alpha') 2^x + 4^x = 272, \quad \beta') \lambda \log x = \lambda \log 24 - \lambda \log 3, \quad \gamma') 2^{x+1} + 4^x = 80.$$

$$\delta') 5 \cdot \lambda \log x = \lambda \log 288 + 3 \lambda \log \frac{x}{2}, \quad \epsilon') \lambda \log x = \lambda \log 192 + \lambda \log \frac{3}{4}.$$

Νὰ λυθοῦν τὰ συστήματα :

$$597. \alpha') \begin{cases} \alpha^{2x} \cdot \alpha^{3\psi} = \alpha^8 \\ \frac{\alpha^{2x}}{\alpha^{3\psi}} = \frac{1}{\alpha^6}, \end{cases} \quad \beta') \begin{cases} 5^{3x} \cdot 5^4\psi = 5^{18} \\ \frac{5^{2x}}{5^7\psi} = 5^{-17}, \end{cases} \quad \gamma') \begin{cases} x + \psi = 95 \\ \lambda \log(x - \psi) = 3. \end{cases}$$

$$598. \alpha') \begin{cases} x^2 + \psi^2 = 425 \\ \lambda \log x + \lambda \log \psi = 2, \end{cases} \quad \beta') \begin{cases} 5x^2 - 3\psi^2 = 11\ 300 \\ \lambda \log x + \lambda \log \psi = 3. \end{cases}$$

Νὰ λυθοῦν αἱ ἔξισώσεις :

$$599. \alpha') 3^x = 177147, \quad \beta') \frac{x}{3^2} = 768, \quad \gamma') 3^{\frac{x}{x}} = 243.$$

$$600. \alpha') 24^3x - 2 = 10\ 000, \quad \beta') 5^{x^2 - 3x} = 625, \quad \gamma') x^{x^2 - 7x + 12} = 1,$$

$$601. \alpha') 6x^4 - 18x^2 + 8 = 7\ 776, \quad \beta') \alpha \cdot \alpha^3 \cdot \alpha^5 \cdot \alpha^5 \dots \alpha^{2x-1} = v.$$

$$602. \alpha') \begin{cases} x^4 + \psi^4 = 641 \\ \lambda \log(x\psi)^2 = 2, \end{cases} \quad \beta') \begin{cases} \lambda \log \frac{x}{\psi} = 0,5, \\ \lambda \log x\psi = 1,5 \end{cases} \quad \gamma') \begin{cases} \lambda \log x\psi = 3 \\ 5x^2 - 3\psi^2 = 11\ 300. \end{cases}$$

$$603. \alpha') \begin{cases} \lambda \log \sqrt{x} - \lambda \log \sqrt{5} = 0,5 \\ 3\lambda \log x + 2\lambda \log \psi = 1,50515 \end{cases} \quad \beta') \begin{cases} \lambda \log \frac{x}{5} = \lambda \log 10 \\ \lambda \log x^3 + \lambda \log \psi^2 = \lambda \log 32. \end{cases}$$

### Δ'. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΝΑΤΟΚΙΣΜΟΥ

**§ 226.** Προβλήματα **άνατοκισμού** ή **συνθέτου τόκου** λέγονται έκεīνα, είς τὰ όποια ὁ τόκος προστίθεται εἰς τὸ κεφάλαιον εἰς τὸ τέλος καθεμιᾶς χρονικῆς μονάδος καὶ ἀποτελεῖ μετ' αὐτοῦ τὸ κεφάλαιον τῆς ἐπομένης χρονικῆς μονάδος.

‘Ο τόκος ( καὶ τὰ προβλήματα τόκου ), τὸν όποιον ἔξετάζει ἡ ‘Αριθμητική, καλεῖται ἀπλοῦς, πρὸς διάκρισιν ἀπὸ τοῦ συνθέτου.

**1ον.** Δανείζει τις ποσὸν α δραχμῶν μὲ ἀνατοκισμὸν καὶ μὲ τόκον τῆς μιᾶς δραχμῆς εἰς μίαν χρονικὴν μονάδα ( εἰς ἔτος ή μίαν ἔξαμηνίαν, τριμηνίαν κ.τ.λ. τ δραχμάς) πόσας δραχμὰς θὰ λάβῃ ἐν ὅλῳ μετὰ ν χρονικὰς μονάδας ;

Πρὸς λύσιν τοῦ προβλήματος τούτου παρατηροῦμεν ὅτι, ἀφοῦ ἡ 1 δρχ. εἰς μίαν χρονικὴν μονάδα δίδει τόκον τ δραχμάς, αἱ α δραχμαὶ εἰς μίαν χρονικὴν μονάδα θὰ δώσουν τόκον α·τ δραχμάς.

Ἐπομένως τὸ κεφάλαιον α δραχμῶν καὶ ὁ τόκος αὐτοῦ εἰς τὸ τέλος τῆς πρώτης χρονικῆς μονάδος θὰ εἶναι  $\alpha + \alpha\tau = \alpha(1+\tau)$  δρχ.

‘Ητοι τὸ κεφάλαιον α πολλαπλασιάζεται ἐπὶ τὸν παράγοντα  $(1+\tau)$ , ἵνα δώσῃ τὸ ζητούμενον ποσὸν εἰς τὸ τέλος τῆς πρώτης χρονικῆς μονάδος.

‘Ομοίως σκεπτόμενοι εύρίσκομεν ὅτι τὸ κεφάλαιον  $\alpha(1+\tau)$  εἰς τὸ τέλος μιᾶς ἀκόμη χρονικῆς μονάδος θὰ γίνη μετὰ τοῦ τόκου αὐτοῦ  $\alpha(1+\tau)(1+\tau)$  ή  $\alpha(1+\tau)^2$ .

‘Ωστε τὸ ἀρχικὸν ποσὸν τῶν α δραχμῶν θὰ γίνη μετὰ τοῦ τόκου αὐτοῦ εἰς τὸ τέλος τῆς δευτέρας χρονικῆς μονάδος  $\alpha(1+\tau)^2$ .

Καθ’ ὅμοιον τρόπον προχωροῦντες εύρίσκομεν ὅτι εἰς τὸ τέλος ν χρονικῶν μονάδων τὸ ἀρχικὸν κεφάλαιον α θὰ γίνη  $\alpha(1+\tau)^v$ . ‘Αν τὸ ποσὸν τοῦτο παραστήσωμεν μὲ Σ, θὰ ἔχωμεν  $\Sigma = \alpha(1+\tau)^v$ .

‘Εκ ταύτης δυνάμεθα νὰ εὔρωμεν ἐν ἐκ τῶν Σ, α, ν, τ μὲ τὴν βοήθειαν καὶ τῶν λογαρίθμων ( ἀκριβῶς ή κατὰ προσέγγισιν ), ὅταν γνωρίζωμεν τὰ τρία ἔξι αὐτῶν.

‘Αν κατὰ τὸν ἀνατοκισμὸν ὡς χρονικὴ μονάδας ληφθῇ τὸ ἔτος, ή δὲ διάρκεια τοῦ δανείου εἶναι ν ἔτη καὶ η ἡμέραι, παρατηροῦμεν ὅτι μετὰ ν ἔτη τὸ κεφάλαιον α δρχ. θὰ γίνη  $\alpha(1+\tau)^v$ . Τοῦτο τοκίζόμενον μὲ ἀπλοῦν τόκον πρὸς  $100\tau\%$  ( ὥστε τόκος τῶν 100 δρχ. εἰς 1 ἔτος νὰ εἶναι τ δρχ. ) ἐπὶ η ἡμέρας δίδει τόκον

$$\frac{\alpha(1+\tau)^v \cdot 100\tau \cdot \eta}{36000} = \frac{\alpha(1+\tau)^v \cdot \tau \cdot \eta}{360}$$

Οῦτο τὸ τελικὸν ποσὸν ἐκ τοῦ ἀνατοκισμοῦ θὰ εἴναι

$$\Sigma = \alpha(1+\tau)^v + \frac{\alpha(1+\tau)^v \tau \eta}{360} [\alpha(1+\tau)^v]$$

*Σημείωσις.* Ἀντὶ τοῦ τύπου τούτου χρησιμοποιοῦμεν (συνήθως) τὸν τύπον  $\Sigma = \alpha(1+\tau)^v + \frac{\eta}{360}$ . Τοῦτο δικαιολογεῖται ἐκ τῶν ἔξῆς: "Αν ὑποτεθῇ ὅτι δὲ ἀνατοκισμός γίνεται δχι κατ' ἔτος ἀλλὰ καθ' ἡμέραν, τότε δὲ χρόνος ἀνατοκισμοῦ είναι ν ἔτη καὶ η ἡμέραι =  $(360 \cdot v + \eta)$  ἡμέραι, τοῦ ἔτους λογιζομένου 360 ἡμέρας. Τὸ ἐπιτόκιον καθ' ἡμέραν ἔστω διτε εἰναι ψ, τότε δὲ τόκος καὶ τὸ κεφάλαιον μιᾶς μονάδος μετὰ 360 ἡμέρας θὰ γίνη  $(1+\psi)^{360}$ , ἀλλὰ τοῦτο = μὲ 1+τ, ἀφοῦ ή μία μονάς δίδει τόκον τείς ἐν ἔτος.

"Αρα ἔχομεν  $(1+\psi)^{360} = (1+\tau)$ ,  $(1+\psi) = (1+\tau)^{\frac{1}{360}}$ . Τὸ κεφάλαιον α δρχ. ἀνατοκιζόμενον καθ' ἡμέραν ἔπι  $(360v + \eta)$  ἡμέρας μὲ ἐπιτόκιον ψ μιᾶς δρχ. ἐπὶ μίαν ἡμέραν γίνεται  $\alpha(1+\psi)^{360v + \eta}$  καὶ θέτοντες ἀντὶ τοῦ  $(1+\psi)$  τὸ 1σον του  $(1+\tau)^{\frac{1}{360}}$  εύρισκομεν  $\alpha(1+\tau)^{\frac{360v + \eta}{360}} = \alpha(1+\tau)^{v + \frac{\eta}{360}}$ ,  $\Sigma = \alpha(1+\tau)^{v + \frac{\eta}{360}}$ .

*Ἐφαρμογαί.* 1η. Δανείζει τις 150 000 δραχ. μὲ ἀνατοκισμὸν πρὸς 4% κατ' ἔτος· πόσας δραχ. θὰ λάβῃ ἐν ὅλῳ μετὰ 6 ἔτη;

Ζητεῖται τὸ Σ καὶ ἔχομεν  $\alpha = 150000$ ,  $v = 6$ ,  $\tau = 0,04$ . Ἐπομένως ἀντικαθιστῶντες εἰς τὴν (1) ἔχομεν  $\Sigma = 150000 \cdot 1,04^6$ . Λαμβάνοντες τοὺς λογαρίθμους τῶν 1σων μελῶν ἔχομεν

$$\lambda\sigma\Sigma = \lambda\sigma 150000 + 6\lambda\sigma 1,04.$$

Ἐκ τῶν πινάκων ἔχομεν

$\lambda\sigma 150000 = 5,17609$ ,  $6\lambda\sigma 1,04 = 6 \cdot 0,01703 = 0,10218$ , ἐξ ὧν προκύπτει διὰ προσθέσεως  $\lambda\sigma\Sigma = 5,27827$  καὶ ἐκ τούτου  $\Sigma = 189786$ ,

"Ητοι δὲ τοκίσας τὰς 150 000 δραχμὰς μὲ ἀνατοκισμὸν κατ' ἔτος πρὸς 4% θὰ λάβῃ μετὰ 6 ἔτη ἐν ὅλῳ 189 786,9 δρχ.

2α. Πόσας δραχμὰς πρέπει νὰ τοκίσῃ τις μὲ ἀνατοκισμὸν κατ' ἔτος πρὸς 6%, ἵνα μετὰ 15 ἔτη λάβῃ ἐν ὅλῳ 500 000 δρχ;

"Ἐχομεν  $\Sigma = 500000$ ,  $\tau = 0,06$ ,  $1+\tau = 1,06$   $v = 15$  καὶ ζητεῖται τὸ α.

"Ἀντικαθιστῶντες εἰς τὴν (1) εύρισκομεν  $500000 = \alpha \cdot 1,06^{15}$ .

Ἐὰν λάβωμεν τοὺς λογαρίθμους τῶν ἵσων τούτων εύρισκομεν  
 $\lambda\text{oy}500\ 000 = \lambda\text{oy}\alpha + 15.\lambda\text{oy}1,06,$   
 ἐκ τοῦ ὅποιου ἔχομεν  $\lambda\text{oy}\alpha = \lambda\text{oy}500\ 000 - 15\lambda\text{oy}1,06.$  Ἐκ τῶν πινάκων εύρισκομεν  $\lambda\text{oy}500\ 000 = 5,69897$  καὶ  $15\lambda\text{oy}1,06 = 15.0,02531 = 0,37965$  καὶ ἔξ αὐτῶν δι' ἀφαιρέσεως  $\lambda\text{oy}\alpha = 5,31932$ , ἐκ τοῦ ὅποιου ἔπειται ὅτι  $\alpha = 208\ 604,8$  δρχ.

3η. Πρὸς ποῖον ἐπιτόκιον 86 200 δρχ. ἀνατοκιζόμεναι κατ' ἔτος γίνονται μετὰ 5 ἔτη 104 870 δραχμαί;

Ἐχομεν  $\alpha = 86\ 200$ ,  $v = 5$ ,  $\Sigma = 104\ 870$  καὶ ζητεῖται τὸ τ.

Ἀντικαθιστῶντες τὰς τιμὰς ταύτας εἰς τὴν (1) εύρισκομεν  $104870 = 86\ 200(1+\tau)^5$ . Λαμβάνοντες τοὺς λογαρίθμους τῶν ἵσων τούτων εύρισκομεν  $\lambda\text{oy}104\ 870 = \lambda\text{oy}86\ 200 + 5\lambda\text{oy}(1+\tau)$ , ἐκ τοῦ ὅποιου ἔπειται ὅτι  $5\lambda\text{oy}(1+\tau) = \lambda\text{oy}104\ 870 - \lambda\text{oy}86\ 200.$  Ἐκ τῶν πινάκων εύρισκομεν

$\lambda\text{oy}104\ 870 = 5,02065$ ,  $\lambda\text{oy}86\ 200 = 4,93551$ ,  
 ἐκ τῶν ὅποιών ἔχομεν  $\lambda\text{oy}104\ 870 - \lambda\text{oy}86\ 200 = 0,08514$   
 καὶ  $\lambda\text{oy}(1+\tau) = 0,08514 : 5 = 0,01703$ . ἦτοι  $(1+\tau) = 1,04$  καὶ  $\tau = 0,04$ . Αὔτὸς εἶναι ὁ τόκος τῆς μιᾶς δραχμῆς εἰς ἓν ἔτος, ἀρα ὁ ἐτήσιος τόκος εἶναι 0,04 τοῦ κεφαλαίου. Τοῦτο σημαίνει ὅτι τὸ ἐπιτόκιον εἶναι  $4^{\circ}/\circ$ .

4η. Μετὰ πόσον χρόνον 208 600 δρχ. ἀνατοκιζόμεναι κατ' ἔτος πρὸς  $6^{\circ}/\circ$  γίνονται 503 750 δρχ;

Ἐχομεν  $\alpha = 208\ 600$ ,  $\tau = 0,06$ ,  $\Sigma = 503\ 750$  καὶ ζητεῖται τὸ  $v$ . Ἀντικαθιστῶντες εἰς τὴν (1) εύρισκομεν  $503\ 750 = 208\ 600 \cdot 1,06^v$ .

Ἐὰν λάβωμεν τοὺς λογαρίθμους τῶν ἵσων, εύρισκομεν  $\lambda\text{oy}503\ 750 = \lambda\text{oy}208\ 600 + v \cdot \lambda\text{oy}1,06$ , ἐκ τοῦ ὅποιου προκύπτει

$$v = \frac{\lambda\text{oy}503750 - \lambda\text{oy}208600}{\lambda\text{oy}1,06}.$$

Ἐκ τῶν πινάκων ἔχομεν  $\lambda\text{oy}503\ 750 = 5,70222$ ,  $\lambda\text{oy}208\ 600 = 5,31931$ ,  $\lambda\text{oy}1,06 = 0,02531$ . Ἡ διαφορὰ τῶν δύο πρώτων εἶναι 0,38291.

Ἐπομένως θὰ ἔχομεν  $v = \frac{0,38291}{0,02531} = 15$  ἔτη καὶ κάτι ἐπὶ πλέον < 1.

Διὰ νὰ εὔρωμεν τὸ ἀπαιτούμενον μέρος τοῦ 16ου ἔτους, παρατηροῦμεν ὅτι εἰς τὸ τέλος τοῦ 15ου ἔτους αἱ 208 600 δρχ. γίνονται 208 600  $\cdot 1,06^{15} = 500\ 000$  δρχ., ἐπομένως αἱ 503 750 δρχ.—500 000 δρχ.

=3 750 δρχ, είναι τόκος άπλους τῶν 500 000 δρχ. πρὸς 6% εἰς τὸν ζητούμενον χρόνον. Λύομεν λοιπὸν τὸ πρόβλημα τοῦτο τοῦ άπλοῦ τόκου καὶ εύρισκομεν 45 ἡμ. τοῦ ἔτους λογιζομένου μὲ 360 ἡμ.

*Παρατήρησις.* "Αν ποσὸν α ἀνατοκίζεται κατ' ἔτος μὲ τόκον τ τῆς μονάδος κατ' ἔτος, θὰ γίνῃ μετὰ ν ἔτη  $\alpha(1+\tau)^v$  καὶ τοῦτο μετὰ τὴν ἡμέρας ἀκόμη φέρει άπλοῦν τόκον  $\frac{\alpha(1+\tau)^v \cdot 100\eta\tau}{100 \cdot 360}$ . "Αρα γίνεται ἐν ὅλῳ μετὰ ν ἔτη καὶ τὴν ἡμέρας  $\Sigma = \alpha (1+\tau)^v \left(1 + \frac{\eta\tau}{360}\right)$ , ἐξ οὗ  
 $\lambda\sigma = \lambda\alpha + v \cdot \lambda\tau + \lambda\eta\tau \left(1 + \frac{\eta\tau}{360}\right)$ ,

ἐπειδὴ δὲ είναι  $1 + \frac{\eta\tau}{360} < 1 + \tau$ , εχομεν  $\lambda\eta\tau \left(1 + \frac{\eta\tau}{360}\right) < \lambda\eta\tau (1 + \tau)$ . "Αρα ἡ διαίρεσις  $(\lambda\sigma - \lambda\alpha) : \lambda\eta\tau (1 + \tau)$  δίδει πηλίκον ν καὶ ὑπόλοιπον  $u = \lambda\eta\tau \left(1 + \frac{\eta\tau}{360}\right)$ .

Πράγματι ἔχομεν τότε  $\lambda\sigma - \lambda\alpha = v\lambda\eta\tau (1 + \tau) + u$  ἢ  
 $\lambda\sigma - \lambda\alpha = v \cdot \lambda\eta\tau (1 + \tau) + \lambda\eta\tau \left(1 + \frac{\eta\tau}{360}\right)$ , ἦτοι τὴν ἀνωτέρω σχέσιν  
 $\lambda\sigma = \lambda\alpha + v\lambda\eta\tau (1 + \tau) + \lambda\eta\tau \left(1 + \frac{\eta\tau}{360}\right)$ .

"Εκ τῆς  $u = \lambda\eta\tau \left(1 + \frac{\eta\tau}{360}\right)$ , ἐπειδὴ ἐκ τῆς διαιρέσεως εύρισκεται τὸ  $u$  (κατὰ προσέγγισιν), εύκόλως προσδιορίζεται τὸ  $\eta$ .

*Σημείωσις.* 'Ἐνίστε δ ἀνατοκισμὸς γίνεται καθ' ἔξαμηνίαν ἡ τριμηνίαν, ἐνῷ τὸ ἐπιτόκιον δρίζεται κατ' ἔτος. Εἰς τὰς περιπτώσεις αὐτὰς τὸ ἐπιτόκιον καθ' ἔξαμηνίαν εύρισκεται ὡς ἔξῆς :

"Αν  $\tau_1$  είναι δ τόκος τῆς 1 μονάδος κεφαλαίου καθ' ἔξαμηνίαν καὶ τὸ τόκος αὐτῆς κατ' ἔτος, παρατηροῦμεν διτο μία μονάδας κεφαλαίου μετὰ δύο χρονικάς Ιονάδας, δηλαδὴ μετὰ δύο ἔξαμηνίας, θὰ γίνῃ ἀνατοκιζομένη μὲ  $\tau_1$  ἐπιτόκιον  $(1 + \tau_1)^2$  καὶ τοῦτο ισοῦται μὲ  $1 + \tau$ , διότι η μία μονάδας μετὰ ἐν ἔτος ἀνατοκιζομένη μὲ ἐπιτόκιον τ γίνεται  $1 + \tau$ , ἀρα ἔχομεν  $(1 + \tau_1)^2 = 1 + \tau$  καὶ  $\tau_1 = \sqrt{1 + \tau} - 1$ .

"Αν δ ἀνατοκισμὸς γίνεται κατὰ τριμηνίαν, ἐπειδὴ τὸ ἔτος ἔχει 4 τριμηνίας, ἀν  $\tau_2$  παριστάνη τὸν τόκον τῆς μιᾶς μονάδος κεφαλαίου κατὰ τριμηνίαν, θὰ ἔχωμεν σκεπττόμενοι κατ' ἀναλογίαν ὡς ἀνωτέρω  $(1 + \tau_2)^4 = 1 + \tau$  καὶ  $\tau_2 = \sqrt[4]{1 + \tau} - 1$ .

### Προβλήματα

604. Πόσας δραχμώς θὰ λάβῃ τις, έαν ἀνατοκίσῃ κατ' ἔτος 5 600 δρχ. ἐπὶ 100 ἔτη πρὸς 5%;

605. Πατήρ τις κατέθεσεν εἰς Τράπεζαν 7500 δρχ. κατὰ τὴν γέννησιν τοῦ νιοῦ αὐτοῦ μὲ ἀνατοκισμὸν κατ' ἔτος πρὸς 4,5%. Πόσα θὰ λάβῃ ὁ υἱός του εἰς τὸ τέλος τοῦ 20οῦ ἔτους τῆς ἡλικίας αὐτοῦ;

606. Πόσην αὐξήσιν παθαίνει κεφάλαιον 1 000 000 δρχ. εἰς 8 ἔτη καὶ 8 μῆνας ἀνατοκιζόμενον κατ' ἔτος πρὸς 4%;

607. Ποιὸν κεφάλαιον γίνεται μετὰ τῶν τόκων αὐτοῦ ἀνατοκιζόμενον κατ' ἔτος πρὸς 3,5% εἰς 20 ἔτη 3 730 850 δρχ;

608. Τίς ἡ παροῦσα ἀξία κεφαλαίου 458 896 000 δρχ. πληρωτέου μετὰ 15 ἔτη καὶ 210 ἡμ. μὲ ἀνατοκισμὸν κατ' ἔτος πρὸς 8%;

609. Πόσον ποσὸν πρέπει νὰ τοκίσωμεν μὲ ἀνατοκισμὸν καθ' ἔξαμηναν πρὸς 4%, ἵνα μετὰ 18 ἔτη γίνη 20 000 000 δρχ;

610. Πρὸς πόσον τοῖς ἑκατὸν ἐτοκίσθη μὲ ἀνατοκισμὸν κατ' ἔτος κεφάλαιον 625 000 δρχ. ἐπὶ 15 ἔτη καὶ ἔγινεν 1 166 900 δρχ;

611. Πρὸς πόσον τοῖς ἑκατὸν λογαριάζεται ὁ τόκος, έαν 10 000 δρχ. εἰς 22 ἔτη γίνωνται 224 770 δρχ. ἀνατοκιζόμεναι;

612. Πρὸς ποιὸν ἐπιτόκιον πρέπει ν' ἀνατοκισθῇ ἐν κεφάλαιον κατ' ἔτος διὰ νὰ τετραπλασιασθῇ μετὰ 31 ἔτη;

613. Εἰς πόσον χρόνον ἀνατοκιζόμενον κατ' ἔτος κεφάλαιον 3 580 000 δρχ. πρὸς 4,5% γίνεται 56 000 000 δρχ.;

614. Πότε κατετέθησαν 630 000 δρχ. εἰς Τράπεζαν τίνα μὲ ἀνατοκισμὸν πρὸς 4%, έαν τὴν 1ην Ἀπριλίου 1956 εἶχον γίνει 969 800 δρχ;

615. Ἐπὶ πόσον χρόνον πρέπει ν' ἀνατοκισθῇ κατ' ἔτος ποσόν τι πρὸς 3,5% διὰ νὰ διπλασιασθῇ ἡ τριπλασιασθῇ ἡ τετραπλασιασθῇ;

616. 'Ο πληθυσμὸς ἐνὸς Κράτους αύξανεται κατ' ἔτος κατὰ τὸ δγδοηκοστὸν τοῦ προηγουμένου ἔτους. Μετὰ πόσα ἔτη θὰ διπλασιασθῇ ἡ θὰ τριπλασιασθῇ διπληθυσμὸς αὐτοῦ ;

617. Μία πόλις ἔχει 8 000 κατοίκους καὶ ὁ πληθυσμὸς αὐτῆς ἐλαττοῦται ἐτησίως κατὰ 160 κατοίκους. Εάν ἡ ἐλάττωσις ἔξακολουθή κατὰ τὴν αὐτὴν ἀναλογίαν, μετὰ πόσα ἔτη θὰ ἔχῃ 5 000 κατοίκους;

### Ε'. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΙΣΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

§ 227. 1ον Καταθέτει τις εἰς τὴν Τράπεζαν μὲ ἀνατοκισμὸν κατ' ἔτος 4,5% ποσὸν 205.000 δρχ. εἰς τὴν ἀρχὴν ἐκάστου ἔτους. Πόσα θὰ λάβῃ μετὰ 15 ἔτη ;

'Η πρώτη κατάθεσις τῶν 205 000 δραχμῶν θὰ μείνῃ 15 ἔτη ἀνατοκιζομένη πρὸς 4,5%. Ἐπομένως θὰ γίνῃ 205 000·1,045<sup>15</sup>.

'Η εἰς τὴν ἀρχὴν τοῦ δευτέρου ἔτους γινομένη κατάθεσις θὰ

μείνη μόνον 14 έτη εις τὸν τόκον ἅρα θὰ γίνη 205 000·1,045<sup>14</sup>.

Όμοιως ἡ εἰς τὴν ἀρχὴν τοῦ τρίτου ἔτους κατάθεσις θὰ γίνη 205 000·1,045<sup>13</sup> κ.ο.κ., ἡ τελευταία θὰ μείνη μόνον ἐν ἔτος καὶ θὰ γίνη 205 000·1,045.

"Ωστε τὸ ποσόν, τὸ ὅποιον θὰ λάβῃ εἰς τὸ τέλος τῶν 15 ἔτῶν θὰ εἶναι 205 000·1,045<sup>15</sup> + 205 000·1,045<sup>14</sup> + ... + 205 000·1,045 ἡ 205 000·1,045 + 205 000·1,045<sup>2</sup> + 205 000·1,045<sup>3</sup> + ... + 205 000·1,045<sup>15</sup>.

Παρατηροῦμεν ὅτι τὸ ἄθροισμα αὐτὸν εἶναι ἄθροισμα τῶν ὅρων γεωμετρικῆς προόδου, τῆς ὅποιας ὁ λόγος εἶναι 1,045.

Ἐφαρμόζοντες λοιπὸν τὸν τύπον τοῦ ἄθροισμάτος τῶν ὅρων γεωμετρικῆς προόδου, εύρίσκομεν ὅτι τὸ ποσόν, ἔστω Σ, τὸ ὅποιον θὰ λάβῃ, εἶναι  $\Sigma = \frac{205000 \cdot 1,045^{15} - 205000 \cdot 1,045}{1,045 - 1} = 0,045$

$$\text{ἢ } \Sigma = 205 000 \cdot 1,045 \frac{1,045^{15} - 1}{0,045}$$

Μὲ τοὺς λογαρίθμους εύρίσκομεν πρῶτον τὸ 1,045<sup>15</sup>. Πρὸς τοῦτο ἔχομεν, ἐὰν θέσωμεν  $x = 1,045^{15}$ ,  $\log x = 15 \log 1,045 = 0,28680$ , ἐκ τοῦ ὅποιου ἐπεταί ὅτι  $x = 1,93552$ . "Ωστε θὰ ἔχωμεν :

$$\Sigma = 205 000 \cdot 1,045 \frac{0,93552}{0,045} \text{ἢ } \Sigma = 205 000 \frac{1,045 \cdot 935,52}{45}.$$

Λαμβάνοντες τοὺς λογαρίθμους τῶν δύο ἵσων ἔχομεν :

$$\log \Sigma = \log 205 000 + \log 1,045 + \log 935,52 - \log 45.$$

Ἐκ τῶν πινάκων ἔχομεν :  $\log 205 000 = 5,31175$

$$\begin{array}{r} \log 1,045 = 0,01912 \\ \log 935,52 = 2,97105 \\ \hline \text{ἄθροισμα} & = 8,30192 \\ \log 45 & = 1,65321 \end{array}$$

καὶ ἀφαιροῦντες εύρίσκομεν  $\log \Sigma = 6,64871$ , ἐκ τοῦ ὅποιου προκύπτει  $\Sigma = 4 453 600$ , ἢ τοι μετὰ 15 έτη θὰ λάβῃ 4 453 600 δραχ.

'Ἐν γένει ἐὰν καταθέσῃ τις εἰς τὴν ἀρχὴν ἑκάστης χρονικῆς μονάδος α δραχμὰς εἰς τινα τράπεζαν μὲν ἀνατοκισμὸν καὶ μὲ τόκον τὴν μιᾶς δραχμῆς εἰς μίαν χρονικὴν μονάδα, ζητήται δὲ πόσας δραχμὰς θὰ λάβῃ μετὰ ν χρονικὰς μονάδας, παρατηροῦμεν ὅτι ἡ πρώτη κατάθεσις θὰ γίνη  $\alpha(1 + \tau)^v$ , ἡ δευτέρα  $\alpha(1 + \tau)^{v-1}$  κ.ο.κ. ἡ τελευταία  $\alpha(1 + \tau)$ , ὥστε εἰς τὸ τέλος τῶν ν χρονικῶν μονάδων θὰ λάβῃ  $\alpha(1+\tau) + \alpha(1+\tau)^2 + \dots + \alpha(1+\tau)^v$ . "Αν παραστήσωμεν τὸ ἄθροι-

σμα αύτὸ διὰ τοῦ Σ, θὰ ἔχωμεν  $\Sigma = \alpha(1+\tau) \frac{(1+\tau)^v - 1}{\tau}$ , ἐκ τοῦ ὁποίου προσδιορίζεται τὸ Σ διὰ τῶν λογαρίθμων ἢ τὸ α, ἐὰν δοθῇ τὸ Σ, τὸ τ καὶ τὸ ν.

**2ον.** Καταθέτει τις εἰς τὸ τέλος ἑκάστης χρονικῆς μονάδος α δραχμὰς μὲ ἀνατοκισμὸν καὶ μὲ τόκον τ τῆς μιᾶς δραχμῆς εἰς μίαν χρονικὴν μονάδα· πόσας δραχμὰς θὰ λάβῃ μετὰ ν χρονικὰς μονάδας;

Ἡ πρώτη κατάθεσις θὰ μείνῃ ἐπὶ ν—1 χρονικὰς μονάδας. Ἐάρα θὰ γίνῃ  $\alpha(1+\tau)^{v-1}$ . Ἡ δευτέρα θὰ μείνῃ ἐπὶ ν—2 χρονικὰς μονάδας, ἅρα θὰ γίνῃ  $\alpha(1+\tau)^{v-2}$  καὶ οὕτω καθεξῆς ἡ τελευταία θὰ εἴναι μόνον α. Ὡστε θὰ ἔχωμεν

$$\Sigma = \alpha + \alpha(1+\tau) + \alpha(1+\tau)^2 + \dots + \alpha(1+\tau)^{v-1}.$$

ἢ  $\Sigma = \frac{\alpha(1+\tau)^v - \alpha}{\tau} = \alpha \frac{(1+\tau)^v - 1}{\tau}$ , ἐκ τοῦ ὁποίου προσδιορίζεται τὸ Σ διὰ τῶν λογαρίθμων, ὅταν δοθῇ ἡ τιμὴ τῶν α, τ, ν. Ἐκ τοῦ αὐτοῦ τύπου εύρίσκομεν εὔκόλως διὰ τῶν λογαρίθμων τὸ α, ὅταν γνωρίζωμεν τὰ Σ, τ, ν.

## ΣΤ'. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΧΡΕΩΛΥΣΙΑΣ

**§ 228. Χρεωλυσία** λέγεται ἡ ἐντὸς ὥρισμένου χρόνου ἀπόσβεσις χρέους δι' ἵσων δόσεων, αἱ ὁποῖαι πληρώνονται κατ' ἵσα χρονικὰ διαστήματα. Τὸ ποσόν, τὸ ὁποῖον πληρώνεται εἰς τὸ τέλος ἑκάστου χρονικοῦ διαστήματος, λέγεται **χρεωλύσιον** καὶ χρησιμεύει μέρος μὲν αὐτοῦ διὰ τὴν πληρωμὴν τῶν τόκων τοῦ χρέους, τὸ δὲ ἄλλο μέρος διὰ τὴν βαθμιαίαν ἀπόσβεσιν τοῦ χρέους.

Τὸ χρέος ἔξιφλεῖται, ὅταν τὸ ἀθροισμα πάντων τῶν χρεωλυσίων μετὰ τῶν συνθέτων τόκων αὐτῶν ἀποτελέσῃ ποσότητα ἵσην μὲ τὴν τελικὴν ἀξίαν τοῦ ἀνατοκιζομένου ἀρχικοῦ κεφαλαίου.

**1ον.** Ἐδανείσθη τις 1 850 000 δραχμὰς πρὸς 4,5% μὲ ἀνατοκισμὸν κατ' ἔτος, μὲ τὴν συμφωνίαν νὰ ἔξιφλήσῃ τὸ χρέος αὐτοῦ διὰ 12 ἵσων χρεωλυσίων, τὰ ὁποῖα θὰ πληρώνωνται εἰς τὸ τέλος ἑκάστου ἔτους· πόσον είναι τὸ χρεωλύσιον;

Τὸ ἀρχικὸν ποσὸν τῶν 1 850 000 δραχμῶν θὰ γίνῃ μετὰ 12 ἔτη 1 850 000 · 1,045<sup>12</sup>. Ἐὰν διὰ τοῦ x παραστήσωμεν τὸ ζητούμενον

χρεωλύσιον, ή πρώτη δόσις ἐκ  $x$  δραχμῶν θὰ γίνῃ  $x \cdot 1,045^{11}$  μετά 11 ἔτη, κατὰ τὰ ὅποια ὑποτίθεται ὅτι ἔμεινεν εἰς τὸν τόκον. Ἡ δευτέρα δόσις θὰ γίνῃ  $x \cdot 1,045^{10}$ , ή τρίτη  $x \cdot 1,045^9$  κ.ο.κ., ἡ δὲ τελευταία θὰ μείνῃ  $x$ . Ἐπομένως τὸ ἄθροισμα τῶν ποσῶν, τὰ ὅποια θὰ πληρωθοῦν μετὰ τῶν τόκων αὐτῶν, θὰ εἴναι

$$x + x \cdot 1,045 + x \cdot 1,045^2 + \dots + x \cdot 1,045^{11} \text{ ή } x \cdot \frac{1,045^{12}-1}{0,045}.$$

Αλλὰ τὸ ποσόν αὐτὸν πρέπει νὰ εἴναι ἵσον μὲ τὸ ὀφειλόμενον συμφώνως πρὸς τὸ πρόβλημα. Ἡτοι θὰ ἔχωμεν :

$$x \cdot \frac{1,045^{12}-1}{0,045} = 1\,850\,000 \cdot 1,045^{12},$$

ἐκ τῆς ὅποιας εὑρίσκομεν τὴν τιμὴν τοῦ  $x$  διὰ τῶν λογαρίθμων.

Πρὸς τοῦτο εὑρίσκομεν πρῶτον τὴν δύναμιν  $1,045^{12}$  θέτοντες αὐτὴν ἵσην π.χ. μὲ τὸ  $\psi$ , ὅτε εἴναι  $\psi = 1,045^{12}$  καὶ  $\log \psi = 12 \log 1,045 = 0,22944$ , ἐκ τοῦ ὅποιου προκύπτει ὅτι  $\psi = 1,696$ .

Λύοντες τὴν ἀνωτέρω ἔξισωσιν ὡς πρὸς  $x$  μετὰ τὴν ἀντικατάστασιν τοῦ  $1,045^{12}$  διὰ τοῦ ἵσου αὐτοῦ  $1,696$  εὑρίσκομεν ὅτι :

$$x = \frac{1\,850\,000 \times 0,045 \times 19696}{696}, \text{ ἐκ τοῦ ὅποιου διὰ λογαριθμήσεως λαμβάνομεν } \log x = \log 1\,850\,000 + \log 0,045 + \log 1\,696 - \log 696.$$

Ἐκ τῶν πινάκων εὑρίσκομεν

$$\begin{array}{rcl} \log 1\,850\,000 & = & 6,26717 \\ \log 0,045 & = & 2,65321 \\ \hline \log 1\,696 & = & 3,22943 \\ \hline \text{ἄθροισμα} & = & 8,14981 \\ \hline \log 696 & = & 2,84261 \end{array}$$

$$\log x = 5,30720,$$

ἐκ τοῦ ὅποιου ἔπειται ὅτι  $x = 202\,861,9$  δραχμαί.

Ἐν γένει ἔὰν μὲ α παραστήσωμεν τὸ δανειζόμενον ποσόν μὲ ἀνατοκισμὸν καθ' ὠρισμένην χρονικὴν μονάδα, μὲ τ τὸν τόκον τῆς 1 δραχμῆς εἰς μίαν χρονικὴν μονάδα καὶ μὲ ν τὸ πλῆθος τῶν χρονικῶν μονάδων, τὸ μὲν κεφάλαιον θὰ γίνῃ  $\alpha(1+\tau)^v$ , ἡ δὲ ὀλικὴ ἀξία τῶν δόσεων ἐκ  $x$  δραχ. ἔκάστη θὰ εἴναι μετὰ ν χρονικὰς μονάδας

$$x + x(1+\tau) + x(1+\tau)^2 + \dots + x(1+\tau)^{v-1} \text{ ή } x \frac{(1+\tau)^v - 1}{\tau}.$$

$$\text{Έπομένως θά } \text{Έχωμεν } x \frac{(1+\tau)^v - 1}{\tau} = \alpha(1+\tau)^v \quad (1)$$

έκ τῆς όποιας δυνάμεθα νὰ εύρωμεν τὴν τιμὴν τοῦ  $x$ .

Ἐνίστε ἡ πρώτη καταβολὴ τοῦ χρεωλυσίου γίνεται ἔτη τινὰ μετά τὴν σύναψιν τοῦ δανείου π.χ. μετά κ τη. Εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν θά  $\text{Έχωμεν } x \frac{(1+\tau)^{v-k+1}-1}{\tau} = \alpha(1+\tau)^v$ .

Διότι ἡ πρώτη χρεωλυτικὴ δόσις θά μείνῃ ἐπὶ  $v-k$  ἔτη ἐπὶ ἀνατοκισμῷ καὶ θά γίνη  $x(1+\tau)^{v-k}$ , ἡ ἐπομένη χρεωλυτικὴ δόσις θά γίνη  $x(1+\tau)^{v-k-1}$  κ.τ.λ. Οὕτω θά  $\text{Έχωμεν}$ :

$$x + x(1+\tau) + \dots + x(1+\tau)^{v-k-1} + x(1+\tau)^{v-k} = \frac{x(1+\tau)^{v-k+1}-1}{\tau},$$

τύ δοποῖον θά ἰσοῦται μὲ  $\alpha(1+\tau)^v$ , ἥτοι  $\text{Έχομεν}$  τὴν ἑξῆς σχέσιν:

$$x \frac{(1+\tau)^{v-k+1}-1}{\tau} = \alpha(1+\tau)^v.$$

2ον. Ποῖον κεφάλαιον δύναται νὰ δανεισθῇ τις, ἐὰν θέλῃ νὰ ἔξοφλήσῃ τὸ χρέος αὐτοῦ εἰς 6 ἔτη δι' ἔτησίου χρεωλυσίου 800 000 δραχ., ὅταν τὸ ἐπιτόκιον εἶναι  $4^{\circ}/_0$ ;

Ἐχομεν  $x=800\,000$ ,  $v=6$ ,  $\tau=0,04$ , ζητεῖται δὲ τὸ  $\alpha$ . Ἀντικαθιστῶντες εἰς τὴν (1) τὰς τιμὰς τῶν  $x$ ,  $v$ , τ εύρισκομεν τὴν σχέσιν  $800\,000 \frac{1,04^6-1}{0,04} = \alpha \cdot 1,04^6$ . Λύοντες αὐτὴν ὡς πρὸς  $\alpha$  εύρισκομεν

$$\alpha = \frac{800\,000(1,04^6-1)}{0,04 \cdot 1,04^6}.$$

Ὑπολογίζομεν ἐν πρώτοις τὴν δύναμιν  $1,04^6$  καὶ ἀκολούθως εύρισκομεν διὰ τῶν λογαρίθμων  $\alpha=4\,193\,636,3$  δραχμάς.

3ον. Εἰς πόσα ἔτη ἔξοφλεῖται δάνειον 2 000 000 δραχμῶν μὲ χρεωλύσιον 130 000 δραχμῶν ὅταν τὸ ἐπιτόκιον εἶναι  $3^{\circ}/_0$ ;

Ἐχομεν  $\alpha=2\,000\,000$ ,  $x=130\,000$ ,  $\tau=0,03$ . Ἀντικαθιστῶντες τὰς τιμὰς ταύτας εἰς τὴν (1) εύρισκομεν :

$$130\,000 \cdot \frac{1,03^v - 1}{0,03} = 2\,000\,000 \cdot 1,03^v.$$

Ἐκ ταύτης ἔχομεν :  $130\,000 \cdot 1,03^v - 130\,000 = 0,03 \cdot 2\,000\,000 \cdot 1,03^v$

$$\therefore 1,03^v \cdot (130\,000 - 0,03 \cdot 2\,000\,000) = 130\,000$$

$$\text{καὶ } 1,03^v = \frac{130\,000}{70\,000} = \frac{13}{7}.$$

Λαμβάνοντες τούς λογαρίθμους τῶν δύο Ἰσων μελῶν ἔχομεν ν·λογ<sub>1,03=λογ13-λογ7</sub> ή  $0,01284v = 1,11394 - 0,84510 = 0,26884$ , ἐκ τῆς ὁποίας εύρισκομεν  $v = 20,937$  ἔτη. "Ητοι ἡ ἔξοφλησις θὰ γίνη μετὰ 21 ἔτη, ἀλλ' ἡ τελευταία δόσις θὰ εἶναι κατά τι μικροτέρα τῶν ἄλλων. Διὰ νὰ εύρωμεν τὴν εἰκοστὴν πρώτην δόσιν, εύρισκομεν πόσον γίνεται τὸ δάνειον τῶν 2 000 000 δρχ. εἰς 21 ἔτη, δηλαδὴ τὸ 2 000 000·1,03<sup>21</sup> δρχ, τὸ ὁποῖον ἴσοῦται μὲ 3 721 083,3 δρχ. ἀκολούθως εύρισκομεν ὅτι αἱ 20 δόσεις ἐκ 130 000 δρχ. ἔκαστη εἰς τὸ τέλος τοῦ 20oῦ ἔτους γίνονται  $130\,000 \frac{1,03^{20}-1}{0,03}$ .  $1,03 = 3\,598\,833,3$  δραχ. Ἡ διαφορὰ 3 721 083,3 – 3 598 833,3 δρχ. = 122 250 δρχ. παριστάνει τὴν τελευταίαν δόσιν.

### Π ρ ο β λ ḥ μ α τ α

618. "Εμπορός τις καταθέτει εἰς τὴν ἀρχὴν ἔκαστου ἔτους 350 000 δρχ. ἐκ τῶν κερδῶν αὐτοῦ εἰς τὴν τράπεζαν μὲ ἀνατοκισμὸν κατ' ἔτος 4 %. Πόσα θὰ λάβῃ εἰς τὸ τέλος τοῦ εἰκοστοῦ ἔτους ἀπὸ τῆς πρώτης καταθέσεως;

619. Καταθέτει τις κατ' ἔτος μὲ σύνθετον τόκον 1 000 000 δρχ. πρὸς 5 %. Μετὰ πόσον χρόνον θὰ λάβῃ 13 210 000. δρχ.;

620. "Ἡ διατροφὴ καὶ τὰ ἔξοδα τῶν σπουδῶν τέκνου κατεγράφοντο ὑπὸ τοῦ πατρός του εἰς τὸ τέλος ἔκαστου ἔτους, ἀνήρχοντο δὲ κατὰ μέσον δρον 20 000 δρχ. ἔτησίως. Πόσα θὰ ἔγινοντο αὐτὰ μετὰ 3 ἔτη, ἐὰν ἀνετοκίζοντο κατ' ἔτος πρὸς 3,5 %;

621. Πατήρ τις ἀποκτήσας κόρην θέλει νὰ καταθέτῃ κατ' ἔτος ποσόν τιώρισμένον δι' αὐτήν, ἵνα αὐτὰ ἀνατοκιζόμενα κατ' ἔτος πρὸς 5% γίνουν μετὰ 21 ἔτη 250 000 δρχ. Πόση πρέπει νὰ εἶναι ἡ ἔτησία κατάθεσις;

622. Πόσον εἶναι τὸ χρεωλύσιον, διὰ τοῦ ὁποίου ἔξοφλεῖται χρέος 100 000 ἔκατομμαρίων δρχ., ἀνατοκιζόμενον κατ' ἔτος πρὸς 4%, ἀν πληρώνεται δι' ἔτησίων δόσεων;

623. Χρέος ἔξοφλεῖται δι' Ἰσων ἔτησίων δόσεων ἐντὸς 30 ἔτῶν. Πόσον ἦτο τὸ ἀρχικὸν κεφάλαιον, ἐὰν καθεμία δόσις εἶναι 318 000 δρχ. καὶ τὸ ἐπιτόκιον 4,5 %;

624. "Εμπορός τις ἔδανείσθη 45 000 000 δρχ. ἐπ' ἀνατοκισμῷ κατ' ἔτος 5 %. Ἐὰν πληρώνῃ ἔτησιον χρεωλύσιον 3 000 000 δρχ., μετὰ πόσα ἔτη θὰ ἔξοφληθῇ τὸ χρέος αὐτοῦ;

625. "Ἡ ἔξοφλησις χρέους πρέπει νὰ γίνῃ εἰς 20 ἔτη χρεωλυτικῶς. Καθεμία δόσις (ἔτησία) θὰ εἶναι 46 130 000 δρχ., θὰ ἀρχίσῃ δὲ ἡ πληρωμὴ μετὰ τὸ 5ον ἔτος ἀπὸ τοῦ δανείου. Πόσον εἶναι τὸ ἀρχικῶς δανεισθὲν ποσόν, ἀν τὸ ἐπιτόκιον εἶναι 4,5% ;

626. Κράτος ἔδανείσθη ποσόν τι πρὸς 3,75%. "Ἡ χρεωλυτικὴ ἔξοφλησις του ἀρχεται 3 ἔτη μετὰ τὴν σύναψιν τοῦ δανείου καὶ θὰ πληρώνεται 158 800 000 δρχ. ἔτησίως ἐπὶ 10 ἔτη. Πόσον ἦτο τὸ δανεισθὲν ποσόν;

627. Χρέος ἐκ 1,5 δισεκατομμυρίων δρχ. πρέπει νὰ ἔξιφληθῇ διὰ 15 ὕσων ἑτησίων δόσεων ἀρχομένων 5 ἔτη μετά τὴν σύναψιν τοῦ δανείου. Πόσον θὰ εἰναι τὸ χρεωλύσιον, ἀν τὸ ἐπιτόκιον εἶναι 3,75 %;

628. Πρὸς ποῖον ἐπιτόκιον πρέπει νὰ ἔξιφλήσῃ τις χρεωλυτικῶς δάνειον 20 000 000 δρχ. διὰ 16 ἑτησίων δόσεων ἐκ 1 780 300 δρχ. ἔκάστην;

(Ἀντικαθιστῶντες εἰς τὴν εὐρεθῆσαν ἔξισωσιν εὐρίσκομεν

$$\frac{1}{\tau} - \frac{1}{\tau(1+\tau)^{16}} = \frac{20\,000\,000}{1\,780\,300}, \quad (1)$$

Ἡ ἔξισωσις αὕτη περιέχει τὸν ἄγγωστον τε εἰς τὸν 17ον βαθμόν. Διὰ τοῦτο ἡ λύσις αὕτης δὲν εἶναι γνωστὴ καὶ καταφεύγομεν εἰς προσεγγίσεις. Τὸ πρῶτον μέλος τῆς ἔξισώσεως θὰ εἶναι μεγαλύτερον, δσον τὸ τε εἶναι μικρότερον. Ἐὰν ἀντικατασταθῇ τὸ τ μὲ μικρότερον ἀριθμὸν τῆς ζητουμένης τιμῆς του, τὸ ἔξαγόμενον

$$\frac{20\,000\,000}{1\,780\,300}.$$

Θέτοντες π.χ.  $\tau = 0,04$  εὐρίσκομεν

$$\frac{1}{0,04} \left(1 - \frac{1}{1,04^{16}}\right) = \left(1 - \frac{1}{1,04^{16}}\right) \cdot 25,$$

ἐνῷ ἐκ τοῦ δευτέρου μέλους τῆς (1) εὐρίσκομεν 11,234. Θέτομεν λοιπὸν τώρα  $\tau =$  τὴν ζητουμένην τιμὴν τοῦ τ.

629. Κατέθεσέ τις ἐπὶ 5 συνεχῆ ἔτη πρὸς 4% εἰς τὴν ἀρχὴν ἔκάστου ἔτους ποσόν τι καὶ εἰσπράξεν ἔξι ἔτη μετά τὴν καταβολὴν τῆς τελευταίας καταθέσεως 20 000 000 δρχ. Πόση ήτο ἡ κατάθεσις;

630. Καταθέτει τις εἰς τὴν ἀρχὴν ἔκάστου ἔτους 1 250 000 δρχ. ἐπὶ 7 ἔτη πρὸς 6 %. Τί ποσόν θὰ εἰσπράξῃ εἰς τὸ τέλος τοῦ δωδεκάτου ἔτους ἀπὸ τῆς πρώτης καταθέσεως;

631. Πρὸς ποῖον ἐπιτόκιον ὀκτὼ ἔτησι καταθέσεις ἐκ 1 000 000 δρχ. ἔκάστη ἀποτελοῦν ποσὸν 10 200 000 δραχμῶν;

632. Πόσαι καταθέσεις ἐκ 1 000 000 δρχ αἱ ὁποῖαι γίνονται εἰς τὸ τέλος ἔκάστου ἔτους, ἀπαιτοῦνται, ἵνα ἀποτελεσθῇ ποσὸν 2 457 639 000 δρχ. τοῦ ἐπιτοκίου ὅντος 5  $\frac{1}{2}$  %;

633. Δικαιοῦται τις νὰ εἰσπράξῃ μετὰ 5 ἔτη ποσὸν 10 000 000 δρχ. Ἀντὶ τούτου ἐπιθυμεῖ νὰ εἰσπράττῃ εἰς τὸ τέλος ἔκάστου τῶν 5 ἔτῶν τὸ αὔτὸ πάντοτε ποσόν Ποῖον εἴναι τὸ ποσόν, τὸ ὅποιον θὰ εἰσπράττῃ τοῦ ἐπιτοκίου ὅντος 5 %;

634. Ὁφείλει τις 15 000 000 δρχ. πληρωτέας τὴν 1ην Ἰουλίου 1949. Νὰ ἀντικατασταθῇ ἡ ὑποχρέωσις αὕτη μὲ τρεῖς ἀλλας πρὸς ἵσας ἀλλήλας πληρωτέας τὴν 1ην Ἰουλίου 1950, 1951 καὶ 1952 (ἐπιτόκιον 6%).

635. Μὲ πόσας ἔξαμηνίας χρεωλυτικᾶς δόσεις θὰ ἔξιφληθῇ δάνειον 20 000 000 δρχ. ἔὰν ὁ ἀνατοκισμὸς γίνεται πρὸς 3% καθ' ἔξαμηνίαν, τὸ δὲ χρεωλύσιον εἴναι 1 000 000 δρχ.;

636. Συνῆψε τις δάνειον χρεωλυτικὸν 25 000 000 δρχ. πρὸς 7% ἔξιφλητέον

έντὸς 8 ἑτῶν. Τρεῖς μῆνας μετὰ τὴν καταβολὴν τῆς πέμπτης χρεωλυτικῆς δόσεως θέλει νὰ ἔξιφλήσῃ τοῦτο ἐξ ὀλοκλήρου. Πόσα πρέπει νὰ καταβάλῃ;

637. Ἐδανείσθη τις τὸν Ἀπρίλιον 1942 ποσὸν 20 008 000 δρχ. ἔξιφλητοινέντὸς 20 ἑτῶν πρὸς 6%. Καταβάλλων κανονικῶς τὰ μέχρι τοῦ 1950 χρεωλύσια ἐπιθυμεῖ τὴν 1ην Ὁκτωβρίου 1950 νὰ ἔξιφλήσῃ τὸ χρέος του τελείως. Τί ποσὸν θὰ χρειασθῇ;

638. Διὰ πόσων χρεωλυτικῶν δόσεων ἔξιφλεῖται δάνειον 100 000 000 δρχ. ὅταν τὸ ἐπιτόκιον εἴναι 7%, διατίθεται δὲ ἑτησίως χρεωλύσιον 10 000 000 δρχ.;

639. Πρὸς ποῖον ἐπιτόκιον δάνειον 250 000 000 δρχ. ἔξιφλεῖται ἐντὸς 15 ἑτῶν δι' ἑτησίων χρεωλυσίων 24 553 000 δραχμῶν;

640. Ἐταιρεία τις δύναται νὰ διαθέσῃ ἑτησίως ἐκ τῶν κερδῶν αὐτῆς 10 000 000 Ποιὸν κεφάλαιον δύναται νὰ δανεισθῇ διαθέτουσα ἐπὶ εἰκοσαετίαν τὸ ἄνωποσὸν διὰ χρεωλύσιον τοῦ δανείου τοῦ ἐπιτοκίου δητὸς 5%;

641. Εἰσπράττει τις ἐπὶ μίαν πενταετίαν καὶ εἰς τὸ μέσον ἔκαστου ἔτους 210 000 ἔκατομμύρια δραχμῶν αὔξανομένου τοῦ ποσοῦ τούτου ἀπὸ ἔτους εἰς ἔτος κατὰ 7,5% (ἄνευ ἀνατοκισμοῦ). Κατὰ τὴν ἐπομένη πενταετίαν εἰσπράττει διοίωσ τὸ προηγούμενον ποσὸν 210 000 ἔκατομμύρια ηὔξημένον κατὰ τὸ τρίτον αὐτοῦ, ἐνῷ ἀπὸ πενταετίας εἰς πενταετίαν ἔξακολουθεῖ ἡ αὔξησις τοῦ ποσοῦ κατὰ τὸ τρίτον τοῦ ἀρχικοῦ καὶ κατὰ 7,5% ἑτησίως (ἄνευ ἀνατοκισμοῦ). Πόσον θὰ εἰσπράξῃεις τὸ τέλος τῆς 1ης, 2ας, 3ης, 4ης πενταετίας, ἀν ἀνατοκίζεται κατ' ἔτος πρὸς 5%;

#### Περίληψις περιεχομένων κεφαλαίου VIII.

‘Ορισμὸς ἀριθμητικῆς προόδου (αὔξουσα, φθίνουσα πρόοδος, ἀν ἡ διαφορὰ ἡ ὁ λόγος αὐτῆς ω > 0 η < 0). ‘Ο νιοστὸς ὅρος  $\tau = \alpha + (n-1)\omega$  ( $\alpha$  = πρῶτος,  $\omega$  ἡ διαφορά). ‘Η πρόοδος ὁρίζεται ἀν διθῆ διαφορὰ καὶ τὸ πλῆθος τῶν ὅρων τῆς.

‘Ορισμὸς παρεμβολῆς ν ὅρων ἀριθμητικῆς προόδου μεταξὺ ἀριθμῶν  $\alpha, \beta$ . “Εχομεν  $\omega_1 = (\beta - \alpha) : (n + 1)$ , ἀν  $\omega_1$  εἴναι ἡ διαφορὰ τῆς προόδου. ‘Ιδιότης τῶν ὅρων ἀριθμητικῆς προόδου  $\alpha, \beta, \gamma, \dots$  κ.λ.τ., είναι  $\alpha + \tau = \beta + \lambda = \gamma + \kappa, \dots$

“Αθροισμα  $\Sigma$  τῶν ὅρων ἀριθμητικῆς προόδου  $\Sigma = (\alpha + \tau) \cdot n : 2$  ἢ  $\Sigma = [2\alpha + (n-1)\omega]n : 2$ .

‘Ορισμὸς γεωμετρικῆς προόδου (ἀπολύτως αὔξουσα ἡ φθίνουσα, ἀν ὁ λόγος αὐτῆς ω εἶναι  $|\omega| > 1$  η < 1).

‘Ο νιοστὸς ὅρος  $\tau = \alpha\omega^{n-1}$ , α ὁ πρῶτος ὅρος, ω ὁ λόγος.

‘Αν  $\alpha, \beta, \gamma, \dots, \kappa, \lambda, \tau$  είναι γεωμετρικὴ προόδος μὲ λόγον ω, είναι  $\beta^2 = \alpha\gamma, \beta\lambda = \gamma\kappa = \alpha\tau$ .

Παρεμβολὴ ν ὅρων γεωμετρικῆς προόδου μεταξὺ δύο ἀριθμῶν  $\alpha, \beta$ . ‘Η σχηματιζομένη πρόοδος θὰ ἔχῃ λόγον  $\omega_1 = \sqrt[n+1]{\beta : \alpha}$ .

”Αθροισμα  $\nu$  δρων γεωμετρικής προόδου  $\alpha, \beta, \gamma, \dots, \kappa, \lambda, \tau$ , τὸ Σ = ( $\alpha\omega^v - \alpha$ ): ( $\omega - 1$ ) = ( $\tau\omega - \alpha$ ): ( $\omega - 1$ ) =  $\frac{\alpha}{1-\omega} - \frac{\alpha\omega^v}{1-\omega}$ . ”Αθροισμα  $\Sigma$  τῶν δρων φθινούστης γεωμετρικής προόδου (μὲς ἄπειρον πλῆθος δρων)  $\Sigma = \frac{\alpha}{1-\omega}$ .

‘Ορισμὸς ἀρμονικῆς προόδου (ἄν οἱ ἀντίστροφοι τῶν δρων τῆς ἀποτελοῦν ἀριθμητικὴν πρόοδον).

‘Ορισμὸς λογαρίθμου ἀριθμοῦ ὡς πρὸς βάσιν 10 ἢ τὸν ἀριθμὸν  $e$  ( $e=1+\frac{1}{1}+\frac{1}{1\cdot 2}+\frac{1}{1\cdot 2\cdot 3}+\dots$ ). Ο είναι ἀσύμμετρος καὶ ὑπερβασικὸς (καθὼς καὶ ὁ  $\pi=3,141\dots$ )

’Ιδιότητες τῶν λογαρίθμων. Πᾶς ἀριθμὸς  $A > 0$  ἔχει λογάριθμον θετικὸν μέν, ἂν  $A > 1$ , ἀρνητικὸν δέ, ἂν  $A < 1$  (ἀρνητικὸς ἀριθμὸς δὲν ἔχει λογάριθμον πραγματικόν).

$\log(A \cdot B) = \log A + \log B$ ,  $\log(A:B) = \log A - \log B$ ,  $\log(A^v) = v \log A$ .

Χαρακτηριστικὸν λογαρίθμου. Τροπὴ ἀρνητικοῦ εἰς ἐν μέρει ἀρνητικόν.

Αἱ 4 πράξεις μὲς ἀριθμούς ἐν μέρει ἀρνητικούς. Λογαριθμικοὶ πίνακες, χρῆσις αὐτῶν. ’Εφαρμογαὶ τῶν λογαρίθμων. ’Αλλαγὴ τῆς βάσεως συστήματος λογαρίθμων.

‘Ορισμὸς ἐκθετικῶν ἔξισώσεων (αἱ ὁποῖαι ἔχουν ἀγνώστους εἰς τοὺς ἐκθέτας δυνάμεων). Λύσις ἐκθετικῶν ἔξισώσεων.

Συστήματα ἐκθετικῶν ἔξισώσεων καὶ λύσεις αὐτῶν.

‘Ορισμὸς λογαριθμικῆς ἔξισώσεως. Λύσεις λογαριθμικῶν ἔξισώσεων.

‘Ορισμὸς τοῦ ἀνατοκισμοῦ. ’Αξία  $\Sigma$  κεφαλαίου αἱ ἀνατοκιζομένου ἐπὶ ἔτη  $\Sigma = \alpha(1+\tau)^v$ ,  $\tau =$  τόκος μιᾶς μονάδος εἰς μίαν χρονικὴν μονάδα. Εὔρεσις  $\alpha'$  τοῦ  $\Sigma$ ,  $\beta'$  τοῦ  $\alpha$ ,  $\gamma'$  τοῦ  $v$  (περίπτωσις καθ' ἥν τὸ  $v$  δὲν είναι ἀκέραιος, δῆτε ἐφαρμόζεται ὁ τύπος

$$\Sigma = \alpha(1+\tau)^v \cdot (1 + \eta\tau : 360).$$

Περίπτωσις ἀνατοκισμοῦ καθ' ἔξαμην  $\tau_1 = \sqrt{1+\tau} - 1$ , περίπτωσις ἀνατοκισμοῦ κατὰ τριμηνίαν  $\tau_2 = \sqrt[4]{1+\tau} - 1$ .

‘Ορισμὸς προβλημάτων ἵσων καταθέσεων. Τελικὴ ἀξία  $\Sigma$  ἵσων καταθέσεων αἱ μετὰ ν ἔτη  $\Sigma = (1+\tau)\alpha [ (1+\tau)^v - 1 ] : \tau$  (ἄν ἡ ἐκάστοτε κατάθεσις γίνεται εἰς τὴν ἀρχὴν τῆς χρονικῆς μονάδος) ἢ

ἢ  $\Sigma = \alpha [(1+\tau)^v - 1] : \tau$  ( ἂν ἢ κατάθεσις γίνεται εἰς τὸ τέλος τῆς χρονικῆς μονάδος ).

**‘Ορισμὸς χρεωλυσίας.** Τύπος εύρεσεως τοῦ χρεωλυσίου  $x$  εἶναι  $x[(1+\tau)^v - 1] : \tau = \alpha(1+\tau)^v$  ἢ γενικώτερον  $x[(1+\tau)^{v-k+1} - 1] : \tau = \alpha(1+\tau)^v$ , ἂν ἢ πρώτη καταβολὴ χρεωλυσίου γίνεται κ ἔτη μετά τὴν σύναψιν τοῦ δανείου α ποσοῦ διὰ ν ἔτη ( $v > k$ ) μὲ τ τόκον μιᾶς μονάδος εἰς τὴν μονάδα τοῦ χρόνου.

---

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΧ

### Α'. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ( ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ) ΑΡΙΘΜΩΝ

**§ 229.** Ως γνωστόν, ἂν είναι  $\alpha > 0$ , ή  $\alpha = 0$  έχομεν  $|\alpha| = \alpha$ , ἐνῷ  
ἄν  $\alpha < 0$ ,  $|\alpha| = -\alpha$ . Π.χ.  $|15| = 15$ ,  $|-6| = 6$ ,  $|0| = 0$ .

Διὰ τὰς ἀπολύτους τιμάς ( πραγματικῶν ) ἀριθμῶν έχομεν τὰς  
έξης ιδιότητας :

1η "Εστω π.χ. ὁ  $-12$ . Έχομεν  $|-12| = 12 = |12|$ . Επίσης  $|-7| = 7 = |7|$ . Γενικῶς ἂν α είναι σχετικός ἀριθμός, έχομεν  $|-α| = |\alpha|$ .

2α "Εστω π.χ. ὁ  $15$ . Έχομεν  $|15| = 15$ , ἐνῷ  $-|15| = -15$ . Άλλ'  
είναι  $-15 < 15 = |15|$ , ἀρα  $-|15| < |15|$ , ἐνῷ  $|0| = 0 = -|0|$ . Εν γένει  
έχομεν λοιπὸν  $-|\alpha| \leq \alpha \leq |\alpha|$ .

3η "Εστω π.χ. ἡ  $|3| < |6|$ . Παρατηροῦμεν ὅτι  $-|6| = -6$ ,  $-|6| =  
-6 < 3 < |6| = 6$ . Όμοιώς  $|-5| = |5| = 5$  καὶ  $-|-5| = -|5| = -5 < |5| = 5$ ,  
ήτοι  $-|-5| = -5 < 5$ . Εν γένει ἂν είναι  $|\alpha| \leq |\beta|$ , θὰ έχωμεν  $-|\beta| \leq \alpha \leq |\beta|$ .  
Διότι ἐκ τῆς  $|\alpha| \leq |\beta|$  εύρισκομεν ( πολλαπλασιάζοντες τὰ μέλη της  
ἐπὶ  $-1$  ),  $-|\alpha| \geq -|\beta|$ , ήτοι  $-|\beta| \leq -|\alpha| \leq \alpha \leq |\alpha|$  ( κατὰ τὴν 2αν  
ιδιότητα ) καὶ  $-|\beta| \leq -|\alpha| \leq \alpha \leq |\alpha| \leq |\beta|$  ( ἐξ ὑποθέσεως ), ήτοι  
 $-|\beta| \leq \alpha \leq |\beta|$ . Καὶ ἀντιστρόφως ἀν ἴσχυντα αὐτῇ, θὰ έχωμεν  $|\alpha| \leq |\beta|$ .

Π.χ. είναι  $-|-8| < -3 < |-8|$  ή  $-8 < -3 < 8$  καὶ  $|-3| < |-8|$  ή  $3 < 8$ .

#### 1. ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΤΙΜΗ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΩΝ

α') "Εστω ὅτι  $\zeta$  τείται ή  $|5+8|$ . Έχομεν  $|5+8| = |13| = 13 =  
5+8 = |5|+|8|$ . "Εστω ή  $|-15-6|$ . Έχομεν  $|-15-6| = |-21| = |21| =  
21 = 15+6 = |-15|+|-6|$ . "Εστω ή  $|-20+8|$ . Έχομεν  $|-20+8| =  
|-12| = |12| = 12 < 20+8 = |-20|+|8|$ , ήτοι  $|-20+8| < |-20|+|8|$ .

"Αν  $\alpha$ ,  $\beta$  είναι όμοσημοι, έχομεν  $|\alpha+\beta| = |\alpha| + |\beta|$ . Διότι, διὰ  
τὴν εὑρεσιν τοῦ  $\alpha+\beta$ , προσθέτομεν τὰς ἀπολύτους τιμάς τῶν  $\alpha$ ,  $\beta$   
κ.τ.λ., ήτοι :

‘Η ἀπόλυτος τιμὴ τοῦ  $\alpha + \beta$  ισοῦται μὲ τὸ ἀθροίσμα τῶν ἀπολύτων τιμῶν τῶν  $\alpha$  καὶ  $\beta$ .

“Αν  $\alpha, \beta$  εἶναι ἑτερόσημοι, ἔχομεν  $|\alpha + \beta| < |\alpha| + |\beta|$ . Διότι, διὰ τὴν εὔρεσιν  $\alpha + \beta = \sqrt{|\alpha|^2 + |\beta|^2 + 2\alpha\beta}$ , θὰ ἀφαιρέσωμεν ἀπὸ τὴν μεγαλυτέραν ἐκ τῶν ἀπολύτων τιμῶν τῶν  $\alpha, \beta$  τὴν μικροτέραν αὐτῶν κ.τ.λ. ὥστε :

‘Η ἀπόλυτος τιμὴ τοῦ ἀθροίσματος εἶναι μικροτέρα τοῦ ἀθροίσματος τῶν ἀπολύτων τιμῶν τῶν προσθετέων,  $|\alpha + \beta| < |\alpha| + |\beta|$ .

”Ητοι γενικῶς ἔχομεν :

“Αν οἱ  $\alpha, \beta$  εἶναι πραγματικοί, ἔχομεν  $|\alpha + \beta| \leq |\alpha| + |\beta|$ , τὴν μὲν ισότητα δι’ ὁμοσήμους ( $\eta 0$ ), τὴν δὲ ἀνισότητα δι’ ἑτεροσήμους προσθετέους.

‘Ομοίως εὑρίσκομεν ὅτι :

$$|\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha^n| \leq |\alpha_1| + |\alpha_2| + \dots + |\alpha^n|.$$

Τὴν αὐτὴν ιδιότητα δεικνύομεν καὶ ὡς ἔξῆς :

”Έχομεν  $-|\alpha| \leq \alpha \leq |\alpha|$ .

‘Επίστης ἔχομεν  $-|\beta| \leq \beta \leq |\beta|$ . Μὲ τὴν πρόσθεσιν τούτων κατὰ μέλη εὑρίσκομεν  $-|\alpha| - |\beta| \leq \alpha + \beta \leq |\alpha| + |\beta|$

$\eta$   $-(|\alpha| + |\beta|) \leq \alpha + \beta \leq |\alpha| + |\beta|$ , ἐπομένως εἶναι καὶ  $|\alpha + \beta| \leq ||\alpha| + |\beta|| = |\alpha| + |\beta|$ , δηλαδὴ  $|\alpha + \beta| \leq |\alpha| + |\beta|$ .

β') Θὰ δείξωμεν ὅτι :  $|\alpha \pm \beta| \geq ||\alpha| - |\beta||$ . ”Έχομεν :

$|\alpha| = |\alpha + \beta + (-\beta)| = |(\alpha + \beta) + (-\beta)| \leq |\alpha + \beta| + |-\beta| = |\alpha + \beta| + |\beta|$ ,  
ἡτοι  $|\alpha| \leq |\alpha + \beta| + |\beta|$ , ἐπομένως  $|\alpha| - |\beta| \leq |\alpha + \beta|$ .

‘Ομοίως ἔχομεν  $|\beta| = |\beta + \alpha + (-\alpha)| \leq |\alpha + \beta| + |-\alpha| = |\alpha + \beta| + |\alpha|$  καὶ  $|\beta| - |\alpha| \leq |\alpha + \beta|$ , ἀρα  $-(|\alpha| - |\beta|) \leq |\alpha + \beta|$ .

‘Ἐν γένει λοιπὸν ἔχομεν  $|\alpha + \beta| \geq ||\alpha| - |\beta||$ . ’Επίστης ἔχομεν  $|\alpha - \beta| = |\alpha + (-\beta)| \geq ||\alpha| - |-\beta|| = ||\alpha| - |\beta||$  (ἔνεκα τῆς προηγουμένης σχέσεως), ἡτοι  $|\alpha - \beta| \geq ||\alpha| - |\beta||$ . ”Ωστε γενικῶς ἔχομεν

$$|\alpha \pm \beta| \geq ||\alpha| - |\beta||.$$

γ') “Αν εἶναι  $|\chi - \psi| < \alpha$ ,  $|\psi - \omega| < \alpha$  θὰ δείξωμεν ὅτι  $|\chi - \omega| < 2\alpha$ .

Διότι μετὰ τὴν πρόσθεσιν τῶν διθεισῶν ἀνισοτήτων κατὰ μέλη εὑρίσκομεν  $|\chi - \psi| + |\psi - \omega| < 2\alpha$ . ’Αλλ’ εἶναι  $|\chi - \omega| = |(\chi - \psi) + (\psi - \omega)| \leq |\chi - \psi| + |\psi - \omega| < 2\alpha$ , ἡτοι  $|\chi - \omega| < 2\alpha$ .

“Οταν χρησιμοποιοῦμεν τὴν ιδιότητα αὐτῆν, λέγομεν συνήθως ὅτι ἀπαλείφομεν τὸν  $\psi$  ἐκ τῶν  $\chi, \psi, \omega$  μεταξὺ τῶν διθεισῶν ἀνισοτήτων.

## 2. ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΤΙΜΗ ΓΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΡΙΘΜΩΝ

"Έχομεν  $|8 \cdot 7| = |56| = 8 \cdot 7 = |8| \cdot |7|$ . Έπίσης  $|-5 \cdot 9| = |-45| = 45 = 5 \cdot 9 = |-5| \cdot |9|$ .

'Εν γένει  $|\alpha \cdot \beta| = |\alpha| \cdot |\beta|$ , διότι οίοιδή ποτε καὶ ἀν εἶναι οἱ σχετικοὶ ἀριθμοὶ  $\alpha, \beta$  (δύμόσημοι ἢ ἔτερόσημοι), διάλ νὰ εὔρωμεν τὸ γινόμενόν των, θὰ εὔρωμεν τὸ γινόμενον τῶν ἀπολύτων τιμῶν τῶν  $\alpha, \beta$  κ.τ.λ., ἦτοι :

'Η ἀπόλυτος τιμὴ γινομένου ἵσοῦται μὲ τὸ γινόμενον τῶν ἀπολύτων τιμῶν τῶν παραγόντων.

## 3. ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΤΙΜΗ ΠΗΛΙΚΟΥ ΔΥΟ ΑΡΙΘΜΩΝ

"Εστω  $\left| \frac{\alpha}{\beta} \right|$  Θὰ δείξωμεν ὅτι  $\left| \frac{\alpha}{\beta} \right| = \frac{|\alpha|}{|\beta|} = |\alpha| : |\beta|$ , ( $\beta \neq 0$ ).

Διότι, ἀν τεθῇ  $\frac{\alpha}{\beta} = \omega$ , ἔχομεν  $\alpha = \beta \cdot \omega$ ,  $|\alpha| = |\beta \cdot \omega| = |\beta| \cdot |\omega|$ .

'Επομένως  $|\omega| = \frac{|\alpha|}{|\beta|}$ , ἦτοι  $\left| \frac{\alpha}{\beta} \right| = \frac{|\alpha|}{|\beta|} = |\alpha| : |\beta|$ .

## 4. ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΤΙΜΗ ΔΥΝΑΜΕΩΣ ΑΡΙΘΜΟΥ

"Εστω ὅτι ἔχομεν  $|\alpha|^v$ , ὅπου  $v$  ἀκέραιος ( $|v| > 0$ ).

"Έχομεν  $\alpha^{|v|} = \alpha \cdot \alpha \cdots \alpha$ ,  $|\alpha^{|v|}| = |\alpha \cdot \alpha \cdots \alpha| = |\alpha| \cdot |\alpha| \cdots |\alpha| = |\alpha|^{|v|}$ .

"Αν ἔχωμεν  $|\alpha^{-|v|}|$ , θὰ εἶναι  $|\alpha^{-|v|}| = |\alpha^{-|v|}$ . Διότι εἶναι  $\alpha^{-|v|} = \frac{1}{\alpha^{|v|}}$ ,

$|\alpha^{-|v|}| = \left| \frac{1}{\alpha^{|v|}} \right| = \frac{1}{|\alpha^{|v|}|} = |\alpha^{-|v|}$  ἦτοι  $|\alpha^{-|v|}| = |\alpha^{-|v|}|$ .

## Β'. ΠΕΡΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΑΡΙΘΜΩΝ

### 1. ΟΡΙΣΜΟΙ

**§ 230. α')** Τυχαῖοι ἀριθμοὶ π.χ. οἱ  $3, -5, -6, 12, 7, \frac{1}{3}$

ἔκαστος τῶν δόποίων ἀντιστοιχεῖ εἰς ἔνα ἀριθμὸν τῆς φυσικῆς σειρᾶς τῶν ἀριθμῶν  $1, 2, 3, 4, \dots$ , λέγομεν ὅτι ἀποτελοῦν μίαν ἀκολουθίαν ἀριθμῶν. Συνήθως ἔκαστος τῶν διδομένων ἀριθμῶν ἀπὸ τοῦ δευτέρου καὶ ἔξῆς γίνεται ἀπὸ τὸν προηγούμενόν του κατά τινα ὥρισμένον τρόπον π.χ. οἱ  $1, \frac{1}{3}, \frac{1}{5}, \frac{1}{7}, \dots$

Διὰ τοῦτο ἀκολουθία ἀριθμῶν καλεῖται τὸ σύνολον ἀριθμῶν ἀντιστοιχούντων εἰς τοὺς ἀριθμοὺς  $1, 2, 3, \dots$ , ἔκαστος τῶν ὅποιών ( ἀπὸ τοῦ  $\beta'$  καὶ ἐξῆς ) γίνεται ἐκ τοῦ προηγουμένου τούς κατά τινα ὡρισμένον τρόπον.

Οἱ ἀποτελοῦντες τὴν ἀκολουθίαν ἀριθμοὶ λέγονται καὶ ὅροι τῆς ἀκολουθίας.

β') Ἀκολουθία τις ἀριθμῶν λέγεται πεπερασμένου πλήθους ἢ πεπερασμένη μὲν, ἂν ἀποτελῆται ἀπὸ πεπερασμένον πλήθος ὅρων, ἀπέραντος δέ, ἂν εἰς πάντα ἀκέραιον (θετικὸν ἀριθμὸν) ἀντιστοιχῇ εἰς τοιοῦτος τῆς ἀκολουθίας, ὅτε αὕτη ἔχει ἀπειρον πλήθος ὅρων.

Παριστάνομεν συμβολικῶς τὴν ἀκολουθίαν μὲν ( $x_1, x_2, x_3, \dots$ ) ἢ μὲν ( $x_v$ ) καὶ λέγομεν ἡ ἀκολουθία τῶν ἀριθμῶν ἢ τῶν ὅρων  $x_v$ , ὅπου ὑποτίθεται ὅτι τὸ  $v = 1, 2, 3, \dots$ . Π.χ. ἡ ἀκολουθία τῶν ὅρων

$$(x_v) = \left( \frac{1}{v} \right) \text{ εἶναι (ὅταν } v = 1, 2, 3, \dots \text{) ἢ } 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{\rho}, \dots \quad (1)$$

Ἡ ἀκολουθία τῶν ὅρων ( $x_v$ ) =  $(2^v)$  εἶναι ἡ  $2^1, 2^2, 2^3, \dots, 2^\rho, \dots$  (2)

Ἐὰν ἔχωμεν ( $x_v$ ) =  $\left( \frac{v+1}{v} \right)$ , οἱ ὅροι τῆς ἀκολουθίας εἶναι

$$\frac{1+1}{1}, \frac{2+1}{2}, \frac{3+1}{3}, \dots \text{ἢ } \frac{2}{1}, \frac{3}{2}, \frac{4}{3}, \dots, \frac{\rho+1}{\rho}, \dots \quad (3)$$

Ἐὰν ἔχωμεν ( $x_v$ ) =  $\left( \frac{(-1)^{v-1}}{v} \right)$ , οἱ ὅροι τῆς ἀκολουθίας εἶναι

$$\frac{(-1)^{1-1}}{1}, \frac{(-1)^{2-1}}{2}, \frac{(-1)^{3-1}}{3}, \frac{(-1)^{4-1}}{4}, \frac{(-1)^{5-1}}{5}, \dots, \text{ἢτοι οἱ} \\ 1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \dots \quad (4)$$

Ἐὰν εἶναι ( $x_v$ ) =  $(-v)$ , οἱ ὅροι τῆς ἀκολουθίας εἶναι  
-1, -2, -3, -4, ... (5)

Ἡ ἀκολουθία τῶν ὅρων ( $x_v$ ) =  $\left( 1 + \frac{1}{v} \right)^v$  ἀποτελεῖται ἐκ τῶν

$$\left( 1 + \frac{1}{1} \right)^1, \left( 1 + \frac{1}{2} \right)^2, \left( 1 + \frac{1}{3} \right)^3, \left( 1 + \frac{1}{4} \right)^4, \dots$$

ἢτοι ἐκ τῶν  $2, \frac{9}{4}, \frac{64}{27}, \frac{625}{256}, \dots$  (6)

γ') Ἀκολουθία τις λέγεται περιωρισμένη ἂν ἡ ἀπόλυτος τιμὴ ἐκάστου τῶν ὅρων τῆς εἶναι μικροτέρα ἢ ἵση ἀριθμοῦ τίνος ( $A > 0$ ),

ήτοι  $\delta$ ν είναι  $|x_v| \leq A$  ή  $-A \leq x_v \leq A$ , δτε ό  $A$  καλείται φραγμός ή φράγμα τῶν ἀπολύτων τιμῶν τῶν ὅρων τῆς ἀκολουθίας.

Ἐὰν ὑπάρχῃ ἀριθμός τις  $A_1$  τοιοῦτος, ώστε νὰ ἔχωμεν  $A_1 \leq x_v$ , ο  $A_1$  καλείται ἀριστερὸς ή πρὸς τὰ κάτω φραγμός τῆς ἀκολουθίας ( $x_v$ ), ἐνῷ  $\delta$ ν ὑπάρχῃ ἀριθμός τις  $A_2$  τοιοῦτος, ώστε νὰ είναι  $x_v \leq A_2$ , ο  $A_2$  καλείται δεξιός ή πρὸς τὰ ἄνω φραγμός τῆς ἀκολουθίας.

Π.χ. διὰ τὴν (1) ἔχομεν  $\frac{1}{v} < 1$ , ήτοι  $\delta$  1 είναι φραγμός αὐτῆς πρὸς τὰ ἄνω φραγμός ταύτης είναι καὶ πᾶς ἀριθμός  $\kappa > 1$ . Διὰ τὴν (2) ἔχομεν  $2 \leq 2_v$  καὶ είναι αὕτη περιωρισμένη πρὸς τὰ ἀριστερά.

Διὰ τὴν (4) ἔχομεν  $\left| \frac{(-1)^{v-1}}{v} \right| = \left| \frac{\pm 1}{v} \right| \leq 1$  καὶ είναι αὕτη περιωρισμένη πρὸς τὰ δεξιά. Διὰ τὴν (5) ἔχομεν  $-v \leq -1$ , τὸ δὲ  $-1$  είναι φραγμός ταύτης πρὸς τὰ ἄνω.

δ') Ἀκολουθία τις ( $x_v$ ) λέγεται μονοτόνως αὔξουσα ή φθίνουσα, ἐὰν διὰ πάντας τοὺς ὅρους αὐτῆς ἔχωμεν  $x_v \leq x_{v+1}$  ή  $x_v \geq x_{v+1}$  ἀντιστοίχως. Οὕτως ἐκ τῶν ἀνωτέρω ἀκολουθιῶν ή μὲν (2) είναι μονοτόνως αὔξουσα, διότι είναι π.χ.  $2 < 2^2$ , ή  $2^v < 2^{v+1}$  ή  $2^v < 2^{v+1}$ , ή δὲ (1) είναι μονοτόνως φθίνουσα ἐπειδὴ είναι  $\frac{1}{v} > \frac{1}{v+1}$ .

*Παρατήρησις.* 1η. Ἀκολουθία τις ( $x_v$ ), διὰ τὴν δόποίαν ή διαφορὰ ( $x_{v+1}-x_v$ ) είναι σταθερὰ  $\lambda \neq 0$ , είναι ἀριθμητικὴ πρόοδος, αὔξουσα μέν, ἢν  $\lambda > 0$ , φθίνουσα δέ, ἢν είναι  $\lambda < 0$ . Π.χ. ή  $5+3$ ,  $5+3 \cdot 2, \dots, (5+3 \cdot v), \dots$  εἴχει  $\lambda = x - x_{v+1} - x_v = 5 + 3(v+1) - (5+3v) = 3$ .

2α. Ἀκολουθία τις ἀριθμῶν θετικῶν ( $x_v$ ), διὰ τὴν δόποίαν ἔχομεν πηλίκον  $\frac{x_{v+1}}{x_v}$  σταθερὸν  $= \omega \neq 1$ , είναι γεωμετρικὴ πρόοδος, αὔξουσα μέν, ἢν  $|\lambda| > 1$ , φθίνουσα δέ, ἢν  $|\lambda| < 1$ . Π.χ. ή  $\frac{6}{2}, \frac{6}{4}, \dots$  είναι γεωμ. πρόοδος ἔχουσα  $\omega = \frac{6}{2v+1} : \frac{6}{2v} = \frac{1}{2}$ .

## 2. ΠΟΤΕ ΜΙΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ ΤΕΙΝΕΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΗΔΕΝ

§ 231. α') Ἐστω ή ἀπέραντος ἀκολουθία  $\left( \frac{1}{10^v} \right) = \frac{1}{10}, \frac{1}{100}, \dots$

\*Εάν δοθέντος οίουδήποτε άριθμού, π.χ.  $0,0000001$  δυνάμεθα νὰ εύρωμεν ὅρον τῆς ἀκολουθίας, ώστε ἔκαστος τῶν ἐπομένων του ( ἀπείρων εἰς πλῆθος ) νὰ εἴναι ἀπολύτως μικρότερος οίουδήποτε δοθέντος άριθμού π.χ. τοῦ  $0,0000001 = \epsilon$ , τότε λέγομεν ὅτι  $\frac{1}{10^n}$  τείνει εἰς τὸ  $0$  καὶ συμβολίζομεν τοῦτο οὔτως  $\left( \frac{1}{10^n} \right) \rightarrow 0$  ή  $o\left( \frac{1}{10^n} \right) = 0$ . Πράγματι ἔκαστος τῶν ὅρων μετὰ τὸν  $0,0000001$ , οἱ  $0,00000001, 0,000\ 000\ 001, \dots$  εἴναι μικρότερος τοῦ  $\epsilon$  καὶ οὔτως ἔχομεν ὅτι

$$\left( \frac{1}{10^n} \right) \rightarrow 0 \text{ ή } o\left( \frac{1}{10^n} \right) = 0.$$

\*Επίσης ή ἀκολουθία  $\left( \frac{(-1)^{v+1}}{v} \right) = 1, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{3}, -\frac{1}{4}, -\frac{1}{5}, \dots$  (διὰ  $v=1, 2, 3, \dots$ ) τείνει εἰς τὸ μηδέν, διότι ἀν π.χ.  $\epsilon = \frac{1}{900}$ , ή ἀπόλυτος τιμὴ ἔκαστου τῶν ὅρων  $\frac{1}{901}, -\frac{1}{902}, \dots$  εἴναι μικροτέρα τοῦ  $\frac{1}{900}$ .

\*Ἐν γένει λέγομεν ὅτι ἀπέραντος ἀκολουθία ἀριθμῶν ( $x_v$ )  $\rightarrow 0$  ή ἔχει ὅριον τὸ  $0$ , ἀν δοθέντος οίουδήποτε ἀριθμοῦ  $\epsilon > 0$ , (όσονδήποτε μικροῦ) δυνάμεθα νὰ εύρωμεν ἄλλον  $\eta > 0$  καὶ ἀκέραιον τοιοῦτον, ώστε νὰ ἔχωμεν  $|x_{\eta\varepsilon}| < \epsilon, |x_{\eta\varepsilon+1}| < \epsilon, |x_{\eta\varepsilon+2}| < \epsilon$ , ητοι  $|x_v| < \epsilon$  διὰ πᾶσαν ἀκεραίαν τιμὴν τοῦ  $v \geq \eta\varepsilon$ .

β') \*Εστω ή ἀπέραντος ἀκολουθία ( $x_v$ )  $= \frac{(-1)^v}{(v+1)^2}$ , διὰ  $v = 0, 1, 2, 3, \dots$ , ητοι  $\frac{1}{1^2}, \frac{1}{2^2}, \frac{1}{3^2}, \frac{3}{4^2}, \dots$

\*Ἀν δοθῇ  $\epsilon > 0$  καὶ θέλωμεν νὰ εἴναι  $|x_v| < \epsilon$ , ἀρκεῖ νὰ εύρωμεν τὸ  $v$ , ώστε νὰ ἔχωμεν  $|x_v| = \frac{1}{(v+1)^2} < \epsilon$  ή  $(v+1)^2 > \frac{1}{\epsilon}$ ,  $v+1 > \frac{1}{\sqrt{\epsilon}}$  καὶ  $v > \frac{1}{\sqrt{\epsilon}} - 1$ .

\* Ωστε διὰ τιμᾶς ἀκεραίας τοῦ  $v > \frac{1}{\sqrt{\epsilon}} - 1$  θὰ εχωμεν  $|x_v| < \epsilon$  καὶ ἐπομένως ή δοθεῖσα ἀκολουθία τείνει εἰς τὸ  $0$  ή ἔχει ὅριον τὸ  $0$ .

γ') Λέγομεν ὅτι ἀπέραντος ἀκολουθία ἀριθμῶν  $x$  τείνει ή ἔχει ὅριον τὸ ἄπειρον καὶ σημειώνομεν τοῦτο μὲ  $(x_v) \rightarrow \infty$  ή  $o(x_v) = \infty$ , ἀν δοθέντος οίουδήποτε ἀριθμοῦ  $M > 0$  (όσονδήποτε μεγάλου)

δυνάμεθα νὰ εὔρωμεν ἄλλον ἀκέραιον  $H_M > 0$  τοιοῦτον, ώστε διὰ  $v > H_M$  νὰ ἔχωμεν  $x_v > M$ .

Π.χ. ή ἀκολουθία  $1, 2, 3, 4, \dots$  τείνει εἰς τὸ  $\infty$ . Διότι ἂν π.χ.  $M = 315\,687$ , ἔχομεν  $H = 315\,688$  καὶ διὰ  $v > 315\,688$  εἶναι οἱ  $31\,5688, 31\,5689, \dots > 31\,5687$ . ἦτοι ή ἀκολουθία  $(x_v) \rightarrow \infty$  η  $\text{o}p(x_v) = \infty$

Λέγομεν ὅτι ἀκολουθία τις ἀριθμῶν  $(x_v)$  τείνει ή ὅτι ἔχει ὅριον ἀριθμὸν ὥρισμένον  $A$ . ἐὰν ή ἀκολουθία  $(x_v - A) \rightarrow 0$ .

Π.χ. ή ἀκολουθία  $(x_v) = \frac{v+1}{v}$  (διὰ  $v = 1, 2, 3, \dots$ ) τείνει εἰς τὴν 1.

Διότι ή ἀκολουθία  $\left( \frac{v+1}{v} - 1 \right) \rightarrow 0$ . Πράγματι ἔχομεν  $\left( \frac{v+1}{v} - 1 \right) = \frac{1}{v}$  καὶ ή  $\left( \frac{1}{v} \right) \rightarrow 0$ , ἕπει  $\left( \frac{v+1}{v} \right) \rightarrow 1$ .

Η ἀκολουθία  $5 \frac{1}{2}, 5 \frac{1}{4}, \dots 5 \frac{1}{2v}, \dots$  ἔχει ὅριον τὸ 5. Διότι ἀκολουθία  $5 \frac{1}{2} - 5, 5 \frac{1}{4} - 5, \dots, 5 \frac{1}{2v} - 5, \dots$ , ἦτοι ή  $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{2v}, \dots$  ἔχει ὅριον τὸ 0.

Όμοίως ή ἀκολουθία  $-11, -11 \frac{1}{2}, -11 \frac{2}{3}, -11 \frac{3}{4}, \dots$  ἔχει ὅριον τὸ  $-12$ . Διότι ή  $-11 - (-12), -11 \frac{1}{2} - (-12), -11 \frac{2}{3} - (-12)$ , ἦτοι ή  $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots$  ἔχει ὅριον τὸ 0.

### 3. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

α') 'Εὰν ή ἀπέραντος ἀκολουθία ἀριθμῶν  $(x_v) \rightarrow 0$ , τότε ή  $|x_v| \rightarrow 0$ · καὶ ἀντιστρόφως. Τοῦτο ἔπειται ἐκ τοῦ ὥρισμοῦ, καθ' ὃν ή ἀκολουθία  $(x_v) \rightarrow 0$ .

β') 'Εὰν ή ἀκολουθία  $(x_v \rightarrow 0)$ , τότε ή  $\left( \frac{1}{x_v} \right) \rightarrow \infty$ .

Έστω ἀριθμὸς  $M > 0$  (όσονδήποτε μεγάλος). Λέγομεν ὅτι ύπαρχει ἀριθμὸς  $\eta_M > 0$  θετικὸς ἀκέραιος, ώστε διὰ  $\eta_M > 0$  νὰ εἶναι  $\left| \frac{1}{x_v} \right| > M$ . Πράγματι, ἀφοῦ  $(x_v) \rightarrow 0$ , ύπαρχει ἀριθμὸς  $\eta_M > 0$ , ώστε ἂν  $v > \eta_M$ , νὰ ἔχωμεν  $|x_v| < \frac{1}{M}$ , ἕπει  $M \cdot |x_v| < 1$ , η  $M < \frac{1}{|x_v|}$ .

Δηλαδή διὰ  $v > \eta_v$  έχομεν  $|\frac{1}{x_v}| > M$ . Ούτως, ή μὲν ἀκολουθία  $(1, \frac{1}{4}, \frac{1}{9}, \frac{1}{16}, \dots \frac{1}{v^2}, \dots) \rightarrow 0$ , ή δὲ  $(1, 4, 9, 16, \dots v^2, \dots) \rightarrow \infty$ .

Εὐκόλως ἀποδεικνύεται καὶ ὅτι, ἂν  $\text{op}(x_v) = \infty$ , ή  $(\frac{1}{x_v}) \rightarrow 0$ .

\*Ἐὰν  $(x_v) \rightarrow 0$ , καὶ  $(\lambda x_v) \rightarrow 0$ , ἂν λ σταθερὰ ποσότης. Διότι, ἀφοῦ  $|x_v| < \epsilon$  διὰ  $v > \eta$ , θὰ εἰναι  $|\lambda x_v| = |\lambda| \cdot |x_v| < |\lambda| \cdot \epsilon$ , τὸ δὲ  $|\lambda| \cdot \epsilon$  δύναται νὰ γίνη δσονδήποτε μικρόν, ὅταν γίνεται τὸ ε δσον θέλομεν μικρόν, ἥτοι  $(\lambda x_v) \rightarrow 0$ .

γ') \*Ἐὰν αἱ ἀκολουθίαι  $(x_v) \rightarrow 0$  ή  $\text{op}(x_v) = 0$ ,  $(x'_v) \rightarrow 0$  ή  $\text{op}(x'_v) = 0$ , θὰ εἰναι :

1ον.  $(x_v + x'_v) \rightarrow 0$  ή  $\text{op}(x_v + x'_v) = 0$ .

2ον.  $(x_v - x'_v) \rightarrow 0$  ή  $\text{op}(x_v - x'_v) = 0$ .

3ον.  $(x_v \cdot x'_v) \rightarrow 0$  ή  $\text{op}(x_v \cdot x'_v) = 0$ .

1ον. Διότι, ἂν θέσωμεν  $x_v + x'_v = \psi_v$ , θὰ ἔχωμεν προφανῶς  $|\psi_v| = |x_v + x'_v| \leq |x_v| + |x'_v|$ . \*Ἐὰν δοθῇ ἀριθμὸς  $\epsilon > 0$ , θὰ εἰναι καὶ  $\frac{\epsilon}{2} > 0$ , δυνάμεθα δὲ νὰ εύρωμεν ἀνὰ ἓνα ἀριθμὸν  $\eta_1 > 0$ ,  $\eta_2 > 0$ , ώστε νὰ ἔχωμεν  $|x_v| < \frac{\epsilon}{2}$  διὰ  $v > \eta_1$  καὶ  $|x'_v| < \frac{\epsilon}{2}$  διὰ  $v > \eta_2$ , ἀφοῦ  $(x_v) \rightarrow 0$  καὶ  $(x'_v) \rightarrow 0$ . \*Αν παρασταθῇ μὲν η ὁ μεγαλύτερος τῶν  $\eta_1$ ,  $\eta_2$ , θὰ ἔχωμεν διὰ  $v > \eta$  τὸ  $|\psi_v| \leq |x_v| + |x'_v| < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon$ , ἥτοι  $|\psi_v| \rightarrow 0$ , δηλαδὴ  $(x_v + x'_v) \rightarrow 0$ .

2ον. \*Επειδὴ εἰναι  $|x_v - x'_v| = |x_v + (-x'_v)| \leq |x_v| + |-x'_v| = |x_v| + |x'_v|$ , ἥτοι  $|x_v - x'_v| \leq |x_v| + |x'_v| < \epsilon$ , ἔπειται ὅτι καὶ  $(x_v - x'_v) \rightarrow 0$  ή  $\text{op}(x_v - x'_v) = 0$ .

3ον. Προφανῶς ἔχομεν  $|x_v \cdot x'_v| = |x_v| \cdot |x'_v|$  καὶ ἂν  $\epsilon > 0$  εἰναι καὶ  $\sqrt{\epsilon} > 0$ . \*Αν λοιπὸν δοθέντος τοῦ  $\epsilon > 0$  εύρεθοῦν οἱ  $\eta_1 > 0$ ,  $\eta_2 > 0$  τοιοῦτοι, ώστε νὰ εἰναι  $|x_v| < \sqrt{\epsilon}$  διὰ  $v > \eta_1$ , καὶ  $|x'_v| < \sqrt{\epsilon}$  διὰ  $v > \eta_2$ , τὸ δὲ η παριστάνη τὸν μεγαλύτερον ἐκ τῶν  $\eta_1$ ,  $\eta_2$ , θὰ ἔχωμεν διὰ  $v > \eta$  τὸ  $|x_v| < \sqrt{\epsilon}$  καὶ  $|x'_v| < \sqrt{\epsilon}$ . \*Αρα καὶ  $|x_v| \cdot |x'_v| < \sqrt{\epsilon} \cdot \sqrt{\epsilon} = \epsilon$ .

\*Επομένως εἰναι  $|x_v| \cdot |x'_v| < \epsilon$ , ἥτοι ἔχομεν  $(x_v \cdot x'_v) \rightarrow 0$  ή  $\text{op}(x_v \cdot x'_v) = 0$ .

Π.χ. ጥν ᔁχωμεν τὰς ἀκολουθίας  $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{v}, \dots$  καὶ  $\frac{1}{2}, \frac{1}{2^2},$   
 $\frac{1}{2^3}, \dots, \frac{1}{2^v}, \dots$  ἐκάστη τῶν ὅποιων τείνει εἰς τὸ 0, τότε ἡ  $(1 \pm \frac{1}{2})$ ,  
 $(\frac{1}{2} \pm \frac{1}{2^2}), (\frac{1}{3} \pm \frac{1}{2^3}), \dots, (\frac{1}{v} \pm \frac{1}{2^v}), \dots$  καθώς καὶ ἡ  $\frac{1}{2}, \frac{1}{2 \cdot 2^2}, \frac{1}{3 \cdot 2^3}, \dots, \frac{1}{v \cdot 2^v}, \dots$  τείνουν εἰς τὸ 0.

### Ἄσκήσεις

642. Νὰ εύρεθῇ εἰς κατώτερος φραγμὸς τῆς ἀκολουθίας 1, 3, 9, 27, ..., 3<sup>v</sup>, ...  
 Υπάρχει πεπερασμένος ἀριθμός, δστις νὰ είναι ἀνώτερος φραγμὸς τῆς ἀκολουθίας ταύτης καὶ διατί;

643. Αἱ ἀκολουθία, αἱ ὀποῖαι τείνουν εἰς τὸ +∞, ᔁχουν ἀνωτέρους ρρταγμούς;  
 Διατί; Ἡ ἀκολουθία  $-1, +1, -1, +1, \dots, (-1)^v, \dots$  τείνει πρὸς ἀριθμόν τινα;

644. Νὰ εύρεθῇ:

α') Ο 10ος ὅρος τῆς ἀκολουθίας 5, 100, 1125, ...,  $v^2 \cdot 5^v, \dots$

β') Ο 5ος      »      »      »       $\frac{3}{2}, \frac{9}{\sqrt{2}-1}, \frac{27}{\sqrt{3}+1}, \dots, \frac{3^v}{\sqrt{v}-(-1)^v}, \dots$

γ') Ο 7ος      »      »      »       $2, 1, \frac{3}{5}, \dots, \frac{v+3}{v^2+1}, \dots$

645. Δίδεται ἡ ἀκολουθία  $1, \frac{1}{4}, \frac{1}{9}, \dots, \frac{1}{v^2}, \dots$  Νὰ εύρεθῇ ἀριθμὸς  $\eta$ , ὃστε ጥν  $v > \eta$ , νὰ ᔁχωμεν  $\frac{1}{v^2} < 0,35$ . Ἐπίσης νὰ ᔁχωμεν  $\frac{1}{v^2} < 0,00001$ .

646. Δείξατε ὅτι, ጥν  $(x_v) \rightarrow \alpha$  ἡ  $\text{o}\rho(x_v) = \alpha$ ,  $(\lambda x_v) \rightarrow \lambda\alpha$  ἡ  $\text{o}\rho(\lambda x_v) = \lambda\alpha$ ,  $\lambda$  σταθερὰ ποσότης. Δείξατε ὅτι ጥν  $(x_v) \rightarrow \alpha$  ἡ  $\text{o}\rho(x_v) = \alpha$ ,  $(x'_v) \rightarrow \beta$  ἡ  $\text{o}\rho(x'_v) = \beta$ .

1ον) Τότε  $(x_v + x_v) \rightarrow \alpha + \beta$  ἡ  $\text{o}\rho(x_v + x'_v) = \text{o}\rho x_v + \text{o}\rho x'_v$ .

2ον) Είναι  $(x_v \cdot x'_v) \rightarrow \alpha \cdot \beta$  ἡ  $\text{o}\rho(x_v \cdot x'_v) = \alpha \cdot \beta = \text{o}\rho x_v \cdot \text{o}\rho x'_v$ .

3ον)  $\left( \frac{x_v}{x'_v} \right) \rightarrow \frac{\alpha}{\beta}$  ἡ  $\text{o}\rho\left( \frac{x_v}{x'_v} \right) = \frac{\alpha}{\beta} = \frac{\text{o}\rho x_v}{\text{o}\rho x'_v}$  ጥν ( $\beta \neq 0$ ).

647. Δίδεται ἡ ἀκολουθία  $6 \frac{1}{2}, 6 \frac{2}{3}, \dots, 6 \frac{v}{v+1}, \dots$  Νὰ εύρεθῇ ἀριθμὸς  $\eta > 0$

ῷστε, ጥν  $v \geq \eta$ , νὰ είναι  $|6 + \frac{v}{v+1}| - 7 | < 0,0025$ .

648. Γενικώτερον εὔρετε τὸν  $\eta$ , ὃστε νὰ είναι  $|6 + \frac{v}{v+1} - 7| < \epsilon$ , δπου  $\epsilon > 0$  δσονδήποτε μικρός. Τί συμπεραίνετε περὶ τῆς μεταβλητῆς, ἡ ὀποία λαμβάνει τὰς τιμὰς τῆς ἀκολουθίας ταύτης;

649. Δίδονται αἱ ἀκολουθίαι  $x_v = 5 + \frac{1}{v}$  καὶ  $\psi_\mu = 6 - \frac{1}{\mu^2}$ . Δείξατε ὅτι αῦται τείνουν εἰς τοὺς ἀριθμούς 5 καὶ 6, δταν  $v \rightarrow \infty$  καὶ  $\mu \rightarrow \infty$ .

#### 4. ΠΕΡΙ ΟΡΙΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΟΣ

**§ 232.** "Ορισμοί. α')" Εάν μεταβλητή ποσότης, έστω  $x$ , λαμβάνη διαδοχικῶς ώς τιμὰς τοὺς ὅρους μιᾶς ἀπεράντου ἀκολουθίας ἀριθμῶν ( $x_v$ ), λέγομεν ὅτι ὅριον τῆς  $x$  εἶναι τὸ 0, ἢν ( $x_v$ ) $\rightarrow 0$  ἢ  $\text{ορ}(x_v) = 0$ , σημειώνομεν δὲ τοῦτο μὲ  $x \rightarrow 0$  ἢ  $\text{ορ}x = 0$ . Π.χ. ἢν  $x$  λαμβάνη τὰς τιμὰς  $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots, \frac{1}{v+1}, \dots$ , ἐπειδὴ εἶναι  $\left(\frac{1}{v}\right) \rightarrow 0$ , λέγομεν ὅτι  $x \rightarrow 0$  ἢ  $\text{ορ}x = 0$ .

β') Λέγομεν ὅτι ὅριον μεταβλητῆς  $x$  εἶναι ἀριθμός τις ὡρισμένος  $\alpha$ , ἔὰν  $\forall x$  λαμβάνη διαδοχικῶς ώς τιμὰς τοὺς ὅρους μιᾶς ἀπεράντου ἀκολουθίας ἀριθμῶν ( $x_v$ ) καὶ  $\forall (x_v - \alpha) \rightarrow 0$  ἢ  $\text{ορ}(x_v - \alpha) = 0$ . Σημειώνομεν δὲ τοῦτο μὲ  $(x - \alpha) \rightarrow 0$  ἢ  $x \rightarrow \alpha$  ἢ  $\text{ορ}x = \alpha$ .

"Ἄν  $x \rightarrow 0$  ἢ  $\text{ορ}x = 0$ , τότε καὶ  $kx \rightarrow 0$  ἢ  $\text{ορ}(kx) = 0$ , ὅπου τὸ  $k$  εἶναι ἀριθμός τις ὡρισμένος (σταθερός). Διότι ὅταν  $\forall x^v \rightarrow 0$  ἢ  $\text{ορ}x = 0$  καὶ  $\forall kx \rightarrow 0$  ἢ  $\text{ορ}(kx) = 0$ .

'Ἐκ τούτου ἐπεταί  $\forall x \rightarrow \alpha$  ἢ  $\text{ορ}x = \alpha$ , τὸ  $kx \rightarrow ka$  ἢ  $\text{ορ}(kx) = ka$ , ὅπου  $k$  παριστάνει ὡρισμένον τινὰ (σταθερὸν) ἀριθμόν. Διότι ὅταν  $x \rightarrow \alpha$ , τὸ  $(x - \alpha) \rightarrow 0$  καὶ  $k(x - \alpha) \rightarrow 0$  ἢ  $(kx - ka) \rightarrow 0$ , ἄρα  $kx \rightarrow ka$  ἢ  $\text{ορ}(kx) = ka$ .

γ') Λέγομεν ὅτι ὅριον μεταβλητῆς  $x$  εἶναι τὸ ἄπειρον ( $\infty$ ), ἢν  $\forall x$  λαμβάνη διαδοχικῶς τὰς τιμὰς τῶν ὅρων ἀπεράντου ἀκολουθίας ἀριθμῶν, ἢ  $\delta$ ποία τείνει εἰς τὸ ἄπειρον, τὸ σημειώνομεν δὲ μὲ  $x \rightarrow \infty$  ἢ  $\text{ορ}x = \infty$ . εἶναι προφανὲς ὅτι, ἢν  $x \rightarrow 0$  ἢ  $\text{ορ}x = 0$ , θὰ ἔχωμεν τὸ  $\frac{1}{x} \rightarrow \infty$  ἢ  $\text{ορ} \frac{1}{x} = \infty$ , καὶ ἀντιστρόφως, ἢν  $\frac{1}{x} \rightarrow \infty$  ἢ  $\text{ορ} \frac{1}{x} = \infty$ , θὰ ἔχωμεν καὶ  $x \rightarrow 0$  ἢ  $\text{ορ}x = 0$ .

#### 5. ΠΕΡΙ ΟΡΙΟΥ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΟΣ, ΓΙΝΟΜΕΝΟΥ, ΠΗΛΙΚΟΥ, ΔΥΝΑΜΕΩΣ, ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

**§ 233. α')** Εάν  $x \rightarrow \alpha$  ἢ  $\text{ορ}x = \alpha$ ,  $\psi \rightarrow \beta$  ἢ  $\text{ορ}\psi = \beta$ , τότε  $(x + \psi) \rightarrow (\alpha + \beta)$  ἢ  $\text{ορ}(x + \psi) = \text{ορ}x + \text{ορ}\psi$ .

Διότι ἢν  $x_v$  καὶ  $\psi_v$  εἶναι αἱ ἀκολουθίαι τῶν τιμῶν τοῦ  $x$  καὶ  $\psi$ , ἐπειδὴ αἱ  $(x_v - \alpha) \rightarrow 0$  καὶ  $(\psi_v - \beta) \rightarrow 0$ , καὶ  $\forall (x_v + \psi_v - \alpha - \beta) \rightarrow 0$ , ἥτοι  $\text{ορ}(x + \psi - \alpha - \beta) \rightarrow 0$ , ἄρα  $(x + \psi) \rightarrow (\alpha + \beta)$  ἢ  $\text{ορ}(x + \psi) = \text{ορ}\psi + \text{ορ}x$ . Ἡ ιδιότης αὕτη ἴσχυει δι' ὁσασδήποτε μεταβλητὰς  $x, \psi$ ,

ω,... ἔχούσας ὅρια, ἀλλ' ὅταν τὸ πλῆθος αὐτῶν εἶναι πεπέρασμένον. Διότι, ἂν ἔχωμεν π.χ. τὸ ἄθροισμα μὲν ἄπειρον πλῆθος προσθετέων  $\frac{1}{x} + \frac{1}{x} + \frac{1}{x} + \dots$ , διότι  $x \rightarrow \infty \Rightarrow 0 \neq \text{o}p \frac{1}{x} = 0$ . Ἐπομένως τὸ ἄθροισμα τῶν ἀπείρων τὸ πλῆθος προσθετέων θὰ ἔτεινε πρὸς τὸ 0, ἂν ἴσχυεν ἡ ἴδιότης, ἐνῷ τὸ ἄθροισμα τοῦτο (τοῦ  $x$  αὐξανομένου διηνεκῶς) δύναται νὰ ἀντικατασταθῇ ὑπὸ τοῦ  $\frac{x}{x} = 1$ .

β') "Αν  $x \rightarrow 0 \Rightarrow \text{o}p x = 0$ ,  $\psi \rightarrow 0 \Rightarrow \text{o}p \psi = 0$ , θὰ ἔχωμεν καὶ  $(x\psi) \rightarrow 0 \Rightarrow \text{o}p(x\psi) = \text{o}p x \cdot \text{o}p \psi$ . Διότι, ἀφοῦ  $x \rightarrow 0$ ,  $\psi \rightarrow 0$ , ἔτοντας  $(x_v)$  καὶ  $(\psi_v)$  εἶναι αἱ ἀκολουθίαι τῶν τιμῶν τοῦ  $x$  καὶ  $\psi$ , θὰ τείνῃ ἐκάστη τούτων εἰς τὸ 0, ἀρα καὶ  $(x_v \psi_v) \rightarrow 0$ , ἤτοι  $x\psi \rightarrow 0 \Rightarrow \text{o}p(x\psi) = \text{o}p x \cdot \text{o}p \psi$ .

"Αν ἔχωμεν  $x = \alpha$ ,  $\psi = \beta$ , διότι  $\alpha$ ,  $\beta$  εἶναι σταθεραὶ ποσότητες, θὰ εἶναι  $(x\psi) \rightarrow \alpha\beta \Rightarrow \text{o}p(x\psi) = \text{o}p x \cdot \text{o}p \psi = \alpha\beta$ . Διότι, ἀφοῦ  $x \rightarrow \alpha$  καὶ  $\psi \rightarrow \beta$ , ἀν  $(x_v)$  καὶ  $(\psi_v)$  εἶναι αἱ ἀκολουθίαι τῶν τιμῶν  $x$ ,  $\psi$ , θὰ εἶναι  $(x_v - \alpha) \rightarrow 0$  καὶ  $(\psi_v - \beta) \rightarrow 0$ . "Αρα καὶ ἡ ἀκολουθία  $\{ (x_v - \alpha)(\psi_v - \beta) \} \rightarrow 0 \Rightarrow [ (x_v \psi_v) - (\alpha\psi_v) - (\beta x_v) + \alpha\beta ] \rightarrow 0$ .

Ἐφαρμόζοντες τὸν κανόνα περὶ ὁρίου ἀθροίσματος ἔχομεν  $\text{o}p(x_v \psi_v) + \text{o}p[-(\alpha\psi_v)] + \text{o}p[-(\beta x_v)] + \alpha\beta = 0$ .

Ἐπειδὴ δέ  $\text{o}p(\beta x_v) = \beta\alpha$  καὶ  $\text{o}p(\alpha\psi_v) = \alpha\beta$ , ἐπεταῖ ὅτι :

$\text{o}p(x_v \psi_v) = \alpha\beta + \alpha\beta - \alpha\beta = \alpha\beta \Rightarrow \text{o}p(x_v \psi_v) = \alpha\beta = \text{o}p x \cdot \text{o}p \psi$ .

Ἡ ἴδιότης αὗτη περὶ τοῦ γινομένου μεταβλητῶν ποσοτήτων ἴσχυει καὶ διὰ περισσοτέρους παράγοντας, ἀλλὰ πεπερασμένους τὸ πλῆθος.

γ') Τὸ ὅριον τοῦ πηλίκου δύο μεταβλητῶν ποσοτήτων ἔχουσῶν ὅρια ἵσοῦται μὲν τὸ πηλίκον τοῦ ὁρίου τοῦ διαιρετέου διὰ τοῦ ὁρίου τοῦ διαιρέτου (ὅταν τὸ ὅριον τούτου εἶναι  $\neq 0$ ).

Ἐστω ὅτι  $\text{o}p x = \alpha$ ,  $\text{o}p \psi = \beta (\neq 0)$ . Θὰ δείξωμεν ὅτι  $\text{o}p \frac{x}{\psi} = \frac{\text{o}p x}{\text{o}p \psi} = \frac{\alpha}{\beta}$ . Διότι ἀν  $x_v$ ,  $\psi_v$  εἶναι ἀκολουθίαι τῶν  $x$ ,  $\psi$  ἀντιστοίχως, θὰ εἶναι  $\text{o}p(x_v) = \alpha$ ,  $\text{o}p(\psi_v) = \beta$  καὶ  $\text{o}p(\psi_v - \beta) = 0$ , ἀρα  $|\psi_v - \beta| < \epsilon = \frac{1}{2} |\beta|$ .

Ἄλλα ἔχομεν  $|\psi_v| = |\beta + (\psi_v - \beta)| \geq |\beta| - |\psi_v - \beta|$  καὶ  $|\psi_v| >$

$|\beta| - \frac{1}{2} |\beta| = \frac{1}{2} |\beta|$ , ήτοι  $|\psi| > \frac{1}{2} |\beta|$  και  $|\frac{1}{\psi}| < \frac{2}{|\beta|}$ . Ούτως, ό αριθμός  $\frac{2}{|\beta|}$  είναι (δεξιός) φραγμός τής άκολουθίας  $\frac{1}{\psi}$ .

Σχηματίζομεν τήν διαφοράν

$$\frac{x_v}{\psi_v} - \frac{\alpha}{\beta} = \frac{\beta x_v - \alpha \psi_v}{\beta \psi_v} = \frac{\beta(x_v - \alpha) - \alpha(\psi_v - \beta)}{\beta \psi_v}$$

και παρατηροῦμεν ότι ό (άριθμητής)  $\beta(x_v - \alpha) - \alpha(\psi_v - \beta)$  είναι άκολουθία τείνουσα είς τὸ μηδέν, διότι  $\text{op}[\beta(x_v - \alpha) - \alpha(\psi_v - \beta)] = \beta \text{op}(x_v - \alpha) - \alpha \text{op}(\psi_v - \beta) = 0$ , ἔκαστος δὲ ὅρος της πολλαπλασιάζεται άντιστοίχως ἐπὶ  $\frac{1}{\beta \cdot \psi_v} = \frac{1}{\beta} \cdot \frac{1}{\psi_v}$ , τὸ ὅπερ είναι μικρότερον ὀρισμένου άριθμοῦ, τοῦ  $\frac{1}{\beta} \frac{2}{|\beta|}$ . Ἀρα είναι  $\text{op}\left(\frac{x_v}{\psi_v} - \frac{\alpha}{\beta}\right) = 0$  και  $\text{op}\frac{x_v}{\psi_v} = \frac{\alpha}{\beta} = \frac{\text{op}x_v}{\text{op}\psi_v}$  ή  $\text{op}\frac{x}{\psi} = \frac{\text{op}x}{\text{op}\psi}$ .

Εύκολως δεικνύεται ότι ἂν  $x \rightarrow \alpha$  ή  $\text{op}x = \alpha$ , τότε  $(x^\mu) \rightarrow \alpha^\mu$  ή  $\text{op}(x^\mu) = \alpha^\mu = (\text{op}x)^\mu$ .

"Εστω α') δ μ ἀκέραιος και θετικός. "Έχομεν  $x^\mu = x \cdot x \cdots x$ . "Αρα  $\text{op}(x^\mu) = \text{op}(x \cdot x \cdots x) = \text{op}x \cdot \text{op}x \cdots \text{op}x = (\text{op}x)^\mu = \alpha^\mu$ .

β') "Αν ό μ είναι άρνητικός, ἔστω  $\mu = -|\nu|$ , έχομεν  $x^{-\nu} = \frac{1}{x^{|\nu|}}$  και  $\text{op}(x^{-|\nu|}) = \text{op}\left(\frac{1}{x^{|\nu|}}\right) = \frac{1}{(\text{op}x^{|\nu|})} = \frac{1}{\text{op}(x)^{|\nu|}} = (\text{op}x)^{-|\nu|} = (\text{op}x)^\mu = \alpha^\mu$ .

γ') "Αν τὸ μείναι κλασματικός άριθμός, π.χ.  $\mu = \frac{k}{\lambda}$ , θέτομεν  $\psi = x^{\frac{k}{\lambda}}$ , οτε (ύψουντες τὰ ἵσα είς τὴν λ δύναμιν) εύρισκομεν  $\psi^\lambda = x^k$  και  $\text{op}(\psi^\lambda) = \text{op}(x^k) \text{ ή } (\text{op}\psi)^\lambda = (\text{op}x)^k$ , ἐκ τοῦ ὅποιού εύρισκομεν  $\text{op}\psi = (\text{op}x)^{\frac{k}{\lambda}}$  ήτοι  $\text{op}\left(x^{\frac{k}{\lambda}}\right) = (\text{op}x)^{\frac{k}{\lambda}} = (\text{op}x)^\mu$ . Κατὰ ταῦτα  $\text{op}V_{\bar{x}} = V_{\overline{\text{op}x}}$ . "Αν λοιπὸν είναι  $\text{op}x = \alpha$ , τότε  $\text{op}V_{\bar{x}} = V_{\overline{\text{op}x}} = V_{\bar{\alpha}}$ .

## 6. ΠΩΣ ΔΙΑΚΡΙΝΟΜΕΝ ΑΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΠΟΣΟΤΗΣ ΕΧΗ ΟΡΙΟΝ

§ 234. "Εάν αἱ ἄπειροι εἰς πλῆθος τιμαὶ μεταβλητῆς ποσότητος βαίνουν αὐξανόμεναι, μένουν δὲ (ἀπό τινος και ἔξῆς) μικρότεραι διοθέντος άριθμοῦ, ή μεταβλητὴ ἔχει ὅριον ίσον ή μικρότερον τοῦ άριθμοῦ, ήτοι, ἂν  $x_v < A$ , ή άκολουθία  $(x_v) \rightarrow \alpha \leq A$ .

"Εστω ὅτι αἱ τιμαὶ τῆς μεταβλητῆς χριστιανούντων αὐξανόμεναι, ἀλλὰ μένουν μικρότεραι ἀριθμοῦ τίνος Α.

"Αν ὁ Α περιλαμβάνεται, π.χ. μεταξὺ τῶν ἀκεραίων ἀριθμῶν 5 καὶ 6, αἱ τιμαὶ τοῦ χριστιανούντων αὐξανόμεναι νὰ ὑπερβαίνουν τινὰς ἐκ τῶν 0, 1, 2, 3, 4, 5, ἀλλὰ θὰ μένουν μικρότεραι τοῦ 6, ἐπειδὴ αὗται μένουν μικρότεραι τοῦ Α < 6.

"Ας ὑποθέσωμεν λοιπὸν ὅτι ὁ μεγαλύτερος ἀκέραιος, τὸν ὅποιον ὑπερβαίνουν αἱ τιμαὶ τοῦ χριστιανούντων καὶ ἔχῃς, εἶναι ὁ 5. Σχηματίζομεν τοὺς ἀριθμοὺς 5. 5,1. 5,2. 5,3. 5,4. 5,5. 5,6. 5,7. 5,8. 5,9. 6.

"Ἐπειδὴ αἱ τιμαὶ τοῦ χριστιανούντων αὐξανόμεναι καὶ εἶναι μεγαλύτεραι τοῦ 5, θὰ ὑπερβαίνουν ἀπό τίνος καὶ ἔχῃς ἀριθμούς τινὰς ἐκ τῶν ἀνωτέρω, ἔστω καὶ τὸν 5,7, ἀλλὰ ἔστω ὅτι θὰ εἶναι μικρότεραι π.χ. τοῦ 5,8.

Σχηματίζομεν τώρα τοὺς ἀριθμοὺς 5,7. 5,71. 5,72. 5,73. 5,74. 5,75. 5,76. 5,77. 5,78. 5,79. 5,8.

Παρατηροῦμεν πάλιν ὅτι, ἐπειδὴ αἱ τιμαὶ τοῦ χριστιανούντων αὐξανόμεναι καὶ εἶναι ἀπό τίνος καὶ ἔχῃς μεγαλύτεραι τοῦ 5,7, θὰ ὑπερβαίνουν αὗται ἀπό τίνος καὶ ἔχῃς τινὰς ἐκ τῶν ἀνωτέρω τελευταίων ἀριθμῶν, ἀλλὰ δὲν φθάνουν τὸ 5,8 ( ως εἰδομεν ).

"Εστω ὁ μεγαλύτερος ἀριθμὸς ἐκ τῶν ἀνωτέρω τελευταίων, τὸν ὅποιον ὑπερβαίνουν αἱ ἐν λόγῳ τιμαὶ ὁ 5,73, καὶ ὅτι αὗται θὰ μένουν μικρότεραι τοῦ 5,74.

"Ἐξακολουθοῦμεν καθ' ὅμοιον τρόπον καὶ θὰ ἔχωμεν π.χ. ὅτι αἱ τιμαὶ τοῦ χριστιανούντων τὸν ἀριθμὸν 5,738426, ἀλλὰ δὲν φθάνουν τὸν 5,738427, ὅστις διαφέρει τοῦ 5,738426 κατὰ ἐν ἑκατομμυριοστόν. Ἐὰν ἐξακολουθήσωμεν ὅμοιώς ὅσον θέλομεν, θὰ εὔρωμεν ὅτι αἱ τιμαὶ τοῦ χριστιανούντων καὶ ἔχῃς περιέχονται μεταξὺ δύο ἀριθμῶν, τῶν ὅποιων ἡ διαφορὰ εἶναι ἵση μὲν δεκαδικὴν μονάδα τῆς τελευταίας δεκαδικῆς τάξεως, τὴν ὅποιαν περιέχουν οἱ ἐν λόγῳ ἀριθμοί.

"Αν τὸν μικρότερον τῶν ἀριθμῶν τούτων παραστήσωμεν μὲν α, αἱ τιμαὶ τοῦ χριστιανούντων ( ἀπό τίνος καὶ ἔχῃς ) διαφέρουν ἀποτολύτως ἀπό τὸν α κατὰ ποσότητα ὅσον θέλομεν μικράν, ἐὰν ἐξακολουθήσωμεν ὅσον θέλομεν διὰ τὸν προσδιορισμὸν περισσοτέρων δεκαδικῶν ψηφίων τοῦ α. Ἐπομένως εἶναι ὅριον τοῦ χριστιανούντων = α, τὸ δόποιον εἶναι μικρότερον τοῦ Α ἢ τὸ πολὺ ἵσον μὲν Α

Τὸ τελευταῖον τοῦτο θὰ συμβαίνῃ, ἐὰν αἱ τιμαὶ τοῦ χριστιανούντων

καὶ ἔξῆς διαφέρουν ἀπολύτως τοῦ A κατὰ ποσότητα ὅσον θέλομεν μικράν, ὥστε νὰ ἔχωμεν ἐν γένει τὸ ὄριον τοῦ  $x \leq A$ .

‘Ομοίως γίνεται ἡ ἀπόδειξις, ἂν ἀντὶ τῶν ἀκεραίων 5 καὶ 6 ὑποθέσωμεν ὅτι ὁ A περιλαμβάνεται μεταξὺ δύο διαδοχικῶν ἀκεραίων, π.χ. τῶν ρ καὶ ρ + 1 (ἐνῷ ὁ ρ δύναται νὰ εἴναι θετικὸς ἢ ἀρνητικὸς ἢ 0).

Κατ’ ἀνάλογον τρόπον ἀποδεικνύεται ὅτι, ἐὰν οἱ ἀπειροὶ εἰς πλήθος τιμαὶ μεταβλητῆς ποσότητος βαίνουν ἐλαττούμεναι, ἀλλὰ μένουν (ἀπό τινος καὶ ἔξῆς) μεγαλύτεραι δοθέντος ἀριθμοῦ B, ἤτοι ἂν  $x_v \geq B$ , τότε ἡ ἀκολουθία ( $x_v$ ) → β  $\geq B$ .

Διότι, ἂν π.χ. αἱ τιμαὶ τοῦ x βαίνουν ἐλαττούμεναι καὶ εἴναι πάντοτε μεγαλύτεραι τοῦ B (ἀπό τινος καὶ ἔξῆς), τότε αἱ τιμαὶ τοῦ -x θὰ βαίνουν αὐξανόμεναι καὶ θὰ μένουν μικρότεραι τοῦ -B. Ὅαρα θὰ ἔχωμεν  $op(-x) \leq -B$  καὶ  $opx \geq B$ .

### A συνήσεις

650. Νὰ εύρεθοῦν τὰ ὄρια τῶν ἔξης μεταβλητῶν ποσοτήτων:

$$\alpha') 1 - \frac{2}{x} + \frac{5}{x^2}, \quad \text{ἄν } x \rightarrow 1. \quad \beta') 1 + \frac{7}{x^2}, \quad \text{ἄν } x \rightarrow 2.$$

$$\gamma') 3x^3 + 6x^2, \quad \text{ἄν } x \rightarrow 0. \quad \delta') \frac{x^2+1}{x+3}, \quad \text{ἄν } x \rightarrow -2.$$

651. ‘Ομοίως τῶν ἔξης:

$$\alpha') \frac{(x-\kappa)-2\kappa x^3}{x(x+\kappa)}, \quad \text{ἄν } x \rightarrow 0. \quad \beta') \frac{5}{3x^2+5x}, \quad \text{ἄν } x \rightarrow \infty.$$

$$\gamma') \alpha x^2 + \beta x + \gamma, \quad \text{ἄν } x \rightarrow -\infty. \quad \delta') -\alpha^2 x^3 + \beta x + \gamma, \quad \text{ἄν } x \rightarrow \infty.$$

$$\epsilon') \frac{2x^3+3x^2}{x^3}, \quad \text{ἄν } x \rightarrow 0. \quad \sigma') \frac{5x^2-5x}{x} \quad \text{ἄν } x \rightarrow \infty.$$

$$652. \text{Νὰ εύρεθῇ τὸ ὄριον τοῦ } \frac{1}{x-5}, \quad \text{ἄν } x \rightarrow 5 \text{ μέ τιμὰς } \alpha') x < 5, \beta') x > 5$$

$$653. \text{Νὰ εύρεθῇ τὸ ὄριον τῆς μεταβλητῆς } 3x^2-5, \quad \text{ἄν } x \rightarrow 3, \text{ τῆς } \frac{2}{\psi^2} + 4\psi. \\ \text{ἄν } \psi \rightarrow 2 \text{ καὶ } \tauῆς 2\omega^2-4\omega-5, \quad \text{ἄν } \omega \rightarrow 0. \text{ Ἐκ τῶν εύρεθέντων ὄρίων νὰ εύρεθῇ τὸ ὄριον } \left(3x^2-5 + \frac{2}{\psi^2} + 4\psi + 2\omega^2-4\omega-5\right).$$

$$654. \text{Νὰ εύρεθῇ τὸ ὄριον } \left(\frac{2}{x} - \frac{5}{\psi^2} + 4\omega^2\right), \quad \text{ἄν } x \rightarrow \infty, \psi \rightarrow 2 \text{ καὶ } \omega \rightarrow 3$$

$$655. \text{Ποιῶν τὸ ὄριον τῆς παραστάσεως } \frac{3x^2-5\omega^3+4\psi}{2x^2-5}, \quad \text{ἄν } x \rightarrow -5, \omega \rightarrow 0 \\ \text{καὶ } \psi \rightarrow -3.$$

656. "Αν  $x \rightarrow 3$ , ποιον θά είναι τὸ δριον τοῦ

$$\alpha') \frac{x^2 - 5x + 6}{x-3} = \frac{(x-3)(x-2)}{x-3}, \quad \beta') \frac{x^2 + x - 12}{x^2 - 4x + 3}.$$

## 7. ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

**§ 235.** *Ορισμοὶ.* "Αν  $\alpha$  καὶ  $\beta$  παριστάνουν δύο πραγματικούς ἀριθμούς ( ὑποτιθεμένου τοῦ  $\alpha$  (<  $\beta$ ), καλοῦμεν κλειστὸν διάστημα ἀπὸ  $\alpha$  ἕως  $\beta$  τὸ σύνολον τῶν ( πραγματικῶν ) ἀριθμῶν τῶν περιεχομένων μεταξὺ τῶν  $\alpha$  καὶ  $\beta$ , εἰς τοὺς ὅπο·ους περιλαμβάνονται καὶ οἱ  $\alpha$ ,  $\beta$  καὶ σημειώνομεν μὲ  $\alpha \dots \beta$  ἡ ( $\alpha, \beta$ ). "Οταν μεταβλητή τις  $x$  λαμβάνῃ πάσας τὰς τιμὰς τοῦ διαστήματος τούτου, σημειώνομεν τοῦτο ὡς ἔξῆς :  $\alpha \leq x \leq \beta$ .

"Αν τὰς τιμὰς τῆς μεταβλητῆς  $x$  τὰς ἀνηκούσας εἰς ἐν διάστημα παριστάνωμεν μὲ σημεῖα μιᾶς εὐθείας ( τῶν ἀριθμῶν ἡ τοῦ ἄξονος τῶν  $x$  ), τὸ κλειστὸν διάστημα  $\alpha \leq x \leq \beta$  παριστάνεται ὑπὸ τοῦ τμήματος  $AB$ , ὅπου τὸ  $A$  παριστάνει τὸν  $\alpha$ , τὸ  $B$  τὸν  $\beta$ , ἀνήκουν δὲ εἰς τὸ  $AB$  καὶ τὰ ἄκρα αὐτοῦ.

Καλοῦμεν περιοχὴν τῆς τιμῆς  $x_0$  τοῦ σημείου  $M_0(x_0)$  ( ἀντιστοιχοῦντος εἰς τὴν τιμὴν  $x=x_0$  ) μὲ μῆκος  $2\epsilon$ , τὸ διάστημα  $x_0-\epsilon < x < x_0+\epsilon$ .

Συνάρτησίς τις  $\psi=\phi(x)$  λέγεται ὥρισμένη μὲν  $\alpha'$ ) διὰ τινα τιμὴν τιμὴν τοῦ  $x$ , π.χ. τὴν  $x=2$ , ἀν ἡ τιμὴ τῆς συναρτήσεως είναι ὥρισμένη διὰ  $x=2$ , δηλαδὴ ἀν είναι ὥρισμένη ἡ τιμὴ  $\phi(2)$ ,  $\beta'$ ) εἰς περιοχὴν δέ τινα τοῦ  $x$ , ἀν είναι ὥρισμένη δι' ἔκάστην τιμὴν τῆς περιοχῆς ταύτης.

"Εστω συνάρτησίς τις τῆς ἀνεξαρτήτου μεταβλητῆς  $x$ , ἡ  $\psi=\phi(x)$  ὥρισμένη εἰς τινα περιοχὴν τῆς τιμῆς  $x=x_0$ . "Αν  $x_0+(x_v)$  παριστάνῃ ἀκολουθίαν ἀριθμῶν τῆς περιοχῆς τοῦ  $x_0$  διαφόρων τοῦ  $x_0$  καὶ ἡ  $[x_0+(x_v)] \rightarrow x_0$ , αἱ δὲ τιμαὶ  $\phi[x_0+(x_v)]$  τείνουν εἰς ἐν καὶ τὸ αὐτὸ δριον, π.χ. τὸ  $\lambda$ , οἰσαδήποτε καὶ ἀν εἶναι ἡ ἀκολουθία  $(x_v)$ , τότε λέγομεν ὅτι  $\phi(x) \rightarrow \lambda$  ἡ ορφ(x)= $\lambda$  ὅταν  $x \rightarrow x_0$  ἡ ορφ=x\_0.

"Εστω π.χ. ἡ συνάρτησις  $\psi=x^2$ . "Αν ὑποθέσωμεν ὅτι  $x=3$ , ἔχομεν  $\phi(3)=3^2$ .

"Αν θέσωμεν  $x=3+(\epsilon_v)$ , ὅπου  $(\epsilon_v)$  παριστάνει μίαν ἀκολουθίαν ἀριθμῶν τείνουσαν εἰς τὸ 0, ἦτοι  $\text{ορ}(\epsilon_v)=0$ , θὰ ἔχωμεν  $\phi[3+(\epsilon_v)]=[3+(\epsilon_v)]^2$ .

"Οταν τὸ  $(\epsilon_v) \rightarrow 0$  ή  $\text{ορ}(\epsilon_v) = 0$ , τότε τὸ  $[3 + (\epsilon_v)] \rightarrow 3$ , ἢτοι  $\text{ορ}[3 + (\epsilon_v)] = 3$ , τὸ  $[3 + (\epsilon_v)]^2 \rightarrow 3^2$ , ἢτοι  $\text{ορ}[3 + (\epsilon_v)]^2 = 3^2$ . Επομένως ἔχομεν ὅτι τὸ  $\varphi[3 + (\epsilon_v)] = [3 + (\epsilon_v)]^2$  τείνει εἰς τὸ  $3^2$ , δηλαδὴ

$$\text{ορ}\varphi[3 + (\epsilon_v)] = \varphi(3) = 3^2.$$

'Επειδὴ συμβαίνει τοῦτο διὰ τὴν συνάρτησιν  $\varphi(x) = x^2$  καὶ διὰ τὴν τιμὴν  $x = 3$ , λέγομεν ὅτι ἡ  $\varphi(x) = x^2$  εἶναι **συνεχής**, ὅταν  $x = 3$ . 'Ομοίως δεικνύεται ὅτι ἡ  $\varphi(x) = x^2$  εἶναι συνεχής καὶ δι' οἵανδήποτε ἀλληλην τιμὴν τοῦ  $x$ .

'Ἐν γένει **συνεχής** λέγεται συνάρτησίς τις  $\psi = \varphi(x)$  διὰ τινα τιμὴν  $\tauῆς x = x_0$ , ἀν εἶναι ὡρισμένη εἰς περιοχὴν  $\tauῆς x_0$  καὶ ἀν δι' ἐκάστην ἀκολουθίαν ( $x_n$ ) τείνουσαν πρὸς τὴν τιμὴν  $x_0$ , ὅταν  $n \rightarrow \infty$ , ἡ ἀντίστοιχος ἀκολουθία τῶν τιμῶν  $\tauῆς$  συναρτήσεως  $\varphi(x_0)$  τείνει πρὸς τὴν τιμὴν  $\varphi(x_0)$ . Τοῦτο ἐκφράζεται καὶ ὡς ἔξης :

Λέγομεν ὅτι ἡ  $\psi = \varphi(x)$  εἶναι συνεχής διὰ  $x = x_0$ , ἀν δοθέντος οἵουδήποτε ἀριθμοῦ  $\epsilon > 0$  (όσονδήποτε μικροῦ) ἔχωμεν ὅτι :

$$\text{ορ}[\varphi(x_0 + \epsilon) - \varphi(x_0)] = 0 \text{ ὅταν } \text{ορ}\epsilon = 0, \text{ ή } \begin{cases} \text{ορ}\varphi(x_0 + \epsilon) = \varphi(x_0) \\ \text{ορ}\epsilon = 0. \end{cases}$$

'Εστω π.χ. ἡ συνάρτησις  $\psi = 3x^2$ . Θέλομεν νὰ ἴδωμεν, ἀν αὕτη εἶναι συνεχής διὰ  $x = 1$ . 'Έχομεν  $\varphi(1) = 3 \cdot 1^2$ . Θέτομεν  $x = 1 + \epsilon$ , ὅτε  $\varphi(1 + \epsilon) = 3(1 + \epsilon)^2$  καὶ  $\varphi(1 + \epsilon) - \varphi(1) = 3(1 + \epsilon)^2 - 3 \cdot 1^2 = 3(1^2 + 2 \cdot \epsilon + \epsilon^2) - 3 \cdot 1^2 = 3 \cdot 2 \cdot \epsilon + 3 \cdot \epsilon^2$ .

"Οταν  $\epsilon \rightarrow 0$  ή  $\text{ορ}\epsilon = 0$ , τότε τὸ  $\varphi(1 + \epsilon) - \varphi(1)$  δηλαδὴ τὸ ἴσον αὐτοῦ  $3 \cdot 2 \cdot \epsilon + 3 \cdot \epsilon^2$  ἔχει ὅριον τὸ 0 (κατὰ τὸν κανόνα περὶ ὁρίου ἀθροίσματος), ἢτοι  $\text{ορ}[\varphi(1 + \epsilon) - \varphi(1)] = 0$  ή  $\text{ορ}\varphi(1 + \epsilon) = \varphi(1)$ , ὅταν  $\text{ορ}\epsilon = 0$ .

'Επομένως ἡ  $\varphi(x) = 3x^2$  εἶναι συνεχής διὰ  $x = 1$ .

'**Ασυνεχής** λέγεται συνάρτησίς τις  $\psi = \varphi(x)$  διὰ  $x = x_0$  ὅταν, καὶ ἀν εἶναι ὡρισμένη εἰς περιοχὴν  $\tauῆς$  τιμῆς  $x_0$ , δὲν εἶναι συνεχής διὰ τὴν τιμὴν ταύτην.

Εύκόλως ἀποδεικνύεται ὅτι :

1ον. "Οταν ἡ  $\varphi(x)$  ἔχῃ σταθερὸν τιμήν, π.χ. 5, εἶναι συνεχής διὰ πᾶσαν τιμὴν τοῦ  $x$ .

2ον. "Αν δύο συναρτήσεις  $\varphi_1(x)$  καὶ  $\varphi_2(x)$  εἶναι συνεχεῖς διὰ μίαν τιμὴν τοῦ  $x$ , θὰ εἶναι συνεχής καὶ ἡ  $\varphi_1(x) \pm \varphi_2(x)$  διὰ τὴν αὐτὴν τι-

μήν, καθώς και ή  $\varphi_1(x) \cdot \varphi_2(x)$  και ή  $\varphi_1(x) : \varphi_2(x)$ , όταν ή  $\varphi_2(x)$  είναι διάφορος του 0 διὰ τὴν τιμὴν ταύτην τοῦ x.

Συνάρτησις τῆς μορφῆς  $\psi = x, x^2, x^3, \dots$  είναι συνεχής διὰ πᾶσαν τιμὴν τοῦ x.

Πᾶσα συνάρτησις τῆς μορφῆς  $ax^{\mu}$ , ὅπου τὸ α είναι σταθερὰ ποσότης, τὸ δέ μ ἀκέραιος καὶ θετικός, είναι συνεχής διὰ πᾶσαν τιμὴν τοῦ x. Πᾶσα δὲ συνάρτησις ἄθροισμα ὅρων τῆς μορφῆς  $ax^{\mu}$  είναι συνεχής διὰ πᾶσαν τιμὴν τοῦ x. Π.χ. ή  $3x^2 - 5x + 6$ .

Πᾶσα ρητὴ συνάρτησις, ἥτοι τὸ πηλίκον δύο ἀκέραιών πολυωνύμων ὡς πρὸς x, είναι συνεχής συνάρτησις διὰ πᾶσαν τιμὴν τοῦ x, διὰ τὴν όποιαν ὁ παρονομαστής είναι διάφορος του 0.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Χ

### Α'. ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ \*

#### 1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ

**§ 236.** "Εστω τυχοῦσα συνάρτησις τοῦ  $x$  ἡ  $\psi = \sigma(x)$  συνεχής εἰς τὸ ώρισμένον διάστημα  $(\alpha, \beta)$  καὶ ἥτις διά τινα τιμὴν τοῦ  $x$ , τὴν  $x_0$ , περιεχομένην ἐν τῷ διαστήματι τούτῳ, λαμβάνει τὴν ώρισμένην τιμὴν  $\psi_0$  τοῦ  $\psi$ , ἥτοι εἶναι  $\psi_0 = \sigma(x_0)$ . "Εὰν εἰς τὴν τιμὴν  $x_0$  δώσωμεν αὐξησίν τινα,  $\epsilon$ , ἡ ἀντίστοιχος τιμὴ τοῦ  $\psi$  θὰ λάβῃ αὐξησίν τινα  $\eta$ , ἥτοι θὰ εἶναι  $\psi_0 + \eta = \sigma(x_0 + \epsilon)$  καὶ ἔπομένως  $\eta = \sigma(x_0 + \epsilon) - \sigma(x_0)$ .

"Ἐπειδὴ ἡ συνάρτησις  $\psi = \sigma(x)$  ὑπετέθη συνεχής ἐν τῷ διαστήματι  $(\alpha, \beta)$ , ἔπειται ὅτι δι' ορε=0 θὰ εἶναι καὶ ορη=0.

"Ἐὰν δὲ λόγος  $\frac{\eta}{\epsilon} = \frac{\sigma(x_0 + \epsilon) - \sigma(x_0)}{\epsilon}$  ἔχῃ ὅριον ώρισμένον, ὅταν ἡ μὲν τιμὴ  $x = x_0$  μένη σταθερά, ἡ δὲ αὐξησίς ε τείνη πρὸς τὸ μηδέν, τὸ ὅριον τοῦτο καλεῖται παράγωγος τῆς συναρτήσεως  $\psi = \sigma(x)$  διὰ  $x = x_0$  καὶ σημειοῦται οὕτω  $\psi'$  ἢ  $\sigma'(x)$ . "Ητοι :

Παράγωγος μιᾶς συναρτήσεως  $\psi = \sigma(x)$  διά τινα τιμὴν τοῦ  $x$  καλεῖται τὸ ὅριον, πρὸς τὸ ὅποιον τείνει δὲ λόγος τῆς αὐξήσεως τῆς συναρτήσεως πρὸς τὴν ἀντίστοιχον αὐξησιν τῆς ἀνεξαρτήτου μεταβλητῆς, ὅταν ἡ αὐξησίς αὐτῆς τείνῃ πρὸς τὸ μηδέν.

"Ἐὰν δὲ συνάρτησις  $\psi = \sigma(x)$  ἔχῃ παράγωγον διὰ πᾶσαν τιμὴν τοῦ  $x$ , τότε σημειοῦμεν αὐτὴν οὕτω  $\psi'$  ἢ  $\sigma'(x)$ .

**§ 237.** Κατὰ τὸν ὅρισμὸν τῆς παραγώγου συναρτήσεως μιᾶς μεταβλητῆς  $x$ , διὰ νὰ εὔρωμεν τὴν παράγωγον αὐτῆς, δίδομεν πρῶτον εἰς τὸ  $x$  μίαν αὐξησιν, τὴν ὁποίαν καὶ παριστῶμεν διὰ τοῦ συμβό-

\* Τὰ ἀπό τῆς § 236 καὶ ἔξῆς ἐλήφθησαν ἐκ τοῦ ὑπὸ τοῦ Λεων. Ἀδαμοπούλου ὑποβληθέντος βιβλίου τῆς Ἀλγέβρας.

λου  $\Delta x$  καὶ ύπολογίζομεν τὴν ἀντίστοιχον αὔξησιν τῆς συναρτήσεως, τὴν ὅποιαν παριστῶμεν διὰ τοῦ  $\Delta \psi$  καὶ κατόπιν εύρισκομεν τὸ ὄριον τοῦ λόγου  $\frac{\Delta \psi}{\Delta x}$ , ὅταν  $\text{o}p\Delta x=0$ . Διὰ νὰ ἔχωμεν παράγωγον πρέπει δι'  $\text{o}p\Delta x=0$  νὰ εἴναι καὶ  $\text{o}p\Delta \psi=0$ . διότι ἐὰν  $\text{o}p\Delta \psi=\alpha \neq 0$ , τότε  $\text{o}p \frac{\Delta \psi}{\Delta x} = \infty$ . Ἡτοι :

"Ινα μία συνάρτησις ἔχῃ παράγωγον, πρέπει νὰ εἴναι συνεχῆς, χωρὶς δμως καὶ ὁ ὥρος αὐτὸς νὰ εἴναι ἐπαρκῆς.

Διότι ἐκ τοῦ  $\text{o}p\Delta x=0$  καὶ  $\text{o}p\Delta \psi=0$  δὲν ἔπειται ὅτι ἀναγκαῖως ὑπάρχει καὶ τὸ  $\text{o}p \frac{\Delta \psi}{\Delta x}$ .

*Παραδείγματα :* 1ον. "Εστω ἡ συνάρτησις  $\psi=x$ . Τότε  $\Delta \psi = x + \Delta x - x = \Delta x$ , ἐπομένως  $\psi' = \text{o}p \frac{\Delta \psi}{\Delta x} = \text{o}p \frac{\Delta x}{\Delta x} = 1$ . "Ωστε :

'Η παράγωγος τοῦ  $x$  εἴναι ἡ μονάς.

2ον. "Εστω ἡ συνάρτησις  $\psi = 5x^2$ . Ἐὰν εἰς τὸ  $x$  δώσωμεν τὴν αὔξησιν  $\Delta x$ , θὰ ἔχωμεν

$$\Delta \psi = 5(x + \Delta x)^2 - 5x^2 = 5x^2 + 10x\Delta x + 5(\Delta x)^2 - 5x^2 = 10x\Delta x + 5(\Delta x)^2$$

καὶ  $\frac{\Delta \psi}{\Delta x} = \frac{10x\Delta x + 5(\Delta x)^2}{\Delta x} = 10x + 5\Delta x$ .

"Οταν δὲ  $\text{o}p\Delta x=0$ , τότε  $\text{o}p \frac{\Delta \psi}{\Delta x} = 10x$  ἢ  $\psi' = 10x$ .

Καθ' ὅμοιον τρόπον εύρισκομεν ὅτι ἡ παράγωγος τῆς συναρτήσεως  $\psi = \alpha x^5$  εἴναι  $\psi' = 5\alpha x^4$  καὶ γενικῶς τῆς  $\psi = \alpha x^\mu$  (μ θετικὸς καὶ ἀκέραιος) ἡ παράγωγος εἴναι  $\psi' = \alpha \cdot \mu \cdot x^{\mu-1}$ .

3ον. "Εστω ἡ συνάρτησις  $\psi = \sqrt{v_x}$ . Θὰ εἴναι  $\psi + \Delta \psi = \sqrt{v_x + \Delta x}$ ,

$$\text{καὶ } \Delta \psi = \sqrt{v_x + \Delta x} - \sqrt{v_x} \text{ καὶ } \frac{\Delta \psi}{\Delta x} = \frac{\sqrt{v_x + \Delta x} - \sqrt{v_x}}{\Delta x} \text{ ἢ } (\S 85)$$

$$\frac{\Delta \psi}{\Delta x} = \frac{[\sqrt{v_x + \Delta x} - \sqrt{v_x}] [\sqrt{v_x + \Delta x} + \sqrt{v_x}]}{\Delta x (\sqrt{v_x + \Delta x} + \sqrt{v_x})} \text{ ἢ }$$

$$\frac{\Delta \psi}{\Delta x} = \frac{\Delta x}{\Delta x [\sqrt{v_x + \Delta x} + \sqrt{v_x}]} = \frac{1}{\sqrt{v_x + \Delta x} + \sqrt{v_x}} \text{ καὶ ἐπομένως διὰ } \text{o}p\Delta x=0,$$

$$\text{θὰ εἴναι } \text{o}p \frac{\Delta \psi}{\Delta x} = \frac{1}{\sqrt{v_x} + \sqrt{v_x}} = \frac{1}{2\sqrt{v_x}} \text{ "Ωστε: } (\sqrt{v_x})' = \frac{1}{2\sqrt{v_x}}$$


4ον. "Εστω ὅτι ἡ συνάρτησις  $\psi$  εἴναι σταθερά. Τότε ἡ αὔξησις

$\Delta\psi$  είναι μηδέν, συνεπώς  $\frac{\Delta\psi}{\Delta x} = 0$  καὶ ἐπομένως ορ  $\frac{\Delta\psi}{\Delta x} = \psi' = 0$ . "Ητοι:

"Η παράγωγος σταθερᾶς εἶναι μηδέν.


## 2. ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

§ 238. "Εστω ἡ συνάρτησις  $\psi = \alpha x + \beta$ . Γνωρίζομεν ὅτι αὗτη παριστᾶ εύθειαν τέμνουσαν τὸν ἄξονα τῶν  $\psi$  εἰς τὸ σημεῖον  $(0, \beta)$  καὶ παράλληλον πρὸς τὴν διὰ τῆς ἀρχῆς διερχομένην  $\psi = \alpha x$ , ἥτις ὁρίζεται ὑπὸ τοῦ σημείου  $O(0,0)$  καὶ τοῦ σημείου  $M(1, \alpha)$  (σχ. 21). "Εὰν κληθῇ ω ἡ γωνία, τὴν ὃποίαν σχηματίζει ἡ εύθεια μετὰ τοῦ θετικοῦ ἄξονος  $Ox$ , θὰ ἔχωμεν εφω =  $\alpha$ . Τὸ  $\alpha$  λέγεται καὶ συντελεστὴς κατευθύνσεως τῆς εὐθείας  $\psi = \alpha x + \beta$ .



Σχ. 21

"Εστω ἡδη τυχοῦσα συνάρτησις  $\psi = \sigma(x)$  συνεχὴς ἔχουσα παράγωγον διὰ τὴν τιμὴν  $x = x_0$ . "Εστω δὲ  $MM'$  καμπύλη εἰς ὁρθογωνίους ἄξονας, τὴν ὃποίαν παριστᾶ ἡ δοθεῖσα συνάρτησις  $\psi = \sigma(x)$  (σχ. 22).



Σχ. 22

μπύλης. "Η ἔξισωσις τῆς εύθειας τῆς διερχομένης διὰ τῶν σημείων  $M$  καὶ  $M'$  θὰ εἶναι τῆς μορφῆς  $\psi = \alpha x + \beta$  ἐπαληθευομένη ὑπὸ τῶν συντεταγμένων τῶν σημείων  $M$  καὶ  $M'$ , ὡστε θὰ ἔχωμεν  $\psi_0 + \Delta\psi = \alpha(x_0 + \Delta x) + \beta$  καὶ  $\psi_0 = \alpha x_0 + \beta$ . ἀφαιροῦντες δὲ τὰς ἔξι-

Εἰς τὴν τιμὴν  $x = x_0$  τῆς μεταβλητῆς ἀντιστοιχεῖ ἡ τιμὴ  $\psi_0$  τῆς συναρτήσεως, ὅπότε τὸ σημεῖον  $M(x_0, \psi_0)$  θὰ εἶναι σημεῖον τῆς καμπύλης. "Εὰν εἰς τὸ  $x_0$  δώσωμεν μίαν αὔξησιν  $\Delta x$ , ἡ συνάρτησις θὰ λάβῃ μίαν αὔξησιν  $\Delta\psi$  καὶ τὸ σημεῖον  $M'(x_0 + \Delta x, \psi_0 + \Delta\psi)$  θὰ εἶναι σημεῖον τῆς κα-

σώσεις κατά μέλη έχουμεν  $\Delta\psi = \alpha\Delta x$  ή  $\frac{\Delta\psi}{\Delta x} = \alpha$ , ήτοι ό συντελεστής κατευθύνσεως της εύθειας  $MM'$  είναι ό λόγος  $\frac{\Delta\psi}{\Delta x}$ . Άλλαξ όταν  $\text{op}\Delta x = 0$ , έπειδή ή συνάρτησις είναι συνεχής, θά είναι και  $\text{op}\Delta\psi = 0$ . Καὶ έπειδὴ ύπετεθή ὅτι έχει παράγωγον, θά είναι  $\text{op} \frac{\Delta\psi}{\Delta x} = \psi'$ , τὸ δὲ σημεῖον  $M'$  τείνει νὰ συμπέσῃ μετά τοῦ  $M$ , όπότε ή χορδὴ  $MM'$  θὰ έχῃ ως όρικήν θέσιν τὴν ἐφαπτομένην  $MT$  τῆς καμπύλης εἰς τὸ σημεῖον  $M(x_0, \psi_0)$  καὶ τῆς όποιας ό συντελεστής κατευθύνσεως είναι τὸ  $\text{op} \frac{\Delta\psi}{\Delta x}$ , δηλαδὴ ή τιμὴ τῆς παραγώγου τῆς συναρτήσεως διὰ  $x = x_0$ . Ἀρα :

"Οταν μία συνάρτησις  $\psi = \sigma(x)$  διὰ τιμὴν  $x = x_0$  έχῃ παράγωγον, ή τιμὴ τῆς παραγώγου διὰ  $x = x_0$  ίσοῦται μὲ τὸν συντελεστὴν κατευθύνσεως τῆς ἐφαπτομένης τῆς καμπύλης, τὴν όποιαν ή συνάρτησις παριστᾷ εἰς τὸ σημεῖον αὐτῆς, τὸ έχον τετμημένην  $x_0$ .

'Επειδὴ ό συντελεστής κατευθύνσεως μιᾶς εύθειας ίσοῦται καὶ μὲ τὴν ἐφω, ἔνθα ω ή γωνία, τὴν όποιαν σχηματίζει ή εύθεια μετά τοῦ ἀξονος  $x'$ , ἔπειται ὅτι :

'Εὰν ή παράγωγος μιᾶς συναρτήσεως διά τινα τιμὴν τοῦ  $x = x_0$  είναι μηδέν, ή ἐφαπτομένη τῆς καμπύλης εἰς τὸ σημεῖον, τὸ έχον τετμημένην  $x_0$ , είναι παράλληλος πρὸς τὸν ἀξονα  $x'$ .

### 3. ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΣ ΑΛΛΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΣ

**§ 239.** "Εστω ή συνάρτησις  $\psi = \phi(\omega)$ , ὅπου  $\psi$  συνεχής συνάρτησις τῆς  $\omega$  καὶ  $\omega = (x)$  ἐπίσης συνεχής συνάρτησις τοῦ  $x$ , όπότε καὶ ή  $\psi$  θὰ είναι συνεχής συνάρτησις τοῦ  $x$  καὶ λέγεται συνάρτησις συναρτήσεως. 'Εὰν ήδη ύποθέσωμεν ὅτι ή συνάρτησις  $\psi = \phi(\omega)$  έχει παράγωγον ως πρὸς  $\omega$  τὴν  $\phi'(\omega)$  καὶ ή  $\omega = \sigma(x)$  έχει παράγωγον ως πρὸς  $x$  τὴν  $\omega'(x)$ , εύρισκομεν τὴν παράγωγον τοῦ  $\psi$  ως πρὸς  $x$  ως ἔξῆς :

'Εὰν εἰς τὸ  $x$  δοθῇ ή αὔξησις  $\Delta x$ , τότε ή  $\psi'(x)$  θὰ είναι τὸ ὄριον τοῦ λόγου  $\frac{\phi(\omega + \Delta\omega) - \phi(\omega)}{\Delta\omega}$ , όταν  $\text{op}\Delta x = 0$ .

'Άλλαξ πρὸς τὴν αὔξησιν  $\Delta x$  ἀντιστοιχεῖ αὔξησις  $\Delta\omega$  τῆς  $\omega$ , ήτοι είναι  $\Delta\omega = \sigma(x + \Delta x) - \sigma(x)$  καὶ ἐπομένως

$$\begin{aligned} \frac{\varphi(\omega + \Delta\omega) - \varphi(\omega)}{\Delta x} &= \frac{\varphi(\omega + \Delta\omega) - \varphi(\omega)}{\Delta x} \cdot \frac{\sigma(x + \Delta x) - \sigma(x)}{\Delta\omega} = \\ &= \frac{\varphi(\omega + \Delta\omega) - \varphi(\omega)}{\Delta\omega} \cdot \frac{\sigma(x + \Delta x) - \sigma(x)}{\Delta x}, \end{aligned}$$

ἀλλὰ ὅταν  $\text{oρ}\Delta x = 0$  εἶναι καὶ  $\text{oρ}\Delta\omega = 0$  καὶ  $\text{oρ}\Delta\psi = 0$ , καθότι αἱ συναρτήσεις  $\psi$ ,  $\omega$  ὑπετέθησαν συνεχεῖς καὶ ὅτι ἔχουσι παράγωγον.

$$\begin{aligned} \text{Αλλὰ εἶναι } \text{oρ} \frac{\varphi(\omega + \Delta\omega) - \varphi(\omega)}{\Delta\omega} &= \varphi'(\omega), \text{ ορ} \frac{\sigma(x + \Delta x) - \sigma(x)}{\Delta x} = \\ \sigma'(x) = \omega' \text{ καὶ } \text{oρ} \frac{\varphi(\omega + \Delta\omega) - \varphi(\omega)}{\Delta x} &= \psi'(x). \text{ ὅθεν } \psi'(x) = \varphi'(\omega) \cdot \omega'. \end{aligned}$$

Π.χ. Νά τις  $\psi = (3x^2 - 5)^6$ . Θέτοντες  $3x^2 - 5 = \omega$  θὰ ἔχωμεν  $\psi = \omega^6$ , ἤτοι συνάρτησιν συναρτήσεως· ὅπότε  $\psi' = 6\omega^5 \cdot \omega' x$  ή  $\psi' = 6(3x^2 - 5)^5 \cdot 6x$  ή  $\psi' = 36x(3x^2 - 5)^5$ .

#### 4. ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ $x$

**§ 240.** Ἐστω ἡ συνάρτησις  $\psi = \varphi + \omega + u$  (1) ἐνθα  $\varphi$ ,  $\omega$ ,  $u$  συνεχεῖς συναρτήσεις τοῦ  $x$  ἔχουσαι ἀντιστοίχως παραγώγους τὰς  $\varphi'$ ,  $\omega'$ ,  $u'$ , καὶ τῆς ὅποιας ζητοῦμεν τὴν παράγωγον  $\psi'$ . Ἐὰν ἡ ἀνεξάρτητος μεταβλητὴ  $x$  λάβῃ ἀπό τινος τιμῆς αὔτῆς μίαν αὔξησιν  $\Delta x$ , αἱ συναρτήσεις  $\varphi$ ,  $\omega$ ,  $u$  θὰ λάβωσιν ἀντιστοίχως αὔξησεις  $\Delta\varphi$ ,  $\Delta\omega$ ,  $\Delta u$ . Ἐπειδὴ αἱ συναρτήσεις  $\varphi$ ,  $\omega$ ,  $u$  ὑπετέθησαν συνεχεῖς ἔχουσαι παράγωγον, θὰ εἶναι δὶ’  $\text{oρ}\Delta x = 0$  καὶ  $\text{oρ}\Delta\varphi = 0$ ,  $\text{oρ}\Delta\omega = 0$ ,  $\text{oρ}\Delta u = 0$ . Ἐὰν ἡδη καλέσωμεν  $\Delta\psi$  τὴν ἀντιστοιχὸν αὔξησιν τῆς συναρτήσεως  $\psi$ , θὰ ἔχωμεν  $\psi + \Delta\psi = (\varphi + \Delta\varphi) + (\omega + \Delta\omega) + (u + \Delta u)$  (2). Ἐὰν δὲ ἀφαιρέσωμεν ἀμφότερα τὰ μέλη τῆς (1) ἀπὸ τὴν (2), θὰ ἔχωμεν  $\Delta\psi = \Delta\varphi + \Delta\omega + \Delta u$  (3). Ἐκ ταύτης ἐπεταί ὅτι  $\text{oρ}\Delta\psi = \text{oρ}\Delta\varphi + \text{oρ}\Delta\omega + \text{oρ}\Delta u$  (4). Καὶ ἐπειδὴ δὶ’  $\text{oρ}\Delta x = 0$  εἶναι καὶ  $\text{oρ}\Delta\varphi = 0$ ,  $\text{oρ}\Delta\omega = 0$ ,  $\text{oρ}\Delta u = 0$ , θὰ εἶναι καὶ  $\text{oρ}\Delta\psi = 0$ , ἤτοι ἡ συνάρτησις  $\psi = \varphi + \omega + u$  εἶναι καὶ αὐτὴ συνεχὴς συνάρτησις τοῦ  $x$ . Διαιροῦντες ἀμφότερα τὰ μέλη τῆς (4) διὰ  $\Delta x$  ἔχομεν  $\frac{\Delta\psi}{\Delta x} = \frac{\Delta\varphi}{\Delta x} + \frac{\Delta\omega}{\Delta x} + \frac{\Delta u}{\Delta x}$  καὶ δὶ’  $\text{oρ}\Delta x = 0$  εἶναι :

$$\text{oρ} \frac{\Delta\psi}{\Delta x} = \text{oρ} \frac{\Delta\varphi}{\Delta x} + \text{oρ} \frac{\Delta\omega}{\Delta x} + \text{oρ} \frac{\Delta u}{\Delta x} \text{ η } \psi' = \omega' + u'.$$

Ἡ παράγωγος τοῦ ἀθροίσματος πολλῶν συναρτήσεων τοῦ  $x$  ἔχουσῶν παραγώγους ισοῦται μὲ τὸ ἀθροισμα τῶν παραγώγων τῶν συναρτήσεων

## 5. ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΓΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ $x$

**§ 241.** "Εστω ἡ συνάρτησις  $\psi = \omega\varphi$ , ἐνθα  $\omega$  καὶ  $\varphi$  συνεχεῖς συναρτήσεις τοῦ  $x$  ἔχουσαι παράγωγον. Ἐργαζόμενοι ώς προηγουμένως ἔχομεν  $\psi + \Delta\psi = (\omega + \Delta\omega)(\varphi + \Delta\varphi)$  καὶ  $\psi = \omega\varphi$ , συνεπῶς

$$\Delta\psi = \omega\Delta\varphi + \varphi\Delta\omega + \Delta\varphi\Delta\omega, \quad (1)$$

διαιροῦντες δὲ ἀμφότερα τὰ μέλη τῆς (1) διὰ  $\Delta x$  ἔχομεν :

$$\begin{aligned} \frac{\Delta\psi}{\Delta x} &= \omega \frac{\Delta\varphi}{\Delta x} + \varphi \frac{\Delta\omega}{\Delta x} + \frac{\Delta\varphi}{\Delta x} \cdot \Delta\omega && \text{καὶ ἔπομένως} \\ \text{oρ} \frac{\Delta\psi}{\Delta x} &= \omega \cdot \text{oρ} \frac{\Delta\varphi}{\Delta x} + \varphi \cdot \text{oρ} \frac{\Delta\omega}{\Delta x} + \text{oρ} \frac{\Delta\varphi}{\Delta x} \cdot \text{oρ} \Delta\omega. && (2) \end{aligned}$$

'Εὰν δὲ  $\text{oρ} \Delta x = 0$ , ἐξ ὑποθέσεως θὰ είναι  $\text{oρ} \frac{\Delta\varphi}{\Delta x} = \varphi'$ ,  $\text{oρ} \frac{\Delta\omega}{\Delta x} = \omega'$  καὶ  $\text{oρ} \Delta\omega = 0$  καὶ ἡ (2) γίνεται  $\psi' = \omega\varphi' + \omega'\varphi$ . 'Εὰν είναι  $\psi = \omega\varphi$ · $u$  καὶ θεωρήσωμεν τὸ  $\omega\varphi$  ώς ἔνα παράγοντα, θὰ ἔχωμεν κατὰ τὸ προηγούμενον  $\psi = (\omega\varphi)u' + u(\omega\varphi)'$  ἢ  $\psi' = \omega\varphi' + \omega\varphi' + u\varphi'$ . "Ωστε :

'Η παράγωγος τοῦ γινομένου πολλῶν συναρτήσεων τῆς αὐτῆς μεταβλητῆς  $x$ , ἔχουσῶν παραγώγους, ίσοῦται μὲ τὸ ἀθροισμα τῶν γινομένων τῆς παραγώγου ἑκάστης τούτων ἐπὶ τὸ γινόμενον τῶν ἀλλων συναρτήσεων.

## 6. ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΓΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΕΡΑΣ ΕΠΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΝ ΤΟΥ $x$

**§ 242.** "Εστω ἡ συνάρτησις  $\psi = \omega\alpha$  (α σταθερά). Θὰ ἔχωμεν  $\psi' = \omega' + \omega\alpha'$ , ἀλλὰ  $\alpha' = 0$ , ἄρα  $\psi' = \omega\alpha'$ . "Ητοι :

'Η παράγωγος τοῦ γινομένου σταθερᾶς ἐπὶ συνάρτησιν τοῦ  $x$  ίσοῦται μὲ τὸ γινόμενον τῆς σταθερᾶς ἐπὶ τὴν παράγωγον τῆς συναρτήσεως.

"Εστω  $\psi = \omega^v$ , ἐνθα  $\omega$  συνεχῆς συνάρτησις τοῦ  $x$  καὶ  $v$  ἀκέραιος καὶ θετικός. Ἐπειδὴ  $\psi = \omega \cdot \omega \cdot \omega \cdots \omega$ , θὰ είναι κατὰ τὰ προηγούμενα  $\psi' = \omega' \cdot \omega^{v-1} = \omega' \cdot \omega^{v-1} = \omega' \cdot \omega^{v-1}$  ἢ  $\psi' = v\omega^{v-1} \cdot \omega'$ . "Ητοι :

'Η παράγωγος δυνάμεως μιᾶς συναρτήσεως τοῦ  $x$  ίσοῦται μὲ τὸν ἔκθέτην τῆς δυνάμεως ἐπὶ τὴν κατὰ μονάδα μικροτέραν δύναμιν τῆς συναρτήσεως τοῦ  $x$  καὶ ἐπὶ τὴν παράγωγον τῆς βάσεως.

Έάν ή βάσις είναι ό  $x$ , τότε ή σχέσις άπλοποιείται· ήτοι έάν  $\psi = x^{\mu}$ , τότε  $\psi' = \mu x^{\mu-1}$ , έπειδή  $x' = 1$ .

*Παραδείγματα.* 1ον. *Έστω* ή συνάρτησις  $\psi = 5x^3$ . ή παράγωγος είναι  $\psi' = 5 \cdot (x^3)' = 5 \cdot 3x^2 = 15x^2$ .

2ον. *Έστω*  $\psi = (5x^2+2)^3$ . ή παράγωγος είναι  
 $\psi' = 3(5x^2+2)^2 \cdot (5x^2+2)' = 3(5x^2+2)^2 10x = 30x(5x^2+2)^2$ .

3ον. *Έστω*  $\psi = (3x^3-2x^2+3x-6)^3$ . ή παράγωγος είναι  
 $\psi' = 3(3x^3-2x^2+3x-6)^2 \cdot (9x^2-4x+3)$ .

4ον. *Έστω*  $\psi = (3x^2+2)(5x+1)$ . ή παράγωγος είναι  
 $\psi' = (3x^2+2)(5x+1)' + (5x+1)(3x^2+2)' \quad \text{ή}$   
 $\psi' = (3x^2+2) \cdot 5 + (5x+1)6x \quad \text{ή}$   
 $\psi' = 15x^2 + 10 + 30x^2 + 6x \quad \text{ή} \quad \psi' = 45x^2 + 6x + 10$ .

## 7. ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΠΗΛΙΚΟΥ ΔΥΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ $x$

**§ 243.** *Έστω* ή συνάρτησις  $\psi = \frac{\omega}{\varphi}$ , ένθα  $\omega$  και  $\varphi$  συνεχεῖς συναρτήσεις τοῦ  $x$  ἔχουσαι παραγώγους τὰς  $\omega'$  καὶ  $\varphi'$ . *Έάν* εἰς τὸ  $x$  δώσωμεν τὴν αὔξησιν  $\Delta x$ , αἱ συναρτήσεις  $\omega, \varphi, \psi$  λαμβάνουν ἀντιστοίχως αὐξήσεις  $\Delta \omega$ ,  $\Delta \varphi$ ,  $\Delta \psi$ , είναι δὲ  $\psi + \Delta \psi = \frac{\omega + \Delta \omega}{\varphi + \Delta \varphi}$  · ἐκ ταύτης και τῆς  $\psi = \frac{\omega}{\varphi}$  προκύπτει  $\Delta \psi = \frac{\omega + \Delta \omega}{\varphi + \Delta \varphi} - \frac{\omega}{\varphi} \quad \text{ή} \quad \Delta \psi = \frac{\varphi \Delta \omega - \omega \Delta \varphi}{(\varphi + \Delta \varphi) \varphi}$   
 ὅθεν  $\frac{\Delta \psi}{\Delta x} = \frac{\varphi \frac{\Delta \omega}{\Delta x} - \omega \frac{\Delta \varphi}{\Delta x}}{(\varphi + \Delta \varphi) \varphi}$ , έάν δὲ  $\text{oρ } \Delta x = 0$ , θὰ είναι ἔξ ύποθέσεως  $\text{oρ } \frac{\Delta \omega}{\Delta x} = \omega'$ ,  $\text{oρ } \frac{\Delta \varphi}{\Delta x} = \varphi'$ , καὶ  $\text{oρ} (\varphi + \Delta \varphi) = \varphi + \text{oρ} \Delta \varphi = \varphi$  διπότε θὰ είναι  $\text{oρ } \frac{\Delta \psi}{\Delta x} = \frac{\varphi \cdot \text{oρ} \frac{\Delta \omega}{\Delta x} - \omega \cdot \text{oρ} \frac{\Delta \varphi}{\Delta x}}{\text{oρ} (\varphi + \Delta \varphi) \cdot \varphi} \quad \text{ή} \quad \psi' = \frac{\varphi \omega' - \omega \varphi'}{\varphi^2}$ . *Ήτοι :*

‘Η παράγωγος πηλίκου δύο συνεχῶν συναρτήσεων τοῦ  $x$  ἔχουσῶν παραγώγους είναι κλάσμα, τὸ ὁποῖον ἔχει ώς ἀριθμητὴν τὸ γινόμενον τοῦ παρονομαστοῦ ἐπὶ τὴν παράγωγον τοῦ ἀριθμητοῦ, ἡλαττωμένον κατὰ τὸ γινόμενον τοῦ ἀριθμητοῦ ἐπὶ τὴν παράγωγον τοῦ παρονομαστοῦ, παρονομαστὴν δὲ τὸ τετράγωγον τοῦ παρονομαστοῦ.

*Παράδειγμα.* Νὰ εύρεθῇ ἡ παράγωγος τῆς συναρτήσεως  $\psi = \frac{x^2-5x+3}{5x-1}$ . Θὰ εἶναι  $\psi' = \frac{(5x-1)(x^2-5x+3)' - (x^2-5x+3)(5x-1)'}{(5x-1)^2}$  ἢ  
 $\psi' = \frac{\psi' = (5x-1)(2x-5) - (x^2-5x+3) \cdot 5}{(5x-1)^2} = \frac{5x^2-2x-10}{(5x-1)^2}$ .

## 8. ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΗΣ ΡΙΖΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΣ ΤΟΥ x

**§ 244.** "Εστω ἡ συνάρτησις  $\psi = \sqrt{\omega}$ , ἐνθα ω συνάρτησίς τις τοῦ x, ἔχουσα παράγωγον τὴν ω'. Ἐάν εἰς τὸ x δώσωμεν τὴν αὔξησιν Δx, αἱ συναρτήσεις ψ καὶ ω λαμβάνουσιν ἀντιστοίχως αὔξησεις Δψ καὶ Δω, αἱ δόποιαi τείνουσι πρὸς τὸ μηδέν, ὅταν ἡ Δx τείνῃ πρὸς τὸ μηδέν. Ἐκ τῶν ἰσοτήτων  $\psi + \Delta\psi = \sqrt{\omega + \Delta\omega}$  καὶ  $\psi = \sqrt{\omega}$  προκύπτει ὅτι  $\Delta\psi = \sqrt{\omega + \Delta\omega} - \sqrt{\omega}$  ἢ

$$\Delta\psi = \frac{[\sqrt{\omega + \Delta\omega} - \sqrt{\omega}] [\sqrt{\omega + \Delta\omega} + \sqrt{\omega}]}{\sqrt{\omega + \Delta\omega} + \sqrt{\omega}} = \frac{\Delta\omega}{\sqrt{\omega + \Delta\omega} + \sqrt{\omega}}. \text{ ὅθεν}$$

$$\frac{\Delta\psi}{\Delta x} = \frac{\frac{\Delta\omega}{\sqrt{\omega + \Delta\omega} + \sqrt{\omega}}}{\Delta x} \text{ καὶ } \text{ορ} \frac{\Delta\psi}{\Delta x} = \frac{\rho \frac{\Delta\omega}{\Delta x}}{\text{ορ} \sqrt{\omega + \Delta\omega} + \sqrt{\omega}} \text{ ἢ } \psi' = \frac{\omega'}{2\sqrt{\omega}}.$$

*Σημείωσις.* Τοῦτο ἴσχυει διὰ τὰς τιμὰς τοῦ x, αἱ δόποιαi δὲν μηδενίζουν τὴν συνάρτησιν ω.

"Ἄρα :

"Η παράγωγος τετραγωνικῆς ρίζης συναρτήσεως τινος τοῦ x ἔχοντης παράγωγον ἴσονται μὲ τὴν παράγωγον τοῦ ὑπορρίζου διὰ τοῦ διπλασίου τῆς ρίζης.

Π.χ. Νὰ εύρεθῇ ἡ παράγωγος τῆς  $\psi = \sqrt{x^2-4x+1}$ . Θὰ εἶναι

$$\psi' = \frac{(x^2-4x+1)'}{2\sqrt{x^2-4x+1}} = \frac{2x-4}{2\sqrt{x^2-4x+1}}.$$

### "Ασκησις

657. Νὰ εύρεθοῦν αἱ παράγωγοι τῶν κάτωθι συναρτήσεων :
- α')  $\psi = (x^3-2x+5)+(3x^2-8x-1)$ , β')  $\psi = (5x^3+2x^2-3x+1)-(2x^2-4x+6)$ ,
  - γ')  $\psi = (\alpha x^2+\beta x+\gamma)+(\alpha x^2-\beta x)+(\alpha x^2+\gamma)+(\alpha^2-\beta\gamma)$ ,
  - δ')  $\psi = (x-3)(x+4)$ , ε')  $\psi = (x^2+3)(2x^2-3x+1)$ , στ'  $\psi = (2x-1)(3x+1)(4x-2)$ ,
  - ζ')  $\psi = x^3(2x^2-5)(3x^3-1)$ , η')  $\psi = \frac{x}{x^2-1}$ , θ')  $\psi = \frac{x}{x+1}$ , ι')  $\psi = \frac{3x-3}{4x-6}$ ,
  - ια')  $\psi = \frac{x(x-3)}{(3x-1)^2}$ , ιβ')  $\psi = \sqrt{x^2-3x-5}$ , ιγ')  $\psi = 3x-4\sqrt{x}$ , ιδ')  $\psi = 2x^2-3+3\sqrt{x^2-2x}$ .

## 9. ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΑΞΕΩΝ

**§ 245.** Ἐστω ἡ συνάρτησις  $\psi = 2x^5$ . ἡ παράγωγός της εἶναι  $\psi' = 10x^4$ . Ἀλλὰ παρατηροῦμεν ὅτι ἡ παράγωγος αὗτη εἶναι νέα συνάρτησις τοῦ  $x$  ἔχουσα καὶ αὐτὴ παράγωγον, ἥτις λέγεται δευτέρα παράγωγος τῆς ἀρχικῆς συναρτήσεως καὶ σημειοῦται  $\psi''$ , ἥτοι  $\psi'' = (10x^4)' = 40x^3$ . Ἀλλὰ καὶ ἡ παράγωγος αὗτη ἔχει παράγωγον, ἥτις καλεῖται τρίτη παράγωγος τῆς ἀρχικῆς συναρτήσεως καὶ σημειοῦται  $\psi'''$  κ.ο.κ. Καὶ γενικῶς, ἐὰν μία συνάρτησις  $\psi = \phi(x)$  ἔχῃ παράγωγον  $\psi'$  διὰ πᾶσαν τιμὴν τοῦ  $x$  ἔν τινι διαστήματι  $(\alpha, \beta)$ , εἶναι δὲ ἡ παράγωγος αὗτη συνάρτησις τοῦ  $x$ , εἶναι δυνατὸν καὶ αὗτη νὰ ἔχῃ παράγωγον καλούμενην δευτέραν παράγωγον τῆς διθείστης καὶ σημειοῦται  $\psi''$ . Ομοίως δυνάμεθα νὰ ἔχωμεν καὶ τρίτην, τετάρτην κ.ο.κ. παράγωγον τῆς ἀρχικῆς συναρτήσεως.

### "Α σ κ η σ i s

658. Νὰ εύρεθοῦν ἡ πρώτη καὶ ἡ δευτέρα παράγωγος τῶν κάτωθι συναρτήσεων:  $\alpha)$   $\psi = 5x^3 - 3x^2 + 2x - 6$ ,  $\beta')$   $\psi = 5x^4 - 7x^3 + 3x - 6$ ,  $\gamma')$   $\psi = (2x - 3)^3$ ,

$$\delta') \quad \psi = \sqrt{1-x}, \quad \epsilon') \quad \psi = \frac{x^2+3}{x+2}, \quad \sigma') \quad \psi = \sqrt[3]{3x^2+5}.$$

## 10. ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

**§ 246.** Αἱ συναρτήσεις  $\psi = \eta mx$ ,  $\psi = \sigma unx$ ,  $\psi = \epsilon phx$ ,  $\psi = \sigma phx$ ,  $\psi = \tau emx$ ,  $\psi = \sigma temx$  καλοῦνται κυκλικαὶ συναρτήσεις. Ἡ μεταβλητὴ  $x$  εἶναι τὸ ἀλγεβρικὸν εἰς ἀκτίνια μέτρον τοῦ τόξου.

Συνέχεια κυκλικῶν συναρτήσεων. Ἐκ τῆς τριγωνομετρίας γνωρίζουμεν ὅτι τὸ  $\eta mx$  τείνει πρὸς τὸ μηδέν, ὅταν τὸ τόξον  $x$  τείνῃ εἰς τὸ μηδέν.

I. Συνέχεια συναρτήσεως τοῦ  $\eta m i t \theta v o n$ . Ἐὰν εἰς αὔξησιν ε τοῦ  $x$  ἀντιστοιχῇ αὔξησις η τοῦ  $\eta mx$ , θὰ εἶναι

$$\eta = \eta m(x + \epsilon) - \eta mx = 2\eta m \frac{\epsilon}{2} \sin \left( x + \frac{\epsilon}{2} \right).$$

Ἐπειδὴ δὲ εἶναι  $|\sin \left( x + \frac{\epsilon}{2} \right)| \leq 1$  καὶ  $\eta m \frac{\epsilon}{2}$  τείνει εἰς τὸ μηδέν μετὰ τοῦ  $\epsilon$ , ἐπεταί ὅτι δι' ορε = 0, θὰ εἶναι καὶ ορη = 0· ἀρα ἡ συνάρτησις  $\psi = \eta mx$  εἶναι συνεχής.

*II. Συνέχεια συναρτήσεως τοῦ συνημιτόνου.* Ἐὰν εἰς αὕξησιν ετοῦ  $x$  ἀντιστοιχῇ αὔξησις η τοῦ συν $x$ , θὰ εἶναι

$$\eta = \sigma_{\text{syn}}(x + \epsilon) - \sigma_{\text{syn}}x = -2\eta\mu \frac{\epsilon}{2} \eta\mu \left(x + \frac{\epsilon}{2}\right).$$


Ἐπειδὴ δὲ εἶναι  $|\eta\mu \left(x + \frac{\epsilon}{2}\right)| \leq 1$  καὶ  $\eta\mu \frac{\epsilon}{2}$  τείνει μετὰ τοῦ εἰς τὸ μηδέν, ἐπεταὶ ὅτι  $\delta'$  ορε $=0$ , θὰ εἶναι καὶ ορη $=0$ . ἄρα ἡ συνάρτησις  $\psi = \sigma_{\text{syn}}x$  εἶναι συνεχῆς.

*III. Συνέχεια τῶν ἄλλων κυκλικῶν συναρτήσεων.* Ἐπειδὴ  $\epsilon\phi x = \frac{\eta\mu x}{\sigma_{\text{syn}}x}$ , ἥτοι ἡ  $\epsilon\phi x$  εἶναι πηλίκον δύο συνεχῶν συναρτήσεων, ἐπεταὶ ὅτι θὰ εἶναι συνεχῆς δι' ὅλας τὰς τιμὰς τοῦ  $x$  ἐκτὸς ἑκείνων, αἱ ὁποῖαι μηδενίζουν τὸν παρονομαστήν. Τὸ αὐτὸ συμβαίνει καὶ διὰ τὰς ἄλλας συναρτήσεις

$$\sigma\phi x = \frac{\sigma_{\text{syn}}x}{\eta\mu x}, \quad \tau\epsilon\mu x = \frac{1}{\sigma_{\text{syn}}x}, \quad \sigma\tau\epsilon\mu x = \frac{1}{\eta\mu x}.$$

I. ΟΡΙΟΝ ΤΟΥ  $\frac{x}{\eta\mu x}$  ΟΤΑΝ  $\sigma\phi x = 0$ .

**§ 247.** Ιον. Ἐστω ὅτι τὸ τόξον  $(\widehat{AM})=x$  τείνει εἰς τὸ μηδὲν ἐκ τιμῶν θετικῶν. Εἶναι  $\eta\mu x = (\overline{PM})$  καὶ  $\epsilon\phi x = (\overline{AT})$ .



Σχ. 23

Τεινόντων πρὸς τὴν μονάδα, θὰ ἔχῃ ὅριον τὴν μονάδα, ἥτοι  $\sigma\phi \frac{x}{\eta\mu x} = 1$ , ὅταν  $\sigma\phi x = 0$ .

Ως ἐκ τοῦ σχήματος φαίνεται ἐμ. τριγ.  $(OAM)$  < ἐμ. κυκ. τοῦ  $(OAM)$  < ἐμ. τριγ.  $(OAT)$  ἢ  $\frac{1}{2}(\overline{OA})$   $\eta\mu x < \frac{1}{2}(\overline{OA})\epsilon\phi x < \frac{1}{2}(\overline{OA})$  εφ $x$  ἢ  $\eta\mu x < x < \epsilon\phi x$  καὶ ἐπειδὴ  $\eta\mu x > 0$ , ἐπεταὶ ὅτι  $1 < \frac{x}{\eta\mu x} < \frac{1}{\sigma_{\text{syn}}x}$ . Ἀλλ' ὅταν  $\sigma\phi x = 0$ , ἐπειδὴ ἡ συνάρτησις  $\sigma_{\text{syn}}x$  εἶναι συνεχῆς καὶ  $\sigma_{\text{syn}}0 = 1$ , θὰ εἶναι ορσυ $n$  = 1. Ἐπομένως καὶ ὁ λόγος  $\frac{x}{\eta\mu x}$ , ὅστις περιέχεται μεταξὺ δύο ἀριθμῶν

Ζων. "Εστω ότι τὸ τόξον ( $\widehat{AM}$ ) =  $x$  τείνει εἰς τὸ μηδέν ἐξ ἀρνητικῶν τιμῶν. Τότε, ἐὰν γράψωμεν  $x = -x'$ , θὰ εἴναι  $x' > 0$ , ὅπότε θὰ εἴναι  $\frac{x}{\eta mx} = \frac{-x'}{\eta m(-x')} = \frac{-x'}{-\eta mx'} = \frac{x'}{\eta mx'}$ , ὅταν δὲ τὸ  $x$  τείνῃ εἰς τὸ μηδέν ἐξ ἀρνητικῶν τιμῶν, τὸ  $x'$  τείνει εἰς τὸ μηδέν ἐκ θετικῶν τιμῶν, ὅπότε ορ  $\frac{x'}{\eta mx'} = 1$  καὶ συνεπῶς ορ  $\frac{x}{\eta mx} = 1$ . "Ωστε :

$$\text{ορ } \frac{x}{\eta mx} = 1, \text{ ὅταν } \text{ορ } x = 0.$$

## II. ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΤΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ

**§ 248.** "Εστω ἡ συνάρτησις  $\psi = \eta mx$ , θὰ εἴναι :

$$\frac{\Delta \psi}{\Delta x} = \frac{\eta m(x + \Delta x) - \eta mx}{\Delta x}$$

$$\text{η } \frac{\Delta \psi}{\Delta x} = \frac{2\eta m \frac{\Delta x}{2}}{\Delta x} \sin \left( x + \frac{\Delta x}{2} \right) = \frac{\eta m \frac{\Delta x}{2}}{\frac{\Delta x}{2}} \sin \left( x + \frac{\Delta x}{2} \right),$$

ἐὰν δὲ ορ  $\Delta x = 0$ , θὰ εἴναι ορ  $\frac{\Delta x}{2} = 0$ , ἕπεια ορ  $\frac{\eta m \frac{\Delta x}{2}}{\frac{\Delta x}{2}} = 1$  καὶ

$$\text{ορσυν } \left( x + \frac{\Delta x}{2} \right) = \text{συν} x. \text{ Ὅστε } (\eta mx)' = \text{συν} x. \text{ "Ητοι :$$

"Η παράγωγος τοῦ  $\eta mx$  εἴναι συν  $x$  διὰ πᾶσαν τιμὴν τοῦ  $x$ .

## III. ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΜΙΤΟΝΟΥ

**§ 249.** "Εστω ἡ συνάρτησις  $\psi = \text{συν} x$ , θὰ εἴναι

$$\frac{\Delta \psi}{\Delta x} = \frac{\text{συν}(x + \Delta x) - \text{συν} x}{\Delta x}$$

$$\text{η } \frac{\Delta \psi}{\Delta x} = \frac{-2\eta m \frac{\Delta x}{2} \eta m \left( x + \frac{\Delta x}{2} \right)}{\Delta x} = -\frac{\eta m \frac{\Delta x}{2}}{\frac{\Delta x}{2}} \eta m \left( x + \frac{\Delta x}{2} \right),$$

ἐκ ταύτης δὲ προκύπτει εὐκόλως ὅτι  $(\text{συν} x)' = -\eta mx$ . "Ητοι :

"Η παράγωγος τοῦ συν  $x$  είναι  $-\eta mx$  διὰ πᾶσαν τιμὴν τοῦ  $x$ .

## IV. ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΤΗΣ ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΗΣ

**§ 250.** "Εστω ἡ συνάρτησις  $\psi = \epsilon \phi x$ . Ἐπειδὴ  $\epsilon \phi x = \frac{\eta \mu x}{\sigma u v x}$ , ἔπειται ὅτι  $(\epsilon \phi x)' = \frac{\sigma u v x (\eta \mu x)' - \eta \mu x (\sigma u v x)'}{\sigma u v^2 x}$  ἢ  $(\epsilon \phi x)' = \frac{\sigma u v^2 x + \eta \mu^2 x}{\sigma u v^2 x} = \frac{1}{\sigma u v^2 x}$ , ἀρα  $(\epsilon \phi x)' = \frac{1}{\sigma u v^2 x}$ . "Ητοι :

"Η παραγωγὸς τῆς ἐφαπτομένης εἶναι τὸ ἀντίστροφον τοῦ  $\sigma u v^2 x$ .

## V. ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ σφχ, τεμχ, στεμχ.

**§ 251.** Κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον ἐργαζόμενοι εύρισκομεν ὅτι  $(\sigma \phi x)' = -\frac{1}{\eta \mu^2 x}$ ,  $(\tau e m x)' = \frac{\epsilon \phi x}{\sigma u v x}$ ,  $(\sigma t e m x)' = -\frac{\sigma \phi x}{\eta \mu x}$ .

## "Α σ κη σις

659. Νὰ εύρεθοῦν αἱ παράγωγοι τῶν συναρτήσεων :

α')  $\psi = \sigma \eta \mu x$ , β')  $\psi = \eta \mu^2 x$ , γ')  $\psi = \sigma u v^7 x$ , δ')  $\psi = \epsilon \phi 3 x$ , ε')  $\psi = \sigma \phi 4 x$ ,  
 στ')  $\psi = \tau e m^2 x$ , ζ')  $\psi = \sigma t e m^2 x$ , η')  $\psi = \eta \mu^2 x$ , θ')  $\psi = \sigma u v^3 x$ , ι')  $\psi = x^3 \eta \mu 3 x$ ,  
 ια')  $\psi = x^2 \sigma u v^2 x$ , ιβ')  $\psi = x^2 \epsilon \phi 3 x$ , ιγ')  $\psi = \sqrt{\eta \mu x}$ , ιδ')  $\psi = \sqrt{\sigma u v x}$ ,  
 ιε')  $\psi = \sigma u v \sqrt{x^2 + 1}$ .


B'. ΧΡΗΣΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ  
ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΠΟΥΔΗΝ ΤΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

## 1. ΘΕΩΡΗΜΑ ΤΩΝ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΑΥΞΗΣΕΩΝ

**§ 252.** "Εστω ἡ συνάρτησις  $\psi = \sigma(x)$ , ὡρισμένη, συνεχὴς καὶ ἔχουσα παράγωγον διὰ πάσας τὰς τιμὰς τοῦ  $x$  τὰς περιεχομένας εἰς τὸ διάστημα ( $\alpha, \beta$ ). Ὡς γνωστὸν ἡ συνάρτησις αὕτη  $\psi = \sigma(x)$  παρίσταται ὑπὸ μιᾶς καμπύλης. Ἐὰν ἐπὶ ταύτης θεωρήσωμεν τὰ σημεῖα  $A(\alpha, \sigma(\alpha))$  καὶ  $B(\beta, \sigma(\beta))$  καὶ φέρωμεν τὴν χορδὴν  $AB$  καὶ τὴν  $A\Delta$  παράλληλον πρὸς τὸν ἄξονα  $Ox$  (σχ. 24), τότε θὰ εἶναι προφανῶς  $A\Delta = \beta - \alpha$  καὶ  $\Delta B = \sigma(\beta) - \sigma(\alpha)$ . Ἐκ τοῦ ὀρθογωνίου τριγώνου  $A\Delta B$  εύρισκομεν ὅτι  $\frac{\Delta B}{A\Delta} = \frac{\sigma(\beta) - \sigma(\alpha)}{\beta - \alpha} = \epsilon \phi \omega = \text{συντελεστὴς κατευ-}$

θύνσεως τῆς χορδῆς  $AB$ . Εἶναι φανερὸν ὅτι ἐπὶ τοῦ τόξου  $AB$  τῆς καμπύλης  $\psi = \alpha(x)$  ὑπάρχει ἔνα τούλάχιστον σημεῖον  $G$  ἔχον τε-

τημημένη γ περιεχομένην μεταξύ α και β και τοιοῦτον, ώστε ή έφαπτομένη τῆς καμπύλης εἰς τὸ σημεῖον τοῦτο νὰ είναι παράλληλος πρὸς τὴν AB. 'Αλλ' ή έφαπτομένη αὕτη ἔχει συντελεστὴν κατευθύνσεως τὴν τιμὴν τῆς παραγώγου  $\sigma'(x)$  διὰ  $x = \gamma$ , ἥτοι  $\sigma'(\gamma)$ , ἐπειδὴ δὲ είναι παράλληλος πρὸς τὴν χορδὴν AB πρέπει νὰ είναι  $\frac{\sigma(\beta) - \sigma(\alpha)}{\beta - \alpha} = \sigma'(\gamma)$  ή  $\sigma(\beta) - \sigma(\alpha) = (\beta - \alpha)\sigma'(\gamma)$ . "Ωστε:



Σχ. 24

"Οταν μία συνάρτησις  $\psi = \sigma(x)$  είναι ώρισμένη και συνεχής ἐν τινι διαστήματι  $(\alpha, \beta)$  ἔχουσα παράγωγον δι' ὅλας τὰς τιμὰς τοῦ x τὰς περιεχομένας ἐν τῷ διαστήματι  $(\alpha, \beta)$ , ὑπάρχει εἰς τούλαχιστον ἀριθμὸς γ μεταξὺ α και β περιεχόμενος τοιοῦτος, ώστε θὰ είναι  $\sigma(\beta) - \sigma(\alpha) = (\beta - \alpha)\sigma'(\gamma)$ .


## 2. ΘΕΩΡΗΜΑ ΤΟΥ ROLLE

**§ 253.** "Εστω ή συνάρτησις  $\psi = \sigma(x)$  ώρισμένη, συνεχής και ἔχουσα παράγωγον ἐν τῷ διαστήματι  $(\alpha, \beta)$  και ἔστω ὅτι ή καμπύλη

ή παριστωμένη ὑπὸ τῆς συναρτήσεως τέμνει τὸν ἄξονα τῶν x εἰς τὰ σημεῖα A(α, 0) και B(β, 0). Κατὰ τὸ θεώρημα τῶν πεπερασμένων αὐξήσεων θὰ ὑπάρχῃ μία τούλαχιστον τιμὴ τοῦ x μεταξὺ α και β τοιαύτη, ώστε  $\sigma(\beta) - \sigma(\alpha) = (\beta - \alpha) \cdot \sigma'(\gamma)$ .

ἀλλὰ ἐπειδὴ  $\sigma(\beta) = 0$ ,  $\sigma(\alpha) = 0$  και  $\beta - \alpha \neq 0$ , ἐπεταί ὅτι θὰ είναι  $\sigma'(\gamma) = 0$ . "Ητοι :

'Εὰν μία συνάρτησις  $\psi = \sigma(x)$  ώρισμένη συνεχής ἔχει παράγωγον ἐν τινι διαστήματι  $(\alpha, \beta)$  μηδενίζεται διὰ  $x = \alpha$  και  $x = \beta$  ὑπάρχει μία τούλαχιστον τιμὴ γ τοῦ x μεταξὺ α και β, διὰ τὴν δύοιαν ή παράγωγος μηδενίζεται.



Σχ. 25

**§ 254.** Θεώρημα. 'Εάν μία συνάρτησις  $\psi = \sigma(x)$  είναι ώρισμένη καὶ συνεχής ἔχουσα παράγωγον ἐν τινι διάστηματι  $(\alpha, \beta)$ , καὶ ἡτις παράγωγος μηδενίζεται διὰ πᾶσαν τιμὴν περιεχομένην μεταξὺ α καὶ β, τότε ἡ συνάρτησις  $\psi = \sigma(x)$  ἔχει σταθερὰν τιμὴν ἐν τῷ διαστήματι  $(\alpha, \beta)$ .

Τῷ ὄντι, ἔστωσαν  $x_1, x_2$  δύο τιμαὶ τοῦ  $x$  μεταξὺ α καὶ β περιεχόμεναι· κατὰ τὸ θεώρημα τῶν πεπερασμένων αὐξήσεων θὰ είναι  $\sigma(x_2) - \sigma(x_1) = (x_2 - x_1)\sigma'(\gamma)$ . Ἐπειδὴ ὅμως  $\sigma'(\gamma) = 0$ , ἐπεταί διὰ τοῦ  $\sigma(x_2) - \sigma(x_1) = 0$  ἢ  $\sigma(x_2) = \sigma(x_1)$ , ἡτοὶ ἡ συνάρτησις ἔχει τὴν αὐτὴν τιμὴν εἰς τὸ διάστημα  $(\alpha, \beta)$ .

**§ 255.** "Εστω ἡ συνάρτησις  $\psi = \sigma(x)$  ώρισμένη, συνεχὴς ἔχουσα παράγωγον ἐν τῷ διαστήματι  $(\alpha, \beta)$ . "Έστωσαν δὲ δύο τιμαὶ τοῦ  $x$  αἱ  $x_2$  καὶ  $x_1$ , ἔνθα  $x_2 > x_1$ , μεταξὺ α καὶ β περιεχόμεναι. Κατὰ τὸ θεώρημα τῶν πεπερασμένων αὐξήσεων θὰ είναι :

$$\sigma(x_2) - \sigma(x_1) = (x_2 - x_1)\sigma'(\gamma).$$

'Ἐπειδὴ δὲ  $x_2 - x_1 > 0$ , ἐπεταί διὰ τοῦ  $\sigma(x_2) - \sigma(x_1) > 0$  καὶ  $\sigma'(\gamma) > 0$  θὰ είναι δόμοςημα, ἡτοὶ, ἐὰν μὲν  $\sigma(x_2) - \sigma(x_1) > 0$  ἢ τὸ αὐτὸ ἐὰν ἡ συνάρτησις είναι αὔξουσα, τότε καὶ  $\sigma'(\gamma) > 0$ , ἐὰν δὲ  $\sigma(x_2) - \sigma(x_1) < 0$  ἢ τὸ αὐτό, ἐὰν ἡ συνάρτησις είναι φθίνουσα, τότε καὶ  $\sigma'(\gamma) < 0$ . "Ωστε :

Μία συνάρτησις  $\psi = \sigma(x)$  ώρισμένη, συνεχὴς ἔχουσα παράγωγον ἐν τινι διαστήματι είναι αὔξουσα ἢ φθίνουσα ἐν τῷ διαστήματι τούτῳ, καθ' ὅσον ἡ παράγωγος αὐτῆς είναι ἐν τῷ διαστήματι τούτῳ θετικὴ ἢ ἀρνητικὴ καὶ ἀντιστρόφως.

Σημείωσις: 'Η παράγωγος ἐάν είναι μηδέν, θὰ είναι διὰ μεμονωμένας τιμὰς τοῦ  $x$ , διότι ἀλλως ἡ συνάρτησις θὰ ἡτοὶ σταθερά εἰς τὸ διάστημα τοῦτο.

**§ 256.** "Εστω μία συνάρτησις  $\psi = \sigma(x)$  συνεχὴς εἰς τι διάστημα  $(\alpha, \beta)$  ἔχουσα παράγωγον  $\psi'$ , ἡτις είναι ἐπίσης συνεχὴς συνάρτησις τοῦ  $x$ .

1ον. "Εστω, διὰ τοῦτο ἡ συνάρτησις μέχρι τῆς τιμῆς τοῦ  $x = x_0$  είναι αὔξουσα, δόποτε καὶ ἡ παράγωγός της θὰ είναι θετική, ἀπὸ δὲ τῆς τιμῆς  $x_0$  καὶ ἑκεῖθεν ἡ συνάρτησις γίνεται φθίνουσα. Τότε ἡ παράγωγός της καθίσταται ἀπὸ θετική ἀρνητική· καὶ ἐπειδὴ ἡ παράγωγος ὑπετέθη συνεχὴς συνάρτησις, ἐπεταί διὰ τοῦτο, διὰ νὰ γίνη ἀπὸ θετική ἀρνητική,

θά διέλθη διά τής τιμῆς 0, ήτοι  $\sigma'(x_0)=0$ , ότε ή συνάρτησις διά τήν τιμήν  $x = x_0$  γίνεται μεγίστη.

2ον. "Εστω ότι ή συνάρτησις μέχρι τής τιμῆς  $x = x_0$  είναι φθίνουσα, όπότε ή παράγωγός της θά είναι άρνητική, άπό δὲ τής τιμῆς  $x_0$  καὶ ἐκεῖθεν ή συνάρτησις γίνεται αὔξουσα. Τότε ή παράγωγός της άπό άρνητική καθίσταται θετική· ἐπομένως, ὡς καὶ προηγουμένως ἔλεχθη, θὰ είναι  $\sigma'(x_0)=0$ , ότε ή συνάρτησις διά τήν τιμήν  $x=x_0$  γίνεται ἐλαχίστη." Ήτοι :

"Οταν μία συνάρτησις  $\sigma(x)$  συνεχής είς τι διάστημα  $(\alpha, \beta)$  ἔχουσα παράγωγον διέρχεται διά τινα τιμήν τοῦ  $x$  τὴν  $x_0$  δι' ἑνὸς μεγίστου ἢ ἐλαχίστου, ή παράγωγος αὐτῆς μηδενίζεται διά τὴν τιμὴν ταύτην, δηλαδὴ  $\sigma'(x_0)=0$  ἀν συμβαίνῃ νὰ είναι καὶ συνεχής διὰ τὴν τιμὴν αὐτήν.

Καὶ ἀντιστρόφως :

"Ἐὰν ή παράγωγος συνεχοῦς τινος συναρτήσεως  $\sigma(x)$  είς τι διάστημα  $(\alpha, \beta)$  μηδενίζεται διά τινα τιμὴν τοῦ  $x$  τὴν  $x_0$ , ή συνάρτησις αὕτη διὰ τὴν τιμὴν  $x_0$  διέρχεται διὰ μεγίστου ἢ ἐλαχίστου, καθ' ὅσον ή παράγωγος μηδενίζεται ἐκ θετικῶν ἢ ἀρνητικῶν τιμῶν.

Τῷ ὄντι, ἔστω ότι ή παράγωγος  $\psi$  μηδενίζεται διὰ τὴν τιμὴν  $x=x_0$  μεταβαίνουσα ἐκ τῶν θετικῶν τιμῶν εἰς τὰς ἀρνητικὰς καὶ ἔστωσαν δύο τιμαὶ τῆς  $\psi$ ', ήτοι ή θετικὴ διὰ  $x=x_0-\epsilon$  καὶ ή ἀρνητικὴ διὰ  $x=x_0+\epsilon$ , ἔνθα ορε=0. Ἐπειδὴ  $\sigma'(x_0-\epsilon) > 0$ , ἔπειται ότι ή συνάρτησις  $\psi$  είναι αὔξουσα, ἐπειδὴ δὲ  $\sigma'(x_0+\epsilon) < 0$ , ἔπειται ότι ή συνάρτησις  $\psi$  είναι φθίνουσα. Ἐφ' ὅσον δὲ ή  $\psi$  ὑπετέθη συνεχής καὶ άπό αὔξουσα γίνεται φθίνουσα, ἔπειται ότι αὕτη ἔχει διὰ  $x=x_0$  μεγιστον. Ἀναλόγως ἀποδεικνύεται ότι, ὅταν ή παράγωγος μεταβαίνῃ ἐκ τῶν ἀρνητικῶν εἰς τὰς θετικὰς τιμάς, ή συνάρτησις διέρχεται δι' ἐλαχίστου διὰ τὴν τιμὴν τοῦ  $x = x_0$ .

**§ 257.** "Εστω 1ον ότι ή συνάρτησις  $\psi=\sigma(x)$  ώρισμένη, συνεχής είς τι διάστημα  $(\alpha, \beta)$ , ἔχουσα παράγωγον  $\psi'$ , ἔχει μέγιστον διὰ τὴν τιμὴν  $x=x_1$ , τότε θὰ είναι  $\sigma'(x_1)=0$  μεταβαίνουσα ἐκ τῶν θετικῶν τιμῶν εἰς τὰς ἀρνητικὰς, ἕρα ή  $\psi'$  είναι φθίνουσα συνάρτησις καὶ ἐπομένως ή παράγωγός της  $\psi''$ , ήτις είναι ή δευτέρα παράγωγος τῆς δοθείστης, είναι ἀρνητική.

"Εστω 2ον ότι ή συνάρτησις διά τινα τιμήν  $x = x_2$  έχει έλάχιστον, τότε θὰ είναι  $\sigma'(x_2) = 0$ , μεταβαίνουσα ἐκ τῶν ἀρνητικῶν εἰς τὰς θετικάς ἄρα, ή  $\psi'$  είναι συνάρτησις αὔξουσα καὶ ἐπομένως ή παράγωγός της  $\psi''$  είναι θετική." Ωστε :

'Εὰν μία συνάρτησις  $\psi = \sigma(x)$  συνεχής εἴς τι διάστημα  $(\alpha, \beta)$ , έχουσα παράγωγον  $\psi'$ , έχῃ διὰ  $x = x_1$  μέγιστον, τότε ή δευτέρα αὐτῆς παράγωγος  $\psi''$  είναι ἀρνητικὴ διὰ τὴν τιμὴν ταύτην τοῦ  $x$ , ἐὰν δὲ ή  $\psi'$  γιὰ  $x = x_2$  έλάχιστον, τότε ή δευτέρα παράγωγος  $\psi''$  είναι θετικὴ διὰ τὴν τιμὴν ταύτην τοῦ  $x$ .

Τὸ ἀντίστροφον ἀποδεικνύεται εὐκόλως.

*Παραδείγματα* : 1ον. Νὰ εύρεθῇ τὸ μέγιστον ή τὸ έλάχιστον τῆς συναρτήσεως  $\psi = x^2 - 8x + 5$ . Τὸ μέγιστον ή τὸ έλάχιστον τῆς συναρτήσεως ταύτης λαμβάνει χώραν διὰ τὴν τιμὴν τοῦ  $x$ , διὰ τὴν δόποιαν μηδενίζεται ή πρώτη παράγωγος  $\psi' = 2x - 8$ , ἥτοι διὰ  $x = 4$ , ἐπειδὴ διὰ κάθε τιμὴν τοῦ  $x$  ή  $\psi'$  είναι συνεχής. "Αρα ή συνάρτησις  $\psi = x^2 - 8x + 5$  διὰ  $x = 4$  έχει μέγιστον ή έλάχιστον. Ἐπειδὴ δὲ ή δευτέρα παράγωγος  $\psi'' = 2$  είναι πάντοτε θετική, ἔπειται οὖτις η συνάρτησις διὰ  $x = 4$  έχει έλάχιστον  $\psi = -11$ .

2ον. Νὰ εύρεθῇ τὸ μέγιστον ή τὸ έλάχιστον τῆς συναρτήσεως  $\psi = \frac{x^3}{3} - 9x + 12$ . Ή  $\psi' = x^2 - 9$ , τῆς δόποιας ρίζαι είναι  $x_1 = 3, x_2 = -3$ , έχει  $\psi'' = 2x$ , ήτις διὰ  $x = 3$  είναι  $\psi'' = 6 > 0$  διὰ καὶ  $x = -3$  είναι  $\psi'' = -6 < 0$ . ἄρα ή συνάρτησις διὰ  $x = 3$  έχει έλάχιστον ὅπερ ἰσοῦται μὲ -6 καὶ διὰ  $x = -3$  έχει μέγιστον, ὅπερ ἰσοῦται μὲ 30.

**§ 258.** "Εστω ή συνάρτησις  $\psi = \frac{\sigma(x)}{\varphi(x)}$ , ἐνθα  $\sigma(x)$  καὶ  $\varphi(x)$  συνεχεῖς συναρτήσεις τοῦ  $x$  καὶ οὖτος οὗτος διὰ  $x = \alpha$  ή συνάρτησις λαμβάνει τὴν ἀριστον μορφὴν  $\frac{0}{0}$ , ἥτοι  $\frac{\sigma(\alpha)}{\varphi(\alpha)} = 0$ . Ἐπειδὴ  $\sigma(\alpha) = 0$

καὶ  $\varphi(\alpha) = 0$ , ή  $\psi$  γράφεται  $\psi = \frac{\sigma(x)}{\varphi(x)} = \frac{\sigma(x) - \sigma(\alpha)}{\varphi(x) - \varphi(\alpha)}$  ή  $\frac{\frac{x-\alpha}{\sigma(x)-\sigma(\alpha)}}{\frac{x-\alpha}{\varphi(x)-\varphi(\alpha)}}$ . Καὶ

ἐάν  $\frac{\sigma(x)-\sigma(\alpha)}{x-\alpha} = 0$ , τότε τὸ κλάσμα  $\frac{\sigma(x)-\sigma(\alpha)}{x-\alpha}$  παριστᾶ τὸ ὄριον τῆς αὔξησεως τῆς συναρτήσεως διὰ τῆς αὔξησεως τῆς ἀνεξαρτήτου μεταβλητῆς, ἥτοι τὴν παράγωγον  $\sigma'(x)$ , τὸ δὲ

κλάσμα  $\frac{\varphi(x)-\varphi(\alpha)}{x-\alpha}$  παριστά τήν παράγωγον  $\varphi'(x)$ . Ήπαρα έταν  $0 \neq x = \alpha$  και  $\varphi(x) \neq 0$  εχόμεν  $\psi = \frac{\sigma'(x)}{\varphi'(x)}$  και έπομένως ορ  $\frac{\sigma(\alpha)}{\varphi(\alpha)} = \frac{\sigma'(\alpha)}{\varphi'(\alpha)}$ .

\* Ωστε :

'Η ἀληθής τιμὴ τοῦ κλάσματος  $\psi = \frac{\sigma(x)}{\varphi(x)}$ , ἔθνα  $\varphi(x) \neq 0$ , καὶ τὸ ὄποιον διὰ  $x=\alpha$  λαμβάνει ἀπροσδιότιστον μορφήν, εἶναι ἡ αὐτὴ μὲ τὴν ἀληθῆ τιμὴν τοῦ λόγου τῶν παραγώγων  $\frac{\sigma'(x)}{\varphi'(x)}$  διὰ τὴν τιμὴν ταύτην. (Κανὼν τοῦ Hospital)

Σημείωσις. Έάν καὶ ὁ λόγος τῶν παραγώγων διὰ τὴν τιμὴν  $x=\alpha$  λαμβάνῃ ἀόριστον μορφήν, τότε λαμβάνομεν τὸν λόγον τῶν δευτέρων παραγώγων διὰ τὴν τιμὴν  $x=\alpha$  κ.ο.κ.

**Παράδειγμα :** Νὰ εύρεθῇ ἡ ἀληθής τιμὴ τοῦ κλάσματος  $\psi = \frac{x^2-5x+6}{x^2-9x+14}$  διὰ  $x=2$ . Τὸ κλάσμα τοῦτο διὰ  $x=2$  λαμβάνει τὴν ἀόριστον μορφήν. Ήπαρα ἡ ἀληθής τιμὴ τοῦ κλάσματος τούτου ίσοῦται μὲ τὸν λόγον τῶν παραγώγων τῶν ὅρων του διὰ  $x=2$ , ὅπότε εχόμεν  $\psi = \frac{2x-5}{2x-9}$ , θέτοντες δὲ  $x=2$  εύρισκομεν  $\psi = \frac{-1}{-5} = \frac{1}{5}$ .

### 3. ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΠΟΥΔΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΜΙΑΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

**§ 259.** Πρὸς σπουδὴν τῶν μεταβολῶν μιᾶς συναρτήσεως 1ον καθορίζομεν τὰ διαστήματα, εἰς τὰ ὄποια ἡ συνάρτησις εἶναι ώρι- σμένη καὶ συνεχής· 2ον εύρισκομεν τὴν παράγωγον, τῆς ὄποιας καθορίζομεν τὸ στημεῖον· 3ον εύρισκομεν τὰ μέγιστα καὶ ἐλάχιστα τῆς συναρτήσεως· 4ον εύρισκομεν τὰς τιμὰς τῆς συναρτήσεως διὰ  $x = \pm\infty$  καὶ  $x=0$  καὶ ἔταν εἶναι δυνατὸν καθορίζομεν τὰς τιμὰς τοῦ  $x$ , αἴτινες μηδενίζουν τὴν συνάρτησιν· 5ον σχηματίζομεν συνοπτικὸν πίνακα ὅλων τῶν ἀνωτέρω· 6ον κατασκευάζομεν τὴν καμπύλην τὴν παριστῶσαν τὴν συνάρτησιν.

'Εφαρμογαί : α') Συνάρτησις  $\psi = \alpha x + \beta$ . 1ον. 'Η συνάρτησις αύτη εἶναι ώρισμένη διὰ πᾶσαν τιμὴν τοῦ  $x$ . 2ον. 'Η παράγωγος  $\psi'$  εἶναι ἴση πρὸς α ἢ τοι  $\psi' = \alpha$ , ἐπομένως διακρίνομεν τρεῖς περιπτώσεις.

1η περίπτωσις :  $\alpha > 0$ . Ό πίνακας τῶν μεταβολῶν τῆς  $\psi$  εἶναι ό ακόλουθος.

$x$	$-\infty$	$-\frac{\beta}{\alpha}$	$+\infty$
$\psi'$	+	+	
$\psi$	$-\infty$	↗ 0 ↗	$+\infty$


Η γραμμή τῶν μεταβολῶν εἶναι εύθεια γραμμή σχηματίζουσα μετά τοῦ θετικοῦ ἀξονος τῶν  $x$  γωνίαν ω δέεταιν, διότι

$$\psi' = \epsilon \varpi = \alpha > 0 \text{ (σχ. 26).}$$


2a περίπτωσις :  $\alpha < 0$ . Ά πίνακας τῶν μεταβολῶν τῆς  $\psi$  εἶναι ό ακόλουθος.

$x$	$-\infty$	$-\frac{\beta}{\alpha}$	$+\infty$
$\psi'$	-	-	
$\psi$	$+\infty$	↘ 0 ↘	$-\infty$

Η γραμμή ἡ παριστῶσα τὰς μεταβολὰς εἶναι εύθεια σχηματίζουσα μετά τοῦ θετικοῦ ἀξοσος τῶν  $x$  γωνίαν ω ἀμβλεῖαιν, διότι  $\psi' = \epsilon \varpi = \alpha < 0$ .



Σχ. 26



Σχ. 27

3η περίπτωσις :  $\alpha = 0$ . Ή συνάρτησις εἶναι σταθερὰ καὶ παριστᾶ εύθειαν παράλληλον πρὸς τὸν ἀξονα τῶν  $x$  (σχ. 27).

β') Ή συνάρτησις  $\psi = \alpha x^2 + \beta x + \gamma$ . 1ον. Ή συνάρτησις αύτη είναι ώρισμένη καὶ συνεχής διὰ πᾶσαν τιμὴν τοῦ  $x$ .

2ον. Ή παράγωγος αύτῆς είναι  $\psi' = 2\alpha x + \beta$ , ήτις, ἐὰν τὸ  $\alpha > 0$ , είναι ἀρνητικὴ εἰς τὸ διάστημα  $(-\infty, -\frac{\beta}{2\alpha})$  καὶ θετικὴ εἰς τὸ διάστημα  $(-\frac{\beta}{2\alpha}, +\infty)$ , ἐὰν δέ τὸ  $\alpha < 0$ , είναι θετικὴ εἰς τὸ διάστημα  $(-\infty, -\frac{\beta}{2\alpha})$  καὶ ἀρνητικὴ εἰς τὸ διάστημα  $(-\frac{\beta}{2\alpha}, +\infty)$ .

3ον. Αἱ ρίζαι τῆς πρώτης παραγώγου  $\psi' = 2\alpha x + \beta$  είναι  $x = -\frac{\beta}{2\alpha}$ , ἕπει τὴν τιμὴν  $x = -\frac{\beta}{2\alpha}$  ἡ συνάρτησις ἔχει μέγιστον ἢ ἐλάχιστον. Η δευτέρα παράγωγος  $\psi'' = 2\alpha$  είναι θετικὴ δι'  $\alpha > 0$ , ἀρνητικὴ δὲ δι'  $\alpha < 0$  ἐπομένως ἡ συνάρτησις, ὅταν  $\alpha > 0$ , ἔχει διὰ  $x = -\frac{\beta}{2\alpha}$  μέγιστον  $\psi = \frac{4\alpha\gamma - \beta^2}{4\alpha}$  καὶ ὅταν  $\alpha < 0$ , ἔχει διὰ  $x = -\frac{\beta}{2\alpha}$  μέγιστον  $\psi = \frac{4\alpha\gamma - \beta^2}{4\alpha}$ .

4ον. Διὰ  $x = \pm\infty$ , ἐὰν  $\alpha > 0$   $\psi = +\infty$ , ἐὰν δὲ  $\alpha < 0$   $\psi = -\infty$ .

### Πίναξ τῶν μεταβολῶν

$\alpha > 0$	$\infty$	$-\infty$	$-\frac{\beta}{2\alpha}$	$+\infty$
	$\psi'$	-	0	+
	$\psi''$		+	
	$\psi$	$+\infty$	$\searrow \frac{4\alpha\gamma - \beta^2}{4\alpha \text{ ἐλάχιστον}}$	$\nearrow +\infty$
$\alpha < 0$	$\infty$	$-\infty$	$-\frac{\beta}{2\alpha}$	$+\infty$
	$\psi'$	+	0	-
	$\psi''$		-	
	$\psi$	$-\infty$	$\nearrow \frac{4\alpha\gamma - \beta^2}{4\alpha \text{ μέγιστον}}$	$\searrow -\infty$

Παράδειγμα. Νὰ σπουδασθῇ ἡ μεταβολὴ τῆς συναρτήσεως  $\psi = x^2 - 6x + 8$ .

Η συνάρτησις αύτη είναι ωρισμένη διὰ πᾶσαν τιμὴν τοῦ  $x$ . Η παράγωγος  $\psi' = 2x - 6$  διὰ  $x < 3$  είναι  $\psi' < 0$ , διὰ  $x > 3$  είναι  $\psi' > 0$ . Διὰ  $x = 3$  είναι  $\psi' = 0$ , ἐπειδὴ δὲ  $\psi'' = 2 > 0$ , ἔπειται ὅτι διὰ  $= 3$  ἡ συνάρτησις ἔχει ἐλάχιστον  $\psi = \frac{32-36}{4} = -1$ .

Διὰ  $x = \pm \infty$  ἐπειδὴ  $\alpha > 0$ ,  $\psi = +\infty$ .

Διὰ  $x = 0$   $\psi = 8$ , διὰ  $x = 2$  καὶ  $x = 4$ ,  $\psi = 0$ .

### Α σ κή σ εις

660. Νὰ ἔξετασθοῦν αἱ μεταβολαὶ τῶν συναρτήσεων :

$$\begin{array}{lll} \alpha') \psi=x+3, & \beta') \psi=-3x+1, & \gamma') \psi=x^3+3, \\ \epsilon') \psi=x^3-8, & \sigma') \psi=x(x-1)^2, & \zeta') \psi=x^2+3x+2, \\ & & \eta') \psi=x^3-5x-4. \end{array}$$

661. Νὰ εύρεθοῦν τὸ μέγιστον ἢ τὸ ἐλάχιστον τῶν συναρτήσεων :

$$\alpha') \psi=x^2-3x+2, \quad \beta') \psi=3x^3+2x^2, \quad \gamma') \psi=x^3-36x.$$

662. Νὰ εύρεθῇ ἡ ἀληθῆς τιμὴ τῶν κάτωθι κλασμάτων :

$$\begin{array}{lll} \alpha') \psi=\frac{x^3-3x^2+4x-2}{x^3+7x^2-5x-3} & \text{διὰ } x=1, & \beta') \psi=\frac{x^3-5x^2+7x-3}{x^3-x^2-5x-3} \\ & & \text{διὰ } x=3, \\ \gamma') \psi=\frac{x^3-3x^2+4}{x^2-2x^2-4x+8} & \text{διὰ } x=2, & \delta') \psi=\frac{x^3-3x^2+4}{3x^3-18x^2+36x-24} \\ & & \text{διὰ } x=2. \end{array}$$

### 4. ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΣ ΜΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ

**§ 260.** Ἐστω τυχοῦσα συνάρτησις τοῦ  $x$ , ἡ  $\psi$ . Ἐὰν ἡ ἀνεξάρτητος μεταβλητὴ  $x$  λάβῃ ἐλαχίστην αὔξησιν  $\Delta x$ , ἡ συνάρτησις λαμβάνει όμοιώς ἀντίστοιχον αὔξησιν  $\Delta \psi$ . Γνωρίζομεν ὅτι, ἀν o $\rho\Delta x=0$ , είναι καὶ o $\rho\Delta\psi=0$  καὶ o $\rho(\frac{\Delta\psi}{\Delta x}-\psi')=0$ .

Ἐκ ταύτης ἔπειται ὅτι  $\frac{\Delta\psi}{\Delta x}-\psi'=e$  (1), ἐὰν o $\rho e=0$ . Λύομεν τὴν

(1) ὡς πρὸς  $\Delta\psi$  καὶ ἔχομεν  $\Delta\psi=\psi'\Delta x+\epsilon\cdot\Delta x$ . Ἡτοι :

Η αὔξησις συνεχοῦς συναρτήσεως τοῦ  $x$  ἔχουσης παράγωγον ἡ ἀντιστοιχοῦσα εἰς ἐλαχίστην αὔξησιν  $\Delta x$  τοῦ  $x$  ἀποτελεῖται ἀφ' ἐνὸς ἀπὸ τὸ γινόμενον τῆς παραγώγου ἐπὶ  $\Delta x$  καὶ ἀφ' ἐτέρου ἀπὸ τὸ γινόμενον τοῦ  $\Delta x$  ἐπὶ ἀριθμὸν  $e$ , δ ὁ ποιοὶς ἔξαρταται ἀπὸ τὴν αὔξησιν  $\Delta x$  καὶ ἔχει δριον μηδέν, ὅταν o $\rho\Delta x=0$ .

Τὸ γινόμενον  $\psi'\Delta x$  καλεῖται διαφορικὸν τῆς συναρτήσεως  $\psi$  καὶ σημειοῦται  $d\psi=\psi'\cdot\Delta(x)$  (1)

Έαν  $\psi = x$  είναι  $\psi' = 1$ , δηλώτε έκ της (1) προκύπτει  $dx = \Delta x$  και  
ή ισότης (1) γράφεται  $d\psi = \psi' \cdot dx$  (2)

Έκ της (2) παρατηροῦμεν· 1ον ότι, ίνα μία συνάρτησις έχῃ διαφορικόν, πρέπει νὰ έχῃ παράγωγον καὶ 2ον ότι πρὸς εὔρεσιν τοῦ διαφορικοῦ μιᾶς συναρτήσεως πολλαπλασιάζομεν τὴν παράγωγον αὐτῆς ἐπὶ  $dx$ . Οὕτως έὰν  $\psi = 2x^3$ , θὰ είναι  $d\psi = 6x^2dx$ .


### Α σ κ η σ i s

663. Νὰ εύρεθῇ τὸ διαφορικὸν τῶν κάτωθι συναρτήσεων:

$$\begin{array}{lll} \alpha') \psi = 3x, & \beta') \psi = 7x^3, & \gamma') \psi = 3x^2 - 5x + 6, \\ \delta') \psi = \frac{3x}{x+1}, & \epsilon') \psi = \frac{x^2-3}{x^2+1}, & \sigma') \psi = \sqrt{3x^2}, \quad \zeta') \psi = \sqrt{x^2-2x+1}, \end{array}$$

### 5. ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΝ ΕΜΒΑΔΟΥ

**§ 261.** "Εστω  $\psi = \sigma(x)$  συνεχὴς συνάρτησις τοῦ  $x$  καὶ  $MN$  ἡ καμπύλη, τὴν ὅποιαν αῦτη παριστᾶ. "Ἄσ λάβωμεν ἐπὶ τοῦ ἄξονος τῶν  $x$  τὸ σταθερὸν σημεῖον  $A(\alpha, 0)$  καὶ τὸ μεταβλητὸν  $B(x, 0)$ , καὶ τῶν ὅποιων φέρομεν τὰς τεταγμένας  $AG$  καὶ  $BD$  τῶν σημείων  $G$  καὶ  $D$  τῆς καμπύλης, οὕτω δὲ δρίζεται τὸ χωρίον  $ABGD$ , τοῦ ὅποιου εἴστω  $E$  τὸ ἐμβαδὸν ( $\sigma$ χ. 28).



Σχ. 28

Είναι προφανὲς ὅτι μετατιθέμενον τοῦ μεταβλητοῦ σημείου  $B$ , ἦτοι μεταβαλλομένον τοῦ  $x$ , μεταβάλλεται καὶ τὸ ἐμβαδὸν  $E$ , ἐπομένως τὸ  $E$  είναι συνάρτησις τοῦ  $x$ . Ἐπίσης είναι φανερὸν ὅτι, ἐφ' ὅ-

σον ή συνάρτησις  $\psi = \sigma(x)$  είναι συνεχής δι' αύξησιν τοῦ  $x$  κατὰ  $\Delta x = (\Delta E)$ , ή αύξησις τοῦ ἐμβαδοῦ  $\Delta E$  είναι τὸ ἐμβαδὸν τοῦ χωρίου  $B\Delta ZE$  καὶ ὅτι δι'  $\sigma(\Delta x) = 0$  θὰ είναι καὶ  $\sigma(\Delta E) = 0$ , ἥτοι τὸ  $E$  είναι καὶ αὐτὸ συνεχής συνάρτησις τοῦ  $x$ . 'Ως ἐκ τοῦ σχήματος φαίνεται, είναι  $(B\Delta HE) < (B\Delta ZE) < (B\theta ZE)$  ἢ ἐὰν τεθῇ ( $\Delta \theta$ ) =  $\Delta \psi$ , θὰ είναι  $\psi \cdot \Delta x < \Delta E < (\psi + \Delta \psi) \cdot \Delta x$ .  $\Delta x$ : διαιροῦντες δὲ διὰ  $\Delta x$  ἔχομεν :

$$\text{Ἐὰν μὲν } \Delta x > 0, \psi < \frac{\Delta E}{\Delta x} < \psi + \Delta \psi, \text{ ἐὰν δὲ } \Delta x < 0, \psi > \frac{\Delta E}{\Delta x} > \psi + \Delta \psi.$$

$$\text{Ἐπειδὴ δέ, ὅταν } \sigma(\Delta x) = 0, \text{ είναι καὶ } \sigma(\Delta \psi) = 0, \text{ ἐπειταὶ ὅτι } \sigma(\frac{\Delta E}{\Delta x}) = \psi.$$

$$\text{Ἄλλὰ } \sigma(\frac{\Delta E}{\Delta x}) = E', \text{ ἕπει } E' = \psi, \text{ ἐκ ταύτης δὲ ἐπειταὶ ὅτι } E' dx = \psi dx.$$

#### 6. ΑΡΧΙΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΣ ΑΥΤΩΝ

**§ 262.** "Εστω ή συνάρτησις  $\psi = 5x^2 - 7x$  ἔχουσα παράγωγον  $\psi' = 10x - 7$ . 'Η συνάρτησις  $\psi = 5x^2 - 7x$  λέγεται ἀρχική συνάρτησις ή καὶ παράγουσα τῆς  $\psi' = 10x - 7$ . "Ητοι :

"Αρχική συνάρτησις δοθείσης συναρτήσεως  $\varphi(x)$  λέγεται μία ἄλλη συνάρτησις, ἐὰν ὑπάρχῃ, ἥτις, ἔχει ὡς παράγωγον τὴν δοθεῖσαν.

**§ 263.** "Εστω ή συνάρτησις  $\alpha\varphi(x)$ , ἐνθα α σταθερά. 'Η παράγωγος αὐτῆς είναι  $[\alpha\varphi(x)]' = \alpha\varphi'(x)$ , ἥτοι ή ἀρχική τῆς συναρτήσεως  $\alpha\varphi'(x)$  είναι ή  $\alpha\varphi(x)$ , ἐνθα  $\varphi(x)$  είναι ή παράγουσα τῆς  $\varphi'(x)$ . "Ωστε:

"Η ἀρχικὴ μιᾶς συναρτήσεως ἐπὶ σταθερὰν ποσότητα είναι ή παράγουσα τῆς δοθείσης συναρτήσεως ἐπὶ τὴν σταθερὰν ποσότητα

*Παραδειγμα :* "Εστω ή συνάρτησις  $\varphi(x) = x^4$ . ή ἀρχικὴ αὐτῆς είναι ή  $f(x) = \frac{x^5}{5}$ . Καὶ γενικῶς ή ἀρχικὴ τῆς  $\varphi(x) = x^\mu$  είναι  $f(x) = \frac{x^{\mu+1}}{\mu+1}$  ( $\mu \neq -1$ ): "Επομένως ή ἀρχικὴ τῆς  $3x^4$  είναι  $3 \cdot \frac{x^5}{5}$ .

**§ 264.** "Εστω ή συνάρτησις  $\psi = \varphi(x) + \sigma(x) + f(x)$  ἔχουσα ὡς παράγωγον τὴν  $\psi' = \varphi'(x) + \sigma'(x) + f'(x)$ . συνεπῶς ή ἀρχικὴ τῆς  $\psi' = \varphi'(x) + \sigma'(x) + f'(x)$  είναι ή  $\psi = \varphi(x) + \sigma(x) + f(x)$ . 'Άλλὰ αἱ  $\varphi(x)$ ,  $\sigma(x)$ ,  $f(x)$  είναι ἀντιστοίχως αἱ ἀρχικαι τῶν  $\varphi'(x)$ ,  $\sigma'(x)$ ,  $f'(x)$ . "Οθεν :

\* Η ἀρχικὴ συνάρτησις τοῦ ἀθροίσματος δύο ἢ περισσοτέρων συναρτήσεων ἔχουσαν ἀρχικὰς ἵσονται μὲ τὸ ἀθροίσμα τῶν ἀρχικῶν τῶν διθεισῶν συναρτήσεων.

*Παράδειγμα :* Ἐπειδὴ αἱ ἀρχικαὶ τῶν  $3x^2, 6x, 5$  εἰναι ἀντιστοίχως αἱ  $x^3, 3x^2, 5x$ , ἐπεται ὅτι ἡ ἀρχικὴ τῆς  $\psi = 3x^2 - 6x + 5$  εἰναι ἡ  $x^3 - 3x^2 + 5x$ .

**§ 265.** \*Εστω μία συνάρτησις τοῦ  $x$  ἡ  $\phi(x)$  ὡρισμένη ἐν τινὶ διαστήματι καὶ ἔχουσα ὡς ἀρχικὴν τὴν συνάρτησιν  $f(x)$ . Κατὰ τὸν ὄρισμὸν τῆς ἀρχικῆς συναρτήσεως πρέπει  $f'(x) = \phi(x)$ . ἀλλὰ καὶ  $(f(x) + c)' = \phi(x)$ , ἔνθα c σταθερά. Ἀρα ἡ  $\phi(x)$  θὰ ἔχῃ ὡς ἀρχικὰς καὶ τὰς συναρτήσεις  $f(x) + c$ , ἔνθα c εἰναι οἰοσδήποτε σταθερὸς ἀριθμός.

## 7. ΑΡΧΙΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

**§ 266.** Εἰς τὸ περὶ παραγώγων κεφάλαιον εἶχομεν εὗρει τὰς παραγώγους ὡρισμένων συναρτήσεων τῇ βοηθείᾳ αὐτῶν εύκόλως εύρισκομεν τὰς ἀρχικὰς ὡρισμένων τοιούτων, αἱ δποῖαι περιέχονται εἰς τὸν κάτωθι πίνακα.

Συναρτήσεις	Ἀρχικαὶ
$x^\mu$	$\frac{x^{\mu+1}}{\mu+1} + c$
$\alpha x^\mu$	$\frac{\alpha x^{\mu+1}}{\mu+1} + c$
$\frac{1}{\sqrt[m]{x}}$	$2\sqrt[m]{x} + c$
$\sigma v x$	$\eta \mu x + c$
$\eta \mu x$	$-\sigma v x + c$
$\frac{1}{\sigma v^2 x}$	$\epsilon \varphi x + c$
$-\frac{1}{\eta \mu^2 x}$	$\sigma \varphi x + c$

**§ 267.** \*Η ἀρχικὴ συνάρτησις ἡ παράγουσα μιᾶς συναρτήσεως  $\sigma(x)$  καλεῖται καὶ δόλοκλήρωμα τοῦ διαφορικοῦ  $\sigma(x)dx$  καὶ παρίσταται διὰ τοῦ συμβόλου  $\int \sigma(x)dx$ .

Κατά ταῦτα εἶναι  $\int \sigma'(x)dx = \sigma(x) + c$  καὶ  $d\int \sigma'(x)dx = \sigma'(x)dx$ .  
”Ητοι :

‘Η όλοκλήρωσις καὶ ἡ διαφόρισις εἶναι πράξεις ἀντίστροφοι.

Ἐκ τούτου καθίσταται φανερὸν ὅτι ἔξ ἑκάστου κανόνος διαφορίσεως προκύπτει ἀντίστοιχος κανὼν όλοκληρώσεως καὶ ἀντιστρόφως· μόνον ὅτι κατά τὴν όλοκλήρωσιν πρέπει νὰ προσθέσωμεν ποσότητα  $c$  ἀνεξάρτητον τῆς ἑκάστοτε μεταβλητῆς.

### Α σκηνις


664. Νὰ εύρεθοῦν τὰ κάτωθι όλοκληρώματα :

- α')  $\int 3xdx$ , β')  $\int 9x^2dx$ , γ')  $\int x^{-4}dx$ , δ')  $\int x^{-5}dx$ ,  
 ε')  $\int -\frac{1}{x^3}dx$ , στ')  $\int \frac{7}{x^5}dx$ , ζ')  $\int (3x^3+2x^2-5x+6)dx$ , η')  $\int (6x^3-7x^2-3x)dx$ ,  
 θ')  $\int (x+2)^3dx$ , ι')  $\int (x-1)^3dx$ , ια')  $\int (\eta mx+\sigma ux)dx$ , ιβ')  $\int \sigma ux^2dx$ ,  
 ιγ')  $\int \eta u^2xdx$ , ιδ')  $\int \sigma ux^3dx$ , ιε')  $\int \eta u^3xdx$ .

### 8. ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΣ ΤΩΝ ΑΡΧΙΚΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

§ 268. ”Εστω μία συνεχὴς συνάρτησις  $\psi = \sigma(x)$  καὶ  $MN$  ἡ καμπύλη, τὴν ὁποίαν αὔτη παριστᾶ.

”Ἄσ ύποθέσωμεν ὅτι  $\int \sigma(x)dx = f(x) + c$ . ”Εστωσαν δὲ  $(\overline{OA}) = \alpha$



Σχ. 29

καὶ  $(\overline{OA'}) = x$ . ”Ἀν κληθῇ  $E$  τὸ ἐμβαδὸν τοῦ καμπυλογράμμου χωρίου  $ABB'A'$  (σχ. 29) θὰ εἶναι  $\delta E = \sigma(x)dx$ , συνεπῶς

$$E = \int \sigma(x)dx = f(x) + c \quad (1)$$

οίουδήποτε ὅντος τοῦ  $x$ . ”Επειδὴ δὲ διὰ  $x = \alpha$  θὰ εἶναι  $E = 0$  ἡ ισότης

(1) γίνεται  $0=f(\alpha)+c$ , έκ της όποιας προκύπτει ότι  $c=-f(\alpha)$ , όπότε  $E=f(x)-f(\alpha)$ . Αύτη διὰ  $x=(OA')=\beta$  δίδει  $(ABB'A')=f(\beta)-f(\alpha)$ . Ή διαφορὰ  $f(\beta)-f(\alpha)$  παρίσταται συμβολικῶς

$$\int_{\alpha}^{\beta} \sigma(x) dx,$$

έὰν  $f'(x)=\sigma(x)$  καὶ καλεῖται ὡρισμένον ὄλοκλήρωμα.

Τὰ α καὶ β καλοῦνται ὅρια τοῦ ὄλοκληρώματος, τὸ μὲν α κατώτερον, τὸ δὲ β ἀνώτερον, ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὸ  $\int \sigma(x) dx$ , τὸ ὄποιον καλεῖται ἀόριστον ὄλοκλήρωμα. "Ωστε :

'Εὰν δοθῇ καμπύλη παριστωμένη ὑπὸ τῆς συναρτήσεως  $\psi=\sigma(x)$ , ὅρισθῶσι δὲ ἐπ' αὐτῆς δύο σημεῖα B καὶ B' ἔχοντα ἀντιστοίχως τετμημένας α καὶ β, τὸ ἐμβαδὸν E τοῦ καμπυλογράμμου χωρίου (ABB'A') θὰ εἶναι :

$$E = \int_{\alpha}^{\beta} \sigma(x) dx = f(\beta) - f(\alpha), \text{ έὰν } f'(x) = \sigma(x).$$

### Α σκήσεις

665. Δίδεται ἡ συνάρτησις  $\psi=x^2-5x+6$ . Νὰ εύρεθῇ τὸ ἐμβαδὸν τοῦ καμπυλογράμμου χωρίου, τοῦ περιεχομένου μεταξὺ τοῦ ἀξονος τοῦ x καὶ τοῦ τόξου τῆς καμπύλης τοῦ περιεχομένου μεταξὺ τῶν τομῶν τῆς x'x καὶ τῆς καμπύλης ταύτης.

666. Τὸ αὐτὸ διὰ τὴν συνάρτησιν  $x^2-6x+5$ .

677. 'Εὰν B εἶναι τὸ σημεῖον, εἰς τὸ δύοιον ἡ συνάρτησις  $\psi=x^2+2x-3$  τέμνει τὸν ἀξονα  $\psi'$ , καὶ A' καὶ A αἱ τομαὶ μὲ τὸν ἀξονα x'x, νὰ εύρεθῇ τὸ ἐμβαδὸν A'OB καὶ OBA.

668. Νὰ εύρεθῃ τὸ ἐμβαδὸν τῆς ἡμιτονοειδοῦς  $\psi=\eta mx$  ἀπὸ 0 ἕως π.

669. Νὰ εύρεθῇ τὸ ἐμβαδὸν τῆς συνημιτονοειδοῦς  $\psi=sinx$  ἀπὸ θ ἕως  $\frac{\pi}{2}$ .



## ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

### ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ I

	Σελίς
Όρισμός της Ἀλγέβρας καὶ σύντομος ιστορικὴ ἐπισκόπησις αὐτῆς . . . . .	9–11
Θετικοὶ καὶ ἀρνητικοὶ ἀριθμοὶ . . . . .	12–16
Γραφικὴ παράστασις τῶν σχετικῶν ἀριθμῶν . . . . .	16–18
Σχηματισμὸς τῶν ἀριθμῶν ἐκ τῆς θετικῆς μονάδος . . . . .	18–19
Πράξεις μὲ σχετικοὺς ἀριθμούς — (Πρόσθεσις) . . . . .	20–23
Ίδιότητες τῆς προσθέσεως . . . . .	23–25
Γεωμετρικὴ ἀπεικόνισις ἀθροίσματος . . . . .	25–26
Ἀφαίρεσις . . . . .	26–28
Ἀλγεβρικὰ ἀθροίσματα . . . . .	28–32
Γεωμετρικὴ ἀπεικόνισις διαφορᾶς σχετικῶν ἀριθμῶν ἢ καὶ ἀλγεβρικοῦ ἀθροίσματος . . . . .	32–33
Πολλαπλασιασμὸς . . . . .	33–35
Πολλαπλασιασμὸς ἀριθμοῦ ἐπὶ + 1 ἢ ἐπὶ – 1 . . . . .	36–37
Διαίρεσις . . . . .	37–39
Κλάσματα ἀλγεβρικά . . . . .	40–42
Περὶ δυνάμεων μὲ ἔκθέτας ἀκεραίους θετικούς ἀριθμούς . . . . .	42–43
Περὶ τῶν συμβόλων αἱ καὶ αἱ ὡς δυνάμεων . . . . .	43
Θεμελιώδεις ίδιότητες τῶν δυνάμεων . . . . .	44–47
Δυνάμεις μὲ ἔκθέτας ἀκεραίους ἀρνητικούς . . . . .	48–49
Περὶ ἀνίστοτήτων μεταξὺ σχετικῶν ἀριθμῶν . . . . .	49–51
Ίδιότητες τῶν ἀνίστοτήτων . . . . .	51–53
Περίληψις περιεχομένων κεφαλαίου I . . . . .	53–55

### ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II

Περὶ ἀλγεβρικῶν παραστάσεων . . . . .	56–57
Εἰδη ἀλγεβρικῶν παραστάσεων . . . . .	57–58
Περὶ μονωνύμων . . . . .	58–60
“Ομοια” μονώνυμα . . . . .	60–61
Πρόσθεσις μονωνύμων . . . . .	61–62
Ἀριθμητικὴ τιμὴ ἀλγεβρικῆς παραστάσεως . . . . .	62–63
Περὶ πολυωνύμων . . . . .	64–66
Πράξεις ἐπὶ τῶν πολυωνύμων (Πρόσθεσις πολυωνύμων) . . . . .	66–67

	Σελίς
'Αφαίρεσις άλγεβρικῶν παραστάσεων . . . . .	67— 69
Περὶ παρενθέσεων καὶ ἀγκυλῶν . . . . .	69— 71
Γινόμενον ἀκεραίων μονωνύμων . . . . .	71— 72
Γινόμενον πολυωνύμου ἐπὶ μονωνύμου . . . . .	72— 73
Γινόμενον πολυωνύμων . . . . .	73— 75
'Ἄξιοσημεῖωτοι πολλαπλασιασμοὶ . . . . .	75— 76
Διαίρεσις ἀκεραίων μονωνύμων . . . . .	76— 77
Διαίρεσις πολυωνύμου διὰ μονωνύμου . . . . .	77— 78
Διαίρεσις πολυωνύμου διὰ πολυωνύμου . . . . .	79— 85
'Υπόλοιπον διαιρέσεως πολυωνύμου περιέχοντος τὸ χ διὰ τῶν χ ± α ἢ διὰ τοῦ αχ ± β . . . . .	85— 87
Πηλίκα τῶν διαιρέσεων χμ ± αμ διὰ χ ± α . . . . .	87— 89
'Ανάλυσις ἀκεραίας ἀλγεβρικῆς παραστάσεως εἰς γινόμενον παραγόν- των (περιπτώσεις ἐννέα) . . . . .	89— 93
Μ.κ.δ. καὶ ἔ.κ.π. ἀκεραίων ἀλγεβρικῶν παραστάσεων . . . . .	93— 94
Περὶ ρητῶν ἀλγεβρικῶν κλασμάτων . . . . .	95
'Ιδιότητες ρητῶν ἀλγεβρικῶν κλασμάτων . . . . .	95— 97
Περὶ τῶν παραστάσεων $\frac{0}{0}$ καὶ $\frac{\alpha}{0}$ . . . . .	98—101
Πρόσθεσις καὶ ἀφαίρεσις ἀλγεβρικῶν κλασμάτων . . . . .	101—102
Πολλαπλασιασμὸς καὶ διαιρέσις ἀλγεβρικῶν κλασμάτων . . . . .	102—104
Σύνθετα κλάσματα . . . . .	103—105
Περίληψις περιεχομένων κεφαλαίου II . . . . .	105—107

### ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ III

'Εξισώσεις πρώτου βαθμοῦ μὲν ἔναν ἀγνωστον—'Ορισμοὶ καὶ Ιδιότητες έξισώσεων . . . . .	108—112
'Απαλοιφὴ τῶν παρονομαστῶν ἔξισώσεως . . . . .	112—114
Λύσις ἔξισώσεως Α' βαθμοῦ μὲν ἔναν ἀγνωστον . . . . .	114—115
Διερεύνησις τῆς ἔξισώσεως $\alpha\chi + \beta = 0$ . . . . .	115—116
Λύσις τῆς ἔξισώσεως $\alpha\chi + \beta = 0$ . . . . .	116—117
'Εφαρμογὴ τῶν ἔξισώσεων εἰς τὴν λύσιν προβλημάτων . . . . .	117—118
Προβλήματα τῶν ὅποιων ὁ ἀγνωστος δὲν ἔχει περιορισμόν . . . . .	119—120
Προβλήματα τῶν ὅποιων ὁ ἀγνωστος πρέπει νὰ είναι θετικὸς . . . . .	120—121
Προβλήματα τῶν ὅποιων ὁ ἀγνωστος πρέπει νὰ είναι ἀκέραιος θε- τικὸς . . . . .	121—122
Προβλήματα τῶν ὅποιων ὁ ἀγνωστος περιέχεται μεταξὺ δρίων . . . . .	123—124
Προβλήματα γενικά . . . . .	124—128
Περὶ συναρτήσεων.—'Η ἔννοια τῆς συναρτήσεως . . . . .	128—130
Πίναξ τιμῶν συναρτήσεως . . . . .	130
'Απεικόνισις τιμῶν συναρτήσεως . . . . .	130—134

Γραφική παράστασις της συναρτήσεως $\psi = \alpha x + \beta$ .....	Σ ε λ i s
Γραφική λύσις της έξισώσεως πρώτου βαθμού .....	134–136
<b>Περί άνισοτήτων πρώτου βαθμού με έναν άγνωστον</b> .....	137
Περίληψις περιεχομένων κεφαλαίου III .....	137–140
	140–141

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΥ

<u>Συστήματα έξισώσεων πρώτου βαθμού</u> .....	142
*Ιδιότητες τῶν συστημάτων .....	143–144
Μέθοδοι λύσεως συστήματος δύο πρωτοβαθμίων έξισώσεων μὲ δύο άγνώστους .....	144
Μέθοδοι ἀπαλοιφῆς διὰ τῶν ἀντιθέτων συντελεστῶν .....	144–147
Μέθοδος ἀπαλοιφῆς δι' ἀντικαταστάσεως .....	147–148
Μέθοδος ἀπαλοιφῆς διὰ συγκρίσεως .....	148–149
Διερεύνησις τοῦ συστήματος τῆς μορφῆς $\begin{cases} \alpha x + \beta \psi = \gamma \\ \alpha_1 x + \beta_1 \psi = \gamma_1 \end{cases}$ .....	150–152
Λύσις τοῦ συστήματος $\begin{cases} \alpha x + \beta \psi = \gamma \\ \alpha_1 x + \beta_1 \psi = \gamma_1 \end{cases}$ .....	152–153
Γραφική λύσις συστήματος δύο έξισώσεων α' βαθμοῦ μὲ δύο άγνώστους .....	153–157
Συστήματα πρωτοβαθμίων έξισώσεων μὲ περισσοτέρους τῶν δύο άγνώστους .....	157–161
Λύσις συστημάτων διὰ τεχνασμάτων .....	161–164
Προβλήματα συστημάτων α' βαθμοῦ .....	164
Προβλήματα συστημάτων α' βαθμοῦ μὲ δύο άγνώστους .....	164–167
Προβλήματα συστημάτων α' βαθμοῦ μὲ περισσοτέρους τῶν δύο άγνώστους .....	167–169
Περίληψις περιεχομένου κεφαλαίου ΙΥ .....	169–171

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Υ

Περὶ τῶν ριζῶν σχετικῶν ἀριθμῶν .....	172
*Ιδιότητες τῶν ριζῶν .....	172–178
Διυνάμεις μὲ ἐκθέτας κλασματικούς .....	178–181
Περὶ τῆς ρίζης μονωνύμων .....	181–182
Περὶ δρίων .....	182–184
*Ιδιότητες τῶν δρίων .....	184–185
Περὶ ἀσυμμέτρων ἀριθμῶν .....	186–189
Περὶ φανταστικῶν καὶ μιγάδων ἀριθμῶν .....	189–190
Πράξεις ἐπὶ φανταστικῶν καὶ μιγάδων ἀριθμῶν .....	190–191
*Ιδιότητες τῶν φανταστικῶν καὶ μιγάδων ἀριθμῶν .....	191–192

Σελίς	
192–194	Σημεῖα δριζόμενα μὲ μιγάδας ἀριθμούς
194–195	Περίληψις περιεχομένων κεφαλαίου V

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VI

Περὶ ἔξισώσεων δευτέρου βαθμοῦ . . . . .	196
'Ιδιότητες τῶν ἔξισώσεων . . . . .	196–197
Λύσις τῆς ἔξισώσεως $\alpha x^2 + \gamma = 0$ . . . . .	197–198
Λύσις τῆς ἔξισώσεως $\alpha x^2 + \beta x = 0$ . . . . .	198–199
Λύσις τῆς ἔξισώσεως $\alpha x^2 + \beta x + \gamma = 0$ . . . . .	99–201
'Εξισώσεις λυόμεναι μὲ βοηθητικούς ἀγνώστους . . . . .	201
Περὶ τοῦ εῖδους τῶν ριζῶν τῆς $\alpha x^2 + \beta x + \gamma = 0$ . . . . .	202–203
Σχέσεις συντελεστῶν καὶ ριζῶν τῆς ἔξισώσεων $\alpha x^2 + \beta x + \gamma + 0$ . . . . .	203–205
Περὶ τοῦ προσήμου τῶν ριζῶν τῆς $\alpha x^2 + \beta x + \gamma = 0$ . . . . .	206
Τροπὴ τοῦ τριωνύμου $\alpha x^2 + \beta x + \gamma$ εἰς γινόμενον πρωτοβαθμίων παραγόντων ὡς πρὸς πρὸς x . . . . .	206–207
Εύρεσις τριωνύμου β' βαθμοῦ ἐκ τῶν ριζῶν αὐτοῦ . . . . .	207–209
Πρόστημα τοῦ τριωνύμου $\alpha x^2 + \beta x + \gamma$ διὰ πραγματικάς τιμᾶς τοῦ x . . . . .	209–210
Θέσις ἀριθμοῦ (πραγματικοῦ) ὡς πρὸς τὰς ρίζας τριωνύμου . . . . .	210–212
Εύρεσις τῶν πραγματικῶν ριζῶν τῆς $\alpha x^2 + \beta x + \gamma = 0$ κατὰ προσέγγισιν . . . . .	212–213
Λύσις ἀνισότητος δευτέρου βαθμοῦ . . . . .	213–217
Περὶ τῶν τιμῶν τοῦ τριωνύμου $\alpha x^2 + \beta x + \gamma$ διὰ πάσας τὰς πραγματικάς τιμᾶς τοῦ x . . . . .	217–220
Γραφική παράστασις τῆς συναρτήσεως $\psi = \alpha x^2 + \beta x + \gamma$ . . . . .	20–224
Γραφική παράστασις τῆς συναρτήσεως $\psi = \frac{\alpha x + \beta}{\gamma x + \delta}$ . . . . .	224–230
Περίληψις περιεχομένων κεφαλαίου VI . . . . .	230–231

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VII

'Εξισώσεις ἀναγόμεναι εἰς ἔξισώσεις β' βαθμοῦ . . . . .	232
Διτετράγωνοι ἔξισώσεις . . . . .	232–233
Τροπὴ τοῦ τριωνύμου $\alpha x^4 + \beta x^2 + \gamma$ εἰς γινόμενον παραγόντων . . . . .	233–235
Τροπὴ διπλῶν τινῶν ριζικῶν εἰς ἀπλᾶ . . . . .	235–236
'Εξισώσεις μὲριζικά β' καὶ ἀνωτέρας τῆς β' τάξεως . . . . .	236–240
Περὶ ἀντιστρόφων ἔξισώσεων . . . . .	240–244
'Εξισώσεις διώνυμοι . . . . .	244–246
'Εξισώσεις α' καὶ β' βαθμοῦ ὡς πρὸς τὴν ἀπόλυτον τιμὴν τοῦ ἀγνώστου . . . . .	246–248
Λύσις τῆς ἔξισώσεως τῆς μορφῆς $\alpha x ^2 + \beta x  + \gamma = 0$ . . . . .	248
Συστήματα δευτέρου καὶ ἀνωτέρου βαθμοῦ . . . . .	249–255

## Σ ε λ ί σ

255–259

259–264

264–266

Προβλήματα ἔξισώσεων δευτέρου βαθμοῦ .....	
Προβλήματα γενικά .....	
Περίληψις περιεχομένων κεφαλαίου VII .....	

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VIII

Περὶ προόδων.—Πρόοδοι ἀριθμητικαὶ .....	267–268
Παρεμβολὴ ὅρων ἀριθμητικῆς προόδου .....	268–269
Ἄθροισμα ὅρων ἀριθμητικῆς προόδου .....	169–273
Πρόοδοι γεωμετρικαὶ .....	273–275
Παρεμβολὴ ὅρων γεωμετρικῆς προόδου .....	275–276
Ἄθροισμα ὅρων γεωμετρικῆς προόδου .....	276–277
Ἄθροισμα ἀπείρων ὅρων φθινούσης γεωμετρικῆς προόδου .....	277–279
Ἀρμονικὴ πρόοδος .....	279–280
Περὶ λογαρίθμων .....	280–283
Ίδιότητες τῶν λογαρίθμων .....	283–284
Περὶ τοῦ χαρακτηριστικοῦ τοῦ λογαρίθμου .....	284–287
Τροπὴ ἀρνητικοῦ δεκαδικοῦ καὶ ἐν μέρει ἀρνητικοῦ .....	287–289
Λογάριθμος ἀριθμοῦ κατὰ προσέγγισιν .....	289–290
Περὶ λογαρίθμικῶν πινάκων .....	290–293
Ἐφαρμογαὶ τῶν λογαρίθμων .....	293–295
Ἄλλωγτὴ τῆς βάσεως τῶν λογαρίθμων .....	295–296
Περὶ ἑκθετικῶν καὶ λογαριθμικῶν ἔξισώσεων .....	296–299
Προβλήματα ἀνατοκισμοῦ .....	300–304
Προβλήματα ἴσων καταθέσεων .....	304–206
Προβλήματα χρεωλυσίας .....	306–311
Περίληψις περιεχομένων κεφαλαίου VIII .....	311–313

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IX

Ίδιότητες τῶν ἀπολύτων τιμῶν πραγματικῶν ἀριθμῶν .....	314
Ἀπόλυτος τιμὴ ἀθροίσματος ἀριθμῶν .....	314–315
Ἀπόλυτος τιμὴ γινομένου ἀριθμῶν .....	316
Ἀπόλυτος τιμὴ πηλίκου δύο ἀριθμῶν .....	316
Ἀπόλυτος τιμὴ δυνάμεως ἀριθμοῦ .....	316
Περὶ ἀκολουθίας ἀριθμῶν .....	316–318
Πότε μία ἀκολουθία ἀριθμῶν τείνει πρὸς τὸ μηδὲν .....	318–320
Ίδιότητες τῶν ἀκολουθιῶν .....	320–323
Περὶ ὁρίου μεταβλητῆς ποσότητος .....	323
Περὶ ὁρίου ἀθροίσματος, γινομένου, πηλίκου, δυνάμεως μεταβλητῶν ποσοτήτων .....	323–325

Πᾶς διακρίνομεν ἀν μεταβλητὴ ποσότης ἔχῃ ὅριον.....	Σ ε λ ι σ
Περὶ συνεχείας τῶν συναρτήσεων .....	325–328
	328–330

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ X

Περὶ παραγώγων .....	331–333
Γεωμετρικὴ σημασία τῆς παραγώγου .....	333–234
Παράγωγος συναρτήσεως ἄλλης συναρτήσεως .....	334–335
Παράγωγος ἀθροίσματος συναρτήσεων τοῦ x .....	335
Παράγωγος γινομένου συναρτήσεων τοῦ x .....	336
Παράγωγος γινομένου σταθερᾶς ἐπὶ συνάρτησιν τοῦ x .....	336–337
Παράγωγος πηλίκου δύο συναρτήσεων τοῦ x .....	336–337
Παράγωγος πηλίκου δύο συναρτήσεων τοῦ x .....	337–338
Παράγωγος τετραγωνικῆς ρίζης τοῦ x .....	338
Παράγωγοι διαφόρων τάξεων .....	339
Παράγωγοι κυκλικῶν συναρτήσεων .....	339–340
"Οριον τοῦ $\frac{x}{\eta \mu x}$ , ὅταν $\sigma \rho x = 0$ .....	340–341
Παράγωγος ἡμιτόνου, συνημιτόνου, ἐφαπτομένης, σφχ, τεμχ, στεμχ Χρῆσις τῶν παραγώγων διὰ τὴν σπουδὴν τῶν συναρτήσεων.....	341–342
Θεώρημα τῶν πεπερασμένων αὐξήσεων .....	342
Θεώρημα τοῦ Rolle .....	342–343
Μέθοδος σπουδῆς τῶν μεταβολῶν συναρτήσεων τῇ βοηθείᾳ τῶν παραγώγων .....	343–347
Διαφορικὸν συναρτήσεως μιᾶς ἀνεξαρτήτου μεταβλητῆς .....	347–350
Παράγωγος καὶ διαφορικὸν ἐμβαδοῦ .....	350–351
<sup>1</sup> Ἀρχικαὶ συναρτήσεις καὶ χρησιμότης αὐτῶν .....	351–352
<sup>2</sup> Ἀρχικαὶ συναρτήσεις ὠρισμένων συναρτήσεων .....	352–353
Χρησιμότης ἀρχικῶν συναρτήσεων .....	353–354
Πίναξ περιεχομένων .....	354–355
	357

Τὰ ἀντίτυπα τοῦ βιβλίου φέρουν τὸ κάτωθι βιβλιόσημον εἰς ἀπόδειξιν τῆς γνησιότητος αὐτῶν.

’Αντίτυπον στερούμενον τοῦ βιβλιοσήμου τούτου θεωρεῖται κλεψίτυπον. ‘Ο διαθέτων, πωλῶν ἢ χρησιμοποιῶν αὐτὸν διώκεται κατά τὰς διατάξεις τοῦ ἅρθρου 7 τοῦ νόμου 1129 τῆς 15|21 Μαρτίου 1946 ( ’Εφ. Κυβ. 1946, A 108 ).



024000025501

ΕΚΔΟΣΙΣ Δ', 1960 (VI) — ΑΝΤΙΤΥΠΑ 40.000 — ΣΥΜΒΑΣΙΣ 979/7-4-60


ΕΚΤΥΠΩΣΙΣ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ : Γ. ΧΡΗΣΤΟΥ & ΥΙΟΣ - Χ.Ε.Ε.Ν.











Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής