

ΝΙΚΟΛΑΟΥ  
ΝΙΚΟΛΑΟΥ

# ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ

Επιμέλεια: Ε. Ν. Σ. Ε.

Δ'  
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  
ΕΚΔΟΣΕΩΣ  
ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ  
ΒΙΒΛΙΩΝ  
ΑΘΗΝΑΙ 1976



Αν  $x > y > 0$  και  $\alpha > \beta > 0$  τότε  
 $\alpha x > \beta y$

Αν  $\alpha, \beta$  ομόσημοί έχουν  $\alpha > \beta$  τότε  $\frac{1}{\alpha} > \frac{1}{\beta}$

## ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ

1. Αδελφοπούλου

Το παρόν βιβλίο είναι ανανεωμένο  
και περιλαμβάνει τις ασκήσεις  
που είναι απαραίτητες για  
την κατανόηση των θεμάτων.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

17529 1976

ΔΩΡΕΑΝ

ΕΠΙΤΡΟΜΗ

1979

Τὸ παρὸν βιβλίον δέον νὰ διαφυλαχθῆ καὶ  
διὰ τὰς Ε', ΣΤ', τάξεις εἰς τὰς ὁποίας ἐπί-  
σης θὰ χρησιμοποιηθῆ.

1979  
ΔΩΡΕΑΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ  
Ἄριστοβαθμίτου Διδάκτορος  
καὶ τέως Καθηγητοῦ τῶν Μαθηματικῶν

# ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ

## Δ', Ε', ΣΤ', ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ



$(\Phi\Gamma) = 0,0375 \cdot 100\ 000 = 3\ 750$  μέτρα  
καὶ  $(\Phi\Delta) = 0,046 \cdot 100\ 000 = 4\ 600$  μέτρα.

2. Σκοπὸς τῆς Τριγωνομετρίας, ἡ προηγουμένη γραφικὴ λύσις τῶν τοιοῦτων προβλημάτων δίδει πολλοὺς ἐξαγόμενους σημαντικὰ σφάλματα, διότι τὰ κατασκευασθέντα σχήματα καὶ τὰ ἐξαγόμενα τῆς μετρήσεως διαφόρων στοιχείων αὐτῶν δὲν εἶναι πάντοτε ἀκριβῆ.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΑΘΗΝΑΙ 1976

Τὰ σφάλματα διὰ ταῦτα εἶναι σημαντικὰ, ὅταν γίνονται κατασκευαί γωνιῶν καὶ ἐπισημαίνονται, ὅταν γίνεται χρῆσις ὁμοίων σχη-

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ  
Αριστοτελείου Σχολείου  
καὶ τῆς ἐπιτροπῆς τῶν Μαθηματικῶν

# ΤΡΙΤΩΝΟΜΕΤΡΙΑ

Δ. Ε. ΣΤ. ΤΥΜΑΖΙΟΥ

Τὸ βιβλίο αὐτὸ ἐκδόθη ἐν Ἀθήναις ἐν τῇ ἐπιτροπῇ  
τῶν Μαθηματικῶν τῆς ἐπιτροπῆς τῶν Μαθηματικῶν  
τῆς ἐπιτροπῆς τῶν Μαθηματικῶν τῆς ἐπιτροπῆς τῶν Μαθηματικῶν

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ  
ἈΘΗΝΑΙ 1976

## ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. *Πρόβλημα.* Δύο φάροι απέχουσιν ἀλλήλων 6400 μέτρα. Κατά τина στιγμήν ἀπὸ τὸν ἓνα φάρον Φ ἐφάνη ὑπὸ γωνίαν  $45^\circ$  ἡ ἀπόστασις πλοίου Π ἀπὸ τὸν ἄλλον φάρον Φ'. Τὴν αὐτὴν δὲ στιγμήν ἡ ἀπόστασις τοῦ πλοίου ἀπὸ τὸν Φ ἐφάνη ἀπὸ τὸν Φ' ὑπὸ γωνίαν  $30^\circ$ . Νὰ εὐρεθῇ ἡ ἀπόστασις τοῦ πλοίου ἀπὸ ἕκαστον φάρον τὴν στιγμήν ἐκείνην.

*Λύσις.* Κατασκευάζομεν τρίγωνον πφφ' ὁμοιον πρὸς τὸ νοητὸν τρίγωνον ΠΦΦ' ὑπὸ κλίμακα π.χ.

1 : 100 000 (σχ. 1).

Μετροῦμεν ἔπειτα τὰς πλευράς φπ καὶ φ'π αὐτοῦ.

Ἔστω δὲ ὅτι (φπ)

= 0,0375 μέτ. καὶ


(φ'π) = 0,046 μέτ.

Κατὰ δὲ τὰ γνωστὰ

ἐκ τῆς Γεωμετρίας θὰ εἶναι :

$$(ΦΠ) = 0,0375 \times 100\,000 = 3\,750 \text{ μέτρα}$$

καὶ  $(Φ'Π) = 0,046 \times 100\,000 = 4\,600 \text{ μέτρα}$



2. *Σκοπὸς τῆς Τριγωνομετρίας.* Ἡ προηγουμένη γραφικὴ λύσις τῶν τοιούτων προβλημάτων δίδει πολλάκις ἐξαγόμενον μὲ σημαντικὰ σφάλματα. Διότι τὰ κατασκευαζόμενα σχήματα καὶ τὰ ἐξαγόμενα τῆς μετρήσεως διαφόρων στοιχείων αὐτῶν δὲν εἶναι πάντοτε ἀκριβῆ ἢ ἔνεκα ἀτελείας τῶν ὀργάνων, μὲ τὰ ὁποῖα κατασκευάζονται ἢ καὶ ἔνεκα ἀδεξιάς χρήσεως αὐτῶν.

Τὰ σφάλματα δὲ ταῦτα εἶναι σημαντικὰ, ὅταν γίνωνται κατασκευαὶ γωνιῶν καὶ ἐνισχύονται, ὅταν γίνηται χρήσις ὁμοίων σχη-

μάτων. Ἄν π.χ. τὸ μήκος τῆς πλευρᾶς φπ εὐρεθῆ με σφάλμα 0,01 μέτ. ἡ εὐρεθείσα ἀπόστασις (ΦΠ) θὰ ἔχη σφάλμα :

$$0,01 \cdot 100\,000 = 1\,000 \text{ μέτρα.}$$

Διὰ τὴν ἀποφυγὴν τοιούτων σφαλμάτων οἱ Μαθηματικοὶ ἐπένοησαν μέθοδον καθαρῶς λογιστικὴν.

Δι' αὐτῆς δύνανται νὰ ὑπολογίζωσι τὰ ἄγνωστα στοιχεῖα ἐνὸς τριγώνου ἀπὸ ἐπαρκῆ δεδομένα. Εἰς τὸ προηγούμενον π.χ. πρόβλημα εἶναι δυνατόν νὰ ὑπολογίζωνται ἀμέσως αἱ ζητούμεναι ἀποστάσεις (ΦΠ) καὶ (Φ'Π) χωρὶς νὰ γίνῃ κατασκευὴ τοῦ τριγώνου φπφ'.

Ἡ ἔκθεσις τῶν μεθόδων τούτων ἀποτελεῖ τὸν σκοπὸν τῆς **Τριγωνομετρίας**. Ὡστε :

**Σκοπὸς τῆς Τριγωνομετρίας εἶναι ὁ ὑπολογισμὸς τῶν ἀγνώστων στοιχείων ἐνὸς τριγώνου, ἂν δοθῶσιν ἐπαρκῆ στοιχεῖα πρὸς τοῦτο.**

Ἐπειδὴ δὲ πᾶν εὐθύγραμμον σχῆμα ἀναλύεται εἰς τρίγωνα, ὁ σκοπὸς οὗτος δύναται νὰ ἐπεκταθῆ καὶ εἰς πάντα τὰ εὐθύγραμμα σχήματα.

Ἡ χρησιμότης τῆς Τριγωνομετρίας εἶναι μεγάλη. Διότι ὄχι μόνον συμπληρώνει αὕτη τὴν Γεωμετρίαν εἰς πολλὰ ζητήματα, ἀλλὰ λύει καὶ ζητήματα ἀπρόσιτα εἰς τὴν Γεωμετρίαν, ὅπως π.χ. εἶναι ἡ εὐρεσις τῆς ἀποστάσεως ἐνὸς ἀστέρος ἀπὸ τὴν Γῆν.

Διὰ νὰ καταλήξωμεν εἰς τὰς μεθόδους, με τὰς ὁποίας ἡ Τριγωνομετρία ἐκτελεῖ τὸν σκοπὸν τῆς, πρέπει πρῶτον νὰ μάθωμεν μερικὰς προκαταρκτικὰς γνώσεις. Ταύτας ἐκθέτομεν εἰς τὸ ἐπόμενον κεφάλαιον.

## ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ

### ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄

#### ΜΕΤΡΗΣΙΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΤΟΣΩΝ ΚΑΙ ΓΩΝΙΩΝ.


**3. Μέτρησις εὐθύγραμμου τμήματος.** Λόγος ἑνὸς εὐθύγραμμου τμήματος πρὸς ἄλλο. Διὰ νὰ μετρήσωμεν εὐθύγραμμον τμήμα, πρέπει νὰ συγκρίνωμεν αὐτὸ πρὸς ἄλλο ὠρισμένον εὐθύγραμμον τμήμα.

Τὸ ὠρισμένον τοῦτο εὐθύγραμμον τμήμα λέγεται **μονάς**.

Ἐκ τῆς σύγκρισιν ταύτην προκύπτει εἰς ἀριθμὸς. Οὗτος λέγεται **μῆκος** τοῦ μετρηθέντος τμήματος καὶ φανερῶνει ἀπὸ πόσας μονάδας ἢ καὶ μέρη αὐτῆς ἀποτελεῖται τοῦτο.

Αἱ δὲ μονάδες, μὲ τὰς ὁποίας μετροῦμεν τὰ εὐθύγραμμα τμήματα, λέγονται **μονάδες μήκους**.

Διεθνεῖς μονάδες μήκους εἶναι τὸ μέτρον καὶ τὰ πολλαπλάσια καὶ ὑποπολλαπλάσια αὐτοῦ.



Σχ. 2

Τὸ εὐθύγραμμον τμήμα  $T$  (σχ. 2) ἀποτελεῖται ἀπὸ τὸ  $\tau$ , ἂν ληφθῇ 4 φορές.

Δι' αὐτὸ τὸ  $T$  λέγεται **γινόμενον** τοῦ  $\tau$  ἐπὶ 4, ἥτοι εἶναι :

$$T = \tau \cdot 4 \quad (1)$$

Τὸ δὲ  $\tau$  εἶναι  $\frac{1}{4}$  τοῦ  $T$ .

Τὸ εὐθύγραμμον τμήμα  $T'$  ἀποτελεῖται ἀπὸ δύο τμήματα ἴσα πρὸς τὸ  $\tau$ , ἀπὸ τὸ  $\frac{1}{2}$  καὶ ἀπὸ τὸ  $\frac{1}{4}$  αὐτοῦ.

Δι' αὐτὸ τὸ  $T'$  λέγεται γινόμενον τοῦ  $\tau$  ἐπὶ  $(2 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4})$ .

Είναι δηλαδή 
$$T' = \tau \cdot \left(2 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4}\right) \quad (2)$$

Παρατηρούντες ότι :  $4 = 1 + 1 + 1 + 1$  και  $2 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4}$ , καταλήγομεν εις τὸν ἐξῆς ὀρισμὸν :

Γινόμενον ἑνὸς εὐθυγράμμου τμήματος ἐπὶ θετικὸν ἀριθμὸν λέγεται τὸ εὐθύγραμμον τμήμα, τὸ ὁποῖον γίνεται ἐξ αὐτοῦ καὶ ἐκ τῶν μερῶν αὐτοῦ, ὅπως ὁ ἀριθμὸς γίνεται ἐκ τῆς ἀκεραίας μονάδος καὶ τῶν μερῶν αὐτῆς.

Ὁ ἀριθμὸς 4 τῆς ἄνω ἰσότητος (1) λέγεται λόγος τοῦ T πρὸς τὸ τ. Ὡστε :

Λόγος εὐθυγράμμου τμήματος πρὸς ἄλλο λέγεται ὁ ἀριθμὸς, ἐπὶ τὸν ὁποῖον πρέπει νὰ πολλαπλασιασθῇ τὸ δεύτερον εὐθύγραμμον τμήμα διὰ νὰ προκύψῃ τὸ πρῶτον.

Ὁ λόγος τοῦ T πρὸς τὸ τ σημειοῦται οὕτω :

$$T : \tau \text{ ἢ } \frac{T}{\tau}$$

Ὁ λόγος εὐθυγράμμου τμήματος πρὸς ἄλλο εἶναι ἀκέραιος ἢ κλάσμα, ὅπως εἰς τὰ προηγούμενα παραδείγματα. Δύναται ὁμως νὰ εἶναι καὶ ἀσύμμετρος ἀριθμὸς.

Οὕτως, ἂν α εἶναι ἡ πλευρὰ καὶ δ ἡ διαγώνιος ἑνὸς τετραγώνου, γνωρίζομεν ὅτι  $\delta^2 = 2\alpha^2$ . Ἐκ ταύτης εὐρίσκομεν κατὰ σειράν

$$\frac{\delta^2}{\alpha^2} = 2 \text{ καὶ } \frac{\delta}{\alpha} = \sqrt{2}$$

Βλέπομεν δηλαδή ὅτι :

Λόγος τῆς διαγωνίου ἑνὸς τετραγώνου πρὸς τὴν πλευρὰν αὐτοῦ εἶναι ὁ ἀσύμμετρος ἀριθμὸς  $\sqrt{2}$ .

4. Μέτρησις καὶ μέτρον τόξου. Διὰ νὰ μετρήσωμεν ἓν τόξον, πρέπει νὰ συγκρίνωμεν αὐτὸ πρὸς ἓν ὠρισμένον τόξον, τὸ ὁποῖον λαμβάνεται ὡς **μονὰς τῶν τόξων**.

Ἐκ τῆς συγκρίσεως ταύτης προκύπτει εἰς ἀριθμὸς, ὁ ὁποῖος λέγεται **μέτρον** τοῦ μετρηθέντος τόξου. Οὗτος φανερώνει ἀπὸ πόσας μονάδας ἢ καὶ μέρη αὐτῆς ἀποτελεῖται τὸ τόξον τοῦτο.

Τὸ μέτρον τόξου T σημειώνομεν συντόμως οὕτω :  $(\bar{T})$ .

**5. Μονάδες τόξων.** Συνήθεις μονάδες τόξων είναι αί εξής :

α') *Η μοίρα* ( $^{\circ}$ ), ήτοι τὸ  $\frac{1}{360}$  τῆς περιφερείας. Ἡ μοίρα διαιρεῖται εἰς 60 ἴσα μέρη, τὰ ὁποῖα λέγονται *πρῶτα λεπτά* ( $'$ ). Ἐκαστον δὲ πρῶτον λεπτὸν διαιρεῖται εἰς 60 *δεύτερα λεπτά* ( $''$ ).

β') *Ὁ βαθμὸς*, ήτοι τὸ  $\frac{1}{400}$  τῆς περιφερείας. Ὁ βαθμὸς διαιρεῖται εἰς 100 ἴσα μέρη, τὰ ὁποῖα λέγονται *πρῶτα λεπτά*. Ἐκαστον δὲ πρῶτον λεπτὸν διαιρεῖται εἰς 100 *δεύτερα λεπτά*. Ἐν μέτρον π.χ. 25 βαθμῶν καὶ 35 πρώτων λεπτῶν σημειοῦται οὕτως : 25Υ, 35.

γ') *Τὸ ἀκτίνιον τόξον*, ήτοι τόξον, τὸ ὁποῖον ἔχει μῆκος ἴσον πρὸς τὸ μῆκος τῆς ἀκτίνοσ αὐτοῦ. Ἄν α εἶναι τὸ μῆκος τῆς ἀκτίνοσ, α θὰ εἶναι καὶ τὸ μῆκος τοῦ ἀκτινίου τόξου. Ἐπομένωσ τὸ μέτρον τῆς περιφερείασ εἶναι 2πα : α = 2π ἀκτίνια. Τῆς ἡμιπεριφερείασ πα : α = π, τοῦ τετάρτου περιφερείασ  $\frac{\pi}{2}$  κ.τ.λ.

**6. Σχέσεις τῶν μέτρων τοῦ αὐτοῦ τόξου.** Ἐστωσαν δύο τόξα AB καὶ ΓΕΔ περιφερείασ K (σχ. 3). Ἄσ ὑποθέσωμεν δὲ ὅτι τὸ ΓΕΔ εἶναι ἑξαπλάσιον τοῦ AB, ήτοι

$$\widehat{\Gamma\text{ΕΔ}} : \widehat{\text{ΑΒ}} = 6. \quad (1)$$

Ἄν ἡ μονὰσ μ τῶν τόξων χωρῆ λ φορὰσ εἰσ τὸ  $\widehat{\text{ΑΒ}}$ , εἰσ τὸ  $\widehat{\Gamma\text{ΕΔ}}$  θὰ χωρῆ 6λ φορὰσ. Θὰ εἶναι λοιπόν :

$$(\widehat{\Gamma\text{ΕΔ}}) = 6\lambda \quad \text{καὶ} \quad (\widehat{\text{ΑΒ}}) = \lambda.$$


Ἐκ τούτων ἔπεται ὅτι :

$$(\widehat{\Gamma\text{ΕΔ}}) = (\widehat{\text{ΑΒ}}) \cdot 6 \quad \text{καὶ} \quad \text{ἔπομένωσ} \quad (\widehat{\Gamma\text{ΕΔ}}) : (\widehat{\text{ΑΒ}}) = 6.$$

Ἐκ ταύτησ καὶ τῆσ (1) προκύπτει ἡ ἰσότησ :

$$\widehat{\Gamma\text{ΕΔ}} : \widehat{\text{ΑΒ}} = (\widehat{\Gamma\text{ΕΔ}}) : (\widehat{\text{ΑΒ}}), \quad \text{ήτοι} :$$

Ἐὸ λόγος ἑνὸσ τόξου πρὸς ἄλλο ἰσοῦται πρὸς τὸν λόγον τοῦ μέτρου τοῦ α' πρὸς τὸ μέτρον τοῦ β', ἂν ταῦτα μετρηθῶσι μὲ τὴν αὐτὴν μονάδα.



σχ. 3

\*Εστωσαν ἤδη  $\mu$ ,  $\beta$ ,  $\alpha$  τὰ μέτρα ἑνὸς τόξου  $AB$  ἀντιστοίχως εἰς μοίρας, βαθμοὺς καὶ ἀκτίνια.

Γνωρίζομεν ὅτι ἡ ἡμιπερίφεια  $\widehat{ΓΕΔ}$  ἔχει μέτρα  $180^\circ$ ,  $200\gamma$ ,  $\pi$  ἀκτίνια. Κατὰ δὲ τὴν προηγουμένην ιδιότητα, θὰ εἶναι :

$$\frac{\widehat{AB}}{\widehat{ΓΕΔ}} = \frac{\mu}{180}, \quad \frac{\widehat{AB}}{\widehat{ΓΕΔ}} = \frac{\beta}{200} \quad \text{καὶ} \quad \frac{\widehat{AB}}{\widehat{ΓΕΔ}} = \frac{\alpha}{\pi}$$

\*Ἐκ τούτων δὲ ἔπεται ὅτι :

$$\frac{\mu}{180} = \frac{\beta}{200} = \frac{\alpha}{\pi} \quad (2)$$

Διὰ τῶν σχέσεων τούτων, ἂν δοθῇ ἓν ἐκ τῶν τριῶν μέτρων τόξου, εὐρίσκομεν τὰ ἄλλα δύο. \*Ἄν π.χ.  $\mu = 54^\circ$ , εὐρίσκομεν ὅτι  $\beta = 54 \cdot \frac{200}{180} = 60\gamma$  καὶ  $\alpha = 54 \cdot \frac{\pi}{180} = \frac{3\pi}{10}$  ἀκτίνια.

#### \* Ἀ σ κ ῆ σ ε ι ς

1. Νὰ εὐρεθῇ εἰς βαθμοὺς καὶ ἀκτίνια τὸ μέτρον τόξου  $40^\circ$  ἢ  $30^\circ$ .
2. Νὰ εὐρεθῇ εἰς βαθμοὺς καὶ ἀκτίνια τὸ μέτρον τόξου  $60^\circ$  ἢ  $80^\circ$ .
3. Νὰ εὐρεθῇ εἰς μοίρας καὶ ἀκτίνια τὸ μέτρον τόξου  $50\gamma$  ἢ  $30\gamma$ .
4. Νὰ εὐρεθῇ εἰς μοίρας καὶ βαθμοὺς τὸ μέτρον τόξου  $\frac{3\pi}{2}$  ἀκτινίων.
5. Νὰ εὐρεθῇ εἰς βαθμοὺς καὶ ἀκτίνια τὸ μέτρον  $40^\circ 20'$ .
6. Νὰ εὐρεθῇ εἰς βαθμοὺς καὶ ἀκτίνια τὸ μέτρον τόξου  $50^\circ 30' 40''$ .
7. Τὸ γεωγραφικὸν πλάτος τῶν Ἀθηνῶν εἶναι  $37^\circ 58' 20''$ . Νὰ ἐκτιμηθῇ τοῦτο εἰς βαθμοὺς.
8. Νὰ εὐρεθῇ εἰς μοίρας καὶ βαθμοὺς τὸ μέτρον τόξου  $\frac{5\pi}{8}$  ἀκτινίων.

**7. Μέτρησης καὶ μέτρον γωνίας.** Διὰ νὰ μετρήσωμεν μίαν γωνίαν, πρέπει νὰ συγκρίνωμεν αὐτὴν πρὸς μίαν ὠρισμένην γωνίαν. Αὕτη λέγεται **μονὰς τῶν γωνιῶν**.

\*Ἀπὸ τὴν σύγκρισιν δὲ αὐτὴν προκύπτει εἰς ἀριθμὸς. Αὐτὸς λέγεται **μέτρον** τῆς μετρηθείσης γωνίας φανερώνει δὲ ἀπὸ πόσας μονάδας ἢ καὶ μέρη αὐτῆς ἀποτελεῖται ἡ γωνία αὕτη.

Τὸ μέτρον μιᾶς γωνίας  $AB\Gamma$  γράφεται οὕτω :  $(\widehat{AB\Gamma})$ . Ὡς μονὰς δὲ τῶν γωνιῶν λαμβάνεται ἡ ἐπίκεντρος γωνία, ἡ ὁποία βαίνει ἐπὶ τῆς μονάδος τῶν τόξων τῆς αὐτῆς περιφερείας.

Ούτως, αν  $\mu$  είναι η μονάς τῶν τόξων (σχ. 3), μονάς τῶν γωνιῶν θὰ εἶναι ἡ γωνία  $\beta$ .

Ἄν μονάς  $\mu$  εἶναι ἡ μοῖρα ἢ ὁ βαθμὸς ἢ τὸ ἀκτίνιον, ἡ μονάς  $\beta$  τῶν γωνιῶν θὰ λέγηται ἀντιστοίχως γωνία μιᾶς μοίρας ἢ ἐνὸς βαθμοῦ ἢ ἐνὸς ἀκτινίου.

Ἐκ τῆς Γεωμετρίας γνωρίζομεν ὅτι :

**Εἰς τὸν αὐτὸν κύκλον (ἢ εἰς ἴσους κύκλους) εἰς ἴσα τόξα βαίνουνσιν ἴσαι ἐπίκεντροι γωνίαὶ καὶ ἀντιστρόφως.**

Ἐκ τούτου δὲ ἐννοοῦμεν εὐκόλως ὅτι :

Ἄν ἐν τόξον  $AB$  εἶναι **διπλάσιον**, **τριπλάσιον** κ.τ.λ. ἄλλου τόξου  $\mu$ , καὶ ἡ ἐπίκεντρος γωνία  $\widehat{AKB}$  θὰ εἶναι ἀντιστοίχως **διπλασία**, **τριπλασία** κ.τ.λ. τῆς  $\beta$  (σχ. 3). Εἶναι λοιπὸν

$$\frac{\widehat{AKB}}{\beta} = \frac{\widehat{AB}}{\mu} \quad \eta \quad (\widehat{AKB}) = (\widehat{AB})$$

Βλέπομεν δηλαδή ὅτι ὑπὸ τὰς προηγουμένας προϋποθέσεις :

**Τὸ μέτρον μιᾶς ἐπίκεντρος γωνίας ἰσοῦται πρὸς τὸ μέτρον τοῦ ἀντιστοίχου τόξου.**

Ἐκ τούτου ἐπεταὶ ὅτι αἱ ἰσότητες 2 (§ 6) ἀληθεύουσι καὶ ἂν  $\mu$ ,  $\beta$ ,  $\alpha$  εἶναι μέτρα γωνίας.


### Ἄ σ κ ή σ ε ι ς

9. Νὰ εὑρεθῇ τὸ μέτρον τῆς ὀρθῆς γωνίας εἰς μοίρας, βαθμοὺς καὶ ἀκτίνια.
10. Νὰ εὑρεθῇ τὸ μέτρον ἡμισείας ὀρθῆς εἰς μοίρας, βαθμοὺς καὶ ἀκτίνια.
11. Νὰ εὑρεθῇ εἰς μοίρας, βαθμοὺς καὶ ἀκτίνια τὸ μέτρον  $\frac{1}{4}$  ὀρθῆς γωνίας.
12. Νὰ εὑρεθῇ ὁμοίως τὸ μέτρον τῆς γωνίας, τὴν ὁποίαν γράφει εἰς μίαν ὠραν ὁ δείκτης ἀκριβοῦς ὥρολογίου.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

### 1. ΗΜΙΤΟΝΟΝ ΟΞΕΙΑΣ ΓΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΣ ΑΥΤΟΥ

8. Λόγος μιᾶς καθέτου πλευρᾶς ὀρθογωνίου τριγώνου πρὸς τὴν ὑποτείνουσαν αὐτοῦ. Ἐστω ὀρθογώνιον τρίγωνον ΑΒΓ (σχ. 4). Ἄν ἐκ σημείου Γ' τῆς εὐθείας ΒΓ φέρωμεν τὴν Γ'Α' κάθετον ἐπὶ τὴν εὐθεῖαν ΑΒ, σχηματίζεται καὶ ἄλλο ὀρθογώνιον τρίγωνον Α'ΒΓ' τὸ ὁποῖον ἔχει μὲ τὸ ΑΒΓ τὴν αὐτὴν ὀξεῖαν γωνίαν Β. Ἐπειδὴ δὲ τὰ τρίγωνα ΑΒΓ καὶ Α'ΒΓ' εἶναι ὅμοια, ἀληθεύει ἡ ἰσότης :



Σχ. 4

καθετον ἐπὶ τὴν εὐθεῖαν ΑΒ, σχηματίζεται καὶ ἄλλο ὀρθογώνιον τρίγωνον Α'ΒΓ' τὸ ὁποῖον ἔχει μὲ τὸ ΑΒΓ τὴν αὐτὴν ὀξεῖαν γωνίαν Β. Ἐπειδὴ δὲ τὰ τρίγωνα ΑΒΓ καὶ Α'ΒΓ' εἶναι ὅμοια, ἀληθεύει ἡ ἰσότης :

$$\frac{ΑΓ}{ΒΓ} = \frac{Α'Γ'}{ΒΓ'} \quad (1)$$

Ἀντιστρόφως : Ἄν ὀρίσθῃ ἀθαιρέτως ἐν εὐθύγραμμον τμῆμα Α'Γ', ἀχθῆ δὲ εὐθεῖα ΧΨ παράλληλος πρὸς τὴν ΑΒ εἰς ἀπόστασιν ἀπὸ τὴν ΑΒ ἴσην μὲ Α'Γ', καὶ τμηθῆ αὕτη εἰς σημεῖον Γ' ὑπὸ περιφερείας κέντρου Β καὶ ἀκτίνας ἴσης πρὸς τὴν τετάρτην ἀνάλογον τῶν ΑΓ, ΒΓ, Α'Γ' θὰ ἀληθεύῃ ἡ (1). Τὰ τρίγωνα δὲ ΑΒΓ καὶ Α'ΒΓ' θὰ εἶναι ὅμοια μὲ ὁμολόγους πλευρᾶς τὰς ΑΓ, Α'Γ', καὶ διὰ τοῦτο αἱ γωνίαι ΑΒΓ καὶ Α'ΒΓ' εἶναι ἴσαι.

Ὅμοίως ἀποδεικνύεται ὅτι καὶ ὅταν δύο ὀρθογώνια τρίγωνα ΑΒΓ, Α'Β'Γ' ἔχωσι γων. Β = γων. Β' μὲ διαφόρους τὰς κορυφᾶς Β, Β', πάλιν ἀληθεύει ἡ (1) καὶ ἀντιστρόφως. Ὡστε: Εἰς ὠρισμένην ὀξεῖαν γωνίαν Β ἀντιστοιχεῖ σταθερὸς λόγος  $\frac{ΑΓ}{ΒΓ}$  καὶ ἀντιστρόφως.

9. Ἡμίτονον ὀξεῖας γωνίας. Ὁ σταθερὸς λόγος  $\frac{ΑΓ}{ΒΓ}$  λέγεται ἡμίτονον τῆς ὀξεῖας γωνίας Β.

Ἐάν ἡ ὀξεῖα γωνία δὲν ἀνήκει εἰς τρίγωνον, κατασκευάζομεν τοιοῦτον, ἂν φέρωμεν ἐξ ἑνὸς σημείου τῆς μιᾶς πλευρᾶς αὐτῆς κάθετον ἐπὶ τὴν ἄλλην.

Γενικῶς λοιπὸν :

**Ἡμίτονον ὀξεῖας γωνίας ὀρθογωνίου τριγώνου λέγεται ὁ λόγος τῆς ἀπέναντι αὐτῆς πλευρᾶς πρὸς τὴν ὑποτείνουσαν αὐτοῦ.**

Τὸ ἡμίτονον γωνίας Β σημειώνομεν συντόμως οὕτως : ἡμ. Β.

**10. Γεωμετρικὴ σημασία τοῦ ἡμίτονου ὀξεῖας γωνίας.** Ἐάν ἐπὶ τῆς ὑποτείνουσας ΒΓ λάβωμεν τμήμα ΒΓ' ἴσον πρὸς τὴν μονάδα καὶ φέρωμεν τὴν Γ'Α' κάθετον ἐπὶ τὴν ΑΒ (σχ. 4), θὰ εἶναι ἡμ Β =  $\frac{Α'Γ'}{ΒΓ'} = (\overline{Α'Γ'})$ . Βλέπομεν λοιπὸν ὅτι :

**Τὸ ἡμίτονον ὀξεῖας γωνίας εἶναι μῆκος εὐθυγράμμου τμήματος, ἥτοι μῆκος στοιχείου ὁμοειδοῦς πρὸς τὰς πλευρᾶς.**

### Ἄσκησεις

13. Ἐν ὀρθογώνιον τρίγωνον ἔχει ὑποτείνουσαν 5 μέτ. καὶ μίαν κάθετον πλευρὰν 3 μέτ. Νὰ εὐρεθῇ τὸ ἡμίτονον ἐκάστης ὀξεῖας γωνίας αὐτοῦ.

14. Αἱ κάθετοι πλευραὶ ὀρθογωνίου τριγώνου ἔχουσι μήκη 12 μέτ. ἢ μία καὶ 9 μέτ. ἄλλη. Νὰ εὐρηθε τὰ ἡμίτονα τῶν ὀξειῶν γωνιῶν αὐτοῦ.

15. Ἡ μία κάθετος πλευρὰ ὀρθογωνίου τριγώνου εἶναι  $\frac{3}{4}$  τῆς ὑποτείνουσας. Νὰ εὐρηθε τὸ ἡμίτονον ἐκάστης τῶν ὀξειῶν γωνιῶν αὐτοῦ.

16. Ἡ ὑποτείνουσα ὀρθογωνίου τριγώνου ἔχει μῆκος 8 μέτ. ἢ δὲ μία κάθετος πλευρὰ αὐτοῦ εἶναι  $\frac{2}{3}$  τῆς ἄλλης. Νὰ εὐρεθῇ τὸ ἡμίτονον ἐκάστης τῶν ὀξειῶν γωνιῶν αὐτοῦ.

17. Ἡ μία κάθετος πλευρὰ ὀρθογωνίου τριγώνου εἶναι τὸ ἡμισυ τῆς ὑποτείνουσας. Νὰ εὐρεθῇ τὸ ἡμίτονον τῆς ἀπέναντι γωνίας αὐτοῦ.

**11. Μεταβολὴ τοῦ ἡμίτονου ὀξεῖας γωνίας μετὰ τῆς γωνίας.** Ἐστω ὀξεῖα γωνία ΧΒΨ (σχ. 5). Ἐπὶ τῆς ΒΧ ὀρίζομεν τμήμα ΒΔ ἴσον πρὸς τὴν μονάδα μήκους καὶ γράφομεν τεταρτημόριον ΔΕ μὲ κέντρον Β καὶ ἀκτῖνα ΒΔ. Ἐκ τῆς τομῆς Γ τοῦ τόξου τούτου καὶ τῆς πλευρᾶς ΒΨ φέρομεν τὴν ΓΑ κάθετον ἐπὶ τὴν ΒΧ.

Κατὰ τὰ προηγούμενα εἶναι  $\widehat{\eta\mu\chi\beta\psi} = (\overline{A\Gamma})$ . Ἐὰν δὲ ἡ γωνία γίνῃ  $\chi\beta\gamma'$ , ἔπειτα  $\chi\beta\gamma''$  κ.τ.λ. θὰ εἶναι:


$$\widehat{\eta\mu\chi\beta\gamma'} = (\overline{A'\Gamma'}), \quad \widehat{\eta\mu\chi\beta\gamma''} = (\overline{A''\Gamma''}) \text{ κ.τ.λ.}$$

Βλέπομεν λοιπὸν ὅτι :

Ἐὰν ἡ ὀξεῖα γωνία βαίνει συνεχῶς αὐξανόμενη, καὶ τὸ ἡμίτονον αὐτῆς βαίνει συνεχῶς αὐξανόμενον.

Ἐφ' ὅσον δὲ ἡ γωνία πλησιάζει πρὸς τὴν ὀρθήν, τὸ ἡμίτονον αὐτῆς πλησιάζει πρὸς τὴν μονάδα ΒΕ. Δεχόμεθα λοιπὸν ὅτι :

$$\widehat{\eta\mu} 90^\circ = 1.$$



Σχ. 5

Ἐὰν ἡ γωνία ἐλαττωμένη γίνῃ μηδέν, τὸ τμήμα ΑΓ ἐλαττωμένον καταπτᾶ σημείον Δ. Δι' αὐτὸ δεχόμεθα ὅτι :

$$\widehat{\eta\mu} 0^\circ = 0.$$

Τὴν μεταβολὴν ταύτην συνοψίζομεν οὕτω :

$$\begin{array}{l} B \mid 0^\circ \dots\dots \nearrow \dots\dots 90^\circ \\ \widehat{\eta\mu} B \mid 0 \dots\dots \nearrow \dots\dots 1 \end{array}$$

Σημειώσεις. Τὸ πρὸς δεξιὰ καὶ ἄνω βέλος ( $\nearrow$ ) δεικνύει αὐξησιν.

## 12. Κατασκευὴ ὀξεῖας γωνίας ἐκ τοῦ ἡμιτόνου αὐτῆς.

*Παράδειγμα 1ον.* Ἐστω ὅτι  $\widehat{\eta\mu} B = \frac{3}{4}$ . Διὰ νὰ κατασκευάσωμεν τὴν γωνίαν Β, σκεπτόμεθα ὡς ἑξῆς :

Κατὰ τὸν ὀρισμὸν τοῦ ἡμιτόνου, πρέπει ἡ Β νὰ εἶναι ὀξεῖα γωνία ὀρθογωνίου τριγώνου μὲ ἀπέναντι πλευρὰν 3 μονάδων καὶ ὑποτείνουσαν 4 τοιοῦτων μονάδων. Οὕτως ὀδηγοῦμεθα εἰς τὴν ἐξῆς λύσιν.


Ἐπὶ τῆς μιᾶς πλευρᾶς μιᾶς ὀρθῆς γωνίας Α ὀρίζομεν τρία ἴσα διαδοχικὰ τμήματα, ἀρχίζοντες ἀπὸ τὴν κορυφὴν τῆς γωνίας. Ἐστω δὲ ΑΓ τὸ ὑπ' αὐτῶν ἀποτελούμενον τμήμα (σχ. 6).

\*Επειτα με κέντρον Γ και ακτίνα τετραπλασίαν ἐνὸς τῶν ἴσων τμημάτων γράφομεν περιφέρειαν. Αὕτη τέμνει τὴν ἄλλην πλευρὰν εἰς σημεῖον Β. Φέρομεν ἔπειτα τὴν ΒΓ καὶ σχηματίζομεν οὕτως ὀξεῖαν γωνίαν Β, ἥτις εἶναι ἡ ζητουμένη. Πράγματι, εἶναι

$$\eta\mu B = \frac{A\Gamma}{B\Gamma} = \frac{3}{4}.$$

*Παράδειγμα 2ον.* \*Ἐστω ὅτι  $\eta\mu \omega = 0,65$  καὶ θέλομεν νὰ κατασκευάσωμεν τὴν ὀξεῖαν γωνίαν  $\omega$ .

\*Ἐπειδὴ  $\eta\mu \omega = 0,65 = \frac{65}{100}$ , ἀπὸ τὰ προηγούμενα ἐννοοῦμεν ὅτι ἡ  $\omega$  θὰ εἶναι ὀξεῖα γωνία ὀρθογωνίου τριγώνου με ὑποτείνουσαν 100 μονάδων καὶ ἀπέναντι πλευρὰν 65 τοιοῦτων μονάδων. \*Ἄν τὸ σχέδιόν μας δὲν χωρῆ τοιοῦτον τρίγωνον, κατασκευάζομεν ὀρθογώνιον τρίγωνον με ὑποτείνουσαν 100 : 10 αὐθαιρέτων μονάδων καὶ μίαν κάθετον πλευρὰν 65 : 10 = 6,5 τοιοῦτων μονάδων. \*Ἡ ἀπέναντι ταύτης γωνία Β θὰ εἶναι ἡ ζητουμένη. Διότι εἶναι  $\eta\mu B = \frac{6,5}{10} = 0,65$ .



Σχ. 6

### \* Ἀ σ κ ῆ σ ε ι ς

18. Νὰ κατασκευασθῆ ὀξεῖα γωνία  $\omega$ , ἂν  $\eta\mu \omega = \frac{1}{2}$ .
19. Νὰ κατασκευασθῆ ὀξεῖα γωνία  $\phi$ , ἂν  $\eta\mu \phi = \frac{5}{6}$ .
20. Νὰ κατασκευασθῆ ὀξεῖα γωνία  $\chi$ , ἂν  $\eta\mu \chi = 0,25$ .
21. Νὰ κατασκευασθῆ ὀξεῖα γωνία  $\psi$ , ἂν  $\eta\mu \psi = 0,125$ .

### 13. Πρόβλημα I. Νὰ εὐρεθῆ τὸ $\eta\mu 45^\circ$ .


*Λύσις.* \*Ἄν  $B = 45^\circ$  (σχ. 7), τὸ ὀρθογώνιον τρίγωνον ΑΒΓ θὰ εἶναι ἰσοσκελές,  $\beta = \gamma$ . Κατὰ δὲ τὸ Πυθαγόρειον θεώρημα, θὰ εἶναι  $2\beta^2 = \alpha^2$ . \*Ἐκ ταύτης ἔπεται κατὰ σειρὰν ὅτι :

$$2\left(\frac{\beta}{\alpha}\right)^2 = 1, \frac{\beta}{\alpha} = \sqrt{\frac{1}{2}}. \text{ *Ἄρα } \eta\mu 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$


### 14. Πρόβλημα II. Νὰ εὐρεθῆ τὸ $\eta\mu 30^\circ$ .

*Λύσις.* Ἐστω ὀρθογώνιον τρίγωνον ΑΒΓ (σχ. 8), τὸ ὁποῖον ἔχει  $B = 30^\circ$ . Γνωρίζομεν ἐκ τῆς Γεωμετρίας ὅτι :

$$\beta = \frac{\alpha}{2} \cdot \text{ὅθεν } \frac{\beta}{\alpha} = \frac{1}{2} \cdot \text{Ἄρα } \eta\mu 30^\circ = \frac{1}{2}.$$



Σχ. 7



Σχ. 8

**15. Πρόβλημα ΙΙΙ. Νὰ εὑρεθῆ τὸ ἥμ  $60^\circ$ .**

*Λύσις.* Ἄν  $\Gamma = 60^\circ$ , θὰ εἶναι  $B = 30^\circ$  (σχ. 8) καὶ ἐπομένως  $\beta = \frac{\alpha}{2}$ . Κατὰ δὲ τὸ Πυθαγόρειον θεώρημα εἶναι  $\gamma^2 + \frac{\alpha^2}{4} = \alpha^2$ ,

ὅθεν  $\gamma^2 = \frac{3\alpha^2}{4}$  καὶ  $\frac{\gamma}{\alpha} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ . Εἶναι λοιπὸν  $\eta\mu 60^\circ = \frac{\gamma}{\alpha} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ .

Κατὰ ταῦτα, δυνάμεθα νὰ συμπληρώσωμεν τὸν πίνακα τῆς σελίδος 14 οὕτως :

ω	0°	. . ↗	30°	. ↗ . .	45°	. . ↗ .	60°	. . ↗ .	90°
ἥμ ω	0	. . ↗	1/2	. ↗ . .	√2/2	. . ↗ .	√3/2	. . ↗ .	1

### Ἀ σ κ ῆ σ ε ι ς

22. Νὰ κατασκευασθῆ γωνία  $30^\circ$  διὰ μεθόδου στηριζομένης εἰς τὴν ἰσότητα  $\eta\mu 30^\circ = \frac{1}{2}$ .

23. Ἄν δοθῆ εὐθύγραμμον τμήμα μήκους  $\alpha$ , νὰ γραφῆ ἄλλο μήκους  $\alpha\sqrt{2}$  διὰ μεθόδου στηριζομένης εἰς τὴν ἰσότητα  $\eta\mu 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$ .

24. Ἄν ὀρθογώνιον τρίγωνον ΑΒΓ ἔχη  $B = 60^\circ$ , νὰ ἀποδειχθῆ, ὅτι  $2\beta = \alpha\sqrt{3}$ .

**16. Εὑρεσις τοῦ ἡμιτόνου οἰασδήποτε ὀξείας γωνίας.** Προ-

ηγουμένως εύρωμεν εύκόλως τὸ ἡμίτονον τῶν γωνιῶν  $30^\circ$ ,  $45^\circ$ ,  $60^\circ$ . διότι εἰς ἑκάστην περίπτωσιν ἐνεθυμήθημεν μίαν ἀπλῆν σχέσιν μεταξὺ τῶν πλευρῶν ὀρθογωνίου τριγώνου διάφορον τῆς  $\alpha^2 = \beta^2 + \gamma^2$ .

Τοιαύτας ὅμως ἀπλᾶς σχέσεις δὲν γνωρίζομεν, ἂν αἱ ὀξείαι γωνίαι τριγώνου εἶναι τυχοῦσαι π.χ.  $35^\circ$  ἢ  $53^\circ 15'$  κ.τ.λ. Ἐπομένως δὲν δυνάμεθα νὰ εύρωμεν π.χ. τὸ ἡμ  $35^\circ$  μὲ τὴν προηγούμενην εύκολίαν. Ἐφρόντισαν ὅμως οἱ Μαθηματικοὶ νὰ εύρωσι τὰ ἡμίτονα διαφόρων γωνιῶν καὶ νὰ διατάξωσιν αὐτὰ εἰς πίνακας, ἀπὸ τοὺς ὁποίους εύρίσκομεν τὰ ἡμίτονα, τὰ ὁποῖα θέλομεν. Οὕτως οἱ λογαριθμικοὶ πίνακες ὑπὸ τὴν ἐπικεφαλίδα «Φυσικοὶ τριγωνομετρικοὶ ἀριθμοὶ» περιέχουσι μὲ προσέγγισιν 0,001 τὰ ἡμίτονα διαφόρων ὀξείων γωνιῶν, αἱ ὁποῖαι προχωροῦσιν ἀνὰ  $30'$ . Δὲν θὰ ἐπιμείνωμεν ὅμως εἰς τὴν περιγραφὴν καὶ χρῆσιν αὐτῶν, διότι ἀντὶ τούτων θὰ χρησιμοποιοῦμεν τὸν παρατιθέμενον ἐναυθθα πίνακα I. Εἰς αὐτὸν τὰ ἡμίτονα ἀναγράφονται μὲ προσέγγισιν 0,00001, καὶ αἱ γωνίαι προχωροῦσιν ἀνὰ  $10'$ . Ἐπομένως οὗτος εἶναι ἀκριβέστερος τῶν προηγούμενων.

Εἰς τὴν  $\alpha'$  ἔξ ἀριστερῶν σελίδα (σελ. 18) αἱ ἀκέραιαι μοῖραι τῶν γωνιῶν ἀναγράφονται εἰς τὴν  $\alpha'$  στήλην καὶ βαίνουσιν αὐξανόμεναι ἐκ τῶν ἄνω πρὸς τὰ κάτω μέχρι τῶν  $45^\circ$ .

Αἱ δεξιά τῆς στήλης ταύτης ἔξ ἄλλαι στήλαι ἔχουσιν ἐπικεφαλίδας τοὺς ἀριθμοὺς  $0'$ ,  $10'$ ,  $20'$ ,  $30'$ ,  $40'$ ,  $50'$ . Τὸ δὲ ἡμίτονον μιᾶς γωνίας, π.χ.  $32^\circ 20'$ , εύρίσκεται εἰς τὴν διασταύρωσιν τῆς ὀριζοντίου γραμμῆς τοῦ ἀριθμοῦ 32 τῆς στήλης τῶν ἀκεραίων μοιρῶν καὶ τῆς στήλης, ἣτις ἔχει ἐπικεφαλίδα  $20'$ . Εἶναι λοιπὸν ἡμ( $32^\circ 20'$ ) = 0,53484.

Τὰ δὲ ἡμίτονα τῶν μεγαλυτέρων τῶν  $45^\circ$  ὀξείων γωνιῶν εύρίσκονται εἰς τὴν  $\beta'$  σελίδα τοῦ πίνακος (σελ. 19). Εἰς αὐτὴν οἱ ἀκέραιοι ἀριθμοὶ τῶν μοιρῶν ἀναγράφονται εἰς τὴν τελευταίαν στήλην καὶ βαίνουσιν αὐξανόμενοι ἐκ τῶν κάτω πρὸς τὰ ἄνω. Αἱ πρὸς τὰ ἀριστερὰ αὐτῆς, ἔξ ἄλλαι στήλαι φέρουσι κάτω τοὺς ἀριθμοὺς  $10'$ ,  $20'$ ,  $30'$ ,  $40'$ ,  $50'$ ,  $60'$ .

Τὸ ἡμ( $48^\circ 30'$ ) π.χ. εύρίσκεται εἰς τὴν διασταύρωσιν τῆς ὀριζοντίου γραμμῆς τοῦ ἀριθμοῦ 48 τῆς στήλης τῶν ἀκεραίων μοιρῶν καὶ τῆς στήλης, ἣτις κάτω φέρει τὸν ἀριθμὸν  $30'$ . Εἶναι λοιπὸν ἡμ( $48^\circ 30'$ ) = 0,74896.

Μοίραι	→						Μοίραι
	0'	10'	20'	30'	40'	50'	
0	0,00000	0,00291	0,00582	0,00873	0,01454	0,01454	89
1	0,01745	0,02036	0,02327	0,02618	0,02908	0,03200	88
2	0,03490	0,03781	0,04071	0,04362	0,04653	0,04943	87
3	0,05234	0,05524	0,05814	0,06105	0,06395	0,06685	86
4	0,06976	0,07266	0,07556	0,07846	0,08136	0,08426	85
5	0,08716	0,09005	0,09295	0,09585	0,09874	0,10164	84
6	0,10453	0,10742	0,11031	0,11320	0,11609	0,11898	83
7	0,12187	0,12476	0,12764	0,13053	0,13341	0,13629	82
8	0,13917	0,14205	0,14493	0,14781	0,15069	0,15356	81
9	0,15643	0,15931	0,16218	0,16505	0,16792	0,17078	80
10	0,17365	0,17651	0,17937	0,18224	0,18509	0,18795	79
11	0,19081	0,19366	0,19652	0,19937	0,20222	0,20507	78
12	0,20791	0,21076	0,21359	0,21644	0,21928	0,22212	77
13	0,22495	0,22778	0,23062	0,23345	0,23627	0,23910	76
14	0,24192	0,24474	0,24756	0,25038	0,25320	0,25601	75
15	0,25882	0,26163	0,26443	0,26724	0,27004	0,27284	74
16	0,27556	0,27833	0,28123	0,28402	0,28680	0,28959	73
17	0,29237	0,29515	0,29793	0,30071	0,30348	0,30625	72
18	0,30902	0,31178	0,31454	0,31730	0,32006	0,32282	71
19	0,32557	0,32832	0,33106	0,33381	0,33655	0,33929	70
20	0,34202	0,34475	0,34748	0,35021	0,35293	0,35565	69
21	0,35837	0,36108	0,36379	0,36650	0,36921	0,37191	68
22	0,37461	0,37730	0,37999	0,38268	0,38537	0,38805	67
23	0,39073	0,39341	0,39608	0,39875	0,40141	0,40408	66
24	0,40674	0,40939	0,41204	0,41469	0,41734	0,41998	65
25	0,42263	0,42525	0,42788	0,43051	0,43313	0,43575	64
26	0,43837	0,44098	0,44359	0,44620	0,44880	0,45139	63
27	0,45399	0,45658	0,45917	0,46175	0,46433	0,46690	62
28	0,46947	0,47204	0,47460	0,47716	0,47971	0,48226	61
29	0,48481	0,48735	0,48989	0,49242	0,49495	0,49748	60
30	0,50000	0,50252	0,50503	0,50754	0,51004	0,51254	59
31	0,51504	0,51753	0,52002	0,52250	0,52498	0,52745	58
32	0,52982	0,53238	0,53484	0,53730	0,53975	0,54220	57
33	0,54464	0,54708	0,54951	0,55194	0,55436	0,55678	56
34	0,55919	0,56160	0,56401	0,56641	0,56880	0,57119	55
35	0,57358	0,57596	0,57833	0,58070	0,58307	0,58543	54
36	0,58779	0,59014	0,59248	0,59482	0,59716	0,59949	53
37	0,60182	0,60414	0,60645	0,60876	0,61107	0,61337	52
38	0,61566	0,61795	0,62024	0,62251	0,62479	0,62706	51
39	0,62932	0,63158	0,63383	0,63608	0,63832	0,64056	50
40	0,64279	0,64501	0,64723	0,64945	0,65166	0,65386	49
41	0,65606	0,65825	0,66044	0,66262	0,66480	0,66697	48
42	0,66913	0,67129	0,67344	0,67559	0,67773	0,67987	47
43	0,68199	0,68412	0,68624	0,68835	0,69046	0,69256	46
44	0,69466	0,69675	0,69883	0,70091	0,70298	0,70505	45
45	0,70711						
	←						
	60'	50'	40'	30'	20'	10'	Μοίραι

**ΣΥΝΗΜΙΤΟΝΟΝ**

Μοίραι	→						Μοίραι
	0'	10'	20'	30'	40'	50'	
0	1,00000	0,99999	0,99998	0,99995	0,99992	0,99988	89
1	0,99984	0,99980	0,99973	0,99965	0,99958	0,99950	88
2	0,99940	0,99928	0,99917	0,99905	0,99892	8,99878	87
3	0,99863	0,99848	0,99831	0,99814	0,99795	0,99776	86
4	0,99756	0,99735	0,99714	0,99692	0,99669	0,99644	85
5	0,99618	0,99594	0,99567	0,99539	0,99511	0,99482	84
6	0,99452	0,99421	0,99389	0,99357	0,99324	0,99289	83
7	0,99255	0,99219	0,99182	0,99144	0,99106	0,99067	82
8	0,99027	0,98986	0,98944	0,98902	0,98858	0,98814	81
9	0,98769	0,98723	0,98676	0,98629	0,98580	0,98531	80
10	0,98481	0,98429	0,98378	0,98325	0,98272	0,98218	79
11	0,98163	0,98107	0,98050	0,97992	0,97934	0,97875	78
12	0,97815	0,97754	0,97692	0,97629	0,97566	0,97502	77
13	0,97437	0,97371	0,97304	0,97237	0,97169	0,97099	76
14	0,97029	0,96959	0,96887	0,96815	0,96742	0,96667	75
15	0,96593	0,96517	0,96440	0,96363	0,96285	0,96206	74
16	0,96126	0,96046	0,95964	0,95882	0,95799	0,95715	73
17	0,95630	0,95545	0,95459	0,95372	0,95284	0,95195	72
18	0,95106	0,95015	0,94921	0,94832	0,94739	0,94646	71
19	0,94552	0,94457	0,94361	0,94264	0,94167	0,94068	70
20	0,93969	0,93869	0,93769	0,93667	0,93565	0,93462	69
21	0,93358	0,93253	0,93148	0,93042	0,92935	0,92827	68
22	0,92718	0,92609	0,92499	0,92388	0,92276	0,92164	67
23	0,92050	0,91936	0,91822	0,91706	0,91589	0,91472	66
24	0,91355	0,91236	0,91116	0,90996	0,90875	0,90753	65
25	0,90631	0,90507	0,90383	0,90259	0,90133	0,90007	64
26	0,89879	0,89752	0,89623	0,89493	0,89363	0,89232	63
27	0,89101	0,88968	0,88835	0,88701	0,88566	0,88431	62
28	0,88295	0,88158	0,88020	0,87882	0,87743	0,87603	61
29	0,87462	0,87321	0,87178	0,87036	0,86892	0,86748	60
30	0,86603	0,86457	0,86310	0,86163	0,86015	0,85866	59
31	0,85717	0,85567	0,85416	0,85264	0,85112	0,84959	58
32	0,84805	0,84650	0,84495	0,84339	0,84182	0,84025	57
33	0,83867	0,83708	0,83549	0,83389	0,83228	0,83066	56
34	0,82904	0,82741	0,82577	0,82413	0,82248	0,82082	55
35	0,81915	0,81748	0,81580	0,81412	0,81242	0,81072	54
36	0,80902	0,80730	0,80558	0,80386	0,80212	0,80038	53
37	0,79864	0,79688	0,79512	0,79335	0,79158	0,78979	52
38	0,78801	0,78622	0,78442	0,78261	0,78079	0,77897	51
39	0,77715	0,77531	0,77347	0,77162	0,76977	0,76791	50
40	0,76604	0,76417	0,76229	0,76041	0,75851	0,75661	49
41	0,75471	0,75279	0,75088	0,74896	0,74703	0,74509	48
42	0,74314	0,74119	0,73924	0,73728	0,73531	0,73332	47
43	0,73135	0,72937	0,72737	0,72537	0,72337	0,72136	46
44	0,71934	0,71732	0,71529	0,71325	0,71121	0,70916	45
45	0,70711						
	←						Μοίραι
	60'	50'	40'	30'	20'	10'	

**ΗΜΙΤΟΝΟΝ**

Εἰς τὴν σελίδα ταύτην (σ. 19) δὲν ὑπάρχει στήλη, ἡ ὁποία νὰ ἔχη ὑποκάτω τὸν ἀριθμὸν 0'. Δι' αὐτό, διὰ νὰ εὐρωμεν π.χ. τὸ ἡμ  $73^0$ , ἀναζητοῦμεν τὸ ἡμ ( $72^0 60'$ ). Οὕτως εὐρίσκομεν ὅτι :

$$\eta\mu 73^0 = 0,95630.$$

Μὲ τοὺς πίνακας τούτους δυνάμεθα νὰ εὐρωμεν καὶ τὸ ἡμίτονον ὀξειῶν γωνιῶν, τῶν ὁποίων τὰ μέτρα δὲν ἀναγράφονται εἰς αὐτούς. Ὡς παράδειγματα ἔστωσαν τὰ ἀκόλουθα :

*Παράδειγμα 1ον.* Ἔστω ὅτι θέλομεν νὰ εὐρωμεν τὸ ἡμ ( $39^0 17'$ ).

Πρὸς τοῦτο παρατηροῦμεν ὅτι :

$$39^0 10' < 39^0 17' < 39^0 20' \text{ καὶ ἔπομένως} \\ \eta\mu (39^0 10') < \eta\mu (39^0 17') < \eta\mu (39^0 20').$$

Ἐπειτα εἰς τοὺς πίνακας εὐρίσκομεν ὅτι :

$$\Delta = \eta\mu (39^0 20') - \eta\mu (39^0 10') = 0,63383 - 0,63158 = 0,00225.$$

Βλέπομεν δηλ. ὅτι εἰς αὐξησιν τῆς γωνίας κατὰ  $10'$  ἀντιστοιχεῖ αὐξησης τοῦ ἡμιτόνου κατὰ 0,00225.

Ἄν δὲ ἡ αὐξησης τῶν πρώτων λεπτῶν τῆς γωνίας γίνη διπλασία, ἤτοι τὸ τόξον γίνη  $39^0 30'$ , τὸ ἡμίτονον εἶναι 0,63608 καὶ

$$0,63608 - 0,63158 = 0,00450 = 0,00225 \cdot 2,$$

ἤτοι καὶ ἡ αὐξησης τοῦ ἡμιτόνου διπλασιάζεται.

Ὅμοίως βλέπομεν ὅτι εἰς τριπλασίαν αὐξησιν τῶν πρώτων λεπτῶν τῆς γωνίας ἀντιστοιχεῖ τριπλασία αὐξησης τοῦ ἡμιτόνου.

Παραδεχόμεθα λοιπὸν ὅτι ἡ αὐξησης τοῦ ἡμιτόνου εἶναι ἀνάλογος πρὸς τὴν αὐξησιν τῶν πρώτων λεπτῶν τοῦ μέτρου μιᾶς γωνίας.

Τώρα σκεπτόμεθα ὡς ἑξῆς :

Εἰς αὐξησιν  $10'$  ἀντιστοιχεῖ αὐξησης ἡμιτ. 0,00225.

» »  $7'$  » » »  $\delta$

καὶ εὐρίσκομεν  $\delta = 0,00225 \cdot \frac{7}{10} = \frac{0,01575}{10} = 0,00157$  κατὰ προσέγγισιν.

Ἐπομένως ἡμ. ( $39^0 17'$ ) = ἡμ. ( $39^0 10'$ ) + 0,00157 = 0,63158 + 0,00157 = 0,63315.

Ἡ πρᾶξις διατάσσεται ὡς ἑξῆς :

$$\begin{aligned} & \eta\mu. (39^0 10') = 0,63158 \\ \text{διὰ } \Delta = 0,00225 \text{ εἶναι } \delta &= \frac{7}{10} \cdot 0,00225 = \underline{0,00157} \\ & \eta\mu. (39^0 17') = 0,63315 \end{aligned}$$

*Παράδειγμα 2ον.* Νά εύρεθῆ τὸ ἥμ ( $28^{\circ} 34' 30''$ ).

Σκεπτόμενοι ὡς προηγουμένως, εύρίσκομεν ὅτι :

$$\text{ἥμ} (28^{\circ} 30') = 0,47716$$

$$\text{διὰ } \Delta = 0,00255 \text{ εἶναι } \delta = 0,00255 \cdot \frac{4,5}{10} = 0,0011475$$

$$\text{ἢ } 0,00115$$

$$\text{καὶ ἥμ} (28^{\circ} 34' 30'') = 0,47831$$

### Ἄ σ κ ῆ σ ε ι ς

25. Νά εύρεθῆ τὸ ἥμ( $18^{\circ} 40'$ ) καὶ τὸ ἥμ ( $42^{\circ} 10'$ ).

26. Νά εύρεθῆ τὸ ἥμ( $54^{\circ} 30'$ ) καὶ τὸ ἥμ ( $78^{\circ} 40'$ ).

27. Νά εύρεθῆ τὸ ἥμ $50^{\circ}$  καὶ τὸ ἥμ $80^{\circ}$ .

28. Νά εύρεθῆ τὸ ἥμ( $27^{\circ} 15'$ ).

29. Νά εύρεθῆ τὸ ἥμ( $46^{\circ} 30'$ ).

30. Νά εύρεθῆ τὸ ἥμ( $20^{\circ} 34' 25''$ ).

31. Νά εύρεθῆ τὸ ἥμ( $67^{\circ} 45' 40''$ ).

32. Νά εύρεθῆ τὸ ἥμίτονον γωνίας ἴσης πρὸς τὰ  $\frac{7}{10}$  ὀρθῆς.

33. Νά εύρεθῆ τὸ ἥμίτονον γωνίας ἴσης πρὸς τὰ  $\frac{5}{8}$  ὀρθῆς.

**17. Λογάριθος τοῦ ἥμιτόνου ὀξείας γωνίας.** Εἰς τὴν "Ἀλγεβραν ἐμάθομεν, ὅτι, ἂν γνωρίζωμεν τὸν λογάριθμον ἑνὸς ἀριθμοῦ, δυνάμεθα τῇ βοήθειᾳ πινάκων νά εύρωμεν τὸν ἀριθμὸν τοῦτον.

"Ἄν λοιπὸν π.χ. θέσωμεν  $\chi = \text{ἥμ} (38^{\circ} 52')$ , θὰ εἶναι :

$$\text{λογ}\chi = \text{λογῆμ} (38^{\circ} 52').$$

Διὰ νά εύρωμεν λοιπὸν τὸν ἀριθμὸν  $\chi$ , πρέπει νά γνωρίζωμεν τὸν λογῆμ ( $38^{\circ} 52'$ ). Τοῦτον δὲ εύρίσκομεν εἰς τοὺς λογαριθμικοὺς τριγωνομετρικοὺς πίνακας.

Οὗτοι ἔχουσι τὸν ἀκέραιον ἀριθμὸν τῶν μοιρῶν εἰς τὸ ἄνω μέρος δύο παρακειμένων σελίδων, ἂν ὁ ἀριθμὸς οὗτος εἶναι μικρότερος τῶν  $45^{\circ}$ , εἰς τὸ κάτω δέ, ἂν εἶναι μεγαλύτερος τῶν  $44^{\circ}$ . Τὰ πρῶτα λεπτὰ ἀναγράφονται εἰς τὴν  $\alpha'$  πρὸς τὰ ἀριστερὰ στήλην ἐκάστης σελίδος διὰ τὰς εἰς τὸ ἄνω μέρος ἀναγεγραμμένας μοίρας καὶ εἰς τὴν τελευταίαν στήλην διὰ τὰς ἄλλας. Προχωροῦσι δὲ ταῦτα ἀπὸ λεπτοῦ εἰς λεπτόν ἐκ τῶν ἄνω πρὸς τὰ κάτω εἰς τὴν πρώτην περίπτωσιν καὶ ἐκ τῶν κάτω πρὸς τὰ ἄνω εἰς τὴν δευτέραν.

Ὁ λογάριθμος  $\eta\mu(38^{\circ} 52')$  εὐρίσκεται εἰς τὰς σελίδας, αἱ ὁποῖαι ἔχουσιν ὑπεράνω τὸν ἀριθμὸν  $38^{\circ}$ , καὶ εἰς τὴν διασταύρωσιν τῆς ὀριζοντίου γραμμῆς τῶν  $52'$ , τῆς ἀριστερᾶς στήλης πρώτων λεπτῶν καὶ τῆς παρακειμένης στήλης, ἣτις ἔχει ἐπικεφαλίδα Ἑμ. (ἡμίτονον).

Εἶναι λοιπὸν λογάριθμος  $\eta\mu(38^{\circ} 52') = \bar{1},79762$ .

Ὁ λογάριθμος  $\eta\mu(51^{\circ} 18')$  εὐρίσκεται εἰς τὰς στήλας τῶν  $51^{\circ}$ , κάτω, καὶ εἰς τὴν διασταύρωσιν τῆς στήλης, ἣτις φέρει κάτω συγκεκριμένην λέξιν Ἑμ. καὶ τῆς ὀριζοντίου γραμμῆς τῶν  $18'$  εἰς τὴν δεξιάν στήλην πρώτων λεπτῶν.

Εἶναι λοιπὸν λογάριθμος  $\eta\mu(51^{\circ} 18') = \bar{1},89233$ .

Πρέπει δὲ νὰ προσέξωμεν ὅτι τὰ δύο πρῶτα ψηφία ἐκάστου λογαρίθμου ἔχουσι γραφῆ εἰς τὴν ἀρχὴν καὶ εἰς τὸ τέλος ἐκάστης σελίδος. Νοοῦνται δὲ καὶ διὰ τοὺς μεταξύ λογαρίθμους.

Ἐὰν τὸ μέτρον τῆς γωνίας ἔχη καὶ δευτερόλεπτα, εὐρίσκομεν τὸν λογάριθμον τοῦ ἡμιτόνου αὐτῆς ὡς ἑξῆς :

Ἐστω ὅτι θέλομεν νὰ εὕρωμεν τὸν λογάριθμον ἡμιτόνου ( $38^{\circ} 10' 45''$ ). Πρὸς τοῦτο παρατηροῦμεν ὅτι :

$$\begin{array}{l} 38^{\circ} 10' < 38^{\circ} 10' 45'' < 38^{\circ} 11' \\ \eta\mu(38^{\circ} 10') < \eta\mu(38^{\circ} 10' 45'') < \eta\mu(38^{\circ} 11') \text{ καὶ} \\ \log\eta\mu(38^{\circ} 10') < \log\eta\mu(38^{\circ} 10' 45'') < \log\eta\mu(38^{\circ} 11') \end{array}$$

Ἐκ τούτων εὐρίσκομεν ὅτι :

$$\left. \begin{array}{l} \log\eta\mu(38^{\circ} 11') = \bar{1},79111 \\ \log\eta\mu(38^{\circ} 10') = \bar{1},79095 \end{array} \right\} \Delta = 16 \text{ μον. τελ. δεκ. τάξ.}$$

Ἐκ τούτων βλέπομεν ὅτι εἰς αὐξήσιν τοῦ μέτρον τῆς γωνίας κατὰ  $1'$  ἀντιστοιχεῖ ἡ αὐτὴ αὐξήσιν τοῦ λογαρίθμου τοῦ ἡμιτόνου αὐτῆς. Ὅθεν δυνάμεθα νὰ θεωρήσωμεν τὴν αὐξήσιν τοῦ λογαρίθμου ὡς ἔγγιστα ἀνάλογον πρὸς τὴν αὐξήσιν τῶν πρώτων λεπτῶν. Σκεπτόμεθα λοιπὸν ὡς ἑξῆς :

$$\begin{array}{l} \text{Εἰς αὐξήσιν γωνίας κατὰ } 60'' \text{ ἀντιστοιχεῖ αὐξήσιν } 16 \\ \text{» } \text{» } \text{» } \text{» } 45'' \text{ » } \text{» } \text{» } \chi \end{array}$$

$$\text{καὶ εὐρίσκομεν } \chi = 16 \cdot \frac{45}{60} = 12 \text{ μον. τελ. δεκ. τάξ.}$$

		26	'Ημ.	Δ	'Εφ.	Δ	φ.	Συν.	Δ	'
1''	0,43									
2	0,87									
3	1,30	<b>0</b>	1,78934	16	1,89281	26	1,10719	1,89653	10	<b>60</b>
4	1,73	1	8950	17	9307	26	0693	9643	10	59
5	2,17	2	8967	16	9333	26	0667	9633	9	58
6	2,60	3	8983	16	9359	26	0641	9624	10	57
7	3,03	4	8999	16	9385	26	0615	9614		56
8	3,47									
9	3,90			16		26			10	
		5	9015	16	9411	26	0589	9604	10	55
		6	9031	16	9437	26	0563	9594	10	54
<b>17'</b>		7	9047	16	9463	26	0537	9584	10	53
		8	9063	16	9489	26	0511	9574	10	52
1	0,28	9	9079	16	9515	26	0485	9564	10	51
2	0,57									
3	0,85									
4	1,13			16					10	
5	1,42									
6	1,70	<b>10</b>	9095	16	9541	26	0459	9554	10	<b>50</b>
7	1,98	11	9111	17	9567	26	0433	9544	10	49
8	2,27	12	9128	16	9593	26	0407	9534	10	48
9	2,55	13	9144	16	9619	26	0381	9524	10	47
		14	9160	16	9645	26	0355	9514	10	46
				16					10	
<b>16</b>		15	9176	16	9671	26	0329	9504	9	45
1	0,27	16	9192	16	9697	26	0303	9495	10	44
2	0,53	17	9208	16	9723	26	0277	9485	10	43
3	0,80	18	9224	16	9749	26	0251	9475	10	42
4	1,07	19	9240	16	9775	26	0225	9465	10	41
5	1,33									
6	1,60			16		26			10	
7	1,87	<b>20</b>	9256	16	9801	26	0199	9455	10	<b>40</b>
8	2,13	21	9272	16	9827	26	0173	9445	10	39
9	2,40	22	9288	16	9853	26	0147	9435	10	38
		23	9304	16	9879	26	0121	9425	10	37
		24	9319	15	9905	26	0095	9415	10	36
				16					10	
1	0,25									
2	0,50	25	9335	16	9931	26	0069	9405	10	35
3	0,75	26	9351	16	9957	26	0043	9395	10	34
4	2,00	27	9367	16	1,89983	26	0,10017	9385	10	33
5	1,25	28	9383	16	1,90009	26	0,09991	9375	10	32
6	1,50	29	9399	16	0035	26	9965	9364	11	31
7	1,75			16					10	
8	2,00									
9	2,25									
		<b>30</b>	1,79415		1,90061		0,09939	1,89354		<b>30</b>
			<b>Συν.</b>		<b>Σφ.</b>		<b>'Εφ.</b>	<b>'Ημ.</b>		

	'Ημ.	Δ	'Εφ.	Δ	Σφ.	Συν.	Δ	
<b>30</b>	1,7 9415	16	1, 90061	25	0,0 9939	1,8 9354		<b>30</b>
31	9431	16	0086	26	9914	9344	10	29
32	9447	16	0112	26	9888	9334	10	28
33	9463	15	0138	26	9862	9324	10	27
34	9478		0164		9836	9314		26
		16		26			10	
35	9494	16	0190	26	9810	9304	10	25
36	9510	16	0216	26	9784	9294	10	24
37	9526	16	0224	26	9758	9284	10	23
38	9542	16	0268	26	9732	9274	10	22
39	9558		0294		9706	9264		21
		15		26			10	
<b>40</b>	9573	16	0320	26	9680	9254	10	<b>20</b>
41	9589	16	0346	25	9654	9244	11	19
42	9605	16	0371	26	9629	9233	10	18
43	9621	15	0397	26	9603	9223	10	17
44	9636		0423		9577	9213		16
		16		26			10	
45	9652	16	0449	26	9551	9203	10	15
46	9668	16	0475	26	9525	9193	10	14
47	9684	15	0501	26	9499	9183	10	13
48	9699	16	0527	26	9473	9173	11	12
49	9715		0553		9447	9162		11
		16		25			10	
<b>50</b>	9731	15	0578	26	9422	9152	10	<b>10</b>
51	9746	16	0604	26	9396	9142	10	9
52	9762	16	0630	26	9370	9132	10	8
53	9778	15	0656	26	9344	9122	10	7
54	9793		0682		9318	9112		6
		16		26			11	
55	9809	16	0708	26	9292	9101	10	5
56	9825	15	0734	26	9266	9091	10	4
57	9840	16	0759	25	9241	9081	10	3
58	9856	16	0785	26	9215	9071	11	2
59	9872		0811		9189	9060		1
		15		26			10	
<b>60</b>	1,7 9887		1,9 0837		0,0 9163	1,8 9050		<b>0</b>
	Συν.		Σφ.		'Εφ.	'Ημ.		

26

1'' 0,43  
2 0,87  
3 1,30  
4 1,73  
5 2,17  
6 2,60  
7 3,03  
8 3,47  
9 3,90

25

1 0,42  
2 0,83  
3 1,25  
4 1,67  
5 2,08  
6 2,50  
7 2,92  
8 3,33  
9 3,75

16

1 0,27  
2 0,53  
3 0,80  
4 1,07  
5 1,33  
6 1,60  
7 1,87  
8 2,13  
9 2,40

15

1 0,25  
2 0,50  
3 0,75  
4 1,00  
5 1,25  
6 1,50  
7 1,75  
8 2,00  
9 2,25

$$\begin{aligned} \text{Ώστε : } \quad \log \eta \mu (38^{\circ} 10') &= \bar{1},79095 \\ \quad \quad \quad \text{εις } 45'' \text{ αύξ.} &= 0,00012 \\ \log \eta \mu (38^{\circ} 10' 45'') &= \bar{1},79107 \end{aligned}$$

**Σ η μ ε ί ω σ ι ς.** Εις τὰς σελίδας τῶν 6<sup>ο</sup>—84<sup>ο</sup> οἱ πίνακες οὗτοι φέρουσιν ἐκτὸς τοῦ πλαισίου μερικὰ πινακίδια.

Ἐκαστον ἀπὸ αὐτὰ φέρει ὡς ἐπικεφαλίδα μίαν τῶν ἐν τῇ αὐτῇ σελίδι διαφορῶν τῶν στηλῶν Δ. Διαιρεῖται δὲ ἕκαστον πινακίδιον εἰς δύο στήλας. Ἡ α' τοῦτων περιέχει τοὺς μονοψηφίους ἀριθμοὺς οἱ ὅποιοι δηλοῦσι δεῦτερα λεπτά. Ἡ δὲ ἄλλη τὰς ἀντιστοιχοῦς διαφορὰς τῶν λογαρίθμων.

Οὕτως εἰς τὸ προηγούμενον παράδειγμα εἶναι  $\Delta = 16$  τὸ δὲ πινακίδιον με ἐπικεφαλίδα 16 δηλοῖ ὅτι: Εἰς αὐξησην τοῦ τόξου κατὰ 4'' ἀντιστοιχεῖ αὐξησης τοῦ λογαρίθμου τοῦ ἡμιτόνου κατὰ 1,07 μονάδας τελευταίας δεκαδικῆς τάξεως. Εἰς αὐξησην δὲ τοῦ τόξου κατὰ 40'' = 4' · 10 ἀντιστοιχεῖ αὐξησης τοῦ λογαρίθμου τοῦ ἡμιτόνου κατὰ  $1,07 \cdot 10 = 10,7$ . Εἰς αὐξησην δὲ τοῦ τόξου κατὰ 5'' ἀντιστοιχεῖ αὐξησης τοῦ λογαρίθμου τοῦ ἡμιτόνου κατὰ 1,33 μ.τ.δ.τ. Ἐπομένως εἰς αὐξησην τοῦ τόξου κατὰ 45'' = 40'' + 5'' ἀντιστοιχεῖ αὐξησης τοῦ λογαρίθμου τοῦ ἡμιτόνου κατὰ  $10,7 + 1,33 = 12,03$  ἢ 12 κατὰ προσέγγισιν.

Τῇ βοηθειᾷ λοιπὸν τῶν πινακιδίων ἀποφεύγουμεν τοὺς προηγουμένους ὑπολογισμοὺς τῆς αὐξήσεως τοῦ λογαρίθμου τοῦ ἡμιτόνου.

### Ἄ σ κ ῆ σ ε ι ς

34. Νὰ εὐρεθῇ ὁ λογάημ(12<sup>ο</sup> 35') καὶ ἐξ αὐτοῦ τὸ ἡμ(12<sup>ο</sup> 35').
35. Νὰ εὐρεθῇ ὁ λογάημ(58<sup>ο</sup> 40') καὶ ἐξ αὐτοῦ τὸ ἡμ(58<sup>ο</sup> 40').
36. Νὰ εὐρεθῇ ὁ λογάημ(34<sup>ο</sup> 25' 32'') καὶ ἐξ αὐτοῦ νὰ εὐρεθῇ τὸ ἡμ(34<sup>ο</sup> 25' 32'').
37. Νὰ εὐρεθῇ ὁ λογάημ(67<sup>ο</sup> 20' 40'') καὶ ἐξ αὐτοῦ νὰ εὐρεθῇ τὸ ἡμ(67<sup>ο</sup> 20' 40'').

$$38. \text{ Ἄν ἡμ } \chi = \frac{3}{4}, \text{ νὰ εὐρεθῇ ὁ λογάημ } \chi.$$

$$39. \text{ Ἄν ἡμ } \omega = \frac{5}{7}, \text{ νὰ εὐρεθῇ ὁ λογάημ } \omega.$$

**18. Εὐρεσις τοῦ μέτρου ὀξεῖας γωνίας ἐκ τοῦ ἡμιτόνου αὐτῆς.** Ἐστω  $\eta \mu \chi = 0,42525$ . Τὸ μέτρον τῆς γωνίας  $\chi$  δυνάμεθα νὰ εὐρωμεν ἀπὸ τὸν πίνακα I τοῦ βιβλίου τούτου σελ. (18 - 19) ὡς ἐξῆς :

Πρῶτον ἐνθυμούμεθα ὅτι ἡμ  $45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2} = 0,70711$  καὶ παρατηροῦμεν ὅτι  $0,42525 < 0,70711$ . Συμπεραίνομεν λοιπὸν ὅτι  $\chi < 45^\circ$  καὶ ἐπομένως πρέπει νὰ ἀναζητήσωμεν τὸν ἀριθμὸν  $0,42525$  εἰς τὴν α' ἀριστερὰν σελίδα τοῦ πίνακος τούτου. Ὄντως δὲ εὐρίσκομεν αὐτὸν εἰς τὴν στήλην τῶν  $10'$  καὶ τὴν ὀριζοντίαν γραμμὴν τῶν  $25^\circ$ . Εἶναι λοιπὸν  $\chi = 25^\circ 10'$ .

Ἐστὼ ἀκόμη ὅτι θέλομεν νὰ εὐρωμεν τὴν ὀξεῖαν γωνίαν  $\omega$ , ἂν γνωρίζωμεν ὅτι ἡμ  $\omega = 0,93190$ .

Ἐπειδὴ  $0,93190 > 0,70711$ , θὰ εἶναι  $\omega > 45^\circ$ .

Ἀναζητοῦμεν λοιπὸν τὸν ἀριθμὸν  $0,93190$  εἰς τὴν β' σελίδα τοῦ πίνακος. Βλέπομεν δὲ ὅτι μετὰ τὸν  $0,93148$  δὲν εὐρίσκεται  $0,93190$  ἀλλ' ὁ  $0,93253$ . Εἶναι δηλ.  $0,93148 < 0,93190 < 0,93253$  καὶ ἐπομένως  $68^\circ 40' < \omega < 68^\circ 50'$ . Ἦδη καταρτίζομεν τὴν ἐξῆς ἀναλογία :

Εἰς αὐξησιν ἡμιτόνου κατὰ 105 ἀντιστοιχεῖ αὐξ. γων.  $10'$

» » » » 42 » » »  $\psi$

καὶ εὐρίσκομεν  $\psi = 10 \cdot \frac{42}{105} = 4'$ . Εἶναι λοιπὸν  $\omega = 68^\circ 44'$ .

Τὴν εὐρεσιν τοῦ μέτρου ὀξεῖας γωνίας ἐκ τοῦ ἡμιτόνου αὐτῆς ἐπιτυγχάνομεν, μάλιστα ἀκριβέστερον, καὶ ἀπὸ τὸν λογάριθμον τοῦ ἡμιτόνου τούτου. Οὕτως ἀπὸ τὴν προηγουμένην ἰσότητα εὐρίσκομεν ὅτι  $\log \eta \mu \omega = \bar{1},96937$ . Τὸν ἀριθμὸν δὲ τοῦτον πρέπει νὰ ἀναζητήσωμεν εἰς τὰς στήλας τῶν ἡμιτόνων τῶν λογαριθμικῶν πινάκων. Διὰ τὴν εὐκολον ἀνεύρεσιν αὐτοῦ παρατηροῦμεν ὅτι :

$$\log \eta \mu 45^\circ = \bar{1},84949 < \bar{1},96937.$$

Πρέπει λοιπὸν νὰ ἀναζητήσωμεν αὐτὸν εἰς τὰς στήλας, αἱ ὁποῖαι φέρουσι κάτω τὸ σύμβολον Ἡμ.

Οὕτως εὐρίσκομεν πάλιν ὅτι  $\omega = 68^\circ 44'$ .

Ἄν ἡμ  $\chi = 0,772$ , θὰ εἶναι  $\log \eta \mu \chi = \bar{1},88762$ . Καὶ

$$\bar{1},88761 < \bar{1},88762 < \bar{1},88772.$$

Οὕτω βλέπομεν, ὅτι  $\Delta = 11$  καὶ  $\delta = 1$ .

Ἐκ τῆς ἀναλογίας  $\frac{11}{1} = \frac{60''}{\psi}$  εὐρίσκομεν  $\psi = \frac{60''}{11} = 5'',45$ .

Ἐπομένως  $\chi = 50^\circ 32' 5'',45$ .

Ἀπὸ τὸν πίνακα I τοῦ βιβλίου τούτου (σελ. 18 - 19) εὐρίσκο-

μεν  $\chi = 50^{\circ} 32' 3'', 24$ . Τὸ ἐξαγόμενον τοῦτο εἶναι ὀλίγον διάφορον τοῦ προηγουμένου. Αἰτία τούτου εἶναι ὅτι εἰς τοὺς λογαριθμικούς πίνακας τὰ τόξα προχωροῦσι ἀνὰ 1', ἐν  $\bar{\phi}$  εἰς τὸν πίνακα I ταῦτα προχωροῦσι ἀνὰ 10'. Οἱ πρῶτοι λοιπὸν πίνακες εἶναι ἀκριβέστεροι τοῦ I. Δι' αὐτό, ὅταν ἐπιδιώκωμεν μεγαλύτεραν ἀκρίβειαν, πρέπει νὰ προτιμῶμεν νὰ ἐργαζώμεθα μετὰ τοὺς λογαριθμικούς πίνακας.

### Ἀσκήσεις

40. Νὰ εὑρεθῇ ἡ ὀξεῖα γωνία  $\chi$ , ἂν  $\eta\mu \chi = 0,4$ .  
 41. Νὰ εὑρεθῇ ἡ ὀξεῖα γωνία  $\omega$ , ἂν  $\eta\mu \omega = \frac{3}{5}$ .  
 42. Νὰ εὑρεθῇ ἡ ὀξεῖα γωνία  $\phi$ , ἂν  $\eta\mu \phi = \frac{1}{2}$ .  
 43. Νὰ εὑρεθῇ ἡ ὀξεῖα γωνία  $\chi$ , ἂν  $\eta\mu \chi = 0,35$ .  
 44. Νὰ κατασκευασθῇ ἡ ὀξεῖα γωνία  $\psi$ , ἂν  $\eta\mu \psi = 0,48$ .

### 2. ΔΥΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΙΛΥΣΕΩΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΩΝ ΤΡΙΓΩΝΩΝ

**19. Δύο σχέσεις τῶν πλευρῶν καὶ τῶν ὀξειῶν γωνιῶν ὀρθογωνίου τριγώνου.** Ἐστω ἐν ὀρθογώνιον τρίγωνον ΑΒΓ με ὑποτείνουσαν (ΒΓ) =  $\alpha$  καὶ καθέτους πλευρὰς (ΑΓ) =  $\beta$  καὶ (ΑΒ) =  $\gamma$  (σχ. 9).


Ἀπὸ τὰς γνωστὰς ἡμῖν ἰσότητας :

$$\eta\mu B = \frac{AG}{BG} = \frac{\beta}{\alpha} \text{ καὶ } \eta\mu \Gamma = \frac{AB}{BG} = \frac{\gamma}{\alpha}$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{εὐρίσκομεν ὅτι: } \beta = \alpha \cdot \eta\mu B \\ \text{καὶ} \quad \quad \quad \gamma = \alpha \cdot \eta\mu \Gamma \end{array} \right\} \quad (1)$$

Βλέπομεν λοιπὸν ὅτι :

Ἐκάστη καθέτος πλευρὰ ἐνὸς ὀρθογωνίου τριγώνου εἶναι γινόμενον τῆς ὑποτείνουσας ἐπὶ τὸ ἡμίτονον τῆς ἀπέναντι ὀξείας γωνίας αὐτοῦ.



Σχ. 9

**20. Στοιχεῖα τριγώνου. Ἐπίλυσις τριγώνου.** Τὰ διάφορα στοιχεῖα ἐκάστου τριγώνου διακρίνομεν εἰς κύρια καὶ εἰς δευτερεύοντα στοιχεῖα.

Αί πλευραί, αί γωνίαί και τό έμβαδόν είναι τὰ κύρια στοιχεΐα έκάστου τριγώνου. Όλα τὰ άλλα, π.χ. ύψη, διάμεσοι, άκτίς τής περιγεγραμμένης περιφερείας κ.τ.λ., είναι δευτερεύοντα στοιχεΐα.

**Έπίλυσις τριγώνου λέγεται ό ύπολογισμός τών κυρίων στοιχειών τριγώνου, άν δοθώσιν έπαρκή πρός τοϋτο στοιχεΐα αϋτοϋ.**

Διά τής έπίλύσεως δηλαδή τών τριγώνων, έκπληροϋται ό σκοπός τής Τριγωνομετρίας ( § 2).

*Σημείωσις.* Διά τών μεθόδων τής Τριγωνομετρίας είναι δυνατόν νά ύπολογίζονται και δευτερεύοντα στοιχεΐα τών τριγώνων. Πρέπει όμως νά αναφέρωνται ρητώς ποΐα τούτων ζητοϋνται.

#### Α'. ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΣ ΕΠΙΛΥΣΕΩΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΥ

**21. Πρόβλημα I. Νά έπιλυθῆ έν όρθογώνιον τρίγωνον, άν είναι γνωστή ή ύποτείνουσα και μία όξειά γωνία αϋτοϋ, π.χ. ή Β.**

*Έπίλυσις.* Εύρίσκομεν τήν γωνίαν Γ έκ τής γνωστής ισότητος  

$$\Gamma = 90^\circ - B.$$

Έπειτα εύρίσκομεν τās πλευράς β και γ από τās ισότητες :

$$\beta = \alpha \cdot \acute{\eta}\mu B \text{ και } \gamma = \alpha \cdot \acute{\eta}\mu \Gamma.$$

Τέλος εύρίσκομεν τό έμβαδόν έκ τής ισότητος  $E = \frac{1}{2} \beta\gamma.$

*1ον Παράδειγμα.* Άν π.χ. είναι :

$\alpha = 753$  μέτ. και  $B = 30^\circ 15' 20''$ ,  
 οί δύο πρώτοι προηγούμενοι τύποι γίνονται :

$$\begin{aligned} \Gamma &= 90^\circ - 30^\circ 15' 20'', \\ \beta &= 753 \cdot \acute{\eta}\mu(30^\circ 15' 20'') \end{aligned}$$

*Υπολογισμός τής Γ.*

$$90^\circ = 89^\circ 59' 60''$$

$$B = 30^\circ 15' 20''$$

$$\Gamma = 59^\circ 44' 40''$$

*Γνωστά, άγνωστα στοιχεΐα*  
 $\alpha, B \quad \Gamma, \beta, \gamma, E$

*Τύποι έπιλύσεως*

$$\Gamma = 90^\circ - B, \quad \beta = \alpha \acute{\eta}\mu B,$$

$$\gamma = \alpha \acute{\eta}\mu \Gamma, \quad E = \frac{1}{2} \beta\gamma.$$

*Υπολογισμός τής β*

$$\log \beta = \log 753 + \log \acute{\eta}\mu(30^\circ 15' 20'')$$

$$\log 753 = 2,87679$$

$$\log \acute{\eta}\mu(30^\circ 15' 20'') = \overline{1},70231$$

$$\log \beta = \overline{2},57910$$

$$\beta = 397,4 \text{ μέτ.}$$

*Υπολογισμός τής γ*

‘Η ισότης  $\gamma = \alpha \acute{\eta}\mu \Gamma$  γίνεται  $\gamma = 753 \acute{\eta}\mu(59^\circ 44' 40'')$

$$\begin{aligned} \text{καί ἔπομένως} \quad \log \gamma &= \log 753 + \log \eta\mu (59^\circ 44' 40'') \\ \log 753 &= 2,87679 \\ \log \eta\mu (59^\circ 44' 40'') &= 1,93641 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \log \gamma &= 2,81320 \\ \gamma &= 650,43 \text{ μέτ.} \end{aligned}$$

Ἐπολογισμός τοῦ  $E$

$$E = \frac{1}{2} \beta \gamma, \quad \log E = \log \beta + \log \gamma - \log 2.$$

$$\log \beta = 2,57910$$

$$\log \gamma = 2,81320$$

$$\text{ἀθρ.} = 5,39230$$

$$\log 2 = 0,30103$$

$$\log E = 5,09127$$

$$E = 123\,386,11 \text{ τετρ. μέτρα}$$

*2ον Παράδειγμα.* Νά ἐπιλυθῆ τὸ ὀρθογώνιον τρίγωνον, τὸ ὁποῖον ἔχει  $\alpha = 1465$  μέτρα καὶ  $B = 53^\circ 26' 30''$

*Ἐπίλυσις.* Κατὰ τὰ προηγούμενα, οἱ τύποι ἐπιλύσεως εἶναι  $\Gamma = 90^\circ - B$ ,  $\beta = \alpha \eta\mu B$ ,  $\gamma = \alpha \eta\mu \Gamma$  (1)

$$\begin{aligned} \text{Ἐπολογισμός τῆς } \Gamma \\ 90^\circ &= 89^\circ 59' 60'' \\ B &= 53^\circ 26' 30'' \\ \hline \Gamma &= 36^\circ 33' 30'' \end{aligned}$$

Ἐπολογισμός τῶν πλευρῶν  $\beta$  καὶ  $\gamma$

$$\begin{aligned} \text{Αἱ δύο τελευταῖαι ἰσότητες τῶν (1) γίνονται :} \\ \beta &= 1465 \cdot \eta\mu (53^\circ 26' 30'') \\ \gamma &= 1465 \cdot \eta\mu (36^\circ 33' 30'') \end{aligned} \quad (2)$$

Ἦδη δυνάμεθα νὰ συνεχίσωμεν, ὅπως εἰς τὸ προηγούμενον παράδειγμα, ἀλλὰ καὶ ὡς ἑξῆς :

Ἀπὸ τὸν πίνακα I βλέπομεν ὅτι :

$$\eta\mu (53^\circ 20') < \eta\mu (53^\circ 26' 30'') < \eta\mu (53^\circ 30')$$

$$\eta\mu 0,80212 < \eta\mu (53^\circ 26' 30'') < 0,80386.$$

Οὕτω βλέπομεν ὅτι  $0,80386 - 0,80212 = 0,00174$  καὶ

$$(53^\circ 26' 30'') - (53^\circ 20') = 6' 30'' = \frac{13'}{2}$$

Ἀπὸ δὲ τὴν διάταξιν

$$\frac{10'}{0,00174} \quad \frac{13'}{2} \quad \chi$$

$$\text{εὐρίσκομεν :} \quad \chi = 0,00174 \cdot \frac{13}{20} = 0,00113.$$

Έπομένως ήμ  $(53^{\circ} 26' 30'') = 0,80212 + 0,00113 = 0,80325$ .

Ή α' λοιπόν τών (2) γίνεται :

$$\beta = 1465 \cdot 0,80325 = 1176,76125 \text{ μέτρα.}$$

Όμοίως εύρισκομεν ότι ήμ  $(36^{\circ} 33' 30'')$   $= 0,59564$  και έπομένως

$$\gamma = 1465 \cdot 0,59564 = 872,6126 \text{ μέτρα.}$$

### Άσκήσεις

45. Έν ορθογώνιον τρίγωνον ΑΒΓ έχει  $\alpha = 20$  μέτρα,  $B = 42^{\circ} 12'$ . Νά έπιλυθῆ τοῦτο.

46. Έν ορθογώνιον τρίγωνον ΑΒΓ έχει  $\alpha = 345$  μέτρα και  $\Gamma = 54^{\circ} 20' 45''$ . Νά έπιλυθῆ τοῦτο.

47. Έν ορθογώνιον τρίγωνον ΑΒΓ έχει  $\alpha = 1565$  μέτρα και  $\Gamma = 56^{\circ} 25'$ . Νά έπιλυθῆ τοῦτο.

48. Έν ορθογώνιον τρίγωνον έχει  $\alpha = 475,50$  μέτρα και  $B = \frac{3\pi}{8}$  ακτίνια. Νά έπιλυθῆ τοῦτο.

49. Ή διαγώνιος ΑΓ ορθογωνίου ΑΒΓΔ έχει μήκος 0,60 μέτρα και σχηματίζει με τήν βάσιν ΑΒ γωνίαν  $38^{\circ} 25'$ . Νά υπολογισθῶσιν αἱ διαστάσεις αὐτοῦ.

50. Ή πλευρά ενός ρόμβου έχει μήκος 15 μέτρα, ή δὲ γωνία αὐτῆς με τήν μικροτέραν διαγώνιον εἶναι  $\frac{3}{5}$  ὀρθῆς. Νά υπολογισθῶσιν τὰ μήκη τῶν διαγώνων αὐτοῦ.

51. Ή ακτίς κύκλου εἶναι 0,65 μέτρον. Νά εύρεθῆ τὸ μήκος τῆς χορδῆς τόξου  $52^{\circ} 35'$  και ή ἀπόστασις τοῦ κέντρου ἀπ' αὐτῆς.

52. Έν κεκλιμένον έπίπεδον έχει μήκος 0,25 μέτρον και κλίσιν  $26^{\circ} 45' 50''$ . Νά εύρεθῆ τὸ ὕψος αὐτοῦ.

53. Δύο δυνάμεις Δ και Δ' ενεργοῦσιν εἰς σημείον Α ὑπὸ ὀρθήν γωνίαν. Ή συνισταμένη αὐτῶν έχει έντασιν 15,6 χιλιογράμμων και σχηματίζει γωνίαν  $35^{\circ} 20'$  με τήν Δ. Νά εύρεθῆ ή έντασις ἐκάστης τῶν δυνάμεων Δ και Δ' και ή γωνία τῆς συνισταμένης με τήν Δ'.

### Β' ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΣ ΕΠΙΛΥΣΕΩΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΥ

22. Πρόβλημα. Νά έπιλυθῆ έν ορθογώνιον τρίγωνον ΑΒΓ, ἄν γνωρίζωμεν τήν ὑποτείνουσαν α και μίαν κάθετον πλευράν π.χ. τήν β.

Ἐπίλυσις. Ἐκ τῆς γνωστῆς ισότητος :

$\gamma^2 = \alpha^2 - \beta^2 = (\alpha + \beta)(\alpha - \beta)$  εύρισκομεν τὴν κάθετον πλευρὰν  $\gamma$ .  
 Ἐκ δὲ τῆς ἰσότητος ἤμ  $B = \frac{\beta}{\alpha}$  εύρισκομεν τὴν  $B$  καὶ ἔπειτα τὴν  $\Gamma$ .  
 Τὸ δὲ ἔμβαδὸν εύρισκομεν ἐκ τῆς ἰσότητος  $E = \frac{1}{2} \beta \gamma$ .

Γνωστά, ἄγνωστα στοιχεῖα  
 $\alpha, \beta \quad \gamma, B, \Gamma, E$   
 Τύποι Ἐπιλύσεως  
 $\gamma^2 = (\alpha + \beta)(\alpha - \beta)$   
 $\acute{\eta}\mu B = \frac{\beta}{\alpha}$   
 $\Gamma = 90^\circ - B$   
 $E = \frac{1}{2} \beta \gamma$ .

Παράδειγμα. Ἐστω  $\alpha = 15\,964$  μέτ. καὶ  $\beta = 11\,465$  μέτρα

Βοηθητικὸς πίναξ

Ἐπιλογισμὸς τῆς  $\gamma$

$\alpha = 15\,964$	$\gamma^2 = 27\,429.4499$ , ὅθεν :
$\beta = 11\,465$	$2\log\gamma = \log 27429 + \log 4499$ καὶ ἔπομένως :
$\alpha + \beta = 27\,429$	$\log\gamma = \frac{\log 27429 + \log 4499}{2}$
$\alpha - \beta = 4\,499$	
$\log 27\,429 = 4,43821$	$\log\gamma = 4,04566$
$\log 4\,499 = 3,65312$	$\gamma = 11\,108,72$ μέτρα.
$\acute{\alpha}\theta\rho\iota\sigma\mu\alpha = 8,09133$	

Ἐπιλογισμὸς τῆς  $B$

Ἐπιλογισμὸς τῆς  $\Gamma$

Ἐκ τῆς ἤμ  $B = \frac{\beta}{\alpha}$  ἔπεται ὅτι :

$$90^\circ = 89^\circ 59' 60''$$

$$\log \acute{\eta}\mu B = \log \beta - \log \alpha$$

$$B = 45^\circ 54' 15''$$

$$\log \beta = 4,05937$$

$$\Gamma = 44^\circ 5' 45''$$

$$\log \alpha = 4,20314$$

$$\log \acute{\eta}\mu B = 1,85623$$

$$B = 45^\circ 54' 15''$$

Ἐπιλογισμὸς τοῦ  $E$

Ἐκ τῆς ἰσότητος  $E = \frac{1}{2} \beta \gamma$  εύρισκομεν ὅτι :

$$\log E = \log \beta + \log \gamma - \log 2$$

$$\log \beta = 4,05937$$

$$\acute{\alpha}\theta\rho. = 8,10503$$

$$\log \gamma = 4,04566$$

$$\log 2 = 0,30103$$

$$\acute{\alpha}\theta\rho. = 8,10503$$

$$\log E = 7,80400$$

$$E = 63\,680\,000 \text{ τ.μ.}$$

## Άσκησεις

54. Έν ὀρθογώνιον τρίγωνον ΑΒΓ ἔχει  $\alpha = 15$  μέτρα καὶ  $\beta = 6,4$  μέτρα. Νά ἐπιλυθῆ τοῦτο.
55. Έν ὀρθογώνιον τρίγωνον ΑΒΓ ἔχει  $\alpha = 165,7$  μέτρα καὶ  $\beta = 74,20$  μέτρα. Νά ἐπιλυθῆ τοῦτο.
56. Έν τρίγωνον ΑΒΓ ἔχει  $(ΑΒ) = (ΑΓ) = 5$  μέτρα καὶ  $(ΒΓ) = 5,60$  μέτρα. Νά εὐρεθῶσι τὰ μέτρα τῶν γωνιῶν καὶ τὸ ὕψος ΑΔ αὐτοῦ.
57. Εἰς ῥόμβος ἔχει πλευρὰν 8 μέτρα καὶ μικροτέραν διαγωνίον 5,30 μέτρα. Νά εὐρεθῶσι τὰ μέτρα τῶν γωνιῶν καὶ τὸ μήκος τῆς ἄλλης διαγωνίου αὐτοῦ.
58. Νά εὐρεθῆ τὸ μέτρον τῆς γωνίας, ὑπὸ τὴν ὁποίαν εἰς κύκλος ἀκτίως  $\rho$  φαίνεται ἀπὸ ἓν σημεῖον Α, ἂν  $(ΚΑ) = 2\rho$ .
59. Έν κεκλιμένον ἐπίπεδον ἔχει μήκος 0,75 μέτρα καὶ ὕψος 0,28 μέτρον. Νά εὐρεθῆ ἡ κλίσις αὐτοῦ.
60. Εἰς κύκλος ἔχει ἀκτίνα 0,80 μέτρον. Νά εὐρεθῆ ἡ ἀπόστασις τοῦ κέντρου αὐτοῦ ἀπὸ χορδῆς του, ἣτις ἔχει μήκος 0,60 μέτρον.
61. Δύο δυνάμεις ἐνεργοῦσιν εἰς τὸ αὐτὸ σημεῖον ὑπὸ ὀρθὴν γωνίαν. Ἡ μία τούτων ἔχει ἔντασιν 25 χιλιογράμμων καὶ ἡ συνισταμένη αὐτῶν 40 χιλιογρ. Νά εὐρεθῆ ἡ ἔντασις τῆς ἄλλης καὶ τὰ μέτρα τῶν γωνιῶν τῆς συνισταμένης μὲ τὰς δυνάμεις ταύτας.

## Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Γ'

### 1. ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΗ ΟΞΕΙΑΣ ΓΩΝΙΑΣ. ΧΡΗΣΙΣ ΑΥΤΗΣ

**23. Έφαπτομένη οξείας γωνίας.** Έστω ἐν ὀρθογώνιον τρίγωνον  $AB\Gamma$  (σχ. 10). Ἐκ τυχόντος σημείου  $\Gamma'$  τῆς εὐθείας  $B\Gamma$  φέρομεν τὴν  $\Gamma'A'$  κάθετον ἐπὶ τὴν εὐθεΐαν  $BA$ .

Ἄν ἐργασθῶμεν, ὅπως ἀνωτέρω ἐν § 8, βεβαιούμεθα ὅτι : Διὰ τὴν σταθερὰν γωνίαν  $B$  εἶναι :

$$\frac{A\Gamma}{BA} = \frac{A'\Gamma'}{BA'}$$

δι' οἰανδήποτε θέσιν τοῦ σημείου  $\Gamma'$  ἐπὶ τῆς εὐθείας  $B\Gamma$ . Καὶ ἀντιστρόφως : εἰς δοθέντα λόγον  $\frac{A\Gamma}{BA}$  ἀντιστοιχεῖ σταθερὰ οξεία γωνία  $B$ . Τὸν σταθερὸν τοῦτον λόγον  $\frac{A\Gamma}{BA}$  ὀνομάζομεν **ἐφαπτομένην** τῆς οξείας γωνίας  $B$ . Ὡστε :



Σχ. 10

**Έφαπτομένη οξείας γωνίας ἑνὸς ὀρθογωνίου τριγώνου λέγεται ὁ λόγος τῆς ἀπέναντι πλευρᾶς πρὸς τὴν ἄλλην κάθετον πλευρὰν αὐτοῦ.**

Ἡ ἐφαπτομένη γωνίας  $B$  σημειώνεται οὕτω : ἐφ $B$ .

Εἶναι λοιπὸν ἐφ $B = \frac{A\Gamma}{BA}$ . Ὁμοίως ἐφ $\Gamma = \frac{BA}{A\Gamma}$ .


**24. Γεωμετρικὴ σημασία τῆς ἐφαπτομένης οξείας γωνίας.** Έστω ὀρθογώνιον τρίγωνον  $AB\Gamma$  (σχ. 11). Μὲ κέντρον τὴν κορυφὴν τῆς οξείας γωνίας  $B$  αὐτοῦ καὶ ἀκτίνα τὴν μονάδα μήκους γράφομεν τεταρτημόριον  $A'D$ . Ἄν ἐκ τοῦ  $A'$  ὑψώσωμεν τὴν  $A'\Gamma'$  κάθετον ἐπὶ τὴν  $BA$  καὶ προεκτείνωμεν τὴν  $B\Gamma$ , μέχρις οὗ τμήση αὐτὴν εἰς τὸ  $\Gamma'$ , σχηματίζεται νέον ὀρθογώνιον τρίγωνον  $A'B\Gamma'$ .

Κατὰ δὲ τὰ προηγούμενα εἶναι ἐφ $B = \frac{A\Gamma}{BA} = \frac{A'\Gamma'}{BA'}$ .

Ἐπειδὴ δὲ  $(BA') = 1$ , θὰ εἶναι  $\frac{A'Γ'}{BA'} = (A'Γ')$ . Ἡ προηγουμένη λοιπὸν ἰσότης γίνεται ἔφB =  $(A'Γ')$ . Οὕτω βλέπομεν ὅτι :

Ἡ ἐφαπτομένη ὀξείας γωνίας ὀρθογωνίου τριγώνου εἶναι μῆκος εὐθυγράμμου τμήματος, ἧτοι μῆκος στοιχείου ὁμοειδοῦς πρὸς τὰς πλευρὰς τοῦ τριγώνου.

25. Μεταβολὴ τῆς ἐφαπτομένης ὀξείας γωνίας μετὰ τῆς γωνίας ταύτης. Μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ σχ. 11 ἐννοοῦμεν εὐκόλως ὅτι :



Σχ. 11

Αὐξανόμενης τῆς ὀξείας γωνίας, τὰ ἀντίστοιχα μῆκη  $(A'Γ''')$ ,  $(A'Γ')$ ,  $(A'Γ''')$  κ.τ.λ. βαίνουνσιν αὐξανόμενα. Ἡ αὐξησης δὲ αὕτη εἶναι ταχυτάτη, ὅταν ἡ γωνία πλησιάζῃ πρὸς τὴν ὀρθὴν γωνίαν, ὅτε τὰ μῆκη ταῦτα δύνανται νὰ ὑπερβῶσι πάντα ἀριθμὸν, ὅσονδήποτε μέγαν. Τείνουσι δηλαδή ταῦτα εἰς τὸ ἄπειρον καὶ δεχόμεθα ὅτι :

$$\text{ἔφ}90^\circ = \infty$$

Ἀντιθέτως, ἀν ἡ γωνία ἐλαττωμένη γίνῃ μηδέν, τὸ τμήμα  $A'Γ'$  ἐλαττούμενον γίνεται ση-

μεῖον  $A'$ . Δεχόμεθα λοιπὸν ὅτι :  $\text{ἔφ}0^\circ = 0$ .

Ταῦτα συνοψίζομεν εἰς τὸν ἀκόλουθον πίνακα :

$$\begin{array}{l} B \left\{ \begin{array}{l} 0^\circ \dots \nearrow \dots 90^\circ \\ \text{ἔφ}B \left\{ \begin{array}{l} 0 \dots \nearrow \dots \infty \end{array} \right. \end{array} \right. \end{array}$$

26. Κατασκευὴ ὀξείας γωνίας ἐκ τῆς ἐφαπτομένης αὐτῆς.

Ἄν  $\text{ἔφ}B = 2$ , πρὸς κατασκευὴν τῆς γωνίας B ἀρκεῖ νὰ κατασκευάσωμεν ὀρθογώνιον τρίγωνον μὲ μίαν κάθετον πλευρὰν διπλασίαν τῆς ἄλλης. Ἡ γωνία B, ἣτις κεῖται ἀπέναντι τῆς μεγαλύτερας πλευρᾶς, εἶναι προφανῶς ἡ ζητούμενη.


Ἄν  $\text{ἔφ}B = \frac{2}{3}$ , πρέπει ἐπὶ τῆς μιᾶς πλευρᾶς ὀρθῆς γωνίας A

νά λάβωμεν δύο ἴσα διαδοχικά τμήματα· ἔστω δὲ ΑΓ τὸ ἄθροισμα αὐτῶν. Ἐπὶ δὲ τῆς ἄλλης τρία διαδοχικά τμήματα ἴσα πρὸς τὰ προηγούμενα· ἔστω δὲ ΑΒ τὸ ἄθροισμα αὐτῶν (σχ. 12). Ἐὰν φέρωμεν τὴν ΒΓ, σχηματίζεται ἡ ζητούμενη γωνία Β. Διότι πράγματι εἶναι :

$$\epsilon\phi B = \frac{AG}{BA} = \frac{2}{3}.$$

Ἐὰν  $\epsilon\phi B = 0,45 = \frac{45}{100}$ , πρέπει ἡ μία πλευρὰ τῆς ὀρθῆς γωνίας νὰ ἔχη 45 τμήματα καὶ ἡ ἄλλη 100, πάντα ἴσα. Ἐὰν τὸ σχέδιόν μας δὲν χωρῆ, λαμβάνομεν  $45 : 10 = 4,5$  ἐπὶ τῆς μιᾶς καὶ  $100 : 10 = 10$  ἐπὶ τῆς ἄλλης. Ἡ ἀπέναντι τῆς πλευρᾶς 4,5 γωνία Β εἶναι ἡ ζητούμενη, διότι

$$\epsilon\phi B = \frac{4,5}{10} = \frac{45}{100} = 0,45.$$



### Ἀσκήσεις

62. Αἱ κάθετοι πλευραὶ ἐνὸς ὀρθογωνίου τριγώνου ἔχουσι μήκη 12 μέτρα ἢ μία καὶ 16 μέτρα ἢ ἄλλη. Νὰ εὑρεθῆ ἡ ἐφαπτομένη ἐκάστης ὀξείας γωνίας αὐτοῦ.

63. Ἡ ὑποτείνουσα ὀρθογωνίου τριγώνου ἔχει μήκος 1,5 μέτρα, ἡ δὲ μία κάθετος πλευρὰ αὐτοῦ 1,2 μέτ. Νὰ εὑρεθῆ ἡ ἐφαπτομένη ἐκάστης ὀξείας γωνίας αὐτοῦ.

64. Ἡ μία κάθετος πλευρὰ ὀρθογωνίου τριγώνου εἶναι τετραπλασία τῆς ἄλλης. Νὰ εὑρεθῆ ἡ ἐφαπτομένη τῶν ὀξείων γωνιῶν αὐτοῦ.

65. Νὰ κατασκευασθῆ ὀξεία γωνία ἔχουσα ἐφαπτομένην  $\frac{1}{5}$ .

66. Νὰ κατασκευασθῆ ὀξεία γωνία  $\omega$ , ἂν  $\epsilon\phi \omega = \frac{5}{6}$ .

67. Νὰ κατασκευασθῆ ὀξεία γωνία  $\chi$ , ἂν  $\epsilon\phi \chi = 1,5$ .

68. Νὰ κατασκευασθῆ ὀξεία γωνία  $\psi$ , διὰ τὴν ὁποίαν εἶναι  $\epsilon\phi \psi = 0,8$ .

**27. Πρόβλημα I. Νὰ εὑρεθῆ ἡ ἐφαπτομένη γωνίας  $45^\circ$ ,  $30^\circ$  καὶ  $60^\circ$ .**

**Λύσις.** α') Ἐὰν  $B = 45^\circ$ , τὸ ὀρθογώνιον τρίγωνον ΑΒΓ θὰ εἶναι ἰσοσκελές, ἤτοι  $AB = AG$  καὶ ἐπομένως  $\frac{AG}{AB} = 1$ .

**ΣΥΝΕΦΑΠΤΟΜΕΝΗ**

Μοίραι	0'	10'	20'	30'	40'	50'	Μοίραι
0		343,77371	171,88540	114,58865	85,93979	68,75009	89
1	57,28996	49,10388	42,96408	38,18846	34,37060	31,24115	88
2	28,63625	26,43160	24,54176	22,90377	21,47060	20,20655	87
3	19,08114	18,07498	17,16934	16,34986	15,60478	14,92442	86
4	14,30067	13,72674	13,19688	12,70621	12,25051	11,82617	85
5	11,43005	11,05943	10,71191	10,38540	10,07803	9,78817	84
6	9,51436	9,25530	9,00983	8,77689	8,55555	8,34496	83
7	8,14435	7,95302	7,77035	7,59575	7,42871	7,26873	82
8	7,11537	6,96823	6,82694	6,69116	6,56055	6,43484	81
9	6,31375	6,19703	6,08444	5,97576	5,87080	5,76937	80
10	5,67128	5,57638	5,48451	5,39552	5,30928	5,22566	79
11	5,14455	5,06584	4,98940	4,91516	4,84300	4,77286	78
12	4,70463	4,63825	4,57363	4,51071	4,44942	4,38969	77
13	4,33148	4,27471	4,21933	4,16530	4,11256	4,06107	76
14	4,01078	3,96165	3,91364	3,86671	3,82083	3,77595	75
15	3,73205	3,68909	3,64705	3,60588	3,56557	3,52609	74
16	3,48741	3,44951	3,41236	3,37595	3,34023	3,30524	73
17	3,27085	3,23714	3,20406	3,17159	3,13972	3,10842	72
18	3,07768	3,04749	3,01783	2,98868	2,96004	2,93189	71
19	2,90421	2,87700	2,85023	2,82391	2,79802	2,77254	70
20	2,74748	2,72281	2,69853	2,67462	2,65109	2,62791	69
21	2,60509	2,58261	2,56046	2,53865	2,51715	2,49597	68
22	2,47509	2,45451	2,43422	2,41421	2,39449	2,37504	67
23	2,35585	2,33693	2,31826	2,29984	2,28167	2,26374	66
24	2,24604	2,22857	2,21132	2,19430	2,17749	2,16090	65
25	2,14451	2,12832	2,11232	2,09654	2,08094	2,06553	64
26	2,05030	2,03526	2,02039	2,00569	1,99116	1,97680	63
27	1,96261	1,94858	1,93470	1,92098	1,90741	1,89400	62
28	1,88073	1,86760	1,85462	1,84177	1,82906	1,81649	61
29	1,80405	1,79174	1,77955	1,76749	1,75556	1,74375	60
30	1,73205	1,72047	1,70901	1,69766	1,68643	1,67530	59
31	1,66428	1,65337	1,64256	1,63185	1,62125	1,61074	58
32	1,60033	1,59002	1,57981	1,56969	1,55966	1,54972	57
33	1,53987	1,53010	1,52043	1,51084	1,50133	1,49190	56
34	1,48256	1,47330	1,46411	1,45501	1,44598	1,43703	55
35	1,42815	1,41934	1,41061	1,40195	1,39336	1,38484	54
36	1,37638	1,36800	1,35968	1,35142	1,34323	1,33511	53
37	1,32704	1,31904	1,31110	1,30323	1,29541	1,28764	52
38	1,27994	1,27230	1,26471	1,25717	1,24969	1,24227	51
39	1,23490	1,22758	1,22031	1,21310	1,20593	1,19882	50
40	1,19175	1,18474	1,17777	1,17085	1,63981	1,15715	49
41	1,15037	1,14363	1,13694	1,13029	1,12369	1,11713	48
42	1,11061	1,10414	1,09770	1,09131	1,08496	1,07864	47
43	1,07237	1,06613	1,05994	1,05378	1,04766	1,04158	46
44	1,03553	1,02952	1,02359	1,01761	1,01170	1,00583	45
45	1,00000						

**ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΗ**

Μοίραι	0'	10'	20'	30'	40'	50'	Μοίραι
0	0,00000	0,00291	0,00582	0,00873	0,01164	0,01455	89
1	0,01746	0,02036	0,02328	0,02620	0,02910	0,03201	88
2	0,03492	0,03783	0,04075	0,04366	0,04658	0,04950	87
3	0,05241	0,05533	0,05824	0,06116	0,06408	0,06700	86
4	0,06993	0,07285	0,07578	0,07870	0,08163	0,08456	85
5	0,08749	0,09042	0,09335	0,09629	0,09923	0,10216	84
6	0,10510	0,10805	0,11099	0,11394	0,11688	0,11983	83
7	0,12278	0,12574	0,12869	0,13165	0,13461	0,13758	82
8	0,14054	0,14351	0,14648	0,14945	0,15243	0,15540	81
9	0,15838	0,16137	0,16435	0,16734	0,17033	0,17333	80
10	0,17633	0,17933	0,18233	0,18534	0,18835	0,19136	79
11	0,19438	0,19740	0,20042	0,20345	0,20648	0,20952	78
12	0,21256	0,21560	0,21864	0,22169	0,22475	0,22781	77
13	0,23087	0,23393	0,23700	0,24008	0,24316	0,24624	76
14	0,24933	0,25242	0,25552	0,25862	0,26172	0,26483	75
15	0,26795	0,27107	0,27419	0,27732	0,28046	0,28360	74
16	0,28675	0,28989	0,29305	0,29621	0,29938	0,30255	73
17	0,30573	0,30891	0,31210	0,31530	0,31850	0,32171	72
18	0,32492	0,32814	0,33136	0,33459	0,33783	0,34108	71
19	0,34433	0,34758	0,35085	0,35412	0,35739	0,36068	70
20	0,36397	0,36727	0,37057	0,37388	0,37720	0,38053	69
21	0,38386	0,38721	0,39055	0,39391	0,39727	0,40065	68
22	0,40403	0,40741	0,41081	0,41421	0,41763	0,42105	67
23	0,42447	0,42791	0,43136	0,43481	0,43828	0,44175	66
24	0,44523	0,44872	0,45222	0,45573	0,45924	0,46277	65
25	0,46631	0,46985	0,47341	0,47698	0,48055	0,48414	64
26	0,48773	0,49134	0,49495	0,49858	0,50222	0,50587	63
27	0,50953	0,51319	0,51688	0,52057	0,52427	0,52798	62
28	0,53171	0,53545	0,53920	0,54296	0,54673	0,55051	61
29	0,55431	0,55812	0,56194	0,56577	0,56962	0,57348	60
30	0,57735	0,58124	0,58513	0,58905	0,59297	0,59691	59
31	0,60086	0,60483	0,60881	0,61280	0,61681	0,62083	58
32	0,62487	0,62892	0,63299	0,63707	0,64117	0,64528	57
33	0,64941	0,65355	0,65771	0,66189	0,66608	0,67028	56
34	0,67451	0,67875	0,68301	0,68728	0,69157	0,69588	55
35	0,70021	0,70455	0,70891	0,71329	0,71769	0,72211	54
36	0,72654	0,73099	0,73547	0,73996	0,74447	0,74900	53
37	0,75355	0,75812	0,76272	0,76733	0,77196	0,77661	52
38	0,78125	0,78598	0,79060	0,79544	0,80019	0,80498	51
39	0,80978	0,81461	0,81946	0,82434	0,82923	0,83415	50
40	0,83910	0,84407	0,84906	0,85408	0,85912	0,86419	49
41	0,86929	0,87441	0,87955	0,88473	0,88992	0,89515	48
42	0,90040	0,90569	0,91099	0,91633	0,92169	0,92709	47
43	0,93252	0,93797	0,94345	0,94896	0,95451	0,96008	46
44	0,96569	0,97133	0,97699	0,98270	0,98843	0,99419	45
45	1,00000						
	60'	50'	40'	30'	20'	10'	Μοίραι

ΣΥΝΕΦΑΠΤΟΜΕΝΗ

$$\text{''Αρα} \quad \epsilon\varphi 45^\circ = 1 \quad (1)$$

$\beta')$  Ἐὰν  $B = 30^\circ$ , γνωρίζομεν ὅτι  $\beta = \frac{\alpha}{2}$ . Κατὰ δὲ τὸ Πυθαγόρειον θεώρημα εἶναι  $4\beta^2 = \beta^2 + \gamma^2$ , ὅθεν  $3\beta^2 = \gamma^2$  καὶ  $\left(\frac{\beta}{\gamma}\right)^2 = \frac{1}{3}$ . Ἐκ ταύτης δὲ ἔπεται, ὅτι  $\frac{\gamma}{\beta} = \frac{\sqrt{3}}{3}$ .

$$\text{''Αρα} \quad \epsilon\varphi 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{3} \quad (2)$$

$\gamma')$  Ἐὰν  $\Gamma = 60^\circ$ , θὰ εἶναι  $\epsilon\varphi 60^\circ = \frac{\gamma}{\beta}$ . Ἐπειδὴ δὲ  $B = 30^\circ$ , θὰ εἶναι  $3\beta^2 = \gamma^2$  καὶ ἔπομένως,  $\frac{\gamma}{\beta} = \sqrt{3}$ .

$$\text{Θὰ εἶναι λοιπόν:} \quad \epsilon\varphi 60^\circ = \sqrt{3} \quad (3)$$

Κατὰ ταῦτα δυνάμεθα νὰ συμπληρώσωμεν τὸν πίνακα τῆς σελ. 34 οὕτω :

B		0°	..	↗	..	30°	..	↗	45°	..	↗	60°	..	↗	90°
εφB		0	..	↗	..	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	..	↗	1	..	↗	$\sqrt{3}$	..	↗	∞

## 28. Εὔρεσις τῆς ἐφαπτομένης οἰασδήποτε ὀξείας γωνίας.

Τὴν ἐφαπτομένην οἰασδήποτε ὀξείας γωνίας δυνάμεθα νὰ εὑρωμεν μετὰ τὴν βοήθειαν τοῦ εἰς τὰς σελ. 40 – 41 παρατιθεμένου πίνακος III. Ἡ περιγραφή καὶ χρῆσις αὐτοῦ εἶναι ἀκριβῶς ὁμοία πρὸς τὴν τοῦ πίνακος I διὰ τὰ ἡμίτονα. Μόνον εἰς τὸ ἄνω μέρος τῆς ἀριστερᾶς σελίδος τοῦ πίνακος τούτου καὶ εἰς τὸ κάτω τῆς δεξιᾶς σελίδος ἀναγράφονται αἱ λέξεις ἐφαπτομένη ἀντὶ ἡμίτονου τοῦ I πίνακος. Ἀπὸ αὐτὸν εὐρίσκομεν π.χ. ὅτι :

$$\epsilon\varphi (19^\circ 20') = 0,35085, \quad \epsilon\varphi (47^\circ 40') = 1,09770 \text{ κ.τ.λ.}$$

Διὰ νὰ εὑρωμεν δὲ τὴν  $\epsilon\varphi(35^\circ 26')$ , παρατηροῦμεν ὅτι :

$$35^\circ 20' < 35^\circ 26' < 35^\circ 30'$$

καὶ  $\epsilon\varphi(35^\circ 20') < \epsilon\varphi(35^\circ 26') < \epsilon\varphi(35^\circ 30')$ .

Ἐκ δὲ τῶν πινάκων βλέπομεν ὅτι :

$$\epsilon\varphi(35^\circ 20') = 0,70891 \quad \text{καὶ} \quad \epsilon\varphi(35^\circ 30') = 0,71329$$

Αἱ δὲ προηγούμεναι ἀνισότητες γίνονται :

$$0,70891 < \epsilon\varphi(35^\circ 26') < 0,71329.$$

10	20	30	40	50	60	70	80	90
----	----	----	----	----	----	----	----	----

Ούτως δια  $\delta = 30' - 20' = 10'$  είναι :

$$\Delta = 0,71329 - 0,70891 = 0,00438.$$

Μεθ' ὃ καταρτίζομεν τὴν διάταξιν :

$$\begin{array}{r} 10' \\ 6' \end{array} \quad \begin{array}{r} 0,00438 \\ \chi \end{array} \quad \text{καὶ εὐρίσκομεν :}$$

$$\chi = 0,00438 \cdot \frac{6}{10} = 0,002628 \text{ ἢ } 0,00263 \text{ κατὰ προσέγγισιν.}$$

Εἶναι λοιπὸν  $\acute{\epsilon}\phi(35^{\circ} 26') = 0,70891 + 0,00263 = 0,71154.$

Διὰ τὴν εὐρωμένον τὴν  $\acute{\epsilon}\phi(59^{\circ} 37' 20'')$  εὐρίσκομεν ὁμοίως ὅτι :

$$\acute{\epsilon}\phi(59^{\circ} 30') < \acute{\epsilon}\phi(59^{\circ} 37' 20'') < \acute{\epsilon}\phi(59^{\circ} 40') \text{ ἢ}$$

$$1,69766 < \acute{\epsilon}\phi(59^{\circ} 37' 20'') < 1,70901.$$

Βλέπομεν οὕτως ὅτι  $\Delta = 0,01135$  καὶ  $\delta = 7' 20'' = 7\frac{1}{3} = \frac{22}{3}.$

$$\begin{array}{r} \text{Ἐκ δὲ τῆς διατάξεως} \\ 10' \\ \frac{22'}{3} \end{array} \quad \begin{array}{r} 0,01135 \\ \chi \end{array}$$

$$\text{εὐρίσκομεν} \quad \chi = 0,01135 \cdot \frac{22}{30} = 0,00832.$$

Εἶναι λοιπὸν  $\acute{\epsilon}\phi(59^{\circ} 37' 20'') = 1,69766 + 0,00832 = 1,70598.$

### Ἀ σ κ ῆ σ ε ι ς

69. Νὰ εὐρεθῇ ἡ  $\acute{\epsilon}\phi(12^{\circ} 30')$  καὶ ἡ  $\acute{\epsilon}\phi(73^{\circ} 40')$ .

70. Νὰ εὐρεθῇ ἡ  $\acute{\epsilon}\phi(42^{\circ} 10')$  καὶ ἡ  $\acute{\epsilon}\phi(67^{\circ} 50')$ .

71. Νὰ εὐρεθῇ ἡ  $\acute{\epsilon}\phi 50^{\circ}$  καὶ ἡ  $\acute{\epsilon}\phi 80^{\circ}$ .

72. Νὰ εὐρεθῇ ἡ  $\acute{\epsilon}\phi(18^{\circ} 25')$  καὶ ἡ  $\acute{\epsilon}\phi(53^{\circ} 47')$ .

73. Νὰ εὐρεθῇ ἡ  $\acute{\epsilon}\phi(23^{\circ} 43' 30'')$ .

74. Νὰ εὐρεθῇ ἡ  $\acute{\epsilon}\phi(48^{\circ} 46' 40'')$ .

75. Νὰ εὐρεθῇ ἡ  $\acute{\epsilon}\phi$ απτομένη γωνίας ἴσης πρὸς  $\frac{3}{10}$  ὀρθῆς γωνίας.

76. Νὰ εὐρεθῇ ἡ  $\acute{\epsilon}\phi$ απτομένη γωνίας ἴσης πρὸς  $\frac{5}{8}$  ὀρθῆς γωνίας.

**29. Λογάριθμος  $\acute{\epsilon}\phi$ απτομένης ὀξείας γωνίας.** Οἱ λογαριθμικοὶ πίνακες περιέχουσι καὶ στήλας, αἱ ὅποια φέρουσι τὴν συγκεκριμένην λέξιν Ἐφ. ἄνω διὰ τὰς μικροτέρας  $45^{\circ}$  γωνίας καὶ κάτω διὰ τὰς ἄλλας μέχρις  $90^{\circ}$ .

Αὗται περιέχουσι τοὺς λογαρίθμους τῶν  $\acute{\epsilon}\phi$ απτομένων ὀξείων γωνιῶν, τῶν ὁποίων τὰ μέτρα προχωροῦσιν ἀνά  $1'$ .

Ἡ εὕρεσις δὲ τοῦ λογαρίθμου τῆς ἐφαπτομένης δοθείσης ὀξείας, γωνίας γίνεται ὅπως καὶ ἡ εὕρεσις τοῦ λογαρίθμου τοῦ ἡμιτόνου αὐτῆς (§ 17). Οὕτως εὕρισκομεν ὅτι :

$$\log \epsilon\phi(38^{\circ} 22') = \bar{1},89853,$$

$$\log \epsilon\phi(51^{\circ} 20') = 0,09680,$$

$$\log \epsilon\phi(51^{\circ} 43') = 0,10277.$$

Διὰ τὰ εὗρωμεν τὸν  $\log \epsilon\phi(38^{\circ} 51' 42'')$ , παρατηροῦμεν ὅτι  $\log \epsilon\phi(38^{\circ} 51') < \log \epsilon\phi(38^{\circ} 51' 42'') < \log \epsilon\phi(38^{\circ} 52')$  ἢ

$$\bar{1},90604 < \log \epsilon\phi(38^{\circ} 51' 42'') < \bar{1},90630.$$

Οὕτω δὲ βλέπομεν ὅτι διὰ  $\delta = 60''$  εἶναι  $\Delta = 26$  μον. τελ. δεκ. τάξ.

$$\text{Μετὰ ταῦτα δὲ ἐκ τῆς διατάξεως} \quad \begin{array}{r} 60'' \\ 42'' \end{array} = \Delta \quad \begin{array}{r} 26 \\ \chi \end{array}$$

εὕρισκομεν  $\chi = 26 \cdot \frac{42}{60} = 18,2$  ἢ 18 μον. τελ. δεκ. τάξεως κατὰ προσέγγισιν.

Εἶναι λοιπὸν :

$$\log \epsilon\phi(38^{\circ} 51' 42'') = \bar{1},90604 + 0,00018 = \bar{1},90622.$$

Ὅταν δὲ γνωρίζωμεν τὸν λογάφω, εὕρισκομεν καὶ τὴν ἔφω ἀπὸ τοὺς λογαριθμικοὺς πίνακας τῶν ἀριθμῶν. Οὕτως ἐκ τῆς ἰσότητος  $\log \epsilon\phi(38^{\circ} 51' 42'') = \bar{1},90622$  εὕρισκομεν ὅτι :

$$\epsilon\phi(38^{\circ} 51' 42'') = 0,80578.$$

### Ἀσκήσεις

77. Νὰ εὕρεθῇ ὁ  $\log \epsilon\phi(38^{\circ} 12')$  καὶ ὁ  $\log \epsilon\phi(38^{\circ} 42' 30'')$  καὶ ἐξ αὐτῶν ἡ  $\epsilon\phi(38^{\circ} 12')$  καὶ ἡ  $\epsilon\phi(38^{\circ} 42' 30'')$ .

78. Νὰ εὕρεθῇ ὁ  $\log \epsilon\phi(51^{\circ} 23')$  καὶ ὁ  $\log \epsilon\phi(51^{\circ} 35' 28'')$  καὶ ἐξ αὐτῶν ἡ  $\epsilon\phi(51^{\circ} 23')$  καὶ ἡ  $\epsilon\phi(51^{\circ} 35' 28'')$ .

79. Νὰ εὕρεθῇ ὁ  $\log \epsilon\phi(41^{\circ} 57' 35'')$  καὶ ὁ  $\log \epsilon\phi(48^{\circ} 18' 52'')$  καὶ ἐξ αὐτῶν ἡ  $\epsilon\phi(41^{\circ} 57' 35'')$  καὶ ἡ  $\epsilon\phi(48^{\circ} 18' 52'')$ .

80. Νὰ εὕρεθῇ ὁ  $\log \epsilon\phi 26',40$  καὶ ἐξ αὐτοῦ ἡ  $\epsilon\phi 26',40$ .

81. Νὰ εὕρεθῇ ὁ  $\log \epsilon\phi \frac{3\pi}{8}$  καὶ ἐξ αὐτοῦ ἡ  $\epsilon\phi \frac{3\pi}{8}$ .

82. Ἄν  $\epsilon\phi \chi = \frac{2}{5}$ , νὰ εὕρεθῇ ὁ  $\log \epsilon\phi \chi$ .

83. Ἄν  $\epsilon\phi \omega = 1,673$ , νὰ εὕρεθῇ ὁ  $\log \epsilon\phi \omega$ .

84. Ἄν  $\epsilon\phi \psi = 0,347$ , νὰ εὕρεθῇ ὁ  $\log \epsilon\phi \psi$ .

**30. Εύρεσις τοῦ μέτρου ὀξείας γωνίας ἐκ τῆς ἐφαπτομένης αὐτῆς. α')** Ἐστω ὅτι  $\epsilon\phi\chi = 0,41763$  καὶ θέλομεν νὰ εὕρωμεν τὸ μέτρον τῆς ὀξείας γωνίας  $\chi$ .

Ταύτην εὐρίσκομεν ἀπὸ τὸν πίνακα III τοῦ βιβλίου τούτου. Πρὸς τοῦτο παρατηροῦμεν ὅτι  $0,41763 < 1 = \epsilon\phi 45^\circ$  καὶ συμπεραίνομεν ὅτι  $\chi < 45^\circ$ .

Ἄναζητοῦμεν λοιπὸν τὸν ἀριθμὸν  $0,41763$  εἰς τὴν  $\alpha'$  σελίδα τοῦ πίνακος τούτου καὶ εὐρίσκομεν ὅτι  $\chi = 22^\circ 40'$ .

Ἐστω ἀκόμη ὅτι  $\epsilon\phi\omega = 1,92098$ . Πρὸς εὐρεσιν τοῦ μέτρου τῆς ὀξείας γωνίας  $\omega$ , ἀναζητοῦμεν τὸν ἀριθμὸν  $1,92098$  εἰς τὴν  $\beta'$  σελίδα τοῦ πίνακος καὶ εὐρίσκομεν ὅτι  $\omega = 62^\circ 30'$ .

Ἄν  $\epsilon\phi\chi = 0,715$ , εὐρίσκομεν εἰς τὴν  $\alpha'$  σελίδα τοῦ πίνακος ὅτι :

$$0,71329 < 0,715 < 0,71769 \text{ καὶ συμπεραίνομεν ὅτι :}$$

$$35^\circ 30' < \chi < 35^\circ 40'.$$

Εὐκόλως δὲ καταρτίζομεν τὴν διάταξιν  $0,00440 \quad 10'$   
 $0,00171 \quad \psi,$

ὅθεν  $\psi = 10 \cdot \frac{171}{440} = 3' 53''$ . Εἶναι λοιπὸν  $\chi = 35^\circ 33' 53''$ .

$\beta')$  Τὸ αὐτὸ ζήτημα λύομεν καὶ μὲ τὴν βοήθειαν τῶν πινάκων τῶν λογαρίθμων τῶν ἐφαπτομένων.

Οὕτως ἐκ τῆς προηγουμένης ἰσότητος  $\epsilon\phi\chi = 0,715$  εὐρίσκομεν ὅτι  $\log\epsilon\phi\chi = \log 0,715 = \bar{1},85431$ .

Πρέπει τώρα νὰ ἀναζητήσωμεν αὐτὸν εἰς τὰς στήλας τῶν ἐφαπτομένων τῶν λογαριθμικῶν πινάκων. Δι' εὐκολίαν πρέπει νὰ ἔχωμεν ὑπ' ὄχιν ὅτι  $\log\epsilon\phi 45^\circ = \log 1 = 0$  καὶ ὅτι, ἂν  $\chi < 45^\circ$ , θὰ εἶναι  $\epsilon\phi\chi < 1$  καὶ  $\log\epsilon\phi\chi < 0$ . Ἄν δὲ  $\chi > 45^\circ$  θὰ εἶναι  $\log\epsilon\phi\chi > 0$ . Καὶ ἀντιστρόφως.

Ἄναζητοῦμεν λοιπὸν τὸν ἀρνητικὸν λογαρίθμῳ  $\bar{1},85431$  εἰς τὰς στήλας, αἱ ὁποῖαι φέρουσιν ἄνω τὸ σύμβολον Ἐφ.

Οὕτω βλέπομεν ὅτι  $\bar{1},85407 < \bar{1},85431 < \bar{1},85434$   
καὶ ἐπομένως :  $35^\circ 33' < \chi < 35^\circ 34'$ .

Ἐπειδὴ δὲ εἰς  $\Delta = 27$  ἀντιστοιχεῖ αὐξήσις τῆς γωνίας κατὰ

60'', είναι δὲ  $\delta = 24$  μον. τελ. δεκ. τάξ. καταρτίζομεν τὴν διάταξιν :

$$27 \quad 60''$$

$$24 \quad \psi \text{ καὶ εὐρίσκομεν } \psi = 60 \cdot \frac{24}{27} = 53''.$$

Εἶναι λοιπὸν


$$\chi = 35^\circ 33' 53''.$$

### Ἀσκήσεις

85. Νὰ εὐρεθῇ τὸ μέτρον ὀξείας γωνίας  $\chi$ , ἂν  $\log \epsilon \phi \chi = 1,89801$ .  
 86. Νὰ εὐρεθῇ τὸ μέτρον ὀξείας γωνίας  $\omega$ , ἂν  $\log \epsilon \phi \omega = 0,09396$ .  
 87. Νὰ εὐρεθῇ τὸ μέτρον ὀξείας γωνίας  $\psi$ , ἂν  $\epsilon \phi \psi = 0,532$ .  
 88. Νὰ εὐρεθῇ τὸ μέτρον ὀξείας γωνίας  $\chi$ , ἂν  $\epsilon \phi \chi = 1,103$ .  
 89. Νὰ εὐρεθῇ τὸ μέτρον ὀξείας γωνίας  $\theta$ , ἂν  $\epsilon \phi \theta = \frac{10}{8}$ .  
 90. Νὰ εὐρεθῇ εἰς βαθμοὺς τὸ μέτρον ὀξείας γωνίας,  $\omega$ , ἂν  $\epsilon \phi \omega = 2,194$ .  
 91. Νὰ εὐρεθῇ εἰς ἀκτίνια τὸ μέτρον ὀξείας γωνίας,  $Z$ , ἂν  $\epsilon \phi Z = 0,923$ .  
 92. Νὰ εὐρεθῇ τὸ μέτρον ὀξείας γωνίας  $\chi$ , ἂν  $\epsilon \phi \chi = 3,275$ .  
 93. Νὰ εὐρεθῇ τὸ μέτρον ὀξείας γωνίας  $\chi$ , ἂν  $\epsilon \phi \chi = \frac{12}{5}$ .

## 2. ΔΥΟ ΑΛΛΑΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΙΛΥΣΕΩΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΩΝ ΤΡΙΓΩΝΩΝ

31. Δύο ἄλλαι σχέσεις μεταξὺ τῶν πλευρῶν καὶ τῶν ὀξείων γωνιῶν ὀρθογωνίου τριγώνου. Ἐκ τῶν γνωστῶν (§ 23)



Σχ. 13

$$\begin{aligned} \text{ἰσοτήτων } \epsilon \phi B &= \frac{AG}{BA} = \frac{\beta}{\gamma}, \quad \epsilon \phi \Gamma = \frac{BA}{AG} \\ &= \frac{\gamma}{\beta} \text{ εὐρίσκομεν ὅτι} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \beta &= \gamma \epsilon \phi B \\ \gamma &= \beta \epsilon \phi \Gamma \end{aligned} \quad (2)$$

Βλέπομεν λοιπὸν ὅτι :

Ἐκάστη κάθετος πλευρὰ ἐνὸς ὀρθογωνίου τριγώνου εἶναι γινόμενον τῆς ἄλλης καθέτου πλευρᾶς ἐπὶ τὴν ἐφαπτομένην τῆς εἰς ἐκείνην ἀντικειμένης ὀξείας γωνίας αὐτοῦ.

Γ' ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΣ ΕΠΙΛΥΣΕΩΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΥ

32. Πρόβλημα 1. Νά ἐπιλυθῆ ὀρθογώνιον τρίγωνον, ἂν εἶναι γνωσταὶ αἱ κάθετοι πλευραὶ αὐτοῦ.

Ἐπιλύσεις. Ἐκ τῆς γνωστῆς ἰσότητος  $\epsilon\phi B = \frac{\beta}{\gamma}$  εὐρίσκομεν τὴν γωνίαν B καὶ εἶτα εὐκόλως τὴν Γ.

Ἐκ δὲ τῆς ἡμ B =  $\frac{\beta}{\alpha}$  εὐρίσκομεν ὅτι  $\alpha = \frac{\beta}{\eta\mu B}$ , ἐκ τῆς ὁποίας εὐρίσκομεν τὴν α. Τέλος τὸ E εὐρίσκομεν ἐκ τῆς  $E = \frac{1}{2} \beta\gamma$ .

Γνωστά, ἄγνωστα στοιχεῖα

$\beta, \gamma$  B, Γ, α, E

Τύποι ἐπιλύσεως

$$\epsilon\phi B = \frac{\beta}{\gamma}, \Gamma = 90^\circ - B$$

$$\alpha = \frac{\beta}{\eta\mu B}, E = \frac{1}{2} \beta\gamma$$

Παράδειγμα. Ἐστω  $\beta = 3456$  μέτρα καὶ  $\gamma = 1280$  μέτρα.

Ἐπιλογισμὸς τῶν B καὶ Γ

Ἐπιλογισμὸς τῆς α

Ἐκ τῆς  $\epsilon\phi B = \frac{\beta}{\gamma}$  ἔπεται ὅτι:

Ἐκ τῆς  $\alpha = \frac{\beta}{\eta\mu B}$  ἔπεται ὅτι:

$$\log \epsilon\phi B = \log \beta - \log \gamma$$

$$\log \beta = 3,53857$$

$$\log \gamma = 3,10721$$

$$\log \epsilon\phi B = 0,43136$$

$$B = 69^\circ 40' 36''$$

$$90^\circ = 89^\circ 59' 60''$$

$$B = 69^\circ 40' 36''$$

$$\Gamma = 20^\circ 19' 24''$$

$$\log \alpha = \log \beta - \log \eta\mu B,$$

$$\log \beta = 3,53857$$

$$\log \eta\mu B = \bar{1},97208$$

$$\log \alpha = 3,56649$$

$$\alpha = 3685,41 \text{ μέτ.}$$

Κατὰ δὲ τὰ γνωστά (§ 21 καὶ § 22) εὐρίσκομεν ὅτι:

$$E = 2211800 \text{ τ.μ.}$$

Ἀσκήσεις

94. Ἐν ὀρθογώνιου τρίγωνον ἔχει  $\beta = 18$  μέτ. καὶ  $\gamma = 12$  μέτρα. Νά ἐπιλυθῆ τοῦτο.

95. Ἐν ὀρθογώνιου τρίγωνον ἔχει  $\beta = 256,25$  μέτ. καὶ  $\gamma = 348$  μέτ. Νά ἐπιλυθῆ τοῦτο.

96. Ἐν ὀρθογώνιου τρίγωνον ἔχει  $\beta = 3168,45$  μέτ. καὶ  $\gamma = 2825,50$  μέτρα. Νά ἐπιλυθῆ τοῦτο.

97. Ἡ μία διαγώνιος ρόμβου ἔχει μήκος 3,48 μέτ. ἡ δὲ ἄλλη 2,20 μετ. Νὰ εὑρεθῇ τὸ μήκος τῆς πλευρᾶς καὶ τὰ μέτρα τῶν γωνιῶν αὐτοῦ.

98. Ὁ λόγος τοῦ ὕψους πρὸς τὴν βᾶσιν ὀρθογωνίου εἶναι  $\frac{2}{3}$ . Νὰ εὑρεθῶσι τὰ μέτρα τῶν γωνιῶν τῆς διαγωνίου μὲ τὰς διαστάσεις αὐτοῦ.

99. Τὸ κέντρον ἑνὸς κύκλου ἀπέχει 8 μέτ. ἀπὸ χορδῆς 12 μέτ. Νὰ εὑρεθῇ τὸ μήκος τῆς ἀκτίνας αὐτοῦ καὶ τὰ μέτρα τῶν εἰς τὴν χορδὴν ἀντιστοίχων τόξων.

100. Ἐν ὀρθογώνιον τρίγωνον ἔχει ἔμβαδὸν 940,50 τ.μ. καὶ μίαν κάθετον πλευρὰν 260,40 μέτ. Νὰ εὑρεθῇ τοῦτο.

101. Ἐκαστον ἀέτωμα τοῦ Παρθενῶνος εἶναι ἰσοσκελὲς τρίγωνον μὲ βᾶσιν 28,35 μέτ. καὶ ὕψος 3,46 μέτ. Νὰ εὑρεθῇ τὸ μέτρον τῆς γωνίας τῆς κορυφῆς καὶ τὸ μήκος ἐκάστης τῶν ἄλλων πλευρῶν.

#### Δ' ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΣ ΕΠΙΛΥΣΕΩΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΥ

**33. Πρόβλημα II.** Νὰ ἐπιλυθῇ ἓν ὀρθογώνιον τρίγωνον, ἂν εἶναι γνωστὴ μία κάθετος πλευρὰ καὶ μία ὀξεία γωνία αὐτοῦ.

*Παράδειγμα.* Ἐστω ὅτι  $\beta = 2347,5$  μέτ. καὶ  $B = 51^\circ 12' 38''$ .

*Ἐπίλυσις.* Εὐρίσκομεν πρῶτον τὴν  $\Gamma$  εὐκόλως. Ἐπειτα ἀπὸ τὴν ἰσότητα  $\gamma = \beta \epsilon\phi \Gamma$  εὐρίσκομεν τὴν  $\gamma$ . Ἀπὸ δὲ τὴν ἰσότητα  $\alpha = \frac{\beta}{\eta\mu\beta}$  εὐρίσκομεν τὴν  $\alpha$ . Τέλος ἀπὸ τὰς ἰσότητας  $E' = \frac{1}{2} \beta\gamma$  καὶ  $\gamma = \beta \epsilon\phi \Gamma$  εὐρίσκομεν ὅτι :

$$E = \frac{1}{2} \beta^2 \epsilon\phi \Gamma, \quad (3)$$

ἀπὸ τὴν ὁποίαν εὐρίσκομεν τὸ ἔμβαδόν.

Γνωστά,  $\epsilon =$  ἄγνωστα  
στοιχεῖα

$$\beta, B \quad \Gamma, \gamma, \alpha, E$$

Τύποι ἐπιλύσεως

$$\Gamma = 90^\circ - B, \gamma = \beta \epsilon\phi \Gamma$$

$$\alpha = \frac{\beta}{\eta\mu B}, E = \frac{1}{2} \beta^2 \epsilon\phi \Gamma$$

*Ἐπιλογισμὸς τῆς  $\Gamma$*

$$90^\circ = 89^\circ 59' 60''$$

$$B = 51^\circ 12' 38''$$

$$\Gamma = 38^\circ 47' 22''$$

*Ἐπιλογισμὸς τῆς  $\gamma$*

Ἐκ τῆς  $\gamma = \beta \epsilon\phi \Gamma$  εὐρίσκομεν ὅτι:

$$\log \gamma = \log \beta + \log \epsilon\phi \Gamma$$

$$\log \beta = 3,37060$$

$$\log \epsilon\phi \Gamma = \bar{1},90511$$

$$\log \gamma = 3,27571,$$

$$\gamma = 1\,886,74 \text{ μέτ.}$$

Υπολογισμός της  $\alpha$

$$\text{Έκ τής ισότητος } \alpha = \frac{\beta}{\eta\mu B}$$

εύρισκομεν ὅτι :

$$\log \alpha = \log \beta - \log \eta\mu B,$$

$$\log \beta = 3,37060$$

$$\log \eta\mu B = \bar{1},89179$$

$$\log \alpha = 3,47881$$

$$\alpha = 3011,71 \text{ μέτ.}$$

Υπολογισμός τοῦ  $E$

$$\text{Έκ τής } E = \frac{1}{2} \beta^2 \epsilon\phi\Gamma \text{ εύρισκο-}$$

μεν ὅτι :

$$\log E = 2\log \beta + \log \epsilon\phi\Gamma - \log 2.$$

$$2\log \beta = 6,74120$$

$$\log \epsilon\phi\Gamma = \bar{1},90511$$

$$\text{ἄθροισμα} = 6,64631$$

$$\log 2 = 0,30103$$

$$\log E = 6,34528$$

$$E = 2214526,32 \text{ τ.μ.}$$

Άσκησεις

102. Έν ὀρθογώνιον τρίγωνον ἔχει  $\beta = 47$  μέτ. καὶ  $B = 47^\circ$ . Νά ἐπιλυθῆ τοῦτο.

103. Έν ὀρθογώνιον τρίγωνον ἔχει  $\beta = 125$  μέτ. καὶ  $\Gamma = 23^\circ 45' 22''$ . Νά ἐπιλυθῆ τοῦτο.

104. Τὸ ὕψος ὀρθογωνίου ἔχει μῆκος 5,60 μέτ. ἡ δὲ διαγώνιος αὐτοῦ σχηματίζει μὲ τὴν βάσιν γωνίαν  $25^\circ 34' 44''$ . Νά εὐρεθῆ τὸ μῆκος τῆς βάσεως, τῆς διαγωνίου καὶ τὸ ἔμβαδὸν αὐτοῦ.

105. Μία χορδὴ κύκλου ἔχει μῆκος 1,65 μέτ., ἡ δὲ γωνία αὐτῆς μὲ τὴν εἰς τὸ ἄκρον τῆς καταλήγουσαν ἀκτίνα εἶναι  $40^\circ 18' 38''$ . Νά εὐρεθῆ τὸ μῆκος τῆς ἀκτίνας τοῦ κύκλου, ἡ ἀπόστασις τοῦ κέντρου ἀπὸ τῆς χορδῆς ταύτης καὶ τὰ μέτρα τῶν εἰς ταύτην ἀντιστοιχῶν τόξων.


106. Τὸ ἀπόστημα ἑνὸς κανονικοῦ ὀκταγώνου εἶναι 0,80 μέτ. Νά εὐρεθῆ τὸ μῆκος τῆς πλευρᾶς του.

107. Έν κεκλιμένον ἐπίπεδον ἔχει ὕψος 1,80 μέτ. καὶ κλίσιν  $20^\circ$ . Νά εὐρεθῆ τὸ μῆκος αὐτοῦ.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'

### ΣΥΝΗΜΙΤΟΝΟΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΦΑΙΠΤΟΜΕΝΗ ΟΞΕΙΑΣ ΓΩΝΙΑΣ

**34. Συνημίτονον ὀξείας γωνίας ἑνὸς ὀρθογωνίου τριγώνου.** Ἐστω  $AB\Gamma$  ἑν ὀρθογώνιον τρίγωνον καὶ  $\Gamma'A'$  κάθετος ἐπὶ τὴν  $AB$  ἀγομένη ἐκ τυχόντος σημείου  $\Gamma'$  τῆς εὐθείας  $B\Gamma$  (σχ. 14).



Σχ. 14

Ἄν ἐργασθῶμεν ὅπως εἰς τὴν § 8, βεβαιούμεθα ὅτι διὰ τὴν σταθερὰν γωνίαν  $B$  εἶναι  $\frac{BA}{B\Gamma} = \frac{BA'}{B\Gamma'}$ , ἥτοι ὁ λόγος  $\frac{BA}{B\Gamma}$  εἶναι σταθερός.

Καὶ ἀντιστρόφως: Εἰς ὠρισμένην τιμὴν τοῦ λόγου  $\frac{BA}{B\Gamma}$  ἀντιστοιχεῖ ὠρισμένη γωνία  $B$ .

Τὸν σταθερὸν τοῦτον λόγον  $\frac{BA}{B\Gamma}$  ὀνομάζομεν **συνημίτονον** τῆς γωνίας  $B$ . Ὡστε :

**Συνημίτονον ὀξείας γωνίας ἑνὸς ὀρθ. τριγώνου λέγεται ὁ λόγος τῆς καθέτου πλευρᾶς, εἰς τὴν ὁποίαν πρόσκειται ἡ γωνία αὕτη, πρὸς τὴν ὑποτείνουσαν.**

Τὸ συνημίτονον μιᾶς γωνίας  $B$  σημειώνομεν οὕτω:  $\text{συν } B$ .

Εἶναι λοιπόν :  $\text{συν } B = \frac{BA}{B\Gamma}$ .

Ἄν δὲ γράψωμεν τὸ τεταρτημόριον  $\Delta E$  μὲ κέντρον  $B$  καὶ ἀκτῖνα τὴν μονάδα μήκους  $BE$ , θὰ εἶναι  $(B\Gamma') = 1$  καὶ

$$\text{συν } B = \frac{BA}{B\Gamma} = \frac{BA'}{B\Gamma'} = (BA').$$

Εἶναι λοιπὸν τὸ  $\text{syn}B$  μῆκος εὐθ. τμήματος, δηλαδὴ μῆκος στοιχείου ὁμοειδοῦς πρὸς τὰς πλευρὰς τοῦ τριγώνου.

Ἐκ τῆς σχ. 14 βλέπομεν εὐκόλως ὅτι: Ἄν ἡ γωνία  $AB\Gamma$  συνεχῶς αὐξανόμενη γίνεται  $AB\Gamma''$ ,  $AB\Gamma'''$  κ.τ.λ., τὸ συνημίτονον ( $BA$ ) γίνεται ἀντιστοίχως ( $BA''$ ), ( $BA'''$ ) κ.τ.λ.  
Εἶναι δὲ  $(BA') > (BA'') > (BA''')$  κ.τ.λ. Ἦτοι:

**Ἄν ἡ ὀξεῖα γωνία βαίνει αὐξανόμενη, τὸ συνημίτονον αὐτῆς βαίνει ἐλαττούμενον.**

Ὅταν δὲ ἡ γωνία πλησιάσῃ πρὸς τὴν ὀρθὴν  $ABE$ , τὸ συνημίτονον αὐτῆς πλησιάζει πρὸς τὸ μηδέν. Κατ' ἀναλογίαν λοιπὸν δεχόμεθα ὅτι:  $\text{syn } 90^\circ = 0$

Ἀντιθέτως: Ἄν ἡ γωνία ἐλαττουμένη γίνῃ  $0$ , τὸ ( $BA'$ ) γίνεται ( $BA$ ), ἤτοι  $1$ . Δεχόμεθα λοιπὸν ὅτι:  $\text{syn } 0^\circ = 1$ .

Τὴν μεταβολὴν ταύτην τοῦ συνημιτόνου γωνίας συνοφίζομεν εἰς τὸν ἀκόλουθον πίνακα.

$$\text{syn } B \begin{cases} 0^\circ & \dots\dots & \nearrow & \dots\dots & 90^\circ \\ 1 & \dots\dots & \searrow & \dots\dots & 0 \end{cases}$$


**35. Συνεφαπτομένη ὀξεῖας γωνίας.** Ἐστω  $AB\Gamma$  ἔν ὀρθογώνιον τρίγωνον (σχ. 15). Ἐκ τυχόντος σημείου  $\Gamma'$  τῆς εὐθείας  $B\Gamma$  φέρομεν τὴν  $\Gamma'A'$  κάθετον ἐπὶ τὴν  $BA$  καὶ ἀποδεικνύομεν, ὅπως εἰς τὴν § 23, ὅτι διὰ σταθερὰν γωνίαν  $B$  εἶναι:

$$\frac{BA'}{A'\Gamma'} = \frac{BA}{A\Gamma}$$

Καὶ ἀντιστρόφως:  
Εἰς ὠρισμένην τιμὴν

τοῦ λόγου  $\frac{BA}{A\Gamma}$  ἀντιστοιχεῖ ὠρισμένη ὀξεῖα γωνία  $B$ .

Τὸν σταθερὸν τοῦτον λόγον  $\frac{BA}{A\Gamma}$  ὀνομάζομεν **συνεφαπτομένην** τῆς ὀξεῖας γωνίας  $B$ . Τὴν συνεφαπτομένην ταύτην σημειοῦμεν οὕτω:  $\text{sf } B$ .



Σχ. 15

Είναι λοιπόν  $\sigma\phi B = \frac{BA}{A\Gamma}$ . Όμοίως  $\sigma\phi \Gamma = \frac{A\Gamma}{BA}$ . Ώστε :

**Συνεφαπτομένη όξείας γωνίας ενός ορθογωνίου τριγώνου λέγεται ο λόγος τής καθέτου πλευράς του τριγώνου, εις τήν οποίαν πρόσκειται ή γωνία αύτη, πρὸς τήν ἀπέναντι αὐτῆς κάθετον πλευράν.**

Τὴν γεωμετρικὴν σημασίαν τῆς  $\sigma\phi B$  μαθαίνομεν ὡς ἑξῆς:

Γράφομεν τεταρτημόριον  $A''E$  με κέντρον τὴν κορυφὴν  $B$  τῆς γωνίας καὶ ἀκτίνα τὴν μονάδα μήκους  $BE$ . Ἐστω δὲ  $\Gamma'$  ἡ τομὴ αὐτοῦ ὑπὸ τῆς εὐθείας  $B\Gamma$  καὶ  $Z$  ἡ τομὴ τῆς  $B\Gamma$  ὑπὸ τῆς εἰς τὸ  $E$  ἐφαπτομένης τοῦ τεταρτημορίου. Φέρομεν ἔπειτα τὰς  $\Gamma'A'$  καὶ  $\Gamma'H$  καθέτους ἀντιστοίχως ἐπὶ τῆς εὐθείας  $BA$  καὶ  $BE$ .

Ἦδη βλέπομεν εὐκόλως ὅτι:  $\sigma\phi B = \frac{BA'}{A'\Gamma'} = \frac{H\Gamma'}{BH} = \frac{EZ}{BE}$ . Ἐπειδὴ δὲ  $BE$  εἶναι ἡ μονὰς μήκους ἐξ ὑποθέσεως, ἔπεται ὅτι  $\frac{EZ}{BE} = (EZ)$  καὶ ἔπομένως :

$$\sigma\phi B = (EZ).$$

Όμοίως εἶναι  $\sigma\phi \widehat{ABZ'} = (EZ')$ ,  $\sigma\phi (\widehat{ABZ''}) = (EZ'')$  κ.τ.λ.

Ώστε, ἂν ἡ γωνία βραίνῃ αὐξανόμενη καὶ πλησιάζῃ νὰ γίνῃ ὀρθή, ἡ συνεφαπτομένη ἐλαττοῦται καὶ πλησιάζει πρὸς τὸ μηδέν. Κατ' ἐπέκτασιν λοιπὸν δεχόμεθα, ὅτι  $\sigma\phi 90^\circ = 0$


Ἀντιθέτως: Ἄν ἡ γωνία ἐλαττουμένη τείνῃ νὰ γίνῃ μηδέν, τομὴ  $Z$  ἀπομακρύνεται εἰς ἄπειρον ἀπόστασιν ἀπὸ τοῦ  $E$ . Τοῦτ' ἐκφράζομεν λέγοντες, ὅτι:  $\sigma\phi 0^\circ = \infty$

Ταῦτα συνοφίζομεν εἰς τὸν ἀκόλουθον πίνακα :

$$\sigma\phi B \begin{cases} 0^\circ & \dots\dots & \nearrow & \dots\dots & 90^\circ \\ \infty & \dots\dots & \searrow & \dots\dots & 0 \end{cases}$$

**36. Σχέσεις μεταξὺ τῶν ἡμιτόνων καὶ συνημιτόνων δύο συμπληρωματικῶν ὀξείων γωνιῶν, ὡς καὶ μεταξὺ ἐφαπτομένων καὶ συνεφαπτομένων αὐτῶν.** α') Ἐστω μία ὀξεία γωνία  $\chi B\Gamma$ , ἔχουσα μέτρον  $\omega$ , καὶ  $\Gamma BZ$  ἡ συμπληρωματικὴ αὐτῆς, ἥτις ἔχει μέτρον  $90^\circ - \omega$  (σχ. 16). Ἐκ τυχόντος σημείου  $\Gamma$  τῆς κοινῆς πλευράς  $B\Gamma$  αὐτῶν φέρομεν τὰς εὐθείας  $\Gamma A$ ,  $\Gamma A'$  καθέτους ἀντιστοίχως ἐπὶ τὰς  $BX$  καὶ  $BZ$ .

$$\begin{aligned} \text{Βλέπομεν οὕτως ὅτι ἡμ } \omega &= \frac{A\Gamma}{B\Gamma}, & \text{συν } \omega &= \frac{BA}{B\Gamma}, \\ \text{συν } (90^\circ - \omega) &= \frac{BA'}{B\Gamma}, & \text{ἡμ } (90^\circ - \omega) &= \frac{A'\Gamma}{B\Gamma}. \end{aligned}$$



Σχ. 16

Ἐπειδὴ δὲ  $A\Gamma = BA'$  καὶ  $BA = A'\Gamma$ , ἔπεται ὅτι :

$$\left. \begin{aligned} \text{συν } (90^\circ - \omega) &= \text{ἡμ } \omega \\ \text{ἡμ } (90^\circ - \omega) &= \text{συν } \omega \end{aligned} \right\} \quad (4)$$

Βλέπομεν λοιπὸν ὅτι :

Ἄν δύο ὀξείαι γωνίαι εἶναι συμπληρωματικαί, τὸ ἡμίτονον ἑκατέρας ἰσοῦται πρὸς τὸ συν-ἡμίτονον τῆς ἄλλης.

β') Ἀπὸ τὸ αὐτὸ σχ. 16 βλέπομεν ὅτι :

$$\begin{aligned} \text{ἔφ } \omega &= \frac{A\Gamma}{BA}, & \text{σφ } \omega &= \frac{BA}{A\Gamma} \\ \text{σφ } (90^\circ - \omega) &= \frac{BA'}{A'\Gamma}, & \text{ἔφ } (90^\circ - \omega) &= \frac{A'\Gamma}{BA'}. \end{aligned}$$

Ἐκ τούτων δὲ συμπεραίνομεν εὐκόλως ὅτι :

$$\left. \begin{aligned} \text{ἔφ } (90^\circ - \omega) &= \text{σφ } \omega \\ \text{σφ } (90^\circ - \omega) &= \text{ἔφ } \omega \end{aligned} \right\} \quad (5)$$

Ἔστω :

Ἄν δύο ὀξείαι γωνίαι εἶναι συμπληρωματικαί, ἡ ἐφαπτομένη ἑκατέρας ἰσοῦται πρὸς τὴν συνεφαπτομένην τῆς ἄλλης.

37. Ἄλλαι σχέσεις μεταξύ τῶν πλευρῶν καὶ τῶν ὀξείων γωνιῶν ὀρθογωνίου τριγώνου  $AB\Gamma$ . Ἐπειδὴ  $B + \Gamma = 90^\circ$ , ἔπεται ὅτι :

$$\text{ἡμ } B = \text{συν } \Gamma, \quad \text{ἡμ } \Gamma = \text{συν } B, \quad \text{ἔφ } B = \text{σφ } \Gamma, \quad \text{ἔφ } \Gamma = \text{σφ } B.$$

Ἔνεκα τούτου αἱ γνωσταὶ (§ 19) σχέσεις :

$$\begin{aligned} \beta &= \alpha \text{ἡμ } B, & \gamma &= \alpha \text{ἡμ } \Gamma \\ \text{γίνονται : } \quad \beta &= \alpha \text{συν } \Gamma, & \gamma &= \alpha \text{συν } B \end{aligned} \quad (6)$$

Ἐξ ὅλων τούτων βλέπομεν ὅτι :

α') Ἐκάστη κάθετος πλευρὰ ὀρθογωνίου τριγώνου εἶναι γινόμενον τῆς ὑποτείνουσας ἐπὶ τὸ ἡμίτονον τῆς ἀπέναντι ὀξείας

γωνίας ἢ ἐπὶ τὸ συνημίτονον τῆς προσκειμένης εἰς ἐκείνην ὀξείας γωνίας.

Ὅμοιως αἱ γνωσταὶ (§ 31) σχέσεις :

$$\begin{aligned} \beta &= \gamma \epsilon \phi B, & \gamma &= \beta \epsilon \phi \Gamma \\ \text{γίνονται :} & \beta &= \gamma \sigma \phi \Gamma, & \gamma &= \beta \sigma \phi B \end{aligned} \quad (7)$$

Ἐξ ὅλων δὲ τούτων βλέπομεν ὅτι :

β') Ἐκάστη κάθετος πλευρὰ ὀρθογωνίου τριγώνου εἶναι γινόμενον τῆς ἄλλης ἐπὶ τὴν ἐφαπτομένην τῆς ἀπέναντι ἢ ἐπὶ τὴν συνεφαπτομένην τῆς προσκειμένης εἰς ἐκείνην ὀξείας γωνίας.

**38. Πρόβλημα I.** Νὰ κατασκευασθῇ ὀξεῖα γωνία ἐκ τοῦ συνημιτόνου ἢ τῆς συνεφαπτομένης αὐτῆς.

Λύσις. α') Ἄν π.χ. συν  $\omega = 0,56$ , ἀρκεῖ νὰ κατασκευάσωμεν ὀρθ. τρίγωνον ΑΒΓ, εἰς τὸ ὁποῖον νὰ εἶναι ἡμ Β = 0,56 (§ 12).

Ἡ ὀξεῖα γωνία Γ αὐτοῦ θὰ εἶναι ἡ ζητουμένη. Διότι ἐκ τῆς σχέσεως Β  $\perp$  Γ = 90° ἐπεταί ὅτι συν Γ = ἡμ Β = 0,56.

β') Ἄν σφ  $\omega = 1,25$ , ἀρκεῖ νὰ κατασκευάσωμεν (§ 26) ὀρθογώνιον τρίγωνον, εἰς τὸ ὁποῖον νὰ εἶναι ἐφ Β = 1,25. Εὐκόλως δὲ βεβαιούμεθα ὅτι ἡ ἄλλη ὀξεῖα Γ εἶναι ἡ ζητουμένη.

#### Ἀσκήσεις

108. Νὰ κατασκευασθῇ ὀξεῖα γωνία  $\chi$ , ἂν συν  $\chi = \frac{2}{3}$ .

109. Νὰ κατασκευασθῇ ὀξεῖα γωνία  $\omega$ , ἂν συν  $\omega = 0,45$ .

110. Νὰ κατασκευασθῇ ὀξεῖα γωνία  $\psi$ , ἂν συν  $\psi = 0,34$ .

111. Νὰ κατασκευασθῇ ὀξεῖα γωνία  $\chi$ , ἂν σφ  $\chi = \frac{2}{5}$ .

112. Νὰ κατασκευασθῇ ὀξεῖα γωνία  $\omega$ , ἂν σφ  $\omega = 0,6$ .

**39. Πρόβλημα II.** Νὰ εὑρεθῇ τὸ συνημίτονον καὶ ἡ συνεφαπτομένη γωνίας 45°, 30°, 60°.

Λύσις. α') Ἄν  $\omega = 45^\circ$ , θὰ εἶναι καὶ  $90^\circ - \omega = 45^\circ$  (σχ. 16). Ἐπομένως ἑκατέρω τῶν γνωστῶν (4) (§ 36) ἰσοτήτων γίνονται :

$$\text{συν } 45^\circ = \text{ἡμ } 45^\circ.$$

Ἐπειδὴ δὲ ἡμ  $45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$  (§ 13), ἐπεταί ὅτι καὶ συν  $45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$

Ἐκ δὲ τῶν γνωστῶν ἰσοτήτων συν  $30^\circ = \eta\mu 60^\circ$ ,  $\eta\mu 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$

ἔπεται ὅτι :  $\text{συν } 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$ .

Τέλος ἐκ τῶν ἰσοτήτων συν  $60^\circ = \eta\mu 30^\circ$ ,  $\eta\mu 30^\circ = \frac{1}{2}$ , ἔπεται ὅτι  $\text{συν } 60^\circ = \frac{1}{2}$ . Κατὰ ταῦτα δυνάμεθα νὰ συμπληρώσωμεν τὸν πίνακα τῆς § 34 οὕτω:

B		$0^\circ$	...	$\nearrow$	...	$30^\circ$	...	$\nearrow$	...	$45^\circ$	...	$\nearrow$	...	$60^\circ$	...	$90^\circ$
συν B		1	...	$\searrow$	...	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	...	$\searrow$	...	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	...	$\searrow$	...	$\frac{1}{2}$	...	0

β') Διὰ  $\omega = 45^\circ$  ἡ γνωστὴ (§ 36,5) ἰσότης ἐφ  $(90^\circ - \omega) = \sigma\phi \omega$  γίνεται  $\sigma\phi 45^\circ = \eta\phi 45^\circ$ . Ἐπειδὴ δὲ  $\eta\phi 45^\circ = 1$  (§ 27), ἔπεται ὅτι καὶ  $\sigma\phi 45^\circ = 1$ .

Ἐπίσης ἐκ τῶν ἰσοτήτων  $\sigma\phi 30^\circ = \eta\phi 60^\circ$  καὶ  $\eta\phi 60^\circ = \sqrt{3}$  (§ 27) εὐρίσκομεν ὅτι :  $\sigma\phi 30^\circ = \sqrt{3}$

Τέλος ἐκ τῶν ἰσοτήτων  $\sigma\phi 60^\circ = \eta\phi 30^\circ$  καὶ  $\eta\phi 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{3}$  (§ 27)

εὐρίσκομεν ὅτι :  $\sigma\phi 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{3}$ . Κατὰ ταῦτα συμπληρώνομεν τὸν πίνακα τῆς § 35 οὕτω :

B		$0^\circ$	...	$\nearrow$	...	$30^\circ$	...	$45^\circ$	...	$\nearrow$	...	$60^\circ$	...	$90^\circ$
σφ B		$\infty$	...	$\searrow$	...	$\sqrt{3}$	...	1	...	$\searrow$	...	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	...	0

#### 40. Περὶ βιβλίου III. Νὰ εὐρεθῇ τὸ συνημίτονον δοθείσης ὀξείας γωνίας.

Λύσις (1ος τρόπος). Ὁ πίναξ I τοῦ βιβλίου τούτου περιέχει καὶ τὰ συνημίτονα τῶν ὀξείων γωνιῶν, τῶν ὁποίων τὰ μέτρα προχωροῦσιν ἀνὰ  $10'$ .

Οἱ ἀριθμοὶ τῶν ἀκεραίων μοιρῶν ἀναγράφονται εἰς τὴν α' στήλην τῆς β' σελίδος καὶ προχωροῦσιν ἐκ τῶν ἄνω πρὸς τὰ κάτω ἀπὸ  $0^\circ$  μέχρι  $45^\circ$ . Συνεχίζονται δὲ εἰς τὴν τελευταίαν στήλην τῆς α' σελίδος ἀπὸ  $45^\circ$  μέχρις  $89^\circ$  ἐκ τῶν κάτω πρὸς τὰ ἄνω.

Τὸ συνημίτονον γωνίας μικροτέρας  $45^\circ$ , π.χ.  $38^\circ 40'$ , εὐρίσκεται εἰς τὴν διασταύρωσιν τῆς γραμμῆς τῶν  $38^\circ$  μετὰ τὴν στήλην, ἣτις φέρει ἄνω τὸν ἀριθμὸν  $40'$ .

Οὕτω βλέπομεν ὅτι  $\text{συν}(38^\circ 40') = 0,78079$ .

Τὸ δὲ συνημίτονον γωνίας μεγαλυτέρας  $45^\circ$ , π.χ.  $51^\circ 20'$ , εὐρίσκειται εἰς τὴν διασταύρωσιν τῆς γραμμῆς τῶν  $51^\circ$  καὶ τῆς στήλης, ἡ ὁποία φέρει κάτω τὸν ἀριθμὸν  $20'$ . Εἶναι λοιπὸν

$$\text{συν}(51^\circ 20') = 0,62479.$$

Τὸ  $\text{συν}(38^\circ 27' 30'')$  εὐρίσκομεν ὡς ἑξῆς :

Παρατηροῦμεν πρῶτον ὅτι :

$$\begin{aligned} 38^\circ 20' < 38^\circ 27' 30'' < 38^\circ 30' \text{ καὶ ἔπομένως:} \\ \text{συν}(38^\circ 20') > \text{συν}(38^\circ 27' 30'') > \text{συν}(38^\circ 30') \text{ ἢ} \\ 0,78442 > \text{συν}(38^\circ 27' 30'') > 0,78261 \end{aligned}$$

Οὕτω βλέπομεν ὅτι εἰς αὐξῆσιν τοῦ μέτρου τῆς γωνίας κατὰ  $10'$  ἀντιστοιχεῖ ἐλάττωσις τοῦ συνημιτόνου κατὰ

$$0,78442 - 0,78261 = 0,00181.$$

Κατ' ἀκολουθίαν πρέπει νὰ ἀναζητήσωμεν τὴν ἐλάττωσιν τοῦ συνημιτόνου, ἡ ὁποία ἀντιστοιχεῖ εἰς αὐξῆσιν τοῦ μέτρου τῆς γωνίας κατὰ  $7' 30''$  ἢ  $\frac{15'}{2}$ . Ἐκ τῆς διατάξεως δέ :

$$10' \quad 0,00181$$

$$\frac{15'}{2} \quad \psi \text{ εὐρίσκομεν } \psi = 0,00181 \cdot \frac{15}{20} = 0,00181 \cdot \frac{3}{4} = 0,00136.$$

$$*\text{Ἄρα } \text{συν}(38^\circ 27' 30'') = 0,78442 - 0,00136 = 0,78306.$$

(2ος τρόπος). Ἄν θέσωμεν π.χ.  $\chi = \text{συν}(38^\circ 27' 30'')$ , θὰ εἶναι  $\log \chi = \log \text{συν}(38^\circ 27' 30'')$ .

Ἄν δὲ εὐρωμεν τὸν  $\log \text{συν}(38^\circ 27' 30'')$ , ἀπὸ τοῦς λογαριθμικοῦς πίνακας τῶν ἀριθμῶν εὐρίσκομεν τὸν  $\chi$ .

Οἱ λογαριθμικοὶ πίνακες, εἰς τοὺς ὁποίους περιέχονται οἱ λογάριθμοι τῶν ἡμιτόνων καὶ ἑφαπτομένων, περιέχουσι καὶ τοὺς λογαριθμοὺς τῶν συνημιτόνων τῶν ὀξειῶν γωνιῶν. Εὐρίσκονται δὲ οἱ λογάριθμοι οὗτοι εἰς τὰς στήλας, αἱ ὁποῖαι φέρουσι τὴν συγκεκριμένην λέξιν **συν** δηλ. συνημίτονον, ἄνω μὲν διὰ τὰς μικροτέρας τῶν  $45^\circ$  γωνίας, κάτω δὲ διὰ τὰς ἄλλας.

Τὰ πρῶτα λεπτὰ εὐρίσκονται εἰς τὰς αὐτὰς στήλας, τὰς ὁποίας ἔγνωρῖσαμεν διὰ τὰ ἡμίτονα καὶ διὰ τὰς ἑφαπτομένας.

Διὰ νὰ εὐρωμεν δὲ τὸν  $\log \text{συν}(38^\circ 27' 30'')$ , ἐργαζόμεθα ὡς ἑξῆς:

Παρατηρούμεν πρώτον ότι :

$$\begin{array}{ccccccc} 38^{\circ} 27' < & 38^{\circ} 27' 30'' < & 38^{\circ} 28', & \text{ὅθεν} \\ \text{συν}(38^{\circ} 27') > & \text{συν}(38^{\circ} 27' 30'') > & \text{συν}(38^{\circ} 28'), & \text{καί} \\ \text{λογσυν}(38^{\circ} 27') > & \text{λογσυν}(38^{\circ} 27' 30'') > & \text{λογσυν}(38^{\circ} 28') & \text{ἢ} \\ \bar{1},89385 > & \bar{1},89375 & & \end{array}$$

Οὕτω βλέπομεν ὅτι εἰς αὐξησιν τοῦ μέτρου τῆς γωνίας κατὰ 60'' ἀντιστοιχεῖ ἐλάττωσις τοῦ λογαρίθμου τοῦ συνημιτόνου κατὰ 10 μον. τελ. δεκ. τάξ. Εἰς δὲ αὐξησιν τοῦ μέτρου κατὰ 30'' θὰ ἀντιστοιχῆ ἐλάττωσις τοῦ λογαρίθμου κατὰ 5 μον. τελ. δεκ. τάξ. Εἶναι λοιπὸν  $\log \chi = \text{λογσυν}(38^{\circ} 27' 30'') = \bar{1},89380$  καὶ ἐπομένως :

$$\chi = \text{συν}(38^{\circ} 27' 30'') = 0,78306.$$

(3ος τρόπος). Εὐκολώτερον λύομεν τὸ ζήτημα τοῦτο μὲ μόνον τοὺς γνωστοὺς μέχρι τοῦδε πίνακας τῶν ἡμιτόνων, ἂν εὐρωμεν τὸ ἡμίτονον τῆς συμπληρωματικῆς τῆς δοθείσης γωνίας. Οὕτω  $\text{συν}(38^{\circ} 40') = \text{ἡμ}(51^{\circ} 20') = 0,78079$ .

Διὰ τὰ εὐρωμεν τὸ  $\text{συν}(38^{\circ} 27' 30'')$  παρατηροῦμεν ὅτι τοῦτο ἰσοῦται πρὸς τὸ  $\text{ἡμ}(51^{\circ} 32' 30'') = 0,78306$ .

### Ἀ σ κ ῆ σ ε ι ς

113. Νὰ εὐρεθῆ τὸ  $\text{συν}(23^{\circ} 17')$  καὶ τὸ  $\text{συν}(49^{\circ} 23')$ .

114. Νὰ εὐρεθῆ τὸ  $\text{συν}(35^{\circ} 15' 45'')$  καὶ τὸ  $\text{συν}(62^{\circ} 12' 54'')$ .

115. Νὰ εὐρεθῆ τὸ  $\text{συν}43^{\circ},6$  καὶ τὸ  $\text{συν}\frac{3\pi}{8}$ .

**41. Πρόβλημα IV. Νὰ εὐρεθῆ τὸ μέτρον ὀξείας γωνίας ἐκ τοῦ συνημιτόνου αὐτῆς.**

*Λύσις.* Ἐστω ὅτι  $\text{συν} \chi = 0,82650$  καὶ θέλομεν νὰ εὐρωμεν τὸ μέτρον τῆς ὀξείας γωνίας  $\chi$ .

*1ος τρόπος ἐκ τοῦ πίνακος I.* Παρατηροῦμεν πρώτον ὅτι  $0,82650 > 0,70711 = \text{συν} 45^{\circ}$  καὶ συμπεραίνομεν ὅτι  $\chi < 45^{\circ}$ .

Ἀναζητοῦμεν λοιπὸν τὸν ἀριθμὸν 0,82650 εἰς τὴν β' σελίδα τοῦ πίνακος καὶ βλέπομεν ὅτι:

$$\begin{array}{ccccccc} 0,82741 > & 0,82650 > & 0,82577 & \text{ἢ} \\ \text{συν}(34^{\circ} 10') > & \text{συν} \chi > & \text{συν}(34^{\circ} 20') & \text{καὶ ἐπομένως} \\ 34^{\circ} 10' < & \chi < & 34^{\circ} 20'. & \end{array}$$

Ούτως εις ἐλάττωσιν τοῦ συνημιτόνου κατὰ  $0,82741 - 0,82577 = 0,00164$  ἀντιστοιχεῖ αὐξησις τοῦ μέτρου τῆς γωνίας κατὰ  $10'$ . Θὰ ἀναζητήσωμεν ἤδη πόση αὐξησις τοῦ μέτρου ἀντιστοιχεῖ εἰς ἐλάττωσιν τοῦ συνημιτόνου κατὰ  $0,82741 - 0,82650 = 0,00091$ . Ἐκ τῆς διατάξεως:

$$\begin{array}{r} 0,00164 \quad 10' \\ 0,00091 \quad \psi \\ \hline \end{array}$$

εὐρίσκομεν  $\psi = 10' \cdot \frac{91}{164} = \frac{910}{164} = 5' 33''$ .

Ἐπομένως:  $\chi = 34^\circ 15' 33''$ .

2ος τρόπος ἐκ τοῦ λογαρίθμου τοῦ συν  $\chi$ . Ἐπειδὴ καθ' ὑπόθεσιν εἶναι  $\text{συν } \chi = 0,82650$ , ἔπεται ὅτι  $\log \text{συν } \chi = \bar{1},91724$ .

Ἀναζητοῦντες τοῦτον εἰς τὰς στήλας τῶν συνημιτόνων τῶν λογαριθμικῶν πινάκων βλέπομεν ὅτι:

$$\begin{array}{r} \bar{1},91729 > \bar{1},91724 > \bar{1},91720 & \eta \\ \text{συν}(34^\circ 15') > \text{συν } \chi > \text{συν}(34^\circ 16') & \text{ὄθεν} \\ 34^\circ 15' < \chi < 34^\circ 16' & \end{array}$$

Ἐπειδὴ δὲ εἰς ἐλάττωσιν τοῦ λογ. κατὰ 9 ἀντιστοιχεῖ αὐξησις τοῦ τόξου κατὰ  $60''$ , καταρτίζομεν τὴν ἀκόλουθον διάταξιν:

$$\begin{array}{r} 9 \quad 60'' \\ 5 \quad \psi \\ \hline \end{array}$$

καὶ εὐρίσκομεν  $\psi = 60'' \cdot \frac{5}{9} = 33''$

Εἶναι λοιπόν:  $\chi = 34^\circ 15' 33''$

3ος τρόπος ἐκ τοῦ μέτρου τῆς συμπληρωματικῆς γωνίας. Ἐπειδὴ  $\text{συν } \chi = \eta\mu(90^\circ - \chi)$ , ἔπεται ὅτι:

$$\eta\mu(90^\circ - \chi) = 0,82650$$

Καθ' ἓνα δὲ τῶν γνωστῶν (§ 18) τρόπων εὐρίσκομεν ὅτι  $90^\circ - \chi = 55^\circ 44' 27''$ . Ἐκ ταύτης δὲ ἔπεται ὅτι:

$$\chi = (89^\circ 59' 60'') - (55^\circ 44' 27'') = 34^\circ 15' 33''$$

### Ἀ σ κ ῆ σ ε ι ς

116. Ἐὰν  $\text{συν } \chi = 0,795$ , νὰ εὐρεθῇ τὸ μέτρον τῆς ὀξείας γωνίας  $\chi$ .

117. Ἐὰν  $\text{συν } \omega = 0,4675$ , νὰ εὐρεθῇ τὸ μέτρον τῆς ὀξείας γωνίας  $\omega$ .

118. Ἐάν  $\sin \psi = \frac{5}{7}$ , νὰ εὐρεθῆ τὸ μέτρον τῆς ὀξείας γωνίας  $\psi$ .

119. Ἐάν  $\eta \mu \chi = 0,41469$  καὶ  $\sin \psi = 0,41469$ , νὰ εὐρεθῆ τὸ ἄθροισμα  $\chi + \psi$

120. Ἐάν  $\eta \mu \chi = 0,92276$  καὶ  $\sin \psi = 0,67321$ , νὰ ἀποδειχθῆ ἄνευ πινάκων ὅτι  $\chi + \psi > 90^\circ$ .

**42. Πρόβλημα V. Νὰ εὐρεθῆ ἡ συνεφαπτομένη μιᾶς ὀξείας γωνίας ἐκ τοῦ μέτρου αὐτῆς.**

Ἐστω π.χ. ὅτι θέλομεν νὰ εὐρωμεν τὸν  $\sigma\phi(38^\circ 45' 28'')$ .

*Λύσις.* *1ος τρόπος ἐκ τοῦ πίνακος III.* Ὁ πίναξ οὗτος περιέχει καὶ τὰς συνεφαπτομένας τῶν ὀξείων γωνιῶν μὲ διάταξιν καὶ χρῆσιν ὁμοίαν πρὸς τὴν τοῦ πίνακος I διὰ τὰ συνημίτονα.

Οὕτως, ἐπειδὴ  $38^\circ 40' < 38^\circ 45' 28'' < 38^\circ 50'$   
ἔπεται ὅτι:  $\sigma\phi(38^\circ 40') > \sigma\phi(38^\circ 45' 28'') > \sigma\phi(38^\circ 50')$   
ἢ  $1,24969 > \sigma\phi(38^\circ 45' 28'') > 1,24227$ .

Οὕτω βλέπομεν ὅτι εἰς αὐξήσιν τοῦ μέτρου τῆς γωνίας κατὰ  $10'$  ἀντιστοιχεῖ ἐλάττωσις τῆς συνεφαπτομένης αὐτῆς κατὰ  $1,24969 - 1,24227 = 0,00742$ . Καταρτίζομεν λοιπὸν τὴν ἀκόλουθον διάταξιν:

$$\begin{array}{r} 10' \\ 5 \frac{28'}{60} \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 0,00742 \\ \psi \end{array}$$

καὶ εὐρίσκομεν  $\psi = 0,00742 \cdot \frac{328}{600} = 0,00405$

Ἐπομένως  $\sigma\phi(38^\circ 45' 28'') = 1,24969 - 0,00405 = 1,24564$ .

*2ος τρόπος ἐκ τοῦ λογαρίθμου τῆς συνεφαπτομένης.* Ἐάν θέσωμεν  $\chi = \sigma\phi(38^\circ 45' 28'')$ , θὰ εἶναι  $\log \chi = \log \sigma\phi(38^\circ 45' 28'')$ .

Τοῦτον δὲ τὸν λογαρίθμον εὐρίσκομεν ἀπὸ τοὺς πίνακας, τοὺς ὁποίους ἐχρησιμοποίησαμεν ἕως τώρα διὰ τοὺς λογαρίθμους τῶν ἡμιτόνων, ἐφαπτομένων καὶ συνημιτόνων. Ἐργαζόμεθα δὲ ἀκριβῶς ἔπως καὶ διὰ τὰ συνημίτονα, ἀλλὰ μὲ τὰς στήλας, αἱ ὁποῖαι ἔχουσιν ἄνω ἢ κάτω τὴν συγκεκριμένην λέξιν  $\Sigma\phi$ , δηλαδὴ (συνεφαπτόμεναι).

Οὕτως εὐρίσκομεν κατὰ σειρὰν τὰς ἀνισότητας:

$$\begin{array}{r} 38^\circ 45' < 38^\circ 45' 28'' < 38^\circ 46' \\ \sigma\phi(38^\circ 45') > \sigma\phi(38^\circ 45' 28'') > \sigma\phi(38^\circ 46') \\ \log \sigma\phi(38^\circ 45') > \log \sigma\phi(38^\circ 45' 28'') > \log \sigma\phi(38^\circ 46') \end{array}$$

ή  $0,09551 > \log \sigma\phi (38^\circ 45' 28'') > 0,09525$

Ἐκ δὲ τοῦ πινακιδίου  $26 = (0,09551 - 0,09525)$  εὐρίσκομεν ὅτι εἰς αὐξήσιν τοῦ μέτρου τῆς γωνίας κατὰ  $28''$  ἀντιστοιχεῖ ἐλάττωσις τοῦ λογαρίθμου κατὰ  $8,7 + 3,47 = 12,17$  ἢ  $12$  κατὰ προσέγγισιν. Εἶναι λοιπὸν  $\log \chi = 0,09551 - 0,00012 = 0,09539$ . Ἐπομένως :

$$\chi = \sigma\phi(38^\circ 45' 28'') = 1,24563.$$

*3ος τρόπος ἐκ τῆς ἐφαπτομένης τῆς συμπληρωματικῆς γωνίας.*  
Οὕτως, ἐπειδὴ  $\sigma\phi(38^\circ 45' 28'') = \epsilon\phi(51^\circ 14' 32'')$  θὰ εἶναι  
 $\log \sigma\phi(38^\circ 45' 28'') = \log \epsilon\phi(51^\circ 14' 32'')$  κ.τ.λ.

### Ἀ σ κ ή σ ε ι ς

121. Νὰ εὐρεθῇ ἡ  $\sigma\phi(15^\circ 35')$  καὶ ἡ  $\sigma\phi(62^\circ 46')$ .

122. Νὰ εὐρεθῇ ἡ  $\sigma\phi(27^\circ 32' 50'')$  καὶ ἡ  $\sigma\phi(70^\circ 12' 24'')$ .

123. Νὰ εὐρεθῇ ἡ  $\sigma\phi 30^\circ,5$  καὶ ἡ  $\sigma\phi \frac{2\pi}{5}$ .

**43. Πρόβλημα VI. Νὰ εὐρεθῇ τὸ μέτρον μιᾶς ὀξείας γωνίας ἐκ τῆς συνεφαπτομένης αὐτῆς.** Τὸ πρόβλημα τοῦτο δυνάμεθα νὰ λύσωμεν μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ πίνακος III τοῦ βιβλίου τούτου ἢ τῶν λογαριθμικῶν τριγωνομετρικῶν πινάκων. Ἐργαζόμεθα δὲ ἀκριβῶς ὅπως καὶ διὰ τὴν λύσιν τοῦ προβλήματος IV (§ 41) μεταχειριζόμενοι τὰς στήλας τῶν συνεφαπτομένων ἀντὶ τῶν συνημιτόνων.

Οὕτως, ἂν  $\sigma\phi \chi = 1,47860$ , θὰ εἶναι  $\log \sigma\phi \chi = 0,16985$  καὶ  $\chi = 34^\circ 4' 15''$ . Δυνάμεθα ἐπίσης νὰ εὐρωμεν πρῶτον τὸ μέτρον τῆς συμπληρωματικῆς γωνίας ἀπὸ τοὺς πίνακας τῶν ἐφαπτομένων. Διότι  $\epsilon\phi(90^\circ - \chi) = \sigma\phi \chi = 1,47860$  καὶ  $\log \epsilon\phi(90^\circ - \chi) = 0,16985$ .  $90^\circ - \chi = 55^\circ 55' 45''$ . Ἐπομένως  $\chi = 34^\circ 4' 15''$ .

### Ἀ σ κ ή σ ε ι ς

124. Ἄν  $\sigma\phi \chi = 2,340$ , νὰ εὐρεθῇ τὸ μέτρον τῆς ὀξείας γωνίας  $\chi$ .

125. Ἄν  $\sigma\phi \omega = 0,892$ , νὰ εὐρεθῇ τὸ μέτρον τῆς ὀξείας γωνίας  $\omega$ .

126. Ἄν  $\sigma\phi \psi = \frac{15}{9}$ , νὰ εὐρεθῇ τὸ μέτρον τῆς ὀξείας γωνίας  $\psi$ .

127. Ἄν  $\sigma\phi \chi = 1,34$  καὶ  $\epsilon\phi \psi = 0,658$ , νὰ ἀποδειχθῇ ἄνευ πινάκων ὅτι  $\chi + \psi < 90^\circ$ .


## Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Ε'

### 1. ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΟΞΕΙΑΣ ΓΩΝΙΑΣ

44. Τριγωνομετρικοί αριθμοί όξείας γωνίας. Το ήμιτονον, συνημίτονον, εφαπτομένη και συνεφαπτομένη εκάστης όξείας γωνίας λέγονται **τριγωνομετρικοί αριθμοί** τής γωνίας ταύτης.

45. Σχέσεις τών τριγωνομετρικών αριθμών τής αὐτῆς όξείας γωνίας.

α') Ἐστω  $AB\Gamma$  ἔν ὀρθογώνιον τρίγωνον καὶ  $\omega$  τὸ μέτρον τῆς όξείας γωνίας  $B$  αὐτοῦ (σχ. 17). Κατὰ τὸ Πυθαγόρειον θεώρημα εἶναι :



Σχ. 17

$$(A\Gamma)^2 + (BA)^2 = (B\Gamma)^2.$$

Ἐὰν δὲ διαιρέσωμεν τὰ μέλη αὐτῆς διὰ  $(B\Gamma)$  εὐρίσκομεν ὅτι :

$$\left(\frac{A\Gamma}{B\Gamma}\right)^2 + \left(\frac{BA}{B\Gamma}\right)^2 = 1$$

Ἐπειδὴ δὲ  $\frac{A\Gamma}{B\Gamma} = \eta\mu \omega$  καὶ  $\frac{BA}{B\Gamma} = \sigma\upsilon\nu\omega$ , ἡ προηγουμένη ἰσότης γίνεται :

$$(\eta\mu \omega)^2 + (\sigma\upsilon\nu\omega)^2 = 1.$$

Ταύτην γράφομεν συνήθως οὕτω :

$$\eta\mu^2\omega + \sigma\upsilon\nu^2\omega = 1 \quad (8)$$

Βλέπομεν λοιπὸν ὅτι :

Τὸ ἄθροισμα τῶν τετραγώνων τοῦ ἡμιτόνου καὶ τοῦ συνημιτόνου τῆς αὐτῆς γωνίας ἰσοῦται πρὸς τὴν ἀκεραίαν μονάδα.

β') Ἄς λάβωμεν τὴν ὑποτείνουσαν  $B\Gamma$  ὡς μονάδα μήκους καὶ μὲ κέντρον  $B$  καὶ ἀκτίνα  $B\Gamma$  ὡς γράψωμεν τὸ τεταρτημόριον  $\Delta E$ . Ἐμάθομεν ὅτι :

ἤμω = (ΑΓ), συνω = (ΒΑ), ἔφω = (ΔΤ) καὶ σφω = (ΕΣ). Ἐκ δὲ τῶν ὁμοίων τριγώνων ΑΒΓ καὶ ΔΒΤ εὐρίσκομεν ὅτι :

$$\frac{(\Delta\Gamma)}{(\text{ΑΓ})} = \frac{(\text{ΒΔ})}{(\text{ΒΑ})} \quad \eta \quad \frac{\acute{\epsilon}\phi\omega}{\acute{\eta}\mu\omega} = \frac{1}{\sigma\upsilon\nu\omega}$$

Ἐκ ταύτης δὲ εὐρίσκομεν ὅτι :

$$\acute{\epsilon}\phi\omega = \frac{\acute{\eta}\mu\omega}{\sigma\upsilon\nu\omega} \quad (9)$$

Οὕτω βλέπομεν ὅτι :

**Ἡ ἐφαπτομένη μιᾶς ὀξείας γωνίας εἶναι πηλίκον τοῦ ἡμιτόνου διὰ τοῦ συνημιτόνου αὐτῆς.**

γ') Ἐκ τῶν ὁμοίων τριγώνων ΒΕΣ καὶ ΒΗΓ εὐρίσκομεν ὅτι :

$$\frac{\text{ΕΣ}}{\text{ΗΓ}} = \frac{\text{ΒΕ}}{\text{ΒΗ}} \quad \eta \quad \frac{\sigma\phi\omega}{\sigma\upsilon\nu\omega} = \frac{1}{\acute{\eta}\mu\omega}$$

ὅθεν :

$$\sigma\phi\omega = \frac{\sigma\upsilon\nu\omega}{\acute{\eta}\mu\omega} \quad (10)$$

Ἔστω :

**Ἡ συνεφαπτομένη μιᾶς ὀξείας γωνίας εἶναι πηλίκον τοῦ συνημιτόνου διὰ τοῦ ἡμιτόνου αὐτῆς.**

Πλὴν τῶν σχέσεων (8), (9), (10), οὐδεμία ἄλλη σχέσηις μὴ ἀπορρέουσα ἀπὸ αὐτὰς ὑπάρχει μεταξὺ τῶν 4 τριγωνομετρικῶν ἀριθμῶν μιᾶς ὀξείας γωνίας. Διότι, ἂν ὑπῆρχε μία ἀκόμη, αὕτη μὲ τὰς ἀνωτέρω τρεῖς θὰ ἀπετέλουσαν σύστημα 4 ἐξισώσεων μὲ ἀγνώστους τοὺς 4 τριγωνομετρικοὺς ἀριθμοὺς τῆς ω. Λύοντες δὲ τοῦτο θὰ εὐρίσκομεν ὠρισμένην ἢ ὠρισμένας τιμὰς ἐκάστου τριγωνομετρικοῦ ἀριθμοῦ δι' οἵανδήποτε τιμὴν τῆς γωνίας ω. Τοῦτο ὅμως εἶναι ἀτοπον, διότι ἐμάθομεν ὅτι οἱ τριγωνομετρικοὶ ἀριθμοὶ ὀξείας γωνίας ω μεταβάλλονται, ἂν ἢ ω μεταβληθῇ.

Ἀπορρέουσιν ὅμως ἀπὸ αὐτὰς διάφοροι ἄλλαι σχέσεις. Ἐν π.χ. πολλαπλασιάσωμεν κατὰ μέλη τὰς ἰσότητας (9) καὶ (10), εὐρίσκομεν τὴν ἰσότητα :

$$\acute{\epsilon}\phi\omega \cdot \sigma\phi\omega = 1 \quad (11)$$

Αἱ ἰσότητες (8) — (11) ἀληθεύουσι διὰ πᾶσαν ὀξείαν γωνίαν. Βραδύτερον θὰ μάθωμεν ὅτι αὗται ἀληθεύουσι διὰ πᾶν εἶδος γωνίας. Διὰ τοῦτο αὗται λέγονται **τριγωνομετρικαὶ ταυτότητες**. Εἰς τὰ ἐπόμενα θὰ γνωρίσωμεν καὶ ἄλλας τριγωνομετρικὰς ταυτότητας.

## Ἄσκησεις

Νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι διὰ πᾶσαν ὀξείαν γωνίαν  $\omega$  ἀληθεύουσιν αἱ ἀκόλουθοι ἰσότητες :

$$128. \eta\mu^2\omega = 1 - \sigma\upsilon\nu^2\omega \text{ καὶ } \sigma\upsilon\nu^2\omega = 1 - \eta\mu^2\omega.$$

$$129. 1 + \acute{\epsilon}\phi\omega = \frac{1}{\sigma\upsilon\nu^2\omega}.$$

$$130. 1 + \sigma\phi^2\omega = \frac{1}{\eta\mu^2\omega}.$$

$$131. \sigma\phi^2\omega - \sigma\upsilon\nu^2\omega = \sigma\phi^2\omega \cdot \sigma\upsilon\nu^2\omega.$$

$$132. \acute{\epsilon}\phi\omega + \sigma\phi\omega = \frac{1}{\eta\mu\omega \cdot \sigma\upsilon\nu\omega}.$$

Νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι διὰ δύο τυχούσας ὀξείας γωνίας  $\alpha$  καὶ  $\beta$  ἀληθεύουσιν αἱ ἀκόλουθοι ἰσότητες :

$$133. \acute{\epsilon}\phi\alpha \cdot \acute{\epsilon}\phi\beta (\sigma\phi\alpha + \sigma\phi\beta) = \acute{\epsilon}\phi\alpha + \acute{\epsilon}\phi\beta.$$

$$134. \sigma\phi\alpha + \sigma\phi\beta = \frac{\acute{\epsilon}\phi\alpha + \acute{\epsilon}\phi\beta}{\acute{\epsilon}\phi\alpha \cdot \acute{\epsilon}\phi\beta}$$

$$135. \frac{\sigma\phi\alpha + \sigma\phi\beta}{\acute{\epsilon}\phi\alpha + \acute{\epsilon}\phi\beta} = \frac{1}{\acute{\epsilon}\phi\alpha \cdot \acute{\epsilon}\phi\beta}.$$

## ΕΦΑΡΜΟΓΑΙ

**46. Πρόβλημα 1.** Νὰ εὑρεθῶσιν οἱ ἄλλοι τριγωνομετρικοί ἀριθμοὶ μιᾶς ὀξείας γωνίας  $\omega$ , ἂν εἶναι γνωστὸν τὸ  $\eta\mu\omega$ .

*Δύσεις. α')* Εὔρεσις τοῦ  $\sigma\upsilon\nu\omega$ . Ἐκ τῆς ἰσότητος (8) (§ 45) εὑρίσκομεν ὅτι  $\sigma\upsilon\nu^2\omega = 1 - \eta\mu^2\omega$  καὶ ἐκ ταύτης ἔπεται ὅτι :

$$\sigma\upsilon\nu\omega = \sqrt{1 - \eta\mu^2\omega} \quad (12)$$

Ἄν π.χ. εἶναι  $\eta\mu\omega = \frac{4}{5}$ , ἐκ τῆς (12) εὑρίσκομεν ὅτι :

$$\sigma\upsilon\nu\omega = \sqrt{1 - \frac{16}{25}} = \frac{3}{5}.$$

*β')* Εὔρεσις τῆς  $\acute{\epsilon}\phi\omega$ . Ἐκ τῶν ἰσοτήτων (9) (§ 45) καὶ (12) εὑρίσκομεν ὅτι :

$$\acute{\epsilon}\phi\omega = \frac{\eta\mu\omega}{\sqrt{1 - \eta\mu^2\omega}} \quad (13)$$

Οὕτω διὰ  $\eta\mu\omega = \frac{\sqrt{3}}{2}$ , ἡ (13) γίνεται :

$$\acute{\epsilon}\phi\omega = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\sqrt{1 - \frac{3}{4}}} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{4-3}} = \sqrt{3}.$$

γ') *Εύρεσις τῆς σφω.* Ἐκ τῶν ἰσοτήτων (10) (§ 45) καὶ (12) εὐρίσκομεν ὅτι :

$$\sigma\phi\omega = \frac{\sqrt{1 - \eta\mu^2\omega}}{\eta\mu\omega} \quad (14)$$

Οὕτω διὰ  $\eta\mu\omega = \frac{1}{2}$  ἢ (14) γίνεται  $\sigma\phi\omega = \frac{\sqrt{1 - \frac{1}{4}}}{\frac{1}{2}} = \sqrt{3}$

Σημ. Αἱ τετρ. ρίζαι τῶν προηγουμένων τύπων ἐλήφθησαν θετικάι, διότι ὅλοι οἱ τριγωνομετρικοὶ ἀριθμοὶ ἐκάστης ὀξείας γωνίας εἶναι θετικοὶ ὀριθμοί.

**47. Πρόβλημα II.** *Νὰ εὐρεθῶσιν οἱ ἄλλοι τριγωνομετρικοὶ ἀριθμοὶ μιᾶς ὀξείας γωνίας  $\omega$ , ἂν γνωρίζομεν τὸ συνω.*

*Λύσις.* Ἄν ἐργασθῶμεν ὡς προηγουμένως, εὐρίσκομεν τοὺς τύπους :

$$\left. \begin{aligned} \eta\mu\omega &= \sqrt{1 - \sigma\upsilon\nu^2\omega} \\ \acute{\epsilon}\phi\omega &= \frac{\sqrt{1 - \sigma\upsilon\nu^2\omega}}{\sigma\upsilon\nu\omega} \\ \sigma\phi\omega &= \frac{\sigma\upsilon\nu\omega}{\sqrt{1 - \sigma\upsilon\nu^2\omega}} \end{aligned} \right\} \quad (15)$$

Οὕτως, ἂν  $\sigma\upsilon\nu\omega = \frac{3}{5}$ , εὐρίσκομεν :

$$\eta\mu\omega = \sqrt{1 - \frac{9}{25}} = \frac{4}{5}, \quad \acute{\epsilon}\phi\omega = \frac{\sqrt{1 - \frac{9}{25}}}{\frac{3}{5}} = \frac{4}{3}, \quad \sigma\phi\omega = \frac{\frac{3}{5}}{\sqrt{1 - \frac{9}{25}}} = \frac{3}{4}.$$

**48. Πρόβλημα III.** *Νὰ εὐρεθῶσιν οἱ ἄλλοι τριγωνομετρικοὶ ἀριθμοὶ μιᾶς ὀξείας γωνίας  $\omega$ , ἂν γνωρίζωμεν τὴν ἔφω.*

*Λύσις α')* *Εύρεσις τοῦ ἡμω καὶ τοῦ συνω.* Παρατηροῦμεν ὅτι οἱ δύο οὗτοι τριγωνομετρικοὶ ἀριθμοὶ εἶναι οἱ μόνοι ἄγνωστοὶ εἰς τὰς ἰσότητας :

$$\eta\mu^2\omega + \sigma\upsilon\nu^2\omega = 1, \quad \acute{\epsilon}\phi\omega = \frac{\eta\mu\omega}{\sigma\upsilon\nu\omega}.$$

Πρέπει λοιπὸν νὰ λύσωμεν τὸ σύστημα αὐτῶν. Πρὸς τοῦτο ἐκ τῆς β' εὐρίσκομεν  $\eta\mu\omega = \sigma\upsilon\nu\omega \cdot \acute{\epsilon}\phi\omega$  (1)

Ἔνεκα δὲ ταύτης ἢ α' γίνεται :

$$\text{συν}^2\omega \cdot \acute{\epsilon}\varphi^2\omega + \text{συν}^2\omega = 1 \quad \eta \quad (1 + \acute{\epsilon}\varphi^2\omega) \cdot \text{συν}^2\omega = 1.$$

Ἐκ ταύτης δὲ εὐρίσκομεν κατὰ σειράν :

καὶ

$$\text{συν}^2\omega = \frac{1}{1 + \acute{\epsilon}\varphi^2\omega} \quad (16)$$

$$\text{καὶ} \quad \text{συν}\omega = \frac{1}{\sqrt{1 + \acute{\epsilon}\varphi^2\omega}}, \quad (17)$$

Ἐκ ταύτης δὲ καὶ τῆς ἀνωτέρω (1) εὐρίσκομεν ὅτι :

$$\acute{\eta}\mu\omega = \frac{\acute{\epsilon}\varphi\omega}{\sqrt{1 + \acute{\epsilon}\varphi^2\omega}} \quad (18)$$

Οὕτως, ἂν  $\acute{\epsilon}\varphi\omega = \sqrt{3}$ , εὐρίσκομεν ὅτι :

$$\text{συν}\omega = \frac{1}{\sqrt{1+3}} = \frac{1}{2} \quad \text{καὶ} \quad \acute{\eta}\mu\omega = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{1+3}} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Ἀπὸ τὴν ἰσότητα (18) προκύπτει εὐκόλως καὶ ἡ ἰσότης :

$$\acute{\eta}\mu^2\omega = \frac{\acute{\epsilon}\varphi^2\omega}{1 + \acute{\epsilon}\varphi^2\omega} \quad (19)$$

τῆς ὁποίας πολλάκις κάμνομεν χρῆσιν.

β') *Εὐρέσεις τῆς σφω*. Ἐκ τῆς (11) εὐρίσκομεν ἀμέσως ὅτι :

$$\sigma\varphi\omega = \frac{1}{\acute{\epsilon}\varphi\omega}.$$

$$\text{Οὕτως, ἂν } \acute{\epsilon}\varphi\omega = \sqrt{3}, \text{ θὰ εἶναι } \sigma\varphi\omega = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}.$$

**49. Πρόβλημα IV. Νὰ εὐρεθῶσιν οἱ ἄλλοι τριγωνομετρικοὶ ἀριθμοὶ μιᾶς ὀξείας γωνίας  $\omega$ , ἂν γνωρίζωμεν τὴν σφω.**

*Λύσις. α')* *Εὐρέσεις τοῦ συνω καὶ τοῦ ἥμω*. Δυνάμεθα νὰ ἐργασθῶμεν ὡς προηγουμένως λύοντες τὸ σύστημα :

$$\acute{\eta}\mu^2\omega + \text{συν}^2\omega = 1, \quad \sigma\varphi\omega = \frac{\text{συν}\omega}{\acute{\eta}\mu\omega}.$$

Ἀφήνομεν διὰ τοὺς μαθητὰς τὴν ἀποπεράτωσιν τῆς ἐργασίας ταύτης καὶ ὑποδεικνύομεν τὴν ἐξῆς ἀκόμη μέθοδον.

Ἐκ τῆς (11) εὐρίσκομεν ὅτι  $\acute{\epsilon}\varphi\omega = \frac{1}{\sigma\varphi\omega}$ . Ἔνεκα ταύτης εὐρίσκομεν ὅτι ἡ (16) γίνεται :

$$\text{συν}^2\omega = \frac{1}{1 + \frac{1}{\sigma\varphi^2\omega}} = \frac{\sigma\varphi^2\omega}{1 + \sigma\varphi^2\omega},$$

$$\text{ὁθεν} \quad \text{συν}\omega = \frac{\sigma\varphi\omega}{\sqrt{1 + \sigma\varphi^2\omega}} \quad (20)$$

Όμοίως ή (19) γίνεται :  $\eta\mu^2\omega = \frac{1}{1 + \frac{1}{\sigma\phi^2\omega}} = \frac{1}{1 + \sigma\phi^2\omega}$

καί έπομένως :  $\eta\mu\omega = \frac{1}{\sqrt{1 + \sigma\phi^2\omega}}$ , (21)

Ούτως, αν  $\sigma\phi\omega = \sqrt{3}$ , εύρισκομεν ότι :

$$\eta\mu\omega = \frac{1}{\sqrt{1+3}} = \frac{1}{2} \quad \text{καί} \quad \sigma\upsilon\nu\omega = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{1+3}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

β') *Ευρέσεις τής έφω.* Ταύτην εύρισκομεν άμέσως έκ τής γνωστής Ισότητος  $\acute{\epsilon}\phi\omega = \frac{1}{\sigma\phi\omega}$ . Ούτως, αν  $\sigma\phi\omega = \sqrt{3}$ , θά είναι  $\acute{\epsilon}\phi\omega = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$ .

### Άσκήσεις

136. Νά εύρεθώσιν οί άλλοι τριγωνομετρικοί άριθμοί μιās όξειας γωνίας  $\omega$ , αν  $\eta\mu\omega = \frac{2}{5}$ .

137. Νά εύρεθώσιν οί άλλοι τριγωνομετρικοί άριθμοί μιās όξειας γωνίας  $\omega$ , αν  $\eta\mu\omega = \frac{1}{2}$ .

138. Νά εύρεθώσιν οί άλλοι τριγωνομετρικοί άριθμοί μιās όξειας γωνίας  $\omega$ , αν  $\sigma\upsilon\nu\omega = 0,5$ .

139. Νά εύρεθώσιν οί άλλοι τριγωνομετρικοί άριθμοί μιās όξειας γωνίας  $\omega$ , αν  $\sigma\upsilon\nu\omega = \frac{2}{3}$ .

140. Νά εύρεθώσιν οί άλλοι τριγωνομετρικοί άριθμοί μιās όξειας γωνίας  $\omega$ , αν  $\acute{\epsilon}\phi\omega = 1$ .

141. Τό αυτό ζήτημα, αν  $\acute{\epsilon}\phi\omega = \sqrt{3}$ .

142. Νά εύρεθώσιν οί άλλοι τριγωνομετρικοί άριθμοί μιās όξειας γωνίας  $\omega$ , αν  $\sigma\phi\omega = 1$ .

143. Τό αυτό ζήτημα, αν  $\sigma\phi\omega = \frac{\sqrt{3}}{3}$ .

144. Νά άποδειχθῆ ότι διά πᾶσαν όξειαν γωνίαν  $\omega$  άληθεύει ή Ισότης :

$$\sigma\upsilon\nu^2\omega - \eta\mu^2\omega = \frac{1 - \acute{\epsilon}\phi^2\omega}{1 + \acute{\epsilon}\phi^2\omega}$$


145. Νά άποδειχθῆ ότι διά δύο τυχούσας όξειας γωνίας  $\alpha$  και  $\beta$  άληθεύει ή Ισότης

$$\frac{\sigma\upsilon\nu^2\alpha - \eta\mu^2\beta}{\eta\mu^2\alpha \cdot \eta\mu^2\beta} = \frac{1 - \acute{\epsilon}\phi^2\alpha \cdot \acute{\epsilon}\phi^2\beta}{\acute{\epsilon}\phi^2\alpha \cdot \acute{\epsilon}\phi^2\beta}$$

## 2. ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΟΥ ΔΙΠΛΑΣΙΟΥ ΟΞΕΙΑΣ ΓΩΝΙΑΣ

50. *Πρόβλημα I.* Νά εύρεθῆ τὸ  $\eta\mu 2\alpha$ , ἂν γνωρίζωμεν τὸ  $\eta\mu\alpha$  καὶ τὸ  $\sigma\upsilon\alpha$ , ὅταν  $2\alpha < 90^\circ$ .

*Λύσις.* Ἐστω  $\text{XOY}$  τυχοῦσα ὀξεῖα γωνία,  $2\alpha$  τὸ μέτρον καὶ  $\text{OB}$  ἡ διχοτόμος αὐτῆς. Ὅριζομεν ἐπὶ τῶν πλευρῶν αὐτῆς τμήματα  $\text{OA}$ ,  $\text{OM}$  ἴσα πρὸς τὴν μονάδα μήκους καὶ φέρομεν τὴν  $\text{AM}$  (σχ. 18). Αὕτη τέμνεται ὑπὸ τῆς διχοτόμου εἰς τὸ μέσον  $\text{B}$  καὶ καθέτως.



Σχ. 18

Εἶναι δηλαδὴ  $(\text{AB}) = (\text{BM})$  καὶ

$(\widehat{\text{ABO}}) = (\widehat{\text{OBM}}) = 90^\circ$ . Ἐὰν δὲ φέρωμεν καὶ τὰς  $\text{MP}$ ,  $\text{BG}$  καθέτους ἐπὶ τὴν  $\text{OA}$ , θὰ εἶναι :

$$(\text{PM}) = 2 (\text{GB}) \quad (1)$$

Ἐκ δὲ τοῦ ὀρθογωνίου τριγώνου  $\text{OPTM}$  προκύπτει ὅτι :

$$(\text{PM}) = (\text{OM}) \eta\mu 2\alpha = \eta\mu 2\alpha \quad (2)$$

Ἀπὸ δὲ τὰ ὀρθογώνια τρίγωνα  $\text{OBG}$  καὶ  $\text{OMB}$  εὐρίσκομεν ὅτι  $(\text{GB}) = (\text{OB}) \eta\mu\alpha$ ,  $(\text{OB}) = (\text{OM}) \sigma\upsilon\alpha = \sigma\upsilon\alpha$  καὶ ἐπομένως  $(\text{GB}) = \eta\mu\alpha \cdot \sigma\upsilon\alpha$ .

Ἐκ ταύτης καὶ τῶν (1) καὶ (2) προκύπτει ἡ ἰσότης :

$$\eta\mu 2\alpha = 2\eta\mu\alpha\sigma\upsilon\alpha \quad (22)$$

Ἐὰν δὲ θέσωμεν  $2\alpha = \omega$ , θὰ εἶναι  $\alpha = \frac{\omega}{2}$  καὶ ἡ ἰσότης (22) γίνεταί :

$$\eta\mu\omega = 2\eta\mu\frac{\omega}{2}\sigma\upsilon\upsilon\frac{\omega}{2} \quad (23)$$

51. *Πρόβλημα II.* Νά εύρεθῆ τὸ  $\sigma\upsilon\upsilon 2\alpha$ , ἂν εἶναι γνωστὸν

τὸ ἥμα καὶ τὸ συνα ἢ ὁ εἷς μόνον ἀπὸ τοὺς τριγωνομετρικοὺς τούτους ἀριθμοὺς, ὅταν  $2\alpha < 90^\circ$ .

*Λύσις.* Ἀπὸ τὸ ὀρθογώνιον τρίγωνον ΟΠΜ βλέπομεν ὅτι :

$$(ΟΠ) = (ΟΜ)\sigma\upsilon\nu 2\alpha = \sigma\upsilon\nu 2\alpha. \quad (1)$$

Ἐφ' ἐτέρου δὲ εἶναι  $(ΟΠ) = (ΟΓ) - (ΠΓ)$  (2)

Ἐπειδὴ δὲ  $(ΠΓ) = (ΓΑ) = (ΟΑ) - (ΟΓ) = 1 - (ΟΓ)$ ,

ἡ σχέσις (2) γίνεταί :  $\sigma\upsilon\nu 2\alpha = 2(ΟΓ) - 1$  (3)

Ἐκ δὲ τῶν ὀρθογωνίων τριγώνων ΟΒΓ, ΟΒΜ, βλέπομεν ὅτι

$(ΟΓ) = (ΟΒ)\sigma\upsilon\nu\alpha$ ,  $(ΟΒ) = (ΟΜ)\sigma\upsilon\nu\alpha = \sigma\upsilon\nu\alpha$  καὶ ἔπομένως :

$(ΟΓ) = \sigma\upsilon\nu^2\alpha$ . Ἡ ἰσότης (3) γίνεταί λοιπόν :

$$\sigma\upsilon\nu 2\alpha = 2\sigma\upsilon\nu^2\alpha - 1 \quad (24)$$

Ἄν παρατηρήσωμεν ὅτι  $2\sigma\upsilon\nu^2\alpha = \sigma\upsilon\nu^2\alpha + \sigma\upsilon\nu^2\alpha$ , ἡ προηγουμένη ἰσότης γίνεταί :

$$\sigma\upsilon\nu 2\alpha = \sigma\upsilon\nu^2\alpha + \sigma\upsilon\nu^2\alpha - 1 = \sigma\upsilon\nu^2\alpha - (1 - \sigma\upsilon\nu^2\alpha)$$

Ἐπειδὴ δὲ  $1 - \sigma\upsilon\nu^2\alpha = \eta\mu^2\alpha$ , ἔπεται ὅτι :

$$\sigma\upsilon\nu 2\alpha = \sigma\upsilon\nu^2\alpha - \eta\mu^2\alpha \quad (25)$$

Ἐπειδὴ δὲ  $\sigma\upsilon\nu^2\alpha = 1 - \eta\mu^2\alpha$ , ἡ ἰσότης (25) γίνεταί :

$$\sigma\upsilon\nu 2\alpha = 1 - 2\eta\mu^2\alpha \quad (26)$$

Ἄν  $2\alpha = \omega$ , αἱ ἰσότητες (24), (25), (26), γίνονται κατὰ σειράν

$$\left. \begin{aligned} \sigma\upsilon\nu\omega &= 2\sigma\upsilon\nu^2\left(\frac{\omega}{2}\right) - 1 \\ \sigma\upsilon\nu\omega &= \sigma\upsilon\nu^2\left(\frac{\omega}{2}\right) - \eta\mu^2\left(\frac{\omega}{2}\right) \\ \sigma\upsilon\nu\omega &= 1 - 2\eta\mu^2\left(\frac{\omega}{2}\right) \end{aligned} \right\} \quad (27)$$

Διὰ τούτων ὀρίζομεν τὸ συνημίτονον μιᾶς ὀξείας γωνίας, ἂν γνωρίζωμεν τὸ ἡμίτονον καὶ συνημίτονον τοῦ ἡμίσεος αὐτῆς ἢ μόνον τὸν ἕνα ἀπὸ τοὺς τριγωνομετρικοὺς τούτους ἀριθμοὺς.

**52. Πρόβλημα III.** Νὰ εὑρεθῇ ἡ  $\epsilon\varphi 2\alpha$ , ἂν εἶναι γνωστή ἡ  $\epsilon\varphi\alpha$ , ὅταν  $2\alpha < 90^\circ$ .

*Λύσις.* Ἀπὸ τὰς ἰσότητας :  $\eta\mu 2\alpha = 2\eta\mu\alpha\sigma\upsilon\nu\alpha$  καὶ

$\text{συν}2\alpha = \text{συν}^2\alpha - \eta\mu^2\alpha$  διὰ διαιρέσεως κατὰ μέλη εὐρίσκομεν ὅτι:

$$\epsilon\varphi 2\alpha = \frac{2\eta\mu\alpha\sigma\upsilon\alpha}{\text{συν}^2\alpha - \eta\mu^2\alpha}.$$

Ἄν δὲ τοὺς ὄρους τοῦ β' μέλους διαιρέσωμεν διὰ  $\text{συν}^2\alpha$ , εὐρίσκομεν ὅτι:

$$\left. \begin{aligned} \epsilon\varphi 2\alpha &= \frac{2\epsilon\varphi\alpha}{1 - \epsilon\varphi^2\alpha} \\ \text{Αὕτη διὰ } 2\alpha = \omega &\text{ γίνεται: } \epsilon\varphi\omega = \frac{2\epsilon\varphi\left(\frac{\omega}{2}\right)}{1 - \epsilon\varphi^2\left(\frac{\omega}{2}\right)} \end{aligned} \right\} (28)$$

**53. Πρόβλημα IV.** Νὰ εὐρεθῇ ἡ  $\sigma\varphi 2\alpha$ , ἂν εἶναι γνωστὴ ἡ  $\sigma\alpha$ , ὅταν  $2\alpha < 90^\circ$ .

Λύσις. Ἀπὸ τὰς ἀνωτέρω ἰσότητας  $\text{συν}2\alpha = \text{συν}^2\alpha - \eta\mu^2\alpha$   
 $\eta\mu 2\alpha = 2\eta\mu\alpha\sigma\upsilon\alpha$

εὐρίσκομεν ὅτι:  $\frac{\text{συν}2\alpha}{\eta\mu 2\alpha} = \frac{\text{συν}^2\alpha - \eta\mu^2\alpha}{2\eta\mu\alpha\sigma\upsilon\alpha}$ . Ἄν δὲ τοὺς ὄρους τοῦ β' μέλους διαιρέσωμεν διὰ  $\eta\mu^2\alpha$ , εὐρίσκομεν ὅτι:

$$\left. \begin{aligned} \sigma\varphi 2\alpha &= \frac{\sigma\varphi^2\alpha - 1}{2\sigma\varphi^2\alpha} \\ \text{Αὕτη διὰ } 2\alpha = \omega &\text{ γίνεται: } \sigma\varphi\omega = \frac{\sigma\varphi^2\left(\frac{\omega}{2}\right) - 1}{2\sigma\varphi\left(\frac{\omega}{2}\right)} \end{aligned} \right\} (29)$$

#### Ἄσκησεις

146. Ἄν  $\eta\mu\frac{\omega}{2} = \frac{1}{2}$ , νὰ εὐρεθῇ τὸ  $\eta\mu\omega$  καὶ τὸ  $\text{συν}\omega$ .

147. Ἄν  $\text{συν}\frac{\omega}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ , νὰ εὐρεθῇ τὸ  $\text{συν}\omega$  καὶ τὸ  $\eta\mu\omega$ .

148. Ἄν  $\epsilon\varphi\frac{\omega}{2} = \frac{\sqrt{3}}{3}$ , νὰ εὐρεθῇ ἡ  $\epsilon\varphi\omega$  καὶ ἡ  $\sigma\varphi\omega$ .

149. Ἄν  $\sigma\varphi\frac{\omega}{2} = \sqrt{3}$ , νὰ εὐρεθῇ ἡ  $\epsilon\varphi\omega$  καὶ ἡ  $\sigma\varphi\omega$ .

**54. Τριγωνομετρικαὶ ἐξισώσεις.** Ἡ ἰσότης  $\eta\mu\omega = \frac{1}{2}$  δὲν ἀληθεύει διὰ πᾶσαν γωνίαν  $\omega$ .

Αὕτη λέγεται **τριγωνομετρικὴ ἐξίσωσις**. Ἐμάθομεν δὲ ὅτι αὕτη ἀληθεύει διὰ  $\omega = 30^\circ$ ,  $\epsilon\varphi$  ὅσον θεωροῦμεν, ὡς μέχρι τοῦδε,

ὀξείας γωνίας. Καὶ ἡ ἰσότης  $3\acute{\epsilon}\phi\chi - 5 = \frac{\acute{\epsilon}\phi\chi}{2}$  (1) εἶναι τριγωνομετρικὴ ἐξίσωσις.

\*Αν δὲ πρὸς στιγμὴν θέσωμεν  $\acute{\epsilon}\phi\chi = \psi$ , αὕτη γίνεται  $3\psi - 5 = \frac{\psi}{2}$  (2), ἥτοι ἀλγεβρική ἐξίσωσις μὲ ἀγνωστον  $\psi$ .

Λέγομεν λοιπὸν ὅτι ἡ (1) ἔχει ἀλγεβρικήν μορφήν πρὸς ἀγνωστον τὴν  $\acute{\epsilon}\phi\chi$ . \*Αν δὲ λύσωμεν αὐτὴν πρὸς τὴν  $\acute{\epsilon}\phi\chi$ , ὅπως λύομεν τὴν (2) πρὸς  $\psi$ , εὐρίσκομεν τὴν ἰσοδύναμον ἐξίσωσιν  $\acute{\epsilon}\phi\chi = 2$ . Ταύτην δὲ ἐμάθομεν (§ 30) νὰ λύωμεν, ἐφ' ὅσον περιοριζόμεθα εἰς ὀξείας γωνίας  $\chi$ .

Κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον λύομεν πᾶσαν τριγωνομετρικὴν ἐξίσωσιν ἀλγεβρικῆς μορφῆς μὲ ἓνα τριγωνομετρικὸν ἀριθμὸν τῆς ἀγνώστου γωνίας. Ἐπὶ τοῦ παρόντος ὅμως θὰ ἀρκοῦμεθα εἰς τιμὰς τῆς ἀγνώστου γωνίας ἀπὸ  $0^\circ$  μέχρις  $90^\circ$ .

#### Ἀ σ κ ῆ σ ε ι ς

150. Νὰ εὑρεθῇ τὸ μέτρον ὀξείας γωνίας  $\chi$ , διὰ τὴν ὁποίαν ἀληθεύει ἡ ἐξίσωσις  $5\acute{\eta}\mu\chi = 3$ .

151. Νὰ εὑρεθῇ τὸ μέτρον ὀξείας γωνίας  $\omega$ , διὰ τὴν ὁποίαν ἀληθεύει ἡ ἐξίσωσις  $2\acute{\eta}\mu\omega + 1 = 2$ .

152. Νὰ λυθῇ ἡ ἐξίσωσις  $9\sigma\upsilon\nu\chi + 2 = 17\sigma\upsilon\nu\chi - 2$ , ὑπὸ τὸν ὄρον νὰ εἶναι καὶ  $\chi(90^\circ)$ .

153. Νὰ λυθῇ ἡ ἐξίσωσις  $6\acute{\epsilon}\phi\chi - \frac{1}{2} = \frac{12\acute{\epsilon}\phi\chi}{5} + 1$  ὑπὸ τὸν αὐτὸν ὄρον.

154. Νὰ λυθῇ ἡ ἐξίσωσις  $2\acute{\epsilon}\phi\chi + \frac{\acute{\epsilon}\phi\chi}{5} - 5 = \frac{\acute{\epsilon}\phi\chi}{4} - \frac{1}{8}$ , ὑπὸ τὸν ὄρον νὰ εἶναι  $\chi(90^\circ)$ .

\*Υπὸ τὸν αὐτὸν ὄρον  $\chi(90^\circ)$  νὰ λυθῶσιν αἱ ἀκόλουθοι ἐξισώσεις:

$$155. 4\sigma\upsilon\nu^2\chi - 4\sigma\upsilon\nu\chi + 1 = 0.$$

$$156. 15\sigma\upsilon\nu^2\chi - 22\sigma\upsilon\nu\chi + 8 = 0.$$

$$157. \frac{5\sigma\phi\chi}{2} - \frac{\sigma\phi\chi}{4} = \frac{9}{2}.$$

$$158. 4\sigma\phi^2\chi - 20\sigma\phi\chi + 25 = 0.$$

#### ΠΙΝΑΞ ΤΥΠΩΝ Α' ΒΙΒΛΙΟΥ

Σχέσεις μέτρων τόξου ἢ γωνίας :

$$\frac{\mu}{180} = \frac{\beta}{200} = \frac{\alpha}{\pi}$$

Σχέσεις πλευρῶν καὶ γωνιῶν ὀρθ. τριγώνου :

$$\begin{array}{l|l} \beta = \alpha\eta\mu\beta = \alpha\sigma\upsilon\nu\Gamma & \beta = \gamma\acute{\epsilon}\phi\beta = \gamma\sigma\phi\Gamma \\ \gamma = \alpha\eta\mu\Gamma = \alpha\sigma\upsilon\nu\beta & \gamma = \beta\acute{\epsilon}\phi\Gamma = \beta\sigma\phi\beta \end{array}$$

$$\text{Έμβασδόν ὀρθογωνίου τριγώνου: } E = \frac{1}{2} \beta\gamma, E = \frac{1}{2} \beta^2\acute{\epsilon}\phi\Gamma.$$

Τριγωνομετρικοί ἀριθμοὶ συμπληρωματικῶν γωνιῶν :

$$\begin{aligned} \eta\mu(90^\circ - \omega) &= \sigma\upsilon\nu\omega, & \sigma\upsilon\nu(90^\circ - \omega) &= \eta\mu\omega, & \acute{\epsilon}\phi(90^\circ - \omega) &= \sigma\phi\omega, \\ \sigma\phi(90^\circ - \omega) &= \acute{\epsilon}\phi\omega. \end{aligned}$$

Τριγωνομετρικοί ἀριθμοὶ γωνίας  $0^\circ, 30^\circ, 45^\circ, 60^\circ, 90^\circ$ ,

γωνία $\tau$	$\eta\mu\tau$	$\sigma\upsilon\nu\tau$	$\acute{\epsilon}\phi\tau$	$\sigma\phi\tau$
$0^\circ$	0	1	0	$\infty$
$30^\circ$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	$\sqrt{3}$
$45^\circ$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1	1
$60^\circ$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\sqrt{3}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$
$90^\circ$	1	0	$\infty$	0

Σχέσεις τριγωνομετρικῶν ἀριθμῶν τῆς αὐτῆς ὀξείας γωνίας,

$$\begin{aligned} \eta\mu^2\omega + \sigma\upsilon\nu^2\omega &= 1, & \acute{\epsilon}\phi\omega &= \frac{\eta\mu\omega}{\sigma\upsilon\nu\omega}, & \sigma\phi\omega &= \frac{\sigma\upsilon\nu\omega}{\eta\mu\omega}, \\ \acute{\epsilon}\phi\omega \cdot \sigma\phi\omega &= 1, & \sigma\upsilon\nu\omega &= \sqrt{1 - \eta\mu^2\omega}, & \acute{\epsilon}\phi\omega &= \frac{\eta\mu\omega}{\sqrt{1 - \eta\mu^2\omega}}, \\ \sigma\phi\omega &= \frac{\sqrt{1 - \eta\mu^2\omega}}{\eta\mu\omega}, & \eta\mu\omega &= \sqrt{1 - \sigma\upsilon\nu^2\omega}, & \acute{\epsilon}\phi\omega &= \frac{\sqrt{1 - \sigma\upsilon\nu^2\omega}}{\sigma\upsilon\nu\omega}, \\ \sigma\phi\omega &= \frac{\sigma\upsilon\nu\omega}{\sqrt{1 - \sigma\upsilon\nu^2\omega}}, & \eta\mu^2\omega &= \frac{\acute{\epsilon}\phi^2\omega}{1 + \acute{\epsilon}\phi^2\omega}, & \sigma\upsilon\nu^2\omega &= \frac{1}{1 + \acute{\epsilon}\phi^2\omega}, \\ \eta\mu\omega &= \frac{\acute{\epsilon}\phi\omega}{\sqrt{1 + \acute{\epsilon}\phi^2\omega}}, & \sigma\upsilon\nu\omega &= \frac{1}{\sqrt{1 + \acute{\epsilon}\phi^2\omega}}, & \sigma\phi\omega &= \frac{1}{\sigma\phi\omega}, \\ \eta\mu\omega &= \frac{1}{\sqrt{1 + \sigma\phi^2\omega}}, & \sigma\upsilon\nu\omega &= \frac{\sigma\phi\omega}{\sqrt{1 + \sigma\phi^2\omega}}, & \acute{\epsilon}\phi\omega &= \frac{1}{\sigma\phi\omega}, \end{aligned}$$

$$\eta\mu 2\alpha = \eta\mu\alpha\sigma\upsilon\nu\alpha, \quad \eta\mu\omega = 2\eta\mu\left(\frac{\omega}{2}\right)\sigma\upsilon\nu\left(\frac{\omega}{2}\right),$$

$$\sigma\upsilon\nu 2\alpha = \sigma\upsilon\nu^2\alpha - \eta\mu^2\alpha = 2\sigma\upsilon\nu^2\alpha - 1 = 1 - 2\eta\mu^2\alpha$$

$$\sigma\upsilon\nu\omega = \sigma\upsilon\nu^2\frac{\omega}{2} - \eta\mu^2\frac{\omega}{2} = 2\sigma\upsilon\nu^2\frac{\omega}{2} - 1 = 1 - 2\eta\mu^2\frac{\omega}{2}$$

$$\xi\phi 2\alpha = \frac{2\xi\phi\alpha}{1 - \xi\phi^2\alpha}, \quad \xi\phi\omega = \frac{2\xi\phi\left(\frac{\omega}{2}\right)}{1 - \xi\phi^2\left(\frac{\omega}{2}\right)},$$

$$\sigma\phi 2\alpha = \frac{\sigma\phi^2\alpha - 1}{2\sigma\phi\alpha}, \quad \sigma\phi\omega = \frac{\sigma\phi^2\left(\frac{\omega}{2}\right) - 1}{2\sigma\phi\left(\frac{\omega}{2}\right)},$$

### Άσκησης προς επανάληψιν του Α' βιβλίου

159. Νά εύρεθῆ εἰς μοίρας τὸ μέτρον γωνίας ἐνὸς βαθμοῦ.

160. Νά εύρεθῆ εἰς μοίρας τὸ μέτρον τοῦ ἀκτινίου τόξου.

161. Νά ἐξετασθῆ, ἂν τὸ πρῶτον λεπτόν τῆς μοίρας εἶναι μεγαλύτερον ἢ μικρότερον ἀπὸ τὸ πρῶτον λεπτόν τοῦ βαθμοῦ.

162. Ἡ μία ὀξεῖα γωνία ἐνὸς ὀρθογωνίου τριγώνου εἶναι  $25^\circ 20'$ . Νά εύρεθῆ εἰς βαθμοὺς τὸ μέτρον τῆς ἄλλης ὀξεῖας γωνίας αὐτοῦ.

163. Ἡ μία ὀξεῖα γωνία ὀρθογωνίου τριγώνου εἶναι τὸ  $\frac{1}{3}$  τῆς ἄλλης. Νά εύρεθῆ εἰς ἀκτίνια τὸ μέτρον ἐκάστης τῶν γωνιῶν τούτων.

164. Ἐν ὀρθογώνιον τρίγωνον ἔχει  $\alpha = 3\beta$ . Νά εύρεθῶσιν οἱ τριγωνομετρικοὶ ἀριθμοὶ τῆς γωνίας Β αὐτοῦ.

165. Ἐν ὀρθογώνιον τρίγωνον ΑΒΓ ἔχει  $B = \frac{2\pi}{5}$ . Νά εύρεθῶσιν οἱ τριγωνομετρικοὶ ἀριθμοὶ ἐκάστης ὀξεῖας γωνίας αὐτοῦ.

166. Τὸ αὐτὸ ζήτημα, ἂν  $B = 57^\circ, 5$ .

167. Νά κατασκευασθῆ ὀξεῖα γωνία  $\chi$ , ἂν  $4\eta\mu\chi - 1 = \eta\mu\chi + \frac{1}{2}$ .

168. Νά κατασκευασθῆ ὀξεῖα γωνία  $\omega$ , ἂν  $\xi\phi\omega - 4\xi\phi\omega + 4 = 0$ .

169. Νά κατασκευασθῆ ὀξεῖα γωνία  $\phi$ , ἂν  $7\sigma\upsilon\nu^3\phi - 12\sigma\upsilon\nu\phi + 5 = 0$ .

170. Ἐν  $\sigma\upsilon\nu(90^\circ - \chi) = 0,456$ , νά κατασκευασθῆ ἡ ὀξεῖα γωνία  $\chi$ .

171. Ἐν  $\sigma\phi(90^\circ - \chi) = 2,50$ , νά κατασκευασθῆ ἡ ὀξεῖα γωνία  $\chi$ .

172. Ἐν  $\sigma\upsilon\nu(90^\circ - \chi) = \frac{3}{5}$ , νά εύρεθῶσιν οἱ τριγωνομετρικοὶ ἀριθμοὶ τῆς ὀξεῖας γωνίας  $\chi$ .

173. Νά ἀποδειχθῆ ὅτι διὰ πᾶσαν ὀξεῖαν γωνίαν  $\omega$  εἶναι:

$$\frac{1}{\eta\mu^2\omega} + \frac{1}{\sigma\upsilon\nu^2\omega} = \frac{1}{\eta\mu^2\omega \cdot \sigma\upsilon\nu^2\omega}.$$

174. Νά ἀποδειχθῆ ὅτι διὰ πᾶν ὀρθογώνιον τρίγωνον ΑΒΓ εἶναι:

$$\frac{\acute{\eta}\mu\text{B} + \sigma\upsilon\nu\Gamma}{\sigma\upsilon\nu\text{B} + \acute{\eta}\mu\Gamma} = \acute{\epsilon}\phi\text{B}$$

175. Νά ἀποδειχθῆ ὅτι διὰ πᾶν ὀρθογώνιον τρίγωνον ΑΒΓ εἶναι:

$$\frac{1}{\acute{\eta}\mu\text{B}} + \sigma\phi\text{B} = \frac{\alpha + \gamma}{\beta}$$

176. Ἐάν  $\omega + \phi = 90^\circ$ , νά εὔρεθῆ τὸ ἄθροισμα  $\acute{\eta}\mu^2\omega + \acute{\eta}\mu^2\phi$ .

177. Νά ἀποδειχθῆ ὅτι διὰ πᾶν ὀρθογώνιον τρίγωνον ΑΒΓ εἶναι:

$$\acute{\eta}\mu\text{B} + \sigma\upsilon\nu\Gamma = \frac{2\beta}{\alpha}$$

178. Νά ἀποδειχθῆ ὅτι διὰ πᾶν ὀρθογώνιον τρίγωνον ΑΒΓ εἶναι:

$$\acute{\eta}\mu^2\text{B} - \acute{\eta}\mu^2\Gamma = \frac{\beta^2 - \gamma^2}{\alpha^2}$$

179. Νά εὔρεθῆ ἡ ἀκτίς ἐνὸς κύκλου, ἂν ἡ πλευρὰ τοῦ εἰς αὐτὸν ἐγγεγραμμένου κανονικοῦ ὀκταγώνου ἔχη μῆκος 8 μέτρα.

180. Ἡ ἀκτίς ἐνὸς κύκλου ἔχει μῆκος 0,80 μέτ. Νά εὔρεθῆ τὸ μῆκος τῆς πλευρᾶς τοῦ εἰς αὐτὸν ἐγγεγραμμένου κανονικοῦ δεκαπενταγώνου.

181. Ἐν σῶμα βάρους 25 χιλιογράμμων κυλιέται ἐπὶ κεκλιμένου ἐπιπέδου κλίσεως  $24^\circ 40'$ . Νά εὔρεθῆ ἡ ἔντασις τῆς δυνάμεως, ἡ ὁποία κινεῖ αὐτὸ καὶ ἡ πίεσις, τὴν ὁποίαν τὸ σῶμα τοῦτο ἐπιφέρει ἐπὶ τοῦ κεκλιμένου ἐπιπέδου.

182. Ἐν σῶμα 20 χιλιογράμμων διήνυσεν 0,85 μέτ. ἐκ τῶν ἄνω πρὸς τὰ κάτω ἐπὶ κεκλιμένου ἐπιπέδου κλίσεως  $20^\circ 30' 40''$ . Νά ὑπολογισθῆ τὸ ἔργον τῆς βαρύτητος κατὰ τὴν κίνησιν ταύτην.

183. Μία χορδὴ τῆς  $56^\circ 35' 18''$  ἔχει μῆκος 0,68 μέτ. Νά εὔρεθῆ ἡ ἀκτίς τοῦ κύκλου καὶ ἡ ἀπόστασις τοῦ κέντρου αὐτοῦ ἀπὸ τῆς χορδῆς.

184. Κεκλιμένον ἐπίπεδον ἔχει ὕψος διπλάσιον τῆς βάρσεως. Νά εὔρεθῆ τὸ μέτρον τῆς κλίσεως αὐτοῦ.

185. Ἡ Μηχανικὴ διδάσκει ὅτι ἡ ἐπιτάχυνσις, μὲ τὴν ὁποίαν κυλιέται ἐν σῶμα ἐπὶ κεκλιμένου ἐπιπέδου κλίσεως  $\omega$ , εἶναι  $981 \cdot \acute{\eta}\mu\omega$ . Νά εὔρεθῆ εἰς ἑκατοστόμετρα ἡ ἐπιτάχυνσις αὕτη, ἂν τὸ ὕψος τοῦ κεκλιμένου ἐπιπέδου εἶναι τὸ ἡμισυ τῆς βάρσεως αὐτοῦ.

186. Νά ἐπιλυθῆ ὀρθογώνιον τρίγωνον ΑΒΓ, ἂν  $\alpha = 1,35$  μέτ. καὶ  $B = \frac{3\pi}{20}$  ἀκτίνια.

187. Νά ἐπιλυθῆ ἐν ὀρθογώνιον τρίγωνον ΑΒΓ, ἂν  $\alpha = 6,80$  μέτ. καὶ  $\beta = 3,40$  μέτ.

188. Ἐκ τῆς Μηχανικῆς γνωρίζομεν ὅτι ἡ συνθήκη ἰσορροπίας ἐλευθέρως τροχαλίας εἶναι  $A = 2\Delta \cdot \sigma\upsilon\nu \frac{\omega}{2}$ . Νά εὔρεθῆ ἡ ἔντασις δυνάμεως  $\Delta$ , μὲ τὴν ὁποίαν ἰσορροποῦμεν ἀντίστασιν  $A = 30 \cdot \sqrt{2}$  χιλιογράμμων διὰ μέσου ἐλευθέρως τροχαλίας, ἂν ἡ γωνία  $\omega$  τῶν νημάτων αὐτῆς εἶναι  $90^\circ$ .

189. Αί προβολαί τῶν καθέτων πλευρῶν ὀρθογωνίου τριγώνου ἐπὶ τὴν ὑποτείνουσαν εἶναι 0,30 μέτ. ἢ μία καὶ 0,40 μέτ. ἢ ἄλλη. Νά ἐπιλυθῆ τοῦτο.

190. Νά ἀποδειχθῆ ὅτι διὰ πᾶν τρίγωνον ΑΒΓ ἀληθεύουσιν αἱ ἰσότητες  
 $\eta\mu\left(\frac{A+B}{2}\right) = \sigma\upsilon\nu\left(\frac{\Gamma}{2}\right)$ ,  $\epsilon\phi\left(\frac{B+\Gamma}{2}\right) = \sigma\phi\left(\frac{A}{2}\right)$ .

191. Νά ἀποδειχθῆ ὅτι τὸ ἄθροισμα:  $\eta\mu(90^\circ - \omega) + \sigma\upsilon\nu(90^\circ - \omega)$  ἴμω εἶναι ἀνεξάρτητον τῆς γωνίας  $\omega$ .

192. Νά εὐρεθῶσι τὰ γινόμενα:  $\epsilon\phi(90^\circ - \omega)\epsilon\phi\omega$ ,  $\sigma\phi(90^\circ - \omega)\sigma\phi\omega$ .

193. Νά λυθῆ ἡ ἐξίσωσις  $\frac{3\epsilon\phi\chi - 1}{\epsilon\phi\chi + 1} = 1$  διὰ  $\chi < 90^\circ$ .

194. Νά λυθῆ ἡ ἐξίσωσις  $\sigma\phi\chi + \frac{1}{\sigma\phi\chi - 3} = 5$  διὰ  $\chi < 90^\circ$ .

195. Νά λυθῆ ἡ ἐξίσωσις  $(2\sigma\upsilon\nu\chi - 3)^2 = 8$  διὰ  $\chi < 90^\circ$ .

196. Νά λυθῆ ἡ ἐξίσωσις  $3 - \frac{\eta\mu^4\omega + 1}{\eta\mu^2\omega} = \eta\mu^2\omega$  διὰ  $\omega < 90^\circ$ .

ΒΙΒΛΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

ΕΠΙΛΥΣΙΣ ΜΗ ΟΡΘΟΓΩΝΙΩΝ ΤΡΙΓΩΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΜΒΛΕΙΑΣ ΓΩΝΙΑΣ

55. Ἡμίτονον καὶ συνημίτονον ἀμβλείας γωνίας. α') Ἐστω  $\omega$  τὸ μέτρον ἀμβλείας γωνίας. Ἡ παραπληρωματικὴ γωνία αὐτῆς ἔχει μέτρον  $180^\circ - \omega$  καὶ εἶναι ὀξεῖα γωνία. Κατὰ δὲ τὴν γνωστὴν (§ 50) ἰσότητα :

$$\eta\mu\omega = 2\eta\mu\left(\frac{\omega}{2}\right) \sigma\upsilon\nu\left(\frac{\omega}{2}\right) \quad (1)$$

$$\begin{aligned} \text{εἶναι} \quad \eta\mu(180^\circ - \omega) &= 2\eta\mu\left(90 - \frac{\omega}{2}\right) \sigma\upsilon\nu\left(90^\circ - \frac{\omega}{2}\right) \\ &= 2\eta\mu\left(\frac{\omega}{2}\right) \sigma\upsilon\nu\left(\frac{\omega}{2}\right) \quad (2) \end{aligned}$$

Ἡ ἰσότης (1) ἀπεδείχθη (§ 50), ἂν  $\omega < 90^\circ$ . ἄληθεύει ὁμως καὶ διὰ  $\omega = 90^\circ$ . Πράγματι εἰς τὴν περίπτωσιν ταύτην εἶναι :

$$\begin{aligned} 2\eta\mu\left(\frac{\omega}{2}\right) \sigma\upsilon\nu\left(\frac{\omega}{2}\right) &= 2\eta\mu 45^\circ \sigma\upsilon\nu 45^\circ = 2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 1 \\ &= \eta\mu 90^\circ = \eta\mu\omega. \end{aligned}$$

Τῆς ἰσότητος (2) ἀμφότερα τὰ μέλη ἔχουσιν ἔννοιαν, διότι  $(180^\circ - \omega) < 90^\circ$  καὶ  $\frac{\omega}{2} < 90^\circ$ . Τῆς ἰσότητος ὁμως (1) τὸ πρῶτον μέλος δὲν ἔχει ἔννοιαν διὰ  $\omega > 90^\circ$ . Διὰ τὴν ἀποκτίθησιν δὲ καὶ τὸ πρῶτον μέλος τῆς (1) ἔννοιαν, θὰ δεχθῶμεν ὅτι  $\eta\mu\omega = \eta\mu(180^\circ - \omega)$ , ἐφ' ὅσον τὰ δευτέρα μέλη τῶν (1) καὶ (2) εἶναι ἴσα.

Οὕτω δὲ ἀγόμεθα εἰς τὸν ἀκόλουθον ὄρισμόν :

**Ἡμίτονον ἀμβλείας γωνίας λέγεται τὸ ἡμίτονον τῆς παραπληρωματικῆς γωνίας αὐτῆς.**

$$\text{Π.χ.} \quad \eta\mu 150^\circ = \eta\mu 30^\circ = \frac{1}{2}.$$

β') Ἄν ἐφαρμόσωμεν τὴν γνωστὴν (§ 50) ἰσότητα :

$$\text{συν}\omega = 2\acute{\eta}\mu^2\left(\frac{\omega}{2}\right) - 1$$

εἰς τὴν ὀξείαν γωνίαν  $180^\circ - \omega$ , εὐρίσκομεν :  $\text{συν}(180^\circ - \omega)$   
 $= 2\text{συν}^2\left(90^\circ - \frac{\omega}{2}\right) - 1 = 2\acute{\eta}\mu^2\left(\frac{\omega}{2}\right) - 1 = -\left(1 - 2\acute{\eta}\mu^2\frac{\omega}{2}\right)$  (3)

Ἐμάθωμεν δὲ (§ 50) ὅτι, ἂν  $\omega < 90^\circ$ , εἶναι :

$$\left(1 - 2\acute{\eta}\mu^2\frac{\omega}{2}\right) = \text{συν}\omega \quad (4)$$

Ἀληθεύει δὲ αὕτη καὶ διὰ  $\omega = 90^\circ$ , διότι εἰς τὴν περίπτωσιν ταύτην εἶναι  $1 - 2\acute{\eta}\mu^2\left(\frac{\omega}{2}\right) = 1 - 2\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 = 0 = \text{συν}90^\circ = \text{συν}\omega$ .

Σκεπτόμενοι δὲ ὅπως καὶ εἰς τὴν περίπτωσιν τοῦ ἡμιτόνου ἐνοοῦμεν ὅτι θὰ πρέπη νὰ δεχθῶμεν ὅτι :

$$\text{συν}(180^\circ - \omega) = -\text{συν}\omega \text{ καὶ ἔπομένως : } \text{συν}\omega = -\text{συν}(180^\circ - \omega).$$

Οὕτως δὲ ἀγόμεθα εἰς τὸν ἀκόλουθον ὀρισμὸν :

**Συνημίτονον ἀμβλείας γωνίας λέγεται τὸ ἀντίθετον συνημίτονον τῆς παραπληρωματικῆς γωνίας αὐτῆς.**

### Ἀσκήσεις

197. Νὰ εὐρεθῇ τὸ  $\acute{\eta}\mu 120^\circ$  καὶ τὸ  $\text{συν} 120^\circ$ .

198. Νὰ εὐρεθῇ τὸ  $\acute{\eta}\mu 135^\circ$  καὶ τὸ  $\text{συν} 135^\circ$ .

199. Νὰ εὐρεθῇ τὸ  $\acute{\eta}\mu(95^\circ 20')$  καὶ τὸ  $\text{συν}(117^\circ 30' 40'')$ .

200. Νὰ εὐρεθῇ τὸ  $\text{συν}(125^\circ 40')$  καὶ τὸ  $\text{συν}(163^\circ 15' 40'')$ .

201. Νὰ σχηματισθῇ ἀμβλεία γωνία  $\omega$ , διὰ τὴν ὁποίαν εἶναι  $\acute{\eta}\mu\omega = 0,55$ .

202. Νὰ σχηματισθῇ γωνία  $\varphi$ , ἂν  $\text{συν}\varphi = -\frac{3}{5}$ .

Νὰ λυθῶσιν αἱ ἀκόλουθοι ἐξισώσεις.

$$203. \frac{\acute{\eta}\mu\chi}{2} - 3\acute{\eta}\mu\chi = -\frac{\acute{\eta}\mu\chi}{4} - \frac{3}{8} \quad 204. 6\text{συν}\chi + \frac{1}{2} = \frac{\text{συν}\chi}{4} - \frac{19}{8}$$

**56. Μεταβολὴ τοῦ ἡμιτόνου καὶ τοῦ συνημιτόνου ἀμβλείας γωνίας  $\omega$ .** α') Ἐπειδὴ  $\acute{\eta}\mu\omega = \acute{\eta}\mu(180^\circ - \omega)$ , ἡ σπουδὴ τῶν μεταβολῶν τοῦ  $\acute{\eta}\mu\omega$  γίνεται ὅπως ἡ γνωστὴ ἤδη μεταβολὴ τοῦ  $\acute{\eta}\mu(180^\circ - \omega)$ .

Συνοψίζομεν δὲ τὴν μεταβολὴν ταύτην εἰς τὸν ἀκόλουθον πίνακα :

α') Μεταβολή ήμω.

$$\begin{array}{l} \omega \\ 180^\circ - \omega \end{array} \left\{ \begin{array}{l} 90^\circ \dots \nearrow \dots 120^\circ \dots \nearrow \dots 135^\circ \dots \nearrow \dots 150^\circ \dots \nearrow \dots 180^\circ \\ 90^\circ \dots \searrow \dots 60^\circ \dots \searrow \dots 45^\circ \dots \searrow \dots 30^\circ \dots \searrow \dots 0^\circ \end{array} \right.$$

$$\eta\mu\omega = \eta\mu(180^\circ - \omega) \left\{ \begin{array}{l} 1 \dots \searrow \dots \frac{\sqrt{3}}{2} \dots \searrow \dots \frac{\sqrt{2}}{2} \dots \searrow \dots \frac{1}{2} \dots \searrow \dots 0 \end{array} \right.$$

β') Όμοίως, επειδή  $\sin\omega = -\sin(180^\circ - \omega)$ , η σπουδή τῶν μεταβολῶν τοῦ  $\sin\omega$  γίνεται με τὴν βοήθειαν τῆς γνωστῆς μεταβολῆς τοῦ  $\sin(180^\circ - \omega)$ . Πρὸς τοῦτο πρέπει νὰ ἔχωμεν ὑπ' ὄψιν ὅτι: Ἀπὸ δύο ἀρνητικούς ἀριθμούς μεγαλύτερος εἶναι ὁ ἔχων τὴν μικροτέραν ἀπόλυτον τιμὴν. Οὕτω δὲ εὐκόλως καταρτίζομεν τὸν ἀκόλουθον πίνακα:

β') Μεταβολή συνω.

$$\begin{array}{l} \omega \\ (180^\circ - \omega) \\ \sin(180^\circ - \omega) \\ \sin\omega = -\sin(180^\circ - \omega) \end{array} \left\{ \begin{array}{l} 90^\circ \dots \nearrow \dots 120^\circ \dots \nearrow \dots 135^\circ \dots \nearrow \dots 150^\circ \dots \nearrow \dots 180^\circ \\ 90^\circ \dots \searrow \dots 60^\circ \dots \searrow \dots 45^\circ \dots \searrow \dots 30^\circ \dots \searrow \dots 0^\circ \\ 0 \dots \nearrow \dots \frac{1}{2} \dots \nearrow \dots \frac{\sqrt{2}}{2} \dots \nearrow \dots \frac{\sqrt{3}}{2} \dots \nearrow \dots 1 \\ 0 \dots \searrow \dots -\frac{1}{2} \dots \searrow \dots -\frac{\sqrt{2}}{2} \dots \searrow \dots -\frac{\sqrt{3}}{2} \dots \searrow \dots -1 \end{array} \right.$$

Ἀπὸ τὸν πίνακα τοῦτον βλέπομεν ὅτι τὸ συνημίτονον πάσης ἀμβλείας γωνίας εἶναι ἀρνητικόν.

### 57. Ἐφαπτομένη καὶ συνεφαπτομένη ἀμβλείας γωνίας ω.

α') Ἐπειδὴ  $180^\circ - \omega < 90^\circ$ , γνωρίζομεν ὅτι:

$$\epsilon\phi(180^\circ - \omega) = \frac{\eta\mu(180^\circ - \omega)}{\sin(180^\circ - \omega)}$$

Ἐπειδὴ δὲ  $\eta\mu(180^\circ - \omega) = \eta\mu\omega$  καὶ  $\sin(180^\circ - \omega) = -\sin\omega$  (§ 55), θὰ εἶναι  $\epsilon\phi(180^\circ - \omega) = -\frac{\eta\mu\omega}{\sin\omega}$ . Σκεπτόμενοι δὲ ὡς προηγουμένως δεχόμεθα ὅτι  $\frac{\eta\mu\omega}{\sin\omega} = \epsilon\phi\omega$  καὶ ὅταν  $\omega > 90^\circ$ .

Ἡ προηγουμένη λοιπὸν ἰσότης γίνεται  $\epsilon\phi(180^\circ - \omega) = -\epsilon\phi\omega$ , ὅθεν:

$$\epsilon\phi\omega = -\epsilon\phi(180^\circ - \omega).$$

Οὕτω δὲ ἀγόμεθα εἰς τὸν ἀκόλουθον ὀρισμὸν:

**Ἐφαπτομένη ἀμβλείας γωνίας λέγεται ἡ ἀντίθετος ἐφαπτομένη τῆς παραπληρωματικῆς γωνίας αὐτῆς.**

$$\text{Π.χ. } \epsilon\phi 150^\circ = -\epsilon\phi 30^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$\beta') \text{ Γνωρίζομεν ἐπίσης ὅτι } \sigma\phi(180^\circ - \omega) = \frac{\sigma\upsilon\upsilon(180^\circ - \omega)}{\eta\mu(180^\circ - \omega)} = -\frac{\sigma\upsilon\upsilon\omega}{\eta\mu\omega}.$$

Σκεπτόμενοι δέ, ὡς προηγουμένως, δεχόμεθα ὅτι  $\frac{\sigma\upsilon\upsilon\omega}{\eta\mu\omega} = \sigma\phi\omega$  καὶ ἂν  $\omega > 90^\circ$ . Οὕτω δὲ καταλήγομεν εἰς τὴν ἰσότητα:

$$\sigma\phi\omega = -\sigma\phi(180^\circ - \omega).$$

Ἄγομεθα λοιπὸν εἰς τὸν ἀκόλουθον ὄρισμόν:

**Συνεφαπτομένη ἀμβλείας γωνίας λέγεται ἡ ἀντίθετος συνεφαπτομένη τῆς παραπληρωματικῆς γωνίας αὐτῆς.**

$$\text{Π.χ. } \sigma\phi 150^\circ = -\sigma\phi 30^\circ = -\sqrt{3}.$$

### Ἄσκησεις

205. Νὰ εὐρεθῆ ἡ ἐφ $135^\circ$  καὶ ἡ σφ $135^\circ$ .

206. Νὰ εὐρεθῆ ἡ ἐφ $120^\circ$  καὶ ἡ σφ $120^\circ$ .

207. Νὰ εὐρεθῆ ἡ ἐφ $(135^\circ 35')$  καὶ ἡ ἐφ $(98^\circ 12' 30'')$ .

208. Νὰ εὐρεθῆ ἡ σφ $(154^\circ 20')$  καὶ ἡ σφ $(162^\circ 20' 45'')$ .

209. Νὰ σχηματισθῆ γωνία  $\chi$ , ἂν ἐφ $\chi = -1,50$ .

210. Νὰ σχηματισθῆ γωνία  $\omega$ , ἂν σφ $\omega = -0,85$ .

Νὰ λυθῶσιν αἱ ἀκόλουθοι ἐξισώσεις:

$$211. \frac{\text{ἐφ}\chi}{3} - \frac{2}{5} = \frac{2\text{ἐφ}\chi}{8} - \frac{30}{40}. \quad 212. 3\sigma\phi\chi + \frac{\sigma\phi\chi}{2} = 2\sigma\phi\chi - \frac{3}{5}.$$

**58. Μεταβολὴ τῆς ἐφαπτομένης καὶ συνεφαπτομένης ἀμβλείας γωνίας.** Ἄν σκεφθῶμεν ὅπως διὰ τὴν μεταβολὴν τοῦ  $\eta\mu\omega$  καὶ  $\sigma\upsilon\upsilon\omega$  (§ 56), καταρτίζομεν τοὺς ἐξῆς πίνακας τῶν μεταβολῶν τῆς ἐφ $\omega$  καὶ τῆς σφ $\omega$ , ἂν ἡ γωνία  $\omega$  βαίνη αὐξανομένη ἀπὸ  $90^\circ$  ἕως  $180^\circ$ .

$$\begin{array}{l} \omega \\ 180^\circ - \omega \\ \text{ἐφ}(180^\circ - \omega) \\ \text{ἐφ}\omega = -(180^\circ - \omega) \end{array} \left\{ \begin{array}{l} 90^\circ \dots \nearrow \dots 120^\circ \dots \nearrow \dots 135^\circ \dots \nearrow \dots 150^\circ \dots \nearrow \dots 180^\circ \\ 90^\circ \dots \searrow \dots 60^\circ \dots \searrow \dots 45^\circ \dots \searrow \dots 30^\circ \dots \searrow \dots 0^\circ \\ +\infty \dots \searrow \dots \sqrt{3} \dots \searrow \dots 1 \dots \searrow \dots \frac{\sqrt{3}}{3} \dots \searrow \dots 0 \\ -\infty \dots \nearrow \dots -\sqrt{3} \dots \nearrow \dots -1 \dots \nearrow \dots -\frac{\sqrt{3}}{3} \dots \nearrow \dots 0 \end{array} \right.$$

$$\begin{array}{l}
 \beta') \text{ Μεταβολή τῆς σφω} \\
 \omega \left\{ \begin{array}{l} 90^\circ \dots \nearrow \dots 120^\circ \dots \nearrow \dots 135^\circ \dots \nearrow \dots 150^\circ \dots \nearrow \dots 180^\circ \\ 180^\circ - \omega \left\{ \begin{array}{l} 90^\circ \dots \searrow \dots 60^\circ \dots \searrow \dots 45^\circ \dots \searrow \dots 30^\circ \dots \searrow \dots 0^\circ \\ \sigma\phi(180^\circ - \omega) \left\{ \begin{array}{l} 0 \dots \nearrow \dots \frac{\sqrt{3}}{3} \dots \nearrow \dots 1 \dots \nearrow \dots \sqrt{3} \dots \nearrow \dots + \infty \\ \sigma\phi\omega = -\sigma\phi(180^\circ - \omega) \left\{ \begin{array}{l} 0 \dots \searrow \dots -\frac{\sqrt{3}}{3} \dots \searrow \dots -1 \dots \searrow \dots -\sqrt{3} \dots \searrow \dots -\infty \end{array} \right. \end{array} \right. \end{array} \right.
 \end{array}
 \end{array}$$

Ἀπὸ τοὺς πίνακας τούτους βλέπομεν ὅτι πᾶσα ἀμβλεία γωνία ἔχει ἀρνητικὴν ἔφαπτομένην καὶ συνεφαπτομένην.

**59. Σχέσεις τῶν τριγωνομετρικῶν ἀριθμῶν ἀμβλείας γωνίας  $\omega$ .** Ἀπὸ τὰς ἰσότητας  $\eta\mu\omega = \eta\mu(180^\circ - \omega)$  καὶ  $\sigma\upsilon\nu\omega = -\sigma\upsilon\nu(180^\circ - \omega)$  (§ 55) εὐρίσκομεν εὐκόλως ὅτι:

$$\eta\mu^2\omega + \sigma\upsilon\nu^2\omega = \eta\mu^2(180^\circ - \omega) + \sigma\upsilon\nu^2(180^\circ - \omega).$$

Ἐπειδὴ δὲ  $180^\circ - \omega < 90^\circ$ , τὸ β' μέλος εἶναι 1 (ἰσότης 8 § 45). Εἶναι λοιπὸν καὶ διὰ πᾶσαν ἀμβλείαν γωνίαν  $\omega$ :

$$\eta\mu^2\omega + \sigma\upsilon\nu^2\omega = 1 \quad (1)$$

Ἐδέχθημεν δὲ χάριν τῆς γενικότητος ἀληθεῖς διὰ τὰς ἀμβλείας γωνίας καὶ τὰς ἰσότητας (9) καὶ (10) τῆς § 45, ἥτοι:

$$\xi\phi\omega = \frac{\eta\mu\omega}{\sigma\upsilon\nu\omega}, \quad \sigma\phi\omega = \frac{\sigma\upsilon\nu\omega}{\eta\mu\omega} \quad (2)$$

Βλέπομεν λοιπὸν ὅτι, ὡς ὠρίσθησαν οἱ τριγωνομετρικοὶ ἀριθμοὶ ἀμβλείας γωνίας, συνδέονται μεταξύ των μὲ τὰς αὐτὰς σχέσεις (1) καὶ (2), μὲ τὰς ὁποίας συνδέονται καὶ οἱ τριγωνομετρικοὶ ἀριθμοὶ μιᾶς ὀξείας γωνίας.

Ἄν δὲ σκεφθῶμεν, ὅπως καὶ διὰ τὰς ὀξείας γωνίας (§ 45), βεβαιούμεθα ὅτι, πλὴν τῶν σχέσεων τούτων, οὐδεμίᾳ ἄλλῃ σχέσιν μὴ ἔξ αὐτῶν ἀπορρέουσα ὑφίσταται μεταξύ τῶν τριγωνομετρικῶν ἀριθμῶν ἀμβλείας γωνίας. Ἐξ αὐτῶν ὅμως ἀπορρέουσιν πολλοὶ ἄλλαι σχέσεις ὅπως καὶ διὰ τὰς ὀξείας γωνίας. Οὕτως ἀπὸ τὰς ἀνωτέρω ἰσότητος (1) καὶ (2) εὐρίσκομεν εὐκόλως ὅτι:

$$\xi\phi\omega \cdot \sigma\phi\omega = 1.$$

Ἐπίσης, ἂν γνωρίζωμεν ἓνα τριγωνομετρικὸν ἀριθμὸν ἀμβλείας γωνίας, δυνάμεθα νὰ εὕρωμεν τοὺς ἄλλους. Πρὸς τοῦτο ἐργαζόμεθα πῶς εἰς τὰς §§ 46—49 διὰ τὰς ὀξείας γωνίας. Μόνον πρέπει νὰ ἔχωμεν ὑπ' ὄψιν ὅτι ἡ ἔφαπτομένη, ἡ συνεφαπτομένη καὶ τὸ συνη-

μίτονον άμβλείας γωνίας είναι άρνητικοί άριθμοί, τὸ δὲ ήμίτονον είναι θετικός άριθμός. Έπομένως πρὸ τοῦ ριζικοῦ έκάστου σχετικοῦ τύπου πρέπει νά θέτωμεν τὸ κατάλληλον εκ τῶν σημείων + ή -, διὰ νά προκύπτῃ θετικὸν έξαγόμενον διὰ τὸ ήμίτονον καὶ άρνητικὸν δι' έκαστον τῶν άλλων τριγωνομετρικῶν άριθμῶν. Οὕτως, αν  $90^\circ < \omega < 180^\circ$  καὶ  $\eta\mu\omega = \frac{1}{2}$ , θά είναι:

$$\sigma\upsilon\nu\omega = -\sqrt{1 - \frac{1}{4}} = -\frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \epsilon\phi\omega = \frac{\frac{1}{2}}{-\sqrt{1 - \frac{1}{4}}} = -\frac{\sqrt{3}}{3},$$

$$\sigma\phi\omega = \frac{-\sqrt{1 - \frac{1}{4}}}{\frac{1}{2}} = -\sqrt{3}. \quad \text{Αν δὲ } 90^\circ < \omega < 180^\circ \text{ καὶ } \sigma\upsilon\nu\omega = -\frac{1}{2},$$

$$\Theta\acute{\alpha} \text{ εἶναι:} \quad \eta\mu\omega = +\sqrt{1 - \frac{1}{4}} = \frac{\sqrt{3}}{2},$$

$$\epsilon\phi\omega = \frac{+\sqrt{1 - \frac{1}{4}}}{-\frac{1}{2}} = -\sqrt{3} \quad \sigma\phi\omega = \frac{-\frac{1}{2}}{+\sqrt{1 - \frac{1}{4}}} = -\frac{\sqrt{3}}{3}$$

**Σημείωσις.** Διὰ τοὺς αὐτοὺς λόγους αἱ εἰς τὰς άσκήσεις 128—135 αναγραφείσαι τριγωνομετρικαὶ ταυτότητες ἀληθεύουσι καὶ δι' άμβλείας γωνίας καὶ ἀποδεικνύονται ὁμοίως.

### Άσκήσεις

213. Ἄν  $\eta\mu\chi = \frac{\sqrt{2}}{2}$  καὶ  $90^\circ < \chi < 180^\circ$ , νά εὐρεθῶσι οἱ άλλοι τριγωνομετρικοὶ άριθμοὶ τῆς γωνίας  $\chi$ .

214. Ἄν  $\sigma\upsilon\nu\phi = -\frac{\sqrt{3}}{2}$  καὶ  $90^\circ < \phi < 180^\circ$ , νά εὐρεθῶσιν οἱ άλλοι τριγωνομετρικοὶ άριθμοὶ τῆς γωνίας  $\phi$ .


215. Ἄν  $\epsilon\phi\psi = -1$  καὶ  $90^\circ < \psi < 180^\circ$ , νά εὐρεθῶσιν οἱ άλλοι τριγωνομετρικοὶ άριθμοὶ τῆς γωνίας  $\psi$ .

216. Ἄν  $\sigma\phi\omega = -\frac{\sqrt{3}}{3}$  καὶ  $90^\circ < \omega < 180^\circ$  νά εὐρεθῶσιν οἱ άλλοι τριγωνομετρικοὶ άριθμοὶ τῆς γωνίας  $\omega$ .

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

### ΕΠΙΛΥΣΙΣ ΜΗ ΟΡΘΟΓΩΝΙΩΝ ΤΡΙΓΩΝΩΝ

60. Σχέσεις τῶν κυρίων στοιχείων οἰουδήποτε τριγώνου.  
 α') Ἐστω ἐν τυχόν τρίγωνον  $AB\Gamma$  καὶ  $R$  ἡ ἀκτίς τῆς περιγεγραμμένης περιφερείας  $K$  (σχῆμα 19). Ἐάν φέρωμεν τὴν διάμετρον  $B\Delta$



Σχ. 19

καὶ τὴν χορδὴν  $\Gamma\Delta$ , σχηματίζομεν τὸ ὀρθογώνιον τρίγωνον  $B\Gamma\Delta$ . Ἐξ αὐτοῦ ἔπεται ὅτι:

$$(B\Gamma) = (B\Delta)\eta\mu\Delta \quad \eta \quad \alpha = 2R\eta\mu\Delta.$$

Ἐπειδὴ δὲ  $\Delta = A$  (σχ. 19α') ἢ  $\Delta + A = 180^\circ$  (σχ. 19β'), ἔπεται ὅτι  $\eta\mu\Delta = \eta\mu A$ , καὶ ἐπομένως  $\frac{\alpha}{\eta\mu A} = 2R$ . Ὁμοίως ἀποδεικνύομεν

ὅτι  $\frac{\beta}{\eta\mu B} = 2R$  καὶ  $\frac{\gamma}{\eta\mu\Gamma} = 2R$ . Ἄρα

$$\frac{\alpha}{\eta\mu A} = \frac{\beta}{\eta\mu B} = \frac{\gamma}{\eta\mu\Gamma} = 2R \quad (30)$$

Ἐλέπτομεν λοιπὸν ὅτι:

**1ον.** Αἱ πλευραὶ παντὸς τριγώνου εἶναι ἀνάλογοι πρὸς τὰ ἡμίτονα τῶν ἀπέναντι γωνιῶν αὐτοῦ.


**2ον.** Ὁ λόγος ἐκάστης πλευρᾶς τριγώνου πρὸς τὸ ἡμίτονον τῆς ἀπέναντι γωνίας ἰσοῦται πρὸς τὴν διάμετρον τῆς περιγεγραμμένης περιφερείας.

$\beta'$ ) Ἐστω  $AB\Gamma$  ἓν τυχὸν τρίγωνον καὶ  $B\Delta$  ἓν ὕψος αὐτοῦ (σχῆμα 20). Γνωρίζομεν ἐκ τῆς Γεωμετρίας ὅτι:

$$\alpha') \alpha^2 = \beta^2 + \gamma^2 - 2\beta \quad (A\Delta), \quad \text{ἂν } A < 90^\circ \text{ καὶ}$$

$$\beta') \alpha^2 = \beta^2 + \gamma^2 + 2\beta \quad (A\Delta), \quad \text{ἂν } A > 90^\circ.$$

Εἰς τὴν  $\alpha'$  περίπτωσιν (σχῆμα 20  $\alpha'$ ,  $\beta'$ ,) ἐκ τοῦ ὀρθογωνίου



Σχ. 20

τριγώνου  $AB\Delta$  προκύπτει ἡ ἰσότης  $(A\Delta) = \gamma \sigma\upsilon\nu A$ . Ἡ δὲ  $\alpha'$  τῶν προηγούμενων ἰσοτήτων γίνεται:

$$\alpha^2 = \beta^2 + \gamma^2 - 2\beta\gamma \sigma\upsilon\nu A \quad (1)$$

Εἰς δὲ τὴν  $\beta'$  περίπτωσιν (σχῆμα 20  $\gamma'$ ) εἶναι  $(A\Delta) = \gamma \sigma\upsilon\nu\alpha = -\gamma \sigma\upsilon\nu A$  καὶ ἐκ τῆς  $\beta'$  τῶν ἄνω ἰσοτήτων προκύπτει πάλιν ἡ (1) Εἰς πᾶσαν λοιπὸν περίπτωσιν εἶναι:

Ὅμοίως εὐρίσκομεν ὅτι:

$$\beta^2 = \alpha^2 + \gamma^2 - 2\alpha\gamma \sigma\upsilon\nu B \quad (31)$$

καὶ

$$\gamma^2 = \alpha^2 + \beta^2 - 2\alpha\beta \sigma\upsilon\nu \Gamma$$

Ἔστω:

Τὸ τετράγωνον ἐκάστης πλευρᾶς τριγώνου ἰσοῦται πρὸς τὸ ἄθροισμα τῶν τετραγώνων τῶν ἄλλων πλευρῶν ἡλαττωμένων κατὰ τὸ διπλάσιον τοῦ γινομένου αὐτῶν πολλαπλασιασθέντος ἐπὶ τὸ συνημίτονον τῆς γωνίας τούτων.

$\gamma'$ ) Ἐστω  $E$  τὸ ἔμβαδὸν ἐνὸς τριγώνου  $AB\Gamma$  (σχ. 20). Γνωρίζομεν ἐκ τῆς Γεωμετρίας ὅτι  $E = \frac{1}{2} \beta(B\Delta)$ . Ἐπειδὴ δὲ  $(B\Delta) = \gamma \eta\mu A$ , αὕτη γίνεται:

$$E = \frac{1}{2} \beta\gamma \eta\mu A \quad (32)$$

Βλέπομεν λοιπόν ὅτι:

Τὸ ἔμβαδὸν παντὸς τριγώνου ἰσοῦται πρὸς τὸ ἥμισυ τοῦ γινομένου δύο πλευρῶν αὐτοῦ πολλαπλασιασθέντος ἐπὶ τὸ ἥμι-  
τονον τῆς γωνίας αὐτῶν.

δ') Ἐστω τρίγωνον  $AB\Gamma$ , εἰς τὸ ὁποῖον εἶναι  $B\Gamma > A\Gamma$  ἢ  $\alpha > \beta$  (σχ. 21). Ἐπὶ τῆς εὐθείας  $B\Gamma$  ὀρίζομεν τμήματα  $\Gamma\Delta = \Gamma\Delta' = \beta$ . οὕτω δὲ εἶναι  $B\Delta = B\Gamma - \Gamma\Delta = \alpha - \beta$  καὶ

$$B\Delta' = B\Gamma + \Gamma\Delta' = \alpha + \beta.$$

Ἄν δὲ φέρωμεν τὰ εὐθύγραμμα τμήματα  $A\Delta, A\Delta'$ , ἡ πλευρὰ  $A\Gamma$  γίνεται διάμεσος τοῦ τριγώνου  $A\Delta\Delta'$ . Ἐπειδὴ δὲ ἡ διάμεσος αὕτη εἶναι τὸ ἥμισυ τῆς  $\Delta\Delta'$ , ἡ γωνία  $\Delta A\Delta'$  εἶναι ὀρθή.

Ἦδη παρατηροῦμεν ὅτι ἡ γωνία  $\omega'$  εἶναι ἔξωτερικὴ γωνία τοῦ τριγώνου  $AB\Gamma$  καὶ τοῦ ἰσοσκελοῦς τριγώνου  $A\Gamma\Delta$ . Ἐνεκα τούτου δὲ εἶναι:

$$\omega' = A + B, \quad \omega' = 2\omega \quad \text{καὶ ἔπομένως} \quad \omega = \frac{A + B}{2} \quad (1)$$

Ἄν δὲ φέρωμεν τὴν  $BE$  παράλληλον πρὸς τὴν  $AD$ , θὰ εἶναι:


$$B + \eta = \omega = \frac{A + B}{2}, \quad \eta = \frac{A + B}{2} - B = \frac{A - B}{2}$$

$$\text{καὶ} \quad \frac{EA}{ED'} = \frac{B\Delta}{B\Delta'} = \frac{\alpha - \beta}{\alpha + \beta} \quad (2)$$

Ἐπειδὴ δὲ ἐκ τῶν ὀρθογωνίων τριγώνων  $EAB, E\Delta'B$  βλέπομεν ὅτι  $(EA) = (EB)\epsilon\phi\eta = (EB)\epsilon\phi\left(\frac{A-B}{2}\right)$  καὶ  $(ED') = (EB)\epsilon\phi(B+\eta)$

$$= (EB)\epsilon\phi\left(\frac{A+B}{2}\right), \quad \text{ἔπεται ὅτι} \quad \frac{EA}{ED'} = \frac{\epsilon\phi\left(\frac{A-B}{2}\right)}{\epsilon\phi\left(\frac{A+B}{2}\right)} \quad \text{καὶ ἔνεκα τῆς (2)}$$

$$\text{εἶναι:} \quad \frac{\alpha - \beta}{\alpha + \beta} = \frac{\epsilon\phi\left(\frac{A - B}{2}\right)}{\epsilon\phi\left(\frac{A + B}{2}\right)} \quad (33)$$



Σχ. 21.

Βλέπομεν λοιπόν ὅτι :

Ἐπιπέδου τῆς διαφορᾶς δύο πλευρῶν τριγώνου πρὸς τὸ ἄθροισμα αὐτῶν εἶναι ἴσος πρὸς τὸν λόγον τῆς ἐφαπτομένης τῆς ἡμιδιαφορᾶς τῶν ἀπέναντι γωνιῶν πρὸς τὴν ἐφαπτομένην τοῦ ἡμισυαθροίσματος τῶν γωνιῶν τούτων.

### Ἀσκήσεις

217. Νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι τὸ ὕψος ΒΔ ἑνὸς τριγώνου ΑΒΓ ἰσοῦται πρὸς  $2R \eta\mu A \eta\mu\Gamma$ .

218. Νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι διὰ πᾶν τρίγωνον ΑΒΓ εἶναι:  $E = 2R^2 \eta\mu A \eta\mu B \eta\mu\Gamma$ .

219. Ἐὰν  $\eta\mu^2 A = \eta\mu^2 B + \eta\mu^2 \Gamma$ , νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι τὸ τρίγωνον ΑΒΓ εἶναι ὀρθογώνιον.

220. Νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι διὰ πᾶν τρίγωνον ΑΒΓ εἶναι:

$$\frac{\alpha^2 + \gamma^2 - \beta^2}{\beta^2 + \gamma^2 - \alpha^2} = \frac{\epsilon\phi A}{\epsilon\phi B}.$$

221. Εἰς τυχὸν τρίγωνον ΑΒΓ φέρομεν τὴν διάμεσον ΑΜ. Ἐὰν καλέσωμεν  $\omega$  τὴν γωνίαν αὐτῆς μὲ τὴν ΑΒ καὶ  $\phi$  μὲ τὴν ΑΓ, νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι  $\gamma \eta\mu\omega - \beta \eta\mu\phi = 0$ .

222. Ἐν τρίγωνον ἔχει  $\alpha = 37$  μέτ,  $\beta = 13$  μέτ,  $A - B = 48^\circ 27' 20''$ . Νὰ εὐρεθῇ ἡ γωνία  $\Gamma$  αὐτοῦ.

### Α' ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΣ ΕΠΙΛΥΣΕΩΣ ΜΗ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΥ

**61. Πρόβλημα I.** Νὰ ἐπιλυθῇ ἓν τρίγωνον ΑΒΓ, ἂν δοθῶσι μία πλευρὰ καὶ δύο γωνίαι αὐτοῦ.

Ἐστω π.χ. ὅτι δίδεται ἡ πλευρὰ  $\alpha$  καὶ αἱ γωνίαι Β καὶ Γ αὐτοῦ. Εἶναι φανερόν ὅτι πρέπει νὰ εἶναι  $B + \Gamma < 180^\circ$ , διὰ νὰ ἔχη τὸ πρόβλημα λύσιν.

**Ἐπιλύσις.** Ἐκ τῆς γνωστῆς ἰσότητος  $A + B + \Gamma = 180^\circ$  ἔπεται ὅτι  $A = 180^\circ - (B + \Gamma)$ .

Ἐκ δὲ τῶν ἰσοτήτων		Γνωστὰ	Ἄγνωστα		
$\frac{\alpha}{\eta\mu A} = \frac{\beta}{\eta\mu B} = \frac{\gamma}{\eta\mu\Gamma}$	εὐρίσκομεν ὅτι:			στοιχεῖα	στοιχεῖα
$\beta = \frac{\alpha \eta\mu B}{\eta\mu A}, \quad \gamma = \frac{\alpha \eta\mu\Gamma}{\eta\mu A}.$				$\alpha, B, \Gamma$	$A, \beta, \gamma, E$

Ἐπειδὴ δὲ  $\eta\mu A = \eta\mu(B + \Gamma)$ , αὗται γίνονται:

$$\beta = \frac{\alpha \eta \mu B}{\eta \mu (B + \Gamma)}, \quad \gamma = \frac{\alpha \eta \mu \Gamma}{\eta \mu (B + \Gamma)}$$

Τέλος ἐκ τῆς  $E = \frac{1}{2} \beta \gamma \eta \mu A$  καὶ τῶν προηγουμένων τιμῶν τῶν  $\beta$  καὶ  $\gamma$  εὐρίσκομεν ὅτι:

$$E = \frac{\alpha^2 \eta \mu B \eta \mu \Gamma}{2 \eta \mu A} = \frac{\alpha^2 \eta \mu B \eta \mu \Gamma}{2 \eta \mu (B + \Gamma)} \quad (34)$$

Σημείωσις. Εἰς τὰς ἐφαρμογὰς μεταχειριζόμεθα τὸ  $\eta \mu A$ , ἂν  $A (90^\circ$  καὶ τὸ  $\eta \mu (B + \Gamma)$ , ἂν  $A > 90^\circ$ .

*Παράδειγμα.* Ἐστω  $\alpha = 3475,6$  μέτ.,  $B = 27^\circ 12' 18''$  καὶ  $\Gamma = 50^\circ 40' 15''$ .

*Ὑπολογισμὸς τῆς A*

$B = 27^\circ 12' 18''$	$180^\circ = 179^\circ 59' 60''$
$\Gamma = 50^\circ 40' 15''$	$B + \Gamma = 77^\circ 52' 33''$
$B + \Gamma = 77^\circ 52' 33''$	$A = 102^\circ 7' 27''$

*Ὑπολογισμὸς τῶν  $\beta$  καὶ  $\gamma$*

$\beta = \frac{\alpha \eta \mu B}{\eta \mu (B + \Gamma)}$	$\gamma = \frac{\alpha \eta \mu \Gamma}{\eta \mu (B + \Gamma)}$
$\log \beta = \log \alpha + \log \eta \mu B - \log \eta \mu (B + \Gamma)$	
$\log \gamma = \log \alpha + \log \eta \mu \Gamma - \log \eta \mu (B + \Gamma)$	
$\log \alpha = 3,54103$	$\log \alpha = 3,54103$
$\log \eta \mu B = 1,66008$	$\log \eta \mu \Gamma = 1,88847$
$\alpha \theta \rho \iota \sigma \mu \alpha = 3,20211$	$\alpha \theta \rho \iota \sigma \mu \alpha = 3,42950$
$\log \eta \mu (B + \Gamma) = 1,99021$	$\log \eta \mu (B + \Gamma) = 1,99021$
$\log \beta = 3,21090$	$\log \gamma = 3,43929$
$\beta = 1525,19$ μέτ.	$\gamma = 2749,75$

*Ὑπολογισμὸς τοῦ E.*

	$2E = \frac{\alpha^2 \eta \mu B \eta \mu \Gamma}{\eta \mu (B + \Gamma)}$
$\log (2E) = 2 \log \alpha + \log \eta \mu B + \log \eta \mu \Gamma - \log \eta \mu (B + \Gamma)$	
$2 \log \alpha = 7,08206$	$\alpha \theta \rho \iota \sigma \mu \alpha = 6,63061$
$\log \eta \mu B = 1,66008$	$\log \eta \mu (B + \Gamma) = 1,99021$
$\log \eta \mu \Gamma = 1,88847$	$\log (2E) = 6,64040$
$\alpha \theta \rho \iota \sigma \mu \alpha = 6,63061$	$2E = 4\ 369\ 200$ τετ. μέτ.

$$E = 2\ 184\ 600 \text{ τετ. μέτ.}$$

### Άσκησης

223. Έν τρίγωνον ΑΒΓ έχει  $\alpha = 5$  μέτ.,  $B = 25^\circ 20'$  και  $\Gamma = 32^\circ 53'$ . Νά ἐπιλυθῆ τοῦτο.

224. Έν τρίγωνον ΑΒΓ έχει  $\alpha = 265,6$  μέτ.,  $B = 70^\circ 15' 20''$  και  $\Gamma = 48^\circ 44' 40''$ . Νά ἐπιλυθῆ τοῦτο.

225. Έν τρίγωνον έχει  $\beta = 2\,667,65$  μέτ.,  $A = 58^\circ 15' 30''$  και  $B = 20^\circ 20' 45''$ . Νά ἐπιλυθῆ τοῦτο.

226. Ἡ διαγώνιος ΑΓ ἑνὸς παραλληλογράμμου ΑΒΓΔ έχει μήκος 8 μέτ. και διαιρεῖ τὴν γωνίαν Α εἰς δύο γωνίας μὲ μέτρον  $23^\circ 15'$  ἢ μία και  $50^\circ 25'$  ἢ ἄλλη. Νά εὐρεθῶσι τὰ μήκη τῶν πλευρῶν και τὸ ἔμβαδὸν τοῦ παραλληλογράμμου τοῦτου.

227. Εἰς ἕνα κύκλον ἀκτίνας 0,7 μέτ. ἄγομεν χορδὴν ΒΓ ἴσην πρὸς τὴν ἀκτίνα και ἑφαπτομένης ΑΒ, ΑΓ. Νά ἐπιλυθῆ τὸ τρίγωνον ΑΒΓ.

228. Έν ἰσοσκελὲς τρίγωνον ΑΒΓ έχει βάσιν (ΒΓ) = 2,5 μέτ. και  $A = 116^\circ 34' 46''$ . Νά ἐπιλυθῆ τοῦτο.

229. Εἰς ἕν σημεῖον Α ἐνεργοῦσι δύο δυνάμεις ὑπὸ γωνίαν  $64^\circ 20' 40''$ . Ἡ συνισταμένη αὐτῶν έχει ἔντασιν 45 χιλιογράμμων και σχηματίζει μὲ τὴν μίαν συνιστώσαν γωνίαν  $48^\circ 12'$ . Νά εὐρεθῆ ἡ ἔντασις ἐκάστης τῶν δυνάμεων τούτων.

230. Έν τρίγωνον ΑΒΓ έχει  $\alpha = 0,85$  μέτ.,  $B = 42^\circ 20'$ ,  $\Gamma = 74^\circ 10' 30''$ . Νά εὐρεθῆ τὸ μήκος τοῦ ὕψους ΑΔ αὐτοῦ.

231. Εἰς κύκλον ἀκτίνας 2 μέτ. εἶναι ἐγγεγραμμένον τρίγωνον, τὸ ὁποῖον έχει  $B = 56^\circ 20' 18''$  και  $\Gamma = 102^\circ 10' 24''$ . Νά ἐπιλυθῆ τοῦτο.

#### Β' ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΣ ΕΠΙΛΥΣΕΩΣ ΜΗ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΥ

**62. Πρόβλημα II.** Νά ἐπιλυθῆ τρίγωνον ΑΒΓ, ἂν δοθῶσι δύο πλευραὶ και ἡ γωνία, ἡ ὁποία κεῖται ἀπέναντι τῆς μιᾶς τούτων.

Ἐστω π.χ. ὅτι δίδονται αἱ πλευραὶ  $\alpha$ ,  $\beta$  και ἡ γωνία Α.

Ἐπίλυσις Ἐκ τῆς ἰσότητος  $\frac{\alpha}{\eta\mu A} = \frac{\beta}{\eta\mu B}$  εὐρίσκομεν ὅτι

$$\eta\mu B = \frac{\beta \eta\mu A}{\alpha}$$

Ἐκ ταύτης δὲ ὀρίζεται ἡ γωνία Β. Μετὰ ταῦτα εὐρίσκομεν και τὴν  $\Gamma$  διὰ τῆς ἰσότητος  $\Gamma = 180^\circ - (A + B)$ .

Ἐπειτα ἐκ τῆς  $\frac{\alpha}{\eta\mu A} = \frac{\gamma}{\eta\mu \Gamma}$  εὐρίσκομεν ὅτι  $\gamma = \frac{\alpha \eta\mu \Gamma}{\eta\mu A}$  και ὀρίζομεν τὴν  $\gamma$ . Τέλος ἐκ τῆς  $E = \frac{1}{2} \alpha \beta \eta\mu \Gamma$  εὐρίσκομεν τὸ ἔμβαδόν.

1ον Παράδειγμα. Ἐστω  $\alpha = 347$  μέτ.,  $\beta = 260$  μέτ. καὶ  $A = 35^\circ$ .

Ἐπολογισμὸς τῆς  $B$

$$\eta\mu B = \frac{\beta\eta\mu A}{\alpha}$$

$$\log\eta\mu B = \log\beta + \log\eta\mu A - \log\alpha.$$

$$\log\beta = 2,41497$$

$$\log\eta\mu A = 1,75859$$

$$\hline \text{ἄθροισμα} = 2,17356$$

$$\log\alpha = 2,54033$$

$$\hline \log\eta\mu B = 1,63323$$

$$\hline B = 25^\circ 27' 9''$$

καὶ

Γνωστὰ Ἀγνωστα  
στοιχεῖα

$\alpha, \beta, A$   $B, \Gamma, \gamma, E,$

Τύποι ἐπιλύσεως

$$\eta\mu B = \frac{\beta\eta\mu A}{\alpha},$$

$$\Gamma = 180^\circ - (A + B)$$

$$\gamma = \frac{\alpha\eta\mu\Gamma}{\eta\mu A}, \quad E = \frac{1}{2}\alpha\beta\eta\mu\Gamma.$$

$$180^\circ = 179^\circ 59' 60''$$

$$B = 25^\circ 27' 9''$$

$$\hline B' = 154^\circ 32' 51''$$

Ἐπειδὴ ὁμως  $154^\circ 32' 51'' + 35^\circ = 189^\circ 32' 51'' > 180^\circ$ , ἡ δευτέρα τιμὴ τῆς  $B$  δὲν εἶναι δεκτὴ.

Ἐπολογισμὸς τῆς  $\Gamma$

$$180^\circ = 179^\circ 59' 60''$$

$$A + B = 60^\circ 27' 9''$$

καὶ

$$\hline \Gamma = 119^\circ 32' 51''$$

Ἐπολογισμὸς τῆς  $\gamma$

$$\text{Ἐκ τῆς } \gamma = \frac{\alpha\eta\mu\Gamma}{\eta\mu A} \text{ ἔπεται ὅτι:}$$

$$\log\gamma = \log\alpha + \log\eta\mu\Gamma - \log\eta\mu A$$

$$\log\alpha = 2,54033$$

$$\log\eta\mu\Gamma = 1,93949$$

$$\hline \text{ἄθροισμα} = 2,47982$$

$$\hline \log\eta\mu A = 1,75859$$

$$\hline \gamma = 526,3 \text{ μέτ.}$$

Ἐπολογισμὸς τοῦ  $E$

Ἐκ τῆς  $2E = \alpha\beta\eta\mu\Gamma$ , ἔπεται ὅτι:

$$\log(2E) = \log\alpha + \log\beta + \log\eta\mu\Gamma$$

$$\log\alpha = 2,54033$$

$$\log\beta = 2,41497$$

$$\log\eta\mu\Gamma = 1,93949$$

$$\hline \log(2E) = 4,89479$$

$$2E = 78\,486 \text{ τετ. μέτ.}$$

$$E = 39\,243 \text{ τετ. μέτ.}$$

2ον Παράδειγμα. Ἐστω ὅτι  $\alpha = 300$  μέτ.,  $\beta = 456,75$  μέτ. καὶ  $A = 34^\circ 16'$ .

Ἐργαζομενοι ὅπως εἰς τὸ προηγούμενον παράδειγμα εὐρίσκομεν πρῶτον ὅτι  $B = 59^\circ 0' 25'',7$  καὶ  $B' = 120^\circ 59' 34'',3$ . Ἐπειδὴ δὲ  $B' + A < 180^\circ$ , ἔπεται ὅτι καὶ αἱ δύο αὐταί τιμαὶ εἶναι δεκταί.

Εἰς ἐκάστην δὲ τούτων ἀντιστοιχεῖ μία τιμὴ τῆς  $\Gamma$ , μία τῆς  $\gamma$  καὶ μία τοῦ  $E$ . Ταῦτα ὑπολογίζομεν ὡς ἑξῆς:

Ἐπιλογισμὸς τῶν τιμῶν τῆς  $\Gamma$

$A = 34^{\circ} 16'$	$180^{\circ} = 179^{\circ} 59' 60''$
$B = 59^{\circ} 0' 25'',7$	$A+B = 93^{\circ} 16' 25'',7$
$B' = 120^{\circ} 59' 34'',3$	<hr/> $\Gamma = 86^{\circ} 43' 34'',3$
<hr/> $A+B = 93^{\circ} 16' 25'',7$	$A+B' = 155^{\circ} 15' 34'',3$
$A+B' = 155^{\circ} 15' 34'',3$	<hr/> $\Gamma' = 24^{\circ} 44' 25'',7$

Ἐπιλογισμὸς τῶν τιμῶν τῆς  $\gamma$ . Ἐκ τῆς  $\gamma = \frac{\alpha \eta \mu \Gamma}{\eta \mu A}$ , ἔπεται ὅτι:

$\log \gamma = \log \alpha + \log \eta \mu \Gamma - \log \eta \mu A$	$\log \gamma' = \log \alpha + \log \eta \mu \Gamma' - \log \eta \mu A$
$\log \alpha = 2,47712$	$\log \alpha = 2,47712$
$\log \eta \mu \Gamma = 1,99929$	$\log \eta \mu \Gamma' = 1,62171$
<hr/> $\text{ἄθροισμα} = 2,47641$	<hr/> $\text{ἄθροισμα} = 2,09883$
$\log \eta \mu A = 1,75054$	$\log \eta \mu A = 1,75054$
<hr/> $\log \gamma = 2,72587$	<hr/> $\log \gamma' = 2,34829$
$\gamma = 531,95 \text{ μέτ.}$	$\gamma' = 222,995 \text{ μέτ.}$

Ἐπιλογισμὸς τῶν τιμῶν τοῦ  $E$ . Ἐκ τῆς  $2E = \alpha \beta \eta \mu \Gamma$  ἔπεται ὅτι:

$\log(2E) = \log \alpha + \log \beta + \log \eta \mu \Gamma$	$\log(2E') = \log \alpha + \log \beta + \log \eta \mu \Gamma'$
$\log \alpha = 2,47712$	$\log \alpha = 2,47712$
$\log \beta = 2,65968$	$\log \beta = 2,65968$
$\log \eta \mu \Gamma = 1,99929$	$\log \eta \mu \Gamma' = 1,62171$
<hr/> $\log(2E) = 5,13609$	<hr/> $\log(2E') = 4,75851$
$2E = 136 800 \text{ τετ. μέτ.}$	$2E' = 57 347,14 \text{ τ.μ.}$
$E = 68 400 \text{ τετ. μέτ.}$	$E' = 28 673,57 \text{ τ.μ.}$

3ον Παράδειγμα. Ἐστω  $\alpha = 900 \text{ μέτ.}$ ,  $\beta = 1 245 \text{ μέτ.}$  καὶ  $A = 53^{\circ} 12' 20''$

Ἐπιλογισμὸς τῆς  $B$ .

Ἐκ τῆς  $\eta \mu B = \frac{\beta \eta \mu A}{\alpha}$  ἔπεται ὅτι:  $\log \eta \mu B = \log \beta + \log \eta \mu A - \log \alpha$ .

$\log \beta = 3,09517$	$\text{ἄθροισμα} = 2,99869$
$\log \eta \mu A = 1,90352$	$\log \alpha = 2,95424$
<hr/> $\text{ἄθροισμα} = 2,99869$	<hr/> $\log \eta \mu B = 0,04445$

Ἐκ τούτου ἔπεται ὅτι  $\eta\mu B > 1$ , ὅπερ ἀδύνατον. Τὸ πρόβλημα λοιπὸν δὲν ἔχει λύσιν.

**Σημείωσις.** Τὸ ἀδύνατον τοῦ προβλήματος τούτου ἐννοοῦμεν καὶ ὡς ἑξῆς: Θέτοντες  $\chi = \beta\eta\mu A$  εὐρίσκομεν ὅτι  $\log \chi = \log \beta + \log \eta\mu A = 2,99869$ , ὅθεν καὶ  $\chi = \beta\eta\mu A = 996,98$  α. Ἄρα  $\eta\mu B = \frac{\beta\eta\mu A}{\alpha} > 1$ , ὅπερ ἀτοπὸν.

### Ἀσκήσεις

232. Ἄν εἰς τρίγωνον ΑΒΓ εἶναι  $\frac{\beta\eta\mu A}{\alpha} = 1$ , νὰ ἀποδειχθῆ ὅτι  $B = 90^\circ$ .
233. Νὰ ἀποδειχθῆ ὅτι δὲν ὑπάρχει τρίγωνον ΑΒΓ, εἰς τὸ ὁποῖον νὰ εἶναι  $\beta\eta\mu A > \alpha$ .
234. Ἐν τρίγωνον ΑΒΓ ἔχει  $\alpha = 95,6$  μέτ.,  $\beta = 34,5$  μέτ. καὶ  $A = 30^\circ 15' 28''$ . Νὰ ἐπιλυθῆ τοῦτο.
235. Τρίγωνον ΑΒΓ ἔχει  $\alpha = 500$  μέτ.,  $\beta = 640$  μέτ. καὶ  $A = 40^\circ 20' 10''$ . Νὰ ἐπιλυθῆ τοῦτο.
236. Ἐν παραλληλόγραμμον ΑΒΓΔ ἔχει  $(AB) = 15,45$  μέτ.,  $(AG) = 25,50$  μέτ. καὶ  $B = 112^\circ$ . Νὰ ὑπολογισθῶσι τὰ μήκη τῶν ἄλλων πλευρῶν αὐτοῦ.
237. Ἡ συνισταμένη δύο δυνάμεων, αἱ ὁποῖαι ἐνεργοῦσιν εἰς ἓν σημεῖον ὑπὸ γωνίαν, ἔχει ἔντασιν 30,35 χιλιογράμμων. Ἡ μία ἀπὸ αὐτὰς ἔχει ἔντασιν 20,35 χιλιογράμμων, ἡ δὲ ἄλλη σχηματίζει μὲ τὴν συνισταμένην γωνίαν  $\frac{2\pi}{9}$  ἀκτινίων. Νὰ εὐρεθῆ ἡ ἔντασις τῆς β' δυνάμεως καὶ ἡ γωνία τῶν δυνάμεων τούτων.

### Γ' ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΣ ΕΠΙΛΥΣΕΩΣ ΜΗ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΥ

**63. Πρόβλημα III.** Νὰ ἐπιλυθῆ ἓν τρίγωνον, ἂν δοθῶσι δύο πλευραὶ αὐτοῦ καὶ ἡ γωνία αὐτῶν.

Ἐστω ὅτι ἐδόθησαν αἱ πλευραὶ  $\alpha$ ,  $\beta$  καὶ ἡ γωνία  $\Gamma$  αὐτῶν καὶ ὅτι  $\alpha > \beta$ .

**Ἐπίλυσις.** Ἀπὸ τὴν γνωστὴν ἰσότητα :

Γνωστά,	Ἄγνωστα
	στοιχεῖα
α, β, Γ,	A, B, γ, E

$$\frac{\alpha - \beta}{\alpha + \beta} = \frac{\epsilon\phi\left(\frac{A-B}{2}\right)}{\epsilon\phi\left(\frac{A+B}{2}\right)} \text{ καὶ ἐκ τῆς } \frac{A+B}{2} + \frac{\Gamma}{2} = 90^\circ \text{ εὐρίσκομεν εὐκό-}$$

$$\text{λως ὅτι : } \epsilon\phi\left(\frac{A-B}{2}\right) = \frac{\alpha - \beta}{\alpha + \beta} \sigma\phi\left(\frac{\Gamma}{2}\right) \quad (1)$$

## Τύποι επιλύσεως

$$\epsilon\phi\left(\frac{A-B}{2}\right) = \frac{\alpha-\beta}{\alpha+\beta} \sigma\phi\left(\frac{\Gamma}{2}\right), \gamma = \frac{\alpha\eta\mu\Gamma}{\eta\mu A}, E = \frac{1}{2} \alpha\beta\eta\mu\Gamma.$$

Έκ τῆς (1) εὐρίσκομεν τὴν διαφορὰν  $A - B$  καὶ ἔστω  $\Delta$  ἡ τιμὴ αὐτῆς. Ἄν δὲ λύσωμεν τὸ σύστημα:

$$A - B = \Delta, A + B = 180^\circ - \Gamma,$$

εὐρίσκομεν τὰ μέτρα  $A$  καὶ  $B$  τῶν ἀγνώστων γωνιῶν τοῦ τριγώνου. Μετὰ ταῦτα ἐκ τῆς ἀναλογίας  $\frac{\gamma}{\eta\mu\Gamma} = \frac{\alpha}{\eta\mu A}$  εὐρίσκομεν ὅτι  $\gamma = \frac{\alpha\eta\mu\Gamma}{\eta\mu A}$ . Διὰ ταύτης δὲ ὑπολογίζομεν τὸ μῆκος  $\gamma$  τῆς ἀγνώστου πλευρᾶς.

Τέλος δὲ διὰ τῆς γνωστῆς ἰσότητος  $E = \frac{1}{2} \alpha\beta\eta\mu\Gamma$  εὐρίσκομεν τὸ ἐμβαδὸν τοῦ τριγώνου.

*Παράδειγμα.* Ἐστω ὅτι  $\alpha = 3475,6$  μέτ,  $\beta = 1625,2$  μέτ,  $\Gamma = 50^\circ 40' 15''$ .

Ἐπιλογισμὸς τῶν  $A$  καὶ  $B$ 

Ἐκ τῆς  $\epsilon\phi\left(\frac{A-B}{2}\right) = \frac{\alpha-\beta}{\alpha+\beta} \sigma\phi\left(\frac{\Gamma}{2}\right)$  ἔπεται ὅτι:

$$\log\epsilon\phi\left(\frac{A-B}{2}\right) = \log(\alpha-\beta) + \log\sigma\phi\left(\frac{\Gamma}{2}\right) - \log(\alpha+\beta).$$

*Βοηθητικὸς πίναξ*

$$\alpha = 3475,6$$

$$\log(\alpha-\beta) = 3,26727$$

$$\beta = 1625,2$$

$$\log\sigma\phi\left(\frac{\Gamma}{2}\right) = 0,32472$$

$$\alpha - \beta = 1850,4$$

$$\text{ἄθροισμα} = 3,59199$$

$$\alpha + \beta = 5100,8$$

$$\log(\alpha + \beta) = 3,70764$$

$$\Gamma = 50^\circ 40' 15''$$

$$\log\epsilon\phi\left(\frac{A-B}{2}\right) = 1,88435$$

$$\frac{\Gamma}{2} = 25^\circ 20' 7'',5$$

$$\frac{A-B}{2} = 37^\circ 27' 34'',6$$

$$180^\circ = 179^\circ 59' 60''$$

$$A - B = 74^\circ 55' 9'',2$$

$$\Gamma = 50^\circ 40' 15''$$

$$A + B = 129^\circ 19' 45''$$

$$A + B = 129^\circ 19' 45''$$

$$2A = 204^\circ 14' 54'',2$$

$$2B = 54^\circ 24' 35'',8$$

$$A = 102^\circ 7' 27'',1$$

$$B = 27^\circ 12' 17'',9$$

### Υπολογισμός τῆς $\gamma$

Ἐπειδὴ  $\gamma = \frac{\alpha \eta \mu \Gamma}{\eta \mu A}$ , εἶναι:  $\log \gamma = \log \alpha + \log \eta \mu \Gamma - \log \eta \mu A$ .

<p>Βοηθητικὸς πίναξ</p> $180^\circ = 179^\circ 59' 60''$ $A = 102^\circ 7' 27'', 1$ <hr style="width: 100%;"/> $180^\circ - A = 77^\circ 52' 32'', 9$ $\eta \mu A = \eta \mu(77^\circ 52' 32'', 9)$	$\log \alpha = 3,54103$ $\log \eta \mu \Gamma = 1,88847$ <hr style="width: 100%;"/> $\acute{\alpha}\theta\rho\omicron\iota\sigma\mu\alpha = 3,42950$ $\log \eta \mu A = 1,99021$ <hr style="width: 100%;"/> $\log \gamma = 3,43929$ $\gamma = 2749,75 \text{ μέτ.}$
---	---

### Υπολογισμὸς τοῦ ἐμβαδοῦ

Ἐκ τῆς  $E = \frac{1}{2} \alpha \beta \eta \mu \Gamma$  εὐρίσκομεν  $2E = \alpha \beta \eta \mu \Gamma$  καὶ ἐπομένως:

$$\log(2E) = \log \alpha + \log \beta + \log \eta \mu \Gamma:$$

$$\log \alpha = 3,54103$$

$$\log \beta = 3,21090$$

$$\log \eta \mu \Gamma = 1,88847$$

$$\log(2E) = 6,64040$$

$$2E = 4\,369\,200 \text{ τετ. μέτρα}$$

$$E = 2\,184\,600 \text{ τετ. μέτρα.}$$

### Ἀσκήσεις

238. Ἐν τρίγωνον ΑΒΓ ἔχει  $\beta = 300$  μέτ.,  $\gamma = 127$  μέτ. καὶ  $A = 68^\circ 40'$ . Νὰ ἐπιλυθῆ τοῦτο.

239. Ἐν τρίγωνον ἔχει  $\alpha = 122,4$  μέτ.,  $\beta = 244,8$  μέτ. καὶ  $\Gamma = 42^\circ 42' 42''$ . Νὰ ἐπιλυθῆ τοῦτο.

240. Ἐν τρίγωνον ἔχει  $\beta = \frac{3}{4}$  μέτ.,  $\gamma = \frac{5}{12}$  μέτ. καὶ  $A = 40^\circ$ . Νὰ ἐπιλυθῆ τοῦτο.

241. Αἱ διαγώνιοι ἑνὸς παραλληλογράμμου τέμνονται ὑπὸ γωνίαν  $45^\circ 20'$ . Ἡ μία δὲ ἀπὸ αὐτὰς ἔχει μῆκος 30 μέτ. καὶ ἡ ἄλλη 15 μέτ. Νὰ εὐρεθῶσι τὰ μῆκη τῶν πλευρῶν, τὰ μέτρα τῶν γωνιῶν καὶ τὸ ἐμβαδὸν τοῦ παραλληλογράμμου τοῦτου.

242. Εἰς ἕνα κύκλον γράφομεν χορδὴν ΒΓ ἴσην πρὸς τὴν ἀκτίνα αὐτοῦ. Ἐκ τοῦ σημείου δὲ Α τῆς περιφερείας ἄγονται αἱ χορδαὶ ΑΒ καὶ ΑΓ. Ἄν  $(AB) = 2\sqrt{3}$  μέτ. καὶ  $(AG) = 4$  μέτ., νὰ εὐρεθῆ τὸ μῆκος τῆς ἀκτίνας αὐτοῦ.

243. Δύο δυνάμεις ἐνεργοῦσιν εἰς σημεῖον Α ὑπὸ γωνίαν  $56^\circ 30'$ . Ἡ δὲ μία ἀπὸ αὐτὰς ἔχει ἔντασιν 10 χιλιογράμμων καὶ ἡ ἄλλη 15 χιλιογράμμων. Νὰ εὐρεθῆ

ή έντασις τῆς συνισταμένης αὐτῶν καὶ τὰ μέτρα τῶν γωνιῶν αὐτῆς με τὰς συνιστώσας.

244. Ἐν τρίγωνον ἔχει  $\alpha = 100$  μέτ.,  $\beta = 79$  μέτ.,  $\Gamma = \frac{5\pi}{9}$  ἀκτίνα. Νὰ ἐπιλυθῇ τοῦτο.

245. Τὸ σχέδιον ἀγροῦ ὑπὸ κλίμακα 0,001 εἶναι τρίγωνον ἔχον  $\alpha = 0,4$  μέτ.,  $\beta = 0,88$  μέτ. καὶ  $\Gamma = 40^\circ 30'$ . Νὰ εὐρεθῇ τὸ ἐμβαδὸν τοῦ ἀγροῦ τούτου.

246. Νὰ ἀναλυθῇ δύναμις 10 χιλιογράμμων εἰς δύο συνιστώσας, αἱ ὁποῖαι νὰ ἐνεργῶσιν εἰς τὸ αὐτὸ σημεῖον με αὐτήν. Ἡ μία δὲ ἀπὸ αὐτὰς νὰ ἔχη έντασιν 6 χιλιογράμμων καὶ νὰ σχηματίζη γωνίαν  $30^\circ$  με τὴν δοθεῖσαν.

#### Δ' ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΣ ΕΠΙΛΥΣΕΩΣ ΜΗ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΥ

64. Π ρ ό β λ η μ α Ι Ι'. Νὰ ἐπιλυθῇ ἐν τρίγωνον, ἂν δοθῶσιν αἱ πλευραὶ αὐτοῦ.

Ἐπίλυσις. Ἐκ τῆς γνωστῆς ἰσότητος  $\alpha^2 = \beta^2 + \gamma^2 - 2\beta\gamma\sigma\upsilon\nu A$  εὐρίσκομεν ὅτι  $\sigma\upsilon\nu A = \frac{\beta^2 + \gamma^2 - \alpha^2}{2\beta\gamma}$ . Ἐκ ταύτης ὀρίζομεν τὴν  $A$ . Ἐπειτα εὐρίσκεται εὐκόλως ἡ  $B$  ἐξ ἀντιστοίχου ἰσότητος. Τέλος τὸ ἐμβαδὸν εὐρίσκομεν ἐκ τῆς  $E = \frac{1}{2} \beta\gamma\eta\mu A$ .

Γνωστὰ	Ἄγνωστα	Τύποι ἐπιλύσεως
	στοιχεῖα	$\sigma\upsilon\nu A = \frac{\beta^2 + \gamma^2 - \alpha^2}{2\beta\gamma}$ , $\eta\mu B = \frac{\beta\eta\mu A}{\alpha}$
$\alpha, \beta, \gamma$	$A, B, \Gamma, E$	$E = \frac{1}{2} \beta\gamma\eta\mu A$ .

Π α ρ ά δ ε ι γ μ α. Ἐστω  $\alpha = 5$  μέτ.,  $\beta = 8$  μέτ.,  $\gamma = 10$  μέτ.

Ἐπολογισμὸς τῆς  $A$

$$\begin{array}{r} \sigma\upsilon\nu A = \frac{8^2 + 10^2 - 5^2}{2 \cdot 8 \cdot 10} = \frac{139}{160} \\ \log \eta\mu(90^\circ - A) = \log 139 - \log 160 \\ \log 139 = 2,14301 \\ \log 160 = 2,20412 \\ \hline \log \eta\mu(90^\circ - A) = 1,93889 \\ 90^\circ - A = 60^\circ 18' 43'' \end{array} \qquad \begin{array}{r} \eta\mu(90^\circ - A) = \frac{139}{160} \\ A = 90^\circ - (60^\circ 18' 43'') \\ 90^\circ = 89^\circ 59' 60'' \\ \qquad \qquad \qquad 60^\circ 18' 43'' \\ \hline A = 29^\circ 41' 17'' \end{array}$$

Ὅμοίως ἐκ τῆς ἰσότητος  $\beta^2 = \alpha^2 + \gamma^2 - 2\alpha\gamma\sigma\upsilon\nu B$  εὐρίσκομεν ὅτι  $\sigma\upsilon\nu B = \frac{\alpha^2 + \gamma^2 - \beta^2}{2\alpha\gamma} = \frac{25 + 100 - 64}{2 \cdot 5 \cdot 10} = 0,61$  καὶ  $B = 52^\circ 24' 38''$

Τὸ μέτρον τῆς  $\Gamma$  καὶ τὸ ἔμβαδὸν  $E$  εὐρίσκουσιν ἤδη εὐκόλως οἱ μαθηταί. Ἡ  $B$  δύναται νὰ εὐρεθῇ καὶ ἐκ τῆς σχέσεως:  $\eta\mu B = \frac{\beta\eta\mu A}{\alpha}$  μετὰ τὴν εὐρεσιν τῆς  $A$ .

*Σημείωσις.* Ἡ μέθοδος αὕτη εἶναι ἐπίπονος, ἰδίᾳ ἔταν τὰ δεδομένα εἶναι μεγάλοι ἀριθμοί.

*Β' τρόποσ.* Ἄν θέσωμεν  $\alpha + \beta + \gamma = 2\tau$ , γνωρίζομεν ἐκ τῆς Γεωμετρίας, ὅτι  $E = \sqrt{\tau(\tau-\alpha)(\tau-\beta)(\tau-\gamma)}$ . Ἀφ' ἑτέρου ἐμάθομεν (§ 60 γ') ὅτι  $E = \frac{1}{2} \beta\gamma\eta\mu A$ . Ἐκ τούτων εὐρίσκομεν ὅτι:

$$\eta\mu A = \frac{2}{\beta\gamma} \sqrt{\tau(\tau-\alpha)(\tau-\beta)(\tau-\gamma)}.$$

Οὕτω δὲ εὐρίσκομεν τὴν γωνίαν  $A$  περιοριζόμενοι εἰς τὴν ὀξείαν  $A$ . Ἐκ δὲ τῶν γνωστῶν (§ 60 α') ἰσοτήτων:  $\frac{\alpha}{\eta\mu A} = \frac{\beta}{\eta\mu B} = \frac{\gamma}{\eta\mu \Gamma}$  εὐρίσκομεν ὅτι  $\eta\mu B = \frac{\beta}{\alpha} \eta\mu A$ ,  $\eta\mu \Gamma = \frac{\gamma}{\alpha} \eta\mu A$ . Διὰ τούτων δὲ ὑπολογίζομεν καὶ τὰς ἄλλας ὀξείας γωνίας  $B$  καὶ  $\Gamma$ . Καὶ ἂν τὸ ἄθροισμα τῶν δύο γωνιῶν, αἱ ὁποῖαι εἶναι ἀπέναντι τῶν μικροτέρων πλευρῶν, εὐρεθῇ ὅτι εἶναι μικρότερον τῶν  $90^\circ$ , ἢ τρίτη γωνία πρέπει νὰ ἀντικατασταθῇ μετὰ τὸ παραπλήρωμά της, διότι πρέπει νὰ εἶναι ἀμβλεῖα. Τὸ δὲ ἔμβαδὸν εὐρίσκομεν ἀπὸ ἓνα τῶν ἀνωτέρω τύπων.

Βραδύτερον θὰ μάθωμεν καὶ ἄλλην συνήθως εἰς τὴν περίπτωσιν ταύτην χρησιμοποιουμένην μέθοδον, τὴν κλασσικὴν λεγομένην.

### Ἄσκησις

247. Ἐν τρίγωνον  $AB\Gamma$  ἔχει  $\alpha = 8$  μέτ,  $\beta = 9$  μέτ,  $\gamma = 10$  μέτ. Νὰ ἐπιλυθῇ τοῦτο

248. Ἐν τρίγωνον  $AB\Gamma$  ἔχει  $\gamma = 12$  μέτρα,  $\alpha = 16$  μέτ. καὶ διάμεσον ( $AM$ ) = 20 μέτ. Νὰ εὐρεθῇ τὸ μέτρον τῆς γωνίας  $B$  αὐτοῦ.

249. Τὰ μήκη  $\alpha, \beta, \gamma$ , τῶν πλευρῶν τριγώνου  $AB\Gamma$  εἶναι ἀνάλογα πρὸς τοὺς ἀριθμοὺς 2, 3, 4. Νὰ εὐρεθῶσι τὰ μέτρα τῶν γωνιῶν αὐτοῦ.

250. Ἐν τρίγωνον  $AB\Gamma$  ἔχει  $\gamma = 8$  μέτ, διχοτόμον ( $AD$ ) = 6 μέτρα καὶ ( $BD$ ) = 4 μέτ. Νὰ ἐπιλυθῇ τοῦτο.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'

### ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΑΙ

65. **Γραφόμετρον.** Διὰ τὴν μέτρησιν τῶν γωνιῶν οἱ τοπογράφοι μεταχειρίζονται ἀκριβῆ ὄργανα, τὰ ὁποῖα γενικῶς λέγονται **γωνιόμετρα**. Ἐν τοιοῦτον ἀκριβέστατον ὄργανον εἶναι ὁ **Θεοδόλιχος**,

τὸν ὁποῖον ἐγνωρίσαμεν εἰς τὸ μάθημα τῆς Κοσμογραφίας. Ἀπλούστερον δὲ γωνιομετρικὸν ὄργανον εἶναι τὸ **Γραφόμετρον**.




Γραφόμετρον

ἐπίπεδον. Δι' ἀρθρωτικῆς βάσεως τὸ ἡμικύκλιον δύναται νὰ συμπίπτῃ με οἰονδήποτε ἐπίπεδον (σχ. 22).

Διὰ νὰ μετρήσωμεν γωνίαν ΒΑΓ θέτομεν τὸ ὄργανον οὕτως

ὥστε τὸ ἡμικύκλιον νὰ εἶναι παράλληλον πρὸς τὸ ἐπίπεδον τῆς γωνίας, τὸ κέντρον  $O$  νὰ προβάλληται καθέτως εἰς τὴν κορυφὴν  $A$  τῆς γωνίας καὶ τὸ ἀμετάθετον σκοπευτικὸν ἐπίπεδον νὰ ἔχη τὴν διεύθυνσιν τῆς μιᾶς πλευρᾶς  $AB$  τῆς γωνίας (σχ. 22). Στρέφομεν




Σχ. 22

ἔπειτα τὸν κανόνα  $E'E$  περὶ τὸ κέντρον  $O$ , μέχρις οὗ τὸ κινητὸν σκοπευτικὸν ἐπίπεδον λάβῃ τὴν διεύθυνσιν τῆς ἄλλης πλευρᾶς  $AG$  τῆς γωνίας. Τὸ μέτρον τοῦ τόξου  $\Delta E$ , τὸ ὁποῖον περιέχεται τότε μεταξὺ τῶν σκοπευτικῶν ἐπιπέδων, εἶναι προφανῶς τὸ ζητούμενον μέτρον τῆς γωνίας  $BA\Gamma$ .

**66. Πρόβλημα I.** Νὰ εὑρεθῇ ἡ ἀπόστασις προσίτου σημείου  $A$  ἀπὸ ἄλλου ἀπροσίτου ἀλλ' ὄρατοῦ σημείου  $\Gamma$  (σχ. 23).

*Λύσις.* Ἐπὶ τοῦ ὀριζοντίου ἐπιπέδου τοῦ  $A$  ὀρίζομεν σημείον  $B$ , ἀπὸ τοῦ ὁποῖου φαίνονται τὰ  $A$  καὶ  $\Gamma$  καὶ εἶναι δυνατὴ ἡ μέτρησις τῆς ἀποστάσεως  $AB$  μετὰ πάσης δυνατῆς ἀκριβείας. Μετὰ

τὴν ᾠμέτρῃσιν αὐτῆς τοποθετοῦντες τὸ γωνιομετρικὸν ὄργανόν μας εἰς τὰ ἄκρα A καὶ B μετροῦμεν τὰς γωνίας ΒΑΓ καὶ ΑΒΓ. Ἐνῆκα δὲ τοῦ τριγώνου ΑΒΓ εἶναι



Σχ. 23

$$\frac{(ΑΓ)}{\acute{\eta}\mu Β} = \frac{(ΑΒ)}{\acute{\eta}\mu Γ} = \frac{(ΑΒ)}{\acute{\eta}\mu(Α+Β)}$$


καὶ ἔπομένως

$$(ΑΓ) = \frac{(ΑΒ)\acute{\eta}\mu Β}{\acute{\eta}\mu(Α+Β)}$$

Οὕτως εὐρίσκομεν τὴν ζητουμένην ἀπόστασιν τῶν A καὶ Γ.

**67. Πρόβλημα II. Νὰ εὐρεθῇ ἡ ἀπόστασις δύο ἀπροσίτων ἄλλ' ὀρατῶν σημείων A, B (Σχ. 24).**

*Λύσις.* Ἐπὶ ὀριζοντίου ἐδάφους ὀρίζομεν δύο σημεία Γ, Δ, ἀπὸ τὰ ὁποῖα φαίνονται καὶ τὰ δύο σημεία A, B ἕκαστον δὲ νὰ εἶναι ὀρατὸν ἀπὸ τὸ ἄλλο. Μετροῦμεν ἔπειτα τὴν ΓΔ καὶ τὰς γωνίας ΑΓΔ, ΑΔΓ, ΔΓΒ, ΒΔΓ καὶ ΑΓΒ. Ἐπειτα διὰ μερικῆς ἐπιλύσεως ἑκάστου τῶν τριγώνων ΑΓΔ, ΒΓΔ εὐρίσκομεν τὰ μήκη (ΑΓ) καὶ (ΓΒ). Οὕτω δὲ γνωρίζομεν τὰς δύο πλευρὰς ΑΓ, ΓΒ τοῦ τριγώνου ΑΓΒ καὶ τὴν γωνίαν ω. Ἐκ τούτου λοιπὸν εὐρίσκομεν τὴν ἀπόστασιν ΑΒ (§ 63).



Σχ. 24


**68. Πρόβλημα III. Νὰ εὐρεθῇ τὸ ὕψος ἑνὸς πύργου, τοῦ ὁποῖου ἡ βάσις εἶναι προσιτῆ (Σχ. 25).**

*Λύσις.* Ἀρχόμενοι ἀπὸ τὴν βάσιν τοῦ πύργου ὀρίζομεν καὶ μετροῦμεν εὐθύγραμμον τμήμα ΑΟ' ἔστω δὲ (ΑΟ') = δ. Τοποθετοῦμεν ἔπειτα εἰς τὸ Ο' τὸ γωνιομετρικὸν ὄργανον ὕψους (ΟΟ') = υ καὶ μετροῦμεν τὴν γωνίαν ΒΟΓ = ω τῆς ὀπτικῆς ἀκτί-



ἢ ὄπισθεν κωλύματος  $\Sigma$  προέκτασις μιᾶς εὐθείας  $AB$  (σχ. 28).

*Δύσις.* Μετροῦμεν μετὰ πάσης δυνατῆς ἀκριβείας τὴν ἀπό-



Σχ. 28

στασιν  $AB$  δύο σημείων τῆς δοθείσης εὐθείας. Ἐπειτα τοποθετοῦμεν ὄρατὸν σῆμα εἰς σημεῖον  $\Gamma$ , ἀπὸ τοῦ ὁποῖον φαίνονται τὰ σημεῖα  $A, B$  καὶ ὁ κατὰ τὴν διεύθυνσιν τῆς  $AB$  ὄπισθεν τοῦ  $\Sigma$  χώρος. Πρὸς τὸν χώρον τοῦτον κατεθύνομεν εὐθεῖαν  $\Gamma Z$ , τὴν ὁποίαν

χαράσσομεν δι' ἄκοντίων. Ἐστω δὲ  $\Delta$  ἡ τομὴ αὐτῆς καὶ τῆς ζητουμένης  $E\Delta$ .

Μετροῦμεν ἔπειτα τὰς γωνίας  $BA\Gamma, AB\Gamma, A\Gamma Z$  καὶ ὑπολογίζομεν τὸ μῆκος τῆς πλευρᾶς  $A\Gamma$  τοῦ τριγώνου  $AB\Gamma$ .

Ἐπειτα ὑπολογίζομεν τὸ μῆκος τῆς πλευρᾶς  $\Gamma\Delta$  τοῦ νοητοῦ τριγώνου  $A\Gamma\Delta$  καὶ τὸ μέτρον  $\theta$  τῆς γωνίας  $\Delta$  αὐτοῦ. Ἐκ τοῦ μήκους δὲ ( $\Gamma\Delta$ ) ὀρίζομεν τὴν θέσιν τοῦ σημείου  $\Delta$  μετὰ τὴν βοήθειαν τῆς μετροταινίας. Τοποθετοῦμεν ἔπειτα εἰς τὸ  $\Delta$  γωνιομετρικὸν ὄργανον καὶ τῇ βοηθείᾳ αὐτοῦ χαράσσομεν δι' ἄκοντίων εὐθεῖαν  $\Delta E$  πρὸς τὸ μέρος τοῦ  $\Sigma$  καὶ σχηματίζουσιν μετὰ τὴν  $\Gamma Z$  γωνίαν μετὰ μέτρον  $\theta$ . Ἡ  $E\Delta$  εἶναι προφανῶς ἡ ζητουμένη προέκτασις.

### Ἀσκήσεις

251. Εἰς τὸ ὀριζόντιον ἐπίπεδον τῆς βάσεως  $\Delta$  πύργου ὀρίζεται σημεῖον  $A$  ἀπὸ τοῦ ὁποῖον ὁ πύργος φαίνεται ὑπὸ γωνίαν  $60^\circ$ . Ἀπὸ δὲ ἄλλου σημείου  $B$  τῆς εὐθείας  $\Delta A$  φαίνεται ὑπὸ γωνίαν  $30^\circ$ . Ἄν ( $AB$ ) = 100 μέτρ., νὰ εὑρεθῇ τὸ ὕψος  $\Delta\Gamma$  τοῦ πύργου.

252. Δύο σημεία  $A$  καὶ  $B$  κείνται ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ ὀριζοντίου ἐπιπέδου καὶ ἀπέχουσιν ἀλλήλων 1000 μέτρα. Ἐν ἀπρόσιτον σημεῖον  $\Pi$  φαίνεται ἐξ ἀμφοτέρων ὑπὸ γωνίαν ὕψους  $35^\circ$ . Ἡ δὲ ἀπόστασις τοῦ  $\Pi$  ἀπὸ ἐκάστου τῶν  $A$  καὶ  $B$  φαίνεται ἐκ τοῦ ἄλλου ὑπὸ γωνίαν  $60^\circ$ . Νὰ εὑρεθῇ τὸ ὕψος τοῦ  $\Pi$  ἀπὸ τοῦ ὀριζοντίου ἐπιπέδου τῶν  $A$  καὶ  $B$ .

253. Τρία σημεία  $A, B, \Gamma$ , ἐπὶ ὀριζοντίου ἐδάφους κείνται ἀπ' εὐθείας καὶ τὰ  $B, \Gamma$

είναι άπρόσιτα. \*Εν τέταρτον σημείον Δ τοῦ αὐτοῦ ὀριζοντίου ἐδάφους ἀπέχει 600 μέτρα τοῦ Α, φαίνεται δὲ ἐξ αὐτοῦ τὸ μὲν ΑΒ ὑπὸ γωνίαν 42°, τὸ δὲ ΑΓ ὑπὸ γωνίαν 75°. Ἀπὸ δὲ τοῦ Α φαίνεται τὸ τμήμα ΒΔ ὑπὸ γωνίαν 40°. Νὰ εὔρεθῇ τὸ μήκος τῆς ἀποστάσεως ΒΓ.

ΠΙΝΑΞ ΤΥΠΩΝ Β' ΒΙΒΛΙΟΥ

Σχέσεις τῶν τριγωνομετρικῶν ἀριθμῶν ἀμβλείας γωνίας θ:

$$\acute{\eta}\mu^2\theta + \sigma\upsilon\nu^2\theta = 1, \acute{\epsilon}\phi\theta = \frac{\acute{\eta}\mu\theta}{\sigma\upsilon\nu\theta}, \sigma\phi\theta = \frac{\sigma\upsilon\nu\theta}{\acute{\eta}\mu\theta}.$$

Σχέσεις τῶν τριγωνομετρικῶν ἀριθμῶν δύο παραπληρωματικῶν γωνιῶν:

$$\begin{aligned} \acute{\eta}\mu(180^\circ - \omega) &= \acute{\eta}\mu\omega, & \sigma\upsilon\nu(180^\circ - \omega) &= -\sigma\upsilon\nu\omega \\ \acute{\epsilon}\phi(180^\circ - \omega) &= -\acute{\epsilon}\phi\omega, & \sigma\phi(180^\circ - \omega) &= -\sigma\phi\omega. \end{aligned}$$

Τριγωνομετρικοὶ ἀριθμοὶ γωνίας 120°, 135°, 150°

γωνία	ἦμ.	συν.	ἐφ.	σφ.
120°	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$-\sqrt{3}$	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$
135°	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	-1	-1
150°	$\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	$-\sqrt{3}$

Σχέσεις μεταξύ τῶν στοιχείων τυχόντος τριγώνου ΑΒΓ.

$$Α + Β + Γ = 180^\circ, \frac{\alpha}{\acute{\eta}\mu Α} = \frac{\beta}{\acute{\eta}\mu Β} = \frac{\gamma}{\acute{\eta}\mu Γ} = 2R,$$

$$\alpha^2 = \beta^2 + \gamma^2 - 2\beta\gamma\sigma\upsilon\nu Α, \quad \beta^2 = \alpha^2 + \gamma^2 - 2\alpha\gamma\sigma\upsilon\nu Β,$$

$$\gamma^2 = \alpha^2 + \beta^2 - 2\alpha\beta\sigma\upsilon\nu Γ,$$

$$Ε = \frac{1}{2} \alpha\beta\acute{\eta}\mu Γ = \frac{1}{2} \beta\gamma\acute{\eta}\mu Α = \frac{1}{2} \alpha\gamma\acute{\eta}\mu Β, \quad \frac{\alpha - \beta}{\alpha + \beta} = \frac{\acute{\epsilon}\phi\left(\frac{Α - Β}{2}\right)}{\acute{\epsilon}\phi\left(\frac{Α + Β}{2}\right)}$$

$$\begin{aligned} Ε &= \frac{\alpha^2\acute{\eta}\mu Β\acute{\eta}\mu Γ}{2\acute{\eta}\mu Α} = \frac{\alpha^2\acute{\eta}\mu Β\acute{\eta}\mu Γ}{2\acute{\eta}\mu(Β + Γ)} = \frac{\beta^2\acute{\eta}\mu Α\acute{\eta}\mu Γ}{2\acute{\eta}\mu Β} = \frac{\beta^2\acute{\eta}\mu Α\acute{\eta}\mu Γ}{2\acute{\eta}\mu(Α + Γ)} \\ &= \frac{\gamma^2\acute{\eta}\mu Α\acute{\eta}\mu Β}{2\acute{\eta}\mu Γ} = \frac{\gamma^2\acute{\eta}\mu Α\acute{\eta}\mu Β}{2\acute{\eta}\mu(Α + Β)} \end{aligned}$$


$$\sigma\upsilon\nu Α = \frac{\beta^2 + \gamma^2 - \alpha^2}{2\beta\gamma}, \quad \sigma\upsilon\nu Β = \frac{\alpha^2 + \gamma^2 - \beta^2}{2\alpha\gamma}, \quad \sigma\upsilon\nu Γ = \frac{\alpha^2 + \beta^2 - \gamma^2}{2\alpha\beta}$$

ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄

ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΓΩΝΙΑΣ ἢ ΤΟΞΟΥ

71. **Θετική καὶ ἀρνητική φορά ἐπὶ περιφερείας.** Ἐπὶ μιᾶς περιφερείας  $K$  ἔν κινήτῶν σημείων δύναται νὰ κινήθῃ κατὰ τὴν φοράν τοῦ βέλους  $\beta$  ἢ κατὰ τὴν φοράν τοῦ  $\gamma$  (σχ. 28). Ἡ φορά τοῦ βέλους  $\gamma$ , καθ' ἣν κινουῦνται καὶ οἱ δείκται ὠρολογίου, λέγεται **ἀρνητική φορά**, ἡ δὲ ἀντίθετος ταύτης φορά τοῦ βέλους  $\beta$  λέγεται **θετική φορά**.



Σχ. 28

72. **Ἀνύσματα - Ἄξων.** Ἄς νοήσωμεν ὅτι ἔν κινήτῶν σημείων κινεῖται ἐπὶ εὐθείας  $X'X$  καὶ μεταβαίνει ἐκ σημείου  $A$  εἰς ἄλλο  $B$  αὐτῆς (σχ. 29).

Ἐν τῷ δρόμῳ  $AB$ , τὸν ὅποιον διανύει, λέγεται ἰδιαιτέρως **ἀνυσμα\***. Τοῦτο ἔχει ἀρχὴν τὸ  $A$ , τέλος τὸ  $B$  καὶ φοράν ἐκ τοῦ  $A$  πρὸς τὸ  $B$ . Σημειώνεται δὲ οὕτως:  $\overline{AB}$ . Τὸ σύμβολον  $\overline{BA}$  σημαίνει ἀνυσμα μὲ ἀρχὴν  $B$ , τέλος  $A$  καὶ φοράν ἀντίθετον τῆς προηγουμένης. Διακρίνομεν δὲ τὴν μίαν φοράν ἀπὸ τὴν ἄλλην ὡς ἑξῆς:

Ἐπὶ τῆς εὐθείας  $X'X$  ὀρίζομεν αὐθαίρετως ἔν σημείον  $O$  ὡς ἀρχὴν καὶ ἔν ἀνυσμα  $OO$ . Τοῦτο λαμβάνομεν ὡς μονάδα μήκους καὶ καλοῦμεν ἰδιαιτέρως **διευθύνον ἀνυσμα**.

Ἡ ἐκ τοῦ  $O$  πρὸς τὸ  $\Theta$  φορά ὀνομάζεται **θετική φορά** ἐπὶ τῆς

\* Τὸ ἀνυσμα λέγεται συνήθως καὶ διάνυσμα.

εὐθείας  $X'X$  καὶ πάσης ἄλλης  $Z'Z$  παραλλήλου πρὸς αὐτήν. Ἡ δὲ ἀντίθετος ταύτης φορά λέγεται **ἀρνητικὴ φορά**.

Πᾶσα εὐθεῖα  $X'X$  ἢ  $Z'Z$ , ἐπὶ τῆς ὁποίας ὠρίσθη τὸ διευθύνον ἄνυσμα, λέγεται **ἄξων**.

Ἡ ἀρχὴ  $O$  διαιρεῖ τὸν ἄξωνα εἰς τὸν **θετικὸν ἡμιάξωνα**  $OX$ , ὅστις περιέχει τὸ  $OH$ , καὶ εἰς τὸν **ἀρνητικὸν ἡμιάξωνα**  $OX'$ .


Πᾶν ἄνυσμα, π.χ. τὸ  $AB$ , ἔχον θετικὴν φοράν λέγεται **θετικὸν ἄνυσμα**. Ἄν δὲ ἔχη ἀρνητικὴν φοράν ὡς τὸ  $\Delta\Lambda$ , λέγεται **ἀρνητικὸν ἄνυσμα**.

Ἄνυσματα τοῦ αὐτοῦ ἄξονος ἢ παραλλήλων ἄξόνων λέγονται **ὁμόρροπα** μὲν, ἂν ἔχωσι τὴν αὐτὴν φοράν· **ἀντίρροπα** δέ, ἂν ἔχωσιν ἀντίθετον φοράν.

Ἄν δὲ δύο ἢ περισσότερα ἄνυσμα-

τα τοῦ αὐτοῦ ἄξονος ἢ παραλλήλων ἄξόνων εἶναι ἐφαρμόσιμα, λέγονται **ὁμορρόπως ἴσα**, ἂν εἶναι ὁμόρροπα, **ἀντιρρόπως δὲ ἴσα**, ἂν εἶναι ἀντίρροπα.

Ἄν ὁ θετικὸς ἡμιάξων  $OX$  στραφῇ περὶ τὴν ἀρχὴν  $O$  κατὰ τὴν θετικὴν φοράν καὶ κατὰ  $90^\circ$ , θὰ ἔλθῃ εἰς θέσιν  $O\Psi$ , τὸ δὲ  $\overline{OH}$  ἐπὶ τοῦ  $\overline{OH}$ . Τοῦτο λαμβάνεται ὡς διευθύνον ἄνυσμα τοῦ ἄξονος  $\Psi'\Psi$ , ὅστις περιέχει αὐτό.



Σχ. 29

**73. Μῆκος ἀνύσματος.** Τὸ ἄνυσμα  $\Lambda\Delta$  (σχ. 29) ἀποτελεῖται ἐκ τριῶν ἀνυσμάτων ὁμορρόπως ἴσων πρὸς τὸ  $\overline{AB}$ . Λέγεται δὲ γινόμενον τοῦ  $\overline{AB}$  ἐπὶ 3 εἶναι δηλαδή  $\overline{\Lambda\Delta} = \overline{AB} \cdot 3$ . Ὁμοίως  $\overline{\Delta\Lambda} = \overline{BA} \cdot 3$ . Τὸ ἄνυσμα τοῦτο  $\Delta\Lambda$  λέγεται καὶ γινόμενον τοῦ  $\overline{AB}$  ἐπὶ  $(-3)$ , ἤτοι:  $\overline{\Delta\Lambda} = \overline{AB} \cdot (-3)$ . Κατὰ ταῦτα.

Τὸ γινόμενον ἀνύσματος ἐπὶ ἀριθμὸν εἶναι ἄνυσμα ὁμόρ-

ροπον πρὸς αὐτό, ἂν ὁ ἀριθμὸς εἶναι θετικὸς, ἀντίροπον δὲ πρὸς αὐτό, ἂν ὁ ἀριθμὸς εἶναι ἀρνητικὸς.

Ἐνεκα τῆς ἀνωτέρω ἰσότητος  $\overline{\Lambda\Delta} = \overline{AB} \cdot 3$ , ὁ 3 λέγεται λόγος τοῦ  $\overline{\Lambda\Delta}$  πρὸς τὸ  $\overline{AB}$ , ἥτοι  $\overline{\Lambda\Delta} : \overline{AB} = 3$ . Ὁμοίως  $\Delta\Lambda : \overline{BA} = +3$  καὶ  $\overline{\Delta\Lambda} : \overline{AB} = -3$ . Ὡστε:

**Λόγος ἀνύσματος πρὸς ἄλλο ἀνυσμα ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ ἢ παραλλήλου ἄξονος, λέγεται ὁ ἀριθμὸς, μὲ τὸν ὁποῖον πρέπει νὰ πολλαπλασιασθῇ τὸ δεύτερον ἀνυσμα, διὰ νὰ προκύψῃ τὸ πρῶτον.**

Ἐκ δὲ τῶν προηγουμένων παραδειγμάτων βλέπομεν ὅτι:

**Ὁ λόγος ἀνύσματος πρὸς ἄλλο ἀνυσμα παράλληλόν του εἶναι θετικὸς ἀριθμὸς, ἂν τὰ ἀνύσματα ταῦτα εἶναι ὁμόρροπα· ἀρνητικὸς δέ, ἂν ταῦτα εἶναι ἀντίρροπα.**

Ἰδιαιτέρως ὁ λόγος  $\overline{AB} : \overline{O\Theta}$  λέγεται **μῆκος** τοῦ  $\overline{AB}$  καὶ σημειοῦται οὕτω:  $(\overline{AB})$ . Εἶναι δηλαδὴ  $\overline{AB} : \overline{O\Theta} = (\overline{AB})$ .

Κατὰ δὲ τὰ προηγούμενα ὁ ἀριθμὸς  $(\overline{AB})$  θὰ εἶναι θετικὸς, ἂν τὸ  $\overline{AB}$  εἶναι θετικόν, ἀρνητικὸς δέ, ἂν καὶ τὸ  $\overline{AB}$  εἶναι ἀρνητικόν ἀνυσμα. Ἐν π.χ. τὸ  $\overline{O\Theta}$  χωρῆ 3 φοράς εἰς τὸ  $\overline{\Lambda\Delta}$ , θὰ εἶναι  $(\overline{\Lambda\Delta}) = 3$  καὶ  $(\overline{\Delta\Lambda}) = -3$ . Ἐπομένως  $(\overline{\Lambda\Delta}) + (\overline{\Delta\Lambda}) = 0$ .

Τὰ ἀνύσματα  $\overline{\Lambda\Delta}$  καὶ  $\overline{\Delta\Lambda}$  λέγονται **ἀντίθετα** ἀνύσματα.

**74. Γενίκευσις τῆς ἐννοίας τοῦ τόξου.** Ἐς νοήσωμεν ὅτι ἐν κινήτῳ σημείον ἀναχωρεῖ ἀπὸ ἐν σημείον Α περιφερείας Ο καὶ κινούμενον ἐπ' αὐτῆς σταματᾷ εἰς τὸ Μ. Οὕτω τὸ κινήτῳ διανύει τὸ τόξον ΑΒΜ. Ἐν δὲ κινήτῳ κατὰ τὴν ἀρνητικὴν φοράν, θὰ διανύσῃ ἄλλο τόξον ΑΒ'Μ (σχ. 30). Κατὰ ταῦτα:

**Ἐκαστον τόξον θεωρεῖται ὡς δρόμος, τὸν ὁποῖον διανύει ἐν κινήτῳ κατὰ τινὰ φοράν.**

Χάριν τῆς γενικότητος ὀνομάζομεν τόξον καὶ τὸν δρόμον, τὸν ὁποῖον διανύει τὸ κινήτῳ. ἂν σταματήσῃ εἰς τὸ Μ κατὰ τὴν 2αν ἢ τὴν 3ην κτλ. ἄφισιν εἰς αὐτό. Ὡστε:

**Τόξον εἶναι τυχὼν δρόμος, τὸν ὁποῖον διανύει ἐν κινήτῳ κινούμενον ἐπὶ περιφερείᾳ κατὰ τινὰ φοράν.**


Τὸ σημείον Α, ἀπὸ τοῦ ὁποῖου ἀρχίζει ἡ κίνησις, λέγεται **ἀρ-**

**χή**, τὸ δὲ  $M$ , εἰς τὸ ὁποῖον σταματᾷ, λέγεται **τέλος** τοῦ τόξου.

Ἡ ἀκτίς, ἡ ὁποία καταλήγει εἰς τὴν ἀρχὴν ἑνὸς τόξου, λέγεται **ἀρχική**, ἡ δὲ καταλήγουσα εἰς τὸ τέλος λέγεται **τελική** ἀκτίς τοῦ τόξου.

Ἡ φορά τῆς κινήσεως τοῦ κινητοῦ λέγεται καὶ **φορά** τοῦ διανυμένου τόξου.

Τὰ τόξα δέ, τὰ ὁποῖα ἔχουσι θετικὴν φοράν, λέγονται **θετικά** τόξα· τὰ δὲ ἔχοντα ἀρνητικὴν φοράν τόξα λέγονται **ἀρνητικά** τόξα. Π.χ. τὸ  $ABM$  εἶναι θετικόν, τὸ δὲ  $AB'M$  εἶναι ἀρνητικόν τόξον (σχ. 30).



Σχ. 30

Ἡ μονὰς  $AN$  τῶν τόξων λαμβάνεται ὡς θετικόν τόξον. Ἐπομένως τὰ μέτρα τῶν μὲν θετικῶν τόξων εἶναι θετικοί, τῶν δὲ ἀρνητικῶν εἶναι ἀρνητικοί ἀριθμοί. Π.χ. τὸ τεταρτημόριον  $AB$  ἔχει μέτρον  $90^\circ$  ἢ  $\frac{\pi}{2}$  ἀκτινίων, τὸ δὲ  $AB'$  εἶναι  $-90^\circ$  ἢ  $-\frac{\pi}{2}$  ἀκτινίων.

Μετὰ τὴν γενίκευσιν ταύτην τῆς ἐννοίας τοῦ τόξου εἶναι φανερόν ὅτι ὑπάρχουσιν ἄπειρα θετικά καὶ ἄπειρα ἀρνητικά τόξα  $AM$ . Ἄν δὲ  $\tau$  εἶναι τὸ μέτρον ἑνὸς τούτων, τὸ μέτρον,  $\chi$  παντὸς ἄλλου τόξου  $AM$  εὐρίσκεται, ἂν εἰς τὸν  $\tau$  προστεθῇ ἓν πολλαπλάσιον τοῦ μέτρου μιᾶς θετικῆς ἢ ἀρνητικῆς περιφερείας. Θὰ εἶναι δηλαδή:

$$\chi = \tau + 360^\circ k \quad \text{ἢ} \quad \chi = \tau + 400^\circ k \quad \text{ἢ} \quad \chi = \tau + 2k\pi \quad (1)$$

ἂν  $k$  εἶναι τυχῶν ἀκέραιος ἀριθμὸς.

**75. Γενίκευσις τῆς ἐννοίας τῆς γωνίας.** Ὄταν τὸ κινητὸν σημεῖον διανύσῃ τὸ τόξον  $ABM$ , ἡ ἀκτίς  $OA$  στρεφομένη περὶ τὸ  $O$  κατὰ τὴν αὐτὴν φοράν θὰ γράψῃ τὴν κυρτὴν γωνίαν  $AOM$ , ἡ ὁποία βαίνει ἐπὶ τοῦ τόξου  $ABM$ . Ὄταν δὲ τὸ κινητὸν γράψῃ τὸ τόξον  $AB'M$ , ἡ  $OA$  θὰ γράψῃ τὴν μὴ κυρτὴν γωνίαν  $AOM$ . Καὶ ὅταν τὸ σημεῖον  $M$  γράψῃ τὸ τόξον  $ABMB'AM$ , λέγομεν χάριν τῆς γενικότητος ὅτι καὶ ἡ  $OA$  γράφει πάλιν γωνίαν βαίνουσαν ἐπὶ τοῦ τόξου τούτου καὶ οὕτω καθ' ἑξῆς.

Ἡ  $OA$  λέγεται **ἀρχική πλευρὰ** ἡ δὲ  $OM$  **τελική πλευρὰ** πάσης

τοιαύτης γωνίας. Σημειώνομεν δὲ μίαν τοιαύτην γωνίαν μὲ τὸ σύμβολον  $\widehat{O\hat{A},\hat{O}M}$ .

Μία ἐκ τῶν γωνιῶν τούτων λέγεται θετική ἢ ἀρνητική, ἂν ἡ  $\widehat{O\hat{A}}$  γράφη αὐτὴν κατὰ τὴν θετικὴν ἢ ἀρνητικὴν φοράν.

Ἐπομένως αἱ θετικαὶ γωνίαι βαίνουσιν ἐπὶ θετικῶν τόξων αἱ δὲ ἀρνητικαὶ ἐπὶ ἀρνητικῶν τόξων καὶ ἀντιστρόφως.

Τὸ μέτρον δὲ πάσης τοιαύτης γωνίας ἰσοῦται πρὸς τὸ μέτρον τοῦ ἀντιστοίχου τόξου (§ 7). Διότι εἶναι φανερόν ὅτι ἐξ ὅσων τόξων ἴσων πρὸς τὴν μονάδα  $\widehat{AN}$  ἢ καὶ μερῶν αὐτῆς ἀποτελεῖται ἐν τῶν τόξων  $\widehat{AM}$ , ἐκ τόσων γωνιῶν  $\widehat{AON}$  ἢ καὶ μερῶν αὐτῆς ἀποτελεῖται ἢ εἰς τὸ τόξον ἐκεῖνο  $\widehat{AM}$  βαίνουσα ἐπίκεντρος γωνία  $\widehat{O\hat{A},\hat{O}M}$ .

**76. Ἴσα καὶ ἀντίθετα τόξα ἢ γωνίαι.** Μετὰ τὴν γενίκευσιν τῆς ἐννοίας τῶν τόξων καὶ τῶν γωνιῶν οἱ ἐκ τῆς Γεωμετρίας γνωστοὶ ὅρισμοί τῆς ἰσότητος δύο τόξων ἢ δύο γωνιῶν δὲν ἐπαρκοῦσι. Τούτους γενικεύομεν ὡς ἑξῆς:

**Δύο γωνίαι ἢ δύο τόξα τῆς αὐτῆς περιφερείας ἢ ἴσων περιφερειῶν λέγονται ἴσα, ἂν ἔχωσιν ἴσα μέτρα, ὅταν μετρηθῶσι μὲ τὴν αὐτὴν μονάδα.**


**Δύο δὲ γωνίαι ἢ δύο τόξα τῆς αὐτῆς περιφερείας ἢ ἴσων περιφερειῶν λέγονται ἀντίθετα, ἂν ἔχωσιν ἀντίθετα μέτρα, ὅταν μετρηθῶσι μὲ τὴν αὐτὴν μονάδα.**

**77. Ἄθροισμα τόξων ἢ γωνιῶν καὶ διαφορὰ δύο τόξων ἢ δύο γωνιῶν.** Ἐκαστον ἀπὸ τὰ τόξα  $\widehat{AN}$ ,  $\widehat{NB}$ ,  $\widehat{BM}$  (σχ. 30) ἔχει ἀρχὴν τὸ τέλος τοῦ προηγουμένου. Λέγονται δὲ ταῦτα διαδοχικὰ τόξα. Ἄθροισμα δὲ αὐτῶν εἶναι τὸ τόξον, τὸ ὁποῖον ἔχει ἀρχὴν τὸ  $A$ , τέλος τὸ  $M$  καὶ μέτρον τὸ ἄθροισμα  $(\widehat{AN}) + (\widehat{NB}) + (\widehat{BM})$  τῶν μέτρων τῶν τόξων τούτων. Ἄν π.χ.  $(\widehat{AN}) = 1^\circ$ ,  $(\widehat{NB}) = 89^\circ$ ,  $(\widehat{BM}) = 30^\circ$ , ἄθροισμα αὐτῶν εἶναι τὸ τόξον  $\widehat{ABM}$ , τὸ ὁποῖον ἔχει μέτρον  $1^\circ + 89^\circ + 30^\circ = 120^\circ$ .

Ἄν δὲ  $(\widehat{AN}) = 361^\circ$ ,  $(\widehat{NB}) = 89^\circ$ ,  $(\widehat{BM}) = 390^\circ$ , ἄθροισμα αὐτῶν εἶναι ἐκεῖνο ἐκ τῶν τόξων  $\widehat{AM}$ , τὸ ὁποῖον ἔχει μέτρον



Ἐάν ἡ ἀκτίς  $OA$  στραφῆ περὶ τὸ  $O$  κατὰ  $90^\circ$  καὶ κατὰ τὴν θετικὴν φοράν, θὰ ἔλθῃ εἰς τὴν θέσιν τῆς ἀκτίνος  $OB$ . Αὕτη λαμβάνεται



Σχ. 31

ὡς διευθύνον ἄνυσμα τοῦ περιέχοντος αὐτὸ ἄξονος  $\Psi'\Psi$ . Οὗτος δὲ λέγεται ἰδιαίτερος **ἄξων τῶν ἡμιτόνων**. Οἱ δύο δὲ οὗτοι κάθετοι ἄξονες  $X'X$ ,  $\Psi'\Psi$  ὁμοῦ λέγονται **πρωτεύοντες ἄξονες** τοῦ τριγωνομετρικοῦ κύκλου.

Εἶναι δὲ φανερόν ὅτι εἰς ἄλλην ἀρχὴν τόξων ἀντιστοιχεῖ ἄλλο ζεῦγος πρωτευόντων ἄξόνων.

Ἐκαστον ζεῦγος πρωτευόντων ἄξόνων διαιρεῖ τὴν τριγωνομετρικὴν περιφέρειαν εἰς 4 τεταρτημόρια. Ταῦτα ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τῶν τόξων καὶ κατὰ τὴν θετικὴν φοράν λέγονται κατὰ σειράν **πρῶτον, δεύτερον, τρίτον, τέταρτον**, τεταρτημόριον. Οὕτω διὰ τὸ σύστημα πρωτευόντων τόξων  $X'X$ ,  $\Psi'\Psi$  (σχ. 31) τὰ τεταρτημόρια ταῦτα κατὰ σειράν εἶναι  $AB$ ,  $BA'$ ,  $A'B'$ ,  $B'A$ .

### Ἀσκήσεις

254. Νὰ στραφῆ δοθὲν σύστημα πρωτευόντων ἄξόνων κατὰ  $45^\circ$  ἢ  $-45^\circ$   
 255. Νὰ στραφῆ δοθὲν σύστημα πρωτευόντων ἄξόνων κατὰ  $30^\circ$  ἢ  $-30^\circ$   
 256. Νὰ στραφῆ δοθὲν σύστημα πρωτευόντων ἄξόνων κατὰ  $90^\circ$  ἢ  $-90^\circ$   
 257. Νὰ στραφῆ δοθὲν σύστημα πρωτευόντων ἄξόνων κατὰ  $180^\circ$  ἢ  $270^\circ$

**79. Ἡμίτονον καὶ συνημίτονον τυχόντος τόξου.** Α') Ἐμάθομεν (§ 9) ὅτι, ἂν  $\omega$  (σχ. 32) εἶναι τυχούσα ὀξεῖα γωνία ὀρθογωνίου τριγώνου  $OΠΜ$ , εἶναι  $\eta\mu\omega = \frac{\overline{ΠΜ}}{\overline{ΟΜ}}$ . Ἐάν δὲ  $(\overline{ΟΜ}) = 1$ , ὁ προηγουμένος ὀρισμὸς γίνεται  $\eta\mu\omega = (\overline{ΠΜ})$ .

Ἐπειδὴ δὲ  $(\overline{ΠΜ}) = (\overline{ΟΡ})$ , ἔπεται ὅτι:  $\eta\mu\omega = (\overline{ΟΡ}) = \overline{ΟΡ} : \overline{ΟΒ}$ .

Τὸ μῆκος τοῦτο ( $\overline{OP}$ ) ὀνομάζομεν **ἡμίτονον** καὶ τοῦ ἀντιστοίχου τόξου  $AM$  τῆς τριγωνομετρικῆς περιφερείας ἣτις ἔχει κέντρον τὴν κορυφὴν  $O$  τῆς γωνίας  $\omega$ . Ἐπεκτείνομεν δὲ καὶ εἰς πᾶν ἐν γένει τόξον θετικὸν ἢ ἀρνητικὸν τριγωνομετρικῆς περιφερείας. Ὡστε:

**Ἡμίτονον τυχόντος τόξου τριγωνομετρικῆς περιφερείας λέγεται τὸ μῆκος τῆς προβολῆς τῆς τελικῆς ἀκτίνος αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ἄξονα τῶν ἡμιτόνων.**

Τοῦ τυχόντος τόξου  $AM$  π.χ. ἡμίτονον εἶναι ὁ ἀριθμὸς ( $\overline{OP}$ ), ἥτοι ὁ λόγος  $\overline{OP} : \overline{OB}$ . Ἐπίσης ἡμίτονον τυχόντος ἐκ τῶν τόξων  $AN$  εἶναι ὁ ἀριθμὸς ( $\overline{OP''}$ ), ἥτοι  $\overline{OP''} : \overline{OB}$ . Ἀπὸ τὸν ὀρισμὸν τοῦτον ἐννοοῦμεν εὐκόλως ὅτι:

**α') Τὰ τόξα, τὰ ὁποῖα ἔχουσι τὰ αὐτὰ ὁμώνυμα ἄκρα, ἔχουσι τὸ αὐτὸ ἡμίτονον.**

Εἶναι λοιπὸν ἡμ  $(2k\pi + \tau) = \eta\mu\tau$ , ἂν  $k$  εἶναι  $0$  ἢ τυχῶν ἀκέραιος ἀριθμὸς.


**β') Τὸ ἡμίτονον τόξου εἶναι θετικὸν ἢ ἀρνητικὸν, ἂν ἡ προβολὴ τῆς τελικῆς ἀκτίνος αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ἄξονα τῶν ἡμιτόνων εἶναι θετικὸν ἢ ἀρνητικὸν ἄνυσμα.**

Ἐπομένως :

**γ') Τὰ τόξα, τὰ ὁποῖα λήγουσιν εἰς τὸ α' ἢ β' τεταρτημόριον, ἔχουσι θετικὸν ἡμίτονον. Τὰ δὲ λήγοντα εἰς τὸ γ' ἢ δ' τεταρτημόριον ἔχουσιν ἀρνητικὸν ἡμίτονον.**

**β') Ὅμοίως τὸν ὀρισμὸν συνω = ( $\overline{OP}$ ) =  $\overline{OP} : \overline{OB} = \overline{OP} : \overline{OA}$  ἐπεκτείνομεν καὶ εἰς τὸ ἀντίστοιχον τόξον  $AM$  τῆς γωνίας  $\omega$  καὶ εἰς πᾶν ἐν γένει τόξον θετικὸν ἢ ἀρνητικὸν τριγωνομετρικῆς περιφερείας. Ὡστε.**

**Συνημίτονον τυχόντος τόξου τριγωνομετρικῆς περιφερείας λέγεται τὸ μῆκος τῆς προβολῆς τῆς τελικῆς ἀκτίνος αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ἄξονα τῶν συνημιτόνων.**



Σχ. 32

Ἀπὸ τὸν ὀρισμὸν τούτου ἐννοοῦμεν εὐκόλως ὅτι:

α') Τὰ τόξα, τὰ ὁποῖα ἔχουσι τὰ αὐτὰ ὁμώνυμα ἄκρα, ἔχουσι τὸ αὐτὸ συνημίτονον.

Εἶναι λοιπὸν  $\sin(2k\pi + \tau) = \sin \tau$ , ἂν  $k$  εἶναι 0 ἢ τυχὼν ἀκέραιος ἀριθμὸς.

β') Τὸ συνημίτονον τόξου εἶναι θετικὸν ἢ ἀρνητικὸν, ἂν ἡ προβολὴ τῆς τελικῆς ἀκτίνος αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ἄξονα τῶν συνημιτόνων εἶναι θετικὸν ἢ ἀρνητικὸν ἄνυσμα.

Ἐπομένως :

γ') Τὰ τόξα, τὰ ὁποῖα λήγουσιν εἰς τὸ α' ἢ δ' τεταρτημόριον, ἔχουσι θετικὸν συνημίτονον. Τὰ δὲ λήγοντα εἰς τὸ β' ἢ γ' ἔχουσι ἀρνητικὸν συνημίτονον.

80. Ἡμίτονον καὶ συνημίτονον τυχούσης γωνίας. Προηγουμένως εἶπομεν ὅτι οἱ γνωστοὶ ὀρισμοὶ τοῦ ἡμιτόνου καὶ συνημιτόνου ὀξείας γωνίας  $\omega$  συμπίπτουσι κατ' ἐπέκτασιν μὲ τοὺς ἀντιστοίχους ὀρισμοὺς τῶν ἀντιστοίχων τόξων.

Τὴν σύμπτωσιν ταύτην γενικεύομεν δίδοντες τοὺς ἑξῆς ὀρισμούς:

α') Ἡμίτονον τυχούσης γωνίας λέγεται τὸ ἡμίτονον τοῦ ἀντιστοίχου τόξου αὐτῆς, ἂν αὕτη γίνῃ ἐπίκεντρος εἰς τριγωνομετρικὸν κύκλον.

β') Συνημίτονον τυχούσης γωνίας λέγεται τὸ συνημίτονον τοῦ ἀντιστοίχου τόξου αὐτῆς, ἂν αὕτη γίνῃ ἐπίκεντρος εἰς τριγωνομετρικὸν κύκλον.

Διὰ τοὺς λόγους τούτους, ὅσα θὰ μάθωμεν διὰ τὰ ἡμίτονα καὶ συνημίτονα τῶν τόξων, ἀληθεύουσι καὶ διὰ τὰ ἡμίτονα καὶ συνημίτονα τῶν ἐπικέντρων γωνιῶν, αἱ ὁποῖαι βαίνουσιν εἰς αὐτά.

### Ἀσκήσεις

258. Νὰ διακρίνητε ποῖα ἀπὸ τὰ τόξα  $35^\circ, -35^\circ, 127^\circ, -127^\circ, 348^\circ, -348^\circ, 205^\circ, -205^\circ$  ἔχουσι θετικὸν καὶ ποῖα ἀρνητικὸν ἡμίτονον.

259. Νὰ διακρίνητε ποῖα ἀπὸ τὰς γωνίας  $175^\circ, -175^\circ, 292^\circ, -292^\circ, 100^\circ, -100^\circ$  ἔχουσι θετικὸν καὶ ποῖα ἀρνητικὸν ἡμίτονον.

260. Νὰ διακρίνητε ποῖα ἀπὸ τὰ τόξα  $\frac{\pi}{5}, -\frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{2}, -\frac{7\pi}{2}, \frac{11\pi}{7}$  ἔχουσι θετικὸν καὶ ποῖα ἀρνητικὸν συνημίτονον.

261. Νά ὀρίσητε τὸ τεταρτημόριον, εἰς τὸ ὁποῖον λήγουσι τὰ τόξα, τὰ ὁποῖα ἔχουσι θετικὸν ἥμιτόνον καὶ θετικὸν συνημίτονον. Εἰς ποῖον δὲ τὰ ἔχοντα ἀρνητικούς καὶ τοὺς δύο τούτους τριγωνομετρικούς ἀριθμούς.

262. Νά ὀρίσητε τὸ τεταρτημόριον, εἰς τὸ ὁποῖον λήγουσι τὰ τόξα, τὰ ὁποῖα ἔχουσι θετικὸν ἥμιτόνον καὶ ἀρνητικὸν συνημίτονον. Εἰς ποῖον δὲ τὰ τόξα, τὰ ὁποῖα ἔχουσιν ἀρνητικὸν ἥμιτόνον καὶ θετικὸν συνημίτονον.

263. Νά εὑρητε τὸ ἥμιτόνον καὶ συνημίτονον τῶν τόξων ἢ τῶν γωνιῶν  $405^\circ (= 360^\circ + 45^\circ)$ ,  $750^\circ = (360^\circ \times 2 + 30^\circ)$ ,  $510^\circ = (360^\circ + 150^\circ)$ .

**81. Μεταβολὴ τοῦ ἥμιτόνου καὶ τοῦ συνημιτόνου τόξου ἢ γωνίας.** α') Ἐὰς παρακολουθήσωμεν τὴν μεταβολὴν τοῦ ἀνύσματος OP (σχ. 32) ἢ τοῦ ΠΜ ὁμορρόπως ἴσου πρὸς αὐτό, ὅταν τὸ πέρασ Μ τόξου AM διατρέχη τὴν περιφέρειαν κατὰ τὴν θετικὴν φοράν. Οὕτως εὐκόλως σχηματίζομεν τὸν ἀκόλουθον πίνακα τῶν μεταβολῶν τοῦ ἥμιτόνου τόξου τ, ἂν τοῦτο βαίνει ἀξανάμενον ἀπὸ  $0^\circ$  ἕως  $360^\circ$ .

$$\begin{array}{l} \tau \\ \text{ἥμτ} \end{array} \left\{ \begin{array}{l} 0^\circ \dots \nearrow \dots 90^\circ \dots \nearrow \dots 180^\circ \dots \nearrow \dots 270^\circ \dots \nearrow \dots 360^\circ \\ 0 \dots \nearrow \dots \frac{\pi}{2} \dots \nearrow \dots \pi \dots \nearrow \dots \frac{3\pi}{2} \dots \nearrow \dots 2\pi \\ 0 \dots \nearrow \dots 1 \dots \searrow \dots 0 \dots \searrow \dots -1 \dots \nearrow \dots 0 \end{array} \right.$$

β') Ὁμοίως παρακολουθοῦντες τὴν μεταβολὴν τοῦ ἀνύσματος OP σχηματίζομεν τὸν ἀκόλουθον πίνακα τῶν μεταβολῶν τοῦ ὀλνημιτόνου τόξου, ἂν τοῦτο βαίνει ἀξανάμενον ἀπὸ  $0^\circ$  ἕως  $360^\circ$ .

$$\begin{array}{l} \tau \\ \text{συντ} \end{array} \left\{ \begin{array}{l} 0^\circ \dots \nearrow \dots 90^\circ \dots \nearrow \dots 180^\circ \dots \nearrow \dots 270^\circ \dots \nearrow \dots 360^\circ \\ 0 \dots \nearrow \dots \frac{\pi}{2} \dots \nearrow \dots \pi \dots \nearrow \dots \frac{3\pi}{2} \dots \nearrow \dots 2\pi \\ 1 \dots \searrow \dots 0 \dots \searrow \dots -1 \dots \nearrow \dots 0 \dots \nearrow \dots 1 \end{array} \right.$$

Ἐὰν τὸ τόξον ἐξακολουθῇ ἀξανάμενον ὑπὲρ τὰς  $360^\circ$ , τὸ πέρασ Μ αὐτοῦ διέρχεται ἀπὸ τὰ αὐτὰ κατὰ σειρὰν σημεῖα. Ἐπομένως τὸ ἥμιτόνον λαμβάνει τὰς εἰς τὸν ἀνωτέρω α' πίνακα ἀναγραφόμενας τιμὰς καὶ κατὰ τὴν αὐτὴν σειρὰν. Τὸ δὲ συνημίτονον λαμβάνει τὰς εἰς τὸν β' πίνακα τιμὰς κατὰ τὴν αὐτὴν σειρὰν.

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω πινάκων βλέπομεν ὅτι ἡ μεγίστη τιμὴ τοῦ ἥμιτόνου καὶ τοῦ συνημιτόνου εἶναι 1, ἢ δὲ ἐλαχίστη  $-1$ .


Εὐκόλως δὲ βεβαιούμεθα ὅτι τὸ συμπέρασμα τοῦτο ἰσχύει καὶ δι' ἀρνητικά τόξα, ἥτοι εἶναι γενικόν..

82. Γραφική παράσταση τῶν μεταβολῶν τοῦ ἡμιτόνου τόξου ἢ γωνίας. Τὰς ἀνωτέρω μεταβολὰς τοῦ ἡμιτόνου τόξου αἰσθητοποιοῦμεν ὡς ἑξῆς :

Γράφομεν δύο καθέτους ἄξονας  $X'X$ ,  $\Psi'\Psi$  τεμνομένους εἰς τὸ σημεῖον  $O$  (σχ. 33).

Ἐπὶ τοῦ θετικοῦ ἡμιάξονος  $OX$  ὀρίζομεν ἄνυσμα  $O\mu$  ἔχον μῆκος ἴσον πρὸς τὸ μῆκος  $(\widehat{AM})$ . Ἐπὶ δὲ τοῦ  $O\Psi$  ὀρίζομεν ἄλλο ἄνυσμα  $O\nu$  ἔχον μῆκος ἴσον πρὸς τὸ ἡμίτονον τοῦ  $(\widehat{AM})$ .

Ἐπειτα ἐκ τῶν ἄκρων  $\mu$  καὶ  $\nu$  τῶν ἀνυσμάτων τούτων φέρομεν




Σχ. 33

εὐθείας καθέτους ἀντιστοίχως ἐπὶ τοὺς ἄξονας  $X'X$ ,  $\Psi'\Psi$ . Αὐταὶ τέμνονται εἰς σημεῖον  $M$ , τὸ ὁποῖον ἀντιστοιχεῖ εἰς τὸ ζεῦγος τῶν ἀντιστοιχῶν τιμῶν  $(\overline{O\mu}) = (\widehat{AM})$  καὶ  $(\overline{O\nu}) = \eta\mu(\widehat{AM})$ .

Ἄν ἐργασθῶμεν ὁμοίως μὲ ἄλλα τόξα, ὀρίζομεν σειρὰν ἄλλων σημείων  $\Gamma$ ,  $M'$ ,  $M''$ ,  $\Delta$ ,  $E$ ,  $Z$  κ.τ.λ., ὅπως λεπτομερέστερον φαίνεται εἰς τὸ σχῆμα 34 σελὶς 107.

Πάντα τὰ σημεῖα ταῦτα ἀποτελοῦσι μίαν καμπύλην  $O\Gamma\Delta E Z$ , ἣτις λέγεται ἡμιτονοειδῆς καμπύλη.

Παρατηροῦντες ὅτι  $(\overline{\mu M})$  ἢ  $(\overline{O\nu})$  εἶναι ἡμίτονον τοῦ τόξου,



ΣΧ. 34

ὄπερ ἔχει μῆκος ( $\overline{Ομ}$ ), ἐννοοῦμεν εὐκόλως ὅτι ἡ μεταβολὴ τοῦ ( $\overline{Μμ}$ ) μετὰ τοῦ ( $\overline{Ομ}$ ) δεικνύει πῶς μεταβάλλεται τὸ ἡμίτονον τόξου μετὰ τοῦ τόξου.


### Ἄσκησεις

264. Νὰ σπουδασθῇ ἡ μεταβολὴ τοῦ ἡμιτόνου τόξου, ἂν τοῦτο ἐλαττοῦται ἀπὸ  $0^\circ$  ἕως  $-360^\circ$ . Νὰ ἐπεκταθῇ δὲ καταλλήλως ἡ ἡμιτονοειδὴς καμπύλη.

265. Νὰ σπουδασθῇ ἡ μεταβολὴ τῆς παραστάσεως  $1 + \eta\mu\chi$ , ἂν τὸ τόξον  $\chi$  βαίη ἀύξανόμενον ἀπὸ  $0^\circ$  ἕως  $360^\circ$ . Νὰ παρασταθῇ δὲ γραφικῶς ἡ μεταβολὴ αὐτῆ.

**83. Γραφικὴ παράστασις τῶν μεταβολῶν τοῦ συνημιτόνου τόξου.** Ἄν ἐργασθῶμεν μετὰ τὰ συνημίτονα διαφόρων τόξων, τὰ ὅποια περιέχονται μετὰ  $0^\circ$  καὶ  $360^\circ$ , ὅπως προηγουμένως εἰργάσθημεν διὰ τὰ ἡμίτονα, ὀρίζομεν τὴν καμπύλην ΒΓΔΕΖ (σχ. 25). Αὕτη λέγεται **συνημιτονοειδὴς** καμπύλη.

Παρατηροῦντες ὅτι ( $\overline{μΜ}$ ) ἢ ( $\overline{Ον}$ ) εἶναι τὸ συνημίτονον τόξου,



Σχ. 35

τὸ ὅποῖον ἔχει μῆκος ( $\overline{Ομ}$ ) ἐννοοῦμεν εὐκόλως ὅτι ἡ μεταβολὴ τοῦ ( $\overline{μΜ}$ ) μετὰ τοῦ ( $\overline{Ομ}$ ) δεικνύει πῶς μεταβάλλεται τὸ συνημίτονον τόξου μετὰ τοῦ τόξου.

### Άσκησεις

266. Νά σπουδασθῆ ἡ μεταβολὴ τοῦ συνημιτόνου τόξου, ἂν τὸ τόξον βαίῃ ἐλαττούμενον ἀπὸ  $0^\circ$  ἕως  $-360^\circ$ . Νά ἐπεκταθῆ δὲ ἀντιστοίχως ἡ συνημιτονοειδῆς καμπύλη.

267. Νά σπουδασθῆ ἡ μεταβολὴ τῆς παραστάσεως  $-1 + \sin x$ , ἂν τὸ τόξον  $x$  βαίῃ αὐξανόμενον ἀπὸ  $0^\circ$  ἕως  $360^\circ$ . Νά παρασταθῆ δὲ γραφικῶς ἡ μεταβολὴ αὕτη.

### 84. Ἐφαπτομένη καὶ συνεφαπτομένη τυχόντος τόξου.

Α') Ἐμάθομεν ὅτι διὰ τὴν ὀξεῖαν γωνίαν  $\omega$  εἶναι  $\epsilon\phi\omega = \frac{\overline{PM}}{\overline{OP}} = \frac{\overline{AT}}{\overline{OA}}$  (σχ.


36). Ἄν δὲ  $(\overline{OA}) = 1$ , ὁ προηγούμενος ὀρισμὸς γίνεται  $\epsilon\phi\omega = (\overline{AT})$

Τὴν εὐθεῖαν  $\phi\phi'$ , ἐπὶ τῆς ὁποίας κείται τὸ ἄνυσμα  $AT$ , ὀνομάζομεν **ἄξονα τῶν ἐφαπτομένων**. Οὗτος ὡς παράλληλος πρὸς τὸν ἄξονα  $B'B$  ἔχει διευθύνον ἄνυσμα τὸ  $OB$ . Τὸν δὲ προηγούμενον ὀρισμὸν τῆς  $\epsilon\phi\omega$  ἐπεκτείνομεν καὶ διὰ τὸ ἀντίστοιχον τόξον  $AM$  τῆς γωνίας  $\omega$  καὶ διὰ πᾶν ἐν γένει τόξον τριγωνομετρικῆς περιφερείας, θετικὸν ἢ ἀρνητικὸν ἢ καὶ  $0^\circ$ . Ὡστε:

**Ἐφαπτομένη τυχόντος τόξου τριγωνομετρικῆς περιφερείας λέγεται τὸ μῆκος τοῦ ἀνύσματος, τὸ ὁποῖον ἔχει τὴν αὐτὴν ἀρχὴν μὲ τὸ τόξον καὶ πέρασ τὴν τομὴν τοῦ ἄξονος τῶν ἐφαπτομένων ὑπὸ τῆς προεκτάσεως τῆς τελικῆς ἀκτίνος τοῦ τόξου.**

Ἐκ τοῦ ὀρισμοῦ τούτου εἶναι φανερὸν ὅτι:

α') **Τὰ τόξα, τὰ ὁποῖα ἔχουσι κοινὰ ὁμώνυμα ἄκρα, ἔχουσι τὴν αὐτὴν ἐφαπτομένην.**



Σχ. 36.

Είναι λοιπόν  $\epsilon\phi(2k\pi + \tau) = \epsilon\phi\tau$ , αν  $k$  είναι 0 ή τυχών άκεραιος αριθμός.

**β')** 'Η έφαπτομένη τόξου  $AM$  είναι θετική ή άρνητική, αν το άνυσμα  $AT$  είναι θετικόν ή άρνητικόν άνυσμα.

Έπομένως :

**γ')** Τα τόξα, τα όποια λήγουσιν εις το  $\alpha'$  ή  $\gamma'$  τεταρτημόριον, έχουν θετική έφαπτομένην. Τα δε λήγοντα εις το  $\beta'$  ή  $\delta'$  τεταρτημόριον έχουν άρνητική έφαπτομένην.

**β')** Όμοίως τον γνωστόν όρισμόν  $\sigma\omega = (\overline{B\Sigma})$  έπεκτείνομεν και εις το αντίστοιχον τόξον  $AM$  τής γωνίας και εις πάν έν γένει τόξον θετικόν ή άρνητικόν ή και  $0^0$ .

Πρός τοϋτο την εύθειαν  $\sigma\sigma$  έφαπτομένην εις το  $B$  τής τριγωνομετρικής περιφερείας καλοϋμεν **άξονα τών συνεφαπτομένων**. Οϋτος ώς παράλληλος προς τον άξονα  $A'A$  έχει το αυτό διευθύνον άνυσμα  $OA$ .

Κατά τα λεχθέντα λοιπόν δίδομεν τον έξής όρισμόν:

**Συνεφαπτομένη** ένός τόξου λέγεται το μήκος του άνύσματος, το όποιον αρχίζει από το πέρας  $B$  του  $\alpha'$  τεταρτημορίου τής τριγωνομετρικής περιφερείας και περατοϋται εις την τομήν του άξονος τών συνεφαπτομένων υπό τής προεκτάσεως τής τελικής ακτίνας του τόξου.

Άπό τον όρισμόν τοϋτον είναι φανερά τα εξής:

**α')** Τα τόξα, τα όποια έχουν τα αυτά όμώνυμα άκρα, έχουν την αύτην συνεφαπτομένην.

Είναι λοιπόν  $\sigma\phi(2k\pi + \tau) = \sigma\phi\tau$ , αν  $k$  είναι 0 ή τυχών άκεραιος αριθμός.

**β')** 'Η συνεφαπτομένη ένός τόξου είναι θετική ή άρνητική, αν το άνυσμα  $B\Sigma$  είναι θετικόν ή άρνητικόν άνυσμα.

Έπομένως :

**γ')** Τα τόξα, τα όποια λήγουσιν εις το  $\alpha'$  ή  $\gamma'$  τεταρτημόριον, έχουν θετική συνεφαπτομένην. Τα δε λήγοντα εις το  $\beta'$  ή  $\delta'$  τεταρτημόριον έχουν άρνητική συνεφαπτομένην.

**85.** Έφαπτομένη και συνεφαπτομένη τυχούσης γωνίας. Κατά τα προηγούμενα ή έφαπτομένη και ή συνεφαπτομένη μιás όξείας γωνίας  $\omega$  (σχ. 36) συμπίπτει άντιστοίχως με την έφαπτο-

μένην καὶ συνεφαπτομένην τοῦ ἀντιστοίχου τόξου. Διὰ τὸ εἶναι ἡ σύμπτωσης αὕτη γενικὴ, δίδομεν τοὺς ἐξῆς ὁρισμούς.

**Ἐφαπτομένη τυχούσης γωνίας λέγεται ἡ ἐφαπτομένη τοῦ ἀντιστοίχου τόξου αὐτῆς, ἂν ἡ γωνία αὕτη γίνῃ ἐπίκεντρος εἰς τριγωνομετρικὸν κύκλον.**

**Συνεφαπτομένη τυχούσης γωνίας λέγεται ἡ συνεφαπτομένη τοῦ ἀντιστοίχου τόξου, ἂν ἡ γωνία γίνῃ ἐπίκεντρος εἰς τριγωνομετρικὸν κύκλον.**

Κατὰ ταῦτα πᾶν ὅ,τι γνωρίζομεν ἢ θὰ μάθωμεν διὰ τὴν ἐφαπτομένην καὶ συνεφαπτομένην τῶν τόξων ἀληθεύει καὶ διὰ τὴν ἐφαπτομένην καὶ τὴν συνεφαπτομένην τῶν γωνιῶν.

### Ἄ σ κ ἡ σ ε ι ς

268. Νὰ διακρίνητε ποῖα ἀπὸ τὰ τόξα  $68^\circ, -68^\circ, 135^\circ, -145^\circ, 300^\circ, 125^\circ$  ἔχουσι θετικὴν ἐφαπτομένην ἢ συνεφαπτομένην καὶ ποῖα ἀρνητικὴν.

269. Νὰ διακρίνητε ποῖα ἀπὸ τὰ τόξα  $\frac{5\pi}{8}, \frac{6\pi}{7}, \frac{5\pi}{9}$  ἔχουσι θετικὴν ἐφαπτομένην ἢ συνεφαπτομένην καὶ ποῖα ἀρνητικὴν.

270. Νὰ ὀρίσητε τὰ τεταρτημόρια, εἰς τὰ ὁποῖα λήγουσι τὰ τόξα, τὰ ὁποῖα ἔχουσι θετικὴν ἐφαπτομένην καὶ θετικὴν συνεφαπτομένην. Καὶ ἐκεῖνα, εἰς τὰ ὁποῖα λήγουσι τὰ τόξα, τὰ ὁποῖα ἔχουσιν ἀρνητικούς καὶ τοὺς δύο τούτους τριγωνομετρικούς ἀριθμούς.

271. Νὰ ὀρίσητε τὸ τεταρτημόριον, εἰς τὸ ὁποῖον λήγουσι τὰ τόξα, τὰ ὁποῖα ἔχουσι θετικὴν ἐφαπτομένην καὶ θετικὸν ἡμίτονον ἢ συνημίτονον. Καὶ ἐκεῖνο εἰς τὸ ὁποῖον λήγουσι τὰ τόξα, τὰ ὁποῖα ἔχουσι θετικὴν ἐφαπτομένην καὶ ἀρνητικὸν ἡμίτονον ἢ συνημίτονον.

272. Νὰ εὗρητε τὴν ἐφ  $(360^\circ k + 45^\circ)$  καὶ τὴν σφ  $(360^\circ k + 30^\circ)$ , ἂν  $k$  εἶναι 0 ἢ τυχῶν ἀκέραιος ἀριθμός.

273. Νὰ εὗρητε τὴν ἐφ  $(2k\pi + \frac{\pi}{3})$  καὶ τὴν σφ  $(2k\pi + \frac{\pi}{3})$ , ἂν  $k$  εἶναι 0 ἢ τυχῶν ἀκέραιος ἀριθμός.

**86. Μεταβολὴ τῆς ἐφαπτομένης καὶ συνεφαπτομένης τόξου.** Παρακολουθοῦντες τὴν μεταβολὴν τοῦ  $(\overline{AT})$  καὶ τοῦ  $(\overline{B\Sigma})$  (σχ. 36), ὅταν τὸ πέρασ  $M$  τοῦ τόξου  $AM$  διαγράφη τὸ  $\alpha'$  καὶ  $\beta'$  τεταρτημόριον, καταλήγομεν εἰς τὸν ἀκόλουθον πίνακα, ὅστις εἶναι σύμπτυξις τῶν γνωστῶν πινάκων (§ § 25, 35, 58).

$$\begin{array}{l} \tau \left\{ \begin{array}{l} 0^{\circ} \dots \nearrow \dots 90^{\circ} \dots \nearrow \dots 180^{\circ} \\ 0 \dots \nearrow \dots \frac{\pi}{2} \dots \nearrow \dots \pi \end{array} \right. \\ \xi\phi\tau \left\{ \begin{array}{l} 0 \dots \nearrow \dots +\infty | -\infty \dots \nearrow \dots 0 \\ \infty \dots \searrow \dots 0 \dots 1 \dots \searrow \dots -\infty \end{array} \right. \end{array}$$

Ἐάν δὲ τὸ  $M$  διαγραφῆ τὸ  $\gamma'$  τεταρτημόριον, ὁ ἀριθμὸς ( $\overline{AT}$ ) βαίνει αὐξανόμενος μέχρι τοῦ  $+\infty$ , μεταπηδᾷ πάλιν εἰς τὸ  $-\infty$  εὐθύς ὡς τὸ  $M$  ὑπερβῆ τὸ  $B'$ , ἐξακολουθεῖ αὐξανόμενος καὶ γίνεται 0, ὅταν τὸ  $M$  εὐρεθῆ εἰς τὴν ἀρχὴν  $A$ .

Ὁ δὲ ἀριθμὸς ( $\overline{B\Sigma}$ ) μεταπηδᾷ εἰς τὸ  $+\infty$ , εὐθύς ὡς τὸ  $M$  ὑπερβῆ τὸ  $A'$ . Ἐπειτα δὲ ἐξακολουθεῖ ἐλαττούμενος ὡς καὶ κατὰ τὴν προηγουμένην κίνησιν τοῦ  $M$ . Ἐκ πάντων τούτων προκύπτει ὁ ἀκόλουθος πίναξ.

$$\begin{array}{l} \tau \left\{ \begin{array}{l} 0^{\circ} \dots \nearrow \dots 90^{\circ} \dots \nearrow \dots 180^{\circ} \dots \nearrow \dots 270^{\circ} \dots \nearrow \dots 360^{\circ} \\ 0 \dots \nearrow \dots \frac{\pi}{2} \dots \nearrow \dots \pi \dots \nearrow \dots \frac{3\pi}{2} \dots \nearrow \dots 2\pi \end{array} \right. \\ \xi\phi\tau \left\{ \begin{array}{l} 0 \dots \nearrow \dots +\infty | -\infty \dots \nearrow \dots 0 \dots \nearrow \dots +\infty | -\infty \dots \nearrow \dots 0 \\ \infty \dots \searrow \dots 0 \dots \searrow \dots -\infty | +\infty \dots \searrow \dots 0 \dots \searrow \dots -\infty \end{array} \right. \end{array}$$

Ἐάν δὲ τὸ τόξον  $\tau$  ἐξακολουθῆ αὐξανόμενον ὑπὲρ τὰς  $360^{\circ}$ , τὸ πέρασ  $M$  αὐτοῦ διέρχεται ἀπὸ τὰς αὐτὰς κατὰ σειρὰν θέσεις, ἕκαστος δὲ τῶν τριγωνομετρικῶν ἀριθμῶν ἔφτ καὶ σφτ λαμβάνει τὰς προηγουμένης τιμὰς αὐτοῦ καὶ κατὰ τὴν αὐτὴν σειρὰν.

**87. Γραφικὴ παράστασις τῶν μεταβολῶν τῆς ἐφαπτομένης τόξου.** Τὴν προηγουμένως σπουδασθεῖσαν μεταβολὴν τῆς ἐφαπτομένης τόξου αἰσθητοποιοῦμεν ὡς ἑξῆς:

Ἐπὶ τοῦ ἄξονος  $X'X$  (σχ. 37) ὀρίζομεν ἄνυσμα  $OA$  ἔχον μῆκος ἴσον πρὸς τὸ μῆκος  $\frac{\pi}{2}$  τεταρτημορίου τριγωνομετρικῆς περιφερείας, ἄνυσμα  $OE$  μήκους  $\pi$ , ἄλλο  $OK$  μήκους  $\frac{3\pi}{2}$  καὶ ἄλλο  $OH$  μήκους  $2\pi$ .

Εἰς τυχὸν τόξον μήκους ( $\overline{Om}$ )  $\langle \frac{\pi}{2}$  ἀντιστοιχεῖ ἄνυσμα  $\mu M$  κάθετον ἐπὶ τὸν ἄξονα  $XX$  καὶ ἔχον μῆκος ἴσον πρὸς τὴν ἐφαπτο-



στοιχα σημεία  $M$  αποτελοῦσι καμπύλην  $\Delta E$ . Αὕτη συνεχῶς ἀπομακρύνεται ἀπὸ τὴν  $N'AN$  καὶ πλησιάζει πρὸς τὸν ἄξονα  $X'X$ , τὸν ὅποιον συναντᾷ εἰς τὸ σημεῖον  $E$ .

Τοῦ τόξου δὲ αὐξανόμενου ἀπὸ  $180^\circ$  ἕως  $270^\circ$  ἡ ἐφαπτομένη του βαίνει αὐξανόμενη ἀπὸ  $0$  ἕως  $+\infty$ . Ἐπομένως ἡ καμπύλη ἀπομακρύνεται τῶν εὐθειῶν  $N'AN$ ,  $X'X$  καὶ ἀπαύστως πλησιάζει πρὸς τὴν εὐθείαν  $PP$  κάθετον ἐπὶ τὸν ἄξονα  $X'X$  εἰς τὸ  $K$  χωρὶς ὅμως νὰ συναντᾷ αὐτὴν ποτέ.

Ὅταν τέλος τὸ τόξον βαίνει αὐξανόμενον ἀπὸ  $270^\circ$  ἕως  $360^\circ$  ἡ ἐφαπτομένη του μεταπηδῶσα εἰς τὸ  $-\infty$  βαίνει αὐξανόμενη ἀπὸ  $-\infty$  ἕως  $0$ . Ὅθεν ἡ καμπύλη ἐμφανίζεται πρὸς τὴν διεύθυνσιν τῆς  $KP$ , δεξιὰ καὶ ἐγγύτατα αὐτῆς· βαίνει δὲ ἀπομακρυνόμενη αὐτῆς καὶ πλησιάζει πρὸς τὸν ἄξονα  $X'X$ , τὸν ὅποιον συναντᾷ εἰς τὸ σημεῖον  $\Theta$ .

Ἡ καμπύλη λοιπὸν  $OM\Gamma\Delta EZH\Theta$  αἰσθητοποιεῖ τὴν μεταβολὴν τῆς ἐφαπτομένης τόξου, ἂν τοῦτο συνεχῶς βαίνει αὐξανόμενον ἀπὸ  $0^\circ$  ἕως  $360^\circ$ . Ἡ συνέχεια αὐτῆς διακόπτεται εἰς τὰ σημεία αὐτῆς, τὰ ὅποια ἀντιστοιχοῦσιν εἰς τὰ τόξα  $90^\circ$  καὶ  $270^\circ$ , ἔνεκα τῆς μεταπηδήσεως τῆς ἐφαπτομένης ἀπὸ  $+\infty$  εἰς  $-\infty$ . Διὰ τοῦτο ἡ συνάρτησις ἐφχ λέγεται **ἀσυνεχῆς** συνάρτησις διὰ  $\chi = \frac{\pi}{2}$  καὶ διὰ  $\chi = \frac{3\pi}{2}$ .

Σημείωσις. Αἱ εὐθεῖαι  $N'AN$  καὶ  $PKP$  λέγονται ἀσύμπτωτοι τῆς καμπύλης ταύτης.

Ἄν τὸ τόξον ἐξακολουθῇ αὐξανόμενον ὑπὲρ τὰς  $360^\circ$ , οἱ κλάδοι τῆς προηγουμένης καμπύλης ἐπαναλαμβάνονται κατὰ τὴν αὐτὴν σειρὰν.


### Ἀσκήσεις

274. Νὰ σπουδασθῇ ἡ μεταβολὴ τῆς ἐφχ, ἂν τὸ τόξον  $\chi$  βαίνει ἐλαττούμενον ἀπὸ  $0^\circ$  ἕως  $-360^\circ$ . Νὰ παρασταθῇ δὲ γραφικῶς ἡ μεταβολὴ αὕτη.

275. Νὰ σπουδασθῇ ἡ μεταβολὴ τῆς συναρτήσεως  $\frac{1}{2}$  ἐφχ, ἂν τὸ τόξον  $\chi$  βαίνει αὐξανόμενον ἀπὸ  $0^\circ$  ἕως  $360^\circ$ . Νὰ παρασταθῇ δὲ γραφικῶς ἡ μεταβολὴ αὕτη.

88. Γραφική παράσταση τών μεταβολών τῆς συνεφαπτομένης τόξου. Ἐν ἐργασθῶμεν διὰ τὰς μεταβολὰς τῆς συνεφαπτομένης, ὅπως προηγουμένως διὰ τὰς μεταβολὰς τῆς ἐφαπτομένης, σχηματίζομεν τὴν καμπύλην ΑΒΓΔΕΖ (σχ. 38).

Δι' αὐτῆς αἰσθητοποιοῦμεν τὰς μεταβολὰς τῆς συνεφαπτομένης τόξου διὰ μεταβολὴν τοῦ τόξου ἀπὸ  $0^\circ$  ἕως  $360^\circ$ .



Σχ. 38

Ἡ καμπύλη αὕτη ἔχει ἀσύμπτωτον τὸν ἄξονα  $\Psi\Psi'$  καὶ τὰς εὐθείας  $N'\Lambda N$ ,  $ΗΚΓ$ .

Ἐάν τὸ τόξον ἐξακολουθήσῃ αὐξανόμενον ὑπὲρ τὰς  $360^\circ$ , οἱ κλάδοι τῆς καμπύλης ἐπαναμαλαμβάνονται κατὰ τὴν αὐτὴν σειράν.

### Ἀσκήσεις

276. Νὰ σπουδασθῇ ἡ μεταβολὴ τῆς  $\sigma\phi\chi$ , ἂν τὸ τόξον  $\chi$  βαίη ἐλαττούμενον ἀπὸ  $0^\circ$  ἕως  $-360^\circ$ . Νὰ παρασταθῇ δὲ γραφικῶς ἡ μεταβολὴ αὕτη.

277. Νὰ σπουδασθῇ ἡ μεταβολὴ τῆς συναρτήσεως  $2\sigma\phi\chi$ , ἂν τὸ  $\chi$  βαίη αὐξανόμενον ἀπὸ  $0^\circ$  ἕως  $360^\circ$  καὶ νὰ παρασταθῇ γραφικῶς ἡ μεταβολὴ αὕτη.

89. Διατήρησις τῶν σχέσεων τῶν τριγωνομετρικῶν ἀριθμῶν οἰουδήποτε τόξου ἢ γωνίας. Ἐστω  $\tau$  τὸ μέτρον ἑνὸς οἰουδήποτε τῶν τόξων  $AM$  (σχ. 39). Ἐάν τὸ  $M$  εὑρίσκηται εἰς τὸ  $\alpha'$  τεταρτημόριον, ἢ τελικὴ ἀκτὶς  $OM$  αὐτοῦ σχηματίζει μὲ τὴν  $OA$  ὀξεῖαν γωνίαν  $\omega$ , ἢ ὁποῖα βαίνει ἐπὶ τοῦ ἐλαχίστου θετικοῦ τόξου

AM. Ἐστω δὲ  $\varepsilon$  τὸ μέτρον αὐτοῦ καὶ  $\tau = 2k\pi + \varepsilon$ , ἂν  $k$  εἶναι τυχῶν ἀκέραιος ἀριθμός.

Ἐπειδὴ δὲ  $\eta\mu\tau = \eta\mu\varepsilon$ ,  $\sigma\upsilon\upsilon\tau = \sigma\upsilon\upsilon\varepsilon$ ,  $\acute{\epsilon}\phi\tau = \acute{\epsilon}\phi\varepsilon$ ,  $\sigma\phi\tau = \sigma\phi\varepsilon$ ,  
καὶ  $\eta\mu\omega = \eta\mu\varepsilon$ ,  $\sigma\upsilon\upsilon\omega = \sigma\upsilon\upsilon\varepsilon$ ,  $\acute{\epsilon}\phi\omega = \acute{\epsilon}\phi\varepsilon$ ,  $\sigma\phi\omega = \sigma\phi\varepsilon$   
ἔπεται ὅτι:  $\eta\mu\omega = \eta\mu\tau$ ,  $\sigma\upsilon\upsilon\omega = \sigma\upsilon\upsilon\tau$ ,  $\acute{\epsilon}\phi\omega = \acute{\epsilon}\phi\tau$ ,  $\sigma\phi\omega = \sigma\phi\tau$


Ἐνεκα τούτων αἱ γνωσταὶ (8), (9), (10) σχέσεις:

$$\eta\mu^2\omega + \sigma\upsilon\upsilon^2\omega = 1, \quad \acute{\epsilon}\phi\omega = \frac{\eta\mu\omega}{\sigma\upsilon\upsilon\omega}, \quad \sigma\phi\omega = \frac{\sigma\upsilon\upsilon\omega}{\eta\mu\omega}$$

γίνονται:

$$\eta\mu^2\tau + \sigma\upsilon\upsilon^2\tau = 1, \quad \acute{\epsilon}\phi\tau = \frac{\eta\mu\tau}{\sigma\upsilon\upsilon\tau}, \quad \sigma\phi\tau = \frac{\sigma\upsilon\upsilon\tau}{\eta\mu\tau} \quad (1)$$

Ἄν τὸ  $M$  εἶναι εἰς τὸ  $\gamma'$  τεταρτημόριον, ἡ προέκτασις τῆς τε-



Σχ. 93

λικῆς ἀκτίνοσ τοῦ τόξου  $\tau$  σχηματίζει μὲ τὴν  $OA$  ὀξεῖαν γωνίαν  $\omega$ , ἥτις βαίνει ἐπὶ τόξου  $\varepsilon$ . Εἶναι δὲ  $\eta\mu\tau = (\overline{P'M}) = -(\overline{PM}) = -\eta\mu\varepsilon$ ,  $\sigma\upsilon\upsilon\tau = (\overline{OP'}) = -(\overline{OP}) = -\sigma\upsilon\upsilon\varepsilon$ ,  $\acute{\epsilon}\phi\tau = (\overline{AT}) = \acute{\epsilon}\phi\varepsilon$  καὶ  $\sigma\phi\tau = (\overline{BS}) = \sigma\phi\varepsilon$ .

Ἐκ τούτων εὐρίσκομεν ὅτι:

$$\eta\mu^2\tau + \sigma\upsilon\upsilon^2\tau = \eta\mu^2\varepsilon + \sigma\upsilon\upsilon^2\varepsilon, \quad \frac{\eta\mu\tau}{\sigma\upsilon\upsilon\tau} = \frac{\eta\mu\varepsilon}{\sigma\upsilon\upsilon\varepsilon}, \quad \frac{\sigma\upsilon\upsilon\tau}{\eta\mu\tau} = \frac{\sigma\upsilon\upsilon\varepsilon}{\eta\mu\varepsilon}$$

Ἐπειδὴ δὲ κατὰ τὴν προηγουμένην περίπτωσιν ἀληθεύουσιν αἱ ἀνωτέρω ἰσότητες (1) διὰ τὸ τόξον  $\varepsilon$ , εὐρίσκομεν ὅτι:

$$\eta\mu^2\tau + \sigma\upsilon\upsilon^2\tau = 1, \quad \frac{\eta\mu\tau}{\sigma\upsilon\upsilon\tau} = \acute{\epsilon}\phi\varepsilon = \acute{\epsilon}\phi\tau, \quad \frac{\sigma\upsilon\upsilon\tau}{\eta\mu\tau} = \sigma\phi\varepsilon = \sigma\phi\tau,$$

ἥτοι καὶ εἰς τὴν περίπτωσιν ταύτην ἀληθεύουσιν αἱ ἰσότητες (1).

Ἄν τὸ  $M$  εὐρίσκηται εἰς τὸ  $\beta'$  τεταρτημόριον, ἡ τελικὴ ἀκτίσ  $OM$  τοῦ τόξου  $\tau$  σχηματίζει μὲ τὴν  $OA$  ἀμβλείαν γωνίαν  $\theta$ , διὰ τὴν ὁποῖαν ἐμάθομεν (§ 59) ὅτι:

$$\eta\mu^2\theta + \sigma\upsilon\upsilon^2\theta = 1, \quad \acute{\epsilon}\phi\theta = \frac{\eta\mu\theta}{\sigma\upsilon\upsilon\theta}, \quad \sigma\phi\theta = \frac{\sigma\upsilon\upsilon\theta}{\eta\mu\theta} \quad (2)$$

$$\begin{aligned} \text{Εἶναι δὲ ἥμτ} &= (\overline{\Pi'M}) = \acute{\eta}\mu\theta, & \text{συντ} &= (\overline{\text{ΟΠ}'}) = \text{συν}\theta, \\ \acute{\epsilon}\phi\tau &= (\overline{\text{ΑΤ}'}) = \acute{\epsilon}\phi\theta, & \sigma\phi\tau &= (\overline{\text{ΒΣ}'}) = \sigma\phi\theta. \end{aligned}$$

Ἐκ τούτων καὶ τῶν (2) προκύπτουσιν πάλιν αἱ (1). Ὁμοίως ἀποδεικνύομεν ὅτι αἱ (1) ἀληθεύουσι καὶ ὅταν τὸ Μ εὐρίσκηται εἰς τὸ δ' τεταρτημόριον.

Ἀληθεύουσι λοιπὸν αὐται διὰ πᾶν τόξον ΑΜ, ἐπομένως καὶ διὰ πᾶσαν γωνίαν  $\widehat{\text{ΟΑ}}, \widehat{\text{ΟΜ}}$ .

Ἄν δὲ ἐργασθῶμεν ὡς ἐν § § 46 – 49, εὐρίσκομεν τοὺς ἀκολουθούσους τύπους:

$$\alpha') \text{ συντ} = \pm \sqrt{1 - \acute{\eta}\mu^2\tau}, \quad \acute{\epsilon}\phi\tau = \frac{\acute{\eta}\mu\tau}{\pm \sqrt{1 - \acute{\eta}\mu^2\tau}}, \quad \sigma\phi\tau = \frac{\pm \sqrt{1 - \acute{\eta}\mu^2\tau}}{\acute{\eta}\mu\tau}$$

$$\beta') \acute{\eta}\mu\tau = \pm \sqrt{1 - \sigma\text{υν}^2\tau}, \quad \acute{\epsilon}\phi\tau = \frac{\pm \sqrt{1 - \sigma\text{υν}^2\tau}}{\sigma\text{υν}\tau}, \quad \sigma\phi\tau = \frac{\sigma\text{υν}\tau}{\pm \sqrt{1 - \sigma\text{υν}^2\tau}}$$

$$\gamma') \acute{\eta}\mu\tau = \frac{\acute{\epsilon}\phi\tau}{\pm \sqrt{1 + \acute{\epsilon}\phi^2\tau}}, \quad \sigma\text{υν}\tau = \frac{1}{\pm \sqrt{1 + \acute{\epsilon}\phi^2\tau}}, \quad \sigma\phi\tau = \frac{1}{\acute{\epsilon}\phi\tau}$$

$$\delta') \acute{\eta}\mu\tau = \frac{1}{\pm \sqrt{1 + \sigma\phi^2\tau}}, \quad \sigma\text{υν}\tau = \frac{\sigma\phi\tau}{\pm \sqrt{1 + \sigma\phi^2\tau}}, \quad \acute{\epsilon}\phi\tau = \frac{1}{\sigma\phi\tau}$$

Διὰ νὰ ὀρίσωμεν δὲ ποῖον σημεῖον πρέπει νὰ θέσωμεν πρὸ τοῦ ριζικοῦ ἐκάστου τύπου, πρέπει νὰ γνωρίζωμεν τὸ τεταρτημόριον, εἰς τὸ ὁποῖον λήγει τὸ τόξον. Οὕτως, ἂν  $90^\circ < \tau < 180^\circ$ , θὰ εἶναι  $\acute{\eta}\mu\tau < 0$ , οἱ δὲ ἄλλοι τριγωνομετρικοὶ ἀριθμοὶ αὐτοῦ ἀρνητικοί. Διὰ νὰ εὔρωμεν δὲ ἀρνητικὰ ἐξαγόμενα ἐκ τῶν τύπων α', πρέπει πρὸ τῶν ριζικῶν αὐτῶν νὰ θέσωμεν τὸ  $-$ . Οὕτως, ἂν  $\acute{\eta}\mu\tau = \frac{1}{2}$ , εὐρί-

$$\begin{aligned} \text{σκομεν ἐξ αὐτῶν ὅτι: } \text{συντ} &= -\sqrt{1 - \frac{1}{4}} = -\frac{\sqrt{3}}{2}, \\ \acute{\epsilon}\phi\tau &= \frac{\frac{1}{4}}{-\sqrt{1 - \frac{1}{4}}} = -\frac{\sqrt{3}}{3}, \quad \sigma\phi\tau = \frac{-\sqrt{1 - \frac{1}{4}}}{\frac{1}{4}} = -\sqrt{3}. \end{aligned}$$

Εἶναι ὅμως δυνατὸν νὰ εἶναι  $\acute{\eta}\mu\tau = \frac{1}{2} > 0$  καὶ  $0^\circ < \tau < 90^\circ$ . Εἰς τὴν περίπτωσιν ταύτην καὶ οἱ ἄλλοι τριγωνομετρικοὶ ἀριθμοὶ τοῦ  $\tau$  εἶναι θετικοί. Διὰ νὰ εὔρωμεν δὲ ἐκ τῶν α' θετικὰ ἐξαγόμενα, πρέπει νὰ λαμβάνωμεν θετικὰς τὰς ρίζας αὐτῶν. Οὕτως εὐρίσκομεν  $\text{συντ} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ,  $\acute{\epsilon}\phi\tau = \frac{\sqrt{3}}{3}$ ,  $\sigma\phi\tau = \sqrt{3}$ .

Κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον ὀρίζομεν τὸ σημεῖον ἐκάστου ριζικοῦ καὶ εἰς τὰς ἄλλας περιπτώσεις. Ἐξηγεῖται δὲ οὕτω στοιχειωδῶς ἡ παρουσία τοῦ διπλοῦ σημείου πρὸ ἐκάστου ριζικοῦ εἰς ἐκάστην τῶν περιπτώσεων τούτων.

### Ἐσκήσεις

278. Ἄν  $\eta\omega = \frac{3}{5}$  καὶ  $90^\circ < \omega < 180^\circ$ , νὰ εὑρεθῶσιν οἱ ἄλλοι τριγωνομετρικοὶ ἀριθμοὶ τοῦ τόξου  $\omega$ .

279. Ἄν  $\eta\omega = -\frac{4}{5}$  καὶ  $180^\circ < \omega < 280^\circ$ , νὰ εὑρεθῶσιν οἱ ἄλλοι τριγωνομετρικοὶ ἀριθμοὶ τοῦ  $\omega$ .

280. Ἄν  $\sigma\omega = \frac{1}{2}$  καὶ  $90^\circ < \omega < 180^\circ$  νὰ εὑρεθῶσιν οἱ ἄλλοι τριγωνομετρικοὶ ἀριθμοὶ τοῦ  $\omega$ .

281. Ἄν  $\sigma\omega = \frac{3}{5}$  καὶ  $270^\circ < \omega < 360^\circ$ , νὰ εὑρεθῶσιν οἱ ἄλλοι τριγωνομετρικοὶ ἀριθμοὶ τοῦ  $\omega$ .

282. Ἄν  $\epsilon\phi\omega = \frac{2}{5}$  καὶ  $540^\circ < \omega < 630^\circ$ , νὰ εὑρεθῶσιν οἱ ἄλλοι τριγωνομετρικοὶ ἀριθμοὶ τοῦ  $\omega$ .

283. Ἄν  $\sigma\tau = -\frac{\sqrt{3}}{3}$  καὶ  $810^\circ < \tau < 900^\circ$ , νὰ εὑρεθῶσιν οἱ ἄλλοι τριγωνομετρικοὶ ἀριθμοὶ τοῦ  $\tau$ .

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

### ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΥΟ ΤΟΞΩΝ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΩΝ ΔΙ' ΑΠΛΗΣ ΣΧΕΣΕΩΣ

**90.** Ἄμοιβαῖαι θέσεις τῶν περᾶτων δύο ἀντιθέτων τόξων.  
Ἐστω ἐν τόξον  $AM$  (σχ. 40) θετικὸν καὶ μικρότερον ἡμιπεριφερείας.

Ἄν δὲ  $AM'$  εἶναι τὸ ἀντίθετον αὐτοῦ, θὰ εἶναι  $\widehat{M'A} = \widehat{AM}$  καὶ ἐπομένως ἡ χορδὴ  $MM'$  τέμνεται δίπλα καὶ καθέτως ὑπὸ τῆς διαμέτρου  $AA'$ . Τὰ δὲ ἄκρα  $M$  καὶ  $M'$  εἶναι συμμετρικὰ πρὸς τὴν  $AA'$ .

Ἄν δὲ ἐν τόξον  $AA'N$  εἶναι μεγαλύτερον ἡμιπεριφερείας καὶ μικρότερον περιφερείας, καὶ τὸ ἀντίθετον αὐτοῦ  $AA'N'$  θὰ εἶναι ἀπολύτως μεγαλύτερον ἡμιπεριφερείας καὶ μικρότερον περιφερείας.

Ἐπειδὴ δὲ  $|\widehat{AA'N}| = |\widehat{AA'N'}|$   
καὶ  $|\widehat{ABA'}| = |\widehat{AB'A'}|$ , ἔπεται δι'

ἀφαιρέσεως κατὰ μέλη ὅτι  $|\widehat{A'N}| = |\widehat{A'N'}|$ .

Τὰ ἀντίρροπα λοιπὸν τόξα  $A'N$  καὶ  $A'N'$  ὡς ἀπολύτως ἴσα εἶναι ἀντίθετα. Ἐπειδὴ δὲ εἶναι καὶ μικρότερα ἡμιπεριφερείας, τὰ ἄκρα αὐτῶν  $N$  καὶ  $N'$  εἶναι συμμετρικὰ πρὸς τὴν  $A'A$ .

Ἄν τέλος ἐν τόξον  $AM$  περιέχη  $\kappa$  θετικὰς περιφερείας καὶ μέρος  $AM$  μικρότερον περιφερείας, τὸ ἀντίθετον αὐτοῦ τόξον  $AM'$  θὰ περιέχη  $\kappa$  ἀρνητικὰς περιφερείας καὶ ἐν μέρος  $AM'$  ἀντίθετον τοῦ προηγουμένου  $AM$ . Τὰ ἄκρα λοιπὸν  $M$  καὶ  $M'$  θὰ εἶναι συμμετρικὰ πρὸς τὴν  $AA'$  κατὰ τὰς προηγουμένας περιπτώσεις.



Σχ. 40

Ἀπεδείχθη λοιπὸν ὅτι:

Ἄν δύο ἀντίθετα τόξα ἔχωσι κοινὴν ἀρχήν, τὰ πέρατα αὐτῶν εἶναι συμμετρικὰ πρὸς τὴν διάμετρον, ἥτις διέρχεται ἀπὸ τὴν κοινὴν ἀρχὴν αὐτῶν.

**91. Πρόβλημα I. Νὰ συγκριθῶσιν οἱ ὁμώνυμοι τριγωνομετρικοὶ ἀριθμοὶ δύο ἀντιθέτων τόξων.**

*Λύσις.* Ἐστωσαν  $AM$  καὶ  $AM'$  (σχ. 40) δύο ἀντίθετα τόξα,  $\tau$  δὲ καὶ  $-\tau$  τὰ μέτρα αὐτῶν. Κατὰ τὰ προηγούμενα ἡ χορδὴ  $M'M$  τέμνεται δίχα καὶ καθέτως ὑπὸ τῆς  $A'A$ , ἥτοι εἶναι  $(\overline{M'P}) = (\overline{PM})$  καὶ ἐπομένως  $(\overline{PM'}) = -(\overline{PM})$ .

Ἐπειδὴ δὲ  $\eta\mu(-\tau) = (\overline{PM'})$  καὶ  $\eta\mu\tau = (\overline{PM})$ ,  
 ἔπεται ὅτι:  $\eta\mu(-\tau) = -\eta\mu\tau$   
 Εἶναι δὲ καὶ  $\sigma\upsilon\nu(-\tau) = (\overline{OP}) = \sigma\upsilon\nu\tau$ , δηλ.  $\sigma\upsilon\nu(-\tau) = \sigma\upsilon\nu\tau$   
 Ἐκ τούτων εὐρίσκομεν εὐκόλως ὅτι:  $\acute{\epsilon}\phi(-\tau) = -\acute{\epsilon}\phi\tau$   
 καὶ  $\sigma\phi(-\tau) = -\sigma\phi\tau$  (36)  
 Βλέπομεν λοιπὸν ὅτι:

Δύο ἀντίθετα τόξα ἔχουσι τὸ αὐτὸ συνημίτονον καὶ ἀντιθέτους τοὺς ἄλλους ὁμωνύμους τριγωνομετρικοὺς ἀριθμοὺς αὐτῶν.

### Ἀσκήσεις

284. Νὰ εὐρεθῶσιν οἱ τριγωνομετρικοὶ ἀριθμοὶ τῶν τόξων  $-30^\circ$ ,  $-45^\circ$ ,  $-60^\circ$ .

285. Νὰ εὐρεθῶσιν οἱ τριγωνομετρικοὶ ἀριθμοὶ τῶν τόξων:

$(2k\pi - \frac{\pi}{6})$ ,  $(2k\pi - \frac{\pi}{4})$ ,  $(2k\pi - \frac{\pi}{3})$  ἂν  $k$  εἶναι 0 ἢ τυχῶν ἀκέραιος ἀριθμός.

286. Νὰ εὐρεθῶσιν τὰ ἀθροίσματα:

α')  $\sigma\upsilon\nu(-\tau) \cdot \sigma\upsilon\nu\tau + \eta\mu^2\tau$  β')  $\sigma\phi(-\tau) \cdot \acute{\epsilon}\phi\tau + 1$ .

287. Νὰ εὐρεθῶσιν τὰ ἀθροίσματα:

α')  $\eta\mu(-\tau) \cdot \sigma\phi\tau + \sigma\upsilon\nu\tau$  β')  $\sigma\upsilon\nu(-\tau) \cdot \acute{\epsilon}\phi(-\tau) + \eta\mu\tau$ .

288. Νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι διὰ πᾶν τόξον  $\tau$  εἶναι:

$\eta\mu\tau \cdot \eta\mu(-\tau) + \sigma\upsilon\nu^2\tau = 1 - 2\eta\mu^2\tau$ .

**92. Ἀμοιβαῖαι θέσεις τῶν περάτων δύο παραπληρωματικῶν τόξων.** Δύο τόξα λέγονται παραπληρωματικά, ἂν ἔχωσιν ἄθροισμα μίαν θετικὴν ἡμιπεριφέρειαν.

Ἐπομένως ἐν τυχόν τόξον AM ἔχη μέτρον  $\tau$  μοίρας, τὸ παραπληρωματικὸν αὐτοῦ θὰ ἔχη μέτρον  $180^\circ - \tau$ . Ἐπειδὴ δὲ  $180^\circ - \tau = (-\tau) + 180^\circ$ , τὸ παραπληρωματικὸν αὐτοῦ εἶναι ἄθροισμα τοῦ τόξου AM' ἀντιθέτου τοῦ δοθέντος τόξου AM καὶ μιᾶς θετικῆς ἡμιπεριφερείας M'ABN', ἥτοι λήγει εἰς σημεῖον N' συμμετρικὸν τοῦ M' πρὸς τὸ κέντρον O (σχ. 40). Ἐπειδὴ δὲ  $N'\widehat{MM}' = 1$  ὀρθή, ἡ χορδὴ MN' εἶναι κάθετος ἐπὶ τὴν MM' καὶ ἐπομένως παράλληλος πρὸς τὴν A'A. Βλέπομεν λοιπὸν ὅτι:

**Ἄν δύο παραπληρωματικὰ τόξα ἔχωσι κοινὴν ἀρχὴν A, τὰ πέρατα αὐτῶν εἶναι ἄκρα μιᾶς χορδῆς παραλλήλου πρὸς τὴν διάμετρον A'A.**

**93. Πρόβλημα II. Νὰ συγκριθῶσιν οἱ ὁμώνυμοι τριγωνομετρικοὶ ἀριθμοὶ δύο παραπληρωματικῶν τόξων.**

Ἐστω AM ἐν τυχόν τόξον καὶ  $\tau$  τὸ μέτρον αὐτοῦ. Τὸ παραπληρωματικὸν αὐτοῦ τόξον ἔχει μέτρον  $180^\circ - \tau$  καὶ κατὰ τὰ προηγούμενα λήγει εἰς τὸ σημεῖον N' συμμετρικὸν τοῦ M πρὸς τὸν ἄξονα B'B (σχ. 40). Ἐπομένως  $\eta\mu(180^\circ - \tau) = (\overline{OP})$  καὶ  $\sigma\upsilon\nu(180^\circ - \tau) = (\overline{OP}')$ . Ἐπειδὴ δὲ  $(\overline{OP}) = \eta\mu\tau$ , ἔπεται ὅτι  $\eta\mu(180^\circ - \tau) = \eta\mu\tau$ . Ἐνεκα δὲ τῶν ἴσων ὀρθογωνίων τριγώνων OPM' καὶ OP'N' εἶναι  $OP' = OP$  καὶ ἐπομένως  $(\overline{OP}') = -(\overline{OP})$ .

Ἐκ ταύτης καὶ τῶν ἰσοτήτων  $\sigma\upsilon\nu(180^\circ - \tau) = (\overline{OP}')$ ,  $\sigma\upsilon\nu\tau = (\overline{OP})$  προκύπτει ἡ ἰσότης  $\sigma\upsilon\nu(180^\circ - \tau) = -\sigma\upsilon\nu\tau$ .

Ἄπεδείχθη λοιπὸν ὅτι :	$\eta\mu(180^\circ - \tau) = \eta\mu\tau$	}	(36)
καὶ	$\sigma\upsilon\nu(180^\circ - \tau) = -\sigma\upsilon\nu\tau$		
Ἐκ τούτων δὲ εὐρίσκομεν ὅτι :	$\acute{\epsilon}\varphi(180^\circ - \tau) = -\acute{\epsilon}\varphi\tau$		
καὶ	$\sigma\varphi(180^\circ - \tau) = -\sigma\varphi\tau$		

Βλέπομεν λοιπὸν ὅτι:

**Δύο παραπληρωματικὰ τόξα ἔχουσι τὸ αὐτὸ ἡμίτονον καὶ ἀντιθέτους τοὺς ἄλλους ὁμωνύμους τριγωνομετρικοὺς ἀριθμοὺς αὐτῶν.**

Ἀληθεύει δὲ ἡ ἰδιότης αὕτη καὶ διὰ τυχούσας παραπληρωματικὰς γωνίας. Ἐπομένως αἱ ἰσότητες (§ 55 καὶ § 57) εἶναι γενικαί.

### Ἀ σ κ ῆ σ ε ι ς

289. Νὰ εὐρεθῶσιν οἱ τριγωνομετρικοὶ ἀριθμοὶ τῶν τόξων  $\pm 120^\circ$ ,  $\pm 135^\circ$   
 $\pm 150^\circ$ .
290. Νὰ εὐρεθῆ ἡ τιμὴ τῆς παραστάσεως:  
 $\eta\mu (180^\circ - \tau)$   $\eta\mu\tau - \sigma\upsilon\upsilon\tau (180^\circ - \tau)$   $\sigma\upsilon\upsilon\tau$ .
291. Νὰ εὐρεθῆ ἡ τιμὴ τῆς παραστάσεως:  $\epsilon\phi (\pi - \tau)$   $\sigma\phi\tau - \sigma\phi (\pi - \tau)$   $\epsilon\phi\tau$ .
292. Νὰ εὐρεθῆ ἡ τιμὴ τῆς παραστάσεως:  
 $\epsilon\phi (180^\circ - \tau)$   $\sigma\upsilon\upsilon\tau - \sigma\phi (180^\circ - \tau)$   $\eta\mu\tau$ , ἂν  $\eta\mu\tau = \frac{1}{2}$  καὶ  $0^\circ < \tau < 90^\circ$
293. Νὰ γίνῃ ἀπλουστέρα ἡ παράστασις:  $-\sigma\phi (\pi - \tau)$   $\eta\mu\tau - \epsilon\phi (\pi - \tau)$   $\sigma\upsilon\upsilon\tau$

**94. Ἀμοιβαῖαι θέσεις τῶν περάτων δύο συμπληρωματικῶν τόξων.** Δύο τόξα λέγονται **συμπληρωματικά**, ἂν ἔχωσιν ἄθροισμα ἓν θετικὸν τεταρτημόριον.



Σχ. 41α

Ἐπομένως, ἂν τυχόντος τόξου  $AM$  (σχ. 41 α) ἔχη μέτρον  $\tau$ , τὸ συμπληρωματικὸν αὐτοῦ  $AM'$  θὰ ἔχη μέτρον  $90^\circ - \tau$ .

Ἄν δὲ  $\Delta'$  εἶναι τὸ μέσον τοῦ  $\alpha'$  τεταρτημορίου, θὰ εἶναι:

$$\tau = (\widehat{AM}) = (\widehat{A\Delta}) + (\widehat{\Delta M})$$

$$\eta \tau = 45^\circ + (\widehat{\Delta M}).$$

$$\begin{aligned} \text{Ἐπομένως } (\widehat{AM'}) &= 90^\circ - \tau = \\ &45^\circ - (\widehat{\Delta M}) \eta (\widehat{AM'}) = 45^\circ + (\widehat{M\Delta}). \end{aligned}$$

Ἐπειδὴ δὲ  $(\widehat{AM'}) = (\widehat{A\Delta}) + (\widehat{\Delta M'}) = 45^\circ + (\widehat{\Delta M'})$ , ἔπεται ὅτι  $\widehat{M\Delta} = \widehat{\Delta M'}$ . Ἡ χορδὴ λοιπὸν  $MM'$  τέμνεται δίχως καὶ καθέτως ὑπὸ τῆς διαμέτρου  $\Delta\Delta'$ , τὰ δὲ σημεῖα  $M, M'$  εἶναι συμμετρικὰ πρὸς αὐτήν. Ὡστε:

**Ἄν δύο συμπληρωματικά τόξα τῆς αὐτῆς περιφερείας ἔχωσι κοινὴν ἀρχὴν  $A$ , τὰ πέρατα αὐτῶν εἶναι συμμετρικὰ πρὸς τὴν διάμετρον, ἣτις διχοτομεῖ τὸ  $\alpha'$  θετικὸν τεταρτημόριον  $AB$ .**

**95. Πρόβλημα III. Νὰ συγκριθῶσιν οἱ τριγωνομετρικοὶ ἀριθμοὶ δύο συμπληρωματικῶν τόξων.**

**Λύσις.** Ἐστω  $\tau$  τὸ μέτρον τυχόντος ἐκ τῶν τόξων  $AM$  (σχ. 41 β) καὶ  $\eta\mu\tau = (\overline{PM})$ ,  $\sigma\upsilon\upsilon\tau = (\overline{OP})$ . (1)

Κατὰ τὰ προηγούμενα τὸ τόξον  $90^\circ - \tau$  θὰ λήγῃ εἰς τὸ  $M'$  συμμετρικὸν τοῦ  $M$  πρὸς τὴν  $\Delta\Delta'$ . Θὰ εἶναι δὲ

$$\eta\mu(90^\circ - \tau) = (\overline{P'M'}), \quad \sigma\upsilon\nu(90^\circ - \tau) = (\overline{OP'}) \quad (2)$$

Ἐκ δὲ τῆς ἰσότητος  $\widehat{AM} = \widehat{M'B}$  ἔπεται ὅτι  $\widehat{AOM} = \widehat{BOM'} = \widehat{OMP'}$  καὶ ἔπομένως τὰ τρίγωνα  $OPM$ ,  $OP'M'$  εἶναι ἴσα καὶ διὰ τοῦτο  $P'M' = OP$ ,  $OP' = PM$ . Ἄν δὲ τὰς πλευρὰς ταύτας θεωρήσωμεν ὡς ἀνύσματα, παρατηροῦμεν ὅτι τὰ μήκη  $(\overline{P'M'})$  καὶ  $(\overline{OP})$  εἶναι ὁμόσημα, ἐπίσης δὲ ὁμόσημα εἶναι καὶ τὰ  $(\overline{OP'})$  καὶ  $(\overline{PM})$ . Εἶναι λοιπὸν καὶ  $(\overline{P'M'}) = (\overline{OP})$ ,  $(\overline{OP'}) = (\overline{PM})$ .



Σχ. 41β

Ἐνεκα δὲ τῶν προηγούμενων ἰσοτήτων (1) καὶ (2) αὗται γίνονται :

$$\left. \begin{array}{l} \eta\mu(90^\circ - \tau) = \sigma\upsilon\nu\tau, \quad \sigma\upsilon\nu(90^\circ - \tau) = \eta\mu\tau \\ \text{Ἐκ τούτων δὲ} \\ \text{εὐρίσκομεν ὅτι : } \epsilon\varphi(90^\circ - \tau) = \sigma\varphi\tau, \quad \sigma\varphi(90^\circ - \tau) = \epsilon\varphi\tau \end{array} \right\} (37)$$

Βλέπομεν λοιπὸν ὅτι :

Ἄν δύο τόξα εἶναι συμπληρωματικά, τὸ ἡμίτονον ἑκατέρου ἰσοῦται πρὸς τὸ συνημίτονον τοῦ ἄλλου καὶ ἡ ἐφαπτομένη ἑκατέρου ἰσοῦται πρὸς τὴν συνεφαπτομένην τοῦ ἄλλου.

#### Ἄ σ κ ἡ σ ε ι ς

294. Ἄν  $\eta\mu\omega = \frac{1}{2}$ , νὰ εὐρεθῇ τὸ  $\sigma\upsilon\nu(90^\circ - \omega)$ .

295. Ἄν  $B + \Gamma = 90^\circ$ , νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι  $\sigma\upsilon\nu^2 B + \sigma\upsilon\nu^2 \Gamma = 1$ .

296. Ἄν  $A + B + \Gamma = 180^\circ$ , νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι :

$$\eta\mu \frac{A+B}{2} = \sigma\upsilon\nu \frac{\Gamma}{2}, \quad \epsilon\varphi \frac{A+B}{2} = \sigma\varphi \frac{\Gamma}{2},$$

$$\sigma\upsilon\nu \frac{B+\Gamma}{2} = \eta\mu \frac{A}{2}, \quad \sigma\varphi \frac{A+\Gamma}{2} = \epsilon\varphi \frac{B}{2},$$

297. Νὰ εὐρεθῇ ἡ τιμὴ τῆς παραστάσεως  $\epsilon\varphi(90^\circ - \alpha)$ . ἔφα καὶ τῆς  $\sigma\varphi(90^\circ - \alpha) \cdot \sigma\varphi\alpha$ .

298. Νά εὑρεθῆ ἡ τιμὴ τῆς παραστάσεως:  $\eta\mu(90^\circ - \alpha)\sigma\upsilon\nu\alpha + \sigma\upsilon\nu(90^\circ - \alpha)\eta\mu\alpha$   
 299. Νά εὑρεθῆ ἡ τιμὴ τῆς παραστάσεως:

$$\acute{\epsilon}\phi\left(\frac{\pi}{2} - \tau\right) \acute{\epsilon}\phi\tau - \sigma\phi\left(\frac{\pi}{2} - \tau\right) \sigma\phi\tau.$$

300. Νά ἀποδειχθῆ ὅτι  $\eta\mu(90^\circ + \tau) = \sigma\upsilon\nu\tau$  καὶ  $\sigma\upsilon\nu(90^\circ + \tau) = -\eta\mu\tau$ .  
 301. Νά ἀποδειχθῆ ὅτι  $\acute{\epsilon}\phi(90^\circ + \tau) = -\sigma\phi\tau$  καὶ  $\sigma\phi(90^\circ + \tau) = -\acute{\epsilon}\phi\tau$ .  
 302. Νά εὑρεθῆ τὸ ἄθροισμα  $\eta\mu(90^\circ + \tau)\eta\mu\tau + \sigma\upsilon\nu(90^\circ + \tau)\sigma\upsilon\nu\tau$ .  
 303. Νά εὑρεθῆ τὸ ἄθροισμα:  $\sigma\phi\left(\frac{\pi}{2} + \omega\right)\sigma\phi\omega - \acute{\epsilon}\phi\left(\frac{\pi}{2} - \omega\right)\acute{\epsilon}\phi\omega$ .

**96. Πρόβλημα IV. Νά συγκριθῶσιν οἱ ὁμώνυμοι τριγωνομετρικοὶ ἀριθμοὶ δύο τόξων, τὰ ὁποῖα διαφέρουσι κατὰ  $180^\circ$ .**



Σχ. 42

*Λύσις.* Ἐστω  $\tau$  τὸ μέτρον τυχόντος ἐκ τῶν τόξων  $AM$  (σχ. 42)  
 Ἄν φέρωμεν τὴν διάμετρον  $MOM'$ , τὸ ἄθροισμα  $180^\circ + \tau$  εἶναι μέτρον ἑνὸς ἀπὸ τὰ τόξα  $AM'$ . Εἶναι δὲ  
 $\eta\mu(180^\circ + \tau) = \overline{PM'}$  καὶ  $\sigma\upsilon\nu(180^\circ + \tau) = \overline{OP'}$   
 Ἐπειδὴ δὲ  $\overline{PM} = \eta\mu\tau$  καὶ  $\overline{OP} = \sigma\upsilon\nu\tau$ ,

$$\left. \begin{aligned} \eta\mu(180^\circ + \tau) &= -\eta\mu\tau \\ \sigma\upsilon\nu(180^\circ + \tau) &= -\sigma\upsilon\nu\tau \\ \acute{\epsilon}\phi(180^\circ + \tau) &= \acute{\epsilon}\phi\tau \\ \sigma\phi(180^\circ + \tau) &= \sigma\phi\tau \end{aligned} \right\} (38)$$

ἔπεται ὅτι:

καὶ

Ἐκ τούτων εὐρίσκομεν ὅτι:

καὶ

Βλέπομέν λοιπὸν ὅτι:

**Ἄν δύο τόξα διαφέρουσι κατὰ  $180^\circ$ , ἔχουσι τὴν αὐτὴν ἐφαπτομένην καὶ τὴν αὐτὴν συνεφαπτομένην, ἀντιθέτους δὲ τοὺς ἄλλους ὁμώνυμους τριγωνομετρικοὺς ἀριθμούς.**

#### Ἀσκήσεις

304. Νά εὑρεθῶσιν οἱ τριγωνομετρικοὶ ἀριθμοὶ ἐκάστου τῶν τόξων  $225^\circ$ ,  $210^\circ$ ,  $240^\circ$ .

305. Νὰ εὐρεθῶσιν οἱ τριγωνομετρικοὶ ἀριθμοὶ ἐκάστου τῶν τόξων  $-225^\circ$ ,  $-210^\circ$ ,  $-240^\circ$ .

306. Νὰ εὐρεθῆ τὸ ἄθροισμα ἤμ  $(180^\circ + \tau)$  ἤμτ + συν  $(180^\circ + \tau)$  συντ.

307. Νὰ εὐρεθῆ τὸ γινόμενον ἐφ  $(\pi + \tau)$  σφτ καὶ τὸ σφ  $(\pi + \tau)$  ἐφτ.

308. Νὰ εὐρεθῆ ἡ διαφορά ἐφ  $(\pi + \tau)$  σφτ - σφ  $(\pi + \tau)$  ἐφτ.

309. Νὰ εὐρεθῆ τὸ ἄθροισμα ἤμ  $(\pi + \tau)$  συν  $(\pi - \tau)$  + συν  $(\pi + \tau)$  ἤμ  $(\pi - \tau)$ .

310. Νὰ εὐρεθῆ ἡ διαφορά :

$$\text{ἐφ}(180^\circ + \omega) \text{ σφ}(90^\circ + \omega) - \text{ἐφ}(180^\circ - \omega) \text{ σφ}(90^\circ - \omega).$$

**97. Πρόβλημα V. Νὰ συγκριθῶσιν οἱ ὁμώνυμοι τριγωνομετρικοὶ ἀριθμοὶ δύο τόξων, τὰ ὁποῖα ἔχουσιν ἄθροισμα  $360^\circ$ .**

*Λύσις.* Ἐστω  $\tau$  τὸ μέτρον τυχόντος ἐκ τῶν τόξων AM (σχ. 43) καὶ  $\chi$  τὸ μέτρον ἄλλου τόξου AM'. Κατὰ τὴν ὑπόθεσιν εἶναι  $\chi + \tau = 360^\circ$  καὶ ἐπομένως :

$$\chi = 360^\circ - \tau = (-\tau) + 360^\circ.$$

Ἐκ ταύτης γίνεται φανερόν ὅτι τὰ τόξα, τὰ ὁποῖα ἔχουσι μέτρα  $360^\circ - \tau$  καὶ  $-\tau$ , ἔχουσι κοινὰ ὁμώνυμα ἄκρα. Διὰ τοῦτο δὲ ἔχουσι καὶ τοὺς αὐτοὺς ὁμωνύμους τριγωνομετρικοὺς ἀριθμούς. Θὰ εἶναι λοιπὸν (§91):

$$\left. \begin{aligned} \text{ἤμ}(360^\circ - \tau) &= -\text{ἤμ}\tau, & \text{συν}(360^\circ - \tau) &= \text{συν}\tau, \\ \text{ἐφ}(360^\circ - \tau) &= -\text{ἐφ}\tau, & \text{σφ}(360^\circ - \tau) &= -\text{σφ}\tau. \end{aligned} \right\} \quad (39)$$


Βλέπομεν λοιπὸν ὅτι :

**Ἄν δύο τόξα ἔχωσιν ἄθροισμα  $360^\circ$ , ταῦτα ἔχουσι τὸ αὐτὸ συνημίτονον καὶ ἀντιθέτους τοὺς ἄλλους ὁμωνύμους τριγωνομετρικοὺς ἀριθμούς αὐτῶν.**

#### Ἀσκήσεις

311. Νὰ εὐρεθῶσιν οἱ τριγωνομετρικοὶ ἀριθμοὶ ἐκάστου τῶν τόξων  $300^\circ$ ,  $315^\circ$ ,  $330^\circ$ .

312. Νὰ εὐρεθῶσιν οἱ τριγωνομετρικοὶ ἀριθμοὶ ἐκάστου τῶν τόξων  $-300^\circ$ ,  $-315^\circ$ ,  $-330^\circ$ .



Σχ. 43

313. Νά εὑρεθῆ τὸ ἄθροισμα :

$$\eta\mu(360^\circ - \alpha) \eta\mu(-\alpha) + \sigma\upsilon\nu(360^\circ - \alpha) \sigma\upsilon\nu(-\alpha).$$

314. Νά εὑρεθῆ ἡ διαφορὰ :

$$\epsilon\phi(360^\circ - \alpha) \sigma\phi(180^\circ + \alpha) - \sigma\phi(360^\circ - \alpha) \epsilon\phi(180^\circ - \alpha).$$

315. Νά εὑρεθῆ τὸ ἄθροισμα :

$$\eta\mu(2\pi - \tau) \sigma\upsilon\nu\left(\frac{\pi}{2} + \tau\right) + \sigma\upsilon\nu(2\pi - \tau) \eta\mu\left(\frac{\pi}{2} + \tau\right).$$

**98. Ἀναγωγή τόξου εἰς τὸ α' τεταρτημόριον.** α') Ἐστω τόξον  $106^\circ 30'$ , τὸ ὁποῖον περιέχεται μεταξύ  $90^\circ$  καὶ  $180^\circ$ . Θέλομεν δὲ νὰ εὑρωμεν τοὺς τριγωνομετρικοὺς ἀριθμοὺς αὐτοῦ. Ἐπειδὴ οἱ πίνακες, τοὺς ὁποίους ἐμάθομεν, δὲν περιέχουσι τόξα μεγαλύτερα τῶν  $90^\circ$ , ἐργαζόμεθα ὡς ἑξῆς: Εὐρίσκομεν τὸ παραπληρωματικὸν τοῦ τόξου, ἦτοι  $73^\circ 30'$ , καὶ ἐνθυμούμεθα ὅτι:

$$\eta\mu(106^\circ 30') = \eta\mu(73^\circ 30') = 0,95882$$

$$\sigma\upsilon\nu(106^\circ 30') = -\sigma\upsilon\nu(73^\circ 30') = -0,28402$$

$$\epsilon\phi(106^\circ 30') = -\epsilon\phi(73^\circ 30') = -3,37594$$

$$\sigma\phi(106^\circ 30') = -\sigma\phi(73^\circ 30') = -0,29621$$

Βλέπομεν λοιπὸν ὅτι ἡ εὔρεσις τῶν τριγωνομετρικῶν ἀριθμῶν τοῦ τόξου  $106^\circ 30'$  ἀνάγεται εἰς τὴν εὔρεσιν τῶν τριγωνομετρικῶν ἀριθμῶν τοῦ τόξου  $73^\circ 30'$ , τὸ ὁποῖον περιέχεται μεταξύ  $0^\circ$  καὶ  $90^\circ$ . Ἡ ἐργασία αὕτη λέγεται **ἀναγωγή τοῦ τόξου  $106^\circ 30'$  εἰς τὸ α' τεταρτημόριον**.

β') Ἐστω ὅτι θέλομεν νὰ εὑρωμεν τοὺς τριγωνομετρικοὺς ἀριθμοὺς τόξου περιεχομένου μεταξύ  $180^\circ$  καὶ  $270^\circ$ , π.χ. τοῦ  $203^\circ 20'$ . Πρὸς τοῦτο ἀφαιροῦμεν ἀπ' αὐτοῦ  $180^\circ$  καὶ εὐρίσκομεν τόξον  $23^\circ 20'$ . Ἐπειτα δέ, κατὰ τὰ προηγούμενα (§ 96), εὐρίσκομεν ὅτι:

$$\eta\mu(203^\circ 20') = -\eta\mu(23^\circ 20') = -0,39608$$

$$\sigma\upsilon\nu(203^\circ 20') = -\sigma\upsilon\nu(23^\circ 20') = -0,91822$$

$$\epsilon\phi(203^\circ 20') = \epsilon\phi(23^\circ 20') = 0,43136$$

$$\sigma\phi(203^\circ 20') = \sigma\phi(23^\circ 20') = 2,31826$$

γ') Ἄν τόξον περιέχεται μεταξύ  $270^\circ$  καὶ  $360^\circ$ , π.χ. τὸ  $297^\circ 10'$  ἐργαζόμεθα ὡς ἑξῆς:

Εὐρίσκομεν ὅτι  $360^\circ - (297^\circ 10') = 62^\circ 50'$  καὶ ἐφαρμόζομεν

τὰς γνωστὰς (§ 97) ἰσότητας. Οὕτως εὐρίσκομεν ὅτι:

$$\eta\mu(297^\circ 10') = -\eta\mu(62^\circ 50') = -0,88968$$

$$\sigma\upsilon\nu(297^\circ 10') = \sigma\upsilon\nu(62^\circ 50') = 0,45658$$

$$\xi\phi(297^\circ 10') = -\xi\phi(62^\circ 50') = -1,94858$$

$$\sigma\phi(297^\circ 10') = -\sigma\phi(62^\circ 50') = -0,51319$$

δ') "Αν τόξον ὑπερβαίνει τὰς  $360^\circ$ , π.χ. τὸ τόξον  $1197^\circ 30'$ , ἡ ἀναγωγή γίνεται ὡς ἑξῆς:

Εὐρίσκομεν πρῶτον ὅτι  $1197^\circ 30' = 360^\circ \cdot 3 + 117^\circ 30'$ . Ἐπομένως:

$$\eta\mu(1197^\circ 30') = \eta\mu(117^\circ 30') = \eta\mu(62^\circ 30') = 0,88701$$

$$\sigma\upsilon\nu(1197^\circ 30') = \sigma\upsilon\nu(117^\circ 30') = -\sigma\upsilon\nu(62^\circ 30') = -0,46175$$

$$\xi\phi(1197^\circ 30') = \xi\phi(117^\circ 30') = -\xi\phi(62^\circ 30') = -1,92098$$

$$\sigma\phi(1197^\circ 30') = \sigma\phi(117^\circ 30') = -\sigma\phi(62^\circ 30') = -0,52057$$

ε') "Αν τὸ τόξον εἶναι ἀρνητικόν, ἐφαρμόζομεν τοὺς τύπους τῆς § 91 καὶ ἀναγόμεθα εἰς μίαν τῶν προηγουμένων περιπτώσεων Οὕτως εὐρίσκομεν π.χ. ὅτι:

$$\eta\mu(-98^\circ 20') = -\eta\mu(98^\circ 20') = -\eta\mu(81^\circ 40') = -0,98944,$$

$$\sigma\upsilon\nu(-98^\circ 20') = \sigma\upsilon\nu(98^\circ 20') = -\sigma\upsilon\nu(81^\circ 40') = -0,14493 \text{ κτλ.}$$

### Ἀσκήσεις

316. Νὰ εὐρεθῶσιν οἱ τριγωνομετρικοὶ ἀριθμοὶ τοῦ τόξου  $132^\circ 40'$  καὶ τοῦ τόξου  $108^\circ 25'$ .

317. Νὰ εὐρεθῶσιν οἱ τριγωνομετρικοὶ ἀριθμοὶ τοῦ τόξου  $202^\circ 20'$  καὶ τοῦ  $228^\circ 45'$ .

318. Νὰ εὐρεθῶσιν οἱ τριγωνομετρικοὶ ἀριθμοὶ τῶν τόξων  $285^\circ 50'$  καὶ  $305^\circ 35'$ .

319. Νὰ εὐρεθῶσιν οἱ τριγωνομετρικοὶ ἀριθμοὶ τῶν τόξων  $820^\circ 40'$  καὶ  $1382^\circ 25'$ .

320. Νὰ εὐρεθῶσιν οἱ τριγωνομετρικοὶ ἀριθμοὶ τῶν τόξων  $-(167^\circ 20')$ ,  $-(265^\circ 10')$  καὶ  $-(298^\circ 15')$ .

321. Νὰ εὐρεθῶσιν οἱ τριγωνομετρικοὶ ἀριθμοὶ τῶν τόξων  $-(467^\circ 50')$ ,  $-(2572^\circ 35')$  καὶ  $-(2724^\circ 30')$ .

322. Νὰ εὐρεθῆ τὸ ἄθροισμα  $\eta\mu 95^\circ + \eta\mu 265^\circ$ .

323. Νὰ εὐρεθῆ τὸ ἄθροισμα  $\xi\phi 642^\circ + \xi\phi 978^\circ$ .



324. Νὰ εὐρεθῆ τὸ ἄθροισμα  $\sigma\upsilon\nu 820^\circ + \sigma\upsilon\nu 280^\circ$ .

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'



### 1. ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΞΩΝ

**99. Διαδοχικά άνύσματα και συνισταμένη αὐτῶν.** Ἐκαστον ἀπὸ τὰ άνύσματα AB, BΓ, ΓΔ, ἔχει ἀρχὴν τὸ τέλος τοῦ προηγουμένου (σχ. 44). Ταῦτα λέγονται **διαδοχικά** άνύσματα.

Τὸ άνύσμα ΑΔ ἔχει ἀρχὴν μὲν τὴν ἀρχὴν Α τοῦ α' άνύσματος



Σχ. 44



Σχ. 45

AB, τέλος δὲ τὸ τέλος Δ τοῦ τελευταίου ΓΔ. Τὸ ΑΔ λέγεται **συνισταμένη** ἢ **γεωμετρικὸν ἄθροισμα** τῶν άνυσμάτων τούτων.

Τὰ άνύσματα AB, BΓ, ΑΓ (σχ. 44) εἶναι ὁμόρροπα καὶ κείνται ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ ἄξονος. Ἐπομένως τὰ μήκη  $(\overline{AB})$ ,  $(\overline{B\Gamma})$ ,  $(\overline{A\Gamma})$  εἶναι ὁμόσημοι ἀριθμοί. Εἶναι δὲ φανερόν ὅτι:  $(\overline{AB}) + (\overline{B\Gamma}) = (\overline{A\Gamma})$  (1)

Ἄν δὲ τὸ Γ κείται μεταξύ τῶν Α καὶ Β (σχ. 45), θὰ εἶναι:

$$(\overline{A\Gamma}) + (\overline{ΓB}) = (\overline{AB}).$$

Ἄν δὲ εἰς τὰ μέλη αὐτῆς προσθέσωμεν τὸν ἀριθμὸν  $(\overline{B\Gamma})$ , εὐρίσκωμεν ὅτι:

$$(\overline{A\Gamma}) + (\overline{ΓB}) + (\overline{B\Gamma}) = (\overline{AB}) + (\overline{B\Gamma}).$$

Ἐπειδὴ δὲ  $(\overline{ΓB}) + (\overline{B\Gamma}) = 0$ , προκύπτει πάλιν ἡ ἰσότης (1). Ὅμοίως ἀποδεικνύεται ὅτι ἡ (1) ἀληθεύει καὶ ὅταν τὸ Α κείται μεταξύ Β καὶ Γ.

Ἐάν δὲ καὶ ἄλλα σημεῖα Δ, Ε κ.τ.λ. κείνται εἰς τὴν αὐτὴν εὐθεῖαν μὲ τὰ Α, Β, Γ, θὰ εἶναι :

$$(\overline{AB}) + (\overline{B\Gamma}) + (\overline{\Gamma\Delta}) = (\overline{A\Gamma}) + (\overline{\Gamma\Delta}) = (\overline{AD}),$$


$$(\overline{AB}) + (\overline{B\Gamma}) + (\overline{\Gamma\Delta}) + (\overline{\Delta\epsilon}) = (\overline{A\Delta}) + (\overline{\Delta\epsilon}) = (\overline{A\epsilon})$$

κ.τ.λ. Βλέπομεν λοιπὸν ὅτι :

**Τὸ ἄθροισμα τῶν μηκῶν διαδοχικῶν ἀνυσμάτων τοῦ αὐτοῦ ἄξονος ἰσοῦται πρὸς τὸ μῆκος τῆς συνισταμένης αὐτῶν.**

**100. Πρόβλημα Ι.** Νὰ εὕρεθῇ τὸ ἡμίτονον καὶ τὸ συνημιτόνον τοῦ ἀθροίσματος δύο τόξων ἐκ τοῦ ἡμιτόνου καὶ συνημιτόνου αὐτῶν.

Ἐστω α τὸ μέτρον ἑνὸς τυχόντος ἐκ τῶν τόξων ΑΜ καὶ β τὴν μέτρον ἑνὸς ἐκ τῶν τόξων ΜΝ (σχ. 46). Ἐπιπέσει τὸ ἄθροισμα τούτων εἰς τὸ ἐκείνου ἐκ τῶν τόξων ΑΝ, τὸ ὅποιον ἔχει μέτρον α+β.



Σχ. 46

Θέλουμεν λοιπὸν νὰ εὕρωμεν τὸ ἡμ(α+β) καὶ τὸ συν(α+β), ἂν γνωρίζωμεν τὸ ἡμα, συνα, ἡμβ, συνβ.

**Λύσις.** Θεωροῦμεν ὡς ἄξονα τῶν σημημιτόνων τὸν Α'Α διὰ τὰ τόξα ΑΜ καὶ ΑΝ καὶ τὸν Μ'Μ διὰ τὰ τόξα ΜΝ. Φέρομεν ἔπειτα τὴν ΝΡ κάθετον ἐπὶ τὸν ἄξονα Μ'Μ, τὰς ΝΗ, ΡΛ καθέτους ἐπὶ τὸν ἄξονα Α'Α καὶ τὴν ΡΘ παράλληλον πρὸς αὐτόν.

\*Αν δὲ τ εἶναι τὸ μέτρον τῆς ἐλαχίστης θετικῆς γωνίας  $\widehat{O\hat{A},\widehat{O}M}$  καὶ τ' τὸ μέτρον τῆς ἐλαχίστης θετικῆς γωνίας  $\widehat{O\hat{M},\widehat{O}N}$ , θὰ εἶναι:

$$\begin{aligned} \eta\mu\tau &= \eta\mu\alpha, & \sigma\upsilon\nu\tau &= \sigma\upsilon\nu\alpha \\ \eta\mu\beta &= \eta\mu\tau' = (\overline{PN}), & \sigma\upsilon\nu\beta &= \sigma\upsilon\nu\tau' = (\overline{OP}). \end{aligned}$$

Γνωρίζομεν δὲ ἄφ' ἑτέρου ὅτι:

$$\begin{aligned} \eta\mu(\alpha+\beta) &= (\overline{HN}) = (\overline{H\Theta}) + (\overline{ON}) = (\overline{AP}) + (\overline{ON}) \\ \sigma\upsilon\nu(\alpha+\beta) &= (\overline{OH}) = (\overline{OL}) + (\overline{LH}) = (\overline{OL}) - (\overline{OP}) \end{aligned} \quad (1)$$

\*Ἐπειδὴ δὲ  $\widehat{PN\Theta} = \widehat{A\hat{O}M} = \tau$ , ἐκ τῶν ὀρθογωνίων τριγώνων  $OP\Lambda$ ,  $NP\Theta$  εὐρίσκομεν ὅτι:

$$\begin{aligned} (\overline{AP}) &= (\overline{OP})\eta\mu\tau = \eta\mu\alpha\sigma\upsilon\nu\beta, & (\overline{OL}) &= (\overline{OP})\sigma\upsilon\nu\tau = \sigma\upsilon\nu\alpha\sigma\upsilon\nu\beta. \\ (\overline{OP}) &= (\overline{PN})\eta\mu\tau = \eta\mu\alpha\eta\mu\beta, & (\overline{ON}) &= (\overline{PN})\sigma\upsilon\nu\tau = \eta\mu\beta\sigma\upsilon\nu\alpha. \end{aligned}$$

\*Ἐνεκα τούτων αἱ ἰσότητες (1) γίνονται:

$$\left. \begin{aligned} \eta\mu(\alpha+\beta) &= \eta\mu\alpha \cdot \sigma\upsilon\nu\beta + \sigma\upsilon\nu\alpha \cdot \eta\mu\beta \\ \sigma\upsilon\nu(\alpha+\beta) &= \sigma\upsilon\nu\alpha \cdot \sigma\upsilon\nu\beta - \eta\mu\alpha \cdot \eta\mu\beta \end{aligned} \right\} \quad (40)$$

$$\text{Π.χ. } \eta\mu 75^\circ = \eta\mu(45^\circ + 30^\circ) = \eta\mu 45^\circ \sigma\upsilon\nu 30^\circ + \sigma\upsilon\nu 45^\circ \eta\mu 30^\circ =$$

$$\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{2}}{4} \cdot (\sqrt{3} + 1).$$

$$\sigma\upsilon\nu 75^\circ = \sigma\upsilon\nu(45^\circ + 30^\circ) = \sigma\upsilon\nu 45^\circ \sigma\upsilon\nu 30^\circ - \eta\mu 45^\circ \eta\mu 30^\circ =$$

$$\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{2}}{4} \cdot (\sqrt{3} - 1).$$

**101. Πρόβλημα II. Νὰ εὐρεθῇ τὸ ἡμίτονον καὶ τὸ συνημίτονον τῆς διαφορᾶς δύο τόξων ἐκ τῶν ἡμιτόνων καὶ τῶν συνημιτόνων αὐτῶν.**

*Λύσις.* Ἐπειδὴ  $\alpha - \beta = \alpha + (-\beta)$ , ἀρκεῖ νὰ ἐφαρμόσωμεν τοὺς προηγουμένους τύπους διὰ τὰ τόξα  $\alpha$  καὶ  $(-\beta)$  καὶ νὰ ἐνθυμηθῶμεν τὰς ἰσότητας τῆς § 91. Οὕτως εὐρίσκομεν ὅτι:

$$\left. \begin{aligned} \eta\mu(\alpha-\beta) &= \eta\mu\alpha\sigma\upsilon\nu(-\beta) + \sigma\upsilon\nu\alpha\eta\mu(-\beta) \\ &= \eta\mu\alpha\sigma\upsilon\nu\beta - \sigma\upsilon\nu\alpha\eta\mu\beta, \\ \sigma\upsilon\nu(\alpha-\beta) &= \sigma\upsilon\nu\alpha\sigma\upsilon\nu(-\beta) - \eta\mu\alpha\eta\mu(-\beta) \\ &= \sigma\upsilon\nu\alpha\sigma\upsilon\nu\beta + \eta\mu\alpha\eta\mu\beta \end{aligned} \right\} \quad (41)$$

$$\text{Π.χ. } \eta\mu 15^\circ = \eta\mu(45^\circ - 30^\circ) = \eta\mu 45^\circ \sigma\upsilon\nu 30^\circ - \sigma\upsilon\nu 45^\circ \eta\mu 30^\circ$$

$$= \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{2}}{4} \cdot (\sqrt{3} - 1).$$

$$\text{Ὁμοίως δὲ εὐρίσκομεν ὅτι } \sigma\upsilon\nu 15^\circ = \frac{\sqrt{2}}{4} \cdot (\sqrt{3} + 1).$$

### Άσκησεις

325. Νὰ εὐρεθῆ τὸ ἡμίτονον καὶ τὸ συνημίτονον τοῦ  $(\alpha + \beta)$ , ἂν  
 $\eta\mu\alpha = \frac{3}{5}$ ,  $\sigma\upsilon\nu\beta = \frac{4}{5}$  καὶ  $0^\circ < \alpha < 90^\circ$ ,  $0^\circ < \beta < 90^\circ$ .

326. Νὰ εὐρεθῆ τὸ ἄθροισμα  $\eta\mu(\alpha + \beta) + \eta\mu(\alpha - \beta)$ , ἂν  $\eta\mu\alpha = \frac{3}{5}$  καὶ  
 $\sigma\upsilon\nu\beta = \frac{4}{5}$ .

327. Νὰ εὐρεθῆ τὸ ἄθροισμα  $\sigma\upsilon\nu(\alpha + \beta) + \sigma\upsilon\nu(\alpha - \beta)$ , ἂν  $\sigma\upsilon\nu\alpha = \frac{5}{8}$  καὶ  
 $\sigma\upsilon\nu\beta = -\frac{2}{9}$ .

328. Νὰ εὐρεθῆ ἡ διαφορὰ  $\eta\mu(\alpha + \beta) - \eta\mu(\alpha - \beta)$ , ἂν  $\eta\mu\beta = \frac{5}{6}$ ,  
 $\sigma\upsilon\nu\alpha = \frac{2}{5}$ .

329. Νὰ εὐρεθῆ ἡ διαφορὰ  $\sigma\upsilon\nu(\alpha - \beta) - \sigma\upsilon\nu(\alpha + \beta)$  ἂν  $\eta\mu\alpha = 0,4$ ,  
 $\eta\mu\beta = \frac{3}{4}$ .

330. Νὰ ἀποδειχθῆ ὅτι :  $\frac{2\eta\mu(\alpha + \beta)}{\sigma\upsilon\nu(\alpha + \beta) + \sigma\upsilon\nu(\alpha - \beta)} = \epsilon\varphi\alpha + \epsilon\varphi\beta$ .

331. Νὰ ἀποδειχθῆ ὅτι :  
 $\eta\mu^2(\alpha + \beta) + \eta\mu^2(\alpha - \beta) = 2(\eta\mu^2\alpha\sigma\upsilon\nu^2\beta + \eta\mu^2\beta\sigma\upsilon\nu^2\alpha)$ .

**102. Πρόβλημα III. Νὰ εὐρεθῆ ἡ ἐφαπτομένη τοῦ ἄθροίσματος καὶ τῆς διαφορᾶς δύο τόξων ἐκ τῶν ἐφαπτομένων τῶν τόξων τούτων.**

*Λύσις.* Διαιροῦμεν τὰς ἰσότητας (40) κατὰ μέλη καὶ εὐρίσκομεν ὅτι  $\epsilon\varphi(\alpha + \beta) = \frac{\eta\mu\alpha\sigma\upsilon\nu\beta + \eta\mu\beta\sigma\upsilon\nu\alpha}{\sigma\upsilon\nu\alpha\sigma\upsilon\nu\beta - \eta\mu\alpha\eta\mu\beta}$

Ἐὰν δὲ τοὺς ὅρους τοῦ β' μέλους αὐτῆς διαιρέσωμεν διὰ τοῦ  $\sigma\upsilon\nu\alpha\sigma\upsilon\nu\beta$ , εὐρίσκομεν :

$$\epsilon\varphi(\alpha + \beta) = \frac{\epsilon\varphi\alpha + \epsilon\varphi\beta}{1 - \epsilon\varphi\alpha\epsilon\varphi\beta}$$

Ἐὰν δὲ ἐφαρμόσωμεν ταύτην διὰ

τὰ τόξα  $\alpha$  καὶ  $(-\beta)$  εὐρίσκομεν ὅτι :  $\epsilon\varphi(\alpha - \beta) = \frac{\epsilon\varphi\alpha - \epsilon\varphi\beta}{1 + \epsilon\varphi\alpha\epsilon\varphi\beta}$

(42)

### Άσκησεις

332. Ἐὰν  $\epsilon\varphi\alpha = 2$ ,  $\epsilon\varphi\beta = 1,5$  νὰ εὐρεθῆ ἡ  $\epsilon\varphi(\alpha + \beta)$  καὶ ἡ  $\epsilon\varphi(\alpha - \beta)$ .

333. Νὰ εὐρεθῆ ἡ  $\epsilon\varphi 75^\circ$  καὶ ἡ  $\epsilon\varphi 15^\circ$ . Ἐκ τούτων δὲ ἡ  $\sigma\varphi 75^\circ$  καὶ ἡ  $\sigma\varphi 15^\circ$ .

334. Ἐν  $A, B, \Gamma$ , εἶναι γωνία τριγώνου, νὰ ἀποδειχθῆ ὅτι:  
 α')  $\epsilon\phi A + \epsilon\phi B + \epsilon\phi \Gamma = \epsilon\phi A \epsilon\phi B \epsilon\phi \Gamma$ .  
 β')  $\sigma\phi A \sigma\phi B + \sigma\phi B \sigma\phi \Gamma + \sigma\phi \Gamma \sigma\phi A = 1$ .
335. Νὰ ἀποδειχθῆ ὅτι:  $\epsilon\phi(45^\circ - \omega) = \frac{\sigma\upsilon\upsilon\omega - \eta\mu\omega}{\sigma\upsilon\upsilon\omega + \eta\mu\omega}$ .
336. Ἐν  $\alpha + \beta + \gamma = 90^\circ$ , νὰ ἀποδειχθῆ ὅτι:  
 α')  $\epsilon\phi\alpha\epsilon\phi\beta + \epsilon\phi\beta\epsilon\phi\gamma + \epsilon\phi\gamma\epsilon\phi\alpha = 1$ .  
 β')  $\sigma\phi\alpha + \sigma\phi\beta + \sigma\phi\gamma = \sigma\phi\alpha\sigma\phi\beta\sigma\phi\gamma$ .
337. Νὰ ὀρισθῆ ἡ  $\sigma\phi(\alpha + \beta)$  καὶ ἡ  $\sigma\phi(\alpha - \beta)$  συναρτήσῃ τῶν  $\sigma\phi\alpha$  καὶ  $\sigma\phi\beta$ .

## 2. ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΟΥ ΔΙΠΛΑΣΙΟΥ ΤΟΞΟΥ

**103. Πρόβλημα IV.** Νὰ εὑρεθῆ τὸ  $\sigma\upsilon\upsilon 2\alpha$  ἐκ τοῦ ἡμα καὶ τοῦ  $\sigma\upsilon\upsilon\alpha$  ἢ μόνον ἐκ τοῦ ἑνὸς τούτων.

Λύσις. α') Ἐν εἰς τὴν γνωστὴν (40) ἰσότητα:

$$\sigma\upsilon\upsilon(\alpha + \beta) = \sigma\upsilon\upsilon\alpha\sigma\upsilon\upsilon\beta - \eta\mu\alpha\eta\mu\beta$$

θέσωμεν  $\alpha$  ἀντὶ  $\beta$ , εὑρίσκομεν ὅτι:

$$\sigma\upsilon\upsilon 2\alpha = \sigma\upsilon\upsilon^2\alpha - \eta\mu^2\alpha \quad (1)$$

Διὰ ταύτης εὑρίσκομεν τὸ  $\sigma\upsilon\upsilon 2\alpha$ , ἂν γνωρίζωμεν τὸ  $\sigma\upsilon\upsilon\alpha$  καὶ τὸ  $\eta\mu\alpha$ .

Π.χ. ἂν  $\sigma\upsilon\upsilon\alpha = \frac{1}{2}$ ,  $\eta\mu\alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$ , θὰ εἶναι:

$$\sigma\upsilon\upsilon 2\alpha = \frac{1}{4} - \frac{3}{4} = -\frac{1}{2}.$$

β') Ἐπειδὴ δὲ  $\eta\mu^2\alpha = 1 - \sigma\upsilon\upsilon^2\alpha$ , ἡ (1) γίνεται:

$$\sigma\upsilon\upsilon 2\alpha = 2\sigma\upsilon\upsilon^2\alpha - 1 \quad (2)$$

Διὰ ταύτης εὑρίσκομεν τὸ  $\sigma\upsilon\upsilon 2\alpha$ , ἂν γνωρίζωμεν μόνον τὸ  $\sigma\upsilon\upsilon\alpha$ .

Οὕτως, ἂν  $\sigma\upsilon\upsilon\alpha = \frac{1}{2}$ , εὑρίσκομεν πάλιν ὅτι:

$$\sigma\upsilon\upsilon 2\alpha = 2 \cdot \frac{1}{4} - 1 = -\frac{1}{2}.$$

γ') Ὁμοίως ἐκ τῆς (1) καὶ τῆς  $\sigma\upsilon\upsilon\alpha = 1 - \eta\mu^2\alpha$  εὑρίσκομεν ὅτι:

$$\sigma\upsilon\upsilon 2\alpha = 1 - 2\eta\mu^2\alpha. \quad (3)$$

Διὰ ταύτης εὑρίσκομεν τὸ  $\sigma\upsilon\upsilon 2\alpha$  ἀπὸ μόνον τὸ  $\eta\mu\alpha$ . Οὕτω διὰ

$\eta\mu\alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$  εὑρίσκομεν πάλιν ὅτι  $\sigma\upsilon\upsilon 2\alpha = 1 - 2 \cdot \frac{3}{4} = -\frac{1}{2}$ .

Ἐμάθομεν λοιπὸν ὅτι:

$$\left. \begin{aligned} \sigma\upsilon\upsilon 2\alpha &= \sigma\upsilon\upsilon^2\alpha - \eta\mu^2\alpha, & \sigma\upsilon\upsilon 2\alpha &= 2\sigma\upsilon\upsilon^2\alpha - 1 \\ \sigma\upsilon\upsilon 2\alpha &= 1 - 2\eta\mu^2\alpha \end{aligned} \right\} \quad (43)$$

**104. Πρόβλημα V.** Νὰ εὑρεθῇ τὸ ἡμ2α ἐκ τοῦ ἡμα καὶ τοῦ συνα ἢ μόνον ἐκ τοῦ ἡμα.

*Λύσις.* α') Ἡ ἰσότης  $\eta\mu(\alpha + \beta) = \eta\mu\alpha\sigma\upsilon\nu\beta + \eta\mu\beta\sigma\upsilon\nu\alpha$  διὰ  $\beta = \alpha$  γίνεται:  $\eta\mu 2\alpha = 2\eta\mu\alpha\sigma\upsilon\nu\alpha$ .

Ἐὰν π.χ.  $\eta\mu\alpha = \frac{1}{2}$ ,  $\sigma\upsilon\nu\alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$ , εὑρίσκομεν ὅτι:

$$\eta\mu 2\alpha = 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

β') Ἐπειδὴ  $\sigma\upsilon\nu\alpha = \pm \sqrt{1 - \eta\mu^2\alpha}$ , ἡ προηγουμένη ἰσότης γίνεται:  $\eta\mu 2\alpha = \pm 2\eta\mu\alpha \sqrt{1 - \eta\mu^2\alpha}$ .

Διὰ ταύτης ὀρίζομεν τὸ ἡμ2α ἀπὸ μόνον τὸ ἡμα. Πρέπει ὅμως νὰ γνωρίζωμεν καὶ τὸ τεταρτημόριον, εἰς τὸ ὁποῖον λήγει τὸ τόξον 2α, διὰ νὰ θέτωμεν τὸ κατάλληλον ἀπὸ τὰ σημεῖα  $\pm$ .

Π.χ. ἂν  $\eta\mu\alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$ , καὶ  $90^\circ < 2\alpha < 180^\circ$ , θὰ εἶναι  $\eta\mu 2\alpha > 0$

καὶ ἐπομένως ἡ εὔρεθίσα ἰσότης γίνεται  $\eta\mu 2\alpha = 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ .

Ἐὰν ὅμως  $180^\circ < 2\alpha < 270^\circ$ , θὰ εἶναι  $\eta\mu 2\alpha < 0$ , ἡ δὲ εὔρεθίσα ἰσότης γίνεται  $\eta\mu 2\alpha = -2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{1}{2} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ .

Εὔρομεν λοιπὸν ὅτι:

$$\eta\mu 2\alpha = 2\eta\mu\alpha\sigma\upsilon\nu\alpha, \quad \eta\mu 2\alpha = \pm 2\eta\mu\alpha \cdot \sqrt{1 - \eta\mu^2\alpha} \quad (44)$$

*Σημείωσις.* Ἡ παρουσία τοῦ διπλοῦ σημείου ἐξηγεῖται ὡς ἑξῆς: Ἐὰν τὸ δοθὲν ἡμα εἶναι θετικόν, τὸ τόξον α θὰ λήγῃ εἰς τὸ α' ἢ τὸ β' τεταρτημόριον. Ἐὰν δὲ εἶναι  $\alpha = 360^\circ k + \tau$  καὶ τὸ μικρότερον περιφερειακὸν τόξον τ θὰ λήγῃ εἰς τὸ αὐτὸ σημεῖον μὲ τὸ α. Ἐπειδὴ δὲ  $2\alpha = 360^\circ 2k + 2\tau$ , θὰ εἶναι  $\eta\mu 2\alpha = \eta\mu 2\tau$ . Καί, ἂν μὲν  $0^\circ < \tau < 90^\circ$ , θὰ εἶναι  $0^\circ < 2\tau < 180^\circ$ , ἐπομένως  $\eta\mu 2\tau > 0$  καὶ  $\eta\mu 2\alpha > 0$ . Ἐὰν δὲ  $90^\circ < \tau < 190^\circ$ , θὰ εἶναι  $180^\circ < 2\tau < 360^\circ$ , ἐπομένως  $\eta\mu 2\tau < 0$  καὶ  $\eta\mu 2\alpha < 0$ .

Βλέπομεν λοιπὸν ὅτι διὰ τὴν αὐτὴν τιμὴν τοῦ ἡμα εἶναι δυνατόν νὰ εἶναι  $\eta\mu 2\alpha > 0$  ἢ  $\eta\mu 2\alpha < 0$ . Ὁμοίως γίνεται ἡ ἐξήγησις καὶ ἂν  $\eta\mu\alpha < 0$ .

**105. Πρόβλημα VI.** Νὰ εὑρεθῇ ἡ ἐφ2α ἐκ τῆς ἐφα.

*Λύσις.* Ἡ ἰσότης  $\epsilon\phi(\alpha + \beta) = \frac{\epsilon\phi\alpha + \epsilon\phi\beta}{1 - \epsilon\phi\alpha\epsilon\phi\beta}$  διὰ  $\beta = \alpha$  γίνεται:

$$\epsilon\phi 2\alpha = \frac{2\epsilon\phi\alpha}{1 - \epsilon\phi^2\alpha} \quad (45)$$

Διὰ ταύτης εὐρίσκομεν τὴν ἐφ2α ἐκ τῆς ἐφα. Ἐάν π.χ. εἶναι ἐφα =  $\sqrt{3}$ , εὐρίσκομεν ὅτι ἐφ2α =  $\frac{2\sqrt{3}}{1-3} = -\sqrt{3}$ .

*Παρατήρησις.* Ἐάν εἰς τὰς ἰσότητας (43), (44) (45) θέσωμεν  $2\alpha = \omega$  καὶ ἐπομένως  $\alpha = \frac{\omega}{2}$ , αὗται γίνονται :

$$\left. \begin{aligned} \text{συν}\omega &= \text{συν}^2\left(\frac{\omega}{2}\right) - \eta\mu^2\left(\frac{\omega}{2}\right) = 2\text{συν}^2\left(\frac{\omega}{2}\right) - 1 = 1 - 2\eta\mu^2\left(\frac{\omega}{2}\right) \\ \eta\mu\omega &= 2\eta\mu\left(\frac{\omega}{2}\right)\text{συν}\left(\frac{\omega}{2}\right) = \pm 2\eta\mu\left(\frac{\omega}{2}\right)\sqrt{1 - \eta\mu^2\left(\frac{\omega}{2}\right)} \\ \epsilon\varphi\omega &= \frac{2\epsilon\varphi\left(\frac{\omega}{2}\right)}{1 - \epsilon\varphi^2\left(\frac{\omega}{2}\right)} \end{aligned} \right\} (46)$$

### Ἀσκήσεις

338. Ἐάν  $\text{συν}\alpha = \frac{3}{5}$ , νὰ εὐρεθῆ τὸ  $\eta\mu 2\alpha$  καὶ τὸ  $\text{συν} 2\alpha$ .

339. Ἐάν  $\epsilon\varphi\alpha = \frac{3}{5}$ , νὰ εὐρεθῆ ἡ  $\epsilon\varphi 2\alpha$ .

340. Νὰ ἀποδειχθῆ ὅτι  $\epsilon\varphi(45^\circ + \alpha) - \epsilon\varphi(45^\circ - \alpha) = 2\epsilon\varphi 2\alpha$ .

341. Νὰ ἀποδειχθῆ ὅτι  $\sigma\varphi 2\alpha = \frac{\sigma\varphi^2\alpha - 1}{2\sigma\varphi\alpha}$ .

342. Νὰ ἀποδειχθῆ ὅτι  $\sigma\varphi\alpha - \epsilon\varphi\alpha = 2\sigma\varphi 2\alpha$ .

343. Νὰ ἀποδειχθῆ ὅτι  $\eta\mu 2\alpha = \frac{2}{\epsilon\varphi\alpha + \sigma\varphi\alpha}$ .

**106. Πρόβλημα III.** Νὰ εὐρεθῆ τὸ  $\eta\mu\omega$  καὶ τὸ  $\text{συν}\omega$  ἐκ τῆς  $\epsilon\varphi\left(\frac{\omega}{2}\right)$ .

*Λύσις.* Γνωρίζομεν ὅτι  $\text{συν}^2\left(\frac{\omega}{2}\right) - \eta\mu^2\left(\frac{\omega}{2}\right) = \text{συν}\omega$ . Ἐπειδὴ δὲ  $\text{συν}^2\left(\frac{\omega}{2}\right) + \eta\mu^2\left(\frac{\omega}{2}\right) = 1$ , ἔπεται ὅτι :

$$\text{συν}\omega = \frac{\text{συν}^2\left(\frac{\omega}{2}\right) - \eta\mu^2\left(\frac{\omega}{2}\right)}{\text{συν}^2\left(\frac{\omega}{2}\right) + \eta\mu^2\left(\frac{\omega}{2}\right)} \quad (43)$$

Ἄν δὲ διαιρέσωμεν τοὺς ὄρους τοῦ κλάσματος διὰ  $\text{συν}^2\left(\frac{\omega}{2}\right)$

$$\left. \begin{array}{l} \text{εὐρίσκομεν ὅτι :} \\ \text{Ὅμοίως ἀπὸ τὴν ἡμω} = 2\eta\mu\left(\frac{\omega}{2}\right) \text{συν}\left(\frac{\omega}{2}\right) \\ \text{εὐρίσκομεν ὅτι :} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{συν}\omega = \frac{1 - \epsilon\phi^2\left(\frac{\omega}{2}\right)}{1 + \epsilon\phi^2\left(\frac{\omega}{2}\right)} \\ \text{ἡμω} = \frac{2\epsilon\phi\left(\frac{\omega}{2}\right)}{1 + \epsilon\phi^2\left(\frac{\omega}{2}\right)} \end{array} \quad (47)$$

Ἄν π.χ.  $\epsilon\phi\left(\frac{\omega}{2}\right) = \frac{1}{2}$ , εὐρίσκομεν ὅτι :

$$\text{συν}\omega = \frac{1 - \frac{1}{4}}{1 + \frac{1}{4}} = \frac{3}{5} \quad \text{καὶ} \quad \eta\mu\omega = \frac{2 \cdot \frac{1}{2}}{1 + \frac{1}{4}} = \frac{4}{5}$$

Ἀξιοπαρατήρητον εἶναι ὅτι οἱ δύο τύποι (47) εἶναι ρητοὶ πρὸς  $\epsilon\phi\left(\frac{\omega}{2}\right)$  καὶ ἐπομένως ἀπὸ ἐκάστην τιμὴν τῆς  $\epsilon\phi\left(\frac{\omega}{2}\right)$  προκύπτει μία μόνον τιμὴ τοῦ  $\text{συν}\omega$  καὶ μία τοῦ  $\eta\mu\omega$ . Τοῦτο ἐξηγεῖται ὡς ἐξῆς: Ἄν  $M$  εἶναι τὸ πέρασ ἐνὸς τόξου  $\tau$ , διὰ τὸ ὁποῖον εἶναι

$\epsilon\phi\tau = \epsilon\phi\frac{\omega}{2}$  τὸ τόξον  $\frac{\omega}{2}$  θὰ λήγη εἰς τὸ  $M$  ἢ εἰς τὸ  $M'$  συμμετρικὸν τοῦ  $M$  πρὸς τὸ κέντρον  $O$  (σχ. 48).

Εἰς τὴν  $\alpha'$  περίπτωσιν θὰ εἶναι  $\frac{\omega}{2} = 360^\circ k + \tau = 2k \cdot 180^\circ + \tau$ , εἰς δὲ τὴν  $\beta'$  περίπτωσιν θὰ εἶναι


$$\frac{\omega}{2} = (2k + 1)180^\circ + \tau. \text{Δηλαδή τὸ } \frac{\omega}{2}$$

εἶναι ἄθροισμα τοῦ  $\tau$  καὶ ἐνὸς πολ-

λαπλασίου τῶν  $180^\circ$  ἄρτίου εἰς τὴν  $\alpha'$  περίπτωσιν καὶ περιττοῦ εἰς τὴν  $\beta'$ . Συγχωνεύοντες τὰ δύο ταῦτα πολλαπλάσια εἰς ἓν  $180^\circ$ . λ, εὐρίσκομεν ὅτι  $\frac{\omega}{2} = 180^\circ \lambda + \tau$ , ἔνθα  $\lambda$  εἶναι 0 ἢ τυχῶν ἀκέραιος

ἄρτιος ἢ περιττός. Ἐκ ταύτης προκύπτει ἡ ἰσότης  $\omega = 360^\circ \lambda + 2\tau$ .

Ἀπὸ ταύτην βλέπομεν ὅτι πᾶν τόξον  $\omega$ , τοῦ ὁποῖου ζητοῦμεν τοὺς



Σχ. 48

τριγωνομετρικούς αριθμούς, περατοῦται εἰς ἓν ὠρισμένον σημεῖον, εἰς τὸ ὁποῖον λήγει καὶ τὸ 2τ. Ἐπομένως ἕκαστος τριγωνομετρικός ἀριθμὸς τοῦ  $\omega$  ἔχει μίαν τιμὴν δι' ἑκάστην τιμὴν τῆς  $\epsilon\phi\left(\frac{\omega}{2}\right)$ .

### Ἄσκησεις

344. Νὰ εὑρεθῆ τὸ ἥμω καὶ τὸ συνω, ἂν  $\epsilon\phi\left(\frac{\omega}{2}\right) = \frac{3}{5}$ .

345. Νὰ εὑρεθῆ τὸ ἥμω καὶ τὸ συνω, ἂν  $\epsilon\phi\left(\frac{\omega}{2}\right) = 1,5$ .

346. Ἄν  $\left| \epsilon\phi\left(\frac{\omega}{2}\right) \right| < 1$ , νὰ ἀποδειχθῆ ὅτι  $\text{συν}\omega > 0$ .

347. Νὰ ἀποδειχθῆ ὅτι ἥμω  $> 0$ , ἂν  $\epsilon\phi\left(\frac{\omega}{2}\right) > 0$  καὶ ἥμω  $< 0$ , ἂν  $\epsilon\phi\left(\frac{\omega}{2}\right) < 0$ .

348. Νὰ ἀποδειχθῆ ὅτι  $1 + \epsilon\phi\alpha \cdot \epsilon\phi 2\alpha = \frac{1}{\text{συν}2\alpha}$ .

### 3. ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΟΥ ΗΜΙΣΕΟΣ ΤΟΣΟΥ

**107. Πρόβλημα VIII.** Νὰ εὑρεθῆ τὸ ἥμ $\left(\frac{\omega}{2}\right)$  καὶ τὸ συν $\left(\frac{\omega}{2}\right)$  ἐκ τοῦ συνω.

Λύσις. Γνωρίζομεν ὅτι:  $\text{συν}^2\left(\frac{\omega}{2}\right) + \eta\mu^2\left(\frac{\omega}{2}\right) = 1$ ,  
καὶ  $\text{συν}^2\left(\frac{\omega}{2}\right) - \eta\mu^2\left(\frac{\omega}{2}\right) = \text{συν}\omega$  (1)

Ἄν προσθέσωμεν ταῦτας κατὰ μέλη, εὑρίσκομεν ὅτι:

$$2\text{συν}^2\left(\frac{\omega}{2}\right) = 1 + \text{συν}\omega \quad (48)$$

Ἐκ ταύτης δὲ εὑρίσκομεν ὅτι  $\text{συν}\left(\frac{\omega}{2}\right) = \pm \sqrt{\frac{1 + \text{συν}\omega}{2}}$ .

Ἄν δὲ ἀπὸ τὰ μέλη τῆς α' τῶν (1) ἀφαιρέσωμεν τὰ ἀντίστοιχα μέλη τῆς β', εὑρίσκομεν ὅτι:  $2\eta\mu^2\left(\frac{\omega}{2}\right) = 1 - \text{συν}\omega$  (49)

Ἐκ ταύτης δὲ ἔπεται ὅτι  $\eta\mu\left(\frac{\omega}{2}\right) = \pm \sqrt{\frac{1 - \text{συν}\omega}{2}}$ . Διὰ τῶν ἰσοτήτων

$$\eta\mu\left(\frac{\omega}{2}\right) = \pm \sqrt{\frac{1 - \text{συν}\omega}{2}}, \quad \text{συν}\left(\frac{\omega}{2}\right) = \pm \sqrt{\frac{1 + \text{συν}\omega}{2}} \quad (50)$$


εύρισκομεν τὸ ἥμ( $\frac{\omega}{2}$ ) καὶ τὸ συν( $\frac{\omega}{2}$ ), ἂν γνωρίζωμεν τὸ συνω καὶ τὸ τεταρτημόριον, εἰς τὸ ὁποῖον λήγει τὸ τόξον  $\frac{\omega}{2}$ . Π.χ. ἂν συνω

$$= \frac{1}{2} \text{ καὶ } 270^\circ < \frac{\omega}{2} < 360^\circ, \text{ θὰ εἶναι: } \eta\mu\left(\frac{\omega}{2}\right) = -\sqrt{\frac{1 - \frac{1}{2}}{2}} = -\sqrt{\frac{1}{4}} = -\frac{1}{2} \text{ καὶ } \text{συν}\left(\frac{\omega}{2}\right) = \sqrt{\frac{1 + \frac{1}{2}}{2}} = \sqrt{\frac{3}{4}} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Ἡ παρουσία τοῦ διπλοῦ σημείου εἰς τοὺς τύπους (50) ἐξηγεῖται ὡς ἑξῆς:

Ἄν συνω =  $\overline{(\text{ΟΠ})}$  (σχ. 48), τὸ τόξον  $\omega$  θὰ λήγη εἰς τὸ M ἢ εἰς τὸ M'. Ἄν δὲ  $\widehat{(\text{ΑΜ})} = \tau$ , θὰ εἶναι  $\widehat{(\text{ΑΜ})}' = -\tau$  καὶ  $\omega = 360^\circ k + \tau$  εἰς τὴν α' περίπτωση,  $\omega = 360^\circ k - \tau$  εἰς τὴν β' περίπτωση. Ἐκ τούτων δὲ εὐρίσκομεν ὅτι  $\frac{\omega}{2} = 180^\circ k \pm \frac{\tau}{2}$ . Καὶ ἂν τὸ τόξον  $\frac{\tau}{2}$

λήγη εἰς τὸ N, μέσον τοῦ  $\widehat{ΑΜ}$ , τὸ  $\frac{\omega}{2}$  θὰ λήγη εἰς τὸ N ἢ εἰς τὸ N', συμμετρικὸν τοῦ N πρὸς τὸν ἄξονα τῶν συνημιτόνων, δι' ἄρτίας τιμᾶς τοῦ k καὶ εἰς τὸ Z ἢ Z', ἀντιστοίχως συμμετρικὰ τῶν N καὶ N' πρὸς τὸ κέντρον, διὰ περιττὰς τιμᾶς τοῦ k. Ἄν δὲ τὸ  $\frac{\tau}{2}$  λήγη εἰς τὸ Z, τὸ  $\frac{\omega}{2}$  θὰ λήγη εἰς τὸ Z ἢ Z' δι' ἄρτίας τιμᾶς τοῦ k καὶ εἰς τὸ N ἢ N' διὰ περιττὰς τιμᾶς αὐ-



Σχ. 48

τοῦ. Ὅθεν ἕκαστος τῶν ἀριθμῶν ἥμ  $\frac{\omega}{2}$  καὶ συν  $\frac{\omega}{2}$  ἄλλο σημεῖον θὰ ἔχη, ὅταν τὸ τόξον  $\frac{\omega}{2}$  λήγη εἰς τὸ N, καὶ ἄλλο, ὅταν λήγη εἰς τὸ Z. Ὅμοίως ἕκαστος τούτων ἄλλο σημεῖον θὰ ἔχη διὰ  $\frac{\omega}{2}$  λήγον εἰς τὸ N' καὶ ἄλλο διὰ  $\frac{\omega}{2}$  λήγον εἰς τὸ Z'.

**108. Πρόβλημα IX. Να εύρεθῇ ἡ ἐφ( $\frac{\omega}{2}$ ) ἐκ τοῦ συνω.**

*Λύσις.* Ἀπὸ τὰς προηγουμένας εύρεθείσας ἰσότητας :

$$2\eta\mu^2\left(\frac{\omega}{2}\right) = 1 - \text{συν}\omega, \quad 2\sigma\upsilon\nu^2\left(\frac{\omega}{2}\right) = 1 + \text{συν}\omega$$

διὰ διαιρέσεως κατὰ μέλη εύρίσκομεν ὅτι :

$$\mathbf{\acute{\epsilon}\phi^2\left(\frac{\omega}{2}\right) = \frac{1 - \text{συν}\omega}{1 + \text{συν}\omega}} \quad (51)$$

Ἐκ ταύτης δὲ ἔπεται ὅτι :

$$\mathbf{\acute{\epsilon}\phi\left(\frac{\omega}{2}\right) = \pm \sqrt{\frac{1 - \text{συν}\omega}{1 + \text{συν}\omega}}} \quad (52)$$

Διὰ ταύτης εύρίσκομεν τὴν ἐφ( $\frac{\omega}{2}$ ), ἂν γνωρίζωμεν τὸ συνω καὶ τὸ τεταρτημόριον, εἰς τὸ ὁποῖον λήγει τὸ τόξον  $\frac{\omega}{2}$ . Ἐὰν π.χ. εἶναι συνω =  $\frac{1}{2}$  καὶ  $0^\circ < \frac{\omega}{2} < 90^\circ$ , εύρίσκομεν ὅτι :

$$\acute{\epsilon}\phi\left(\frac{\omega}{2}\right) = \sqrt{\frac{1 - \frac{1}{2}}{1 + \frac{1}{2}}} = \sqrt{\frac{\frac{1}{2}}{\frac{3}{2}}} = \sqrt{\frac{2-1}{2+1}} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}.$$

**Σημείωσις.** Ἡ παρουσία τοῦ διπλοῦ σημείου ὀφείλεται εἰς τὸ ὅτι τὸ τόξον  $\frac{\omega}{2}$  δύναται νὰ λήγῃ εἰς τὸ Ν ἢ τὸ Ζ εἰς μίαν περίπτωσιν καὶ εἰς τὸ Ν' ἢ τὸ Ζ' εἰς ἄλλην περίπτωσιν (σχ. 48), ὡς ἀνωτέρω (§ 107) ἐξηγήθη.

#### Ἀσκήσεις

349. Να εύρεθῇ τὸ ἦμ  $\frac{\omega}{2}$ , συν  $\frac{\omega}{2}$ , ἐφ  $\frac{\omega}{2}$ , ἂν συνω =  $\frac{1}{4}$  καὶ  $0^\circ < \frac{\omega}{2} < 90^\circ$ .

350. Να εύρεθῶσιν οἱ τριγωνομετρικοὶ ἀριθμοὶ τοῦ τόξου  $22^\circ 30'$ .

351. Να εύρεθῶσιν οἱ τριγωνομετρικοὶ ἀριθμοὶ τοῦ τόξου  $15^\circ$ .

352. Να εύρεθῶσιν οἱ τριγωνομετρικοὶ ἀριθμοὶ τοῦ τόξου  $7^\circ 30'$ .

353. Να εύρεθῶσιν οἱ τριγωνομετρικοὶ ἀριθμοὶ τόξου  $\frac{\omega}{2}$ , ἂν συνω =  $\frac{2}{3}$  καὶ  $270^\circ < \frac{\omega}{2} < 360^\circ$ .

354. Να εύρεθῶσιν οἱ τριγωνομετρικοὶ ἀριθμοὶ τόξου  $\frac{\omega}{2}$ , ἂν εἶναι συνω =  $-0,5$  καὶ  $0^\circ < \frac{\omega}{2} < 90^\circ$ .

## ΚΕΦ Α Λ Α Ι Ο Ν Δ '

### 1. Η ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΙΛΥΣΕΩΣ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΕΚ ΤΩΝ ΠΛΕΥΡΩΝ ΑΥΤΟΥ

**109. Πρόβλημα I.** Να εύρεθῆ τὸ ἡμίτονον καὶ τὸ συν-  
ημίτονον τοῦ ἡμίσεος ἐκάστης γωνίας τριγώνου ἐκ τῶν πλευρῶν  
αὐτοῦ.

*Λύσις.* Ἐφαρμόζοντας τὴν ἰσότητα  $2\eta\mu^2\left(\frac{\omega}{2}\right) = 1 - \text{συν}\omega$  εἰς  
τὴν γωνίαν A ἐνὸς τριγώνου ABΓ εὐρίσκομεν ὅτι :

$$2\eta\mu^2\left(\frac{A}{2}\right) = 1 - \text{συν}A \quad (1)$$

Ἐπειδὴ δὲ ἐκ τῆς γνωστῆς (31 § 60) ἰσότητος  $\alpha_2 = \beta^2 + \gamma^2 - 2\beta\gamma\text{συν}A$   
εὐρίσκομεν ὅτι  $\text{συν}A = \frac{\beta^2 + \gamma^2 - \alpha^2}{2\beta\gamma}$  ἢ (1) γίνεται :

$$2\eta\mu^2\left(\frac{A}{2}\right) = 1 - \frac{\beta^2 + \gamma^2 - \alpha^2}{2\beta\gamma} = \frac{2\beta\gamma - \beta^2 - \gamma^2 + \alpha^2}{2\beta\gamma} = \frac{\alpha^2 - (\beta - \gamma)^2}{2\beta\gamma} =$$

$$\frac{(\alpha + \beta - \gamma)(\alpha - \beta + \gamma)}{2\beta\gamma} \quad (2)$$

Ἄν δὲ χάριν συντομίας θέσωμεν  $\alpha + \beta + \gamma = 2\tau$  καὶ ἀφαιρέσωμεν  
ἀπὸ τὰ μέλη αὐτῆς  $2\gamma$ , εὐρίσκομεν ὅτι :  $\alpha + \beta - \gamma = 2(\tau - \gamma)$ . Ἄν δὲ  
ἀφαιρέσωμεν  $2\beta$ , εὐρίσκομεν ὅτι :  $\alpha - \beta + \gamma = 2(\tau - \beta)$ . Ἡ ἰσότης  
λοιπὸν (2) γίνεται :

$$2\eta\mu^2\left(\frac{A}{2}\right) = \frac{4(\tau - \beta)(\tau - \gamma)}{2\beta\gamma} = \frac{2(\tau - \beta)(\tau - \gamma)}{\beta\gamma}$$

Ἐκ αὐτῆς δὲ, ἔχοντες ὑπ' ὄψιν ὅτι  $0^\circ < \frac{A}{2} < 90^\circ$ , εὐρίσκομεν ὅτι :

$$\eta\mu\left(\frac{A}{2}\right) = \sqrt{\frac{(\tau - \beta)(\tau - \gamma)}{\beta\gamma}} \quad (53)$$

Ὅμοίως ἐκ τῆς ἰσότητος  $2\sigma\upsilon\nu^2\left(\frac{A}{2}\right) = 1 + \text{συν}A$  εὐρίσκομεν ὅτι :

$$\sigma\upsilon\nu\left(\frac{A}{2}\right) = \sqrt{\frac{\tau(\tau - \alpha)}{\beta\gamma}} \quad (54)$$

Π.χ. ἂν  $\alpha = 4$  μέτ,  $\beta = 5$  μέτ,  $\gamma = 6$  μέτ, θὰ εἶναι :

$$2\tau = 15, \tau = \frac{15}{2}, \tau - \alpha = \frac{7}{2}, \tau - \beta = \frac{5}{2}, \tau - \gamma = \frac{3}{2} \quad \text{καὶ}$$

$$\eta\mu\left(\frac{A}{2}\right) = \sqrt{\frac{5 \cdot 3}{2 \cdot 2}} = \sqrt{\frac{5 \cdot 3}{4 \cdot 5 \cdot 6}} = \sqrt{\frac{1}{4 \cdot 2}} = \frac{1}{4} \sqrt{2},$$

$$\sigma\upsilon\nu\left(\frac{A}{2}\right) = \sqrt{\frac{15 \cdot 7}{2 \cdot 2}} = \sqrt{\frac{15 \cdot 7}{4 \cdot 5 \cdot 6}} = \sqrt{\frac{7}{4 \cdot 2}} = \sqrt{\frac{14}{4 \cdot 4}} = \frac{1}{4} \sqrt{14}.$$

κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον εὐρίσκομεν ὅτι :

$$\eta\mu\left(\frac{B}{2}\right) = \sqrt{\frac{(\tau-\alpha)(\tau-\gamma)}{\alpha\gamma}}, \quad \sigma\upsilon\nu\left(\frac{B}{2}\right) = \sqrt{\frac{\tau(\tau-\beta)}{\alpha\gamma}}$$

$$\eta\mu\left(\frac{\Gamma}{2}\right) = \sqrt{\frac{(\tau-\alpha)(\tau-\beta)}{\alpha\beta}}, \quad \sigma\upsilon\nu\left(\frac{\Gamma}{2}\right) = \sqrt{\frac{\tau(\tau-\gamma)}{\alpha\beta}}$$

**110. Πρόβλημα II.** Νὰ εὐρεθῇ ἡ ἐφαπτομένη τοῦ ἡμίσεως ἐκάστης γωνίας τριγώνου ἐκ τῶν πλευρῶν αὐτοῦ.

*Λύσις.* Ἐκ τῶν προηγουμένων ἰσοτήτων :

$$\eta\mu\left(\frac{A}{2}\right) = \sqrt{\frac{(\tau-\beta)(\tau-\gamma)}{\beta\gamma}}, \quad \sigma\upsilon\nu\left(\frac{A}{2}\right) = \sqrt{\frac{\tau(\tau-\alpha)}{\beta\gamma}}$$

εὐρίσκομεν ἀμέσως ὅτι :

$$\acute{\epsilon}\varphi\left(\frac{A}{2}\right) = \sqrt{\frac{(\tau-\beta)(\tau-\gamma)}{\tau(\tau-\alpha)}}$$

Ὅμοίως εὐρίσκομεν ὅτι :

$$\acute{\epsilon}\varphi\left(\frac{B}{2}\right) = \sqrt{\frac{(\tau-\alpha)(\tau-\gamma)}{\tau(\tau-\beta)}}$$

$$\acute{\epsilon}\varphi\left(\frac{\Gamma}{2}\right) = \sqrt{\frac{(\tau-\alpha)(\tau-\beta)}{\tau(\tau-\gamma)}}$$

(55)

## 2. ΤΡΕΙΣ ΑΛΛΑΙ ΚΛΑΣΣΙΚΑΙ ΜΟΡΦΑΙ ΤΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ ΕΝΟΣ ΤΡΙΓΩΝΟΥ

**111. Πρόβλημα I.** Νὰ εὐρεθῇ τὸ ἐμβαδὸν τριγώνου ἐκ τῶν πλευρῶν αὐτοῦ.

*Λύσις.* Γνωρίζομεν (§ 60γ') ὅτι  $E = \frac{1}{2} \beta\gamma\eta\mu A$ . Ἐπειδὴ δὲ  $\eta\mu A = 2\eta\mu \frac{A}{2} \sigma\upsilon\nu \frac{A}{2}$ , αὕτη γίνεται  $E = \beta\gamma\eta\mu \frac{A}{2} \sigma\upsilon\nu \frac{A}{2}$ . Ἀπὸ αὐτὴν καὶ ἀπὸ τὰς προηγουμένας (§ 109) εὐρεθείσας τιμὰς τοῦ  $\eta\mu \frac{A}{2}$  καὶ τοῦ  $\sigma\upsilon\nu \frac{A}{2}$  εὐρίσκομεν ὅτι :

$$E = \sqrt{\tau(\tau-\alpha)(\tau-\beta)(\tau-\gamma)} \quad (56)$$

Π.χ. τὸ προηγούμενον (§ 109) τρίγωνον ἔχει :

$$E = \sqrt{\frac{15}{2} \cdot \frac{7}{2} \cdot \frac{5}{2} \cdot \frac{3}{2}} = \frac{15}{4} \sqrt{7} \text{ τετ. μέτρα.}$$

**112. Πρόβλημα II.** Νὰ εὑρεθῇ τὸ ἔμβαδὸν ἑνὸς τριγώνου ἀπὸ τὴν ἡμιπερίμετρον αὐτοῦ καὶ ἀπὸ τὴν ἀκτίνα τῆς ἐγγεγραμμένης περιφερείας εἰς αὐτό.


*Λύσις.* Ἐὰν  $K$  εἴναι τὸ κέντρον τῆς ἐγγεγραμμένης περιφερείας, αἱ εὐθεῖαι  $KA, KB, \Gamma K$ , διαιροῦσι τὸ τρίγωνον  $AB\Gamma$  εἰς τρία τρίγωνα (σχ. 49). Εἶναι λοιπὸν  $E = (KAB) + (KB\Gamma) + (K\Gamma A)$  (1) Ἐπειδὴ δὲ  $(KAB) = \frac{1}{2} (AB) \cdot (KZ)$   
 $= \frac{1}{2} \gamma \rho$ ,  $(KB\Gamma) = \frac{1}{2} \alpha \rho$ ,  
 $(K\Gamma A) = \frac{1}{2} \beta \rho$ , ἢ (1) γίνε-  
 ται :  $E = \frac{1}{2} (\alpha + \beta + \gamma) \rho$ .

Δι' αὐτῆς εὐρίσκομεν τὸ ἔμβαδὸν ἑνὸς τριγώνου ἐκ τῆς  $\rho$  καὶ τῶν πλευρῶν τοῦ. Συνήθως ὁμως δίδομεν εἰς αὐτὴν ἀπλουστέραν μορφήν, ἂν λάβωμεν ὑπ' ὄψιν ὅτι  $\alpha + \beta + \gamma = 2\tau$ . Οὕτως εὐρίσκομεν ὅτι :

$$E = \tau \rho \quad (57)$$

**113. Πρόβλημα III.** Νὰ εὑρεθῇ τὸ ἔμβαδὸν ἑνὸς τριγώνου ἐκ τῶν πλευρῶν του καὶ ἐκ τῆς ἀκτίνος μιᾶς τῶν παρεγγεγραμμένων περιφερειῶν εἰς αὐτό.

*Λύσις.* Ἐστω  $K'$  τὸ κέντρον καὶ  $\rho_a$ , ἡ ἀκτίς τῆς παρεγγεγραμμένης περιφερείας εἰς ἓν τρίγωνον  $AB\Gamma$ , ἣτις εὐρίσκεται ἐντὸς τῆς γωνίας  $A$  αὐτοῦ (σχ. 49). Ἐὰν φέρωμεν τὰς εὐθεῖας  $K'A, K'B, K'\Gamma$ , βλέπομεν ὅτι :  $E = (K'AB) + (K'A\Gamma) - (K'B\Gamma)$  (1)



Σχ. 49

$$\begin{aligned} \text{Ἐπειδὴ } (K'AB) &= \frac{1}{2} (AG) \cdot (K'H) = \frac{1}{2} \gamma \rho_\alpha, \quad (K'AG) = \frac{1}{2} \beta \rho_\alpha, \\ (K'BG) &= \frac{1}{2} \alpha \rho_\alpha, \quad \eta \quad (1) \quad \gamma \text{ίνεται: } E = \frac{1}{2} \rho_\alpha (\beta + \gamma - \alpha). \end{aligned}$$

Δι' αὐτῆς εὐρίσκομεν τὸ ἔμβαδὸν ἑνὸς τριγώνου ἐκ τῶν πλευρῶν του καὶ τῆς  $\rho_\alpha$ . Ἄν ὁμως ἐνθυμηθῶμεν ὅτι  $\beta + \gamma - \alpha = 2(\tau - \alpha)$ , δίδομεν εἰς αὐτὴν τὴν ἄπλουστέραν μορφήν:

$$\text{Ὅμοίως εὐρίσκομεν ὅτι: } \left. \begin{aligned} E &= (\tau - \alpha) \rho_\alpha, \\ E &= (\tau - \beta) \rho_\beta \\ E &= (\tau - \gamma) \rho_\gamma \end{aligned} \right\} \quad (58)$$

### 3. ΕΥΡΕΣΙΣ ΤΩΝ $\rho, \rho_\alpha, \rho_\beta, \rho_\gamma$ , ΕΝΟΣ ΤΡΙΓΩΝΟΥ

**114. Πρόβλημα I.** Νὰ εὐρεθῇ ἡ ἀκτίς  $\rho$  τῆς ἐγγεγραμμένης περιφερείας εἰς ἓν τρίγωνον ἐκ τῶν πλευρῶν του ἢ ἐκ τῶν πλευρῶν καὶ τῶν γωνιῶν αὐτοῦ.

*Λύσις.* α') Ἐκ τῆς γνωστῆς (57 § 112) ἰσότητος  $E = \tau \rho$  εὐρίσκομεν ὅτι  $\rho = \frac{E}{\tau}$ . Ἐπειδὴ δὲ  $E = \sqrt{\tau(\tau - \alpha)(\tau - \beta)(\tau - \gamma)}$

$$\text{αὕτη γίνεται: } \rho = \sqrt{\frac{(\tau - \alpha)(\tau - \beta)(\tau - \gamma)}{\tau}} \quad (59)$$

Δι' αὐτῆς εὐρίσκομεν τὴν  $\rho$  ἐκ τῶν πλευρῶν τοῦ τριγώνου.

β') Ἀπὸ τὸ ὀρθογώνιον τρίγωνον AKE (σχ. 49) εὐρίσκομεν ὅτι:

$$(KE) = (AE) \epsilon\phi \frac{A}{2} \quad (1)$$

Ἐπειδὴ δὲ  $2(AE) + 2(BD) + 2(\Gamma\Delta) = \alpha + \beta + \gamma = 2\tau$  καὶ  $2(BD) + 2(\Gamma\Delta) = 2\alpha$ , ἔπεται ὅτι  $(AE) = \tau - \alpha$ .

$$\left. \begin{aligned} \text{Ἡ (1) λοιπὸν γίνεται: } & \rho = (\tau - \alpha) \epsilon\phi \left( \frac{A}{2} \right) \\ \text{Ὅμοίως εὐρίσκομεν ὅτι: } & \rho = (\tau - \beta) \epsilon\phi \left( \frac{B}{2} \right) \\ \text{καὶ} & \rho = (\tau - \gamma) \epsilon\phi \left( \frac{\Gamma}{2} \right) \end{aligned} \right\} \quad (60)$$

Ἄν δὲ ἐνθυμηθῶμεν ὅτι  $\epsilon\phi \left( \frac{A}{2} \right) = \sqrt{\frac{(\tau - \beta)(\tau - \gamma)}{\tau(\tau - \alpha)}}$  εὐρίσκομεν ὅτι:

$$\rho = (\tau - \alpha) \cdot \sqrt{\frac{(\tau - \beta)(\tau - \gamma)}{\tau(\tau - \alpha)}} = \sqrt{\frac{(\tau - \alpha)(\tau - \beta)(\tau - \gamma)}{\tau}}$$

ήτοι πάλιν τὴν ἀνωτέρω ἰσότητα (59).

**115. Πρόβλημα II.** Νὰ εὐρεθῶσιν αἱ ἀκτῖνες τῶν παρεγγεγραμμένων περιφερειῶν εἰς ἓν τρίγωνον ἐκ τῶν πλευρῶν τοῦ ἢ ἐκ τῶν πλευρῶν καὶ γωνιῶν αὐτοῦ.

*Λύσις.* α') Ἀπὸ τὴν γνωστὴν (58) ἰσότητα  $E = (\tau - \alpha) \rho_\alpha$  εὐρίσκομεν ὅτι  $\rho_\alpha = \frac{E}{\tau - \alpha}$ . Ἐπειδὴ δὲ  $E = \sqrt{\tau(\tau - \alpha)(\tau - \beta)(\tau - \gamma)}$

$$\left. \begin{array}{l} \text{αὕτη γίνεται:} \quad \rho_\alpha = \sqrt{\frac{\tau(\tau - \beta)(\tau - \gamma)}{(\tau - \alpha)}} \\ \text{'Ὁμοίως εὐρίσκομεν ὅτι:} \quad \rho_\beta = \sqrt{\frac{\tau(\tau - \alpha)(\tau - \gamma)}{(\tau - \beta)}} \\ \text{καὶ} \quad \rho_\gamma = \sqrt{\frac{\tau(\tau - \alpha)(\tau - \beta)}{(\tau - \gamma)}} \end{array} \right\} \quad (61)$$

β') Ἀπὸ τὸ ὀρθογώνιον τρίγωνον ΑΚ'Θ (σχ. 49) βλέπομεν ὅτι:

$$(Κ'Θ) = (ΑΘ) \cdot \acute{\epsilon}\varphi \frac{A}{2} \quad (1)$$

Ἐπειδὴ δὲ  $(ΑΘ) + (ΑΗ) = (ΑΓ) + (ΓΘ) + (ΑΒ) + (ΒΗ) = (ΑΓ) + (ΓΛ) + (ΑΒ) + (ΒΛ) \dot{=} 2(ΑΘ) = \beta + \gamma + \alpha = 2\tau$ , ἔπεται ὅτι  $(ΑΘ) = \tau$ .

$$\left. \begin{array}{l} \text{'Η (1) λοιπὸν γίνεται:} \quad \rho_\alpha = \tau \cdot \acute{\epsilon}\varphi \frac{A}{2} \\ \text{'Ὁμοίως εὐρίσκομεν ὅτι:} \quad \rho_\beta = \tau \cdot \acute{\epsilon}\varphi \frac{B}{2}, \quad \rho_\gamma = \tau \cdot \acute{\epsilon}\varphi \frac{\Gamma}{2} \end{array} \right\} \quad (2)$$

Δι' αὐτῶν εὐρίσκομεν τὰς ζητούμενας ἀκτῖνας ἐκ τῶν πλευρῶν καὶ τῶν γωνιῶν τοῦ τριγώνου. Ἐκ τούτων δὲ καὶ τῶν γνωστῶν ἰσοτήτων (55) εὐρίσκομεν πάλιν τὰς ἰσοτήτας (61).

#### 4. ΜΙΑ ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΙΣ ΤΡΙΓΩΝΟΥ

**116. Πρόβλημα** Νὰ ἐπιλυθῇ ἓν τρίγωνον ἐκ τῶν πλευρῶν αὐτοῦ.

*Ἐπίλυσις.* Ἀπὸ τοὺς γνωστοὺς τύπους (55) ὀρίζονται οἱ ἄγνωστοι  $\frac{A}{2}$ ,  $\frac{B}{2}$ ,  $\frac{\Gamma}{2}$  καὶ ἐκ τούτων ἔπεται εὐρίσκομεν τὰ ζη-

τούμενα μέτρα Α, Β, Γ τῶν γωνιῶν τοῦ τριγώνου. Ταχύτερον ὁμως γίνονται οἱ ὑπολογισμοὶ ὡς ἑξῆς :

Προηγουμένως εὕρομεν ὅτι  $\rho = (\tau - \alpha) \epsilon\phi \frac{A}{2}$ . Ἐκ ταύτης δὲ ἔπεται ὅτι:  $\epsilon\phi \frac{A}{2} = \frac{\rho}{\tau - \alpha}$ . Ὁμοίως εἶναι  $\epsilon\phi \frac{B}{2} = \frac{\rho}{\tau - \beta}$ ,  $\epsilon\phi \frac{\Gamma}{2} = \frac{\rho}{\tau - \gamma}$ . Ἄν λοιπὸν ὑπολογισθῇ ἀρχικῶς ὁ λογρ, εὐρίσκονται εὐκόλως οἱ λογάριθμοι τῶν α' μελῶν τῶν ἰσοτήτων τούτων καὶ εἶτα οἱ ἄγνωστοι  $\frac{A}{2}$ ,  $\frac{B}{2}$ ,  $\frac{\Gamma}{2}$ . Οὕτως ἐκ τῆς ἰσότητος (59) εὐρίσκομεν ὅτι :

$$\text{λογρ} = \frac{\text{λογ}(\tau - \alpha) + \text{λογ}(\tau - \beta) + \text{λογ}(\tau - \gamma) - \text{λογ}\tau}{2}$$

Ἄν π.χ. εἶναι  $\alpha = 4$  μέτ,  $\beta = 5$  μέτ,  $\gamma = 6$  μέτ, εὐρίσκομεν ὅτι :

$\text{λογ}(\tau - \alpha) = 0,54407$	$\text{ἄθροισμα} = 1,11810$
$\text{λογ}(\tau - \beta) = 0,39794$	$\text{λογ}\tau = 0,87506$
$\text{λογ}(\tau - \gamma) = 0,17609$	$\text{διαφορὰ} = 0,24304$
$\text{ἄθροισμα} = 1,11810$	$\text{λογρ} = 0,12152$

Ἐπολογισμὸς τοῦ μέτρου Α.

Ἐπολογισμὸς τοῦ μέτρου Β.

$$\text{λογ}\epsilon\phi\left(\frac{A}{2}\right) = \text{λογρ} - \text{λογ}(\tau - \alpha), \quad \text{λογ}\epsilon\phi\left(\frac{B}{2}\right) = \text{λογρ} - \text{λογ}(\tau - \beta)$$

$\text{λογρ} = 0,12152$	$\text{λογρ} = 0,12152$
$\text{λογ}(\tau - \alpha) = 0,54407$	$\text{λογ}(\tau - \beta) = 0,39794$
$\text{λογ}\epsilon\phi\left(\frac{A}{2}\right) = 1,57745$	$\text{λογ}\epsilon\phi\left(\frac{B}{2}\right) = 1,72358$

$\frac{A}{2} = 20^\circ 42' 17'', 37$	$\frac{B}{2} = 27^\circ 53' 8''$
$A = 41^\circ 24' 34'', 74$	$B = 55^\circ 46' 16''$

Ἐπολογισμὸς τοῦ μέτρου Γ.

Δοκιμὴ

$$\text{λογ}\epsilon\phi\left(\frac{\Gamma}{2}\right) = \text{λογρ} - \text{λογ}(\tau - \gamma) \quad 180^\circ = 179^\circ 59' 60''$$

$\text{λογρ} = 0,12152$	$A + B + \Gamma = 179^\circ 59' 59'', 94$
$\text{λογ}(\tau - \gamma) = 0,17609$	$\text{λάθος} = 0'', 06$
$\text{λογ}\epsilon\phi\left(\frac{\Gamma}{2}\right) = 1,94543$	

$$\frac{\Gamma}{2} = 41^\circ 24' 34'', 6 \quad \Gamma = 82^\circ 49' 9'', 2$$

## Υπολογισμός του έμβραδοῦ

$$E = \sqrt{\tau(\tau - \alpha)(\tau - \beta)(\tau - \gamma)}$$

$$2\log E = [\log(\tau - \alpha) + \log(\tau - \beta) + \log(\tau - \gamma)] + \log \tau$$

ἄθροισμα ἐντὸς ἀγκυλῶν = 1,11810  
 $\log \tau = 0,87506$   
 $\frac{2\log E}{2} = 1,99316$   
 $\log E = 0,99658$   
 $E = 9,92125$  τετ. μέτ.

## Ἀσκήσεις

355. Νὰ εὑρεθῆ ἡ  $\rho$  τοῦ τριγώνου, τὸ ὁποῖον ἔχει  $\alpha = 8$  μέτ,  $\beta = 9$  μέτ,  $\gamma = 10$  μέτ.

356. Νὰ ἐπιλυθῆ τὸ τρίγωνον, τὸ ὁποῖον ἔχει πλευράς  $\alpha = 347$  μέτ,  $\beta = 247$  μέτ,  $\gamma = 147$  μέτ. Νὰ εὑρεθῆ δὲ καὶ ἡ  $\rho$  αὐτοῦ.

357. Ἐν τριγώνου  $AB\Gamma$  ἔχει  $\tau - \alpha = 5,5$  μέτ. καὶ  $A = 24^\circ 43' 46''$ . Νὰ εὑρεθῆ ἡ  $\rho$  αὐτοῦ.

358. Νὰ εὑρεθῆ ἡ  $\rho$  συναρτήσῃ τῶν πλευρῶν τριγώνου  $AB\Gamma$  διὰ μεθόδου στηριζομένης εἰς τὴν ὁμοιότητα τῶν τριγώνων  $AKE$  καὶ  $AK'\Theta$  (σχ. 49).

359. Εἰς ἓν τρίγωνον  $AB\Gamma$  εἶναι  $E = \tau(\tau - \alpha)$ . Νὰ ἀποδειχθῆ ὅτι τοῦτο εἶναι ὀρθογώνιον τρίγωνον. Καὶ ἀντιστρόφως.

360. Ἐν τριγώνου ἔχει περίμετρον 36 μέτ. καὶ  $\rho_a = \frac{6}{5}\sqrt{15}$  μέτ. Νὰ εὑρεθῆ τὸ μέτρον τῆς γωνίας  $A$ .

**117. Διάφοροι ἄλλαι μορφαὶ τοῦ ἐμβραδοῦ ἐνὸς τριγώνου.**  
 Ἐμάθομεν μέχρι τοῦδε τοὺς ἐξῆς τύπους, σχετικούς μὲ τὸ ἐμβραδὸν τοῦχοντος τριγώνου  $AB\Gamma$  :

$$E = \frac{\alpha^2 \eta \mu B \cdot \eta \mu \Gamma}{2 \eta \mu A}, \quad E = \sqrt{\tau(\tau - \alpha)(\tau - \beta)(\tau - \gamma)}, \quad E = \tau \rho,$$

$$E = (\tau - \alpha) \rho_\alpha = (\tau - \beta) \rho_\beta = (\tau - \gamma) \rho_\gamma.$$

Πλὴν τούτων, ἀξιοσημεῖωτοι μορφαὶ τοῦ ἐμβραδοῦ ἐνὸς τριγώνου εἶναι καὶ αἱ ἀκόλουθοι :

α') Ἐκ τῶν ἰσοτήτων  $E = \frac{1}{2} \beta \gamma \eta \mu A$ ,  $\beta = 2R \eta \mu B$ ,  $\gamma = 2R \eta \mu \Gamma$ ,  
 εὑρίσκομεν ὅτι :  $E = 2R^2 \eta \mu A \eta \mu B \eta \mu \Gamma$  (63)

Ἐπειδὴ δὲ ἐκ τῆς  $\alpha = 2R\eta\mu A$  προκύπτει ὅτι  $\eta\mu A = \frac{\alpha}{2R}$ , ἡ προηγουμένη ἰσότης γίνεται :

$$\left. \begin{aligned} \mathbf{E} &= \alpha R\eta\mu B\eta\mu \Gamma \\ \mathbf{E} &= \beta R\eta\mu A\eta\mu \Gamma \\ \mathbf{E} &= \gamma R\eta\mu A\eta\mu B \end{aligned} \right\} \quad (64)$$

β') Ἀπὸ τὴν ἰσότητα  $E = \sqrt{\tau(\tau-\alpha)(\tau-\beta)(\tau-\gamma)}$  διὰ πολλαπλασιασμοῦ καὶ διαιρέσεως τοῦ β' μέλους διὰ  $\tau(\tau-\alpha)$  εὐρίσκομεν ὅτι :

$$E = \tau(\tau-\alpha) \cdot \sqrt{\frac{(\tau-\beta)(\tau-\gamma)}{\tau(\tau-\alpha)}}$$
, ὅθεν εὐκόλως ἔπεται ὅτι:

Ἐπομένως :

$$\left. \begin{aligned} \mathbf{E} &= \tau(\tau-\alpha)\epsilon\phi\left(\frac{A}{2}\right) \\ \mathbf{E} &= \tau(\tau-\beta)\epsilon\phi\left(\frac{B}{2}\right) \\ \mathbf{E} &= \tau(\tau-\gamma)\epsilon\phi\left(\frac{\Gamma}{2}\right) \end{aligned} \right\} \quad (65)$$

γ') Ἀπὸ τὰς ἰσότητας  $E = \tau\rho$ ,  $E = (\tau-\alpha)\rho_\alpha$ ,  $E = (\tau-\beta)\rho_\beta$ ,  $E = (\tau-\gamma)\rho_\gamma$  διὰ πολλαπλασιασμοῦ κατὰ μέλη εὐρίσκομεν ὅτι :

$$E^4 = \rho_\alpha \rho_\beta \rho_\gamma \cdot \tau(\tau-\alpha)(\tau-\beta)(\tau-\gamma) = \rho_\alpha \rho_\beta \rho_\gamma E^2.$$

Ἐκ ταύτης δὲ εὐρίσκομεν  $E^2 = \rho_\alpha \rho_\beta \rho_\gamma$  καὶ ἔπομένως :

$$\mathbf{E} = \sqrt{\rho_\alpha \rho_\beta \rho_\gamma} \quad (66)$$

δ') Ἀπὸ τὰς ἰσότητας (62) εὐρίσκομεν ὅτι :

$$\rho_\alpha \rho_\beta \rho_\gamma = \tau^2 \epsilon\phi \frac{A}{2} \epsilon\phi \frac{B}{2} \epsilon\phi \frac{\Gamma}{2}, \quad \text{ὅθεν } \rho_\alpha \rho_\beta \rho_\gamma = \tau^2 \epsilon\phi \frac{A}{2} \epsilon\phi \frac{B}{2} \epsilon\phi \frac{\Gamma}{2}.$$

Ἐπειδὴ δὲ  $\rho_\alpha \rho_\beta \rho_\gamma = E^2$  καὶ  $\rho\tau = E$ , ἔπεται ὅτι :

$$\mathbf{E} = \tau^2 \epsilon\phi \frac{A}{2} \epsilon\phi \frac{B}{2} \epsilon\phi \frac{\Gamma}{2} \quad (67)$$

ε') Ἐκ τῆς ἰσότητος  $E = \frac{1}{2}\beta\gamma\eta\mu A$  εὐρίσκομεν κατὰ σειράν

$$2E = \beta\gamma\eta\mu A, \quad 2E \cdot \frac{\alpha}{\eta\mu A} = \alpha\beta\gamma.$$

Ἐπειδὴ δὲ  $\frac{\alpha}{\eta\mu A} = 2R$ , αὕτη γίνεται  $4ER = \alpha\beta\gamma$  καὶ ἔπομένως

$$\mathbf{E} = \frac{\alpha\beta\gamma}{4R} \quad (68)$$

**118. Πρόβλημα** Νὰ εὐρεθῇ ἡ ἄκτις τῆς περιγεγραμμένης περιφερείας εἰς ἓν τρίγωνον ἐκ τῶν πλευρῶν του.

Λύσεις. Ἀπὸ τὴν προηγουμένην ἰσότητα  $E = \frac{\alpha\beta\gamma}{4R}$ , εὐρίσκομεν ὅτι :

$$R = \frac{\alpha\beta\gamma}{4E} = \frac{\alpha\beta\gamma}{4\sqrt{\tau(\tau-\alpha)(\tau-\beta)(\tau-\gamma)}} \quad (69)$$

### Ἀσκήσεις

361. Νὰ εὐρεθῇ τὸ ἔμβαδὸν τριγώνου, τὸ ὁποῖον ἔχει  $A = 53^\circ 7' 48''$ ,  
 $B = 67^\circ 22' 48''$ ,  $R = 8,125$  μέτ.
362. Νὰ εὐρεθῇ τὸ ἔμβαδὸν τριγώνου, τὸ ὁποῖον ἔχει  $\alpha = 13$  μέτ.  
 $A = 53^\circ 7' 48''$ ,  $\Gamma = 59^\circ 29' 24''$ .
363. Νὰ εὐρεθῇ τὸ ἔμβαδὸν τριγώνου, τὸ ὁποῖον ἔχει  $\alpha = 37$  μέτ,  $R = 20,04\mu$ ,  
 $B = 18^\circ 55' 29''$ ,  $\Gamma = 93^\circ 41' 44''$ .
364. Νὰ εὐρεθῇ τὸ ἔμβαδὸν τριγώνου, τὸ ὁποῖον ἔχει  $\tau = 21$  μέτ,  $\tau - \alpha = 8\mu$ ,  
 $A = 53^\circ 7' 42''$ .
365. Νὰ εὐρεθῇ τὸ ἔμβαδὸν τριγώνου, τὸ ὁποῖον ἔχει  $\tau = 160$  μέτ, καὶ  
 $\rho = 11,28$  μέτ.
366. Ἐν τρίγωνον ἔχει  $\rho = 9,6$  μέτ,  $\rho_\alpha = 50$  μέτ,  $\rho_\beta = 12,5$  μέτ,  $\rho_\gamma = 12,5\mu$ .  
 Νὰ εὐρεθῇ τὸ ἔμβαδὸν αὐτοῦ.
367. Ἐν τρίγωνον ἔχει  $E = 8169$  τετ. μέτρα,  $A = 77^\circ 19' 10''$ ,  $B = 5^\circ 43' 29''$ ,  $\Gamma = 3$ . Νὰ εὐρεθῇ ἡ περίμετρος αὐτοῦ.
368. Ἐν τρίγωνον ἔχει  $E = 1200$  τετ. μέτρα,  $\alpha = 101$  μέτ,  $\beta = 29$  μέτ. καὶ  
 $\tau = 125$  μέτ. Νὰ εὐρεθῇ ἡ  $R$  αὐτοῦ.

## Κ Ε Φ Α Λ Λ Α Ι Ο Ν Ε'

### ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΛΟΓΙΣΜΟΝ ΔΙΑ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΘΜΩΝ

**119.** Χρησιμότης τῆς τροπῆς παραστάσεων εἰς ἄλλας λογιστὰς διὰ τῶν λογαριθμῶν. Ἐὰν ὑποθέσωμεν ὅτι θέλομεν νὰ εὐρωμεν τὴν τιμὴν τῆς παραστάσεως  $\frac{1 - \text{συν} \chi}{1 + \text{συν} \chi}$ , ἂν  $\chi = 18^\circ 42'$ .

Ἐὰν καλέσωμεν  $\psi$  τὴν ζητούμενην τιμὴν, θὰ εἶναι :

$$\psi = \frac{1 - \text{συν}(18^\circ 42')}{1 + \text{συν}(18^\circ 42')}$$

Πρέπει λοιπὸν νὰ εὐρωμεν τὸ  $\text{συν}(18^\circ 42')$  καὶ νὰ ἐκτελέσωμεν τὰς σημειουμένας πράξεις εἰς τὸ β' μέλος τῆς προηγουμένης ἰσότητος. Ἐπειδὴ δὲ  $\log \text{συν}(18^\circ 42') = \log \eta \mu(71^\circ 18') = \bar{1},97645$ , εὐρίσκομεν ἐκ τῶν πινάκων τῶν ἀριθμῶν ὅτι  $\text{συν}(18^\circ 42') = 0,94722$ . Ἐπομένως  $\psi = \frac{1 - 0,94722}{1 + 0,94722} = \frac{0,05278}{1,94722} = 0,02711$ .

Ἐὰν ὁμως ἐνθυθηθῶμεν (51 § 108) ὅτι  $\frac{1 - \text{συν} \chi}{1 + \text{συν} \chi} = \epsilon \phi^2\left(\frac{\chi}{2}\right)$ , βλέπομεν ὅτι  $\psi = \epsilon \phi^2(9^\circ 21')$ . Ἐκ ταύτης δὲ εὐρίσκομεν ὅτι  $\log \psi = 2 \log \epsilon \phi(9^\circ 21') = \bar{2},43314$  καὶ ἐπομένως :  $\psi = 0,02711$ .

Βλέπομεν οὕτως ὅτι κατὰ τὸν β' τρόπον εὐρέθη τὸ ζητούμενον μὲ ὀλιγωτέρας πράξεις. Κατωρθώθη δὲ τοῦτο, διότι ἡ δοθεῖσα παράστασις ἀντικατεστάθη μὲ τὴν ἰσοδύναμον παράστασιν  $\epsilon \phi^2(9^\circ 21')$ , τῆς ὁποίας ὁ λογάριθμος εὐρέθη δι' ἀμέσου ἐφαρμογῆς τῆς γνωστῆς ιδιότητος τοῦ λογαρίθμου δυνάμεως.

Διὰ τοῦτο ἡ τελευταία αὕτη παράστασις λέγεται **λογιστὴ διὰ τῶν λογαριθμῶν**.

Ἀπὸ τὸ παράδειγμα τοῦτο βλέπομεν ὅτι εἶναι πολὺ χρήσιμον νὰ γνωρίζωμεν νὰ τρέπωμεν παράστασεις εἰς ἄλλας ἰσοδύναμους καὶ λογιστὰς διὰ τῶν λογαριθμῶν. Διὰ τοῦτο εἰς τὰ ἀκόλουθα θὰ

ἐκθέσωμεν πῶς γίνεται ἡ τροπή αὕτη τῶν συνηθεστέρων τριγωνομετρικῶν παραστάσεων.

**120. Πρόβλημα I. Νὰ γίνωσι λογισταὶ διὰ τῶν λογαρίθμων αἱ παραστάσεις  $\eta\mu A \pm \eta\mu B$ .**

*Λύσις.* Ἐμάθομεν (§ § 100, 101) ὅτι :

$$\eta\mu(\alpha + \beta) = \eta\mu\alpha\sigma\upsilon\nu\beta + \eta\mu\beta\sigma\upsilon\nu\alpha$$

$$\eta\mu(\alpha - \beta) = \eta\mu\alpha\sigma\upsilon\nu\beta - \eta\mu\beta\sigma\upsilon\nu\alpha$$

Ἄν δὲ προσθέσωμεν ταύτας κατὰ μέλη, εὐρίσκομεν ὅτι :

$$\eta\mu(\alpha + \beta) + \eta\mu(\alpha - \beta) = 2\eta\mu\alpha\sigma\upsilon\nu\beta \quad (1)$$

Ἄν δὲ ἀφαιρέσωμεν κατὰ μέλη τὰς ἰδίας ἰσότητος, εὐρίσκομεν ὅτι :

$$\eta\mu(\alpha + \beta) - \eta\mu(\alpha - \beta) = 2\eta\mu\beta\sigma\upsilon\nu\alpha \quad (2)$$

Τώρα θέτομεν  $\alpha + \beta = A$ ,  $\alpha - \beta = B$  καὶ εὐρίσκομεν εὐκόλως ὅτι  $\alpha = \frac{A+B}{2}$  καὶ  $\beta = \frac{A-B}{2}$ . Αἱ ἰσότητες λοιπὸν (1), (2) γίνου-

$$\left. \begin{array}{l} \text{ταί :} \quad \eta\mu A + \eta\mu B = 2\eta\mu\left(\frac{A+B}{2}\right) \sigma\upsilon\nu\left(\frac{A-B}{2}\right) \\ \text{καί :} \quad \eta\mu A - \eta\mu B = 2\eta\mu\left(\frac{A-B}{2}\right) \sigma\upsilon\nu\left(\frac{A+B}{2}\right) \end{array} \right\} \quad (70)$$

Τούτων δὲ τὰ β' μέλη εἶναι προφανῶς λογιστὰ διὰ τῶν λογαρίθμων.

**121. Πρόβλημα II. Νὰ γίνῃ λογιστὴ διὰ τῶν λογαρίθμων ἡ παράστασις  $\frac{\eta\mu A - \eta\mu B}{\eta\mu A + \eta\mu B}$ .**

*Λύσις.* Ἀπὸ τὰς προηγουμένας ἰσότητος εὐρίσκομεν εὐκόλως

$$\text{ὅτι :} \quad \frac{\eta\mu A - \eta\mu B}{\eta\mu A + \eta\mu B} = \frac{2\eta\mu\left(\frac{A-B}{2}\right) \sigma\upsilon\nu\left(\frac{A+B}{2}\right)}{2\eta\mu\left(\frac{A+B}{2}\right) \sigma\upsilon\nu\left(\frac{A-B}{2}\right)} =$$

$$\frac{\eta\mu\left(\frac{A-B}{2}\right)}{\sigma\upsilon\nu\left(\frac{A-B}{2}\right)} \cdot \frac{\sigma\upsilon\nu\left(\frac{A+B}{2}\right)}{\eta\mu\left(\frac{A+B}{2}\right)} = \epsilon\phi\left(\frac{A-B}{2}\right) \cdot \sigma\phi\left(\frac{A+B}{2}\right)$$

Ἐπειδὴ δὲ  $\sigma\phi\left(\frac{A+B}{2}\right) = \frac{1}{\epsilon\phi\left(\frac{A+B}{2}\right)}$ , ἔπεται ὅτι :

$$\frac{\acute{\eta}\mu A - \acute{\eta}\mu B}{\acute{\eta}\mu A + \acute{\eta}\mu B} = \frac{\acute{\epsilon}\varphi\left(\frac{A-B}{2}\right)}{\acute{\epsilon}\varphi\left(\frac{A+B}{2}\right)} \quad (71)$$

**122. Πρόβλημα III. Νά γίνωσι λογισταί διὰ τῶν λογαρίθμων αἱ παραστάσεις  $1 \pm \acute{\eta}\mu A$ .**

*Λύσις.* Ἐπειδὴ  $1 = \acute{\eta}\mu 90^\circ$ , ἔπεται ὅτι :

$$1 + \acute{\eta}\mu A = \acute{\eta}\mu 90^\circ + \acute{\eta}\mu A = 2\acute{\eta}\mu\left(45^\circ + \frac{A}{2}\right) \text{ συν}\left(45^\circ - \frac{A}{2}\right) \quad (72)$$

Ταύτης τὸ β' μέλος εἶναι λογιστὸν διὰ τῶν λογαρίθμων. Δίδομεν ὅμως εἰς αὐτὸ καὶ δύο ἀκόμη μορφάς. Πρὸς τοῦτο παρατηροῦμεν ὅτι :

$$\left(45^\circ + \frac{A}{2}\right) + \left(45^\circ - \frac{A}{2}\right) = 90^\circ$$

καὶ συμπεραίνομεν ὅτι  $\text{συν}\left(45^\circ - \frac{A}{2}\right) = \acute{\eta}\mu\left(45^\circ + \frac{A}{2}\right)$ .

Ἡ προηγουμένη λοιπὸν ἰσότης γίνεται :

$$1 + \acute{\eta}\mu A = 2\acute{\eta}\mu^2\left(45^\circ + \frac{A}{2}\right) = 2\text{συν}^2\left(45^\circ - \frac{A}{2}\right) \quad (73)$$

Κατὰ τὸν ἴδιον τρόπον εὐρίσκομεν ὅτι :

$$1 - \acute{\eta}\mu A = 2\acute{\eta}\mu^2\left(45^\circ - \frac{A}{2}\right) = 2\text{συν}^2\left(45^\circ + \frac{A}{2}\right) \quad (74)$$

**123. Πρόβλημα IV. Νά γίνωσι λογισταί διὰ τῶν λογαρίθμων αἱ παραστάσεις  $\text{συν} A \pm \text{συν} B$ .**

*Λύσις.* Ἀπὸ τὰς γνωστὰς ἰσότητας :

$$\text{συν}(\alpha + \beta) = \text{συνασυν}\beta - \acute{\eta}\mu\alpha\acute{\eta}\mu\beta$$

$$\text{συν}(\alpha - \beta) = \text{συνασυν}\beta + \acute{\eta}\mu\alpha\acute{\eta}\mu\beta$$

ἐργαζόμενοι ὡς ἐν § 120 εὐρίσκομεν ὅτι :

$$\left. \begin{aligned} \text{συν} A + \text{συν} B &= 2\text{συν}\left(\frac{A+B}{2}\right) \text{συν}\left(\frac{A-B}{2}\right) \\ \text{συν} A - \text{συν} B &= -2\acute{\eta}\mu\left(\frac{A+B}{2}\right) \acute{\eta}\mu\left(\frac{A-B}{2}\right) \\ &= 2\acute{\eta}\mu\left(\frac{A+B}{2}\right) \acute{\eta}\mu\left(\frac{B-A}{2}\right) \end{aligned} \right\} \quad (75)$$

**124. Πρόβλημα V. Νά γίνωσι λογισταί διὰ τῶν λογαρίθμων αἱ παραστάσεις  $1 \pm \text{συν} A$ .**

*Λύσις.* Ἐπειδὴ  $1 = \text{συν} 0^\circ$ , ἔπεται ὅτι :

$$1 + \sigma\upsilon\nu A = \sigma\upsilon\nu 0^{\circ} + \sigma\upsilon\nu A = 2\sigma\upsilon\nu\left(\frac{0 + A}{2}\right) \cdot \sigma\upsilon\nu\left(\frac{0 - A}{2}\right) \\ = 2\sigma\upsilon\nu^2\left(\frac{A}{2}\right).$$

Όμοίως εύρισκομεν ὅτι  $1 - \sigma\upsilon\nu A = 2\acute{\eta}\mu^2\left(\frac{A}{2}\right).$

Σημείωσις. Παρατηροῦμεν ὅτι τὰς ἰσότητας ταύτας ἀνεύρομεν καὶ ἄλλως (§ 107).

### Ἄσκησεις

369. Νὰ εὔρεθῆ τὸ ἄθροισμα  $\acute{\eta}\mu(38^{\circ} 16')$  +  $\acute{\eta}\mu(52^{\circ} 24')$  χωρὶς νὰ εὔρεθῶσι προηγουμένως οἱ προσθετοὶ αὐτοῦ.

370. Νὰ εὔρεθῆ ἡ διαφορὰ  $\acute{\eta}\mu(64^{\circ} 40' 20'')$  -  $\acute{\eta}\mu(28^{\circ} 16' 8'')$  χωρὶς νὰ εὔρεθῆ ὁ μειωτέος καὶ ὁ ἀφαιρετέος.

371. Νὰ εὔρεθῶσιν οἱ προσθετοὶ αὐτοῦ.  $\sigma\upsilon\nu(18^{\circ} 46' 54'')$  +  $\sigma\upsilon\nu(40^{\circ} 24' 12'')$  χωρὶς νὰ εὔρεθῶσιν οἱ προσθετοὶ αὐτοῦ.

372. Νὰ εὔρεθῆ ὁμοίως ἡ διαφορὰ  $\sigma\upsilon\nu(34^{\circ} 16' 36'')$  -  $\sigma\upsilon\nu(58^{\circ} 18' 44'')$ .

373. Νὰ εὔρεθῶσιν αἱ παραστάσεις  $1 \pm \acute{\eta}\mu(26^{\circ} 22' 40'')$ .

374. Νὰ εὔρεθῶσιν αἱ παραστάσεις  $1 \pm \sigma\upsilon\nu(32^{\circ} 50' 34'')$ .

375. Νὰ εὔρεθῶσιν αἱ παραστάσεις  $\acute{\eta}\mu 490^{\circ} \pm \acute{\eta}\mu 350^{\circ}$ .

376. Ἐὰν  $\Delta B\Gamma$  εἶναι ὀρθογώνιον τρίγωνον, νὰ ἀποδειχθῆ ὅτι:

$$\acute{\eta}\mu B + \acute{\eta}\mu \Gamma = \sqrt{2} \sigma\upsilon\nu\left(\frac{B - \Gamma}{2}\right) \text{ καὶ } \acute{\eta}\mu B - \acute{\eta}\mu \Gamma = \sqrt{2} \acute{\eta}\mu\left(\frac{B - \Gamma}{2}\right).$$

377. Ἐὰν  $\Delta B\Gamma$  εἶναι ὀρθογώνιον τρίγωνον, νὰ ἀποδειχθῆ ὅτι:

$$\sigma\upsilon\nu B + \sigma\upsilon\nu \Gamma = \sqrt{2} \sigma\upsilon\nu\left(\frac{B - \Gamma}{2}\right) \text{ καὶ } \sigma\upsilon\nu B - \sigma\upsilon\nu \Gamma = \sqrt{2} \acute{\eta}\mu\left(\frac{\Gamma - B}{2}\right)$$

378. Νὰ γίνῃ λογιστὴ διὰ τῶν λογαρίθμων ἡ παράστασις:  
 $\sigma\upsilon\nu \alpha + \sigma\upsilon\nu 3\alpha$ .

379. Νὰ ἀποδειχθῆ ὅτι:

$$\sigma\upsilon\nu \omega + 2\sigma\upsilon\nu 2\omega + \sigma\upsilon\nu 3\omega = 4\sigma\upsilon\nu 2\omega \sigma\upsilon\nu^2\left(\frac{\omega}{2}\right).$$

380. Νὰ γίνῃ λογιστὴ διὰ τῶν λογαρίθμων ἡ παράστασις:  
 $\acute{\eta}\mu \alpha + \acute{\eta}\mu 5\alpha$ .

**125. Πρόβλημα VI. Νὰ γίνωσι λογισταὶ διὰ τῶν λογαρίθμων αἱ παραστάσεις  $\acute{\epsilon}\varphi A \pm \acute{\epsilon}\varphi B$ .**

Λύσις. α') Ἀπὸ τὰς ἰσότητας  $\acute{\epsilon}\varphi A = \frac{\acute{\eta}\mu A}{\sigma\upsilon\nu A}$ ,  $\acute{\epsilon}\varphi B = \frac{\acute{\eta}\mu B}{\sigma\upsilon\nu B}$

εύρισκομεν ὅτι:  $\acute{\epsilon}\varphi A + \acute{\epsilon}\varphi B = \frac{\acute{\eta}\mu A}{\sigma\upsilon\nu A} + \frac{\acute{\eta}\mu B}{\sigma\upsilon\nu B} = \frac{\acute{\eta}\mu A \sigma\upsilon\nu B + \sigma\upsilon\nu A \acute{\eta}\mu B}{\sigma\upsilon\nu A \cdot \sigma\upsilon\nu B}$

Ἐπειδὴ δὲ ὁ ἀριθμητὴς εἶναι ἀνάπτυγμα τοῦ  $\eta\mu(A+B)$ , ἔπεται ὅτι :

$$\beta') \text{ Ὅμοίως εὐρίσκομεν ὅτι : } \left. \begin{aligned} \eta\phi A + \eta\phi B &= \frac{\eta\mu(A+B)}{\sigmaυνA \cdot \sigmaυνB} \\ \eta\phi A - \eta\phi B &= \frac{\eta\mu(A-B)}{\sigmaυνA \cdot \sigmaυνB} \end{aligned} \right\} (76)$$

**126. Πρόβλημα VII. Νὰ γίνωσι λογισταὶ διὰ τῶν λογαρίθμων αἱ παραστάσεις  $1 \pm \eta\phi A$ .**

*Λύσις.* Ἐπειδὴ  $1 = \eta\phi 45^\circ$ , ἔπεται ὅτι :

$$1 + \eta\phi A = \eta\phi 45^\circ + \eta\phi A = \frac{\eta\mu(45^\circ + A)}{\sigmaυν45^\circ \sigmaυνA} = \frac{\sqrt{2} \eta\mu(45^\circ + A)}{\sigmaυνA} \left. \vphantom{\frac{\eta\mu(45^\circ + A)}{\sigmaυν45^\circ \sigmaυνA}} \right\} (77)$$

Ὅμοίως εὐρίσκομεν ὅτι :

$$1 - \eta\phi A = \frac{\sqrt{2} \eta\mu(45^\circ - A)}{\sigmaυνA}$$

#### Ἀσκήσεις

381. Νὰ εὐρεθῆ τὸ ἄθροισμα  $\eta\phi(42^\circ 30') + \eta\phi(34^\circ 40')$  καὶ ἡ διαφορὰ  $\eta\phi(36^\circ 45') - \eta\phi(11^\circ 45')$ .

382. Νὰ εὐρεθῆ τὸ ἄθροισμα  $1 + \eta\phi(120^\circ 30')$  καὶ ἡ διαφορὰ  $1 - \eta\phi(18^\circ 20')$ .

383. Νὰ εὐρεθῆ τὸ ἄθροισμα  $\eta\phi 1120^\circ + \eta\phi 3635^\circ$ .

384. Νὰ εὐρεθῆ ἡ διαφορὰ  $\eta\phi(-25^\circ 42') - \eta\phi(-45^\circ)$ .

385. Ἐὰν  $AB\Gamma$  εἶναι ὀρθογώνιον τρίγωνον, νὰ ἀποδειχθῆ ὅτι :

$$\eta\phi B + \eta\phi \Gamma = \frac{2}{\eta\mu 2B}$$

386. Ἐὰν  $AB\Gamma$  εἶναι ὀρθογώνιον τρίγωνον, νὰ ἀποδειχθῆ ὅτι :

$$\eta\phi B - \eta\phi \Gamma = \frac{2\eta\mu(B-\Gamma)}{\eta\mu 2B}$$

387. Νὰ γίνη λογιστὴ διὰ τῶν λογαρίθμων ἡ παράστασις  $\sigma\phi A + \sigma\phi B$ .

388. Νὰ γίνη λογιστὴ διὰ τῶν λογαρίθμων ἡ παράστασις  $\frac{\eta\phi A + \sigma\phi B}{\sigma\phi A + \sigma\phi B}$ .

389. Νὰ εὐρεθῆ τὸ ἄθροισμα  $\eta\phi \frac{5\pi}{3} + \eta\phi \frac{3\pi}{8}$  καὶ ἡ διαφορὰ

$$\eta\phi \frac{4\pi}{3} - \eta\phi(268^\circ 12').$$

**127. Πρόβλημα VIII. Νὰ γίνωσι λογισταὶ διὰ τῶν λογαρίθμων αἱ παραστάσεις  $\eta\mu A \pm \sigmaυνB$ .**

*Λύσις.* Παρατηροῦμεν ὅτι  $\sigmaυνB = \eta\mu(90^\circ - B)$  καὶ ἐφαρμόζομεν τοὺς τύπους (70 § 120). Οὕτω δὲ εὐρίσκομεν ὅτι :

$$\begin{aligned} \eta\mu A + \sigma\upsilon\nu B &= 2\eta\mu\left(\frac{A-B}{2} + 45^\circ\right) \sigma\upsilon\nu\left(\frac{A+B}{2} - 45^\circ\right) \\ \eta\mu A - \sigma\upsilon\nu B &= 2\eta\mu\left(\frac{A+B}{2} - 45^\circ\right) \sigma\upsilon\nu\left(\frac{A-B}{2} + 45^\circ\right) \end{aligned} \quad (78)$$

### Ἄσκησεις

390. Νὰ εὐρεθῆ τὸ ἄθροισμα  $\eta\mu(18^\circ 12' 40'') + \sigma\upsilon\nu(24^\circ 20' 30'')$ .

391. Νὰ εὐρεθῆ ἡ διαφορά  $\eta\mu(72^\circ 24') - \sigma\upsilon\nu(106^\circ 30' 42'')$ .

392. Νὰ εὐρεθῆ τὸ ἄθροισμα  $\eta\mu \frac{3\pi}{8} + \sigma\upsilon\nu \frac{2\pi}{5}$  καὶ ἡ διαφορά

$$\eta\mu \frac{4\pi}{7} - \sigma\upsilon\nu \frac{2\pi}{7}$$

393. Νὰ εὐρεθῆ τὸ ἄθροισμα  $\eta\mu 1925^\circ + \sigma\upsilon\nu 930^\circ$  καὶ ἡ διαφορά  $\sigma\upsilon\nu 1128^\circ - \eta\mu 1656^\circ$ .

**128. Χρησις βοηθητικῆς γωνίας.** Πολλοὶ παραστάσεις γίνονται λογισταὶ διὰ τῶν λογαριθμῶν μὲ τὴν χρῆσιν βοηθητικῆς γωνίας. Αἱ συνηθέστεραι μορφαὶ τοιοῦτων παραστάσεων εἶναι αἱ ἀκόλουθοι :

α') Παραστάσεις τῆς μορφῆς  $\alpha + \beta$ . Αὗται γίνονται λογισταὶ κατὰ τοὺς ἑξῆς τρόπους :

1ον. Εἶναι φανερὸν ὅτι  $\alpha + \beta = \alpha\left(1 + \frac{\beta}{\alpha}\right)$ . Ἐὰν δὲ θέσωμεν  $\frac{\beta}{\alpha} = \epsilon\phi^2\omega$ , εὐρίσκομεν ὅτι :  $\alpha + \beta = \alpha(1 + \epsilon\phi^2\omega) = \frac{\alpha}{\sigma\upsilon\nu^2\omega}$

2ον. Ἐὰν θέσωμεν  $\frac{\beta}{\alpha} = \epsilon\phi\omega$ , εὐρίσκομεν ὅτι :

$$\alpha + \beta = \alpha(1 + \epsilon\phi\omega) = \alpha\sqrt{2} \cdot \frac{\eta\mu(45^\circ + \omega)}{\sigma\upsilon\nu\omega} \quad (\S 126).$$

3ον. Ἐὰν εἶναι  $\beta < \alpha$ , δυνάμεθα νὰ θέσωμεν  $\frac{\beta}{\alpha} = \sigma\upsilon\nu\omega$  καὶ εὐρίσκομεν ὅτι :

$$\alpha + \beta = \alpha(1 + \sigma\upsilon\nu\omega) = 2\alpha\sigma\upsilon\nu^2\left(\frac{\omega}{2}\right).$$

β') Παραστάσεις τῆς μορφῆς  $\alpha - \beta$ , ἂν  $\alpha > \beta$ . Εἰς τὴν ἰσότητα  $\alpha - \beta = \alpha\left(1 - \frac{\beta}{\alpha}\right)$  θέτομεν  $\frac{\beta}{\alpha} = \eta\mu^2\omega$  καὶ εὐρίσκομεν ὅτι :

$$\alpha - \beta = \alpha(1 - \eta\mu^2\omega) = \alpha\sigma\upsilon\nu^2\omega.$$

Δυνάμεθα ἐπίσης νὰ θέσωμεν  $\frac{\alpha}{\beta} = \sigma\upsilon\nu\omega$ , ὅτε εὐρίσκομεν

$$\alpha - \beta = \alpha(1 - \text{συν}\omega) = 2\alpha\eta\mu_2\left(\frac{\omega}{2}\right)$$

γ') Παραστάσεις τῆς μορφῆς  $\alpha\eta\mu\chi \pm \beta\text{συν}\chi$ . Ἐξάγοντες τὸν  $\alpha$  ἔκτος παρενθέσεως εὐρίσκομεν ὅτι :

$$\alpha\eta\mu\chi \pm \beta\text{συν}\chi = \alpha\left(\eta\mu\chi \pm \frac{\beta}{\alpha}\text{συν}\chi\right).$$

Ἐπειτα θέτομεν  $\frac{\beta}{\alpha} = \xi\varphi\omega = \frac{\eta\mu\omega}{\text{συν}\omega}$  καὶ εὐρίσκομεν ὅτι :

$$\alpha\eta\mu\chi \pm \beta\text{συν}\chi = \alpha \cdot \frac{\eta\mu\chi\text{συν}\omega \pm \eta\mu\omega\text{συν}\chi}{\text{συν}\omega} = \frac{\alpha\eta\mu(\chi \pm \omega)}{\text{συν}\omega}.$$

δ') Παραστάσεις τῆς μορφῆς  $\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}$ . Ἐπειδὴ  $\alpha^2 + \beta^2 = \alpha^2\left(1 + \frac{\beta^2}{\alpha^2}\right)$  ἔπεται ὅτι  $\sqrt{\alpha^2 + \beta^2} = \alpha\sqrt{1 + \frac{\beta^2}{\alpha^2}}$ . Ἄν δὲ θέσωμεν  $\frac{\beta^2}{\alpha^2} = \xi\varphi^2\omega$ , αὕτη (§ 89) γίνεται :

$$\sqrt{\alpha^2 + \beta^2} = \alpha\sqrt{1 + \xi\varphi^2\omega} = \frac{\alpha}{\text{συν}\omega}$$

ε') Παραστάσεις τῆς μορφῆς  $\sqrt{\alpha^2 - \beta^2}$ , ἂν  $\alpha > \beta$ . Εἰς τὴν ἰσότητα  $\sqrt{\alpha^2 - \beta^2} = \alpha\sqrt{1 - \frac{\beta^2}{\alpha^2}}$  θέτομεν  $\frac{\beta^2}{\alpha^2} = \text{συν}^2\omega$  καὶ εὐρίσκομεν ὅτι :

$$\sqrt{\alpha^2 - \beta^2} = \alpha\sqrt{1 - \text{συν}^2\omega} = \alpha\eta\mu\omega.$$

### Ἄσκησεις

394. Ἄν  $\log\alpha = 3,35892$ ,  $\log\beta = 2,75064$ , νὰ εὐρεθῇ τὸ ἄθροισμα  $\alpha + \beta$  καὶ ἡ διαφορὰ  $\alpha - \beta$ , χωρὶς νὰ εὐρεθῶσιν οἱ ἀριθμοὶ  $\alpha$  καὶ  $\beta$ .

395. Ἄν  $\log\chi = 1,27964$  καὶ  $\log\psi = 0,93106$ , νὰ εὐρεθῇ ἡ τιμὴ τῆς παραστάσεως  $\frac{\chi - \psi}{\chi + \psi}$ .

396. Νὰ εὐρεθῇ ἡ τιμὴ τῆς παραστάσεως :  $\sqrt{2} + 2\eta\mu\chi$  διὰ  $\chi = 48^\circ 15' 40''$ .

397. Νὰ εὐρεθῇ ὁξεία γωνία  $\chi$  διὰ τὴν ὁποίαν εἶναι :  $\xi\varphi\chi = \sqrt{2} + \eta\mu 20^\circ$ .

**129. Τροπὴ γινομένου τριγωνομετρικῶν ἀριθμῶν εἰς ἄθροισμα ἢ διαφορὰν τριγωνομετρικῶν ἀριθμῶν.** Διὰ νὰ εὐρωμεν τὸ γινόμενον  $\text{συν}75^\circ \cdot \text{συν}15^\circ$ , θέτομεν  $\chi = \text{συν}75^\circ \cdot \text{συν}15^\circ$ .

Ἐπειτα λαμβάνομεν τοὺς λογαρίθμους ἀμφοτέρων τῶν μελῶν καὶ εὐρίσκομεν :

$$\log\chi = \log\text{συν}75^\circ + \log\text{συν}15^\circ = \bar{1},39794.$$

Ἐκ ταύτης δὲ εὐρίσκομεν ὅτι  $\chi = 0,25$ .

Ἄν ὁμως ἐνθυμηθῶμεν ὅτι :

$$2\sigma\upsilon\alpha\sigma\upsilon\nu\beta = \sigma\upsilon\nu(\alpha + \beta) + \sigma\upsilon\nu(\alpha - \beta),$$

εὐρίσκομεν ὅτι :

$$2\chi = \sigma\upsilon\nu 90^\circ + \sigma\upsilon\nu 60^\circ = \frac{1}{2} \text{ καὶ ἔπομένως } \chi = \frac{1}{4} = 0,25.$$

Ὅμοίως, ἂν  $\psi = \eta\mu(67^\circ 30') \cdot \eta\mu(22^\circ 30')$ , εὐρίσκομεν ὅτι :

$$2\psi = 2\eta\mu(67^\circ 30') \cdot \eta\mu(22^\circ 30') = \sigma\upsilon\nu 45^\circ - \sigma\upsilon\nu 90^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ καὶ}$$

$$\text{ἔπομένως } \psi = \frac{\sqrt{2}}{4}.$$

Ἐκ τὰ παραδείγματα ταῦτα βλέπομεν ὅτι εἶναι χρήσιμος ἡ μετατροπὴ γινομένων τριγωνομετρικῶν ἀριθμῶν εἰς ἀθροίσματα ἢ διαφορὰς τοιούτων.

Αἱ συνθέστεραι τοιαῦται μετατροπαὶ γίνονται κατὰ τοὺς ἀκόλουθους γνωστοὺς τύπους :

$$2\sigma\upsilon\alpha\sigma\upsilon\nu\beta = \sigma\upsilon\nu(\alpha - \beta) + \sigma\upsilon\nu(\alpha + \beta)$$

$$2\eta\mu\alpha\eta\mu\beta = \sigma\upsilon\nu(\alpha - \beta) - \sigma\upsilon\nu(\alpha + \beta)$$

$$2\eta\mu\alpha\sigma\upsilon\nu\beta = \eta\mu(\alpha + \beta) + \eta\mu(\alpha - \beta)$$

$$2\eta\mu\beta\sigma\upsilon\nu\alpha = \eta\mu(\alpha + \beta) - \eta\mu(\alpha - \beta)$$

### Ἀσκήσεις

398. Νὰ εὐρεθῶσι τὰ γινόμενα:

$$\sigma\upsilon\nu(67^\circ 30') \sigma\upsilon\nu(22^\circ 30') \text{ καὶ } \eta\mu 15^\circ \cdot \eta\mu 75^\circ.$$

399. Νὰ εὐρεθῶσι τὰ γινόμενα  $\eta\mu(82^\circ 30') \sigma\upsilon\nu(37^\circ 30')$  καὶ

$$\sigma\upsilon\nu(52^\circ 30') \eta\mu(7^\circ 30').$$

400. Νὰ γίνῃ ἀπλουστέρα ἡ παράστασις :

$$\eta\mu 7\chi - 2\eta\mu\chi (\sigma\upsilon\nu 2\chi + \sigma\upsilon\nu 4\chi + \sigma\upsilon\nu 6\chi).$$

401. Νὰ γίνῃ ἀπλουστέρα ἡ παράστασις:

$$\eta\mu 13\chi - 2\eta\mu 2\chi (\sigma\upsilon\nu 3\chi + \sigma\upsilon\nu 7\chi + \sigma\upsilon\nu 11\chi).$$

402. Νὰ γίνῃ ἀπλουστέρα ἡ παράστασις.

$$\eta\mu\alpha\eta\mu(\beta - \gamma) + \eta\mu\beta\eta\mu(\gamma - \alpha) + \eta\mu\gamma\eta\mu(\alpha - \beta).$$

**ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΑΙ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ**

**1. ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΑΙ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ**

130. Ὅρισμός τριγωνομετρικῆς ἐξίσωσως. Ἡ ἐξίσωσις  $\eta\mu\chi = \eta\mu 35^\circ$  ἀληθεύει διὰ  $\chi = 35^\circ$  καὶ διὰ  $\chi = 180^\circ - 35^\circ = 145^\circ$ . Ἐπειδὴ δὲ  $\eta\mu(360^\circ + 35^\circ) = \eta\mu 35^\circ$  καὶ  $\eta\mu(360^\circ + 145^\circ) = \eta\mu 35^\circ$ , ἔπεται ὅτι ἀληθεύει καὶ διὰ  $\chi = 360^\circ k + 35^\circ$  καὶ διὰ  $\chi = 360^\circ k + 145^\circ$  } (1)

ἂν  $k$  εἶναι 0 ἢ τυχῶν ἀκέραιος ἀριθμὸς. Π.χ. διὰ  $k = 1$ , εὐρίσκομεν  $\chi = 395^\circ$  καὶ  $\chi = 505^\circ$  κ.τ.λ.


Μὲ οὐδεμίαν δὲ ἄλλην τιμὴν τοῦ  $\chi$  ἀληθεύει· διότι, ἂν  $M$  καὶ  $M'$  (σχ. 50) εἶναι τὰ πέρατα τῶν τόξων  $35^\circ$  καὶ  $145^\circ$ , θὰ εἶναι  $\eta\mu 35^\circ = \eta\mu 145^\circ = (OP)$ . Πᾶν δὲ τόξον λήγον εἰς ἄλλο σημεῖον  $N$  ἔχει ἡμίτονον  $(OP') \neq (OP)$ .

Ἡ ἐξίσωσις  $\eta\mu\chi = \eta\mu 35^\circ$  λέγεται **τριγωνομετρικὴ ἐξίσωσις**. Οἱ δὲ τύποι (1) ἀποτελοῦσι τὴν λύσιν αὐτῆς.

Καὶ αἱ ἐξίσωσις  $2\eta\mu\chi = 1$ ,  $\sigma\upsilon\nu\chi + \eta\mu\chi = 1$ ,  $\epsilon\phi\chi - 3 = 3\phi\chi$  εἶναι τριγωνομετρικαὶ ἐξίσωσις. Ὡστε :

Μία ἐξίσωσις λέγεται τριγωνομετρικὴ, ἂν περιέχῃ ἓνα τοῦλάχιστον τριγωνομετρικὸν ἀριθμὸν ἀγνώστου τόξου ἢ γωνίας καὶ δὲν ἀληθεύῃ διὰ πᾶσαν τιμὴν τοῦ ἀγνώστου τούτου.

Λύσις δὲ τριγωνομετρικῆς ἐξίσωσως λέγεται ἡ εὕρεσις τύπου ἢ τύπων, ἀπὸ τοὺς ὁποίους μόνον εὐρίσκομεν ὅσα θέλομεν τόξα ταῦτοποιοῦντα τὴν ἐξίσωσιν ταύτην.



Σχ. 50

### 131. Εἶδη τριγωνομετρικῶν ἐξισώσεων μὲ ἓνα ἄγνωστον.

α') Ἀπλῆ τριγωνομετρικαὶ ἐξισώσεις. Οὕτως ὀνομάζονται αἱ τριγωνομετρικαὶ ἐξισώσεις αἱ ἔχουσαι τὰς ἀκολουθοῦσας μορφάς :

$$\acute{\eta}\mu\chi = \acute{\eta}\mu\tau, \quad \sigma\upsilon\nu\chi = \sigma\upsilon\nu\tau, \quad \acute{\epsilon}\phi\chi = \acute{\epsilon}\phi\tau, \quad \sigma\phi\chi = \sigma\phi\tau,$$

$$\acute{\eta}\mu\chi = \alpha, \quad \sigma\upsilon\nu\chi = \alpha, \quad \acute{\epsilon}\phi\chi = \alpha, \quad \sigma\phi\chi = \alpha$$

ἢ καὶ τοιαύτας :

$$\acute{\eta}\mu(2\chi + 5^\circ) = \acute{\eta}\mu 52^\circ, \quad \sigma\upsilon\nu(2\chi + 12^\circ) = \sigma\upsilon\nu\left(\frac{\chi}{2} - 30^\circ\right),$$

$$\acute{\epsilon}\phi\left(2\chi - \frac{\pi}{2}\right) = \acute{\epsilon}\phi\left(\chi + \frac{\pi}{2}\right) \text{ κ.τ.λ.}$$

β') Ἡ ἐξίσωσις  $5\sigma\upsilon\nu\chi + \frac{1}{2} = 3\sigma\upsilon\nu\chi + \frac{3}{2}$  ἔχει ἀλγεβρικὴν μορφήν πρὸς ἄγνωστον τὸ  $\sigma\upsilon\nu\chi$ . Αὕτη λυομένη πρὸς  $\sigma\upsilon\nu\chi$  γίνεται  $\sigma\upsilon\nu\chi = \frac{1}{2}$ , ἥτοι γίνεται ἀπλῆς μορφῆς.

γ') Ὑπάρχουσι τέλος καὶ πολυπλοκώτεροι ἐξισώσεις, αἱ ὁποῖα ἔχουσι περισσοτέρους τοῦ ἑνὸς τριγωνομετρικοῦ ἀριθμοῦ τοῦ ἄγνωστοῦ τόξου ἢ καὶ συναρτήσεων αὐτοῦ. Τοιαῦται π.χ. εἶναι αἱ  $\sigma\upsilon\nu 2\chi - \sigma\upsilon\nu \frac{\chi}{2} = 0,924$ ,  $\acute{\epsilon}\phi 2\chi - \acute{\eta}\mu\chi = 0$  κ.τ.λ.

Εἰς τὰ ἐπόμενα θὰ μάθωμεν πῶς λύονται αἱ ἀπλούστεροι τριγωνομετρικαὶ ἐξισώσεις.

### 132. Λύσις τριγωνομετρικῶν ἐξισώσεων ἀπλῆς μορφῆς.

α') Ἡ ἐξίσωσις  $\acute{\eta}\mu\chi = \acute{\eta}\mu\tau$  ἀληθεύει διὰ  $\chi = \tau$ , διὰ  $\chi = 180^\circ - \tau$  ἢ διὰ  $\chi = 360^\circ k + \tau$  καὶ διὰ  $\chi = 360^\circ k + 180^\circ - \tau$ , ὡς ἐξηγήσαμεν προηγουμένως (§ 130). Ἐπειδὴ δὲ αἱ δύο πρῶται τιμαὶ τοῦ  $\chi$  προέρχονται ἐκ τῶν δύο τελευταίων τύπων διὰ  $k = 0$ , ἔπεται ὅτι τὴν λύσιν τῆς δοθείσης ἐξισώσεως ἀποτελοῦσιν οἱ τύποι :

$$\chi = 360^\circ k + \tau \quad \text{καὶ} \quad \chi = 360^\circ k + 180^\circ - \tau.$$

ἢ εἰς ἀκτίνια  $\chi = 2k\pi + \tau$  καὶ  $\chi = (2k + 1)\pi - \tau$ .

Ἡ ἐξίσωσις  $\acute{\eta}\mu\chi = \frac{1}{2}$  εἶναι ἰσοδύναμος πρὸς τὴν  $\acute{\eta}\mu\chi = \acute{\eta}\mu 30^\circ$  καὶ ἀληθεύει διὰ

$$\chi = 360^\circ k + 30^\circ \quad \text{καὶ} \quad \text{διὰ} \quad \chi = 360^\circ k + 180^\circ - 30^\circ = 360^\circ k + 150^\circ$$

ἢ εἰς ἀκτίνια διὰ  $\chi = 2k\pi + \frac{\pi}{6}$  καὶ διὰ  $\chi = (2k + 1)\pi - \frac{\pi}{6}$

Διά νά λύσωμεν τήν ἐξίσωσιν  $\eta\mu\chi = 0,45139$ , εὐρίσκομεν μέ τήν βοήθειαν τῶν πινάκων ὅτι  $0,45139 = \eta\mu(26^{\circ}50')$ .

Ἐπομένως ἡ ἐξίσωσις γίνεται  $\eta\mu\chi = \eta\mu(26^{\circ}50')$  καί ἀληθεύει διά  $\chi = 360^{\circ}k + 26^{\circ}50'$ .

καί διά  $\chi = 360^{\circ}k + 180^{\circ} - (26^{\circ}50') = 360^{\circ}k + 153^{\circ} 10'$ .

Ἀξιοσημείωτος εἶναι ἡ ἐξίσωσις  $\eta\mu\chi = 0$ , ἥτις εἶναι ἰσοδύναμος πρὸς τὰς  $\eta\mu\chi = \eta\mu 0^{\circ}$  καί  $\eta\mu\chi = \eta\mu 180^{\circ}$ . Ἀληθεύει ἐπομένως διά  $\chi = 360^{\circ}k + 0^{\circ}$  καί διά  $\chi = 360^{\circ}k + 180^{\circ} - 0^{\circ}$

ἢ  $\chi = 180^{\circ} \cdot 2k$  καί  $\chi = 180^{\circ}(2k + 1)$ .

Αὗται συγχωνεύονται εἰς τήν  $\chi = 180^{\circ}\lambda$  ἢ  $\chi = \lambda\pi$ , ἂν  $\lambda$  εἶναι 0 ἢ τυχῶν ἀκέραιος ἀριθμός.

β') Ἡ ἐξίσωσις  $\sigma\upsilon\nu\chi = \sigma\upsilon\nu\tau$  ἀληθεύει διά  $\chi = \tau$ . Ἐπειδὴ δὲ  $\sigma\upsilon\nu(-\tau) = -\sigma\upsilon\nu\tau$ , ἀληθεύει καί διά  $\chi = -\tau$ . Κατ' ἀκολουθίαν ἀληθεύει γενικῶς διά

$\chi = 360^{\circ}k \pm \tau$  ἢ εἰς ἀκτίνια διά  $\chi = 2k\pi \pm \tau$ .

Διά τήν λύσιν τῆς ἐξισώσεως  $\sigma\upsilon\nu\chi = \frac{\sqrt{2}}{2}$  ἐνθυμούμεθα ὅτι  $\frac{\sqrt{2}}{2} = \sigma\upsilon\nu 45^{\circ}$  καί ἐννοοῦμεν ὅτι ἡ ἐξίσωσις εἶναι ἰσοδύναμος πρὸς

τήν  $\sigma\upsilon\nu\chi = \sigma\upsilon\nu 45^{\circ} = \sigma\upsilon\nu \frac{\pi}{4}$ . Ἀληθεύει δὲ διά

$\chi = 360^{\circ}k \pm 45^{\circ}$  ἢ εἰς ἀκτίνια διά  $\chi = 2k\pi \pm \frac{\pi}{4}$ .

Διά νά λύσωμεν δὲ τήν ἐξίσωσιν  $\sigma\upsilon\nu\chi = 0,94832$ , εὐρίσκομεν μέ τήν βοήθειαν τῶν πινάκων ὅτι  $0,94832 = \sigma\upsilon\nu(18^{\circ}30')$ .

Ἐπομένως ἡ ἐξίσωσις γίνεται  $\sigma\upsilon\nu\chi = \sigma\upsilon\nu(18^{\circ}30')$  καί ἀληθεύει διά  $\chi = 360^{\circ}k \pm (18^{\circ}30')$ .

γ') Ἡ ἐξίσωσις  $\epsilon\phi\chi = \epsilon\phi\tau$  ἀληθεύει προφανῶς διά  $\chi = \tau$  καί γενικῶς διά  $\chi = 360^{\circ}k + \tau$ . Ἐπειδὴ δὲ  $\epsilon\phi(180^{\circ} + \tau) = -\epsilon\phi\tau$ , ἡ ἐξίσωσις γίνεται  $\epsilon\phi\chi = \epsilon\phi(180^{\circ} + \tau)$  καί ἀληθεύει γενικῶς διά  $\chi = 360^{\circ}k + 180^{\circ} + \tau = 2 \cdot 180^{\circ}k + 180^{\circ} + \tau = 180^{\circ}(2k + 1) + \tau$ . Ἐπειδὴ δὲ καί  $\chi = 360^{\circ}k + \tau = 180^{\circ} \cdot 2k + \tau$ , δυνάμεθα νά συμπτύξωμεν τοὺς δύο τύπους εἰς τὸν  $\chi = 180^{\circ}\lambda + \tau$  ἢ εἰς ἀκτίνια  $\chi = \lambda\pi + \tau$ , ἂν  $\lambda$  εἶναι 0 ἢ τυχῶν ἀκέραιος ἀριθμός.

Ἡ ἐξίσωσις  $\epsilon\phi\chi = 1 = \epsilon\phi 45^{\circ}$  ἀληθεύει διά

$\chi = 180^{\circ}\lambda + 45^{\circ}$  ἢ διά  $\chi = \lambda\pi + \frac{\pi}{4}$ .

Διὰ νὰ λύσωμεν τὴν ἐξίσωσιν  $\epsilon\phi\chi = 2,56064$ , εὐρίσκομεν πρῶτον ἀπὸ τοὺς πίνακας ὅτι  $2,56064 = \epsilon\phi(68^\circ 40' 5'')$ .

Ἡ ἐξίσωσις λοιπὸν γίνεται  $\epsilon\phi\chi = \epsilon\phi(68^\circ 40' 5'')$  καὶ ἀληθεύει διὰ  $\chi = 180^\circ\lambda + 68^\circ 40' 5''$ .

δ') Ἡ ἐξίσωσις  $\epsilon\phi\chi = \sigma\phi\tau$  εἶναι ἰσοδύναμος πρὸς τὴν  $\frac{1}{\epsilon\phi\chi} = \frac{1}{\epsilon\phi\tau}$  ἢ  $\epsilon\phi\chi = \epsilon\phi\tau$  καὶ ἔχει τὰς ρίζας αὐτῆς.

### Ἀνακεφαλαίωσις

- α') Ἡ ἐξίσωσις  $\eta\mu\chi = \eta\mu\tau$  ἀληθεύει διὰ  $\chi = 360^\circ k + \tau$  καὶ διὰ  $\chi = 360^\circ k + 180^\circ - \tau$ .  
ἢ διὰ  $\chi = 2k\pi + \tau$  καὶ διὰ  $\chi = (2k + 1)\pi - \tau$ .
- β') Ἡ ἐξίσωσις  $\sigma\upsilon\nu\chi = \sigma\upsilon\nu\tau$  ἀληθεύει διὰ  $\chi = 360^\circ k \pm \tau$  ἢ εἰς ἄκτίνια διὰ  $\chi = 2k\pi \pm \tau$ .
- γ') Ἡ ἐξίσωσις  $\epsilon\phi\chi = \epsilon\phi\tau$  ἀληθεύει διὰ  $\chi = 180^\circ\lambda + \tau$  ἢ εἰς ἄκτίνια διὰ  $\chi = \lambda\pi + \tau$ .
- δ') Ἡ ἐξίσωσις  $\sigma\phi\chi = \sigma\phi\tau$  ἀληθεύει διὰ  $\chi = 180^\circ\lambda + \tau$  ἢ εἰς ἄκτίνια διὰ  $\chi = \lambda\pi + \tau$ .

### Ἀσκήσεις

403. Νὰ λυθῶσιν αἱ ἐξισώσεις:  
 $\eta\mu\chi = \eta\mu 23^\circ$ ,  $\sigma\upsilon\nu\chi = \sigma\upsilon\nu 15^\circ$ ,  $\epsilon\phi\chi = \epsilon\phi 54^\circ$ ,  $\sigma\phi\chi = \sigma\phi(37^\circ 20')$ .
404. Νὰ λυθῶσιν αἱ ἐξισώσεις:  
 $\eta\mu\chi = \eta\mu \frac{3\pi}{8}$ ,  $\sigma\upsilon\nu\chi = \sigma\upsilon\nu \frac{\pi}{5}$ ,  $\epsilon\phi\chi = \epsilon\phi \frac{7\pi}{12}$ ,  $\sigma\phi\chi = \sigma\phi \frac{4\pi}{9}$ .
405. Νὰ λυθῶσιν αἱ ἐξισώσεις:  
 $\eta\mu\chi = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ,  $\sigma\upsilon\nu\chi = \frac{1}{2}$ ,  $\epsilon\phi\chi = -1$ ,  $\sigma\phi\chi = 0$ .
406. Νὰ λυθῶσιν αἱ ἐξισώσεις:  
 $\eta\mu\chi = 0,75$ ,  $\sigma\upsilon\nu\chi = 0,825$ ,  $\epsilon\phi\chi = 1,125$ ,  $\sigma\phi\chi = 0,895$ .
407. Νὰ λυθῶσιν αἱ ἐξισώσεις:  
 $\sigma\upsilon\nu\chi = \sigma\upsilon\nu\left(\frac{\chi}{2} - \pi\right)$ ,  $\epsilon\phi\left(\frac{\chi}{3} - \frac{3\pi}{8}\right) = \epsilon\phi 2\chi$ .
408. Νὰ λυθῶσιν αἱ ἐξισώσεις:  
 $\sigma\phi\left(\frac{2\chi}{5} + 30^\circ\right) = \sigma\phi\left(\frac{\chi}{3} + 30^\circ\right)$ ,  $\eta\mu(2\chi + 50^\circ) = \eta\mu(\chi + 25^\circ)$ .

133. Λύσεις τριγωνομετρικῶν ἔξισώσεων ἀλγεβρικοῦ μορφῆς πρὸς ἓνα τριγωνομετρικὸν ἀριθμὸν ἀγνώστου τόξου ἢ γωνίας. Ἐστω ὡς παραδείγμα ἡ ἔξισωσις :

$$2\sigma\upsilon\upsilon\chi + 3 = \frac{\sigma\upsilon\upsilon\chi}{2} + \frac{15}{4}.$$

Ἄν λύσωμεν αὐτὴν πρὸς  $\sigma\upsilon\upsilon\chi$ , εὐρίσκομεν τὴν ἰσοδύναμον ἔξισωσιν  $\sigma\upsilon\upsilon\chi = \frac{1}{2} = \sigma\upsilon\upsilon 60^\circ$ . Αὕτη δὲ ἀληθεύει διὰ

$$\chi = 360^\circ k \pm 60^\circ \quad \eta \quad \epsilon\iota\varsigma \quad \acute{\alpha}\kappa\tau\acute{\iota}\nu\iota\alpha \quad \delta\iota\acute{\alpha} \quad \chi = 2k\pi \pm \frac{\pi}{3}.$$

Ἐστω ἀκόμη ἡ ἔξισωσις  $\acute{\epsilon}\phi^2\chi - (1 + \sqrt{3})\acute{\epsilon}\phi\chi + \sqrt{3} = 0$ . Ἄν λύσωμεν αὐτὴν πρὸς τὴν  $\acute{\epsilon}\phi\chi$ , εὐρίσκομεν ὅτι :

$$\acute{\epsilon}\phi\chi = \frac{1 + \sqrt{3} \pm \sqrt{(1 + \sqrt{3})^2 - 4\sqrt{3}}}{2} = \frac{1 + \sqrt{3} \pm (1 - \sqrt{3})}{2} = \begin{cases} 1 \\ \sqrt{3} \end{cases}$$

Τὸ ζήτημα λοιπὸν ἀνάγεται εἰς τὴν λύσιν τῶν ἀπλῶν ἔξισώσεων :

$$\acute{\epsilon}\phi\chi = 1 \quad \kappa\alpha\acute{\iota} \quad \acute{\epsilon}\phi\chi = \sqrt{3} \quad \eta \quad \acute{\epsilon}\phi\chi = \acute{\epsilon}\phi \frac{\pi}{4} \quad \kappa\alpha\acute{\iota} \quad \acute{\epsilon}\phi\chi = \acute{\epsilon}\phi \frac{\pi}{3}.$$

Ἐκ τούτων δὲ εὐρίσκομεν ὅτι :

$$\chi = \lambda\pi + \frac{\pi}{4} \quad \kappa\alpha\acute{\iota} \quad \chi = \lambda\pi + \frac{\pi}{3}.$$

Ἀπὸ τὰ παραδείγματα ταῦτα βλέπομεν ὅτι ἡ λύσις τῶν τριγωνομετρικῶν ἔξισώσεων μὲ ἓνα τριγωνομετρικὸν ἀριθμὸν τοῦ ἀγνώστου, αἱ ὁποῖαι ἔχουσιν ἀλγεβρικήν μορφήν πρὸς αὐτόν, ἀνάγεται εἰς τὴν λύσιν ἀπλῶν ἔξισώσεων.

### Ἀσκήσεις

409. Νὰ λυθῶσιν αἱ ἔξισώσεις:

$$10\sigma\upsilon\upsilon\chi - 1 = 6\sigma\upsilon\upsilon\chi + 1, \quad 2\sigma\upsilon\upsilon^2\chi - 3\sigma\upsilon\upsilon\chi + 1 = 0.$$

410. Νὰ λυθῶσιν αἱ ἔξισώσεις:

$$3\eta\mu\chi + 2 = 7\eta\mu\chi - 2, \quad \eta\mu^2\chi - \frac{3\eta\mu\chi}{2} - \frac{1}{2} = 0.$$

411. Νὰ λυθῶσιν αἱ ἔξισώσεις:

$$(\acute{\epsilon}\phi\chi - 1)^2 - \acute{\epsilon}\phi^2\chi = -3, \quad \acute{\epsilon}\phi^2\chi - 3\acute{\epsilon}\phi\chi = \sqrt{3}(\acute{\epsilon}\phi\chi - 3).$$

412. Νὰ λυθῶσιν αἱ ἔξισώσεις:

$$\sigma\phi\chi (\sigma\phi\chi - 3) + 1 = 5 (\sigma\phi\chi - 3), \quad \acute{\epsilon}\phi\chi + \frac{3\acute{\epsilon}\phi\chi - 1}{5} = 1 - \frac{5\acute{\epsilon}\phi\chi - 16}{3}.$$

413. Νά λυθῶσιν αἱ ἑξισώσεις:

$$(2\sigma\eta\chi - 3)^2 - 8\sigma\eta\chi = 0, \quad \frac{1}{\eta\mu^2\chi} - \frac{2}{\eta\mu\chi} + 1 = 0.$$

**134. Λύσις τριγωνομετρικῶν ἑξισώσεων μορφῆς διαφόρου τῶν προηγουμένων.** Ἡ λύσις τῶν τοιούτων ἑξισώσεων δὲν δύναται νὰ ὑπαχθῆ εἰς γενικὸν κανόνα ἕνεκα τῆς μεγάλης ποικιλίας αὐτῶν. Θὰ περιορισθῶμεν λοιπὸν εἰς μερικὰ παραδείγματα ἀπὸ τὰ ὀπλοῦστερα.

*Παράδειγμα 1ον.* Νά λυθῆ ἡ ἑξίσωσις  $\eta\mu\chi - \sigma\eta\chi = 0$ .

*Λύσις. α' τρόπος.* Αὕτη εἶναι ἰσοδύναμος πρὸς τὴν

$$\eta\mu\chi = \sigma\eta\chi \quad \eta \quad \sigma\eta\left(\frac{\pi}{2} - \chi\right) = \sigma\eta\chi.$$

Ἐπομένως (§ 132) ἀληθεύει διὰ  $\chi = 2k\pi \pm \left(\frac{\pi}{2} - \chi\right)$ . Ἐκ τούτων δὲ εὐρίσκομεν ὅτι :

$$\chi = 2k\pi + \frac{\pi}{2} - \chi \quad \text{καὶ} \quad \chi = 2k\pi - \frac{\pi}{2} + \chi.$$

Ἐκ τῆς α' τούτων προκύπτει  $\chi = k\pi + \frac{\pi}{4}$  (1). Ἐκ δὲ τῆς β' προκύπτει  $0 = 2k\pi - \frac{\pi}{2}$ , ἥτις ἀληθεύει διὰ  $k = \frac{1}{4}$ , ὅπερ ἄτοπον, διότι ὁ  $k$  μόνον ἀκεραίας τιμὰς πρέπει νὰ λαμβάνη. Ὡστε ἡ δοθεῖσα ἑξίσωσις ἀληθεύει μόνον διὰ πᾶσαν τιμὴν τοῦ  $\chi$  παρεχομένην ὑπὸ τῆς (1).

*β' τρόπος.* Γνωρίζομεν ὅτι :  $\eta\mu\chi - \sigma\eta\chi = \eta\mu\chi - \eta\mu\left(\frac{\pi}{2} - \chi\right) = 2\eta\mu\left(\chi - \frac{\pi}{4}\right)\sigma\eta\frac{\pi}{4} = \sqrt{2}\eta\mu\left(\chi - \frac{\pi}{4}\right)$ . Ἐπομένως ἡ ἑξίσωσις γίνεται  $\eta\mu\left(\chi - \frac{\pi}{4}\right) = 0 = \eta\mu 0^\circ$ . Ἀληθεύει δὲ (§ 132 α') διὰ  $\chi - \frac{\pi}{4} = \lambda\pi$ , ὅθεν  $\chi = \lambda\pi + \frac{\pi}{4}$ .

*γ' τρόπος.* Παρατηροῦμεν πρῶτον ὅτι, ἂν ἦτο  $\sigma\eta\chi = 0$ , θὰ ἦτο καὶ  $\eta\mu\chi = 0$ . Αἱ δύο ὁμως αὗται ἑξισώσεις δὲν συναληθεύουσι διὰ τὰς αὐτὰς τιμὰς τοῦ  $\chi$ . Διότι τόσα, διὰ τὰ ὁποῖα εἶναι  $\sigma\eta\chi = 0$ , εἶναι τὰ λήγοντα εἰς τὰ σημεῖα Β καὶ Β' τῆς περιφερείας. Διὰ ταῦτα δὲ εἶναι  $\eta\mu\chi = \pm 1$ . Εἶναι λοιπὸν  $\sigma\eta\chi \neq 0$ , ἡ δὲ δοθεῖσα ἑξίσω-

σις είναι ισοδύναμος πρὸς τὴν  $\frac{\eta\mu\chi}{\sigma\upsilon\nu\chi} = 1$  ἢ  $\epsilon\phi\chi = 1 = \epsilon\phi\frac{\pi}{4}$ . Ἐπομένως (§ 132 γ'), ἀληθεύει διὰ  $\chi = \lambda\pi + \frac{\pi}{4}$ .

**Παράδειγμα 2ον. Νὰ λυθῇ ἡ ἐξίσωσις  $\eta\mu\chi = \sigma\upsilon\nu 2\chi$ .**  
**Λύσις. α' τρόπος.** Αὕτη είναι ισοδύναμος πρὸς τὴν  $\sigma\upsilon\nu\left(\frac{\pi}{2} - \chi\right) = \sigma\upsilon\nu 2\chi$  καὶ ἀληθεύει διὰ  $\frac{\pi}{2} - \chi = 2k\pi \pm 2\chi$ .  
 Ἐκ τούτων δὲ εὐρίσκομεν ὅτι :

$$\chi = \frac{\pi}{6} - \frac{2k\pi}{3} = \frac{(1-4k)\pi}{6} \quad \text{καὶ} \quad \chi = 2k\pi - \frac{\pi}{2}.$$

**β' τρόπος.** Γνωρίζομεν (§ 103) ὅτι  $\sigma\upsilon\nu 2\chi = 1 - 2\eta\mu^2\chi$ . Ἐπομένως ἡ ἐξίσωσις γίνεται  $2\eta\mu^2\chi + \eta\mu\chi - 1 = 0$ . Αὕτη δὲ ἀληθεύει, ἂν  $\eta\mu\chi = -1 = \eta\mu\frac{3\pi}{2}$  καὶ ἂν  $\eta\mu\chi = \frac{1}{2} = \eta\mu\frac{\pi}{6}$ .

Οὕτω τὸ ζήτημα ἀνάγεται εἰς τὴν λύσιν τῶν δύο τελευταίων ἀπλῆς μορφῆς ἐξισώσεων.

**Παράδειγμα 3ον. Νὰ λυθῇ ἡ ἐξίσωσις  $\epsilon\phi\chi = \sigma\phi\left(\frac{\chi}{2} + \frac{\pi}{4}\right)$**

**Λύσις.** Παρατηροῦμεν ὅτι  $\left(\frac{\pi}{4} - \frac{\chi}{2}\right) + \left(\frac{\chi}{2} + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\pi}{2}$  καὶ ἐννοοῦμεν ὅτι  $\sigma\phi\left(\frac{\chi}{2} + \frac{\pi}{4}\right) = \epsilon\phi\left(\frac{\pi}{4} - \frac{\chi}{2}\right)$ . Ἡ ἐξίσωσις λοιπὸν γίνεται  $\epsilon\phi\chi = \epsilon\phi\left(\frac{\pi}{4} - \frac{\chi}{2}\right)$ . Αὕτη δὲ ἀληθεύει, ἂν

$$\chi = \lambda\pi + \frac{\pi}{4} - \frac{\chi}{2}, \quad \text{ὅθεν} \quad \chi = \frac{(4\lambda + 1)\pi}{6}.$$

**Παράδειγμα 4ον. Νὰ λυθῇ ἡ ἐξίσωσις  $2\eta\mu^2\chi - \sigma\upsilon\nu^2\chi = 2$**

**Λύσις.** Ἐπειδὴ  $\eta\mu^2\chi = 1 - \sigma\upsilon\nu^2\chi$ , ἡ ἐξίσωσις γίνεται :

$$2(1 - \sigma\upsilon\nu^2\chi) - \sigma\upsilon\nu^2\chi = 2 \quad \text{ἢ} \quad \sigma\upsilon\nu^2\chi = 0.$$

Αὕτη δὲ ἀληθεύει, ἂν  $\sigma\upsilon\nu\chi = 0 = \sigma\upsilon\nu\frac{\pi}{2}$  καὶ ἐπομένως

$$\chi = 2k\pi \pm \frac{\pi}{2} = \frac{(4k \pm 1)\pi}{2}.$$

**Παράδειγμα 5ον. Νὰ λυθῇ ἡ ἐξίσωσις :**

$$4\sigma\upsilon\nu\chi - 8\sigma\upsilon\nu\left(\frac{\chi}{2}\right) + 6 = 0.$$

Λύσις. Ἐπειδὴ  $\sin \chi = 2\sin^2\left(\frac{\chi}{2}\right) - 1$ , ἡ ἐξίσωσις γίνεται :

$$4\sin^2\left(\frac{\chi}{2}\right) - 4\sin\left(\frac{\chi}{2}\right) + 1 = 0.$$

Αὕτη δὲ ἀληθεύει διὰ  $\sin \frac{\chi}{2} = \frac{1}{2} = \sin \frac{\pi}{3}$  καὶ ἐπομένως :

$$\frac{\chi}{2} = 2k\pi \pm \frac{\pi}{3} = \frac{(6k \pm 1)\pi}{3}, \quad \text{ὅθεν } \chi = \frac{(6k \pm 1)2\pi}{3}.$$

Ἀπὸ τὰ παραδείγματα ταῦτα βλέπομεν ὅτι καὶ τῶν τοιοῦτων ἐξισώσεων ἡ λύσις ἀνάγεται εἰς τὴν λύσιν τῶν ἐξισώσεων ἀπλῆς μορφῆς. Ἡ ἀναγωγή αὕτη ἐπιτυγχάνεται διὰ τῆς ἐφαρμογῆς γνωστών καὶ καταλλήλων ἐκάστοτε σχέσεων μεταξὺ τῶν τριγωνομετρικῶν ἀριθμῶν διαφόρων τόξων.

### Ἀσκήσεις

114. Νὰ λυθῶσιν αἱ ἐξισώσεις:

$$\eta\mu \frac{\chi}{2} = \sin \chi, \quad \eta\mu \chi = \sin \frac{\chi}{3}, \quad \epsilon\phi \chi = \sigma\phi \frac{\chi}{4}.$$

115. Νὰ λυθῶσιν αἱ ἐξισώσεις :

$$\eta\mu^2 \chi - \sin^2 \chi = 0, \quad 2\sin \chi - 3\eta\mu^2 \chi = -2.$$

116. Νὰ λυθῶσιν αἱ ἐξισώσεις:  $3\eta\mu^2 \chi - \sin^2 \chi = 1$ ,  $\sin 2\chi - \sin^2 \chi = 0$ .

117. Νὰ λυθῆ ἡ ἐξίσωσις  $\frac{3\eta\mu \chi - \sin \chi}{\eta\mu \chi + \sin \chi} = 1$ .

118. Νὰ λυθῆ ἡ ἐξίσωσις  $\epsilon\phi(\chi + 60^\circ) + \sigma\phi(60^\circ - 3\chi) = 0$ .

**135. Μία κλασσικὴ τριγωνομετρικὴ ἐξίσωσις.** Ὑπάρχουσι τριγωνομετρικαὶ ἐξισώσεις, αἱ ὁποῖαι λύνονται μὲ ἐιδικούς τρόπους ἐξαρτωμένους ἀπὸ τὴν μορφήν ἐκάστης. Ἀπὸ αὐτὰς ἀπλούστεραι καὶ συνηθέστερον ἀπαντῶμεναι εἶναι αἱ ἔχουσαι ἢ λαμβάνουσαι μίαν τῶν μορφῶν  $\alpha\eta\mu \chi \pm \beta \sin \chi = \gamma$ .

Ταύτας λύομεν ὡς ἐξῆς: Διαιροῦμεν τὰ μέλη αὐτῶν διὰ  $\alpha$  καὶ εὐρίσκομεν τὰς ἀντιστοίχους ἰσοδυνάμους ἐξισώσεις:

$$\eta\mu \chi \pm \frac{\beta}{\alpha} \sin \chi = \frac{\gamma}{\alpha}.$$

Ἄν δὲ θέσωμεν  $\frac{\beta}{\alpha} = \epsilon\phi \omega = \frac{\eta\mu \omega}{\sin \omega}$  ( $\omega$  βοθηθικὸς ἄγνωστος), εὐρίσκομεν τὴν ἐξίσωσιν:

$$\eta\mu\chi \pm \frac{\eta\mu\omega}{\sigma\upsilon\nu\omega} \cdot \sigma\upsilon\nu\chi = \frac{\gamma}{\alpha}.$$

Ἐκ ταύτης δὲ εὐρίσκομεν :

$$\eta\mu\chi\sigma\upsilon\nu\omega \pm \eta\mu\omega\sigma\upsilon\nu\chi = \frac{\gamma}{\alpha} \sigma\upsilon\nu\omega, \text{ ἢ } \eta\mu(\chi \pm \omega) = \frac{\gamma}{\alpha} \sigma\upsilon\nu\omega \quad (1).$$

Ἄν δὲ ἐκ τῆς ἐξίσωσης ἐφω =  $\frac{\beta}{\alpha}$  εὐρωμεν μίαν τιμὴν τοῦ  $\omega$ , δυνάμεθα νὰ λύσωμεν τὰς (1) πρὸς ἄγνωστον τόξον  $(\chi \pm \omega)$ .

Π.χ. ἡ ἐξίσωσις  $3\eta\mu\chi + \sqrt{3}\sigma\upsilon\nu\chi = 3$  εἶναι ἰσοδύναμος πρὸς τὴν

$$\eta\mu\chi + \frac{\sqrt{3}}{3} \cdot \sigma\upsilon\nu\chi = 1.$$

Ἐπειδὴ δὲ  $\frac{\sqrt{3}}{3} = \epsilon\phi \frac{\pi}{6}$ , αὕτη γίνεται κατὰ σειρὰν :

$$\eta\mu\chi + \frac{\eta\mu \frac{\pi}{6}}{\sigma\upsilon\nu \frac{\pi}{6}} \sigma\upsilon\nu\chi = 1, \quad \eta\mu\chi\sigma\upsilon\nu \frac{\pi}{6} + \eta\mu \frac{\pi}{6} \sigma\upsilon\nu\chi = \sigma\upsilon\nu \frac{\pi}{6}$$

$$\eta\mu\left(\chi + \frac{\pi}{6}\right) = \eta\mu \frac{\pi}{3}.$$

Ἐκ ταύτης δὲ εὐρίσκομεν ὅτι :

$$\chi + \frac{\pi}{6} = 2k\pi + \frac{\pi}{3} \quad \text{καὶ} \quad \chi + \frac{\pi}{6} = (2k + 1)\pi - \frac{\pi}{3} \quad \text{κτλ.}$$

### Ἀσκήσεις

419. Νὰ λυθῆ ἡ ἐξίσωσις  $\sqrt{3}\eta\mu\chi + \sigma\upsilon\nu\chi - 1 = 0$ .

420. Νὰ λυθῆ ἡ ἐξίσωσις  $\eta\mu\chi - \sigma\upsilon\nu\chi = \frac{\sqrt{2}}{2}$ .

421. Νὰ λυθῆ ἡ ἐξίσωσις  $\sigma\upsilon\nu 3\chi + \eta\mu 3\chi = \frac{\sqrt{2}}{2}$ .

422. Νὰ λυθῆ ἡ ἐξίσωσις  $\frac{\sqrt{2}}{\sigma\upsilon\nu\chi} - 1 = \epsilon\phi\chi$ .

423. Νὰ λυθῆ ἡ ἐξίσωσις  $4\eta\mu\chi + 5\sigma\upsilon\nu\chi = 6$ .

## 2. ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

**136.** Πρὸ β λ η μ α I. Τὸ ἡμίτονον τῆς μιᾶς ὀξείας γωνίας

ένος ὀρθογώνιου τριγώνου εἶναι διπλάσιον τοῦ ἡμιτόνου τῆς ἄλλης. Νὰ εὑρεθῶσι τὰ μέτρα τῶν ὀξείων τούτων γωνιῶν.

*Λύσις.* Τὰ ζητούμενα μέτρα Β καὶ Γ πρέπει νὰ ταυτοποιῶσι τὰς δύο ἐξισώσεις :  $B + \Gamma = 90^\circ$ ,  $\eta\mu B = 2\eta\mu\Gamma$ .

Τὸ ζήτημα λοιπὸν ἀνάγεται εἰς τὴν λύσιν τοῦ συστήματος τῶν δύο τούτων ἐξισώσεων. Πρὸς τοῦτο παρατηροῦμεν ὅτι ἕνεκα τῆς  $\alpha'$  ἐξισώσεως εἶναι  $\eta\mu\Gamma = \text{συν}B$ . Ἡ δὲ  $\beta'$  ἐξίσωσις γίνεται  $\eta\mu B = 2\text{συν}B$ . Ἐπειδὴ δὲ  $\text{συν}B \neq 0$ , αὕτη εἶναι ἰσοδύναμος πρὸς τὴν ἐξίσωσιν  $\epsilon\phi B = 2$ . Τῇ βοήθειᾳ δὲ τῶν πινάκων εὐρίσκομεν ὅτι:

$$\epsilon\phi B = \epsilon\phi(63^\circ 26' 5'', 7).$$

Ἐκ ταύτης δὲ ἔπεται ὅτι  $B = 180^\circ\lambda + 63^\circ 26' 5'', 7$ . Ἐπειδὴ δὲ  $0^\circ < B < 90^\circ$ , πρέπει νὰ εἶναι  $\lambda = 0$  καὶ ἐπομένως

$$B = 63^\circ 26' 5'', 7 \quad \text{καὶ} \quad \Gamma = 90^\circ - (63^\circ 26' 5'', 7) = 26^\circ 33' 54'', 3.$$

**137. Πρόβλημα II. Νὰ εὑρεθῶσι δύο γωνίαι τριγώνου τῶν ὁποίων τὰ ἡμίτονα ἔχουσιν ἄθροισμα  $\frac{\sqrt{2}+1}{2}$  καὶ διαφορὰν  $\frac{\sqrt{2}-1}{2}$**

*Λύσις.* Ἐὰν  $\chi$  καὶ  $\psi$  εἶναι τὰ μέτρα τῶν ζητουμένων γωνιῶν, θὰ εἶναι:

$$\eta\mu\chi + \eta\mu\psi = \frac{\sqrt{2}+1}{2} \quad \text{καὶ} \quad \eta\mu\chi - \eta\mu\psi = \frac{\sqrt{2}-1}{2}.$$

Ἐὰν πρὸς στιγμὴν θεωρήσωμεν ὡς ἀγνώστους τὸ  $\eta\mu\chi$  καὶ  $\eta\mu\psi$ , τὸ σύστημα τοῦτο ἔχει ἀλγεβρικὴν μορφήν πρὸς τοὺς ἀγνώστους τούτους. Κατὰ δὲ τὰ γνωστὰ ἐκ τῆς Ἀλγέβρας προσθέτομεν καὶ εἶτα ἀφαιροῦμεν ταύτας κατὰ μέλη. Οὕτως εὐρίσκομεν τὸ ἰσοδύναμον σύστημα:

$$2\eta\mu\chi = \sqrt{2}, \quad 2\eta\mu\psi = 1 \quad \eta \quad \tauὸ$$

$$\eta\mu\chi = \frac{\sqrt{2}}{2} = \eta\mu\frac{\pi}{4}, \quad \eta\mu\psi = \frac{1}{2} = \eta\mu\frac{\pi}{6}$$

Ἡ πρώτη τούτων ἀληθεύει διὰ

$$\chi = 2k\pi + \frac{\pi}{4} \quad \text{καὶ} \quad \text{διὰ} \quad \chi = (2k+1)\pi - \frac{\pi}{4},$$

$$\eta \quad \text{δὲ} \quad \beta' \quad \text{διὰ} \quad \psi = 2k'\pi + \frac{\pi}{6} \quad \text{καὶ} \quad \text{διὰ} \quad \psi = (2k'+1)\pi - \frac{\pi}{6}.$$

Συνδυάζοντες ἕκαστον τύπον διὰ τὸν  $\chi$  μὲ ἕκαστον διὰ τὸν  $\psi$  εὐρίσκομεν τὰς ἀκολουθούς γενικὰς λύσεις :

$$\left. \begin{aligned} \chi &= 2k\pi + \frac{\pi}{4} \\ \psi &= 2k'\pi + \frac{\pi}{6} \end{aligned} \right\} (1) \quad \left. \begin{aligned} \chi &= (2k+1)\pi - \frac{\pi}{4} \\ \psi &= 2k'\pi + \frac{\pi}{6} \end{aligned} \right\} (3)$$

$$\left. \begin{aligned} \chi &= 2k\pi + \frac{\pi}{4} \\ \psi &= (2k'+1)\pi - \frac{\pi}{6} \end{aligned} \right\} (2) \quad \left. \begin{aligned} \chi &= (2k+1)\pi - \frac{\pi}{4} \\ \psi &= (2k'+1)\pi - \frac{\pi}{6} \end{aligned} \right\} (4)$$

Ἐπειδὴ ὁμως  $\chi$  καὶ  $\psi$  εἶναι μέτρα γωνιῶν τριγώνου, πρέπει νὰ εἶναι  $\chi + \psi < \pi, \chi > 0, \psi > 0$ .

Ἀπὸ τὸ ζεῦγος (1) εὐρίσκομεν λοιπὸν δεκτὰς τιμὰς  $\chi = \frac{\pi}{4}$ ,  $\psi = \frac{\pi}{6}$  διὰ  $k = k' = 0$ . Ἀπὸ τὸ (2) οὐδεμίαν δεκτὴν, ἀπὸ τὸ (3) εὐρίσκομεν  $\chi = \frac{3\pi}{4}$ ,  $\psi = \frac{\pi}{6}$  καὶ ἀπὸ τὸ (4) οὐδεμίαν.

**138. Τριγωνομετρικὰ συστήματα.** Ἀπὸ τὰ προηγούμενα προβλήματα βλέπομεν ὅτι ὑπάρχουσ' προβλήματα, τῶν ὁποίων ἡ λύσις ἀνάγεται εἰς τὴν λύσιν συστημάτων μὲ μίαν τοῦλάχιστον τριγωνομετρικὴν ἐξίσωσιν. Τὰ τοιαῦτα συστήματα λέγονται τριγωνομετρικὰ συστήματα. Τὰ προηγούμενα λοιπὸν συστήματα (§ § 136, 137) εἶναι τριγωνομετρικὰ συστήματα. Ὡστε :

**Τριγωνομετρικὸν σύστημα λέγεται πᾶν σύστημα, τὸ ὁποῖον ἔχει μίαν τοῦλάχιστον τριγωνομετρικὴν ἐξίσωσιν.**

Τὰ ἀπλούστερα καὶ συνηθέστερα τριγωνομετρικὰ συστήματα ἔχουσι δύο ἐξισώσεις καὶ δύο ἀγνώστους. Ταῦτα διακρίνομεν εἰς δύο εἶδη.

Τὸ α' εἶδος περιέχει μόνον μίαν τριγωνομετρικὴν ἐξίσωσιν, ἡ δὲ ἄλλη εἶναι ἀλγεβρική. Τοιοῦτον π.χ. εἶναι τὸ σύστημα τῆς § 136.

Τὸ β' εἶδος περιέχει δύο τριγωνομετρικὰς ἐξισώσεις ὅπως τὸ σύστημα τῆς § 137.

**139. Λύσις τριγωνομετρικοῦ συστήματος δύο ἐξισώσεων μὲ δύο ἀγνώστους.** Διὰ τὴν λύσιν τοιοῦτου συστήματος δυνάμεθα νὰ ἀπαλείψωμεν τὸν ἓνα ἀγνώστον διὰ τῆς μεθόδου τῆς ἀντικατάστασεως (§ 136) ἢ τῆς προσθέσεως (§ 137). Συνηθέστερον ὁμως λύομεν τὰ τοιαῦτα συστήματα μὲ εἰδικὰ τεχνάσματα τὰ ὁποῖα, ἐξαρτῶνται ἀπὸ τὴν μορφήν τῶν συστημάτων. Ὡς παραδείγματα ἔστωσαν τὰ ἀκόλουθα:

**Παράδειγμα 1ον. Νά λυθῆ τὸ σύστημα :**

$$\chi - \psi = 15^\circ, \quad \eta\mu\chi + \eta\mu\psi = \frac{\sqrt{2} + 1}{2}.$$

**Λύσις.** Ἐπειδὴ ἐκ τῆς α' ἐξισώσεως γνωρίζομεν τὴν διαφορὰν τῶν ἀγνώστων, θὰ προσπαθῆσωμεν νὰ εὑρωμεν τὸ ἄθροισμα αὐτῶν ἐκ τῆς β' ἐξισώσεως. Πρὸς τοῦτο ἐνθυμούμεθα ὅτι:

$$\eta\mu\chi + \eta\mu\psi = 2\eta\mu \frac{\chi + \psi}{2} \text{ συν } \frac{\chi - \psi}{2}.$$

Ἡ β' λοιπὸν ἐξίσωσις γίνεται:

$$2\eta\mu \frac{\chi + \psi}{2} \text{ συν } (7^\circ 30') = \frac{\sqrt{2} + 1}{2}$$

ὅθεν: 
$$\eta\mu \frac{\chi + \psi}{2} = \frac{2,4142}{4 \text{ συν } (7^\circ 30')}.$$

Ἐκ ταύτης εὐρίσκομεν ὅτι  $\log \eta\mu \frac{\chi + \psi}{2} = \bar{1},78445$  καὶ ἐκ ταύτης

$$\eta\mu \left( \frac{\chi + \psi}{2} \right) = \eta\mu (37^\circ 30').$$

Αὕτη δὲ ἀληθεύει, ἂν  $\frac{\chi + \psi}{2} = 360^\circ k + (37^\circ 30')$  καὶ ἂν

$$\frac{\chi + \psi}{2} = 360^\circ k + 180^\circ - (37^\circ 30') = 360^\circ k + 142^\circ 30'.$$

\* Ἄρα  $\chi + \psi = 720^\circ k + 75^\circ$  καὶ  $\chi + \psi = 720^\circ k + 285^\circ$ .

Οὕτως ἀγόμεθα εἰς τὴν λύσιν τῶν δύο ἀλγεβρικῶν συστημάτων:

$$\begin{array}{l|l} \chi - \psi = 15^\circ & \chi - \psi = 15^\circ \\ \chi + \psi = 720^\circ k + 75^\circ & \chi + \psi = 720^\circ k + 285^\circ \end{array}$$

\* Ἐκ τοῦ α' τοῦτων εὐρίσκομεν: 
$$\begin{array}{l} \chi = 360^\circ k + 45^\circ \\ \psi = 360^\circ k + 30^\circ \end{array} \quad (1)$$

\* Ἐκ δὲ τοῦ β' εὐρίσκομεν: 
$$\begin{array}{l} \chi = 360^\circ k + 150^\circ \\ \psi = 360^\circ k + 135^\circ \end{array} \quad (2)$$

Οὕτω διὰ  $k = 0$  ἐκ μὲν τῶν (1) εὐρίσκομεν  $\chi = 45^\circ$ ,  $\psi = 30^\circ$ , ἐκ δὲ τῶν (2) εὐρίσκομεν  $\chi = 150^\circ$ ,  $\psi = 135^\circ$  κ.τ.λ.

**Παράδειγμα 2ον. Νά λυθῆ τὸ σύστημα :**

$$\chi + \psi = 90^\circ, \quad \eta\mu\chi \cdot \eta\mu\psi = \frac{\sqrt{3}}{4}.$$

**Λύσις.** Θὰ προσπαθῆσωμεν νὰ εὑρωμεν τὴν διαφορὰν  $\chi - \psi$  ἀπὸ τὴν β' ἐξίσωσιν. Πρὸς τοῦτο πολλαπλασιάζομεν τὰ μέλη αὐτῆς

ἐπί 2 καὶ εὐρίσκομεν τὴν ἰσοδύναμον ἐξίσωσιν  $2\acute{\eta}\mu\chi\acute{\eta}\mu\psi = \frac{\sqrt{3}}{2}$  (1)

Ἐπειδὴ δὲ  $2\acute{\eta}\mu\chi\acute{\eta}\mu\psi = \sigma\upsilon\nu(\chi - \psi) - \sigma\upsilon\nu(\chi + \psi)$  ἢ ἔνεκα τῆς α'  $2\acute{\eta}\mu\chi\acute{\eta}\mu\psi = \sigma\upsilon\nu(\chi - \psi)$ , ἡ (1) γίνεταί :

$$\sigma\upsilon\nu(\chi - \psi) = \frac{\sqrt{3}}{2} = \sigma\upsilon\nu 30^\circ.$$

Ἐκ ταύτης εὐρίσκομεν ὅτι  $\chi - \psi = 360^\circ k \pm 30^\circ$ . Οὕτως ἀγόμεθα εἰς τὴν λύσιν τῶν ἀλγεβρικῶν συστημάτων.

$$\chi + \psi = 90^\circ, \quad \chi - \psi = 360^\circ k + 40^\circ \text{ καὶ}$$

$$\chi + \psi = 90^\circ, \quad \chi - \psi = 360^\circ k - 30^\circ.$$

Ἐκ τοῦ α' τούτων εὐρίσκομεν.

$$\chi = 180^\circ k + 60^\circ, \quad \psi = -180^\circ k + 30^\circ$$

Ἐκ δὲ τοῦ β' εὐρίσκομεν  $\chi = 180^\circ k + 30^\circ, \psi = -180^\circ k + 60^\circ$ .

Οὕτω διὰ  $k = 0$  ἐκ τῆς α' λύσεις εὐρίσκομεν  $\chi = 60^\circ, \psi = 30^\circ$  ἐκ τῆς β',  $\chi = 30^\circ, \psi = 60^\circ$ . Διὰ  $k = 1$  ἐκ τῆς α' εὐρίσκομεν  $\chi = 240^\circ, \psi = -150^\circ$  καὶ ἐκ τῆς β',  $\chi = 210^\circ, \psi = -120^\circ$  κ.τ.λ.

**Παράδειγμα 3ον. Νὰ λυθῇ τὸ σύστημα :**

$$\acute{\epsilon}\phi\chi + \acute{\epsilon}\phi\psi = 1 + \sqrt{3}, \quad \acute{\epsilon}\phi\chi \cdot \acute{\epsilon}\phi\psi = \sqrt{3}.$$

**Λύσις.** Ἄν πρὸς στιγμὴν θεωρήσωμεν ὡς ἀγνώστους τὴν  $\acute{\epsilon}\phi\chi$  καὶ  $\acute{\epsilon}\phi\psi$ , οὗτοι εἶναι ρίζαι τῆς ἐξισώσεως.

$$k^2 - (1 + \sqrt{3})k + \sqrt{3} = 0$$

Λύοντες ταύτην εὐρίσκομεν :  $k = \frac{(1 + \sqrt{3}) \pm (\sqrt{3} - 1)}{2} = \begin{cases} \sqrt{3} \\ 1 \end{cases}$

Οὕτως ἀγόμεθα εἰς τὴν λύσιν τῶν συστημάτων:

$$\acute{\epsilon}\phi\chi = \sqrt{3} = \acute{\epsilon}\phi \frac{\pi}{3}, \quad \acute{\epsilon}\phi\psi = 1 = \acute{\epsilon}\phi \frac{\pi}{4} \text{ καὶ}$$

$$\acute{\epsilon}\phi\chi = 1 = \acute{\epsilon}\phi \frac{\pi}{4}, \quad \acute{\epsilon}\phi\psi = \sqrt{3} = \acute{\epsilon}\phi \frac{\pi}{3}$$

Λύοντες τὸ α' εὐρίσκομεν  $\chi = \lambda\pi + \frac{\pi}{3}, \psi = \lambda\pi + \frac{\pi}{4}$ , ἐκ δὲ

τοῦ β' τάνάπαλιν  $\chi = \lambda\pi + \frac{\pi}{4}, \psi = \lambda\pi + \frac{\pi}{3}$ .

Οὕτω διὰ  $\lambda = 0$  εἶναι  $\chi = \frac{\pi}{3}, \psi = \frac{\pi}{4}$  ἢ τάνάπαλιν  $\chi = \frac{\pi}{4}$

$\psi = \frac{\pi}{3}$ . Διὰ  $\lambda = 1$  εἶναι  $\chi = \frac{4\pi}{3}$ ,  $\psi = \frac{5\pi}{4}$  καὶ τὰνάπαλιν

$\chi = \frac{5\pi}{4}$ ,  $\psi = \frac{4\pi}{3}$  κ.τ.λ.

**Παράδειγμα 4ον. Νὰ λυθῆ τὸ σύστημα :**

$$\eta\mu^2\chi + \epsilon\phi^2\psi = \frac{3}{2}, \quad \eta\mu\chi\epsilon\phi\psi = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

**Λύσις.** Διπλασιάζοντες τὰ μέλη τῆς β' καὶ προσθέτοντες ἔπειτα κατὰ μέλη μὲ τὴν α' εὐρίσκομεν τὴν ἐξίσωσιν :

$(\eta\mu\chi + \epsilon\phi\psi)^2 = \frac{3 + 2\sqrt{2}}{2} = \frac{(1 + \sqrt{2})^2}{2}$ . Δι' ἀφαίρεσεως δὲ τῶν ἰδίων ἐξισώσεων κατὰ μέλη εὐρίσκομεν τὴν ἐξίσωσιν :

$(\eta\mu\chi - \epsilon\phi\psi)^2 = \frac{3 - 2\sqrt{2}}{2} = \frac{(1 - \sqrt{2})^2}{2}$ . Ἐκ τούτων εὐρίσκομεν

$(\eta\mu\chi + \epsilon\phi\psi) = \pm \frac{1 + \sqrt{2}}{\sqrt{2}}$  καὶ  $\eta\mu\chi - \epsilon\phi\psi = \pm \frac{1 - \sqrt{2}}{\sqrt{2}}$ .

Οὕτω δὲ τὸ ζήτημα ἀνάγεται εἰς τὴν λύσιν τῶν ἀκολουθῶν συστημάτων :

$$\left. \begin{aligned} \eta\mu\chi + \epsilon\phi\chi &= \frac{1 + \sqrt{2}}{\sqrt{2}} \\ \eta\mu\chi - \epsilon\phi\psi &= \frac{1 - \sqrt{2}}{\sqrt{2}} \end{aligned} \right\} \quad \left. \begin{aligned} \eta\mu\chi + \epsilon\phi\psi &= -\frac{1 + \sqrt{2}}{\sqrt{2}} \\ \eta\mu\chi - \epsilon\phi\psi &= \frac{1 - \sqrt{2}}{\sqrt{2}} \end{aligned} \right\}$$

$$\left. \begin{aligned} \eta\mu\chi + \epsilon\phi\psi &= \frac{1 + \sqrt{2}}{\sqrt{2}} \\ \eta\mu\chi - \epsilon\phi\psi &= -\frac{1 - \sqrt{2}}{\sqrt{2}} \end{aligned} \right\} \quad \left. \begin{aligned} \eta\mu\chi + \epsilon\phi\psi &= -\frac{1 + \sqrt{2}}{\sqrt{2}} \\ \eta\mu\chi - \epsilon\phi\psi &= -\frac{1 - \sqrt{2}}{\sqrt{2}} \end{aligned} \right\}$$

Ἐκ τοῦ α' τούτων εὐρίσκομεν  $2\eta\mu\chi = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$  καὶ  $2\epsilon\phi\psi = 2$

Ἐκ τούτων δὲ ἔπεται ὅτι:  $\eta\mu\chi = \frac{\sqrt{2}}{2} = \eta\mu\frac{\pi}{4}$  καὶ  $\epsilon\phi\psi = 1 = \epsilon\phi\frac{\pi}{4}$

\*Ἄρα

$$\left. \begin{aligned} \chi &= 2k + \frac{\pi}{4} \\ \psi &= \lambda\pi + \frac{\pi}{4} \end{aligned} \right\} \quad \left. \begin{aligned} \chi &= (2k + 1)\pi - \frac{\pi}{4} \\ \psi &= \lambda\pi + \frac{\pi}{4} \end{aligned} \right\}$$

Οὕτω πρὸς ἀσκήσιν ὡς λύσωσιν οἱ μαθηταὶ καὶ τὰ ἄλλα τρία συστήματα.

## Άσκησης

424. Νά λυθῆ τὸ σύστημα  $\chi + \psi = 75^\circ$ ,  $\acute{\eta}\mu\chi - \acute{\eta}\mu\psi = \frac{\sqrt{2}-1}{2}$ .

425. Νά λυθῆ τὸ σύστημα  $\chi - \psi = 60^\circ$ ,  $\sigma\upsilon\mu\chi + \sigma\upsilon\mu\psi = 0$ .

426. Νά λυθῆ τὸ σύστημα  $\chi - \psi = 30^\circ$ ,  $\frac{\acute{\eta}\mu\chi}{\acute{\eta}\mu\psi} = \sqrt{3}$ .

427. Νά λυθῆ τὸ σύστημα :

$$\sigma\upsilon\mu\chi - \sigma\upsilon\mu\psi = -\frac{1}{2}, \quad \sigma\upsilon\mu\chi + \sigma\upsilon\mu\psi = \frac{1}{2}.$$

428. Νά λυθῆ τὸ σύστημα:

$$\acute{\eta}\mu\chi + \sqrt{3}\sigma\upsilon\mu\psi = 1, \quad \acute{\eta}\mu\chi + \sigma\upsilon\mu\psi = \frac{\sqrt{3}-1}{2}.$$

429. Νά λυθῆ τὸ σύστημα :

$$\sigma\upsilon\mu\chi + \sigma\upsilon\mu\psi = \frac{1 + \sqrt{2}}{2}, \quad \sigma\upsilon\mu\chi \cdot \sigma\upsilon\mu\psi = \frac{\sqrt{2}}{4}.$$

430. Νά λυθῆ τὸ σύστημα  $\chi + \psi = 90^\circ$ ,  $\frac{\acute{\epsilon}\phi\chi}{\acute{\epsilon}\phi\psi} = 3$ .

431. Νά λυθῆ τὸ σύστημα  $\chi - \psi = 15^\circ$ ,  $\sigma\upsilon\mu\chi \cdot \sigma\upsilon\mu\psi = \frac{\sqrt{6}}{4}$ .

432. Νά λυθῆ τὸ σύστημα  $\chi - \psi = 30^\circ$ ,  $\acute{\epsilon}\phi\chi \cdot \acute{\epsilon}\phi\psi = 1$ .

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'

### ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟΙ ΚΥΚΛΙΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

**140. α')** Ἡ συνάρτησις τόξήμχ. Ἐμάθομεν ὅτι ἕκαστος τριγωνομετρικὸς ἀριθμὸς τόξου μεταβάλλεται μεταβαλλομένου τοῦ τόξου. Ἐκαστος λοιπὸν τριγωνομετρικὸς ἀριθμὸς τόξου εἶναι συνάρτησις τοῦ τόξου.


Οὕτως ἂν  $\chi = \eta\mu\psi$ , ὁ  $\chi$  εἶναι συνάρτησις τοῦ τόξου  $\psi$ . Ὁ δὲ  $\psi$  λέγεται ἀνεξάρτητος μεταβλητή.

**Ἀντιστροφως:**  
Ἄν ὁ  $\chi$  μεταβάλλεται καὶ τὸ τόξον  $\psi$  μεταβάλλεται, ἦτοι καὶ τοῦτο εἶναι συνάρτησις τοῦ  $\chi$ . Δηλ. τὸ τόξον εἶναι συνάρτησις τοῦ ἡμιτόνου του. Εἰς τὴν πε-

ρίπτωσιν ταύτην τὸ ἡμίτονον εἶναι ἀνεξάρτητος μεταβλητὴ καὶ τὸ τόξον  $\psi$  ἡ συνάρτησις. Λέγομεν λοιπὸν ὅτι:

**Τὸ  $\psi$  εἶναι τόξον, τὸ ὁποῖον ἔχει ἡμίτονον τὸν ἀριθμὸν  $\chi$  ἢ συντομώτερον  $\psi$  εἶναι τόξον ἡμιτόνου  $\chi$ .**

Τοῦτο παριστάνομεν διὰ τῆς ἰσότητος  $\psi = \text{τόξήμχ.}$  (1)  
Αὕτῃ ἡ συνάρτησις  $\psi$  λέγεται **ἀντίστροφος συνάρτησις** τῆς συναρτήσεως ἡμψ.



Σχ. 51


Μεταξύ τῶν δύο συναρτήσεων  $\psi$  καὶ  $\eta\mu\psi$  ὑπάρχει ἡ ἐξῆς σπουδαία διαφορά. Ἡ συνάρτησις  $\eta\mu\psi$  λαμβάνει μίαν ὠρισμένην τιμὴν δι' ἐκάστην τιμὴν τοῦ τόξου  $\psi$ .

Ἀντιστρόφως: Εἰς ἐκάστην τιμὴν  $\alpha$  τοῦ  $\chi$  ἀπὸ  $-1$  ἕως  $+1$  τὸ τόξον  $\psi$  λαμβάνει ἀπείρους τιμάς. Ἄν δὲ  $\tau$  εἶναι μία τιμὴ τοῦ τόξου  $\psi$ , δηλαδή ἂν  $\eta\mu\tau = \alpha$ , αἱ τιμαὶ τοῦ  $\psi$  εἶναι ρίζαι τῆς τριγωνομετρικῆς ἐξισώσεως  $\eta\mu\psi = \eta\mu\tau$ , ἦτοι:

$$\psi = 2k\pi + \tau \text{ καὶ } \psi = (2k + 1)\pi - \tau.$$

Ἄν χάριν ἀπλότητος ἐκ τῶν ἀπείρων τιμῶν θεωρήσωμεν μόνον τὰς περιεχομένας ἀπὸ  $-\frac{\pi}{2}$  ἕως  $\frac{\pi}{2}$ , καταρτίζομεν εὐκόλως τὸν ἀκόλουθον πίνακα τῶν μεταβολῶν τῆς συναρτήσεως  $\psi$  μετὰ τοῦ  $\chi$ .

$\chi$	}	$-1$	$\nearrow$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\nearrow$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\nearrow$	$-\frac{1}{2}$	$\nearrow$	$0$	$\nearrow$	$\frac{1}{2}$	$\nearrow$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\nearrow$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\nearrow$	$1$
$\psi = \text{τόξ.}\eta\mu\chi$	}	$-\frac{\pi}{2}$	$\nearrow$	$-\frac{\pi}{3}$	$\nearrow$	$-\frac{\pi}{4}$	$\nearrow$	$-\frac{\pi}{6}$	$\nearrow$	$0$	$\nearrow$	$\frac{\pi}{6}$	$\nearrow$	$\frac{\pi}{4}$	$\nearrow$	$\frac{\pi}{3}$	$\nearrow$	$\frac{\pi}{2}$



Τὴν μεταβολὴν ταύτην αἰσθητοποιοῦμεν διὰ τῆς καμπύλης AOB (σχ. 51).

**141. β')** Ἡ συνάρτησις τόξ.συν $\chi$ .

Ἄν  $\text{συν}\psi = \chi$ , ὁ  $\chi$  εἶναι συνάρτησις τοῦ  $\psi$  λαμβάνουσα μίαν ὠρισμένην τιμὴν δι' ἐκάστην τιμὴν τῆς ἀνεξαρτήτου μεταβλητῆς  $\psi$ .

Ἀντιστρόφως: Τὸ τόξον  $\psi$  εἶναι συνάρτησις τοῦ  $\chi$ , δηλ. τοῦ  $\text{συν}\psi$ .

Λέγομεν δὲ ὅτι  $\psi$  εἶναι τόξον, τὸ ὁποῖον ἔχει **συνημίτονον** τὸν ἀριθμὸν  $\chi$  καὶ **συντομώτερον**,  $\psi = \text{τόξ.συν}\chi$ .


Ἡ συνάρτησις  $\psi$  λέγεται **αντίστροφος τῆς  $\chi$** , δηλ. τοῦ  $\sin\psi$ , καὶ λαμβάνει ἀπείρους τιμὰς δι' ἑκάστην τιμὴν τοῦ  $\chi$  ἀπὸ  $-1$  ἕως  $+1$ .

Ἄν δὲ θεωρήσωμεν μόνον τὰς ἀπὸ  $0$  ἕως  $\pi$  τιμὰς αὐτῆς, καταρτίζομεν τὸν ἀκόλουθον πίνακα:

$$\chi \quad \left\{ \begin{array}{l} -1 \nearrow -\frac{\sqrt{3}}{2} \nearrow -\frac{\sqrt{2}}{2} \nearrow -\frac{1}{2} \nearrow 0 \nearrow \frac{1}{2} \nearrow \frac{\sqrt{2}}{2} \nearrow \frac{\sqrt{3}}{2} \nearrow 1 \\ \pi \searrow \frac{5\pi}{6} \searrow \frac{3\pi}{4} \searrow \frac{2\pi}{3} \searrow \frac{\pi}{2} \searrow \frac{\pi}{3} \searrow \frac{\pi}{4} \searrow \frac{\pi}{6} \searrow 0 \end{array} \right.$$

Τὴν μεταβολὴν ταύτην αἰσθητοποιοῦμεν διὰ τῆς καμπύλης ΑΒΓ (σχ. 52).

142.  $\gamma'$ ) Ἡ συνάρτησις τὸξέφχ. Ὅμοιως ἐκ τῆς ἐφψ =  $\chi$



Σχ. 53


ἔπεται ὅτι  $\psi =$  τὸξέφχ, ἤτοι  $\psi$  εἶναι τὸξον, τὸ ὅποιον ἔχει ἐφαπτομένην τὸν ἀριθμὸν  $\chi$ .

Ἡ συνάρτησις  $\psi$  λέγεται **αντίστροφος συνάρτησις τῆς  $\chi$** , δηλαδή τῆς ἐφψ. Καὶ ἡ συνάρτησις αὕτη λαμβάνει ἀπείρους τιμὰς δι' ἑκάστην τιμὴν  $\alpha$  τοῦ  $\chi$ . Ἄν δὲ θεωρήσωμεν μόνον τὰς μεταξὺ  $-\frac{\pi}{2}$  καὶ  $\frac{\pi}{2}$  τιμὰς αὐτῆς, καταρτίζομεν τὸν ἀκόλουθον πίνακα:

$$\chi \quad \left\{ \begin{array}{l} -\infty \dots \nearrow \dots -1 \dots \nearrow \dots 0 \dots \nearrow \dots 1 \dots \nearrow \dots +\infty \\ -\frac{\pi}{2} \dots \nearrow \dots -\frac{\pi}{4} \dots \nearrow \dots 0 \dots \nearrow \dots \frac{\pi}{4} \dots \nearrow \dots \frac{\pi}{2} \end{array} \right.$$

Τὴν μεταβολὴν ταύτην αἰσθητοποιοῦμεν διὰ τῆς καμπύλης AOB (σχ. 53).

**143. δ')** Ἡ συνάρτησις τόξοσφχ. Τέλος ἐκ τῆς σφψ = χ ἔπεται ὅτι  $\psi = \text{τόξοσφχ}$ , ἥτοι ἡ  $\psi$  εἶναι ἀντίστροφος συνάρτησις τῆς  $\chi$ , δηλ. τῆς σφψ. Καὶ ἡ συνάρτησις αὕτη  $\psi$  λαμβάνει ἀπείρους τιμὰς δι' ἑκάστην τιμὴν  $\alpha$  τῆς ἀνεξαρτήτου μεταβλητῆς  $\chi$ . Θεωροῦντες



Σχ. 54

ἐκ τούτων τὰς μεταξὺ 0 καὶ  $\pi$  καταρτίζομεν τὸν ἀκόλουθον πίνακα:

$\chi$	$-\infty \dots \nearrow \dots -1 \dots \nearrow \dots 0 \dots \nearrow \dots 1 \dots \nearrow \dots +\infty$
$\psi = \text{τόξοσφχ}$	$\pi \dots \searrow \dots \frac{3\pi}{4} \dots \searrow \dots \frac{\pi}{2} \dots \searrow \dots \frac{\pi}{4} \dots \searrow \dots 0$

Τὴν μεταβολὴν ταύτην αἰσθητοποιοῦμεν διὰ τῆς καμπύλης ABΓ (σχ. 54).

#### ΕΦΑΡΜΟΓΑΙ

**144. Πρόβλημα 1.** Νὰ εὑρεθῇ τὸ ἄθροισμα τόξήμχ + τόξήμψ ἂν τὰ ἐν αὐτῷ ἀναφερόμενα τόξα περιέχωνται μεταξὺ 0 καὶ  $\frac{\pi}{2}$ , χωρὶς νὰ εὑρεθῶσιν οἱ προσθετέοι αὐτοῦ.

*Λύσις.* Θετόμεν  $Z = \text{τόξήμ}\chi + \text{τόξήμ}\psi$ ,  $\text{τόξήμ}\chi = \alpha$ ,  $\text{τόξήμ}\psi = \beta$ .  
 'Επομένως  $Z = \alpha + \beta$ ,  $\eta\mu\alpha = \chi$ ,  $\eta\mu\beta = \psi$ . 'Εκ τῆς  $\alpha'$  τούτων εὐρίσκομεν:  
 $\eta\mu Z = \eta\mu\alpha\sigma\upsilon\nu\beta + \eta\mu\beta\sigma\upsilon\nu\alpha = \chi\sqrt{1-\psi^2} + \psi\sqrt{1-\chi^2}$ . 'Επομένως  
 $Z = \text{τόξήμ}(\chi\sqrt{1-\psi^2} + \psi\sqrt{1-\chi^2})$ .

\*'Αν π.χ.  $Z = \text{τόξήμ}\frac{1}{3} + \text{τόξήμ}\frac{2}{3}$  καὶ θέσωμεν  $\chi = \text{τόξήμ}\frac{1}{3}$ ,  
 $\psi = \text{τόξήμ}\frac{2}{3}$ , θὰ εἶναι  $Z = \chi + \psi$ ,  $\eta\mu Z = \eta\mu\chi\sigma\upsilon\nu\psi + \eta\mu\psi\sigma\upsilon\nu\chi =$   
 $\frac{1}{3}\sqrt{1-\frac{4}{9}} + \frac{2}{3}\sqrt{1-\frac{1}{9}} = \frac{1}{9}\sqrt{5} + \frac{4}{9}\sqrt{2} = 0,87699 =$   
 $\eta\mu(61^\circ 17')$

$$\left. \begin{aligned} \text{Αὕτη ἀληθεύει διὰ } Z = 360^\circ k + (61^\circ 17') \\ \text{καὶ διὰ } Z = 360^\circ k + 180^\circ - (61^\circ 17') \end{aligned} \right\} (1)$$

ἂν  $k$  εἶναι 0 ἢ τυχὸν ἀκέρατος ἀριθμὸς.

'Επειδὴ δὲ  $\eta\mu\chi = \frac{1}{3} < \frac{1}{2} = \eta\mu 30^\circ$ , ἔπεται ὅτι  $\eta\mu\chi < \eta\mu 30^\circ$  καὶ  
 ἔνεκα τῆς ὑποθέσεως  $0^\circ < \chi < 90^\circ$ , εἶναι  $0^\circ < \chi < 30^\circ$  (2)

'Ομοίως ἐκ τῶν  $\eta\mu\psi = \frac{2}{3} < \frac{\sqrt{3}}{2} = \eta\mu 60^\circ$  καὶ  $0^\circ < \psi < 90^\circ$  ἔπεται  
 ὅτι  $0^\circ < \psi < 60^\circ$ . 'Εκ ταύτης δὲ καὶ τῆς (2) ἔπεται ὅτι  
 $0^\circ < \chi + \psi < 90^\circ$  ἢ  $0^\circ < Z < 90^\circ$ . Οἱ ὅροι οὗτοι πληροῦνται μόνον  
 ὑπὸ τῆς τιμῆς  $Z = 61^\circ 17'$ , ἣν εὐρίσκομεν ἐκ τῆς πρώτης τῶν (1)  
 διὰ  $k = 0$ . Εἶναι λοιπὸν  $Z = 61^\circ 17'$ .

**145. Πρόβλημα II.** Νὰ εὐρεθῇ ἡ διαφορὰ  $\text{τόξήμ}\chi - \text{τόξήμ}\psi$   
 ἂν τὰ ἐν αὐτῇ τόξα περιέχωνται μεταξύ 0 καὶ  $\frac{\pi}{2}$ , χωρὶς νὰ  
 εὐρεθῇ χωριστὰ ὁ μειωτέος καὶ ὁ ἀφαιρετέος αὐτῆς.

*Λύσις.* Ὡς προηγουμένως, θέτομεν  $Z = \text{τόξήμ}\chi - \text{τόξήμ}\psi$   
 $\text{τόξήμ}\chi = \alpha$ ,  $\text{τόξήμ}\psi = \beta$  καὶ βλέπομεν ὅτι:

$$Z = \alpha - \beta, \quad \eta\mu\alpha = \chi, \quad \eta\mu\beta = \psi,$$

$$\eta\mu Z = \eta\mu\alpha\sigma\upsilon\nu\beta - \sigma\upsilon\nu\alpha\eta\mu\beta = \chi\sqrt{1-\psi^2} - \psi\sqrt{1-\chi^2}.$$

'Εκ ταύτης δὲ εὐρίσκομεν τὸ  $Z$ . Οὕτως, ἂν  $Z = \text{τόξήμ}\frac{2}{5} - \text{τόξήμ}\frac{1}{5}$   
 καὶ θέσωμεν  $\text{τόξήμ}\frac{2}{5} = \chi$ ,  $\text{τόξήμ}\frac{1}{5} = \psi$ , εὐρίσκομεν ὅτι:

$$Z = \chi - \psi, \quad \eta\mu\chi = \frac{2}{5}, \quad \eta\mu\psi = \frac{1}{5},$$

$\eta\mu Z = \eta\mu\chi\sigma\upsilon\eta\psi - \eta\mu\psi\sigma\upsilon\eta\chi = \frac{2}{5}\sqrt{1 - \frac{1}{25}} - \frac{1}{5}\sqrt{1 - \frac{4}{25}}$   
 $= \frac{2}{25}\sqrt{24} - \frac{1}{25}\sqrt{21} = \frac{4}{25}\sqrt{6} - \frac{1}{25}\sqrt{21} = \frac{5,21535}{25} = 0,20861 =$   
 $\eta\mu(12^\circ 2' 26'', 44)$ . Καί επειδή  $0^\circ < \chi - \psi < 90^\circ$ , εκ τῆς ἀνωτέρω  
 ἰσότητος ἐννοοῦμεν ὅτι  $Z = \chi - \psi = 12^\circ 2' 26'', 44$ .

**146. Πρὸ β λ η μ α III. Νὰ εὑρεθῇ ἀριθμὸς  $\chi$  τοιοῦτος, ὥστε  
 νὰ εἶναι τὸξέφ  $\frac{1}{5} + \text{τόξέφ}\chi = \frac{\pi}{4}$ .**

**Λύσις.** Θετομεν  $\text{τόξέφ}\frac{1}{5} = \psi$ ,  $\text{τόξέφ}\chi = Z$  καὶ εὐρίσκομεν  
 $\text{έφ}\psi = \frac{1}{5}$ ,  $\text{έφ}Z = \chi$ . Ἡ δὲ δοθεῖσα ἐξίσωσις γίνεται:  $\psi + Z = \frac{\pi}{4}$ .  
 Ἐκ ταύτης δὲ ἔπεται ὅτι

$$\text{έφ}(\psi + Z) = 1, \quad \frac{\text{έφ}\psi + \text{έφ}Z}{1 - \text{έφ}\psi\text{έφ}Z} = 1 \quad \eta \quad \frac{\frac{1}{5} + \chi}{1 - \frac{\chi}{5}} = 1.$$

Ἐκ ταύτης δὲ εὐρίσκομεν ὅτι:  $\chi = \frac{2}{3}$ .

#### Ἀσκήσεις

433. Νὰ εὑρεθῇ τὸξον  $\chi$  μεταξὺ 0 καὶ  $\frac{\pi}{2}$ , διὰ τὸ ὁποῖον ἀληθεύει ἡ ἐξίσωσις  
 $\text{τόξήμ}0,4 = \chi$  ἢ  $\text{τόξσιν}0,6 = \chi$  ἢ  $\text{τόξέφ}2 = \chi$ .

434. Νὰ εὑρεθῇ ἡ διαφορὰ  $\text{τόξήμ}0,15 - \text{τόξήμ}0,12$  διὰ τὸξα περιεχόμενα με-  
 ταξὺ 0 καὶ  $\frac{\pi}{2}$ .

435. Νὰ εὑρεθῇ ἀριθμὸς τοιοῦτος, ὥστε νὰ εἶναι  $\text{τόξήμ}\chi + 2\text{τόξήμ}\frac{2}{5} =$   
 $\text{τόξήμ}1$ , ἂν τὰ τὸξα ταῦτα δὲν ὑπερβαίνωσι τὸ τὸξον  $\frac{\pi}{2}$ .

436. Νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι διὰ τὸξα περιεχόμενα μεταξὺ 0 καὶ  $\frac{\pi}{2}$  εἶναι

$$\text{τόξήμ}\frac{\mu^2 - \nu^2}{\mu^2 + \nu^2} = \text{τόξσιν}\frac{2\mu\nu}{\mu^2 + \nu^2}.$$

437. Νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι διὰ τὸξα περιεχόμενα μεταξὺ 0 καὶ  $\frac{\pi}{2}$  εἶναι

$$\text{τόξήμ}\sqrt{\frac{\chi}{\chi + \alpha}} = \text{τόξέφ}\sqrt{\frac{\chi}{\alpha}}.$$

438. Νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι:

$$\text{τόξήμ } \frac{1}{4} + \text{τόξήμ } \frac{1}{5} = \text{τόξήμ } \frac{\sqrt{15} + \sqrt{24}}{20}.$$

439. Νά εύρεθῆ ἀριθμὸς  $\chi$  τοιοῦτος, ὥστε νά εἶναι:

$$\text{τόξήμ } \frac{1}{3} + \text{τόξήμ } \chi = \frac{\pi}{4}.$$

440. Νά εύρεθῆ ἀριθμὸς  $\chi$  τοιοῦτος, ὥστε νά εἶναι:

$$\text{τόξήμ } \chi + \text{τόξουν } \sqrt{1 - \chi^2} = 0.$$

441. Ἐάν τόξ ἤμ  $\frac{\chi}{\sqrt{5}}$  + τόξήμ  $\frac{\psi}{\sqrt{5}} = \frac{\pi}{2}$ , νά ἀποδειχθῆ ὅτι:  $\chi^2 + \psi^2 = 5$ .

#### ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΝ

442. Ἐν ὀρθογώνιον τρίγωνον ΑΒΓ ἔχει Β =  $\frac{3\pi}{8}$ . Νά εύρεθῆ εἰς ἀκτίνα τὸ μέτρον ἐκάστης τῶν ἄλλων γωνιῶν αὐτοῦ.

443. Ἡ γωνία τῆς κορυφῆς ἰσοσκελοῦς τριγώνου εἶναι 60°, 54. Νά εύρεθῆ τὸ μέτρον ἐκάστης τῶν ἄλλων γωνιῶν αὐτοῦ.

444. Νά εύρεθῶσιν οἱ τριγωνομετρικοὶ ἀριθμοὶ τοῦ τόξου  $\frac{(4\lambda + 1)\pi}{4}$  κατὰ τὰς διαφόρους ἀκεραίας τιμὰς τοῦ  $\lambda$ .

445. Νά εύρεθῶσιν οἱ τριγωνομετρικοὶ ἀριθμοὶ τῶν τόξων:  $\frac{[(-1)^n \cdot 3 + 1]\pi}{3}$  κατὰ τὰς διαφόρους ἀκεραίας τιμὰς τοῦ  $n$ .

446. Ἡ ἐφαπτομένη τῆς μιᾶς ὀξείας γωνίας ὀρθογωνίου τριγώνου εἶναι τριπλασία τῆς ἐφαπτομένης τῆς ἄλλης. Νά εύρεθῶσιν τὰ μέτρα τῶν ὀξείων τούτων γωνιῶν.

447. Ἐν τρίγωνον ΑΒΓ ἔχει ΑΒ=ΑΓ καὶ εἶναι 2ἤμ2Α =  $\sqrt{3}$ . Νά ὀρισθῶσιν τὰ μέτρα τῶν γωνιῶν αὐτοῦ.

448. Ἐν ὀρθογώνιον τρίγωνον ἔχει  $\alpha = \nu, 4$  μέτ. καὶ Γ = 2Β. Νά ἐπιλυθῆ τοῦτο.

449. Ἐάν  $0^\circ < \tau < 90^\circ$ , νά ἀποδειχθῆ ὅτι ἤμτ =  $\frac{(\chi\sigma\rho\delta\tau)}{2}$ .

450. Ἐκ τῆς Γεωμετρίας γνωρίζομεν ὅτι ἡ πλευρὰ κανονικοῦ δεκαγώνου ἐγγεγραμμένου εἰς κύκλον ἀκτίνας R εἶναι  $\frac{R}{2} (-1 + \sqrt{5})$ . Νά εύρεθῆ τὸ ἤμ  $18^\circ$  καὶ συν  $18^\circ$ .

451. Δύο εὐθεῖαι Οχ καὶ Οψ τέμνονται ὑπὸ γωνίαν  $25^\circ 20'$ . Ἐν ἀνυσμα ΟΑ τοῦ ἀξονος Οψ ἔχει μῆκος 0,15 μέτ. Νά εύρεθῆ τὸ μῆκος τῆς προβολῆς αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ἀξονα Οχ.

452. Ἐν ἀνυσμα ΟΒ ἀξονος Οψ ἔχει μῆκος 0,24 μέτ. καὶ προβολὴν μήκους 0,12 μέτ. ἐπὶ ἄλλον ἀξονα Οχ. Νά εύρεθῆ ἡ γωνία τῶν ἀξόνων τούτων.

453. Νά ὀρισθῶσιν τὰ σημεῖα τριγωνομετρικῆς περιφερείας, εἰς τὰ ὁποῖα πρέπει νὰ λήγῃσι τόξα  $\chi$ , διὰ νά εἶναι  $\epsilon\phi\chi = 4\sigma\phi\chi$ .

454. Νά λυθῶσιν αἱ ἐξισώσεις:

- $\eta\mu(2k\pi + \chi) = \sigma\upsilon\nu\chi$  και  $\acute{\epsilon}\phi[(2k + 1)\pi + \chi] = \sigma\phi\chi$ .
455. Νά λυθῆ ἡ ἔξισῶσις  $\acute{\epsilon}\phi\left(\frac{\pi}{2} + \chi\right) = \sigma\upsilon\nu\chi$ .
456. Νά εὔρεθῆ ἡ τιμὴ τῆς παραστάσεως:  
 $\eta\mu\left(\frac{\pi}{2} + \tau\right) \sigma\upsilon\nu\tau + \sigma\upsilon\nu\left(\frac{\pi}{2} + \tau\right) \eta\mu(-\tau)$ .
457. Νά ἀποδειχθῆ ὅτι:  
 $\acute{\epsilon}\phi\left(\frac{\pi}{2} - \omega\right) \eta\mu\omega + \sigma\phi\left(\frac{\pi}{2} - \omega\right) \sigma\upsilon\nu\omega = \eta\mu\omega + \sigma\upsilon\nu\omega$ .
458. Νά ἀποδειχθῆ ὅτι  $\acute{\epsilon}\phi(270^\circ - \tau) = \sigma\phi\tau$ ,  $\sigma\phi(270^\circ - \tau) = \acute{\epsilon}\phi\tau$ ,  
 $\eta\mu(270^\circ + \tau) = -\sigma\upsilon\nu\tau$ ,  $\sigma\upsilon\nu(270^\circ + \tau) = \eta\mu\tau$ ,  $\eta\mu(270^\circ - \tau) = -\sigma\upsilon\nu\tau$ ,  
 $\sigma\upsilon\nu(270^\circ - \tau) = -\eta\mu\tau$ .
459. Νά εὔρεθῆ ἡ τιμὴ τῆς παραστάσεως:  
 $\eta\mu(270^\circ - \omega) \sigma\upsilon\nu(90^\circ + \omega) - \sigma\upsilon\nu(270^\circ + \omega) \eta\mu(90^\circ - \omega)$ .
460. Νά εὔρεθῆ τὸ ἄθροισμα  $\acute{\epsilon}\phi 282^\circ + \acute{\epsilon}\phi 258^\circ$ .
461. Νά εὔρεθῆ τὸ ἄθροισμα  $\sigma\upsilon\nu \frac{5\pi}{9} + \sigma\upsilon\nu \frac{14\pi}{9}$ .
462. Νά ἀποδειχθῆ ὅτι:  $\sigma\upsilon\nu(\alpha + \beta) \sigma\upsilon\nu(\alpha - \beta) = \sigma\upsilon\nu^2\alpha - \eta\mu^2\beta$ .  
 καὶ ὅτι:  $\eta\mu(\alpha + \beta) \eta\mu(\alpha - \beta) = \eta\mu^2\alpha - \eta\mu^2\beta$ .
463. Ἐὰν  $\alpha + \beta + \gamma = \pi$ , νά ἀποδειχθῆ ὅτι:  
 $\sigma\upsilon\nu^2\alpha + \sigma\upsilon\nu^2\beta + \sigma\upsilon\nu^2\gamma + 2\sigma\upsilon\nu\alpha\sigma\upsilon\nu\beta\sigma\upsilon\nu\gamma = 1$ .
464. Νά ἀποδειχθῆ ὅτι:  $\acute{\epsilon}\phi\left(45^\circ + \frac{\alpha}{2}\right) + \sigma\phi\left(45^\circ + \frac{\alpha}{2}\right) = \frac{2}{\sigma\upsilon\nu\alpha}$ .
465. Νά ἀποδειχθῆ ὅτι  $\acute{\epsilon}\phi^2(45^\circ - \alpha) = \frac{1 - \eta\mu 2\alpha}{1 + \eta\mu 2\alpha}$ .
466. Νά ἀποδειχθῆ ὅτι:  $\frac{\acute{\epsilon}\phi 2\alpha}{1 + \acute{\epsilon}\phi\alpha \cdot \acute{\epsilon}\phi 2\alpha} = \eta\mu 2\alpha$ .
467. Νά ἀποδειχθῆ ὅτι  $\acute{\epsilon}\phi \frac{\omega}{2} = \frac{-1 \pm \sqrt{1 + \acute{\epsilon}\phi^2\omega}}{\acute{\epsilon}\phi\omega}$ .
468. Νά ἀπλοποιηθῆ ἡ παράστασις  $\frac{\eta\mu\alpha + \eta\mu 3\alpha + \eta\mu 5\alpha}{\sigma\upsilon\nu\alpha + \sigma\upsilon\nu 3\alpha + \sigma\upsilon\nu 5\alpha}$ .
469. Νά γίνῃ λογιστῆ διὰ τῶν λογαριθμῶν ἡ παράστασις:  
 $1 + \acute{\epsilon}\phi^2\tau$  καὶ ἡ παράστασις  $\frac{\eta\mu^2\alpha - \eta\mu^2\beta}{(\sigma\upsilon\nu\alpha + \sigma\upsilon\nu\beta)^2}$ .
470. Νά γίνῃ λογιστῆ διὰ τῶν λογαριθμῶν ἡ παράστασις  $\sigma\phi^2\alpha - \acute{\epsilon}\phi^2\alpha$ .
471. Νά γίνῃ γινόμενον ἡ παράστασις  $(\eta\mu A + \eta\mu B)^2 + (\sigma\upsilon\nu A + \sigma\upsilon\nu B)^2$ .
472. Νά ἀποδειχθῆ ὅτι  $\frac{2\eta\mu\alpha - \eta\mu 2\alpha}{2\eta\mu\alpha + \eta\mu 2\alpha} = \acute{\epsilon}\phi^2\left(\frac{\alpha}{2}\right)$ .
473. Νά ἀποδειχθῆ ὅτι:  
 $\frac{1}{\sigma\upsilon\nu\alpha} + \frac{1}{\eta\mu\alpha} = \frac{2\sqrt{2}\sigma\upsilon\nu(45^\circ - \alpha)}{\eta\mu 2\alpha} = \frac{2\sqrt{2}\eta\mu(45^\circ + \alpha)}{\eta\mu 2\alpha}$ .
474. Νά εὔρεθῆ ἡ τιμὴ ἐκάστης τῶν παραστάσεων:

$$1 \pm \epsilon\phi 5^{\circ} \text{ και } \tau\eta\varsigma \frac{\epsilon\phi 42^{\circ} + \epsilon\phi 25^{\circ}}{\sigma\phi 42^{\circ} + \sigma\phi 25^{\circ}}$$

475. Νά λυθώσιν αἱ ἐξισώσεις:  $\sigma\phi\chi = \frac{1}{2}$ ,  $\eta\mu\chi = -\frac{5}{6}$ ,  $\sigma\upsilon\nu\chi = -\frac{6}{10}$ .

476. Νά ὑπολογισθῶσιν αἱ παραστάσεις:

$$\frac{\eta\mu(80^{\circ} 15') - \eta\mu(48^{\circ} 25')}{\eta\mu(80^{\circ} 15') + \eta\mu(48^{\circ} 25')} \text{ και } \frac{1 + \eta\mu(48^{\circ} 15' 30'')}{1 - \eta\mu(48^{\circ} 15' 30'')}.$$

477. Νά ἀποδειχθῆ ὅτι διὰ πᾶν ὀρθογώνιον τρίγωνον εἶναι:

$$\epsilon\phi \frac{B}{2} = \frac{\beta}{\alpha + \gamma}.$$

478. Νά ἀποδειχθῆ ὅτι διὰ πᾶν ὀρθογώνιον τρίγωνον εἶναι :

$$\epsilon\phi 2B = \frac{2\beta\gamma}{\gamma^2 - \beta^2}.$$

479. Νά ἀποδειχθῆ ὅτι διὰ πᾶν ὀρθογώνιον τρίγωνον εἶναι :

$$\sigma\upsilon\nu(B - \Gamma) = \frac{2\beta\gamma}{\alpha^2}.$$

480. Νά ἀποδειχθῆ ὅτι διὰ πᾶν ὀρθογώνιον τρίγωνον εἶναι :

$$\sigma\upsilon\nu 2B = \frac{\gamma^2 - \beta^2}{\alpha^2}.$$

481. Νά ἀποδειχθῆ ὅτι διὰ πᾶν ὀρθογώνιον τρίγωνον εἶναι :

$$E = \frac{1}{4} \alpha^2 \eta\mu(2B).$$

482. Εὐθύγραμμον τμήμα σιδηροδρομικῆς γραμμῆς ΒΓ σχηματίζει γωνίαν  $20^{\circ}$  μὲ τὸ ὀριζόντιον ἐπίπεδον, τὸ ὁποῖον διέρχεται ἀπὸ τὸ κατώτερον ἄκρον Β αὐτῆς. Μία ἀμαξοστοιχία διανύει αὐτὸ εἰς 3' πρῶτα λεπτά μὲ ταχύτητα 40 χιλιόμετρον τὴν ὥραν. Νά εὐρεθῆ τὸ ὕψος τοῦ ἄκρου Γ ἀπὸ τὸ ὀριζόντιον ἐκεῖνο ἐπίπεδον.

483. Ἡ Μηχανικὴ διδάσκει ὅτι ἐν σῶμα διανύει διάστημα  $\frac{1}{2} \gamma t^2$  εἰς  $t$  δεῦτερα λεπτά ἐπὶ κεκλιμένου ἐπιπέδου κλίσεως  $\omega$  καὶ ὅτι  $\gamma = 981$  ἠμω δακτύλους. Νά εὐρεθῆ τὸ ὕψος κεκλιμένου ἐπιπέδου κλίσεως  $29^{\circ} 25'$ , ἂν τοῦτο διανύηται εἰς 2 δευτερόλεπτα ὑπὸ τίνος σώματος.

484. Ἐν τρίγωνον ΑΒΓ ἔχει  $A = 30^{\circ}$ ,  $B = 135^{\circ}$ ,  $\gamma = 80$  ἑκατ. Νά εὐρεθῆ τὸ ὕψος (ΓΔ) αὐτοῦ.

485. Ἐν τρίγωνον ΑΒΓ ἔχει  $B = 60^{\circ}$ ,  $\Gamma = 45^{\circ}$  καὶ ὕψος (ΑΔ) = 5 μέτ. Νά ἐπιλυθῆ τοῦτο.

486. Μία πλευρὰ στέγης, εἶναι τριγωνικὴ μὲ κλίσιν  $25^{\circ}$ . Ἡ βᾶσις αὐτῆς ἔχει μῆκος 4,30 μέτ. καὶ εἶναι ὀριζόντιος. Ἡ δὲ κορυφὴ ἀπέχει 1,80 μέτ. ἀπὸ τὸ ὀριζόντιον ἐπίπεδον τῆς βάσεως. Νά εὐρεθῆ τὸ ἔμβαδὸν τῆς πλευρᾶς ταύτης τῆς στέγης.

487. Νά εὐρεθῆ τὸ ὕψος τοῦ Ἡλίου τὴν στιγμὴν, κατὰ τὴν ὁποίαν μία κατακόρυφος ράβδος μήκους 2,15 μέτ. ρίπτει ἐπὶ ὀριζοντίου ἐδάφους σκιὰν 6,45 μέτ.

488. Μία κλίμαξ ἔχει 10 βαθμίδας. Ἐκάστη τούτων ἔχει πλάτος 0,30 μέτ. καὶ ἀπέχει ἀπὸ τὴν ὑπερκειμένην 0,18 μέτ. Νά εὐρεθῆ ἡ κλίσις τῆς κλίμακος ταύτης πρὸς τὸ ὀριζόντιον ἐπίπεδον.

489. Έν κεκλιμένον οικόπεδον ἔχει σχῆμα ὀρθογωνίου ΑΒΓΔ μὲ διαστάσεις (ΑΒ) = 25 μέτ., (ΑΔ) = 15 μέτ. Ἡ βάσις ΑΒ αὐτοῦ εἶναι ὀριζόντιος, ἡ δὲ ἀπέναντι πλευρὰ ΓΔ κείται 9 μέτ. Ὑψηλότερον τοῦ ὀριζοντίου ἐπιπέδου, τὸ ὅποιον διέρχεται διὰ τῆς βάσεως. Νὰ εὐρεθῆ ἡ κλίσις τοῦ οἰκοπέδου τούτου.

490. Νὰ ἀποδειχθῆ ὅτι διὰ πᾶν τρίγωνον ΑΒΓ εἶναι:

$$\frac{\beta + \gamma}{\alpha} = \frac{\text{συν}\left(\frac{B - \Gamma}{2}\right)}{\eta\mu\frac{A}{2}}$$

491. Νὰ ἀποδειχθῆ ὅτι διὰ πᾶν τρίγωνον εἶναι :

$$\frac{\eta\mu(A - B)}{\eta\mu(A + B)} = \frac{\alpha^2 - \beta^2}{\gamma^2}$$

492. Νὰ γίνῃ λογιστὸν διὰ τῶν λογαρίθμων τὸ ἄθροισμα:  
 $\eta\mu 2A + \eta\mu 2B + \eta\mu 2\Gamma$ , ἂν Α, Β, Γ, εἶναι γωνίαι τοῦ αὐτοῦ τριγώνου.

493. Νὰ ἀποδειχθῆ ὅτι διὰ πᾶν τρίγωνον ΑΒΓ εἶναι:

$$\beta \text{συν}B + \gamma \text{συν}B = \alpha \text{συν}(B - \Gamma)$$

494. Ἐὰν  $\eta\mu A = 2\eta\mu B \text{συν} \Gamma$ , νὰ ἀποδειχθῆ ὅτι τὸ τρίγωνον ΑΒΓ εἶναι ἰσοσκελές.

495. Νὰ εὐρεθῶσι τὰ μέτρα τῶν γωνιῶν ἰσοσκελοῦς τριγώνου, τὸ ὅποιον ἔχει βάσιν ἴσην πρὸς τὸ ἡμισυ μιᾶς ἄλλης πλευρᾶς αὐτοῦ.

496. Νὰ ἀποδειχθῆ ὅτι τὸ ἔμβαδὸν παραλληλογράμμου εἶναι γινόμενον δύο προσκειμένων πλευρῶν ἐπὶ τὸ ἡμίτονον τῆς γωνίας αὐτῶν.

497. Εἰς κύκλον ἀκτίως 8 μέτρ. εἶναι ἐγγεγραμμένον τρίγωνον ΑΒΓ, τὸ ὅποιον ἔχει Α = 35° 15', Β = 75° 30'. Νὰ ὑπολογισθῶσι τὰ μήκη τῶν πλευρῶν καὶ τὸ ἔμβαδὸν αὐτοῦ.

498. Τὰ μήκη τῶν πλευρῶν τῆς καθέτου τομῆς πλαγίου τριγωνικοῦ πρίσματος εἶναι 20, 16, 12 ἑκατ. Νὰ ὑπολογισθῶσι τὰ μέτρα τῶν διέδρων γωνιῶν, τὰς ὁποίας σχηματίζουν αἱ τετράπλευροι ἕδραι τοῦ πρίσματος τούτου.

499. Νὰ ἀποδειχθῆ ὅτι τὸ ἔμβαδὸν τῆς ὀρθῆς προβολῆς ἑνὸς τριγώνου ἐπὶ ἐπίπεδον εἶναι γινόμενον τοῦ ἔμβαδου τοῦ τριγώνου τούτου ἐπὶ τὸ συνημίτονον τῆς κλίσεως τοῦ τριγώνου πρὸς τὸ προβολικὸν ἐπίπεδον. Νὰ ἐξετασθῆ, ἂν ἀληθεύῃ ἡ ἰδιότης αὕτη καὶ διὰ πᾶν ἄλλο εὐθύγ σχῆμα.

500. Ἡ ἀκμὴ κανονικοῦ τετραέδρου ΚΑΒ ἔχει μήκος α μέτ. Νὰ ὑπολογισθῆ τὸ μέτρον τῆς γωνίας, τὴν ὁποίαν σχηματίζει ἡ ἀκμὴ ΚΑ μὲ τὴν ἕδραν ΑΒΓ.

501. Εἰς τρίγωνον ΑΒΓ εἶναι Β = 90° + Γ. Νὰ ἀποδειχθῆ ὅτι  $\beta^2 + \gamma^2 = 4R^2$ .

502. Νὰ λυθῆ τὸ σύστημα  $\theta \epsilon \phi \chi + \epsilon \phi \psi = 4$ ,  $2 \sigma \phi \chi + 4 \sigma \phi \psi = 1$ .

503. Νὰ λυθῆ ἡ ἐξίσωσις  $\epsilon \phi 2\chi = -3 \epsilon \phi \chi$ .

504. Ἐν ἀπλοῦν ἑκρεμῆς ἔχει μήκος 0,50 μέτ. καὶ ἀπομακρύνεται τῆς κατακόρυφου ΟΑ κατὰ γωνίαν 2° 10' εἰς νέαν θέσιν ΟΒ. Νὰ εὐρεθῆ ἡ κατακόρυφος ἀπόστασις τῶν θέσεων Α καὶ Β τοῦ σφαιριδίου.

505. Φωτεινὴ ἀκτίς προσπίπτει ἐπὶ ὀριζοντίου ἐπιπέδου κατόπρου καὶ μετὰ τὴν ἀνάκλασιν εἰσέρχεται εἰς τὸν ὀφθαλμὸν παρατηρητοῦ. Ὁ ὀφθαλμὸς

οὔτος ἀπέχει 0,38 μέτ. ἀπὸ τὸ κάτοπτρον, ἡ δὲ ἐπ' αὐτὸ προβολὴ τοῦ ἀπέχει 0,15 μέτ. ἀπὸ τὸ σημεῖον προσπίπτουσας τῆς φωτεινῆς ἀκτίνος. Νὰ εὑρεθῇ τὸ μέτρον τῆς γωνίας τῆς προσπίπτουσας τῆς φωτεινῆς ἀκτίνος.

506. Γνωρίζομεν ὅτι ὁ δείκτης διαθλάσεως ἀπεσταγμένου ὕδατος  $4^\circ\text{K}$  πρὸς τὸν ἀέρα εἶναι  $\frac{4}{3}$ . Φωτεινὴ ἀκτὶς εἰσδύει ἐκ τοῦ ἀέρος εἰς τοιοῦτον ὕδωρ προσπίπτουσα εἰς τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ ὑπὸ γωνίαν  $38^\circ 12'$ . Νὰ εὑρεθῇ ἡ γωνία τῆς διαθλάσεως αὐτῆς.

507. Ἡ διαθλαστικὴ γωνία διαφανοῦς τριγωνικοῦ πρίσματος εἶναι  $90^\circ$ . Φωτεινὴ μονόχρους ἀκτὶς προσπίπτουσα ἐπὶ τῆς μιᾶς ἕδρας αὐτοῦ ὑπὸ γωνίαν  $60^\circ$  ἐξέρχεται διὰ τῆς ἄλλης ἕδρας ὑπὸ γωνίαν διαθλάσεως  $60^\circ$ . Νὰ εὑρεθῇ ὁ δείκτης διαθλάσεως τῆς ὕλης τοῦ πρίσματος πρὸς τὸν ἀέρα.

508. Ἡ ἀκτὶς ἐνὸς παραλλήλου τῆς  $\Gamma\eta$ ς εἶναι τὰ  $\frac{2}{3}$  τῆς ἀκτίνος τῆς  $\Gamma\eta$ ς ὑποτιθεμένης σφαιρικῆς. Νὰ εὑρεθῇ τὸ γεωγραφικὸν πλάτος τοῦ παραλλήλου τούτου.

509. Πλοῖον Π πλέον πρὸς τὰ Ν-Α ἐφάνη κατὰ τινα στιγμήν ἐκ σημείου Ο τῆς ἀκτῆς πρὸς τὰ Ν-Δ καὶ εἰς ἀπόστασιν (ΟΠ) = 30 χιλιομ. Μετὰ ἰσοταχῆ πλοῦν 3 ὥρων, ἐφάνη πρὸς νότον εἰς θέσιν Π'. Νὰ εὑρεθῇ ἡ ταχύτης τοῦ πλοίου καὶ ἡ ἀπόστασις (ΟΠ').

510. Παρατηρητῆς ὕψους 1,65 μέτ. ἰστάμενος εἰς τὴν ὄχθην λίμνης εἶδε κατὰ τινα στιγμήν ἀεροπλάνον εἰς ὕψος  $44^\circ 30'$  ὑπὲρ τὸ ὀριζόντιον ἐπίπεδον τοῦ ὀφθαλμοῦ του. Τὴν αὐτὴν δὲ στιγμήν εἶδε τὸ εἶδωλον τοῦ ἀεροπλάνου ἐντὸς τῆς λίμνης εἰς βάθος  $45^\circ 30'$  ὑπὸ τὸ ὀριζόντιον ἐπίπεδον. Νὰ εὑρεθῇ τὸ ὕψος τοῦ ἀεροπλάνου τὴν στιγμήν ἐκείνην.

511. Νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι  $\alpha + \beta$  τὸς  $\alpha + \beta$   $\frac{\alpha + \beta}{1 - \alpha\beta}$ , ἂν τὰ ἐν αὐτῇ ἀναφερόμενα τόσα περιέχωνται μεταξὺ 0 καὶ  $\frac{\pi}{2}$ .

512. Ἐὰν  $\eta\mu A = \eta\mu B$  καὶ  $\sigma\upsilon\nu A = \sigma\upsilon\nu B$ , νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι:  $A - B = 2k\pi$ , ἂν  $k$  εἶναι μηδὲν ἢ τυχῶν ἀκέραιος ἀριθμὸς.

513. Νὰ ἀπαλειφθῇ τὸ τόξον  $\omega$  μεταξὺ τῶν ἐξισώσεων:

$$\chi = \alpha\sigma\upsilon\nu\omega, \quad \psi = \beta\eta\mu\omega.$$

514. Νὰ ἀπαλειφθῇ τὸ τόξον  $\omega$  μεταξὺ τῶν ἐξισώσεων:  $\chi\sigma\upsilon\nu\omega = \alpha$   $\psi\eta\mu\omega = \beta$ . Ἐπειτα δὲ μεταξὺ τῶν ἐξισώσεων:  $\chi = \alpha\sigma\upsilon\nu^3\omega$ ,  $\psi = \beta\eta\mu^3\omega$ .

515. Ἐὰν εἶναι  $\eta\mu A + \eta\mu B = \eta\mu A\eta\mu B$ , νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι:

$$\left( \sigma\upsilon\nu \frac{A-B}{2} - \eta\mu \frac{A+B}{2} \right)^2 = 1.$$

516. Ἐὰν  $AD$  εἶναι ἡ διχοτόμος τῆς γωνίας  $A$  ἐνὸς τριγώνου  $AB\Gamma$ , νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι  $(BD) : (D\Gamma) = \eta\mu\Gamma : \eta\mu B$ .

517. Ἐὰν ἐν τριγώνου  $AB\Gamma$  ἔχη  $A = \frac{\pi}{3}$ , νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι:  $\alpha^2 = \beta^2 + \gamma^2 - \beta\gamma$ ,

Αν δὲ  $A = \frac{2\pi}{3}$ , νὰ ἀποδειχθῆ ὅτι  $a^2 = \beta^2 + \gamma^2 + \gamma\beta$ .

518. Ἐν ὀρθογώνιον τρίγωνον ἔχει  $B = 25^\circ 30'$  καὶ τὸ ἐπὶ τὴν ὑποτείνουσαν ὕψος (ΑΔ) = 20 μέτ. Νὰ ἐπιλυθῆ τοῦτο.

519. Ἐν ὀρθογώνιον τρίγωνον ἔχει ὑποτείνουσαν  $\alpha = 10$  μέτ. καὶ  $\beta + \gamma = 12$  μέτ. Νὰ ἐπιλυθῆ τοῦτο.

520. Ἐν τρίγωνον ΑΒΓ ἔχει  $2\tau = 35$  μέτ,  $B = 45^\circ$ ,  $\Gamma = 30^\circ$ . Νὰ ἐπιλυθῆ τοῦτο.

521. Μία κανονικὴ πυραμὶς ἔχει βάσιν τετράγωνον μὲ πλευρὰν 12 ἑκάτ. Ἐκάστη δὲ πλευρὰ τῆς πυραμίδος εἶναι 20 ἑκάτ. Νὰ εὑρεθῇ ἡ κλίσις ἐκάστης παραπλεύρου ἕδρας πρὸς τὴν βάσιν.

## ΕΠΙΛΟΓΟΣ

### 147. Ἡ τριγωνομετρία ἐν σχέσει πρὸς τὴν Γεωμετρίαν καὶ τὴν Ἀλγεβραν.

α') Ἀπὸ τὴν μελέτην τοῦ στοιχειώδους τούτου βιβλίου Τριγωνομετρίας ἐμάθομεν ὅτι ἡ Τριγωνομετρία ἔχει ὡς κύριον σκοπὸν τὸν ὑπολογισμὸν τῶν ἀγνώστων στοιχείων τριγώνου ἐξ ἐπαρκῶν δεδομένων εἰς ὅλας τὰς περιπτώσεις.

Ἐπιτυγχάνει δὲ τὴν ἐκπλήρωσιν τοῦ σκοποῦ τούτου διὰ τῆς ἐπινοήσεως τῶν τριγωνομετρικῶν ἀριθμῶν γωνίας, δι' ὧν κατορθώνει νὰ εὐρίσκη σχέσεις καὶ μεταξὺ ἑτεροειδῶν στοιχείων τῶν τριγώνων, π.χ. μεταξὺ πλευρῶν καὶ γωνιῶν κτλ.

Καὶ ἡ Γεωμετρία διδάσκει σχέσεις μεταξὺ τῶν στοιχείων τριγώνου, ἀλλὰ ἐκάστη τοιαύτη σχέση συνδέει ὁμοειδῆ στοιχεῖα, π.χ.  $A+B+\Gamma = 180^\circ$ ,  $\alpha^2 = \beta^2 + \gamma^2$ . Κατὰ τοῦτο λοιπὸν ἡ Τριγωνομετρία ὑπερέχει τῆς Γεωμετρίας καὶ εἰς τοῦτο ἀκριβῶς ὀφείλεται ἡ ἐπιτυχία τοῦ σκοποῦ τῆς Τριγωνομετρίας.

Ἀλλὰ διὰ τὴν ἐπινοήσιν τῶν τριγωνομετρικῶν ἀριθμῶν τῶν γωνιῶν ἡ Τριγωνομετρία ἀναχωρεῖ ἀπὸ γεωμετρικῶν ἀληθειῶν. Πολλάκις δὲ διὰ τὴν ἀνεύρεσιν σχέσεων μεταξὺ τριγωνομετρικῶν ἀριθμῶν τῶν γωνιῶν τριγώνου καὶ ἄλλων στοιχείων αὐτοῦ χρησιμοποιῶμεν γεωμετρικὰς γνώσεις. Οὕτω διὰ τὴν ἀνεύρεσιν τῆς ἰσότητος  $\alpha^2 = \beta^2 + \gamma^2 - 2\beta\gamma\sigmaυνA$  στηρίζεται ἐπὶ τῆς γενικεύσεως τοῦ Πυθαγορείου θεωρήματος, τὴν ὁποίαν δανείζεται ἀπὸ τὴν Γεωμετρίαν.

Ἀλλὰ καὶ ἀματαβλήτους γεωμετρικὰς ἀληθείας χρησιμοποιεῖ ἡ Τριγωνομετρία διὰ τὴν ἀποπεράτωσιν τοῦ σκοποῦ τῆς εἰς διαφοροὺς περιπτώσεις. Π.χ. διὰ τὴν ἐπίλυσιν ὀρθογωνίου τριγώνου ἐκ τῶν πλευρῶν  $\alpha$  καὶ  $\beta$  πλὴν τῆς τριγωνομετρικῆς σχέσεως  $\beta = \alpha\eta\mu B$ , χρησιμοποιεῖ καὶ τὰς γεωμετρικὰς σχέσεις  $B+\Gamma = 90^\circ$ ,  $\alpha^2 = \beta^2 + \gamma^2$  καὶ  $E = \frac{1}{2}\beta\gamma$ . Δυνάμεθα λοιπὸν νὰ εἴπωμεν ὅτι ἡ Τριγωνομετρία εἶναι ἐπέκτασις τῆς Γεωμετρίας, τὴν ὁποίαν συμπληρώνει συντελοῦσα οὕτως εἰς τὴν λύσιν ζητημάτων, τὰ ὁποῖα ἡ Γεωμετρία ἤδυσ-

νάται νά λύση άνευ τῆς ἐπεκτάσεώς ταύτης. Ἡ ἐπέκτασις δὲ αὕτη εἶναι φυσικὸν νά συντελῆ εἰς τὴν ἐπέκτασιν καὶ τοῦ κύκλου τῶν ἐφαρμογῶν. Οὕτω δὲ ἡ Τριγωνομετρία εὐρίσκει πολλαπλᾶς ἐφαρμογὰς οὐ μόνον εἰς καθαρῶς γεωμετρικὰ ζητήματα, ἀλλὰ καὶ εἰς ὅλας τὰς ἐφηρμοσμένας ἐπιστήμας, π.χ. τὴν Φυσικὴν, Μηχανικὴν, Γεωδαισίαν, Ἀστρονομίαν.

β') Οἱ τριγωνομετρικοὶ ἀριθμοὶ εἶναι ἀλγεβρικοὶ ἀριθμοί. Αἱ σχέσεις λοιπὸν μεταξὺ πλευρῶν τριγώνου καὶ γωνιῶν αὐτοῦ εἶναι ἀλγεβρικαὶ σχέσεις. Διὰ τοῦτο πολλοὶ ἀπὸ τοὺς μετασχηματισμοὺς αὐτῶν γίνονται κατὰ κανόνας τοῦ ἀλγεβρικοῦ λογισμοῦ. Ὡστε ἡ Τριγωνομετρία χρησιμοποιεῖ καὶ τὰς ἀναγκαίας εἰς αὐτὴν ἀλγεβρικὰς γνώσεις. Ἀπὸ τῆς ἀπόψεως δὲ ταύτης ἡ Τριγωνομετρία ἀποτελεῖ ἐφαρμογὴν τῆς Ἀλγέβρας.


**184. Σύντομος ἱστορικὴ ἐξέλιξις τῆς τριγωνομετρίας.** Εἶδομεν προηγουμένως ὅτι ἡ Τριγωνομετρία ἐφαρμόζεται πλὴν ἄλλων καὶ εἰς τὴν Ἀστρονομίαν. Ἡ σπουδὴ μάλιστα τῆς Ἀστρονομίας ὑπήρξεν ἡ πρώτη ἀφορμὴ τῆς δημιουργίας τῆς Τριγωνομετρίας.

Οὕτως οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες ἀστρονόμοι **Ἀρίσταρχος** (3ος αἰὼν π.Χ.) καὶ **Εὐδοξος** (400 π.Χ.), ἀναφέρονται ὡς ἀσχοληθέντες μετὰ τριγωνομετρικὰ ζητήματα τῆς σφαιρικῆς ἰδίᾳ Τριγωνομετρίας, ζητήματα χρήσιμα εἰς αὐτοὺς διὰ τὰς ἀστρονομικὰς ἐργασίας των. Ὑπάρχει μάλιστα καὶ γνώμη ὅτι πρῶτος ὁ Εὐδοξος συνέταξε τριγωνομετρικὸν πῖνακα.

Μετ' αὐτοὺς πρῶτος ὁ μέγιστος ἀστρονόμος τῆς ἀρχαιότητος **Ἰππάρχος** (2ος αἰὼν π.Χ.) μετεχειρίσθη τριγωνομετρικὰς μεθόδους κατὰ τοὺς πολυαριθμοὺς ὑπολογισμοὺς, εἰς τοὺς ὁποίους ἦγον αὐτὸν αἱ ἀστρονομικαὶ ἀσχολίαι του.

Εἰς τὸν Ἰππάρχον ἀποδίδεται μία πραγματεία «**Περὶ τῶν χορδῶν τῶν τόξων κύκλου**», εἰς 12 βιβλία. Αὕτη κατ' οὐσίαν εἶναι τριγωνομετρικὴ πραγματεία, διότι οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες μετεχειρίζοντο τὰς χορδὰς τῶν διπλασίων τόξων, ἤτοι διπλᾶ ἡμίτονα τῶν ἡμίσεων τῶν τόξων.

Ὁ **Πτολεμαῖος** (2ος αἰὼν μ.Χ.) εἰς τὴν **Μαθηματικὴν Σύνταξιν** ἀναγράφει πῖνακα τῶν μηκῶν τῶν χορδῶν τούτων ἀνά 15'.



### ΙΠΠΑΡΧΟΣ

Μέγας Έλληνα άστρονόμος. Έγεννήθη έν Νικαία της Βιθυνίας, άλλ' έξετέλει τās παρατηρήσεις του εις την νήσον Ρόδον. Διά τούτο δέ έθεωρήθη ώς καταγόμενος εκ Δωδεκανήσου.

Ὁ πίναξ οὗτος ἀποδίδεται ὑπὸ τινων εἰς τὸν Ἴππαρχον. Εἰς τὸ αὐτὸ ἔργον τοῦ Πτολεμαίου εὐρίσκεται ἡ πρώτη διασωθεῖσα μέχρις ἡμῶν τριγωνομετρικὴ πραγματεία.

Καὶ ὁ Ἀλεξανδρινὸς μαθηματικὸς **Μενέλαος** (1ος αἰὼν μ.Χ.) φέρεται ἀσχοληθεῖς εἰς ζητήματα σφαιρικῆς Τριγωνομετρίας δι' ἀστρονομικοὺς ἐπίσης σκοποὺς.

Ἡ ἀντικατάστασις τῶν χορδῶν διὰ τῶν ἡμιτόνων ἐγένετο κατ' ἄλλους μὲν τὸν 15ον αἰῶνα μ.Χ. ὑπὸ τοῦ Βαυαροῦ **Purbach**, κατ' ἄλλους δὲ 5 αἰῶνας ἐνωρίτερον ὑπὸ τοῦ Πρίγκιπος τῆς Συρίας **Mohamet-ben-Geber**, ὅστις εἶναι γνωστὸς μὲ τὸ λατινικὸν ὄνομα **Albatégnius**.

Ὁ **Purbach** συνέταξε τὸν πρῶτον ἐν Εὐρώπῃ τριγωνομετρικὸν πίνακα. Τὸν πίνακα τοῦτον ἐτελειοποίησεν ὁ Γερμανὸς ἀστρονόμος **Jean Muller** (1436 - 1476 μ.Χ.), ὁ ἐπονομαζόμενος **Regiomontanus**. Οὗτος εἰσήγαγε καὶ τὴν χρῆσιν τῆς ἐφαπτομένης καταρτίσας καὶ σχετικὸν πίνακα διὰ τὴν εὐκολίαν τῶν πολυαριθμῶν ὑπολογισμῶν, εἰς τοὺς ὁποίους μετεχειρίζετο αὐτὴν.

Αἱ τριγωνομετρικαὶ ἐργασίαι αὐτοῦ μόλις κατὰ τὸ ἔτος 1539 ἐδημοσιεύθησαν μὲ τὸν τίτλον «**Περὶ παντοειδῶν τριγῶνων**» εἰς 5 βιβλία. Ἦτο δὲ ἡ πραγματεία αὕτη μία πλήρης Τριγωνομετρία.

Σπουδαιοτάτην ὠθησιν εἰς τὴν περαιτέρω ἀνάπτυξιν καὶ διαμόρφωσιν τῆς Τριγωνομετρίας ἔδωσεν ὁ Γάλλος **Francois Viète** (1540 - 1603 μ.Χ.). Οὗτος διὰ τῆς ἀγχινοίας του διείδε τὸ ἐσφαλμένον τοῦ Πτολεμαϊκοῦ συστήματος καὶ ἐπεχείρησε νὰ ἀντικαταστήσῃ αὐτό. Ἐδημοσίευσεν λοιπὸν ἓν ἔργον ὑπὸ τὸν τίτλον «**Harmonicum Celesten**», τὸ ὁποῖον θεωρεῖται σήμερον πεπλανημένον. Διὰ νὰ φθάσῃ ὁμως ὁ συγγραφεὺς εἰς τὸν ἐπιδιωκόμενον σκοπὸν ἔπρεπε πρὸ πάσης ἄλλης ἐργασίας νὰ ἀναμορφώσῃ τὴν Τριγωνομετρίαν. Οὕτω κατὰ τὸ 1579 ἐδημοσίευσεν ἓν ἔργον ὑπὸ τὸν τίτλον «**Μαθηματικὸς Κανῶν**». Εἰς αὐτὸ περιέχονται πίνακες ἐκτενέστεροι τῶν ἕως τότε ὑπαρχόντων καὶ κατάλληλοι κανόνες διὰ τὴν ἐπίλυσιν τῶν τριγῶνων. Οἱ πίνακες τοῦ ἔργου τούτου διὰ πρῶτην φορὰν περιέχουσι τοὺς τριγωνομετρικοὺς ἀριθμοὺς τῶν γωνιῶν ἀνὰ λεπτόν. Εἰς ἄλλο ἔργον βραδύτερον ἀπέδειξε τύπους διὰ τὴν λύσιν τῶν ἐπιπέδων καὶ σφαιρικῶν τριγῶνων μὲ πολυἀριθμα ἀριθμητικὰ παραδείγματα.



FRANÇOIS VIÈTE

Ὁ **Viète** ἀπῆλλαξε τὴν Τριγωνομετρίαν σχοινοτενῶν ἐκφωνήσεων καὶ ἀπέδειξε τύπους γενικοὺς καὶ συντόμους, οἱ ὅποιοι καὶ ἤδη χρησιμοποιοῦνται. Ἰδιαιτέρως δὲ ἡ σφαιρική Τριγωνομετρία τὰ μέγιστα ὠφελήθη ἐκ τῶν ἐργασιῶν τοῦ **Viète**.

Εἰς νεώτερον τρίτον ἔργον του ἔδωκε νέους τύπους, ὑπελόγησε τὸ  $\eta\mu(\nu\chi)$ ,  $\sigma\upsilon\nu(\nu\chi)$ ,  $\epsilon\phi(\nu\chi)$  συναρτήσῃ ἀντιστοιχῶς τοῦ  $\eta\mu\chi$ ,  $\sigma\upsilon\nu\chi$ ,  $\epsilon\phi\chi$  καὶ ἔφθασεν εἰς τὴν γενικὴν ἐξίσωσιν τῆς χορδῆς τόξου  $\nu\chi$  συναρτήσῃ τῆς χορδῆς τόξου  $\chi$ .

Εἶναι ὅθεν ἐκ τούτων φανερὸν ὅτι ὁ **Viète** ἀνεμόρφωσε τελείως τὴν Τριγωνομετρίαν τῆς ἐποχῆς του.

Ἐπικαίρουν δὲ θεωροῦμεν νὰ προσθέσωμεν ὅτι ὁ **Viète** εἶναι πατήρ τῆς νεωτέρας Ἀλγέβρας, διότι αὐτὸς εἰσήγαγεν εἰς αὐτὴν τὴν χρῆσιν τῶν γραμμάτων.

Κατὰ τὸ 1610 ὁ **Barthélemy Pitiseus** ἐξέδωκε πίνακα τῶν τριγωνομετρικῶν ἀριθμῶν τῶν τόξων ἀνὰ 10'' καὶ μὲ 16 δεκαδικὰ ψηφία. Ὁ πίναξ οὗτος θεωρεῖται ὡς ἐν τῶν ἀξιοθαυμάστων μνημείων τῆς ἀνθρωπίνης ὑπομονῆς. Χρησιμεύει δὲ οὗτος καὶ σήμερον ἀκόμη διὰ τὸν ἔλεγχον τῶν συνήθων πινάκων.

Εὐθύς δὲ ὡς ἐπενοήθησαν οἱ λογάριθμοι, ἐφηρμόσθησαν καὶ εἰς τοὺς τριγωνομετρικοὺς ὑπολογισμούς. Κατὰ δὲ τὸ ἔτος 1626 μ.Χ. ἐξεδόθησαν εἰς Παρισίους οἱ πρῶτοι λογαριθμικοὶ πίνακες μὲ 7 δεκαδικὰ ψηφία.

Κατὰ τὰς ἀρχὰς τοῦ 17ου αἰῶνος ὁ Ὀλλανδὸς γεωμέτρης **Snel-lius** ὑπέδειξε καὶ πρῶτος ἐφήρμοσε μέθοδον διὰ τὴν μέτρησιν μεσημβρινοῦ τόξου. Αὕτη εἶναι γνωστὴ μὲ τὸ ὄνομα **Τριγωνισμὸς** καὶ ἀποτελεῖ μίαν τῶν ἀξιοθαυμάστων ἐφαρμογῶν τῆς Τριγωνομετρίας. Ἄνευ αὐτῆς καὶ τῶν ἀκριβῶν ἀποτελεσμάτων τῆς ἐφαρμογῆς τῆς ὑπὸ τοῦ Γάλλου **Picard**, ἴσως ὁ Νεύτων δὲν θὰ ἔφθανεν εἰς τὸν νόμον τῆς παγκοσμίου ἑλξεως.

Βραδύτερον μὲ τὴν τεραστίαν ἀνάπτυξιν τῆς Μαθηματικῆς Ἀναλύσεως καὶ τὴν ἐφαρμογὴν αὐτῆς εἰς τὴν Τριγωνομετρίαν, αὕτη ἔλαβεν ἕκτασιν, τὴν ὁποίαν οὐδεὶς ἠδύνατο νὰ προϊδῃ. Αἱ δὲ ἐφαρμογαὶ αὐτῆς καὶ εἰς αὐτὸν ἀκόμη τὸν κύκλον τῶν ἀνωτέρων μαθηματικῶν εἶναι πολυαριθμώταται.

Ἐργον βραδύτερον ἀπέδειξ τύπους διὰ τὴν λύσιν τῶν ἐπιπέδων καὶ σφαιρικῶν τριγώνων μὲ πολυάριθμα ἀριθμητικὰ παραδείγματα.

# ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

## ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Εισαγωγικόν πρόβλημα .—Σκοπός τῆς Τριγωνομετρίας .....	Σελ. 5 - 6
--	------------

## BIBLION A' — ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ A'

Μέτρησις εὐθυγράμμου τμήματος, τόξου καὶ γωνίας .....	7 - 11
---	--------

### ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Λόγος καθέτου πλευρᾶς πρὸς τὴν ὑποτείνουσαν ὀρθογωνίου τριγώνου. — Ἡμίτονον ὀξείας γωνίας. — Γεωμετρικὴ σημασία τοῦ ἡμιτόνου τούτου.— Μεταβολὴ τοῦ ἡμιτόνου.— Κατασκευὴ ὀξείας γωνίας ἐκ τοῦ ἡμιτόνου.— Ἡμίτονον $45^\circ$ , $30^\circ$ , $60^\circ$ . — Εὗρεσις τοῦ ἡμιτόνου οἰασθῆποτε ὀξείας γωνίας.— Λογάρριθμος τοῦ ἡμιτόνου ὀξείας γω- νίας. — Εὗρεσις τοῦ μέτρου ὀξείας γωνίας ἐκ τοῦ ἡμιτόνου αὐτῆς ..	12 - 27
Δύο σχέσεις τῶν πλευρῶν καὶ τῶν ὀξείων γωνιῶν ὀρθογωνίου τρι- γώνου. — Ἐπίλυσις ὀρθογωνίου τριγώνου ἐκ τῆς $\alpha$ καὶ τῆς $B$ ἢ ἐκ τῆς $\alpha$ καὶ τῆς $\beta$ .....	27 - 32

### ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'

*Ἐφαπτομένη ὀξείας γωνίας, γεωμετρικὴ σημασία, μεταβολὴ αὐτῆς.— Κατασκευὴ ὀξείας γωνίας ἐκ τῆς ἐφαπτομένης αὐτῆς. — Ἐφαπτο- μένη γωνίας $45^\circ$ , $30^\circ$ , $60^\circ$ καὶ οἰασθῆποτε ὀξείας γωνίας. — Λογάρ- ριθμος ἐφαπτομένης. — Εὗρεσις τοῦ μέτρου ὀξείας γωνίας ἐκ τῆς ἐφαπτομένης αὐτῆς .....	33 - 42
Δύο ἄλλαι σχέσεις τῶν πλευρῶν καὶ τῶν ὀξείων γωνιῶν ὀρθ. τριγώ- νου. — Ἐπίλυσις ὀρθ. τριγώνου ἐκ τῶν $\beta$ καὶ $\gamma$ ἢ ἐκ τῶν $B$ καὶ $\beta$ ...	42 - 45

### ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'

Συνημίτονον καὶ συνεφαπτομένη ὀξείας γωνίας.— Σχέσεις μεταξύ ἡμι- τόνων καὶ συνημιτόνων καὶ μεταξύ ἐφαπτομένων καὶ συνεφαπτο- μένων δύο συμπληρωματικῶν γωνιῶν.— Ἄλλαι σχέσεις μεταξύ τῶν πλευρῶν καὶ τῶν ὀξείων γωνιῶν ὀρθ. τριγώνου.—Κατασκευὴ ὀξείας γωνίας ἐκ τοῦ συνημιτόνου ἢ τῆς συνεφαπτομένης αὐτῆς.— Συνη- μίτονον καὶ συνεφαπτομένη $45^\circ$ , $30^\circ$ , $60^\circ$ .—Εὗρεσις τοῦ συνημι-	
--	--

τόνου και τῆς συνεφαπτομένης ὀξείας γωνίας.—Εὐρεσις τοῦ μέ-  
τρου ὀξείας γωνίας ἐκ τοῦ συνημιτόνου ἢ ἐκ τῆς συνεφαπτομένης  
αὐτῆς ..... 46 - 56

### ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄

Σχέσεις τῶν τριγ. ἀριθμῶν τῆς αὐτῆς ὀξείας γωνίας.—Εὐρεσις τῶν  
ἄλλων τριγ. ἀριθμῶν ἐξ ἑνὸς τούτων.—Εὐρεσις τοῦ  $\eta\mu 2\alpha$ , τοῦ  
 $\sigma\upsilon\nu 2\alpha$  ἐκ τοῦ  $\eta\mu\alpha$  καὶ  $\sigma\upsilon\nu\alpha$  ἢ ἐκ τοῦ ἑνὸς τούτων.—Εὐρεσις τῆς  
 $\epsilon\varphi 2\alpha$  ἐκ τῆς  $\epsilon\varphi\alpha$  καὶ τῆς  $\sigma\varphi 2\alpha$  ἐκ τῆς  $\sigma\varphi\alpha$  ( $2\alpha < 90^\circ$ ) ..... 57 - 65

Τριγωνομετρικαὶ ἐξισώσεις ἀλγεβρικῆς μορφῆς.—Πίναξ τύπων Α΄ βι-  
βλίου.—Ἀσκήσεις πρὸς ἐπανάληψιν τοῦ Α΄ βιβλίου ..... 65 - 70

### ΒΙΒΛΙΟΝ Β΄ — ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄

Ἡμίτονον, συνημίτονον, ἐφαπτομένη καὶ συνεφαπτομένη ἀμβλείας γω-  
νίας  $\omega$  ..... 71 - 76

### ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄

Σχέσεις τῶν κυρίων στοιχείων οἰοῦδήποτε τριγώνου.—Ἐπίλυσις μὴ  
ὀρθ. τριγώνου ΑΒΓ ἐκ τῆς  $\alpha$  καὶ τῶν Β, Γ ἢ ἐκ τῶν  $\alpha, \beta, \Gamma$  ἐκ τῶν  
 $\alpha, \beta, \Gamma$  ἢ ἐκ τῶν  $\alpha, \beta, \gamma$  ..... 77 - 89

### ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄

Γραφόμετρον.—Τοπογραφικὰ προβλήματα.— Πίναξ τύπων Β΄ βι-  
βλίου ..... 90 - 95

### ΒΙΒΛΙΟΝ Γ΄ — ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄

Ἄνυσμα καὶ μήκος ἀνύσματος.—Γενίκευσις τῆς ἐνοίας τόξου καὶ γω-  
νίας.—Τριγων. κύκλος καὶ πρωτεύοντες ἄξονες.—Ἡμίτονον καὶ  
συνημίτονον τυχόντος τόξου.—Μεταβολὴ καὶ γραφικὴ παράστα-  
σις αὐτῶν.—Τὰ αὐτὰ διὰ τὴν ἐφαπτομένην καὶ συνεφαπτομένην  
τυχόντος τόξου.—Διατήρησις τῶν σχέσεων τῶν τριγωνομετρι-  
κῶν ἀριθμῶν τόξου ἢ γωνίας ..... 96 - 118

### ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄

Σχέσεις τῶν τριγ. ἀριθμῶν δύο τόξων ἀντιθέτων, παραπληρωματικῶν,  
συμπληρωματικῶν, διαφερόντων κατὰ  $180^\circ$ , ἐχόντων ἄθροισμα  
 $360^\circ$ .—Ἀναγωγή τόξου εἰς τὸ α΄ τεταρτημόριον ..... 119 - 127

### ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄

Εὐρεσις τοῦ  $\eta\mu(\alpha \pm \beta)$ ,  $\sigma\upsilon\nu(\alpha \pm \beta)$ ,  $\epsilon\varphi(\alpha \pm \beta)$ ,  $\sigma\varphi(\alpha \pm \beta)$ ,  
 $\eta\mu 2\alpha$ ,  $\sigma\upsilon\nu 2\alpha$ ,  $\epsilon\varphi 2\alpha$ .—Εὐρεσις τοῦ  $\eta\mu\omega$  καὶ τοῦ  $\sigma\upsilon\nu\omega$  ἐκ τῆς  $\epsilon\varphi \frac{\omega}{2}$   
καὶ τῶν  $\eta\mu \frac{\omega}{2}$ ,  $\sigma\upsilon\nu \frac{\omega}{2}$ ,  $\epsilon\varphi \frac{\omega}{2}$ , ἐκ τοῦ  $\sigma\upsilon\nu\omega$  ..... 128 - 138

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄

Εύρεσις τοῦ ἡμιτόνου, συνημιτόνου, ἑφαπτομένης γωνίας τριγώνου ἐκ τῶν πλευρῶν αὐτοῦ.—Τρεῖς μορφαὶ τοῦ ἔμβαδοῦ τριγώνου.—Εὐρεσις τῶν $\rho$ , $\rho_\alpha$ , $\rho_\beta$ , $\rho_\gamma$ τριγώνου.—Ἐπίλυσις τριγώνου ἐκ τῶν πλευρῶν του.—Ἄλλαι μορφαὶ τοῦ ἔμβαδοῦ τριγώνου.—Εὐρεσις τῆς $R$ τριγώνου ἐκ τῶν $\alpha$ , $\beta$ , $\gamma$ .....	139 - 147
--	-----------

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄

Τροπὴ διαφόρων τριγωνομετρικῶν παραστάσεων εἰς ἄλλας λογιστὰς διὰ τῶν λογαρίθμων.—Τροπὴ γινομένου τριγωνομετρικῶν παραστάσεων εἰς ἀθροίσματα ἢ διαφορὰς .....	148 - 154
---	-----------

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ΄

Τριγωνομετρικαὶ ἐξισώσεις καὶ συστήματα .....	156 - 170
---	-----------

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ΄

Αἱ συναρτήσεις τόξῆμχ, τόξσυνχ, τόξέφχ, τόξσφχ.—Ἐφαρμογαὶ αὐτῶν	171 - 176
Ἀσκήσεις πρὸς γενικὴν ἐπανάληψιν .....	177 - 182

## Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Σ

Ἡ Τριγωνομετρία ἐν σχέσει πρὸς τὴν Γεωμετρίαν καὶ Ἀλγεβραν.—Σύντομος ἱστορικὴ ἐξέλιξις τῆς Τριγωνομετρίας .....	183 - 188
Πίναξ περιεχομένων .....	189 - 191

---

ΕΞΩΦΥΛΛΟΝ: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'.....

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'.....

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'.....

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'.....

ΕΠΙΛΟΓΟΣ.....

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΟΧΩΝ.....

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'.....

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ'.....

Στοιχεία για την έκδοση



024000025212

Έκδοσις Κ' 1976 (V) ΑΝΤΙΤΥΠΑ 59.000 ΣΥΜΒΑΣΙΣ 2714/28-4-76  
 Έκτύπωσις : "ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ", Κ. ΜΠΕΪΝΟΓΛΟΥ & Σια Ο.Ε.  
 Βιβλιοδεσία : Δ. ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ — Ι. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.



