

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

# ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΓΕΒΡΑ - ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

Γ. ΓΡΑΦΑΚΟΥ - Κ. ΔΙΑΚΑΚΗ - Σ. ΜΑΝΤΖΑΡΑ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΑΘΗΝΑ 1977

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής





Α. Α. Σαμίου

## ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Με απόφαση τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως τὰ δι-  
δακτικά βιβλία τοῦ Δημοτικοῦ, Γυμνασίου καὶ Λυ-  
κείου τυπώνονται ἀπὸ τὸν Ὀργανισμό Ἐκδόσεως  
Διδακτικῶν Βιβλίων καὶ μοιράζονται ΔΩΡΕΑΝ.

17614

Ψηφιοποιήθηκε ἀπὸ τὸ Ἰνστιτούτο Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Τὸ βιβλίο μεταγλωττίστηκε ἀπὸ τοὺς καθηγητὲς Ἄνδρ. Πατεράκη,  
μαθηματικό, καὶ Ἄθ. Μασσούκα, φιλόλογο.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

# ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΓΕΒΡΑ - ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ)

Γ. ΓΡΑΦΑΚΟΥ - Κ. ΔΙΑΚΑΚΗ - Σ. ΜΑΝΤΖΑΡΑ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΑΘΗΝΑ 1977

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΙΟ

# ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ - ΕΚΔΟΣΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΙΟ  
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ - ΕΚΔΟΣΗ

# Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ι

## ΠΕΡΙ ΣΥΝΟΛΩΝ

### 1. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ

#### (Επαναλήψεις και συμπληρώσεις)

§ 1. Φέρετε στο νοῦ σας τὰ πρόσωπα τῆς οἰκογένειάς σας καὶ θεωρήστε τὰ σὰν μιὰ δλόττητα (μιὰ ομάδα, μιὰ συλλογή προσώπων). Τί παρατηρεῖτε;

Παρατηροῦμε ὅτι μὲ ἀντικείμενα, πού τὰ γνωρίζομε καλά (τὰ πρόσωπα τῆς οἰκογένειάς μας) καὶ πού δὲν τὰ συγχέομε μεταξύ τους, σχημάτισαμε μὲ τὴ σκέψη μας ἓνα νέο ἀντικείμενο.

Τὸ ἀντικείμενο αὐτὸ τὸ ὀνομάζομε **σύνολο**. Τὸ σύνολο τῶν προσώπων τῆς οἰκογένειάς μας. Μποροῦμε λοιπὸν νὰ θεωρήσουμε ἀντικείμενα  $\alpha, \beta, \gamma, \delta$  ἐντελῶς καθορισμένα καὶ διαφορετικὰ μεταξύ τους σὰν ἓνα ἀντικείμενο: Τὸ σύνολο τῶν  $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ .

**Σύνολο εἶναι τὸ ἀντικείμενο, πὸ σχηματίζομε (μὲ τὴ σκέψη μας ἢ τὴ φαντασία μας), ἂν θεωρήσουμε ἀντικείμενα ἐντελῶς καθορισμένα καὶ διαφορετικὰ μεταξύ τους σὰν ἓνα ἀντικείμενο.**

Τὰ ἀντικείμενα αὐτὰ λέγονται **στοιχεῖα τοῦ συνόλου** καὶ συμβολίζονται μὲ μικρὰ γράμματα τοῦ ἑλληνικοῦ ἀλφαβήτου:  $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \dots$ . Τὸ σύνολο τῶν ἀντικειμένων  $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ , συμβολίζεται μὲ κεφαλαῖο γράμμα:  $A$  ἢ  $B$  ἢ  $\dots$

Λέμε ὅτι **τὰ στοιχεῖα ἐνὸς συνόλου  $A$  ἀνήκουν σ' αὐτό**, καὶ γράφομε συμβολικὰ  $\alpha \in A, \beta \in A$  κ.ο.κ., ἢ ὅτι **ἀπὸ τὸ σύνολο  $A$  λαμβάνονται τὰ στοιχεῖα του**. Συμβολικὰ  $A \ni \alpha$  ἢ  $A \ni \beta$  (ἀπὸ τὸ  $A$  λαμβάνεται τὸ  $\alpha$  κ.λ.π.). Ἐὰν τὸ ἀντικείμενο  $\alpha$  δὲν ἀνήκει στὸ σύνολο  $A$ , γράφομε  $\alpha \notin A$ .

§ 2. Ἐνα σύνολο καθορίζεται, ἂν δηλώσουμε τὰ στοιχεῖα του καὶ τὰ γράψομε μέσα σὲ ἄγκιστρα· π.χ. τὸ σύνολο τῶν  $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ , γράφεται  $\{\alpha, \beta, \gamma, \delta\}$ . Αὐτὸ τὸν τρόπο παραστάσεως τὸν λέμε καθορισμὸ τοῦ συνόλου μὲ ἀναγραφή τῶν στοιχείων του.

**Παράδειγμα.** Νὰ ὀρισθεῖ τὸ σύνολο τῶν φυσικῶν ἀριθμῶν 5, 6, 7, 8, 9. Τὸ σύνολο αὐτὸ ὀρίζεται ὡς ἑξῆς:  $\{5, 6, 7, 8, 9\}$ .

Μποροῦμε ὅμως νὰ ὀρίσουμε τὸ σύνολο αὐτὸ καὶ ὡς τὸ σύνολο τῶν φυσικῶν ἀριθμῶν, πού εἶναι μεγαλύτεροι τοῦ 4 καὶ μικρότεροι τοῦ 10, καὶ νὰ γράψομε  $\{x/x \text{ φυσικὸς ἀριθμὸς καὶ } 4 < x < 10\}$ .

Τὸν τρόπο αὐτὸ τὸν λέμε καθορισμὸ τοῦ συνόλου μὲ περιγραφή.

Ἐνα σύνολο καθορίζεται μὲ περιγραφή, ἂν περιγράψομε μιὰ χαρα-

κτηριστική ιδιότητα τών στοιχείων του. Δηλαδή μιὰ ιδιότητα, πού τήν έχουν όλα τὰ στοιχεῖα του καί μόνο αὐτά.

Μιὰ ιδιότητα συμβολίζεται μέ  $p(\ )$  ἢ  $q(\ )$ . Π.χ.  $q(\ )$  σημαίνει «φυσικός ἀριθμός μεγαλύτερος τοῦ 10». Γιά τούς 11, 13, 17, πού έχουν τήν ιδιότητα αὐτή, γράφουμε  $11:q(11)^*$ ,  $13:q(13)$ ,  $17:q(17)$ . Γιά τούς 6, 3, 2, πού δέν έχουν τήν ιδιότητα αὐτή, γράφουμε ὄχι  $6:q(6)$ , ὄχι  $3:q(3)$ , ὄχι  $2:q(2)$ . Γιά ἕνα ἀντικείμενο  $x$ , πού ἔχει τήν ιδιότητα  $q(\ )$ , γράφουμε  $x:q(x)$ . Δηλαδή τὸ  $x$  ἔχει τήν ιδιότητα  $q(\ )$ . Γιά ἕνα ἀντικείμενο  $\psi$ , πού δέν ἔχει τήν ιδιότητα αὐτή, γράφουμε ὄχι  $\psi:q(\psi)$  καί διαβάζουμε: τὸ  $\psi$  δέν ἔχει τήν ιδιότητα  $q(\ )$ .

§ 3. Ὀνομάστε  $A$  τὸ σύνολο  $\{3, 4, 5, 6\}$  καί  $B$  τὸ  $\{x/x$  φυσικός μεγαλύτερος τοῦ 2 καί μικρότερος τοῦ 7 $\}$ . Τί παρατηρεῖτε;

Παρατηροῦμε ὅτι κάθε στοιχεῖο τοῦ  $A$  ἀνήκει στό  $B$  καί κάθε στοιχεῖο τοῦ  $B$  ἀνήκει στό  $A$ . Λέμε τώρα ὅτι τὰ σύνολα  $A$  καί  $B$  εἶναι ἴσα καί συμβολίζουμε  $A = B$  ἢ λέμε ὅτι πρόκειται γιά τὸ ἴδιο σύνολο:  $A \equiv B$ . Τὰ ἴδια παρατηροῦμε καί στά σύνολα  $A$  καί  $\Gamma = \{5, 3, 6, 4\}$ . Ἐπομένως ἡ σειρά (ἢ τάξη), μέ τήν ὁποία γράφονται τὰ στοιχεῖα ἐνὸς συνόλου, δέν ἔχει καμιά σημασία γιά τὸν καθορισμό του.

Δύο σύνολα εἶναι ἴσα, ἂν κάθε στοιχεῖο τοῦ ἐνὸς ἀπὸ αὐτὰ ἀνήκει στό ἄλλο καί ἀντιστρόφως.

Εὐκόλα διαπιστώνουμε ἀπὸ τὰ παραπάνω παραδείγματα ὅτι:  $A = A$ ,  $A = B \Rightarrow B = A$  καί  $A = B$  καί  $B = \Gamma \Rightarrow A = \Gamma$ .

Ἡ ἰσότητα τῶν συνόλων εἶναι ἀνακλαστική, συμμετρική καί μεταβατική.

§ 4. Ἄν προσέξουμε μόνο τήν ιδιότητα: κάθε στοιχεῖο τοῦ  $A$  ἀνήκει στό  $B$ , θά λέμε ὅτι τὸ  $A$  εἶναι ὑποσύνολο τοῦ  $B$  ἢ ὅτι τὸ  $A$  περιέχεται στό  $B$  καί θά γράφουμε:  $A \subseteq B$ . (στό παραπάνω παράδειγμα τῆς § 3 εἶναι καί  $B \subseteq A$ ). Ἐπομένως  $A \subseteq B$  καί  $B \subseteq A \Rightarrow A = B$

Τῆ σχέση  $A \subseteq B$  μπορούμε νὰ τῆ γράψουμε  $B \supseteq A$ . Θά λέμε τότε: **Τὸ  $B$  εἶναι ὑπερσύνολο τοῦ  $A$ .**

Στὰ σύνολα  $A$  καί  $\Delta = \{x/x$  φυσικός ἀριθμός μεγαλύτερος τοῦ 2 $\}$  παρατηροῦμε ὅτι  $A \subseteq \Delta$ , ἀλλά ὅτι  $\Delta \not\subseteq A$  (γιατί τὰ στοιχεῖα 7, 8, 9, ... τοῦ  $\Delta$  δέν ἀνήκουν στό  $A$ ). Στὴν περίπτωση αὐτῆ λέμε ὅτι τὸ  $A$  εἶναι γνήσιο ὑποσύνολο τοῦ  $\Delta$ : συμβολικά  $A \subset \Delta$ . Τὸ  $\Delta$  λέγεται γνήσιο ὑπερσύνολο τοῦ  $A$ : συμβολικά  $\Delta \supset A$ .

Ἄν ὀρίσουμε μέ περιγραφή τὸ σύνολο  $\{x/x$  φυσικός μεγαλύτερος τοῦ 2 καί μικρότερος τοῦ 3 $\}$ , θά παρατηρήσουμε ὅτι δέν ἔχει κανένα στοι-

\* Τὸ σύμβολο  $11:q(11)$  διαβάζεται: 11 ἔχει τήν ιδιότητα.

χειό. Καθορίζεται λοιπόν ένα σύνολο, πού δέν έχει κανένα στοιχείο. Το σύνολο αυτό λέγεται **κενό σύνολο** και συμβολίζεται με το  $\emptyset$ . Το  $\emptyset$  είναι υποσύνολο κάθε συνόλου.  $\emptyset \subseteq A$  για κάθε σύνολο  $A$ .

Δεχόμαστε ότι όλα τα αντικείμενα, πού μπορούν να είναι στοιχεία τών θεωρούμενων συνόλων, ανήκουν σ' ένα σύνολο  $U$ . Το  $U$  λέγεται **βασικό (ή γενικό) σύνολο** ή **σύνολο αναφοράς** τών θεωρούμενων συνόλων.

Κάθε σύνολο  $A$  είναι υποσύνολο του  $U$ .  $A \subseteq U$  για κάθε σύνολο  $A$ .

Η σχέση του **έγκλεισμού**  $\subseteq$  έχει τις εξής ιδιότητες:



$A \subseteq A$  ανακλαστική (γιατί κάθε στοιχείο οποιουδήποτε συνόλου  $A$  ανήκει στο σύνολο  $A$ ).

$A \subseteq B$  και  $B \subseteq A \Rightarrow A = B$  άντισυμμετρική (§4),

$A \subseteq B$  και  $B \subseteq \Gamma \Rightarrow A \subseteq \Gamma$  μεταβατική (γιατί αν κάθε στοιχείο του  $A$  ανήκει στο  $B$  και κάθε στοιχείο του  $B$  ανήκει στο  $\Gamma$ , τότε κάθε στοιχείο του  $A$  ανήκει στο  $\Gamma$ ). Να τó έπαληθεύσετε στα παραπάνω παραδείγματα.

Για να κάνουμε αίσθητή την έννοια του συνόλου  $A$  τών στοιχείων  $\alpha, \beta, \gamma, \dots$  παριστάνομε τά στοιχεία του με σημεία και τó σύνολο  $\{\alpha, \beta, \gamma, \dots\}$  με μιά κλειστή γραμμή, ή όποια περιβάλλει τά σημεία αυτά. Σχήμα (1).

Τό υποσύνολο  $B = \{\alpha, \beta, \gamma\}$  του  $A$ , τó παριστάνομε στο έσωτερικό του  $A$ . Σχήμ. (2). Τό βασικό σύνολο  $U$  τó παριστάνομε σάν ένα όρθογώνιο· στο έσωτερικό του όρθογωνίου παριστάνονται όλα τά θεωρούμενα σύνολα. Σχήμ. (3).



Οί παραστάσεις αυτές λέγονται βέννια διαγράμματα πρós τιμή του Άγγλου φιλοσόφου και μαθηματικού J. Venn, (1834-1923), πού τίς χρησιμοποίησε πρώτος.

### Άσκήσεις:

1. Να βρείτε τά υποσύνολα τών συνόλων  $\{\alpha\}$ ,  $\{1, 2\}$ ,  $\{\alpha, \beta, \gamma\}$ ,  $\{3, 12, 6, 7\}$ .
2. Να βρείτε τά υποσύνολα του  $\{x / x \text{ άκεραίος μεγαλύτερος του } \frac{7}{5} \text{ και μικρότερος του } \frac{10}{3}\}$ .

3. Νά ὀρίσετε μὲ ἀναγραφή τὸ σύνολο  $\{x/x \text{ διαγώνιος τοῦ πενταγώνου } ABΓΔΕ\}$ .  
 4. Νά ὀρίσετε μὲ ἀναγραφή τὸ σύνολο  $\{x/x \text{ ὑπόλοιπο τῆς διαιρέσεως } κ : 5, \text{ ὅπου } κ \text{ ἀκέρατος}\}$  καὶ μὲ περιγραφή τὸ  $\{AΓ, BΔ\}$ .  
 5. Νά συγκρίνετε τὰ σύνολα  $A = \{0, 1, 2\}$  καὶ  $B = \{x/x \text{ ὑπόλοιπο διαιρέσεως φυσικοῦ ἀριθμοῦ διὰ } 3\}$ .  
 6. Νά συγκρίνετε τὰ σύνολα  $A = \{x/x \text{ παραλληλόγραμμο}\}$ ,  $B = \{x/x \text{ ὀρθογώνιο}\}$  καὶ  $Γ = \{x/x \text{ τετράγωνο}\}$  καὶ νά κάνετε τὰ διαγράμματά τους.

## 2. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ

### Μονοσήμαντη καὶ ἀμφιμονοσήμαντη ἀντιστοιχία.

#### Ἴσοδύναμα σύνολα.

§ 5. Σὲ μιὰ συλλογὴ (ἓνα σύνολο)  $A$  γραμματοσήμων ἀνήκουν τὰ γραμματόσημα  $α, β, γ, δ, ε$ . Τὰ  $α, γ$  καὶ  $δ$  ἀξίζον 1 δραχμὴ τὸ καθένα. Τὰ  $β$  καὶ  $ε$ , 2 δραχ. Τὰ  $α$  καὶ  $δ$  ἐκδόθησαν τὸ 1932, τὰ  $β, γ$  καὶ  $ε$  τὸ 1936.


Θεωρήσετε τὰ σύνολα  $A = \{α, β, γ, δ, ε\}$  καὶ  $B = \{1, 2, 1932, 1936\}$ . Σκεφτήτε τώρα ἓνα στοιχεῖο τοῦ  $A$  καὶ δίπλα σ' αὐτὸ ἓνα στοιχεῖο τοῦ  $B$ . Τί παρατηρεῖτε;

Παρατηροῦμε ὅτι στὸ  $α$  παραθέτομε τὸν 1 ἢ τὸ 1932 (τὴν τιμὴν τοῦ ἢ τῆ χρονολογία ἐκδόσεώς του) συμβολικὰ  $(α, 1)$  ἢ  $(α, 1932)$ . Στὸ  $β$  παραθέτομε ἢ ἀντιστοιχίζομε τὸν 2 ἢ τὸ 1936. Συμβολικὰ  $(β, 2)$  ἢ  $(β, 1936)$  κ.λ.π.

Λέμε τώρα ὅτι μεταξὺ τῶν συνόλων  $A$  καὶ  $B$  ὑπάρχει μιὰ ἀντιστοιχία (ἐπειδὴ στὰ στοιχεῖα τοῦ  $A$  παραθέσαμε ἢ ἀντιστοιχίσαμε στοιχεῖα τοῦ  $B$ ).

Ἀντιστοιχία μεταξὺ δύο συνόλων εἶναι ἡ ἀντιστοίχιση (ἢ παράθεση) στοιχείων τοῦ δευτέρου συνόλου σὲ στοιχεῖα τοῦ πρώτου.

Τὴν ἀντιστοιχία μεταξὺ τῶν συνόλων  $A$  καὶ  $B$  μποροῦμε νὰ τὴν παραστήσουμε σὰν μιὰ κίνηση μὲ ἀναχώρηση ἀπὸ στοιχεῖα τοῦ  $A$  καὶ ἀφίξη σὲ στοιχεῖα τοῦ  $B$ . Αὐτὸ γίνεται μὲ τὴ βοήθεια τῶν βένιων διαγραμμάτων καὶ γραμμῶν κατευθύνσεως στὸ σχῆμα 4.



σχ. 4.



Γι' αυτό τὸ Α λέγεται **σύνολο ἀφετηρίας** καὶ τὸ Β **σύνολο ἀφίξεως**. Τὸ σχῆμα 4 τὸ ὀνομάζουμε διάγραμμα (ἢ γράφημα) τῆς ἀντιστοιχίας (στὸ γραμματόσημο ἀντιστοιχεῖ ἡ τιμὴ του καὶ ἡ χρονολογία ἐκδόσεώς του).


**Σημείωση:** Οἱ παραστάσεις  $(\alpha, 1)$ ,  $(\alpha, 1932)$ ,  $(\beta, 2)$  κ.λ.π., τὶς ὁποῖες χρησιμοποίησαμε, γιὰ νὰ συμβολίσουμε τὴν ἀντιστοίχιση, λέγονται **διατεταγμένα ζευγῆ**. Μποροῦμε νὰ παραστήσουμε (ἢ νὰ ὀρίσουμε) μίαν ἀντιστοιχία σὰν ἓνα σύνολο διατεταγμένων ζευγῶν.

**§ 6.** Ἄν μεταξὺ τοῦ συνόλου Α τῶν γραμματοσήμων καὶ τοῦ συνόλου τῶν τιμῶν  $\Gamma = \{1, 2\}$  μελετήσουμε τὴν ἀντιστοιχία: σ' ἓνα γραμματόσημο ἀντιστοιχεῖ ἡ τιμὴ του, θὰ παρατηρήσουμε ὅτι σὲ **κάθε** στοιχεῖο τοῦ συνόλου Α ἀντιστοιχεῖ **ἓνα μόνο** στοιχεῖο τοῦ συνόλου  $\Gamma$ . Ἡ ἀντιστοιχία αὕτη λέγεται **μονοσήμαντη ἀντιστοιχία**. Τὰ πρῶτα μέλη τῶν διατεταγμένων ζευγῶν  $(\alpha, 1)$ ,  $(\gamma, 1)$ ,  $(\delta, 1)$ ,  $(\beta, 2)$ ,  $(\epsilon, 2)$  εἶναι τῶρα διαφορετικά μεταξὺ τους.

**Μονοσήμαντη ἀντιστοιχία μεταξὺ δύο συνόλων ἔχομε, ὅταν σὲ κάθε στοιχεῖο τοῦ πρώτου συνόλου ἀντιστοιχεῖ ἓνα μόνο στοιχεῖο τοῦ δευτέρου.**

Στὸ σχῆμα 5 ἔχομε τὸ διάγραμμα τῆς μονοσήμαντης ἀντιστοιχίας μεταξὺ τῶν συνόλων Α καὶ  $\Gamma$ .

**Παρατήρηση:** Τὸ σύνολο τῶν διατεταγμένων ζευγῶν, τὸ ὁποῖο παριστάνει μιά μονοσήμαντη ἀντιστοιχία, λέγεται —ὅπως θὰ μάθουμε ἀργότερα— **συναρτήση**. Τὰ Α καὶ  $\Gamma$  θὰ λέγονται τότε **πεδίο ὀρισμοῦ** καὶ **πεδίο τιμῶν** τῆς συναρτήσεως (ἀντιστοίχως).




σχ. 5.

**Σημείωση:** Σὲ ἀνώτερη τάξη θὰ μάθουμε ὅτι μιά μονοσήμαντη ἀντιστοιχία μεταξὺ τῶν συνόλων Α καὶ Β λέγεται καὶ **ἀπεικόνιση τοῦ Α στὸ Β**. Τὸ Α στὴν περίπτωση αὕτη θὰ ὀνομάζεται σύνολο ἀρχετύπων καὶ τὸ Β σύνολο εἰκόνων.

**§ 7.** Μεταξὺ τοῦ συνόλου τῶν ἀριθμῶν  $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$  καὶ τοῦ συνόλου τῶν διπλασίων τους  $B = \{2, 4, 6, 8, 10\}$  ὑπάρχει μιά μονοσήμαντη ἀντιστοιχία, ἡ ἐξῆς: σὲ κάθε ἀριθμὸ τοῦ Α ἀντιστοιχεῖ ὁ διπλασιός του στὸ Β. Ἄλλὰ καὶ μεταξὺ τῶν συνόλων Β καὶ Α ὑπάρχει μιά μονοσήμαντη ἀντιστοιχία. Ἡ ἀντίστροφη τῆς προηγούμενης: σὲ κάθε στοιχεῖο (ἀριθμὸ) τοῦ Β ἀντιστοιχεῖ τὸ  $\frac{1}{2}$  αὐτοῦ στὸ Α. Ἡ ἀντιστοιχία αὕτη λέγεται **ἀμφιμονοσήμαντη ἀντιστοιχία**.

Ἄμφιμονοσήμαντη ἀντιστοιχία μεταξύ δύο συνόλων (ἢ ἀπεικόνιση ἕνα πρὸς ἕνα) ἔχομε, ὅταν σὲ **κάθε στοιχείο τοῦ πρώτου συνόλου ἀντιστοιχεῖ ἕνα μόνον στοιχείο τοῦ δευτέρου** καὶ σὲ **κάθε στοιχείο τοῦ δευτέρου συνόλου ἀντιστοιχεῖ ἕνα μόνον στοιχείο τοῦ πρώτου** (ἐκεῖνο πού τὸ εἶχε ὡς ἀντίστοιχο) ἢ ὅταν μεταξύ τοῦ πρώτου καὶ τοῦ δευτέρου **ὑπάρχει μιὰ μονοσήμαντη ἀντιστοιχία καὶ μεταξύ τοῦ δευτέρου καὶ τοῦ πρώτου ὑπάρχει ἡ ἀντίστροφή της.**



σχ. 6.

Στὸ σχῆμα 6 ἔχομε τὸ διάγραμμα τῆς ἀμφιμονοσήμαντης ἀντιστοιχίας μεταξύ τῶν συνόλων A καὶ B. Αὐτὸ μποροῦμε νὰ τὸ παραστήσουμε καὶ ὡς ἑξῆς:

1	2	3	4	5
2	4	6	8	10

Παρατηροῦμε ὅτι μποροῦμε κάτω ἀπὸ κάθε στοιχείο τοῦ πρώτου συνόλου νὰ γράψουμε ἕνα στοιχείο τοῦ δευτέρου, χωρὶς νὰ ἐπαναλάβουμε ἢ νὰ παραλείψουμε κανένα.

§ 8. Τὰ σύνολα A καὶ B, μεταξύ τῶν ὁποίων εἶναι δυνατὴ μιὰ ἀμφιμονοσήμαντη ἀντιστοιχία, λέγονται **ισοδύναμα** σύνολα. Τότε ὁμως, ὅπως εἶδαμε, μποροῦμε κάτω ἀπὸ κάθε στοιχείο τοῦ A νὰ γράψουμε ἕνα στοιχείο τοῦ B, χωρὶς νὰ ἐπαναλάβουμε καὶ χωρὶς νὰ παραλείψουμε κανένα. Δηλαδή τὰ σύνολα A καὶ B ἔχουν τὸ ἴδιο πλῆθος στοιχείων. Γι' αὐτὸ λέμε ὅτι τὰ ἰσοδύναμα σύνολα ἔχουν τὸν ἴδιο **πληθικὸ ἀριθμὸ**.

Τὴ σχέση «τὸ A εἶναι ἰσοδύναμο τοῦ B» τὴν γράφουμε συμβολικά:  $A \sim B$ . Τὸν ἀριθμὸ, πού ἐκφράζει τὸ πλῆθος τῶν στοιχείων τοῦ συνόλου A, τὸν συμβολίζομε μὲ  $v(A)$ .

Ὅστε  $A \sim B \Leftrightarrow v(A) = v(B)$ . Αὐτὸ τὸ διαπιστώνομε καὶ ἂν ἀπαριθμήσουμε τὰ στοιχεῖα τῶν A καὶ B.

Μεταξύ ἐνὸς συνόλου A καὶ τοῦ ἑαυτοῦ του εἶναι δυνατὸν νὰ ἔχομε μιὰ ἀμφιμονοσήμαντη ἀντιστοιχία τὴν

1	2	3	4	5
1	2	3	4	5

Ἄν μεταξύ τῶν A καὶ B εἶναι δυνατὴ ἡ ἀμφιμονοσήμαντη ἀντιστοιχία

1	2	3	4	5
2	4	6	8	10,

τότε εἶναι δυνατὴ καὶ ἡ

2	4	6	8	10
1	2	3	4	5

μεταξύ τῶν B καὶ A.

Θεωροῦμε τώρα καὶ τὸ σύνολο Γ μὲ στοιχεῖα τὰ τριπλάσια τῶν

στοιχείων του συνόλου  $A$ :  $\Gamma = \{3, 6, 9, 12, 15\}$ . Παρατηρούμε ότι μεταξύ των  $A$  και  $B$ ,  $A$  και  $\Gamma$  έχουμε τις άμφιμονοσήμαντες αντιστοιχίες:

1	2	3	4	5
2	4	6	8	10
3	6	9	12	15

τότε όμως έχουμε και την

2	4	6	8	10
3	6	9	12	15

μεταξύ των  $B$  και  $\Gamma$ .

Από τὰ παραπάνω συμπεραίνομε ότι ἡ ἰσοδυναμία τῶν συνόλων ἔχει τὶς γνωστὲς ιδιότητες τῆς ἰσότητας:

$$A \sim A, \quad A \sim B \Rightarrow B \sim A \quad \text{καὶ} \quad A \sim B \quad \text{καὶ} \quad B \sim \Gamma \Rightarrow A \sim \Gamma$$

ἀνακλαστική, συμμετρική καὶ μεταβατική.

Ἐπομένως τὶς ἴδιες ιδιότητες ἔχει καὶ ἡ ἰσότητα τῶν πληθικῶν ἀριθμῶν τους.

### 3. ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΣΥΝΟΛΑ— ΑΠΕΙΡΟΣΥΝΟΛΑ

§ 9. Ἄν θεωρήσουμε τὸ σύνολο  $A = \{\alpha, \beta, \gamma, \delta, \epsilon\}$ , θὰ παρατηρήσουμε ὅτι τὸ πλήθος τῶν στοιχείων του ἐκφράζεται ἀπὸ τὸ φυσικὸ ἀριθμὸ 5. Συνεπῶς  $n(A) \in \mathbb{N}$ .

Τὰ σύνολα, πού οἱ πληθικοὶ τους ἀριθμοὶ εἶναι φυσικοὶ ἀριθμοὶ, λέγονται **πεπερασμένα σύνολα**.

*Πάρτε τώρα ἓνα γνήσιο ὑποσύνολο τοῦ  $A$  καὶ ἐξετάστε ἂν μεταξὺ αὐτοῦ καὶ τοῦ  $A$  μπορούμε νὰ ἔχουμε μιὰν ἀμφιμονοσήμαντη ἀντιστοιχία. Τί παρατηρεῖτε;*

Παίρνομε τὸ  $B = \{\alpha, \gamma, \delta\}$  καὶ παρατηροῦμε ὅτι αὐτὸ δὲν εἶναι δυνατόν:

$\alpha$	$\beta$	$\gamma$	$\delta$	$\epsilon$	$\eta$	$\alpha$	$\beta$	$\gamma$	$\delta$	$\epsilon$
$\alpha$		$\gamma$	$\delta$			$\alpha$	$\gamma$	$\delta$		

Τὸ ἴδιο θὰ παρατηρήσουμε, ἂν πάρουμε ὅποιοδήποτε γνήσιο ὑποσύνολο τοῦ  $A$ . Λέμε λοιπὸν ὅτι **ἓνα σύνολο εἶναι πεπερασμένο, ὅταν δὲν ἔχει γνήσιο ὑποσύνολο ἰσοδύναμο μὲ αὐτό.**

§ 10. Ἄς πάρουμε τώρα τὸ σύνολο  $\mathbb{N}$  τῶν φυσικῶν ἀριθμῶν:  $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, 5, \dots\}$  καὶ τὸ σύνολο  $N_a$  τῶν ἀρτίων  $N_a = \{2, 4, 6, 8, 10, \dots\}$ . Παρατηροῦμε ὅτι τὸ  $N_a$  εἶναι γνήσιο ὑποσύνολο τοῦ  $\mathbb{N}$ ,  $N_a \subset \mathbb{N}$  καὶ ὅτι κάτω ἀπὸ κάθε στοιχεῖο τοῦ  $\mathbb{N}$  μπορούμε νὰ γράψουμε ἓνα στοιχεῖο τοῦ  $N_a$ , χωρὶς νὰ ἐπαναλάβουμε ἢ νὰ παραλείψουμε κανένα.

1	2	3	4	5	6	7	8	.....	1000	.....
2	4	6	8	10	12	14	16	.....	2000	.....

Τὸ σύνολο  $N$  τῶν φυσικῶν ἀριθμῶν ἔχει ἓνα γνήσιο ὑποσύνολο ἰσοδύναμο μὲ αὐτό. Κανένας φυσικὸς ἀριθμὸς —ὀσοδήποτε μεγάλος— δὲν μπορεῖ νὰ ἐκφράσει τὸ πλῆθος τῶν στοιχείων του. Τὸ  $N$  εἶναι ἓνα ἀπειροσύνολο. Τὸ  $N_a$  εἶναι ἐπίσης ἓνα ἀπειροσύνολο.

Ἔτσι, ἓνα σύνολο εἶναι ἀπειροσύνολο, ὅταν ἔχει ἓνα γνήσιο ὑποσύνολο ἰσοδύναμο μὲ αὐτό.

Ἐνα σύνολο ἰσοδύναμο μὲ ἓνα ἀπειροσύνολο εἶναι ἐπίσης ἀπειροσύνολο. Τὸ ὑπερσύνολο ἑνὸς ἀπειροσυνόλου εἶναι ἀπειροσύνολο. Π.χ. τὸ σύνολο  $Q$  τῶν ρητῶν.

Τὸ σύνολο  $\Delta$  τῶν σημείων ἑνὸς εὐθύγραμμου τμήματος  $AB$  εἶναι ἀπειροσύνολο.

§ 11. Τὰ παραπάνω σύνολα δὲν μπορούμε νὰ τὰ ὀρίσουμε πλήρως μὲ ἀναγραφή. Γι' αὐτὸ ὡς τῶρα χρησιμοποίησαμε ἀτελεῖς ἀναγραφές:  $N = \{1, 2, 3, 4, \dots\}$   $Q = \{\dots \frac{1}{3}, \dots \frac{1}{2}, \dots 1, \dots \frac{3}{2}, \dots\}$ . Μποροῦμε ὅμως νὰ τὰ ὀρίσουμε μὲ περιγραφή. Δηλαδή νὰ δηλώσουμε μιὰν ιδιότητα, πού ἂν τὴν ἔχει ἓνα ἀντικείμενο, ἀνήκει στὸ σύνολο, ἂν ὅμως δὲν τὴν ἔχει, δὲν ἀνήκει σ' αὐτό.

$N = \{x/x \text{ εἶναι πηληθικὸς ἀριθμὸς πεπερασμένου συνόλου}\}.$

$N_a = \{x/x \text{ εἶναι φυσικὸς ἀριθμὸς διαιρετὸς διὰ 2}\}.$

$Q = \{x/x = \frac{\mu}{\nu}, \mu: \text{εἶναι ἀκέραιος, } \nu: \text{εἶναι φυσικὸς καὶ } \frac{\mu}{\nu} \text{ ἀνάγωγο κλάσμα}\}.$

$\Delta = \{x/x \text{ εἶναι τὸ σημεῖο } A \text{ ἢ } B \text{ ἢ σημεῖο μεταξὺ τῶν } A \text{ καὶ } B\}.$

Συνεπῶς μὲ περιγραφή ὀρίζονται κυρίως τὰ ἀπειροσύνολα, ἀλλὰ καὶ πεπερασμένα σύνολα.

**Σημείωση:** Μποροῦμε τῶρα νὰ ποῦμε ὅτι ἓνα σύνολο εἶναι μιὰ κατηγορία ἢ ἓνα εἶδος ἀντικειμένων, τὰ ὁποῖα ἔχουν μιὰ ὀρισμένη ιδιότητα (ὡς πρὸς τὴν ὁποία θεωροῦνται).

### Ἀσκήσεις :

7. Κάνετε μεταξὺ τῶν συνόλων  $A = \{3, 8, 15, 13, 14, 12, 7\}$  καὶ  $B = \{0, 1, 2, 3, 4\}$  τὴν ἀντιστοιχία: σὲ στοιχεῖο τοῦ  $A$  ἀντιστοιχεῖ τὸ ὑπόλοιπο τῆς διαιρέσεως αὐτοῦ διὰ 3, τὸ ὁποῖο ἀνήκει στὸ  $B$ .

8. Στὸ σύνολο  $A$  τῶν χωρῶν τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης ἀντιστοιχίστε τὸ σύνολο  $B$  τῶν πρωτευουσῶν τους. Χαρακτηρίστε τὴν ἀντιστοιχία. Κάνετε τὸ διάγραμμά της.

9. Ἐξετάστε ἂν εἶναι ἰσοδύναμα τὰ σύνολα  $A = \{x/x \text{ εἶναι πολλαπλάσιο τοῦ } 3\}$  καὶ  $B = \{x/x \text{ εἶναι ὑπόλοιπο διαιρέσεως φυσικοῦ ἀριθμοῦ διὰ } 7\}.$

10. Νὰ γίνουν ὅλες οἱ δυνατὲς ἀμφιμονοσήμαντες ἀντιστοιχίες μεταξὺ τῶν συνόλων  $A = \{2, 9, 4\}$  καὶ  $B = \{\alpha, \beta, \gamma\}$ . Πόσες εἶναι αὐτές;

11. Νὰ ὀρίσετε μὲ ἀναγραφή τὸ σύνολο τῶν ὑποσυνόλων ἑνὸς τριμελοῦς συνόλου καὶ τὸ σύνολο τῶν πηληθικῶν ἀριθμῶν τους. Κάνετε μεταξὺ τους μιὰ ἀντιστοιχία. Χαρακτηρίστε τὸ εἶδος της.

12. Μεταξύ των συνόλων  $A = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$  και  $B = \{0, 1, 2, 3, 9, 12, 18\}$  να γίνει η αντιστοιχία: σε στοιχείο του  $A$  αντιστοιχεί το υπόλοιπο της διαιρέσεώς του διά 3 ή πολλαπλασίου του, το οποίο ανήκει στο  $B$ .

13. Έξετάστε αν μεταξύ των συνόλων  $A = \{x/x \text{ είναι πολλαπλάσιο του } 11 \text{ μικρότερο του } 97\}$  και ενός γνήσιου υποσυνόλου του είναι δυνατή μία αμφιμονοσήμαντη αντιστοιχία.

14. Να ορίσετε με περιγραφή το σύνολο  $A = \{0, 7, 14, 21, 28, \dots\}$ .

15. Ποιά σχέση υπάρχει μεταξύ του συνόλου των άρτίων  $N_4$  και του συνόλου  $N_4$  των άκ. πολλαπλασίων του 4.

16. Έξετάστε αν είναι ισοδύναμα τα σύνολα  $E = \{x/x \text{ επίκεντρα γωνία } \sigma' \text{ έναυ κύκλου } (0)\}$  και  $T = \{x/x \text{ τόξο του κύκλου } (0)\}$ .

17. Έξετάστε αν είναι ισοδύναμα τα σύνολα  $N$  και  $K = \{x/x \text{ είναι κλασματική μονάδα}\}$ .

#### 4. ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟΜΗ ΣΥΝΟΛΩΝ — ΔΙΑΖΕΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΖΕΥΞΗ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ

§ 12. Το σύνολο, στο οποίο ανήκουν όλα τα στοιχεία δύο συνόλων  $A$  και  $B$ , και μόνον αυτά, λέγεται **ένωση των  $A$  και  $B$**  και συμβολίζεται  $A \cup B$ .

‘Η ένωση ορίζεται από την ισοδυναμία  $α \in A$  είτε  $α \in B \Leftrightarrow α \in A \cup B$ .


Τήν πράξη, με την οποία βρίσκουμε το  $A \cup B$ , αν δοθούν τα  $A$  και  $B$ , τήν ονομάζουμε «ένωση συνόλων» και τή συμβολίζουμε με το  $\cup$ .

Το σύνολο, στο οποίο ανήκουν τα κοινά στοιχεία δύο συνόλων  $A$  και  $B$  και μόνον αυτά, λέγεται **τομή των  $A$  και  $B$**  και συμβολίζεται  $A \cap B$ .

‘Η τομή ορίζεται από την ισοδυναμία  $α \in A$  και  $α \in B \Leftrightarrow α \in A \cap B$ .

Τήν αντίστοιχη πράξη τή λέμε «τομή συνόλων» και τή συμβολίζουμε με  $\cap$ .

**Παράδειγμα.** ‘Αν  $A = \{\alpha, \beta, \gamma, \delta, \epsilon\}$  και  $B = \{\gamma, \delta, \epsilon, \zeta\}$  τότε  $A \cup B = \{\alpha, \beta, \gamma, \delta, \epsilon, \zeta\}$  και  $A \cap B = \{\gamma, \delta, \epsilon\}$ . ‘Αν χρησιμοποιήσουμε τα βέννια διαγράμματα, έχομε:



σχ. 7.

§ 13. Θεωρήστε τα σύνολα  $A = \{x/x \text{ είναι διαμέτρης του } 12\}$  και  $B = \{x/x \text{ είναι διμέτρης του } 18\}$  και καθορίστε με αναγραφή 1) τήν ένωση και 2) τήν τομή τους.

Ἄφοῦ καθορίσουμε μὲ ἀναγραφή τὰ σύνολα, τὰ ὁποῖα μᾶς ἔχουν δοθεῖ  $A = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$  καὶ  $B = \{1, 2, 3, 6, 9, 18\}$ , βρίσκομε:

1) τὸ σύνολο  $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18\}$  καὶ παρατηροῦμε ὅτι κάθε στοιχεῖο τοῦ  $A \cup B$  ἢ διαιρεῖ μόνο τὸν 12 (οἱ 4 καὶ 12) ἢ διαιρεῖ μόνο τὸν 18 (οἱ 9 καὶ 18) ἢ διαιρεῖ καὶ τοὺς δύο (οἱ 1, 2, 3, 6).

Τῆ σύνθετη αὐτὴ ἰδιότητα, τὴν ὁποία ἔχουν τὰ στοιχεῖα τοῦ  $A \cup B$ , τὴ λέμε **διάζευξη (συμβολικά  $\vee$ , προφορικά «εἶτε»), τῶν ἰδιοτήτων «εἶναι διαιρέτης τοῦ 12», «εἶναι διαιρέτης τοῦ 18» καὶ τὴ συμβολίζομε: «εἶναι διαιρέτης τοῦ 12»  $\vee$  «εἶναι διαιρέτης τοῦ 18» (καὶ πιὸ ἀπλὰ «εἶναι διαιρέτης τοῦ 12» εἶτε «εἶναι διαιρέτης τοῦ 18»).**

Κανένα ἄλλο ἀντικείμενο ἐκτὸς ἀπὸ τὰ στοιχεῖα τοῦ  $A \cup B$  δὲν ἔχει τὴν ἰδιότητα αὐτή.

Ἐπομένως μποροῦμε νὰ ὀρίσουμε μὲ περιγραφή τὸ σύνολο  $A \cup B$  ὡς ἐξῆς:  $A \cup B = \{x / \langle x \text{ εἶναι διαιρέτης τοῦ } 12 \rangle \text{ εἶτε } \langle x \text{ εἶναι διαιρέτης τοῦ } 18 \rangle\}$  ἢ  $A \cup B = \{x / \langle x \text{ εἶναι διαιρέτης τοῦ } 12 \rangle \vee \langle x \text{ εἶναι διαιρέτης τοῦ } 18 \rangle\}$ .

Γενικὰ ἂν ἓνα ἀντικείμενο ἔχει μιὰ τουλάχιστο ἀπὸ δύο ἰδιότητες, λέμε ὅτι ἔχει **σὰν ἰδιότητα τὴ διάζευξή τους.**

Συμβολικά:  $x : p(x) \text{ ἢ } x : q(x) \Rightarrow x : p(x) \vee q(x)$ .

Συνεπῶς: Ἐάν δύο σύνολα περιγράφονται (ἀντιστοίχως) ἀπὸ τὶς ἰδιότητες  $p(\ )$  καὶ  $q(\ )$ , ἡ ἔνωση τῶν συνόλων αὐτῶν περιγράφεται ἀπὸ τὴ **διάζευξή τους.**

$A = \{x / x : p(x)\}$ ,  $B = \{x / x : q(x)\} \Rightarrow A \cup B = \{x / x : p(x) \vee q(x)\}$ .

2) Ὀρίζομε μὲ ἀναγραφή τὸ σύνολο  $A \cap B = \{1, 2, 3, 6\}$  καὶ παρατηροῦμε ὅτι κάθε στοιχεῖο του εἶναι διαιρέτης καὶ τοῦ 12 καὶ τοῦ 18.

Τῆ σύνθετη αὐτὴ ἰδιότητα τὴ λέμε **σύζευξη τῶν ἰδιοτήτων «εἶναι διαιρέτης τοῦ 12», «εἶναι διαιρέτης τοῦ 18», καὶ τὴ συμβολίζομε «εἶναι διαιρέτης τοῦ 12» καὶ «εἶναι διαιρέτης τοῦ 18» ἢ «εἶναι διαιρέτης τοῦ 12»  $\wedge$  «εἶναι διαιρέτης τοῦ 18». Ἐπειδὴ κανένας ἄλλος ἀριθμὸς ἐκτὸς ἀπὸ τὰ στοιχεῖα τοῦ  $A \cap B$  δὲν ἔχει αὐτὴ τὴν ἰδιότητα, ὀρίζομε μὲ περιγραφή τὴν τομὴ τῶν συνόλων  $A$  καὶ  $B$  ὡς ἐξῆς:**

$A \cap B = \{x / \langle x \text{ εἶναι διαιρέτης τοῦ } 12 \rangle \wedge \langle x \text{ εἶναι διαιρέτης τοῦ } 18 \rangle\}$ .

Γενικὰ:

Ἐάν ἓνα ἀντικείμενο ἔχει δύο ἰδιότητες, θὰ λέμε ὅτι ἔχει **σὰν ἰδιότητα καὶ τὴ σύζευξή τους.** (Ἡ σύζευξη συμβολίζεται μὲ  $\wedge$  καὶ διαβάζεται «καί»).

Ἐάν δύο σύνολα περιγράφονται ἀντιστοίχως ἀπὸ δύο ἰδιότητες, ἡ τομὴ τους περιγράφεται ἀπὸ τὴν **σύζευξη τῶν ἰδιοτήτων.**

$A = \{x / x : p(x)\}$ ,  $B = \{x / x : q(x)\} \Rightarrow A \cap B = \{x / x : p(x) \wedge q(x)\}$ .

Εύκολα έπαληθεύουμε με παραδείγματα τις γνωστές ιδιότητες τής ένωσης και τής τομής.

Τò μονότιμο

Τή μεταθετική

Τήν προσεταιριστική

Τοῦ οὔδετέρου

Τήν έπιμεριστική

$$A \cup B = B \cup A \quad A \cap B = B \cap A$$

$$A \cup (B \cap \Gamma) = (A \cup B) \cap \Gamma$$

$$A \cap (B \cup \Gamma) = (A \cap B) \cup \Gamma$$

$$A \cup \emptyset = A, \quad A \cap U = A$$

$$A \cup (B \cap \Gamma) = (A \cup B) \cap (A \cup \Gamma)$$

$$A \cap (B \cup \Gamma) = (A \cap B) \cup (A \cap \Gamma)$$

### Άσκήσεις :

18. Ποιά είναι ή διάζευξη τών ιδιοτήτων «είναι άρτιος», «είναι περιττός»;

19. Ποιά είναι ή σύζευξη τών ιδιοτήτων  $x > 5$ ,  $x < 13$ ;

20. Ποιό είναι τò σύνολο  $\{x/x: «x \text{ είναι άρτιος} \wedge «x \text{ είναι περιττός} \}$ ;

21. Νά όρισθοῦν με περιγραφή και άναγραφή ή ένωση και ή τομή τών συνόλων  $\Delta_1 = \{x/x: «x \text{ είναι διαιρέτης του } 18 \}$ ,  $\Delta_2 = \{x/x: «x \text{ είναι διαιρέτης του } 54 \}$ .

22. Ποιά είναι ή ένωση τών τριών συνόλων  $A = \{x/x: «x \text{ είναι διαιρέτης του } 32 \wedge «x \text{ είναι διαιρέτης του } 40 \}$ ,  $B = \{x/x: «x \text{ είναι διαιρέτης του } 40 \}$  και  $\Gamma = \{x/x: «x \text{ είναι διαιρέτης του } 40 + 32 \}$ ;

23. Νά βρεθεί τò σύνολο  $A = \{x/x: «x \in \mathbb{Q}_0^+ \wedge «x + 1 = 5 \}$ ,  $B = \{x: «x \in \mathbb{Q}_0^+ \wedge «x - 3 = 7 \}$ .

24. Νά έκτελεστοῦν οί πράξεις  $(A \cup B) \cap (\Gamma \cup B)$ ,  $(A \cup B \cap \Gamma) \cap \Delta$ .

### 5. ΤΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ — ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΩΝ — ΚΛΑΣΕΙΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑΣ

§ 14. Άν θεωρήσουμε τò σύνολο  $A = \{x/x \text{ διαιρέτης του } 6 \}$  και τò σύνολο  $B = \{x/x \text{ διαιρέτης του } 12 \}$ , θά παρατηρήσουμε ότι  $A \subseteq B$ .

Πράγματι  $B = \{1, 2, 3, 4, 6, 12 \}$  και  $A = \{1, 2, 3, 6 \}$ . Τò σύνολο  $\{4, 12 \}$  ή  $\{x/x «x \text{ διαιρέτης του } 12 \wedge «x \text{ δέν είναι διαιρέτης του } 6 \}$  λέγεται συμπλήρωμα του  $A$  ως πρòς τò υπερσύνολό του  $B$  και συμβολίζεται  $A_B^c$  ή  $A_B'$ . Όσπε:


**Συμπλήρωμα ένός συνόλου  $A$ , ως πρòς ένα υπερσύνολό του  $B$ , είναι τò σύνολο τών στοιχείων του  $B$ , τά όποια δέν ανήκουν στο  $A$ .**

Παρατηρούμε ότι στο συμπλήρωμα του  $A$  ανήκουν τά στοιχεία του  $B$ , τά όποια δέν έχουν τή χαρακτηριστική ιδιότητα τών στοιχείων του  $A$ .


Τò  $B_B^c$  είναι τò  $\emptyset$ , Τò  $\emptyset_B^c$  είναι τò  $B$ .

Όταν λίμε άπλώς συμπλήρωμα του  $A$  (συμβολικά  $A^c$ ), έννοούμε τò συμπλήρωμά του ως πρòς τò βασικό σύνολο  $U$  (έπερσύνολο όλων τών θεωρούμενων συνόλων).

Τὸ βέννιο διάγραμμα τοῦ  $A_B^c$  τὸ βλέπομε στὸ σχῆμα 8 καὶ τὸ διάγραμμα τοῦ  $A^c$  στὸ σχῆμα 9.



σχ. 8.



σχ. 9.

§ 15. Θεωροῦμε τὰ σύνολα  $B = \{\alpha, \beta, \gamma, \delta, \epsilon\}$ ,  $A = \{\beta, \delta, \epsilon\}$  καὶ  $A_B^c = \{\alpha, \gamma\}$ . Ἡ τομὴ τῶν  $A$  καὶ  $A_B^c$  εἶναι τὸ κενὸ σύνολο, ἢ μὲ ἄλλα λόγια τὰ σύνολα αὐτὰ εἶναι ξένα μεταξύ τους.

Ἡ ἔνωσή τους εἶναι τὸ  $B$ . Λέμε ὅτι τὰ σύνολα  $A$  καὶ  $A_B^c$  ἀποτελοῦν ἓνα **διαμερισμὸ** τοῦ συνόλου  $B$ . Ὁμοίως λέμε ὅτι τὰ σύνολα  $\{\alpha, \gamma\}$ ,  $\{\beta, \epsilon\}$  καὶ  $\{\delta\}$  ἀποτελοῦν ἓνα διαμερισμὸ τοῦ συνόλου  $B$ , γιατί εἶναι διαφορετικὰ ἀπὸ τὸ κενὸ σύνολο, εἶναι ξένα μεταξύ τους ἀνὰ δύο καὶ ἡ ἔνωσή τους εἶναι τὸ  $B$ . Μποροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι τὸ  $B$  διαμερίζεται στὰ σύνολα αὐτὰ.

Τὰ σύνολα  $A_1, A_2, A_3, \dots$  εἶναι ἓνας **διαμερισμὸς** τοῦ συνόλου  $A$ , ὅταν κανένα ἀπὸ αὐτὰ δὲν εἶναι κενό, εἶναι ξένα μεταξύ τους ἀνὰ δύο καὶ ἡ ἔνωση ὅλων εἶναι τὸ  $A$ .

§ 16. Νὰ διαμερισθεῖ τὸ σύνολο:

$$K = \left\{ \frac{1}{1}, \frac{1}{2}, \frac{3}{5}, \frac{3}{3}, \frac{3}{6}, \frac{6}{10}, \frac{7}{14}, \frac{12}{20} \right\}$$

σὲ σύνολα, ποὺ καθένα νὰ περιέχει ἴσους ρητοὺς ἀριθμοὺς. Μὲ βάση τὴ σχέση ἰσότητος τῶν κλασμάτων διαμερίζομε τὸ  $K$  στὰ σύνολα.

$$K_1 = \left\{ \frac{1}{1}, \frac{3}{3} \right\}, \quad K_2 = \left\{ \frac{1}{2}, \frac{3}{6}, \frac{7}{14} \right\}, \quad K_3 = \left\{ \frac{3}{5}, \frac{6}{10}, \frac{12}{20} \right\}.$$

Τὰ στοιχεῖα καθενὸς ἀπὸ τὰ  $K_1, K_2, K_3$  ἀντιπροσωπεύουν τὸν ἴδιο ρητὸ ἀριθμὸ. Τὰ στοιχεῖα τοῦ  $K_1$  τὸν ρητὸ  $\frac{1}{1}$ , τοῦ  $K_2$  τὸν ρητὸ  $\frac{1}{2}$  καὶ τοῦ  $K_3$  τὸν  $\frac{3}{5}$ .

Τὰ σύνολα  $K_1, K_2, K_3$  λέγονται **κλάσεις ἰσοδυναμίας**.

Γενικά ἡ σχέση τῆς ἰσότητος τῶν κλασμάτων διαμερίζει τὸ σύνολο ὅλων τῶν κλασμάτων σὲ κλάσεις ἰσοδυναμίας. Κάθε κλάση παριστάνει ἡ ἀντιπροσωπεύει ἓναν ρητὸ ἀριθμὸ.

Ἄν ἓνα σύνολο  $A$  διαμερίζεται σὲ ἄλλα σύνολα  $A_1, A_2, A_3, \dots$  ἔτσι, ὅστε ὅλα τὰ στοιχεῖα τοῦ  $A_1$  νὰ ἀντιπροσωπεύουν ἓνα ἀντικείμενο, ὅλα τὰ



στοιχεία του  $A_2$  ένα άλλο αντικείμενο κ.ο.κ., τα  $A_1, A_2, A_3, \dots$  λέγονται **κλάσεις ισοδυναμίας**.

Ἡ σχέση, με βάση την οποία γίνεται ὁ διαμερισμός αὐτός, λέγεται **σχέση ισοδυναμίας** καὶ ἔχει τὶς ιδιότητες τῆς ἰσότητος.

### Ἀσκήσεις :

25. Νὰ βρεθεῖ τὸ  $A_N^C$  ὅπου  $A = \{x/x \text{ φυσικὸς ἀριθμὸς } \wedge x > 6\}$ .
26. Ἐὰν  $A = \{x/\langle x \in Q_0^+ \rangle \wedge x > 3\}$  καὶ  $B = \{x/\langle x \in Q_0^+ \rangle \wedge x < 11\}$ , νὰ βρεθοῦν τὰ σύνολα  $A \cup B$ ,  $A \cap B$ ,  $A \setminus B$  καὶ ἡ τομὴ τῶν συμπληρωμάτων τῶν  $A$  καὶ  $B$  ὡς πρὸς  $Q_0^+$ .
27. Νὰ ἐκτελεσθεῖ ἡ πράξις  $(A \cup A^C) \cap A$ .
28. Ἐὰν  $A = \{x/x \text{ εἶναι διαιρέτης τοῦ } 60\}$ ,  $B = \{x/x \text{ εἶναι διαιρέτης τοῦ } 12\}$  καὶ  $\Gamma = \{x/x \text{ εἶναι διαιρέτης τοῦ } 15\}$ , νὰ βρεῖτε τὰ συμπληρώματα τῶν  $B$  καὶ  $\Gamma$  ὡς πρὸς  $A$ .
29. Νὰ ἐπαληθεύσετε μετὰ τὰ σύνολα τῆς προηγούμενης ἀσκήσεως ὅτι τὸ συμπλήρωμα τῆς ἐνώσεως τῶν  $B$  καὶ  $\Gamma$  ἰσοῦται μετὰ τὴν τομὴ τῶν συμπληρωμάτων τῶν συνόλων αὐτῶν (ὡς πρὸς τὸ ὑπερσύνολό τους  $A$ ). Ἐπίσης ὅτι τὸ συμπλήρωμα τῆς τομῆς ἰσοῦται μετὰ τὴν ἔνωση τῶν συμπληρωμάτων. Συμβολικᾶ:
- $$(B \cup \Gamma)_A^C = (B_A^C) \cap (\Gamma_A^C) \text{ καὶ } (B_A^C) \cup (\Gamma_A^C) = (B \cap \Gamma)_A^C.$$
30. Νὰ ἐπαληθεύσετε μετὰ παραδείγματα, ὅτι τὸ σύνολο, ποὺ περιγράφεται μετὰ τὴν σύζευξη δύο ιδιοτήτων, εἶναι ὑποσύνολο ἐκείνου, ποὺ περιγράφεται μετὰ μία ἀπ' αὐτῆς.
31. Διαμερίστε τὸ σύνολο  $A = \{2, 5, 9, 6\}$  σὲ μονομελῆ σύνολα.
32. Νὰ διαμερισθεῖ τὸ σύνολο  $A = \{x/x \text{ εἶναι διαιρέτης τοῦ } 4\}$  σὲ διμελῆ σύνολα.
33. α) Νὰ κάνετε ἕνα διαμερισμὸ τοῦ συνόλου τῶν πλευρῶν ἑνὸς παραλληλογράμμου  $AB\Gamma\Delta$  μετὰ βάση τῆς σχέσεως «εἶναι παράλληλος». β) Κάνετε ἕνα διαμερισμὸ τοῦ συνόλου τῶν τριγῶνων σὲ τρία ὑποσύνολα.
34. Νὰ διαμερίσετε τὸ σύνολο  $A = \{2, 5, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 13\}$  σὲ κλάσεις ἰσοδυναμίας μετὰ βάση τῆς σχέσεως: οἱ ἀριθμοὶ κάθε κλάσεως ἀφήνουν τὸ ἴδιο ὑπόλοιπο, ἂν διαιρεθοῦν διὰ 3.

35. Σὲ πόσες κλάσεις ἰσοδυναμίας διαμερίζεται τὸ σύνολο  $N$  μετὰ βάση τῆς σχέσεως: ὑπόλοιπο διαιρέσεως τοῦ  $\alpha$  διὰ 5 = ὑπόλοιπο διαιρέσεως τοῦ  $\beta$  διὰ 5;

36. Σχηματίστε τὰ ὑποσύνολα τοῦ συνόλου τῶν διαγωνίων τοῦ πενταγώνου  $AB\Gamma\Delta\epsilon$  ἔτσι, ὥστε  $\sigma'$  ἕνα ὑποσύνολο ν' ἀνήκουν οἱ διαγώνιοι, οἱ ὁποῖες περνοῦν ἀπὸ τὴν ἴδια κορυφή. Ἀποτελοῦν διαμερισμὸ αὐτὰ τὰ ὑποσύνολα;

## 6. ΔΙΑΤΕΤΑΓΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΟ

§ 17. Ὅταν —κατὰ τὴν μελέτη τῆς ἀντιστοιχίας— ἀντιστοιχίσουμε στὸ στοιχεῖο  $\alpha$  τὸ στοιχεῖο  $\beta$ , χρησιμοποίησαμε τὸ συμβολισμὸ:  $(\alpha, \beta)$ . Αὐτὸ εἶναι ἕνα διμελὲς σύνολο, στὸ ὁποῖο τὸ ἕνα μέλος προηγεῖται ἀπὸ τὸ ἄλλο (δηλαδὴ ἔχει σημασία ἡ τάξις τῶν στοιχείων του). Τὸ  $(\alpha, \beta)$  λέγεται **διατεταγμένο ζεῦγος** ἢ **διατεταγμένο (διμελὲς) σύνολο**. Ἐπειδὴ μπορούμε στὸ  $\alpha$  νὰ ἀντιστοιχίσουμε τὸ  $\alpha$ , θεωροῦμε καὶ τὸ  $(\alpha, \alpha)$  διατεταγμένο ζεῦγος.

**Πρόβλημα.** *Νά γράψετε τὸ σύνολο  $\{2, 3, 1, 5, 4\}$  ἔτσι, ὥστε νὰ προηγείται ὁ μικρότερος ἀριθμὸς.*

Γράφουμε τότε  $(1, 2, 3, 4, 5)$ . Τὸ  $(1, 2, 3, 4, 5)$  εἶναι ἓνα διατεταγμένο σύνολο. (Γιὰ τὴν παράστασή του χρησιμοποιήσαμε παρενθέσεις ἀντὶ γιὰ ἄγκιστρα).

Ἐνα σύνολο εἶναι διατεταγμένο, ὅταν μεταξὺ δύο στοιχείων του ἔχει ὀρισθεῖ ποῖο προηγείται.

Μεταξὺ δύο στοιχείων τοῦ  $(1, 2, 3, 4, 5)$ , π.χ. τῶν 3 καὶ 2, ἰσχύει ἡ σχέση:  $2 < 3$ . Σχηματίζουμε τότε τὸ ζεῦγος  $(2, 3)$ . Γιὰ τὸ ζεῦγος  $(4, 4)$  ἰσχύει  $4 = 4$ .

Γενικὰ γιὰ δύο στοιχεῖα του  $\alpha$  καὶ  $\beta$  μπορούμε νὰ γράψουμε  $\alpha \leq \beta$  ἢ  $\beta \leq \alpha$ .

Γι' αὐτὸ λέμε ὅτι τὸ διατεταγμένο σύνολο  $(1, 2, 3, 4, 5)$ , εἶναι τὸ σύνολο  $\{2, 3, 1, 5, 4\}$  ἐφοδιασμένο μὲ τὴ διάταξη (ἢ τὴ σχέση διατάξεως)  $\leq$ . Τὴ διάταξη αὐτὴ τὴν ὀνομάζουμε διάταξη κατὰ μέγεθος.

Παρατηροῦμε ὅτι ὁποιοδήποτε διμελὲς ὑποσύνολο τοῦ  $\{2, 3, 1, 5, 4\}$  μπορεῖ νὰ διαταχθεῖ μὲ τὴ διάταξη  $\leq$ . Τὸ  $\{2, 3\}$ :  $2 \leq 3$ . Τὸ  $\{5, 4\}$ :  $4 \leq 5$  κ.ο.κ. Γι' αὐτὸ ἡ διάταξη  $\leq$  λέγεται **ὀλικὴ διάταξη** καὶ τὸ  $(1, 2, 3, 4, 5)$  **ὀλικῶς διατεταγμένο σύνολο**.


Γραφικῶς παριστάνουμε τὴ διάταξη:  $\alpha < \beta$  ὡς ἑξῆς:  $\alpha \curvearrowright \beta$ . Δηλαδή μὲ γραμμὴ πού κετευθύνεται ἀπὸ τὸ  $\alpha$  πρὸς τὸ  $\beta$ .

Τὴν περίπτωσιν  $\alpha = \alpha$  τὴν παριστάνουμε μὲ  $\alpha \curvearrowright \alpha$ , δηλαδή μὲ μιὰ θηλειά, πού ἐπιστρέφει στὸ  $\alpha$ .

Στὸ σχῆμα 10 ἔχομε γραφικὴ παράστασιν (διάγραμμα) τῆς διατάξεως στὸ διατεταγμένο σύνολο  $(1, 2, 3, 4, 5)$ .



σχ. 11.



σχ. 10.

Μερικὲς φορές μᾶς δίνεται ἡ εὐκαιρία νὰ κάνουμε καὶ διασκεδαστικὰ διαγράμματα διατεταγμένων συνόλων, ὅπως στὰ σχήματα 11 καὶ 12 γιὰ τὸ  $(1, 2, 3, 4)$ .



σχ. 12.

§ 18. Τή σχέση  $\acute{\alpha}$   $\delta$  αιρεί τόν  $\beta$  τή συμβολίζομε προσωρινά μέ  $\alpha/\beta$ . Ἐφοδιάσομε τὸ σύνολο  $\{2, 3, 4, 6, 9\}$  μέ τή διάταξη αὐτή, θά παρατηρήσομε ὅτι μερικά ἀπὸ τὰ διμελῆ ὑποσύνολά του δὲν διατάσσονται.

Γράφομε  $2/4$  (ὁ 2 διαιρεί τὸν 4),  $2/2$ ,  $4/4$  κ.ο.κ, ἀλλὰ δὲν μποροῦμε νὰ γράψομε:  $2/3$  (ὁ 2 διαιρεί τὸν 3),  $6/9$ .

Τὸ σύνολο  $\{2, 3, 4, 6, 9\}$  ἐφοδιασμένο μέ τή διάταξη / λέγεται **μερικῶς διατεταγμένο σύνολο** καὶ ἡ σχέση «διαιρεί τὸν ...» λέγεται **μερικὴ διάταξη**.

Ἐάν τή διάταξη: τὸ  $\alpha$  προηγῆται ἀπὸ τὸ  $\beta$  ἢ ταυτίζεται μέ τὸ  $\beta$ , τή συμβολίζομε μέ  $\alpha \leq \beta$  καὶ τήν: τὸ  $\beta$  ἀκολουθεῖ τὸ  $\alpha$  (ἢ ταυτίζεται μέ τὸ  $\alpha$ ) μέ  $\beta \geq \alpha$ , ἐπαληθεύομε εὐκόλα ἀπὸ τὰ παραδείγματά μας ὅτι οἱ ιδιότητες τῆς διατάξεως εἶναι οἱ ἑξῆς:

- $\alpha \leq \alpha$  ἀνακλαστικὴ  
 $\alpha \leq \beta$  καὶ  $\beta \leq \alpha \Rightarrow \alpha = \beta$  ἀντισυμμετρικὴ καὶ  
 $\alpha \leq \beta$  καὶ  $\beta \leq \gamma \Rightarrow \alpha \leq \gamma$  μεταβατικὴ.

#### Ἀσκήσεις:


37. Νὰ διατάξετε τὸ σύνολο  $\{3^3, 3^2, 3^1, 3^0, 3^3, 3^4\}$ , ὥστε νὰ προηγῆται ἡ δύναμη μέ τὸ μικρότερο ἐκθέτη.

38. Κάνετε τὸ ἴδιο καὶ στὸ σύνολο  $\{3^2, 5^1, 10^0, 2^5\}$ . Αὐτὴ ἡ διάταξη εἶναι διάταξη κατὰ μέγεθος;

39. Νὰ διατάξετε τὸ σύνολο  $\{4, 8, 9, 3, 12, 16, 18\}$  ἔτσι, ὥστε μεταξύ δύο στοιχείων του νὰ προηγῆται ἐκεῖνο πού εἶναι πολλαπλάσιο τοῦ ἄλλου. Θά εἶναι τότε τὸ σύνολο ὀλικῶς διατεταγμένο; Νὰ γίνῃ τὸ διάγραμμα τῆς διατάξεως.

40. Εἶναι ὀλικῶς διατεταγμένο τὸ  $N$  μέ διάταξη κατὰ μέγεθος; Γιατί;

41. Ἐξηγήστε γιατί εἶναι ὀλικῶς διατεταγμένο τὸ σύνολο τῶν ρητῶν τῆς ἀριθμητικῆς μέ διάταξη κατὰ μέγεθος.



σχ. 13.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

### Α'. ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΡΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

#### 1. ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ $Q_0^+$ ΤΩΝ ΡΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ).

§ 19. Μάθαμε στην Α' τάξη για τους ρητούς αριθμούς, τις πράξεις τους και τις ιδιότητες των πράξεων.

Παρακάτω θα επαναλάβουμε μερικούς γνωστούς κανόνες για τους ρητούς αριθμούς και για τις πράξεις τους.

Το σύνολο  $Q_0^+ = \{0, \dots, \frac{1}{2}, \dots, \frac{3}{4}, \dots, 1, \dots, 2, \dots, 2\frac{1}{2}, \dots\}$


των ρητών τῆς ἀριθμητικῆς εἶναι ἡ ἔνωση τοῦ συνόλου  $N_0$  τῶν ἀκεραίων καὶ τοῦ συνόλου τῶν μὴ ἀκεραίων πηλίκων ἑνὸς ἀκεραίου διὰ ἑνὸς φυσικοῦ. Ἔχομε:

$$Q_0^+ = N_0 \cup \{ \chi/\lambda \text{ δὲν εἶναι ἀκέραιο πηλίκο ἑνὸς ἀκερ. διὰ ἑνὸς φυσικοῦ} \}.$$

Ἡ ἔνωση αὐτῶν τῶν δύο συνόλων δίνει περιγραφικὰ τὸ  $Q_0^+$ , ὡς ἑξῆς:


$$Q_0^+ = \{ \chi/\lambda = \frac{\alpha}{\beta} \text{ ὅταν } \alpha \in N_0, \beta \in N \text{ καὶ } \frac{\alpha}{\beta} \text{ ἀνάγωγο} \}.$$

Στὸ σχῆμα 14 ἔχομε τὴ γραφικὴ παράσταση τῶν ρητῶν στὴν ἡμιευθεία AX καὶ στὸ σχῆμα 15 τὸ διάγραμμα τοῦ συνόλου  $Q_0^+$ .



σχ. 14.

§ 20. Ἄν δοθοῦν δύο ρητοὶ  $\alpha$  καὶ  $\beta$ , τότε ὑπάρχει πάντοτε ὁ ρητὸς  $\alpha + \beta$ . Δηλαδή μπορούμε νὰ ἐκτελέσουμε τὴν πράξη τῆς προσθέσεως στὸ σύνολο τῶν ρητῶν τῆς ἀριθμητικῆς καὶ νὰ βροῦμε σὰν ἄθροισμά τους ἕναν ρητό. Αὐτὸ ὁμως δὲν συμβαίνει



σχ. 15.

στην πράξη τῆς ἀφαιρέσεως. Ἡ διαφορὰ  $\alpha - \beta$  ὑπάρχει, ἂν  $\alpha \geq \beta$ . Ἐπομένως δὲν μπορούμε νὰ ἐκτελέσουμε πάντοτε τὴν πράξη τῆς ἀφαιρέσεως, ἢ λέμε ὅτι ἡ ἀφαίρεση δὲν εἶναι πάντοτε δυνατὴ στὸ σύνολο τῶν ρητῶν τῆς ἀριθμητικῆς.

Ἄν ἡ διαφορὰ  $\alpha - \beta$  ὑπάρχει καὶ εἶναι ὁ ρητὸς  $\gamma$ , τότε, ὅπως εἶναι γνωστό, ἔχομε:  $\alpha - \beta = \gamma \Leftrightarrow \alpha = \beta + \gamma \Leftrightarrow \alpha - \gamma = \beta$ . Ἐπίσης ἂν  $\gamma$ ,  $\delta$  εἶναι ρητοί, ὑπάρχει πάντοτε ὁ ρητὸς  $\gamma \cdot \delta$  καὶ ἂν  $\gamma \neq 0$ , ὑπάρχει ὁ ρητὸς  $\frac{1}{\gamma}$  (ἀντίστροφος τοῦ  $\gamma$ ) καὶ ἔχομε  $\delta : \gamma = \delta \cdot \frac{1}{\gamma}$ .

§ 21. Τὸ μηδὲν «0» εἶναι τὸ οὐδέτερο στοιχεῖο τῆς προσθέσεως:  $0 + \alpha = \alpha$ , σὰν παράγοντας μηδενίζει τὸ γινόμενο:  $0 \cdot \alpha = 0$  καὶ δὲν θεωρεῖται ποτὲ σὰν διαιρέτης. Ἡ μονάδα «1» εἶναι τὸ οὐδέτερο στοιχεῖο τοῦ πολλαπλασιασμοῦ:  $1 \cdot \alpha = \alpha$ .

§ 22. Οἱ πράξεις τῆς προσθέσεως καὶ τοῦ πολ./σμοῦ εἶναι μονότιμες. Δηλαδή τὸ ἄθροισμα καὶ τὸ γινόμενο δύο ρητῶν εἶναι ἕνας μόνος ρητός. (Τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ μὲ τὴν ἀφαίρεση, ἂν εἶναι δυνατὴ). Γιατί, ἀφοῦ ἡ διαφορὰ  $18 - 5$  ἢ  $13$  εἶναι τέτοια, ὥστε τὸ ἄθροισμά της μὲ τὸν ἀφαιρετέο  $5$  νὰ δίνει τὸν μειωτέο  $18$ , δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρχει ἄλλη διαφορὰ, γιὰ τὸν λόγο ὅτι ἡ πρόσθεση εἶναι μονότιμη. Ὁμοίως καὶ ἡ διαίρεση  $\alpha : \beta$  ( $\beta \neq 0$ ) εἶναι μονότιμη, γιατί  $\alpha : \beta = \alpha \cdot \frac{1}{\beta}$  καὶ ὁ πολλαπλασιασμός δύο ρητῶν εἶναι πράξη μονότιμη).

Ὁ παρακάτω πίνακας περιέχει τὶς κυριότερες ιδιότητες τῶν πράξεων συμβολικά.

Οἱ $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{Q}_0^+$		
Πράξεις	Πρόσθεση	Πολ./μὸς
Ἐπιμέτρηση ἄθροισμ. καὶ γινομένου	$(\alpha + \beta) \in \mathbb{Q}_0^+$	$(\alpha \cdot \beta) \in \mathbb{Q}_0^+$
Ἀντιμεταθ. ιδιότητα	$\alpha + \beta = \beta + \alpha$	$\alpha \cdot \beta = \beta \cdot \alpha$
προσεταιρ. ιδιότητα	$(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma)$	$(\alpha \cdot \beta) \cdot \gamma = \alpha \cdot (\beta \cdot \gamma)$
Ἐπιμεριστ. ιδιότητα	$\alpha \cdot (\beta + \gamma) = \alpha \cdot \beta + \alpha \cdot \gamma$	

### Ἀσκήσεις:

42. α) Ἀπλοποιήστε τὰ κλάσματα:

$$\frac{24}{27}, \frac{15}{14}, \frac{55}{30}, \frac{12}{30}, \frac{35}{35}, \frac{42}{21}, \frac{11}{33}, \frac{9}{18}$$

β) Κάνετε τις παρακάτω πράξεις:

$$\frac{3}{4} + \frac{2}{5}, \quad \frac{7}{6} + \frac{8}{9}, \quad \frac{13}{4} - \frac{5}{16}, \quad \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{5}, \quad \frac{7}{3} \cdot \frac{9}{14}, \quad \frac{11}{8} \cdot \frac{0}{4},$$

$$\frac{12}{13} : \frac{4}{13}, \quad \frac{15}{16} : \frac{1}{4}$$

43. Ποιές από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές, ποιές λαθεμένες και γιατί;

α)  $(17:15,2) \in \mathbb{Q}_0^+$ , β)  $\frac{5}{8} - \frac{3}{8} = \frac{3}{8} - \frac{5}{8}$ , γ)  $200:40 = 40:200$ ,

δ)  $205 \cdot \left(\frac{1}{3} + 19\right) = 205 \cdot \left(19 + \frac{1}{3}\right)$ , ε)  $(97-98) \in \mathbb{N}_0$ ,

στ)  $\frac{3}{4} + 8 = \left(\frac{3}{4} + 8\right) \cdot \left(\frac{3}{4} + \frac{1}{4}\right)$

ζ)  $\left(\frac{7}{13} + \frac{3}{7}\right) + 1 = \frac{7}{13} + \left(\frac{3}{7} + 1\right)$ , η)  $\left(15\frac{1}{2} - \frac{31}{2}\right) \in \mathbb{Q}_0^+$

θ)  $0,5 \cdot \left(7 \cdot \frac{1}{3}\right) = \left(0,5 \cdot 7\right) \cdot \frac{1}{3}$

44. Να εκτελεσθούν οι παρακάτω πράξεις:

α)  $\left(\frac{3}{4} + \frac{2}{3}\right) : 2\frac{2}{3} + \left(4\frac{1}{3} - \frac{1}{2}\right) : \frac{2}{5}$ ,

β)  $\left[\left(\frac{3}{16} + \frac{2}{8} + \frac{3}{4}\right) : \frac{3}{2} - \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right) : \frac{3}{4}\right] \cdot 10\frac{2}{7}$ ,

γ)  $2\frac{1}{3} \cdot \left(\frac{7}{8} - \frac{1}{2}\right) - \frac{3}{8} \cdot \left(2 - \frac{3}{4}\right)$ ,

δ)  $\left(5\frac{7}{26} - 1\frac{4}{39}\right) : \left(6\frac{2}{9} - 4\frac{5}{6}\right)$

## 2. ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΡΗΤΩΝ

§ 23. Θα προσπαθήσουμε να επιλύσουμε τα παρακάτω προβλήματα.

α) Στην πόλη Α η θερμοκρασία το μεσημέρι ήταν 10 βαθμοί πάνω από το μηδέν. Το βράδυ η θερμοκρασία είχε κατεβεί κατά 7 βαθμούς. Ποιά ήταν η θερμοκρασία το βράδυ;

\*Έχουμε: 10 βαθμ. - 7 βαθμ. = 3 βαθμ. πάνω από το μηδέν.

\*Άρα η θερμοκρασία το βράδυ στην πόλη Α ήταν 3 βαθμοί πάνω από το μηδέν.

β) Η θερμοκρασία το μεσημέρι στην πόλη Β ήταν 6 βαθμοί πάνω από το μηδέν. Το βράδυ η θερμοκρασία είχε κατεβεί κατά 8 βαθμούς. Ποιά ήταν η θερμοκρασία στην πόλη Β το βράδυ;

\*Αν ονομάσουμε χ βαθμούς τη θερμοκρασία το βράδυ στην πόλη Β,



Οί αντίθετοι τῶν  $1, 3, 4, \frac{1}{2}$  καὶ  $\frac{3}{4}$  παριστάνονται ἀντιστοίχως μὲ  $-1, -3, -4, -\frac{1}{2}$  καὶ  $-\frac{3}{4}$  καὶ ἔχομε:  $1+(-1)=0, 3+(-3)=0, (-4)+4=0, \frac{1}{2}+(-\frac{1}{2})=0$  καὶ  $\frac{3}{4}+(-\frac{3}{4})=0$ .

Οἱ ἀριθμοὶ  $-1, -2, -3, -4, -\frac{1}{2}, -\frac{3}{4}$  κ.λ.π. δὲν ἀνήκουν στὸ σύνολο  $Q_0^+$  τῶν ρητῶν τῆς ἀριθμητικῆς. Γι' αὐτὸ ὀρίζομε τὸ σύνολο τῶν ἀρνητικῶν ρητῶν, τὸ ὁποῖο ἔχει στοιχεῖα τοὺς ἀριθμοὺς  $-1, -2, -3, -\frac{1}{2}, -\frac{3}{4}$ , καὶ γενικῶς τὸν ἀριθμὸ  $-a$  ὅπου  $a \in Q_0^+$ .

Τὸ σύνολο αὐτὸ τὸ συμβολίζομε μὲ τὸ  $Q^-$  καὶ ἔχει τὰ στοιχεῖα τοῦ συνόλου  $Q^+$ , μπροστὰ ἀπὸ τὰ ὁποῖα ἔχομε θέσει τὸ πρόσσημο πλὴν  $(-)$ . Δηλαδὴ τὰ ἀντίθετα τῶν στοιχείων τοῦ  $Q^+$ .

Στοιχεῖα τοῦ  $Q^+$ :  $1, \dots, \frac{1}{2}, \dots, \frac{3}{4}, \dots, 2, \dots, 2\frac{1}{2}, \dots, 3, \dots$

Στοιχεῖα τοῦ  $Q^-$ :  $-1, \dots, -\frac{1}{2}, \dots, -\frac{3}{4}, \dots, -2, \dots, -2\frac{1}{2}, \dots, -3, \dots$



σχ. 16.

Σύμφωνα μὲ αὐτὰ ἐκφράζομε τὴ λύση τοῦ πρώτου προβλήματος ὡς ἑξῆς: «Ἡ θερμοκρασία τὸ βράδυ θὰ εἶναι  $+3$  βαθμοί».

Στὸ σύνολο  $Q^+$  ἀνήκουν τώρα οἱ ἀριθμοὶ  $+1, +\frac{1}{2}, +2$  κ.λ.π., τοὺς ὁποῖους ὀνομάζομε θετικούς ρητούς καὶ τὸ σύνολο  $Q^+$  σύνολο τῶν θετικῶν ρητῶν.

Ἔχομε τώρα:

§ 24. Παρατηροῦμε στὸ θερμόμετρο (σχ. 16) ὅτι τὸ ἄκρο τῆς ὑδραργυρικῆς στήλης περνᾷ μπροστὰ ἀπὸ τοὺς νέους ἀριθμοὺς  $-1, -2, -3$ , κ.λ.π., ὅταν ἡ θερμοκρασία ἀρχίζοντας ἀπὸ τὸ μηδὲν ἐλαττώνεται. (Αὐτὸ δικαιολογεῖ γιὰ ποῖο λόγο διαλέξαμε τὸ πρόσσημο πλὴν « $-$ », γιὰ νὰ παραστήσουμε τοὺς νέους ἀριθμοὺς).

Γιὰ νὰ περάσει ὁμως τὸ ἄκρο τῆς ὑδραργυρικῆς στήλης μπροστὰ ἀπὸ τοὺς ἀριθμοὺς, ποὺ εἶναι πάνω ἀπὸ τὸ μηδὲν, πρέπει ἡ θερμοκρασία, ἀρχίζοντας ἀπὸ τὸ μηδὲν, νὰ αὐξάνει. Γι' αὐτὸν τὸ λόγο γιὰ τὴν παράσταση τῶν γνωστῶν μας ἀριθμῶν τοῦ  $Q^+$  θὰ χρησιμοποιήσουμε τὸ πρόσσημο σὺν « $+$ ».



Στοιχεία του συνόλου  $Q^+$  :  $+1, \dots, +\frac{1}{2}, \dots, +2, \dots, +\frac{5}{2}, \dots, +3, \dots$

Στοιχεία του συνόλου  $Q^-$  :  $-1, \dots, -\frac{1}{2}, \dots, -2, \dots, -\frac{5}{2}, \dots, -3, \dots$

Τὰ στοιχεῖα τοῦ συνόλου τῶν ἀρνητικῶν ρητῶν ἀπὸ τὸν ὀρισμὸ τῆς ἀντιστοιχοῦν ἓνα πρὸς ἓνα στὰ στοιχεῖα τοῦ συνόλου  $Q^+$ .

Τὰ στοιχεῖα τοῦ  $Q^-$  λέγονται ἀντίθετα (ἢ συμμετρικὰ) τῶν ἀντίστοιχων στοιχείων τοῦ  $Q^+$  ὅπως ἐπίσης καὶ τὰ στοιχεῖα τοῦ  $Q^+$  λέγονται ἀντίθετα τῶν ἀντίστοιχων στοιχείων τοῦ  $Q^-$ .

Π.χ. Ὁ ἀντίθετος τοῦ  $+\frac{5}{2}$  εἶναι ὁ  $-\frac{5}{2}$  καὶ ὁ ἀντίθετος τοῦ  $-\frac{5}{2}$  εἶναι ὁ  $+\frac{5}{2}$ . Αὐτοὶ ἔχουν ἄθροισμα μηδέν

$$\left(+\frac{5}{2}\right) + \left(-\frac{5}{2}\right) = 0 \quad \eta \quad \left(-\frac{5}{2}\right) + \left(+\frac{5}{2}\right) = 0.$$

Ὁ μηδέν δὲν ἀνήκει στὸ  $Q^+$  οὔτε στὸ  $Q^-$  καὶ συνεπῶς δὲν ἔχει πρόσημο. (Δὲν γράφομε  $+0$  ἢ  $-0$ )

Ἀντίθετος ὁμως τοῦ μηδενὸς εἶναι ὁ μηδέν, διότι  $0+0=0$ .

**§ 25** Ἄν συνοψίσουμε τὰ παραπάνω, ἔχομε:

1) Τὸ γνωστὸ μας σύνολο  $Q^+$  (τῶν ρητῶν τῆς ἀριθμητικῆς ἐκτὸς ἀπὸ τὸ μηδέν) τὸ ὀνομάσαμε σύνολο τῶν θετικῶν ρητῶν καὶ μπροστὰ ἀπὸ τὰ στοιχεῖα του θέσαμε τὸ πρόσημο σὺν «+»

Εἶναι:

$$\text{Σύνολο θετικῶν ρητῶν} = Q^+ = \left\{ \dots, +\frac{1}{2}, \dots, +1, \dots, +2, \dots \right\}.$$

**Σημείωση:** Στὰ ἐπόμενα ὁ θετικὸς ρητὸς θὰ γράφεται μὲ τὸ πρόσημό του ἢ χωρὶς αὐτὸ (π.χ. ὁ θετικὸς  $\frac{1}{2}$  θὰ γράφεται  $+\frac{1}{2}$  ἢ  $\frac{1}{2}$ ). Τὸ πρόσημο σὺν θὰ τὸ θέτομε στὸν θετικὸ ἀριθμὸ, ἂν θέλομε νὰ δώσουμε μεγαλύτερη ἐμφαση στὴν ἐκφραση «θετικός».

Ὡστε: **Θετικὸς ρητὸς λέγεται κάθε ρητὸς τῆς ἀριθμητικῆς ἐκτὸς ἀπὸ τὸ μηδέν.** Μπροστὰ ἀπ' αὐτὸν θέτομε τὸ πρόσημο σὺν «+» ἢ κανένα πρόσημο.

2) Ὅρισame ἓνα νέο σύνολο, τὸ ὁποῖο ὀνομάσαμε σύνολο τῶν ἀρνητικῶν ρητῶν, ἀπὸ τὰ στοιχεῖα τοῦ συνόλου τῶν ρητῶν τῆς ἀριθμητικῆς, στὰ ὁποῖα ἐθέσαμε μπροστὰ τὸ πρόσημο πλὴν «-».

Ὡστε: **Ἀρνητικὸς ρητὸς λέγεται κάθε ἀντίθετος θετικὸς ρητοῦ.** Συμβολικά: **κάθε ρητὸς τῆς ἀριθμητικῆς (ἐκτὸς ἀπὸ τὸ μηδέν) ὁ ὁποῖος ἔχει τὸ πρόσημο πλὴν «-».**

Είναι: Σύνολο ἀρνητικῶν ρητῶν =  $Q^- = \{\dots, -\frac{1}{2}, \dots, -1, \dots, -2, \dots\}$ .

3) Μεταξὺ τῶν στοιχείων τῶν συνόλων  $Q^+$  καὶ  $Q^-$  ὑπάρχει ἀμφοσήμεντη ἀντιστοιχία. Τὰ ἀντίστοιχα στοιχεῖα εἶναι αὐτὰ ποὺ ἐγίναν ἀπὸ τὸ ἴδιο στοιχεῖο τοῦ συνόλου τῶν ρητῶν τῆς ἀριθμητικῆς καὶ λέγονται ἀντίθετα στοιχεῖα.

Ὡστε: **Κάθε θετικὸς ρητὸς ἔχει ἓναν καὶ μόνο ἓναν ἀρνητικὸ ὡς ἀντίθετό του. Καὶ κάθε ἀρνητικὸς ἔχει ἓναν καὶ μόνο ἓναν θετικὸ ὡς ἀντίθετό του.**

### Ἀσκήσεις :

45. Ἀπαντήστε στὰ παρακάτω ἐρωτήματα:

α) Ἀνήκει ὁ μηδὲν στὸ σύνολο  $Q^+$  ἢ στὸ  $Q^-$ ;

β) Ποιοὶ εἶναι οἱ ἀντίθετοι τῶν :  $+\frac{35}{17}$ ,  $-20$ ,  $+\frac{17}{20}$ ,  $-\frac{25}{2}$ ,  $+16$ ,  $15$ ,  $\frac{1}{2}$ .

46. Ποιοὶ εἶναι οἱ ἀρνητικοὶ ρητοὶ  $\chi$ ,  $\psi$ ,  $z$ ,  $\omega$ ,  $\phi$ , γιὰ τοὺς ὁποίους ἔχομε:


$$\chi + \frac{7}{8} = 0, \quad \frac{11}{3} + \psi = 0, \quad \frac{1}{5} + z = 0, \quad \omega + 10,3 = 0, \quad \phi + 12 = 0;$$

47. Ποιοὶ εἶναι οἱ θετικοὶ ρητοὶ  $\kappa$ ,  $\lambda$ ,  $\mu$ ,  $\nu$ , γιὰ τοὺς ὁποίους ἔχομε:

$$-\frac{8}{9} + \kappa = 0, \quad \lambda + \left(-\frac{2}{7}\right) = 0, \quad \mu + (-100) = 0, \quad -\frac{35}{2} + \nu = 0;$$

48. Ποιὸν κανόνα ξέρετε γιὰ τοὺς ἀντίθετους ρητούς;

### 3. ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ Q ΤΩΝ ΡΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ



σχ. 17α καὶ 17β.


§ 26. Το σχήμα 17α παριστάνει την ήμιευθεία  $AX$ , στην οποία έχουν τοποθετηθεί με τὸν γνωστό τρόπο οἱ ρητοὶ τῆς ἀριθμητικῆς.

Στὸ σχήμα 17β γίνεται ἐπέκταση τῆς ήμιευθείας  $AX$  κατὰ τὴν ἀντικείμενὴ τῆς  $AX'$  καὶ σχηματίζεται ἡ εὐθεΐα  $X'AX$ . Οἱ ρητοὶ τῆς ἀριθμητικῆς (ἐκτὸς ἀπὸ τὸ μηδέν), οἱ ὁποῖοι εἶναι τοποθετημένοι στὴν  $AX$ , λέγονται τώρα θετικοὶ ρητοὶ.

Στὴν ήμιευθεία  $AX'$ μποροῦν νὰ τοποθετηθοῦν (στὸ σχήμα ἔχουν τοποθετηθεῖ) οἱ ἀντίθετοι τῶν ρητῶν τῆς ἀριθμητικῆς, οἱ ἀρνητικοί, μετέτοιον τρόπο, ὥστε κάθε ἀρνητικὸς νὰ τοποθετεῖται σ' ἓνα σημεῖο ἀριστερὰ τοῦ  $A$ , τὸ ὁποῖο νὰ ἀπέχει ἀπὸ τὸ  $A$  ὅσο ἀπέχει καὶ τὸ σημεῖο, στὸ ὁποῖο ἔχει τοποθετηθεῖ ὁ ἀντίθετός του θετικὸς.

Ὡστε οἱ ἀντίθετοι ἀριθμοὶ τοποθετοῦνται στὴν  $X'AX$  συμμετρικὰ ὡς πρὸς τὸ σημεῖο  $A$ .

Μποροῦμε ἀπὸ αὐτὸ νὰ παρατηρήσουμε ὅτι κάθε θετικὸς εἶναι δεξιὰ τοῦ μηδενὸς καὶ κάθε ἀρνητικὸς εἶναι ἀριστερὰ τοῦ μηδενὸς.



σχ. 17γ.

Στὸ σχήμα 17γ ἔχομε τοποθετήσει σὲ μιὰ εὐθεΐα: α) Τὸ σύνολο τῶν ἀρνητικῶν ρητῶν, β) τὸ σύνολο τὸ ὁποῖο ἔχει στοιχεῖο μόνον τὸ μηδέν καὶ γ) τὸ σύνολο τῶν θετικῶν ρητῶν.

Ἡ ἔνωση τῶν τριῶν αὐτῶν συνόλων δίνει ἓνα νέο σύνολο  $Q$  ( $Q = Q^- \cup \{0\} \cup Q^+$ ), τὸ ὁποῖο λέγεται **σύνολο τῶν ρητῶν πραγματικῶν ἀριθμῶν**.

**Σημείωση α':** Ὁ τρόπος μετὸν ὁποῖο παραστήσαμε τοὺς ρητοὺς στὴν εὐθεΐα  $X'AX$  σημαίνει ὅτι κάθε ρητὸς ἔχει τοποθετηθεῖ σ' ἓνα μόνον σημεῖο τῆς εὐθείας, χωρὶς αὐτὸ νὰ σημαίνει ὅτι σὲ κάθε σημεῖο τῆς ἔχει τοποθετηθεῖ ἓνας ρητὸς πραγματικὸς ἀριθμὸς.

**Σημείωση β':** Στὰ ἐπόμενα θὰ λέμε «ρητὸς» καὶ θὰ ἐννοοῦμε «πραγματικὸς ρητὸς».

**Σημείωση γ':** Σὲ παλαιότερα βιβλία οἱ πραγματικοὶ ρητοὶ λέγονταν σχετικοὶ (ρητοὶ) ἀριθμοὶ.

§ 27. Ὑποσύνολα τοῦ  $Q$  (συνόλου τῶν ρητῶν) εἶναι τὰ  $Q^-$ ,  $\{0\}$ ,  $Q^+$ .


Ὁμοίως ὑποσύνολα τοῦ  $Q$  εἶναι τὸ σύνολο τῶν ἀρνητικῶν ἀκεραίων, τὸ ὁποῖο συμβολίζομε μὲ τὸ  $Z^-$  (αὐτὸ εἶναι ὑποσύνολο καὶ τοῦ  $Q^-$ ) καὶ τὸ σύνολο τῶν θετικῶν ἀκεραίων, τὸ ὁποῖο συμβολίζομε μὲ τὸ  $Z^+$  (τὸ  $Z^+$  εἶναι ὑποσύνολο καὶ τοῦ  $Q^+$ ). Ἡ ἔνωση τῶν συνόλων  $Z^-$ ,  $\{0\}$ ,  $Z^+$  δίνει τὸ σύνολο τῶν ἀκεραίων, τὸ ὁποῖο συμβολίζομε μὲ τὸ  $Z$ .

$$\underbrace{\{\dots, -4, -3, -2, -1\}}_{Z^-} \cup \{0\} \cup \underbrace{\{+1, +2, +3, +4, \dots\}}_{Z^+}$$

$$\underbrace{\qquad \cup \{0\} \cup \qquad}_{Z}$$

Ὡστε  $Z = Z^- \cup \{0\} \cup Z^+$

Τὸ σχῆμα 176 εἶναι τὸ διάγραμμα τοῦ συνόλου  $Q$  τῶν ρητῶν ἀριθμῶν.



σχ. 176.

### Ἀνακεφαλαίωση :

1. Οἱ ἀρνητικοὶ ρητοί, τὸ μηδέν καὶ οἱ θετικοὶ ρητοὶ λέγονται ρητοὶ ἀριθμοὶ καὶ τὸ σύνολό τους συμβολίζεται μὲ  $Q$ .

Τὰ στοιχεῖα τοῦ  $Q$  μέσα σὲ ἄγκιστρα γράφονται καὶ ὡς ἑξῆς:

$$Q = \left\{ 0, \pm \frac{1}{2}, \pm 1, \pm \frac{3}{2}, \pm 2, \pm 3, \dots \right\}$$

2. Οἱ ἀρνητικοὶ ἀκέραιοι, τὸ μηδέν καὶ οἱ θετικοὶ ἀκέραιοι λέγονται ἀκέραιοι ἀριθμοὶ καὶ τὸ σύνολό τους συμβολίζεται μὲ τὸ  $Z$ .

Τὰ στοιχεῖα τοῦ  $Z$  μέσα σὲ ἄγκιστρα γράφονται, μὲ συντομία καὶ ὡς ἑξῆς:

$$Z = \{0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots\}$$


### § 28. Ἐφαρμογές:

Τοὺς ρητοὺς ἀριθμοὺς τοὺς χρησιμοποιοῦμε στὰ προβλήματα τῆς καθημερινῆς ζωῆς.

1. Το θερμόμετρο α σχ. 18 δείχνει 1 βαθμό πάνω από το μηδέν.

“Αν καλυφθεί ή θερμομετρική κλίμακα (σχ. 18β) με τέτοιον τρόπο, ώστε να φαίνεται μόνο το άκρο της υδραργυρικής στήλης και ο αριθμός της κλίμακας, ο οποίος είναι παραπλεύρως (ό «1»), δεν μπορούμε να απαντήσουμε με βεβαιότητα αν ή θερμοκρασία είναι 1 βαθμός πάνω από το μηδέν ή 1 βαθμός κάτω από το μηδέν.

“Όμως με το θερμόμετρο γ δεν αντιμετωπίζουμε αυτή τη δυσκολία, γιατί, αν το άκρο της υδραργυρικής στήλης είναι στον  $-1$ , θα καταλάβουμε ότι ή θερμοκρασία είναι 1 βαθμός κάτω από το μηδέν, αν είναι στον  $+1$ , ή θερμοκρασία είναι 1 βαθμός πάνω από το μηδέν.



σχ. 18.

2. ‘Ο ταμίας μπορεί να αντικαταστήσει τις εκφράσεις: «πληρωμή 2.000 δρχ», «είσπραξη 1800 δρχ.» με τούς ρητούς  $-2000$  δρχ. και  $+1800$  δρχ. αντίστοιχως.

3. Οί χρονολογίες πρό Χριστού μπορούν να παρασταθούν με αρνητικούς ρητούς και οί χρονολογίες μ.Χ. με θετικούς ρητούς. Π.χ. αν γράψουμε  $-300$  έτη, έννοούμε 300 έτη π.Χ., ενώ αν γράψουμε  $+1900$  έτη (ή 1900 έτη), έννοούμε 1900 έτη μ.Χ.

4. Για το κέρδος και ή ζημία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τούς ρητούς αριθμούς.

### Άσκήσεις:

49. ‘Απαντήστε στα παρακάτω έρωτήματα:

- ‘Ο μηδέν άνήκει στο Q;
- ‘Ο μηδέν άνήκει στο Z;
- Ποιά είναι ή τομή και ή ένωση τών συνόλων  $Z^-$ ,  $Z^+$ ;
- Ποιά είναι ή τομή και ή ένωση τών συνόλων  $Q^-$ ,  $Q^+$ ;
- Τό σύνολο Z είναι ύποσύνολο του συνόλου  $Q^+$  ή του  $Q^-$ ;
- Διαμερίστε τά σύνολα Q και Z σε γνωστά σας ύποσύνολα.

50. Χρησιμοποιήστε τούς ρητούς για να έκφράσετε σύντομα τά παρακάτω:

$3\frac{1}{2}$  m κάτω από την έπιφάνεια της θάλασσας.

500 m πάνω από την έπιφάνεια της θάλασσας.

Κέρδος 2600 δρχ., ζημία 3500 δρχ.

Χρονολογία της μάχης τών Θερμοπυλών.

Χρονολογία της κηρύξεως της έλληνικής έπαναστάσεως.

“Έτος γενήσεως του Χριστού.

51. Βρείτε παραδείγματα, στα όποια να χρησιμοποιούνται οί ρητοί αριθμοί.

#### 4. ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΙΜΗ ΡΗΤΟΥ - Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ.

##### § 29. Ἀπόλυτη τιμή ρητού.

Ἀπόλυτους ρητούς ονομάζομε τοὺς ρητούς τῆς ἀριθμητικῆς, ἔπομένως καὶ τοὺς θετικούς ρητούς.

Ὁ θετικός ἀριθμὸς πέντε γράφεται +5 ἢ 5, δηλαδή συμβολίζεται με τὸν ἀπόλυτο 5 καὶ τὸ πρόσημο σὺν μπροστά του ἢ μόνο με τὸν ἀπόλυτο 5.

Ὁ ἀπόλυτος ἀριθμὸς 5 λέγεται ἀπόλυτη τιμὴ τοῦ +5.

Αὐτὸ συμβολίζεται ὡς ἑξῆς:  $|+5| = 5$ .

Ὡστε ἀπόλυτη τιμὴ θετικοῦ ἀριθμοῦ ονομάζομε τὸν ἴδιο τὸν ἀριθμὸ.

Ὁ ἀρνητικὸς τρία γράφεται -3. Συμβολίζεται με τὸν ἀπόλυτο τρία καὶ τὸ πρόσημο - μπροστά του. Ὁ 3 λέγεται ἀπόλυτη τιμὴ τοῦ -3 καὶ συμβολίζεται με  $|-3|$ . Εἶναι:  $|-3| = 3$  καὶ διαβάζεται «ἀπόλυτη τιμὴ τοῦ πλὴν τρία ἴσον 3».

Ὡστε ἀπόλυτη τιμὴ ἑνὸς ἀρνητικοῦ ἀριθμοῦ εἶναι ὁ ἀντίθετός του.

Ἐπειδὴ  $|+3| = 3$  καὶ  $|-3| = 3$ , ἔχομε  $|+3| = |-3|$  (γιατί;)

Ἀπόλυτὴ τιμὴ τοῦ μηδενὸς εἶναι τὸ μηδὲν  $|0| = 0$

Γενικά: ἂν α εἶναι θετικὸς ρητός, ἔχομε  $|α| = α$ ,  
 ἂν α εἶναι ἀρνητικὸς ρητός, ἔχομε  $|α| = ὁ ἀντίθετος τοῦ α$   
 καὶ ἂν α εἶναι μηδέν, ἔχομε  $|α| = 0$ .

##### Ἐφαρμογές :

α) Νὰ βρεθῆ ἡ ἀπόλυτη τιμὴ τῶν ρητῶν:

$$-\frac{7}{2}, -\frac{1}{8}, +\frac{3}{5}, +2\frac{4}{9}, +3, 6, \frac{4}{5}, 0.$$

$$\text{Ἐχομε: } \left|-\frac{7}{2}\right| = \frac{7}{2}, \left|-\frac{1}{8}\right| = \frac{1}{8}, \left|+\frac{3}{5}\right| = \frac{3}{5},$$

$$\left|+2\frac{4}{9}\right| = 2\frac{4}{9}, |+3| = 3, |6| = 6, \left|\frac{4}{5}\right| = \frac{4}{5}, |0| = 0.$$

β) Ἄν  $|χ-1| = 12$  καὶ  $χ-1$  εἶναι θετικὸς ρητός, νὰ βρεθῆ ὁ  $χ$ .

Ἐπειδὴ  $χ-1$  εἶναι θετικὸς, ἔχομε  $|χ-1| = χ-1$ . Ἄρα  $|χ-1| = χ-1 = 12 \Leftrightarrow χ = 12 + 1 \Leftrightarrow χ = 13$ .

##### § 30. Συμβολισμὸς ρητοῦ με ἓνα γράμμα.

Ὅπως εἶδαμε, συμβολίσαμε ἓναν ὁποιοδήποτε ρητὸ με ἓνα γράμμα α.

Μποροῦμε πάντοτε νὰ συμβολίζομε με γράμματα τοὺς ρητούς ἀριθμούς.

Όταν λέμε ότι ο  $\beta$  είναι ρητός αριθμός, θα έννοούμε ότι μπορούμε να αντικαταστήσουμε τον  $\beta$  με οποιοδήποτε ρητό αριθμό, δηλαδή θετικό, αρνητικό ή μηδέν.

Ἡ ἔκφραση «ο  $\beta$  είναι θετικός» συμβολίζεται:  $\beta = +|\beta|$

Ἡ ἔκφραση «ο  $\beta$  είναι αρνητικός» συμβολίζεται:  $\beta = -|\beta|$

§ 31. Δύο ή περισσότεροι θετικοί αριθμοί είναι όμοσημοι.

Δύο ή περισσότεροι αρνητικοί αριθμοί είναι όμοσημοι.

Ένας θετικός και ένας αρνητικός είναι ἑτερόσημοι.

Π.χ. ο  $+\frac{3}{4}$  και ο  $-\frac{2}{3}$  είναι ἑτερόσημοι,

ο  $-2$  και ο  $+\frac{1}{2}$  είναι ἑτερόσημοι,

ο  $3$  και ο  $-4$  είναι ἑτερόσημοι

Οἱ ἀριθμοί:  $+\frac{3}{2}, +2, +1, \frac{4}{7}, 8$  είναι όμοσημοι.

Οἱ ἀριθμοί:  $-\frac{3}{10}, -4, -20, -2\frac{1}{4}, -5$  είναι όμοσημοι.

§ 32. Ἡ ἰσότητα στὸ σύνολο τῶν ρητῶν.

Ξέρουμε ότι τον αριθμό 8 μπορούμε να τον παραστήσουμε με τὰ σύμβολα  $8, \frac{16}{2}, 6+2, 2\cdot 4$  κ.λ.π.

Ἐπομένως  $8 = \frac{16}{2} = 6+2 = 2\cdot 4$ . Όταν λέμε ότι δύο ἀριθμοί  $\alpha$  και  $\beta$  τῆς ἀριθμητικῆς εἶναι ἴσοι, έννοούμε ότι πρόκειται γιὰ δύο διαφορετικούς συμβολισμούς τοῦ ἴδιου ρητοῦ.

Ἄν ἔχουμε τώρα τοὺς ρητοὺς  $+3$  και  $+\frac{6}{2}$ , παρατηροῦμε ὅτι ἔχουν ἴσες ἀπόλυτες τιμές (εἶναι  $|+3|=3$  και  $|+\frac{6}{2}|=\frac{6}{2}$ , ἄρα  $|+3|=|+\frac{6}{2}|$  ἢ  $3=\frac{6}{2}$ ) και τὸ ἴδιο πρόσσημο (εἶναι όμοσημοι).

Ἐπίσης οἱ ρητοὶ  $-\frac{2}{5}$  και  $-\frac{4}{10}$  ἔχουν ἴσες ἀπόλυτες τιμές και εἶναι όμοσημοι.

Τοὺς ρητοὺς, οἱ ὁποῖοι εἶναι όμοσημοι και ἔχουν ἴσες ἀπόλυτες τιμές, τοὺς ὀνομάζουμε ἴσους.

Ὅστε οἱ ρητοὶ  $\alpha$  και  $\beta$  λέγονται ἴσοι (συμβολικὰ  $\alpha=\beta$ ), ἂν και μόνο ἂν εἶναι όμοσημοι και ἔχουν ἴσες ἀπόλυτες τιμές.

Ὁ συμβολισμὸς  $\alpha=\beta$ , ὁ ὁποῖος σημαίνει ὅτι ὁ  $\alpha$  εἶναι ἴσος με τὸν  $\beta$ , λέγεται ἰσότητα.

Ἐπειδὴ ὁ  $-5 = -5$ , ἰσχύει ἡ ἀνακλαστική ιδιότητα τῆς ἰσότητος.

Ἐπίσης ἂν  $-5 = -\frac{10}{2}$ , εἶναι καὶ  $-\frac{10}{2} = -5$ . ἐπομένως ἰσχύει καὶ ἡ συμμετρική ιδιότητα τῆς ἰσότητος.

Τέλος ἂν  $-5 = -\frac{10}{2}$  καὶ  $-\frac{10}{2} = -\frac{15}{3} \Rightarrow -5 = -\frac{15}{3}$ , ἄρα ἰσχύει καὶ ἡ μεταβατική ιδιότητα τῆς ἰσότητος.

Ὡστε ἡ ἰσότητα τῶν ρητῶν ἀριθμῶν ἔχει τὶς γνωστὲς ιδιότητες:

$\alpha = \alpha$  (ἀνακλαστική ιδιότητα)

$\alpha = \beta \Rightarrow \beta = \alpha$  (συμμετρική ιδιότητα)

$\alpha = \beta$  καὶ  $\beta = \gamma \Rightarrow \alpha = \gamma$  (μεταβατική ιδιότητα)

### Ἀσκήσεις:

52. Νὰ βρεθεῖ ἡ ἀπόλυτη τιμὴ τῶν παρακάτω ρητῶν:

$$+ 8 - \frac{25}{3}, -\frac{13}{20}, +\frac{12}{3}, +\frac{1}{12}, \frac{11}{4}, 0$$

53. Ποιὸς ρητοὺς παριστάνουν τὰ  $\chi, \psi, z$ , ἂν:

$$|\chi| = 1, |\psi| = 0, |z| = \left| -\frac{3}{2} \right|;$$

54. α) Ἄν  $|\chi + 3| = 5$  καὶ  $\chi + 3$  εἶναι θετικὸς ρητός, νὰ βρεθεῖ ὁ  $\chi$ .

β) Ἄν  $|3\chi| = 0$ , νὰ βρεθεῖ ὁ  $\chi$ .

γ) Ἄν γιὰ τοὺς ρητοὺς  $\alpha, \beta, \gamma, \delta$  ἔχουμε  $\alpha + 1 = \beta + \gamma + \delta$  καὶ  $\beta + \gamma + \delta = 5$ , νὰ βρεθεῖ ὁ  $\alpha$ .

55. Ἐξετάστε ἂν οἱ ἀριθμοὶ  $\alpha$  καὶ  $\gamma$  εἶναι ὁμόσημοι ἢ ἐτερόσημοι στὶς παρακάτω περιπτώσεις.

1. Ὁ  $\alpha$  εἶναι ὁμόσημος τοῦ  $\beta$  καὶ ὁ  $\beta$  εἶναι ὁμόσημος τοῦ  $\gamma$ .
2. Ὁ  $\alpha$  εἶναι ὁμόσημος τοῦ  $\beta$  καὶ ὁ  $\beta$  εἶναι ἐτερόσημος τοῦ  $\gamma$ .
3. Ὁ  $\alpha$  εἶναι ἐτερόσημος τοῦ  $\beta$  καὶ ὁ  $\beta$  εἶναι ἐτερόσημος τοῦ  $\gamma$ .
4. Ὁ  $\alpha$  εἶναι ἐτερόσημος τοῦ  $\beta$  καὶ ὁ  $\beta$  εἶναι ὁμόσημος τοῦ  $\gamma$ .

## Β' ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΡΗΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ.

Οἱ πράξεις στὸ σύνολο  $Q$  εἶναι ἡ πρόσθεση, ἡ ἀφαίρεση, ὁ πολλαπλασιασμός καὶ ἡ διαίρεση.

### § 33. 1. ΠΡΟΣΘΕΣΗ

α) Ἐνα ἀεροπλάνο ἀνέβηκε ἀρχικὰ 3 km καὶ κατόπι ἄλλα 2 km. Σὲ ποῖο ὕψος ἀνέβηκε τελικὰ τὸ ἀεροπλάνο;

Εἶναι φανερό ὅτι τὸ ἀεροπλάνο ἀνέβηκε 5 km.



\*Αν χρησιμοποιήσουμε τους ρητούς αριθμούς, τότε η έκφραση «άνεβηκε 3 km» συμβολίζεται + 3 km, το ίδιο για την έκφραση «άνεβηκε 2 km» έχουμε + 2 km και για την «άνεβηκε 5 km» γράφουμε + 5 km.

\*Επειδή  $\text{άνεβηκε } 3 \text{ km} + \text{άνεβηκε } 2 \text{ km} = \text{άνεβηκε } 5 \text{ km}$ ,  
 έχουμε  $(+3 \text{ km}) + (+2 \text{ km}) = +5 \text{ km}$ .

\*Αν το αεροπλάνο κατέβαινε 3 km και 2 km, θα κατέβαινε τελικά 5 km.  
 \*Άρα  $(-3 \text{ km}) + (-2 \text{ km}) = -5 \text{ km}$ .

Συνεπώς το άθροισμα δύο όμοσημων ρητών είναι ρητός όμοσημος με αυτούς και έχει απόλυτη τιμή το άθροισμα των απόλυτων τιμών τους.

### Παραδείγματα.

$$(+5) + (+8) = +13 = +(5+8)$$

$$(-7) + (-3) = -10 = -(7+3)$$

$$\left(+\frac{6}{11}\right) + \left(+\frac{5}{11}\right) = +\frac{11}{11} = +\left(\frac{6}{11} + \frac{5}{11}\right)$$

$$\left(-\frac{3}{4}\right) + \left(-\frac{2}{4}\right) = -\frac{5}{4} = -\left(\frac{3}{4} + \frac{2}{4}\right)$$

Γενικά εάν  $\alpha$  και  $\beta$  είναι θετικοί, το άθροισμα  $\alpha + \beta$  είναι θετικός και η απόλυτη τιμή του ισούται με το άθροισμα των απόλυτων τιμών.

$$|\alpha + \beta| = |\alpha| + |\beta|.$$

(Αν  $\alpha$  και  $\beta$  είναι αρνητικοί, το  $\alpha + \beta$  είναι αρνητικός).

$\beta$ ) Γνωρίζουμε ότι το μηδέν είναι το ουδέτερο στοιχείο της προσθέσεως στο σύνολο  $\mathbb{Q}_0^+$ . Δηλαδή  $5+0 = 0+5 = 5$ , επομένως και  $(+5)+0 = 0+(+5) = +5$ .

\*Αν η θερμοκρασία είναι  $-2$  βαθμοί και ανεβεί κατά 0 βαθμούς, τελικά θα έχουμε θερμοκρασία  $-2$  βαθμούς.

\*Άρα  $(-2)+0 = -2$ . Όμοίως και  $0+(-2) = -2$ .

\*Ωστε το μηδέν είναι το ουδέτερο στοιχείο της προσθέσεως στο σύνολο των ρητών.

Συμβολικά: \*Αν  $\alpha \in \mathbb{Q} \Rightarrow \alpha + 0 = 0 + \alpha = \alpha$

$\gamma$ ) \*Αν η θερμοκρασία ανεβεί 3 βαθμούς και ύστερα κατεβεί 3 βαθμούς, τελικά δεν γίνεται καμιά μεταβολή της θερμοκρασίας. Δηλαδή:

$$(+3) + (-3) = 0.$$

**Το άθροισμα δύο αντίθετων ρητών ισούται με μηδέν.**

$\delta$ ) Νά βρεθεί το άθροισμα  $(-3) + (+7)$ .

Για να λύσουμε αυτό το πρόβλημα, θα στηριχτούμε στους κανόνες του αθροίσματος των όμοσημων και του αθροίσματος των αντίθετων ρητών.

Ἐπειδὴ  $+7 = +(3+4) = (+3)+(+4)$ ,  
 ἔχομε:  $(-3) + (+7) = (-3) + \underbrace{(+3) + (+4)}_0 = 0 + (+4) = +4 =$   
 $= +(7-3)$ .

Γιὰ νὰ βροῦμε τὸ ἄθροισμα  $(+3)+(-5)$ , ἐργαζόμαστε μὲ τὸν ἴδιο τρόπο. Δηλαδή

$-5 = -(3+2) = (-3)+(-2)$ , ἄρα  $(+3)+(-5) = (+3) + \underbrace{(-3)+(-2)}_0 =$   
 $= 0 + (-2) = -2 = -(5-3)$ .

Ἀπὸ τὰ παραπάνω παραδείγματα τοῦ ἄθροίσματος δύο ἐτερόσημων ρητῶν ἔχομε:

Τὸ ἄθροισμα δύο ἐτερόσημων ρητῶν εἶναι ρητὸς ὁμόσημος μὲ ἐκεῖνον ποὺ ἔχει τὴ μεγαλύτερη ἀπόλυτη τιμὴ καὶ ἡ ἀπόλυτη τιμὴ του ἰσοῦται μὲ τὴ διαφορά (τῆς μικρότερης ἀπὸ τὴν μεγαλύτερη) τῶν ἀπόλυτων τιμῶν τους.

#### Παραδείγματα.

$$(-12) + (+11) = -(12-11) = -1$$

$$(+10) + (-4) = +(10-4) = +6$$

$$\left(-\frac{7}{8}\right) + \left(+\frac{5}{8}\right) = -\left(\frac{7}{8}-\frac{5}{8}\right) = -\frac{2}{8}$$

Γενικά:

\*Ἄν  $\alpha \in \mathbb{Q}^+$ ,  $\beta \in \mathbb{Q}^-$  καὶ  $|\alpha| > |\beta| \Rightarrow \alpha + \beta = +(|\alpha| - |\beta|)$ , ὅπου  $|\alpha| - |\beta| > 0$ .

\*Ἄν  $\alpha \in \mathbb{Q}^+$ ,  $\beta \in \mathbb{Q}^-$  καὶ  $|\alpha| < |\beta| \Rightarrow \alpha + \beta = -(|\beta| - |\alpha|)$ , ὅπου  $|\beta| - |\alpha| > 0$

#### Ἐφαρμογές:

$$1. (+4) + (+2) = +6 = +(4+2), (+4) + (-7) = -3 = -(7-4)$$

$$(-2) + (-3) = -5 = -(2+3), (-3) + (+8) = +5 = +(8-3)$$

$$2. \left(-\frac{1}{6}\right) + \left(-\frac{5}{6}\right) = -\frac{6}{6} = -\left(\frac{1}{6} + \frac{5}{6}\right),$$

$$\left(-\frac{5}{3}\right) + \left(+\frac{2}{3}\right) = -\frac{3}{3} = -\left(\frac{5}{3} - \frac{2}{3}\right)$$

§ 34. Ἀπὸ τὰ πιὸ πάνω καὶ ἀπὸ τὰ προηγούμενα παραδείγματα παρατηροῦμε ὅτι ὑπάρχει πάντοτε τὸ ἄθροισμα δύο ρητῶν καὶ εἶναι μονότιμο (βρίσκεται μόνο μία τιμὴ του), γιατί ὁ ὑπολογισμὸς του ἀνάγεται στὴν πρόσθεση ἢ στὴν ἀφαίρεση τῶν ἀπόλυτων ἀριθμῶν.

Γενικά εάν  $a$  και  $\beta$  είναι ρητοί, υπάρχει ο ρητός  $(a+\beta)$  [συμβολικά:  $a, \beta \in \mathbb{Q} \Rightarrow (a+\beta) \in \mathbb{Q}$ ], ο οποίος λέγεται άθροισμα αυτών.


Τò άθροισμα δύο ρητών είναι μονότιμο.

Έπειδή  $(+2)+(-5) = -3$  και  $(-5)+(+2) = -3$ , έχουμε ότι  
 $(+2)+(-5) = (-5)+(+2)$ .

Όστε. Αν  $a$  και  $\beta$  είναι ρητοί, έχουμε  $a+\beta = \beta+a$  (μεταθετική ιδιότητα της προσθέσεως).


3. Παρακάτω δίνεται γεωμετρική εξήγηση τών προσθέσεων τής πρώτης εφαρμογής.

$$(+4)+(+2)=+6$$




σχ. 19.

$$(-2)+(-3)=-5$$




σχ. 20.

$$(+4)+(-7)=-3$$



σχ. 21.

$$(-3)+(+8)=+5$$



σχ. 22.

4. Αν προσθέσουμε και στα δύο μέλη τής ισότητας  $-3 = -\frac{6}{2}$  τόν  $+2$ , έχουμε

$$\alpha' \text{ μέλος } -3+(+2) = -1,$$

$$\beta' \text{ μέλος } -\frac{6}{2}+(+2) = -\left(\frac{6}{2}-2\right) = -1.$$

\*Άρα  $-3+(+2) = -\frac{6}{2}+(+2)$

$$\text{Γενικά } \alpha = \beta \Rightarrow \alpha + \gamma = \beta + \gamma \quad (\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{Q})$$

### Άσκησης:

56. Νά υπολογισθούν τὰ ἀθροίσματα:

$$\alpha) (+3) + \left(+\frac{1}{2}\right), \quad \beta) (-5) + (-19), \quad \gamma) (+12) + (-7),$$

$$\delta) (+7) + (-13,5), \quad \epsilon) \left(-\frac{1}{2}\right) + (+1), \quad \sigma\tau) \left(-\frac{13}{4}\right) + \left(-\frac{1}{2}\right),$$

$$\zeta) \left(+\frac{2}{5}\right) + \left(-\frac{3}{10}\right), \quad \eta) (-1) + \left(+\frac{3}{2}\right), \quad \theta) -\frac{4}{3} + \left(+\frac{1}{6}\right),$$

$$\iota) +\frac{5}{2} + \left(-\frac{3}{5}\right), \quad \iota\alpha) +\frac{3}{8} + \left(-\frac{87}{16}\right), \quad \iota\beta) +\frac{2}{5} + \left(-\frac{4}{7}\right).$$

57. Νά βρεθούν τὰ παρακάτω ἀθροίσματα με τὸν κανόνα τῆς προσθέσεως ὁμόσημων ρητῶν:

$$\alpha) (-3) + (-2) + (-1), \quad \beta) \left(-\frac{2}{5}\right) + \left(-\frac{2}{5}\right) + \left(-\frac{2}{5}\right),$$

$$\gamma) (-2) + (-2) + (-2), \quad \delta) -\frac{3}{4} + (-1) + \left(-\frac{3}{8}\right) + \left(-\frac{1}{2}\right).$$

(Γιὰ τὴν α' νὰ δοθεῖ καὶ γεωμετρικὴ ἐρμηνεία).

58. Ἄν  $\alpha, \beta, \gamma, \delta$  εἶναι ρητοί, νά ἐπαληθεύσετε με ἀριθμητικὰ παραδείγματα τὴν παρακάτω ἰδιότητα:

$$\alpha = \beta \quad \text{καὶ} \quad \gamma = \delta \Rightarrow \alpha + \gamma = \beta + \delta.$$

**Σημείωση:** Ἡ ἐργασία αὐτὴ λέγεται πρόσθεση τῶν δύο ἰσοτήτων κατὰ μέλη. Ἡ παραπάνω ἰδιότητα ἐκφράζει τὸ μονότιμο τῆς προσθέσεως.

59. Ἄν οἱ  $\alpha, \beta$  εἶναι ἀπόλυτοι ἀριθμοὶ καὶ  $\beta < \alpha$ , νά δικαιολογήσετε με βάση τοὺς κανόνες τῆς προσθέσεως τὰ ἀποτελέσματα τῶν ἀθροισμάτων:

$$1. (+\alpha) + (-\beta) = +(\alpha - \beta),$$

$$2. (-\alpha) + (+\beta) = -(\alpha - \beta),$$

$$3. (-\alpha) + (-\beta) = -(\alpha + \beta),$$

$$4. (+\alpha) + (+\beta) = +(\alpha + \beta).$$

## 2. ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟ ΔΥΟ ΠΡΟΣΘΕΤΕΩΝ.

### ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΣΕΩΣ

§ 35. Νά υπολογισθεῖ τὸ ἄθροισμα  $(+2) + (+3) + (-6)$ . Θὰ υπολογίσουμε τὸ ἄθροισμα αὐτὸ με τὸν τρόπο ἐργασίας ποὺ μάθαμε στὴν Α' τάξη.

Δηλαδή θὰ βροῦμε τὸ ἄθροισμα τῶν δύο πρώτων προσθετέων,  $(+2) + (+3) = +5$  καὶ σ' αὐτὸ θὰ προσθέσουμε τὸν τρίτο προσθετέο,  $(+5) + (-6) = -1$ .

Αὐτὸ τὸ γράφομε ὡς ἐξῆς:

$$(+2) + (+3) + (-6) = [(+2) + (+3)] + (-6) = (+5) + (-6) = -1.$$

Ὁ ρητὸς  $-1$  εἶναι τὸ ἄθροισμα  $(+2) + (+3) + (-6)$ .

Ἡ ἀγκύλη  $[(+2) + (+3)]$  ἔχει τὴν ἔννοια ὅτι κάνομε πρῶτα τὴν πράξη ποὺ εἶναι μέσα σ' αὐτή.

Ἀνάλογα ἐργαζόμαστε, ἂν ἔχουμε περισσότερους ἀπὸ τρεῖς προσθετέους.

Ὡστε τὸ ἄθροισμα περισσότερων ἀπὸ δύο ρητῶν εἶναι ὁ ρητὸς, τὸν ὁποῖο βρίσκουμε, ἂν στὸ ἄθροισμα τῶν δύο πρώτων προσθέσουμε τὸν τρίτο, στὸ νέο ἄθροισμα προσθέσουμε τὸν τέταρτο κ.ο.κ.

Γενικὰ ἂν  $\alpha, \beta, \gamma, \delta$  εἶναι ρητοί, ἔχομε  
 $\alpha + \beta + \gamma + \delta = [(\alpha + \beta) + \gamma] + \delta$ .

§ 36. α) Παρατηροῦμε ὅτι:

$$\begin{aligned} & [(+2) + (+3)] + (-6) = (+5) + (-6) = -1 \\ \text{καὶ } & [(+3) + (-6)] + (+2) = (-3) + (+2) = -1 \quad \Rightarrow \\ & [(+2) + (+3)] + (-6) = [(+3) + (-6)] + (+2) \quad \eta \\ & [(+2) + (+3)] + (-6) = (+2) + [(+3) + (-6)] \end{aligned}$$

Ἀπὸ τὴν παραπάνω ἰσότητα προκύπτει ὅτι ἡ πρόσθεση τῶν ρητῶν ἔχει τὴν ιδιότητα τῆς προσεταιριστικότητας.

Γενικὰ ἂν  $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbf{Q} \Rightarrow (\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma)$ .

β) Νὰ βρεθεῖ τὸ ἄθροισμα τῶν ρητῶν  $-4, +7, -1$  μὲ ὅλους τοὺς δυνατοὺς τρόπους.

Ἔχομε:

$$(-4) + (+7) + (-1) = [(-4) + (+7)] + (-1) = (+3) + (-1) = +2$$

$$(-4) + (-1) + (+7) = [(-4) + (-1)] + (+7) = (-5) + (+7) = +2$$

$$(+7) + (-1) + (-4) = [(+7) + (-1)] + (-4) = (+6) + (-4) = +2$$

$$(+7) + (-4) + (-1) = [(+7) + (-4)] + (-1) = (+3) + (-1) = +2$$

$$(-1) + (-4) + (+7) = [(-1) + (-4)] + (+7) = (-5) + (+7) = +2$$

$$(-1) + (+7) + (-4) = [(-1) + (+7)] + (-4) = (+6) + (-4) = +2$$

Ἀπὸ τὰ παραπάνω παρατηροῦμε ὅτι:

Τὸ ἄθροισμα τριῶν ρητῶν εἶναι ἀνεξάρτητο ἀπὸ τὴ σειρά, μὲ τὴν ὁποία λαμβάνονται οἱ προσθετέοι.

Γενικὰ ἂν  $\alpha, \beta, \gamma$  εἶναι ρητοί, ἔχομε

$$\alpha + \beta + \gamma = \alpha + \gamma + \beta = \beta + \alpha + \gamma = \dots$$

(Αὐτὸ ἰσχύει καὶ γιὰ περισσότερους ἀπὸ τρεῖς ρητούς).

Ἐφαρμογές.

1. Νὰ ὑπολογισθεῖ τὸ ἄθροισμα  $(-3) + (+5) + (-4) + (+6)$ .

Σύμφωνα μὲ τὴν παραπάνω β' ιδιότητα ἔχομε:

$$\begin{aligned} & \eta \quad | +6 + (+3) = (+6) + (+3) \quad \text{καὶ} \quad | -6 + (-3) = | (-6) + (-3) \\ & \eta \quad | (+5) + (+3) = (+6) + (+3) \quad \text{καὶ} \quad | (-6) + (-3) = | -6 + (-3) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (-3) + (+5) + (-4) + (+6) &= (+6) + (+5) + (-4) + (-3) = \\ &= [(+6) + (+5)] + [(-4) + (-3)] = \\ &= (+11) + (-7) = +4. \end{aligned}$$

Παρατηρούμε ότι η β' ιδιότητα και η προσεταιριστικότητα της προσθέσεως μās επιτρέπουν να προσθέσουμε χωριστά τούς θετικούς και χωριστά τούς άρνητικούς και να καταλήξουμε σ' ένα άθροισμα δύο ετερόσημων ρητών αριθμών.

2. Νά βρεθεί τó άθροισμα:

$$\left(+\frac{5}{2}\right) + (-3) + \left(+\frac{8}{2}\right) + \left(+\frac{1}{2}\right) + \left(-\frac{8}{2}\right)$$

Έχουμε:

$$\begin{aligned} \left(+\frac{5}{2}\right) + \left(+\frac{1}{2}\right) + \left(+\frac{8}{2}\right) + \left(-\frac{8}{2}\right) + (-3) &= \\ & \quad + \frac{6}{2} \qquad \qquad \qquad 0 \\ &= \left(+\frac{6}{2}\right) + 0 + (-3) = (+3) + (-3) = 0. \end{aligned}$$

3. Παρακάτω δίνεται γεωμετρική έρμηνεία τών ιδιοτήτων (άντιμεταθετική-προσεταιριστική) τής προσθέσεως.

$$(+2) + (-5) = -3$$




$$(-5) + (+2) = -3$$




σχ. 23.

$$\begin{aligned} [(+2) + (+3)] + (-6) \\ (+5) + (-6) &= -1 \end{aligned}$$



σχ. 24.

$$\begin{aligned} (+2) + [(+3) + (-6)] \\ [(+3) + (-6)] + (+2) \\ (-3) + (+2) &= -1 \end{aligned}$$



σχ. 25.

Σημείωση.

Συμφωνούμε σ' ένα άθροισμα να παραλείψουμε τó σύμβολο τής προσθέσεως και να γράφουμε τούς προσθετέους τόν ένα μετά τόν άλλο με τó πρόσημό τους.

Π. χ. αντί να έχουμε  $(+6) + (-5) + (+2)$ ,

γράφουμε  $+6 \quad -5 \quad +2$  ή  $6-5+2$ .

Όταν λοιπόν λέμε να υπολογισθεί το άθροισμα:

$$-3+4-12+5, \text{ έννοούμε το } (-3)+(+4)+(-12)+(+5)$$

$$\text{Π.χ. } -3+4-12+5 = (-3)+(+4)+(-12)+(+5) = (+4)+(+5)+(-12)+(-3) = (+9)+(-15) = -6.$$

### Άσκήσεις:

60. Να βρεθούν τα άθροισματα:

α)  $(-10)+(-11)+(-12)+(+13)+(+14).$

β)  $(+15)+(-7)+(+3)+(-5)+(-4).$

γ)  $(-4,2)+(+3,7)+(-2,6)+(+1).$

δ)  $\left(+\frac{27}{5}\right) + \left(-\frac{23}{6}\right) + \left(+8\frac{1}{2}\right) + \left(-2\frac{7}{15}\right) + \left(-8\frac{2}{3}\right).$

61. α) \*Αν  $\alpha = -\frac{1}{2}$ ,  $\beta = -5\frac{3}{4}$ ,  $\gamma = -\frac{4}{12}$  και  $\delta = +6$ , να βρεθεί το άθροισμα  $\alpha+\beta+\gamma+\delta.$

β) Να βρεθεί το άθροισμα  $-\frac{4}{5} + \frac{2}{10} - 3\frac{1}{2} + 1.$

γ) Να βρεθεί το άθροισμα  $16-7+5\frac{1}{6}-13\frac{1}{3}-1.$

δ) Να βρεθεί το άθροισμα  $-15+15,5-\frac{1}{2}+2,3-0,3.$

62. Να συγκριθούν τα δύο επόμενα άθροισματα:

α)  $[(-4)+(+8)+(-6)]+(-3), (-4)+(+8)+[(-6)+(-3)],$

β) επίσης τά:  $(-4)+(+12)+(-13), (-4)+(+20)+(-8)+(-13).$

63. \*Αν  $\alpha, \beta, \gamma$  είναι ρητοί, να δείξετε με παραδείγματα ότι η ισότητα  $\alpha+\gamma = \beta+\gamma$  συνεπάγεται την ισότητα  $\alpha = \beta.$

### 3. ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΟΣ ΔΥΟ ΡΗΤΩΝ.

§ 37. α) Να συγκριθεί η απόλυτη τιμή των άθροισμάτων  $(+6) + (+3)$  και  $(-6)+(-3)$  με το άθροισμα των απόλυτων τιμών των προσθετέων τους.

Γνωρίζουμε ότι  $(+6)+(+3) = +9$  και  $(-6)+(-3) = -9.$

\*Επίσης ότι  $6 = |+6| = |-6|, 3 = |+3| = |-3|$  και  $9 = |+9| = |-9|$

\*Επειδή όμως

$$6 + 3 = 9$$

έχουμε  $|+6| + |+3| = |+9|$  και  $|-6| + |-3| = |-9|$

ή  $|+6| + |+3| = |(+6)+(+3)|$  και  $|-6| + |-3| = |(-6)+(-3)|$

ή  $|(+6)+(+3)| = |+6| + |+3|$  και  $|(-6)+(-3)| = |-6| + |-3|$

“Ωστε ή απόλυτη τιμή τοῦ ἄθροίσματος δύο ὁμόσημων ρητῶν ἰσοῦται μέ τὸ ἄθροισμα τῶν ἀπόλυτων τιμῶν τους.

Γενικά ἂν οἱ ρητοὶ  $\alpha, \beta$  εἶναι ὁμόσημοι, ἔχομε

$$\underbrace{|\alpha + \beta|}_{\substack{\downarrow \\ \text{ἀπόλυτη τιμῆ} \\ \text{τοῦ ἄθροίσματος}}} = \underbrace{|\alpha| + |\beta|}_{\substack{\downarrow \\ \text{ἄθροισμα τῶν} \\ \text{ἀπόλυτων τιμῶν}}}$$

β) Νά συγκριθεῖ ή απόλυτη τιμή τοῦ ἄθροίσματος  $(+8) + (-6)$  μέ τὸ ἄθροισμα τῶν ἀπόλυτων τιμῶν τῶν προσθετέων του.

\*Έχομε  $|(+8) + (-6)| = |2| = 2$  καί  $|+8| + |-6| = 8 + 6 = 14$ . Ἄπ' αὐτὰ συμπεραίνομε  
ὅτι  $|(+8) + (-6)| < |+8| + |-6|$

“Ωστε ή απόλυτη τιμή τοῦ ἄθροίσματος δύο ἑτερόσημων ρητῶν εἶναι μικρότερη ἀπὸ τὸ ἄθροισμα τῶν ἀπόλυτων τιμῶν τους.

Γενικά ἂν οἱ ρητοὶ  $\alpha, \beta$  εἶναι ἑτερόσημοι, ἔχομε :

$$|\alpha + \beta| < |\alpha| + |\beta|$$

**Παραδείγματα:**

1. Νά ἀποδειχθεῖ ὅτι  $|(-10) + (+3)| < |-10| + |+3|$   
\*Έχομε:  $|(-10) + (+3)| = |-7| = 7$  καί  $|-10| + |+3| = 10 + 3$ .  
Ἐπειδὴ  $7 < 10 + 3 \Rightarrow |(-10) + (+3)| < |-10| + |+3|$

2. Νά ἀποδειχθεῖ ὅτι  $|(+\frac{3}{5}) + (-\frac{3}{5})| < |+\frac{3}{5}| + |-\frac{3}{5}|$

\*Έχομε:  
 $|(+\frac{3}{5}) + (-\frac{3}{5})| = |0| = 0$  καί  $|+\frac{3}{5}| + |-\frac{3}{5}| = \frac{3}{5} + \frac{3}{5} = \frac{6}{5}$

\*Άρα:  $|(+\frac{3}{5}) + (-\frac{3}{5})| < |+\frac{3}{5}| + |-\frac{3}{5}|$

**\*Ανακεφαλαίωση.**

§ 38. Ἐκ τῶν ἀναφέρονται στήν «πρόσθεση τῶν ρητῶν» συμπεραίνομε ὅτι:

α. Ὄταν δοθοῦν δύο ρητοὶ  $\alpha$  καί  $\beta$  ὑπάρχει πάντοτε ὁ ρητὸς  $\alpha + \beta$ .  
Συμβολικά:  $\alpha, \beta \in \mathbb{Q} \Rightarrow (\alpha + \beta) \in \mathbb{Q}$

Δηλαδή:

\*Ἄν  $\alpha$  καί  $\beta$  εἶναι ὁμόσημοι, τότε ὁ  $(\alpha + \beta)$  εἶναι ὁμόσημος μέ αὐτούς καί ἔχει ἀπόλυτη τιμή τὸ ἄθροισμα τῶν ἀπόλυτων τιμῶν τους.



$$|\alpha + \beta| = |\alpha| + |\beta|.$$

• Αν  $\alpha, \beta$  είναι ετερόσημοι, τότε  $\alpha + \beta$  είναι όμοσημος με τὸν ρητὸ πού ἔχει τὴ μεγαλύτερη ἀπόλυτη τιμὴ καὶ ἡ ἀπόλυτη τιμὴ του ἰσοῦται με τὴ διαφορά τῶν ἀπόλυτων τιμῶν τῶν προσθετέων.

$$|\alpha + \beta| = |\alpha| - |\beta| \quad \text{ἂν } |\alpha| > |\beta|$$

$$|\alpha + \beta| = |\beta| - |\alpha| \quad \text{ἂν } |\alpha| < |\beta|$$

β) Τὸ ἄθροισμα δύο ρητῶν εἶναι ἕνας καὶ μόνο ἕνας ρητὸς (μονότιμο τῆς προσθέσεως).

γ) Ἰσχύει ἡ μεταθετικότητα στὸ ἄθροισμα δύο ρητῶν

$$\alpha + \beta = \beta + \alpha$$

δ) • Αν δοθοῦν οἱ ρητοὶ  $\alpha, \beta, \gamma$ , ἰσχύει ἡ προσεταιριστικὴ ιδιότητα τῆς προσθέσεως

$$(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma)$$

ε) Ὑπάρχει ἕνα μόνο στοιχεῖο στὸ σύνολο τῶν ρητῶν, τὸ μηδέν, τὸ ὁποῖο εἶναι τὸ οὐδέτερο στοιχεῖο τῆς προσθέσεως.

$$\text{• Αν } \alpha \in \mathbb{Q} \text{ εἶναι: } 0 + \alpha = \alpha + 0 = \alpha$$

στ) Γιὰ κάθε ρητὸ ὑπάρχει ἕνας καὶ μόνο ἕνας ἄλλος ρητὸς ἀντίθετος (ἢ συμμετρικός) του.

Τὸ ἄθροισμα τῶν ἀντίθετων εἶναι ἴσο με μηδέν.

• Αν  $\alpha$  εἶναι ἀπόλυτος ἀριθμὸς, ὁ ἀντίθετος τοῦ  $+\alpha$  εἶναι ὁ  $-\alpha$  καὶ  $(+\alpha) + (-\alpha) = 0$ .

### Ἀσκῆσεις:

64. Μὲ ἀριθμητικὰ παραδείγματα νὰ συγκρίνετε τὸ  $|\alpha + \beta + \gamma|$  με τὸ  $|\alpha| + |\beta| + |\gamma|$ , α) ἂν  $\alpha, \beta, \gamma$  εἶναι ὁμοσημοὶ καὶ β) ἂν εἶναι ετερόσημοι.

65. Νὰ συγκριθεῖ ἡ ἀπόλυτη τιμὴ τοῦ ἀθροίσματος δύο ἐτερόσημων ρητῶν με τὴ διαφορά τῶν ἀπόλυτων τιμῶν τους. Δηλαδή ἂν  $\alpha, \beta$  εἶναι ἐτερόσημοι, νὰ συγκριθεῖ τὸ

$$|\alpha + \beta| \text{ με τὸ } |\alpha| - |\beta|, \text{ ἂν } |\alpha| > |\beta| \quad \text{ἢ τὸ}$$

$$|\alpha + \beta| \text{ με τὸ } |\alpha| - |\beta|, \text{ ἂν } |\alpha| < |\beta|.$$

66. Ποιοὶ ρητοὶ μποροῦν ν' ἀντικαταστήσουν τὸ  $x$  στὶς παρακάτω ἰσότητες;

$$\alpha) \left| \left( +\frac{3}{4} \right) + x \right| = \left| +\frac{3}{4} \right| + \left| +\frac{1}{4} \right| \quad \beta) |(-3) + x| = |-3| + |-1|,$$

$$\gamma) \left| (+5) + \left( +\frac{1}{2} \right) \right| = |5| + \left| \frac{1}{2} \right|$$

$$\delta) \left| \left( -\frac{5}{8} \right) + \left( -\frac{3}{8} \right) \right| = \left| -\frac{5}{8} \right| + \left| \frac{3}{8} \right|$$

67. Ποιὸ συμπέρασμα προκύπτει γιὰ τοὺς ρητοὺς  $\alpha$  καὶ  $\beta$ ,

$$\text{ἂν } \alpha) \alpha + \beta = 0, \quad \beta) \alpha + \beta = \alpha.$$

68. Νὰ βρεθοῦν τὰ ἀθροίσματα:

$$\alpha) (-12) + (-18) + (+24) + (+30) + (-36).$$

$$\beta) \left(-\frac{5}{8}\right) + \left(-\frac{7}{4}\right) + \left(+\frac{11}{2}\right) + \left(+\frac{10}{16}\right) + (-1)$$

$$\gamma) \left(-\frac{4}{9}\right) + (+2) + \left(-\frac{25}{6}\right) + \left(-\frac{14}{3}\right) + \left(+\frac{8}{18}\right) + (+1).$$

69. Να βρεθούν τα άθροισματα:

$$\alpha) -4 - 6 + 8 - 10 + 14 - 20,$$

$$\beta) 1 + \frac{1}{5} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{6} - 1$$

$$\gamma) 5 + \frac{18}{9} - \frac{15}{3} + \frac{21}{7} - \frac{24}{6} - 2$$

$$\delta) 1 + \frac{5}{12} - \frac{4}{3} + \frac{3}{4} - 2.$$

70. Να βρεθεί το άθροισμα των δύο άθροισμάτων.

$$\alpha) [(+3) + (-8) + (+2) + (-1)] + [(-7) + (+10) + (-2)],$$

$$\beta) (-1 + 3 - 8 + 12) + (5 - 7 - 13).$$

71. Να επίλυθούν οι εξισώσεις: α)  $(-2) + \chi = +3$  και β)  $\chi + (-\frac{1}{2}) = -2$ .

#### 4. Η ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΑΦΑΙΡΕΣΕΩΣ

**§ 39. Πρόβλημα.** Το πρωί το θερμόμετρο έδειχνε  $-2^{\beta}$  και το μεσημέρι  $+3^{\beta}$ . Κατά πόσους βαθμούς μεταβλήθηκε η θερμοκρασία;

\*Εστω ότι η θερμοκρασία μεταβλήθηκε κατά  $\chi^{\beta}$ . Για να βρούμε το ζητούμενο, πρέπει από την τελική θερμοκρασία  $+3^{\beta}$  να αφαιρέσουμε την αρχική θερμοκρασία  $-2^{\beta}$ .



σχ. 27

$$\begin{aligned} \text{*Έχουμε λοιπόν } \chi^{\beta} &= (+3)^{\beta} - (-2)^{\beta} \quad \eta \\ \chi &= (+3) - (-2). \end{aligned}$$

Η τιμή του  $\chi$  μπορεί να θεωρηθεί και σαν λύση της εξίσωσης  $(-2) + \chi = +3$ , η οποία εκφράζει το πρόβλημα. «Ποιόν ρητό πρέπει να προσθέσουμε στον  $(-2)$ , για να βρούμε το  $+3$ ;».

Μάθαμε στην Α' τάξη ότι η αφαίρεση είναι πράξη αντίστροφη της προσθέσεως. Το ίδιο ισχύει και στο σύστημα Q των ρητών αριθμών.

Δηλαδή και στους νέους αριθμούς αφαίρεση είναι η πράξη, κατά την οποία δίνονται δύο ρητοί και βρίσκεται ένας τρίτος, ο οποίος όταν προστεθεί στον δεύτερο, δίνει άθροισμα τον πρώτο.

\*Ωστε έχουμε την Ισοδυναμία:

$$(+3) - (-2) = \chi \Leftrightarrow (-2) + \chi = +3$$

Για να βρούμε όμως τη διαφορά  $(+3) - (-2)$ , κάνουμε τις εξής σκέψεις: στο αρχικό πρόβλημα: Το θερμόμετρο δείχνει  $-2^{\beta}$ , άρα πρέπει να ανέβει  $2^{\beta}$  η θερμοκρασία, για να φθάσει στο μηδέν και ύστερα να ανέβει  $3^{\beta}$ . Δηλαδή πρέπει να ανέβει η θερμοκρασία  $5^{\beta}$ .

\*Άρα  $\chi^{\beta} = (+2)^{\beta} + (+3)^{\beta} = +5^{\beta}$ . Συνεπώς η διαφορά  $(+3)^{\beta} - (-2)^{\beta} = (+2)^{\beta} + (+3)^{\beta}$  ή  $(+3) - (-2) = (+3) + (+2)$ .

**\*Ωστε η διαφορά δύο ρητών βρίσκεται, αν προσθέσουμε στον μειωτέον τον αντίθετο του αφαιρετέου.**

Επομένως και η εξίσωση  $(-2)+\chi = +3$  επιλύεται ως εξής:  
 $(-2)+\chi = +3 \Leftrightarrow \chi = (+3)-(-2) \Leftrightarrow \chi = (+3)+(+2) \Leftrightarrow \chi = +5.$

Χρησιμοποιούμε τώρα την ιδιότητα  $\alpha = \beta \Leftrightarrow \alpha + \gamma = \beta + \gamma$ , ( $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{Q}$ ), για να αιτιολογήσουμε γενικότερα την επίλυση της εξίσωσης  $(-2)+\chi = +3$  ή την εύρεση της διαφοράς  $\chi = (+3)-(-2)$ .

Προσθέτουμε και στα δύο μέλη της  $(-2)+\chi = +3$  τον αντίθετο του  $-2$  και έχουμε:

$$\begin{aligned} (-2)+\chi = +3 &\Leftrightarrow [(-2)+\chi] + (+2) = +3 + (+2) \\ &\quad [\chi + (-2)] + (+2) = +3 + (+2) \\ &\quad \chi + [(-2) + (+2)] = +3 + (+2) \\ &\quad \quad \chi + 0 = +3 + (+2) \\ &\quad \quad \quad \chi = (+3) + (+2) = +5 \end{aligned}$$

**\*Ωστε  $\chi = (+3)-(-2) = (+3)+(+2)$ .**

Δηλαδή διαπιστώνουμε ότι, για να αφαιρέσουμε έναν ρητό, πρέπει να προσθέσουμε τον αντίθετό του. ( $-\alpha = \delta$  αντίθετος του  $\alpha$ ). Έπειδή στο σύνολο των ρητών υπάρχει πάντοτε ο αντίθετος ενός αριθμού που μας δίνεται, υπάρχει πάντοτε και η διαφορά δύο ρητών και επομένως η αφαίρεση είναι πάντοτε δυνατή στο σύνολο αυτό. Η αφαίρεση είναι πράξη μονότιμη, γιατί το άθροισμα του μειωτέου και του αντίθετου του αφαιρετέου είναι μονότιμο.

**\*Ωστε, αν  $\alpha$  και  $\beta$  είναι ρητοί αριθμοί, ονομάζουμε διαφορά  $\alpha-\beta$  τον ρητό  $\gamma$ , ο οποίος είναι ίσος με τον  $\alpha +$  (αντίθετος του  $\beta$ ).**

**\*Έχουμε  $\gamma = \alpha +$  (αντίθ. του  $\beta$ )  $\Rightarrow \gamma + \beta = \alpha +$  (αντίθ. του  $\beta$ ) +  $\beta$**   
 $\Rightarrow \gamma + \beta = \alpha$

Συμβολικά:

<b>*Αν <math>\alpha, \beta \in \mathbb{Q}</math>: <math>\alpha - \beta = \gamma \Leftrightarrow \beta + \gamma = \alpha</math>, <math>\gamma \in \mathbb{Q}</math></b>
--

**\*Εφαρμογές.**

1.  $\alpha - 0 = \alpha + 0 = \alpha$  (γιατί ο αντίθετος του μηδενός είναι το μηδέν)

$$(-3) - (-3) = (-3) + (+3) = 0. \text{ Γενικά } \alpha - \alpha = 0, (\alpha \in \mathbb{Q})$$

2.  $0 - (+3) = 0 + (-3) = -3$

$$0 - (-3) = 0 + (+3) = +3$$

$$0 - \alpha = 0 + (-\alpha) = -\alpha \quad (\alpha \in \mathbb{Q})$$

Έπειδή  $0 - \alpha = 0 +$  (αντίθ. του  $\alpha$ ), **συμβολίζουμε** τον αντίθετο ενός ρητού  $\alpha$  με  $-\alpha$ .

**\*Ωστε για κάθε ρητό  $\alpha$  έχουμε:  $\alpha - 0 = \alpha$ ,  $0 - \alpha = -\alpha$ ,  $\alpha - \alpha = 0$ .**

3. Να βρεθούν οι παρακάτω διαφορές:

$$(+6)-(-7) = (+6)+(+7) = +13$$

$$(-7)-(+6) = (-7)+(-6) = -13$$

$$\left(-\frac{3}{4}\right) - \left(-\frac{5}{4}\right) = \left(-\frac{3}{4}\right) + \left(+\frac{5}{4}\right) = +\frac{2}{4}$$

$$\left(-\frac{5}{4}\right) - \left(-\frac{3}{4}\right) = \left(-\frac{5}{4}\right) + \left(+\frac{3}{4}\right) = -\frac{2}{4}$$

Από τα παραπάνω παρατηρούμε ότι (αν  $\alpha, \beta \in \mathbb{Q}$ ) οι ρητοί  $\alpha - \beta$  και  $\beta - \alpha$  είναι αντίθετοι.

### Άσκησης:

72. Να βρεθούν οι παρακάτω διαφορές:

$$\alpha) (-10) - (+25),$$

$$\beta) (+25) - (-10)$$

$$\gamma) (+14) - (+11),$$

$$\delta) (+11) - (+14)$$

$$\epsilon) (-5) - (+5),$$

$$\sigma\tau) (-18) - (-18)$$

$$\zeta) \left(+\frac{3}{16}\right) - \left(-\frac{3}{16}\right),$$

$$\eta) \left(-\frac{4}{9}\right) - \left(-\frac{2}{3}\right)$$

73. Να επιλυθούν οι επόμενες εξισώσεις:

$$\alpha) x - \left(+\frac{7}{3}\right) = -1, \quad \delta) \left(-\frac{4}{15}\right) + x = -1, \quad \zeta) x - \left(-\frac{1}{3}\right) = -\frac{1}{3}$$

$$\beta) x + \left(-\frac{3}{20}\right) = -\frac{1}{5}, \quad \epsilon) -x - \left(+\frac{13}{2}\right) = -2, \quad \eta) -x - (-12) = -12$$

$$\gamma) x - (-13) = -13, \quad \sigma\tau) -4x = -14, \quad \theta) +3 - x = -3.$$

74. Να βρεθούν οι επόμενες διαφορές και να επαληθευθεί η ισότητα «μειωτός = αφαιρετός + διαφορά».

$$\alpha) \left(-\frac{1}{3}\right) - \left(+\frac{3}{4}\right), \quad \beta) (-5) - \left(-\frac{2}{3}\right), \quad \gamma) \left(+\frac{1}{2}\right) - \left(+\frac{1}{3}\right),$$

$$\delta) \left(+\frac{3}{5}\right) - \left(-\frac{1}{2}\right), \quad \epsilon) \left(-\frac{10}{7}\right) - (-1), \quad \sigma\tau) (+3) - \left(-\frac{11}{2}\right).$$

### 5. ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ (-) ΣΑΝ ΣΥΜΒΟΛΟ ΑΦΑΙΡΕΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΑΝ ΠΡΟΣΗΜΟ. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΦΑΙΡΕΣΕΩΣ

§ 40. Είδαμε (§ 36 σημείωση) ότι ένα άθροισμα π.χ. το  $(+3)+(-2)$  γράφεται σύντομα  $+3-2$  ή  $3-2$ .

Το πλήν μπροστά από το δύο θεωρείται σαν πρόσημο.

Μπορεί όμως το πλήν να θεωρηθεί και σαν σύμβολο αφαιρέσεως του θετικού δύο από τον 3, γιατί

$$3-2 = (+3)-(+2) = (+3)+(-2).$$

Επίσης για τὸ  $3-7$  ἔχομε:  $3-7 = (+3)+(-7) = -4$

↓  
πρόσημο τοῦ ἑπτά  
Πρόσθεση τοῦ  $-7$  στὸν  $+3$

$$3-7 = (+3)-(+7) = (+3)+(-7) = -4$$

↓  
Σύμβολο ἀφαιρέσεως  
Ἀφαίρεση τοῦ  $+7$  ἀπὸ τὸν  $+3$   
ἢ τοῦ  $7$  ἀπὸ τὸν  $3$

Συνεπῶς τὸ σύμβολο πλὴν  $(-)$  μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ σὰν σύμβολο ἀφαιρέσεως ἢ σὰν πρόσημο.

### Παραδείγματα

1. Στὸ σύμβολο  $-(+2)$  τὸ πλὴν θεωρεῖται σὰν πρόσημο τοῦ  $(+2)$  ἀλλὰ καὶ σὰν σύμβολο ἀφαιρέσεως τοῦ  $+2$ .

↓ πρόσημο ἀφαιρέσεως τοῦ θετικοῦ πέντε ἀπὸ τὸ μηδὲν

$$2. 0-5 = 0-(+5) = 0+(-5) = -5$$

$$0-5 = 0+(-5) = -5$$

↓ πρόσημο τοῦ πέντε

↓ πρόσημο

$$3. -8-3 = (-8)-(+3) = (-8)+(-3) = -11$$

↓ σύμφ. ἀφαιρέσεως.

↓ πρόσημο

$$-8-3 = -(+8)-(+3) = +(-8)+(-3) = (-8)+(-3) = -11$$

↓ πρόσημο ἀφαιρέσεως

$$4) \text{ Ἔχομε } -4-10 = \underbrace{(-4)+(-10)}_{-14} = -14 = \underbrace{-[(+4)+(+10)]}_{-14}$$

Δηλαδή:  $-[(+4)+(+10)] = (-4)+(-10)$ , ἀλλὰ  $(+4)+(+10) = [(+4)+(+10)]$  ἢ  $[(+4)+(+10)] = (+4)+(+10)$ .

“Ὅστε τὸ ἀντίθετο ἐνὸς ἀθροίσματος ἰσοῦται μὲ τὸ ἄθροισμα τῶν ἀντιθέτων τῶν προσθετέων.

§ 41. **Ιδιότητες της αφαιρέσεως** (οί παρακάτω ιδιότητες επαληθεύονται εύκολα).

1. Η διαφορά δέν μεταβάλλεται, αν προσθέσουμε (ή αφαιρέσουμε) στὸν μειωτέο καὶ στὸν ἀφαιρετέο τὸν ἴδιο ρητό.

$$\alpha - \beta = (\alpha + \gamma) - (\beta + \gamma) \quad (\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{Q})$$

$$\alpha - \beta = (\alpha - \gamma) - (\beta - \gamma)$$

2. Πῶς αφαιρῶ ρητό ἀπὸ ἄθροισμα.

$$(\alpha + \beta) - \gamma = \alpha + (\beta - \gamma) \quad \eta$$

$$(\alpha + \beta) - \gamma = (\alpha - \gamma) + \beta$$

3. Πῶς αφαιρῶ ἀριθμὸ ἀπὸ διαφορά.

$$(\alpha - \beta) - \gamma = \alpha - (\beta + \gamma) \quad \eta$$

$$(\alpha - \beta) - \gamma = (\alpha - \gamma) - \beta$$

4. Πῶς αφαιρῶ ἄθροισμα ἀπὸ ἀριθμὸ.

$$\alpha - (\beta + \gamma) = (\alpha - \beta) - \gamma \quad \eta$$

$$\alpha - (\beta + \gamma) = (\alpha - \gamma) - \beta \quad \eta$$

$\alpha - (\beta + \gamma) = \alpha + [(-\beta) + (-\gamma)]$  (βλέπε προηγούμενο παράδειγμα 4).

5. Πῶς αφαιρῶ διαφορά ἀπὸ ἀριθμὸ

$$\alpha - (\beta - \gamma) = (\alpha - \beta) + \gamma \quad \eta$$

$$\alpha - (\beta - \gamma) = (\alpha + \gamma) - \beta$$

Οἱ παραπάνω ιδιότητες ἰσχύουν χωρὶς κανέναν περιορισμό, γιατί ἡ διαφορά ὑπάρχει πάντοτε στὸ σύνολο τῶν ρητῶν ἀριθμῶν.

6. Νὰ επαληθευθεῖ ἡ ιδιότητα:  $\alpha = \beta \Rightarrow \alpha - \gamma = \beta - \gamma$

\*Αφαιροῦμε καὶ ἀπὸ τὰ δύο μέλη τῆς ἰσότητος  $-5 = -\frac{10}{2}$  τὸν  $-3$ .

α' μέλος:  $(-5) - (-3) = (-5) + (+3) = -2$

β' μέλος:  $\left(-\frac{10}{2}\right) - (-3) = \left(-\frac{10}{2}\right) + (+3) = -\left(\frac{10}{2} - 3\right) = -(5 - 3) = -2$

\*Αρα  $(-5) - (-3) = \left(-\frac{10}{2}\right) - (-3)$

Συνεπῶς ἀπὸ τὴν  $-5 = -\frac{10}{2} \Rightarrow (-5) - (-3) = \left(-\frac{10}{2}\right) - (-3)$ .

### \*Εφαρμογή.

\*Αφαιροῦμε καὶ ἀπὸ τὰ δύο μέλη τῆς ἰσότητος  $-8 + 3 = -5$  τὸν 3.

\*Ἐχομε:  $-8 + 3 - 3 = -5 - 3$

$$-8 + 0 = -5 - 3$$

$$-8 = -5 - 3$$

\*Αν παρατηρήσουμε τὶς ἰσότητες:  $-8 + 3 = -5$

$$-8 = -5 - 3$$

καταλήγουμε στὸ συμπέρασμα ὅτι: \*Αν μεταφέρουμε ἓναν ὄρο ἀπὸ τὸ ἓνα μέλος μιᾶς ἰσότητος στὸ ἄλλο, ἀλλάζομε τὸ πρόσημό του.

7. \*Αν  $\alpha, \beta, \gamma, \delta \in \mathbb{Q}$ , νά επαληθευθεί ή ιδιότητα  $\alpha = \beta$  και  $\gamma = \delta \Rightarrow \alpha - \gamma = \beta - \delta$  μέ αριθμητικό παράδειγμα.

(‘Η ιδιότητα αυτή εκφράζει τó μονότιμο τής διαφοράς).

**Σημείωση:** ‘Η εργασία, κατά τήν όποία αν  $\alpha = \beta$  και  $\gamma = \delta \Rightarrow \alpha - \gamma = \beta - \delta$ , λέγεται άφαιρέση τών δύο Ισοτήτων κατά μέλη.

### Άσκήσεις:

75. Νά υπολογισθεί ή τιμή τών παρακάτω παραστάσεων:  
α) αν θεωρηθεί τó (-) σάν σύμβολο άφαιρέσεως και β) αν θεωρηθεί τó πλήν σάν πρόσμο:

$$\alpha) 7-10, \quad \beta) 5-\frac{1}{2}, \quad \gamma) \frac{1}{3}-\frac{1}{2}, \quad \delta) -17-19, \quad \epsilon) -6-\frac{2}{5}.$$

76. Νά επαληθεύσετε τις Ιδιότητες 1, 2, 3, 4, 5 τής άφαιρέσεως μέ τά παρακάτω αριθμητικά παραδείγματα:

$$1. \alpha = +5, \quad \beta = -12 \quad \text{και} \quad \gamma = +7.$$

$$2. \alpha = -\frac{3}{5}, \quad \beta = +1 \quad \text{και} \quad \gamma = -\frac{2}{3}$$

$$3. \alpha = 5,6, \quad \beta = 7,2 \quad \text{και} \quad \gamma = -11.$$

77. Νά βρεθούν τά έξαγόμeνα τών πράξεων:

$$\alpha) 7-(-3), \quad \beta) (7+8)-(-3+8), \quad \gamma) (7-5)-(-3-5),$$

$$\delta) [12+(-2)+3]-(-4), \quad \epsilon) -7-(7+3),$$

$$\sigma\tau) -12-[5-(-2)], \quad \zeta) (-3-7)-9, \quad \eta) (15-21)+(-4).$$

78. Νά υπολογισθούν τά  $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \chi, \psi$  από τις:

$$1) \alpha = (-4+7) + (5-12), \quad 2) \beta = (-4+5) - [7+(-12)],$$

$$3) \gamma = (-5+9) + (-5-9), \quad 4) \delta = (-5+9) - (-5-9),$$

$$5) -\chi - 3 = -5, \quad 6) \psi + 4 = -7.$$

79. Νά βρεθούν μέ άναγραφή τών στοιχείων τους τά σύνολα:

$$A = \{\chi/\chi + 3 = 3\}, \quad B = \{\psi/\psi - 5 = -7\}, \quad \Gamma = \{\omega/2 - \omega = -3\}$$

80. Νά δοκιμάσετε αν τά παρακάτω ζεύγη τιμών  $\alpha$  και  $\beta$  επαληθεύουν τήν Ισότητα

$$|\alpha - \beta| = |\alpha| - |\beta|:$$

$$1) \alpha = 7, \quad \beta = 2, \quad 2) \alpha = 2, \quad \beta = 7, \quad 3) \alpha = -7, \quad \beta = -2,$$

$$4) \alpha = -7, \quad \beta = 2, \quad 5) \alpha = 7, \quad \beta = -2, \quad 6) \alpha = 2, \quad \beta = -7,$$

$$7) \alpha = -2, \quad \beta = -7. \quad 8) \alpha = -2, \quad \beta = 7,$$

### 6. ΑΛΓΕΒΡΙΚΑ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ.

§ 42. Νά υπολογισθεί ή αριθμητική παράσταση:

$$(+6)-(-5)+(-3)-(+4)$$

Κάνομε τις πράξεις μέ τή σειρά πού είναι σημειωμένες:

$$(+6)-(-5)+(-3)-(+4)$$

$$\begin{aligned} & (+6) + (+5) + (-3) - (+4) \\ & \quad \quad \quad \underbrace{(+11)} + (-3) - (+4) \\ & \quad \quad \quad \quad \quad \quad \underbrace{(+8)} - (+4) = (+8) + (-4) = +4 \end{aligned}$$

Το αποτέλεσμα +4 είναι η τιμή τῆς αριθμητικῆς παραστάσεως. Γενικά ἂν  $\alpha, \beta, \gamma, \delta$  εἶναι ρητοί, ἔχομε:

$\alpha - \beta + \gamma - \delta = [(\alpha - \beta) + \gamma] - \delta$  χωρίς περιορισμούς, γιατί οἱ ἀφαιρέσεις στό σύνολο  $Q$  εἶναι πάντοτε δυνατές.

Οἱ ἀριθμητικῆς παραστάσεις

- $(+6) - (-5) + (-3) - (+4)$
- $\left(+\frac{1}{2}\right) + \left(-\frac{2}{3}\right) + \left(+\frac{1}{3}\right) + (-2)$
- $(-1) + (-3) + (-6) + \left(-\frac{3}{4}\right)$
- $12 - 6 + 7 - 14$

λέγονται **ἀλγεβρικά ἄθροίσματα**.

Ἔστω κάθε ἀριθμητικῆ παραστάση, ἡ ὁποία περιέχει ρητούς ἀριθμούς, πού συνδέονται μέ τὸ + ἢ τὸ -, λέγεται **ἀλγεβρικό ἄθροισμα** (ἢ **ἀριθμητικό πολώνυμο**).

Τὰ παραπάνω ἀλγεβρικά ἄθροίσματα  $\beta, \gamma$  εἶναι ἄθροίσματα πολλῶν προσθετέων (§ 35). Οἱ προσθετέοι τους λέγονται καὶ ὄροι.

Ἐπίσης καὶ τὸ  $\delta$  εἶναι ἄθροισμα πολλῶν προσθετέων μέ ὄρους: 12, -6, +7, -14, γιατί

$$12 - 6 + 7 - 14 = 12 + (-6) + (+7) + (-14)$$

(πιὸ ἀπλή μορφή ἄθροίσματος § 36 σημείωση 4)

Τὸ  $\alpha'$  ἀλγεβρικό ἄθροισμα  $(+6) - (-5) + (-3) - (+4)$  μπορεῖ νὰ γραφεῖ καὶ  $(+6) + (+5) + (-3) + (-4)$ . Αὐτὸ ἔχει ὄρους τούς: +6, +5, -3, -4, οἱ ὁποῖοι εἶναι ὄροι καὶ τοῦ ἀρχικοῦ, καὶ τιμὴ +4.

Ἄν  $\sigma'$  ἓνα ἀλγεβρικό ἄθροισμα προσθέσουμε τοὺς ἀντίθετους τῶν ρητῶν οἱ ὁποῖοι ἀφαιροῦνται, θὰ ἔχομε ἓνα ἄθροισμα πολλῶν προσθετέων.

### Παραδείγματα:

- $-\frac{1}{5} + \left(-\frac{4}{9}\right) - \left(-\frac{2}{3}\right) + (-1) = \left(-\frac{1}{5}\right) + \left(-\frac{4}{9}\right) + \left(+\frac{2}{3}\right) + (-1)$
- $7 - \left(-\frac{1}{2}\right) - \left(+\frac{3}{2}\right) + 2 = 7 + \left(+\frac{1}{2}\right) + \left(-\frac{3}{2}\right) + 2$



$$3. \quad +8 - (+7) - (-6) + (-5) + (+4) = +8 + (-7) + (+6) + (-5) + (+4) = 8 - 7 + 6 - 5 + 4$$

### Παρατηρήσεις:

1. Ένα άθροισμα πολλών προσθετέων είναι ανεξάρτητο από τη σειρά των όρων του (§ 36). Αυτό ισχύει και σ' ένα άλγεβρικό άθροισμα, αν στους αριθμούς που αφαιρούνται μεταφέρουμε μπροστά το σύμβολο της αφαιρέσεως, όταν τους αλλάζουμε σειρά.

$$\begin{array}{cccccccc} (+6) & - & (-5) & + & (-3) & - & (+4) & = & - & (-5) & + & (+6) & - & (+4) & + & (-3) \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \text{προσθετ.} & & \text{άφαιρ.} & & \text{προσθετ.} & & \text{άφαιρ.} & & \text{άφαιρ.} & & \text{προσθετ.} & & \text{άφαιρ.} & & \text{προσθετ.} & & \end{array}$$

Δηλαδή κάθε αριθμός που προσθέτεται (ή αφαιρείται) στο πρώτο μέλος, πρέπει να προσθέτεται (ή να αφαιρείται) και στο δεύτερο μέλος.

Είπαμε ότι όροι του  $(+6) - (-5) + (-3) - (+4)$  είναι οι όροι του  $(+6) + (+5) + (-3) + (-4)$ . Δηλαδή οι  $+6, +5, -3, -4$ .

$$\begin{aligned} \text{Έπειδή:} \quad & (+6) = +(+6) = +6 \\ & -(-5) = +(+5) = +5 \\ & +(-3) = +(-3) = -3 \\ & -(+4) = +(-4) = -4, \end{aligned}$$

μπορούμε να θεωρήσουμε σαν όρους του άλγεβρικού άθροίσματος  $(+6) - (-5) + (-3) - (+4)$  τους  $+6, -(-5), -3, -(+4)$

**Σημείωση:** Για να αποφύγουμε λάθη, ή αντιμετάθεση των όρων άλγ. άθροίσματος γίνεται συνήθως, όταν μετατραπεί σε άθροισμα πολλών προσθετέων.

Υπενθυμίζουμε ότι κάθε θετικός ή αρνητικός αριθμός, ο οποίος έχει μπροστά του  $+$  (ή κανένα πρόσημο) προσθέτεται, π.χ. οι αριθμοί  $+(+6), +(-3), (+6)$  προσθέτονται. Αν υπάρχει μπροστά του  $-$ , αφαιρείται, δηλαδή προσθέτεται ο αντίθετός του. Π.χ.  $-(-5) = +(+5) = +5 = 5$

2. Έχουμε:

$$\begin{aligned} (+6) - (-5) + (-3) - (+4) &= (+6) + (+5) + (-3) + (-4) = 6 + 5 - 3 - 4 \\ (+6) - (-5) - (+3) + (-4) &= (+6) + (+5) + (-3) + (-4) = 6 + 5 - 3 - 4. \end{aligned}$$

Απ' αυτά παρατηρούμε ότι ή απλουστευμένη γραφή ενός άθροίσματος μπορεί να προέρχεται από ένα άλγεβρικό άθροισμα, το οποίο έχει γραφεί με διάφορους τρόπους.

$$\begin{aligned} \text{Π.χ. τό:} \quad -6 + 3 - 1 + 2 &= (-6) + (+3) + (-1) - (-2) \quad \text{ή} \\ &= -(+6) - (-3) + (-1) + (+2) \quad \text{ή} \\ &= +(-6) + (+3) - (+1) + (+2) \quad \text{κ.λ.π.} \end{aligned}$$

**Εφαρμογές:**

1. α)  $(-3)+(-6)-(-8) = (-3)+(-6)+(+8) = (-9)+(+8) = -1$

β)  $(+3)-(-6)-(+8) = (+3)+(+6)+(-8) = (+9)+(-8) = +1$

Τά παραπάνω άθροίσματα έχουν αντίθετους όρους και λέγονται αντίθετα.

2. Προσθέτουμε δύο άλγ. άθροίσματα π.χ:  $[(-4)+(-5)-(-10)]+[(-6)-(+9)] =$

$[(-4)+(-5)+(+10)]+[ (+6)+(-9)] = (-4)+(-5)+(+10)+(+6)+(-9) =$

$$\begin{array}{ccc} & \downarrow & \downarrow \\ & & = (+16)+(-18) = -2 \end{array}$$

$[ (-9) + (+10) ] + [ -3 ] = [+1] + [-3] = -2.$

Η τιμή του άθροίσματος των δύο παραπάνω άθροισμάτων βρέθηκε με δύο τρόπους.

α) Σχηματίσαμε ένα άθροισμα από τους όρους των άλγεβρικών άθροισμάτων και βρήκαμε την τιμή του κατά τά γνωστά (§ 36 εφαρμογή 1) και

β) Βρήκαμε την τιμή καθενός από τά άλγεβρικά άθροίσματα και καταλήξαμε σε άθροισμα δύο ρητών.

3.  $[(-4)+(-5)-(-10)]-[-(-6)-(+9)] = [(-4)+(-5)+(+10)]-[(+6)+(-9)]$

$= [(-4)+(-5)+(+10)]+[ (+6)+(+9)] = [+1]+[+3] = +4$

Για να αφαιρέσουμε ένα άλγεβρικό άθροισμα, προσθέτουμε τó αντίθετό του.

**Άσκήσεις:**

81. Να ύπολογίσετε τά παρακάτω άλγεβρικά άθροίσματα:

α)  $(-4)-(+3)+(-15)$ , γ)  $\frac{7}{2} - (+2) + \left(+\frac{1}{2}\right) - (+2,5) - (-0,5)$

β)  $- (+10) - 8 - (-16) + (-7) + 1$ , δ)  $-\frac{3}{11} - \left(-\frac{4}{22}\right) + (-1) - \left(+\frac{8}{11}\right)$

82. Να ύπολογίσετε τά παρακάτω άλγεβρικά άθροίσματα:

α)  $[-5-(-9)+(-13)+(+17)] + (-13)$ ,

β)  $\left[ (-12)+(+7) - (+19) - \left(-\frac{29}{2}\right) \right] + \left(+\frac{1}{2}\right)$

γ)  $\left[ \frac{1}{2} - (-2) + \left(-\frac{1}{3}\right) \right] + \left[ \frac{1}{3} + \left(-\frac{1}{2}\right) - (+3) \right]$

δ)  $-\frac{38}{5} - \left[ 1 - (+7) - \left(-\frac{2}{5}\right) \right]$

ε)  $\left[ +3 - (+6) - \left(-\frac{22}{3}\right) \right] - \left[ \left(-\frac{2}{3}\right) - (-3) + (+2) \right]$

83. Να ύπολογίσετε τά παρακάτω άλγεβρικά άθροίσματα:

α)  $\alpha+\beta+\gamma$ , β)  $-\alpha-\beta-\gamma$ , γ)  $\alpha-\beta+\gamma$ , δ)  $-\alpha-\beta+\gamma$ ,

ε)  $\alpha-\beta-\gamma$ , στ)  $-\alpha+\beta-\gamma$ , ζ)  $-\alpha+\beta+\gamma$ ,

$$\text{αν } \alpha = -\frac{1}{2}, \quad \beta = -\frac{3}{4} \text{ και } \gamma = 1.$$

**7. Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ Q. ΔΙΑΤΑΞΗ.**

§ 43. Τί σημαίνει ή σχέση  $\alpha > \beta$ ; Τί ή  $\gamma < \delta$ ;

Ξέρουμε ότι ή σχέση  $\alpha > \beta$  σημαίνει «ό α είναι μεγαλύτερο του β».

Η σχέση αυτή λέγεται ανισότητα με πρώτο μέλος τόν α και δεύτερο μέλος τόν β.

Ἡ ἀνισότητα  $\gamma < \delta$  ἐκφράζει ὅτι «ὁ  $\gamma$  εἶναι μικρότερος τοῦ  $\delta$ ».  
 Οἱ ἀνισότητες  $\alpha > \beta$ ,  $\epsilon > \zeta$  εἶναι ὁμόστροφες (ἢ τῆς ἴδιας φορᾶς).  
 Οἱ ἀνισότητες  $\alpha > \beta$ ,  $\gamma < \delta$  εἶναι ἐτερόστροφες (ἢ ἀντίθετης φορᾶς).

Παρατηροῦμε τὸ σχῆμα 28, τὸ ὁποῖο παριστάνει ἕνα μέρος τῆς θερμομετρικῆς κλίμακας. Εἶναι φανερό ὅτι ἡ θερμοκρασία  $+3^\circ$  εἶναι μεγαλύτερη ἀπὸ τὴ θερμοκρασία  $0^\circ$  καὶ ὅτι ἡ θερμοκρασία  $0^\circ$  εἶναι μεγαλύτερη ἀπὸ τὴ θερμοκρασία  $-2^\circ$ .

Ἐπίσης ἡ θερμοκρασία  $-1^\circ$  εἶναι μεγαλύτερη ἀπὸ τὴ θερμοκρασία  $-4^\circ$ .

Ἀπ' αὐτὰ συμπεραίνομε τὰ ἑξῆς:

1. Κάθε θετικὸς ρητὸς εἶναι μεγαλύτερος ἀπὸ τὸ μηδὲν ἢ ὅτι τὸ μηδὲν εἶναι μικρότερο ἀπὸ κάθε θετικὸ ἀριθμὸ.

$$\alpha \in \mathbb{Q} \text{ καὶ } \alpha \text{ εἶναι θετικὸς} \Leftrightarrow \alpha > 0$$

2. Τὸ μηδὲν εἶναι μεγαλύτερο ἀπὸ κάθε ἀρνητικὸ ἢ ὅτι κάθε ἀρνητικὸς εἶναι μικρότερος ἀπὸ τὸ μηδὲν.

$$\beta \in \mathbb{Q} \text{ καὶ } \beta \text{ εἶναι ἀρνητικὸς} \Leftrightarrow \beta < 0$$

3. Κάθε θετικὸς εἶναι μεγαλύτερος ἀπὸ κάθε ἀρνητικὸ.

$$\alpha \text{ εἶναι θετικὸς καὶ } \beta \text{ ἀρνητικὸς} \Rightarrow \alpha > \beta.$$

4. Μεταξύ δύο θετικῶν ρητῶν μεγαλύτερος εἶναι ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος ἔχει τὴ μεγαλύτερη ἀπόλυτη τιμῆ.

$$\alpha, \gamma \text{ θετικοὶ καὶ } |\alpha| > |\gamma| \Rightarrow \alpha > \gamma$$

5. Μεταξύ δύο ἀρνητικῶν μεγαλύτερος εἶναι ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος ἔχει τὴ μικρότερη ἀπόλυτη τιμῆ.

$$\beta, \delta \text{ ἀρνητικοὶ καὶ } |\beta| > |\delta| \Rightarrow \beta < \delta.$$

Ξέρομε ὅτι κάθε ἀριθμὸς, πού εἶναι τοποθετημένος δεξιότερα ἀπὸ ἕναν ἄλλο στὴν εὐθεῖα τῶν ρητῶν τῆς ἀριθμητικῆς, εἶναι μεγαλύτερος ἀπὸ αὐτόν.




σχ. 28.



σχ. 29.

Τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ γιὰ τοὺς ρητούς, οἱ ὁποῖοι εἶναι τοποθετημένοι στὴν εὐθεῖα τῶν ρητῶν ἀριθμῶν.



σχ. 30

§ 44. *Νά συγκριθεῖ ἡ διαφορά δύο ρητῶν μὲ τὸ μηδέν.*

$$\begin{aligned} \left(+\frac{1}{2}\right) - 0 &= \left(+\frac{1}{2}\right) + 0 = +\frac{1}{2} && \text{ἡ διαφορά εἶναι θετικός ἀριθμός} \\ 0 - (-1) &= 0 + (+1) = +1 && \text{ἡ διαφορά εἶναι θετικός ἀριθμός} \\ (+5) - (-2) &= (+5) + (+2) = +7 && \text{ἡ διαφορά εἶναι θετικός ἀριθμός} \\ \left(-\frac{2}{3}\right) - \left(-\frac{12}{3}\right) &= \left(-\frac{2}{3}\right) + \left(+\frac{12}{3}\right) = +\frac{10}{3} && \text{ἡ διαφορά εἶναι θετικ. ἀριθμ.} \\ \left(-\frac{5}{8}\right) - \left(-\frac{5}{8}\right) &= \left(-\frac{5}{8}\right) + \left(+\frac{5}{8}\right) = 0 && \text{ἡ διαφορά εἶναι ἴση μὲ μηδέν} \\ (+3) - (+5) &= (+3) + (-5) = -2 && \text{ἡ διαφορά εἶναι ἀρνητικός ἀριθμός.} \\ (-6) - (-5) &= (-6) + (+5) = -1 && \text{ἡ διαφορά εἶναι ἀρνητ. ἀριθμός.} \end{aligned}$$

Ἀπὸ αὐτὰ παρατηροῦμε τὰ ἑξῆς:

1. Ἡ διαφορά ἐνὸς μικρότερου ἀπὸ ἕναν μεγαλύτερο εἶναι θετικός ἀριθμός.
2. Ἡ διαφορά δύο ἴσων ἀριθμῶν εἶναι μηδέν.
3. Ἡ διαφορά ἐνὸς μεγαλύτερου ἀπὸ ἕναν μικρότερο εἶναι ἀρνητικός ἀριθμός.

Ἐπομένως διατυπώνομε τὸν παρακάτω ὄρισμό:

**Ὁ ρητὸς  $\alpha$  εἶναι μεγαλύτερος ἀπὸ τὸν ρητὸ  $\beta$ , ἂν καὶ μόνον ἂν  $\alpha - \beta$  εἶναι θετικός ἀριθμός· εἶναι ἴσος μὲ τὸν  $\beta$ , ἂν  $\alpha - \beta$  ἰσοῦται μὲ μηδέν· εἶναι μικρότερος ἀπὸ τὸν  $\beta$ , ἂν  $\alpha - \beta$  εἶναι ἀρνητικός ἀριθμός.**

Συμβολικά:  $\alpha, \beta \in \mathbb{Q}$

$\begin{aligned} \alpha - \beta > 0 &\Leftrightarrow \alpha > \beta \\ \alpha - \beta = 0 &\Leftrightarrow \alpha = \beta \\ \alpha - \beta < 0 &\Leftrightarrow \alpha < \beta \end{aligned}$
--

### Ἐφαρμογή.

Νά συγκριθοῦν οἱ παρακάτω ἀριθμοί.

α)  $+7$  καὶ  $-5$

Ἔχομε  $(+7) - (-5) = (+7) + (+5) = +12 > 0$

Ἄρα  $+7 > -5$

β)  $-13$  καὶ  $-12$

Εἶναι  $(-13) - (-12) = (-13) + (+12) = -1 < 0$

Ἐπομένως  $-13 < -12$

γ)  $-\frac{12}{3}$  καὶ  $-4$

Ἐπειδὴ  $-\frac{12}{3} - (-4) = \left(-\frac{12}{3}\right) + (+4) = \left(-\frac{12}{3}\right) + \left(+\frac{12}{3}\right) = 0$

$$\Rightarrow -\frac{12}{3} = -4.$$

### § 45. Ίδιότητες.

1. Παρατηρούμε ότι οι ανισότητες

$$+7 > +2 \text{ και } +2 > -10 \text{ συνεπάγονται την ανισότητα } +7 > -10.$$

Δηλαδή ισχύει η μεταβατική ιδιότητα στην ανισότητα.

$$\text{Γενικά: } \alpha > \beta \text{ και } \beta > \gamma \Rightarrow \alpha > \gamma \quad (\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{Q})$$

Αυτό δικαιολογείται ως εξής:

Έπειδή  $\alpha > \beta$  και  $\beta > \gamma$ , έχουμε ότι  $\alpha - \beta$  είναι θετικός και  $\beta - \gamma$  είναι θετικός αριθμός. Το άθροισμά τους:  $\alpha - \beta + \beta - \gamma$  είναι θετικός αριθμός. Άλλα  $-\beta$  και  $\beta$  είναι αντίθετοι: άρα  $\alpha - \beta + \beta - \gamma = \alpha - \underbrace{\beta + \beta}_{0} - \gamma = \alpha - \gamma$  είναι θετικός αριθμός, επομένως  $\alpha > \gamma$ .

2. Έπειδή  $+\frac{5}{9} > 0$  και ο αντίθετός του  $-\frac{5}{9} < 0$ , έχουμε γενικά την ισουδυναμία:  $\alpha > 0 \Leftrightarrow -\alpha < 0 \quad (\alpha \in \mathbb{Q})$

3. Επίσης από τα παραδείγματα:

$$-3 - (-8) = -3 + (+8) = +5, \quad -3 > -8$$

$$-8 - (-3) = -8 + (+3) = -5, \quad -8 < -3$$

$$\text{*Έχουμε: } \alpha > \beta \Leftrightarrow \beta < \alpha \quad (\alpha, \beta \in \mathbb{Q})$$

Δικαιολόγηση:

$\alpha > \beta$ , συνεπάγεται ότι  $\alpha - \beta$  είναι θετικός αριθμός· αλλά τότε ο αντίθετός του  $\beta - \alpha$  θα είναι αρνητικός αριθμός. Συνεπώς  $\beta < \alpha$ .

4. Αν και στα δύο μέλη μιās ανισότητας προσθέσουμε τον ίδιο ρητό, βρίσκουμε όμοστροφη ανισότητα. π.χ.  $-5 > -12$  προσθέτουμε τον  $-3$ :

$$-5 + (-3) > -12 + (-3) \text{ δηλαδή } -8 > -15$$

$$\text{Γενικά: } \alpha > \beta \Leftrightarrow \alpha + \gamma > \beta + \gamma \quad (\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{Q})$$

Δικαιολόγηση:

Έπειδή  $\alpha > \beta \Rightarrow \alpha - \beta > 0$ . Προσθέτουμε και στα δύο μέλη της τὸ μηδέν:

$$\alpha - \beta + 0 > 0$$

$$\alpha - \beta + \gamma - \gamma > 0 \Rightarrow \alpha + \gamma - \beta - \gamma > 0 \Rightarrow \alpha + \gamma - (\beta + \gamma) > 0 \Rightarrow \alpha + \gamma > \beta + \gamma$$

### Έφαρμογή

$$\alpha + \beta > \gamma \Leftrightarrow \alpha + \beta + (-\beta) > \gamma + (-\beta) \Rightarrow \alpha > \gamma - \beta.$$

Αν από τὸ ένα μέλος μιās ανισότητας μεταφέρουμε έναν όρο στο άλλο, αλλάζουμε τὸ πρόσημό του.

5. Νά διατυπώσετε με λόγια και νά ἐπαληθεύσετε τὴν ιδιότητα:

$$\alpha > \beta \Rightarrow \alpha - \gamma > \beta - \gamma \quad (\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{Q})$$

## § 46. Διάταξη.

“Αν δοθοῦν δύο ρητοὶ ἀριθμοί, αὐτοὶ ἢ εἶναι ἴσοι ἢ ὁ ἓνας εἶναι μικρότερος ἀπὸ τὸν ἄλλο.

Τὴν ἔκφραση «... εἶναι μικρότερος ἢ ἴσος...» τὴ συμβολίζομε μὲ  $\leq$ .

“Αν λάβουμε ὑπ’ ὄψη τὶς ιδιότητες τῆς ἀνισότητος καὶ τῆς ἰσότητος, παρατηροῦμε ὅτι ἰσχύουν οἱ παρακάτω ιδιότητες.

$\alpha \leq \alpha$		ἀνακλαστική
$\alpha \leq \beta$ καὶ $\beta \leq \alpha \Rightarrow \alpha = \beta$		ἀντισυμμετρική
$\alpha \leq \beta$ καὶ $\beta \leq \gamma \Rightarrow \alpha \leq \gamma$		μεταβατική

Τὴ σχέση  $\leq$  τὴ λέμε διάταξη τῶν ρητῶν κατὰ μέγεθος.

**Σημείωση:** Κάθε σχέση, ποὺ ἔχει τὶς ιδιότητες «ἀνακλαστική», «ἀντισυμμετρική» καὶ «μεταβατική» λέγεται σχέση διατάξεως.

## Ἐσκήσεις:

84. Ἀπὸ τὰ σύμβολα  $>$ ,  $<$ ,  $=$  νὰ βάλετε τὸ κατάλληλο μεταξὺ τῶν ἀριθμῶν:  
 $-2$  καὶ  $-5$ ,  $-1$  καὶ  $-\frac{3}{2}$ ,  $0$  καὶ  $-6$ ,  $-\frac{5}{6}$  καὶ  $-\frac{3}{4}$ ,  $\frac{1}{4}$  καὶ  $0$ ,  $-\frac{1}{2}$  καὶ  $-\frac{1}{3}$   
 $-\frac{2}{14}$  καὶ  $-\frac{1}{7}$ ,  $(-3+1)$  καὶ  $-8$ .

85. Ποιὲς ἀπὸ τὶς ἐπόμενες σχέσεις εἶναι ἀληθεῖς;

$$\alpha) -12+15-2 > 3-13+17-7, \quad \beta) -2+12-5 = 2-3+10,$$

$$\gamma) -10 > -\frac{21}{2}, \quad \delta) -50 < -\frac{1}{2}, \quad \epsilon) -\frac{3}{4} > 0, \quad \sigma\tau) 0 < -20,$$

$$\zeta) -1 + \frac{24}{5} > -0,6 + 4,2, \quad \eta) -\frac{2}{3} + \frac{3}{4} < 0,75 - \frac{5}{8}.$$

86. Ἐφαρμόζοντας τὴν ιδιότητα  $\alpha + \beta > \gamma \Rightarrow \alpha > \gamma - \beta$  νὰ ἀποδείξετε ὅτι:

$$\alpha + 2 > 12 \Rightarrow \alpha > 10$$

$$\beta - 3 < 5 \Rightarrow \beta < 8 \quad (\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{Q})$$

$$2 - \gamma > 2 \Rightarrow \gamma < 0.$$

87. Νὰ ἀποδείξετε μὲ ἀριθμητικὰ παραδείγματα τὶς παρακάτω ιδιότητες καὶ νὰ τὶς διατυπώσετε καὶ μὲ λόγια:  $\alpha, \beta, \gamma, \delta \in \mathbb{Q}$ .

$$\alpha > \beta \Leftrightarrow -\alpha < -\beta,$$

$$\alpha > \beta \text{ καὶ } \gamma = \delta \Rightarrow \alpha + \gamma > \beta + \delta,$$

$$\alpha > \beta \text{ καὶ } \gamma > \delta \Rightarrow \alpha + \gamma > \beta + \delta.$$

88. Νὰ προσθέσετε κατὰ μέλη τὶς παρακάτω ἀνισότητες:

$$\alpha) \begin{array}{l} -5 < -3 \\ 3 < 5 \end{array}$$

$$\beta) \begin{array}{l} -5 < -3 \\ -4 < -1 \end{array}$$

$$\gamma) \begin{array}{l} -5 < -3 \\ 1 < 3. \end{array}$$

Τί παρατηρεῖτε; Μπορεῖτε νὰ ἀφαιρέσετε κατὰ μέλη; Διατυπώστε κανόνες.

### Άσκησης για επανάληψη:

89. Βρείτε τα εξαγόμενα των παρακάτω πράξεων:

α)  $0 - \frac{1}{4}$ ,  $-\frac{1}{4} - 0$ ,  $-3 + 4 - 6$ ,  $-6 + 4 - 3$ ,

β)  $-1 - \frac{3}{2}$ ,  $-\frac{3}{2} - 1$ ,  $-1 - (-\frac{3}{2})$ ,  $-\frac{3}{2} - (-1)$ ,

γ)  $-1 - 11 - 111$ ,  $-1 + (-2-3)$ ,  $-1 - (-2-3)$ ,

δ)  $-30,3 - 15,7 + \frac{63}{5} - 10 + \frac{1}{2}$ ,  $17,7 + 12,5 - 9,4 + \frac{2}{5} - 1$ .

90. Απαντήστε στα παρακάτω ερωτήματα:

α)  $\alpha = \beta$  συνεπάγεται  $|\alpha| = |\beta|$ ; Αν  $|\alpha| = |\beta|$ , τί συμπέρασμα βγαίνει για τους ρητούς  $\alpha, \beta$ ;

β) Ποιός είναι ο ρητός  $\chi$ , όταν  $|\chi| = \left| -\frac{3}{7} \right|$ ;

γ) Άληθεύει για τον ρητό  $\gamma$  ότι  $\gamma = |- \gamma|$ ;

δ) Σε ποιά ύποσύνολο του  $Q$  ανήκει ο ρητός  $\psi$ , αν

1)  $\psi = |\psi|$ , 2)  $0 = |\psi|$  και 3)  $-\psi = |\psi|$ ;

ε) Ποιός είναι ο αντίθετος του  $\kappa - \lambda$  και ποιός του  $-\mu + \nu$ ; ( $\kappa, \lambda, \mu, \nu \in Q$ ).

91. Αν  $\chi = -12 + 17 - 9$ ,  $\psi = 5 - 11 + 10$  και  $z = -19 + 22$ , να βρεθούν τα

α)  $\chi + \psi - z$ , β)  $\chi - \psi + z$ , γ)  $-\chi + z + \psi$  καθώς και τα

δ)  $\chi + \psi + z$ , ε)  $(\chi + \psi) + z$ , στ)  $\chi + (\psi + z)$

92. Αν  $\chi = -\frac{5}{6} + \frac{7}{3} - 1$  και  $\psi = \frac{1}{6} - \frac{2}{3} + 3$ , να βρεθούν τα

α)  $\chi + \psi$ , β)  $\chi - \psi$ , γ)  $-\chi + \psi$ .

93. Να υπολογίσετε τα α)  $-\alpha + \beta - \gamma$ , β)  $-\gamma + \beta - \alpha$ , γ)  $-\alpha - \gamma + \beta$ ,

αν  $\alpha = -\frac{3}{2}$ ,  $\beta = -\frac{5}{3}$ ,  $\gamma = +\frac{1}{6}$

94. Να διατάξετε τα στοιχεία του συνόλου  $\{-\frac{1}{3}, -\frac{1}{2}, -1, -5, +\frac{1}{8}, +1, 0\}$  κατά τάξη μεγέθους.

95. Ποιές από τις παρακάτω σχέσεις είναι αληθείς;

α)  $-4 > -2$ , β)  $13 > -31$ , γ)  $-\frac{1}{3} > -\frac{1}{2}$ , δ)  $-\frac{1}{5} < -1$

ε)  $-\frac{3}{2} + 5 - 1 \neq 4 - 1,5$ , στ)  $-\frac{2}{3} + \frac{3}{2} \neq \frac{1}{3} + \frac{1}{2}$ .

96. Ποιά από τα στοιχεία του συνόλου  $\{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5\}$  επαληθεύουν τη σχέση  $\chi - 5 < -2$ ;

97. Με παραδείγματα να επαληθεύσετε ότι:

αν  $\alpha < \beta$ , θα είναι και  $\alpha < \frac{\alpha + \beta}{2} < \beta$ .

98. Αν για τους ρητούς  $\alpha, \beta$  έχουμε τη σχέση  $\alpha > \beta$ , να εξετάσετε ποιά σχέση υπάρχει μεταξύ των αντίθετων του  $\alpha$  και  $\beta$ .

99. \*Αν  $\chi \in \mathbb{Q}$ ,  $\psi \in \mathbb{Q}^+$ ,  $z \in \mathbb{Q}^-$ , να βρεθούν με άναγραφή τῶν στοιχείων τους τὰ σύνολα:

$$\alpha) \left\{ \chi / \frac{5}{7} - \chi = -\frac{5}{7} \right\}, \quad \beta) (\psi / \psi - 3 = -1), \quad \gamma) \left\{ \chi / -\frac{3}{5} - \chi = -\frac{3}{5} \right\},$$

$$\delta) \left\{ \psi / \frac{1}{2} - \psi = 20 \right\}, \quad \epsilon) \left\{ \chi / -\frac{5}{2} + \chi = -\frac{5}{2} \right\}, \quad \sigma\tau) \left\{ z / -\frac{2}{3} + z = -\frac{2}{3} \right\},$$

100. \*Αν  $\alpha = 0$ ,  $\beta = -1$  καὶ  $\gamma = -2$ , να ὑπολογίσετε τὰ

$$1) (\alpha - \beta) + (\beta - \gamma) + (\gamma - \alpha) \quad \text{καὶ} \quad 2) -(\alpha - \beta) - (\beta - \gamma) - (\gamma - \alpha).$$

## 8. Η ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ $\mathbb{Q}$ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΔΥΟ ΡΗΤΩΝ

§ 47. Στις πράξεις τῶν ρητῶν ἀριθμῶν, τὶς ὁποῖες ὄρισαμε μέχρι τώρα, εἶδαμε ὅτι διατηροῦνται οἱ ιδιότητες τῶν πράξεων τῶν ρητῶν τῆς ἀριθμητικῆς.

Γι' αὐτὸ θὰ ὀρίσουμε τὸν πολλαπλασιασμὸ στὸ σύνολο τῶν ρητῶν ἀριθμῶν ἔτσι, ὥστε νὰ ἰσχύουν οἱ γνωστὲς ιδιότητες τοῦ πολ/σμοῦ.

$$\begin{aligned} \alpha \cdot \beta &= \beta \cdot \alpha && \text{ἀντιμεταθετικὴ} \\ (\alpha \cdot \beta) \cdot \gamma &= \alpha \cdot (\beta \cdot \gamma) && \text{προσεταιριστικὴ} \\ \alpha \cdot (\beta + \gamma) &= \alpha \cdot \beta + \alpha \cdot \gamma && \text{ἐπιμεριστικὴ} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1. \text{ Ἐπειδὴ } 3 \cdot 5 &= 15 \text{ εἶναι καὶ} \\ (+3) \cdot (+5) &= +15. \end{aligned}$$

Δηλαδή τὸ γινόμενο δύο θετικῶν εἶναι θετικὸς ἀριθμὸς.

2. Στὸν πίνακα (α) παρατηροῦμε τὰ ἑξῆς:

\*Ὅταν ὁ πολ/στής 3 ἐλαττώνεται κατὰ μία μονάδα καὶ γίνεται: 2, 1, 0, τὸ γινόμενο ἐλαττώνεται κατὰ 5 καὶ γίνεται: 10, 5, 0. \*Αν συνεχίσουμε νὰ ἐλαττώνουμε τὸν πολ/στή κατὰ ἓνα: -1, -2, -3, ... πρέπει νὰ ἐλαττώνουμε καὶ τὸ γινόμενο κατὰ 5: -5, -10, -15, ...

$$\begin{aligned} \text{Δηλαδή πρέπει } (-1) \cdot 5 &= -5, \quad (-2) \cdot 5 = \\ = -10, \quad (-3) \cdot 5 &= -15 \text{ κ.ο.κ. ἢ } (-1) \cdot (+5) = \\ = -5 \quad (-2) \cdot (+5) &= -10 \text{ κ.ο.κ.} \end{aligned}$$

Δεχόμαστε ὅτι  $5 \cdot (-2) = (-2) \cdot 5 = -10$  (μεταθετικὴ ιδιότητα τοῦ πολ/σμοῦ).

\*Ἐπομένως τὸ γινόμενο δύο ἑτερόσημων ρητῶν εἶναι ἀρνητικὸς ἀριθμὸς.

(α)

Παράγοντες	Γινόμενο
3 · 5	15
2 · 5	10
1 · 5	5
0 · 5	0
-1 · 5	; - 5
-2 · 5	; - 10
-3 · 5	; - 15
·	·
·	·
·	·

(β)

Παράγοντες	Γινόμενο
5 · (-2)	- 10
4 · (-2)	- 8
3 · (-2)	- 6
2 · (-2)	- 4
1 · (-2)	- 2
0 · (-2)	; 0
(-1) · (-2)	; 2
(-2) · (-2)	; 4
(-3) · (-2)	; 6
·	·
·	·
·	·



3. Ἀφοῦ παραδεχτήκαμε ὅτι  $(-2) \cdot 5 = 5 \cdot (-2) = -10$  (μεταθετική ιδιότητα τοῦ πολ/σμοῦ), παρατηροῦμε τὸν πίνακα (β).

Ἐπομένως ὁ πολ/σμός 5 ἐλαττώνεται κατὰ ἓνα, τὸ γινόμενο αὐξάνεται κατὰ δύο.

\* Ἄρα πρέπει νὰ δεχτοῦμε ὅτι:  $0 \cdot (-2) = 0$ ,  $(-1) \cdot (-2) = 2$ ,  $(-2) \cdot (-2) = 4$ ,  $(-3) \cdot (-2) = 6$  κ.ο.κ.

Συνεπῶς τὸ γινόμενο δύο ἀρνητικῶν εἶναι θετικὸς ἀριθμὸς.

§ 48. Μποροῦμε νὰ αἰτιολογήσουμε τὰ παραπάνω, ἂν δεχτοῦμε ὅτι ἰσχύουν οἱ ιδιότητες:

$$\alpha \cdot (\beta + \gamma) = \alpha \cdot \beta + \alpha \cdot \gamma, \quad \alpha \cdot \beta = \beta \cdot \alpha, \quad \alpha \cdot 0 = 0$$

1. Ἐπειδὴ  $\frac{2}{3} \cdot \frac{7}{5} = \frac{2 \cdot 7}{3 \cdot 5} = \frac{14}{15}$  ἔχομε  $\boxed{\left(+\frac{2}{3}\right) \cdot \left(+\frac{7}{5}\right) = +\frac{14}{15}}$

2. Εἶναι  $\frac{3}{4} \cdot 0 = 0$

$$\eta \frac{3}{4} \cdot (-2 + 2) = 0$$

$$\eta \frac{3}{4} \cdot (-2) + \frac{3}{4} \cdot 2 = 0 \quad (\text{ἐπιμεριστική ιδιότητα})$$

$$\eta \frac{3}{4} \cdot (-2) + \frac{6}{4} = 0. \text{ Ἄπ' αὐτὴ παρατηροῦμε ὅτι τὸ } \frac{3}{4} \cdot (-2) \text{ πρέπει}$$

νὰ παριστάνει τὸν ἀντίθετο τοῦ  $\frac{6}{4}$ , δηλαδὴ τὸ  $-\frac{6}{4}$ .

Συνεπῶς  $\frac{3}{4} \cdot (-2) = -\frac{6}{4}$  ἢ  $\left(+\frac{3}{4}\right) \cdot (-2) = -\frac{6}{4}$  καὶ

$$\boxed{\left(+\frac{3}{4}\right) \cdot (-2) = (-2) \cdot \left(+\frac{3}{4}\right) = -\frac{6}{4}} \quad (\text{μεταθετική ιδιότητα})$$

3. Ἐχομε  $(-2) \cdot 0 = 0$

$$\eta (-2) \cdot \left(-\frac{3}{4} + \frac{3}{4}\right) = 0$$

$$\eta (-2) \cdot \left(-\frac{3}{4}\right) + (-2) \cdot \left(\frac{3}{4}\right) = 0$$

$$\eta (-2) \cdot \left(-\frac{3}{4}\right) + \left(-\frac{6}{4}\right) = 0.$$

\* Ἀπὸ τὴν τελευταία αὐτὴ ἰσότητα συμπεραίνομε ὅτι τὸ  $(-2) \cdot \left(-\frac{3}{4}\right)$  παριστάνει τὸν ἀντίθετο τοῦ  $-\frac{6}{4}$ , δηλαδὴ τὸν  $+\frac{6}{4}$ . Ἄρα:

$$\boxed{(-2) \cdot \left(-\frac{3}{4}\right) = +\frac{6}{4}}$$

Ἄπ' αὐτὰ καταλήγομε στὸ συμπέρασμα ὅτι:

Τὸ γινόμενο δύο ρητῶν εἶναι ρητὸς ἀριθμὸς, ὁ ὁποῖος ἔχει ἀπόλυτη τιμὴ τὸ γινόμενο τῶν ἀπόλυτων τιμῶν καὶ εἶναι θετικὸς, ἂν αὐτοὶ εἶναι ὁμόσημοι, ἀρνητικὸς ἂν εἶναι ἐτερόσημοι, καὶ μηδέν, ἂν ὁ ἓνας εἶναι μηδέν.

Συμβολικά:  $\alpha, \beta \in \mathbb{Q}$  και  $\alpha, \beta$  όμοσημοι,  $\alpha \cdot \beta = |\alpha| \cdot |\beta|$   
 $\alpha, \beta$  έτερόσημοι,  $\alpha \cdot \beta = -(|\alpha| \cdot |\beta|)$   
 $\alpha \cdot 0 = 0$

**Σημείωση:** Το γινόμενο  $\alpha \cdot \beta$  γράφεται και  $\alpha\beta$ .

### Παραδείγματα

$(+2) \cdot (+\frac{3}{5}) = + (2 \cdot \frac{3}{5}) = +\frac{6}{5} > 0$ ,  $(-\frac{6}{7}) \cdot (+3) = -(\frac{6}{7} \cdot 3) = -\frac{18}{7} < 0$ ,  
 $(-\frac{2}{3}) \cdot (-\frac{5}{7}) = +(\frac{2}{3} \cdot \frac{5}{7}) = +\frac{10}{21} > 0$ ,  $(+4) \cdot (-\frac{2}{5}) = -(4 \cdot \frac{2}{5}) = -\frac{8}{5} < 0$ .  
 $\alpha, \beta$  ρητοί όμοσημοι  $\Leftrightarrow \alpha\beta > 0$ ,  $\alpha, \beta$  ρητοί έτερόσημοι  $\Leftrightarrow \alpha\beta < 0$ ,  
 $0 \cdot (-\frac{1}{2}) = 0$ ,  $0 \cdot (+\frac{5}{16}) = 0$ ,  $0 \cdot \alpha = 0$ .

### § 49. Ίδιότητες.

Σύμφωνα με τόν κανόνα για τήν εύρεση του γινομένου δύο ρητών παρατηρούμε ότι ό πολ/σμός έκτός από τις ιδιότητες, που δεχτήκαμε, έχει και τις παρακάτω:

α) Όταν δοθούν δύο ρητοί  $\alpha$  και  $\beta$ , υπάρχει πάντοτε ό ρητός  $\alpha\beta$  (γινόμενο αυτών). Συμβολικά  $\alpha, \beta \in \mathbb{Q} \Rightarrow \alpha\beta \in \mathbb{Q}$

β) Το γινόμενο δύο ρητών είναι ένας μόνο ρητός. Δηλαδή ή πράξη του πολ/σμού είναι μονότιμη.

γ) Έπειδή  $(+1) \cdot (+\frac{2}{3}) = +(1 \cdot \frac{2}{3}) = +\frac{2}{3}$ ,  $(-\frac{4}{7}) \cdot (+1) = -(\frac{4}{7} \cdot 1) = -\frac{4}{7}$  συμπεραίνουμε ότι ό αριθμός  $+1$  είναι τό ουδέτερο στοιχείο του πολ/σμού.

$$\alpha \in \mathbb{Q} \Rightarrow (+1) \cdot \alpha = \alpha$$

δ) Έπειδή  $(-1) \cdot (-5) = +(1 \cdot 5) = +5$ ,  $(+\frac{3}{10}) \cdot (-1) = -(\frac{3}{10} \cdot 1) = -\frac{3}{10}$  συμπεραίνουμε ότι τό γινόμενο ενός ρητού επί  $(-1)$  είναι ίσο με τόν αντίθετό του.

$$\alpha \in \mathbb{Q} \Rightarrow (-1) \cdot \alpha = -\alpha$$

ε) Έχουμε:

$(+2) \cdot (+\frac{1}{2}) = +(2 \cdot \frac{1}{2}) = +1$ ,  $(+\frac{5}{3}) \cdot (+\frac{3}{5}) = +(\frac{5}{3} \cdot \frac{3}{5}) = +1$   
 $(-2) \cdot (-\frac{1}{2}) = +(2 \cdot \frac{1}{2}) = +1$ ,  $(-\frac{5}{3}) \cdot (-\frac{3}{5}) = +(\frac{5}{3} \cdot \frac{3}{5}) = +1$

\*Αρα δύο όμοσημοι ρητοί, οι οποίοι έχουν αντίστροφες απόλυτες τιμές, έχουν γινόμενο τὸ +1. Οἱ ρητοὶ αὐτοὶ λέγονται ἀντίστροφοι.

Συνεπῶς ὅταν δοθεῖ ἕνας ρητὸς  $a$  ( $a \neq 0$ ), ὑπάρχει ἕνας μόνος ρητὸς ὁμοσήμος μὲ αὐτὸν καὶ μὲ ἀντίστροφη ἀπόλυτη τιμὴ, ὁ ὁποῖος λέγεται ἀντίστροφος τοῦ  $a$  καὶ συμβολίζεται μὲ  $\frac{1}{a}$  ἢ  $a^{-1}$

Συντομότερα:

Γιὰ κάθε στοιχεῖο τοῦ συνόλου  $Q$  τῶν ρητῶν (ἐκτὸς ἀπὸ τὸ μηδέν) ὑπάρχει ἕνα μόνος στοιχεῖο τοῦ  $Q$ , τὸ ὁποῖο λέγεται ἀντίστροφο αὐτοῦ.

Π.χ. ὁ ἀντίστροφος τοῦ +20 εἶναι ὁ  $+\frac{1}{20}$ , τοῦ -48 εἶναι ὁ  $-\frac{1}{48}$  τοῦ  $-\frac{17}{19}$  εἶναι ὁ  $-\frac{19}{17}$  τοῦ +1 εἶναι ὁ +1 καὶ τοῦ -1 εἶναι ὁ -1.

### Ἀσκήσεις:

101. Βρῆτε τὰ γινόμενα:

$$\alpha) +1 \cdot (-1), \quad (+8) \cdot (+1), \quad -\frac{3}{5} \cdot (-1), \quad \left(-\frac{15}{7}\right) \cdot (+1)$$

$$\beta) 0 \cdot (-12), \quad \left(-\frac{4}{21}\right) \cdot \left(-\frac{21}{4}\right), \quad \left(+\frac{1}{2}\right) \cdot (+2), \quad \left(+\frac{3}{8}\right) \cdot \left(-\frac{8}{3}\right)$$

102. Βρῆτε τὰ ἐξαγόμενα τῶν παρακάτω πράξεων:

$$\alpha) -\frac{13}{15} \cdot \left(-\frac{15}{13}\right) + 8 \cdot \left(-\frac{1}{8}\right), \quad \beta) -\frac{1}{2} \cdot (-2) + \frac{41}{61} \cdot \frac{61}{41} + \left(-\frac{101}{119}\right) \cdot \left(-\frac{119}{101}\right)$$

$$\gamma) \frac{5}{3} \cdot \left(-\frac{3}{5}\right) + \frac{1}{2} \cdot (-2) + 15 \cdot \left(-\frac{1}{15}\right) + \frac{46}{3} \cdot \left(-\frac{3}{23}\right)$$

$$\delta) -\frac{4}{7} \cdot \frac{7}{4} + \frac{10}{17} \cdot \left(-\frac{17}{10}\right) + \frac{21}{29} \cdot \left(-\frac{29}{21}\right)$$

103. Νὰ βρεθοῦν τὰ ἐξαγόμενα μὲ τὸν συντομότερο τρόπο:

[χρησιμοποιήστε τὴν ιδιότητα:  $\alpha\beta + \alpha\gamma = \alpha(\beta + \gamma)$ ]

$$\alpha) 5 \cdot (-7) + 5 \cdot 27, \quad \beta) 6 \cdot (-12) - 6 \cdot 18, \quad \gamma) 59 \cdot (-19) + 59 \cdot 9,$$

$$\delta) -\frac{2}{5} \cdot 11 - \frac{2}{5} \cdot 19, \quad \epsilon) -21 \cdot (-17) + (-21) \cdot (-13), \quad \sigma\tau) \frac{15}{23} \cdot (-18) - \frac{30}{46} \cdot 12.$$

104. Νὰ ὑπολογίσετε τὰ παρακάτω γινόμενα μὲ δύο τρόπους:

$$\alpha) -5 \cdot (+12 - 19), \quad \beta) \frac{3}{4} \cdot \left(-\frac{2}{3} + \frac{5}{6}\right), \quad \gamma) \left(-4 + \frac{7}{2} - \frac{3}{5}\right) \cdot \left(-\frac{10}{11}\right)$$

$$\delta) \left(\frac{4}{3} - \frac{3}{4} + \frac{1}{8} - \frac{1}{6}\right) \cdot \left(-\frac{24}{13}\right), \quad \epsilon) \left(\frac{2,1}{7} - \frac{11}{5} + \frac{7}{2} - 1\right) \cdot \left(-\frac{70}{19}\right)$$

105. Ποιὸ συμπέρασμα ἐξάγεται γιὰ τοὺς ρητοὺς  $\alpha, \beta$ , ἂν  $\alpha\beta > 0$  ἢ  $\alpha\beta = 0$  ἢ  $\alpha\beta < 0$ ;

### 9. ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΤΡΙΩΝ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΡΗΤΩΝ - ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

§ 50. Νὰ ὑπολογισθεῖ τὸ γινόμενο  $2 \cdot (-3) \cdot 4$ .

Βρίσκουμε τὸ γινόμενο τῶν δύο πρώτων παραγόντων,  $2 \cdot (-3) = -6$

και κατόπι πολλαπλασιάζουμε τὸ γινόμενο αὐτὸ μὲ τὸν τρίτο παράγοντα.

Αὐτὸ τὸ γράφουμε καὶ ὡς ἑξῆς:

$$2 \cdot (-3) \cdot 4 = [2 \cdot (-3)] \cdot 4 = (-6) \cdot 4 = -24.$$

Ἀνάλογα ἐργαζόμαστε, ἂν ἔχουμε περισσότερους ἀπὸ τρεῖς παράγοντες.

Ὡστε γινόμενο τριῶν ἢ περισσότερων ρητῶν εἶναι ὁ ρητός, τὸν ὁποῖο βρίσκουμε, ἂν πολλαπλασιάσουμε τοὺς δύο πρώτους, τὸ γινόμενο ποὺ θὰ βροῦμε μὲ τὸν τρίτο κ.ο.κ.

$$\text{Συμβολικά: } \alpha \cdot \beta \cdot \gamma \cdot \delta = [(\alpha \cdot \beta) \cdot \gamma] \cdot \delta \quad (\alpha, \beta, \gamma, \delta \in \mathbb{Q}).$$

### Παραδείγματα :

$$(+2) \cdot (+4) \cdot (+5) = [(+2) \cdot (+4)] \cdot (+5) = (+8) \cdot (+5) = +40 = +(2 \cdot 4 \cdot 5)$$

$$(-2) \cdot (+4) \cdot (+5) = [(-2) \cdot (+4)] \cdot (+5) = (-8) \cdot (+5) = -40 = -(2 \cdot 4 \cdot 5)$$

$$(-2) \cdot (-4) \cdot (+5) = [(-2) \cdot (-4)] \cdot (+5) = (+8) \cdot (+5) = +40 = +(2 \cdot 4 \cdot 5)$$

$$(-2) \cdot (-4) \cdot (-5) = [(-2) \cdot (-4)] \cdot (-5) = (+8) \cdot (-5) = -40 = -(2 \cdot 4 \cdot 5)$$

Ἀπ' αὐτὰ παρατηροῦμε ὅτι:

Ἐνα γινόμενο μὲ περισσότερους ἀπὸ δύο παράγοντες ἔχει ἀπόλυτη τιμὴ τὸ γινόμενο τῶν ἀπόλυτων τιμῶν τῶν παραγόντων του καὶ εἶναι θετικό, ἂν οἱ παράγοντές του εἶναι θετικοὶ ἢ τὸ πλῆθος τῶν ἀρνητικῶν παραγόντων εἶναι ἄρτιος ἀριθμός· εἶναι ἀρνητικό, ἂν τὸ πλῆθος τῶν ἀρνητικῶν παραγόντων εἶναι περιττός ἀριθμός.

Μὲ βάση τὸν προηγούμενο κανόνα νὰ ὑπολογίσετε τὰ γινόμενα:

$$(+2) \cdot (+3) \cdot (+4) \cdot (+5) = +(2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5) = +120$$

$$(-2) \cdot (+3) \cdot (+4) \cdot (+5) = -(2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5) = -120$$

$$(+2) \cdot (+3) \cdot (-4) \cdot (-5) = +(2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5) = +120$$

$$(+2) \cdot (-3) \cdot (-4) \cdot (-5) = -(2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5) = -120$$

$$(-2) \cdot (-3) \cdot (-4) \cdot (-5) = +(2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5) = +120$$

Ἐάν  $\alpha, \beta, \gamma, \delta$  εἶναι θετικοὶ ἔχομε:

$$(-\alpha) \cdot \beta \cdot \gamma \cdot \delta = -(\alpha \cdot \beta \cdot \gamma \cdot \delta)$$

$$(-\alpha) \cdot (-\beta) \cdot \gamma \cdot \delta = (\alpha \cdot \beta \cdot \gamma \cdot \delta)$$

$$(-\alpha) \cdot (-\beta) \cdot (-\gamma) \cdot \delta = -(\alpha \cdot \beta \cdot \gamma \cdot \delta)$$

$$(-\alpha) \cdot (-\beta) \cdot (-\gamma) \cdot (-\delta) = (\alpha \cdot \beta \cdot \delta \cdot \gamma)$$

Σημείωση: Τὸ γινόμενο  $\alpha \cdot \beta \cdot \gamma \cdot \delta$  γράφεται καὶ  $\alpha\beta\gamma\delta$ .

### § 51. Ἰδιότητες.

Ἐπειδὴ τὸ γινόμενο ρητῶν ἔχει ἀπόλυτη τιμὴ τὸ γινόμενο τῶν ἀπόλυτων τιμῶν τους, ἰσχύουν σ' αὐτὸ ὅλες οἱ ἰδιότητες τοῦ γινομένου τῶν ρητῶν τῆς ἀριθμητικῆς.

1.  $(\alpha \cdot \beta) \cdot \gamma = \alpha \cdot (\beta \cdot \gamma) = (\alpha \cdot \gamma) \cdot \beta$
2.  $(\alpha \cdot \beta \cdot \gamma) \cdot (\delta \cdot \epsilon) = \alpha \cdot \beta \cdot \gamma \cdot \delta \cdot \epsilon$
3.  $\alpha\beta\gamma\delta = \gamma\alpha\delta\beta = \beta\alpha\delta\gamma = \dots$
4.  $(\alpha + \beta) \cdot (\gamma + \delta) = \alpha(\gamma + \delta) + \beta(\gamma + \delta) = \alpha\gamma + \alpha\delta + \beta\gamma + \beta\delta$

Π.χ.  $[(-2) \cdot (-5)] \cdot (-6) = (+10) \cdot (-6) = -60$

$(-2) \cdot [(-5) \cdot (-6)] = (-2) \cdot (+30) = -60$ . \*Αρα

$[(-2) \cdot (-5)] \cdot (-6) = (-2) \cdot [(-5) \cdot (-6)]$  και γενικώς

$(\alpha\beta)\gamma = \alpha(\beta\gamma)$  ή προσεταιριστική ιδιότητα του πολλαπλασιασμού.

### Εφαρμογές :

ο)  $2 \cdot (-\frac{3}{5}) \cdot (-\frac{1}{2}) \cdot \frac{3}{4} \cdot (-\frac{5}{3}) = -(2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{5}{3} \cdot \frac{3}{4}) = -(1 \cdot 1 \cdot \frac{3}{4}) = -\frac{3}{4}$

β)  $(-2) \cdot (-2) = (2 \cdot 2) = 2^2$ ,  $(-3) \cdot (-3) \cdot (-3) = -(3 \cdot 3 \cdot 3) = -3^3$

γ)  $(-\frac{3}{4} \cdot 5) \cdot (-\frac{4}{3} \cdot 2) = (-\frac{3}{4}) \cdot 5 \cdot (-\frac{4}{3}) \cdot 2 =$   
 $= (\frac{3}{4} \cdot \frac{4}{3} \cdot 5 \cdot 2) = 1 \cdot 10 = 10$

δ)  $[(-2) \cdot (-2) \cdot (-2)] \cdot [(-2) \cdot (-2)] = [-(2 \cdot 2 \cdot 2)] \cdot [+(2 \cdot 2)] =$   
 $[-2^3] \cdot [2^2] = -(2^3 \cdot 2^2) = -2^5$

ε)  $[(-3) + (-6)] \cdot [(-8) + (-6)] = (-3) \cdot [(-8) + (-6)] + (-6) \cdot [(-8) + (-6)] =$   
 $= 24 + 18 + 48 + 36 = 126$

$[(-3) + (-6)] \cdot [(-8) + (-6)] = [-9] \cdot [-14] = 126$ . (Β' τρόπος πιο άπλως).

στ)  $(-2 + \alpha) \cdot (-3 + \beta) = (-2) \cdot [-3 + \beta] + \alpha[-3 + \beta] = (-2) \cdot (-3) + (-2)\beta + \alpha(-3) + \alpha\beta$   
 $= 6 - 2\beta - 3\alpha + \alpha\beta$

ζ)  $-2 \cdot (-3 + \alpha) + (-5 + \alpha) \cdot 3 = (-2) \cdot (-3) + (-2) \cdot \alpha + (-5) \cdot 3 + 3\alpha$   
 $= 6 - 2\alpha + (-15) + 3\alpha =$   
 $= 6 - 2\alpha - 15 + 3\alpha =$   
 $= 6 - 15 + 3\alpha - 2\alpha =$   
 $= -9 + \alpha$

### § 52. Απόλυτη τιμή γινομένου ρητών αριθμών.

\*Έχουμε:  $|(-2) \cdot (+\frac{3}{4})| = |-\frac{6}{4}| = \frac{6}{4}$

$| -2 | \cdot | +\frac{3}{4} | = 2 \cdot \frac{3}{4} = \frac{6}{4}$

Συνεπώς  $|(-2) \cdot (+\frac{3}{4})| = |(-2)| \cdot |+\frac{3}{4}|$ .

\*Όστε ή απόλυτη τιμή ενός γινομένου είναι ίση με τὸ γινόμενο τῶν απόλυτων τιμῶν τῶν παραγόντων.

Γενικά αν  $\alpha, \beta \in \mathbb{Q}$ , είναι  $|\alpha \cdot \beta| = |\alpha| \cdot |\beta|$ .

Η ιδιότητα αυτή ισχύει και για περισσότερους από δύο παράγοντες.

### Ιδιότητες ισότητων και ανισότητων

§ 53. α) Ιδιότητα: "Αν  $\alpha = \beta \Rightarrow \alpha \cdot \gamma = \beta \cdot \gamma$ , ( $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{Q}$ )

Π.χ. Έχουμε την ισότητα  $-\frac{4}{5} = -\frac{8}{10}$  και πολ/με και τὰ δύο μέλη της επί τὸν ρητὸ  $-5$ .

$$\alpha' \text{ μέλος } -\frac{4}{5} \cdot (-5) = +4$$

$$\beta' \text{ μέλος } -\frac{8}{10} \cdot (-5) = +\frac{8}{2} \text{ ἄρα } -\frac{4}{5} \cdot (-5) = -\frac{8}{10} \cdot (-5)$$

Ἐπομένως μπορούμε νὰ πολ/σουμε και τὰ δύο μέλη μιᾶς ισότητας με τὸν ἴδιο ρητὸ και νὰ λάβουμε ισότητα.

β) Ιδιότητα: "Αν  $\alpha \cdot \gamma = \beta \cdot \gamma$  και  $\gamma \neq 0$ , θὰ ἔχουμε και  $\alpha = \beta$  ( $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{Q}$ ).

Π.χ. ἂν  $\chi \cdot (-5) = (-4) \cdot (-5)$ , ( $\chi \in \mathbb{Q}$ ) πολ/με και τὰ δύο μέλη της επί τὸν ἀντίστροφο τοῦ  $-5$ .

$$\alpha' \text{ μέλος: } [\chi \cdot (-5)] \cdot \left(-\frac{1}{5}\right) = \chi \cdot [(-5) \cdot \left(-\frac{1}{5}\right)] = \chi \cdot (+1) = \chi$$

$$\beta' \text{ μέλος } [(-4) \cdot (-5)] \cdot \left(-\frac{1}{5}\right) = (-4) \cdot [(-5) \cdot \left(-\frac{1}{5}\right)] = (-4) \cdot (+1) = -4$$

$$\text{* Ἄρα } \chi = -4$$

§ 54. α) Ιδιότητα: "Αν  $\alpha > \beta$  και  $\gamma > 0$  είναι και

$$\alpha \cdot \gamma > \beta \cdot \gamma, \quad (\alpha, \beta \in \mathbb{Q}, \gamma \in \mathbb{Q}^+)$$

Π.χ.  $-3 > -4$  πολ/με και τὰ δύο μέλη επί τὸ  $+2$  και ἔχουμε:

$$\alpha' \text{ μέλος: } (-3) \cdot (+2) = -6$$

$$\beta' \text{ μέλος: } (-4) \cdot (+2) = -8$$

$$\text{* Ἄρα } (-3) \cdot (+2) > (-4) \cdot (+2)$$

β) Ιδιότητα: "Αν  $\alpha > \beta$  και  $\gamma < 0$  είναι και:

$$\alpha \cdot \gamma < \beta \cdot \gamma \quad (\alpha, \beta \in \mathbb{Q}, \gamma \in \mathbb{Q}^-)$$

Π.χ.  $+\frac{2}{3} > -\frac{4}{5}$  πολ/με και τὰ δύο μέλη επί τὸν  $-2$

$$\alpha' \text{ μέλος: } \left(+\frac{2}{3}\right) \cdot (-2) = -\frac{4}{3}$$

$$\beta' \text{ μέλος: } -\frac{4}{5} \cdot (-2) = +\frac{8}{5} \text{ και ἔπειδιθ } -\frac{4}{3} < +\frac{8}{5}, \text{ ἔχουμε ὅτι:}$$

$$\left(+\frac{2}{3}\right) \cdot (-2) < \left(-\frac{4}{5}\right) \cdot (-2). \text{ Ἐπομένως:}$$

"Αν πολλαπλασιάσουμε και τὰ δύο μέλη μιᾶς ανισότητας με τὸν ἴδιο ἀριθμὸ, διάφορο τοῦ μηδενός, προκύπτει ὁμόστροφη ανισότητα, ἂν ὁ ἀριθμὸς εἶναι θετικὸς, και ἑτερόστροφη ἂν ὁ ἀριθμὸς εἶναι ἀρνητικὸς.

**Εφαρμογές :**

§ 55. 1. Πολλαπλασιάζουμε και τα δύο μέλη της ισότητας  $-10 + 7 = -3$  επί τον  $-1$ .  
 $-10 + 7 = -3 \Rightarrow (-10 + 7) \cdot (-1) = -3 \cdot (-1) \Rightarrow (-10) \cdot (-1) + 7 \cdot (-1) = 3 \Rightarrow 10 - 7 = 3$   
 Δηλαδή μπορούμε να αλλάξουμε το πρόσημο των όρων και των δύο μελών μίας ισότητας.

Γενικά:  $(\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{Q})$  αν  $\alpha - \beta = \gamma \Rightarrow -\alpha + \beta = -\gamma$

2. Πολλαπλασιάζουμε και τα δύο μέλη της ανισότητας  $-\frac{1}{3} > -2$  επί τον  $-1$ .

$$-\frac{1}{3} > -2 \Rightarrow -\frac{1}{3}(-1) < (-2) \cdot (-1) \Rightarrow \frac{1}{3} < 2$$

Μπορούμε να αλλάξουμε το πρόσημο των όρων και των δύο μελών μίας ανισότητας, αν αλλάξουμε τη φορά της.

Γενικά:  $(\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{Q})$ . Αν  $\alpha + \beta > \gamma \Rightarrow -\alpha - \beta < -\gamma$ .

**§ 56. Ανακεφαλαίωση:**

Από όσα αναφέρονται στον πολ/σμό των ρητών συμπεραίνουμε ότι:

α. Όταν δοθούν δύο ρητοί  $\alpha$  και  $\beta$ , υπάρχει ο ρητός  $\alpha\beta$  (γινόμενο αυτών).

Συμβολικά  $\alpha, \beta \in \mathbb{Q}$  και  $\alpha\beta \in \mathbb{Q}$ . Δηλαδή:

Αν  $\alpha, \beta$  είναι όμοσημοι, τότε  $\alpha\beta = |\alpha| \cdot |\beta|$

αν  $\alpha, \beta$  είναι ετερόσημοι, τότε  $\alpha\beta = -(|\alpha| \cdot |\beta|)$ ,

αν ο ένας είναι μηδέν, τότε  $\alpha \cdot \beta = 0$ .

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις έχουμε

$$|\alpha \cdot \beta| = |\alpha| \cdot |\beta|$$

β. Το γινόμενο δύο ρητών είναι ένας και μόνο ένας ρητός (μονότιμο του πολ/σμού).

γ. Ισχύει η μεταθετική ιδιότητα:  $\alpha \cdot \beta = \beta \cdot \alpha$ ,  $(\alpha, \beta \in \mathbb{Q})$

δ. Όταν δοθούν οί ρητοί  $\alpha, \beta$  και  $\gamma$ , ισχύει η προσεταιριστική ιδιότητα του πολ/σμού:  $(\alpha \cdot \beta) \cdot \gamma = \alpha \cdot (\beta \cdot \gamma)$

ε. Υπάρχει ένα στοιχείο του  $\mathbb{Q}$ , το  $+1$ , το οποίο είναι ουδέτερο στοιχείο του πολ/σμού.

$$\alpha \in \mathbb{Q} \Rightarrow \alpha \cdot (+1) = \alpha$$

στ. Για κάθε στοιχείο του  $\mathbb{Q}$ , (έκτος από το μηδέν) υπάρχει ένα άλλο στοιχείο αυτού (και είναι μοναδικό), το οποίο είναι αντίστροφο του.

Ο αντίστροφος του ρητού  $\alpha$  ( $\alpha \neq 0$ ) είναι ο  $\frac{1}{\alpha}$  ή  $\alpha^{-1}$  και  $\alpha \cdot \frac{1}{\alpha} = 1$

ζ. Για τους ρητούς  $\alpha, \beta$  και  $\gamma$  ισχύει η επιμεριστική ιδιότητα:

$$\alpha(\beta + \gamma) = \alpha\beta + \alpha\gamma$$

### Άσκήσεις:

106. Νά βρεθούν τὰ γινόμενα:

$$\alpha) (-8) \cdot (-13) \cdot (+2) \cdot (-5), \quad \beta) (-125) \cdot (-8) \cdot (+179) \cdot (-1),$$

$$\gamma) -\frac{17}{19} \cdot \left(-\frac{3}{16}\right) \cdot (+4) \cdot \left(+\frac{19}{17}\right) \cdot \left(-\frac{16}{3}\right) \cdot$$

$$\delta) \left(-\frac{2}{3}\right) \cdot \left(-\frac{3}{2}\right) \cdot \left(+\frac{2}{3}\right) \cdot \left(+\frac{3}{2}\right) \cdot$$

$$\epsilon) (-4) \cdot (-4) \cdot (-4) \cdot (-4) \cdot (-4)$$

$$\sigma\tau) \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)$$

107. Νά βρεθούν τὰ γινόμενα:

$$\alpha) \left(-\frac{3}{5}\right) \cdot \left(-\frac{3}{5}\right),$$

$$\delta) \left(-\frac{2}{3}\right) \cdot \left(-\frac{2}{3}\right) \cdot \left(-\frac{2}{3}\right),$$

$$\beta) \left[ (-2) \cdot (-3) \cdot \left(+\frac{4}{5}\right) \right] \cdot (-5), \quad \epsilon) \left[ \left(-\frac{2}{7}\right) \cdot \left(-\frac{3}{8}\right) \cdot (-5) \right] \cdot \left(-\frac{56}{6}\right)$$

$$\gamma) [(3) \cdot (-3) \cdot (-3)] \cdot [(-3) \cdot (-3)] \quad \sigma\tau) \left[-\frac{7}{8} \cdot \left(-\frac{8}{9}\right) \cdot \left(-\frac{11}{10}\right)\right] \cdot$$

$$\left[ \left(-\frac{9}{7}\right) \cdot \left(-\frac{10}{11}\right) \right]$$

108. Νά βρεθούν τὰ παρακάτω γινόμενα με δύο τρόπους:

$$\alpha) [(-5)+2] \cdot [(-3)+(-2)],$$

$$\beta) \left[ \left(-\frac{3}{4}\right) + \left(-\frac{2}{3}\right) \right] \cdot \left[ \left(-\frac{4}{3}\right) - \left(-\frac{3}{2}\right) \right],$$

$$\gamma) \left[ -4 + \left(-\frac{2}{3}\right) \cdot \left(-\frac{4}{5}\right) + \frac{1}{3} \right] \cdot \left(-\frac{15}{16}\right),$$

$$\delta) \left(-1 + \frac{3}{2} - \frac{5}{3}\right) \cdot \left(-2 + \frac{1}{2}\right)$$

109. \*Αν  $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{Q}$ , νά επαληθεύσετε ότι

$$|\alpha \cdot \beta \cdot \gamma| = |\alpha| \cdot |\beta| \cdot |\gamma|$$

110. Νά υπολογίσετε τὰ γινόμενα:

$$\alpha) (-4+7) \cdot (-4-7), \quad \beta) (-5+\beta) \cdot (\alpha-3), \quad \gamma) (-3+5) \cdot (-3+5),$$

$$\delta) (-4+\beta) \cdot (+3+\alpha), \quad \epsilon) (-4-6) \cdot (-4-6), \quad \sigma\tau) (\alpha-5) \cdot (\alpha+5).$$

111. Νά γίνουν οί πράξεις:

$$\alpha) 3 \cdot (\alpha-\beta) - 4 \cdot (\alpha-4) + 3 \cdot (\beta-2), \quad \beta) 4(\alpha+\beta+\gamma) - 3(\alpha-\beta) - 2(\beta+\gamma).$$

112. Νά επίλυθούν οί εξισώσεις.

$$\alpha) x \cdot \frac{1}{2} = 1, \quad \beta) x \cdot \left(-\frac{1}{3}\right) = 1, \quad \gamma) \left(-\frac{5}{7}\right) \cdot x = 1, \quad \delta) \left(-\frac{3}{4}\right) \cdot x = \frac{6}{8}.$$



113. α) Στη θέση του ἐρωτηματικοῦ νὰ θέσετε τὸ κατάλληλο σύμβολο ἀπὸ τὰ  $=$ ,  $>$ ,  $<$  μεταξύ τῶν παραστάσεων:

$$\begin{array}{ll} \alpha) \frac{17}{6} + \frac{2}{3} ; \frac{1}{2} + 3, & \beta) \frac{2}{5} - 1 ; -\frac{7}{5} + \frac{1}{10} \\ \gamma) \frac{20}{3} ; 7 - \frac{1}{3}, & \delta) \frac{7}{3} ; 6 - \frac{7}{2} \end{array}$$

β) Πολλαπλασιάστε καὶ τὰ δύο μέλη τῶν σχέσεων ποὺ βρήκατε:

- 1) ἐπὶ τὸ Ε.Κ.Π. τῶν παρονομαστῶν,
- 2) ἐπὶ τὸν ἀντίθετο τοῦ Ε.Κ.Π. τῶν παρονομαστῶν καὶ
- 3) ἐπὶ  $(-1)$ .

114. Νὰ ἀλλάξετε τὸ πρόσημο τῶν ὄρων καὶ τῶν δύο μελῶν στὶς παρακάτω ἰσότητες καὶ ἀνισότητες. Τί παρατηρεῖτε;

$$\begin{array}{lll} \alpha) -\frac{20}{3} = \frac{1}{3} - 7, & \beta) -5 > -\frac{15}{2}, & \gamma) -\frac{1}{1000} > -10, \\ \delta) \frac{7}{8} - 1 < -\frac{1}{9}, & \epsilon) -x + 5 = -12, & \sigma\tau) -6 - x > -6. \end{array}$$

115. Πολλαπλασιάστε κατὰ μέλη τὶς παρακάτω ὁμόστροφες ἀνισότητες. Τί παρατηρεῖτε;

$$\begin{array}{lll} \alpha) \begin{array}{l} -3 > -8 \\ 4 > 2 \end{array} & \beta) \begin{array}{l} -3 < 2 \\ -5 < 5 \end{array} & \gamma) \begin{array}{l} 3 > -2 \\ 2 > -3 \end{array} \end{array}$$

116. Ἐὰν μεταξύ τῶν θετικῶν ρητῶν  $\alpha$  καὶ  $\beta$  ὑπάρχει ἡ σχέση  $\alpha > \beta$ , νὰ ἐξετάσετε ποιά σχέση ἰσχύει μεταξύ τῶν ἀντιστρόφων τοῦ  $\alpha$  καὶ τοῦ  $\beta$ .

## 10. Η ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΕΩΣ ΣΤΟ Q — ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ.

### § 57. Πηλικο δύο ρητῶν.

Νὰ βρεθεῖ ρητός, ὁ ὁποῖος, ὅταν πολλαπλασιάζεται ἐπὶ τὸν  $-\frac{3}{5}$ , δίνει γινόμενο τὸν 6.

Ἄν  $x$  εἶναι ὁ ζητούμενος ρητός, ἔχομε τὴν ἐξίσωση  $(-\frac{3}{5}) \cdot x = 6$ .

Ἡ διαίρεση στὸ σύνολο τῶν ρητῶν ἀριθμῶν ὀρίζεται ὡς πράξη ἀντίστροφη τοῦ πολ/σμοῦ.

**Διαίρεση εἶναι ἡ πράξη, κατὰ τὴν ὁποία δίνονται δύο ἀριθμοὶ καὶ βρίσκεται τρίτος, ὁ ὁποῖος, ὅταν πολλαπλασιάζεται ἐπὶ τὸν δεῦτερο, δίνει γινόμενο τὸν πρῶτο.**

Ὅστε μποροῦμε νὰ γράψουμε:

$$\left(-\frac{3}{5}\right) \cdot x = 6 \Rightarrow x = 6 : \left(-\frac{3}{5}\right)$$

Γιὰ τὴν εὕρεση τοῦ  $x$  θὰ χρησιμοποιήσουμε τὴν ιδιότητα:  $\alpha = \beta \Leftrightarrow \gamma \cdot \alpha = \gamma \cdot \beta$

$$\text{*Ἐχομε: } \left(-\frac{3}{5}\right) \cdot x = 6 \Rightarrow \left(-\frac{5}{3}\right) \cdot \left[\left(-\frac{3}{5}\right) \cdot x\right] = \left(-\frac{5}{3}\right) \cdot 6$$

$$\Rightarrow \left[\left(-\frac{5}{3}\right) \cdot \left(-\frac{3}{5}\right)\right] \cdot x = 6 \cdot \left(-\frac{5}{3}\right)$$

$$\Rightarrow [+1] \cdot \chi = 6 \cdot \left(-\frac{5}{3}\right)$$

$$\chi = 6 \cdot \left(-\frac{5}{3}\right)$$

\*Αρα

$$\chi = 6 : \left(-\frac{3}{5}\right) = 6 \cdot \left(-\frac{5}{3}\right)$$

Ωστε διαίρεση είναι ο πολλαπλασιασμός του διαιρετέου επί τον αντίστροφο του διαιρέτη.

$$(\alpha, \beta \in \mathbb{Q}) \quad \alpha : \beta = \alpha \cdot \frac{1}{\beta} \quad (\beta \neq 0)$$

### Εφαρμογές

$$(+12) : (+3) = (+12) \cdot \left(+\frac{1}{3}\right) = +\frac{12}{3} = +4$$

$$(-15) : (-5) = (-15) \cdot \left(-\frac{1}{5}\right) = +\frac{15}{5} = +3$$

$$(+24) : (-7) = (+24) \cdot \left(-\frac{1}{7}\right) = -\frac{24}{7}$$

$$\left(-\frac{4}{7}\right) : \left(+\frac{4}{9}\right) = \left(-\frac{4}{7}\right) \cdot \left(+\frac{9}{4}\right) = -\frac{36}{28} = -\frac{9}{7}$$

$$0 : \left(-\frac{2}{3}\right) = 0 \cdot \left(-\frac{3}{2}\right) = 0$$

Η διαίρεση  $\left(-\frac{4}{5}\right) : 0$  είναι αδύνατη, διότι δεν υπάρχει αντίστροφος του μηδενός και επομένως δεν υπάρχει και το πηλίκο αυτό.

Απ' αυτά παρατηρούμε ότι:

Αν δοθούν οι ρητοί  $\alpha$  και  $\beta$ , το πηλίκο του  $\alpha$  δια του  $\beta$  ( $\beta \neq 0$ ) είναι θετικό, αν αυτοί είναι όμοσημοι, άρνητικό αν είναι ετερόσημοι, και μηδέν αν ο  $\alpha$  είναι μηδέν. Η απόλυτη τιμή του είναι ίση με το πηλίκο των απόλυτων τιμών των  $\alpha$  και  $\beta$ .

Το πηλίκο  $\alpha : \beta$  γράφεται και με μορφή κλάσματος  $\frac{\alpha}{\beta}$ .

$$\text{Συμβολικά: } 1. \quad \alpha \cdot \beta > 0 \quad \text{τό } \alpha : \beta = \frac{\alpha}{\beta} > 0$$

$$(\alpha, \beta \in \mathbb{Q}) \quad 2. \quad \alpha \cdot \beta < 0 \quad \text{τό } \alpha : \beta = \frac{\alpha}{\beta} < 0 \quad \left| \frac{\alpha}{\beta} \right| = \frac{|\alpha|}{|\beta|}$$

$$3. \quad \alpha = 0 \quad \text{τό } \alpha : \beta = \frac{0}{\beta} = 0$$

**Σημείωση:** Είπαμε ότι διαίρεση είναι ο πολ/σμός του διαιρετέου επί τον αντίστροφο του διαιρέτη. Συνεπώς έπειδή ο πολ/σμός είναι πράξη μονότιμη, και η διαίρεση είναι πράξη μονότιμη.

Η διαίρεση είναι δυνατή, όταν υπάρχει αντίστροφος του διαιρέτη, αλλά αντίστροφος του διαιρέτη υπάρχει μόνον, όταν ο διαιρέτης είναι διαφορετικός από το μηδέν.

### § 58. Ιδιότητες τής διαιρέσεως.

Ἀπὸ τὸν ὀρισμὸ τοῦ πηλίκου δύο ρητῶν εἶναι φανερό, ὅτι ἰσχύουν οἱ ιδιότητες τής διαιρέσεως.

$$1. \alpha : \beta = (\alpha \cdot \gamma) : (\beta \cdot \gamma) \quad (\gamma \neq 0)$$

$$2. (\alpha + \beta + \gamma) : \delta = (\alpha : \delta) + (\beta : \delta) + (\gamma : \delta)$$

$$3. (\alpha - \beta) : \gamma = (\alpha : \gamma) - (\beta : \gamma)$$

$$4. (\alpha \cdot \beta) : \gamma = (\alpha : \gamma) \cdot \beta = \alpha : (\beta : \gamma)$$

$$5. \alpha : (\beta \cdot \gamma \cdot \delta) = [(\alpha : \beta) : \gamma] : \delta$$

Ἐπαληθεύουμε τὴν 1η ιδιότητα:

$$(+3) : (-4) = -\frac{3}{4}, \quad [(+3) \cdot (-2)] : [(-4) \cdot (-2)] = (-6) : (+8) = -\frac{6}{8}$$

$$* \text{Άρα } (+3) : (-4) = [(+3) \cdot (-2)] : [(-4) \cdot (-2)]$$

Μποροῦμε ὁμως νὰ αἰτιολογήσουμε καὶ γενικότερα τὴν ιδιότητα  $\alpha : \beta = (\alpha \cdot \gamma) : (\beta \cdot \gamma)$ .

$$\begin{aligned} * \text{Έχουμε } \alpha : \beta &= \alpha \cdot \frac{1}{\beta} = \alpha \cdot \frac{1}{\beta} \cdot (+1) = \alpha \cdot \frac{1}{\beta} \cdot (\gamma \cdot \frac{1}{\gamma}) = \\ &= \alpha \cdot \gamma \cdot \frac{1}{\beta} \cdot \frac{1}{\gamma} = \alpha \cdot \gamma \cdot \frac{1}{\beta \cdot \gamma} = (\alpha \cdot \gamma) : (\beta \cdot \gamma) \end{aligned}$$

Αἰτιολογοῦμε καὶ τὴν 2η ιδιότητα:

$$\begin{aligned} (\alpha + \beta + \gamma) : \delta &= (\alpha + \beta + \gamma) \cdot \frac{1}{\delta} = \alpha \cdot \frac{1}{\delta} + \beta \cdot \frac{1}{\delta} + \gamma \cdot \frac{1}{\delta} = \\ &= (\alpha : \delta) + (\beta : \delta) + (\gamma : \delta) \end{aligned}$$

Ὁμοίως αἰτιολογοῦνται καὶ οἱ ὑπόλοιπες ιδιότητες.

**Σημείωση:** Μποροῦμε νὰ διατυπώσουμε καὶ μὲ λόγια τὶς παραπάνω ιδιότητες. Π.χ. τὶς ιδιότητες 1 καὶ 2:

1. Ἄν πολ/σουμε διαιρέτο καὶ διαιρέτη μιᾶς διαιρέσεως ἐπὶ ἕναν ρητὸ διαφορετικὸ ἀπὸ τὸν μηδέν, τὸ πηλίκον δὲν μεταβάλλεται.

2. Γιὰ νὰ διαιρέσουμε ἕνα ἄθροισμα διὰ ἐνὸς ρητοῦ διαφορετικοῦ ἀπὸ τὸ μηδέν, διαιροῦμε καθένα ἀπὸ τοὺς προσθετέους τοῦ ἄθροισματος διὰ τοῦ ρητοῦ καὶ προσθέτομε τὰ πηλικά πού προκύπτουν.

### Ἀσκήσεις:

117. Νὰ βρεῖτε τὰ πηλικά: α)  $(-24) : (+6)$ , β)  $(-48) : (-16)$ , γ)  $(-4) : (+\frac{3}{7})$

δ)  $(+\frac{3}{8}) : (-\frac{5}{7})$ , ε)  $-\frac{10}{11} : (+3)$ , στ)  $(-6) : (-\frac{15}{2})$ ,

ζ)  $(-\frac{4}{5}) : (-\frac{3}{10})$ , η)  $(+\frac{15}{17}) : (+15)$

118. Νὰ γίνουν οἱ πράξεις:

α)  $(\frac{4}{5} + \frac{2}{3} + 3) : (-3)$ , δ)  $[(-\frac{5}{6}) \cdot 8 \cdot (-\frac{3}{4})] : (-\frac{1}{2})$

β)  $[(-\frac{1}{2}) \cdot (-\frac{3}{5}) \cdot (-\frac{2}{7})] : (-\frac{3}{5})$ , ε)  $(-\frac{3}{4} - \frac{6}{2} + 1) : (-\frac{1}{2})$

$$\gamma) [(-3) \cdot (-5) \cdot 4] : [(-2) \cdot (-3)], \quad \sigma\tau) [(-3) \cdot (-3) \cdot (-3) \cdot (-3)] : [(-3) \cdot (-3)]$$

119. Να επιλυθούν οι εξισώσεις:

$$\alpha) \chi \cdot (-3) = -\frac{27}{31}, \quad \beta) \chi \cdot \left(-\frac{3}{7}\right) = -8, \quad \gamma) \frac{5}{8} \cdot \chi = -\frac{4}{15},$$

$$\delta) -\chi = \frac{3}{11}, \quad \epsilon) \chi : \left(-\frac{13}{15}\right) = -\frac{5}{26}, \quad \sigma\tau) \left(-\frac{2}{7}\right) : \chi = -\frac{23}{7}, \quad \zeta) (-10) \cdot \chi = 0.$$

120. Να επαληθεύσετε τις Ισοδυναμίες:

1.  $\alpha = \beta \Leftrightarrow \alpha : \gamma = \beta : \gamma$  ( $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{Q}, \gamma \neq 0$ )

2.  $\alpha > \beta \Leftrightarrow \alpha : \gamma > \beta : \gamma$  ( $\alpha, \beta \in \mathbb{Q}, \gamma \in \mathbb{Q}^+$ )

3.  $\alpha > \beta \Leftrightarrow \alpha : \gamma < \beta : \gamma$  ( $\alpha, \beta \in \mathbb{Q}, \gamma \in \mathbb{Q}^-$ )

4.  $\left|\frac{\alpha}{\beta}\right| = \frac{|\alpha|}{|\beta|}$  ( $\alpha, \beta \in \mathbb{Q}, \beta \neq 0$ ).

Μπορείτε να τις δικαιολογήσετε;

## 11. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ — ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΕΝΘΕΣΕΩΝ

§ 59. Να υπολογισθούν οι αριθμητικές παραστάσεις:

α.  $-(-5) + (-2) - (+12)$

β.  $-(-8 + 13 - 14) + (10 - 6 + 1) - (12 - 6)$

γ.  $[(2 - 8) + (-15 + 17)] - [(-6 + 3) - (-12 + 7)] + (-5 + 3)$

δ.  $(-7 + 2) - (-2 + \frac{3}{4}) \cdot (-\frac{2}{3}) + [(-\frac{5}{8}) \cdot (-\frac{8}{6}) + 1] : (-\frac{11}{3})$

ε.  $(-3 + \frac{7}{5}) \cdot (-\frac{5}{4}) + (2 - \frac{1}{6}) : (-11) - (-\frac{3}{5} - 1) \cdot (\frac{2}{3} + 1)$

Για τὸν ὑπολογισμὸ τῶν παραστάσεων αὐτῶν ἐργαζόμεστε ὡς ἑξῆς:

Παρατηροῦμε ὅτι στὶς παραστάσεις  $\alpha, \beta, \gamma$  δὲν ἔχουν σημειωθεῖ πολ/σμοὶ ἢ διαιρέσεις, ἐπομένως αὐτὲς μποροῦν νὰ θεωρηθοῦν ἀλγεβρικὰ ἄθροισματα. Ἀλλὰ γιὰ τὰ  $\beta$  καὶ  $\gamma$  (ἀλγ. ἄθροισματα) ὁ ρητός, ὁ ὁποῖος προσθέτεται ἢ ἀφαιρεῖται, εἶναι τὸ ἄθροισμα ποὺ βρίσκεται μέσα στὴν παρένθεση ἢ τὸ ἄθροισμα ἄθροισμάτων ἢ ἡ διαφορὰ ἄθροισμάτων, ποὺ βρίσκεται μέσα στὴν ἀγκύλη.

1. Ὑπολογισμὸς τῆς παραστάσεως  $\gamma$ .

$$\begin{aligned} \text{Α' τρόπος: } & [(2-8) + (-15+17)] - [(-6+3) - (-12+7)] + (-5+3) = \\ & = [(-6) + 2] - [(-3) - (-5)] + (-5+3) = \\ & = (-4) - [-3 + (+5)] + (-2) = \\ & = (-4) - (+2) + (-2) = \\ & = (-4) + (-2) + (-2) = -8 \end{aligned}$$

**Σημείωση.** Ἡ ἀγκύλη, ἡ ὁποία παύει νὰ περιέχει παρενθέσεις, μετατρέπεται σὲ παρένθεση.

Υπολογίσαμε τις τιμές τῶν ἀλγεβρικών ἀθροισμάτων, τὰ ὁποῖα βρίσκονται μέσα στὶς ἀγκύλες, καὶ καταλήξαμε σ' ἓνα ἀλγεβρικό ἀθροισμα ρητῶν ἀριθμῶν.

$$\begin{aligned} \text{Β' τρόπος } & [(2-8) + (-15 + 17)] - [(-6+3) - (-12+7)] + (-5+3) = \\ & [(2-8) + (-15 + 17)] + [ -(-6+3) + (-12+7)] + (-5+3) = \\ & (2-8) + (-15 + 17) \quad -(-6+3) + (-12+7) + (-5+3) = \\ & (2-8) + (-15 + 17) \quad +(+6-3) + (-12+7) + (-5+3) = \\ & 2-8 \quad -15 + 17 \quad +6-3 \quad -12+7 \quad -5+3 = \\ & 2-8-15+17+6-3-12+7-5+3 = 35-43 = -8 \end{aligned}$$

Στὴν ἀρχὴ προσθέσαμε τὸ ἀντίθετο τῶν ἀθροισμάτων, πού βρίσκονται μέσα στὴ δευτέρη ἀγκύλη, ἢ ὁποῖα ἔχει μπροστά τῆς τὸ πλὴν (-).

Κατόπι παραλείψαμε τὶς ἀγκύλες καὶ τὸ σύμβολο + πού βρίσκεται μπροστά τους.

Ἔστερα προσθέσαμε τὸ ἀντίθετο τῶν ἀθροισμάτων, τὰ ὁποῖα ἀφαιροῦνται (ἔχουν μπροστά ἀπὸ τὴν παρένθεσή τους τὸ πλὴν (-)), ἀφαιρεῖται μόνο τὸ (-6+3), καὶ παραλείψαμε τὶς παρενθέσεις καὶ τὸ σύμβολο + πού βρίσκεται μπροστά τους.

Τελικὰ ὑπολογίσαμε τὴν τιμὴ τοῦ ἀθροίσματος πού προκύπτει.

Ἀνάλογα ἐργαζόμαστε καὶ γιὰ τὴν παράσταση β.

(Στὴν παράγραφο 42, ἐφαρμογὴ, ἔχομε ὑπολογίσει ἀθροισμα καὶ διαφορά ἀλγεβρικών ἀθροισμάτων).

Ἀπὸ τὸν δευτέρο τρόπο τοῦ ὑπολογισμοῦ τῆς γ' ἀριθμ. παραστάσεως συμπεραίνομε τὰ ἐξῆς:

1) Μποροῦμε νὰ ἐξαλείψομε μιὰ παρένθεση (ἢ ἀγκύλη), ὅταν ἔχει μπροστά τῆς τὸ σύμβολο + (ἢ κανένα πρόσημο), καὶ νὰ ἀφήσουμε τοὺς ὅρους πού βρίσκονται μέσα σ' αὐτὴ καὶ καθένα μὲ τὸ πρόσημό του στὸ νέο ἀθροισμα.

2. Ἄν μπροστά ἀπὸ μιὰ παρένθεση (ἢ μιὰ ἀγκύλη) ὑπάρχει τὸ σύμβολο -, προσθέτομε τὴν παρένθεση (ἢ τὴν ἀγκύλη) πού περιέχει τὸ ἀθροισμα τῶν ἀντίθετων ὄρων, οἱ ὁποῖοι ὑπάρχουν μέσα σ' αὐτὴ, καὶ ἀναγόμετε στὴν πρώτη περίπτωση.

### Παραδείγματα

$$\begin{array}{ll} \alpha) 10 + (-7 + 5 + 4) = & \beta) -(-8 + 13 - 14) = \\ 10 - 7 + 5 + 4 = & +(+8 - 13 + 14) = \\ 10 - 7 + 5 + 4 = 12 & +8 - 13 + 14 = \\ & 8 - 13 + 14 = 9 \\ \gamma) 10 + (5 - 7 + 4) = & \delta) (10 - 6 + 1) - (12 - 6) = \\ 10 + (+5 - 7 + 4) = & (10 - 6 + 1) + (-12 + 6) = \\ 10 + 5 - 7 + 4 = & 10 - 6 + 1 - 12 + 6 = \\ 10 + 5 - 7 + 4 = 12 & 10 - 6 + 1 - 12 + 6 = -1 \end{array}$$

## Σημείωση.

1. Όταν ο πρώτος όρος ενός άθροίσματος είναι θετικός, συνήθως δεν έχει το πρόσημό του +. Για να συνδεθεί όμως στο νέο άθροισμα, πρέπει να θέσουμε το πρόσημό του. (Βλ. παρ. γ).

2. Οι παραστάσεις  $(\alpha - \beta + \gamma) + (\beta - \gamma + 3\alpha)$  και  $(\alpha + \beta) - (\alpha - \beta)$  γίνονται πιο απλές, αν εξαλείψουμε τις παρενθέσεις.

$$\begin{array}{rcl} \text{Π.χ. } (\alpha - \beta + \gamma) + (\beta - \gamma + 3\alpha) = & & (\alpha + \beta) - (\alpha - \beta) = \\ \alpha - \beta + \gamma + \beta - \gamma + 3\alpha = & & (\alpha + \beta) + (-\alpha + \beta) = \\ \alpha + 3\alpha + \beta - \beta + \gamma - \gamma = 4\alpha & & \alpha + \beta - \alpha + \beta = \\ & & \alpha + \beta - \alpha + \beta = 2\beta \end{array}$$

$$\text{*Έχομε: } (\alpha - \beta) - (\delta - \gamma) = (\alpha - \beta) + (-\delta + \gamma) = \alpha - \beta - \delta + \gamma.$$

\*Αν εφαρμόσουμε τη συμμετρική ιδιότητα της ισότητας και γράψουμε  $\alpha - \beta - \delta + \gamma = (\alpha - \beta) - (\delta - \gamma)$ ,

παρατηρούμε ότι:

Μπορούμε να θέσουμε όρους ενός άθροίσματος μέσα σε παρένθεση μπροστά από την οποία έχουμε θέσει το σύμβολο +.

\*Αν όμως θέσουμε όρους ενός άθροίσματος μέσα σε παρένθεση, μπροστά από την οποία έχουμε θέσει το -, πρέπει να αλλάξουμε τα πρόσημά τους.

2. Υπολογισμός της παραστάσεως δ.

$$\begin{aligned} & (-7+2) - (-2 + \frac{3}{4}) \cdot (-\frac{2}{3}) + [(-\frac{5}{8}) \cdot (-\frac{8}{6}) + 1] : (-\frac{11}{3}) \\ & (-5) - (-\frac{8}{4} + \frac{3}{4}) \cdot (-\frac{2}{3}) + [\frac{5}{8} \cdot \frac{8}{6} + 1] \cdot (-\frac{3}{11}) = \\ & (-5) - (-\frac{5}{4}) \cdot (-\frac{2}{3}) + [\frac{5}{6} + \frac{6}{6}] \cdot (-\frac{3}{11}) = \\ & (-5) - (+\frac{5 \cdot 2}{4 \cdot 3}) + [\frac{11}{6}] \cdot (-\frac{3}{11}) = \\ & (-5) - (+\frac{5}{6}) + [-\frac{11 \cdot 3}{6 \cdot 11}] = \\ & (-\frac{30}{6}) + (-\frac{5}{6}) + [-\frac{3}{6}] = -\frac{38}{6} = -\frac{19}{3} \end{aligned}$$

3. Υπολογισμός της παραστάσεως ε.

$$\begin{aligned} & (-3 + \frac{7}{5}) \cdot (-\frac{5}{4}) + (2 - \frac{1}{6}) : (-11) - (-\frac{3}{5} - 1) \cdot (\frac{2}{3} + 1) \\ & (-\frac{8}{5}) \cdot (-\frac{5}{4}) + (\frac{11}{6}) \cdot (-\frac{1}{11}) - (-\frac{8}{5}) \cdot (\frac{5}{3}) = \\ & \frac{8}{4} + (-\frac{1}{6}) - (-\frac{8}{3}) = \\ & \frac{4}{2} + (-\frac{1}{6}) + (+\frac{8}{3}) = \frac{12}{6} - \frac{1}{6} + \frac{16}{6} = \frac{27}{6} \end{aligned}$$

Για τὸν ὑπολογισμὸ τῶν παραστάσεων δ καὶ ε ἐργαστήκαμε ὡς ἑξῆς:

- α) Βρήκαμε τὸν ρητὸ σὲ κάθε παρένθεση (ἢ ἀγκύλη)  
 β) Ἐκτελέσαμε τοὺς πολ/σμούς καὶ τὶς διαιρέσεις καὶ  
 γ) Ἐκτελέσαμε τὶς ἀφαιρέσεις καὶ τὶς προσθέσεις.

### Παραδείγματα :

- α)  $(-4+3) \cdot 2 + (8-6) \cdot (-3) =$   
 $(-8+6) + (-24+18) = -8+6-24+18 = -8$   
 β)  $(12-15) : (-3) + (23-3) : (-4) =$   
 $(-3) : (-3) + (20) : (-4) = 1 + (-5) = -4$   
 γ)  $6 - (-5) \cdot (-2) + (-14) : (-7) + 7 =$   
 $6 - (+10) + (+2) + 7 =$   
 $6 + (-10) + 2 + 7 = 15 - 10 = 5.$

### Παρατήρηση.

Στὸ α' παράδειγμα ἔχομε ἄθροισμα γινομένων.  
 Βρήκαμε πρῶτα τὰ γινόμενα (ἐπιμεριστική ιδιότητα) καὶ κατόπι  
 τὰ προσθέσαμε.

Στὸ β' παράδειγμα ἔχομε ἄθροισμα πηλίκων.  
 Για νὰ βρεθῆ τὸ ἄθροισμα, προηγήθηκαν οἱ διαιρέσεις (ἐπιμεριστική  
 ιδιότητα).

Καὶ στὸ γ' παράδειγμα προηγήθηκαν οἱ πολ/σμοὶ καὶ οἱ διαιρέσεις.

### Ἀσκήσεις :

121. Νὰ ἐκτελεσθοῦν οἱ πράξεις:

- α)  $(-6+2-3) + (13-7)$ , β)  $(7-10) + (-8+10-6)$ , γ)  $-(3-12)$ ,  
 δ)  $-(-4+11)$ , ε)  $(11-12) - (-2+4)$ ,  
 στ)  $(-3+2) - (-8+7) - (7-2) + (-3+1-10) - 5.$

122. Νὰ ἐκτελεσθοῦν οἱ πράξεις:

- α)  $(20-13) + [(5-10) + (-12+9)]$ , β)  $-[(4-6) + (7-3)] + [(-7+11) - (-5+2)]$   
 γ)  $[ -(-7+12) + (-3+10) ] - [ -(-3+11) - (8-15) ] + [ -(-17+3) - 5 ]$ ,  
 δ)  $[ (-5+7) + (3-12) ] - [ -6 + (-8) ]$ .

123. Νὰ ἐκτελεσθοῦν οἱ πράξεις:

- α)  $(\frac{1}{5} - \frac{1}{4} - 1) + (\frac{1}{10} - \frac{3}{20} + 1) - (\frac{3}{4} - \frac{2}{5})$   
 β)  $0 - [(5,5 - \frac{15}{2}) - \frac{3}{2}] + [-(0,5 - 4) + 2] - (-\frac{1}{2} + 1)$ ,  
 γ)  $[(-10,5 + 15,50) - \frac{1}{2}] + [0 + (-\frac{18}{5} + \frac{15}{7}) + \frac{1}{35}] - \frac{10}{7}$

124. Νὰ ἐκτελεσθοῦν οἱ πράξεις:

$$\alpha) \left(-3 + \frac{2}{5}\right) \cdot \left(-\frac{5}{2}\right) + \left(2 - \frac{5}{8}\right) : (-5),$$

$$\beta) \left(-\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right) : \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) - \left(\frac{1}{2} - \frac{3}{4}\right) : \left(1 - \frac{1}{4}\right)$$

$$\gamma) \left(\frac{1}{6} - \frac{1}{3}\right) : \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{6}\right) - \left(\frac{3}{2} - \frac{5}{4}\right) : \left(-\frac{5}{2} + \frac{1}{4}\right),$$

$$\delta) \left(2 - \frac{1}{2} + \frac{3}{5}\right) \cdot (-3) - \left(-\frac{1}{3} + 4 - \frac{5}{6}\right) : (-3)$$

125. Νά εκτελεσθοῦν οἱ πράξεις:

$$\alpha) (-7+13) : (-2) + (12-19) \cdot (15-16) - 4,$$

$$\beta) (21-27) : (-3) - (12-16) : (-4) + 5 \cdot (-2),$$

$$\gamma) 12 - 6 \cdot (-3) + 7 - 15 : (-3) + 18 - 16 : (-4) + 1.$$

126. Νά εκτελεσθοῦν οἱ πράξεις:

$$\alpha) \left(-\frac{5}{3}\right) : \left(-\frac{11}{6}\right) + \left(-\frac{10}{3}\right) : \left(+\frac{2}{9}\right) - 15 : (-1),$$

$$\beta) (3-2) \cdot (-3+2) - \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{42}{8} - \frac{11}{4}\right)$$

$$\gamma) -0,01 : (0,001-0,01) - \frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{3}{4} : \frac{3}{5}\right)$$

$$\delta) [-3 + (-7+2) - 1] \cdot [-2 + (-3+2-9)] - (3-8+2) \cdot (-5).$$

127. Νά εξαλείψετε τίς παρενθέσεις:

$$\alpha) (\alpha - \beta) + (\gamma - \delta), \quad (\alpha - \beta) - (\gamma - \delta),$$

$$\beta) \alpha - (-\beta + \gamma - \delta), \quad -(\alpha - \beta) - (-\gamma + \delta),$$

$$\gamma) \alpha - [(\beta - \gamma) + \alpha] - (\gamma - \beta) + (\alpha - \gamma),$$

$$\delta) \alpha + (\beta - \gamma) + [-\delta + (\alpha - \beta) + \gamma] - (\delta - \gamma).$$

128. Νά υπολογίσετε τίς τιμές τῶν παραστάσεων, ἂν  $\alpha = -2$ ,  $\beta = -3$ ,  $\gamma = 4$ :

$$1. \frac{\alpha + \beta - \gamma}{-\alpha + \gamma - \beta}, \quad 2. \frac{-3\alpha + 2\beta - \gamma}{\alpha + \beta + \gamma}, \quad 3. \frac{\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha}{\alpha\beta\gamma}.$$

129. Νά γράψετε τίς ἐπόμενες παραστάσεις μέ μορφή ἀθροίσματος περισσότερων παραστάσεων.

$$1) -\alpha + \beta + \gamma - \delta + \kappa - \lambda,$$

$$2) \alpha - \beta + \gamma - \delta + \epsilon - \zeta + \eta.$$

130. Στίς ἐπόμενες παραστάσεις νά βάλετε τόν πρώτο καί τόν τρίτο ὄρο σέ μία παρένθεση μέ τὸ σύμβολο + μπροστά της καί τοὺς ὑπόλοιπους σέ ἄλλη παρένθεση μέ τὸ σύμβολο - μπροστά της.

$$\alpha) -15,4 - 11,7 + 12 - 10 + \frac{1}{3}, \quad \beta) 19,6 + 13,5 - 9,4 + \frac{2}{5} - 1,$$

$$\gamma) \rho + \tau - \mu - \nu + \sigma - \kappa,$$

$$\delta) -\alpha - \beta + \gamma - \delta + \epsilon.$$

## 12. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ

### § 60. α) - Εφαρμοστό διάνυσμα.

Στή Γεωμετρία μπορούμε νά ὀρίσουμε τὸ εὐθύγραμμο τμήμα AB σάν



τό διμελές σύνολο τῶν ἄκρων του,  $\{A, B\}$ .

Γι' αὐτό, ὅταν λέμε εὐθύγραμμο τμήμα  $AB$  ἢ εὐθύγραμμο τμήμα  $BA$ , ἔννοοῦμε τὸ ἴδιο ἀντικείμενο (γιατί;)

### Πρόβλημα.

α) "Ἐνα αὐτοκίνητο πὸν κινεῖται πάνω σὲ εὐθύγραμμο δρόμο ἀπὸ τὸ σημεῖο  $A$  ἔφθασε στὸ σημεῖο  $B$ .

β) "Ἐνα αὐτοκίνητο πὸν κινεῖται πάνω σὲ εὐθύγραμμο δρόμο ἀπὸ τὸ σημεῖο  $B$  ἔφθασε στὸ σημεῖο  $A$ .

Πῶς θὰ ἐκφράσομε μαθηματικὰ τὶς διαφορετικὲς αὐτὲς κινήσεις;

"Ἄν ποῦμε ὅτι τὸ αὐτοκίνητο διέτρεξε καὶ στὶς δύο περιπτώσεις τὸ εὐθύγραμμο τμήμα (τοῦ δρόμου)  $AB$ , δὲν θὰ εἴμαστε ἄκριβοι.

Τὸ σωστὸ εἶναι νὰ ποῦμε στὴν α) περίπτωση «... διάνυσε τὸ εὐθύγραμμο τμήμα, τὸ ὁποῖο ἔχει ἀρχὴ τὸ  $A$  καὶ πέρασ τὸ  $B$ » καὶ στὴν β) «διάνυσε τὸ εὐθύγραμμο τμήμα, τὸ ὁποῖο ἔχει ἀρχὴ τὸ  $B$  καὶ πέρασ τὸ  $A$ ».

Τώρα πιά τὸ εὐθύγρ. τμήμα  $AB$ , πὸν διανύεται ἀπὸ τὸ  $A$  πρὸς τὸ  $B$ , δὲν εἶναι τὸ ἴδιο μὲ τὸ εὐθύγρ. τμήμα  $BA$ , πὸν διανύεται ἀπὸ τὸ  $B$  πρὸς τὸ  $A$ , γιατί διαφέρει ἡ φορὰ τῆς κινήσεως.

Τὰ ἀντικείμενα αὐτὰ τὰ λέμε **διανύσματα**, τὰ συμβολίζομε  $\vec{AB}$ ,  $\vec{BA}$  καὶ τὰ παριστάνομε γραφικῶς: (δηλαδὴ σὰν βέλη μὲ τὴν αἰχμὴ στὸ πέρασ τους).

**Διάνυσμα**, λοιπόν, εἶναι ἓνα εὐθύγραμμο τμήμα μὲ ὀρισμένη ἀρχὴ καὶ ὀρισμένο πέρασ,

ἢ λέμε μὲ συντομία ὅτι:

**Διάνυσμα** εἶναι ἓνα προσανατολισμένο εὐθύγραμμο τμήμα.

"Ἄν ἓνα διάνυσμα ἔχει ὀρισμένη θέση (ἄρα καὶ ἀρχὴ ὀρισμένη), λέγεται **ἐφαρμοστὸ διάνυσμα** (ἢ δεσμευμένο διάνυσμα).

σχ. 34.

### Παρατήρηση.

Τὸ **ἐφαρμοστὸ διάνυσμα** εἶναι ἓνα διατεταγμένο ζεῦγος σημείων καὶ ἔχει ἀπλῶς ἓνα διμελές σύνολο σημείων.



σχ. 31.



σχ. 32.




σχ. 33.



Έχουμε λοιπόν: Εὐθύγραμμο τμήμα  $AB \equiv \{(A, B) \equiv \{B, A\}$   
 Διάνυσμα  $\vec{AB} \equiv (A, B)$ , διάνυσμα  $\vec{BA} \equiv (B, A)$ .

### § 61. Στοιχεία εφαρμοστού διανύσματος.




σχ. 35.

Τὸ διατεταγμένο ζεύγος  $(A, B)$  καθορίζεται:

1. Ἀπὸ τὴν εὐθεία  $AB$ , δηλαδή τὸ **φορέα** του  $\epsilon$ .
2. Ἀπὸ τὴ φορά πὺν καθορίζει τὴ κίνηση ἀπὸ τὸ  $A$  πρὸς τὸ  $B$ .
3. Ἀπὸ τὴν τιμὴ τοῦ εὐθυγρ. τμήματος  $AB$ , δηλαδή τὸ λόγο  $*$  του πρὸς τὴ μονάδα μετρήσεως. Ἡ τιμὴ τοῦ  $AB$  συμβολίζεται μὲ  $|\vec{AB}|$ , ( $|\vec{AB}| \in \mathbb{Q}_0^+$ ) καὶ διαβάζεται «ἀπόλυτη τιμὴ τοῦ  $\vec{AB}$ »
4. Ἀπὸ τὴν ἀρχὴ  $A$ .

### § 62. Τὸ ἐλεύθερο διάνυσμα.

Ἐνας πύραυλος ἐκτοξεύεται ἀπὸ ἕνα σημεῖο  $A$  τοῦ πεδίου ἐκτοξεύσεως πυραύλων κατακόρυφα πρὸς τὰ πάνω μὲ ταχύτητα  $5 \text{ km/sec}$ . Πῶς θὰ παραστήσουμε τὴν ταχύτητά του;



σχ. 36.

Ὁ καλύτερος τρόπος παραστάσεως εἶναι: ἕνα διάνυσμα μὲ **φορέα** τὴν κατακόρυφη εὐθεία, πὺν περνᾷ ἀπὸ τὸ  $A$ , **φορά** πρὸς τὰ πάνω καὶ **ἀπόλυτη τιμὴ**  $5$ .

Ἄν ἕνας δεύτερος πύραυλος ἐκτοξευθεῖ ἀπὸ τὸ σημεῖο  $B$  κατακόρυφα πρὸς τὰ πάνω μὲ τὴν ἴδια ταχύτητα, ἡ ταχύτητα τοῦ δεύτερου πυραύλου εἶναι ἕνα διάνυσμα μὲ **φορέα** τὴν κατακόρυφη εὐθεία, πὺν περνᾷ ἀπὸ τὸ  $B$ , **φορά** πρὸς τὰ πάνω καὶ **ἀπόλυτη τιμὴ**  $5$ .

\* Βλέπε § 13 τοῦ μέρους τῆς Γεωμετρίας τοῦ βιβλίου αὐτοῦ.

Τὰ δύο αὐτὰ διανύσματα παριστάνουν τὸ ἴδιο ἀντικείμενο, τὴν ἴδια ταχύτητα.

Γι' αὐτὸ λέμε ὅτι εἶναι ἰσοδύναμα ἢ **ἴσα διανύσματα**.

Τὰ ἴσα αὐτὰ διανύσματα ἔχουν: α) παράλληλους φορεῖς  
β) τὴν ἴδια φορὰ (πρὸς τὰ πάνω)  
γ) ἴσες ἀπόλυτες τιμές.

### Παρατήρηση.

Τὸ σύνολο τῶν εὐθειῶν, οἱ ὁποῖες εἶναι **παράλληλες μετὰ τὴν πλατιά ἔννοια** (εἶναι παράλληλες ἢ συμπίπτουν), τὸ ὀνομάζουμε **διεύθυνση**. Λέμε τώρα, ὅτι δύο διανύσματα, πού βρίσκονται πάνω σὲ παράλληλους φορεῖς ἢ πάνω στὸν ἴδιο φορέα, ἔχουν τὴν ἴδια διεύθυνση.

Ἐπομένως τὰ διανύσματα, τὰ ὁποῖα ἔχουν **τὴν ἴδια διεύθυνση, τὴν ἴδια φορὰ καὶ ἴσες ἀπόλυτες τιμές, εἶναι ἴσα**.

### § 63. Ἰδιότητες τῆς ἰσότητος τῶν διανυσμάτων.

1. Κάθε διάνυσμα εἶναι ἴσο μετὰ τὸν ἑαυτό του.

$$\vec{AB} = \vec{AB}$$

2. Ἄν ἓνα διάνυσμα  $\vec{\Gamma\Delta}$  εἶναι ἴσο μετὰ τὸ  $\vec{ΕΖ}$ , τότε καὶ τὸ  $\vec{ΕΖ}$  εἶναι ἴσο μετὰ τὸ  $\vec{\Gamma\Delta}$ .


$$\vec{\Gamma\Delta} = \vec{ΕΖ} \Rightarrow \vec{ΕΖ} = \vec{\Gamma\Delta}$$

3. Δύο διανύσματα ἴσα μ' ἓνα τρίτο διάνυσμα εἶναι καὶ μεταξὺ τους ἴσα.


$$\left. \begin{array}{l} \vec{H\Theta} = \vec{K\Lambda} \\ \vec{K\Lambda} = \vec{M\Nu} \end{array} \right\} \Rightarrow \vec{H\Theta} = \vec{M\Nu}$$

Δηλαδή ἡ ἰσότητα τῶν διανυσμάτων ἔχει τὶς ἰδιότητες **ἀνακλαστική, συμμετρική, μεταβατική**.


§ 64. Ἄν ἔχουμε ἓνα σύνολο ἴσων διανυσμάτων, μπορούμε σύμφωνα μετὰ τὶς ἰδιότητες αὐτὲς νὰ θεωροῦμε ὅτι ἓνα ὁποιοδήποτε ἀπὸ τὰ διανύσματα αὐτὰ ἀντιπροσωπεύει τὸ σύνολο.




Σχ. 37.



Σχ. 38.




Σχ. 39.



Σχ. 40.


Ένα σύνολο ίσων διανυσμάτων ορίζεται από τα εξής στοιχεία:



σχ. 41.

1. Τη διεύθυνση.
2. Τη φορά.
3. Την απόλυτη τιμή.

Το σύνολο αυτό λέγεται **ελεύθερο διάνυσμα** ή απλώς **διάνυσμα**.



σχ. 42.

Τα ελεύθερα διανύσματα τα συμβολίζουμε με  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$ ,  $\vec{c}$ , ...,  $\vec{\alpha}$ ,  $\vec{\beta}$  κ.λπ.

(Γράμματα του λατινικού ή ελληνικού αλφαβήτου με το σύμβολο  $\rightarrow$  πάνω απ' αυτά).

Τις απόλυτες τιμές των  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$ ,  $\vec{c}$ , ... τις συμβολίζουμε με  $|\vec{a}|$ ,  $|\vec{b}|$ ,  $|\vec{c}|$ , ...

### Παρατήρηση.

1. Μπορούμε να θεωρήσουμε ελεύθερο διάνυσμα ένα διάνυσμα, το οποίο έχει καθορισμένα:

**Διεύθυνση – φορά – απόλυτη τιμή** (χωρίς ορισμένη αρχή).

2. Δεχόμαστε ότι υπάρχει ένα διάνυσμα  $\vec{AA}$ , του οποίου η αρχή και το πέρας συμπίπτουν. Το διάνυσμα αυτό λέγεται μηδενικό και συμβολίζεται με  $\vec{0}$ . Η απόλυτη τιμή του μηδενικού διανύσματος είναι 0, ή διεύθυνσή του και η φορά του δεν ορίζονται.

### Άσκησης:

131. Να αναφέρετε τα διανύσματα, που ορίζουν τρία σημεία A, B, Γ.
132. Να αναφέρετε τα ζεύγη των ίσων διανυσμάτων, που ορίζουν οι κορυφές ενός παραλ/μου ABΓΔ.
133. Σχεδιάστε δύο διανύσματα με αρχές τα σημεία B και Γ και ίσα με το διάνυσμα  $\vec{AM}$ , όπου AM είναι διάμεσος του τριγώνου ABΓ.
134. Δίνεται ένα τετράπλευρο ABΓΔ. Με αρχή ένα οποιοδήποτε σημείο O σχεδιάστε όλα τα διανύσματα που είναι ίσα με εκείνα, τα οποία ορίζουν οι κορυφές του τετραπλεύρου.
135. Γράψτε 5 διανύσματα, που αντιπροσωπεύουν το ίδιο ελεύθερο διάνυσμα.
136. Να δικαιολογήσετε τις ιδιότητες της ισότητας των διανυσμάτων.

13. Η ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΕΝΗ ΕΥΘΕΙΑ (ΑΞΟΝΑΣ) — ΑΛΓΕΒΡΙΚΗ ΤΙΜΗ  
ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ — ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΡΗΤΩΝ ΣΤΗΝ  
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΕΝΗ ΕΥΘΕΙΑ

1. Ἡ προσανατολισμένη εὐθεία - ἄξονας.

§ 65. Πάρτε δύο σημεία  $O$  και  $A$  στὴν εὐθεία  $\varepsilon$  (τὸ  $A$  δεξιὰ τοῦ  $O$ ). Συγκρίνετε τὰ διανύσματα  $\vec{OA}$  και  $\vec{AO}$ . Τί παρατηρεῖτε;



σχ. 43.

Παρατηροῦμε ὅτι τὰ διανύσματα  $\vec{OA}$  και  $\vec{AO}$  ἔχουν τὴν ἴδια διεύθυνση και τὴν ἴδια ἀπόλυτη τιμή, ἀλλὰ διαφέρουν κατὰ τὴ φορά τους. Τὰ διανύσματα αὐτὰ λέγονται **ἀντίθετα**.


Συμφωνοῦμε νὰ ὀνομάζουμε **θετική φορά τῆς εὐθείας**  $\varepsilon$  τὴ φορά τοῦ διανύσματος  $\vec{OA}$ , και **ἀρνητική φορά τῆς**  $\varepsilon$  τὴ φορά τοῦ διανύσματος  $\vec{AO}$ .

Κάθε εὐθεία, τῆς ὁποίας ἔχει ὀρισθεῖ ἡ θετική φορά, λέγεται **προσανατολισμένη εὐθεία**.

Ἡ ἡμιευθεία  $OX$ , πάνω στὴν ὁποία βρίσκεται τὸ διάνυσμα  $\vec{OA}$ , λέγεται **θετική ἡμιευθεία** και ἡ ἀντικείμενή της ἡμιευθεία  $OX'$  ἀρνητική ἡμιευθεία. Τὸ σημεῖο  $O$  λέγεται **ἀρχή** τῆς προσανατολισμένης εὐθείας  $\varepsilon$ .

Ἄν θεωρήσουμε ὅτι τὸ μήκος τοῦ εὐθύγρ. τμήματος  $OA$  εἶναι ἡ μονάδα τοῦ μήκους, τὸ διάνυσμα  $\vec{OA}$  τῆς εὐθείας  $\varepsilon$  λέγεται **μοναδιαῖο διάνυσμα**.

Αὐτὸ τὸ διάνυσμα ἔχει φορά τὴ θετική φορά τῆς εὐθείας, ἀρχὴ τὴν ἀρχὴ τῆς προσανατολισμένης εὐθείας  $\varepsilon$  και ἀπόλυτη τιμὴ 1.



σχ. 43α

Στὴν περίπτωσι αὐτὴ ἡ προσανατ. εὐθεία λέγεται **ἄξονας** (σχ. 43α)

Ἄξονας εἶναι ἡ προσανατολισμένη εὐθεία, πάνω στὴν ὁποία ἔχει ὀρι-  
σθεῖ ἡ ἀρχὴ και τὸ μοναδιαῖο διάνυσμα.


## 2. Άπεικόνιση τῶν ρητῶν ἀριθμῶν στὴν προσανατολισμένη εὐθεία.

§ 66. Μποροῦμε νὰ ἀπεικονίσουμε τὸ σύνολο  $Q$  τῶν ρητῶν πάνω σὲ μιὰ προσανατολισμένη εὐθεία (ἄξονα), ὡς ἑξῆς:

Στὴν ἀρχὴ  $O$  τοῦ ἄξονα  $X'OX$  ἀπεικονίζουμε (δηλαδή ἀντιστοιχίζουμε μονοσήμαντα) τὸν ἀριθμὸ μηδέν.

Στὸ πέρασ τοῦ μοναδιαίου διανύσματος  $\vec{OA}$  τὸν ἀριθμὸ  $+1$ , στὸ πέρασ τοῦ διανύσματος  $\vec{OB}$ , ποῦ ἡ ἀπόλυτη τιμὴ του εἶναι  $2$ , ἀπεικονίζουμε τὸν  $+2$  κ.ο.κ.

Δηλαδή στὰ πέρατα τῶν διανυσμάτων τοῦ ἄξονα, τὰ ὁποῖα ἔχουν ἀρχὴ τὸ  $O$  καὶ φορὰ θετική, ἀπεικονίζουμε τοὺς ἀριθμούς τοῦ  $Q^+$ , οἱ ὁποῖοι εἶναι ἀντιστοίχως οἱ ἀπόλυτες τιμές των.



σχ. 44.

Στὰ πέρατα τῶν διανυσμάτων  $\vec{OA}'$ ,  $\vec{OB}'$  κ.λ.π., τὰ ὁποῖα εἶναι ἀντίθετα τῶν  $\vec{OA}$ ,  $\vec{OB}$  κ.ο.κ. ἀντιστοίχως, ἀπεικονίζουμε τοὺς  $-1$ ,  $-2$ , κ.λ.π., οἱ ὁποῖοι εἶναι ἀντίθετοι τῶν  $+1$ ,  $+2$ , κ.ο.κ.

Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ τὸ σύνολο  $Q$  τῶν ρητῶν ἀπεικονίζεται μονοσήμαντα πάνω στὸν ἄξονα  $X'OX$  (στὸ σύνολο τῶν σημείων τῆς εὐθείας  $\epsilon$ ).

### Παρατηρήσεις:

1. Μποροῦμε νὰ λέμε ὅτι τὸ σύνολο  $Q$  ἀπεικονίζεται στὸ σύνολο τῶν διανυσμάτων:  $\vec{OA}$ ,  $\vec{OB}$ ,  $\vec{OZ}$ , ...,  $\vec{OA}'$ ,  $\vec{OB}'$ , ...

2. Τὸ διάνυσμα  $\vec{OB}$  μποροῦμε νὰ τὸ θεωρήσουμε σὰν γινόμενο τοῦ ἀριθμοῦ  $+2$  ἐπὶ τὸ μοναδιαῖο  $\vec{OA}$  καὶ νὰ γράψουμε:  $\vec{OB} = (+2) \cdot \vec{OA}$  (ἢ  $\vec{OB} = 2\vec{OA}$ ).

Ὁμοίως  $\vec{OA}' = (-1) \cdot \vec{OA}$ ,  $\vec{OB}' = (-2) \cdot \vec{OA}$  κ.λ.π.

Τοὺς ἀριθμούς  $0$ ,  $+1$ ,  $+2$ , ...,  $-1$ ,  $-2$ , ... τοὺς λέμε **τετμημένες** τῶν σημείων  $O$ ,  $A$ ,  $B$ , ...,  $A'$ ,  $B'$ , ... ἀντιστοίχως.

Ἐπομένως **τετμημένη σημείου ἐνὸς ἄξονα εἶναι ὁ ἀριθμὸς, ὁ ὁποῖος ἀπεικονίζεται σ' αὐτό.**

### 3. Άλγεβρική τιμή διανύσματος.

§ 67. Άλγεβρική τιμή του διανύσματος  $\vec{OB}$  λέγεται ο αριθμός +2. Έπειδή θεωρήσαμε  $\vec{OB} = +2\vec{OA}$ , ο +2 είναι ο λόγος του  $\vec{OB}$  προς το μοναδιαίο  $\vec{OA}$ .

$$\frac{\vec{OB}}{\vec{OA}} = +2$$

Την άλγεβρική τιμή του  $\vec{OB}$  τη συμβολίζουμε με  $(\vec{OB})$ . Όστε  $(\vec{OB}) = +2$ ,  $(\vec{OO}) = 0$  (το μηδενικό διάνυσμα έχει άλγεβρική τιμή 0).  $(\vec{OG}) = +3$ ,  $(\vec{OB}') = -2$  κ.λ.π.

Παρατηρούμε ότι:  $(\vec{OB}) = +2 = +2 - 0 = \text{τετμ. B} - \text{τετμ. O}$ .

Άρα η άλγεβρική τιμή ενός διανύσματος ισούται με τη διαφορά της τετμημένης της αρχής από την τετμημένη του πέρατός του.

#### Παραδείγματα:

$$\begin{aligned} (\vec{BZ}) &= 2,5 - 2 = 0,5 & (\vec{ZA}) &= 1 - 2,5 = -1,5 \\ (\vec{B'A'}) &= -1 - (-2) = 1 & (\vec{G'O}) &= 0 - (-3) = +3 \end{aligned}$$

Παρατηρούμε ότι, αν η άλγεβρική τιμή ενός διανύσματος πάνω σ' έναν άξονα είναι θετικός αριθμός, το διάνυσμα έχει φορά θετική, και αν είναι αρνητικός αριθμός, το διάνυσμα έχει φορά αρνητική.

#### Έφαρμογή

Θεωρούμε τα σημεία Z, A, B' και τα διανύσματα  $\vec{ZA}$ ,  $\vec{AB'}$ ,  $\vec{B'Z}$  (Σχ. 44).

Υπολογίστε το άθροισμα  $(\vec{ZA}) + (\vec{AB'}) + (\vec{B'Z})$ .

Έχουμε:  $(ZA) = 1 - 2,5$ ,  $(AB') = -2 - 1$ ,  $(B'Z) = 2,5 - (-2)$ .

Όστε:  $(\vec{ZA}) + (\vec{AB'}) + (\vec{B'Z}) = (1 - 2,5) + (-2 - 1) + [2,5 - (-2)] =$   
 $= 1 - 2,5 - 2 - 1 + 2,5 + (+2) =$   
 $= 1 - 2,5 - 2 - 1 + 2,5 + 2 = 0$

#### Άσκησεις:

137. Να υπέλογισθούν οι άλγεβρικές τιμές τών διανυσμάτων  $\vec{KL}$ ,  $\vec{MN}$ ,  $\vec{LM}$ ,  $\vec{MK}$ , αν οι τετμημένες τών σημείων K, Λ, Μ, Ν του άξονα είναι αντίστοιχως  $-7$ ,  $+2$ ,  $-\frac{3}{8}$ ,  $-\frac{13}{5}$

138. Νά βρεθεί ή άλγεβρική τιμή ενός διανύσματος, άν:

- α) ή τετμημένη τής άρχής είναι  $\frac{11}{2}$  και ή τετμημένη του πέρατος 8,  
 β) » » » » » -4 » » » » -1,  
 γ) » » » » »  $-\frac{3}{2}$  » » » » 4,  
 δ) » » » » » 2 » » » » -5,  
 ε) » » » » » 5 » » » » 2.

139. Νά βρεθεί ή τετμημένη του πέρατος ενός διανύσματος άν:

- α) ή τετμημένη τής άρχής είναι -2 και ή άλγεβρική τιμή του είναι + 1,  
 β) » » » » » -1 » » » » 3,  
 γ) » » » » » 2 » » » » 2,  
 δ) » » » » » -5 » » » » -7,  
 ε) » » » » »  $\frac{3}{2}$  » » » » 4.

#### 14. ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΩΝ ΡΗΤΩΝ ΜΕ ΕΚΘΕΤΗ ΑΚΕΡΑΙΟ — ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΩΝ ΡΗΤΩΝ.

§ 68. α) Δυνάμεις με βάση ρητό και εκθέτη άκέραιο  $\geq 2$ .

Νά ύπολογισθοῦν τὰ γινόμενα:  $(-3) \cdot (-3)$ ,  $(-2) \cdot (-2) \cdot (-2)$ ,

$$\left(-\frac{2}{3}\right) \cdot \left(-\frac{2}{3}\right) \cdot \left(-\frac{2}{3}\right) \cdot \left(-\frac{2}{3}\right), \quad (-4) \cdot (-4) \cdot (-4) \cdot (-4) \cdot (-4)$$

\*Έχομε:  $(-3) \cdot (-3) = +(3 \cdot 3) = 3^2$

$$(-2) \cdot (-2) \cdot (-2) = -(2 \cdot 2 \cdot 2) = -2^3$$

$$\left(-\frac{2}{3}\right) \cdot \left(-\frac{2}{3}\right) \cdot \left(-\frac{2}{3}\right) \cdot \left(-\frac{2}{3}\right) = +\left(\frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3}\right) = \left(\frac{2}{3}\right)^4$$

$$(-4) \cdot (-4) \cdot (-4) \cdot (-4) \cdot (-4) = -(4 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4) = -4^5$$

Γνωρίζομε ότι τὸ γινόμενο  $\underbrace{\alpha \cdot \alpha \cdot \alpha \cdot \dots \cdot \alpha}_n$  λέγεται νιοστή δύναμη τοῦ  $\alpha$

καί γράφεται συντόμως:  $\alpha^v$   $\left( \begin{array}{l} \text{ό } \alpha \text{ λέγεται βάση, } \alpha \in \mathbb{Q}^+ \\ \text{ό } v \text{ λέγεται εκθέτης, } v \in \mathbb{N} \\ \text{καί } v \geq 2 \end{array} \right)$

Ἐπίσης ότι:  $\alpha^1 = \alpha$  καί  $\alpha^0 = 1$  ( $\alpha \neq 0$ )

Τοὺς ὁρισμοὺς αὐτοὺς τοὺς ἐπεκτείνομε καί στοὺς ρητοὺς πραγμ. ἀριθμοὺς, δηλαδή ἂν  $\alpha \in \mathbb{Q}$  καί  $v \in \mathbb{N}$ , τὸ  $\alpha^v$  παριστάνει τὸ γινόμενο  $v$  παραγόντων ἴσων με τὸν  $\alpha$  καί λέγεται νιοστή δύναμη τοῦ  $\alpha$ .



Επομένως ή 2η δύναμη του  $-3$  είναι:  $(-3) \cdot (-3) = (-3)^2$

ή 3η δύναμη του  $-2$  είναι:  $(-2) \cdot (-2) \cdot (-2) = (-2)^3$

ή 4η δύναμη του  $-\frac{2}{3}$  είναι:  $(-\frac{2}{3}) \cdot (-\frac{2}{3}) \cdot (-\frac{2}{3}) \cdot (-\frac{2}{3}) = (-\frac{2}{3})^4$

και ή 5η δύναμη του  $-4$  είναι:  $(-4) \cdot (-4) \cdot (-4) \cdot (-4) \cdot (-4) = (-4)^5$

Αν συγκρίνουμε αυτά μ' έκεϊνα που βρήκαμε παραπάνω, έχουμε:

$$(-3)^2 = 3^2 \text{ (θετικός)} \quad (-\frac{2}{3})^4 = (\frac{2}{3})^4 \text{ (θετικός)}$$

$$(-2)^3 = -2^3 \text{ (άρνητικός)} \quad (-4)^5 = -4^5 \text{ (άρνητικός)}$$

Αρα όταν ένας άρνητικός αριθμός υψώνεται σε άρτια δύναμη, δίνει θετικό έξαγόμενο, ενώ όταν υψώνεται σε περιττή δύναμη, δίνει άρνητικό.

Παρατηρούμε ότι:

$$(-2)^2 \cdot (-2)^3 = (-2)^{2+3} = (-2)^5$$

$$[(-2) \cdot (-2)] \cdot [(-2) \cdot (-2) \cdot (-2)] = (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) = (-2)^5$$

$$[(-2)^3]^2 = (-2)^{2 \cdot 3} = (-2)^6$$

$$(-2)^3 \cdot (-2)^3 = (-2)^{3+3} = (-2)^{2 \cdot 3}$$

$$(-3)^4 : (-3)^2 = (-3)^{4-2} = (-3)^2$$

$$\frac{(-3)^4}{(-3)^2} = \frac{(-3) \cdot (-3) \cdot (-3) \cdot (-3)}{(-3) \cdot (-3)} = (-3) \cdot (-3) = (-3)^2$$

$$[(-2) \cdot (-3)]^2 = (-2)^2 \cdot (-3)^2$$

$$[(-2) \cdot (-3)] \cdot [(-2) \cdot (-3)] = (-2) \cdot (-3) \cdot (-2) \cdot (-3) = (-2) \cdot (-2) \cdot (-3) \cdot (-3)$$

$$[(-2) \cdot (-2)] \cdot [(-3) \cdot (-3)] = (-2)^2 \cdot (-3)^2$$

Επομένως ισχύουν οι γνωστές ιδιότητες των δυνάμεων

$$\alpha^{\mu} \cdot \alpha^{\nu} = \alpha^{\mu+\nu} \quad (\alpha^{\mu} \cdot \alpha^{\nu} = \underbrace{\alpha \cdot \alpha \dots \alpha}_{\mu \text{ παράγ.}} \cdot \underbrace{\alpha \cdot \alpha \dots \alpha}_{\nu \text{ παράγ.}} = \underbrace{\alpha \cdot \alpha \dots \alpha}_{\mu+\nu \text{ παράγ.}} = \alpha^{\mu+\nu})$$

$$\alpha^{\mu} : \alpha^{\nu} = \alpha^{\mu-\nu} \quad (\mu \geq \nu) \quad \left( \alpha^{\mu} : \alpha^{\nu} = \frac{\underbrace{\alpha \cdot \alpha \dots \alpha}_{\mu \text{ παράγ.}}}{\underbrace{\alpha \cdot \alpha \dots \alpha}_{\nu \text{ παράγ.}}} = \underbrace{\alpha \cdot \alpha \dots \alpha}_{\mu-\nu \text{ παράγ.}} = \alpha^{\mu-\nu} \right)$$

$$(\alpha^{\mu})^{\nu} = \alpha^{\mu \nu} \quad \left( \underbrace{\alpha^{\mu} \cdot \alpha^{\mu} \dots \alpha^{\mu}}_{\nu \text{ παράγ.}} = \alpha^{\mu+\mu+\dots+\mu} = \alpha^{\mu \nu} \right)$$

$$(\alpha\beta\gamma)^{\nu} = \alpha^{\nu} \cdot \beta^{\nu} \cdot \gamma^{\nu} \quad \text{και όταν } \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{Q} \quad (\mu, \nu \in \mathbb{N}),$$

### Έφαρμογές.

$$(-1)^0 = 1, \left(-\frac{1}{2}\right)^0 = 1, \left(-\frac{3}{2}\right) \cdot \left(-\frac{3}{2}\right)^2 = \left(-\frac{3}{2}\right)^3 = -\frac{27}{8}$$

$$(-1)^1 = -1, \left(-\frac{1}{2}\right)^1 = -\frac{1}{2}, \left(-\frac{3}{5}\right)^5 : \left(-\frac{3}{5}\right)^3 = \left(-\frac{3}{5}\right)^2 = \frac{9}{25}$$

$$(-1)^2 = 1, \left(-\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}, \left[\left(-\frac{1}{2}\right)^2\right]^3 = \left(-\frac{1}{2}\right)^6 = \frac{1}{64}$$

$$(-1)^3 = -1$$

$$\begin{aligned} (-1)^4 = 1, \left(-\frac{1}{2}\right)^3 = -\frac{1}{8}, \left[\left(-\frac{1}{2}\right) \cdot \frac{3}{4}\right]^2 &= \left(-\frac{1}{2}\right)^2 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^2 = \\ &= \frac{1}{4} \cdot \frac{9}{16} = \frac{9}{64} \end{aligned}$$

#### § 69. β) Δυνάμεις με εκθέτη άκέραιο μικρότερο από το μηδέν.

Γνωρίζουμε τί παριστάνει το σύμβολο  $\alpha^v$ , όταν το  $\alpha \in \mathbb{Q}$  και το  $v \in \mathbb{Z}^+$ , δηλαδή γνωρίζουμε ότι:

$$\alpha^1 = \alpha, \quad \alpha^2 = \alpha \cdot \alpha, \quad \alpha^3 = \alpha \cdot \alpha \cdot \alpha, \quad \text{κ.ο.κ.}$$

Τί παριστάνει όμως το σύμβολο  $\alpha^k$ , όταν το  $k \in \mathbb{Z}^-$ ; Δηλαδή τί παριστάνει το  $\alpha^{-1}$ ; το  $\alpha^{-2}$ ; το  $\alpha^{-3}$ ; κ.ο.κ.

Στην § 49ε είδαμε ότι ο αντίστροφος του  $\alpha$  συμβολίζεται με  $\frac{1}{\alpha}$  ή με  $\alpha^{-1}$ . Άρα τα δύο αυτά σύμβολα είναι ίσα, αφού συμβολίζουν τον ίδιο αριθμό (τον αντίστροφο του  $\alpha$ ).

$$\text{Συνεπώς } \alpha^{-1} = \frac{1}{\alpha} \quad \text{ή} \quad \alpha^{-1} = \left(\frac{1}{\alpha}\right)^1 = \frac{1}{\alpha}$$

Έπεκτείνουμε αυτό το συμβολισμό και έχουμε:

$$\alpha^{-2} = \left(\frac{1}{\alpha}\right)^2 = \frac{1}{\alpha} \cdot \frac{1}{\alpha} = \frac{1}{\alpha^2}$$

$$\alpha^{-3} = \left(\frac{1}{\alpha}\right)^3 = \frac{1}{\alpha} \cdot \frac{1}{\alpha} \cdot \frac{1}{\alpha} = \frac{1}{\alpha^3}$$

$$\dots \dots \dots$$

$$\dots \dots \dots$$

$$\dots \dots \dots$$

$$\alpha^{-v} = \left(\frac{1}{\alpha}\right)^v = \frac{1}{\alpha^v} \quad v \in \mathbb{N}$$

Ωστε κάθε δύναμη ρητού (διαφορετικού από το μηδέν) με εκθέτη αρνητικό άκέραιο παριστάνει τη δύναμη του αντίστροφου του ρητού με εκθέτη τον αντίθετο θετικό άκέραιο.

Έπειδή όμως ο αντίστροφος του  $\alpha$  υπάρχει, όταν ο  $\alpha$  είναι διαφορετικός από το μηδέν, γι' αυτό το σύμβολο  $\alpha^{-v}$ , ( $v \in \mathbb{N}$ ) έχει έννοια, όταν  $\alpha \neq 0$

$$\text{Συμβολικά: } \text{άν το } v \in \mathbb{N}_0 \text{ και } \alpha \neq 0, \text{ τότε } \alpha^{-v} = \left(\frac{1}{\alpha}\right)^v.$$

### Εφαρμογές.

$$2^{-1} = \left(\frac{1}{2}\right)^1 = \frac{1}{2}, \quad \left(\frac{4}{5}\right)^{-2} = \left(\frac{5}{4}\right)^2 = \frac{25}{16}, \quad (-2)^{-1} = \left(-\frac{1}{2}\right)^1 = -\frac{1}{2}$$

$$(-3)^{-2} = \left(-\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{1}{9}, \quad (-3)^{-3} = \left(-\frac{1}{3}\right)^3 = -\frac{1}{27}, \quad (-2)^{-2} =$$

$$= \left(-\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$$

$$\left(-\frac{2}{3}\right)^{-3} = \left(-\frac{3}{2}\right)^3 = -\frac{27}{8}, \quad (-3)^{-1} = \left(-\frac{1}{3}\right)^1 = -\frac{1}{3}, \quad (-2)^{-3} = \left(-\frac{1}{2}\right)^3 = -\frac{1}{8}$$

#### Σημείωση.

1. Από τα παραπάνω παρατηρούμε ότι ισχύει ο κανόνας για το πρόσημο τής δυνάμεως, όταν η βάση είναι αρνητική και ο εκθέτης άρτιος ή περιττός.

2. Στόν τύπο  $a^{-v} = \left(\frac{1}{a}\right)^v$  αν  $v=0$ , έχουμε  $a^{-0} = \left(\frac{1}{a}\right)^0$ . Αλλά επειδή  $-0=0$ ,

$$\text{είναι } a^{-0} = a^0 = \left(\frac{1}{a}\right)^0 = 1.$$

3. Στα επόμενα, όταν γράφουμε το σύμβολο  $a^v$ , θα έννοούμε ότι  $a \in \mathbb{Q}$ ,  $a \neq 0$  και  $v \in \mathbb{Z}$ .

**§ 70. Ίδιότητες των δυνάμεων με βάση ρητό (διαφορετικό από το μηδέν) και εκθέτη ακέραιο.**

$$1. (-2)^{-2} \cdot (-2)^{-3} = \left(-\frac{1}{2}\right)^2 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)^3 = \left(-\frac{1}{2}\right)^5 = (-2)^{-5}$$

\*Αρα γενικά:  $a^u \cdot a^v = a^{u+v}$

$$2. [(-2)^{-3}]^{-2} = \left[\left(-\frac{1}{2}\right)^3\right]^{-2} = \left[\frac{1}{\left(-\frac{1}{2}\right)^3}\right]^2 = \left[\left(\frac{1}{-\frac{1}{2}}\right)^3\right]^2 =$$

$$= \left[\left(\frac{1}{-\frac{1}{2}}\right)\right]^{2 \cdot 3} = (-2)^6 = (-2)^{(-3) \cdot (-2)}$$

\*Αρα γενικά:  $(a^u)^v = a^{u \cdot v}$

$$3. (-4)^{-5} : (-4)^{-3} = \left(-\frac{1}{4}\right)^5 : \left(-\frac{1}{4}\right)^3 = \left(-\frac{1}{4}\right)^2 = (-4)^{-2}$$

\*Αλλά και  $(-4)^{-5} : (-4)^{-3} = (-4)^{-5 - (-3)} = (-4)^{-5+3} = (-4)^{-2}$

Γενικά:  $a^u : a^v = a^{u-v}$

$$4. [(-2) \cdot (-3)]^{-2} = \left[\frac{1}{(-2)(-3)}\right]^2 = \left[\left(-\frac{1}{2}\right) \cdot \left(-\frac{1}{3}\right)\right]^2 =$$

$$= \left(-\frac{1}{2}\right)^2 \cdot \left(-\frac{1}{3}\right)^2 = (2)^{-2} \cdot (-3)^{-2}$$

Γενικά:  $(\alpha \cdot \beta)^v = \alpha^v \cdot \beta^v$

Ο τύπος αυτός ισχύει και για περισσότερους παράγοντες:

$$(\alpha \cdot \beta \cdot \gamma \cdot \delta)^{\nu} = \alpha^{\nu} \cdot \beta^{\nu} \cdot \gamma^{\nu} \cdot \delta^{\nu}$$

### Εφαρμογές.

$$(-3) \cdot (-3)^{-2} \cdot (-3)^3 = (-3)^{1-2+3} = (-3)^2 = 9$$

$$\left[ \left(-\frac{1}{2}\right)^2 \right]^{-2} = \left(-\frac{1}{2}\right)^{-4} = (-2)^4 = 16$$

$$\left(-\frac{3}{4}\right)^{-2} : \left(-\frac{3}{4}\right)^{-3} = \left(-\frac{3}{4}\right)^{-2-(-3)} = \left(-\frac{3}{4}\right)^{-2+3} = \left(-\frac{3}{4}\right)^1 = -\frac{3}{4}$$

$$\left[ \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot (-3) \right]^{-2} = \left(-\frac{1}{2}\right)^{-2} \cdot (-3)^{-2} = (-2)^2 \cdot \left(-\frac{1}{3}\right)^2 = 4 \cdot \frac{1}{9} = \frac{4}{9}$$

$$\left(-\frac{131}{25}\right) \cdot \left(-\frac{131}{25}\right)^2 \cdot \left(-\frac{131}{25}\right)^{-3} = \left(-\frac{131}{25}\right)^{1+2-3} = \left(-\frac{131}{25}\right)^0 = 1$$

### Άσκησης:

140. Να υπολογισθούν οι δυνάμεις:

α)  $4^{-2}$ ,  $(-7)^{-2}$ ,  $(-1)^1$ ,  $(-1)^{-1}$ ,  $(-1)^{-2}$ ,  $-1^{12}$ ,  $-(-1)^{-3}$ ,

β)  $\left(-\frac{1}{3}\right)^{-3}$ ,  $\left(\frac{1}{3}\right)^{-2}$ ,  $\left(-\frac{3}{4}\right)^{-2}$ ,  $\left(\frac{3}{4}\right)^{-2}$ ,  $(-0,5)^3$ ,  $(-0,5)^{-2}$ .

141. Να εκτελεσθούν με τον συντομότερο τρόπο οι πράξεις:

α)  $\left(-\frac{101}{305}\right)^{-2} \cdot \left(-\frac{101}{305}\right)^3 \cdot \left(-\frac{101}{305}\right)^{-1}$ , β)  $\left(\frac{259}{748}\right)^2 \cdot \left(\frac{259}{748}\right)^3 \cdot \left(\frac{748}{259}\right)^5$

γ)  $\left(-\frac{149}{245}\right)^{-4} : \left(-\frac{149}{245}\right)^{-3}$ , δ)  $\left(-\frac{15}{16}\right)^{+3} : \left(-\frac{16}{15}\right)^{-3} + \left(-\frac{1}{2}\right)^{-2}$

142. Να εκτελεσθούν οι πράξεις:

α)  $(-1)^1 + (-1)^{-1} + (-1)^2 + (-1)^{-2} + (-1)^0 + 1^0$ , β)  $(10^{-4})^{-3}$ .

γ)  $2^{-2} + 4^{-1} + 3^0 - 8^1 + (-1)^{-2}$ , δ)  $[(-10)^2]^{-3}$ , ε)  $\left[ \left(-\frac{1}{10}\right)^{-2} \right]^{-3}$

143. Να γράψετε με μορφή δυνάμεως τους αριθμούς:

α) 10, -10, 0,1, -0,1, -8,  $-\frac{16}{9}$

β) 100, -100, 0,01, -0,01.

γ) 1000, -1000, 0,001, -0,001,  $-\frac{1}{8}$ ,  $-\frac{27}{64}$

144. Να γράψετε με σύντομο τρόπο τους αριθμούς:

α) 0,0000001, δ)  $\frac{1}{0,00000007}$

β) 0,0000000015,

γ) -0,00000000045, ε)  $\frac{1}{-0,0000000009}$

145. Να βρεθεί ή τιμή των παραστάσεων:

α)  $2x^{-4} - 6 \cdot 4x^{-3} + 1x^{-2} - 5x^{-1}$ , αν  $x = 1$ ,

β)  $2 \cdot x^{-2} - 2 \cdot x + x^2 - 3 \cdot (-1)^{-3}$ , αν  $x = -2$ ,

γ)  $(x+4) \cdot 2x^{-2} - 3 \cdot 3x^{+1} + 6 \cdot 3x^{-1}$ , αν  $x = 0$ .

$$\delta) 2 \cdot \left(-\frac{1}{3}\right)^3 \cdot (-2)^{-2} - (-3)^{-3} + (-1)^{-1},$$

$$\epsilon) \frac{\chi^2 - \psi^2}{\chi + \psi} \quad \text{αν } \chi = -\frac{1}{2} \text{ και } \psi = -2$$

146. Τα παρακάτω γινόμενα να γίνουν δυνάμεις ενός ρητού:

$$\alpha) (-8)^2 \cdot (-4)^3 \quad \beta) \left(-\frac{1}{8}\right) \cdot \left(-\frac{1}{4}\right)$$

$$\gamma) \left(-\frac{1}{2}\right)^{-2} \cdot (-2)^3 \quad \delta) (-1)^{-3} \cdot (-2)^{-1} \cdot 2^3$$

$$\epsilon) \left(-\frac{1}{3}\right)^{-3} \cdot 3^2 \quad \sigma\tau) \left(-\frac{1}{9}\right) \cdot \frac{1}{3}$$

147. Να επιλυθούν οι εξισώσεις:

$$\alpha) \left(-\frac{1}{2}\right)^{-3} \cdot \chi = \left(-\frac{1}{2}\right)^{-2} \quad \beta) \left(-\frac{2}{3}\right)^{-2} : \chi = \left(-\frac{2}{3}\right)$$

$$\gamma) \chi : \left(-\frac{1}{2}\right)^{-2} = -\frac{1}{2} \quad \delta) 0,00000016 = \chi \cdot 4^2 \cdot 10^{-8}$$

### 15. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΙΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ.

§ 71. Στόν παρακάτω πίνακα περιλαμβάνονται οι βασικές πράξεις: Πρόσθεση — Πολλαπλασιασμός και οι σπουδαιότερες ιδιότητές τους.

**Σημείωση.** Ἀφαίρεση ρητοῦ είναι ἡ πρόσθεση τοῦ ἀντίθετου του καὶ διαίρεση ρητοῦ είναι ὁ πολλαπλασιασμός ἐπὶ τὸν ἀντίστροφο τοῦ διαιρέτη:

Τὰ $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{Q}$		
Πράξεις	Πρόσθεση	Πολλαπλασιασμός
Ἐπιμεριστικότητα	Γιὰ κάθε $\alpha$ καὶ $\beta$ $\alpha + \beta \in \mathbb{Q}$	Γιὰ κάθε $\alpha$ καὶ $\beta$ $\alpha\beta \in \mathbb{Q}$
Μεταθετική ιδιότητα	Γιὰ κάθε $\alpha$ καὶ $\beta$ $\alpha + \beta = \beta + \alpha$	Γιὰ κάθε $\alpha$ καὶ $\beta$ $\alpha\beta = \beta\alpha$
Προσεταιριστική ιδιότητα	Γιὰ κάθε $\alpha, \beta$ καὶ $\gamma$ $(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma)$	Γιὰ κάθε $\alpha, \beta$ καὶ $\gamma$ $(\alpha\beta)\gamma = \alpha(\beta\gamma)$
Ἐπίλυση οὐδέτερου στοιχείου	Ἐπάρχει τὸ $0 \in \mathbb{Q}$ , ὥστε γιὰ κάθε $\alpha$ $\alpha + 0 = \alpha$	Ἐπάρχει τὸ $1 \in \mathbb{Q}$ , ὥστε γιὰ κάθε $\alpha$ $1 \cdot \alpha = \alpha$
Ἐπίλυση ἀντίθετου καὶ ἀντίστροφου στοιχείου	Γιὰ κάθε $\alpha$ ὑπάρχει τὸ στοιχείο $-\alpha$ ὥστε, $\alpha + (-\alpha) = 0$	Γιὰ κάθε $\alpha \neq 0$ ὑπάρχει τὸ στοιχείο $\frac{1}{\alpha}$ , ὥστε $\alpha \cdot \frac{1}{\alpha} = 1$
Ἐπιμεριστική ιδιότητα	Γιὰ κάθε $\alpha, \beta$ καὶ $\gamma$ , $\alpha(\beta + \gamma) = \alpha\beta + \alpha\gamma$	

## § 72. Ιδιότητες ισότητων και άνισοτήτων.

$$\begin{array}{ll}
 \alpha + \gamma = \beta + \gamma & \alpha = \beta \quad \alpha + \gamma = \beta + \delta \\
 1. \alpha = \beta \Leftrightarrow & 2. \Rightarrow \\
 \alpha\gamma = \beta\gamma \quad (\gamma \neq 0) & \gamma = -\delta \quad \alpha\gamma = \beta\delta \\
 3. \alpha > \beta \Leftrightarrow \alpha + \gamma > \beta + \gamma & 4. \alpha > \beta \\
 \alpha\gamma > \beta\gamma \quad (\gamma > 0) & \Rightarrow \alpha + \gamma > \beta + \delta \\
 \alpha\gamma < \beta\gamma \quad (\gamma < 0) & \gamma \geq \delta
 \end{array}$$

## § 73. Ιδιότητες τών δυνάμεων.

$$\begin{array}{lll}
 1. \alpha^m \cdot \alpha^n \cdot \dots \cdot \alpha^p = \alpha^{m+n+\dots+p} & 2. (\alpha^m)^n = \alpha^{mn} & 3. \alpha^m : \alpha^n = \alpha^{m-n} \\
 4. (\alpha \cdot \beta \cdot \gamma \cdot \dots \cdot \kappa)^n = \alpha^n \cdot \beta^n \cdot \gamma^n \cdot \dots \cdot \kappa^n & & \\
 5. \alpha^1 = \alpha, \quad \alpha^0 = 1 \quad (\alpha \neq 0), \quad \alpha^{-n} = \left(\frac{1}{\alpha}\right)^n \quad (\alpha \neq 0) & &
 \end{array}$$

## Γενικές άσκήσεις του κεφαλαίου II.

148. Άν  $\chi = -6+7-2+3$ ,  $\psi = -4+3-7+2$  και  $z = -4+6-3$ , νά βρεθοῦν τά α)  $\chi + \psi + z$ , β)  $\chi - \psi - z$ , γ)  $\chi^2 + \psi^2 + z^2$ , δ)  $-\chi^2 + \psi^2 - z^2$

149. Νά έκτελεσθοῦν οί πράξεις:

$$\begin{array}{l}
 \alpha) (2-5+7) \cdot (-2+7) + (-13+7) : (-12+15), \\
 \beta) \left(-\frac{2}{5}+1\right) \cdot \left(-\frac{3}{2}-1\right) - \left(1+\frac{5}{2}\right) : \left(-2-\frac{1}{3}\right), \\
 \gamma) \left(-3+\frac{1}{3}-\frac{4}{5}\right) \cdot \left(-\frac{3}{2}\right) + \left(-\frac{1}{4}+3-\frac{1}{2}\right) : \left(-\frac{2}{3}\right), \\
 \delta) \left(-\frac{3}{5}+\frac{7}{3}\right) \cdot \left(-\frac{15}{7}\right) - \left(\frac{7}{2}-1\right) : \left(-\frac{1}{2}\right), \\
 \epsilon) -[-4-(-3+2)] + [-(6+2)-14] \cdot [-0,5+1]
 \end{array}$$

150. Νά βρεθεῖ ὁ  $\chi$  ἀπό τίς Ισότητες:

$$\begin{array}{ll}
 \alpha) -\frac{2}{5}\chi = -\frac{14}{5} - \frac{5}{10}, & \beta) \left(-\frac{1}{3}\right)^{-2} : \chi = \left(-\frac{1}{3}\right)^{-1} \\
 \gamma) \left(-\frac{1}{2}\right)^{-2} : \chi = -\frac{1}{2} & \delta) -\frac{1}{4} \cdot \chi = [(-2)^2 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)^3]^2 \\
 \epsilon) \left(-\frac{3}{4}\right) : \chi = \frac{1}{4} - \frac{27}{8}, & \sigma\tau) \left(-\frac{1}{2}\right)^2 + (-\chi) = -\frac{1}{2} \\
 \zeta) [2^3 \cdot 10^{-7}] : \chi = 5^2 \cdot 10^{-9}
 \end{array}$$

151. Άν  $\alpha = -5$  και  $\beta = +3$ , νά βρεθεῖ ἡ τιμή τών παραστάσεων:

$$\begin{array}{lll}
 \alpha) (\alpha + \beta)^2 & \beta) (\alpha - \beta)^2 & \gamma) \alpha^2 - \beta^2 \\
 \alpha^2 + 2\alpha\beta + \beta^2, & \alpha^2 - 2\alpha\beta + \beta^2, & (\alpha + \beta)(\alpha - \beta)
 \end{array}$$

Τί παρατηρεῖτε ;

152. Να βρεθεί ή τιμή τῶν παρακάτω παραστάσεων:

$$\alpha) \frac{3\alpha^2 - 2\beta^3}{2} - \frac{\alpha^2 - \beta^2}{3}, \quad \text{ἄν } \alpha = -\frac{1}{2}, \quad \beta = 2$$

$$\beta) \left( \frac{\alpha^2 + \beta^2}{3} - \frac{\alpha^2 - \beta^2}{4} \right) : \left( \frac{\alpha^3 - \beta^3 + 1}{\alpha\beta} \right), \quad \text{ἄν } \alpha = 1, \quad \beta = 2$$

$$\gamma) \frac{\alpha^3 + 3\alpha^2\beta + 3\alpha\beta^2 + \beta^3}{\alpha^3 - 3\alpha^2\beta + 3\alpha\beta^2 - \beta^3}, \quad \text{ἄν } \alpha = -3, \quad \beta = 2$$

$$\delta) (4 \cdot \chi^\chi)^2 - 6(\chi\psi)^{\chi\psi} - \psi^{2\psi}, \quad \text{ἄν } \chi = -1, \quad \psi = 2$$

153. Στις ἐπόμενες παραστάσεις νά βρεθεί τὸ ἐξαγόμενο καί νά γραφεῖ σάν δύναμη.

$$\alpha) (3^2 \cdot 3^3) : 3^4 + (2^5 \cdot 2^3) \cdot 2 - 6 \cdot 5$$

$$\beta) (-3^{-2} : 3^{-3}) \cdot 3^{-4} + \left(-\frac{2}{3}\right)^2 + 4^2 : 3^3$$

$$\gamma) \left(\frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{5}{2} \cdot \frac{3}{7}\right)^{-3} : \left[\frac{4}{7} \left(\frac{2}{3} \cdot \frac{5}{2}\right)^0\right]^{-2} - \left[\frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{3}{7} \cdot \frac{5}{2}\right]^{-1}$$

$$\delta) 5 \cdot \left(\frac{1}{5}\right)^{-4} + \left(-\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{9} \cdot \frac{1}{27} \cdot \frac{1}{81}\right)^0 - \left(-\frac{2}{3}\right)^2 \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^2 - \left(\frac{1}{5}\right)^{-2} : 5^{-2}$$

154. Να βρεθεί ή τιμή τῶν παραστάσεων:

$$\alpha) 4 \cdot 2^{x+1} - 3 \cdot 3^x - 6 \cdot 3^{x-1} + (\chi - 2) \cdot 2^{x-2} \quad \text{ἔάν } \chi = 0$$

$$\beta) \left(-\frac{1}{2}\right)^{x-4} + \left(-\frac{1}{3}\right)^{x-3} + \left(-\frac{1}{5}\right)^{x-2} + (-1)^{x-1} - (-1)^x \quad \text{ἔάν } \chi = 1$$

$$\gamma) \left(-\frac{1}{3}\right)^{x-3} + \left(-\frac{1}{5}\right)^{x-2} - \left(-\frac{1}{2}\right)^{x-1} + (-1)^x \quad \text{ἔάν } \chi = 1$$

155. Στή θέση τοῦ ἐρωτηματικοῦ νά βάλετε τὸ κατάλληλο σύμβολο ἀπὸ τὰ  $>$ ,  $<$ ,  $=$  στὰ παρακάτω:

$$\alpha) -\frac{7}{3} + \frac{14}{6} \quad ; \quad -\frac{1}{2}$$

$$\beta) -5 + \frac{1}{2} \quad ; \quad \frac{3}{8} - \frac{7}{4}$$

$$\gamma) -\frac{3}{5} \quad ; \quad -\frac{4}{3} + \frac{11}{15}$$

καί νά πολλαπλασιάσετε ἐπὶ  $(-1)$  καί τὰ δύο μέλη τῶν σχέσεων πού προκύπτουν.

δ) Στις προηγούμενες σχέσεις νά μεταφέρετε τοὺς ὄρους τοῦ β' μέλους στὸ πρῶτο.

156. Νά πολλαπλασιάσετε καί τὰ δύο μέλη τῶν παρακάτω ἰσοτήτων καί ἀνισότητων μὲ τὸ Ε.Κ.Π. τῶν παρονομασῶν τους:

$$\alpha) \frac{1}{3} + \frac{1}{2} = 1 - \frac{1}{6}, \quad \beta) \frac{3}{4} - 1 = \frac{1}{2} - \frac{3}{4}, \quad \gamma) \frac{12}{14} - \frac{1}{7} = 1 - \frac{2}{7}$$

$$\delta) \frac{13}{14} > 1 - \frac{1}{7}, \quad \epsilon) \frac{7}{3} < 3 - \frac{1}{2}, \quad \sigma\tau) 1 - \frac{1}{4} < \frac{25}{8} - 2$$

157. Νά επαληθεύσετε με αριθμητικά παραδείγματα τις σχέσεις:

1)  $\alpha^2 + \beta^2 \geq 2\alpha\beta$ ,    2)  $\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 \geq \alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha$ .

158. Νά αποδείξετε τά:

α)  $|\alpha^v| = |\alpha|^v$  ,    β)  $(-1)^{2v} = 1$ ,

γ)  $(-1)^{2v+1} = -1$  ,    δ)  $\alpha^{\kappa-\lambda} \cdot \alpha^{\lambda-\mu} \cdot \alpha^{\mu-\kappa} = 1$ ,

ε)  $\alpha = \beta \Rightarrow \alpha^v = \beta^v$



## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

### Α. ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ — ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ — ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ

#### 1. Η ΕΞΙΣΩΣΗ $ax + b = 0$ . ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΥΤΗΣ.

§ 74. Στην Α' τάξη μάθαμε εξισώσεις, όπως είναι οι  $x+3=0$ ,  $12-x=8$ ,  $3x=15$  και είδαμε ότι αυτές αληθεύουν για όρισμένες τιμές του γράμματος  $x$ , το οποίο λέγεται άγνωστος της εξισώσεως.

**Όστε εξίσωση ως προς  $x$  είναι μια ισότητα, ή οποία περιέχει τον άγνωστο  $x$  και ή οποία αληθεύει για όρισμένες από τις τιμές, που μπορεί να λάβει ό  $x$ .**

Ο αριθμός, που επαληθεύει την εξίσωση, λέγεται λύση της εξισώσεως.

Η εύρεση των λύσεων λέγεται επίλυση της εξισώσεως.

#### Σημείωση.

1. Όταν λέμε ότι ή εξίσωση  $x+3=8$  αληθεύει για την τιμή 5 του  $x$ , ή ότι ό αριθμός 5 επαληθεύει την εξίσωση, έννοούμε ότι, αν στην εξίσωση  $x+3=8$  θέσουμε αντί για τον  $x$  τον 5, θα πάρουμε την αριθμητική ισότητα  $5+3=8$  ή  $8=8$  (τό πρώτο μέλος ίσο μέ τό δεύτερο μέλος).

Με την εργασία αυτή, κατά την όποία θέτομε αντί για τον  $x$  τη λύση της εξισώσεως και βρίσκομε ότι τό πρώτο μέλος είναι ίσο μέ τό δεύτερο, λέμε ότι **επαληθεύομε** την εξίσωση ή ότι γίνεται ή **επαλήθευση της εξισώσεως**.

Όταν μια εξίσωση επαληθεύεται για μια τιμή του άγνωστου, λέμε ότι ή τιμή αυτή είναι πράγματι λύση της εξισώσεως. Π.χ. επειδή ό αριθμός 3 επαληθεύει την εξίσωση  $x-2=1$ , συμπεραίνομε ότι ό 3 είναι λύση της εξισώσεως αυτής.

2. Μια εξίσωση είναι δυνατόν νά μήν έχει λύση. Π.χ. ή εξίσωση  $3+x=x+\frac{5}{2}$  δέν επαληθεύεται, όποιονδήποτε ρητό κι αν θέσουμε αντί για τον  $x$ .

Αυτή λέγεται **άδύνατη** εξίσωση.

Υπάρχουν και εξισώσεις οι όποιες έχουν άπειρες λύσεις π.χ. ή  $x+5=5+x$  επαληθεύεται μέ όποιονδήποτε ρητό. Η εξίσωση αυτή λέγεται **ταυτότητα** ή **άοριστη** εξίσωση.

Οι εξισώσεις, τις όποιες εξετάζομε, ανάγονται στη γενική μορφή  $ax+b=0$ , ή όποια λέγεται **εξίσωση πρώτου βαθμού ως προς  $x$** , επειδή ό άγνωστος έχει εκθέτη τη μονάδα,  $ax^1+b=0$  ή  $ax+b=0$ .

Οι  $a, b$  είναι αριθμοί ή παραστάσεις ανεξάρτητες από τον  $x$  (δέν περιέχουν τον  $x$ ).

Ό  $a$  λέγεται συντελεστής του άγνωστου και θεωρείται διαφορετικός από τό μηδέν.

Ό  $b$  λέγεται γνωστός όρος.

Στην εξίσωση  $6x-5=3x+1$ , ή όποια είναι 1ου βαθμού ως προς  $x$ , παρατηρούμε τά εξής:

Οι παραστάσεις  $6x-5$ ,  $3x+1$  λέγονται «μέλη της εξισώσεως».

Οι όροι τους λέγονται και όροι τῆς ἐξισώσεως.

Οι  $-5$ ,  $1$  είναι οι γνωστοί όροι και οι  $6x$ ,  $3x$  είναι οι άγνωστοί όροι.

Στὴν ἐξίσωση  $\frac{2x+3}{2} + \frac{x-1}{3} = \frac{x+2}{6}$  μπορούμε νὰ θεωρήσουμε σὰν όρους

τοῦ 1ου μέλους τὶς παραστάσεις  $\frac{2x+3}{2}$  καὶ  $\frac{x-1}{3}$  καὶ τοῦ δεύτερου μέλους τὴν παράσταση  $\frac{x+2}{6}$ .

### § 75. Ἴσοδύναμες ἐξισώσεις.

Οἱ ἐξισώσεις  $x-2=5$ ,  $x+3=10$  ἔχουν τὴ λύση 7 (γιατὶ ἐπαληθεύονται ἂν ἀντὶ τοῦ  $x$  θέσουμε τὸν 7) καὶ μόνον αὐτῆ.

Δύο ἐξισώσεις μὲ ἕναν ἄγνωστο λέγονται ἰσοδύναμες, ἂν ἔχουν τὶς ἴδιες λύσεις.

### § 76. Ἰδιότητες τῶν ἐξισώσεων.

α) Ἄν στὴν ἐξίσωση  $(x+2) \cdot 3 - 6 = 12$  ἐκτελέσουμε τὶς πράξεις

$$3x + 6 - 6 = 12$$

$$3x + 0 = 12,$$

καταλήγουμε στὴν ἐξίσωση  $3x = 12$ , ἡ ὁποία ἔχει λύση τὸν ἀριθμὸ 4.

Ἡ λύση αὐτῆ εἶναι καὶ λύση τῆς ἀρχικῆς, γιατί παρατηροῦμε ὅτι τὴν ἐπαληθεύει:

$$(x+2) \cdot 3 - 6 = 12$$

α' μέλος:  $(4+2) \cdot 3 - 6$

$$6 \cdot 3 - 6$$

$$18 - 6 = 12$$

β' μέλος:  $12$

Ἔστω, ἂν στὰ μέλη μιᾶς ἐξισώσεως ἐκτελέσουμε τὶς σημειωμένες πράξεις, βρίσκουμε ἰσοδύναμη ἐξίσωση.

β) Ἡ ἐξίσωση  $x+3=2$  ἔχει τὴ λύση  $-1$ . Ἄν προσθέσουμε καὶ στὰ δύο μέλη τῆς τὸν 4, θὰ ἔχουμε:

$$x+3+4=2+4 \Leftrightarrow x+7=6$$

Ἡ ἐξίσωση  $x+7=6$  ἔχει τὴ λύση  $-1$ , γιατί τὴν ἐπαληθεύει καὶ ἐπομένως εἶναι ἰσοδύναμη μὲ τὴν ἀρχικῆ.

Ἄρα, ἂν προσθέσουμε καὶ στὰ δύο μέλη μιᾶς ἐξισώσεως τὸν ἴδιο ρητό, παίρνομε ἰσοδύναμη ἐξίσωση.

**Σημείωση.** Τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ ὅταν προσθέσουμε τὴν ἴδια παράσταση, ἡ ὁποία περιέχει τὸν ἄγνωστο  $x$ . π.χ.  $x+3=2 \Leftrightarrow x+3+(x+1)=2+(x+1) \Leftrightarrow 2x+4=x+3$

Αὐτὴ ἔχει τὴ λύση  $-1$ , γιατί τὴν ἐπαληθεύει,

$$2(-1)+4 = -1+3$$

$$-2+4 = -1+3$$

$$2 = 2$$

### Πρακτικό συμπέρασμα τής ιδιότητας αυτής.

Αν προσθέσουμε και στα δύο μέλη τής εξίσωσης  $2x+3=5$  τον  $-3$ , παίρνουμε τήν ισοδύναμη εξίσωση  $2x+3+(-3)=5+(-3)$  ή τήν  $2x=5-3$ , ή όποια είναι πιό άπλη από τήν άρχική.

Παρατηρούμε ότι από τήν εξίσωση  $2x+3=5$  μεταβαίνομε στήν  $2x=5-3$ , αν μεταφέρουμε τον 3 από τó πρώτο μέλος στο δεύτερο και αλλάξομε τó πρόσημό του.

Ωστε μπορούμε νά μεταφέρουμε έναν όρο άθροίσματος από τó ένα μέλος μιās εξίσωσης στο άλλο, αν τοῦ αλλάξομε τó πρόσημο ή με συντομία:

Ο όρος μιās εξίσωσης, ό όποιος αλλάζει μέλος, αλλάζει και πρόσημο.

#### Παραδείγματα:

$$1. x-5=7 \Leftrightarrow x=7+5$$

2.  $3-2x+6=5x-1 \Leftrightarrow 3+6=2x+5x-1 \Leftrightarrow 3+6+1=2x+5x \Leftrightarrow 5x+2x=3+6+1$ . Στή μορφή αὐτή τής εξίσωσης λέμε ότι έχομε χωρίσει γνωστούς από άγνωστους.

γ) Η εξίσωση  $\frac{x}{2}-1=0$  έχει τή λύση 2, γιατί τήν έπαληθεύει.

Πολλαπλασιάζομε και τά δύο μέλη της επί 2 και έχομε  $(\frac{x}{2}-1) \cdot 2 = 0 \cdot 2 \Leftrightarrow \frac{x}{2} \cdot 2 - 1 \cdot 2 = 0 \cdot 2 \Leftrightarrow x-2=0$ .

Η εξίσωση  $x-2=0$  έχει τή λύση 2, άρα είναι ισοδύναμη με τήν άρχική.

Επομένως, αν πολ/σομε και τά δύο μέλη μιās εξίσωσης επί έναν ρητό, διαφορετικό από τó μηδέν, παίρνομε εξίσωση ισοδύναμη.

#### Πρακτικά συμπεράσματα τής ιδιότητας αυτής.

1. πολ/ζομε επί  $(-1)$  και τά δύο μέλη τής εξίσωσης  $2-x=3$ ,  $(2-x)(-1)=3(-1)$  και παίρνομε τήν ισοδύναμη εξίσωση  $-2+x=-3$

Παρατηρούμε ότι μπορούμε νά αλλάξομε τά πρόσημα τών όρων και τών δύο μελών μιās εξίσωσης.

Παραδείγματα:  $-x=7 \Leftrightarrow x=-7$ ,  $-x+3=-\frac{1}{2} \Leftrightarrow x-3=\frac{1}{2}$

2. Πολ/ζομε και τά δύο μέλη τής εξίσωσης  $\frac{x}{2}-\frac{x}{3}=1$  επί τó 6.

(Ε.Κ.Π. τών παρονομαστών),  $6 \cdot (\frac{x}{2}-\frac{x}{3})=6 \cdot 1 \Leftrightarrow 6 \cdot \frac{x}{2}-6 \cdot \frac{x}{3}=6 \Leftrightarrow 3x-2x=6$

Άρα μπορούμε νά απαλειψομε τούς παρονομαστές μιās εξίσωσης, αν πολ/με τά μέλη της επί τó Ε.Κ.Π. τών παρονομαστών.

**Παραδείγματα:**

$$1. \frac{x}{2} - 3 = 1 \Leftrightarrow 2 \cdot \frac{x}{2} - 2 \cdot 3 = 2 \cdot 1 \Leftrightarrow x - 6 = 2$$

$$2. \frac{2x}{3} + \frac{1-x}{4} = \frac{3}{2} \Leftrightarrow 12 \cdot \frac{2x}{3} + \frac{12(1-x)}{4} = 12 \cdot \frac{3}{2} \Leftrightarrow 4 \cdot 2x + 3(1-x) = 6 \cdot 3$$

§ 77. Έργασία για την επίλυση μιᾶς εξισώσεως πρώτου βαθμοῦ με ἓναν ἄγνωστο.

$$\text{Νὰ ἐπιλυθεῖ ἡ ἐξίσωση: } \frac{2x+1}{4} - \frac{x-2}{3} = \frac{1}{2}$$

Γιὰ νὰ ἐπιλύσουμε τὴν ἐξίσωση αὐτή, ἀπαλείφουμε πρῶτα τοὺς παρονομαστές.

Γιὰ τὸ σκοπὸ αὐτὸ βρίσκουμε τὸ Ε.Κ.Π. τῶν παρονομαστῶν 4, 3, 2 τὸ ὁποῖο εἶναι ὁ 12, πολ/με καὶ τὰ δύο μέλη τῆς ἐξισώσεως μὲ τὸν 12 καὶ ἐκτελοῦμε τὶς πράξεις διαιρέσεως (ἀπλοποιήσεις). Αὐτὸ εἶναι πάντοτε δυνατόν, γιατί τὸ Ε.Κ.Π. τῶν παρονομαστῶν εἶναι διαιρετὸ μὲ καθένα ἀπ' αὐτούς.

$$\text{᾽Ωστε: } \frac{2x+1}{4} - \frac{x-2}{3} = \frac{1}{2} \Leftrightarrow 12 \left( \frac{2x+1}{4} - \frac{x-2}{3} \right) = 12 \cdot \frac{1}{2}$$

$$\Leftrightarrow \frac{12 \cdot (2x+1)}{4} - \frac{12(x-2)}{3} = 6 \cdot 1 \Leftrightarrow 3 \cdot (2x+1) - 4 \cdot (x-2) = 6$$

Γιὰ τὴν ἐπίλυση τῆς ἐξισώσεως  $3(2x+1) - 4(x-2) = 6$  (καὶ κάθε ἄλλης τῆς μορφῆς αὐτῆς) ἐργαζόμαστε ὡς ἑξῆς:

᾽Εκτελοῦμε τὶς πράξεις τοῦ πολ/μοῦ:

$$3(2x+1) - 4(x-2) = 6 \Leftrightarrow (6x+3) - (4x-8) = 6$$

᾽Εξαλείφουμε τὶς παρενθέσεις:  $(6x+3) - (4x-8) = 6 \Leftrightarrow 6x+3-4x+8=6$

᾽Εκτελοῦμε τὶς πράξεις προσθέσεως:  $6x+3-4x+8=6 \Leftrightarrow 2x+11=6$  (Ἡ ἐργασία αὐτὴ λέγεται καὶ ἀναγωγή τῶν ὁμοίων ὄρων).

Τώρα γιὰ νὰ ἐπιλύσουμε τὴν  $2x+11=6$ , μεταφέρουμε τὸν 11 στὸ β' μέλος (χωρίζουμε γνωστούς ἀπὸ ἀγνώστους),  $2x+11=6 \Leftrightarrow 2x=6-11$  καὶ ἐκτελοῦμε τὴν τελευταία πράξη τῆς προσθέσεως ἢ ἀναγωγή,

$$2x=6-11 \Leftrightarrow 2x=-5$$

Κατόπι ἐπιλύουμε τὴν  $2x=-5$ , ἂν διαιρέσουμε καὶ τὰ δύο μέλη τῆς μὲ τὸ συντελεστὴ τοῦ ἀγνώστου, δηλαδὴ ἂν πολ/σουμε καὶ τὰ δύο μέλη τῆς ἐπὶ τὸν ἀντίστροφο τοῦ συντελεστῆ τοῦ ἀγνώστου.

$$2x=-5 \Leftrightarrow \frac{2x}{2} = -\frac{5}{2} \Leftrightarrow x = -\frac{5}{2} \cdot \text{Συντομότερα } 2x=-5 \Leftrightarrow$$

$x = -\frac{5}{2}$ . ᾽Ωστε ἡ λύση τῆς ἀρχικῆς ἐξισώσεως  $\frac{2x+1}{4} - \frac{x-2}{3} = \frac{1}{2}$  εἶναι ὁ ἀριθμὸς  $-\frac{5}{2}$

Ἐπαλήθευση:

α' μέλος:

$$\frac{2\left(-\frac{5}{2}\right) + 1}{4} - \frac{-\frac{5}{2} - 2}{3} = \frac{-5 + 1}{4} - \frac{-\frac{5-4}{2}}{3} = \frac{-4}{4} - \frac{-9}{6} = -1 + \frac{9}{6} = -\frac{6}{6} + \frac{9}{6} = \frac{-6+9}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

β' μέλος:  $\frac{1}{2}$

Ἄν συνοψίσουμε τὰ παραπάνω γιὰ τὴν ἐπίλυση μιᾶς πρωτοβάθμιας ἐξισώσεως, ἔχομε τὴν ἑξῆς γενικὴ πορεία ἐπιλύσεως:

1. Ἀπαλείφουμε τοὺς παρνομαστές (ἂν ὑπάρχουν).
2. Ἐκτελοῦμε τὶς πράξεις τοῦ πολ/μοῦ.
3. Ἐξαλείφουμε τὶς παρενθέσεις.
4. Χωρίζουμε γνωστούς ἀπὸ ἀγνώστους.
5. Ἐκτελοῦμε τὶς ἀναγωγές τῶν ὁμοίων ὄρων καὶ στὰ δύο μέλη.
6. Διαιροῦμε μὲ τὸ συντελεστή τοῦ ἀγνώστου, ἂν εἶναι διαφορετικός ἀπὸ τὸ μηδέν.

Μὲ τὴν παραπάνω ἐργασία κάθε ἐξίσωση 1ου βαθμοῦ μὲ ἓναν ἀγνωστο παίρνει τὴ μορφή  $\gamma\chi = \delta$  καὶ ἔχει τὴν λύση  $\chi = \frac{\delta}{\gamma}$  ἂν  $\gamma \neq 0$ .

**Σημείωση.** Εἶναι δυνατὸν ἡ ἐκτέλεση τῶν πράξεων τοῦ πολ/μοῦ καὶ ἡ ἐξάλειψη τῶν παρενθέσεων νὰ γίνουν συγχρόνως. Π.χ.  $2(3\chi+1)-3(\chi+2)=5(\chi+1)-4(\chi-1) \Leftrightarrow 6\chi+2-3\chi-6=5\chi+5-4\chi+4$ .

Ἐπίσης πρὶν χωρίσουμε γνωστούς ἀπὸ ἀγνώστους, μπορούμε νὰ κάνουμε ἀναγωγές καὶ στὰ δύο μέλη τῆς ἐξισώσεως: Π.χ.  $6\chi+2-3\chi-6=5\chi+5-4\chi+4 \Leftrightarrow 3\chi-4=\chi+9$  Στὴ συνέχεια χωρίζουμε γνωστούς ἀπὸ ἀγνώστους...

### § 78. Ἐπίλυση τῆς γενικῆς ἐξισώσεως πρώτου βαθμοῦ.

Ἡ γενικὴ ἐξίσωση πρώτου βαθμοῦ ἔχει τὴ μορφή  $\alpha\chi + \beta = 0$ . Μεταφέρομε τὸ γνωστὸ ὄρο  $\beta$  στὸ δεῦτερο μέλος καὶ ἔχομε  $\alpha\chi = 0 - \beta$  ἢ  $\alpha\chi = -\beta$ .

Διαιροῦμε καὶ τὰ δύο μέλη μὲ τὸ συντελεστή  $\alpha$  τοῦ ἀγνώστου:

$$\frac{\alpha\chi}{\alpha} = -\frac{\beta}{\alpha} \text{ καὶ βρῖσκομε τὴ λύση } \chi = -\frac{\beta}{\alpha}$$

**Σημείωση.** Ὁ  $\alpha$  θεωρεῖται διαφορετικός ἀπὸ τὸ μηδέν. Ἄν  $\alpha=0$  καὶ  $\beta \neq 0$ , ἡ ἐξίσωση εἶναι ἀδύνατη. Π.χ. ἡ  $0\chi=5$  εἶναι ἀδύνατη, γιατί δὲν ὑπάρχει ρητός, ὁ ὁποῖος δταν πολ/ται μὲ τὸ 0 νὰ δίνει γινόμενο τὸν 5. Ἄν  $\alpha=0$  καὶ  $\beta=0$ , ἡ ἐξίσωση εἶναι ἀόριστη ἢ ταυτότητα. Π.χ. ἡ ἐξίσωση  $0\chi=0$  εἶναι ταυτότητα, γιατί ἐπαληθεύεται ἀπὸ κάθε ρητὸ ἀριθμὸ.

### Άσκησης:

159. Νά επιλυθούν και νά επαληθευθούν οι εξισώσεις:

$$\alpha) -12\chi + 60 = 12, \quad \beta) 3\chi - 14 = +8, \quad \gamma) 5(\chi - 2) - 2(3 - \chi) = 3\chi - 4$$

$$\delta) \chi - 1 = 2(3 - 2\chi) - 3(1 - \chi), \quad \epsilon) 2\chi - 5 = \frac{4\chi - 3}{5}, \quad \sigma\tau) \frac{\chi}{2} + \frac{\chi}{3} = 5$$

$$\zeta) \chi - \frac{2\chi - 1}{3} = \frac{3(\chi + 1)}{4}$$

160. Νά επιλύσετε τις εξισώσεις:

$$\alpha) \frac{4 - 5\chi}{12} - \frac{3(\chi - 1)}{2} = 2\chi - 6, \quad \beta) 2\chi + \left( \frac{\chi}{3} - \frac{\chi}{4} \right) = \frac{5\chi}{3} + 30$$

$$\gamma) \frac{3\chi - 5}{2} - \frac{4\chi - 2}{5} = \frac{3(\chi - 2)}{10} + \frac{\chi - 23}{2}, \quad \delta) \frac{2\chi - 1}{3} - \frac{3\chi - 2}{4} = \frac{5\chi - 4}{6} - \frac{7\chi + 6}{12}$$

161. Νά βρεθεί με άναγραφή τὸ σύνολο  $A \cup B$ , ἄν:

$$\alpha) A = \{ \chi / 3(\chi - 1) = 12, \chi \in \mathbb{Q} \} \text{ καὶ } B = \{ \chi / \frac{3\chi - 4}{5} - \frac{3 - 2\chi}{2} = 0, \chi \in \mathbb{Q} \}$$

$$\beta) A = \{ \chi / \frac{\chi}{3} + 2 = 4, \chi \in \mathbb{Q} \} \text{ καὶ } B = \{ \chi / \frac{2\chi + 3}{3} = \frac{\chi - 1}{4}, \chi \in \mathbb{Q} \}$$

$$\gamma) A = \{ \chi / \frac{2\chi}{3} + \frac{\chi}{6} - 5 = \frac{5\chi}{4}, \chi \in \mathbb{Q} \} \text{ καὶ } B = \{ \chi / 6,5 - \frac{5\chi - 1}{6} = \frac{20}{3}, \chi \in \mathbb{Q} \}$$

162. Νά επιλυθούν οι εξισώσεις:

$$\alpha) \chi + 2 = \chi + 1, \quad \beta) \chi + 3 = 2 + \chi + 1, \quad \gamma) \frac{2\chi - 3}{2} = \chi - 5,$$

$$\delta) \chi - \frac{5\chi - 12}{4} = 3 - \frac{\chi}{4}, \quad \epsilon) \frac{3\chi + 7}{15} = \frac{\chi - 1}{5}, \quad \sigma\tau) \frac{5\chi + 6}{6} = 0,5\chi + \frac{\chi + 3}{3}$$

163. Νά βρεθούν τὰ ὑποσύνολα τοῦ  $Q$ :  $A, B, \Gamma, \Delta, E$  καὶ  $Z$ , ἄν:

$$A = \{ \chi / 0\chi = -4 \}, \quad B = \{ \chi / 0\chi = 0 \}, \quad \Gamma = \{ \chi / \chi - 3 = 2 + \chi \},$$

$$\Delta = \{ \chi / 1\chi = \chi \}, \quad E = \{ \chi / \frac{2\chi - 1}{3} - \frac{5\chi - 2}{12} = \frac{\chi + 1}{4} \}, \quad Z = \{ \chi / 2\chi - \frac{5\chi - 12}{4} = 3 + \frac{3\chi}{4} \}$$

164. Για ποιές τιμές τῶν  $\alpha, \beta, \gamma, \delta$  οἱ παρακάτω εξισώσεις εἶναι ἀδύνατες;

$$1) (\alpha + 2)\chi = 1, \quad 2) \beta\chi = 6 + 5\chi, \quad 3) (3\gamma - 1)\chi = 2, \quad 4) \delta\chi + \chi + 1 = 5\chi + 7$$

165. Για ποιές τιμές τῶν  $\alpha$  καὶ  $\beta$  οἱ παρακάτω εξισώσεις εἶναι ἀόριστες;

$$1) (\alpha - 1)\chi = \beta - 2, \quad 2) (3\alpha + 4)\chi = \beta + \frac{1}{2}, \quad 3) \alpha\chi - 1 = \beta - 3\chi,$$

$$4) \alpha\chi - \beta = 8\chi + 3\beta - 1.$$

## 2. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΥΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΣ Αἰ ΒΑΘΜΟΥ ΜΕ ΕΝΑΝ ΑΓΝΩΣΤΟ.

§ 79. Πρόβλημα εἶναι μιὰ πρόταση, ποὺ περιλαμβάνει δεδομένα καὶ ζητούμενα, τὰ ὅποια εἶναι ρητοὶ ἀριθμοὶ ποὺ συνδέονται μεταξύ τους. Ἡ εὕρεση τῶν ζητουμένων λέγεται ἐπίλυση τοῦ προβλήματος.

Ένα πρόβλημα μπορεί να εκφρασθεί από μια εξίσωση, όπως θα δούμε παρακάτω.

Με τις εξισώσεις βρίσκουμε συντομότερα και εύκολότερα τη λύση των προβλημάτων.

Σημείωση. Αν τα δεδομένα του προβλήματος δεν είναι έπαρκη και κατάλληλα, το πρόβλημα δεν έχει λύση. Π.χ. Ένας μαθητής έχει 20 δρχ. και ξοδεύει 3 δρχ. την ημέρα. Ένας άλλος μαθητής έχει 12 δρχ. και ξοδεύει 2 δρχ. την ημέρα. Μετά πόσες ημέρες θα έχουν το ίδιο χρηματικό ποσό;

Δεν υπάρχει λύση. Η λύση 8 ημέρες δεν είναι δεκτή, γιατί μετά την έκτη ημέρα δεν θα έχουν χρήματα.

### Παραδείγματα:

1<sup>ο</sup>. Οι τρεις πρώτες τάξεις ενός Γυμνασίου έχουν 360 μαθητές. Η Α' τάξη έχει διπλάσιους μαθητές από τη Β' τάξη και η Γ' τάξη έχει τριπλάσιους από τη Β' τάξη.

Πόσους μαθητές έχει κάθε τάξη;

Οι λύσεις πρέπει να είναι άκεραίοι και θετικοί αριθμοί.

Ένα από τα ζητούμενα το συμβολίζουμε με  $x$ . Σ' αυτό το πρόβλημα συμβολίζουμε με  $x$  τον αριθμό των μαθητών της Β' τάξης. Για να σχηματίσουμε την εξίσωση, εργαζόμαστε ως εξής:

Η Β' τάξη έχει  $x$  μαθητές. Η πρώτη τάξη, η οποία έχει 2πλάσιους μαθητές από την Β' τάξη, θα έχει  $2x$  μαθητές και η Γ' τάξη  $3x$  μαθητές. Άλλα μαθητές Α' τάξης + μαθητές Β' τάξης + μαθητές Γ' τάξης = 360 μαθ.

$$2x + x + 3x = 360$$

Επίλυση της εξίσωσης:

$$2x + x + 3x = 360 \Leftrightarrow 6x = 360 \Leftrightarrow x = \frac{360}{6} \Leftrightarrow x = 60$$

Απάντηση στο πρόβλημα:

Η Β' τάξη έχει 60 μαθητές

Η Α' τάξη έχει  $2 \cdot 60 = 120$  μαθητές

Η Γ' τάξη έχει  $3 \cdot 60 = 180$  μαθητές


Επαλήθευση:  $60 \text{ μαθ} + 120 \text{ μαθ} + 180 \text{ μαθ} = 360 \text{ μαθ}$ .

2<sup>ο</sup>. Δύο πόλεις Α και Β απέχουν μεταξύ τους 21 km. Δύο αυτοκίνητα ξεκινούν συγχρόνως από τις πόλεις αυτές με σταθερές ταχύτητες 45 km/h και 38 km/h αντίστοιχως και κινούνται ευθύγραμμα κατά τη φορά του διανύσματος  $\vec{AB}$ . Μετά πόσες ώρες θα συναντηθούν και σε πόση απόσταση από την πόλη Α;

Οι λύσεις πρέπει να είναι θετικοί αριθμοί.

Εκλογή του άγνωστου:

Έστω ότι μετά  $x$  ώρες θα συναντηθούν στο Σ.



σχ. 45.

Σχηματισμός τής εξίσωσης:

Ἐποὺ σὲ 1 ὥρα τὸ 1ο αὐτοκίνητο διανύει 45 km, σὲ  $\chi$  ὥρες θὰ διανύσει 45 $\chi$  km. Τὸ 2ο αὐτοκίνητο σὲ  $\chi$  ὥρες θὰ διανύσει 38 $\chi$  km.

Ἄρα θὰ ἔχουμε τὴν εξίσωση:  $A\Sigma = AB + B\Sigma$

$$45\chi = 21 + 38\chi$$

Ἐπίλυση τής εξίσωσης.  $45\chi = 21 + 38\chi \Leftrightarrow 45\chi - 38\chi =$

$$= 21 \Leftrightarrow 7\chi = 21 \Leftrightarrow \chi = \frac{21}{7} \Leftrightarrow \chi = 3$$

(Ἐπαλήθευση τής εξίσωσης:  $45\chi = 21 + 38\chi$

α' μέλος:  $45 \cdot 3 = 135$

β' μέλος:  $21 + 38 \cdot 3 = 21 + 114 = 135$ )

Ἀπάντηση στὸ πρόβλημα:

Θὰ συναντηθοῦν μετὰ 3 ὥρες.

Σὲ ἀπόσταση 3·45 km = 135 km ἀπὸ τὴν πόλη Α.

30. Ὄταν τὸ 3πλάσιο ἑνὸς ἀριθμοῦ αὐξηθεῖ κατὰ  $\frac{11}{2}$ , γίνεται 41,5. Ποιὸς εἶναι ὁ ἀριθμὸς;

Ἡ λύση εἶναι ρητὸς ἀριθμὸς.

Ἐστὼ  $\chi$  ὁ ζητούμενος ἀριθμὸς, ἄρα τὸ 3πλάσιό του θὰ εἶναι 3 $\chi$ . Σύμφωνα μετὰ τὸ πρόβλημα σχηματίζουμε τὴν εξίσωση.

«Τὸ 3πλάσιο ἑνὸς ἀριθμοῦ» «ὅταν αὐξηθεῖ κατὰ  $\frac{11}{2}$ » «γίνεται» 41,5

$$3\chi + \frac{11}{2} = 41,5$$

Ἀπὸ τὴν επίλυση τής εξίσωσης βρίσκουμε τὴ λύση 12, ἡ ὁποία τὴν ἐπαληθεύει καὶ ἐπομένως εἶναι ὁ ζητούμενος ἀριθμὸς τοῦ προβλήματος.

40. Δύο ἀκέραιοι θετικοὶ ἀριθμοὶ ἔχουν ἄθροισμα 188. Ἄν διαιρεθεῖ ὁ μεγαλύτερος διὰ τοῦ μικρότερου, δίνει πηλίκο 3 καὶ ὑπόλοιπο 8. Ποιοὶ εἶναι οἱ ἀριθμοί;

Οἱ λύσεις εἶναι ἀκέραιοι καὶ θετικοὶ ἀριθμοί. Ἄν ὁ μικρότερος εἶναι  $\chi$ , τότε ὁ μεγαλύτερος θὰ εἶναι 188- $\chi$  καὶ σύμφωνα μετὰ τὴν ιδιότητα:

Διαιρετέος = διαιρέτης ἐπὶ πηλίκο + ὑπόλοιπο ἔχομε τὴν εξίσωση:

$$188 - \chi = \chi \cdot 3 + 8.$$

Ἡ λύση τής εξίσωσης αὐτῆς εἶναι 45.

Ἄρα ὁ μικρότερος ἀριθμὸς εἶναι ὁ 45 καὶ ὁ μεγαλύτερος ὁ 188-45 = 143.



Πραγματικά ό 143 αν διαιρεθεί διά 45, δίνει πηλίκο 3 και υπόλοιπο 8.

5<sup>ο</sup> Μια βρύση γεμίζει μια άδεια δεξαμενή σε 4 ώρες και μία άλλη σε 12 ώρες Σε πόσες ώρες θα γεμίσουν τη δεξαμενή, αν τρέχουν και οι δύο συγχρόνως;

Έστω ότι σε  $x$  ώρες θα γεμίσουν τη δεξαμενή, αν τρέχουν συγχρόνως. (Ό  $x$  πρέπει να είναι θετικός).

Έπειδή η πρώτη βρύση γεμίζει τη δεξαμενή σε 4 ώρες, σε μια ώρα θα γεμίσει το  $\frac{1}{4}$  της δεξαμενής, σε 2 ώρες τα  $\frac{2}{4}$ , και σε  $x$  ώρες τα  $\frac{x}{4}$ .

Η δεύτερη βρύση σε  $x$  ώρες θα γεμίσει τα  $\frac{x}{12}$  της δεξαμενής. Άρα έχουμε την εξίσωση:

Μέρος της δεξ. που γεμίζει ή α' βρύση σε  $x$  ώρες + μέρος της δεξ. που γεμίζει ή β' βρύση σε  $x$  ώρες = Όλοκληρη ή δεξαμενή (Μια δεξαμενή)

$$\frac{x}{4} + \frac{x}{12} = 1$$

Η λύση της εξίσωσης είναι 3.

Έπομένως σε 3 ώρες θα γεμίσουν τη δεξαμενή και οι δυο βρύσες.

6<sup>ο</sup> Ένας πατέρας είναι 42 ετών και ο γιός του 10 ετών. Μετά πόσα έτη ή ηλικία του πατέρα θα είναι 3πλάσια από την ηλικία του γιού;

Έστω μετά  $x$  έτη. (Αν ή τιμή του  $x$  βρεθεί άρνητική, τό ζητούμενο έγινε στό παρελθόν).

Τότε ή ηλικία του πατέρα θα είναι  $42 + x$  και του γιού  $10 + x$ . Έπειδή ή ηλικία του πατέρα είναι τριπλάσια από την ηλικία του γιού, έχουμε την εξίσωση:


$42 + x = 3 \cdot (10 + x) \Leftrightarrow 42 + x = 30 + 3x \Leftrightarrow 2x = 12 \Leftrightarrow x = 6$ . Άρα μετά από 6 έτη ή ηλικία του πατέρα θα είναι 3πλάσια από την ηλικία του γιού.

7<sup>ο</sup> Το άθροισμα των ψηφίων ενός διψηφίου αριθμού είναι 10. Αν έναλλάξουμε τη θέση των ψηφίων του, βρίσκουμε αριθμό μεγαλύτερο κατά 18. Ποιός είναι ό αριθμός;

Έστω  $x$  τό ψηφίο των δεκάδων, τότε τό ψηφίο των μονάδων θα είναι  $10 - x$  και ό αριθμός.

$$10 \cdot x + (10 - x) : (\text{π.χ. } 53 = 10 \cdot 5 + 3)$$

$\begin{array}{ccccc} \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \text{δεκάδες} & & \text{μονάδες} & & \text{δεκάδες} & & \text{μονάδες} \end{array}$



σχ. 46.

Περιορισμός: Οί  $\chi$ ,  $10-\chi$  πρέπει να είναι άκεραίοι, μεγαλύτεροι ή ίσοι του 0 και μικρότεροι από το 10.

“Αν εναλλάξουμε τα ψηφία του, βρίσκουμε τον αριθμό

$$10 \cdot \underbrace{(10-\chi)}_{\text{δεκάδες}} + \underbrace{\chi}_{\text{μονάδες}}$$

‘Επειδή ο β’ είναι κατά 18 μεγαλύτερος από τον α’, θα έχουμε την εξίσωση:

$$10\chi + 10 - \chi + 18 = 10(10 - \chi) + \chi$$

‘Η λύση τής εξισώσεως αυτής είναι ο 4.

‘Επομένως έχουμε 4 δεκάδες και  $10-4=6$  μονάδες. “Αρα ο αριθμός είναι ο 46.

8<sup>ο</sup>. ‘Η τιμή του κιλού του κρέατος είναι κατά 9 δρχ. μεγαλύτερη από το τριπλάσιο τής τιμής του κιλού των ζυμαρικών. “Αν 15 κιλά κρέας και 50 κιλά ζυμαρικά αξίζουν 1370 δρχ., ποιά είναι ή τιμή του κιλού του κρέατος και ποιά του κιλού των ζυμαρικών; (οί λύσεις πρέπει να είναι θετικοί αριθμοί).

“Εστω  $\chi$  δρχ. ή τιμή του κιλού των ζυμαρικών. ‘Η τιμή του κιλού του κρέατος θα είναι  $3\chi + 9$  και θα έχουμε την εξίσωση:

$$(3\chi + 9) \cdot 15 + 50\chi = 1370 \Leftrightarrow 45\chi + 135 + 50\chi = 1370 \Leftrightarrow$$

$95\chi = 1370 - 135 \Leftrightarrow 95\chi = 1235 \Leftrightarrow \chi = 13$ . “Ωστε ή τιμή του κιλού των ζυμαρικών είναι 13 δρχ. και ή τιμή του κιλού του κρέατος είναι 48 δρχ.

### Προβλήματα:

166. Μετρήσαμε 360 άτομα: άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Οί άνδρες ήταν 2πλάσιοι από τις γυναίκες και τὰ παιδιά ήταν τὰ  $\frac{3}{5}$  τών γυναικών. Πόσα ήταν τὰ παιδιά;

167. ‘Ο Πέτρος έχει 3πλάσιες δραχμές από όσες έχει ο Παῦλος. Πόσες δραχμές έχει ο καθένας, αν ο Πέτρος έχει 12 δραχμές περισσότερες από τον Παῦλο;

168. “Από δύο πόλεις, που απέχουν μεταξύ τους 108 km, ξεκινούν συγχρόνως δύο ποδηλάτες με ταχύτητες 19 km/h και 17 km/h και κατευθύνονται για συνάντηση. “Υστερ’ από πόσες ώρες θα συναντηθούν και σε ποιά απόσταση από τις πόλεις;

169. “Αν σ’ έναν αριθμό προσθέσουμε τὸ  $\frac{1}{3}$  του, βρίσκουμε τον αριθμό 19 ελαττωμένο κατά τὸ  $\frac{1}{4}$  του ζητούμενου αριθμοῦ. Ποιός είναι ο αριθμός αυτός;

170. Να βρεθούν δύο θετικοί άκεραίοι αριθμοί, που να έχουν διαφορά 401, τὸ πηλίκο του μεγαλύτερου διὰ του μικρότερου να είναι 6 και τὸ ὑπόλοιπο 6.

171. Μιά βρύση γεμίζει μιάν αδεα δεξαμενή σε 3 ώρες, μιὰ ἄλλη σε 6 ώρες και μιὰ τρίτη τὴν αδειάζει σε 4 ώρες. Σε πόσες ώρες θα γεμίσει ή δεξαμενή, αν τρέχουν και οί τρεῖς μαζί;

172. Ένας πατέρας είναι 59 χρονών και ο γιός του 29. Ύστερ' από πόσα χρόνια ή ηλικία του πατέρα θα είναι τὰ  $\frac{5}{3}$  τῆς ηλικίας του γιου;

173. Ἡ διαφορά του ψηφίου τῶν δεκάδων ἀπὸ τὸ ψηφίο τῶν μονάδων ἐνὸς διψήφιου ἀριθμοῦ εἶναι 3. Ἄν σ' αὐτὸν προσθέσουμε τὸ νέο ἀριθμὸ, ποὺ προκύπτει με ἐναλλαγή τῶν ψηφίων του, βρίσκουμε ἀθροισμα 121. Ποιὰ εἶναι τὰ ψηφία τοῦ ἀριθμοῦ;

174. Ἀπὸ ποιὸν ἀριθμὸ πρέπει ν' ἀφαιρέσουμε τὸ 13πλάσιο τοῦ  $\frac{1}{21}$  του, γιὰ νὰ βροῦμε ἕναν ἀριθμὸ κατὰ 4 μικρότερο ἀπὸ τὸ 2πλάσιο τοῦ  $\frac{1}{7}$  του;

175. Καθεμιὰ ἀπὸ τὶς ἴσες πλευρὲς ἐνὸς ἰσοσκελοῦς τριγώνου εἶναι τὰ  $\frac{5}{3}$  τῆς τρίτης πλευρᾶς του. Νὰ βρεθοῦν οἱ πλευρὲς, ἂν ἡ περίμετρος τοῦ τριγώνου εἶναι 31,2 cm.

176. Ἡ γωνία Β ἐνὸς τριγώνου ΑΒΓ εἶναι τὰ  $\frac{3}{5}$  τῆς γωνίας Α καὶ ἡ γωνία Γ εἶναι τὸ  $\frac{1}{3}$  τῆς γωνίας Β. Νὰ βρεθοῦν οἱ γωνίαι τοῦ τριγώνου ΑΒΓ.

177. Ένας υπάλληλος ἔδωσε τὰ  $\frac{2}{5}$  τοῦ μισθοῦ του γιὰ ν' ἀγοράσει ὕφασμα καὶ τὸ  $\frac{1}{3}$  γιὰ ραφτικά. Ἐὰν τοῦ περισσεύσαν 800 δρχ, πόσος εἶναι ὁ μισθός του;

178. Τίνος ἀριθμοῦ τὸ 10πλάσιο εἶναι μεγαλύτερο κατὰ 16 ἀπὸ τὸ 2πλάσιο τοῦ  $\frac{1}{5}$  του;

179. Νὰ διατυπωθοῦν σὲ προβλήματα οἱ ἐπόμενες ἐξισώσεις:

$$\alpha) \frac{x}{2} - \frac{x}{4} = 9, \quad \beta) \frac{x}{2} = 35 - \frac{x}{3}, \quad \gamma) x - \frac{3x}{4} = \frac{4x}{5} + \frac{11}{2}$$

### 3. ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΜΕ ΕΝΑΝ ΑΓΝΩΣΤΟ.

§ 80. Ἡ σχέση  $x+1 > 5$  γιὰ  $x=7$  ἀληθεύει:  $7+1 > 5$ , ἀλλὰ γιὰ  $x=2$  δὲν ἀληθεύει ( $2+1$  δὲν εἶναι μεγαλύτερο τοῦ 5). Ἡ  $x+1 > 5$  λέγεται ἀνίσωση πρώτου βαθμοῦ ὡς πρὸς  $x$ .

Ἀνίσωση ὡς πρὸς  $x$  εἶναι μιὰ ἀνισότητα, ἡ ὁποία περιέχει τὸν ἄγνωστο  $x$ .

Παραδείγματα ἀνισώσεων 1ου βαθμοῦ:

$$x-1 > 3, \quad 2x+6 > 0, \quad 4x+10 < 0, \quad 3x-1 < 8$$

Γενικὰ τὴν ἀνίσωση 1ου βαθμοῦ ὡς πρὸς ἕναν ἄγνωστο  $x$  τὴν παριστάνομε με τὴ σχέση:  $\alpha x + \beta > 0$  ( $\alpha, \beta \in \mathbb{Q}$ )

Λύση ἀνισώσεως λέγεται κάθε τιμὴ τοῦ ἀγνώστου, ἡ ὁποία τὴν ἐπαληθεύει.

Π.χ. τὸ 7 εἶναι λύση τῆς  $x+1 > 5$ .

Ἐπίλυση ἀνισώσεως λέγεται ἡ εὑρεση τῶν λύσεών της.

Δύο ἀνισώσεις λέγονται ἰσοδύναμες, ὅταν ἔχουν τὶς ἴδιες λύσεις ἢ τὸ ἴδιο σύνολο λύσεων.

### Ίδιότητες άνισώσεων

Οι άνισώσεις έχουν τις ιδιότητες που μάθαμε στις εξισώσεις (§ 76). Με βάση τις ιδιότητες αυτές, παίρνουμε όμοστροφη Ισοδύναμη άνίσωση, με την παρατήρηση ότι:

\*Αν πολ/με και τα δύο μέλη μιᾶς άνίσωσης ἐπὶ θετικό ἀριθμό, προκύπτει όμοστροφη Ισοδύναμη άνίσωση, ἐνώ, ἂν πολ/με ἐπὶ ἀρνητικό, προκύπτει ἐτερόστροφη Ισοδύναμη άνίσωση.

Ἐπομένως, ἂν ἀλλάξουμε τὰ πρόσημα τῶν ὄρων και τῶν δύο μελῶν μιᾶς άνίσωσης, πρέπει νὰ ἀλλάξουμε και τὴ φορά της.

Γιὰ τὴν ἐπίλυση μιᾶς άνίσωσης ἀκολουθοῦμε πορεία ἐργασίας παρόμοια μ' ἐκείνη, που μάθαμε στις εξισώσεις.


### Παραδείγματα.

1) Νὰ ἐπιλυθεῖ ἡ άνίσωση  $3x - 2 > 4$

$$3x - 2 > 4 \Leftrightarrow 3x > 4 + 2 \Leftrightarrow 3x > 6 \Leftrightarrow \frac{3x}{3} > \frac{6}{3} \Leftrightarrow x > 2$$

Ἐπομένως ὅλοι οἱ ρητοί, που εἶναι μεγαλύτεροι τοῦ 2, εἶναι λύσεις τῆς άνίσωσης  $3x - 2 > 4$ .

\*Αν χρησιμοποιήσουμε τὸν ἄξονα τῶν ρητῶν ἀριθμῶν, παρατηροῦμε




σχ. 47.

ὅτι στὸ σύνολο τῶν λύσεων ἀνήκουν οἱ ρητοί, οἱ ὁποῖοι εἶναι δεξιὰ τοῦ 2.

2) Νὰ ἐπιλυθεῖ ἡ άνίσωση  $2x + 5 > 7x - 15$

$$2x + 5 > 7x - 15 \Leftrightarrow 2x - 7x > -5 - 15 \Leftrightarrow -5x > -20 \Rightarrow 5x < 20 \Leftrightarrow$$

$$\frac{5x}{5} < \frac{20}{5} \Leftrightarrow x < 4.$$



σχ. 48.

\*Αρα οἱ ρητοί, που εἶναι μικρότεροι τοῦ 4, εἶναι οἱ λύσεις τῆς ἀρχικῆς άνίσωσης  $2x + 5 > 7x - 15$ . Στὸν ἄξονα τῶν ρητῶν οἱ λύσεις εἶναι ἀριστερὰ τοῦ 4.


3) Νὰ ἐπιλυθεῖ ἡ άνίσωση:  $\frac{2x+1}{3} < \frac{x}{2}$

$$\frac{2x+1}{3} < \frac{x}{2} \Leftrightarrow \frac{6 \cdot (2x+1)}{3} < 6 \cdot \frac{x}{2} \Leftrightarrow 2(2x+1) < 3x \Leftrightarrow 4x+2 < 3x \Leftrightarrow$$

$$4x - 3x < -2 \Leftrightarrow x < -2$$


Οἱ ρητοί, που εἶναι ἀριστερὰ τοῦ -2 στὸν ἄξονα τῶν ρητῶν, ἀποτελοῦν τὸ σύνολο τῶν λύσεων τῆς  $x < -2$ , συνεπῶς και τῆς Ισοδύναμῆς

$$\text{της } \frac{2x+1}{3} < \frac{x}{2}.$$



σχ. 49.

\*Έχουμε:  $2\chi + 4 > 0 \Leftrightarrow 2\chi > -4 \Leftrightarrow \chi > -2$   
 $3\chi - 4 < 11 \Leftrightarrow 3\chi < 4 + 11 \Leftrightarrow 3\chi < 15 \Leftrightarrow \chi < 5$



σχ. 50.

Οί κοινές λύσεις τῶν παραπάνω ἀνισώσεων εἶναι οἱ ρητοί, πού εἶναι μεγαλύτεροι τοῦ  $-2$  καὶ μικρότεροι τοῦ  $5$ . Τὸ σύνολο αὐτῶν τῶν ρητῶν περιγράφεται ἀπὸ τὴν:  $-2 < \chi < 5$

**Σημείωση.**

\*Ἄν  $A = \{ \chi / 2\chi + 4 > 0 \}$  καὶ  $B = \{ \chi / 3\chi - 4 < 11 \}$

\*Έχουμε:  $A = \{ \chi / \chi > -2 \}$  καὶ  $B = \{ \chi / \chi < 5 \}$

$A \cap B = \{ \chi / \chi > -2 \} \cap \{ \chi / \chi < 5 \} = \{ \chi / -2 < \chi < 5 \}$

5) \*Ἄν  $\chi \in \mathbb{Z}$  καὶ  $-3 < \chi < 5$  (ὁ  $\chi$  περιέχεται μεταξύ τοῦ  $-3$  καὶ τοῦ  $5$ ), νὰ βρεθῆ με ἀναγραφή τὸ σύνολο  $A = \{ \chi / 2\chi - 1 < 2 + \chi \}$

\*Έχουμε:  $2\chi - 1 < 2 + \chi \Leftrightarrow 2\chi - \chi < 2 + 1 \Leftrightarrow \chi < 3$ . \*Ἄρα ὁ  $\chi$  εἶναι:  
 $-2, 0, 1, 2$  καὶ  $A = \{-2, 0, 1, 2\}$ .

6) Νὰ γίνῃ πιὸ ἀπλή ἢ περιγραφή τοῦ συνόλου:

$$A = \{ \chi / 4\chi - 5 < 3 + 3\chi \wedge 5\chi - 5 > 4\chi - 2 \}$$

Εἶναι:  $4\chi - 5 < 3 + 3\chi \Leftrightarrow 4\chi - 3\chi < 3 + 5 \Leftrightarrow \chi < 8$

$$5\chi - 5 > 4\chi - 2 \Leftrightarrow 5\chi - 4\chi > 5 - 2 \Leftrightarrow \chi > 3 \Leftrightarrow 3 < \chi$$

\*Ἄρα  $A = \{ \chi / 3 < \chi < 8 \}$

### Ἀσκήσεις:

180. Νὰ ἐπιλυθοῦν οἱ ἀνισώσεις:

α)  $2\chi + 8 < 0$ , δ)  $3\chi < \chi + 1$ , στ)  $-2\chi + 1 < \chi$ , ζ)  $\chi + 1 > \frac{\chi}{2}$

β)  $-3\chi > \frac{6}{5}$ , ε)  $\frac{3\chi}{-2} + 5 > \chi$ , η)  $7\chi - 3 < 3(\chi - 2) + 2(3 - \chi)$ ,

γ)  $\frac{3\chi + 1}{2} - \frac{\chi - 1}{3} > 0$ , θ)  $\frac{2\chi + 1}{3} + \frac{1 - \chi}{2} > 3$ , ι)  $\frac{3\chi + 1}{4} - \frac{4 - \chi}{3} > 1$

181. Νά επιλυθούν οι άνισώσεις:

$$\alpha) 2-x > 2, \quad \epsilon) -x + \frac{1}{2} < -\frac{3}{2}, \quad \theta) x - \frac{5}{4} < 2x - \frac{1}{4}$$

$$\beta) 5(x-3) > 3(x-1), \quad \sigma\tau) 18-5(x+1) < 3(x-1)-2$$

$$\gamma) 2(4-x)-3(x-7) < 16x+1, \quad \zeta) -13(x-2) > 1-6(x-3)$$

$$\delta) 6 - \frac{x-1}{2} > \frac{x-2}{3} - \frac{x-3}{4}, \quad \eta) \frac{2x-1}{3} - \frac{5x-4}{6} < \frac{3x-2}{4} + \frac{7x+6}{12}$$

182. \*Αν  $A = \{ x / \frac{x}{3} + 2 > x - \frac{2x-4}{3} \}$  και  $B = \{ x / \frac{2}{3}x - \frac{1}{3} > \frac{3}{4}x + \frac{3}{4} \}$ ,

νά παραστήσετε γραφικώς τὸ σύνολο  $A \cap B$  στὴν εὐθεία τῶν ρητῶν.

183. \*Αν  $A = \{ x / x-5 > 5x-1 \}$  και  $B = \{ x / \frac{3}{2}x+1 > x-2 \}$ , νά βρεῖτε μέ

ἀναγραφή τὸ σύνολο  $A \cap B = \{ x / x \in Z \}$

184. Νά παραστήσετε γραφικώς τὰ σύνολα (στὴν εὐθεία τῶν ρητῶν).

$$\alpha) A = \{ x / 8-x < x+2 \wedge 8-x > x-1 \}$$

$$\beta) B = \{ x / 4x-5 < 3+3x \wedge 5x-5 > 4x-2 \}$$

$$\gamma) \Gamma = \{ x / \frac{1}{2}x+5 > -3x-2 \wedge \frac{1}{2}x-1 < x-2 \}$$

$$\delta) \Delta = \{ x / -\frac{2}{3}x-4 > 0 \wedge -\frac{1}{2}x+2 > 0 \}$$

185. Νά επιλυθούν οι άνισώσεις:

$$\alpha) x-2 > x, \quad \gamma) x+3 < x, \quad \epsilon) \frac{1}{2}-x < \frac{1}{4}-x$$

$$\beta) x+1 > x, \quad \delta) x-1 < x, \quad \sigma\tau) x+6 > x+4$$

## Β' ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ — ΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΗΣ $\alpha x + \beta \geq 0$

### 1. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΗΤΗΣ ΚΑΙ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΣ

#### α) \*Η έννοια τής μεταβλητής.

§ 81. Ποιές τιμές μπορεί νά πάρει ή ήλικία ενός παιδιοῦ;

\*Η ήλικία ενός παιδιοῦ μπορεί νά λάβει τῖς τιμές:  $\frac{1}{2}$  ἔτους, 1 ἔτος, 1,5 ἔτη, καθὼς και ὅλες τῖς τιμές πού βρίσκονται μεταξύ τους. Γενικά μπορεί νά πάρει ὅλες τῖς τιμές μεταξύ 0 και 12 ἔτη.

\*Αν συμβολίσουμε μέ  $x$  τὴν ήλικία τοῦ παιδιοῦ, ἔχουμε τὸν πίνακα:

$x$	...	$\frac{1}{2}$	1	1,5	...
-----	-----	---------------	---	-----	-----

Οι τιμές του  $\chi$  είναι στοιχεία του συνόλου

$$A = \{0, \dots, \frac{1}{2}, \dots, 1, \dots, 12\} \text{ ή } A = \{\chi/0 \leq \chi \leq 12\}$$

Το γράμμα  $\chi$  λέγεται μεταβλητή.

"Ωστε μεταβλητή είναι κάθε γράμμα, το οποίο παίρνει τιμές από ένα σύνολο αριθμών.


Σημείωση. 'Η παιδική ηλικία θεωρείται ότι διαρκεί μέχρι το 12ο έτος.

### β) 'Η έννοια της συναρτήσεως.

§ 82. Όταν γεννήθηκε ένα παιδί, είχε ύψος 50 cm, όταν έγινε 6 μηνών, είχε ύψος 64 cm, σε ηλικία ενός έτους είχε ύψος 71 cm κ.ο.κ., όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, στον οποίο παριστάνομε με  $\chi$  έτη την ηλικία και με  $\psi$  cm το ύψος του παιδιού (Στις τιμές της ηλικίας, που βρίσκονται μεταξύ των  $0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}$ , αντιστοιχοῦν τιμές του ύψους που βρίσκονται μεταξύ των 50, 64, 71, 74 αντιστοίχως).

'Ηλικία: $\chi$ έτη	0	...	$\frac{1}{2}$	...	1	...	$\frac{3}{2}$	...
"Υψος : $\psi$ cm	50	...	64	...	71	...	74	...

Παρατηρούμε ότι σε κάθε τιμή της ηλικίας του παιδιού αντιστοιχεί μία μόνο τιμή του ύψους του. Δηλαδή σε κάθε στοιχείο του συνόλου  $A = \{0, \dots, \frac{1}{2}, \dots, 1, \dots, \frac{3}{2}, \dots\}$  αντιστοιχεί ένα μόνο στοιχείο του συνόλου  $B = \{50, \dots, 64, \dots, 71, \dots, 74, \dots\}$ . 'Επομένως μεταξύ του συνόλου  $A$  των τιμών της ηλικίας και του συνόλου  $B$  των τιμών του ύψους υπάρχει μία μονοσήμαντη αντιστοιχία, της οποίας το διάγραμμα βλέπετε στο σχ. (51)



σχ. 51.

Τὸ σύνολο  $A$ , ἀπὸ τὸ ὁποῖο παίρνει τιμές ἡ μεταβλητὴ  $\chi$ , λέγεται **πεδίο ὀρισμοῦ** καὶ τὸ σύνολο  $B$  **πεδίο τιμῶν**.

Ἄν σὲ κάθε στοιχεῖο ἑνὸς συνόλου ἀντιστοιχεῖ ἓνα καὶ μόνο ἓνα στοιχεῖο ἑνὸς ἄλλου συνόλου, τότε ἔχουμε μεταξύ τῶν συνόλων αὐτῶν μία μονοσήμαντη ἀντιστοιχία.

Ἡ ἀντιστοιχία αὐτὴ ὀρίζει μία συνάρτηση.

**γ) Ἡ συνάρτηση σὰν σύνολο διατεταγμένων ζευγῶν.**


**§ 83.** Ἄν σχηματίσουμε τὰ διατεταγμένα ζεύγη:

$(0, 50)$ ,  $(\frac{1}{2}, 60)$ ,  $(1, 71)$ ,  $(\frac{3}{2}, 74)$ , ... τὰ ὁποῖα ἔχουν ὡς πρῶτο μέλος μία τιμὴ τοῦ  $\chi$  καὶ ὡς δεύτερο μέλος τὴν ἀντίστοιχη τιμὴ τοῦ  $\psi$ , παίρνουμε ἓνα σύνολο διατεταγμένων ζευγῶν τὸ

$$F = \{(0, 50), (\frac{1}{2}, 64), (1, 71), (\frac{3}{2}, 74), \dots\}$$

Τὸ σύνολο αὐτὸ παριστάνει τὴν προηγούμενη συνάρτηση.

Ἐπειδὴ ἡ ἀντιστοιχία μεταξύ τῶν συνόλων  $A$  καὶ  $B$  εἶναι μονοσήμαντη, δὲν ὑπάρχουν στὸ σύνολο  $F$  ζεύγη μὲ τὸ ἴδιο πρῶτο μέλος.



σχ. 52.

**δ) Γραφικὴ παράσταση τῆς συναρτήσεως  $F$ .**

**§ 84.** Παίρνουμε δύο ἄξονες, οἱ ὁποῖοι τέμνονται καθέτως.

Θεωροῦμε τὸ σημεῖο τομῆς τους ὡς ἀρχὴ καὶ τοποθετοῦμε πάνω σ' αὐτοὺς τοὺς ρητούς ἀριθμούς ὅπως μάθαμε.

Τὸν  $\chi'$  ὡς τὸν ὀνομάζουμε ἄξονα τῶν  $\chi$  (ἢ ἄξονα τῶν τετμημένων) καὶ τὸν ἄξονα  $\psi'$  ὡς ἄξονα τῶν  $\psi$  ἢ ἄξονα τῶν τεταγμένων. Τὸ ζεύγος τῶν ἄξόνων αὐτῶν τὸ λέμε ὀρθογώνιο σύστημα συντεταγμένων. Ὁ ἀριθμὸς, ποὺ ἀντιστοιχεῖ σ' ἓνα σημεῖο τοῦ ἄξονα τῶν  $\psi$ , λέγεται τεταγμένη τοῦ σημείου αὐτοῦ.

Γιὰ τὴν τετμημένη ἑνὸς σημείου τοῦ ἄξονα τῶν  $\chi$  μάθαμε στὴν § 66.



Στό σημείο, που έχει τετμημένη  $\frac{1}{2}$ , ύψώνομε κάθετο στὸν ἄξονα τῶν  $\chi$  καὶ στό σημείο που ἔχει τεταγμένη 64, φέρνουμε κάθετο στὸν ἄξονα τῶν  $\psi$ . Οἱ κάθετες αὐτὲς τέμνονται στό σημείο N. Λέμε ὅτι τὸ N εἶναι ἡ **γραφικὴ παράσταση** τοῦ ζεύγους  $(\frac{1}{2}, 64)$  ἢ ἡ **γραφικὴ εἰκόνα** του. Τοὺς ἀριθμοὺς  $\frac{1}{2}$  καὶ 64 τοὺς ὀνομάζομε ἀντιστοίχως **τετμημένη** καὶ **τεταγμένη** τοῦ σημείου N ἢ **συντεταγμένες** του.

Μὲ τὸν ἴδιο τρόπο κατασκευάζομε τὶς γραφικὲς παραστάσεις τῶν ζευγῶν τοῦ συνόλου F, δηλαδὴ τῆς συναρτήσεως.

Ἡ γραφικὴ παράσταση τοῦ ζεύγους  $(0, 50)$  εἶναι τὸ σημείο M τοῦ ἄξονα τῶν  $\psi$ , γιατί ἡ τετμημένη τοῦ σημείου αὐτοῦ εἶναι 0 καὶ ἡ τεταγμένη 50.

Τὸ σύνολο τῶν M, ..., N, ..., Ξ, ..., O, ... τὸ λέμε **γραφικὴ εἰκόνα τῆς συναρτήσεως F**.

**Σημείωση:** Ἄν πάρουμε τὶς γραφικὲς παραστάσεις πολλῶν ζευγῶν, ἡ γραφικὴ παράσταση τῆς συναρτήσεως θὰ εἶναι μία γραμμὴ.

### Ἀσκήσεις:

186. Ἄν παραστήσουμε μὲ  $\chi$  τὴν ἡλικία ἑνὸς παιδιοῦ σὲ ἔτη καὶ μὲ  $\psi$  τὸ βάρος του σὲ kg\*, ἔχουμε τὸν πίνακα:

$\chi$	...	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{3}{2}$	2	...
$\psi$	...	7	9,2	10,4	11,5	...

Νὰ παραστήσετε τὴ συνάρτηση μεταξύ ἡλικίας καὶ βάρους σὰν σύνολο διατεταγμένων ζευγῶν καὶ νὰ κατασκευάσετε τὴ γραφικὴ παράστασή της. (Χρησιμοποιήστε τετραγωνισμένο ἢ χιλιοστομετρικὸ χαρτί).

187. Τὸ σύνολο  $F = \{(1, 0), (2, 1), (3, 2), (4, 3)\}$  εἶναι συνάρτηση; Ποιοὶ εἶναι τὸ πεδίου ὀρισμοῦ καὶ τὸ πεδίο τιμῶν της;

188. Ἄν  $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ , νὰ ὀρίσετε τὸ σύνολο  $F = \{(\chi, \psi) / \chi \in A \text{ καὶ } \psi \text{ εἶναι διπλάσιο τοῦ } \chi\}$  καὶ νὰ τὸ παραστήσετε γραφικῶς.

189. Ἄν  $A = \{4, 5, 6\}$ , νὰ ὀρίσετε τὸ σύνολο:

$\Sigma = \{(\chi, \psi) / \chi \in A \text{ καὶ } \psi \text{ εἶναι διαιρέτης τοῦ } \chi\}$  καὶ νὰ τὸ παραστήσετε γραφικῶς. Εἶναι συνάρτηση τὸ σύνολο  $\Sigma$ ;

190. Ἄν παραστήσουμε μὲ  $\chi$  τὴν ὥρα καὶ μὲ  $\psi$  τὴ θερμοκρασία, που δείχνει τὴν ὥρα αὐτὴ τὸ θερμοῦμετρο τοῦ σπιτιοῦ σας, κατασκευάστε πίνακα τῶν ἀντίστοιχων τιμῶν καὶ τὴ γραφικὴ παράσταση τῆς συναρτήσεως αὐτῆς.

191. Μετρήστε τὴ σκιά, που ρίχνει ἕνας στύλος ἢ ἕνα δένδρο κατὰ τὶς ἀκέραιες ὥρες, καὶ κατασκευάστε τὴ γραφικὴ παράσταση τοῦ μήκους τῆς σκιάς συναρτήσθαι τῆς ὥρας.

2. Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ  $\psi = \alpha x$  ΚΑΙ Η ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ

§ 85. Πρόβλημα. "Ένα αεροπλάνο έχει σταθερή ταχύτητα 500 km/h. Πόση απόσταση θα διανύσει σε  $\chi$  ώρες, αν κινείται εθόγγραμμα;

$$\text{Σε 1 ώρα διανύει } 1.500 \text{ km} = 500 \text{ km}$$

$$\text{Σε 2 ώρες διανύει } 2.500 \text{ km} = 1000 \text{ km}$$

$$\text{Σε 3 ώρες διανύει } 3.500 \text{ km} = 1500 \text{ km}$$

$$\text{Σε } \chi \text{ ώρες διανύει } \chi \cdot 500 \text{ km} = \psi \text{ km}$$

Μπορούμε να πούμε ότι:

$$\text{Σε 0 ώρες διανύει } 0 \cdot 500 \text{ km} = 0 \text{ km}$$

Παρατηρούμε ότι σε κάθε τιμή του χρόνου  $\chi$  αντιστοιχεί μία μόνο τιμή της απόστασης.

Δηλαδή η απόσταση, την όποια διανύει το αεροπλάνο, είναι συνάρτηση του χρόνου  $\chi$ .

Η συνάρτηση αυτή ορίζεται από τη σχέση  $\psi = 500 \chi$ .

Η μεταβλητή  $\chi$  παίρνει τιμές από το σύνολο  $Q_0^+$  και οι αντίστοιχες τιμές της  $\psi$  ανήκουν επίσης στο  $Q_0^+$ , όπως φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα.

(Δηλαδή το πεδίο ορισμού και το πεδίο τιμών της συναρτήσεως είναι υποσύνολα του  $Q_0^+$  )

Χρόνος σε ώρες $\chi$	0	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{3}{2}$	2	3	4	...	$\chi$
Απόσταση σε km $\psi$	0	250	500	750	1000	1500	2000	...	$\psi = 500\chi$

Η συνάρτηση σαν σύνολο διατεταγμένων ζευγών παριστάνεται ως εξής:

$$F = \{(0, 0), (\frac{1}{2}, 250), (1, 500), (\frac{3}{2}, 750), \dots, (2, 1000), \dots\}$$

ή με περιγραφή:  $F = \{(\chi, \psi) / \chi \in Q_0^+ \text{ και } \psi = 500\chi\}$

Επειδή η σχέση  $\psi = 500\chi$  ορίζει τη συνάρτηση  $F$ , λέμε πολλές φορές **η συνάρτηση  $\psi = 500\chi$ .**


Γραφική παράσταση της συναρτήσεως.

Κατασκευάζουμε τις γραφικές εικόνες των διατεταγμένων ζευγών της  $F$  και παρατηρούμε ότι τα σημεία αυτά βρίσκονται πάνω σε μια ήμιευθεία ρητών αριθμών, την  $OZ$  (σχ. 53)

β) Τί παριστάνει η  
σχέση  $\psi = -\frac{1}{2}\chi$ ; ( $\chi \in Q$ )


Ἡ σχέση  $\psi = -\frac{1}{2}\chi$

εἶναι συνάρτηση (μὲ πεδίο ὀρισμοῦ τὸ  $Q$  καὶ πεδίο τιμῶν ἐπίσης τὸ  $Q$ ), γιατί, ὅπως φαίνεται ἀπὸ τὸν παρακάτω πίνακα, σὲ κάθε τιμὴ τοῦ  $\chi$  θετική, ἀρνητική ἢ μηδέν ἀντιστοιχεῖ μία μόνο ρητὴ τιμὴ τοῦ  $\psi$  (μονότιμο τοῦ πολ/σμοῦ).



σχ. 53.

$\chi$	...	-10	-4	-1	0	1	2	3	4	10	...
$\psi = -\frac{1}{2}\chi$	...	5	2	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	-1	$-\frac{3}{2}$	-2	-5	...



σχ. 54.

**Παρατήρηση:** Τὸ πηλίκο τῶν ἀντίστοιχων τιμῶν εἶναι σταθερὸ, δηλαδή ἴσο μὲ  $-2$ , ἐκτὸς τῶν ἀντίστοιχων τιμῶν  $0,0$ .

Κατασκευάζομε τὴ γραφικὴ παράσταση τῆς συνάρτησεως  $\psi = -\frac{1}{2}\chi$  σ' ἕνα σύστημα ὀρθογώνιων ἀξόνων καὶ παρατηροῦμε ὅτι αὐτὴ εἶναι μιὰ εὐθεῖα  $\epsilon$  ρητῶν πραγματ. ἀριθμῶν, ποὺ περνᾷ ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῶν ἀξόνων (σχ. 54)

Ἡ συνάρτηση σὰν σύνολο διατεταγμένων ζευγῶν εἶναι:

$$F = \{ \dots (-10, 5), (-4, 2), \dots (0, 0), \dots (2, -1), \dots \}$$

$$\text{Μὲ περιγραφή: } F = \{(\chi, \psi) / \chi \in \mathbb{Q} \text{ καὶ } \psi = -\frac{1}{2}\chi\}$$

**Σημείωση:** Ὄταν λέμε εὐθεία ρητῶν ἀριθμῶν, ἐννοοῦμε τὸ σύνολο τῶν σημείων μιᾶς εὐθείας, στὰ ὁποῖα τοποθετοῦνται οἱ ρητοὶ ἀριθμοί.

γ) Γενικά ἢ  $\psi = \alpha\chi$ , ( $\alpha, \chi \in \mathbb{Q}$ ) ὀρίζει μιὰ συνάρτηση, τῆς ὁποίας ἡ γραφικὴ παράσταση εἶναι τὸ σύνολο τῶν ρητῶν σημείων μιᾶς εὐθείας, ποὺ περνᾷ ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῶν ἀξόνων. (Ρητὰ σημεία μιᾶς εὐθείας εἶναι οἱ εἰκόνες τῶν ρητῶν ἀριθμῶν).

**Σημείωση.** Γιὰ νὰ κατασκευάσουμε τὴν εὐθεία, στὴν ὁποία βρίσκονται οἱ εἰκόνες τῶν διατεταγμένων ζευγῶν τῆς συναρτήσεως  $\psi = \alpha\chi$ , ἀρκεῖ νὰ βροῦμε τὶς γραφικὲς παραστάσεις μόνο δύο ζευγῶν, γιὰτὶ δύο σημεία ὀρίζουν μιὰ μόνον εὐθεία.

### Ἀσκήσεις:

192. Νὰ σχηματίσετε πίνακα ἀντίστοιχων τιμῶν καὶ νὰ κατασκευάσετε τὴ γραφικὴ παράσταση τῶν παρακάτω συναρτήσεων:

$$\alpha) F_1 = \{(\chi, \psi) / \chi \in \mathbb{Z}^+ \text{ καὶ } \psi = 2\chi\}$$

$$\beta) F_2 = \{(\chi, \psi) / \chi \in \mathbb{Q}^+ \text{ καὶ } \psi = 4\chi\}$$

$$\gamma) F_3 = \{(\chi, \psi) / \chi \in \mathbb{Q} \text{ καὶ } \psi = \chi\}$$

193. Κάνετε τὸ ἴδιο καὶ γιὰ τὶς συναρτήσεις:

$$\alpha) F_1 = \{(\chi, \psi) / \chi \in \mathbb{Z} \text{ καὶ } \psi = -3\chi\}$$

$$\beta) F_2 = \{(\chi, \psi) / \chi \in \mathbb{Q} \text{ καὶ } \psi = -2\chi\}$$

$$\gamma) F_3 = \{(\chi, \psi) / \chi \in \mathbb{Q} \text{ καὶ } \psi = -\chi\}$$

194. Νὰ κατασκευάσετε τὴ γραφικὴ παράσταση τῶν συναρτήσεων:

$$\alpha) \{(\chi, \psi) / \psi = 2\chi \wedge 1 \leq \chi \leq 5\},$$

$$\beta) \{(\chi, \psi) / \psi = \frac{3}{2}\chi, \chi \in \mathbb{Z} \text{ καὶ } -2 \leq \chi < 3\}.$$

195. Νὰ ὀρίσετε μὲ ἀναγραφή τὸ σύνολο.


$$\Sigma = \{(\chi, \psi) / |\psi| = 2\chi, \chi \in \mathbb{Z} \text{ καὶ } 2 \leq \chi \leq 5\}.$$

Εἶναι αὐτὸ τὸ σύνολο συνάρτησης; Νὰ τὸ παραστήσετε γραφικῶς.

### 3. Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ $\psi = \alpha\chi + \beta$ ΚΑΙ Η ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ.

**§ 86. α) Πρόβλημα.** "Ἐνα πλοῖο ἀναχώρησε ἀπὸ ἕνα λιμάνι καὶ ἀπὸ τὴ στιγμή ποὺ παρέπλενε ἕνα φάρο, ὁ ὁποῖος ἀπέχει ἀπὸ τὸ λιμάνι 40 μίλια, ἀπόκτησε σταθερὴ ταχύτητα 20 μίλια τὴν ὥρα. Πόσα μίλια θὰ ἀπέχει τὸ πλοῖο ἀπὸ τὸ λιμάνι μετὰ  $\chi$  ὥρες, ἀπὸ τὴ στιγμή ποὺ παρέπλενε τὸ φάρο; (τὸ πλοῖο κινεῖται εὐθύγραμμα κατὰ τὴ διεύθυνση καὶ φορὰ Λιμάνι-Φάρος).

Τὴν 0 ὥρα τὸ πλοῖο βρίσκεται μπροστά στὸ φάρο. Ἐπομένως:



Σχ. 55.

Σὲ 0 ὥρες ἔχει διανύσει  $40 + 0 \cdot 20$  μίλια = 40 μίλια

Σὲ 1 ὥρα ἔχει διανύσει  $40 + 1 \cdot 20$  μίλια = 60 μίλια

Σὲ 2 ὥρες ἔχει διανύσει  $40 + 2 \cdot 20$  μίλια = 80 μίλια

Σὲ 3 ὥρες ἔχει διανύσει  $40 + 3 \cdot 20$  μίλια = 100 μίλια

· · · · · : · · · · ·  
· · · · · : · · · · ·

Σὲ  $\chi$  ὥρες ἔχει διανύσει  $40 + \chi \cdot 20$  μίλια =  $\psi$  μίλια =  $20 \cdot \chi + 40$  μίλια.

Παρατηροῦμε ὅτι σὲ κάθε τιμὴ τοῦ  $\chi$  ἀντιστοιχεῖ μιὰ τιμὴ τοῦ  $\psi$  (μονότιμο πολ/μοῦ καὶ προσθέσεως).

Παρατηρήστε το καὶ στὸν παρακάτω πίνακα.

Χρόνος $\chi$ h	0	1	2	3	·	·	·	$\chi$
Ἀπόσταση $\psi$ mil	40	60	80	100	·	·	·	$\psi = 20\chi + 40$

Συνεπῶς ἡ σχέση  $\psi = 20\chi + 40$  ὀρίζει τὴ συνάρτηση

$$F = \{ (0, 40), (1, 60), (2, 80), (3, 100), \dots \}$$

Μὲ περιγραφή:


$F = \{ (\chi, \psi) / \psi = 20\chi + 40 \wedge \chi \in Q_0^+ \}$  μὲ πεδίο ὀρισμοῦ τὸ  $Q_0^+$  καὶ πεδίο τιμῶν τὸ σύνολο τῶν ρητῶν, ποὺ εἶναι μεγαλύτεροι ἢ ἴσοι μὲ τὸν 40.

Ἐπειδὴ ἡ σχέση  $\psi = 20\chi + 40$  ὀρίζει τὴ συνάρτηση  $F$ , λέμε:

Ἡ συνάρτηση  $\psi = 20\chi + 40$

**Γραφικὴ πειράσταση τῆς  $\psi = 20\chi + 40$ .**

Βρίσκουμε κατὰ τὰ γνωστὰ τὶς γραφικὲς παραστάσεις τῶν ζευγῶν τῆς συναρτήσεως καὶ παρατηροῦμε ὅτι ἡ  $\psi = 20\chi + 40$  παριστάνεται γρα-



σχ. 56.

φικῶς ἀπὸ τὴν ἡμιευθεία AT τῶν ρητῶν ἀριθμῶν.

β) Νὰ ἐξετάσετε, ἂν ἡ σχέση  $\psi = 2\chi + 1$ , ( $\chi \in \mathbb{Q}$ ) εἶναι συνάρτηση καὶ νὰ βρεῖτε τὴ γραφικὴ παράστασή της.

Δίνουμε διάφορες τιμές στοῦ  $\chi$  καὶ βρίσκουμε τὶς ἀντίστοιχες τιμές τοῦ  $\psi$ , ὅπως φαίνεται στὸν παρακάτω πίνακα:

$\chi$	...	-3	-2	$-\frac{3}{2}$	-1	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	1	2	3	4	...
$\psi = 2\chi + 1$	...	-5	-3	-2	-1	0	1	2	3	5	7	9	...

Παρατηροῦμε ὅτι σὲ κάθε τιμὴ τοῦ  $\chi$  ἀντιστοιχεῖ μία καὶ μόνο μία τιμὴ τοῦ  $\psi$ . Ἄρα ἡ  $\psi = 2\chi + 1$  εἶναι συνάρτηση μὲ πεδίο ὀρίσμου καὶ πεδίο τιμῶν τὸ  $\mathbb{Q}$ .

Αὐτὴ σὰν σύνολο διατεταγμένων ζευγῶν εἶναι:


$$F = \left\{ (-3, -5), \dots, \left(-\frac{1}{2}, 0\right), (0, 1), \left(\frac{1}{2}, 2\right), (1, 3), \dots \right\}$$

Μὲ περιγραφή:

$$F = \left\{ (\chi, \psi) / \psi = 2\chi + 1 \wedge \chi \in \mathbb{Q} \right\}$$

Γραφικὴ παράσταση τῆς  $\psi = 2\chi + 1$ .

Κατασκευάζουμε τὶς γραφικὲς παραστάσεις (εἰκόνες) τῶν ζευγῶν καὶ παρατηροῦμε ὅτι αὐτὲς



σχ. 57.

βρίσκονται σε μία ευθεία  $\epsilon$ , που δέν περνᾶ ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῶν ἀξόνων.

γ) Γενικὰ ἡ  $\psi = \alpha\chi + \beta$ , ὅπου  $\alpha, \beta$  εἶναι σταθεροὶ ρητοὶ καὶ  $\chi$  μεταβλητὴ, που παίρνει τιμὲς ἀπὸ τὸ  $Q$ , εἶναι συνάρτηση μὲ πεδίο ὀρισμοῦ καὶ πεδίο τιμῶν τὸ  $Q$ .

Γραφικῶς παριστάνεται ἀπὸ τὰ ρητὰ σημεῖα μιᾶς ευθείας, που δέν περνᾶ ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῶν ἀξόνων.

### Ἀσκήσεις:

196. Νὰ γίνῃ γραφικὴ παράσταση τῆς συναρτήσεως:

$$\psi = -\frac{1}{2}\chi - 1, \quad \text{ἂν } \chi \in A = \{-4, -2, 0, 2, 4, 6\}.$$

197. Σὲ τετραγωνισμένο χαρτὶ νὰ σχεδιάσετε δύο ὀρθογώνιους ἀξονες καὶ νὰ βρεῖτε τὴ γραφικὴ παράσταση τῆς συναρτήσεως  $F = \{(\chi, \psi) / \psi = -\frac{1}{2}\chi + 1 \wedge \chi \in Q\}$ . Ἐπίσης νὰ βρεῖτε τὰ ζεύγη τῆς  $F$ , τὰ ὁποῖα ἔχουν τὶς εἰκόνες των πάνω στοὺς ἀξονες.

198. Κάνετε τὰ ἴδια καὶ γιὰ τὶς συναρτήσεις:

$$F_1 = \{(\chi, \psi) / \psi = 0\chi + 2 \wedge \chi \in Q\} \text{ καὶ } F_2 = \{(\chi, \psi) / \psi = 0\chi + 0 \wedge \chi \in Q\}.$$

199. Νὰ κατασκευάσετε τὴν ευθεία, ἀπὸ τὴν ὁποία παριστάνεται γραφικῶς ἡ συνάρτηση  $\psi = 2\chi - 1 (\chi \in Q)$  σὲ τετραγωνισμένο χαρτὶ, καὶ νὰ σημειώσετε τὸ σημεῖο, στὸ ὁποῖο ἡ πιὸ πάνω ευθεία τέμνει τὸν ἀξονα τῶν  $\chi$ . Ποιὰ εἶναι ἡ τετμημένη τοῦ σημείου αὐτοῦ; Νὰ θέσετε τὴν τετμημένη αὐτὴ στὴν ἐξίσωση  $2\chi - 1 = 0$ . Τί παρατηρεῖτε;

200. Στὸ ἴδιο σύστημα ὀρθογώνιων ἀξόνων νὰ κατασκευάσετε τὶς γραφικὲς παραστάσεις τῶν συναρτήσεων:

$$F_1 = \{(\chi, \psi) / \psi = \chi + 1 \wedge \chi \in Q\}, F_2 = \{(\chi, \psi) / \psi = 2\chi - 4 \wedge \chi \in Q\}.$$

201. Ἐπίσης τῶν συναρτήσεων:

$$F_3 = \{(\chi, \psi) / \psi = -2\chi + 2 \wedge \chi \in Q\}, F_4 = \{(\chi, \psi) / \psi = -2\chi + 3 \wedge \chi \in Q\}.$$

202. Τὸ ἴδιο γιὰ τὶς συναρτήσεις:

$$F_3 = \{(\chi, \psi) / \psi = -2\chi + 2 \wedge \chi \in Q\}, F_5 = \{(\chi, \psi) / \psi = \frac{4-4\chi}{2} \wedge \chi \in Q\}.$$

### 4. ΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΗΣ $\alpha\chi + \beta = 0$ ΚΑΙ ΤΗΣ $\alpha\chi + \beta > 0$


**α) Πρόβλημα.** Νὰ βρεθεῖ γραφικῶς ἡ λύση τῆς ἐξίσωσεως  $-\frac{1}{2}\chi + 1 = 0$ .

§ 87. Πάνω σὲ τετραγωνισμένο χαρτὶ γράφουμε τοὺς ὀρθογώνιους ἀξονες καὶ βρίσκουμε τὴ γραφικὴ παράσταση τῆς συναρτήσεως:  $\psi = -\frac{1}{2}\chi + 1$ .

(Δίνουμε δύο τιμὲς στὸ  $\chi$  ἔστω τὶς  $\chi = -2$  καὶ  $\chi = 4$  καὶ βρίσκουμε τὶς ἀντίστοιχες τιμὲς τοῦ  $\psi$ , δηλαδὴ  $\psi = 2$  καὶ  $\psi = -1$ ).

Ἐπειτα βρ. σκουμε τὶς εἰκόνες τῶν ζευγῶν  $(-2, 2)$ ,  $(4, -1)$  καὶ ἔστω ὅτι αὐτὲς εἶναι τὰ σημεῖα  $M_1$  καὶ  $M_2$  ἀντιστοίχως, καὶ φέρνουμε τὴν ευθεία  $M_1M_2$ )

Ἡ εὐθεία  $M_1M_2$  παριστάνει γραφικῶς τὴ συνάρτηση  $\psi = -\frac{1}{2}x + 1$ .  
Ἡ εὐθεία αὐτὴ τέμνει τοὺς ἄξονες  $x'x$  καὶ  $y'y$  στὰ σημεῖα  $A$  καὶ  $B$  ἀντιστοίχως.



σχ. 58.

Τὸ σημεῖο  $B$  εἶναι ἡ εἰκόνα τοῦ ζεύγους  $(0, 1)$  καὶ τὸ  $A$  ἡ εἰκόνα τοῦ ζεύγους  $(2, 0)$ .

Τὸ πρῶτο μέλος τοῦ ζεύγους  $(2, 0)$ , δηλαδή ὁ 2, ἐπαληθεύει τὴν ἐξίσωση:  $-\frac{1}{2}x + 1 = 0$  ἄρα εἶναι ἡ λύση τῆς.

Ὡστε γιὰ νὰ βροῦμε γραφικῶς τὴ λύση τῆς ἐξίσωσης  $\alpha x + \beta = 0$


( $\alpha \neq 0$ ), κατασκευάζομε τὴ γραφικὴ παράσταση τῆς συναρτήσεως  $\psi = \alpha x + \beta$  καὶ βρίσκουμε τὸ σημεῖο τομῆς τῆς μὲ τὸν ἄξονα τῶν  $x$ . Ἡ τετμημένη τοῦ σημείου αὐτοῦ εἶναι ἡ λύση τῆς ἐξίσωσεως  $\alpha x + \beta = 0$ .

#### Σημείωση.

1. Ἡ συνάρτηση  $\psi = 0 \cdot x + \beta$  ( $\beta \neq 0$ ) παριστάνεται γραφικῶς ἀπὸ μιὰ εὐθεῖα // πρὸς τὸν ἄξονα τῶν  $x$ . Ἄρα γραφικῶς δὲν προσδιορίζεται λύση τῆς ἐξίσωσεως  $0x + \beta = 0$ . Ἀλλὰ οὔτε καὶ ἀριθμητικῶς, ὅπως μάθαμε. Ἐπομένως καὶ γραφικῶς ἐπαληθεύεται ὅτι ἡ ἐξίσωση  $0x + \beta = 0$  ( $\beta \neq 0$ ) εἶναι ἀδύνατη.

Πίνακ. τιμῶν τῆς συναρτήσεως  $\psi = 0x + \beta$ :

$x$	0	...	1	...	2	...	3	...
$\psi$	$\beta$	...	$\beta$	...	$\beta$	...	$\beta$	...



σχ. 59.



2. Η συνάρτηση  $\psi=0\chi+0$  παριστάνεται γραφικώς από τον άξονα τών  $\chi$ . Άρα δέν προσδιορίζεται γραφικώς μία λύση για τήν εξίσωση  $0\chi+0=0$ . Αύτη έχει άπειρες λύσεις.


Πίνακας τιμών τής συναρτήσεως  $\psi = 0\chi+0$ :

$\chi$	0	...	1	...	2	...	3	...
$\psi$	0	...	0	...	0	...	0	...

β) Νά βρεθοῦν γραφικώς οί λύσεις τής  $\frac{1}{2}\chi-1>0$

§ 88. Θεωρούμε τή συνάρτηση  $\psi=\frac{1}{2}\chi-1$  καί εργαζόμενοι ὅπως στά προηγούμενα κατασκευάζουμε τήν εὐθεία  $\epsilon$  (γραφ. παράσταση αὐτῆς), πού τέμνει τόν ἄξονα τών  $\chi$  στό σημεῖο  $A$ , τὸ ὁποῖο ἔχει τετμημένη 2.

Θέτουμε στήν ἀνίσωση  $\frac{1}{2}\chi-1>0$  ἀντί  $\chi$  τήν τετμημένη 3 ἑνὸς σημείου  $B$  τοῦ ἄξονα  $X'X$ , τὸ ὁποῖο βρίσκεται δεξιὰ τοῦ  $A$ , καί παρατηροῦμε ὅτι ὁ 3 ἔπαληθεύει τήν ἀνίσωση.



$$\left(\frac{1}{2} \cdot 3 - 1 = \frac{3}{2} - \frac{2}{2} = \frac{1}{2} > 0\right)$$

Τὸ ἴδιο συμβαίνει μὲ τήν τετμημένη ὁποιοδήποτε ἄλλου σημείου, τὸ ὁποῖο βρίσκεται δεξιὰ τοῦ  $A$  πάνω στὸν ἄξονα τών  $\chi$ . Άρα οί λύσεις τής ἀνισώσεως  $\frac{1}{2}\chi-1>0$  εἶναι οί ρητοί, πού εἶναι μεγαλύτεροι ἀπὸ τὸν 2 ( $\chi > 2$ ). Αὐτὸ ἔπαληθεύεται καί ἀπὸ τήν ἀριθμ. ἐπίλυση τής ἀνισώσεως.

**Σημείωση:** Ἄν θέσουμε τήν τετμημένη 1 ἑνὸς σημείου  $K$ , τὸ ὁποῖο βρίσκεται ἀριστερὰ τοῦ  $A$  πάνω στὸν ἄξονα τών  $\chi$ , παρατηροῦμε ὅτι δέν ἔπαληθεύει τήν ἀνίσωση.

$$\frac{1}{2}\chi-1>0 \quad \left(\frac{1}{2} \cdot 1 - 1 = \frac{1}{2} - \frac{2}{2} = -\frac{1}{2} < 0\right)$$

Άρα οί τετμημένες τών σημείων τοῦ ἄξονα τών  $\chi$ , τὰ ὁποῖα βρίσκονται ἀριστερὰ τοῦ  $A$ , δέν ἔπαληθεύουν τήν ἀνίσωση.

Γενικά αν έχουμε την ανίσωση  $\alpha x + \beta > 0$  ( $\alpha \neq 0$ ), για να βρούμε γραφικώς τις λύσεις της, εργαζόμαστε ως εξής:

1) Κατασκευάζουμε την ευθεία, που ορίζεται από δύο τυχόντα ζεύγη της συναρτήσεως.

2) Βρίσκουμε το σημείο τομής της ευθείας αυτής και του άξονα τών  $x$ . Έστω  $A$  το σημείο αυτό.

3) Δοκιμάζουμε αν η τετμημένη ενός οποιουδήποτε σημείου του άξονα τών  $x$  (π.χ. δεξιά του  $A$ ) επαληθεύει την ανίσωση.

Αν την επαληθεύει, οι λύσεις της είναι οι ρητές τετμημένες τών σημείων της ήμιευθείας  $AX'$ . Αν δέν την επαληθεύει, οι λύσεις της είναι οι ρητές τετμημένες τών σημείων της αντικείμενης ήμιευθείας  $AX''$ .

(Έκτός από την τετμημένη του σημείου  $A$ ).

### Άσκησης:

203. Να επιλυθούν γραφικώς οι εξισώσεις:

α)  $3x - 12 = 0$    β)  $-8x - 24 = 0$ ,   γ)  $2x + 3 = 0$ ,

δ)  $5(x-3) - 3(x-1) = 0$ ,   ε)  $18 - 5(x+1) - 3(x-1) = 0$

204. Να επιλυθούν γραφικώς οι ανισώσεις:

α)  $x + 3 > 0$ ,   β)  $2x - 3 < 0$ ,   γ)  $-2x - 6 > 0$

δ)  $\frac{1}{2} + 3x - (x + 0,5) > 0$ ,   ε)  $3(x-3) < 0$

### 5. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ III :

205. Να επιλυθούν οι εξισώσεις:

α)  $4(x-3) - 3(3-x) = 5(x+2) - 9(8-x) + 20$

β)  $20(7x+4) - 18(3x+4) - 5 = 25(x+5)$

γ)  $6 - [2x - (3x-4) - 1] = 0$

206. Να επιλυθούν και να επαληθευθούν οι εξισώσεις:

α)  $5 - 4(x-3) = x - 2(x-1)$ ,   β)  $6(x-1) - (3x+11) + 7 = 0$

207. Να επιλυθούν οι εξισώσεις:

α)  $\frac{7x-4}{15} + \frac{x-1}{3} = \frac{3x-1}{5} - \frac{7+x}{10}$ ,   β)  $\frac{2x}{15} + \frac{x-6}{12} = \frac{3}{10} \left( \frac{x}{2} - 5 \right)$

γ)  $\frac{18x+13}{9} = \frac{6x+1}{5} + \frac{2}{3} \cdot \left( 6 - \frac{3x}{2} \right)$ ,   δ)  $\frac{2}{5} \left( \frac{3x}{4} - \frac{2}{7} \right) = \frac{5}{7} \left( \frac{12x}{25} - \frac{1}{75} \right)$

208. Να επιλυθούν τα παρακάτω προβλήματα με τη βοήθεια εξισώσεων:

α) Να βρεθούν οι γωνίες του παραλ/μου  $AB\Delta\Gamma$ , αν η γωνία του  $A$  ισούται με τα  $\frac{2}{3}$  της γωνίας  $B$ .

β) Να βρεθούν οι γωνίες ενός τριγώνου  $AB\Gamma$ , αν η γωνία  $B$  ισούται με το  $\frac{1}{2}$  της γωνίας  $A$  και η γωνία  $\Gamma$  ισούται με τα  $\frac{3}{8}$  της γωνίας  $A$ .

γ) Δύο κομμάτια ύφασμα διαφέρουν κατά 66,5 m. Το μεγαλύτερο είναι 5πλάσιο από το μικρότερο και 4,5 m άκομη. Νά βρεθούν τὰ μήκη τους.

δ) Νά βρεθούν τρεις διαδοχικοί θετικοί άκέραιοι τέτοιοι, πού, αν από το ήμισυ του άφαιρέσουμε το  $\frac{1}{3}$  του μεγαλύτερου, θά βρούμε τον ρητό  $\frac{127}{6}$ .

ε) Ένα αυτοκίνητο άναχώρησε στις 7 το πρωί από την πόλη Α με ταχύτητα 33 km/h. Τί ώρα πρέπει νά άναχωρήσει ένα άλλο αυτοκίνητο από την ίδια πόλη και πρὸς την ίδια φορά με ταχύτητα 45 km/h, για νά φτάσει το πρώτο ύστερ' από 2h 45min;

209. Με τή βοήθεια έξισώσεων νά έπιλυθούν τὰ προβλήματα:

α) Έφαγαν μαζί 47 άνδρες και γυναίκες. Κάθε άνδρας πλήρωσε 50 δρχ. και κάθε γυναίκα 47 δρχ. Άν οι άνδρες πλήρωσαν 1380 δρχ. περισσότερα από τις γυναίκες, πόσοι ήταν οι άνδρες;

β) Άπό το περιεχόμενο ενός βαρελιού πουλήθηκαν την α' ημέρα τὰ  $\frac{3}{8}$  και τή β' ημέρα 39 κιλά. Έάν το πουλημένο ποσό αντιπροσωπεύει τὰ  $\frac{3}{4}$  του περιεχομένου, πόσα κιλά έμειναν άκόμη στο βαρέλι;

γ) Ένας έργατης τελειώνει ένα έργο σε 3 ημέρες· άλλος έργατης τελειώνει το ίδιο έργο σε 6 ημέρες. Σε πώσες ημέρες θά τελειώσουν το έργο και οι δύο έργατες, αν εργάζονται συγχρόνως;

δ) Ένας πατέρας έχει 2πλάσια ηλικία από το γιό του, ενώ πριν από 15 χρόνια είχε 3πλάσια. Ποιά είναι ή ηλικία του καθενός;

ε) Νά βρεθεί ένας αριθμός πού, αν διαιρεθεί δια 13, νά δίνει πηλίκο το  $\frac{1}{14}$  του και ύπόλοιπο 12.

ζ) Το άθροισμα τών ψηφίων ενός διψήφιου αριθμού είναι 10. Άν αλλάξουμε τή θέση τών ψηφίων του, βρίσκουμε έναν αριθμό μικρότερο κατά 36. Ποιός είναι ο αριθμός;

210. Νά έπιλυθούν οι άνισώσεις:

$$\alpha) 2(8x-5) > 15x-8, \quad \beta) 2(2x-3)-5x + \frac{1}{2} > 0$$

$$\gamma) \frac{x}{4} - x > \frac{1}{6} - \frac{2x}{3} \quad \delta) \frac{x+1}{2} - \frac{x-1}{3} > 1$$

211. Άν  $A = \{x/\frac{3}{4}x+3 > 0 \wedge x \in Z\}$ ,  $B = \{x/x-2 < 0 \wedge x \in Z\}$ , νά βρεθεί το σύνολο  $A \cap B$  με άναγραφή.

212. Νά βρεθεί ή τομή τών συνόλων  $A = \{x/x+1 > \frac{x}{2}-2\}$  και

$$B = \{x/x+1 < \frac{x}{3}-3\} \text{ (με άπλή περιγραφή).}$$

213. Νά κατασκευάσετε τή γραφική παράσταση τών συναρτήσεων:

$$\alpha) \psi = 3x \quad \beta) \psi = -2x+1 \quad \gamma) \psi = 1,5x - \frac{1}{2} \quad (x \in Q),$$

214. Άν  $A = \{(x, \psi)/\psi = 2x \wedge x \in Q\}$  και  $B = \{(x, \psi)/\psi = x+2 \wedge x \in Q\}$ , νά βρεθεί γραφικώς το σύνολο  $A \cap B$ .

**A. ΛΟΓΟΙ — ΜΕΓΕΘΗ ΕΥΘΕΩΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ ΑΝΑΛΟΓΑ —  
ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ**

**1. ΛΟΓΟΣ ΔΥΟ ΑΡΙΘΜΩΝ — ΛΟΓΟΣ ΔΥΟ ΟΜΟΕΙΔΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ —  
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ.**

**§ 89. Λόγος δύο αριθμών.**

Δίνονται οί αριθμοί 54 και 9. Με ποιόν αριθμό πρέπει να πολλαπλασιάσουμε τον δεύτερο (9), για να βρωμε τον πρώτο (54);

\*Αν  $\chi$  είναι ο αριθμός, θα έχουμε:  $9\chi = 54 \Leftrightarrow \chi = \frac{54}{9} \Leftrightarrow \chi = 6$ . Ο αριθμός 6 λέγεται λόγος του 54 προς τον 9.

\*Ωστε λόγος ενός αριθμού  $\alpha$  προς έναν αριθμό  $\beta$  ( $\beta \neq 0$ ) λέγεται ο αριθμός, ο οποίος, όταν πολλαπλασιάζεται με τον  $\beta$ , δίνει γινόμενο τον  $\alpha$ .

\*Αν ο λόγος του  $\alpha$  προς τον  $\beta$  είναι  $\lambda$ , έχουμε:

$$\frac{\alpha}{\beta} = \lambda \Leftrightarrow \beta \cdot \lambda = \alpha$$


Συνεπώς ο λόγος δύο αριθμών είναι το πηλίκο της διαιρέσεώς τους.

Ο λόγος του  $\alpha$  προς τον  $\beta$  παριστάνεται και:  $(\alpha, \beta)$

Ο  $\alpha$  και ο  $\beta$  λέγονται όροι του λόγου, ο  $\alpha$  λέγεται ήγούμενος και ο  $\beta$  έπόμενος.

**§ 90. Λόγος δύο όμοειδών μεγεθών.**

Δίνεται το εθύγραμμο τμήμα  $AB$ . Να βρεθεί ένα άλλο εθύγραμμο τμήμα  $\Gamma\Delta$ , ώστε  $\Gamma\Delta = AB + AB + \frac{1}{4} AB$ .



Κατασκευάζουμε  
κατά τὰ γνωστά τὸ



$$\Gamma\Delta = AB + AB + \frac{1}{4} AB \quad \text{σχ. 61.}$$

$$\Gamma\Delta = (1 + 1 + \frac{1}{4})AB \Leftrightarrow \Gamma\Delta = \frac{9}{4} AB.$$



Ο αριθμός  $\frac{9}{4}$ , με τον οποίο πολλαπλασιάζεται το  $AB$  και δίνει το  $\Gamma\Delta$ , λέγεται λόγος του  $\Gamma\Delta$  προς το  $AB$  και συμβολίζεται  $\frac{\Gamma\Delta}{AB}$  ή  $(\Gamma\Delta, AB)$ .

$$\text{Ώστε } \frac{\Gamma\Delta}{AB} = \frac{9}{4} \Leftrightarrow \Gamma\Delta = \frac{9}{4} AB$$

Γενικά λόγος ενός μεγέθους  $A$  προς ένα άλλο όμοιοιδές μέγεθος  $B$  λέγεται ο αριθμός  $\lambda$ , με τον οποίο όταν πολλαπλασιάζεται το μέγεθος  $B$ , δίνει το  $A$ .

$$\text{Συμβολικά: } \frac{A}{B} = \lambda \Leftrightarrow A = \lambda \cdot B$$

§ 91. Στο σχήμα (62) ο λόγος του ὀρθογωνίου  $A$  προς το ὀρθογώνιο  $B$  είναι ο αριθμός 4, δηλαδή  $\frac{A}{B} = 4$  διότι  $A = 4B$ .



σχ. 62.

Ἄν λάβουμε το τετράγωνο  $M$  ὡς μονάδα μετρήσεως τῶν ἐπιφανειῶν, τότε ὁ λόγος  $\frac{B}{M}$  λέγεται τιμὴ τοῦ  $B$  καὶ παριστάνεται  $\frac{B}{M} = (B)$ .

Ὁμοίως καὶ ὁ λόγος  $\frac{A}{M} = (A)$  λέγεται τιμὴ τοῦ  $A$ .

Ἔχουμε  $\frac{B}{M} = (B) = 6$ , γιατί  $B = 6M$  καὶ  $\frac{A}{M} = (A) = 24$ , γιατί  $A = 24M$ .

Ἄπὸ τὴν ἰσότητες:  $(A) = 24$

$(B) = 6$  με διαίρεση κατὰ μέλη παίρνουμε:

$$\frac{(A)}{(B)} = \frac{24}{6} = 4. \text{ Ἄλλὰ καὶ } \frac{A}{B} = 4, \text{ ἐπομένως } \boxed{\frac{A}{B} = \frac{(A)}{(B)}} \quad (1)$$

Ώστε ὁ λόγος δύο ἐπιφανειῶν ἰσοῦται μετὰ τὸν λόγο τῶν τιμῶν τους, ἂν μετρηθοῦν μετὰ τὴν ἴδια μονάδα.

Ἡ ιδιότητα αὐτὴ ἰσχύει γιὰ ὅποιαδήποτε ὁμοιοειδῆ μέγεθρα  $A$  καὶ  $B$

και ο λόγος  $\frac{A}{B}$  είναι ανεξάρτητος από τη μονάδα μετρήσεώς τους.

Δηλαδή ή ισότητα (1) ισχύει, και αν πάρουμε άλλη μονάδα μετρήσεως αντί για τη μονάδα M.

### § 92. Ίδιότητες του λόγου.

1) Να συγκρίνετε το λόγο τῶν ἀριθμῶν  $-5$  και  $-8$  με το λόγο τῶν  $(-5) \cdot (-2)$  και  $(-8) \cdot (-2)$

$$\text{*Έχουμε} \quad \frac{-5}{-8} = \frac{5}{8} \quad \text{και} \quad \frac{(-5) \cdot (-2)}{(-8) \cdot (-2)} = \frac{10}{16} = \frac{5}{8}$$

$$\text{*Άρα} \quad \frac{-5}{-8} = \frac{(-5) \cdot (-2)}{(-8) \cdot (-2)}. \quad \text{Ίσχύει και} \quad \frac{-5}{-8} = \frac{(-5) : (-2)}{(-8) : (-2)}$$

Συνεπῶς ὁ λόγος δύο ἀριθμῶν δὲν μεταβάλλεται, ἂν τοὺς πολλαπλασιάσουμε (ἢ τοὺς διαιρέσουμε) με τὸν ἴδιο ρητὸ ( $\neq 0$ ).

$$\text{Συμβολικά:} \quad \frac{\alpha}{\beta} = \frac{\alpha\rho}{\beta\rho} = \frac{\alpha : \kappa}{\beta : \kappa} \quad (\beta, \rho, \kappa \neq 0, \alpha, \beta, \rho, \kappa \in \mathbb{Q}).$$

$$2. \text{ Ἀπὸ τὴν ἰσότητα} \quad \frac{-15}{7} + \frac{13}{7} = \frac{-15+13}{7}, \quad \left(-\frac{2}{3}\right) \cdot \left(-\frac{4}{5}\right) = \frac{(-2) \cdot (-4)}{3 \cdot 5}$$

συνάγομε τοὺς παρακάτω κανόνες :

α) Τὸ ἄθροισμα δύο λόγων, οἱ ὁποῖοι ἔχουν τὸν ἴδιο ἐπόμενο, ἰσοῦται μετὸν ἴδιο ἐπόμενο τοῦ ἄθροίσματος τῶν ἡγουμένων πρὸς τὸν ἴδιο ἐπόμενο.

β) Τὸ γινόμενο δύο λόγων ἰσοῦται μετὸν ἴδιο ἐπόμενο τοῦ γινομένου τῶν ἡγουμένων πρὸς τὸ γινόμενο τῶν ἐπομένων.

$$\text{Συμβολικά:} \quad \frac{\alpha}{\beta} + \frac{\gamma}{\beta} = \frac{\alpha+\gamma}{\beta}, \quad \frac{\alpha}{\beta} \cdot \frac{\gamma}{\delta} = \frac{\alpha \cdot \gamma}{\beta \delta} \quad (\beta, \delta \neq 0)$$

$$3. \text{ Ὁ λόγος τοῦ } (-3) \text{ πρὸς τὸν } 5 \text{ εἶναι} \quad \frac{-3}{5} = -\frac{3}{5}$$

Ὁ λόγος τῶν ἀντιστρόφων τῶν ὄρων του εἶναι

$$\frac{-\frac{1}{3}}{\frac{1}{5}} = -\frac{\frac{1}{3}}{\frac{1}{5}} = -\frac{5}{3}$$

Ἐπομένως ὁ λόγος τῶν ἀντιστρόφων τῶν ὄρων ἑνὸς λόγου ἰσοῦται μετὸν ἀντίστροφο τοῦ λόγου.

$$\text{Συμβολικά: Ἐὰν } \lambda_1 = \frac{\alpha}{\beta} \text{ τότε } \lambda_2 = \frac{1}{\frac{\alpha}{\beta}} = \frac{\beta}{\alpha} \text{ και } \lambda_1 \lambda_2 = \frac{\alpha}{\beta} \cdot \frac{\beta}{\alpha} = 1$$

### \*Ἐφαρμογές.

$$\alpha) \frac{-5}{-6} = \frac{(-5) \cdot (-1)}{(-6) \cdot (-1)} = \frac{5}{6} \quad \beta) \frac{-7}{8} = \frac{(-7) \cdot (-1)}{8 \cdot (-1)} = \frac{7}{-8} = -\frac{7}{8}$$

$$\gamma) \frac{6}{17} + \frac{1}{17} + \left(-\frac{5}{17}\right) = \frac{-6+1-5}{17} = \frac{2}{17}$$

$$\delta) \frac{-5}{9} \cdot \frac{3}{-4} = \frac{(-5) \cdot 3}{9 \cdot (-4)} = \frac{-15}{-36} = \frac{-5}{-12} = \frac{5}{12}$$

$$\epsilon) \lambda_1 = \frac{-2}{-3} = +\frac{2}{3}, \quad \lambda_2 = \frac{-\frac{1}{2}}{-\frac{1}{3}} = +\frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{3}} = \frac{3}{2} \text{ και } \lambda_1 \lambda_2 = \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{2} = 1.$$

$$\zeta) \text{ Έάν } \frac{X}{\Psi} = 2, \text{ νά βρεθεί ό λόγος } \frac{X+\Psi}{2X-\Psi}.$$

Διαιρούμε και τούς δύο όρους του λόγου  $\frac{X+\Psi}{2X-\Psi}$  διά του  $\Psi$ :

$$\frac{X+\Psi}{2X-\Psi} = \frac{\frac{X}{\Psi} + \frac{\Psi}{\Psi}}{2 \cdot \frac{X}{\Psi} - \frac{\Psi}{\Psi}} = \frac{\frac{X}{\Psi} + 1}{2 \cdot \frac{X}{\Psi} - 1} = \frac{2+1}{2 \cdot 2-1} = \frac{3}{4-1} = \frac{3}{3} = 1$$

### Άσκησεις:

215. Νά βρεθεί ό λόγος τής περιμέτρου του ίσόπλευρου τριγώνου πρὸς τήν πλευρά του.

216. Νά βρεθεί ό λόγος τής ὀρθῆς γωνίας πρὸς τή γωνία του ίσόπλευρου τριγώνου.

217. Ό λόγος του τεκτονικοῦ πήχη πρὸς τὸ m εἶναι  $\frac{3}{4}$ . Νά βρεθεί ό λόγος του τ.τ. πήχη πρὸς τὸ m<sup>2</sup>.

218. Νά πάρετε δύο εὐθύγρ. τμήματα με τιμές ρητούς ἀριθμούς και νά βρεῖτε τὸ λόγο τους.

219. Δίνεται ό λόγος δύο εὐθύγρ. τμημάτων, ἴσος με  $\frac{3}{5}$ , και τὸ ἓνα ἀπ' αὐτά. Νά βρεθεί τὸ ἄλλο εὐθύγρ. τμήμα.

$$220. \text{ Ἄν } \frac{X}{\Psi} = -\frac{1}{2}, \text{ νά βρεθοῦν οι λόγοι: } \alpha) \frac{\Psi}{X}, \beta) \frac{\Psi-X}{X+\Psi}, \gamma) \frac{X+2\Psi}{2X-\Psi}.$$

$$221. \text{ Ἄν } \frac{X}{\Psi} = -2, \text{ νά βρεθοῦν οι λόγοι: } \alpha) \frac{2X+\Psi}{X+3\Psi}, \beta) \frac{2X\Psi-\Psi^2}{X^2-\Psi^2}, \gamma) \frac{X^2+\Psi^2}{X^2-\Psi^2}.$$

222. Μπορεῖτε νά βρεῖτε τὸ λόγο δύο ὁποιοῦνδήποτε εὐθύγρ. τμημάτων;

## 2. ΜΕΓΕΘΗ ΕΥΘΕΩΣ ΑΝΑΛΟΓΑ — ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ — ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΧΕΣΗΣ.

§ 93. Ξαναρχόμαστε στὸ πρόβλημα τῆς § 85.

Ἐνα ἀεροπλάνο, τὸ ὁποῖο κινεῖται εὐθύγραμμα με σταθερὴ ταχύτητα 500 km/h, περνᾷ πάνω ἀπὸ τὸ σχολεῖο μας A. Μετὰ χ ὥρες περνᾷ πάνω ἀπὸ ἓνα σημεῖο B. Πόση εἶναι ἡ ἀπόσταση AB; (Τὸ ἀεροπλάνο κινεῖται ὀριζοντίως).

Ἄν  $AB = \psi$  km, ἔχουμε τὴ συνάρτηση  $\psi = 500\chi$ . Σχηματίζουμε τὸν πίνακα τῶν ἀντίστοιχων τιμῶν.

Τιμές χρόνου σε ώρες	$x$	0	$\frac{1}{20}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{2}$	1	2	3	...	$x$
Τιμές απόστασεως σε km	$\psi=500x$	0	25	50	250	500	1000	1500	...	$500x$

Παρατηρούμε ότι, αν πολλαπλασιάσουμε την τιμή του χρόνου  $\frac{1}{20}$  επί 10, θα βρούμε  $\frac{1}{2}$ . Αν πολ/σουμε και την αντίστοιχη τιμή 25 της απόστασεως επί 10, θα βρούμε 250. Άλλα από τον πίνακα διαπιστώνουμε ότι οι τιμές  $\frac{1}{2}$  και 250 είναι αντίστοιχες.

Επίσης αν πολλαπλασιάσουμε τις αντίστοιχες τιμές  $\frac{1}{10}$  και 50 επί 30, βρίσκουμε τις αντίστοιχες τιμές 3 και 1500.

Ωστε, αν πολ/σουμε αντίστοιχες τιμές των μεγεθών χρόνου και απόστασεως με έναν ρητό, βρίσκουμε πάλι αντίστοιχες τιμές. Τα μεγέθη χρόνος και απόσταση είναι ανάλογα.

Ωστε δύο μεγέθη λέγονται εὐθέως ανάλογα, αν έχουν αντίστοιχες τιμές και τὰ γινόμενα δύο αντίστοιχων τιμών ἐπὶ τὸν ἴδιο ρητὸ εἶναι πάλι ἀντίστοιχες τιμές.

Συνεπῶς, αν οι αντίστοιχες τιμές  $x, \psi$  δύο μεγεθών συνδέονται με τη σχέση  $\psi = \alpha x$  ( $\alpha \neq 0$ ), τὰ μεγέθη αὐτὰ εἶναι εὐθέως ἀνάλογα.

Αν δύο μεγέθη εἶναι εὐθέως ἀνάλογα, οἱ ἀντίστοιχες τιμές τους συνδέονται με μιὰ σχέση τῆς μορφῆς  $\psi = \alpha x$ ;

Δύο μεγέθη A και B ἔχουν ἀντίστοιχες τιμές αὐτὲς πού ἀναγράφονται στὸν παρακάτω πίνακα.

Τιμές μεγ. A	1	...	2	...	3	...	4	...	5	...	6	...	7	...	8	...	$x$
Τιμές μεγ. B	2	...	4	...	6	...	8	...	10	...	12	...	14	...	16	...	$\psi$

Τὰ μεγέθη A και B εἶναι ἀνάλογα· διότι, αν πολ/σουμε δύο ἀντίστοιχες τιμές π.χ. τὶς 2 και 4 με τὸν ἴδιο ἀριθμὸ 2 ἢ 3 ἢ 4 κ.λ.π., βρίσκουμε πάλι ἀντίστοιχες τιμές.

Παρατηρούμε ὅτι:  $\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \dots = \frac{x}{\psi}$ . Ἀπ' αὐτὰ ἔχουμε:

$$\frac{x}{\psi} = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \psi = 2x$$

Ωστε οἱ ἀντίστοιχες τιμές  $x$  και  $\psi$  τῶν ἀνάλογων μεγεθῶν A και B συνδέονται με μιὰ σχέση τῆς μορφῆς  $\psi = \alpha x$ .



Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι δύο μεγέθη με αντίστοιχες τιμές  $\chi$  και  $\psi$  είναι εὐθέως ἀνάλογα, ἂν οἱ τιμές τους συνδέονται με μιὰ σχέση τῆς μορφῆς  $\psi = \alpha\chi$  ( $\alpha \neq 0$ )

### § 94. Ἰδιότητες.

1. Γιὰ τὶς τιμές τῶν ἀνάλογων μεγεθῶν  $A$  καὶ  $B$  εἶδαμε ὅτι:

$$\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{3}{6} = \dots$$

Ὡστε, ἂν δύο μεγέθη εἶναι ἀνάλογα, οἱ ἀντίστοιχες τιμές τους ἔχουν τὸν ἴδιο λόγο.

**Σημείωση:** Στὴ συνάρτηση  $\psi = \alpha\chi$  ( $\alpha \neq 0$ ) διὰ  $\chi = 0$  ἔχουμε  $\psi = 0$ . Ἐπειδὴ τὸ  $\frac{0}{0}$  δὲν εἶναι ὀρισμένο, γι' αὐτὸ ἐξαιρεῖται ἀπὸ τὸν παραπάνω κανόνα ὁ λόγος τῶν ἀντίστοιχων τιμῶν 0 καὶ 0.

2. Συγκρίνουμε τὸ λόγο δύο τιμῶν τοῦ μεγέθους  $A$  μετὰ τὸ λόγο τῶν ἀντίστοιχων τιμῶν τοῦ μεγέθους  $B$ .

Λόγος τῶν τιμῶν 2 καὶ 6 τοῦ μεγέθους  $A$  :  $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$

Λόγος τῶν ἀντίστοιχων τιμῶν 4 καὶ 12 τοῦ μεγέθους  $B$  :  $\frac{4}{12} = \frac{1}{3}$

Συνεπῶς, ἂν δύο μεγέθη εἶναι εὐθέως ἀνάλογα, ὁ λόγος δύο τιμῶν τοῦ ἑνὸς ἰσοῦται μετὰ τὸν λόγο τῶν ἀντίστοιχων τιμῶν τοῦ ἄλλου.

Παραδείγματα εὐθέως ἀνάλογων μεγεθῶν:

α) Ὁ ἀριθμὸς ἐργατῶν τῆς ἴδιας ἀποδόσεως καὶ τὸ ἔργο τὸ ὁποῖο ἐκτελοῦν στὸν ἴδιο χρόνο.

β) Τὸ βάρος ἑνὸς ἐμπορεύματος καὶ ἡ τιμὴ του.

γ) Ἡ πλευρὰ ἰσόπλευρου τριγώνου, καὶ ἡ περίμετρος του.


δ) Ὁ χρόνος καὶ τὸ διάστημα στὴν ἰσοταχῆ κίνηση.

ε) Ἡ ἀκτίνα τοῦ κύκλου καὶ τὸ μήκος του.

### § 95. Γραφικὴ παράσταση.

Ἡ γραφικὴ παράσταση τῆς σχέσης, ποὺ συνδέει τὶς τιμές εὐθέως ἀνάλογων μεγεθῶν, εἶναι ἡ γραφικὴ παράσταση τῆς συναρτήσεως  $\psi = \alpha\chi$ , τὴν ὁποία ἐμελετήσαμε στὴν § 85 α καὶ τὴν ἐπαναλαμβάνουμε με συντομία παρακάτω γιὰ τὴν σχέση  $\psi = 2\chi$ , ἡ ὁποία συνδέει τὶς ἀντίστοιχες τιμές τῶν εὐθέως ἀνάλογων μεγεθῶν  $A$  καὶ  $B$ .

Οἱ τετμημένες τῶν σημείων τοῦ ἡμίξονα  $ox$  παριστάνουν τιμές τοῦ μεγέθους  $A$  καὶ οἱ τεταγμένες τῶν σημείων τοῦ  $oy$  τιμές τοῦ μεγέθους  $B$ .



σχ. 63.

Στο σημείο, το οποίο έχει τετμημένη  $\frac{5}{2}$ , φέρνουμε κάθετο στον  $οχ$ , ή οποία τέμνει την  $OZ$  στο σημείο  $M$ . Από το σημείο  $M$  φέρνουμε // προς τον  $οχ$  (ή  $\perp$  στον  $οψ$ ). Αυτή τέμνει τον  $οψ$  σ' ένα σημείο, του οποίου η τεταγμένη 5 είναι η αντίστοιχη τιμή του  $\frac{5}{2}$ .

### Άσκησης :

223. Έξετάστε αν τα επόμενα μεγέθη είναι ανάλογα:

- Ο χρόνος και το έργο που εκτελεί μια ομάδα από εργάτες.
- Η ηλικία ενός ατόμου και το βάρος του.
- Ο αριθμός των εργατών και ο χρόνος εκτέλεσης ενός έργου.

224. Βρείτε παραδείγματα εὐθέως ανάλογων μεγεθών.

225. Νά συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας, νά βρεθεί ή σχέση, που συνδέει τις αντίστοιχες τιμές, και νά γίνει γραφική παράσταση αυτής.

Τιμές μήκους ύφασματος σε m				2	4,5	3	
Τιμές πωλήσεως ύφασματος σε δραχ.	10	150	400				

Τὰ σημεία  $M_1, M_2, M_3, \dots$  είναι οί γραφικές παραστάσεις (ή εικόνες) τῶν ζευγῶν  $(1, 2), (2, 4), (3, 6), \dots$  και βρίσκονται πάνω στήν ἡμιευθεία  $OZ$ .

### Παρατήρηση :

Μέ τήν ἡμιευθεία  $OZ$  μπορούμε νά βροῦμε τιμές τοῦ μεγέθους  $B$  ἀντίστοιχες τιμῶν τοῦ  $A$ . Π.χ. Για νά βροῦμε ποιά τιμή τοῦ μεγέθους  $B$  ἀντίστοιχέ στήν τιμή  $\frac{5}{2}$  τοῦ μεγέθους  $A$ , ἐργαζόμεστε ὡς ἐξῆς:

226. Για τὰ μεγέθη «πλευρά τετραγώνου» καὶ «περίμετρος αὐτοῦ» νὰ βρεθῆ ἡ σχέση, ποὺ συνδέει τὶς ἀντίστοιχες τιμές τους, καὶ νὰ γίνῃ γραφικὴ παράσταση αὐτῆς.

227. Νὰ γίνῃ τὸ ἴδιο καὶ γιὰ τὰ μεγέθη βάρους ἔμπορεύματος καὶ τιμῆ του, ἂν ἡ τιμὴ τῆς μονάδας βάρους εἶναι 40 δρχ.

228. Ἐξετάστε ἂν μεγέθη μὲ τιμές, ποὺ τὶς συνδέει ἡ σχέση τῆς μορφῆς  $\psi = \alpha\chi + \beta$ , εἶναι ἀνάλογα.

### 3. ΜΕΓΕΘΗ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ ΑΝΑΛΟΓΑ— ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ — ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΧΕΣΗΣ.

§ 96. **Πρόβλημα.** Μὲ ποιά ταχύτητα πρέπει νὰ κινήθῃ ἓνα αὐτοκίνητο, γιὰ νὰ διανύσει μιὰ ἀπόσταση 100 χιλιομέτρων σὲ 1 ὥρα, 2 ὥρες, 2,5 ὥρες, 4 ὥρες κ.ο.κ. ;

Ἄν παραστήσουμε μὲ  $\chi$  τὴν τιμὴ τοῦ χρόνου σὲ ὥρες καὶ μὲ  $\psi$  τὴν τιμὴ τῆς ταχύτητας σὲ χιλιόμετρα ἀνὰ ὥρα, θὰ ἔχουμε τὴ σχέση:

$$\begin{aligned} \text{Ταχύτητα ἐπὶ χρόνο} &= \text{διάστημα} \\ \psi \cdot \chi &= 100 \Leftrightarrow \psi = \frac{100}{\chi} \end{aligned}$$

Ἄν στὴ σχέση  $\psi = \frac{100}{\chi}$  θέσουμε ὅπου  $\chi$  τὶς τιμές 1, 2, 2,5, ..., βρίσκουμε τὶς ἀντίστοιχες τιμές τοῦ  $\psi$  100, 50, 40, ... καὶ σχηματίζουμε τὸν παρακάτω πίνακα:

Τιμές τοῦ χρόνου σὲ ὥρες	$\chi$	...	1	2	2,5	4	5	...	$\chi$
Τιμές τῆς ταχύτητας σὲ km/h	$\psi$	...	100	50	40	25	20	...	$\frac{100}{\chi}$

Ἀπὸ τὸν πίνακα αὐτὸ παρατηροῦμε τὰ ἑξῆς:

1. Σὲ κάθε τιμὴ τοῦ χρόνου ἀντιστοιχεῖ μιὰ μόνο τιμὴ τῆς ταχύτητας (μονότιμο τῆς διαιρέσεως), ἄρα ἡ  $\psi = \frac{100}{\chi}$  εἶναι συνάρτηση.

2. Ἄν πολ/σουμε τὴν τιμὴ 2,5 τοῦ χρόνου ἐπὶ 2, βρίσκουμε 5. Ἄν διαιρέσουμε τὴν τιμὴ 40 τῆς ταχύτητας (ἀντίστοιχη τιμὴ τοῦ 2,5) διὰ 2, βρίσκουμε 20, δηλαδὴ τὴν ἀντίστοιχη τιμὴ τοῦ 5.

Τὰ μεγέθη χρόνος καὶ ταχύτητα, τὰ ὁποῖα ἔχουν τὶς ιδιότητες αὐτές, λέγονται ἀντιστρόφως ἀνάλογα μεγέθη.

Δύο μεγέθη λέγονται ἀντιστρόφως ἀνάλογα, ὅταν ἔχουν ἀντίστοιχες τιμές τέτοιες ὥστε, ὅταν πολλαπλασιάζεται μιὰ τιμὴ τοῦ ἑνὸς ἐπὶ ἓναν ρητὸ ( $\neq 0$ ) καὶ διαιρεῖται ἡ ἀντίστοιχη τιμὴ τοῦ ἄλλου μὲ τὸν ἴδιο ρητὸ, νὰ βρίσκονται νέες τιμές ἀντίστοιχες.

## § 97. Ίδιότητες.

α) Παρατηρούμε ότι:  $1 \cdot 100 = 2 \cdot 50 = 2,5 \cdot 40 = \dots$

Άρα τὸ γινόμενο δύο ἀντίστοιχων τιμῶν τῶν ἀντιστρόφως ἀνάλογων μεγεθῶν εἶναι τὸ ἴδιο (σταθερό).


β) Οἱ προηγούμενες ἰσότητες γράφονται:

$$\frac{1}{100} = \frac{2}{50} = \frac{2,5}{40} = \dots$$

Ἐπομένως στὰ ἀντιστρόφως ἀνάλογα μεγέθη οἱ τιμές τοῦ ἑνὸς εἶναι ἀνάλογες πρὸς τὶς ἀντίστροφες τῶν ἀντίστοιχων τιμῶν τοῦ ἄλλου.

γ) Παρατηροῦμε ἐπίσης ὅτι ὁ λόγος τῶν τιμῶν 1 καὶ 4 τοῦ χρόνου εἶναι  $\frac{1}{4}$  καὶ ὁ λόγος τῶν ἀντίστοιχων τιμῶν 100 καὶ 25 τῆς ταχύτητας εἶναι  $\frac{100}{25} = 4$ , δηλαδή ὁ ἀντίστροφος τοῦ  $\frac{1}{4}$ .

Συνεπῶς στὰ ἀντιστρόφως ἀνάλογα μεγέθη ὁ λόγος δύο τιμῶν τοῦ ἑνὸς εἶναι ἴσος μὲ τὸν ἀντίστροφο τοῦ λόγου τῶν ἀντίστοιχων τιμῶν τοῦ ἄλλου.

§ 98. Γραφικὴ παράσταση τῆς σχέσης  $\psi = \frac{100}{\chi}$ 

σχ. 64.

Οἱ τετμημένες τῶν σημείων τοῦ οχ παριστάνουν τιμές χρόνου σὲ ὥρες καὶ οἱ τεταγμένες τῶν σημείων τοῦ οψ τιμές ταχύτητας σὲ χιλιόμετρα ἀνά ὥρα.

Βρίσκουμε κατὰ τὰ γνωστὰ τὶς γραφικὲς παραστάσεις (εἰκόνες) τῶν ζευγῶν (5, 20), (4, 25), (2, 5, 40) ... καὶ παρατηροῦμε ὅτι τὰ σημεία  $M_1, M_2, M_3, \dots$  δὲν βρίσκονται πάνω σὲ μιὰ εὐθεία, ἀλλὰ σὲ μιὰ καμπύλη, ἡ ὁποία λέγεται ὑπερβολή.

Ἐπειδὴ τὸ πεδίο ὀρίσμου τῆς συναρτήσεως  $\psi = \frac{100}{\chi}$  εἶναι τὸ  $Q^+$ , ἡ ὑπερβολὴ ἀποτελεῖται ἀπὸ ἕναν κλάδο, ὁ ὁποῖος βρίσκεται μέσα στὴ  $\chi$   $\chi$ οψ.

### Εφαρμογή :

§ 99. Δίνεται η συνάρτηση  $\psi = \frac{1}{\chi}$ .

α) Νά κατασκευασθεί πίνακας αντίστοιχων τιμών.

β) Νά εξετασθεί αν οι αντίστοιχες τιμές είναι τιμές αντίστροφως ανάλογων μεγεθών.


γ) Νά γίνει η γραφική παράσταση τής  $\psi = \frac{1}{\chi}$

α)

$\chi$	...	-3	-2	-1	$-\frac{1}{2}$	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	2	3	...
$\psi$	...	$-\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{2}$	-1	-2	1	2	3	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	...

β) Πολλαπλασιάζουμε την τιμή  $\frac{1}{2}$  του  $\chi$  επί 6 και βρίσκουμε την τιμή 3. Διαιρούμε την τιμή 2 του  $\psi$  (αντίστοιχη του  $\frac{1}{2}$ ) δια 6 και βρίσκουμε την τιμή  $\frac{1}{3}$ . Οι τιμές όμως 3 και  $\frac{1}{3}$  είναι αντίστοιχες, όπως προκύπτει από τον πίνακα.

\*Αρα οι αντίστοιχες τιμές είναι τιμές αντίστροφως ανάλογων μεγεθών.



σχ. 65.

γ) Παρατηρούμε ότι η γραφική παράσταση της συναρτήσεως  $\psi = \frac{1}{\chi}$  αποτελείται από δύο καμπύλες συμμετρικές προς την άρχη των αξόνων, οι οποίες είναι οι δύο κλάδοι μιᾶς υπερβολῆς.

Γενικά ἡ συνάρτηση  $\psi = \frac{\alpha}{\chi}$  ( $\alpha, \chi, \psi \in \mathbb{Q}$  καὶ  $\alpha, \chi, \psi \neq 0$ ) ὀρίζει ζεύγη τιμῶν ἀντιστρόφως ἀνάλογων μεγεθῶν.

Τὸ γινόμενο τῶν ἀντίστοιχων τιμῶν εἶναι σταθερὸ ( $\chi\psi = \alpha$ ). Ὁ λόγος δύο τιμῶν τοῦ  $\chi$  ἰσοῦται μὲ τὸν ἀντίστροφο λόγο τῶν ἀντίστοιχων τιμῶν τοῦ  $\psi$ .

Γραφικῶς ἡ  $\psi = \frac{\alpha}{\chi}$  παριστάνεται ἀπὸ μιὰ καμπύλη (μὲ ἓνα ἢ δύο κλάδους, ἀνάλογα μὲ τὸ πεδίο ὀρισμοῦ της), ποῦ λέγεται ὑπερβολή (ὀρθογώνια ὑπερβολή).

### Ἄσκῆσεις:

229. Ἐξετάστε ἂν τὰ παρακάτω μεγέθη εἶναι ἀντιστρόφως ἀνάλογα:

α) Ἀριθμὸς ἐργατῶν καὶ χρόνος γιὰ ἓνα ὀρισμένο ἔργο.

β) Ἡ πλευρὰ τριγώνου καὶ τὸ ἀντίστοιχο σ' αὐτὴ ὕψος, ὅταν παραμένει σταθερὸ τὸ ἐμβαδὸ του.

230. Βρεῖτε παραδείγματα ἀντιστρόφως ἀνάλογων μεγεθῶν.

231. Νὰ συμπληρώσετε τὸν παρακάτω πίνακα καὶ νὰ γράψετε τὴ σχέση ποῦ συνδέει δύο ὅποιοσδήποτε ἀντίστοιχες τιμές, ἂν παραμένει σταθερὴ ἡ ἐπιφάνεια τοῦ ὑφάσματος.

Τιμές μήκους ὑφάσματος σὲ m		;	2		;	5		;	8		$\chi$
Τιμές πλάτους ὑφάσματος σὲ m		80		;	40		;	20	15		$\psi$

232. Νὰ γίνει καὶ γραφικὴ παράσταση τῆς προηγούμενης σχέσης.

233. Νὰ γίνει γραφικὴ παράσταση τῶν συναρτήσεων:

$$\alpha) \psi = -\frac{1}{\chi}, \quad \beta) \psi = -\frac{12}{\chi} \quad (\chi, \psi \in \mathbb{Q}, \chi, \psi \neq 0).$$

### 4. ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΩΝ.

§ 100. Δίνεται ὁ παρακάτω πίνακας, ὁ ὁποῖος παριστάνει τὶς ἀντίστοιχες τιμές δύο εὐθέως ἀνάλογων μεγεθῶν. Ποιὰ σχέση ὑπάρχει μεταξὺ τῶν λόγων τῶν ἀντίστοιχων τιμῶν;

...	9	...	18	...	$\alpha$	...	$\gamma$
...	7	...	14	...	$\beta$	...	$\delta$

( $\beta, \delta \neq 0$ )

$$\text{Ξέρουμε ότι } \frac{9}{7} = \frac{18}{14} = \frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta}$$

Ἡ ἰσότητα  $\frac{9}{7} = \frac{18}{14}$  ἢ γενικὰ  $\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta}$  ὀνομάζεται ἀναλογία.

Ὡστε ἀναλογία εἶναι ἡ ἰσότητα δύο λόγων.

Ἡ ἀναλογία  $\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta}$  γράφεται συμβολικά:  $(\alpha, \beta, \gamma, \delta)$  ἢ  $[(\alpha, \beta), (\gamma, \delta)]$ .

Οἱ  $\alpha, \gamma$ , λέγονται ἡγούμενοι ὄροι καὶ οἱ  $\beta, \delta$  ἐπόμενοι ὄροι τῆς ἀναλογίας.

Οἱ  $\beta, \gamma$  λέγονται μέσοι ὄροι καὶ οἱ  $\alpha, \delta$  ἄκροι ὄροι τῆς ἀναλογίας.

**Σημείωση.** Στὴν ἀναλογία  $\frac{\chi}{\psi} = \frac{\varphi}{z}$  ὁ  $\varphi$  λέγεται μέσος ἀνάλογος τῶν  $\chi$  καὶ  $z$ .

Στὴν περίπτωση ἀυτὴ ἡ ἀναλογία λέγεται συνεχῆς.

Στὴ συνεχῆ ἀναλογία  $\frac{8}{4} = \frac{4}{2}$  ὁ 4 εἶναι μέσος ἀνάλογος τῶν 8 καὶ 2.

Ὁ μέσος ἀνάλογος δύο ἀριθμῶν λέγεται καὶ γεωμετρικὸς μέσος αὐτῶν.

### § 101. Ἰδιότητες τῶν ἀναλογιῶν.

Στὴν ἀναλογία  $\frac{4}{2} = \frac{6}{3}$  παρατηροῦμε ὅτι  $4 \cdot 3 = 2 \cdot 6$ . Ὁμοίως στὴν  $\frac{9}{6} = \frac{6}{4}$  ἔχομε  $9 \cdot 4 = 6 \cdot 6$  ἢ  $9 \cdot 4 = 6^2$

Ἄρα σὲ μιὰ ἀναλογία τὸ γινόμενο τῶν ἄκρων ὄρων εἶναι ἴσο μὲ τὸ γινόμενο τῶν μέσων ὄρων.

$$\text{Γενικά: } \frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta} \Rightarrow \frac{\alpha}{\beta} \cdot \beta\delta = \frac{\gamma}{\delta} \cdot \beta\delta \Rightarrow \alpha\delta = \gamma\beta$$

Ἄν  $\alpha\delta = \gamma\beta$  καὶ  $\beta\delta \neq 0$  θὰ ἔχομε:

$$\alpha\delta = \gamma\beta \Rightarrow \frac{\alpha\delta}{\beta\delta} = \frac{\gamma\beta}{\beta\delta} \Rightarrow \frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta}$$

Ὡστε ἔχομε τὴν ἰσοδυναμία  $\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta} \Leftrightarrow \alpha\delta = \beta\gamma$  ( $\beta, \delta \neq 0$ ).

#### Ἐφαρμογές.

α) Νὰ βρεθῆ ὁ ὄρος  $\chi$  τῆς ἀναλογίας  $\frac{\chi}{7} = \frac{4}{2}$ .

$$\text{Ἐχομε: } \frac{\chi}{7} = \frac{4}{2} \Rightarrow 2\chi = 4 \cdot 7 \Rightarrow 2\chi = 28 \Rightarrow \chi = \frac{28}{2} = 14$$

β) Νὰ βρεθῆ ὁ μέσος ὄρος τῆς συνεχοῦς ἀναλογίας  $\frac{32}{\chi} = \frac{\chi}{2}$ . Εἶναι:

$$\frac{32}{\chi} = \frac{\chi}{2} \Rightarrow 32 \cdot 2 = \chi \cdot \chi \Rightarrow 64 = \chi \cdot \chi \Leftrightarrow 8^2 = \chi^2 \Rightarrow \chi = 8$$

2. \*Εστω ή αναλογία  $\frac{10}{5} = \frac{8}{4}$ . Οί αντίστροφοι λόγοι είναι ίσοι και έχουμε την αναλογία  $\frac{5}{10} = \frac{4}{8}$ . \*Επίσης παρατηρούμε ότι, αν εναλλάξουμε τους μέσους όρους, προκύπτει μιá νέα αναλογία:  $\frac{10}{8} = \frac{5}{4}$ . \*Όμοιως αν εναλλάξουμε τους άκρους όρους:  $\frac{4}{5} = \frac{8}{10}$ .

Γενικά, αν έχουμε την αναλογία  $\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta}$  ( $\alpha, \beta, \gamma, \delta \neq 0$ ), βρίσκουμε τις νέες αναλογίες: 1)  $\frac{\beta}{\alpha} = \frac{\delta}{\gamma}$ , 2)  $\frac{\alpha}{\gamma} = \frac{\beta}{\delta}$ , 3)  $\frac{\delta}{\beta} = \frac{\gamma}{\alpha}$

Πραγματικά:

$$1) \frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta} \Rightarrow \alpha\delta = \beta\gamma \Rightarrow \frac{\alpha\delta}{\alpha\gamma} = \frac{\beta\gamma}{\alpha\gamma} \Rightarrow \frac{\delta}{\gamma} = \frac{\beta}{\alpha}$$

$$2) \frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta} \Rightarrow \alpha\delta = \beta\gamma \Rightarrow \frac{\alpha\delta}{\gamma\delta} = \frac{\beta\gamma}{\gamma\delta} \Rightarrow \frac{\alpha}{\gamma} = \frac{\beta}{\delta}$$

$$3) \frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta} \Rightarrow \alpha\delta = \beta\gamma \Rightarrow \frac{\alpha\delta}{\alpha\beta} = \frac{\beta\gamma}{\alpha\beta} \Rightarrow \frac{\delta}{\beta} = \frac{\gamma}{\alpha}$$

\*Αν έχουμε μιá αναλογία με όρους διαφορετικούς από τó 0 και α) αντιστρέψουμε τους λόγους β) εναλλάξουμε τους μέσους όρους γ) εναλλάξουμε τους άκρους όρους της, παίρνουμε νέες αναλογίες.

### \*Εφαρμογή.

\*Από την αναλογία  $\frac{-12}{-6} = \frac{-10}{-5}$  να σχηματίσετε νέες αναλογίες.

1ο. \*Αντιστρέφουμε τους λόγους:  $\frac{-6}{-12} = \frac{-5}{-10}$

2ο. \*Εναλλάσσουμε τους μέσους όρους:  $\frac{-12}{-10} = \frac{-6}{-5}$

3ο. \*Εναλλάσσουμε τους άκρους όρους:  $\frac{-5}{-6} = \frac{-10}{-12}$

3. Να προσθέσετε τή μονάδα στους λόγους τής αναλογίας  $\frac{3}{5} = \frac{6}{10}$  και να εξετάσετε αν προκύπτει νέα αναλογία.

$$*Εχουμε: \frac{3}{5} = \frac{6}{10} \Leftrightarrow \frac{3}{5} + 1 = \frac{6}{10} + 1 \Leftrightarrow \frac{3}{5} + \frac{5}{5} = \frac{6}{10} + \frac{10}{10}$$

$$\Leftrightarrow \frac{3+5}{5} = \frac{6+10}{10} \cdot \left( \frac{8}{5} = \frac{16}{10} \right)$$

\*Αν στους ήγούμενους όρους μιās αναλογίας προσθέσουμε τους επόμενους, έχουμε πάλι αναλογία.

Γενικά:  $\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta} \Leftrightarrow \frac{\alpha+\beta}{\beta} = \frac{\gamma+\delta}{\delta}$



\*Αν αφαιρέσουμε από τους λόγους της αναλογίας  $\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta}$  τη μονάδα, έχουμε:

$$\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta} \Leftrightarrow \frac{\alpha}{\beta} - 1 = \frac{\gamma}{\delta} - 1 \Leftrightarrow \frac{\alpha}{\beta} - \frac{\beta}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta} - \frac{\delta}{\delta} \Leftrightarrow \frac{\alpha - \beta}{\beta} = \frac{\gamma - \delta}{\delta}$$

Νά διατυπώσετε κανόνα για την ισοδυναμία:

$$\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta} \Leftrightarrow \frac{\alpha - \beta}{\beta} = \frac{\gamma - \delta}{\delta}$$

### Εφαρμογές.

α) Νά βρεθεί ο  $x$  από την αναλογία  $\frac{28-x}{x} = \frac{2}{5}$ . έχουμε:

$$\begin{aligned} \frac{28-x}{x} = \frac{2}{5} &\Leftrightarrow \frac{28-x+x}{x} = \frac{2+5}{5} \Leftrightarrow \frac{28}{x} = \frac{7}{5} \Leftrightarrow 7x = 5 \cdot 28 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow x = \frac{5 \cdot 28}{7} \Leftrightarrow x = 5 \cdot 4 \Leftrightarrow x = 20. \end{aligned}$$

β) Νά βρεθούν δύο αριθμοί, που νά έχουν άθροισμα 50 και λόγο  $\frac{12}{13}$

\*Εστω  $x$  και  $\psi$  οι αριθμοί. \*Έχουμε  $x + \psi = 50$  και  $\frac{x}{\psi} = \frac{12}{13}$ .

\*Από την  $\frac{x}{\psi} = \frac{12}{13} \Leftrightarrow \frac{x+\psi}{\psi} = \frac{12+13}{13} \Leftrightarrow \frac{50}{\psi} = \frac{25}{13} \Leftrightarrow 25\psi = 13 \cdot 50 \Leftrightarrow$

$$\psi = \frac{13 \cdot 50}{25} \Leftrightarrow \psi = 13 \cdot 2 \Leftrightarrow \psi = 26. \text{ *Επομένως } x = 50 - 26 = 24.$$

4. Νά συγκρίνετε το λόγο  $\frac{2+8}{3+12}$  με τους λόγους της αναλογίας

$$\frac{2}{3} = \frac{8}{12}$$

Τί παρατηρείτε;

Παρατηρούμε ότι  $\frac{2+8}{3+12} = \frac{10}{15} = \frac{2}{3}$ .

\*Αρα  $\frac{2}{3} = \frac{8}{12} = \frac{2+8}{3+12}$ . Γενικά:  $\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta} = \frac{\alpha+\gamma}{\beta+\delta}$  ( $\beta \cdot \delta > 0$ ).

Πραγματικά: αν  $\frac{\alpha}{\beta} = \lambda$ , τότε και  $\frac{\gamma}{\delta} = \lambda$ . \*Επομένως έχουμε

$$\left. \begin{array}{l} \alpha = \beta\lambda \\ \gamma = \delta\lambda \end{array} \right\} \Rightarrow \alpha + \gamma = \beta\lambda + \delta\lambda \Rightarrow \alpha + \gamma = (\beta + \delta)\lambda \Rightarrow \frac{\alpha + \gamma}{\beta + \delta} = \lambda = \frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta}$$

\*Αν έχουμε ίσους λόγους με όμοσημους παρονομαστές, ο λόγος που έχει αριθμητή το άθροισμα των αριθμητών και παρονομαστή το άθροισμα των παρονομαστών είναι ίσος με τους αρχικούς λόγους.

Δηλαδή γενικότερα

$$\frac{\alpha_1}{\beta_1} = \frac{\alpha_2}{\beta_2} = \frac{\alpha_3}{\beta_3} = \dots = \frac{\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \dots}{\beta_1 + \beta_2 + \beta_3 + \dots}$$

**Σημείωση.** \*Αν οι παρονομαστές δεν είναι όμοσημοι, είναι δυνατόν να γίνουν όμοσημοι.

$$\text{Π.χ. } \frac{-2}{4} = \frac{5}{-10} = \dots$$

$$\text{*Έχουμε } \frac{-2}{4} = \frac{5(-1)}{-10 \cdot (-1)} = \dots \Leftrightarrow \frac{-2}{4} = \frac{-5}{10} = \dots$$

### Έφαρμογή.

\*Αν  $\frac{\alpha}{-5} = \frac{\beta}{-7} = \frac{\gamma}{-12}$  και  $\alpha + \beta + \gamma = 48$ , να βρεθούν οι  $\alpha, \beta, \gamma$ .

$$\text{*Έχουμε } \frac{\alpha}{-5} = \frac{\beta}{-7} = \frac{\gamma}{-12} = \frac{\alpha + \beta + \gamma}{-5 - 7 - 12} = \frac{48}{-24} = -2$$

$$\text{*Άρα } \frac{\alpha}{-5} = -2 \Rightarrow \alpha = (-5) \cdot (-2) \Rightarrow \alpha = 10$$

$$\frac{\beta}{-7} = -2 \Rightarrow \beta = (-7) \cdot (-2) \Rightarrow \beta = 14$$

$$\frac{\gamma}{-12} = -2 \Rightarrow \gamma = (-12) \cdot (-2) \Rightarrow \gamma = 24.$$

### Άσκησης:

234. Να βρεθούν οι άγνωστοι όροι των παρακάτω αναλογιών:

$$\alpha) \frac{-10}{x} = \frac{5}{4}, \quad \delta) \frac{x}{-4} = \frac{-25}{x}, \quad \zeta) \frac{8}{-4} = \frac{4}{x}, \quad \eta) \frac{6}{-3} = \frac{x}{2}$$

$$\beta) \frac{-9}{6} = \frac{6}{x}, \quad \epsilon) \frac{x}{-9} = \frac{-9}{27}, \quad \theta) \frac{2}{5} = \frac{6}{\psi}, \quad \iota\alpha) \frac{27}{42} = \frac{\psi}{70}$$

$$\gamma) \frac{2}{\beta} = \frac{10}{35}, \quad \sigma\tau) \frac{16}{\gamma} = \frac{\gamma}{9}, \quad \theta) \frac{4,5}{\psi} = \frac{\psi}{2}, \quad \eta\beta) \frac{-4}{7} = \frac{\gamma}{56}, \quad \eta\gamma) \frac{\alpha}{15} = \frac{15}{12}$$

235. Να αποδείξετε ότι αποτελούν αναλογία οι τετράδες:

$$\alpha) (15, 35, 9, 21) \quad \beta) (-12, 34, -18, 51)$$

$$\gamma) (9, 21, 21, 49) \quad \delta) (x, \psi, x^2, x\psi)$$

236. Να βρεθεί ο μέσος ανάλογος των 16 και 25.

237. Να βρεθούν οι ηγούμενοι όροι της αναλογίας

$$\frac{x}{6} = \frac{\psi}{7} \quad \alpha) \text{ αν } x + \psi = 65 \text{ και } \beta) \text{ αν } x - \psi = 78.$$

238. Να βρεθούν δύο αριθμοί, που να έχουν άθροισμα 560 και λόγο  $\frac{2}{5}$ .

239. Να βρεθούν δύο αριθμοί, που να έχουν διαφορά 200 και λόγο  $\frac{7}{5}$ .

240. \*Αν  $\frac{x}{2} = \frac{\psi}{3} = \frac{z}{5}$  και  $x + \psi + z = 200$ , να βρεθούν τα  $x, \psi, z$ .

241. Να βρεθούν οι επόμενοι όροι των ίσων λόγων  $\frac{2}{x} = \frac{3}{\psi} = \frac{4}{z}$ , αν  $x + \psi + z = 81$ .

242. \*Αν  $\frac{x}{\psi} = \frac{3}{4}$  και  $x + \psi = 56$ , να βρεθούν τα  $x$  και  $\psi$ .

243. \*Αν  $\frac{x-3}{x} = \frac{\psi-4}{\psi}$  και  $x + \psi = 84$ , να βρεθούν τα  $x$  και  $\psi$ .

## Β. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

### 1. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΛΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ

§ 102. Πρόβλημα 1<sup>ο</sup>. "Αν 6 εργάτες σκάβουν 3 στρέμματα σε 8 ώρες, πόσα στρέμματα θα σκάψουν 14 εργάτες σε 8 ώρες; (όλοι οι εργάτες έχουν την ίδια απόδοση).

"Εστω ότι στην τιμή «14 εργάτες» αντιστοιχεί η τιμή « $x$  στρέμματα». Σχηματίζουμε τον παρακάτω πίνακα.

Πλήθος εργατών	6	14	2πλάσιοι έργ. 12	3πλάσιοι έργ. 18	...
Τιμές έργου σε στρέμματα	3	$x$	2πλάσια στρέμ. 6	3πλάσια στρέμ. 9	...

"Επειδή τα μεγέθη πλήθος εργατών και έργο είναι ευθέως ανάλογα, ο λόγος δύο τιμών του ενός είναι ίσος με το λόγο των αντίστοιχων τιμών του άλλου, δηλαδή  $\frac{6}{14} = \frac{3}{x}$

$$\text{"Επομένως } \frac{6}{14} = \frac{3}{x} \Leftrightarrow 6x = 3 \cdot 14 \Leftrightarrow 6x = 42 \Leftrightarrow x = 7.$$

"Αρα οι 14 εργάτες θα σκάψουν 7 στρέμματα σε 8 ώρες.

#### Σημείωση 1.

Το παραπάνω πρόβλημα μπορούμε να το κατατάξουμε ως εξής:

Πλήθος εργατών της ίδιας απόδοσης	Τιμές έργου σε στρέμ.	Τιμές χρόνου σε ώρες
6	3	8
14	$x$	8

ή πιο απλά

6 εργάτες  $\rightarrow$  3 στρέμ.

14 »  $\rightarrow$   $x$  »

#### Σημείωση 2.

Σχηματίζουμε την αναλογία  $\frac{6}{3} = \frac{14}{x}$ , αν χρησιμοποιήσουμε την ιδιότητα: «Στα ευθέως ανάλογα ποσά οι λόγοι των αντίστοιχων τιμών είναι ίσοι». 'Αλλά και από αυτή την αναλογία βρίσκουμε  $x=7$ .

**Πρόβλημα 2<sup>ο</sup>.** "Αν 10 εργάτες σκάβουν σε 12 ημέρες 50 στρέμματα, 8 εργάτες σε πόσες ημέρες θα σκάψουν τὰ 50 στρέμματα; (όλοι οι εργάτες έχουν τὴν ἴδια ἀπόδοση καὶ ἐργάζονται τὶς ἴδιες ὥρες κάθε ἡμέρα).

"Εστω ὅτι οἱ 8 εργάτες θὰ σκάψουν σε  $\chi$  ἡμέρες τὰ 50 στρέμματα.

Σχηματίζουμε τὸν πίνακα:

Πλῆθος εργατῶν	10	8		20	5.
Τιμὲς χρόνου σὲ ἡμέρες	12	$\chi$		6	24

Ἐπειδὴ τὰ μεγέθη πλῆθος εργατῶν καὶ χρόνος εἶναι ἀντιστρόφως ἀνάλογα, ὁ λόγος δύο τιμῶν τοῦ ἑνὸς εἶναι ἴσος μὲ τὸν ἀντίστροφο λόγο τῶν ἀντίστοιχων τιμῶν τοῦ ἄλλου.

"Αρα ἔχουμε τὴν ἀναλογία  $\frac{10}{8} = \frac{\chi}{12}$ , ἀπὸ τὴν ὁποία βρίσκουμε  $\chi = 15$ .

Ἐπομένως οἱ 8 εργάτες θὰ σκάψουν σε 15 ἡμέρες τὰ 50 στρέμματα.

#### Σημείωση 1.

"Αν χρησιμοποιήσουμε τὴν ιδιότητα «στὰ ἀντιστρόφως ἀνάλογα μεγέθη τὰ γινόμενα τῶν ἀντίστοιχων τιμῶν εἶναι ἴσα», ἔχουμε  $10 \cdot 12 = 8 \cdot \chi \Leftrightarrow \chi = \frac{10 \cdot 12}{8} \Leftrightarrow$

$$\chi = \frac{120}{8} \Leftrightarrow \chi = 15.$$

#### Σημείωση 2.

Μποροῦμε νὰ κατατάξουμε τὸ παραπάνω πρόβλημα καὶ ὡς ἐξῆς:

Πλῆθος εργατῶν τῆς ἴδιας ἀποδόσεως	Τιμὲς χρόνου σὲ ἡμέρες	Τιμὲς ἔργου σὲ στρέμματα
10	12	50
8	$\chi$	50

ἢ  $10 \text{ εργάτες} \rightarrow 12 \text{ ἡμέρες}$   
 $8 \text{ » } \rightarrow \chi \text{ »}$

#### Προβλήματα:

244. Γιὰ τὰ  $\frac{3}{4}$  ἐνὸς ἔργου διατέθηκε τὸ ποσὸ τῶν 9.000 δρχ. Τὶ ποσὸ χρημάτων ἀντιστοιχεῖ στὰ  $\frac{5}{6}$  τοῦ ἴδιου ἔργου;

245. Για 100 ένδυμασίες χρειάζονται 300 m μήκος από ένα ύφασμα πλάτους 1,40 m. Για 125 όμοιες ένδυμασίες πόσο πρέπει να είναι το πλάτος του ύφασματος, αν το μήκος παραμένει σταθερό;

246. Ένα αυτοκίνητο κινείται διατηρώντας για  $\frac{8}{3}$  ώρες ταχύτητα 67,5 km/h. Πόσα km θα διανύσει με την ίδια ταχύτητα σε  $\frac{32}{9}$  ώρες;

247. Ένα αυτοκίνητο έχει ταχύτητα 56 km/h και διανύει απόσταση 182 km. Σε πόσες ώρες θα διανύσει την απόσταση αυτή, αν ελαττώσει την ταχύτητά του κατά το  $\frac{1}{14}$  της;

248. 50 στρατιώτες έχουν τροφές για 30 ημέρες. Πόσες ημέρες θα περάσουν με αυτές, αν αύξηθεί ή μειωθεί κατά το  $\frac{1}{5}$  της;

249. Συμφωνήθηκε να τελειώσει ένα έργο σε 25 ημέρες. Εάν 6 εργάτες τελειώσαν το  $\frac{1}{2}$  του έργου σε 10 ημέρες, πόσοι εργάτες πρέπει να χρησιμοποιηθούν, για να τελειώσει το υπόλοιπο έργο στην καθορισμένη προθεσμία;

250. 12 άνδρες εκτελούν ένα έργο σε 20 ημέρες. Σε πόσες ημέρες θα εκτελέσουν το ίδιο έργο 20 γυναίκες, αν η εργασία 4 ανδρών ισοδυναμεί με την εργασία 5 γυναικών;

## 2. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ

§ 103. **Πρόβλημα 1<sup>ο</sup>**. Ένα εμπόρευμα κόστους 800.000 δραχ. πουλήθηκε με κέρδος 12%. Πόσο ήταν το κέρδος;

Αν καλέσουμε  $x$  δραχ. το κέρδος, επειδή 12% σημαίνει «σε 100 μονάδες κόστους το κέρδος είναι 12» και το κέρδος θεωρείται ανάλογο του κόστους, έχουμε:

Κόστος	100	800.000
Κέρδος	12	$x$

$$\Rightarrow \frac{100}{800.000} = \frac{12}{x} \Rightarrow x = 96.000$$

\*Αρα το κέρδος είναι 96.000 δραχ.

Το κέρδος λέγεται ποσοστό επί του κόστους.

Στην πράξη και στην οικονομική ζωή ένα μέγεθος, που ονομάζεται **ποσοστό**, θεωρείται **ανάλογο** ενός άλλου μεγέθους, το οποίο καλείται **άρχικό μέγεθος** ή **άρχικό ποσό**.

Το ποσοστό και το άρχικό ποσό είναι όμοιδη μεγέθη, συνήθως νομισματικά ή μεγέθη βάρους ή όγκου.

Συμβολίζουμε με  $A$  το άρχικό μέγεθος και με  $\Pi$  το ποσοστό.

Το ποσοστό, που αντιστοιχεί σε 100 μονάδες άρχικού ποσού, λέγε-

ται «ποσόστωση» ή απλώς «ποσοστό» επί τοῖς ἑκατό. Τὸ συμβολίζουμε μὲ τὸ  $\epsilon$  καὶ γράφουμε  $\epsilon\%$ .

(Μποροῦμε νὰ ἔχουμε καὶ ποσοστὸ ἐπὶ 1000 μονάδων ἀρχικοῦ ποσοῦ, ὁπότε γράφουμε  $\epsilon\%$ ).

Τὸ ἐμπορικὸ κέρδος ἢ ἡ ζημία εἶναι ποσοστὰ ἐπὶ τῆς τιμῆς κόστους, ἢ ὅποια εἶναι γι' αὐτὰ ἀρχικὸ ποσό, (ἐκτὸς ἂν ὀρίζονται ρητῶς ἐπὶ τῆς τιμῆς πωλήσεως).

Τὰ ἔξοδα γιὰ μεταφορὰ - ἀποθήκευση - δασμούς, μὲ τὰ ὅποια ἐπιβαρύνεται ἓνα προϊόν, εἶναι ποσοστὸ μὲ ἀρχικὸ ποσὸ τὴν τιμὴ τῆς ἀγορᾶς.

Ἡ ἀμοιβὴ ἑνὸς ἐμπορικοῦ ἀντιπροσώπου εἶναι ποσοστὸ μὲ ἀρχικὸ ποσὸ τὴν τιμὴ πωλήσεως τῶν προϊόντων, τὰ ὅποια διαθέτει.

Τὸ ἀπόβαρο (βάρους συσκευασίας ἑνὸς προϊόντος) εἶναι ποσοστὸ μὲ ἀρχικὸ ποσὸ τὸ μεικτὸ βάρους.

Τὸ βάρους ἑνὸς διαλυμένου σώματος εἶναι ποσοστὸ μὲ ἀρχικὸ ποσὸ τὸ βάρους τοῦ διαλύματος.

Ἄν  $A$ ,  $\Pi$ ,  $\epsilon\%$  εἶναι ἀντιστοιχῶς τὸ ἀρχικὸ ποσὸ, τὸ ποσοστὸ καὶ ἡ ποσόστωση (ποσοστὸ ἐπὶ τοῖς ἑκατό) ἔχουμε τὸν πίνακα:

Ἀρχικὸ ποσὸ	$A$	100	καὶ ἀπ' αὐτὸν τὴν ἀναλογία $\frac{A}{100} = \frac{\Pi}{\epsilon}$ , ἀπὸ τὴν ὁποία παίρνουμε τοὺς τύπους $A = \frac{100}{\epsilon} \cdot \Pi$ , $\Pi = \frac{\epsilon}{100} \cdot A$ .
Ποσοστὸ	$\Pi$	$\epsilon$	

**Πρόβλημα 2<sup>ο</sup>.** Ἐνα ἐμπόρευμα πωλήθηκε 805.000 δρχ. μὲ κέρδος 15%. Πόσο κόστιζε τὸ ἐμπόρευμα;

Ἄν  $\chi$  δρχ. εἶναι τὸ κόστος, τὸ ποσοστὸ θὰ εἶναι 805.000 -  $\chi$  δρχ. Κατατάσσουμε αὐτὰ σὲ πίνακα, γράφουμε τὴν ἀναλογία καὶ βρίσκουμε τὸν  $\chi$ .

$A$	100	$\chi$	$\Rightarrow \frac{\chi}{100} = \frac{805000 - \chi}{15} \Leftrightarrow \dots \chi = 700000$
$\Pi$	15	805000 - $\chi$	

Ἐπειδὴ ἔχουμε  $\frac{A}{100} = \frac{\Pi}{\epsilon} = \frac{A + \Pi}{100 + \epsilon}$  (ιδιότητα τῶν ἀναλογιῶν), τὰ  $A$ ,  $A + \Pi$  εἶναι μεγέθη ἀνάλογα, καθὼς ἐπίσης καὶ τὰ  $\Pi$ ,  $A + \Pi$ . Τὸ  $A + \Pi$  εἶναι τὸ ἀρχικὸ ποσὸ, τὸ ὁποῖο ἔχει αὐξηθεῖ κατὰ τὸ ἀντίστοιχο ποσοστὸ  $\Pi$ .

Μποροῦμε λοιπὸν νὰ χρησιμοποιήσουμε καὶ τὸν ἐξῆς πίνακα:

$A$	100	$\chi$	$\Rightarrow \frac{\chi}{805000} = \frac{100}{115} \Leftrightarrow 115\chi = 805.000 \cdot 100$
$A + \Pi$	115	805000	

$$\Leftrightarrow \chi = \frac{805.000 \cdot 100}{115} \Leftrightarrow \chi = 7000 \cdot 100 \Leftrightarrow \chi = 700.000$$

Άρα τὸ κόστος εἶναι 700.000 δρχ.

**Σημείωση 1.** Ἀπὸ τὴν ἀναλογία  $\frac{A}{100} = \frac{\Pi}{\epsilon} \Rightarrow \frac{A}{100} = \frac{A-\Pi}{100-\epsilon}$  καὶ  $\frac{\Pi}{\epsilon} = \frac{A-\Pi}{100-\epsilon}$ . Τὸ  $A-\Pi$  εἶναι τὸ ἀρχικὸ ποσὸ ἐλαττωμένο κατὰ τὸ ἀντίστοιχο ποσοστὸ. Τὸ μέγεθος αὐτὸ εἶναι ἀνάλογο καὶ πρὸς τὸ ἀρχικὸ ποσὸ  $A$  καὶ πρὸς τὸ ποσοστὸ  $\Pi$ . Ἀπὸ τὴς προηγούμενες ἀναλογίες προκύπτουν καὶ οἱ παρακάτω τύποι γιὰ τὰ  $A$  καὶ  $\Pi$ .

$$A = \frac{(A-\Pi) \cdot 100}{100-\epsilon}, \quad \Pi = \frac{(A-\Pi) \cdot \epsilon}{100-\epsilon} \text{ καὶ ἀντιστοιχῶς οἱ: } A = \frac{(A+\Pi) \cdot 100}{100+\epsilon}$$

$$\Pi = \frac{(A+\Pi) \cdot \epsilon}{100+\epsilon} \quad (\text{Πρόβλ. 2})$$

**Σημείωση 2.** Οἱ παραπάνω ὀριζόντιοι πίνακες χρησιμοποιοῦνται καὶ κατακόρυφα.

**Πρόβλημα 3<sup>ο</sup>.** Τὸ καθαρὸ βάρους ἑνὸς ἐμπορεύματος εἶναι 1067 kgr\*. Ἄν τὸ ἀπόβαρό του εἶναι 3%, πόσο εἶναι τὸ μεικτὸ βάρους του καὶ πόσο τὸ ἀπόβαρό του;

α) Ἐστω  $\chi$  kgr\* τὸ μεικτὸ βάρους. Τὸ ἀντίστοιχο ἀπόβαρο εἶναι  $\chi - 1067$  kgr\*

A	Π
100	3
$\chi$	$\chi - 1067$

$$\Rightarrow \frac{\chi}{100} = \frac{\chi - 1067}{3} \Leftrightarrow \dots \chi = 1100$$

Μποροῦμε νὰ χρησιμοποιήσουμε τὸν πίνακα:

A	Π
100	97
$\chi$	1067

$$\Rightarrow \frac{\chi}{100} = \frac{1067}{97} \Leftrightarrow 97\chi = 106700 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \chi = \frac{106700}{97} \Leftrightarrow \chi = 1100$$

Άρα τὸ μεικτὸ βάρους εἶναι 1100 kgr\*.

β) Τὸ ἀπόβαρο εἶναι  $1100 - 1067 = 33$  kgr\*.

Μποροῦμε νὰ τὸ βροῦμε καὶ ἀπ' εὐθείας.

\*Εστω  $\chi$  kgr\* τὸ ἀπόβαρο. \*Έχουμε τὸν πίνακα.

Π	A-Π
3	97
$\chi$	1067

$$\Rightarrow \frac{\chi}{3} = \frac{1067}{97} \Leftrightarrow \chi = \frac{1067 \cdot 3}{97} \Leftrightarrow \chi = 11.3 \Leftrightarrow \chi = 33$$

**Πρόβλημα 4<sup>ο</sup>.** \*Ένας ἔμπορος ἀγοράζει ἐμπόρευμα καὶ πληρώνει 82.000 δρχ. \*Έχει ἔξοδα 12% (ἐπὶ τῆς τιμῆς ἀγορᾶς) καὶ πουλᾷ μὲ κέρδος 15% (ἐπὶ τοῦ κόστους). Πόσες δρχ. θὰ πουλήσει τὸ ἐμπόρευμα;

\*Υπολογίζουμε πρῶτα τὸ κόστος· ἔστω ὅτι αὐτὸ εἶναι  $\chi$  δρχ.

A	A+Π
100	112
82000	$\chi$

$$\Rightarrow \chi = 91840$$

\*Υπολογίζουμε τώρα τὴν τιμὴ πωλήσεως  $\psi$  δρχ.

A	A+Π
100	115
91840	$\psi$

$$\Rightarrow \frac{\psi}{115} = \frac{91840}{100} \Leftrightarrow \psi = \frac{91840 \cdot 115}{100} \Leftrightarrow \psi = 105616$$

\*Άρα ἡ τιμὴ πωλήσεως τοῦ ἐμπορεύματος εἶναι 105.616 δρχ.

**Παρατήρηση.** Στὸ ἴδιο ἀποτέλεσμα καταλήγουμε, ἂν κάνουμε τὴν κατάταξη:

$\chi$  δρχ. πώληση      82000 δρχ. ἀγορά

100 δρχ. ἀγορά      112 δρχ. κόστος

100 δρχ. κόστος      115 δρχ. πώληση καὶ σχηματίζουμε τὴν ἐξίσωση:

$\chi \cdot 100 \cdot 100 = 82000 \cdot 112 \cdot 115$  ἢ ὅποια, ὅταν ἐπιλυθεῖ, δίνει

$$\chi = \frac{82000 \cdot 112 \cdot 115}{100 \cdot 100} \Leftrightarrow \chi = \frac{1056160000}{10000} \Leftrightarrow \chi = 105616.$$



### Προβλήματα:

251. "Ενας έμπορος πούλησε έμπορεύματα με κέρδος 20% και εισέπραξε 360.000 δρχ. Ποιά είναι ή αξία του έμπορεύματος;
252. "Ενας έμπορος πούλησε έμπορεύματα με κέρδος 15% και κέρδισε 60.000 δρχ. Ποιά είναι ή αξία του έμπορεύματος;
253. Τό μεικτό βάρος ενός προϊόντος είναι 375 kgι\* και τό καθαρό 300 kgι\*. Πόσο τοίς εκατό είναι τό άπόβαρο α) έπί του μικτού βάρους και β) έπί του καθαρού βάρους;
254. "Ενα άντικείμενο αξίας 3750 δρχ. πουλήθηκε με κέρδος 25% έπί του κόστους. Ποιά είναι ή τιμή πωλήσεως και πόσο είναι τό κέρδος;
255. "Εάν τό κέρδος με 20% είναι 4940 δρχ, ποιά είναι ή τιμή πωλήσεως και ποίο τό κόστος;
256. Μιά τηλεόραση πουλήθηκε με έκπτωση 30% 4550 δρχ. Πόσο ήταν τό κόστος και πόση ή έκπτωση;
257. "Ενας έμπορος πουλά τόν τ. πήχη όσο αγοράζει τό m. Πόσο τοίς εκατό κερδίζει;
258. "Εάν ένας έμπορος πουλά με κέρδος 25% έπί τής τιμής αγοράς, πόσο τοίς εκατό κερδίζει έπί τής τιμής πωλήσεως;
259. "Εάν ένας έμπορος πουλούσε τό έμπορεύμα του 11500 δρχ, θά κέρδιζε 15% έπί του κόστους του. Τό πούλησε όμως 9500 δρχ. Πουλήθηκε τό έμπορεύματα πάνω ή κάτω από τό κόστος του και πόσο τοίς εκατό έπί του κόστους;
260. "Ενας έμπορος πούλησε ένα άντικείμενο με ζημία 7%. "Εάν τό πουλούσε με κέρδος 3%, θά έπαιρνε 750 δρχ. περισσότερο. Ποίο ήταν τό κόστος του άντικειμένου;
261. Πόσο αγοράστηκε ένα έμπορεύματα, που έπιβαρύνθηκε με έξοδα 10% και πουλήθηκε με κέρδος 11% 183150 δρχ.;
262. Δύο άντικείμενα κοστίζουν μαζί 5000 δρχ. και πουλήθηκαν τό α' με κέρδος 20% και τό β' με κέρδος 15%. "Αν τό όλικό κέρδος ήταν 900 δρχ., νά βρεθεί τό κόστος του καθενός.
263. "Ενας έμπορος ύπολογίζει νά κερδίσει 25% έπί του κόστους ενός έμπορεύματος. Τό πούλησε όμως με υπερτίμηση 5% έπί τής τιμής που έγραφε πάνω. Πόσο τοίς εκατό κέρδισε έπί του κόστους;
264. "Ενας έμπορος γράφει πάνω σ' ένα έμπορεύματα τιμή κατά 30% άνωτερη από τό κόστος και τό πουλά με έκπτωση κερδίζοντας έτσι 23,50% έπί του κόστους. Ποιά είναι ή έκπτωση έπί τής τιμής που γράφει πάνω;

### 3. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ

#### § 104. Πρόβλημα.

$3 m^3$  τοίχου χτίζονται από 5 χτίστες σε 2 ήμέρες

$6 m^3$  τοίχου χτίζονται από ; χτίστες σε 2 ήμέρες

$9 m^3$  τοίχου χτίζονται από ; χτίστες σε 2 ήμέρες

$6 m^3$  τοίχου χτίζονται από 5 χτίστες σε ; ήμέρες

$12 m^3$  τοίχου χτίζονται από 5 χτίστες σε ; ήμέρες

Νά συμπληρωθούν οι τιμές «πλήθος χτιστών» και «τιμή χρόνου».

Οί άπαντήσεις είναι με τή σειρά 10 χτίστες, 15 χτίστες, 4 ήμέρες, 8 ήμέρες, διότι τὸ μέγεθος «τιμὴ ἔργου» εἶναι ἀνάλογο με καθένα ἀπὸ τὰ μεγέθη «πλήθος ἔργατῶν», «τιμὴ χρόνου», ἐφόσον τὸ ἄλλο διατῆρεῖ τὴν ἴδια τιμὴ (παραμένει σταθερὸ).

Λέμε ὅτι τὸ μέγεθος «τιμὴ χρόνου» εἶναι ἀνάλογο πρὸς τὸ ζεῦγος τῶν μεγεθῶν «πλήθος ἔργατῶν», «τιμὴ χρόνου».

Σχηματίζουμε τὸν παρακάτω πίνακα ἀντίστοιχων τιμῶν.

Τιμὴ ἔργου $\chi$	3	6	9	6	12
Πλήθος ἔργατῶν $\psi$	5	10	15	5	5
Τιμὴ χρόνου $z$	2	2	2	4	8
Γινόμενο $\psi \cdot z$	10	20	30	20	40

καὶ παρατηροῦμε ὅτι, ὅταν πολλαπλασιάζεται μιὰ τιμὴ τοῦ  $\chi$  ἐπὶ ἕναν ἀριθμὸ, πολλαπλασιάζεται μιὰ ἀπὸ τὶς τιμὲς  $\psi$  ἢ  $z$  με τὸν ἴδιο ἀριθμὸ (ἐφόσον ἡ ἄλλη παραμένει σταθερή). Ἐπομένως τὸ γινόμενο τῶν ἀντίστοιχων τιμῶν  $\psi \cdot z$  πολλαπλασιάζεται με τὸν ἴδιο ἀριθμὸ (σύμφωνα με τὴν προσεταιριστικὴ ιδιότητα τοῦ πολλαπλασιασμοῦ).

Δηλαδή τὸ μέγεθος  $\chi$  εἶναι ἀνάλογο πρὸς τὸ μέγεθος  $\psi \cdot z$ . Ἀπ' αὐτὰ συμπεραίνουμε ὅτι:

**1. Ἐνα μέγεθος εἶναι ἀνάλογο πρὸς ἕνα ζεῦγος, μιὰ τριάδα, κ.ο.κ. μεγεθῶν, ὅταν εἶναι ἀνάλογο πρὸς καθένα ἀπὸ αὐτὰ, ἐφόσον τὰ ἄλλα διατηροῦνται σταθερά.**

**2. Ἄν ἕνα μέγεθος εἶναι ἀνάλογο πρὸς ἕνα ζεῦγος, μιὰ τριάδα κ.ο.κ. μεγεθῶν, εἶναι ἀνάλογο πρὸς τὸ γινόμενό τους.**

Ἄν στὸ ζεῦγος ἢ τὴν τριάδα ὑπάρχει ἕνα μέγεθος π.χ. τὸ  $\psi$  ἀντιστρόφως ἀνάλογο τοῦ  $\chi$ , τότε τὸ ἀντικαθιστοῦμε με ἐκεῖνο, τὸ ὁποῖο ἔχει τὶς ἀντίστροφες τιμὲς, δηλαδή τὸ  $\frac{1}{\psi}$ , γιατί, ὅπως μάθαμε, οἱ τιμὲς τοῦ  $\chi$  εἶναι ἀνάλογες πρὸς τὶς ἀντίστροφες τῶν τιμῶν τοῦ  $\psi$ .

**Ἐφαρμογές. 1.** Ἐνα οἰκόπεδο ἔχει μῆκος 32m, πλάτος 30m καὶ τιμὴ 480.000 δρχ. Πόσο πλάτος θὰ εἶχε, ἂν εἶχε μῆκος 20m καὶ τιμὴ 450000 δρχ.;

Καλοῦμε  $\chi$  δρχ. τὸ ζητούμενο καὶ κατατάσσουμε σὲ πίνακα τὶς ἀντίστοιχες τιμὲς, ὀριζοντίως.

Πλάτος	Μήκος	Χρηματική τιμή
30	32	480000
χ	20	450000

Συγκρίνουμε το μέγεθος του άγνωστου με το μέγεθος του ζεύγους τῶν γνωστών.

Ἐπειδὴ τὸ μέγεθος πλάτος εἶναι ἀντιστρόφως ἀνάλογο τοῦ μήκους καὶ εὐθέως ἀνάλογο τῆς χρημ. τιμῆς, εἶναι ἀνάλογο τοῦ γινομένου  $\frac{1}{\text{μήκος}} \cdot \text{χρημ. τιμῆ}$ .

$$\text{Συνεπῶς ἔχουμε τὴν ἀναλογία} \quad \frac{30}{\chi} = \frac{\frac{1}{32} \cdot 480000}{\frac{1}{20} \cdot 450000}$$

$$\text{Ἀπὸ τὴν ἀναλογία αὐτὴ προκύπτει ἢ} \quad \frac{\chi}{30} = \frac{32 \cdot 450000}{20 \cdot 480000} \quad \text{ἢ} \quad \chi = 30 \cdot \frac{32}{20} \cdot \frac{450000}{480000} \quad (1).$$

Τελικὰ βρίσκουμε  $\chi = 45$ . Ἄρα τὸ οἰκόπεδο θὰ εἶχε πλάτος 45 m.

**Παρατήρηση.** Ἡ ἐξίσωση (1) δικαιολογεῖ τὸν γνωστὸ κανόνα ἀπὸ τὸ Δημοτικὸ Σχολεῖο: ὁ  $\chi$  ἰσοῦται μετὰ τὸν ὑπεράνω τοῦ ἀριθμοῦ ἐπὶ τὰ κλάσματα κάθε στήλης ἀντιστραμμένα, ὅταν τὸ ποσὸ εἶναι ἀνάλογο πρὸς τὸ ποσὸ τοῦ ἀγνώστου, καὶ ἐπὶ τὰ κλάσματα ὅπως εἶναι, ὅταν τὸ ποσὸ εἶναι ἀντιστρόφως ἀνάλογο.

2. 8 ἔργατες τελειώνουν ἓνα ἔργο σὲ 12 ἡμέρες, ὅταν ἐργάζονται 7 ὥρες τὴν ἡμέρα. Σὲ πόσες ἡμέρες 18 ἔργατες θὰ τελειώσουν τὸ 3πλάσιο τοῦ ἔργου, ὅταν ἐργάζονται 8 ὥρες τὴν ἡμέρα. (Οἱ ἔργατες εἶναι τῆς ἴδιας ἀποδόσεως).

Ἄν ἐργαστοῦμε ὅπως προηγουμένως, ἔχουμε:

Ἡμέρες ἐργασίας	Πλῆθος ἐργατῶν	Ὡρες ἐργασίας	Ἔργο
12	8	7	1
χ	18	8	3

Ἐπειδὴ τὸ μέγεθος «ἡμ. ἐργασ.» εἶναι ἀντιστρ. ἀνάλογο τοῦ «πλῆθος ἐργατῶν» καὶ τοῦ «ὥρες ἐργασίας» καὶ ἀνάλογο τοῦ «ἔργου», θὰ εἶναι

ἀνάλογο τοῦ γινομένου : «  $\frac{1}{\text{πλ. ἐργ.}}$  » · «  $\frac{1}{\text{ὠρ. ἐργ.}}$  » · « ἔργο ».

ἡμ. ἐργασίας

$$\begin{aligned} \text{Ἐπομένως} \quad 12 &\rightarrow \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{7} \cdot 1 \\ \chi &\rightarrow \frac{1}{18} \cdot \frac{1}{8} \cdot 3 \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad \frac{12}{\chi} = \frac{\frac{1}{8} \cdot \frac{1}{7} \cdot 1}{\frac{1}{18} \cdot \frac{1}{8} \cdot 3}$$

$$\Leftrightarrow \chi \cdot \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{7} = 12 \cdot \frac{1}{18} \cdot \frac{1}{8} \cdot 3 \Leftrightarrow \frac{\chi}{8 \cdot 7} = \frac{12 \cdot 3}{18 \cdot 8} \Leftrightarrow \chi = 12 \cdot \frac{8}{18} \cdot \frac{7}{8} \cdot \frac{3}{1}$$

$\Leftrightarrow \chi = 14$ . Το τριπλάσιο έργο θα τελειώσει σε 14 ημέρες.

3. Ένας έμπορικός αντιπρόσωπος που περιοδεύει (πλασιέ) πληρώνεται με 3% κάθε έτος επί της τιμής πωλήσεως των προϊόντων που πουλά. Η προμήθεια όμως διπλασιάζεται, τριπλασιάζεται, κ.ο.κ., αν πετύχει τις πωλήσεις στο  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$  κ.ο.κ. του καθορισμένου χρόνου. Κάποτε πούλησε έμπορεύματα μέσα σε 3 μήνες, και, αφού κράτησε την προμήθειά του, παρέδωσε στον εργοδότη του 88.000 δρχ. Τί ποσό κράτησε;

Ο αντιπρόσωπος κράτησε την προμήθειά του, που είναι ανάλογη προς την τιμή πωλήσεως (όταν ο χρόνος παραμένει σταθερός) και αντίστροφως ανάλογη προς το χρόνο (όταν η τιμή πωλήσεως παραμένει σταθερή).

Αν  $\chi$  δρχ. είναι η προμήθειά του, η αντίστοιχη σ' αυτήν τιμή πωλήσεως είναι  $88000 + \chi$  και ο χρόνος είναι 3 μήνες. Αν η τιμή πωλήσεως είναι 100 δρχ. και ο χρόνος 12 μήνες, η προμήθεια είναι 3 δρχ.

Προμήθεια	Τιμή πωλήσεως	Χρόνος
3	100	12
$\chi$	$88000 + \chi$	3
Προμήθεια	Τιμή πωλήσεως επί $\frac{1}{\text{χρόνος}}$	
3	$100 \cdot \frac{1}{12}$	
$\chi$	$(88000 + \chi) \cdot \frac{1}{3}$	

$$\Rightarrow \frac{\chi}{3} = \frac{\frac{1}{3}(88000 + \chi)}{\frac{1}{12} \cdot 100} \Leftrightarrow$$

$$100\chi = 12(88000 + \chi) \Leftrightarrow 100\chi = 12 \cdot 88000 + 12\chi \Leftrightarrow 100\chi - 12\chi = 12 \cdot 88000 \Leftrightarrow 88\chi = 12 \cdot 88000 \Leftrightarrow \chi = \frac{12 \cdot 88000}{88} \Leftrightarrow \chi = 12 \cdot 1000 \Leftrightarrow \chi = 12000. \text{ Έκράτησε για προμήθεια } 12000 \text{ δρχ.}$$

### Προβλήματα :

265. 8 εργάτες τελειώνουν ένα έργο σε 12 ημέρες με 7 ώρες εργασία την ημέρα. Σε πόσες ημέρες θα τελειώσουν το ίδιο έργο 12 εργάτες, όταν εργάζονται 8 ώρες την ημέρα;

266. 9 εργάτες σκάβουν 18 στρέμματα σε 6 ημέρες, αν εργάζονται 8 ώρες την ημέρα. Σε πόσες ημέρες 8 εργάτες θα σκάψουν 16 στρέμματα, αν εργάζονται 8 ώρες την ημέρα;

267. 20 εργάτες με εργασία 8 ώρες την ημέρα τελείωσαν τα  $\frac{2}{5}$  ενός έργου σε 14 ημέρες. Πόσες ώρες την ημέρα πρέπει να εργάζονται 16 εργάτες, για να τελειώσουν το υπόλοιπο έργο σε 30 ημέρες;

268. Για το πάτωμα ενός δωματίου αγοράστηκαν 700 σανίδες μήκους 3,4 dm και πλάτους 6 cm. Πόσες σανίδες μήκους 3 dm και πλάτους 7 cm θα χρειαστούν για το ίδιο πάτωμα;

269. Ένας ράφτης χρειάζεται ύφασμα 60 m μήκους και 1 m πλάτους για 20 δμοιες ένδυμασις. Πόσα m μήκος θα χρειαστεί για 18 δμοιες ένδυμασις, αν τὸ πλάτος τοῦ ὑφάσματος εἶναι 1,2 m;

270. Ἐνα πλοῖο ἀναχώρησε γιὰ ταξίδι 45 ἡμερῶν μὲ 35 ἐπιβάτες. Τὸ ἀπόθεμα τῶν τροφίμων τοῦ ἐπιτρέπει νὰ παρέχεται στοὺς ἐπιβάτες ἡμερήσια μερίδα τροφίμων 1200 gr\*. Ὑστερ' ἀπὸ 15 ἡμέρες περισυλλέγει ναυαγούς καὶ συντομεύει τὸ ταξίδι τοῦ κατὰ 5 ἡμέρες, ἐνῶ ἡ μερίδα τῶν τροφίμων περιορίζεται σὲ 1008 gr\*. Πόσους ναυαγούς περισυνέλεξε τὸ πλοῖο;

271. Οἱ ἐπιστήμονες ὑπολόγισαν ὅτι τὸ βῆρος ἐνὸς σώματος εἶναι ἀνάλογο πρὸς τὴ μάζα τοῦ πλανήτη, πᾶνω στὸν ὅποιο βρίσκεται, καὶ ἀντιστρόφως ἀνάλογο πρὸς τὸ τετράγωνο τῆς ἀκτίνας τοῦ. Νὰ ὑπολογισθεῖ τὸ βῆρος ἐνὸς ἀστροναύτη στὴ Σελήνη, ἀν αὐτὸς ζυγίζει στὴ Γῆ 70 kg\*. Οἱ μάζες Γῆς καὶ Σελήνης εἶναι ἀντίστοιχα  $6.10^{21}$  lοη καὶ  $7,5 \cdot 10^{19}$  lοη καὶ οἱ ἀκτίνες τοὺς 6400 km, 1740 km.

272. Μεταξὺ παραγωγῶν καὶ μιᾶς ἐταιρείας μεταφορῶν ἔγινε ἡ ἑξῆς συμφωνία: Ἡ ἐταιρεία θὰ παίρνει 5% ἐπὶ τῆς τιμῆς πωλήσεως τῶν πρώιμων λαχανικῶν, τὰ ὁποῖα θὰ μεταφέρει στὴ Δυτικὴ Γερμανία μέσα σὲ 10 ἡμέρες, καὶ ἡ ἀμοιβὴ τῆς θὰ εἶναι ἐπίσης καὶ ἀντιστρόφως ἀνάλογη πρὸς τὸ χρόνο μεταφορᾶς. Ἡ ἐταιρεία μετέφερε προϊόντα μέσα σ' 6 ἡμέρες. Αὐτὰ πωλήθηκαν καὶ οἱ παραγωγοὶ εἰσέπραξαν ἕνα ποσό, ποῦ ἀφαιρώντας τὴν ἀμοιβὴ τῆς ἐταιρείας ἔμεινε 102000 δρχ. Ποῖα ἦταν ἡ τιμὴ πωλήσεως τῶν προϊόντων;

### ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΚΟΥ

§ 105. Ἄν καταθέσουμε στὴν τράπεζα ἕνα ποσό χρημάτων καὶ μετὰ ἀπὸ ὀρισμένο χρόνο τὸ ἀποσύρουμε, θὰ πάρουμε αὐτὸ καὶ ἐπὶ πλέον ἕνα ἄλλο χρηματικὸ ποσό, ποῦ λέγεται **τόκος**.

Ὁ τόκος δηλαδὴ εἶναι τὸ κέρδος ποῦ παίρνουμε, ὅταν τοκίζουμε τὰ χρήματά μας.

Τὰ χρήματα, ποῦ καταθέτουμε στὴν Τράπεζα ἢ δανείζουμε σὲ ἰδιώτες, χρησιμοποιοῦνται σὲ διάφορες ἐπιχειρήσεις μὲ σκοπὸ τὴν παραγωγὴ κέρδους. Ἀπὸ τὸ κέρδος ποῦ δίνουν αὐτά, εἶναι δίκαιο νὰ παίρνουμε κι ἐμεῖς ἕνα μέρος, δηλαδὴ τὸν τόκο.

**Ἐπιτόκιο** εἶναι ὁ τόκος τῶν 100 νομισματικῶν μονάδων σ' ἕνα ἔτος.

Ὁ τόκος εἶναι ἀνάλογος πρὸς τὸ κεφάλαιο, πρὸς τὸ χρόνο, κατὰ τὸν ὅποιο τοκίζεται αὐτὸ, καὶ πρὸς τὸ ἐπιτόκιο.

**Σημείωση.** Ἄν κάποιος δανειστεῖ π.χ. 100 δρχ. γιὰ ἕνα ἔτος μὲ 6%, στὸ τέλος τοῦ ἔτους θὰ ἐπιστρέφει 106 δρχ. δηλ. τὸ κεφάλαιο καὶ τὸν ἀντίστοιχο τόκο του· αὐτὸ λέγεται **αὐξημένο κεφάλαιο** κατὰ τὸν ἀντίστοιχο τόκο του.

Σὲ μερικές περιπτώσεις ὁ δανειστὴς κρατεῖ προκαταβολικὰ τὸν τόκο καὶ ὁ ὀφειλέτης παίρνει σὰν δάνειο 94 δρχ. αὐτὸ λέγεται **ἐλαττωμένο κεφάλαιο** κατὰ τὸν ἀντίστοιχο τόκο του. Στὸ τέλος τοῦ ἔτους θὰ ἐπιστρέφει στὸ δανειστὴ 100 δρχ.

β) Ἄν καταθέσουμε στὴν τράπεζα ἕνα κεφάλαιο, μᾶς δίνουν ἕνα βιβλιᾶριο, στὸ ὁποῖο ἀναγράφεται ὁ ἀριθμὸς τοῦ λογαριασμοῦ μας, τὸ ὀνοματεπώνυμό μας, ἡ διεύθυνσή μας, τὸ ποσό ποῦ καταθέσαμε, καὶ ἡ ἡμερομηνία καταθέσεως.

Συνήθως οι τράπεζες υπολογίζουν τους τόκους κατά τὸ τέλος τοῦ Ἰουνίου καὶ τὸ τέλος τοῦ Δεκεμβρίου κάθε ἔτους. Ἄν δὲν ἀποσύρουμε τοὺς τόκους τὴν ἡμέρα, κατὰ τὴν ὁποία υπολογίζονται, τότε γιὰ τὸ ἐπόμενο ἐξάμηνο τὸ κεφάλαιο ἔχει ἀυξηθεῖ κατὰ τὸν τόκο του. (Ἡ πρόσθεση τῶν τόκων στὸ κεφάλαιο λέγεται κεφαλοποίηση τῶν τόκων).

Τὸ ἴδιο γίνεται καὶ στὰ Ταχ. Ταμειυτήρια, ἀλλὰ ἐκεῖ οἱ τόκοι υπολογίζονται στὸ τέλος κάθε ἔτους.

\*Ἄν γίνεται κεφαλοποίηση τῶν τόκων, τότε ἔχουμε σύνθετο τόκο ἢ ἀνατοκισμό.

Στὰ παρακάτω προβλήματα τὸ κεφάλαιο παραμένει σταθερὸ σ' ὅλη τὴ διάρκεια τοῦ τοκισμοῦ του.

\*Ὅταν πρόκειται γιὰ τράπεζα ἢ ταμειυτήριο, θεωροῦμε ὅτι οἱ τόκοι ἀποσύρονται κατὰ τὴν ἡμέρα τοῦ ὑπολογισμοῦ τους (δηλαδὴ δὲν γίνεται κεφαλοποίησή τους).

**Πρόβλημα 1.** Ποιὸς εἶναι ὁ τόκος ἑνὸς κεφαλαίου 20000 δρχ. σὲ 3 ἔτη μὲ 5%.

Κεφάλαιο	Χρόνος	Τόκος
100	1	5
20000	3	χ

\*Ἐπειδὴ ὁ τόκος εἶναι ἀνάλογος πρὸς τὸ κεφάλαιο καὶ πρὸς τὸ χρόνο, θὰ εἶναι ἀνάλογος καὶ πρὸς τὸ γινόμενο «Κεφάλαιο» ἐπὶ «Χρόνος». Συνεπῶς ἔχουμε:

Κεφάλαιο·χρόνος	Τόκος
100·1	5
20000·3	χ

$$\Leftrightarrow \frac{100 \cdot 1}{20000 \cdot 3} = \frac{5}{\chi} \Leftrightarrow 100\chi = 20000 \cdot 5 \cdot 3 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \chi = \frac{20000 \cdot 5 \cdot 3}{100} \quad (1) \Leftrightarrow \chi = 3000.$$

\*Ἄρα ὁ τόκος εἶναι 3000 δρχ.

\*Ἄν εἶναι τ ὁ τόκος, κ τὸ κεφάλαιο, ε τὸ ἐπιτόκιο καὶ t ὁ χρόνος καὶ ἐργαστοῦμε ὅπως καὶ στὴν ἐξίσωση (1), θὰ ἔχουμε τὸν τύπο

$$T = \frac{\kappa \cdot \epsilon \cdot t}{100}$$

Τὸν τύπο αὐτὸ τὸν βρίσκουμε καὶ ὡς ἐξῆς.

\*Ἐπειδὴ 100 δρχ. φέρνουν τόκο ε σὲ 1 ἔτος

ἢ 1 δρχ. θὰ φέρει τόκο  $\frac{\epsilon}{100}$  σὲ 1 ἔτος καὶ

οἱ κ δρχ. θὰ φέρουν τόκο  $\kappa \cdot \frac{\epsilon}{100}$  σὲ 1 ἔτος

Οἱ κ δρχ. σὲ t ἔτη θὰ φέρουν τόκο  $\kappa \cdot \frac{\epsilon}{100} \cdot t$  δρχ. \*Ἄρα  $T = \frac{\kappa \cdot \epsilon \cdot t}{100}$

**Σημείωση 1.** Στόν τύπο του τόκου ή μεταβλητή  $t$  παριστάνει τιμές χρόνου σε έτη. Άν έχουμε μήνες ή ημέρες, τότε ο πιο πάνω τύπος γίνεται:  $t = \frac{\kappa \cdot \epsilon \cdot \mu}{1200}$  ή  $t = \frac{\kappa \cdot \epsilon \cdot \eta}{36000}$  (μ είναι ή τιμή του χρόνου σε μήνες και η ή τιμή του χρόνου σε ημέρες).

2. Το έμπορικό έτος το θεωρούμε με 360 ημέρες και κάθε μήνα με 30 ημέρες.

3. Ο τύπος  $t = \frac{\kappa \cdot \epsilon \cdot \eta}{36000}$  παίρνει τή μορφή  $t = \frac{\kappa \cdot \eta}{36000} = \frac{\nu}{\delta}$

Το πηλίκο  $\frac{36000}{\epsilon}$  λέγεται σταθερός διαιρέτης και το γινόμενο  $\kappa \cdot \eta = \nu$  λέγεται τοκάρηθος. Άρα ο τόκος ίσοῦται με το πηλίκο του τοκαρίθμου δια τοῦ σταθεροῦ διαιρέτη.

**Πρόβλημα 2.** Ποιό κεφάλαιο σε 11 μήνες, όταν τοκίζεται με 6%, φέρνει τόκο 1100 δρχ.;

\*Έστω  $\chi$  δρχ. το κεφάλαιο. Άπό τον τύπο του τόκου  $t = \frac{\kappa \cdot \epsilon \cdot \mu}{1200}$  παίρνουμε τήν εξίσωση  $1100 = \frac{\chi \cdot 6 \cdot 11}{1200} \Leftrightarrow 1100 \cdot 1200 = 6 \cdot 11 \cdot \chi \Leftrightarrow \chi = \frac{1200 \cdot 1100}{6 \cdot 11} \Leftrightarrow \chi = 200 \cdot 100 \Leftrightarrow \chi = 20.000$ . Άρα το κεφάλαιο είναι 20.000 δρχ.

**Πρόβλημα 3.** Σε πόσο χρόνο κεφάλαιο 18.000 δρχ. όταν τοκίζεται με 8%, φέρνει τόκο 160 δρχ.;

\*Έστω  $\chi$  έτη ο χρόνος. Άπό τον τύπο  $t = \frac{\kappa \cdot \epsilon \cdot t}{100}$  παίρνουμε τήν εξίσωση  $160 = \frac{18000 \cdot 8 \cdot \chi}{100} \Leftrightarrow 160 = 180 \cdot 8 \cdot \chi \Leftrightarrow \chi = \frac{160}{180 \cdot 8} \Leftrightarrow \chi = \frac{20}{180} \Leftrightarrow \chi = \frac{1}{9}$ . Έπομένως ο χρόνος είναι  $\frac{1}{9}$  έτη ή  $\frac{1}{9} \cdot 12 = \frac{4}{3}$  μήνες ή  $\frac{4}{3} \cdot 30 = 40$  ημέρες.

**Πρόβλημα 4.** Με ποιό επιτόκιο πρέπει να τοκίσουμε 45000 δρχ., για να πάρουμε μετά 52 ημέρες 260 δρχ. τόκο;

\*Αντικαθιστούμε τα δεδομένα στον τύπο  $t = \frac{\kappa \cdot \epsilon \cdot \eta}{36000}$  και επιλύουμε τήν εξίσωση ως προς τον άγνωστο  $\epsilon$ .

$$260 = \frac{45000 \cdot 52 \cdot \epsilon}{36000} \Leftrightarrow 260 = \frac{45 \cdot 52 \cdot \epsilon}{36} \Leftrightarrow 45 \cdot 52 \cdot \epsilon = 260 \cdot 36 \Leftrightarrow \epsilon = \frac{260 \cdot 36}{45 \cdot 52} \Leftrightarrow \epsilon = 4.$$

\*Άρα  $\epsilon\% = 4\%$  δηλαδή πρέπει να τοκίσουμε με 4%.

**Πρόβλημα 5.** Ποιό κεφάλαιο όταν τοκίζεται με 5% για 72 ημέρες γίνεται με τον τόκο του 10100 δρχ.;

\*Έχουμε κεφάλαιο συν τόκος ίσον 10100 δρχ. Άν  $\chi$  δρχ. είναι το κε-

φάλαιο, παίρνουμε την εξίσωση  $x + \frac{x \cdot 5 \cdot 72}{36000} = 10100 \Leftrightarrow x + \frac{x \cdot 360}{360 \cdot 100} = 10100 \Leftrightarrow x + \frac{x}{100} = 10100 \Leftrightarrow 100x + x = 1010000 \Leftrightarrow 101x = 1010000 \Leftrightarrow x = \frac{101 \cdot 10000}{101} \Leftrightarrow x = 10000$ . Το κεφάλαιο είναι 10000 δρχ.

**Πρόβλημα 6.** Κάποιος τόκισε τα  $\frac{3}{5}$  του κεφαλαίου του με 5,5% και το υπόλοιπο με 4,5%. Αν από το α' μέρος του κεφαλαίου πήρε μετά ένα έτος 120 δρχ. τόκο περισσότερο παρά από το β' μέρος, να βρεθεί το κεφάλαιο.

\*Εστω  $x$  δρχ. το κεφάλαιο. Το α' μέρος είναι  $\frac{3}{5}x$  και ο τόκος του  $\frac{3}{5}x \cdot 5,5 \cdot 1$ . Το β' μέρος είναι  $\frac{2}{5}x$  και ο τόκος του (σ' ένα έτος):  $\frac{2}{5}x \cdot 4,5 \cdot 1$ .

\*Έχουμε όμως: Τόκος α' μέρους πλην τόκος β' μέρους ίσον 120 δρχ.  
\*Έχουμε συνεπώς την εξίσωση

$$\begin{aligned} \frac{\frac{3}{5}x \cdot 5,5}{100} - \frac{\frac{2}{5}x \cdot 4,5}{100} &= 120 \Leftrightarrow \frac{3x \cdot 1,1}{100} - \frac{2x \cdot 0,9}{100} = 120 \\ \Leftrightarrow \frac{3,3x - 1,8x}{100} &= 120 \Leftrightarrow \frac{1,5x}{100} = 120 \Leftrightarrow 1,5x = 12000 \Leftrightarrow x = \frac{12000}{1,5} \\ \Leftrightarrow x &= 8000. \text{ Το κεφάλαιο είναι } 8000 \text{ δρχ.} \end{aligned}$$

**Σημείωση.** Ο τόκος ενός κεφαλαίου 6000 δρχ. με 6% για 89 ημέρες βρίσκεται σύντομα με τον τύπο

$$t = \frac{v}{\delta} = \frac{6000 \cdot 89}{36000} = \frac{6000 \cdot 89}{6000} = 89. \text{ Ο τόκος είναι } 89 \text{ δρχ.}$$

\*Όταν το κεφάλαιο Ισοῦται με το σταθερό διαιρέτη, ο τόκος είναι ίσος με τον αριθμό των ημερών.

### Προβλήματα.

273. Πόσο τόκο φέρνουν α) 16000 δρχ. με 4,5% για 8 μήνες;  
β) 4500 δρχ. με 8% για 179 ημέρες;  
γ) 7200 δρχ. με 5% για 211 ημέρες;  
δ) 12000 δρχ. με 6% για 97 ημέρες;

274. Να βρεθεί το κεφάλαιο, αν  $\epsilon\% = 5\%$ , ο τόκος είναι 345 δρχ. και ο χρόνος 115 ημέρες.

275. Να βρεθεί η χρόνος, αν  $\epsilon\% = 6\%$ , ο τόκος είναι 138 δρχ. και το κεφ. 4600 δρχ.

276. Να βρεθεί το επιτόκιο, αν το κεφ. είναι 3600 δρχ., ο τόκος 480 δρχ. και ο χρόνος 20 μήνες.



277. Ποιό κεφάλαιο σε 100 ημέρες με 4,5% φέρνει τόκο, όσο δίνει κεφάλαιο 8000 δρχ. σε 6 μήνες με 5%;

278. Τα  $\frac{5}{8}$  ενός κεφαλαίου τοκίστηκαν με 6,5% και σε 5 μήνες έδωσαν τόκο 650 δρχ.

Ποιό ήταν τὸ κεφάλαιο;

279. Κεφάλαιο 37500 δρχ. τοκίστηκε με 6% κι έγινε με τὸν τόκο του 37750 δρχ. Νὰ βρεθῆ ὁ χρόνος.

280. Δανειστήκαμε 1200 δρχ. με 9% και πληρώσαμε στὶς 2 Φεβρουαρίου γιὰ κεφάλαιο και τόκο 1386 δρχ. Πότε δανειστήκαμε τὸ κεφάλαιο;

281. Μὲ ποιὸ ἐπιτόκιο ἕνα κεφάλαιο 12000 δρχ. έδωσε τόκο 1250 δρχ. σε χρόνο ἴσο με τὸ χρόνο, κατὰ τὸν ὁποῖο τοκίστηκαν 3600 δρχ. με 4% κι έγιναν μαζί με τὸν τόκο τους 4000 δρχ.;

282. Κεφάλαιο 111000 δρχ. κατατέθηκε σε μιὰ τράπεζα στὶς 14 Μαρτίου και στὶς 17 Ὀκτωβρίου τοῦ ἐπόμενου ἔτους ἀποσύρθηκε μαζί με τοὺς τόκους του. Ποιὸ ἦταν τὸ ἐπιτόκιο, ἂν κεφάλαιο και τόκος μαζί έγιναν 121600,50 δρχ.;

283. Ποιὸ κεφάλαιο σε 40 μήνες με 4,5% έγινε μαζί με τὸν τόκο του 13800 δρχ. (Ἄν  $\chi$  δρχ. τὸ κεφάλαιο, ὁ τόκος του θὰ εἶναι  $\frac{\chi \cdot 4,5 \cdot 40}{1200}$  και  $\chi + \frac{\chi \cdot 4,5 \cdot 40}{1200} = 13800$ )

284. Δανειστήκαμε ἕνα ποσὸ χρημάτων με τὴ συμφωνία νὰ κρατηθοῦν οἱ τόκοι προκαταβολικά. Ποιὸ ἦταν τὸ κεφάλαιο, ἂν μᾶς έδωσαν 9800 δρχ. και κράτησαν τόκους 4 μηνῶν με 6%; (Κεφάλαιο πλὴν τόκος = 9800 δρχ.:  $\kappa - \frac{\kappa \cdot \epsilon \cdot \mu}{1200} = 9800$ ).

285. Ἐτόκισε κάποιος τὰ  $\frac{2}{3}$  τοῦ κεφαλαίου του με 4% και τὸ ὑπόλοιπο με 5% και πῆρε σε ἕνα ἔτος τόκο 546 δρχ. Ποιὸ ἦταν τὸ κεφάλαιο;

## 5. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΦΑΙΡΕΣΕΩΣ

### § 106. α) Γραμμάτια.

Ἐκεῖνος ποὺ δανεῖζεται χρήματα ἢ ἀγοράζει ἐμπορεύματα με πίστωση (δὲν πληρώνει ἀμέσως τὴν ἀξία τους) δίνει στὸν δανειστὴ ἢ στὸν πιστωτὴ μιὰ ἔγγραφη ὑπόσχεση πληρωμῆς τοῦ χρέους του. Τὸ ἔγγραφο αὐτὸ λέγεται **γραμμάτιο**.

#### Τύπος γραμματίου

Ἐν Ἀθήναις τῇ 20ῇ Μαρτίου 1970 Διὰ δραχμᾶς 5000.

Μετὰ δύο μῆνας ἀπὸ σήμερον, ἦτοι τὴν 20ην Μαΐου 1970, ὑπόσχομαι νὰ πληρώσω εἰς τὸν κ. Α..... ἢ εἰς διαταγὴν αὐτοῦ τὸ ἄνω ποσὸν τῶν πέντε χιλιάδων δραχμῶν (5000), ὅπερ ἔλαβον παρ' αὐτοῦ ὡς δάνειον.

Χαρτόσημον

Β.....

(Ἐπογραφή και Δ/σις ὀφειλέτου)

Συνήθως στις έμπορικες συναλλαγές γίνεται χρήση ενός έγγραφου, πού λέγεται **συναλλαγματική**. Τη συναλλαγματική την εκδίδει ο πιστωτής και την αποδέχεται ο όφειλέτης με την ύπογραφή του.

### Τύπος συναλλαγματικής

Λήξις τῆ 20 - 5 - 1970.

Συναλλαγματική διὰ δρχ. 5000.

Τὴν 20ὴν Μαΐου 1970 πληρώσατε δυνάμει τῆς παρούσης μόνης Συναλλαγματικῆς εἰς διαταγὴν μου καὶ εἰς.....τὸ ἄνω ποσὸν τῶν πέντε χιλιάδων δραχμῶν, ὧν τὸ ἰσότιμον ἐλάβετε παρ' ἐμοῦ εἰς ἐμπορεύματα τῆς τελείας ἀρεσκείας σας καὶ ἐν ὑπερμερίᾳ μετὰ τοῦ νομίμου τόκου ἀπὸ τῆς λήξεως μέχρις ἐξοφλήσεως.



Πρὸς τὸν κ. Β..... Ἐν Ἀθήναις τῆ 20-3-1970  
 Δ/νσις..... ὁ ἐκδότης  
 Ἐν Ἀθήναις τῆ 20-3-1970 Α.....  
 Δεκτὴ (Ὑπογραφή καὶ Δ/νσις)  
 Β.....  
 (ὑπογραφή)

Τὸ ποσό, πού ἀναγράφεται στὴν ἔγγραφη ὑπόσχεση, λέγεται **ὄνομαστικὴ ἀξία** τοῦ γραμματίου. Αὐτὴ τὴ συμβολίζουμε μὲ ο.

Ἡ ἡμερομηνία, κατὰ τὴν ὁποία πρέπει νὰ πληρωθεῖ τὸ γραμμάτιο, εἶναι ἡ **λήξις** τοῦ γραμματίου.

### β) Ὁπισθογράφηση καὶ προεξόφληση γραμματίου.

Ὑποθέτουμε ὅτι ὁ κ. Α. εἶναι κάτοχος τοῦ πῶς πάνω γραμματίου ὀνομ. ἀξίας 5000 δρχ., τὸ ὁποῖο λήγει μετὰ ἀπὸ 2 μῆνες. Μετὰ ἀπὸ 20 ἡμέρες ἀπὸ τὴν ἐκδοσὴ τοῦ γραμματίου (ἢ 40 ἡμέρες πρὶν ἀπὸ τὴ λήξη του, δηλαδὴ στὶς 10-4-1970) ὁ κ. Α. ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ χρήματα καὶ μεταβιβάζει, δηλαδὴ πουλᾷ τὸ γραμμάτιο σ' ἕνα τρίτο πρόσωπο (ἢ συνήθως στὴν Τράπεζα) ἀφοῦ προηγουμένως ὑπογράφει στὴν πίσω ὄψη του γιὰ τὴ μεταβίβαση ἢ πώληση αὐτὴ. Αὐτὴ ἡ πράξη λέγεται **ὀπισθογράφηση τοῦ γραμματίου**. Ὁ πωλητὴς κ. Α. λέγεται καὶ **κομιστὴς** τοῦ γραμματίου.

Ὁ ἀγοραστὴς τοῦ γραμματίου κρατεῖ ἀπὸ τὴν ὄν. ἀξία του τὸν τόκο τῆς γιὰ 40 ἡμέρες μὲ ἕνα ὀρισμένο ἐπιτόκιο π.χ. 4,5% ( $5000 \cdot \frac{4,5}{100} \cdot \frac{40}{360} = 25$ ) καὶ τὸ ὑπόλοι-

πο (5000 - 25 = 4975) τὸ δίνει στὸν κομιστὴ κ. Α. Ἡ διαδικασία αὐτὴ λέγεται **προ-εξόφληση τοῦ γραμματίου**. Ὁ χρόνος μεταξύ ἡμερομηνίας προεξοφλήσεως καὶ λήξεως τοῦ γραμματίου λέγεται καὶ **προθεσμία**.

Τὸ ποσὸ τῶν 25 δρχ., πού κρατεῖ ὁ ἀγοραστής, λέγεται **ἐξωτερικὴ ὑφαίρεση**. Τὴ συμβολίζουμε μὲ τὸ γράμμα υ. (Γενικὰ ὑφαίρεση εἶναι ἡ ἐκπτώση, πού γίνεται σ' ἕνα γραμμάτιο, ὅταν προεξοφλεῖται, δηλαδή ὅταν πληρώνεται πρὶν ἀπὸ τὴ λήξη του). Στὰ ἐπόμενα θὰ λέμε ὑφαίρεση καὶ θὰ ἔννοοῦμε ἐξωτερικὴ ὑφαίρεση). Τὸ ποσὸ 4975 δρχ. = 5000 δρχ. - 25 δρχ. λέγεται **παρούσα ἀξία** τοῦ γραμματίου καὶ ἰσοῦται μὲ τὴ διαφορά τῆς ἐξ. ὑφ. ἀπὸ τὴν ὄν. ἀξία. Ἄν συμβολίσουμε μὲ π τὴν παρούσα ἀξία, ἔχουμε τὶς παρακάτω ἰσοδυναμίες:

$$\pi = 0 - u \Leftrightarrow \pi + u = 0 \Leftrightarrow u = 0 - \pi \quad (1)$$

Ἐπειδὴ ἡ ὑφαίρεση εἶναι ὁ τόκος τῆς ὀνομαστικῆς ἀξίας, τὰ προβλήματα τῆς ὑφαίρεσεως ἐπιλύονται μὲ τοὺς τύπους τοῦ τόκου, εἰς τοὺς ὁποίους τὸ κεφάλαιο κ ἀντικαθίσταται μὲ τὴν ὄν. ἀξία ο καὶ τὸ τ μὲ τὸ υ. π.χ.

Τύπος τοῦ τόκου	Τύπος τῆς ἐξ. ὑφαίρεσεως
$\tau = \frac{\kappa \cdot \epsilon \cdot t}{100}$	$u = \frac{o \cdot \epsilon \cdot t}{100}$

**Σημείωση.** Ἐνα γραμμάτιο ἢ μιὰ συναλλαγματικὴ, πού δὲν περιέχει τὶς λέξεις «εἰς διαταγήν», δὲν μπορεῖ νὰ μεταβιβασθεῖ σὲ ἄλλον.

Στὰ παρακάτω προβλήματα θὰ χρησιμοποιήσουμε τὴ λέξη «γραμμάτιο» καὶ θὰ ἔννοοῦμε ἔγγραφο ὑπόσχεση (γραμμάτιο ἢ συναλλαγματικὴ), ἡ ὁποία μεταβιβάζεται σ' ἕνα τρίτο πρόσωπο ἢ στὴν Τράπεζα.

### Παραδείγματα:

**1<sup>ο</sup>.** Ἐνα γραμμάτιο ὄν. ἀξίας 3000 δρχ. προεξοφλήθηκε τὴν 10η Μαΐου μὲ 6% γιὰ 2980 δρχ. Πότε ἔληγε τὸ γραμμάτιο;

Ἄν χ ἔτη εἶναι ὁ χρόνος μεταξύ προεξοφλήσεως καὶ λήξεως τοῦ γραμματίου, ἀπὸ τὸν τύπο  $u = 0 - \pi$  βρισκόμε τὴν ὑφαίρεση 20 δρχ. καὶ ἀπὸ τὸν τύπο  $u = \frac{o \cdot \epsilon \cdot t}{100}$  ἔχουμε τὴν ἐξίσωση  $20 = \frac{3000 \cdot 6 \cdot \chi}{100} \Leftrightarrow 20 = 30 \cdot 6 \cdot \chi \Leftrightarrow \chi = \frac{20}{180} \Leftrightarrow \chi = \frac{1}{9}$ . Ὁ χρόνος εἶναι  $\frac{1}{9}$  ἔτη ἢ  $\frac{1}{9} \cdot 360$  ἡμέρες = 40 ἡμέρες. Ἄρα τὸ γραμμάτιο ἔληγε στὶς 20 Ἰουνίου τοῦ ἴδιου ἔτους.

**2<sup>ο</sup>.** Νὰ βρεθεῖ ἡ ὄν. ἀξία καὶ ἡ ὑφαίρεση ἑνὸς γραμματίου, τὸ ὁποῖο προεξοφλήθηκε 40 ἡμέρες πρὶν ἀπὸ τὴ λήξη του μὲ 9% γιὰ 1980 δρχ.

Ἄν εἶναι χ δρχ ἡ ὄν. ἀξία του, ἡ ὑφαίρεση θὰ εἶναι  $\frac{\chi \cdot \epsilon \cdot \eta}{36000}$  καὶ ὁ τύπος  $0 - u = \pi$  γίνεται:

$$\chi - \frac{\chi \cdot \epsilon \cdot \eta}{36000} = \pi. \text{ Ἄπ' αὐτὸν τὸν τύπο λαμβάνουμε τὴν ἐξίσωση } \frac{\chi \cdot 9 \cdot 40}{36000} = 1980 \Leftrightarrow \chi - \frac{\chi}{100} = 1980 \Leftrightarrow 100\chi - \chi = 198000 \Leftrightarrow 99\chi = 198000 \Leftrightarrow \chi = \frac{198000}{99} \Leftrightarrow \chi = 2000. \text{ Ἡ ὄν. ἀξία τοῦ γραμματίου εἶναι 2000 δρχ. καὶ ἡ ὑφαίρεση } 2000 \text{ δρχ.} - 1980 \text{ δρχ.} = 20 \text{ δρχ.}$$

### Προβλήματα.

286. Ποιά είναι ή έξ. ύφαίρεση και ή παρ. άξία ενός γραμματίου όνομ. άξίας 2600 δρχ., τό όποίο προεξοφλήθηκε 2 μήνες πριν από τή λήξη του με 6% ;

287. Νά βρεθεί ή όνομ. άξία και ή παρ. άξία ενός γραμματίου, που προεξοφλήθηκε 5 μήνες πριν από τή λήξη του με 7,2% και είχε έξ. ύφαίρεση 60 δρχ.

288. Ποιός ήταν ό χρόνος από τήν προεξόφληση μέχρι τήν λήξη ενός γραμματίου 2160 δρχ., που προεξοφλήθηκε με 8% για 2131,2 δρχ.;

289. Με ποιό έπιτόκιο προεξοφλήθηκε ένα γραμμάτιο 3200 δρχ. 50 ήμέρες πριν από τή λήξη του για 3168 δρχ.;

290. Νά βρεθεί ή έξ. ύφαίρεση ενός γραμματίου, που προεξοφλήθηκε 3 μήνες πριν από τή λήξη του για 2751 δρχ. με 7%.

291. Ένα γραμμάτιο, που έπρεπε νά πληρωθεί στις 28 'Ιουνίου, προεξοφλήθηκε για 2970 δρχ. στις 13 Μαΐου (του ίδιου έτους) με 8%. Ποιά ήταν ή όνομ. άξία του;

292. Ένα γραμμάτιο προεξοφλήθηκε 80 ήμέρες πριν από τή λήξη του με 9% για 4410 δρχ. Τι κέρδος θά είχε ό κομιστής, εάν ή προεξόφληση γινόταν με 8% ;

293. Έάν ή όνομ. άξία είναι 1600 δρχ., ε% = 9% και ή παρ. άξία είναι 1562 δρχ., νά βρεθεί ό χρόνος.

294. Έάν ή όνομ. άξία είναι 1200 δρχ., ή παρ. άξία είναι 1155 δρχ. και ό χρόνος είναι 5 μήνες, νά βρεθεί τό έπιτόκιο.

295. Έάν ή παρ. άξία είναι 4900 δρχ., ε% = 6% και ό χρόνος είναι 4 μήνες, νά βρεθεί ή όνομ. άξία.

296. Δύο γραμμάτια, που έχουν άθροισμα όνομ. άξιών 14400 δρχ., προεξοφλούνται μαζί με 6% για 14214 δρχ. Άν τό α' έληγε μετά από 3 μήνες και τό β' μετά από 2 μήνες, νά ύπολογισθεί ή όνομ. άξία του κάθε γραμματίου.

### 6. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ.

§ 107. Άν ένας μαθητής έχει 8 στα γραπτά ενός μαθήματος και 12 στα προφορικά, τότε ό βαθμός του σ' αυτό τό μάθημα θά είναι  $\frac{8+12}{2} = 10$ . Ό αριθμός 10 λέγεται μέσος όρος τών αριθμών 8 και 12.

Άν οι βαθμοί του μαθητή στα μαθήματά του είναι: 10, 11, 17, 12, 14, 13, 16, 14, 15, 17, τότε ό γενικός βαθμός στο ένδεικτικό του θά είναι ό αριθμός  $\frac{10+11+17+12+14+13+16+14+15+17}{10} = \frac{139}{10} = 13\frac{9}{10}$ , ό όποιος είναι ό μέσος όρος τών βαθμών του μαθητή.

Γενικά: Άριθμητικός μέσος όρος διάφορων όμοειδών αριθμών λέγεται τό **πηλίκιο τής διαιρέσεως του άθροίσματός των δια του πλήθους των.**

Άν  $\chi_1, \chi_2, \chi_3, \dots, \chi_n$  είναι όμοειδείς αριθμοί ( $n \in \mathbb{N}$ ), τότε ό αριθμός  $\frac{\chi_1 + \chi_2 + \chi_3 + \dots + \chi_n}{n} = \chi_\mu$  είναι ό μέσος όρος τους. Έπειδή  $\chi_1 + \chi_2 + \dots + \chi_n = n \cdot \chi_\mu$ , λέμε ότι τό άθροισμα τών αριθμών, που μās έχουν δοθεί, είναι ίσο με τό γινόμενο του μέσου όρου τους επί τό πλήθος τους.

**Σημείωση.** Αν ο αριθμός  $\chi_1$  εμφανίζεται  $\kappa_1$  φορές, ο  $\chi_2$   $\kappa_2$  φορές και ο  $\chi_3$   $\kappa_3$  φορές, τότε  $\chi_{\mu} = \frac{\kappa_1\chi_1 + \kappa_2\chi_2 + \kappa_3\chi_3}{\kappa_1 + \kappa_2 + \kappa_3}$

### Εφαρμογές.

1. Να βρεθεί ο αριθμός, ο οποίος είναι ο μέσος όρος των 15 και 20.

\*Έχουμε  $\frac{15+20}{2} = \frac{35}{2} = 17,5$ . Παρατηρούμε ότι  $15 < 17,5 < 20$  και ότι  $17,5 - 15 = 20 - 17,5$ .

Ο μέσος όρος των αριθμών  $\alpha$  και  $\beta$  είναι ο  $\frac{\alpha+\beta}{2}$ , ο οποίος περιέχεται μεταξύ των  $\alpha$  και  $\beta$  (π.χ. αν  $\alpha < \beta \Rightarrow \alpha < \frac{\alpha+\beta}{2} < \beta$ ) και είναι  $\frac{\alpha+\beta}{2} - \alpha = \beta - \frac{\alpha+\beta}{2}$ .

2. Αν ο βαθμός στα προφορικά ενός μαθητή σ' ένα μάθημα είναι 11 και στον έλεγχο του ο μ. όρος είναι 13 σ' αυτό το μάθημα, ποιός είναι ο βαθμός στα γραπτά;

\*Αν  $\chi$  είναι ο βαθμός των γραπτών του, έχουμε  $\frac{11+\chi}{2} = 13 \Leftrightarrow 11+\chi=26 \Leftrightarrow \chi=15$ .

### Προβλήματα:

297. Να βρεθεί η μέση θερμοκρασία ενός ασθενούς σε μία ημέρα, αν θερμομετρήθηκε τρεις φορές κι έδειξε θερμοκρασία 38 β., 38,7 β. και 38,2 β.

298. Να βρεθεί ο μέσος όρος των αριθμών 7, 10, 13, 16, 19. Επίσης των αριθμών 7 και 19. Τί παρατηρείτε;

299. Να βρεθεί ο μ. ό. των 10, 14, 18, 22. Επίσης των 10 και 22. Τί παρατηρείτε;

300. Να βρεθεί το άθροισμα των άκεραίων από 1 ως 49 (Βρείτε πρώτα τον μ. ό.)

301. Ο μ. ό. των βαθμών σε τρία μαθήματα ήταν 14,5. Κατόπι μεταβλήθηκε ο βαθμός στο ένα μάθημα και ο μ. ό. έγινε 15, 5. Πόσο αυξήθηκε ο βαθμός σ' αυτό το μάθημα;

## 7. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΡΙΣΜΟΥ

### § 108. Πρόβλημα 1<sup>ο</sup>.

Να μερισθεῖ ὁ ἀριθμὸς 100 σὲ μέρη ἀνάλογα πρὸς τοὺς ἀριθμοὺς 2, 3 καὶ 5,

\*Αν  $\chi, \psi, z$  είναι οἱ ἀριθμοὶ ποὺ ζητοῦμε, θὰ ἔχουμε  $\chi + \psi + z = 100$  καὶ ἐπειδὴ εἶναι ἀνάλογοι πρὸς τοὺς 2, 3 καὶ 5, θὰ ἔχουμε ἴσους λόγους:

$$\frac{\chi}{2} = \frac{\psi}{3} = \frac{z}{5} \Leftrightarrow \frac{\chi}{2} = \frac{\psi}{3} = \frac{z}{5} = \frac{\chi + \psi + z}{2 + 3 + 5} = \frac{100}{10} = 10.$$

\*Αρα  $\frac{\chi}{2} = 10 \Leftrightarrow \chi = 20$ ,  $\frac{\psi}{3} = 10 \Leftrightarrow \psi = 30$  καὶ  $\frac{z}{5} = 10 \Leftrightarrow z = 50$

### Πρόβλημα 2<sup>ο</sup>.

Νὰ μερισθεῖ ὁ 130 σὲ μέρη ἀντιστρόφως ἀνάλογα τῶν ἀριθμῶν 2, 3 καὶ 4.

\*Αν  $\chi, \psi, z$  εἶναι τὰ μέρη τοῦ 130, θὰ εἶναι  $\chi + \psi + z = 130$ .

Ἐπειδὴ οἱ  $\chi, \psi, z$  εἶναι ἀντιστρόφως ἀνάλογοι τῶν 2, 3, 4, θὰ εἶναι ἀνάλογοι τῶν  $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}$ . Ἐπομένως:

$$\frac{\chi}{\frac{1}{2}} = \frac{\psi}{\frac{1}{3}} = \frac{z}{\frac{1}{4}} \Leftrightarrow \frac{\chi}{\frac{1}{2} \cdot 12} = \frac{\psi}{\frac{1}{3} \cdot 12} = \frac{z}{\frac{1}{4} \cdot 12}$$

$$\Leftrightarrow \frac{\chi}{6} = \frac{\psi}{4} = \frac{z}{3} = \frac{\chi + \psi + z}{6 + 4 + 3} = \frac{130}{13} = 10. \text{ Ἄρα } \chi = 60, \psi = 40, z = 30.$$

**Πρόβλημα 3ο.** Ἐνα κεφάλαιο 10000 δρχ. εἶχε κατατεθεῖ γιὰ 6 μῆνες καὶ ἕνα ἄλλο 9000 δρχ. γιὰ 10 μῆνες μὲ τὸ ἴδιο ἐπιτόκιο. Ἄν καὶ τὰ δύο κεφάλαια ἔφεραν 500 δρχ. τόκο, πόσος τόκος ἀναλογεῖ σὲ κάθε κεφάλαιο;

Ἐστω  $\chi$  δρχ. ὁ τόκος ποὺ ἀντιστοιχεῖ στὸ κεφάλαιο τῶν 10000 δρχ. καὶ  $\psi$  δρχ. ὁ τόκος ποὺ ἀντιστοιχεῖ στὸ κεφάλαιο τῶν 9000 δρχ.

Γνωρίζουμε ὅτι ὁ τόκος εἶναι ἀνάλογος πρὸς τὸ κεφάλαιο καὶ πρὸς τὸ χρόνο, ἐπομένως θὰ εἶναι ἀνάλογος καὶ πρὸς τὸ γινόμενο «κεφάλαιο ἐπὶ χρόνο».

$$\begin{aligned} \text{Συνεπῶς } \frac{\chi}{10000 \cdot 6} &= \frac{\psi}{9000 \cdot 10} \Leftrightarrow \frac{\chi}{6} = \frac{\psi}{9} \Leftrightarrow \frac{\chi}{2} = \frac{\psi}{3} = \frac{\chi + \psi}{2 + 3} = \\ &= \frac{500}{5} = 100. \end{aligned}$$

$$\text{Ἄρα } \frac{\chi}{2} = 100 \Leftrightarrow \chi = 200 \text{ καὶ } \frac{\psi}{3} = 100 \Leftrightarrow \psi = 300.$$

Οἱ τόκοι εἶναι 200 δρχ. καὶ 300 δρχ. ἀντιστοίχως.

#### Σημείωση.

Ἄν  $t_1, t_2$  εἶναι τιμὲς τοῦ τόκου

$k_1, k_2$  τιμὲς τοῦ κεφαλαίου

$t_1, t_2$  τιμὲς τοῦ χρόνου, ἔχουμε τὸν πίνακα

T	$T_1$	$T_2$
K	$K_1$	$K_2$
t	$t_1$	$t_2$
Kt	$K_1 t_1$	$K_2 t_2$

καὶ ἀπ' αὐτὸν τὴν ἀναλογία  $\frac{T_1}{K_1 t_1} = \frac{T_2}{K_2 t_2}$ .

Ἄν  $t_1 = t_2$  μερίζουμε τὸν τόκο (ἢ τὸ κέρδος) ἀναλόγως τῶν κεφαλαίων.

Ἄν  $k_1 = k_2$  μερίζουμε τὸν τόκο (ἢ τὸ κέρδος) ἀναλόγως τῶν χρόνων.

(Τὸ ἐπιτόκιο θεωρεῖται σταθερὸ. Εἶναι δυνατόν νὰ βρεθεῖ τὸ ἐπιτόκιο στὸ 3ο πρόβλημα;)

**Πρόβλημα 4<sup>ο</sup>.** Ένα χρηματικό έπαθλο από 4840 δρχ. πρόκειται να μοιραστεί στους τρεις πρώτους δρομείς, οι οποίοι πέτυχαν τις εξής τιμές χρόνου επίδοσης (σ' ένα αγώνισμα δρόμου μιάς απόστάσεως): ο πρώτος τερμάτισε σε 2,4 min, ο β' σε 2,7 min και ο γ' σε 3 min. Πόσες δρχ. θα πάρει ο καθένας;

Έστω  $\chi$  δρχ,  $\psi$  δρχ,  $z$  δρχ, οι άμοιβές τῶν  $\alpha'$ ,  $\beta'$   $\gamma'$  αντίστοιχως

Άμοιβή	$\chi$	$\psi$	$z$
Χρόνος επίδ.	2,4	2,7	3
Απόσταση	1	1	1

Έπειδή η άμοιβή είναι αντίστροφως ανάλογη του χρόνου επίδοσης (για τήν ίδια απόσταση), θα έχουμε.

$$\frac{\chi}{1} = \frac{\psi}{1} = \frac{z}{1} \Leftrightarrow \frac{\chi}{2,4} = \frac{\psi}{2,7} = \frac{z}{3} \Leftrightarrow \frac{\chi}{2,4} \cdot 21,6 = \frac{\psi}{2,7} \cdot 21,6 = \frac{z}{3} \cdot 21,6$$

$$\frac{\chi}{9} = \frac{\psi}{8} = \frac{z}{7,2} = \frac{\chi + \psi + z}{9 + 8 + 7,2} = \frac{4840}{24,2} = 200.$$

Άρα  $\frac{\chi}{9} = 200 \Leftrightarrow \chi = 1800$ ,  $\frac{\psi}{8} = 200 \Leftrightarrow \psi = 1600$  και  $z = 1440$ .

Ο  $\alpha'$  θα πάρει 1800 δρχ., ο  $\beta'$  1600 δρχ. και ο  $\gamma'$  1440 δρχ.

### Πρόβλημα 5<sup>ο</sup>.

Τρεις συνεταίροι κατέθεσαν σε μιὰ επιχείρηση τὰ εξής ποσά: Ο  $\alpha'$  500.000 δρχ., ο  $\beta'$  600.000δρχ. και ο  $\gamma'$  660.000 δρχ.

Τὰ χρήματα του  $\alpha'$  έμειναν στην επιχείρηση 2 έτη  
τὰ χρήματα του  $\beta'$  έμειναν στην επιχείρηση 18 μήνες  
τὰ χρήματα του  $\gamma'$  έμειναν στην επιχείρηση 20 μήνες.

Άν έκέρδισαν 300000 δρχ, πόσο κέρδος πρέπει να πάρει καθένας;

Τὸ πρόβλημα αὐτὸ επιλύεται, ὅπως τὸ παραπάνω 3ο πρόβλημα. Μεριζουμε τὸ κέρδος αναλόγως πρὸς τὸ γινόμενο τῶν καταθέσεων ἐπὶ τοὺς χρόνους.

Έστω  $\chi$  δρχ,  $\psi$  δρχ,  $z$  δρχ, τὰ κέρδη αντίστοιχως. Έχουμε

$$\frac{\chi}{500000 \cdot 24} = \frac{\psi}{600000 \cdot 18} = \frac{z}{660000 \cdot 20} \Leftrightarrow \frac{\chi}{120} = \frac{\psi}{108} = \frac{z}{132} \Leftrightarrow$$

$$\frac{\chi}{10} = \frac{\psi}{9} = \frac{z}{11} = \frac{\chi + \psi + z}{10 + 9 + 11} = \frac{300000}{30} = 10000.$$

\*Αρα  $\chi = 100000$ ,  $\psi = 90000$ ,  $z = 110000$ .

‘Ο α’ θά πάρει 100000 δραχμές, ό β’ 90000 δραχμές και ό γ’ 110000 δρχ.

### Προβλήματα:

302. Νά μερισθεί ό 180 σέ μέρη ανάλογα πρός τούς α) 6, 10, 14. β) 3, 5, 7. γ) 18, 30, 42 και δ) 360, 600, 840. Νά συγκρίνετε τά αποτελέσματα τών 4 περιπτώσεων και νά δικαιολογήσετε αυτό πού θά βρείτε.

303. Νά μερισθεί ό 260 ανάλογα πρός τούς:  $\frac{3}{4}$ ,  $\frac{5}{6}$  και  $\frac{7}{12}$ .

304. Νά μερισθοῦν: α) ό 480 ανάλογα πρός τούς 2,  $\frac{9}{4}$  και  $\frac{6}{8}$ , β) ό 310 αντίστροφως ανάλογα πρός τούς 2, 3 και 5 και γ) ό 24 αντίστροφως ανάλογα πρός τούς 2,  $\frac{1}{3}$  και  $\frac{2}{5}$ .

305. Ένας σύλλογος φιλοπτώχων μοίρασε 600 δρχ. σέ 3 φτωχές οικογένειες ανάλογα πρός τόν αριθμό τών μελών τους. ‘Η α’ οικογένεια είχε 4 μέλη, ή β’ 6 και ή γ’ 10. Πόσες δραχμές πήρε κάθε οικογένεια;

306. ‘Από δύο πόλεις, πού απέχουν μεταξύ τους 220 km, ξεκινούν συγχρόνως δύο αυτοκίνητα μέ ταχύτητες 50 km/h και 60 km/h και τρέχουν νά συναντηθοῦν. Νά βρείτε πόσα km θά διανύσει τό καθένα μέχρι νά συναντηθοῦν.

307. Ένα χρηματικό έπαθλο 5200 δρχ. πρόκειται νά μοιραστεί σέ 2 ποδηλάτες ανάλογα πρός τις επιδόσεις τους σ’ ένα αγώνισμα δρόμου κάποιας απόστάσεως: ό α’ έτρεξε τήν απόσταση σέ 18 min και ό β’ σέ 21 min. Πόσες δραχμές θά πάρει ό καθένας;

308. Δύο αυτοκινητιστές μετέφεραν έμπορεύματα μέ άμμοιβή 6800 δραχμές. ‘Ο α’ μετέφερε 4,5 ton σέ απόσταση 40 km και ό β’ 5 ton σέ απόσταση 32 km. Πόσες δραχμές πήρε ό καθένας;

309. Τρεις άδελφές κληρονόμησαν από τό θείο τους 700960 δρχ. μέ τόν όρο νά τις μοιραστοῦν ανάλογα πρός τήν ηλικία τους. Οί ηλικίες τους ήταν 14, 16 και 21 έτη. Πόσες δραχμές θά πάρει ή καθεμιά;

310. Δύο βοσκοί ένοίκιασαν ένα χωράφι 2850 δρχ. ‘Ο α’ έβόσκησε 200 πρόβατα 20 ήμέρες και ό β’ 150 πρόβατα 30 ήμέρες. Πόσα χρήματα θά πληρώσει ό καθένας;

311. Ένας έμπορος άρχισε μιá επιχείρηση καταθέτοντας 100000 δρχ. Δύο μήνες άργότερα πήρε συνεταιίρο, ό όποίος κατέθεσε 150000 δρχ. Ένα χρόνο μετά τήν πρόσληψη τοῦ συνεταιίρου βρήκαν ότι κέρδισαν 99000 δρχ. Πόσο κέρδος θά πάρει ό καθένας;

### 8. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΙΞΕΩΣ

§ 109. Τά προβλήματα, στα όποία γίνεται λόγος για άνάμειξη έμπορευμάτων τοῦ ίδιου είδους μέ διαφορετικές ποιότητες και γενικά διάφορων σωμάτων, τά όποία μποροῦν νά άναμιχθοῦν, λέγονται προβλήματα άναμειξεως ή μειξεως. Τό προϊόν τής άναμειξεως ή μειξεως λέγεται **μείγμα**. Τά σώματα, πού άναμειγνύονται, λέγονται **μέρη** τοῦ μείγματος.

‘Η έπίλυση τών προβλημάτων αυτών θά γίνει μέ τή βοήθεια τών εξισώσεων και στηρίζεται στους εξής κανόνες:

1. Τά βάρη τών μερών έχουν **άθροισμα τό βάρος τοῦ μείγματος**.
2. ‘Η τιμή κόστους τοῦ μείγματος είναι ίση μέ τό **άθροισμα τών τιμών, πού κοστίζουν τά μέρη του**.



**Πρόβλημα 1<sup>ο</sup>.** "Ενας έμπορος ανάμειξε 150 kg\* λάδι τών 24 δρχ. τὸ kg\* μὲ 100 kg\* λάδι ἄλλης ποιότητας τών 29 δρχ. τὸ kg\*. Πόσο ἀξίζει τὸ kg\* τοῦ μείγματος;

Ἐστω  $\chi$  δρχ. ἡ τιμὴ τοῦ kg\* τοῦ μείγματος

Ἐχουμε: Τιμὴ ἀ'ποιότητας συν τιμὴ β'ποιότητας ἴσον τιμὴ μείγματος.  

$$100 \cdot 29 + 150 \cdot 24 = (150 + 100) \cdot \chi$$

Ἐπιλύουμε τὴν ἐξίσωση καὶ βρίσκουμε  $\chi = 26$

Ἐπομένως 26 δρχ. ἀξίζει τὸ kg\* τοῦ μείγματος.

**Σημείωση.** Στὸ πρόβλημα αὐτὸ μπορούμε νὰ ζητήσουμε: Πόσο πρέπει νὰ πουλᾷ τὸ κιλό τοῦ μείγματος, γιὰ νὰ κερδίσει 25% ἐπὶ τῆς τιμῆς κόστους τοῦ μείγματος;

Ἀφοῦ βρούμε πόσο κοστίζει τὸ κιλό τοῦ μείγματος, προχωρούμε στὴν ἐπίλυση σύμφωνα μὲ τὰ γνωστὰ ἀπὸ τὰ ποσοστὰ

$$\begin{array}{ll} 100 \text{ δρχ. κόστος} & 125 \text{ δρχ. πώληση} \\ 26 \text{ δρχ. κόστος} & \chi \end{array} \Rightarrow \frac{100}{26} = \frac{125}{\chi} \Leftrightarrow \chi = 32,50$$

Πρέπει νὰ πουλᾷ 32,50 δρχ. τὸ κιλό, γιὰ νὰ κερδίζει 25% ἐπὶ τοῦ κόστους.

**Πρόβλημα 2<sup>ο</sup>.** "Ενας οἰνοπώλης ἀνάμειξε κρασί τών 5 δρχ./kg\* μὲ κρασί ἄλλης ποιότητας τών 4 δρχ./kg\* καὶ ἔκανε μίγμα 100 kg\* τών 4,60 δρχ./kg\*. Πόσα kg\* πῆρε ἀπὸ κάθε εἶδος;

Ἐστω ὅτι πῆρε  $\chi$  kg\* ἀπὸ τὴν ποιότητα τών 5 δρχ./kg\*. Τότε ἀπὸ τὴν ἄλλη ποιότητα ἔλαβε  $(100 - \chi)$  kg\*. Ἐπομένως ἔχουμε τὴν ἐξίσωση  $5\chi + 4(100 - \chi) = 4,6 \cdot 100$  ἀπὸ τὴν ὁποία βρίσκουμε  $\chi = 60$ .

Ἄρα ἔλαβε 60 kg\* ἀπὸ τὴν ἀ' ποιότητα καὶ 40 kg\* ἀπὸ τὴ β' ποιότητα.

**Πρόβλημα 3<sup>ο</sup>** Μὲ ποιά ἀναλογία πρέπει νὰ ἀναμείξουμε λίπος τών 35 δρχ./kg\* μὲ λίπος τών 30 δρχ./kg\*, γιὰ νὰ σχηματίσουμε μίγμα τών 32 δρχ./kg\*;

Ἄν πάρουμε  $\chi$  kg\* ἀπὸ τὸ λίπος τών 35 δρχ./kg\* καὶ  $\psi$  kg\* ἀπὸ τὸ λίπος τών 30 δρχ./kg\*, τότε τὸ μίγμα θὰ εἶναι  $(\chi + \psi)$  kg\* καὶ θὰ ἔχουμε τὴν ἐξίσωση.

$$35\chi + 30\psi = 32(\chi + \psi), \text{ ἡ ὁποία ἔχει δύο ἀγνώστους.}$$

Ἡ μορφή τῆς ἐξισώσεως αὐτῆς εἶναι τέτοια, ὥστε μπορεῖ νὰ βρεθεῖ ὁ λόγος τών  $\chi$  καὶ  $\psi$ .

$$\text{Π.χ. } 35\chi + 30\psi = 32(\chi + \psi) \Leftrightarrow 35\chi + 30\psi = 32\chi + 32\psi \Leftrightarrow$$

$$35\chi - 32\chi = 32\psi - 30\psi \Leftrightarrow 3\chi = 2\psi \Leftrightarrow \frac{\chi}{\psi} = \frac{2}{3} \Leftrightarrow \frac{\chi}{2} = \frac{\psi}{3}$$

Ἡ ἀναλογία ἀναμείξεως εἶναι 2 kg\* ἀπὸ τὴν ποιότητα τών 35 δρχ./kg\* καὶ 3 kg\* ἀπὸ τὴν ἄλλη ποιότητα.

**Πρόβλημα 4<sup>ο</sup>.** "Ενας έμπορος ἀνάμειξε δύο ποιότητες ἑνὸς εἶδους

των 36 δρχ./kg\* και των 25 δρχ./kg\* Το κόστος του μείγματος ήταν 30 δρχ./kg\* "Αν από την α' ποιότητα πήρε 100 kg\*, πόσα kg\* πήρε από την άλλη;

\*Εστω ότι πήρε  $\chi$  kg\* από τη β' ποιότητα..

\*Έχουμε την εξίσωση  $36 \cdot 100 + 25 \cdot \chi = 30(100 + \chi) \Leftrightarrow$

$3600 + 25\chi = 3000 + 30\chi \Leftrightarrow 3600 - 3000 = 30\chi - 25\chi \Leftrightarrow$

$5\chi = 600 \Leftrightarrow \chi = \frac{600}{5} \Leftrightarrow \chi = 120.$

\*Επήρε 120 kg\* από τη β' ποιότητα.

### Προβλήματα :

312. Αναμείχθηκαν 200 kg\* κρασί των 4 δρχ./kg\* με 300 kg\* από άλλη ποιότητα των 4,5 δρχ./kg\*. Πόσο αξίζει το kg\* του μείγματος;

313. Ένας έμπορος ανάμειξε 80 kg\* λάδι των 25 δρχ./kg\* με 120 kg\* από άλλη ποιότητα των 30 δρχ./kg\*. Πόσο πρέπει να πουλά το kg\* του μείγματος, για να κερδίσει 10% επί του κόστους; (Οι τιμές είναι τιμές κόστους).

314. Σε ποιά αναλογία πρέπει να αναμείξουμε βούτυρο των 50 δρχ./kg\* με βούτυρο των 60 δρχ./kg\*, για να πετύχουμε μείγμα των 56 δρχ./kg\*; Και αν κάνουμε μείγμα 50 kg\*, πόσα kg\* πρέπει να πάρουμε από κάθε ποιότητα βουτύρου;

315. Ένας καφεπώλης ανάμειξε καφέ των 90 δρχ./kg\* με καφέ των 82 δρχ./kg\* κι έκανε μείγμα 12 kg\* των 88 δρχ./kg\*. Πόσα kg\* πήρε από κάθε ποιότητα;

316. Ένας έμπορος ανάμειξε 150 kg\* λάδι των 32 δρχ./kg\* με 100 kg\* από άλλη ποιότητα των 26 δρχ./kg\*. Αν πουλά το μείγμα 34,80 δρχ. το kg\*, πόσο τοις εκατό κερδίσει; (Οι τιμές είναι τιμές κόστους).

317. Έγινε μείγμα  $(100 + \chi)$  kg\* από δύο ποιότητες ενός είδους. Η τιμή του kg\* της α' ποιότητας ήταν 35 δρχ., της β' ποιότητας 30 δρχ. και του μείγματος 32 δρχ. Αν από τη β' ποιότητα χρησιμοποιήθηκαν  $\chi$  kg\*, να βρεθεί ο  $\chi$ .

318. Αναμείχθηκαν 100kg \* των 20 δρχ./kg \* με 80kg\* των  $\chi$  δρχ./kg\* από δύο ποιότητες ενός είδους. Αν η τιμή του μείγματος ήταν 22 δρχ./kg\*, να βρεθεί ο  $\chi$ .

319. Πώς πρέπει να αναμείξουμε δύο ποιότητες ενός είδους, που έχουν κόστος 48 δρχ./kg\* και 44 δρχ./kg\*, για να κάνουμε μείγμα, που αν το πουλάμε 49,50 δρχ./kg\*, να κερδίζουμε 10% επί του κόστους;

### 9. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΡΑΜΑΤΩΝ

§ 110. "Αν συγχωνεύσουμε ή συντήξουμε (με διάφορες μεθόδους) δύο ή περισσότερα μέταλλα, παίρνουμε ένα σώμα που λέγεται **κράμα**.

Στήν οικονομική ζωή ενδιαφέρουν τα κράματα, που γίνονται από πολύτιμα μέταλλα (χρυσό, άργυρο). Η αξία τους εκτιμάται από το λόγο του βάρους του πολύτιμου μετάλλου προς το όλικό βάρος του κράματος. Ο λόγος αυτός λέγεται **τίτλος** του κράματος και εκφράζεται σε **χιλιοστά**.

"Αν Α είναι το βάρος του πολύτιμου μετάλλου, Β το βάρος του κράματος και τ ο τίτλος του κράματος, έχουμε

$$\frac{A}{B} = \tau \Leftrightarrow A = B \cdot \tau$$

Π.χ. όταν λέμε ότι το κράμα έχει τίτλο  $0,850$  ή  $\frac{850}{1000}$ , εννοούμε ότι από τα  $1000 \text{ gr}^*$  του κράματος τα  $850 \text{ gr}^*$  είναι πολύτιμο μέταλλο και τα  $150 \text{ gr}^*$  είναι άλλο ή άλλα μέταλλα.

Ό τίτλος των χρυσών κοσμημάτων εκφράζεται και σε **καράτια**. Π.χ. όταν λέμε ότι ένα χρυσό κόσμημα είναι  $18$  καρατιών, εννοούμε ότι τα  $\frac{18}{24}$  του βάρους του είναι καθαρός χρυσός και τα υπόλοιπα  $\frac{6}{24}$  άλλα μέταλλα.

Η επίλυση των προβλημάτων θα γίνει με τη βοήθεια των εξίσωσεων, όπως και στα προβλήματα της μείξεως, με βάση τους κανόνες.

α) «Το άθροισμα των βαρών του πολύτιμου μετάλλου, το οποίο περιέχεται στα κράματα που πρόκειται να συντηχθούν είναι ίσο με το βάρος του πολύτιμου μετάλλου στο νέο κράμα».

β) Το άθροισμα των βαρών των κραμάτων ισούται με το βάρος του νέου κράματος.

**Πρόβλημα 1<sup>ο</sup>.** Ένας χρυσοχός συνέτηξε  $12 \text{ gr}^*$  χρυσό τίτλου  $0,900$  με  $18 \text{ gr}^*$  άλλο χρυσό τίτλου  $0,800$ .

Να βρεθεί ο τίτλος του νέου κράματος.

Έστω  $\chi$  ο τίτλος του νέου κράματος.

Το βάρος του καθαρού χρυσοῦ στο  $\alpha'$  κράμα είναι  $0,900 \cdot 12 \text{ gr}^*$ .

Το βάρος του καθαρού χρυσοῦ στο  $\beta'$  κράμα είναι  $0,800 \cdot 18 \text{ gr}^*$ .

Το βάρος του καθαρού χρυσοῦ στο νέο κράμα είναι  $\chi \cdot (12 + 18) \text{ gr}^*$ .

Σύμφωνα με τον παραπάνω κανόνα έχουμε την εξίσωση

$$0,900 \cdot 12 + 0,800 \cdot 18 = \chi(12 + 18) \Leftrightarrow 10,8 + 14,4 = 30\chi \Leftrightarrow 30\chi = 25,2$$

$$\chi = \frac{25,2}{30} \Leftrightarrow \chi = 0,840.$$

Ό τίτλος του νέου κράματος είναι  $0,840$ .

**Πρόβλημα 2<sup>ο</sup>.** Αν συντήξουμε δύο είδη κραμάτων (του ίδιου πολύτιμου μετάλλου) με τίτλους  $0,900$  και  $0,600$ , παίρνουμε ένα νέο κράμα, που έχει βάρος  $42 \text{ gr}^*$  και τίτλο  $0,700$ . Πόσα γραμμάρια πήραμε από κάθε κράμα;

Έστω ότι πήραμε  $\chi \text{ gr}^*$  από το κράμα με τίτλο  $0,900$ , τότε από το άλλο κράμα θα έχουμε πάρει  $(42 - \chi) \text{ gr}^*$ . Έπομένως έχουμε την εξίσωση:  $0,900\chi + 0,600(42 - \chi) = 0,700 \cdot 42 \Leftrightarrow 9\chi + 6(42 - \chi) = 7 \cdot 42 \Leftrightarrow 9\chi + 6 \cdot 42 - 6\chi = 7 \cdot 42 \Leftrightarrow 9\chi - 6\chi = 7 \cdot 42 - 6 \cdot 42 \Leftrightarrow 3\chi = (7 - 6) \cdot 42 \Leftrightarrow 3\chi = 42 \Leftrightarrow \chi = \frac{42}{3}$

$$\Leftrightarrow \chi = 14$$

Όστε πήραμε  $14 \text{ gr}^*$  από το κράμα με τίτλο  $0,900$  και  $42 \text{ gr}^* - 14 \text{ gr}^* = 28 \text{ gr}^*$  από το άλλο κράμα.

**Πρόβλημα 3<sup>ο</sup>.** Σε ποιά αναλογία πρέπει να συγχωνεύσουμε δύο κράματα (του ίδιου πολύτιμου μετάλλου) με τίτλους  $0,920$  και  $0,800$ , για να πετύχουμε νέο κράμα με τίτλο  $0,840$ ;

Ἄν πάρουμε  $\chi$  gr\* ἀπὸ τὸ κράμα μὲ τίτλο 0,920 καὶ  $\psi$  gr\* ἀπὸ τὸ ἄλλο κράμα, τὸ νέο κράμα θὰ εἶναι  $(\chi + \psi)$  gr\*

$$\begin{aligned} & \text{Ἔχουμε τὴν ἐξίσωση } 0,920\chi + 0,800\psi = 0,840(\chi + \psi) \Leftrightarrow \\ & 92\chi + 80\psi = 84(\chi + \psi) \Leftrightarrow 23\chi + 20\psi = 21\chi + 21\psi \Leftrightarrow 23\chi - 21\chi = 21\psi - 20\psi \Leftrightarrow \\ & \Leftrightarrow 2\chi = \psi \Leftrightarrow \frac{\chi}{1} = \frac{\psi}{2} \Leftrightarrow \frac{\chi}{\psi} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Ἡ ἀναλογία συγχωνεύσεως εἶναι 1 gr\* ἀπὸ τὸ κράμα μὲ τίτλο 0,920 καὶ 2 gr\* ἀπὸ τὸ ἄλλο κράμα.

### Προβλήματα:

320. Ἐνας χρυσοχόος συγχωνεύει 10 gr\* χρυσὸ τίτλου 0,900 μὲ 14 gr\* ἄλλο χρυσὸ τίτλου 0,600. Νὰ βρεθεῖ ὁ τίτλος τοῦ νέου κράματος.

321. Κάνουμε νέο κράμα βάρους 90 gr\* καὶ τίτλου 0,840 ἀπὸ δύο ἄλλα κράματα τίτλων 0,900 καὶ 0,800. Πόσα gr\* θὰ πάρουμε ἀπὸ κάθε κράμα;

322. Σὲ ποιά ἀναλογία πρέπει νὰ συγχωνεύσουμε δύο εἶδη χρυσοῦ μὲ τίτλους 0,900 καὶ 0,750, γιὰ νὰ πετύχουμε κράμα τίτλου 0,800, καὶ πόσα gr\* θὰ πάρουμε ἀπὸ κάθε εἶδος, ἂν τὸ νέο κράμα ἔχει βάρους 75 gr\*;

323. Συγχωνεύουμε 80 gr\* ἄργυρο τίτλου 0,920 μὲ ἄλλο ἄργυρο τίτλου 0,850 καὶ παίρνουμε νέο κράμα τίτλου 0,900. Πόσα gr\* ἀπὸ τὸ β' κράμα θὰ χρησιμοποιήσουμε;

324. α) Πόσα gr\* καθαρὸς χρυσὸς περιέχονται σὲ 50,5 gr\* χρυσὸ τίτλου 0,740; β) Κράμα χρυσοῦ 80 gr\* περιέχει 50 gr\* καθαρὸ χρυσό. Ποιὸς εἶναι ὁ τίτλος τοῦ κράματος;

325. Ἐνας χρυσοχόος συνήτηξε 10 gr\* χρυσὸ 17 καρατιῶν μὲ 20 gr\* ἄλλο χρυσὸ 20 καρατιῶν καὶ μὲ 30 gr\* τίτλου 22 καρατιῶν. Νὰ βρεθεῖ ὁ τίτλος τοῦ νέου κράματος σὲ καράτια.

326. Πόσα gr\* χαλκὸ πρέπει νὰ συγχωνεύσουμε μὲ 140 gr\* καθαρὸ χρυσό, γιὰ νὰ πετύχουμε κράμα τίτλου 0,700;

### 10. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΕΦ. IV.

327. Ἐὰν  $\frac{\chi}{\psi} = 2$  καὶ  $\chi + \psi = 15$ , νὰ βρεθοῦν τὰ  $\chi$ ,  $\psi$ .

328. Ἐὰν  $\frac{\chi}{\psi} = -\frac{2}{3}$ , νὰ βρεθοῦν οἱ λόγοι:

$$\alpha) \frac{2\chi - \psi}{\chi + \psi} \quad \beta) \frac{\chi + 2}{\psi - 3} \quad (\psi \neq 3) \quad \gamma) \frac{\chi - 2}{\psi + 3} \quad (\psi \neq -3) \quad \text{καὶ} \quad \delta) \frac{\chi + \psi}{3\chi - 2\psi}$$

329. Ἐὰν  $3\chi + 4\psi = 52$  καὶ  $\frac{\chi}{\psi} = \frac{2}{5}$ , νὰ βρεθοῦν τὰ  $\chi$ ,  $\psi$ .

$$\left( \frac{\chi}{\psi} = \frac{2}{5} \Leftrightarrow \frac{\chi}{2} = \frac{\psi}{5} = \frac{3\chi}{3 \cdot 2} = \frac{4\psi}{4 \cdot 5} = \frac{3\chi}{6} = \frac{4\psi}{20} = \frac{3\chi + 4\psi}{6 + 20} = \frac{52}{26} = \dots \right)$$

330. Νὰ βρεθοῦν οἱ ἡγούμενοι ὄροι τῆς ἀναλογίας  $\frac{\chi}{3} = \frac{\psi}{1}$ , ἂν α)  $2\chi + 3\psi = 180$  καὶ β)  $2\chi - 5\psi = 30$ .

331. Νά βρεθοῦν οἱ ὄροι τοῦ λόγου  $\frac{X}{\Psi} = \frac{3}{4}$ , ἂν α)  $X + 3\Psi = 150$  καὶ β)  $5X - 3\Psi = 30$

332. Δύο ἐργάτες τέλειωσαν ἓνα ἔργο. Ὁ α' ἔκανε τὰ  $\frac{2}{7}$  τοῦ ἔργου καὶ ὁ β' τὸ ὑπόλοιπο. Ἐάν ὁ α' πῆρε 4200 δρχ., πόσο ἐκότισε ὁλόκληρο τὸ ἔργο;

333. Γιὰ ν' ἀγοράσει κάποιος μίαν ἐνδυμασίαν, τοῦ ἔγινε ἐκπτώση 270 δρχ. καὶ πλήρωσε 1230 δρχ. Πόσο τοῖς ἑκατὸ ἦταν ἡ ἐκπτώση;

334. Ἐνα ἀντικείμενον κόστους 1800 δρχ. πουλήθηκε 1440 δρχ. Πόσο τοῖς ἑκατὸ ἦταν ἡ ἐκπτώση; Ἐάν εἶχε κόστος 1400 δρχ. καὶ πουλιόταν 1750 δρχ., πόσο τοῖς ἑκατὸ θὰ ἦταν τὸ κέρδος;

335. 15 ἐργάτες ἔκαναν σὲ 8 ἡμέρες τὸ  $\frac{1}{3}$  ἐνὸς ἔργου. Ἐάν ἀπολύθηκαν 5 ἐργάτες, σὲ πόσες ἡμέρες οἱ ὑπόλοιποι θὰ τελειώσουν τὸ ὑπόλοιπον ἔργο;

336. Ἐάν ἓνας πεζοπόρος βαδίσει 7 ἡμέρες ἐπὶ 8 ὥρες κάθε μέρα, θὰ διανύσει τὰ  $\frac{7}{13}$  μιᾶς ἀπόστασως. Πόσες ὥρες τὴν ἡμέρα πρέπει νὰ βαδίζει, γιὰ νὰ διανύσει τὴν ὑπόλοιπὴ ἀπόστασιν σὲ 8 ἡμέρες;

337. Τὰ  $\frac{5}{16}$  ἐνὸς κεφαλαίου τοκίστηκαν μὲ 7% κὶ ἔγιναν μαζί μὲ τὸν τόκον τους 9831 δρχ. Νά βρεθῆ ὁ χρόνος, ἂν ὁλόκληρον τὸ κεφάλαιον ἦταν 28928 δραχμῆς.

338. Τὸ  $\frac{1}{2}$  ἐνὸς κεφαλαίου τοκίστηκε μὲ 5%, τὸ  $\frac{1}{3}$  του μὲ 6% καὶ τὸ ὑπόλοιπον μὲ 4%. Ἐάν σ' ἓνα χρόνον κεφάλαιον καὶ τόκον ἔγιναν 18930 δρχ., νὰ βρεθῆ τὸ κεφάλαιον.

339. Τοκίστηκαν τὰ  $\frac{2}{3}$  ἐνὸς κεφαλαίου μὲ 6% καὶ τὸ ὑπόλοιπον μὲ 5%. Ἐάν τοκίζοταν ὁλόκληρον τὸ κεφάλαιον μὲ 5%, θὰ ἔδινε 120 δρχ. τόκον λιγότερον ἀπὸ ὅσον ἔδωκε στὴν προηγούμενη περίπτωσιν. Ἐάν ὁ χρόνος καὶ στὶς δύο περιπτώσεις εἶναι 12 μῆνες, νὰ βρεθῆ τὸ κεφάλαιον.

340. Ἐάν κεφ. + τόκ. εἶναι 10100 δρχ., ὁ χρόνος εἶναι 2,5 μῆνες καὶ  $\epsilon\% = 4,8\%$ , νὰ βρεθῆ τὸ κεφάλαιον.

341. Ἐάν κεφ. + τόκ. εἶναι 9126 δρχ., ὁ χρόνος εἶναι 63 ἡμέρες καὶ  $\epsilon\% = 8\%$ , νὰ βρεθῆ τὸ κεφάλαιον.

342. Ἐάν κεφ. — τόκ. εἶναι 4440 δρχ., ὁ χρόνος εἶναι 4 μῆν. καὶ  $\epsilon\% = 4\%$ , νὰ βρεθῆ τὸ κεφάλαιον.

343. Στὶς παρακάτω ἐξισώσεις ὁ  $X$  παριστάνει τὸ κεφάλαιον σὲ δραχμῆς. Νά διατυπώσετε τὶς ἐξισώσεις αὐτὲς σὲ προβλήματα καὶ νὰ τὶς ἐπιλύσετε.

$$\alpha) X + X \cdot \frac{4}{100} \cdot \frac{5}{12} = 18300, \quad \beta) X - X \cdot \frac{5}{100} \cdot \frac{105}{360} = 9460.$$

344. Ἐπὶ δύο πόλεις, ποὺ ἀπέχουν μεταξύ τους 360 km, ξεκινοῦν συγχρόνως γιὰ συνάντησιν δύο αὐτοκίνητα μὲ ταχύτητες 65 km/h καὶ 55 km/h. Σὲ ποίαν ἀπόστασιν θὰ συναντηθοῦν;

345. Νά μερισθῆ ὁ ἀριθ. 3600 ἀντιστρόφως ἀνάλογα πρὸς τοὺς 12, 15, 20.

346. Νά μερισθῆ ὁ ἀριθ. 250 ἀντιστρόφως ἀνάλογα πρὸς τοὺς  $\frac{4}{6}$  καὶ  $\frac{4}{9}$

347. Δύο ἔμποροι κατέθεσαν γιὰ μίαν ἐπιχείρησιν 100.000 δρχ. ὁ α' καὶ 80.000 δρχ. ὁ β'. Ἐπιτέλους ἀπὸ 18 μῆνες κέρδισαν 54000 δρχ. Πόσο κέρδος θὰ πάρει ὁ καθένας;

348. Ἐνας ἔμπορος ἀρχισὲ μίαν ἐπιχείρησιν μὲ 500.000 δρχ. Ἐπιτέλους ἀπὸ 3 μῆνες πῆρε συνεταιρὸν, ὁ ὅποιος κατέθεσε τὸ ἴδιον ποσόν. 6 μῆνες μετὰ τὴν πρόσληψιν τοῦ συνεταιροῦ βρῆκαν ὅτι κέρδισαν 60.000 δρχ. Πόσο κέρδος θὰ πάρει ὁ καθένας;

349. Δύο συνεταίροι κατέθεσαν 405000 δρχ. για μία επιχείρηση. Τα χρήματα του α' έμειναν στην επιχείρηση 15 μήνες και του β' 12 μήνες. Έάν πήραν ίσα κέρδη, να βρεθεί το κεφάλαιο, που είχε καταθέσει ο καθένας.

350. Ένας έμπορος άνάμειξε 100/kg\* ενός είδους τών 35 δρχ./kg\* με άλλο τών 30 δρχ./kg\*. Πόσα kg\* χρησιμοποίησε από τη β' ποιότητα, έάν πουλούσε 33 δρχ. τὸ kg\* τοῦ μείγματος κι έκέρδισε 250 δραχμές;

### ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

351. Έάν  $\alpha = -4$  και  $\beta = 2$ , να βρεθεί ή άριθμ. τιμή τών παραστάσεων  $\alpha^3 + 3\alpha^2\beta + 3\alpha\beta^2 + \beta^3$  και  $(\alpha + \beta)^3$ . Τί παρατηρείτε;

352. Έάν  $\alpha = -2$ ,  $\beta = -3$  και  $\gamma = -1$ , να βρεθεί ή άριθμ. τιμή τών παραστάσεων:  $\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 + 2\alpha\beta + 2\beta\gamma + 2\gamma\alpha$  και  $(\alpha + \beta + \gamma)^2$ . Τί παρατηρείτε;

353. Έάν  $\chi = -2$ ,  $\alpha = -3$  και  $\beta = 4$ , να βρεθεί ή άριθμ. τιμή τών παραστάσεων  $\chi^2 + (\alpha + \beta)\chi + \alpha\beta$  και  $(\chi + \alpha) \cdot (\chi + \beta)$ . Τί παρατηρείτε;

354. Έάν  $\chi = 3$ ,  $\psi = -4$ ,  $\alpha = -2$  και  $\beta = 1$ , να βρεθεί ή άριθμητική τιμή τών παραστάσεων  $(\alpha^2 + \beta^2) \cdot (\chi^2 + \psi^2) - (\alpha\chi + \beta\psi)^2$  και  $(\alpha\psi - \beta\chi)^2$ . Τί παρατηρείτε;

355. Να έπιλυθούν και να έπαληθευθούν οι έξισώσεις:

$$\alpha) \frac{3\chi - 1}{5} = \frac{5 - 7\chi}{15}, \quad \beta) \frac{5\chi + 1}{7} = \frac{2\chi - 3}{3}, \quad \gamma) \frac{2\chi - 2,5}{3} = \frac{4\chi - 5}{6},$$

$$\delta) \frac{2\chi - 1,5}{5} = \frac{0,8\chi - 1}{2}$$

(Για την άπαλοιφή τών παρονομαστών να χρησιμοποιηθεί ή ιδιότητα τών αναλογιών:

$$\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta} \Leftrightarrow \alpha\delta = \beta\gamma$$

356. Να έπιλυθούν οι έξισώσεις:

$$\alpha) (\chi + 1) \cdot (\chi + 2) = \chi(\chi + 7) - 6, \quad \beta) 2 \cdot (\chi - 1) \cdot (\chi + 1) = \chi(2\chi - 6) + 16,$$

$$\gamma) (\chi - 3) \cdot (\chi - 4) - 2\chi(\chi - 3) = \chi(11 - \chi), \quad \delta) \frac{1}{3} \left( \chi - \frac{5}{2} \right) - \frac{3}{5} \left( \chi + \frac{4}{3} \right) + \frac{7}{2} = 0$$

357. Να έπιλυθούν οι έξισώσεις:

$$\alpha) \frac{\chi - 7}{4} + \frac{\chi + 10}{21} + 1 = \frac{5\chi - 7}{8} - \frac{9\chi + 6}{35},$$

$$\beta) \frac{3\chi - 2}{8} - \frac{13\chi + 3}{27} + 9 = \frac{5\chi - 12}{18} - \frac{2 - 5\chi}{4},$$

$$\gamma) \frac{3\chi}{4} + \frac{5}{17} (2\chi + 1) = (\chi - 1) + \frac{7\chi - 5}{51} - \frac{2 - \chi}{2},$$

$$\delta) \frac{4 + 13\chi}{22} + \frac{\chi}{2} - \frac{7\chi - 1}{3} + \frac{3 - 15\chi}{33} - \frac{6 - 5\chi}{4} = 0.$$

358. Τίνος αριθμοῦ τὸ  $\frac{1}{7}$  εἶναι κατὰ  $\frac{13}{5}$  μικρότερο ἀπὸ τὸ τριπλάσιό του;
359. Ἄν σ' ἓναν ἀριθμὸ προσθέσουμε τὸ 4πλάσιό του, βρίσκουμε ἀριθμὸ κατὰ  $\frac{8}{25}$  μικρότερο ἀπὸ τὸν 10,32. Ποιὸς εἶναι ὁ ἀριθμὸς;
360. Ἄπὸ ποιὸν ἀριθμὸ πρέπει ν' ἀφαιρέσουμε τὸ 8πλάσιό του  $\frac{1}{8}$  του, γιὰ νὰ βροῦμε ἀριθμὸ κατὰ  $\frac{21}{2}$  μεγαλύτερο ἀπὸ τὸ  $\frac{1}{10}$  αὐτοῦ;
361. Μὲ ποιὸν ἀριθμὸ πρέπει νὰ διαιρέσουμε τὸν 744, γιὰ νὰ βροῦμε πηλίκο 14 καὶ ὑπόλοιπο 44;
362. Νὰ χωριστεῖ ὁ ἀριθμὸς  $\frac{378}{5}$  σὲ δύο ἄλλους, ὥστε ὁ ἓνας νὰ εἶναι διπλάσιος ἀπὸ τὸν ἄλλο.
363. Ἡ ἡλικία τοῦ Πέτρου εἶναι 2πλάσια ἀπὸ τοῦ Παύλου. Πρὶν ἀπὸ 7 χρόνια οἱ ἡλικίες τους εἶχαν ἄθροισμα ἴσο μὲ τὴ σημερινὴ ἡλικία τοῦ Πέτρου. Νὰ βρεθοῦν οἱ ἡλικίες τους.
364. Ἐνα πλοῖο ἀναχώρησε ἀπὸ τὸν Πειραιᾶ μὲ ταχύτητα 19,5 mil/h. Ὑστερ' ἀπὸ 4 ὥρες ἀναχώρησε δεύτερο πλοῖο μὲ ταχύτητα 23,5 mil/h πρὸς τὴν ἴδια κατεύθυνση. Μετὰ ἀπὸ πόσες ὥρες τὸ β' πλοῖο θὰ φτάσει τὸ α' ;
365. Ἡ γωνία Γ ὀρθ. τριγώνου ΑΒΓ ( $\widehat{A}=1$  ὀρθ.) εἶναι ἴση μὲ τὰ  $\frac{2}{3}$  τῆς γωνίας Β. Νὰ βρεθοῦν οἱ γωνίες τοῦ τριγώνου ΑΒΓ.
366. Νὰ βρεθοῦν δύο διαδοχικοὶ ἀκέραιοι ἀριθμοὶ τοῦ τὰ τετράγωνά τους διαφέρουν κατὰ 39.
367. Δύο ἀκέραιοι ἀριθμοὶ ἔχουν ἄθροισμα 17 καὶ τὰ τετράγωνά τους διαφέρουν κατὰ 119. Ποιοὶ εἶναι οἱ ἀριθμοὶ;
368. Δύο ἀκέραιοι ἀριθμοὶ ἔχουν ἄθροισμα 27. Ἄν στὸ γινόμενό τους προσθέσουμε τὸ τετράγωνο τοῦ μικρότερου, βρίσκουμε 216. Ποιοὶ εἶναι οἱ ἀριθμοὶ;
369. Ἐνας ἀκέραιος ἀριθμὸς ἂν διαιρεθῆ διὰ 11, δίνει ὑπόλοιπο 9, ἐνῶ ἂν διαιρεθῆ διὰ 3, δίνει ὑπόλοιπο 2. Ἐὰν ἡ διαφορά τῶν πηλίκων εἶναι 53, βρεῖτε τὸν ἀριθμὸ.
370. Τὸ ψηφίο τῶν δεκάδων ἑνὸς διψήφιου ἀριθμοῦ εἶναι κατὰ 4 μεγαλύτερο ἀπὸ τὸ ψηφίο τῶν μονάδων. Ἄν στὸν ἀριθμὸ προσθέσουμε τὸ  $\frac{1}{5}$  του, βρίσκουμε 114. Ποιὸς εἶναι ὁ ἀριθμὸς;
371. Ἐνα ρολοὶ δείχνει μεσημέρι ἀκριβῶς (12 h 0 min 0 sec). Ποιὰ ὥρα θὰ συναντηθοῦν (γιὰ δευτέρη φορά) ὁ ὥροδείκτης καὶ ὁ λεπτοδείκτης;
372. Δύο θετικοὶ ἀκέραιοι ἀριθμοὶ ἔχουν διαφορά 48. Ἄν ὁ μεγαλύτερος διαιρεθῆ διὰ τοῦ μικρότερου, δίνει πηλίκο 3 καὶ ὑπόλοιπο 2. Ποιοὶ εἶναι οἱ ἀριθμοὶ;
373. Νὰ ἐπιλυθοῦν οἱ ἀνισώσεις:
- α)  $\frac{3x-1}{5} > \frac{x-1}{3}$ , β)  $\frac{x+5}{2} - \frac{x-1}{3} > 3$ , γ)  $3x-3 + \frac{x-1}{-4} > 0$ .
- δ)  $\frac{x+1}{3} - \frac{x-1}{2} < 1$ , ε)  $2\left(\frac{5}{2}-x\right) > \frac{1}{2} + 2(1,5-x)$ .
374. Νὰ προσδιορισθοῦν οἱ κοινὲς λύσεις τῶν ἀνισώσεων:
- α)  $x-1 > -2$  καὶ  $2(x-3) < 0$
- β)  $\frac{1}{2} + x > x$  καὶ  $x-3 < 10$
- γ)  $x-3 > x$  καὶ  $2-x > -x$
375. Ἄν  $A = \left\{x/x - \frac{x-1}{2} > \frac{x-2}{2} - \frac{x-3}{4} \text{ καὶ } x \in \mathbb{Z}\right\}$  καὶ

$B = \{x/-x+1 < 4x+1 \wedge x \in Z\}$ , να βρεθεί το  $A \cap B$  με αναγραφή.

376. Να παραστήσετε γραφικώς τις συναρτήσεις:

$$\alpha) \psi = -2x+5, \beta) \psi = \frac{24}{x} \quad \gamma) \psi = -4x \quad (x, \psi \in \mathbb{Q})$$

377. 'Εάν  $\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta}$ , ν' αποδείξετε ότι ισχύουν οι πιό κάτω αναλογίες:

$$1) \frac{\alpha}{\alpha+\beta} = \frac{\gamma}{\gamma+\delta}, \quad 2) \frac{\alpha}{\alpha-\beta} = \frac{\gamma}{\gamma-\delta}, \quad 3) \frac{\alpha+\beta}{\alpha-\beta} = \frac{\gamma+\delta}{\gamma-\delta} \quad (\beta, \delta \neq 0, |\alpha| \neq |\beta|, |\gamma| \neq |\delta|)$$

378. "Αν  $\frac{x}{x+1} = \frac{\psi}{\psi+2}$  και  $x+\psi=21$ , να βρεθούν τὰ  $x, \psi$ .

379. Να βρεθούν οι ήγουμενοι όροι τῶν ἰσῶν λόγων  $\frac{x}{2} = \frac{\psi}{3} = \frac{z}{5}$ , ἐὰν  $2x+3\psi+4z=330$ .

380. Να μερισθεῖ ὁ 99 ἀνάλογα πρὸς τοὺς α) 2, 3, 4 καὶ β)  $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}$ .

381. Να μερισθεῖ ὁ 390 ἀντιστρ. ἀνάλογα πρὸς τοὺς α) 2, 3, 4 καὶ β)  $\frac{5}{2}, \frac{5}{6}, 1$ .

382. "Ενας ἔμπορος ἀγοράζει καφέ 81 δρχ. τὸ  $\text{kg}^*$ , τὸν καβουρδίζει καὶ τὸν μεταπουλᾷ. Πόσο πρέπει νὰ πουλᾷ τὸ  $\text{kg}^*$ , γιὰ νὰ πέτυχει κέρδος 10% ἐπὶ τοῦ κόστους, ἂν λάβουμε ὑπ' ὄψη ὅτι ὁ καφὲς χάνει τὸ  $\frac{1}{10}$  τοῦ βάρους του, ὅταν καβουρδίζεται;

383. "Ενας ἔμπορος γράφει ἐπάνω σ' ἕνα ἐμπόρευμα τιμὴ κατὰ 25% μεγαλύτερη ἀπὸ τὴν τιμὴ κόστους. Ὑστερα κάνει ἐκπτώση 10% ἐπὶ τῆς τιμῆς ποὺ γράφει ἐπάνω. Βρεῖτε πόσο τοῖς ἑκατὸ ἐπὶ τοῦ κόστους κερδίζει τελικὰ ὁ ἔμπορος.

384. 'Εὰν κέφ.—τόκ. = 54000 δρχ., ὁ χρόνος εἶναι 2,5 ἔτη καὶ  $\epsilon\% = 4\%$ , νὰ βρεθεῖ ὁ τόκος.

385. 'Εὰν κέφ. + τόκ. = 4060 δρχ., ὁ χρόνος εἶναι 3 μῆν. καὶ  $\epsilon\% = 6\%$ , νὰ βρεθεῖ ὁ τόκος.

386. 'Εὰν κέφ.—τόκ. = 7160 δρχ., ὁ χρόνος εἶναι 40 ἡμ. καὶ  $\epsilon\% = 5\%$ , νὰ βρεθεῖ ὁ τόκος.

387. "Ενα μέρος κεφαλαίου 40.000 δρχ. τοκίστηκε μὲ 4% γιὰ 5 μῆνες κι ἔφερε τόκο 500 δρχ. περισσότερο ἀπὸ τὸ ὑπόλοιπο μέρος του, ποὺ τοκίστηκε μὲ 5% γιὰ 6 μῆνες. Νὰ βρεθεῖ τὸ μέρος τοῦ κεφαλαίου ποὺ τοκίστηκε (τὸ πρῶτο).

388. Δύο ἴσα κεφάλαια τοκίζονται τὸ ἕνα μὲ 4,5% καὶ τὸ ἄλλο μὲ 5,5% καὶ δίνουν τόκο 4500 δρχ. σὲ 2 ἔτη. Ποιὰ εἶναι τὰ κεφάλαια;

389. Στὶς παρακάτω ἐξισώσεις ὁ  $x$  παριστάνει τὸ κεφάλαιο σὲ δραχμὲς. Νὰ διατυπώσετε αὐτὲς τὶς ἐξισώσεις σὲ προβλήματα καὶ νὰ τὶς ἐπιλύσετε.

$$\alpha) x+x \cdot \frac{6}{100} \cdot \frac{2,4}{12} = 10120, \quad \beta) x-x \cdot \frac{2,5}{100} \cdot \frac{400}{360} = 7000.$$

390. "Ενας γεωργὸς πούλησε ἕναν κῆπο 1050  $\text{m}^2$ . Τὰ χρήματα ποὺ πῆρε τὰ τόκισε μὲ 12% καὶ μετὰ ἀπὸ 3 ἔτη καὶ 2 μῆνες πῆρε τόκο καὶ κεφάλαιο 115920 δρχ. Πόσο πούλησε τὸ στρέμμα;

391. 'Αγόρασε κάποιος οἰκόπεδο 700  $\text{m}^2$ . Ἐπλήρωσε τὴ μισὴ τιμὴ ἀμέσως κι ἐπέτυχε ἐκπτώση 8% ἐπ' αὐτῆς. Γιὰ τὴν ἄλλη μισὴ πλήρωσε ὕστερ' ἀπὸ 8 μῆνες 104000 δρχ. μαζί μὲ τὸν τόκο, μὲ 6%. Τί ποσὸ πλήρωσε συνολικὰ γιὰ τὸ οἰκόπεδο καὶ ποιὰ ἦταν ἡ τιμὴ τοῦ στρέμματος;

392. 4 ἀδελφοὶ μοιράστηκαν κληρονομία 540 στρέμματα ὡς ἑξῆς: Ὁ πρῶτος πῆρε τὰ μισὰ ἀπὸ ὅσα πῆραν οἱ ἄλλοι τρεῖς, ποὺ τὰ μερίδιά τους ἦταν ἀνάλογα πρὸς τοὺς ἀριθμοὺς 3, 4 καὶ 5. Πόσα στρέμματα πῆρε ὁ καθένας;

393. Δύο ἔμποροι ἔκαναν ἐπιχείρηση. Ὁ α' κατέθεσε 70000 δρχ. καὶ πῆρε κέρδος 6000 δρχ., ὁ β' κατέθεσε 80000 δρχ. καὶ τὸ κέρδος του ἦταν 8000 δρχ. Πόσο χρόνο ἔμειναν τὰ χρήματα τοῦ β' στὴν ἐπιχείρηση, ἂν τὰ χρήματα τοῦ α' ἔμειναν 6 μῆνες;



## ΜΕΡΟΣ Β΄

# ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

# ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ


# ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

### Α. ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΓΩΝΙΑ

§ 1. Σχεδιάστε στο τετραδίδί σας έναν κύκλο και στο χαρτόνι σας μία κυρτή γωνία. Κόψτε τή γωνία και σχεδιάστε τις διάφορες θέσεις, πού μπορεί νὰ πάρει ἡ γωνία σχετικά μὲ τὸν κύκλο.

Περιγράψουμε μερικές ἀπὸ τὶς θέσεις αὐτές:



σχ. 1.

Ἡ γωνία τοῦ σχήματος 1α ἔχει τὴν κορυφή της στὸ κέντρο τοῦ κύκλου. Ἡ γωνία αὐτή, ὅπως ἔχουμε μάθει στὴν Α' τάξη, λέγεται **ἐπίκεντρο**. Οἱ γωνίες τοῦ σχήματος 1β δὲν ἔχουν τὴν κορυφή τους στὸν κύκλο· ἡ (I) τὴν ἔχει στὸ ἐξωτερικὸ καὶ ἡ (II) στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ κύκλου. Ἡ γωνία τοῦ σχήματος 1γ ἔχει τὴν κορυφή της στὸν κύκλο καὶ οἱ πλευρές της βρίσκονται στὸ ἐξωτερικὸ του. Στὸ σχῆμα 1δ ἡ μία πλευρὰ τῆς γωνίας ἀποκόβει χορδὴ καὶ ἡ ἄλλη εἶναι ἐφαπτομένη τοῦ κύκλου στὸ ἓνα ἄκρο τῆς χορδῆς.

Ἡ γωνία  $\widehat{BA\Gamma}$  τοῦ σχήματος 1ε ἔχει τὴν κορυφή της στὸν κύκλο καὶ οἱ πλευρές της τὸν τέμνουν. Ἡ γωνία αὐτή λέγεται **ἐγγεγραμμένη** στὸν κύκλο.


Ὡστε: Ἐγγεγραμμένη στὸν κύκλο γωνία ὀνομάζεται ἡ γωνία, πού ἔχει τὴν κορυφή της στὸν κύκλο καὶ οἱ πλευρές της τὸν τέμνουν.

Τὸ τόξο  $\widehat{B\Gamma}$ , πού βρίσκεται στὸ ἐσωτερικὸ τῆς γωνίας αὐτῆς, λέγεται **ἀντίστοιχο τόξο** τῆς ἐγγεγραμμένης γωνίας (σχῆμα 1ε).

Τὴν ἐπίκεντρη γωνία  $\widehat{BOΓ}$ , ποὺ ἔχει τὸ ἴδιο ἀντίστοιχο τόξο μὲ τὴν ἔγγεγραμμένην, τὴ λέμε **ἀντίστοιχη ἐπίκεντρη** τῆς ἔγγεγραμμένης γωνίας  $\widehat{BAΓ}$ . (σχῆμα 1ε).

**§ 2. Σχέση τῆς ἔγγεγραμμένης γωνίας μὲ τὴν ἐπίκεντρη, ποὺ ἔχει τὸ ἴδιο ἀντίστοιχο τόξο.**

Σχεδιάστε ἕναν κύκλο, μίαν ἔγγεγραμμένη γωνία σ' αὐτὸν καὶ τὴν ἐπίκεντρη, ποὺ ἔχει τὸ ἴδιο ἀντίστοιχο τόξο. Συγκρίνετε τὶς δύο αὐτὲς γωνίες. Τί παρατηρεῖτε; (σχ. 2).



σχ. 2.

\*Ἐστω κύκλος  $(O, R)$  καὶ ἡ ἔγγεγραμμένη σ' αὐτὸν γωνία  $\widehat{BAΓ}$ . Σχηματίζουμε τὴν ἀντίστοιχὴ τῆς ἐπίκεντρη γωνία  $\widehat{BOΓ}$ .

\*Ἄν μετρήσουμε ἢ χρησιμοποιήσουμε διαφανὲς χαρτί, θὰ διαπιστώσουμε ὅτι ἡ ἐπίκεντρη γωνία  $\widehat{BOΓ}$  εἶναι διπλάσια ἀπὸ τὴν ἔγγεγραμμένην  $\widehat{BAΓ}$  ἢ ἡ ἔγγεγραμμένη γωνία  $\widehat{BAΓ}$  εἶναι ἴση μὲ τὸ μισὸ τῆς ἐπίκεντρης, ποὺ ἔχει τὸ ἴδιο ἀντίστοιχο τόξο. Δηλαδή

$$\widehat{BAΓ} = \frac{1}{2} \widehat{BOΓ}.$$

Ἐπειδὴ ἡ τιμὴ τῆς ἐπίκεντρης γωνίας ἰσοῦται μὲ τὴν τιμὴ τοῦ ἀντίστοιχου τόξου τῆς, συμπεραίνουμε ὅτι ἡ τιμὴ τῆς ἔγγεγραμμένης γωνίας ἰσοῦται μὲ τὸ μισὸ τῆς τιμῆς τοῦ ἀντίστοιχου τόξου τῆς.


Γιὰ νὰ αἰτιολογήσουμε τὴ σχέση τῆς ἔγγεγραμμένης γωνίας σ' ἕναν κύκλο μὲ τὴν ἀντίστοιχὴ τῆς ἐπίκεντρη, ἐργαζόμαστε ὡς ἑξῆς:

Διακρίνουμε τρεῖς περιπτώσεις:

**α' περίπτωση.** Μία ἀπὸ τὶς πλευρὲς τῆς ἔγγεγραμμένης γωνίας εἶναι διάμετρος τοῦ κύκλου. (σχῆμα 3). Ἐστω κύκλος  $(O, R)$ , ἡ ἔγγεγραμμένη σ' αὐτὸν γωνία  $\widehat{BAΓ}$  καὶ ἡ ἀντίστοιχη ἐπίκεντρη γωνία  $\widehat{BOΓ}$ . Ἡ ἐπίκεντρη γωνία  $\widehat{BOΓ}$  εἶναι ἐξωτερικὴ γωνία τοῦ ἰσοσκελοῦς τριγώνου  $AOB$ . Ἐπομένως  $\widehat{BOΓ} = \widehat{BAΓ} + \widehat{ABO}$  καὶ ἐπειδὴ  $\widehat{ABO} = \widehat{BAΓ}$ , ἔχουμε  $\widehat{BOΓ} = 2 \cdot \widehat{BAΓ}$  ἄρα

$$\widehat{BAΓ} = \frac{1}{2} \widehat{BOΓ}$$

Δηλαδή ἡ ἔγγεγραμμένη γωνία  $\widehat{BAΓ}$  εἶναι τὸ μισὸ τῆς ἐπίκεντρης  $\widehat{BOΓ}$ .



σχ. 3.

**β' περίπτωση** Έστω ότι το κέντρο  $O$  είναι έσωτερικό σημείο τής έγγεγραμμένης γωνίας  $\widehat{BAG}$  (σχ. 4). Φέρνουμε τή διάμετρο  $AO\Delta$  και σχηματίζονται δύο έγγεγραμμένες γωνίες, οί  $\widehat{BAD}$  και  $\widehat{DAG}$ , για τίς όποίες έχουμε (άν λάβουμε ύπ' όψη τήν  $\alpha'$  περίπτωση):

$$\widehat{BAD} = \frac{1}{2} \widehat{BOD} \quad \text{Προσθέτουμε τίς ισότητες}$$

$$\widehat{DAG} = \frac{1}{2} \widehat{DOG} \quad \text{αυτέσ κατά μέλη και έχουμε}$$

$$\widehat{BAD} + \widehat{DAG} = \frac{1}{2} (\widehat{BOD} + \widehat{DOG}) \quad \text{δηλαδή}$$

$$\boxed{\widehat{BAG} = \frac{1}{2} \widehat{BOG}}$$

**γ' περίπτωση.** Τό κέντρο  $O$  είναι έξω-τερικό σημείο τής γωνίας  $\widehat{BAG}$  (σχ. 5).

Φέρνουμε τή διάμετρο  $AO\Delta$  και σχηματίζονται οί έγγεγραμμένες γωνίες  $\widehat{BAD}$  και  $\widehat{GAD}$ , για τίς όποίες έχουμε ( $\alpha'$  περίπτωση):

$$\widehat{BAD} = \frac{1}{2} \widehat{BOD} \quad \text{Ή αφαιρούμε τίς ισότητες αυ-}$$

$$\widehat{GAD} = \frac{1}{2} \widehat{GOD} \quad \text{τέσ κατά μέλη και βρίσκουμε:}$$

$$\widehat{BAD} - \widehat{GAD} = \frac{1}{2} (\widehat{BOD} - \widehat{GOD}),$$

Συνεπώς

$$\boxed{\widehat{BAG} = \frac{1}{2} \widehat{BOG}}$$


Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι: **Κάθε έγγεγραμμένη γωνία σέ κύκλο ίσούται μέ τό μισό τής έπίκεντρης, πού έχει τό ίδιο αντίστοιχο τόξο.**

### Παρατηρήσεις


- 1) Κάθε έγγεγραμμένη γωνία σέ κύκλο είναι πάντοτε **κυρτή** γωνία.
- 2) Ή έπίκεντρη γωνία, πού έχει τό ίδιο αντίστοιχο τόξο μέ τήν έγγεγραμμένη, μπορεί νά είναι κυρτή ή μή κυρτή γωνία.

### Άσκήσεις

- 1) Μία έπίκεντρη γωνία είναι  $120^\circ$ . Νά βρεθεί ή έγγεγραμμένη γωνία, πού έχει τό ίδιο αντίστοιχο τόξο μέ τήν έπίκεντρη αυτή.



σχ. 4.



σχ. 5.

2) \*Αν μία έγγεγραμμένη γωνία είναι  $23^\circ 30'$ , να βρείτε σε μοίρες και σε μέρη όρθης την αντίστοιχη της επίκεντρη γωνία.


3) Να βρείτε την έγγεγραμμένη γωνία, που έχει αντίστοιχο τόξο α)  $35^\circ$ , β)  $42^\circ$ , γ)  $192^\circ$ .

4) Σημειώνουμε στον κύκλο  $(O, R)$  4 διαδοχικά σημεία  $A, B, \Gamma, \Delta$  έτσι ώστε να έχουμε  $\widehat{A\Delta} = 50^\circ$ ,  $\widehat{B\Gamma} = 110^\circ$ ,  $\widehat{\Gamma\Delta} = 70^\circ$ . Να υπολογίσετε τις γωνίες  $\widehat{BA\Gamma}$ ,  $\widehat{B\Delta\Gamma}$ ,  $\widehat{\Gamma\Delta A}$ ,  $\widehat{\Gamma B\Delta}$ ,  $\widehat{\Delta B A}$ ,  $\widehat{\Delta\Gamma A}$ ,  $\widehat{B\Delta A}$  και  $\widehat{A\Gamma B}$ .

5) Δίνεται ο κύκλος  $(O, R)$ . Φέρνουμε δύο χορδές του  $AD$  και  $B\Gamma$ , οι οποίες τέμνονται στο σημείο  $E$ , που βρίσκεται στο έσωτερικό του κύκλου. Να συγκρίνετε την τιμή της γωνίας, που έχει κορυφή το  $E$ , με το ήμισυ του τόξου των τόξων, τα οποία περιέχονται μεταξύ των πλευρών της και των προεκτάσεών τους. (Υπόδειξη: Φέρετε την  $AG$ ).

6) Δίνεται ο κύκλος  $(O, R)$ . Φέρνουμε δύο εύθειες, οι οποίες τον τέμνουν αντίστοιχως στα σημεία  $B, \Gamma$  και  $A, \Delta$  και συναντιούνται στο σημείο  $Z$ , που βρίσκεται στο έξωτικό του κύκλου. Να συγκρίνετε την τιμή της γωνίας, που έχει κορυφή το  $Z$ , με την ήμιδιαφορά των τιμών των τόξων του κύκλου, τα οποία περιέχονται μεταξύ των πλευρών της γωνίας αυτής. (Υπόδειξη: Φέρετε την  $AG$  ή  $BD$ ).

7) Δίνεται ο κύκλος  $(O, R)$  και μία χορδή του  $AB$  (σχ. 6). Στο ένα άκρο της (π.χ. στο  $A$ ) φέρετε την εφαπτομένη του κύκλου  $\psi'A\psi$ . Να συγκρίνετε τη γωνία  $\widehat{\psi'AB}$ , που σχηματίζεται από τη χορδή  $AB$  και την εφαπτομένη στο άκρο της, με την έγγεγραμμένη  $\widehat{A\theta B}$ , που έχει αντίστοιχο τόξο το  $\widehat{ANB}$ . (Υπόδειξη: Συγκρίνετε τις γωνίες αυτές με το μισό της επίκεντρης  $\widehat{BOA}$ . Διατυπώστε τη σχετική πρόταση).



σχ. 6.

κεντρης  $\widehat{BOA}$ . Διατυπώστε τη σχετική πρόταση).

### § 3. Έφαρμογές των έγγεγραμμένων γωνιών.


\*Άμεσες εφαρμογές της προηγούμενης προτάσεως έχουμε στα παρακάτω:

1. \*Εστω ο κύκλος  $(O, R)$  και οι έγγεγραμμένες γωνίες σ' αυτόν  $\widehat{A\Gamma B}$ ,  $\widehat{A\Delta B}$ ,  $\widehat{A\epsilon B}$ , που έχουν το ίδιο αντίστοιχο τόξο  $\widehat{AB}$ . Συγκρίνετε αυτές τις γωνίες (σχ. 7).

Οι γωνίες αυτές είναι ίσες, επειδή κάθε μία απ' αυτές είναι ίση με το μισό της ίδιας επίκεντρης γωνίας  $\widehat{A\theta B}$ . Δηλαδή


$$\widehat{A\Gamma B} = \widehat{A\Delta B} = \widehat{A\epsilon B} = \frac{1}{2} \widehat{A\theta B}.$$

\*Άρα: Οι έγγεγραμμένες γωνίες, που έχουν το ίδιο αντίστοιχο τόξο, είναι ίσες.



σχ. 7.

2. Έχουμε τις έγγεγραμμένες στον ίδιο κύκλο  $O$  γωνίες  $\widehat{BA\Gamma}$  και  $\widehat{B'A'\Gamma'}$ , οι όποιες έχουν τα αντίστοιχά τους τόξα ίσα,  $\widehat{B\Gamma} = \widehat{B'\Gamma'}$ . Να συγκρίνετε αυτές τις γωνίες (σχ. 8).




σχ. 8.

Στις γωνίες αυτές έχουμε τις ισότητες  $\widehat{BA\Gamma} = \frac{1}{2} \widehat{BO\Gamma}$  και  $\widehat{B'A'\Gamma'} = \frac{1}{2} \widehat{B'O\Gamma'}$ .

Έπειδή  $\widehat{B\Gamma} = \widehat{B'\Gamma'}$ , έχουμε  $\widehat{BO\Gamma} = \widehat{B'O\Gamma'}$ , όποτε και  $\widehat{BA\Gamma} = \widehat{B'A'\Gamma'}$ , γιατί είναι μισά ίσων γωνιών.

Στόν ίδιο κύκλο (ή σε ίσους κύκλους) δύο έγγεγραμμένες γωνίες, που έχουν ίσα τα αντίστοιχά τους τόξα, είναι ίσες.

Αντιστρόφως, αν οι έγγεγραμμένες γωνίες  $\widehat{BA\Gamma}$ ,  $\widehat{B'A'\Gamma'}$  είναι ίσες, δηλαδή  $\widehat{BA\Gamma} = \widehat{B'A'\Gamma'}$ , θα είναι και οι αντίστοιχές τους επίκεντρες γωνίες ίσες, δηλαδή  $\widehat{BO\Gamma} = \widehat{B'O\Gamma'}$  και συνεπώς  $\widehat{B\Gamma} = \widehat{B'\Gamma'}$ . Ωστε παρατηρούμε ότι δύο ίσες έγγεγραμμένες γωνίες στόν ίδιο κύκλο (ή σε ίσους κύκλους) έχουν ίσα αντίστοιχα τόξα.



σχ. 9.

3. Έστω κύκλος  $(O, R)$  και ή έγγεγραμμένη γωνία σ' αυτόν  $\widehat{BA\Gamma}$ , ή όποια έχει αντίστοιχο τόξο ίσο με ένα ήμικύκλιο. Μεταηστε τήν γωνία αυτή (σχ. 9).

Μετρώντας την διαπιστώνουμε ότι είναι  $90^\circ$  (ή 1 όρθ.). Αυτό δικαιολογείται ως εξής: Η γωνία αυτή είναι όρθή, γιατί ή αντίστοιχη επίκεντρη γωνία είναι μία εϑθεία γωνία. Δηλαδή  $\widehat{BA\Gamma} = \frac{1}{2} \widehat{BO\Gamma} = \frac{1}{2} \cdot 2 \text{ όρθ.} = 1 \text{ όρθ.}$

Κάθε έγγεγραμμένη γωνία σε κύκλο, τής όποίας τό αντίστοιχο τόξο είναι ένα ήμικύκλιο, είναι όρθή.

#### Σημείωση.

Τήν πρόταση τής § 2 «κάθε έγγεγραμμένη γωνία σε κύκλο ίσούται με τό μισό τής επίκεντρης γωνίας, ή όποια έχει τό ίδιο αντίστοιχο τόξο» τήν αίτιολογήσαμε με τή βοήθεια άλλων προτάσεων, που είναι γνωστές από τήν προηγούμενη τάξη. Τό ίδιο επαναλάβαμε στις προτάσεις 1, 2, 3 τής § 3. Τήν εργασία αυτή τήν ονομάζουμε απόδειξη και τις προτάσεις τις λέμε **θεωρήματα**.

Ωστε: **θεώρημα** είναι μία πρόταση, τής όποίας αποδειχνουμε τήν αλήθεια.

Στήν Α' τάξη μάθαμε μερικές βασικές προτάσεις, τις όποιες δέν αποδείξαμε, όπως

π.χ. «ἀπὸ δύο σημεία διέρχεται μία καὶ μόνο εὐθεία» ἢ «ἀπὸ ἓνα σημείο, πού βρίσκεται ἔκτος εὐθείας, διέρχεται μία μόνο παράλληλη πρὸς αὐτήν». Τὶς προτάσεις αὐτὲς τὶς ὀνομάζουμε **ἀξιώματα**.

Ἔστω: **ἀξίωμα** εἶναι μία βασικὴ πρόταση, πού τὴν δεχόμαστε σὰν ἀληθῆ.

### Ἀσκήσεις

8) Σ' ἓναν κύκλο νὰ φέρετε δύο κάθετες διαμέτρους  $AA'$  καὶ  $BB'$ . Ἐὰν  $M$  εἶναι ἓνα ὀποιοδήποτε σημεῖο τοῦ τόξου  $A'B'$ , νὰ συγκρίνετε τὶς γωνίες  $\widehat{AMB}$  καὶ  $\widehat{B'MA}$ .

9) Βρεῖτε τὸ εἶδος τῆς ἐγγεγραμμένης γωνίας σὲ κύκλο μὲ ἀντίστοιχο τόξο μεγαλύτερο, ἴσο, ἢ μικρότερο ἀπὸ ἡμικύκλιο.


10) Δύο κύκλοι μὲ κέντρα  $O$  καὶ  $O'$  τέμνονται στὰ σημεῖα  $A$  καὶ  $B$ . Ἐὰν  $\Gamma$  καὶ  $\Delta$  εἶναι τὰ ἕκ διαμέτρου ἀντίθετα σημεῖα τοῦ  $A$  ὡς πρὸς τοὺς κύκλους αὐτοὺς, ν' ἀποδείξετε ὅτι τὰ σημεῖα  $\Gamma, B, \Delta$  βρίσκονται πάνω σὲ μία εὐθεῖα καὶ νὰ συγκρίνετε τὰ εὐθ. τμήματα  $OO'$  καὶ  $\Gamma\Delta$ . (Σημ. Μὲ τὸν ὑπολογισμὸ τῶν γωνιῶν  $\widehat{AB\Gamma}$  καὶ  $\widehat{AB\Delta}$  θὰ βοηθηθεῖτε νὰ ἀποδείξετε τὴν πρόταση).

11) Σημειώνουμε στὸν κύκλο  $(O, R)$  4 διαδοχικὰ σημεῖα  $A, B, \Gamma, \Delta$  ἔτσι πού νὰ εἶναι  $\widehat{AB}=70^\circ$ ,  $\widehat{B\Gamma}=100^\circ$ ,  $\widehat{\Gamma\Delta}=110^\circ$ . Νὰ ὑπολογισθοῦν οἱ γωνίες  $\widehat{AB\Gamma}$ ,  $\widehat{A\Delta\Gamma}$ . Τί παρατηρεῖτε; Τὸ ἴδιο καὶ γιὰ τὶς γωνίες  $\widehat{B\Delta\Delta}$  καὶ  $\widehat{B\Gamma\Delta}$ .

## Β'. ΕΥΘΕΙΕΣ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΣΕ ΤΡΙΓΩΝΟ

### 1ο. Μεσοκάθετοι τῶν πλευρῶν τριγώνου.

§ 4. Κατασκευάστε ἓνα τρίγωνο  $AB\Gamma$  μὲ πλευρὰς  $B\Gamma=5\text{ cm}$ ,  $A\Gamma=6\text{ cm}$ ,  $AB=4\text{ cm}$ . Μὲ τὴ βοήθεια τοῦ διαβήτη καὶ τοῦ χάρακα φέρετε (προσεκτικὰ) τὶς μεσοκάθετους τῶν πλευρῶν του. Τί παρατηρεῖτε; (σχ. 10).



σχ. 10.

Κατασκευάζουμε τὸ τρίγωνο  $AB\Gamma$ . Μὲ τὴ βοήθεια τοῦ διαβήτη καὶ τοῦ χάρακα φέρνουμε κατὰ τὸν γνωστὸ μας τρόπο τὶς μεσοκάθετους  $\epsilon_1, \epsilon_2, \epsilon_3$  τῶν πλευρῶν τοῦ τριγώνου  $AB\Gamma$  καὶ παρατηροῦμε ὅτι αὐτὲς **συντρέχουν** σ' ἓνα σημεῖο  $O$ .

Συγκρίνουμε (μὲ τὸ διαβήτη) τὰ τμήματα  $OA, OB, O\Gamma$  καὶ παρατηροῦμε ὅτι αὐτὰ εἶναι ἴσα, δηλαδὴ  $OA=OB=O\Gamma$ . Ἐὰν μὲ κέντρο τὸ  $O$  καὶ ἀκτίνα  $OA$  γράψουμε κύκλο, αὐτὸς διέρχεται ἀπὸ τὶς τρεῖς κορυφές  $A, B, \Gamma$  τοῦ τριγώνου  $AB\Gamma$  καὶ λέγεται **περιγεγραμμένος** κύκλος τοῦ τριγώνου.

**\*Ἀρα: Οἱ τρεῖς μεσοκάθετοι τῶν πλευρῶν τριγώνου συντρέχουν σ' ἓνα σημεῖο, πού εἶναι τὸ κέντρο τοῦ περιγεγραμμένου κύκλου τοῦ τριγώνου.**



Για να αιτιολογήσουμε το παραπάνω αποτέλεσμα, στηριζόμαστε στη γνωστή μας πρόταση: «Κάθε σημείο της μεσοκάθετου ενός ευθ. τμήματος απέχει εξ ίσου από τὰ άκρα του» και «κάθε σημείο, που απέχει εξ ίσου από τὰ άκρα ενός ευθ. τμήματος, βρίσκεται πάνω στην μεσοκάθετο αυτού».

Οι μεσοκάθετοι  $\epsilon_1$  και  $\epsilon_2$  τών πλευρών ΒΓ και ΑΓ τέμνονται σ' ένα σημείο Ο, (έπειδή οι κάθετοι πάνω σ' αυτές ΑΓ και ΒΓ τέμνονται). Έπειδή τὸ Ο βρίσκεται πάνω στη μεσοκάθετο  $\epsilon_1$ , έχουμε  $OB=OG$ . Όμοίως, έπειδή τὸ Ο βρίσκεται και πάνω στη μεσοκάθετο  $\epsilon_2$ , έχουμε και  $OG=OA$ . Συνεπώς  $OA=OB$ . Έπειδή τὸ Ο απέχει εξ ίσου από τὰ άκρα τῆς πλευρᾶς ΑΒ τοῦ τριγώνου ΑΒΓ, βρίσκεται πάνω στη μεσοκάθετο τῆς  $\epsilon_3$ . Από τὰ παραπάνω συμπεραίνουμε, ὅτι  $OA=OB=OG$ . Ἄν με κέντρο τὸ Ο και άκτίνα ΟΑ γράψουμε κύκλο, αυτός περνά από τις τρεις κορυφές Α, Β, Γ τοῦ τριγώνου ΑΒΓ και λέγεται **περιγεγραμμένος κύκλος** τοῦ τριγώνου.

**Ἔστω: Οἱ τρεις μεσοκάθετοι τών πλευρών κάθε τριγώνου συντρέχουν σ' ένα σημείο, που είναι τὸ κέντρο τοῦ περιγεγραμμένου κύκλου τοῦ τριγώνου.**

### Ἀσκήσεις:

12) Φέρετε τις μεσοκάθετους τών πλευρών ενός ὀρθογωνίου και ενός ἀμβλυγωνίου τριγώνου. Τί έχετε να παρατηρήσετε για τὴ θέση τοῦ κέντρου τών περιγεγραμμένων κύκλων σ' αυτά;


13) Φέρετε τις μεσοκάθετους τών ἰσών πλευρών ενός ἰσοσκελοῦς τριγώνου και τὸ ὕψος, που ἀντιστοιχεί στη βάση του. Τί παρατηρεῖτε; Δικαιολογήστε με συλλογισμούς τὴ παρατήρησή σας.

14) Κατασκευάστε ένα τρίγωνο ΑΒΓ. Με βάσεις τις πλευρές του σχηματίστε ἰσοκέλη τρίγωνα ΑΟΒ, ΒΚΓ, ΓΛΑ και φέρετε τὰ ὕψη τους ΟΟ', ΚΚ', ΛΛ'. Προεκτείνετε α και δικαιολογήστε τὸ ὅτι αυτά συντρέχουν στο ἴδιο σημείο.

### 2ο. Ὑψη ενός τριγώνου.

§ 5. Ὑψος ενός τριγώνου ὀνομάζουμε τὸ ευθ. τμήμα, τὸ ὁποῖο συνδέει μιὰ κορυφή τοῦ τριγώνου με τὸ ἴχνος τῆς καθέτου από τὴν κορυφή αὐτή στην ἀπέναντι πλευρά. Ὑψος ὁμως θεωρεῖται και ὁ φορέας τοῦ τμήματος αὐτοῦ. Ἐπομένως κάθε τρίγωνο έχει τρία ὕψη.

Νὰ κατασκευάσετε ένα τρίγωνο ΑΒΓ με πλευρές  $AB=3,5$  cm,  $BΓ=4$  cm



και  $ΑΓ=2,5$  cm. Φέρετε με τὴ βοήθεια τοῦ χάρακα και τοῦ διαβήτη τὰ ὕψη τοῦ τριγώνου. Τί παρατηρεῖτε; (Σχ. 11).

Φέρνουμε με προσοχή τὰ ὕψη ΑΔ, ΒΕ και ΓΖ τοῦ τριγώνου ΑΒΓ. Παρατηροῦμε ὅτι τὰ

τρία ύψη **συντρέχουν** στο ίδιο σημείο  $H$ , που το ονομάζουμε **ὀρθόκεντρο** τοῦ τριγώνου. Ἔχουμε λοιπὸν τὴν πρόταση: **Τὰ ύψη κάθε τριγώνου συντρέχουν σὲ ἓνα σημείο.**

\*Αν θέλουμε νὰ **αἰτιολογήσουμε** αὐτὴ τὴν παρατήρηση μὲ συλλογισμούς, ἐργαζόμαστε ὡς ἑξῆς: (σχ. 11).

Γράφουμε τρεῖς εὐθείες, πού περνοῦν ἀπὸ τὶς κορυφές  $A, B$  καὶ  $\Gamma$  τοῦ τριγώνου καὶ εἶναι παράλληλες πρὸς τὶς πλευρές του  $B\Gamma, A\Gamma, AB$  ἀντιστοίχως, Οἱ τρεῖς αὐτές εὐθείες τέμνονται ἀνά δύο καὶ σχηματίζουν τὸ τρίγωνο  $A_1B_1\Gamma_1$ .

$$\left. \begin{array}{l} \text{*Έχουμε: } AB_1 // B\Gamma \\ \quad \quad \quad \Gamma B_1 // AB \end{array} \right\} \Rightarrow AB\Gamma B_1 \text{ εἶναι παραλληλόγραμμο} \Rightarrow AB_1 = B\Gamma$$

$$\text{καὶ} \left. \begin{array}{l} B\Gamma_1 // A\Gamma \\ A\Gamma_1 // B\Gamma \end{array} \right\} \Rightarrow A\Gamma_1 B\Gamma \text{ εἶναι παραλληλόγραμμο} \Rightarrow A\Gamma_1 = B\Gamma.$$

\*Επομένως  $AB_1 = A\Gamma_1$ . \*Αρα τὸ σημείο  $A$  εἶναι τὸ μέσο τῆς  $B_1\Gamma_1$ . Τὸ ὕψος  $AD$  τοῦ  $AB\Gamma$  (κάθετο) στὴ  $B\Gamma$  εἶναι κάθετο στὴν παράλληλό της  $B_1\Gamma_1$ , στὸ μέσο της  $A$ . Δηλαδή ἡ  $AD$  εἶναι μεσοκάθετος τῆς πλευρᾶς  $B_1\Gamma_1$  τοῦ τριγώνου  $A_1B_1\Gamma_1$ . Ὀμοίως καὶ τὰ ἄλλα ὕψη  $BE$  καὶ  $\Gamma Z$  τοῦ τριγώνου  $AB\Gamma$  εἶναι μεσοκάθετοι τῶν πλευρῶν  $\Gamma_1 A_1, A_1 B_1$  τοῦ τριγώνου  $A_1B_1\Gamma_1$ .

Οἱ μεσοκάθετοι ὁμῶς τῶν πλευρῶν τοῦ τριγώνου  $A_1B_1\Gamma_1$ , ὅπως ξέρομε πιά, συντρέχουν σ' ἓνα σημείο  $H$ . \*Αρα καὶ τὰ ὕψη  $AD, BE$  καὶ  $\Gamma Z$  **συντρέχουν** σ' ἓνα σημείο  $H$ , τὸ **ὀρθόκεντρο** τοῦ τριγ.  $AB\Gamma$ . \*Ὡστε: **Τὰ ύψη κάθε τριγώνου συντρέχουν σὲ ἓνα σημείο.**

### Παρατηρήσεις

- 1) \*Ἐὰν τὸ τρίγωνο εἶναι ὀρθογώνιο στὸ  $A$ , ἐπειδὴ δύο ὕψη του εἶναι οἱ κάθετες πλευρές του, τὸ ὀρθόκεντρό του εἶναι ἡ κορυφή τῆς ὀρθῆς γωνίας του.
- 2) \*Ἐὰν τὸ τρίγωνο εἶναι ὀξυγώνιο, τὸ ὀρθόκεντρό του βρίσκεται στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ τριγώνου, καὶ ἂν εἶναι ἀμβλυγώνιο, βρίσκεται στὸ ἐξωτερικὸ του.

### \*Ασκήσεις

15) Νὰ κατασκευάσετε τρίγωνο  $AB\Gamma$  καὶ νὰ βρεῖτε τὸ ὀρθόκεντρό του  $H$ . Νὰ ὀρίσετε τὰ ὀρθόκεντρα τῶν τριγώνων  $ABH, B\Gamma H$  καὶ  $\Gamma AH$ .

16) Σ' ἓνα τρίγωνο  $\Delta EZ$  φέρετε τὰ ὕψη  $\Delta\Delta'$  καὶ  $EE'$ . Αὐτὰ τέμνονται στὸ σημείο  $H$ . Ἀπὸ τὸ  $H$  φέρετε κάθετο στὴν  $E\Delta$ . Περνᾷ αὐτὴ ἡ κάθετος ἀπὸ τὸ  $Z$ ; (Γιατί;)


17) Σ' ἓνα ἰσοσκελές τρίγωνο  $AB\Gamma$  ( $AB = A\Gamma$ ) φέρετε τὰ ὕψη  $BB'$  καὶ  $\Gamma\Gamma'$ . Ἀπὸ τὸ σημείο τομῆς τους  $H$  φέρετε τὴν  $AH$ . Περνᾷ αὐτὴ ἀπὸ τὸ μέσο τῆς  $B\Gamma$ ; (Γιατί;).

18) Ἐνὸς τριγώνου  $AB\Gamma$  ἡ γωνία  $\widehat{A}$  εἶναι  $70^\circ$ . Τὰ ὕψη του  $AD$  καὶ  $BE$  τέμνονται στὸ  $H$ . Νὰ ὑπολογισθοῦν οἱ γωνίες  $\widehat{HBA}$  καὶ  $\widehat{H\Gamma A}$ .

### 3<sup>ο</sup>. Διάμεσοι τριγώνου.

§ 6. **Διάμεσο** ἐνὸς τριγώνου ονομάζουμε τὸ εὐθ. τμήμα, πού συνδέει μία κορυφή τοῦ τριγώνου μὲ τὸ μέσο τῆς ἀπέναντι πλευρᾶς. Κάθε τρίγωνο ἔχει τρεῖς διαμέσους.

Νά κατασκευάσετε ένα τρίγωνο  $AB\Gamma$  με πλευρές  $AB=4$  cm,  $B\Gamma=5$  cm και  $A\Gamma=6$  cm. Με τη βοήθεια των γεωμετρικών οργάνων φέρετε (προσεκτικά) τις διαμέσους του τριγώνου. Τι παρατηρείτε; (σχ. 12).



σχ. 12.

στο τρίγωνο  $AB\Gamma$  φέρνουμε τις διαμέσους  $AM$ ,  $BN$  και  $\Gamma\Lambda$  και παρατηρούμε ότι αυτές **συντρέχουν** στο ίδιο σημείο  $\Theta$ . 'Αν συγκρίνουμε με το διαβήτη τὰ εὐθ. τμήματα  $A\Theta$  και  $\Theta M$ , τὰ  $B\Theta$  και  $\Theta N$ , καθώς και τὰ  $\Gamma\Theta$  και  $\Theta\Lambda$ , θὰ διαπιστώσουμε ὅτι  $A\Theta=2\Theta M$  και  $\Theta M=\frac{1}{3} AM$  (ἢ  $A\Theta=\frac{2}{3} AM$ ). 'Ομοίως ἔχουμε  $N\Theta=\frac{1}{3} BN$  και  $\Theta\Lambda=\frac{1}{3} \Gamma\Lambda$ .

Ἐπομένως: **Οἱ τρεῖς διαμέσοι ἑνὸς τριγώνου συντρέχουν σ' ἓνα σημείο, πού λέγεται κέντρο βάρους τοῦ τριγώνου και ἀπέχει ἀπὸ τὸ μέσο κάθε πλευρῆς τὸ  $\frac{1}{3}$  τῆς ἀντί-**

**στοιχῆς διαμέσου (ἢ τὰ  $\frac{2}{3}$  τῆς διαμέσου ἀπὸ τὴν ἀντίστοιχη κορυφή).**

Μποροῦμε νὰ **αἰτιολογήσουμε** τὸ ἀποτέλεσμα αὐτὸ με τὸν ἐξῆς τρόπο:

Στὶς προεκτάσεις τῶν  $AM$  και  $BN$  (πέρα ἀπὸ τὰ  $M$  και  $N$ ) παίρνουμε ἀντιστοίχως τμήματα  $M\Delta=M\Theta$  και  $NE=N\Theta$ . Φέρνουμε τὶς  $\Gamma E$  και  $\Gamma\Delta$ . Τὸ τετράπλευρο  $\Gamma\Theta B\Delta$  πού σχηματίζεται εἶναι παραλληλόγραμμο, ἐπειδὴ οἱ διαγώνιοί του διχοτομοῦνται ( $\Gamma M=MB$  και  $\Theta M=M\Delta$ ). 'Ομοίως και τὸ  $\Gamma\Theta A E$  εἶναι παραλληλόγραμμο, ἐπειδὴ  $\Gamma N=NA$  και  $\Theta N=NE$ . Συνεπῶς  $B\Delta \parallel \Gamma\Theta$  και  $A E \parallel \Gamma\Theta$ . 'Αρα  $B\Delta \parallel A E$ . 'Ωστε τὸ  $AB\Delta E$  εἶναι παραλληλόγραμμο, γιατί ἔχει δύο ἀπέναντι πλευρῆς ἴσες και παράλληλες. Τότε ὁμως ἔχουμε  $A\Theta=\Theta\Delta$  και  $B\Theta=\Theta E$  (γιατὶ οἱ διαγώνιοι παραλληλογράμμου διχοτομοῦνται). 'Αλλὰ  $\Theta\Delta=2\Theta M$ , ὥστε  $A\Theta=2\Theta M$  και  $\Theta M=\frac{1}{3} AM$ . 'Ομοίως συμπεραίνουμε ὅτι  $\Theta N=\frac{1}{3} BN$ . Με ὁμοιο τρόπο ἀποδεικνύουμε ὅτι ἡ διάμεσος  $\Gamma\Lambda$  τέμνει τὴν  $BN$  σ' ἓνα σημείο, πού ἀπέχει ἀπὸ τὸ  $N$  τὸ  $\frac{1}{3}$  τῆς  $BN$ , δηλαδή στο σημείο  $\Theta$ , τὸ ὁποῖο ἀπέχει ἀπὸ τὸ  $\Lambda$  τὸ  $\frac{1}{3}$  τῆς  $\Gamma\Lambda$ . 'Ωστε: **Οἱ τρεῖς διαμέσοι ἑνὸς τριγώνου συντρέχουν σ' ἓνα σημείο. Αὐτὸ ἀπέχει ἀπὸ τὸ μέσο κάθε πλευρῆς τὸ  $\frac{1}{3}$  τῆς ἀντίστοιχῆς διαμέσου ἢ τὰ  $\frac{2}{3}$  τῆς διαμέσου ἀπὸ τὴν ἀντίστοιχη κορυφή.**

### Ἀ σ κ ῆ σ ε ι ς

19) Σχεδιάστε ἓνα τρίγωνο  $AB\Gamma$  και βρεῖτε τὸ κέντρο βάρους του.

20) Φέρετε τὴν διάμεσο  $AM$  τοῦ τριγώνου  $AB\Gamma$ . Πάρτε σ' αὐτὴν ἓνα τμήμα  $A\Theta=\frac{2}{3} AM$ . Συγκρίνετε τὰ τμήματα, στὰ ὁποῖα οἱ  $B\Theta$  και  $\Gamma\Theta$  τέμνουν τὶς πλευρῆς του  $A\Gamma$  και  $AB$ .

21) Σχηματίστε ἓνα παραλληλόγραμμο  $AB\Gamma\Delta$  ἐνῶστε με εὐθ. τμήμα τὴν κορυφή  $A$  με τὸ μέσο τῆς  $\Gamma\Delta$ . Συγκρίνετε τὰ τμήματα, στὰ ὁποῖα χωρίζεται ἡ  $AM$  ἀπὸ τὴν  $B\Delta$ .


22) Νά σχηματίσετε ἓνα παραλληλόγραμμο  $AB\Gamma\Delta$  και νά πάρετε ἓνα ὁποιοδήποτε σημείο  $N$  στο ἐπίπεδο τοῦ παραλληλογράμμου. 'Αποδείξετε ὅτι τὰ τρίγωνα  $NA\Gamma$  και  $NB\Delta$  ἔχουν τὸ ἴδιο κέντρο βάρους.

4<sup>ο</sup>. Διχοτόμοι τριγώνου.

§ 7. 'Ονομάζουμε έσωτερική **διχοτόμο** ενός τριγώνου τή διχοτόμο μιᾶς γωνίας του. Διχοτόμο ονομάζουμε και τὸ τμήμα τῆς προηγούμενης ἀπὸ τὴν κορυφή μέχρι τὴν ἀπέναντι πλευρά.

Κάθε τρίγωνο ἔχει τρεῖς έσωτερικές διχοτόμους.

Νὰ κατασκευάσετε ἓνα τρίγωνο  $AB\Gamma$  με πλευρές  $AB=4\text{ cm}$ ,  $B\Gamma=5\text{ cm}$ ,  $A\Gamma=6\text{ cm}$ . Με τὴ βοήθεια τῶν γεωμετρικῶν ὀργάνων (διαβήτη, χάρακα) νὰ φέρετε (προσεκτικᾶ) τὶς έσωτερικές διχοτόμους τῶν γωνιῶν τοῦ τριγώνου. Τί παρατηρεῖτε; (σχ. 13).



σχ. 13.

Κατασκευάζουμε κατὰ τὰ γνωστά μας τὸ τρίγωνο  $AB\Gamma$  και φέρνουμε τὶς διχοτόμους τῶν έσωτερικῶν γωνιῶν τοῦ  $\widehat{A}$ ,  $\widehat{B}$ ,  $\widehat{\Gamma}$ . Παρατηροῦμε, (ἂν ἡ κατασκευή ἔχει γίνει με προσοχή) ὅτι οἱ τρεῖς έσωτερικές διχοτόμοι τοῦ **συντρέχουν** σὲ ἓνα σημεῖο  $I$ . Φέρνουμε τὶς ἀποστάσεις  $IA'$ ,  $IB'$ ,  $IG'$  τοῦ σημείου  $I$  ἀπὸ τὶς πλευρές  $B\Gamma$ ,  $\Gamma A$ ,  $AB$  ἀντιστοίχως. Συγκρίνουμε τὶς ἀποστάσεις αὐτὲς με τὸ διαβήτη και παρατηροῦμε ὅτι εἶναι ἴσες, δηλαδή  $IA' = IB' = IG'$ .

**Έπομένως: Οἱ τρεῖς έσωτερικές διχοτόμοι κάθε τριγώνου συντρέχουν σὲ ἓνα σημεῖο, ποὺ ἀπέχει ἐξ ἴσου ἀπὸ τὶς πλευρές του.**

Μποροῦμε νὰ **αιτιολογήσουμε** τὴν παρατήρηση αὐτὴ με συλλογισμούς, ἂν στηριχτοῦμε σὲ τὶς γνωστὲς ιδιότητες: «Κάθε σημεῖο τῆς διχοτόμου μιᾶς γωνίας ἀπέχει ἐξ ἴσου ἀπὸ τὶς πλευρές της» και «κάθε έσωτερικὸ σημεῖο μιᾶς γωνίας, τὸ ὅποιο ἀπέχει ἐξ ἴσου ἀπὸ τὶς πλευρές της, εἶναι σημεῖο τῆς διχοτόμου τῆς γωνίας αὐτῆς».

Ἡ έσωτερική διχοτόμος  $AZ$  τῆς γωνίας  $\widehat{A}$  τοῦ τριγώνου  $AB\Gamma$  τέμνει τὴν πλευρὰ  $B\Gamma$  σὲ τὸ  $Z$ . Ἡ έσωτ. διχοτόμος  $BZ'$  τῆς γωνίας  $\widehat{B}$  τοῦ τριγώνου  $ABZ$  τέμνει τὴν πλευρὰ τοῦ  $AZ$  σ' ἓνα σημεῖο  $I$ .

Σημειώνουμε με τὰ  $A'$ ,  $B'$ ,  $G'$  τοὺς πόδες τῶν καθέτων, οἱ ὁποῖες ἄγονται ἀπὸ τὸ  $I$  σὲ τὶς πλευρές  $B\Gamma$ ,  $\Gamma A$ ,  $AB$ . Τὸ σημεῖο  $I$ , ἐπειδὴ βρίσκεται πάνω στὴ διχοτόμο  $AZ$  τῆς γωνίας  $\widehat{A}$ , ἀπέχει ἐξ ἴσου ἀπὸ τὶς  $AB$  και  $A\Gamma$ . Εἶναι ὁμοίως και σημεῖο τῆς διχοτόμου  $BZ'$ , ἄρα ἀπέχει ἐξ ἴσου ἀπὸ τὶς  $AB$  και  $B\Gamma$ . Έπομένως ἀπέχει ἐξ ἴσου και ἀπὸ τὶς πλευρές  $B\Gamma$  και  $A\Gamma$ . Έπειδὴ τὸ  $I$  εἶναι έσωτερικὸ σημεῖο τοῦ τριγώνου  $AB\Gamma$ , συμπεραίνουμε ὅτι τὸ  $I$  βρίσκεται και πάνω στὴ διχοτόμο  $\Gamma E$  τῆς γωνίας  $\Gamma$  τοῦ τριγώνου  $AB\Gamma$ .

**Ὡστε: Οἱ τρεῖς έσωτερικές διχοτόμοι κάθε τριγώνου συντρέχουν σὲ ἓνα σημεῖο, ποὺ ἀπέχει ἐξ ἴσου ἀπὸ τὶς πλευρές του.**

## Παρατηρήσεις

1. Ἀπὸ τὴν ἰσότητα  $IG' = IB' = IA'$  (τῶν ἀποστάσεων τοῦ  $I$  ἀπὸ τὶς πλευρές) παρατηροῦμε ὅτι, ἐὰν με κέντρο τὸ σημεῖο  $I$  και ἀκτίνα  $IA' =$

$=IB' = IG'$  γράψουμε έναν κύκλο, αυτός θα εφάπτεται στις πλευρές του τριγώνου  $ABΓ$  στα σημεία  $A', B', Γ'$  (γιατί;). Ὡστε τὸ σημείο, στὸ ὅποιο συντρέχουν οἱ ἐσωτερικὲς διχοτόμοι τῶν γωνιῶν ἑνὸς τριγώνου  $ABΓ$ , εἶναι τὸ κέντρο ἑνὸς κύκλου, ὁ ὁποῖος εφάπτεται στὶς πλευρὲς τοῦ τριγώνου καὶ λέγεται **ἐγγεγραμμένος** κύκλος στὸ τρίγωνο.


2. Στὸ ἰσόπλευρο τρίγωνο οἱ διάμεσοι εἶναι καὶ ὕψη καὶ διχοτόμοι τῶν γωνιῶν του. Ἄρα τὸ κοινὸ σημείο τους εἶναι τὸ κέντρο βάρους του, τὸ κέντρο τοῦ περιγεγραμμένου κύκλου, τὸ κέντρο τοῦ ἐγγεγραμμένου καὶ τὸ ὀρθόκέντρο τοῦ ἰσοπλεύρου τριγώνου. Λέμε ὅτι τὸ  $O$  εἶναι τὸ **κέντρο** τοῦ ἰσοπλεύρου τριγώνου.

**Σημ.** Οἱ προτάσεις τῶν § 4, 5, 6, 7 εἶναι θεωρήματα.

### Ἀσκήσεις

23) Κατασκευάστε ἕνα ἰσοσκελὲς τρίγωνο καὶ βρεῖτε τὸ σημείο τομῆς τῶν διχοτόμων του. Ἐξηγήστε γιατί βρίσκεται αὐτὸ πάνω στὸ ὕψος του.

24) Ἐνὸς τριγώνου  $ABΓ$  οἱ γωνιῖς  $\widehat{B}$  καὶ  $\widehat{\Gamma}$  εἶναι ἀντιστοίχως  $60^\circ$  καὶ  $50^\circ$ . Νὰ υπολογισθεῖ ἡ γωνία  $B\widehat{I}\Gamma$  (τῶν ἐσωτερικῶν διχοτόμων του  $BI, I\Gamma$ ), (σχ. 14).



σχ. 14.

25) Σ' ἕνα ὀρθογώνιο τρίγωνο  $ABΓ$  ( $\widehat{A} = 90^\circ$ ) νὰ φέρετε τὶς διχοτόμους τῶν γωνιῶν  $\widehat{B}$  καὶ  $\widehat{\Gamma}$ . Ἄν  $I$  εἶναι τὸ σημείο τομῆς τους, μετρήστε τὴ γωνία  $B\widehat{I}\Gamma$ . Μπορεῖτε νὰ αἰτιολογήσετε τὸ ἀποτέλεσμα αὐτό;

26) Κατασκευάστε ἕναν κύκλο ( $O, R = 2\text{ cm}$ ) φέρετε τρεῖς ἐφαπτόμενές του, οἱ ὁποῖες τέμνονται ἀνὰ δύο στὰ σημεία  $A, B, \Gamma$ . Ἄπὸ ποῖο σημείο περνοῦν οἱ διχοτόμοι τῶν γωνιῶν τοῦ τριγώνου  $ABΓ$ ;


27) Κατασκευάστε ἕνα τετράγωνο  $AB\Gamma\Delta$ . Φέρετε τὴ διαγώνιό του  $A\Gamma$  καὶ τὶς διχοτόμους τῶν γωνιῶν  $B\widehat{A}\Gamma, \Gamma\widehat{B}A$ . Αὐτὲς τέμνονται πάνω στὴ διαγώνιο  $B\Delta$  τοῦ τετραγώνου. Γιατί;

### § 8. Περιγεγραμμένος κύκλος τριγώνου. Κατασκευή.

Σχεδιάστε ἕνα τρίγωνο  $ABΓ$  καὶ κατασκευάστε ἕναν κύκλο, πὸν νὰ περνᾷ ἀπὸ τὶς κορυφὲς τοῦ τριγώνου.

Σύμφωνα μὲ ὅσα εἶπαμε στὴν § 4 ὑπάρχει ἕνας κύκλος, ὁ ὁποῖος περνᾷ ἀπὸ τὶς κορυφὲς  $A, B, \Gamma$  τοῦ τριγώνου  $ABΓ$ . Αὐτὸν τὸν ὀνομάσαμε περιγεγραμμένο κύκλο τοῦ τριγώνου. Ἄν  $O$  εἶναι τὸ κέντρο του, τότε  $OA = OB = OG$  (ἐπειδὴ εἶναι ἀκτίνες).

Ἐπομένως τὸ κέντρο  $O$  εἶναι τὸ σημείο, στὸ ὅποιο συντρέχουν οἱ μεσοκάθετοι τῶν πλευρῶν  $AB, B\Gamma$  καὶ  $A\Gamma$  τοῦ τριγώνου  $ABΓ$ .

**Κατασκευή:**

σχ. 15.

\*Εστώ τρίγωνο  $AB\Gamma$ . Μὲ τὴ βοήθεια τοῦ διαβήτη καὶ τοῦ χάρακα φέρνουμε τὶς μεσοκάθετους  $\varepsilon_1$  καὶ  $\varepsilon_2$  τῶν πλευρῶν τοῦ  $B\Gamma$  καὶ  $A\Gamma$ . Οἱ  $\varepsilon_1$  καὶ  $\varepsilon_2$  τέμνονται σὲ ἓνα (μοναδικό) σημεῖο  $O$ , ποῦ εἶναι τὸ κέντρο τοῦ περιγεγραμμένου κύκλου τοῦ τριγώνου  $AB\Gamma$ , γιατί ἔχουμε  $OB = OG$ , ἐπειδὴ τὸ  $O$  βρίσκεται πάνω στὴν  $\varepsilon_1$ , καὶ  $OG = OA$ , ἐπειδὴ τὸ  $O$  βρίσκεται πάνω στὴν  $\varepsilon_2$ . Ἐπομένως  $OA = OB = OG$ .

\*Ἀρα, ἐὰν μὲ κέντρο τὸ  $O$  καὶ ἀκτίνα  $OA$  γράψουμε κύκλο  $(O, OA)$ , αὐτὸς θὰ περάσει ἀπὸ τὰ σημεῖα  $A, B, \Gamma$  καὶ συνεπῶς θὰ εἶναι ὁ περιγεγραμμένος κύκλος τοῦ τριγώνου  $AB\Gamma$ .

\*Ἄν τώρα προσπαθήσουμε νὰ γράψουμε καὶ ἄλλον κύκλο περιγεγραμμένο στὸ τρίγωνο  $AB\Gamma$ , θὰ παρατηρήσουμε ὅτι αὐτὸς ταυτίζεται μὲ τὸν πρῶτο (ἐπειδὴ οἱ  $\varepsilon_1$  καὶ  $\varepsilon_2$  τέμνονται σὲ ἓνα μόνο σημεῖο).

\*Ὡστε: **Ἑπάρχει ἕνας κύκλος (καὶ μόνον ἕνας), ποῦ περνᾷ ἀπὸ τὶς τρεῖς κορυφές ἑνὸς τριγώνου.** Αὐτὸς λέγεται **περιγεγραμμένος κύκλος** τοῦ τριγώνου.

Τὸ κέντρο τοῦ  $O$  εἶναι τὸ σημεῖο, στὸ ὁποῖο συντρέχουν οἱ μεσοκάθετοι τῶν πλευρῶν τοῦ τριγώνου. **Ἀκτίνα τοῦ  $R$**  εἶναι ἡ ἀπόσταση αὐτοῦ τοῦ σημείου ἀπὸ μίᾳ κορυφῆ του.

**§ 9. Ἐγγεγραμμένος κύκλος σ' ἓνα τρίγωνο. Κατασκευή.**


*Νὰ κατασκευάσετε ἓνα τρίγωνο  $AB\Gamma$  καὶ ἓναν κύκλο, ποῦ νὰ ἐφάπτεται καὶ στὶς τρεῖς πλευρές τοῦ τριγώνου ἐσωτερικά.*

Σύμφωνα μὲ ὅσα εἶπαμε στὴν § 7 ὑπάρχει ἕνας κύκλος, ποῦ ἐφάπτεται στὶς πλευρές  $AB, B\Gamma$  καὶ  $A\Gamma$  τοῦ τριγώνου  $AB\Gamma$ . Τὸ κέντρο  $I$  τοῦ κύκλου αὐτοῦ εἶναι τὸ σημεῖο, στὸ ὁποῖο συντρέχουν οἱ ἐσωτερικὲς διχοτόμοι τῶν ᾄγωνιῶν τοῦ τριγώνου. Ὁ κύκλος αὐτὸς λέγεται **ἐγγεγραμμένος κύκλος** στὸ τρίγωνο.

**Κατασκευή:**

Σχεδιάζουμε ἓνα τρίγωνο  $AB\Gamma$ . Μὲ τὴ βοήθεια τοῦ διαβήτη καὶ τοῦ χάρακα φέρνουμε τὶς ἐσωτερικὲς διχοτόμους τῶν ᾄγωνιῶν  $\widehat{B}$  καὶ  $\widehat{\Gamma}$  τοῦ τριγώνου (σχ. 16). Αὐτές, ὅπως γνωρίζουμε (§ 7), συντρέχουν σὲ ἓνα σημεῖο  $I$ .

Με κέντρο τὸ  $I$  καὶ ἀκτίνα τὴν ἀπόσταση τοῦ  $I$  ἀπὸ τῆ  $B\Gamma$ , τὴν  $IA'$ , γράφουμε κύκλο  $(I, IA')$ , ὁ ὁποῖος ἐφάπτεται στὴν πλευρὰ  $B\Gamma$  στὸ σημεῖο  $A'$ . Ὁ κύκλος αὐτὸς ἐφάπτεται καὶ στὶς πλευρὲς  $AB$  καὶ  $AG$  τοῦ τριγώνου αὐτοῦ, γιατί, ἂν φέρουμε τὶς ἀποστάσεις  $IG'$ ,  $IB'$  ἀπὸ τὶς πλευρὲς  $AB$  καὶ  $AG$ , ἔχουμε (καθὼς μάθαμε)  $IB' = IG' = IA'$ . Ἄρα ὁ κύκλος  $(I, IA')$  εἶναι ὁ ἐγγεγραμμένος στὸ τρίγωνο  $AB\Gamma$ , γιατί οἱ πλευρὲς του εἶναι κάθετες στὰ ἄκρα τῶν ἀκτίνων  $IA'$ ,  $IB'$ ,  $IG'$ .



σχ. 16.

Ἄν ἐπιχειρήσουμε νὰ γράψουμε καὶ ἄλλον κύκλο ἐγγεγραμμένο στὸ ἴδιο τρίγωνο  $AB\Gamma$ , αὐτὸς θὰ ταυτισθεῖ με τὸν πρῶτο (γιατί οἱ διχοτόμοι  $GZ$ ,  $BE$  τέμνονται σὲ ἓνα μόνο σημεῖο).

Ὡστε: **Υπάρχει ἓνας κύκλος καὶ μόνο ἓνας ἐγγεγραμμένος στὸ τρίγωνο  $AB\Gamma$ . Τὸ κέντρο του  $I$  εἶναι τὸ σημεῖο, στὸ ὁποῖο συντρέχουν οἱ τρεῖς ἐσωτερικὲς διχοτόμοι τοῦ τριγώνου. Ἀκτίνα του  $\rho$ , εἶναι ἡ ἀπόσταση τοῦ σημείου αὐτοῦ ἀπὸ μιὰ πλευρὰ του.**

### Ἀσκήσεις

28) Κατασκευάστε ἰσόπλευρο τρίγωνο  $AB\Gamma$  με πλευρὰ 4 cm καὶ σχεδιάστε τὸν περιγεγραμμένο κύκλο του.

29) Κατασκευάστε ἰσόπλευρο τρίγωνο  $AB\Gamma$  με πλευρὰ 5 cm καὶ σχεδιάστε τὸν ἐγγεγραμμένο κύκλο σ' αὐτό.

30) Νὰ κατασκευάσετε τὸν περιγεγραμμένο κύκλο ἑνὸς ὀρθογωνίου καὶ ἑνὸς ἀμβλυγωνίου τριγώνου.

31) Νὰ σχηματίσετε ἓνα τρίγωνο  $AB\Gamma$  καὶ νὰ κατασκευάσετε τὸν περιγεγραμμένο κύκλο του. Νὰ βρεῖτε τὸ συμμετρικὸ τοῦ ὀρθόκεντρου τοῦ τριγώνου ὡς πρὸς τὶς πλευρὲς του. Τί παρατηρεῖτε;


32) Νὰ πάρετε τρία σημεῖα, ποὺ δὲν βρίσκονται πάνω στὴν ἴδια εὐθεῖα, καὶ νὰ κατασκευάσετε τὸν κύκλο, ποὺ περνᾷ ἀπ' αὐτά.

### Γ. ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΣΕ $2^n$ ( $n \in \mathbb{N}$ καὶ $n > 1$ ) ἢ $3 \cdot 2^n$ (ὅπου $n$ ἀκέρ.) ἸΣΑ ΤΟΞΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΠΟΛΥΓΩΝΑ.

§ 10. Κατ'ισκενάστε κύκλο  $(O, R)$  καὶ διαιρέστε τον σὲ 4 ἴσα τόξα. Ἐπειτα διαιρέστε τὸν κύκλο σὲ 8, 16, ... ἴσα τόξα καὶ ἐνῶστε με εὐθύγραμμα τμήματα τὰ σημεῖα κάθε διαιρέσεώς του. Τί παρατηρεῖτε; (σχ, 17).

Σχηματίζουμε έναν κύκλο με κέντρο  $O$  και ακτίνα  $R$ .

Για να τον διαιρέσουμε σε 4 ίσα τόξα, φέρνουμε δύο διαμέτρους κάθετες, τις  $ΑΓ$  και  $ΒΔ$ . Οί επίκεντρες γωνίες  $\widehat{ΑΟΒ}$ ,  $\widehat{ΒΟΓ}$ ,  $\widehat{ΓΟΔ}$ ,  $\widehat{ΔΟΑ}$  είναι ίσες, επειδή είναι ὀρθές. Ἐπομένως και τὰ ἀντίστοιχα τόξα τους είναι ίσα, δηλαδή  $\widehat{ΑΒ} = \widehat{ΒΓ} = \widehat{ΓΔ} = \widehat{ΔΑ}$ .



σχ. 17.

Φέρνουμε τις  $ΑΒ$ ,  $ΒΓ$ ,  $ΓΔ$ ,  $ΔΑ$  κι ἔτσι ὀρίζουμε ἕνα κυρτὸ τετράπλευρο, πού ἔχει τις πλευρές του ίσες, δηλαδή  $ΑΒ = ΒΓ = ΓΔ = ΔΑ$  (χορδές ἴσων τόξων τοῦ ἴδιου κύκλου), και τις γωνίες του ίσες  $\widehat{Α} = \widehat{Β} = \widehat{Γ} = \widehat{Δ}$ , γιατί είναι ὀρθές (γωνίες ἐγγεγραμμένες σὲ ἡμικύκλιο). Τὸ τετράπλευρο  $ΑΒΓΔ$  λέγεται **κανονικὸ τετράπλευρο ἢ τετράγωνο**.

Ὡστε: **Κανονικὸ πολύγωνο λέγεται τὸ πολύγωνο, πὸ ἔχει τις πλευρές του ἴσες και τις γωνίες του ἴσες**. Τὸ μήκος μῖας ἀπὸ τις ἴσες πλευρές του τὸ συμβολίζουμε μὲ τὸ  $λ$ .

Ἄν φέρουμε τις διχοτόμους τῶν γωνιῶν  $\widehat{ΑΟΒ}$ ,  $\widehat{ΒΟΓ}$ ,  $\widehat{ΓΟΔ}$ ,  $\widehat{ΔΟΑ}$ , ὁ κύκλος διαιρεῖται σὲ 8 ἴσα τόξα (ἀντίστοιχα ἴσων ἐπίκεντρων γωνιῶν). Φέρνουμε τις χορδές τῶν τόξων αὐτῶν και ἔτσι κατασκευάζουμε ἕνα κυρτὸ ὀκτάγωνο. Τὸ ὀκτάγωνο αὐτὸ εἶναι κανονικὸ, γιατί ἔχει τις πλευρές του ἴσες, επειδή είναι χορδές ἴσων τόξων, και τις γωνίες του ἴσες, επειδή καθεμιά τους είναι ἐγγεγραμμένη στὸν κύκλο και ἔχει ἀντίστοιχο τόξο ἴσο μὲ τὰ  $\frac{6}{8}$  τοῦ κύκλου.

Μὲ τὸν ἴδιο τρόπο ἐργασίας διαιροῦμε τὸν κύκλο σὲ 16 ἴσα τόξα, 32 κλπ. και ὀρίζουμε κανονικὸ δεκαεξάγωνο, ἔπειτα κυρτὸ κανονικὸ πολύγωνο μὲ 32 πλευρές κ.ο.κ.

Βασισμένοι στίς προηγούμενες κατασκευές λέμε ὅτι μπορούμε να διαιρέσουμε τὸν κύκλο (μὲ τὴ βοήθεια τοῦ διαβήτη και τοῦ χάρακα) σὲ  $2^2 = 4$ ,  $2^3 = 8$ ,  $2^4 = 16$ ,  $2^5, \dots, 2^n$  ἴσα τόξα και να ὀρίσουμε μ' αὐτὸν τὸν τρόπο κανονικὰ κυρτὰ πολύγωνα μὲ  $2^2, 2^3, 2^4, \dots, 2^n$  πλευρές.

Ὁ κύκλος ( $O, R$ ) πὸν περνᾷ ἀπὸ τις κορυφές τῶν κανονικῶν αὐτῶν πολυγώνων, λέγεται **περιγεγραμμένος κύκλος** και τὰ πολύγωνα είναι ἐγγεγραμμένα στὸν κύκλο αὐτὸ. Οί ἀκτίνες τοῦ περιγεγραμμένου κύκλου, πὸν καταλήγουν στίς κορυφές τῶν κανονικῶν πολυγώνων, λέγονται **ἀκτίνες τῶν πολυγώνων**.




Ἡ κυρτὴ γωνία δύο διαδοχικῶν ἀκτίνων τοῦ κανονικοῦ πολυγώνου λέγεται **κεντρικὴ** γωνία τοῦ πολυγώνου καὶ ἰσοῦται μὲ  $\frac{360}{v}$ , ὅπου  $v$  εἶναι τὸ πλῆθος τῶν πλευρῶν τοῦ κανονικοῦ πολυγώνου.

Τὸ κέντρο  $O$  τοῦ κύκλου λέγεται **κέντρο** τοῦ καν. πολυγώνου.

Οἱ ἀποστάσεις τοῦ κέντρου  $O$  ἀπὸ τὶς πλευρὲς του εἶναι ἴσες (ἀποστάσεις τοῦ κέντρου τοῦ κύκλου ἀπὸ ἴσες χορδὲς του). Ἡ ἀπόσταση τοῦ κέντρου ἀπὸ τὴν πλευρὰ λέγεται **ἀπόστημα** τοῦ κανονικοῦ πολυγώνου καὶ τὸ μήκος του συμβολίζεται μὲ τὸ  $\alpha$  (π.χ. τοῦ τετραγώνου  $\alpha_4$ , τοῦ καν. ἑξαγώνου  $\alpha_6$  κ.ο.κ.). Ἀντιστοίχως τὸ μήκος τῶν πλευρῶν τους συμβολίζεται μὲ  $\lambda_4, \lambda_6$  κ.ο.κ.).

Ἄν ἓνα κανονικὸ πολύγωνο εἶναι κυρτό, τὸ ἄθροισμα τῶν γωνιῶν του εἶναι  $\Sigma = (v-2) \cdot 2 \text{ ὄρθ.} = (2v-4) \text{ ὄρθ.}$  (ὅπου  $v$  τὸ πλῆθος τῶν γωνιῶν του). Ἐπειδὴ ὅλες οἱ γωνίες του εἶναι ἴσες, καθεμιὰ εἶναι ἴση μὲ  $\frac{2v-4}{v} \text{ ὄρθ.} = \left(2 - \frac{4}{v}\right) \text{ ὄρθ.}$

§ 11. *Νὰ κατασκευάσετε κύκλο  $(O, R)$  καὶ νὰ ἐγγράψετε σ' αὐτὸν ἓνα κανονικὸ ἑξάγωνο, ἀφοῦ διαιρέσετε τὸν κύκλο σὲ 6 ἴσα τόξα. Τί παρατηρεῖτε; (σχ. 18).*



σχ. 18.

Κατασκευάζουμε κύκλο μὲ κέντρο  $O$  καὶ ἀκτίνα  $R$ . Ὑποθέτουμε ὅτι μὲ τὰ σημεῖα  $A, B, \Gamma, \Delta, E, Z$  ἔχουμε διαιρέσει τὸν κύκλο σὲ 6 ἴσα τόξα. Τὸ τρίγωνο  $AOB$  εἶναι ἰσοσκελὲς ( $OA = OB$ , ἐπειδὴ εἶναι ἀκτίνες τοῦ κύκλου) καὶ ἔχει τὴ γωνία  $\widehat{AOB} = \frac{360^\circ}{6} = 60^\circ$  (κεντρικὴ γωνία). Ἄρα καὶ οἱ γωνίες του εἶναι  $\widehat{A} = \widehat{B} = \frac{180^\circ - 60^\circ}{2} = 60^\circ$ . Δηλαδή τὸ τρίγωνο  $AOB$  εἶναι ἰσόπλευρο. Ἐπομένως  $AB = R$ .

Γιὰ νὰ διαιρέσουμε λοιπὸν ἓναν κύκλο σὲ 6 ἴσα τόξα, γράφουμε 6 διαδοχικὲς χορδὲς ἴσες μὲ τὴν ἀκτίνα. Ἐνώνουμε τὰ σημεῖα  $A, B, \Gamma, \Delta, E, Z$ , πού διαιροῦν τὸν κύκλο, καὶ σχηματίζουμε ἓνα κυρτὸ ἑξάγωνο. Αὐτὸ εἶναι κανονικὸ, ὅπως μπορούμε νὰ τὸ διαπιστώσουμε, ἂν συγκρίνουμε τὶς πλευρὲς του μὲ τὸ διαβήτη καὶ τὶς γωνίες του μὲ διαφανὲς χαρτί (ἢ μὲ τὸ μοιρογνωμόνιο). Μποροῦμε ὅμως καὶ νὰ αἰτιολογήσουμε τὴ διαπίστωσή μας αὐτὴ μὲ τὴν παρατή-

ρηση ότι οι πλευρές του πολυγώνου ΑΒΓΔΕΖ είναι **ίσες**, γιατί τις πήραμε κατά την κατασκευή του ίσες με την ακτίνα του κύκλου, και οι γωνίες του είναι **ίσες**, επειδή είναι έγγεγραμμένες στον ίδιο κύκλο κι έχουν αντίστοιχα τόξα ίσα με  $\frac{4}{6}$  του κύκλου.

Για να έγγράψουμε στον κύκλο κανονικό **δωδεκάγωνο**, τον διαιρούμε σε 12 ίσα τόξα. Για να γίνει αυτό, φέρνουμε τις διχοτόμους των κεντρικών γωνιών του κανονικού έξαγώνου, ενώνουμε τα διαδοχικά σημεία διαιρέσεως του κύκλου και κατασκευάζουμε έτσι κανονικό δωδεκάγωνο (γιατί;). Με όμοιο τρόπο εργασίας διαιρούμε τον κύκλο σε 24, 48 κ.ο.κ. ίσα τόξα και έγγράφουμε σ' αυτόν κανονικό **είκοσιτετράγωνο**, έπειτα κυρτό κανονικό πολύγωνο με 48 πλευρές κ.ο.κ. Τελικά συνδέουμε με εϋθύγραμμα τμήματα ανά δύο τις μη διαδοχικές κορυφές Α,Γ,Ε του έγγεγραμμένου στον κύκλο κανονικού έξαγώνου ΑΒΓΔΕΖ. Έτσι σχηματίζεται ένα τρίγωνο ΑΓΕ έγγεγραμμένο στον κύκλο, τὸ ὁποῖο εἶναι ἰσόπλευρο, διότι ΑΓ = ΓΕ = ΕΑ, επειδή είναι χορδές ίσων τόξων του κύκλου. Αυτό είναι τὸ **κανονικό τρίγωνο**. Από τις προηγούμενες κατασκευές συμπεραίνουμε ότι μπορούμε να διαιρέσουμε έναν κύκλο σε 3,  $3 \cdot 2 = 6$ ,  $3 \cdot 2^2 = 12$ ,  $3 \cdot 2^3$ ,  $3 \cdot 2^4$ , . . . ,  $3 \cdot 2^n$  ίσα τόξα και να έγγράψουμε κανονικό πολύγωνο στον κύκλο με 3,  $3 \cdot 2 = 6$ ,  $3 \cdot 2^2 = 12$ ,  $3 \cdot 2^3$ , . . . ,  $3 \cdot 2^n$  πλευρές.

Συνοψίζουμε τὰ συμπεράσματά μας με τὴν παρατήρηση, ὅτι **μπορούμε να διαιρέσουμε τὸν κύκλο σε  $2^n$  ἢ  $3 \cdot 2^n$  ἴσα τόξα καὶ συνεπῶς μπορούμε να έγγράψουμε σ' αὐτὸν κανονικά πολύγωνα με  $2^n$  ἢ  $3 \cdot 2^n$  πλευρές.**

**Σημείωση.** Με τὴν έγγραφή στον κύκλο καὶ ἄλλων κανονικῶν πολυγώνων θ' ἀσχοληθοῦμε σε ἀνώτερη τάξη.

## Ἀσκήσεις

33) Βρεῖτε τὴν κεντρικὴ γωνία ἑνὸς κανονικοῦ α) πενταγώνου, β) δωδεκαγώνου, γ) εἰκοσιτετραγώνου, δ) τριγώνου.

34) Πόσων μοιρῶν εἶναι ἡ ἐσωτερικὴ γωνία ἑνὸς κανονικοῦ α) ὄκταγώνου, β) δεκαεξαγώνου, γ) δωδεκαγώνου;

35) Τίνος κανονικοῦ πολυγώνου ἡ κεντρικὴ γωνία εἶναι α)  $90^\circ$ , β)  $\frac{1}{2}$  ὀρθ., γ)  $30^\circ$  καὶ δ)  $24^\circ$ ;

36) Τίνος κανονικοῦ πολυγώνου ἡ ἐσωτερικὴ γωνία εἶναι α)  $108^\circ$ , β)  $\frac{4}{3}$  ὀρθ., γ)  $135^\circ$ , δ)  $\frac{5}{3}$  ὀρθ. καὶ ε)  $175^\circ$ ;

37) Νὰ κατασκευάσετε ἕναν κύκλο με κέντρο Ο καὶ ἀκτίνα  $R=5$  cm καὶ νὰ έγγράψετε σ' αὐτὸν ἕνα κανονικό εἰκοσιτετράγωνο.


38) Νὰ κατασκευάσετε κανονικό έξάγωνο με πλευρὰ μήκους 4 cm.

39) Νά γράψετε ένα ευθ. τμήμα  $AB$  μήκους 3 cm και νά κατασκευάσετε ένα κανονικό οκτάγωνο, πού νά έχει τό  $AB$  ώς πλευρά.


40) Νά έγγράψετε σ' έναν κύκλο μέ ακτίνα  $R$  κανονικό έξάγωνο και νά ένώσετε μέ ευθύγραμμα τμήματα τά μέσα τών πλευρών του. Έτσι όρίζεται ένα νέο έξάγωνο. Τί έχετε νά παρατηρήσετε γι' αυτό;

## § 12. Στοιχεία συμμετρίας καθενός από τά κανονικά πολύγωνα και ύπαρξη του έγγεγραμμένου κύκλου σ' αυτά.


Κατασκευάστε σέ διαφανές χαρτί ένα τετράγωνο, ένα κανονικό έξάγωνο και ένα κανονικό τρίγωνο και βρείτε τούς άξονες συμμετρίας του καθενός τους. Τί παρατηρείτε; (σχ. 19).



σχ. 19α.



σχ. 19β.



σχ. 19γ.

Σέ διαφανές χαρτί κατασκευάζουμε ένα τετράγωνο  $AB\Gamma\Delta$ , ένα κανονικό έξάγωνο  $EZH\Theta IK$  κι ένα κανονικό τρίγωνο  $LMN$  διαιρώντας τρεις κύκλους σέ 4, 6 και 3 ίσα τόξα άντιστοίχως και γράφουμε τις ακτίνας και τά άποστήματά τους.

Αν τά διπλώσουμε κατά μήκος του φορέα μιās ακτίνας τους, θα παρατηρήσουμε ότι τά δύο τμήματα καθενός τους ταυτίζονται. Τό ίδιο συμβαίνει και στα άλλα κανονικά πολύγωνα.

Επομένως: **Οί φορείς τών ακτίνων τών κανονικών πολυγώνων είναι άξονες συμμετρίας αυτών.**

Αν τώρα διπλώσουμε τά παραπάνω κανονικά πολύγωνα κατά μήκος του φορέα ενός από τά άποστήματά τους, θα παρατηρήσουμε πάλι ότι τά δύο τμήματα του καθενός από αυτά ταυτίζονται. Τό ίδιο μπορούμε νά διαπιστώσουμε και στα άλλα κανονικά πολύγωνα. Άρα **οί φορείς τών άποστημάτων ενός κανονικού πολυγώνου είναι άξονες συμμετρίας αυτού.** Παρατηρούμε λοιπόν, ότι τά κανονικά πολύγωνα έχουν ως άξονες συμμετρίας τούς φορείς τών ακτίνων τους και τούς φορείς τών άποστημάτων τους.

Στά κανονικά πολύγωνα μέ **άρτιο** πλήθος πλευρών (π.χ. στό καν.

εξάγωνο ΕΖΗΘΙΚ) δύο άκτινες βρίσκονται πάνω στον ίδιο φορέα (όπως οί ΟΗ και ΟΚ του καν. εξάγώνου ΕΖΗΘΙΚ). "Ωστε : **Ο άριθμός των φορέων των άκτινων ενός κανονικού πολυγώνου με άρτιο πλήθος πλευρών ισούται με τó μισό του άριθμού των πλευρών του** (στό ΕΖΗΘΙΚ είναι τρείς). 'Επίσης τó πλήθος των φορέων των άποστημάτων τους είναι ίσο με τó μισό του πλήθους των πλευρών του κανονικού πολυγώνου, γιατί τά άποστήματά τους ανά δύο έχουν τόν ίδιο φορέα (όπως π.χ. στό κανονικό εξάγωνο ΕΖΗΘΙΚ τά άποστήματα  $OM_1$  και  $OM_4$ , δηλαδή τó πλήθος των φορέων των άποστημάτων του είναι  $\frac{6}{2} = 3$ ). Τό κανονικό εξάγωνο λοιπόν έχει 6 άξονες συμμετρίας.

**"Ωστε : Ένα κανονικό πολύγωνο με άρτιο πλήθος πλευρών  $n$ , έχει  $n$  άξονες συμμετρίας.**

Στά κανονικά πολύγωνα με περιττό άριθμό πλευρών (π.χ. στό καν. τρίγωνο  $LMN$ ) οί άκτινες και τά άποστήματα ανά δύο έχουν τόν ίδιο φορέα (όπως ή άκτίνα  $ON$  και τó άπόστημα  $OΞ_3$  του τριγώνου  $LMN$ ). Παρατηρούμε άκόμη ότι στό κανονικό εξάγωνο ΕΖΗΘΙΚ οί άξονες συμμετρίας  $OM_1$  και  $OH$  είναι κάθετοι ( $M_1\hat{O}Z = 30^\circ$  και  $Z\hat{O}H = 60^\circ$ ).

'Εμάθαμε όμως στην Α' τάξη ότι ένα σχήμα, που έχει δύο άξονες συμμετρίας κάθετους, έχει κέντρο συμμετρίας τó σημείο τής τομής τους. 'Επομένως τó κέντρο του κανονικού εξάγώνου είναι κέντρο συμμετρίας του. **Τό ίδιο συμβαίνει σε όλα τά κανονικά πολύγωνα με άρτιο πλήθος πλευρών.** Στό κανονικό τρίγωνο  $LMN$  δέν υπάρχουν κάθετοι άξονες συμμετρίας. 'Επομένως αυτό δέν έχει κέντρο συμμετρίας. **Τό ίδιο συμβαίνει σ' όλα τά κανονικά πολύγωνα με περιττό πλήθος πλευρών.** "Ωστε στό κανονικά πολύγωνα με άρτιο πλήθος πλευρών τó κέντρο τους είναι κέντρο συμμετρίας, ενώ στό κανονικά πολύγωνα με περιττό άριθμό πλευρών τó κέντρο τους δέν είναι κέντρο συμμετρίας.

Τό κέντρο καθενός από τά κανονικά πολύγωνα είναι κέντρο ενός κύκλου, ό όποιος εφάπτεται στις πλευρές του, γιατί, όπως μάθαμε, αυτό απέχει έξ ίσου από τις πλευρές. 'Ο κύκλος αυτός λέγεται **έγγεγραμμένος** στό καν. πολύγωνο.

**Κάθε κανονικό πολύγωνο έχει έναν έγγεγραμμένο κύκλο, που είναι όμόκεντρος με τόν περιγεγραμμένο και έχει άκτίνα τó άπόστημα του καν. πολυγώνου.**

### Άσκήσεις


- 41) Νά κατασκευάσετε κανονικό όκτάγωνο και νά φέρετε τους άξονες συμμετρίας του. Βρείτε τά ζεύγη των κάθετων άξόνων.
- 42) Κάνετε τó ίδιο και γιά ένα κανονικό δωδεκάγωνο.
- 43) Νά κατασκευάσετε ένα κανονικό δεκαεξάγωνο και ένα κανονικό δωδεκάγωνο και νά γράψετε τους έγγεγραμμένους κύκλους σε καθένα άπ' αυτά.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

### ΟΜΟΙΑ ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΓΩΝΑ

#### Α. ΛΟΓΟΣ ΔΥΟ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

§ 13. Πάρτε μιὰ εὐθεία  $\epsilon$  καὶ ἓνα εὐθύγραμμο τμήμα  $AB$ . Πάνω στὴν  $\epsilon$ , μὲ ἀρχὴ τὸ  $A'$ , πάρτε τρία εὐθύγραμμο τμήματα διαδοχικὰ καὶ ἴσα μὲ τὸ  $AB$ . Ἔστω  $B'$  τὸ ἄκρο τοῦ τελευταίου (σχ. 20).



Λέμε ὅτι ὁ λόγος τοῦ εὐθύγραμμου τμήματος  $A'B'$  πρὸς τὸ  $AB$  εἶναι ὁ ἀριθμὸς 3 καὶ γράφουμε  $\frac{A'B'}{AB} = 3$ . Ὁ ἀριθμὸς 3 εἶναι ἐκεῖνος μὲ τὸν ὁποῖο πρέπει νὰ πολλαπλασιασθεῖ τὸ  $AB$ , γιὰ νὰ δώσει τὸ  $A'B'$ .

Ἔστω: Λόγος ἑνὸς εὐθύγραμμου τμήματος  $A$  πρὸς ἓνα εὐθύγραμμο τμήμα  $B$  (συμβολικὰ  $\frac{A}{B}$ ) εἶναι ὁ ἀριθμὸς  $\lambda$ , μὲ τὸν ὁποῖο ὅταν πολλαπλασιάζεται τὸ δεύτερο, δίνει τὸ πρῶτο.

Ἄν  $\Gamma\Delta$  καὶ  $EZ$  εἶναι εὐθύγρ. τμήματα, λέμε «τὸ  $\Gamma\Delta$  ἔχει πρὸς τὸ  $EZ$  λόγο  $\lambda$ » ἢ συντομότερα « $\Gamma\Delta$  πρὸς  $EZ$  ἴσον  $\lambda$ » καὶ γράφουμε  $(\Gamma\Delta, EZ) = \lambda$  ἢ συνηθέστερα:

$$\frac{\Gamma\Delta}{EZ} = \lambda$$

ὥστε

$$\frac{\Gamma\Delta}{EZ} = \lambda \Leftrightarrow \Gamma\Delta = \lambda \cdot EZ$$

**Τιμὴ εὐθύγραμμου τμήματος εἶναι ὁ λόγος του πρὸς τὴ μονάδα μετρήσεως ἢ συγκρίσεως.**

Τὴν τιμὴ τοῦ  $AB$  τὴ συμβολίζουμε μὲ  $(AB)$ . Τὸ  $AB$  εἶναι εὐθύγραμμο τμήμα. Ἡ τιμὴ  $(AB)$  εἶναι ἀριθμὸς. Ἄν  $\alpha$  εἶναι ἡ μονάδα μετρήσεως τῶν εὐθύγραμμων τμημάτων καὶ  $AB = 5 \cdot \alpha$ ,  $\Gamma\Delta = 8 \cdot \alpha$  τότε  $\frac{AB}{\alpha} = 5$  καὶ  $\frac{\Gamma\Delta}{\alpha} = 8$ . Συνεπῶς  $(AB) = 5$  καὶ  $(\Gamma\Delta) = 8$  (1)

Θεωροῦμε τὸ λόγο  $\frac{BA}{\Gamma\Delta}$ . Ἄν  $\frac{AB}{\Gamma\Delta} = \lambda$  τότε  $AB = \lambda \cdot \Gamma\Delta$ . Ἄν ἀντικαταστήσουμε ἀπὸ τὴν (1) τὰ  $AB$  καὶ  $\Gamma\Delta$  μὲ τὰ ἴσα τους, θὰ πάρουμε  $5\alpha = \lambda \cdot 8\alpha$ , συνεπῶς  $5 = 8\lambda$  (ἐπειδὴ τὸ γινόμενο εὐθ. τμήματος  $\alpha$  ἐπὶ ἓναν ἀριθμὸ εἶναι μονότιμο) ἄρα  $\lambda = \frac{5}{8}$  δηλαδή:

$$\frac{AB}{\Gamma\Delta} = \frac{(AB)}{(\Gamma\Delta)}$$

Ὁ λόγος δύο εὐθύγραμμων τμημάτων είναι ἴσος μὲ τὸ λόγο τῶν τιμῶν τους (ὅταν μετρηθοῦν μὲ τὴν ἴδια μονάδα).

Σημείωση: Αὐτὸ ἰσχύει γενικὰ γιὰ τὸ λόγο δύο ὁμοειδῶν μεγεθῶν. Ἐπίσης ἀληθεύει ὅτι: Ἡ τιμὴ τοῦ ἀθροίσματος δύο ὁμοειδῶν μεγεθῶν ἰσοῦται μὲ τὸ ἀθροισμα τῶν τιμῶν τους (ὅταν μετρηθοῦν μὲ τὴν ἴδια μονάδα). Τὴν ιδιότητα αὐτὴ θὰ τὴ χρησιμοποιήσουμε στὴ μέτρηση τῶν ἐμβαδῶν καὶ τῶν ὄγκων τῶν σχημάτων.

#### § 14. Ἀνάλογα εὐθύγραμμα τμήματα.

Εὐθύγραμμα τμήματα λέγονται **ἀνάλογα** πρὸς ἄλλα ἀντίστοιχά τους, ὅταν τὰ γινόμενα δύο ἀντίστοιχων τμημάτων ἐπὶ τὸν ἴδιο ἀριθμὸ εἶναι ἀντίστοιχα εὐθύγραμμα τμήματα.

Δηλαδή, ἂν τὰ εὐθύγραμμα τμήματα  $\alpha$  καὶ  $\beta$  εἶναι ἀντίστοιχα, τότε καὶ τὰ  $2\alpha$  καὶ  $2\beta$  εἶναι ἀντίστοιχα ὅπως καὶ τὰ  $3\alpha$ ,  $3\beta$  καὶ γενικὰ τὰ  $\lambda\alpha$  καὶ  $\lambda\beta$  ( $\lambda$  εἶναι ὅποιοσδήποτε ἀριθμὸς).



σχ. 21.

Ἄν συγκρίνουμε τὸ λόγο δύο τμημάτων ἀπὸ αὐτὰ π.χ. τῶν  $2\alpha$  καὶ  $3\alpha$  μὲ τὸ λόγο τῶν ἀντίστοιχῶν τους (ἀντίστοιχά τους εἶναι τὰ  $2\beta$  καὶ  $3\beta$ ) παρατηροῦμε ὅτι  $\frac{2\alpha}{3\alpha} = \frac{2}{3}$  καὶ  $\frac{2\beta}{3\beta} = \frac{2}{3}$  (θεωροῦμε ὡς μονάδα τὸ  $\alpha$  γιὰ τὰ πρῶτα καὶ τὸ  $\beta$  γιὰ τὰ δευτέρτα). Ὡστε: **Ἄν εὐθύγραμμα τμήματα εἶναι ἀνάλογα, ὁ λόγος δύο (ὁποίωνδήποτε) ἀπὸ αὐτὰ ἰσοῦται μὲ τὸν λόγο τῶν ἀντίστοιχῶν τους.**

Ἄν σὲ ἀνάλογα εὐθύγραμμα τμήματα τὰ  $A'B'$  καὶ  $\Gamma'D'$  εἶναι ἀντίστοιχα τῶν  $AB$  καὶ  $\Gamma\Delta$ , τὴν ἰσότητα τῶν λόγων  $\frac{AB}{\Gamma\Delta} = \frac{A'B'}{\Gamma'D'}$  τὴ λέμε **ἀναλογία τῶν εὐθύγραμμων τμημάτων**  $AB$ ,  $\Gamma\Delta$ ,  $A'B'$ ,  $\Gamma'D'$ . Μποροῦμε νὰ ἀντικαταστήσουμε τοὺς λόγους τῶν εὐθύγραμμων τμημάτων μὲ τοὺς λόγους τῶν τιμῶν τους καὶ νὰ ἔχουμε τὴν  $\frac{(AB)}{(\Gamma\Delta)} = \frac{(A'B')}{(\Gamma'D')}$ , ἡ ὁποία εἶναι **ἀναλογία ἀριθμῶν**.

Ἄναλογία τῶν ἀριθμῶν  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ ,  $\delta$  ἔχουμε, ὅταν  $\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta}$ . Οἱ  $\alpha$  καὶ  $\delta$  λέγονται **ἄκροι** ὄροι τῆς ἀναλογίας, οἱ  $\beta$  καὶ  $\gamma$  λέγονται **μέσοι** ὄροι αὐτῆς.

Οἱ  $\alpha$  καὶ  $\gamma$  **ἡγούμενοι** καὶ οἱ  $\beta$  καὶ  $\delta$  **ἐπόμενοι** ὄροι. Γιὰ τὶς ἀναλογίες τῶν ἀριθμῶν μπορεῖτε νὰ δεῖτε στὴν Ἀριθμητικὴ (κεφ. 4 § 100, 101).

Ἄναφέρουμε μὲ συντομία μερικὲς ιδιότητες τῶν ἀναλογιῶν, τὶς ὁποῖες θὰ χρησιμοποιήσουμε στὰ ἐπόμενα.

1)  $\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta} \Leftrightarrow \beta\gamma = \alpha\delta$  συνεπώς τὸ γινόμενο τῶν μέσων ὄρων μιᾶς ἀναλογίας ἰσοῦται μὲ τὸ γινόμενο τῶν ἄκρων ὄρων της.

2)  $\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta} \Leftrightarrow \frac{\alpha}{\gamma} = \frac{\beta}{\delta}$  καὶ  $\frac{\delta}{\beta} = \frac{\gamma}{\alpha}$ . Σὲ μιὰ ἀναλογία μπορούμε νὰ ἐναλλάξουμε τοὺς ἄκρους ἢ τοὺς μέσους ὄρους της.

3)  $\frac{\alpha}{\alpha'} = \frac{\beta}{\beta'} = \frac{\gamma}{\gamma'} = \lambda \Rightarrow \lambda = \frac{\alpha + \beta + \gamma}{\alpha' + \beta' + \gamma'}$ . Λόγοι ἴσοι μεταξὺ τους εἶναι ἴσοι καὶ μὲ τὸ λόγο ποὺ ἔχει ἀριθμητὴ τὸ ἄθροισμα τῶν ἀριθμητῶν καὶ παρονομαστὴ τὸ ἄθροισμα τῶν παρονομαστῶν.

### Ἀσκήσεις.

44) Νὰ ἐξηγήσετε γιατί καὶ σὲ μιὰ ἀναλογία εὐθύγραμμων τμημάτων μπορούμε νὰ ἐναλλάξουμε τοὺς μέσους ἢ τοὺς ἄκρους ὄρους.

45) Νὰ ἐξηγήσετε γιατί, ἂν δύο λόγοι εὐθύγραμμων τμημάτων εἶναι ἴσοι, θὰ εἶναι ἴσοι καὶ μὲ τὸ λόγο τοῦ ἀθροίσματος τῶν ἡγουμένων πρὸς τὸ ἄθροισμα τῶν ἐπομένων.

Ἐπίσης ἂν  $\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta}$  δεῖξτε ὅτι  $\frac{\alpha + \beta}{\beta} = \frac{\gamma + \delta}{\delta}$

### Τὸ Θεώρημα τοῦ Θαλῆ

#### 1<sup>ο</sup>. Θεώρημα.


§ 15. Πάνω σὲ μιὰ εὐθεῖα  $\chi\psi$  πάρτε ἴσα εὐθύγραμμα τμήματα  $AB$ ,  $B\Gamma$ ,  $\Gamma\Delta$ . Ἀπὸ τὰ σημεῖα  $A, B, \Gamma$  καὶ  $\Delta$  φέρετε εὐθεῖες παράλληλες μεταξὺ τους. Ἐπειτα φέρετε μιὰ ἄλλη εὐθεῖα, ποὺ νὰ τέμνει τὶς παράλληλες αὐτὲς στὰ σημεῖα  $A', B', \Gamma', \Delta'$  ἀντιστοιχῶς. Συγκρίνετε (μὲ τὸ διαβήτη) τὰ εὐθ. τμήματα  $A'B', B'\Gamma', \Gamma'\Delta'$ .

Τὰ συγκρίνουμε καὶ παρατηροῦμε ὅτι εἶναι ἴσα.

Ἐπομένως: Ἄν παράλληλες εὐθεῖες τέμνουν δύο ἄλλες καὶ ὀρίζουν πάνω στὴ μιὰ ἴσα εὐθ. τμήματα, θὰ ὀρίζουν ἴσα εὐθ. τμήματα καὶ πάνω στὴν ἄλλη.

Γιὰ νὰ αἰτιολογήσουμε τὸ ἀποτέλεσμα αὐτό, ἐργαζόμεστε ὡς ἑξῆς:

Ἀπὸ τὰ σημεῖα  $A'$  καὶ  $B'$  φέρουμε παράλληλες πρὸς τὴ  $\chi\psi$  (ἄρα καὶ παράλληλες



σχ. 22.

μεταξύ τους). Αυτές τέμνουν τις  $BB'$  και  $\Gamma\Gamma'$  στα σημεία  $A_1$  και  $B_1$  αντιστοίχως. Παρατηρούμε ότι τα τετράπλευρα  $ABA_1A'$  και  $B\Gamma B_1B'$  είναι παραλληλόγραμμα. Έπομένως  $A'A_1=AB$  και  $B'B_1=B\Gamma$ . Άλλά  $AB=B\Gamma$  συνεπώς  $A'A_1=B'B_1$ .

Συγκρίνουμε τώρα τα τρίγωνα  $A'A_1B'$  και  $B'B_1\Gamma'$ . Αυτά είναι ίσα, γιατί έχουν:


$$A'A_1=B'B_1, \quad \text{όπως δείξαμε πιο πάνω.}$$

$\widehat{A_1A'B'}=\widehat{B_1B'\Gamma'}$  επειδή είναι έντος εκτός και επί τα αυτά των παραλλήλων  $A'A_1, B'B_1$ , οι οποίες τέμνονται από την  $A'B'$ , και

$$\widehat{A_1}=\widehat{B_1}, \quad \text{επειδή } \widehat{A_1}=\widehat{B}, \widehat{B_1}=\widehat{\Gamma} \text{ και } \widehat{\Gamma}=\widehat{B} \text{ (γιατί;)}$$

Έπομένως  $A'B'=B'\Gamma'$ . Όμοίως  $B'\Gamma'=\Gamma'D'$  κ.ο.κ.

### Έφαρμογές



σχ. 23.

1. Να διαιρεθεί ένα ευθύγραμμο τμήμα  $AB$  σε τρία ίσα ευθύγραμμα τμήματα (σχ. 23). Φέρνουμε μια ήμικυκλίδα  $AX$  και παίρνουμε σ' αυτήν τα ίσα διαδοχικά ευθύγραμμα τμήματα  $AG, \Gamma\Delta, \Delta E$ . Φέρνουμε τη  $BE$  και από τα  $\Delta, \Gamma$  και  $A$  φέρνουμε παράλληλες προς αυτή, οι οποίες τέμνουν το

$AB$  στα σημεία  $\Delta'$  και  $\Gamma'$ . Τότε θα είναι  $AG'=\Gamma'\Delta'=\Delta'B$ .

**Παρατήρηση:** Το  $AG'$  ίσούται με το γινόμενο  $\frac{1}{3} AB$ .


2. Από το μέσο  $\Delta$  της πλευράς  $AB$  ενός τριγώνου  $AB\Gamma$  (σχ. 24) φέρνουμε παράλληλο προς τη  $B\Gamma$ . Αυτή θα κόψει την  $A\Gamma$  στο  $E$ . "Αν φέρουμε και την  $AX \parallel B\Gamma$ , παρατηρούμε ότι, επειδή  $\Delta\Delta'=\Delta B$ , θα είναι και  $AE=EG$ . "Ωστε: "Αν από το μέσο μιας πλευράς τριγώνου φέρουμε παράλληλο προς μία πλευρά του, αυτή θα περάσει από το μέσο της τρίτης πλευράς.

Φέρετε τώρα από το μέσο  $E$  παράλληλο προς την  $AB$ . Αυτή σύμφωνα με το προηγούμενο θα περάσει από το μέσο  $Z$  της  $B\Gamma$  και, επειδή το τετράπλευρο  $\Delta BZE$  είναι παραλληλόγραμμο, θα είναι  $\Delta E=BZ$ , δηλαδή

$$\Delta E = \frac{1}{2} B\Gamma.$$

3. Σημειώστε τα μέσα  $\Delta$  και  $E$  των πλευρών  $AB$  και  $A\Gamma$  ενός τριγώνου  $AB\Gamma$ . Συγκρίνετε τη  $\Delta E$  με τη  $B\Gamma$ .

Η  $\Delta E$  είναι παράλληλος προς τη  $B\Gamma$ , γιατί από το  $\Delta$  περνά μία



σχ. 24.



μόνο παράλληλος προς τή ΒΓ. Αύτη όμως ή παράλληλος, όπως είδαμε στο προηγούμενο, περνά και από το Ε και δύο σημεία όρίζουν μιá εύθεια. Το τμήμα ΔΕ είναι ίσο, όπως είδαμε, με το  $\frac{1}{2}$  ΒΓ. Με συντομία γράφουμε τις δύο αυτές ιδιότητες  $\Delta E \parallel \frac{1}{2} B\Gamma$ . Όσπε:

**Τò εὐθύγραμμο τμήμα, τὸ ὁποῖο ἐνώνει τὰ μέσα δύο πλευρῶν τριγώνου, εἶναι παράλληλο πρὸς τὴν τρίτη πλευρὰ καὶ ἰσοῦται με τὸ μισό αὐτῆς.**

### Ἄσκήσεις

46) Νά διαιρεθεῖ ἕνα εὐθύγραμμο τμήμα σὲ πέντε ἴσα μέρη.

47) Νά πάρετε ἕνα εὐθύγραμμο τμήμα ΑΒ καὶ νά βρεῖτε τὰ  $\frac{2}{5} \cdot AB$ .

48) Δίνεται ἕνα τραπέζιο ΑΒΓΔ (ΑΒ//ΓΔ). Ἀπὸ τὸ μέσο Μ τῆς διαγωνίου ΒΔ νά φέρετε παράλληλο πρὸς τὴς βάσεις του, ἡ ὁποία τέμνει τὴν ΑΔ στὸ Ν καὶ τὴν ἄλλη διαγώνιο στὸ Λ. Νά συγκρίνετε τὸ τμήμα ΝΛ με τὸ ΓΔ καὶ τὸ ΜΛ με τὴ διαφορά τῶν βάσεων.

49) Νά πάρετε τὰ μέσα τῶν πλευρῶν ἐνὸς τετραπλεύρου καὶ νά ἐξετάσετε με τὰ γεωμετρικὰ ὄργανα ἂν εἶναι κορυφῆς ἐνὸς παραλληλογράμμου.

50) Νά ἐξηγήσετε γιατί τὰ εὐθύγραμμο τμήματα, ποὺ συνδέουν τὰ μέσα τῶν ἀπέναντι πλευρῶν ἐνὸς τετραπλεύρου, διχοτομοῦνται.


### 2<sup>ο</sup>. Θεώρημα

§ 16. Στὴν § 15 σχ. 24, είδαμε ὅτι ἂν  $AB = \Gamma\Delta$ , θὰ εἶναι καὶ  $A'B' = \Gamma\Delta'$ . Τότε ὁμως  $\frac{AB}{\Gamma\Delta} = \frac{A'B'}{\Gamma\Delta'} = 1$ . Δηλαδή τὰ ἀντίστοιχα εὐθύγραμμο τμήματα, ποὺ ὀρίζονται ἀπὸ τὴς παράλληλες εὐθεῖες πάνω στὴς ΑΔ καὶ Α'Δ', εἶναι ἀνάλογα. Γεννάται τώρα τὸ ἐρώτημα: συμβαίνει τὸ ἴδιο καὶ ὅταν τὸ ΑΒ εἶναι διαφορετικὸ ἀπὸ τὸ ΓΔ; (σχ.25)

Κατασκευάστε ἕνα τραπέζιο ΑΒΒ'Α' (ΑΑ'//ΒΒ') με  $AB = 3$  cm,  $A'B' = 5$  cm καὶ στὴν προέκταση τοῦ ΑΒ νά πάρετε ἕνα εὐθύγραμμο τμήμα  $\Gamma\Delta = 6$  cm.

Ἀπὸ τὰ Γ καὶ Δ νά φέρετε παράλληλες πρὸς τὴς βάσεις τοῦ τραπέζιου, οἱ ὁποῖες τέμνουν τὴν προέκταση τῆς Α'Β' στὰ σημεία Γ' καὶ Δ' ἀντιστοίχως. Μετρήστε τὸ Γ'Δ' καὶ συγκρίνετε τοὺς λόγους:  $\frac{AB}{\Gamma\Delta}$  καὶ  $\frac{A'B'}{\Gamma'\Delta'}$ .

Βρίσκουμε  $\Gamma'\Delta' = 10$  cm,



σχ. 25.

έπομένως  $\frac{AB}{\Gamma\Delta} = \frac{A'B'}{\Gamma'\Delta'} = \frac{1}{2}$ . Άρα: "Αν παράλληλες εὐθείες τέμνουν δύο ἄλλες, τὰ ἀντίστοιχα εὐθύγραμμα τμήματα, τὰ ὅποια ὀρίζονται ἀπὸ τις παράλληλες, εἶναι ἀνάλογα.

Γιὰ νὰ αἰτιολογήσουμε τὸ ἀποτέλεσμα αὐτό, ἐργαζόμαστε ὡς ἑξῆς: Στὴν προέκταση τῆς  $AB$  παίρνουμε τμήμα  $BE=AB$ . Ἡ παράλληλος ἀπὸ τὸ  $E$  πρὸς τις  $AA'$  καὶ  $BB'$  τέμνει τὴν  $A'B'$  στὸ  $E'$  καὶ εἶναι  $A'B'=B'E'$ . Τὰ εὐθ. τμήματα  $AB$  καὶ  $A'B'$  εἶναι ἀντίστοιχα (βρίσκονται μεταξύ τῶν ἰδίων παραλλήλων). Ἀλλὰ καὶ τὰ  $AE$  καὶ  $A'E'$  εἶναι ἀντίστοιχα. Αὐτὰ ὅμως εἶναι ἴσα μὲ  $2AB$  καὶ  $2A'B'$  ἀντιστοίχως. Ἄν θεωρήσουμε καὶ τὸ  $AZ=3\cdot AB$ , θὰ πάρουμε ὡς ἀντίστοιχὸ του τὸ  $A'Z'=3\cdot A'B'$  κ.ο.κ.

Ἀποδεικνύεται (ὅπως θὰ μάθουμε σὲ μεγαλύτερη τάξη) ὅτι, ἂν  $\Gamma\Delta = \lambda \cdot AB$ , τότε  $\Gamma'\Delta' = \lambda \cdot A'B'$  ( $\lambda$  ἕνας ὁποιοσδήποτε ἀριθμὸς).

Ἐπομένως: Τὰ τμήματα ποὺ ὀρίζονται πάνω στὴν εὐθεῖα  $AB$  ἀπὸ τις παράλληλες εὐθείες, εἶναι ἀνάλογα πρὸς τὰ ἀντίστοιχὰ τους, ποὺ ὀρίζονται ἀπὸ τις ἴδιες παράλληλες πάνω στὴν  $A'B'$ .

### Ἐφαρμογές.

1. Μιὰ εὐθεῖα παράλληλη πρὸς μιὰ πλευρὰ ἐνὸς τριγώνου διαιρεῖ τις ἄλλες πλευρές του σὲ τμήματα ἀνάλογα.

Φέρνουμε μιὰ εὐθεῖα παράλληλη πρὸς τὴν πλευρὰ  $B\Gamma$  ἐνὸς τριγώνου  $AB\Gamma$ . Αὕτη τέμνει τις  $AB$  καὶ  $A\Gamma$  στὰ σημεῖα  $\Delta$  καὶ  $E$  ἀντιστοίχως. Ἄν φέρουμε καὶ τὴν  $AX \parallel B\Gamma$ , θὰ συμπεράνουμε σύμφωνα μὲ τὸ προηγούμενο ὅτι:

$$\frac{A\Delta}{AB} = \frac{AE}{A\Gamma}, \quad \frac{A\Delta}{\Delta B} = \frac{AE}{E\Gamma} \quad \text{καὶ} \quad \frac{\Delta B}{AB} = \frac{E\Gamma}{A\Gamma}.$$

Ἡ πρόταση αὕτη ποὺ εἶναι γνωστὴ σὰν Θεώρημα τοῦ Θαλῆ, ἀποδίδεται στὸ Θαλῆ τὸ Μιλήσιο(\*).

2. Σχηματίστε ἕνα τρίγωνο  $AB\Gamma$  μὲ μήκη πλευρῶν  $AB$  καὶ  $A\Gamma$  ἴσα μὲ  $8\text{ cm}$  καὶ  $12\text{ cm}$  ἀντιστοίχως. Πάνω στὴν  $AB$  πάρτε τμήμα  $A\Delta=2\text{ cm}$  καὶ πάνω στὴν  $A\Gamma$  τμήμα  $AE=3\text{ cm}$ . Νὰ βρεῖτε τὴ σχετικὴ θέσιν (σχ. 26) τῶν εὐθειῶν  $\Delta E$  καὶ  $B\Gamma$ .

Ἄν μετρήσουμε τις γωνίες  $\widehat{A\Delta E}$  καὶ  $\widehat{A\Delta B}$ , θὰ βροῦμε ὅτι εἶναι ἴσες. Ἐπομένως  $\Delta E \parallel B\Gamma$  (τέμνονται ἀπὸ τὴν  $AB$  καὶ σχηματίζουν δύο ἐντὸς ἐκτὸς καὶ ἐπὶ τὰ αὐτὰ γωνίες ἴσες). Μποροῦμε νὰ ἀποδείξουμε, δηλαδὴ

\* **Θαλῆς ὁ Μιλήσιος** (637-548 π.Χ.): Μεγάλος Ἕλληνας μαθηματικὸς καὶ φιλόσοφος. Κατὰ τὴν ἀρχαιότητα τὸν θεωροῦσαν ἕναν ἀπὸ τοὺς ἑπτὰ σοφοὺς. Αὐτὸς χρησιμοποίησε πρῶτος τὴν ἀπόδειξη, δηλαδὴ τὴ δικαιολόγηση μιᾶς ἀλήθειας μὲ βάση ἄλλες γνωστές. Γι' αὐτὸ θεωρεῖται ἰδρυτὴς τῆς μαθηματικῆς ἐπιστήμης καὶ γενικὰ τῆς ἐπιστήμης. Ὑπῆρξε ἰδρυτὴς τῆς φιλοσοφικῆς σχολῆς τῆς Μιλήτου. Οἱ πρῶτες γνώσεις γιὰ τὸν ἠλεκτρισμὸ ἀφείλονται σ' αὐτόν.

νά αιτιολογήσουμε τὸ ἀποτέλεσμα αὐτό. Παρατηροῦμε ὅτι  $\frac{AD}{AB} = \frac{1}{4}$  καὶ  $\frac{AE}{AG} = \frac{1}{4}$ , ἐπομένως  $\frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AG}$ . Ἄρα ἡ παράλληλος πρὸς τὴν ΒΓ, ποὺ φέρεται ἀπὸ τὸ Δ, ὀφείλει (κατὰ τὸ προηγούμενο) νὰ περάσει ἀπὸ τὸ Ε.

Ἔστω: "Ἄν μιὰ εὐθεῖα διαιρεῖ δύο πλευρὲς τριγώνου σὲ τμήματα ἀνάλογα, εἶναι παράλληλος πρὸς τὴν τρίτη πλευρὰ του.

### Ἀσκήσεις

51) Νὰ διαιρεθῆ ἓνα εὐθ. τμήμα σὲ δύο τμήματα, ποὺ νὰ ἔχουν λόγος  $\frac{3}{4}$ .

52) Δίνονται τὸ εὐθύγραμμο τμήμα ΑΒ καὶ δύο εὐθύγραμμα τμήματα α καὶ β. Νὰ διαιρέσετε τὸ ΑΒ σὲ τμήματα ἀνάλογα πρὸς τὰ α καὶ β.

53) Κατασκευάστε ἓνα τρίγωνο ΑΒΓ μὲ πλευρὲς ΑΒ=5 cm καὶ ΑΓ=6 cm. Πάρτε πάνω στὴν ΑΒ ἓνα τμήμα  $AD = \frac{1}{3} AG$  καὶ φέρετε ἀπὸ τὸ Δ // πρὸς τὴ ΒΓ. Ἄν αὐτὴ τέμνει τὴν ΑΓ στὸ Ζ, βρεῖτε τὸ μήκος τοῦ ΑΖ.

54) Ἀπὸ τὸ κέντρο βάρους ἑνὸς τριγώνου ΑΒΓ νὰ φέρετε παράλληλο πρὸς τὴ ΒΓ. Ἄν αὐτὴ τέμνει τὴν ΑΒ στὸ Δ, ὑπολογίστε τοὺς λόγους  $\frac{AD}{DB}$ ,  $\frac{AB}{AD}$ ,  $\frac{AB}{DB}$ .

55) Νὰ κατασκευάσετε τὴ διχοτόμο ΑΔ ἑνὸς τριγώνου ΑΒΓ καὶ ἀπὸ τὸ Β νὰ φέρετε παράλληλο πρὸς τὴν ΑΔ. Ἄν αὐτὴ τέμνει τὴν προέκταση τῆς ΑΓ στὸ Ε, νὰ συγκρίνετε τὰ ΑΒ καὶ ΑΕ. Νὰ συγκρίνετε ἐπίσης τοὺς λόγους  $\frac{DB}{DG}$ ,  $\frac{AB}{AG}$ .


56) Νὰ κατασκευάσετε τρεῖς παράλληλες εὐθεῖες ε, ε', ε'' ὥστε ἡ ε νὰ ἀπέχει ἀπὸ τὴν ε' 3 cm καὶ ἡ ε' ἀπὸ τὴν ε'' 5 cm. Νὰ τὶς κόψετε μὲ μιὰ εὐθεῖα χψ καὶ νὰ υπολογίσετε τοὺς λόγους τῶν τμημάτων, τὰ ὁποῖα ὀρίζουν οἱ παράλληλες πάνω στὴ χψ.

## Β. ΟΜΟΙΑ ΤΡΙΓΩΝΑ

§ 17. Πάρτε ἓνα τρίγωνο ΑΒΓ καὶ φέρετε μιὰ εὐθεῖα παρὰλληλη πρὸς τὴ ΒΓ, ἡ ὁποία νὰ τέμνει τὶς πλευρὲς ΑΒ καὶ ΑΓ στὰ σημεῖα Δ καὶ Ε ἀντιστοίχως. Συγκρίνετε τὶς γωνίες καὶ τὶς πλευρὲς τῶν τριγώνων ΑΔΕ καὶ ΑΒΓ. Τί παρατηροῦτε;

Παρατηροῦμε ὅτι,  $\hat{A} = \hat{A}$ ,  $\hat{B} = \hat{\Delta}$  καὶ  $\hat{\Gamma} = \hat{E}$  (εἶναι ἐντὸς ἑκτὸς καὶ ἐπὶ τὰ αὐτὰ τῶν παραλλήλων ΒΓ καὶ ΔΕ, οἱ ὁποῖες τέμνονται ἀπὸ τὶς ΑΒ καὶ ΑΓ).

Γιὰ τὶς πλευρὲς τοῦ τριγώνου, σύμφωνα μὲ τὸ θεώρημα τοῦ Θαλῆ ἔχουμε:



σχ. 27.

$\frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AG}$ . Φέρνουμε τώρα από το E παράλληλο προς την AB. Αυτή τέμνει την ΒΓ στο E'. Σύμφωνα πάλι με το θεώρημα του Θαλή θα είναι  $\frac{AE}{AG} = \frac{BE'}{BG}$ .

Το τετράπλευρο όμως ΔΒΕ'Ε είναι παραλληλόγραμμο. Άρα  $BE' = DE$ , επομένως  $\frac{AE}{AG} = \frac{DE}{BG}$ .

Έχουμε λοιπόν  $\frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AG} = \frac{DE}{BG}$ . Τα τρίγωνα ΑΔΕ και ΑΒΓ έχουν τις αντίστοιχες γωνίες τους ίσες και τις πλευρές, που βρίσκονται απέναντι των ίσων γωνιών, ανάλογες.

**Λέμε ότι τα τρίγωνα ΑΔΕ και ΑΒΓ είναι όμοια.**

Οι αντίστοιχες κορυφές Α, Α, Δ, Β και Ε, Γ των ίσων γωνιών λέγονται **ομόλογες κορυφές**. Οι γωνίες τους λέγονται **ομόλογες γωνίες**, και οι πλευρές, οι οποίες συνδέουν δύο ομόλογες κορυφές ή βρίσκονται απέναντι ομόλογων γωνιών, λέγονται **ομόλογες πλευρές**.


Θα λέμε ότι δύο τρίγωνα είναι όμοια, όταν έχουν τις ομόλογες γωνίες τους ίσες και τις ομόλογες πλευρές τους ανάλογες.

$$\widehat{A} = \widehat{\Delta}, \widehat{B} = \widehat{E}, \widehat{\Gamma} = \widehat{Z} \text{ και } \frac{AB}{\Delta E} = \frac{BG}{EZ} = \frac{AG}{\Delta Z} \Leftrightarrow \text{Τριγ. ΑΒΓ } \hat{=} \text{ τριγ. } \Delta E Z.$$

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω, μια ευθεία παράλληλη προς μια πλευρά τριγώνου ορίζει ένα νέο τρίγωνο όμοιο με αυτό.

**Σημείωση:** Οι ομόλογες κορυφές πρέπει να γράφονται με την ίδια τάξη.

### § 18. Έφαρμογές.



σχ. 28.

1. Πάρτε δύο ίσα τρίγωνα (με την βοήθεια διαφανούς χαρτιού) τα ΑΒΓ και ΔΕΖ και συγκρίνετε τις γωνίες τους και τους λόγους των ομόλογων πλευρών τους.

Έπειδή τα τρίγωνα είναι ίσα, θα έχουν τις ομόλογες γωνίες τους ίσες, δηλαδή  $\widehat{A} = \widehat{\Delta}$ ,  $\widehat{B} = \widehat{E}$  και  $\widehat{\Gamma} = \widehat{Z}$ . Οι λόγοι των ομόλογων πλευρών είναι ίσοι με τη μονάδα (γιατί οι ομόλογες πλευρές των ίσων τριγώνων είναι ίσες). Έπομένως:  $\frac{AB}{\Delta E} = \frac{BG}{EZ} = \frac{AG}{\Delta Z}$  και  $\widehat{A} = \widehat{\Delta}$ ,  $\widehat{B} = \widehat{E}$  και  $\widehat{\Gamma} = \widehat{Z}$ .

Ωστε: **Δύο ίσα τρίγωνα είναι όμοια.** Άλλά δύο όμοια τρίγωνα δεν είναι πάντοτε ίσα, όπως φαίνεται στο σχήμα (27) για τα τρίγωνα ΑΔΕ και ΑΒΓ.

2. Έπειδή στο σχήμα (27) φέραμε τη ΔΕ παράλληλο προς τη ΒΓ, συμπεράναμε ότι το τρίγ. ΑΔΕ είναι όμοιο με το τρίγ. ΑΒΓ.

Παρατηρούμε όμως ότι και η ΒΓ είναι παράλληλος προς την πλευρά ΔΕ του τριγώνου ΑΔΕ. Έπομένως, αν ένα τρίγωνο είναι όμοιο με ένα άλλο, και το δεύτερο είναι όμοιο με το πρώτο.

3. Στο σχήμα (27) φέρνουμε τη  $\Delta_1 E_1$  παράλληλο προς τη ΒΓ.

Τότε το τρίγ.  $\Delta_1 E_1$  είναι όμοιο με το τρίγ. ΑΒΓ. Διαπιστώσαμε ότι το τρίγ. ΑΔΕ είναι όμοιο με το τρίγ. ΑΒΓ, και έπειδή οι  $\Delta E // B\Gamma$  και  $\Delta_1 E_1 // B\Gamma$  συνεπάγονται την  $\Delta E // \Delta_1 E_1$ , έχουμε ότι το τρίγωνο  $\Delta_1 E_1$  είναι όμοιο με το τρίγωνο ΑΔΕ. Ωστε δύο τρίγωνα όμοια με ένα τρίτο είναι όμοια.

Αν συνοψίσουμε, θα παρατηρήσουμε ότι η σχέση τής ομοιότητας έχει τις γνωστές ιδιότητες τής ισότητας.

Τρίγ. ΑΒΓ όμοιο τρίγ. ΑΒΓ (άνακλαστική).

τρίγ. ΑΒΓ όμοιο τρίγ. ΔΕΖ  $\Rightarrow$  τρίγ. ΔΕΖ όμοιο τρίγ. ΑΒΓ (συμμετρική) και

τρίγ. ΑΒΓ όμοιο τρίγ. ΔΕΖ και τρίγ. ΔΕΖ όμοιο τρίγ. ΗΘΙ  $\Rightarrow$  τρίγ. ΑΒΓ όμοιο τρίγ. ΘΗΙ (μεταβατική).

### Άσκησης

57) Κατασκευάστε ένα τρίγωνο ΑΒΓ με πλευρές  $AB=3$  cm,  $B\Gamma=5$  cm και  $A\Gamma=6$  cm. Πάνω στην ΑΒ πάρτε τμήμα  $AD=2$  cm και φέρτε παράλληλο προς τη ΒΓ, ή όποια νά τέμνει την ΑΓ στο Ε. Υπολογίστε το μήκος τής ΔΕ.

58) Η πλευρά ενός ισοπλεύρου τριγώνου ΑΒΓ έχει μήκος 6 cm. Από το όρθόκεντρο του τριγώνου νά φέρετε παράλληλο προς τη ΒΓ. Πόσο είναι το μήκος του τμήματος της, που είναι έσωτερικό του τριγώνου;

59) Σχηματίστε ένα τρίγωνο ΑΒΓ και προεκτείνετε τις ΑΒ και ΑΓ μέχρι τά σημεία Δ και Ε αντίστοιχως, ώστε  $AD = \frac{3}{5} \cdot AB$  και  $AE = \frac{3}{5} \cdot A\Gamma$ . Υπολογίστε το λόγο  $\frac{\Delta E}{B\Gamma}$ .


60) Ένα τραπέζιο έχει βάσεις 12 cm και 7 cm. Ποιός είναι ο λόγος τών τμημάτων, στα όποια η μία διαγώνιος χωρίζει την άλλη;

61) Στο ίδιο τραπέζιο προεκτείνετε τις μη παράλληλες πλευρές μέχρι το σημείο τομής τους. Ποιός είναι ο λόγος τών αποστάσεων του σημείου τομής τους από τά άκρα μιάς από τις μη παράλληλες πλευρές;

### Κριτήρια ομοιότητας τριγώνων

#### § 19. 1<sup>ο</sup> Κριτήριο ομοιότητας.

Κατασκευάστε ένα τρίγωνο ΑΒΓ με πλευρές  $B\Gamma=2$  cm,  $BA=4$  cm



και  $ΓΑ=5$  cm. Μετά πάρετε ένα εὐθύγραμμο τμήμα  $ΔΕ=4$  cm και με βάση αὐτὸ κατασκευάστε τὸ τρίγωνο  $ΖΔΕ$ , ὥστε  $\widehat{Δ}=\widehat{Β}$  και  $\widehat{Γ}=\widehat{Ε}$ . Συγκρίνετε τὶς γωνίες  $\widehat{Α}$ ,  $\widehat{Ζ}$  και τοὺς λόγους τῶν ὁμόλογων πλευρῶν. Τί παρατηρεῖτε; (σχ. 29).

Χρησιμοποιώντας μοιρογνωμόνιο ἢ «διαφανές» βρίσκουμε ὅτι  $\widehat{Α}=\widehat{Ζ}$ . Ἐπομένως τὰ τρίγωνα ἔχουν τὶς ὁμόλογες γωνίες τοὺς ἴσες, δηλαδή  $\widehat{Α}=\widehat{Ζ}$ ,  $\widehat{Β}=\widehat{Δ}$ ,  $\widehat{Γ}=\widehat{Ε}$ .

Μετρώντας με ὑποδεκάμετρο βρίσκουμε ὅτι  $ΔΖ=8$  cm και  $ΕΖ=10$  cm.

Τότε  $\frac{ΒΓ}{ΔΕ} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$ ,  $\frac{ΑΒ}{ΖΔ} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$  και  $\frac{ΑΓ}{ΖΕ} = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}$ .

Ὡστε  $\frac{ΒΓ}{ΔΕ} = \frac{ΑΒ}{ΖΔ} = \frac{ΑΓ}{ΖΕ}$ , δηλαδή οἱ ὁμόλογες πλευρές τῶν τριγῶνων εἶναι ἀνάλογες. Ἐπομένως τὰ τρίγωνα  $ΑΒΓ$  και  $ΖΔΕ$ , τὰ ὁποῖα ἔχουν δύο γωνίες ἴσες μία πρὸς μία, εἶναι ὅμοια.

**Ἄν δύο τρίγωνα ἔχουν δύο γωνίες ἴσες μία πρὸς μία, εἶναι ὅμοια.**

Γιὰ νὰ **αἰτιολογήσουμε** τὸ ἀποτέλεσμα τῆς ἐργασίας μας και νὰ πειστοῦμε, ὅτι δὲν εἶναι συμπτωματικὸ, ἐργαζόμαστε ὡς ἐξῆς: Παίρνουμε πάνω στὴ  $ΔΕ$  τμήμα  $ΔΗ=ΒΓ$  και ἀπὸ τὸ  $Η$  φέρνουμε παράλληλο πρὸς τὴν  $ΕΖ$ , ἡ ὁποία τέμνει τὴ  $ΖΔ$  στὸ  $Θ$ . Παρατηροῦμε ὅτι, τὸ τρίγ.  $ΘΔΗ$  εἶναι ὁμ. μετὸ  $ΖΔΕ$  (1), ὅπως μάθαμε στὴν § 17. Ἀλλὰ τὰ τρίγωνα  $ΘΔΗ$  και  $ΑΒΓ$  εἶναι ἴσα, γιατί ἔχουν  $ΔΗ=ΒΓ$  και  $\widehat{Δ}=\widehat{Β}$ ,  $\widehat{Η}=\widehat{Γ}$  (ἐπειδὴ  $\widehat{Η}=\widehat{Ε}$  και  $\widehat{Ε}=\widehat{Γ}$ ).

Ἄρα τὸ τρίγ.  $ΘΔΗ$  εἶναι ὅμοιο μετὸ τρίγ.  $ΑΒΓ$  (2). Ἀπὸ τὶς (1) και (2) συμπεραίνουμε ὅτι τὸ τρίγ.  $ΑΒΓ$  εἶναι ὅμοιο μετὸ τρίγ.  $ΖΔΕ$ . Ὡστε: **Δύο τρίγωνα με δύο γωνίες ἴσες μία πρὸς μία εἶναι ὅμοια.**


### Ἐφαρμογές.

1. Δύο ἰσόπλευρα τρίγωνα εἶναι ὅμοια, γιατί κάθε ἓνα ἀπ' αὐτὰ ἔχει γωνίες  $60^\circ$ . Δηλαδή ἔχουν δύο γωνίες ἴσες.

2. Κατασκευάστε δύο ὀρθογώνια τρίγωνα, ὥστε μία ὀξεία γωνία τοῦ ἑνὸς νὰ εἶναι ἴση μετὸ ὀξεία γωνία τοῦ ἄλλου. Τί παρατηρεῖτε;

Κατασκευάζουμε τὰ ὀρθογώνια τρίγωνα  $ΑΒΓ$  και  $ΔΕΖ$  ἔτσι ὥστε  $\widehat{Γ}=\widehat{Ζ}$ . Παρατηροῦμε ὅτι  $\widehat{Γ}=\widehat{Ζ}$  και  $\widehat{Α}=\widehat{Ε}$ , ἐπειδὴ εἶναι ὀρθές. Ἐπομένως, **ἂν δύο ὀρθογώνια τρίγωνα ἔχουν μία ὀξεία γωνία ἴση, εἶναι ὅμοια.** (σχ. 30)

3. Σ' ἓνα ὀρθογώνιο τρίγωνο  $ΒΑΓ$  ( $\widehat{Α}=1$  ὀρθή) νὰ φέρετε τὸ ὕψος



σχ. 30.

ΑΔ και να συγκρίνετε τὰ ὀρθογώνια τρίγωνα ΑΔΒ και ΓΔΑ με τὸ ΓΑΒ. Τί παρατηρεῖτε; (σχ. 31).

Παρατηροῦμε ὅτι τὰ ὀρθ. τρίγωνα ΑΔΒ και ΓΑΒ ἔχουν μία ὀξεῖα γωνία κοινή, τὴ  $\widehat{B}$ . Ἄρα εἶναι ὅμοια. Ὁμοίως τὰ ὀρθ. τρίγωνα ΓΔΑ και ΓΑΒ ἔχουν τὴν ὀξεῖα γωνία  $\widehat{\Gamma}$  κοινή, εἶναι λοιπὸν και αὐτὰ ὅμοια. Ἐπομένως και τὰ τρίγωνα ΑΔΒ και ΓΔΑ εἶναι ὅμοια (ἐπειδὴ εἶναι ὅμοια με ἓνα τρίτο).


### Ἀσκήσεις

62) Ἐξετάστε ἂν δύο ἰσοσκελῆ ὀρθογώνια τρίγωνα εἶναι ὅμοια.

63) Νὰ κατασκευάσετε δύο ὅμοια τρίγωνα ΑΒΓ και Α'Β'Γ' και νὰ φέρετε τὶς διχοτόμους τοὺς ΑΔ και Α'Δ'. Ἐξετάστε ἂν τὰ τρίγωνα ΑΒΔ και Α'Β'Δ' καθὼς και τὰ ΑΓΔ και Α'Γ'Δ' εἶναι ὅμοια.

64) Νὰ κατασκευάσετε ἓνα ὀρθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ και νὰ φέρετε τὸ ὕψος τοῦ ΑΔ. Νὰ συγκρίνετε τοὺς λόγους  $\frac{ΔΒ}{ΑΒ}$  και  $\frac{ΑΒ}{ΓΒ}$ .

65) Κατασκευάστε ἓνα τρίγωνο ΑΒΓ με πλευρὲς ΑΒ=7 cm, ΒΓ=6 cm και ΓΑ=9 cm. Πάρτε πάνω στὴν ΑΒ ἓνα τμήμα ΒΔ=4 cm και κατασκευάστε γωνία  $\widehat{BΔE} = \widehat{\Gamma}$ , τῆς ὁποίας ἡ πλευρὰ ΔΕ τέμνει τὴν ἡμιευθεῖα ΒΓ στὸ Ε. Ὑπολογίστε τὰ μήκη τῶν πλευρῶν τοῦ τριγώνου ΒΔΕ.



σχ. 31.

66) Νὰ σχηματίσετε ἓνα τρίγωνο ΑΒΓ και τὴ διάμεσό του ΑΜ. Νὰ φέρετε μιὰ παράλληλο πρὸς τὴ ΒΓ, ἡ ὁποία τέμνει τὶς ΑΒ, ΑΜ, ΑΕ στὰ σημεῖα Β', Μ', Γ' ἀντιστοίχως. Νὰ συγκρίνετε τὰ τμήματα Β'Μ' και Γ'Μ'.

67) Νὰ κατασκευάσετε δύο ὀξυγώνια τρίγωνα με πλευρὲς ἀντιστοίχως παράλληλες και νὰ τὰ συγκρίνετε. Νὰ διαπιστώσετε, ὅτι αὐτὰ εἶναι ὅμοια.

### § 20. 2<sup>ο</sup> Κριτήριο ὁμοιότητας τριγώνων.

Κατασκευάστε ἓνα τρίγωνο ΑΒΓ με πλευρὲς ΑΒ=3 cm, ΑΓ=4 cm και ΒΓ=6 cm. Ἐπειτα νὰ κατασκευάσετε μιὰ γωνία Δ ἴση με τὴν Α και στὶς πλευρὲς τῆς νὰ πάρετε τμήματα ΔΕ=6 cm και ΔΖ=8 cm. Συγκρίνετε τὰ τρίγωνα ΑΒΓ και ΔΕΖ. Τί παρατηρεῖτε; (σχ. 32).

Χρησιμοποιώντας μοιρογνωμόνιο ἢ διαφανὲς χαρτί βρίσκουμε ὅτι  $\widehat{B} = \widehat{E}$  και  $\widehat{Z} = \widehat{\Gamma}$ . Ἄν μετρήσουμε τὴν ΕΖ, βρίσκουμε ὅτι εἶναι 12 cm. Ἐπειδὴ τὴν ὥρα εἶναι  $\frac{ΑΒ}{ΔΕ} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ ,  $\frac{ΑΓ}{ΔΖ} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$  και  $\frac{ΒΓ}{ΕΖ} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$ , ἔχουμε

$\frac{AB}{\Delta E} = \frac{A\Gamma}{\Delta Z} = \frac{B\Gamma}{E Z}$  και  $\widehat{A} = \widehat{\Delta}$ ,  $\widehat{B} = \widehat{E}$ ,  $\widehat{\Gamma} = \widehat{Z}$ . Συνεπώς, τὰ τρίγωνα  $AB\Gamma$  και  $\Delta EZ$  είναι ὁμοια. Τὰ τρίγωνα αὐτὰ κατασκευάστηκαν ἀπὸ τὴν

ἀρχὴ ἔτσι, ὥστε οἱ ἴσες γωνίες τους  $\widehat{A}$  καὶ  $\widehat{\Delta}$  νὰ περιέχονται μεταξύ τῶν ἀνάλογων πλευρῶν  $AB$ ,  $A\Gamma$  καὶ  $\Delta E$ ,  $\Delta Z$ . Ὡστε:

**Ἐάν δύο τρίγωνα ἔχουν δύο πλευρὲς ἀνάλογες καὶ τὶς γωνίες, ποὺ περιέχονται ἀπ' αὐτές, ἴσες, εἶναι ὁμοια.**


Αἰτιολογοῦμε τὸ ἀποτέλεσμα τῆς ἐργασίας μας ὡς ἑξῆς: Πάνω στὶς  $\Delta E$  καὶ  $\Delta Z$  παίρνουμε τμήματα  $\Delta H = AB$  καὶ  $\Delta \Theta = A\Gamma$ .

Ἐπειδὴ εἶναι  $\frac{AB}{\Delta E} = \frac{A\Gamma}{\Delta Z}$ , θὰ εἶναι καὶ  $\frac{\Delta H}{\Delta E} = \frac{\Delta \Theta}{\Delta Z}$ . Τότε ὁμως, ὅπως μάθαμε

στὴν § 16.2, θὰ εἶναι  $H\Theta // EZ$ , συνεπῶς τὸ τρίγωνο  $\Delta H\Theta$  εἶναι ὁμοιο μὲ τὸ  $\Delta EZ$ . Ἄλλὰ τὰ τρίγωνα  $\Delta H\Theta$  καὶ  $AB\Gamma$  εἶναι ἴσα, γιατί ἔχουν μία γωνία ἴση, ἡ ὁποία περιέχεται μεταξύ ἴσων πλευρῶν. Ἐπομένως τὰ τρίγωνα  $\Delta H\Theta$  καὶ  $AB\Gamma$  εἶναι ὁμοια. Ἄρα τὰ τρίγωνα  $AB\Gamma$  καὶ  $\Delta EZ$  εἶναι ὁμοια (γιατὶ εἶναι ὁμοια μὲ ἕνα τρίτο, τὸ  $\Delta H\Theta$ ). Ὡστε:

**Τρίγωνα, τὰ ὁποῖα ἔχουν δύο πλευρὲς ἀνά-**

**λογες καὶ τὶς γωνίες τῶν πλευρῶν αὐτῶν ἴσες, εἶναι ὁμοια.**



σχ. 32.

### Ἐφαρμογές.

1. Δύο ὀρθογώνια τρίγωνα, τὰ ὁποῖα ἔχουν τὶς κάθετες πλευρὲς τους ἀνάλογες, εἶναι ὁμοια, γιατί ἔχουν μία γωνία ἴση (τὴν ὀρθή), ἡ ὁποία περιέχεται μεταξύ ἀνάλογων πλευρῶν.


2. Σχηματίζουμε τὰ ἰσοσκελῆ τρίγωνα  $AB\Gamma$  καὶ  $A'B'\Gamma'$ , ὥστε οἱ γωνίες τῶν κορυφῶν τους νὰ εἶναι ἴσες,  $\widehat{A} = \widehat{A'}$  καὶ  $AB = A\Gamma$ ,  $A'B' = A'\Gamma'$  τότε  $\frac{AB}{A'B'} = \frac{A\Gamma}{A'\Gamma'}$ . Ἄπ' αὐτὰ συμπεραίνουμε ὅτι, ἂν δύο ἰσοσκελῆ τρίγωνα ἔχουν τὶς γωνίες τῶν κορυφῶν τους ἴσες, εἶναι ὁμοια.

### § 21. 3<sup>ο</sup> Κριτήριο ὁμοιότητας τριγῶνων.

Κατασκευάστε ἕνα τρίγωνο  $AB\Gamma$  μὲ πλευρὲς  $AB=4$  cm,  $B\Gamma=5$  cm καὶ  $\Gamma A=6$  cm καὶ ἕνα ἄλλο τρίγωνο  $\Delta EZ$  μὲ πλευρὲς  $\Delta E=8$  cm,  $E Z=10$  cm καὶ  $Z\Delta=12$  cm. Συγκρίνετε τώρα τὶς γωνίες τῶν τριγῶνων αὐτῶν.

Μὲ τὴ βοήθεια διαφανοῦς χαρτιοῦ ἢ μοιρογνωμονίου βρίσκουμε εὐκόλα ὅτι οἱ ὁμόλογες γωνίες τους εἶναι ἴσες. Τὰ τρίγωνα αὐτὰ ἀπὸ τὴν ἀρχὴ





σχ. 33.

με με τὰ ἴσα τους). Τότε ὁμοῦς τρίγ. ΔΗΘ ὁμοῖον με τρίγ. ΔΕΖ, συνεπῶς  $\frac{HΘ}{EZ} = \frac{ΔΘ}{ΔΖ}$

Θέτουμε ὅπου ΔΘ τὸ ἴσο του ΑΓ καὶ ἔχουμε  $\frac{HΘ}{EZ} = \frac{ΓΑ}{ΖΔ}$ . Ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ὁμοῦς εἶναι

$\frac{ΓΑ}{ΖΔ} = \frac{ΒΓ}{ΕΖ}$ , συνεπῶς  $\frac{ΒΓ}{ΕΖ} = \frac{HΘ}{ΕΖ}$ , ἄρα  $HΘ = ΒΓ$ . Τὰ τρίγωνα τώρα ΔΗΘ καὶ

ΑΒΓ εἶναι ἴσα, γιατί ἔχουν τὶς πλευρὲς τοὺς ἴσες μίᾳ πρὸς μίᾳ. Συνεπῶς εἶναι ὁμοῖα. Ἄρα τὰ τρίγωνα ΑΒΓ καὶ ΔΕΖ εἶναι ὁμοῖα (γιατί εἶναι ὁμοῖα με τὸ τρίγωνο ΔΗΘ). Ἐπομένως: Δύο τρίγωνα με τὶς (ὁμόλογες) πλευρὲς τοὺς ἀνάλογες εἶναι ὁμοῖα.

### Ἐφαρμογές.

Σχηματίστε ἓνα ὀρθογώνιο τρίγωνο καὶ κατασκευάστε ἓνα ἄλλο τρίγωνο με πλευρὲς ἀνάλογες πρὸς τὶς πλευρὲς τοῦ ὀρθογωνίου τριγώνου. Τί παρατηρεῖτε;

Παρατηροῦμε ὅτι τὸ δεύτερο τρίγωνο εἶναι ὁμοῖο με τὸ πρῶτο. Ἐπομένως οἱ ὁμόλογες γωνίες τοὺς εἶναι ἴσες. Συνεπῶς καὶ τὸ δεύτερο τρίγωνο εἶναι ὀρθογώνιο.

### Ἀσκήσεις

68) Νὰ κατασκευάσετε δύο ἰσοσκελῆ τρίγωνα ΑΒΓ καὶ ΑΔΕ ( $AB=AC$  καὶ  $AD=AE$ ), ὥστε  $\widehat{BAG} = \widehat{DAE}$  καὶ ἡ ΑΔ νὰ εἶναι ἐσωτερικὴ τῆς  $\widehat{BAG}$ . Νὰ συγκρίνετε τὰ τρίγωνα ΒΑΔ καὶ ΓΑΕ καὶ νὰ δικαιολογήσετε γιατί εἶναι ὁμοῖα.

69) Νὰ κατασκευάσετε δύο τρίγωνα ΑΒΓ καὶ Α'Β'Γ', ὥστε  $\widehat{A} = \widehat{A'}$  καὶ  $\frac{AB}{A'B'} = \frac{AG}{A'G'} = \frac{2}{3}$ .

Νὰ δικαιολογήσετε γιατί αὐτὰ εἶναι ὁμοῖα.

70) Νὰ σχηματίσετε ἓνα τρίγωνο καὶ νὰ ἐνώσετε τὰ μέσα τῶν πλευρῶν του. Νὰ συγκρίνετε τὰ τέσσερα τρίγωνα, πού σχηματίζονται, με τὸ ἀρχικό.

71) Νὰ κατασκευάσετε ἓνα τρίγωνο ΑΒΓ με πλευρὲς  $AB=2,5$  cm,  $BC=4,2$  cm καὶ

εἶχαν καὶ τὶς ὁμόλογες πλευρὲς τοὺς ἀνάλογες:  $\frac{AB}{ΔΕ} = \frac{ΒΓ}{ΕΖ} = \frac{ΓΑ}{ΖΔ}$ .

Ἀπ' αὐτὰ συμπεραίνουμε ὅτι τὰ τρίγωνα ΑΒΓ καὶ ΔΕΖ εἶναι ὁμοῖα ὥστε:

Ἄν δύο τρίγωνα ἔχουν τὶς (ὁμόλογες) πλευρὲς τοὺς ἀνάλογες, εἶναι ὁμοῖα.

Τὸ ἀποτέλεσμα αὐτὸ μπορούμε νὰ τὸ αἰτιολογήσουμε ὡς ἐξῆς (σχ. 33): Πάνω στὶς ΔΕ καὶ ΔΖ παίρνουμε τμήματα ΔΗ=ΑΒ καὶ ΔΘ=ΑΓ καὶ ἐπειδὴ ἀπὸ τὴν ἀρχὴ εἶναι  $\frac{AB}{ΔΕ} = \frac{ΒΓ}{ΕΖ} = \frac{ΓΑ}{ΖΔ}$ , θὰ εἶναι καὶ  $\frac{ΔΗ}{ΔΕ} = \frac{ΔΘ}{ΔΖ}$  (ἀντικαθιστοῦ-

$\Gamma\Lambda=3$  cm. και ένα άλλο  $A'B'\Gamma'$  με αντίστοιχες πλευρές διπλάσιες. Φέρετε τις διαμέσους  $AM$  και  $A'M'$  και αποδείξτε γιατί τὰ τρίγωνα  $ABM$  και  $A'B'M'$  είναι ὁμοια.

72) Νὰ κατασκευάσετε ένα ὀρθογώνιο τρίγωνο  $BA\Gamma$  και ένα ἄλλο με πλευρές τριπλάσιες ἀπὸ τὴς πλευρές τοῦ πρώτου. Δικαιολογήστε γιατί και αὐτὸ εἶναι ὀρθογώνιο.


73) Νὰ κατασκευάσετε δύο τρίγωνα ἔτσι, ὥστε τὸ ένα νὰ εἶναι ὀξυγώνιο και τὸ ἄλλο νὰ ἔχει πλευρές ἀντιστοίχως τριπλάσιες ἀπὸ τὴς πλευρές τοῦ πρώτου. Νὰ ἐξηγήσετε γιατί και τὸ δεύτερο τρίγωνο θὰ εἶναι ὀξυγώνιο.

74) Κατασκευάστε ένα ἀμβλυγώνιο τρίγωνο και ένα ἄλλο τρίγωνο με πλευρές διπλάσιες ἀπὸ τὴς πλευρές τοῦ πρώτου. Νὰ ἐξηγήσετε γιατί και τὸ δεύτερο τρίγωνο θὰ ἔχει μιὰ ἀμβλεία γωνία.

75) Νὰ κατασκευάσετε τὰ τρίγωνα  $AB\Gamma$  και  $\Delta EZ$  ἔτσι, ὥστε οἱ πλευρές τοῦ δευτέρου νὰ εἶναι τὸ  $\frac{1}{3}$  τῶν ἀντιστοίχων (ὁμόλογων) πλευρῶν τοῦ πρώτου. Νὰ φέρετε μετὰ τὴς διάμεσες  $AM$  και  $\Delta N$  και νὰ τὴς συγκρίνετε.

76) Νὰ κατασκευάσετε δύο ὀρθογώνια τρίγωνα με τὴς πλευρές τους ἀντιστοίχως παράλληλες και νὰ ἐξετάσετε ἂν εἶναι ὁμοια.

### Γ. ΟΜΟΙΑ ΠΟΛΥΓΩΝΑ



σχ. 34.

§ 22. Σχηματίσετε ένα πεντάγωνο  $AB\Gamma\Delta E$  και προεκτείnete τὴν  $AB$  μέχρι τὸ  $B'$ , ὥστε  $AB'=2AB$ .

Προεκτείnete με τὸν ἴδιο τρόπο τὴς διαγωνίους  $A\Gamma$  μέχρι τὸ  $\Gamma'$ ,  $A\Delta$  μέχρι τὸ  $\Delta'$  και τὴν πλευρὰ  $AE$  μέχρι τὸ  $E'$ . Συγκρίνετε τὴς ὁμόλογες (ἀντίστοιχες) γωνίες  $\widehat{A}, \widehat{A'}, \widehat{B}, \widehat{B'}, \widehat{\Gamma}, \widehat{\Gamma'}, \widehat{\Delta}, \widehat{\Delta'}, \widehat{E}, \widehat{E'}$  και τὴς ὁμόλογες πλευρές  $AB, AB', B\Gamma, B'\Gamma', \Gamma\Delta, \Gamma'\Delta', \Delta E, \Delta'E', EA, E'A$  τῶν πενταγώνων  $AB\Gamma\Delta E$  και  $AB'\Gamma'\Delta'E'$ . Τί παρατηρεῖτε; (σχ. 34).

Χρησιμοποιοῦμε μοιρογνωμόνιο ἢ διαφανὲς και βρίσκουμε, ὅτι οἱ ὁμόλογες γωνίες τῶν πενταγώνων αὐτῶν εἶναι ἴσες. Με τὸ διαβήτη ἢ τὸ ὑποδεκάμετρο διαπιστώνουμε ὅτι  $AB = \frac{1}{2} \cdot AB', B\Gamma = \frac{1}{2} \cdot B'\Gamma', \Gamma\Delta =$

$$= \frac{1}{2} \Gamma \Delta', \Delta E = \frac{1}{2} \Delta \Gamma' \text{ και } AE = \frac{1}{2} \cdot AE' \text{ ή } \frac{AB}{A'B'} = \frac{B\Gamma}{B'\Gamma'} = \frac{\Gamma\Delta}{\Gamma'\Delta'} = \frac{\Delta E}{\Delta'E'} = \frac{EA}{E'A'}$$

δηλαδή οι όμολογες πλευρές τους είναι ανάλογες.

Τὰ πεντάγωνα  $AB\Gamma\Delta E$  και  $AB'\Gamma'\Delta'E'$  λέγονται **ὅμοια**. Ὁ λόγος λ δύο ὁμόλογων πλευρῶν τῶν ὁμοίων αὐτῶν πενταγώνων λέγεται **λόγος ὁμοιότητας αὐτῶν**. (στὴν περίπτωσή μας  $\lambda = \frac{1}{2}$ ).

Γενικὰ λέμε ὅτι δύο πολύγωνα (μὲ τὸ ἴδιο πλῆθος κορυφῶν) εἶναι ὅμοια, ἂν ἔχουν τὶς ὁμόλογες γωνίες τους ἴσες και τὶς ὁμόλογες πλευρὲς τους ἀνάλογες.

Μποροῦμε νὰ ἐργαστοῦμε μὲ τὰ πεντάγωνα  $AB\Gamma\Delta E$  και  $AB'\Gamma'\Delta'E'$ , (σχ. 34) χωρὶς νὰ χρησιμοποιήσουμε γεωμετρικὰ ὄργανα.

Συγκρίνουμε τὰ τρίγωνα  $AB\Gamma$  και  $AB'\Gamma'$ . Αὐτὰ ἔχουν μὴ γωνία κοινὴ (τὴν  $A$ ), ἢ ὅποια περιέχεται μεταξύ τῶν ἀνάλογων πλευρῶν  $AB, A\Gamma$  και  $AB', A\Gamma'$ . Ἄρα:

$$\begin{array}{c} \widehat{B} = \widehat{B}' \\ \widehat{\Gamma}_1 = \widehat{\Gamma}' \end{array} \quad \text{και} \quad \frac{AB}{AB'} = \frac{B\Gamma}{B'\Gamma'} = \frac{A\Gamma}{A\Gamma'}$$

Μὲ ὅμοιο τρόπο διαπιστώνουμε ὅτι τὰ τρίγωνα  $A\Gamma\Delta$  και  $A\Gamma'\Delta'$  εἶναι ὅμοια. Ἐπομένως:

$$\widehat{\Gamma}_2 = \widehat{\Gamma}'_2, \widehat{\Delta}_1 = \widehat{\Delta}'_1 \text{ και } \frac{A\Gamma}{A\Gamma'} = \frac{\Gamma\Delta}{\Gamma'\Delta'} = \frac{A\Delta}{A\Delta'}$$

Ἄλλὰ και τὰ τρίγωνα  $A\Delta E$  και  $A\Delta'E'$  εἶναι ὅμοια (ἔχουν μὴ γωνία κοινὴ μεταξύ ἀνάλογων πλευρῶν), συνεπῶς:

$$\widehat{\Delta}_2 = \widehat{\Delta}'_2, \widehat{E} = \widehat{E}' \text{ και } \frac{A\Delta}{A\Delta'} = \frac{\Delta E}{\Delta'E'} = \frac{AE}{AE'}$$

Ἀπ' αὐτὰ συμπεραίνουμε ὅτι οἱ ὁμόλογες γωνίες τῶν πενταγώνων μας εἶναι ἴσες ἢ ἀπ' εὐθείας ( $\widehat{A} = \widehat{A}, \widehat{E} = \widehat{E}, \widehat{B} = \widehat{B}'$ ) ἢ σὰν ἀθροίσματα ἴσων γωνιῶν ( $\widehat{\Gamma} = \widehat{\Gamma}', \widehat{\Delta} = \widehat{\Delta}'$ ) και οἱ ὁμόλογες πλευρὲς τους εἶναι ἀνάλογες.

**Παρατήρηση 1.** Οἱ διαγώνιοι, ποὺ ἐνώνουν δύο ὁμόλογες κορυφές, λέγονται ὁμόλογες διαγώνιοι. Στὰ ὅμοια πεντάγωνα τοῦ σχήματος 34 δύο διαγώνιοι τοῦ ἐνὸς εἶναι ἀνάλογες πρὸς τὶς ὁμόλογες διαγωνίους τοῦ ἄλλου π.χ. οἱ  $A\Gamma, A\Delta$  εἶναι ἀνάλογες πρὸς τὶς  $A\Gamma', A\Delta'$ .

**Οἱ ὁμόλογες διαγώνιοι δύο ὁμοίων πολυγώνων εἶναι ἀνάλογες.**

**Παρατήρηση 2.** Στὸ σχ. 34 παρατηροῦμε ὅτι τὰ τρίγωνα  $AB'\Gamma', A\Gamma'\Delta', A\Delta'E'$  ἔχουν τὴν ἴδια διάταξη μὲ τὰ ἀντιστοιχῶς ὁμοιά τους  $AB\Gamma, A\Gamma\Delta, A\Delta E$ .

Ἐπομένως: **Δύο ὅμοια πολύγωνα χωρίζονται σὲ τρίγωνα ὅμοια ἕνα πρὸς ἕνα και ὁμοίως διατεταγμένα.**


**Παρατήρηση 3.** Στὴν ἀρχὴ τῆς ἐργασίας μας κατασκευάσαμε πρῶτα τὰ πεντάγωνα ἔτσι, ὥστε νὰ χωρίζονται σὲ τρίγωνα κατὰ τὸν παραπάνω τρόπο και ἀπ' αὐτὸ καταλήξαμε στὸ συμπέρασμα ὅτι εἶναι ὅμοια.

Ἐπομένως: **Ἄν δύο πολύγωνα χωρίζονται σὲ τρίγωνα ὅμοια ἕνα πρὸς ἕνα και ὁμοίως διατεταγμένα, εἶναι ὅμοια.**

Στὰ ἴδια συμπεράσματα καταλήγουμε καὶ ὅταν τὰ πολύγωνα βρίσκονται σὲ διαφορετικὲς θέσεις, γιατί μπορούμε νὰ θέσουμε τὸ ἓνα πάνω στὸ ἄλλο, ὅπως στὸ σχ. 34, χρησιμοποιώντας διαφανὲς ἢ κατασκευάζοντας ἓνα πολύγωνο ἴσο μὲ τὸ ἓνα.

### § 23. Ἐφαρμογές.

1. Δύο ρόμβοι  $AB\Gamma\Delta$  καὶ  $A'B'\Gamma'\Delta'$  μὲ μία γωνία ἴση εἶναι ὅμοιοι (σχ. 35).



σχ. 35.

Ἐὰν  $\widehat{A} = \widehat{A}'$  τότε καὶ  $\widehat{\Gamma} = \widehat{\Gamma}'$ .

Ἐπειδὴ καὶ  $\widehat{B} = \widehat{B}'$  καὶ  $\widehat{\Delta} = \widehat{\Delta}'$  (εἶναι ἴσες μὲ ἴσες ἢ παραπληρωματικὲς ἴσων). Ἐπειδὴ εἶναι  $AB = B\Gamma = \Gamma\Delta = \Delta A$  καὶ  $A'B' = B'\Gamma' = \Gamma'\Delta' = \Delta'A'$ , θὰ εἶναι καὶ  $\frac{AB}{A'B'} = \frac{B\Gamma}{B'\Gamma'} = \frac{\Gamma\Delta}{\Gamma'\Delta'} = \frac{\Delta A}{\Delta'A'}$ .

2. Ὁ λόγος τῶν περιμέτρων δύο ὁμοίων πολυγώνων ἰσοῦται μὲ τὸ λόγο τῆς ὁμοιότητάς των.

Ἐὰν  $\lambda$  εἶναι ὁ λόγος τῆς ὁμοιότητάς των πενταγώνων τοῦ σχήματος (34),

$$\theta\acute{\alpha} \text{ ἔχουμε } \lambda = \frac{AB}{A'B'} = \frac{B\Gamma}{B'\Gamma'} = \frac{\Gamma\Delta}{\Gamma'\Delta'} = \frac{\Delta E}{\Delta'E'} = \frac{EA}{E'A'}$$

συνεπῶς:

$$\lambda = \frac{AB + B\Gamma + \Gamma\Delta + \Delta E + EA}{A'B' + B'\Gamma' + \Gamma'\Delta' + \Delta'E' + E'A'} \quad (\text{ἰδιωτ. τῶν ἀναλογιῶν § 14}).$$

3. Σχεδιάζουμε δύο ἄνισους κύκλους καὶ ἐγγράφουμε σ' αὐτοὺς τὰ κανονικὰ ἑξάγωνα  $AB\Gamma\Delta E Z$  καὶ  $A'B'\Gamma'\Delta'E'Z'$  ἀντιστοίχως. Παρατηροῦμε ὅτι:  $\widehat{A} = \widehat{A}'$ ,  $\widehat{B} = \widehat{B}'$ ,  $\widehat{\Gamma} = \widehat{\Gamma}'$ ,  $\widehat{\Delta} = \widehat{\Delta}'$ ,  $\widehat{E} = \widehat{E}'$ ,  $\widehat{Z} = \widehat{Z}'$  (κάθε μία ἀπ' αὐτὲς εἶναι  $120^\circ$ ) καὶ  $\frac{AB}{A'B'} = \frac{B\Gamma}{B'\Gamma'} = \frac{\Gamma\Delta}{\Gamma'\Delta'} = \frac{\Delta E}{\Delta'E'} = \frac{EZ}{E'Z'} = \frac{ZA}{Z'A'}$  γιατί οἱ λόγοι αὐτοὶ ἔχουν ἴσους ὄρους.

Ἐπομένως: (§ 22).

**Δύο κανονικὰ πολύγωνα μὲ τὸ ἴδιο πλῆθος πλευρῶν εἶναι ὅμοια.**

### Ἐσκήσεις

- 77) Νὰ ἐξετάσετε ἂν δύο τετράγωνα εἶναι ὅμοια.
- 78) Δύο ὀρθογώνια παραλληλόγραμμα ἔχουν διαστάσεις 3 cm, 4 cm καὶ 6 cm, 8 cm ἀντιστοίχως. Εἶναι ὅμοια; Γιατί;
- 79) Ἐξηγήστε γιατί δύο ρόμβοι μὲ ἀνάλογες διαγωνίους εἶναι ὅμοιοι.
- 80) Νὰ κατασκευάσετε δύο ὀρθογώνια ἔτσι, ὥστε οἱ διαγωνιοὶ καθενὸς νὰ σχη-

ματίζουν γωνία  $30^\circ$  και η διαγώνιος του ενός να είναι τριπλάσια από μία διαγώνιο του άλλου. Ξηγηήστε γιατί είναι όμοια.


81) Ξηγηήστε γιατί δύο παραλληλόγραμμα με πλευρές ανάλογες και μία γωνία ίση είναι όμοια.

82) Νά σχηματίσετε ένα τρίγωνο και σε κάθε μία από τις διαμέσους του να πάρετε ένα σημείο, το οποίο να απέχει από την αντίστοιχη κορυφή το  $\frac{1}{3}$  της διαμέσου. Ξηγηήστε γιατί τα σημεία αυτά είναι κορυφές τριγώνου όμοιου με το αρχικό.

## Δ'. ΑΠΑΕΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

### § 24. Κατασκευή τετάρτης ανάλογου.

Πάρτε τρία εθύγραμμα τμήματα  $a=3$  cm,  $b=4$  cm,  $\gamma=6$  cm και βρείτε ένα τέταρτο εθύγραμμο τμήμα  $\chi$ , ώστε να είναι  $\frac{a}{b} = \frac{\gamma}{\chi}$ , δηλαδή τα  $a, b, \gamma, \chi$  να αποτελούν αναλογία. Το  $\chi$  λέγεται τετάρτη ανάλογος των  $a, b, \gamma$ .




Αν πάνω στη μία πλευρά μιās γωνίας  $O$  πάρουμε  $OA=3$  cm,  $AB=4$  cm και στην άλλη πλευρά τμήμα  $OG=6$  cm και φέρουμε από το  $B$  παράλληλο προς την  $AG$ , αυτή τέμνει την ευθεία  $OG$  στο  $\Delta$ . Μετρώντας βρίσκουμε ότι  $\Gamma\Delta=8$  cm, συνεπώς ή  $\Gamma\Delta$  έπαληθεύει την αναλογία  $\frac{a}{b} = \frac{\gamma}{\chi}$  και είναι ή τετάρτη ανάλογος των  $a, b, \gamma$ , την οποία ζητούμε.

Αν φέρουμε από το  $O$  την  $O\psi \parallel AG$ , βλέπουμε ότι το αποτέλεσμα αυτό δικαιολογείται από το θεώρημα του Θαλή: Παράλληλες ευθείες ορίζουν πάνω σε δύο ευθείες, τις οποίες τέμνουν (δηλαδή τις πλευρές της γωνίας  $O$ ), ανάλογα εθύγραμμα τμήματα.

**Σημείωση:** Αν με  $a, b, \gamma$ , ονομάσουμε τις τιμές των τριών τμημάτων και με  $\chi$  την τιμή της τετάρτης ανάλογου τους, θα έχουμε  $\frac{a}{b} = \frac{\gamma}{\chi} \Leftrightarrow a \cdot \chi = b \cdot \gamma$ . Η εργασία, που κάναμε παραπάνω, αποτελεί γεωμετρική επίλυση της εξίσωσης αυτής.

§ 25. Πάρτε τα εθ. τμήματα  $a=2$  cm και  $b=8$  cm. Νά βρείτε ένα εθύγραμμο τμήμα  $\chi$ , ώστε  $\frac{a}{b} = \frac{\chi}{\beta}$ . Το  $\chi$  λέγεται μέση ανάλογος των  $a$  και  $b$ . Αν πάρουμε τις τιμές τους, θα έχουμε  $\frac{(a)}{(b)} = \frac{(x)}{(\beta)} \Leftrightarrow (x)^2 = (a) \cdot (\beta)$ .

Παίρνουμε πάνω σε μία ευθεία τα διαδοχικά τμήματα  $AB$  και  $B\Gamma$  ίσα με 2 cm και 8 cm αντίστοιχως. Με διάμετρο την  $AG$  γράφουμε ημικύκλιο. Στο  $B$  ύψώνουμε κάθετο




σχ. 37.

είναι έγγεγραμμένη σε ήμικύκλιο, και ΔΒ τὸ ὕψος πού ἀντιστοιχεί στήν ὑποτείνουσα). Ἐπομένως  $\frac{(AB)}{(BD)} = \frac{(BD)}{(BG)}$  και  $(BD)^2 = (AB) \cdot (BG)$ .

§ 26. Οἱ ἀποστάσεις τεσσάρων πόλεων Α, Β, Γ, Δ ἀπό ἕνα σημεῖο εἶναι 40 km, 60 km, 50 km και 45 km ἀντιστοίχως. Νά σχεδιάσετε χάρτη τῆς περιοχῆς αὐτῆς με κλίμακα 1/1.000.000.


Αὐτό σημαίνει ὅτι πρέπει νά κατασκευάσουμε σχήματα ὅμοια με τὰ σχήματα τοῦ ἐδάφους με λόγο ὁμοιότητας 1/1000.000. Για νά γίνει αὐτό, μετροῦμε (με σκόπευση ἀπό τὸ σημεῖο Ο τοῦ ἐδάφους) τίς γωνίες  $\widehat{AOB}$ ,  $\widehat{BOG}$ ,  $\widehat{GOA}$ ,  $\widehat{DOA}$  με ἕνα ὄργανο, πού λέγεται γωνιόμετρο, και τίς σχεδιάζουμε στο χαρτί μας. Πάνω στήν πλευρά ΟΑ παίρνουμε τμήμα ΟΕ = 4 cm, στήν ΟΒ τμήμα ΟΖ = 6 cm, στήν ΟΓ τμήμα ΟΗ = 5 cm και στήν ΟΔ τμήμα ΟΘ = 4,5 cm. Τὰ σημεῖα Ο, Ε, Ζ, Η, Θ ἀποτελοῦν τὸ χάρτη τῆς περιοχῆς Ο, Α, Β, Γ, Δ. Πραγματικά τὸ τρίγωνο ΟΘΕ εἶναι ὅμοιο με τὸ ΟΔΑ (ἔχουν δύο γωνίες ἴσες μεταξύ ἀνάλογων πλευρῶν) και ὁ λόγος ὁμοιότητας λ εἶναι ἴσος με  $\frac{OE}{OA} = \frac{4 \text{ cm}}{4000000 \text{ cm}} = \frac{1}{1000000}$



σχ. 39.

στήν ΑΓ, ή ὁποία τέμνει τὸ ήμικύκλιο στο σημεῖο Δ. Με μέτρηση βρίσκουμε ὅτι ΒΔ = 4cm. Τότε ὁμως  $4^2 = 2 \cdot 8$ , δηλαδή  $(BD)^2 = (AB) \cdot (AG)$ . Ὡστε τὸ εὐθύγραμμο τμήμα ΒΔ εἶναι ή ζητούμενη μέση ἀνάλογος.

Τὸ ἀποτέλεσμα αὐτὸ δὲν εἶναι τυχαῖο, γιατί ὅπως μάθαμε στήν § 19.3 τὰ ὀρθογώνια τρίγωνα ΔΒΑ και ΓΒΔ εἶναι ὅμοια (τὸ τρίγ. ΑΔΓ εἶναι ὀρθογώνιο, γιατί  $\widehat{ADG} = 1$  ὀρθή ἐπειδή



σχ. 38.

§ 27. Σχηματίστε ἕνα τρίγωνο ΑΒΓ. Μετά νά κατασκευάσετε ἕνα ἄλλο τρίγωνο ὅμοιο με αὐτό, τὸ ὁποῖο νά ἔχει ἕνα ὕψος ἴσο με 6 cm.

Φέρνουμε τὸ ὕψος ΑΔ τοῦ τριγώνου ΑΒΓ και παίρνουμε σ' αὐτὸ τμήμα ΑΕ ἴσο με 6 cm. Ἀπὸ τὸ Ε φέρνουμε παράλληλο πρὸς τὴ ΒΓ, ή ὁποία τέμνει τίς ΑΒ και ΑΓ στα Ζ και Η ἀντιστοίχως. Συγκρίνουμε τὰ τρίγωνα ΑΖΗ και ΑΒΓ. Αὐτὰ εἶναι ὅμοια σύμφωνα με ὅσα

μάθαμε. Τὸ  $AZH$  ἔχει ὕψος  $AE = 6$  cm, γιατί ἐφόσον ἡ  $AE$  εἶναι κάθετος στὴ  $BΓ$ , θὰ εἶναι κάθετος καὶ στὴν παράλληλό της  $ZH$ . Ὡστε τὸ  $AZH$  εἶναι τὸ ζητούμενο τρίγωνο.

### Ἀσκήσεις

83) Κατασκευάστε τὴν τετάρτη ἀνάλογο τῶν πλευρῶν  $\alpha, \beta, \gamma$ , ἐνὸς τριγώνου  $ABΓ$ .

84) Κατασκευάστε τὴν τετάρτη ἀνάλογο τῶν ὑψῶν  $AD, BE, ΓZ$  τοῦ προηγούμενου τριγώνου.

85) Σχηματίστε ἓνα τρίγωνο  $ABΓ$  καὶ κατασκευάστε ἓνα ἄλλο ὁμοιο μὲ αὐτό, τοῦ ὁποίου τὸ ὁμόλογο ὕψος πρὸς τὸ ὕψος  $BE$  τοῦ τριγώνου  $ABΓ$  νὰ εἶναι 4 cm.

86) Βόρεια, ἀνατολικά καὶ βορειοδυτικά τοῦ Γυμνασίου σας  $Γ$  βρίσκονται τὰ σημεῖα  $A, B$  καὶ  $\Delta$  ἀντιστοίχως, τὰ ὁποία ἀπέχουν ἀπὸ τὸ  $Γ$  4,7km, 6,5 km, καὶ 7,3 km. Κατασκευάστε χάρτη τῆς περιοχῆς (κλίμακα 1:1.000.000).



## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ


### ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

#### Α. ΕΜΒΑΔΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

##### 1. Όρισμοί:

§ 28. Ονομάζουμε επιφάνεια ενός επιπέδου σχήματος (άπλης κλειστής γραμμής) τὸ μέρος τοῦ επιπέδου, τὸ ὁποῖο εἶναι ἔσωτερικό του.

Ἐπιφάνειες ἐπιπέδων σχημάτων μπορούμε νὰ παρατηρήσουμε στὸ σχῆμα (40). Ἡ εἰκόνα αὐτὴ παριστάνει δύο ἐπιφάνειες ἐπιπέδων σχημάτων  $E_1$  καὶ  $E_2$ . Ἄθροισμα τῶν ἐπιφανειῶν  $E_1$  καὶ  $E_2$  ὀνομάζουμε τὴν ἐπιφάνεια τοῦ σχήματος, τὸ ὁποῖο παίρνουμε, ἂν διαγράψουμε (σβήσουμε) τὴν κοινὴ γραμμή.



σχ. 40.

Ἐμβαδὸ ἐπιφάνειας καλοῦμε τὴν ἔκτασή της, ἢ ὁποῖα ἔχει ἔκφρασεῖ σὲ μονάδες μετρήσεως, καὶ τὸ συμβολίζουμε μὲ τὸ  $E$ .

Θέτουμε τώρα τὸ ἐξῆς πρόβλημα: Πῶς μπορούμε νὰ προσδιορίσουμε τὴν ἔκταση (δηλ. τὸ ἔμβαδὸ) τῆς ἐπιφάνειας τοῦ σχήματος (40) ἢ τῆς ἐπιφάνειας κάθε ἐπιπέδου σχήματος;

Αὐτὸ μπορούμε νὰ τὸ πετύχουμε συγκρίνοντας τὴν ἐπιφάνεια τοῦ σχήματος μὲ τὴν ἐπιφάνεια ἑνὸς ὀρισμένου ἐπιπέδου σχήματος, τὴν ὁποῖα παίρνουμε ὡς μονάδα. Τὸ ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς συγκρίσεως εἶναι ἕνας ἀριθμὸς, ὁ ὁποῖος καλεῖται **τιμὴ τοῦ ἐμβαδοῦ** τῆς ἐπιφάνειας. (Τὴν **τιμὴ** τοῦ ἐμβαδοῦ τοῦ  $ΑΒΓΔ$  τὴ συμβολίζουμε μὲ  $(ΑΒΓΔ)$ ).

Ἡ εὕρεση **τῆς τιμῆς** τοῦ ἐμβαδοῦ μιᾶς ἐπιφάνειας λέγεται **μέτρηση** αὐτῆς. Ἡ τιμὴ λοιπὸν τοῦ ἐμβαδοῦ εἶναι ἕνας ἀριθμὸς, μὲ τὸν ὁποῖο πρέπει νὰ πολλαπλασιάσουμε τὴ μονάδα, γιὰ νὰ πάρουμε τὸ ἔμβαδὸ (δηλ. ὁ λόγος τοῦ ἐμβαδοῦ πρὸς τὴ μονάδα).

##### § 29. Μονάδες μετρήσεως ἐπιφανειῶν

Οἱ μονάδες ἐπιφανειῶν εἶναι ἐπιφάνειες τετραγώνων, τῶν ὁποίων ἡ πλευρὰ ἴσούται μὲ μιὰ μονάδα μήκους.

Ἡ κυριότερη μονάδα γιὰ τὴ μέτρηση ἐπιφανειῶν εἶναι:



Το τετραγωνικό μέτρο ( $m^2$ ), δηλαδή το έμβαδο τῆς ἐπιφάνειας ἑνὸς τετραγώνου μὲ πλευρὰ 1 m.

Τὰ πολλαπλάσιά του εἶναι:

1. Τὸ τετραγωνικὸ δεκάμετρο ( $dam^2$ ), ἔμβαδο ἑνὸς τετραγώνου μὲ πλευρὰ 1 δεκάμετρο (dam)
2. Τὸ τετραγωνικὸ ἑκατόμετρο ( $hm^2$ ), ἔμβαδο ἑνὸς τετραγώνου μὲ πλευρὰ 1 ἑκατόμετρο (hm)
3. Τὸ τετραγωνικὸ χιλιόμετρο ( $km^2$ ), ἔμβαδο ἑνὸς τετραγώνου μὲ πλευρὰ 1 χιλιόμετρο (km)

Οἱ ὑποδιαιρέσεις του εἶναι :


1. Τὸ τετραγωνικὸ δεκατόμετρο ( $dm^2$ ), ἔμβαδο ἑνὸς τετραγώνου μὲ πλευρὰ 1 δεκατόμετρο (dm).
2. Τὸ τετραγωνικὸ ἑκατοστόμετρο ( $cm^2$ ), ἔμβαδο ἑνὸς τετραγώνου μὲ πλευρὰ 1 ἑκατοστόμετρο (cm).
3. Τὸ τετραγωνικὸ χιλιοστόμετρο ( $mm^2$ ), ἔμβαδο ἑνὸς τετραγώνου μὲ πλευρὰ 1 χιλιοστόμετρο (mm).

**Κατασκευὴ ὀρισμένων μονάδων ἐπιφανειῶν.**

1. Κατασκευάζουμε πάνω σ' ἓνα φύλλο χιλιοστομετρικοῦ χαρτιοῦ ἓνα τετράγωνο  $AB\Gamma\Delta$  μὲ πλευρὰ 1 dm καὶ ὀρίζουμε ἔτσι ἓνα τετραγωνικὸ δεκατόμετρο ( $dm^2$ ).

2. Στὸ ἐσωτερικὸ τῆς γωνίας A τοῦ τετραγώνου  $AB\Gamma\Delta$  κατασκευάζουμε τὸ τετράγωνο  $AB'\Gamma'\Delta'$ , μὲ πλευρὰ 1 cm, δηλαδή ἓνα τετραγωνικὸ ἑκατοστόμετρο ( $cm^2$ ).

3. Ἐπίσης μέσα στὸ τετράγωνο  $AB'\Gamma'\Delta'$  ὑπάρχουν μικρότερα τετράγωνα, μὲ πλευρὰ 1mm, καθένα ἀπ' αὐτὰ εἶναι μιὰ ὑποδιαίρεση τῆς ἀρχικῆς μονάδας ἐπιφάνειας. Καθένα τους τὸ ὀνομάσαμε τετραγωνικὸ χιλιοστόμετρο ( $mm^2$ ).



σχ. 41.

Μπορούμε έτσι να βρούμε π.χ. πόσα τετράγωνα ίσα με το  $AB\Gamma\Delta'$  περιέχει το  $AB\Gamma\Delta$  και πόσα τετραγωνικά χιλιοστόμετρα υπάρχουν στο έσωτερικό του τετραγώνου  $AB\Gamma\Delta'$  και να ορίσουμε τη σχέση, που υπάρχει μεταξύ των αντίστοιχων μονάδων επιφανειών.

**Σύγκριση μονάδων επιφανειών:** Συγκρίνοντας την επιφάνεια του τετραγώνου  $AB\Gamma\Delta$  με την επιφάνεια του  $AB\Gamma\Delta'$ , το οποίο έχει πλευρά το  $\frac{1}{10}$  της πλευράς του πρώτου, βρίσκουμε ότι το τετράγωνο  $AB\Gamma\Delta$  περιέχει δέκα ταινίες. Κάθε μία από τις ταινίες αυτές περιέχει 10 τετράγωνα ίσα με το  $AB\Gamma\Delta'$ .

Ώστε:  $AB\Gamma\Delta = 100 \cdot AB\Gamma\Delta'$ .

Συνεχίζοντας με όμοιο τρόπο και με τις άλλες υποδιαιρέσεις της αρχικής μονάδας συμπεραίνουμε γενικά ότι: «Κάθε μονάδα επιφάνειας αποτελείται από 100 μονάδες επιφάνειας της άμέσως κατώτερης τάξης» (1)  
 Δηλαδή:  $1\text{m}^2 = 100\text{dm}^2 = 10.000\text{cm}^2 = 1.000.000\text{mm}^2$

$$1\text{dm}^2 = 100\text{cm}^2 = 10.000\text{mm}^2$$

$$1\text{cm}^2 = 100\text{mm}^2$$

Ἡ ιδιότητα (1) μᾶς ὁδηγεῖ καὶ στοὺς ἀκόλουθους κανόνες:

1) Γιὰ νὰ τρέψουμε ἓνα συμμιγῆ σὲ ἀπλὸ (τῆς τελευταίας τάξης), ὁ ὁποῖος ἐκφράζει ἓνα ἔμβαδό, παριστάνουμε κάθε ἀριθμὸ τοῦ συμμιγῆ σὰν διψήφιο (ἂν δὲν εἶναι) ἀναπληρώνοντας μὲ μηδενικά κάθε μονάδα ποῦ λείπει.

$$\text{Π.χ. } \alpha) 8\text{hm}^2 2\text{dm}^2 7\text{m}^2 = 08\text{hm}^2 02\text{dm}^2 07\text{m}^2 = 80207\text{m}^2$$

$$\beta) 9\text{m}^2 18\text{cm}^2 = 90018\text{cm}^2$$

2) Μποροῦμε νὰ μεταβάλουμε τὴ μονάδα ἐπιφάνειας μεταθέτοντας τὴν ὑποδιαστολὴ κατὰ 2, κατὰ 4, κ.ο.κ. θέσεις πρὸς τὰ δεξιά, ἂν θέλουμε νὰ πᾶμε ἀπὸ μιὰ μονάδα στὴν ἀμέσως κατώτερη μονάδα ἐπιφάνειας, ἢ πρὸς τὰ ἀριστερά, γιὰ νὰ πᾶμε ἀπὸ μιὰ μονάδα ἔμβαδοῦ στὴν μονάδα τῆς ἀμέσως ἀνώτερης τάξης. (Ἀναπληρώνουμε μὲ μηδενικά τὰ ψηφία ποῦ λείπουν ἀπὸ μονάδα μιᾶς ὀρισμένης τάξης).

$$\text{Π.χ. } \alpha) 832, 18\text{m}^2 = 8,3218\text{dam}^2 = 83218\text{dm}^2 = 8321800\text{cm}^2.$$

#### Παρατήρηση:

Γιὰ τὴ μέτρηση τῆς ἐπιφάνειας τῶν ἀγρῶν χρησιμοποιοῦν ἄλλοῦ:


1) Τὸ τετραγωνικὸ δεκάμετρο ( $\text{dam}^2$ ) =  $100\text{m}^2$ , τὸ ὁποῖο ὀνομάζουν ἄρ (a) καὶ 2) τὸ τετραγωνικὸ ἑκατόμετρο ( $\text{hm}^2$ ) =  $100\text{dam}^2 = 10.000\text{m}^2$ , τὸ ὁποῖο λέγεται ἑκτάριο (ha) καὶ ἰσοῦται μὲ  $100\text{ἄρ} = 100\text{a}$ . Στὴ χώρα μας χρησιμοποιεῖται τὸ στρέμμα =  $1000\text{m}^2 = \frac{1}{10}\text{ha}$ . Γιὰ τὴ μέτρηση τοῦ ἔμβαδοῦ τῶν οἰκοπέδων χρησιμοποιοῦμε ἀκόμη καὶ τὸν τετραγωνικὸ τεκτονικὸ πήχη,  $1\text{π}^2 = \frac{9}{16}\text{m}^2 = 0,5625\text{m}^2$ .

Τέλος γιὰ τὴ μέτρηση μεγάλων ἐπιφανειῶν χρησιμοποιοῦμε τὸ τετραγωνικὸ χιλιόμετρο ( $1\text{km}^2$ ) =  $1.000.000\text{m}^2$ .


### § 30. Ἴσοδύναμες ἐπιφάνειες.— Ἴσοδύναμα σχήματα.

Οἱ ἐπιφάνειες τῶν ἴσων σχημάτων εἶναι ἴσες.



Δύο ἴσες ἐπιφάνειες (ὅταν μετροῦνται μὲ τὴν ἴδια μονάδα) ἔχουν τὸ ἴδιο ἔμβαδό. Π.χ. οἱ ἐπιφάνειες τοῦ σχήματος 42α, ποῦ εἶναι ἴσες καὶ κάθε μιὰ ἔχει ἔμβαδό  $4\text{cm}^2$ .



α





σχ. 42.



β

Οι επιφάνειες στο σχήμα 42β δὲν εἶναι ἴσες, ἔχουν ὅμως ἔμβαδὸ ἴσο μὲ  $5\text{cm}^2$ . Αὐτὲς λέγονται **ισοδύναμες ἢ ἰσεμβαδικές** ἐπιφάνειες.



σχ. 43.

Τὰ ἐπίπεδα σχήματα  $ΑΒΓΔ$  καὶ  $Ε'Ζ'Θ'$  (σχ. 43) ἔχουν ἰσοδύναμες ἐπιφάνειες. Αὐτὸ μπορούμε νὰ τὸ διαπιστώσουμε μὲ κατάλληλη διαίρεσή τους. Τὰ παραπάνω σχήματα

λέγονται **ισοδύναμα** σχήματα.

**Ἴσοδύναμες ἐπιφάνειες εἶναι αὐτὲς ποὺ ἔχουν ἴσα ἔμβαδά.**

**Ἴσοδύναμα σχήματα εἶναι αὐτὰ ποὺ ἔχουν ἰσοδύναμες ἐπιφάνειες.**

**Παρατήρηση:** Δύο ἴσα ἔμβαδὰ ἔχουν ἴσες τιμὲς καὶ ἑντιστρόφως.

$$\text{'Ἐμβ. } ΑΒΓΔ = \text{'Ἐμβ. } Α'Β'Γ'Δ' \Leftrightarrow (ΑΒΓΔ) = (Α'Β'Γ'Δ')$$


### Ἐσκήσεις

- 87) Νὰ τραποῦν σὲ  $\text{m}^2$  τὰ:  $13 \text{ dam}^2$ ,  $1 \text{ hm}^2$ ,  $2 \text{ km}^2$ ,  $18 \text{ dam}^2$ ,  $58 \text{ hm}^2$ .  
 88) Πόσα  $\text{mm}^2$  ἔχουν α)  $3 \text{ m}^2$ , β)  $4 \text{ dam}^2$ , γ)  $38 \text{ cm}^2$ .  
 89) Ἐκφράστε σὲ  $\text{m}^2$  καὶ κατόπι σὲ ares α)  $\frac{1}{10} \text{ hm}^2$ , β)  $\frac{1}{10} \text{ km}^2$ .  
 90) Νὰ τραποῦν σὲ  $\text{m}^2$  τὰ ἔμβαδὰ α)  $5 \text{ hm}^2$ ,  $6 \text{ dam}^2$ ,  $8 \text{ mm}^2$  καὶ β)  $156,25 \text{ dm}^2$ .  
 91) Μετατρέψτε σὲ  $\text{cm}^2$  α)  $672 \text{ dm}^2$ , β)  $3,84 \text{ hm}^2$  γ)  $29 \text{ dam}^2$ .  
 92) Ἐκτελέσετε τὴν πρόσθεση, ἀφοῦ πρηγουμένως μετατρέψτε τοὺς προσθετοὺς σὲ  $\text{cm}^2$ :  $\frac{2}{5} \text{ m}^2 + 560000 \text{ mm}^2 + 152 \text{ cm}^2 + 16 \text{ dm}^2$ .  
 93) Ὑπολογίστε σὲ  $\text{m}^2$  τὴς διαφορὲς: α)  $8 \text{ στρεμ.} - 243 \text{ m}^2$  καὶ β)  $4 \text{ ha} - 136,25 \text{ a}$ .  
 94) Ἐνα γήπεδο μὲ ἔμβαδὸ  $6 \text{ ha}$  ἔχει διαιρεθεῖ σὲ δύο μέρη, ἀπὸ τὰ ὁποῖα τὸ ἓνα εἶναι μεγαλύτερο ἀπὸ τὸ ἄλλο κατὰ  $40 \text{ a}$ . Νὰ βρεῖτε πόσο εἶναι τὸ ἔμβαδὸ κάθε μέρους τοῦ γηπέδου.

### § 31. Ἐμβαδὸ ὀρθογωνίου.

**Ὄρθογώνιο** εἶναι ἓνα παραλληλόγραμμο, τὸ ὁποῖο ἔχει μιὰ γωνία ὀρθή.

$$ΑΒΓΔ \text{ ὀρθογώνιο} \Leftrightarrow \begin{cases} ΑΒΓΔ \text{ παραλληλόγραμμο} \\ \widehat{Α} = 1 \text{ ὀρθή} \end{cases}$$



σχ. 44.


(ἢ διαφορετικὰ: Ὄρθογώνιο εἶναι τὸ τετράπλευρο, τὸ ὁποῖο ἔχει τὴς γωνίες τοῦ ὀρθῆς).

Ξέρουμε ἀπὸ τὰ προηγούμενα ὅτι οἱ ἀπέναντι πλευρὲς τοῦ ὀρθογωνίου εἶναι ἴσες, δηλαδή  $ΑΒ = ΔΓ$  καὶ  $ΑΔ = ΒΓ$ .

Τὰ μήκη τῶν πλευρῶν  $ΑΒ = α$  καὶ  $ΑΔ =$

$=\beta$  λέγονται **διαστάσεις** τοῦ ὀρθογωνίου. Τὸ πρῶτο λέγεται **βάση** ἢ **μῆκος** καὶ τὸ δεύτερο **ὑψος** ἢ **πλάτος** τοῦ ὀρθογωνίου.

Κατασκευάστε σὲ μία γωνία ἐνὸς φύλλον χιλιοστομετρικοῦ χαρτιοῦ (ἢ τετραγωνισμένον χαρτιοῦ) ἓνα ὀρθογώνιο  $AB\Gamma\Delta$  μὲ  $AB=6\text{ cm}$  καὶ  $AD=4\text{ cm}$  καὶ βρεῖτε τὸ ἐμβαδό του.



σχ. 45.

$$=12\text{ cm}^2 = \frac{12}{100}\text{ dm}^2 = \left(\frac{4}{10} \cdot \frac{3}{10}\right)\text{ dm}^2 = \frac{4}{10}\text{ dm} \cdot \frac{3}{10}\text{ dm} \text{ ἴσο μὲ τὸ γινόμενο τῶν διαστάσεών του.}$$

Ἄν πάνω στὸ χιλιοστομετρικὸ χαρτὶ κατασκευάσουμε ἓνα ὀρθογώνιο  $\Delta EZ\Theta$  μὲ  $\Delta E=6,5\text{ cm}$  καὶ  $\Delta\Theta=3,4\text{ cm}$ , μποροῦμε νὰ βροῦμε τὸ ἐμβαδό του σὲ ἀκέραιο ἀριθμὸ μονάδων, δηλαδή σὲ τετρ. χιλιοστόμετρα ( $\text{mm}^2$ ),  $E_{\Delta EZ\Theta} = 2210\text{ cm}^2$ . Μετατρέπουμε τὸ ἐμβαδό του σὲ τετρ. ἑκατοστόμετρα  $E_{\Delta EZ\Theta} = 22,10\text{ cm}^2$  καὶ συγκρίνοντάς το μὲ τὸ γινόμενο τῶν διαστάσεών του σὲ ἑκατοστόμετρα ( $\text{cm}$ ), βρίσκουμε ὅτι τὸ  $E_{\Delta EZ\Theta} = 22,10\text{ cm}^2 = (6,5 \cdot 3,4)\text{ cm}^2$ .

Δηλαδή διαπιστώνουμε πάλι ὅτι τὸ ἐμβαδό του εἶναι ἴσο μὲ τὸ γινόμενο τῶν διαστάσεών του (ἢ μὲ τὸ γινόμενο τοῦ μήκους τῆς βάσης του ἐπὶ τὸ μῆκος τοῦ ὑψους του) (1). Αὐτὸ ἰσχύει, ὅπως διαπιστώσαμε στὶς περιπτώσεις ποὺ ἐξετάσαμε, ὅταν τὰ μήκη τῶν διαστάσεων τοῦ ὀρθογωνίου εἶναι ρητοὶ ἀριθμοί.

Ἀποδεικνύεται ὁμως ὅτι ἡ πρόταση (1) ἰσχύει καὶ ὅταν τὰ μήκη τῶν διαστάσεων τοῦ ὀρθογωνίου εἶναι ἀσύμμετροι (μὴ ρητοὶ) ἀριθμοὶ (ὅπως θὰ μάθουμε σὲ μεγαλύτερη τάξη).

Ἐπομένως τὸ ἐμβαδό τοῦ ὀρθογωνίου μὲ διαστάσεις  $\alpha$  καὶ  $\beta$  δίνεται ἀπὸ τὸν τύπο  $E=\alpha \cdot \beta$  (2), δηλαδή: **Τὸ ἐμβαδό ἐνὸς ὀρθογωνίου εἶναι ἴσο μὲ τὸ γινόμενο τῶν διαστάσεών του.**

Διαπιστώνουμε ὅτι τὸ ὀρθογώνιο αὐτὸ ἀποτελεῖται ἀπὸ  $24\text{ cm}^2$  ἢ  $(6 \times 4)\text{ cm}^2$ , καὶ βρίσκουμε ἔτσι τὸ ἐμβαδό του  $E_{AB\Gamma\Delta} = 24\text{ cm}^2 = (6 \times 4)\text{ cm}^2$  δηλ.  $(6\text{ cm} \times 4\text{ cm})$  ἴσο μὲ τὸ γινόμενο τῶν διαστάσεών του.


Μὲ ὁμοιο τρόπο ἐργαζόμεστε γιὰ νὰ βροῦμε τὸ ἐμβαδό τοῦ ὀρθογωνίου  $A'B'\Gamma'\Delta'$  μὲ διαστάσεις κλασματικούς ἀριθμούς π.χ.  $A'B' = \frac{4}{10}\text{ dm}$  καὶ  $A'\Delta' = \frac{3}{10}\text{ dm}$ . Ἐχομε  $E_{A'B'\Gamma'\Delta'} =$

Ο τύπος (2) γράφεται και  $E = \beta \cdot \nu$ , γιατί ξέρουμε ότι ή μιὰ ἀπὸ τὶς διαστάσεις τοῦ ὀρθογωνίου λέγεται **βάση** καὶ ἡ ἄλλη **ὑψος** του. Ἀπὸ τὸν τύπο  $E = \beta \cdot \nu$  παίρουμε καὶ τοὺς  $\beta = \frac{E}{\nu}$  καὶ  $\nu = \frac{E}{\beta}$ .

Εἶναι φανερό ὅτι τὸ μήκος τῶν δύο διαστάσεων πρέπει νὰ ἐκφράζεται μὲ τὴν ἴδια μονάδα μήκους, ὁπότε τὸ ἐμβαδὸ ἐκφράζεται μὲ τὴ μονάδα ποῦ παριστάνεται μὲ τὸ τετράγωνο, τὸ ὁποῖο ἔχει πλευρὰ τὴ μονάδα μήκους ποῦ ἔχουμε ἐκλέξει.

### § 32. Ἐμβαδὸ τετραγώνου.

**Τετράγωνο** εἶναι ἓνα ὀρθογώνιο, τοῦ ὁποῖου οἱ δύο διαστάσεις εἶναι ἴσες.



σχ. 46.

$ABCD$  τετράγωνο  $\Leftrightarrow$   $\begin{cases} ABGD \text{ ὀρθογώνιο} \\ AB = AD \end{cases}$

*Ζητοῦμε νὰ βροῦμε τὸ ἐμβαδὸ τοῦ τετραγώνου.*

Ἄν παραστήσουμε μὲ  $\alpha$  τὸ μήκος τῶν ἴσων διαστάσεων του, τὸ ὁποῖο εἶναι τὸ μήκος τῆς πλευρᾶς τοῦ τετραγώνου, τὸ ἐμβαδὸ του εἶναι  $E = \alpha \cdot \alpha = \alpha^2$ ,

δηλαδή:

$$E = \alpha^2$$

**Τὸ ἐμβαδὸ ἑνὸς τετραγώνου εἶναι ἴσο μὲ τὸ τετράγωνο τοῦ μήκους τῆς πλευρᾶς του.**

#### Παρατηρήσεις:

1. Ξέρουμε ὅτι ἡ δευτέρα δύναμη ἑνὸς ἀριθμοῦ λέγεται καὶ τετράγωνο τοῦ ἀριθμοῦ αὐτοῦ, γιατί δίνει τὴν τιμὴ τοῦ ἐμβαδοῦ τοῦ τετραγώνου, τοῦ ὁποῖου τὸ μήκος τῆς πλευρᾶς ἔχει τιμὴ ἴση μὲ τὸν ἀριθμὸ αὐτό.

2. Εἶναι χρήσιμο νὰ ξέρουμε ἀπὸ μνήμης τὰ τετράγωνα μερικῶν φυσικῶν ἀριθμῶν:

$\alpha$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	...
$\alpha^2$	1	4	9	16	25	36	49	64	81	100	121	144	169	196	225	...


#### Ἐφαρμογή.

Τὰ μήκη τῶν κάθετων πλευρῶν ἑνὸς ὀρθογωνίου τριγώνου εἶναι  $\alpha$  καὶ  $\beta$ . Νὰ βρεῖτε τὸ ἐμβαδὸ του.

Ἔχουμε βρεῖ ὅτι ἡ διαγώνιος ἑνὸς ὀρθογωνίου  $ABGD$  χωρίζει αὐτὸ

σέ δύο ίσα ὀρθογώνια τρίγωνα, τῶν ὁποίων οἱ πλευρές τῆς ὀρθῆς γωνίας ἔχουν μήκη τῆς διαστάσεις τοῦ ὀρθογωνίου. Ἐπομένως τὸ ἔμβαδὸ τοῦ ὀρθ. τριγώνου π.χ. τοῦ  $\triangle AB$  εἶναι ἴσο μὲ τὸ μισὸ τοῦ ἔμβαδοῦ τοῦ ὀρθογωνίου  $AB\Gamma\Delta$ , ποῦ ἔχει διαστάσεις ἴσες μὲ τῆς κάθετες πλευρές τοῦ ὀρθ. τριγώνου.

$$\text{Συνεπῶς } E = \frac{\alpha \cdot \beta}{2}$$



σχ. 47.

(Διατυπώσετε τὸ σχετικὸ κανόνα).


### Ἀσκήσεις

- 95) Οἱ διαστάσεις ἑνὸς ὀρθογωνίου εἶναι 13 m καὶ 187 m. Νὰ βρεθῆι τὸ ἔμβαδὸ του.
- 96) Ἐνα ὀρθογώνιο ἔχει ἔμβαδὸ 36 cm<sup>2</sup>. Μία ἀπὸ τῆς διαστάσεις του εἶναι 4 cm. Νὰ ὑπολογίσετε τὸ μήκος τῆς ἄλλης διαστάσεώς του.
- 97) Τὸ μήκος τῆς πλευρᾶς ἑνὸς τετραγώνου εἶναι 6 cm, ποῖο εἶναι τὸ ἔμβαδὸ του;
- 98) Ποῖο εἶναι τὸ μήκος μιᾶς πλευρᾶς ἑνὸς τετραγώνου, ποῦ τὸ ἔμβαδὸ του εἶναι 121 cm<sup>2</sup>;
- 99) Ἡ περίμετρος ἑνὸς τετραγώνου εἶναι 124 cm, ποῖο εἶναι τὸ ἔμβαδὸ του;
- 100) Οἱ δύο κάθετες πλευρές ἑνὸς ὀρθογωνίου τριγώνου εἶναι 14 cm καὶ 23 cm, ποῖο εἶναι τὸ ἔμβαδὸ του;
- 101) Ἡ περίμετρος ἑνὸς ὀρθογωνίου εἶναι 150 cm. Ἄν ἡ μιὰ ἀπὸ τῆς διαστάσεις του εἶναι 25 cm, νὰ βρεῖτε τὸ ἔμβαδὸ του.
- 102) Νὰ ὑπολογισθῆι τὸ ἔμβαδὸ ἑνὸς ὀρθογωνίου, ὅταν γνωρίζουμε ὅτι ἡ περίμετρος του ἰσοῦται μὲ 24 cm καὶ ὁ λόγος τῶν διαστάσεών του εἶναι  $\frac{1}{3}$ .
- 103) Νὰ βρεθῆι ἡ πλευρὰ ἑνὸς τετραγώνου  $AB\Gamma\Delta$ , ὅταν εἶναι γνωστὸ ὅτι, ἂν αὐξήσουμε τὴν  $AB$  κατὰ 4m καὶ ἐλαττώσουμε τὴν  $B\Gamma$  κατὰ 8 m, βρισκόμε ἕνα ὀρθογώνιο, τὸ ὁποῖο ἔχει ἔμβαδὸ κατὰ 196 m<sup>2</sup> μικρότερο ἀπὸ τὸ ἔμβαδὸ τοῦ τετραγώνου.
- 104) Τὰ  $\frac{3}{4}$  τῆς ἐπιφάνειας ἑνὸς ὀρθογωνίου ἀγροῦ ἔχουν ἔμβαδὸ 8,112 στρέμματα. Ποῖο εἶναι τὸ ἔμβαδὸ τοῦ ἀγροῦ; Ποῖα εἶναι ἡ μιὰ ἀπὸ τῆς διαστάσεις του, ἂν ἡ ἄλλη εἶναι 169 m;
- 105) Ἐνας ὀρθογωνίος ἀγρὸς, ποῦ ἡ μιὰ διάστασή του εἶναι 180 m, ἀγοράστηκε 288000 δρχ. μὲ 16.000 δρχ. τὸ στρέμμα. Ἐνας δρόμος πλάτους 3 m κάνει τὸ γύρο τοῦ ὀρθογωνίου ἀγροῦ κατὰ μήκος τῆς περιμέτρου του καὶ στὸ ἔσωτερικὸ του. Δύο ἄλλοι δρόμοι πλάτους 2 m εἶναι χαραγμένοι παράλληλα μὲ τοὺς ἀξονες συμμετρίας τοῦ ὀρθογωνίου. Οἱ τρεῖς αὐτοὶ δρόμοι διαιροῦν τὸν ἀγρὸ σὲ 4 ἴσα μέρη. Ὑπολογίστε τὸ ἔμβαδὸ ἑνὸς ἀπὸ τὰ ἴσα αὐτὰ μέρη τοῦ ἀγροῦ.
- 106) Ἡ περίμετρος ἑνὸς ἀγροῦ σχήματος ὀρθογωνίου εἶναι 240 m. Κατὰ μήκος τῆς περιμέτρου του καὶ στὸ ἔσωτερικὸ του φυτεύουμε δένδρα, τὰ ὁποῖα ἀπέχουν 5 m

μεταξύ τους και 5 m από την περίμετρο. Το πλάτος του άγρου είναι τα  $\frac{3}{5}$  του μήκους του. Υπολογίστε τον αριθμό των δένδρων και την επιφάνεια του άγρου, η οποία περιλαμβάνεται μεταξύ των δενδροστοιχιών και των πλευρών του άγρου.

107) Ένας χωρικός αντάλλαξε έναν αγρό, που είχε σχήμα τετραγώνου πλευρᾶς 60m, με έναν άλλο αγρό (με την ίδια ποιότητα χώματος) που είχε σχήμα ὀρθογωνίου με πλάτος 40 m και περίμετρο ἴση με την περίμετρο του πρώτου. Έχασε ἢ κέρδισε ὁ χωρικός ἀπὸ τὴν ἀνταλλαγή αὐτή;

108) Κατασκευάστε ἕνα τετράγωνο με μήκος πλευρᾶς ἔστω  $\alpha$ . Ν' αὐξήσετε τὴν πλευρά του κατὰ τὸ μήκος  $\beta$  ( $\beta \neq \alpha$ ) ἔτσι, ὥστε νὰ τμηματίσετε τὸ τετράγωνο  $AB\Gamma\Delta'$



σχ. 48.

(σχ. 48). Ἡ προέκταση τῆς  $\Delta\Gamma$  τέμνει τὴ  $B\Gamma$  στὸ  $E$  καὶ ἡ προέκταση τῆς  $B\Gamma$  τῆς  $\Gamma\Delta'$  στὸ  $Z$ . Νὰ συγκρίνετε τὸ ἔμβαδὸ τοῦ τετραγώνου  $AB\Gamma\Delta'$  μετὰ τὸ ἔμβαδὸ τοῦ ἀρχικοῦ τετραγώνου  $AB\Gamma\Delta$ . Ποιὰ εἶναι ἡ πλευρὰ τοῦ τετραγώνου  $AB\Gamma\Delta'$ ; Ποιὰ εἶναι ἡ φύση τῶν τραπυζέρων  $BB'E\Gamma$ ,  $\Gamma E\Gamma'Z$ ,  $Z\Delta'\Delta\Gamma$ ; Ποιές εἶναι οἱ διαστάσεις τους; Νὰ συμπληρώσετε τὶς τιμὲς τῶν ἐμβαδῶν:

$$(AB\Gamma\Delta') = (\alpha + \beta)^2$$

$$(AB\Gamma\Delta) = \dots, (BB'E\Gamma) = \dots$$

$$(\Gamma E\Gamma'Z) = \dots (\Delta\Gamma Z\Delta') = \dots$$

Νὰ βρεῖτε τὴ σχέση που συνδέει τὰ ἔμβαδὰ αὐτά.

(Παρατηροῦμε ὅτι τὸ ἔμβαδὸ τοῦ  $AB\Gamma\Delta'$  εἶναι τὸ ἄθροισμα τῶν ἐμβαδῶν τῶν ἄλλων τεσσάρων. Τὸ ἀποτέλεσμα αὐτὸ ἐκφράζεται με ἕναν τύπο, ὁ ὁποῖος περιέχει τὶς τιμὲς τῶν ἐμβαδῶν που βρήκαμε:

$(\alpha + \beta)^2 = \alpha^2 + \beta^2 + \alpha\beta + \alpha\beta$ . Ὁ τύπος αὐτὸς μπορεῖ νὰ γραφεῖ με τὴ μορφή  $(\alpha + \beta)^2 = \alpha^2 + \beta^2 + 2\alpha\beta$ , τὸ ὁποῖο ἐκφράζεται ὡς ἐξῆς: Τὸ τετράγωνο τοῦ ἄθροισματος δύο ἀριθμῶν εἶναι ἴσο μετὰ τὸ ἄθροισμα τῶν τετραγῶνων τους σὺν τὸ διπλάσιο γινόμενό τους.

Ἐφαρμόζουμε τὸν τύπο αὐτὸ στὸν ὑπολογισμό τοῦ τετραγώνου ἐνὸς διψήφιου ἀριθμοῦ.


π.χ.  $45^2 = 40^2 + 5^2 + 2 \cdot 40 \cdot 5 = 1600 + 25 + 400 = 2025$ .

109) Νὰ ἐργασθεῖτε με ὄμοιο τρόπο καὶ νὰ δώσετε γεωμετρικὴ ἐξήγηση τῶν τύπων:

$$\alpha) (\alpha - \beta)^2 = \alpha^2 + \beta^2 - 2\alpha\beta \text{ καὶ } \beta) (\alpha + \beta)(\alpha - \beta) = \alpha^2 - \beta^2.$$

### § 33. Ἐμβαδὸ παραλληλογράμμου

**Παραλληλόγραμμο** εἶναι ἕνα τετράπλευρο, τὸ ὁποῖο ἔχει τὶς ἀπέναντι πλευρὲς του παράλληλες.




σχ. 49.

$$AB\Gamma\Delta \text{ παραλληλόγραμμο} \Leftrightarrow \begin{cases} AB // \Delta\Gamma \\ AD // B\Gamma \end{cases}$$

**βάση** ἑνὸς παραλληλογράμμου λέγεται μιὰ ὁποιαδήποτε πλευρὰ του.



**Ύψος** παραλληλογράμμου είναι τὸ τμήμα τῆς καθέτου σὲ δύο ἀπέναντι βάσεις, τὸ ὁποῖο περιέχεται μεταξύ τῶν δύο αὐτῶν βάσεων.



σχ. 50.

Κατασκευάστε ἓνα παραλληλόγραμμο  $ABΓΔ$ , φέρετε τὰ ὕψη του  $AE$  καὶ  $BZ$  καὶ συγκρίνετε τὸ ἐμβαδὸ του μὲ τὸ ἐμβαδὸ τοῦ ὀρθογωνίου  $AEZB$ . Τί παρατηρεῖτε;

Τὰ ὀρθογώνια τρίγωνα  $ΑΔΕ$  καὶ  $ΒΓΖ$  εἶναι ἴσα, ἐπειδὴ ἔχουν τὶς ὑποτείνουσες τῶν ἴσες ( $ΑΔ = ΒΓ$ ) καὶ μία κάθετη πλευρὰ ἴση ( $ΑΕ = ΒΖ$ ) (γιατί;).

Ἄρα τὰ τρίγωνα αὐτὰ εἶναι ἰσομετρικά. Συνεπῶς  $(ΑΔΕ) = (ΒΓΖ)$ . (1) Τὰ ἰσομετρικά σχήματα ἔχουν ἴσες τιμὲς ἐμβαδῶν § 30.

Ἐπομένως, ὅπως φαίνεται ἀπὸ τὸ σχῆμα (50), ἔχουμε:  $(ΑΒΓΔ) = (ΑΒΓΕ) + (ΑΔΕ)$ . Ἄπ' αὐτὴ καὶ τὴν (1) προκύπτει ἢ  $(ΑΒΓΔ) = (ΑΒΓΕ) + (ΒΓΖ)$  ἄρα  $(ΑΒΓΔ) = (ΑΕΖΒ)$ , δηλαδή μετασχηματίσαμε τὸ παραλληλόγραμμο  $ΑΒΓΔ$  στὸ ἰσομετρικὸ ὀρθογώνιο  $ΑΕΖΒ$ . Ἄλλὰ ὅπως γνωρίζουμε  $E_{ΑΕΖΒ} = (ΑΕ) \cdot (ΕΖ)$  καὶ ἐπειδὴ  $ΔΓ = ΑΒ = ΕΖ = \beta$ ,  $ΑΕ = ΒΖ = \nu$  καὶ  $E_{ΑΒΓΔ} = E_{ΑΕΖΒ}$ , ἔχουμε  $E_{ΑΒΓΔ} = \beta \cdot \nu$ , δηλαδή

$$E = \beta \cdot \nu \quad (2).$$

Τὸ ἐμβαδὸ ἑνὸς παραλληλογράμμου εἶναι ἴσο μὲ τὸ γινόμενο τοῦ μήκους τῆς βάσης του ἐπὶ τὸ μήκος τοῦ ὕψους ποὺ ἀντιστοιχεῖ σ' αὐτήν. (Τὰ μήκη ἐκφράζονται μὲ τὴν ἴδια μονάδα).


#### Παρατηρήσεις:

1. Εἶναι φανερὸ πὼς μπορούμε νὰ χρησιμοποιήσουμε ὡς βάση ὁποιαδήποτε πλευρὰ τοῦ παραλληλογράμμου, ἀρκεῖ νὰ πάρουμε καὶ τὸ ὕψος, ποὺ ἀντιστοιχεῖ σ' αὐτήν. Ἄν  $\beta'$  εἶναι τὸ μήκος τῆς ἄλλης πλευρᾶς καὶ  $\nu'$  τὸ ὕψος ποὺ ἀντιστοιχεῖ σ' αὐτήν, ἔχουμε  $E = \beta \cdot \nu = \beta' \cdot \nu'$ .

2. Ἐννοεῖται πὼς τὸ μήκος τῆς βάσης καὶ τὸ μήκος τοῦ ὕψους τοῦ παραλληλογράμμου ἐκφράζονται μὲ τὴν ἴδια μονάδα μήκους.

3. Ἄπὸ τὴ (2) ἔχουμε  $\beta = \frac{E}{\nu}$  καὶ  $\nu = \frac{E}{\beta}$ .

**Σημείωση:** Μποροῦμε ἐπιποτικά μὲ ἓνα παραλληλόγραμμο ἀπὸ χαρτόνι καὶ μὲ



σχ. 51.

δίπλωση και αναδίπλωση των ίσων ορθογωνίων τριγώνων, όπως φαίνεται στο σχ. (51), να δοῦμε τὸ μετασχηματισμὸ τοῦ παραλληλογράμμου σὲ ἰσημερικό ορθογώνιο.

### Ἀσκήσεις


110) Ἐνα παραλληλόγραμμο ἔχει μιὰ πλευρὰ 48 cm καὶ ἀντίστοιχο σ' αὐτὴν ὕψος 3 dm. Νὰ βρεῖτε τὸ ἔμβασό του.

111) Ἐνα παραλληλόγραμμο ἔχει ἔμβασό 72 cm<sup>2</sup> καὶ ὕψος 1,2 dm. Πόση εἶναι ἡ βάση του;

112) Ἐνα παραλληλόγραμμο ἔχει βάση 96 cm καὶ ὕψος ἴσο μὲ τὸ  $\frac{1}{4}$  τῆς βάσης του. Νὰ βρεθεῖ τὸ ἔμβασό του σὲ dm<sup>2</sup>.

### § 34. Ἐμβασὸ τριγώνου.

Κατασκευάστε ἕνα τρίγωνο  $AB\Gamma$ . Νὰ βρεῖτε τὸ ἔμβασό του ἀπὸ τὴν ἄντη βάση  $B\Gamma$  καὶ τὸ ὕψος του  $AE$ .



Εἶναι γνωστὸ ὅτι **βάση** ἑνὸς τριγώνου λέγεται μιὰ ὁποιαδήποτε πλευρὰ του. Π.χ. ἡ  $B\Gamma$  εἶναι βάση. Ἀντίστοιχο ὕψος σ' αὐτὴ εἶναι τὸ  $AE$ . Φέρνουμε ἀπὸ τὶς κορυφές  $A$  καὶ  $\Gamma$  τὶς παραλλήλους  $AD$  καὶ  $\Gamma D$  πρὸς τὴν  $B\Gamma$  καὶ  $AB$  ἀντιστοίχως,

ὁπότε τὸ τετράπλευρο  $AB\Gamma D$ , τὸ ὁποῖο σχηματίζεται, εἶναι παραλληλόγραμμο μὲ βάση τὴν  $B\Gamma$  καὶ ὕψος τὸ  $AE$ .

Ἐχομε μᾶθει ὅτι κάθε διαγώνιος παραλληλογράμμου τὸ χωρίζει σὲ δύο ἴσα τρίγωνα. Ἐπομένως ἡ  $A\Gamma$  χωρίζει τὸ  $AB\Gamma D$  σὲ δύο ἰσημερικά τρίγωνα τὰ  $AB\Gamma$  καὶ  $A\Gamma D$  συνεπῶς  $(AB\Gamma) = (A\Gamma D)$ .

Ἄρα τὸ ἔμβασό τοῦ καθενὸς τριγώνου εἶναι ἴσο μὲ τὸ μισὸ τοῦ παραλληλογράμμου. Ἐπομένως εἶναι:

$$(AB\Gamma) = \frac{1}{2} (AB\Gamma D) = \frac{1}{2} (B\Gamma) \cdot (AE) \text{ καὶ ἂν τὸ μήκος τῆς βάσης}$$

$B\Gamma$  εἶναι  $\alpha$  καὶ τὸ μήκος τοῦ ὕψους  $AE$  εἶναι  $u_1$ , ἔχομε:

$$E = \frac{\alpha \cdot u_1}{2}$$

Τὸ ἔμβασὸ ἑνὸς τριγώνου εἶναι ἴσο μὲ τὸ ἡμίγινόμενο τοῦ μήκους τῆς βάσης του ἐπὶ τὸ μήκος τοῦ ὕψους του.

### Παρατηρήσεις:

1) Είναι φανερό ότι βρίσκουμε το ίδιο έμβαδό, αν πάρουμε ως βάση μία άλλη πλευρά και ως ύψος εκείνο που αντιστοιχεί στην πλευρά αυτή. Έπομένως:

$$\frac{\alpha \cdot u_1}{2} = \frac{\beta \cdot u_2}{2} = \frac{\gamma \cdot u_3}{2} = E$$

2) Δύο τρίγωνα με ίσες βάσεις και ίσα ύψη είναι ίσηεμβαδικά.

3) Δύο τρίγωνα με ίσες βάσεις έχουν έμβαδά ανάλογα προς τὰ αντίστοιχα ύψη τους (γιατί);

4) Τί συμπεραίνετε για τὰ έμβαδά δύο τριγώνων, τὰ όποια έχουν ίσα ύψη;

### Άσκησης

113) Ένα τρίγωνο έχει βάση 62 cm και ύψος ίσο με τὸ μισό τῆς βάσης του. Νά βρεθῆ τὸ έμβαδό του.

114) Πόσο είναι τὸ ύψος ενός τριγώνου, πὸν έχει έμβαδό 5 m<sup>2</sup>, αν ἡ αντίστοιχη πλευρά στο ύψος αυτό έχει μήκος 20 dm;

115) Οἱ πλευρές ενός παραλληλογράμμου έχουν μήκη 24 cm και 27 cm. Τὸ ύψος πὸν αντιστοιχεί στην πρώτη πλευρά έχει μήκος 18 cm. Νά υπολογισθῆ τὸ ύψος πὸν αντιστοιχεί στην ἄλλη πλευρά.

116) Ένας κήπος έχει σχῆμα παραλληλογράμμου. Ἡ περίμετρός του είναι 186 m και ἡ μία πλευρά του 24m. Ἐν ἡ απόσταση μεταξύ τῶν μεγαλύτερων πλευρῶν του είναι 19 m, νά βρεθῆ τὸ έμβαδό του.

117) Ένα παραλληλόγραμμο είναι ίσηεμβαδικὸ με ένα τετράγωνο, πὸν έχει πλευρά 16 cm. Ἐν ἡ βάση τοῦ παραλληλογράμμου είναι 3,2 dm, νά βρεθῆ τὸ αντίστοιχὸ τῆς ύψος.

118) Ένα τρίγωνο και ένα ὀρθογώνιο έχουν μία πλευρά κοινή και ίσα έμβαδά. Ποιά σχέση συνδέει τὸ ύψος τοῦ τριγώνου, τὸ όποιο αντιστοιχεί στην κοινή πλευρά, με τὴν πλευρά τοῦ ὀρθογωνίου, πὸν είναι κάθετη στην κοινή πλευρά;


119) Ένα τρίγωνο έχει έμβαδό 27 cm<sup>2</sup>. Ένα από τὰ ύψη του είναι τὰ  $\frac{2}{3}$  τῆς πλευρᾶς, πὸν αντιστοιχεί σ' αὐτό. Νά υπολογισθῆ τὸ ύψος και ἡ πλευρά τοῦ τριγώνου.

120) Δίνεται ένα τρίγωνο ΑΒΓ ὀρθογώνιο και ίσοσκελές. Οἱ ίσες πλευρές του ΑΒ και ΑΓ έχουν μήκος 8 cm κάθε μία. Ἐπολογίστε τὸ έμβαδό τοῦ τριγώνου ΑΒΓ. Πῶς υπολογίζεται γενικά τὸ έμβαδό ενός ὀρθογωνίου και ίσοσκελοῦς τριγώνου;

121) Τὸ έμβαδό ενός ὀρθογωνίου και ίσοσκελοῦς τριγώνου ΑΒΓ ( $\widehat{A}=1$  ὀρθή) είναι 50 m<sup>2</sup>. Νά βρεθῆ τὸ μήκος τῶν ἴσων πλευρῶν του ΑΒ και ΑΓ.

122) Σ' ένα ὀρθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ( $\widehat{A}=1$  ὀρθή) με ΑΒ=γ, ΑΓ=β και ΒΓ=α νά φέρετε τὸ ύψος ΑΔ=υ και νά συγκρίνετε τὰ γινόμενα β·γ και α·υ. Τί παρατηρεῖτε;

123) Κατασκευάστε ένα τρίγωνο ΑΒΓ. Ὀρίστε τὸ μέσο Ε τῆς ΑΓ και από τὰ



σχ. 53.


123) Σχηματίστε ένα τρίγωνο  $AB\Gamma$  και από τις κορυφές του να φέρετε παραλλήλους προς τις πλευρές του. Σχηματίζεται τότε ένα δεύτερο τρίγωνο  $\Delta EZ$ . Να συγκρίνετε τα έμβαδά τών δύο τριγώνων  $AB\Gamma$  και  $\Delta EZ$  (σχ. 54).

**Σημείωση:** Στις ασκήσεις 123, 124 και 125 γίνεται μετασχηματισμός εϋθύγραμμων σχημάτων σε άλλα ισοδύναμα με χάραξη κατάλληλων γραμμών.

### § 35. Έμβαδο τραπεζίου.

**Τραπεζίο** είναι ένα κυρτό τετράπλευρο, το οποίο έχει δύο μόνο παράλληλες πλευρές.


$$\text{Τραπεζίο } AB\Gamma\Delta \Leftrightarrow \begin{cases} AB\Gamma\Delta \text{ κυρτό} \\ \text{μόνο } AB \parallel \Gamma\Delta \end{cases}$$




σχ. 55.

Οι παράλληλες πλευρές του τραπεζίου λέγονται **βάσεις** του. **Ύψος** του τραπεζίου είναι το εϋθύγραμμο τμήμα της καθέτου προς τις βάσεις του, το οποίο περιέχεται μεταξύ τών βάσεων. **Διάμεσος** τραπεζίου λέγεται το εϋθ. τμήμα, το οποίο συνδέει τὰ μέσα τών μη παράλληλων πλευρών του (σχ. 55β).

Ίσοσκελές τραπεζίο είναι το τραπεζίο, που έχει ίσες τις μη παράλληλες πλευρές του. (σχ. 56).




σχ. 55β.



σχ. 56.


Ε και Β φέρετε παραλλήλους προς τις  $\Gamma B$  και  $\Gamma A$  αντίστοιχως. Αϋτές τέμνονται στο  $Z$ . Συγκρίνετε τὸ έμβαδο τοῦ παραλληλογράμμου  $E\Gamma BZ$ , ποῦ σχηματίζεται, με τὸ έμβαδο τοῦ τριγώνου  $AB\Gamma$  (σχ. 53).

124) Σχηματίστε ένα κυρτό τετράπλευρο  $AB\Gamma\Delta$  και από τις κορυφές του φέρετε παραλλήλους προς τις διαγωνίους του. Σχηματίζεται τότε ένα παραλληλόγραμμο, τὸ  $EZH\Theta$ . Να συγκρίνετε τὸ έμβαδο τοῦ παραλληλογράμμου αὔτου με τὸ έμβαδο τοῦ τετραπλεύρου  $AB\Gamma\Delta$ .



σχ. 54.

Όρθογώνιο τραπέζιο είναι το τραπέζιο, που έχει μία πλευρά κάθετη στις βάσεις του. (σχ.57)




σχ. 57.

Ζητούμε να βρούμε το έμβασό του τραπέζιου ABΓΔ.

Το τυχόν τραπέζιο ABΓΔ (σχ. 58) έχει βάσεις  $AB = \beta_1$ ,  $\Delta\Gamma = \beta_2$  και ύψος  $\Delta E = u$ . Έστω  $l$  το μέσο της μη παράλληλης πλευράς BΓ. Κατασκευάζουμε το συμμετρικό του ABΓΔ ως προς κέντρο συμμετρίας το  $l$ . Το συμμετρικό του τραπέζιου ABΓΔ είναι το τραπέζιο A'ΓBΔ', που είναι ίσο με το ABΓΔ. Το άθροισμα των

έπιφανειών αυτών των δύο συμμετρικών τραπέζιων είναι η επιφάνεια του παραλληλογράμμου  $AD'A'\Delta$ . ( $\Delta A' // AD'$ ,  $AD // \Delta'A'$  γιατί είναι συμμετρικά προς κέντρο συμμετρίας το  $l$ ). Το έμβασό καθενός από τα τραπέζια ABΓΔ



σχ. 58.

καί A'ΓBΔ' είναι το μισό του έμβασού του παραλληλογράμμου  $AD'A'\Delta$ , δηλαδή  $E_{AB\Gamma\Delta} = \frac{1}{2} E_{AD'A'\Delta}$ .

Έπειδή το παραλληλόγραμμο αυτό έχει βάση την  $AD' = \beta_1 + \beta_2$  και ύψος  $u$ , το έμβασό του τραπέζιου δίνεται από τον τύπο:

$$E = \frac{\beta_1 + \beta_2}{2} \cdot u \quad (1)$$

Το έμβασό του τραπέζιου είναι ίσο με το γινόμενο του ήμισυαθροίσματος των μηκών των βάσεων του επί το μήκος του ύψους του.

Άπό τον τύπο (1) έχουμε:  $E = \frac{\beta_1 + \beta_2}{2} \cdot u \Leftrightarrow 2E = (\beta_1 + \beta_2) \cdot u \Leftrightarrow \beta_1 + \beta_2 = \frac{2E}{u} \Leftrightarrow \beta_1 = \frac{2E}{u} - \beta_2$ . Επίσης έχουμε τον τύπο  $u = \frac{2E}{\beta_1 + \beta_2}$ .

#### Παρατήρηση :

Η διάμεσος  $IM$  του τραπέζιου τέμνει την  $A'\Delta'$  στο μέσο της  $M'$  (λόγω της συμμετρίας) τότε  $MM' = A'\Delta' = \beta_1 + \beta_2$ . Άλλ' έπειδή το  $l$  είναι

τὸ κέντρο συμμετρίας, εἶναι τὸ μέσο τοῦ  $MM'$ , ἐπομένως  $2MI = \beta_1 + \beta_2$  καὶ  $MI = \frac{\beta_1 + \beta_2}{2}$ . Ἄρα ὁ τύπος (1) γράφεται καὶ  $E = \mu \cdot$ , ἂν  $\mu$  εἶναι τὸ μήκος τῆς  $MI$ .

### Ἀσκήσεις

126) Τὰ μήκη τῶν βάσεων ἑνὸς τραπέζιου εἶναι  $\beta_1 = 8$  cm καὶ  $\beta_2 = 6$  cm καὶ τὸ μήκος τοῦ ὕψους του  $u = 7$  cm. Νὰ βρεῖτε τὸ ἔμβαδὸ τοῦ τραπέζιου.

127) Ἐνα τραπέζιο ἔχει ἔμβαδὸ  $63$  cm<sup>2</sup>. Τὸ ὕψος του εἶναι  $6$  cm καὶ ἡ μία ἀπὸ τῆς βάσεις του  $14$  cm. Νὰ ὑπολογίσετε τὴν ἄλλη βάση.


128) Τὸ ἔμβαδὸ ἑνὸς ἀγροῦ σχήματος τραπέζιου εἶναι  $3$  στρέμ. καὶ οἱ βάσεις του ἔχουν μήκη  $180$  m καὶ  $120$  m. Ποιὸ εἶναι τὸ ὕψος του;

129) Ἐνα τραπέζιο ἔχει ἔμβαδὸ  $30$  dm<sup>2</sup> καὶ ὕψος  $50$  cm. Ὑπολογίστε τῆς βάσεις του, ὅταν γνωρίζετε ὅτι ἡ μία βάση εἶναι διπλάσια ἀπὸ τὴν ἄλλη.

130) Νὰ ὑπολογίσετε τῆς βάσεις ἑνὸς τραπέζιου, τὸ ὁποῖο ἔχει ἔμβαδὸ  $252$  m<sup>2</sup> καὶ ὕψος  $24$  m, ὅταν γνωρίζετε ὅτι ἡ διαφορά τῶν μηκῶν τῶν βάσεων του εἶναι  $5$  m.

131) Ἐνας ἀγρὸς ἔχει σχῆμα ὀρθογωνίου τραπέζιου. Οἱ βάσεις του εἶναι  $120$  m

καὶ  $144$  m. Θέλουμε νὰ τὸν διαιρέσουμε σὲ δύο μέρη ἰσεμβαδικὰ μὲ μίαν κάθετο στῆς βάσεις του. Σὲ ποιά ἀπόσταση ἀπὸ τῆς κορυφῆς τῶν ὀρθῶν γωνιῶν τοῦ τραπέζιου θὰ τέμνει ἡ κάθετος αὐτὴ τῆς βάσεις του;



σχ. 59.

**Ὑπόδειξη:** Τὸ ἔμβαδὸ τοῦ ἀγροῦ, ποῦ ἔχει σχῆμα ὀρθογ. τραπέζιου, εἶναι ἴσο μὲ τὸ μισὸ τοῦ ἔμβαδου ἑνὸς ὀρθογωνίου, τὸ ὁποῖο ἔχει διαστάσεις τὸ ἄθροισμα τῶν βάσεων τοῦ τραπέζιου ( $120\text{ m} + 144\text{ m} = 264\text{ m}$ ) καὶ τὸ ὕψος του  $u$ , ἢ εἶναι ἴσο μὲ τὸ ἔμβαδὸ ἑνὸς ὀρθογωνίου, τὸ ὁποῖο ἔχει διαστάσεις  $\frac{264}{2}\text{ m} = 132\text{ m}$

καὶ  $u$  m. Ἡ κάθετος στῆς δύο βάσεις χωρίζει τὸ τραπέζιο σὲ ἕνα ὀρθογώνιο καὶ σ' ἕνα ὀρθογώνιο


τραπέζιο (τὸ ὕψος  $u$  τοῦ τραπέζιου εἶναι ἡ μία διάσταση τοῦ ὀρθογωνίου). Ἐπειδὴ οἱ δύο αὐτὲς ἐπιφάνειες ἔχουν ἴσα ἔμβαδά, πρέπει κάθε μίαν νὰ ἔχει ἔμβαδὸ τὸ μισὸ τοῦ ἔμβαδου τοῦ τραπέζιου ποῦ μᾶς δόθηκε, δηλαδὴ τὸ μισὸ τοῦ ὀρθογωνίου, τὸ ὁποῖο ἔχει διαστάσεις  $132$  m καὶ  $u$  m· δηλαδὴ τὸ ἔμβαδὸ ἑνὸς ὀρθογωνίου μὲ διαστάσεις  $\frac{132}{2}\text{ m} = 66\text{ m}$  καὶ  $u$  m. Τώρα πιά εἶναι εὐκόλο νὰ ὑπολογίσουμε τὴν ἀπόσταση τῆς καθέτου πρὸς τῆς βάσεις τοῦ τραπέζιου ἀπὸ τῆς κορυφῆς τῶν ὀρθῶν γωνιῶν του, τὴν ὁποία ἔχετε νὰ ὑπολογίσετε.

### § 36. Έμβαδό πολυγώνου.


Ἐάν πάρουμε πάνω σ' ἓνα ἐπίπεδο τὰ σημεῖα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ μὲ τὴν σειράν πού ἀναφέρονται καὶ φέρουμε τὰ εὐθύγραμμα τμήματα ΑΒ, ΒΓ, ΓΔ, ΔΕ, ΕΖ καὶ ΖΑ, ἡ πολυγωνικὴ γραμμὴ ΑΒΓΔΕΖΑ λέγεται **πολύγωνο ΑΒΓΔΕΖ**.

Λέμε ὅτι ἓνα πολύγωνο εἶναι **κυρτὸ** (σχ. 60), ὅταν βρίσκεται ὁλόκληρο στὸ ἓνα ἀπὸ τὰ ἡμιεπίπεδα, πού ὀρίζονται, ἀπὸ τὸ φορέα κάθε πλευρᾶς του. Σὲ κάθε ἄλλη περίπτωση εἶναι **μὴ κυρτὸ** (σχ. 61). **Διαγώνιος** πολυγώνου λέγεται τὸ εὐθύγραμμο τμήμα, τὸ ὁποῖο ἐνώνει δύο μὴ διαδοχικὲς κορυφές του.

*Ζητοῦμε νὰ βροῦμε τὸ ἔμβαδὸ ἑνὸς κυρτοῦ πολυγώνου.*



σχ. 60.




σχ. 61.

Μποροῦμε νὰ βροῦμε τὸ ἔμβαδὸ του χρησιμοποιώντας τὶς παρακάτω μεθόδους:

#### Α. Τὴν προσθετικὴ μέθοδο:

##### α) Διαίρεση κυρτοῦ πολυγώνου σὲ τρίγωνα:




σχ. 62.

Ἐστω ἓνα κυρτὸ πολύγωνο ΑΒΓΔΕΖ. Φέρουμε τὶς διαγωνίους τοῦ ΑΓ, ΑΔ, ΑΕ, οἱ ὁποῖες διέρχονται ἀπὸ τὴν κορυφή Α, καὶ διαιροῦμε τὸ πολύγωνο σὲ 4 τρίγωνα τὰ ΑΒΓ, ΑΓΔ, ΑΔΕ, ΑΕΖ (σχ. 62). Ἐχομε:  $(ΑΒΓΔΕΖ) = (ΑΒΓ) + (ΑΓΔ) + (ΑΔΕ) + (ΑΕΖ)$

Ἄρα: τὸ ἔμβαδὸ τοῦ πολυγώνου εἶναι ἴσο μὲ τὸ ἄθροισμα τῶν ἔμβαδῶν τῶν τριγώνων, στὰ ὁποῖα διαιρεῖται.

β) Ἀνάλυση τοῦ πολυγώνου σὲ κυρτὰ τραπέζια, ὀρθογώνια καὶ ὀρθογώνια τρίγωνα:




σχ. 63.

Φέρνουμε τὴ μεγαλύτερη διαγώνιο, τὴν ΑΔ, καὶ ἀπὸ τὶς ἄλλες κορυφὲς φέρνουμε τὶς καθέτους σ' αὐτήν. Διαίροῦμε ἔτσι τὸ πολύγωνο σὲ ὀρθογώνια τραπέζια καὶ ὀρθογώνια τρίγωνα (σχ. 63) καὶ ἔχουμε:


$$E_{ABΓΔΕΖ} = E_{ABΘ} + E_{ΘΒΓΙ} + E_{ΙΓΔ} + E_{ΔΕΚ} + E_{ΚΕΖΗ} + E_{ΖΑΗ}.$$

### Β. Τὴ μέθοδο τῆς διαφορᾶς τῶν ἐμβαδῶν:

Σχηματίζουμε ἓνα ὀρθογώνιο ΙΚΛΜ, ποὺ νὰ περνᾷ ἀπὸ ὅσο τὸ δυνατόν περισσότερες κορυφὲς τοῦ πολυγώνου.



σχ. 64.



σχ. 65.

Τὸ ἐμβαδὸ τοῦ πολυγώνου ΑΒΓΔΕ εἶναι ἴσο μὲ τὸ ἐμβαδὸ τοῦ ὀρθογωνίου ΙΚΛΜ, τὸ ὁποῖο ἔχει ἐλαττωθεῖ κατὰ τὰ ἐμβαδὰ τῶν ὀρθογωνίων τριγῶνων ἢ ὀρθ. τραπέζιων ποὺ σχηματίστηκαν (σχ. 64).

Δηλαδή:  $E_{ABΓΔΕ} = E_{IKLM} - E_{AKB} - E_{BLΓ} - E_{ΓΜΖΔ} - E_{ΔΖΕ} - E_{ΕΙΑ}.$

### § 37. Ἐφαρμογές.

1. Κατασκευάστε ἓνα τετράπλευρο ΑΒΓΔ (σχ. 65) μὲ διαγωνίους καθέτους καὶ ἀπὸ τὶς κορυφὲς του φέρετε παραλλήλους πρὸς τὶς διαγωνίους του. Σχηματίζεται τότε τὸ ὀρθογώνιο Α'Β'Γ'Δ' μὲ διαστάσεις ἴσες μὲ τὶς διαγωνίους τοῦ τετραπλεύρου. Ἐπομένως  $(Α'Β'Γ'Δ') = (ΑΓ) \cdot (ΒΔ)$


Τὸ ὀρθογώνιο Α'Β'Γ'Δ' εἶναι ἄθροισμα τῶν ὀρθογωνίων ΑΑ'ΒΟ, ΒΒ'ΓΟ, ΓΓ'ΔΟ, ΟΔΔ'Α ποὺ καθένα τους εἶναι ἀντιστοίχως διπλάσιο ἀπὸ τὰ ὀρθογ. τρίγωνα ΒΟΑ, ΒΓΟ, ΓΔΟ; ΑΟΔ τὰ ὁποῖα ἔχουν ἄθροι-



σμα τὸ τετράπλευρο ΑΒΓΔ. Συνεπῶς τὸ ἔμβαδὸ τοῦ ΑΒΓΔ εἶναι τὸ μισό τοῦ ἔμβαδου τοῦ ὀρθογωνίου Α'Β'Γ'Δ'.

\*Αρα: Τὸ ἔμβαδὸ ἑνὸς τετραπλεύρου με καθέτους διαγωνίους, εἶναι ἴσο με τὸ ἡμιγινόμενο τῶν μηκῶν τῶν διαγωνίων του.  $E = \frac{\delta_1 \cdot \delta_2}{2}$  ( $\delta_1, \delta_2$  εἶναι τὰ μήκη τῶν ΑΓ, ΒΔ σχ. 65).

## 2. Ἐμβαδὸ ρόμβου.




σχ. 66.

Ἐπειδὴ, ὅπως γνωρίζουμε, οἱ διαγωνιοὶ τοῦ ρόμβου τέμνονται καθέτως (σχ. 66), τὸ ἔμβαδὸ του ἰσοῦται με τὸ ἡμιγινόμενο τῶν μηκῶν τῶν διαγωνίων του.

Δηλαδή:  $E = \frac{\delta_1 \cdot \delta_2}{2}$  ( $\delta_1, \delta_2$  τὰ μήκη τῶν διαγωνίων τοῦ ρόμβου).

3. Ἐμβαδὸ κανονικοῦ πολυγώνου: Δίνεται ἓνα κανονικὸ πολύγωνο ἐγγεγραμμένο σ' ἓναν κύκλο (π.χ. στὴν περίπτωση αὐτὴ ἓνα κανονικὸ ἑξάγωνο) καὶ ζητεῖται νὰ βρεθεῖ τὸ ἔμβαδὸ του (σχ. 67).




σχ. 67.

Περίμετρο ἑνὸς εὐθ. σχήματος ὀνομάσαμε τὸ ἄθροισμα τῶν πλευρῶν του. Ἐπειδὴ στὰ κανονικὰ πολύγωνα οἱ πλευρὲς τους εἶναι ὅλες ἴσες, ἡ περίμετρος π.χ. τοῦ παραπάνω ἑξαγώνου θὰ εἶναι  $\delta \cdot \lambda_6$  καὶ γενικὰ ἡ περίμετρος ἑνὸς κανονικοῦ ν-πλεύρου εἶναι  $\nu \cdot \lambda_\nu$ . Ἄν φέρουμε τὶς ἀκτίνες τοῦ παραπάνω κανονικοῦ πολυγώνου (σχ. 67), αὐτὸ διαιρεῖται σὲ 6 ἴσα τρίγωνα. Ἄρα τὸ ἔμβαδὸ του εἶναι  $E = 6 \cdot E'$  (ὅπου  $E'$  εἶναι τὸ ἔμβαδὸ ἑνὸς ἀπὸ τὰ ἴσα τρίγωνα). Συνεπῶς  $E = 6 \cdot \frac{1}{2} \lambda_6 \cdot \alpha_6 = \frac{1}{2} (6\lambda_6) \cdot \alpha_6$ , δηλαδή  $E = \frac{1}{2} \chi$  μήκος περιμέτρου  $\chi$  μήκος ἀποστήματος. Καὶ γενικὰ γιὰ ἓνα κανονικὸ ν-πλευρο  $E = \frac{1}{2} (\nu \lambda_\nu) \cdot \alpha_\nu$ .

Τὸ ἔμβαδὸ ἑνὸς κανονικοῦ κυρτοῦ πολυγώνου ἰσοῦται με τὸ  $\frac{1}{2}$  τοῦ γινομένου τοῦ μήκους τῆς περιμέτρου του ἐπὶ τὸ μήκος τοῦ ἀποστήματός του.

### Άσκησης



σχ. 68.

132) Ένα πολύγωνο  $ABGD$  έχει τη διαγώνιο  $AD=148$  m. Οι κάθετες  $GZ$ ,  $EH$  και  $B\Theta$  είναι 43 m, 45 m και 52 m αντίστοιχως (σχ. 68). Αν  $\Delta Z=18$  m,  $\Theta A=38$  m και  $\Delta H=70$  m. Να υπολογίσετε το έμβαδό του.

133) Ένας ρόμβος έχει διαγωνίους 12 cm και 9 cm. Να βρεθεί το έμβαδό του.

134) Αν το έμβαδό ενός ρόμβου είναι 42 cm<sup>2</sup> και η μία διαγώνιος του είναι 12 cm, να βρεθεί η άλλη διαγώνιος.

135) Να βρεθεί το έμβαδό ενός τετραπλεύρου με καθέτους διαγωνίους, όταν τα μήκη των διαγωνίων αυτών είναι 14 cm και 27 cm.


136) Η περίμετρος ενός ρόμβου είναι 144 cm και η απόσταση δύο παράλληλων πλευρών του 28 cm. Να βρεθεί το έμβαδό του.

137) Κάθε μία από τις διαγωνίους ενός τετραγώνου έχει μήκος 10 cm. Να βρεθεί το έμβαδό του.

138) Φέρετε δύο κάθετα ευθύγραμμα τμήματα  $AG$  και  $BD$  με μήκος 12 cm το καθένα. Αυτά τέμνονται σ' ένα σημείο  $I$ , που απέχει 5 cm από το  $A$  και 4 cm από το  $B$ . Κατασκευάστε το τετράπλευρο  $ABGD$  και υπολογίστε το έμβαδό του.

139) Έστω ένα οικόπεδο, που έχει σχήμα όπως αυτό που εικονίζεται στο σχήμα (69). ( $\hat{A}=1$  όρθή). Να βρεθεί το έμβαδό του.


140) Να σχηματίσετε ένα τετράπλευρο  $ABGD$  και να φέρετε από το  $A$  μία παράλληλο προς την διαγώνιο του  $BD$ . Η παράλληλος αυτή τέμνει την ευθεία  $GB$  στο  $E$ . Συγκρίνετε το έμβαδό του τετραπλεύρου με το έμβαδό του τριγώνου  $\Delta EG$ .



σχ. 69.

### Β'. ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΘΕΩΡΗΜΑ.

§ 38. Κατασκευάστε ένα ορθογώνιο τρίγωνο  $ABG$  με κάθετες πλευρές  $AG=4$  μονάδ. μήκους και  $AB=3$  μονάδ. μήκους. Μετρήστε την ύποτείνουσά του. Έπειτα κατασκευάστε τετράγωνα με πλευρές τις πλευρές του τριγώνου και συγκρίνετε



σχ. 70.


το έμβαδό του τετραγώνου της ύποτείνουσας με το άθροισμα των εμβαδών των τετραγώνων των κάθετων πλευρών του. Τί παρατηρείτε;

Μετρώντας διαπιστώνουμε ότι η ύποτείνουσα  $BG$  είναι ίση με 5 μον. μήκους και παρατηρούμε (σχ. 70) ότι το τετράγωνο, που έχει πλευρά την ύποτείνουσα, περιέχει 25 τετραγωνάκια με πλευρά τη μονάδα μήκους και ότι τα δύο άλλα τετράγωνα περιέχουν


αντιστοίχως 9 και 16 τέτοια τετραγωνάκια. Ἄλλὰ  $25 = 16 + 9$  ἢ  $5^2 = 4^2 + 3^2$  ἄρα  $(ΒΓ)^2 = (ΑΓ)^2 + (ΑΒ)^2$  (1). Ἡ σχέση (1), πού συνδέει τὰ τετράγωνα τῶν πλευρῶν τοῦ ὀρθογωνίου τριγώνου ΑΒΓ, ἐκφράζει τὸ πυθαγόρειο θεώρημα.

Μποροῦμε γενικὰ νὰ αἰτιολογήσουμε τὴν σχέση (1) ὡς ἑξῆς:

Ἐστω ἕνα ὀρθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ μὲ  $\hat{A} = 1$  ὀρθή καὶ μὲ μήκη πλευρῶν  $ΑΒ = \gamma$ ,  $ΑΓ = \beta$  καὶ  $ΒΓ = \alpha$ . Κατασκευάζουμε δύο ἴσα τετράγωνα καὶ καθένα μὲ πλευρὰ ἴση μὲ τὸ ἄθροισμα  $\beta + \gamma$ , τῶν μηκῶν τῶν κάθετων πλευρῶν τοῦ τριγώνου.



(71α)



(71β)

σχ. 71.

Παριστάνουμε μὲ  $E_1$  τὸ ἔμβαδὸ καθενὸς ἀπὸ τὰ τετράγωνα αὐτά. Κατασκευάζουμε ἐπίσης ἀπὸ χαρτόνι τέσσερα ὀρθογώνια τρίγωνα ἴσα μὲ τὸ ΑΒΓ πού μᾶς δόθηκε ( $E$  τὸ ἔμβαδὸ καθενὸς). Θέτουμε τὰ τρίγωνα αὐτὰ πάνω στὸ τετράγωνο, ὅπως δείχνει τὸ σχῆμα 71α, καὶ παρατηροῦμε ὅτι τὸ ἕνα τετράγωνο ἀποτελεῖται ἀπὸ 4 τρίγωνα ἴσα μὲ τὸ ΑΒΓ, πού μᾶς δόθηκε, καὶ ἀπὸ ἕνα τετράγωνο μὲ πλευρὰ ἴση μὲ τὴν ὑποτείνουσα τοῦ ΑΒΓ, δηλαδή  $E_1 = \alpha^2 + 4E$  (2). Ἐπειτα τοποθετοῦμε τὰ τρίγωνα στὸ ἄλλο τετράγωνο μὲ τὸν τρόπο πού δείχνει τὸ σχῆμα 71β. Παρατηροῦμε, ὅπως φαίνεται ἀπὸ τὸ σχῆμα 71β, ὅτι αὐτὸ ἀποτελεῖται ἀπὸ 2 τετράγωνα μὲ πλευρὲς  $\beta$  καὶ  $\gamma$  ἀντιστοίχως, καὶ ἀπὸ τέσσερα ὀρθογώνια τρίγωνα ἴσα μὲ τὸ ΑΒΓ. Ἄρα  $E_1 = \beta^2 + \gamma^2 + 4E$  (3).

Ἐφαρμόζουμε τὴ μεταβατική ιδιότητα στὶς σχέσεις (2) καὶ (3) καὶ ἔχουμε  $\alpha^2 + 4E = \beta^2 + \gamma^2 + 4E$ . Συνεπῶς  $\alpha^2 = \beta^2 + \gamma^2$ . Δηλαδή βρήκαμε πάλι τὴν σχέση  $(ΒΓ)^2 = (ΑΒ)^2 + (ΑΓ)^2$ , ἡ ὁποία ἐκφράζει τὸ πυθαγόρειο θεώρημα:

Τὸ τετράγωνο τῆς ὑποτείνουσας ἑνὸς ὀρθογωνίου τριγώνου εἶναι ἰσόδυναμο μὲ τὸ ἄθροισμα τῶν τετραγώνων τῶν δύο κάθετων πλευρῶν του.

**Παρατήρηση:** Ἀπὸ τὴν σχέση  $\alpha^2 = \beta^2 + \gamma^2$  βρίσκουμε τὶς ἑξῆς σχέσεις:  $\beta^2 = \alpha^2 - \gamma^2$  καὶ  $\gamma^2 = \alpha^2 - \beta^2$ , δηλαδή: Τὸ τετράγωνο κάθε μιᾶς ἀπὸ τὶς κάθετες πλευρὲς ἑνὸς ὀρθογωνίου τριγώνου βρίσκεται, ἂν ἀπὸ τὸ τετράγωνο τῆς ὑποτείνουσας ἀφαιρέσουμε τὸ τετράγωνο τῆς ἄλλης κάθετης πλευρᾶς.

**Ίστορική σημείωση:** Ὁ διάσημος μαθηματικός καὶ φιλόσοφος **Πυθαγόρας** γεννήθηκε τὸ 580 π.Χ. στὴ Σάμο καὶ πέθανε τὸ 500 π.Χ. στὸ Μεταπόντιο τῆς Κάτω Ἰταλίας.

Μετὰ ἀπὸ σύσταση τοῦ Θαλῆ πῆγε στὴν Αἴγυπτο (πιθανῶς καὶ στὴ Βαβυλώνα) ὅπου παρέμεινε γιὰ πολλὰ χρόνια καὶ μύηθηκε στὶς γνώσεις τῶν Αἰγυπτίων μὲ τὴ μελέτη τῶν βιβλίων τους.

Μετὰ τὴν ἐπιστροφή του στὴν Ἑλλάδα πῆγε στὴν Κρήτη καὶ τὴ Σάμο καὶ τέλος πέρασε στὸν Κρότωνα τῆς Κάτω Ἰταλίας (Μεγάλῃ Ἑλλάδα), ὅπου ἱδρυσε καὶ διεύθυνε Σχολή, ἡ ὁποία θεωρεῖται ὡς τὸ Πρῶτο Πανεπιστήμιο τοῦ κόσμου. Ὁ Πυθαγόρας καὶ οἱ μαθητὲς του, ποὺ ὀνομάζονταν **Πυθαγόρειοι**, συνέβαλαν στὴν ἀνάπτυξη τῶν μαθηματικῶν.

Ὁ Πυθαγόρας ὑπῆρξε ἀπὸ τὶς κορυφαῖες μορφές τῆς ἐπιστήμης ὄλων τῶν ἐποχῶν καὶ ἡ πνευματικὴ του δραστηριότητα ἀναφέρεται σ' ὅλους τοὺς τομείς τῶν φυσικῶν καὶ μαθηματικῶν ἐπιστημῶν.

Στὸν Πυθαγόρα ἀποδίδεται μετὰξὺ τῶν ἄλλων καὶ ἡ ἐπινόηση τοῦ θεωρήματος ποὺ φέρει τ' ὄνομά του, τοῦ **πυθαγορείου θεωρήματος**.

### Ἄ σ κ ῆ σ ε ι ς

Στὶς παρακάτω ἀσκῆσεις νὰ χρησιμοποιήσετε τὸν πίνακα τετραγώνων τῆς § 32.

141) Δίνεται ἓνα ὀρθογώνιο τρίγωνο μὲ κάθετες πλευρὲς 6 cm καὶ 8 cm. Νὰ ὑπολογίσετε τὸ μῆκος τῆς ὑποτείνουσάς του.

142) Ἐνα ὀρθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ἔχει ὑποτείνουσα ΒΓ=15 cm καὶ τὴν κάθετη πλευρὰ ΑΒ=9 cm. Νὰ ὑπολογισθεῖ ἡ ἄλλη κάθετη πλευρὰ τοῦ ΑΓ.

143) Οἱ διαγώνιοι ἐνὸς ρόμβου εἶναι 6 cm καὶ 8 cm. Νὰ ὑπολογίσετε τὸ ὕψος του.

144) Σ' ἓνα ἰσοσκελὲς τραπέζιο ἡ μικρὴ βάση εἶναι  $\beta_1=50$  cm, κάθε μιά ἀπὸ τὶς μὴ παράλληλες πλευρὲς τοῦ 10 cm καὶ τὸ ὕψος του 6 cm. Νὰ βρεῖτε τὸ ἐμβαδὸ του.

145) Δίνεται ἓνα ἰσοσκελὲς τραπέζιο, ποὺ ἔχει μεγάλη βάση ἴση μὲ  $\frac{11}{5} \alpha$  καὶ τὶς ἄλλες τρεῖς πλευρὲς τους ἴσες μὲ  $\alpha$ . Νὰ ὑπολογίσετε τὸ ἐμβαδὸ του. Ἐφαρμογή:  $\alpha=5$  cm.

146) Νὰ ὑπολογισθεῖ τὸ ἐμβαδὸ ἐνὸς ὀρθογωνίου, ποὺ ἔχει μιά πλευρὰ μήκους 3 cm καὶ διαγώνιο μήκους 5 cm.

147) Ἐνα ὀρθογώνιο τρίγωνο ἔχει ὑποτείνουσα 25 cm καὶ μιά κάθετη πλευρὰ 24 cm. Νὰ βρεῖτε τὸ ὕψος, ποὺ ἀντιστοιχεῖ στὴν ὑποτείνουσα.


148) Ἐνα ὀρθογώνιο τρίγωνο ἔχει ἐμβαδὸ 6 cm<sup>2</sup>. Μία κάθετη πλευρὰ του εἶναι 4 cm. Νὰ βρεθῆ τὸ μῆκος τῆς ὑποτείνουσάς του.

### Τετραγωνικὴ ρίζα

#### § 39. Τετραγωνικὴ ρίζα θετικοῦ ἀριθμοῦ καὶ ὑπολογισμὸς τῆς.

*Νὰ κατασκευάσετε ἓνα ὀρθογώνιο τρίγωνο μὲ κάθετες πλευρὲς 45 mm καὶ 28 mm καὶ νὰ ὑπολογίσετε τὸ τετράγωνο τῆς τιμῆς τῆς ὑποτείνουσας καὶ τὴν τιμὴ τῆς.*

Κατασκευάζουμε ἓνα ὀρθογώνιο τρίγωνο ΓΑΒ μὲ κάθετες πλευρὲς ΑΒ=45 mm καὶ ΑΓ=28 mm καὶ ἐφαρμόζουμε τὸ πυθαγόρειο θεώρημα (σχ. 72).



σχ. 72.

$$\begin{aligned}(B\Gamma)^2 &= (AB)^2 + (A\Gamma)^2 \Rightarrow (B\Gamma)^2 = \\ &= 45^2 + 28^2 \Rightarrow (B\Gamma)^2 = 2025 + 784 \Rightarrow \\ &\Rightarrow (B\Gamma)^2 = 2809\end{aligned}$$

Αν μετρήσουμε την υπότεινους, θα βρούμε ότι  $B\Gamma = 53$  mm. Ωστε:  $53^2 = 2809$ . Τον αριθμό 53 τον ονομάζουμε **τετραγωνική ρίζα** του αριθμού 2809 και συμβολίζουμε  $\sqrt{2809}$  Ωστε  $\sqrt{2809} = 53$ . Γενικά:

**Τετραγωνική ρίζα** ενός θετικού αριθμού  $a$  είναι ο θετικός αριθμός  $\sqrt{a}$ , ο οποίος όταν υψώνεται στη δεύτερα δύναμη δίνει τον  $a$ .

$$(\sqrt{a})^2 = a \quad \eta \quad a = \beta^2 \Rightarrow \beta = \sqrt{a}$$

Αν συμβουλευθούμε τον πίνακα της § 32, θα συμπεράνουμε ότι:

$$\begin{aligned}\sqrt{1} = 1, \quad \sqrt{4} = 2, \quad \sqrt{9} = 3, \quad \sqrt{16} = 4, \quad \sqrt{25} = 5, \quad \sqrt{36} = 6 \\ \sqrt{49} = 7, \quad \sqrt{64} = 8, \quad \sqrt{81} = 9 \quad \text{κ.λ.π.}\end{aligned}$$

Τους αριθμούς 1 ... 4 ... 9 ... 16 ... 25 ... 36 ... 49 ... 64 ... 81... τους λέμε τέλεια τετράγωνα άκεραίων ή απλώς τέλεια τετράγωνα, γιατί γράφονται με τη μορφή  $1^2 \dots 2^2 \dots 3^2 \dots 4^2 \dots 5^2 \dots 6^2 \dots 7^2 \dots 8^2 \dots 9^2 \dots$

Οί τετραγωνικές ρίζες τών παραπάνω τέλειων τετραγώνων είναι άκέραιοι αριθμοί.

§ 40. Παρατηρούμε ότι κάθε άκέραιος αριθμός, πού δεν είναι τέλειο τετράγωνο, βρίσκεται μεταξύ δύο διαδοχικών τέλειων τετραγώνων.

$$\text{Π.χ. } 1 < 3 < 4, \quad 25 < 31 < 36 \quad \text{κ.λ.π.} \quad \eta \quad 1^2 < 3 < 2^2, \quad 5^2 < 31 < 6^2.$$

Λέμε ότι ο 1 είναι τετραγωνική ρίζα του 3 κατά προσέγγιση μονάδας, με έλλειψη, και ο 2 είναι τετραγωνική ρίζα του 3 κατά προσέγγιση μονάδας, με ύπεροχή, και συμβολίζουμε: με έλ.  $\sqrt{3} = 1$  κατά προσέγγιση μονάδας και: με ύπ.  $\sqrt{3} = 2$  κατά προσέγγιση μονάδας. Όμοίως: με έλ.  $\sqrt{31} = 5$  κατά προσέγγιση μονάδας και: με ύπ.  $\sqrt{31} = 6$  κατά προσέγγιση μονάδας.

Απ' έδω κι εμπρός όταν λέμε τετραγωνική ρίζα κατά προσέγγιση μονάδας, θα έννοούμε την τετραγωνική ρίζα με έλλειψη.

**Τετραγωνική ρίζα ενός αριθμού κατά προσέγγιση μονάδας είναι ο μεγαλύτερος άκέραιος, του οποίου τó τετράγωνο είναι μικρότερο από τον αριθμό πού μās έχει δοθεί.**

Ο αριθμός 2809 είναι τέλειο τετράγωνο, γιατί η τετραγωνική ρίζα του είναι ο άκέραιος 53.

§ 41. Την τετραγωνική ρίζα του αριθμού 2809 την υπολογίζουμε ως εξής:

1. Τόν χωρίζουμε σε διψήφια τμήματα αρχίζοντας από το τέλος.

$$\sqrt{28'09}$$

2. Βρίσκουμε την τετραγωνική ρίζα του πρώτου τμήματος 28 κατά προσέγγιση μονάδας με έλλειψη.

$$\sqrt{28'09} \quad | \quad 5$$

3. Αφαιρούμε από το 28 το τετράγωνο του 5 (τόν 25).

$$\begin{array}{r} \sqrt{28'09} \quad | \quad 5 \\ \underline{-25} \phantom{09} \\ 3 \phantom{09} \end{array}$$

4. Παραθέτουμε δεξιά από τη διαφορά 3 το επόμενο διψήφιο τμήμα 09 και χωρίζουμε το τελευταίο ψηφίο του αριθμού 309 που σχηματίστηκε.

$$\begin{array}{r} \sqrt{28'09} \quad | \quad 5 \\ \underline{-25} \phantom{09} \\ 30'9 \phantom{09} \end{array}$$

5. Διπλασιάζουμε τον αριθμό 5 που βρήκαμε (πάνω-δεξιά) και βρίσκουμε 10, το οποίο γράφουμε κάτω από τον 5.

6. Διαιρούμε το 30 του 309 διά του 10 και το πληκίο 3 το γράφουμε δεξιά του 10 και σχηματίζουμε τον αριθμό 103· πολλαπλασιάζουμε αυτόν με τον 3 (γράφουμε και δεξιά και κάτω από τον 10 τον πληκίο 3). Αφαιρούμε το γινόμενο 309 από τον αριθμό 309 ("Αν το γινόμενο  $103 \times 3$  ήταν μεγαλύτερο από τον 309, θα γράφαμε δεξιά και κάτω από τον 10 τον άμεσως μικρότερο αριθμό του 3, τον 2, ως εξής 102 και θα συνεχίζαμε να εργαζόμαστε το ίδιο).  $\times 2$

$$\begin{array}{r} \sqrt{28'09} \quad | \quad 5 \\ \underline{-25} \phantom{09} \quad 103 \\ \phantom{00} 30'9 \phantom{09} \quad \times 3 \\ \underline{-30'9} \phantom{09} \quad 309 \\ \phantom{00} 0 \phantom{09} \end{array}$$

7. Παραθέτουμε δεξιά από τον 5 που βρήκαμε (στάδιο 2), το πληκίο 3. Ο αριθμός 53 που βρήκαμε πάνω δεξιά είναι η τετραγωνική ρίζα του 2809.


$$\begin{array}{r} \sqrt{28'09} \quad | \quad 53 \\ \underline{-25} \phantom{09} \quad 103 \\ \phantom{00} 309 \phantom{09} \quad \times 3 \\ \underline{-309} \phantom{09} \quad 309 \\ \phantom{00} 0 \phantom{09} \end{array}$$

Ο 2809 είναι τέλειο τετράγωνο, γιατί κάτω αριστερά βρήκαμε υπόλοιπο 0. "Αν έχουμε και τρίτο τμήμα, επαναλαμβάνουμε την εργασία από το στάδιο 4 και κάτω.

### Έφαρμογές.

1. Να υπολογισθεί η διαγώνιος ενός ορθογωνίου παραλληλογράμμου με διαστάσεις 57 m και 176 m (σχ. 73).

Εφαρμόζουμε τὸ πυθαγόρειο θεώρημα καὶ βρίσκουμε τὸ μήκος  $\delta$  τῆς διαγωνίου.  $\delta^2 = 57^2 + 176^2 \Leftrightarrow \delta^2 = 34225 \Leftrightarrow \delta = \sqrt{34225}$ .



σχ. 73.

(ἐδῶ τὸ πρῶτο τμήμα εἶναι μονοψήφιο).

$\sqrt{3'42'25}$	185		
-1	29	28	365
24'2	$\times 9$	$\times 8$	$\times 5$
-224	261	224	1825
182'5			
-1825			
0			

Ὡστε ἡ διαγωνίος ἔχει μήκος  $185 \text{ m}^2$ .

**Παρατήρηση:** Κατὰ τὴ διαίρεση 24:2 θέτουμε τὸν μεγαλύτερο μονοψήφιο 9. Ἄν ὅμως, ὅπως ἐδῶ, τὸ γινόμενο  $29 \times 9$  εἶναι μεγαλύτερο ἀπὸ τὸν 242, θέτουμε τὸν ἀμέσως μικρότερο ἀριθμὸ 8 κ.ο.κ.

Ἄν ἡ τελικὴ διαφορὰ δὲν εἶναι 0, τότε ἡ τετραγωνικὴ ρίζα, πού βρίσκουμε, εἶναι κατὰ προσέγγιση μονάδας καὶ μὲ ἔλλειψη.

2. Ἡ ὑποτείνουσα ἑνὸς ὀρθογωνίου τριγώνου εἶναι 139 mm καὶ μία κάθετη πλευρὰ του 38 mm. Νὰ βρεθῆ ἡ ἄλλη κάθετη πλευρὰ.

Ἄν  $\chi$  εἶναι ἡ τιμὴ τῆς, ἔχουμε:

$$\chi^2 + 38^2 = 139^2 \Leftrightarrow \chi^2 = 139^2 - 38^2 \Leftrightarrow \chi^2 = 17877 \Leftrightarrow \chi = \sqrt{17877}$$

Ὡστε  $\sqrt{17877} = 133$  κατὰ προσέγγιση μονάδας.

$$\text{Δηλ. } 133^2 < 17877 < 134^2. \text{ Πραγματικά } \Rightarrow 17689 < 17877 < 17956$$

Μὲ μέτρηση διαπιστώνουμε ὅτι ἡ πλευρὰ εἶναι μεγαλύτερη ἀπὸ 133 mm ἀλλὰ μικρότερη ἀπὸ 134 mm.

### Ἀσκήσεις

149) Ὑπολογίστε τοὺς ἀριθμοὺς  $\sqrt{121}$ ,  $\sqrt{6241}$ ,  $\sqrt{12321}$

150) Βρεῖτε τὶς τετραγωνικὲς ρίζες τῶν ἀριθμῶν 11, 45, 1797, 394563 κατὰ προσέγγιση μονάδας.

151) Ἐνα ἰσοσκελὲς τρίγωνο ἔχει ἴσες πλευρὲς 185 m καὶ βάση 222 m. Νὰ ὑπολογίσετε τὸ ὕψος του καὶ τὸ ἐμβαδὸ του.

152) Μία χορδὴ AB ἑνὸς κύκλου εἶναι 336 cm καὶ ἀπέχει ἀπὸ τὸ κέντρο του ἀπόσταση 374 cm. Ποιὸ εἶναι τὸ μήκος τῆς ἀκτίνας τοῦ κύκλου;

153) Ένα τραπέζιο ΑΒΓΔ έχει βάσεις  $AB=276$  mm και  $ΓΔ=78$  mm και πλευρές  $ΒΓ=ΑΔ=165$  mm. Να υπολογίσετε το ύψος του και το έμβαδό του.

154) 'Ανάμεσα σε ποιά μήκη βρίσκεται η ύποτείνουσα ενός ορθογωνίου τριγώνου, το όποιο έχει κάθετες πλευρές με μήκη 389 cm και 214 cm;

#### § 42. Τετραγωνική ρίζα κατά προσέγγιση.

Να βρείτε μεταξύ ποιων άκεραίων τετραγώνων περιέχεται ο αριθμός 1200 και να διαιρέσετε τους αριθμούς που θα βρείτε και τον 1200 διά 100. Τί παρατηρείτε;

Υπολογίζουμε την τετραγωνική ρίζα του 1200 κατά προσέγγιση μονάδας με έλλειψη

$$\begin{array}{r|l} \sqrt{12'00} & 34 \\ -9 & 64 \\ \hline 30'0 & \times 4 \\ -256 & \\ \hline & 44 \end{array}$$

Αυτή είναι ο αριθμός 34

$$\begin{aligned} \text{Τότε έχουμε } 34^2 < 1200 < 35^2 &\Leftrightarrow \frac{34^2}{100} < 12 < \frac{35^2}{100} \\ \Rightarrow \frac{34^2}{10^2} < 12 < \frac{35^2}{10^2} &\Rightarrow \left(\frac{34}{10}\right)^2 < 12 < \left(\frac{35}{10}\right)^2 \\ \Rightarrow 3,4^2 < 12 < 3,5^2. \end{aligned}$$

Παρατηρούμε, ότι ο αριθμός 12 περιέχεται μεταξύ των τετραγώνων των δεκαδικών 3,4 και 3,5. Οί αριθμοί αυτοί διαφέρουν κατά 0,1.

Ο αριθμός 3,4 είναι η τετραγωνική ρίζα του 12 κατά προσέγγιση 0,1 με έλλειψη. Ο αριθμός 3,5 είναι η τετραγωνική ρίζα του 12 κατά προσέγγιση 0,1, με ύπεροχή.

Όταν λέμε άπλως τετραγωνική ρίζα κατά προσέγγιση, θα έννοούμε την τετραγωνική ρίζα με έλλειψη και θα γράφουμε με έλ.  $\sqrt{12} = 3,4$  κατά προσέγγιση 0,1. Άν έργαστούμε όμοια με τον αριθμό 120.000, θα βρούμε:

$$\begin{array}{r|ll} \sqrt{12'00'00} & 346 & \\ -9 & 64 & 686 \\ \hline 30'0 & \times 4 & \times 6 \\ -256 & & \\ \hline & 256 & 4116 \\ & 440'0 & \\ -4116 & & \\ \hline & & 284 \end{array}$$

Δηλαδή  $346^2 < 120.000 < 347^2$ . Διαιρούμε διά 10.000 = 100<sup>2</sup> και έχουμε:  $\left(\frac{346}{100}\right)^2 < 12 < \left(\frac{347}{100}\right)^2 \Rightarrow (3,46)^2 < 12 < (3,47)^2$ .

Ο αριθμός 3,46 είναι η τετραγωνική ρίζα του 12 κατά προσέγγιση έκατοστού (0,01).



Τετραγωνική ρίζα ενός αριθμού κατά προσέγγιση δεκάτου, εκατοστοῦ, χιλιοστοῦ κλπ. είναι ὁ μεγαλύτερος ἀπὸ τοὺς δεκαδικούς ἀριθμούς μὲ ἕνα, δύο, τρία κλπ. δεκαδικὰ ψηφία ἀντιστοίχως, τοῦ ὁποίου τὸ τετράγωνο εἶναι μικρότερο ἀπὸ τὸν ἀριθμό, ποὺ μᾶς ἔχει δοθεῖ.

Γιὰ νὰ βροῦμε προηγουμένως τὴν τετραγωνικὴ ρίζα τοῦ 12 κατὰ προσέγγιση 0,1, ὑπολογίσαμε τὴν τετραγωνικὴ ρίζα τοῦ  $1200=12 \cdot 100 = 12 \cdot 10^2$  κατὰ προσέγγιση μονάδας καὶ τὴ διαιρέσαμε διὰ 10.

Γιὰ τὸν ὑπολογισμό τῆς τετραγωνικῆς ρίζας τοῦ 12 κατὰ προσέγγιση 0,01 ὑπολογίσαμε τὴν τετραγωνικὴ ρίζα τοῦ  $120000=12 \cdot 10000 = 12 \cdot 10^4$  καὶ τὴ διαιρέσαμε διὰ 100.

Γιὰ νὰ βροῦμε τὴν τετραγωνικὴ ρίζα ἑνὸς ἀριθμοῦ κατὰ προσέγγιση δεκάτου, εκατοστοῦ, χιλιοστοῦ, . . . ἐργαζόμαστε ὡς ἑξῆς: 1) πολλαπλασιάζουμε τὸν ἀριθμὸ ἐπὶ  $100=10^2$ ,  $10000=10^4$ ,  $1000000=10^6$  κλπ. ἀντιστοίχως. 2) Ὑπολογίζουμε τὴν τετραγωνικὴ ρίζα τοῦ γινομένου κατὰ προσέγγιση μονάδας καὶ 3) διαιροῦμε αὐτὴ διὰ 10, 100, 1000 ἀντιστοίχως.

### Τετραγωνικὴ ρίζα κλασματικοῦ ἀριθμοῦ.

α) Δίνεται τὸ κλάσμα  $\frac{16}{25}$ . Παρατηροῦμε ὅτι οἱ ὅροι του εἶναι ἀκέραια τετράγωνα:  $\frac{16}{25} = \frac{4^2}{5^2} \Rightarrow \frac{16}{25} = \left(\frac{4}{5}\right)^2 \Leftrightarrow \sqrt{\frac{16}{25}} = \frac{4}{5} = \frac{\sqrt{16}}{\sqrt{25}}$ .

Ὁ  $\frac{16}{25}$  λέγεται τέλειο τετράγωνο τοῦ ρητοῦ  $\frac{4}{5}$ . Οἱ ἀριθμοὶ  $\frac{16}{25}$ ,  $\frac{36}{81}$ ,  $\frac{9}{64}$ , . . . εἶναι τέλεια τετράγωνα ρητῶν ἀριθμῶν.

$$\text{Γενικά: } \sqrt{\frac{\alpha^2}{\beta^2}} = \frac{\alpha}{\beta} = \frac{\sqrt{\alpha^2}}{\sqrt{\beta^2}}, \text{ διότι } \left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^2 = \frac{\alpha^2}{\beta^2}$$

β) Νὰ βρεθῆ ἡ τετραγωνικὴ ρίζα τοῦ  $\frac{3}{8}$  κατὰ προσέγγιση  $\frac{1}{8}$ . Πολλαπλασιάζουμε τὸ κλάσμα  $\frac{3}{8}$  ἐπὶ  $8^2$  καὶ ἔχουμε  $\frac{3}{8} \cdot 8^2 = 3 \cdot 8 = 24$ . Ὑπολογίζουμε τὴν τετραγωνικὴ ρίζα τοῦ γινομένου 24 κατὰ προσέγγιση μονάδας καὶ τὴ διαιροῦμε διὰ 8. Δηλαδή  $\sqrt{\frac{3}{8}} = \frac{\sqrt{24}}{8} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$  κατὰ προσέγγιση  $\frac{1}{8}$ , δηλαδή μὲ ἕλλ.  $\sqrt{\frac{3}{8}} = \frac{1}{2}$  κατὰ προσέγγιση  $\frac{1}{8}$ .

Γιὰ νὰ βροῦμε τὴν τετραγωνικὴ ρίζα κλάσματος κατὰ προσέγγιση τῆς κλασματικῆς μονάδας του, πολλαπλασιάζουμε τὸ κλάσμα ἐπὶ τὸ τετράγωνο τοῦ παρονομαστή, ὑπολογίζουμε τὴν τετραγωνικὴ ρίζα τοῦ γι-

νομένου κατά προσέγγιση μονάδας και τη διαιρούμε με τον παρονομαστή του κλάσματος.

### Εφαρμογές.

1) Νά βρεθεί η τετραγωνική ρίζα του 19,763 κατά προσέγγιση 0,01. Πολλαπλασιάζουμε τον αριθμό επί 10000 και έχουμε  $19,763 \cdot 10000 = 197630$ .

Υπολογίζουμε την τετραγωνική ρίζα του 197630 κατά προσέγγιση μονάδας, ή όποια είναι 444, και τη διαιρούμε δια 100. Ωστε  $\sqrt{19,763} = 4,44$  κατά προσέγγιση 0,01.

2) Θέλουμε να μετρήσουμε την ύποτείνουσα ενός ορθογωνίου τριγώνου με κάθετες πλευρές  $\frac{3}{5}$  m και  $\frac{2}{3}$  m και διαθέτουμε μια μετροταινία, που έχει διαιρέσεις σε mm.

Μεταξύ ποιών τιμών θα βρούμε το μήκος της ύποτείνουσας; Έστω  $\chi$  m το μήκος της ύποτείνουσας. Τότε  $\chi^2 = \left(\frac{3}{5}\right)^2 + \left(\frac{2}{3}\right)^2 \Rightarrow \chi^2 = \frac{9}{25} + \frac{4}{9} \Rightarrow \chi^2 = \frac{81+100}{225} \Rightarrow \chi^2 = \frac{181}{225} \Rightarrow \chi = \sqrt{\frac{181}{225}}$ .

Για να βρούμε το μήκος μέχρι χιλιοστόμετρο, πρέπει να υπολογίσουμε την τετραγωνική ρίζα του  $\frac{181}{225}$  κατά προσέγγιση 0,001. Για το σκοπό αυτό πολλαπλασιάζουμε το  $\frac{181}{225}$  επί 1000<sup>2</sup> δηλαδή  $\frac{181}{225} \cdot 1000000 = \frac{181000000}{225}$ .

Βρίσκουμε το άκεραίο πηλίκο του  $\frac{181000000}{225} = 804444$ .

Υπολογίζουμε την τετραγωνική ρίζα του 804444 κατά προσέγγιση μονάδας και τη διαιρούμε δια 1000.

$\sqrt{80'44'44}$	896	
-64	169	1786
164'4	x 9	x 6
-15 2 1	1521	10716
12 34'4		
- 10716		
1628		

$$\sqrt{\frac{181}{225}} = 0,896 \text{ κατά προσέγγιση } 0,001 \Rightarrow 0,896 < \chi < 0,897.$$

Ωστε το μήκος της ύποτείνουσας είναι μεταξύ 0,896 m και 0,897 m.


**Σημείωση 1.** Νά υπολογίσετε τις ανώτερες και κατώτερες τετραγωνικές ρίζες του 3 κατά προσέγγιση 0,1, 0,01, 0,001 και να τις διατάξετε πάνω σ' έναν άξονα.

(Όταν λέμε ανώτερες και κατώτερες τετρ. ρίζες, έννοούμε τις τετραγ. ρίζες με ύπεροχή και με έλλειψη αντίστοιχως).

Οι ρίζες είναι 1,7, 1,8 κατά προσέγγιση 0,1  
1,73, 1,74 κατά προσέγγιση 0,01

1,731, 1,732 κατά προσέγγιση 0,001

Διατάσσουμε αυτές πάνω σ' έναν άξονα.



Ώσεσδήποτε φορές και αν επαναλάβουμε τον υπολογισμό, δεν θα βρούμε ακριβώς την τετραγωνική ρίζα του 3. Αν τοποθετήσουμε τις κατά προσέγγιση τετραγωνικές ρίζες πάνω σ' έναν άξονα μεταξύ των άνωτέρων και κατωτέρων, θα υπάρχει πάντοτε ένα σημείο. Σ' αυτό τοποθετείται ο αριθμός 1,731..., ο οποίος έχει άπειρα δεκαδικά ψηφία, αλλά δεν είναι περιοδικός. Τον αριθμό αυτό τον λέμε τετραγωνική ρίζα του 3 και τον συμβολίζουμε με  $\sqrt{3}$ .

Ο αριθμός αυτός δεν ανήκει στο  $\mathbb{Q}$ . Σε μεγαλύτερη τάξη θα μάθουμε ότι ονομάζεται **ασύμμετρος** αριθμός. Αριθμοί αυτού του είδους είναι και οι  $\sqrt{2}$ ,  $\sqrt{5}$  κλπ.

**Σημείωση 2.** Ο αριθμός 2 είναι τετραγωνική ρίζα του 4, γιατί  $2^2=4$ . Παρατηρούμε όμως ότι και  $(-2)^2=4$ . Ο  $-2$  λέγεται δεύτερη τετραγωνική ρίζα του 4.

Γενικά, αν  $a > 0$ , εκτός από τον θετικό αριθμό  $\sqrt{a}$  υπάρχει και δεύτερη τετραγωνική ρίζα, που συμβολίζεται με  $-\sqrt{a}$ .

### Άσκησης

155) Υπολογίστε τις τετραγωνικές ρίζες των αριθμών 138, 272, 19836, κατά προσέγγιση 0,1 και 0,001.

156) Υπολογίστε τις τετραγωνικές ρίζες των αριθμών 97, 635,  $\frac{3}{17}$ , 0,003845 κατά προσέγγιση 0,001.

157) Υπολογίστε τις τετραγωνικές ρίζες των κλασμάτων  $\frac{2}{5}$ ,  $\frac{13}{19}$ ,  $\frac{47}{131}$ ,  $\frac{656}{713}$  κατά προσέγγιση  $\frac{1}{5}$ ,  $\frac{1}{19}$ ,  $\frac{1}{131}$ ,  $\frac{1}{713}$  αντίστοιχως.

158) Ποιά είναι κατά προσέγγιση 0,001 το μήκος της διαγωνίου ενός τετραγώνου με πλευρά τη μονάδα μήκους;

159) Ποιά είναι κατά προσέγγιση 0,0001 το ύψος ενός ισοπλεύρου τριγώνου με πλευρά 2 cm;

## Γ'. ΜΗΚΟΣ ΚΥΚΛΟΥ — ΕΜΒΛΟ ΚΥΚΛΟΥ

### Α'. Μήκος κύκλου

§ 43. Αποκόψτε έναν κύκλο με ακτίνα 5 cm από ένα χονδρό χαρτόνι ή ξύλο. Μετρήστε το μήκος του κύκλου με μια πάνινη μετροταινία περιτυλίγοντάς την γύρω από τον κύκλο και βρείτε το λόγο του μήκους του κύκλου προς το μήκος της διαμέτρου του.

Το μήκος του κύκλου που μετρήθηκε είναι 31,4 cm. \*Αρα  $\frac{31,4 \text{ cm}}{10 \text{ cm}} = 3,14$ .

\*Αν επαναλάβουμε την ίδια εργασία με περισσότερους κύκλους, θα παρατηρήσουμε ότι ο λόγος του μήκους κάθε κύκλου προς το μήκος της διαμέτρου του είναι 3,14 (κατά προσέγγιση). Δηλαδή:

**Ο λόγος του μήκους του κύκλου προς το μήκος της διαμέτρου του είναι σταθερός και ίσος με 3,14.**

Ο αριθμός αυτός παριστάνεται διεθνώς με το γράμμα  $\pi$  του αλφάβητου μας (\*).

\*Αν παραστήσουμε με  $\Gamma$  το μήκος ενός κύκλου με ακτίνα  $R$ , θα έχουμε:

$$\frac{\Gamma}{2R} = \pi \Leftrightarrow \boxed{\Gamma = 2\pi R}$$


Δηλαδή: Το μήκος του κύκλου είναι ίσο με το γινόμενο του μήκους της διαμέτρου του επί τον αριθμό  $\pi$ .

#### § 44. Μήκος τόξου.

Γνωρίζουμε ότι ο κύκλος διαιρείται σε  $360^\circ$ . \*Εστω  $\tau$  το μήκος ενός τόξου  $\mu^\circ$  και  $\Gamma$  το μήκος του κύκλου, ο οποίος είναι τόξο  $360^\circ$ . Τότε έχουμε:  $\frac{\tau}{\Gamma} = \frac{\mu}{360}$  (επειδή ο λόγος δύο ομοειδών μεγεθών είναι ίσος με το λόγο των τιμών τους, αν μετρηθούν με την ίδια μονάδα).

\*Επομένως:  $\frac{\tau}{2\pi R} = \frac{\mu}{360} \Leftrightarrow \tau = 2\pi R \cdot \frac{\mu}{360} \Leftrightarrow \boxed{\tau = \pi R \frac{\mu}{180}}$  Δηλαδή:

Για να βρούμε το μήκος ενός τόξου  $\mu^\circ$ , πολλαπλασιάζουμε το μήκος του κύκλου επί το κλάσμα  $\frac{\mu}{360}$  ή το μήκος του ήμικυκλίου επί το κλάσμα  $\frac{\mu}{180}$ .



σχ. 74.

**Σημείωση:** Για να βρούμε το μήκος του κύκλου, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την έξις μέθοδο: \*Εγγράφουμε στον κύκλο ένα κανονικό κυρτό έξάγωνο. Παρατηρούμε ότι η περίμετρός του είναι μικρότερη από το μήκος του κύκλου. \*Αν τώρα εγγράψουμε κανονικό δωδεκάγωνο, παρατηρούμε ότι η περίμετρός του πλησιάζει περισσότερο το μήκος του κύκλου, αλλά παραμένει μικρότερη από αυτό. \*Αν διπλασιάζουμε συνεχώς το πλήθος των πλευρών του εγγεγραμμένου κανονικού πολυγώνου, πλησιάζουμε όσο θέλουμε το μήκος του κύκλου (σχ. 74).

**Σημ.** Τη μέθοδο αυτή χρησιμοποίησε ο \*Αρχιμήδης στο βιβλίο του «Κύκλου μέτρησης».

#### \* Ιστορική σημείωση:

\*Από την αρχαιότητα είχε διαπιστωθεί ότι ο λόγος του μήκους του κύκλου δια του μήκους της διαμέτρου του είναι σταθερός. (Ίπποκράτης ο Χίος 450 π.Χ.).

Αυτό το σταθερό λόγο τον παρέστησαν με το γράμμα  $\pi$ .

Πρώτος ό μεγάλος Έλληνας μαθηματικός τής αρχαιότητας **Άρχιμήδης** όρισε κατά προσέγγιση ώς τιμή τού  $\pi$  τό κλάσμα  $\frac{22}{7} = 3,1428 \left( \frac{310}{71} < \pi < \frac{31}{7} \right)$ . Για τό σκοπό αυτό χρησιμοποίησε τή μέθοδο πού αναφέρουμε στήν προηγούμενη σημείωση.

Ό Πτολεμαίος βρήκε τήν τιμή 3,14166. Ό Όλλανδός γεωμέτρης Μέττιους (1571-1635 μ.Χ.) βρήκε τό  $\pi = 3,1415920$ .

Κατά προσέγγιση τιμή τού  $\pi$  παίρνουμε τόν αριθμό 3,14 και για μεγαλύτερη προσέγγιση τόν αριθμό 3,14159.

Γι' αυτή τήν τιμή τού  $\pi$  ύπάρχει και μνημονικός κανόνας.

άει ό Θεός ό Μέγας γεωμετρεί

3, 1 4 1 5 9

Δηλαδή ό αριθμός τών γραμμάτων κάθε λέξης αντίπροσωπεύει τό αντίστοιχο ψηφίο τού αριθμού  $\pi$ .

### Άσκησης


- 160) Νά βρείτε τό μήκος τού κύκλου, πού έχει άκτίνα 4 cm.
- 161) Νά ύπολογίσετε τήν άκτίνα τού κύκλου, ό όποιος έχει μήκος 37,68 cm.
- 162) Ποιό είναι τό μήκος τόξου  $50^\circ$  σ' έναν κύκλο άκτίνας 12 cm;
- 163) Νά βρείτε τό μήκος ενός τόξου  $100^\circ$  σ' έναν κύκλο με άκτίνα 5 cm.
- 164) Ποιά είναι ή άκτίνα ενός κύκλου, αν ένα τόξο του  $30^\circ$  έχει μήκος 2 cm;
- 165) Ένας κύκλος έχει μήκος 62πβ cm. Ποιά είναι ή άκτίνα τού κύκλου αυτού;

### Β'. Έμβαδό κύκλου και κυκλικού τομέα

#### § 45. Έμβαδό κύκλου.


Έμβαδό κύκλου καλοῦμε τήν έκταση τής επιφάνειάς του, δηλαδή τήν έκταση τού έσωτερικού του, ή όποία έχει έκφρασθει σε μονάδες μετρήσεως.

*Πάνω σε χιλιοστομετρικό χαρτί σχηματίστε έναν κύκλο με άκτίνα 2 cm. (Χρησιμοποιήστε ώς κέντρο ένα σημείο τομής δύο έντονων γραμμών). Μετρήστε τό έμβαδό τής επιφάνειάς του σε  $\text{cm}^2$ . (σχ. 75).*



σχ. 75.

Μετροῦμε τά  $\text{cm}^2$ , πού περικλείει ό κύκλος και τά επί πλέον  $\text{mm}^2$  και βρίσκουμε ότι τό έμβαδό τού κύκλου είναι περίπου  $12,56 \text{ cm}^2$ . Παρατηρούμε ότι  $3,14 \cdot 2^2 = 3,14 \cdot 4 = 12,56 \text{ cm}^2$ . Δηλαδή τό έμβαδό τού κύκλου δίνεται από τόν τύπο  $3,14 \cdot R^2$  ή  $E = \pi R^2$  (όπου  $R$  τó μήκος τής άκτίνας τού κύκλου). Μπορούμε νά αιτιολογήσουμε τά παραπάνω ώς εξής:



σχ. 76.

από το μήκος του κύκλου και πλησιάζει περισσότερο αυτόν. Στη συνέχεια εγγράφουμε στον ίδιο κύκλο ένα κανονικό κυρτό 24-γωνο κ.ο.κ.

Διπλασιάζοντας συνεχώς το πλήθος των πλευρών του εγγεγραμμένου κανονικού πολυγώνου παρατηρούμε ότι:

- 1) Η περίμετρος του κανονικού κυρτού πολυγώνου, που εγγράφεται στον κύκλο, πλησιάζει **όσο θέλουμε** το μήκος του κύκλου.
- 2) Το απόστημα **πλησιάζει όσο θέλουμε** το μήκος της ακτίνας του κύκλου.
- 3) Το έμβαδο του κανονικού πολυγώνου **πλησιάζει όσο θέλουμε** το έμβαδο του κύκλου.


Αν αντικαταστήσουμε στον τύπο του έμβαδου του κανονικού πολυγώνου ( $E = \frac{1}{2} \times \text{μήκος περιμέτρου} \times \text{μήκος απόστηματος}$ ) το μήκος της περιμέτρου με το μήκος του κύκλου  $2\pi R$  και το μήκος του απόστηματος με την ακτίνα  $R$ , έχουμε:  $E = \frac{1}{2} \cdot 2\pi R \cdot R = \pi R^2$ , άρα  $E = \pi R^2$ .

Δηλαδή: **Το έμβαδο ενός κύκλου ισούται με το γινόμενο του  $\pi$  επί του τετράγωνου της ακτίνας του.**

Σημ. Τη μέθοδο αυτή χρησιμοποίησε ο Αρχιμήδης στο βιβλίο του «κύκλου μέτρησις».

#### § 46. Έμβαδο κυκλικού τομέα

Θεωρούμε έναν κύκλο με κέντρο  $O$  και ακτίνα  $R$ . Έστω  $OANB$  ένας τομέας του κύκλου. Όπως είναι γνωστό, **κυκλικός τομέας** λέγεται ή μεικτή κλειστή γραμμή που αποτελείται από ένα τόξο κύκλου (π.χ. το  $\widehat{ANB}$ ) και τις δύο ακτίνες, που καταλήγουν στα άκρα του τόξου αυτού (σχ. 77). Το τόξο  $\widehat{ANB}$  λέγεται **βάση** του κυκλικού τομέα. Μπορούμε να θεωρήσουμε τον κύκλο σαν ένα κυκλικό τομέα, του οποίου ή γωνία της κορυφής είναι  $360^\circ$ . Έμβαδο κυκλικού τομέα καλούμε την έκταση της επιφάνειάς του (δηλαδή του έσωτερικού του) έκφρασμένη σε μονάδες μετρήσεως.




σχ. 77.

Ἐάν  $\epsilon$  εἶναι τὸ ἔμβαδὸ ἐνὸς κυκλικοῦ τομέα  $\mu^\circ$  καὶ  $E$  τὸ ἔμβαδὸ τοῦ κύκλου, θὰ ἔχουμε  $\frac{\epsilon}{E} = \frac{\mu}{360} \Leftrightarrow \epsilon = \frac{E \cdot \mu}{360} \Leftrightarrow \epsilon = \frac{\pi R^2 \cdot \mu}{360}$ .

Ἀλλὰ  $\epsilon = \frac{\pi \cdot R^2 \cdot \mu}{360} = \frac{\pi R \cdot \mu}{180} \cdot \frac{R}{2} = \tau \cdot \frac{R}{2}$  (ὅπου  $\tau$  τὸ μήκος τῆς βάσης τοῦ τομέα).

### Ἐφαρμογές.


1. **Ἐμβαδὸ κυκλικοῦ τμήματος:** Ἐπιφάνεια κυκλικοῦ τμήματος ὀνομάζουμε τὴν ἐπιφάνεια, ποὺ περιέχεται μεταξύ ἐνὸς τόξου κύκλου καὶ τῆς χορδῆς του (π.χ. στὸ σχ. 78 τὸ σχῆμα ANBA καθὼς καὶ τὸ AMBA εἶναι κυκλικά τμήματα).



σχ. 78.

εἶναι μεγαλύτερο ἀπὸ τὸ ἡμικύκλιο, προσθέτοντας στὸ ἔμβαδὸ τοῦ κυκλικοῦ τομέα AOBMA τὸ ἔμβαδὸ τοῦ τριγώνου AOB.

2. **Ἐμβαδὸ κυκλικῆς στεφάνης:** Ἡ ἐπιφάνεια ποὺ περιέχεται μεταξύ δύο ὁμόκεντρων κύκλων μὲ ἀκτίνες  $R_1$  καὶ  $R_2$  (ὅπου  $R_1 > R_2$ ) λέγεται **κυκλικὴ στεφάνη** (ἢ κυκλικὸς δακτύλιος) (σχ. 79). Τὸ ἔμβαδὸ τῆς κυκλικῆς στεφάνης δίνεται ἀπὸ τὸν τύπο  $E = \pi R_1^2 - \pi R_2^2 = \pi (R_1^2 - R_2^2)$ .



σχ. 79.

### Ἀσκήσεις

- 166) Νὰ ὑπολογίσετε τὸ ἔμβαδὸ ἐνὸς κύκλου μὲ ἀκτίνα 13 cm.  
 167) Νὰ βρεθεῖ ἡ ἀκτίνα ἐνὸς κύκλου, ποὺ ἔχει ἔμβαδὸ 50,24 cm<sup>2</sup>.  
 168) Τὸ μήκος ἐνὸς κύκλου εἶναι 37,68 dm. Νὰ βρεῖτε τὸ ἔμβαδὸ του.  
 169) Νὰ βρεῖτε τὸ ἔμβαδὸ ἐνὸς κυκλικοῦ τομέα 60° ἐνὸς κύκλου ἀκτίνας 10 cm.  
 170) Νὰ ὑπολογισθεῖ τὸ ἔμβαδὸ τῆς κυκλικῆς στεφάνης, ποὺ σχηματίζεται ἀπὸ δύο ὁμόκεντρους κύκλους μὲ ἀκτίνες 8 cm καὶ 5 cm.  
 171) Νὰ ὑπολογίσετε τὸ ἔμβαδὸ ἐνὸς κύκλου μὲ ἀκτίνα  $R=3a$ .  
 172) Τὸ ἔμβαδὸ ἐνὸς κύκλου εἶναι 24 πa<sup>2</sup>. Νὰ ὑπολογίσετε τὴν ἀκτίνα του.  
 173) Δίνεται κύκλος μὲ ἀκτίνα  $R=4a$  καὶ ἓνας κυκλικὸς τομέας τοῦ γωνίας 60°. Νὰ βρεῖτε τὸ ἔμβαδὸ τοῦ κυκλικοῦ τομέα αὐτοῦ καὶ τὴν περίμετρό του.


174) Να βρείτε τὸ ἔμβαδὸ ἑνὸς κυκλικοῦ τμήματος, ποῦ ὀρίζεται σ' ἕναν κύκλο μὲ ἀκτίνα  $R$  καὶ ποῦ ἔχει ἀντίστοιχο τόξο  $60^\circ$ . Ἐφαρμογὴ  $R=15$  cm.

175) Ἡ περίμετρος ἑνὸς κυκλικοῦ τομέα, ὁ ὁποῖος ὀρίζεται σ' ἕναν κύκλο μὲ ἀκτίνα  $6$  dm, εἶναι  $13,57$  dm. Να βρείτε τὴν ἐπίκεντρη γωνία τοῦ κυκλικοῦ τομέα καὶ τὸ ἔμβαδὸ του.

**Πίνακας τύπων τοῦ ἔμβαδου διάφορων ἐπιπέδων σχημάτων**

Εἰκόνα τοῦ εὐθ. σχήμ.	*Όνομα τοῦ σχήματος	Τύπος ποῦ δίνει τὸ ἔμβαδὸ τῆς ἐπιφάνειάς του
	Ὁρθογώνιο	$E = \alpha\beta$ (ἢ $E = B \cdot \upsilon$ )
	Τετράγωνο	$E = \alpha^2$
	Παραλληλόγραμμο	$E = \beta \cdot \upsilon$
	Τρίγωνο	$E = \frac{\alpha \cdot \upsilon_1}{2} = \frac{\beta \cdot \upsilon_2}{2} = \frac{\gamma \cdot \upsilon_3}{2}$
	Τραπεζίο	$E = \frac{\beta_1 + \beta_2}{2} \cdot \upsilon$
	Κύκλος	$E = \pi R^2$


**Διάφορες ασκήσεις στὰ ἔμβαδά.**



σχ. 80.


τε τὸ ἔμβαδὸ τῆς γραμμοσκιασμένης ἐπιφάνειας τοῦ σχήματος (81).

178) Δίνονται τρεῖς ἴσοι κύκλοι μὲ κέντρα  $O_1, O_2, O_3$  καὶ ἀκτίνα  $R=10$  cm. Οἱ κύκλοι αὐτοὶ ἐφάπτονται ἐξωτερικῶς ἀνὰ δύο καὶ ὀρίζουν ἔτσι ἕνα καμπυλόγραμμο τρίγωνο  $AB\Gamma$  (τὸ γραμμοσκιασμένο ἐπίπεδο μέρος). Να ὑπολογίσετε τὸ ἔμβαδὸ τῆς ἐπιφάνειας τοῦ καμπυλόγραμμου αὐτοῦ τριγώνου (σχ. 82).




σχ. 81.






σχ. 82.



σχ. 83.



σχ. 84.

179) Δίνεται ένα ορθογώνιο και ίσοσκελές τρίγωνο  $AB\Gamma$ . Το μήκος τών κάθετων πλευρῶν του είναι  $\alpha$ . Με διαμέτρους τὰ μισὰ τῶν κάθετων πλευρῶν του γράφουμε 4 ἡμικύκλια, ὅπως φαίνεται στὸ σχῆμα 83. Νὰ βρεῖτε τὸ ἔμβαδὸ τῆς γραμμοσκιασμένης ἐπιφάνειας. Ἐφαρμογή:  $\alpha = 4$  cm.

180) Δίνεται ένα ἰσόπλευρο τρίγωνο  $AB\Gamma$  μὲ μήκος πλευρᾶς  $\alpha$ . Με κέντρα τῆς κορυφῆς  $B$  καὶ  $A$  καὶ ἀκτῖνα  $\frac{\alpha}{2}$  γράφουμε τόξα, τὰ ὁποῖα νὰ βρίσκονται στὸ ἔσωτερικὸ τῶν γωνιῶν  $A$  καὶ  $B$  καὶ νὰ περατῶνονται στὶς πλευρῆς του. Ἐπίσης γράφουμε δύο ἡμικύκλια μὲ διαμέτρους  $\Gamma M = \Gamma N = \frac{\alpha}{2}$ , ὅπως φαίνεται στὸ σχῆμα 84. Νὰ ὑπολογίσετε τὸ ἔμβαδὸ τῆς γραμμοσκιασμένης ἐπιφάνειας. Ἐφαρμογή:  $\alpha = 6$  cm.

181) Δίνεται ένα τραπέζιο  $AB\Gamma\Delta$  ὀρθογώνιο στὰ  $A$  καὶ  $\Delta$ , στὸ ὁποῖο ἔχουμε  $AD = AB = \frac{\Gamma\Delta}{2}$ . Τὸ ἔμβαδὸ τοῦ τραπέζιου αὐτοῦ εἶναι  $6\alpha^2$ . Ὑπολογίστε τὶς βάσεις καὶ τὸ ὕψος τοῦ τραπέζιου συναρτήσῃ τοῦ  $\alpha$ .

182) Σχεδιάστε ένα τραπέζιο  $AB\Gamma\Delta$  ( $\Delta\Gamma \parallel AB$ ). Βρεῖτε τὸ μέσο  $I$  τῆς  $B\Gamma$  καὶ φέρετε τὴ  $\Delta I$ , ἡ ὁποία τέμνει τὴν  $AB$  στὸ  $E$ . Συγκρίνετε τὰ ἔμβαδὰ τοῦ τραπέζιου καὶ τοῦ τριγῶνου  $\Delta AE$ .

183) Ἀπὸ τὸ μέσο  $I$  τῆς πλευρᾶς  $\Delta\Gamma$  τοῦ τραπέζιου  $AB\Gamma\Delta$  ( $AD \parallel B\Gamma$ ) φέρετε παράλληλο πρὸς τὴν  $AB$ , ἡ ὁποία τέμνει τὶς εὐθεῖες  $AD$  καὶ  $B\Gamma$  στὰ σημεῖα  $E$  καὶ  $Z$  ἀντιστοίχως.

1ο. Νὰ συγκρίνετε τὰ ἔμβαδὰ τοῦ τραπέζιου  $AB\Gamma\Delta$  καὶ τοῦ παραλληλογράμμου  $ABZE$ .

2ο. Φέρετε τὴν  $IK$  κάθετο στὴν  $AB$  καὶ βρεῖτε τὸ ἔμβαδὸ τοῦ τραπέζιου ἀπὸ τὸ μήκος τῆς  $AB$  καὶ τὸ μήκος τῆς  $IK$ .

184) Στὸ παραπάνω τραπέζιο φέρετε τὶς διαγωνίους, οἱ ὁποῖες τέμνονται στὸ  $O$ .

1ο. Συγκρίνετε τὰ ἔμβαδὰ τῶν τριγῶνων  $AB\Gamma$  καὶ  $\Delta B\Gamma$  καὶ

2ο. Συγκρίνετε ἐπίσης τὰ ἔμβαδὰ τῶν τριγῶνων  $AOB$  καὶ  $\Delta OG$ .

#### Δ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ


§ 47. Λέμε ὅτι κατασκευάζουμε ἕνα σχῆμα, ὅταν τὸ σχεδιάζουμε μὲ τὴ βοήθεια τοῦ χάρακα καὶ τοῦ διαβήτη, μὲ βάση ὀρισμένα δεδομένα π.χ. ὅταν κατασκευάζουμε ἕνα τρίγωνο, τοῦ ὁποῖου μᾶς δίνονται οἱ πλευρῆς· ὅταν κατασκευάζουμε τὴ μεσοκάθετο ἐνὸς δεδομένου εὐθύγραμμου τμήματος ἢ ὅταν κατασκευάζουμε τὴ διχοτόμο μιᾶς δεδομένης γωνίας.

Τις κατασκευές τις πραγματοποιοῦμε γράφοντας ευθείες και κύκλους και στηριζόμενοι στις γνωστές ιδιότητες τῶν σχημάτων.

Τώρα πιά γνωρίζουμε πολλές ιδιότητες των σχετικές με τις ἐγγεγραμμένες γωνίες σ' ἕναν κύκλο, τὴν ὁμοιότητα και τὰ ἐμβαδὰ τῶν σχημάτων. Συνεπῶς εἴμαστε σὲ θέση νὰ πραγματοποιοῦμε και ἄλλες κατασκευές πέρα ἀπ' ὅσες ἔχουμε μάθει.

### § 48. Πρόβλημα.

Δίνεται ἕνα εὐθ. τμήμα  $a$  και μιὰ γωνία  $\omega$ . Νὰ κατασκευασθεῖ τόξο κύκλου, πού νὰ ἔχει χορδὴ ἴση με τὸ  $a$  και νὰ ἐγγράφεται σ' αὐτὸ γωνία ἴση με τὴν  $\omega$ .



σχ. 85.


Σὲ μιὰ ευθεία  $\epsilon$  παίρνουμε τμήμα  $AB = a$  και φέρνουμε πρὸς τὸ ἴδιο μέρος τῆς  $\epsilon$  τις παράλληλες ἡμιευθείες  $AX$  και  $BY$ . Κατασκευάζουμε τώρα τὴ γωνία  $\widehat{YBZ} = \omega$ . Ἡ  $BZ$  τέμνει τὴν  $AX$  στὸ σημεῖο  $\Gamma$  (ἡ γωνία  $\widehat{AGB}$  εἶναι ἴση με  $\omega$  κατὰ τις γνωστές ιδιότητες τῶν παραλλήλων). Κατασκευάζουμε σύμφωνα με τὰ γνωστὰ τὸν περιγεγραμμένο κύκλο τοῦ τριγώνου  $AB\Gamma$  (σχ.85).

Τὸ τόξο  $AGB$  τοῦ κύκλου αὐτοῦ εἶναι τὸ ζητούμενο, γιατί κάθε γωνία  $AMB$  με τὴν κορυφὴ της πάνω σ' αὐτὸ εἶναι ἴση με τὴν  $\widehat{AGB}$ , δηλαδή ἴση με τὴν  $\omega$ .

### § 49. Πρόβλημα 1ο.

Δίνονται δύο τετράγωνα  $AB\Gamma\Delta$  και  $EZH\Theta$ . Νὰ κατασκευασθεῖ ἕνα τετράγωνο, πού νὰ ἔχει ἐμβαδὸ ἴσο με τὸ ἄθροισμα τῶν ἐμβαδῶν τῶν δύο αὐτῶν τετραγώνων.

\*Αν καλέσουμε  $\chi$  τὴν τιμὴ τῆς πλευρᾶς τοῦ τετραγώνου πού ζητεῖται, θὰ πρέπει νὰ εἶναι  $\chi^2 = (AB)^2 + (EZ)^2$ . Ἐπειδὴ αὐτὸ μᾶς ὑπενθυμίζει τὸ πυθαγόρειο θεώρημα, κάνουμε τὴν ἐξῆς κατασκευή. Κατασκευά-




σχ. 86.

ζουμε ένα ορθογώνιο τρίγωνο  $B'A'Γ'$  με κάθετες πλευρές  $A'B' = AB$  και  $A'Γ' = EZ$ . Με πλευρά την ύποτεινυσά του κατασκευάζουμε το τετράγωνο  $B'D'E'Γ'$  (σχ. 86). Αυτό είναι το ζητούμενο, γιατί  $(B'Γ')^2 = (A'B')^2 + (A'Γ')^2$ , δηλαδή  $(B'Γ')^2 = (AB)^2 + (EZ)^2$ .

**Πρόβλημα 2ο.** Δίνονται δύο τετράγωνα  $ABΓΔ$  και  $EZHΘ$  (σχ. 87).

Νά κατασκευασθεῖ ένα τετράγωνο, πὸν νά ἔχει ἔμβαδὸ ἴσο μὲ τὴ διαφορά τῶν δύο αὐτῶν τετραγώνων.




σχ. 87.

τὸ τετράγωνο  $A'B'D'E'$ , τὸ ὁποῖο εἶναι τὸ ζητούμενο.

§ 50. Μερικές φορές μπορούμε νά μετρήσουμε φυσικά μεγέθη με γεωμετρικές κατασκευές.

#### Παράδειγμα:

Μετροῦμε τὸ μήκος τῆς σκιᾶς ἑνὸς δένδρου καὶ τὸ βρίσκουμε 22,5 m.



σχ. 88.

Πώς μπορούμε να μετρήσουμε το ύψος του δένδρου (χωρίς ν' ανεβούμε μέχρι την κορυφή του) χρησιμοποιώντας έναν κατακόρυφο στύλο με μήκος ένα μέτρο; (σχ. 88).

Παριστάνουμε το ύψος του δένδρου με την  $AB$ , κάθετο στην οριζόντια γραμμή, τη σκιά του δένδρου με το τμήμα  $AΓ$ , το στύλο με το  $ΕΔ$  και τη σκιά του με  $ΔΖ$ . Μετρούμε στο έδαφος με μετροταινία τη  $ΔΖ$  και βρίσκουμε  $ΔΖ = 1,5$  m.

Επειδή οι ήλιακές ακτίνες μπορούν να θεωρηθούν παράλληλες λόγω της μεγάλης απόστασεως του ήλιου, θα είναι  $\widehat{\Gamma} = \widehat{Ζ}$ . Τότε όμως τα ὀρθογώνια τρίγωνα  $BAΓ$  και  $ΕΔΖ$  είναι ὅμοια· ἄρα  $\frac{AB}{ΕΔ} = \frac{AΓ}{ΔΖ} \Rightarrow \frac{AB}{1m} = \frac{22,5}{1,5} = 15$ . Το ύψος του δένδρου είναι 15 m.

**Σημείωση:** Λέγεται ότι με παρόμοιο τρόπο ὁ Θαλής μέτρησε τὸ ὕψος τῆς μεγάλης πυραμίδας (σ' ἓνα ταξίδι του στὴν Αἴγυπτο) καὶ ἀπέσπασε τὸ θαυμασμό τῶν Αἰγυπτίων σοφῶν.

### Ἀσκήσεις

- 185) Νὰ κατασκευάσετε ἓνα τόξο κύκλου, στὸ ὁποῖο νὰ ἐγγράφεται γωνία  $45^\circ$ .
- 186) Νὰ διαιρέσετε ἓνα τρίγωνο σὲ δύο ἰσοδύναμα τρίγωνα μὲ μιὰ εὐθεῖα, ποὺ νὰ περνᾷ ἀπὸ μιὰ κορυφή του.
- 187) Δίνονται τρία τετράγωνα. Νὰ κατασκευάσετε ἓνα τετράγωνο, ποὺ νὰ ἔχει ἔμβαδὸ ἴσο μὲ τὸ ἄθροισμα τῶν ἐμβαδῶν τῶν τριῶν τετραγώνων.
- 188) Νὰ κατασκευάσετε ἓνα τετράγωνο, ποὺ ἡ διαγωνίός του εἶναι ἴση μὲ ἓνα γνωστὸ εὐθ. τμήμα  $\delta$ .

# ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV

### Α. ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΩΝ

#### § 51. Εισαγωγή

Στην Α' τάξη μάθαμε για τὰ γεωμετρικὰ στερεά (ἢ ἀπλῶς στερεά) καὶ τὶς διαφορὲς τῶν ἀπὸ τὰ ἀντίστοιχα φυσικὰ στερεά.

Γνωρίσαμε ιδιότητες τῶν γεωμετρικῶν στερεῶν α) τὸ μέγεθός τους ἢ τὴν ἔκτασή τους στὸν τρισδιάστατο χῶρο, β) τὸ σχῆμα τους (τὴ μορφή τους) καὶ γ) τὴ δυνατότητα νὰ ἀλλάζουμε τὴ θέση τους στὸ χῶρο, χωρὶς νὰ μεταβάλλονται τὸ σχῆμα καὶ τὸ μέγεθός τους. (Σὲ μεγαλύτερη τάξη θὰ ἐξετάσουμε λεπτομερέστερα τὴν ιδιότητα αὐτὴ καὶ θὰ μάθουμε, ὅτι σὲ κάθε θέση ὑπάρχει στερεὸ ἴσο μ' αὐτὸ ποὺ μετατοπίζεται). Τέλος γνωρίσαμε διάφορα γεωμετρικὰ σχήματα (εὐθεία, ἐπίπεδο, γωνία, τρίγωνο, κύκλο, πολύγωνο, πρίσματα, πυραμίδες, κύλινδρο, κῶνο καὶ σφαῖρα).

Ἀπὸ τὰ γεωμετρικὰ σχήματα ἄλλα ἔχουν ὅλα τὰ σημεῖα τους στὸ ἴδιο ἐπίπεδο καὶ λέγονται **ἐπίπεδα σχήματα** (ὅπως τὰ: εὐθεία, γωνία, τρίγωνο, πολύγωνο, κύκλος), ἄλλα ὅμως δὲν ἔχουν ὅλα τὰ σημεῖα τους στὸ ἴδιο ἐπίπεδο καὶ λέγονται **μὴ ἐπίπεδα γεωμετρικὰ σχήματα ἢ στερεὰ σχήματα** (ὅπως τὰ: πρίσματα, πυραμίδες, κύλινδροι, κ.ά.).

Τὸ μέρος τῆς γεωμετρίας, ποὺ ἀναφέρεται στὴ μελέτη τῶν ἐπιπέδων σχημάτων, λέγεται **Γεωμετρία τοῦ ἐπιπέδου** (ἢ ἐπιπεδομετρία) καὶ τὸ μέρος τῆς, ποὺ ἀναφέρεται στὶς ιδιότητες καὶ τὶς σχέσεις τῶν γεωμετρικῶν σχημάτων ἐπιπέδων καὶ στερεῶν στὸ χῶρο, λέγεται **Γεωμετρία τοῦ χῶρου**.

Μὲ τὸ δεύτερο αὐτὸ μέρος τῆς γεωμετρίας θὰ ἀσχοληθοῦμε στὴ συνέχεια.

§ 52. Ὁ χῶρος, μέσα στὸν ὁποῖο ἀντιλαμβανόμαστε μὲ τὶς αἰσθήσεις μας τὰ φυσικὰ ἀντικείμενα, ὀνομάζεται αἰσθητὸς χῶρος. Στὸν αἰσθητὸ χῶρο παίρνουμε μιὰ «ιδέα» τοῦ σημείου μὲ τὴν αἰχμὴ μιᾶς λεπτῆς βελόνας, τῆς εὐθείας μὲ ἓνα λεπτὸ τευτωμένο νῆμα καὶ τοῦ ἐπιπέδου μὲ τὴν ἐπιφάνεια ποὺ ἔχει τὸ τζάμι.

Ἀπὸ τὸν αἰσθητὸ χῶρο σχηματίζουμε μὲ τὴ νόηση τὸ **Γεωμετρικὸ χῶρο**, ἂν ἀφαιρέσουμε προοδευτικὰ τὶς αἰσθητὲς ιδιότητες τῶν ἀντικειμένων.

**Στοιχεία** τοῦ γεωμετρικοῦ χώρου εἶναι τὰ **σημεῖα**, οἱ **εὐθεῖες** καὶ τὰ **ἐπίπεδα**.


Τὶς ἰδιότητες τῶν στοιχείων τοῦ γεωμετρικοῦ χώρου τὶς δίνουμε μὲρικὲς βασικὲς προτάσεις, τὶς ὁποῖες ὀνομάζουμε **ἀξιώματα**.

### § 53. Καθορισμὸς μιᾶς εὐθείας στὸ χῶρο.

**Ἀξιώματα:**

1. Ἀπὸ δύο ὁποιαδήποτε διαφορετικὰ σημεῖα τοῦ χώρου διέρχεται μία εὐθεῖα καὶ μόνο μία. (σχ. 89α.)

2. Ἡ εὐθεῖα εἶναι ἀπεριόριστη (δηλαδή τὸ εὐθ. τμήμα AB μπορεῖ νὰ προεκταθεῖ καὶ ἀπὸ τὰ δύο ἄκρα του).



σχ. 89α.

### § 54. Ὅρισμὸς τοῦ ἐπιπέδου.

Ἄν παρατηρήσουμε τὴν ἐπιφάνεια τοῦ νεροῦ ποὺ βρίσκεται σὲ ἡρεμία μέσα σὲ μιὰ δεξαμενὴ ἢ μέσα σ' ἕνα δοχεῖο ἢ τὴν ἐπιφάνεια ποὺ ἔχει τὸ τζάμι, παίρνουμε μιὰ **ιδέα τῆς ἐπιπέδης ἐπιφάνειας**.

Γιὰ νὰ ἐξακριβώσουμε πρακτικὰ ἂν μιὰ ἐπιφάνεια εἶναι ἐπίπεδη, θέτουμε πάνω σ' αὐτὴ ἕνα χάρακα καὶ τὸν μετατοπίζουμε πρὸς διάφορες διευθύνσεις παρατηρώντας ἂν ἡ ἀκμὴ του ἐφαρμόζει σ' ὅλες τὶς θέσεις πάνω στὴν ἐπιφάνεια.


Ἐχομε λοιπὸν στὸ γεωμ. χῶρο τὸ παρακάτω ἀξίωμα:

**Ἐνα ἐπίπεδο ( $p$ ) εἶναι μιὰ ἐπιφάνεια τέτοια ὥστε, ἂν δύο σημεῖα μιᾶς εὐθείας ἀνήκουν στὸ ἐπίπεδο, τότε ὅλὸκληρὴ ἢ εὐθεῖα ἀνήκει στὸ ἐπίπεδο.**

Οἱ εὐθεῖες ἐνὸς ἐπιπέδου εἶναι, ὅπως εἴπαμε, ἀπεριόριστες, ἄρα καὶ τὸ ἐπίπεδο εἶναι μιὰ ἐπιφάνεια ἀπεριόριστη.

### Παράσταση τοῦ ἐπιπέδου.

Ἐπειδὴ τὸ ἐπίπεδο εἶναι μιὰ ἀπεριόριστη ἐπιφάνεια, παριστάνουμε μόνο ἕνα μέρος του συνήθως μὲ ἕνα **ὀρθογώνιο** (σχ. 89). Τὸ ὀρθογώνιο αὐτὸ φαίνεται προοπτικῶς σὰν ἕνα παραλληλόγραμμο. Πάνω σ' αὐτὸ σημειώνουμε ἕνα ἀπὸ τὰ ἐπόμενα λατινικὰ γράμματα ( $p$ ), ( $q$ ), κ.λ.π.




σχ. 89.

**Σημ.** Ἡ παράσταση αὐτὴ τοῦ ἐπιπέδου δὲν πρέπει νὰ μᾶς παρασύρει, ὥστε νὰ λησμονοῦμε πὼς τὸ ἐπίπεδο εἶναι μιὰ ἐπιφάνεια, ποὺ ἐκτείνεται ἀπεριόριστα.

### § 55. Καθορισμός ενός επιπέδου στο χώρο.

**Άξιώμα:** Από τρία σημεία, τα όποια δὲν ἀνήκουν στήν ἴδια εὐθεία, διέρχεται ἓνα καὶ μόνο ἓνα ἐπίπεδο.

Πρακτικά εἶναι εὐκόλο νὰ πετύχουμε τὴν ἀναπαράσταση τοῦ καθορισμοῦ τοῦ ἐπιπέδου. Τροποθετοῦμε μιὰ μεταλλικὴ πλάκα πάνω σὲ τρία ση-




σχ. 90.

μεταλλικὴ πλάκα καὶ οἱ ἐπίπεδες ἐπιφάνειές των θὰ ταυτισθοῦν.


Ἀπ' αὐτὴ καὶ ἄλλες παρόμοιες παρατηρήσεις σὲ φαινόμενα τῆς καθημερινῆς ζωῆς (π.χ. τραπέζια, τρίποδα, καθίσματα κ.ἄ), δικαιολογοῦμε γιὰ τὴν θέσασε στὸν γεωμ. χώρο τὸ παραπάνω ἀξίωμα. Μποροῦμε νὰ συμπεράνουμε ἀκόμη, ὅτι:

**I) Ἀπὸ μιὰ εὐθεία καὶ ἓνα σημεῖο A, ποὺ δὲν ἀνήκει σ' αὐτὴ, διέρχεται ἓνα καὶ μόνο ἓνα ἐπίπεδο.**

Θεωροῦμε μιὰ εὐθεῖα  $\epsilon$  καὶ ἓνα σημεῖο A ποὺ δὲν ἀνήκει σ' αὐτὴ. Ἄν πάρουμε στήν  $\epsilon$  δύο ὁποιαδήποτε σημεῖα B καὶ Γ καὶ θεωρήσουμε



σχ. 91.




σχ. 92.

καὶ τὸ A, ἔχουμε τρία σημεῖα, ποὺ δὲν ἀνήκουν στήν ἴδια εὐθεῖα, καί, ὅπως μάθαμε, αὐτὰ ὀρίζουν ἓνα ἐπίπεδο, τὸ P, στὸ ὁποῖο ἀνήκει καὶ ἡ  $\epsilon$  (γιατί;)


Αὐτὸ μπορούμε νὰ τὸ διαπιστώσουμε καὶ πρακτικά, ἂν στηρίξουμε μιὰ ἐπίπεδη μεταλλικὴ πλάκα πάνω σ' ἓνα τευτωμένο νῆμα (συρμάτινο)  $\epsilon$  καὶ σ' ἓνα σημεῖο A (ἄκρο ἀκίδας), τὸ ὁποῖο δὲν ἀνήκει στὸ νῆμα. Τὸ ἐπίπεδο, ὅταν στρέφεται γύρω ἀπὸ τὴν  $\epsilon$ , μπορεῖ νὰ περάσει ἀπὸ κάθε νέα θέση τοῦ σημείου A (σχ. 92).

II) Από δύο εὐθείες, που τέμνονται, διέρχεται ένα μόνο επίπεδο.

Αυτό συμβαίνει, γιατί έχουμε τρία σημεία, τὰ  $O$ ,  $A$  και  $B$  τὰ ὁποῖα δὲν ἀνήκουν στὴν ἴδια εὐθεῖα.




σχ. 93.



σχ. 94.

Μποροῦμε νὰ τὸ διαπιστώσουμε αὐτὸ και πρακτικὰ, ἂν τοποθετήσουμε μιὰ μεταλλικὴ πλάκα πάνω σὲ δύο συρμάτινα νήματα, τὰ ὁποῖα ἔχουν ἓνα κοινὸ σημεῖο, ὁπότε θὰ δοῦμε ὅτι στηρίζεται πάνω σ' αὐτὰ (σχ. 94).

III) Από δύο παράλληλες εὐθείες διέρχεται ένα μόνο επίπεδο.



σχ. 95.

Αὐτὸ εἶναι φανερό, γιατί δύο παράλληλες εὐθεῖες, ἀπὸ τὸν ὀρισμὸ, ἀνήκουν στοῦ ἴδιο ἐπίπεδο (σχ. 95).

Ὡστε τὸ ἐπίπεδο ὀρίζεται:

I. Από τρία σημεία, τὰ ὁποῖα δὲν ἀνήκουν στὴν ἴδια εὐθεῖα.

II. Από μία εὐθεῖα και ἓνα σημεῖο, τὸ ὁποῖο δὲν ἀνήκει σ' αὐτήν.

III. Από δύο εὐθεῖες, που τέμνονται.

IV. Από δύο παράλληλες εὐθεῖες.

### Θέσεις εὐθειῶν και ἐπιπέδων

§ 56. I. Σχετικὲς θέσεις εὐθειῶν στοῦ χῶρο.


A. Δύο διαφορετικὲς εὐθεῖες  $\epsilon_1$ ,  $\epsilon_2$  μποροῦν νὰ ἔχουν τὶς ἐξῆς θέσεις:

α) Νὰ ἀνήκουν στοῦ ἴδιο ἐπίπεδο (νὰ εἶναι συνεπίπεδες).


β) Νὰ μὴν ἀνήκουν στοῦ ἴδιο ἐπίπεδο.

Στὴν πρώτη περίπτωση οἱ εὐθεῖες θὰ τέμνονται ἢ θὰ εἶναι παράλληλες.

Στὴ δεύτερη περίπτωση δὲν τέμνονται και δὲν εἶναι παράλληλες. Τότε οἱ εὐθεῖες  $\epsilon_1$  και  $\epsilon_2$  λέγονται **ἀσύμβατες** εὐθεῖες (ἢ στρεβλὲς ἢ μὴ συνεπίπεδες) (σχ. 96, 97).



σχ. 96.




σχ. 97.




II. Τρεῖς ἢ περισσότερες εὐθεῖες μποροῦν:


α) Νά εἶναι συνεπίπιδες (σχ. 98).



σχ. 98.



σχ. 99.



σχ. 100.


β) Νά περνοῦν ἀπό τὸ ἴδιο σημεῖο, χωρὶς νά εἶναι συνεπίπιδες (σχ. 99).

γ) Νά εἶναι ἀνά δύο παράλληλες χωρὶς νά εἶναι συνεπίπιδες. (Σ' αὐτὴ τὴν περίπτωση ἔχουν τὶς ἰδιότητες τῆς παραλληλίας, τὶς ὁποῖες μάθαμε) (σχ. 100).

### § 57. Σχετικὲς θέσεις εὐθείας καὶ ἐπιπέδου

#### α' περίπτωση:


Ἐάν μιὰ εὐθεῖα  $\epsilon$  ἔχει δύο κοινὰ σημεῖα Α καὶ Β μὲ ἓνα ἐπίπεδο (P), ἀνήκει στοῦ ἐπίπεδο αὐτό, ὅπως μάθαμε κατὰ τὸν ὄρισμὸ τοῦ ἐπιπέδου (σχ. 101).



σχ. 101.

#### β' περίπτωση:


Ἐάν μιὰ εὐθεῖα  $\epsilon$  ἔχει ἓνα μόνο κοινὸ σημεῖο Μ μὲ τὸ ἐπίπεδο (P), λέμε ὅτι ἡ εὐθεῖα εἶναι τέμνει τὸ ἐπίπεδο αὐτό ἢ ὅτι τὸ ἐπίπεδο (P) τέμνει τὴν εὐθεῖα  $\epsilon$ . Τὸ κοινὸ σημεῖο τους Μ λέγεται **σημεῖο τομῆς ἢ ἴχνος** (σχ. 102).



σχ. 102.

#### γ' περίπτωση:


Ἐάν τέλος μιὰ εὐθεῖα  $\epsilon$  δὲν ἔχει κανένα κοινὸ σημεῖο μὲ τὸ ἐπίπεδο (P), λέμε ὅτι εἶναι παράλληλος πρὸς τὸ ἐπίπεδο αὐτό. (σχ. 103).



σχ. 103.

### § 58. Ἡ ἔννοια τοῦ ἡμίχωρου.

Ἐνα ἐπίπεδο  $P$ , ἐπειδὴ προεκτείνεται ἀπεριόριστα πρὸς ὅλες τὶς διευθύνσεις, χωρίζει τὸ χῶρο σὲ δύο περιοχὲς  $\Sigma_1$  καὶ  $\Sigma_2$ . Αὐτὲς οἱ δύο περιοχὲς λέγονται **ἡμίχωροι** (σχ. 104).




σχ. 104.

Ἄν δύο σημεῖα  $A$  καὶ  $A'$  ἀνήκουν ἀντιστοίχως στοὺς ἡμίχωρους  $\Sigma_1$  καὶ  $\Sigma_2$ , ἡ εὐθεῖα  $AA'$  τέμνει τὸ ἐπίπεδο σ' ἓνα σημεῖο  $M$ , μεταξύ τῶν  $A$  καὶ  $A'$ , τὸ ὁποῖο καλοῦμε σημεῖο τομῆς τῆς εὐθείας καὶ τοῦ ἐπιπέδου. Ἡ ἡμιευθεῖα  $MA$  περιέχεται στὸν ἡμίχωρο  $\Sigma_1$  καὶ ἡ  $MA'$  περιέχεται στὸν ἡμίχωρο  $\Sigma_2$ .

### § 59. Σχετικὲς θέσεις ἐπιπέδων

A'. Δύο ἐπιπέδων.

α) Ἄν δύο διαφορετικὰ ἐπίπεδα  $(p)$  καὶ  $(q)$  ἔχουν κοινὰ δύο σημεῖα  $A, B$ , θὰ ἔχουν κοινὴ καὶ τὴν εὐθεῖα  $AB$  (γιατί;). Τότε λέμε ὅτι τὰ ἐπίπεδα  $(p)$  καὶ  $(q)$  τέμνονται κατὰ τὴν εὐθεῖα  $AB$ . Ἡ εὐθεῖα αὐτὴ λέγεται **τομὴ** τῶν δύο ἐπιπέδων.




σχ. 105.

Τὰ ἐπίπεδα  $(p)$  καὶ  $(q)$  δὲν ἔχουν ἄλλο κοινὸ σημεῖο  $\Gamma$ , τὸ ὁποῖο νὰ βρῖσκεται ἔκτος τῆς εὐθείας  $AB$ , γιατί τότε θὰ εἶχαν τρία κοινὰ σημεῖα, ποὺ δὲν ἀνήκουν στὴν ἴδια εὐθεῖα, καὶ θὰ ταυτίζονταν. Αὐτὸ ὅμως δὲν εἶναι δυνατόν, γιατί τὰ ἐπίπεδα  $(p)$  καὶ  $(q)$  εἶναι διαφορετικὰ. Τὰ ἐπίπεδα  $(p)$  καὶ  $(q)$  λέγονται **τεμνόμενα** (σχ. 105).

**Σημ.** Ἄν δύο διαφορετικὰ ἐπίπεδα ἔχουν ἓνα κοινὸ σημεῖο, τέμνονται κατὰ μίαν εὐθεῖα, ἡ ὁποία περνᾷ ἀπὸ τὸ σημεῖο αὐτό. (Ἄξίωμα).


β) Δύο ἐπίπεδα, τὰ ὁποῖα δὲν ἔχουν κοινὸ σημεῖο, λέγονται **παράλληλα**  $[(p) \parallel (q)]$ . (σχ. 106).




σχ. 106.

B'. Περισσότερων ἀπὸ δύο ἐπιπέδων.

α) Τρία ἢ περισσότερα ἐπίπεδα μποροῦν νὰ περνοῦν ἀπὸ τὸ ἴδιο σημεῖο (σχ. 107), ἢ ἀπὸ μίαν εὐθεῖα (σχ. 108).



σχ. 107.




σχ. 108.

β) Ἄν δύο διαφορετικὰ ἐπίπεδα εἶναι παράλληλα πρὸς ἓνα τρίτο, εἶναι καὶ μεταξύ τους παράλληλα. Μποροῦν συνεπῶς καὶ περισσότερα ἀπὸ δύο ἐπίπεδα νὰ εἶναι ἀνὰ δύο παράλληλα. Παράδειγμα: Οἱ ὀροφές (ἢ τὰ δάπεδα) τῶν ὀρόφων μιᾶς πολυκατοικίας παράλληλες πρὸς τὴν ὀροφή τοῦ α' ὀρόφου (ἢ τὸ ἔδαφος) εἶναι καὶ μεταξύ τους παράλληλες. (Σχ. 109).



σχ. 109.

### § 59α. Διέδρη γωνία — Πολύεδρη (στερεά) γωνία




σχ. 109α.

Διέδρη γωνία εἶναι τὸ σχῆμα, πού ὀρίζουν δύο ἡμιεπίπεδα μὲ κοινὴ ἀρχικὴ εὐθεία. Τὴν ἀρχικὴ εὐθεία τὴν ὀνομάζουμε ἀκμὴ τῆς διέδρης γωνίας καὶ τὰ ἡμιεπίπεδα ἔδρες τῆς.


Ἡ P-ΧΨ-Q εἶναι μιὰ διέδρη γωνία. Ἡ ἀκμὴ τῆς εἶναι ἡ εὐθεία χψ καὶ οἱ ἔδρες τῆς τὰ ἡμιεπίπεδα P καὶ Q (σχ. 109α). Δύο ἐπίπεδα, πού τέμνονται, ὀρίζουν τέσσερες διαδοχικὲς διέδρες γωνίες (σχ. 105).

Τρεῖς ἡμιευθεῖες μὲ κοινὴ ἀρχή, πού δὲν ἀνήκουν στὸ ἴδιο ἐπίπεδο, ὀρίζουν τρεῖς διαδοχικὲς ἀλλὰ μὴ συνεπίπεδες γωνίες. Τὸ σχῆμα τῶν τριῶν αὐτῶν γωνιῶν τὸ ὀνομάζουμε τρίεδρη στερεὰ γωνία καὶ τὶς τρεῖς ἐπίπεδες γωνίες ἔδρικες γωνίες τῆς. Στὸ σχῆμα 109β οἱ ἡμιευθεῖες OX, OΨ, OZ ὀρίζουν τὴν τρίεδρη γωνία O.XΨZ μὲ ἔδρικες γωνίες τὶς  $\widehat{XO\Psi}$ ,  $\widehat{\Psi OZ}$ ,  $\widehat{ZOX}$ . Τὸ σημεῖο O τὸ λέμε κορυφὴ τῆς τρίεδρης γωνίας.



σχ. 109β.

Περισσότερες ἀπὸ τρεῖς ἡμιευθεῖες μὲ κοινὴ ἀρχή, ἀλλὰ μὴ συνεπίπεδες



ανά τρεῖς, ὀρίζουν ἰσάριθμὲς τοὺς ἐπίπεδες διαδοχικὲς γωνίες, ποὺ δὲν εἶναι στὸ ἴδιο ἐπίπεδο. Τὸ σχῆμα τῶν γωνιῶν αὐτῶν τὸ λέμε πολυέδρη στερεὰ γωνία καὶ τὶς γωνίες ἑδρικές γωνίες τῆς πολυέδρης.

Ἡ  $O.AB\Gamma\Delta E$  εἶναι μιὰ πολυέδρη (πεντάεδρη) στερεὰ γωνία μὲ ἑδρικές γωνίες τὶς  $\widehat{AOB}$ ,  $\widehat{BO\Gamma}$ ,  $\widehat{\Gamma O\Delta}$ ,  $\widehat{\Delta O E}$ ,  $\widehat{EOA}$  (σχ. 109 γ).

### Ἀσκήσεις

189) Στὴν αἴθουσα διδασκαλίας νὰ βρεῖτε εὐθεῖες α) παράλληλες, β) τεμνόμενες καὶ γ) ἀσύμβατες.

190) Στὴν αἴθουσα διδασκαλίας νὰ ὀρίσετε τὰ ζεύγη τῶν τεμνόμενων ἐπιπέδων καὶ τὰ ζεύγη τῶν παράλληλων ἐπιπέδων.

191) Ἔχουμε τέσσερα σημεῖα  $A, B, \Gamma, \Delta$ , τὰ ὅποια δὲν ἀνήκουν στὸ ἴδιο ἐπίπεδο. Βρεῖτε τὴν τομὴ τῶν ἐπιπέδων  $AB\Gamma$  καὶ  $AB\Delta$ .

192) Κατασκευάστε τρεῖς παράλληλες εὐθεῖες  $\epsilon_1, \epsilon_2$  καὶ  $\epsilon_3$  α) ὅταν ἀνήκουν στὸ ἴδιο ἐπίπεδο, β) ὅταν δὲν ἀνήκουν ὅλες στὸ ἴδιο ἐπίπεδο (π.χ. μὲ νήματα τοποθετημένα παράλληλα).




193) Δίνονται ἕνα ἐπίπεδο ( $\rho$ ) καὶ μιὰ εὐθεῖα  $\epsilon$  παράλληλη πρὸς αὐτό. Τὸ τυχόν σημεῖο  $M$  τοῦ ἐπιπέδου ( $\rho$ ) ὀρίζει μὲ τὴν  $\epsilon$  ἕνα ἐπίπεδο ( $q$ ), τὸ ὁποῖο τέμνει τὸ ( $\rho$ ) κατὰ μιὰ εὐθεῖα  $\delta$ . Ποιὰ εἶναι ἡ σχετικὴ θέση τῶν εὐθειῶν αὐτῶν  $\epsilon$  καὶ  $\delta$ ; (γιατί;)

## Β'. ΕΥΘΕΙΑ ΚΑΘΕΤΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ—ΚΑΘΕΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΠΕΔΩΝ

### § 60. Γωνία δύο ἀσύμβατων εὐθειῶν.

Θεωροῦμε δύο ἀσύμβατες εὐθεῖες τοῦ χώρου  $xx'$  καὶ  $yy'$ . Ἀπὸ ἕνα ὁποιοδήποτε σημεῖο τῆς μιᾶς φέρνουμε παράλληλο πρὸς τὴν ἄλλη. Σχηματίζονται τότε τέσσερες κυρτές γωνίες, ἀπὸ τὶς ὁποῖες δύο εἶναι ὀξείες (ἴσες) καὶ δύο ἀμβλεῖες (ἴσες) ἢ καὶ οἱ τέσσερες εἶναι ὀρθές (σχ. 110).

Γωνία δύο ἀσύμβατων εὐθειῶν  $xx'$  καὶ  $yy'$  ὀνομάζουμε τὴν ὀξεία (ἢ τὴν ὀρθή) γωνία, τὴν ὁποία σχηματίζουν οἱ  $yy'$  καὶ ἡ παράλληλος  $X'X'$  πρὸς τὴν  $xx'$ , ἢ ὁποία περνᾷ ἀπὸ τὸ σημεῖο  $O$  τῆς  $yy'$ .




"Αρα η γωνία τῶν δύο εὐθειῶν  $\chi\chi'$  καὶ  $\psi\psi'$  εἶναι ἡ γωνία  $(OX, OY)$  (σχ. 110).

Δύο εὐθεῖες λέγονται **ὀρθογώνιες**, ὅταν ἡ γωνία τους εἶναι ὀρθή (σχ. 111).


"Αν δύο εὐθεῖες τέμνονται καὶ εἶναι ὀρθογώνιες, εἶναι **κάθετες**. Σὰν παράδειγμα ὀρθογώνιων εὐθειῶν ἀναφέρουμε τὶς μὴ παράλληλες ἀκμές ἐνὸς κύβου (σχ. 112).

### § 61. Καθετότητα εὐθείας καὶ ἐπιπέδου.

Μία εὐθεῖα, ἡ ὁποία τέμνει ἓνα ἐπίπεδο ( $\rho$ ) σ' ἓνα σημεῖο  $O$ , λέγεται **κάθετη** σ' αὐτό, ἂν εἶναι κάθετη σὲ ὅλες τὶς εὐθεῖες τοῦ ἐπιπέδου, πού περνοῦν ἀπὸ τὸ  $O$ .




σχ. 113.



σχ. 114.

Μποροῦμε νὰ διαπιστώσουμε ὅτι ἡ  $\epsilon$  εἶναι ὀρθογώνια πρὸς ὅλες τὶς εὐθεῖες τοῦ ( $\rho$ ). (σχ. 113).

Ἡ κατακόρυφη τομὴ  $AB$  δύο τοίχων τῆς σχολικῆς αἴθουσας εἶναι κάθετη στὶς τομές  $BZ$  καὶ  $BE$  τῶν ἐπιπέδων τῶν τοίχων καὶ τοῦ ἐπιπέδου τοῦ πατώματος. Μὲ τὸ γνῶμονα διαπιστώνουμε ὅτι ἡ  $AB$  εἶναι κάθετη σὲ ὅλες τὶς εὐθεῖες τοῦ πατώματος, πού περνοῦν ἀπὸ τὸ  $B$ . Συνεπῶς ἡ εὐθεῖα  $AB$  εἶναι κάθετη στοῦ πάτωμα. Τὸ ἴδιο παρατηροῦμε γιὰ τὴν εὐθεῖα περιστροφῆς ( $\Gamma\Delta$ ) (εὐθεῖα πού περνᾷ ἀπὸ τοὺς στροφεῖς τῆς) τῆς πόρτας τῆς αἴθουσας (σχ. 114). "Αν τὴν ἀνοιγοκλείσουμε καὶ σημειώσουμε μὲ κίμωνία στὸ πάτωμα τὶς διάφορες θέσεις τῆς κάτω εὐθύγραμμης ἀκμῆς τῆς πόρτας, θὰ παρατηρήσουμε ὅτι οἱ γωνίες, πού σχηματίζονται ἀπὸ τὶς




σχ. 115.

ήμιευθείες αυτές και την ευθεία περιστροφής της πόρτας, όταν μετρηθούν με το γνώμονα, είναι ὀρθές. Ἄρα ἡ ευθεία ΓΔ εἶναι κάθετη στοῦ ἐπίπεδο τοῦ πατώματος. Γιὰ νὰ αἰτιολογήσουμε τὶς παραπάνω παρατηρήσεις, στερεώνουμε δύο γνῶμονες τὸν ἕνα πάνω στὸν ἄλλο ἔτσι, ὥστε νὰ ἔχουν μιὰ κοινὴ πλευρὰ ΑΒ τῆς ὀρθῆς γωνίας καὶ τοὺς τοποθετοῦμε πάνω στοῦ ἐπίπεδο με τρόπο ὥστε τὸ Α νὰ συμπίπτει με τὸ Ο καὶ οἱ πλευρὲς ΟΓ καὶ ΟΓ' νὰ βρίσκονται στοῦ ἐπίπεδο (σχ. 115). Ἡ κοινὴ πλευρὰ τῶν δύο γνωμόνων εἶναι κάθετη στὶς ευθείες ΟΓ καὶ ΟΓ' τοῦ ἐπιπέδου στοῦ Ο ( $OB \perp OG$  καὶ  $OB \perp OG'$ , γιατί εἶναι κάθετες πλευρὲς ὀρθογωνίου τριγώνου).

Μὲ ἕνα τρίτο γνῶμονα διαπιστώνουμε ὅτι ἡ ευθεία ΟΒ εἶναι κάθετη σὲ κάθε ευθεία τοῦ ἐπιπέδου αὐτοῦ (σχ. 115), πού περνᾷ ἀπὸ τὸ κοινὸ σημεῖο Ο τῶν δύο ευθειῶν τοῦ ΟΓ, ΟΓ', ἄρα εἶναι κάθετη στοῦ ἐπίπεδο (ρ).

**Ἄν μιὰ ευθεία εἶναι κάθετη σὲ δύο ευθείες ἐνὸς ἐπιπέδου, οἱ ὁποῖες τέμνονται, εἶναι κάθετη στοῦ ἐπίπεδο αὐτό.** (Ἡ πρόταση αὐτὴ εἶναι σπουδαῖο θεώρημα τῆς Γεωμετρίας τοῦ χώρου).



σχ. 116.


**Σημείωση.** Μιὰ ευθεία ε κάθετη σὲ μιὰ ευθεία α τοῦ ἐπιπέδου (ρ) εἶναι δυνατόν νὰ εἶναι κάθετη στοῦ ἐπίπεδο, ἀλλὰ εἶναι δυνατό καὶ νὰ μὴν εἶναι ἢ νὰ ἀνήκει σ' αὐτό. Ἄν μιὰ ευθεία τέμνει ἕνα ἐπίπεδο χωρὶς νὰ εἶναι κάθετη σ' αὐτό, λέγεται **πλάγια** πρὸς τὸ (ρ) (σχ. 116).

## § 62. Ἰδιότητες τῆς καθέτου – (θεωρήματα)


Ἄν χρησιμοποιήσουμε τὸ σύστημα με τοὺς γνῶμονες τῆς § 61, καταλήγουμε στὰ ἑξῆς συμπεράσματα:

α) Ἄπὸ ἕνα σημεῖο Ο τοῦ ἐπιπέδου μπορούμε νὰ φέρουμε μόνο **μιὰ** ευθεία κάθετη στοῦ ἐπίπεδο.

β) Δύο ευθείες ε καὶ ε' κάθετες στοῦ ἴδιο ἐπίπεδο (ρ) εἶναι παράλληλες (σχ. 117).




σχ. 117.




σχ. 118.

γ) Ἄπὸ ἕνα σημεῖο Α μπορούμε νὰ φέρουμε μιὰ μόνο κάθετο σ' ἕνα ἐπίπεδο, εἴτε τὸ σημεῖο Α ἀνήκει σ' αὐτό εἴτε ὄχι (σχ. 118).

δ) Από ένα σημείο μπορούμε να φέρουμε ένα επίπεδο κάθετο σε μία ευθεία. Το σημείο αυτό είναι δυνατό να ανήκει στην  $AB$  ή να μην ανήκει σ' αυτή.




σχ. 119.



σχ. 120.

Με το σύστημα τῶν δύο γνωμόνων μπορούμε να ὀρίσουμε τὴ θέση τοῦ ἐπιπέδου αὐτοῦ, ὅπως φαίνεται στὰ σχήματα 119 καὶ 120.



σχ. 121.

ε) Δύο ἐπίπεδα κάθετα στὴν ἴδια εὐθεία εἶναι παράλληλα (γιατί;). Ἄν τέμνονταν στὸ  $A$ , θὰ εἴχαμε ἀπ' αὐτὸ δύο ἐπίπεδα κάθετα στὴν ἴδια εὐθεία.


ζ) Μία εὐθεία κάθετη στὸ ἓνα ἀπὸ δύο παράλληλα ἐπίπεδα εἶναι κάθετη καὶ στὸ ἄλλο.

### § 63. Ἀπόσταση σημείου ἀπὸ ἐπίπεδο

Εἶπαμε ὅτι ἀπὸ ἓνα σημεῖο π.χ.  $O$ , ποὺ δὲν ἀνήκει σ' ἓνα ἐπίπεδο ( $p$ ), μπορούμε νὰ φέρουμε μιὰ μόνο κάθετο στὸ ἐπίπεδο, τὴν  $OD$ .

Ἄν ἀπὸ τὸ  $O$  φέρουμε καὶ διάφορες πλάγιες πρὸς τὸ ἐπίπεδο, θὰ διαπιστώσουμε εὐκολα ὅτι ἡ κάθετος εἶναι μικρότερη ἀπὸ κάθε τέτοια πλάγια (σχ. 122).

Τὸ μῆκος τοῦ εὐθ. τμήματος  $OD$  τῆς καθέτου, ἢ ὁποῖα φέρεται ἀπὸ τὸ σημεῖο  $O$  πρὸς τὸ ἐπίπεδο, λέγεται **ἀπόσταση** τοῦ σημεῖο  $O$  ἀπὸ τὸ ἐπίπεδο. (Τὸ ἴχνος  $\Delta$  τῆς καθέτου  $OD$  λέγεται **προβολή** τοῦ  $A$  πάνω στὸ ἐπίπεδο ( $p$ )).



σχ. 122.

### § 64. Καθετότητα ἐπιπέδων


Εἶπαμε στὴν προηγούμενη § 61 ὅτι ἡ εὐθεία, ποὺ περνᾷ ἀπὸ τοὺς

στροφείς τῆς σχολικῆς αἴθουσας, εἶναι κάθετη στοῦ ἐπίπεδο τοῦ πατώματος. Τότε τὸ ἐπίπεδο  $\Theta$  τῆς πόρτας αὐτῆς λέγεται **ἐπίπεδο κάθετο** πρὸς τὸ ἐπίπεδο τοῦ πατώματος (γιατὶ τοποθετήθηκε μὲ τέτοιον τρόπο, ὥστε νὰ περιέχει τὴ  $\Gamma\Delta$ , πού εἶναι κάθετος στοῦ **ὀριζόντιο** ἐπίπεδο τοῦ πατώματος, δηλαδὴ ἡ  $\Gamma\Delta$  εἶναι κατακόρυφη (σχ. 114).

Τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ γιὰ τοὺς τοίχους τῆς αἴθουσας διδασκαλίας (ἢ τοῦ σπιτιοῦ), οἱ ὅποιοι κατασκευάστηκαν ἔτσι, ὥστε νὰ περιέχουν **κατακόρυφες** εὐθείες, δηλαδὴ εὐθείες κάθετες στοῦ ὀριζόντιο ἐπίπεδο τοῦ πατώματος ἢ τῆς ὀροφῆς. (Σημ. Οἱ κτίστες κατὰ τὴν κατασκευὴ τῶν τοίχων μιᾶς οἰκοδομῆς χρησιμοποιοῦν τὸ **νῆμα** τῆς **στάθμης**, γιὰ νὰ πετύχουν ὥστε οἱ τοίχοι νὰ εἶναι κατακόρυφοι, δηλαδὴ κάθετοι στὴν ὀριζόντια ἐπιφάνεια τοῦ πατώματος).

Ἀπὸ ὅσα ἀναφέραμε παραπάνω συμπεραίνουμε γενικά ὅτι: **Ἐνα ἐπίπεδο (p) λέγεται κάθετο πρὸς ἕνα ἄλλο ἐπίπεδο (q), ἂν περιέχει μιὰ εὐθεῖα κάθετη στοῦ (q)** (σχ. 123).

Μποροῦμε νὰ διαπιστώσουμε ὅτι ἂν  $(p) \perp (q)$ , τότε καὶ  $(q) \perp (p)$ . Ἄρα στὴν καθετότητα τῶν ἐπιπέδων ἰσχύει ἡ συμμετρικὴ ιδιότητα, δηλαδὴ:  $(p) \perp (q) \Leftrightarrow (q) \perp (p)$ .



σχ. 123.

### Ἀσκήσεις

194) Βρεῖτε μέσα στὴν αἴθουσα


α) Ἐπίπεδα κάθετα β) ἕνα ἐπίπεδο παράλληλο πρὸς τὸ πάτωμά της, γ) ἐπίπεδα ὀριζόντια καὶ κατακόρυφα καὶ δ) εὐθείες κάθετες σὲ ἐπίπεδο.

195) Δίνεται ἕνα ἐπίπεδο (p) καὶ ἕνα σημεῖο B, πού δὲν ἀνήκει σ' αὐτό. Ἀπὸ τὸ σημεῖο B φέρουμε τὴν κάθετο BA στοῦ ἐπίπεδο (p) καὶ τὴν πλάγια πρὸς αὐτό BΓ. Ἄν τὸ μήκος τῆς BA εἶναι 6 cm καὶ τῆς BΓ 10 cm, νὰ ὑπολογίσετε τὸ μήκος τῆς ΑΓ.


196) Δίνεται μιὰ εὐθεῖα ε, στὴν ἀποία παίρνουμε ἕνα σημεῖο A. Στὸ σημεῖο αὐτὸ μπορούμε νὰ φέρουμε στοῦ χώρου ἄπειρες καθετοὺς στὴν ε.

Ἐξετάστε τὸ εἶδος τοῦ σχήματος, πού παράγεται ἀπὸ τὶς καθετοὺς αὐτές. (Διατυπῶστε τὰ συμπεράσματά σας).

197) Δίνεται ἕνα ἐπίπεδο (p). Ἐστω μιὰ εὐθεῖα, ἡ ὅποια τέμνει τὸ ἐπίπεδο σ' ἕ-



σχ. 124.





σχ. 125.



να σημείο  $A$  και είναι κάθετη στο  $(\rho)$ . Από ένα σημείο  $B$  τής  $\epsilon$  φέρνουμε την κάθετο  $B\Gamma$  σε μία οποιαδήποτε ευθεία  $\Gamma\Delta$  του επιπέδου  $(\rho)$ . Ξεθάσσε αν οι  $A\Gamma$  και  $\Gamma\Delta$  είναι κάθετες. (Με τη βοήθεια τών τριών γνωμόνων τής § 61).

198) Δίνεται ένα επίπεδο  $(\rho)$ . Αν από ένα σημείο  $A$  του επιπέδου φέρουμε την κάθετο  $A\Gamma$  σε μία ευθεία του, να δείξετε ότι η ευθεία, η όποια συνδέει το σημείο  $\Gamma$  με ένα οποιοδήποτε σημείο  $B$  τής καθέτου προς το επίπεδο στο  $A$ , είναι κάθετη στην  $\Gamma\Delta$  (Σχ. 124). (Με τη βοήθεια τών γνωμόνων).


199) Δίνεται ένα επίπεδο  $(\rho)$ . Αν από ένα σημείο  $B$ , που δέν ανήκει στο επίπεδο, φέρουμε την κάθετο  $B\Gamma$  σε μία ευθεία  $\Gamma\Delta$  του επιπέδου αυτού κι έπειτα φέρουμε την κάθετο  $\Gamma\Lambda$  (ή όποια ανήκει στο  $(\rho)$ ) στη  $\Gamma\Delta$ , δείξετε ότι η κάθετος που φέρεται από το  $B$  προς την  $\Gamma\Lambda$  είναι κάθετος στο επίπεδο  $(\rho)$ . (Σχήμα 125). (Με τη βοήθεια τών γνωμόνων).



ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ

A. ΕΜΒΑΔΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΓΚΟΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΠΙΠΕΔΟΥ


§ 65. **Όρθογώνιο παραλληλεπίπεδο** είναι ένα στερεό, το οποίο αποτελείται από 6 όρθογώνια (σε τρόπο ώστε κάθε πλευρά καθενός να είναι κοινή ενός μόνο άλλου). Τα όρθογώνια αυτά ονομάζονται έδρες (ή βάσεις) του όρθογωνίου παραλ/δου. Οι πλευρές των όρθογωνίων λέγονται άκμές. **Διαστάσεις** του παραλληλεπιπέδου λέγονται τα μήκη των τριών άκμών, που περνούν από την ίδια κορυφή. 'Η μιá άπ' αυτές λέγεται μήκος, ή άλλη πλάτος και ή τρίτη ύψος. π.χ. στο σχ.126 οι  $AB = \alpha$ ,  $AD = \beta$  και  $AA' = \gamma$ .



σχ. 126.

**Διαγώνιο** του όρθογ. παραλ/δου ονομάζουμε το ευθ. τμήμα, το οποίο όρίζουν δύο κορυφές του, που δεν ανήκουν στην ίδια έδρα.


Μπορούμε να μελετήσουμε τις ιδιότητες του όρθ. παραλ/δου με τη



σχ. 127.



σχ. 128.



σχ. 129.

βοήθεια ενός στερεομετρικού υποδείγματος (μοντέλου) όρθογωνίου παραλληλεπιπέδου, με ύλοποιημένες μόνο τις άκμές του (π.χ. από σκληρό σύρμα) και στο οποίο οι διαγώνιες είναι κατασκευασμένες από νήματα.

α) Οι άκμές του όρθ. παραλ/δου που είναι παράλληλες, είναι ίσες.

β) Οι άπέναντι έδρες του είναι παράλληλες και ίσες.

γ) Οι διαγώνιοί του περνούν από το ίδιο σημείο, το οποίο είναι το μέσο κάθε μιáς άπ' αυτές και λέγεται **κέντρο** του όρθογωνίου παραλ-

ληλεπιπέδου (είναι και κέντρο συμμετρίας του).

**Σημ.** Οι παραπάνω ιδιότητες ισχύουν για όλα τα παραλληλεπίπεδα, όπως θα δούμε στα επόμενα μαθήματα.

δ) Οί διαγώνιοι του ὀρθογωνίου παραλληλεπιπέδου είναι ίσες.

Μπορούμε να υπολογίσουμε το μήκος τῆς διαγωνίου ἑνὸς ὀρθογωνίου παραλληλεπιπέδου συναρτήσει τῶν διαστάσεων του.

Γιὰ νὰ υπολογίσουμε τὴ διαγώνιο  $ΑΓ' = \delta$  τοῦ ὀρθογωνίου παραλληλεπιπέδου  $ΑΒΓΔΑ'Β'Γ'Δ'$  (σχ. 127), ἐφαρμόζουμε τὸ πυθαγόρειο θεώρημα στὰ ὀρθογώνια τρίγωνα  $ΑΒΓ$  καὶ  $ΑΓΓ'$  (τὸ τρίγωνο  $ΑΓΓ'$  εἶναι ὀρθογώνιο, γιατί ἡ  $ΓΓ'$  εἶναι κάθετος στὸ ἐπίπεδο  $ΑΒΓΔ$ , ἄρα κάθετος καὶ στὴν  $ΓΑ$ . Ἐπομένως ἡ γωνία  $ΑΓΓ' = 1$  ὀρθή.)

$$\begin{aligned} \text{Ἔτσι ἔχουμε: } ΑΓ'^2 &= ΑΓ^2 + ΓΓ'^2 \text{ καὶ } ΑΓ^2 = ΑΒ^2 + ΒΓ^2. \text{ Ἄρα } ΑΓ'^2 = \\ &= ΑΒ^2 + ΒΓ^2 + ΓΓ'^2 \Rightarrow \delta^2 = \alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 \text{ καὶ ἔπομένως } \delta = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2}. \end{aligned}$$


Ἡ ἀπόσταση τῶν δύο ἀπέναντι ἑδρῶν ἑνὸς ὀρθογωνίου παραλληλεπιπέδου λέγεται ὕψος αὐτοῦ.

Ἐμβαδὸ τῆς ἐπιφάνειας τοῦ ὀρθογωνίου παρ/δου εἶναι τὸ ἄθροισμα τῶν ἐμβαδῶν τῶν ἑδρῶν του.

Ἀνάπτυγμα ὀρθογωνίου παραλληλεπιπέδου εἶναι ἡ ἐπίπεδη ἐπιφάνεια, τὴν ὁποία παίρνουμε, ἂν τὸ κόψουμε κατὰ μῆκος τῆς  $ΒΓ$  καὶ τῶν  $ΒΒ'$ ,  $ΒΑ$ ,  $Α'Β'$ ,  $ΓΔ$ ,  $Δ'Γ'$ ,  $ΓΓ'$  καὶ τὸ ἀναπτύξουμε (ξεδιπλώσουμε) σ' ἓνα ἐπίπεδο (σχ. 128, 129).

### § 66. Ἐμβαδὸ τῆς ἐπιφάνειας ὀρθογωνίου παραλληλεπιπέδου

Θεωροῦμε ἓνα ὀρθογώνιο παραλληλεπίπεδο μὲ διαστάσεις  $ΑΒ = \alpha$ ,  $ΑΔ = \beta$ ,  $ΑΑ' = \gamma$  (σχ. 130). Νὰ βρεῖτε τὸ ἐμβαδὸ τῆς ἐπιφάνειάς του.



σχ. 130.


Παρατηροῦμε ὅτι τὸ ἐμβαδὸ τῆς ἑδρας  $ΑΒΓΔ$  εἶναι  $\alpha \cdot \beta$  καθὼς ἐπίσης καὶ τῆς ἑδρας  $Α'Β'Γ'Δ'$ . (γιατί;)

Τὸ ἐμβαδὸ τῆς ἑδρας  $ΑΒΒ'Α'$  εἶναι  $\alpha \cdot \gamma$  καθὼς καὶ τῆς ἀπέναντί της ἑδρας  $ΔΓΓ'Δ'$ . Τῆς ἑδρας  $ΑΑ'Δ'Δ$  τὸ ἐμβαδὸ εἶναι  $\beta \cdot \gamma$  καθὼς καὶ τῆς  $ΒΒ'Γ'Γ$ , πού εἶναι ἀπέναντι σ' αὐτήν.

Ἵνα βρεῖτε τὸ ἐμβαδὸ τῆς ἐπιφάνειας τοῦ ὀρθογωνίου παραλληλεπιπέδου

$$ΑΒΓΔΑ'Β'Γ'Δ' \text{ εἶναι } E = 2\alpha\beta + 2\alpha\gamma + 2\beta\gamma \text{ ἢ } \boxed{E = 2(\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha)}$$

## § 67. Κύβος



σχ. 131.

Κύβος είναι ένα ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο, που έχει όλες τις άκμές του ίσες.

Έπομένως οι έδρες του κύβου είναι τετράγωνα (σχ. 131).

Για να βρούμε το μήκος της διαγωνίου ενός κύβου, εφαρμόζουμε τον τύπο  $\delta^2 = \alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2$  και έχουμε  $\delta^2 = \alpha^2 + \alpha^2 + \alpha^2$  άρα  $\delta^2 = 3\alpha^2 \Leftrightarrow \delta = \alpha\sqrt{3}$ .

Το έμβαδο της όλικής επιφάνειάς του είναι:

$$E = 2 \cdot (\alpha \cdot \alpha + \alpha \cdot \alpha + \alpha \cdot \alpha) = 2 \cdot 3\alpha^2 \Leftrightarrow$$

$$E = 6\alpha^2$$

## Άσκησης

200) Οι διαστάσεις ενός ορθογωνίου παραλληλεπίπεδου είναι 6 cm, 5 cm, 4 cm. Να υπολογίσετε το έμβαδο της επιφάνειάς του.


201) Κατασκευάστε το ανάπτυγμα ενός κύβου με άκμή 3 cm και βρείτε το έμβαδο της επιφάνειάς του.

202) Δίνεται ένα ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο. Οι τρεις διαστάσεις του είναι ανάλογες προς τους αριθμούς 8, 10, 12 και το έμβαδο της (όλικής) επιφάνειάς του είναι  $2368 \text{ cm}^2$ . Να υπολογισθούν οι διαστάσεις του.

203) Το έμβαδο της όλικής επιφάνειας ενός κύβου είναι  $54 \text{ cm}^2$ . Να βρείτε το μήκος της πλευράς του και το μήκος της διαγωνίου του.

204) Δίνεται το μήκος, το ύψος, και το μήκος της διαγωνίου μιας έδρας ενός ορθογωνίου παραλληλεπίπεδου. Να βρεθεί το έμβαδο της επιφάνειάς του.

## Όγκος στερεών



σχ. 132.

§ 68. Όγκος ενός στερεού λέγεται ή έκταση του χώρου, ό οποίος περικλείεται από τό στερεό, έκφρασμένη σε μονάδες μετρήσεως.

Μέτρηση του όγκου ενός στερεού.

Τιμή του όγκου ενός στερεού είναι ό λόγος του όγκου του προς τη μονάδα μετρήσεως των όγκων. Την τιμή του όγκου του στερεού π.χ. ΑΒΓΔ (σχ. 132) τη συμβολίζουμε με (ΑΒΓΔ) και τον όγκο του με τό V ή  $V_{ΑΒΓΔ}$ .

**Μέτρηση του όγκου** ενός στερεοῦ εἶναι ἡ εὔρεση τῆς τιμῆς τοῦ ὄγκου του. Ἡ τιμὴ τοῦ ὄγκου ἑνὸς στερεοῦ εἶναι ὁ ἀριθμὸς, μὲ τὸν ὁποῖο πρέπει νὰ πολλαπλασιάσουμε τὴ μονάδα, γιὰ νὰ ἔχουμε τὸν ὄγκο του.

### Μονάδες ὄγκου

Ἡ μονάδα ὄγκου εἶναι ὁ ὄγκος ἑνὸς κύβου, ὁ ὁποῖος ἔχει ἀκμὴ τῆ μονάδα μήκους ποὺ ἔχουμε ἐκλέξει.

Μονάδα μήκους ἔχουμε ὀρίσει τὸ μέτρο (1 m), ἄρα ἡ μονάδα ὄγκου εἶναι ὁ ὄγκος ἑνὸς κύβου μὲ ἀκμὴ ἕνα μέτρο· δηλαδή τὸ **κυβικὸ μέτρο**, τὸ ὁποῖο σημειώνεται μὲ συντομία ( $m^3$ ).


### Οἱ ὑποδιαιρέσεις τοῦ κυβικοῦ μέτρου εἶναι:

- 1) Τὸ κυβικὸ δεκατόμετρο ( $dm^3$ ), δηλαδή ὁ ὄγκος ἑνὸς κύβου μὲ ἀκμὴ μήκους 1 dm.
- 2) Τὸ κυβικὸ ἑκατοστόμετρο ( $cm^3$ ), δηλαδή ὁ ὄγκος ἑνὸς κύβου μὲ ἀκμὴ μήκους 1 cm.
- 3) Τὸ κυβικὸ χιλιοστόμετρο ( $mm^3$ ), δηλαδή ὁ ὄγκος ἑνὸς κύβου μὲ ἀκμὴ μήκους 1 mm.

### § 69. Ὅγκος ὀρθογωνίου παραλληλεπίπεδου

Δίνεται ἕνα ὀρθογώνιο παραλληλεπίπεδο μὲ διαστάσεις  $a=4$  cm,  $\beta=5$  cm καὶ  $\gamma=3$  cm. Σκεφθεῖτε πῶς μπορούμε νὰ μετρήσουμε αὐτὸ τὸ ὀρθογώνιο παραλληλεπίπεδο.

Γιὰ νὰ βροῦμε τὸν ὄγκο αὐτοῦ τοῦ ὀρθογωνίου παραλληλεπιπέδου,



σχ. 133.

τὸ γεμίζουμε μὲ κύβους, ποὺ ἔχουν ἀκμὴ 1 cm. Γιὰ νὰ γεμίσει, χρειάζονται 60 κύβοι ὄγκου ἴσου μὲ  $1\text{ cm}^3$  δηλαδή  $V=60\text{ cm}^3$ . Παρατηροῦμε ὁμως ὅτι καταλήγουμε στὸ ἴδιο ἀποτέλεσμα, ἂν πολλαπλασιάσουμε καὶ τὶς τρεῖς διαστάσεις τοῦ ὀρθογωνίου παραλληλεπιπέδου,

$$4\text{ cm} \cdot 5\text{ cm} \cdot 3\text{ cm} = 60\text{ cm}^3.$$

Ἄρα  $V = 4\text{ cm} \cdot 5\text{ cm} \cdot 3\text{ cm} = 60\text{ cm}^3$ , δηλαδή γιὰ νὰ βροῦμε τὸν ὄγκο τοῦ ὀρθογωνίου παραλληλεπιπέδου πολλαπλασιάζουμε τὶς τρεῖς διαστάσεις του ἐκφρασμένες στὴν ἴδια μονάδα μήκους.

Το αποτέλεσμα αυτό δικαιολογείται ως εξής:  
 'Η βάση του ὀρθογωνίου παραλληλεπίπεδου χωρίζεται σὲ 5 ἐπὶ 4 ἴσα τετράγωνα μὲ πλευρὰ 1 cm. Πάνω σὲ καθένα ἀπ' αὐτὰ τοποθετοῦμε τὴν βάση ενός κύβου μὲ πλευρὰ 1 cm καὶ σχηματίζεται ἔτσι ἕνα ὀρθογώνιο παραλληλεπίπεδο μὲ τὴν ἴδια βάση καὶ ὕψος 1 cm. Αὐτὸ ἔχει ὄγκο  $4 \text{ cm} \cdot 5 \text{ cm} \cdot 1 \text{ cm} = 20 \text{ cm}^3$ . Τὸ ὀρθογώνιο παραλληλεπίπεδο χωρίζεται (μὲ ἐπίπεδα παράλληλα πρὸς τὴν βάση του) σὲ τρία ὀρθογώνια παραλληλεπίπεδα μὲ τὸν ἴδιο ὄγκο.

Συνεπῶς:  $V = 3 \cdot 20 \text{ cm}^3 = 60 \text{ cm}^3 = 3 \cdot (4 \text{ cm} \cdot 5 \text{ cm} \cdot 1 \text{ cm}) = 4 \text{ cm} \cdot 5 \text{ cm} \cdot 3 \text{ cm}$ .

Ἄν δοθεῖ ἕνα ὀρθογώνιο παραλληλεπίπεδο, τοῦ ὁποῖου οἱ διαστάσεις ἔχουν μήκη  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ , ὁ ὄγκος του εἶναι  $V = \alpha \cdot \beta \cdot \gamma$

**Ὁ ὄγκος ὀρθογωνίου παραλληλεπίπεδου ἰσοῦται μὲ τὸ γινόμενο τῶν τριῶν διαστάσεών του.**

Ἀποδεικνύεται ὅτι αὐτὸ ἀληθεύει καὶ ὅταν οἱ τιμὲς τῶν  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  εἶναι ὅποιοιδήποτε ἀριθμοί.

Παρατηροῦμε στὸν τύπο  $V = \alpha \cdot \beta \cdot \gamma$  ὅτι τὸ γινόμενο  $\alpha \cdot \beta$  δίνει τὸ ἐμβαδὸ  $E_B$  τοῦ ὀρθογωνίου τῆς βάσης μὲ διαστάσεις  $\alpha$  καὶ  $\beta$ , ἐνῶ τὸ  $\gamma$  εἶναι τὸ ὕψος τοῦ ὀρθογωνίου παραλληλεπίπεδου:


Ἄρα  $V = E_B \cdot u$  δηλαδή:

**Ὁ ὄγκος ενός ὀρθογωνίου παραλληλεπίπεδου ἰσοῦται μὲ τὸ γινόμενο τοῦ ἐμβαδοῦ μῆς βάσης του ἐπὶ τὸ μήκος τοῦ ἀντίστοιχου ὕψους.**

## § 70. Ὁγκος κύβου

Γνωρίζουμε ὅτι ὁ κύβος εἶναι ἕνα ὀρθογώνιο παραλληλεπίπεδο, τοῦ ὁποῖου οἱ τρεῖς διαστάσεις εἶναι ἴσες (σχ. 134).

Ἄν ὑποθέσουμε ὅτι τὸ μήκος τῆς πλευρᾶς τοῦ κύβου εἶναι  $\alpha$ , ὁ ὄγκος του θὰ εἶναι  $V = \alpha \cdot \alpha \cdot \alpha \Rightarrow$



σχ. 134.

$$V = \alpha^3 \quad (1) \text{ δηλαδή:}$$

**Ὁ ὄγκος ενός κύβου ἰσοῦται μὲ τὴν τρίτη δύναμη τοῦ μήκους τῆς ἀκμῆς του.**

**Παρατήρηση:** Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ ἡ τρίτη δύναμη ενός ἀριθμοῦ λέγεται κύβος τοῦ ἀριθμοῦ. Ἄπὸ τὸν τύπο (1) ἐννοοῦμε ὅτι κάθε μονάδα ὄγκου ἰσοῦται μὲ  $1000 = 10^3$  μονάδες τῆς ἀμέσως κατώτερης τάξης, ἄρα:

$$1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ dm}^3 = 1000000 \text{ cm}^3 = 1000000000 \text{ mm}^3 \quad \eta$$

$$1 \text{ m}^3 = 10^3 \text{ dm}^3 = 10^6 \text{ cm}^3 = 10^9 \text{ mm}^3.$$

$$1 \text{ dm}^3 = 1000 \text{ cm}^3 = 1000000 \text{ mm}^3$$


$$1 \text{ cm}^3 = 1000 \text{ mm}^3.$$

### Άσκήσεις

- 205) Βρείτε τον όγκο ενός κύβου πλευράς 3,5 m.
- 206) Ένα ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο έχει διαστάσεις 5 m, 14 dm, και 8 cm. Να βρείτε τον όγκο του.
- 207) Ο όγκος ενός ορθογωνίου παρ/δου είναι  $64 \text{ dm}^3$  και το έμβαδο της βάσης του  $16 \text{ dm}^2$ . Να βρείτε το μήκος του ύψους του, που αντιστοιχεί στη βάση αυτή.
- 208) Να βρείτε το μήκος της πλευράς ενός κύβου, που έχει όγκο  $4913 \text{ cm}^3$ . (Υπόδειξη: αναλύστε τον αριθμό σε γινόμενο παραγόντων).
- 209) Η ολική επιφάνεια ενός κύβου είναι  $294 \text{ dm}^2$ . Να υπολογίσετε τον όγκο του.
- 210) Ένας σιδηρουργός έχει μια μεταλλική πλάκα σε σχήμα ορθογωνίου παραλληλεπίπεδου με διαστάσεις 4 m, 5 m και 0,5 m και σκοπεύει να τη διαιρέσει σε κύβους, που καθένας τους να έχει άκμη 0,05 m. Σε πόσους τέτοιους κύβους μπορεί να διαιρεθεί η πλάκα;
- 211) Δίνεται ένα ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο που οι διαστάσεις του είναι ανάλογες προς τους αριθμούς 3, 5, 6 και έχουν άθροισμα 70 dm. Να βρείτε τον όγκο του.
- 212) Ένα ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο έχει όγκο  $960 \text{ cm}^3$ . Να υπολογίσετε τις διαστάσεις του, αν γνωρίζετε ότι αυτές είναι ανάλογες προς τους αριθμούς 4, 5, 6.
- 213) Ένα δοχείο έχει σχήμα ορθογωνίου παραλληλεπίπεδου με διαστάσεις 2 m, 3 m, 4 m. Ένα άλλο δοχείο με το ίδιο σχήμα έχει όκταπλάσιο όγκο και διαστάσεις ανάλογες προς τις διαστάσεις του πρώτου δοχείου. Να βρεθούν οι διαστάσεις του δεύτερου δοχείου.
- 214) Αν πολλαπλασιάσουμε το μήκος α της άκμης ενός κύβου επί 2, πόσος γίνεται ο όγκος του; Έφαρμογή:  $\alpha = 5 \text{ cm}$ .

### B. ΠΡΙΣΜΑΤΑ

#### § 71. Πολύεδρο




σχ. 135.

Το στερεό που εικονίζεται στο σχήμα (135) αποτελείται από πολύγωνα, τα όποια δε βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο. Κάθε πλευρά καθενός πολυγώνου ανήκει και σε ένα (μόνο ένα) άλλο πολύγωνο. Το στερεό αυτό είναι ένα **πολύεδρο**. Τα πολύγωνα, από τα όποια αποτελείται, είναι οι **έδρες** του πολυέδρου. Οι πλευρές των εδρών είναι οι **άκμεις** του πολυέδρου και οι κορυφές των εδρών οι **κορυφές** του πολυέδρου. Το ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο και ο κύβος είναι πολύεδρα.

**Σημ.** Σημεία του πολυέδρου λέγονται τα σημεία των ακμών του και τα έσωτερικά σημεία των έδρών του.

## § 72. Πρίσμα

Πρίσμα είναι ένα πολυέδρο, που έχει δύο έδρες ίσες και παράλληλες και τις άλλες παραλληλόγραμμα. (σχ. 136).




σχ. 136.

Οι ίσες και παράλληλες έδρες  $ΑΒΓΔ$ ,  $Α'Β'Γ'Δ'$  λέγονται βάσεις του πρίσματος. Τα παραλληλόγραμμα λέγονται παράπλευρες έδρες του πρίσματος, όπως τα  $ΑΒΒ'Α'$ ,  $ΒΓΓ'Β'$  κ.λ.π. Οι ακμές  $ΑΑ'$ ,  $ΒΒ'$ , ..., οι οποίες περιέχονται μεταξύ των βάσεων, λέγονται παράπλευρες ακμές. Αυτές είναι ίσες και παράλληλες.

Η απόσταση των επιπέδων των βάσεων λέγεται ύψος του πρίσματος, π.χ. το  $ΔΔ'$  (σχ. 137α). Αν οι παράπλευρες ακμές είναι κάθετες στα επίπεδα των βάσεων, το πρίσμα λέγεται **όρθο πρίσμα**, διαφορετικά λέγεται **πλάγιο**. Συνεπώς το ύψος του όρθου πρίσματος είναι ίσο με την παράπλευρη ακμή του και οι παράπλευρες έδρες του είναι όρθογώνια, π.χ. το  $ΔΔ'$  (σχ. 137β).

Αν το πρίσμα έχει τριγωνικές βάσεις, λέγεται **τριγωνικό πρίσμα**, όπως το  $ΑΒΓΑ'Β'Γ'$  στο σχήμα 137α. Αν έχει βάσεις τετράπλευρα,



σχ. 137.


πεντάγωνα κ.λ.π., λέγεται αντίστοιχως **τετραπλευρικό** (σχ. 137β), **πενταγωνικό** κ.λ.π. πρίσμα.

Όταν οι βάσεις ενός όρθου πρίσματος είναι κανονικά πολύγωνα, αυτό λέγεται **κανονικό πρίσμα**. (σχ. 137γ).

**Παρατήρηση:** Μπορούμε με μια άπλη κατασκευή να έχουμε ένα στερεομετρικό υπόδειγμα (μοντέλο) πρίσματος.



Παίρνουμε δύο (ή περισσότερα) ίσα πολύγωνα από ξύλο ή χαρτόνι. Άνοιγουμε τρύπες στις κορυφές τῶν πολυγώνων αὐτῶν καὶ περνᾶμε νήματα, τὰ ὁποῖα παίρνουν παράλληλες θέσεις. Μὲ παράλληλη μεταφορὰ τῶν πολυγώνων θὰ ἔχουμε τὴν ἔννοια τοῦ πρίσματος (ὀρθοῦ καὶ πλάγιου) καθὼς καὶ τῆς παράλληλης πρὸς τὶς βάσεις ἢ τῆς κάθετης τομῆς του.



σχ. 138.


Ἐὰν φέρουμε ἕνα ἐπίπεδο κάθετο στὶς παράπλευρες ἀκμές τοῦ πρίσματος, παίρνουμε ἕνα πολύγωνο, τὸ ὁποῖο λέγεται **κάθετη τομὴ** τοῦ πρίσματος. Οἱ πλευρὲς τῆς κάθετης τομῆς ἑνὸς πρίσματος εἶναι ὕψη τῶν ἀντίστοιχων παράπλευρων ἐδρῶν, ὅταν λάβουμε ὡς βάσεις τῶν τὶς παράπλευρες ἀκμές. Στὰ ὀρθὰ πρίσματα ἡ κάθετη τομὴ εἶναι ἴση μὲ τὶς βάσεις.

### § 73. Ἐμβαδὸ ἐπιφάνειας πρίσματος.

Ἐμβαδὸ τῆς ὀλικῆς ἐπιφάνειας πρίσματος λέγεται τὸ ἄθροισμα τῶν ἐμβαδῶν τῶν ἐδρῶν του.

Ἐμβαδὸ τῆς παράπλευρης ἐπιφάνειας πρίσματος εἶναι τὸ ἄθροισμα τῶν ἐμβαδῶν τῶν παράπλευρων ἐδρῶν του.

Δίνεται τὸ πλάγιο πρίσμα  $AB\Gamma A'B'\Gamma'$  καὶ ἔστω  $K, L, M, N$  μὲ κάθετη τομὴ του. (σχ. 138). Ζητεῖται νὰ βρεῖτε:



σχ. 139.

α) Τὸ ἐμβαδὸ τῆς παράπλευρης ἐπιφάνειας τοῦ πρίσματος καὶ

β) Τὸ ἐμβαδὸ τῆς ὀλικῆς ἐπιφάνειάς του.

α) Κατασκευάζουμε ἕνα στερεομετρικὸ ὑπόδειγμα (μοντέλο) τοῦ πρίσματος αὐτοῦ.

Κόβουμε κατὰ μῆκος μιᾶς ἀκμῆς π.χ. τῆς  $AA'$  τὴν παράπλευρη ἐπιφάνεια τοῦ πρίσματος ποὺ μᾶς δόθηκε καὶ ἀναπτύσσουμε τὶς ἔδρες τῆς (τοῦ στερ. ὑποδείγματος) πάνω σ' ἕνα ἐπίπεδο.

Ἐχουμε ἔτσι τὸ σχῆμα 139, ποὺ εἶναι τὸ ἀνάπτυγμα τῆς παράπλευρης ἐπιφάνειας τοῦ πρίσματος. Παρατηροῦμε ὅτι αὐτὸ ἀποτελεῖται ἀπὸ τέσσερα (4) παραλληλόγραμμα, τὰ  $ABB'A'$ ,  $B\Gamma\Gamma'B'$ ,  $\Gamma\Delta\Delta'\Gamma'$ ,  $\Delta A A'\Delta'$  τῶν ὁποίων τὰ ὕψη εἶναι οἱ πλευρὲς  $KL$ ,  $LM$ ,  $MN$ ,  $NK$  τῆς κάθετης τομῆς τοῦ πρίσματος καὶ οἱ βάσεις ἴσες μὲ τὴν παράπλευρη ἀκμὴ του. Ἐὰν α,

$\beta$ ,  $\gamma$ ,  $\delta$  είναι αντίστοιχως τὰ μήκη τους και  $\lambda$  είναι τὸ μήκος τῆς παράπλευρης ἄκμης τοῦ πρίσματος, τὸ ἔμβασθό τοῦ ἀναπτύγματος αὐτοῦ εἶναι ἴσο μὲ τὸ ἔμβασθό τῆς παράπλευρης ἐπιφάνειας τοῦ πρίσματος αὐτοῦ. Δηλαδή:

$$E_{\text{παρ. ἐπιφ. πρίσμ.}} = E_{\text{ΑΒΒ'Α'}} + E_{\text{ΒΓΓ'Β'}} + E_{\text{ΓΔΔ'Γ'}} + E_{\text{ΔΑΑ'Δ'}} \Rightarrow$$

$$E_{\text{παρ. ἐπιφ. πρίσμ.}} = \alpha\lambda + \beta\lambda + \gamma\lambda + \delta\lambda \text{ συνεπῶς}$$

$$E_{\text{παρ. ἐπιφ. πρίσμ.}} = (\alpha + \beta + \gamma + \delta) \cdot \lambda. \text{ Δηλαδή:}$$

**Τὸ ἔμβασθό τῆς παράπλευρης ἐπιφάνειας πρίσματος ἰσοῦται μὲ τὸ γινόμενο τῆς περιμέτρου τῆς κάθετης τομῆς του ἐπὶ τὸ μήκος τῆς παράπλευρης ἄκμης του.**

Ἄν τὸ πρίσμα εἶναι ὀρθό, τὸ ἀνάπτυγμα τῆς παράπλευρης ἐπιφάνειάς του εἶναι ἓνα ὀρθογώνιο μὲ διαστάσεις τὰ μήκη τῆς περιμέτρου τῆς βάσης του και τοῦ ὕψους του.


Ἄρα: **Τὸ ἔμβασθό τῆς παράπλευρης ἐπιφάνειας ἑνὸς ὀρθοῦ πρίσματος ἰσοῦται μὲ τὸ γινόμενο τῶν μηκῶν τῆς περιμέτρου τῆς βάσης του και τοῦ ὕψους του.**

Στὸ ἴδιο ἀποτέλεσμα μποροῦμε νὰ καταλήξουμε και ἂν θεωρήσουμε ἀπ' εὐθείας τὸ στερεό, χωρὶς νὰ χρησιμοποιήσουμε τὸ στερεομετρικὸ ὑπόδειγμα και τὸ ἀνάπτυγμά του. Ἐπειδὴ κάθε παράπλευρη ἔδρα εἶναι παραλληλόγραμμο, ἔχουμε

$$E_{\text{παρ. ἐπιφ. πρίσμ.}} = E_{\text{ΑΒΒ'Α'}} + E_{\text{ΒΓΓ'Β'}} + E_{\text{ΓΔΔ'Γ'}} + E_{\text{ΔΑΑ'Δ'}} \\ \Rightarrow E_{\text{παρ. ἐπιφ. πρίσμ.}} = \alpha\lambda + \beta\lambda + \gamma\lambda + \delta\lambda \Rightarrow E_{\text{παρ. ἐπιφ. πρίσμ.}} = (\alpha + \beta + \gamma + \delta) \cdot \lambda$$

β) Για νὰ βροῦμε τὸ ἔμβασθό τῆς ὀλικῆς ἐπιφάνειας τοῦ πρίσματος προσθέτουμε στὸ ἔμβασθό τῆς παράπλευρης ἐπιφάνειάς του τὰ ἔμβασθὰ τῶν δύο ἴσων βάσεων του.

$$\text{Ἔτσι ἔχουμε: } E_{\text{ὀλ. ἐπιφ. πρίσμ.}} = E_{\text{παρ. ἐπ. πρ.}} + 2E_{\text{βάσης.}}$$



σχ. 140.

**Σημείωση:** Ἐνα πρίσμα, τοῦ ὁποῖου οἱ βάσεις εἶναι παραλληλόγραμμα, ὀνομάζεται **παραλληλεπίπεδο** (σχ. 140). Ἔτσι και οἱ 6 ἔδρες τοῦ παραλληλεπίπεδου εἶναι παραλληλόγραμμα και ἔπομένως μποροῦμε νὰ πάρουμε γιὰ βάσεις του δυὸ ὅποισδήποτε ἀπέναντι ἔδρες του.

Ἐνα παραλληλεπίπεδο ὀνομάζεται ὀρθό, ἂν οἱ παράπλευρες ἔδρες του εἶναι ὀρθογώνια.

Συνεπῶς, ὅσα ἀναφέραμε παραπάνω γιὰ τὸ ἔμβασθό τῆς παράπλευρης και τῆς ὀλικῆς ἐπιφάνειας πρίσματος, ἰσχύουν και γιὰ τὰ παραλληλεπίπεδα.

## Άσκησης

215) Ένα ὀρθό πρίσμα έχει βάση ὀρθογώνιο τρίγωνο με κάθετες πλευρές 6 cm και 8 cm και ὕψος 15 cm. Νά βρεῖτε τὸ ἔμβαδὸ τῆς παράπλευρης ἐπιφάνειάς του, καθώς και τὸ ἔμβαδὸ τῆς ὀλικῆς ἐπιφάνειάς του.

216) Ἡ κάθετη τομὴ ἑνὸς πλάγιου τριγωνικοῦ πρίσματος εἶναι ἰσόπλευρο τρίγωνο με πλευρὰ 3 cm. Ἡ παράπλευρη ἀκμὴ τοῦ πρίσματος εἶναι 8 cm. Νά βρεῖτε τὸ ἔμβαδὸ τῆς παράπλευρης ἐπιφάνειάς του.


217) Δίνεται ἕνα κανονικὸ πρίσμα ἀκμῆς 5 m, τοῦ ὁποῖου ἡ βάση εἶναι τετράγωνο πλευρᾶς 2 m. Νά βρεῖτε τὸ ἔμβαδὸ τῆς παράπλευρης ἐπιφάνειάς του.

218) Νά κατασκευάσετε ἕνα ὀρθό πρίσμα ἀπὸ χαρτόνι, ποῦ νὰ ἔχει ὕψος 7 cm και ἡ βάση του νὰ εἶναι ῥόμβος με διαγωνίους 6 cm και 8 cm. Νά ὑπολογίσετε τὸ ἔμβαδὸ τῆς ὀλικῆς ἐπιφάνειάς του.

219) Δίνεται ἕνα κανονικὸ πρίσμα με ἀκμὴ 5α, τοῦ ὁποῖου ἡ βάση εἶναι ἰσόπλευρο τρίγωνο με πλευρὰ α. Νά βρεῖτε τὸ ἔμβαδὸ α) τῆς παράπλευρης ἐπιφάνειάς του και β) τῆς ὀλικῆς ἐπιφάνειάς του. Ἐφαρμογή:  $\alpha = 13$  cm.

### § 74. Ὀγκος πρίσματος

α) Ὀγκος ὀρθοῦ τριγωνικοῦ πρίσματος με βάση ὀρθογώνιο τρίγωνο:



σχ. 141.

Δίνεται ἕνα ὀρθό τριγωνικὸ πρίσμα με βάση ὀρθογώνιο τρίγωνο με μίση κάθετων πλευρῶν α και β και ὕψος μήκους υ. Νά βρεῖτε τὸν ὄγκο του.

Θεωροῦμε ἕνα ὀρθογώνιο παραλληλεπίπεδο με διαστάσεις α, β και υ. Τὸ στερεὸ αὐτὸ τέμνεται ἀπὸ τὸ διαγώνιο ἐπίπεδο  $AA'\Gamma\Gamma'$  (σχ. 141) σὲ δύο πρίσματα, ποῦ ἔχουν βάσεις ὀρθογώνια τρίγωνα με μήκη κάθετων πλευρῶν α και β και ὕψος υ. Τὰ ὀρθὰ αὐτὰ πρίσματα εἶναι ἴσα (γιατὶ εἶναι συμμετρικὰ πρὸς τὸν ἄξονα  $OO'$ , ὁ ὁποῖος συν-

δέει τὰ κέντρα  $O$  και  $O'$  τῶν βάσεων).

Συνεπῶς ὁ ὄγκος τοῦ ὀρθοῦ τριγωνικοῦ πρίσματος, τὸ ὁποῖο ἔχει βάση ὀρθογώνιο τρίγωνο, εἶναι τὸ μισὸ τοῦ ὄγκου τοῦ ὀρθογωνίου παραλληλεπιπέδου με διαστάσεις α, β, υ.

Δηλαδή:  $V = \frac{\alpha \cdot \beta \cdot \upsilon}{2} \Rightarrow V = \frac{\alpha \cdot \beta}{2} \cdot \upsilon$ . Ἀλλὰ τὸ ἔμβαδὸ τῆς βάσης τοῦ ὀρθοῦ πρίσματος, ἡ ὁποία εἶναι ὀρθογώνιο τρίγωνο, εἶναι


$$E = \frac{\alpha \cdot \beta}{2} \quad \text{Ἄρα} \quad \boxed{V = E_{\beta} \cdot \upsilon}$$

Ἐπομένως: Ὁ ὄγκος τοῦ ὀρθοῦ τριγωνικοῦ πρίσματος με βάση ὀρθογώνιο τρίγωνο, ἰσοῦται με τὸ γινόμενο τοῦ ἔμβαδου τῆς βάσης ἐπὶ τὸ μήκος τοῦ ὕψους.


β) **Όγκος ὀρθοῦ τριγωνικοῦ πρίσματος:**

Δίνεται ἓνα ὀρθό τριγωνικό πρίσμα  $ABΓA'B'Γ'$  με βάση ἓνα τυχόν τρίγωνο  $ABΓ$ . Νὰ βρεῖτε τὸν ὄγκο του.

Γιὰ νὰ βροῦμε τὸν ὄγκο τοῦ πρίσματος  $ABΓA'B'Γ'$ , τὸ διαιροῦμε σὲ δύο ὀρθὰ τριγωνικά πρίσματα, πού ἔχουν βάσεις ὀρθογώνια τρίγωνα,



σχ. 142.



σχ. 143.

με τὸ ἐπίπεδο  $AHH'A'$ , τὸ ὁποῖο ὀρίζεται ἀπὸ τὸ ὕψος  $AH$  τοῦ τριγώνου  $ABΓ$  καὶ τὸ ὕψος  $AA'$  τοῦ πρίσματος. Δηλαδή με ἓνα ἐπίπεδο κάθετο στὸ  $BΓΓ'B'$  (σχ. 142).

$$\begin{aligned} \text{Ἄρα: } V_{ABΓA'B'Γ'} &= V_{ABHA'B'H'} + V_{AHH'A'H} = E_{ABH} \cdot \upsilon + E_{AHH'} \cdot \upsilon = \\ &= (E_{ABH} + E_{AHH'}) \cdot \upsilon = E_{ABΓ} \cdot \upsilon \end{aligned}$$

$$\text{Ἔστω: } V_{ABΓA'B'Γ'} = E_{\text{βάσεως}} \cdot \upsilon.$$

Ἄρα: **Ὁ ὄγκος κάθε ὀρθοῦ τριγωνικοῦ πρίσματος ἰσοῦται με τὸ γινόμενο τοῦ ἐμβαδοῦ τῆς βάσης ἐπὶ τὸ μήκος τοῦ ὕψους του.**

γ) **Όγκος ὀρθοῦ πρίσματος με βάση ὁποιοδήποτε πολύγωνο:**

Γιὰ νὰ βροῦμε τὸν ὄγκο τοῦ πρίσματος  $ABΓΔEA'B'Γ'D'E'$ , τὸ διαιροῦμε σὲ ὀρθὰ τριγωνικά πρίσματα, τὰ ὁποῖα ἔχουν ὕψος τὸ ὕψος τοῦ πρίσματος πού μᾶς ἔχει δοθεῖ καὶ βάσεις τὰ τρίγωνα  $ABE$ ,  $BEG$ ,  $ΓED$  (σχ. 143). Ὀνομάζουμε με  $V_1, V_2, V_3$  τοὺς ὄγκους τῶν πρισμάτων αὐτῶν καὶ με  $E_1, E_2, E_3$  τὰ ἐμβαδὰ τῶν βάσεων τους. Τότε ἔχουμε

$$V_{\text{πρισμ.}} = V_1 + V_2 + V_3. \text{ Συνεπῶς}$$

$$V_{\text{πρισμ.}} = E_1 \cdot \upsilon + E_2 \cdot \upsilon + E_3 \cdot \upsilon = (E_1 + E_2 + E_3) \cdot \upsilon$$

$$\text{Ἐπομένως } V_{\text{πρισμ.}} = E_{\text{βασ.}} \cdot \upsilon.$$

Ἔστω: **Ὁ ὄγκος κάθε ὀρθοῦ πρίσματος ἰσοῦται με τὸ γινόμενο τοῦ ἐμβαδοῦ τῆς βάσης ἐπὶ τὸ μήκος τοῦ ὕψους.**

δ) **Όγκος ὁποιοδήποτε πλάγιου πρίσματος:**

Ὁ τύπος  $V_{\text{πρισμ.}} = E_{\text{βασ.}} \cdot \upsilon$ , ὁ ὁποῖος χρησιμοποιεῖται γιὰ τὴν εὑρεση τοῦ ὄγκου ἐνὸς ὀρθοῦ πρίσματος εἶναι γενικός καὶ ἰσχύει, ὅπως θὰ μάθουμε σὲ μεγαλύτερη τάξη, καὶ γιὰ τὰ πλάγια πρίσματα.

Ἄρα γενικά: **Ὁ ὄγκος ὁποιοδήποτε πρίσματος ἰσοῦται με τὸ γινόμενο τοῦ ἐμβαδοῦ τῆς βάσης ἐπὶ τὸ μήκος τοῦ ὕψους.**

**Σημ.** Ὁ ὄγκος ὁποιουδήποτε πρίσματος δίνεται καὶ ἀπὸ τὸν τύπο  $V = E \cdot \lambda$  κάθετης τομῆς  $\cdot \lambda$  (ὅπου  $\lambda$  τὸ μήκος τῆς παράπλευρης ἀκμῆς).

### Ἄσκησεις

220) Ἐνα ὀρθὸν τριγωνικὸν πρίσμα ἔχει ὕψος 40 cm καὶ βάση ὀρθογώνιο τρίγωνο μὲ κάθετες πλευρὲς 6 cm καὶ 8 cm. Νὰ βρεῖτε τὸν ὄγκο του.

221) Δίνεται ἕνα κανονικὸν ἑξαγωνικὸν πρίσμα, τὸ ὁποῖο ἔχει ὕψος 12 dm καὶ μήκος τῆς πλευρᾶς τῆς βάσεως του 8 dm. Νὰ βρεῖτε τὸν ὄγκο του.


222) Ἐνα ὀρθὸν πρίσμα ἔχει ὄγκο  $200 \text{ cm}^3$  καὶ ὕψος 8 cm. Ἐὰν ἡ βάση του εἶναι τετράγωνο, νὰ ὑπολογίσετε τὴν πλευρὰ τῆς.

223) Ἡ παράπλευρη ἐπιφάνεια ἐνὸς κανονικοῦ τριγωνικοῦ πρίσματος εἶναι  $324 \text{ cm}^2$ . Ἐὰν τὸ ὕψος του εἶναι τριπλάσιο ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς βάσεως του, νὰ ὑπολογίσετε τὸν ὄγκο του.

224) Ἐνα κανονικὸν ἑξαγωνικὸν πρίσμα ἔχει πλευρὰ τῆς βάσεως του  $a$  καὶ ὕψος  $2a$ . Νὰ ὑπολογίσετε τὸν ὄγκο τοῦ πρίσματος. Ἐφαρμογή:  $a = 9 \text{ cm}$ .

## Γ. ΠΥΡΑΜΙΔΑ—ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΥΡΑΜΙΔΑ—ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΥΡΑΜΙΔΑΣ

### § 75. Πυραμίδα:



σχ. 144.

**Πυραμίδα** εἶναι ἕνα στερεό, ποῦ ὀρίζεται ἀπὸ ἕνα πολύγωνο καὶ ἀπὸ τρίγωνο. Τὰ τρίγωνα ἔχουν μία κοινὴ κορυφή (ποῦ δὲν ἀνήκει στὸ ἐπίπεδο τοῦ πολυγώνου) καὶ καθένα ἔχει μία πλευρὰ κοινὴ μὲ τὸ πολύγωνο (σχ. 144).


Τὸ πολύγωνο  $ΑΒΓΔ$  λέγεται βάση τῆς πυραμίδας καὶ τὰ τρίγωνα  $ΑΟΒ$ ,  $ΒΟΓ$ , ... λέγονται παράπλευρες ἑδρες τῆς. Τὸ σημεῖο  $Ο$  λέγεται κορυφὴ τῆς πυραμίδας· τὰ εὐθ. τμήματα  $ΟΑ$ ,  $ΟΒ$ , ... λέγονται παράπλευρες ἀκμῆς τῆς. Ἡ ἀπόσταση  $ΟΗ$  τῆς κορυφῆς ἀπὸ τὴν βάση τῆς πυραμίδας εἶναι τὸ ὕψος τῆς. Τὸ **σύνολο** τῶν παράπλευρων ἑδρῶν ἀποτελεῖ τὴν παράπλευρη ἐπιφάνεια τῆς πυραμίδας. Ἐὰν ἡ

βάση τῆς πυραμίδας εἶναι τρίγωνο, ἡ πυραμίδα λέγεται **τριγωνικὴ**· ἂν εἶναι τετράπλευρο, πεντάγωνο κλπ., λέγεται **τετραπλευρικὴ**, **πενταγωνικὴ** κλπ.

Ἡ τριγωνικὴ πυραμίδα εἶναι ἕνα πολυέδρο μὲ 4 ἑδρες καὶ λέγεται **τετράεδρο**.

### § 76. Κανονικὴ πυραμίδα


Μία πυραμίδα λέγεται **κανονικὴ**, ὅταν ἡ βάση τῆς εἶναι κανονικὸν πολύγωνο καὶ τὸ ἴχνος τοῦ ὕψους εἶναι τὸ κέντρο τοῦ κανονικοῦ πολυγώνου (σχ. 145).



σχ. 145.

## § 77. Έμβαδὸ κανονικῆς πυραμίδας.

Οἱ παράπλευρες ἔδρες τῆς κανονικῆς πυραμίδας εἶναι ἰσοσκελῆ τρίγωνα ἴσα (AOB, BOΓ, ...). Τὸ ὕψος ΟΘ ἑνὸς ἀπὸ τὰ ἴσα ἰσοσκελῆ τρίγωνα λέγεται **ἀπόστημα** τῆς κανονικῆς πυραμίδας (ἢ **παράπλευρο ὕψος**) καὶ συμβολίζεται μὲ  $h$ . Ἐὰν ἡ βάση μιᾶς κανονικῆς πυραμίδας εἶναι ἰσόπλευρο τρίγωνο, αὐτὴ λέγεται κανονικὴ τριγωνικὴ πυραμίδα. Ἐνα τετράεδρο εἶναι κανονικόν, ἂν οἱ 4 ἔδρες του εἶναι ἴσα ἰσόπλευρα τρίγωνα.



σχ. 146.

Ὀνομάζουμε **ἐμβαδὸ πυραμίδας** τὸ ἄθροισμα τῶν ἐμβαδῶν τῶν ἐδρῶν της. **Ἐμβαδὸ τῆς παράπλευρης ἐπιφάνειας** λέμε τὸ ἄθροισμα τῶν ἐμβαδῶν τῶν παράπλευρων ἐδρῶν της.

1. Ἐμβαδὸ τῆς παράπλευρης ἐπιφάνειας μιᾶς κανονικῆς πυραμίδας:

Λίνεται μιὰ κανονικὴ πυραμίδα (π.χ. ἑξαγωνικὴ) OABΓΔΕΖ (σχ. 146) καὶ ζητεῖται νὰ βρεθεῖ τὸ ἐμβαδὸ τῆς παράπλευρης ἐπιφάνειάς της, ἂν εἶναι γνωστὸ τὸ μῆκος τῆς πλευρᾶς τῆς βάσης  $\lambda_6$  καὶ τὸ μῆκος τοῦ ἀποστήματος  $h$ .


Γιὰ νὰ βροῦμε τὸ ἐμβαδὸ τῆς παράπλευρης ἐπιφάνειας τῆς καν. αὐτῆς πυραμίδας, προσθέτουμε τὰ ἐμβαδὰ τῶν παράπλευρων ἐδρῶν της. Οἱ ἔδρες αὐτὲς εἶναι ἴσες.

$$\begin{aligned} \text{Ἄρα } E_{\text{παρ. ἐπιφ. πυρ.}} &= 6 \cdot E_{\text{AOB}} = 6 \cdot \frac{\lambda_6 \cdot h}{2} = \frac{6\lambda_6 \cdot h}{2} = \\ &= \frac{\text{μῆκος περιμέτρου βάσης} \times \text{μῆκος ἀποστήματος}}{2} \end{aligned}$$


Ἐπομένως: Τὸ ἐμβαδὸ τῆς παράπλευρης ἐπιφάνειας μιᾶς κανονικῆς πυραμίδας ἰσοῦται μὲ τὸ ἡμισυνόμοιο τοῦ μήκους τῆς περιμέτρου τῆς βάσης της ἐπὶ τὸ μῆκος τοῦ ἀποστήματός της.

**Παρατηρήσεις:** 1) Ἐὰν κόψουμε τὴν παράπλευρη ἐπιφάνεια κατὰ μῆκος μιᾶς παράπλευρης ἀκμῆς καὶ τὴν ἀναπτύξουμε σ' ἐπίπεδο, ἔχουμε τὸ ἀνάπτυγμα τοῦ σχήματος 146 (σχ. 147).

2) Μποροῦμε κόβοντας τὴν πυραμίδα κατὰ μῆκος ὅλων τῶν παρά-



σχ. 147.



σχ. 148.

πλευρών άκμών να έχουμε το άνάπτυγμα τής παράπλευρης επιφάνειας τής κανονικής πυραμίδας (σχ. 148).

Τότε το έμβασό τής παράπλευρης επιφάνειας αύτής βρίσκεται, αν πάρουμε το μισό του έμβασού του όρθογωνίου, που έχει διαστάσεις το μήκος τής περιμέτρου τής βάσης τής πυραμίδας και το μήκος του άποστήματός της.


Άρα  $E_{\text{πυρ. έπιφ. καν. πυρ.}} =$

$$= \frac{\text{μήκος περιμέτρου βάσης} \times \text{μήκος άποστήματος}}{2}$$

Αν καλέσουμε  $\lambda_v$  το μήκος τής πλευράς τής βάσης τής κανονικής πυραμίδας,  $v$  το πλήθος των πλευρών τής βάσης και  $h$  το άπόστημα τής κανονικής πυραμίδας, θα έχουμε:

$$E_{\text{πυρ. έπιφ. καν. πυρ.}} = \frac{v \cdot \lambda_v \cdot h}{2}$$

2. Έμβασό τής όλικής επιφάνειας κανονικής πυραμίδας:



σχ. 149

Για να βρούμε το έμβασό τής όλ. επιφάνειας μιās κανονικής πυραμίδας, προσθέτουμε στο έμβασό τής παράπλευρης επιφάνειας το έμβασό τής βάσης της.

$$E_{\text{ολ.}} = E_{\text{παρ.}} + E_{\text{βασ.}} \quad (1)$$

δηλαδή:


$$E_{\text{ολ.}} = \frac{v \cdot \lambda_v \cdot h}{2} + E_{\text{βασ.}} \quad (2)$$

Ο τύπος (1) ισχύει και για τις μη κανονικές πυραμίδες.

Για να βρούμε το έμβασό τής παράπλευρης επιφάνειας μιās όποιασδήποτε πυραμίδα, προσθέτουμε τα έμβασά των έδρών της.

## Άσκησης

225) Δίνεται μία κανονική εξαγωνική πυραμίδα με πλευρά βάσης 3 cm και απόσταση 9 cm. Να βρείτε το έμβαδο της παράπλευρης και της ολικής επιφάνειας της πυραμίδας.



σχ. 150.


226) Κατασκευάστε το άναπτυσμα μιας κανονικής πυραμίδας, που η βάση της είναι ένα τετράγωνο με πλευρά 3 cm και το απόστημα της 2,5 cm. Βρείτε το έμβαδο της παράπλευρης και της ολικής επιφάνειας της πυραμίδας.

227) Δίνεται μία κανονική πυραμίδα με βάση ένα τετράγωνο, που έχει πλευρά 6 cm, και ύψος 4 cm. Να υπολογίσετε το έμβαδο της παράπλευρης και της ολικής επιφάνειας της κανονικής πυραμίδας.

228) Δίνεται μία κανονική εξαγωνική πυραμίδα, που η παράπλευρη άκμή της είναι 10 cm και το ύψος 6 cm. Να υπολογίσετε το έμβαδο της ολικής επιφάνειάς της.

229) Το στερεό του σχήματος 150 αποτελείται από έναν κύβο με πλευρά 5 m και από μία κανονική τετραγωνική πυραμίδα, που το απόστημά της είναι 7 m. Βρείτε το έμβαδο της επιφάνειάς του.

### § 78. Όγκος πυραμίδας.



σχ. 151.


1. Δίνεται μία κανονική τετραγων. πυραμίδα με μήκος πλευρής βάσης  $\lambda$  και μήκος ύψους  $v = \frac{\lambda}{2}$ . Να βρείτε τον όγκο της.

Κατασκευάζουμε 6 πυραμίδες ίσες με αυτή που μας δόθηκε και τις τοποθετούμε έτσι, ώστε να έχουν κοινή την κορυφή και ανά δύο κοινή παράπλευρη έδρα. Τότε σχηματίζεται ένας κύβος με άκμή  $\lambda$  (σχ. 151).

Άρα ο όγκος καθεμιάς από τις ίσες αυτές πυραμίδες είναι το  $\frac{1}{6}$  του όγκου του κύβου.

$$\text{Δηλαδή: έχουμε } V_{\text{καν. πυρ.}} = \frac{1}{6} \lambda^3 = \frac{1}{3} \lambda^2 \cdot \frac{\lambda}{2} \Leftrightarrow V = \frac{1}{3} E_{\beta} \cdot v$$

Έπομένως: Ο όγκος της κανονικής πυραμίδας ισούται με το  $\frac{1}{3}$  του γινομένου του εμβαδού της βάσης επί το μήκος του ύψους.



σχ. 152.


2. Ο τύπος, που βρήκαμε πιο πάνω, για τον όγκο της κανονικής πυραμίδας ισχύει για οποιαδήποτε πυραμίδα, καθώς θ' αποδείξουμε σε ανώτερη τάξη. Πρακτικά μπορούμε να βρούμε τον τύπο του όγκου της πυραμίδας ως εξής.

Χρησιμοποιούμε δύο δοχεία: ένα σε σχήμα τριγωνικής πυραμίδας OABΓ με ανοικτή τη βάση ABΓ και ένα άλλο πρισματικό, που έχει βάση ίση με τη βάση ABΓ της τριγωνικής πυραμίδας και ύψος ίσο με της πυραμίδας.



Παρατηρούμε ότι, αν γεμίσουμε με ψιλή άμμο (ή νερό) το πρώτο δοχείο και αδειάσουμε το περιεχόμενό του στο δεύτερο, θα χρειαστεί να επαναλάβουμε αυτή την έργασία τρεις φορές, ώσπου να γεμίσει το πρισματικό δοχείο (σχ. 152).

Αν είναι  $V$  ο όγκος τής τριγωνικής πυραμίδας και  $V'$  ο όγκος του πρίσματος, θα έχουμε:



σχ. 153.

$$3V = V' \Leftrightarrow V = \frac{V'}{3} \Leftrightarrow V = \frac{1}{3} \cdot E_B \cdot u \quad (V' = E_B \cdot u)$$

3. Για να μετρήσουμε μια οποιαδήποτε πυραμίδα  $OABΓΔΕ$  (σχ. 153), που έχει έμβαδο βάσης  $E_B$  και ύψος  $u$ , τη διαιρούμε στις τριγωνικές πυραμίδες  $OABΓ$ ,  $OAGΔ$ ,  $OADE$ , οι οποίες έχουν το ίδιο ύψος, όγκους  $V_1, V_2, V_3$  αντίστοιχως και έμβαδα βάσεων  $E_1, E_2, E_3$ , τα όποια έχουν άθροισμα  $E$ . Έπομένως:

$$\begin{aligned} V_{OABΓΔΕ} &= V_1 + V_2 + V_3 \Leftrightarrow V_{OABΓΔΕ} = \frac{1}{3} E_1 \cdot u + \frac{1}{3} E_2 \cdot u + \frac{1}{3} E_3 \cdot u \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow V_{OABΓΔΕ} = \frac{1}{3} (E_1 + E_2 + E_3) \cdot u \Leftrightarrow V = \frac{1}{3} E_B \cdot u \end{aligned}$$

Αρα καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι: **Ο όγκος μίας οποιασδήποτε πυραμίδας ισούται με το  $\frac{1}{3}$  του γινομένου του έμβαδού τής βάσης επί το μήκος του ύψους.**

### Άσκησης

230) Μία κανονική πυραμίδα έχει για βάση ένα τετράγωνο με πλευρά μήκους 8 cm και το ύψος της είναι 6 cm. Να υπολογίσετε τόν όγκο της.

231) Μία καν. έξωγωνική πυραμίδα έχει παράπλευρη άκμή μήκους 10 cm και ύψος 8 cm. Να βρείτε τόν όγκο της.

232) Δίνεται μία τριγωνική πυραμίδα  $OABΓ$  με άκμες  $OA=3\alpha$ ,  $OB=4\alpha$  και  $OG=2\alpha$ , οι οποίες είναι ανά δύο κάθετες. Υπολογίστε τόν όγκο τής πυραμίδας  $OABΓ$ , που έχει κορυφή  $O$  και βάση  $ABΓ$  (θα τό πετύχετε αυτό, αν βρείτε τόν όγκο τής πυραμίδας  $AOBΓ$ , που έχει κορυφή  $A$  και βάση  $OBΓ$ ). Έφαρμογή:  $\alpha=5$  cm.


233) Δίνεται μία πυραμίδα  $OABΓΔ$  με κορυφή  $O$  και βάση ένα ρόμβο  $ABΓΔ$ , που ή πλευρά του έχει μήκος 8 cm και ή διαγώνίός του  $AG$  έχει επίσης μήκος 8 cm. Τό ίχνος  $H$  του ύψους  $OH$  τής πυραμίδας είναι τό σημείο τομής τών διαγωνίων  $AG$  και  $BD$  του ρόμβου. Τό μήκος τής παράπλευρης άκμής  $OB$  είναι 8 cm. Να βρείτε τόν όγκο τής πυραμίδας  $OABΓΔ$ .

234) Δίνεται ένα κανονικό τετράεδρο με άκμή  $\alpha$  και ζητείται ό όγκος του. Έφαρμογή:  $\alpha=6$  cm.

235) Να συγκρίνετε τά ύψη ενός κανονικού τετραέδρου (χρησιμοποίηστε τόν όγκο του).

## Δ. ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΕΚ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ (ΟΡΘΟΣ ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ) ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΡΘΟΥ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ

### § 79. Ὀρθός κυκλικός κύλινδρος.



σχ. 154.

Θεωρούμε ένα ὀρθογώνιο  $ΑΟΟ'Α'$  (σχ. 154) πού περιστρέφεται γύρω ἀπὸ τὴν  $ΟΟ'$ , ἡ ὁποία παραμένει ἀκίνητη. Μὲ μιὰ ὀλόκληρη περιστροφή του παράγεται ἕνας ὀρθός κυκλικός κύλινδρος (ἢ κύλινδρος ἐκ περιστροφῆς).

Ἡ εὐθεία  $ΟΟ'$ , πού παραμένει ἀκίνητη κατὰ τὴν περιστροφή, λέγεται **ἄξονας** τοῦ κύλινδρου. Οἱ πλευρῆς  $ΟΑ$  καὶ  $Ο'Α'$  παράγουν μὲ τὴν περιστροφή δύο ἴσους κυκλικούς δίσκους, πού τὰ ἐπίπεδά τους εἶναι κάθετα στὴν  $ΟΟ'$ , δηλαδή παράλληλα μεταξύ τους. Οἱ κύκλοι αὐτοὶ λέγονται **βάσεις** τοῦ κύλινδρου. Ἡ ἀκτίνα τῆς βάσης λέγεται **ἀκτίνα τοῦ κύλινδρου**. Ἡ πλευρὰ  $ΑΑ'$  παράγει μὲ τὴν περιστροφή τὴν κυρτὴ ἐπιφάνεια τοῦ κύλινδρου.

Ἡ  $ΑΑ'$  λέγεται **γενέτειρα** τοῦ κύλινδρου. Τὸ κοινὸ μῆκος τῶν γενετειρῶν τοῦ κύλινδρου ἐκ περιστροφῆς εἶναι ἴσο μὲ τὴν ἀπόσταση  $ΟΟ'$  τῶν κέντρων τῶν βάσεων του καὶ εἶναι τὸ ὕψος τοῦ κύλινδρου.

Ἀπὸ τὰ παραπάνω συμπεραίνουμε ὅτι:

**Ἐνας ὀρθός κυκλικός κύλινδρος (ἢ ἀπλᾶ κύλινδρος) εἶναι ἕνα στερεὸ ἐκ περιστροφῆς, τὸ ὁποῖο παράγεται ἀπὸ ἕνα ὀρθογώνιο, πού περιστρέφεται γύρω ἀπὸ μιὰ πλευρὰ του, ἡ ὁποία παραμένει ἀκίνητη.**



σχ. 155.

**Σημείωση:** Μποροῦμε μὲ κάποιο μηχανισμό νὰ περιστρέψουμε γρήγορα ἕνα ὀρθογώνιο (ἀπὸ χαρτόνι ἢ ἄλλο ὑλικό) γύρω ἀπὸ μιὰ διάστασή του καὶ λόγω τοῦ ὀπτικοῦ μεταισθηματος νὰ ἔχουμε τὴν εἰκόνα ἑνὸς ὀρθοῦ κυκλικοῦ κύλινδρου στὸ χῶρο τῶν τριῶν διαστάσεων. Ἡ εἰκόνα αὐτὴ δικαιολογεῖ καὶ κινητικῶς τὸν τρόπο παραγωγῆς τοῦ ὀρθοῦ κυκλικοῦ κύλινδρου (ἢ ἐκ περιστροφῆς) (σχ. 155). Στὸ ἐξῆς ὅταν λέμε «κύλινδρος», θὰ ἐννοοῦμε «ὀρθός κυκλικός κύλινδρος».


### § 80. Ἐμβαδὸ ὀρθοῦ κυκλικοῦ κύλινδρου.

α) Ἐμβαδὸ τῆς κυρτῆς ἐπιφάνειας ὀρθοῦ κυκλικοῦ κύλινδρου:

*Δίνεται ἕνας ὀρθός κυκλικός κύλινδρος μὲ ἀκτίνα βάσης  $R$  καὶ ὕψος  $v$ .  
Νὰ βρεῖτε τὸ ἔμβαδὸ τῆς κυρτῆς ἐπιφάνειάς του.*

Ἄν κόψουμε τὴν κυρτὴ ἐπιφάνεια τοῦ κύλινδρου κατὰ μῆκος μῖσ

γενέτειράς του (σχ. 156) και την αναπτύξουμε σ' ένα επίπεδο, θά πά-  
ρουμε ένα ὀρθογώνιο, πού ἔχει διαστάσεις τὰ μήκη τοῦ κύκλου τῆς βάσης  
καὶ τοῦ ὕψους (σχ. 157).



σχ. 156.



σχ. 157.

Ἐπομένως: Τὸ ἔμβαδὸ τῆς κυρτῆς ἐπιφάνειας ἑνὸς κυλίνδρου ἰσοῦται  
μὲ τὸ γινόμενο τοῦ μήκους τοῦ κύκλου τῆς βάσης ἐπὶ τὸ μήκος τοῦ ὕψους.

Δηλαδή

$$E_{\text{κυρτ. ἐπιφ. κυλ.}} = 2\pi R \cdot u$$

β) Ἐμβαδὸ τῆς ὀλικῆς ἐπιφάνειας κυλίνδρου:

Γιὰ νὰ βροῦμε τὸ ἔμβαδὸ τῆς ὀλικῆς ἐπιφάνειας τοῦ προηγούμενου  
κυλίνδρου, προσθέτουμε τὸ ἔμβαδὸ τῶν βάσεων τοῦ κυλίνδρου στὸ ἔμ-  
βαδὸ τῆς κυρτῆς ἐπιφάνειάς του.

\*Ἐτσι ἔχουμε

$$E_{\text{ὀλικ.}} = 2\pi R \cdot u + 2\pi R^2$$

ἢ ἀλλιῶς  $E_{\text{ὀλικ.}} = 2\pi R \cdot (u + R)$

### Ἀσκήσεις

236) Δίνεται ἕνας κύλινδρος μὲ ἀκτίνα βάσης 5 cm καὶ ὕψος  $u=25$  cm. Νὰ βρεῖτε  
τὸ ἔμβαδὸ α) τῆς κυρτῆς καὶ β) τῆς ὀλικῆς ἐπιφάνειας τοῦ κυλίνδρου.

237) Μία δεξαμενὴ πετρελαίου σὲ σχῆμα ὀρθοῦ κυλίνδρου ἔχει διάμετρο (ἔσωτερι-  
κῆ) βάσης 10 m καὶ ὕψος 20m. Νὰ βρεῖτε τὸ ἔμβαδὸ τῆς κυρτῆς (ἔσωτερικῆς) ἐπιφάνειας  
τῆς δεξαμενῆς αὐτῆς.

238) Δίνεται ἕνας κύλινδρος, τοῦ ὁποῦ τοῦ ἔμβαδὸ τῆς ὀλικῆς ἐπιφάνειας εἶναι  
 $471 \text{ cm}^2$  καὶ ἡ ἀκτίνα τῆς βάσης 5 cm. Βρεῖτε τὸ ὕψος τοῦ κυλίνδρου.


239) Ἐνα κυλινδρικό μολύβι ἀξυστο ἔχει διάμετρο 6 mm καὶ μήκος 18 cm. Νὰ  
βρεῖτε τὸ ἔμβαδὸ τῆς κυρτῆς καὶ τῆς ὀλικῆς ἐπιφάνειάς του.

240) Δίνεται ἕνα ὀρθογώνιο μὲ διαστάσεις α καὶ β. Τὸ περιστρέφουμε πρῶτα γύρω  
ἀπὸ τὴ μιά πλευρά καὶ ἔπειτα γύρω ἀπὸ τὴν ἄλλη (τὴ διαδοχικὴ μὲ τὴν πρώτη πλευρά)  
καὶ παράγονται ἔτσι δύο κύλινδροι ἐκ περιστροφῆς. Τί ἔχετε νὰ παρατηρήσετε γιὰ τὰ  
ἔμβαδά τῶν κυρτῶν ἐπιφανειῶν τῶν δύο αὐτῶν κυλίνδρων;

### § 81. Όγκος του ὀρθοῦ κυκλικῦ κυλίνδρου.

Δίνεται ἕνας ὀρθὸς κυκλικὸς κύλινδρος μὲ ἀκτίνα βάσης  $R$  καὶ ὕψος  $v$ . (σχ. 158). Νὰ βρεῖτε τὸν ὄγκο του.

Ὁ ὄγκος τοῦ ὀρθοῦ κυκλικῦ κυλίνδρου μὲ ἀκτίνα βάσης  $R$  καὶ ὕψος  $v$  δίνεται ἀπὸ τὸν τύπο  $V = \pi \cdot R^2 \cdot v$ , καθὼς θ' ἀποδείξουμε σὲ ἀνώτερη τάξη.




σχ. 158.

**Σημείωση.** Μποροῦμε νὰ βροῦμε τὸν προηγούμενο τύπο μὲ τὴ βοήθεια τῆς ἔννοιας τοῦ ἔγγεγραμμένου στὸν κύλινδρο κανονικοῦ πρίσματος. (Ἐνα κανονικὸ πρίσμα λέγεται ἔγγεγραμμένο σὲ κύλινδρο, ἂν οἱ βάσεις του εἶναι πολύγωνα κανονικὰ ἔγγεγραμμένα στὶς βάσεις τοῦ κυλίνδρου καὶ οἱ παράπλευρες ἀκμές του εἶναι γενέτιρες τοῦ κυλίνδρου).

Ἐνα ἔγγεγραμμένο σὲ κύλινδρο κανονικὸ πρίσμα, ποῦ ὁ ἀριθμὸς τῶν πλευρῶν τῆς βάσης του συνεχῶς διπλασιάζεται, πλησιάζει λίγο λίγο τὸ σχῆμα τοῦ κυλίνδρου.

Αὐτὸ μποροῦμε νὰ τὸ δεῖξουμε μὲ τὴ βοήθεια ἐνὸς ἀνοικτοῦ ἀπὸ πάνω κυλίνδρου ἀπὸ χαρτόνι καὶ μερικῶν κανονικῶν πρισματῶν, ποῦ ἔχουν ὕψος ἴσο μὲ τὸ ὕψος τοῦ κυλίνδρου καὶ βάσεις σχήματος τετραγώνου, καν. ὀκταγώνου, καν. δεκαεξαγώνου κλπ. (πολυγώνων, τὰ ὁποῖα μποροῦν νὰ ἔγγραφον στὴ βάση τοῦ κυλίνδρου).



σχ. 159.

Ἄν βάλουμε ἕνα ἀπ' αὐτὰ μέσα στὸν κύλινδρο, οἱ βάσεις του θὰ εἶναι ἔγγεγραμμένες στὶς βάσεις τοῦ κυλίνδρου καὶ οἱ παράπλευρες ἀκμές του εἶναι γενέτιρες τοῦ κυλίνδρου.

Βάνουμε μὲ τὴ σειρά μέσα στὸν κύλινδρο τὰ καν. πρίσματα μὲ βάση τετράγωνο, καν. 8/γώνο, καν. 16/γώνο κλπ. καὶ παρατηροῦμε ὅτι ἡ διαφορὰ τῶν ὀγκῶν τοῦ κυλίνδρου καὶ τῶν πρισματῶν συνεχῶς ἐλαττώνεται, ὅσο αὐ-

ξάνει τὸ πλῆθος τῶν πλευρῶν τῆς βάσης τοῦ ἔγγεγραμμένου πρίσματος, καὶ μπορεῖ νὰ γίνῃ ὅσο θέλουμε μικρὴ (σχ. 159).


Γι' αὐτὸ τὸ λόγῳ λέμε ὅτι ὁ ὄγκος τοῦ πρίσματος προσεγγίζει (ἔχει ὄριο) τὸν ὄγκο τοῦ κυλίνδρου. Ἄλλὰ ὁ ὄγκος τοῦ ὀρθοῦ πρίσματος εἶναι  $V = E_{\beta} \cdot v$ . Ἐπομένως καὶ τοῦ κυλίνδρου ὁ ὄγκος θὰ εἶναι  $V = E_{\beta} \cdot v = \pi R^2 \cdot v$ .

(Μὲ περισσότερες λεπτομέρειες θὰ ἐξετάσουμε τὸ θέμα αὐτὸ σὲ ἀνώτερη τάξη).

### Ἄσκησεις

241) Ἐνας ὀρθὸς κυκλικὸς κύλινδρος ἔχει ἀκτίνα βάσης  $R = 5$  cm καὶ ὕψος 15 cm. Νὰ βρεῖτε τὸν ὄγκο του.

242) Ἐνας κύλινδρος, ποῦ ὁ ὄγκος του εἶναι  $45\pi$  cm<sup>3</sup>, ἔχει ὕψος 5 cm. Νὰ βρεῖτε τὴν ἀκτίνα τῆς βάσης του.



σχ. 160.

243) Ἡ κυρτὴ ἐπιφάνεια ἐνὸς κυλίνδρου εἶναι  $94,20 \text{ cm}^2$ . Τὸ ὕψος του εἶναι  $15 \text{ cm}$ . Νὰ ὑπολογίσετε τὸν ὄγκο του.


244) Ἐνα πηγάδι κυλινδρικοῦ σχήματος ἔχει βάθος  $6 \text{ m}$ . Νὰ ὑπολογίσετε τὸν ὄγκο τῆς λιθοδομῆς του, ἂν ἡ ἐσωτερικὴ διάμετρος τοῦ πηγαδιοῦ εἶναι  $3 \text{ m}$  καὶ τὸ πάχος τοῦ τοίχου  $2,5 \text{ dm}$ .

245) Ἐνα ὀρθογώνιο  $ΑΒΓΔ$  μὲ διαστάσεις  $ΑΒ=10 \text{ cm}$  καὶ  $ΒΓ=4 \text{ cm}$  στρέφεται γύρω ἀπὸ μιὰ εὐθεῖα  $\epsilon$  παράλληλη πρὸς τὴν  $ΑΒ$ , ποὺ βρίσκεται στὸ ἐπίπεδο τοῦ ὀρθογωνίου καὶ σὲ ἀπόσταση  $12 \text{ cm}$  ἀπ' αὐτήν. Νὰ ὑπολογίσετε τὸν ὄγκο τοῦ στερεοῦ, ποὺ παράγεται κατὰ τὴν περιστροφή τοῦ ὀρθογωνίου γύρω ἀπὸ τὴν εὐθεῖα  $\epsilon$  (σχ. 160).

## Ε. ΟΡΘΟΣ ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΚΩΝΟΣ (ΚΩΝΟΣ ΕΚ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ) ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΡΘΟΥ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΩΝΟΥ

### § 82. Ὁρθὸς κυκλικὸς κῶνος.

Θεωροῦμε ἕνα ὀρθογώνιο τρίγωνο  $ΑΚΟ$  (γων.  $Κ=1\acute{o}\rho\theta.$ ). Τὸ περιστρέφουμε γύρω ἀπὸ τὴν  $ΟΚ$ . Μὲ μιὰ ὁλόκληρη περιστροφή τοῦ τριγώνου αὐτοῦ γύρω ἀπὸ μιὰ κάθετη πλευρὰ του παράγεται ἕνας ὀρθὸς κυκλικὸς κῶνος. Ἡ  $ΚΟ$  παραμένει ἀκίνητη κατὰ τὴν περιστροφή καὶ ὁ φορέας τῆς λέγεται **ἄξονας** τοῦ κῶνου (σχ. 161).



σχ. 161.

Ἡ πλευρὰ  $ΟΑ$  (ὑποτείνουσα τοῦ ὀρθογ. τριγώνου  $ΑΚΟ$ ) μὲ τὴν περιστροφή παράγει τὴν κυρτὴ ἐπιφάνεια τοῦ κῶνου καὶ ὀνομάζεται **γενέτειρα** ἢ **πλευρὰ** τοῦ κῶνου.

Ἡ πλευρὰ  $ΚΑ$  παράγει μὲ τὴν περιστροφή ἕναν κυκλικὸ δίσκο, ποὺ τὸ ἐπίπεδό του εἶναι κάθετο στὸν ἄξονα τοῦ κῶνου στὸ σημεῖο  $Κ$ . Ὁ δίσκος αὐτὸς λέγεται **βάση**

τοῦ κῶνου. Ἡ ἀκτίνα  $R$  τῆς βάσης εἶναι ἡ **ἀκτίνα** τοῦ κῶνου καὶ τὸ σημεῖο  $Ο$  εἶναι ἡ **κορυφή** τοῦ κῶνου.

Ἡ ἀπόσταση τῆς κορυφῆς  $Ο$  τοῦ κῶνου ἀπὸ τὴν βάση, δηλαδή τὸ εὐθ. τμῆμα  $ΟΚ$  τοῦ ἄξονά του λέγεται **ὑψος** τοῦ κῶνου. Ἡ γωνία  $ΑΟΚ$  τοῦ ὀρθογ. τριγώνου  $ΑΟΚ$  εἶναι τὸ μισὸ τῆς γωνίας τῆς κορυφῆς τοῦ κῶνου. Ἄν τὸ τρίγωνο  $ΑΟΑ'$  εἶναι ἰσόπλευρο, δηλαδή ἡ διάμετρος τῆς βάσης εἶναι ἴση μὲ τὴν γενέτειρα τοῦ κῶνου, τότε ὁ κῶνος λέγεται **ἰσόπλευρος**.

**Σημείωση.** Μποροῦμε νὰ περιστρέψουμε γρήγορα μὲ κάποιο μηχανισμὸ ἕνα ὀρθογ.



σχ. 162.

τρίγωνο (άπό χαρτόνι ή κάτι άλλο) γύρω άπό μία κάθετη πλευρά του και να έχουμε την εικόνα ενός κώνου εκ περιστροφής στο χώρο των τριών διαστάσεων (σχ. 162).


Άπό τά παραπάνω συμπεραίνουμε ότι: Τό στερεό, πού παράγεται με μία όλόκληρη περιστροφή ενός όρθου. τριγώνου γύρω άπό μία άκίνητη κάθετη πλευρά του, λέγεται όρθος κυκλικός κώνος (ή κώνος εκ περιστροφής). Στα έπόμενα όταν λέμε «κώνος», θα έννοούμε «όρθος κυκλικός κώνος».

### § 83. Έμβαδό του όρθου κυκλικού κώνου.


α) Έμβαδό τής κυρτής επιφάνειας του όρθου κυκλικού κώνου:

Δίνεται ένας κώνος με άκτίνα βάσης  $R$  και πλευρά  $\lambda$ . Να βρεΐτε τό έμβαδό τής κυρτής επιφάνειάς του.


Κόβουμε την κυρτή επιφάνεια του κώνου κατά μήκος μιάς γενέτειράς του και την άναπτύσσουμε σ' ένα έπίπεδο (σχ. 163, 164).



σχ. 163.



σχ. 164.



σχ. 165.

Τό άνάπτυγμα τής κυρτής επιφάνειας του κώνου είναι ένας κυκλικός τομέας, πού τό έμβαδό του είναι ίσο με τό έμβαδό τής κυρτής επιφάνειας του κώνου και τό τόξο είναι ίσο με τό μήκος του κύκλου τής βάσης του κώνου, δηλαδή  $\tau = 2\pi R$ .

Ξέρουμε ότι τό έμβαδό του κυκλικού τομέα δίνεται και άπό τόν τύπο:

$$\epsilon = \tau \cdot \frac{\lambda}{2} = \frac{1}{2} 2\pi R \lambda = \pi R \lambda.$$

Άρα

$$E_{\text{κυρτ. επιφ. κών. εκ περ.}} = \pi R \lambda$$

δηλαδή:

Τό έμβαδό τής κυρτής επιφάνειας ενός όρθου κυκλικού κώνου ίσοΐται με τό γινόμενο του μήκους του ήμικυκλίου τής βάσης επί τό μήκος τής γενέτειρας του κώνου.

β) Έμβασδο τῆς ὀλικῆς ἐπιφάνειας ὀρθοῦ κυκλικοῦ κώνου:

Γιὰ νὰ βροῦμε τὸ ἔμβασδο τῆς ὀλικῆς ἐπιφάνειας, τοῦ ὀρθοῦ κυκλικοῦ κώνου, προσθέτουμε στὸ ἔμβασδο τῆς κυρτῆς ἐπιφάνειάς του τὸ ἔμβασδο τῆς βάσης του (σχ. 165).

$$\text{Δηλαδή } \boxed{E_{\text{ὀλικ.}} = \pi R\lambda + \pi R^2} \quad \eta \quad \alpha\lambda\lambda\iota\omega\varsigma \quad \boxed{E_{\text{ὀλικ.}} = \pi R \cdot (R + \lambda)}$$

### Ἀσκήσεις

246) Δίνεται ἓνας κώνος μὲ ἀκτίνα βάσης 8 cm καὶ πλευρὰ 10 cm. Νὰ βρεῖτε τὸ ἔμβασδο τῆς κυρτῆς καὶ τῆς ὀλικῆς ἐπιφάνειάς του.

247) Ἐνας κώνος ἐκ περιστροφῆς ἔχει πλευρὰ μήκους 15 cm καὶ ὕψος 12 cm. Νὰ βρεῖτε τὸ ἔμβασδο τῆς κυρτῆς ἐπιφάνειάς του.

248) Νὰ ὑπολογίσετε τὸ ἔμβασδο τῆς ὀλικῆς ἐπιφάνειας ἑνὸς κώνου, ποῦ ἔχει ὕψος 16 cm καὶ πλευρὰ μήκους 20 cm.


249) Τὸ ἔμβασδο τῆς κυρτῆς ἐπιφάνειας ἑνὸς κώνου εἶναι  $47,10 \text{ dm}^2$  καὶ ἡ πλευρὰ του 5 dm. Νὰ βρεῖτε τὸ ἔμβασδο τῆς ὀλικῆς ἐπιφάνειας τοῦ κώνου.

250) Ἐνας ἰσόπλευρος ὀρθὸς κυκλικὸς κώνος ἔχει ὕψος 10 cm. Νὰ βρεῖτε τὸ μήκος τῆς ἀκτίνας τῆς βάσης, τὸ μήκος τῆς πλευρᾶς καὶ τὸ ἔμβασδο τῆς ὀλικῆς ἐπιφάνειας τοῦ κώνου αὐτοῦ.

251) Ἐνα τετράγωνο μὲ πλευρὰ 20 cm περιστρέφεται γύρω ἀπὸ μιὰ διαγώνιό του. Νὰ βρεῖτε τὸ ἔμβασδο τῆς ἐπιφάνειας τοῦ στερεοῦ ποῦ παράγεται.

### § 84. Ὅγκος τοῦ ὀρθοῦ κυκλικοῦ κώνου

Ὁ ὄγκος ἑνὸς ὀρθοῦ κυκλικοῦ κώνου μὲ ἀκτίνα βάσης  $R$  καὶ ὕψος  $u$  (σχ. 166) δίνεται ἀπὸ τὸν τύπο  $V = \frac{1}{3} \pi R^2 u$ , δηλαδή ὁ ὄγκος ἑνὸς ὀρθοῦ κυκλικοῦ κώνου ἰσοῦται μὲ τὸ  $\frac{1}{3}$  τοῦ γινομένου τοῦ ἔμβασδοῦ τῆς βάσης ἐπὶ τὸ μήκος τοῦ ὕψους του.



σχ. 166.

Σὲ ἀνώτερη τάξη θ' ἀποδείξουμε αὐτὴ τὴν πρόταση.

Μποροῦμε ὁμως νὰ βροῦμε τὸν τύπο αὐτὸ μὲ συλλογισμοὺς ἀνάλογους πρὸς ἐκείνους τῆς § 81.

Γιὰ τὸ σκοπὸ αὐτὸ θὰ χρησιμοποιήσουμε κανονικὲς πυραμίδες ἐγγεγραμμένες στὸν κώνο, ποῦ ὁ ἀριθμὸς τῶν πλευρῶν τῆς βάσης των συνεχῶς διπλασιάζεται.

**Παρατήρηση:** Ἀπὸ τοὺς τύπους τῶν ὄγκων τοῦ ὀρθοῦ κυκλικοῦ κυλίνδρου καὶ τοῦ κώνου, ποῦ ἔχουν τὴν ἴδια βάση καὶ τὸ ἴδιο ὕψος, παρατηροῦμε ὅτι ὁ ὄγκος ἑνὸς ὀρθοῦ κυκλικοῦ κώνου ἰσοῦται μὲ τὸ  $\frac{1}{3}$  τοῦ ὄγκου ἑνὸς ὀρθοῦ κυκλικοῦ κυλίνδρου, ὁ ὁποῖος ἔχει τὴν ἴδια βάση καὶ τὸ ἴδιο ὕψος μὲ τὸν κώνο.

Αυτό το διαπιστώνουμε, αν χρησιμοποιήσουμε ένα κωνικό και ένα κυλινδρικό δοχείο με ίσες βάσεις και ίσα ύψη και εργαστούμε όπως στην § 78.

### Άσκησης

252) Ένας κώνος έχει ακτίνα βάσης 15 cm και ύψος 40 cm. Να υπολογίσετε τον όγκο του.

253) Ένας κώνος, που το έμβαδό της κυρτής επιφάνειάς του είναι  $47,10 \text{ cm}^2$ , έχει πλευρά μήκους 5 cm. Να βρείτε τον όγκο του.

254) Να υπολογίσετε τον όγκο ενός όρθου κυκλικού κώνου, που έχει ύψος  $v=9 \text{ cm}$  και μήκος γενέτειρας  $\lambda=15 \text{ cm}$ .


255) Το μήκος του κύκλου της βάσης ενός όρθου κυκλικού κώνου είναι 18,84 dm και η γενέτειρά του 5 dm. Να υπολογίσετε τον όγκο του κώνου αυτού.

256) Δίνεται ένας ισόπλευρος κώνος, που έχει ύψος 8 cm. Να υπολογίσετε την ακτίνα της βάσης και τον όγκο του.

## ΣΤ. ΣΦΑΙΡΑ – ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΦΑΙΡΑΣ

### § 85. Σφαίρα.

Δίνεται ένα ημικύκλιο  $AMA'$ . Αν το περιστρέψουμε (μια ολοκλήρη περιστροφή) γύρω από την ακίνητη διάμετρό του  $AA'$ , παράγεται ένα στερεό, που λέγεται **σφαίρα**.



σχ. 167.



σχ. 168.

Κάθε σημείο της σφαίρας απέχει από το  $O$  απόσταση  $R$  ίση με την ακτίνα του ημικυκλίου. Το  $O$  λέγεται κέντρο της σφαίρας. Η σφαίρα συμβολίζεται: σφαίρα  $(O, R)$ .

Κάθε επίπεδο, που περνά από το  $O$ , τέμνει τη σφαίρα κατά έναν κύκλο, ο οποίος έχει κέντρο  $O$  και ακτίνα  $R$  και λέγεται **μέγιστος κύκλος** της σφαίρας.

Κάθε επίπεδο, που τέμνει τη σφαίρα, αλλά δεν περνά από το κέντρο της, την τέμνει κατά έναν κύκλο, ο οποίος λέγεται **μικρός κύκλος** της σφαίρας.



**Σημ.** Με έναν μηχανισμό περιστρέφουμε γρήγορα ένα ημικύκλιο (από χαρτόνι ή άλλο υλικό) και έχουμε την εικόνα μιάς σφαίρας στο χώρο των τριών διαστάσεων (σχ. 168).

### § 86. Έμβαδό σφαίρας.

Το έμβαδό της σφαίρας ισούται με το τετραπλάσιο του έμβαδού ενός κύκλου, ο οποίος έχει ακτίνα ίση με την ακτίνα της σφαίρας (μέγιστος κύκλος).

Δηλαδή:

$$E_{\text{σφαιρ.}} = 4\pi R^2$$

### Άσκήσεις

257) Μία σφαίρα έχει ακτίνα 8 cm. Βρείτε το έμβαδό της.

258) Το μήκος ενός μεγίστου κύκλου μιάς σφαίρας είναι 50,24 cm. Να βρείτε το έμβαδό της σφαίρας.

259) Το έμβαδό μιάς σφαίρας είναι 50,24 cm<sup>2</sup>. Να υπολογίσετε την ακτίνα της, καθώς και την ακτίνα μιάς άλλης σφαίρας, που το έμβαδό της είναι τετραπλάσιο από το έμβαδό της πρώτης.

260) Να βρείτε το λόγο των έμβαδών δύο σφαιρών με ακτίνες 3 cm και 2 cm.

261) Κάνετε το ίδιο, όταν οι ακτίνες είναι  $R_1, R_2$ .

### § 87. Όγκος σφαίρας.

Ο όγκος  $V$  μιάς σφαίρας με ακτίνα  $R$  δίνεται από τον τύπο  $V = \frac{4}{3}\pi R^3$  (1)


καθώς θ' αποδείξουμε σ' ανώτερη τάξη.

Δηλαδή: Ο όγκος της σφαίρας ισούται με το γινόμενο του κύβου του μήκους της ακτίνας της επί τον αριθμό  $\frac{4}{3}\pi$ .

Ο τύπος (1) μπορεί να γραφεί και ως εξής:

$$V = \frac{4}{3} \cdot \pi R^3 = \frac{4}{3} \pi \left(\frac{D}{2}\right)^3 = \frac{4}{3} \pi \frac{D^3}{8} \Rightarrow V = \frac{1}{6} \pi D^3, \text{ όπου } D = 2R.$$

**Σημ.** Ο μεγάλος Έλληνας μαθηματικός Αρχιμήδης πέτυχε πρώτος να μετρήσει το έμβαδό και τον όγκο της σφαίρας.



σχ. 169.

### Εφαρμογές.

1. Δύο σφαίρες έχουν ακτίνες 2 και 3 cm. Να βρεθεί ο λόγος των όγκων τους.

2. Δύο σφαίρες έχουν ακτίνες  $R_1, R_2$ . Βρείτε το λόγο των όγκων τους.

$$\left(\frac{V_1}{V_2} = \frac{R_1^3}{R_2^3}\right)$$


3. Αν  $R$  και  $2R$  είναι οι ακτίνες δύο σφαιρών, ποιά είναι η σχέση των όγκων τους;

### Άσκήσεις


- 262) Να υπολογίσετε τον όγκο μιάς σφαίρας με ακτίνα 5 m.  
 263) Βρείτε την ακτίνα μιάς σφαίρας, που έχει όγκο  $113,04 \text{ cm}^3$ .  
 264) Το έμβαδόν μιάς σφαίρας είναι  $314 \text{ cm}^2$ . Να υπολογίσετε τον όγκο της.  
 265) Το έμβαδόν μιάς σφαίρας είναι  $113,04 \text{ cm}^2$ . Να βρείτε τον όγκο μιάς άλλης σφαίρας, που έχει ακτίνα τριπλάσια από την ακτίνα της πρώτης σφαίρας.  
 266) Το έμβαδόν ενός μεγίστου κύκλου μιάς σφαίρας είναι  $153,86 \text{ cm}^2$ . Να υπολογίσετε τον όγκο τής σφαίρας αυτής.

### Άσκήσεις για επανάληψη του κεφ. V.


- 267) Ένα σώμα σε σχήμα κυκλικού κυλίνδρου με ακτίνα βάσης 1,5 dm και μήκος 4 dm καταλήγει στο ένα άκρο του σε κώνο με την ίδια ακτίνα και ύψος 2 dm· στο άλλο άκρο του καταλήγει σε ημισφαίριο με την ίδια ακτίνα (έξωτερικώς). Να βρείτε το έμβαδόν τής επιφάνειας (έξωτερικής) του στερεού και τον όγκο του (σχ. 170).



σχ. 170.



σχ. 171.




σχ. 172.

- 268) Μία σφαίρα είναι έγγεγραμμένη σε κύλινδρο εκ περιστροφής (σχ. 171), δηλαδή η σφαίρα περιέχεται ακριβώς στο έσωτερικό του κυλίνδρου και έφάπτεται στις δύο βάσεις και στην κυρτή επιφάνειά του κατά μήκος ενός μεγίστου κύκλου. Αν η ακτίνα τής σφαίρας είναι 5 cm, να βρείτε α) την ακτίνα τής βάσης του κυλίνδρου, β) το ύψος του, γ) το έμβαδόν τής κυρτής επιφάνειας του όρθου κυκλικού κυλίνδρου, δ) το έμβαδόν τής σφαίρας, ε) το λόγο των δύο αυτών έμβαδών και στ) το λόγο των όγκων των στερεών αυτών.


- 269) Στο παραπάνω σχήμα (σχ. 172) έχουμε ένα τετράγωνο με πλευρά 5 cm, που κάνει μια ολόκληρη περιστροφή γύρω από μια ευθεία  $\epsilon$  του επιπέδου του, η οποία είναι παράλληλη προς μία πλευρά του και βρίσκεται σ' απόσταση 3 cm απ' αυτή. Να βρεθεί το έμβαδόν τής ολικής επιφάνειας του στερεού, που παράγεται από την περιστροφή του τετραγώνου γύρω από την ευθεία  $\epsilon$ . (σχ. 172).

- 270) Ένας ισόπλευρος όρθος κυκλικός κώνος είναι έγγεγραμμένος σε μιά σφαίρα με ακτίνα 6 cm (δηλ. η σφαίρα περνά από την κορυφή του κώνου και ο κύκλος τής βάσης του είναι ένας μικρός κύκλος τής σφαίρας). Να βρεθεί το έμβαδόν τής ολικής επιφάνειας του κώνου (σχ. 173).

- 271) Ένα δοχείο ανοικτό προς τα πάνω έχει σχήμα όρθου κυκλικού κυλίνδρου με ακτίνα βάσης 6 m και ύψος 8 m και στηρίζεται πάνω σ' έναν κύβο, που έχει ακμή 18 m. Το έσωτερικό του δοχείου έχει σχήμα κώνου εκ περιστροφής με βάση τη μία από τις βάσεις του κυλίνδρου αυτού και κορυφή το κέντρο τής άλλης βάσης του. Αν βάψουμε με λαδομπογιά ολόκληρη την επιφάνεια του δοχείου (έξωτερική κι έσωτερική) καθώς και την έλευθερη επιφάνεια τής κυβικής βάσης, όπου στηρίζεται το κυλινδρικό δοχείο πληρώνοντας 85 δραχ. το  $\text{m}^2$ , πόσες δραχμές θά ξοδεύσουμε;











σχ. 173.



σχ. 174.

## Πίνακας τύπων εμβαδών και όγκων διαφόρων στερεών

Εικόνα στερεού	*Όνομα Στερεού	*Εμβαδό για ύπολογισμό	Τύπος που δίνει το έμβαδό	*Όγκος για ύπολογισμό	Τύπος που δίνει τόν όγκο
	Πρίσμα	*Εμβαδό παράπλ. επιφάνειας  *Εμβαδό όλικης επιφάνειας	*Όρθου πρίσματος $E_{\text{παρ. επ.}} = \text{περ.βασ.} \times u$  $E_{\text{ολ.}} = \text{περ.βασ.} \times u + 2E_{\beta}$	*Όγκος Πρίσματος	$V = E_{\beta} \cdot u$
	*Όρθ. παρ/δο	*Εμβαδό όλικης επιφάνειας	$E = 2(\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha)$	*Όγκος όρθ. παρ/δου	α) $V = \alpha \cdot \beta \cdot \gamma$ και β) $V = E_{\beta} \cdot u$
	Κύβος	*Εμβαδό όλικης επιφάνειας	$E = 6\alpha^2$	*Όγκος κύβου	$V = \alpha^3$
	Πυραμίδα (κανονική)	*Εμβαδό παράπλ. επιφάνειας  *Εμβαδό όλικης	$E = \frac{\text{περ.βασ.} \times \text{άποστ.}}{2}$  $E = \frac{\text{περ.βασ.} \times \text{άποστ.}}{2} + E_{\beta}$	*Όγκος πυραμίδας	$V = \frac{1}{3} E_{\beta} \cdot u$
	Πυραμίδα (όποιαδήποτε)	*Εμβαδό	$E = \text{*Άθροισ.} E_{\text{εδρών}}$	*Όγκος	$V = \frac{1}{3} E_{\beta} \cdot u$
	Κύλινδρος (όρθος κυκλ.)	*Εμβαδό κυρτ. επιφάνειας  *Εμβαδό όλικης επιφάνειας	$E = 2\pi R u$  $E = 2\pi R u + 2\pi R^2$ ή $E = 2\pi R(u + R)$	*Όγκος κυλίνδρου	$V = \pi R^2 \cdot u$
	Κώνος (όρθος κυκλ.)	*Εμβαδό κυρτ. επιφάνειας  *Εμβαδό όλικ. επιφάνειας	$E = \pi R l$  $E = \pi R l + \pi R^2$ ή $E = \pi R(R + l)$	*Όγκος κώνου	$V = \frac{1}{3} \pi \cdot R^2 \cdot u$
	Σφαίρα	*Εμβαδό	$E = 4\pi R^2$	*Όγκος	$V = \frac{4}{3} \pi \cdot R^3$

Πίνακας τῶν τετραγώνων καὶ τῶν κύβων τῶν φυσικῶν ἀριθμῶν  
ἀπὸ 1 ὠς 100

$\alpha$	$\alpha^2$	$\alpha^3$	$\alpha$	$\alpha^2$	$\alpha^3$
1	1	1	51	2601	132651
2	4	8	52	2704	140608
3	9	27	53	2809	148877
4	16	64	54	2916	157464
5	25	124	55	3025	166375
6	36	216	56	3136	175616
7	49	343	57	3249	185193
8	64	512	58	3364	195112
9	81	729	59	3481	205379
10	100	1000	60	3600	216000
11	121	1331	61	3721	226981
12	144	1728	62	3844	238328
13	169	2197	63	3969	250047
14	196	2744	64	4096	262144
15	225	3375	65	4225	274625
16	256	4096	66	4356	287496
17	289	4913	67	4489	300756
18	324	5832	68	4624	314432
19	361	6859	69	4761	328509
20	400	8000	70	4900	343000
21	441	9261	71	5041	357911
22	484	10648	72	5184	373248
23	529	12167	73	5329	389017
24	576	13824	74	5476	405224
25	625	15625	75	5625	421875
26	676	17576	76	5776	438976
27	729	19683	77	5929	456533
28	784	21952	78	6084	474552
29	841	24389	79	6241	493039
30	900	27000	80	6400	512000
31	961	29791	81	6561	531441
32	1024	32768	82	6724	551368
33	1089	35937	83	6889	571787
34	1156	39304	84	7056	592704
35	1225	42875	85	7224	614125
36	1296	46656	86	7396	636056
37	1369	50653	87	7569	658503
38	1444	54872	88	7744	681472
39	1521	59139	89	7921	704969
40	1600	64000	90	8100	729000
41	1681	68921	91	8281	753571
42	1764	74088	92	8464	778688
43	1849	79507	93	8649	804357
44	1936	85184	94	8836	830584
45	2025	91125	95	9025	857375
46	2116	97336	96	9216	884735
47	2209	103823	97	9409	912673
48	2304	110592	98	9604	941192
49	2401	117649	99	9801	970299
50	2500	125000	100	10000	1000000

## Πίνακας τετραγωνικών ριζών των φυσικών αριθμών από 1 ως 100

Αριθμός $\alpha$	Τετραγ. ρίζα $\sqrt{\alpha}$	Αριθμός $\alpha$	Τετραγ. ρίζα $\sqrt{\alpha}$	Αριθμός $\alpha$	Τετραγ. ρίζα $\sqrt{\alpha}$	Αριθμός $\alpha$	Τετραγ. ρίζα $\sqrt{\alpha}$
1	1,000	26	5,099	51	7,141	76	8,718
2	1,414	27	5,196	52	7,211	77	8,775
3	1,732	28	5,292	53	7,280	78	8,832
4	2,000	29	5,385	54	7,349	79	8,888
5	2,236	30	5,477	55	7,416	80	8,944
6	2,450	31	5,568	56	7,483	81	9,000
7	2,646	32	5,657	57	7,550	82	9,055
8	2,828	33	5,745	58	7,616	83	9,110
9	3,000	34	5,831	59	7,681	84	9,165
10	3,162	35	5,916	60	7,746	85	9,220
11	3,317	36	6,000	61	7,810	86	9,274
12	3,464	37	6,083	62	7,874	87	9,327
13	3,606	38	6,164	63	7,937	88	9,381
14	3,741	39	6,245	64	8,000	89	9,434
15	3,873	40	6,325	65	8,062	90	9,487
16	4,000	41	6,403	66	8,124	91	9,539
17	4,123	42	6,481	67	8,185	92	9,591
18	4,243	43	6,557	68	8,246	93	9,644
19	4,359	44	6,633	69	8,307	94	9,695
20	4,472	45	6,708	70	8,367	95	9,747
21	4,583	46	6,782	71	8,426	96	9,798
22	4,690	47	6,856	72	8,485	97	9,849
23	4,796	48	6,928	73	8,544	98	9,900
24	4,899	49	7,000	74	8,602	99	9,950
25	5,000	50	7,071	75	8,660	100	10,000

Σημείωση: Οι τετραγωνικές ρίζες των μη τελείων τετραγώνων είναι κατά προσέγγιση 0,001.

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ – ΑΛΓΕΒΡΑΣ

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι – ΣΥΝΟΛΑ

σελίδα

1. 'Η έννοια του συνόλου – ('Επαναλήψεις και συμπληρώσεις) .....	5
2. 'Η έννοια της αντιστοιχίας – Μονοσήμαντη και άμφιμονοσήμαντη αντιστοιχία – Ισοδύναμα σύνολα .....	8
3. Πεπερασμένα σύνολα – 'Απειροσύνολα .....	11
4. Ένωση και τομή συνόλων – Διάζευξη και σύζευξη ιδιοτήτων .....	13
5. Το συμπλήρωμα συνόλων – Διαμερισμός συνόλων – Κλάσεις ισοδυναμίας .....	15
6. Διατεταγμένο σύνολο .....	17

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ – Α' ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΡΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

1. Το σύνολο $Q_0^+$ των ρητών αριθμών της αριθμητικής (έπανάληψη) .....	20
2. Το σύνολο των θετικών και άρνητικών ρητών .....	22

3. Το σύνολο Q των ρητών πραγματικών αριθμών - Έφαρμογές	26
4. Απόλυτη τιμή ρητού αριθμού - Συμβολισμός ρητού με ένα γράμμα - Ή ισοότητα στο σύνολο των ρητών και οι ιδιότητές της.	30

### Β' ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΡΗΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

1. Πρόσθεση	32
2. Πρόσθεση περισσότερων από δύο προσθετών - Ιδιότητες της προσθέσεως	36
3. Απόλυτη τιμή του άθροισματος δύο ρητών	39
4. Ή πράξη της αφαιρέσεως	42
5. Το σύμβολο (-) σαν σύμβολο αφαιρέσεως και σαν πρόσημο	44
6. Άλγεβρικά άθροισματα	47
7. Ή σχέση της ανισότητας στο σύνολο Q - Διάταξη	50
8. Ή πράξη του πολλαπλασιασμού στο σύνολο Q. - Γινόμενο δύο ρητών	56
9. Γινόμενο τριών ή περισσότερων ρητών - Ιδιότητες	59
10. Ή πράξη της διαιρέσεως στο Q - Πηλίκο δύο ρητών - Ίδιότητες	65
11. Αριθμητικές παραστάσεις - Σημασία των παρενθέσεων	68
12. Ή έννοια του διανύσματος	72
13. Ή προσανατολισμένη ευθεία (άξονας) - Άλγεβρική τιμή διανύσματος - Άπεικόνιση των ρητών στην προσανατολισμένη ευθεία	77
14. Δυνάμεις των ρητών με εκθέτη άκραιο - Πράξεις πάνω στις δυνάμεις των ρητών	80
15. Περίληψη των περιεχομένων στο κεφάλαιο II - Άσκησης για επανάληψη	85
<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ III - Α' ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ - ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ</b>	
1. Ή εξίσωση $ax + b = 0$ . Επίλυση αυτής	89
2. Προβλήματα που επιλύονται με τη βοήθεια εξισώσεως α' βαθμού με έναν άγνωστο	94
3. Άνισώσεις πρώτου βαθμού με έναν άγνωστο	99

### Β' ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ - ΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΗΣ $ax + b = 0$ ΚΑΙ ΤΗΣ $ax + b > 0$

1. Ή έννοια της μεταβλητής και ή έννοια της συναρτήσεως	102
2. Ή συνάρτηση $\psi = ax$ και ή γραφική παράστασή της	106
3. Ή συνάρτηση $\psi = ax + b$ και ή γραφική παράστασή της	108
4. Γραφική επίλυση της $ax + b = 0$ και της $ax + b > 0$	111
5. Άσκησης για επανάληψη του κεφαλαίου III	114

### ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

#### Α' ΛΟΓΟΙ - ΜΕΓΕΘΗ ΕΥΘΕΩΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ ΑΝΑΛΟΓΑ - ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ

1. Λόγος δύο αριθμών - Λόγος δύο όμοιδων μεγεθών - Ιδιότητες του λόγου	116
2. Μέγεθος ευθέως ανάλογα - Ιδιότητες - Γραφική παράσταση της $\psi = ax$	119
3. Μεγέθη αντίστροφως ανάλογα - Ιδιότητες - Γραφική παράσταση της $\psi = \frac{\alpha}{x}$	123
4. Αναλογίες και ιδιότητες αυτών	126

#### Β' ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

1. Προβλήματα άπλης μεθόδου των τριών	131
2. » ποσοστών	133
3. » συνθέτου μεθόδου των τριών	137
4. » τόκου	141
5. » ύφαιρέσεως	145
6. » μέσου όρου	148
7. » μερισμού	149
8. » μείξεως	152
9. » κραμάτων	154
10. Άσκησης για επανάληψη του κεφαλαίου IV	156
<b>ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ</b>	<b>158</b>

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ

### ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι — Α. ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΓΩΝΙΑ

σελίδα

- |   |     |
|---|-----|
| 1. Έγγεγραμμένες γωνίες .....                         | 163 |
| 2. Εφαρμογές των έγγεγραμμένων γωνιών. Άσκήσεις ..... | 166 |

#### Β. ΕΥΘΕΙΕΣ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΣΕ ΤΡΙΓΩΝΟ

- |   |     |
|---|-----|
| 1. Μεσοκάθετοι των πλευρών τριγώνου. Άσκήσεις .....                     | 168 |
| 2. Ύψη ενός τριγώνου. Άσκήσεις .....                                    | 169 |
| 3. Διάμεσοι τριγώνου. Άσκήσεις .....                                    | 170 |
| 4. Διχοτόμοι τριγώνου. Άσκήσεις .....                                   | 172 |
| 5. Περιγεγραμμένος και έγγεγραμμένος κύκλος σ' ένα τρίγωνο. Κατασκευή . | 173 |

#### Γ. ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΣΕ 2<sup>ο</sup> ΚΑΙ 3·2<sup>ο</sup> ΙΣΑ ΤΟΞΑ — ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΠΟΛΥΓΩΝΑ

- |  |     |
|--|-----|
| 1. Διάρεση κύκλου σέ 2 <sup>ο</sup> ίσα τόξα — Άντίστοιχα έγγεγραμμένα κανονικά πολύγωνα .....   | 175 |
| 2. Διάρεση κύκλου σέ 3·2 <sup>ο</sup> ίσα τόξα — Άντίστοιχα έγγεγραμμένα κανονικά πολύγωνα ..... | 177 |
| 3. Στοιχεία συμμετρίας καθενός από τά κανονικά πολύγωνα — Άσκήσεις ..                            | 179 |

#### ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ — Α. ΛΟΓΟΣ ΔΥΟ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

- |   |     |
|---|-----|
| 1. Λόγος δύο ευθυγράμμων τμημάτων. Άνάλογα ευθύγραμμα τμήματα. Άσκήσεις ..... | 181 |
| 2. Τό θεώρημα του Θαλή 1ο, 2ο θεώρημα. Άσκήσεις .....                         | 183 |

#### Β. ΟΜΟΙΑ ΤΡΙΓΩΝΑ

- |  |     |
|--|-----|
| 1. Όμοια τρίγωνα. Άσκήσεις .....                           | 187 |
| 2. Κριτήρια ομοιότητας τριγώνων. Εφαρμογές. Άσκήσεις ..... | 189 |

#### Γ. ΟΜΟΙΑ ΠΟΛΥΓΩΝΑ

- |  |     |
|--|-----|
| Όμοια πολύγωνα . Εφαρμογές. Άσκήσεις ..... | 194 |
|--|-----|

#### Δ. ΑΠΛΕΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

- |  |     |
|--|-----|
| Γεωμετρικές κατασκευές. Άσκήσεις ..... | 197 |
|--|-----|

#### ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ. Α. ΕΜΒΑΔΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

- |   |     |
|---|-----|
| 1. Όρισμοί. Μονάδες μετρήσεως έπιφανειών. Σχέσεις αυτών. Άσκήσεις ..... | 200 |
| 2. Έμβαδό όρθογωνίου και τετραγώνου. Εφαρμογές. Άσκήσεις .....          | 204 |
| 3. Έμβαδό παραλληλογράμμου. Έμβαδό τριγώνου. Εφαρμογές. Άσκήσεις .      | 208 |
| 4. Έμβαδό τραπέζιου. Άσκήσεις .....                                     | 212 |
| 5. Έμβαδό πολυγώνου. Εφαρμογές. Άσκήσεις .....                          | 215 |

#### Β. ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΘΕΩΡΗΜΑ

- |  |     |
|--|-----|
| 1. Πυθαγόρειο θεώρημα. Άσκήσεις .....  | 218 |
| 2. Τετραγωνική ρίζα θετικού αριθμού — Υπολογισμός αυτής. Εφαρμογές. Άσκήσεις ..... | 220 |
| 3. Τετραγωνική ρίζα αριθμού κατά προσέγγιση. Εφαρμογές. Άσκήσεις ...               | 224 |

#### Γ. ΜΗΚΟΣ ΚΥΚΛΟΥ — ΕΜΒΑΔΟ ΚΥΚΛΟΥ

- |  |     |
|--|-----|
| 1. Μήκος κύκλου — Μήκος τόξου. Άσκήσεις .....                  | 227 |
| 2. Έμβαδό κύκλου και κυκλικού τομέα. Εφαρμογές. Άσκήσεις ..... | 229 |
| 3. Πίνακας τύπων έμβαδών σχημάτων. Άσκήσεις διάφορες .....     | 232 |

## Δ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

σελίδα

Προβλήματα γεωμετρικῶν κατασκευῶν .....	233
---	-----

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV – Α. ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΩΝ

1. Εισαγωγή .....	237
2. Σχετικές θέσεις ευθειῶν, ἐπιπέδων, ευθειῶν καὶ ἐπιπέδων. Ἀσκήσεις .....	240
3. Διέδρη γωνία – πολυέδρη γωνία .....	243

## Β. ΕΥΘΕΙΑ ΚΑΘΕΤΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ – ΚΑΘΕΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΠΕΔΩΝ

1. Γωνία ασύμβατων ευθειῶν .....	244
2. Καθετότητα ευθείας καὶ ἐπιπέδου. Καθετότητα ἐπιπέδων. Ἀσκήσεις .....	245

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ V – ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ

1. Ὀρθογώνιο παραλληλεπίπεδο. Ἰδιότητες .....	250
2. Ἐμβαδὸ ἐπιφάνειας ὀρθογωνίου παραλληλεπιπέδου καὶ κύβου. Ἀσκήσεις .....	251
3. Ὅγκος στερεοῦ. Μονάδες ὄγκου .....	252
4. Ὅγκος ὀρθογωνίου παραλληλεπιπέδου καὶ κύβου. Ἀσκήσεις .....	253
5. Πρίσματα. Ἐμβαδὸ ἐπιφάνειας πρίσματος .....	255
6. Ὅγκος πρίσματος. Ἐφαρμογές. Ἀσκήσεις .....	259
7. Πυραμίδα – Κανονικὴ πυραμίδα – Ἐμβαδὸ κανονικῆς πυραμίδας. Ἀσκήσεις .....	261
8. Ὅγκος πυραμίδας. Ἀσκήσεις .....	264
9. Κυλινδρὸς ἐκ περιστροφῆς. Ἐμβαδὸ ὀρθοῦ κυκλικοῦ κυλίνδρου. Ἀσκήσεις .....	266
10. Ὅγκος κυλίνδρου ἐκ περιστροφῆς. Ἀσκήσεις .....	268
11. Ὀρθὸς κυκλικὸς κώνος. Ἐμβαδὸ ὀρθοῦ κυκλικοῦ κώνου. Ἀσκήσεις .....	269
12. Ὅγκος ὀρθοῦ κυκλικοῦ κώνου. Ἀσκήσεις .....	271
13. Σφαίρα – Ἐμβαδὸ σφαίρας. Ἀσκήσεις .....	272
14. Ὅγκος σφαίρας. Ἀσκήσεις .....	273
15. Ἀσκήσεις .....	274
16. Πίνακας τύπων ἐμβαδῶν καὶ ὄγκων τῶν στερεῶν πού ἔχουν ἐξετασθεῖ.	275



024000019839

ΕΚΔΟΣΗ Η', 1977 (V) — ΑΝΤΙΤΥΠΑ 135.000 — ΣΥΜΒΑΣΗ 2853/16-5-1977

ΕΚΤΥΠΩΣΗ Μ. ΕΥΡΕΝΙΔΗΣ &amp; ΣΙΑ Ο.Ε. — ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ Δ. Ο.Ε.







Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής