

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ

ΙΩΑΝΝΟΥ Φ. ΠΑΝΑΚΗ

ΙΣΤ
ΜΑΘ
1978

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΑΘΗΝΑ 1978

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Α. Αδαμίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

17616

Μέ απόφαση τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως τὰ δι-
δακτικά βιβλία τοῦ Δημοτικοῦ, Γυμνασίου καί Λυ-
κείου τυπώνονται ἀπό τόν Ὀργανισμό Ἐκδόσεως
Διδακτικῶν Βιβλίων καί μοιράζονται ΔΩΡΕΑΝ.

Τό βιβλίό μεταγλωτίστηκε από τήν καθαρεύουσα στή δημοτική γλώσσα,
ἀπό τούς φιλόλογους κ. κ. Θεοδωρακόπουλο Βασίλειο, Ζορμπά Ἀπόστολο
καί τό Συγγραφέα.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ

ΙΩΑΝΝΟΥ Φ. ΠΑΝΑΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΑΘΗΝΑ 1978

Τά κεφάλαια, οί παράγραφοι καί οί ομάδες άσκήσεων πού έχουν άστερίσκο δέ θά διδαχθούν στους μαθητές τών τμημάτων κλασικής κατευθύνσεως.

ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΔΥΟ ΤΟΣΩΝ


● 1. ΠΡΟΒΛΗΜΑ. Από τούς τριγωνομετρικούς αριθμούς τών προσανατολισμένων τόξων α και β να υπολογισθοῦν οί τριγωνομετρικοί αριθμοί τών τόξων $\alpha - \beta$ και $\alpha + \beta$.

Α) Ὑπολογισμός τοῦ $\sin(\alpha - \beta)$.

Ἔχουμε τόν τριγωνομετρικό κύκλο (Ο) καί τούς πρωτεύοντες ἄξονες $X'OX$ καί $Y'OY$ τών συνημιτόνων καί ἡμιτόνων, ἀντιστοίχως.

Ἄς πάρουμε $\widehat{A\Gamma}$ καί $\widehat{A\beta}$ δύο τόξα ἴσα πρὸς τὰ α καί β , ὅπου Α ἡ κοινή ἀρχή τους. Οί συντεταγμένες τών Γ καί Β ὡς πρὸς τούς ἄξονες $X'X$ καί $Y'Y$ εἶναι, ἀντιστοίχως:

$$\text{καί } \left. \begin{aligned} x &= \overline{O\Gamma_1} = \sin \alpha \\ y &= \overline{\Gamma_1\Gamma} = \eta\mu \alpha \\ x' &= \overline{OB_1} = \sin \beta \\ y' &= \overline{B_1\beta} = \eta\mu \beta \end{aligned} \right\}$$



Φέρνουμε τή ΒΔ κάθετη πρὸς τή $\Gamma_1\Gamma$. Ἀπό τό ὀρθογώνιο τρίγωνο ΒΔΓ ἔχουμε:

$$B\Gamma^2 = B\Delta^2 + \Delta\Gamma^2 = (x - x')^2 + (y - y')^2$$

$$\begin{aligned} \eta \quad B\Gamma^2 &= (\sin \alpha - \sin \beta)^2 + (\eta\mu \alpha - \eta\mu \beta)^2 \\ &= \sin^2 \alpha + \sin^2 \beta - 2\sin \alpha \sin \beta + \eta\mu^2 \alpha + \eta\mu^2 \beta - 2\eta\mu \alpha \eta\mu \beta \\ &= 2 - 2(\sin \alpha \sin \beta + \eta\mu \alpha \eta\mu \beta) \end{aligned} \quad (\alpha')$$

Ἡ τιμή τοῦ τόξου $\widehat{B\Gamma}$ εἶναι: $\alpha - \beta + 2k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$)

Φέρνουμε τήν εὐθεῖα $X_1'OBX_1$ καί, ἐπάνω σ' αὐτή, τήν κάθετο $Y_1'OY_1$, τίς ὁποῖες θεωροῦμε ὡς πρωτεύοντες ἄξονες γιά τό τόξο $(\widehat{B\Gamma}) = \alpha - \beta$. Ἀπό τό Γ φέρνουμε τήν κάθετη $\Gamma\Gamma_2$ πρὸς τή $X_1'X$ καί τότε οί συντεταγμένες τών Β καί Γ θά εἶναι, ἀντιστοίχως:

$$\left. \begin{aligned} x_1' &= \overline{OB} = 1 \\ y_1' &= 0 \end{aligned} \right\} \quad \text{καί} \quad \left. \begin{aligned} x_1 &= \overline{O\Gamma_2} = \sin(\alpha - \beta) \\ y_1 &= \overline{\Gamma_2\Gamma} = \eta\mu(\alpha - \beta) \end{aligned} \right\}$$

Από τό ὀρθογώνιο τρίγωνο $B\Gamma_2\Gamma$ θά ἔχουμε:

$$\begin{aligned} B\Gamma^2 &= B\Gamma_2^2 + \Gamma_2\Gamma^2 = (x_1 - 1)^2 + (y_1 - 0)^2 \\ &= [\sigma\upsilon\nu(\alpha - \beta) - 1]^2 + \eta\mu^2(\alpha - \beta) \\ &= \sigma\upsilon\nu^2(\alpha - \beta) + 1 - 2\sigma\upsilon\nu(\alpha - \beta) + \eta\mu^2(\alpha - \beta) \\ &= 2 - 2\sigma\upsilon\nu(\alpha - \beta) \end{aligned} \quad (\alpha'')$$

Από τίς σχέσεις (α'') καί (α') , τώρα, ἔχουμε:

$$2 - 2\sigma\upsilon\nu(\alpha - \beta) = 2 - 2(\sigma\upsilon\nu\alpha \sigma\upsilon\nu\beta + \eta\mu\alpha \eta\mu\beta). \text{ Άρα:}$$

$$\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}: \quad \boxed{\sigma\upsilon\nu(\alpha - \beta) \equiv \sigma\upsilon\nu\alpha \sigma\upsilon\nu\beta + \eta\mu\alpha \eta\mu\beta} \quad (1)$$

★ Δεύτερος τρόπος. Κατά τό θεώρημα τοῦ Chasles εἶναι:

$$\overline{\gamma\omega\nu}(\vec{O\Gamma}, \vec{O\beta}) = \overline{\gamma\omega\nu}(\vec{O\chi}, \vec{O\beta}) - \overline{\gamma\omega\nu}(\vec{O\chi}, \vec{O\Gamma}) + k \cdot 2\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

ὅπου οἱ τιμές τῶν γωνιῶν αὐτῶν ἐκφράζονται σέ ἀκτίνια. Άρα:

$$\overline{\gamma\omega\nu}(\vec{O\Gamma}, \vec{O\beta}) = \beta - \alpha + k \cdot 2\pi \quad k \in \mathbb{Z}$$

Σύμφωνα μέ τόν ὀρισμό τοῦ ἐσωτερικοῦ γινομένου δύο διανυσμάτων $\vec{O\Gamma}$ καί $\vec{O\beta}$ εἶναι:

$$\vec{O\Gamma} \cdot \vec{O\beta} = |\vec{O\Gamma}| \cdot |\vec{O\beta}| \sigma\upsilon\nu(\vec{O\Gamma}, \vec{O\beta})$$

Ἐπειδή ὁμοῦς εἶναι καί

$$|\vec{O\Gamma}| = |\vec{O\beta}| = 1$$

$$\sigma\upsilon\nu(\vec{O\Gamma}, \vec{O\beta}) = \sigma\upsilon\nu(\beta - \alpha) = \sigma\upsilon\nu(\alpha - \beta) \quad \left. \vphantom{\begin{matrix} |\vec{O\Gamma}| = |\vec{O\beta}| = 1 \\ \sigma\upsilon\nu(\vec{O\Gamma}, \vec{O\beta}) = \sigma\upsilon\nu(\beta - \alpha) = \sigma\upsilon\nu(\alpha - \beta) \end{matrix}} \right\}$$

ἢ προηγούμενη ἰσότητα γίνεται:

$$\vec{O\Gamma} \cdot \vec{O\beta} = \sigma\upsilon\nu(\alpha - \beta). \quad (\alpha_1)$$

Στό ὀρθοκανονικό ὁμοῦς σύστημα ἀξόνων εἶναι:

$$\vec{O\Gamma} \cdot \vec{O\beta} = xx' + yy' = \sigma\upsilon\nu\alpha \sigma\upsilon\nu\beta + \eta\mu\alpha \eta\mu\beta \quad (\alpha_2)$$

Από τίς σχέσεις (α_1) καί (α_2) συμπεραίνουμε ὅτι:

$\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$:

$$\boxed{\sigma\upsilon\nu(\alpha - \beta) \equiv \sigma\upsilon\nu\alpha \sigma\upsilon\nu\beta + \eta\mu\alpha \eta\mu\beta.}$$

δηλαδή προκύπτει πάλι ὁ τύπος (1).

B) Ἐπιλογισμός τοῦ $\sigma\upsilon\nu(\alpha + \beta)$. Ἐπειδή ὁ τύπος (1) ἰσχύει γιά κάθε τόσο α καί β , θά ἰσχύει καί ὅταν στή θέση τοῦ β βάλουμε τό $-\beta$. Δηλαδή:

$$\sigma\upsilon\nu(\alpha + \beta) \equiv \sigma\upsilon\nu\alpha \sigma\upsilon\nu(-\beta) + \eta\mu\alpha \eta\mu(-\beta)$$

$$\equiv \sigma\upsilon\nu\alpha \sigma\upsilon\nu\beta - \eta\mu\alpha \eta\mu\beta,$$

γιατί $\sigma\upsilon\nu(-\beta) = \sigma\upsilon\nu\beta$ καί $\eta\mu(-\beta) = -\eta\mu\beta$. Άρα:

$\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$:

$$\boxed{\sigma\upsilon\nu(\alpha + \beta) \equiv \sigma\upsilon\nu\alpha \sigma\upsilon\nu\beta - \eta\mu\alpha \eta\mu\beta} \quad (2)$$

★ Μπορεῖ νά μή διδαχθεῖ ὁ τρόπος αὐτός.

Γ) **Υπολογισμός του $\eta\mu(\alpha + \beta)$.** Αν στον τύπο (1), όπου α βάλουμε $\frac{\pi}{2} - \alpha$, θα έχουμε:

$$\sin\left[\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) - \beta\right] \equiv \sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right)\sin\beta + \eta\mu\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right)\eta\mu\beta \quad (1)$$

Άλλά
$$\begin{cases} \sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha - \beta\right) \equiv \sin\left[\frac{\pi}{2} - (\alpha + \beta)\right] = \eta\mu(\alpha + \beta) \\ \sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) \equiv \eta\mu\alpha \text{ και } \eta\mu\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) \equiv \sin\alpha. \end{cases}$$

οπότε η ισότητα (1) γίνεται:

$\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$: $\eta\mu(\alpha + \beta) \equiv \eta\mu\alpha \sin\beta + \eta\mu\beta \sin\alpha$ (3)

Δ) **Υπολογισμός του $\eta\mu(\alpha - \beta)$.** Αν στον τύπο (3), όπου β βάλουμε $-\beta$, θα έχουμε:

$$\begin{aligned} \eta\mu(\alpha - \beta) &\equiv \eta\mu\alpha \sin(-\beta) + \eta\mu(-\beta) \sin\alpha \\ &\equiv \eta\mu\alpha \sin\beta - \eta\mu\beta \sin\alpha. \end{aligned}$$

Άρα:

$\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$: $\eta\mu(\alpha - \beta) \equiv \eta\mu\alpha \sin\beta - \eta\mu\beta \sin\alpha$ (4)

Ε) **Υπολογισμός της $\epsilon\varphi(\alpha + \beta)$.** Αν υποθέσουμε ότι: $\sin(\alpha + \beta) \neq 0$, που ισχύει για $\alpha + \beta \neq \frac{\pi}{2} + k \cdot \pi, k \in \mathbb{Z}$, θα έχουμε

$$\epsilon\varphi(\alpha + \beta) = \frac{\eta\mu(\alpha + \beta)}{\sin(\alpha + \beta)} = \frac{\eta\mu\alpha \sin\beta + \eta\mu\beta \sin\alpha}{\sin\alpha \sin\beta - \eta\mu\alpha \eta\mu\beta} \quad (1)$$

Αν $\sin\alpha \sin\beta \neq 0$, που ισχύει για:

$$\alpha \neq \frac{\pi}{2} + k_1\pi \quad \text{και} \quad \beta \neq \frac{\pi}{2} + k_2\pi, \quad k_1, k_2 \in \mathbb{Z}$$

τότε η ισότητα (1) γράφεται διαδοχικά:

$$\begin{aligned} \epsilon\varphi(\alpha + \beta) &= \frac{\eta\mu\alpha \sin\beta + \eta\mu\beta \sin\alpha}{\sin\alpha \sin\beta - \eta\mu\alpha \eta\mu\beta} = \frac{\frac{\eta\mu\alpha \sin\beta}{\sin\alpha \sin\beta} + \frac{\eta\mu\beta \sin\alpha}{\sin\alpha \sin\beta}}{\frac{\sin\alpha \sin\beta}{\sin\alpha \sin\beta} - \frac{\eta\mu\alpha \eta\mu\beta}{\sin\alpha \sin\beta}} = \\ &= \frac{\frac{\eta\mu\alpha}{\sin\alpha} + \frac{\eta\mu\beta}{\sin\beta}}{1 - \frac{\eta\mu\alpha}{\sin\alpha} \cdot \frac{\eta\mu\beta}{\sin\beta}} = \frac{\epsilon\varphi\alpha + \epsilon\varphi\beta}{1 - \epsilon\varphi\alpha \epsilon\varphi\beta}. \end{aligned}$$

*Αρα :

$$\boxed{\varepsilon\varphi(\alpha + \beta) = \frac{\varepsilon\varphi\alpha + \varepsilon\varphi\beta}{1 - \varepsilon\varphi\alpha \varepsilon\varphi\beta}} \quad (5)$$

Στ) Υπολογισμός τής $\varepsilon\varphi(\alpha - \beta)$. *Αν στον τύπο (5) βάλουμε όπου β τό $-\beta$ και υποθέσουμε ότι $\alpha - \beta \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$, $k \in \mathbf{Z}$, τότε:

$$\varepsilon\varphi(\alpha - \beta) = \frac{\varepsilon\varphi\alpha + \varepsilon\varphi(-\beta)}{1 - \varepsilon\varphi\alpha \varepsilon\varphi(-\beta)} = \frac{\varepsilon\varphi\alpha - \varepsilon\varphi\beta}{1 + \varepsilon\varphi\alpha \varepsilon\varphi\beta}$$

γιατί $\varepsilon\varphi(-\beta) = -\varepsilon\varphi\beta$.

*Αρα:

$$\boxed{\varepsilon\varphi(\alpha - \beta) = \frac{\varepsilon\varphi\alpha - \varepsilon\varphi\beta}{1 + \varepsilon\varphi\alpha \varepsilon\varphi\beta}} \quad (6)$$

Ζ) Υπολογισμός τής $\sigma\varphi(\alpha + \beta)$. *Αν υποθέσουμε ότι:

$$\eta\mu(\alpha + \beta) \neq 0, \text{ πού ισχύει για } \alpha + \beta \neq k\pi, \quad k \in \mathbf{Z}$$

καί $\eta\mu\alpha \eta\mu\beta \neq 0$, πού ισχύει για $\alpha \neq k_1\pi$ καί $\beta \neq k_2\pi$, $k_1, k_2 \in \mathbf{Z}$,
θά έχουμε διαδοχικά:

$$\begin{aligned} \sigma\varphi(\alpha + \beta) &= \frac{\sigma\upsilon\upsilon(\alpha + \beta)}{\eta\mu(\alpha + \beta)} = \frac{\sigma\upsilon\upsilon\alpha \sigma\upsilon\upsilon\beta - \eta\mu\alpha \eta\mu\beta}{\eta\mu\alpha \sigma\upsilon\upsilon\beta + \eta\mu\beta \sigma\upsilon\upsilon\alpha} = \\ &= \frac{\frac{\sigma\upsilon\upsilon\alpha \sigma\upsilon\upsilon\beta}{\eta\mu\alpha \eta\mu\beta} - \frac{\eta\mu\alpha \eta\mu\beta}{\eta\mu\alpha \eta\mu\beta}}{\frac{\eta\mu\alpha \sigma\upsilon\upsilon\beta}{\eta\mu\alpha \eta\mu\beta} + \frac{\eta\mu\beta \sigma\upsilon\upsilon\alpha}{\eta\mu\alpha \eta\mu\beta}} = \frac{\sigma\varphi\alpha \sigma\varphi\beta - 1}{\sigma\varphi\alpha + \sigma\varphi\beta} \end{aligned}$$

*Αρα:

$$\boxed{\sigma\varphi(\alpha + \beta) = \frac{\sigma\varphi\alpha \sigma\varphi\beta - 1}{\sigma\varphi\alpha + \sigma\varphi\beta}} \quad (7)$$

Η) Υπολογισμός τής $\sigma\varphi(\alpha - \beta)$. *Αν στον τύπο (7) βάλουμε όπου β τό $-\beta$, θά έχουμε:

$$\sigma\varphi(\alpha - \beta) = \frac{\sigma\varphi\alpha \sigma\varphi(-\beta) - 1}{\sigma\varphi\alpha + \sigma\varphi(-\beta)} = \frac{-\sigma\varphi\alpha \sigma\varphi\beta - 1}{\sigma\varphi\alpha - \sigma\varphi\beta} = \frac{\sigma\varphi\alpha \sigma\varphi\beta + 1}{\sigma\varphi\beta - \sigma\varphi\alpha}$$

*Αρα:

$$\boxed{\sigma\varphi(\alpha - \beta) = \frac{\sigma\varphi\alpha \sigma\varphi\beta + 1}{\sigma\varphi\beta - \sigma\varphi\alpha}} \quad (8)$$

άν $\alpha - \beta \neq k\pi$, $k \in \mathbf{Z}$ καί $\alpha \neq k_1\pi$ καί $\beta \neq k_2\pi$, $k_1, k_2 \in \mathbf{Z}$.

Μερικές περιπτώσεις. *Αν $\beta = \frac{\pi}{4}$, τότε $\varepsilon\varphi \frac{\pi}{4} = 1$ και για

$$\left. \begin{array}{l} \alpha \neq \frac{\pi}{4} + k\pi \\ \alpha \neq \frac{\pi}{2} + k_1\pi \end{array} \right\} \Rightarrow \varepsilon\varphi \left(\frac{\pi}{4} + \alpha \right) = \frac{\varepsilon\varphi \frac{\pi}{4} + \varepsilon\varphi\alpha}{1 - \varepsilon\varphi \frac{\pi}{4} \cdot \varepsilon\varphi\alpha} = \frac{1 + \varepsilon\varphi\alpha}{1 - \varepsilon\varphi\alpha}, \quad k, k_1 \in \mathbb{Z}$$

και για

$$\left. \begin{array}{l} \alpha \neq -\frac{\pi}{4} + k_2\pi \\ \alpha \neq \frac{\pi}{2} + k_3\pi \end{array} \right\} \Rightarrow \varepsilon\varphi \left(\frac{\pi}{4} - \alpha \right) = \frac{\varepsilon\varphi \frac{\pi}{4} - \varepsilon\varphi\alpha}{1 + \varepsilon\varphi \frac{\pi}{4} \cdot \varepsilon\varphi\alpha} = \frac{1 - \varepsilon\varphi\alpha}{1 + \varepsilon\varphi\alpha}, \quad k_2, k_3 \in \mathbb{Z}$$

$$\text{*}\Omega\sigma\tau\epsilon: \quad \varepsilon\varphi \left(\frac{\pi}{4} + \alpha \right) = \frac{1 + \varepsilon\varphi\alpha}{1 - \varepsilon\varphi\alpha}, \quad \varepsilon\varphi \left(\frac{\pi}{4} - \alpha \right) = \frac{1 - \varepsilon\varphi\alpha}{1 + \varepsilon\varphi\alpha} \quad (9)$$

μέ τούς παραπάνω περιορισμούς.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• 1. *Αν $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$, $\frac{\pi}{2} < \beta < \pi$ και $\eta\mu\alpha = \frac{3}{5}$, $\eta\mu\beta = \frac{9}{41}$, νά υπολογισθούν οι παραστάσεις:

$$\eta\mu(\alpha - \beta), \quad \sigma\upsilon\nu(\alpha + \beta), \quad \varepsilon\varphi(\alpha - \beta), \quad \sigma\varphi(\alpha + \beta).$$

Λύση. *Επειδή είναι $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ και $\frac{\pi}{2} < \beta < \pi$ θά έχουμε:

$$\sigma\upsilon\nu\alpha = \sqrt{1 - \eta\mu^2\alpha} = \sqrt{1 - \left(\frac{3}{5}\right)^2} = \frac{4}{5},$$

$$\sigma\upsilon\nu\beta = -\sqrt{1 - \eta\mu^2\beta} = -\sqrt{1 - \left(\frac{9}{41}\right)^2} = -\frac{40}{41},$$

όπότε θά είναι:

$$\varepsilon\varphi\alpha = \frac{3}{5} : \frac{4}{5} = \frac{3}{4}, \quad \varepsilon\varphi\beta = \frac{9}{41} : \left(-\frac{40}{41}\right) = -\frac{9}{40}, \quad \sigma\varphi\alpha = \frac{4}{3}, \quad \sigma\varphi\beta = -\frac{40}{9}$$

και, έπομένως:

$$\eta\mu(\alpha - \beta) = \eta\mu\alpha \sigma\upsilon\nu\beta - \eta\mu\beta \sigma\upsilon\nu\alpha = \frac{3}{5} \cdot \left(-\frac{40}{41}\right) - \frac{9}{41} \cdot \frac{4}{5} = -\frac{156}{205}$$

$$\text{συν}(\alpha + \beta) = \text{συν}\alpha \text{συν}\beta - \eta\mu\alpha \eta\mu\beta = \frac{4}{5} \cdot \left(-\frac{40}{41}\right) - \frac{3}{5} \cdot \frac{9}{41} = -\frac{187}{205},$$

$$\epsilon\varphi(\alpha - \beta) = \frac{\epsilon\varphi\alpha - \epsilon\varphi\beta}{1 + \epsilon\varphi\alpha\epsilon\varphi\beta} = \frac{\frac{3}{4} - \left(-\frac{9}{40}\right)}{1 + \frac{3}{4}\left(-\frac{9}{40}\right)} = \frac{\frac{3}{4} + \frac{9}{40}}{1 - \frac{27}{160}} = \frac{156}{133},$$

$$\sigma\varphi(\alpha + \beta) = \frac{\sigma\varphi\alpha \cdot \sigma\varphi\beta - 1}{\sigma\varphi\alpha + \sigma\varphi\beta} = \frac{\frac{4}{3} \cdot \left(-\frac{40}{9}\right) - 1}{\frac{4}{3} + \left(-\frac{40}{9}\right)} = \frac{187}{84}.$$

● 2. Νά υπολογισθοῦν οἱ τριγωνομετρικοὶ ἀριθμοὶ τῶν τόξων 15° καὶ 75° .

Λύση. Ἐπειδὴ $15^\circ + 75^\circ = 90^\circ$, θά ἔχουμε:

$$\eta\mu 15^\circ = \text{συν} 75^\circ = \text{συν}(45^\circ + 30^\circ) = \text{συν} 45^\circ \text{συν} 30^\circ - \eta\mu 45^\circ \eta\mu 30^\circ =$$

$$= \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}.$$

$$\text{συν} 15^\circ = \eta\mu 75^\circ = \eta\mu(45^\circ + 30^\circ) = \eta\mu 45^\circ \text{συν} 30^\circ + \eta\mu 30^\circ \text{συν} 45^\circ =$$

$$= \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}.$$

$$\epsilon\varphi 15^\circ = \sigma\varphi 75^\circ = \frac{\text{συν} 75^\circ}{\eta\mu 75^\circ} = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{\sqrt{6} + \sqrt{2}} = \frac{(\sqrt{6} - \sqrt{2})^2}{6 - 2} = 2 - \sqrt{3}.$$

$$\sigma\varphi 15^\circ = \epsilon\varphi 75^\circ = \frac{\eta\mu 75^\circ}{\text{συν} 75^\circ} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{\sqrt{6} - \sqrt{2}} = \frac{(\sqrt{6} + \sqrt{2})^2}{6 - 2} = 2 + \sqrt{3}.$$

Ἀνακεφαλαίωση.

$\eta\mu 15^\circ = \text{συν} 75^\circ = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$	$\epsilon\varphi 15^\circ = \sigma\varphi 75^\circ = 2 - \sqrt{3}$	(10)
$\text{συν} 15^\circ = \eta\mu 75^\circ = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$	$\sigma\varphi 15^\circ = \epsilon\varphi 75^\circ = 2 + \sqrt{3}$	

● 3. Νά ἀποδειχθεῖ ὅτι:

$$\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}: \quad \eta\mu(\alpha + \beta)\eta\mu(\alpha - \beta) \equiv \eta\mu^2\alpha - \eta\mu^2\beta \equiv \text{συν}^2\beta - \text{συν}^2\alpha.$$

Ἀπόδειξη. Ἔχουμε διαδοχικά:

$$\begin{aligned} \eta\mu(\alpha + \beta) \eta\mu(\alpha - \beta) &\equiv (\eta\mu\alpha \sigma\upsilon\nu\beta + \eta\mu\beta \sigma\upsilon\nu\alpha) (\eta\mu\alpha \sigma\upsilon\nu\beta - \eta\mu\beta \sigma\upsilon\nu\alpha) \\ &\equiv \eta\mu^2\alpha \sigma\upsilon\nu^2\beta - \eta\mu^2\beta \sigma\upsilon\nu^2\alpha \\ &\equiv \eta\mu^2\alpha(1 - \eta\mu^2\beta) - \eta\mu^2\beta(1 - \eta\mu^2\alpha) \\ &\equiv \eta\mu^2\alpha - \eta\mu^2\alpha \eta\mu^2\beta - \eta\mu^2\beta + \eta\mu^2\alpha \eta\mu^2\beta \\ &\equiv \eta\mu^2\alpha - \eta\mu^2\beta \\ &\equiv 1 - \sigma\upsilon\nu^2\alpha - (1 - \sigma\upsilon\nu^2\beta) \equiv \sigma\upsilon\nu^2\beta - \sigma\upsilon\nu^2\alpha. \end{aligned}$$

● 4. Σέ κάθε τρίγωνο $AB\Gamma$ νά ἀποδειχθεῖ ὅτι:

$$\Sigma \equiv \alpha\eta\mu(B - \Gamma) + \beta\eta\mu(\Gamma - A) + \gamma\eta\mu(A - B) = 0.$$

Ἀπόδειξη. Ἐπειδή $\alpha = 2R\eta\mu A = 2R\eta\mu(B + \Gamma)$, θά ἔχουμε:

$$\alpha\eta\mu(B - \Gamma) = 2R\eta\mu(B + \Gamma)\eta\mu(B - \Gamma) = 2R(\eta\mu^2B - \eta\mu^2\Gamma)$$

καί μέ κυκλική ἐναλλαγή τῶν γραμμάτων α, β, γ καί A, B, Γ θά ἔχουμε:

$$\begin{aligned} \Sigma &\equiv 2R(\eta\mu^2B - \eta\mu^2\Gamma) + 2R(\eta\mu^2\Gamma - \eta\mu^2A) + 2R(\eta\mu^2A - \eta\mu^2B) = \\ &= 2R(\eta\mu^2B - \eta\mu^2\Gamma + \eta\mu^2\Gamma - \eta\mu^2A + \eta\mu^2A - \eta\mu^2B) = 2R \cdot 0 = 0. \end{aligned}$$

ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

● 5. Ἄν $\alpha + \beta + \gamma = \pi$, καί $\alpha \neq k_1\pi + \frac{\pi}{2}$ ἢ $\beta \neq k_2\pi + \frac{\pi}{2}$ ἢ $\gamma \neq k_3\pi + \frac{\pi}{2}$, νά ἀποδειχθεῖ ἡ σχέση:

$$\epsilon\phi\alpha + \epsilon\phi\beta + \epsilon\phi\gamma = \epsilon\phi\alpha \epsilon\phi\beta \epsilon\phi\gamma.$$

Ἀπόδειξη. Ἀπό τή σχέση $\alpha + \beta + \gamma = \pi \Rightarrow \alpha + \beta = \pi - \gamma$ καί ἔπομένως:

$$\epsilon\phi(\alpha + \beta) = \epsilon\phi(\pi - \gamma) = -\epsilon\phi\gamma \Rightarrow \frac{\epsilon\phi\alpha + \epsilon\phi\beta}{1 - \epsilon\phi\alpha \epsilon\phi\beta} = -\epsilon\phi\gamma \Rightarrow$$

$$\epsilon\phi\alpha + \epsilon\phi\beta + \epsilon\phi\gamma = \epsilon\phi\alpha \epsilon\phi\beta \epsilon\phi\gamma.$$

Ἀντιστρόφως:

● 6. Ἄν οἱ γωνίες α, β, γ ἰκανοποιῦν τήν ἰσότητα:

$$(1) \quad \epsilon\phi\alpha + \epsilon\phi\beta + \epsilon\phi\gamma = \epsilon\phi\alpha \epsilon\phi\beta \epsilon\phi\gamma \quad (12)$$

μέ ποιὰ σχέση συνδέονται αὐτές οἱ γωνίες;

Λύση. Ἀπό τή σχέση (1) ἔχουμε:

$$\epsilon\phi\alpha + \epsilon\phi\beta = -\epsilon\phi\gamma(1 - \epsilon\phi\alpha \epsilon\phi\beta) \quad (2)$$

Ἄν εἶναι $1 - \epsilon\phi\alpha \epsilon\phi\beta = 0 \Leftrightarrow \epsilon\phi\alpha \epsilon\phi\beta = 1$, τότε ἀπό τή (2) \Rightarrow

$$\epsilon\phi\alpha + \epsilon\phi\beta = 0 \Leftrightarrow \epsilon\phi\alpha = -\epsilon\phi\beta,$$

ἡ ὁποία ἰσότητα δέ συμβιβάζεται μέ τήν $\epsilon\phi\alpha \epsilon\phi\beta = 1$. Ἄρα:

$$1 - \epsilon\phi\alpha \epsilon\phi\beta \neq 0,$$

όπότε από τη σχέση (2) έχουμε:

$$\frac{\varepsilon\varphi\alpha + \varepsilon\varphi\beta}{1 - \varepsilon\varphi\alpha \varepsilon\varphi\beta} = -\varepsilon\varphi\gamma \Leftrightarrow \varepsilon\varphi(\alpha + \beta) = -\varepsilon\varphi\gamma = \varepsilon\varphi(\pi - \gamma) \Leftrightarrow$$

$$\alpha + \beta = (\pi - \gamma) + \nu\pi \Leftrightarrow \alpha + \beta + \gamma = \pi + \nu\pi = (\nu + 1)\pi = k\pi \text{ με } \nu, k \in \mathbb{Z}$$

Από τα παραπάνω βλέπουμε ότι οι γωνίες α, β, γ συνδέονται με τη σχέση $\alpha + \beta + \gamma = k\pi$, όπου $k \in \mathbb{Z}$.

● 7. Αν οι γωνίες α, β, γ ικανοποιούν την ισότητα $\alpha + \beta + \gamma = \pi$, τότε:

$$\sin^2\alpha + \sin^2\beta + \sin^2\gamma + 2\sigma\upsilon\alpha\sigma\upsilon\beta\sigma\upsilon\gamma = 1 \quad (13)$$

Απόδειξη. Έχουμε $\alpha + \beta + \gamma = \pi \Leftrightarrow \alpha + \beta = \pi - \gamma$ και επομένως:

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin(\pi - \gamma) = -\sin\gamma \Leftrightarrow \sigma\upsilon\alpha\sigma\upsilon\beta - \eta\mu\alpha\eta\mu\beta = -\sin\gamma \Leftrightarrow$$

$$\sigma\upsilon\alpha\sigma\upsilon\beta + \sin\gamma = \eta\mu\alpha\eta\mu\beta$$

Υψώνοντας και τα δύο μέλη της τελευταίας ισότητας στο τετράγωνο, έχουμε:

$$\begin{aligned} \sin^2\alpha \sin^2\beta + \sin^2\gamma + 2\sigma\upsilon\alpha\sigma\upsilon\beta\sin\gamma &= \eta\mu^2\alpha \eta\mu^2\beta = \\ &= (1 - \sin^2\alpha)(1 - \sin^2\beta) = 1 - \sin^2\alpha - \sin^2\beta + \sin^2\alpha \sin^2\beta \Leftrightarrow \\ \sin^2\alpha + \sin^2\beta + \sin^2\gamma + 2\sigma\upsilon\alpha\sigma\upsilon\beta\sin\gamma &= 1. \end{aligned}$$

Αντιστρόφως:

★ ● 8. Αν ισχύει ο τύπος (13), πώς συνδέονται οι γωνίες α, β, γ ;

Λύση: Ο τύπος (13) γράφεται:

$$\sin^2\gamma + 2\sigma\upsilon\alpha\sigma\upsilon\beta\sin\gamma + \sin^2\alpha + \sin^2\beta - 1 = 0 \quad (1)$$

και μπορεί να θεωρηθεί το πρώτο μέλος ως δευτεροβάθμιο τριώνυμο ως προς $\sin\gamma$. Αν Δ είναι η διακρίνουσά του, θα έχουμε:

$$\frac{\Delta}{4} = \sin^2\alpha \sin^2\beta - \sin^2\alpha - \sin^2\beta + 1 = (1 - \sin^2\alpha)(1 - \sin^2\beta) = \eta\mu^2\alpha \eta\mu^2\beta,$$

και επομένως οι ρίζες του τριωνύμου θα είναι:

$$\sin\gamma = -\sigma\upsilon\alpha\sigma\upsilon\beta \pm \eta\mu\alpha\eta\mu\beta = -\sin(\alpha \pm \beta),$$

όπότε θα έχουμε:

$$\alpha \pm \beta = \pm(\pi - \gamma) + k \cdot 2\pi \Leftrightarrow \alpha \pm \beta \pm \gamma = (2k + 1)\pi, \text{ με } k \in \mathbb{Z}.$$

ΣΗΜ. Τα διπλά σημεία είναι άνεξάρτητα τό ένα από τό άλλο.

Μέ ομοια εργασία βρίσκουμε ότι:

★ Αν οι γωνίες α, β, γ επαληθεύουν την ισότητα:

$$\sin^2\alpha + \sin^2\beta + \sin^2\gamma - 2\sigma\upsilon\alpha\sigma\upsilon\beta\sin\gamma = 1 \quad (14)$$

τότε οι γωνίες α, β, γ συνδέονται με τις σχέσεις:

$$\alpha \pm \beta \pm \gamma = k \cdot 2\pi, \text{ όπου } k \in \mathbb{Z}$$

- 9. "Αν μεταξύ τῶν κυρίων στοιχείων ἑνὸς τριγώνου $AB\Gamma$ ὑπάρχει ἡ σχέση:

$$a = 2\beta \text{ συν } \Gamma, \quad (1)$$

τότε τὸ τρίγωνο αὐτό θὰ εἶναι ἰσοσκελές.

Ἄπόδειξη. Ἡ σχέση (1) γράφεται:

$$2R\eta\mu A = 2 \cdot 2R\eta\mu B \text{ συν } \Gamma \Leftrightarrow \eta\mu A = 2\eta\mu B \text{ συν } \Gamma \quad (2)$$

καὶ ἐπειδὴ $A + B + \Gamma = \pi \Rightarrow \eta\mu A = \eta\mu(B + \Gamma)$ καὶ ἡ (2) γίνεται:

$$\eta\mu(B + \Gamma) = 2\eta\mu B \text{ συν } \Gamma \Leftrightarrow \eta\mu B \text{ συν } \Gamma + \eta\mu\Gamma \text{ συν } B = 2\eta\mu B \text{ συν } \Gamma \Leftrightarrow$$

$$\eta\mu B \text{ συν } \Gamma - \eta\mu\Gamma \text{ συν } B = 0 \Leftrightarrow \eta\mu(B - \Gamma) = 0 \Leftrightarrow$$

$$B - \Gamma = k \cdot \pi, \quad \delta\text{που } k \in \mathbb{Z}.$$

Ἐπειδὴ ὁμως B καὶ Γ εἶναι γωνίες τριγώνου, πρέπει $k = 0$.

"Αρα $B - \Gamma = 0$, ὁπότε $B = \Gamma$. Δηλαδή τὸ τρίγωνο $AB\Gamma$ εἶναι ἰσοσκελές.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Πρώτη ομάδα

1. Νὰ ὑπολογισθοῦν οἱ τριγωνομετρικοὶ ἀριθμοὶ τῆς γωνίας 105° .

2. "Αν $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$, $0 < \beta < \frac{\pi}{2}$ καὶ $\eta\mu \alpha = \frac{3}{5}$, $\text{συν } \beta = \frac{9}{41}$, νὰ ὑπολογισθοῦν οἱ παραστάσεις:

$$\eta\mu(\alpha - \beta), \text{ συν}(\alpha + \beta), \text{ εφ}(\alpha - \beta), \text{ σφ}(\alpha + \beta).$$

3. "Αν $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$, $\frac{3\pi}{2} < \beta < 2\pi$ καὶ $\eta\mu \alpha = \frac{15}{17}$, $\text{συν } \beta = \frac{12}{13}$, νὰ ὑπολογισθοῦν οἱ παραστάσεις:

$$\eta\mu(\alpha + \beta), \text{ συν}(\alpha - \beta), \text{ εφ}(\alpha + \beta), \text{ σφ}(\alpha - \beta).$$

4. "Αν $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$, $\frac{\pi}{2} < \beta < \pi$ καὶ $\text{συν } \alpha = \frac{1}{\sqrt{2}}$, $\text{συν } \beta = -\frac{3}{5}$, νὰ ὑπολογισθοῦν οἱ παραστάσεις:

$$\eta\mu(\alpha + \beta), \text{ συν}(\alpha - \beta), \text{ εφ}(\alpha - \beta), \text{ σφ}(\alpha + \beta).$$

5. Νὰ ἀποδειχθοῦν οἱ ἀκόλουθες ταυτότητες:

- $\eta\mu(\alpha - \beta)\text{συν}\beta + \eta\mu\beta \text{συν}(\alpha - \beta) \equiv \eta\mu\alpha.$
- $\text{συν}(\alpha - \beta)\text{συν}(\alpha + \beta) - \eta\mu(\alpha - \beta)\eta\mu(\alpha + \beta) \equiv \text{συν}2\alpha.$
- $\eta\mu(60^\circ - \alpha)\text{συν}(30^\circ + \alpha) + \eta\mu(30^\circ + \alpha)\text{συν}(60^\circ - \alpha) \equiv 1.$
- $\text{συν}(\alpha + \beta)\text{συν}(\alpha - \beta) \equiv \text{συν}^2\alpha - \eta\mu^2\beta \equiv \text{συν}^2\beta - \eta\mu^2\alpha.$
- $\text{εφ}(\beta - \gamma) + \text{εφ}(\gamma - \alpha) + \text{εφ}(\alpha - \beta) = \text{εφ}(\beta - \gamma)\text{εφ}(\gamma - \alpha)\text{εφ}(\alpha - \beta).$

Γιὰ ποιές τιμές τῶν α, β, γ δέν ἔχουν ἔννοια τὰ μέλη τῆς 5;

6. Νὰ ἀποδειχθεῖ ὅτι:

- $\frac{\eta\mu(\alpha - \beta)}{\text{συν}\alpha \text{συν}\beta} + \frac{\eta\mu(\beta - \gamma)}{\text{συν}\beta \text{συν}\gamma} + \frac{\eta\mu(\gamma - \alpha)}{\text{συν}\gamma \text{συν}\alpha} = 0.$
- $\frac{\eta\mu(\beta - \gamma)}{\eta\mu\beta \eta\mu\gamma} + \frac{\eta\mu(\gamma - \alpha)}{\eta\mu\gamma \eta\mu\alpha} + \frac{\eta\mu(\alpha - \beta)}{\eta\mu\alpha \eta\mu\beta} = 0.$
- $\frac{2\eta\mu(\alpha + \beta)}{\text{συν}(\alpha + \beta) + \text{συν}(\alpha - \beta)} = \text{εφ}\alpha + \text{εφ}\beta.$
- $\frac{\text{εφ}^2 2\alpha - \text{εφ}^2 \alpha}{1 - \text{εφ}^2 2\alpha \text{εφ}^2 \alpha} = \text{εφ}3\alpha \text{εφ}\alpha.$

7. Νά αποδειχθεί ότι:

- $\text{συν}^2 x + \text{συν}^2(120^\circ + x) + \text{συν}^2(120^\circ - x) \equiv \frac{3}{2}$.
- “Αν $\alpha + \beta = 45^\circ$, τότε: $(1 + \epsilon\phi\alpha)(1 + \epsilon\phi\beta) = 2$.
- $\text{συν}^2\alpha + \text{συν}^2(60^\circ + \alpha) + \text{συν}^2(60^\circ - \alpha) \equiv \frac{3}{2}$.

★ Δεύτερη ομάδα

8. “Αν $\alpha + \beta + \gamma = \pi$, νά αποδειχθεί ότι:

- $\sigma\phi \frac{\alpha}{2} + \sigma\phi \frac{\beta}{2} + \sigma\phi \frac{\gamma}{2} = \sigma\phi \frac{\alpha}{2} \sigma\phi \frac{\beta}{2} \sigma\phi \frac{\gamma}{2}$.
- $\sigma\phi\alpha \sigma\phi\beta + \sigma\phi\beta \sigma\phi\gamma + \sigma\phi\gamma \sigma\phi\alpha = 1$.
- $\frac{\text{συν}\alpha}{\eta\mu\beta \eta\mu\gamma} + \frac{\text{συν}\beta}{\eta\mu\gamma \eta\mu\alpha} + \frac{\text{συν}\gamma}{\eta\mu\alpha \eta\mu\beta} = 2$.
- $\eta\mu^2\alpha + \eta\mu^2\beta + \eta\mu^2\gamma - 2\text{συν}\alpha \text{συν}\beta \text{συν}\gamma = 2$.
- $\epsilon\phi 2\alpha + \epsilon\phi 2\beta + \epsilon\phi 2\gamma = \epsilon\phi 2\alpha \epsilon\phi 2\beta \epsilon\phi 2\gamma$.

9. Σέ κάθε τρίγωνο ΑΒΓ νά αποδειχθεί ότι:

- $\frac{\alpha^2 \eta\mu(B-\Gamma)}{\eta\mu B + \eta\mu\Gamma} + \frac{\beta^2 \eta\mu(\Gamma-A)}{\eta\mu\Gamma + \eta\mu A} + \frac{\gamma^2 \eta\mu(A-B)}{\eta\mu A + \eta\mu B} = 0$.
- $\frac{\alpha^2 \eta\mu(B-\Gamma)}{\eta\mu A} + \frac{\beta^2 \eta\mu(\Gamma-A)}{\eta\mu B} + \frac{\gamma^2 \eta\mu(A-B)}{\eta\mu\Gamma} = 0$.
- $(\beta + \gamma) \text{συν} A + (\gamma + \alpha) \text{συν} B + (\alpha + \beta) \text{συν} \Gamma = \alpha + \beta + \gamma$.
- $\eta\mu A \eta\mu(B-\Gamma) + \eta\mu B \eta\mu(\Gamma-A) + \eta\mu\Gamma \eta\mu(A-B) = 0$.

10. “Αν $\alpha + \beta + \gamma = \pi$, νά αποδειχθεί ότι:

- $\sigma\phi^2\alpha + \sigma\phi^2\beta + \sigma\phi^2\gamma \geq 1$.
- $\epsilon\phi \frac{\alpha^2}{2} + \epsilon\phi \frac{\beta^2}{2} + \epsilon\phi \frac{\gamma^2}{2} \geq 1$.
- “Αν $\alpha + \beta + \gamma = \frac{\pi}{2}$, τότε: $\epsilon\phi^2\alpha + \epsilon\phi^2\beta + \epsilon\phi^2\gamma \geq 1$.
- “Αν $\frac{\epsilon\phi(\alpha-\beta)}{\epsilon\phi\alpha} + \frac{\eta\mu^2\gamma}{\eta\mu^2\alpha} = 1$, τότε: $\epsilon\phi^2\gamma = \epsilon\phi\alpha \epsilon\phi\beta$.

★ ● 10. ΠΡΟΒΛΗΜΑ. “Από τούς τριγωνομετρικούς αριθμούς τῶν προσανατολισμένων τόξων α, β, γ νά ὑπολογισθοῦν οἱ τριγωνομετρικοὶ ἀριθμοὶ τοῦ ἀθροίσματος $\alpha + \beta + \gamma$.

Α) “Υπολογισμός τοῦ $\eta\mu(\alpha + \beta + \gamma)$. “Εχουμε διαδοχικά:

$$\begin{aligned} \eta\mu(\alpha + \beta + \gamma) &\equiv \eta\mu[(\alpha + \beta) + \gamma] \equiv \eta\mu(\alpha + \beta)\text{συν}\gamma + \eta\mu\gamma \text{συν}(\alpha + \beta) \equiv \\ &\equiv (\eta\mu\alpha \text{συν}\beta + \eta\mu\beta \text{συν}\alpha)\text{συν}\gamma + \eta\mu\gamma(\text{συν}\alpha \text{συν}\beta - \eta\mu\alpha \eta\mu\beta) \\ &\equiv \eta\mu\alpha \text{συν}\beta \text{συν}\gamma + \eta\mu\beta \text{συν}\alpha \text{συν}\gamma + \eta\mu\gamma \text{συν}\alpha \text{συν}\beta - \eta\mu\alpha \eta\mu\beta \eta\mu\gamma \end{aligned}$$

“Ωστε, $\forall \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$, εἶναι:

$$\eta\mu(\alpha + \beta + \gamma) \equiv \eta\mu\alpha \text{συν}\beta \text{συν}\gamma + \eta\mu\beta \text{συν}\alpha \text{συν}\gamma + \eta\mu\gamma \text{συν}\alpha \text{συν}\beta - \eta\mu\alpha \eta\mu\beta \eta\mu\gamma$$

καί πιό σύντομα:

$$\eta\mu(\alpha + \beta + \gamma) \equiv \Sigma \eta\mu\alpha \text{συν}\beta \text{συν}\gamma - \eta\mu\alpha \eta\mu\beta \eta\mu\gamma$$

(15)

Β) Ύπολογισμός του συν(α + β + γ). Έχουμε διαδοχικά:

$$\begin{aligned} \text{συν}(\alpha + \beta + \gamma) &\equiv \text{συν}[(\alpha + \beta) + \gamma] \equiv \text{συν}(\alpha + \beta)\text{συν}\gamma - \eta\mu(\alpha + \beta)\eta\mu\gamma \equiv \\ &\equiv (\text{συν}\alpha \text{συν}\beta - \eta\mu\alpha \eta\mu\beta)\text{συν}\gamma - (\eta\mu\alpha \text{συν}\beta + \eta\mu\beta \text{συν}\alpha)\eta\mu\gamma \\ &\equiv \text{συν}\alpha \text{συν}\beta \text{συν}\gamma - \eta\mu\alpha \eta\mu\beta \text{συν}\gamma - \eta\mu\alpha \eta\mu\gamma \text{συν}\beta - \eta\mu\beta \eta\mu\gamma \text{συν}\alpha. \end{aligned}$$

Όστε, $\forall \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$, είναι:

$$\text{συν}(\alpha + \beta + \gamma) \equiv \text{συν}\alpha \text{συν}\beta \text{συν}\gamma - \eta\mu\alpha \eta\mu\beta \text{συν}\gamma - \eta\mu\beta \eta\mu\gamma \text{συν}\alpha - \eta\mu\gamma \eta\mu\alpha \text{συν}\beta$$

καί συντομότερα:

$$\boxed{\text{συν}(\alpha + \beta + \gamma) \equiv \text{συν}\alpha \text{συν}\beta \text{συν}\gamma - \Sigma \eta\mu\alpha \eta\mu\beta \text{συν}\gamma} \quad (16)$$

Γ) Ύπολογισμός της εφ(α + β + γ). Έχουμε διαδοχικά:

$$\text{εφ}(\alpha + \beta + \gamma) = \frac{\eta\mu(\alpha + \beta + \gamma)}{\text{συν}(\alpha + \beta + \gamma)} = \frac{\Sigma \eta\mu\alpha \text{συν}\beta \text{συν}\gamma - \eta\mu\alpha \eta\mu\beta \eta\mu\gamma}{\text{συν}\alpha \text{συν}\beta \text{συν}\gamma - \Sigma \eta\mu\alpha \eta\mu\beta \text{συν}\gamma} \quad (1)$$

όταν είναι $\text{συν}(\alpha + \beta + \gamma) \neq 0$, πού ισχύει για $\alpha + \beta + \gamma \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.

Αν όμως είναι και $\text{συν}\alpha \text{συν}\beta \text{συν}\gamma \neq 0$, πού ισχύει για:

$$\alpha \neq \frac{\pi}{2} + k_1\pi, \quad \beta \neq \frac{\pi}{2} + k_2\pi, \quad \gamma \neq \frac{\pi}{2} + k_3\pi \quad \text{σύγχρονα} \quad (k_1, k_2, k_3 \in \mathbb{Z})$$

διαιρώντας και τούς δύο όρους του κλάσματος (1) του δεύτερου μέλους με $\text{συν}\alpha \text{συν}\beta \text{συν}\gamma$, έχουμε:

$$\boxed{\text{εφ}(\alpha + \beta + \gamma) = \frac{\Sigma \text{εφ}\alpha - \text{εφ}\alpha \text{εφ}\beta \text{εφ}\gamma}{1 - \Sigma \text{εφ}\alpha \text{εφ}\beta}} \quad (17)$$

$$\eta \quad \text{εφ}(\alpha + \beta + \gamma) = \frac{\text{εφ}\alpha + \text{εφ}\beta + \text{εφ}\gamma - \text{εφ}\alpha \text{εφ}\beta \text{εφ}\gamma}{1 - \text{εφ}\alpha \text{εφ}\beta - \text{εφ}\beta \text{εφ}\gamma - \text{εφ}\gamma \text{εφ}\alpha}$$

Δ) Ύπολογισμός της σφ(α + β + γ). Αν $\eta\mu(\alpha + \beta + \gamma) \neq 0$, πού ισχύει για $\alpha + \beta + \gamma \neq k\pi$, όπου $k \in \mathbb{Z}$, έχουμε διαδοχικά:

$$\text{σφ}(\alpha + \beta + \gamma) = \frac{\text{συν}(\alpha + \beta + \gamma)}{\eta\mu(\alpha + \beta + \gamma)} = \frac{\text{συν}\alpha \text{συν}\beta \text{συν}\gamma - \Sigma \eta\mu\alpha \eta\mu\beta \text{συν}\gamma}{\Sigma \eta\mu\alpha \text{συν}\beta \text{συν}\gamma - \eta\mu\alpha \eta\mu\beta \eta\mu\gamma} \quad (1)$$

Αν όμως είναι και $\eta\mu\alpha \eta\mu\beta \eta\mu\gamma \neq 0$, πού ισχύει για $\alpha \neq k_1\pi$ και $\beta \neq k_2\pi$ και $\gamma \neq k_3\pi$, όπου $k_1, k_2, k_3 \in \mathbb{Z}$, διαιρώντας τούς όρους του κλάσματος (1) με $\eta\mu\alpha \eta\mu\beta \eta\mu\gamma$, βρίσκουμε τον τύπο:

$$\text{σφ}(\alpha + \beta + \gamma) = \frac{\sigma\phi\alpha \sigma\phi\beta \sigma\phi\gamma - \Sigma \sigma\phi\alpha}{\Sigma \sigma\phi\beta \sigma\phi\gamma - 1} \quad 18$$

$$\boxed{\text{σφ}(\alpha + \beta + \gamma) = \frac{\sigma\phi\alpha \sigma\phi\beta \sigma\phi\gamma - \sigma\phi\alpha - \sigma\phi\beta - \sigma\phi\gamma}{\sigma\phi\beta \sigma\phi\gamma + \sigma\phi\gamma \sigma\phi\alpha + \sigma\phi\alpha \sigma\phi\beta - 1}}$$

Παράδειγμα. *Αν $\varepsilon\varphi\alpha = \frac{1}{12}$, $\varepsilon\varphi\beta = \frac{2}{5}$, $\varepsilon\varphi\gamma = \frac{1}{3}$, νά αποδειχθεί ἡ ἀλήθεια τῆς ισότητος:

$$\alpha + \beta + \gamma = \frac{\pi}{4} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

*Απόδειξη. Στόν τύπο (17) ἀντικαθιστώντας τίς δεδομένες τιμές, βρίσκουμε μετά τήν ἐκτέλεση τῶν σχετικῶν πράξεων:

$$\varepsilon\varphi(\alpha + \beta + \gamma) = 1 = \varepsilon\varphi \frac{\pi}{4}. \quad \text{*Αρα: } \alpha + \beta + \gamma = \frac{\pi}{4} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Πρώτη ομάδα

11. Νά ὑπολογισθοῦν οἱ παραστάσεις:

- | | | |
|---|--|--|
| 1. $\eta\mu(\beta + \gamma - \alpha)$, | $\eta\mu(\gamma + \alpha - \beta)$, | $\eta\mu(\alpha + \beta - \gamma)$. |
| 2. $\sigma\upsilon\nu(\beta + \gamma - \alpha)$, | $\sigma\upsilon\nu(\gamma + \alpha - \beta)$, | $\sigma\upsilon\nu(\alpha + \beta - \gamma)$. |
| 3. $\sigma\upsilon\nu(\alpha - \beta - \gamma)$, | $\sigma\upsilon\nu(\beta - \alpha - \gamma)$, | $\sigma\upsilon\nu(\gamma - \alpha - \beta)$. |

12. 1. *Αν $0 < \alpha, \beta, \gamma < \frac{\pi}{2}$ καί $\varepsilon\varphi\alpha = \frac{3}{4}$, $\varepsilon\varphi\beta = \frac{8}{15}$, $\varepsilon\varphi\gamma = \frac{5}{12}$, νά ὑπολογισθοῦν οἱ τριγωνομετρικοί ἀριθμοὶ τῶν ἀθροισμάτων $\alpha \pm \beta \pm \gamma$:

2. *Αν $0 < \alpha, \beta, \gamma < \frac{\pi}{2}$ καί $\eta\mu\alpha = \frac{3}{5}$, $\eta\mu\beta = \frac{12}{13}$, $\eta\mu\gamma = \frac{7}{25}$, νά ὑπολογισθοῦν οἱ τριγωνομετρικοί ἀριθμοὶ $\eta\mu(\alpha + \beta + \gamma)$, $\varepsilon\varphi(\alpha + \beta + \gamma)$, $\sigma\varphi(\alpha + \beta - \gamma)$.

ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΚΕΡΑΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΩΝ ΤΟΞΩΝ

● 11. ΠΡΟΒΛΗΜΑ. *Από τοὺς τριγωνομετρικούς ἀριθμούς ἑνός τόξου α νά ὑπολογισθοῦν οἱ τριγωνομετρικοί ἀριθμοὶ τῶν τόξων:

$$2\alpha, 3\alpha, \dots, \nu\alpha \quad \nu \in \mathbb{Z}$$

A) *Υπολογισμὸς τοῦ $\eta\mu 2\alpha$. *Αν στό γνωστό τύπο:

$$\eta\mu(\alpha + \beta) \equiv \eta\mu\alpha \sigma\upsilon\nu\beta + \eta\mu\beta \sigma\upsilon\nu\alpha$$

βάλουμε ἀντί β τό α , θά ἔχουμε:

$$\eta\mu(\alpha + \alpha) \equiv \eta\mu\alpha \sigma\upsilon\nu\alpha + \eta\mu\alpha \sigma\upsilon\nu\alpha$$

ἢ

$$\eta\mu 2\alpha \equiv 2\eta\mu\alpha \sigma\upsilon\nu\alpha$$

(19)

B) *Υπολογισμὸς τοῦ $\sigma\upsilon\nu 2\alpha$. *Αν στό γνωστό τύπο:

$$\sigma\upsilon\nu(\alpha + \beta) \equiv \sigma\upsilon\nu\alpha \sigma\upsilon\nu\beta - \eta\mu\alpha \eta\mu\beta,$$

βάλουμε όπου β τό α , θά έχουμε διαδοχικά:

$$\text{συν}2\alpha \equiv \text{συν}^2\alpha - \eta\mu^2\alpha \equiv 1 - \eta\mu^2\alpha - \eta\mu^2\alpha \equiv 1 - 2\eta\mu^2\alpha$$

$$\text{καί } \text{συν}2\alpha \equiv \text{συν}^2\alpha - \eta\mu^2\alpha \equiv \text{συν}^2\alpha - (1 - \text{συν}^2\alpha) \equiv 2\text{συν}^2\alpha - 1.$$

Ώστε:

$$\boxed{\text{συν}2\alpha \equiv 1 - 2\eta\mu^2\alpha \equiv 2\text{συν}^2\alpha - 1 \equiv \text{συν}^2\alpha - \eta\mu^2\alpha} \quad (20)$$

Γ) Ύπολογισμός τῆς εφ.2α. Ἀπό τό γνωστό τύπο:

$$\text{εφ}(\alpha + \beta) = \frac{\text{εφ}\alpha + \text{εφ}\beta}{1 - \text{εφ}\alpha \cdot \text{εφ}\beta}, \text{ ἄν βάλουμε ὅπου } \beta \text{ τό } \alpha, \text{ ἔχουμε:}$$

$$\text{εφ}(\alpha + \alpha) = \frac{\text{εφ}\alpha + \text{εφ}\alpha}{1 - \text{εφ}\alpha \cdot \text{εφ}\alpha} = \frac{2\text{εφ}\alpha}{1 - \text{εφ}^2\alpha} \quad \eta \quad \boxed{\text{εφ}2\alpha = \frac{2\text{εφ}\alpha}{1 - \text{εφ}^2\alpha}} \quad (21)$$

Ὁ τύπος (21) ἰσχύει γιά:

$$\alpha \neq \frac{\pi}{2} + k \cdot \pi \quad \text{καί} \quad \alpha \neq \pm \frac{\pi}{4} + k_1 \cdot \pi, \text{ ὅπου } k, k_1, \in \mathbb{Z}.$$

Δ) Ύπολογισμός τῆς σφ.2α. Ἀπό τό γνωστό τύπο:

$$\text{σφ}(\alpha + \beta) = \frac{\text{σφ}\alpha \text{σφ}\beta - 1}{\text{σφ}\alpha + \text{σφ}\beta}, \text{ ὅταν } \beta = \alpha, \text{ ἔχουμε:}$$

$$\text{σφ}(\alpha + \alpha) = \frac{\text{σφ}\alpha \cdot \text{σφ}\alpha - 1}{\text{σφ}\alpha + \text{σφ}\alpha} = \frac{\text{σφ}^2\alpha - 1}{2\text{σφ}\alpha} \quad \eta \quad \boxed{\text{σφ}2\alpha = \frac{\text{σφ}^2\alpha - 1}{2\text{σφ}\alpha}} \quad (22)$$

Ὁ τύπος (22) ἰσχύει γιά $\alpha \neq k\pi$ καί $\alpha \neq \pi/2 + k_1 \cdot \pi$, ὅπου $k, k_1 \in \mathbb{Z}$.

● 12. Οἱ τριγωνομετρικοί ἀριθμοί τοῦ τόξου 3α. Ἔχουμε διαδοχικά

$$\eta\mu 3\alpha = \eta\mu(2\alpha + \alpha) = \eta\mu 2\alpha \text{συν}\alpha + \eta\mu\alpha \text{συν}2\alpha =$$

$$= 2\eta\mu\alpha \text{συν}\alpha \cdot \text{συν}\alpha + \eta\mu\alpha(1 - 2\eta\mu^2\alpha) =$$

$$= 2\eta\mu\alpha \text{συν}^2\alpha + \eta\mu\alpha - 2\eta\mu^3\alpha =$$

$$= 2\eta\mu\alpha(1 - \eta\mu^2\alpha) + \eta\mu\alpha - 2\eta\mu^3\alpha =$$

$$= 2\eta\mu\alpha - 2\eta\mu^3\alpha + \eta\mu\alpha - 2\eta\mu^3\alpha = 3\eta\mu\alpha - 4\eta\mu^3\alpha.$$

$$\text{συν}3\alpha = \text{συν}(2\alpha + \alpha) = \text{συν}2\alpha \text{συν}\alpha - \eta\mu 2\alpha \eta\mu\alpha =$$

$$= (2\text{συν}^2\alpha - 1)\text{συν}\alpha - 2\eta\mu^2\alpha \text{συν}\alpha = 2\text{συν}^3\alpha - \text{συν}\alpha - 2(1 - \text{συν}^2\alpha)\text{συν}\alpha =$$

$$= 2\text{συν}^3\alpha - \text{συν}\alpha - 2\text{συν}\alpha + 2\text{συν}^3\alpha = 4\text{συν}^3\alpha - 3\text{συν}\alpha.$$

$$\text{εφ}3\alpha = \text{εφ}(2\alpha + \alpha) = \frac{3\text{εφ}\alpha - \text{εφ}^3\alpha}{1 - 3\text{εφ}^2\alpha}, \quad \text{σφ}3\alpha = \text{σφ}(2\alpha + \alpha) = \frac{\text{σφ}^3\alpha - 3\text{σφ}\alpha}{3\text{σφ}^2\alpha - 1}$$

Ώστε, τελικά, θά έχουμε:

$\eta\mu 3\alpha = 3\eta\mu\alpha - 4\eta\mu^3\alpha$
$\sigma\upsilon\nu 3\alpha = 4\sigma\upsilon\nu^3\alpha - 3\sigma\upsilon\nu\alpha$

(23) και

$\epsilon\phi 3\alpha = \frac{3\epsilon\phi\alpha - \epsilon\phi^3\alpha}{1 - 3\epsilon\phi^2\alpha}$	(24)
$\sigma\phi 3\alpha = \frac{\sigma\phi^3\alpha - 3\sigma\phi\alpha}{3\sigma\phi^2\alpha - 1}$	

ΣΗΜ. Οί τύποι (23) και (24) προκύπτουν από τούς τύπους 15 - 18, αν έκει βάλουμε όπου $\beta = \gamma = \alpha$ και έκτελέσουμε τίς πράξεις.

Ώ πρώτος από τούς τύπους (24) έχει έννοια, όταν

$$3\alpha \neq \frac{\pi}{2} + k\pi \Rightarrow \alpha \neq \frac{\pi}{6} + k \cdot \frac{\pi}{3} \text{ και } \alpha \neq \pm \frac{\pi}{6} + k_1\pi, \text{ όπου } k, k_1 \in \mathbb{Z}.$$

Ώ δεύτερος από τούς τύπους (24) έχει έννοια, όταν:

$$3\alpha \neq k_2\pi \Rightarrow \alpha \neq k_2 \cdot \frac{\pi}{3} \text{ και } \alpha \neq \pm \frac{\pi}{3} + k_3\pi, \text{ όπου } k_2, k_3 \in \mathbb{Z}.$$

★ ● 13. Τύποι του Simpson. Προφανώς είναι:

$$\left. \begin{aligned} \eta\mu(\alpha + \beta) + \eta\mu(\alpha - \beta) &\equiv 2\eta\mu\alpha \sigma\upsilon\nu\beta \\ \sigma\upsilon\nu(\alpha + \beta) + \sigma\upsilon\nu(\alpha - \beta) &\equiv 2\sigma\upsilon\nu\alpha \sigma\upsilon\nu\beta \end{aligned} \right\}$$

Ώπομένως:

$$\left. \begin{aligned} \eta\mu(\alpha + \beta) &\equiv 2\eta\mu\alpha \sigma\upsilon\nu\beta - \eta\mu(\alpha - \beta) \\ \sigma\upsilon\nu(\alpha + \beta) &\equiv 2\sigma\upsilon\nu\alpha \sigma\upsilon\nu\beta - \sigma\upsilon\nu(\alpha - \beta) \end{aligned} \right\}$$

και αν βάλουμε όπου α τό $\mu\alpha$ και όπου β τό α , βρίσκουμε τούς τύπους:

$\eta\mu(\mu + 1)\alpha \equiv 2\eta\mu(\mu\alpha) \sigma\upsilon\nu\alpha - \eta\mu(\mu - 1)\alpha$	(25)
--	------

$\sigma\upsilon\nu(\mu + 1)\alpha \equiv 2\sigma\upsilon\nu(\mu\alpha) \sigma\upsilon\nu\alpha - \sigma\upsilon\nu(\mu - 1)\alpha$	(26)
--	------

Ώπό τούς τύπους (25), (26) για $\mu = 1, 2, 3, 4, 5, 6, \dots$ βρίσκουμε αντίστοιχώς τούς τύπους:

$\eta\mu 2\alpha \equiv 2\eta\mu\alpha \sigma\upsilon\nu\alpha$	$\sigma\upsilon\nu 2\alpha \equiv 2\sigma\upsilon\nu^2\alpha - 1$
$\eta\mu 3\alpha \equiv 3\eta\mu\alpha - 4\eta\mu^3\alpha$	$\sigma\upsilon\nu 3\alpha \equiv 4\sigma\upsilon\nu^3\alpha - 3\sigma\upsilon\nu\alpha$
$\eta\mu 4\alpha \equiv (4\eta\mu\alpha - 8\eta\mu^3\alpha)\sigma\upsilon\nu\alpha$	$\sigma\upsilon\nu 4\alpha \equiv 8\sigma\upsilon\nu^4\alpha - 8\sigma\upsilon\nu^2\alpha + 1$
$\eta\mu 5\alpha \equiv 5\eta\mu\alpha - 20\eta\mu^3\alpha + 16\eta\mu^5\alpha$	$\sigma\upsilon\nu 5\alpha \equiv 16\sigma\upsilon\nu^5\alpha - 20\sigma\upsilon\nu^3\alpha + 5\sigma\upsilon\nu\alpha$
$\eta\mu 6\alpha \equiv (6\eta\mu\alpha - 32\eta\mu^3\alpha + 32\eta\mu^5\alpha)\sigma\upsilon\nu\alpha$	$\sigma\upsilon\nu 6\alpha \equiv 32\sigma\upsilon\nu^6\alpha - 48\sigma\upsilon\nu^4\alpha + 18\sigma\upsilon\nu^2\alpha - 1$
.....

● 14. ΕΦΑΡΜΟΓΗ. Νά υπολογισθοῦν οί τριγωνομετρικοί αριθμοί τῶν γωνιῶν $18^\circ, 36^\circ, 54^\circ, 72^\circ$.

Λύση. Έχουμε διαδοχικά: $36^\circ + 54^\circ = 90^\circ \Leftrightarrow 36^\circ = 90^\circ - 54^\circ \Leftrightarrow$
 $\eta\mu 36^\circ \equiv \eta\mu(90^\circ - 54^\circ) \equiv \sigma\upsilon\nu 54^\circ \Leftrightarrow \eta\mu(2 \cdot 18^\circ) \equiv \sigma\upsilon\nu(3 \cdot 18^\circ) \Leftrightarrow$

$$2\eta\mu 18^\circ \sigma\upsilon\nu 18^\circ \equiv 4\sigma\upsilon\nu^3 18^\circ - 3\sigma\upsilon\nu 18^\circ \Leftrightarrow$$

$$2\eta\mu 18^\circ \equiv 4\sigma\upsilon\nu^2 18^\circ - 3 \Leftrightarrow 4\eta\mu^2 18^\circ + 2\eta\mu 18^\circ \equiv 1 \Leftrightarrow$$

$$4\eta\mu^2 18^\circ + 2\eta\mu 18^\circ + \frac{1}{4} \equiv \frac{5}{4} \Leftrightarrow \left(2\eta\mu 18^\circ + \frac{1}{2} \right)^2 \equiv \frac{5}{4} \Leftrightarrow$$

$$\left| 2\eta\mu 18^\circ + \frac{1}{2} \right| \equiv \frac{\sqrt{5}}{2} \Leftrightarrow 2\eta\mu 18^\circ + \frac{1}{2} \equiv \frac{\sqrt{5}}{2} \Rightarrow \eta\mu 18^\circ = \frac{\sqrt{5}-1}{4} \approx 0,3090$$

Άρα $\sigma\upsilon\nu^2 18^\circ = 1 - \eta\mu^2 18^\circ = 1 - \left(\frac{\sqrt{5}-1}{4} \right)^2 = \frac{10 + 2\sqrt{5}}{16} \Rightarrow$

$$\sigma\upsilon\nu 18^\circ = \frac{1}{4} \sqrt{10 + 2\sqrt{5}}$$

οπότε $\epsilon\phi 18^\circ = \frac{\eta\mu 18^\circ}{\sigma\upsilon\nu 18^\circ} = \frac{\sqrt{25 - 10\sqrt{5}}}{5}$.

Άπό τόν τύπο $\sigma\upsilon\nu 2\alpha = 1 - 2\eta\mu^2 \alpha$, γιά $\alpha = 18^\circ$, έχουμε:

$$\sigma\upsilon\nu 36^\circ = 1 - 2\eta\mu^2 18^\circ = 1 - 2 \left(\frac{\sqrt{5}-1}{4} \right)^2 = \frac{\sqrt{5}+1}{4}$$

καί $\eta\mu^2 36^\circ = 1 - \sigma\upsilon\nu^2 36^\circ = 1 - \left(\frac{\sqrt{5}+1}{4} \right)^2 = \frac{10 - 2\sqrt{5}}{16}$ ή $\eta\mu 36^\circ = \frac{1}{4} \sqrt{10 - 2\sqrt{5}}$.

καί άρα: $\epsilon\phi 36^\circ = \frac{\eta\mu 36^\circ}{\sigma\upsilon\nu 36^\circ} = \sqrt{5 - 2\sqrt{5}}$.

Καί έπειδή $18^\circ + 72^\circ = 90^\circ$ καί $36^\circ + 54^\circ = 90^\circ$, συμπεραίνουμε:

$$\eta\mu 72^\circ = \sigma\upsilon\nu 18^\circ$$

$$\eta\mu 54^\circ = \sigma\upsilon\nu 36^\circ$$

$$\sigma\upsilon\nu 72^\circ = \eta\mu 18^\circ$$

$$\sigma\upsilon\nu 54^\circ = \eta\mu 36^\circ$$

$$\epsilon\phi 72^\circ = \sigma\phi 18^\circ$$

καί

$$\epsilon\phi 54^\circ = \sigma\phi 36^\circ$$

$$\sigma\phi 72^\circ = \epsilon\phi 18^\circ$$

$$\sigma\phi 54^\circ = \epsilon\phi 36^\circ$$

Άνακεφαλαιώνοντας έχουμε:

$\eta\mu 18^\circ = \sigma\upsilon\nu 72^\circ = \frac{\sqrt{5}-1}{4}$	$\eta\mu 36^\circ = \sigma\upsilon\nu 54^\circ = \frac{1}{4} \sqrt{10-2\sqrt{5}}$
$\sigma\upsilon\nu 18^\circ = \eta\mu 72^\circ = \frac{1}{4} \sqrt{10+2\sqrt{5}}$	$\sigma\upsilon\nu 36^\circ = \eta\mu 54^\circ = \frac{\sqrt{5}+1}{4}$
$\epsilon\phi 18^\circ = \sigma\phi 72^\circ = \frac{1}{5} \sqrt{25-10\sqrt{5}}$	$\epsilon\phi 36^\circ = \sigma\phi 54^\circ = \sqrt{5-2\sqrt{5}}$
$\sigma\phi 18^\circ = \epsilon\phi 72^\circ = \sqrt{5+2\sqrt{5}}$	$\sigma\phi 36^\circ = \epsilon\phi 54^\circ = \frac{1}{\sqrt{5-2\sqrt{5}}}$

(28)

Πρώτη ομάδα

13. "Αν $\eta\mu\alpha = 0,4$ και $90^\circ < \alpha < 180^\circ$, νά υπολογισθοῦν οἱ τριγωνομετρικοὶ ἀριθμοί:
 $\eta\mu 2\alpha$, $\sigma\upsilon\nu 2\alpha$, $\epsilon\varphi 2\alpha$, $\sigma\varphi 2\alpha$

14. "Αν $\eta\mu\alpha = \frac{1}{3}$, $\eta\mu\beta = \frac{1}{2}$ καὶ $0 < \alpha, \beta < \frac{\pi}{2}$, νά υπολογισθεῖ τό $\eta\mu(2\alpha + \beta)$.

15. "Αν $4\eta\mu^2\alpha - 2(1 + \sqrt{3})\eta\mu\alpha + \sqrt{3} = 0$, νά υπολογισθοῦν οἱ ἀριθμοί:
 $\eta\mu 2\alpha$, $\sigma\upsilon\nu 2\alpha$, $\epsilon\varphi 2\alpha$.

16. "Αν $\sigma\upsilon\nu\alpha = \frac{1}{3}$, νά υπολογισθεῖ τό $\sigma\upsilon\nu 3\alpha$.

17. "Αν $\eta\mu\alpha = \frac{3}{5}$, νά υπολογισθεῖ τό $\eta\mu 3\alpha$.

18. "Αν $\epsilon\varphi\alpha = 3$, νά υπολογισθεῖ ἡ $\epsilon\varphi 3\alpha$.

19. Νά ἀποδειχθοῦν οἱ ἀκόλουθες ἰσότητες:

- | | |
|---|--|
| 1. $\frac{\eta\mu 2\alpha}{1 + \sigma\upsilon\nu 3\alpha} = \epsilon\varphi\alpha,$ | 5. $\frac{1 + \sigma\varphi^2\alpha}{2\sigma\varphi\alpha} = \sigma\tau\epsilon\mu 2\alpha,$ |
| 2. $\frac{\eta\mu 2\alpha}{1 - \sigma\upsilon\nu 2\alpha} = \sigma\varphi\alpha,$ | 6. $\frac{\sigma\varphi^2\alpha + 1}{\sigma\varphi^2\alpha - 1} = \tau\epsilon\mu 2\alpha,$ |
| 3. $\sigma\upsilon\nu^4\alpha - \eta\mu^4\alpha \equiv \sigma\upsilon\nu 2\alpha,$ | 7. $\epsilon\varphi(45^\circ - \alpha) = \frac{\sigma\upsilon\nu 2\alpha}{1 + \eta\mu 2\alpha}.$ |
| 4. $\sigma\varphi\alpha - \epsilon\varphi\alpha = 2\sigma\varphi 2\alpha.$ | |

Πότε ἔχουν ἔννοια τὰ μέλη τῶν παραπάνω ἀσκήσεων;

20. Νά ἀποδειχθοῦν οἱ ἀκόλουθες ἰσότητες:

- $\sigma\upsilon\nu^2\left(\frac{\pi}{4} - \alpha\right) - \eta\mu^2\left(\frac{\pi}{4} - \alpha\right) \equiv \eta\mu 2\alpha.$
- $\epsilon\varphi(45^\circ + \alpha) - \epsilon\varphi(45^\circ - \alpha) = 2\epsilon\varphi 2\alpha.$
- $\frac{\sigma\upsilon\nu\alpha + \eta\mu\alpha}{\sigma\upsilon\nu\alpha - \eta\mu\alpha} - \frac{\sigma\upsilon\nu\alpha - \eta\mu\alpha}{\sigma\upsilon\nu\alpha + \eta\mu\alpha} = 2\epsilon\varphi 2\alpha.$
- $\frac{1 - \sigma\upsilon\nu 2\alpha + \eta\mu 2\alpha}{1 + \sigma\upsilon\nu 2\alpha + \eta\mu 2\alpha} = \epsilon\varphi\alpha.$

★ **Δεύτερη ομάδα**

21. Νά ἀποδειχθοῦν οἱ ἀκόλουθες ἰσότητες:

- | | |
|---|---|
| 1. $\frac{\eta\mu 3\alpha}{\eta\mu\alpha} - \frac{\sigma\upsilon\nu 3\alpha}{\sigma\upsilon\nu\alpha} = 2.$ | 2. $\frac{3\sigma\upsilon\nu\alpha + \sigma\upsilon\nu 3\alpha}{3\eta\mu\alpha - \eta\mu 3\alpha} = \sigma\varphi^2\alpha,$ |
| 3. $\frac{\eta\mu 3\alpha + \eta\mu^3\alpha}{\sigma\upsilon\nu^3\alpha - \sigma\upsilon\nu 3\alpha} = \sigma\varphi\alpha.$ | 4. $\frac{\sigma\upsilon\nu^3\alpha - \sigma\upsilon\nu 3\alpha}{\sigma\upsilon\nu\alpha} + \frac{\eta\mu^3\alpha + \eta\mu 3\alpha}{\eta\mu\alpha} = 3.$ |
| 5. $4\eta\mu^3\alpha \sigma\upsilon\nu 3\alpha + 4\sigma\upsilon\nu^3\alpha \eta\mu 3\alpha \equiv 3\eta\mu 4\alpha.$ | |
| 6. $4\eta\mu\alpha \eta\mu(60^\circ + \alpha) \eta\mu(60^\circ - \alpha) \equiv \eta\mu 3\alpha.$ | |
| 7. $\epsilon\varphi 3\alpha - \epsilon\varphi 2\alpha - \epsilon\varphi\alpha = \epsilon\varphi 3\alpha \epsilon\varphi 2\alpha \epsilon\varphi\alpha.$ | |
| 8. $\frac{\sigma\varphi\alpha}{\sigma\varphi\alpha - \sigma\varphi 3\alpha} + \frac{\epsilon\varphi\alpha}{\epsilon\varphi\alpha - \epsilon\varphi 3\alpha} = 1.$ | |

● 15. ΠΡΟΒΛΗΜΑ. Από την εφα ενός τόξου α νά υπολογισθούν οι τριγωνομετρικοί αριθμοί της γωνίας 2α.

Λύση. Από τις ισότητες:

$$\sin^2\alpha = \frac{1}{1 + \epsilon\phi^2\alpha} \text{ και } \eta\mu^2\alpha = \frac{\epsilon\phi^2\alpha}{1 + \epsilon\phi^2\alpha}, \text{ αν } \alpha \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

έχουμε διαδοχικά:

$$\eta\mu 2\alpha = 2\eta\mu\alpha \sin\alpha = 2\epsilon\phi\alpha \cdot \sin^2\alpha = 2\epsilon\phi\alpha \cdot \frac{1}{1 + \epsilon\phi^2\alpha} = \frac{2\epsilon\phi\alpha}{1 + \epsilon\phi^2\alpha},$$

$$\sin 2\alpha = \sin^2\alpha - \eta\mu^2\alpha = \frac{1}{1 + \epsilon\phi^2\alpha} - \frac{\epsilon\phi^2\alpha}{1 + \epsilon\phi^2\alpha} = \frac{1 - \epsilon\phi^2\alpha}{1 + \epsilon\phi^2\alpha},$$

$$\epsilon\phi 2\alpha = \frac{\eta\mu 2\alpha}{\sin 2\alpha} = \frac{2\epsilon\phi\alpha}{1 - \epsilon\phi^2\alpha}, \text{ αν } \alpha \neq \frac{\pi}{4} + k_1 \cdot \frac{\pi}{2} \text{ και } \alpha \neq \pm \frac{\pi}{4} + k_2\pi$$

$$\sigma\phi 2\alpha = \frac{1 - \epsilon\phi^2\alpha}{2\epsilon\phi\alpha}, \text{ αν } \alpha \neq (2k_3 + 1) \cdot \frac{\pi}{2} \text{ και } \alpha \neq \frac{\pi}{2} + k_4\pi,$$

όπου οι $k_1, k_2, k_3, k_4 \in \mathbb{Z}$.

Ανακεφαλαιώνοντας έχουμε:

$\eta\mu 2\alpha = \frac{2\epsilon\phi\alpha}{1 + \epsilon\phi^2\alpha}$	$\epsilon\phi 2\alpha = \frac{2\epsilon\phi\alpha}{1 - \epsilon\phi^2\alpha}$	(29)
$\sin 2\alpha = \frac{1 - \epsilon\phi^2\alpha}{1 + \epsilon\phi^2\alpha}$	$\sigma\phi 2\alpha = \frac{1 - \epsilon\phi^2\alpha}{2\epsilon\phi\alpha}$	

Στους τύπους (29) παρατηρούμε ότι οι τριγωνομετρικοί αριθμοί $\eta\mu 2\alpha$, $\sin 2\alpha$, $\epsilon\phi 2\alpha$, $\sigma\phi 2\alpha$ είναι ρητές συναρτήσεις της εφα.

★● 16. Γεωμετρική έρμηνεία των τύπων (29). *Ας υποθέσουμε ότι Ο είναι το κέντρο του τριγωνομετρικού κύκλου, Α ή άρχή των τόξων και ΑΖ ο άξονας των εφαπτομένων.


*Αν $t = \epsilon\phi\alpha = \overline{AT}$ είναι η τιμή της εφαπτομένης, ή όποια αντιστοιχεί στα δύο αντιδιαμετρικά σημεία Μ και M_1 του τριγωνομετρικού κύκλου (Ο), τότε τα τόξα, τα όποια έχουν εφαπτομένη $t = \overline{AT}$, περατώνονται στο σημείο Μ ή τό M_1 .

*Αρα οι τιμές τους θά είναι :

$$x = \alpha + k \cdot \pi, \text{ όπου } k \in \mathbb{Z}.$$

Τά διπλάσια τόξα θά έχουν τιμές:

$$2x = 2(\alpha + k \cdot \pi) = 2\alpha + k \cdot 2\pi$$



Σχ. 2

καί θά περατώνονται στό σημείο P ή P₁. Ἄν, λοιπόν, γνωρίζουμε τό σημείο T, εἶναι ἀμέσως γνωστό καί τό σημείο P. Ἄρα οἱ τριγωνομετρικοί ἀριθμοί τοῦ τόξου \widehat{AP} εἶναι τελείως ὀρισμένοι.

Ἀντιστρόφως, ἂν εἶναι γνωστό τό σημείο P, εἶναι ἀμέσως γνωστό καί τό σημείο T, ὁπότε εἶναι γνωστή καί ἡ ἐφαπτομένη τοῦ τόξου \widehat{AM} . Δηλαδή ἀπό τούς τριγωνομετρικούς ἀριθμούς τοῦ τόξου 2α εἶναι γνωστή ἡ εφ. Ἔτσι εἶναι:

$$\frac{1 - \sigma\upsilon\nu 2\alpha}{\eta\mu 2\alpha} = \frac{2\eta\mu^2\alpha}{2\eta\mu\alpha \sigma\upsilon\nu\alpha} = \varepsilon\varphi\alpha = \frac{\eta\mu 2\alpha}{1 + \sigma\upsilon\nu 2\alpha}.$$

● 17. ΠΡΟΒΛΗΜΑ. Ἀπό τήν εφ $\frac{\alpha}{2}$, νά ὑπολογισθοῦν οἱ τριγωνομετρικοί ἀριθμοί τοῦ τόξου α.

Λύση. Ἄν στούς γνωστούς τύπους (29) ἀντικαταστήσουμε τή γωνία α μέ τή γωνία $\frac{\alpha}{2}$, θά βροῦμε τούς ἀκόλουθους τύπους:

$\eta\mu\alpha = \frac{2\varepsilon\varphi\alpha \frac{\alpha}{2}}{1 + \varepsilon\varphi^2 \frac{\alpha}{2}}$	$\varepsilon\varphi\alpha = \frac{2\varepsilon\varphi \frac{\alpha}{2}}{1 - \varepsilon\varphi^2 \frac{\alpha}{2}}$
$\sigma\upsilon\nu\alpha = \frac{1 - \varepsilon\varphi^2 \frac{\alpha}{2}}{1 + \varepsilon\varphi^2 \frac{\alpha}{2}}$	$\sigma\varphi\alpha = \frac{1 - \varepsilon\varphi^2 \frac{\alpha}{2}}{2\varepsilon\varphi \frac{\alpha}{2}}$

(30)

Στούς τύπους (30) παρατηροῦμε ὅτι οἱ τριγωνομετρικοί ἀριθμοί τῆς γωνίας α ἐκφράζονται ὡς ρητές συναρτήσεις τῆς εφ $\frac{\alpha}{2}$.

Οἱ τύποι τῆς πρώτης στήλης ἔχουν ἔννοια, ἂν
 $\alpha \neq \pm\pi + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$

Ἐπίσης, ὁ πρῶτος τῆς δεύτερης στήλης ἔχει ἔννοια, ἂν

$$\alpha \neq (2k_1 + 1)\frac{\pi}{2} \quad \text{καί} \quad \alpha \neq \pm \frac{\pi}{2} + 2k_2\pi, \quad k_1, k_2 \in \mathbb{Z}.$$

Ἐπίσης, ὁ δεύτερος τῆς δεύτερης στήλης ἔχει ἔννοια, ἂν

$$\alpha \neq (k_3 + 1)\pi \quad \text{καί} \quad \alpha \neq \pi + 2k_4\pi, \quad k_4, k_3 \in \mathbb{Z}.$$

● 18. ΠΡΟΒΛΗΜΑ. Ἀπό τό $\sigma\upsilon\nu 2\alpha$ νά ὑπολογισθοῦν οἱ τριγωνομετρικοί ἀριθμοί τῆς γωνίας α.

Λύση. Από τούς γνωστούς τύπους:

$$\sin 2\alpha = 1 - 2\eta\mu^2\alpha \text{ και } \sin 2\alpha = 2\sigma\upsilon\nu^2\alpha - 1,$$

έχουμε αντίστοιχως:

$$\eta\mu^2\alpha = \frac{1 - \sin 2\alpha}{2} \Leftrightarrow |\eta\mu\alpha| = \sqrt{\frac{1 - \sin 2\alpha}{2}}$$

$$\text{και } \sigma\upsilon\nu^2\alpha = \frac{1 + \sin 2\alpha}{2} \Leftrightarrow |\sigma\upsilon\nu\alpha| = \sqrt{\frac{1 + \sin 2\alpha}{2}}$$

Δηλαδή, αντίστοιχως:

$$\eta\mu\alpha = \pm \sqrt{\frac{1 - \sin 2\alpha}{2}} \text{ και } \sigma\upsilon\nu\alpha = \pm \sqrt{\frac{1 + \sin 2\alpha}{2}}$$

Θά είναι άκόμα:

$$\epsilon\varphi^2\alpha = \frac{1 - \sin 2\alpha}{1 + \sin 2\alpha} \Leftrightarrow |\epsilon\varphi\alpha| = \sqrt{\frac{1 - \sin 2\alpha}{1 + \sin 2\alpha}}, \text{ με } \alpha \neq \pm \frac{\pi}{2} + k\pi$$

$$\text{και } \sigma\varphi^2\alpha = \frac{1 + \sin 2\alpha}{1 - \sin 2\alpha} \Leftrightarrow |\sigma\varphi\alpha| = \sqrt{\frac{1 + \sin 2\alpha}{1 - \sin 2\alpha}}, \text{ με } \alpha \neq k_1\pi$$

και $\alpha \neq 2k_2\pi$, όπου $k, k_1, k_2 \in \mathbb{Z}$.

Ανακεφαλαιώνοντας έχουμε:

$\eta\mu\alpha = \pm \sqrt{\frac{1 - \sin 2\alpha}{2}}$	$\epsilon\varphi\alpha = \pm \sqrt{\frac{1 - \sin 2\alpha}{1 + \sin 2\alpha}}$	(31)
$\sigma\upsilon\nu\alpha = \pm \sqrt{\frac{1 + \sin 2\alpha}{2}}$	$\sigma\varphi\alpha = \pm \sqrt{\frac{1 + \sin 2\alpha}{1 - \sin 2\alpha}}$	

Από τούς τύπους (31) φαίνεται ότι τό πρόβλημα έχει τίσ έξις λύσεις:

$$\begin{array}{l}
 1. \left\{ \begin{array}{l} \eta\mu\alpha = + \sqrt{\frac{1 - \sin 2\alpha}{2}} \\ \sigma\upsilon\nu\alpha = + \sqrt{\frac{1 + \sin 2\alpha}{2}} \end{array} \right. \quad \left\| \quad \begin{array}{l}
 3. \left\{ \begin{array}{l} \eta\mu\alpha = - \sqrt{\frac{1 - \sin 2\alpha}{2}} \\ \sigma\upsilon\nu\alpha = - \sqrt{\frac{1 + \sin 2\alpha}{2}} \end{array} \right. \\
 \\
 2. \left\{ \begin{array}{l} \eta\mu\alpha = + \sqrt{\frac{1 - \sin 2\alpha}{2}} \\ \sigma\upsilon\nu\alpha = - \sqrt{\frac{1 + \sin 2\alpha}{2}} \end{array} \right. \quad \left\| \quad \begin{array}{l}
 4. \left\{ \begin{array}{l} \eta\mu\alpha = - \sqrt{\frac{1 - \sin 2\alpha}{2}} \\ \sigma\upsilon\nu\alpha = + \sqrt{\frac{1 + \sin 2\alpha}{2}} \end{array} \right.
 \end{array} \right.
 \end{array}$$

(31α)

★ ● 19. Γεωμετρική έρμηνεία τῶν λύσεων αὐτῶν. Τό διπλό πρόσημο τῶν παραπάνω τύπων ἐξηγεῖται ὡς ἐξῆς:

* Ἄς δεχθοῦμε ὅτι: $\sin 2\alpha = \mu = \overline{OP}$ (σχ. 3) καὶ $\widehat{AM} = \theta$ τὸ ἐλάχιστο θετικό τόξο, τοῦ ὁποῦ τοῦ συνημίτονο εἶναι μ .

* Ἄν M_1 εἶναι τὸ συμμετρικὸ τοῦ M ὡς πρὸς τὸν ἄξονα $A'O A$, τότε καὶ τὸ τόξο $\widehat{A A' M_1}$ ἔχει τὸ ἴδιο συνημίτονο $\mu = \overline{OP}$. Ἡ τιμὴ κάθε ἄλλου τόξου, τὸ ὁποῖο ἔχει ἀρχὴ τὸ A καὶ τέλος τὸ σημεῖο M ἢ M_1 , θά εἶναι:

$$2\alpha = \pm\theta + k \cdot 2\pi, \quad k \in \mathbf{Z}.$$

$$\text{* Ἄρα: } \alpha = \pm \frac{\theta}{2} + k \cdot \pi \quad (1)$$

* Ἄν $k = 2\nu$, $\nu \in \mathbf{Z}$, τότε

$$\alpha = \pm \frac{\theta}{2} + 2\nu \cdot \pi$$

καὶ τὰ ἀντίστοιχα τόξα περατώνονται στὰ σημεῖα N καὶ N_1 , ὅπου N καὶ N_1 τὰ μέσα τῶν τόξων \widehat{AM} καὶ $\widehat{A N_1 M_1}$.

* Ἄν $k = 2\nu + 1$, $\nu \in \mathbf{Z}$, τότε ἡ σχέση (1) γίνεται :

$$\alpha = \pm \frac{\theta}{2} + (2\nu + 1)\pi = \pm \frac{\theta}{2} + \pi + 2\nu\pi \quad (2)$$

καὶ τὰ ἀντίστοιχα τόξα περατώνονται στὰ σημεῖα N_3 καὶ N_2 , ἀντιδιαμετρικὰ τῶν N καὶ N_1 ἀντιστοίχως. Τὰ ἡμίτονα τῶν τόξων \widehat{AN} , $\widehat{AN_2}$, $\widehat{AN_3}$, $\widehat{AN_1}$ ἔχουν ἴσες ἀπόλυτες τιμές. Τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ μὲ τὰ συνημίτονά τους.


Τὰ τόξα \widehat{AN} , $\widehat{AN_2}$ καθὼς καὶ τὰ $\widehat{AN_3}$, $\widehat{AN_1}$ ἔχουν ἴσα ἡμίτονα καὶ ἀντίθετα συνημίτονα.

Τὰ τόξα \widehat{AN} καὶ $\widehat{AN_3}$ ἔχουν τὴν ἴδια ἐφαπτομένη $\overline{AT_1}$ καὶ τὴν ἴδια συνεφαπτομένη $\overline{B\Sigma_1}$, ἐνῶ τὰ τόξα $\widehat{AN_2}$ καὶ $\widehat{AN_1}$ ἔχουν τὴν ἴδια ἐφαπτομένη $\overline{AT_2}$ (ἀρνητική) καὶ τὴν ἴδια συνεφαπτομένη $\overline{B\Sigma_2}$ (ἀρνητική).

Τὰ διανύσματα $\overrightarrow{AT_1}$ καὶ $\overrightarrow{AT_2}$ εἶναι ἀντίρροπα, καθὼς καὶ τὰ $\overrightarrow{B\Sigma_1}$ καὶ $\overrightarrow{B\Sigma_2}$ μὲ ἀλγεβρικές τιμές ἀντίθετες ἀντιστοίχως.

● 20. ΠΡΟΒΛΗΜΑ. Ἄπο τὸ συνα νὰ ὑπολογισθοῦν οἱ τριγωνομετρικοὶ ἀριθμοὶ τῆς γωνίας $\frac{\alpha}{2}$.

Λύση. Ἄν στοὺς τύπους (31) βάλουμε ἀντὶ γιὰ τὴ γωνία α τὴ γωνία $\frac{\alpha}{2}$, ἔχουμε τοὺς τύπους:



Σχ. 3

$\eta\mu \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \sigma\upsilon\nu\alpha}{2}}$	$\epsilon\phi \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \sigma\upsilon\nu\alpha}{1 + \sigma\upsilon\nu\alpha}}$
$\sigma\upsilon\nu \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 + \sigma\upsilon\nu\alpha}{2}}$	$\sigma\phi \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 + \sigma\upsilon\nu\alpha}{1 - \sigma\upsilon\nu\alpha}}$

(32)

Από τούς τύπους αυτούς φαίνεται πάλι ότι τό πρόβλημα έχει τέσσερις λύσεις, τίς εξής:

$$\begin{array}{l}
 1. \left\{ \begin{array}{l} \eta\mu \frac{\alpha}{2} = + \sqrt{\frac{1 - \sigma\upsilon\nu\alpha}{2}} \\ \sigma\upsilon\nu \frac{\alpha}{2} = + \sqrt{\frac{1 + \sigma\upsilon\nu\alpha}{2}} \end{array} \right. \quad \left\| \quad \left\{ \begin{array}{l} \eta\mu \frac{\alpha}{2} = - \sqrt{\frac{1 - \sigma\upsilon\nu\alpha}{2}} \\ \sigma\upsilon\nu \frac{\alpha}{2} = - \sqrt{\frac{1 + \sigma\upsilon\nu\alpha}{2}} \end{array} \right. \\
 2. \left\{ \begin{array}{l} \eta\mu \frac{\alpha}{2} = + \sqrt{\frac{1 - \sigma\upsilon\nu\alpha}{2}} \\ \sigma\upsilon\nu \frac{\alpha}{2} = - \sqrt{\frac{1 + \sigma\upsilon\nu\alpha}{2}} \end{array} \right. \quad \left\| \quad \left\{ \begin{array}{l} \eta\mu \frac{\alpha}{2} = - \sqrt{\frac{1 - \sigma\upsilon\nu\alpha}{2}} \\ \sigma\upsilon\nu \frac{\alpha}{2} = + \sqrt{\frac{1 + \sigma\upsilon\nu\alpha}{2}} \end{array} \right.
 \end{array}$$

Ἡ γεωμετρική ἐρμηνεία τῶν διπλῶν σημείων τῶν τύπων αὐτῶν γίνεται μέ τόν τρόπο πού ἐγινε καί στή προηγούμενη παράγραφο καί μέ τό ἴδιο σχῆμα.

Παράδειγμα I. Νά ὑπολογισθοῦν οἱ τριγωνομετρικοί ἀριθμοί τοῦ τόξου $22^\circ,5$.

Λύση. Ἐπειδή $0^\circ < 22^\circ,5 < 90^\circ$, συμπεραίνουμε ὅτι ὅλοι οἱ τριγωνομετρικοί ἀριθμοί τοῦ τόξου $22^\circ,5$ εἶναι θετικοί. Ἄρα:

$$\eta\mu 22^\circ,5 = \sqrt{\frac{1 - \sigma\upsilon\nu 45^\circ}{2}} = \sqrt{\frac{1 - (\sqrt{2}:2)}{2}} = \sqrt{\frac{2 - \sqrt{2}}{4}} = \frac{1}{2} \sqrt{2 - \sqrt{2}},$$

$$\sigma\upsilon\nu 22^\circ,5 = \sqrt{\frac{1 + \sigma\upsilon\nu 45^\circ}{2}} = \sqrt{\frac{1 + (\sqrt{2}:2)}{2}} = \sqrt{\frac{2 + \sqrt{2}}{4}} = \frac{1}{2} \sqrt{2 + \sqrt{2}},$$

$$\epsilon\phi 22^\circ,5 = \frac{\sqrt{2 - \sqrt{2}}}{\sqrt{2 + \sqrt{2}}} = \frac{\sqrt{4 - 2}}{2 + \sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2 + \sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}(2 - \sqrt{2})}{4 - 2} = \sqrt{2} - 1, \quad \text{καί}$$

$$\sigma\phi 22^\circ,5 = \frac{1}{\sqrt{2} - 1} = \frac{\sqrt{2} + 1}{2 - 1} = \sqrt{2} + 1.$$

★ Παράδειγμα II. *Νά υπολογισθεί ή εφ 7° 30'.*

Λύση. 'Επειδή είναι:

$$\varepsilon\varphi \frac{\alpha}{2} = \frac{\eta\mu\alpha}{1 + \sigma\upsilon\nu\alpha} = \frac{1 - \sigma\upsilon\nu\alpha}{\eta\mu\alpha}, \quad (\alpha \neq k\pi) \quad k \in \mathbb{Z}$$

θά έχουμε: $\varepsilon\varphi 7^\circ 30' = \frac{1 - \sigma\upsilon\nu 15^\circ}{\eta\mu 15^\circ} \quad (1)$

'Αλλά $\sigma\upsilon\nu 15^\circ = \frac{1}{4} (\sqrt{6} + \sqrt{2})$ και $\eta\mu 15^\circ = \frac{1}{4} (\sqrt{6} - \sqrt{2})$

και ή σχέση (1) γίνεται:

$$\begin{aligned} \varepsilon\varphi 7^\circ 30' &= \frac{1 - \frac{1}{4}(\sqrt{6} + \sqrt{2})}{\frac{1}{4}(\sqrt{6} - \sqrt{2})} = \frac{(4 - \sqrt{6} - \sqrt{2})(\sqrt{6} + \sqrt{2})}{(\sqrt{6} - \sqrt{2})(\sqrt{6} + \sqrt{2})} = \\ &= \frac{4\sqrt{6} + 4\sqrt{2} - 4\sqrt{3} - 8}{4} = \sqrt{6} - \sqrt{3} + \sqrt{2} - 2 \end{aligned}$$

Ώστε: $\varepsilon\varphi 7^\circ 30' = \sqrt{6} - \sqrt{3} + \sqrt{2} - 2$

Νά βρείτε μόνοι σας τώρα τούς άλλους τριγωνομετρικούς αριθμούς τής γωνίας 7° 30'.

★ Παράδειγμα III. *Νά υπολογισθοῦν οί τριγωνομετρικοί αριθμοί τής γωνίας 165°.*

Λύση. 'Επειδή $270^\circ < 330^\circ < 360^\circ$, συμπεραίνουμε ότι $135^\circ < 165^\circ < 180^\circ$ και άρα τό τόξο 165° έχει τό τέλος του στό δεύτερο τεταρτημόριο. Θά έχει άκόμη θετικό ήμίτονο και άρνητικό συνημίτονο.

'Ετσι θά έχουμε:

$$\eta\mu 165^\circ = + \sqrt{\frac{1 - \sigma\upsilon\nu 330^\circ}{2}} = + \sqrt{\frac{1 - (\sqrt{3}:2)}{2}} = \frac{1}{2} \sqrt{2 - \sqrt{3}},$$

$$\sigma\upsilon\nu 165^\circ = - \sqrt{\frac{1 + \sigma\upsilon\nu 330^\circ}{2}} = - \sqrt{\frac{1 + (\sqrt{3}:2)}{2}} = - \frac{1}{2} \sqrt{2 + \sqrt{3}},$$

$$\varepsilon\varphi 165^\circ = \frac{\eta\mu 165^\circ}{\sigma\upsilon\nu 165^\circ} = \sqrt{3} - 2 \quad \text{και} \quad \sigma\varphi 165^\circ = -(2 + \sqrt{3}).$$

Σημείωση. Έπειδή $165^\circ + 15^\circ = 180^\circ$, θά έχουμε διαδοχικά:

$$\eta\mu 165^\circ = \eta\mu 15^\circ = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4} = \frac{1}{2} \sqrt{2 - \sqrt{3}}$$

$$\sigma\upsilon\nu 165^\circ = -\sigma\upsilon\nu 15^\circ = -\frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4} = -\frac{1}{2} \sqrt{2 + \sqrt{3}}$$

$$\epsilon\phi 165^\circ = -\epsilon\phi 15^\circ = -(2 - \sqrt{3}) = \sqrt{3} - 2$$

$$\kappa\alpha\iota \sigma\phi 165^\circ = -\sigma\phi 15^\circ = -(2 + \sqrt{3})$$

★ **Παράδειγμα IV.** Νά αποδειχθεί ή αλήθεια τής ισότητας:

$$A \equiv \eta\mu^4 \frac{\pi}{8} + \eta\mu^4 \frac{3\pi}{8} + \eta\mu^4 \frac{5\pi}{8} + \eta\mu^4 \frac{7\pi}{8} = \frac{3}{2} \quad (1)$$

Απόδειξη. Έπειδή $\frac{7\pi}{8} + \frac{\pi}{8} = \pi$ και $\frac{3\pi}{8} + \frac{5\pi}{8} = \pi$,

προκύπτει ότι:

$$\eta\mu \frac{7\pi}{8} = \eta\mu \frac{\pi}{8} \quad \kappa\alpha\iota \quad \eta\mu \frac{5\pi}{8} = \eta\mu \frac{3\pi}{8}$$

όποτε ή (1) μᾶς δίνει διαδοχικά:

$$\begin{aligned} A &\equiv 2\eta\mu^2 \frac{\pi}{8} + 2\eta\mu^4 \frac{3\pi}{8} = 2 \left\{ \frac{1 - \sigma\upsilon\nu \frac{\pi}{4}}{2} \right\}^2 + 2 \left\{ \frac{1 - \sigma\upsilon\nu \frac{3\pi}{4}}{2} \right\}^2 = \\ &= 2 \cdot \left\{ \frac{1 - \frac{\sqrt{2}}{2}}{2} \right\}^2 + 2 \left\{ \frac{1 + \frac{\sqrt{2}}{2}}{2} \right\}^2 = 2 \cdot \frac{(2 - \sqrt{2})^2}{16} + 2 \cdot \frac{(2 + \sqrt{2})^2}{16} = \\ &= \frac{4 - 4\sqrt{2} + 2}{8} + \frac{4 + 4\sqrt{2} + 2}{8} = \frac{12}{8} = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

★ **Παράδειγμα V.** Νά αποδειχθεί ότι ή παράσταση:

$$B \equiv \sigma\upsilon\nu^2 \alpha + \sigma\upsilon\nu^2(\alpha + 120^\circ) + \sigma\upsilon\nu^2(\alpha - 120^\circ) \quad (1)$$

είναι ανεξάρτητη από τό τόξο α .

Απόδειξη. Έχουμε διαδοχικά:

$$\begin{aligned} B &\equiv \frac{1 + \sigma\upsilon\nu 2\alpha}{2} + \frac{1 + \sigma\upsilon\nu(2\alpha + 240^\circ)}{2} + \frac{1 + \sigma\upsilon\nu(2\alpha - 240^\circ)}{2} = \\ &= \frac{3}{2} + \frac{1}{2} \left[\sigma\upsilon\nu 2\alpha + \sigma\upsilon\nu(2\alpha + 240^\circ) + \sigma\upsilon\nu(2\alpha - 240^\circ) \right] = \\ &= \frac{3}{2} + \frac{1}{2} \left[\sigma\upsilon\nu 2\alpha + 2\sigma\upsilon\nu 2\alpha \sigma\upsilon\nu 240^\circ \right] = \frac{3}{2} + \frac{1}{2} \left[\sigma\upsilon\nu 2\alpha + 2\sigma\upsilon\nu 2\alpha (-\sigma\upsilon\nu 60^\circ) \right] \\ &= \frac{3}{2} + \frac{1}{2} \left[\sigma\upsilon\nu 2\alpha - 2 \cdot \frac{1}{2} \sigma\upsilon\nu 2\alpha \right] = \frac{3}{2} + \frac{1}{2} \cdot 0 = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

● 21. ΠΡΟΒΛΗΜΑ. Από τούς τριγωνομετρικούς αριθμούς τῆς γωνίας $\frac{\alpha}{2}$ νά ὑπολογισθοῦν οἱ τριγωνομετρικοί ἀριθμοί τῆς γωνίας α .

Λύση. Από τούς γνωστούς τύπους:

$$\begin{aligned} \eta\mu 2\alpha &\equiv 2\eta\mu\alpha \sigma\upsilon\nu\alpha, \\ \sigma\upsilon\nu 2\alpha &\equiv \sigma\upsilon\nu^2\alpha - \eta\mu^2\alpha \equiv 1 - 2\eta\mu^2\alpha \equiv 2\sigma\upsilon\nu^2\alpha - 1, \\ \epsilon\varphi 2\alpha &= \frac{2\epsilon\varphi\alpha}{1 - \epsilon\varphi^2\alpha} \quad \text{καί} \quad \sigma\varphi 2\alpha = \frac{1 - \epsilon\varphi^2\alpha}{2\epsilon\varphi\alpha}, \end{aligned}$$

ἂν ὅπου α βάλουμε τό $\frac{\alpha}{2}$, θά ἔχουμε τούς τύπους:

$\eta\mu\alpha \equiv 2\eta\mu \frac{\alpha}{2} \sigma\upsilon\nu \frac{\alpha}{2}$	$\epsilon\varphi\alpha = \frac{2\epsilon\varphi \frac{\alpha}{2}}{1 - \epsilon\varphi^2 \frac{\alpha}{2}}$	(33)
$\begin{aligned} \sigma\upsilon\nu\alpha &\equiv \sigma\upsilon\nu^2 \frac{\alpha}{2} - \eta\mu^2 \frac{\alpha}{2} \\ &\equiv 1 - 2\eta\mu^2 \frac{\alpha}{2} \\ &\equiv 2\sigma\upsilon\nu^2 \frac{\alpha}{2} - 1 \end{aligned}$		
		$\sigma\varphi\alpha = \frac{1 - \epsilon\varphi^2 \frac{\alpha}{2}}{2\epsilon\varphi \frac{\alpha}{2}}$

Πότε τά μέλη τῶν τύπων τῆς δεύτερης στήλης δέν ἔχουν ἕννοια;

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

1. Νά ἀποδειχθεῖ ἡ ἀλήθεια τῆς ἰσότητας:

$$A \equiv \frac{1 + \eta\mu\theta - \sigma\upsilon\nu\theta}{1 + \eta\mu\theta + \sigma\upsilon\nu\theta} = \epsilon\varphi \frac{\theta}{2}.$$

*Απόδειξη. *Ἐχουμε διαδοχικά:

$$\begin{aligned} A &\equiv \frac{1 + 2\eta\mu \frac{\theta}{2} \sigma\upsilon\nu \frac{\theta}{2} - \left(1 - 2\eta\mu^2 \frac{\theta}{2}\right)}{1 + 2\eta\mu \frac{\theta}{2} \sigma\upsilon\nu \frac{\theta}{2} + \left(2\sigma\upsilon\nu^2 \frac{\theta}{2} - 1\right)} = \frac{2\eta\mu \frac{\theta}{2} \sigma\upsilon\nu \frac{\theta}{2} + 2\eta\mu^2 \frac{\theta}{2}}{2\eta\mu \frac{\theta}{2} \sigma\upsilon\nu \frac{\theta}{2} + 2\sigma\upsilon\nu^2 \frac{\theta}{2}} = \\ &= \frac{\eta\mu \frac{\theta}{2} \left(\sigma\upsilon\nu \frac{\theta}{2} + \eta\mu \frac{\theta}{2}\right)}{\sigma\upsilon\nu \frac{\theta}{2} \left(\eta\mu \frac{\theta}{2} + \sigma\upsilon\nu \frac{\theta}{2}\right)} = \frac{\eta\mu \frac{\theta}{2}}{\sigma\upsilon\nu \frac{\theta}{2}} = \epsilon\varphi \frac{\theta}{2} \end{aligned}$$

ἂν ἰσχύουν: $\theta \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$ καί $\theta \neq 2k_1\pi + \frac{\pi}{2}$, γιατί; $k, k_1 \in \mathbb{Z}$.

2. Νά αποδειχθεί ή ἀλήθεια τῆς ἰσότητος:

$$\epsilon\varphi^2\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\theta}{2}\right) = \frac{1 + \eta\mu\theta}{1 - \eta\mu\theta}, \quad (1)$$

Ἀπόδειξη. Ἔχουμε διαδοχικά:

$$\begin{aligned} \epsilon\varphi^2\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\theta}{2}\right) &= \frac{\left(\epsilon\varphi\frac{\pi}{4} + \epsilon\varphi\frac{\theta}{2}\right)^2}{\left(1 - \epsilon\varphi\frac{\pi}{4} - \epsilon\varphi\frac{\theta}{2}\right)^2} = \frac{\left(1 + \epsilon\varphi\frac{\theta}{2}\right)^2}{\left(1 - \epsilon\varphi\frac{\theta}{2}\right)^2} = \frac{\left(1 + \frac{\eta\mu\frac{\theta}{2}}{\sigma\upsilon\nu\frac{\theta}{2}}\right)^2}{\left(1 - \frac{\eta\mu\frac{\theta}{2}}{\sigma\upsilon\nu\frac{\theta}{2}}\right)^2} = \\ &= \frac{\left(\sigma\upsilon\nu\frac{\theta}{2} + \eta\mu\frac{\theta}{2}\right)^2}{\left(\sigma\upsilon\nu\frac{\theta}{2} - \eta\mu\frac{\theta}{2}\right)^2} = \frac{\sigma\upsilon\nu^2\frac{\theta}{2} + \eta\mu^2\frac{\theta}{2} + 2\eta\mu\frac{\theta}{2}\sigma\upsilon\nu\frac{\theta}{2}}{\sigma\upsilon\nu^2\frac{\theta}{2} + \eta\mu^2\frac{\theta}{2} - 2\eta\mu\frac{\theta}{2}\sigma\upsilon\nu\frac{\theta}{2}} = \frac{1 + \eta\mu\theta}{1 - \eta\mu\theta} \end{aligned}$$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Πρώτη ομάδα

22. Νά αποδειχθοῦν οἱ ἀκόλουθες ἰσότητες:

1. $\frac{\sigma\varphi\frac{\theta}{2} + 1}{\sigma\varphi\frac{\theta}{2} - 1} = \frac{\sigma\upsilon\nu\theta}{1 - \eta\mu\theta}$, 2. $\tau\epsilon\mu\alpha - \epsilon\varphi\alpha = \epsilon\varphi\left(45^\circ - \frac{\alpha}{2}\right)$,
3. $\epsilon\varphi\alpha + \tau\epsilon\mu\alpha = \sigma\varphi\left(45^\circ - \frac{\alpha}{2}\right)$, 4. $\frac{1 + \sigma\upsilon\nu\alpha + \sigma\upsilon\nu\frac{\alpha}{2}}{\eta\mu\alpha + \eta\mu\frac{\alpha}{2}} = \sigma\varphi\frac{\alpha}{2}$.
5. $\frac{\eta\mu 2\alpha}{1 - \sigma\upsilon\nu 2\alpha} \cdot \frac{1 - \sigma\upsilon\nu\alpha}{\sigma\upsilon\nu\alpha} = \varkappa\varphi\frac{\alpha}{2}$, 6. $\frac{\eta\mu 2\alpha}{1 + \sigma\upsilon\nu 2\alpha} \cdot \frac{\sigma\upsilon\nu\alpha}{1 + \sigma\upsilon\nu\alpha} = \epsilon\varphi\frac{\alpha}{2}$.
7. $\sigma\varphi\frac{\alpha}{2} - \epsilon\varphi\frac{\alpha}{2} = 2\sigma\varphi\alpha$, 8. $\epsilon\varphi\left(45^\circ + \frac{\alpha}{2}\right) = \sqrt{\frac{1 + \eta\mu\alpha}{1 - \eta\mu\alpha}}$,

23. Νά αποδειχθοῦν οἱ παρακάτω ἰσότητες:

1. $(\sigma\upsilon\nu\alpha + \sigma\upsilon\nu\beta)^2 + (\eta\mu\alpha - \eta\mu\beta)^2 \equiv 4\sigma\upsilon\nu^2\frac{\alpha + \beta}{2}$,
2. $(\sigma\upsilon\nu\alpha + \sigma\upsilon\nu\beta)^2 + (\eta\mu\alpha + \eta\mu\beta)^2 \equiv 4\sigma\upsilon\nu^2\frac{\alpha - \beta}{2}$,
3. $(\sigma\upsilon\nu\alpha - \sigma\upsilon\nu\beta)^2 + (\eta\mu\alpha - \eta\mu\beta)^2 \equiv 4\eta\mu^2\frac{\alpha - \beta}{2}$.
4. $\eta\mu^2\left(\frac{\pi}{8} + \frac{\alpha}{2}\right) - \eta\mu^2\left(\frac{\pi}{8} - \frac{\alpha}{2}\right) \equiv \frac{\sqrt{2}}{2}\eta\mu\alpha$.

★ Δεύτερη ομάδα

24. Νά αποδειχθούν οι ακόλουθες ισότητες:

$$1. \quad \text{συν}^4 \frac{\pi}{8} + \text{συν}^4 \frac{3\pi}{8} = \frac{3}{4}, \quad 2. \quad \eta\mu^4 \frac{\pi}{8} + \eta\mu^4 \frac{3\pi}{8} = \frac{3}{4}.$$

$$3. \quad \text{συν}^4 \frac{\pi}{8} + \text{συν}^4 \frac{3\pi}{8} + \text{συν}^4 \frac{5\pi}{8} + \text{συν}^4 \frac{7\pi}{8} = \frac{3}{2}$$

$$4. \quad \left(1 + \text{συν} \frac{\pi}{8}\right) \left(1 + \text{συν} \frac{3\pi}{8}\right) \left(1 + \text{συν} \frac{5\pi}{8}\right) \left(1 + \text{συν} \frac{7\pi}{8}\right) = \frac{1}{8}.$$

$$5. \quad \text{Αν } \text{συν}x = \frac{\alpha}{\beta + \gamma}, \quad \text{συν}y = \frac{\beta}{\gamma + \alpha}, \quad \text{συν}z = \frac{\gamma}{\alpha + \beta}, \quad \text{τότε:}$$

$$\epsilon\varphi^2 \frac{x}{2} + \epsilon\varphi^2 \frac{y}{2} + \epsilon\varphi^2 \frac{z}{2} = 1.$$

25. Νά αποδειχθούν οι ακόλουθες ισότητες:

$$1. \quad \epsilon\varphi\left(\alpha - \beta + \frac{\pi}{3}\right) + \epsilon\varphi\left(\beta - \gamma + \frac{\pi}{3}\right) + \epsilon\varphi\left(\gamma - \alpha + \frac{\pi}{3}\right) = \\ = \epsilon\varphi\left(\alpha - \beta + \frac{\pi}{3}\right) \epsilon\varphi\left(\beta - \gamma + \frac{\pi}{3}\right) \epsilon\varphi\left(\gamma - \alpha + \frac{\pi}{3}\right).$$

$$2. \quad \Sigma\sigma\varphi(\gamma + \alpha - \beta) \sigma\varphi(\alpha + \beta - \gamma) = 1, \quad \text{άν } \alpha + \beta + \gamma = 0.$$

$$3. \quad \Sigma\sigma\varphi(2\alpha + \beta - 3\gamma) \sigma\varphi(2\beta + \gamma - 3\alpha) = 1.$$

$$4. \quad \Sigma\chi(1 - y^2)(1 - \omega^2) = 4xy\omega, \quad \text{άν } xy + y\omega + \omega x = 1.$$

$$5. \quad \eta\mu(\alpha + \beta + \gamma) < \eta\mu\alpha + \eta\mu\beta + \eta\mu\gamma, \quad \text{άν } 0 < \alpha, \beta, \gamma < \frac{\pi}{2}.$$

6. Νά αποδειχθεί ότι:

$$1 + \eta\mu^2\alpha + \eta\mu^2\beta > \eta\mu\alpha + \eta\mu\beta + \eta\mu\alpha\eta\mu\beta.$$

★ ● 22. ΠΡΟΒΛΗΜΑ 'Από τήν $\epsilon\varphi\alpha$ νά ύπολογισθεί ή $\epsilon\varphi \frac{\alpha}{2}$

Λύση. 'Από τή γνωστή ισότητα:

$$\epsilon\varphi\alpha = \frac{2\epsilon\varphi \frac{\alpha}{2}}{1 - \epsilon\varphi^2 \frac{\alpha}{2}} \quad \text{έχουμε τήν: } \epsilon\varphi\alpha \epsilon\varphi^2 \frac{\alpha}{2} + 2\epsilon\varphi \frac{\alpha}{2} - \epsilon\varphi\alpha = 0 \quad (\alpha)$$

άπό τήν όποία βρίσκουμε:

$$\boxed{\epsilon\varphi \frac{\alpha}{2} = \frac{-1 \pm \sqrt{1 + \epsilon\varphi^2\alpha}}{\epsilon\varphi\alpha}} \quad (34)$$

Διερεύνηση. 'Από τόν τύπο (34) φαίνεται ότι τό πρόβλημα έχει δύο λύσεις. Σέ μιά τιμή τής $\epsilon\varphi\alpha$, πού άντιστοιχεί στό διάνυσμα \vec{AT} , πού έχει μήκος \overline{AT} ,

ἀντιστοιχοῦν δύο τόξα \widehat{AM} καὶ $\widehat{A'M_1}$, συμμετρικά ὡς πρὸς τὸ κέντρο O τοῦ τριγωνομετρικοῦ κύκλου (σχ. 4), τῶν ὁποίων οἱ τιμές εἶναι:

$$\alpha = \theta + k\pi \quad (1) \quad k \in \mathbb{Z}$$

ὅπου $\widehat{AM} = \theta$ τὸ ἐλάχιστο θετικό τόξο. Ἄρα

$$\frac{\alpha}{2} = \frac{\theta}{2} + k \cdot \frac{\pi}{2} \quad (2)$$

Διακρίνουμε δύο περιπτώσεις.

A) Ἄν $k = 2\nu$, $\nu \in \mathbb{Z}$, ἡ (2) γράφεται:

$$\frac{\alpha}{2} = \frac{\theta}{2} + \nu\pi \quad (3)$$

καὶ τὰ ἀντίστοιχα τόξα ἔχουν τὸ τέλος τους στὰ σημεία N καὶ N_1 καὶ ἔχουν τὴν ἴδια ἐφαπτομένη, πού παριστάνεται ἀπὸ τὸ τμήμα AT_1 .

B) Ἄν $k = 2\nu + 1$, $\nu \in \mathbb{Z}$, ἡ (2) γράφεται:

$$\frac{\alpha}{2} = \frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{2} + \nu\pi \quad (4)$$

καὶ τὰ ἀντίστοιχα τόξα ἔχουν τὸ τέλος τους στὰ σημεία M_2 καὶ M_3 καὶ ἔχουν ἐφαπτομένη τὸ μήκος $\overline{AT_2}$.

Ἐπειδὴ τὸ τρίγωνο T_1OT_2 εἶναι ὀρθογώνιο στό O , θὰ ἔχουμε:

$$\overline{AT_1} \cdot \overline{AT_2} = -OA^2 = -OB^2 \quad \eta \quad \frac{\overline{AT_1}}{OB} \cdot \frac{\overline{AT_2}}{OB} = -1 \quad (5)$$

Τὸ γινόμενο τῶν ριζῶν x' , x'' τῆς ἐξίσωσως (α) εἶναι:

$$x'x'' = -\frac{\epsilon\phi\alpha}{\epsilon\phi\alpha} = -1$$


καὶ ἀπὸ ἐδῶ φαίνεται ὅτι ἀληθεύει ἡ (5).

Ἄν, ἀντὶ γιὰ τὴν $\epsilon\phi\alpha$, δοθεῖ τὸ τόξο α , τότε ἡ παράσταση $\sqrt{1 + \epsilon\phi^2\alpha}$ εἶναι μεγαλύτερη ἀπὸ τὴν μονάδα, ὅταν $\epsilon\phi\alpha \neq 0$. Ἄρα:

$$1. \text{ Ἄν } 0 < \alpha < \frac{\pi}{2}, \text{ τότε: } \begin{cases} \epsilon\phi\alpha > 0 \\ \epsilon\phi\frac{\alpha}{2} > 0 \end{cases} \Rightarrow \epsilon\phi\frac{\alpha}{2} = \frac{-1 + \sqrt{1 + \epsilon\phi^2\alpha}}{\epsilon\phi\alpha}$$

$$2. \text{ Ἄν } \frac{\pi}{2} < \alpha < \pi, \text{ τότε: } \begin{cases} \epsilon\phi\alpha < 0 \\ \epsilon\phi\frac{\alpha}{2} > 0 \end{cases} \Rightarrow \epsilon\phi\frac{\alpha}{2} = \frac{-1 - \sqrt{1 + \epsilon\phi^2\alpha}}{\epsilon\phi\alpha}$$

$$3. \text{ Ἄν } \pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}, \text{ τότε: } \begin{cases} \epsilon\phi\alpha > 0 \\ \epsilon\phi\frac{\alpha}{2} < 0 \end{cases} \Rightarrow \epsilon\phi\frac{\alpha}{2} = \frac{-1 - \sqrt{1 + \epsilon\phi^2\alpha}}{\epsilon\phi\alpha}$$



Σχ. 4

$$4. \text{ Αν } \frac{3\pi}{2} < \alpha < 2\pi, \text{ τότε: } \begin{cases} \varepsilon\varphi\alpha < 0 \\ \varepsilon\varphi \frac{\alpha}{2} < 0 \end{cases} \Rightarrow \varepsilon\varphi \frac{\alpha}{2} = \frac{-1 + \sqrt{1 + \varepsilon\varphi^2\alpha}}{\varepsilon\varphi\alpha}$$

★ **Παράδειγμα.** Από την $\varepsilon\varphi 4800^\circ = -\sqrt{3}$, νά υπολογισθεί ή $\varepsilon\varphi 2400^\circ$.

Λύση. Για νά βρούμε τό τέλος του τόξου 2400° , γράφουμε:

$$2400^\circ = 360^\circ \cdot 6 + 240^\circ.$$

Άρα τό τόξο 2400° έχει τό τέλος του στό τρίτο τεταρτημόριο.

Ή $\varepsilon\varphi$ απτομένη του είναι θετική. Δηλαδή:

$$\varepsilon\varphi 2400^\circ = \frac{-1 - \sqrt{1 + 3}}{-\sqrt{3}} = \frac{-1 - 2}{-\sqrt{3}} = \frac{3}{\sqrt{3}} = \sqrt{3}.$$

Μπορούμε, όμως, νά $\varepsilon\varphi$ ραστούμε καί ώς $\varepsilon\varphi$ ξης:

$$\varepsilon\varphi 2400^\circ = \varepsilon\varphi (360^\circ \cdot 6 + 240^\circ) = \varepsilon\varphi 240^\circ = \varepsilon\varphi (180^\circ + 60^\circ) = \varepsilon\varphi 60^\circ = \sqrt{3}$$

καί $\varepsilon\varphi$ πομένως:

$$\sigma\upsilon\nu 2400^\circ = \frac{1}{-\sqrt{1 + \varepsilon\varphi^2 2400^\circ}} = \frac{1}{-\sqrt{1 + 3}} = -\frac{1}{2},$$

$$\eta\mu 2400^\circ = \frac{\varepsilon\varphi 2400^\circ}{-\sqrt{1 + \varepsilon\varphi^2 2400^\circ}} = \frac{\sqrt{3}}{-\sqrt{1 + 3}} = -\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

● 23. Μετασχηματισμός άθροίσματος ή διαφοράς δύο δμώνυμων τριγωνομετρικών συναρτήσεων σε γινόμενο ή πηλίκο.

α) Από τις γνωστές ταυτότητες:

$$\begin{aligned} \eta\mu(\alpha + \beta) &\equiv \eta\mu\alpha \sigma\upsilon\nu\beta + \eta\mu\beta \sigma\upsilon\nu\alpha, & \sigma\upsilon\nu(\alpha + \beta) &\equiv \sigma\upsilon\nu\alpha \sigma\upsilon\nu\beta - \eta\mu\alpha \eta\mu\beta, \\ \eta\mu(\alpha - \beta) &\equiv \eta\mu\alpha \sigma\upsilon\nu\beta - \eta\mu\beta \sigma\upsilon\nu\alpha, & \sigma\upsilon\nu(\alpha - \beta) &\equiv \sigma\upsilon\nu\alpha \sigma\upsilon\nu\beta + \eta\mu\alpha \eta\mu\beta, \end{aligned}$$

προσθέτοντας και αφαιρώντας κατά μέλη, βρίσκουμε:

$$\eta\mu(\alpha + \beta) + \eta\mu(\alpha - \beta) \equiv 2\eta\mu\alpha \sigma\upsilon\nu\beta, \quad (1)$$

$$\eta\mu(\alpha + \beta) - \eta\mu(\alpha - \beta) \equiv 2\eta\mu\beta \sigma\upsilon\nu\alpha, \quad (2)$$

$$\sigma\upsilon\nu(\alpha + \beta) + \sigma\upsilon\nu(\alpha - \beta) \equiv 2\sigma\upsilon\nu\alpha \sigma\upsilon\nu\beta, \quad (3)$$

$$\sigma\upsilon\nu(\alpha + \beta) - \sigma\upsilon\nu(\alpha - \beta) \equiv 2\eta\mu\alpha \eta\mu\beta = 2\eta\mu\alpha \eta\mu(-\beta) \quad (4)$$

και άν βάλουμε:

$$\left. \begin{aligned} \alpha + \beta &= A \\ \alpha - \beta &= B \end{aligned} \right\} \Leftrightarrow \left. \begin{aligned} 2\alpha &= A + B \\ 2\beta &= A - B \end{aligned} \right\} \Leftrightarrow \begin{aligned} \alpha &= \frac{A + B}{2} \\ \beta &= \frac{A - B}{2} \end{aligned} \quad \text{και} \quad -\beta = \frac{B - A}{2}$$

οι (1), (2), (3), (4) γίνονται:

$\eta\mu A + \eta\mu B \equiv 2\eta\mu \frac{A + B}{2} \sigma\upsilon\nu \frac{A - B}{2}$	(35)
---	------

$\eta\mu A - \eta\mu B \equiv 2\eta\mu \frac{A - B}{2} \sigma\upsilon\nu \frac{A + B}{2}$	(36)
---	------

$\sigma\upsilon\nu A + \sigma\upsilon\nu B \equiv 2\sigma\upsilon\nu \frac{A + B}{2} \sigma\upsilon\nu \frac{A - B}{2}$	(37)
---	------

$\sigma\upsilon\nu A - \sigma\upsilon\nu B \equiv 2\eta\mu \frac{A + B}{2} \eta\mu \frac{B - A}{2}$	(38)
---	------

β) Έχουμε διαδοχικά:

$$\epsilon\phi A + \epsilon\phi B = \frac{\eta\mu A}{\sigma\upsilon\nu A} + \frac{\eta\mu B}{\sigma\upsilon\nu B} = \frac{\eta\mu A \sigma\upsilon\nu B + \eta\mu B \sigma\upsilon\nu A}{\sigma\upsilon\nu A \sigma\upsilon\nu B} = \frac{\eta\mu(A + B)}{\sigma\upsilon\nu A \sigma\upsilon\nu B},$$

άφοῦ θά είναι $A \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$ και $B \neq \frac{\pi}{2} + k_1\pi$ μέ $k, k_1 \in \mathbb{Z}$.

$$\varepsilon\varphi A - \varepsilon\varphi B = \frac{\eta\mu A}{\sigma\upsilon\nu A} - \frac{\eta\mu B}{\sigma\upsilon\nu B} = \frac{\eta\mu A \sigma\upsilon\nu B - \eta\mu B \sigma\upsilon\nu A}{\sigma\upsilon\nu A \sigma\upsilon\nu B} = \frac{\eta\mu(A - B)}{\sigma\upsilon\nu A \sigma\upsilon\nu B}$$

$$\sigma\varphi A + \sigma\varphi B = \frac{\sigma\upsilon\nu A}{\eta\mu A} + \frac{\sigma\upsilon\nu B}{\eta\mu B} = \frac{\eta\mu B \sigma\upsilon\nu A + \eta\mu A \sigma\upsilon\nu B}{\eta\mu A \eta\mu B} = \frac{\eta\mu(A + B)}{\eta\mu A \eta\mu B}$$

άφοϋ θά είναι $A \neq (k_2 + 1)\pi$ καί $B \neq (k_3 + 1)\pi$, μέ $k_2, k_3 \in \mathbb{Z}$,

$$\text{καί } \sigma\varphi A - \sigma\varphi B = \frac{\sigma\upsilon\nu A}{\eta\mu A} - \frac{\sigma\upsilon\nu B}{\eta\mu B} = \frac{\eta\mu B \sigma\upsilon\nu A - \eta\mu A \sigma\upsilon\nu B}{\eta\mu A \eta\mu B} = \frac{\eta\mu(B - A)}{\eta\mu A \eta\mu B}$$

Ἐνακεφαλαιώνοντας ἔχουμε:

(39)	$\varepsilon\varphi A + \varepsilon\varphi B = \frac{\eta\mu(A + B)}{\sigma\upsilon\nu A \sigma\upsilon\nu B}$		$\sigma\varphi A + \sigma\varphi B = \frac{\eta\mu(A + B)}{\eta\mu A \eta\mu B}$	(41)
(40)	$\varepsilon\varphi A - \varepsilon\varphi B = \frac{\eta\mu(A - B)}{\sigma\upsilon\nu A \sigma\upsilon\nu B}$		$\sigma\varphi A - \sigma\varphi B = \frac{\eta\mu(B - A)}{\eta\mu A \eta\mu B}$	(42)

● 24. Εἰδικές περιπτώσεις. Ἔχουμε διαδοχικά:

α) $\eta\mu A + \sigma\upsilon\nu A \equiv \eta\mu A + \eta\mu(90^\circ - A) \equiv 2\eta\mu 45^\circ \sigma\upsilon\nu(A - 45^\circ)$ (1)

καί ἐπειδή $2\eta\mu 45^\circ = 2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2}$ καί:

$$\sigma\upsilon\nu(A - 45^\circ) \equiv \sigma\upsilon\nu(45^\circ - A) \equiv \eta\mu(45^\circ + A), \text{ ἢ (1) γίνεται:}$$

$$\boxed{\eta\mu A + \sigma\upsilon\nu A \equiv \sqrt{2} \sigma\upsilon\nu(45^\circ - A) \equiv \sqrt{2} \eta\mu(45^\circ + A)} \quad (43)$$

β) $\eta\mu A - \sigma\upsilon\nu A \equiv \eta\mu A - \eta\mu(90^\circ - A) \equiv 2\eta\mu(A - 45^\circ)\sigma\upsilon\nu 45^\circ \equiv$
 $\equiv \sqrt{2} \eta\mu(A - 45^\circ) \equiv -\sqrt{2} \eta\mu(45^\circ - A) \equiv -\sqrt{2} \sigma\upsilon\nu(45^\circ + A).$

Ἔστω θά είναι:

$$\boxed{\eta\mu A - \sigma\upsilon\nu A \equiv -\sqrt{2} \eta\mu(45^\circ - A) \equiv -\sqrt{2} \sigma\upsilon\nu(45^\circ + A)} \quad (44)$$

γ) $1 + \eta\mu A \equiv \eta\mu 90^\circ + \eta\mu A \equiv 2\eta\mu\left(45^\circ + \frac{A}{2}\right)\sigma\upsilon\nu\left(45^\circ - \frac{A}{2}\right)$

καί ἐπειδή είναι:

$$\eta\mu\left(45^\circ + \frac{A}{2}\right) \equiv \sigma\upsilon\nu\left(45^\circ - \frac{A}{2}\right), \text{ θά ἔχουμε:}$$

$$\boxed{1 + \eta\mu A \equiv 2\eta\mu^2\left(45^\circ + \frac{A}{2}\right) \equiv 2\sigma\upsilon\nu^2\left(45^\circ - \frac{A}{2}\right)} \quad (45)$$

δ) Επίσης θά είναι και:

$$1 - \eta\mu A \equiv \eta\mu 90^\circ - \eta\mu A \equiv 2\eta\mu \left(45^\circ - \frac{A}{2}\right) \operatorname{συν} \left(45^\circ + \frac{A}{2}\right) \equiv \\ \equiv 2\eta\mu^2 \left(45^\circ - \frac{A}{2}\right) \equiv 2\sigma\upsilon\nu^2 \left(45^\circ + \frac{A}{2}\right)$$

δηλαδή:

$$1 - \eta\mu A \equiv 2\eta\mu^2 \left(45^\circ - \frac{A}{2}\right) \equiv 2\sigma\upsilon\nu^2 \left(45^\circ + \frac{A}{2}\right) \quad (46)$$

ε) Επίσης είναι:

$$1 + \sigma\upsilon\nu A \equiv \sigma\upsilon\nu 0^\circ + \sigma\upsilon\nu A \equiv 2\sigma\upsilon\nu \frac{0^\circ + A}{2} \operatorname{συν} \frac{0^\circ - A}{2} \equiv 2\sigma\upsilon\nu^2 \frac{A}{2},$$

$$1 - \sigma\upsilon\nu A \equiv \sigma\upsilon\nu 0^\circ - \sigma\upsilon\nu A \equiv 2\eta\mu \frac{0^\circ + A}{2} \eta\mu \frac{A - 0^\circ}{2} \equiv 2\eta\mu^2 \frac{A}{2}$$

Άρα:

$$\boxed{1 + \sigma\upsilon\nu A \equiv 2\sigma\upsilon\nu^2 \frac{A}{2}} \quad \boxed{1 - \sigma\upsilon\nu A \equiv 2\eta\mu^2 \frac{A}{2}} \quad (47)$$

στ) *Αν $A \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$, μέ $k \in \mathbb{Z}$, θά έχουμε:

$$1 + \epsilon\varphi A = \epsilon\varphi 45^\circ + \epsilon\varphi A = \frac{\eta\mu(45^\circ + A)}{\sigma\upsilon\nu 45^\circ \sigma\upsilon\nu A} = \\ = \frac{\sqrt{2} \eta\mu(45^\circ + A)}{\sigma\upsilon\nu A} = \frac{\sqrt{2} \sigma\upsilon\nu(45^\circ - A)}{\sigma\upsilon\nu A},$$

καί

$$1 - \epsilon\varphi A = \epsilon\varphi 45^\circ - \epsilon\varphi A = \frac{\eta\mu(45^\circ - A)}{\sigma\upsilon\nu 45^\circ \sigma\upsilon\nu A} = \\ = \frac{\sqrt{2} \eta\mu(45^\circ - A)}{\sigma\upsilon\nu A} = \frac{\sqrt{2} \sigma\upsilon\nu(45^\circ + A)}{\sigma\upsilon\nu A}$$

*Ανακεφαλαιώνοντας έχουμε:

$$\boxed{1 + \epsilon\varphi A = \frac{\sqrt{2}\eta\mu(45^\circ + A)}{\sigma\upsilon\nu A} = \frac{\sqrt{2}\sigma\upsilon\nu(45^\circ - A)}{\sigma\upsilon\nu A}} \quad (48)$$

$$\boxed{1 - \epsilon\varphi A = \frac{\sqrt{2}\eta\mu(45^\circ - A)}{\sigma\upsilon\nu A} = \frac{\sqrt{2}\sigma\upsilon\nu(45^\circ + A)}{\sigma\upsilon\nu A}} \quad (49)$$

ζ) *Αν $A \neq (k + 1)\pi$, μέ $k \in \mathbb{Z}$ και μέ όμοια έργασία βρίσκουμε:

$$\boxed{1 + \sigma\varphi A = \frac{\sqrt{2}\eta\mu(45^\circ + A)}{\eta\mu A} = \frac{\sqrt{2}\sigma\upsilon\nu(45^\circ - A)}{\eta\mu A}} \quad (50)$$

$$\boxed{1 - \sigma\varphi A = -\frac{\sqrt{2}\eta\mu(45^\circ - A)}{\eta\mu A} = -\frac{\sqrt{2}\sigma\upsilon\nu(45^\circ + A)}{\eta\mu A}} \quad (51)$$

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

α) Νά άπλοποιηθεϊ ή παράσταση:

$$A \equiv \frac{(\sigma\upsilon\alpha - \sigma\upsilon\upsilon 3\alpha)(\eta\mu 8\alpha + \eta\mu 2\alpha)}{(\eta\mu 5\alpha - \eta\mu\alpha)(\sigma\upsilon\upsilon 4\alpha - \sigma\upsilon\upsilon 6\alpha)}$$

Λύση. Έχουμε διαδοχικά:

$$\begin{aligned} A &\equiv \frac{2\eta\mu \frac{\alpha + 3\alpha}{2} \cdot \eta\mu \frac{3\alpha - \alpha}{2} \cdot 2\eta\mu \frac{8\alpha + 2\alpha}{2} \cdot \sigma\upsilon\upsilon \frac{8\alpha - 2\alpha}{2}}{2\eta\mu \frac{5\alpha - \alpha}{2} \cdot \sigma\upsilon\upsilon \frac{5\alpha + \alpha}{2} \cdot 2\eta\mu \frac{4\alpha + 6\alpha}{2} \cdot \eta\mu \frac{6\alpha - 4\alpha}{2}} = \\ &= \frac{2\eta\mu 2\alpha \cdot \eta\mu\alpha \cdot 2\eta\mu 5\alpha \cdot \sigma\upsilon\upsilon 3\alpha}{2\eta\mu 2\alpha \cdot \sigma\upsilon\upsilon 3\alpha \cdot 2\eta\mu 5\alpha \cdot \eta\mu\alpha} = 1, \text{ \u03b1\u03bd \u03b9\sigma\u03c7\u03c5\u03bf\u03bd:} \end{aligned}$$

$$\alpha \neq k\pi, \alpha \neq k_1 \cdot \frac{\pi}{5}, \alpha \neq k_2 \cdot \frac{\pi}{2}, \alpha \neq (2k_3 + 1) \cdot \frac{\pi}{2}, k, k_1, k_2, k_3 \in \mathbb{Z}.$$

\u03b2) Νά άπλοποιηθεϊ τό κλάσμα:

$$B \equiv \frac{\eta\mu\alpha - \eta\mu 5\alpha + \eta\mu 9\alpha - \eta\mu 13\alpha}{\sigma\upsilon\alpha - \sigma\upsilon\upsilon 5\alpha - \sigma\upsilon\upsilon 9\alpha + \sigma\upsilon\upsilon 13\alpha}$$

Λύση. Έχουμε διαδοχικά:

$$\begin{aligned} B &\equiv \frac{(\eta\mu 9\alpha + \eta\mu\alpha) - (\eta\mu 13\alpha + \eta\mu 5\alpha)}{(\sigma\upsilon\alpha - \sigma\upsilon\upsilon 5\alpha) - (\sigma\upsilon\upsilon 9\alpha - \sigma\upsilon\upsilon 13\alpha)} = \frac{2\eta\mu 5\alpha \sigma\upsilon\upsilon 4\alpha - 2\eta\mu 9\alpha \sigma\upsilon\upsilon 4\alpha}{2\eta\mu 3\alpha \eta\mu 2\alpha - 2\eta\mu 11\alpha \eta\mu 2\alpha} = \\ &= \frac{\sigma\upsilon\upsilon 4\alpha(\eta\mu 5\alpha - \eta\mu 9\alpha)}{\eta\mu 2\alpha(\eta\mu 3\alpha - \eta\mu 11\alpha)} = \frac{\sigma\upsilon\upsilon 4\alpha \cdot 2\eta\mu 2\alpha \sigma\upsilon\upsilon 7\alpha}{\eta\mu 2\alpha \cdot 2\eta\mu 4\alpha \cdot \sigma\upsilon\upsilon 7\alpha} = \sigma\phi 4\alpha, \end{aligned}$$

\u03b1\u03bd \u03b9\u03c0\u03ac\u03c1\u03c7\u03bf\u03bd \u03bf\u03b9 \u03c3\u03c7\u03b5\u03c3\u03b5\u03b9\u03c2:

$$\eta\mu 2\alpha \neq 0 \Leftrightarrow 2\alpha \neq k\pi \Leftrightarrow \alpha \neq k \cdot \frac{\pi}{2}, \text{ \u03bc\u03b5 } k \in \mathbb{Z},$$

$$\eta\mu 4\alpha \neq 0 \Leftrightarrow 4\alpha \neq k_1\pi \Leftrightarrow \alpha \neq k_1 \cdot \frac{\pi}{4}, \text{ \u03bc\u03b5 } k_1 \in \mathbb{Z},$$

$$\sigma\upsilon\upsilon 7\alpha \neq 0 \Leftrightarrow 7\alpha \neq k_2\pi + \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow \alpha \neq k_2 \cdot \frac{\pi}{7} + \frac{\pi}{14}, \text{ \u03bc\u03b5 } k_2 \in \mathbb{Z}.$$

\u03b3) Νά γίνει γιν\u03cc\u03bc\u03b5\u03bd\u03bf \u03b7 \u03c0\u03ac\u03c1\u03ac\u03c3\u03c4\u03b1\u03c3\u03b7:

$$A \equiv \eta\mu x + \eta\mu y + \eta\mu \omega - \eta\mu(x + y + \omega).$$

Λύση. Έχουμε διαδοχικά:

$$A \equiv 2\eta\mu \frac{x + y}{2} \cdot \sigma\upsilon\upsilon \frac{x - y}{2} + 2\eta\mu \frac{\omega - x - y - \omega}{2} \cdot \sigma\upsilon\upsilon \frac{\omega + x + y + \omega}{2} =$$

$$\begin{aligned}
&\equiv 2\eta\mu \frac{x+y}{2} \sigma\upsilon\nu \frac{x-y}{2} - 2\eta\mu \frac{x+y}{2} \sigma\upsilon\nu \frac{2\omega+x+y}{2} \\
&\equiv 2\eta\mu \frac{x+y}{2} \left[\sigma\upsilon\nu \frac{x-y}{2} - \sigma\upsilon\nu \frac{2\omega+x+y}{2} \right] \\
&\equiv 2\eta\mu \frac{x+y}{2} \cdot 2\eta\mu \frac{x-y+2\omega+x+y}{4} \eta\mu \frac{2\omega+x+y-x+y}{4} \\
&\equiv 4\eta\mu \frac{x+y}{2} \cdot \eta\mu \frac{x+\omega}{2} \cdot \eta\mu \frac{\omega+y}{2}. \quad \text{*Άρα:}
\end{aligned}$$

$$\boxed{\eta\mu x + \eta\mu y + \eta\mu \omega - \eta\mu(x+y+\omega) \equiv 4\eta\mu \frac{x+y}{2} \eta\mu \frac{y+\omega}{2} \eta\mu \frac{\omega+x}{2}} \quad (52)$$

Σημείωση. *Αν οι γωνίες x, y, ω είναι, αντίστοιχως, οι γωνίες A, B, Γ ενός τριγώνου $AB\Gamma$, τότε θα έχουμε από τον τύπο (52):

$$\begin{aligned}
\eta\mu A + \eta\mu B + \eta\mu \Gamma - \eta\mu(A+B+\Gamma) &\equiv \eta\mu A + \eta\mu B + \eta\mu \Gamma - \eta\mu 180^\circ \equiv \\
&\equiv \eta\mu A + \eta\mu B + \eta\mu \Gamma \equiv 4\eta\mu \frac{A+B}{2} \eta\mu \frac{B+\Gamma}{2} \eta\mu \frac{\Gamma+A}{2} \equiv \\
&\equiv 4\sigma\upsilon\nu \frac{\Gamma}{2} \sigma\upsilon\nu \frac{A}{2} \sigma\upsilon\nu \frac{B}{2},
\end{aligned}$$

γιατί $\frac{A+B}{2} + \frac{\Gamma}{2} = 90^\circ$, άρα $\eta\mu \frac{A+B}{2} = \sigma\upsilon\nu \frac{\Gamma}{2}, \dots$ *Άρα:

Σέ κάθε τρίγωνο $AB\Gamma$ ισχύει:

$$\boxed{\eta\mu A + \eta\mu B + \eta\mu \Gamma \equiv 4\sigma\upsilon\nu \frac{A}{2} \sigma\upsilon\nu \frac{B}{2} \sigma\upsilon\nu \frac{\Gamma}{2}} \quad (52a)$$

δ) Νά γίνει γινόμενο ή παράσταση:

$$B \equiv \sigma\upsilon\nu x + \sigma\upsilon\nu y + \sigma\upsilon\nu \omega + \sigma\upsilon\nu(x+y+\omega).$$

Λύση. *Έχουμε διαδοχικά:

$$\begin{aligned}
B &\equiv 2\sigma\upsilon\nu \frac{x+y}{2} \sigma\upsilon\nu \frac{x-y}{2} + 2\sigma\upsilon\nu \frac{\omega+x+y+\omega}{2} \sigma\upsilon\nu \frac{\omega-x-y-\omega}{2} \\
&\equiv 2\sigma\upsilon\nu \frac{x+y}{2} \sigma\upsilon\nu \frac{x-y}{2} + 2\sigma\upsilon\nu \frac{x+y}{2} \sigma\upsilon\nu \frac{x+y+2\omega}{2}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\equiv 2\sigma\upsilon\nu\frac{x+y}{2}\left[\sigma\upsilon\nu\frac{x-y}{2} + \sigma\upsilon\nu\frac{x+y+2\omega}{2}\right] \\ &\equiv 2\sigma\upsilon\nu\frac{x+y}{2} \cdot 2\sigma\upsilon\nu\frac{x-y+x+y+2\omega}{4}\sigma\upsilon\nu\frac{x-y-x-y-2\omega}{4} \\ &\equiv 4\sigma\upsilon\nu\frac{x+y}{2}\sigma\upsilon\nu\frac{y+\omega}{2}\sigma\upsilon\nu\frac{\omega+x}{2}. \end{aligned}$$

*Άρα :

$$\sigma\upsilon\nu x + \sigma\upsilon\nu y + \sigma\upsilon\nu \omega + \sigma\upsilon\nu(x+y+\omega) \equiv 4\sigma\upsilon\nu\frac{x+y}{2}\sigma\upsilon\nu\frac{y+\omega}{2}\sigma\upsilon\nu\frac{\omega+x}{2} \quad (53)$$

Σημείωση. *Αν οι γωνίες x, y, ω είναι, αντίστοιχως, οι γωνίες A, B, Γ ενός τριγώνου $AB\Gamma$, τότε:

$$\sigma\upsilon\nu(x+y+\omega) = \sigma\upsilon\nu(A+B+\Gamma) = \sigma\upsilon\nu 180^\circ = -1$$

καί $\sigma\upsilon\nu\frac{x+y}{2} = \sigma\upsilon\nu\frac{A+B}{2} = \eta\mu\frac{\Gamma}{2}, \dots$ καί ο τύπος (53) γίνεται για κάθε τρίγωνο $AB\Gamma$:

$$\sigma\upsilon\nu A + \sigma\upsilon\nu B + \sigma\upsilon\nu \Gamma = 1 + 4\eta\mu\frac{A}{2}\eta\mu\frac{B}{2}\eta\mu\frac{\Gamma}{2} \quad (53a)$$

✦ ε) *Νά γίνει γινόμενο παραγόντων ή παράσταση:*

$$\Gamma \equiv \sigma\upsilon\nu^2\alpha + \sigma\upsilon\nu^2\beta + \sigma\upsilon\nu^2\gamma + \sigma\upsilon\nu^2(\alpha + \beta + \gamma) - 2.$$

Λύση. *Έχουμε διαδοχικά:

$$\begin{aligned} \sigma\upsilon\nu^2\alpha + \sigma\upsilon\nu^2\beta &\equiv \frac{1 + \sigma\upsilon\nu 2\alpha}{2} + \frac{1 + \sigma\upsilon\nu 2\beta}{2} \equiv 1 + \frac{1}{2}[\sigma\upsilon\nu 2\alpha + \sigma\upsilon\nu 2\beta] \equiv \\ &\equiv 1 + \frac{1}{2} \cdot 2\sigma\upsilon\nu(\alpha + \beta)\sigma\upsilon\nu(\alpha - \beta) \equiv 1 + \sigma\upsilon\nu(\alpha + \beta)\sigma\upsilon\nu(\alpha - \beta). \end{aligned}$$

*Επίσης είναι:

$$\begin{aligned} \sigma\upsilon\nu^2\gamma + \sigma\upsilon\nu^2(\alpha + \beta + \gamma) &\equiv \frac{1 + \sigma\upsilon\nu 2\gamma}{2} + \frac{1 + \sigma\upsilon\nu 2(\alpha + \beta + \gamma)}{2} \equiv \\ &\equiv 1 + \frac{1}{2}[\sigma\upsilon\nu 2\gamma + \sigma\upsilon\nu 2(\alpha + \beta + \gamma)] \equiv 1 + \sigma\upsilon\nu(\alpha + \beta)\sigma\upsilon\nu(\alpha + \beta + 2\gamma). \end{aligned}$$

*Άρα θά είναι:

$$\begin{aligned} \Gamma &\equiv \sigma\upsilon\nu(\alpha + \beta)\sigma\upsilon\nu(\alpha - \beta) + \sigma\upsilon\nu(\alpha + \beta)\sigma\upsilon\nu(\alpha + \beta + 2\gamma) \equiv \\ &\equiv \sigma\upsilon\nu(\alpha + \beta)[\sigma\upsilon\nu(\alpha - \beta) + \sigma\upsilon\nu(\alpha + \beta + 2\gamma)] \equiv \\ &\equiv \sigma\upsilon\nu(\alpha + \beta) \cdot 2\sigma\upsilon\nu(\alpha + \gamma)\sigma\upsilon\nu(\beta + \gamma) \equiv \\ &\equiv 2\sigma\upsilon\nu(\alpha + \beta)\sigma\upsilon\nu(\beta + \gamma)\sigma\upsilon\nu(\gamma + \alpha). \end{aligned}$$

Ωστε:

$$\text{συν}^2\alpha + \text{συν}^2\beta + \text{συν}^2\gamma + \text{συν}^2(\alpha + \beta + \gamma) - 2 \equiv 2\text{συν}(\alpha + \beta)\text{συν}(\beta + \gamma)\text{συν}(\gamma + \alpha) \quad (54)$$

Σημείωση. Αν οι γωνίες α, β, γ , αντίστοιχως, είναι οι γωνίες ενός τριγώνου $AB\Gamma$, τότε ο τύπος (54) γίνεται:

$$\text{συν}^2A + \text{συν}^2B + \text{συν}^2\Gamma = 1 - 2\text{συν}A \text{συν}B \text{συν}\Gamma \quad (54a)$$

Ο τύπος (54a) γράφεται συντομότερα και ως εξής:

$$\Sigma \text{συν}^2A = 1 - 2\Pi \text{συν}A$$

μέ

$$A + B + \Gamma = 180^\circ$$

A Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ

Πρώτη ομάδα

26. Νά γίνουν γινόμενα οι παραστάσεις:

1. $\eta\mu 4\alpha + \eta\mu\alpha,$

2. $\eta\mu 7\alpha - \eta\mu 5\alpha,$

3. $\text{συν}5\alpha - \text{συν}\alpha,$

4. $\text{συν}3\alpha - \text{συν}5\alpha.$

27. Νά αποδειχθεί ή αλήθεια τών Ισοτήτων:

1. $\frac{\text{συν}3\alpha - \text{συν}5\alpha}{\eta\mu 5\alpha - \eta\mu 3\alpha} = \epsilon\phi 4\alpha,$

3. $\frac{\eta\mu 2\alpha + \eta\mu 3\alpha}{\text{συν}2\alpha - \text{συν}3\alpha} = \epsilon\phi \frac{\alpha}{2},$

2. $\frac{\text{συν}2\alpha - \text{συν}4\alpha}{\eta\mu 4\alpha - \eta\mu 2\alpha} = \epsilon\phi 3\alpha,$

4. $\frac{\text{συν}4\alpha - \text{συν}\alpha}{\eta\mu\alpha - \eta\mu 4\alpha} = \epsilon\phi \frac{5\alpha}{2}.$

28. Νά γίνουν γινόμενα παραγόντων οι παραστάσεις:

1. $\eta\mu\alpha - \eta\mu 2\alpha + \eta\mu 3\alpha,$

4. $\text{συν}3\alpha + \text{συν}5\alpha + \text{συν}7\alpha + \text{συν}15\alpha,$

2. $\eta\mu 3\alpha + \eta\mu 7\alpha + \eta\mu 10\alpha,$

5. $\eta\mu 7\alpha - \eta\mu 5\alpha - \eta\mu 3\alpha + \eta\mu\alpha,$

3. $\text{συν}7\alpha - \text{συν}5\alpha + \text{συν}3\alpha - \text{συν}\alpha,$

6. $\text{συν}\alpha + 2\text{συν}2\alpha + \text{συν}3\alpha.$

29. Νά αποδειχθεί ή αλήθεια τών Ισοτήτων:

1. $\frac{\eta\mu 2\alpha + \eta\mu 5\alpha - \eta\mu\alpha}{\text{συν}2\alpha + \text{συν}5\alpha + \text{συν}\alpha} = \epsilon\phi 2\alpha,$

2. $\frac{\eta\mu\alpha + \eta\mu 3\alpha + \eta\mu 5\alpha + \eta\mu 7\alpha}{\text{συν}\alpha + \text{συν}3\alpha + \text{συν}5\alpha + \text{συν}7\alpha} = \epsilon\phi 4\alpha.$

3. $\frac{\text{συν}7\alpha + \text{συν}3\alpha - \text{συν}5\alpha - \text{συν}\alpha}{\eta\mu 7\alpha - \eta\mu 3\alpha - \eta\mu 5\alpha + \eta\mu\alpha} = \sigma\phi 2\alpha.$

4. $\frac{\eta\mu A - \eta\mu B}{\text{συν}A + \text{συν}B} = \epsilon\phi \frac{A - B}{2}.$

Πότε δέν έχουν έννοια τά μέλη τών παραπάνω Ισοτήτων;

★ Δεύτερη ομάδα

30. Νά γίνουν γινόμενα οι παραστάσεις:

1. $\eta\mu(\alpha + \beta + \gamma) + \eta\mu(\alpha - \beta - \gamma) + \eta\mu(\alpha + \beta - \gamma) + \eta\mu(\alpha - \beta + \gamma),$

2. $\text{συν}(\beta + \gamma - \alpha) - \text{συν}(\gamma + \alpha - \beta) + \text{συν}(\alpha + \beta - \gamma) - \text{συν}(\alpha + \beta + \gamma).$

3. $\eta\mu 2\alpha + \eta\mu 2\beta + \eta\mu 2\gamma - \eta\mu 2(\alpha + \beta + \gamma),$

4. $\eta\mu\alpha + \eta\mu\beta - \eta\mu(\alpha + \beta) = 4\eta\mu \frac{\alpha}{2} \eta\mu \frac{\beta}{2} \eta\mu \frac{\alpha + \beta}{2},$

5. $\text{συν}^2\theta + \text{συν}^22\theta + \text{συν}^23\theta + \text{συν}^24\theta - 2.$

● 25. Μετασχηματισμός γινομένων σε άθροισματα ή διαφορές.

Ύπό τις γνωστές ταυτότητες:

καί $\eta\mu A \sigma\upsilon\nu B + \eta\mu B \sigma\upsilon\nu A \equiv \eta\mu(A + B),$
 $\eta\mu A \sigma\upsilon\nu B - \eta\mu B \sigma\upsilon\nu A \equiv \eta\mu(A - B),$
 μέ πρόσθεση καί ἀφαίρεση κατά μέλη βρίσκουμε, ἀντιστοίχως:

$$\boxed{2\eta\mu A \sigma\upsilon\nu B \equiv \eta\mu(A + B) + \eta\mu(A - B)} \quad (54)$$

καί $\boxed{2\eta\mu B \sigma\upsilon\nu A \equiv \eta\mu(A + B) - \eta\mu(A - B)} \quad (55)$

Ύπίσης ἀπό τις γνωστές ταυτότητες:

καί $\sigma\upsilon\nu A \sigma\upsilon\nu B - \eta\mu A \eta\mu B \equiv \sigma\upsilon\nu(A + B),$
 $\sigma\upsilon\nu A \sigma\upsilon\nu B + \eta\mu A \eta\mu B \equiv \sigma\upsilon\nu(A - B),$
 μέ πρόσθεση καί ἀφαίρεση κατά μέλη βρίσκουμε, ἀντιστοίχως:

$$\boxed{2\sigma\upsilon\nu A \sigma\upsilon\nu B \equiv \sigma\upsilon\nu(A + B) + \sigma\upsilon\nu(A - B)} \quad (56)$$

καί $\boxed{2\eta\mu A \eta\mu B \equiv \sigma\upsilon\nu(A - B) - \sigma\upsilon\nu(A + B)} \quad (57)$

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

α) *Νά ἀπλοποιηθεῖ τό κλάσμα:*

$$A \equiv \frac{\eta\mu 8\alpha \sigma\upsilon\nu\alpha - \eta\mu 6\alpha \sigma\upsilon\nu 3\alpha}{\sigma\upsilon\nu 2\alpha \sigma\upsilon\nu\alpha - \eta\mu 3\alpha \eta\mu 4\alpha}$$

Λύση. Ἔχουμε διαδοχικά:

$$\begin{aligned} A &\equiv \frac{2\eta\mu 8\alpha \sigma\upsilon\nu\alpha - 2\eta\mu 6\alpha \sigma\upsilon\nu 3\alpha}{2\sigma\upsilon\nu 2\alpha \sigma\upsilon\nu\alpha - 2\eta\mu 3\alpha \eta\mu 4\alpha} = \frac{(\eta\mu 9\alpha + \eta\mu 7\alpha) - (\eta\mu 9\alpha + \eta\mu 3\alpha)}{(\sigma\upsilon\nu 3\alpha + \sigma\upsilon\nu\alpha) - (\sigma\upsilon\nu\alpha - \sigma\upsilon\nu 7\alpha)} = \\ &= \frac{\eta\mu 7\alpha - \eta\mu 3\alpha}{\sigma\upsilon\nu 3\alpha + \sigma\upsilon\nu 7\alpha} = \frac{2\eta\mu 2\alpha \sigma\upsilon\nu 5\alpha}{2\sigma\upsilon\nu 5\alpha \sigma\upsilon\nu 2\alpha} = \epsilon\varphi 2\alpha, \end{aligned}$$

ἔν $\alpha \neq (2k + 1) \frac{\pi}{10}$ καί $\alpha \neq (2k_1 + 1) \frac{\pi}{4}$, $k, k_1 \in \mathbb{Z}$. Γιατί;

β) *Νά ἀποδειχθεῖ ὅτι:*

$$A \equiv \sigma\upsilon\nu \frac{\pi}{15} \sigma\upsilon\nu \frac{2\pi}{15} \sigma\upsilon\nu \frac{3\pi}{15} \sigma\upsilon\nu \frac{4\pi}{15} \sigma\upsilon\nu \frac{5\pi}{15} \sigma\upsilon\nu \frac{6\pi}{15} \sigma\upsilon\nu \frac{7\pi}{15} = \frac{1}{2^7}$$

Ἀπόδειξη. Ἀπό τὸ γνωστὸ τύπο:

$$\eta\mu 2x = 2\eta\mu x \sigma\upsilon\nu x, \text{ ἔχουμε: } \sigma\upsilon\nu x = \frac{\eta\mu 2x}{2\eta\mu x}$$

καὶ ἐπομένως:

$$A \equiv \frac{\eta\mu \frac{2\pi}{15}}{2\eta\mu \frac{\pi}{15}} \cdot \frac{\eta\mu \frac{4\pi}{15}}{2\eta\mu \frac{2\pi}{15}} \cdot \frac{\eta\mu \frac{6\pi}{15}}{2\eta\mu \frac{3\pi}{15}} \cdot \frac{\eta\mu \frac{8\pi}{15}}{2\eta\mu \frac{4\pi}{15}} \cdot \frac{\eta\mu \frac{10\pi}{15}}{2\eta\mu \frac{5\pi}{15}} \cdot \frac{\eta\mu \frac{12\pi}{15}}{2\eta\mu \frac{6\pi}{15}} \cdot \frac{\eta\mu \frac{14\pi}{15}}{2\eta\mu \frac{7\pi}{15}} = \frac{1}{2^7},$$

γιατί εἶναι: $\eta\mu \frac{\pi}{15} = \eta\mu \frac{14\pi}{15}$, $\eta\mu \frac{3\pi}{15} = \eta\mu \frac{12\pi}{15}$, $\eta\mu \frac{5\pi}{15} = \eta\mu \frac{10\pi}{15}$

★ γ) *Νά ἀποδειχθεῖ ἡ ἀλήθεια τῆς ἰσότητος :*

$$A \equiv \eta\mu 20^\circ \cdot \eta\mu 40^\circ \cdot \eta\mu 60^\circ \cdot \eta\mu 80^\circ = \frac{3}{16}. \quad (1)$$

Ἀπόδειξη. Ἡ ἰσότητα (1) γράφεται:

$$2 \cdot 2\eta\mu 20^\circ \eta\mu 40^\circ \cdot 2\sigma\upsilon\nu 30^\circ \sigma\upsilon\nu 10^\circ = \frac{3}{2}. \quad (2)$$

*Ἄν ὀνομάσουμε Β τὸ πρῶτο μέλος τῆς (2), θὰ ἔχουμε:

$$\begin{aligned} B &\equiv 2(\sigma\upsilon\nu 20^\circ - \sigma\upsilon\nu 60^\circ)(\sigma\upsilon\nu 20^\circ + \sigma\upsilon\nu 40^\circ) = \\ &= 2(\sigma\upsilon\nu^2 20^\circ - \sigma\upsilon\nu 20^\circ \sigma\upsilon\nu 60^\circ + \sigma\upsilon\nu 20^\circ \sigma\upsilon\nu 40^\circ - \sigma\upsilon\nu 40^\circ \sigma\upsilon\nu 60^\circ) = \\ &= 2\sigma\upsilon\nu^2 20^\circ - 2\sigma\upsilon\nu 20^\circ \sigma\upsilon\nu 60^\circ + 2\sigma\upsilon\nu 20^\circ \sigma\upsilon\nu 40^\circ - 2\sigma\upsilon\nu 40^\circ \sigma\upsilon\nu 60^\circ = \\ &= 1 + \sigma\upsilon\nu 40^\circ - (\sigma\upsilon\nu 80^\circ + \sigma\upsilon\nu 40^\circ) + (\sigma\upsilon\nu 60^\circ + \sigma\upsilon\nu 20^\circ) - (\sigma\upsilon\nu 100^\circ + \sigma\upsilon\nu 20^\circ) = \\ &= 1 - (\sigma\upsilon\nu 80^\circ + \sigma\upsilon\nu 100^\circ) + \sigma\upsilon\nu 60^\circ = \\ &= 1 - 2\sigma\upsilon\nu 90^\circ \sigma\upsilon\nu 10^\circ + \frac{1}{2} = 1 - 0 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}. \end{aligned}$$

καὶ ἄρα $A = \frac{3}{16}$.

★ ● 26. *Νά μετασχηματισθεῖ σέ γινόμενο τὸ ἄθροισμα τῶν ἡμιτόνων v τόξων, ποὺ ἀποτελοῦν ἀριθμητικὴ πρόοδος.*

Λύση. *Ἄς ὑποθέσουμε ὅτι θέλουμε νὰ βροῦμε τὸ ἄθροισμα:

$$S = \eta\mu \alpha + \eta\mu(\alpha + \omega) + \eta\mu(\alpha + 2\omega) + \dots + \eta\mu[\alpha + (v-1)\omega] \quad (1)$$

*Ἄν πολλαπλασιάσουμε καὶ τὰ δύο μέλη τῆς (1) μὲ $2\eta\mu \frac{\omega}{2}$, ἔχουμε:

$$2S\eta\mu \frac{\omega}{2} = 2\eta\mu \alpha \eta\mu \frac{\omega}{2} + 2\eta\mu(\alpha + \omega)\eta\mu \frac{\omega}{2} + \dots + 2\eta\mu[\alpha + (v-1)\omega]\eta\mu \frac{\omega}{2}$$

*Ἀλλὰ: $2\eta\mu \alpha \eta\mu \frac{\omega}{2} = \sigma\upsilon\nu\left(\alpha - \frac{\omega}{2}\right) - \sigma\upsilon\nu\left(\alpha + \frac{\omega}{2}\right),$

(2) $2\eta\mu(\alpha + \omega)\eta\mu \frac{\omega}{2} = \sigma\upsilon\nu\left(\alpha + \frac{\omega}{2}\right) - \sigma\upsilon\nu\left(\alpha + \frac{3\omega}{2}\right),$

$$2\eta\mu(\alpha + 2\omega)\eta\mu\frac{\omega}{2} = \sigma\upsilon\nu\left(\alpha + \frac{3\omega}{2}\right) - \sigma\upsilon\nu\left(\alpha + \frac{\omega}{2}\right),$$

$$2\eta\mu\left[\alpha + (v-1)\omega\right]\eta\mu\frac{\omega}{2} = \sigma\upsilon\nu\left[\alpha + \frac{2v-3}{2}\omega\right] - \sigma\upsilon\nu\left[\alpha + \frac{2v-1}{2}\omega\right]$$

Προσθέτοντας κατά μέλη τις ισότητες αυτές έχουμε:

$$2S\eta\mu\frac{\omega}{2} = \sigma\upsilon\nu\left(\alpha - \frac{\omega}{2}\right) - \sigma\upsilon\nu\left[\alpha + \frac{2v-1}{2}\omega\right] = 2\eta\mu\left[\alpha + \frac{v-1}{2}\omega\right]\eta\mu\frac{v\omega}{2},$$

άπ' όπου, τελικά, βρίσκουμε:

$$S = \frac{\eta\mu\left[\alpha + \frac{v-1}{2}\omega\right]\eta\mu\frac{v\omega}{2}}{\eta\mu\frac{\omega}{2}} \quad (58)$$

Με ανάλογο τρόπο εργαζόμενοι βρίσκουμε ότι τό άθροισμα:

$$S' = \sigma\upsilon\nu\alpha + \sigma\upsilon\nu(\alpha + \omega) + \sigma\upsilon\nu(\alpha + 2\omega) + \dots + \sigma\upsilon\nu[\alpha + (v-1)\omega]$$

είναι:

$$S' = \frac{\sigma\upsilon\nu\left[\alpha + \frac{v-1}{2}\omega\right]\eta\mu\frac{v\omega}{2}}{\eta\mu\frac{\omega}{2}} \quad (59)$$

Τό αποτέλεσμα αυτό βγαίνει από τον τύπο (58), αν αντικαταστήσουμε τό α μέ $\frac{\pi}{2} - \alpha$ καί τό ω μέ $-\omega$.

*Αν $\omega = \alpha$, οί τύποι (58) καί (59) γίνονται:

$$S_1 = \eta\mu\alpha + \eta\mu2\alpha + \eta\mu3\alpha + \dots + \eta\mu(v\alpha) = \frac{\eta\mu\frac{(v+1)}{2}\alpha \cdot \eta\mu\frac{v\alpha}{2}}{\eta\mu\frac{\alpha}{2}} \quad (60)$$

$$\text{καί } S_2 = \sigma\upsilon\nu\alpha + \sigma\upsilon\nu2\alpha + \sigma\upsilon\nu3\alpha + \dots + \sigma\upsilon\nu(v\alpha) = \frac{\sigma\upsilon\nu\frac{(v+1)}{2}\alpha \cdot \eta\mu\frac{v\alpha}{2}}{\eta\mu\frac{\alpha}{2}} \quad (61)$$

*Αν όμως βάλουμε $\omega = 2\alpha$, έχουμε τούς τύπους:

$$S_3 = \eta\mu\alpha + \eta\mu3\alpha + \eta\mu5\alpha + \dots + \eta\mu(2v-1)\alpha = \frac{\eta\mu^2(v\alpha)}{\eta\mu\alpha} \quad (62)$$

$$\text{καί } S_4 = \text{συν}\alpha + \text{συν}3\alpha + \text{συν}5\alpha + \dots + \text{συν}(2\nu-1)\alpha = \frac{\eta\mu 2(\nu\alpha)}{2\eta\mu\alpha} \quad (63)$$

★ **Παράδειγμα.** *Νά αποδειχθεί ή αλήθεια τής ισότητας:*

$$S = \text{συν} \frac{\pi}{17} + \text{συν} \frac{3\pi}{17} + \dots + \text{συν} \frac{15\pi}{17} = \frac{1}{2}.$$

***Απόδειξη.** Τά τόξα $\frac{\pi}{17}, \frac{3\pi}{17}, \dots, \frac{15\pi}{17}$ αποτελοῦν ἀριθμητική πρόοδο μέ

λόγο $\frac{2\pi}{17}$. Τό πλήθος τῶν ὄρων τής προκύπτει ἀπό τόν τύπο:

$$\tau = \alpha + (\nu - 1)\omega \Rightarrow \nu = \frac{\tau - \alpha}{\omega} + 1 = 8.$$

Μέ τή βοήθεια τώρα τοῦ τύπου (59), βρίσκουμε:

$$\begin{aligned} S &= \frac{\text{συν} \left(\frac{\pi}{17} + \frac{8-1}{2} \cdot \frac{2\pi}{17} \right) \eta\mu \frac{8\pi}{17}}{\eta\mu \frac{\pi}{17}} = \frac{\text{συν} \frac{8\pi}{17} \cdot \eta\mu \frac{8\pi}{17}}{\eta\mu \frac{\pi}{17}} = \\ &= \frac{2\eta\mu \frac{8\pi}{17} \text{συν} \frac{8\pi}{17}}{2\eta\mu \frac{\pi}{17}} = \frac{\eta\mu \frac{16\pi}{17}}{2\eta\mu \frac{\pi}{17}} = \frac{1}{2}, \end{aligned}$$

γιατί $\eta\mu \frac{16\pi}{17} = \eta\mu \frac{\pi}{17}$, ἀφοῦ $\frac{\pi}{17} + \frac{16\pi}{17} = \pi$.

Μέ ἀνάλογο τρόπο βρίσκουμε ὅτι:

$$S = \text{συν} \frac{\pi}{23} + \text{συν} \frac{3\pi}{23} + \text{συν} \frac{5\pi}{23} + \dots + \text{συν} \frac{21\pi}{23} = \frac{1}{2}.$$

★ • 27. *Νά ὑπολογισθεῖ τό ἄθροισμα :*

$$S_n = \eta\mu^2\alpha + \eta\mu^2(\alpha + \omega) + \eta\mu^2(\alpha + 2\omega) + \dots + \eta\mu^2[\alpha + (\nu - 1)\omega]$$

Λύση. *Αν στή γνωστή μας ταυτότητα

$$\eta\mu^2\alpha = \frac{1}{2} (1 - \text{συν}2\alpha)$$

ἀντικαταστήσουμε τό α μέ τό $\alpha + \omega$, θά ἔχουμε διαδοχικά:

$$\eta\mu^2\alpha = \frac{1}{2} (1 - \text{συν}2\alpha),$$

$$\eta\mu^2(\alpha + \omega) = \frac{1}{2} \left[1 - \text{συν}2(\alpha + \omega) \right],$$

$$\eta\mu^2(\alpha + 2\omega) = \frac{1}{2} \left[1 - \sigma\upsilon\nu 2(\alpha + 2\omega) \right],$$

$$\dots \dots \dots$$

$$\eta\mu^2 \left[\alpha + (v-1)\omega \right] = \frac{1}{2} \left[1 - \sigma\upsilon\nu 2[\alpha + (v-1)\omega] \right]$$

καί μέ πρόσθεση κατά μέλη:

$$S_\alpha = \frac{v}{2} - \frac{1}{2} \left[\sigma\upsilon\nu 2\alpha + \sigma\upsilon\nu 2(\alpha + \omega) + \sigma\upsilon\nu 2(\alpha + 2\omega) + \dots + \sigma\upsilon\nu 2 \left[\alpha + (v-1)\omega \right] \right] =$$

$$= \frac{v}{2} - \frac{\sigma\upsilon\nu [2\alpha + (v-1)\omega] \eta\mu(v\omega)}{2\eta\mu\omega}$$

Ώστε :

$$S_\alpha = \eta\mu^2\alpha + \eta\mu^2(\alpha + \omega) + \eta\mu^2(\alpha + 2\omega) + \dots + \eta\mu^2[\alpha + (v-1)\omega] =$$

$$= \frac{v}{2} - \frac{\sigma\upsilon\nu [2\alpha + (v-1)\omega] \eta\mu(v\omega)}{2\eta\mu\omega} \quad (64)$$

*Αν στόν τύπο (64) βάλουμε $\omega = \alpha$, έχουμε:

$$S_\alpha = \eta\mu^2\alpha + \eta\mu^2 2\alpha + \eta\mu^2 3\alpha + \dots + \eta\mu^2(v\alpha) = \frac{v}{2} - \frac{\sigma\upsilon\nu(v+1)\alpha \cdot \eta\mu(v\alpha)}{2\eta\mu\alpha} \quad (65)$$

Καί αν βάλουμε $\omega = 2\alpha$, βρίσκουμε ότι:

$$S_\alpha = \eta\mu^2\alpha + \eta\mu^2 3\alpha + \eta\mu^2 5\alpha + \eta\mu^2(2v-1)\alpha = \frac{v}{2} - \frac{\sigma\upsilon\nu 2(v\alpha) \eta\mu 2(v\alpha)}{2\eta\mu 2\alpha} \quad (66)$$

Μέ τόν ίδιο τρόπο εργαζόμαστε καί όταν αντί γιά ήμίτονο έχουμε συν-ήμίτονο.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Πρώτη ομάδα

31. Νά μετασχηματισθοῦν σέ άθροισμα ή διαφορά οι παραστάσεις:

- | | |
|---|---|
| 1. $2\eta\mu 2\alpha \sigma\upsilon\nu\alpha$, | 4. $2\eta\mu\alpha \eta\mu 3\alpha$, |
| 2. $2\eta\mu\alpha \sigma\upsilon\nu 4\alpha$, | 5. $2\sigma\upsilon\nu 5\alpha \sigma\upsilon\nu 7\alpha$, |
| 3. $2\eta\mu 4\alpha \sigma\upsilon\nu 8\alpha$, | 6. $2\eta\mu 3\alpha \eta\mu 5\alpha$. |

32. Νά βρεθεί ή αριθμητική τιμή τῶν παραστάσεων:

- | | |
|---|--|
| 1. $2\sigma\upsilon\nu 60^\circ \eta\mu 30^\circ$, | 3. $2\sigma\upsilon\nu 150^\circ \sigma\upsilon\nu 30^\circ$, |
| 2. $\eta\mu 45^\circ \sigma\upsilon\nu 75^\circ$, | 4. $2\eta\mu 36^\circ \sigma\upsilon\nu 54^\circ$. |

33. Νά άποδειχθεί ότι:

1. $\sigma\upsilon\nu 2\alpha \sigma\upsilon\nu\alpha - \eta\mu 4\alpha \eta\mu\alpha = \sigma\upsilon\nu 3\alpha \sigma\upsilon\nu 2\alpha$,
2. $\sigma\upsilon\nu 5\alpha \sigma\upsilon\nu 2\alpha - \sigma\upsilon\nu 4\alpha \sigma\upsilon\nu 3\alpha = -\eta\mu 2\alpha \eta\mu\alpha$,
3. $\eta\mu 4\alpha \sigma\upsilon\nu\alpha - \eta\mu 3\alpha \sigma\upsilon\nu 2\alpha = \eta\mu\alpha \sigma\upsilon\nu 2\alpha$.

34. Νά αποδειχθεί ότι:

1. $\sin(36^\circ - \alpha) \sin(36^\circ + \alpha) + \sin(54^\circ + \alpha) \sin(54^\circ - \alpha) = \sin 2\alpha$,
2. $\sin \alpha \eta\mu(\beta - \gamma) + \sin \beta \eta\mu(\gamma - \alpha) + \sin \gamma \eta\mu(\alpha - \beta) = 0$,
3. $\eta\mu \alpha \eta\mu(\beta - \gamma) + \eta\mu \beta \eta\mu(\gamma - \alpha) + \eta\mu \gamma \eta\mu(\alpha - \beta) = 0$,
4. $\frac{\eta\mu \alpha \eta\mu 2\alpha + \eta\mu 3\alpha \eta\mu 6\alpha + \eta\mu 4\alpha \eta\mu 13\alpha}{\eta\mu \alpha \sin 2\alpha + \eta\mu 3\alpha \sin 6\alpha + \eta\mu 4\alpha \sin 13\alpha} = \epsilon\phi 9\alpha$.

Δεύτερη ομάδα

35. Νά αποδειχθεί ότι:

1. $\sin 20^\circ \sin 40^\circ \sin 60^\circ \sin 80^\circ = \frac{1}{16}$,
2. $\epsilon\phi 20^\circ \epsilon\phi 40^\circ \epsilon\phi 60^\circ \epsilon\phi 80^\circ = 3$,
3. $\sin \frac{2\pi}{7} + \sin \frac{4\pi}{7} + \sin \frac{6\pi}{7} = -\frac{1}{2}$,
4. $\eta\mu^4 \frac{\pi}{16} + \eta\mu^4 \frac{3\pi}{16} + \eta\mu^4 \frac{5\pi}{16} + \eta\mu^4 \frac{7\pi}{16} = \frac{3}{2}$.

36. Νά υπολογισθοῦν τὰ ἀκόλουθα ἀθροίσματα, πού τό καθένα τους ἔχει n προσθετέους:

1. $\eta\mu 2\alpha + \eta\mu 4\alpha + \eta\mu 6\alpha + \dots$
2. $\sin 2\alpha + \sin 4\alpha + \sin 6\alpha + \dots$
3. $\eta\mu \alpha - \eta\mu 2\alpha + \eta\mu 3\alpha - \dots$
4. $\sin \alpha - \sin 2\alpha + \sin 3\alpha - \dots$

37. Νά αποδειχθεί ότι:

1. $\sin \frac{\pi}{19} + \sin \frac{3\pi}{19} + \sin \frac{5\pi}{19} + \dots + \sin \frac{17\pi}{19} = \frac{1}{2}$,
2. $\sin \frac{2\pi}{21} + \sin \frac{4\pi}{21} + \sin \frac{6\pi}{21} + \dots + \sin \frac{20\pi}{21} = -\frac{1}{2}$,
3. $\eta\mu \frac{\pi}{9} + \eta\mu \frac{2\pi}{v} + \eta\mu \frac{3\pi}{v} + \dots = \sigma\phi \frac{\pi}{2v}$, όπου τό πλήθος τῶν ὀρων εἶναι $v - 1$.
4. $\sin \frac{\pi}{v} + \sin \frac{3\pi}{v} + \sin \frac{5\pi}{v} + \dots = -\sin \frac{\pi}{v}$, όπου τό πλήθος τῶν ὀρων εἶναι $2v - 1$.

**ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ
ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΙΣ ΓΩΝΙΕΣ ΤΡΙΓΩΝΟΥ — ΤΕΤΡΑΠΛΕΥΡΟΥ
ΤΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ**

- 28. Τριγωνομετρικές σχέσεις ανάμεσα στις γωνίες ενός τριγώνου $AB\Gamma$.
Σέ κάθε τρίγωνο $AB\Gamma$ είναι:

$$A + B + \Gamma = \pi \text{ και } \text{άρα } \frac{A}{2} + \frac{B}{2} + \frac{\Gamma}{2} = \frac{\pi}{2}.$$

*Άρα θά έχουμε τις ακόλουθες σχέσεις:

$\eta\mu(A + B) = \eta\mu\Gamma$ $\eta\mu \frac{A + B}{2} = \sigma\upsilon\nu \frac{\Gamma}{2}$	$\eta\mu(B + \Gamma) = \eta\mu A$ $\eta\mu \frac{B + \Gamma}{2} = \sigma\upsilon\nu \frac{A}{2}$	$\eta\mu(\Gamma + A) = \eta\mu B$ $\eta\mu \frac{\Gamma + A}{2} = \sigma\upsilon\nu \frac{B}{2}$
$\sigma\upsilon\nu(A + B) = -\sigma\upsilon\nu\Gamma$ $\sigma\upsilon\nu \frac{A + B}{2} = \eta\mu \frac{\Gamma}{2}$	$\sigma\upsilon\nu(B + \Gamma) = -\sigma\upsilon\nu A$ $\sigma\upsilon\nu \frac{B + \Gamma}{2} = \eta\mu \frac{A}{2}$	$\sigma\upsilon\nu(\Gamma + A) = \sigma\upsilon\nu B$ $\sigma\upsilon\nu \frac{\Gamma + A}{2} = \eta\mu \frac{B}{2}$

Μέ τή βοήθεια τών ταυτοτήτων αυτών και μέ τή χρήση τών τριγωνομετρικών μετασχηματισμῶν ἀποδεικνύονται διάφορες χρήσιμες τριγωνομετρικές σχέσεις ανάμεσα στις γωνίες A, B, Γ τοῦ τριγώνου $AB\Gamma$ καί στά μισά αυτῶν τῶν γωνιῶν. Οἱ κυριότερες εἶναι οἱ ακόλουθες:

- 29. Σέ κάθε τρίγωνο $AB\Gamma$ νά ἀποδειχθεῖ ὅτι :

$$\eta\mu A + \eta\mu B + \eta\mu \Gamma = 4\sigma\upsilon\nu \frac{A}{2} \sigma\upsilon\nu \frac{B}{2} \sigma\upsilon\nu \frac{\Gamma}{2}$$

*Απόδειξη. *Έχουμε διαδοχικά :

$$\begin{aligned} \eta\mu A + \eta\mu B + \eta\mu \Gamma &= 2\eta\mu \frac{A+B}{2} \sigma\upsilon\nu \frac{A-B}{2} + 2\eta\mu \frac{\Gamma}{2} \sigma\upsilon\nu \frac{\Gamma}{2} = \\ &= 2\sigma\upsilon\nu \frac{\Gamma}{2} \sigma\upsilon\nu \frac{A-B}{2} + 2\eta\mu \frac{\Gamma}{2} \sigma\upsilon\nu \frac{\Gamma}{2} = 2\sigma\upsilon\nu \frac{\Gamma}{2} \left[\sigma\upsilon\nu \frac{A-B}{2} + \eta\mu \frac{\Gamma}{2} \right] = \\ &= 2\sigma\upsilon\nu \frac{\Gamma}{2} \left[\sigma\upsilon\nu \frac{A-B}{2} + \sigma\upsilon\nu \frac{A+B}{2} \right] = 2\sigma\upsilon\nu \frac{\Gamma}{2} \cdot 2\sigma\upsilon\nu \frac{A}{2} \sigma\upsilon\nu \frac{B}{2} = \\ &= 4\sigma\upsilon\nu \frac{A}{2} \sigma\upsilon\nu \frac{B}{2} \sigma\upsilon\nu \frac{\Gamma}{2}. \quad \text{*Άρα:} \end{aligned}$$

$A + B + \Gamma = \pi \Rightarrow$	$\eta\mu A + \eta\mu B + \eta\mu \Gamma = 4\sigma\upsilon\nu \frac{A}{2} \sigma\upsilon\nu \frac{B}{2} \sigma\upsilon\nu \frac{\Gamma}{2}$	(67)
------------------------------------	--	------

Ο τύπος (67) βρέθηκε και στην παράγραφο (γ) σελίδα 37 με άλλο τρόπο.

Παρατήρηση. *Αν $\alpha + \beta + \gamma = 2\nu\pi$, με $\nu \in \mathbb{Z}^+$, τότε :

$$\eta\mu\alpha + \eta\mu\beta + \eta\mu\gamma = (-1)^{\nu-1} \cdot 4\eta\mu \frac{\alpha}{2} \eta\mu \frac{\beta}{2} \eta\mu \frac{\gamma}{2}$$

Απόδειξη. Από τη σχέση:

$$\alpha + \beta + \gamma = 2\nu\pi \Rightarrow \frac{\gamma}{2} = \nu\pi - \frac{\alpha + \beta}{2} \text{ και } \frac{\alpha + \beta}{2} = \nu\pi - \frac{\gamma}{2}.$$

*Αλλά: $\eta\mu\alpha + \eta\mu\beta = 2\eta\mu \frac{\alpha + \beta}{2} \sigma\upsilon\nu \frac{\alpha - \beta}{2} = 2\eta\mu \left(\nu\pi - \frac{\gamma}{2} \right) \sigma\upsilon\nu \frac{\alpha - \beta}{2}$ (1)

και : $\eta\mu\gamma = 2\eta\mu \frac{\gamma}{2} \sigma\upsilon\nu \frac{\gamma}{2} = 2\eta\mu \frac{\gamma}{2} \sigma\upsilon\nu \left(\nu\pi - \frac{\alpha + \beta}{2} \right)$ (2)

*Επειδή ο ν μπορεί να είναι άρτιος ή περιττός, θα έχουμε:

$$\eta\mu \left(\nu\pi - \frac{\gamma}{2} \right) = \pm \eta\mu \frac{\gamma}{2} \text{ και } \sigma\upsilon\nu \left(\nu\pi - \frac{\alpha + \beta}{2} \right) = \pm \sigma\upsilon\nu \frac{\alpha + \beta}{2}.$$

*Αρα σε όλες τις περιπτώσεις θα είναι:

$$\eta\mu \left(\nu\pi - \frac{\gamma}{2} \right) = (-1)^{\nu-1} \eta\mu \frac{\gamma}{2} \text{ και } \sigma\upsilon\nu \left(\nu\pi - \frac{\alpha + \beta}{2} \right) = -(-1)^{\nu-1} \sigma\upsilon\nu \frac{\alpha + \beta}{2}$$

*Αρα οι ισότητες (1) και (2) γίνονται:

$$\eta\mu\alpha + \eta\mu\beta = (-1)^{\nu-1} 2\eta\mu \frac{\gamma}{2} \sigma\upsilon\nu \frac{\alpha - \beta}{2} \text{ και } \eta\mu\gamma = (-1)^{\nu-1} \left[-2\eta\mu \frac{\gamma}{2} \sigma\upsilon\nu \frac{\alpha + \beta}{2} \right],$$

και με πρόσθεση αυτών των ισοτήτων κατά μέλη βρίσκουμε:

$$\begin{aligned} \eta\mu\alpha + \eta\mu\beta + \eta\mu\gamma &= (-1)^{\nu-1} \cdot 2\eta\mu \frac{\gamma}{2} \left[\sigma\upsilon\nu \frac{\alpha - \beta}{2} - \sigma\upsilon\nu \frac{\alpha + \beta}{2} \right] = \\ &= (-1)^{\nu-1} \cdot 2\eta\mu \frac{\gamma}{2} \cdot 2\eta\mu \frac{\alpha}{2} \eta\mu \frac{\beta}{2} = (-1)^{\nu-1} \cdot 4\eta\mu \frac{\alpha}{2} \eta\mu \frac{\beta}{2} \eta\mu \frac{\gamma}{2}. \end{aligned}$$

*Ωστε :

$\alpha + \beta + \gamma = 2\nu\pi \Rightarrow$	$\eta\mu\alpha + \eta\mu\beta + \eta\mu\gamma = (-1)^{\nu-1} \cdot 4\eta\mu \frac{\alpha}{2} \eta\mu \frac{\beta}{2} \eta\mu \frac{\gamma}{2}$	(67a)
---	--	-------

*Αν όμως είναι:

$\alpha + \beta + \gamma = (2\nu - 1)\pi \Rightarrow$	$\eta\mu\alpha + \eta\mu\beta + \eta\mu\gamma = (-1)^\nu \cdot 4\sigma\upsilon\nu \frac{\alpha}{2} \sigma\upsilon\nu \frac{\beta}{2} \sigma\upsilon\nu \frac{\gamma}{2}$	(67β)
---	--	-------

Ἡ ἀπόδειξη τοῦ τύπου (67β) γίνεται μέ τόν ἴδιο τρόπο πού ἔγινε καί ἡ ἀπόδειξη τοῦ τύπου (67α).

● 30. Σέ κάθε τρίγωνο $AB\Gamma$ νά ἀποδειχθεῖ ὅτι :

$$\sigma\upsilon\nu A + \sigma\upsilon\nu B + \sigma\upsilon\nu \Gamma = 1 + 4\eta\mu \frac{A}{2} \eta\mu \frac{B}{2} \eta\mu \frac{\Gamma}{2}.$$

Ἀπόδειξη. Ἔχουμε διαδοχικά :

$$\begin{aligned} \sigma\upsilon\nu A + \sigma\upsilon\nu B + \sigma\upsilon\nu \Gamma &= 2\sigma\upsilon\nu \frac{A+B}{2} \sigma\upsilon\nu \frac{A-B}{2} + 1 - 2\eta\mu^2 \frac{\Gamma}{2} = \\ &= 2\eta\mu \frac{\Gamma}{2} \sigma\upsilon\nu \frac{A-B}{2} - 2\eta\mu^2 \frac{\Gamma}{2} + 1 = 2\eta\mu \frac{\Gamma}{2} \left[\sigma\upsilon\nu \frac{A-B}{2} - \eta\mu \frac{A}{2} \right] + 1 = \\ &= 1 + 2\eta\mu \frac{\Gamma}{2} \left[\sigma\upsilon\nu \frac{A-B}{2} - \sigma\upsilon\nu \frac{A+B}{2} \right] = 1 + 2\eta\mu \frac{\Gamma}{2} \cdot 2\eta\mu \frac{A}{2} \eta\mu \frac{B}{2} = \\ &= 1 + 4\eta\mu \frac{A}{2} \eta\mu \frac{B}{2} \eta\mu \frac{\Gamma}{2}. \end{aligned}$$

Ἄρα θά ἰσχύει ἡ συνεπαγωγή :

$A + B + \Gamma = \pi \Rightarrow$	$\sigma\upsilon\nu A + \sigma\upsilon\nu B + \sigma\upsilon\nu \Gamma = 1 + 4\eta\mu \frac{A}{2} \eta\mu \frac{B}{2} \eta\mu \frac{\Gamma}{2}$ (68)
------------------------------------	---

Ὁ τύπος (68) βρέθηκε καί μέ ἄλλο τρόπο στήν παράγραφο (δ) σελίδα 38.

Παρατήρηση. Ἄν ἀληθεύει ἡ ἰσότητα :

$$\sigma\upsilon\nu \alpha + \sigma\upsilon\nu \beta + \sigma\upsilon\nu \gamma = 1 + 4\eta\mu \frac{\alpha}{2} \eta\mu \frac{\beta}{2} \eta\mu \frac{\gamma}{2}$$

νά βρεῖτε πῶς συνδέονται οἱ γωνίες α, β καί γ .

Λύση. Ἡ δεδομένη ἰσότητα γράφεται ὡς ἑξῆς :

$$\begin{aligned} 1 - 2\eta\mu^2 \frac{\alpha}{2} + 2\sigma\upsilon\nu \frac{\beta+\gamma}{2} \sigma\upsilon\nu \frac{\beta-\gamma}{2} &= 1 + 2\eta\mu \frac{\alpha}{2} \left[\sigma\upsilon\nu \frac{\beta-\gamma}{2} - \sigma\upsilon\nu \frac{\beta+\gamma}{2} \right] - \\ - \eta\mu \frac{\alpha}{2} \left[\eta\mu \frac{\alpha}{2} + \sigma\upsilon\nu \frac{\beta-\gamma}{2} \right] &= -\sigma\upsilon\nu \frac{\beta+\gamma}{2} \left[\eta\mu \frac{\alpha}{2} + \sigma\upsilon\nu \frac{\beta+\gamma}{2} \right] \Leftrightarrow \\ \left[\eta\mu \frac{\alpha}{2} - \sigma\upsilon\nu \frac{\beta-\gamma}{2} \right] \left[\eta\mu \frac{\alpha}{2} + \sigma\upsilon\nu \frac{\beta-\gamma}{2} \right] &= 0. \end{aligned}$$

Ἡ ἰσότητα αὐτή ἐπαληθεύεται :

$$\text{Iο : Μέ } \eta\mu \frac{\alpha}{2} = \sigma\upsilon\nu \frac{\beta+\gamma}{2} = \eta\mu \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\beta+\gamma}{2} \right) \Rightarrow \begin{cases} \frac{\alpha}{2} = 2k\pi + \frac{\pi}{2} - \frac{\beta+\gamma}{2} & (1) \\ \frac{\alpha}{2} = (2k_1+1)\pi - \frac{\pi}{2} + \frac{\beta+\gamma}{2} & (2) \end{cases}$$

$$2ο : \text{Μέ } \eta\mu\frac{\alpha}{2} = \sigma\upsilon\nu\frac{\beta-\gamma}{2} = \eta\mu\left(\frac{\beta-\gamma}{2} - \frac{\pi}{2}\right) \Rightarrow \begin{cases} \frac{\alpha}{2} = 2k_2\pi - \frac{\pi}{2} + \frac{\beta-\gamma}{2} & (3) \\ \frac{\alpha}{2} = (2k_3+1)\pi + \frac{\pi}{2} - \frac{\beta-\gamma}{2} & (4) \end{cases}$$

Από τις (1), (2), (3), (4) βρίσκουμε εύκολα τις σχέσεις:

$\alpha \pm \beta \pm \gamma = (4\lambda + 1)\pi,$ $\alpha \pm \beta \pm \gamma = (4\lambda - 1)\pi,$	όπου $k, k_1, k_2, k_3, \lambda \in \mathbf{Z}$.
---	---

Αν όμως είναι:

$\alpha + \beta + \gamma = 2\nu\pi \Rightarrow$	$\sigma\upsilon\nu\alpha + \sigma\upsilon\nu\beta + \sigma\upsilon\nu\gamma = -1 + (-1)^\nu \cdot 4\sigma\upsilon\nu\frac{\alpha}{2}\sigma\upsilon\nu\frac{\beta}{2}\sigma\upsilon\nu\frac{\gamma}{2}$	(68α)
---	--	-------

Η απόδειξη γίνεται όπως και στην παράγραφο (29).

Αν, τέλος, είναι:

$\alpha + \beta + \gamma = (2\nu + 1)\pi \Rightarrow$	$\sigma\upsilon\nu\alpha + \sigma\upsilon\nu\beta + \sigma\upsilon\nu\gamma = 1 + (-1)^\nu \cdot 4\eta\mu\frac{\alpha}{2}\eta\mu\frac{\beta}{2}\eta\mu\frac{\gamma}{2}$	(68β)
---	---	-------

● 31. Σε κάθε μη ορθογώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$ ισχύει η ισότητα:

$$\epsilon\varphi A + \epsilon\varphi B + \epsilon\varphi \Gamma = \epsilon\varphi A \epsilon\varphi B \epsilon\varphi \Gamma.$$

Απόδειξη. Έχουμε: $A + B + \Gamma = \pi$, οπότε:

$$A + B = \pi - \Gamma \text{ και } \epsilon\varphi(A + B) = \epsilon\varphi(\pi - \Gamma) = -\epsilon\varphi\Gamma \Leftrightarrow$$

$$\frac{\epsilon\varphi A + \epsilon\varphi B}{1 - \epsilon\varphi A \epsilon\varphi B} = -\epsilon\varphi\Gamma \Leftrightarrow \epsilon\varphi A + \epsilon\varphi B + \epsilon\varphi\Gamma = \epsilon\varphi A \epsilon\varphi B \epsilon\varphi\Gamma.$$

Ωστε, με $A \neq \frac{\pi}{2}$ ή $B \neq \frac{\pi}{2}$ ή $\Gamma \neq \frac{\pi}{2}$, και $A + B + \Gamma = \pi$, ισχύει:

$\epsilon\varphi A + \epsilon\varphi B + \epsilon\varphi\Gamma = \epsilon\varphi A \epsilon\varphi B \epsilon\varphi\Gamma$	(69)
---	------

Αντιστρόφως: Αν τρεις γωνίες A, B, Γ διαφορετικές από το $\frac{\pi}{2}$, ικανοποιούν την ισότητα (69), τότε θά είναι:

$$\epsilon\varphi A + \epsilon\varphi B = \epsilon\varphi A \epsilon\varphi B \epsilon\varphi\Gamma - \epsilon\varphi\Gamma = -\epsilon\varphi\Gamma(1 - \epsilon\varphi A \epsilon\varphi B) \Leftrightarrow$$

$$\frac{\epsilon\varphi A + \epsilon\varphi B}{1 - \epsilon\varphi A \epsilon\varphi B} = -\epsilon\varphi\Gamma = \epsilon\varphi(\pi - \Gamma) \Leftrightarrow \epsilon\varphi(A + B) = \epsilon\varphi(\pi - \Gamma) \Leftrightarrow$$

$$A + B = \nu\pi + \pi - \Gamma \Leftrightarrow A + B + \Gamma = (\nu + 1)\pi, \quad \nu \in \mathbf{Z}$$

- 32. Σέ κάθε τρίγωνο $AB\Gamma$ ισχύει ή ισότητα:

$$\sigma\phi A \sigma\phi B + \sigma\phi B \sigma\phi \Gamma + \sigma\phi \Gamma \sigma\phi A = 1.$$

Ἀπόδειξη. Ἀπό τή σχέση $A + B + \Gamma = \pi$ ἔχουμε:

$$A + B = \pi - \Gamma \Rightarrow \sigma\phi(A + B) = \sigma\phi(\pi - \Gamma) = -\sigma\phi \Gamma \Rightarrow$$

$$\frac{\sigma\phi A \sigma\phi B - 1}{\sigma\phi A + \sigma\phi B} = -\sigma\phi \Gamma. \text{ Ἀπό ἐδῶ προκύπτει ὅτι:}$$

$$\boxed{\sigma\phi A \sigma\phi B + \sigma\phi B \sigma\phi \Gamma + \sigma\phi \Gamma \sigma\phi A = 1} \quad (70)$$

Ἀντιστρόφως. Ἄν τρεῖς γωνίες A, B, Γ ἱκανοποιοῦν τήν ἰσότητα (70), τότε θά ἔχουμε:

$$\sigma\phi A \sigma\phi B - 1 = -\sigma\phi \Gamma (\sigma\phi A + \sigma\phi B) \Leftrightarrow$$

$$\frac{\sigma\phi A \sigma\phi B - 1}{\sigma\phi A + \sigma\phi B} = -\sigma\phi \Gamma \Leftrightarrow \sigma\phi(A + B) = -\sigma\phi \Gamma = \sigma\phi(\pi - \Gamma) \Leftrightarrow$$

$$A + B = n\pi + (\pi - \Gamma), \text{ μέ } n \in \mathbf{Z}. \text{ Ἄρα: } A + B + \Gamma = (n + 1)\pi$$

- 33. Ἄν οἱ γωνίες ἑνός τριγώνου $AB\Gamma$ ἀποτελοῦν ἀριθμητική πρόοδο καί συγχρόνως ισχύει ή ισότητα:

$$\eta\mu^2 A + \eta\mu^2 B + \eta\mu^2 \Gamma = 2, \quad (1)$$

νά ἀποδειχθεῖ ὅτι οἱ πλευρές αὐτοῦ τοῦ τριγώνου εἶναι ἀνάλογες μέ τούς ἀριθμούς $2, \sqrt{3}$ καί 1 .

Ἀπόδειξη. Ἡ δεδομένη σχέση (1) γράφεται:

$$\begin{aligned} 1 - \sigma\upsilon\nu^2 A + 1 - \sigma\upsilon\nu^2 B + 1 - \sigma\upsilon\nu^2 \Gamma &= 2 \Leftrightarrow \\ \sigma\upsilon\nu^2 A + \sigma\upsilon\nu^2 B + \sigma\upsilon\nu^2 \Gamma &= 1 \end{aligned} \quad (2)$$

Ἀφοῦ εἶναι $A + B + \Gamma = \pi$, κατά τόν τύπο (13), θά ἔχουμε:

$$\sigma\upsilon\nu^2 A + \sigma\upsilon\nu^2 B + \sigma\upsilon\nu^2 \Gamma + 2\sigma\upsilon\nu A \sigma\upsilon\nu B \sigma\upsilon\nu \Gamma = 1 \quad (3)$$

Ἀπό τίς (2) καί (3) βρῖσκουμε τή σχέση:

$$\sigma\upsilon\nu A \sigma\upsilon\nu B \sigma\upsilon\nu \Gamma = 0 \Rightarrow \begin{cases} \sigma\upsilon\nu A = 0 \Rightarrow A = \frac{\pi}{2}, \\ \text{ἢ } \sigma\upsilon\nu B = 0 \Rightarrow B = \frac{\pi}{2}, \\ \text{ἢ } \sigma\upsilon\nu \Gamma = 0 \Rightarrow \Gamma = \frac{\pi}{2}. \end{cases}$$

Ἄς ὑποθέσουμε ὅτι:

$$A = \frac{\pi}{2}, \text{ ὁπότε } B + \Gamma = \frac{\pi}{2} \quad (4)$$

Έπειδή από την υπόθεση οι γωνίες A, B, Γ αποτελούν αριθμητική πρόοδο, θα ισχύει η σχέση:

$$2B = \Gamma + A = \Gamma + \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow 2B - \Gamma = \frac{\pi}{2} \quad (5)$$

Από τις σχέσεις (4) και (5) βρίσκουμε:

$$B + \Gamma = 2B - \Gamma \Leftrightarrow B = 2\Gamma \text{ και ή (4) γίνεται:}$$

$$2\Gamma + \Gamma = \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow 3\Gamma = \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow \Gamma = \frac{\pi}{6} \text{ και άρα } B = \frac{\pi}{3}.$$

$$\text{Ώστε είναι: } A = \frac{\pi}{2}, B = \frac{\pi}{3}, \Gamma = \frac{\pi}{6}.$$

Αν α, β, γ είναι, αντίστοιχως, η υπότεινουσα και οι κάθετες πλευρές του τριγώνου ABΓ, τότε, έπειδή:

$$\Gamma = \frac{\pi}{6} \Rightarrow \gamma = \frac{\alpha}{2} \text{ και άρα } \beta^2 = \alpha^2 - \gamma^2 = \alpha^2 - \frac{\alpha^2}{4} = \frac{3\alpha^2}{4} \Rightarrow$$

$$\beta = \frac{\alpha\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \frac{\beta}{\sqrt{3}} = \frac{\alpha}{2}. \text{ Άρα: } \boxed{\frac{\alpha}{2} = \frac{\beta}{\sqrt{3}} = \frac{\gamma}{1}}$$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Πρώτη ομάδα

38. Σέ κάθε τρίγωνο ABΓ νά άποδειχθούν οι Ισότητες:

- $\eta\mu A + \eta\mu B - \eta\mu\Gamma = 4\eta\mu \frac{A}{2} \eta\mu \frac{B}{2} \sigma\upsilon\nu \frac{\Gamma}{2},$
- $\sigma\upsilon\nu A + \sigma\upsilon\nu B - \sigma\upsilon\nu\Gamma = -1 + 4\sigma\upsilon\nu \frac{A}{2} \sigma\upsilon\nu \frac{B}{2} \eta\mu \frac{\Gamma}{2},$
- $\eta\mu 2A + \eta\mu 2B + \eta\mu 2\Gamma = 4\eta\mu A \eta\mu B \eta\mu\Gamma,$
- $\sigma\upsilon\nu 2A + \sigma\upsilon\nu 2B + \sigma\upsilon\nu 2\Gamma = -1 - 4\sigma\upsilon\nu A \sigma\upsilon\nu B \sigma\upsilon\nu\Gamma,$
- $\epsilon\varphi 2A + 2\epsilon\varphi 2B + \epsilon\varphi 2\Gamma = \epsilon\varphi 2A \epsilon\varphi 2B \epsilon\varphi 2\Gamma,$
- $\epsilon\varphi \frac{A}{2} \epsilon\varphi \frac{B}{2} + \epsilon\varphi \frac{B}{2} \epsilon\varphi \frac{\Gamma}{2} + \epsilon\varphi \frac{\Gamma}{2} \epsilon\varphi \frac{A}{2} = 1.$

39. Σέ κάθε τρίγωνο ABΓ Ισχύουν οι Ισότητες:

- $\eta\mu^2 A + \eta\mu^2 B + \eta\mu^2 \Gamma = 2 + 2\sigma\upsilon\nu A \sigma\upsilon\nu B \sigma\upsilon\nu\Gamma,$
- $\eta\mu^2 A + \eta\mu^2 B - \eta\mu^2 \Gamma = 2\eta\mu A \eta\mu B \sigma\upsilon\nu\Gamma,$
- $\sigma\upsilon\nu^2 A + \sigma\upsilon\nu^2 B - \sigma\upsilon\nu^2 \Gamma = 1 - 2\eta\mu A \eta\mu B \sigma\upsilon\nu\Gamma,$
- $\eta\mu(B + \Gamma - A) + \eta\mu(\Gamma + A - B) + \eta\mu(A + B - \Gamma) = 4\eta\mu A \eta\mu B \eta\mu\Gamma.$

40. Σέ κάθε τρίγωνο ABΓ νά άποδειχθεί ότι:

- $\eta\mu 4A + \eta\mu 4B + \eta\mu 4\Gamma = -4\eta\mu 2A \eta\mu 2B \eta\mu 2\Gamma,$
- $\sigma\upsilon\nu 4A + \sigma\upsilon\nu 4B + \sigma\upsilon\nu 4\Gamma = -1 + 4\sigma\upsilon\nu 2A \sigma\upsilon\nu 2B \sigma\upsilon\nu 2\Gamma,$
- $\eta\mu^2 \frac{A}{2} + \eta\mu^2 \frac{B}{2} + \eta\mu^2 \frac{\Gamma}{2} = 1 - 2\eta\mu \frac{A}{2} \eta\mu \frac{B}{2} \eta\mu \frac{\Gamma}{2},$
- $\frac{\eta\mu 2A + \eta\mu 2B + \eta\mu 2\Gamma}{\eta\mu A + \eta\mu B + \eta\mu\Gamma} = 8\eta\mu \frac{A}{2} \eta\mu \frac{B}{2} \eta\mu \frac{\Gamma}{2},$

$$5. \frac{\varepsilon\varphi A + \varepsilon\varphi B + \varepsilon\varphi \Gamma}{(\eta\mu A + \eta\mu B + \eta\mu \Gamma)^2} = \frac{\varepsilon\varphi \frac{A}{2} \varepsilon\varphi \frac{B}{2} \varepsilon\varphi \frac{\Gamma}{2}}{2\sigma\upsilon\nu A \sigma\upsilon\nu B \sigma\upsilon\nu \Gamma}$$

41. *Αν $A + B + \Gamma = 180^\circ$, νά γίνουν γινόμενα οι παραστάσεις:

- $\eta\mu 3A + \eta\mu 3B + \eta\mu 3\Gamma$,
- $\eta\mu 6A + \eta\mu 6B + \eta\mu 6\Gamma$,
- $\varepsilon\varphi(kA) + \varepsilon\varphi(kB) + \varepsilon\varphi(k\Gamma)$, $\delta\upsilon\nu k \in \mathbb{N}$.

42. Σέ κάθε τρίγωνο $AB\Gamma$ νά άποδειχθεί ή άλήθεια καθεμιός από τίς παρακάτω Ισό-
τητες:

- $\eta\mu \frac{A}{2} + \eta\mu \frac{B}{2} + \eta\mu \frac{\Gamma}{2} = 1 + 4\eta\mu \frac{\pi-A}{4} \eta\mu \frac{\pi-B}{4} \eta\mu \frac{\pi-\Gamma}{4}$,
- $\sigma\upsilon\nu \frac{A}{2} + \sigma\upsilon\nu \frac{B}{2} + \sigma\upsilon\nu \frac{\Gamma}{2} = 4\sigma\upsilon\nu \frac{B+\Gamma}{4} \sigma\upsilon\nu \frac{\Gamma+A}{4} \sigma\upsilon\nu \frac{A+B}{4}$,
- $\eta\mu^2 \frac{A}{4} + \eta\mu^2 \frac{B}{4} + \eta\mu^2 \frac{\Gamma}{4} = \frac{3}{2} - 2\sigma\upsilon\nu \frac{\pi-A}{4} \sigma\upsilon\nu \frac{\pi-B}{4} \sigma\upsilon\nu \frac{\pi-\Gamma}{4}$,
- $\sigma\upsilon\nu^2 \frac{A}{4} + \sigma\upsilon\nu^2 \frac{B}{4} + \sigma\upsilon\nu^2 \frac{\Gamma}{4} = \frac{3}{2} + 2\sigma\upsilon\nu \frac{\pi-A}{4} \sigma\upsilon\nu \frac{\pi-B}{4} \sigma\upsilon\nu \frac{\pi-\Gamma}{4}$.

★ Δεύτερη όμάδα

43. Σέ κάθε τρίγωνο $AB\Gamma$ νά άποδειχθεί ότι:

- $\Sigma\eta\mu A \sigma\upsilon\nu B \sigma\upsilon\nu \Gamma = \eta\mu A \eta\mu B \eta\mu \Gamma$,
- $\Sigma\sigma\upsilon\nu A \eta\mu B \eta\mu \Gamma = 1 + \sigma\upsilon\nu A \sigma\upsilon\nu B \sigma\upsilon\nu \Gamma$,
- $\Sigma\eta\mu A \sigma\upsilon\nu(B-\Gamma) = 4\eta\mu A \eta\mu B \eta\mu \Gamma$,
- $\Sigma\sigma\upsilon\nu A \sigma\upsilon\nu(B-\Gamma) = 1 + 4\sigma\upsilon\nu A \sigma\upsilon\nu B \sigma\upsilon\nu \Gamma$,
- $\Sigma\eta\mu^2 A \eta\mu(B-\Gamma) = 0$,
- $\Sigma\eta\mu^2 A \sigma\upsilon\nu(B-\Gamma) - 3\eta\mu A \eta\mu B \eta\mu \Gamma = 0$,
- $\Sigma\eta\mu 3A \sigma\upsilon\nu(B-\Gamma) = 0$,
- $\Sigma\eta\mu 3A \eta\mu^2(B-\Gamma) = 0$.

44. Σέ κάθε κυρτό τετράπλευρο $AB\Gamma\Delta$ νά άποδειχθεί ότι:

- $\eta\mu A + \eta\mu B + \eta\mu \Gamma + \eta\mu \Delta = 4\eta\mu \frac{A+B}{2} \eta\mu \frac{B+\Gamma}{2} \eta\mu \frac{\Gamma+A}{2}$,
- $\sigma\upsilon\nu A + \sigma\upsilon\nu B + \sigma\upsilon\nu \Gamma + \sigma\upsilon\nu \Delta = 4\sigma\upsilon\nu \frac{A+B}{2} \sigma\upsilon\nu \frac{B+\Gamma}{2} \sigma\upsilon\nu \frac{\Gamma+A}{2}$.

45. *Αν σέ κάποιο τρίγωνο $AB\Gamma$ άληθεύει καθεμιός από τίς Ισότητες:

- $\sigma\varphi \frac{B}{2} = \frac{\eta\mu A + \eta\mu \Gamma}{\eta\mu B}$, 2. $\eta\mu A = \frac{\eta\mu B + \eta\mu \Gamma}{\sigma\upsilon\nu B + \sigma\upsilon\nu \Gamma}$
- $\eta\mu \Gamma = \sigma\upsilon\nu A + \sigma\upsilon\nu B$,

νά άποδειχθεί ότι τό τρίγωνο αυτό είναι όρθογώνιο καί άντιστρόφως.

46. *Αν σέ κάποιο τρίγωνο $AB\Gamma$ Ισχύει καθεμιός από τίς Ισότητες:

- $\Sigma \varepsilon\varphi \frac{A}{2} + \varepsilon\varphi \frac{A}{2} \varepsilon\varphi \frac{B}{2} \varepsilon\varphi \frac{\Gamma}{2} = 2$, 2. $\Sigma \sigma\upsilon\nu^2 A = 1$,
- $\eta\mu 2A + \eta\mu 2\Gamma = \eta\mu 2B$, 4. $\Sigma \eta\mu 4A = 0$,

νά άποδειχθεί ότι τό τρίγωνο αυτό είναι όρθογώνιο καί άντιστρόφως.

47. *Αν σέ τρίγωνο $AB\Gamma$ Ισχύει ή Ισότητα

$$\eta\mu 3A + \eta\mu 3B + \eta\mu 3\Gamma = 0,$$

νά αποδειχθεί ότι μία γωνία του τριγώνου είναι 60° .

48. "Αν $\eta\mu \frac{A}{2} \operatorname{cun}^3 \frac{B}{2} = \eta\mu \frac{B}{2} \operatorname{cun}^3 \frac{A}{2}$, τότε το τρίγωνο αυτό είναι ισοσκελές.

Έπίσης, αν $\operatorname{cun}^2 \frac{A}{2} = \eta\mu B \eta\mu \Gamma$.

49. "Αν $\operatorname{cun}3A + \operatorname{cun}3B + \operatorname{cun}3\Gamma = 1$, τότε μία γωνία του τριγώνου ABΓ είναι 120° .

50. Σε κάθε τρίγωνο ABΓ νά αποδειχθεί ότι:

$$1 + \sum \frac{\eta\mu\Gamma \operatorname{cun}B}{\eta\mu A \eta\mu^2 B} = (\sigma\phi A + \sigma\phi B + \sigma\phi \Gamma)^2.$$

51. "Αν $x + y + \omega = xy\omega$, νά αποδειχθεί ότι:

1. $\sum \frac{2x}{1-x^2} = \frac{2x}{1-x^2} \cdot \frac{2y}{1-y^2} \cdot \frac{2\omega}{1-\omega^2}$.

2. $\sum \frac{3x-x^3}{1-3x^2} = \frac{3x-x^3}{1-3x^2} \cdot \frac{3y-y^3}{1-3y^2} \cdot \frac{3\omega-\omega^3}{1-3\omega^2}$.

3. $\sum x(1-y^2)(1-\omega^2) = 4xy\omega$.

52. "Αν $A + B + \Gamma = 180^\circ$ και $v \in \mathbb{Z}$, νά αποδειχθεί ότι:

$$\eta\mu(2vA) + \eta\mu(2vB) + \eta\mu(2v\Gamma) = 4(-1)^{v-1} \eta\mu(vA) \eta\mu(vB) \eta\mu(v\Gamma).$$

**ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ
ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΙΓΩΝΟΥ**

● 34. ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ MOLLWEIDE. Σε κάθε τρίγωνο $AB\Gamma$ ισχύουν οι ακόλουθες σχέσεις:

$$\frac{\beta - \gamma}{\alpha} \text{ συν } \frac{A}{2} = \eta\mu \frac{B - \Gamma}{2}, \quad \frac{\beta + \gamma}{\alpha} \eta\mu \frac{A}{2} = \text{συν } \frac{B - \Gamma}{2},$$

$$\frac{\beta - \gamma}{\beta + \gamma} \sigma\phi \frac{A}{2} = \epsilon\phi \frac{B - \Gamma}{2}.$$

*Απόδειξη. *Αν $\beta > \gamma$, θά έχουμε διαδοχικά:

$$\begin{aligned} \frac{\beta - \gamma}{\alpha} \text{συν } \frac{A}{2} &= \frac{2R\eta\mu B - 2R\eta\mu\Gamma}{2R\eta\mu A} \text{συν } \frac{A}{2} = \frac{\eta\mu B - \eta\mu\Gamma}{\eta\mu A} \cdot \text{συν } \frac{A}{2} = \\ &= \frac{2\eta\mu \frac{B - \Gamma}{2} \text{συν } \frac{B + \Gamma}{2}}{2\eta\mu \frac{A}{2} \text{συν } \frac{A}{2}} \cdot \text{συν } \frac{A}{2} = \frac{\eta\mu \frac{B - \Gamma}{2} \text{συν } \frac{B + \Gamma}{2}}{\eta\mu \frac{A}{2}} = \eta\mu \frac{B - \Gamma}{2} \end{aligned} \quad (1)$$

$$\begin{aligned} \frac{\beta + \gamma}{\alpha} \eta\mu \frac{A}{2} &= \frac{2R\eta\mu B + 2R\eta\mu\Gamma}{2R\eta\mu A} \cdot \eta\mu \frac{A}{2} = \frac{\eta\mu B + \eta\mu\Gamma}{\eta\mu A} \cdot \eta\mu \frac{A}{2} = \\ &= \frac{2\eta\mu \frac{B + \Gamma}{2} \text{συν } \frac{B - \Gamma}{2}}{2\eta\mu \frac{A}{2} \text{συν } \frac{A}{2}} \cdot \eta\mu \frac{A}{2} = \frac{\eta\mu \frac{B + \Gamma}{2} \text{συν } \frac{B - \Gamma}{2}}{\text{συν } \frac{A}{2}} = \text{συν } \frac{B - \Gamma}{2} \end{aligned} \quad (2)$$

Με διαίρεση τώρα κατά μέλη τῶν (1) καὶ (2), βρίσκουμε :

$$\frac{\beta - \gamma}{\beta + \gamma} \sigma\phi \frac{A}{2} = \epsilon\phi \frac{B - \Gamma}{2} \quad (3)$$

καὶ μέ κυκλική ἐναλλαγή τῶν α, β, γ , ($\alpha > \beta > \gamma$) καὶ A, B, Γ βρίσκουμε τούς τύπους τοῦ Mollweide.

$\frac{\alpha - \beta}{\gamma} \text{συν } \frac{\Gamma}{2} = \eta\mu \frac{A - B}{2}$
$\frac{\beta - \gamma}{\alpha} \text{συν } \frac{A}{2} = \eta\mu \frac{B - \Gamma}{2}$
$\frac{\alpha - \gamma}{\beta} \text{συν } \frac{B}{2} = \eta\mu \frac{A - \Gamma}{2}$

(71)

$\frac{\beta + \gamma}{\alpha} \eta\mu \frac{A}{2} = \text{συν } \frac{B - \Gamma}{2}$
$\frac{\gamma + \alpha}{\beta} \eta\mu \frac{B}{2} = \text{συν } \frac{\Gamma - A}{2}$
$\frac{\alpha + \beta}{\gamma} \eta\mu \frac{\Gamma}{2} = \text{συν } \frac{A - B}{2}$

(72)

$$\frac{\alpha - \beta}{\alpha + \beta} \sigma\varphi \frac{\Gamma}{2} = \varepsilon\varphi \frac{A - B}{2} \frac{\beta - \gamma}{\beta + \gamma} \sigma\varphi \frac{A}{2} = \varepsilon\varphi \frac{B - \Gamma}{2}$$

$$\frac{\gamma - \alpha}{\gamma + \alpha} \sigma\varphi \frac{A}{2} = \varepsilon\varphi \frac{\Gamma - A}{2}$$
(73)

● 35. ΠΡΟΒΛΗΜΑ. Από τις πλευρές ενός τριγώνου $AB\Gamma$ νά υπολογισθοῦν οἱ τριγωνομετρικοί ἀριθμοὶ τῶν μισῶν γωνιῶν του.

Λύση. Ἐὰς ὑποθέσουμε ὅτι α, β, γ εἶναι οἱ πλευρὲς τοῦ τριγώνου $AB\Gamma$ καὶ 2τ ἡ περίμετρος του. Τότε θὰ ἔχουμε:

$$\alpha + \beta + \gamma = 2\tau \Rightarrow \begin{cases} \beta + \gamma - \alpha = 2\tau - 2\alpha = 2(\tau - \alpha), \\ \gamma + \alpha - \beta = 2\tau - 2\beta = 2(\tau - \beta), \\ \alpha + \beta - \gamma = 2\tau - 2\gamma = 2(\tau - \gamma). \end{cases}$$

Ἀπὸ τὸ νόμο τῶν συνημιτόνων ἔχουμε τὸν τύπο:

$$\alpha^2 = \beta^2 + \gamma^2 - 2\beta\gamma \cos A \Leftrightarrow \cos A = \frac{\beta^2 + \gamma^2 - \alpha^2}{2\beta\gamma} \quad (1)$$

Εἶναι ὁμως καὶ

$$2\cos^2 \frac{A}{2} = 1 + \cos A \quad (2) \quad \text{καὶ} \quad 2\eta\mu^2 \frac{A}{2} = 1 - \cos A \quad (3)$$

Ἐπομένως μὲ τὴ βοήθεια τῶν (1) καὶ (2) θὰ ἔχουμε:

$$\begin{aligned} 2\cos^2 \frac{A}{2} = 1 + \cos A &= 1 + \frac{\beta^2 + \gamma^2 - \alpha^2}{2\beta\gamma} = \frac{\beta^2 + \gamma^2 + 2\beta\gamma - \alpha^2}{2\beta\gamma} = \\ &= \frac{(\beta + \gamma)^2 - \alpha^2}{2\beta\gamma} = \frac{(\beta + \gamma + \alpha)(\beta + \gamma - \alpha)}{2\beta\gamma} = \frac{2\tau \cdot 2(\tau - \alpha)}{2\beta\gamma} = \frac{2\tau(\tau - \alpha)}{\beta\gamma} \end{aligned}$$

Ἐπειδὴ ὁμως $\frac{A}{2} < \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow \cos \frac{A}{2} > 0$ καὶ θὰ ἔχουμε:

$$\cos \frac{A}{2} = \sqrt{\frac{\tau(\tau - \alpha)}{\beta\gamma}}$$

Μὲ ὅμοιο τρόπο ἀπὸ τὴν (1) καὶ (3) βρίσκουμε: $\eta\mu \frac{A}{2} = \sqrt{\frac{(\tau - \beta)(\tau - \gamma)}{\beta\gamma}}$

Τέλος, μὲ κυκλικὴ ἐναλλαγή τῶν α, β, γ καὶ A, B, Γ βρίσκουμε:

$$\begin{aligned} \cos \frac{A}{2} &= \sqrt{\frac{\tau(\tau - \alpha)}{\beta\gamma}} \\ \cos \frac{B}{2} &= \sqrt{\frac{\tau(\tau - \beta)}{\gamma\alpha}} \\ \cos \frac{\Gamma}{2} &= \sqrt{\frac{\tau(\tau - \gamma)}{\alpha\beta}} \end{aligned} \quad (74)$$

$$\begin{aligned} \eta\mu \frac{A}{2} &= \sqrt{\frac{(\tau - \beta)(\tau - \gamma)}{\beta\gamma}} \\ \eta\mu \frac{B}{2} &= \sqrt{\frac{(\tau - \gamma)(\tau - \alpha)}{\gamma\alpha}} \\ \eta\mu \frac{\Gamma}{2} &= \sqrt{\frac{(\tau - \alpha)(\tau - \beta)}{\alpha\beta}} \end{aligned} \quad (75)$$

Διαιρώντας ξππειτα κατά μέλη, αντίστοιχως, τούς τύπους (75) μέ τούς τύπους (74) βρίσκουμε τούς τύπους:

$$(76) \begin{cases} \epsilon\phi \frac{A}{2} = \sqrt{\frac{(\tau-\beta)(\tau-\gamma)}{\tau(\tau-\alpha)}} \\ \epsilon\phi \frac{B}{2} = \sqrt{\frac{(\tau-\gamma)(\tau-\alpha)}{\tau(\tau-\beta)}} \\ \epsilon\phi \frac{\Gamma}{2} = \sqrt{\frac{(\tau-\alpha)(\tau-\beta)}{\tau(\tau-\gamma)}} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \sigma\phi \frac{A}{2} = \sqrt{\frac{\tau(\tau-\alpha)}{(\tau-\beta)(\tau-\gamma)}} \\ \sigma\phi \frac{B}{2} = \sqrt{\frac{\tau(\tau-\beta)}{(\tau-\gamma)(\tau-\alpha)}} \\ \sigma\phi \frac{\Gamma}{2} = \sqrt{\frac{\tau(\tau-\gamma)}{(\tau-\alpha)(\tau-\beta)}} \end{cases} (77)$$

★ Διερεύνηση: Γιά νά υπάρχουν οί γωνίες A, B, Γ, πρέπει:

$$\frac{(\tau-\beta)(\tau-\gamma)}{\tau(\tau-\alpha)} > 0 \text{ ή } (\tau-\alpha)(\tau-\beta)(\tau-\gamma) > 0, \text{ άφοϋ } \tau > 0$$

Γιά νά είναι όμως $(\tau-\alpha)(\tau-\beta)(\tau-\gamma) > 0$, πρέπει ή όλοι οί παράγοντες νά είναι θετικοί ή ένας θετικός καί οί άλλοι δύο άρνητικοί. *Αν δύο παράγοντες είναι άρνητικοί, π.χ. οί

$$\left. \begin{matrix} \tau-\beta < 0 \\ \tau-\gamma < 0 \end{matrix} \right\} \Rightarrow 2\tau-\beta-\gamma < 0 \Leftrightarrow \alpha < 0, \text{ πράγμα πού είναι άτοπο.}$$

*Αρα: $\tau-\alpha > 0 \Leftrightarrow \tau > \alpha \Leftrightarrow 2\tau > 2\alpha \Leftrightarrow 2\alpha < 2\tau \Leftrightarrow \alpha < \beta + \gamma$. Όμοίως (1)

$$\tau-\beta > 0 \Leftrightarrow \beta < \gamma + \alpha \quad (2) \text{ καί } \tau-\gamma > 0 \Rightarrow \gamma < \alpha + \beta \quad (3)$$

*Από τίς σχέσεις (2) καί (3) βρίσκουμε:

$$\left. \begin{matrix} -\alpha < \gamma-\beta \\ \gamma-\beta < \alpha \end{matrix} \right\} \Rightarrow -\alpha < \gamma-\beta < \alpha \Leftrightarrow |\gamma-\beta| < \alpha < \beta+\gamma$$

Μέ όμοιο τρόπο βρίσκουμε: $|\alpha-\gamma| < \beta < \alpha+\gamma$ καί $|\alpha-\beta| < \gamma < \alpha+\beta$

*Αν όμως α είναι ή μεγαλύτερη πλευρά, τότε άρκεί $\alpha < \beta + \gamma$.

Παρατήρηση. *Αν έργαστοϋμε μέ τόν ίδιο τρόπο στους τύπους (74) ή (75), θά έχουμε:

$$0 < \frac{\tau(\tau-\alpha)}{\beta\gamma} < 1, \text{ δηλαδή } 0 < \frac{\tau(\tau-\alpha)}{\beta\gamma} \text{ καί } \frac{\tau(\tau-\alpha)}{\beta\gamma} < 1$$

$$\begin{matrix} \text{ή } \tau(\tau-\alpha) > 0 & \text{καί} & \tau(\tau-\alpha) < \beta\gamma, \\ \text{ή } \tau-\alpha > 0 & \text{»} & (\beta+\gamma+\alpha)(\beta+\gamma-\alpha) < 4\beta\gamma, \\ \text{ή } \tau > \alpha & \text{»} & (\beta-\gamma)^2 - \alpha^2 < 0, \\ \text{ή } \alpha < \beta + \gamma & \text{»} & (\beta-\gamma+\alpha)(\beta-\gamma-\alpha) < 0 \end{matrix} \quad (4)$$

Τό πρώτο μέλος τής (4) είναι δευτεροβάθμιο τριώνυμο ώς πρός β. Για νά είναι τό τριώνυμο αυτό άρνητικό, δηλαδή νά έχει σημείο αντίθετο από τό σημείο του συντελεστοϋ του β², πρέπει καί άρκεί ό β νά βρίσκεται άνάμεσα στίς ρίζες του τριωνύμου. Δηλαδή πρέπει:

$$\gamma-\alpha < \beta < \gamma + \alpha, \text{ άπ' όπου: } \gamma < \alpha + \beta \text{ καί } \beta < \alpha + \gamma.$$

Επομένως θα έχουμε:

$$\left. \begin{array}{l} \alpha < \beta + \gamma, \\ \beta < \gamma + \alpha, \\ \gamma < \alpha + \beta \end{array} \right\} \Rightarrow \left. \begin{array}{l} |\beta - \gamma| < \alpha < \beta + \gamma, \\ |\gamma - \alpha| < \beta < \gamma + \alpha, \\ |\alpha - \beta| < \gamma < \alpha + \beta. \end{array} \right.$$


● 36. **Έμβαδό τριγώνου.** *Ας υποθέσουμε ότι α, β, γ είναι οι πλευρές του τριγώνου $AB\Gamma$ και E τό έμβαδό του. Φέρνουμε τά ύψη του AD και BZ .

*Από τό σχήμα 5 έχουμε:

$$AD = \beta \eta\mu\Gamma, AD = \gamma \eta\mu B \text{ και } BZ = \gamma \eta\mu A.$$

Τό έμβαδό του τριγώνου $AB\Gamma$ είναι:

$$\begin{aligned} E &= \frac{1}{2} \beta \cdot BZ = \frac{1}{2} \cdot \alpha \cdot AD = \frac{1}{2} \beta \gamma \eta\mu A \\ &= \frac{1}{2} \alpha \beta \eta\mu\Gamma = \frac{1}{2} \alpha \gamma \eta\mu B. \end{aligned}$$



Σχ. 5

*Ωστε :

$$\boxed{E = \frac{1}{2} \beta \gamma \eta\mu A = \frac{1}{2} \gamma \alpha \eta\mu B = \frac{1}{2} \alpha \beta \eta\mu\Gamma} \quad (78)$$

Οί σχέσεις (78) δείχνουν ότι : Τό έμβαδό κάθε τριγώνου είναι ίσο μέ τό μισό του γινομένου δύο πλευρών του επί τό ήμίτονο τής γωνίας, ή όποία περιέχεται σ' αυτές τίσ πλευρές.

Συνέπεια : *Επειδή είναι $\eta\mu\Gamma = \frac{\gamma}{2R}$, θα έχουμε:

$$E = \frac{1}{2} \alpha \beta \eta\mu\Gamma = \frac{1}{2} \alpha \beta \cdot \frac{\gamma}{2R} = \frac{\alpha \beta \gamma}{4R} \Leftrightarrow \boxed{\alpha \beta \gamma = 4ER} \quad (79)$$

● 37. **ΠΡΟΒΛΗΜΑ.** *Από τίς πλευρές ενός τριγώνου $AB\Gamma$ νά υπολογισθεί τό έμβαδό του.

Λύση. *Έχουμε διαδοχικά:

$$\begin{aligned} E &= \frac{1}{2} \beta \gamma \eta\mu A = \frac{1}{2} \beta \gamma \cdot 2\eta\mu \frac{A}{2} \sigma\upsilon\nu \frac{A}{2} = \beta \gamma \eta\mu \frac{A}{2} \sigma\upsilon\nu \frac{A}{2} = \\ &= \beta \gamma \cdot \sqrt{\frac{(\tau - \beta)(\tau - \gamma)}{\beta \gamma}} \cdot \sqrt{\frac{\tau(\tau - \alpha)}{\beta \gamma}} = \sqrt{\tau(\tau - \alpha)(\tau - \beta)(\tau - \gamma)} \end{aligned}$$

*Ωστε:

$$\boxed{E = \sqrt{\tau(\tau - \alpha)(\tau - \beta)(\tau - \gamma)}} \quad (80)$$

*Ο τύπος αυτός καλείται τύπος του ***Ηρώνας**.

● 38. **ΠΡΟΒΛΗΜΑ.** *Από τίς πλευρές ενός τριγώνου $AB\Gamma$, νά υπολογισθεί ή άκτίνα του περιγεγραμμένου κύκλου.

Λύση. Από τούς γνωστούς τύπους:

$$\alpha\beta\gamma = 4ER \text{ και } E = \sqrt{\tau(\tau - \alpha)(\tau - \beta)(\tau - \gamma)}$$

μέ ἀπαλοιφή τοῦ E βρίσκουμε:

$$R = \frac{\alpha\beta\gamma}{\sqrt{(\tau - \alpha)(\tau - \beta)(\tau - \gamma)}} \quad (81)$$

● **39. ΠΡΟΒΛΗΜΑ.** Από τὰ ἡμίτονα τῶν γωνιῶν ἑνός τριγώνου $AB\Gamma$ καί τήν ἀκτίνα R τοῦ περιγεγραμμένου κύκλου, νά ὑπολογισθεῖ τό ἐμβαδό τοῦ τριγώνου.

Λύση. Από τίς γνωστές σχέσεις:

$$\alpha = 2R\eta\mu A, \beta = 2R\eta\mu B, \gamma = 2R\eta\mu\Gamma$$

καί τόν τύπο: $\alpha\beta\gamma = 4ER$, ἔχουμε διαδοχικά:

$$E = \frac{\alpha\beta\gamma}{4R} = \frac{2R\eta\mu A \cdot 2R\eta\mu B \cdot 2R\eta\mu\Gamma}{4R} = 2R^2\eta\mu A \eta\mu B \eta\mu\Gamma$$

Ὡστε:

$$E = 2R^2\eta\mu A \eta\mu B \eta\mu\Gamma \quad (82)$$

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

α) Νά ὑπολογισθοῦν οἱ γωνίες B καί Γ ἑνός τριγώνου $AB\Gamma$ ἀπό τὰ γνωστά στοιχεῖα του:

$$A = 60^\circ \text{ και } a = (\beta - \gamma) \sqrt{3},$$

Λύση. Από τό δεύτερο τύπο τοῦ Mollweide ἔχουμε:

$$\begin{aligned} \eta\mu \frac{B - \Gamma}{2} &= \frac{\beta - \gamma}{\alpha} \text{ συν} \frac{A}{2} = \frac{\beta - \gamma}{(\beta - \gamma)\sqrt{3}} \text{ συν} \frac{60^\circ}{2} = \frac{1}{\sqrt{3}} \text{ συν} 30^\circ = \\ &= \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{1}{2} = \eta\mu 30^\circ. \end{aligned}$$

$$\text{Ἄρα θά εἶναι: } \frac{B - \Gamma}{2} = 30^\circ \Rightarrow B - \Gamma = 60^\circ \quad (1)$$

$$\text{Ἐπειδή ὁμως: } B + \Gamma = 180^\circ - A = 180^\circ - 60^\circ = 120^\circ \quad (2)$$

ἀπό τίς σχέσεις (1) καί (2) προκύπτει: $B = 90^\circ$ καί $\Gamma = 30^\circ$.

Συμπέρασμα: Τό τρίγωνο $AB\Gamma$ ἔχει: $A = 60^\circ$, $B = 90^\circ$, $\Gamma = 30^\circ$, δηλαδή εἶναι ὀρθογώνιο στήν κορυφή B .

β) Σέ κάθε τρίγωνο $AB\Gamma$ ἀληθεύει ἡ σχέση:

$$\beta^2\eta\mu 2\Gamma + \gamma^2\eta\mu 2B = 4E$$

Ἀπόδειξη. Ἐχουμε διαδοχικά:

$$\begin{aligned} \beta^2\eta\mu 2\Gamma + \gamma^2\eta\mu 2B &= 2\beta^2\eta\mu\Gamma \text{ συν}\Gamma + 2\gamma^2\eta\mu B \text{ συν}B = \\ &= 2\beta^2\eta\mu\Gamma \text{ συν}\Gamma + 2\gamma \cdot \beta\eta\mu\Gamma \text{ συν}B = 2\beta\eta\mu\Gamma (\beta \text{ συν}\Gamma + \gamma \text{ συν}B) = \\ &= 2\beta\eta\mu\Gamma \cdot \alpha = 2\alpha\beta\eta\mu\Gamma = 4E, \end{aligned}$$

ἀφοῦ ξέρομε ἀπό τήν προηγούμενη τάξη ὅτι εἶναι:

$$\alpha = \beta \text{ συν}\Gamma + \gamma \text{ συν}B, \gamma\eta\mu B = \beta\eta\mu\Gamma, \alpha\eta\mu\Gamma = \gamma\eta\mu A.$$

γ) *Αν οι πλευρές a, β, γ και η γωνία B ενός τριγώνου $AB\Gamma$ ικανοποιούν την ισότητα:

$$\alpha + \gamma = \beta \sigma\phi \frac{B}{2} \quad (1)$$

νά βρεθεί τό είδος τοῦ τριγώνου.

Λύση. Ἡ ισότητα (1) γράφεται:

$$2R\eta\mu A + 2R\eta\mu\Gamma = 2R\eta\mu B \sigma\phi \frac{B}{2} \Leftrightarrow \eta\mu A + \eta\mu\Gamma = \eta\mu B \sigma\phi \frac{B}{2} \Leftrightarrow$$

$$2\eta\mu \frac{A+\Gamma}{2} \sigma\upsilon\nu \frac{A-\Gamma}{2} = 2\eta\mu \frac{B}{2} \sigma\upsilon\nu \frac{B}{2} \cdot \frac{\sigma\upsilon\nu \frac{B}{2}}{\eta\mu \frac{B}{2}} \Leftrightarrow \sigma\upsilon\nu \frac{A-\Gamma}{2} = \sigma\upsilon\nu \frac{B}{2} \quad (2)$$

*Αρα θά είναι: $\frac{B}{2} = \frac{A-\Gamma}{2} \Leftrightarrow B + \Gamma = A \Leftrightarrow A = 90^\circ$

ή $\frac{B}{2} = \frac{\Gamma-A}{2} \Leftrightarrow B + A = \Gamma \Leftrightarrow \Gamma = 90^\circ.$

*Αρα τό τρίγωνο $AB\Gamma$ θά είναι ὀρθογώνιο ἤ στήν κορυφή A ἤ στήν κορυφή Γ .

*Από τή σχέση (2) θά μπορούσε νά προκύψει ὅτι ἰσχύουν οἱ σχέσεις:

$$\frac{B}{2} = \frac{\Gamma-A}{2} + k \cdot 360^\circ \quad \text{ἢ} \quad \frac{B}{2} = \frac{A-\Gamma}{2} + k \cdot 360^\circ, \quad k \in \mathbb{Z},$$

οἱ ὁποῖες ὁμως ἀπορρίπτονται, γιατί:

$$\frac{B}{2} < 90^\circ \quad \text{καί} \quad \left| \frac{A-\Gamma}{2} \right| < 90^\circ. \quad \text{*Αρα } k = 0.$$

δ) Σέ κάθε τρίγωνο $AB\Gamma$ ἀληθεύει ἡ σχέση:

$$(\alpha + \beta + \gamma) \left(\varepsilon\phi \frac{A}{2} + \varepsilon\phi \frac{B}{2} \right) = 2\gamma \sigma\phi \frac{\Gamma}{2}.$$

*Απόδειξη. Ἔχουμε διαδοχικά:

$$(\alpha + \beta + \gamma) \left(\varepsilon\phi \frac{A}{2} + \varepsilon\phi \frac{B}{2} \right) = 2R(\eta\mu A + \eta\mu B + \eta\mu\Gamma) \cdot \frac{\eta\mu \frac{A+B}{2}}{\sigma\upsilon\nu \frac{A}{2} \sigma\upsilon\nu \frac{B}{2}} =$$

$$= 2R \cdot 4\sigma\upsilon\nu \frac{A}{2} \sigma\upsilon\nu \frac{B}{2} \sigma\upsilon\nu \frac{\Gamma}{2} \cdot \frac{\sigma\upsilon\nu \frac{\Gamma}{2}}{\sigma\upsilon\nu \frac{A}{2} \sigma\upsilon\nu \frac{B}{2}} = 8R \sigma\upsilon\nu^2 \frac{\Gamma}{2} =$$

$$= 8R \cdot \eta\mu \frac{\Gamma}{2} \cdot \frac{\sigma\upsilon\nu^2 \frac{\Gamma}{2}}{\eta\mu \frac{\Gamma}{2}} = 8R\eta\mu \frac{\Gamma}{2} \cdot \sigma\upsilon\nu \frac{\Gamma}{2} \cdot \frac{\sigma\upsilon\nu \frac{\Gamma}{2}}{\eta\mu \frac{\Gamma}{2}} =$$

$$= 2R \cdot 2 \cdot 2\eta\mu \frac{\Gamma}{2} \sigma\upsilon\nu \frac{\Gamma}{2} \cdot \sigma\varphi \frac{\Gamma}{2} = 2 \cdot 2R\eta\mu\Gamma \sigma\varphi \frac{\Gamma}{2} = 2\gamma\sigma\varphi \frac{\Gamma}{2}.$$

ε) *Αν οι πλευρές ενός τριγώνου $AB\Gamma$ ικανοποιούν τήν ισότητα:

$$\alpha + \gamma = 2\beta, \text{ τότε } \sigma\varphi \frac{A}{2} + \sigma\varphi \frac{\Gamma}{2} = 2\sigma\varphi \frac{B}{2}$$

καί αντίστροφως.

*Απόδειξη. Από τή σχέση:

$\alpha + \gamma = 2\beta \Leftrightarrow 2\tau - (\alpha + \gamma) = 2\tau - 2\beta \Leftrightarrow (\tau - \alpha) + (\tau - \gamma) = 2(\tau - \beta)$
 διαιρώντας τά μέλη της μέ τήν παράσταση

$$\sqrt{\frac{(\tau - \alpha)(\tau - \beta)(\tau - \gamma)}{\tau}}$$

βρίσκουμε τή σχέση:

$$\sqrt{\frac{\tau(\tau - \alpha)}{(\tau - \beta)(\tau - \gamma)}} + \sqrt{\frac{\tau(\tau - \gamma)}{(\tau - \alpha)(\tau - \beta)}} = 2 \cdot \sqrt{\frac{\tau(\tau - \beta)}{(\tau - \gamma)(\tau - \alpha)}}$$

άπό τήν όποία, μέ βάση τούς τύπους (77), βρίσκουμε:

$$\sigma\varphi \frac{A}{2} + \sigma\varphi \frac{\Gamma}{2} = 2\sigma\varphi \frac{B}{2}.$$

Η αντίστροφη πρόταση άποδεικνύεται εύκολα, άφοῦ όλες οι προηγούμενες πράξεις είναι άντιστρεπτές.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Πρώτη ομάδα

53. *Αν σ' ένα τρίγωνο $AB\Gamma$ είναι $\Gamma = 120^\circ$ καί $2\alpha = \beta(\sqrt{3} - 1)$, νά υπολογισθοῦν οι γωνίες αὐτοῦ τοῦ τριγώνου.

54. *Αν σ' ένα τρίγωνο $AB\Gamma$ είναι $3\alpha = (\beta + \gamma)\sqrt{3}$ καί $A = 60^\circ$, νά υπολογισθοῦν οι άλλες γωνίες αὐτοῦ τοῦ τριγώνου.

55. *Αν σ' ένα τρίγωνο $AB\Gamma$ είναι $\beta = 2\gamma$ καί $A = 60^\circ$, νά υπολογισθοῦν οι άλλες γωνίες αὐτοῦ τοῦ τριγώνου.

56. *Αν σ' ένα τρίγωνο $AB\Gamma$ είναι $\beta = \alpha(\sqrt{3} - 1)$ καί $\Gamma = 30^\circ$, νά υπολογισθοῦν οι άλλες γωνίες αὐτοῦ τοῦ τριγώνου.

57. *Αν σ' ένα τρίγωνο $AB\Gamma$ είναι $\alpha = 2$, $\gamma = \sqrt{2}$, $B = 15^\circ$, νά υπολογισθοῦν οι άλλες γωνίες αὐτοῦ τοῦ τριγώνου.

58. Σέ κάθε τρίγωνο $AB\Gamma$ Ισχύουν οι ακόλουθες Ισότητες:

1. $\alpha(\beta\sigma\upsilon\nu\Gamma - \gamma\sigma\upsilon\nu B) = \beta^2 - \gamma^2$,
2. $\alpha(\sigma\upsilon\nu B + \sigma\upsilon\nu\Gamma) = 2(\beta + \gamma)\eta\mu^2 \frac{A}{2}$.

3. $(\beta + \gamma - \alpha) \left(\sigma\phi \frac{B}{2} + \sigma\phi \frac{\Gamma}{2} \right) = 2\alpha\sigma\phi \frac{A}{2},$
4. $\frac{\beta^2 - \gamma^2}{\alpha^2} \eta\mu 2A + \frac{\gamma^2 - \alpha^2}{\beta^2} \eta\mu 2B + \frac{\alpha^2 - \beta^2}{\gamma^2} \eta\mu 2\Gamma = 0.$

★ Δεύτερη ομάδα

59. Σέ κάθε τρίγωνο ΑΒΓ Ισχύουν οι Ισότητες:

1. $\frac{\alpha\eta\mu(B-\Gamma)}{\beta^2-\gamma^2} = \frac{\beta\eta\mu(\Gamma-A)}{\gamma^2-\alpha^2} = \frac{\gamma\eta\mu(A-B)}{\alpha^2-\beta^2},$
2. $\Sigma(\beta-\gamma)\sigma\phi\frac{A}{2} = 0,$
3. $\Sigma(\beta^2-\gamma^2)\sigma\phi A = 0,$
4. $\Sigma(\alpha+\beta)\epsilon\phi\frac{A+B}{2} = 0,$
5. $\Sigma\frac{\beta}{\alpha\eta\mu\Gamma} = 2\sigma\phi A,$
6. $\Sigma\alpha\sigma\upsilon\nu A = \frac{2E}{R},$
7. $\Sigma\frac{\sigma\upsilon\nu A\sigma\upsilon\nu B}{\alpha\beta} = \frac{1}{4R^2},$
8. $\Sigma(\alpha-\beta)\epsilon\phi\frac{A+B}{2} = 0,$
9. $\Sigma\alpha\eta\mu\frac{B-\Gamma}{2}\sigma\tau\epsilon\mu\frac{A}{2} = 0.$

60. Σέ κάθε τρίγωνο ΑΒΓ νά άποδειχθεί ότι:

1. $\alpha^2 = \beta^2 + \gamma^2 - 4E\sigma\phi A,$
2. $2E(\sigma\phi B - \sigma\phi A) = \alpha^2 - \beta^2,$
3. $\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 = 4E\Sigma\sigma\phi A,$
4. $1 - \epsilon\phi\frac{A}{2}\epsilon\phi\frac{B}{2} = \frac{\gamma}{\tau}.$

61. *Αν σέ τρίγωνο ΑΒΓ Ισχύουν οι σχέσεις:

1. $\alpha = 2\beta\eta\mu\frac{A}{2},$
2. $\eta\mu A = 2\eta\mu B\sigma\upsilon\nu\Gamma,$
3. $\alpha = 2\beta\sigma\upsilon\nu\Gamma,$
4. $(\tau - \beta)\sigma\phi\frac{\Gamma}{2} = \tau\epsilon\phi\frac{B}{2},$
5. $2\nu_\alpha = \alpha\sigma\phi\frac{A}{2},$
6. $4E = \alpha^2\sigma\phi\frac{A}{2},$
7. $\frac{\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2}{2E} = \sigma\phi\frac{A}{2} + 3\epsilon\phi\frac{A}{2},$
8. $\alpha\epsilon\phi A + B\epsilon\phi\beta = (\alpha + \beta)\epsilon\phi\frac{A+B}{2}$

νά άποδειχθεί ότι τό τρίγωνο αυτό είναι Ισοσκελές.

62. *Αν σέ τρίγωνο ΑΒΓ είναι:

$$\eta\mu\Gamma(\sigma\upsilon\nu A + 2\sigma\upsilon\nu\Gamma) = \eta\mu B(\sigma\upsilon\nu A + 2\sigma\upsilon\nu B),$$

νά άποδειχθεί ότι τό τρίγωνο αυτό είναι Ισοσκελές ή όρθογώνιο.

63. Σ' ένα τρίγωνο ΑΒΓ είναι: $(1 - \sigma\phi\Gamma)[1 + \sigma\phi(45^\circ - B)] = 2.$ Νά άποδειχθεί ότι αυτό είναι όρθογώνιο.

64. *Αν σέ τρίγωνο ΑΒΓ είναι $A = 90^\circ$ καί $4E = \alpha^2,$ τό τρίγωνο αυτό θά είναι Ισοσκελές.

65. *Αν σ' ένα τρίγωνο ΑΒΓ είναι:

$$\beta^3 + \gamma^3 - \alpha^3 = \alpha^2(\beta + \gamma - \alpha) \text{ καί } 4\eta\mu B\eta\mu\Gamma = 3,$$

τό τρίγωνο αυτό είναι Ισόπλευρο.

66. *Αν σ' ένα τρίγωνο ΑΒΓ είναι $A = 120^\circ,$ νά άποδειχθεί ότι:

$$\gamma(\alpha^2 - \gamma^2) = \beta(\alpha^2 - \beta^2).$$

67. *Αν οι πλευρές ενός τριγώνου άποτελούν άριθμητική πρόοδο, νά άποδειχθεί ότι τά ήμίτονα τών γωνιών πού βρίσκονται άπέναντι άπό τις πλευρές αυτές άποτελούν άριθμητική πρόοδο.

68. *Αν σ' ένα τρίγωνο ΑΒΓ είναι $\alpha^2 + \gamma^2 = 2\beta^2,$ νά άποδειχθεί ότι:

$$\sigma\phi A + \sigma\phi\Gamma = 2\sigma\phi B$$

καί άντιστρόφως.

69. Σ' ένα τρίγωνο ΑΒΓ είναι $\alpha + \gamma = 2\beta$. Νά αποδειχθεί ότι:

$$1. \quad \text{συν}A \sigma\varphi \frac{A}{2} + \text{συν}Γ \sigma\varphi \frac{\Gamma}{2} = 2\text{συν}B \sigma\varphi \frac{B}{2},$$

$$2. \quad \alpha \text{συν}^2 \frac{\Gamma}{2} + \gamma \text{συν}^2 \frac{A}{2} = \frac{3\beta}{2},$$

$$3. \quad \sigma\varphi \frac{A}{2} + \sigma\varphi \frac{\Gamma}{2} = 2\sigma\varphi \frac{B}{2},$$

$$4. \quad \varepsilon\varphi \frac{A}{2} \varepsilon\varphi \frac{\Gamma}{2} = \frac{1}{3}.$$

Ίσχύουν τὰ αντίστροφα των;

70. "Αν οι πλευρές α, β, γ τριγώνου ΑΒΓ άποτελοῦν άρμονική πρόοδο, νά άποδειχθεί ότι καί οι άριθμοί

$$\eta\mu^2 \frac{A}{2}, \quad \eta\mu^2 \frac{B}{2}, \quad \eta\mu^2 \frac{\Gamma}{2}$$

άποτελοῦν άρμονική πρόοδο.

71. Σ' ένα τρίγωνο ΑΒΓ είναι $\alpha + \gamma = 2\beta$ καί $A - \Gamma = 90^\circ$. Νά άποδειχθεί ότι:

$$\frac{\alpha}{\sqrt{7} + 1} = \frac{\beta}{7} = \frac{\gamma}{\sqrt{7} - 1}$$

72. "Αν σ' ένα τρίγωνο ΑΒΓ είναι $\Gamma = 60^\circ$, νά άποδειχθεί ότι:

$$\frac{1}{\alpha + \gamma} + \frac{1}{\beta + \gamma} = \frac{3}{\alpha + \beta + \gamma}$$

καί αντίστροφως.

73. "Αν $\text{συν}A = \text{συν} \alpha \eta\mu\beta$, $\text{συν}B = \text{συν} \beta \eta\mu\gamma$, $\text{συν}Γ = \text{συν} \gamma \eta\mu \alpha$ καί $A + B + \Gamma = \pi$, νά άποδειχθεί ότι:

$$\varepsilon\varphi \alpha \varepsilon\varphi \beta \varepsilon\varphi \gamma = 1.$$

74. "Αν $\text{συν}A = \varepsilon\varphi \beta \varepsilon\varphi \gamma$, $\text{συν}B = \varepsilon\varphi \gamma \varepsilon\varphi \alpha$, $\text{συν}Γ = \varepsilon\varphi \alpha \varepsilon\varphi \beta$ καί $A + B + \Gamma = \pi$, νά άποδειχθεί ότι:

$$\eta\mu^2 \alpha + \eta\mu^2 \beta + \eta\mu^2 \gamma = 1.$$

75. Σέ κάθε τρίγωνο ΑΒΓ νά άποδειχθεί ότι:

$$\sigma\varphi A + \sigma\varphi B + \sigma\varphi \Gamma \geq \sqrt{3}.$$

76. "Αν σ' ένα τρίγωνο ΑΒΓ άληθεύει ή Ισότητα:

$$\eta\mu 4A + \eta\mu 4B + \eta\mu 4\Gamma = 0,$$

νά άποδειχθεί ότι αυτό είναι όρθογώνιο.

77. "Αφοῦ άποδειχθεί ή ταυτότητα:

$$\varepsilon\varphi x = \sigma\varphi x - 2\sigma\varphi 2x,$$

νά άποδειχθεί άκόλουθως ότι:

$$S_n = \frac{1}{2} \varepsilon\varphi \frac{x}{2} + \frac{1}{2^2} \varepsilon\varphi \frac{x}{2^2} + \dots + \frac{1}{2^n} \varepsilon\varphi \frac{x}{2^n} = \frac{1}{2^n} \sigma\varphi \frac{x}{2^n} - \sigma\varphi x,$$

όπου $0 < x < \frac{\pi}{2}$

78. Νά άποδειχθεί ότι υπάρχουν δύο άριθμοί x καί y , τέτοιοι ώστε:

$$\sigma\tau\epsilon\mu \alpha = x \varepsilon\varphi \frac{\alpha}{2} + y \sigma\varphi \alpha,$$

όποιοδήποτε καί άν είναι τό α . "Ακολουθως δείξτε ότι:


$$S_n = \sigma\tau\epsilon\mu \alpha + \sigma\tau\epsilon\mu 2\alpha + \sigma\tau\epsilon\mu 4\alpha + \dots + \sigma\tau\epsilon\mu 2^n \alpha = \sigma\varphi \frac{\alpha}{2} - \varepsilon\varphi 2^n \alpha.$$

ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

● 40. **Ανάγκη τῶν τριγωνομετρικῶν πινάκων.** Οἱ τριγωνομετρικοὶ ἀριθμοὶ τῶν γωνιῶν χρησιμοποιοῦνται γιὰ τὴν ἐκπλήρωση τοῦ σκοποῦ τῆς Τριγωνομετρίας. Γιὰ νὰ γίνῃ αὐτὸ ἀντιληπτὸ ἀπὸ τώρα, λύνουμε τὸ ἀκόλουθο πρόβλημα.

● 41. **ΠΡΟΒΛΗΜΑ.** "Ἐνα ὀρθογώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$ ἔχει $a = 20\text{ m}$ καὶ $\beta = 12\text{ m}$. Νά ὑπολογισθεῖ ἡ γωνία του B .

Λύση. Μὲ κέντρο τὸ B καὶ ἀκτίνα $B\Delta = 1$ γράφουμε κύκλο, πού κόβει τὴν ὑποτείνουσα $B\Gamma$ στὸ Δ καὶ τὴν κάθετη πλευρὰ AB στὸ E . Φέρνουμε τὴ DZ κάθετη στὴν AB . Ἀπὸ τὰ ὅμοια τρίγωνα $BZ\Delta$ καὶ $BA\Gamma$ ἔχουμε :



$$\frac{\beta}{Z\Delta} = \frac{\alpha}{B\Delta} = \frac{\alpha}{1} \quad \eta \quad \frac{\beta}{\eta\mu B} = \frac{\alpha}{1} \Leftrightarrow$$

$$\eta\mu B = \frac{\beta}{\alpha} = \frac{12}{20} = \frac{6}{10} = 0,6 \quad (1)$$

Ἀπὸ τὴ σχέση αὐτὴ φαίνεται ὅτι γνωρίζουμε τὸ $\eta\mu B$, ὄχι ὅμως καὶ τὴ γωνία B .

Γιὰ τὸν ὑπολογισμὸ τῆς γωνίας B ἐργαζόμαστε ὡς ἑξῆς:

Παίρνουμε τοὺς λογαρίθμους καὶ τῶν δύο μελῶν τῆς ἰσότητος (1) καὶ ἔχουμε:

$$\log \eta\mu B = \log 0,6 = \bar{1},77815.$$

"Ἄν, λοιπόν, ἔχουμε πίνακα, πού νὰ περιέχει τοὺς λογαρίθμους τῶν τριγωνομετρικῶν ἀριθμῶν τῶν γωνιῶν, μπορούμε νὰ βροῦμε τὴ γωνία B , τῆς ὁποίας τὸ ἡμίτονο ἔχει λογαρίθμο τὸν ἀριθμὸ $\bar{1},77815$. Τέτοιοι πίνακες ὑπάρχουν διαφόρων εἰδῶν.

"Ἐνας περιέχει τοὺς λογαρίθμους τῶν τριγωνομετρικῶν ἀριθμῶν, ἡμιτόνου, συνημιτόνου, ἐφαπτομένης καὶ συνεφαπτομένης μὲ 7 δεκαδικὰ ψηφία, ἄλλος μὲ 11 δεκαδικὰ ψηφία, ἄλλος μὲ 20 δεκαδικὰ ψηφία καὶ ἄλλος μὲ 5 δεκαδικὰ ψηφία.

Γιὰ τίς συνηθισμένες ὁμως ἐφαρμογές ἀρκεῖ ὁ πενταψήφιος πίνακας, τοῦ ὁποίου ὑπάρχουν καὶ ἑλληνικὲς ἐκδόσεις κατὰ τὸ σύστημα Dupuis.

"Ἐναν τέτοιο πίνακα θὰ περιγράψουμε μὲ συντομία καὶ θὰ ἐκθέσουμε καὶ τὸν τρόπο τῆς χρήσεώς του.

● 42. Περιγραφή τῶν λογαριθμικῶν πινάκων Dupuis.

Οἱ πίνακες τοῦ Dupuis περιέχουν τοὺς λογαρίθμους τοῦ ἡμίτονου, τῆς ἐφαπτομένης, τῆς συνεφαπτομένης καὶ τοῦ συνημιτόνου τῶν τόξων ἀπὸ 0° μέχρις 90°, τὰ ὁποῖα αὐξάνουν κατὰ 1'.

Ὁ ἀριθμὸς τῶν μοιρῶν ἀναγράφεται ἔξω ἀπὸ τὸ πλαίσιο τοῦ πίνακα. Γιά τὰ τόξα ποὺ ἔχουν λιγότερες ἀπὸ 45°, ὁ ἀριθμὸς τῶν μοιρῶν γράφεται στὸ ἐπάνω μέρος τῆς σελίδας. Γιά τὰ ἄλλα τόξα ὁ ἀριθμὸς τῶν μοιρῶν γράφεται στὸ κάτω μέρος τῆς σελίδας.

Οἱ ἀριθμοὶ τῶν πρώτων λεπτῶν στὰ τόξα τὰ μικρότερα ἀπὸ 45° ἀναγράφονται στὴν πρώτη στήλη ἀριστερά, ἡ ὁποία ἔχει ὡς ἐπικεφαλίδα μιὰ ὀξεῖα ('), ἐνῶ στὰ ἄλλα τόξα γράφεται στὴν πρώτη στήλη ἀπὸ τὰ δεξιά.

Στὴν ἀριστερὴ στήλη τὰ πρώτα λεπτά αὐξάνονται ἀπὸ πάνω πρὸς τὰ κάτω, ἐνῶ στὴ δεξιά αὐξάνονται ἀπὸ κάτω πρὸς τὰ πάνω.

Μέ τὴν παραπάνω διάταξη οἱ ἀριθμοὶ τῶν πρώτων λεπτῶν δύο συμπληρωματικῶν τόξων βρίσκονται στὴν ἴδια ὀριζόντια γραμμὴ. Οἱ λογάριθμοι τοῦ καθενὸς ἀπὸ τοὺς τριγωνομετρικοὺς ἀριθμοὺς ἑνὸς τόξου, ποὺ εἶναι μικρότερο ἀπὸ 45°, καὶ δὲν περιέχει δεῦτερα λεπτά, βρίσκεται στὴ διασταύρωση τῆς ἀντίστοιχης ὀριζόντιας γραμμῆς τῶν πρώτων λεπτῶν καὶ τῆς στήλης, ἡ ὁποία ἔχει ὡς ἐπικεφαλίδα τὸν τριγωνομετρικὸ ἀριθμὸ.

*Ἄν ὁμως τὸ τόξο περιέχεται μεταξύ 45° καὶ 90° καὶ δὲν ἔχει δεῦτερα λεπτά, ὁ λογάριθμος καθενὸς τριγωνομετρικοῦ ἀριθμοῦ βρίσκεται στὴ διασταύρωση τῆς ἀντίστοιχης γραμμῆς τῶν πρώτων λεπτῶν καὶ τῆς στήλης, ἡ ὁποία στὸ κάτω μέρος τῆς ἔχει τὴν ὀνομασία τοῦ τριγωνομετρικοῦ ἀριθμοῦ.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

$\log \eta\mu (18^\circ 25') = \bar{1},49958$ $\log \eta\mu (39^\circ 56') = \bar{1},80746$	$\log \eta\mu (67^\circ 16') = \bar{1},96488$ $\log \eta\mu (78^\circ 33') = \bar{1},99127$
$\log \sigma\upsilon\nu (24^\circ 12') = \bar{1},96005$ $\log \sigma\upsilon\nu (43^\circ 52') = \bar{1},85791$	$\log \sigma\upsilon\nu (62^\circ 10') = \bar{1},66922$ $\log \sigma\upsilon\nu (56^\circ 53') = \bar{1},73747$
$\log \epsilon\phi (30^\circ 14') = \bar{1},76551$ $\log \epsilon\phi (39^\circ 27') = \bar{1},91533$	$\log \epsilon\phi (61^\circ 58') = 0,27372$ $\log \epsilon\phi (48^\circ 19') = 0,05039.$
$\log \sigma\phi (29^\circ 39') = 0,24471$ $\log \sigma\phi (44^\circ 51') = 0,00227$	$\log \sigma\phi (52^\circ 11') = \bar{1},88994$ $\log \sigma\phi (77^\circ 38') = \bar{1},34095$

Ὄταν οἱ λογάριθμοι ἔχουν κοινὰ τὰ δύο πρώτα ψηφία τους, αὐτὰ γράφονται μόνο στὸν πρώτο καὶ στὸν τελευταῖο λογάριθμο. Γιά τοὺς ἐνδιάμεσους λογαρίθμους τὰ δύο αὐτὰ ψηφία δέ γράφονται, ἀλλὰ ἐννοοῦνται.

*Αν οι λογάριθμοι αυτοί βρίσκονται σε περισσότερες σελίδες, τὰ δύο ὅμοια ψηφία ἀναγράφονται καί στήν ἀρχή καί στό τέλος αὐτῶν τῶν σελίδων.

*Αν στό μεταξύ μεταβληθεῖ τό ἕνα ἀπό τὰ δύο πρῶτα ψηφία, ὁ λογάριθμος ἀναγράφεται ὁλόκληρος, ὅπως καί ὁ προηγούμενός του.

Μετά ἀπό τίς στήλες τῶν λογαρίθμων τῶν ἡμιτόνων καί τῶν συνημιτόνων, ὑπάρχουν στήλες μέ ἐπικεφαλίδα τό γράμμα Δ (διαφορά). Στά ἀντίστοιχα τετραγωνίδια ἀναγράφονται σέ μονάδες πέμπτης δεκαδικῆς τάξεως (μ.ε'.δ.τ) οἱ διαφορές τῶν λογαρίθμων τῶν ἡμιτόνων καί συνημιτόνων δύο διαδοχικῶν τόξων.

Ἐπίσης ὅμοια στήλη ὑπάρχει καί ἀνάμεσα στίς στήλες Εφ καί Σφ πού περιέχουν τίς κοινές διαφορές τῶν λογαρίθμων τῶν ἐφαπτομένων καί συνεφαπτομένων δύο διαδοχικῶν τόξων.

Ἄπό τίς,ισότητες:

$$\epsilon\phi\alpha = \frac{1}{\sigma\phi\alpha} \quad \text{καί} \quad \epsilon\phi\beta = \frac{1}{\sigma\phi\beta}$$

ἔχουμε:

$$\log \epsilon\phi \alpha = -\log \sigma\phi \alpha \quad \text{καί} \quad \log \epsilon\phi \beta = -\log \sigma\phi \beta$$

καί ἐπομένως:

$$\log \epsilon\phi \alpha - \log \epsilon\phi \beta = \log \sigma\phi \beta - \log \sigma\phi \alpha$$

Στά δεξιά τῶν συνημιτόνων δέν ὑπάρχει στήλη διαφορῶν γιά τὰ τόξα πού εἶναι μικρότερα ἀπό 18° ἢ μεγαλύτερα ἀπό 71°, γιατί οἱ διαφορές αὐτές εἶναι μικρότερες ἀπό τό 5 καί βρίσκονται εὐκολα ἀπό μνήμης.

Στίς σελίδες τῶν τόξων ἀπό 6° ἕως 83° καί ἔξω ἀπό τό πλαίσιο, ὑπάρχουν μερικά πινακίδια. Καθένα ἀπό τὰ πινακίδια αὐτά ἔχει ὡς ἐπικεφαλίδα μιά ἀπό τίς διαφορές πού εἴπαμε πιο πάνω καί διαιρεῖται σέ δύο στήλες. Ἡ πρώτη στήλη περιέχει τοὺς μονοψήφιους ἀριθμούς (1 - 9), οἱ ὅποιοι φανερώνουν δεύτερα λεπτά, καί ἡ ἄλλη τίς ἀντίστοιχες μεταβολές τῶν λογαρίθμων τῶν τριγωνομετρικῶν ἀριθμῶν. Τό πινακίδιο π.χ. μέ ἐπικεφαλίδα 23 δείχνει ὅτι, ἂν ἡ διαφορά τῶν λογαρίθμων τριγωνομετρικοῦ ἀριθμοῦ δύο διαδοχικῶν τόξων εἶναι 23 μ.ε'.δ.τ., σέ αὐξηση τοῦ τόξου κατά

$$1'' \quad \text{ἢ} \quad 2'' \quad \text{ἢ} \quad 3'' \quad \text{ἢ} \quad \dots \quad \text{ἢ} \quad 9''$$

ἀντιστοιχεῖ αὐξηση ἢ ἐλάττωση τοῦ λογαρίθμου τοῦ ἴδιου τριγωνομετρικοῦ ἀριθμοῦ κατά:

$$0,38 \quad \text{ἢ} \quad 0,77 \quad \text{ἢ} \quad 1,15 \quad \text{ἢ} \quad \dots \quad \text{ἢ} \quad 3,45 \quad \mu.ε'.δ.τ.$$

		Ημ		Εφ		Σφ		Συν		
			Δ		Δ				Δ	
31										
1''	0,52	0	1,67161	24	1,72567	31	0,27433	1,94593	6	60
2	1,03	1	7185	23	2598	30	7402	4587	7	59
3	1,55	2	7208	24	2628	31	7372	4580	7	58
4	2,07	3	7232	24	2659	30	7341	4573	6	57
5	2,58	4	7256		2689		7311	4567	7	56
6	3,10	—	—	24	—	31	—	—	7	—
7	3,62	5	7280	23	2720	30	7280	4560	7	55
8	4,13	6	7303	24	2750	30	7250	4553	7	54
9	4,65	7	7327	23	2780	31	7220	4546	7	53
	30	8	7350	24	2811	30	7189	4540	6	52
1	0,5	9	7374		2841	30	7159	4533	7	51
2	1,0	—	—	24	—	31	—	—	7	—
3	1,5	10	7398	23	2872	30	7128	4526	7	50
4	2,0	11	7421	24	2902	30	7098	4519	6	49
5	2,5	12	7445	23	2932	31	7068	4513	7	48
6	3,0	13	7468	24	2963	30	7037	4506	7	47
7	3,5	14	7492		2993	30	7007	4499	7	46
8	4,0	—	—	23	—	30	—	—	7	—
9	4,5	15	7515	24	3023	31	6977	4492	7	45
	24	16	7539	23	3054	30	6946	4485	6	44
1	0,4	17	7562	24	3084	30	6916	4479	7	43
2	0,8	18	7586	23	3114	30	6886	4472	7	42
3	1,2	19	7609		3144		6856	4465	7	41
4	1,6	—	—	24	—	31	—	—	7	—
5	2,0	20	7633	23	3175	30	6825	4458	7	40
6	2,4	21	7656	24	3205	30	6795	4451	6	39
7	2,8	22	7680	23	3235	30	6765	4445	7	38
8	3,2	23	7703	23	3265	30	6735	4438	7	37
9	3,6	24	7726		3295		6705	4431	7	36
	23	—	—	24	—	31	—	—	7	—
1	0,38	25	7750	23	3326	30	6674	4424	7	35
2	0,77	26	7773	23	3356	30	6644	4417	7	34
3	1,15	27	7796	24	3386	30	6614	4410	6	33
4	1,53	28	7820	23	3416	30	6584	4404	7	32
5	1,92	29	7843		3446	30	6554	4397	7	31
6	2,30	—	—	23	—	30	—	—	7	—
7	2,68	30	1,67866		1,73476		0,26524	1,94390	30	—
8	3,07									
9	3,45									
			Συν		Σφ		Εφ	Ημ		

	Ημ	Δ	Εφ	Δ	Σφ	Συν	Δ		30
30	1,67866	24	1,73476	31	0,26524	1,94390	7	30	1'' 0,5
31	7890	23	3507	30	6493	4383	7	29	2 1,0
32	7913	23	3537	30	6463	4376	7	28	3 1,5
33	7936	23	3567	30	6433	4369	7	27	4 2,0
34	7959	23	3597	30	6403	4362	7	26	5 2,5
—	—	23	—	30	—	—	7	—	6 3,0
35	7982	24	3627	30	6373	4355	6	25	7 3,5
36	8006	23	3657	30	6343	4349	7	24	8 4,0
37	8029	23	3687	30	6313	4342	7	23	9 4,5
38	8052	23	3717	30	6283	4335	7	22	29
39	8075	23	3747	30	6253	4328	7	21	1 0,48
—	—	23	—	30	—	—	7	—	2 0,97
40	8098	23	3777	30	6223	4321	7	20	3 1,45
41	8121	23	3807	30	6193	4314	7	19	4 1,93
42	8144	23	3837	30	6163	4307	7	18	5 2,42
43	8167	23	3867	30	6133	4300	7	17	6 2,90
44	8190	23	3897	30	6103	4293	7	16	7 3,38
—	—	23	—	30	—	—	7	—	8 3,87
45	8213	24	3927	30	6073	4286	7	15	9 4,35
46	8237	23	3957	30	6043	4279	6	14	23
47	8260	23	3987	30	6013	4273	7	13	1 0,38
48	8283	22	4017	30	5983	4266	7	12	2 0,77
49	8305	23	4047	30	5953	4259	7	11	3 1,15
—	—	23	—	30	—	—	7	—	4 1,53
50	8328	23	4077	30	5923	4252	7	10	5 1,92
51	8351	23	4107	30	5893	4245	7	9	6 2,30
52	8374	23	4137	29	5863	4238	7	8	7 2,68
53	8397	23	4166	30	5834	4231	7	7	8 3,07
54	8420	23	4196	30	5804	4224	7	6	9 3,45
—	—	23	—	30	—	—	7	—	
55	8443	23	4226	30	5774	4217	7	5	22
56	8466	23	4256	30	5744	4210	7	4	1 0,39
57	8489	23	4286	30	5714	4203	7	3	2 0,73
58	8512	22	4316	29	5684	4196	7	2	3 1,10
59	8534	23	4345	30	5655	4189	7	1	4 1,47
—	—	23	—	30	—	—	7	—	6 2,20
60	1,68557		1,74375		0,25625	1,94182		0	7 2,57
—	—		—		—	—		—	8 2,93
	Συν		Σφ		Εφ	Ημ			9 3,30

● 43. Χρήση τῶν λογαριθμικῶν τριγ. πινάκων. Τούς λογαριθμικούς τριγωνομετρικούς πίνακες τούς χρησιμοποιοῦμε γιά τήν ἐπίλυση τῶν ἀκόλουθων προβλημάτων.

● 44. ΠΡΟΒΛΗΜΑ I. Νά βρεθεῖ ὁ λογάριθμος ὀρισμένον τριγωνομετρικοῦ ἀριθμοῦ ἑνός δεδομένου τόξου.

Λύση. α) *Ἄν τό δεδομένο τόξο δέν ἔχει δεύτερα λεπτά, ὁ ζητούμενος λογάριθμος βρίσκεται στή σελίδα τῶν μοιρῶν τοῦ τόξου καί στή διασταύρωση τῆς ὀριζόντιας γραμμῆς τῶν πρώτων λεπτῶν καί τῆς στήλης πού ἔχει τήν ὀνομασία τοῦ τριγωνομετρικοῦ ἀριθμοῦ. *Ἔτσι βρίσκουμε:

$$\begin{array}{l|l} \log \eta\mu (19^\circ 38') = \bar{1},52634 & \log \sigma\upsilon\upsilon (65^\circ 51') = \bar{1},61186 \\ \log \epsilon\phi (26^\circ 17') = \bar{1},69361 & \log \sigma\phi (56^\circ 23') = \bar{1},82270 \text{ κλπ.} \end{array}$$

β) *Ἄν τό τόξο περιέχει καί δεύτερα λεπτά, ἐργαζόμεστε ὡς ἔξῃς (γιατί οἱ πίνακες δέν περιέχουν δεύτερα λεπτά):

1ο. Ὁ $\log \eta\mu (29^\circ 15' 18'')$ δέν ὑπάρχει στους πίνακες. Γιά νά τόν βροῦμε παρατηροῦμε ὅτι:

$$\begin{array}{l} 29^\circ 15' < 29^\circ 15' 18'' < 29^\circ 16' \\ \text{καί ἄρα:} \quad \eta\mu (29^\circ 15') < \eta\mu (29^\circ 15' 18'') < \eta\mu (29^\circ 16') \\ \text{καί} \quad \log \eta\mu (29^\circ 15') < \log (29^\circ 15' 18'') < \log (29^\circ 16'), \\ \eta \quad \bar{1},68897 < \log (29^\circ 15' 18'') < \bar{1},68920. \end{array}$$

Δηλαδή ὁ ζητούμενος λογάριθμος περιέχεται μεταξύ τῶν ἀριθμῶν $\bar{1},68897$ καί $\bar{1},68920$, οἱ ὁποῖοι διαφέρουν κατά 23 μ.ε'.δ.τ.

*Ἀπό τόν πίνακα βλέπουμε πῶς σέ αὔξηση τοῦ τόξου κατά 1' ἀντιστοιχεῖ ἡ ἴδια αὔξηση τοῦ λογαρίθμου τοῦ ἡμιτόνου του, ἄρκει τό τόξο νά μή διαφέρει πολύ ἀπό τό $(29^\circ 15')$. Μποροῦμε, λοιπόν, νά θεωρήσουμε τήν αὔξηση περίπου ἀνάλογη μέ τήν αὔξηση τῶν τόξων καί νά ὑπολογίσουμε πόσο πρέπει νά αὔξηθεῖ ὁ $\log \eta\mu (29^\circ 15') = \bar{1},68897$, γιά νά προκύψει ὁ ζητούμενος λογάριθμος.

Ὁ ὑπολογισμός γίνεται ὡς ἔξῃς:

*Ἄν αὔξηθεῖ τό τόξο κατά 1' = 60'', θά ἔχουμε αὔξηση τοῦ \log . κατά 23 μ.ε'.δ.τ.
 » » » » 18'', » » » » » x ;

$$*\text{Ἄρα} \quad x = 23 \cdot \frac{18}{60} = \frac{414}{60} = 6,9 \text{ ἢ } 7 \text{ μ.ε'.δ.τ. μέ ὑπεροχή.}$$

*Ἐπομένως:

$$\log \eta\mu (29^\circ 15' 18'') = \bar{1},68897 + 0,00007 = \bar{1},68904.$$

Οἱ παραπάνω πράξεις γράφονται καί ὡς ἔξῃς:

$$\begin{array}{l} \log \eta\mu (29^\circ 16') = \bar{1},68920 \\ \log \eta\mu (29^\circ 15') = \bar{1},68897 \\ \Delta = \quad 23 \end{array} \quad \left\| \begin{array}{l} 60'' \quad 23 \mu.ε'.δ.τ. \\ 18'' \quad x ; \\ \hline x = 23 \cdot \frac{18}{60} = 6,9 \text{ ή } 7 \mu.ε'.δ.τ \end{array} \right.$$

*Άρα: $\log \eta\mu (29^\circ 15' 18'') = \bar{1},68897 + 0,00007 = \bar{1},68904.$

2ο. Κατά τον ίδιο τρόπο εργαζόμαστε για να βρούμε και τό λογάριθμο της έφαπτομένης δεδομένου τόξου. *Έτσι, για την εύρεση του $\log \epsilon\phi (60^\circ 45' 23'')$ γράφουμε:

$$\begin{array}{l} \log \epsilon\phi (60^\circ 46') = 0,25209 \\ \log \epsilon\phi (60^\circ 45') = 0,25179 \\ \Delta = \quad 30 \end{array} \quad \left\| \begin{array}{l} 60'' \quad 30 \mu.ε'.δ.τ. \\ 23'' \quad x ; \\ \hline x = 30 \cdot \frac{23}{60} = \frac{23}{2} = 11,5 \text{ ή } 12 \mu.ε'.δ.τ, \end{array} \right.$$

*Άρα: $\log \epsilon\phi (60^\circ 45' 23'') = 0,25179 + 0,00012 = 0,25191.$

3ο. *Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να βρούμε τό $\log \sigma\upsilon\upsilon (60^\circ 48' 28'')$.

Γνωρίζουμε ότι, όταν αύξάνεται τό τόξο από 0 έως 90° , τό $\sigma\upsilon\upsilon\eta\mu\acute{\iota}\tau\omicron\upsilon$ και ή $\sigma\upsilon\upsilon\epsilon\phi\alpha\pi\tau\omicron\mu\acute{\epsilon}\nu\eta$ έλαττώνονται. *Έτσι σέ αύξηση του τόξου άντιστοιχεί έλάττωση των λογαρίθμων των τριγωνομετρικών άριθμῶν.

Στήν περίπτωση μας:

*Έπειδή $60^\circ 48' < 60^\circ 48' 28'' < 60^\circ 49'$

θά είναι $\sigma\upsilon\upsilon(60^\circ 48') > \sigma\upsilon\upsilon(60^\circ 48' 28'') > \sigma\upsilon\upsilon(60^\circ 49')$

άρα και $\log \sigma\upsilon\upsilon (60^\circ 48') > \log \sigma\upsilon\upsilon (60^\circ 48' 28'') > \log \sigma\upsilon\upsilon (60^\circ 49')$

ή $\bar{1},68829 > \log \sigma\upsilon\upsilon (60^\circ 48' 28'') > \bar{1},68807.$

Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι ό ζητούμενος λογάριθμος περιέχεται άνάμεσα στους άριθμούς $\bar{1},68829$ και $\bar{1},68807$, οι όποιοι διαφέρουν κατά $22 \mu.ε'.δ.τ.$

Γράφουμε την πράξη ως έξής:

$$\begin{array}{l} \log \sigma\upsilon\upsilon (60^\circ 48') = \bar{1},68829 \\ \log \sigma\upsilon\upsilon (60^\circ 49') = \bar{1},68807 \\ \Delta = \quad 22 \end{array} \quad \left\| \begin{array}{l} 60'' \quad 22 \mu.ε'.δ.τ. \\ 28'' \quad x ; \\ \hline x = 22 \cdot \frac{28}{60} = 10,26 \text{ ή } 10 \mu.ε'.δ.τ. \end{array} \right.$$

*Άρα: $\log \sigma\upsilon\upsilon (60^\circ 48' 28'') = \bar{1},68829 - 0,00010 = \bar{1},68819.$

4ο. *Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να βρούμε τό $\log \sigma\phi (36^\circ 54' 38'')$

Γράφουμε την πράξη ως έξής:

$$\begin{array}{l} \log \sigma\phi (36^\circ 54') = 0,12446 \\ \log \sigma\phi (36^\circ 55') = 0,12420 \\ \Delta = \quad 26 \end{array} \quad \left\| \begin{array}{l} 60'' \quad 26 \mu.ε'.δ.τ. \\ 38'' \quad x ; \\ \hline x = 26 \cdot \frac{38}{60} = 16,46 \text{ ή } 16 \mu.ε'.δ.τ. \end{array} \right.$$

*Άρα: $\log \sigma\phi (36^\circ 54' 38'') = 0,12446 - 0,00016 = 0,12430.$

Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ

79. Νά βρεθοῦν οἱ λογάριθμοι τῶν ἀκόλουθων τριγωνομετρικῶν ἀριθμῶν:

- | | | |
|-------------------|------------------------|-------------------------|
| 1. ημ (15° 27'), | 5. εφ (20° 16'), | 9. ημ (25° 10' 18''), |
| 2. συν (36° 12'), | 6. εφ (53° 6'), | 10. ημ (55° 26' 39''), |
| 3. συν (58° 10'), | 7. σφ (14° 36'), | 11. συν (33° 17' 25''), |
| 4. ημ (65° 25'), | 8. σφ (70° 14'), | 12. συν (66° 14' 52''), |
| | 13. εφ (18° 56' 10''), | 16. σφ (24° 19' 10''), |
| | 14. εφ (48° 10' 50''), | 17. σφ (70° 34' 15''), |
| | 15. σφ (29° 33' 48''), | 18. ημ (123° 56' 10''). |

80. Ἐπίσης τῶν τριγωνομετρικῶν ἀριθμῶν:

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1. ημ $\frac{3\pi}{7}$, | 3. εφ $\frac{3\pi}{11}$, |
| 2. συν $\frac{\pi}{17}$, | 4. σφ $\frac{5\pi}{17}$. |

● 45. ΠΡΟΒΛΗΜΑ II. Νά βρεθεῖ τό ἐλάχιστο θετικό τόξο, ἄν δοθεῖ ὁ λογάριθμος ἑνός τριγωνομετρικοῦ ἀριθμοῦ του.

1ο. Ἄς ὑποθέσουμε ὅτι θέλουμε νά βροῦμε τό ἐλάχιστο θετικό τόξο x , γιά τό ὁποῖο εἶναι:

$$\log \eta\mu x = \bar{1},73940.$$

Λύση. Βρίσκουμε πρῶτα στόν πίνακα ὅτι:

$$\log \eta\mu 45^\circ = \bar{1},84949.$$

Καί ἐπειδή:

$$\bar{1},73940 < \bar{1},84949, \text{ θά ἔχουμε:}$$

$$\eta\mu x < \eta\mu 45^\circ \text{ καί ἄρα } x < 45^\circ.$$

Πρέπει, λοιπόν, νά ἀναζητήσουμε τόν ἀριθμό $\bar{1},73940$ στίς στήλες, τῶν ἡμίτονων. Τόν βρίσκουμε στή σελίδα τῶν 33° καί στήν ὀριζόντια γραμμή τῶν 17'. Εἶναι, λοιπόν:

$$\log \eta\mu x = \bar{1},73940^\circ = \log \eta\mu (33^\circ 17')$$

καί ἄρα:

$$x = 33^\circ 17'.$$

*Ἄν ὁμως εἶναι: $\log \eta\mu x = \bar{1},68129$, παρατηροῦμε ὅτι:

$$\bar{1},68121 < \bar{1},68129 < \bar{1},68144$$

καί ἐπομένως:

$$28^\circ 41' < x < 28^\circ 42'$$

Ἐπίσης παρατηροῦμε ὅτι:

$$\Delta = \bar{1},68144 - \bar{1},68121 = 23 \text{ μ.ε'}.δ.τ.,$$

$$\delta = \bar{1},68129 - \bar{1},68121 = 8 \text{ μ.ε'}.δ.τ.$$

καί καταρτίζουμε τή διάταξη ὡς ἑξῆς:

Αύξηση λογαρίθμου κατά 23 φέρνει αύξηση τοῦ τόξου κατά 60''

» » » 8 » » » y;

Ἐπομένως:

$$y = 60'' \cdot \frac{8}{23} = \frac{480''}{23} = 20'', 88.$$

Θά είναι λοιπόν: $x = 28^\circ 41' 20'',88$.

Συντομότερα ή πράξη γράφεται ως εξής:

$\bar{1},68129$	$\bar{1},68144$	$28^\circ 42'$	23	$60''$
$\bar{1},68121$	$\bar{1},68121$	$28^\circ 41'$	8	$y;$
Διαφορές:	8	23	$1' = 60''$	$y = 60'' \cdot \frac{8}{23} = 20'',88$.

*Αρα: $x = 28^\circ 41' 20'',88$.

2ο. *Αν $\log \epsilon\phi x = \bar{1},85360$, νά υπολογισθεί ό x .

Διάταξη τών πράξεων:

$\bar{1},85360$	$\bar{1},85380$	$35^\circ 32'$	26	$60''$
$\bar{1},85354$	$\bar{1},85354$	$35^\circ 41'$	6	$y;$
Διαφορές:	6	26	$1' = 60''$	$y = 60'' \cdot \frac{6}{26} = 13'',84$.

*Αρα: $x = 35^\circ 31' 13'',84$.

3ο. *Αν $\log \sigma\upsilon\nu x = \bar{1},85842$, νά βρεθεί τό ελάχιστο θετικό τόξο x .

Στούς πίνακες παρατηρούμε ότι:

$$\bar{1},85851 > \bar{1},85842 > \bar{1},85839$$

καί άρα $43^\circ 47' < x < 43^\circ 48'$.

*Επομένως, γιά νά βρούμε τό τόξο x κάνουμε τήν άκόλουθη διάταξη:

$\bar{1},85842$	$\bar{1},85851$	$43^\circ 47'$	12	$60''$
$\bar{1},85839$	$\bar{1},85839$	$43^\circ 48'$	3	$y;$
Διαφορές:	3	12	$1' = 60''$	$y = 60'' \cdot \frac{3}{12} = 15''$.

*Επειδή όμως, όταν αύξάνεται τό τόξο ελαττώνεται τό συνημίτονο, θά βρούμε τό τόξο x ως εξής:

$$x = (43^\circ 48') - 15'' = (43^\circ 47' 60'') - 15'' = 43^\circ 47' 45''.$$

Κατά τόν ίδιο τρόπο εργαζόμαστε καί όταν δοθεί ό λογάριθμος τής συνεφαπτομένης ενός τόξου x .

★**Σημείωση.** Οί λογάριθμοι στός πενταψηφίους πίνακες έχουν γραφεί μέ προσέγγιση 0,00005. *Επομένως τά τόξα πού υπολογίζονται μέ αύτούς τούς πίνακες δέν είναι μαθηματικά άκριβή. Χρειάζεται, λοιπόν, νά ξέρουμε σέ ποιά περίπτωση βρίσκουμε τήν άκριβέστερη τιμή τοῦ τόξου.

Γιά τοῦτο σκεπτόμαστε ως εξής: *Ας υποθέσουμε ότι τό μέτρο ενός από τά τόξα πού είναι γραμμένα στός πίνακες είναι α . Τότε τό μέτρο τοῦ άμέσως μεγαλύτερου του είναι $\alpha + 1' = \alpha + 60''$.

Ἐκ τῶν σχέσεων:

$$\varepsilon\varphi(\alpha + 60'') = \frac{\eta\mu(\alpha + 60'')}{\sigma\upsilon\nu(\alpha + 60'')} \quad \text{καί} \quad \varepsilon\varphi\alpha = \frac{\eta\mu\alpha}{\sigma\upsilon\nu\alpha}$$

προκύπτουν οἱ σχέσεις:

$$\log \varepsilon\varphi(\alpha + 60'') = \log \eta\mu(\alpha + 60'') - \log \sigma\upsilon\nu(\alpha + 60'')$$

καί

$$\log \varepsilon\varphi\alpha = \log \eta\mu\alpha - \log \sigma\upsilon\nu\alpha.$$

Γι' αὐτό καί:

$$\log \varepsilon\varphi(\alpha + 60'') - \log \varepsilon\varphi\alpha = [\log \eta\mu(\alpha + 60'') - \log \eta\mu\alpha] + [\log \sigma\upsilon\nu\alpha - \log \sigma\upsilon\nu(\alpha + 60'')] \quad (1)$$

Ἐάν παραστήσουμε:

$$\left. \begin{aligned} \log \varepsilon\varphi(\alpha + 60'') - \log \varepsilon\varphi\alpha &= \delta \\ \log \eta\mu(\alpha + 60'') - \log \eta\mu\alpha &= \delta_1 \\ \log \sigma\upsilon\nu\alpha - \log \sigma\upsilon\nu(\alpha + 60'') &= \delta_2 \end{aligned} \right\}$$

ἡ (1) γίνεται:

$$\delta = \delta_1 + \delta_2$$

καί ἐπομένως

$$\delta > \delta_1 \quad (2) \quad \text{καί} \quad \delta > \delta_2 \quad (3)$$

Εἶναι φανερό ὅτι οἱ ἀριθμοὶ δ , δ_1 καὶ δ_2 , ἀφοῦ ἀναφέρονται σὲ πενταψήφιους λογαριθμοὺς, παριστάνουν ἑκατοντάκις χιλιοστά (ἐ.χ.).

Ἐτσι, σύμφωνα μὲ τὰ προηγούμενα, ἂν πάρουμε ἀντὶ γιὰ τὸ $\log \varepsilon\varphi(\alpha + 60'')$ τὸ $\log \varepsilon\varphi\alpha$, κάνουμε λάθος ἴσο μὲ:

$$\log \varepsilon\varphi(\alpha + 60'') - \log \varepsilon\varphi\alpha = \delta \quad \text{ἐ.χ.}$$

Ἀλλὰ τότε ἀντὶ γιὰ τὸ τόξο $\alpha + 60''$, θὰ πάρουμε τὸ α . Ἐτσι τὸ ἀντιστοιχὸ λάθος στό τόξο θὰ εἶναι ἴσο μὲ $60''$.

Δηλαδή, λάθος δ ἐ.χ. πού συμβαίνει στό λογάριθμο τῆς ἐφαπτομένης, προκαλεῖ στό τόξο λάθος $60''$.

Ἀπὸ αὐτὸ συμπεραίνουμε ὅτι λάθος k ἐ.χ. στό λογάριθμο τῆς ἐφαπτομένης, θὰ προκαλέσει στό τόξο λάθος $60'' \cdot \frac{k}{\delta}$. Ὅμοια σκεπτόμενοι βρίσκουμε ὅτι λάθος k ἐ.χ. στό λογάριθμο τοῦ ἡμιτόνου ἢ τοῦ συνημιτόνου ἑνὸς τόξου, προκαλεῖ στό τόξο ἀντίστοιχο λάθος

$$60'' \cdot \frac{k}{\delta_1} \quad \text{ἢ} \quad 60'' \cdot \frac{k}{\delta_2}$$

Ἐχοντας ὁμως ὑπόψη μας καί τίς (2), (3) συνάγουμε ὅτι:

$$60'' \cdot \frac{k}{\delta_1} > 60'' \cdot \frac{k}{\delta} \quad \text{καί} \quad 60'' \cdot \frac{k}{\delta_2} > 60'' \cdot \frac{k}{\delta}$$

Ἀπὸ αὐτὸ προκύπτει ὅτι κάποιον τόξο προσδιορίζεται ἀκριβέστερα ἀπὸ τὸ λογάριθμο τῆς ἐφαπτομένης παρά ἀπὸ τὸ λογάριθμο τοῦ ἡμιτόνου τοῦ ἢ τοῦ συνημιτόνου του.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

81. Νά υπολογισθούν οι μεταξύ 0° και 90° τιμές του τόξου x , οι οποίες ικανοποιούν τις εξισώσεις:

- | | |
|---|---|
| 1. $\log \eta \mu x = \bar{1},84439,$ | 4. $\log \sigma \varphi x = \bar{1},59183,$ |
| 2. $\log \sigma \nu \nu x = \bar{1},65190,$ | 5. $\log \sigma \varphi x = 0,21251,$ |
| 3. $\log \epsilon \varphi x = \bar{1},26035,$ | 6. $\log \epsilon \varphi x = \bar{1},18954,$ |
| 7. $\log \tau \epsilon \mu x = 0,02830.$ | |

● 46. **ΠΡΟΒΛΗΜΑ III.** Νά βρεθεί τό ελάχιστο θετικό τόξο x από εκείνα πού έχουν δεδομένο τριγωνομετρικό αριθμό.

Λύση. Ἐς ὑποθέσουμε ὅτι θέλουμε νά βροῦμε τό ελάχιστο θετικό τόξο x , πού ικανοποιεῖ μιά ἀπό τίς εξισώσεις:

$$\eta \mu x = \alpha, \quad \sigma \nu \nu x = \beta, \quad \epsilon \varphi x = \gamma$$

ὅπου $\alpha > 0, \beta > 0, \gamma > 0$. Θά εἶναι:

$$\log \eta \mu x = \log \alpha, \quad \log \sigma \nu \nu x = \log \beta, \quad \log \epsilon \varphi x = \log \gamma.$$

Ἀπό τήν ἄλγεβρα γνωρίζουμε ὅτι, ἂν δύο θετικοί ἀριθμοί εἶναι ἴσοι, τότε καί οἱ λογάριθμοί τους θά εἶναι ἴσοι.

Ἄν ὁμως ἕνας ἀπό τούς α, β, γ εἶναι ἀρνητικός, τότε αὐτός δέν ἔχει λογάριθμο. Στήν περίπτωση αὐτή ἐργαζόμαστε ὡς ἑξῆς:

α') Ἄν $\alpha < 0$, τότε ἀπό τήν $\eta \mu x = \alpha$, παίρουμε:

$$\eta \mu(x - 180^\circ) = -\alpha > 0.$$

Ἀπό αὐτή τώρα ὀρίζεται τό τόξο $x - 180^\circ$, ἄρα καί τό x .

Παράδειγμα 1ο. Ἄς ὑποθέσουμε ὅτι: $\eta \mu x = -\frac{3}{5}$.

Λύση. Τό ελάχιστο θετικό τόξο πού λήγει στό γ' τεταρτημόριο ὑπερβαίνει τό θετικό ἡμικύκλιο κατά κάποιον τόξο y , δηλαδή θά εἶναι:

$$x = 180^\circ + y. \quad \text{Ἄρα: } \eta \mu y = -\eta \mu x = \frac{3}{5} \Rightarrow$$

$$\log \eta \mu y = \log \frac{3}{5} = \log 3 - \log 5 = 0,47712 - 0,69897 = \bar{1},77815,$$

ἀπ' ὅπου κατά τά γνωστά:

$$y = 36^\circ 52' 10'',58 \quad \text{καί ἄρα } x = 180^\circ + y = 216^\circ 52' 10'',58.$$

β') Ἄν $\gamma < 0$, τότε ἀπό τήν

$$\epsilon \varphi x = \gamma < 0 \Leftrightarrow -\epsilon \varphi x = -\gamma > 0 \Leftrightarrow \epsilon \varphi(180^\circ - x) = -\gamma > 0.$$

Παράδειγμα 2ο. Ἄς δεχθοῦμε ὅτι $\epsilon \varphi x = -3$.

Λύση. Έχουμε διαδοχικά:

$$\begin{aligned} \varepsilon\varphi x = -3 &\Leftrightarrow -\varepsilon\varphi x = 3 \Leftrightarrow \varepsilon\varphi(180^\circ - x) = 3 \Rightarrow \\ \log \varepsilon\varphi(180^\circ - x) &= \log 3 = 0,47712 \end{aligned}$$

καί κατά τά γνωστά:

$$180^\circ - x = 71^\circ 31' 54'' \Leftrightarrow x = 108^\circ 26' 6''.$$

γ) *Αν $\beta < 0$, τότε από τή:

$$\text{συν } x = \beta < 0 \Leftrightarrow -\text{συν } x = -\beta > 0 \Leftrightarrow \text{συν}(180^\circ - x) = -\beta > 0.$$

Παράδειγμα 3ο. *Ας δεχθοῦμε ὅτι: $\text{συν } x = -0,6$.

Λύση. Έχουμε διαδοχικά:

$$-\text{συν } x = 0,6 \Leftrightarrow \text{συν}(180^\circ - x) = \frac{6}{10} = \frac{3}{5} \Leftrightarrow$$

$$\log \text{συν}(180^\circ - x) = \log 3 - \log 5 = 0,47712 - 0,69897 = \bar{1},77815,$$

καί κατά τά γνωστά βρίσκουμε ἀπό ἐδῶ ὅτι:

$$180^\circ - x = 53^\circ 7' 49'',42 \Leftrightarrow x = 126^\circ 52' 10'',58.$$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

82. Νά ὑπολογισθοῦν οἱ μεταξύ 0° καί 90° ρίζες τῶν παρακάτω ἐξισώσεων:

1. $\eta\mu x = -\frac{3}{5}$

4. $\sigma\varphi x = \text{συν } 42^\circ,$

7. $\text{συν } \frac{x}{2} = \varepsilon\varphi 150^\circ,$

2. $\text{συν } x = -0,7,$

5. $\text{τεμ } x = -1,8,$

8. $\eta\mu 2x = 0,58,$

3. $\varepsilon\varphi x = -3,$

6. $\sigma\tau\epsilon\mu x = -\frac{4}{3}$

9. $\varepsilon\varphi\left(45^\circ + \frac{x}{2}\right) = -\frac{17}{9}$

★ ● 47. Χρήση τῶν λογαριθμικῶν τριγωνομετρικῶν πινάκων γιά τόξα μικρότερα ἀπό 4° καί μεγαλύτερα ἀπό 85° .

Παράδειγμα 1ο. Νά βρεθεῖ ὁ $\log \eta\mu(12' 40'')$.

Λύση. Στούς πίνακες βρίσκουμε ὅτι:

$$\log \eta\mu 12' = \bar{3},54291.$$

Ἐξετάζοντας τίς διαφορές στήν οἰκεία στήλη, βλέπουμε ὅτι σέ κάθε αὐξηση ἢ ἐλάττωση τοῦ τόξου κατά $1'$ δέν ἔχουμε πάντοτε καί τήν ἴδια αὐξηση ἢ τήν ἴδια μείωση τοῦ ἀντίστοιχου λογαριθμοῦ· οἱ διαφορές εἶναι δυσανάλογες.

Δέν ὑπάρχει λοιπόν οὔτε κατά προσέγγιση ἀναλογία ἀνάμεσα στήν αὐξηση τῶν τόξων καί στήν αὐξηση τοῦ λογαριθμοῦ. Αὐτό συμβαίνει γιά τοὺς λογαριθμούς τοῦ ἡμιτόνου, τῆς ἐφαπτομένης καί τῆς συνεφαπτομένης τῶν τόξων ἐκείνων πού εἶναι μικρότερα ἀπό 4° καί γιά τοὺς λογαριθμούς τοῦ συνημιτόνου, τῆς ἐφαπτομένης καί τῆς συνεφαπτομένης τῶν τόξων ἐκείνων πού εἶναι μεγαλύτερα ἀπό 85° . Γι' αὐτό τό λόγο δέν μπορούμε νά ἐφαρμόσουμε στίς περιπτώσεις αὐτές τήν ἀναλογική μέθοδο, τήν ὁποία ἐφαρμόσαμε στά προηγούμενα προβλήματα.

Στις περιπτώσεις αυτές ή λύση τῶν σχετικῶν προβλημάτων γίνεται μέ τήν ἀκόλουθη ειδική μέθοδο.

Παρατηροῦμε ὅτι:

$$\eta\mu x = x \cdot \frac{\eta\mu x}{x} \quad \text{καί} \quad \epsilon\varphi x = x \cdot \frac{\epsilon\varphi x}{x}$$

καί ἐπομένως:

$$\log \eta\mu x = \log x + \log \frac{\eta\mu x}{x} \quad (1) \quad \text{καί} \quad \log \epsilon\varphi x = \log x + \log \frac{\epsilon\varphi x}{x} \quad (2)$$

Ἄν x παριστάνει δεῦτερα λεπτά, ὁ $\log x$ βρίσκεται ἀπό τοὺς πίνακες τῶν λογαρίθμων τῶν ἀριθμῶν. Ἐξάλλου ὁ λογάριθμος τῶν λόγων $\frac{\eta\mu x}{x}$ καί $\frac{\epsilon\varphi x}{x}$ ἀναγράφεται στό πάνω μέρος τῆς α' σελίδας καί στό κάτω καί ἔξω ἀπό τό πλαίσιο καθεμιᾶς ἀπό τίς ἄλλες σελίδες τῶν λογαριθμικῶν πινάκων τῶν ἀριθμῶν καί ἔξω ἀπό τό πλαίσιο τους. Γιά διάκριση, ὁ $\log \frac{\eta\mu x}{x}$ σημειώνεται μέ τό S , ἐνῶ ὁ $\log \frac{\epsilon\varphi x}{x}$ σημειώνεται μέ τό T . Δηλαδή:

$$\log \frac{\eta\mu x}{x} = S \quad \text{καί} \quad \log \frac{\epsilon\varphi x}{x} = T.$$

Ἄν λοιπόν ἐφαρμόσουμε τήν ἰσότητα (1) στό τόξο $12' 40'' = 760''$ βρίσκουμε ὅτι:

$$\log \eta\mu(12' 40'') = \log 760 + S = 2,88081 + 6,68557 = 3,56638.$$

Παράδειγμα 2ο. *Νά βρεθεῖ ὁ $\log \epsilon\varphi(1^\circ 5' 32'')$.*

Λύση. Ἐπειδή εἶναι $1^\circ 5' 32'' = 3932''$, σύμφωνα μέ τήν ιδιότητα (2) θά ἔχουμε:

$$\begin{aligned} \log \epsilon\varphi(1^\circ 5' 32'') &= \log \epsilon\varphi(3932'') = \\ &= \log 3932 + T = 3,5941 + \bar{6},68563 = \bar{2},28024. \end{aligned}$$

Παράδειγμα 3ο. *Νά βρεθεῖ ὁ $\log \sigma\varphi(15' 20'')$.*

Λύση. Ἐπειδή εἶναι:

$$\sigma\varphi(15' 20'') = \frac{1}{\epsilon\varphi(15' 20'')} \Leftrightarrow \log \sigma\varphi(15' 20'') = -\log \epsilon\varphi(15' 20'').$$

Ἄλλά:

$$\log \epsilon\varphi(15' 20'') = \log 920 + T = 2,96379 + \bar{6},68558 = \bar{3},64937.$$

Ἄρα $\log \sigma\varphi(15' 20'') = -(\bar{3},64937) = -\bar{3},64937 = 2,35063$.

Παράδειγμα 4ο. *Νά βρεθεῖ ὁ $\log \sigma\eta\nu(88^\circ 40' 25'')$.*

Λύση. Ἐπειδή εἶναι:

$$90^\circ - (88^\circ 40' 25'') = 1^\circ 19' 35'' = 4775'',$$

θά έχουμε:

$$\log \text{ συν } (88^\circ 40' 25'') = \log \eta \mu (4775'') = \bar{2},36451.$$

Παράδειγμα 5ο. *Νά βρεθεί ο λογ εφ (89° 3' 40'').*

Λύση. 'Επειδή είναι: $90^\circ - (89^\circ 3' 40'') = 56' 20''$, θά είναι και:

$$\text{εφ}(89^\circ 3' 40'') = \sigma\phi(56' 20'') = \frac{1}{\text{εφ}(56' 20'')}$$

καί άρα: $\log \text{ εφ}(89^\circ 3' 40'') = -\log \text{ εφ}(56' 20'') = -(\bar{2},21453) = 1,78547.$

Παράδειγμα 6ο. *Νά βρεθεί ο λογ σφ (88° 50' 25'').*

Λύση. 'Επειδή είναι:

$$90^\circ - (88^\circ 50' 25'') = 1^\circ 9' 35''$$

θά είναι και:

$$\log \sigma\phi(88^\circ 50' 25'') = \log \text{ εφ}(1^\circ 9' 35'') = \bar{2},30629.$$

Παράδειγμα 7ο. *Νά βρεθεί τό ελάχιστο θετικό τόξο x, για τό όποιο είναι :*

$$\log \eta \mu x = \bar{3},72960.$$

Λύση. "Αν άναζητήσουμε τό δεδομένο λογάριθμο στην αντίστοιχη στήλη τών λογαριθμικών πινάκων, παρατηρούμε ότι αυτός περιέχεται μεταξύ τών $\bar{3},71900$ και $\bar{3},74248$. Είναι δηλαδή:

$$\bar{3},71900 < \bar{3},72960 < \bar{3},74248$$

$$\text{ή } \log \eta \mu(18') < \log \eta \mu x < \log \eta \mu(19')$$

$$\text{ή } 18' < x < 19' \Leftrightarrow 1080'' < x < 1140'',$$

καί έπομένως $S = \bar{6},68557$. Γι' αυτό από τήν (1) θά έχουμε:

$$\bar{3},72960 = \log x + \bar{6},68557 \Leftrightarrow$$

$$\log x = 3,04403 = \log(1106'',69) \Leftrightarrow$$

$$x = 1106'',69 = 18' 28'',69.$$

Παράδειγμα 8ο. *Νά βρεθεί τό ελάχιστο θετικό τόξο x, για τό όποιο είναι :*

$$\log \text{ εφ } x = \bar{2},45777.$$

Λύση. 'Από τούς πίνακες έχουμε:

$$\bar{2},45507 < \bar{2},45777 < \bar{2},45958 \Leftrightarrow$$

$$1^\circ 38' < x < 1^\circ 39' \Leftrightarrow$$

$$5880'' < x < 5940''$$

καί έπομένως: $T = \bar{6},68569$ καί άρα από τή (2):

$$\bar{2},45777 = \log x + \bar{6},68569 \Leftrightarrow$$

$$\log x = 3,77208 = \log(5916'',7) \Leftrightarrow x = 1^\circ 38' 36'',7.$$

Παράδειγμα 9ο. *Νά βρεθεί τό ελάχιστο θετικό τόξο x, για τό όποιο είναι :*

$$\log \text{ συν } x = \bar{2},16833.$$

Λύση. Από τούς πίνακες βρίσκουμε:

$$\begin{aligned} \bar{2},17128 &> \bar{2},16833 > \bar{2},16268 && \Leftrightarrow \\ 89^\circ 9' &< x < 89^\circ 10' && \Leftrightarrow \\ 90^\circ - (89^\circ 9') &> 90^\circ - x > 90^\circ - (89^\circ 10') && \Leftrightarrow \\ 51' &> 90^\circ - x > 50' && \Leftrightarrow \\ 3060'' &> 90^\circ - x > 3000'' \end{aligned}$$

*Αρα, για τό τόξο $90^\circ - x$ είναι: $S = \bar{6},68556$ και
 $\log \eta\mu(90^\circ - x) = \log \sigma\upsilon\nu x = \bar{2},16833$.

*Έτσι ή (1) γίνεται:

$$\begin{aligned} \bar{2},16833 &= \log \eta\mu(90^\circ - x) + \bar{6},68556 && \Leftrightarrow \\ \log \eta\mu(90^\circ - x) &= 3,48277 = \log \eta\mu(3039'',29) && \Leftrightarrow \\ 90^\circ - x &= 3039'',29 = 50' 39'',29 && \Leftrightarrow \\ x &= 89^\circ 9' 20'',7. \end{aligned}$$

Παράδειγμα 10ο. Νά βρεθεί τό ελάχιστο θετικό τόξο x , για τό όποιο είναι:

$$\log \sigma\phi x = \bar{3},92888.$$

Λύση. Από τούς πίνακες παρατηρούμε ότι :

$$\begin{aligned} \bar{3},94086 &> \bar{3},92888 > \bar{3},92619 && \Leftrightarrow \\ 89^\circ 30' &< x < 89^\circ 31' && \Leftrightarrow \\ 30' &> 90^\circ - x > 29' && \Leftrightarrow \\ 1800'' &< 90^\circ - x < 1740'' && \text{καί ἄρα } T = \bar{6},68558. \end{aligned}$$

*Εξάλλου: $\log \epsilon\phi(90^\circ - x) = \log \sigma\phi x = \bar{3},92888$,

όπότε ή (2) γίνεται:

$$\begin{aligned} \bar{3},92888 &= \log(90^\circ - x)'' + \bar{6},68558 && \Leftrightarrow \\ (90^\circ - x)'' &= 1751'' = 29' 11' && \Leftrightarrow \\ x &= 89^\circ 30' 49''. \end{aligned}$$

A Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ

83. Νά βρεθεί τό ελάχιστο θετικό τόξο x , για τό όποιο είναι:

- | | |
|--|---|
| 1. $\log \eta\mu x = \bar{3},72835$, | 4. $\log \sigma\upsilon\nu x = \bar{2},69231$, |
| 2. $\log \epsilon\phi x = \bar{2},77213$, | 5. $\log \epsilon\phi x = 2,48739$, |
| 3. $\log \sigma\phi x = 1,53421$, | 6. $\log \sigma\phi x = \bar{2},53298$. |

84. Νά βρεθεί τό ελάχιστο θετικό τόξο x , για τό όποιο είναι:

$$\sigma\phi x = \frac{\sqrt[3]{\alpha \cdot \sigma\upsilon\nu A}}{\eta\mu 5A \cdot \epsilon\phi B},$$

όπου $\alpha = -0,08562$, $A = 131^\circ 49' 25''$, $B = 36^\circ 43' 26''$.

ΛΟΓΑΡΙΘΜΙΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

● 48. Χρησιμότητα μετατροπής παραστάσεων σε άλλες λογαριθμίσιμες.

*Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να υπολογίσουμε την τιμή της παραστάσεως

$$y = \frac{1 + \sin x}{1 - \sin x}, \quad \text{αν } x = 24^\circ 36'.$$

θά έχουμε:
$$y = \frac{1 + \sin(24^\circ 36')}{1 - \sin(24^\circ 36')} \quad (1)$$

Παρατηρούμε ότι για να βρούμε τον y πρέπει να βρούμε τό $\sin(24^\circ 36')$ και να εκτελέσουμε τις πράξεις στο δεύτερο μέλος της (1).

*Από τούς πίνακες βρίσκουμε ότι είναι:

$$\log \sin(24^\circ 36') = \bar{1},95868. \quad \text{*Αρα } \sin(24^\circ 36') = 0,90922$$

και επομένως:

$$y = \frac{1 + 0,90922}{1 - 0,90922} = \frac{1,90922}{0,09078} = 21,031.$$

*Επειδή όμως $\frac{1 + \sin x}{1 - \sin x} = \sigma\varphi^2 \frac{x}{2}$, θά έχουμε $y = \sigma\varphi^2 \frac{x}{2}$ και άρα :

$$y = \sigma\varphi^2(12^\circ 18') \Leftrightarrow \log y = 2\log \sigma\varphi(12^\circ 18') = 2 \cdot 0,66147 = 1,32394$$

άπό όπου έχουμε:
$$y = 21,031.$$

*Από τά παραπάνω διαπιστώνουμε ότι με τό δεύτερο τρόπο τό ζητούμενο βρέθηκε εύκολότερα και μέ λιγότερες πράξεις. Αυτό οφείλεται στό ότι ή δεδομένη παράσταση αντικαταστάθηκε μέ τήν ισοδύναμή της $\sigma\varphi^2(12^\circ 18')$, τής όποιás τό λογάριθμο βρίσκουμε αν εφαρμόσουμε τή γνωστή ιδιότητα τού λογαρίθμου μιās δυνάμεως. Για τό λόγο αυτό ή τελευταία αυτή παράσταση ονομάζεται λογαριθμίσιμη.

*Από τό παράδειγμα αυτό και άπό άλλα όμοια βλέπουμε ότι είναι πολύ χρήσιμο νά ξέρουμε πώς νά μετατρέπουμε τριγωνομετρικές παραστάσεις σε άλλες ισοδύναμες και λογαριθμίσιμες.

Στά προηγούμενα κεφάλαια είδαμε ότι μερικές παραστάσεις μετατρέπονται σε άλλες ισοδύναμες μέ μορφή γινομένου ή πηλίκου. *Έτσι είδαμε ότι οί παραστάσεις:

$$\left. \begin{array}{l} \eta\mu\alpha \sigma\upsilon\upsilon\beta \pm \eta\mu\beta \sigma\upsilon\alpha \\ \sigma\upsilon\alpha \sigma\upsilon\upsilon\beta \pm \eta\mu\alpha \eta\mu\beta \end{array} \right\} \left. \begin{array}{l} \eta\mu\alpha \pm \eta\mu\beta \\ \sigma\upsilon\alpha\alpha \pm \sigma\upsilon\upsilon\beta \end{array} \right\} \left. \begin{array}{l} \epsilon\varphi\alpha \pm \epsilon\varphi\beta \\ \sigma\varphi\alpha \pm \sigma\varphi\beta \end{array} \right\} \text{ κλπ.}$$

μετατρέπονται σε μονώνυμα.

*Επαναλαμβάνουμε μερικές γνωστές παραστάσεις που είναι απαραίτητο να τις ξέρουμε.

$1 + \sigma\upsilon\nu\alpha \equiv 2\sigma\upsilon\nu^2 \frac{\alpha}{2}$ (1)	$1 + \eta\mu\alpha \equiv 2\sigma\upsilon\nu^2 \left(45^\circ - \frac{\alpha}{2}\right)$ (2)
$1 - \sigma\upsilon\nu\alpha \equiv 2\eta\mu^2 \frac{\alpha}{2}$ (3)	$1 - \eta\mu\alpha \equiv 2\eta\mu^2 \left(45^\circ - \frac{\alpha}{2}\right)$ (4)
$1 \pm \epsilon\varphi\alpha = \frac{\sqrt{2} \eta\mu(45^\circ \pm \alpha)}{\sigma\upsilon\nu\alpha}$ (5)	$1 \pm \sigma\varphi\alpha = \frac{\sqrt{2} \eta\mu(\alpha \pm 45^\circ)}{\eta\mu\alpha}$ (6)
$1 - \sigma\upsilon\nu^2\alpha \equiv \eta\mu^2\alpha$ (7)	$1 - \eta\mu^2\alpha \equiv \sigma\upsilon\nu^2\alpha$ (8)
$\frac{1 + \epsilon\varphi\alpha}{1 - \epsilon\varphi\alpha} = \epsilon\varphi(45^\circ + \alpha)$ (9)	$\frac{1 - \epsilon\varphi\alpha}{1 + \epsilon\varphi\alpha} = \epsilon\varphi(45^\circ - \alpha)$ (10)
$1 + \epsilon\varphi^2\alpha = \frac{1}{\sigma\upsilon\nu^2\alpha}$ (11)	$1 + \sigma\varphi^2\alpha = \frac{1}{\eta\mu^2\alpha}$ (12)
$\frac{1 + \sigma\upsilon\nu\alpha}{1 - \sigma\upsilon\nu\alpha} = \sigma\varphi^2 \frac{\alpha}{2}$ (13)	$\frac{1 - \sigma\upsilon\nu\alpha}{1 + \sigma\upsilon\nu\alpha} = \epsilon\varphi^2 \frac{\alpha}{2}$ (14)

● 49. Χρήση βοηθητικής γωνίας. Πολλές φορές διευκολυνόμαστε στη μετατροπή μιᾶς παραστάσεως σε ἄλλη λογιστή με τούς λογαρίθμους, ἂν χρησιμοποιήσουμε κατάλληλη βοηθητική γωνία. *Έτσι:

α) *Αν $k \in \mathbb{R}^+$, τότε ὑπάρχει γωνία ὀξεῖα φ , τέτοια ὥστε:

$$\epsilon\varphi\varphi = k \quad \eta \sigma\varphi^2\varphi = k \quad \eta \epsilon\varphi^2\varphi = k \quad \eta \sigma\varphi\varphi = k.$$

*Αν $0 < k < 1$, τότε μπορούμε νά βάλουμε:

$$k = \eta\mu\varphi \quad \eta \quad k = \sigma\varphi\varphi \quad \eta \quad k = \eta\mu^2\varphi \quad \eta \quad k = \sigma\upsilon\nu^2\varphi.$$

β) *Αν $k \in \mathbb{R}$, τότε μπορούμε νά βάλουμε:

$$k = \epsilon\varphi\varphi \quad \eta \quad k = \sigma\varphi\varphi.$$

*Αν $|k| < 1$, τότε μπορούμε νά βάλουμε:

$$k = \eta\mu\varphi \quad \eta \quad k = \sigma\upsilon\nu\varphi.$$

γ) Διαλέγουμε πάντοτε ὡς τιμή τῆς γωνίας φ τήν ἐλάχιστη θετική τῆς ἐξισώσεως που δόθηκε ὡς πρὸς φ . *Αν $k > 0$, τότε ἡ γωνία φ εἶναι ὀξεῖα.

Οἱ συνηθέστερες προτάσεις στίς ὁποῖες γίνεται χρήση τῆς μεθόδου (βοηθητικής γωνίας) αὐτῆς ἔχουν τίς ἀκόλουθες μορφές.

● 50. ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1. Νά γίνων λογαριθμίσιμες οἱ παραστάσεις:

$$y_1 = \alpha + \beta \quad \text{καὶ} \quad y_2 = \alpha - \beta$$

Λύση. *Ἐδῶ ὑποτίθεται ὅτι $\alpha > 0$, $\beta > 0$ καὶ οἱ λογαρίθμοί τους εἶναι γνωστοί.

10. "Ας δεχθούμε ότι $\log \alpha > \log \beta$. "Άρα $\alpha > \beta$. "Έτσι γράφουμε:

$$\alpha \pm \beta = \alpha \left(1 \pm \frac{\beta}{\alpha} \right)$$

α') "Επειδή $\left| \frac{\beta}{\alpha} \right| < 1$, μπορούμε να βάλουμε:

$$\frac{\beta}{\alpha} = \sigma\upsilon\upsilon\varphi \quad \eta \quad \frac{\beta}{\alpha} = \varepsilon\varphi^2\varphi \quad \eta \quad \frac{\beta}{\alpha} = \varepsilon\varphi\varphi,$$

οπότε θα έχουμε αντίστοιχως:

$$y_1 = \alpha + \beta = \alpha(1 + \sigma\upsilon\upsilon\varphi) = 2\alpha \sigma\upsilon\upsilon^2 \frac{\varphi}{2},$$

$$y_1 = \alpha + \beta = \alpha(1 + \varepsilon\varphi^2\varphi) = \frac{\alpha}{\sigma\upsilon\upsilon^2\varphi},$$

$$y_1 = \alpha + \beta = \alpha(1 + \varepsilon\varphi\varphi) = \frac{\alpha\sqrt{2} \eta\mu(45^\circ + \varphi)}{\sigma\upsilon\upsilon\varphi}$$

β') "Αν βάλουμε:

$$\frac{\beta}{\alpha} = \sigma\upsilon\upsilon\varphi \quad \eta \quad \frac{\beta}{\alpha} = \eta\mu^2\varphi \quad \eta \quad \frac{\beta}{\alpha} = \varepsilon\varphi\varphi$$

καί υποθέσουμε ότι $\left| \frac{\beta}{\alpha} \right| < 1$ και $0 < \frac{\beta}{\alpha} < 1$, τότε θα έχουμε, αντίστοιχως:

$$y_2 = \alpha - \beta = \alpha(1 - \sigma\upsilon\upsilon\varphi) = 2\alpha \eta\mu^2 \frac{\varphi}{2}$$

$$y_2 = \alpha - \beta = \alpha(1 - \eta\mu^2\varphi) = \alpha \sigma\upsilon\upsilon^2\varphi,$$

$$y_2 = \alpha - \beta = \alpha(1 + \varepsilon\varphi\varphi) = \frac{\alpha\sqrt{2} \eta\mu(45^\circ - \varphi)}{\sigma\upsilon\upsilon\varphi}$$

20. "Αν $\log \alpha < \log \beta$, τότε $\alpha < \beta$. "Έτσι γράφουμε:

$$\alpha + \beta = \alpha \left(1 + \frac{\beta}{\alpha} \right) \quad \text{καί} \quad \alpha - \beta = \alpha \left(1 - \frac{\beta}{\alpha} \right)$$

καί εργαζόμαστε όπως παραπάνω.

Παρατήρηση. Γιά να κάνουμε λογαριθμισιμη την παράσταση:

$$x = \alpha - \beta + \gamma - \delta,$$

βάζουμε $\alpha - \beta = A$, $B = A + \gamma$ και $\Gamma = B - \delta$, και εργαζόμαστε όπως και προηγουμένως.

● 51. ΠΡΟΒΛΗΜΑ II. Νά γίνει λογαριθμισιμη η παράσταση:

$$x = \frac{\alpha - \beta}{\alpha + \beta}. \quad (1)$$

Λύση. *Ας υποθέσουμε ότι $\alpha > \beta$. *Αν βάλουμε όπου $\frac{\beta}{\alpha} = \epsilon\phi\phi$, τότε θα έχουμε :

$$x = \frac{\alpha - \alpha \epsilon\phi\phi}{\alpha + \alpha \epsilon\phi\phi} = \frac{1 - \epsilon\phi\phi}{1 + \epsilon\phi\phi} = \epsilon\phi(45^\circ - \phi),$$

καί αν $\left| \frac{\beta}{\alpha} \right| < 1$, μπορούμε να βάλουμε όπου $\frac{\beta}{\alpha} = \sigma\upsilon\nu\phi$, οπότε:

$$x = \frac{\alpha - \alpha \sigma\upsilon\nu\phi}{\alpha + \alpha \sigma\upsilon\nu\phi} = \frac{1 - \sigma\upsilon\nu\phi}{1 + \sigma\upsilon\nu\phi} = \epsilon\phi^2 \frac{\phi}{2}.$$

*Αν $\alpha < \beta$, τότε υπολογίζουμε την παράσταση $y = \frac{\beta - \alpha}{\beta + \alpha}$

★ ● 52. ΠΡΟΒΛΗΜΑ III. *Νά γίνον λογαριθμίσιμες οι παραστάσεις:*

$$x = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2} \quad \text{και} \quad y = \sqrt{\alpha^2 - \beta^2}.$$

Λύση. *Η δεύτερη παράσταση, προφανώς, έχει έννοια, όταν $\alpha > \beta$.

α') *Αν βάλουμε $\frac{\beta}{\alpha} = \epsilon\phi\phi$, ή πρώτη παράσταση γίνεται:

$$x = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2} = \alpha \sqrt{1 + \left(\frac{\beta}{\alpha}\right)^2} = \alpha \sqrt{1 + \epsilon\phi^2\phi} = \frac{\alpha}{\sigma\upsilon\nu\phi}$$

β') *Αν βάλουμε $\frac{\beta}{\alpha} = \eta\mu\phi$, τότε η δεύτερη παράσταση γίνεται:

$$y = \sqrt{\alpha^2 - \beta^2} = \alpha \sqrt{1 - \left(\frac{\beta}{\alpha}\right)^2} = \alpha \sqrt{1 - \eta\mu^2\phi} = \alpha \sigma\upsilon\nu\phi.$$

● 53. ΠΡΟΒΛΗΜΑ IV. *Νά γίνει λογαριθμίσιμη η παράσταση:*

$$y = \alpha \sigma\upsilon\nu x \pm \beta \eta\mu x. \quad (1)$$

Λύση. *Εδώ υποτίθεται ότι $\alpha\beta \neq 0$ και $x \neq k \cdot \frac{\pi}{2}$, $k \in \mathbb{Z}$.

*Αν $\frac{\beta}{\alpha} = \epsilon\phi\phi = \frac{\eta\mu\phi}{\sigma\upsilon\nu\phi}$, ή παράσταση (1) γράφεται:

$$y = \alpha \left(\sigma\upsilon\nu x \pm \frac{\beta}{\alpha} \eta\mu x \right) = \alpha \left(\sigma\upsilon\nu x + \frac{\eta\mu\phi}{\sigma\upsilon\nu\phi} \eta\mu x \right) = \frac{\alpha \sigma\upsilon\nu(x \mp \phi)}{\sigma\upsilon\nu\phi}$$

*Ωστε :

$$y = \frac{\alpha \sigma\upsilon\nu(x \mp \phi)}{\sigma\upsilon\nu\phi},$$

ή όποια είναι λογαριθμίσιμη.

Παρατήρηση. Θα μπορούσαμε να βάλουμε $\frac{\beta}{\alpha} = \sigma\phi\phi$ ή αν βγει κινός παράγοντας $\delta \beta$, να βάλουμε :

$$\frac{\alpha}{\beta} = \epsilon\phi\phi \quad \text{ή} \quad \frac{\alpha}{\beta} = \sigma\phi\phi.$$

Παράδειγμα 1ο 'Η παράσταση $y = 3\sigma\upsilon\eta\kappa + 4\eta\mu\kappa$ νά γραφεί μέ τή μορφή:

$$y = A\sigma\upsilon\eta(x - \varphi).$$

Λύση. 'Η δεδομένη παράσταση γράφεται:

$$y = 5\left(\frac{3}{5}\sigma\upsilon\eta\kappa + \frac{4}{5}\eta\mu\kappa\right) \quad (1)$$

*'Αν όμως $0 < \varphi < \frac{\pi}{2}$, τότε $\sigma\upsilon\eta\varphi = \frac{3}{5}$, $\eta\mu\varphi = \frac{4}{5}$. *'Αρα $\epsilon\varphi\varphi = \frac{4}{3}$

καί έπομένως:

$$y = 5(\sigma\upsilon\eta\varphi\sigma\upsilon\eta\kappa + \eta\mu\varphi\eta\mu\kappa) = 5\sigma\upsilon\eta(x - \varphi) \quad (2)$$

'Η παράσταση (2) είναι τής ζητούμενης μορφής μέ

$$A = 5 \text{ καί } \varphi = 53^\circ 7' 48'', 4,$$

γιατί άπό τήν $\epsilon\varphi\varphi = \frac{4}{3}$ παίρνουμε:

$$\log \epsilon\varphi\varphi = \log 4 - \log 3 = 0,60206 - 0,47712 = 0,12494 = \log \epsilon\varphi(53^\circ 7' 48'', 4).$$

★ **Παράδειγμα 2ο.** Νά γίνει λογαριθμίσμη ή παράσταση:

$$y = \sqrt{\beta^2 + \gamma^2 - 2\beta\gamma \sigma\upsilon\eta A} \quad (1)$$

Λύση. Θεωρούμε τούς άριθμούς β καί γ θετικούς μέ $\beta > \gamma$ καί ότι:

$$0^\circ < A < 180^\circ.$$

Τό ύπόρριζο γράφεται διαδοχικά:

$$\begin{aligned} \beta^2 + \gamma^2 - 2\beta\gamma \sigma\upsilon\eta A &= (\beta^2 + \gamma^2)\left(\sigma\upsilon\eta^2 \frac{A}{2} + \eta\mu^2 \frac{A}{2}\right) - 2\beta\gamma\left(\sigma\upsilon\eta^2 \frac{A}{2} - \eta\mu^2 \frac{A}{2}\right) = \\ &= (\beta^2 + \gamma^2)\eta\mu^2 \frac{A}{2} + (\beta - \gamma)^2 \sigma\upsilon\eta^2 \frac{A}{2} = (\beta^2 + \gamma^2)\eta\mu^2 \frac{A}{2} \left[1 + \left(\frac{\beta - \gamma}{\beta + \gamma}\right)^2 \sigma\varphi^2 \frac{A}{2}\right] \Rightarrow \end{aligned}$$

$$y = (\beta + \gamma)\eta\mu \frac{A}{2} \sqrt{1 + \left(\frac{\beta - \gamma}{\beta + \gamma}\right)^2 \sigma\varphi^2 \frac{A}{2}} \quad (2)$$

*'Αν γράψουμε $\frac{\beta - \gamma}{\beta + \gamma} \sigma\varphi \frac{A}{2} = \epsilon\varphi\varphi$, ή (2) γίνεται:

$$y = (\beta + \gamma)\eta\mu \frac{A}{2} \sqrt{1 + \epsilon\varphi^2\varphi} = \frac{\beta + \gamma}{\sigma\upsilon\eta\varphi} \eta\mu \frac{A}{2}$$

*'Ωστε :

$$y = \frac{\beta + \gamma}{\sigma\upsilon\eta\varphi} \eta\mu \frac{A}{2}$$

★ ● 54. **ΠΡΟΒΛΗΜΑ V.** Νά γίνονν λογαριθμίσμησ οι ρίζες τής δευτεροβάθμιας έξισώσεως:

$$ax^2 + \beta x + \gamma = 0.$$

Λύση. 'Η κανονική μορφή μιās δευτεροβάθμιας έξισώσεως είναι ή :

$$ax^2 + \beta x + \gamma = 0 \quad (1)$$

*Αν $\beta = 0$ ή $\gamma = 0$, οι μη μηδενικές ρίζες τής εξίσωσης —αν αυτή επιδέχεται τέτοιες— είναι λογαριθμίσιμες.

*Αν επίσης $\beta^2 - 4\alpha\gamma = 0$, πάλι οι ρίζες τής εξίσωσης είναι λογαριθμίσιμες. Παραλείποντας τις περιπτώσεις αυτές, μένει να εξετάσουμε τήν περίπτωση τού ή εξίσωση είναι πλήρης και επιδέχεται ρίζες πραγματικές και διαφορετικές από τό μηδέν.

Υποτίθεται πάντα $\alpha > 0$. *Αρα ή (1) μπορεί νά έχει τīs ακόλουθες μορφές:

$$ax^2 - \beta x - \gamma = 0 \quad (2) \qquad ax^2 + \beta x - \gamma = 0 \quad (4)$$

$$ax^2 - \beta x + \gamma = 0 \quad (3) \qquad ax^2 + \beta x + \gamma = 0 \quad (5)$$

Προφανώς, οι ρίζες τών εξισώσεων (4) και (5) είναι αντίστοιχως αντίθετες μέ τīs ρίζες τών εξισώσεων (2) και (3).

*Αρκεί, λοιπόν, νά θεωρήσουμε μόνο τīs εξισώσεις (2) και (3).

α) *Η εξίσωση $ax^2 - \beta x - \gamma = 0$. Στήν εξίσωση αυτή είναι $\alpha\gamma < 0$ και επομένως οι ρίζες της είναι:

$$x_1 = \frac{\beta - \sqrt{\beta^2 + 4\alpha\gamma}}{2\alpha} \quad \text{και} \quad x_2 = \frac{\beta + \sqrt{\beta^2 + 4\alpha\gamma}}{2\alpha}$$

*Αν βάλουμε $\frac{4\alpha\gamma}{\beta^2} = \varepsilon\varphi^2$, ή παράσταση $\sqrt{\beta^2 + 4\alpha\gamma}$ γράφεται διαδοχικά:

$$\sqrt{\beta^2 + 4\alpha\gamma} = \beta \sqrt{1 + \frac{4\alpha\gamma}{\beta^2}} = \beta \sqrt{1 + \varepsilon\varphi^2} = \frac{\beta}{\text{συν}\varphi}$$

$$\text{*Αρα: } x_1 = \frac{1}{2\alpha} \left(\beta - \frac{\beta}{\text{συν}\varphi} \right) = \frac{\beta}{2\alpha \text{συν}\varphi} (\text{συν}\varphi - 1) = -\frac{\beta}{\alpha} \cdot \frac{\eta\mu^2 \frac{\varphi}{2}}{\text{συν}\varphi} \quad (6)$$

$$\text{και } x_2 = \frac{1}{2\alpha} \left(\beta + \frac{\beta}{\text{συν}\varphi} \right) = \frac{\beta}{2\alpha \text{συν}\varphi} (\text{συν}\varphi + 1) = \frac{\beta}{\alpha} \cdot \frac{\text{συν}^2 \frac{\varphi}{2}}{\text{συν}\varphi} \quad (7)$$

*Από τήν $\frac{4\alpha\gamma}{\beta^2} = \varepsilon\varphi^2 \Leftrightarrow \beta = \frac{2\sqrt{\alpha\gamma}}{\varepsilon\varphi}$, όποτε οι (6) και (7) γίνονται:

$$x_1 = -\sqrt{\frac{\gamma}{\alpha}} \varepsilon\varphi \frac{\varphi}{2} \quad \text{και} \quad x_2 = \sqrt{\frac{\gamma}{\alpha}} \sigma\varphi \frac{\varphi}{2}$$

δηλαδή παραστάσεις λογαριθμίσιμες.

β) *Η εξίσωση $ax^2 - \beta x + \gamma = 0$. *Αν είναι:

$$\beta^2 - 4\alpha\gamma > 0 \Leftrightarrow \beta^2 > 4\alpha\gamma,$$

τότε και ή εξίσωση επιδέχεται ρίζες θετικές, επειδή τό γινόμενό τους είναι θετικό, όπως και τό άθροισμά τους είναι θετικό. Αυτές είναι:

$$x_1 = \frac{\beta - \sqrt{\beta^2 - 4\alpha\gamma}}{2\alpha} \quad \text{και} \quad x_2 = \frac{\beta + \sqrt{\beta^2 - 4\alpha\gamma}}{2\alpha}$$

Επειδή $\beta^2 > 4\alpha\gamma$, θα είναι $0 < \frac{4\alpha\gamma}{\beta^2} < 1$ και μπορούμε να βάλουμε:

$$\frac{4\alpha\gamma}{\beta^2} = \eta\mu^2\varphi \Leftrightarrow \beta = \frac{2\sqrt{\alpha\gamma}}{\eta\mu\varphi}$$

Άρα η παράσταση $\sqrt{\beta^2 - 4\alpha\gamma}$ γράφεται διαδοχικά:

$$\sqrt{\beta^2 - 4\alpha\gamma} = \beta \sqrt{1 - \frac{4\alpha\gamma}{\beta^2}} = \beta \sqrt{1 - \eta\mu^2\varphi} = \beta \sigma\upsilon\nu\varphi$$

και επομένως:

$$x_1 = \frac{1}{2\alpha}(\beta - \beta\sigma\upsilon\nu\varphi) = \frac{\beta}{2\alpha}(1 - \sigma\upsilon\nu\varphi) = \frac{\beta}{\alpha} \eta\mu^2 \frac{\varphi}{2} \quad (8)$$

$$\text{και} \quad x_2 = \frac{1}{2\alpha}(\beta + \beta\sigma\upsilon\nu\varphi) = \frac{\beta}{2\alpha}(1 + \sigma\upsilon\nu\varphi) = \frac{\beta}{\alpha} \sigma\upsilon\nu^2 \frac{\varphi}{2} \quad (9)$$

Επειδή όμως $\beta = \frac{2\sqrt{\alpha\gamma}}{\eta\mu\varphi}$, οι (8) και (9) γίνονται:

$$x_1 = \sqrt{\frac{\gamma}{\alpha}} \varepsilon\varphi \frac{\varphi}{2} \quad \text{και} \quad x_2 = \sqrt{\frac{\gamma}{\alpha}} \sigma\varphi \frac{\varphi}{2}$$

δηλαδή παραστάσεις λογαριθμίσιμες.

Εφαρμογή. *Νά υπολογισθούν οι ρίζες της εξίσωσης:*

$$4x^2 - 25,7x + 35,549 = 0.$$

Λύση. Η εξίσωση αυτή είναι της μορφής $ax^2 - bx + \gamma = 0$.

Αν γράψουμε $\eta\mu^2\varphi = \frac{4\alpha\gamma}{\beta^2}$, θα έχουμε διαδοχικά:

$$\begin{aligned} \log \eta\mu\varphi &= \frac{1}{2} (\log 4 + \log \alpha + \log \gamma) + \sigma\upsilon\log \beta = \\ &= \frac{1}{2} (0,60206 + 0,60206 + 1,55083) + \bar{2},59007 = \bar{1},96755, \end{aligned}$$

$$\text{όπότε} \quad \varphi = 68^\circ 7' 36'' \quad \text{και} \quad \frac{\varphi}{2} = 34^\circ 3' 48''.$$

Οι ρίζες της εξίσωσης προκύπτουν από τις σχέσεις (8), (9), δηλαδή:

$$x_1 = \frac{\beta}{\alpha} \eta\mu^2 \frac{\varphi}{2} \Leftrightarrow$$

$$\begin{aligned} \log x_1 &= \log \beta + \sigma\upsilon\log \alpha + 2\log \eta\mu (34^\circ 3' 48'') = \\ &= 1,40993 + \bar{1},39794 + \bar{1},49654 = 0,30441 \Rightarrow \end{aligned}$$

$$x_1 = \mathbf{2,0156},$$

$$\text{και} \quad x_2 = \frac{\beta}{\alpha} \sigma\upsilon\nu^2 \frac{\varphi}{2} \Rightarrow$$

$$\begin{aligned} \log x_2 &= \log \beta + \sigma \log \alpha + 2 \log \sigma \nu (34^\circ 3' 48'') = \\ &= 1,40993 + \overline{1},39794 + \overline{1},83650 = 0,64437 \Rightarrow \\ x_2 &= 4,4093. \end{aligned}$$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Πρώτη ομάδα

85. Με τη χρήση κατάλληλης βοηθητικής γωνίας, νά γίνουν λογαριθμίσιμες οι ακόλουθες παραστάσεις:

$$\begin{array}{ll} 1. & x = \sqrt{2} - 1, \\ 2. & x = 2 + \sqrt{2}, \\ 3. & x = 2 + \sqrt{3}, \\ 4. & x = 1 - \sqrt{3}, \\ 5. & x = \sqrt{3} + \sqrt{2}, \\ 6. & x = 3 - \sqrt{3}, \\ 7. & x = \frac{2 + \sqrt{2}}{2 - \sqrt{2}}, \\ 8. & x = \frac{3 - \sqrt{3}}{3 + \sqrt{3}}, \\ 9. & x = \frac{\sqrt{3} + 1}{\sqrt{3} - 1}. \end{array}$$

86. Νά γίνουν λογαριθμίσιμες οι παραστάσεις:

$$\begin{array}{ll} 1. & x = 1 + 2\eta\mu\alpha, \\ 2. & x = 1 - 2\sigma\upsilon\eta\alpha, \\ 3. & x = 1 + \sqrt{2}\eta\mu\alpha, \\ 4. & x = 2\sigma\upsilon\eta\alpha - \sqrt{3}, \\ 5. & x = 1 - \sqrt{3}\sigma\phi\alpha, \\ 6. & x = \eta\mu\alpha + \eta\mu 2\alpha + \eta\mu 3\alpha, \\ 7. & x = \sigma\upsilon\eta\alpha + \sqrt{3}\eta\mu\alpha, \\ 8. & x = \frac{\sqrt{3} + \epsilon\phi\alpha}{1 - \sqrt{3}\epsilon\phi\alpha}. \end{array}$$

★ Δεύτερη ομάδα

87. "Αν είναι γνωστοί οι $\log\alpha$ και $\log\beta$ με $\log\alpha > \log\beta$, νά γίνουν λογαριθμίσιμες οι παραστάσεις:

$$\begin{array}{ll} 1. & x = \sqrt{\alpha^2 - \beta^2}, \\ 2. & x = \sqrt{\alpha + \beta} + \sqrt{\alpha - \beta}, \\ 3. & x = \sqrt{\frac{\alpha - \beta}{\alpha + \beta}} + \sqrt{\frac{\alpha + \beta}{\alpha - \beta}}, \\ 4. & x = \frac{4(\alpha - \beta)\sqrt{\alpha\beta}}{(\alpha + \beta)^2}, \\ 5. & x = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2 - \gamma^2}, \end{array}$$

αν για όλες είναι: $\alpha = 1375$, $\beta = 8602$, $\gamma = 1215$.

88. "Αν $\alpha = 108,7$, $\beta = 73,45$, νά υπολογισθεί ή $x = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2}$.

89. "Αν $\alpha = 71,29$, $\beta = 32,57$, νά υπολογισθεί ή $x = \sqrt{\alpha^2 - \beta^2}$.

90. "Αν $\alpha = 4258$, $\beta = 3672$ και $\beta \epsilon\phi 3x = \alpha + \sqrt{\alpha^2 + \beta^2}$, νά υπολογισθεί ό x έτσι, ώστε $0^\circ < x < 180^\circ$.

91. "Αν $\alpha = 4625,5$, $\beta = 3944,6$, $\theta = 51^\circ 57' 44''$, $\theta_1 = 63^\circ 18' 27''$ και

$$\epsilon\phi 2x = \frac{\alpha \eta\mu\theta_1 - \beta \eta\mu\theta}{\alpha \eta\mu\theta_1 + \beta \eta\mu\theta},$$

νά υπολογισθεί ό x , γιά νά είναι: $0^\circ < x < 180^\circ$.

92. Νά επίλυθει ή εξίσωση:

$$8x^2 - 36,75x - 25,628 = 0.$$

93. 'Επίσης οι εξισώσεις:

1. $x^2 - 148,7x + 1385 = 0$,

2. $x^2 - 245,7x - 1247,6 = 0$,

3. $x^2 + 16,75x - 64,53 = 0$,

4. $x^2 + 75,23x - 433,7 = 0$.

Επίσης, η συνάρτηση $f(x) = x^2 - 2x + 1$ είναι πάντα θετική, αφού $f(x) = (x-1)^2 \geq 0$.

$$f(x) = x^2 - 2x + 1 = (x-1)^2$$

Επίσης, η συνάρτηση $f(x) = x^2 - 2x + 1$ είναι πάντα θετική, αφού $f(x) = (x-1)^2 \geq 0$.

Επίσης, η συνάρτηση $f(x) = x^2 - 2x + 1$ είναι πάντα θετική, αφού $f(x) = (x-1)^2 \geq 0$.

Επίσης, η συνάρτηση $f(x) = x^2 - 2x + 1$ είναι πάντα θετική, αφού $f(x) = (x-1)^2 \geq 0$.

Επίσης, η συνάρτηση $f(x) = x^2 - 2x + 1$ είναι πάντα θετική, αφού $f(x) = (x-1)^2 \geq 0$.

$$f(x) = x^2 - 2x + 1 = (x-1)^2$$

$$f(x) = x^2 - 2x + 1 = (x-1)^2$$

$$f(x) = x^2 - 2x + 1 = (x-1)^2$$

Επίσης, η συνάρτηση $f(x) = x^2 - 2x + 1$ είναι πάντα θετική, αφού $f(x) = (x-1)^2 \geq 0$.

$$f(x) = x^2 - 2x + 1 = (x-1)^2$$

$$f(x) = x^2 - 2x + 1 = (x-1)^2$$

$$f(x) = x^2 - 2x + 1 = (x-1)^2$$

$$f(x) = x^2 - 2x + 1 = (x-1)^2$$

Επίσης, η συνάρτηση $f(x) = x^2 - 2x + 1$ είναι πάντα θετική, αφού $f(x) = (x-1)^2 \geq 0$.

Επίσης, η συνάρτηση $f(x) = x^2 - 2x + 1$ είναι πάντα θετική, αφού $f(x) = (x-1)^2 \geq 0$.

$$f(x) = x^2 - 2x + 1 = (x-1)^2$$

$$f(x) = x^2 - 2x + 1 = (x-1)^2$$

$$f(x) = x^2 - 2x + 1 = (x-1)^2$$

$$f(x) = x^2 - 2x + 1 = (x-1)^2$$

$$f(x) = x^2 - 2x + 1 = (x-1)^2$$

$$f(x) = x^2 - 2x + 1 = (x-1)^2$$

$$f(x) = x^2 - 2x + 1 = (x-1)^2$$

$$f(x) = x^2 - 2x + 1 = (x-1)^2$$

$$f(x) = x^2 - 2x + 1 = (x-1)^2$$

$$f(x) = x^2 - 2x + 1 = (x-1)^2$$

$$f(x) = x^2 - 2x + 1 = (x-1)^2$$

$$f(x) = x^2 - 2x + 1 = (x-1)^2$$

$$f(x) = x^2 - 2x + 1 = (x-1)^2$$

$$f(x) = x^2 - 2x + 1 = (x-1)^2$$

$$f(x) = x^2 - 2x + 1 = (x-1)^2$$

$$f(x) = x^2 - 2x + 1 = (x-1)^2$$

$$f(x) = x^2 - 2x + 1 = (x-1)^2$$

$$f(x) = x^2 - 2x + 1 = (x-1)^2$$

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

	Σελίδα
1. Τριγωνομετρικοί αριθμοί του $\alpha \pm \beta$	5 - 9
2. Έφαρμογές	9 - 11
3. Ταυτότητες υπό συνθήκες — Άσκησης	11 - 14
4. Τριγωνομετρικοί αριθμοί του $\alpha + \beta + \gamma$ — Άσκησης	14 - 16
5. Τριγωνομετρικοί αριθμοί άκεραίων πολλαπλάσιων τόξων	16 - 18
6. Τύποι του Simpson	18
7. Τριγωνομετρικοί αριθμοί των γωνιών $18^\circ, 36^\circ, 54^\circ, 72^\circ$ — Άσκησης	18 - 20
8. Οι τριγωνομετρικοί αριθμοί του τόξου 2α από την $\epsilon\phi \alpha$	21
9. Οι τριγωνομετρικοί αριθμοί της γωνίας α από την $\epsilon\phi \frac{\alpha}{2}$	22
10. Οι τριγωνομετρικοί αριθμοί της γωνίας α από τό $\text{syn } 2\alpha$	22-24
11. Οι τριγωνομετρικοί αριθμοί της γωνίας $\frac{\alpha}{2}$ από τό $\text{syn } \alpha$	24
Έφαρμογές	25 - 27
12. Οι τριγωνομετρικοί αριθμοί της γωνίας α από τους τριγωνομετρικούς αριθμούς της γωνίας $\frac{\alpha}{2}$	28
Έφαρμογές — Άσκησης	28 - 30
13. Η $\epsilon\phi \frac{\alpha}{2}$ από την $\epsilon\phi \alpha$ — Παραδείγματα	30 - 32

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

14. Μετασχηματισμοί τριγωνομετρικών συναρτήσεων	33 - 35
15. Έφαρμογές — Άσκησης	36 - 40
16. Μετασχηματισμός γινομένων σε άθροίσματα ή διαφορές	40
Έφαρμογές — Άσκησης	41 - 45

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

17. Τριγωνομετρικές ταυτότητες πάνω στο τρίγωνο καί στο τετράπλευρο	46 - 51
Άσκησης	51 - 53

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

18. Έφαρμογές των τριγωνομετρικών μετασχηματισμών. Τύποι του Mollweide ..	54 - 55
19. Τριγωνομετρικοί αριθμοί των μισών των γωνιών τριγώνου από τις πλευρές του	55 - 56
20. Έμβαδό τριγώνου	57
21. Έμβαδό τριγώνου από τις πλευρές του	57
22. Υπολογισμός της ακτίνας R του περιγραμμένου κύκλου σε τρίγωνο από τις πλευρές του α, β, γ	57 - 58
23. Έμβαδό τριγώνου από την R καί από τά ήμίτονα των γωνιών αυτού ...	58
Έφαρμογές — Άσκησης	58 - 62

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

24. Τριγωνομετρικοί πίνακες — Περιγραφή τους — Άσκησης	63 - 64
25. Έφαρμογές των τριγωνομετρικών πινάκων — Προβλήματα — Άσκησης	68 - 77

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

26. Λογαριθμίσιμες παραστάσεις — Έφαρμογές — Άσκησης	78 - 85
--	---------

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-90
91-100
101-110
111-120
121-130
131-140
141-150
151-160
161-170
171-180
181-190
191-200
201-210
211-220
221-230
231-240
241-250
251-260
261-270
271-280
281-290
291-300
301-310
311-320
321-330
331-340
341-350
351-360
361-370
371-380
381-390
391-400
401-410
411-420
421-430
431-440
441-450
451-460
461-470
471-480
481-490
491-500
501-510
511-520
521-530
531-540
541-550
551-560
561-570
571-580
581-590
591-600
601-610
611-620
621-630
631-640
641-650
651-660
661-670
671-680
681-690
691-700
701-710
711-720
721-730
731-740
741-750
751-760
761-770
771-780
781-790
791-800
801-810
811-820
821-830
831-840
841-850
851-860
861-870
871-880
881-890
891-900
901-910
911-920
921-930
931-940
941-950
951-960
961-970
971-980
981-990
991-1000



024000019884

ΕΚΔΟΣΗ Ζ', 1978 (II) - ΑΝΤΙΤΥΠΑ 95.000 - ΣΥΜΒΑΣΗ 3026/25-2-78
ΕΚΤΥΠΩΣΗ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ: Γ. ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗ - Δ. ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΗ - ΓΡΑΦΕΜΠΟΡΙΚΗ Ο.Ε.



Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής