

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΡΙΣΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΟΣ ΚΑΙ Τ. ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ
ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

ΔΙΑ ΤΑΣ ΚΑΤΩΤΕΡΑΣ ΤΑΞΕΙΣ
ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ



ΒΙΒΛΙΟΤΗΚΗ ΕΚΔΟΣΕΩΣ
ΑΔΙΟΡΓΑΝΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΝ - ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΤΡΑΠΕΖΑΝ 4-60

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1963

ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΟΥ ΜΥΡΟΥ
ΕΜ. ΣΙΑΜΝΑΚΑΚΗ ΣΑΞΙΣ Β1
ΑΡ. ΣΑΞ. 23 Θ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ Δ.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

17886

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΡΙΣΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΟΣ ΚΑΙ Τ. ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ
ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

ΔΙΑ ΤΑΣ ΚΑΤΩΤΕΡΑΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1963

ΕΙΣΑΓΩΓΗ


1. Τί είναι διάστημα, όγκος και σχήμα ενός σώματος. Όλοι έννοούμεν ότι γύρω μας εξαπλοῦται μία ἀπέραντος έκτασις. Όνομάζομεν δὲ αὐτὴν **διάστημα**.

Εἰς τὸ διάστημα τοῦτο εἶναι σκορπισμένα ὅλα τὰ σώματα τῆς φύσεως. Δηλ. ἡ Γῆ, ὁ Ἡλιος, ἡ Σελήνη καὶ πολυπληθεῖς ἄλλοι ἀστέρες.

Κάθε σῶμα καταλαμβάνει ἐν μέρος ἀπὸ τὸ διάστημα. Τὸ μέρος τοῦτο τὸ ὀνομάζομεν **όγκον** τοῦ σώματος.

Ὁ ὄγκος κάθε σώματος ἐκτείνεται ἀπὸ τὰ ἀριστερὰ πρὸς τὰ δεξιὰ, ἀπὸ κάτω πρὸς τὰ ἄνω καὶ ἀπὸ ὀπισθεν πρὸς τὰ ἐμπροσθεν. Δι' αὐτὸ λέγομεν ὅτι :

Κάθε σῶμα ἔχει τρεῖς διαστάσεις.



Σχ. 1

Διάφορα σώματα π. χ. ἐν μήλον, μία κασσετίνα ἔχουσι διάφορον ἐξωτερικὴν μορφήν ἢ **σχῆμα**.

Εἰς τὸ χαρτὶ ἢ εἰς τὸν πίνακα παριστάνομεν τὰ σώματα μὲ εἰκόνας. Καὶ αὐτὰς τὰς εἰκόνας τὰς ὀνομάζομεν **σχῆματα**. Π. χ. αἱ εἰκόνας Α καὶ Β (σχ. 1) εἶναι **σχῆματα**.

2. Τί εἶναι ἐπιφάνεια ενός σώματος. Ἄν παρατηρήσωμεν ἐν σῶμα ἀπὸ ὅλα τὰ μέρη του, βλέπομεν ὅλα τὰ ἄκρα του. Αὐτὰ τὰ ἄκρα ὅλα μαζὶ ἀποτελοῦσι τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ. Λέγομεν δηλ. ὅτι :


Ἐπιφάνεια ενός σώματος εἶναι τὸ σύνολον τῶν ἄκρων του.

Ἡ ἐπιφάνεια ενός σώματος χωρίζει αὐτὸ ἀπὸ τὸ περίξ διάστημα.

Κάθε επιφάνεια έχει δύο διαστάσεις.

3. Τι είναι εὐθεία γραμμὴ. Ἡ εὐθεία γραμμὴ εἶναι ἓν πολὺ ἀπλοῦν σχῆμα. Π. χ. ἡ τομὴ τῶν ἐσωτερικῶν ἐπιφανειῶν δύο τοίχων τῆς αἰθούσης μας εἶναι εὐθεία γραμμὴ.

Εἰς τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ κανόνος (χάρακος) βλέπομεν 4 εὐθείας γραμμὰς. Ὅλοι δὲ γνωρίζομεν πῶς χαρακώνομεν τὰ τετράδιά μας μὲ ὀδηγοὺς αὐτὰς τὰς εὐθείας τοῦ κανόνος.



Κανόνες

Σχ. 2

Μίαν εὐθεῖαν δυνάμεθα νὰ τὴν φαντασθῶμεν ὅτι ἐκτείνεται εἰς ἄπειρον ἀπόστασιν καὶ ἀπὸ τὰ δύο μέρη. Ὡστε εἰς τὸν κανόνα καθὼς καὶ εἰς τὴν ἐπιφάνειαν π. χ. τοῦ σώματος Α βλέπομεν μέρη εὐθειῶν.

Αὐτὰ τὰ λέγομεν ἰδιαιτέρως εὐθύγραμμα τμήματα.

4. Ποῖα εἶναι τὰ εἶδη τῶν ἐπιφανειῶν. α') Ἐπίπεδος ἐπιφάνεια ἢ ἐπίπεδον. Εἶναι εὐκόλον νὰ ἴδωμεν ὅτι μία εὐθεῖα τοῦ κανόνος ἐφαρμόζει εἰς ὅλα τὰ μέρη τῆς ἐπιφανείας ἑνὸς ὑαλοπίνακος ἢ ἑνὸς ὀμαλοῦ πατώματος κ.τ.λ. Ἡ ἐπιφάνεια τοῦ ὑαλοπίνακος, τοῦ πατώματος κ.τ.λ. λέγεται ἐπίπεδος ἐπιφάνεια ἢ ἐπίπεδον. Δηλαδή :

Ἐπίπεδος ἐπιφάνεια ἢ ἐπίπεδον εἶναι μία ἐπιφάνεια, εἰς τὴν ὁποίαν ἡ εὐθεῖα γραμμὴ ἐφαρμόζει πανταχοῦ.

Ἐφαρμογὴ. Ὅταν ὁ ξυλουργὸς θέλῃ νὰ κάμῃ ἐπίπεδον μίαν σανίδα, ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρὸν παρατηρεῖ, ἂν μία εὐθεῖα τοῦ κανόνος ἐφαρμόζῃ εἰς ὅλα τὰ μέρη τῆς σανίδος.

β') Τεθλασμένη ἢ πολυεδρική ἐπιφάνεια. Μὲ τὸν κανόνα βεβαιούμεθα ὅτι ἡ ἐπιφάνεια τοῦ σώματος Α (σχ. 1) ἀποτελεῖται ἀπὸ ἐπίπεδα, ἀλλὰ ὅλη ὁμοῦ δὲν εἶναι ἐπίπεδον. Αὐτὴ λέγεται τεθλασμένη ἢ πολυεδρική ἐπιφάνεια. Δηλαδή :

Τεθλασμένη ἢ πολυεδρική ἐπιφάνεια εἶναι μία ἐπιφάνεια, ἡ ὁποία ἀποτελεῖται ἀπὸ ἐπίπεδα, ἀλλὰ δὲν εἶναι ἐπίπεδον.

*Αν ἓν σῶμα ἔχη κλειστὴν πολυεδρικήν ἐπιφάνειαν, λέγεται **πολύεδρον**. Π. χ. τὸ σῶμα Α (σχ. 1) εἶναι **πολύεδρον**. Τὰ ἐπίπεδα μέρη τῆς ἐπιφανείας ἑνὸς πολυέδρου λέγονται **ἔδρα** αὐτοῦ.

γ') Καμπύλη ἐπιφάνεια. Ἡ ἐπιφάνεια τοῦ σώματος Β (σχ. 1) δὲν ἔχει ἐπίπεδα μέρη· αὕτη λέγεται **καμπύλη ἐπιφάνεια**.

Δηλαδή :

Καμπύλη ἐπιφάνεια εἶναι μία ἐπιφάνεια, ἣ ὅποια δὲν ἔχει ἐπίπεδα μέρη.

δ') Μεικτὴ ἐπιφάνεια.

Αἱ ἐπιφάνειαι τῶν σωμάτων Γ καὶ Δ (σχ. 3) ἀποτελοῦνται ἀπὸ ἐπίπεδα καὶ καμπύλα μέρη. Αὗται λέγονται **μεικταὶ ἐπιφάνειαι**. Δηλαδή :

Μεικτὴ ἐπιφάνεια εἶναι μία ἐπιφάνεια, ἣ ὅποια ἀποτελεῖται ἀπὸ ἐπίπεδα καὶ καμπύλα μέρη.

Ἄσκησεις

1. Νὰ ὀρίσητε τὸ εἶδος τῆς ἐπιφανείας μιᾶς ὄψεως ἑνὸς φύλλου χάρτου τοῦ τετραδίου σας ἢ τὸ εἶδος τῆς ἐπιφανείας μιᾶς θήκης διὰ τὰ μολυβδοκόνδυλά σας (κασσεΐνας).


12. Νὰ ὀρίσητε τὸ εἶδος τῆς ἐπιφανείας ἑνὸς βάλου, ἑνὸς τεμαχίου σωλῆνος θερμάστρας.

3. Νὰ ὀνομάσητε διάφορα ἀντικείμενα καὶ νὰ ὀρίσητε τὸ εἶδος τῆς ἐπιφανείας τοῦ καθ' ἑνός.

5. **Τί εἶναι γραμμὴ καὶ ποῖα εἶναι τὰ εἶδη αὐτῶν.** Ἐμάθομεν (§ 3) ὅτι ἡ τομὴ τῶν ἐσωτερικῶν ἐπιφανειῶν δύο τοίχων τῆς αἰθούσης μας εἶναι εὐθεῖα γραμμὴ. Καὶ ἡ τομὴ ὅλης τῆς ἐσωτερικῆς ἐπιφανείας τῶν τοίχων ἀπὸ τὸ πάτωμα λέγεται **γραμμὴ**.

Ἐπίσης **γραμμὴ λέγεται καὶ ἡ τομὴ τῶν δύο μερῶν τῆς ἐπιφανείας τοῦ σώματος Δ (σχ. 3).** Ὡστε :

Ἡ τομὴ δύο ἐπιφανειῶν εἶναι γραμμὴ.



Σχ. 3

Μία γραμμὴ ἔχει μόνον μίαν διάστασιν.

α') Ἀπλουστέρα ἀπὸ τὰς γραμμὰς εἶναι ἡ εὐθεῖα γραμμὴ (§ 3).

β') Ἡ γραμμὴ, εἰς τὴν ὁποίαν τελειώνει τὸ πάτωμα ἀποτελεῖται ἀπὸ εὐθύγραμμα τμήματα, ἀλλὰ δὲν εἶναι εὐθεῖα γραμμὴ. Αὕτῃ λέγεται **τεθλασμένη γραμμὴ**. Δηλαδή :


Τεθλασμένη γραμμὴ εἶναι μία γραμμὴ, ἡ ὁποία ἀποτελεῖται ἀπὸ εὐθύγραμμα τμήματα, ἀλλὰ δὲν εἶναι εὐθεῖα γραμμὴ.

Τὰ εὐθύγραμμα τμήματα μιᾶς τεθλασμένης γραμμῆς λέγονται **πλευραὶ** αὐτῆς.

γ') Ἡ τομὴ τῶν δύο μερῶν τῆς ἐπιφανείας τοῦ σώματος Δ (σχ. 3) δὲν ἔχει εὐθύγραμμα τμήματα. Αὕτῃ λέγεται **καμπύλη γραμμὴ**. Δηλαδή :

Καμπύλη γραμμὴ εἶναι μία γραμμὴ, ἡ ὁποία δὲν ἔχει εὐθύγραμμα τμήματα.

δ') Αἱ γραμμαὶ τοῦ σχήματος 4 ἀποτελοῦνται ἀπὸ εὐθείας



Σχ. 4

καὶ ἀπὸ καμπύλας γραμμᾶς. Διὰ τοῦτο αὐταὶ λέγονται **μεικτᾶι γραμμαὶ**.

Ὡστε :

Μεικτὴ γραμμὴ εἶναι μία γραμμὴ, ἡ ὁποία ἀποτελεῖται ἀπὸ εὐθείας καὶ καμπύλας γραμμᾶς.

Ἐσκήσεις

4. Νὰ ὀρίσητε τὸ εἶδος τῆς γραμμῆς, εἰς τὴν ὁποίαν τελειώνει μία ἕδρα τοῦ κυτίου μὲ τὰς κιμαλίαις.

5. Νὰ ὀρίσητε τί γραμμὴν σχηματίζει κάθε ἓνα ἀπὸ τὰ γράμματα Δ, Σ, Ο, Ω.

6. Νὰ τεντώσητε ἓν λεπτὸν νῆμα εἰς τὴν ἐπιφάνειαν μιᾶς μπάλας καὶ νὰ ὀρίσητε τὸ εἶδος τῆς γραμμῆς, τὴν ὁποίαν τότε σχηματίζει τοῦτο.

6. Περιληπτικὸς πίναξ ἐπιφανειῶν καὶ γραμμῶν.

Εἶδη ἐπιφανειῶν

Εἶδη γραμμῶν

α'. Ἐπίπεδος ἐπιφάνεια ἢ ἐπίπεδον.

α' Εὐθεῖα γραμμὴ.

β'. Τεθλασμένη ἐπιφάνεια.

β' Τεθλασμένη γραμμὴ.

γ' Καμπύλη ἐπιφάνεια.

γ' Καμπύλη γραμμὴ.

δ' Μεικτὴ ἐπιφάνεια.

δ' Μεικτὴ γραμμὴ.


7. Τί είναι σημείον. Ἡ τομὴ Β τῶν γραμμῶν ΒΓ καὶ ΒΔ (σχ. 1) εἶναι σημείον. Καὶ αἱ τομαὶ τῶν γραμμῶν τοῦ σχ. 4 εἶναι σημεῖα. Ὡστε :

Σημεῖον εἶναι μία τομὴ δύο γραμμῶν.

Εἰς τὸ χαρτὶ καὶ εἰς τὸν πίνακα παριστάνομεν ἓν σημείον μὲ μίαν στιγμῆν. Πλησίον αὐτῆς γράφομεν ἓν γράμμα. Μὲ αὐτὸ ὀνομάζομεν τὸ σημείον.

Π. χ. τὸ σημείον Α (σχ. 5).

Τὸ σημείον οὐδεμίαν διάστασιν ἔχει.



Σχ. 5

8. Τί εἶναι ἴσα καὶ τί ἄνισα σχήματα. α') Ἐν πολυέδρον, π. χ.

τὸ Α (σχ. 1), ὅταν τεθῆ ἐπάνω εἰς τὸ τραπέζι μας, σκεπάζει ἓν μέρος αβγδ (σχ. 6) τῆς ἐπιφανείας του. Εἰς αὐτὸ ἐφαρμόζει ἀκριβῶς ἡ ἕδρα ε τοῦ πολυέδρου Α. Δι' αὐτὸ τὰ σχήματα αβγδ καὶ ε λέγονται ἴσα. Δηλαδή :

Δύο σχήματα λέγονται ἴσα, ἂν εἶναι δυνατόν νὰ ἐφαρμόσωσιν, ὥστε νὰ ἀποτελέσωσιν ἓν σχῆμα.

Ἐὰν δὲ ἓν ἄλλο σχῆμα ἐφαρμόζη ἀκριβῶς εἰς τὸ αβγδ, αὐτὸ θὰ ἐφαρμόζη ἀκριβῶς καὶ εἰς τὸ ε. Ἐννοοῦμεν λοιπὸν ὅτι :

Ὅσα σχήματα εἶναι ἴσα πρὸς ἓν ἄλλο, θὰ εἶναι καὶ μεταξύ των ἴσα.

Τὸ σχῆμα αεζη καλύπτει ἓνα μέρος τοῦ αβγδ. Δι' αὐτὸ τὸ αεζη λέγεται μικρότερον ἀπὸ τὸ αβγδ· τοῦτο δὲ μεγαλύτερον ἀπὸ τὸ αεζη (σχ. 6). Μαζὶ δὲ τὰ δύο αὐτὰ σχήματα λέγονται ἄνισα σχήματα. Δηλαδή :

Δύο σχήματα εἶναι ἄνισα, ἂν τὸ ἓν ἐφαρμόζη εἰς ἓν μέρος τοῦ ἄλλου.

9. Εἰς ποῖα εἶδη χωρίζομεν τὰ σχήματα. α') Ὅλα τὰ σημεῖα μιᾶς ἕδρας ἑνὸς πολυέδρου εὑρίσκονται εἰς τὸ αὐτὸ ἐπίπεδον (§ 4α'). Δι' αὐτὸ ἡ ἕδρα αὕτη λέγεται ἐπίπεδον σχῆμα. Δηλαδή :

Ἐπίπεδον σχῆμα εἶναι ἓν σχῆμα, τοῦ ὁποῖου ὅλα τὰ σημεῖα εὑρίσκονται εἰς τὸ αὐτὸ ἐπίπεδον.

β') Τὰ σημεῖα μιᾶς κασσετίνας δὲν εὑρίσκονται ὅλα μαζὶ εἰς τὸ

αὐτὸ ἐπίπεδον. Λέγεται δὲ τὸ σχῆμα τῆς κασσετίνας στερεὸν σχῆμα. Διηλαδῆ :

Στερεὸν σχῆμα εἶναι ἓν σχῆμα, τοῦ ὁποίου τὰ σημεῖα δὲν εὐρίσκονται ὅλα εἰς τὸ αὐτὸ ἐπίπεδον.

Π. χ. ἐν μῆλον, ἐν τόπι, μιὰ πέτρα εἶναι στερεὰ σχήματα.

Ἄσκησεις

7. Νά δηλώσητε, ἂν τὸ μελανοδοχεῖον σας, ὁ κονδυλοφόρος σας, εἶναι ἐπίπεδον ἢ στερεὸν σχῆμα.

8. Νά γράψητε ἓν κεφαλαῖον δέλτα καὶ ἓν κεφαλαῖον πὶ καὶ νά ὀρίσητε, ἂν αὐτὰ εἶναι στερεὰ ἢ ἐπίπεδα σχήματα.

9. Νά δηλώσητε, ἂν ἐν μεταλλικὸν νόμισμα εἶναι ἐπίπεδον ἢ στερεὸν σχῆμα.

10. Ποῖα εἶναι τὰ κυριώτερα στερεὰ σχήματα. Ἀπὸ τὰ στερεὰ σχήματα κυριώτερα εἶναι τὰ ἐξῆς :

α') Τὰ πολύεδρα. Τὰ σχήματα Α, Β, Γ, Δ, Ε (σχ. 7) εἶναι ὅλα πολύεδρα. Ἐμάθομεν (§ 4β'), ὅτι κάθε πολύεδρον ἔχει τεθλασμένην ἐπιφάνειαν.

Κάθε ἔδρα ἑνὸς πολυέδρου περικλείεται ἀπὸ εὐθύγραμμα τμήματα. Αὐτὰ λέγονται **ἀκμαὶ** τοῦ πολυέδρου.

Τὰ σημεῖα ἑνὸς πολυέδρου, ἀπὸ τὰ ὁποῖα διέρχονται τρεῖς ἢ περισσότεραι ἀκμαί, λέγονται **κορυφαί** τοῦ πολυέδρου. Π. χ. τὰ σημεῖα α καὶ β τοῦ πολυέδρου Α εἶναι δύο κορυφαί αὐτοῦ.

Τὰ πολύεδρα Α, Β, Γ, λέγονται **ἰδιαίτερος πρίσματα**.

Ἄν ἐργασθῶμεν, ὅπως εἴπομεν εἰς τὴν § 8, μετὰ τὸ πρίσμα Γ, βλέπομεν ὅτι αἱ δύο ἀπέναντι ἔδραι αὐτοῦ εἶναι ἴσαι.

Αὐταὶ λέγονται **βάσεις** αὐτοῦ.

Ὅμοίως βεβαιούμεθα ὅτι δύο τυχούσαι ἀπέναντι ἔδραι τοῦ Α ἢ τοῦ Β εἶναι ἴσαι.

Αὐτὰ λέγονται ἰδιαίτερος **ὀρθογώνια παραλληλεπίπεδα**. Τὸ κυτίον μετὰ τὰς κιμαλίας π. χ. εἶναι ἓν **ὀρθογώνιον παραλληλεπίπεδον**.


Ἰδιαίτερος δὲ βεβαιούμεθα ὁμοίως ὅτι τὸ Α ἔχει ὅλας τὰς ἔδρας ἴσας. Καὶ μετὰ τὸν διαβήτην ἀναγνωρίζομεν ὅτι τοῦτο ἔχει ἴσας καὶ ὅλας τὰς ἀκμάς του.

Τὸ Α λέγεται ἰδιαίτερος **κύβος**. Κύβος π. χ. εἶναι τὸ γνωστὸν ζάρι τῶν παιγνιδίων.

Π Ο Λ Υ Ε Δ Ρ Α


Π Ρ Ι Σ Μ Α Τ Α

ΚΥΒΟΣ



ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΠΙΠΕΔΑ

Π Υ Ρ Α Μ Ι Δ Ε Σ



Σχ. 7

Ἐμάθομεν λοιπὸν ὅτι :

α') Ὅλαι αἱ ἔδραι ἑνὸς κύβου εἶναι ἴσαι.

β') Ὅλαι αἱ ἀκμαὶ ἑνὸς κύβου εἶναι ἴσαι.

Τὰ πολυέδρα Δ καὶ Ε (σχ. 7) λέγονται ἰδιαίτερος πυραμίδες. Αἱ ἔδραι δ καὶ ε λέγονται βάσεις αὐτῶν.

Ἀσκήσεις


10. Νὰ ἀριθμήσητε δεικνύοντες συγχρόνως τὰς ἔδρας, τὰς κορυφὰς καὶ τὰς ἀκμὰς τῆς αἰθούσης τῆς διδασκαλίας.

11. Ἐνας μαθητὴς ἄς δείξη καὶ ἄς ἀριθμήσῃ τὰς ἔδρας, τὰς κορυφὰς καὶ τὰς ἀκμὰς ἐκάστου τῶν πολυέδρων Β καὶ Γ (Σχ. 7).


12. Νὰ ἐξετάσητε, ἂν τὰ προηγούμενα συμπεράσματα ἀληθεύωσι καὶ διὰ ἕνα κύβου.

13. Ἐνας μαθητὴς νὰ ἀριθμήσῃ καὶ νὰ δείξη τὰς ἔδρας, τὰς κορυφὰς καὶ τὰς ἀκμὰς τῆς πυραμίδος Δ καὶ ἄλλος τῆς Ε.


14. Νὰ προσπαθήσητε νὰ κάμητε εἰς τὴν οἰκίαν σας ἀπὸ ἕν ὀρθογώνιον παραλληλεπίπεδον ἀπὸ μαλακὸν κηρὸν ἢ ἀπὸ κατάλληλον πηλόν.



Κύλινδρος



Κῶνος
Σχ. 8



Κόλουρος Κῶνος

β') Σχήματα με μεικτὴν ἐπιφάνειαν. Τὰ στερεὰ σχήματα Κ, Λ, Μ, (σχ. 8) ἔχουσι μεικτὴν ἐπιφάνειαν.

Τὸ Κ λέγεται κύλινδρος. Π. χ. ὁ σωλὴν μιᾶς θερμάστρας εἶναι κύλινδρος.

*Αν εφαρμόσωμεν μερικά ίσα μεταλλικά νομίσματα τὸ ἐν ἑπάνω εἰς τὸ ἄλλο, σχηματίζομεν ἕνα κύλινδρον.

Ἡ κάτω ἐπιφάνεια τοῦ 1ου νομίσματος καὶ ἡ ἄνω τοῦ τελευταίου λέγονται **βάσεις** αὐτοῦ τοῦ κυλίνδρου.

Εἶναι δὲ φανερόν ὅτι αἱ βάσεις αὗται εἶναι ἴσαι. Εὐκόλα δὲ (§ 8) ἐννοοῦμεν ὅτι καὶ τοῦ κυλίνδρου K (σχ. 8) αἱ βάσεις A καὶ B εἶναι ἴσαι.

Ἡ καμπύλη ἐπιφάνεια ἑνὸς κυλίνδρου περιέχεται μεταξύ τῶν βάσεων. Λέγεται δὲ ἰδιαιτέρως **κυρτὴ ἐπιφάνεια** τοῦ κυλίνδρου.

Μὲ τὸν κανόνα βεβαιούμεθα ὅτι : Ἡ εὐθεῖα γραμμὴ εφαρμόζει εἰς τὴν κυρτὴν ἐπιφάνειαν ἑνὸς κυλίνδρου, ἀλλὰ μόνον κατὰ μίαν διεύθυνσιν. Δυνάμεθα λοιπὸν νὰ μεταχειρισθώμεθα ἕνα κύλινδρον, διὰ νὰ γράψωμεν εὐθείας γραμμὰς. Διὰ τὸν σκοπὸν τοῦτον ὑπάρχουσι καὶ κυλινδρικοὶ χάρακες.


Τὸ στερεὸν σχῆμα Λ (σχ. 8) λέγεται **κῶνος**.

Τὸ ἐπίπεδον μέρος Γ τῆς ἐπιφανείας του λέγεται **βάσις** αὐτοῦ. Τὸ δὲ καμπύλον μέρος λέγεται **κυρτὴ ἐπιφάνεια τοῦ κῶνου**. Αὕτη ἀπὸ τὴν βάσιν ἀρχίζει νὰ στενοῦται καὶ καταλήγει εἰς ἕνα σημεῖον Α.

Αὐτὸ λέγεται **κορυφὴ** τοῦ κῶνου.

Τὸ στερεὸν σῶμα Μ (σχ. 8) λέγεται **κόλουρος κῶνος**. Αἱ γλάστραι, οἱ κουβάδες, μερικὰ ποτήρια εἶναι κολουροὶ κῶνοι.

Ὁ κολουρος κῶνος ἔχει δύο ἀνίσους βάσεις Β καὶ β καὶ μίαν κυρτὴν ἐπιφάνειαν μεταξύ τῶν βάσεων.



Σχ. 9

γ') Σφαῖρα. Τὸ στερεὸν σχῆμα Σ (σχ. 9) λέγεται **σφαῖρα**. Τὸ ἐλαστικὸν τόπι σας, οἱ βῆλοι τῶν παιγνιδίων σας κ.τ.λ. εἶναι σφαῖραι.

Ἡ ἐπιφάνεια μιᾶς σφαίρας εἶναι **καμπύλη ἐπιφάνεια**.

Ἀσκήσεις

| 15. Ἐνας μαθητὴς νὰ λάβῃ ἀπὸ τὴν συλλογὴν τῶν στερεῶν σχημάτων τοῦ σχολείου μας ἕνα κύλινδρον καὶ νὰ δείξῃ τὰ στοιχεῖα αὐτοῦ, τὰ ὁποῖα ἐμάθομεν.

16. Τὸ ἴδιον δι' ἓνα κῶνον καὶ δι' ἓνα κόλουρον κῶνον.

17. Νὰ προσπαθήσητε νὰ ἴδητε, ἂν μία εὐθεῖα τοῦ κανόνος ἐφαρμόζη εἰς τὴν κυρτὴν ἐπιφάνειαν ἑνὸς κῶνου ἢ ἑνὸς κολούρου κῶνον.

18. Νὰ τεντώσητε ἐπάνω εἰς τὴν ἐπιφάνειαν μιᾶς σφαιράς ἓν λεπτὸν νῆμα καὶ νὰ ὀρίσητε τὸ εἶδος τῆς γραμμῆς, τὴν ὁποίαν ἀποτελεῖ τότε τοῦτο.

19. Νὰ ἐξετάσητε, ἂν αἱ κυρταὶ ἐπιφάνειαι τῶν κυλίνδρων, τῶν κῶνων καὶ τῶν κολούρων κῶνων εἶναι στερεὰ ἢ ἐπίπεδα σχήματα.

11. Τί εἶναι Γεωμετρία. Εἰς τὰ προηγούμενα ἐγνωρίσαμεν στερεὰ σχήματα καὶ ἐπάνω εἰς αὐτὰ διάφορα ἐπίπεδα σχήματα.

“Ὅλα τὰ σχήματα, ἐπίπεδα καὶ στερεὰ, ἐξετάζονται λεπτομερῶς ἀπὸ τὴν Γεωμετρίαν.

“Ἐν μέρος τῆς Γεωμετρίας ἐξετάζει τὰ ἐπίπεδα σχήματα· λέγεται δὲ τοῦτο Ἐπιπεδομετρία.

“Ἡ Ἐπιπεδομετρία ἐξετάζει τὰ ἐπίπεδα σχήματα χωρὶς νὰ λαμβάνη ὑπ' ὄψιν τὰ σώματα, εἰς τὰ ὁποῖα εὐρίσκονται ταῦτα.

Τὸ ἄλλο μέρος τῆς Γεωμετρίας ἐξετάζει τὰ στερεὰ σχήματα καὶ λέγεται Στερεομετρία. Αὕτη σπουδάζει τὰ στερεὰ σχήματα χωρὶς νὰ λαμβάνη ὑπ' ὄψιν ἀπὸ ποίαν ὕλην εἶναι κατασκευασμένα αὐτά.

Ἑρωτήσεις

- Ποῦ εὐρίσκονται τὰ σώματα τῆς φύσεως ;
 Τί χωρίζει ἓν σῶμα ἀπὸ τὸ περίξ διάστημα ;
 Πόσας διαστάσεις ἔχει ἓν σῶμα, πόσας μία ἐπιφάνεια καὶ πόσας μία γραμμὴ ;
 Ποῖα εἶναι ἀντιστοιχῶς τὰ εἶδη τῶν ἐπιφανειῶν καὶ τῶν γραμμῶν ;
 Ποῖα σχήματα λέγονται ἴσα καὶ ποῖα ἄνισα ;
 Ποῖα στερεὰ σχήματα ἐγνωρίσαμεν ἕως τώρα ;
 Ποῖα ἐπιστήμη ἐξετάζει τὰ σχήματα ;
 Εἰς ποῖα μέρη διαιρεῖται ἡ ἐπιστήμη αὕτη καὶ εἰς τί ὀφείλεται ἡ διαίρεσις αὕτη ;

ΕΠΙΠΕΔΟΜΕΤΡΙΑ

ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

ΑΙ ΓΡΑΜΜΑΙ

12. Πόσαι εὐθεῖαι γραμμαὶ διέρχονται ἀπὸ δύο σημεία.

Εἰς μίαν ἀπὸ τὰς εὐθεῖας γραμμὰς ἑνὸς χαρακωμένου τετραδίου ὀρίζομεν δύο σημεία Α καὶ Β (σχ. 10). Ἐπειτα προσπαθοῦμεν μετὰ τὴν βοήθειαν τοῦ κανόνος νὰ γράψωμεν καὶ ἄλλην μίαν εὐθεῖαν, ἣ ὅποια νὰ περῆ ἀπὸ τὰ σημεία Α καὶ Β. Βλέπομεν ὅμως ὅτι δὲν κατορθώνομεν τοῦτο, διότι τὸ μολύβι γράφει τὴν ἴδιαν εὐθεῖαν. Ἐνωσοῦμεν λοιπὸν ὅτι :



Σχ. 10

Ἀπὸ δύο σημεία μία μόνον εὐθεῖα γραμμὴ διέρχεται.

Ἄρκεῖ λοιπὸν νὰ ὀνομάζωμεν μίαν εὐθεῖαν μετὰ τὰ γράμματα δύο σημείων τῆς. Π.χ. εὐθεῖα ΑΒ εἶναι ἡ μόνη εὐθεῖα, ἣ ὅποια διέρχεται ἀπὸ τὰ σημεία Α καὶ Β (σχ. 10).

13. Μετὰ ποίους ἀκόμη τρόπους χαρασσομεν εὐθεῖας γραμμὰς.

α') Εἰς μικρὰς ἐδαφικὰς ἐκτάσεις, π.χ. εἰς προαύλια, εἰς κήπους κ.τ.λ. χαρασσομεν εὐθεῖας γραμμὰς ὡς ἑξῆς :

Εἰς δύο σημεία, ἀπὸ τὰ ὅποια θέλομεν νὰ περάσῃ ἡ εὐθεῖα, ἐμπήγομεν δύο πασσάλους. Εἰς αὐτοὺς δένομεν ἓν νῆμα καλὰ τετνωμένον. Ἐπειτα σύρομεν ἓνα αἰχμηρὸν πάσσαλον κατὰ μῆκος τοῦ νήματος, ὥστε ἡ αἰχμὴ νὰ χαρασῃ τὸ ἔδαφος. Τοιοῦτοτρόπως εἰς τὸ ἔδαφος χαρασσεται ἡ εὐθεῖα γραμμὴ, τὴν ὅποιαν θέλομεν.

β') Οἱ τεχνῖται χαρασσομεν εὐθεῖας γραμμὰς εἰς μίαν σανίδα ὡς ἑξῆς :

Μεταξὺ δύο σημείων, ἀπὸ τὰ ὅποια θέλουσι νὰ περάσῃ ἡ εὐθεῖα, τετνώουσι ἓν νῆμα χρωματισμένον μετὰ κόκκινον χρῶμα.

Ἐπειτα σηκώνουν αὐτὸ ὀλίγον κατὰ τὸ μέσον του περιήπου καὶ τὸ

ἀφήνουν ἔπειτα νὰ πέση ἀποτόμως εἰς τὴν σανίδα. Τὸ χρῶμα, τὸ ὁποῖον θὰ κολλήσῃ εἰς τὴν σανίδα, σχηματίζει εὐθεῖαν γραμμὴν.


Ἀσκήσεις

20. Νὰ ὀρίσητε εἰς τὸ τετράδιόν σας ἀπὸ δύο σημεῖα καὶ νὰ γράψητε τὴν εὐθεῖαν, ἢ ὁποία περνᾷ ἀπὸ αὐτά.

21. Μὲ τὴν βοήθειαν ἑνὸς νήματος χρωματισμένου μὲ τὴν κόκκιν τῆς κιμωλίας νὰ γράψητε μίαν εὐθεῖαν ἐπάνω εἰς τὸ πάτωμα.

22. Νὰ ὀρίσητε εἰς τὸ τετράδιόν σας τρία σημεῖα, τὰ ὁποῖα νὰ μὴ εὐρίσκονται εἰς μίαν εὐθεῖαν. Ἐπειτα νὰ γράψητε τὰς εὐθείας, αἱ ὁποῖαι διέρχονται ἀπὸ ἅλα τὰ ζεύγη αὐτῶν.

14. **Τί εἶναι ὁ διαβήτης.** Ὁ διαβήτης εἶναι ὄργανον ξύλινον ἢ μεταλλινόν (σχ. 11). Ἀποτελεῖται δὲ ἀπὸ δύο ἴσα σκέλη. Δύο δὲ ἄκρα αὐτῶν συνδέονται με-



Σχ. 11

ταξὺ των μὲ ἓνα κοχλίαν (βίδαν). Πέριξ τοῦ κοχλίου τούτου δύνανται νὰ στρέφονται τὰ σκέλη τοῦ διαβήτου, ὥστε τὸ ἀνοιγμα αὐτῶν νὰ γίνηται μεγαλύτερον ἢ μικρότερον, ὅσον θέλομεν.

Ἐπίσης μὲ τὸν κοχλίαν δυνάμεθα νὰ στε-

ρεώσωμεν τὰ σκέλη, ὥστε νὰ μὴ ἀλλάξῃ τὸ ἀνοιγμα αὐτῶν.


Τὰ ἐλεύθερα ἄκρα τῶν σκελῶν εἶναι ὀξεῖαι αἰχμαὶ ἢ εἰς τὸ ἐν προσαρμύζεται εἰς γραμμοσύρτης ἢ μία γραφίς ἢ κιμωλία.

15. **Μία πρώτη χρῆσις τοῦ διαβήτου.** Μὲ τὸν διαβήτην λαμβάνομεν εἰς μίαν εὐθεῖαν ἓν τμήμα AB ἴσον πρὸς ἄλλο εὐθύγραμμον τμήμα α (σχ. 12).

Δυνάμεθα ἐπίσης νὰ συγκρίνωμεν δύο εὐθύγραμμα τμήματα, διὰ νὰ ἴδωμεν, ἂν αὐτὰ εἶναι ἴσα ἢ ἄνισα, ποῖον εἶναι τὸ μεγαλύτερον καὶ ποῖον μικρότερον. Βλέπομεν π. χ. ὅτι $AB = \alpha, \beta > \alpha, \gamma < \beta$ (σχ. 12).

16. **Τί εἶναι ἄθροισμα εὐθυγράμμων τμημάτων.** Εἰς ἓν φύλλον χάρτου ἢ εἰς τὸν πίνακα γράφομεν τρία π. χ. εὐθύγραμμα τμήματα α, β, γ καὶ χωριστὰ ἀπὸ αὐτὰ μίαν εὐθεῖαν AD (σχ. 12).

Ἐπειτα μὲ τὸν διαβήτην ὀρίζομεν εἰς τὴν ΑΔ τμήματα ΑΒ, ΒΓ, ΓΔ, τὸ ἐν παραπλευρῶς ἀπὸ τὸ ἄλλο καὶ νὰ εἶναι $AB = \alpha$, $BΓ = \beta$,



Σχ. 12

$ΓΔ = \gamma$. Ἀπὸ αὐτὰ σχηματίζεται τὸ εὐθύγραμμον τμήμα ΑΔ.

Αὐτὸ λέγεται ἄθροισμα τῶν α , β , γ . Εἶναι δηλαδή :

$$\alpha + \beta + \gamma = ΑΔ.$$

Εἰς τὸ ἴδιον σχῆμα εἶναι $EZ = \alpha$, $ZH = \alpha$, $HΘ = \alpha$. Τὸ ΕΗ λοιπὸν εἶναι $\alpha + \alpha$ καὶ λέγεται διπλάσιον τοῦ α , τὸ δὲ ΕΘ εἶναι $\alpha + \alpha + \alpha$ καὶ λέγεται τριπλάσιον τοῦ α κ.τ.λ.

Ἀντιστρόφως τὸ α εἶναι $\frac{1}{2}$ τοῦ ΕΗ, $\frac{1}{3}$ τοῦ ΕΘ κ.τ.λ.

Τὸ ἄθροισμα τῶν πλευρῶν μιᾶς τεθλασμένης γραμμῆς λέγεται ἰδιαίτερος περίμετρος αὐτῆς.

17. Τί εἶναι διαφορὰ δύο ἀνίσων εὐθυγράμμων τμημάτων.

Εἰς τὸ σχ. 12 εἶναι $ΑΓ > \alpha$ καὶ $AB = \alpha$. Ἄν ἀπὸ τὸ ΑΓ ἀποχωρίσωμεν τὸ ΑΒ, μένει τὸ τμήμα ΒΓ.

Αὐτὸ εἶναι διαφορὰ τοῦ α ἀπὸ τοῦ ΑΓ. Εἶναι δηλ. $ΑΓ - \alpha = ΒΓ$.

Ἀσκήσεις


123. Νὰ γράψετε ἀπὸ δύο ἄνισα εὐθύγραμμα τμήματα καὶ νὰ σχηματίσετε τὸ ἄθροισμα καὶ τὴν διαφορὰν αὐτῶν.

124. Νὰ γράψετε ἀπὸ μίαν τεθλασμένην γραμμὴν μὲ τρεῖς πλευράς. Ἡ δευτέρα νὰ εἶναι διπλασία καὶ ἡ τρίτη τριπλασία ἀπὸ τὴν πρώτην. Ἐπειτα νὰ σχηματίσετε τὴν περίμετρον αὐτῆς.

125. Νὰ σχηματίσετε τὸ ἄθροισμα τῶν δύο πρώτων πλευρῶν τῆς προηγουμένης τεθλασμένης γραμμῆς καὶ νὰ συγκρίνητε αὐτὸ πρὸς τὴν τρίτην πλευρὰν αὐτῆς.

126. Νὰ γράψετε ἀπὸ δύο εὐθείας, αἱ ὅποισι νὰ ἀρχίζωσιν ἀπὸ ἓν σημεῖον Α. Ἐπειτα εἰς τὴν μίαν νὰ λάβητε δύο ἴσα τμήματα ΑΒ, ΒΓ καὶ εἰς τὴν ἄλλην ὁμοίως δύο ἴσα τμήματα ΑΔ, ΔΕ. Ἐπειτα νὰ γράψετε τὰ τμήματα ΒΔ καὶ ΓΕ καὶ νὰ τὰ συγκρίνητε.

18. Ποία γραμμή μεταξύ δύο σημείων είναι μικρότερα. Ἐκτός ἀπὸ τὴν καθήμερινὴν πεῖραν γνωρίζομεν ὅλοι, ὅτι συντομώτερον μεταβαίνομεν ἀπὸ ἓν σημεῖον Α εἰς ἄλλο Β, ἂν ἀκολουθῶμεν τὴν εὐθεῖαν, ΑΒ, παρὰ ἄλλην γραμμὴν, π. χ. ΑΓΒ, ἢ ΑΔΒ ἢ ΑΕΔΒ (σχ. 13). Ὡστε :



Σχ. 13

Ἐν εὐθύγραμμον τμήμα εἶναι μικρότερον ἀπὸ κάθε ἄλλην γραμμὴν, ἢ ὅποια ἔχει τὰ αὐτὰ ἄκρα.

Διὰ τὸν λόγον τοῦτον τὸ εὐθύγραμμον τμήμα ΑΒ λέγεται ἀπόστασις τῶν σημείων Α καὶ Β.

19. Πῶς μετροῦμεν ἓν εὐθύγραμμον τμήμα καὶ τί εἶναι μῆκος αὐτοῦ. Διὰ νὰ μετρήσωμεν ἓν εὐθύγραμμον τμήμα, συγκρίνομεν αὐτὸ πρὸς ἓν ὀρισμένον καὶ γνωστὸν εὐθ. τμήμα. Τὸ τμήμα τοῦτο ὀνομάζομεν μονάδα. Μὲ τὴν σύγκρισιν δὲ αὐτὴν εὐρίσκομεν ἓνα ἀριθμὸν· αὐτὸς φανερώνει ἀπὸ πόσας μονάδας ἢ καὶ ἀπὸ μέρη αὐτῆς ἀποτελεῖται τὸ μετρηθὲν τμήμα.


Ὁ ἀριθμὸς οὗτος λέγεται μῆκος αὐτοῦ τοῦ τμήματος.

Αἱ δὲ μονάδες, μὲ τὰς ὁποίας μετροῦμεν τὰς γραμμὰς, λέγονται μονάδες μῆκους.

20. Ποῖαι εἶναι αἱ συνηθέστεραι μονάδες μῆκους. Συνηθέστερα μονὰς μῆκους εἶναι τὸ μέτρον ἢ ὁ βασιλικὸς πήχυς.

Τὸ μέτρον διαιρεῖται εἰς δέκα ἴσα μέρη· αὐτὰ λέγονται παλάμαι.

Ἡ παλάμη (σχ. 14) διαιρεῖται εἰς δέκα ἴσα μέρη, τοὺς δακτύλους (πόντους).



Σχ. 14

Ὁ δάκτυλος διαιρεῖται εἰς δέκα ἴσα μέρη, τὰς γραμμὰς.

Ὡστε : 1 μετ. = 10 παλ. = 100 δακ. = 1000 γραμ.

1 παλ. = 10 δακ. = 100 γραμ.

1 δακ. = 10 γραμ.

Ἡ παλάμη λοιπὸν εἶναι $\frac{1}{10}$ τοῦ μέτρου. Δι' αὐτὸ λέγεται καὶ δεκατόμετρον. Ὁ δάκτυλος εἶναι $\frac{1}{100}$ τοῦ μέτρου· λέγεται δὲ καὶ ἑκατοστόμετρον. Ἡ γραμμὴ εἶναι $\frac{1}{1000}$ τοῦ μέτρου· λέγεται δὲ καὶ χιλιοστόμετρον. Εἰς τὴν πρᾶξιν μεταχειρίζομεθα τὸ διπλοῦν ὑποδεκάμετρον μὲ δύο παλάμας ἢ μὲ 20 ἑκατοστόμετρα καὶ τὴν ταινίαν μὲ μῆκος 10 ἢ 20 μέτρων συνήθως. Διὰ τὰς μεγάλας ἀποστάσεις μεταχειρίζομεθα τὸ στάδιον ἢ τὸ χιλιόμετρον = 1000 μέτρα καὶ τὸ μυριάμετρον = 10 στάδια = 10000 μέτρα.

Ἀσκήσεις

27. Νὰ εὕρητε πόσας παλάμας, πόσους δακτύλους καὶ πόσας γραμμάς ἔχουσιν 8 μέτρα, ἔπειτα 12 μέτρα, ἔπειτα 3,45 μέτρα.

28. Νὰ εὕρητε πόσα ἑκατοστόμετρα καὶ πόσα χιλιοστόμετρα ἔχουσιν 8,4 παλάμαι.

29. Νὰ εὕρητε πόσα μέτρα ἀποτελοῦσι 30 παλάμαι καὶ πόσα 15 παλάμαι.

30. Νὰ εὕρητε πόσα μέτρα ἀποτελοῦσι 500, ἔπειτα 425, ἔπειτα 3167,4 ἑκατοστόμετρα.

31. Νὰ εὕρητε πόσας παλάμας ἀποτελοῦσιν 800, ἔπειτα 64 καὶ ἔπειτα 7 χιλιοστόμετρα.

32. Νὰ γράψητε ἀπὸ μίαν εὐθείαν καὶ νὰ ὀρίσητε εἰς αὐτὴν ἓν τμήμα μήκους 5 ἑκατοστομέτρων, ἓν ἄλλο μήκους 120 χιλιοστομέτρων καὶ τρίτον 1,3 παλάμας.

Ἀσκήσεις πρὸς ἐπανάληψιν τοῦ Α' κεφαλαίου.

33. Νὰ γράψητε ἀπὸ δύο ἄνισα εὐθύγραμμα τμήματα καὶ νὰ μετρήσητε αὐτὰ.

34. Νὰ μετρήσῃ κάθε μαθητὴς τὸ μῆκος καὶ τὸ πλάτος τοῦ τετραδίου του.

35. Νὰ μετρήσητε μὲ τὴν ταινίαν τὸ πλάτος τῆς θύρας τῆς αἰθούσης μας καὶ ἔπειτα τὸ μῆκος καὶ τὸ πλάτος τῆς αἰθούσης.

36. Νὰ ἐκτιμήσητε μὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς σας τὸ μῆκος καὶ τὸ πλάτος τοῦ μελανοπίνακος. Ἐπειτα δὲ νὰ μετρήσητε αὐτὰ πρὸς ἔλεγχον.

37. Νὰ κάμητε τὴν ἰδίαν ἐργασίαν διὰ τὸ ὕψος τῆς ἑδρας καὶ διὰ τὸ πλάτος ἑνὸς παραθύρου.

38. Ὅμοίαν ἐργασίαν νὰ κάμη κάθε μαθητὴς εἰς τὴν οἰκίαν του διὰ τὸ μῆκος, πλάτος καὶ ὕψος τῆς κλίνης του. Διὰ τὸ μῆκος, πλάτος καὶ ὕψος τῆς τραπεζαρίας. Διὰ τὸ πλάτος καὶ ὕψος τῶν βαθμίδων τῆς κλίμακος τῆς οἰκίας του.

39. Μία τεθλασμένη γραμμὴ ἔχει τρεῖς πλευράς. Ἡ α' ἔχει μῆκος 0,05 μέτρον,


ή β' είναι διπλασία και ή γ' τριπλασία από την α'. Να εϋρητε τὸ μήκος αὐτῆς τῆς τεθλασμένης γραμμῆς.

140. Μία τεθλασμένη γραμμὴ ἔχει 4 πλευράς. Ἡ α' ἔχει μήκος 0,60 μέτρου, ή β' εἶναι τὸ $\frac{1}{4}$ τῆς α', ή γ' τὸ $\frac{1}{3}$ τῆς α' καὶ ή δ' εἶναι ἴση πρὸς τὴν α'. Να εϋρητε τὸ μήκος τῆς περιμέτρου αὐτῆς.

141. Μία τεθλασμένη γραμμὴ με τρεῖς πλευράς ἔχει περίμετρον 56 ἑκατοστομέτρων. Ἡ μία πλευρά της ἔχει μήκος 30 ἑκατοστομέτρων, αἱ δὲ ἄλλαι εἶναι ἴσαι. Να εϋρητε τὸ μήκος ἐκάστης τῶν ἴσων τούτων πλευρῶν.

ΓΩΝΙΑΙ. ΚΑΘΕΤΟΙ ΚΑΙ ΠΛΑΓΙΑΙ ΕΥΘΕΙΑΙ

21. Τί είναι γωνία και ποία είναι τὰ στοιχεῖα αὐτῆς. Αἱ ἀκμαὶ AB καὶ AG ἑνὸς κύβου K (σχ. 15) ἀρχίζουσιν ἀπὸ τὴν κορυφὴν A καὶ δὲν σχηματίζουν μίαν εὐθεΐαν. Αὗται σχηματίζουν ἐν ἐπίπεδον σχῆμα. Τοῦτο λέγεται γωνία. Τὴν ὀνομάζομεν δὲ γωνίαν A ἢ ω ἢ $\widehat{BA\Gamma}$ ἢ \widehat{GAB} .



Σχ. 15

Καὶ αἱ ἀκμαὶ $E\Delta$, EZ τοῦ πολυέδρου Π σχηματίζουν γωνίαν ΔEZ ἢ φ . Ὡστε :

Γωνία εἶναι ἐν σχῆμα, τὸ ὁποῖον σχηματίζεται ἀπὸ δύο εὐθείας, αἱ ὁποῖαι ἀρχίζουν ἀπὸ ἕν σημείου καὶ δὲν ἀποτελοῦσι μίαν εὐθεΐαν.

Αἱ εὐθεΐαι AB , AG , ἀπὸ τὰς ὁποίας σχηματίζεται ἡ γωνία A λέγονται πλευραὶ αὐτῆς.

Τὸ δὲ κοινὸν σημεῖον A τῶν πλευρῶν λέγεται κορυφὴ αὐτῆς τῆς γωνίας.

22. Ποῖαι γωνίαι εἶναι ἴσαι καὶ ποῖαι ἄνισοι. Σύμφωνα μετὰ ὅσα ἐμάθομεν (§ 8) διὰ τὰ ἴσα καὶ ἄνισα σχήματα ἐνοοῦμεν ὅτι :

α) Δύο γωνίαι λέγονται ἴσαι, ἂν δύνανται νὰ ἐφαρμοζώσιν, ὥστε νὰ σχηματίξωσι μίαν γωνίαν.


Ἄς τοποθετήσωμεν π. χ. τὴν γωνίαν η τοῦ κυτίου Σ μετὰ τὰς κίμαι-

λίαν ἐπάνω εἰς τὴν γωνίαν ω τοῦ κύβου K . Νὰ προσέξωμεν δὲ νὰ ἔλθῃ ἡ κορυφή τῆς η ἐπάνω εἰς τὴν κορυφήν A καὶ ἡ μία πλευρὰ τῆς η ἐπάνω εἰς τὴν AB . Θὰ ἴδωμεν τότε ὅτι ἡ ἄλλη πλευρὰ τῆς η θὰ ἔλθῃ ἐπάνω εἰς τὴν AB . Ἡ δὲ γωνία η ἐφαρμόζει ἀκριβῶς εἰς τὴν ω . Εἶναι λοιπὸν $\eta = \omega$.

β') Δύο γωνίαι λέγονται ἄνισοι, ἂν ἡ μία ἐφαρμόξῃ εἰς ἓν μέρος τῆς ἄλλης.

Ἄν π. χ. ἡ γωνία τ τοῦ κύβου K τεθῇ ἐπάνω εἰς τὴν γωνίαν φ τοῦ πολυέδρου Π , ὅπως προηγουμένως ἡ η ἐπὶ τῆς ω , βλέπομεν ὅτι ἡ τ καλύπτει ἓν μέρος τῆς φ . Εἶναι λοιπὸν $\tau < \varphi$.

23. Τί εἶναι κάθετοι καὶ τί πλάγια εὐθεῖαι. Τί εἶναι ὀρθή γωνία. α') Θετόμεν μίαν ἕδραν ἐνὸς κύβου ἐπάνω εἰς τὸ τραπέζι μας



Σχ. 16

(ἡ εἰς τὸν πίνακα). Ἐπειτα σύρωμεν ἓν μολύβι (ἢ τὴν κιμαλίαν) κατὰ μῆκος δύο τεμνομένων πλευρῶν τῆς ἕδρας ταύτης. Ἄν δὲ ἀποσύρωμεν τὸν κύβον καὶ προεκτείνωμεν τὰς χαραχθεῖσας εὐθεῖας πέραν τῆς τομῆς O αὐτῶν, σχηματίζονται 4 γωνίαι (σχ. 16).

Εἶναι εὐκόλον νὰ βεβαιωθῶμεν ὅτι μία γωνία ω τοῦ κύβου ἐφαρμόζει εἰς κάθε μίαν ἀπὸ αὐτάς. Εἶναι λοιπὸν αἱ 4 γωνίαι ὅλαι ἴσαι. Αἱ δὲ εὐθεῖαι, ἀπὸ τὰς ὁποίας σχηματίζονται αἱ ἴσαι αὐταὶ γωνίαι, λέγονται **κάθετοι εὐθεῖαι**. Δηλαδή :

Δύο εὐθεῖαι λέγονται **κάθετοι**, ἂν αἱ γωνίαι αὐτῶν εἶναι ὅλαι ἴσαι.

Κάθε δὲ μία ἀπὸ τὰς 4 γωνίας τῶν εὐθειῶν AB, BG (σχ. 16) λέγεται **ὀρθή γωνία**. Δηλαδή :

Μία γωνία λέγεται **ὀρθή**, ἂν αἱ πλευραὶ τῆς εἶναι κάθετοι.

Εύκολα δὲ παρατηροῦμεν ὅτι ὅλαι αἱ ἐπίπεδοι γωνίαί ω , τ , η κ.τ.λ. ἐνὸς κύβου ἢ ἄλλου ὀρθογωνίου παραλληλεπιπέδου Σ (σχ. 15) ἐφαρμόζουσιν εἰς μίαν ὀρθὴν γωνίαν π. χ. τὴν ΑΟΓ. Ἐννοοῦμεν λοιπὸν ὅτι :

Αἱ ἐπίπεδοι γωνίαί ἐνὸς κύβου ἢ ἄλλου ὀρθογωνίου παραλληλεπιπέδου εἶναι ὅλαι ὀρθαὶ γωνίαί.

β'. Μὲ τὴν βοήθειαν ἐνὸς κύβου ἢ ἐνὸς φύλλου τετραδίου βεβαιούμεθα ὅτι αἱ γωνίαί τῶν εὐθειῶν ΕΖ, ΗΘ (σχ. 16) δὲν εἶναι ὅλαι ἴσαι. Αὐταὶ αἱ εὐθεῖαι λέγονται **πλάγιαι εὐθεῖαι**. Δηλαδή :

Δύο εὐθεῖαι λέγονται πλάγιαι, ἂν αἱ γωνίαί αὐτῶν δὲν εἶναι ὅλαι ἴσαι.

Ἀσκήσεις

42. Νὰ σχηματίσητε μίαν γωνίαν καὶ νὰ ὀνομάσητε αὐτὴν μὲ ὅλους τοὺς τρόπους.


43. Νὰ τοποθετήσητε δύο λεπτὰ εὐθύγραμμα σύρματα, ὥστε νὰ σχηματίζωσι γωνίαν.

44. Νὰ ὀνομάσητε ἓν σύμβολον τῆς ἀριθμητικῆς, τὸ ὁποῖον σχηματίζεται ἀπὸ καθέτους εὐθείας καὶ ἄλλα ἀπὸ πλαγίας εὐθείας.

45. Νὰ ὀνομάσητε κεφαλαῖα γράμματα, τὰ ὁποῖα ἔχουσι καθέτους εὐθείας καὶ ἄλλα μὲ πλαγίας εὐθείας.

46. Νὰ ἐκτιμήσητε, ἂν αἱ γωνίαί ἐνὸς ὑαλοπίνακος τῶν παραθῶρων εἶναι ὀρθαὶ ἢ ὄχι καὶ νὰ βεβαιωθῆτε περὶ αὐτοῦ.

47. Νὰ κάμητε ὁμοίαν ἐργασίαν διὰ τὰς γωνίας τοῦ πατώματος.



Σχ. 17

24. Τί εἶναι γνῶμων καὶ εἰς τί μᾶς χρησιμεύει. Ὁ γνῶμων (σχ. 17) εἶναι ἓν ὄργανον ἀπὸ ξύλον ἢ καὶ ἀπὸ μέταλλον. Τοῦτο

έχει δύο πλευράς καθέτους και τὸ χρησιμοποιοῦμεν, διὰ νὰ γράψωμεν καθέτους εὐθείας.

Πρὸς τοῦτο θέτομεν μίαν ἀπὸ τὰς καθέτους πλευράς του εἰς μίαν εὐθεῖαν AB , ἡ δὲ ἄλλη κάθετος πλευρά του νὰ διέρχεται ἀπὸ ἓν σημεῖον Γ ἢ Δ . Ἐπειτα σύρομεν τὴν γραφίδα κατὰ μῆκος τῆς δευτέρας ταύτης καθέτου πλευρᾶς.

Τοιοιτοτρόπως γράφομεν μίαν εὐθεῖαν, ἡ ὁποία διέρχεται ἀπὸ τὸ σημεῖον ἐκεῖνο Γ ἢ Δ καὶ εἶναι κάθετος ἐπὶ τὴν AB .




Ἀσκήσεις

48. Ἐνὰ γράψετε ἀπὸ μίαν εὐθεῖαν καὶ νὰ ὀρίσητε ἓν σημεῖον αὐτῆς καὶ ἄλλο ἐκτὸς αὐτῆς. Ἐπειτα ἀπὸ κάθε ἓν ἀπὸ αὐτὰ τὰ σημεῖα νὰ φέρητε εὐθεῖαν κάθετον εἰς τὴν πρώτην.

49. Νὰ γράψετε ἓν μεγάλο κεφαλαῖον δέλτα καὶ ἀπὸ μίαν κορυφὴν του νὰ φέρητε κάθετον εἰς τὴν ἀπέναντι πλευράν.

50. Εἰς μαθητῆς νὰ γράψῃ τυχαίως δύο εὐθείας εἰς τὸν πίνακα. Νὰ ἐκτιμήσητε δέ, ἂν αὗται εἶναι κάθετοι ἢ πλάγιοι καὶ νὰ βεβαιωθῆτε ἔπειτα περὶ αὐτοῦ μετὰ τὴν βόηθειαν τοῦ γνόμονος.

25. Ποίας ιδιότητος ἔχουσιν αἱ κάθετοι καὶ αἱ πλάγιοι εὐθεῖαι. α') Αἱ εὐθεῖαι AB καὶ $\Gamma\Delta$ (σχ. 18 α'), εἶναι κάθετοι. Ἐὰν



Σχ. 18

στρέψωμεν πολὺ ὀλίγον τὴν $\Gamma\Delta$ περὶ τοῦ σημείου O , βλέπομεν ὅτι δύο ἀπὸ τὰς γωνίας των γίνονται μεγαλύτεραι καὶ δύο μικρότεραι.

Αἱ εὐθεῖαι λοιπὸν γίνονται πλάγιοι.

Ἐὰν ἡ στροφή τῆς $\Gamma\Delta$ γίνῃ περὶ ἀπὸ ἄλλο σημεῖον Γ αὐτῆς, θὰ

έλθη εις άλλην θέσιν ΓΕ (σχ. 18 β'). Με τὸν γνώμονα δὲ βεβαιούμεθα ὅτι $\omega > 1$ ὄρθ. $\theta < 1$ ὄρθ.

Αἱ εὐθεῖαι λοιπὸν ΑΒ καὶ ΓΕ εἶναι πλάγιαι.

Ἀπὸ ὅλα αὐτὰ ἐννοοῦμεν ὅτι :

Ἀπὸ ἓν σημεῖον διέρχεται μία μόνον κάθετος ἐπὶ μίαν εὐθεῖαν. β') Δι' αὐτὸν τὸν λόγον :

Εὐθεῖαι τοῦ αὐτοῦ ἐπιπέδου κάθετοι ἐπὶ τὴν αὐτὴν εὐθεῖαν οὐδέποτε συναντῶνται.

Τὰ κοινὰ σημεῖα μιᾶς εὐθείας ΑΒ καὶ ἄλλων εὐθειῶν λέγονται πόδες αὐτῶν. Π. χ. τὸ σημεῖον Ο (σχ. 18 α') εἶναι πὸς τῆς ΓΔ καὶ τῆς ΕΖ.

γ') Ἀπὸ τὸ σημεῖον Γ διέρχεται ἡ ΓΔ κάθετος ἐπὶ τὴν ΑΒ καὶ διάφοροι ἄλλαι ΓΕ, ΓΖ, ΓΗ (σχ. 18 γ'). Με τὸν διαβήτην δὲ βλέπομεν ὅτι $\Gamma\Delta < \Gamma\text{Ε}$, $\Gamma\Delta < \Gamma\text{Ζ}$ κ.τ.λ. Δηλαδή :

Τὸ κάθετον τμήμα ΓΔ εἶναι μικρότερον ἀπὸ κάθε τμήμα πλάγιον πρὸς τὴν αὐτὴν εὐθεῖαν, τὸ ὅποιον ἀρχίζει ἀπὸ τὸ σημεῖον Γ.

Δι' αὐτὸ τὸ κάθετον τμήμα ΓΔ λέγεται ἀπόστασις τοῦ σημείου Γ ἀπὸ τὴν εὐθεῖαν ΑΒ.

δ') Ἄν $\Delta\text{Ε} = \Delta\text{Ζ}$, με τὸν διαβήτην βλέπομεν ὅτι

$\Gamma\text{Ε} = \Gamma\text{Ζ}$, $\Theta\text{Ε} = \Theta\text{Ζ}$ κ.τ.λ. Δηλαδή :

Κάθε σημεῖον τῆς καθέτου εἰς τὸ μέσον ἐνὸς εὐθυγράμμου τμήματος ἀπέχει ἴσον ἀπὸ τὰ ἄκρα αὐτοῦ.

ε'. Εἰς τὸ σχ. 18 γ' εἶναι $\Delta\text{Η} > \Delta\text{Ζ}$. Με τὸν διαβήτην δὲ βλέπομεν ὅτι $\Gamma\text{Η} > \Gamma\text{Ζ}$, $\Theta\text{Η} > \Theta\text{Ζ}$ κ.τ.λ. Δηλαδή :

Ἄν οἱ πόδες δύο πλαγίων ἀπέχωσιν ἄνισον ἀπὸ τὸν πόδα τῆς καθέτου, αἱ πλάγια αὐταὶ εἶναι ὁμοίως ἄνισοι. *


Ἀ σ κ ῆ σ ε ι ς

1 51. Νά γράψητε δύο εὐθείας καθέτους εἰς ἓν σημεῖον Ο, εἰς τὴν μίαν δὲ νά ὀρίσητε δύο τμήματα ΟΑ, ΟΒ ἴσα καὶ ἐκτὸς αὐτῶν ἓν σημεῖον Γ. Ἐπειτα νά γράψητε καὶ νά συγκρίνητε τὰ τμήματα ΓΑ καὶ ΓΒ.

1 52. Νά σχηματίσητε μίαν γωνίαν καὶ ἀπὸ ἓν σημεῖον αὐτῆς νά φέρητε καθέτους ἐπὶ τὰς πλευράς τῆς. Νά ἐξετάσητε δὲ ἂν εἶναι δυνατόν αὐταὶ αἱ κάθετοι νά σχηματίζωσι μίαν εὐθεῖαν.

1 53. Νά ὀρίσητε εἰς τὸ τετράδιόν σας ἓν σημεῖον Α καὶ νά γράψητε μίαν εὐθεῖαν εἰς ἀπόστασιν 0,05 μέτ. ἀπὸ τὸ Α.

26. Τί προκύπτει από την σύγκρισιν δύο ὀρθῶν γωνιῶν. Διὰ νὰ συγκρίνωμεν δύο ὀρθὰς γωνίας B καὶ E (σχ. 19), θέτομεν



Σχ. 19

τὴν μίαν ἐπάνω εἰς τὴν ἄλληλην. Προσέχομεν δὲ νὰ ἔλθῃ ἡ κορυφή E ἐπάνω εἰς τὴν κορυφήν B καὶ ἡ πλευρὰ EZ ἐπάνω εἰς τὴν BΓ. Βλέπομεν τότε ὅτι καὶ ἡ πλευρὰ ED ἔρχεται ἐπάνω εἰς τὴν BA καὶ αἱ γωνίαι ἐφαρμόζουσι. Εἶναι λοιπὸν $B = E$. Δηλαδή :

Αἱ ὀρθαὶ γωνίαι εἶναι ἴσαι.

Πρὸς τὴν ὀρθὴν γωνίαν συγκρίνονται αἱ ἄλλαι γωνίαι, ὅπως ἀμέσως θὰ ἴδωμεν.

27. Τί εἶναι ὀξεῖαι καὶ τί ἀμβλεῖαι γωνίαι. α') Ἐάν εἰς τὴν γωνίαν θ τοῦ πολυέδρου Π (σχ. 15) θέσωμεν τὴν ὀρθὴν γωνίαν τοῦ γνόμωνος, βλέπομεν ὅτι $\theta < 1$ ὀρθῆς. Λέγεται δὲ ἡ θ ὀξεῖα γωνία. Ὁμοίως εἶναι $\widehat{\Delta B\Gamma} < \widehat{\text{ὀρθῆς}} \widehat{H B\Gamma}$ (σχ. 20) καὶ ἡ $\widehat{\Delta B\Gamma}$ εἶναι ὀξεῖα γωνία. Ὡστε:

Ὀξεῖα γωνία εἶναι μία γωνία μικροτέρα ἀπὸ τὴν ὀρθὴν γωνίαν.

β') Κατὰ τὸν ἴδιον τρόπον βλέπομεν ὅτι $\varphi > 1$ ὀρθῆς (σχ. 15). Λέγεται δὲ ἡ φ ἀμβλεῖα γωνία. Καὶ ἡ $\widehat{\Delta E Z}$ εἶναι ἀμβλεῖα, διότι εἶναι μεγαλυτέρα τῆς ὀρθῆς γωνίας $\widehat{\Theta E Z}$ (σχ. 20). Ὡστε :

Ἀμβλεῖα γωνία εἶναι μία γωνία μεγαλυτέρα ἀπὸ τὴν ὀρθὴν γωνίαν.

Ἀσκήσεις

†54. Νὰ γράψητε δύο τεμνομένας εὐθείας καὶ νὰ ἐκτιμήσητε τὸ εἶδος κάθε



γωνίας αυτών. Έπειτα δὲ μὲ τὸν γνῶμονα νὰ ἐξελέγητε τὴν ἀκρίβειαν τῆς ἐκτιμήσεώς σας.

† 55. Ἀπὸ ἓν σημεῖον μιᾶς ὀρθῆς γωνίας νὰ φέρητε καθέτους πρὸς τὰς πλευράς τῆς. Έπειτα νὰ ἐκτιμήσητε τὸ εἶδος τῆς γωνίας τῶν καθέτων τούτων καὶ νὰ ἐξελέγητε τὴν ἐκτίμησίν σας.


‡ 56. Νὰ κάμητε ὁμοίαν ἐργασίαν μὲ ὀξείαν γωνίαν.

‡ 28. Τί εἶναι ἐφεξῆς καὶ τί διαδοχικαὶ γωνίαι. α') Αἱ γωνίαι ΔΕΖ καὶ ΖΕΗ (σχ. 21 α') ἔχουσι τὴν αὐτὴν κορυφὴν Ε, κοινὴν τὴν πλευρὰν ΕΖ καὶ τὰς ἄλλας πλευράς ἀπὸ τὰ δύο μέρη τῆς ΕΖ. Αὐταὶ αἱ γωνίαι λέγονται ἐφεξῆς γωνίαι. Διὰ τοὺς ἰδίους λόγους καὶ αἱ γωνίαι ΑΒΓ καὶ ΓΒΔ (σχ. 21 β') εἶναι ἐφεξῆς. Ὡστε :

Δύο γωνίαι εἶναι ἐφεξῆς, ἂν ἔχωσι τὴν αὐτὴν κορυφὴν καὶ μίαν κοινὴν πλευρὰν καὶ τὰς ἄλλας ἐκατέρωθεν τῆς κοινῆς.



β') Ἀπὸ τὴν κορυφὴν μιᾶς γωνίας ΑΒΓ καὶ μέσα εἰς αὐτὴν φέρομεν διαφόρους εὐθείας ΒΔ, ΒΕ, ΒΖ (σχ. 22 α'). Τοιοῦτοτρόπως σχηματίζομεν διαφόρους γωνίας η, θ, ι, κ. Παρατηροῦμεν δὲ ὅτι κάθε μία ἀπὸ αὐτὰς καὶ ἡ ἐπομένη ἢ ἡ προηγούμενη εἶναι ἐφεξῆς γωνίαι. Αἱ γωνίαι η, θ, ι, κ, ὅλαι μαζί, λέγονται διαδοχικαὶ γωνίαι. Ὡστε :



Γωνίαι περισσότεραι ἀπὸ δύο λέγονται διαδοχικαί, ἂν κάθε μία καὶ ἡ ἐπομένη ἢ ἡ προηγούμενη εἶναι ἐφεξῆς γωνίαι.

Άσκησης


57. Να σχηματίσετε δύο έφεξης γωνίας με κοινή πλευράν μίαν ώρισμένην εὐθείαν.

58. Να γράψετε δύο τεμνομένας εὐθείας καὶ νὰ δνομάσετε τὰ ζεύγη τῶν έφεξης γωνιῶν, αὶ ὅποια σχηματίζονται ἀπὸ αὐτάς.


59. Πὼς λέγονται ὅλαι μαζί αὶ γωνίαι τῶν προηγουμένων εὐθειῶν;

60. Νὰ ἐξετάσετε, ἂν αὶ γωνίαι ΔΕΖ καὶ ΔΕΗ (σχ. 21 α') εἶναι έφεξης ἢ ὄχι.

29. Τί εἶναι ἄθροισμα γωνιῶν. α') Αὶ έφεξης γωνίαι ΔΕΖ, ΖΕΗ ἀποτελοῦσι μαζί τὴν γωνίαν ΔΕΗ (σχ. 21 α'). Αὐτὴ περιέχει



Σχ. 22 α'



Σχ. 22 β'

τὴν κοινήν πλευράν ΕΖ τῶν γωνιῶν ΔΕΖ, ΖΕΗ. Λέγεται δὲ ἄθροισμα αὐτῶν.

Αὶ δὲ γωνίαι ΙΘΚ, ΚΘΛ (σχ. 21 γ') ἀποτελοῦσι μαζί ἓν σχῆμα, τὸ ὅποϊον περιέχει τὴν κοινήν πλευράν ΘΚ καὶ περιορίζεται ἀπὸ τὰς εὐθείας ΘΙ, ΘΛ. Αὐτὸ τὸ σχῆμα τὸ δνομάζομεν ἐπίσης γωνίαν. Δὲν πρέπει δὲ νὰ συγγέωμεν αὐτὴν μετὴν ΙΘΛ, ἢ ὅποια δὲν περιέχει τὴν εὐθεῖαν ΘΚ.

β') Αὶ γωνίαι η, θ, ι, κ μαζί ἀποτελοῦσι τὴν γωνίαν ΑΒΓ (σχ. 22 α'). Αὐτὴ εἶναι τὸ ἄθροισμα τῶν η, θ, ι, κ. Ὡστε :

Ἐθροισμα έφεξης ἢ διαδοχικῶν γωνιῶν εἶναι ἡ γωνία, ἡ ὅποια ἀποτελεῖται ἀπὸ αὐτάς.

Αὶ έφεξης ὅμως γωνίαι ΑΒΔ, ΔΒΓ (σχ. 22 β') δὲν ἀποτελοῦσι μίαν γωνίαν. Ἀποτελοῦνται ὅμως αὐταὶ ἀπὸ τὰς δύο ὀρθῶν $\widehat{ΑΒΕ}$ καὶ $\widehat{ΕΒΓ}$.


Είναι λοιπόν $\widehat{AB\Delta} + \widehat{\Delta B\Gamma} = 2$ ὀρθαί.

Ὁμοίως (σχ. 23 α') ἐννοοῦμεν ὅτι $\widehat{ZH\Theta} + \widehat{\Theta HK} + \widehat{KH\Lambda} + \widehat{\Lambda HM} = \widehat{ZHI} + \widehat{IHM} = 2$ ὀρθ. Δηλαδή :

Ἄν ἀπὸ ἓν σημεῖον εὐθείας φέρωμεν μίαν ἢ περισσοτέρας εὐθείας πρὸς τὸ αὐτὸ μέρος αὐτῆς, αἱ σχηματιζόμεναι ἐφεξῆς ἢ διαδοχικαὶ γωνίαι ἔχουσιν ἄθροισμα 2 ὀρθῶν γωνίας.


Ὁμοίως (σχ. 23 β') : $\widehat{AKB} + \widehat{BK\Gamma} + \widehat{\Gamma K\Lambda} + \widehat{\Lambda KE} + \widehat{EKA} = \widehat{ZKH} + \widehat{HKB} + \widehat{BK\Theta} + \widehat{\Theta KZ} = 4$ ὀρθαί. Δηλαδή :

Ἄν ἀπὸ ἓν σημεῖον ἑνὸς ἐπιπέδου φέρωμεν εἰς αὐτὸ διαφόρους εὐθείας, αἱ σχηματιζόμεναι διαδοχικαὶ γωνίαι ἔχουσιν ἄθροισμα 4 ὀρθῶν γωνίας.



Σχ. 23 α'

γ') Διὰ νὰ προσθέσωμεν τυχούσας γωνίας, θέτομεν αὐτὰς τὴν μίαν παραπλευρῶς ἀπὸ τὴν ἄλλην, ὥστε νὰ γίνωσι διαδοχικαὶ καὶ ἀναγνωρίζομεν τὸ ἄθροισμα αὐτῶν, ὅπως προηγουμένως.



Σχ. 23 β'

30. Τί εἶναι συμπληρωματικαὶ καὶ τί παραπληρωματικαὶ γωνίαι. Ἐπειδὴ $\omega + \varphi$ εἶναι ἡ ὀρθὴ γωνία $EB\Gamma$ (σχ. 22 β'), αἱ γωνίαι ω καὶ φ λέγονται συμπληρωματικαὶ γωνίαι.

Ἐπειδὴ δὲ $\widehat{\omega} + \widehat{AB\Delta} = 2$ ὀρθαί, αἱ γωνίαι ω καὶ $AB\Delta$ λέγονται παραπληρωματικαὶ γωνίαι. Ὡστε :

Δύο γωνίαι εἶναι συμπληρωματικαί, ἂν ἔχωσιν ἄθροισμα 1 ὀρθῆν γωνίαν.

Δύο δὲ γωνίαι εἶναι παραπληρωματικάι, ἂν ἔχωσιν ἄθροισμα 2 ὀρθῶς γωνίας.

31. Τί εἶναι διαφορὰ δύο ἀνίσων γωνιῶν. Ἀπὸ μίαν γωνίαν π.χ. ἀπὸ τὴν $AB\Delta$ ἀποκόπτομεν τὴν γωνίαν ABE , ἣ ὁποία ἔχει μὲ τὴν $AB\Delta$ κοινὴν τὴν πλευρὰν AB (σχ. 22 β'). Μένει δὲ ἡ γωνία $EB\Delta$. Αὐτὴ εἶναι ἡ διαφορὰ τῆς γωνίας ABE ἀπὸ τὴν γωνίαν $AB\Delta$, ἥτοι $\widehat{AB\Delta} - \widehat{ABE} = \widehat{EB\Delta}$.

Ἀσκήσεις

61. Νὰ σχηματίσῃτε μίαν ὀξεῖαν γωνίαν καὶ ἔπειτα τὴν συμπληρωματικὴν τῆς.
62. Ἄν μία γωνία εἶναι $\frac{1}{5}$ ὀρθῆς, νὰ εὑρῆτε πόσα μέρη τῆς ὀρθῆς ἔχει ἡ συμπληρωματικὴ τῆς.
63. Νὰ σχηματίσῃτε μίαν γωνίαν καὶ ἔπειτα τὴν παραπληρωματικὴν τῆς.
64. Ἄν μία γωνία εἶναι $\frac{3}{8}$ ὀρθῆς νὰ εὑρῆτε πόσα μέρη τῆς ὀρθῆς ἔχει ἡ παραπληρωματικὴ τῆς.
65. Ἄν μία γωνία εἶναι $1 + \frac{3}{8}$ ὀρθῆς, νὰ εὑρῆτε πόσα μέρη τῆς ὀρθῆς ἔχει ἡ παραπληρωματικὴ τῆς.
66. Νὰ ὀρίσητε τὸ εἶδος τῆς συμπληρωματικῆς μιᾶς ὀξείας γωνίας.
67. Νὰ ὀρίσητε τὸ εἶδος τῆς παραπληρωματικῆς μιᾶς ὀξείας καὶ ἔπειτα μιᾶς ἀμβλείας γωνίας.
68. Ἄπὸ ἓν σημεῖον μιᾶς εὐθείας φέρομεν πρὸς τὸ αὐτὸ μέρος αὐτῆς δύο εὐθείας. Ἄν συμβῇ αἱ σχηματιζόμεναι τρεῖς διαδοχικαὶ γωνίαι νὰ εἶναι ἴσαι, νὰ εὑρῆτε πόσον μέρος τῆς ὀρθῆς εἶναι κάθε μία.
69. Ἄν συμβῇ μία ἀπὸ τὰς προηγουμένας γωνίας νὰ εἶναι $\frac{3}{8}$ ὀρθῆς, αἱ δὲ ἄλλαι ἴσαι, νὰ εὑρῆτε πόσα μέρη τῆς ὀρθῆς ἔχει κάθε μία ἀπὸ αὐτάς.
70. Ἄπὸ ἓν σημεῖον τοῦ πίνακος φέρομεν εἰς αὐτὸν τρεῖς εὐθείας. Ἄν συμβῇ αἱ τρεῖς διαδοχικαὶ γωνίαι νὰ γίνωσιν ἴσαι, νὰ εὑρῆτε πόσον μέρος τῆς ὀρθῆς εἶναι κάθε μία.


32. Τί εἶναι κατὰ κορυφὴν γωνίαι. Γράφομεν δύο τεμνομένας εὐθείας $AB\Gamma$, ΔBE (σχ. 24) καὶ παρατηροῦμεν ὅτι αἱ πλευραὶ μιᾶς ἀπὸ τὰς γωνίας η καὶ θ αὐτῶν εἶναι προεκτάσεις τῶν πλευρῶν τῆς ἄλλης. Ὀνομάζομεν δὲ αὐτάς κατὰ κορυφὴν γωνίας. Διὰ

τὸν ἴδιον λόγον καὶ αἱ κ καὶ λ εἶναι κατὰ κορυφήν γωνίαι. Ὡστε :

Δύο γωνίαι λέγονται κατὰ κορυφήν, ἂν αἱ πλευραὶ τῆς μιᾶς εἶναι προεκτάσεις τῶν πλευρῶν τῆς ἄλλης.

Ἄν εἰς τὴν γωνίαν η προσθέσωμεν τὴν κ ἢ τὴν λ , εὐρίσκομεν ἄθροισμα 2 ὀρθῶν (§ 29 β').

Εἶναι λοιπὸν $\kappa = \lambda$. Ὁμοίως ἐννοοῦμεν ὅτι $\eta = \theta$. Δηλαδή :
Αἱ κατὰ κορυφήν γωνίαι εἶναι ἴσαι.



Σχ. 24

Ἀσκήσεις

71. Νὰ σχηματίσῃτε μίαν γωνίαν καὶ ἔπειτα ἄλλην ἴσην με αὐτήν.
72. Νὰ ὀρίσητε τὸ εἶδος τῆς κατὰ κορυφήν μιᾶς ὀξείας ἢ ὀρθῆς γωνίας.
73. Μία ἀπὸ τὰς γωνίας 2 τεμνομένων εὐθειῶν εἶναι $\frac{1}{2}$ ὀρθῆς. Νὰ εὑρητε ἀπὸ πόσα μέρη τῆς ὀρθῆς ἀποτελεῖται κάθε μία ἀπὸ τὰς ἄλλας.
74. Νὰ νοήσητε ὅτι ἡ γωνία η (σχ. 24) στρέφεται περίξ τῆς κορυφῆς B, ὅπως στρέφονται οἱ δείκται ἑνὸς ὥρολογίου. Ἄν δὲ ἡ στροφή σταματήσῃ, ὅταν ἡ πλευρὰ BA εὐρεθῇ εἰς τὴν BE, νὰ ὀρίσητε τὴν θέσιν τῆς BA.

Ἐρωτήσεις


- Τι εἶναι γωνία καὶ ποῖα εἶναι τὰ στοιχεῖα αὐτῆς;
Τι εἶναι κάθετοι καὶ τί πλάγια εὐθεῖαι;
Ποῖα εἶναι τὰ εἶδη τῶν γωνιῶν;
Τι εἶναι ἐφεξῆς γωνίαι;
Τι εἶναι διαδοχικαὶ γωνίαι;
Τι εἶναι κατὰ κορυφήν γωνίαι;
Τι ἐμάθομεν διὰ τὰς κατὰ κορυφήν γωνίας;
Ποῖαι γωνίαι λέγονται συμπληρωματικαὶ καὶ ποῖαι παραπληρωματικαὶ;
Εἰς ποῖαν περίπτωσιν τὸ ἄθροισμα γωνιῶν εἶναι δύο ὀρθαὶ καὶ εἰς ποῖαν εἶναι 4 ὀρθαί.

Άσκήσεις πρὸς ἐπανάληψιν τοῦ Β' κεφαλαίου

175. Νὰ φέριτε καὶ νὰ μετρήσητε τὴν ἀπόστασιν ἑνὸς σημείου ἀπὸ μίαν εὐθεΐαν.
176. Νὰ γράψητε δύο καθέτους εὐθείας καὶ εἰς τὴν μίαν νὰ ὀρίσητε δύο σημεία εἰς ἀπόστασιν 3 ἑκατοστῶν ἀπὸ τὴν ἄλλην.
177. Εἰς τὴν μίαν πλευρὰν μιᾶς ὀξείας γωνίας Α νὰ ὀρίσητε δύο ἴσα τμήματα ΑΒ καὶ ΒΓ εἰς δὲ τὴν ἄλλην πλευρὰν νὰ ὀρίσητε ἓν σημεῖον Δ τοιοῦτον, ὥστε νὰ εἶναι $\Delta A = \Delta \Gamma$.
178. Νὰ σχηματίσητε μίαν ἀμβλείαν γωνίαν καὶ ἔπειτα τὴν διαφορὰν τῆς ὀρθῆς γωνίας ἀπὸ αὐτὴν.
179. Μία γωνία εἶναι $\frac{1}{6}$ ὀρθῆς. Νὰ εὑρητε τὴν διαφορὰν αὐτῆς ἀπὸ τὴν συμπληρωματικὴν τῆς.
180. Ἄν μία γωνία εἶναι διπλασία ἀπὸ τὴν παραπληρωματικὴν τῆς, νὰ εὑρητε πόσα μέρη τῆς ὀρθῆς ἔχει κάθε μία ἀπὸ αὐτὰς τὰς παραπληρωματικὰς γωνίας.
181. Ἄν μία γωνία εἶναι $\frac{3}{4}$ ὀρθῆς, νὰ εὑρητε τὴν διαφορὰν αὐτῆς ἀπὸ τὴν παραπληρωματικὴν τῆς.
182. Ἄπὸ ἓν σημεῖον Β τῆς μιᾶς πλευρᾶς ὀξείας γωνίας Α νὰ φέριτε κάθετον ἐπὶ τὴν ἄλλην πλευρὰν. Νὰ ἐκτιμήσητε δὲ μετὸν ὀφθαλμὸν σας τὸ εἶδος τῆς γωνίας τῆς καθέτου ταύτης μετὴν πλευρὰν ΑΒ.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΕΥΘΕΙΑΙ

§ 33. Τί είναι παράλληλοι ευθείαι. Αί άκμαι ΑΔ και ΒΓ ενός κύβου Κ (σχ. 25) εϋρίσκονται εις μίαν ἔδραν και εἶναι κάθετοι εις την εϋθειαν ΑΒ αὐτῆς (§ 23). Γνωρίζομεν δὲ ὅτι οὐδέποτε συναντῶνται αὐ-




Σχ. 25

ται (§ 25 β'). Δι' αὐτοὺς τοὺς λόγους αἱ άκμαι ΑΔ και ΒΓ λέγονται παράλληλοι ευθείαι. Δηλαδή :

Δύο ευθείαι εἶναι παράλληλοι, ἂν εἶναι εις τὸ αὐτὸ ἐπίπεδον και οὐδέποτε συναντῶνται.

Νὰ δείξετε εις την αἴθουσαν παραλλήλους ευθείας.




Σχ. 26

§ 34. Πρόβλημα I. Ἀπὸ ἓν σημεῖον Α νὰ ἀχθῆ εϋθεῖα παράλληλος πρὸς μίαν ευθείαν ΕΖ (Σχ. 26).

Λύσις. Εἰς τὸ ἐπίπεδον τῆς ΕΖ και τοῦ Α φέρομεν τὸν γῶμονα με την μίαν κάθετον πλευρὰν ΒΓ εις την ΕΖ. Παραπλευρῶς δὲ και εις ἐπαφήν με την ἄλλην κάθετον πλευρὰν ΒΔ θέτομεν τὸν κανόνα.

Ἐπειτα κρατοῦμεν τὸν κανόνα ἀκίνητον και μεταθέτομεν τὸν γῶμονα οὕτως ὥστε ἡ πλευρὰ ΒΔ νὰ ὀλισθαίνη κατὰ μῆκος τοῦ κανόνος. Ὅταν δὲ τὸ Α εϋρεθῆ εις την ΒΓ, σταματῶμεν τὸν γῶμονα και σύρομεν την γραφίδα κατὰ μῆκος τῆς ΒΓ. Τοιοιτοτρόπως γράφομεν την ζητούμενην ευθείαν. (Διὰτί ;).

| 35. Τί είναι τὸ ταῦ καὶ εἰς τί τὸ χρησιμοποιοῦμεν. Τὸ ταῦ ἀποτελεῖται ἀπὸ δύο ἀνίσους καὶ καθέτους κανόνας. Ὁ μικρότερος κανὼν λέγεται **κεφαλὴ**, ὁ δὲ μεγαλύτερος **βραχίον** καὶ στερεοῦται μετὰ τὴν κεφαλὴν εἰς τὸ μέσον τῆς (σχ. 27).



Σχ. 27


Με τὸ ταῦ γράφομεν παραλλήλους εὐθείας εἰς μίαν ἰσνογραφικὴν σανίδα, εἰς τὸν πίνακα κτλ. Πρὸς τοῦτο ὀλισθαίνομεν τὴν κεφαλὴν κατὰ μῆκος μιᾶς πλευρᾶς π. χ. τοῦ πίνακος μετὰ τὸν βραχίονα ἐπ' αὐτοῦ (σχ. 27). Σταματῶμεν δὲ τὸ ταῦ κατὰ διαστήματα καὶ σύρομεν τὴν κίμωνιαν κατὰ μῆκος τοῦ βραχίονος. Ὅλαι αἱ εὐθεῖαι, τὰς ὁποίας γράφομεν, εἶναι παράλληλοι. (Διατί;).

| 36. Πῶς βεβαιούμεθα ἂν δύο εὐθεῖαι εἶναι παράλληλοι ἢ ὄχι. Ποῖον εἶναι τὸ Εὐκλείδειον αἴτημα. Τοποθετοῦμεν (σχ. 28) τὸν γνώμονα καὶ τὸν κανόνα, ὅπως καὶ κατὰ τὴν λύσιν τοῦ προηγούμενου προβλήματος (§ 34). Δηλαδή μετὰ τὴν μίαν κάθετον πλευρὰν β εἰς τὴν μίαν εὐθεῖαν AB κ.τ.λ. Μετακινούμεν ἔπειτα τὸν γνώμονα, ὥστε ἡ ἄλλη κάθετος πλευρὰ γ νὰ ὀλισθαίνῃ κατὰ μῆκος τοῦ κανόνος. Παύομεν δὲ τὴν κίνησιν, ὅταν ἡ κορυφὴ τῆς ὀρθῆς γωνίας εὐρεθῇ εἰς ἓν σημεῖον Γ τῆς ἄλλης εὐθείας ΓΔ.

Ἄν τότε ἡ πλευρὰ β συμπίπτῃ μετὰ τὴν ΓΔ, αὕτη εἶναι παράλληλος πρὸς τὴν AB. Ἄν δὲ ἡ β συμπίπτῃ μετὰ ἄλλην εὐθεῖαν ΓΕ, αὕτη εἶναι παράλληλος πρὸς τὴν AB καὶ ὄχι ἡ ΓΔ. Παραδεχόμεθα δηλ. ὅτι :

Ἄπὸ ἓν σημεῖον, τὸ ὁποῖον εἶναι ἐκτὸς μιᾶς εὐθείας ἄγεται μία μόνον παράλληλος πρὸς αὐτήν.

Ἡ πρότασις αὕτη ὀφείλεται εἰς τὸν Ἑλληνα μαθηματικὸν Εὐκλείδην (330 - 275 π. Χ.) καὶ λέγεται **Εὐκλείδειον αἴτημα. I**



Σχ. 28

Ἀσκήσεις


83. Νὰ γράψητε ἀπὸ τρεῖς παράλληλους εὐθείας καὶ ἔπειτα ἄλλας τρεῖς παράλληλους, αἱ ὁποῖαι νὰ τέμνωσι τὰς πρώτας.

84. Νὰ ὀρίσητε ἀπὸ τρία σημεῖα, τὰ ὁποῖα νὰ μὴ κείνται εἰς μίαν εὐθεῖαν. Ἐπειτα ἀπὸ κάθε ἓν νὰ γράψητε παράλληλον πρὸς τὴν εὐθεῖαν τῶν δύο ἄλλων.

85. Νὰ γράψητε μίαν εὐθεῖαν καὶ δύο παράλληλους πρὸς αὐτήν. Νὰ ἐλεγξῆτε δέ, ἂν αὗται εἶναι παράλληλοι μεταξὺ τῶν ἢ ὄχι.

37. Πρόβλημα II. Νὰ διαιρεθῇ ἓν εὐθύγραμμον τμήμα AB εἰς τρία ἴσα μέρη. (σχ. 29).

Λύσις. Γράφομεν μίαν εὐθεῖαν AE, ἡ ὁποία νὰ σχηματίζῃ γωνίαν μὲ τὴν AB. Ἐπειτα ὀρίζομεν εἰς τὴν AE τρία ἴσα καὶ διαδοχικὰ τμήματα AG, ΓΔ, ΔE. Φέρομεν δὲ τὴν BE καὶ παράλληλους πρὸς αὐτήν τὰς ΓZ καὶ ΔH. Μετὸν διαβήτην δὲ βεβαιούμεθα ὅτι AZ = ZH = HB.



Σχ. 29

Άσκησης

186. Νά γράψετε ἓν εὐθύγραμμον τμήμα καὶ νά ὀρίσητε τὸ μέσον αὐτοῦ.
 187. Εἰς τὰς πλευρὰς μιᾶς γωνίας A νά ὀρίσητε δύο τμήματα AB , AG καὶ νά ὀρίσητε τὰ μέσα Δ καὶ E αὐτῶν.
 188. Εἰς τὸ προηγούμενον σχῆμα νά γράψετε τὰ εὐθύγραμμα τμήματα $B\Gamma$ καὶ ΔE . Νά συγκρίνητε ταῦτα καὶ νά ἐξακριβώσητε, ἂν εἶναι παράλληλα ἢ ὄχι.

38. **Τί εἶναι παράλληλος μετάθεσις.** Διὰ τὴν λύσιν τοῦ προβλήματος τῆς § 34 ἐδώσαμεν ὀρισμένην κίνησιν εἰς τὸν γνώμονα (σχ. 26).


Κατ' αὐτὴν τὴν κίνησιν κάθε θέσις μιᾶς εὐθείας τοῦ γνώμονος εἶναι παράλληλος πρὸς τὰς ἄλλας θέσεις αὐτῆς. Π. χ. αἱ εὐθεῖαι $\Gamma\Delta$ καὶ $H\Theta$ εἶναι παράλληλοι.

Δι' αὐτὸ ἡ κίνησις αὐτὴ τοῦ γνώμονος λέγεται **παράλληλος μετάθεσις τοῦ γνώμονος**.

Ἡ πλευρὰ τοῦ κανόνος, εἰς τὴν ὁποίαν ὀλισθαίνει μία πλευρὰ τοῦ γνώμονος λέγεται **ὁδηγός**.

Καὶ ἡ κίνησις τοῦ ταῦ (σχ. 27) εἶναι παράλληλος μετάθεσις αὐτοῦ μὲ ὁδηγὸν EZ .

39. **Τί εἶναι ἀπόστασις δύο παραλλήλων εὐθειῶν.** Μεταξὺ δύο παραλλήλων εὐθειῶν AB καὶ $\Gamma\Delta$ (σχ. 30) γράφομεν διάφορα εὐθύγραμμα τμήματα AG , EZ , $H\Theta$, IK παράλληλα μεταξὺ των καὶ



Σχ. 30

πλάγια πρὸς τὰς AB καὶ $\Gamma\Delta$. Γράφομεν ἐπίσης ἄλλα τμήματα IK , MN , BD παράλληλα μεταξὺ των καὶ κάθετα πρὸς τὴν AB . Μὲ τὸν γνώμονα βλέπομεν ὅτι αὐτὰ εἶναι κάθετα καὶ εἰς τὴν $\Gamma\Delta$.

Μὲ τὸν διαβήτην βλέπομεν ὅτι : $AG = EZ = H\Theta = IK$ καὶ $IK = MN = BD$. Δηλαδή :

Παράλληλα εὐθύγραμμα τμήματα μεταξύ παραλλήλων εὐθειῶν εἶναι ἴσα.

Ἐπειδὴ δὲ $IK < IA$ (§ 25 γ'), τὸ τμήμα IK λέγεται ἀπόστασις τῶν AB καὶ $\Gamma\Delta$. Δηλαδή :

Ἀπόστασις δύο παραλλήλων εὐθειῶν εἶναι ἓν εὐθύγραμμον τμήμα κάθετον πρὸς αὐτὰς καὶ περατούμενον εἰς αὐτὰς.

Ἀσκήσεις

89. Νὰ γράψητε καὶ νὰ μετρήσητε τὴν ἀπόστασιν δύο παραλλήλων εὐθειῶν τοῦ τετραδίου σας.


90. Νὰ γράψητε δύο παραλλήλους εὐθείας. Ἐπειτα νὰ γράψητε καὶ νὰ μετρήσητε τὴν ἀπόστασιν αὐτῶν.

91. Νὰ γράψητε μίαν εὐθεῖαν καὶ μίαν παράλληλον πρὸς αὐτὴν εἰς ἀπόστασιν 3 ἑκατοστομέτρων.

92. Νὰ γράψητε δύο παραλλήλους εὐθείας καὶ ἄλλην παράλληλον πρὸς αὐτὰς καὶ εἰς ἴσην ἀπόστασιν ἀπὸ αὐτὰς.

40. Πῶς σχετιζονται αἱ γωνίαι, αἱ ὁποῖαι σχηματίζονται ἀπὸ δύο παραλλήλους εὐθείας τεμνομένας ὑπὸ τρίτης πλαγίως.

Αἱ παράλληλοι εὐθεῖαι AB καὶ $\Gamma\Delta$ τέμνονται πλαγίως ὑπὸ τῆς EZ (σχ. 31). Ἀπὸ αὐτὰς σχηματίζονται 4 ὀξείαι γωνίαι $\alpha, \gamma, \epsilon, \theta$ καὶ 4 ἀμβλεῖαι $\beta, \delta, \eta, \iota$. Ἄν ὑποβάλωμεν τὴν ϵ εἰς παράλληλον μεταθεσὶν μὲ ὀδηγὸν EZ , βλέ-



Σχ. 31

πομεν ὅτι ἐφαρμόζει εἰς τὴν α . Εἶναι λοιπὸν $\alpha = \epsilon$. Ἐπειδὴ δὲ $\alpha = \gamma$, $\epsilon = \theta$ (§ 32), ἐννοοῦμεν ὅτι $\alpha = \gamma = \epsilon = \theta$. Δηλαδή :

Αἱ ὀξείαι γωνίαι, αἱ ὁποῖαι σχηματίζονται ἀπὸ δύο παραλλήλους εὐθείας τεμνομένας πλαγίως ὑπὸ ἄλλης, εἶναι ἴσαι.

Ὁμοίως ἐννοοῦμεν ὅτι $\eta = \beta = \delta = \iota$. Δηλαδή :

Καὶ αἱ ἀμβλεῖαι γωνίαι τοιούτων εὐθειῶν εἶναι ἴσαι.

Άσκησης

| 93. Αν $\alpha = \frac{1}{2}$ ὀρθῆς (σχ. 31), νά εὑρητε πόσα μέρη τῆς ὀρθῆς ἔχει κάθε μία ἀπό τὰς γωνίας τοῦ ἰδίου σχήματος.

| 94. Αν μία ἀπό τὰς γωνίας, αἱ ὁποῖαι σχηματίζονται ἀπό δύο παραλλήλους εὐθείας τεμνομένας ὑπό τρίτης εἶναι $1 \frac{1}{4}$ ὀρθῆς, νά εὑρητε πόσα μέρη τῆς ὀρθῆς ἔχει κάθε μία ἀπό τὰς ἄλλας γωνίας αὐτῶν.

| 95. Αν μία ἀπό τὰς γωνίας, αἱ ὁποῖαι σχηματίζονται ἀπό δύο παραλλήλους εὐθείας τεμνομένας ὑπό τρίτης, εἶναι διπλασία ἀπό μίαν ἄλλην ἀπό αὐτάς, νά εὑρητε πόσα μέρη τῆς ὀρθῆς ἔχει κάθε μία ἀπό αὐτάς.

Ἐρωτήσεις

Τί εἶναι παράλληλοι εὐθεῖαι;

Ποῖα ὄργανα μᾶς βοηθοῦσι νά γράφωμεν παραλλήλους εὐθείας;

Τί λέγει τὸ Εὐκλείδειον αἴτημα;

Τί εἶναι ἀπόστασις δύο παραλλήλων εὐθειῶν;

Τί γνωρίζετε διὰ τὰς γωνίας, αἱ ὁποῖαι σχηματίζονται ἀπό δύο παραλλήλους εὐθείας τεμνομένας ὑπό τρίτης πλαγίως;

Άσκησης πρὸς ἐπανάληψιν τοῦ Γ' κεφαλαίου

96. Νά γράψητε δύο παραλλήλους εὐθείας AB, ΓΔ καὶ ἄλλην EZ κάθετον πρὸς τὴν AB. Νά διακρίνητε, ἂν αἱ εὐθεῖαι ΓΔ καὶ EZ εἶναι κάθετοι ἢ πλάγιοι.

| 97. Εἰς μίαν πλευρὰν μιᾶς γωνίας A νά ὀρίσητε ἓν σημεῖον B καὶ νά φέρητε ἀπὸ αὐτὸ παράλληλον πρὸς τὴν ἄλλην πλευρὰν.

98. Νά γράψητε μίαν εὐθεῖαν AB καὶ δύο ἄλλας ΓΔ, EZ παραλλήλους πρὸς τὴν AB καὶ εἰς ἀπόστασιν 4 ἑκατοστομέτρων ἀπὸ αὐτῆν.

99. Νά εὑρητε τὴν ἀπόστασιν τῶν προηγούμενων εὐθειῶν ΓΔ καὶ EZ.

| 100. Νά γράψητε δύο παραλλήλους εὐθείας καὶ τὴν ἀπόστασιν αὐτῶν. Ἐπειτα νά διαιρέσητε αὐτὴν τὴν ἀπόστασιν εἰς τρία ἴσα μέρη.

| 101. Νά εὑρητε τὸ ἄθροισμα μιᾶς ὀξείας καὶ μιᾶς ἀμβλείας γωνίας ἀπὸ τὰς σχηματιζομένας ὑπὸ δύο παραλλήλων εὐθειῶν τεμνομένων ὑπὸ τρίτης.

| 102. Αν μία ἀπὸ τὰς γωνίας δύο παραλλήλων εὐθειῶν τεμνομένων ὑπὸ τρίτης εἶναι 0,4 ὀρθῆς, νά εὑρητε πόσα μέρη τῆς ὀρθῆς ἔχει κάθε μία ἀπὸ τὰς ἄλλας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'

1. Ο ΚΥΚΛΟΣ

41. Τί είναι κύκλος καὶ ποῖα εἶναι τὰ στοιχεῖα αὐτοῦ.
Τὸ ἐπίπεδον μέρος τῆς ἐπιφανείας ἑνὸς κώνου περικλείεται ἀπὸ μίαν καμπύλην γραμμὴν. Τοιαύτην καμπύλην γραμμὴν δυνάμεθα νὰ γράψωμεν εἰς ἓν ἐπίπεδον ὡς ἑξῆς :

Στερεώνομεν τὰ σκέλη τοῦ διαβήτου μας, ὥστε νὰ μὴ μεταβάλληται ἡ γωνία αὐτῶν. Ἐπειτα στηρίζομεν τὴν αἰχμὴν τοῦ ἑνὸς σκέλους εἰς ἓν σημεῖον K τοῦ ἐπιπέδου καὶ περιφέρομεν τὸν διαβήτην εἰς τρόπον, ὥστε ἡ γραφίς τοῦ ἄλλου σκέλους νὰ ἐγγίξῃ συνεχῶς τὸ ἐπίπεδον.

Τοιοῦτοτρόπως ἡ γραφίς γράφει μίαν καμπύλην $AΔBΓ$ (σχ. 32).

Αὕτη ἡ καμπύλη λέγεται **περιφέρεια**.

Τὸ δὲ μέρος τοῦ ἐπιπέδου, τὸ ὁποῖον περικλείεται ἀπὸ αὐτήν, λέγεται **κύκλος**.

Ἀπὸ τὸν τρόπον, μὲ τὸν ὁποῖον ἐγράψαμεν τὴν περιφέρειαν, ἐννοοῦμεν ὅτι τὸ σημεῖον K ἀπέχει ἴσον ἀπὸ ὅλα τὰ σημεῖα τῆς περιφερείας. Δι' αὐτὸ τὸ K λέγεται **κέντρον** τῆς περιφερείας καὶ τοῦ κύκλου. Ὡστε :

Κύκλος εἶναι ἓν ἐπίπεδον μέρος, τοῦ ὁποῖου ἓν σημεῖον (τὸ κέντρον) ἀπέχει ἴσον ἀπὸ ὅλα τὰ σημεῖα τῆς γραμμῆς, ἀπὸ τὴν ὁποίαν περικλείεται.


Ἡ δὲ γραμμὴ, ἀπὸ τὴν ὁποίαν περικλείεται εἰς κύκλος, λέγεται **περιφέρεια** αὐτοῦ. Τὰ τμήματα KA , KB , $KΓ$ κ.τ.λ. (σχ. 32) ἀρχίζουσιν ἀπὸ τὸ κέντρον καὶ τελειώνουσιν εἰς τὴν περιφέρειαν τοῦ κύκλου K . Αὐτὰ λέγονται **ἀκτίνες** τοῦ κύκλου. Ἀπὸ τὰ προηγούμενα δὲ ἐννοοῦμεν ὅτι :

Ὅλοι αἱ ἀκτίνες ἑνὸς κύκλου εἶναι ἴσαι.

Τὸ εὐθύγραμμον τμήμα BKA διέρχεται ἀπὸ τὸ κέντρον K καὶ τελειώνει εἰς τὴν περιφέρειαν καὶ ἀπὸ τὰ δύο μέρη.

Τοῦτο λέγεται **διάμετρος** τοῦ κύκλου. Καὶ τὸ τμήμα $ΔKH$ εἶναι διάμετρος. Ἐπειδὴ δὲ κάθε διάμετρος ἀποτελεῖται ἀπὸ δύο ἀκτίνες, ἐννοοῦμεν ὅτι :

Ὅλοι αἱ διάμετροι ἑνὸς κύκλου εἶναι ἴσαι.



Σχ. 32

42. Εἰς τί διαιρεῖ τὸν κύκλον καὶ τὴν περιφέρειαν μίαν διάμετρος. Εἰς ἓν φύλλον χάρτου γράφομεν μίαν περιφέρειαν καὶ μίαν διάμετρον. Κόπτομεν τὸν κύκλον κατὰ τὴν διάμετρον ταύτην καὶ θέτομεν τὸ ἓν μέρος ἐπάνω εἰς τὸ ἄλλο. Μὲ μικρὰν προσοχὴν κατορθώνομεν νὰ ἐφαρμόσωσι τὰ δύο ταῦτα μέρη ἀκριβῶς τὸ ἓν ἐπάνω εἰς τὸ ἄλλο. Ἐννοοῦμεν λοιπὸν ὅτι :

Μία διάμετρος ἑνὸς κύκλου χωρίζει αὐτὸν καὶ τὴν περιφέρειάν του εἰς ἴσα μέρη.

Αὐτὰ τὰ μέρη τοῦ κύκλου λέγονται ἡμικύκλια. Τὰ δὲ μέρη τῆς περιφέρειᾶς λέγονται ἡμιπεριφέρειαι.

43. Πῶς σχετίζονται δύο κύκλοι ἢ δύο περιφέρειαι μὲ τὴν αὐτὴν ἀκτίνα. Εἰς ἓν φύλλον χάρτου γράφομεν δύο περιφέρειας μὲ τὴν αὐτὴν ἀκτίνα. Ἀποχωρίζομεν ἔπειτα τὸν ἓνα κύκλον καὶ τὸν θέτομεν ἐπάνω εἰς τὸν ἄλλον, ὥστε νὰ συμπέσωσι τὰ κέντρα των. Βλέπομεν δὲ ὅτι οἱ κύκλοι οὗτοι ἐφαρμόζουσιν ἀκριβῶς. Ἀπὸ αὐτὸ ἐννοοῦμεν ὅτι :

Ἄν αἱ ἀκτίνες δύο κύκλων εἶναι ἴσαι, οἱ κύκλοι οὗτοι εἶναι ἴσοι καὶ αἱ περιφέρειαι αὐτῶν εἶναι ἐπίσης ἴσαι.

Ἄ σ κ ῆ σ ε ι ς

103. Νὰ γράψητε ἀπὸ μίαν περιφέρειαν μὲ ἀκτίνα 4 ἑκατοστομέτρων καὶ νὰ εὑρητε τὸ μῆκος τῆς διαμέτρου αὐτῆς.

104. Εἰς μαθητῆς νὰ γράψῃ εἰς τὸν πίνακα μίαν περιφέρειαν μὲ ἀκτίνα 0,3 μετ. καὶ νὰ εὑρητε τὸ μῆκος τῆς διαμέτρου.

105. Νὰ γράψητε μίαν περιφέρειαν μὲ κέντρον ἓν σημεῖον Κ. Νὰ ὀρίσητε ἔπειτα ἓν σημεῖον Α μέσα εἰς τὸν κύκλον καὶ ἓν ἄλλο Β ἔξω ἀπὸ αὐτὸν. Νὰ συγκρίνητε δὲν τὴν ἀπόστασιν ΚΑ καὶ τὴν ΚΒ πρὸς τὴν ἀκτίνα.

106. Νὰ γράψητε μίαν περιφέρειαν καὶ δύο καθέτους διαμέτρους. Ἐπειτα δὲ νὰ ἀποπερατώσητε τὴν ἰχνογράφησιν τοῦ σχ.33 καὶ νὰ χρωματίσητε τὰ μέρη αὐτοῦ μὲ 3 χρώματα κατὰ βούλησιν.

144. Ποῖα μέρη διακρίνομεν εἰς ἓνα κύκλον καὶ εἰς μίαν περιφέρειαν. α') Τὸ μέρος ΒΕΔ τῆς περιφέρειᾶς (σχ. 34) λέγεται τόξον. Δηλαδή :

Τόξον εἶναι ἓν μέρος μιᾶς περιφέρειᾶς.

Καὶ κάθε ἡμιπεριφέρεια εἶναι λοιπὸν τόξον.


Τὸ εὐθύγραμμον τμήμα ΒΔ λέγεται **χορδὴ** τοῦ τόξου ΒΕΔ καὶ τοῦ τόξου ΒΓΑΔ. Δηλαδή :

Χορδὴ ἑνὸς τόξου εἶναι τὸ εὐθύγραμμον τμήμα, τὸ ὁποῖον ὀρίζεται ἀπὸ τὰ ἄκρα αὐτοῦ.


β') Μεταξὺ ἑνὸς τόξου ΔΕΒ καὶ τῆς χορδῆς αὐτοῦ περιέχεται ἓν μέρος ΔΖΒΕΔ τοῦ κύκλου. Τοῦτο λέγεται **κυκλικὸν τμήμα**.

Καὶ τὸ μέρος ΑΗΓΘΑ εἶναι **κυκλικὸν τμήμα**. "Ὡστε :

Κυκλικὸν τμήμα εἶναι μέρος ἑνὸς κύκλου, τὸ ὁποῖον περικλείεται ἀπὸ ἓν τόξον καὶ ἀπὸ τὴν χορδὴν αὐτοῦ.



Σχ. 33



Σχ. 34

γ') Μεταξὺ τοῦ τόξου ΑΔ καὶ τῶν ἀκτίνων ΚΑ, ΚΔ ὑπάρχει ἓν μέρος ΑΚΔ τοῦ κύκλου. Τοῦτο λέγεται **κυκλικὸς τομεὺς**. Καὶ τὸ μέρος ΑΚΓΗΑ εἶναι **κυκλικὸς τομεὺς**. "Ὡστε :

Κυκλικὸς τομεὺς εἶναι μέρος ἑνὸς κύκλου, τὸ ὁποῖον περικλείεται ἀπὸ ἓν τόξον καὶ ἀπὸ τὰς ἀκτίνες, αἱ ὁποῖαι καταλήγουσιν εἰς τὰ ἄκρα αὐτοῦ.

Τὸ τόξον ἑνὸς κυκλικοῦ τομέως λέγεται **βάσις** αὐτοῦ.

Ἐσκήσεις

107. Νὰ ἐξετάσητε πόσας χορδὰς ἔχει ἓν τόξον.


108. Νὰ γράψητε μίαν περιφέρειαν μὲ ἀκτίνα 0,04 μέτρου καὶ νὰ χωρίσητε τὸν κύκλον εἰς δύο κυκλικὰ τμήματα μὲ μίαν χορδὴν 0,06 μέτρου.

109. Νὰ γράψητε δύο διαμέτρους ἑνὸς κύκλου καὶ νὰ ὀρίσητε εἰς τί χωρίζεται ὁ κύκλος ἀπὸ αὐτάς.

110. Νά σχηματίσετε ένα κυκλικόν τομέα, τοῦ ὁποίου ἡ βάσις νά ἔχη χορδὴν ἴσην πρὸς τὴν ἀκτίνα.

111. Νά συγκρίνητε τὴν χορδὴν μιᾶς ἡμιπεριφερείας πρὸς τὴν ἀκτίνα αὐτῆς.

145. Πῶς σχετίζονται τὰ τόξα μιᾶς περιφερείας ἢ ἴσων περιφερειῶν, τὰ ὁποῖα ἔχουσιν ἴσας χορδὰς καὶ αἱ χορδαὶ ἴσων τόξων. α') Εἰς μίαν περιφέρειαν K ἢ εἰς δύο ἴσας περιφερείας K καὶ Λ ὀρίζομεν δύο ἴσας χορδὰς $ΑΓ$ καὶ $ΕΗ$ (σχ. 35). Ἀποκό-



Σχ. 35

πτομεν ἔπειτα τὸ κυκλικὸν τμήμα $EZHΘE$ καὶ τὸ θέτομεν ἐπάνω εἰς τὸ $ΑΒΓΑ$, ὥστε νά ἐφαρμόσωσιν αἱ ἴσαι χορδαὶ $ΑΓ$ καὶ $ΕΗ$.

Βλέπομεν δὲ ὅτι τὸ τόξον EZH ἐφαρμόζει ἀκριβῶς

εἰς τὸ $ΑΒΓ$. Εἶναι λοιπὸν $\widehat{ΑΒΓ} = \widehat{ΕΖΗ}$. Καὶ τὰ ὑπόλοιπα δὲ τόξα τῶν περιφερειῶν τούτων εἶναι ἴσα (§ 43) Ὡστε :

Τὰ τόξα τῆς αὐτῆς περιφερείας ἢ ἴσων περιφερειῶν, τὰ ὁποῖα ἔχουσιν ἴσας χορδὰς, εἶναι ἴσα ἂν ἀμφότερα εἶναι μικρότερα ἢ μεγαλύτερα ἡμιπεριφερείας.

Ἀπὸ αὐτὰ ἐνοοῦμεν ὅτι :

Διὰ νά ὀρίσωμεν ἴσα τόξα εἰς μίαν περιφέρειαν ἢ εἰς ἴσας περιφερείας, ἀρκεῖ νά ὀρίσωμεν δύο ἴσας χορδὰς με τὸν διαβήτην.

β') Ἄν δύο ἴσα τόξα $ΑΒΓ$, $ΕΖΗ$ ἐφαρμόσωσι τὸ ἐν ἐπάνω εἰς τὸ ἄλλο, βλέπομεν ὅτι αἱ χορδαὶ αὐτῶν ἐφαρμόζουσιν. Εἶναι λοιπὸν $ΑΓ = ΕΗ$. Ὡστε :

Τὰ ἴσα τόξα ἔχουσιν ἴσας χορδὰς. |

Ἀσκήσεις


112. Εἰς μίαν περιφέρειαν νά ὀρίσητε ἓν τόξον μικρότερον ἡμιπεριφερείας με χορδὴν ἴσην πρὸς τὴν ἀκτίνα. Νά προσπαθήσητε δὲ νά ἴδητε πόσας φορές χωρεῖ εἰς τὴν περιφέρειαν ἓν τοιοῦτον τόξον.

113. Εἰς ἓνα κύκλον νὰ γράψητε δύο ἴσας χορδὰς καὶ τὰς ἀποστάσεις τοῦ κέντρου ἀπὸ αὐτάς. Ἐπειτα δὲ νὰ συγκρίνητε αὐτὰς τὰς ἀποστάσεις.

114. Εἰς μίαν περιφέρειαν νὰ ὀρίσητε δύο τόξα AB καὶ ABΓ μικρότερα ἡμι-περιφερείας καὶ νὰ συγκρίνητε τὰς χορδὰς αὐτῶν.

46. Ποῖαι εἶναι αἱ δυναταὶ θέσεις μιᾶς εὐθείας καὶ μιᾶς περιφερείας. Εἰς μίαν ἀκτῖνα KΘ (σχ. 36) ὀρίζομεν ἓν σημεῖον Η, εἰς δὲ τὴν προέκτασιν αὐτῆς ἔξω ἀπὸ τὸν κύκλον ἓν ἄλλο Λ. Ἀπὸ δὲ τὰ σημεῖα Η, Θ, Λ, φέρομεν εὐθείας AB, ΓΔ, EZ καθέτους εἰς τὴν ΚΛ. Τοιοῦτοτρόπως βλέπομεν ὅτι :

α') Ἡ εὐθεῖα AB συναντᾷ τὴν περιφέρειαν εἰς δύο σημεῖα Α καὶ Β. Λέγεται δὲ αὐτὴ **τέμνουσα** τῆς περιφερείας. Εἶναι δὲ φανερόν ὅτι $KH < KΘ$. Δηλαδή :



Σχ. 36

Ἡ ἀπόστασις τοῦ κέντρου ἀπὸ μίαν τέμνουσαν εἶναι μικρότερα ἀπὸ τὴν ἀκτῖνα.

β') Ἡ εὐθεῖα ΓΔ ἔχει μὲ τὴν περιφέρειαν κοινὸν μόνον τὸ σημεῖον Θ. Διότι ἓν ἄλλο σημεῖον τῆς ΓΔ, π. χ. τὸ Μ, εἶναι ἔξω ἀπὸ τὸν κύκλον, ἐπειδὴ εἶναι $KM > KΘ$ (§ 25 γ').

Ἡ εὐθεῖα ΓΔ λέγεται **ἐφαπτομένη** τῆς περιφερείας. Τὸ δὲ σημεῖον Θ λέγεται **σημεῖον ἐπαφῆς**. Εἶναι δὲ φανερόν ὅτι :

Ἡ ἀπόστασις τοῦ κέντρου ἀπὸ μίαν ἐφαπτομένην εἶναι ἀκτίς.

γ') Ἡ εὐθεῖα EZ οὐδὲν ἔχει κοινὸν σημεῖον μὲ τὴν περιφέρειαν. Εἶναι δὲ $KΛ > KΘ$.

Ἀπὸ ὅλα αὐτὰ βλέπομεν ὅτι :

Μία εὐθεῖα δυνατόν νὰ τέμνη μίαν περιφέρειαν ἢ νὰ ἐφάπτηται αὐτῆς ἢ νὰ μὴ ἔχη κοινὸν σημεῖον μὲ αὐτήν.

Ἀσκήσεις

115. Νὰ ὀρίσητε ἓν σημεῖον εἰς μίαν περιφέρειαν καὶ νὰ φέρητε τὴν ἐφαπτομένην εἰς αὐτό.


116. Νὰ γράψητε μίαν διάμετρον ἑνὸς κύκλου καὶ νὰ φέρητε τὰς ἐφαπτομένας

εις τὰ ἄκρα αὐτῆς. Νὰ ἐξακριβώσητε δέ, ἂν αὐταὶ εἶναι παράλληλοι ἢ τέμνονται.

117. Νὰ γράψητε μίαν εὐθεῖαν AB καὶ ἐκτὸς αὐτῆς νὰ ὀρίσητε ἓν σημεῖον K . Ἐπειτα νὰ γράψητε μίαν περιφέρειαν μὲ κέντρον K , εἰς τὴν ὁποίαν ἡ AB νὰ εἶναι ἐφαπτομένη.

118. Εἰς μίαν εὐθεῖαν AB νὰ ὀρίσητε ἓν σημεῖον Γ καὶ νὰ γράψητε δύο περιφέρειας μὲ ἀκτῖνα δύο ἑκατοστομέτρων, εἰς τὰς ὁποίας ἡ AB νὰ ἐφάπτηται εἰς τὸ Γ .

47. Ποῖαι εἶναι αἱ δυναταὶ θέσεις δύο μὴ ὁμοκέντρων περιφερειῶν. α') Εἰς τὴν προέκτασιν μιᾶς ἀκτῖνος AB ἑνὸς κύκλου A




ὀρίζομεν ἓν σημεῖον Λ . Ἐπειτα γράφομεν μίαν περιφέρειαν μὲ κέντρον Λ καὶ ἀκτῖνα μικροτέραν τῆς AB (σχ. 37 α'). Παρατηροῦμεν δὲ ὅτι

αἱ δύο περιφέρειαι δὲν ἔχουσι κοινὰ σημεῖα καὶ ὁ εἰς κύκλος εἶναι ὅλος ἔξω ἀπὸ τὸν ἄλλον.

Ἡ εὐθεῖα $A\Lambda$ διέρχεται ἀπὸ τὰ κέντρα καὶ διὰ τοῦτο λέγεται **διάκεντρος** τῶν κύκλων τούτων.

β') Εἰς τὴν ἀκτῖνα KA ὀρίζομεν δύο σημεῖα, Λ , B μὲ τὸ Λ πλησιέστερον πρὸς τὸ K . Γράφομεν πάλιν περιφέρειαν μὲ κέντρον Λ καὶ




ἀκτῖνα AB καὶ παρατηροῦμεν ὅτι καὶ αὐτὴ δὲν ἔχει κοινὰ σημεῖα μὲ τὴν περιφέρειαν K . Ὁ κύκλος Λ ὅμως εἶναι ὅλος μέσα εἰς τὸν K (σχ. 37 β').

γ') Εἰς τὴν προέκτασιν μιᾶς ἀκτίνος ΚΑ ἐκτὸς τοῦ κύκλου ὀρίζομεν ἓν σημεῖον Λ καὶ γράφομεν τὴν περιφέρειαν, ἣ ὅποια ἔχει κέντρον Λ καὶ ἀκτῖνα ΛΑ (σχ. 38 α').

Τώρα βλέπομεν ὅτι αἱ περιφέρειαι ἔχουσι κοινὸν μόνον τὸ σημεῖον Α καὶ ἕκαστος κύκλος εἶναι ἔξω ἀπὸ τὸν ἄλλον.

Λέγομεν δὲ ὅτι οἱ κύκλοι οὗτοι **ἐφάπτονται ἐκτὸς** εἰς τὸ σημεῖον Α. Τοῦτο δὲ λέγεται **σημεῖον ἐπαφῆς**.



Σχ. 39

δ') Ἐὰν ὀρίσωμεν τὸ Λ ἐπὶ τῆς ἀκτίνος ΚΑ (σχ. 38 β'), πάλιν αἱ περιφέρειαι Κ καὶ Λ ἔχουσι κοινὸν σημεῖον μόνον τὸ Α, ἀλλ' ὁ κύκλος Λ εἶναι μέσα εἰς τὸ Κ.

Διὰ τοῦτο λέγομεν ὅτι οὗτοι **ἐφάπτονται ἐντὸς**.

ε') Εἰς μίαν περιφέρειαν Κ ὀρίζομεν ἓν σημεῖον Α καὶ φέρομεν εὐθεῖαν ΚΛ, ἣ ὅποια νὰ μὴ περνᾷ ἀπὸ τὸ Α (σχ. 39). Ἐπειτα γράφομεν τὴν περιφέρειαν, ἣ ὅποια ἔχει κέντρον Λ καὶ ἀκτῖνα ΛΑ.

Βλέπομεν δὲ ὅτι αὐτὴ καὶ ἡ Κ ἔχουσι κοινὰ σημεῖα τὸ Α καὶ ἓν ἄλλο Α'. Δι' αὐτὰς λέγομεν ὅτι **τέμνονται**.

Τὸ εὐθύγραμμον τμήμα ΑΑ' εἶναι **χορδὴ τόξων** καὶ τῶν δύο περιφερειῶν. Διὰ συντομίαν ὀνομάζομεν αὐτὴν **κοινὴν χορδὴν** τῶν τεμνομένων περιφερειῶν.

Ἀσκήσεις

119. Νὰ ὀρίσητε εἰς τὸ τετράδιόν σας δύο σημεῖα Κ καὶ Λ εἰς ἀπόστασιν 5 ἑκατοστομέτρων. Ἐπειτα νὰ γράψητε περιφέρειας μὲ κέντρα Κ καὶ Λ καὶ ἀκτῖνα 2 ἑκατοστομέτρων. Νὰ παρατηρήσητε δὲ ποίαν θέσιν ἔχουσιν οἱ δύο κύκλοι μεταξὺ τῶν.

120. Νὰ κάμητε τὴν ἰδίαν ἐργασίαν ἀλλὰ μὲ ἀκτῖνα 3 ἑκατοστῶν τοῦ μέτρου.

121. Εἰς μίαν εὐθεῖαν τοῦ πίνακος νὰ ὀρίσητε ἓν σημεῖον Α καὶ νὰ γράψητε δύο περιφέρειας ἐφαπτομένης ἐκτὸς εἰς τὸ Α καὶ μὲ ἀκτῖνα 1 παλάμης τὴν μίαν καὶ 5 ἑκατοστομέτρων τὴν ἄλλην.

122. Εἰς ἓνα κύκλον νὰ γράψητε μίαν διάμετρον ΑΒ. Ἐπειτα νὰ γράψητε τὴν περιφέρειαν, ἣ ὅποια ἔχει κέντρον Α καὶ ἀκτῖνα ΑΒ. Νὰ παρατηρήσητε δὲ ποίαν θέσιν ἔχουσι μεταξύ τῶν οἱ δύο κύκλοι.


48. Πῶς ἡ διάκεντρος καὶ ἡ κοινὴ χορδὴ δύο περιφερειῶν τέμνονται. Ἡ διάκεντρος ΚΛ καὶ ἡ κοινὴ χορδὴ δύο περιφερειῶν Κ καὶ Λ τέμνονται εἰς ἓν σημεῖον Β (σχ. 39). Μὲ κατάλληλα δὲ ὄργανα βλέπομεν ὅτι $AB = BA'$ καὶ $\widehat{ABK} = 1$ ὀρθή. Δηλαδή :

Ἡ κοινὴ χορδὴ δύο περιφερειῶν τέμνεται καθέτως καὶ εἰς τὸ μέσον ἀπὸ τὴν διάκεντρον αὐτῶν. Ἄν δὲ εἶναι $KA = LA$, βλέπομεν ὁμοίως ὅτι πάλιν $\widehat{ABK} = 1$ ὀρθή καὶ $KB = BL$. Δηλαδή :


Ἡ ἀπόστασις τῶν κέντρων δύο ἴσων περιφερειῶν τέμνεται καθέτως καὶ εἰς τὸ μέσον ἀπὸ τὴν κοινὴν χορδὴν αὐτῶν.

49. Ἐφαρμογαί. Πρόβλημα Ι. Νὰ γραφῆ ἡ εὐθεῖα, ἡ ὁποία τέμνει εὐθύγραμμον τμήμα AB εἰς τὸ μέσον καὶ καθέτως.

Λύσις. Ὁδηγοῦμενοι ἀπὸ τὰ προηγούμενα γράφομεν δύο περι-



Σχ. 40



Σχ. 41

φερείας μὲ κέντρα τὰ ἄκρα Α, Β καὶ ἀκτῖνα AB (σχ. 40). Αὗται βλέπομεν ὅτι τέμνονται. Φέρομεν ἔπειτα τὴν κοινὴν χορδὴν $\Gamma\Gamma'$ καὶ γνωρίζομεν ὅτι αὕτη εἶναι ἡ ζητούμενη εὐθεῖα (§ 48).

Ἡ ἀκτίς τῶν περιφερειῶν τούτων εἶναι δυνατὸν νὰ διαφέρῃ ἀπὸ τὴν AB , ἀρκεῖ μόνον νὰ τέμνονται αἱ περιφέρειαι.

Ἄν π. χ. τὸ εὐθύγραμμον τμήμα AB εἶναι χορδὴ ἑνὸς τόξου κύκλου Κ (σχ. 41), δυνάμεθα νὰ γράψωμεν περιφέρειας μὲ κέντρα Α, Β καὶ ἀκτῖνα ΚΑ. Αὗται τέμνονται εἰς τὸ κέντρον Κ καὶ εἰς ἓν ἄλλο σημεῖον

Λ. Ἡ ζητούμενη λοιπὸν εὐθεΐα εἶναι ΚΛ. Τοιοῦτοτρόπως βλέπομεν ὅτι :

Ἡ κάθετος εἰς τὸ μέσον μιᾶς χορδῆς διέρχεται ἀπὸ τὸ κέντρον.

Παρατηροῦμεν ἐπίσης ὅτι ἡ ΚΛ τέμνει τὴν περιφέρειαν Κ εἰς δύο σημεῖα Γ καὶ Δ. Μὲ τὸν διαβήτην δὲ βλέπομεν ὅτι ἡ χορδὴ ΑΓ = χορδὴ ΓΒ καὶ ἐννοοῦμεν ὅτι $\widehat{ΑΓ} = \widehat{ΒΓ}$. Ὁμοίως βλέπομεν ὅτι $\widehat{ΑΔ} = \widehat{ΒΔ}$. Ὡστε :

Ἡ κάθετος εἰς τὸ μέσον μιᾶς χορδῆς, διχοτομεῖ τὰ ἀντίστοιχα τόξα.

Ἀσκήσεις



123. Νὰ γράψετε ἐν εὐθύγραμμον τμήμα καὶ περιφέρειαν μὲ διάμετρον αὐτὸ τὸ τμήμα.

124. Νὰ γράψετε ἐν εὐθύγραμμον τμήμα καὶ νὰ τὸ διαιρέσητε εἰς τέσσαρα ἴσα μέρη.

125. Νὰ ὀρίσητε ἐν τόξον καὶ νὰ τὸ διαιρέσητε εἰς δύο καὶ ἔπειτα εἰς 4 ἴσα μέρη.

50. Πρόβλημα II. Ἀπὸ ἐν σημείου Γ νὰ ἀχθῆ εὐθεΐα κάθετος εἰς μίαν εὐθεΐαν ΑΒ.


Λύσις. α') Ἐὰν τὸ Γ εἶναι εἰς τὴν ΑΒ, ὀρίζομεν εἰς αὐτὴν δύο ἴσα



τμήματα ΓΔ, ΓΕ καὶ φέρομεν τὴν κάθετον εἰς τὸ μέσον τοῦ τμήματος ΔΕ (σχ. 42).

β') Ἐὰν τὸ Γ εἶναι ἔξω ἀπὸ τὴν ΑΒ, γράφομεν μίαν περιφέρειαν μὲ κέντρον Γ, ἡ ὁποία νὰ τέμνη τὴν ΑΒ εἰς δύο σημεῖα Δ, Ε (σχ. 43).

Ἐπειτα γράφομεν τὴν κάθετον εἰς τὸ μέσον τῆς χορδῆς ΔΕ. Γνωρίζομεν δὲ ὅτι αὕτη διέρχεται ἀπὸ τὸ κέντρον Γ καὶ διὰ τοῦτο εἶναι ἡ ζητούμενη εὐθεΐα.



Σχ. 44

51. Πρόβλημα III. Νὰ γραφῆ περιφέρεια, ἡ ὁποία νὰ διέρχεται ἀπὸ τρία σημεῖα Α, Β, Γ, τὰ ὁποῖα δὲν κεῖνται εἰς μίαν εὐθεΐαν. (σχ. 44).

Λύσις. Ἐμάθομεν (§ 49) ὅτι αἱ κάθετοι εἰς τὰ μέσα τῶν χορδῶν ΑΒ καὶ ΒΓ διέρχονται ἀπὸ τὸ κέντρον Κ. Γράφομεν λοιπὸν αὐτὰς τὰς καθέτους καὶ ὀρίζομεν τὴν τομῆν Κ αὐτῶν. Ἐπειτα γράφομεν περιφέρειαν μὲ κέντρον Κ καὶ ἀκτῖνα ΚΑ.

Ἀσκήσεις

126. Νὰ σχηματίσῃτε μίαν γωνίαν καὶ εἰς τὰς πλευρὰς αὐτῆς νὰ ὀρίσῃτε ἀπὸ ἓν σημεῖον. Ἐπειτα νὰ γράψῃτε περιφέρειαν, ἡ ὁποία νὰ διέρχεται ἀπὸ αὐτὰ τὰ σημεῖα καὶ ἀπὸ τὴν κορυφὴν τῆς γωνίας.


127. Εἰς τὴν μίαν πλευρὰν μιᾶς ὀρθῆς γωνίας Α νὰ ὀρίσῃτε ἓν τμήμα ΑΒ μήκους 0,04 μέτρον καὶ εἰς τὴν ἄλλην ἓν τμήμα ΑΓ μήκους 0,03 μέτρον. Νὰ γράψῃτε ἔπειτα τὴν περιφέρειαν, ἡ ὁποία διέρχεται ἀπὸ τὰ σημεῖα Α, Β, Γ. Νὰ συγκρίνητε δὲ τὴν χορδὴν ΒΓ πρὸς τὴν ἀκτῖνα τῆς περιφερείας.

Β' ἔδαφινον

2. ΕΠΙΚΕΝΤΡΟΙ ΚΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑΙ ΓΩΝΙΑΙ

52. Τί εἶναι ἐπίκεντρος γωνία. Εἰς ἓνα κύκλον Κ γράφομεν δύο ἀκτῖνας ΚΑ, ΚΒ, ἀπὸ τὰς ὁποίας σχηματίζεται μία γωνία ΑΚΒ (σχ. 45). Αὕτη ἔχει κορυφὴν τὸ κέντρον Κ καὶ διὰ τοῦτο λέγεται ἐπίκεντρος γωνία.

Μεταξὺ τῶν πλευρῶν αὐτῆς περιέχεται ἓν τόξον ΑΒ· αὐτὸ λέγεται ἀντίστοιχον τόξον τῆς ἐπικέντρου γωνίας ΑΚΒ.



Σχ. 45

Συνήθως δὲ λέγομεν ὅτι ἡ γωνία AKB βαίνει ἐπὶ τοῦ τόξου AB .
Ὁμοίως ἡ $\widehat{ΓΛΔ}$ εἶναι ἐπίκεντρος γωνία καὶ βαίνει ἐπὶ τοῦ τόξου $ΓΔ$. Ὡστε :

Ἐπίκεντρος γωνία εἶναι μία γωνία, ἡ ὅποια ἔχει κορυφὴν τὸ κέντρον ἑνὸς κύκλου. Μία δὲ ἐπίκεντρος γωνία βαίνει ἐπὶ τοῦ ἀντιστοίχου τόξου δηλ. ἐπὶ τοῦ τόξου, τὸ ὁποῖον περιέχεται μεταξύ τῶν πλευρῶν της.

53. Πῶς σχετίζονται αἱ ἐπίκεντροι γωνίαι, αἱ ὁποῖαι βαίνουν εἰς ἴσα τόξα. Καὶ ἀντιστρόφως. Εἰς ἓν φύλλον χάρτου γράφομεν δύο ἴσας περιφερείας K καὶ Λ (σχ. 45). Ἐπειτα ὀρίζομεν εἰς αὐτὰς δύο ἴσα τόξα AB καὶ $\Gamma\Delta$ καὶ φέρομεν τὰς ἀκτῖνας KA , KB , $\Lambda\Gamma$, $\Lambda\Delta$. Διὰ τὰ συγκρίνωμεν τὰς ἐπίκεντρος γωνίας AKB καὶ $\Gamma\Lambda\Delta$, ἀποχωρίζομεν τὸν κυκλικὸν τομέα $\Lambda\Gamma\Delta$ καὶ τὸν θέτομεν ἐπάνω εἰς τὸν AKB . Ἄν προσέξωμεν νὰ ἐφαρμόσωσι τὰ ἴσα τόξα AB καὶ $\Gamma\Delta$, βλέπομεν ὅτι καὶ αἱ ἐπίκεντροι γωνίαι ἐφαρμόζουσι. Εἶναι λοιπὸν $\widehat{AKB} = \widehat{\Gamma\Lambda\Delta}$.

Κατὰ τὸν ἴδιον τρόπον φθάνομεν εἰς τὸ συμπέρασμα τοῦτο καὶ ἂν τὰ ἴσα τόξα εὐρίσκονται εἰς τὴν αὐτὴν περιφέρειαν K . Ὡστε :

α'. Εἰς ἓνα κύκλον ἢ εἰς ἴσους κύκλους εἰς ἴσα τόξα βαίνουν ἴσαι ἐπίκεντροι γωνίαι.

Ἄν δὲ εἶναι $\widehat{AKB} = \widehat{\Gamma\Lambda\Delta} = \widehat{EKZ}$, κατὰ τὸν ἴδιον τρόπον βλέπομεν ὅτι $\widehat{AB} = \widehat{\Gamma\Delta} = \widehat{EZ}$. Δηλαδή :

β'. Εἰς ἓνα κύκλον ἢ εἰς ἴσους κύκλους ἴσαι ἐπίκεντροι γωνίαι βαίνουν εἰς ἴσα τόξα.


Ἄπὸ τὰς ιδιότητας αὐτὰς ἐννοοῦμεν ὅτι :

γ'. Εἰς ἓν τόξον διπλάσιον ἢ τριπλάσιον κ.τ.λ. ἀπὸ ἓν ἄλλο τόξον τῆς αὐτῆς ἢ ἴσων περιφερειῶν βαίνει διπλασία ἢ τριπλασία κ.τ.λ. ἐπίκεντρος γωνία. |


54. Ἐφαρμογαί. Πρόβλημα I. Νὰ διαιρεθῇ μία περιφέρεια Λ εἰς 4 ἴσα τόξα (σχ. 46).

Λύσις. Γράφομεν δύο καθέτους διαμέτρους AKB , $\Gamma\Lambda\Delta$. Αὐταὶ

χωρίζουσι την περιφέρειαν εις τὰ τόξα ΑΓ, ΓΒ, ΒΔ, ΔΑ. Είναι δὲ ταῦτα ἴσα (§ 53 β') καὶ λέγονται **τεταρτημόρια** τῆς περιφερείας.



Σχ. 46



Σχ. 47

55. Πρόβλημα II. Νὰ διαιρεθῇ μία γωνία Α εις δύο ἴσας γωνίας (Σχ. 47).

Λύσις. Καθιστῶμεν τὴν γωνίαν Α ἐπίκεντρον καὶ γράφομεν τὴν ΑΕ κάθετον εἰς τὸ μέσον τῆς χορδῆς ΒΓ τοῦ ἀντιστοίχου τόξου.


Γνωρίζομεν ὅτι (§ 49) $\widehat{BE} = \widehat{E\Gamma}$ καὶ ἐπομένως $\widehat{BAE} = \widehat{EAG}$.

Ἡ εὐθεῖα ΑΕ διαιρεῖ λοιπὸν τὴν γωνίαν ΒΑΓ εἰς δύο ἴσας γωνίας.

Διὰ τοῦτο δὲ ἡ ΑΕ λέγεται **διχοτόμος** τῆς \widehat{BAG} .

56. Πρόβλημα III. Νὰ σχηματισθῇ μία γωνία ἴση πρὸς ἄλλην γωνίαν Α (σχ. 48).

Λύσις. Καθιστῶμεν τὴν γωνίαν Α ἐπίκεντρον καὶ ἔστω ΕΔ τὸ ἀντίστοιχον τόξον. Ἐπειτα γράφομεν μίαν περιφέρειαν μὲ κέντρον ἐν σημείῳ Β καὶ ἀκτίνα ΑΔ. Εἰς αὐτὴν τὴν περιφέρειαν ὀρίζομεν ἓν τόξον ΗΖ ἴσον πρὸς τὸ



Σχ. 48

ΕΔ και φέρομεν τὰς ἀκτῖνας ΒΗ καὶ ΒΖ. Ἡ γωνία ΗΒΖ εἶναι ἴση πρὸς τὴν Α. (Διατί ;). †

Ἄσκησεις

- † 128. Νὰ σχηματίσῃτε μίαν γωνίαν ἴσην πρὸς $\frac{1}{2}$ ὀρθῆς.
 † 129. Νὰ σχηματίσῃτε μίαν γωνίαν καὶ νὰ τὴν διαιρέσῃτε εἰς 4 ἴσας γωνίας.
 † 130. Νὰ σχηματίσῃτε μίαν γωνίαν ἴσην πρὸς τὰ $\frac{3}{4}$ ὀρθῆς.

† 57. Πῶς μετροῦμεν τὰ τόξα καὶ τὰς γωνίας. α') Διὰ νὰ μετρήσωμεν ἓν τόξον, πρέπει νὰ συγκρίνωμεν αὐτὸ πρὸς ἓν ὠρισμένον τόξον. Τοῦτο λέγεται **μονὰς** τῶν τόξων.

Ἀπὸ τὴν σύγκρισιν δὲ αὐτὴν προκύπτει εἰς ἀριθμὸς. Αὐτὸς λέγεται **μέτρον** τοῦ τόξου καὶ φανερώνει ἀπὸ πόσας μονάδας ἢ καὶ ἀπὸ πόσα μέρη αὐτῆς ἀποτελεῖται τὸ μετρηθὲν τόξον.

Πολὺ συνηθισμένη μονὰς τῶν τόξων εἶναι τὸ $\frac{1}{360}$ τῆς περιφερείας. Τοῦτο λέγεται **μοῖρα** (°).


Αὕτη διαιρεῖται εἰς 60 ἴσα μέρη, τὰ ὅποια λέγονται **πρῶτα λεπτά** ('). Τὸ δὲ πρῶτον λεπτόν διαιρεῖται εἰς 60 ἴσα μέρη, τὰ **δεύτερα λεπτά** (").

Π. χ. τὸ $\frac{1}{4}$ μιᾶς περιφερείας ἔχει μέτρον 90°, τὸ $\frac{1}{8}$ ἔχει 45°, τὸ $\frac{1}{16}$ ἔχει 22° 30'.

Ὅμοιως διὰ νὰ μετρήσωμεν μίαν γωνίαν, συγκρίνομεν αὐτὴν πρὸς ὠρισμένην γωνίαν, ἢ ὅποια λέγεται **μονὰς τῶν γωνιῶν**.

Ἀπὸ τὴν σύγκρισιν δὲ αὐτὴν προκύπτει εἰς ἀριθμὸς. Αὐτὸς λέγεται **μέτρον** τῆς γωνίας. Φανερώνει δὲ ἀπὸ πόσας μονάδας ἢ καὶ ἀπὸ πόσα μέρη αὐτῆς ἀποτελεῖται ἢ μετρηθεῖσα γωνία.


Μέχρι τοῦδε ἐλαμβάνομεν ὡς μονάδα γωνιῶν τὴν ὀρθὴν γωνίαν. Ὅταν π. χ. λέγωμεν ὅτι μία γωνία εἶναι $\frac{1}{2}$ ὀρθῆς, ὁ ἀριθμὸς οὗτος εἶναι τὸ μέτρον αὐτῆς.



Σχ. 49

Ἄλλη συνήθης μονὰς τῶν γωνιῶν εἶναι ἡ ἐπίκεντρος γωνία, ἡ ὁποία βαίνει εἰς τόξον 1° . Αὕτη δὲ λέγεται γωνία 1° .

Ἀπὸ ὅσα δὲ προηγουμένως (§ 53 γ') ἐμάθομεν, ἐννοοῦμεν τὰ ἐξῆς: Ὅσας φορὰς ἐν τόξον 1° χωρεῖ εἰς ἕν ἄλλο τόξον AB, τόσας



Σχ. 50

φορὰς ἡ γωνία μ μιᾶς μοίρας χωρεῖ εἰς τὴν γωνίαν ω (σχ. 49). Δηλαδή:

Τὸ μέτρον μιᾶς ἐπίκεντρος γωνίας εἶναι ἴσον πρὸς τὸ μέτρον τοῦ ἀντιστοίχου τόξου.

Διὰ νὰ μετρήσωμεν λοιπὸν μίαν γωνίαν, ἀρκεῖ νὰ τὴν καταστήσωμεν ἐπίκεντρον καὶ νὰ μετρήσωμεν τὸ ἀντίστοιχον τόξον. Κατορθώνομεν δὲ τοῦτο μὲ τὸ **μοιρογνώμονιον** (σχ. 50).

Τοῦτο εἶναι ἕν ἡμικύκλιον συνήθως μεταλλικόν, τοῦ ὁποίου τὸ τόξον εἶναι διηρημένον εἰς 180 μοίρας ἡριθμημένας ἀπὸ 0° ἕως 180° .

Θέτομεν π. χ. τοῦτο ἐπάνω εἰς μίαν γωνίαν AOB μὲ τὸ κέντρον εἰς τὴν κορυφὴν τῆς καὶ εἰς τὴν μίαν πλευρὰν OA νὰ ἔλθῃ ἡ ἀκτίς, ἡ ὁποία τελειώνει εἰς τὴν ἀρχὴν τῆς ἡμιπεριφερείας. Ὁ ἀριθμὸς διαίρεσεως, ἀπὸ τὴν ὁποία διέρχεται ἡ ἄλλη πλευρὰ OB, εἶναι τὸ μέτρον τῆς γωνίας AOB. †

Ἀσκήσεις

131. Νὰ μετρήσῃτε ὅλοι τὴν γωνίαν AKB τοῦ σχήματος 49 τοῦ βιβλίου σας.
132. Νὰ σχηματίσῃτε ἀπὸ μίαν ὀξείαν καὶ ἀπὸ μίαν ἀμβλείαν γωνίαν καὶ νὰ μετρήσῃτε αὐτάς.

133. Νά εὑρητε εἰς μοίρας τὸ μέτρον τῆς ὀρθῆς γωνίας, ἔπειτα δὲ τοῦ $\frac{1}{2}$ καὶ τοῦ $\frac{1}{3}$ αὐτῆς.

134. Νά εὑρητε εἰς μοίρας τὸ μέτρον τῶν $\frac{2}{5}$ τῆς ὀρθῆς καὶ ἔπειτα τῆς $\frac{5}{8}$ ὀρθῆς.

135. Νά εὑρητε πόσον μέρος τῆς ὀρθῆς εἶναι γωνία 40° , 65° , 120° .


136. Νά εὑρητε πόσον μέρος τῆς ὀρθῆς εἶναι γωνία $50^\circ 30'$.

158. Τί εἶναι ἐγγεγραμμένη εἰς κύκλον γωνία. Ἀπὸ ἓν σημεῖον Β μιᾶς περιφερείας Κ φέρομεν δύο χορδὰς ΒΑ καὶ ΒΓ (σχ. 51).

Ἡ γωνία ΑΒΓ αὐτῶν λέγεται ἐγγεγραμμένη εἰς τὸν κύκλον Κ. Αὕτη βαίνει εἰς τὸ τόξον ΑΓ, τὸ ὁποῖον περιέχεται μεταξὺ τῶν πλευρῶν τῆς. Ὡστε :

Μία γωνία λέγεται ἐγγεγραμμένη εἰς ἓνα κύκλον, ἂν ἡ μὲν κορυφή αὐτῆς κεῖται εἰς τὴν περιφέρειαν, αἱ δὲ πλευραὶ τῆς εἶναι χορδαὶ τόξων τῆς αὐτῆς περιφερείας.


Μία δὲ ἐγγεγραμμένη γωνία βαίνει εἰς τὸ τόξον, τὸ ὁποῖον περιέχεται μεταξὺ τῶν πλευρῶν τῆς.



Σχ. 51

159. Πρόβλημα I. Νά συγκριθῆ μία ἐγγεγραμμένη γωνία ΑΒΓ πρὸς τὴν ἐπίκεντρον ΑΚΓ, ἡ ὁποία βαίνει εἰς τὸ αὐτὸ τόξον ΑΔΓ (σχ. 52 α').

Λύσις. Καθίστωμεν τὴν ΑΒΓ ἐπίκεντρον εἰς κύκλον μὲ ἀκτῖνα ΒΚ. Μὲ τὴν βοήθειαν δὲ τοῦ δια-



Σχ. 52

βήτου βλέπομεν ὅτι τὸ ἀντίστοιχον τόξον ΕΖ χωρεῖ δύο φορές ἀκριβῶς εἰς τὸ τόξον ΑΔΓ. Ἐννοοῦμεν λοιπὸν ὅτι :

α') Μία ἐγγεγραμμένη εἰς κύκλον γωνία εἶναι τὸ ἡμισυ τῆς ἐπικέντρου γωνίας, ἢ ὅποια βαίνει εἰς τὸ αὐτὸ τόξον.

Ἐκ τούτου τὸ συμπέρασμα δὲ αὐτὸ ἐννοοῦμεν ἀκόμη ὅτι :

β') Αἱ ἐγγεγραμμεναι εἰς κύκλον γωνίαι, αἱ ὁποῖαι βαίνουσιν εἰς τὸ αὐτὸ τόξον ἢ εἰς ἴσα τόξα, εἶναι ἴσαι.

Ἡ ἐγγεγραμμένη εἰς τὸν κύκλον Κ γωνία ΗΘΛ (σχ. 52 β') βαίνει εἰς τὴν ἡμιπεριφέρειαν ΗΜΛ. Μὲ τὸν γνώμονα δὲ βλέπομεν ὅτι αὕτη εἶναι ὀρθή γωνία.

Ἀσκήσεις

137. Νὰ εὑρητε τὸ μέτρον μιᾶς ἐγγεγραμμένης γωνίας, ἢ ὅποια βαίνει εἰς ἓν τεταρτημόριον περιφέρειας.

138. Νὰ εὑρητε τὸ μέτρον μιᾶς ἐγγεγραμμένης γωνίας, ἢ ὅποια βαίνει εἰς τόξον $42^{\circ} 30'$ καὶ μιᾶς ἄλλης, ἢ ὅποια βαίνει εἰς τόξον $54^{\circ} 24' 40''$.

139. Ἐάν μία ἐγγεγραμμένη γωνία εἶναι $\frac{2}{3}$ ὀρθῆς, νὰ εὑρητε τὸ μέτρον τῆς ἐπικέντρου, ἢ ὅποια βαίνει εἰς τὸ αὐτὸ τόξον.

140. Ἐάν μία ἐγγεγραμμένη γωνία εἶναι $25^{\circ} 30'$, νὰ εὑρητε τὸ μέτρον εἰς μέρη ὀρθῆς τῆς ἐπικέντρου γωνίας, ἢ ὅποια βαίνει εἰς τὸ αὐτὸ τόξον.

Ἐρωτήσεις

Τί εἶναι κύκλος καὶ ποῖα τὰ κυριώτερα στοιχεῖα αὐτοῦ;

Ποῖα μέρη τῆς περιφέρειᾶς καὶ τοῦ κύκλου ἐμάθομεν;

Πῶς διαιροῦμεν ἓνα κύκλον καὶ μίαν περιφέρειαν εἰς δύο ἴσα μέρη;

Πῶς ὀρίζομεν ἴσα τόξα εἰς μίαν περιφέρειαν;

Τί εἶναι ἐπίκεντρος καὶ τί ἐγγεγραμμένη εἰς κύκλον γωνία;

Πῶς σχετίζονται μία ἐπίκεντρος καὶ μία ἐγγεγραμμένη εἰς κύκλον γωνία μὲ τὸ αὐτὸ ἀντίστοιχον τόξον;

Μὲ ποῖον ὄργανον μετροῦμεν τὰ τόξα καὶ τὰς γωνίας;

Ποῖα εἶναι ἡ μονὰς τῶν γωνιῶν κατὰ τὴν μέτρησιν ταύτην;

Πῶς τέμνονται ἢ διάκεντρος καὶ ἢ κοινῇ χορδῇ δύο περιφερειῶν;

Ποίας ιδιότητος ἔχει ἡ κάθετος εἰς τὸ μέσον μιᾶς χορδῆς;

Ποῖον εἶναι τὸ μέτρον μιᾶς ἐγγεγραμμένης εἰς κύκλον γωνίας, ἢ ὅποια βαίνει εἰς ἡμιπεριφέρειαν;

Ἀσκήσεις πρὸς ἐπανάληψιν τοῦ Δ' κεφαλαίου

141. Νὰ γράψετε δύο ὁμοκέντρος περιφερειᾶς μὲ ἀκτίνας 5 ἑκατοστομέτρων

και 2 εκατοστομέτρων. Να γράψετε μίαν ακτίνα της εξωτερικής περιφέρειας και να εϋρητε το μήκος του τμήματος αυτής, το όποιον περιέχεται μεταξύ των περιφερειών.

142. Ἡ διάμετρος ἑνὸς κύκλου εἶναι 0,06 μέτρου. Να εϋρητε πόσον ἀπέχει τὸ κέντρον ἀπὸ μίαν ἐφαπτομένην αὐτοῦ.

143. Να ὀρίσητε εἰς τὸ τετράδιόν σας δύο σημεῖα Κ και Λ εἰς ἀπόστασιν 2 ἑκατοστομέτρων. Ἐπειτα νὰ γράψετε μίαν περιφέρειαν μὲ κέντρον Κ και ἀκτίνα 5 ἑκατοστομέτρων και ἄλλην μὲ κέντρον Λ και ἀκτίνα 2 ἑκατοστομέτρων. Να παρατηρήσητε δὲ ποίαν θέσιν ἔχουσι μεταξύ των οἱ κύκλοι Κ και Λ.

144. Μὲ τὴν βοήθειαν ἑνὸς μεταλλικοῦ νομίσματος νὰ γράψετε ἓν τόξον και ἔπειτα νὰ εϋρητε τὸ κέντρον αὐτοῦ.

145. Εἰς ἓνα κύκλον νὰ γράψετε δύο χορδὰς εἰς ἴσην ἀπόστασιν ἀπὸ τὸ κέντρον. Ἐπειτα δὲ νὰ συγκρίνητε αὐτάς.

146. Εἰς μίαν περιφέρειαν νὰ ὀρίσητε δύο ἄνισα τόξα και νὰ συγκρίνητε τὰς ἐπικέντρους γωνίας, αἱ ὁποῖαι βαίνουν εἰς αὐτά.

147. Εἰς μίαν περιφέρειαν νὰ ὀρίσητε τόξον μὲ χορδὴν ἴσην πρὸς τὴν ἀκτίνα και μικρότερον ἡμιπεριφέρειας. Ἐπειτα νὰ σχηματίσητε κυκλικὸν τομέα μὲ βάσιν αὐτὸ τὸ τόξον και νὰ μετρήσητε τὴν γωνίαν αὐτοῦ.


148. Μία ἐγγεγραμμένη εἰς κύκλον γωνία ἔχει μέτρον $18^{\circ} 38' 35''$. Να εϋρητε τὸ μέτρον τοῦ ἀντιστοίχου τόξου.

149. Να γράψετε μίαν διάμετρον εἰς ἓνα κύκλον Κ και ἀπὸ τὰ ἄκρα αὐτῆς νὰ φέρητε δύο παραλλήλους χορδὰς. Ἐπειτα δὲ νὰ συγκρίνητε τὰς γωνίας αὐτῶν μὲ τὴν διάμετρον.

150. Να φέρητε τὰς ἀκτίνας εἰς τὰ ἄκρα τῶν προηγουμένων χορδῶν και νὰ διακρίνητε τὸ εἶδος τῆς γραμμῆς, τὴν ὁποίαν σχηματίζουν αὐταί.

1. ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΑ ΣΧΗΜΑΤΑ


160. Τί είναι εὐθύγραμμα σχήματα καὶ ποῖα εἶναι τὰ στοιχεῖα αὐτῶν. Ἐμάθομεν (§ 10) ὅτι αἱ ἔδραι ἑνὸς πολυέδρου, π. χ. τοῦ ΑΚ (σχ. 53), εἶναι ἐπίπεδα σχήματα, τὰ ὁποῖα περικλείονται ἀπὸ εὐθύγραμμα τμήματα. Δι' αὐτὸ αἱ ἔδραι αὗται λέγονται εὐθύγραμμα σχήματα. Καὶ τὰ σχήματα 54 εἶναι εὐθύγραμμα σχήματα. Ὡστε :



Σχ. 53

Εὐθύγραμμον σχῆμα εἶναι μέρος ἐπιπέδου, τὸ ὁποῖον περικλείεται ἀπὸ εὐθύγραμμα τμήματα.

Αὐτὰ τὰ τμήματα λέγονται πλευραὶ. Π. χ. ΑΜ, ΜΝ, ΝΑ εἶναι αἱ πλευραὶ τοῦ ΑΜΝ. Αἱ πλευραὶ ἑνὸς εὐθυγράμμου σχήματος σχηματίζουν γωνίας· αὗται λέγονται γωνίαι τοῦ εὐθυγράμμου σχήματος. Αἱ δὲ κορυφαὶ τῶν γωνιῶν τούτων λέγονται κορυφαὶ καὶ τοῦ εὐθυγράμμου σχήματος. Παρατηροῦμεν δὲ ὅτι ἓνα εὐθύγραμμον σχῆμα ἔχει τὸ αὐτὸ



Σχ. 54

πλήθος πλευρῶν, γωνιῶν καὶ κορυφῶν. Π. χ. τὸ ΑΜΝ ἔχει τρεῖς πλευράς, τρεῖς γωνίας καὶ τρεῖς κορυφάς. Διὰ τοῦτο δὲ λέγεται **τρίπλευρον** ἢ συνηθέστερον **τρίγωνον**.

Τὸ ΗΘΙΚ εἶναι τετράπλευρον, ἡ ἔδρα ΑΒΓΔΕ (σχ. 53) εἶναι πεντάγωνον, τὸ ΑΒΓΔΕΖ εἶναι ἑξάγωνον κ.τ.λ.

Τὰ πεντάγωνα, ἑξάγωνα κ.τ.λ. λέγονται **πολύγωνα**.

Τὸ εὐθύγραμμον τμήμα ΑΓ ἑνώνει δύο μὴ διαδοχικὰς κορυφὰς τοῦ ΑΒΓΔΕΖ (σχ. 54). Λέγεται δὲ **διαγώνιος** αὐτοῦ. Καὶ τὰ τμήματα ΑΔ, ΑΕ εἶναι διαγώνιοι τοῦ ΑΒΓΔΕΖ. Δηλαδή :

Διαγώνιος ἑνὸς εὐθύγραμμου σχήματος εἶναι ἓνα εὐθύγραμμον τμήμα, τὸ ὁποῖον ἑνώνει δύο μὴ διαδοχικὰς κορυφὰς.

Ἔνα τρίγωνον π. χ. τὸ ΑΜΝ οὐδεμίαν διαγώνιον ἔχει. (Διατί ;).

Τὸ ἄθροισμα τῶν πλευρῶν ἑνὸς εὐθύγραμμου σχήματος λέγεται **περίμετρος** αὐτοῦ. Ἄν π. χ. αἱ πλευραὶ ἑνὸς τριγώνου εἶναι 4, 3,5 καὶ 3 ἑκατοστόμετρα, ἡ περίμετρος αὐτοῦ εἶναι $4 + 3,5 + 3 = 10,5$ ἑκατοστόμετρα.

Ἐσκήσεις

151. Νὰ εὕρητε τὸ μήκος τῆς περιμέτρου τοῦ ΗΘΙΚ (σχ. 54).

152. Νὰ γράψετε ἓνα τετράπλευρον· ἔπειτα δὲ νὰ γράψετε καὶ νὰ μετρήσετε τὰς διαγωνίους του.

153. Νὰ σχηματίσετε ἀπὸ ἓνα πεντάγωνον καὶ νὰ γράψετε ὅλας τὰς διαγωνίους του μὲ ἑστιγμένας γραμμὰς.

2. ΤΡΙΓΩΝΑ


61. Ποῖα εἶναι τὰ εἶδη τῶν τριγώνων. α') Μὲ ἀκτῖνα ἓνα τμήμα ΚΛ καὶ μὲ κέντρα Κ, Λ γράφομεν δύο περιφερείας. Ἀπὸ ἓνα κοινὸν σημεῖον Μ αὐτῶν φέρομεν τὰ τμήματα ΜΚ, ΜΛ. Τὸ τρίγωνον ΜΚΛ ἔχει ἴσας ὅλας τὰς πλευράς του. Δι' αὐτὸ δὲ λέγεται **ισόπλευρον** τρίγωνον (σχ. 55).

Ὅμοίως μὲ κέντρα Δ, Ε καὶ ἀκτῖνα διάφορον ἀπὸ τὸ ΔΕ γράφομεν δύο περιφερείας καὶ σχηματίζομεν ἓνα τρίγωνον ΔΕΖ μὲ δύο μόνον ἴσας πλευράς. Τοῦτο λέγεται **ἰσοσκελὲς** τρίγωνον.

Τέλος μὲ κέντρα Η, Ι καὶ ἀνίσους ἀκτῖνας ΗΚ, ΙΛ γράφομεν δύο περιφερείας καὶ σχηματίζομεν ἓν τρίγωνον ΗΘΙ μὲ ἀνίσους ὅλας τὰς πλευράς του. Τοῦτο λέγεται **σκαληνὸν** τρίγωνον.


β') Αἱ γωνίαι τοῦ τριγώνου ΚΛΜ εἶναι ὅξαι· διὰ τοῦτο δὲ αὐτὸ λέγεται **ὀξυγώνιον** τρίγωνον.

Ἡ γωνία A τοῦ τριγώνου $AB\Gamma$ (σχ. 56) εἶναι ὀρθή. Δι' αὐτὸ δὲ τοῦτο λέγεται **ὀρθογώνιον** τρίγωνον. Ὁ γνῶμων λοιπὸν εἶναι ἓνα ὀρθο-



Σχ. 55

γώνιον τρίγωνον. Ἡ πλευρὰ $B\Gamma$, ἡ ὁποία εἶναι ἀπέναντι τῆς ὀρθῆς γωνίας, λέγεται **ὑποτείνουσα** τοῦ ὀρθογωνίου τριγώνου.



Σχ. 56

Ἡ γωνία Δ τοῦ $\Delta E Z$ (σχ. 56) εἶναι ἀμβλεῖα καὶ τοῦτο λέγεται



Ἐνατολικὸν ἀέτωμα



Δυτικὸν ἀέτωμα

ἀμβλυγώνιον τρίγωνον. Τὰ ἀετώματα τοῦ Ναοῦ τοῦ Διὸς εἰς τὴν Ὀλυμπίαν εἶναι ἀμβλυγώνια καὶ ἰσοσκελῆ τρίγωνα.

Άσκησης

154. Να σχηματίσετε από ένα ισόπλευρον τρίγωνον με πλευράν 3 εκατοστών τοῦ μέτρου καὶ νὰ εὑρητε τὴν περιφέρειαν αὐτοῦ.

155. Να σχηματίσετε ἀπὸ ἓνα ἰσοσκελὲς τρίγωνον με πλευράς 5, 3, 5 εκατοστών τοῦ μέτρου. Νὰ εὑρητε τὴν περίμετρον αὐτοῦ καὶ νὰ διακρίνητε τὸ εἶδος τῶν γωνιῶν του.

156. Νὰ σχηματίσετε ἀπὸ ἓνα ὀρθογώνιον τρίγωνον με καθέτους πλευράς 3 καὶ 4 εκατοστών τοῦ μέτρου. Ἐπειτα δὲ νὰ μετρήσετε τὴν ὑποτείνουσαν αὐτοῦ.

157. Ἡ περίμετρος ἑνὸς ἰσοπλεύρου τριγωνικοῦ ἀγροῦ εἶναι 182,25 μέτρα. Νὰ εὑρητε τὸ μήκος τῆς πλευράς του.


158. Ἐν ἰσοσκελὲς τρίγωνον ἔχει περίμετρον 93,80 μέτρα, ἡ δὲ μία ἀπὸ τὰς ἴσας πλευράς ἔχει μήκος 36,75. Νὰ εὑρητε τὸ μήκος τῶν ἄλλων πλευρῶν του.

162. Ποῖα ἄλλα ἀξιοσημείωτα στοιχεῖα ἔχουσι τὰ τρίγωνα. α') Μία ἀπὸ τὰς πλευράς ἑνὸς τριγώνου $AB\Gamma$ (σχ. 57), π. χ. ἡ $B\Gamma$, λέγεται **βάσις** αὐτοῦ.

Ἡ ἀπόστασις AD τῆς ἀπέναντι κορυφῆς A ἀπὸ τὴν βάσιν $B\Gamma$ λέγεται **ὑψος** τοῦ τριγώνου.

Ἄν ἡ ZH εἶναι βάσις τοῦ ἀμβλυγωνίου τριγώνου EZH , ὑψος αὐτοῦ θὰ εἶναι τὸ τμήμα $E\Theta$.

Συνήθως ὡς βάσις ἑνὸς ἰσοσκελοῦς τριγώνου ΔEZ (σχ. 55) λαμ-




Σχ. 57

βάνεται ἡ ἄνωσος πρὸς τὰς ἄλλας πλευράς ΔE αὐτοῦ. Ὡς βάσις δὲ καὶ ὑψος ἑνὸς ὀρθογωνίου τριγώνου $AB\Gamma$ (σχ. 56) λαμβάνονται αἱ κάθετοι πλευραὶ AB καὶ $A\Gamma$ αὐτοῦ.

β') Ἡ ἀπόστασις AM μιᾶς κορυφῆς A ἀπὸ τὸ μέσον M τῆς ἀπέναντι πλευρᾶς λέγεται **διάμεσος** τοῦ τριγώνου $AB\Gamma$.

Ἄν εἰς ἓνα ἰσοσκελὲς τρίγωνον $AB\Gamma$ (σχ. 58) φέρωμεν τὸ ὑψος,

ΑΔ, με την βοήθειαν καταλλήλων οργάνων βλέπομεν ὅτι $ΒΔ = ΔΓ$ καὶ $\eta = \theta$. Ὡστε :



Σχ. 58


Τὸ ὕψος ἐνὸς ἰσοσκελοῦς τριγώνου εἶναι διάμεσος τοῦ τριγώνου καὶ διχοτόμος τῆς ἀπέναντι τῆς βάσεως γωνίας.

*Ἄν ἐργασθῶμεν ὁμοίως με ὅλα τὰ ὕψη ἐνὸς ἰσοπλευροῦ τριγώνου, βλέπομεν ὅτι κάθε ὕψος αὐτοῦ ἔχει τὰς προηγουμένας ιδιότητες.

Ἄσκῆσεις

159. Νὰ ὀρίσητε πόσα ὕψη καὶ πόσας διαμέσους ἔχει ἓνα τρίγωνον.
 160. Νὰ μετρήσητε τὸ ὕψος ΑΔ τοῦ τριγώνου ΑΒΓ (σχ. 58).
 161. Νὰ συγκρίνητε τὸ ὕψος ΑΔ καὶ τὴν διάμεσον ΑΜ τοῦ τριγώνου ΑΒΓ (σχ. 57).
 162. Νὰ σχηματίσητε ἓνα ὀρθογώνιον τρίγωνον καὶ νὰ γράψητε τὴν διάμεσον, ἢ ὅποια ἀρχίζει ἀπὸ τὴν κορυφὴν τῆς ὀρθῆς γωνίας. Νὰ συγκρίνητε δὲ αὐτὴν πρὸς τὴν ὑποτείνουσαν.

63. Ποίας ιδιότητος ἔχουσιν ὅλα τὰ τρίγωνα. α') Σχηματίζομεν τὸ ἄθροισμα δύο πλευρῶν ἐνὸς τριγώνου ΑΒΓ (σχ. 57) π. χ.



Σχ. 59

τῶν ΑΓ καὶ ΒΓ. *Ἄν συγκρίνωμεν αὐτὸ με τὴν ΑΒ, βλέπομεν ὅτι $ΑΒ < ΑΓ + ΒΓ$. Δηλαδή :

Μία πλευρὰ ἐνὸς τριγώνου εἶναι μικροτέρα ἀπὸ τὸ ἄθροισμα τῶν δύο ἄλλων.

β') Ἀποχωρίζομεν τὰς γωνίας Β καὶ Γ ἑνὸς τριγώνου ΑΒΓ ἀπὸ φύλλον χάρτου καὶ θέτομεν αὐτὰς παραπλεύρως ἀπὸ τὴν Α δηλ. τὴν Β εἰς τὴν ω καὶ τὴν Γ εἰς τὴν φ (σχ. 59). Βλέπομεν δὲ ὅτι αἱ πλευραὶ ΗΑ καὶ ΑΘ ἀποτελοῦσι μίαν εὐθεΐαν. Εἰς τὴν θέσιν δὲ ταύτην αἱ γωνίαι Β, Α, Γ, ἀποτελοῦνται ἀπὸ τὰς ὀρθὰς ΗΑΛ, ΛΑΘ. Εἶναι δηλαδή :

$$A + B + \Gamma = 2 \text{ ὀρθαί, ἤτοι :}$$

Τὸ ἄθροισμα τῶν γωνιῶν ἑνὸς τριγώνου εἶναι 2 ὀρθαὶ γωνίαι.

Δι' ἓνα ἄλλο τρίγωνον ΔΕΖ (σχ. 59) εἶναι ὁμοίως $\Delta + E + Z = 2$ ὀρθαὶ καὶ διὰ τοῦτο $A + B + \Gamma = \Delta + E + Z$. Ἄν δὲ εἶναι $A = \Delta$ καὶ $\Gamma = Z$, εὐκολα ἐννοοῦμεν ὅτι καὶ $B = E$. Δηλαδή :

Ἄν δύο τρίγωνα ἔχωσι δύο γωνίας ἴσας, μίαν πρὸς μίαν, θὰ ἔχωσιν ἴσας καὶ τὰς ἄλλας γωνίας.

Ἀσκήσεις


163. Ἐνα τρίγωνον ΑΒΓ ἔχει $A = 90^\circ$. Νὰ εὑρητε τὸ ἄθροισμα $B + \Gamma$ καὶ νὰ ὀρίσητε τὸ εἶδος τῶν γωνιῶν Β καὶ Γ.

164. Ἄν ἓν τρίγωνον ΑΒΓ ἔχη $A = 90^\circ$, $B = \frac{4}{5}$ ὀρθῆς, νὰ εὑρητε τὸ μέτρον τῆς Γ εἰς μοίρας.

165. Ὅμοιως, ἂν $A = 90^\circ$, $B = 38^\circ 15' 20''$, νὰ εὑρητε τὸ μέτρον τῆς Γ.

166. Ἄν ἓν τρίγωνον ΑΒΓ ἔχη $A = 46^\circ 18' 20''$ καὶ $B = \Gamma$, νὰ εὑρητε τὸ μέτρον τῆς Β καὶ τῆς Γ.

64. Πρόβλημα Ι. Νὰ εὑρεθῇ τὸ ἄθροισμα τῶν γωνιῶν ἑνὸς εὐθυγράμμου σχήματος.



Σχ. 60

Λύσις. Εἰς ἓνα τετράπλευρον ΑΒΓΔ (σχ. 60) φέρομεν μίαν διαγώνιον ΑΓ καὶ διαιροῦμεν αὐτὸ εἰς 2 ἢ $(4 - 2)$ τρίγωνα. Ἐπειδὴ αἱ

γωνία των τριγώνων αποτελοῦσι τὰς γωνίας τοῦ τετραπλεύρου, ἐνοοῦμεν ὅτι :

$$A + B + \Gamma + \Delta = 2 \text{ ὀρθαί} \times (4 - 2) = (2 \times 4) - 4 \text{ ὀρθαί} = 4 \text{ ὀρθαί.}$$

Τὸ πεντάγωνον ΑΒΓΔΕ (σχ. 60) μὲ τὰς διαγωνίους ΑΓ, ΑΔ διαιρεῖται εἰς 3 ἢ $(5 - 2)$ τρίγωνα. Βλέπομεν δὲ ὅτι :

$$A + B + \Gamma + \Delta + E = 2 \text{ ὀρθαί} \times (5 - 2) = (2 \times 5) - 4 \text{ ὀρθαί} = 6 \text{ ὀρθαί. Βλέπομεν λοιπὸν ὅτι :}$$

Διὰ τὴν εὐρωμεν πόσας ὀρθὰς γωνίας ἔχει τὸ ἄθροισμα τῶν γωνιῶν ἑνὸς εὐθυγράμμου σχήματος, ἀφαιροῦμεν τὸν 4 ἀπὸ τὸ διπλάσιον τοῦ ἀριθμοῦ τῶν πλευρῶν του.

Ἀ σ κ ῆ σ ε ι ς

167. Νὰ εὑρητε πόσας μοίρας ἔχει τὸ ἄθροισμα τῶν γωνιῶν ἑνὸς τετραπλεύρου καὶ ἔπειτα ἑνὸς πενταγώνου.

168. Νὰ εὑρητε τὸ ἄθροισμα τῶν γωνιῶν ἑνὸς ἑξαγώνου, ἑνὸς ὀκταγώνου καὶ ἑνὸς δεκαγώνου.

169. Ἐάν τὸ ἄθροισμα τῶν γωνιῶν ἑνὸς εὐθυγράμμου σχήματος εἶναι 10 ὀρθαί νὰ εὑρητε πόσας πλευρὰς ἔχει αὐτό.

§ 3. ΓΕΝΙΚΑΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΙΣΟΤΗΤΟΣ ΔΥΟ ΤΡΙΓΩΝΩΝ


65. Εἰς ποίας περιπτώσεις δύο τρίγωνα εἶναι ἴσα. α') Εἰς ἓνα φύλλον χάρτου σχηματίζομεν ἓνα τρίγωνον ΑΒΓ καὶ μίαν γωνίαν Δ ἴσην μὲ τὴν Α (σχ. 61). Ἐπειτα εἰς τὰς πλευρὰς τῆς Δ ὀρίζομεν τμήματα ΔΕ = ΑΒ καὶ ΔΖ = ΑΓ καὶ φέρομεν τὸ τμήμα ΕΖ.

Ἀποχωρίζομεν δὲ τὸ τρίγωνον ΔΕΖ καὶ τὸ θέτομεν εἰς τὸ ΑΒΓ, ὥστε ἡ γωνία Δ νὰ ἐφαρμόσῃ εἰς τὴν Α μὲ τὴν πλευρὰν ΕΔ ἐπὶ τῆς ΑΒ. Βλέπομεν δὲ ὅτι τὰ δύο τρίγωνα ἐφαρμόζουσιν ἀκριβῶς καὶ ἐνοοῦμεν ὅτι :

Ἐάν δύο τρίγωνα ἔχωσι δύο πλευρὰς ἴσας, μίαν πρὸς μίαν, καὶ τὰς γωνίας τῶν πλευρῶν τούτων ἴσας, τὰ τρίγωνα ταῦτα εἶναι ἴσα.

β') Εἰς ἓνα φύλλον χάρτου ὀρίζομεν ἓνα τμήμα ΕΖ ἴσον πρὸς τὴν πλευρὰν ΒΓ (σχ. 61). Ἐπειτα σχηματίζομεν γωνίαν Ε ἴσην μὲ τὴν Β καὶ Ζ = Γ καὶ τὰς δύο πρὸς τὸ αὐτὸ μέρος τῆς κοινῆς πλευρᾶς ΕΖ. Ἐάν δὲ τὸ τρίγωνον ΔΕΖ θέσωμεν εἰς τὸ ΑΒΓ, ὥστε ἡ πλευρὰ ΕΖ νὰ ἐφαρμόσῃ εἰς τὴν ΒΓ μὲ τὸ Ε εἰς τὸ Β, βλέπομεν ὅτι τὰ τρίγωνα ἐφαρμόζουσιν. Ἐνοοῦμεν λοιπὸν ὅτι :

Ἐάν δύο τρίγωνα ἔχωσι μίαν πλευρὰν ἴσην καὶ τὰς προσκειμένας εἰς αὐτὴν γωνίας ἴσας, μίαν πρὸς μίαν, ταῦτα εἶναι ἴσα.



Σχ. 61

γ') Ἐάν ὀρίσωμεν $EZ = BΓ$ καὶ γράψωμεν μίαν περιφέρεια με κέντρον Ε καὶ ἀκτῖνα AB καὶ ἄλλη με κέντρον Ζ καὶ ἀκτῖνα $AΓ$, σχηματίζομεν ἔπειτα εὐκόλως ἓνα τρίγωνον ΔEZ . Τοῦτο ἔχει ἀκόμη $\Delta E = AB$ καὶ $\Delta Z = AΓ$. Ἐάν δὲ τὸ θέσωμεν εἰς τὸ $ABΓ$, βλέπομεν ὅτι ταῦτα ἐφαρμόζουσιν. Ἐννοοῦμεν λοιπὸν ὅτι :

Ἐάν δύο τρίγωνα ἔχωσι τὰς πλευρὰς ἴσας ἀνά μίαν, ταῦτα εἶναι ἴσα.

Γενικὴ παρατήρησις. Ἐπὸ τὸν τρόπον τῆς ἐφαρμογῆς τῶν τριγώνων $ABΓ$ καὶ ΔEZ εἰς ὅλας τὰς προηγουμένας περιπτώσεις βλέπομεν ὅτι :

Εἰς δύο ἴσα τρίγωνα ἀπέναντι ἴσων γωνιῶν κείνται ἴσαι πλευραί.

Ἀπέναντι δὲ ἴσων πλευρῶν κείνται ἴσαι γωνίαι.

Ἀσκήσεις


170. Νὰ σχηματίσητε δύο ὀρθογώνια τρίγωνα με τὰς καθέτους πλευρὰς ἴσας, μίαν πρὸς μίαν. Νὰ συγκρίνητε δὲ τὰς ὑποτείνουσας αὐτῶν.

171. Εἰς τὰς προεκτάσεις τῶν πλευρῶν AB καὶ $AΓ$ ἐνὸς τριγώνου $ABΓ$ νὰ ὀρίσητε τμήμα $AΔ$ ἴσον με AB καὶ ἄλλο AE ἴσον με $AΓ$. Ἐπειτα νὰ συγκρίνητε τὰ τμήματα $BΓ$ καὶ ΔE .

172. Εἰς περιφέρειαν K νὰ ὀρίσητε δύο ἴσα τόξα AB καὶ $BΓ$. Νὰ φέρητε δὲ τὰς χορδὰς αὐτῶν καὶ τὰς ἀκτῖνας KA , KB , $KΓ$ καὶ νὰ συγκρίνητε τὰ τρίγωνα AKB καὶ $BKΓ$.

173. Εἰς τὰς πλευρὰς μιᾶς γωνίας A νὰ ὀρίσητε δύο ἴσα τμήματα AB καὶ $AΓ$. Νὰ γράψητε ἔπειτα τὴν διχοτόμον $AΔ$ τῆς γωνίας καὶ τὰ τμήματα BD , $ΓΔ$. Νὰ συγκρίνητε δὲ ταῦτα.

66. Πρόβλημα 1. Νά συγκριθῶσιν αἱ γωνίαι ἰσοπλεύρου τριγώνου $AB\Gamma$ (σχ. 62).



Σχ. 62

Λύσις. Καθιστῶμεν αὐτὰς ἐπικέντρους εἰς ἴσους κύκλους καὶ μετὸν διαβήτην βλέπομεν ὅτι τὰ ἀντίστοιχα τόξα αὐτῶν εἶναι ἴσα. Ἐννοοῦμεν λοιπὸν ὅτι : **Αἱ γωνίαι ἑνὸς ἰσοπλεύρου τριγώνου εἶναι ὅλαι ἴσαι.**

Κάθε μία δὲ εἶναι $180 : 3 = 60^\circ$. Δι' αὐτὸν τὸν λόγον ἓνα ἰσόπλευρον τρίγωνον λέγεται καὶ **ἰσογώνιον**.

Ἀσκήσεις

174. Νά σχηματίσῃτε μίαν γωνίαν 60° καὶ ἔπειτα μίαν 30° .
 175. Νά διαιρέσῃτε μίαν ὀρθήν γωνίαν εἰς τρία ἴσα μέρη.
 176. Νά σχηματίσῃτε ἓνα ἰσοσκελὲς τρίγωνον καὶ νά συγκρίνητε τὰς ἀπέναντι τῶν ἴσων πλευρῶν γωνίας του.
 177. Νά σχηματίσῃτε ἓνα ἰσοσκελὲς τρίγωνον μετὰ γωνίαν 30° ἀπέναντι τῆς βάσεως. Ἐπειτα δὲ νά εὕρητε τὰ μέτρα τῶν ἄλλων γωνιῶν του.
 178. Ἐάν ἓνα τρίγωνον $AB\Gamma$ ἔχη $AB = B\Gamma$ καὶ $B = 40^\circ$, νά εὕρητε τὸ μέτρον τῆς Γ καὶ τῆς A .
 179. Νά σχηματίσῃτε ἓνα τρίγωνον $AB\Gamma$ μετὰ $A = 90^\circ$ καὶ $B = 30^\circ$ καὶ νά συγκρίνητε τὴν πλευρὰν $A\Gamma$ μετὰ τὴν ὑποτείνουσαν.
 180. Ἐν τρίγωνον $AB\Gamma$ ἔχει $AB = B\Gamma$ καὶ $\Gamma = 50^\circ$. Νά εὕρητε τὰ μέτρα τῶν ἄλλων γωνιῶν του.

4. ΤΕΤΡΑΠΛΕΥΡΑ

167. Ποῖα εἶναι τὰ εἶδη τῶν τετραπλευρῶν. α') Ἐμάθομεν ὅτι αἱ ἀπέναντι πλευραὶ μιᾶς ἑδρας ἑνὸς ὀρθογωνίου παραλληλεπιπέδου εἶναι παράλληλοι. Δι' αὐτὸ κάθε ἑδρα ἀπὸ αὐτὰς λέγεται **παραλληλόγραμμον**.


Ὅμοιως, ἂν δύο παραλλήλους εὐθείας $AB, \Gamma\Delta$ τμήσωμεν μετὰ ἄλλας δύο παραλλήλους $A\Delta, B\Gamma$, σχηματίζομεν ἓν παραλληλόγραμμον $AB\Gamma\Delta$ (σχ. 63). Ὡστε :

Παραλληλόγραμμον εἶναι ἓνα τετράπλευρον μετὰ τὰς ἀπέναντι πλευρὰς παράλληλους.

β') Ἐάν τὰς παραλλήλους εὐθείας EZ καὶ ΘH τμήσωμεν μετὰ τὰς

μη παραλλήλους εὐθείας $ΕΘ$, $ΖΗ$, σχηματίζομεν ἕνα τετράπλευρον $ΕΖΗΘ$ (σχ. 63) με δύο μόνον παραλλήλους πλευράς. Τοῦτο λέγεται **τραπέζιον**. Δηλαδή :

Τραπεζίον εἶναι ἕνα τετράπλευρον με δύο παραλλήλους πλευράς.
 γ') Γράφομεν δύο μη παραλλήλους εὐθείας IK , AM καὶ τέμνομεν



Σχ. 63

αὐτὰς με δύο ἄλλας IM , KL ἐπίσης μη παραλλήλους. Σχηματίζομεν τοιουτοτρόπως ἕνα τετράπλευρον $IKLM$ (σχ. 63), τὸ ὁποῖον δὲν ἔχει παραλλήλους πλευράς. Αὐτὸ λέγεται **τραπεζοειδές**. Ὡστε :

Τραπεζοειδές εἶναι ἕνα τετράπλευρον χωρίς παραλλήλους πλευράς.

168. Ποῖα εἶναι τὰ στοιχεῖα τῶν παραλληλογράμμων καὶ τῶν τραπέζιων. Μία ἀπὸ τὰς πλευράς ἑνὸς παραλληλογράμμου ὀνομάζεται **βάσις** αὐτοῦ. Ἡ δὲ ἀπόστασις τῆς βάσεως ἀπὸ τὴν ἀπέναντι πλευρὰν λέγεται **ὑψος** αὐτοῦ. Π. χ. ἂν ἡ BA ληφθῇ ὡς **βάσις** τοῦ $ABΓΔ$ (σχ. 63), **ὑψος** αὐτοῦ θὰ εἶναι τὸ **τμήμα $ΔΠ$** .

Αἱ **παράλληλοι πλευραὶ** ἑνὸς τραπέζιου λέγονται **βάσεις** αὐτοῦ. Ἡ δὲ ἀπόστασις τῶν βάσεων τραπέζιου λέγεται **ὑψος** αὐτοῦ. Π. χ. EZ καὶ $ΘΗ$ εἶναι αἱ **βάσεις** καὶ $ΘP$ τὸ **ὑψος** τοῦ τραπέζιου $EZHΘ$ (σχ. 63).

Ἄσκησεις


181. Νὰ σχηματίσῃτε εἰς τὸ τετράδιόν σας ἀπὸ ἕνα παραλληλόγραμμον, ἀπὸ ἕνα τραπέζιον καὶ ἀπὸ ἕνα τραπεζοειδές. Ἐπειτα νὰ γράψῃτε καὶ νὰ μετρήσῃτε τὸ ὑψος τοῦ παραλληλογράμμου καὶ τοῦ τραπέζιου.

182. Νὰ σχηματίσῃτε ἀπὸ ἕνα παραλληλόγραμμον $ABΓΔ$, τὸ ὁποῖον νὰ ἔχη $A = 60^\circ$, $AB = 4$ ἑκατμ. καὶ $AD = 2$ ἑκατμ.

183. Νὰ σχηματίσῃτε εἰς τὸν πίνακα ἕνα παραλληλόγραμμον $ABΓΔ$ τὸ ὁποῖον νὰ ἔχη $A = 30^\circ$, **βάσιν** (AB) = 2 **παλάμας** καὶ **ὑψος** 12 ἑκατοστόμετρα.

184. Νὰ σχηματίσῃτε ἀπὸ ἕνα τραπέζιον $ABΓΔ$ με **βάσεις** (AB) = 8 ἑκατοστόμετρα, ($ΓΔ$) = 4 ἑκατοστόμετρα καὶ **ὑψος** νὰ εἶναι ἡ πλευρὰ AD ἴση πρὸς 2 ἑκατοστόμετρα.

69. Ποία είναι τὰ εἶδη τῶν παραλληλογράμμων. α') Αἱ ἔδραι ἐνὸς κυτίου εἶναι παραλληλόγραμμα μὲ ὀρθὰς τὰς γωνίας των.



Σχ. 64

Δι' αὐτὸ αἱ ἔδραι αὐτὰ λέγονται ὀρθογώνια παραλληλόγραμμα ἢ ἀπλῶς ὀρθογώνια.

Ὁμοίως, ἂν εἰς δύο παραλλήλους εὐθείας ΑΒ, ΔΓ φέ-

ρωμεν δύο καθέτους ΑΔ, ΒΓ, σχηματίζομεν ἓνα ὀρθογώνιον παραλληλόγραμμον ΑΒΓΔ (σχ. 64). Ὡστε :

Ὁρθογώνιον εἶναι ἓνα παραλληλόγραμμον μὲ ὀρθὰς ὅλας τὰς γωνίας του.


Κάθε ἔδρα ἐνὸς κύβου εἶναι ὀρθογώνιον μὲ ἴσας ὅλας τὰς πλευράς του. Μία τοιαύτη ἔδρα λέγεται **τετράγωνον**.

Ὁμοίως εἰς τὰς πλευράς μιᾶς ὀρθῆς γωνίας Ε ὀρίζομεν δύο ἴσα τμήματα ΕΖ, ΗΘ καὶ φέρομεν τὴν ΖΗ παράλληλον πρὸς τὴν ΕΘ, τὴν δὲ ΘΗ παράλληλον πρὸς τὴν ΕΖ. Τοιουτοτρόπως γίνεται ἓνα ὀρθογώνιον ΕΖΗΘ μὲ ἴσας τὰς πλευράς του, δηλ. ἓνα τετράγωνον (σχ. 64). Ὡστε :

Τετράγωνον εἶναι ἓνα ὀρθογώνιον μὲ ἴσας ὅλας τὰς πλευράς του.

Ἀπὸ δύο τεμνομένης πλευράς ἐνὸς ὀρθογωνίου ἢ μία εἶναι ἡ βᾶσις, ἢ δὲ ἄλλη τὸ ὕψος αὐτοῦ. Ἡ βᾶσις καὶ τὸ ὕψος ἐνὸς ὀρθογωνίου μαζὶ λέγονται **διαστάσεις** αὐτοῦ. Εἶναι δὲ φανερόν ὅτι αἱ διαστάσεις ἐνὸς τετραγώνου εἶναι ἴσαι.


β') Εἰς τὰς πλευράς μιᾶς ὀξείας γωνίας Κ ἡ ἀμβλείας, ὀρίζομεν δύο ἴσα τμήματα καὶ συνεχίζομεν ὅπως προηγουμένως. Τοιουτοτρόπως σχηματίζομεν ἓνα παραλληλόγραμμον ΚΛΜΙ (σχ. 65). Μὲ τὸν διαβήτην βεβαιούμεθα ὅτι ὅλαι αἱ πλευραὶ αὐτοῦ εἶναι ἴσαι. Μὲ τὸν γνώμονα δὲ βλέπομεν ὅτι δύο γωνίαι αὐτοῦ εἶναι ὀξείαι καὶ δύο ἀμβλείαι. Αὐτὸ λέγεται **ρόμβος**. Δηλαδή :



Σχ. 65

Ρόμβος είναι ένα παραλληλόγραμμο με ίσες όλες τās πλευράς του και με 2 όξειās και 2 άμβλειās γωνίās.

γ') Είς τās πλευράς μίξ μη όρθής γωνίās Α όρίζομεν δύο άνισα τμήματα ΑΒ, ΑΔ. Άν δέ συνεχίσωμεν, όπως προηγουμένως, σχηματίζομεν ένα



Σχ. 66

παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ (σχ. 66). Με κατάλληλα δέ όργανα βλέπομεν ότι αί πλευράί του δέν είναι όλαι ίσαι και δύο γωνίαι του είναι όξειαι και δύο άμβλειαι. Τοϋτο λέγεται **ρομβοειδής**. Δηλαδή :

Ρομβοειδής είναι ένα παραλληλόγραμμο, τοϋ όποιου αί πλευράί δέν είναι όλαι ίσαι· δύο δέ γωνίαι αϋτοϋ είναι όξειαι και δύο άμβλειαι.

Άσκήσεις

185. Νά άναγνωρίσητε ποίαι όμοιότητες και ποίαι διαφοράι μεταξύ τετραγώνου και ρόμβου προκύπτουσιν από τούς προηγουμένους όρισμούς.

186. Το αϋτό διά ρομβοειδή και όρθογώνια (μη τετράγωνα).

187. Το αϋτό διά ρόμβον και ρομβοειδής.

188. Το αϋτό διά τετράγωνον και ρομβοειδής.

70. Ποίās ιδιότητās έχουσιν όλα τὰ παραλληλόγραμμα.

α'. Με τόν διαβήτην βλέπομεν ότι είς κάθε παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ (σχ. 66) είναι $AB = \Gamma\Delta$, $AD = B\Gamma$. Δηλαδή :

Αί άπέναντι πλευράί ενός παραλληλογράμμου είναι ίσαι.

β'. Άν τās άπέναντι γωνίās Α και Γ καταστήσωμεν επίκέντρους είς ίσους κύκλους, βλέπομεν κατά τὰ γνωστά, ότι $A = \Gamma$. Όμοίως βλέπομεν ότι και $B = \Delta$. Δηλαδή :

Αί άπέναντι γωνίαι παραλληλογράμμου είναι ίσαι.

γ'. Άν συγκρίνωμεν τὰ τμήματα τών διαγωνίων ενός παραλληλογράμμου ΑΒΓΔ (σχ. 66), βλέπομεν ότι $AE = E\Gamma$ και $BE = E\Delta$. Δηλαδή :

Αί διαγώνιοι ενός παραλληλογράμμου διχοτομοϋνται.

δ'. Από ένα παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ από φύλλον χάρτου απο-

χωρίζομεν τὸ τρίγωνον ΑΒΓ. Ἄν δὲ τὸ θέσωμεν εἰς τὸ ΑΓΔ, βεβαιούμεθα ὅτι τρίγ. ΑΒΓ = τρίγ. ΑΓΔ. Ὁμοίως βλέπομεν ὅτι τρίγ. ΑΒΔ = τρίγ. ΒΓΔ. Δηλαδή :

Κάθε διαγώνιος ἑνὸς παραλληλογράμμου χωρίζει αὐτὸ εἰς ἴσα τρίγωνα.

Ἄσκησεις

189. Ἐνα παραλληλόγραμμον ΑΒΓΔ ἔχει (ΑΒ) = 0,35 μέτρον καὶ (ΒΓ) = 0,12 μέτρον. Νὰ εὑρητε τὸ μήκος τῆς περιμέτρου αὐτοῦ.

190. Νὰ σχηματίσῃτε ἕνα ὀρθογώνιον μὲ βάσιν 7 ἑκατοστόμετρα καὶ περίμετρον 24 ἑκατοστόμετρα.

191. Ἐνα ὀρθογώνιον οἰκόπεδον ἔχει περίμετρον 87,20 μέτρα καὶ βάσιν 25,40 μέτρα. Νὰ εὑρητε πόσον μήκος ἔχει τὸ ὕψος του.

192. Μία ὀρθογώνιος ἄμπελος ἔχει βάσιν 68,80 μέτρα καὶ ὕψος 24,20 μέτρα. Νὰ εὑρητε πόσον θὰ στοιχίσῃ ἡ περίφραξις αὐτῆς πρὸς 20 δρχ. τὸ μέτρον.

193. Νὰ σχηματίσῃτε ἕνα ρόμβον μὲ μίαν γωνίαν 45° καὶ πλευρὰν 4 ἑκατοστόμετρον. Ἐπειτα νὰ εὑρητε τὴν περίμετρον καὶ τὰ μέτρα τῶν ἄλλων γωνιῶν αὐτοῦ.

71. Μὲ ποίους ἄλλους τρόπους σχηματίζομεν παραλληλόγραμμον. α'. Εἰς δύο παραλλήλους εὐθείας ὀρίζομεν δύο ἴσα τμήματα ΑΒ, ΓΔ καὶ συμπληρώνομεν τὸ τετράπλευρον ΑΒΓΔ (σχ. 66). Ἐπειτα μὲ τὸν γνωστὸν (§ 36) τρόπον βεβαιούμεθα ὅτι καὶ αἱ πλευραὶ ΑΔ, ΒΓ εἶναι παράλληλοι. Τὸ ΑΒΓΔ εἶναι λοιπὸν παραλληλόγραμμον. Ἄπὸ τὴν ἐργασίαν αὐτὴν μαθαίνομεν ὅτι :

Ἄν δύο πλευραὶ ἑνὸς τετραπλεύρου εἶναι ἴσαι καὶ παράλληλοι, τοῦτο εἶναι παραλληλόγραμμον.

γ'. Εἰς μίαν ἀπὸ τὰς δύο τεμνομένης εὐθείας εἰς ἕνα σημεῖον Ε, ὀρίζομεν δύο ἴσα τμήματα ΕΑ, ΕΓ καὶ εἰς τὴν ἄλλην ἄλλα δύο ΕΒ, ΕΔ ἐπίσης ἴσα. Σχηματίζομεν ἔπειτα τὸ τετράπλευρον ΑΒΓΔ καὶ βεβαιούμεθα, ὅπως προηγουμένως, ὅτι αἱ ἀπέναντι πλευραὶ του εἶναι παράλληλοι καὶ τὸ σχῆμα ἐπομένως εἶναι παραλληλόγραμμον.

Ἄπὸ αὐτὰ μαθαίνομεν ὅτι :

Ἄν αἱ διαγώνιοι ἑνὸς τετραπλεύρου διχοτομοῦνται, αὐτὸ εἶναι παραλληλόγραμμον.

Ἄσκησεις

194. Εἰς μίαν εὐθείαν γραμμὴν τοῦ τετραδίου σας νὰ ὀρίσῃτε ἕνα σημεῖον Γ καὶ εἰς τὴν ἄλλην ἕνα τμήμα (ΑΒ) = 5 ἑκατοστόμετρα. Ἐπειτα νὰ σχηματίσῃτε ἕνα παραλληλόγραμμον ΑΒΓΔ.

195. Νά σχηματίσετε ένα παραλληλόγραμμο με μίαν διαγώνιον 12 ἑκατοστ. τὴν ἄλλην 8 ἑκατοστ. καὶ μίαν γωνίαν αὐτῶν 45° .

196. Νά γράψετε τὰς διαγωνίους ἑνὸς τετραγώνου. Ἐπειτα νά συγκρίνητε αὐτὰς καὶ νά ὀρίσητε τὸ εἶδος τῶν γωνιῶν τῶν.


197. Νά ἐπαναλάβητε τὴν ἰδίαν ἐργασίαν με ἕνα ῥόμβον.

198. Νά δηλώσητε ποίαι ὁμοιότητες καὶ ποίαι διαφοραὶ μεταξύ τῶν διαγωνίων ῥόμβου καὶ τετραγώνου προκύπτουσιν ἀπὸ τὴν λύσιν τῶν δύο προηγουμένων ἀσκήσεων.


199. Ἀπὸ τὴν τομὴν δύο εὐθειῶν νά ὀρίσητε εἰς αὐτὰς 4 ἴσα τμήματα. Ἐπειτα νά σχηματίσετε τὸ τετράπλευρον, τὸ ὅποιον ἔχει κορυφὰς τὰ ἄκρα αὐτῶν καὶ νά διακρίνητε τὸ εἶδος αὐτοῦ με τὴν βοήθειαν καταλλήλων ὀργάνων.

200. Νά ἐπαναλάβητε τὴν ἰδίαν ἐργασίαν, ἀλλὰ τὰ ἴσα τμήματα τῆς μιᾶς εὐθείας νά εἶναι μικρότερα ἀπὸ τὰ ἴσα τμήματα τῆς ἄλλης.

72. Τί εἶναι κανονικὰ σχήματα. Γνωρίζομεν ὅτι αἱ πλευραὶ




Σχ. 67 α'




Σχ. 67 β'

ἑνὸς τετραγώνου εἶναι ἴσαι καὶ αἱ γωνίαι του εἶναι ἐπίσης ἴσαι. Δι' αὐτοὺς τοὺς λόγους τὸ τετράγωνον λέγεται **κανονικὸν σχῆμα**.




Σχ. 68 α'



Σχ. 68 β'

Διὰ τοὺς ἰδίους λόγους καὶ ἓνα ἰσόπλευρον τρίγωνον εἶναι κανονικὸν σχῆμα. Ὡστε :


Ἐνα εὐθύγραμμον σχῆμα εἶναι κανονικόν, ἂν ὅλαι αἱ πλευραὶ τοῦ εἶναι ἴσαι καὶ ὅλαι αἱ γωνίαι τοῦ εἶναι ἴσαι.



Σχ. 69

Αἱ πλάκες, μετὰς τὰς ὁποίας στρώνομεν διαδρόμους, μαγειρεῖα κ.τ.λ. εἶναι κανονικὰ σχήματα. Π.χ. τὸ σχῆμα 67 α' δεικνύει ἐπίστρωσιν μετὰ τριγωνικὰς, τὸ δὲ 67 β' μετὰ τετραγωνικὰς πλάκας. Τὸ σχ. 68 α' δεικνύει στρώσιν μετὰ ἑξαγωνικὰς, τὸ δὲ 68 β' μετὰ ἑξαγωνικὰς καὶ τριγωνικὰς καὶ τὸ 69 μετὰ ὀκταγωνικὰς καὶ τετραγωνικὰς πλάκας.

73. Πῶς ἐγγράφομεν καὶ περιγράφομεν εἰς κύκλον ἓνα κανονικὸν εὐθύγραμμον σχῆμα. α') Εἰς μίαν περιφέρειαν ὀρίζομεν κατὰ σειρὰν διάφορα σημεῖα Α, Β, Γ, Δ, Ε, καὶ φέρομεν τὰς χορδὰς ΑΒ, ΒΓ, ΓΔ, ΔΕ, ΕΑ.



Σχ. 70

Τὸ εὐθύγραμμον σχῆμα ΑΒΓΔΕ λέγεται ἐγγεγραμμένον εἰς τὸν κύκλον. Ἡ δὲ περιφέρεια τοῦ κύκλου λέγεται περιγεγραμμένη περὶ τὸ ΑΒΓΔΕ (σχ. 70 α').

Ἐάν τὰ τόξα $AB, BG, ΓΔ, ΔE, EA$ εἶναι ἴσα (σχ. 70 α'), αἱ πλευραὶ τοῦ εὐθύγραμμου σχήματος $ABΓΔE$ θὰ εἶναι ἴσαι, ὡς χορδαὶ ἴσων τόξων. Καὶ αἱ γωνίαι τοῦ δὲ A, B κ.τ.λ. εἶναι ἐπίσης ἴσαι, διότι εἶναι ἐγγεγραμμένα εἰς κύκλον καὶ βαίνουν εἰς ἴσα τόξα, δηλ. εἰς τὰ $\frac{3}{5}$ τῆς περιφερείας ἢ καθὲ μία. Εἶναι λοιπὸν τοῦτο **κανονικὸν σχῆμα**.
 Ὡστε :

Διὰ τὸ ἐγγράψωμεν εἰς ἓνα κύκλον ἓν κανονικὸν εὐθύγραμμον σχῆμα, πρέπει τὸ διαιρέσωμεν τὴν περιφέρειαν εἰς ἴσα τόξα καὶ τὸ φέρωμεν τὰς χορδὰς αὐτῶν.

Τὸ κέντρον τοῦ κύκλου λέγεται καὶ κέντρον τοῦ ἐγγεγραμμένου κανονικοῦ σχήματος.

β') Ἐάν εἰς τὰ σημεῖα διαιρέσεως μιᾶς περιφερείας (σχ. 70 β') φέρομεν ἐφαπτομένας αὐτῆς, σχηματίζομεν ἓνα εὐθύγραμμον σχῆμα $ABΓΔE$. Τοῦτο λέγεται **περιγεγραμμένον** περὶ τὸν κύκλον. Ὁ δὲ κύκλος λέγεται **ἐγγεγραμμένος** εἰς τὸ $ABΓΔE$. Ἐάν τὰ τόξα τῆς περιφερείας εἶναι ἴσα, μὲ τὸν διαβήτην βλέπομεν ὅτι αἱ πλευραὶ τοῦ $ABΓΔE$ εἶναι ἴσαι καὶ αἱ γωνίαι τοῦ εἶναι ἐπίσης ἴσαι. Εἶναι λοιπὸν τὸ περιγεγραμμένον σχῆμα $ABΓΔE$ **κανονικὸν σχῆμα**.

Ἄ σ κ ή σ ε ι ς

201. Εἰς ἓνα κύκλον τὸ ἐγγράψητε ἓν τετράγωνον.

202. Εἰς ἓνα κύκλον τὸ περιγράψητε ἓν τετράγωνον καὶ τὸ συγκρίνητε τὴν πλευρὰν τοῦ πρὸς τὴν διάμετρον.

203. Νὰ εὑρητε τὸ μέτρον τῆς γωνίας ἑνὸς κανονικοῦ ὀκταγώνου καὶ ἑνὸς κανονικοῦ ἐξαγώνου.

74. Πρόβλημα I. Νὰ ἐγγράψητε εἰς ἓνα κύκλον ἓν κανονικὸν ἐξάγωνον.


Λύσις. Ἐπαναλαμβάνομεν τὴν λύσιν τῆς ἀσκήσεως 112 καὶ ἐννοοῦμεν ὅτι :

Ἡ πλευρὰ ἑνὸς ἐγγεγραμμένου εἰς κύκλον κανονικοῦ ἐξαγώνου εἶναι ἴση πρὸς τὴν ἀκτίνα τοῦ κύκλου.

Διὰ τὸ ἐγγράψωμεν λοιπὸν ἓνα κανονικὸν ἐξάγωνον, γράφομεν ἕξ διαδοχικὰς χορδὰς ἴσας πρὸς τὴν ἀκτίνα (σχ. 71 α').


75. Πρόβλημα II. Νὰ ἐγγραφῆ εἰς ἓνα κύκλον ἓνα ἰσόπλευρον τρίγωνον.

Λύσις. Διαιροῦμεν τὴν περιφέρειαν εἰς ἕξ ἴσα τόξα $ΑΔ, ΔΒ, ΒΕ, ΕΓ, ΓΖ, ΖΑ$, (σχ. 71 β') καὶ ἄγομεν τὰς χορδὰς τῶν τόξων $ΑΔΒ, ΒΕΓ, ΓΖΑ$.



α'



Σχ. 71



β'

Ἀσκήσεις

204. Εἰς ἓνα κύκλον νὰ ἐγγράψητε καὶ νὰ περιγράψητε ἀπὸ ἓνα ἰσόπλευρον τρίγωνον Ἐπειτα δὲ νὰ συγκρίνητε τὰς πλευρὰς αὐτῶν.



Σχ. 72

205. Εἰς ἓνα κύκλον νὰ ἐγγράψητε ἓνα κανονικὸν ἑξάγωνον καὶ ἓνα ἰσόπλευρον τρίγωνον. Νὰ συγκρίνητε δὲ τὴν ἀπόστασιν τοῦ κέντρου ἀπὸ τὴν πλευρὰν τοῦ ἑνὸς πρὸς τὴν πλευρὰν τοῦ ἄλλου.

205. Νὰ ἰχνογραφῆσητε τὰ σχήματα 72 τοῦ βιβλίου σας καὶ νὰ τὰ χρωματίσητε κατ' ἀρέσκειαν.

Ἐρωτήσεις

- Τί εἶναι εὐθύγραμμον σχῆμα;
 Ποῖα τὰ εἶδη τῶν τριγῶνων;
 Εἰς ποίας περιπτώσεις εἶναι δύο τρίγωνα ἴσα;

- Πώς άλλως λέγεται τὸ ἰσόπλευρον τρίγωνον καὶ διατί ;
 Πὼς εὐρίσκομεν τὸ ἄθροισμα τῶν γωνιῶν ἑνὸς εὐθυγράμμου σχήματος ;
 Ποῖα εἶναι τὰ εἶδη τῶν τετραπλευρῶν ;
 Ποῖα εἶναι τὰ εἶδη τῶν παραλληλογράμμων ;
 Τί εἶναι κανονικὸν εὐθύγραμμον σχῆμα ;
 Ποῖα τετράπλευρα καὶ ποῖα τρίγωνα εἶναι κανονικά ;
 Πὼς ἐγγράφομεν εἰς κύκλον κανονικὸν ἐξάγωνον καὶ πὼς ἔπειτα ἰσόπλευρον
 τρίγωνον ;

Ἐσκήσεις πρὸς ἐπανάληψιν τοῦ Ε' κεφαλαίου

207. Νὰ σχηματίσῃτε ἀπὸ ἓνα τρίγωνον μὲ πλευρὰς 3, 2, 2 ἑκατοστομέτρων καὶ νὰ διακρίνητε τὸ εἶδος τῶν γωνιῶν του.
208. Νὰ σχηματίσῃτε ἀπὸ ἓνα ρόμβον μὲ μίαν γωνίαν 60° καὶ πλευρὰν 0,03 μέτρου. Νὰ μετρήσῃτε ἔπειτα τὰς διαγωνίους του καὶ νὰ εὕρητε τὰ μέτρα τῶν ἄλλων γωνιῶν αὐτοῦ.
209. Ἐνα ἰσοσκελὲς τρίγωνον ἔχει περίμετρον 60,40 μέτρα καὶ βάσιν 18,60 μ. Νὰ εὕρητε τὸ μῆκος τῶν ἄλλων πλευρῶν του.
210. Ἡ ἀπέναντι τῆς βάσεως γωνία ἑνὸς ἰσοσκελοῦς τριγώνου εἶναι $86^\circ 20' 18''$. Νὰ εὕρητε τὸ μέτρον τῶν ἄλλων γωνιῶν του.
211. Νὰ σχηματίσῃτε ἓνα τετράγωνον μὲ διαγώνιον 0,06 μέτρου.
212. Νὰ σχηματίσῃτε ἓνα ρόμβον μὲ διαγωνίους 0,08 καὶ 0,06 μέτρου.
213. Νὰ διχοτομήσῃτε μίαν γωνίαν ἔπειτα νὰ γράψῃτε καὶ νὰ συγκρίνητε τὰς ἀποστάσεις ἑνὸς σημείου αὐτῆς ἀπὸ τὰς πλευρὰς αὐτῆς.
214. Νὰ ἐξετάσῃτε, ἂν ἓνα ἰσοσκελὲς ἢ ἓνα ὀρθογώνιον τρίγωνον δύναται νὰ εἶναι κανονικὸν σχῆμα.
215. Τὸ αὐτὸ δι' ἓνα ρόμβον καὶ δι' ἓνα ρομβοειδὲς.
216. Εἰς ἓνα κύκλον νὰ ἐγγράψῃτε ἓνα κανονικὸν ὀκτάγωνον.
217. Νὰ περιγράψῃτε ἓνα κανονικὸν ἐξάγωνον εἰς ἓνα κύκλον.
218. Νὰ εὕρητε τὸ μέτρον τῆς γωνίας ἑνὸς κανονικοῦ δωδεκαγώνου.

ΒΙΒΛΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄

ΜΕΤΡΗΣΙΣ ΤΩΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

76. Τί σημαίνει νὰ μετρήσωμεν μίαν ἐπιφάνειαν. Διὰ νὰ μετρήσωμεν μίαν ἐπιφάνειαν, τὴν συγκρίνομεν πρὸς μίαν ὀρισμένην ἐπιφάνειαν. Αὐτὴν τὴν λέγομεν **μονάδα τῶν ἐπιφανειῶν**.

Ἀπὸ τὴν σύγκρισιν δὲ αὐτὴν εὐρίσκομεν ἓνα ἀριθμὸν. Αὐτὸς λέγεται **ἐμβαδὸν** τῆς ἐπιφανείας καὶ φανερώνει ἀπὸ πόσας μονάδας ἢ καὶ μέρη αὐτῆς ἀποτελεῖται ἡ μετρηθεῖσα ἐπιφάνεια.

Τὸ ἐμβαδὸν μιᾶς ἐπιφανείας ΑΒΓΔ θὰ τὸ παριστάνωμεν οὕτως : (ΑΒΓΔ).

77. Ποῖαι εἶναι αἱ μονάδες τῶν ἐπιφανειῶν. Συνηθεστέρα μονὰς τῶν ἐπιφανειῶν εἶναι τὸ **τετραγωνικὸν μέτρον**.

Τοῦτο εἶναι ἓνα τετράγωνον μὲ πλευρὰν 1 μέτρον. Διαιρεῖται δὲ εἰς 100 τετράγωνα μὲ πλευρὰν 1 **παλάμη**.

Αὐτὰ λέγονται **τετραγωνικαὶ παλάμαι**. Κάθε τετραγωνικὴ παλάμη διαιρεῖται εἰς 100 τετράγωνα μὲ πλευρὰν 1 **δακτύλου** (σχ. 73).

Αὐτὰ λέγονται **τετραγωνικοὶ δάκτυλοι** ἢ **τετραγωνικὰ ἑκατοστόμετρα**. Καθὲν ἀπὸ αὐτὰ διαιρεῖται εἰς 100 **τετραγωνικὰς γραμμὰς τετραγωνικὰ χιλιοστόμετρα** ἢ (**τετ. χιλ.**). Ὡστε :

$$\begin{array}{rcl}
 1 \text{ τετρ. μετ.} & = & 100 \text{ τετρ. παλ.} = 10\,000 \text{ τετρ. ἐκ} = 1\,000\,000 \text{ τετρ. χιλ.} \\
 & & 1 \text{ τετρ. παλ.} = 100 \text{ τετρ. ἐκ.} = 10\,000 \text{ τετρ. χιλ.} \\
 & & 1 \text{ τετρ. ἐκ.} = 100 \text{ τετρ. χιλ.}
 \end{array}$$

Διὰ τὴν μέτρησιν τῶν ἀγρῶν, ἀμπέλων κ.τ.λ. οἱ ἀγρόται μεταχειρίζονται τὸ **βασιλικὸν στρέμμα** = 1000 τετραγωνικὰ μέτρα καὶ τὸ **παλαιὸν στρέμμα** = 1270 τετραγωνικὰ μέτρα.

Διὰ τὴν μέτρησιν τῶν οἰκοπέδων μεταχειριζόμεθα ἐνίοτε καὶ τὸν **τεκτονικὸν τετραγωνικὸν πῆχυν** = $\frac{9}{16}$ τετραγωνικοῦ μέτρον.

Διὰ τὰς μεγάλας ἐπιφανείας μεταχειριζόμεθα τὸ **τετραγωνικὸν χιλιόμετρον**. Αὐτὸ εἶναι ἓνα τετράγωνον μὲ πλευρὰν 1 χιλιόμετρον καὶ ἔχει 1 000 000 τετραγωνικὰ μέτρα.


78. Μέτρησις τῶν παραλληλογράμμων. Πρόβλημα 1. Νὰ εὑρεθῇ τὸ ἔμβαδὸν ἑνὸς ὀρθογωνίου, ἂν εἶναι γνωστὴ ἡ βᾶσις καὶ τὸ ὕψος αὐτοῦ.



Ἡ τετραγωνικὴ παλάμη διηρημένη εἰς 100 τετρ. δακτύλους.

Σχ. 73

Λύσις. Μετροῦμεν τὰς διαστάσεις ἑνὸς ὀρθογωνίου $AB\Gamma\Delta$ (σχ. 74) καὶ εὑρίσκομεν $(AB) = 4$ ἑκατοστόμετρα καὶ $(A\Delta) = 3$ ἑκατοστόμετρα. Ἐπειτα διαιροῦμεν τὴν βᾶσιν εἰς 4 καὶ τὸ ὕψος εἰς 3 ἴσα μέρη. Ἀπὸ δὲ τὰ σημεῖα τῆς διαιρέσεως κάθε μιᾶς φέρομεν παραλλήλους πρὸς τὴν ἄλλην. Βλέπομεν δὲ ὅτι τὸ ὀρθογώνιον διηρέθη εἰς $4 \times 3 = 12$ τετραγωνικά ἑκατοστόμετρα. Εἶναι λοιπὸν $(AB\Gamma\Delta) = 4 \times 3 = 12$ τετραγ. ἑκατοστόμετρα.



Σχ. 74

"Αν ένα ὀρθογώνιον προαύλιον ΑΒΓΔ ἔχη $(AB) = 5$ μέτρα καὶ
 $(AD) = 3$ μέτρα κατὰ τὸν ἴδιον τρόπον ἐννοοῦμεν ὅτι :
 $(ΑΒΓΔ) = 5 \times 3 = 15$ τετραγωνικὰ μέτρα.

Βλέπομεν λοιπὸν ὅτι :

Διὰ νὰ εὑρωμεν τὸ ἐμβαδὸν ἐνὸς ὀρθογωνίου, πολλαπλασιάζομεν τὴν βάσιν β ἐπὶ τὸ ὕψος υ αὐτοῦ.

Σημ. Ἡ βάση καὶ τὸ ὕψος νοοῦνται πάντοτε μετρημένα μὲ τὴν αὐτὴν μονάδα.

Εἶναι δηλαδή : $E = \beta \times \upsilon$

Ἐπειδὴ δὲ καὶ τὸ τετράγωνον εἶναι ἓνα ὀρθογώνιον, ἐννοοῦμεν ὅτι :

Διὰ νὰ εὑρωμεν τὸ ἐμβαδὸν ἐνὸς τετραγώνου, πολλαπλασιάζομεν τὸ μῆκος α τῆς πλευρᾶς του ἐπὶ α.

Εἶναι δηλαδή : $E = \alpha \times \alpha$ ἢ συντομώτερα $E = \alpha^2$. (2)

Ἀσκήσεις

219. Ἐνα ὀρθογώνιον οἰκόπεδον ἔχει βάση 25,40 μέτρα καὶ ὕψος 10 μέτρα. Νὰ εὑρητε τὸ ἐμβαδὸν αὐτοῦ.
220. Μία ὀρθογώνιος ἄμπελος ἔχει μῆκος 100 μέτρα καὶ πλάτος 32,25 μέτρα. Νὰ εὑρητε τὸ ἐμβαδὸν αὐτῆς.
221. Ὁ στίβος τοῦ σταδίου τῶν Ἀθηνῶν ἔχει μῆκος 204 μέτρα καὶ πλάτος 33 μέτρα. Νὰ εὑρητε τὸ ἐμβαδὸν αὐτοῦ.
222. Ἐνας χωρικός θέλει νὰ φυτεύσῃ μίαν ὀρθογώνιον ἄμπελον μὲ ἐμβαδὸν 600 τετραγωνικῶν μέτρων. Ἄν τὸ μῆκος αὐτῆς εἶναι 30 μέτρα, νὰ εὑρητε πόσον πρέπει νὰ εἶναι τὸ πλάτος τῆς ἀμπέλου.
223. Ἐνας γεωργὸς ἠγόρασεν ἓνα ὀρθογώνιον ἄγρον μῆκους 50 μέτρων καὶ πλάτους 30 μέτρων πρὸς 1350 δραχ. τὸ βασιλικὸν στρέμμα. Νὰ εὑρητε πόσα χρήματα ἔδωκεν.
224. Ἐνα τετραγωνικὸν οἰκόπεδον ἔχει πλευρὰν 16,40 μέτρα. Νὰ εὑρητε τὸ ἐμβαδὸν αὐτοῦ.
225. Μία τετραγωνικὴ ἄμπελος ἔχει περίμετρον 209,50 μέτρα. Νὰ εὑρητε τὸ ἐμβαδὸν αὐτῆς.
226. Ἡ αἴθουσα ὑποδοχῆς μιᾶς οἰκίας ἔχει μῆκος 5 μέτρα καὶ πλάτος 4 μέτρα. Ἡ οἰκοδέσποινα θέλει νὰ στρώσῃ αὐτὴν μὲ τάπητα πλάτους 2 μέτρων. Νὰ εὑρητε πόσα μέτρα ἀπὸ αὐτὸν πρέπει νὰ ἀγοράσῃ.

79. Πρόβλημα II. Νά εὑρεθῇ τὸ ἔμβαδὸν ἑνὸς μὴ ὀρθογωνίου παραλληλογράμμου, ἂν εἶναι γνωστὴ ἡ βάση καὶ τὸ ὕψος αὐτοῦ.

Λύσις. Μετροῦμεν τὴν βάση AB καὶ τὸ ὕψος AE ἑνὸς παραλληλογράμμου ABΓΔ (σχ. 75) καὶ εὐρίσκομεν ὅτι $(AB) = 4$ ἑκατοστόμετρα καὶ $(AE) = 2$ ἑκατοστόμετρα.

Ἄν τὸ τρίγωνον AΔE ὑποβληθῇ εἰς παράλληλον μετάθεσιν μὲ ὁδηγὸν ΔΓ, ἕως ὅτου ἡ κορυφή A φθάσῃ εἰς τὴν B, τὸ AΔE ἔρχεται εἰς τὸ BΓZ.

Τὸ δὲ παραλληλόγραμμον ABΓΔ γίνεται ὀρθογώνιον ABZE μὲ βάση (AB) καὶ ὕψος (AE) . Τοῦτο δὲ ἔχει ἔμβαδὸν $4 \times 2 = 8$ τετραγωνικὰ ἑκατοστόμετρα. Εἶναι λοιπὸν καὶ $(ABΓΔ) = 8$ τετραγωνικὰ ἑκατοστόμετρα. Ὡστε βλέπομεν πάλιν ὅτι :

Διὰ νὰ εὑρωμεν τὸ ἔμβαδὸν οἰοῦδήποτε παραλληλογράμμου, πολλαπλασιάζομεν τὴν βάση β ἐπὶ τὸ ὕψος υ αὐτοῦ.

Εἶναι δηλαδή :

$$E = \beta \times \upsilon \quad (3)$$

Τὸ παραλληλόγραμμον ABΓΔ καὶ τὸ ὀρθογώνιον ABZE λέγονται ἰσοδύναμα σχήματα, διότι ἔχουσι τὸ αὐτὸ ἔμβαδόν.

Ἀσκήσεις

227. Ἐνα παραλληλόγραμμον οἰκόπεδον ἔχει βάση 12,5 μέτρα καὶ ὕψος 5,7 μέτρα. Νά εὑρητε τὸ ἔμβαδόν αὐτοῦ.

228. Ἐνας παραλληλόγραμμος ἀγρὸς ἔχει βάση 56,4 μέτρα καὶ ὕψος 33,70 μέτρα. Νά εὑρητε τὸ ἔμβαδόν του.

229. Τὸ ἄθροισμα τῶν μηκῶν δύο ἀπέναντι πλευρῶν ἑνὸς παραλληλογράμμου κήπου εἶναι 28,45 μέτρα, ἡ δὲ ἀπόστασις αὐτῶν εἶναι 8,5 μέτρα. Νά εὑρητε τὸ ἔμβαδόν αὐτοῦ.

230. Ἐνας παραλληλόγραμμος ἀγρὸς ἔχει ἔμβαδὸν 5 βασιλικῶν στρεμμάτων καὶ βάση 100 μέτρων. Νά εὑρητε τὸ ὕψος αὐτοῦ.

80. Μέτρησις τριγώνου. Πρόβλημα III. Νά εὑρεθῇ τὸ ἔμβαδόν ἑνὸς τριγώνου ABΓ, ἂν εἶναι γνωστὴ ἡ βάση καὶ τὸ ὕψος αὐτοῦ. (Σχ. 76).

Λύσις. Διὰ μετρήσεως εὐρίσκομεν $(BG) = 3$ ἑκατοστόμετρα

καὶ $(A\Delta) = 2$ ἑκατοστόμετρα.

Ἐπειτα φέρομεν εὐθεΐαν AE

παράλληλον πρὸς τὴν BG καὶ

ἄλλην GE παράλληλον πρὸς τὴν

AB . Τὸ παραλληλόγραμμον


$ABG\Delta$ ἔχει βάσιν BG , ὕψος

$A\Delta$ καὶ ἔμβαδὸν $3 \times 2 = 6$ τε-

τραγωνικά ἑκατοστόμετρα. Ἐ-

πειδὴ δὲ $(ABG) = (ABGE) : 2$

(§ 70 δ') ἐννοοῦμεν ὅτι



Σχ. 76

$$(ABG) = \frac{3 \times 2}{2} = 3 \text{ τετραγωνικά ἑκατοστόμετρα.}$$

Βλέπομεν λοιπὸν ὅτι :

Διὰ νὰ εὐρωμεν τὸ ἔμβαδὸν E ἐνὸς τριγώνου, πολλαπλασιάζομεν τὴν βάσιν β ἐπὶ τὸ ὕψος υ αὐτοῦ, καὶ διαίρομεν τὸ γινόμενον διὰ 2.

$$\text{Εἶναι δηλαδὴ } E = \frac{\beta \times \upsilon}{2} \quad (4)$$

Ἀσκήσεις

231. Νὰ σχηματίσῃτε ἀπὸ ἓνα ὀρθογώνιον τρίγωνον μὲ καθέτους πλευρὰς 4 ἑκατοστομέτρων καὶ 3 ἑκατοστομέτρων καὶ νὰ εὐρητὴ τὸ ἔμβαδὸν του.


232. Ἡ μία ἀπὸ τὰς καθέτους πλευρὰς ἐνὸς γνόμονος εἶναι 0,3 μέτρον καὶ ἡ ἄλλη 0,15 μέτρον. Νὰ εὐρητὴ τὸ ἔμβαδὸν του.

233. Ἐνα τριγωνικὸν οἰκόπεδον μὲ βάσιν 40,80 μέτρα καὶ ὕψος 28,60 μέτρα ἐξετιμήθη πρὸς 125 δραχ. τὸ τετραγωνικὸν μέτρον. Νὰ εὐρητὴ τὴν ἀξίαν του.

81. Μέτρησις τραπεζίου. Πρόβλημα IV. Νὰ εὐρεθῇ τὸ ἔμβαδὸν ἐνὸς τραπεζίου $ABG\Delta$, ἂν εἶναι γνωστὰ αἱ βάσεις καὶ τὸ ὕψος αὐτοῦ (σχ. 77).

Λύσις. Διὰ μετρήσεως εὐρίσκομεν

ὅτι $(AB) = 6$ ἑκατοστόμετρα, $(\Delta\Gamma) = 4$ ἑκατοστόμετρα καὶ $(\Delta E) = 3$



Σχ. 77

έκατοστόμετρα. Φέρομεν ἔπειτα τὴν διαγώνιον ΒΔ καὶ βλέπομεν ὅτι
 $(AB\Delta) = \frac{6 \times 3}{2}$ καὶ $(B\Gamma\Delta) = \frac{4 \times 3}{2}$.

Ἐκ τούτων δὲ εὐρίσκομεν ὅτι $(AB\Delta\Gamma) = \frac{6 \times 3}{2} + \frac{4 \times 3}{2}$ ἢ συντομώτερα $(AB\Gamma\Delta) = \frac{6+4}{2} \times 3 = 15$ τετραγωνικὰ ἑκατοστόμετρα.


Βλέπομεν λοιπὸν ὅτι :

Διὰ τὸ νὰ εὕρωμεν τὸ ἔμβადόν ἑνὸς τραπέζιου πολλαπλασιάζομεν τὸ ἡμίθροισμα τῶν βάσεων ἐπὶ τὸ ὕψος του.


Εἶναι δηλαδὴ : $E = \frac{B+\beta}{2} \times \upsilon$ (5)

Ἀσκήσεις

234. Νὰ σχηματίσῃτε ἀπὸ ἓνα τραπέζιον μὲ βάσεις 5 ἑκατοστόμετρα καὶ 3 ἑκατοστόμετρα καὶ ὕψος 2 ἑκατοστόμετρα. Ἐπειτα δὲ νὰ εὕρητε τὸ ἔμβადόν του.



Σχ. 78 α'



Σχ. 78 β'

235. Ἐνας ἀγρὸς ἔχει σχῆμα τραπέζιου μὲ $B=85$ μέτρα, $\beta=62,5$ μέτρα καὶ $\upsilon=20$ μέτρα. Νὰ εὕρητε πόσα βασιλικά στρέμ. εἶναι τὸ ἔμβადόν του.

236. Μία ἄμπελος ἔχει σχῆμα τραπέζιου καὶ $E=1,265$ βασιλικά στρέμματα, $B=60,40$ μέτρα καὶ $\beta=40,80$ μέτρα. Νὰ εὕρητε τὸ ὕψος αὐτῆς.

237. Ἐνα οἰκόπεδον ἔχει σχῆμα τραπέζιου. Τοῦτο ἔχει $\upsilon=20$ μέτρα, $B=40$ μέτρα καὶ $\beta=30$ μέτρα. Νὰ εὕρητε τὴν ἀξίαν του πρὸς 180 δραχ. τὸ τετραγωνικὸν μέτρον.

81. Μέτρησις οἰουδήποτε εὐθυγράμμου σχήματος. Πρόβλημα V. Νὰ εὕρηθῇ τὸ ἔμβადόν ἑνὸς οἰουδήποτε εὐθυγράμμου σχήματος.

Λύσις. α'. Διαιροῦμεν τὸ εὐθύγραμμον σχῆμα εἰς τρίγωνα (σχ. 78 α' καὶ β') καὶ προσθέτομεν τὰ ἔμβαδά αὐτῶν.

β'. Φέρομεν τὴν μεγαλυτέραν διαγώνιον καὶ ἀπὸ τὰς ἄλλας κορυφὰς καθέτους εἰς αὐτὴν (σχ. 78 γ'). Ἐπειτα δὲ προσθέτομεν τὸ ἔμβαδὸν ὄλων τῶν σχημάτων, τὰ ὅποια σχηματίζονται.


Ἀσκήσεις

238. Ἡ μεγαλυτέρα διαγώνιος ἐνὸς τετραπλεύρου ἀγροῦ ἔχει μῆκος 80 μέτρα.

Μία κορυφή ἀπέχει ἀπὸ αὐτὴν 5 μέτρα καὶ ἡ ἄλλη 35 μέτρα. Νὰ εὑρηθε ἀπὸ πόσα βασιλικά στρέμματα ἀποτελεῖται ὁ ἀγρὸς αὐτός.

239. Ἐνα κανονικὸν ἐξάγωνον ἔχει πλευρὰν 0,30 μέτρον. Ἡ δὲ ἀπόστασις τοῦ κέντρου τῆς περιγεγραμμένης περιφερείας ἀπὸ τὴν πλευρὰν αὐτοῦ εἶναι 0,26 μέτρον. Νὰ εὑρηθε τὸ ἔμβαδὸν αὐτοῦ.

240. Νὰ γράψητε περιφέρειαν μὲ ἀκτῖνα 4 ἑκατοστομέτρον καὶ νὰ περιγράψητε περὶ αὐτὴν ἓν τραπέζιον. Νὰ μετρήσῃτε ἔπειτα τὰς πλευρὰς του καὶ νὰ εὑρηθε τὸ ἔμβαδὸν του



Σχ. 78 γ'


83. Τὸ Πυθαγόρειον θεώρημα. Ἐστω $ABΓ$ ἐν ὀρθογώνιον τρίγωνον καὶ $BΔEΓ$ τετράγωνον μὲ πλευρὰν τὴν ὑποτείνουσαν $BΓ$ τοῦ τριγώνου (σχ. 79 α'). Προεκτείνωμεν τὰς καθέτους πλευρὰς AB , $AΓ$ καὶ ἀπὸ τὴν κορυφὴν $Δ$ φέρομεν τὴν $HΔZ$ κάθετον ἐπὶ τὴν AB ἀπὸ δὲ τὴν κορυφὴν E φέρομεν τὴν $HEΘ$ κάθετον ἐπὶ τὴν $AΓ$.

Μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ διαβήτου καὶ τοῦ γνώμονος βεβαιούμεθα ὅτι τὸ $AZHΘ$ εἶναι τετράγωνον καὶ ὅτι $BZ = AΓ$. Ἐπομένως τοῦτο ἔχει πλευρὰν $AZ = AB + AΓ$.


Κατασκευάζομεν ἔπειτα εἰς ἓν φύλλον χάρτου ἓνα τετράγωνον $ΙΑMΓ$ μὲ πλευρὰν $ΙΑ = ΙK + KΛ = AB + AΓ$ (σχ. 79 β'). Εἶναι δὲ φανερόν ὅτι $(ΙΑMΓ) = (AZHΘ)$.

Ἄν δὲ ἐντὸς τοῦ $ΙΑMΓ$ σχηματίσωμεν τετράγωνον $ABKΙ$ μὲ πλευρὰν $IK = AB$ καὶ προεκτείνωμεν τὰς πλευρὰς AB , KB αὐτοῦ

ἐντὸς τοῦ τετραγώνου ΙΑΜΓ, σχηματίζεται τὸ τετράγωνον ΒΝΜΠ μὲ πλευρὰν ΒΠ = ΓΑ. Ἐκτὸς δὲ αὐτοῦ γίνονται καὶ δύο ὀρθογώνια



Σχ. 79 α'



Σχ. 79 β'

ΒΚΑΝ, ΑΒΠΓ. Φέρομεν ἔπειτα τὴν διαγώνιον ΚΝ τοῦ πρώτου καὶ τὴν ΒΓ τοῦ δευτέρου καὶ οὕτω σχηματίζονται τὰ ὀρθογώνια τρίγωνα 1', 2', 3', 4'. Ἄν δὲ ἀποχωρίσωμεν ταῦτα μὲ τὸ ψαλίδι μας, βλέπομεν εὐκόλως ὅτι τὸ 1' ἐφαρμόζει ἀκριβῶς εἰς τὸ 1, τὸ 2' εἰς τὸ 2 τὸ 3' εἰς τὸ 3 καὶ τὸ 4' εἰς τὸ 4.

Ἐννοοῦμεν λοιπὸν ὅτι $(ΒΓΕΔ) = (ΑΒΚΙ) + (ΒΝΜΠ)$.

ἢ $(ΒΓ)^2 = (ΑΒ)^2 + (ΑΓ)^2$ (1). Ἦτοι:

Τὸ τετράγωνον τῆς ὑποτείνουσας ἑνὸς ὀρθογωνίου τριγώνου εἶναι ἰσοδύναμον μὲ τὸ ἄθροισμα τῶν τετραγώνων τῶν καθέτων πλευρῶν αὐτοῦ.

Τὴν ιδιότητα αὐτὴν ἀνεκάλυψεν ὁ Ἕλληνας Φιλόσοφος καὶ Μαθηματικὸς Πυθαγόρας (580 — 500 π. Χ.). Διὰ τοῦτο δὲ αὕτη λέγεται Πυθαγόρειον θεώρημα.

Ἐφαρμογαί. Ἄν π. χ. $(ΑΒ) = 3$ ἑκατοστόμετρα, $(ΑΓ) = 4$ ἑκατοστόμετρα, ἢ ἰσότης (1) γίνεται $(ΒΓ)^2 = 3^2 + 4^2 = 25$ καὶ ἐπομένως $(ΒΓ) = \sqrt{25} = 5$ ἑκατοστόμετρα.

Ἄν δὲ $(ΒΓ) = 10$ ἑκατοστόμετρα, $(ΑΒ) = 6$ ἑκατοστόμετρα ἢ (1) γίνεται $10^2 = 6^2 + (ΑΓ)^2$ ἢ $100 = 36 + (ΑΓ)^2$.

Ἐπειδὴ δὲ $100 = 36 + 64$, ἐννοοῦμεν ὅτι $(ΑΓ)^2 = 64$ καὶ ἐπομένως $(ΑΓ) = \sqrt{64} = 8$ ἑκατοστόμετρα.

Άσκησης

241. Ἡ μία κάθετος πλευρά ἐνός ὀρθογωνίου τριγώνου ἔχει μήκος 12 μέτρα καί ἡ ἄλλη 9 μέτρα. Νά εὑρητε τὸ μήκος τῆς ὑποτείνουσας αὐτοῦ.

242. Ἡ ὑποτείνουσα ἐνός ὀρθογωνίου τριγώνου ἔχει μήκος 20 ἑκατοστομέτρων καί ἡ μία κάθετος πλευρά 16 ἑκατοστομέτρων. Νά εὑρητε τὸ μήκος τῆς ἄλλης καθέτου πλευρᾶς αὐτοῦ.

243. Ἐνα ὀρθογώνιον τρίγωνον ἔχει ἐμβαδὸν 150 τετραγωνικά μέτρα, ἡ δὲ μία κάθετος πλευρά αὐτοῦ ἔχει μήκος 20 μέτρα. Νά εὑρητε τὸ μήκος τῆς ἄλλης καθέτου πλευρᾶς καί τῆς ὑποτείνουσας.

244. Νά εὑρητε τὴν ἀπόστασιν τῆς κορυφῆς τῆς ὀρθῆς γωνίας τοῦ προηγούμενου τριγώνου ἀπὸ τὴν ὑποτείνουσαν αὐτοῦ.

245. Νά κατασκευάσητε ἓνα ὀρθογώνιον τρίγωνον $ΑΒΓ$ μὲ γωνίαν $B = 30^\circ$ καί ὑποτείνουσαν 10 ἑκατοστομέτρων. Νά μετρήσητε τὴν πλευρὰν $ΑΓ$ καί ἔπειτα νά ὑπολογίσητε τὸ μήκος τῆς $ΑΒ$. Μετὰ ταῦτα δὲ νά εὑρητε τὸ ἐμβαδὸν τοῦ τριγώνου τούτου καί τὴν ἀπόστασιν τῆς κορυφῆς A ἀπὸ τὴν ὑποτείνουσαν $ΒΓ$.

246. Ἡ ἀκτίς ἐνός κύκλου εἶναι 15 ἑκατοστόμετρα. Μία δὲ χορδὴ αὐτοῦ ἔχει μήκος 18 ἑκατοστομέτρων. Νά εὑρητε τὴν ἀπόστασιν τοῦ κέντρου ἀπὸ τὴν χορδὴν ταύτην.

247. Τὸ κέντρον ἐνός κύκλου ἀπέχει 16 ἑκατοστόμετρα ἀπὸ μίαν χορδὴν 24 ἑκατοστομέτρων. Νά εὑρητε πόσον εἶναι τὸ μήκος τῆς ἀκτίως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

ΜΕΤΡΗΣΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΥ

84. Πρόβλημα I. Νά εὑρεθῆ τὸ μῆκος μιᾶς περιφερείας, ἂν εἶναι γνωστὴ ἡ διάμετρος αὐτῆς.

Λύσις. Καλύπτομεν ἀκριβῶς μίαν φορὰν μὲ ἓνα λεπτὸν νῆμα τὴν περιφέρειαν ἑνὸς κύκλου ἀπὸ χονδρὸν χαρτόνι ἀκτῖνος π. χ. 5 ἑκατοστομέτρων. Μετροῦμεν τὸ νῆμα καὶ εὐρίσκομεν μῆκος 31,4 ἑκατοστόμετρα. Καὶ τὸ μῆκος τῆς περιφερείας λοιπὸν εἶναι 31,4 ἑκατοστόμετρα.

Ἡ διάμετρος δὲ εἶναι 10 ἑκατοστόμετρα. Βλέπομεν δὲ ὅτι :

$$31,4 : 10 = 3,14.$$

Ἄν ἐργασθῶμεν κατὰ τὸν ἴδιον τρόπον καὶ μὲ ἄλλας περιφερείας, π. χ. μὲ τὴν περιφέρειαν μιᾶς κυκλικῆς τραπέζης, τῆς βάσεως ἑνὸς κυλινδρικοῦ βάζου κ.λ.π., εὐρίσκομεν πηλίκον 3,14 πάντοτε. Δηλαδή :

Τὸ πηλίκον τοῦ μῆκους μιᾶς περιφερείας διὰ τοῦ μῆκους τῆς διαμέτρου τῆς εἶναι 3,14.

Ἀπὸ τοῦτο δὲ ἐννοοῦμεν ὅτι :

Διὰ νὰ εὐρωμεν τὸ μῆκος Γ περιφερείας πολλαπλασιάζομεν τὸ μῆκος δ τῆς διαμέτρου τῆς ἐπὶ 3,14.

Εἶναι δηλαδή :

$$\Gamma = \delta \times 3,14.$$

Ἄν δὲ α εἶναι τὸ μῆκος τῆς ἀκτῖνος, θὰ εἶναι

$$\delta = \alpha \times 2 \text{ καὶ } \Gamma = 2 \times \alpha \times 3,14. \quad (1)$$

Σημείωσις. Ἡ θεωρητικὴ Γεωμετρία διδάσκει ὅτι τὸ προηγούμενον πηλίκον ἔχει ἄπειρα δεκαδικὰ ψηφία. Διὰ τὰς συνήθεις ὅμως ἐφαρμογὰς ἀρκεῖ ὁ 3,14. Ἄν δὲ εἰς μερικὰ ζητήματα θέλωμεν μεγαλύτεραν ἀκρίβειαν, θεωροῦμεν ὡς πηλίκον τὸν 3,14159.

Ἄσκησεις

248. Ἡ περιφέρεια μιᾶς τραπέζης ἔχει διάμετρον 1 μέτρον. Νά εὐρητε τὸ μῆκος αὐτῆς.

249. Ἡ ἀκτίς ἑνὸς τροχοῦ εἶναι 0,8 μέτρον. Νά εὐρητε τὸ μῆκος τῆς περιφερείας του.

250. Ἐνας τροχὸς ἔχει περιφέρειαν 15,70 μέτρα. Νά εὐρητε τὸ μῆκος τῆς ἀκτῖνος αὐτοῦ.

251. Ἐνας τροχὸς μὲ μίαν στροφὴν διανύει 2,512 μέτρα. Νά εὐρητε τὸ μῆκος τῆς ἀκτῖνος του.

85. Πρόβλημα II. Νά εὑρεθῆ τὸ μῆκος ἑνὸς τόξου 50° μιᾶς περιφερείας 8 μέτρων.

Λύσις. Παρατηροῦμεν πρῶτον ὅτι τὸ ἥμισυ αὐτῆς τῆς περιφερείας θὰ ἔχη μῆκος 4 μέτρων. Τὸ τέταρτον 2 μέτρα κ.τ.λ. Δηλ. τὸ μῆκος τόξου εἶναι ἀνάλογον πρὸς τὸ μέτρον του.

Ἄπο δὲ τὴν διάταξιν

$$\begin{array}{r} \text{Τόξον } 360^\circ \text{ ἔχει μκος } 8 \text{ μέτρα} \\ \text{» } 50^\circ \text{ » » } \tau \end{array}$$

εὐρίσκομεν ὅτι $\tau = 8 \times \frac{50}{360} = 1,111$ μέτρα. Ὡστε :

Διὰ τὴν εὐρωμεν τὸ μῆκος τ ἑνὸς τόξου μ° , πολλαπλασιάζομεν τὸ μῆκος Γ ὅλης τῆς περιφερείας ἐπὶ τὸ κλάσμα $\frac{\mu}{360}$.

Εἶναι δηλαδὴ :

$$\tau = \Gamma \times \frac{\mu}{360}.$$

Ἀ σ κ ῆ σ ε ι ς

252. Νά εὑρητε τὸ μῆκος ἑνὸς τόξου 15° , ἂν ἀνήκη εἰς περιφέρειαν 40 μέτρων.

253. Μία περιφέρεια ἔχει ἀκτίνα 2,5 μέτρων. Νά εὑρητε τὸ μῆκος τόξου 28° αὐτῆς.

254. Ἐνα τόξον 35° ἔχει μῆκος 32 μέτρων. Νά εὑρητε τὸ μῆκος τῆς περιφερείας του.

89. Πρόβλημα III. Νά εὐρεθῆ τὸ ἐμβαδὸν ἑνὸς κύκλου, ἂν εἶναι γνωστὴ ἡ ἀκτίς αὐτοῦ.

Λύσις. Σχηματίζομεν μερικοὺς ἴσους κύκλους K ἀπὸ φύλλον χάρτου. Ἐπειτα ἓνα ἀπὸ αὐτοὺς διαιροῦμεν εἰς 6, ἄλλον εἰς 12, ἄλλον εἰς 24 κ.τ.λ. ἴσους τομεῖς.


Ἀποχωρίζομεν ἔπειτα τοὺς τομεῖς ἐκάστου κύκλου καὶ θέτομεν αὐτοὺς τὸν ἓνα παραπλευρῶς ἀπὸ τὸν ἄλλον, οὕτως ὥστε ἡ κορυφὴ ἐκάστου νὰ εἶναι πρὸς τὸ μέρος τῆς βάσεως τοῦ ἐπομένου. Τοιοῦτοτρόπως σχηματίζομεν τὰ σχήματα $AB\Gamma\Delta$, $EZH\Theta$, $IK\Lambda M$ κ.τ.λ. (σχ. 80).

Εἶναι δὲ φανερόν ὅτι κάθε ἓνα ἀπὸ αὐτὰ ἔχει τὸ ἴδιον ἐμβαδὸν μὲ τὸν κύκλον K , ἀπὸ τὸ ὁποῖον ἐσχηματίσθη.

Κάθε μία δὲ ἀπὸ τὰς γραμμὰς AB , EZ , IK κ.τ.λ. ἔχει τὸ ἴδιον μῆκος μὲ τὴν ἡμιπεριφέρειαν αὐτοῦ.

Μὲ μικρὰν δὲ προσοχὴν διακρίνομεν ὅτι : Ἐφ' ὅσον ὁ ἀριθμὸς

τῶν τομέων γίνεται μεγαλύτερος, τὸ σχῆμα, τὸ ὁποῖον σχηματίζεται ἀπὸ αὐτοῦς, πλησιάζει περισσότερο πρὸς ὀρθογώνιον μὲ ὕψος τὴν ἀκτίνα καὶ βάσιν ἰσομήκη πρὸς τὴν ἡμιπεριφέρειαν.



Σχ. 80

Ἐννοοῦμεν λοιπὸν ὅτι :

Διὰ νὰ εὑρωμεν τὸ ἔμβαδὸν E ἐνὸς κύκλου, πολλαπλασιάζομεν τὴν ἡμιπεριφέρειαν ἐπὶ τὴν ἀκτίνα αὐτοῦ.

Εἶναι δηλαδὴ $E = \alpha \times 3,14 \times \alpha = \alpha^2 \times 3,14$. Ἦτοι :

Διὰ νὰ εὑρωμεν τὸ ἔμβαδὸν κύκλου, πολλαπλασιάζομεν τὸ τετράγωνον τῆς ἀκτίνας αὐτοῦ ἐπὶ 3,14.

Ἄν π. χ. εἷς κύκλος ἔχη ἀκτίνα 2 μέτρων, τὸ ἔμβαδὸν αὐτοῦ θὰ εἶναι $2^2 \times 3,14 = 3,14 = 12,56$ τετραγωνικά μέτρα.

Άσκησης

255. Είς κύκλος έχει ακτίνα 3 μέτρων. Νά εὑρητε τὸ ἔμβαδὸν αὐτοῦ.
 256. Ἐνα κυκλικὸν ἀλώνιον ἔχει ἀκτίνα 5 μέτρων. Νά εὑρητε τὸ ἔμβαδὸν αὐτοῦ.
 257. Ἡ περιφέρεια ἑνὸς κύκλου ἔχει μῆκος 15,70 μέτρων. Νά εὑρητε τὸ ἔμβαδὸν τοῦ κύκλου τούτου.
 258. Ἡ ὀρχήστρα τοῦ ἀρχαίου θεάτρου τοῦ Διονύσου ἦτο κυκλικὴ μὲ διάμετρον 19,61 μέτρων. Νά εὑρητε τὸ μῆκος τῆς περιφερείας καὶ τὸ ἔμβαδὸν τοῦ κύκλου αὐτῆς.

Πρόβλημα IV. Νά εὑρεθῇ τὸ ἔμβαδὸν ἑνὸς κυκλικοῦ τομέως 45° , ὁ ὁποῖος ἀνήκει εἰς κύκλον ἀκτίνας 4 μέτρων.

Λύσις. Παρατηροῦμεν πρῶτον, ὅτι καὶ ὁ κύκλος δύναται νὰ θεωρηθῇ ὡς ἕνας κυκλικὸς τομεὺς 360° . Ἐπειτα σκεπτόμεθα, ὅπως προηγουμένως (§ 85) καὶ ἐννοοῦμεν ὅτι τὸ ἔμβαδὸν κυκλικοῦ τομέως εἶναι ἀνάλογον πρὸς τὸ μέτρον τῆς βάσεως αὐτοῦ.

Εὐρίσκομεν ἔπειτα, ὅτι ὁ κύκλος μὲ ἀκτίνα 4 μέτρων ἔχει
 $E = 50,24$ τετραγωνικὰ μέτρα
 καὶ καταρτίζομεν τὴν ἐξῆς διάταξιν :

Κυκλικὸς τομεὺς 360°	ἔχει ἔμβαδὸν	$50,24$	τ. μ.
»	»	45°	»
			ε

καὶ εὐρίσκομεν $\varepsilon = 50,24 \times \frac{45}{360} = 6,28$ τετραγωνικὰ μέτρα.

Βλέπομεν λοιπὸν ὅτι :

Διὰ νὰ εὑρωμεν τὸ ἔμβαδὸν ἑνὸς κυκλικοῦ τομέως μ° , πολλαπλασιάζομεν τὸ ἔμβαδὸν E ὅλου τοῦ κύκλου ἐπὶ τὸ κλάσμα $\frac{\mu}{360}$.

Εἶναι δηλαδὴ $\varepsilon = E \times \frac{\mu}{360}$

Σημείωσις. Γνωρίζομεν (§ 85) ὅτι τόξον 45° τῆς προηγουμένης περιφερείας ἔχει μῆκος $\tau = 2 \times 3,14 \times 4 \times \frac{45}{360}$ μέτρα.

Ἄν δὲ τὸ μῆκος τοῦτο πολλαπλασιάσωμεν ἐπὶ τὸ ἡμισυ τῆς ἀκτίνας, εὐρίσκομεν ὅτι :

$2 \times 3,14 \times 4 \times \frac{45}{360} \times \frac{4}{2} = 6,28$ δηλ. τὸ προηγούμενον ἔμβαδὸν.

Εἶναι λοιπὸν : $\varepsilon = \tau \times \frac{\alpha}{2}$.

Άσκησης

259. Εἰς κύκλος ἔχει ἔμβαδὸν 28,16 τετραγωνικῶν μέτρων. Νὰ εὑρῆτε τὸ ἔμβαδὸν κυκλικοῦ τομέως 100° αὐτοῦ.

260. Νὰ σχηματίσῃτε ἓνα ἰσόπλευρον τρίγωνον ΑΒΓ μὲ πλευρὰν 3 ἑκατοστομέτρων. Ἐπειτα νὰ γράψῃτε ἓνα τόξον μικρότερον ἡμιπεριφερείας μὲ κέντρον Α, τὸ ὁποῖον νὰ ἔχῃ χορδὴν ΒΓ. Νὰ εὑρῆτε δὲ τὸ ἔμβαδὸν τοῦ κυκλικοῦ τομέως, ὁ ὁποῖος θὰ σχηματισθῇ.

Πίναξ τύπων Β' Βιβλίου

Ε ἔμβαδὸν, Β, β βάσεις, υ ὕψος

Διὰ παραλληλόγραμμον

Διὰ τρίγωνον

Διὰ τραπέζιον

$$E = B \times \upsilon$$

$$E = \frac{B \times \upsilon}{2}$$

$$E = \frac{B + \beta}{2} \times \upsilon$$

α ἀκτίς, Γ μῆκος περιφερείας, τ μῆκος τόξου, μ μέτρον τόξου.

$$\Gamma = 2 \times 3,14 \times \alpha$$

$$\tau = \Gamma \times \frac{\mu}{360}$$

$$E = 3,14 \times \alpha^2$$

Διὰ κυκλικὸν τομέα

$$\epsilon = E \times \frac{\mu}{360} = \alpha^2 \times 3,14 \times \frac{\mu}{360} = \tau \times \frac{\alpha}{2}$$

Άσκησης πρὸς ἐπανάληψιν τοῦ Β' Βιβλίου


261. Ὁ Παρθενὼν ἔχει μῆκος 69,51 μέτρων καὶ πλάτος 30,86 μέτρων. Νὰ εὑρῆτε τὸ ἔμβαδὸν τοῦ διαπέδου αὐτοῦ.

262. Τὸ Θησεῖον ἔχει μῆκος 31,77 μέτρων καὶ πλάτος 13,73 μέτρων. Νὰ εὑρῆτε τὸ ἔμβαδὸν τοῦ διαπέδου αὐτοῦ.

263. Ἐνα ὀρθογώνιον ἀγρόκτημα ἔχει ἔμβαδὸν 3675,6 τετραγωνικῶν μέτρων καὶ βάσιν 100 μέτρων. Νὰ εὑρῆτε τὸ ὕψος καὶ τὴν περίμετρον αὐτοῦ.

264. Ἐνας ὀρθογώνιος διάδρομος ἔχει μῆκος 8 μέτρων καὶ πλάτος 5 μέτρων. Οὗτος εἶναι στρωμένος μὲ τετραγωνικὰς πλάκας μὲ πλευρὰν 2 παλαμῶν. Νὰ εὑρῆτε πόσας πλάκας ἔχει οὗτος.

265. Ἐνα ὀρθογώνιον οἰκόπεδον ἐπωλήθη πρὸς 30 δραχ. τὸν τεκτονικὸν τετραγωνικὸν πῆχυν. Τοῦτο δὲ ἔχει βάσιν 150 μέτρων καὶ πλάτος 63 μέτρων. Νὰ εὑρῆτε τὴν ἀξίαν του.



Σχ. 81

266. Τὸ τετράγωνον ΑΒΓΔ (σχ. 81) ἔχει πλευρὰν 4 ἑκατοστομέτρων. Τὰ δὲ σημεῖα Ε, Ζ, Η, Θ εἶναι μέσα τῶν πλευρῶν του. Νὰ εὕρεθῇ τὸ ἔμβασδὸν τοῦ ΕΖΗΘ.

267. Ἐνα κυκλικὸν ἀλώνιον ἔχει ἀκτίνα 3,5 μέτρα. Πρόκειται νὰ στρωθῇ με τσιμεντοκονίαμα πρὸς 10 δρχ. τὸ τετραγωνικὸν μέτρον. Νὰ εὕρητε πόσα χρήματα θὰ ἐξοδευθῶσι πρὸς τοῦτο.

268. Ἀπὸ δύο ὁμοκέντρους περιφερείας ἡ μία ἔχει ἀκτίνα 5 ἑκατοστομέτρων καὶ ἡ ἄλλη 3 ἑκατοστομέτρων. Νὰ εὕρητε τὸ ἔμβασδὸν τῆς ἐπιφανείας, ἡ ὁποία περιέχεται μεταξύ αὐτῶν.

269. Ἐνα δωμάτιον ἔχει διαστάσεις 5 μέτρα καὶ 3,60 μέτρα. Πρόκειται δὲ νὰ στρωθῇ με σανίδας καθαροῦ μήκους 1,80 μέτρων καὶ πλάτους 0,25 μέτρων. Νὰ εὕρητε πόσαι σανίδες θὰ χρειασθῶσι.

270. Οἱ ἐμπρόσθιοι τροχοὶ μιᾶς ἀμάξης κἀμνουσιν ἀπὸ 1000 στροφᾶς, ὅταν ἡ ἄμαξα διανύη 3140 μέτρα. Νὰ εὕρητε τὴν ἀκτίνα αὐτῶν τῶν τροχῶν.

271. Γύρω ἀπὸ μίαν κυκλικὴν τράπεζαν διαμέτρου 1,95 μέτρων κάθηνται 8 ἄνθρωποι. Νὰ εὕρητε πόσον μέρος τῆς περιφερείας ἀναλογεῖ διὰ κάθε ἕνα.

272. Ἐνας χωρικὸς ἠγόρασε μίαν ἄμπελον πρὸς 620 δραχ. τὸ βασιλικὸν στρέμμα. Ἡ ἄμπελος ἔχει σχῆμα τραπεζίου με ὕψος 45 μέτρων καὶ βάσεις 30 μέτρων τὴν μίαν καὶ 36 μέτρων τὴν ἄλλην. Νὰ εὕρητε πόσα χρήματα ἔδωσεν.

273. Εἰς κυκλικὸς τομεὺς 150° ἔχει ἀκτίνα 0,25 μέτρου. Νὰ εὕρητε τὸ μῆκος τῆς βάσεως καὶ τὸ ἔμβασδὸν αὐτοῦ.

274. Νὰ γράψητε μίαν περιφέρειαν με ἀκτίνα 0,25 μέτρου καὶ ἄλλην με διπλασίαν ἀκτίνα. Νὰ εὕρητε τὰ μῆκη τῶν περιφερειῶν τούτων καὶ νὰ συγκρίνητε αὐτάς.

ΣΤΕΡΕΟΜΕΤΡΙΑ

ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

1. ΘΕΣΙΣ ΕΥΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΩΝ


88. Ποῖαι αἱ θέσεις μιᾶς εὐθείας πρὸς ἓνα ἐπίπεδον.

Ἡ ἀκμὴ AB τοῦ πολυέδρου AZ (σχ. 82) κεῖται εἰς τὸ ἐπίπεδον Π . Ἡ ΘI δὲν συναντᾷ τὸ Π , ὅσον καὶ ἂν προεκταθῶσι.

Διὰ τοῦτο ἡ ΘI λέγεται παράλληλος πρὸς τὸ Π .

Ἡ ἀκμὴ $A\Theta$ ἔχει μὲ τὸ Π ἓνα μόνον κοινὸν σημεῖον A . Ἄν δὲ προεκταθῇ αὐτὴ, διαπερᾷ τὸ Π , ἥτοι τέμνει αὐτό. Τὸ σημεῖον A λέγεται πὺς τῆς εὐθείας $A\Theta$. Ὡστε :

Μία εὐθεῖα δυνατὸν νὰ εὐρίσκηται εἰς ἓνα ἐπίπεδον ἢ νὰ εἶναι παράλληλος πρὸς αὐτὸ ἢ νὰ τέμνη αὐτό.



Σχ. 82

Ἀσκήσεις

275. Νὰ δεῖξετε μέσα εἰς τὴν αἰθουσάν μας εὐθείας παράλληλους πρὸς τὸ πάτωμα καὶ ἄλλας παράλληλους πρὸς διαφόρους πλευράς τῆς αἰθούσης.

276. Νὰ τεντώσητε ἓνα νῆμα, ὥστε νὰ εἶναι παράλληλον πρὸς τὸ πάτωμα καὶ ἔπειτα πρὸς μίαν πλευρὰν τῆς αἰθούσης.

277. Νὰ τοποθετήσητε τὸν γνώμονα, ὥστε ἡ ὑποτείνουσα αὐτοῦ νὰ εἶναι παράλληλος πρὸς τὸν πίνακα. Ἐπειτα οὕτως, ὥστε αὐτὴ νὰ τέμνη τὸν πίνακα.

278. Δείξατε εὐθείας, αἱ ὁποῖαι νὰ τέμνωσι τὸ πάτωμα καὶ ἄλλας νὰ τέμνωσι μίαν πλευρὰν τῆς αἰθούσης.

89. Ποῖαι εὐθεῖαι εἶναι κάθετοι ἢ πλάγαι πρὸς ἓνα ἐπίπεδον. Μὲ τὸν γνώμονα βεβαιούμεθα, ὅτι ἡ εὐθεῖα AB τοῦ τοίχου

Και πᾶν ἐπίπεδον, τὸ ὁποῖον διέρχεται ἀπὸ μίαν κατακόρυφον, λέγεται **κατακόρυφον ἐπίπεδον**. Τὰ ἐπίπεδα T, T' (σχ. 83) π. χ. εἶναι κατακόρυφα ἐπίπεδα.

Ἄν δὲ ἓνα ἐπίπεδον εἶναι κάθετον εἰς μίαν κατακόρυφον, λέγεται **ὀριζόντιον ἐπίπεδον**. Τὸ πάτωμα Π (σχ. 83) π. χ. εἶναι ἓνα ὀριζόντιον ἐπίπεδον.

2. ΘΕΣΕΙΣ ΔΥΟ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ


91. α') Ποῖα ἐπίπεδα εἶναι παράλληλα. Ἡ ὀροφή καὶ τὸ πάτωμα ἑνὸς δωματίου οὐδέποτε συναντῶνται, ὅσον καὶ ἂν φαντασθῶμεν αὐτὰ προεκτεινόμενα. Διὰ τοῦτο αὐτὰ λέγονται **παράλληλα ἐπίπεδα**.

Ὁμοίως τὰ ἐπίπεδα Π καὶ P (σχ. 82), εἶναι παράλληλα ἐπίπεδα.

Ἡ δὲ ἀκμὴ AO , ἣτις εἶναι κάθετος ἐπὶ τὸ Π (σχ. 82), εἶναι διὰ τὸν ἴδιον λόγον κάθετος καὶ ἐπὶ τὸ P .

Ἐπειδὴ δὲ $\Theta A \perp \Theta \Delta$, $\Theta A \perp \Theta E$ κ.τ.λ., τὸ τμήμα ΘA λέγεται ἀπόστασις τῶν παραλλήλων ἐπιπέδων Π καὶ P (σχ. 82). Δηλαδή :

Ἀπόστασις δύο παραλλήλων ἐπιπέδων, λέγεται τὸ μεταξὺ αὐτῶν τμήμα μιᾶς εὐθείας καθέτου πρὸς αὐτὰ.



Ἀσκήσεις

282. Νὰ δεიξητε εἰς τὴν αἰθουσαν διάφορα ζεύγη παραλλήλων ἐπιπέδων.

283. Νὰ τοποθετήσητε τὸν γνῶμονα παραλλήλως πρὸς τὸ πάτωμα καὶ ἔπειτα πρὸς μίαν πλευρὰν τῆς αἰθούσης.

92. Ποῖα ἐπίπεδα λέγονται τεμνόμενα ἐπίπεδα. Τὰ ἐπίπεδα T καὶ T' (σχ. 82) ἔχουσι κοινὰ ὅλα τὰ σημεῖα τῆς AB . Αὐτὰ λέγονται **τεμνόμενα ἐπίπεδα** καὶ ἡ εὐθεῖα AB λέγεται **τομὴ** αὐτῶν. Δηλαδή :

Δύο ἐπίπεδα λέγονται τεμνόμενα, ἂν ἔχουσι κοινὰ σημεῖα.

Εἰς τὰ διάφορα τεμνόμενα ἐπίπεδα, τὰ ὁποῖα παρατηροῦμεν βλέπομεν ὅτι :

Ἡ τομὴ δύο ἐπιπέδων εἶναι εὐθεῖα γραμμὴ.

93. Τί εἶναι διέδρος γωνία. Τὰ τεμνόμενα ἐπίπεδα T καὶ

T' (σχ. 83) σταματῶσιν εἰς τὴν τομὴν AB αὐτῶν. Τοιοῦτοτρόπως δὲ σχηματίζουσιν ἓνα σχῆμα, τὸ ὁποῖον λέγεται **διέδρος γωνία**.

Ταύτην ὀνομάζομεν διέδρον AB ἢ $TABT'$ ἢ $T'ABT$.

Τὰ ἐπίπεδα T καὶ T' λέγονται **ἔδραι** αὐτῆς. Ἡ δὲ τομὴ AB τῶν ἐδρῶν τούτων λέγεται **ἀκμὴ** τῆς διέδρου γωνίας.

Καὶ αἱ ἔδραι $ABI\Theta$ καὶ $B\Gamma ZI$ τοῦ πολυέδρου AZ (σχ. 82) σχηματίζουσι διέδρον γωνίαν μὲ ἀκμὴν BI .

Αἱ ἔδραι T καὶ T' τῆς διέδρου AB , ἐνὸς δωματίου τέμνονται ἀπὸ τὸ πάτωμα κατὰ τὰς εὐθείας AG καὶ AD (σχ. 83). Ἐπειδὴ τὸ πάτωμα εἶναι κάθετον ἐπὶ τὴν AB , ἡ γωνία ΓAD τῶν τομῶν AG καὶ AD λέγεται **ἀντίστοιχος ἐπίπεδος τῆς διέδρου AB** .

Ἐπειδὴ δὲ $\Delta AG = 1$ ὀρθὴ καὶ ἡ διέδρος AB λέγεται **ὀρθὴ διέδρος γωνία**. Αἱ δὲ ἔδραι μιᾶς ὀρθῆς διέδρου γωνίας λέγονται **κάθετα ἐπίπεδα**.


Τὰ ἐπίπεδα λοιπὸν T καὶ T' εἶναι **κάθετα ἐπίπεδα**. Ἐπίσης τὸ T καὶ τὸ πάτωμα Π εἶναι **κάθετα ἐπίπεδα**.

Εὐκόλως βλέπομεν ὅτι μία ὀρθὴ διέδρος γωνία ἐνὸς κυτίου π. χ. εφαρμόζει ἀκριβῶς εἰς μίαν διέδρον γωνίαν ἐνὸς δωματίου. Εἶναι λοιπὸν αἱ **ὀρθαὶ διέδροι γωνία ἴσαι**.

Ἡ διέδρος γωνία BE τοῦ πολυέδρου Π (σχ. 84) καταλαμβάνει ἓνα μέρος μιᾶς ὀρθῆς διέδρου π. χ. ἐνὸς κυτίου. Εἶναι λοιπὸν διέδρος $BE < 1$ ὀρθῆς διέδρου. Λέγεται δὲ αὕτη **ὀξεῖα διέδρος γωνία** καὶ ἔχει ἀντίστοιχον ἐπίπεδον τὴν ὀξεῖαν γωνίαν ω .

Ὁμοίως βλέπομεν ὅτι διέδρος $AD < 1$ ὀρθῆς διέδρου. Λέγεται δὲ ἡ AD **ἀμβλεία διέδρος γωνία** καὶ ἔχει ἀντίστοιχον ἐπίπεδον τὴν ἀμβλείαν γωνίαν φ (σχ. 48).

Αἱ ἔδραι μιᾶς ὀξεῖας ἢ ἀμβλείας διέδρου λέγονται **πλάγια ἐπίπεδα**. Τὰ ἐπίπεδα π. χ. P καὶ Σ εἶναι πλάγια ἐπίπεδα.



Άσκησεις

284. Νά δείξετε και νά ἀριθμήσετε τὰς διέδρους γωνίας και τὰς ἀκμὰς τῆς αἰθούσης μας.

285. Νά δείξετε μίαν διεδρον γωνίαν μὲ μίαν ἑδραν τὸ πάτωμα. Ἐπειτα δὲ νά δείξετε τὴν ἀντίστοιχον ἐπίπεδον αὐτῆς.


286. Δείξατε εἰς τὴν αἰθουσαν κατακόρυφα και ὀριζόντια ἐπίπεδα. Ἐπειτα δὲ διάφορα ζεύγη καθέτων ἐπιπέδων.

287. Νά τοποθετήσετε κατακορύφως τὸ ἐπίπεδον τοῦ γνῶμονος και ἔπειτα καθέτως ἢ πλαγίως πρὸς τὸν πίνακα.

94. Ποῖον σχῆμα γίνεται ἀπὸ τρία ἢ περισσότερα τεμνόμενα ἐπίπεδα. Ἡ ὀροφή τῆς αἰθούσης μας και τὰ ἐπίπεδα Γ και Γ' αὐτῆς (σχ. 83) διέρχονται ἀπὸ ἓνα σημεῖον B και κάθε ἓνα σταματᾷ εἰς τὰς τομὰς αὐτοῦ ἀπὸ τὰ ἄλλα. Τοιοῦτοτρόπως γίνεται ἀπὸ αὐτὰ ἓνα σχῆμα, τὸ ὁποῖον λέγεται **στερεὰ γωνία**.

Τὰ τρία ἐπίπεδα, ἀπὸ τὰ ὁποῖα γίνεται αὕτη, λέγονται ἑδρα αὐτῆς και αὕτη ἰδιαιτέρως λέγεται **τρίεδρος στερεὰ γωνία**.

Τὸ κοινὸν σημεῖον B τῶν ἑδρῶν λέγεται **κορυφή** τῆς στερεᾶς γωνίας. Συνήθως μίαν στερεὰν γωνίαν ὀνομάζομεν μὲ τὸ γράμμα τῆς κορυφῆς. Εἰς τὸ πολύεδρον $KAB\Gamma\Delta$ (σχ. 85) αἱ 4 ἑδραι, αἱ ὁποῖαι διέρχονται ἀπὸ τὸ σημεῖον K , σχηματίζουν ἓνα σχῆμα, τὸ ὁποῖον ἐπίσης λέγεται στερεὰ γωνία. Αὕτη ὅμως λέγεται **τετράεδρος στερεὰ γωνία**. Ὑπάρχουσι δὲ και πεντάεδροι, ἑξάεδροι κ.τ.λ. στερεὰ γωνία.



Σχ. 85

Εἰς μίαν στερεὰν γωνίαν βλέπομεν διέδρους γωνίας, ἀκμὰς και ἐπιπέδους γωνίας. Αἱ διέδροι γωνία σχηματίζονται ἀπὸ ἑδρας τῆς στερεᾶς γωνίας. Κάθε δὲ ἐπίπεδος γωνία ἀπὸ δύο ἀκμὰς τῆς αὐτῆς ἑδρας.

Παρατηροῦμεν δὲ ὅτι αἱ ἐπίπεδοι γωνία τῆς στερεᾶς γωνίας A (σχ. 83) εἶναι και αἱ τρεῖς ὀρθαί. Δι' αὐτὸ αὕτη λέγεται **τρισορθογώνιος στερεὰ γωνία**.

Άσκήσεις

288. Να δείξετε στερεάς γωνίας μέσα εις την αΐθουσάν μας.
289. Να ονομάσητε τὰς ἐπιπέδους γωνίας μιᾶς στερεᾶς γωνίας K (σχ. 85).
290. Να ονομάσητε τὰς ἀκμὰς καὶ τὰς διέδρους γωνίας τῆς αὐτῆς στερεᾶς γωνίας K (σχ. 85).

Ἐρωτήσεις

- Ποῖα αἱ δυνατὰί θέσεις μιᾶς εὐθείας πρὸς ἓνα ἐπίπεδον ;
Ποῖα αἱ δυνατὰί θέσεις ἑνὸς ἐπιπέδου πρὸς ἄλλο ἐπίπεδον ;
Ποῖα ἐπίπεδα λέγονται παράλληλα καὶ ποῖα τεμνόμενα ;
Τί εἶναι διέδρος γωνία καὶ τί στερεὰ γωνία ;
Ποῖα ἐπίπεδα εἶναι κάθετα ;
Τί εἶναι τρισσορθογώνιος στερεὰ γωνία ;
Τί εἶναι κατακόρυφος ;
Τί εἶναι κατακόρυφα καὶ τί εἶναι ὀριζόντια ἐπίπεδα ;

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

1. ΠΟΛΥΕΔΡΑ

95. Τί εἶναι πολύεδρα καὶ ποῖα εἶναι τὰ στοιχεῖα αὐτῶν. Ἐγνωρίσαμεν ἕως τῶρα πολλὰ πολύεδρα καὶ παρατηρήσαμεν διάφορα στοιχεῖα αὐτῶν. Ὅλα αὐτά, τὰ ὁποῖα ἐμάθομεν, θὰ τὰ ἐπαναλάβωμεν συγκεντρωμένα ὡς ἑξῆς :

Πολύεδρον εἶναι ἓνα σῶμα, τὸ ὁποῖον ἀπὸ ὅλα τὰ μέρη περικλείεται ἀπὸ ἐπίπεδα.

Αὐτὰ τὰ ἐπίπεδα, ἀπὸ τὰ ὁποῖα περικλείεται ἓνα πολύεδρον, λέγονται ἔδραι αὐτοῦ.

Ἐνα πολύεδρον λοιπὸν ἔχει τεθλασμένην ἢ πολυεδρικήν ἐπιφάνειαν.

Αἱ τεμνόμεναι ἔδραι ἑνὸς πολυέδρου σχηματίζουσι τὰς διέδρους καὶ στερεὰς γωνίας αὐτοῦ.

Αἱ ἀκμαὶ καὶ αἱ κορυφαὶ αὐτῶν λέγονται ἀκμαὶ καὶ κορυφαὶ τοῦ πολυέδρου.

Αἱ γωνίαι ἐκάστης ἔδρας πολυέδρου λέγονται ἐπίπεδοι γωνίαι αὐτοῦ.

2. ΤΑ ΚΥΡΙΩΤΕΡΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΕΔΡΩΝ

Ι. ΠΡΙΣΜΑΤΑ


96. Τί εἶναι πρίσματα καὶ ποῖα εἶναι τὰ στοιχεῖα αὐτῶν. Αἱ ἔδραι E τοῦ πολυέδρου Π (σχ. 84) εἶναι παράλληλοι. Κατὰ δὲ τὸν γνωστὸν (§ 8) τρόπον βλέπομεν, ὅτι εἶναι καὶ ἴσαι. Αἱ ἄλλαι ἔδραι τοῦ πολυέδρου τούτου εἶναι παραλληλόγραμμα. Τὸ πολύεδρον τοῦτο λέγεται πρίσμα. Διὰ τοὺς ἰδίους λόγους καὶ τὸ πολύεδρον $A\Theta$ (σχ. 86) εἶναι πρίσμα. Ὡστε :

Πρίσμα εἶναι ἓνα πολύεδρον, τὸ ὁποῖον ἔχει δύο ἔδρας ἴσας καὶ παραλλήλους, αἱ δὲ ἄλλαι ἔδραι εἶναι παραλληλόγραμμα.

Αἱ ἴσαι καὶ παράλληλοι ἔδραι ἑνὸς πρίσματος λέγονται βάσεις αὐτοῦ. Ἡ δὲ ἀπόστασις τῶν βάσεων ἑνὸς πρίσματος λέγεται ὕψος αὐτοῦ. Π. χ. $AB\Gamma\Delta$ καὶ $EZH\Theta$ εἶναι αἱ βάσεις καὶ $\eta\theta$ τὸ ὕψος τοῦ πρίσματος $A\Theta$ (σχ. 86).

Τὸ πρίσμα Π (σχ. 84) ἔχει τριγωνικὰς βάσεις, λέγεται δὲ τριγωνικὸν πρίσμα.

Αἱ βάσεις τοῦ πρίσματος $ΑΘ$ (σχ. 86) εἶναι τετράπλευρα· αὐτὸ δὲ λέγεται **τετραγωνικὸν πρίσμα**.



Σχ. 86

Ὅμοίως ὑπάρχουσι **πενταγωνικά, ἑξαγωνικά** κ. τ. λ. πρίσματα, τὰ ὁποῖα ἔχουσι βάσεις πεντάγωνα, ἑξάγωνα κ.τ.λ.

Ὅσαι ἔδραι ἑνὸς πρίσματος εὐρίσκονται μεταξύ τῶν βάσεων, λέγονται **παράπλευροι ἔδραι** αὐτοῦ.

Ὅλαι αἱ παράπλευροι ἔδραι τοῦ πρίσματος Π (σχ. 84) εἶναι ὀρθογώνια. Δι' αὐτὸ λέγεται τοῦτο **ὀρθὸν πρίσμα**.


Τοῦ πρίσματος $ΑΘ$ (σχ. 86) αἱ παράπλευροι ἔδραι δὲν εἶναι ὅλαι ὀρθογώνια. Τοῦτο δὲ λέγεται **πλάγιον πρίσμα**. Ὡστε :

Ἐνα πρίσμα εἶναι ὀρθόν, ἂν ὅλαι αἱ παράπλευροι ἔδραι του εἶναι ὀρθογώνια.

Τὰ μὴ ὀρθὰ πρίσματα εἶναι **πλάγια**.

Αἱ ἄκμαι AZ, BH κ.τ.λ. τοῦ πρίσματος $ΑΘ$ (σχ. 86) περιέχονται μεταξύ τῶν βάσεων αὐτοῦ καὶ λέγονται **ἰδιαίτερώς πλευραὶ** αὐτοῦ.

Εἶναι δὲ φανερόν ὅτι μία πλευρὰ ἑνὸς ὀρθοῦ πρίσματος π. χ. τοῦ Π (σχ. 84) εἶναι καὶ ὕψος αὐτοῦ.



Σχ. 87

Ἀσκήσεις

291. Νὰ ἀριθμήσητε τὰς κορυφὰς ἑνὸς τριγωνικοῦ, ἑνὸς τετραγωνικοῦ κ.τ.λ. πρίσματος. Νὰ κάμητε δὲ ἕνα κανόνα, μὲ τὸν ὅποιον νὰ εὐρίσκωμεν ἀμέσως τὸ πλῆθος τῶν κορυφῶν τῶν πρισμάτων ἀπὸ τὸ εἶδος τῶν βάσεων αὐτοῦ.

292. Ὅμοίως διὰ τὸ πλῆθος τῶν ἄκμων τῶν πρισμάτων.

293. Ἐπίσης διὰ τὸ πλῆθος τῶν ἐδρῶν τῶν πρισμάτων.

97. Τί εἶναι **παραλληλεπίπεδα** καὶ ποῖα εἶναι τὰ εἶδη αὐτῶν. Ὅλαι αἱ ἔδραι τοῦ πρίσματος $P\Sigma$ (σχ. 87) εἶναι **παραλληλό-**


γραμμά. Λέγεται δὲ τοῦτο ἰδιαιτέρως **παραλληλεπίπεδον**. Διὰ τὸν ἴδιον λόγον καὶ τὸ πρίσμα AZ (σχ. 88) εἶναι παραλληλεπίπεδον. Ὡστε :

Παραλληλεπίπεδον εἶναι ἓνα πρίσμα, τοῦ ὁποίου ὅλαι αἱ ἔδραι εἶναι παραλληλόγραμμα.

Ὅλαι αἱ ἔδραι τοῦ παραλληλεπιπέδου AZ (σχ. 88) εἶναι ὀρθογώνια. Δι' αὐτὸ δὲ τοῦτο λέγεται ἰδιαιτέρως **ὀρθογώνιον παραλληλεπίπεδον**. Δηλαδή :

Ὁρθογώνιον παραλληλεπίπεδον εἶναι ἓνα παραλληλεπίπεδον, τοῦ ὁποίου ὅλαι αἱ ἔδραι εἶναι ὀρθογώνια.

Αἱ ἀκμαὶ AB, AΔ, AΘ ἀρχίζουσι ἀπὸ μίαν κορυφὴν A τοῦ ὀρθογωνίου παραλληλεπιπέδου AZ (σχ. 88) καὶ λέγονται **διαστάσεις** αὐτοῦ. Ἰδιαιτέρως ἡ μία (AB) λέγεται **μῆκος**, ἡ ἄλλη (AΔ) λέγεται **πλάτος** καὶ ἡ τρίτη (AΘ) εἶναι τὸ **ὑψος** αὐτοῦ.



σχ. 89

Ὅλαι αἱ ἔδραι τοῦ ὀρθογωνίου παραλληλεπιπέδου KΛ (σχ. 89) εἶναι τετράγωνα. Τοῦτο δὲ λέγεται ἰδιαιτέρως **κύβος**. Ὡστε :

Κύβος εἶναι ἓνα ὀρθογώνιον παραλληλεπίπεδον, τοῦ ὁποίου ὅλαι αἱ ἔδραι εἶναι τετράγωνα.

Μὲ τὸν διαβήτην βλέπομεν ὅτι :

Αἱ διαστάσεις ἑνὸς κύβου εἶναι ἴσαι.

Ὁμοίως ὅτι :

Ὅλαι αἱ ἀκμαὶ ἑνὸς κύβου εἶναι ἴσαι.

Ἀπὸ αὐτὸ δὲ ἐννοοῦμεν ὅτι :


Ὅλαι αἱ ἔδραι ἑνὸς κύβου εἶναι ἴσαι (§ 10).

Ἀσκήσεις

294. Νὰ ἐξετάσητε, ἂν ἓνα ὀρθογώνιον παραλληλεπίπεδον εἶναι ὀρθὸν ἢ πλάγιον πρίσμα.


295. Νὰ ἐξετάσητε, ἂν ἓνα ὀρθὸν παραλληλεπίπεδον δύναται νὰ μὴ εἶναι ὀρθογώνιον παραλληλεπίπεδον.

296. Ἐάν εἷας κύβος ἔχη ὕψος 5 ἑκατοστομέτρων, νά εὑρητε τὸ ἄθροισμα τῶν διαστάσεων αὐτοῦ.



Σχ. 90

297. Ἐάν τὸ ἄθροισμα ὄλων τῶν ἄκμῶν ἑνὸς κύβου εἶναι 0,60 μέτρου, νά εὑρητε τὸ μήκος μιᾶς ἐκ τῶν ἄκμῶν αὐτοῦ.



Σχ. 91

298. Μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ σχήματος 90 νά κάμῃτε ἕνα κύβον ἀπὸ χαρτόνι.


299. Μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ σχήματος 91 νά κάμῃτε ἕνα ὀρθογώνιον παραλληλεπίπεδον ἀπὸ χαρτόνι.

Π. ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ


98. Τί εἶναι πυραμίδες καὶ ποῖα εἶναι τὰ στοιχεῖα αὐτῶν. Τὸ πολυέδρον ΚΑΔ (σχ. 92 α') περικλείεται ἀπὸ τὰς ἔδρας

μιας στερεάς γωνίας K και από μίαν επίπεδον τομήν $ABΓΔEZ$, ή οποία τέμνει όλες τας άκμας τής K .

Αυτό τὸ πολύεδρον λέγεται ιδιαίτέρως **πυραμίς**.



Σχ. 92 α'



Σχ. 92 β'


Διὰ τὸς ίδίους λόγους και τὸ πολύεδρον Π (σχ. 92 β') εἶναι πυραμίς. Ὡστε :

Πυραμίς εἶναι ἓνα πολύεδρον, τὸ ὁποῖον περικλείεται ἀπὸ τὰς ἔδρας μιᾶς στερεᾶς γωνίας και ἀπὸ μίαν επίπεδον τομήν της, ή οποία τέμνει ὅλας τὰς άκμας αὐτῆς.

Ἡ κορυφή τῆς στερεᾶς γωνίας, ἀπὸ τὴν ὁποῖαν γίνεται μία πυραμίς, λέγεται **κορυφή** και τῆς πυραμίδος. Τὸ σημεῖον K π. χ. εἶναι κορυφή τῆς πυραμίδος $KAΔ$.

Ἡ ἔδρα $ABΓΔEZ$ κεῖται ἀπέναντι τῆς κορυφῆς και λέγεται **βάσις** τῆς πυραμίδος $KAΔ$. Ὁμοίως ή ἔδρα $ABΓ$ (σχ. 92 β') εἶναι ή **βάσις** τῆς πυραμίδος Π . Ὡστε :

Βάσις μιᾶς πυραμίδος εἶναι ή ἔδρα αὐτῆς, ή ὁποία κεῖται ἀπέναντι ἀπὸ τὴν κορυφήν της.



Σχ. 92 γ'

Ἡ πυραμὶς Π ἔχει βάσιν τὸ τρίγωνον ΑΒΓ καὶ λέγεται **τριγωνικὴ πυραμὶς**.

Ἡ Κ.ΑΒΓΔ (σχ. 92 γ') ἔχει βάσιν τὸ τετράπλευρον ΑΒΓΔ καὶ λέγεται **τετραγωνικὴ κ. τ. λ.**

Αἱ ἄλλαι ἔδραι μιᾶς πυραμίδος λέγονται **παράπλευροι ἔδραι** αὐτῆς. Π.χ. παράπλευροι ἔδραι τῆς πυραμίδος Π εἶναι τὰ τρίγωνα ΚΑΒ, ΚΒΓ, ΚΓΑ, τὰ ὅποια συναντῶνται εἰς τὴν κορυφὴν Κ τῆς πυραμίδος ταύτης. Καὶ τῶν ἄλλων πυραμίδων αἱ παράπλευροι ἔδραι εἶναι τοιαῦτα τρίγωνα.

Ἡ ἀπόστασις τῆς κορυφῆς μιᾶς πυραμίδος ἀπὸ τὴν βάσιν τῆς λέγεται **ὑψος** αὐτῆς. Π.χ. ΚΗ (σχ. 92 α') εἶναι τὸ ὑψος τῆς πυραμίδος ΚΑΔ.

Αἱ ἀκμαὶ ΚΑ, ΚΒ, ΚΓ κ.τ.λ. αἱ ὁποῖαι ἀρχίζουσι ἀπὸ τὴν κορυφὴν μιᾶς πυραμίδος, λέγονται **ἰδιαιτέρως πλευραὶ** αὐτῆς.

Ἡ βάσις ΑΒΓΔΕΖ τῆς πυραμίδος ΚΑΔ εἶναι **κανονικὸν ἐξάγωνον**, τὸ δὲ ὑψος ΚΗ συναντᾷ τὴν βάσιν εἰς τὸ κέντρον τῆς. Δι' αὐτὸ αὐτὴ λέγεται **κανονικὴ πυραμὶς**. Ὡστε :

Μία πυραμὶς εἶναι κανονικὴ, ἂν ἔχη βάσιν κανονικὸν εὐθύγραμμον σχῆμα καὶ τὸ ὑψος συναντᾷ τὴν βάσιν εἰς τὸ κέντρον τῆς.

Κάθε τριγωνικὴ πυραμὶς ἔχει 4 ἔδρας· λέγεται δὲ διὰ τοῦτο καὶ **τετράεδρον**.

Εἶναι δυνατὸν αἱ ἔδραι μιᾶς κανονικῆς τριγωνικῆς πυραμίδος νὰ εἶναι ὅλαι ἴσαι. Μία τοιαύτη πυραμὶς λέγεται **κανονικὸν τετράεδρον**. Π.χ. τὸ τετράεδρον Π εἶναι κανονικὸν (σχ. 92 β').

Ἀσκήσεις

300. Νὰ ἀριθμήσητε τὰς κορυφὰς μιᾶς τριγωνικῆς, τετραγωνικῆς κ.τ.λ. πυραμίδος καὶ νὰ κάμητε ἓνα κανόνα, μὲ τὸν ὅποιον νὰ εὐρίσκωμεν ἀμέσως τὸ πλῆθος τῶν κορυφῶν μιᾶς πυραμίδος ἀπὸ τὸ εἶδος τῆς βάσεώς τῆς.

301. Νὰ κάμητε αὐτὴν τὴν ἐργασίαν διὰ τὸ πλῆθος τῶν ἐδρῶν τῶν πυραμίδων.

302. Νὰ κάμητε ὁμοίαν ἐργασίαν διὰ τὸ πλῆθος τῶν ἀκμῶν τῶν πυραμίδων.

303. Νὰ συγκρίνητε τὴν διεδρον γωνίαν τῆς βάσεως καὶ μιᾶς παραπλευροῦς ἔδρας μιᾶς πυραμίδος πρὸς μίαν ὀρθὴν διεδρον γωνίαν π.χ. ἐνὸς κυτίου.

304. Ἡ βάσις μιᾶς πυραμίδος εἶναι κανονικὸν εὐθύγραμμον σχῆμα. Νὰ ἐξετάσητε, ἂν ἀρκῆ τοῦτο, διὰ νὰ εἶναι ἡ πυραμὶς κανονικὴ.


305. Νὰ συγκρίνητε μὲ τὸν διαβήτην τὰς πλευρὰς μιᾶς κανονικῆς πυραμίδος.

306. Νὰ συγκρίνητε ὅλας τὰς ἀκμὰς ἐνὸς κανονικοῦ τετράεδρου.


307. Τὸ ἄθροισμα τῶν ἀκμῶν ἐνὸς κανονικοῦ τετραέδρου εἶναι 0,30 μέτρου. Νὰ εὑρηθε τὸ μήκος μιᾶς ἀκμῆς του.

308. Μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ σχήματος 93 νὰ κατασκευάσητε μίαν πυραμίδα ἀπὸ χαρτόνι.

99. Πῶς δυνάμεθα νὰ σχηματίσωμεν μίαν κόλουρον πυραμίδα. Ἐπάνω εἰς τὰς παραπλεύρους ἕδρας μιᾶς πυραμίδος, π. χ. τῆς $K.AB\Gamma\Delta$ (σχ. 94 α') ἀπὸ ξύλον χαρασσομεν εὐθείας $\alpha\beta$, $\beta\gamma$, $\gamma\delta$, $\delta\alpha$,



Σχ. 93




Σχ. 94 α'

τὴν α' παράλληλον πρὸς τὴν AB , τὴν β' πρὸς τὴν $B\Gamma$ κ.τ.λ. Ἐπειτα μὲ προσοχὴν ἑναὶς ξυλουργὸς κόπτει τὴν πυραμίδα κατὰ τὴν γραμμὴν $\alpha\beta\gamma\delta$. Ἄν δὲ ἀποχωρήσωμεν τὴν πυραμίδα $K.\alpha\beta\gamma\delta$, μένει ἕνα στερεὸν $B\delta$. Αὐτὸ λέγεται **κόλουρος πυραμίδος**.

Στηρίζομεν αὐτὴν μὲ τὴν ἕδραν $AB\Gamma\Delta$ εἰς τὴν τράπεζάν μας καὶ εἰς τὴν ἕδραν $\alpha\beta\gamma\delta$ θέτομεν ἕνα μέγα ἐπίπεδον χαρτόνι. Παρατηροῦμεν δὲ ὅτι τοῦτο εἶναι παράλληλον πρὸς τὴν ἀπέναντι ἐπίπεδον ἐπιφάνειαν τῆς τράπεζης. Ἐννοοῦμεν λοιπὸν ὅτι ἡ τομὴ $\alpha\beta\gamma\delta$ εἶναι παράλληλος πρὸς τὴν ἕδραν $AB\Gamma\Delta$.

Ὁμοίως ἀπὸ τὴν ἄλλην πυραμίδα $\Lambda.\Delta E Z$ (σχ. 94 β') δυνάμεθα νὰ ἀποχωρήσωμεν μίαν πυραμίδα $\Lambda.\delta\epsilon\zeta$ καὶ μένει μία κόλουρος πυραμὶς μὲ παραλλήλους ἕδρας $\Delta E Z$ καὶ $\delta\epsilon\zeta$. Ὡστε :

Κόλουρος πυραμίδς είναι ένα μέρος πυραμίδος, τὸ ὁποῖον περιέχεται μεταξύ τῆς βάσεως καὶ μιᾶς ἐπιπέδου τομῆς αὐτῆς παραλλήλου πρὸς τὴν βάσιν τῆς.



Σχ. 94 β'

Αἱ παράλληλοι ἔδραι μιᾶς κολούρου πυραμίδος λέγονται **βάσεις** αὐτῆς.

Ἡ δὲ ἀπόστασις τῶν βάσεων λέγεται **ὑψος** τῆς κολούρου πυραμίδος.

Π. χ. ΑΒΓΔ καὶ αβγδ εἶναι αἱ βάσεις καὶ ΗΘ εἶναι τὸ ὑψος τῆς κολούρου πυραμίδος Βδ (σχ. 94 α').

Αἱ κόλουροι πυραμίδες λέγονται **τριγωνικαί**, **τετραγωνικαί**, **πενταγωνικαί** κ. τ. λ. ἂν αἱ βάσεις αὐτῶν εἶναι τρίγωνα, τετράπλευρα κλπ.


3. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΥΡΑΜΙΔΩΝ

100. Πῶς μετροῦμεν τὰς ἐπιφανείας τῶν πολυέδρων. Διὰ νὰ εὐρωμεν τὸ ἐμβαδὸν τῆς ἐπιφανείας ἐνὸς πολυέδρου, εὐρίσκομεν τὰ ἐμβαδὰ τῶν ἐδρῶν καὶ προσθέτομεν αὐτά. Ἰδιαιτέρως προσέχομεν τὰς ἀκολούθους περιπτώσεις.

101. Πρόβλημα I. Νὰ εὐρεθῇ τὸ ἐμβαδὸν τῆς παραπλεύρου ἐπιφανείας ἐνὸς ὀρθοῦ πρίσματος, ἂν εἶναι γνωστὴ ἡ περίμετρος τῆς βάσεως καὶ τὸ ὑψος αὐτοῦ.

Λύσις. Μετροῦμεν τὸ ὑψος καὶ τὰς πλευρὰς τῆς βάσεως ἐνὸς ὀρθοῦ πρίσματος (σχ. 95) καὶ εὐρίσκομεν $(ΑΔ) = 4$ ἑκατοστόμετρα, $(ΑΒ) = 2$ ἑκατ. $(ΒΓ) = 1$ ἑκατ. καὶ $(ΑΓ) = 2,5$ ἑκατ.

Ἡ περίμετρος λοιπὸν τῆς βάσεως εἶναι $2 + 1 + 2,5 = 5,5$ ἑκατ. Τὰ δὲ ἐμβαδὰ τῶν παραπλεύρων ἐδρῶν εἶναι



Σχ. 95

(ABEΔ) = 2 × 4, (BΓZE) = 1 × 4, (AΓΖΔ) = 2,5 × 4 τετ. εκατ. Ἡ παράπλευρος λοιπὸν ἐπιφάνεια ἔχει ἐμβαδὸν :

$$\varepsilon = (2 \times 4) + (1 \times 4) + (2,5 \times 4).$$

Ἐπειδὴ δὲ καὶ $(2 + 1 + 2,5) \times 4 = (2 \times 4) + (1 \times 4 + (2,5 \times 4)$, ἐννοοῦμεν ὅτι $\varepsilon = (2 + 1 + 2,5) \times 4 = 5,5 \times 4 = 22$ τετραγωνικά εκατοστόμετρα. "Ὡστε :

Διὰ τὸ εὐρωμεν τὸ ἐμβαδὸν ε τῆς παραπλεύρου ἐπιφανείας ἑνὸς ὀρθοῦ πρίσματος, πολλαπλασιάζομεν τὴν περίμετρον Π τῆς βάσεως ἐπὶ τὸ ὕψος Υ αὐτοῦ.

Εἶναι δηλ. $\varepsilon = \Pi \times \Upsilon$.

Ἄν δὲ κάθε βάσις ἔχη ἐμβαδὸν β , ὅλη ἡ ἐπιφάνεια τοῦ πρίσματος ἔχει ἐμβαδὸν :

$$E = (\Pi \times \Upsilon) + (\beta \times 2).$$


102. Πρόβλημα II. Νὰ εὑρεθῇ τὸ ἐμβαδὸν τῆς παραπλεύρου ἐπιφανείας κανονικῆς πυραμίδος, ἂν εἶναι γνωστὴ ἡ περίμετρος τῆς βάσεως καὶ τὸ ὕψος μιᾶς παραπλεύρου ἔδρας αὐτῆς.

Λύσις. Μετροῦμεν μιὰν πλευρὰν AB τῆς βάσεως μιᾶς κανονικῆς πυραμίδος (σχ. 96) καὶ εὐρίσκομεν π. χ. $(AB) = 3$ εκατοστόμετρα. Φέρομεν ἔπειτα καὶ μετροῦμεν τὰ ὕψη KH , KE , KZ , $K\Theta$ τῶν παραπλεύρων ἐδρῶν καὶ βλέπομεν ὅτι ὅλαι ἔχουσι τὸ αὐτὸ ὕψος π. χ. 5 εκατοστόμετρων. Εὐρίσκομεν λοιπὸν ὅτι $(KAB) = \frac{3 \times 5}{2}$

τετραγωνικά εκατ. καὶ ὅλη ἡ παράπλευρος ἐπιφάνεια ἔχει ἐμβαδὸν $\varepsilon = \frac{(3 \times 5)}{2} \times 4 = (3 \times 4) \times \frac{5}{2} = 30$ τετραγ.έκ. Βλέπομεν λοιπὸν ὅτι:

Διὰ τὸ εὐρωμεν τὸ ἐμβαδὸν τῆς παραπλεύρου ἐπιφανείας μιᾶς κανονικῆς πυραμίδος, πολλαπλασιάζομεν τὴν περίμετρον Π τῆς βάσεως ἐπὶ τὸ ἡμισυ τοῦ ὕψους υ μιᾶς παραπλεύρου ἔδρας τῆς.

Εἶναι δηλαδὴ : $\varepsilon = \Pi \times \frac{\upsilon}{2}$.



Σχ. 96

Διὰ τὸ εὐρωμεν δὲ τὸ ἔμβαδὸν E ὅλης τῆς ἐπιφανείας, προσθέτομεν εἰς τὸ ε τὸ ἔμβαδὸν β τῆς βάσεως.

$$\text{Εἶναι δηλαδὴ : } E = \left(\Pi \times \frac{v}{2} \right) + \beta.$$

Ἡ προηγουμένη π. χ. πυραμὶς ἔχει $E = 30 + 9 = 39$ τετραγ. ἑκατ.

Ἀσκήσεις

309. Ἐνα ὀρθὸν πρίσμα ἔχει ὕψος 7 ἑκατοστομέτρων καὶ βάσιν ἓνα τετράγωνον πλευρᾶς 4 ἑκατοστομέτρων. Νὰ εὕρητε τὸ ἔμβαδὸν τῆς ἐπιφανείας αὐτοῦ.

310. Ἐνα ὀρθὸν πρίσμα ἔχει ὕψος 5 ἑκατοστομέτρων καὶ βάσιν ὀρθογώνιον μὲ διαστάσεις 6 ἑκατοστομέτρων καὶ 4 ἑκατοστομέτρων. Νὰ εὕρητε τὸ ἔμβαδὸν τῆς ἐπιφανείας αὐτοῦ.

311. Μία στήλη ἔχει ὕψος 2,5 μέτρων καὶ βάσιν τετράγωνον μὲ πλευρὰν 0,50 μέτρον. Συνεφωνήθη δὲ νὰ ὑδροχρωματισθῇ ἡ παράπλευρος ἐπιφάνεια αὐτῆς πρὸς 1,6 δραχμὰς τὸ τετραγωνικὸν μέτρον. Νὰ εὕρητε πόσον θὰ στοιχίσῃ αὐτὸς ὁ ὑδροχρωματισμός.

312. Ἐνα ὀρθὸν πρίσμα ἔχει ὕψος 5 ἑκατοστομέτρων. Ἡ δὲ βάσις του εἶναι τετράπλευρον μὲ πλευρὰς 2, 4, 2, 3 ἑκατοστομέτρων. Νὰ ἀναπτύξητε ἐπὶ φύλλον χαρτοῦ τὴν παράπλευρον ἐπιφάνειαν αὐτοῦ. Δηλ. εἰς ἓνα φύλλον χαρτοῦ νὰ κάμητε σχῆμα, μὲ τὸ ὅποσον νὰ δύνασθε νὰ καλύψητε ἀκριβῶς τὴν παράπλευρον ἐπιφάνειαν.

103. Τί σημαίνει νὰ μετρήσωμεν ἓνα σῶμα καὶ ποῖαι εἶναι αἱ μονάδες τῶν ὄγκων. Νὰ μετρήσωμεν ἓνα σῶμα σημαίνει νὰ εὐρωμεν πόσον μέρος τοῦ διαστήματος καταλαμβάνει αὐτὸ τὸ σῶμα. Διὰ νὰ εὐρωμεν τοῦτο, πρέπει νὰ συγκρίνωμεν αὐτὸ πρὸς τὸ μέρος τοῦ διαστήματος, τὸ ὅποιον καταλαμβάνει ἓνα ὀρισμένον σῶμα.

Τὸ μέρος τοῦτο ὀνομάζομεν **μονάδα**. Ἀπὸ τὴν σύγκρισιν δὲ αὐτῆν εὐρίσκομεν ἓνα ἀριθμόν.

Αὐτὸς λέγεται **ὄγκος** τοῦ σώματος καὶ φανερώνει ἀπὸ πόσας μονάδας ἢ καὶ μέρη αὐτῆς ἀποτελεῖται τὸ μετρηθὲν σῶμα.

Αἱ δὲ μονάδες, μὲ τὰς ὁποίας ἐκφράζομεν τὸν ὄγκον, λέγονται **μονάδες ὄγκων ἢ ὀγκομετρικαὶ μονάδες**.

Συνήθεις μονάδες ὄγκων εἶναι αἱ ἑξῆς :

α) Τὸ **κυβικὸν μετρον**. Τοῦτο εἶναι ἓνας κύβος μὲ ἀκμὴν 1 μέτρον.


β) Ἡ **κυβικὴ παλάμη**. Αὐτὴ εἶναι ἓνας κύβος μὲ ἀκμὴν 1 παλάμης.

γ) Ὁ κυβικός δάκτυλος. Αὐτός εἶναι ἕνας κύβος με ἀκμὴν 1 δακτύλου.


δ) Ἡ κυβικὴ γραμμὴ. Αὐτὴ εἶναι ἕνας κύβος με ἀκμὴν 1 χιλιομέτρου.

ΕΥΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ὈΓΚΟΥ ΤΩΝ ΠΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΑΜΙΔΩΝ

104. Πρόβλημα I. Νὰ εὑρεθῇ ὁ ὄγκος ἑνὸς ὀρθογωνίου παραλληλεπιπέδου.



Σχ. 97 α'



Σχ. 97 β'

Λύσις. Ἄς ὑποθέσωμεν ὅτι ἕνα κυτίον ΒΘ ἔχει διαστάσεις $(BA) = 5$ ἐκ. $(BD) = 3$ ἐκ. καὶ $(BE) = 4$ ἐκ. (σχ. 97 α').

Γνωρίζομεν (§ 78) νὰ διαιρέσωμεν τὴν βᾶσιν ΑΒΓΔ εἰς $5 \times 3 = 15$ τετραγωνικά ἑκατοστομέτρα. Εἰς ἕκαστον ἀπὸ αὐτὰ τὰ τετράγωνα τοποθετοῦμεν ἕνα κυβικὸν δάκτυλον.

Ἀπὸ τοὺς 15 δὲ αὐτοὺς κυβικοὺς δακτύλους σχηματίζεται μία πλάξ Α'Δ' ὕψους 1 ἑκατοστομέτρου. Ἐπειδὴ δὲ τὸ ὕψος τοῦ κυτίου εἶναι 4 ἑκατοστομέτρων, χωροῦσιν εἰς αὐτὸν 4 τοιαῦται πλάκες ἢ $15 \times 4 = 60$ κυβικοὶ δάκτυλοι.

Ἄν αἱ διαστάσεις ἑνὸς ὀρθογωνίου παραλληλεπιπέδου εἶναι 3 μέτρων, 4 μέτρων, 5 μέτρων, ὁμοίως, εὐρίσκομεν ὅτι ὁ ὄγκος του εἶναι $15 \times 4 = 60$ κυβικά μέτρα. Βλέπομεν λοιπὸν ὅτι :

Διὰ νὰ εὑρωμεν τὸν ὄγκον Θ ἑνὸς ὀρθογωνίου παραλληλεπιπέδου, πολλαπλασιάζομεν τὴν βᾶσιν β ἐπὶ τὸ ὕψος υ αὐτοῦ.

Εἶναι δηλαδὴ $\Theta = \beta \times \upsilon$.

Ἐπειδὴ δὲ $\beta = 3 \times 5$, εἶναι $\Theta = 3 \times 5 \times 4$. Δηλαδὴ :

Διὰ νὰ εὑρωμεν τὸν ὄγκον Θ ἑνὸς ὀρθογωνίου παραλληλεπιπέδου,

πολλαπλασιάζομεν τὰς τρεῖς διαστάσεις α , β , γ αὐτοῦ, ὅταν εἶναι μετρημένοι μετὰ τὴν αὐτὴν μονάδα.

Εἶναι δηλαδή $\Theta = \alpha \times \beta \times \gamma$.

Ἐπειδὴ ὁ κύβος εἶναι ὀρθογώνιον παραλληλεπίπεδον, δυνάμεθα νὰ ἐφαρμόσωμεν καὶ εἰς αὐτὸν τὸν προηγούμενον κανόνα.

Ἄν π. χ. ἕνας κύβος ἔχη ἀκμὴν 4 παλάμων, θὰ ἔχη ὄγκον

$$\Theta = 4 \times 4 \times 4 = 64 \text{ κυβικὰς παλάμας. "Ὡστε :}$$

Διὰ νὰ εὑρωμεν τὸν ὄγκον Θ ἑνὸς κύβου μετὰ ἀκμὴν α , εὐρίσκομεν τὴν τρίτην δύναμιν τῆς ἀκμῆς του.

Εἶναι δηλαδή $\Theta = \alpha^3$.

Ἀπὸ αὐτὸ ἐννοοῦμεν τὰ ἑξῆς :

Ἐπειδὴ 1 μέτρον = 10 παλάμαι, τὸ κυβικὸν μέτρον ἔχει $10^3 = 1000$ κυβικὰς παλάμας. Ὁμοίως ἐννοοῦμεν ὅτι :

1 κυβ. παλ. = $10^3 = 1000$ κυβ. δακ. καὶ 1 κυβ. δάκ. = $10^3 = 1000$ κυβ. γραμ. Ὡστε :

1 κυβ. μ. = 1000 κυβ. παλ. = 1000 000 κυβ. δακ. = 1000 000 000 κυβ. γραμ.

1 κυβ. παλ. = 1000 κυβ. δακ. = 1000 000 κυβ. γραμ.

1 κυβ. δακ. = 1000 κυβ. γραμ.

Ἡ κυβικὴ παλάμη λέγεται συνήθως **κυβικὸν δεκατόμετρον**, ὁ δὲ κυβικὸς δάκτυλος λέγεται καὶ **κυβικὸν ἑκατοστόμετρον**.

Ἄσκῆσεις

313. Μία αἶθουσα ἔχει διαστάσεις, 6, 4, 5 μέτρων. Νὰ εὑρητε πόσον ὄγκον ἀέρος χωρεῖ.

314. Ἐνα κῦτιον ἔχει διαστάσεις 20, 9,5,8,5 ἑκατοστομέτρων. Νὰ εὑρητε τὸν ὄγκον τοῦ.

315. Μία δεξαμενὴ εἶναι ὀρθογώνιον παραλληλεπίπεδον μετὰ διαστάσεις 3 μέτ., 5 μέτ., 3,5 μέτ. Νὰ εὑρητε πόσον ὄγκον ὕδατος χωρεῖ.

316. Μία τετραγωνικὴ πλατεῖα ἔχει πλευρὰν 80 μέτρων. Πρόκειται δὲ νὰ στρωθῇ μετὰ σκῦρα εἰς ὕψος 0,30 μέτρου προτοῦ περάσῃ ἀπὸ αὐτὰ ὁ ὁδοστρωτήρ. Νὰ εὑρητε τὸν ὄγκον τῶν σκῦρων, τὰ ὅποια θὰ χρειασθῶσι.

317. Μία ἀποθήκη ἔχει σχῆμα ὀρθογωνίου παραλληλεπίπεδου μετὰ διαστάσεις 6 μέτρων, 4 μέτρων, 3 μέτρων. Νὰ εὑρητε πόσα κιλά σίτου χωρεῖ (1 κιλὸν = $\frac{1}{10}$ κυβικοῦ μέτρου).

318. Μία σχολικὴ αἶθουσα ἔχει διαστάσεις 6 μέτρων, 5,5 μέτρων, 5 μέτ. Εἰς αὐτὴν διδάσκονται 40 μαθηταί. Νὰ εὑρητε πόσα κυβικὰ μέτρα ἀπὸ τὸν ἀέρα αὐτῆς ἀναλογοῦσιν εἰς κάθε μαθητὴν.

105. Ποῖαι εἶναι αἱ συνηθέστεραι μονάδες βάρους. "Όλα τὰ πολιτισμένα κράτη μεταχειρίζονται τὰς ἐξῆς μονάδας βάρους :

α'. Τὸ γραμμαρίον, ἥτοι τὸ βᾶρος ἐνὸς κυβικοῦ ἑκατοστομέτρου ὕδατος (4° K ἀπεσταγμένου).

β'. Τὸ χιλιόγραμμον, ἥτοι τὸ βᾶρος μιᾶς κυβικῆς παλάμης ὕδατος (4° K ἀπεσταγμένου). Ἔχει δὲ τὸ χιλιόγραμμον 1000 γραμμάρια.

γ'. Τὸν τόννον, ἥτοι τὸ βᾶρος ἐνὸς κυβικοῦ μέτρου ὕδατος (4° K ἀπεσταγμένου). Ἔχει δὲ 1 τόννος 1000 χιλιόγραμματα ἢ 1000000 γραμμάρια.

Σύμφωνα μὲ αὐτὰ, τὰ 5 κυβικὰ ἑκατοστόμετρα ὕδατος (4° K ἀπεσταγμένου) ἔχουσι βᾶρος 5 γραμμαρίων. Ὁμοίως 20 κυβικαὶ παλάμαι τοιοῦτου ὕδατος ἔχουσι βᾶρος 20 χιλιόγραμματα καὶ 4 κυβικὰ μέτρα τοιοῦτου ὕδατος ἔχουσι βᾶρος 4 τόν. Βλέπομεν δηλ. ὅτι :

Ὁ ἀριθμός, ὁ ὁποῖος φανερώνει τὸν ὄγκον ὕδατος (4° K ἀπεσταγμένου), αὐτὸς φανερώνει καὶ τὸ βᾶρος τοῦ ὕδατος τοῦτου.

Πρέπει ὅμως νὰ προσέχωμεν εἰς τὰ ἐξῆς :

Εἰς κυβικὰ ἑκατοστόμετρα ἀντιστοιχοῦσι γραμμάρια, εἰς κυβικὰς παλάμας ἀντιστοιχοῦσι χιλιόγραμματα, εἰς κυβικὰ μέτρα ἀντιστοιχοῦσι τόννοι.

Σημείωσις : Εἰς τὸ ἐξῆς, ὕδωρ θὰ ἐννοοῦμεν τὸ ἀπεσταγμένον καὶ 4° Κελσίου.

Ἀ σ κ ῆ σ ε ι ς

319. Ἐνα δοχεῖον σχήματος ὀρθογωνίου παραλληλεπίδου ἔχει διαστάσεις 10 ἑκατοστομέτρων, 8 ἑκατοστομέτρων καὶ 15 ἑκατοστομέτρων. Νὰ εὑρητε τὸ βᾶρος τοῦ ὕδατος, τὸ ὁποῖον χωρεῖ εἰς τὸ δοχεῖον αὐτό.

320. Ἐνας τεχνίτης θέλει νὰ κάμη μίαν ὕδαταποθήκην (ντεπόζιτο) σχήματος ὀρθογωνίου παραλληλεπίδου, ἣ ὁποία νὰ χωρῇ 960 χιλιόγραμματα ὕδατος. Ἡ βάσις αὐτῆς θὰ ἔχη διαστάσεις 1,20 μέτρων καὶ 0,80 μέτρου. Νὰ εὑρητε πόσον πρέπει νὰ εἶναι τὸ βάθος αὐτῆς.

321. Ἐνα δοχεῖον ἔχει βάσιν τετράγωνον μὲ πλευρὰν 15 ἑκατοστομέτρων καὶ χωρεῖ 4,5 χιλιόγραμματα ὕδατος. Νὰ εὑρητε τὸ βάθος αὐτοῦ.

106. Τί εἶναι εἰδικὸν βᾶρος ἐνὸς σώματος. Ἐνας σιδηροῦς κύβος ἀκμῆς 5 ἑκατοστομέτρων ἔχει βᾶρος 973,75 γραμμαρίων.

Ἐἴδωρ δὲ μὲ τὸν αὐτὸν ὄγκον, δηλ. 125 κυβικῶν ἑκατοστομέτρων ἔχει βάρους 125 γραμμαρίων.

Εἶναι λοιπὸν ὁ σιδηροῦς κύβος βαρύτερος ἀπὸ τὸ ὕδωρ τοῦτο $973,75 : 125 = 7,79$ φορές.

Ὁ ἀριθμὸς 7,79 λέγεται **εἰδικὸν βᾶρος** τοῦ σιδήρου. Ὡστε :

Εἰδικὸν βᾶρος εἰς ἑνὸς σώματος, λέγεται τὸ πηλίκον, τὸ ὁποῖον εὐρίσκομεν, ἂν διαιρέσωμεν τὸ βᾶρος B ἐνὸς μέρους ἀπὸ αὐτὸ μὲ τὸ βᾶρος β ἴσου ὄγκου ὕδατος.

Εἶναι δηλαδή :

$$\epsilon = B : \beta.$$

Ἡ Φυσικὴ διδάσκει διαφόρους τρόπους, μὲ τοὺς ὁποίους εὐρίσκομεν τὰ εἰδικὰ βάρη τῶν σωμάτων. Ἀπὸ αὐτὴν δανειζόμεθα τὸν ἀκόλουθον πίνακα τῶν εἰδικῶν βαρῶν τῶν κυριωτέρων σωμάτων.

Λευκὸ χρυσοῦς	21,50	Ἐδράργυρος	13,59	Θεῖον	2,07
Χρυσὸς	19,30	Ἐλαιον	0,92	Ἰάλος	2,60
Μόλυβδος	11,35	Οἰνόπνευμα	0,974	Πτελέα	0,80
Ἄργυρος	10,45	Ἐἴδωρ	1	Ἐλάτη	0,56
Χαλκὸς	8,85	Θαλάσ. ὕδωρ	1,026	Ὄξυά	0,75
Σιδηρὸς	7,79	Πάγος	9,9167	Δρῦς	0,70
Φελλὸς	0,24	Ἀτμόσφ. ἀήρ	0,0013	Καρυδιά	0,66
		Μάρμαρον	2,65	Λεύκη	0,36

107. Πῶς σχετίζεται τὸ βᾶρος ἐνὸς σώματος μὲ τὸν ὄγκον αὐτοῦ καὶ μὲ τὸ εἰδικὸν βᾶρος αὐτοῦ. Ἀπὸ τὴν προηγουμένην ἰσότητα $973,75 : 125 = 7,79$ εὐρίσκομεν ὅτι : $973,75 = 125 \times 7,79$.

Ἐνθυμούμεθα δὲ (§ 105) ὅτι ὁ ἀριθμὸς 125 φανερώσει καὶ τὸν ὄγκον εἰς κυβικοὺς δακτύλους τοῦ ὕδατος ἢ τοῦ σιδήρου καὶ ἐννοοῦμεν ὅτι :

Διὰ τὴν εὐρωμεν τὸ βᾶρος B ἐνὸς σώματος, πολλαπλασιάζομεν τὸν ὄγκον Θ ἐπὶ τὸ εἰδικὸν βᾶρος ε αὐτοῦ.

Εἶναι δηλαδή :

$$B = \Theta \times \epsilon.$$

Ἀπὸ δὲ τὴν ἰσότητα $973,75 = 125 \times 7,79$ εὐρίσκομεν ὅτι :

$$973,75 : 7,79 = 125. \text{ Ἦτοι :}$$

Δυνάμεθα νὰ εὐρωμεν τὸν ὄγκον ἐνὸς σώματος, ἂν διαιρέσωμεν τὸ βᾶρος διὰ τοῦ εἰδικοῦ βάρους αὐτοῦ.

Εἶναι δηλαδή :

$$\Theta = B : \epsilon.$$

Εἰς αὐτάς τὰς πράξεις πρέπει νὰ ἐνθυμούμεθα ὅτι τὸ Β φανερώνει γραμμάρια, ἂν τὸ Θ φανερώνη κυβικούς δακτύλους κ. τ. λ. (§ 105).

Ἄσκησεις

322. Ἐνα κυβικὸν δοχεῖον ἔχει ἐσωτερικὴν ἀκμὴν 0,5 μέτρου. Νὰ εὑρητε τὸ βάρος τοῦ ὑδραργύρου, τὸν ὁποῖον χωρεῖ.

323. Τὸ μαρμάρινον βᾶθρον ἐνὸς ἀγάλματος ἔχει σχῆμα ὀρθογωνίου παραλληλεπιπέδου μὲ διαστάσεις 1,5 μέτρων, 1 μέτρου, 0,5 μέτρου. Νὰ εὑρητε τὸ βάρος αὐτοῦ.

324. Νὰ εὑρητε τὸ βάρος τοῦ ἀέρος, ὁ ὁποῖος εὑρίσκεται μέσα εἰς τὴν αἴθουσαν τῆς διδασκαλίας.

325. Ἐν γεωμετρικὸν σχῆμα ἀπὸ ἐλάτην ἔχει βάρος 26,8 γραμμαρίων. Νὰ εὑρητε τὸν ὄγκον του.

326. Ἐνα ποτήριον εἶναι γεμᾶτον μὲ ἔλαιον. θέτομεν μέσα εἰς αὐτὸ ἓνα σιδηροῦν κύβον μὲ ἀκμὴν 2 ἑκατοστομέτρων. Νὰ εὑρητε τὸ βάρος τοῦ ἐλαίου, τὸ ὁποῖον θὰ χυθῆ.

327. Ἐνα κυβικὸν δοχεῖον ἀκμῆς 4 ἑκατοστομέτρων χωρεῖ 60,8 γραμμ. οἴνου. Νὰ εὑρητε τὸ εἰδικὸν βάρος τοῦ οἴνου τούτου.

108. Πρόβλημα II. Νὰ εὑρεθῆ ὁ ὄγκος ἐνὸς πρίσματος, ἂν εἶναι γνωστὴ ἡ βᾶσις καὶ τὸ ὕψος αὐτοῦ.

Λύσις. Ἐνα ξύλινον ὀρθογώνιον παραλληλεπίπεδον μὲ βᾶσιν 12 τετραγωνικῶν ἑκατοστομέτρων καὶ ὕψος 8 ἑκατοστομέτρων ἔχει ὄγκον $12 \times 8 = 96$ κυβικῶν ἑκατοστομέτρων. Ἐνα ἄλλο πρῖσμα ἀπὸ τὸ αὐτὸ ξύλον ἔχει ἐπίσης βᾶσιν 12 τετραγωνικῶν ἑκατοστομέτρ. καὶ ὕψος 8 ἑκ. Θέλομεν δὲ νὰ εὑρωμεν τὸν ὄγκον αὐτοῦ.

Ἄν ζυγίσωμεν τὰ δύο αὐτὰ σώματα, εὑρίσκομεν ὅτι ἔχουσι τὸ αὐτὸ βάρος. Ἐπειδὴ δὲ ἔχουσι καὶ τὸ αὐτὸ εἰδικὸν βάρος, θὰ ἔχωσι τὸν ἴδιον ὄγκον. Δηλ. καὶ τὸ πρῖσμα ἔχει ὄγκον $12 \times 8 = 96$ κυβικῶν ἑκατοστομέτρων.

Βλέπομεν λοιπὸν ὅτι :

Διὰ νὰ εὑρωμεν τὸν ὄγκον Θ ἐνὸς πρίσματος, πολλαπλασιάζομεν τὴν βᾶσιν Β ἐπὶ τὸ ὕψος υ αὐτοῦ.

Εἶναι δηλαδή :

$$\Theta = B \times u.$$

Ἄσκησεις

328. Ἐνα πρῖσμα ἔχει βᾶσιν 20 τετραγ. ἑκατοστομέτρων καὶ ὕψος 10,5 ἑκατοστομέτρων. Νὰ εὑρητε τὸν ὄγκον αὐτοῦ.

329. Τὸ μαρμάρινον βάθρον τοῦ μνημείου τοῦ Λυσικράτους εἶναι ὀρθὸν τετραγωνικὸν πρίσμα. Τοῦτο ἔχει ὕψος 3 μέτρων καὶ βάσιν τετράγωνον μὲ πλευρὰν 4 μέτρων. Νὰ εὑρητε τὸν ὄγκον τοῦ βάθρου τούτου.

330. Ἐνα ὀρθὸν τριγωνικὸν πρίσμα ἀπὸ μάρμαρον ἔχει ὕψος 2,5 μέτρων. Ἡ δὲ βάση του εἶναι ὀρθογώνιον τρίγωνον μὲ καθέτους πλευρὰς 0,5 μέτρον κάθε μίαν. Νὰ εὑρητε μὲ πόσον βάρος πιέζεται τὸ ἔδαφος, εἰς τὸ ὅποιον στηρίζεται.

331. Ἐνα πρίσμα ἔχει ὄγκον 250 κυβικῶν παλαμῶν καὶ βάσιν 1 000 τετραγ. ἐκ. Νὰ εὑρητε πόσα μέτρα εἶναι τὸ ὕψος του.

332. Παραλληλεπίπεδον ἔχει ὄγκον 34,5 κυβικῶν ἑκατοστομέτρων καὶ ὕψος 10 ἐκ. Νὰ εὑρητε τὸ ἔμβαδὸν τῆς βάσεώς του.

109. Πρόβλημα III. Νὰ εὑρεθῇ ὁ ὄγκος μιᾶς πυραμίδος, ἂν εἶναι γνωστὴ ἡ βάση καὶ τὸ ὕψος της.

Λύσις. Ἐνα ξύλινον πρίσμα μὲ βάσιν 12 τετραγωνικῶν ἑκατοστομέτρων καὶ ὕψος 6 ἐκ. ἔχει ὄγκον $12 \times 6 = 72$ κυβικῶν ἐκ. Μία πυραμὶς ἀπὸ τὸ ἴδιον ξύλον ἔχει ἐπίσης βάσιν 12 τετρ. ἐκ. καὶ ὕψος 6 ἐκ. Θέλομεν δὲ νὰ εὑρωμεν τὸν ὄγκον αὐτῆς.

Πρὸς τοῦτο ζυγίζομεν καὶ τὰ δύο αὐτὰ σώματα καὶ εὐρίσκομεν ὅτι τὸ πρίσμα ἔχει τριπλάσιον βάρος ἀπὸ τὴν πυραμίδα. Ἐπειδὴ δὲ ἔχουσι τὸ αὐτὸ εἰδικὸν βάρος, ἐννοοῦμεν ὅτι ὁ ὄγκος τῆς πυραμίδος εἶναι τὸ τρίτον τοῦ ὄγκου τοῦ πρίσματος, δηλ.

$$\frac{12 \times 6}{3} = 24 \text{ κυβ. ἐκ.}$$

Βλέπομεν λοιπὸν ὅτι :

Διὰ νὰ εὑρωμεν τὸν ὄγκον Θ μιᾶς πυραμίδος, πολλαπλασιάζομεν τὴν βάση B ἐπὶ τὸ ὕψος της u καὶ τὸ γινόμενον διαιροῦμεν διὰ 3.

$$\text{Εἶναι δηλαδή: } \Theta = \frac{B \times u}{3}$$

Ἐσκήσεις

333. Μία πυραμὶς ἔχει ὕψος 0,20 μέτ. καὶ βάσιν ὀρθογώνιον μὲ διαστάσεις 0,12 μέτρ. καὶ 0,30 μέτρ. Νὰ εὑρητε τὸν ὄγκον αὐτῆς.

334. Μία πυραμὶς ἔχει ὕψος 1,5 μέτρων καὶ βάσιν τετράγωνον μὲ πλευρὰν 0,6 μέτρον. Νὰ εὑρητε τὸν ὄγκον αὐτῆς.

335. Μία πυραμὶς ἀπὸ ἐλάτην ἔχει ὕψος 6 ἑκατοστομέτρων καὶ βάσιν ὀρθογώνιον τρίγωνον μὲ καθέτους πλευρὰς 4 ἑκατοστομέτρων καὶ 3 ἑκατοστομέτρων. Νὰ εὑρητε τὸ βάρος αὐτῆς.

336. Μία πυραμὶς ἔχει ὄγκον 50 κυβικῶν ἑκατοστομέτρων καὶ βάσιν 20 τετραγ. ἑκατοστομέτρων. Νὰ εὑρητε τὸ ὕψος αὐτῆς.

Ἑρωτήσεις

- Τί είναι πολυέδρον ;
Ποία είναι τὰ κυριότερα στοιχεῖα ἑνὸς πολυέδρου ;
Τί είναι πρίσμα ;
Εἰς ποῖα εἶδη διαιροῦνται αἱ ἑδραι ἑνὸς πρίσματος ;
Ποία πρίσματα εἶναι ὀρθά καὶ ποῖα εἶναι πλάγια ;
Τί είναι παραλληλεπίπεδον ;
Τί είναι ὀρθογώνιον παραλληλεπίπεδον ;
Τί είναι πυραμὶς καὶ ποῖα τὰ στοιχεῖα μιᾶς πυραμίδος ;
Ποῖαι πυραμίδες λέγονται κανονικαί ;
Τί είναι κανονικὸν τετράεδρον ;

Πίναξ τύπων Γ' κεφαλαίου

Υ ὕψος

ε ἔμβαδὸν παραπλεύρου ἐπιφανείας

Π Περὶμετρος βάσεως

υ ὕψος μιᾶς παραπλεύρου ἑδρας κανονικῆς πυραμίδος

B ἔμβαδὸν βάσεως

α, β, γ, αἱ διαστάσεις ὀρθογωνίου παραλληλεπιπέδου

Διὰ ὀρθὸν πρίσμα

$$\varepsilon = \Pi \times \Upsilon$$

Διὰ κανονικὴν πυραμίδα

$$\varepsilon = \Pi \times \frac{\upsilon}{2}$$

Διὰ ὀρθογώνιον παραλληλεπίπεδον

$$\Theta = \alpha \times \beta \times \gamma = B \times \upsilon$$

Διὰ πᾶν πρίσμα

$$\Theta = B \times \upsilon$$

Διὰ πυραμίδα

$$\Theta = \frac{B \times \upsilon}{3}$$

Ἀσκήσεις πρὸς ἐπανάληψιν Β' κεφαλαίου

337. Μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ σχήματος 98 (σελ. 125) νὰ κάμῃτε ἓνα τριγωνικὸν πρίσμα ἀπὸ χαρτόνι.

338. Μία στήλη ἔχει ὕψος 2,50 μέτρων καὶ βάσιν τετράγωνον μὲ πλευρὰν 0,40 μέτρον. Νὰ εὑρητὲ πόσον ὕφασμα πλάτους 0,40 μέτρον χρειάζεται, διὰ νὰ καλυφθῇ ἡ παράπλευρος ἐπιφάνεια αὐτῆς.

339. Μία δεξαμενὴ ἔχει σχῆμα ὀρθογωνίου παραλληλεπιπέδου. Τὸ στόμιον αὐτῆς ἔχει διαστάσεις 3,5 μέτρ. καὶ 2,5 μέτρ. Νὰ εὑρητὲ πόσον βάθος πρέπει νὰ ἔχη, διὰ νὰ χωρῇ 3,5 τόνν. ὕδατος.


340. Ἐνα κιβώτιον ἔχει ἐσωτερικὸν μήκος 2,20 μέτρων, πλάτος 1 μέτρον καὶ

ὕψος 0,70 μέτρου. Τοῦτο εἶναι γεμᾶτον με πλάκας σάπωνος. Κάθε δὲ πλάξ ἔχει μήκος 0,14 μέτρου, πλάτος δὲ καὶ ὕψος 0,05 μέτρου. Νὰ εὑρητε πόσας πλάκας ἔχει

341. Εἰς ἓνα δοχεῖον γεμᾶτον με ὕδωρ βυθίζεται ἓνας χάλκινος κύβος με ἀκμὴν 3 ἑκατοστομέτρων. Νὰ εὑρητε τὸ βάρος τοῦ ὕδατος, τὸ ὁποῖον θὰ χυθῆ.

342. Μία ὁμάς ἐργατῶν ἔσκαψε μίαν τάφρον μήκους 30 μέτρων, πλάτους 0,80 μέτρου καὶ βάθους 2 μέτρων. Εἶχον δὲ συμφωνήσει νὰ πληρωθῶσι 10 δραχμᾶς κατὰ

κυβικὸν μέτρον. Νὰ εὑρητε πόσα χρήματα ἔλαβον.



Σχ. 98

343. Ἐνα πρίσμα καὶ μία πυραμὶς ἀπὸ τὸ αὐτὸ ξύλον ἔχουσιν ἰσοδυνάμους βάσεις καὶ ἴσα βάρη. Τὸ δὲ πρίσμα ἔχει ὕψος 3 ἑκατοστομέτρων. Νὰ εὑρητε τὸ ὕψος τῆς πυραμίδος.

344. Τὸ ἐμβαδὸν τῆς παραπλεύρου ἐπιφανείας μιᾶς τετραγωνικῆς κανονικῆς πυραμίδος εἶναι 14,4 τετραγωνικῶν

ἑκατοστομέτρων. Ἡ δὲ πλευρὰ τῆς βάσεως ἔχει μήκος 2 ἑκατοστομέτρων. Νὰ εὑρητε τὴν ἀπόστασιν τῆς κορυφῆς αὐτῆς ἀπὸ μίαν πλευρὰν τῆς βάσεώς της.

345. Ἐνας κρουνοὸς ἀποδίδει 2 κυβικὰ ἑκατοστόμετρα ὕδατος κατὰ δευτερόλεπτον. Νὰ εὑρητε εἰς πόσον χρόνον γεμίζει οὗτος μίαν δεξαμενὴν με διαστάσεις 3,5 μέτρων, 3 μέτρων, 2,5 μέτρων.

346. Τὸ ὕδωρ τοῦ προηγουμένου ζητήματος εἶναι τῆς δεξαμενῆς τοῦ Μαραθῶνος καὶ κοστίζει 3 δραχ. κατὰ κυβικὸν μέτρον. Νὰ εὑρητε πόσα χρήματα θὰ χρειασθῶσι, διὰ νὰ γεμίση ἐκείνη ἡ δεξαμενὴ.

347. Ἐνα τεμάχιον θείου ἔχει βάρος 24,84 χιλιόγραμμα. Νὰ εὑρητε τὸν ὄγκον του.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Γ'

ΣΤΕΡΕΑ ΕΚ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

Α'. ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ

110. Πώς γεννᾶται ἓνας κύλινδρος. Σχηματίζομεν ἓνα ὀρθογώνιον $ΑΒΓΔ$ ἀπὸ χονδρὸν χαρτόνι ἢ καὶ ἀπὸ λεπτὴν σανίδα, ὅπως π.χ. τὸ κάλυμμα τοῦ κυτίου μὲ τὰς κιωλίας (σχ. 99). Τοποθετοῦμεν δὲ αὐτὸ οὕτως, ὥστε μίαν πλευρὰν $ΑΔ$ αὐτοῦ νὰ εἶναι ἐπάνω εἰς τὸ τραπέζι μας, αἱ δὲ $ΑΒ$ καὶ $ΓΔ$ νὰ εἶναι κάθετοι ἐπ' αὐτό.

Ἐπειτα κρατοῦμεν τὴν πλευρὰν $ΑΒ$ ἀκίνητον καὶ στρέφομεν περίξ αὐτῆς καὶ πρὸς τὸ αὐτὸ μέρος τὸ ὀρθογώνιον, ἕως ὅτου γυρίσῃ εἰς τὴν πρώτην θέσιν του.

Αἱ θέσεις, ἀπὸ τὰς ὁποίας θὰ περάσῃ τοῦτο, ὄλαι μαζὶ ἀποτελοῦσιν ἓνα στερεὸν σχῆμα.

Τοῦτο λέγεται κύλινδρος. Ὡστε :

Κύλινδρος εἶναι ἓνα στερεόν, τὸ ὁποῖον σχηματίζεται ἀπὸ ἓνα ὀρθογώνιον, ἂν στραφῇ περὶ μίαν ἀκίνητον πλευρὰν του καὶ κατὰ τὴν αὐτὴν φορὰν, ἕως ὅτου γυρίσῃ εἰς τὴν πρώτην θέσιν του.


Ἡ ἀκίνητος πλευρὰ $ΑΒ$ τοῦ ὀρθογωνίου λέγεται ὕψος ἢ καὶ ἄξων τοῦ κυλίνδρου.

Αἱ κάθετοι εἰς τὸν ἄξωνα πλευραὶ $ΑΔ$ καὶ $ΒΓ$ γράφουσι δύο ἴσους καὶ παραλλήλους κύκλους. Οὗτοι εἶναι κάθετοι ἐπὶ τὸν ἄξωνα καὶ λέγονται **βάσεις** τοῦ κυλίνδρου.

Μεταξὺ τῶν βάσεων ἑνὸς κυλίνδρου ὑπάρχει μία καμπύλη ἐπιφάνεια. Αὕτη λέγεται ἰδιαιτέρως **κυρτὴ ἐπιφάνεια** τοῦ κυλίνδρου. Γράφεται δὲ αὕτη ἀπὸ τὴν πλευρὰν $ΓΔ$ τοῦ ὀρθογωνίου ἢ ὁποία εἶναι ἀπέναντι τοῦ ἄξονος. Διὰ τοῦτο δὲ ἡ $ΓΔ$ λέγεται **γενέτειρα** τῆς κυρτῆς ἐπιφανείας.

Ἡ ἐπιφάνεια λοιπὸν τοῦ κυλίνδρου εἶναι **μεικτὴ ἐπιφάνεια**.

Ἄν ἀπὸ ἓνα κύλινδρον ἀπὸ ἴσα μεταλλικὰ νομίσματα ἀφαιρέσωμεν μερικά, παρουσιάζεται ἓνας κύκλος $Ε$ (σχ. 100) κάθετος εἰς τὸν ἄξωνα καὶ ἴσος πρὸς μίαν βάσιν του.




Σχ. 99

Ἐννοοῦμεν λοιπὸν ὅτι :

Ἡ τομὴ ἑνὸς κυλίνδρου ἀπὸ ἑνα ἐπίπεδον κάθετον ἐπὶ τὸν ἄξονα εἶναι κύκλος ἴσος πρὸς τὴν βάσιν του.

Ἄν κόψωμεν ἕνα κύλινδρον μὲ ἕνα ἐπίπεδον, τὸ ὁποῖον διέρχεται ἀπὸ τὸν ἄξονα, βλέπομεν ὅτι :

Ἡ τομὴ εἶναι ἕνα ὀρθογώνιον ΘΙΚΛ διπλάσιον ἐκείνου, ἀπὸ τὸ ὁποῖον παρήχθη ὁ κύλινδρος.



Σχ. 100

ΜΕΤΡΗΣΙΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ

111. Πρόβλημα I. Νὰ εὑρεθῇ τὸ ἔμβαδὸν τῆς κυρτῆς ἐπιφανείας ἑνὸς κυλίνδρου.

Λύσις. Περιτυλίσσομεν μίαν φορὰν τὴν κυρτὴν ἐπιφάνειαν ἑνὸς κυλίνδρου μὲ ἕνα λεπτὸν φύλλον χάρτου. Ἄν δὲ ἀνοίξωμεν πάλιν τὸ φύλλον τοῦτο, βλέπομεν ὅτι εἶναι ἕνα ὀρθογώνιον ΔΓΖΕ, τὸ ὁποῖον ἔχει ὕψος ΓΔ δηλ. τὸ ὕψος π. χ. 5 ἑκατοστομέτρων τοῦ κυλίνδρου (σχ. 101).

Τὸ ὀρθογώνιον τοῦτο εἶναι τὸ ἀνάπτυγμα τῆς κυρτῆς ἐπιφανείας καὶ ἔχει τὸ αὐτὸ ἔμβαδὸν μὲ αὐτὴν. Ἐχει λοιπὸν ἡ κυρτὴ ἐπιφάνεια ἔμβαδόν, $\epsilon = (\Delta E) \times 5$. Ἐπειδὴ δὲ ἡ ΔΕ ἐκάλυπτε προηγουμένως τὴν περιφέρειαν τῆς βάσεως ἀκριβῶς, ἔχει μῆκος ἴσον μὲ τὸ μῆκος Γ τῆς περιφερείας ταύτης.

Εἶναι λοιπὸν $\epsilon = \Gamma \times 5$. Δηλαδή :

Λιὰ νὰ εὑρωμεν τὸ ἔμβαδὸν τῆς κυρτῆς ἐπιφανείας ἑνὸς κυλίνδρου, πολλαπλασιάζομεν τὸ μῆκος τῆς περιφερείας τῆς βάσεως ἐπὶ τὸ ὕψος ν αὐτοῦ.

Ἄν ἡ βάσις τοῦ κυλίνδρου ἔχη ἀκτῖνα α , θὰ εἶναι :

$$\Gamma = 2 \times \alpha \times 3,14 \text{ καὶ } \epsilon = 2 \times \alpha \times 3,14 \times \nu.$$

Ὅλη δὲ ἡ ἐπιφάνεια τοῦ κυλίνδρου ἔχει ἔμβαδόν :


$$E = (2 \times \alpha \times 3,14 \times \nu) + 2\alpha^2 \times 3,14$$

ἢ συντομώτερον : $E = 2 \times \alpha \times 3,14 \times (\alpha + \nu)$.

Ἄν π. χ. $\alpha = 2$ ἑκατοστόμετρα, $\nu = 5$ ἑκατοστόμετρα, θὰ εἶναι $\epsilon = 2 \times 2 \times 3,14 \times 5 = 62,8$ τετ. ἐκ. καὶ $E = 2 \times 2 \times 3,14 \times 7 = 87,92$ τ. ἐκ.

Άσκήσεις

348. Ένας κύλινδρος έχει ύψος 8 εκατοστομέτρων και βάσεις με ακτίνα 2 εκατοστομέτρων. Να εϋρητε τὸ ἔμβαδὸν τῆς κυρτῆς ἐπιφανείας του καὶ ἔπειτα ὅλης τῆς ἐπιφανείας.



Σχ. 101

349. Μία κυλινδρική στήλη έχει ύψος 2,5 μέτρων και βάσεις με ακτίνα 0,30 μέτρον. Να εϋρητε πόσον θὰ στοιχίση ὁ ὕδροχρωματισμὸς αὐτῆς πρὸς 16 δραχμὰς τὸ τετραγωνικὸν μέτρον.

350. Ἡ κυρτὴ ἐπιφάνεια ἑνὸς κυλίνδρου ἔχει ἔμβαδὸν 314 τετραγωνικὸν εκατοστομέτρων καὶ ἡ ἀκτίς τῶν βάσεων εἶναι 5 εκατοστόμετρα. Να εϋρητε τὸ ὕψος τοῦ κυλίνδρου τούτου.

351. Τὸ οἶκημα, εἰς τὸ ὁποῖον στεγάζεται τὸ μεγαλύτερον ἀπὸ τὰ τηλεσκόπια τοῦ Ἀστεροσκοπείου τῶν Ἀθηνῶν ἀποτελεῖται ἀπὸ ἕνα κυλινδρικὸν πύργον μὲ ἐσωτερικὴν διάμετρον 7,40 μέτρων καὶ ὕψος 2,8 μέτρων. Καλύπτεται δὲ οὗτος ἀπὸ ἕνα περιστρεφόμενον θόλον. Να εϋρητε τὸ ἔμβαδὸν τῆς ἐσωτερικῆς κυρτῆς ἐπιφανείας τοῦ πύργου τούτου ἄνευ τοῦ θόλου.

112. Πρόβλημα II. Να εϋρεθῇ ὁ ὄγκος ἑνὸς κυλίνδρου, ἂν εἶναι γνωστὴ ἡ βᾶσις καὶ τὸ ὕψος αὐτοῦ.

Λύσις. Ἐνας κύλινδρος ἀπὸ πτελέαν μὲ ὕψος 10 εκατοστομέτρων καὶ βᾶσιν μὲ διάμετρον 5 εκατοστομέτρων ἔχει βάρος 157 γραμμῶν. Ἐπειδὴ δὲ τὸ εἰδικὸν βᾶρος τῆς πτελέας εἶναι 0,8 ὁ κύλινδρος ἔχει ὄγκον $\Theta = 157 : 0,8 = 196,25$ κυβικῶν εκατοστομέτρων. Ἡ βᾶσις δὲ τοῦ κυλίνδρου τούτου ἔχει ἔμβαδὸν

$$\left(\frac{5}{2}\right)^2 \times 3,14 = 19,625.$$

καὶ παρατηροῦμεν, ὅτι $19,625 \times 10 = 196,25$.

Βλέπομεν λοιπόν, ότι :

Διὰ τὰ εὐρωμεν τὸν ὄγκον Θ ἐνὸς κυλίνδρου, πολλαπλασιάζομεν τὴν βάσιν β ἐπὶ τὸ ὕψος υ αὐτοῦ.

Εἶναι δηλαδὴ : $\Theta = \beta \times \upsilon$.

*Ἄν λοιπὸν ἓνας κύλινδρος ἔχη βάσεις μὲ ἀκτῖνα α , θὰ εἶναι

$$\beta = \alpha^2 \times 3,14 \text{ καὶ } \Theta = \alpha^2 \times 3,14 \times \upsilon.$$

Ἄ σ κ ή σ ε ι ς

352. Ἐνας κύλινδρος ἔχει ὕψος 4 ἑκατοστομέτρων καὶ βάσεις μὲ ἀκτῖνα 2,4 ἑκατοστομέτρων. Νὰ εὕρητε τὸν ὄγκον του.

353. Ἐνα κυλινδρικόν δοχεῖον ἔχει ὕψος 20 ἑκατοστομέτρων καὶ πυθμένα μὲ διάμετρον 20 ἑκατοστομέτρων. Νὰ εὕρητε τὸ βάρος τοῦ ἐλαίου, τὸ ὁποῖον χωρεῖ.

354. Ἐνας κύλινδρος ἔχει ὄγκον 79,65 κυβικῶν μέτρων καὶ βάσιν 7,85 τετρ. παλάμας. Νὰ εὕρητε πόσα μέτρα εἶναι τὸ ὕψος του.

355. Ἐνας κύλινδρος ἀπὸ φελλὸν ἔχει ὕψος 3 ἑκατοστομέτρων καὶ βάσεις μὲ ἀκτῖνα 1,5 ἑκατοστομέτρων. Νὰ εὕρητε τὸ βάρος του.

356. Ὁ πυθμὴν ἐνὸς φρέατος ἔχει διάμετρον 1,20 μέτρων. Τὸ ὕδωρ εἰς αὐτὸ ἔχει ὕψος 2,30 μέτρων. Νὰ εὕρητε τὸν ὄγκον τοῦ ὕδατος τούτου.

357. Νὰ εὕρητε πόσον πρέπει νὰ ὑψωθῇ τὸ ὕδωρ εἰς τὸ προηγούμενον φρέαρ, διὰ τὰ ἀξηθῆ ὁ ὄγκος του κατὰ 5,6 κυβικά μέτρα.

Β'. Κ Ω Ν Ο Σ

113. Πῶς γεννᾶται ἓνας κῶνος. Στηρίζομεν ἓνα ὀρθογώνιον τρίγωνον $ΑΒΓ$ οὕτως, ὥστε ἡ μία πλευρὰ $ΑΒ$ τῆς ὀρθῆς γωνίας νὰ εἶναι εἰς τὸ τραπέζι μας, ἡ δὲ ἄλλη $ΑΓ$ νὰ εἶναι κάθετος ἐπ' αὐτὸ (σχ. 102).


*Ἐπειτα κρατοῦμεν τὴν $ΑΓ$ ἀκίνητον καὶ στρέφομεν περίξ αὐτῆς τὸ τρίγωνον πρὸς τὸ αὐτὸ μέρος, ἕως ὅτου γυρίσῃ εἰς τὴν πρώτην θέσιν του. Αἱ θέσεις, ἀπὸ τὰς ὁποίας θὰ περάσῃ τοῦτο, ὄλαι μαζί, σχηματίζουσιν ἓνα στερεόν. Αὐτὸ λέγεται κῶνος. *Ὡστε :

Κῶνος εἶναι ἓνα στερεὸν σῶμα, τὸ ὁποῖον γίνεται ἀπὸ ἓνα ὀρθογώνιον τρίγωνον, ἂν τοῦτο στραφῇ περὶ μίαν ἀκίνητον πλευρὰν τῆς ὀρθῆς γωνίας του κατὰ τὴν αὐτὴν φορὰν καὶ ἕως ὅτου γυρίσῃ εἰς τὴν πρώτην θέσιν.

Ἡ ἀκίνητος πλευρὰ $ΑΓ$ λέγεται ὕψος ἢ ἄξων τοῦ κῶνου. Τὸ δὲ ἄκρον $Γ$ τοῦ ἄξωνος λέγεται κορυφὴ τοῦ κῶνου.

Ἡ ἄλλη πλευρά AB τῆς ὀρθῆς γωνίας γράφει ἕνα κύκλον μὲ κέντρον A , κάθετον ἐπὶ τὸν ἄξονα. Αὐτὸς ὁ κύκλος λέγεται **βάσις** τοῦ κώνου.

Ἡ δὲ ὑποτείνουσα $BΓ$ γράφει μίαν καμπύλην ἐπιφάνειαν. Αὕτη λέγεται ἰδιαιτέρως **κυρτή** ἐπιφάνεια τοῦ κώνου. Ἡ δὲ $BΓ$ λέγεται **γενέτειρα** αὐτῆς καὶ **πλευρά** τοῦ κώνου.



Σχ. 102

Ἄν κόψωμεν ἕνα κώνον μὲ ἕνα ἐπίπεδον παράλληλον πρὸς τὴν βᾶσιν, βλέπομεν ὅτι ἡ τομὴ εἶναι ἕνας κύκλος, π. χ. $HΘ$. Αὕτη ἡ τομὴ γίνεται βαθμηδὸν μικρότερα, ὅταν πλησιάζῃ πρὸς τὴν κορυφήν, ὅπου γίνεται σημεῖον.

Ἄν κόψωμεν τὸν κώνον μὲ ἕνα ἐπίπεδον, τὸ ὁποῖον διέρχεται ἀπὸ τὸν ἄξονα, βλέπομεν ὅτι ἡ τομὴ εἶναι ἕνα ἰσοσκελὲς τρίγωνον $ΓΑΜ$. Αὐτὸ ἀποτελεῖται ἀπὸ δύο ὀρθογώνια τρίγωνα $ΓΑΛ$ καὶ $ΓΑΜ$, μὲ τὰ ὁποῖα ἐφαρμόζει κατὰ σειράν τὸ $ΑΒΓ$ κατὰ τὴν περιστροφὴν του.

Ἡ τομὴ λοιπὸν $ΓΑΜ$ εἶναι τρίγωνον διπλάσιον ἀπὸ τὸ $ΑΒΓ$.

ΜΕΤΡΗΣΙΣ ΚΩΝΟΥ

114. Πρόβλημα I. Νὰ εὑρεθῇ τὸ ἐμβαδὸν ϵ τῆς κυρτῆς ἐπιφάνειας ἑνὸς κώνου, ἂν εἶναι γνωστὴ ἡ πλευρά καὶ ἡ περιφέρεια τῆς βάσεως αὐτοῦ.

Λύσις. Μετροῦμεν τὴν πλευρὰν λ καὶ τὴν περιφέρειαν Γ τῆς βάσεως ἑνὸς κώνου καὶ εὐρίσκομεν π. χ. $\lambda = 6$ ἑκατοστόμετρα καὶ $\Gamma = 12,56$ ἑκατοστόμετρα.

Καλύπτομεν ἔπειτα ἀκριβῶς τὴν κυρτὴν ἐπιφάνειαν τοῦ κώνου τούτου μὲ ἓνα λεπτὸν φύλλον. Ἐπειτα ἀνοίγομεν τὸ φύλλον καὶ βλέπομεν ὅτι τὸ ἀνάπτυγμα τῆς κυρτῆς ἐπιφανείας εἶναι ἓνας κυκλικὸς τομεὺς μὲ ἀκτῖνα 6 ἑκατοστομέτρων καὶ μὲ βάσιν 12,56 ἑκατοστομέτρων (σχ. 102).

Εἶναι λοιπὸν $\epsilon = 12,56 \times \frac{6}{2} = 37,68$ τετρ. ἐκ. (§ 87, Σημ.).

Ὡστε :

Διὰ νὰ εὐρωμεν τὸ ἔμβαδὸν τῆς κυρτῆς ἐπιφανείας ἑνὸς κώνου, πολλαπλασιάζομεν τὴν περιφέρειαν τῆς βάσεως ἐπὶ τὸ ἥμισυ τῆς πλευρᾶς αὐτοῦ.

Ἄν δὲ ἡ βάσις ἔχη ἀκτῖνα α , θὰ εἶναι :

$$\Gamma = 2 \times 3,14 \times \alpha \quad \text{καὶ} \quad \epsilon = 2 \times 3,14 \times \alpha \times \frac{\lambda}{2}$$

$$\text{ἢ συντομώτερον} \quad \epsilon = 3,14 \times \alpha \times \lambda.$$

Ἄν π. χ. $\alpha = 3$ ἑκατοστόμετρα καὶ $\lambda = 5$ ἑκατοστόμετρα θὰ εἶναι $\epsilon = 3,14 \times 3 \times 5 = 47,10$ ἑκατοστόμετρα.

Ὅλη δὲ ἡ ἐπιφάνεια ἑνὸς κώνου ἔχει ἔμβαδὸν :

$$E = (3,14 \times \alpha \times \lambda) + (3,14 \times \alpha^2) \quad \text{ἢ} \quad E = 3,14 \times \alpha \times (\alpha + \lambda).$$

Ἡ ἐπιφάνεια π. χ. τοῦ προηγουμένου κώνου ἔχει ἔμβαδὸν

$$E = 3,14 \times 3 \times 8 = 75,36 \text{ τετραγωνικὰ ἑκατοστόμετρα.}$$

Ἀσκήσεις

358. Ἐνας κώνος ἔχει πλευρὰν 10 ἑκατοστομέτρων καὶ βάσιν μὲ ἀκτῖνα 5 ἐκ. Νὰ εὐρητε τὸ ἔμβαδὸν τῆς κυρτῆς ἐπιφανείας αὐτοῦ.

359. Ἐνας κώνος ἔχει πλευρὰν 50 ἑκατοστομέτρων καὶ βάσιν μὲ ἀκτῖνα 30 ἐκ. Νὰ εὐρητε τὸ ἔμβαδὸν τῆς ἐπιφανείας του.

360. Ἐνας κώνος ἔχει βάσιν μὲ ἀκτῖνα 2 παλαμῶν καὶ κυρτὴν ἐπιφάνειαν 31,4 τετρ. παλ. Νὰ εὐρητε πόσα μέτρα εἶναι ἡ πλευρὰ του.

115. Πρόβλημα II. Νὰ εὐρεθῇ ὁ ὄγκος ἑνὸς κώνου, ἂν εἶναι γνωστὴ ἡ βάσις καὶ τὸ ὕψος του.

Λύσις. Γεμίζομεν μὲ ὕδωρ ἓνα κωνικὸν ποτήριον μὲ ἐσωτερικὸν ὕψος 10 π. χ. ἑκατοστομέτρων καὶ στόμιον 28,26 τετραγωνικῶν ἑκατοστομέτρων. Ἄν ζυγίσωμεν τὸ ὕδωρ τοῦτο, εὐρίσκομεν ὅτι ἔχει βάρος 94,2 γραμμαρίων. Ὁ ὄγκος λοιπὸν αὐτοῦ, δηλ. τοῦ ἐσωτερικοῦ τοῦ ποτηρίου, εἶναι 94,2 κυβικὰ ἑκατοστόμετρα.

Παρατηροῦμεν δὲ ὅτι ἓνας κύλινδρος μὲ τὸ ἴδιον ὕψος καὶ βάσιν, ἔχει ὄγκον $28,26 \times 10 = 282,6$ κυβικῶν ἑκατοστομέτρων. Ἐπειδὴ δὲ $282,6 : 94,2 = 3$, ἐννοοῦμεν ὅτι ὁ κύλινδρος ἔχει τριπλάσιον ὄγκον ἀπὸ τὸν κῶνον καὶ ἀντιστρόφως ὁ κῶνος ἔχει ὄγκον

$$94,2 = 282,6 : 3 = \frac{28,26 \times 10}{3}$$

Βλέπομεν λοιπὸν ὅτι :

Διὰ τὸ εὑρωμεν τὸν ὄγκον Θ ἐνὸς κῶνου, πολλαπλασιάζομεν τὴν βάσιν β ἐπὶ τὸ ὕψος υ καὶ τὸ γινόμενον διαιροῦμεν διὰ 3.

Εἶναι δηλαδὴ : $\Theta = \frac{\beta \times \upsilon}{3}$

Ἄν δὲ ἡ βάσις ἔχη ἀκτῖνα α , θὰ εἶναι

$$\beta = 3,14 \times \alpha^2 \text{ καὶ } \Theta = \frac{3,14 \times \alpha^2 \times \upsilon}{3}$$

Ἄν π. χ. εἶναι $\alpha = 10$ ἑκατοστόμετρα καὶ $\upsilon = 20$ ἑκατ., θὰ εἶναι

$$\Theta = \frac{3,14 \times 10^2 \times 20}{3} = 2093,33 \text{ κυβικὰ ἑκατοστόμετρα.}$$

Ἀσκήσεις


361. Ἐνας κῶνος ἔχει ὕψος 1,2 παλαμῶν καὶ βάσιν 28,26 τετραγωνικῶν παλαμῶν. Νὰ εὑρητε τὸν ὄγκον αὐτοῦ.
362. Ἐνας κῶνος ἔχει ὄγκον 94,2 κυβικῶν παλαμῶν καὶ βάσιν 28,26 τετραγωνικῶν παλαμῶν. Νὰ εὑρητε τὸ ὕψος αὐτοῦ.
363. Ἐνας σιδηροῦς κῶνος ἔχει ὕψος 0,04 μέτρου καὶ ἀκτῖνα βάσεως 0,02 μέτρου. Νὰ εὑρητε τὸ βάρος του.
364. Ἐνας μολύβδινος κῶνος ἔχει βάρος 23843 γραμμαρίων καὶ βάσιν μὲ διάμετρον 20 ἑκατοστομέτρων. Νὰ εὑρητε τὸ ὕψος αὐτοῦ.
365. Ἐνας κῶνος ἔχει ὕψος 20 ἑκατοστομέτρων, ἡ δὲ περιφέρεια τῆς βάσεως εἶναι 25,12 παλάμαι. Νὰ εὑρητε τὸν ὄγκον αὐτοῦ.

Γ'. ΚΟΛΟΥΡΟΣ ΚΩΝΟΣ

116. Τί εἶναι κόλουρος κῶνος καὶ πῶς εὐρίσκεται τὸ ἔμβαδὸν τῆς ἐπιφανείας καὶ ὁ ὄγκος του. Μεταξὺ τῆς βάσεως ἐνὸς κῶνου καὶ μιᾶς τομῆς αὐτοῦ παραλλήλου πρὸς τὴν βάσιν (§ 113) περιέχεται ἓνα μέρος τοῦ κῶνου τούτου. Τοῦτο λέγεται κόλουρος κῶνος. Τὸ στερεὸν π. χ. ΗΘΙΑ (σχ. 103) εἶναι κόλουρος κῶνος.

Οἱ δύο κύκλοι Ο καὶ Π, μεταξὺ τῶν ὁποίων περιέχεται οὗτος, λέγονται βάσεις αὐτοῦ.

Ἡ δὲ ἀπόστασις ΟΠ τῶν βάσεων λέγεται **ὕψος** τοῦ κολ. κώνου. Μεταξὺ τῶν βάσεων περιέχεται ἡ κυρτὴ ἐπιφάνεια τοῦ κολούρου κώνου καὶ μέρη ΙΘ, ΛΗ κ.τ.λ. τῶν πλευρῶν τοῦ ἀρχικοῦ κώνου. Ταῦτα λέγονται ἐπίσης **πλευραὶ** τοῦ κολούρου κώνου.



Σχ. 103

Πρακτικῶς δὲν δυνάμεθα νὰ εὑρωμεν τὸ ἐμβαδὸν εἰς τῆς κυρτῆς ἐπιφάνειας, οὐδὲ τὸν ὄγκον Θ' ἐνὸς κολούρου κώνου. Δι' αὐτὸ δανειζόμεθα ἀπὸ τὴν θεωρητικὴν Γεωμετρίαν τὰ ἐξῆς συμπεράσματα αὐτῆς :

Εἰς αὐτὰ Α καὶ α εἶναι αἱ ἀκτῖνες τῶν βάσεων ἐνὸς κολούρου κώνου, λ ἡ πλευρὰ καὶ υ τὸ ὕψος αὐτοῦ :

$$Α') \quad \epsilon = (A + \alpha) \times \lambda \times 3,14$$

καὶ ἐπομένως ὅλη ἡ ἐπιφάνεια ἔχει ἐμβαδὸν :

$$E = (A + \alpha) \times \lambda \times 3,14 + (A^2 + \alpha^2) \times 3,14.$$

$$Β') \quad \Theta = \frac{1}{3} \times (A^2 + A \times \alpha + \alpha^2) \times \upsilon \times 3,14.$$

Ἐν π.χ. Α = 8 ἑκατ., α = 4 ἑκατ., λ = 5 ἑκατ., υ = 3 ἑκατ., θὰ εἶναι
 $\epsilon = (8 + 4) \times 5 \times 3,14 = 188,4$ τετ. ἑκ.,

$$E = 188,4 + (64 + 16) \times 3,14 = 439,6 \text{ τετ. ἑκ.}$$

$$\text{καὶ ὁ ὄγκος } \Theta = \frac{1}{3} \times (64 + 32 + 16) \times 3 \times 3,14 = 359,68 \text{ κυβ. ἑκ.}$$

Ἀσκήσεις

366. Ἐνας κολούρου κώνου ἔχει λ = 5 ἑκατοστομέτρων, Α = 12-ἑκατοστομέτρων, α = 3 ἑκατοστομέτρων. Νὰ εὑρητε τὸ ἐμβαδὸν τῆς κυρτῆς ἐπιφάνειας καὶ ὅλης τῆς ἐπιφάνειας του.

367. Ἐνας κολούρου κώνου ἔχει Α = 0,6 μέτρον, α = 0,3 μέτρον καὶ υ = 0,4 μέτρον. Νὰ εὑρητε τὸν ὄγκον του.

368. Ἐνας κουβάς ἔχει βάθος $\frac{4}{3}$ παλάμης. Ἡ διάμετρος τοῦ μὲν στομίου εἶναι 6 παλάμαι, τοῦ δὲ πυθμένος 2 παλάμαι. Νὰ εὑρητε τὸ βάρος τοῦ ὕδατος, τὸ ὁποῖον χωρεῖ.

Δ'. Σ Φ Α Ι Ρ Α

117. Πῶς γεννᾶται μία σφαιρα καὶ ποῖα εἶναι τὰ στοιχεῖα αὐτῆς. Στῆρίζομεν εἰς τὸ τραπέζι μας ἕνα ἡμικύκλιον ΑΒΓ ἀπὸ χροῦν χαρτόνι οὕτως, ὥστε ἡ διάμετρος ΑΒ αὐτοῦ νὰ εἶναι κάθετος

ἐπὶ τὸ τραπέζι καὶ νὰ ἐγγίξῃ αὐτὸ μὲ τὸ ἄκρον Β αὐτῆς (σχ. 104).

Ἐπειτα κρατοῦμεν τὴν ΑΒ ἀκίνητον καὶ στρέφομεν περὶς αὐτῆς τὸ ἡμικύκλιον κατὰ τὴν αὐτὴν φοράν, ἕως ὅτου γυρίσῃ εἰς τὴν πρώτην θέσιν του.

Αἱ θέσεις, ἀπὸ τὰς ὁποίας θὰ περάσῃ, ὄλαι μαζί, ἀποτελοῦσιν ἓνα στερεόν. Τοῦτο ὀνομάζεται **σφαῖρα**.

Λέγομεν λοιπὸν ὅτι τὸ ἡμικύκλιον στρεφόμενον γράφει σφαῖραν.

Ἡ δὲ ἡμιπεριφέρεια γράφει τὴν ἐπιφάνειαν τῆς σφαίρας, ἣ ὁποία εἶναι **καμπύλη ἐπιφάνεια**.

Ἐπειδὴ δὲ κατὰ τὴν στροφὴν ταύτην τὸ σχῆμα τοῦ ἡμικυκλίου δὲν μεταβάλλεται, τὸ κέντρον Ο αὐτοῦ ἀπέχει ἴσον ἀπὸ ὅλα τὰ σημεῖα τῆς ἐπιφανείας τῆς σφαίρας. Δι' αὐτὸ τὸ Ο λέγεται **κέντρον** τῆς σφαίρας. Ὡστε :

Σφαῖρα εἶναι ἓνα στερεόν, τοῦ ὁποίου ἓν σημεῖον ἀπέχει ἴσον ἀπὸ ὅλα τὰ σημεῖα τῆς ἐπιφανείας του.


Τὰ τμήματα ΟΑ, ΟΒ, ΟΓ κ.τ.λ. λέγονται **ἄκτινες** τῆς σφαίρας.

Τὰ δὲ ΑΟΒ, ΜΟΔ κ.τ.λ. λέγονται **διάμετροι** τῆς σφαίρας.


Αἱ ἄκτινες καὶ αἱ διάμετροι μιᾶς σφαίρας ὀρίζονται καὶ σχετίζονται, ὅπως καὶ αἱ ἄκτινες καὶ αἱ διάμετροι ἑνὸς κύκλου. Μόνον ἀντὶ περιφερείας θὰ λέγωμεν **ἐπιφάνειαν**.

118. Ποίας θέσεις δύνανται νὰ λάβῃ μία σφαῖρα πρὸς ἓνα ἐπίπεδον.

α') Ὄταν κρατῶμεν μίαν σφαῖραν Σ ὑπεράνω ἀπὸ τὸ τραπέζι μας,



Σχ. 104




Σχ. 105

βλέπομεν ὅτι αὕτη οὐδὲν κοινὸν σημεῖον ἔχει μὲ τὸ ἐπίπεδον Π αὐτοῦ (σχ. 105).


β') "Όταν δὲ ἀκουμβῶμεν τὴν σφαῖραν εἰς τὸ τραπέζι, βλέπομεν ὅτι ἐγγίζει αὐτὸ μὲ ἓνα σημεῖον A (σχ. 106).

Τὸ ἐπίπεδον Π λέγεται τότε **ἐφαπτόμενον ἐπίπεδον** τῆς σφαίρας, τὸ δὲ σημεῖον A λέγεται σημεῖον **ἐπαφῆς**.

γ') Δυνάμεθα ἀκόμη νὰ θέσωμεν τὴν σφαῖραν παραπλευρώς ἀπὸ τὸ τραπέζι, ὥστε ἓνα μέρος αὐτῆς νὰ εἶναι ἐπάνω ἀπὸ τὸ ἐπίπεδον Π



Σχ. 106



Σχ. 107

τοῦ τραπέζιου καὶ ἓνα ὑποκάτω ἀπὸ αὐτό. "Αν τότε φαντασθῶμεν ὅτι τὸ Π προεκτείνεται πρὸς τὸ μέρος τῆς σφαίρας, ἐννοοῦμεν ὅτι τοῦτο εἰσχωρεῖ μέσα εἰς τὴν σφαῖραν, ἥτοι τέμνει αὐτὴν (σχ. 107).

119. Πρόβλημα I. Νὰ εὑρεθῇ ἡ ἀκτίς μιᾶς σφαίρας K . (σχ. 108).


Λύσις. Θέτομεν τὴν σφαῖραν ἐπάνω εἰς τὸ ἐπίπεδον E τοῦ τραπέζιου μας. Ἐπάνω δὲ εἰς αὐτὴν ἀκουμβῶμεν ἓνα ἐπίπεδον χαρτόνι Z οὕτως, ὥστε νὰ εἶναι παράλληλον πρὸς τὸ E . Παρατηροῦμεν δὲ ὅτι ἡ διάμετρος $\Gamma\Delta$ τῆς σφαίρας εἶναι ἴση πρὸς τὴν ἀπόστασιν AB τῶν ἐπιπέδων Z καὶ E . Μετροῦμεν λοιπὸν τὴν AB καὶ διαιροῦμεν τὸ μῆκος αὐτῆς διὰ 2.

120. Τί εἶναι παράλληλοι κύκλοι μιᾶς σφαίρας.


Εἰς ἓνα ἡμικύκλιον $ΑΓΒ$ (σχ. 109) γράφομεν διαφόρους εὐθείας EZ , ΓO , ΘK κ.τ.λ. καθέτους ἐπὶ τὴν διάμετρον AB . "Όταν τὸ ἡμικύκλιον στρέφεται περὶ τὴν AB , διὰ νὰ γράψῃ τὴν σφαῖραν O , αἱ εὐθεῖαι

αὗται γράφουσι κύκλους, καθέτους ἐπὶ τὴν AB . Ἐπειδὴ δὲ τὰ ἐπίπεδα αὐτῶν εἶναι παράλληλα, οὗτοι λέγονται **παράλληλοι κύκλοι**.

Ὁ κύκλος, τὸν ὁποῖον γράφει ἡ ἀκτίς OG , διέρχεται ἀπὸ τὸ κέντρον



Σχ. 108



Σχ. 109

τῆς σφαίρας καὶ εἶναι μεγαλύτερος ἀπὸ τοὺς παράλληλους πρὸς αὐτὸν Z, K κ.τ.λ., διότι $OG > ZE$, $OG > KΘ$ κ.τ.λ. Δι' αὐτό :

Ἐνας κύκλος μιᾶς σφαίρας, ὁ ὁποῖος διέρχεται ἀπὸ τὸ κέντρον τῆς, λέγεται **μέγιστος κύκλος** αὐτῆς.

Ὅσοι κύκλοι δὲν διέρχονται ἀπὸ τὸ κέντρον, λέγονται **μικροὶ κύκλοι**.


121. Τί εἶναι ἄξων καὶ πόλοι κύκλου μιᾶς σφαίρας. Ἡ διάμετρος AB μιᾶς σφαίρας O , ἥτις εἶναι κάθετος ἐπὶ τοὺς παράλληλους κύκλους O, Z, K (σχ. 109), λέγεται **ἄξων** τῶν κύκλων τούτων. Τὰ δὲ ἄκρα A καὶ B τοῦ ἄξωνος λέγονται **πόλοι** τῶν κύκλων τούτων. Ὡστε :

Ἄξων ἑνὸς κύκλου σφαίρας εἶναι ἡ διάμετρος αὐτῆς, ἡ ὁποία εἶναι κάθετος ἐπὶ τὸν κύκλον τοῦτον.

Πόλοι δὲ ἑνὸς κύκλου εἶναι τὰ ἄκρα τοῦ ἄξωνος αὐτοῦ.

122. Τί εἶναι σφαιρικὸς διαβήτης καὶ εἰς τί χρησιμεύει. Τὸ ὄργανον Δ (σχ. 110) εἶναι ἕνας διαβήτης μὲ καμπυλωμένα σκέλη. Κατὰ τὴν περιστροφήν τοῦ ἡμικυκλίου $AB\Gamma$ περὶ τὴν AB (§ 117)

στηρίζομεν τὸ ἄκρον τοῦ ἑνὸς σκέλους εἰς τὸ Α καὶ τὸ ἄλλο π. χ. εἰς τὸ Ε. Παρατηροῦμεν δὲ ὅτι καθ' ὅλην τὴν διάρκειαν τῆς στροφῆς τὰ ἄκρα τῶν σκελῶν τοῦ διαβήτου μένουσι διαρκῶς εἰς τὰ σημεῖα Α καὶ Ε.



Σχ. 110

Δηλ. τὸ κινητὸν ἄκρον αὐτοῦ διαγράφει τὴν περιφέρειαν Ζ.

Δυνάμεθα λοιπὸν μὲ τὸν σφαιρικὸν διαβήτην νὰ γράψωμεν ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας μιᾶς σφαίρας περιφερεῖας κύκλων, ὅπως εἰς τὸ ἐπίπεδον μὲ τὸν κοινὸν διαβήτην.

Διὰ νὰ γράψωμεν δὲ περιφέρειαν μεγίστου κύκλου, πρέπει ἡ ἀπόστασις τῶν ἄκρων τοῦ διαβήτου νὰ εἶναι ἴση πρὸς τὴν χορδὴν ΑΓ ἑνὸς τεταρτημορίου περιφερείας μεγίστου κύκλου. Ὅρίζομεν δὲ αὐτὴν τὴν ἀπόστασιν, ἀφοῦ εὗρωμεν τὴν ἀκτῖνα τῆς

σφαίρας (§ 119) καὶ γράψωμεν εἰς ἕνα ἐπίπεδον περιφέρειαν μεγίστου κύκλου κ.τ.λ.

123. Τί εἶναι σφαιρικὴ ζώνη. Μεταξὺ δύο παραλλήλων κύκλων, π. χ. τῶν Ζ καὶ Κ (σχ. 109) περιέχεται ἕνα μέρος τῆς ἐπιφανείας τῆς σφαίρας. Τοῦτο λέγεται **σφαιρικὴ ζώνη**.

Αἱ περιφέρειαι τῶν κύκλων, μεταξὺ τῶν ὁποίων περιέχεται μία σφαιρικὴ ζώνη λέγονται **βάσεις** αὐτῆς.

Ἡ δὲ ἀπόστασις ΖΚ τῶν βάσεων λέγεται **ὕψος** τῆς ζώνης.

Καὶ τὸ μέρος ΑΕΗ τῆς ἐπιφανείας τῆς σφαίρας Ο εἶναι σφαιρικὴ ζώνη μὲ μίαν βάσιν Ζ καὶ ὕψος ΑΖ.

Εἰς τὴν γεωγραφίαν θὰ μάθωμεν ὅτι εἰς τὴν ἐπιφάνειαν τῆς Γῆς διακρίνομεν 5 ἀξιοσημειώτους ζώνας.

ΜΕΤΡΗΣΙΣ ΣΦΑΙΡΑΣ

124. Πρόβλημα Ι. Νὰ εὗρεθῇ τὸ ἔμβადον τῆς ἐπιφανείας καὶ ὁ ὄγκος μιᾶς σφαίρας, ἂν εἶναι γνωστὴ ἡ ἀκτίς αὐτῆς.

Λύσις. Τὸ πρόβλημα τοῦτο δὲν δυνάμεθα νὰ λύσωμεν πρακτικῶς.

Δανειζόμεθα λοιπόν από την θεωρητικήν Γεωμετρίαν τὰ ἑξῆς συμπε-
ράσματα αὐτῆς :

$$E = 4 \times 3,14 \times \alpha^2, \quad \Theta = \frac{4}{3} \times 3,14 \times \alpha^3.$$

Ἄν π. χ. $\alpha = 6$ ἐκ. θὰ εἶναι $E = 4 \times 3,14 \times 36 = 452,16$ τετ. ἐκατ.
καὶ $\Theta = \frac{4}{3} \times 3,14 \times 216 = 904,32$ κυβικὰ ἑκατοστόμετρα.

Ἀσκήσεις

369. Μία σφαῖρα ἔχει ἀκτίνα 0,30 μέτρον. Νὰ εὑρητε τὸ ἔμβαδόν τῆς ἐπιφα-
νείας καὶ τὸν ὄγκον τῆς.

370. Μία μολυβδίνη σφαῖρα ἔχει ἀκτίνα 0,10 μέτρον. Νὰ εὑρητε τὸ βάρος
αὐτῆς.

371. Εἰς ἓνα δοχεῖον γεμᾶτον ἔλαιον ἀφήνομεν μίαν σιδηρᾶν σφαῖραν ἀκτί-
νος 0,01 μέτρον. Νὰ εὑρητε τὸ βάρος τοῦ ἐλαίου, τὸ ὁποῖον θὰ χυθῆ.

Πίναξ τύπων Γ' κεφαλαίου

Διὰ κύλινδρον

$$\varepsilon = 2 \times 3,14 \times \alpha \times \upsilon, \quad E = 2 \times 3,14 \times \alpha (\alpha + \upsilon), \quad \Theta = \beta \times \upsilon = 3,14 \times \alpha^2 \times \upsilon.$$

Διὰ κῶνον

$$\varepsilon = 3,14 \times \alpha \times \lambda, \quad E = 3,14 \times \alpha \times (\lambda + \alpha), \quad \Theta = \frac{3,14 \times \alpha^2 \times \upsilon}{3}$$

Διὰ κόλουρον κῶνον

$$\varepsilon = 3,14 \times (A + \alpha) \times \lambda, \quad E = 3,14 \times (A + \alpha) \times \lambda + 3,14 \times (A^2 + \alpha^2),$$

$$\Theta = \frac{1}{3} \times 3,14 \times (A^2 + A \times \alpha + \alpha^2) \times \upsilon$$

Διὰ σφαῖραν

$$E = 4 \times 3,14 \times \alpha^2, \quad \Theta = \frac{4}{3} \times 3,14 \times \alpha^3.$$

Ἀσκήσεις

372. Νὰ εὑρητε τὸ ἔμβαδόν τῆς ἐπιφανείας ἑνὸς κυλίνδρου, ὁ ὁποῖος ἔχει
ὕψος 0,2 μέτρον καὶ βάσιν μὲ διάμετρον 0,2 μέτρον.


373. Ἐνας κῶνος ἔχει πλευρὰν 0,2 μέτρον καὶ βάσιν ἴσην πρὸς τὴν βάσιν τοῦ
προηγούμενου κυλίνδρου. Νὰ συγκρίνητε τὰ ἔμβαδά τῶν κυρτῶν ἐπιφανειῶν
αὐτῶν.

374. Πρόκειται νὰ κατασκευασθῆ ἓνας κυλινδρικός κάδος χωρητικότητος

5000 οκάδων ύδατος με βάση 3,2 τετραγωνικών μέτρων. Να εὑρητε τὸ ὕψος αὐτοῦ.

375. Ἐνας κύλινδρος ἔχει ὕψος 0,15 μέτρου καὶ βάσεις με διάμετρον 0,85 μέτρου. Ἐνας δὲ κώνος ἔχει βάσιν τὴν μίαν βάσην τοῦ κυλίνδρου τούτου καὶ κορυφὴν τὸ κέντρον τῆς ἄλλης βάσεως αὐτοῦ. Να εὑρητε τὸν ὄγκον τοῦ μέρους τοῦ κυλίνδρου, τὸ ὁποῖον εἶναι περίξ τοῦ κώνου.

376. Να σχηματίσῃτε ἓνα ὀρθογώνιον $AB\Gamma\Delta$ (σχ. 111) με διαστάσεις (AB) = 2 ἑκατοστόμετρα καὶ ($A\Delta$) = 4 ἑκατοστόμετρα. Μέσα δὲ εἰς αὐτὸ νὰ γράψῃτε ἡμιπεριφέρειαν με διάμετρον $A\Delta$. Να φαντασθῆτε τώρα ὅτι τὸ $AB\Gamma\Delta$ στρέφεται περὶ τὴν $A\Delta$, ἕως ὅτου γυρίσῃ εἰς τὴν πρώτην θέσιν του. Να ὑπολογίσῃτε δὲ τὸν ὄγκον τοῦ στερεοῦ, τὸ ὁποῖον θὰ γράψῃ τὸ σκιασμένον μέρος τοῦ ὀρθογωνίου.



Σχ. 111

377. Μία σφαῖρα ἔχει ἀκτίνα 10 ἑκατοστομέτρων. Ἐνας δὲ κώνος ἔχει βάση ἓνα μέγιστον κύκλον τῆς σφαίρας καὶ κορυφὴν ἓνα πόλον τῆς βάσεως. Να εὑρητε τὸν ὄγκον τοῦ κώνου τούτου.

378. Μία σφαῖρα ἔχει ἀκτίνα 15 ἑκατοστομέτρων καὶ ἓνας μικρὸς κύκλος αὐτῆς ἔχει ἀκτίνα 8 ἑκατοστομέτρων. Να εὑρητε τὸ ἔμβαδόν τῆς κυρτῆς ἐπιφανείας τοῦ κώνου, ὁ ὁποῖος ἔχει βάση τὸν κύκλον τούτον καὶ κορυφὴν τὸ κέντρον τῆς σφαίρας.

379. Ἐνας κόλουρος κώνος ἔχει $A = 24$ ἑκατοστόμετρα, $a = 12$ ἑκατοστόμετρα καὶ $\lambda = 15$ ἑκατοστόμετρα. Να εὑρητε τὸ ἔμβαδόν τῆς κυρτῆς ἐπιφανείας του.


380. Μία σφαῖρα ἔχει ἀκτίνα 10 ἑκατοστομέτρων. Ἐνας δὲ μικρὸς κύκλος αὐτῆς ἀπέχει 6 ἑκατοστόμετρα ἀπὸ τὸ κέντρον τῆς σφαίρας. Να εὑρητε τὸ μήκος τῆς περιφερείας τοῦ κύκλου τούτου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ΚΛΙΜΑΚΕΣ

125. Τί είναι ἀριθμητική κλίμαξ. Όλοι γνωρίζομεν ὅτι ὁ χάρτης μιᾶς χώρας παριστάνει αὐτὴν πολὺ μικροτέραν ἀπὸ ὅ,τι εἶναι, διὰ τὴν χωρῆν εἰς αὐτόν. Λέγομεν δὲ ὅτι ὁ χάρτης μιᾶς χώρας εἶναι τὸ σχέδιον αὐτῆς ὑπὸ σμίκρυνσιν. Ὁμοίως ὁ μηχανικὸς εἰς ἓνα φύλλον



Σχ. 112

χάρτου ἀπεικονίζει π. χ. ἓνα ὀρθογώνιον οἰκόπεδον ὑπὸ σμίκρυνσιν. Πρὸς τοῦτο κάμνει τὰς διαστάσεις αὐτοῦ π. χ. 1 000 φορές μικροτέρας. Διὰ τὴν φανερῶσιν τοῦτο, γράφει ὑποκάτω :

Κλίμαξ 1 : 1 000

Ὁ ἀριθμὸς 1 : 1 000 ἢ $\frac{1}{1\,000}$ λέγεται ἀριθμητικὴ κλίμαξ.

Αἱ συνήθεις κλίμακες εἶναι :


$\frac{1}{10}$, $\frac{1}{100}$, $\frac{1}{1\,000}$, κ.λ.π. ἢ $\frac{1}{5}$, $\frac{1}{50}$, $\frac{1}{500}$ κ.λ.π.

Τὸ σχῆμα π. χ. αβγδ (σχ. 112) εἶναι τὸ σχέδιον ἑνὸς οἰκοπέ-

δου ὑπὸ κλίμακα 1 : 1 000. Ἀπὸ αὐτὸ ἐννοοῦμεν ὅτι τὸ οἰκόπεδον τοῦτο ἔχει διαστάσεις $0,08 \times 1\,000 = 80$ μέτρα καὶ $0,06 \times 1\,000 = 60$ μέτρα, ὡς ἀναγράφονται καὶ ἐν τῷ σχεδίῳ. Δηλαδή :

Διὰ νὰ εὑρωμεν τὸ μῆκος μιᾶς γραμμῆς ἑνὸς σχήματος, πολλαπλασιάζομεν τὸ μῆκος τῆς ἀντιστοίχου γραμμῆς τοῦ σχεδίου ἐπὶ τὸν παρονομαστήν τῆς ἀριθμητικῆς κλίμακος.

126. Τί εἶναι γραφικὴ κλίμαξ καὶ εἰς τί μᾶς χρησιμεύει.
Πολλὰ σχέδια ἀντὶ ἀριθμητικῆς κλίμακος ἢ καὶ μαζὶ μὲ αὐτὴν ἔχουσι



Γραφικὴ Κλίμαξ

Σχ. 113

καὶ μίαν ἀντίστοιχον γραφικὴν κλίμακα. Π.χ. τὸ σχῆμα 113 εἶναι ἡ γραφικὴ κλίμαξ, ἡ ὁποία ἀντιστοιχεῖ καὶ δύναται νὰ ἀντικαταστήσῃ τὴν ἀριθμητικὴν κλίμακα 1 : 1 000.

Ἀποτελεῖται δὲ ἀπὸ μίαν εὐθεῖαν, εἰς τὴν ὁποίαν ὀρίσθησαν διαδοχικὰ τμήματα AB, ΒΓ, ΓΔ κ.τ.λ. μήκους 0,01 μέτρου κάθε ἑν. Παριστάνει δὲ τὸ κάθε τμήμα μῆκος $0,01 \times 1\,000 = 10$ μέτρα. Δι' αὐτὸ εἰς τὴν ἀρχὴν αὐτῶν γράφονται κατὰ σειρὰν οἱ ἀριθμοὶ 0, 10, 20, 30, κ.τ.λ.

Εἰς τὴν αὐτὴν εὐθεῖαν καὶ πρὸ τοῦ AB εἶναι ἓνα τμήμα AM μήκους 0,01 μέτρου διηρημένον εἰς 10 ἴσα μέρη. Κάθε ἑν ἀπὸ αὐτὰ εἶναι τὸ δέκατον τοῦ AB καὶ παριστάνει εὐθύγραμμον τμήμα μήκους $10 \times \frac{1}{10} = 1$ μέτρον. Δι' αὐτὸ ἀριθμοῦνται μὲ τοὺς ἀριθμούς, 1, 2, 3..., 10 ἐκ τοῦ A πρὸς τὸ M.


Μὲ τὴν κλίμακα αὐτὴν ἐκτελοῦμεν τὰς ἐξῆς δύο ἐργασίας :

1ον. Μεταφέρομεν εἰς τὸ σχεδίον ἓνα εὐθύγραμμον τμήμα μήκους π.χ. 37 μέτρων.

Πρὸς τοῦτο θέτομεν τὸ ἄκρον τοῦ ἑνὸς σκέλους τοῦ διαβήτου εἰς τὴν διαίρεσιν 30 καὶ τὸ ἄλλο εἰς τὴν διαίρεσιν 7 τοῦ τμήματος AM. Αὐτὴν δὲ τὴν ἀπόστασιν τῶν ἄκρων τῶν σκελῶν τοῦ διαβήτου μεταφέρομεν εἰς τὸ σχεδίον.

2ον. Εύρίσκομεν τὸ μῆκος ἑνὸς εὐθυγράμμου τμήματος, τὸ ὁποῖον εἰς τὸ σχέδιον παριστάνεται μὲ ἓνα τμήμα αβ. Πρὸς τοῦτο μὲ τὸν διαβήτην μεταφέρομεν αὐτὸ εἰς τὴν γραφικὴν κλίμακα μὲ τὸ ἓν ἄκρον εἰς τὸ Ο καὶ τὸ ἄλλο πρὸς τὸ Β. Ἄν τοῦτο πέσῃ ἀκριβῶς π. χ. εἰς τὴν διαίρεσιν 20, τὸ ζητούμενον μῆκος εἶναι 20 μέτρα. Ἄν δὲ πέσῃ π. χ. μεταξύ 20 καὶ 30, θέτομεν τὸ ἓνα ἄκρον εἰς τὴν διαίρεσιν 20 καὶ τὸ ἄλλο πρὸς τὸ μέρος τοῦ ΑΜ. Ἄν τοῦτο πέσῃ εἰς τὴν διαίρεσιν π. χ. 6 τοῦ ΑΜ, τὸ ζητούμενον μῆκος εἶναι $20 + 6 = 26$ μέτρα.

127. Πῶς χαράσσομεν εὐθείας γραμμὰς εἰς τὸ ἔδαφος καὶ πῶς μετροῦμεν αὐτάς. Διὰ νὰ κάμῃ ὁ μηχανικὸς τὸ σχέδιον αβγδ (σχ. 112), ἔπρεπε νὰ γνωρίζῃ τὰς διαστάσεις τοῦ οἰκοπέδου



Σχ. 114

ἐπὶ τοῦ ἔδαφους. Δι' αὐτὸ χαράσσει πρῶτον κάθε μίαν διάστασιν καὶ ἔπειτα μετρεῖ αὐτήν. Τὴν χάραξιν π. χ. τῆς εὐθείας ΑΒ ἐκτελεῖ ὡς ἐξῆς :


Εἰς τὸ Β τοποθετεῖται ἓνα κατακόρυφον ἀκόντιον. Ἐπειτα ὁ μηχανικὸς ἰστάμενος εἰς τὸ Α νεύει εἰς τὸν βοηθὸν του νὰ τοποθετήσῃ δεύτερον ἀκόντιον Δ, τὸ ὁποῖον νὰ ἀποκρύπτῃ ἀπὸ τὸν μηχανικὸν τὸ ἀκόντιον Β. Ἐπειτα ὁμοίως τοποθετεῖ ἄλλο Γ, τὸ ὁποῖον νὰ ἀποκρύπτῃ τὰ ἄλλα καὶ οὕτω καθ' ἐξῆς, μέχρι τοῦ ἀκοντίου Α (σχ. 114).

Οἱ πόδες τῶν ἀκοντίων τούτων ὀρίζουσι τὴν εὐθεῖαν ΑΒ.

Ἡ δὲ μέτρησις τοῦ τμήματος ΑΒ γίνεται ἔπειτα εὐκόλα μὲ τὴν ταινίαν μῆκους 20 ἢ 30 μέτρων.

128. Πῶς γίνεται ἡ μεταφορὰ εὐθυγράμμου σχήματος εἰς τὸ ἐπίπεδον σχεδίασεως. Εἶδομεν προηγουμένως (§ 125) ὅτι,

διὰ τὴν μεταφέρει ὁ μηχανικὸς ἓνα ὀρθογώνιον οἰκόπεδον εἰς τὸ ἐπίπεδον σχεδιάσεως, κατασκευάζει εἰς αὐτὸ ἓνα ὀρθογώνιον μετὰ διαστάσεις 1 000 π. γ. φορὰς μικροτέρας.



Σχ. 115

Διὰ τὴν μεταφέρωμεν ἓνα τρίγωνον μετὰ πλευρὰς 500, 400, 700 μέτρων ὑπὸ κλίμακα 1 : 10 000, κατασκευάζομεν εἰς τὸ ἐπίπεδον σχεδιάσεως ἓνα τρίγωνον μετὰ πλευρὰς.

$$500 : 10\ 000 = 0,05$$

$$400 : 10\ 000 = 0,04$$

καὶ $700 : 10\ 000 = 0,07$ μετ.

Διὰ τὴν μεταφέρωμεν ἓνα πολυγωνικὸν ἀγρὸν ΑΒΓΔΕ, χαράσσομεν καὶ μετροῦμεν τὰς πλευρὰς καὶ τὰς διαγωνίους ΑΓ καὶ ΑΔ. Ἐπειτα μεταφέρομεν ὑπὸ τὴν αὐτὴν κλίμακα τὰ τρίγωνα ΑΒΓ, ΑΓΔ, ΑΔΕ εἰς θέσεις αβγ, αγδ, αδε (σχ. 115). Τὸ αβγδε εἶναι τὸ σχέδιον τοῦ ἀγροῦ ΑΒΓΔΕ.

Ἀσκήσεις

381. Νὰ σχηματίσητε τὴν γραφικὴν κλίμακα, ἢ ὁποία ἀντιστοιχεῖ εἰς ἀριθμητικὴν κλίμακα 1 : 100 καὶ ἔπειτα εἰς 1 : 10 000.

382. Νὰ μεταφέρητε ἓνα εὐθύγραμμον τμήμα 200 μέτρων ὑπὸ κλίμακα 1 : 10 000.

383. Ἡ πλευρὰ ΑΒ ἐνός ἀγροῦ μετεφέρθη εἰς αβ (σχ. 115) ὑπὸ κλίμακα 1 : 1 000. Νὰ εὑρητε τὸ μήκος τῆς ΑΒ.

384. Ἐνα ἰσόπλευρον τρίγωνον ἔχει πλευρὰν 1 200 μέτρων. Νὰ μεταφέρητε αὐτὸ ὑπὸ κλίμακα 1 : 1 000.

385. Τὸ παραλληλόγραμμον ΑΒΓΔ (σχ. 76) τοῦ βιβλίου σας παριστάνει μίαν ἄμπελον ὑπὸ κλίμακα 1 : 100. Νὰ εὑρητε τὴν βάσιν, τὸ ὕψος καὶ τὸ ἐμβαδὸν τῆς ἄμπελου ταύτης.

Ἀσκήσεις πρὸς γενικὴν ἐπανάληψιν

386. Μία γωνία εἶναι διπλασία ἀπὸ τὴν συμπληρωματικὴν τῆς. Νὰ εὑρητε τὸ μέτρον ἑκατέρας τῶν γωνιῶν τούτων.

387. Μέσα εἰς μίαν ὀρθὴν γωνίαν νὰ φέρητε μίαν εὐθεῖαν, ἢ ὁποία νὰ ἀποχω-

ρίζη από αυτήν τό $\frac{1}{4}$ αυτής. Νά εὑρητε τό μέτρον τῆς γωνίας τῆς εὐθείας ταύτης μέ τήν προέκτασιν μιᾶς πλευράς τῆς ὀρθῆς γωνίας. (Δύο περιπτώσεις).

388. Νά γράψητε τήν ἀπόστασιν AD ἐνός σημείου A ἀπό μίαν εὐθείαν BG καί μίαν πλαγίαν AE πρὸς αὐτήν. Νά διαιρέσητε ἔπειτα τό τμήμα AD εἰς 4 ἴσα μέρη καί ἀπό τὰ σημεία τῆς διαιρέσεως νά φέρητε παραλλήλους πρὸς τήν BG . Νά συγκρίνητε δὲ τὰ τμήματα, εἰς τὰ ὁποῖα διαιρεῖται τό AE .

389. Νά γράψητε δύο ὁμοκέντρους περιφέρειας μέ ἀκτίνα 6 καί 3 ἑκατοστομέτρων καί δύο ἀκτίνας τῆς ἐξωτερικῆς περιφέρειας. Ἐπειτα νά γράψητε καί νά συγκρίνητε τὰς χορδὰς τῶν μεταξύ αὐτῶν τόξων.

390. Νά ἐξετάσητε, ἂν αἱ προηγούμεναι χορδαὶ εἶναι παράλληλοι ἢ ὄχι.

391. Εἰς ἓνα κύκλον K νά φέρητε δύο ἀκτίνας KA, KB , ὥστε $\angle AKB = 45^\circ$. Νά φέρητε ἐφαπτομένας $\Delta A, \Delta B$ καί νά μετρήσητε τήν γωνίαν Δ . Ἐπειτα δὲ νά συγκρίνητε τὰ τμήματα $\Delta A, \Delta B$.


392. Νά γράψητε μίαν περιφέρειαν K καί μίαν εὐθείαν AB ἐκτός τῆς K . Ἐπειτα νά γράψητε εὐθείαν KG κάθετον ἐπὶ τὴν AB . Βοηθούμενοι δὲ ἀπὸ τὴν κάθετον αὐτὴν νά γράψητε δύο ἐφαπτομένας τῆς K παραλλήλους πρὸς τὴν AB .

393. Νά διχοτομήσητε δύο ἐφεξῆς καί παραπληρωματικὰς γωνίας καί νά μετρήσητε τὴν γωνίαν τῶν διχοτόμων.


394. Ἐνα τετραγωνικὸν οἰκόπεδον μέ περίμετρον 122 μέτρων ἐπωλήθη πρὸς 18 δραχμάς τὸν τεκτονικὸν τετραγωνικὸν πῆχυν. Νά εὑρητε τὴν ἀξίαν του.

395. Νά σχηματίσητε ἓνα τρίγωνον μέ βάσιν 6 ἑκατοστομέτρων καί ὕψος 4 ἑκατοστομέτρων. Νά φέρητε τὴν διάμετρον εἰς τὸ μέσον τῆς βάσεως καί νά συγκρίνητε τὰ δύο τρίγωνα, εἰς τὰ ὁποῖα θὰ διαιρεθῇ τὸ πρῶτον.

396. Νά σχηματίσητε ἓνα παραλληλόγραμμον $AB\Gamma\Delta$ μέ $A = 45^\circ$, βάσιν $(AB) = 6$ ἑκατοστομέτρ., ὕψος $(\Delta E) = 4$ ἑκατοστομέτρων. Ἐπειτα δὲ νά εὑρητε τὸ ἐμβαδὸν αὐτοῦ καί τοῦ τριγώνου $A\Delta E$.



Σχ. 116



Σχ. 117

397. Ἐν τετράγωνον οἰκόπεδον ἔχει ἐμβαδὸν 225 τετραγωνικῶν μέτρων. Περιεφράχθη δὲ μέ συρματοπλέγμα πρὸς 30 δραχμάς τὸ μέτρον. Νά εὑρητε πόσον ἐστοίχισεν ἡ περιφραξὶς αὐτῆ.

398. Μία τριγωνικὴ ἄμπελος ἔχει βάσιν 127 μέτρων καί ὕψος 40 μέτρων. Ἐ-

παλήθη δὲ αὐτὴ πρὸς 1 200 δραχ. τὸ παλαιὸν στρέμμα. Νὰ εὑρητε τὴν ἀξίαν της.

399. Ὁρθογώνιον οἰκόπεδον μὲ διαστάσεις 25 μέτρων καὶ 8,20 μέτρων ἠγύρασθη πρὸς 88,5 δραχ. τὸν τετραγωνικὸν τεκτονικὸν πῆχυν. Νὰ εὑρητε τὴν ἀξίαν του.

400. Ἐνα κυκλικὸν ἀλώνιον ἔχει ἔμβαδὸν 113,04 τετραγωνικά μετρα. Νὰ εὑρητε τὸ μῆκος τῆς περιφερείας αὐτοῦ.

401. Νὰ ἰχνογραφήσητε τὸ σχῆμα 116 καὶ νὰ χρωματίσητε τὰ διάφορα μέρη αὐτοῦ κατ' ἀρέσκειαν.


402. Μία σιταλοθήκη ἔχει σχῆμα ὀρθογωνίου παραλληλεπιπέδου μὲ ὕψος 4 μέτρων καὶ βάσιν τετραγώνου. Χωρεῖ δὲ αὐτὴ 810 κιλὰ σίτου. Νὰ εὑρητε τὸ μῆκος τῆς πλευρᾶς τῆς βάσεως.

403. Μία ὀρθογώνιος ταρατσα ἔχει διαστάσεις 4,5 μέτρων καὶ 3,5 μέτρων. Ἐκαλύφθη δὲ μὲ ὀπλισμένον σκυροκονίαμα πάχους 0,20 μέτρου πρὸς 500 δραχ. κατὰ κυβικὸν μέτρον. Νὰ εὑρητε πόσον ἐστοίχισε.


404. Ἐνα πρισματικὸν τεμάχιον πάγου ἔχει βάσιν 0,60 τετραγωνικοῦ μέτρου καὶ ὕψος 1,2 μέτρων. Νὰ εὑρητε τὸ βάρος του.

405. Τὸ σχῆμα 117 παριστᾷ ὑπὸ κλίμακα 1 : 10 τὸ ἀνάπτυγμα τῆς παραπλευροῦ ἐπιφανείας ἑνὸς ὀρθοῦ πρίσματος. Νὰ εὑρητε τὸ ἔμβαδὸν τῆς ἐπιφανείας ταύτης.


406. Μία κυλινδρική στήλη ἔχει ὕψος 2 μέτρων. Ἡ δὲ κυρτὴ ἐπιφάνεια αὐτῆς




Σχ. 118



Σχ. 119



Σχ. 120



Σχ. 121

ἐκαλύφθη μὲ 6,28 μέτρα ὑφάσματος πλάτους 1 μέτρου. Νὰ εὑρητε τὸν ὄγκον αὐτῆς τῆς στήλης.

407. Ἡ μαρμαρίνη πλάξ μιᾶς σιφωνιέρας ἔχει διαστάσεις 1 μέτρου, 0,80 μέτρου, 0,02 μέτρου. Νά εὑρητε τὸ βάρος αὐτῆς.

408. Ἐνας κόλουρος κῶνος ἔχει ὕψος 4 ἑκατοστομ., $A = 6$ ἑκατοστομέτρων καὶ $a = 3$ ἑκατοστομ. Μέσα εἰς αὐτὸν ὑπάρχει ἕνας κύλινδρος μὲ τὸ αὐτὸ ὕψος καὶ βάσεις μὲ ἀκτῖνα 3 ἑκατοστομέτρ. Νά εὑρητε τὸν ὄγκον τοῦ μέρους τοῦ κολούρου κώνου, τὸ ὁποῖον εὐρίσκεται ἐκτὸς τοῦ κυλίνδρου.

409. Ἡ βάσις ἑνὸς ὀρθογωνίου παραλληλεπίπεδου μετεφέρθη εἰς τὸ αβγδ (σχ. 118), μία δὲ παράπλευρος ἕδρα εἰς τὸ εζηθ ὑπὸ κλίμακα 1 : 10. Νά εὑρητε τὸν ὄγκον αὐτοῦ.

410. Τὸ αβζδ (σχ. 119) εἶναι τὸ σχέδιον μιᾶς ἕδρας ἑνὸς κύβου ὑπὸ κλίμακα 1 : 10. Νά εὑρητε τὸ ἔμβადὸν τῆς ἐπιφανείας καὶ τὸν ὄγκον αὐτοῦ τοῦ κύβου.

411. Τὸ αβγδ (σχ. 120) παριστάνει τὴν βάσιν μιᾶς κανονικῆς πυραμίδος, τὸ δὲ εζη μίαν παράπλευρον ἕδραν αὐτῆς ὑπὸ κλίμακα 1 : 5. Νά εὑρητε τὸ ἔμβადὸν τῆς ἐπιφανείας αὐτῆς τῆς πυραμίδος.

412. Ὁ κύκλος K (σχ. 121) παριστάνει τὴν βάσιν μιᾶς κυλινδρικῆς στήλης, τὸ δὲ ὀρθογώνιον αβγδ μίαν τομὴν αὐτῆς, διερχομένην διὰ τοῦ ἄξονος αὐτῆς. Καὶ τὰ δύο δὲ ὑπὸ κλίμακα 1 : 100. Νά εὑρητε τὸ ἔμβადὸν τῆς κυρτῆς ἐπιφανείας καὶ τὸν ὄγκον αὐτῆς.

413. Ἐνας κύκλος μιᾶς σφαιράς ἀπέχει ἀπὸ τὸ κέντρον τῆς 12 μέτρα καὶ ἔχει περιφέρειαν μήκους 54,52 μέτρων. Νά ἀπεικονίσθητε μέγιστον κύκλον τῆς σφαιράς ταύτης ὑπὸ κλίμακα 1 : 100.

ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΕΙΣ ΑΓΩΓΗ

Διάστημα — Όγκος, σχήμα, επιφάνεια σώματος. Γραμμαί και επιφάνειαι, είδη αὐτῶν — Σημεῖον	Σελ. 5 - 9
Ἴσα καὶ ἄνισα σχήματα. — Εἶδη σχημάτων. — Τὰ κυριώτερα στερεὰ σχήματα	9 - 14
Τί εἶναι Γεωμετρία καὶ εἰς ποῖα μέρη διαιρεῖται	14

ΕΠΙΠΕΔΟΜΕΤΡΙΑ

ΒΙΒΛΙΟΝ Α'

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'. Εὐθεῖαι γραμμαί, χάραξις αὐτῶν. — Διαβήτησ καὶ πρώτη χρῆσις αὐτοῦ. — Ἀθροισμα καὶ διαφορὰ εὐθυγράμμων τμημάτων. — Πῶσ μετροῦμεν ἓνα εὐθύγραμμον τμήμα. — Ποῖαι εἶναι αἱ συνηθέστεραι μονάδεσ μήκουσ	15 - 20
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'. Τί εἶναι γωνία. — Ἴσαι καὶ ἄνισαι γωνίαι. — Κάθετοι καὶ πλάγαι εὐθείαι. — Ὀρθή γωνία. — Γνώμων καὶ χρῆσις αὐτοῦ. — Ἰδιότητες τῶν καθέτων καὶ πλαγίων εὐθειῶν. — Ἐφεξῆσ καὶ διαδοχικαὶ γωνίαι. — Ἀθροισμα καὶ διαφορὰ γωνιῶν. — Συμπληρωματικά, παραπληρωματικά καὶ κατὰ κορυφήν γωνίαι	21 - 32
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'. Τί εἶναι παράλληλοι εὐθεῖαι. — Ταῦ. — Χάραξις παραλλήλων εὐθειῶν. — Παράλληλος μετάθεσις. — Ἰδιότητες παραλλήλων εὐθειῶν	33 - 38
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'. Τί εἶναι κύκλος καὶ τί περιφέρεια κύκλου. — Διάφορα μέρη περιφερείασ καὶ κύκλου. — Σχέσις δύο κύκλων ἢ δύο περιφερειῶν μὲ τὴν αὐτὴν ἀκτίνα. — Σχέσις τῶν χορδῶν ἴσων τόξων καὶ ἀντιστρόφως. — Θέσις εὐθείασ καὶ περιφερείασ. — Θέσις δύο μὴ ὁμοκέντρων περιφερειῶν. — Ἰδιότητες τῆσ διακέντρου καὶ τῆσ κοινῆσ χορδῆσ δύο περιφερειῶν. — Ἰδιότητες τῆσ καθέτου εἰς τὸ μέσον χορδῆσ. — Χάραξις καθέτων εὐθειῶν. — Περιφέρεια τριῶν σημείων. — Ἐπίκεντροι καὶ ἐγγεγραμμένα γωνία. — Ἰδιότητες καὶ ἐφαρμογαὶ αὐτῶν. — Μέτρησις τόξων καὶ γωνιῶν	39 - 55

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'. Εὐθύγραμμα σχήματα καὶ στοιχεῖα αὐτῶν.—Τρίγωνα στοιχεῖα, εἶδη, ιδιότητες αὐτῶν.—Περιπτώσεις ἰσότητος τριγῶνων. Τετράπλευρα καὶ εἶδη αὐτῶν.—Παραλληλόγραμμα, εἶδη καὶ ιδιότη- τες αὐτῶν.—Κανονικὰ εὐθύγραμμα σχήματα, χρῆσις αὐτῶν.—Ἐγγε- γραμμένα καὶ περιγεγραμμένα κανονικὰ εὐθύγραμμα σχήματα.—Ἐ- φαρμογαὶ αὐτῶν	56 - 73
--	---------

ΒΙΒΛΙΟΝ Β'

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'. Τί σημαίνει νὰ μετρήσωμεν μίαν ἐπιφάνειαν.—Αἱ μονά- δες τῶν ἐπιφανειῶν.—Μέτρησις παραλληλογράμμων, τριγῶνων, τραπεζίων, τυχόντων τετραπλεύρων.—Τὸ πυθαγόρειον θεώρημα ..	74 - 82
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'. Μέτρησις περιφερείας καὶ κύκλου, τόξου καὶ κυκλικῆς τομέως	83 - 88

ΣΤΕΡΕΟΜΕΤΡΙΑ

ΒΙΒΛΙΟΝ Γ'

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'. Θέσεις εὐθείας πρὸς ἐπίπεδον.—Κάθετοι καὶ πλάγια πρὸς ἐπίπεδον εὐθεῖαι.—Παράλληλα καὶ τεμνόμενα ἐπίπεδα.—Κάθετα καὶ πλάγια ἐπίπεδα.—Διέδροι καὶ στερεαὶ γωνίαι	89 - 94
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'. Π ο λ ὶ ε δ ρ α.—Πρίσματα, στοιχεῖα καὶ εἶδη αὐ- τῶν.—Παραλληλεπίπεδα.—Πυραμίδες καὶ στοιχεῖα αὐτῶν.—Κόλου- ροι πυραμίδες	95 - 102
Μέτρησις τῶν πρισμάτων καὶ πυραμίδων.—Ἐμβαδὸν ἐπιφανείας ὀρθοῦ πρίσματος καὶ κανονικῆς πυραμίδος.—Ὀγκος παραλληλεπι- πέδου.—Μονάδες βάρους.—Σχέσις ὄγκου, βάρους καὶ εἰδικοῦ βάρους σώματος.—Ὀγκος πρίσματος καὶ πυραμίδος	102 - 112
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'. Κύλινδρος.—Κῶνος.—Κόλυρος κῶνος.—Ἐμβαδὸν τῆς ἐπιφανείας καὶ ὄγκος ἐκάστου	113 - 120
Σφαῖρα.—Θέσεις σφαίρας καὶ ἐπιπέδου.—Ἐῤρεσις τῆς ἀκτίνος σφαι- ρας—Κύκλοι σφαιρας.—Ἐμβαδὸν τῆς ἐπιφανείας καὶ ὄγκος σφαιρας ..	120 - 126
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'. Μεταφορὰ εὐθυγράμμου σχήματος εἰς ἐπίπεδον.—Κλί- μακες.—Χάραξις εὐθείας γραμμῆς εἰς τὸ ἔδαφος.—Ἀσκήσεις πρὸς γενικὴν ἐπανάληψιν	127 - 133
Πίναξ περιεχομένων	134 - 135

Τὰ ἀντίτυπα τοῦ βιβλίου φέρουν τὸ κάτωθι βιβλιοσήμον εἰς ἀπόδειξιν τῆς γνησιότητος αὐτῶν.

Ἄντίτυπον στερούμενον τοῦ βιβλιοσήμου τούτου θεωρεῖται κλεψίτυπον. Ὁ διαθέτων, πωλῶν ἢ χρησιμοποιοῦν αὐτὸ διώκεται κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 7 τοῦ νόμου 1129 τῆς 15) 21 Μαρτίου 1949 (Ἐφ. Κυβ. 1946, Α' 108).



ΕΚΔΟΣΙΣ Θ', 1963 (VI) — ΑΝΤΙΤΥΠΑ 30.000 — ἀριθ. Συμβ. 1171) 24 - 5 - 63

Ἐκτύπωσης - Βιβλιοδεσίας : Ν. ΤΙΑΠΕΡΟΓΛΟΥ καὶ Σία - Μεσιδώνη 15 - Ἀθήναι

0,

