

ΝΕΙΛΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ

ΕΝ ΤΩ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩ ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΟΛῃ ΤΩΝ Ν. ΔΟΚΙΜΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΔΡΙΘΜΗΤΙΚΗ

Διὰ τὰ ἑλληνικὰ σχολεῖα, τὰ ἄστικὰ
καὶ τὰ ἀνώτερα παρθεναγωγεῖα

Ἐγκρίθη κατὰ τὴν ἐπ' ἀριθ. $\frac{36398}{4-11-17}$ κοινολοίσειν
τοῦ Ὑπουργείου τῆς Παιδείας

ΕΚΔΟΣΙΣ ΕΝΑΤΗ

Ἄριθ. πράξεως Ἐκπ. Συμβ.	$\frac{762}{2-10-21}$
τιμὴν μετὰ βιβλίου καὶ φόρον δρ.	19.00
ἄξια βιβλιοσύμμοσ	7.30
Πρόσθ. αὐτὸς φόρος ἀναγκ. δαν.	0,70



ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΙΩΑΝΝΟΥ Ν. ΣΙΔΕΡΟΥ
ὉΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ—ΜΕΓΑΡΟΝ ΑΡΧΑΙΚΕΙΟΥ

1924

Απρίλ. Μάϊου.

$$= 126 - 126 =$$

οταν η μορφή
ταίριαζε και η φύση

αρω.
126

ΝΕΙΛΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

Μειντζ.
126


ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ
ΕΝ ΤΩ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩ ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΤΩΝ Ν. ΔΟΚΙΜΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ

Διὰ τὰ ἑλληνικὰ σχολεῖα, τὰ ἀστικά
καὶ τὰ ἀνώτερα παρθεναγωγεῖα

Ἐνεκρίθη κατὰ τὴν ὑπ' ἀριθ. $\frac{36798}{4-11-17}$ κοινοποίησιν
τοῦ Ὑπουργείου τῆς Παιδείας

ΕΚΔΟΣΙΣ ΕΝΑΤΗ



ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΙΩΑΝΝΟΥ Ν. ΣΙΔΕΡΗ
ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ—ΜΕΓΑΡΟΝ ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ

1924

Πᾶν ἀντίτυπον μὴ φέρον τὴν ὑπογραφήν τοῦ συγγραφέως
θεωρεῖται κλεψίτυπον.

Μανιχαριστίου

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Κεφάλαιον		Σελίς
	I. Περὶ γραφῆς καὶ ἀπαγγελίας τῶν ἀριθμῶν	5— 12
»	II. Περὶ προθέσεως	13— 20
»	III. Περὶ ἀφαιρέσεως	20— 28
»	IV. Περὶ πολλαπλασιασμοῦ	28— 41
»	V. Περὶ διαιρέσεως	41— 54
»	VI. Περὶ διαιρετότητος καὶ περὶ πρώτων ἀριθμῶν	54— 59
»	VII. Περὶ τοῦ μεγ. κ. διαιρέτου καὶ τοῦ ἐλ. κ. πολλαπλασίου ἀριθμῶν	59— 65
»	III. Περὶ τῶν δεκαδικῶν ἀριθμῶν	66— 82
»	IX. Περὶ τῶν κλασματικῶν ἀριθμῶν	83—123
»	X. Περὶ μέτρων, σταθμῶν καὶ νομισμάτων	124—133
	Πίναξ τῶν κυριωτέρων μονάδων αἱ ὁποῖαι εἶνε ἐν χρήσει εἰς τὰ διάφορα μέρη	130—131
»	XI. Περὶ τῶν συμμιγῶν ἀριθμῶν	132—151
»	XII. Περὶ λόγων καὶ ἀναλογιῶν	152—160
	Περὶ μεθόδων	160—169
	ΧΙ Τ Προβλήματα ὑπολογισμοῦ ποσοστῶν	169—175
	ΧΙΜ Περὶ τόκου	176—187
	Περὶ ὑφαιρέσεως	187—191
	Προβλήματα μίξεως	191—196
	Περὶ μερισμοῦ εἰς μέρη ἀνάλογα	196—199
	Προβλήματα ἑταιροείας	199—203
»	XIII. Περὶ τετραγωνικῆς ρίζης	203—208
	Διάφορα προβλήματα	208—213
»	XIV. Στοιχεῖα Λογιστικῆς καὶ Καταστιχογραφίας	214—240

Σημειώσεις διὰ τὸν διδάσκοντα.

Τὰ προβλήματα τοῦ βιβλίου εἰς τὰ ὁποῖα δὲν ἀναγράφεται ἀκριβῶς τὸ εἶδος τοῦ ἐμπορεύματος καλὸν εἶνε νὰ συμπληροῦνται κατὰ τὴν διδασκαλίαν καταλλήλως ὑπὸ τοῦ καθηγητοῦ, ὥστε αἱ τιμαὶ τοῦ ἐμπορεύματος νὰ ἀρμόζουιν κατὰ τὸ δυνατόν μὲ τοὺς ἀναγραφομένους ἀριθμοὺς εἰς τὸ πρόβλημα, νὰ εἶνε δὲ τὸ ἐμπόρευμα ἐκ τῶν μᾶλλον γνωστῶν εἰς τοὺς μαθητὰς καὶ πρὸς τοῦτο ἐκ τῶν προϊόντων ἰδίως τοῦ τόπου ἐν ᾧ λειτουργεῖ τὸ σχολεῖον.



§ 1. Περὶ ἀριθμῆσεως καὶ ἀριθμοῦ.—

α') Ἐὰν ἔχωμεν ἓν πλῆθος μῆλων, δυνάμεθα νὰ κάμωμεν ἐρωτήσεις περὶ αὐτῶν. Π. χ. πόσον βάρος, ἢ ποῖον χρῶμα, ἔχουν; ἢ πόσα μῆλα ἔχει τὸ πλῆθος; Διὰ ν' ἀπαντήσωμεν εἰς τὴν τελευταίαν ἐρώτησιν, λαμβάνομεν ἓν μῆλον ἀπὸ τὸ πλῆθος καὶ τὸ θέτομεν χωριστὰ ἀπὸ τὰ ἄλλα. Πλησίον του θέτομεν ἓν ἄλλο, τὸ ὅποσον λαμβάνομεν ἀπὸ τὰ πομείναντα τοῦ πλῆθους καὶ λέγομεν ὅτι ἔχομεν δύο μῆλα χωριστὰ ἀπὸ τὸ πλῆθος. Ἐπειτα λαμβάνομεν ἓν ἀκόμη ἀπὸ τὰ τὰ πομείναντα, θέτομεν αὐτὸ πλησίον τῶν δύο καὶ λέγομεν ὅτι ἐλάβομεν τρία μῆλα ἀπὸ τὸ πλῆθος. Οὕτω καθεξῆς ἐξακολουθοῦμεν ὁμοίως, ἐνόσω μένου ἀκόμη μῆλα εἰς τὸ πλῆθος. Ἀφοῦ λάβωμεν ὅλα τὰ μῆλα τοῦ πλῆθους, κατὰ τὸν τρόπον τὸν ὅποσον εἶπομεν, θὰ εὔρωμεν πόσα μῆλα ἔχομεν, π. χ. ἑννέα μῆλα.

Ἡ ἐργασία αὕτη, διὰ τῆς ὁποίας εὐρίσκομεν, πόσα μῆλα ἔχει τὸ δοθὲν πλῆθος τῶν μῆλων, λέγεται ἀριθμῆσις τῶν μῆλων, τὸ δὲ ἐξαχθένον τῆς ἀριθμῆσεως λέγεται ἀριθμός, καὶ δίδει τὴν ἀπάντησιν εἰς τὴν ἀνωτέρω ἐρώτησιν. Καθ' ὅμοιον τρόπον δυνάμεθα ν' ἀριθμήσωμεν ἓν πλῆθος βῶλων, γλυκυσμάτων, κλπ., ἐκ τῶν ὁποίων ἀποτελεῖται καθὲν πλῆθος. Τὸ ἓν τῶν μῆλων, ὃ εἰς βῶλος, ἢ τὸ ἓν γλύκισμα ἐκ τοῦ πλῆθους τῶν λέγεται καὶ μονὰς μῆλων, βῶλων, γλυκυσμάτων, καθεὶς δ' ἀριθμὸς ἀποτελεῖται, ἐν γένει, ἀπὸ πολλῶν μονάδων, ἧτοι εἶνε τὸ σύνολον πολλῶν μονάδων.

β') Ἐὰν ἔχωμεν ἓν πλῆθος σάκκων, οἱ ὅποιοι εἶνε πλήρεις μῆλων, καὶ θέλωμεν νὰ εὔρωμεν πόσους σάκκους μῆλων ἔχει τὸ

πλήθος αυτό, θά θέτωμεν κατὰ μέρος ἕνα-ἕνα σάκκον, καὶ θά κάμω-
μεν τὴν ἀρίθμησιν. Εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν, καθὼς καὶ εἰς ἄλλας
ὁμοίας, βλέπομεν ὅτι ἡ μονὰς τῶν σάκκων τούτων ἔχει πολλὰ μῆλα
καὶ ὄχι ἕν μόνον. Ἐκ τῶν ἀνωτέρω συνάγομεν ὅτι,

γ') «μονὰς λέγεται ἕν ἀπὸ πολλὰ ὁμοία πράγματα, ἢ καὶ
πολλὰ πράγματα, τὰ ὁποῖα θεωροῦμεν ὡς ἕν ὄλον».

δ') «Ἀριθμὸς λέγεται τὸ σύνολον πολλῶν μονάδων, ἢ καὶ μία
μονὰς».

ε') «Ἀρίθμησις ἐνὸς πλήθους λέγεται ἡ εὗρεσις τοῦ ἀριθμοῦ,
ὁ ὁποῖος παριστάνει τὸ πλήθος».

στ') Ἐνίστε τὸ εἶδος τῶν ἀντικειμένων, τὰ ὁποῖα ἀριθμοῦμεν, μᾶς
εἶνε ἐντελῶς ἀδιάφορον. Οὕτω, ἐὰν εἰς ἐννέα πράγματα, τὰ ὁποῖα ἔχο-
μεν, θέσωμεν καὶ ἄλλα τέσσαρα τοῦ αὐτοῦ εἶδους, θά ἔχωμεν δεκατρία
πράγματα τοῦ εἶδους αὐτοῦ. Εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν καλοῦμεν τὸν
ἀριθμὸν τοῦτον ἀφηρημένον. Π. χ. δέκα, τρία, ὀκτώ, κλπ. Ἐνῶ τοὺς ἀ-
ριθμοὺς εἰς τοὺς ὁποίους δηλώνομεν καὶ τὸ εἶδος τῶν ἀντικειμένων, τὰ
ὁποῖα παριστάνουν, καλοῦμεν συγκεκριμένους. Π. χ. ὀκτῶ μῆλα, δώδε-
κα θρανία, ἑπτὰ βῶλοι κλπ.

ζ') Ἐὰν δύο ἢ περισσότεροι ἀριθμοὶ παριστάνουν τὸ αὐτὸ πρᾶγμα,
π.χ. ὀκτῶ μῆλα, δέκα μῆλα, λέγονται ὁμοειδεῖς, ἐνῶ, ἐὰν παριστάνουν
διάφορα πράγματα, π. χ. τρεῖς ἄνθρωποι, πέντε δραχμαί, λέγονται ἑτε-
ροειδεῖς.

§ 2. Ἴσοι καὶ ἄνισοι ἀριθμοί. —

α') Δύο ἀριθμοὶ λέγονται ἴσοι, ἐὰν ἀποτελοῦνται ἀπὸ τὸ αὐτὸ πλήθος
μονάδων δηλαδή, ἐὰν ὅσας μονάδας ἔχη ὁ εἰς τόσας ἔχει καὶ ὁ ἄλλος.
Π. χ. ὁ ἀριθμὸς τῶν δακτύλων τῆς δεξιᾶς χειρὸς καὶ τῶν τῆς ἀριστερᾶς.
Σημειώνομεν ὅτι δύο ἀριθμοὶ εἶνε ἴσοι, ἐὰν μεταξὺ τῶν γράψωμεν τὸ
σημεῖον ἴσον (=). Π. χ. ἐννέα ἴσον ἐννέα γράφεται ἐννέα=ἐννέα.

β') Ἐὰν ἐκ δύο ἀριθμῶν ὁ εἰς ἔχη περισσοτέρας μονάδας τοῦ
ἄλλου, λέγεται μεγαλύτερος αὐτοῦ, ὁ ἄλλος μικρότερος τοῦ
πρώτου. οἱ δύο δὲ ἀριθμοὶ λέγονται ἄνισοι. Π. χ. οἱ ἀριθμοὶ τρία
καὶ ἑπτὰ εἶνε ἄνισοι. Σημειώνομεν ὅτι δύο ἀριθμοὶ εἶνε ἄνισοι

διὰ τοῦ σημείου $>$ ἢ $<$ γράφοντες εἰς τὸ κοῖλον μέρος τούτου τὸν μεγαλύτερον ἀριθμὸν καὶ εἰς τὸ κυρτὸν τὸν μικρότερον. Π. χ. τρία $<$ ἑπτὰ, ὀκτῶ $>$ πέντε καὶ ἀπαγγέλλομεν τρία μικρότερον τοῦ ἑπτὰ, ὀκτῶ μεγαλύτερον τοῦ πέντε.

γ') Τὸ σύνολον τῶν ἀφήρημένων ἀριθμῶν ἔν, δύο, τρία, τέσσαρα, . . . οἱ ὅποιοι προκύπτουν ἐκ τῆς ἀριθμήσεως, λέγομεν ὅτι ἀποτελοῦν τὴν φυσικὴν σειρὰν τῶν ἀριθμῶν, ἣ ὁποία δὲν ἔχει τέλος. Διότι, ἡ προσθήκη μιᾶς μονάδος εἰς καθένα αὐτῶν δύναται νὰ γίνεταί πάντοτε. Ὁ καθεὶς ἀριθμὸς τῆς σειρᾶς αὐτῆς εἶνε μεγαλύτερος ἐνὸς οἰουδήποτε ἐκ τῶν προηγουμένων του καὶ μικρότερος τῶν ἐπομένων του.

§ 3. Τὸ δεκαδικὸν σύστημα τῆς ἀριθμήσεως.—

α') Κατὰ τὸν σχηματισμὸν τῆς φυσικῆς σειρᾶς τῶν ἀριθμῶν ἀπαιτεῖται ὄχι μόνον ἡ προσθήκη μιᾶς μονάδος εἰς τὸν ἐκάστοτε προκύπτοντα ἀριθμὸν (διὰ νὰ εὐρεθῇ ὁ ἀμέσως ἐπόμενός του), ἀλλὰ καὶ νὰ κρατῶμεν εἰς τὴν μνήμην μας τὰ ὀνόματα ἑλῶν τῶν ἀριθμῶν, οἱ ὅποιοι προκύπτουν τοιοῦτοτρόπως καὶ τὰ ὅποια εἶνε ὅσοι καὶ οἱ ἀριθμοὶ, δηλαδὴ δὲν ἔχουν τέλος. Διὰ νὰ κάμωμεν τὴν ὀνομασίαν τῶν ἀριθμῶν εὐκολωτέραν καὶ διὰ νὰ δυνάμεθα εὐκολώτερον νὰ ἐνθυμούμεθα τὰς ὀνομασίας, ἐργαζόμεθα ὡς ἑξῆς.

Ἄς ὑποθέσωμεν ὅτι ἔν παιδίον ἔχει ἔν πληθὺς βῶλων. Διὰ νὰ εὕρῃ τὸν ἀριθμὸν των, θέτει τοὺς βῶλους ἀνὰ δέκα εἰς σειρὰς. Οὕτω εὕρισκεὶ δύο σειρὰς π.χ. καὶ τοῦ μένου καὶ τέσσαρες βῶλοι ἀκόμη.



Τὸ σύνολον τῶν βῶλων καθεμιᾶς σειρᾶς ἀπὸ δέκα καλοῦμεν δεκάδα ἢ μονάδα δευτέρας τάξεως. Ὡστε τὸ παιδίον ἔχει δύο δεκάδας καὶ τέσσαρας βῶλους. Ἐὰν εἶχε περισσοτέρους βῶλους, ὥστε αἱ δεκάδες, τὰς ὁποίας θὰ ἐσχημάτιζε, νὰ ἦσαν π.χ. εἴκοσι πέντε, νὰ ἔμενον δὲ καὶ ἑπτὰ βῶλοι ἀκόμη (ἐπειδὴ ἡ αὐτὴ δυσκολία θὰ παρουσιάζετο καὶ τώρα διὰ τὴν ὀνομασίαν τοῦ ἀριθμοῦ τῶν δεκάδων) θὰ ἠδύνατο, ὁμοίως ἐργαζόμενον, νὰ σχηματίσῃ ἐκ δέκα δεκάδων μίαν ἑκατοντάδα, ἢ μίαν μονάδα τρίτης τάξεως καὶ θὰ εἶχε δύο ἑκατοντάδας, πέντε δεκάδας καὶ ἑπτὰ βῶλους.

β') Βλέπομεν λοιπόν, ὅτι μὲ δέκα μονάδας, τὰς ὁποίας καλοῦμεν καὶ μονάδας ἀπλᾶς, ἢ πρώτης τάξεως, σχηματίζομεν μίαν μονάδα δευτέρας τάξεως, ἢ μίαν δεκάδα. Μὲ δέκα μονάδας δευτέρας τάξεως σχηματίζομεν μίαν μονάδα τρίτης τάξεως, ἢ μίαν ἑκατοντάδα. Καθ' ὁμοίον τρόπον μὲ δέκα μονάδας τρίτης τάξεως σχηματίζομεν μίαν τετάρτης, ἢ μίαν χιλιάδα μὲ δέκα χιλιάδας μίαν δεκάδα χιλιάδων κλπ. Ἐὰν οἱ βῶλοι τοῦ παιδίου ἦσαν πολλοὶ περισσότεροι καὶ ἐτακτοποιεῖ αὐτοὺς εἰς σειρὰς ἐκ χιλιάδων, ἑκατοντάδων, δεκάδων καὶ τοῦ ἔμμενον ἀκόμη, αὐτοὶ θὰ ἦσαν ὀλιγώτεροι τῶν δέκα. Θὰ γνωρίζῃ λοιπόν τὸ παιδίον πόσους βῶλους ἔχει, ἐὰν εὕρῃ πόσας σειρὰς ἐκ χιλιάδων, ἑκατοντάδων, δεκάδων ἔχει καὶ πόσοι βῶλοι τοῦ μένου ἀκόμη.

γ') Ὁ σχηματισμὸς τῶν ἀριθμῶν κατὰ τὸν ἀνωτέρω τρόπον, ὥστε ἀπὸ δέκα μονάδας μιᾶς τάξεως νὰ σχηματίζεται μία μονὰς ἀμέσως μεγαλύτερας τάξεως, λέγεται δεκαδικὸν σύστημα ἀριθμήσεως. Ἡ ἀπλῆ μονὰς, ἢ δεκάς, ἢ ἑκατοντάς, ἢ χιλιάς, ἢ δεκάς χιλιάδων, ἢ ἑκατοντάς χιλιάδων, τὸ ἑκατομμύριον κλπ. λέγονται μονάδες διαφόρων τάξεων.

§ 4. Ὀνομασία τῶν ἀριθμῶν. —

α') Τὸ δεκαδικὸν σύστημα εὐκολύνει νὰ σχηματίζομεν ὅλα τὰ τὰ ὀνόματα τῶν ἀριθμῶν μὲ ὀλίγας λέξεις, τὰς ὁποίας διακρίνομεν εἰς δύο κατηγορίας. 1) τὰς λέξεις ἔν. δύο, τρία, τέσσαρα, πέντε, ἕξ, ἐπτά, ὀκτώ, ἐννέα, μηδέν. 2) τὰς μονάς, δεκάς, ἑκατοντάς, χιλιάς, δεκάς χιλιάδων, ἑκατοντάς χιλιάδων, ἑκατομμύριον, δεκάς ἑκατομμυρίου, δισεκατομμύριον κλπ. Μὲ αὐτὰς δυνάμεθα νὰ ἐκφράσωμεν οἷονδήποτε ἀριθμὸν, ἐὰν μεταχειρίζομεθα τὴν λέξιν μηδέν, διὰ νὰ ἐκφράσωμεν τὴν ἔλλειψιν μονάδων.

Πραγματικῶς, ἐὰν ἔχωμεν ἓνα ἀριθμὸν μῆλων, εὕρωμεν δὲ ὅτι ὁ ἀριθμὸς αὐτὸς ἔχει ὀκτὼ δεκάδας χιλιάδων, πέντε χιλιάδας, μηδέν ἑκατοντάδας, τρεῖς δεκάδας καὶ τέσσαρας μονάδας π.χ., ἔχομεν ἀμέσως τὸ ὄνομα τοῦ ἀριθμοῦ διὰ τῶν λέξεων τούτων.

β') Τὴν δεκάδα λέγομεν καὶ δέκα, τὰς δύο δεκάδας καὶ εἴκοσι, τὰς τρεῖς καὶ τριάκοντα, τὰς τέσσαρας καὶ τεσσαράκοντα, τὰς πέντε, ἕξ, ἐπτά, ὀκτώ, ἐννέα καὶ πενήκοντα, ἐξήκοντα, ἑβδομή-

κοντα, ογδοήκοντα, ἐνενηήκοντα. Ἐπίσης τὴν ἑκατοντάδα καλοῦμεν καὶ ἑκατόν, τὰς δύο ἑκατοντάδας καὶ διακόσια καὶ οὕτω καθεξῆς τὰς τρεῖς, τέσσαρας, πέντε ἕξ κλπ. καὶ τριακόσια, τετρακόσια, πεντακόσια, ἑξακόσια, ἑπτακόσια, ὀκτακόσια, ἐννεακόσια. Τὴν χιλιάδα καλοῦμεν καὶ χίλια, τὴν δεκάδα χιλιάδων καὶ δέκα χιλιάδας κ. ο. κ. εἴκοσι χιλιάδας, τριάκοντα χιλιάδας, .. ἑκατόν χιλιάδας.

λ γ') Ἀντὶ τῶν ὀνομασιῶν μίᾳ δεκάς καὶ μίᾳ μονάς, μίᾳ δεκάς καὶ δύο μονάδες κλπ. λέγομεν ἔνδεκα, δώδεκα, δέκα τρία, δέκα τέσσαρα, δέκα πέντε, δέκα ἕξ, δέκα ἑπτὰ, δέκα ὀκτώ, δέκα ἐννέα, κ. ο. κ.

Κατὰ ταῦτα ὁ ἀριθμὸς, ὁ ὁποῖος ἔχει μίαν δεκάδα χιλιάδων, πέντε χιλιάδας, ἕξ ἑκατοντάδας, τρεῖς δεκάδας καὶ δύο μονάδας ἔχει τὴν ὀνομασίαν δέκα πέντε χιλιάδες ἑξακόσια τριάκοντα δύο.

Ἄ σ κ ή σ ε ι ς .

1) Πόσας μονάδας ἔχει α') μίᾳ χιλιάς; β') μίᾳ δεκάς χιλιάδων; γ') μίᾳ ἑκατοντάς χιλιάδων; δ') ἓν ἑκατομμύριον;

2) Πόσας ἑκατοντάδας ἔχει α') μίᾳ χιλιάς; β') μίᾳ δεκάς χιλιάδων; γ') μίᾳ ἑκατοντάς χιλιάδων;

3) Πόσας ἑκατοντάδας ἔχει τὸ ἓν ἑκατομμύριον;

4) Μίᾳ μονάς μιᾶς τάξεως πόσας μονάδας ἔχει τῆς ἀμέσως κατωτέρως τάξεως;

5) Ποίᾳς τάξεως μονάς εἶνε ἡ μονάς τῶν χιλιάδων; ἡ δεκάς τῶν χιλιάδων; ἡ ἑκατοντάς τῶν χιλιάδων; τὸ ἑκατομμύριον, τὸ δισεκατομμύριον;

§ 35. Περὶ γραφῆς τῶν ἀριθμῶν. —

α') Ἄν καὶ δυνάμεθα νὰ γράφωμεν οἰονδήποτε ἀριθμὸν μὲ τὸ ὄνομά του, δηλαδὴ μὲ τὴν λέξιν ἢ τὰς λέξεις τοῦ ὀνόματός του, ἐν τούτοις οἱ Ἴνδοι εὗρον ἐν μέσῳ διὰ τοῦ ὁποῖου γράφωμεν εὐκολώτερον πάντα ἀριθμὸν, καθὼς ἀμέσως θὰ ἴδωμεν.

Καθὼς ἀνωτέρω εἶδομεν, δυνάμεθα νὰ γράφωμεν καθένα ἀριθμὸν διὰ τῶν λέξεων ἓν, δύο, τρία, τέσσαρα, πέντε, ἕξ, ἑπτὰ, ὀκτώ, ἐννέα, μηδὲν καὶ τῶν μονάδων τῶν διαφόρων τάξεων.

Ἐάν ἀντὶ τῶν λέξεων αὐτῶν εἰσαγάγωμεν τὰ σύμβολα 1· 2· 3· 4· 5· 6· 7· 8· 9· 0, τὰ ὁποῖα λέγονται ψηφία καὶ ἀντὶ τῶν

ονομασιῶν τῶν μονάδων τῶν διαφόρων τάξεων τὰς ἀρχικὰ γράμματα τῶν Μ, Δ, Ε, Χ, Δ_κ, Ε_κ, Μ_ε, Δ_ε, Ε_ε, κλπ., δυνάμεθα ἀντὶ τοῦ ἀριθμοῦ π. χ. ὀκτὼ χιλιάδες τετρακόσι εἴκοσι πέντε

X E Δ M

νά γράψωμεν συντομώτερον 8 4 2 5. Ἀκόμη ὅμως συντομώτερον θὰ κάμωμεν τὴν γραφὴν τοῦ ἀριθμοῦ, ἐὰν ὀρίσωμεν ζτι, αἱ ἀπλαῖ μονάδες τοῦ ἀριθμοῦ θὰ εὐρίσκωνται πάντοτε εἰς τὴν πρώτην θέσιν πρὸς τὰ δεξιὰ· αἱ δεκάδες εἰς τὴν δευτέραν· αἱ ἑκατοντάδες εἰς τὴν τρίτην, κ.ο.κ., παρκαλείπωμεν δὲ τοιοῦτοτρόπως τὴν γραφὴν τῶν γραμμάτων Μ, Δ, Ε, ... ὡς μὴ χρησίμων πλέον. Οὕτω διὰ τὸν ἀριθμὸν ὀκτὼ χιλιάδες τετρακόσια εἴκοσι πέντε, ἀντὶ τοῦ

X E Δ M

8 4 2 5

ἀρκεῖ νά γράψωμεν 8425.

β') Ἐὰν εἰς ἓνα ἀριθμὸν δὲν ὑπάρχουν μονάδες μιᾶς τάξεως, παριστάνομεν τὴν ἔλλειψιν αὐτὴν, ὡς γνωστὸν, μὲ τὸ μηδέν καὶ γράφομεν εἰς τὴν θέσιν τῆς τάξεως αὐτῆς τῶν μονάδων τὸ σύμβολον 0.

γ') Καθὼς βλέπομεν, διὰ καθὲν ψηφίον ἑνὸς ἀριθμοῦ ἔχομεν νά παρατηρήσωμεν· 1) τὴν ἀξίαν του ὡς ψηφίου καὶ 2) τὴν ἀξίαν του ὡς ἐκ τῆς θέσεως, τὴν ὁποῖαν τοῦτο ἔχει εἰς τὸν ἀριθμὸν μεταξὺ τῶν ἄλλων ψηφίων, τῆς τάξεως μετρομένης ἐκ δεξιῶν πρὸς τὰ ἀριστερά.

Ἀ σ κ ῆ σ ε ι ς .

1) Νά γραφοῦν διὰ ψηφίων οἱ ἀριθμοὶ α') διακόσια ἐξήκοντα ἑπτὰ· β') ἑπτακόσια ὀγδοήκοντα ἕξ· γ') πεντακόσια τεσσαράκοντα· δ') ἑνεακόσια δύο· ε') ἑπτακόσια ἓν· ς') πέντε χιλιάδες τριακόσια ἐξήκοντα ἕξ.

2) Ὅμοίως οἱ ἀριθμοὶ α') χίλια τετρακόσια πενήκοντα τέσσαρα· β') ἑννέα χιλιάδες ἐξήκοντα· γ') ἑννέα χιλιάδες ἑκατὸν ἑπτὰ.

3) Νά γραφοῦν διὰ ψηφίων οἱ ἀριθμοὶ

X M E	X Δ E	X E M	Με	Mχ
α') 7 8 3.	β') 7 8 3	γ') 7 8 3	δ') 74.	ε') 84.

4) Ὅμοίως οἱ ἀριθμοὶ α') 25· β') 183· γ') 95· δ') 83.

§ 6. Περὶ ἀπαγγελίας τῶν ἀριθμῶν. —

α') Ἐστω ὁ ἀριθμὸς 24. Διὰ ν' ἀπαγγελλόμεν αὐτόν, ἢ ἀπαγγέλλομεν ὀλόκληρον ὡς μονάδας, τὰς ὁποίας παριστάνει τὸ τελευταῖόν του ψηφίον, δηλαδὴ ὡς ἀπλᾶς μονάδας, ἢ ἀπαγγέλλομεν καθὲν ψηφίον του χωριστὰ ἐξ ἀριστερῶν πρὸς τὰ δεξιὰ μὲ τὸ ὄνομα τῆς τάξεως τῶν μονάδων του, τὰς ὁποίας παρξστάνει. Οὕτω λέγομεν εἴκοσι τέσσαρες μονάδες, ἢ δύο δεκάδες καὶ τέσσαρες μονάδες. Ὅμοιως τὸν ἀριθμὸν 648 ἀπαγγέλλομεν, ἐὰν εἴπωμεν, ἑξακόσια τεσσαράκοντα ὀκτώ μονάδες ἢ ἐξ ἑκατοντάδες, τέσσαρες δεκάδες καὶ ὀκτὼ μονάδες.

β') Ὅταν ὁ ἀριθμὸς ἔχη περισσότερα τῶν τριῶν ψηφίων, ἀπαγγέλλεται κατὰ δύο τρόπους κυρίως. 1) χωρίζομεν αὐτὸν εἰς τριμήφια τμήματα ἐκ δεξιῶν πρὸς τὰριστερὰ καὶ ἀκολουθῶς ἀπαγγέλλομεν καθὲν τούτων μὲ τὸ ὄνομα τῶν μονάδων τοῦ τελευταίου του ψηφίου πρὸς τὰ δεξιὰ τὸ πρῶτον τριψήφιον τμήμα πρὸς τὰ δεξιὰ λέγεται τμήμα τῶν ἀπλῶν μονάδων, τὸ ἀμέσως ἐπόμενόν του τμήμα τῶν χιλιάδων, τὸ ἀμέσως ἐπόμενον τμήμα τῶν ἑκατομμυρίων, τὸ ἄλλο τμήμα τῶν δισεκατομμυρίων κλπ. Εἶνε φανερόν ὅτι, κατὰ τὸν χωρισμὸν τοῦ ἀριθμοῦ εἰς τριψήφια τμήματα εἶνε δυνατόν τὸ τελευταῖον τμήμα πρὸς τὰριστερὰ νὰ εἶνε διψήφιον ἢ μονοψήφιον. 2) ἀπαγγέλλομεν καθὲν ψηφίον τοῦ ἀριθμοῦ χωριστὰ μὲ τὸ ὄνομα τῶν μονάδων του.

γ') Καὶ κατὰ τὰς δύο περιπτώσεις ἀρχίζομεν συνήθως τὴν ἀπαγγελίαν ἐκ τοῦ πρώτου ψηφίου ἢ τμήματος ἐξ ἀριστερῶν. Κατὰ ταῦτα, τὸν ἀριθμὸν 6834572 ἀπαγγέλλομεν λέγοντες. 1) ἐξ ἑκατομμύρια, ὀκτακόσια τριάκοντα τέσσαρες χιλιάδες, πεντακόσια ἑβδομήκοντα δύο ἢ 2) ἐξ ἑκατομμύρια, ὀκτὼ ἑκατοντάδες χιλιάδων, τρεῖς δεκάδες χιλιάδων, τέσσαρες χιλιάδες, πέντε ἑκατοντάδες, ἑπτὰ δεκάδες, καὶ δύο μονάδες.

Ἀ σ κ ῆ σ ε ι ς.

1) Ἀπαγγελάτε τοὺς ἐπομένους ἀριθμοὺς καὶ εὑρετε πόσες μονάδας, δεκάδας, ἑκατοντάδας κλπ. ἐν ὄλῳ ἔχει καθεὶς ἐξ αὐτῶν 245· 569· 950· 907· 1000· 2635· 7400.

2) Ὅμοιως διὰ τοὺς ἀριθμοὺς 64000· 87000· 600070· 637535· 507402· 24693972· 9324652.

3) α') Γράψατε ἓνα ἀριθμὸν, π. χ. τὸν 643 καὶ ἔπειτα πρὸς τὰριστερὰ τοῦ 6 ἐν, δύο, τρία... μηδενικά καὶ ἀπαγγελάτε ἔπειτα τὸν νέον ἀριθμὸν. Τί παρατηρεῖτε λοιπόν, ἐὰν πρὸς τὰ τὰριστερὰ ἐνὸς ἀριθμοῦ γράψωμεν ὁσδήποτε μηδενικά; β') Μεταβάλλεται ἡ ἀξία

τοῦ 643, ἐὰν μετὰ τὸ ψηφίον 3 γράψωμεν ἐν μηδὲν καὶ ποῖαν θέσιν λαμβάνει τότε τὸ ψηφίον τῶν μονάδων τοῦ 643; ποῖαν τὸ ψηφίον τῶν δεκάδων καὶ ποῖαν τὸ τῶν ἑκατοντάδων; Τί παθαίνει λοιπὸν ἡ ἀξία τοῦ 643, ἐὰν εἰς τὸ τέλος τοῦ πρὸς τὰ δεξιὰ γράψωμεν ἐν 0; γ') Μεταβάλλεται ἡ ἀξία τοῦ 643, ἐὰν δεξιὰ τοῦ 3 γράψωμεν δύο μηδενικά καὶ ποῖαν θέσιν λαμβάνει τὸ ψηφίον τῶν δεκάδων, τὸ τῶν ἑκατοντάδων; Τί παθαίνει ἡ ἀξία ἑνὸς ἀριθμοῦ, ἐὰν εἰς τὸ τέλος πρὸς τὰ δεξιὰ τοῦ γράψωμεν ἐν, δύο, ... μηδενικά;

§ 7. Αἱ ἐν Ἑλλάδι κυριώτεραι μονάδες μετρήσεως μήκους, βάρους, χρόνου κλπ.—

α') Συνήθως οἱ συγκεκριμένοι ἀριθμοὶ ἔχουν τὴν ἐπωνυμίαν μέτρα πῆχεις, χιλιόμετρα, ὀκάδες, δράμα, δραχμαί, λεπτά κλπ. Αἱ κυριώτεραι μονάδες τοῦ μήκους, βάρους, χρόνου καὶ νομισμάτων, τῶν ὁποίων γίνεται χρῆσις ἐν Ἑλλάδι εἶνε αἱ ἑξῆς.

β') Πρὸς μέτρησιν τοῦ μήκους μεταχειρίζονται συνήθως ὡς μονάδα τὸ μέτρον, τὸ ὁποῖον διαιρεῖται εἰς δέκα ἴσα μέρη, καθὲν τῶν ὁποίων καλεῖται παλάμη. Καθεμία παλάμη διαιρεῖται εἰς δέκα ἴσα μέρη, καθὲν τῶν ὁποίων λέγεται δάκτυλος, ἢ πόντος. Ὡστε ἐν μέτρον ἔχει 10 παλάμας, ἢ 100 δακτύλους.

γ') Διὰ τὴν μέτρησιν τῶν ὑψοσμάτων μεταχειρίζονται τὸν πῆχυν, ὁ ὅποιος ἰσοδυναμεῖ μὲ 64 δακτύλους περίπου, καὶ διαιρεῖται εἰς 8 ἴσα μέρη, τὰ ὁποῖα λέγονται ρούπια.

Τὸ μήκος χιλίων μέτρων λέγεται χιλιόμετρον.

δ') Πρὸς μέτρησιν τοῦ βάρους τῶν σωμάτων μεταχειρίζονται ὡς μονάδα τὴν ὀκᾶν, ἢ ὁποῖα ἔχει 400 δράμα. Βᾶρος 44 ὀκάδων λέγεται στατήρ (κοινῶς καντάρι).

ε') Πρὸς μέτρησιν τοῦ χρόνου λαμβάνομεν ὡς μονάδα τὴν ἡμέραν, ἢ ὁποῖα ἔχει 24 ὥρας. Καθεμία ὥρα ἔχει 60 πρῶτα λεπτά, τὰ ὁποῖα σημειώνομεν διὰ μιᾶς ὀξεῖας (') ὑπεράνω τοῦ ἀριθμοῦ π.χ. 35'. Καθὲν πρῶτον λεπτὸν ἔχει 60 δευτέρα λεπτά, τὰ ὁποῖα σημειώνομεν μὲ δύο ὀξεῖας (") ὑπεράνω τοῦ ἀριθμοῦ π.χ. 12". Τὸ ἔτος ἔχει 365 ἡμέρας καὶ ἀνὰ 4 ἔτη 366.

στ') Μονὰς νομισμάτων εἶνε ἡ δραχμή, ἢ ὁποῖα ἔχει 100 λεπτά.

ζ') Θὰ σημειώνομεν χάριν συντομίας τὰ μέτρα διὰ τοῦ μ., τὰ χιλιόμετρα διὰ τοῦ χμ., τοὺς πῆχεις διὰ τοῦ π., τὰ ρούπια διὰ τοῦ ρ., τὰς ἡμέρας διὰ τοῦ ἡμ., τὰ ὥρας διὰ τοῦ ὥρ., τὰ ἔτη διὰ τοῦ ἔτ., τὰς δὲ δραχμάς καὶ λεπτά, διὰ τῶν δρ. καὶ λ. καὶ οὕτω καθεξῆς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΙ.

Περὶ προσθέσεως.

§ 8. Ὅρισμοί.—

α') Ἐὰν ἔχωμεν 8 δρ. καὶ 6 δρ. πόσας ἔχομεν ἐν ὄλῳ;
Θὰ εὐρωμεν τὸν ζητούμενον ἀριθμὸν, ἐὰν εὐρωμεν τὸ ἀριθμὸν, ὃ ὁποῖος ἔχει τόσας μονάδας, ὅσας ἔχουν καὶ οἱ δύο δοθέντες ἀριθμοὶ 8 καὶ 6· ἦτοι 14 δρ.

Ὅμοίως, ἂν ἔχωμεν 5 βιβλία καὶ 3 βιβλία καὶ 7 βιβλία καὶ ζητῆται πόσα ἔχομεν ἐν ὄλῳ, ἀρκεῖ νὰ εὐρωμεν τὸν ἀριθμὸν, ὃ ὁποῖος ἀποτελεῖται ἀπὸ τὰς μονάδας τοῦ 5, τοῦ 3 καὶ τοῦ 7· ἦτοι τὸν 15.

β') Γενικῶς, ἔστω ὅτι δίδονται δύο ἢ περισσότεροι ἀριθμοὶ καὶ ζητεῖται νὰ εὐρωμεν ἄλλον, ὃ ὁποῖος ν' ἀποτελεῖται ἀπὸ ὅλας τὰς μονάδας τῶν δοθέντων. Λαμβάνομεν ἕνα ἐκ τῶν δοθέντων· αὐτὸν αὐξάνομεν κατὰ τὰς μονάδας ἐνὸς ἄλλου ἐξ αὐτῶν· τὸν οὕτω προκύπτοντα αὐξάνομεν κατὰ τὰς μονάδας ἐνὸς ἄλλου ἐκ τῶν δοθέντων· κ.ο.κ. ἐξακολουθοῦμεν, μέχρις ὅτου λάβωμεν ὅλους τοὺς δοθέντας, χωρὶς νὰ λάβωμεν ὑπ' ὄψιν τὴν τάξιν τὴν ὁποῖαν καθεὶς ἔχει.

Εἶνε φανερόν, ὅτι τοῦτο δυνάμεθα νὰ κάμωμεν, ἂν οἱ δοθέντες ἀριθμοὶ εἶνε ἀφηρημένοι ἢ συγκεκριμένοι ἀλλ' ὁμοειδεῖς.

γ') *Πρόσθεσις λέγεται ἡ πράξις, διὰ τῆς ὁποίας δοθέντων ἢ περισσοτέρων ἀριθμῶν, εὐρίσκομεν ἄλλον, ὃ ὁποῖος ἀποτελεῖται ἀπὸ ὅλας τὰς μονάδας τῶν δοθέντων.*

δ') Οἱ δοθέντες ἀριθμοὶ λέγονται *προσθετοί*, ὃ δ' ἐξ αὐτῶν διὰ τῆς προσθέσεως εὐρισκόμενος *ἄθροισμα*. Τὸ ἄθροισμα τῶν ἀριθμῶν 8 καὶ 6 γράφομεν οὕτω $8+6$, ἢ $6+8$ καὶ ἀναγινώσκομεν ὀκτώ σὺν ἕξ ἢ ἕξ σὺν ὀκτώ. Ὡστε τὸ σημεῖον τῆς προσθέσεως εἶνε τὸ σὺν (+).

ε') Ἐὰν μετὰ τὴν ἐκτέλεσιν μιᾶς προσθέσεως θέλωμεν νὰ ἴδωμεν, ἂν ἡ πράξις ἐγινεν ἀκριβῶς, ἀφοῦ πρῶτον ἀλλάξωμεν τὴν μεταξὺ τῶν θέσειν τῶν προσθετῶν ἐπαναλαμβάνομεν ἀκολούθως τὴν πρόσθεσιν καὶ βλέπομεν, ἂν εὐρίσκωμεν τὸ αὐτὸ ἄθροισμα, καθὼς καὶ πρὶν. Ἡ νέα αὕτη πράξις, διὰ τῆς ὁποίας θέλομεν νὰ ἐλέγξωμεν τὴν προηγουμένην, λέγεται *δοκιμὴ* τῆς προσθέσεως.

Άσκήσεις και προβλήματα.

1) Εύρετε τὰ ἐπόμενα ἀθροίσματα· α') $28 + 7 \cdot 6'$ $\overset{\Delta}{37} + \overset{\Delta}{6}$ γ') $59 \delta\rho. + 6 \delta\rho.$ δ') $139 + 7.$ ε') $168 + 29.$

2) Εύρετε τὸ ἀθροισμα δλων τῶν μονοψηφίων ἀριθμῶν.

3) Σχηματίσατε τὰθροίσματα τῶν μονοψηφίων ἀριθμῶν ἀνά δύο.

4) Προσθέσατε τὸν 3, ἀναχωροῦντες ἀπὸ τὸν 2, μέχρις οὗτου εὑρετε τριψηφίον ἀριθμὸν.

5) Εύρετε τὰ ἐπόμενα ἀθροίσματα· α') $50 + 20.$ β') $800 + 600.$ γ') $200 + 500 + 400.$ δ') $8000 + 300$ (παρατηρήσατε ὅτι $50 + 20 = \overset{\Delta}{5} + \overset{\Delta}{2} = \overset{\Delta}{7} = 70$).

6) Λαμβάνει τις τὴν πρώτην ἡμέραν 8 δρ., τὴν δευτέραν 6 δρ., τὴν δὲ τρίτην 9 δρ. πόσας δραχμὰς λαμβάνει ἐν δλω;

7) Ἀγοράζει τις ἐξ ἑνὸς πράγματος τὴν πρώτην φορὰν 7 δκ., τὴν δευτέραν φορὰν 6 δκ., τὴν δὲ τρίτην 10 δκ. πόσας οὐκάδας ἠγόρασεν ἐν δλω;

§ 9. Ἐφαρμογὴ εἰς τὸν πρακτικὸν βίον. —

Αἱ ἐπόμεναι ἐφαρμογαὶ τῆς προσθέσεως εἶνε ἀξίαι ἰδιαιτέρας προσοχῆς.

α') Ἐὰν ἡ τιμὴ τῆς πωλήσεως ἑνὸς ἐμπορεύματος εἶνε μεγαλύτερα τῆς τιμῆς τῆς ἀγορᾶς, λέγομεν ὅτι ὁ ἔμπορος ἐκέρδισεν ἢ ἔχει κέρδος ἐκ τῆς πωλήσεως τοῦ ἐμπορεύματος αὐτοῦ, ὑπάρχει δ' ἡ ἐξῆς σχέση:

$$\frac{\text{τιμὴ τῆς πωλήσεως}}{\text{τιμὴ τῆς ἀγορᾶς}} \text{ κέρδος}$$

β') Ὅταν ἡ τιμὴ τῆς πωλήσεως ἑνὸς ἐμπορεύματος εἶνε μικροτέρα τῆς τιμῆς τῆς ἀγορᾶς, λέγομεν ὅτι ὁ ἔμπορος ἐζημιώθη ἢ ἔχει ζημίαν ἐκ τῆς πωλήσεως τοῦ ἐμπορεύματος αὐτοῦ, ὑπάρχει δ' ἡ ἐξῆς σχέση:


$$\frac{\text{τιμὴ τῆς ἀγορᾶς}}{\text{τιμὴ τῆς πωλήσεως}} \text{ ζημία}$$

γ') Ὅταν ἔν ἐμπόρευμα ἢ ἀντικείμενον εὐρίσκεται ἐντὸς ἑνὸς

ἀγγείου, π. χ. ἔλαιον ἐντὸς βαρελλίου, οἶνος ἐντὸς φιάλης, σάπων ἐντὸς κισωτίου κλπ. λέγομεν **μικτὸν βᾶρος** αὐτοῦ τὸ βᾶρος τοῦ ἐμπορεύματος καὶ τοῦ ἀγγείου, ἐντὸς τοῦ ὁποίου περιέχεται **καθαρὸν βᾶρος** (κοινῶς νέτο) τὸ βᾶρος μόνον τοῦ ἐμπορεύματος καὶ **ἀπόβαρον** (κοινῶς ντάρα) τὸ βᾶρος μόνον τοῦ ἀγγείου. Μεταξὺ αὐτῶν ὑπάρχει ἡ ἐξῆς σχέσις

καθαρὸν βᾶρος + ἀπόβαρον = μικτὸν βᾶρος.


δ') Ἐν γεγονόσι, π. χ. εἰς πόλεμος, ἤρχισεν εἰς τὴν ἀρχὴν τοῦ τρίτου ἔτους π. Χ. καὶ ἐτελείωσεν εἰς τὴν ἀρχὴν τοῦ ἕκτου ἔτους μ. Χ. Πόσα ἔτη διήρκεσεν ὁ πόλεμος αὐτός;



Καθὼς βλέπομεν, θὰ ἔχωμεν $3 \text{ ἔτη} + 5 \text{ ἔτη} = 8 \text{ ἔτη}$.


ε') Τρεῖς τόποι Α, Β, Γ εὐρίσκονται ἐπὶ μιᾶς εὐθείας ὁδοῦ. Ἡ ἀπόστασις τῶν Α καὶ Β εἶνε 3 χμ., τῶν δὲ Β καὶ Γ εἶνε 5 χμ. πόση εἶνε ἡ ἀπόστασις τῶν Α καὶ Γ;

Προφανῶς ἔχομεν



$ΑΓ = 3 \text{ χμ.} + 5 \text{ χμ.} = 8 \text{ χμ.}$

στ') Εἰς μερικὰς προσθέσεις δὲν δίδονται ὅλοι οἱ προσθετέοι, ἀλλὰ θυνάμεθα νὰ εὕρωμεν αὐτοὺς ἀπὸ σχέσιν τινά, ἡ ὁποία δίδεται. Π. χ. ἔκ δύο ἀριθμῶν ὁ εἰς εἶνε 15, ὁ ἄλλος κατὰ 8 μεγαλύτερος· πόσον εἶνε τὸ ἄθροισμὰ των;




$15 + 8 = 23$

Καθὼς βλέπομεν καὶ ἐκ τοῦ σχήματος, ὁ δεύτερος ἀριθμὸς εἶνε $15 + 8 = 23$. ἐπομένως τὸ ἄθροισμα τῶν δύο εἶνε $15 + 23 = 38$.

Παράδειγμα. Ἠγόρασέ τις ἓν ἐμπόρευμα ἀντὶ 25 δρ. καὶ τὸ ἐπώλησε μὲ κέρδος 14 δραχμ. ἀντὶ πόσων δραχμῶν τὸ ἐπώ-

λησεν. Ἄν διὰ τοῦ γράμματος x παραστήσωμεν τὸν ζητούμενον ἀριθμὸν, θὰ ἔχωμεν



25 δρ. + 14 δρ. = x ἴτοι $x = 39$ δρ. Ὅστε ἡ ζητούμενη τιμὴ εἶνε 39 δραχμαί.

Κατωτέρω θὰ παριστάνωμεν ἐνίοτε τὸν ζητούμενον ἀριθμὸν διὰ τοῦ x .

Προβλήματα πρὸς λύσιν.

Ὅμας πρώτη 1) Ἐμπορος ἠγόρασεν ἐμπόρευμα ἀντὶ 20 (14)* δρ: ἀντὶ πώσων δραχμῶν τὸ ἐπώλησε μὲ κέρδος 5(6) δρχ;

2) Ἀγοράζει τις καφὲ ἀντὶ 38 (45) δρχ. καὶ τὸ πωλεῖ 12 (15) δρχ. ἀκριβώτερον ἀντὶ πώσων δρ. τὸν πωλεῖ;

3) Ἐμπορος ἐπώλησεν ἐν ἐμπόρευμα ἀντὶ 30 (26) δρχ. μὲ ζημίαν 10 (14) δραχμῶν ἀντὶ πώσων δρ. τὸ εἶχεν ἀγοράσει;

4) Ἡ τιμὴ τῆς πωλήσεως ἐμπορεύματος ἦτο 22 (43) δραχ., ἡ δὲ ζημία 12 (17) δρ. ποῖα ἦτο ἡ τιμὴ τῆς ἀγορᾶς;

5) Τὸ καθαρὸν βᾶρος ἐμπορεύματος ἦτοι 38 (19) ὀκ., τὸ δὲ ἀπόδαρον 7 (6) ὀκ. πώσον ἦτο τὸ μίκτον βᾶρος του;

Ὅμας δευτέρα. 1) Εἷς εἶνε ἡλικίας 48 (37) ἐτῶν ποῖαν ἡλικίαν θὰ ἔχη μετὰ 14 (13) ἔτη;

2) Ἐγεννήθη τις τὸ ἔτος 1880 (1853) ποῖον ἔτος ἦτο 18 (47) ἐτῶν;

3) Εἷς πόλεμος ἤρχισε τὸ 1914 καὶ διήρκεσε 4 ἔτη· πότε ἐτελείωσε;

4) Ἐν παιδίον ἀπέθανε τὸ 75 (94) π. X. εἰς ἡλικίαν 5 (4) ἐτῶν· πότε ἐγεννήθη;

5) Ἡ πόλις τῆς Ῥώμης ἰδρύθη τὸ 753 π. X. πόσα ἔτη ἐπέρασαν ἀπὸ τῆς ἰδρύσεώς της μέχρι τοῦ 8 (12) ἔτους μ. X.;

6) Ἐν γεγονὸς ἤρχισε κατὰ τὸ τέλος τοῦ 8 (15) ἔτους π. X., καὶ ἔπαυσε α') εἰς τὴν ἀρχὴν β') εἰς τὸ τέλος τοῦ 8 ἔτους μ. X. πόσα ἔτη διήρκεσε;

*) Ἀντὶ νὰ ἐπαναλαμβάνεται ἡ διατύπωσις ἐνὸς προβλήματος μὲ ἄλλους ἀριθμοὺς γράφονται πρὸς συντομίαν μόνον οἱ ἄλλοι ἀριθμοὶ ἐν παρενθέσει.

Ὅμως τρίτη. 1) Τρεῖς τόποι Α, Β, Γ εὐρίσκονται ἐπὶ μιᾶς εὐθείας ὁδοῦ. Ἡ ἀπόστασις ΑΒ εἶνε 5 (9) χμ., ἡ ΒΓ 10 (15) χμ. πόση εἶνε ἡ ἀπόστασις ΑΓ;

2) Δύο ταχυδρόμοι βαδίζουσι κατ' ἀντίθετον φοράν, ἀναχωροῦντες ἀπὸ τὸ αὐτὸ σημεῖον· πόσον θὰ ἀπέχουσι, ἐὰν ὁ εἰς διανύσῃ 8 (7) χμ., ὁ δὲ ἄλλος 9 (10) χμ.;

Ὅμως τετάρτη. 1) Μία ράβδος εἶνε 9 (10) παλάμας μακροτέρα ἄλλης καὶ αὐτὴ κατὰ 6 (5) παλ. μακροτέρα τρίτης, ἡ ὅποια ἔχει μῆκος 5 (8) παλ.· πόσον μῆκος ἔχει καθεμία; ἡ α' 20 (23).

2) Εἰς τὴν α' τάξιν σχολείου φοιτῶσι 4 (3) μαθηταὶ περισσότεροι τῶν εἰς τὴν β'. εἰς τὴν β' φοιτῶσι 6 (5) περισσότεροι τῶν εἰς τὴν γ'. εἰς τὴν γ' φοιτῶσι 3 (2)· περισσότεροι ἢ εἰς τὴν δ'. Πόσους μαθητὰς ἔχει καθεμία τάξις, ἂν ἡ δ' ἔχη 34 (28) μαθητὰς;

47, 43, 37, 34, (38, 35, 30, 28).

3) Πόσον εἶνε τὸ ἄθροισμα τοῦ 20 (36) τοῦ 25 (24) καὶ τοῦ κατὰ 5 (10) μεγαλυτέρου τούτου;

4) Εἰς ἔμπορος εἰσπράττει τὴν πρώτην ἡμέραν 18 (22) δρ. τὴν δευτέραν 8 (6) δρ. ἐπὶ πλεον καὶ τὴν τρίτην 4 (5) δρ. περισσότερας, ἢ ὅσον τὴν δευτέραν· πόσας δραχμὰς εἰσέπραξεν ἐν ἑλφ; 74 (83).

§ 10. Πρόσθεσις ἀπὸ μνήμης.—

α') Ἐστω ὅτι ζητοῦμεν τὸ ἄθροισμα $58 + 30$. Ἀντὶ νὰ προσθέσωμεν εἰς τὸν 58 τὰς μονάδας τοῦ 30 ἀνὰ μίαν, δυνάμεθα νὰ εὐρωμεν αὐτὸ συντομώτερον ὡς ἑξῆς. Ἐχομεν

$$\begin{array}{cccccc} & \Delta & M & \Delta & \Delta & M \\ 58 + 30 = & 5 & + & 8 & + & 3 = 8 + 8 = 88. \end{array}$$

β') Τὸ ἄθροισμα $48 + 35$ εὐρίσκομεν εὐκολώτερον ὡς ἑξῆς. Ἐν πρώτοις προσθέτομεν εἰς τὸν 48 τὸν 30 καὶ εὐρίσκομεν 78, εἰς αὐτὸν δὲ προσθέτομεν ἀκόμη 5, ὅτε εὐρίσκομεν 83.

γ') Διὰ νὰ εὐρωμεν τὸ ἄθροισμα $26 + 16 + 14$ εὐκολώτερον, σχηματίζομεν τὸ ἄθροισμα $26 + 14$, καθὼς εἶδομεν καὶ εἰς τὸ ἄθροισμα αὐτὸ 40 προσθέτομεν ἀκόμη 16, ὅτε εὐρίσκομεν 56.

δ') Τὰ ἐξαγόμενα τῶν ἀνωτέρω προσθέσεων, καθὼς καὶ ἄλλων τοιούτων, εὐρίσκομεν ἀπὸ μνήμης, χωρὶς νὰ γράφωμεν τοὺς

προσθέτους, και τὰ ἀπὸ καθεμίαν πρόσθεσιν ἀθροίσματα. Διὰ τοῦτο λέγομεν ὅτι ἐκτελοῦμεν τὴν πρόσθεσιν ἀπὸ μνήμης.

Ἀσκήσεις.

- 1) Εὑρετε ἀπὸ μνήμης τὰ ἐξῆς ἀθροίσματα.
 α') $28 + 20$ β') $39 + 70$ γ') $59 + 40$ δ') $30 + 64 + 20$.
 2) Ὅμοίως τὰ α') $246 + 40$ β') $50 + 56 + 4$.
 γ') $65 + 35$ δ') $70 + 32 + 19$ ε') $98 + 22 + 15$.
 3) Ὅμοίως τὰ α') $63 + 17 + 9$ β') $28 + 62 + 18$.
 γ') $67 + 29 + 31$ δ') $65 + 28 + 32$ ε') $9 + 623 + 25$.
 4) Ὅμοίως τὰ α') $78 + 12 + 13 + 27$ β') $900 + 15 + 35$.
 γ') $28 + 32 + 48 + 19$ δ') $650 + 92 + 240 + 67 + 3$.

§ II. Γενικὸς κανὼν τῆς προσθέσεως. —

Ἐστω ὅτι θέλομεν νὰ εὑρωμεν τὸ ἀθροισμα $68 + 35 + 847$.

$$\begin{array}{ccccccc} \Delta & M & & \Delta & M & & E & \Delta & M \end{array}$$

Ἐπειδὴ ἔχομεν $68 = 6 + 8$ · $35 = 3 + 5$ · $847 = 8 + 4 + 7$, τὸ ἀθροισμα

$$\begin{array}{ccccccccccc} \Delta & M & & \Delta & M & & E & \Delta & M & E \\ 68 + 35 + 847 \text{ εἶνε ἴσον μὲ τὸ } & 6 + 8 + 3 + 5 + 8 + 4 + 7 = 8 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccccccc} \Delta & M & & M & \Delta & M & & E & \Delta & M \\ + 13 + 20. \text{ Ἐπειδὴ δὲ αἱ } & 20 = 2 + 0, \text{ τὸ ἀθροισμα εἶνε } & 8 + 15 + 0. \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} \Delta & E & \Delta \\ & & E & \Delta & M \end{array}$$

Ἐπειδὴ πάλιν αἱ $15 = 1 + 5$, θὰ ἔχωμεν ἀθροισμα $9 + 5 + 0 = 950$.

Ἐκ τούτου καὶ ἄλλων ὁμοίων πειραδαιγμάτων συνάγομεν ὅτι, δυνάμεθα νὰ προσθέσωμεν τοὺς δοθέντας ἀριθμοὺς, ἐὰν προσθέσωμεν χωριστὰ τὰ ψηφία τῶν ἀπλῶν μονάδων, τῶν δεκάδων, τῶν ἑκατοντάδων κλπ. Πρὸς εὐκολίαν ἐκτελοῦμεν τὴν πρόσθεσιν δεδομένων ἀριθμῶν ὡς ἐξῆς συνήθως.

Γράφομεν ἓνα τῶν προσθετέων καὶ κάτωθὲν τοῦ ἄλλου ἐξ αὐτῶν κάτω τούτου ἄλλον καὶ οὕτω καθ' ἑξῆς μέχρις ὅτου γράψωμεν ὅλους τοὺς δοθέντας, ἀλλ' ὥστε, τὰ ψηφία τῶν μονάδων τῆς αὐτῆς τάξεως νὰ εὐρίσκονται εἰς τὴν αὐτὴν στήλην. Σύρομεν κάτωθεν γραμμὴν ὀριζοντίαν καὶ ἀρχίζοντες ἀπὸ τῶν ἀπλῶν μονάδων προσθέτομεν χωριστὰ

τὰ ψηφία καθεμιᾶς στήλης καὶ ἂν τὸ ἄθροισμα τῶν ψηφίων στήλης
τινὸς δὲν ὑπερβαίνει τὸ 9, γράφομεν αὐτὸ ὑπὸ τὴν γραμμὴν εἰς τὴν
αὐτὴν στήλην. Ἐὰν ὅμως περιέχη καὶ δεκάδας, τότε γράφομεν
μόνον τὰς μονάδας, τὰς δὲ δεκάδας προσθέτομεν μὲ τὰ ψηφία τῆς
ἐπομένης στήλης πρὸς τὰριστερά. Οὕτω προχωροῦμεν μέχρις ὅτου
προσθέσωμεν καὶ τὰ ψηφία τῆς τελευταίας στήλης πρὸς τὰριστερά».

Οὕτω διὰ τὸ ἄθροισμα $68 + 35 + 847$ ἔχομεν

$$\begin{array}{r} 68 \\ 35 \\ 847 \\ \hline \end{array}$$

950

καὶ λέγομεν 7 καὶ $5 = 12$ καὶ $8 = 20$ · γράφομεν 0 καὶ κρατοῦμεν 2 ·
 2 καὶ $4 = 6$ καὶ $3 = 9$ καὶ $6 = 15$ · γράφομεν 5 καὶ κρατοῦμεν 1 · 1 καὶ
 $3 = 9$ · γράφομεν τὸ 9 . Ὡστε τὸ ἄθροισμα 950 .

Ἀσκήσεις καὶ προβλήματα.

Ὅμας πρώτη. Νὰ εὑρεθοῦν τὰ ἐπόμενα ἄθροίσματα κατὰ τὸν ἀνω-
τέρω κανόνα καὶ ἔπειτα κατ' ἄλλον τρόπον ἀπὸ μνήμης.

α') $940 + 2675 + 30$ β') $960 + 864 + 90$ γ') $3635 + 743 + 95$ δ')
 $670 + 3570 + 860$ ε') $1965 + 643 + 95$.

στ') $1840 + 983 + 60$ ζ') $950 + 962 + 60$ η') $925 + 585 + 87$.

Ὅμας δευτέρα. 1) Εἰς χωρικὸς ἀγοράζει χωράφιον ἀντὶ 4182
(6132) δρ. καὶ τὸ πωλεῖ μὲ κέρδος 864 (973) δρ. ἀντὶ πόσων δραχμῶν
πωλεῖ αὐτό; 5046 (7105).

2) Ἐμπορος πωλεῖ ζάχαριν ἀντὶ 6783 (4871) δρ. μὲ ζημίαν 385
(576) δρ. πόσον τοῦ ἐκόστιζεν; 7168 (5447).

3) Τὸ καθαρὸν βῆρος βρελλίου οἴνου εἶνε 728 (313) δκ., τὸ δὲ ἀπό-
θερον 12 (19) δκ. πόσον εἶνε τὸ μικτὸν βῆρος; 740 (332).

Ὅμας τρίτη. 1) Ἐγεννήθη τις τὸ 1743 (1736) καὶ ἔζησεν 89 (74)
ἔτη· ποῖον ἔτος ἀπέθανεν; 1832 (1810).

2) Ἀπέθανέ τις τὸ 324 (453) π. Χ. εἰς ἡλικίαν 83 (95) ἐτῶν· πότε
ἐγεννήθη; 407 (548).

3) Ὁ φιλόσοφος Θαλῆς ἐγεννήθη κατὰ τὸ ἔτος 640 π. Χ.

πόσα ἔτη ἐπέρασαν ἀπὸ τὴν ἀρχὴν τοῦ ἔτους αὐτοῦ μέχρι τῆς ἀρχῆς τοῦ τρέχοντος ἔτους;

4) Εἰς πόλεμος ἤρχισε κατὰ τὸ τέλος τοῦ ἔτους 643 (528) π. Χ. καὶ διήρκεσε μέχρι τῆς ἀρχῆς (τέλους) τοῦ ἔτους 324 (1218) μ. Χ. Πόσα ἔτη διήρκεσεν;

965 (1745) 966 (1746).

Ὅμας ιετάρτη. 1) Ἀπὸ ἓνα τόπον ἀναχωροῦν δύο ταχυδρόμοι ἀντιθέτως: πῶσον θ' ἀπέχουν, ἐὰν ὁ μὲν διανύσῃ 24825 (36124) μ., ὁ δὲ 34105 (37158) μ;

58930 (73282).

2) Τέσσερες τόποι Α, Β, Γ, Δ εὐρίσκονται ἐπ' εὐθείας γραμμῆς. Ἡ ἀπόστασις ΑΒ εἶνε 1684 (9325) μ., ἡ ΒΓ εἶνε 7108 (2974) μ., ἡ δὲ ΓΔ 7418 (3078) μ. πῶσον ἀπέχουν μεταξύ των οἱ Α καὶ Δ;

16210 (15777).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΙΙ.

Περὶ ἀφαιρέσεως.

§ 12. Ὅρισμοί.—

α') (Πρόβλημα). «Ἐμπορος ἠγόρασε βούτυρον ἀντὶ 40 δρ. καὶ τὸ ἐπώλησεν ἀντὶ 50 δρ. πῶσας δραχμάς ἐκέρδισε;»

Πρὸς λύσιν τοῦ προβλήματος παρατηροῦμεν ὅτι ἐκ τῶν 50 δρ., τὰς ὁποίας ἔλαβεν ὁ ἔμπορος ἀπὸ τὴν πώλησιν, αἱ 40 δρ. ἦσαν ἰδικαί του, ἐπειδὴ τὰς ἐξώδευσε κατὰ τὴν ἀγορὰν τοῦ ἐμπορεύματος, αἱ δὲ ἄλλαι εἶνε κέρδος. Διὰ νὰ εὐρωμεν λοιπὸν τὸν ζητούμενον ἀριθμὸν, ἀρκεῖ νὰ ἐλαττώσωμεν τὸν ἀριθμὸν 50 κατὰ τὰς μονάδας τοῦ 40. Ἐλαττώνοντες ἀνὰ μίαν τὰς 50 μονάδας κατὰ 40 εὐρίσκομεν ὅτι μένουσι 10. Ὡστε ὁ ἔμπορος ἐκέρδισεν 10 δραχμάς.

Τὸ αὐτὸ ἐξαγόμενον εὐρίσκομεν, ἐὰν τὸ 40 αὐξήσωμεν ἀνὰ μίαν μονάδα μέχρις ὅτου εὐρωμεν τὸ 50.

β') (Πρόβλημα). «Εἰς ἠύξησε τὰ χρήματά του κατὰ 8 δρ. καὶ οὕτω ἔχει 15 δρ. πῶσας δρ. εἶχεν ἐξ ἀρχῆς;»

Ἀφοῦ εἰς τὸ τέλος τὰ χρήματα εἶνε 15 δρ., ἐκ τούτων δὲ αἱ 8 δρ. προέρχονται ἀπὸ τὴν αὕξησιν, ἔπεται ὅτι διὰ νὰ εὐρωμεν πόσα χρήματα εἶχεν ἐξ ἀρχῆς, ἀρκεῖ τὰς 15 δρ. νὰ ἐλαττώσωμεν κατὰ 8 δρ. Ἐὰν ἐλαττώσωμεν τὰς 15 δρ. κατὰ 8 δραχμάς ἀνὰ μίαν, εὐρίσκομεν ὅτι εἶχεν ἐξ ἀρχῆς 7 δραχμάς.

Τὸ αὐτὸ ἐξαγόμενον εὐρίσκομεν, ἐὰν τὰς 8 δρ. αὐξήσωμεν

ἀνά μίαν δραχμὴν μέχρις οὗτο εὐρωμεν τὰς 15 δραχμάς.

Εἰς καθὲν τῶν ἀνωτέρω προβλημάτων δίδονται δύο ἀριθμοὶ καὶ ἐλαττώνομεν τὸν μεγαλύτερον ἐξ αὐτῶν κατὰ τόσας μονάδας, ὅσας ἔχει ὁ μικρότερος. Ἡ πράξις αὕτη λέγεται ἀφαίρεσις.

γ') Ἐν γένει, «ἀφαίρεσις λέγεται ἡ πράξις διὰ τῆς ὁποίας δοθέντων δύο ἀριθμῶν ἐλαττώνομεν τὸν ἕνα ἐξ αὐτῶν κατὰ τόσας μονάδας ὅσας ἔχει ὁ ἄλλος».

Ἐὰν εἰς τὸ α') πρόβλημα παραστήσωμεν διὰ τοῦ x τὰς δραχμάς, τὰς ὁποίας ἐκέρδισε, θὰ ἔχωμεν $40 \text{ δρ.} + x \text{ δρ.} = 50 \text{ δρ.}$

Καθὼς βλέπομεν, εἰς τὸ πρόβλημα τοῦτο δίδεται τὸ ἄθροισμα δύο ἀριθμῶν καὶ ὁ εἰς ἐξ αὐτῶν, ζητεῖται δ' ὁ ἄλλος προσθετός. Θὰ εὐρωμεν λοιπὸν τὸν ζητούμενον ἀριθμὸν, εἰν εὐρωμεν πόσας μονάδας θὰ προσθέσωμεν εἰς τὸν 40, διὰ νὰ εὐρωμεν τὸν 50.

Ὁμοίως εἰς τὸ β') πρόβλημα, εἰν διὰ τοῦ x παραστήσωμεν τὸν ζητούμενον ἀριθμὸν, θὰ ἔχωμεν $x \text{ δρ.} + 8 \text{ δρ.} = 15 \text{ δρ.}$, ἂν δ' ἀλλάξωμεν τὴν θέσιν τῶν προσθετῶν, θὰ ἔχωμεν ὡς καὶ ἀνωτέρω $8 \text{ δρ.} + x \text{ δρ.} = 15 \text{ δρ.}$

Δυνάμεθα λοιπὸν νὰ λέγωμεν ὅτι,

δ') «ἀφαίρεσις λέγεται ἡ πράξις εἰς τὴν ὁποίαν δίδεται τὸ ἄθροισμα δύο ἀριθμῶν καὶ ὁ εἰς τῶν προσθετῶν καὶ ζητεῖται ὁ ἄλλος».

ε') Εἶνε φανερόν, ὅτι οἱ δοθέντες ἀριθμοὶ διὰ τὴν ἀφαίρεσιν πρέπει νὰ εἶνε ἀφηρημένοι, ἢ συγκεκριμένοι ἀλλ' ὁμοειδεῖς.

στ') Τὸ διδόμενον ἄθροισμα τῶν ἀριθμῶν, ἢ ὁ ἀριθμὸς ἀπὸ τὸν ὁποῖον θ' ἀφαιρέσωμεν ὅσας μονάδας ἔχει ὁ ἄλλος δοθεὶς ἀριθμὸς, λέγεται μειωτέος, ὁ ἀριθμὸς, τὸν ὁποῖον ἀφαιροῦμεν ἀπὸ τὸν μειωτέον, ἢ ὁ δοθεὶς προσθετός, λέγεται ἀφαιρετέος. Ὁ ζητούμενος ἀριθμὸς εἰς τὴν ἀφαίρεσιν λέγεται διαφορὰ ἢ ὑπόλοιπον τῆς ἀφαιρέσεως τῶν δοθέντων ἀριθμῶν.

ζ') Τὴν διαφορὰν τῶν ἀριθμῶν, π, γ. τῶν 50 καὶ 40 σημειώνομεν οὕτω $50 - 40$ καὶ ἀπαγγέλλομεν πενήτην καὶ πλὴν τεσσαράκοντα ἢ πενήτην καὶ μείον τεσσαράκοντα, ἢ τεσσαράκοντα ἀπὸ πενήτην. Ὡστε σημεῖον τῆς ἀφαιρέσεως εἶνε τὸ πλὴν ($-$), ἢ δὲ διαφορὰ $50 - 40$ φανερώνει τὸν ἀριθμὸν, ὁ ὁποῖος ἀυξανόμενος κατὰ 40 δίδει τὸν 50. Διὰ τοῦτο δυνάμεθα νὰ λέγωμεν ὅτι,

η') «ἀφαίρεσις εἶνε ἡ πράξις διὰ τῆς ὁποίας δοθέντων δύο ἀριθμῶν, εὐρίσκεται τρίτος, ὁ ὁποῖος προσσιθόμενος εἰς τὸν δεύτερον δίδει ἄθροισμα τὸν πρῶτον».

θ') Διὰ νὰ κάμωμεν τὴν δοκιμὴν τῆς ἀφαιρέσεως, προθέτομεν τὸ ὑπόλοιπον εἰς τὸν ἀφαιρετέον καὶ ἂν εὕρωμεν ἄθροισμα τὸν μειωτέον, τότε ἡ ἀφαίρεσις εἶνε ἀκριβής. Οὕτω εἰς τὴν ἀφαίρεσιν $50 - 40$ τὸ ὑπόλοιπον εἶνε 10, τὸ δὲ ἄθροισμα $40 + 10$ εἶνε ἴσον μετὰ 50.

Ἀσκήσεις καὶ προβλήματα.

Ὅμας πρώτη. 1) Γράψατε τὰς κατωτέρω ἰσότητας κατ' ἄλλον τρόπον, μεταχειριζόμενοι τὸ σημεῖον τῆς ἀφαιρέσεως καὶ εὕρετε τὸν ἄγνωστον x κατὰ δύο τρόπους, τοὺς ὁποίους ἀνωτέρω εἶδομεν.

α') $17 + x = 15$. β') $x + 45 \text{ ἡμ.} = 53 \text{ ἡμ.}$ γ') $47 \text{ ὀκ.} + x = 64 \text{ ὀκ.}$
 $\begin{array}{c} X \\ 10 + x = 37 \end{array}$ $\begin{array}{c} X \\ x + 19 = 39 \end{array}$ $\begin{array}{c} \Delta \quad \Delta \\ x + 17 \text{ δρ.} = 36 \text{ δρ.} \end{array}$ $\begin{array}{c} E \\ x + 9 = 12 \end{array}$ $\begin{array}{c} X \\ x + 8 = 15 \end{array}$

2) Εὕρετε τὰς ἐπομένους διαφοράς· α') $95 \text{ ὀκ.} - 86 \text{ ὀκ.}$

β') $29 \text{ δρ.} - 19 \text{ δρ.}$ γ') $9 - 4$ δ') $148 \text{ ἡμ.} - 132 \text{ ἡμ.}$ ε') $28 - 17$.

3) Ἀριθμήσατε ἀπὸ τοῦ ἀριθμοῦ 100 ἀναδρομικῶς, ἐνόςσω εἶνε δυνατὸν.

Ὅμας δευτέρα. 1) Εὕρετε τὰς διαφοράς· α') $40 - 20$ β') $700 - 300$ γ') $5900 - 4800$ δ') $8000 - 3000$ ε') $38000 - 19000$.

2) Εὕρετε τὰ ἐξογόμενα· α') $9 + 4 - 7$ β') $20 \text{ δρ.} + 24 \text{ δρ.} - 18 \text{ δρ.}$ γ') $39 \text{ μ.} + 11 \text{ μ.} - 25 \text{ μ.}$ δ') $143 \text{ ὀκ.} - 150 \text{ ὀκ.} + 362 \text{ ὀκ.}$

Ὅμας τρίτη. 1) Ἐὰν εἰς τινὰ ἀριθμὸν προσθέσω τὸν 38 (92) εὕρῃσκω τὸν 56 (140)· ποῖος εἶνε ὁ ἀριθμὸς;

2) Ἐὰν εἰς τινὰ ἀριθμὸν προσθέσω τὸ ἄθροισμα 5 (8) + 6 (9) + 9 (6) εὕρῃσκω τὸν 27 (30)· ποῖος εἶνε ὁ ἀριθμὸς;

Ὅμας τετάρτη. 1) Λαμβάνει τις 46 (63) δρ. καὶ ἐξ αὐτῶν ἐξοδεύει 23 (40) δρ.· πόσαι δραχμαὶ τῷ μένουσι;

2) Μίαν πρωτὴν ἢ θερμοκρασίαν ἦτο 19° (21°)· τὴν μεσημβρίαν τῆς αὐτῆς ἡμέρας 24° (35°), τὴν δὲ ἑσπέραν 20° (24°)· κατὰ πόσους βαθμοὺς ἢ θερμοκρασίαν τῆς μεσημβρίας καὶ τῆς ἑσπέρας ἦτο μεγαλύτερα τῆς πρωτῆς;

§ 13. Ἐφαρμογή εἰς τὸν πρακτικὸν βίον.—

Τῆς ἀφαιρέσεως γίνεται χρῆσις ἰδίως εἰς ζητήματα κέρδους, ζημίας κλπ. Π. χ. ἔμπορος ἀγοράζει ἐν ἑμπορεύμα ἀντὶ 39 δρ. καὶ τὸ πωλεῖ μὲ ζηνίαν 9 δρ. ἀντὶ πόσων δραχμῶν τὸ ἐπώλησεν;

Ἄν διὰ τοῦ x παραστήσωμεν τὸν ζητούμενον ἀριθμὸν, ἔχομεν τιμὴν πωλήσεως + ζηνία = τιμὴ ἀγορᾶς

$$\frac{\text{τιμὴ πωλήσεως} = x \mid \text{ζηνία } 9 \text{ δρ.}}{39 \text{ δρ.} = \text{τιμὴ ἀγορᾶς}}$$

$$39 \text{ δρ.} = \text{τιμὴ ἀγορᾶς}$$

$$x + 9 = 39, \text{ ἐκ τοῦ ὁποίου εὐρίσκομεν } x = 30 \text{ δρ.}$$

Προβλήματα πρὸς λύσιν.

Ἑμᾶς πρώτη. 1) Ἐμπορος ἀγοράζει καφὲν ἀντὶ 24 (26) δρ. καὶ τὸ πωλεῖ ἀντὶ 36 (38) δρ. πόσας δραχμὰς κερδίζει;

2) Ἐμπορος ἐκέρδισεν ἀπὸ τὴν πώλησιν ἑμπορεύματος 12 (15) δρ. πόσον τὸ ἠγόρασεν, ἐὰν τὸ ἐπώλησεν ἀντὶ 38 (46) δρ.;

3) Ἐμπορος ἠγόρασεν ἑμπορεύμα 39 (63) δρ. καὶ ἐζημιώθη κατὰ τὴν πώλησίν του 12 (16) δρ. ἀντὶ πόσων δραχμῶν τὸ ἐπώλησε;

4) Τὸ μικτὸν βᾶρος ἑμπορεύματος εἶνε 49 (65) δκ., τὸ δὲ ἀπόβαρον 8 (6) δκ. πόσον εἶνε τὸ καθαρὸν βᾶρος;

5) Τὸ μικτὸν βᾶρος ἑμπορεύματος εἶνε 263 (349) δκ., τὸ δὲ καθαρὸν βᾶρος του 130 (149) δκ. πόσον εἶνε τὸ ἀπόβαρον;

Ἑμᾶς δευτέρα. 1) Ἐν παιδίον ἀπέθανε τὸ 1885 (1896) εἰς ἡλικίαν 16 (17) ἐτῶν· ποίον ἔτος ἐγεννήθη;

2) Ἐγεννήθη τις εἰς τὴν ἀρχὴν τοῦ ἔτους 1857 (1842) καὶ ἀπέθανεν εἰς τὸ τέλος τοῦ 1896 (1873)· εἰς ποίαν ἡλικίαν ἀπέθανε;

3) Ἐν γεγονὸς ἤρχισεν εἰς τὸ τέλος τοῦ 1863 (1769) μ. Χ. Ἐὰν ἐτελείωνε α') εἰς τὴν ἀρχὴν β') εἰς τὸ τέλος τοῦ 1879 (1778) πόσον χρόνον θὰ διήρκει;

Ἑμᾶς τρίτη. 1) Τρεῖς τόποι Α, Β, Γ, εὐρίσκονται ἐπ' εὐθείας ὁδοῦ· ἡ ἀπόστασις Α Β εἶνε 45 (64) χμ., ἡ Α Γ εἶνε 63 (96) χμ.· πόση εἶνε ἡ Β Γ;

2) Ἐκ δύο τόπων, οἱ ὁποῖοι ἀπέχουν μεταξύ των 36 (29) χμ. ἀναχωροῦν δύο ταχυδρόμοι καὶ διευθύνεται καθεὶς πρὸς τὸν ἄλλον. Ὅταν συνητηθήσαν, ὁ εἰς εἶχε διατρέξει 18 (16) χμ.· πόσα εἶχε διατρέξει ὁ ἄλλος;

3) Τρεῖς τόποι Α, Β, Γ εὐρίσκονται ὁδοῦ ἢ ἀπόστασις ΑΒ εἶνε 23 (15) χμ., ἢ ΒΓ 13 (3) χμ. μικροτέρα· πόση εἶνε ἢ ΑΓ; 33 (27).

Ἰμάς τετάρτη. 1) Ἐβάδισέ τις πρὸς νότον, ἀναχωρήσας ἀπὸ ἑν σημείου. Ἀφοῦ διέτρεξεν 825 (967) μ., διηυθύνθη πάλιν πρὸς βορρᾶν καὶ διέτρεξεν 802 (955) μ.: α') πόσα μέτρα διέτρεξεν ἐν ἄλλῳ; β') πόσα μέτρα ἀπεμακρύνθη ἀπὸ τοῦ σημείου τῆς ἀναχωρήσεως;

1627 (1922), 23 (12).

2) Ἐκ τριῶν ἀριθμῶν ὁ εἰς εἶνε 25 (36), ὁ δεύτερος κατὰ 8 (12) μικρότερος τοῦ πρώτου, ὁ δὲ τρίτος κατὰ 15 (18) μικρότερος τοῦ δευτέρου· ποιοὶ εἶνε οἱ ἀριθμοὶ καὶ πόσον τὸ ἄθροισμά των;

25, 17, 2 (36, 24, 6).

3) Ἐκ τριῶν ράβδων ἡ πρώτη ἔχει μῆκος 56 (83) δάκτ., ἡ δευτέρα εἶνε κατὰ 15 (68) δακ. βραχυτέρα τῆς πρώτης, ἡ δὲ τρίτη κατὰ 18 (16) δακ. βραχυτέρα τοῦ ἄθροίσματος τῶν δύο πρώτων· πόσον μῆκος ἔχουν καὶ αἱ τρεῖς;

176 (180).

§ 14. Ἀφαιρέσεις ἀπὸ μνήμης. —

α') Διὰ νὰ εὐρωμεν τὸ ἐξαγόμενον $276 \text{ δρχ.} + 39 \text{ δρ.} - 76 \text{ δρ.}$, ἀρκεῖ ἀπὸ τὸν 276 δρ., ν' ἀφαιρέσωμεν 76 δρ. καὶ εἰς τὸ ὑπόλοιπον 200 δρ. νὰ προσθέσωμεν 39 δρ., ὅτε εὐρίσκομεν 239 δραχμάς.

β') Ἐστὼ ὅτι θέλομεν νὰ ἐλαττώσωμεν ἕνα ἀριθμὸν κατὰ τὸ ἄθροισμα ἄλλων· π.χ. τὸν 39 κατὰ τὸ ἄθροισμα τοῦ 15 καὶ 4, ἤτοι κατὰ 19. Θὰ ἔχωμεν $39 - 19 = 20$. Εἶνε φανερόν, ὅτι τὸ ἐξαγόμενον αὐτὸ εὐρίσκομεν καὶ ἐὰν ἀπὸ τὸν 39 ἀφαιρέσωμεν πρῶτον 15 καὶ ἀπὸ τὸ ὑπόλοιπον 24 ἀφαιρέσωμεν τὸν 4.

Κατὰ ταῦτα, διὰ νὰ εὐρωμεν τὴν διαφοράν $96 - 58$, ἀφαιροῦμεν ἀπὸ τὸν 96 τὸ ἄθροισμα $50 + 8$ καὶ εὐρίσκομεν $96 - 50 = 46$ · $46 - 8 = 38$.

γ') Διὰ νὰ εὐρωμεν τὴν διαφοράν $46 - 14 - 2$, δυναμέθα ἀπὸ τὸν 46 ν' ἀφαιρέσωμεν τὸ ἄθροισμα τοῦ 14 καὶ τοῦ 2, ἤτοι τὸν 16, ὅτε εὐρίσκομεν 30.

Ἀσκήσεις.

1) Νὰ εὐρεθοῦν τὰ ἐξαγόμενα τῶν κάτωθι πράξεων κατὰ

δύο τρόπους συμφώνως πρὸς τάνωτέρω, ἀλλ' ἀπὸ μνήμης. α') $127 + 6 - 27 \cdot \beta')$ $439 + 4 - 39 \cdot \gamma')$ $649 + 9 - 349 \cdot \delta')$ $259 + 36 - 59 - 7$.
 ε') $836 + 38 - 39 - 8$.

2) Ὅμοιως τὰ: α') $96 - 16 - 30$. β') $94 - 14 - 30$. γ') $70 - 12 - 28 + 16$. δ') $64 - 68 + 24 - 12$.

§ 15. Γενικὸς κανὼν τῆς ἀφαιρέσεως.—

α') Διὰ νὰ εὕρωμεν τὴν διαφορὰν $76 - 34$, παρατηροῦμεν, ὅτι

$$\begin{array}{r} M \qquad \qquad \qquad M \\ \hline \end{array}$$

ἀρκεῖ νὰ φαιρέσωμεν τὰς 4 τοῦ ἀφαιρετέου ἀπὸ τὰς 6 τοῦ μειωτέου, ὅτε

εὐρίσκομεν 2, τὰς δὲ 3 τοῦ ἀφαιρετέου ἀπὸ τὰς 7 τοῦ μειωτέου, ὅτε

εὐρίσκομεν 4. Ἦτοι δυνάμεθα ν' ἀφαιρέσωμεν τὸν 34 ἀπὸ τὸν 76, ἐὰν ἀφαιρέσωμεν χωριστὰ τὸ ψηφίον τῶν μονάδων καὶ τὸ τῶν δεκάδων τοῦ ἀφαιρετέου ἀπὸ ἀντίστοιχα ψηφία τοῦ μειωτέου, ὅτε εὐρίσκομεν τὸ ὑπόλοιπον 42.

Ὅμοιως διὰ νὰ ἀφαιρέσωμεν τὸν 465 ἀπὸ τὸν 976, ἀφαιροῦμεν

$$\begin{array}{r} M \qquad M \qquad \Delta \qquad \Delta \qquad E \qquad E \\ \hline \end{array}$$


τὰς 5 ἀπὸ τὰς 6, τὰς 6 ἀπὸ 7 καὶ τὰς 4 ἀπὸ τὰς 9. Πρὸς εὐκολίαν γράφομεν τὸ μειωτέον καὶ κάτωθεν αὐτοῦ τὸν ἀφαιρετέον, εἰς τρόπον ὥστε τὰ ψηφία τῆς αὐτῆς τάξεως νὰ εὐρίσκωνται εἰς τὴν αὐτὴν στήλην, κάτωθεν δὲ σύρομεν ὀριζοντίαν γραμμὴν καὶ ὑποκάτω ταύτης γράφομεν τὰ ὑπόλοιπα τῆς ἀφαιρέσεως καθενὸς ψηφίου τοῦ ἀφαιρετέου ἀπὸ τοῦ ἀντιστοίχου τοῦ μειωτέου. Οὕτω ἔχομεν

$$\begin{array}{r} 976 \\ 465 \\ \hline 511 \end{array}$$

β') Εἶνε δυνατόν νὰ συμβῇ, ὥστε ἐν ἡ περισσότερα ψηφία τοῦ ἀφαιρετέου νὰ εἶνε μεγαλύτερα τῶν ἀντιστοίχων τοῦ μειωτέου. Εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν παρατηροῦμεν ἐν πρώτοις, ὅτι « ἡ διαφορὰ δύο ἀριθμῶν δὲν μεταβάλλεται, ἐὰν εἰς τὸν μειωτέον καὶ τὸν ἀφαιρετέον προσθέσωμεν τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν ». Ἐὰν ἔχωμεν π. χ. τὴν ἀφίρεσιν $7 - 4$, θὰ εὕρωμεν ὑπόλοιπον 3, καθὼς φαίνεται καὶ ἐὰν καθελῶν μονάδα τῶν ἀριθμῶν παραστήσωμεν μὲ μίαν σιγμὴν

$$\begin{array}{ccccccc} : & | & : & | & : & | & : & | & \dots \end{array}$$

Ἐάν εἰς τὸν μειωτέον καὶ ἀφαιρετέον προσθέσωμεν τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν, π. χ. τὸν 5, θὰ ἔχωμεν πάλιν



διαφορὰν 3· ἦται $(7+5) - (4+5) = 3$.

γ) Ἐστω ὅτι θέλομεν νὰ εὕρωμεν τὴν διαφορὰν δύο ἀριθμῶν π. χ.

τῶν 764—438. Ἐπειδὴ αἱ 8 δὲν ἀφαιροῦνται ἀπὸ τὰς 4, αὐξά-

νομεν τὸν μειωτέον κατὰ 10 καὶ τὸν ἀφαιρετέον κατὰ 1 καὶ λέ-

γομεν 8 ἀπὸ 14 μένουσιν 6· 1 καὶ 3=4 ἀπὸ 6 μένουσιν 2. Τέλος 4

ἀπὸ 7=3. Ὡστε τὸ ὑπόλοιπον εἶνε 326. Πρὸς εὐκολίαν γράφομεν συνήθως τὸν ἀφαιρετέον ὑπὸ τὸν μειωτέον, καθὼς εἰς τὸ προηγούμενον παράδειγμα· καὶ λέγομεν 8 ἀπὸ 4 δὲν ἀφαιρεῖται· 8 ἀπὸ 14=6, γράφομεν τὸ 6· 1 τὸ κρατούμενον καὶ 3=4 ἀπὸ 6=2· γράφομεν τὸ 2· 4 ἀπὸ 7=3· γράφομεν τὸ 3.

$$\begin{array}{r} 764 \\ -438 \\ \hline 326 \end{array}$$

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω συνάγομεν τὸν ἑξῆς γενικὸν κανόνα.

δ) «Διὰ ν' ἀφαιρέσωμεν δύο ἀριθμούς, γράφομεν τὸν ἀφαιρετέον ὑπὸ τὸν μειωτέον, ὥστε τὰ ψηφία τῆς αὐτῆς τάξεως νὰ εὐρίσκωνται εἰς τὴν αὐτὴν στήλην καὶ σύρομεν ὑπ' αὐτοὺς γραμμὴν ὀριζοντίαν. Ἀκολουθῶν ἀφαιροῦμεν καθὲν ψηφίον τοῦ ἀφαιρετέου ἀπὸ τὸ ἀντίστοιχον τοῦ μειωτέου, ἀρχίζομεν δὲ ἀπὸ τὰς ἀπλῆς μονάδας καὶ τὰ ὑπόλοιπα γράφομεν κάτωθεν τῆς γραμμῆς εἰς τὴν ἀντίστοιχον στήλην καθενός. Ἐάν ψηφίον τι τοῦ ἀφαιρετέου εἶνε μεγαλύτερον ἀπὸ τὸ ἀντίστοιχον τοῦ μειωτέου, αὐξάνομεν τὸ μὲν ψηφίον τοῦ μειωτέου κατὰ 10, τὸ δὲ ἀμέσως ἐπόμενον πρὸς τὰριστερὰ τοῦ ἀφαιρετέου κατὰ μίαν μονάδα καὶ ἀφαιροῦμεν· οὕτω ἐξακολουθοῦμεν τὴν ἀφαίρεσιν, μέχρις ὅτου ἀφαιρεθῶν πάντα τὰ ψηφία τοῦ ἀφαιρετέου».

Ἀσκήσεις καὶ προβλήματα.

Ὁμὰς πρώτη. 1) Νὰ ἐκτελεσθῶσιν αἱ ἐπόμεναι ἀφαιρέσεις καὶ δοκιμαί των· α') 476—243· β') 8693—5746· γ') 9663—8569· δ') 869 λ.—307 λ.

- 2) Νὰ εὐρεθῆ κατὰ δύο τρόπους τὸ $8963 + 3276 - 5864$.
- 3) Ἀπὸ τὸν ἀριθμὸν 89342 ν' ἀφαιρεθῆ τὸ ἄθροισμα $2532 + 7634 + 5846$. (Εὐρετε τὸ ὑπόλοιπον κατὰ δύο τρόπους).
- 4) Νὰ ἐλαττωθῆ τὸ ἄθροισμα $7936 + 5284$ κατὰ τὴν διαφορὰν $14647 - 8993$.
- 5) Νὰ ἐλαττωθῆ ἡ διαφορὰ $2178 - 1937$ κατὰ τὴν $8873 - 8864$.
- 6) Ἀπὸ τὸν 9306 ν' ἀφαιρεθῆ ὁ 846· ἀπὸ τὸ ὑπόλοιπον ν' ἀφαιρεθῆ πάλιν ὁ 846 κ. ο. κ. ὅσον εἶνε δυνατόν. 11 φορές.
- 7) Ἀδξάνω ἀριθμὸν τινα κατὰ 387 (95) καὶ εὐρίσκω τὸν 496 (126)· πόσος εἶνε ὁ ἀριθμὸς; 109 (31).
- Ὅμως δευτέρα. 1) Ἐχει τις 4876 (3122) δρ. καὶ ἐξοδεύει 2998 (1380) δρ.· ἔπειτα εἰσπράττει 896 (475) δρ. καὶ δαπανᾷ 711 (88) δρ.· πόσαι δραχμαὶ τοῦ ἔμειναν; (Νὰ λυθῆ κατὰ δύο τρόπους). 2063 (2129)
- 2) Ἐχει τις περιουσίαν 52864 (83467) δρ. καὶ χαρίζει εἰς ἓν φιλανθρωπικὸν κατάστημα 2865 (4569) δρ. εἰς ἄλλο 3562 (5882) δρ. καὶ εἰς τρίτον 7826 (4835) δρ.· πόσαι δραχ. τοῦ ἔμειναν; (Νὰ λυθῆ κατὰ δύο τρόπους). 38611 (68191).
- 3) Εἰς σιδηρόδρομος εἰσπράττει κατὰ μῆνα Ἰανουάριον, Φεβρουάριον καὶ Μαρτίον ἀντιστοίχως 224516 δρ., 198213 δρ., 234787 δρ. Τὰ ἐξοδά του κατὰ τοὺς τρεῖς τούτους μῆνας ἦσαν ἀντιστοίχως 218415 δρ., 200816 δρ., 218793 δρ.· πόσον κέρδος εἶχε κατὰ τοὺς τρεῖς μῆνας; 19492.
- Ὅμως τρίτη. 1) Ἐμπορος ἠγόρασεν οἶνον ἀντὶ 3824 (768) δρ. καὶ τὸν ἐπώλησεν ἀντὶ 4128 (879) δρ.· πόσας δραχμάς ἐκέρδισε; 304 (111).
- 2) Ἐμπορος ἐπώλησε τυρὸν ἀντὶ 2187 (176) δραχ., ἐκέρδισε δὲ 478 (79) δρ.· πόσον τὸν ἠγόρασε; 1709 (97).
- 3) Εἷς ἠγόρασε σάπωνα ἀντὶ 1678 (362) δρ. καὶ τὸν μετεπώλησε μεζυμῖαν 472 (122) δρ.· πόσον τὸν ἐπώλησε; 1206 (840).
- 4) Τὸ μίκτον βάρος ἐμπορεύματος εἶνε 386 (415) ὀκ., τὸ δὲ καθαρὸν βάρος 317 (398) ὀκ.· πόσον εἶνε τὸ ἀπόβαρον; 69 (17).
- Ὅμως τετάρτη. 1) Ἐγεννήθη τις τὴν 1ην Ἰανουαρίου τοῦ 1749 καὶ ἀπέθανε τὴν 1ην Ἰανουαρίου τοῦ 1832· εἰς πόσαν ἡλικίαν ἀπέθανε; (83).
- 2) Ἐγεννήθη τις εἰς τὸ τέλος τοῦ 1571 καὶ ἀπέθανε

α') εις την αρχήν, β') εις τὸ τέλος τοῦ 1630· πόσα ἔτη ἔζησε; 58 (59).
 3) Εἰς πόλεμος ἤρχισεν εἰς τὴν ἀρχὴν τοῦ ἔτους 836 (925) π. Χ. καὶ διήρκεσεν 76 (78) ἔτη· πότε ἐτελείωσεν; 760 (847).
 4) Ἐν γεγονόσ ἤρχισεν εἰς τὴν ἀρχὴν τοῦ ἔτους 711 (387) π. Χ. καὶ ἐτελείωσεν εἰς τὸ τέλος τοῦ 685 (297) π. Χ. πόσον χρόνον διήρκεσεν; 27 (91).

Ὅμως πέμπη. 1) Ἀπὸ τὸ αὐτὸ σημεῖον ἀναχωροῦν δύο παζοποροί, διευθυνόμενοι πρὸς τὴν αὐτὴν φορὰν· πόσον θ' ἀπέχουν μεταξύ των, ἐὰν ὁ μὲν διατρέξῃ 586 (961) μ., ὁ δὲ 489 (1024) μ.; 97 (63).

2) Ἀπὸ δύο τόπους, οἱ ὁποῖοι ἀπέχουν μεταξύ των 328 (170) μ., ἀναχωροῦν πρὸς ἀντιθέτους φορὰς δύο ταχυδρόμοι διὰ νὰ συναντηθοῦν· πόση θὰ εἶνε ἡ ἀπόστασις των μετὰ μίαν ἡμέραν, ἐὰν ὁ πρῶτος διανύῃ 28 (27) χμ., ὁ δὲ 27 (31) χμ., καθ' ἡμέραν; 273 (112).

3) Ἀπὸ δύο τόπους A, B, οἱ ὁποῖοι ἀπέχουν μεταξύ των 35 (45) χμ. ἀναχωροῦν δύο ταχυδρόμοι κατὰ τὴν αὐτὴν φορὰν· πόσον θ' ἀπέχουν ἐὰν, ὁ ἐκ τοῦ A ἀναχωρήσας διανύσῃ 125 (125) χμ., ὁ δ' ἐκ τοῦ B 327 (285) χμ.; 237 (115).

4) Ἐκ τριῶν προσώπων A, B, Γ ὁ A ἔχει 4826 (176) δρ. Ὁ B 625 (83) ὀλιγωτέρας τοῦ A καὶ ὁ Γ 178 (24) δρ. ὀλιγωτέρας τοῦ B. Ὁ A δίδει εἰς τὸν Γ 48 (22) δρ., ὁ Γ δὲ εἰς τὸν B 243 (18) δρ. Πόσα δραχμὰς θὰ ἔχη καθεὶς; 4778· 4444· 3828· (154, 111, 73).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙV.

Περὶ πολλαπλασιασμοῦ.

§ 16. Ὅρισμοί.—

α') (Πρόβλημα). «Ἡ μία ὀκτὰ ὀσπρίων κοστίζει 9 δρ: πόσον κοστίζουν αἱ 5 ὀκ. τῶν αὐτῶν ὀσπρίων;»

Ἀφοῦ διὰ καθεμίαν ὀκτὰν πληρώνομεν 9 δρ., διὰ τὰς 2 ὀκ. θὰ πληρώσωμεν 9 δρ. + 9 δρ. ἐπομένως διὰ τὰς 5 ὀκ. θὰ πληρώσωμεν 9 δρ. + 9 δρ. + 9 δρ. + 9 δρ. = 45 δρ. Εἰς τὸ πρόβλημα τοῦτο δίδονται δύο ἀριθμοί, οἱ 9 καὶ 5 καὶ σχηματίζομεν ἓν ἄθροισμα, τὸ ὁποῖον ἔχει τόσους προσθετέους ἴσους μὲ τὸν πρῶτον 9, ἔσας

μονάδας έχει ο δεύτερος 5, οδηγεί δὲ εἰς τὸ ἐξῆς γενικώτερον.

6) «Δίδονται δύο ἀριθμοὶ καὶ ζητεῖται νὰ εὕρωμεν ἐν ἄθροισμα, ἔχον τόσους προσθετέους ἴσους μὲ τὸν πρῶτον ἀριθμόν, ὅσας μονάδας ἔχει ὁ δεύτερος».

Εἶνε φανερόν, ὅτι ἐν τοιοῦτον πρόβλημα τότε μόνον εἶνε δυνατόν, ἐὰν ὁ δεύτερος τῶν δοθέντων ἀριθμῶν εἶνε ἀφηρημένος καὶ διάφορος τοῦ 0 καὶ 1, διότι καθὲν ἄθροισμα πρέπει νὰ ἔχη τοῦλάχιστον δύο προσθετέους.

γ') Ἐκ τῶν δύο δοθέντων ἀριθμῶν ὁ πρῶτος λέγεται πολλαπλασιαστέος, ὁ δεύτερος πολλαπλασιαστής καὶ οἱ δὲ δύο μαζῇ παράγοντες. Ὁ ζητούμενος ἀριθμὸς λέγεται γινόμενον, ἢ δὲ πράξις διὰ τῆς ὁποίας εὐρίσκεται τὸ γινόμενον λέγεται πολλαπλασιασμός.

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω συνάγομεν ἔτι,

δ) «πολλαπλασιασμός λέγεται ἢ πράξις διὰ τῆς ὁποίας δοθέντων δύο ἀριθμῶν, ἐπαναλαμβάνομεν τὸν ἕνα τόσας φορὰς, ὅσας μονάδας ἔχει ὁ ἄλλος».

Τὸ γινόμενον δύο ἀριθμῶν π. χ. τῶν 7 καὶ 4, γράφομεν οὕτω 7×4 , ἢ $7 \cdot 4$ καὶ ἀπαγγέλλομεν ἐπὶ ἐπὶ τέσσαρα, δηλαδὴ τὸ σημεῖον τοῦ πολλαπλασιασμοῦ εἶνε τὸ ἐπὶ (\times ἢ \cdot). Ὡστε τὸ 7×4 φανερώνει τὸν ἀριθμόν, τὸν ὁποῖον εὐρίσκομεν, ἐὰν εὕρωμεν τὸ ἄθροισμα τεσσάρων προσθετέων ἴσων μὲ 7, ἦτοι

$$7 \times 4 = 7 + 7 + 7 + 7 = 28.$$

§ 17. Γινόμενον πολλῶν παρσγόντων.—

Καλοῦμεν γινόμενον τριῶν ἢ περισσοτέρων δοθέντων ἀριθμῶν, ἢ παραγόντων, τὸν ἀριθμόν, τὸν ὁποῖον εὐρίσκομεν, ἐὰν πολλαπλασιάσωμεν τὸν πρῶτον ἐκ τῶν δοθέντων ἐπὶ τὸν δεύτερον, τὸ γινόμενον ἐπὶ τὸν τρίτον, τὸ νέον γινόμενον ἐπὶ τὸν τέταρτον κ.ο.κ. μέχρι τοῦ τελευταίου. Π. χ. τὸ γινόμενον τῶν $3 \times 2 \times 5$ θὰ εὐρεθῆ, ἐὰν εὕρωμεν τὸ γινόμενον 3×2 , ἦτοι τὸ 6 καὶ τοῦτο πολλαπλασιάσωμεν ἐπὶ 5, ὅτε εὐρίσκομεν $6 \times 5 = 30$. Σημειώνομεν τὸ γινόμενον τοῦτο ὡς ἐξῆς

$$3 \cdot 2 \cdot 5, \text{ ἢ } 3 \times 2 \times 5 \text{ καὶ εἶνε } = 30, \text{ ὡς εἶδομεν.}$$

Ἀσκήσεις.

1) Νὰ γραφοῦν αἱ κάτωθι προσθέσεις ὡς πολλαπλασιασμοί.
α') $6 + 6 + 6$ β') $94 + 94$ γ') $130 \text{ ἑρ.} + 130 \text{ ἑρ.} + 130 \text{ ἑρ.}$

Δ Δ Δ

δ') $832 \text{ μ.} + 832 \text{ μ.}$ ε') $9 + 9 + 9$.

2) Νὰ γραφοῦν οἱ κάτωθι πολλαπλασιασμοὶ ὡς προσθέσεις

και να εὑρεθοῦν τὰ ἐξαγόμενα· α') 18×4 · β') 140×5 · γ') 1250×5 ·
 $\delta')$ 9800×4 · ε') 560×3 · στ') 89×5 · ζ') 12×5 · η') 38×7 .

3) Να εὑρεθοῦν τὰ γινόμενα· α') 40×6 · β') 50×9 γ') 350×6 ·

$\delta')$ 8600×9 · ε') 900×7 . (Παρατηρήσατε ὅτι $40 \times 6 = 4 \times 6 = 24$
 $= 240$).

4) Σχηματίσατε τὰ γινόμενα πάντων τῶν μονοψηφίων ἀριθμῶν, λαμβανομένων ἀνά δύο.

5) Να εὑρεθοῦν τὰ γινόμενα α') $5 \times 2 \times 7 \times 4$ · β') $6 \times 7 \times 9 \times 2$ ·
 γ') $40 \times 5 \times 1$ · δ') $8 \times 3 \times 5 \times 2$ · ε') 8. 4. 3. 2. 7.

6) Μία εὐθεῖα γραμμὴ διαιρεῖται εἰς 8 ἴσα μέρη καὶ καθὲν τούτων πάλιν εἰς 5 ἴσα μέρη· εἰς πόσα ἴσα μέρη διαιρεῖται οὕτω ἡ εὐθεῖα ;

§ 18. Δύναμεις ἑνὸς ἀριθμοῦ.

α') Συνήθως ἀπαντῶμεν γινόμενα μὲ παράγοντας ἴσους. Π. χ. $3 \times 3 \times 3$, $6 \times 6 \times 6$, ἢ 9×9 κ.ο.κ. Μεταχειριζόμεθα δι' αὐτὰ γραφὴν συντομωτέραν καὶ τὰ ὀνομάζομεν μὲ ἰδιαιτερον ὄνομα. Γράφομεν μόνον ἓνα τῶν ἴσων παραγόντων, δεξιὰ δ' αὐτοῦ καὶ ἄνω τὸν ἀριθμὸν, ὃ ὁποῖος φανερώνει πόσας φορὰς ὑπάρχει ὁ παράγων αὐτὸς εἰς τὸ γινόμενον. Οὕτω τὸ $3 \times 3 \times 3$ γράφεται 3^3 , τὸ $6 \times 6 \times 6 \times 6 \times 6 = 6^5$, τὸ $9 \times 9 = 9^2$. Τοιαῦτα γινόμενα λέγονται δυνάμεις τῶν ἀριθμῶν. Οὕτω τὸ 3^3 λέγεται τρίτη δύναμις τοῦ 3, καὶ ἀπαγγέλλεται τρία εἰς τὴν τρίτην δύναμιν· τὸ 6^5 λέγεται πέμπτη δύναμις τοῦ 6, ἢ 6 εἰς τὴν πέμπτην δύναμιν κ.ο.κ.

β') Κατὰ ταῦτα «δύναμις ἑνὸς ἀριθμοῦ λέγεται τὸ γινόμενον ἴσων παραγόντων μὲ τὸν ἀριθμὸν». Ὁ ἀριθμὸς, ὃ ὁποῖος δεικνύει τὸ πλῆθος τῶν ἴσων παραγόντων τοῦ γινομένου, λέγεται ἐκθέτης τῆς δυνάμεως, ὃ δὲ εἰς τῶν ἴσων παραγόντων λέγεται βάσις τῆς δυνάμεως.

γ') Ἄν οἱ ἴσοι παράγοντες εἴνε δύο, ἢ δύναμις τοῦ ἀριθμοῦ λέγεται τετράγωνον ἢ δευτέρα δύναμις αὐτοῦ· ἂν εἴνε τρεῖς, λέγεται κύβος τοῦ ἀριθμοῦ ἢ τρίτη δύναμις, ἂν τέσσαρες, πέντε, ..., λέγεται τετάρτη, πέμπτη, ... δύναμις κ.ο.κ. Οὕτω ὁ κύβος τοῦ 4 εἴνε $4^3 = 4 \times 4 \times 4 = 64$ · τὸ τετράγωνον τοῦ 5 εἴνε $5^2 = 5 \times 5 = 25$.

Εἶνε φανερόν, ὅτι πᾶσα δύναμις τοῦ 1 εἴνε ἴση μὲ 1, πᾶσα δὲ δύναμις τοῦ 10 εἴνε ἴση μὲ τὴν μονάδα, ἀκολουθοῦμένην ὑπὸ τῶσων

μηδενικῶν ὄσας μονάδας ἔχει ὁ ἐκθέτης τῆς δυνάμεως. Οὕτω ἔχομεν
 ἔτι $10^2 = 10 \times 10 = 100$. $10^3 = 10 \times 10 \times 10 = 1000$.

δ') Ἐὰν ἔχωμεν νὰ πολλαπλασιάσωμεν δύο δυνάμεις τοῦ αὐτοῦ ἀριθμοῦ, π.χ. τὰς 5^2 καὶ 5^4 θὰ εἶνε $5^2 \times 5^4 = 5 \times 5 \times 5 \times 5 \times 5 \times 5 = 5^6$. Ὁμοίως τὸ $6^3 \times 6^2 = 6^5$. τὸ $7^2 \times 7^2 \times 7^5 = 7^9$. Ἥτοι,

«τὸ γινόμενον δυνάμεων τοῦ αὐτοῦ ἀριθμοῦ εἶνε δύναμις αὐτοῦ, ἔχουσα ἐκθέτην τὸ ἄθροισμα τῶν ἐκθετῶν τῶν δοθεισῶν δυνάμεων».

§ 19. Ἐφαρμογὴ τοῦ ποπλαπλασιασμοῦ εἰς τὸν πρακτικὸν βίον.—

α') Ἐκ τῶν πολλῶν ἐφαρμογῶν τοῦ πολλαπλασιασμοῦ ἀναφέρομεν ἐνταῦθα ἐκείνην, καθ' ἣν ἀπὸ τῆν τιμὴν τῆς μιᾶς μονάδος εὐρίσκομεν τὴν τιμὴν πολλῶν ὁμοειδῶν μονάδων.

β') (Πρόβλημα). «**Ἡ** ὀκτὼ σάπωνος τιμᾶται 9 δρ. πόσον τιμῶνται αἱ 4 ὀκ. τοῦ αὐτοῦ σάπωνος;»

Ἐν πρώτοις παριστάνομεν τὸν ἄγνωστον ἀριθμὸν διὰ τοῦ x καὶ γράφομεν

$$\frac{1 \text{ ὀκ. τιμῶνται } 9 \text{ δρ.}}{4 \qquad \qquad \qquad x}$$

Παρατηροῦμεν ὅτι, ἀφοῦ ἡ 1 ὀκ. τιμᾶται 9 δρ., αἱ 2 ὀκ. θὰ τιμῶνται $9 \text{ δρ.} + 9 \text{ δρ.} = 9 \text{ δρ.} \times 2$. αἱ 4 ὀκ. θὰ τιμῶνται $9 \text{ δρ.} + 9 \text{ δρ.} + 9 \text{ δρ.} + 9 \text{ δρ.} = 9 \text{ δρ.} \times 4 = 36$ δραχμάς.

γ') (Πρόβλημα). «**Δίδει** τις μίαν ὀκτὼν καφέ καὶ λαμβάνει 3 ὀκ. σάπωνος· ἐὰν δώσῃ 8 ὀκ. καφέ, πόσας ὀκτάδας σάπωνος θὰ λάβῃ;»

Παριστάνομεν τὸν ζητούμενον ἀριθμὸν διὰ τοῦ x καὶ γράφομεν

$$\frac{1 \text{ ὀκ. } x. \qquad \qquad \qquad 3 \text{ ὀκ. } \sigma.}{8 \qquad \qquad \qquad x}$$

σκεπτόμενοι δὲ καθὼς εἰς τὸ προηγούμενον πρόβλημα, βλέπομεν ὅτι, ἀφοῦ διὰ μίαν ὀκτὼν καφέ λαμβάνει 3 ὀκ. σάπωνος, διὰ δύο ὀκ. καφέ θὰ λάβῃ 3×2 ὀκτάδας σάπωνος καὶ διὰ 8 ὀκ. καφέ θὰ λάβῃ $3 \times 8 = 24$ ὀκ. σάπωνος.

δ') «**Τάνωτέρω** προβλήματα, εἰς καθὲν τῶν ὁποίων δίδεται ἡ τιμὴ τῆς μιᾶς μονάδος καὶ ζητεῖται ἡ τιμὴ πολλῶν ὁμοειδῶν μονάδων, καθὼς καὶ τὰ ὁμοια πρὸς αὐτά, λύονται διὰ ποπλαπλασιασμοῦ· ποπλαπλασιαστέος εἶνε ἡ τιμὴ τῆς

μιάς μονάδος (ἀδιαφόρως τοῦ τι αὐτὴ παριστάνει), πολλαπλασιαστικῆς δὲ ὁ ἀριθμὸς τῶν μονάδων, τῶν ὁποίων ἡ τιμὴ ζητεῖται (καὶ εἶνε εἰς τὴν πρᾶξιν τοῦ πολλαπλασιασμοῦ ἀριθμὸς ἀφηρημένος). Τὸ γινόμενον τοῦ πολλαπλασιασμοῦ φανερῶνει ὅτι καὶ ὁ πολλαπλασιαστέος.

Προβλήματα πρὸς λύσιν.

Ὅμας πρώτη. 1) Μία ὀκά οἴνου τιμᾶται 4(3) δρ.· πόσον τιμῶνται 8 (7) ὀκ. τοῦ αὐτοῦ οἴνου;

2) Ἡ μία ὀκά (δραχμὴ) ἔχει 400 (100) δράμια (λεπτὰ)· πόσα ἔχουν αἱ 3, αἱ 6, αἱ 9 ὀκ. (δραχμαί);

3) Ἐν χρηματικὸν κεφάλαιον δίδει τόκον εἰς ἓν ἔτος 396 (692) δρ.· πόσον τόκον θὰ δώσῃ εἰς 5 (8) ἔτη; 1980 (5536).

4) Ἄν ἡ ὀκά τῆς ζαχάρως τιμᾶται 12 (23) δρχ., πόσον τιμῶνται αἱ 8, αἱ 10, αἱ 14, αἱ 30 ὀκ.;

5) Ἀμαξοστοιχία διατρέχει εἰς 1 ὥρ. 40 (60) χμ.· πόσα διατρέχει εἰς 6, εἰς 10, εἰς 12, εἰς 30 ὥρ.;

Ὅμας δευτέρα. 1) Ἀγοράζει τις 5 (12) ὀκ. ἐνὸς ἐμπορεύματος* πρὸς 32 (53) λ. τὴν ὀκάν καὶ τὸ πωλεῖ πρὸς 37 (56) λ. τὴν ὀκάν· πόσα λεπτὰ κερδίζει ἐν ὄλφ; 25 (36).

2) Ἐμπορος ἠγόρασεν 8 (9) ὀκ. πράγματος ἀντὶ 120 (150) δρχ. καὶ τὸ ἐπώλησε πρὸς 20 (25) δρ. τὴν ὀκάν· πόσον ἐκέρδισε; 40 (75).

Ὅμας τρίτη. 1) Ἀπὸ ἓνα τόπον ἀναχωροῦν δύο ταχυδρόμοι, διευθυνόμενοι ἀντιθέτως· πόση θὰ εἶνε ἡ ἀπόστασις των μετὰ 3 (4) ἡμ., ἐὰν ὁ πρῶτος διατρέχῃ 25 (38) χμ., ὁ δὲ δεύτερος 36 (42) χμ. καθ' ἡμέραν; 183 (320).

2) Πόση θὰ εἶνε ἡ ἀπόστασις τῶν αὐτῶν ταχυδρόμων, ἐὰν ἔχουν τὴν αὐτὴν φορὰν; 33 (16).

* Εἰς τὸ πρόβλημα τοῦτο καθὼς καὶ εἰς ἄλλα εἰς τὰ ὅποια δὲν ἀναφέρεται ἁκριβῶς τὸ εἶδος τοῦ ἐμπορεύματος, καλὸν εἶνε νὰ ὀρίξῃ αὐτὸ ὁ καθηγητὴς εἰς τρόπον, ὥστε ν' ἀρμόζουσιν καὶ αἱ ἀναγραφόμεναι τιμαὶ διὰ καθὲν καὶ κατὰ τὸ δυνατόν συμφῶνως πρὸς τὰ προϊόντα τοῦ τόπου.

Ὅμας τετάρτη. 1) Ἔχομεν ἓνα ἀριθμὸν μνηθητῶν καὶ τοποθετοῦμεν εἰς καθὲν ἐκ 3 (4) θρανίων 7 (8), περισσεύουν δὲ 6 (6) μαθηταί· πόσους μαθητὰς ἔχομεν ; 27 (38).

2) Ἔχομεν 4 (5) θρανία καὶ δοκιμάζομεν νὰ τοποθετήσωμεν εἰς καθὲν 6 (7) μαθητὰς, ἀλλὰ περισσεύουν 2 (3) θέσεις κεναί· πόσους μαθητὰς ἔχομεν ; 22 (32).

Ὅμας πέμπτη. 1) Εἰς ἐργάτης κερδίζει καθ' ἡμέραν 20 δρ.· πόσον κερδίζει α') εἰς 8 ἡμέρ ; β') εἰς μίαν ἐβδομάδα ;

2) Ἀγοράζει τις 80 δκ. σίτου πρὸς 8 (5) δραχ. τὴν ὀκτῶν· πόσους δραχμάς θὰ πληρώσῃ ;

3) Ἐμπορὸς ἀγοράζει 6 πῆχ. ὑφάσματος ἀντὶ 72 δρ. καὶ τὸ πωλεῖ πρὸς 10 δραχμάς τὸν πῆχυν· ἐκέρδισεν ἢ ἐζημιώθη καὶ πόσον ; ζ. 12.

4) Ἐκ δύο τόπων, οἱ ὁποῖοι ἀπέχουν 432 (583) χμ., ἀναχωροῦν δύο ταχυδρόμοι, διευθυνόμενοι πρὸς συνάντησίν των· πόσον θ' ἀπέχουν, ἐὰν ὁ μὲν βαδίσῃ 3 (4) ἡμ. ἀπὸ 25 (43) χμ., ὁ δὲ ἐπὶ 4 (5) ἡμ. ἀπὸ 21 (41) χμ. καθ' ἡμέραν ; 273 (206).

5) Τρεῖς τόποι Α, Β, Γ εὐρίσκονται ἐπ' εὐθείας ὁδοῦ· ἡ ἀπόστασις ΑΒ εἶνε 4 (6) χμ., ἡ ΒΓ 8 (12) χμ. μεγαλύτερα τοῦ τριπλασίου τῆς ΑΒ· πόση εἶνε ἡ ΑΓ ; 24 (36).

§ 20. Πολλαπλασιασμοὸς ἀπὸ μνήμης.—

α') Ἐστω δι θελομεν νὰ εὕρωμεν τὸ γινόμενον 35×9 .

Εἶνε φανερὸν ὅτι, ἂν γράψωμεν $35 = 3 + 5$ δυνάμεθα ἀντὶ νὰ πολλαπλασιάσωμεν τὸν 35 ἐπὶ 9, νὰ πολλαπλασιάσωμεν τὰς 3×9 καὶ 5×9 , ὅτε εὐρίσκομεν $3 \times 9 = 27$, καὶ $5 \times 9 = 45$, τὰ δύο δὲ αὐτὰ ἐξαγόμενα νὰ τὰ προσθέσωμεν. Οὕτω προκύπτει $27 + 45 = 270 + 45 = 315$. Ὅμοίως ἔχομεν $45 \times 6 = 4 \times 6 + 5 \times 6 = 24 + 30 = 270$ ἤτοι·

β') « Διὰ νὰ πολλαπλασιάσωμεν ἀθροισμα ἐπὶ ἀριθμὸν, ἀρκεῖ νὰ πολλαπλασιάσωμεν καθένα τῶν προσθετέων ἐπὶ τὸν ἀριθμὸν καὶ νὰ προσθέσωμεν τὰ ἐξαγόμενα ».

γ') (Πρόβλημα). « Μαθητὴς ἀγοράζει 6 τετράδια πρὸς 50 λεπτὰ τὸ ἓν· ἄλλην φορὰν ἀγοράζει 3 τετράδια πρὸς 50 λεπτὰ τὸ ἓν· πόσον ἐπλήρωσεν ἐν ὅλῳ ; ».

Θὰ εὐρωμεν τὸν ζητούμενον ἀριθμὸν, ἐὰν παρατηρήσωμεν ὅτι ὁ μαθητῆς ἐπλήρωσε τόσα, ὅσα θὰ ἐπλήρωνεν, ἐὰν ἠγόραζεν 6 τετρ. + 3 = 9 τετρ. πρὸς 50 λ. καθέν· ἦτοι $50 \times 9 = 450$ λ. Τὸ αὐτὸ ἐξαγόμενον εὐρίσκομεν, ἐὰν πολλαπλασιάσωμεν τὸ 50 λ. ἐπὶ 6 καὶ ἔπειτα ἐπὶ 3 καὶ προσθέσωμεν τὰ ἐξαγόμενα· ἦτοι $50 \lambda. \times (6 + 3) = 50 \lambda. \times 6 + 50 \lambda. \times 3 = 50 \lambda. \times 9 = 450$ λ.

Ἐκ τούτων καὶ ἄλλων ὁμοίων παραδειγμάτων ἔπεται ὅτι, «διὰ νὰ πολλαπλασιάσωμεν ἀριθμὸν ἐπὶ ἄθροισμα, ἀρκεῖ νὰ πολλαπλασιάσωμεν τὸν ἀριθμὸν ἐπὶ καθένα τῶν προσθετέων καὶ νὰ προσθέσωμεν τὰ ἐξαγόμενα».

δ') (Πρόβλημα). «Ἐμπορος παραγγέλλει καὶ τοῦ στέλλουν 29 δκ. ἐνὸς ἐμπορεύματος πρὸς 8 δραχ. τὴν δκᾶν. Ἄλλ' ἐκ τούτων ἐπέστρεψε τὰς 9 δκ. πόσας δραχ. πρέπει νὰ πληρώσῃ;».

Θὰ εὐρωμεν τὸν ζητούμενον ἀριθμὸν, ἐὰν παρατηρήσωμεν, ὅτι ὁ ἔμπορος πρέπει νὰ πληρώσῃ μόνον τὰς 29 δκ. — 9 δκ. = 20 δκ., τὰς ὁποίας ἐκράτησε, πρὸς 8 δρ. καθεμίαν· ἦτοι θὰ πληρώτῃ $20 \times 8 = 160$ δρ. Τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν θὰ εὐρωμεν, ἐὰν πολλαπλασιάσωμεν τὸ 8 δρ. $\times 29$, καὶ ἀπὸ τὸ γινόμενον 232 δρ. ἀφαιρέσωμεν τὸ 8 δρ. $\times 9 = 72$ δρ. Ὡστε ἔχομεν $8 \delta\rho. \times 29 - 8 \delta\rho. \times 9 = 8 \delta\rho. \times (29 - 9) = 8 \delta\rho. \times 20 = 160$ δρ.

Καθ' ὁμοίον τρόπον ἔχομεν ὅτι, $26 - 6$ ἐπὶ 4 ἰσοῦται μὲ $26 \times 4 = 104$ πλὴν $6 \times 4 = 24$ δηλαδή μὲ 80. Ἦτοι

«διὰ νὰ πολλαπλασιάσωμεν ἀριθμὸν ἐπὶ τὴν διαφορὰν δύο ἄλλων, ἀρκεῖ νὰ πολλαπλασιάσωμεν τὸν ἀριθμὸν ἐπὶ τὸν μειωτέον καὶ τὸν ἀφαιρετέον τῆς διαφορᾶς καὶ ἀπὸ τὸ πρῶτον γινόμενον νὰ ἀφαιρέσωμεν τὸ δεύτερον».

ε') Ἔστω ὅτι θέλομεν νὰ εὐρωμεν τὸ γινόμενον 96×10 ἢ τὸ 96×100 , ἢ τὸ $96 \times 1000 \dots$ κ. ο. κ.

Εἶνε φανερόν ὅτι, ἐὰν ἡ μονὰς ληφθῇ ὡς προσθετέος 10 φορές, θὰ δώσῃ 1 δεκάδα· ἄρα αἱ 96×10 θὰ δώσουν $96 = 960$.

Ὅμοίως $96 \times 100 = 96 = 9600$ · $96 \times 1000 = 96 = 96000$ κ. ο. κ. Ὡστε, «διὰ νὰ πολλαπλασιάσωμεν ἀριθμὸν ἐπὶ 10, 100, 1000... ἀρκεῖ, νὰ γράψωμεν εἰς τὸ τέλος τοῦ ἀριθμοῦ πρὸς τὰ δεξιὰ ἐν, δύο, τρία... μηδενικά».

“Ὅθεν κατὰ γινόμενον ἀριθμῶν δὲν μεταβάλλεται, καθ’ οἰανδήποτε τάξιν καὶ ἂν γράψωμεν τοὺς παράγοντάς του».

γ’) Τὴν ιδιότητα αὐτὴν μεταχειρίζομεθα, διὰ νὰ κάμωμεν τὴν δοκιμὴν τοῦ πολλαπλασιασμοῦ. Ἐὰν π.χ. ζητοῦμεν τὸ γινόμενον 20×15 καὶ εὑρωμεν 300, ἀλλάσσομεν τὴν θέσιν τῶν παραγόντων, γράφομεν δηλαδὴ 15×20 ἐκτελοῦμεν καὶ τὸν πολλαπλασιασμὸν αὐτόν, πρέπει δὲ νὰ εὑρωμεν τὸ αὐτὸ γινόμενον 300.

δ’) Ἐὰν ὁ πολλαπλασιαστέος εἶνε συγκεκριμένος ἀριθμὸς, δὲν ἐπιτρέπεται ν’ ἀλλάξωμεν τὴν θέσιν τῶν παραγόντων. Διότι ὁ πολλαπλασιαστής πρέπει νὰ εἶνε πάντοτε ἀριθμὸς ἀφηρημένος. Εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν θεωροῦμεν καὶ τὸν πολλαπλασιαστέον ὡς ἀφηρημένον ἀριθμὸν καὶ εἰς τὸ προκύπτον γινόμενον δίδομεν τὴν ἐπωνυμίαν τοῦ δοθέντος πολλαπλασιαστέου. Οὕτω δυνάμεθα νὰ κάμωμεν τὴν ἀλλαγὴν τῆς θέσεως τῶν παραγόντων. Π.χ. ἐὰν ἔχωμεν 8×15 , λέγομεν $8 \times 15 = 15 \times 8$ καὶ εἰς τὸ γινόμενον 120 δίδομεν τὴν ἐπωνυμίαν δραχμαί.
δρ.

Ἀσκήσεις.

1) Νὰ εὑρεθοῦν ἀπὸ μνήμης τὰ κάτωθι γινόμενα κατὰ τὸν εὐκολώτερον τρόπον. α’) $8 \times 4 \times 5$. β’) $6 \times 8 \times 5$. γ’) $5 \times 8 \times 2$. δ’) $6 \times 4 \times 3 \times 5$. ε’) $8 \times 5 \times 3 \times 9$. ς’) $5^2 \times 2^2 \times 10$.

2) Ὁμοίως τὰ α’) τὸ 4 νὰ ληφθῆ 5 × 6 φορές· β’) τὸ 5 × 7 νὰ ληφθῆ 3 φορές· γ’) 8 φορές τὸ 5 × 4.

§ 22. Περὶ τῶν παραγόντων 1 καὶ 0.—

α’) Εἰς τὴν (§ 16, 6’) εἶδομεν, ὅτι ὁ πολλαπλασιασμὸς ἑνὸς ἀριθμοῦ ἐπὶ ἄλλον ἰσχύει, ἔταν ὁ δεῦτερος ἀριθμὸς δὲν εἶνε 1 ἢ 0. Τὸ γινόμενον ἀριθμοῦ ἐπὶ 1 σημαίνει αὐτὸν τὸν ἀριθμὸν.

Οὕτω 9 ἐπὶ 1 σημαίνει, νὰ λάβωμεν τὸν 9 μίαν φοράν· ἦτοι $9 \times 1 = 9$.

β’) Ἐστω ὅτι θέλομεν νὰ εὑρωμεν τὸ γινόμενον 8×0 . Ἐπειδὴ κατὰ τὴν ιδιότητα τοῦ πολλαπλασιασμοῦ (§ 21, α’) τὸ $8 \times 0 =$ μὲ 0×8 καὶ τοῦτο εἶνε ἴσον μὲ $0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0$, ἔπεται ὅτι καὶ $8 \times 0 = 0$.

Κατὰ ταῦτα, τὸ γινόμενον ἀριθμοῦ ἐπὶ 1 ἰσοῦται μὲ αὐτὸν τὸν ἀριθμὸν, ἐνῶ τὸ γινόμενον ἀριθμοῦ ἐπὶ 0 εἶνε ἴσον μὲ 0. Ὡστε $9 \times 1 = 9$, ἐνῶ $9 \times 0 = 0$.

Ἀσκήσεις.

1) Ἐάν εἰς τῶν παραγόντων γινομένου δύο ἀριθμῶν εἶνε ἴσος μὲ 1, π. χ. 1×7 ἢ 1×25 , μὲ τι ἰσοῦται τὸ γινόμενον;

2) Ἐάν εἰς τῶν παραγόντων γινομένου εἶνε 0, π. χ. $8 \times 0 \times 3$, ἢ $2 \times 7 \times 0 \times 8$ μὲ τι ἰσοῦται τὸ γινόμενον;

3) Μὲ τι ἰσοῦται οἰαδήποτε δύναμις τῆς μονάδος; π. χ. ἢ 1^3 ;

§ 23. Κανὼν τοῦ πολλαπλασιασμοῦ δύο ἀριθμῶν.—

α') Ἐστω ὅτι θέλομεν νὰ εὑρωμεν τὸ γινόμενον 496×8 .

E Δ M

Παρατηροῦμεν ὅτι τὸ $496 = 4 + 9 + 6$. Ἐπομένως (§ 20, α'), διὰ πολλαπλασιάσωμεν τὸ 496 ἐπὶ 8, ἀρκεῖ νὰ πολλαπλασιά-

E Δ M

σωμεν τὰς 4 ἐπὶ 8, τὰς 9 ἐπὶ 8 καὶ τὰς 6 ἐπὶ 8, νὰ προσθέσωμεν δὲ τὰ

E Δ M E Δ M

ἐξαγόμενα· ἦτοι $496 \times 8 = 4 \times 8 + 9 \times 8 + 6 \times 8 = 32 + 72 + 48 =$

M Δ E M Δ E

$= 8 + 76 + 32 = 8 + 6 + 39 = 3968$.

Ὡς βλέπομεν, διὰ νὰ πολλαπλασιάσωμεν τὸ 496×8 , ἀρκεῖ νὰ πολλαπλασιάσωμεν καθὲν ψηφίον τοῦ χωριστὰ ἐπὶ 8 καὶ νὰ προσθέσωμεν τὰ ἐξαγόμενα, προσέχοντες εἰς τὸ ὅτι, ὁ πολλαπλασιασμοῦ

M

τοῦ ψηφίου τῶν μονάδων 6×8 δίδει γινόμενον 48, τοῦ τῶν δεκάδων

Δ

E

9×8 δίδει 72, καὶ τοῦ τῶν ἑκατοντάδων 4×8 δίδει 32. Πρὸς εὐκολίαν γράφομεν τὸν 496, ὑποκάτω αὐτοῦ τὸν 8 καὶ πολλαπλασιάζομεν ὡς ἐξῆς, ἀφοῦ προηγουμένως σύρωμεν κάτωθεν αὐτῶν γραμμὴν ὀριζοντίαν, ὑπὸ τὴν ὁποίαν γράφομεν τὰ ἐξαγόμενα.

496

8

3968.

Λέγομεν $8 \times 6 = 48$ · γράφομεν 8 καὶ κρατοῦμεν $4 \cdot 8 \times 9 = 72$ καὶ $4 = 76$, γράφομεν 6 κρατοῦμεν $7 \cdot 8 \times 4 = 32$ καὶ 7 τὰ κρατούμενα 39· γράφομεν τὸ 39. Τὸ γινόμενον εἶνε 3968.

β') Ἐστω ὅτι θέλομεν νὰ εὑρωμεν τὸ γινόμενον 387×562 .

Ὡς εἶδομεν εἰς τὴν § 20, α'), ἀντὶ νὰ λάβωμεν τὸ 387 ὡς προσ-

θετέον 562 φορές, εἶνε τὸ αὐτό, ἐὰν λάβωμεν αὐτὸν πρῶτον 500 φορές, ἔπειτα 60 φορές καὶ τέλος 2 φορές ἀκόμη καὶ προσθέσωμεν τὰ ἐξαγόμενα. Ὡστε θὰ ἔχωμεν

$$387 \times 500 = 387 \times 5 \times 100 = 1935 \times 100 = 193500.$$

$$387 \times 60 = 387 \times 6 \times 10 = 2322 \times 10 = 23220.$$

$$387 \times 2 = 774.$$

Ἦτοι $387 \times 562 = 193500 + 23220 + 774$. Διὰ νὰ προσθέσωμεν τὰ ἐξαγόμενα αὐτά, ἐφαρμόζομεν τὸν γενικὸν κανόνα τῆς προσθέσεως (§ 11), ὅτε ἔχομεν

774
23220
193500
<hr style="width: 100%;"/>
217494.

ἄθροισμα

Διὰ νὰ εὐρωμεν σύντομον κανόνα τοῦ πολλαπλασιασμοῦ, παρατηροῦμεν ὅτι τὸ 774 εἶνε τὸ γινόμενον τοῦ 387 ἐπὶ τὸ ψηφίον 2 τῶν ἀπλῶν μονάδων τοῦ 562· τὸ 2322 εἶνε τὸ γινόμενον τοῦ 387 ἐπὶ τὸ ψηφίον 6 τῶν δεκάδων τοῦ 562 καὶ τὸ 1935 εἶνε τὸ γινόμενον τοῦ 387 ἐπὶ τὸ ψηφίον 5 τῶν ἑκατοντάδων τοῦ 562. Πρὸς τοῦτοις βλέπομεν, ὅτι τὸ 2322 γράφεται ὑποκάτω τοῦ 774, ἀφοῦ ἀφεθῆ μία θέσις ἐκ τοῦ τέλους πρὸς τὰ δεξιὰ, εἰς τὴν ὁποίαν γράφεται 0 (τὸ ὅποιον δύναται καὶ νὰ παραλειφθῆ)· ἐπίσης τὸ 1935 γράφεται ὑποκάτω τοῦ 2322, ἀφοῦ ἀφεθῆ μία θέσις πρὸς τὰ δεξιὰ.

Πρὸς εὐκολίαν γράφομεν τὸ 387 καὶ ὑποκάτω αὐτοῦ τὸ 562· σύρομεν γραμμὴν ὀριζοντίαν καὶ κάτωθεν αὐτῆς γράφομεν τὰ γινόμενα 774· 2322· 1935, καθὼς εἶπομεν καὶ παρατηροῦμεν, ὅτι τὸ πρῶτον πρὸς τὰ δεξιὰ ψηφίον καθενὸς τῶν γινομένων τοῦ 387 ἐπὶ τὰ ψηφία τοῦ 562 εὐρίσκεται εἰς τὴν αὐτὴν στήλην μὲ τὸ ἀντίστοιχον ψηφίον τούτου·

	387
	562
	<hr style="width: 100%;"/>
ἦτοι τὸ 4 τοῦ 774 εὐρίσκεται ὑπο-	774
κάτω τοῦ 2 τοῦ 562· τὸ 2 τοῦ 2322	2322
εὐρίσκεται ὑποκάτω τοῦ 6 τοῦ 562·	1935
τὸ 5 τοῦ 1935 εὐρίσκεται ὑποκάτω	<hr style="width: 100%;"/>
τοῦ 5 τοῦ 562.	217494

γ') Ὁμοίως διὰ νὰ εὐρωμεν τὸ γινόμενον 83054×413 λέγομεν, ἀφοῦ γράψωμεν τὸ 83054, ὑποκάτω αὐτοῦ τὸ 413 καὶ

κάτωθεν τούτου σύρωμεν γραμμὴν ὀριζοντίαν. $3 \times 4 = 12$, γράφομεν
2 καὶ κρατοῦμεν $1 \cdot 3 \times 5 = 15$ 83054

	413
(1)	249162
(2)	83054
(3)	332216
	34301302

καὶ $1 = 16$, γράφομεν 6 καὶ κρατοῦμεν $1 \cdot 3 \times 0 = 0$ καὶ $1 = 1$, γρά-
φομεν τὸ $1 \cdot 3 \times 3 = 9$, γράφομεν τὸ $9 \cdot 3 \times 8 = 24$, γράφομεν 24.
Ὅμοιως πολλαπλασιάζομεν τὸ 83054 ἐπὶ 1, καὶ ἔπειτα ἐπὶ 4 καὶ τὸ
μὲν γινόμενον ἐπὶ 1 ἀρχίζομεν νὰ γράψωμεν ἐκ τῆς θέσεως ἣ ὀποία
εἶνε ὑποκάτω τοῦ 1 τοῦ 413 κ.ο.κ.

Τὰ γινόμενα τὰ ὀποῖα εὐρίσκομεν ἐκ τοῦ πολλαπλασιασμοῦ τοῦ
πολλαπλασιαστέου ἐπὶ καθὲν τῶν ψηφίων τοῦ πολλαπλασιαστοῦ λέγον-
ται μερικὰ γινόμενα. Οὕτω τὰ (1), (2), (3), εἶνε μερικὰ γινόμενα.

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω συνάγομεν τὸν ἑξῆς γενικὸν κανόνα.

ε) « Διὰ νὰ πολλαπλασιάσωμεν δύο οἰουσδήποτε ἀριθμούς,
γράφομεν τὸν πολλαπλασιαστὴν ὑπὸ τὸν πολλαπλασιαστέον καὶ
κάτωθεν σύρωμεν γραμμὴν ὀριζοντίαν. Ἐπειτα πολλαπλασιάζομεν
τὸν πολλαπλασιαστέον ἐπὶ καθὲν τῶν ψηφίων τοῦ πολλαπλασια-
στοῦ, ἀρχίζοντες ἐκ τῶν δεξιῶν καὶ γράφομεν τὰ μερικὰ γινόμενα
ὑπὸ τὴν γραμμὴν τὸ ἕν μετὰ τὸ ἄλλο οὕτως, ὥστε τὸ πρῶτον
πρὸς τὰ δεξιὰ ψηφίον καθενὸς τούτων νὰ εὐρίσκεται εἰς τὴν στή-
λην τοῦ ψηφίου τοῦ πολλαπλασιαστοῦ, ἐπὶ τὸ ὀποῖον πολλαπλα-
σιάζομεν. Ἀκολουθῶν φέρομεν κάτωθεν τοῦ τελευταίου τῶν μερι-
κῶν γινομένων γραμμὴν ὀριζοντίαν καὶ προσθέτομεν ταῦτα, τὸ
δὲ ἄθροισμὰ τῶν γράφομεν ὑπὸ τὴν γραμμὴν. »

Ἀσκήσεις καὶ προβλήματα.

Ὅμοιως πρώτη. 1) Νὰ πολλαπλασιασθῇ καθεὶς τῶν $185 \cdot 3642 \cdot$
 83513 ἐπὶ καθένα τῶν μονοψηφίων ἀριθμῶν.

2) Νὰ πολλαπλασιασθοῦν οἱ ἀριθμοὶ $831 \cdot 605 \cdot 2353 \cdot 2793$ ἀντι-
στοίχως ἐπὶ $75 \cdot 19 \cdot 187 \cdot 322$ καὶ νὰ γίνουσι καὶ αἱ δοκιμαί.

3) Νὰ εὐρεθοῦν τὰ γινόμενα· α') $2174 \times 1079 \times 2009$. β') $8172 \times$
 3021×715 . γ') $3005 \times 7 \times 2 \times 3 \times 5$.

(Ἀπόκρ. α') 4712603714. β') 17651642580. γ') 631050).

4) Πόσον εἶνε τὸ ἄθροισμα τοῦ γινομένου 8262×7132 καὶ τοῦ 3151×829 , 61536763.

5) Πολλαπλασιάσατε τὸν 4800×400 καὶ δείξατε ὅτι, ἀρκεῖ νὰ πολλαπλασιάσωμεν τὸν 48×4 καὶ εἰς τὸ τέλος τοῦ γινομένου αὐτοῦ νὰ γράψωμεν τέσσαρα μηδενικά (ἅσα ἔχουν εἰς τὸ τέλος καὶ οἱ δύο παράγοντες).

Ὅμως δευτέρα. 1) Μία δωδεκάς ἔχει δώδεκα τεμάχια· πόσα τεμάχια ἔχουν 24 (36 δωδεκάδες); 288 (432).

2) Μία δραχμὴ ἔχει 100 λεπτά· πόσα λεπτά ἔχουν 68 (125) δρ.; 6800 (12500).

3) Τὸ ἀγγλικὸν μίλιον ἔχει 1760 ὑάρδας· πόσας ὑάρδας ἔχουν 196 (285) μίλια; 344960 (501600).

4) Ἀμαξοστοιχία διατρέχει 35 (68) χμ. εἰς μίαν ὥραν· πόσα διατρέχει εἰς 29 (45) ὥρας; 1015 (3060).

Ὅμως τρίτη. 1) Ἀγοράζει τις 78 (63) ὀκ. ἐνὸς ἐμπορεύματος πρὸς 135 (235) δρ. τὴν ὀκᾶν καὶ τὸ πωλεῖ πρὸς 178 (265) δρ. τὴν ὀκᾶν· πόσον κερδίζει; 3354 (1890) δρ.

2) Ἐὰν ἔμπορος πωλήσῃ 278 (137) μ. ὑφάσματος ἀντὶ 1673 (1224) δρ., κερδίσῃ δὲ 4 (7) δρ. εἰς καθὲν μέτρον, ἀντὶ πόσων δραχμῶν ἠγόρασε τὸ ἐμπόρευμα; 561 (265).

3) Ἦγόρασέ τις 385 (426) μ. ὑφάσματος πρὸς 125 (238) δρ. τὸ μέτρον· πόσον θὰ πωλήσῃ τὸ ὑφασμα διὰ νὰ κερδίσῃ 36 δρ. (75) δρ. τὸ μέτρον; 61985. (133338) δρ.

Ὅμως τετάρτη. 1) Ἀπὸ ἓνα τόπον ἀναχωροῦν σιδηροδρομικῶς κατ' ἀντίθετον φορὰν δύο ταχυδρόμοι· πόσον θὰ ἀπέχουν ὁ εἰς ἀπὸ τὸν ἄλλον μετὰ 47 (86) ὥρ., ἐὰν ἡ μία ἀμαξοστοιχία διανύῃ 35 (25) χιλ., ἡ δὲ ἄλλη 65 (54) χιλ., τὴν ὥραν; 4700 (6794).

2) Πόσον θ' ἀπέχουν οἱ δύο ταχυδρόμοι, ἐὰν διευθύνωνται πρὸς τὴν αὐτὴν φορὰν; 1410 (2494).

Ὅμως πέμπτη. 1) Ἀγοράζει τις 68 (53) ὀκ. ἐμπορεύματος πρὸς 78 (93) δρ. τὴν ὀκᾶν· 712 (623) ὀκ. πρὸς 126 (385) δρ. τὴν ὀκ. καὶ 226 (30) ὀκ. πρὸς 125 (318) δρ. τὴν ὀκ.· πόσον πληρώνει ἐν ἔλω; 123266 (254324).

2) Ἐν ποσὸν χρημάτων ἐμοιράσθη εἰς 125 (136) ἀνθρώπους εἰς τρόπον, ὥστε καθεὶς ἔλαβε 53 (75) δρ., ἐπερίσσευσαν δὲ καὶ 28 (37) δρ.· πόσον ἦτο τὸ ποσόν; 6653 (10237).

3) Ἐν χρηματικὸν ποσὸν πρέπει νὰ μοιρασθῇ μεταξὺ 118 (102) πτωχῶν οἰκογενειῶν, διὰ νὰ λάβῃ καθεμία 217 (408) δρ.· ἄλλ' ἔλλειπουν 825 (716) δρ.· πόσον εἶνε τὸ ποσόν; 24781 (40900).

- Όμως ἔκτη. 1) Ἐν κεφάλαιον δίδει τόκον 240 (348) δρ. ἑτησίως*
 πόσον τόκον θὰ δώσῃ εἰς 12 (16) ἔτη; 2880 (5568).
 2) Πληρώνει τις ἓνα ἐργάτην 220 (280) δρ. τὴν ἑβδομάδα· πόσα
 θὰ τὸν πληρώσῃ εἰς 64 (78) ἑβδομάδας; 14080 (21840).
 3) Ἐργάτης λαμβάνει ὡς ἀμοιβὴν 240 (260) δρ. τὴν ἑβδομάδα·
 πόσα θὰ λάβῃ εἰς 35 (43) ἑβδομάδας; 8400 (11180).
 4) Ἀγοράζει τις 325 (486) ὀκ. ἔμπορεύματος πρὸς 415 (725) δρ.
 τὴν ὀκᾶν· πόσα θὰ πληρώσῃ; 134875 (352350).
 5) Ἐμπορος ἀγοράζει 283 (563) ὀκ. ἔμπορεύματος ἀντὶ 27451
 (53485) δρ., πᾶλει δὲ τὴν ὀκᾶν πρὸς 89 (87) δρ.· πόσον ἐζημιώθη;
 2264 (4504).
 6) Τέσσαρες τόποι Α, Β, Γ, Δ, εὐρίσκονται ἐπ' εὐθείας γραμμῆς.
 Ἡ ἀπόστασις ΑΒ εἶνε 3486 (8456) μέτρα· ἡ ΒΓ 7 (4) πλάσια τῆς
 ΑΒ, ἡλαττωμένης κατὰ 2486 (6825) μ.· ἡ ΓΔ εἶνε 3 (2) φορές μεγα-
 λυτέρα τῆς ΑΒ· πόση εἶνε ἡ ΑΔ; 20944 (31892).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ V.

Περὶ διαιρέσεως.

§ 24. Ὅρισμοί.—

α') (Πρόβλημα). «Πόσας φορές δυνάμεθα νὰ λάβωμεν ἀπὸ 200 μῆλα 40 μῆλα;»

Εἶνε φανερόν, ὅτι θὰ εὐρωμεν τὸν ζητούμενον ἀριθμόν, ἐὰν ἀπὸ τὰ 200 μῆλα ἀφαιροῦμεν 40 μῆλα, μέχρις ὅτου ἐξαντλήσωμεν καὶ τὰ 200 μῆλα, ἢ ἂν θέσωμεν τόσους προσθετέους ἀπὸ 40 μῆλα καθένα, μέχρις ὅτου τὸ ἄθροισμὰ των εἶνε 200 μῆλα. Ἄν λοιπὸν παραστήσωμεν διὰ τοῦ x τὸ πλῆθος τῶν προσθετέων, τῶν ὁποίων καθεὶς ἔχει 40 μῆλα, θὰ ἔχωμεν

$$\begin{aligned} & \text{μῆλ.} \\ & 40 \times x = 200 \text{ μῆλα,} \end{aligned}$$

εὐρίσκομεν δὲ καὶ κατὰ τοὺς δύο τρόπους, ὅτι δυνάμεθα ν' ἀφαιρέσωμεν τὰ 40 ἀπὸ 200 μῆλα 5 φορές, ἢ ὅτι ὁ ἀριθμὸς 40 μῆλα χωρεῖ 5 φορές εἰς τὸν 200 μῆλα· ἦτοι εἶνε $x = 5$.

Ὡς βλέπομεν, εἰς τὸ πρόβλημα αὐτὸ δίδεται τὸ γινόμενον

δύο ἀριθμῶν καὶ εἰς τῶν δύο παραγόντων (ὁ πολλαπλασιαστέος) ζητεῖται δὲ νὰ εὑρεθῇ ὁ ἄλλος.

β') (Πρόβλημα). «Θέλομεν νὰ μοιράσωμεν 90 δρ. ἐξ ἴσου εἰς 9 πτωχὰς οἰκογενείας· πόσας δραχμὰς θὰ λάβῃ καθεμία;».

Ἐπειδὴ τὸ ἄθροισμα τῶν τεσσάρων μεριδίων θὰ εἶνε 90 δρ., ἐὰν διὰ τοῦ x δρ. παραστήσωμεν καθὲν μερίδιον, θὰ ἔχωμεν

δρ.

$$x \times 9 = 90 \text{ δρ.}$$

Ἄρκει λοιπὸν νὰ εὑρωμεν τὸ ἀριθμὸν x , ὥστε νὰ εἶνε $x \times 9 = 90$, ἢ ἂν ἀλλάξωμεν τὴν θέσιν τῶν παραγόντων $9 \times x = 90$. Οὕτω λύομεν καὶ τὸ πρόβλημα αὐτό, καθὼς καὶ τὸ προηγούμενον εὐρίσκομεν δ' ὅτι ὁ ζητούμενος ἀριθμὸς εἶνε ὁ 10 καὶ παριστάνει δραχμὰς.

γ') Ἐκ τῶν ἀνωτέρω προβλημάτων βλέπομεν ὅτι, ἐὰν δοθῇ τὸ γινόμενον δύο ἀριθμῶν (ἀφηρημένων) καὶ ὁ εἰς ἐξ αὐτῶν, δυνάμεθα νὰ εὑρωμεν τὸν ἄλλον κατὰ δύο τρόπους. Πρῶτον, ἀφαιροῦμεν ἀπὸ τὸ δοθὲν γινόμενον τὸν δοθέντα παράγοντα ἐν ὧσιν εἶνε δυνατὸν καὶ μετροῦμεν πόσας φορές ἀφηρέσαμεν· δεύτερον, πολλαπλασιάζομεν τὸν δοθέντα ἐπὶ ἓνα ἀριθμὸν, ὥστε νὰ εὑρωμεν ἐξαγόμενον τὸ δοθὲν γινόμενον.

Ἐὰν πρόκειται περὶ ἀριθμῶν συγκεκριμένων, ἐργαζόμεθα ὡς νὰ ἦσαν ἀφηρημένοι καὶ εἰς τὸ ἐξαγόμενον δίδομεν τὴν πρέπουσαν ἐπωνυμίαν.

δ') Τὸ δοθὲν γινόμενον καλοῦμεν *διαιρέτιον*, τὸν δεδομένον παράγοντα *διαιρέτην*, τὸν ζητούμενον ἀριθμὸν *πηλίκον*, τὴν δὲ πράξιν, διὰ τῆς ὁποίας ἐκ τῶν δοθέντων ἀριθμῶν εὐρίσκομεν τὸ πηλίκον, καλοῦμεν *διαίρεσιν*.

Κατὰ ταῦτα.

ε') «*Διαίρεσις λέγεται ἡ πράξις, διὰ τῆς ὁποίας δοθέντων δύο ἀριθμῶν εὐρίσκεται τρίτος, ὁ ὁποῖος πολλαπλασιαζόμενος ἐπὶ τὸν δεύτερον δίδει γινόμενον τὸν πρῶτον*».

Τὸ πηλίκον δύο ἀριθμῶν, π. χ. τοῦ 10 καὶ 5, σημειώνομεν οὕτω 10:5 καὶ ἀπαγγέλλομεν δέκα διὰ πέντε, ἢ δέκα διαιρούμενον διὰ πέντε· ἦτοι τὸ σημεῖον τῆς διαιρέσεως εἶνε τὸ διὰ (:). Τὸ 10:5 σημαίνει λοιπὸν τὸν ἀριθμὸν, ὁ ὁποῖος πολλαπλασιαζόμενος ἐπὶ 5 δίδει γινόμενον τὸν 10. Διὰ τοῦτο διὰ νὰ κάμωμεν τὴν δοκιμὴν τῆς διαιρέσεως, πολλαπλασιάζομεν τὸν διαιρέτην ἐπὶ τὸ πηλίκον καὶ ἂν εὑρωμεν τὸν διαιρέτεον, ἢ πράξις εἶνε ἀκριβής.

στ') Ἄξιον ἰδιαιτέρας προσοχῆς εἶνε, ὅτι εἰς τὴν περίπτωσιν εἰς τὴν ὁποίαν δίδεται τὸ γινόμενον δύο ἀριθμῶν καὶ ὁ πολλαπλασιαστέος ἢ διαίρεσις λέγεται *μέτρησις* ἢ *εἰκίρεσις μετρήσεως*.

Διότι καθὼς εἰς τὸν πρακτικὸν βίον, ἐὰν ἔχωμεν π. χ. ἐν ἀγγεῖον πλήρες ὕδατος καὶ θέλωμεν νὰ εὐρωμεν πόσας φορὰς δυνάμεθα ν' ἀφαιρέσωμεν τὸ ὕδωρ μιᾶς ὀκάς ἀπὸ τὸ ὕδωρ τοῦ ἀγγείου (περιέχοντος πολλὰς ὀκάδας), οὕτω καὶ εἰς μίαν τοιαύτην διαίρεσιν θέλομεν νὰ μετρήσωμεν, πόσας φορὰς ὁ δοθεὶς ἀριθμὸς, π.χ. ὁ 6 δρ., χωρεῖ ἢ περιέχεται εἰς ἄλλον δοθέντα ἀριθμὸν, π. χ. τὸν 60 δρ. Εἰς τὴν περίπτωσηιν καθ' ἣν δίδεται τὸ γινόμενον δύο ἀριθμῶν καὶ ὁ πολλαπλασιαστής, ἡ διαίρεσις λέγεται *μερισμὸς*, ἢ *διαίρεσις μερισμοῦ* Διότι ζητεῖται νὰ μοιράσωμεν ἓνα ἀριθμὸν εἰς ἴσα μέρη, καθὼς π.χ. εἰς τὸ 6') (πρόβλημα).

ζ') Τὸ ἀπλοῦν παράδειγμα $7 : 2$ δεικνύει ὅτι, πᾶσα διαίρεσις δὲν δύναται πάντοτε νὰ γίνῃ ἀκριβῶς, καθὼς ἀνωτέρω εἶπομεν. Δηλαδή ἐν δυνάμεθα νὰ εὐρωμεν ἀριθμὸν, ὁ ὅποιος πολλαπλασιαζόμενος ἐπὶ 2 δίδει γινόμενον 7. Διότι, ἐὰν θέσωμεν $7 : 2 = 4$, ὁ ἀριθμὸς 4 εἶνε μεγάλος, ἐπειδὴ $4 \times 2 = 8$ εἶνε μεγαλύτερος τοῦ 7· ἐὰν θέσωμεν $7 : 2 = 3$, ὁ 3 εἶνε μικρὸς, διότι ὁ $2 \times 3 = 6$ εἶνε κατὰ 1 μικρότερος τοῦ 7. Εἰς τὴν περίπτωσηιν αὐτὴν καλοῦμεν τὸν 3 ἀτελὲς πηλίκον τῆς διαίρεσεως $7 : 2$, τὸ 1 ὑπόλοιπον τῆς διαίρεσεως, τὴν δὲ διαίρεσιν αὐτὴν ἀτελεῖ πρὸς διάκρισιν ἀπὸ ἐκείνης, εἰς τὴν ὁποίαν τὸ πηλίκον εὐρίσκεται ἀκριβῶς καὶ τὴν ὁποίαν καλοῦμεν *τελείαν διαίρεσιν*. Ὁμοίως ἡ διαίρεσις $19 : 4$ εἶνε ἀτελής, τὸ ἀτελὲς πηλίκον εἶνε 4, τὸ δὲ ὑπόλοιπον 3.

η') Καθὼς βλέπομεν, ἐνῶ εἰς τὴν τελείαν διαίρεσιν τὸ πηλίκον παριστάνει τὸν ἀριθμὸν, ὁ ὅποιος πολλαπλασιαζόμενος ἐπὶ τὸν διαιρέτην δίδει γινόμενον τὸν διαιρετέον, εἰς τὴν ἀτελεῖ εὐρίσκομεν τὸν μεγαλύτερον ἀριθμὸν, ὁ ὅποιος πολλαπλασιαζόμενος ἐπὶ τὸν διαιρέτην δίδει γινόμενον περιεχόμενον εἰς τὸν διαιρετέον.

Ἐκ τούτων ἔπεται ὅτι δυνάμεθα, γενικώτερον, νὰ λέγωμεν ὅτι,

θ') «*Διαίρεσις λέγεται ἢ πρᾶξις διὰ τῆς ὁποίας δοθέντων δύο ἀριθμῶν, εὐρίσκεται ὁ μεγαλύτερος ἀριθμὸς, ὁ ὅποιος πολλαπλασιαζόμενος ἐπὶ τὸν δεύτερον, δίδει γινόμενον περιεχόμενον εἰς τὸν πρῶτον*».

ι') Ἐνῶ εἰς τὴν τελείαν διαίρεσιν ὑπάρχει ἡ σχέση

$$\text{Διαιρέτης} \times \text{πηλίκον} = \text{διαιρετέος},$$

ια') εἰς τὴν ἀτελεῖ ἔχομεν

$$\text{Διαιρέτης} \times \text{πηλίκον} + \text{ὑπόλοιπον} = \text{διαιρετέος}.$$

Ἀσκήσεις.

Ἄμας πρώτη. 1) α') Πόσον χωρεῖ τὸ 2 εἰς καθένα τῶν ἀριθ-

μῶν 4·6·18·14·20·30·34·40 β') πόσον χωρεῖ τὸ 3 εἰς καθένα τῶν ἀριθμῶν 6·18·9·12·16·20·48· γ') τὸ 6 εἰς τοὺς 0·6·12·15·18·28·30·36·45·48· δ') τὸ 5 εἰς τοὺς 5·10·12·15·18·28·20·30·38·50· ε') τὸ 7 εἰς τοὺς 0·7·14·21·25·28·85·42·45·52· στ') τὸ 8 εἰς τοὺς 8·18·16·24·36·42·49·51·56· ζ') τὸ 9 εἰς τοὺς 9·18·23·27·36·45·53·61·64·81.

M M Δ Δ

2) Πόσον χωροῦν α') αἱ 2 εἰς τὰς 18· β') αἱ 6 εἰς τὰς 60· γ')
 X X

αἱ 8 εἰς τὰς 48 ;

3) Νὰ εὐρεθῇ ὁ ἀριθμὸς x , ὥστε νὰ εἶνε· α') $7 \times x = 21$ · β') $5 \times x = 40$ · γ') $12 \times x = 72$ · δ') $125 \times x = 500$ · ε') $136 \times x = 544$ · ζ') $340 \times x = 340$ · ζ') $576 \times x = 0$.

Ὅμας δευτέρα. 1) α') Πόσον εἶνε τὸ ἡμισυ τῶν 4· 8· 12· 13· 16· 17· 19· 20· 24 ; β') πόσον εἶνε τὸ τρίτον μέρος τῶν 0· 3· 18· 15· 21· 24· 27· 29· 86· 42· 50 ; γ') Νὰ εὐρεθῇ τὸ πέμπτον μέρος τῶν 5· 10· 15· 20· 22· 28· 30· 35· 37· δ') τὸ ἕκτον τῶν 6· 12· 18· 20· 24· 29· 45· ε') τὸ τέταρτον τῶν 0· 4· 8· 18· 15· 20· 48· ζ') τὸ ἑβδομον τῶν 0· 7· 14· 33· 25· 28· 35· 49· ζ') τὸ ἑνατον τῶν 0· 9· 15· 18· 23· 40· 45· 57· 63· 72·

2) Ἐκτελέσατε τὰς ἐξῆς διαιρέσεις· α') 96 : 24· β') 125 : 25· γ') 3824 : 100· δ') 48 : 6· ε') 120 : 40.

Ὅμας τρίτη. 1) Νὰ ἐκτελεσθοῦν αἱ ἐπόμεναι διαιρέσεις καὶ αἱ δοκιμαί των· α') 95 : 2· β') 64 : 1· γ') 0 : 13· δ') 18 : 6· ε') 49 : 16.

2) Τρέψατε τὸν 8 εἰς γινόμενον δύο ἀριθμῶν, τῶν ὁποίων ὁ εἰς εἶνε 2. Ὁμοίως τὸν 26, τὸν 34, τὸν 50.

3) Ἐὰν διαιρέσωμεν ἕνα ἀριθμὸν, π. χ. τὸν 35 διὰ τοῦ 1, εὐρίσκομεν πηλίκον αὐτὸν τὸν ἀριθμὸν. Διατί ;

4) Ἐὰν διαιρέσωμεν τὸν 0 δι' ἑνὸς ἀριθμοῦ π. χ. διὰ τοῦ 6 εὐρίσκομεν πηλίκον 0. Διατί ;

§ 23. Ἐφαρμογαὶ εἰς τὸν πρακτικὸν βίον.—

Αἱ ἐπόμεναι ἐφαρμογαὶ τῆς διαιρέσεως εἶνε ἄξιαι ἰδιαιτέρας προσοχῆς.

α') «Πῶς δυνάμεθα εἰς πλεῖστα προβλήματα διὰ διαιρέσεως ἐκ τῆς τιμῆς πολλῶν μονάδων νὰ εὐρωμεν τὴν τιμὴν τῆς μονάδος ἐξ αὐτῶν».

(Πρόβλημα 1). «Ἐὰν αἱ 5 δκ. ἐμπορεύματος τιμῶνται 20 δραχ. πόσον τιμᾶται ἡ 1 δκᾶ αὐτοῦ ;»

Παριστάνομεν διὰ τοῦ x τὸν ζητούμενον ἀριθμὸν καὶ γράφομεν

5 δκ.	τιμῶνται	20 δρα.
1	τιμᾶται	x

Διὰ τὴν λύσιν λέγομεν, ἀρχίζοντες ἀπὸ τὸν ἀριθμὸν ὁ ὅποιος εἶνε ὑπεράνω τῆς μονάδος (ἢ ἀπέναντι τοῦ x καὶ πλαγίως). Ἄφου αἱ 5 δκ. τιμῶνται 20 δρα., ἡ μία δκᾶ θὰ τιμᾶται 5 φορές ὀλιγώτερον, ἦτοι 20 δρα. : 5 = 4 δραχμάς.

(Πρόβλημα 2). «Δίδει τις 8 δκ. καφέ καὶ λαμβάνει ἀντ' αὐτῶν 24 δκ. σάπωνος» διὰ μίαν δκᾶν καφέ πόσας δκάδας σάπωνος θὰ λάβῃ ;»

Γράφομεν πάλιν

8 δκ. καφέ	ἀνταλλάσσονται	μὲ	24 δκ. σάπωνος
1	»		x

Πρὸς λύσιν αὐτοῦ σκεπτόμεθα καθὼς καὶ εἰς τὸ προηγούμενον, ἦτοι λέγομεν ἄφου αἱ 8 δκ. καφέ ἀνταλλάσσονται μὲ 24 δκ. σάπωνος, ἡ μία δκᾶ καφέ θ' ἀνταλλάσσεται μὲ 8 φορές ὀλιγώτερας δκάδας σάπωνος, ἦτοι μὲ 24 δκ. : 8. Ἐκτελοῦντες τὴν διαίρεσιν εὐρίσκομεν 3 δκ. σάπωνος. Ὡστε ἡ μία δκ. καφέ ἀνταλλάσσεται μὲ 3 δκ. σάπωνος.

Εἰς τὰνωτέρω προβλήματα καὶ τὰ ὅμοια πρὸς αὐτὰ δίδεται ἡ τιμὴ πολλῶν μονάδων καὶ ζητεῖται ἡ τιμὴ τῆς μιᾶς τῶν μονάδων τούτων. Οὕτω εἰς τὸ πρόβλημα 1) δίδεται ἡ τιμὴ τῶν 5 δκ., δηλαδὴ αἱ 20 δρα., καὶ ζητεῖται ἡ τιμὴ τῆς 1 δκ. Εἰς τὸ πρόβλημα 2) δίδεται ἡ τιμὴ τῶν 8 δκ. καφέ, δηλαδὴ αἱ 24 δκ. σάπωνος καὶ ζητεῖται ἡ τιμὴ τῆς 1 δκ. καφέ.

β') Διὰ νὰ λύσωμεν τὰ τοιαῦτα προβλήματα, διαιροῦμεν τὴν τιμὴν τῶν πολλῶν μονάδων διὰ τοῦ ἀριθμοῦ, ὁ ὅποιος φανερώνει τὰς πολλὰς μονάδας. Ἡ διαίρεσις αὐτὴ εἶνε μερισμοῦ καὶ τὸ πηλίκον εἶνε ὁμοειδὲς μὲ τὸν διαιρετέον, ἐνῶ ὁ διαιρέτης εἶνε ἀριθμὸς ἀφηρημένος.

γ') Μέση τιμή. (Πρόβλημα) «Ἐργάζεται τις τρεῖς ὥρας, καὶ λαμβάνει τὴν πρώτην ὥραν 7 δρα. ὡς ἀμοιβήν, τὴν δευτέραν ὥραν 5 δρα., καὶ τὴν τρίτην 6 δρα. πόσας δραχμάς λαμβάνει κατὰ μέσον ὄρον καθ' ὥραν ;»

Δηλαδὴ πόσας δραχμάς θὰ ἐλάμβανε καθ' ὥραν, ἐὰν ἐλάμβανε τὸ αὐτὸ ποσὸν εἰς καθεμίαν ὥραν ;

Ἐπειδὴ καὶ κατὰ τὰς τρεῖς ἡμέρας λαμβάνει $7\delta\rho. + 5\delta\rho. \times 6\delta\rho. = 18\delta\rho.$, ἔπεται ὅτι καθ' ὥραν θὰ ἐλάμβανε $18\delta\rho. : 3 = 6$ δραχμάς.

Εἰς τὸ πρόβλημα αὐτὸ καὶ τὰ ὅμοια πρὸς αὐτὸ ἢ ζητούμενη τιμὴ λέγεται μέση τιμὴ, τὰ δὲ προβλήματα λέγονται μέσης τιμῆς καὶ λύνονται διὰ διαιρέσεως μερισμοῦ.

δ') Προβλήματα μίξεως. Συγγενῆ μὲ τὰ προβλήματα τῆς μέσης τιμῆς εἶνε καὶ τὰ προβλήματα μίξεως, π.χ. τὸ ἐξῆς.

«*Ἀναμιγνύει τις 6 δκ. ἐμπορεύματος, τοῦ ὀποίου ἢ ὀκᾶ τιμᾶται 5 δρ., μὲ 3 δκ. ἄλλης ποιότητος, τοῦ ὀποίου ἢ ὀκᾶ τιμᾶται 8 δρ. πόσον ἀξίζει ἢ ὀκᾶ τοῦ μίγματος;*»

Ἐπειδὴ τὸ μίγμα ἔχει βάρος $6 + 3 = 9$ δκ. καὶ θ' ἀξίῳ $5 \times 6 + 8 \times 3 = 54$ δρ., ἔπεται ὅτι ἢ ὀκᾶ τοῦ μίγματος θ' ἀξίῳ $54 : 9 = 6$ δραχμάς.

Καθὼς βλέπομεν, διὰ νὰ λύσωμεν τὸ πρόβλημα αὐτὸ καὶ τὰ ὅμοια πρὸς αὐτό, πρῶτον θὰ εὗρωμεν τὴν τιμὴν καθεμιᾶς τῶν ἀναμιγνυομένων ποσοτήτων καὶ τὸ ἄθροισμα αὐτῶν θὰ διαιρέσωμεν διὰ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν μονάδων, τὰς ὁποίας περιέχει τὸ μίγμα.

ε') Πῶς δυνάμεθα εἰς πλεῖστα προβλήματα, ὅταν δίδεται ἢ τιμὴ τῆς μιᾶς μονάδος καὶ ἢ τιμὴ πολλῶν ὁμοειδῶν μονάδων, νὰ εὗρωμεν τὸ πλῆθος τῶν μονάδων τούτων.

(Πρόβλημα 1). «*Ἡ ὀκᾶ τοῦ καφέ τιμᾶται 20 δρ. πόσαι ὀκάδες τιμῶνται 80 δρ.;*»

Παριστάνοντες τὸν ἄγνωστον ἀριθμὸν διὰ τοῦ x , γράφομεν

1 δκ.	τιμᾶται	20 δρ.
x		80

Διὰ νὰ λύσωμεν τὸ πρόβλημα τοῦτο σκεπτόμεθα ὅτι, καθεμίαν φοράν ὅταν δίδωμεν 20 δρ., λαμβάνομεν 1 δκ. καφέ. Ἐπομένως θ' ἀγοράσωμεν τόσας ὀκάδας, ὅσας φορές δυνάμεθα ν' ἀφαιρέσωμεν τὰς 20 δρ. ἀπὸ τὰς 80 δρ. ἢ ἀρκεῖ, νὰ μετρήσωμεν πόσας φορές χωρεῖ τὸ 20 δρ. εἰς τὰς 80 δρ. ἦτοι ἔχομεν τὴν διαίρεσιν μετρήσεως

$$80 \delta\rho. : 20 \delta\rho. = 4.$$

Ὅστε αἱ 4 δκ. τιμῶνται 80 δραχμάς. Πρὸς λύσιν τοῦ προβλήματος λέγομεν, ἀρχίζοντες ἀπὸ τὸν ἀριθμὸν, ὃ ὁποῖος εὐρίσκεται ἀπέναντι καὶ πλαγίως τοῦ x . Ἀφοῦ 20 δρ. τιμᾶται ἢ 1 δκ., 80 δρ. θὰ τιμῶνται τόσαι ὀκάδες, ὅσας φορές χωρεῖ τὸ 20 δρ. εἰς τὸ 80 δρ., ἦτοι $80 : 20 = 4$ ὀκάδες.

(Πρόβλημα) 2). «Εἰς πόσους μῆνας θὰ πληρώσωμεν δι' ἐνοίκιον μιᾶς οἰκίας 600 δρ., ἐὰν διὰ καθένα μῆνα πληρώνωμεν 200 δρ.»

Παριστάνομεν τὸν ζητούμενον ἀριθμὸν διὰ τοῦ x καὶ γράφομεν

δι' ἓνα	1 μῆνα	200 δρ.
	x	600

Καὶ εἰς τὸ πρόβλημα αὐτὸ λέγομεν, ἀρχίζοντες ἀπὸ τὸν ἀριθμὸν, ὃ ὅποιος εὑρίσκεται ἀπέναντι τοῦ x . Ἀφοῦ τὰς 200 δρ. πληρώνομεν διὰ 1 μῆνα, διὰ νὰ εὐρωμεν διὰ πόσους μῆνας θὰ πληρώσωμεν 600 δρ., πρέπει νὰ μετρήσωμεν πόσας φορὰς χωρεῖ τὸ 200 δρ. εἰς τὰς 600 δρ. Ἦτοι πρέπει νὰ κάμωμεν τὴν διαίρεσιν μετρήσεως 600 δρ. : 200 δρ., καὶ εὑρίσκομεν πηλίκον 3. Ὄποτε εἰς 3 μῆνας θὰ πληρώσωμεν 600 δραχμάς.

Εἰς καθὲν τῶν δύο τούτων προβλημάτων καὶ εἰς τὰ ἕμοια πρὸς αὐτὰ δίδεται ἡ τιμὴ τῆς μιᾶς μονάδος καὶ ἡ τιμὴ ἄλλων ὁμοειδῶν μονάδων, ζητεῖται δὲ νὰ εὐρωμεν τὸ πλῆθος τῶν μονάδων τούτων. Οὕτω ἔχομεν εἰς τὸ πρόβλημα 1) ὅτι δίδεται ἡ τιμὴ τῆς 1 ὀκάς, δηλαδὴ αἰ 20 δρ., ἡ τιμὴ ἄλλων ὀκάδων, δηλ. αἰ 80 δρ. καὶ ζητεῖται νὰ εὐρωμεν τὸ πλῆθος τῶν ὀκάδων τούτων. Ὁμοίως εἰς τὸ πρόβλημα 2) δίδεται ἡ τιμὴ τοῦ 1 μηνός, δηλαδὴ αἰ 200 δρ., καὶ ζητεῖται πόσαι μονάδες ἔχουν τὴν τιμὴν 600 δρ.

στ') «Διὰ νὰ λύσωμεν τὰ τοιαῦτα προβλήματα, ὡς εἶδομεν, μετροῦμεν πόσας φορὰς χωρεῖ ἡ τιμὴ τῆς μιᾶς μονάδος εἰς τὴν τῶν πολλῶν, ἀλλ' ἀγνώστων τὸ πλῆθος μονάδων. Ἡ διαίρεσις αὐτὴ εἶνε μετρήσεως, ὃ διαιρετέος καὶ ὃ διαιρέτης εἶνε ἀριθμοὶ ὁμοειδεῖς, τὸ δὲ πηλίκον εἶνε ἀριθμὸς ἀφηρημένος καὶ μετὰ τὴν εὕρεσίν του θὰ λέγωμεν, ὅτι παριστάνει ὃ,τι καὶ ἡ μονάς, τῆς ὁποίας ἡ τιμὴ δίδεται».

Π ρ ο β λ ῆ μ α τ α π ρ ὸ ς λ ῦ σ ι ν.

Ὁμάς πρώτη. 1) 12 (15) τεμάχια ὑφάσματος στοιχίζου 60 (45) δρ.· πόσον στοιχίζει τὸ ἓν τεμάχιον ; 5 (3).

2) Μικρὸς ἐργάτης λαμβάνει εἰς 16 (17) ἡμ. 192 (153) δρ.· πόσας λαμβάνει εἰς 1 ἡμ. κατὰ μέσον ἔρον ; 12 (9).

3) Αἰ 8 (9) ὀκ. οἴνου τιμῶνται 328 (270) δρ.· πόσον τιμᾶται ἡ ὀκά ; 41 (30).

4) Αἰ 4 ὥραι ἔχουν 240' πόσα λεπτὰ ἔχει ἡ ὥρα ; 60.

5) Ἐὰν τὰ 415 (336) δράμια ἐμπορεύματος τιμῶνται 83 (56) δρ., πόσον ἀγοράζομεν ἐξ αὐτοῦ μὲ 1 δρ. ; 5 (6).

6) Οἰκονομεῖ τις 270 (160) δρ. εἰς 81 (64) ἡμέρας· εἰς πόσας ἡμέρας οἰκονομεῖ ἐν δεκάδραχμον; 3 (4).

7) Ποσὸν 360 (520) δρ. πρέπει νὰ μοιρασθῇ ἐξ ἴσου μεταξὺ 60 (130) προσώπων· πόσον θὰ λάβῃ καθέν; 6 (4).

Ὅμας δευτέρα. 1) Διαμβάνει τις εἰς μίαν ὥραν 6 (8) δρ.· εἰς ἄλλην ὥραν 9 (12) δρ., εἰς ἄλλην 10 (18) δρ. καὶ εἰς ἄλλην 15 (22) δρ.· πόσας δραχμὰς λαμβάνει κατὰ μέσον ἔρον εἰς καθεμίαν τῶν τεσσάρων ὥρῶν; 10 (15).

2) Ἀμαξοστοιχία τρέχει ἐπὶ 5 ὥρας καὶ διανύει εἰς καθεμίαν τῶν ὥρῶν τούτων ἀντιστοίχως 46 (44) χμ., 60 (51) χμ., 52 (50) χμ., 58 (52) χμ., 34 (53) χμ.· πόσα χιλιόμετρα διατρέχει εἰς καθεμίαν τῶν ὥρῶν κατὰ μέσον ἔρον; 50 (50).

3) Ἀγοράζει τις ἐξ ἐνὸς ἐμπορεύματος 2 (2) δκ. ἀντὶ 12 (7) δρ., ἔπειτα 3 (3) δκ. ἀντὶ 16 (9) δρ. καὶ τέλος 4 (5) δκ. ἀντὶ 26 (14) δρ.· πόσον στοιχίζει ἢ δκᾶ κατὰ μέσον ἔρον; 6 (3).

Ὅμας τρίτη. 1) Ἀναμιγνύομεν 4 (8) δκ. οἴνου τῶν 6 δρ. (900 λ.) τὴν ὁκᾶν μὲ 6 (4) δκ. τῶν 5 δρ. (720 λ.) τὴν ὁκᾶν· πόσον στοιχίζει ἢ δκᾶ τοῦ μίγματος; 540 (840) λ.

2) Ἐμπορὸς ἀναμιγνύει 2 (4) δκ. τείου τῶν 70 (90) δρ., μὲ 5 (5) δκ. τῶν 140 (180) δρ.· πόσον κοστίζει ἢ δκᾶ τοῦ μίγματος; 120 (140).

3) Θέλει τις νὰ τοποθετήσῃ 144 (108) σφίρας, ὥστε καθεμία νὰ ἔχῃ 12 (18) σφίρας· πόσας σειρὰς θὰ σχηματίσῃ; 12 (6).

4) Ἐμπορὸς πληρώνει κατὰ τὴν ἀγορὰν ἐμπορεύματος διὰ τὰς 60 (3) δκ. 480 (312) δρ.· πωλεῖ δὲ τὰς 70 (4) δκ. ἀντὶ 630 (420) δρ.· πόσας δραχμὰς κερδίζει εἰς καθεμίαν ὁκᾶν; 1 (1).

5) Ταχυδρόμος διανύει τὴν πρώτην ἡμέραν 30 (30) χμ., καθεμίαν δὲ τῶν ἐπομένων ἡμερῶν 10 (5) χμ. περισσότερον τῆς προηγούμενης· πόσον θὰ διέτρεχε τὴν ἡμέραν κατὰ μέσον ἔρον, ἐὰν ἐβάδιζεν ἐπὶ 4 (5) ἡμέρας; 45 (40).

§ 26. Διαίσεις ἀπὸ μνήμης. —

α') Ἔστω ὅτι ἔχομεν νὰ διαιρέσωμεν τὸ γινόμενον $6 \times 4 \times 5 \times 8$ διὰ τοῦ 5. Τὸ πηλίκον εἶνε $6 \times 4 \times 8$. Διότι ἂν τὸ $6 \times 4 \times 8$ πολλαπλασιάσωμεν ἐπὶ 5, εὐρίσκομεν τὸν διαιρετέον $6 \times 4 \times 5 \times 8$.

Ὁμοίως, διὰ νὰ διαιρέσωμεν τὸ $6 \times 4 \times 5 \times 8$ διὰ τοῦ 5×8 , παραλείπομεν τὸ 5×8 καὶ εὐρίσκομεν ὡς πηλίκον τὸ 6×4 . Διότι,

ἂν τοῦτο πολλαπλασιάσωμεν ἐπὶ 5×8 εὐρίσκωμεν τὸν διαιρέτεον, $6 \times 4 \times 5 \times 8$. Ἐκ τούτων ἔπεται ὅτι,

« διὰ νὰ διαιρέσωμεν γινόμενον παραγόντων δι' ἑνὸς ἢ διὰ τοῦ γινομένου μερικῶν ἐκ τῶν παραγόντων του, ἀρκεῖ νὰ ἐξαλειφωμεν τοὺς παράγοντας αὐτοὺς ἀπὸ τὸ δοθὲν γινόμενον ».

β') Διὰ νὰ εὐρωμεν εὐκολώτερον τὸ πηλίκον $72 : 24$, παρατηροῦμεν ὅτι, ἐπειδὴ τὸ 24 εἶνε ἴσον μὲ 8×3 , θυνάμεθα νὰ διαιρέσωμεν τὸ 72 εἰς 8 ἴσα μέρη καὶ ἔπειτα καθὲν τῶν μερῶν αὐτῶν εἰς 3 ἴσα μέρη. Θὰ ἔχωμεν δηλαδὴ $72 : 8 = 9$ καὶ ἀκολουθῶς $9 : 3 = 3$. Ὅμοίως ἐὰν ἔχωμεν $150 : 15$, ἐπειδὴ $15 = 3 \times 5$ ἔπεται ὅτι $150 : 15 = 150 : 3 = 50$ καὶ ἀκολουθῶς ἀκόμη $50 : 5 = 10$.

γ') Διὰ νὰ εὐρωμεν τὸ πηλίκον $360 : 10$, παρατηροῦμεν ὅτι $360 = 36$, τὸ δὲ δέκατον μέρος τῆς 1 εἶνε 1, ἄρα τὸ δέκατον μέρος τῶν 36 εἶνε 36. Ὅμοίως τὸ πηλίκον $2785 : 100$ εὐρίσκωμεν, ἐὰν παρατηρήσωμεν ὅτι τὸ $2785 = 27 + 85$. Ἐπειδὴ δὲ τὸ ἑκατοστὸν μέρος τῆς 1 εἶνε 1, ἔπεται ὅτι, τὸ ἑκατοστὸν μέρος τῶν 27 εἶνε 27. Ὡστε τὸ πηλίκον τοῦ $2785 : 100$ εἶνε 27 καὶ τὸ ὑπόλοιπον 85. Ἐκ τούτων ἔπεται ὅτι:

δ') « διὰ νὰ διαιρέσωμεν ἀριθμὸν διὰ 10, 100, 1000, ... ἀρκεῖ, νὰ χωρίσωμεν ἕν δύο, τρία, ... ψηφία ἐκ δεξιῶν τοῦ ἀριθμοῦ καὶ τὸ μὲν πρὸς τὰριστερὰ οὕτω ἀπομένον τμήμα τοῦ ἀριθμοῦ θὰ εἶνε τὸ πηλίκον τῆς διαιρέσεως, τὸ δὲ πρὸς τὰ δεξιά τὸ ὑπόλοιπον ».

Ἀ σ κ ῆ σ ε ι ς.

1) Νὰ εὐρεθοῦν τὰ πηλίκια τῶν κάτωθι διαιρέσεων κατὰ τὸν συντομώτερον τρόπον· α') $3 \times 6 \times 8 : 3 \times 6$. β') $5 \times 3 \times 2 \times 9 : 5 \times 9$.

2) Νὰ γίνουν αἱ ἐπόμεναι διαιρέσεις κατὰ δύο τρόπους μετὰ τῶν δοκιμῶν των· α') $24 \times 3 \times 2 \times 48 : 2 \times 3$. β') $64 : 8 \times 2$. γ') $60 : 2 \times 10$.

3) Νὰ εὐρεθῇ τὸ πηλίκον καὶ ὑπόλοιπον καθεμιᾶς τῶν κάτωθι διαιρέσεων· α') $390 : 10$. β') $904 : 100$. γ') $886 : 100$. δ') $16987 : 1000$.

§ 27. Ἰδιότης τῆς διαιρέσεως.—

« Ἐὰν τὸν διαιρετέον καὶ διαιρέτην μιᾶς διαιρέσεως πολλαπλασιάσωμεν ἢ διαιρέσωμεν μὲ τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν, τὸ μὲν πηλίκον δὲν μεταβάλλεται, τὸ δὲ ὑπόλοιπον πολλαπλασιάζεται ἢ διαιρεῖται μὲ τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν ».

Διὰ τὴν δεξιῶμεν ὅτι ἡ ἰδιότης αὐτὴ εἶνε ἀληθὴς, ἂς μοιράσωμεν ἓνα ἀριθμὸν δραχμῶν εἰς μερικοὺς ἀνθρώπους, π.χ. 13 δρ. εἰς 4 ἀνθρώπους. Θὰ εὕρωμεν ὅτι ἡ διίρεσις 13 δρ. : 4 δίδει πηλίκον 3 δρ. καὶ ὑπόλοιπον 1 δρ. Ἄν τώρα μοιράσωμεν 13 δίδραχμα, ἤτοι 26 δρ., εἰς 8 ἀνθρώπους, καθεὶς θὰ λάβῃ πάλιν 3 δρ. καὶ θὰ μείνῃ 1 δίδραχμον, δηλαδὴ 2 δραχμαί. Ὡστε ἔχομεν 13 δρ. : 4 = 3 δρ. καὶ ὑπόλοιπον 1 δρ. (13 × 2) δρ. : 4 × 2 = 3 δρ. καὶ ὑπόλοιπον 2 δραχμάς. Ἦτοι, ἂν πολλαπλασιάσωμεν τὸν διαιρετέον καὶ διαιρέτην ἐπὶ 2, τὸ πηλίκον δὲν μεταβάλλεται, τὸ δὲ ὑπόλοιπον πολλαπλασιάζεται ἐπὶ 2.

Καθ' ὅμοιον τρόπον βλέπομεν, ὅτι ἡ ἰδιότης εἶνε ἀληθὴς καὶ ἐὰν πολλαπλασιάσωμεν ἢ διαιρέσωμεν τὸν διαιρετέον καὶ διαιρέτην μὲ 2, 3, 4,

Ἀσκήσεις.

1) Ἐὰν ὁ διαιρετέος καὶ διαιρέτης λήγουν εἰς μηδενικά, δυνάμεθα νὰ παραλείψωμεν ἰσάριθμα μηδενικά ἐκ τοῦ τέλους πρὸς τὰ δεξιὰ τοῦ διαιρετέου καὶ διαιρέτου, χωρὶς τὸ πηλίκον νὰ μεταβληθῇ. Π.χ. τὸ πηλίκον τοῦ 72000 : 400 εἶνε τὸ αὐτὸ μὲ τὸ πηλίκον τοῦ 720 : 4. Διατί;

2) Ἐὰν ἓν ποσὸν μοιρασθῇ ἐξ ἴσου μεταξὺ δύο πτωχῶν λαμβάνει καθεὶς 38 δρ. Ἄν τὸ τριπλάσιον ποσὸν μοιρασθῇ εἰς τριπλασίους πτωχοὺς, πόσα θὰ λάβῃ ὁ καθεὶς. Διατί;

3) Διὰ τὴν διανύσῃ τις μίαν ἀπόστασιν κάμνει 30 βήματα· πόσα βήματα θὰ κάμῃ, ἐὰν ἡ ἀπόστασις καὶ τὸ βῆμά του διπλασιασθοῦν; Διατί;

§ 28. Γενικὸς κανὼν τῆς διαιρέσεως.—

Ἔστω ὅτι ἔχομεν νὰ διαιρέσωμεν τὸν ἀριθμὸν 6825 διὰ 32.

Χωρίζομεν τὸν 6825 εἰς $68 + 2 + 5$ καὶ ζητοῦμεν νὰ διαι-

ρέσωμεν καθένα τῶν προσθετέων τούτων διὰ τοῦ 32. Τὸ 68 : 32 εἶνε κατὰ προσέγγισιν $60 : 30 = 6 : 3 = 2$ (§27).

Παρατηροῦμεν ὅτι ἐνῶ εἰς τὴν πρόσθεσιν, τὴν ἀφίρεσιν καὶ

τὸν πολλαπλασιασμὸν καθὲν ψηφίον τοῦ ἐξαγομένου εὐρίσκεται ἀκριδῶς, ἐδῶ δὲ συμβαίνει τοῦτο πάντοτε καὶ διὰ τοῦτο πρέπει νὰ κάψωμεν τὴν δοκιμὴν.

E

Πολλαπλασιάζομεν λοιπὸν τὰς 2 τοῦ εὐρεθέντος πηλίκου ἐπὶ

E E

τὸν διαιρέτην 32 καὶ εὐρίσκομεν $2 \times 32 = 64$.

E E E

Καθὼς βλέπομεν, τὸ 64 εἶνε κατὰ 4 μικρότερον τοῦ 68 τοῦ διαιρετέου. Διὰ νὰ συνεχίσωμεν τὴν διαίρεσιν πρέπει νὰ διαιρέσωμεν

E Δ M E Δ

τὰς 4, τὰς 2, καὶ τὰς 5 διὰ τοῦ 32. Ἀλλὰ $4 = 40$.

Δ Δ M

Ἐπομένως εἶνε τὸ αὐτό, ἐὰν διαιρέσωμεν τὰς $40 + 2 + 5$ διὰ τοῦ

Δ M

32, ἢ τὰς $42 + 5$ διὰ τοῦ 32. Πρὸς τοῦτο διαιροῦμεν πρῶτον τὰς

Δ Δ Δ Δ Δ

$42 : 32$ καὶ εὐρίσκομεν κατὰ προσέγγισιν $40 : 30 = 4 : 3 = 1$.

Διὰ νὰ βεβαιωθῶμεν περὶ τῆς ἀκρίβειας τοῦ πηλίκου καὶ τοῦ υπόλοιπου τῆς διαιρέσεως αὐτῆς κάμνομεν τὴν δοκιμὴν, καθὼς ἀνωτέρω,

Δ Δ Δ

καὶ ἔχομεν $1 \times 32 = 32$. Ἐπομένως μένουσιν ἀκόμη 10. Μένει νὰ διαι-

Δ M

ρέσωμεν ἀκόμη τὰς 10 καὶ τὰς 5, διὰ τοῦ 32.

Δ M

M M

Ἀλλὰ $10 = 100$. Ὡστε ἀρκεῖ νὰ διαιρέσωμεν τὰς $100 + 5 =$

M M M M

$105 : 32$. Ἐχομεν πάλιν κατὰ προσέγγισιν $100 : 30 = 10 : 3 = 3$.

M M M

Ἡ δοκιμὴ δεῖξει $3 \times 32 = 96$. ἄρα μένει υπόλοιπον $105 - 96 = 9$.

E Δ M

Ἢτοι εὐρήκαμεν πηλίκον 2 1 3, δηλαδή 213 καὶ υπόλοιπον 9.

Πρὸς εὐκολίαν γράφομεν τὸν διαιρέτεον, δεξιὰ τοῦ τὸν διαιρέτην καὶ σύρομεν μεταξὺ των εὐθειῶν γραμμῶν κατὰ κύρπον, κάτωθεν δὲ τοῦ διαιρέτου ὀριζοντίαν, ὑπὸ τὴν ὅποιαν θὰ γράψωμεν τὰ ψηφία τοῦ πηλίκου, ἐνῶ κάτωθεν τοῦ διαιρετέου τὰ υπόλοιπα τῶν μερικῶν διαιρέσεων καὶ λέγομεν

68' 2' 5'	32
42	-----
105	213
= 9	

Ὁ διαιρέτης ἔχει δύο ψηφία· χωρίζομεν καὶ ἀπὸ τὸν διαιρετέον δύο ψηφία ἐξ ἀριστερῶν πρὸς τὰ δεξιὰ· τὸ 32 εἰς τὸ 68 χωρεῖ περίπου ὅσον τὸ 3 εἰς τὸ 6· τὸ 3 εἰς τὸ 6=2, γράφομεν 2 εἰς τὸ πηλίκον. Πολλαπλασιάζομεν τὸ 2 ἐπὶ τὸν διαιρέτην καὶ τὸ γινόμενον ἀφαιροῦμεν ἀπὸ τὸ 68· 2 ἐπὶ 2=4 ἀπὸ 8 τοῦ διαιρετέου =4· γράφομεν 4 ὑποκάτω τοῦ 8· $2 \times 3 = 6$ ἀπὸ 6=0. Καταβιδάζομεν καὶ τὸ ἀκόλουθον ψηφίον τοῦ διαιρετέου 2 καὶ γράφομεν αὐτὸ δεξιὰ τοῦ ὑπολοίπου 4. Οὕτω ἔχομεν τὸ 42. Τὸ 32 εἰς τὸ 42 χωρεῖ περίπου ὅσον τὸ 3 εἰς τὸ 4· τὸ 3 εἰς τὸ 4=1. Γράφομεν εἰς τὸ πηλίκον δεξιὰ τοῦ 2 τὸ 1 καὶ πολλαπλασιάζομεν αὐτὸ ἐπὶ τὸν διαιρέτην 32, τὸ δὲ γινόμενον ἀφαιροῦμεν ἀπὸ τὸ 42, ὅτε εὐρίσκομεν 10. Καταβιδάζομεν καὶ τὸ ἀκόλουθον ψηφίον 5 τοῦ διαιρετέου καὶ γράφομεν αὐτὸ δεξιὰ τοῦ 10, ὅτε λαμβάνομεν 105. Τὸ 32 εἰς τὸ 105 χωρεῖ περίπου ὅσον τὸ 3 εἰς τὸ 10, τὸ 3 εἰς τὸ 10=3. Γράφομεν 3 εἰς τὸ πηλίκον δεξιὰ τοῦ 1. Πολλαπλασιάζομεν τὸ 3 ἐπὶ τὸν διαιρέτην καὶ ἀφαιροῦμεν τὸ γινόμενον ἀπὸ τὸ 105, ὅτε εὐρίσκομεν ὑπόλοιπον 9. Ὡστε τὸ πηλίκον εἶνε 213 καὶ τὸ ὑπόλοιπον 9.

β') Διὰ νὰ κάμωμεν τὴν δοκιμὴν, πολλαπλασιάζομεν τὸν διαιρέτην 32 ἐπὶ τὸ πηλίκον 213, εἰς τὸ γινόμενον προσθέτομεν τὸ ὑπόλοιπον 9 καὶ πρέπει νὰ εὐρωμεν τὸν διαιρετέον 6825, τὸ ὁποῖον πράγματι συμβαίνει.

γ') Ὅμοίως ἐκτελοῦμεν τὴν διαίρεσιν δύο αἰωνοδήποτε ἀριθμῶν, προσέχοντες νὰ χωρίζομεν ἀπὸ τὸν διαιρετέον τόσα ψηφία, κατὰ τὴν ἀρχὴν τῆς ἐκτελέσεως τῆς πράξεως, ὅσα ἔχει ὁ διαιρέτης. Ἐὰν, ἀφοῦ χωρίσωμεν ἀπὸ τὸν διαιρετέον ἐξ ἀριστερῶν πρὸς τὰ δεξιὰ ὅσα ψηφία ἔχει ὁ διαιρέτης, τύχη ὁ ἀριθμὸς, τὸν ὁποῖον λαμβάνομεν, νὰ εἶνε μικρότερος τοῦ διαιρετέου, χωρίζομεν καὶ τὸ ἐπόμενον ψηφίον τοῦ διαιρετέου.

δ') Ἐὰν ἡ ἀφαίρεσις τοῦ γινομένου ψηφίου τινὸς τοῦ πηλίκου ἐπὶ τὸν διαιρέτην ἀπὸ τὸν ἀντίστοιχον διαιρετέον δὲν γίνεται, γράφομεν ἀντὶ τοῦ εὐρεθέντος ψηφίου τοῦ πηλίκου τὸ κατὰ μονάδα μικτότερον, μέχρις ἔστου τὸ γινόμενον ν' ἀφαιρῆται ἀπὸ τὸν ἀντίστοιχον διαιρετέον.

ε') Ἐὰν διαιρετέος τις, ἐκ τῶν προκυπτόντων ἐὰν καταβιδάσωμεν τὸ ἐπόμενον ψηφίον τοῦ δοθέντος διαιρετέου, δὲν διαιρῆται διὰ τοῦ διαιρέτου, γράφομεν 0 εἰς τὸ πηλίκον, καταβιδάζομεν ἀμέσως τὸ ἐπόμενον ψηφίον τοῦ διαιρετέου καὶ προχωροῦμεν ὁμοίως τὴν πρᾶξιν.

Ὅπως εἰς τὴν διαίρεσιν τοῦ 14023 : 23 ἔχομεν·

$$\begin{array}{r|l} 14023 & 23 \\ 223 & 609 \\ \hline 16 & \end{array}$$

Ἦτοι τὸ πηλίκον εἶνε 609 καὶ ὑπόλοιπον 16.

Ἀσκήσεις καὶ προβλήματα.

Ὅμως πρώτη. 1) Νὰ διαιρεθοῦν οἱ ἀριθμοὶ 146· 538· 2307· 5906· 7662· 9781 διὰ καθενὸς τῶν μονοψηφίων 2· 3· . . 9.

2) Νὰ ἐκτελεσθοῦν αἱ ἐπόμεναι διαιρέσεις μετὰ τῶν δοκιμῶν των·
α') 8965:42· β') 8930:75· γ') 30078:13· δ') 764632:835.

3) Ποῖον ἀριθμὸν πρέπει νὰ λάβωμεν 121 (315) φορές ὡς προσθετέον, διὰ νὰ εὗρωμεν ἄθροισμα 24568 (65205); 203 (207).

4) Ἐκτελέσατε τὴν διαίρεσιν $5^4 = 5 \times 5 \times 5 \times 5$ διὰ τοῦ $5^3 = 5 \times 5 \times 5$ ὁμοίως $6^3:6^2$ καὶ $10^4:10^2$ (§ 26, α')· τί παρατηρεῖτε ἐκ τῶν παραδειγμάτων τούτων; μὲ τί ἰσοῦται τὸ πηλίκον δύο δυνάμεων τοῦ αὐτοῦ ἀριθμοῦ;

Ὅμως δευτέρα. 1) Αἰ 375 (3489) ὀκ. ἐνὸς ἐμπορεύματος στοιχίζουσι 29988 (226785) δρ.· πόσον στοιχίζει ἡ ὀκᾶ;

79 καὶ ὑπ. 363 (65).

2) Σιδηρόδρομος εἰσπράττει εἰς ἓν ἔτος 81711820 (2767430) δρ.· πόσα εἰσπράττει καθ' ἡμέραν κατὰ μέσον ὄρον, ἐὰν τὸ ἔτος ἔχη 365 ἡμέρας; 223868 (7582).

3) Ποσὸν ἐκ 215460 (46336) δρ. πρόκειται νὰ διανεμηθῇ μετὰ 315 (128) ἀνθρώπων· πόσα θὰ λάβῃ ὁ καθείς; 684 (362).

Ὅμως τρίτη. 1) Ἐμπορὸς ἐπλήρωσε δι' ἀξίαν 318 (327) ὀκ. ἐνὸς ἐμπορεύματος 20988 (22890) δρ., ἐπώλησε δὲ ἀνὰ 728 (459) ὀκ. ἀντὶ 52416 (30294) δρ.· πόσον ἐκέρδισεν εἰς τὴν 1 ὀκᾶν;

6 (ζ. 4) δρ.

2) Πληρώνει τις διὰ 37 (49) ὀκ. ἐμπορεύματος 10471 (6223) δρ., κερδίζει (ζημιοῦται) δὲ κατὰ τὴν πώλησιν 374 (224) δρ. ἀνὰ 17 (16) ὀκ.· πόσον ἐπώλησε καθεμίαν ὀκᾶν; 305 (113) δρ.

Ὅμως τετάρτη. 1) Ἀγοράζει τις 28 (16) ὀκ. πράγματος ἀντὶ 504 (96) δρ.· ἔπειτα 36 (18) ὀκ. ἀντὶ 432 (144) δρ. καὶ

τέλος 8 (14) δεκ. ἀντὶ 216 (336) δερ. πόσον στοιχίζει ἡ δεκά κατὰ μέσον ἔρον; 16 (12).

2) Ἀτμάμαξα τρέχει ἐπὶ 35' (56') ἀπὸ 784 (612) μ. εἰς 1'· ἔπειτα ἐπὶ 48' (58') διανύουσα 898 (765) μ. εἰς 1' καὶ τέλος ἐπὶ 31' (39') ἀπὸ 670 (459) μ. εἰς 1'· πόσα διατρέχει εἰς 1' κατὰ μέσον ἔρον; 801 (631).

Ὀμάς πέμπτη. 1) Πόσον 4500 (60225) δερ. πρόκειται νὰ μοιρασθῆ ἐξ ἰσοῦ εἰς ἕνα ἀριθμὸν ἀνθρώπων, ὥστε ὁ καθεὶς νὰ λάβῃ 125 (825) δερ. πόσοι εἶνε οἱ ἄνθρωποι; 36 (73).

2) Πόσας φοράς δυνάμεθα νὰ ἐπαναλάβωμεν μήκος 128 (253) δεκτ. ἐπὶ ἄλλου μήκους 4736 (20999) δεκτ.; 37 (83).

3) Πόσας φοράς χωρεῖ τὸ περιεχόμενον δοχείου 26 (16) δεκ. εἰς 884 (944) δεκ.; 34 (59).

Ὀμάς ἕκτη. 1) Μία δωδεκάς μολυβδοκοκκιδύλων ἐτιμᾶτο 432 πεντηκοντάλεπτα· πόσον ἐτιμᾶτο τὸ ἐν μολυβδοκόνδυλον; 18 δερ.

2) Θέλει τις νὰ τοποθετήσῃ 1645 (4165) σφαίρας εἰς 35 (35) ἴσας σειράς· πόσας σφαίρας πρέπει νὰ θέτῃ εἰς καθεμίαν; 47 (119).

Ἐμπορος ἀναμιγνύει 12 (32) δεκ. οἴνου τῶν 10 (6) δερ. τὴν δεκά, 16 (36) δεκ. τῶν 9 δερ. (720 λ.) καὶ 24 (24) δεκ. τῶν 8 δερ. (520 λ.) πρὸς δὲ 8 δεκ. ὕδατος· πόσον στοιχίζει ἡ δεκά τοῦ κράματος; 760 (576) λ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VI

Περὶ διαιρετότητος καὶ περὶ πρώτων ἀριθμῶν.

§ 29. Γνωρίσματα τῆς διαιρετότητος.—

α') Ἡ πρώτη Ἰανουαρίου τοῦ 1909 ἔπεσεν ἡμέραν Παρασκευῆν. Θέλομεν νὰ μάθωμεν, ἂν καὶ ἡ πρώτη τοῦ 1910 ἔπεσε Παρασκευῆν.

Ἄν συνέδῃ τοῦτο, πρέπει ἂν τὰς 365 ἡμέρας τοῦ ἔτους 1909 διαιρέσωμεν διὰ τοῦ 7, νὰ μείνῃ ὑπόλοιπον μηδέν. Ἄλλ' ἡ διαίρεσις 365: 7 δίδει ὑπόλοιπον 1. Ὡστε ἡ 1η Ἰανουαρίου τοῦ 1910 ἔπεσε Σάββατον.

Ὡς βλέπομεν, ἐνίοτε ἐνδιαφερόμεθα νὰ γνωρίσωμεν τὸ ὑπόλοιπον τῆς διαιρέσεως καὶ ὄχι τὸ πηλίκον τῆς καὶ μάλιστα ἂν

τὸ ὑπόλοιπον εἶνε 0. Εἰς τινὰς διαιρέσεις δυνάμεθα νὰ εὐρίσκωμεν εὐκόλως τὸ ὑπόλοιπον.

β') Ἐάν μία διαιρέσις εἶνε τελεία, π. χ. ἡ $18 : 3$, λέγομεν ὅτι ὁ διαιρετέος εἶνε πολλαπλάσιον τοῦ διαιρέτου, ἢ ὅτι εἶνε διαιρετὸς διὰ τοῦ διαιρέτου, ὁ δὲ διαιρέτης λέγεται ἀπλῶς διαιρέτης τοῦ διαιρετέου.

γ') « Πᾶς ἀριθμὸς εἶνε διαιρετὸς διὰ τῆς 1 καὶ διὰ τοῦ ἑαυτοῦ του ».

(Πρόβλημα). δ') « Ἐν παιδίον λαμβάνει 6543 δρ. μὲ τὴν ἐντολὴν νὰ τὰς μοιράσῃ εἰς πτωχοὺς, δίδον εἰς καθένα 2 δρ., ὅ,τι δὲ μείνῃ νὰ κρατήσῃ αὐτὸ. Πόσαι δραχμαὶ θὰ τοῦ μείνουσιν; »

Ἄντι νὰ εὐρωμεν τὸ ὑπόλοιπον τῆς διαιρέσεως $6543 : 2$ μετὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῆς πράξεως, σκεπτόμεθα ὅτι, τὸ παιδίον ἔλαβεν 6 χιλιάδας, 5 ἑκατοντάδας, 4 δεκάδας δραχμῶν καὶ 3 δραχμάς, διὰ νὰ τὰς μοιράσῃ καθὼς εἶπομεν. Ἄλλ' ἂν εἶχε νὰ μοιράσῃ 1000 δρ. καὶ ἔδιδε 2 δρ. εἰς καθένα πτωχὸν, θὰ ἐμοίραζεν αὐτὰς εἰς 500 πτωχοὺς καὶ δὲν θὰ τοῦ ἔμενε τίποτε. Ὅμοίως σκεπτόμενοι, βλέπομεν ὅτι, ἀπὸ καθεμίαν ἑκατοντάδα, ἡ δεκάδα, δὲν θὰ τοῦ μείνῃ τίποτε, ἀπὸ δὲ τὰς 3 δρ. τοῦ μένει 1 δρ., ἀφοῦ δώσει 2 δρ. εἰς ἓνα πτωχὸν. Διὰ νὰ εὐρωμεν λοιπὸν ἂν εἰς ἀριθμὸς εἶνε διαιρετὸς διὰ τοῦ 2, ἀρκεῖ νὰ διαιρέσωμεν μόνον τὸ ψηφίον τῶν ἀπλῶν μονάδων τοῦ διὰ τοῦ 2 καὶ ὅ, τι ὑπόλοιπον εὐρωμεν αὐτὸ θὰ εἶνε καὶ ὑπόλοιπον τῆς διαιρέσεως ὀλοκλήρου τοῦ ἀριθμοῦ διὰ τοῦ 2.

Τὰ αὐτὰ παρατηροῦμεν, ἐάν τὸ παιδίον δώσῃ 5 δρ., ἢ 10 δρ. εἰς καθένα πτωχόν.

Ὡστε δυνάμεθα νὰ λέγωμεν ὅτι,

ε') « ἀριθμὸς εἶνε διαιρετὸς διὰ 2, ἢ 5, ἢ 10, ἐάν τὸ ψηφίον τῶν ἀπλῶν μονάδων τοῦ εἶνε διαιρετὸν διὰ 2, ἢ 5, ἢ 10 ».

στ') Συμφώνως πρὸς τὸν κανόνα αὐτὸν πάντες οἱ ἀριθμοὶ τῶν ὀπίστων τὸ τελευταῖον ψηφίον εἶνε 0·2·4·6·8 εἶνε διαιρετοὶ διὰ τοῦ 2 καὶ λέγονται ἄρτιοι ἢ ζυγοὶ ἀριθμοὶ. Τοῦναντίον οἱ ἀριθμοὶ τῶν ὀπίστων τὸ τελευταῖον ψηφίον εἶνε 1·3·5·7·9 διαιρούμενοι διὰ τοῦ 2 ἀφήνουν ὑπόλοιπον 1 καὶ λέγονται περιττοὶ ἢ μονοὶ ἀριθμοὶ.

Οἱ ἀριθμοὶ τῶν ὀπίστων τὸ τελευταῖον ψηφίον εἶνε 0 ἢ 5 εἶνε διαιρετοὶ διὰ τοῦ 5, ἐκεῖνοι δὲ οἱ ὅποιοι λήγουν εἰς 0 εἶνε διαιρετοὶ διὰ τοῦ 10.

ζ') Εάν τὸ παιδίον ἔπρεπε νὰ διδῆ 3 δρ. εἰς καθένα πτωχόν, εἶνε εὐκολὸν νὰ ἴδωμεν, ὅτι ἀπὸ καθεμίαν δεκάδα, ἑκατοντάδα, χιλιάδα κλπ. δραχμῶν θὰ τοῦ ἔμενε 1 δραχμὴ, ἄρα ἀπὸ τὰς 6 χιλιάδας θὰ τοῦ ἔμενον 6 δρ., ἀπὸ τὰς 5 ἑκατοντάδας 5 δρ., ἀπὸ τὰς 4

X E Δ M

δεκάδας 4 δρ. Ἐπομένως ἀπὸ τὰς 6543 = $\theta + 5 + 4 + 3$ δρ. θὰ τοῦ μείνουν $6 + 5 + 4 + 3 = 18$ δρ. Ἄλλ' αὐτὰς πρέπει νὰ μοιράσῃ πάλιν εἰς πτωχοὺς, δίδον εἰς καθένα 3 δρ. θὰ δώσῃ λοιπὸν αὐτὰς εἰς $18 : 3 = 6$ πτωχοὺς καὶ δὲν θὰ τοῦ μείνῃ τίποτε.

Ἄν εἶχε νὰ μοιράσῃ 851 δρ. ἀπὸ τρεῖς δραχμάς εἰς καθένα, θὰ τοῦ ἔμενον πρῶτον $8 + 5 + 1 = 14$ δρ., ἀπὸ αὐτὰς δ' ἔπειτα 2 δρ. Βλέπομεν λοιπὸν, ὅτι τὸ ὑπόλοιπον τῆς διαιρέσεως ἑνὸς ἀριθμοῦ διὰ 3 εὐρίσκεται, ἐὰν προσθέσωμεν τὰ ψηφία τοῦ ἀριθμοῦ καὶ τὸ προκύπτον ἄθροισμα διαιρέσωμεν διὰ τοῦ 3. Τὸ ὑπόλοιπον, τὸ ὅποιον θὰ εὐρωμεν ἐκ τῆς διαιρέσεως αὐτῆς, θὰ εἶνε καὶ ὑπόλοιπον ὁλοκλήρου τοῦ ἀριθμοῦ διὰ τοῦ 3.

Τὰ αὐτὰ παρατηροῦμεν, ἐὰν τὸ παιδίον διδῆ 9 δρ. εἰς καθένα πτωχόν. Ἐπομένως δυνάμεθα νὰ λέγωμεν ὅτι,

« ἀριθμὸς εἶνε διαιρετὸς διὰ 3, ἢ 9, ἐὰν τὸ ἄθροισμα τῶν ψηφίων του εἶνε διαιρετὸν διὰ τοῦ 3, ἢ 9 ».

η') Ἄν τὸ παιδίον ἔπρεπε νὰ διδῆ 4 δρ. εἰς καθένα πτωχόν, εὐρίσκομεν εὐκόλως, ὅτι ἀπὸ καθεμίαν ἑκατοντάδα, χιλιάδα κλπ. δὲν θὰ τοῦ ἔμενε τίποτε (διότι $100 : 4 = 25$ ἀκριβῶς· $1000 : 4 = 250$), ἀπὸ δὲ τὰς ὑπολοιπομένας 43 δρ. ἐκ τῶν 6543 θὰ ἔδιδε τὰς 40 δρ. εἰς 10 πτωχοὺς καὶ θὰ τοῦ ἔμενον 3 δρ.

Διὰ νὰ εὐρωμεν λοιπὸν, ἂν εἰς ἀριθμὸς εἶνε διαιρετὸς διὰ τοῦ 4, ἀρκεῖ νὰ διαιρέσωμεν τὸν ἀριθμὸν, τὸν ὅποιον ἀποτελοῦν τὰ δύο τελευταῖα τοῦ ψηφία ἐκ δεξιῶν διὰ 4. Τὰ αὐτὰ παρατηροῦμεν, ἐὰν τὸ παιδίον ἔδιδεν 25 δρ., ἢ 100 δρ., εἰς καθένα πτωχόν.

Ὅθεν « ἀριθμὸς εἶνε διαιρετὸς διὰ 4, ἢ 25, ἢ 100, ἐὰν ὁ ἀριθμὸς, τὸν ὅποιον ἀποτελοῦν τὰ δύο πρὸς τὰ δεξιὰ τελευταῖα ψηφία του, εἶνε διαιρετὸς διὰ 4 ἢ 25, ἢ 100 ».

θ') Εάν τὸ παιδίον διδῆ 8 δρ. εἰς καθένα πτωχόν, παρατηροῦμεν ὅτι, ἀπὸ καθεμίαν χιλιάδα δὲν θὰ τοῦ μείνῃ τίποτε. Διότι $1000 : 8 = 125$ ἀκριβῶς. Διὰ νὰ εὐρωμεν δὲ τί θὰ τοῦ μείνῃ ἀπὸ τὰς ἄλλας 543 δραχμάς, διαιροῦμεν τὸ $543 : 8$ καὶ εὐρίσκομεν ὑπόλοιπον 7 δραχμάς.

Ὅστε «ἀριθμὸς εἶνε διαιρετὸς διὰ τοῦ 8, ἐὰν ὁ ἀριθμὸς, τὸν ὅποιον ἀποτελοῦν τὰ τρία πρὸς τὰ δεξιὰ τελευταῖα ψηφία του εἶνε διαιρετὸς διὰ τοῦ 8».

Ἀσκήσεις.

1) Ποιοὶ ἐκ τῶν ἀριθμῶν 456· 965· 589· 2028· 7968· 38684· 26336· 228672· 850340 εἶνε διαιρετοὶ διὰ τοῦ 2, τοῦ 5, τοῦ 8, τοῦ 3 τοῦ 9;

2) Ἄν ἀριθμὸς διαιρῆται διὰ τοῦ 2 καὶ τοῦ 3, διαιρεῖται καὶ διὰ 6. Ποιοὶ ἐκ τῶν 846· 7283· 8921· 9324· 16843· 76224 εἶνε διαιρετοὶ διὰ τοῦ 3· 2· 4· 6;

3) Διὰ ποίων ἐκ τῶν ἀριθμῶν 1· 2· 3· 4· 5· 6· 7· 8· 9· 25· 100 εἶνε διαιρετοὶ οἱ ἀριθμοὶ 95365· 839715· 932405;

4) Ποῖον ψηφίον νὰ γράψωμεν εἰς τὸ τέλος τῶν ἀριθμῶν 2825· 39894· 386427, διὰ νὰ γίνουν ἀριθμοὶ διαιρετοὶ διὰ τοῦ 5, τοῦ 3, τοῦ 10;

5) Ἐὰν ἀριθμὸς εἶνε διαιρετὸς διὰ τοῦ 3, ἢ 9, καὶ ἀλλάξωμεν τὴν θέσιν τῶν ψηφίων του, ὁ προκύπτων ἀριθμὸς εἶνε πάλιν διαιρετὸς διὰ 3, ἢ 9. Διὰτί;

6) Ἐὰν ἀριθμὸς ἔχη εἰς τὸ τέλος 2 μηδενικά, διαιρεῖται διὰ τοῦ 100, ἂν τρία διαιρεῖται διὰ τοῦ 1000. Διὰτί;

7) Ὅταν ἐξετάζωμεν ἂν ἀριθμὸς εἶνε διαιρετὸς διὰ 3 ἢ 9, δυνάμεθα νὰ παραλείπωμεν τὰ ψηφία τὰ ὅποια εἶνε διαιρετὰ διὰ 3, ἢ 9. Διὰτί;

§ 30. Περὶ τῶν πρώτων ἀριθμῶν.—

Υπάρχουν ἀριθμοὶ, οἱ ὅποιοι εἶνε διαιρετοὶ μόνον διὰ τοῦ 1 καὶ τοῦ ἑαυτοῦ των, π. γ. οἱ 2· 3· 5· 7· 11 καὶ ἄλλοι, οἱ ὅποιοι ἔχουν καὶ ἄλλους διαιρέτας, καθὼς οἱ 4· 6· 8· 9. Οἱ ἀριθμοὶ, οἱ ὅποιοι ἔχουν διαιρέτας μόνον τὸν ἑαυτὸν των καὶ τὴν μονάδα, λέγονται πρῶτοι, ἐκεῖνοι δὲ οἱ ὅποιοι ἔχουν καὶ ἄλλους διαιρέτας λέγονται σύνθετοι ἀριθμοὶ. Ἐπειδὴ πᾶς πρῶτος ἀριθμὸς διαιρεῖται μόνον διὰ τοῦ ἑαυτοῦ του καὶ τῆς μονάδος, δυνάμεθα νὰ μετατρέψωμεν αὐτὸν εἰς γινόμενον δύο παραγόντων, ἐκ τῶν ὁποίων ὁ εἰς εἶνε ἢ 1 καὶ ὁ ἄλλος αὐτὸς ὁ ἀριθμὸς. Οὕτω ἔχομεν $7=1 \times 7$, $11=1 \times 11$.

Ἐκ τούτων βλέπομεν ὅτι «πᾶς πρῶτος ἀριθμὸς δὲν δύναται ν' ἀναλυθῆ εἰς τὸ γινόμενον παραγόντων μικροτέρων του».

§ 31. Ἀνάλυσις συνθέτου ἀριθμοῦ εἰς γινόμενον παραγόντων πρῶτων.—

α') Ἐπειδὴ πᾶς σύνθετος ἀριθμὸς ἐκτὸς τοῦ ἑαυτοῦ του καὶ τῆς μονάδος ἔχει καὶ ἄλλους διαιρέτας, δυνάμεθα νὰ τρέψωμεν αὐτὸν εἰς γινόμενον δύο ἄλλων ἀριθμῶν, καθεὶς τῶν ὁποίων εἶνε μικρότερός του. Οὕτω π. χ. ὁ 6 ἔχει διαιρέτην τὸν 2 καὶ εἶνε $6=2 \times 3$.

β') Ἐὰν ἀριθμὸς σύνθετος ἀναλυθῆ εἰς γινόμενον δύο παραγόντων, δυνάμεθα καθένας τῶν παραγόντων τούτων, ἐὰν δὲν εἶνε πρῶτος, νὰ τρέψωμεν εἰς γινόμενον δύο ἄλλων παραγόντων μικροτέρων του καὶ τοῦτο νὰ ἐξακολουθήσωμεν μέχρις ὅτου ἔλοι οἱ παράγοντες, τοὺς ὁποίους θὰ εὔρωμεν, νὰ εἶνε πρῶτοι ἀριθμοί. Δυνάμεθα λοιπὸν νὰ λέγωμεν ὅτι,

«πᾶς σύνθετος ἀριθμὸς ἀναλύεται εἰς γινόμενον παραγόντων πρῶτων ἀριθμῶν».

Ἐστω π. χ. ὅτι θέλομεν ν' ἀναλύσωμεν τὸν ἀριθμὸν 60 εἰς γινόμενον παραγόντων πρῶτων ἀριθμῶν. Ἔχομεν $60=4 \times 15$ καὶ ἐπειδὴ εἶνε $4=2 \times 2$ καὶ $15=3 \times 5$, ἔπεται ὅτι εἶνε $60=2 \times 2 \times 3 \times 5=2^2 \times 3 \times 5$.

γ') Ὅταν πρόκειται περὶ μεγάλων ἀριθμῶν, π. χ. ἐὰν θέλωμεν ν' ἀναλύσωμεν τὸν 560 εἰς γινόμενον πρῶτων ἀριθμῶν, διαιροῦμεν τὸν 560 διὰ τοῦ μικροτέρου τῶν πρῶτων ἀριθμῶν, διὰ τοῦ ὁποίου διαιρεῖται. Ἐπειτα ἐξακολουθοῦμεν ὁμοίως μὲ τὸ πηλίκον καὶ οὕτω καθεξῆς μὲ τὸ εὐρισκόμενον πηλίκον, ἐν ὧσιν τοῦτο εἶνε δυνατόν· δηλαδὴ ἐν ὧσιν δὲν εὐρισκομεν πηλίκον πρῶτον ἀριθμὸν. Οὕτω ὁ 560 διαιρεῖται διὰ τοῦ 2 καὶ ἔχομεν

	$560:2=280$.	ἐπομένως $560=2 \times 280$.
Ὅμοίως	$280:2=140$.	» $280=2 \times 140$.
»	$140:2=70$.	» $140=2 \times 70$.
»	$70:2=35$.	» $70=2 \times 35$.
»	$35:5=7$.	» $35=5 \times 7$.

Ἄρα $560=2 \times 280=2 \times 2 \times 140=2 \times 2 \times 2 \times 70=$
 $2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 35=2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 5 \times 7=2^4 \times 5 \times 7$.

δ') Διὰ νὰ εὔρωμεν τὸν μικρότερον πρῶτον, ὁ ὁποῖος εἶνε διαιρέτης ἐνὸς ἀριθμοῦ, δοκιμάζομεν ἂν ὁ δοθεὶς διαιρῆται διὰ τῶν $2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23 \dots$, οἱ ὁποῖοι εἶνε πρῶτοι.

Ἀσκήσεις.

- Ὅμας πρώτη. 1) Ποιοὶ ἐκ τῶν ἀριθμῶν 1 ἕως 30 εἶνε πρῶτοι;
 2) Ποιοὶ ἐκ τῶν 30 ἕως 50 εἶνε πρῶτοι; Ποιοὶ ἐκ τῶν 50 ἕως 100;
- Ὅμας δευτέρα. 1) Ν' ἀναλυθοῦν ἀπὸ μνήμης εἰς γινόμενον δύο παραγόντων οἱ ἀριθμοὶ 24· 32· 36· 39· 40.
 2) Ὅμοίως οἱ 69· 75· 78· 81· 84· 85· 87· 91· 100.
- Ὅμας τρίτη. 1) Ν' ἀναλυθοῦν ἀπὸ μνήμης οἱ ἐπόμενοι ἀριθμοὶ εἰς γινόμενα παραγόντων πρῶτων ἀριθμῶν 8· 12· 16· 18· 20· 34· 27· 28· 32· 36· 40· 44· 48· 50· 52· 60· 63· 64.
 2) Ν' ἀναλυθοῦν εἰς γινόμενα παραγόντων πρῶτων ἀριθμῶν οἱ ἀριθμοὶ 432· 2145· 700· 728· 5445· 871· 1764.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VII.

Περὶ τοῦ μεγίστου κοινοῦ διαιρέτου
 καὶ τοῦ ἐλαχίστου κοινοῦ πολλαπλασίου ἀριθμῶν.

§ 32. Μέγιστος κοινὸς διαιρέτης.—

α') Ὁ ἀριθμὸς 15 ἔχει τοὺς διαιρέτας 1· 3· 5· 15. Ὁ 40 ἔχει τοὺς 1· 2· 4· 5· 8· 10· 20· 40. Οἱ 15 καὶ 40 ἔχουν κοινὸς διαιρέτας τοὺς 1 καὶ 5 ἐκ τῶν ὁποίων μεγαλύτερος εἶνε ὁ 5.

Ὁ μεγαλύτερος αὐτὸς κοινὸς διαιρέτης τῶν 15 καὶ 40 λέγεται μέγιστος κοινὸς διαιρέτης τῶν 15 καὶ 40.

Ἐν γένει, καλοῦμεν μέγιστον κοινὸν διαιρέτην δύο ἢ περισσοτέρων ἀριθμῶν τὸν μεγαλύτερον ἐκ τῶν κοινῶν διαιρειτῶν των, θὰ παριστάνωμεν δ' αὐτὸν συντόμως διὰ τοῦ μ. κ. δ.

β') Ὅταν δοθέντες ἀριθμοὶ ἔχουν μ. κ. δ. τὴν 1, θὰ λέγωμεν ὅτι οἱ ἀριθμοὶ αὗτοι εἶνε πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους.

γ') Διὰ νὰ εὕρωμεν τὸν μ. κ. δ. ἀριθμῶν, πρέπει νὰ εὕρωμεν τοὺς διαιρέτας καθενὸς ἐξ αὐτῶν, νὰ συγκρίνωμεν μεταξὺ των μόνον τοὺς κοινούς ἐξ αὐτῶν καὶ νὰ κρατήσωμεν τὸν μεγαλύτερον. Ἐπειδὴ ὁμοίως ὁ τρόπος αὐτὸς τῆς εἰρέσεως τοῦ μ. κ. δ. εἶνε δύσκολος, ὅταν οἱ δοθέντες ἀριθμοὶ εἶνε μεγάλοι, ἔχομεν τρόπον ἀπλοῦν καὶ γενικὸν πρὸς εὐρεσιν αὐτοῦ.

δ') Ἐστω ὅτι θέλομεν νὰ εὑρωμεν τὸν μ. κ. δ. τῶν 24· 60· 72.

Ἀναλύομεν καθένα ἐξ αὐτῶν εἰς γινόμενον πρώτων παραγόντων, ἔτε λαμβάνομεν $24 = 2 \times 2 \times 2 \times 3 = 2^3 \times 3$, $60 = 2 \times 2 \times 3 \times 5 = 2^2 \times 3 \times 5$, $72 = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 = 2^3 \times 3^2$.

Παρατηροῦμεν ὅτι ὁ 3, ὁ ὁποῖος περιέχεται εἰς τὰ τρία γινόμενα, τὰ διαιρεῖ. Ἐὰν πολλαπλασιάσωμεν δύο παράγοντας, οἱ ὁποῖοι περιέχονται εἰς καθένα τῶν τριῶν τούτων γινομένων, π.χ. ἐὰν σχηματίσωμεν τὸ γινόμενον $2 \times 3 = 6$, τοῦτο διαιρεῖ καὶ τὰ τρία γινόμενα, ἦτοι τοὺς ἀριθμοὺς 24·60·72. Ἐπομένως ὁ 6 εἶνε κοινὸς διαιρέτης τῶν τριῶν δοθέντων ἀριθμῶν. Διὰ νὰ εὑρωμεν ὁμοίως τὸν μ.κ.δ. τῶν ἀριθμῶν, πρέπει νὰ πολλαπλασιάσωμεν πάντας τοὺς κοινούς παράγοντας των, ἦτοι τοὺς $2 \cdot 2 \cdot 3$. Ὡστε ὁ μ.κ.δ. τῶν 24·60·72 εἶνε ὁ $2 \times 2 \times 3 = 2^2 \times 3 = 12$. Ὡς βλέπομεν ὁ 2 περιέχεται εἰς τοὺς 24· 60· 70 καὶ εἰς μὲν τὸν πρῶτον ἔχει τὸν ἐκθέτην 3, εἰς τὸν δεῦτερον 2 καὶ εἰς τὸν τρίτον 3, εἰς δὲ τὸν μ.κ.δ. $2^2 \times 3$ τὸ 2 περιέχεται μὲ ἐκθέτην 2 δηλαδὴ μὲ τὸν μικρότερον τῶν ἐκθετῶν, τοὺς ὁποῖους αὐτὸς ἔχει εἰς τοὺς δοθέντας ἀριθμοὺς. Τὰ αὐτὰ παρατηροῦμεν καὶ διὰ τὸν παράγοντα 3.

Ὁμοίως δυνάμεθα νὰ εὑρωμεν τὸν μ.κ.δ. τῶν 32·80· 120.

Ἐχομεν δηλαδὴ

$$32 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 2^5$$

$$80 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 5 = 2^4 \times 5$$

$$120 = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 5 = 2^3 \times 3 \times 5$$

Οἱ κοινοὶ πρώτοι παράγοντες εἶνε ὁ 2 καὶ ὁ μικρότερος ἐκθετῆς του μὲ τὸ ὁποῖον περιέχεται εἰς τοὺς δοθέντας ἀριθμοὺς εἶνε ὁ 3· ἄρα ὁ $2^3 = 8$ εἶνε ὁ μ. κ. δ. τῶν 32· 80· 120.

Ἐκ τούτων συνάγομεν ὅτι,

«διὰ νὰ εὑρωμεν τὸν μ. κ. δ. ἀριθμῶν, ἀναλύομεν καθένα ἐξ αὐτῶν εἰς γινόμενον πρώτων παραγόντων καὶ ἀκολουθῶς πολλαπλασιάζομεν πάντας τοὺς κοινούς παράγοντας των, καθενὸς λαμβανομένου μὲ τὸν μικρότερον τῶν ἐκθετῶν, τοὺς ὁποῖους ἔχει εἰς τὰ γινόμενα, εἰς τὰ ὁποῖα ἀνελύθησαν οἱ ἀριθμοί».

ε') Ἄλλος τρόπος εὐρέσεως τοῦ μ. κ. δ. ἀριθμῶν.

Διὰ τὴν εὑρεσιν τοῦ μ. κ. δ. δύο ἀριθμῶν ὑπάρχει καὶ ἡ ἐξῆς:

ώραία μέθοδος γνωστή ἀπὸ τῆς ἐποχῆς τοῦ Ἑλληνος μαθηματικοῦ Εὐκλείδου (γεννηθέντος τὸ 300 μ.Χ.).

*Ἐστω ὅτι θέλομεν νὰ εὕρωμεν τὸν μ. κ. δ. τῶν ἀριθμῶν 810 καὶ 279.

Διαιροῦμεν τὸν 810 διὰ τοῦ 279 καὶ εὕρισκομεν ὑπόλοιπον 252. Τὸν διαιρέτην 279 διαιροῦμεν διὰ τοῦ 252 καὶ εὕρισκομεν ὑπόλοιπον 27. Διαιροῦμεν πάλιν τὸν 252 διὰ τοῦ 27 καὶ εὕρισκομεν ὑπόλοιπον 9. Τέλος διαιροῦμεν τὸν 27 διὰ τοῦ 9 καὶ εὕρισκομεν ὑπόλοιπον 0. Ὁ τελευταῖος αὐτὸς διαιρέτης 9 εἶνε ὁ μ. κ. δ. τῶν 810 καὶ 279.

Ἡ διαίρεσις λοιπὸν τοῦ ἐκάστοτε διαιρέτου διὰ τοῦ ὑπολοίπου θὰ ἐξακολουθήσῃ μέχρις ὅτου εὕρωμεν ὑπόλοιπον 0 καὶ ὁ τελευταῖος αὐτὸς διαιρέτης θὰ εἶνε ὁ μ. κ. δ.

Ἡ μέθοδος αὐτὴ τῆς εὐρέσεως τοῦ μ. κ. δ. λέγεται μέθοδος διὰ διαίρεσεως, πρὸς διάκρισιν ἀπὸ τῆς ἀνωτέρω ἐκτεθείσης, ἣ ὁποία λέγεται δι' ἀναλύσεως εἰς τὸν πρῶτον παράγοντα.

στ') Ἡ μέθοδος διὰ διαίρεσεως ἐφαρμόζεται καὶ διὰ τὴν εὐρεσιν τοῦ μ. κ. δ. περισσοτέρων τῶν δύο ἀριθμῶν. *Ἐστω π. χ. ὅτι ζητοῦμεν τὸν μ. κ. δ. τῶν ἀριθμῶν 125· 350· 480· 500.

Διαβάνομεν τὸν μικρότερον 125. Διαιροῦμεν δι' αὐτοῦ πάντας τοὺς ἄλλους, γράφομεν δὲ κάτωθεν καθενὸς τὸ ἀντίστοιχον ὑπόλοιπον τῆς διαίρεσεως, κάτωθεν δὲ τοῦ μικροτέρου αὐτὸν τὸν ἴδιον.

Εἰς τὴν νέαν σειρὰν τῶν ἀριθμῶν ἐργαζόμεθα ὁμοίως, διαιροῦντες τοὺς ἄλλους διὰ τοῦ μικροτέρου των (ὁ ὁποῖος δὲν πρέπει νὰ εἶνε 0) καὶ οὕτω προχωροῦμεν ὁμοίως μέχρις ὅτου πάντα τὰ ὑπόλοιπα τῆς διαίρεσεως εἶνε ἴσα μὲ 0, ὅτε ὁ τελευταῖος διαιρέτης εἶνε ὁ μ. κ. δ.

Οὕτω διὰ τοὺς ἀριθμοὺς 125· 350· 480· 500 θὰ ἔχωμεν τὰς ἑξῆς.

σειρὰς	125·	350·	480·	500	
					διαίρετης ὁ 125
	125·	100,	105	0	
					διαίρετης ὁ 100
	25·	100·	5·	0	
					διαίρετης ὁ 5
	0·	0·	5·	0	
					μ. κ. δ. ὁ 5.

Ἀσκήσεις καὶ προβλήματα.

Ὅμας πρώτη. 1) Νὰ εὑρεθῇ ὁ μ. κ. δ. τῶν ἐπομένων ἀριθμῶν δι' ἀναλύσεως καὶ διὰ διαιρέσεως· α') 18, 14, 60, 72. β') 25, 30, 24, 36, 50. γ') 25, 100, 60, 90.

2) Ὅμοίως τῶν α') 6, 8, 12· β') 12, 16, 24· γ') 12, 20, 30. δ') 135, 625, 350, 140.

3) Νὰ εὑρεθῇ διὰ διαιρέσεως καὶ δι' ἀναλύσεως ὁ μ. κ. δ. τῶν 360, 781, 3784.

Ὅμας δευτέρα. 1) Ἐὰν ἐκ δύο ἀριθμῶν εἷς διαιρῇ τὸν ἄλλον, ὁ διαιρέτης αὐτὸς εἶνε ὁ μ. κ. δ. των. Διατί;

2) Ἰσχύει τοῦτο καὶ ἔταν ἐκ πολλῶν ἀριθμῶν εἷς διαιρῇ πάντας ἄλλους;

3) Ἐν παιδίῳ ἔχει 60 σφαίρας λευκάς, 72 ἐρυθρὰς καὶ 48 μαύρας· θέλει δὲ ἐκ τοῦ καθενὸς εἶδους νὰ σχηματίσῃ ὅσον τὸ δυνατόν περισσοτέρους σωρούς, ἀλλ' οὕτως ὥστε ὁ καθεὶς σωρὸς νὰ ἔχη τὸ αὐτὸ πλῆθος σφαιρῶν· α') πόσους τοιοῦτους σωρούς δύναται νὰ σχηματίσῃ; β') ἐκ πόσων σφαιρῶν θ' ἀποτελεῖται καθεὶς σωρὸς; 1%.

4) Ἐὰν δύο ἀριθμοὶ εἶνε πρῶτοι, π. χ. οἱ 5 καὶ 7, θὰ εἶνε καὶ πρῶτοι πρὸ ἀλλήλους. Διατί;

5) Ἰσχύει αὐτὸ καὶ διὰ περισσοτέρους ἀριθμούς; Διατί;

§ 33. Ἐλάχιστον κοινὸν πολλαπλάσιον.—

α') Ἐν παιδίῳ λαμβάνει ἀπὸ σήμερον ἀνὰ 4 ἡμέρας χρήματα ἀπὸ τὸν πατέρα του ἐπίσης ἀπὸ τὴν μητέρα του ἀπὸ σήμερον, ἀλλὰ ἀνὰ 6 ἡμέρας. Μετὰ πόσας ἡμέρας θὰ λάβῃ πάλιν χρήματα κατὰ τὴν αὐτὴν ἡμέραν καὶ ἀπὸ τοὺς δύο;

Ἐπειδὴ ἀπὸ τὸν πατέρα του θὰ λάβῃ τὴν 4ην, 8ην, 12ην, ... ἡμέραν ἀπὸ σήμερον, καὶ ἀπὸ τὴν μητέρα του τὴν 6ην, 12ην, 18ην, .. συναγομένῳ, τὴν δωδεκάτην ἡμέραν ἀπὸ σήμερον θὰ λάβῃ χρήματα καὶ ἀπὸ τοὺς δύο διὰ πρώτην φοράν ἐκτὸς τῆς σημερινῆς.

Εἰς τὸ πρόβλημα αὐτὸ πρόκειται νὰ εὗρωμεν τὸν μικρότερον ἀριθμὸν, εἰς τὸν ὅποιον ὁ 4 καὶ ὁ 6 χωροῦν ἀκριβῶς. Τοὺς ἀριθμοὺς εἰς τοὺς ὁποίους ὁ 4 καὶ ὁ 6 χωροῦν ἀκριβῶς καλοῦμεν κοινὰ πολλαπλάσια τῶν 4 καὶ 6. Τὸ μικρότερον ἐκ τῶν κοινῶν πολλαπλάσιων τῶν 4 καὶ 6 λέγεται ἐλάχιστον κοινὸν πολλαπλάσιον τῶν 4 καὶ 6.

β') Ἐν γένει, «καλοῦμεν ἐλάχιστον κοινὸν πολλαπλάσιον δύο ἢ περισσοτέρων ἀριθμῶν τὸν μικρότερον ἐκ τῶν ἀριθμῶν εἰς τοὺς ὁποίους οἱ δοθέντες χωροῦν ἀκριβῶς».

Θὰ παριστάνωμεν τὸ ἐλάχιστον κοινὸν πολλαπλάσιον πρὸς συντομίαν διὰ τοῦ ἐ.κ.π.

γ') Εὐρεσις τοῦ ἐ.κ.π. διὰ πολλαπλασιασμοῦ. Ἔστωσαν οἱ ἀριθμοὶ $5 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 10$, τῶν ὁποίων ζητοῦμεν τὸ ἐ.κ.π. Παρατηροῦμεν ἂν ὁ μεγαλύτερος αὐτῶν, ὁ 10, διαιρῆται διὰ καθενὸς τῶν ἄλλων. Καὶ ἂν μὲν διαιρῆται, αὐτὸς θὰ εἶνε τὸ ἐ.κ.π. τῶν δοθέντων ἀριθμῶν, εἰ δὲ μὴ, δοκιμάζομεν τὸ διπλάσιον (20), τὸ τριπλάσιον (30)...μέχρις ὅτου εὐρωμεν ἀριθμὸν, ὁ ὁποῖος νὰ διαιρῆται διὰ καθενὸς τῶν δοθέντων. Ὁ ἀριθμὸς 210, τὸν ὁποῖον πρῶτον θὰ εὐρωμεν τοιοῦτοτρόπως, θὰ εἶνε τὸ ἐ.κ.π. τῶν δοθέντων ἀριθμῶν. Ὅμοίως διὰ τοὺς ἀριθμοὺς $2 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6$ εὐρίσκομεν ἐ.κ.π. αὐτῶν τὸν 60.

Ὁ τρόπος αὐτὸς τῆς εὐρέσεως τοῦ ἐ.κ.π. λέγεται καὶ μέθοδος διὰ πολλαπλασιασμοῦ.

δ') Εὐρεσις τοῦ ἐ.κ.π. δι' ἀναλύσεως εἰς πρώτους παράγοντας.

Ἔστω ὅτι θέλομεν νὰ εὐρωμεν τὸ ἐ.κ.π. τῶν ἀριθμῶν $8 \cdot 18 \cdot 24$. Ἀναλύομεν καθένα αὐτῶν εἰς γινόμενον πρώτων παραγόντων, ὅτε λαμβάνομεν $8 = 2 \times 2 \times 2 = 2^3$, $18 = 2 \times 3 \times 3 = 2 \times 3^2$, $24 = 2 \times 2 \times 2 \times 3 = 2^3 \times 3$. Παρατηροῦμεν ὅτι, ἀφοῦ ὁ ζητούμενος ἀριθμὸς πρέπει νὰ διαιρῆται διὰ τοῦ $8 = 2 \times 2 \times 2$, πρέπει νὰ ἔχη τὸ γινόμενον $2 \times 2 \times 2$. Ἐπίσης διὰ νὰ διαιρῆται διὰ τοῦ 18, πρέπει νὰ περιέχη τὸ γινόμενον $2 \times 3 \times 3$. Διὰ τοῦτο πρέπει εἰς τοὺς παράγοντας τοῦ $2 \times 2 \times 2$, νὰ παραθέσωμεν καὶ τοὺς παράγοντας τοῦ 3×3 . ὅτε λαμβάνομεν, ὅτι ὁ ζητούμενος ἀριθμὸς πρέπει νὰ περιέχη τὸ γινόμενον $2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3$. Ἐπειδὴ ὁ ζητούμενος ἀριθμὸς πρέπει νὰ διαιρῆται καὶ διὰ τοῦ $24 = 2 \times 2 \times 2 \times 3$, πρέπει νὰ περιέχη τὸ γινόμενον τοῦτο $2 \times 2 \times 2 \times 3$, τὸ ὁποῖον πράγματι περιέχει. Ἄρα τὸ $2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3$, εἶνε ἀριθμὸς διαιρητὸς διὰ τῶν δοθέντων· εἶνε δὲ καὶ τὸ ἐ.κ.π. αὐτῶν. Διότι οὐδεὶς ἄλλος ἀριθμὸς μικρότερός του διαιρεῖται καὶ διὰ τῶν τριῶν ἀριθμῶν $8 \cdot 18 \cdot 24$. Ὡστε τὸ ζητούμενον ἐ.κ.π. εἶνε ὁ 72.

ε') Καθ' ὅμοιον τρόπον ἐργαζόμενοι, δυνάμεθα νὰ εὐρωμεν τὸ ἐ.κ.π. οἰωνδήποτε ἄλλων ἀριθμῶν. Π.χ. διὰ τοὺς ἀριθμοὺς $5 \cdot 35 \cdot 80 \cdot 120$ ἔχομεν $5 = 5$, $35 = 5 \times 7$, $80 = 2^4 \times 5$, $120 = 2^3 \times 3 \times 5$.

Τὸ δὲ ἐ.κ.π. αὐτῶν εἶνε τὸ $2^4 \times 3 \times 5 \times 7 = 1680$.

στ') Ἐκ τούτων συνάγομεν ὅτι, ἐὰν νὰ εὐρωμεν τὸ ἐ.κ.π. ὁσωνδήποτε ἀριθμῶν, ἀναλύομεν καθένα τούτων εἰς γινόμενον παραγόντων πρώτων ἀκολουθῶν σχηματίζομεν τὸ γινόμενον τῶν κοινῶν καὶ

μη κοινῶν παραγόντων τῶν γινομένων τούτων, καθενὸς λαμβανομένου μὲ τὸν μέγιστον ἐκθέτην».

ζ') Ὅταν οἱ δοθέντες ἀριθμοὶ δὲν εἶνε πολὺ μεγάλοι, ἀποφεύγομεν τὴν ἀνάλυσιν καθενὸς ἐξ αὐτῶν εἰς γινόμενον πρώτων παραγόντων, ἀλλ' ἐργαζόμεθα συνήθως ὡς ἐξῆς πρὸς εὕρεσιν τοῦ ἐ. κ. π.

Ἐστω ὅτι ζητοῦμεν τὸ ἐ.κ.π. τῶν ἀριθμῶν 3·5·9·12·16.

Εὕρισκομεν τὸν μικρότερον πρώτον ἀριθμὸν, ὃ ὁποῖος διαιρεῖ τοῦλάχιστον δύο ἐξ αὐτῶν. Διαιροῦμεν δι' αὐτοῦ ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι διαιροῦνται καὶ ὑποκάτω καθενὸς τούτων γράφομεν τὰ ἀντίστοιχα πηλίκα τῶν διαιρέσεων, κάτωθεν δὲ τῶν ἄλλων αὐτοὺς τοὺς ἰδίους ἀριθμοὺς. Ἐπὶ τῶν νέων ἀριθμῶν ἐργαζόμεθα ὁμοίως καὶ οὕτω καθεξῆς μέχρις ἔτου εὕρωμεν σειρὰν ἀριθμῶν ἐκ μονάδων ἀποτελουμένην, ἢ καὶ ἐκ τοιούτων, ὥστε νὰ μὴ ὑπάρχη εἰς πρώτος ἀριθμὸς, ὃ ὁποῖος νὰ διαιρῆ τοῦλάχιστον δύο ἐξ αὐτῶν. Τοὺς ἐκάστοτε εὕρισκομένους διαιρέτας, καθὼς καὶ τοὺς ἀριθμοὺς τῆς τελευταίας σειρᾶς ἐκτὸς τῆς μονάδος, γράφομεν εἰς στήλην, κειμένην ἀριστερὰ τῶν δοθέντων ἀριθμῶν, ἀπὸ τῶν ὁποίων χωρίζεται διὰ γραμμῆς κατακορύφου.

Κατὰ ταῦτα ἔχομεν

2	3·	5·	9·	12·	16·
2	3·	5·	9·	6·	8·
3	3·	5·	9·	3·	4·
3	1;	5·	3·	1·	4·
4					
5					

Τὸ ἐ.κ.π. τῶν ἀνωτέρω δοθέντων ἀριθμῶν εἶνε τὸ γινόμενον $2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 4 \times 5$ ἢ τὸ $2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 5 = 720$.

Ὅμοίως πρὸς εὕρεσιν τοῦ ἐ. κ. π. τῶν ἀριθμῶν 7·12·15·27·35·40·45 ἔχομεν

2	7·	12·	15·	27·	35·	40·	45·
2	7·	6·	15·	27·	35·	20·	45·
3	7·	3·	15·	27·	35·	10·	45·
3	7·	1·	5·	9·	35·	10·	15·
5	7·	1·	5·	3·	35·	10·	5·
7	7·	1·	1·	3·	7·	2·	1·
2	1·	1·	1·	3·	1·	2·	1·
3							

Τὸ ἐ.κ.π. εἶνε τὸ $2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 3 \times 5 \times 7 = 7560$.

Προβλήματα πρὸς λύσιν.

1) Ὅμοιως πρώτη. 1) Νὰ εὑρεθῇ τὸ ἐ. κ. π. τῶν κάτωθι ἀριθμῶν δι' ἀναλύσεως καὶ διὰ πολλαπλασιασμοῦ· α') 8, 9, 6, 12, 15, 20· β') 18, 24, 60, 80· γ') 50, 65, 16, 6.

2) Ὅμοιως τῶν α') 2, 4, 8, 14· β') 6, 12, 5, 16, 10· γ') 8, 12, 16, 5, 6· δ') 7, 2, 4, 6, 8· ε') 8, 6, 9, 12, 25, 30.

3) Νὰ εὑρεθῇ τὸ ἐ. κ. π. καὶ ὁ μ. κ. ε. τῶν ἀριθμῶν α') 240, 360, 144, 6648· β') 280, 644, 600, 1024, 1800· γ') 3700, 72, 130, 366· δ') 770, 2420, 3850.

4) Τὸ ἐ. κ. π. ἀριθμῶν πρώτων εἶνε τὸ γινόμενόν των. Διατί;

5) Τὸ ἐ. κ. π. δύο ἀριθμῶν πρώτων πρὸς ἀλλήλους εἶνε τὸ γινόμενόν των. Διατί;

6) Τὸ ἐ. κ. π. δύο ἀριθμῶν, ἐκ τῶν ὁποίων ὁ εἰς διαιρεῖται διὰ τοῦ ἄλλου, εἶνε ὁ μεγαλύτερος ἐκ τούτων. Ἀληθεύει τοῦτο καὶ διὰ περισσοτέρους ἀριθμοὺς καὶ διατί;

7) Ἐκ τοῦ λιμένος Πειραιῶς ἀναχωρεῖ ἀνὰ 7 ἡμέρ. ἀτμόπλοισιν διὰ Βόλον· πάντοτε ἀνὰ 3 ἡμ. ἄλλο διὰ Σπέτσας καὶ ἄλλο ἀνὰ 2 δι' Ἰτέαν. Ἐὰν μίαν Κυριακὴν συμπέσῃ ἢ ἀναχώρησις τριῶν ἀτμοπλοίων ἐκ Πειραιῶς διὰ Βόλον, Σπέτσας, Ἰτέαν, πότε πάλιν θὰ συμπέσῃ ἢ πρώτη κοινὴ ἀναχώρησις; (42 ἡμ.).

8) Ὁ Α καὶ ὁ Β ἀρχίζουν νὰ κτυποῦν ἐπὶ διαφόρων ὀργάνων συγχρόνως· Ὁ Α ἐπαναλαμβάνει τὸν κτύπον ἀνὰ 8' (9'), ὁ δὲ Β ἀνὰ 12' (15')· μετὰ πόσα λεπτὰ θὰ κτυπήσουν συγχρόνως πάλιν διὰ δευτέραν φοράν; 24 (45).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΙΧ.

Περὶ τῶν δεκαδικῶν ἀριθμῶν.

§ 34. Οἱ δεκαδικοί ἀριθμοί. —

α') Μίαν σπουδαίαν ἐπέκτασιν τοῦ δεκαδικοῦ συστήματος τῶν ἀριθμῶν εἰσήγαγεν ὁ μαθητικὸς *Simon Stevin* (1585).

Διὰ τὴν ἐννοήσωμεν αὐτήν, ἄς φαντασθῶμεν μίαν μονάδα, π. χ. ἓν μῆλον, χωρισμένον εἰς 10 ἴσα μέρη καὶ ἄς ὀνομάσωμεν ἓν τοιοῦτον μέρος ἓν δέκατον· ἄς σχηματίσωμεν δὲ ἓνα ἀριθμὸν ὄχι μόνον ἐκ τῶν μέχρι τοῦδε γνωστῶν μονάδων τῶν διαφορῶν τάξεων, τὰς ὁποίας παρεστήσαμεν διὰ τῶν Μ, Δ, Ε, Χ, ... ἀλλὰ καὶ ἐκ δεκάτων, τὰ ὁποῖα θὰ σημειώνωμεν διὰ τοῦ δ. Οὕτω ὁ νέος ἀριθμὸς θὰ σχηματισθῆ, καθὼς οἱ μέχρι τοῦδε γνωστοί, δηλαδή πάντοτε 10 μονάδες μιᾶς τάξεως ἀποτελοῦν μίαν μονάδα τῆς ἀμέτως ἀνωτέ-

ΕΔΜδ

ρας τάξεως. Π. χ. εἰς τὸν ἀριθμὸν 5356 τὰ 10 δέκατα ἀποτελοῦν μία μονάδα, αἱ 10 μονάδες μίαν δεκάδα κ. ο. κ.

β') Συμφώνως πρὸς τὴν ἀρχὴν αὐτήν, δυνάμεθα νὰ διαιρέσωμεν ἓν δέκατον εἰς 10 ἴσα μέρη. Ἐν τοιοῦτον μέρος καλοῦμεν ἑκατοστὸν καὶ σημειώνομεν αὐτὸ διὰ τοῦ ε. Σχηματίζομεν δὲ ἓνα ἀριθμὸν ὄχι μόνον ἐκ τῶν μέχρι τοῦδε γνωστῶν μονάδων, ἀλλὰ καὶ ἐκ δεκάτων καὶ ἑκατοστῶν. Ἐπίσης καὶ οἱ τοιοῦτοι ἀριθμοὶ θὰ σχημα-

ΔΜδ ε ε

τίζονται, ὡς οἱ μέχρι τοῦδε. Π. χ. εἰς τὸν ἀριθμὸν 2303 τὰ 10 ἀπο-

δ δ Μ Μ

τελοῦν 1, τὰ 10 ἀποτελοῦν 1, αἱ 10 μίαν δεκάδα κ. ο. κ.

γ') Ἐὰν οὕτω ἐξακολουθήσωμεν, δυνάμεθα τὸ ἓν τῶν 10 ἴσων μερῶν ἑνὸς ἑκατοστοῦ νὰ καλέσωμεν χιλιοστὸν, τὸ ἓν τῶν 10 ἴσων μερῶν τοῦ χιλιοστοῦ δέκατον τοῦ χιλιοστοῦ κ. ο. κ., νὰ σχηματίσωμεν δὲ ἀριθμούς, ἀκριβῶς ὅπως τοὺς μέχρι τοῦδε γνωστούς. Τὰς νέας αὐτὰς μονάδας (δέκατον, ἑκατοστὸν, χιλιοστὸν, δέκατον χιλιοστοῦ, ἑκατοστὸν χιλιοστοῦ, ἑκατομμυριοστὸν, ...) καλοῦμεν δεκαδικὰς μονάδας, τοὺς δὲ νέους ἀριθμούς, δεκαδικούς ἀριθμούς, ἐνῶ τοὺς μέχρι τοῦδε γνωστούς ἀκεραίους.

§ 33. Περὶ γραφῆς καὶ ἀπαγγελίας τῶν δεκαδικῶν ἀριθμῶν.—

α) Δυνάμεθα νὰ γράψωμεν τοὺς δεκαδικοὺς ἀριθμοὺς συμφώνως πρὸς τὴν γραφὴν τῶν ἀκεραίων, ἐὰν θέσωμεν ὡς ἀρχήν, ὅτι δεξιὰ τῶν ἀπλῶν μονάδων καὶ εἰς τὴν πρώτην θέσιν θὰ γράψωμεν τὰ δέκατα, εἰς τὴν δευτέραν θέσιν τὰ ἑκατοστά, εἰς τὴν τρίτην τὰ χιλιοστά κ. ο. κ.

Εἶνε φυσικόν, ὅτι πρέπει νὰ γνωρίζωμεν, ποῖα θέσις ἀντιστοιχεῖ εἰς τὰς ἀπλᾶς μονάδας καὶ πρὸς διάκρισιν γράφομεν μεταξὺ τῶν ἀπλῶν μονάδων καὶ τῶν δεκάτων ἐν κόμμα (,). Κατὰ ταῦτα ὁ

Δ Μ δε

ἀριθμὸς 6347 θὰ γραφῆ οὕτω 63,47. Ἐὰν ὁ δοθεὶς ἀριθμὸς δὲν ἔχη ἀκεραίας μονάδας, γράφομεν εἰς τὴν θέσιν τῶν 0.

δεχ

Π. χ. ὁ ἀριθμὸς 372 γράφεται οὕτω 0,372.

β) Ἡ ἀπαγγελία δεκαδικοῦ ἀριθμοῦ, π. χ. τοῦ 23,407 δύναται νὰ γίνῃ κατὰ τρεῖς τρόπους κυρίως. 1) λέγομεν 23 ἀκέραϊος, 4 δέκατα, καὶ 7 χιλιοστά· ἤτοι ἀπαγγέλλομεν χωριστὰ τὸν ἀκέραϊον καὶ ἔπειτα καθὲν δεκαδικὸν ψηφίον σημαντικὸν μὲ

δεχ

τὸ ὄνομα τῶν μονάδων, τὰς ὁποίας παριστάνει. 2) ἐπειδὴ 407 εἶνε ἴσον μὲ 407 χιλιοστά (διότι ἐν δέκατον ἔχει 100 χιλιοστά), λέγομεν 23 ἀκέραϊος καὶ 407 χιλιοστά. Ἡτοι ἀπαγγέλλομεν χωριστὰ τὸν ἀκέραϊον καὶ χωριστὰ τὸ δεκαδικὸν μέρος, ὀνομάζοντες αὐτὸ μὲ τὸ ὄνομα τῶν μονάδων τῆς τάξεως τοῦ τελευταίου δεκαδικοῦ ψηφίου. 3) Ἐπειδὴ αἱ 23 μονάδες ἔχουν 230 δέκατα,

δ ε ε χ

τὰ 230=2300 καὶ τὰ 2300=23000, ἔπεται ὅτι ὁ ἀριθμὸς 23,407 εἶνε ἴσος μὲ 23407 χιλιοστά· ἀπαγγέλλομεν λοιπὸν εἴκοσι τρεῖς χιλιάδες τετρακόσια ἑπτὰ χιλιοστά. Ἡτοι ἀπαγγέλλομεν ὁλόκληρον τὸν ἀριθμὸν ὡς νὰ ἦτο ἀκέραϊος, ὀνομάζοντες αὐτὸν μὲ τὸ ὄνομα τῶν μονάδων τῆς τάξεως τοῦ τελευταίου δεκαδικοῦ ψηφίου του.

Ἐὰν ὁ ἀριθμὸς ἔχη πολλὰ δεκαδικὰ ψηφία, συνήθως ἀπαγγέλλομεν αὐτὰ κατὰ τμήματα τριψήφια ἐξ ἀριστερῶν, εἰς καθὲν δὲ τούτων προσαρτῶμεν τὸ ὄνομα τῶν μονάδων τοῦ τελευταίου του ψηφίου. Π.χ. τὸν ἀριθμὸν 48,0426289 ἀπαγγέλλομεν ὡς ἐξῆς· 48 ἀκέραϊος, 42 χιλιοστά, 628 ἑκτομμυριοστά καὶ 9 δέκατα ἑκτομμυριστοῦ.

Ἀσκήσεις.

1) Νὰ γραφοῦν οἱ ἐπόμενοι δεκαδικοὶ ἀριθμοὶ α') 7 ἀκέρατος, 8 δέκατα, 6 ἑκατοστά, 3 χιλιοστά. β') 162 ἀκέρατος, 5 ἑκατοστά, 6 χιλιοστά. γ') 6 ἑκατοστά, 9 χιλιοστά, 7 ἑκατοστὰ χιλιοστοῦ.

ε χ δ χ δ χ δ ε

δ') 9, 6, 3· ε') 6, 9, 7, 3.

2) Νὰ γραφοῦν οἱ ἀριθμοί· α') 64 δέκατα· β') 627 ἑκατοστά· γ') 995 χιλιοστά· δ') 863 δέκατα χιλιοστοῦ.

Μ δ

Ε δ

3) Νὰ τραποῦν α') 96 εἰς ἑκατοστά. β') 96 εἰς δέκατα.

Μ Δ Ε

ε Μ Δ

γ') 653 εἰς δέκατα δ') 843 εἰς χιλιοστά.

4) Ν' ἀπαγγελθῆ καθεὶς τῶν ἐπομένων ἀριθμῶν κατὰ τρεῖς τρόπους καὶ νὰ ὀρισθῆ ἡ σημασία καθενὸς ψηφίου ἐκ τῆς θέσεώς του.

α') 0,385· β') 29,084· γ') 249,3435· δ') 0,00684.

5) Μεταβάλλεται ἡ ἀξία ἐνὸς δεκαδικοῦ ἀριθμοῦ, π. χ. τοῦ 4, 5 ἂν εἰς τὴν ἀρχήν, ἢ εἰς τὸ τέλος τοῦ γράψωμεν μηδενικά;

6) Πᾶς ἀκέρατος ἀριθμὸς γράφεται ὡς δεδικὸς μὲ δεσadhήποτε δεδικὰ ψηφία. Π. χ. $5 = 5,000$ · $26 = 26,000$.

Γράψατε τοὺς α') 38· β') 48· γ') 369 ὑπὸ δεκαδικὴν μορφήν.

7) Νὰ μεταφερθῆ ἡ ὑποδιαστολὴ τοῦ ἀριθμοῦ 96,5937 μίαν θέσιν πρὸς τὰ δεξιὰ καὶ νὰ ὀρισθῆ ἡ ἀξία καθενὸς ψηφίου ἐκ τῆς νέας θέσεώς του· ἐπίσης δύο, τρεῖς... θέσεις πρὸς τὰ δεξιὰ τοῦ αὐτοῦ ἀριθμοῦ, καὶ νὰ ὀρισθῆ ἡ ἀξία καθενὸς ψηφίου εἰς τοὺς νέους ἀριθμοὺς. Τὸ αὐτὸ νὰ γίνῃ καὶ εἰς τοὺς ἀριθμοὺς α') 8,1347· β') 0,965· γ') 0,007.

§ 36. Πρόσθεσις. —

Καθὼς εἰς τοὺς ἀκεραίους ἀριθμοὺς, οὕτω καὶ εἰς τοὺς δεκαδικούς δύναται νὰ δοθῆ τὸ πρόβλημα.

«Δοθέντων δύο ἢ περισσοτέρων δεκαδικῶν ἢ καὶ ἀκεραίων ἀριθμῶν, ζητεῖται νὰ εὑρεθῆ ἄλλος, περιέχων πάσας τὰς μονάδας τῶν δοθέντων καὶ μόνον αὐτάς».

Δυνάμεθα νὰ λύσωμεν αὐτὸ ἀκριβῶς ἔπως ὅταν ἔχωμεν ἀκεραίους, γράφοντες τὴν ὑποδιαστολὴν εἰς τὸ ἄθροισμα, ὅταν τὴν συναντήσωμεν κατὰ τὴν πρόσθεσιν. Π. χ. ἂν οἱ προσθετέοι εἶνε 8,34 δρ. καὶ 6,87 δρ. γράφομεν τὸν ἕνα ὑπὸ τὸν ἄλλον, ὥστε αἱ μονάδες τῆς αὐτῆς τάξεως νὰ εὑρίσκωνται εἰς τὴν αὐτὴν κατακόρυφον

στήλην και προσθέτομεν λέγοντες· 7 και 4=11· γράφομεν 1 και κρατοῦμεν 1· 1 και 8=9, 9 και 3=12· γράφομεν 2 και κρατοῦμεν 1· γράφομεν τὸ κόμμα· 1 και 6=7 και 8=15, γράφομεν τὸ 15.

Ὡστε τὸ ἄθροισμα εἶνε 1521 ἑκατοστὰ δραχμῆς.

$$\begin{array}{r} 8,34 \\ 6,87 \\ \hline 15,21 \end{array}$$

Προβλήματα πρὸς λύσιν.

Ὅμας πρώτη. 1) Νὰ εὑρεθοῦν τὰ ἄθροίσματα· α') $2,837 + 18 + 16,13 + 0,343$. β') $3,815 + 35,61 + 6286 + 130,5 + 83,02$. γ') $0,31 + 3,167 + 0,12 + 9,11$.

2) Ὅμοιως νὰ γίνουν αἱ προσθέσεις μετὰ τῶν δοκιμῶν των· α') $6,2 + 9,3 + 0,36 + 8 + 0,92$. β') $63 + 8,56 + 3,64 + 7,8 + 8,61$. γ') $0,3 + 5,69 + 7,56 + 8,6 + 2,1389$. δ') $1850 + 0,386 + 0,0073 + 1546 + 4,7 + 3,06 + 17,04093$.

Ὅμας δευτέρα. 1) Ἐμπορος εἰσπράττει κατὰ τὸν Μάρτιον 3864,25 (1225,34) δρ., τὸν Ἀπρίλιον 2864,01 (1365,1) δρ., τὸν Μάϊον 3925 (1521,34) δρ. και τὸν Ἰούνιον 3877,7 (1526) δρ. πόσα εἰσέπραξεν ἐν ἔλῳ; 14530,96 (5637,78).

2) Ἐκ τριῶν κεφαλαίων τὸ α' εἶδει τόκον 125,34 (1825,26) δρ., τὸ β' 385,9 (2485,6) δρ., τὸ δὲ γ' 1675,3 (5721,34) δρ. πόσος εἶνε ὁ ὀλίκος τόκος; 2186,54 (10032,2).

Ὅμας τρίτη. 1) Ἐμπορος ἀγοράζει ἐμπορεύματα ἀντὶ 1846,5 (2877,27) δρ., πωλεῖ δὲ αὐτὸ 375,12 (874,64) δρ. ἀκριώτερον. Ἄντι πόσων δραχμῶν τὸ ἐπώλησε; 2221,62 (3751,91).

2) Ἐμπορος πωλεῖ ἐμπορεύματα ἀντὶ 28426,45 (49811,45) δρ. με ζημίαν 825,11 (6345,51) δρ. ἀντὶ πόσων δραχμῶν τὸ ἠγόρασε; 29251,56 (56156,96).

3) Τὸ καθαρὸν βᾶρος ἐμπορεύματος εἶνε 123,45 (217,48) ὀκ., τὸ δὲ ἀπόδαρον 6,04 (9,423) ὀκ. πόσον εἶνε τὸ μίκτον βᾶρος; 129,49 (226,903).

Ὅμας τετάρτη. 1) Οἱ τόποι Α, Β, Γ, Δ κείνται ἐπ' εὐθείας γραμμῆς. Ἡ ἀπόστασις ΑΒ εἶνε 3,146 (8,076) χμ., ἡ ΒΓ 2,38

(6,345)χμ., ἢ ΓΔ 5,3 (8,12) χμ.· πόση εἶνε ἡ ΑΓ; ἢ ΑΔ; καὶ ΒΔ;
5,526 (14,421)· 10,826 (22,541)· 7,68 (14,165).

2) Δύο τόποι κείνται ἐκατέρωθεν πόλεως καὶ ἐπ' εὐθείας γραμμῆς μετ' αὐτῆς· πόσον ἀπέχουν μεταξύ των, ἐὰν ὁ εἰς ἀπέχη αὐτῆς 4,347 χμ., ὁ δὲ ἄλλος 2,42 χμ; 6,767.

Οὐμὰς πέμπτη. 1) Κατὰ τινα πρωΐαν ἡ θερμοκρασία ἦτο 16,5° (8,4°), ἀνῆλθε δὲ μέχρι τῆς μεσημβρίας κατὰ 5,1° (4,2°)· πόση ἦτο τὴν μεσημβρίαν; 21,6° (12,6°).

2) Ἐμπορος εἰσπράττει εἰς ἓν ἔτος 36854,21 (125943,12) δρ., εἰς τὸ ἐπόμενον 3758,21 (42896,56) δρ. περισσότερα· τὸ ἐπόμενον 6815,39 (431,79) δρ. περισσότερα, ἢ ὅσον τὸ α' καὶ β' ὁμοῦ· πόσα εἰσέπραξεν ἐν ὄλῳ; 161748,65 (589997,39).

3) Τέσσαρες τόποι Α, Β, Γ, Δ κείνται ἐπ' εὐθείας ὁδοῦ. Ἡ ἀπόστασις ΑΒ εἶνε 3,845 (6,123) χμ.· ἢ ΒΓ 3,122 (4,38) χμ. μεγαλύτερα τῆς προηγούμενης· ἢ ΓΔ 5,385 (6,122) χμ. μεγαλύτερα τῆς ΑΓ· πόση εἶνε ἡ ΑΔ; 27,009 (39,374).

§ 37. Ἀφαίσεις.—

Ὅπως εἰς τοὺς ἀκεραίους οὕτω καὶ ἐνταῦθα δυνάμεθα νὰ λύσωμεν τὸ πρόβλημα· «δοθέντος ἐνὸς δεκαδικοῦ ἀριθμοῦ νὰ ἐλαττώσωμεν, αὐτὸν κατὰ τὰς μονάδας ἄλλου».

Ἡ πράξις διὰ τῆς ὁποίας λύεται τὸ πρόβλημα τοῦτο λέγεται ἀφαίσεις καὶ γίνεται καθὼς καὶ τῶν ἀκεραίων. Πρὸς τοῦτο γράφομεν τὸν ἀφαιρετέον ὑπὸ τὸν μειωτέον εἰς τρόπον, ὥστε τὰ ψηφία τῆς αὐτῆς τάξεως νὰ εὑρίσκωνται εἰς τὴν αὐτὴν στήλην καὶ ἡ ὑποδιαστολὴ ὑπὸ τὴν ὑποδιαστολὴν. Κατὰ τὴν ἀφαίρεσιν γράφομεν εἰς τὸ ὑπόλοιπον τὴν ὑποδιαστολὴν ἅμα τὴν συναντήσωμεν. Οὕτω ἐὰν ἔχωμεν τὴν ἀφαίρεσιν 18,832—7,84 γράφομεν

$$\begin{array}{r} 18,832 \\ - 7,84 \\ \hline 10,992 \end{array}$$

καὶ λέγομεν· κάτω τὸ 2, καὶ γράφομεν αὐτὸ ὑπὸ τὴν γραμμὴν εἰς τὴν στήλην τοῦ 2· 4 ἀπὸ 3 δὲν ἀφαιρεῖται, 4 ἀπὸ 13=9· γράφομεν τὸ 9· 1 καὶ 8=9, ἀπὸ 8 δὲν ἀφαιρεῖται, ἀπὸ 18=9· γράφομεν τὸ 9· γράφομεν τὸ κόμμα· 1 καὶ 7=8, ἀπὸ 8=0· γράφομεν τὸ 0 κάτω τοῦ 1· γράφομεν 1. Ὡστε τὸ ὑπόλοιπον εἶνε 10,992.

Ἀσκήσεις καὶ προβλήματα.

Ὅμας πρώτη. 1) Νὰ ἐκτελεσθοῦν αἱ ἐπόμεναι ἀφαιρέσεις μετὰ τῶν δοκιμῶν των· α') $13,2 - 0, 1$. β') $184, 34 - 167, 95$. γ') $1,345 - 0, 467$. δ') $33,3 - 29, 84$. ε') $12858 - 999,88$. στ') $185 - 129,121$. ζ') $386, 1 - 123,147$. η') $13, 04 - 5,68214$.

2) Ἀπὸ τὸ $278,45 + 3,172$ ν' ἀφαιρεθῆ $1,1846 + 264,4374$.

3) Ἀπὸ τὸν ἀριθμὸν $76,46$ ν' ἀφαιρεθῆ $0, 485$ καὶ ἐκ τοῦ ὑπολοίπου $0, 913$ καὶ πάλιν $0, 13, 001$. 56, 061.

4) Ἀπὸ τὸν $83,126 - 9$ ν' ἀφαιρεθῆ ἡ διαφορά $7,14 - 6,458$. 73,444.

Ὅμας δευτέρα. 1) Εἰσπράττει τις $7856,25$ ($3904, 85$) δρ. καὶ ἐξοδεύει ἀμέσως $487,30$ ($1040,65$) λαμβάνει πάλιν $4976,34$ ($5807,38$) δρ. καὶ ἐξοδεύει $417,87$ ($334,58$) δρ. πόσα του μένουν; (Νὰ λυθῆ κατὰ δύο τρόπους). 11927,42 (8337).

2) Ἔχει τις περιουσίαν $26418,56$ ($43189,51$ δρ. καὶ ἐξοδεύει πρῶτον $477, 38$ ($125,68$) δρ., ἔπειτα πάλιν $5218, 97$ ($1875, 36$) δρ. καὶ τέλος $387,41$ ($217,77$) δρ. πόσα τοῦ ἔμειναν; (Νὰ λυθῆ κατὰ δύο τρόπους). 20334,80 (40970,70).

Ὅμας τρίτη. 1) Ἐμπορὸς ἀγοράζει ἐμπορεύματα ἀντὶ $311, 46$ ($217,57$) δρ., πωλεῖ δὲ αὐτὰ ἀντὶ $337,96$ ($238,44$) δρ. πόσα κερδίζει; 26,5(20,87).

2) Πωλήσας τις ἐμπορεύματα ἀντὶ $468,12$ ($517, 34$) δρ. ἐκέρδισε $59, 34$ ($48,56$) δρ. ἀντὶ πόσων δραχμῶν τὰ ἠγόρασε; $408,78$ ($468,78$).

3) Ἀγοράζει τις ἐμπορεύματα ἀντὶ $7846,12$ ($3819,02$) δρ., πωλεῖ δὲ αὐτὰ ἀντὶ $7211,84$ ($3798,64$) πόσα ἐζημιώθη; $634,28$ ($20,38$).

Ὅμας τετάρτη. 1) Ἐκ δύο τόπων Α καὶ Β, οἱ ὅποιοι ἀπέχουν μετὰξὺ των $45,126$ ($83,457$) χμ., ἀναχωροῦν δύο ἀμαξοστοιχίαι πρὸς τὴν φορὰν Α Β. Ἡ ἐκ τοῦ Α ἀναχωροῦσα διανύει $60,48$ ($58,64$) χμ., ἡ δ' ἐκ τοῦ Β $45,17$ ($40,856$) χμ. τὴν ὥραν· πόση θὰ εἶνε ἡ ἀπόστασις των μετὰ 1 ὥραν; 29,816 (65,673).

2) Από το άθροισμα $13,12 + 8,416$ ν' αφαιρεθῆ ἡ διαφορά $25 - 23,84$. 20,376.

3) Από τὸν $930,6$ ($6,72$) ν' αφαιρεθῆ ὁ $84,6$ ($0,84$)· ἀπὸ τὸ ὑπόλοιπον πάλιν ὁ $84,6$ ($0,84$) κ.ο.κ. ἐν ὄσῳ εἶνε δυνατόν.

Εἶνε δυνατόν 11 (8) φορές.

4) Αὐξάνω ἕνα ἀριθμὸν κατὰ $38,4$ καὶ εὐρίσκω 126 ποῖος εἶνε ὁ ἀριθμὸς; 87,6.

§ 38. Πολλαπλασιασμοὶ δεκαδικοῦ ἐπὶ ἀκεραίων. —

α') Ὅταν λέγωμεν, ὅτι θέλομεν νὰ πολλαπλασιάσωμεν ἕνα δεκαδικὸν ἀριθμὸν, π.χ. τὸν $4,52$ ἐπὶ $2 \cdot 3 \cdot 4 \dots$, ἐννοοῦμεν, νὰ εὐρωμεν τὸ ἄθροισμα, τὸ ὁποῖον ἔχει δύο, τρεῖς, τέσσαρας, ... προσθετέους ἴσους μὲ τὸν δοθέντα $4,52$. Ὅταν λέγωμεν, νὰ πολλαπλασιάσωμεν ἕνα δεκαδικὸν ἀριθμὸν ἐπὶ 1 , ἢ ἐπὶ 0 , ἐννοοῦμεν νὰ λάβωμεν αὐτὸν τὸν δεκαδικὸν ἀριθμὸν, ἢ τὸ 0 .

β') Ἐστω ὅτι θέλομεν νὰ εὐρωμεν τὸ γινόμενον τοῦ $5,484$ ἐπὶ τὸν 263 · ἦτοι τὸ $5,484 \times 263$. Παρατηροῦμεν ὅτι τὸ $5,484 = 5484$ χιλιοστά. Ὡστε θὰ ἔχωμεν νὰ εὐρωμεν τὸ γινόμενον 5484 χιλιοστά $\times 263$.

Ἀλλὰ τοῦτο εἶνε τὸ γινόμενον τῶν ἀκεραίων ἀριθμῶν 5484 καὶ 263 καὶ παριστάνει χιλιοστά. Δηλαδή 1442292 χιλιοστά $1442,292$.

γ') Ὅθεν, «διὰ νὰ πολλαπλασιάσωμεν δεκαδικὸν ἀριθμὸν ἐπὶ ἀκεραίων, πολλαπλασιάζομεν ὡς νὰ ἦσαν καὶ οἱ δύο ἀριθμοὶ ἀκεραιοί, ἀλλ' εἰς τὸ οὕτω προκύπτον γινόμενον χωρίζομεν τόσα δεκαδικὰ ψηφία ἐκ δεξιῶν πρὸς τὰριστερὰ ὅσα ἔχει ὁ δεκαδικὸς ἀριθμὸς».

Οὕτω καὶ διὰ τὸ ἀνωτέρω παράδειγμα γράφομεν καὶ πολλαπλασιάζομεν, ὅπως τοὺς ἀκεραίους ἀριθμοὺς, χωρίζομεν δὲ εἰς τὸ γινόμενον τρεῖς δεκαδικὰ ψηφία.

$$\begin{array}{r}
 5,484 \\
 \underline{263} \\
 16452 \\
 32904 \\
 10968 \\
 \hline
 1442,292
 \end{array}$$

δ') Ἐάν ὁ πολλαπλασιαστής εἶνε $10 \cdot 100 \cdot 1000 \dots$ ὁ κανὼν εἶνε ἀπλούστερος τοῦ προηγούμενου. Διὰ νὰ πολλαπλασιάσωμεν π. χ. τὸν $0,425 \times 10$ σκεπτόμεθα ὅτι, τὰ 425 χιλιοστὰ δεκάκις λαμβανόμενα γίνονται 425 ἑκατοστὰ $= 4,25$. Ὅμοίως $0,425 \times 100 = 42,5$. Ἐπειδὴ τὸ 1 χιλιοστὸν $\times 100$ γίνεται 1 δέκατον κ. σ. κ.

ε') Ἦτοι, «διὰ νὰ πολλαπλασιάσωμεν δεκαδικὸν ἀριθμὸν ἐπὶ $10 \cdot 100 \cdot 1000 \dots$ ἀρκεῖ νὰ μεταφέρωμεν τὸ κόμμα τοῦ δεκαδικοῦ, μίαν, δύο, τρεῖς, ... θέσεις πρὸς τὰ δεξιά».

στ') Ἐπειδὴ πᾶς ἀκέραιος ἀριθμὸς δύναται νὰ θεωρηθῆ ὡς δεκαδικός, τοῦ ὁποῦ τοῦ δεκαδικὰ ψηφία εἶνε μηδενικά, δύναμεθα νὰ λέγωμεν, γενικῶς, ὅτι:

«ἀριθμὸς πολλαπλασιάζεται ἐπὶ $10 \cdot 100 \cdot 1000 \dots$ ἐὰν μεταφέρωμεν τὴν ὑποδιαστολὴν του μίαν, δύο, τρεῖς, ... θέσεις πρὸς τὰ δεξιά»

Προβλήματα πρὸς λύσιν.

Ὅμας πρώτη. 1) Νὰ πολλαπλασιασθῆ καθεὶς τῶν $5,34 \cdot 6,782 \cdot 0,1234$ ἐπὶ καθένα τῶν μονοψηφίων ἀκεραίων.

2) Νὰ πολλαπλασιασθῆ καθεὶς τῶν $2,37 \cdot 31,58 \cdot 0,8759 \cdot 87,875$ ἐπὶ $25 \cdot 17 \cdot 27 \cdot 39$ ἀντιστοίχως.

3) Νὰ πολλαπλασιασθῆ ὁ $25,135$ ἐπὶ τὸ $125 + 315 + 278$ (κατὰ δύο τρόπους). 18046.93.

4) Νὰ πολλαπλασιασθῆ ὁ $127,123$ ἐπὶ τὸ 38×105 . 507220.77.

5) Νὰ πολλαπλασιασθῆ καθεὶς τῶν $3, 21 \cdot 14, 15 \cdot 0,578$ ἐπὶ $10 \cdot 100 \cdot 1000$.

6) Νὰ πολλαπλασιασθῆ καθεὶς τῶν $1,68 \cdot 2,37 \cdot 13,47 \cdot 0,451 \cdot 0,1237$ ἐπὶ $20 \cdot 70 \cdot 300 \cdot 600 \cdot 700 \cdot 9000$.

Ὅμας δευτέρα. 1) Ἀγοράζει τις 48 (137) ὄκ. ἐμπορεύματος πρὸς 53,4 (60,1) δρ. τὴν ὀκτῶν πόσα πληρώνει; 2563.2 (8233,7).

2) Ἐργάτης λαμβάνει καθ' ἡμέραν 22,5 (35,6) δρ. ὡς ἀμοιβὴν πόσα θὰ λάβῃ εἰς 28 (36) ἡμέρας; 630 (1281,6).

3) Πληρώνει τις καθ' ἡμέραν ἐργασίας 38,5 (45,6) δρ. εἰς καθένα ἐργάτην· πόσα θὰ πληρώσῃ εἰς μίαν ἡμέραν εἰς 85 (72) ἐργάτας;
3272,5 (3283,2).

4) Ἐν κεφάλαιον φέρει ἐτήσιον τόκον 385,56 (475,86) δρ.· πόσον τόκον θὰ φέρῃ εἰς 18 (21) ἔτη;
6940,08 (9993,06).

5) Τὸ γεωγραφικὸν μίλιον ἔχει 7420,44 μ. πόσα μέτρα ἔχουν 325 (634) γεωγρ. μίλια ;
2411643 (4704558,96).

§ 39. Πολλαπλασιασμὸς ἐπὶ δεκαδικὸν ἀριθμὸν. —

α') (Πρόβλημα). «Ἡ ὀκτὰ τοῦ κρέατος τιμᾶται 20 δρ.· πόσον τιμᾶται τὸ 0,1 τῆς ὀκτᾶς αὐτοῦ;»

Εἰς τὸ πρόβλημα αὐτὸ διδεται ἡ τιμὴ τῆς μιᾶς ὀκτᾶς καὶ ζητεῖται ἡ τιμὴ τοῦ ἑνὸς δεκάτου τῆς ὀκτᾶς.

Καὶ τὸ πρόβλημα τοῦτο θὰ λύωμεν διὰ τοῦ πολλαπλασιασμοῦ, καθὼς ἐκεῖνα εἰς τὰ ὁποῖα διδεται ἡ τιμὴ τῆς μιᾶς μονάδος καὶ ζητεῖται ἡ τιμὴ πολλῶν ὁμοειδῶν μονάδων (§ 19). Δηλαδή θὰ πολλαπλασιάσωμεν τὸ 20 δρ. ἐπὶ 0,1. Διὰ νὰ εὐρωμεν τώρα τὸ γινόμενον $20\delta\rho. \times 0,1$ παρατηροῦμεν ὅτι, ἀφοῦ ἡ μία ὀκτὰ ἀξίζει 20 δρ., τὸ ἕν δεκάτον τῆς ὀκτᾶς τὸ ὁποῖον εἶνε δέκα φορὰς ὀλιγώτερον, θ' ἀξίξῃ 10 φορὰς ὀλιγώτερον τῶν 20 δρ., ἦτοι 20 δρ.: 10 = 2 δρ. Διὰ νὰ εὐρωμεν λοιπὸν πόσον ἀξίζει τὸ δεκάτον τῆς μιᾶς ὀκτᾶς, θὰ διαιρέσωμεν τὴν τιμὴν μιᾶς ὀκτᾶς, δηλαδή τὰς 20 δρ. διὰ τοῦ 10 καὶ θὰ λέγωμεν ὅτι τὸ γινόμενον τοῦ $20\delta\rho. \times 0,1$ εἶνε ἴσον μὲ τὸ $20\delta\rho. : 10 = 2\delta\rho.$

Ὁμοίως, ἂν ὁ πῆχυς ἑνὸς ὑφάσματος τιμᾶται 130 δρ., θὰ εὐρωμεν, πόσον τιμᾶται τὸ δεκάτον τοῦ πῆχεως, ἐὰν πολλαπλασιάσωμεν τὸ $130 \times 0,1$ ἦτοι ἐὰν διαιρέσωμεν τὸ 130 δρ.: 10 εὐρίσκομεν = 13 δρ.

Καθ' ὅμοιον τρόπον, ἐὰν ἔχωμεν $18 \times 0,01$ θὰ ἐννοοῦμεν νὰ εὐρωμεν τὸ ἑκατοστὸν τοῦ 18, ἦτοι νὰ διαιρέσωμεν τὸ 18 διὰ τοῦ 100.

β') Ἐν γένει «καλοῦμεν γινόμενον ἑνὸς ἀριθμοῦ ἐπὶ 0,1· 0,01 τὸ δεκάτον, ἑκατοστὸν, .. μέρος τοῦ ἀριθμοῦ τούτου».

γ') (Πρόβλημα). «Ἡ ὀκτὰ ὀσπρίων τιμᾶται 12 δρ.· πόσον τιμᾶνται τὰ 0,4 ὀκτ. ;»

Ἐπειδὴ τὸ τέσσαρα δέκατα εἶνε 4 φορές μεγαλύτερον τοῦ ἑνὸς δεκάτου, ἔπεται ὅτι, ἐὰν εὕρωμεν πόσον τιμᾶται τὸ 0,1 ὄκ., εὐρίσκομεν πόσον τιμῶνται τὰ τέσσαρα δέκατα αὐτῆς, ἂν τὴν τιμὴν τοῦ ἑνὸς δεκάτου πολλαπλασιάσωμεν ἐπὶ 4. Ἄλλ' ἢ τιμὴ τοῦ 0,1 εὐρίσκεται καθῶς εἶδομεν, ἐὰν τὸ 1^ο δρ. πολλαπλασιάσωμεν ἐπὶ 0,1. Ἐπομένως τὴν τιμὴν τῶν 0,4 ὄκ. θὰ εὕρωμεν, ἐὰν τὸ γινόμενον $12 \times 0,1$ πολλαπλασιάσωμεν ἐπὶ 4.

Ἀκριβῶς τὸ αὐτὸ θὰ ἐννοοῦμεν, εἰταν λέγωμεν, νὰ πολλαπλασιασθῇ ὁ ἀριθμὸς 12 ἐπὶ 0,4· δηλαδὴ νὰ εὕρωμεν τὸ δέκατον τοῦ 12 καὶ τοῦτο νὰ πολλαπλασιάσωμεν ἐπὶ 4.

δ') Ἐν γένει, «γινόμενον ἑνὸς ἀριθμοῦ ἐπὶ δεκαδικὸν π. χ. ἐπὶ 3,45 σημαίνει, νὰ εὐρεθῇ μέρος τοῦ δοθέντος ἀριθμοῦ, π. χ. τὸ ἑκατοστὸν ἐδῶ, καὶ τοῦτο νὰ πολλαπλασιασθῇ ἐπὶ 345».

ε') Ἐπειδὴ πᾶς ἀκέραιος ἀριθμὸς, π. χ. ὁ 5, σχηματίζεται ἐκ τῆς μονάδος 1, ἐὰν τὴν ἐπαναλάβωμεν πεντάκις ($1+1+1+1+1=5$), πᾶς δὲ δεκαδικός, π. χ. 3,45 σχηματίζεται ἐκ τῆς 1 ἐὰν λάβωμεν ἕν μέρος τῆς (τὸ ἕν ἑκατοστὸν ἐδῶ) καὶ τὸ ἐπαναλάβωμεν πολλάκις (345 φορές), ἔπεται ὅτι δυνάμεθα νὰ ἔχωμεν τὸν ἐξῆς γενικὸν ὄρισμὸν τοῦ πολλαπλασιασμοῦ.

«Πολλαπλασιασμὸς λέγεται ἢ πρᾶξις, διὰ τῆς ὁποίας δοθέντων δύο ἀριθμῶν σχηματίζεται ἐκ τοῦ πρώτου τρίτος, καθὼς ὁ δεύτερος ἐσχηματίσθη ἐκ τῆς μονάδος».

Ὅστω 8×3 φανερώνει νὰ σχηματίσωμεν ἐκ τοῦ 8 τρίτον ἀριθμὸν, ὅπως ὁ 3 ἐγένεν ἐκ τῆς μονάδος. Ἄλλ' ὁ 3 ἐγένεν ἐκ τῆς 1, ἀφοῦ τὴν ἐπανελάβωμεν τρεῖς φορές ($1+1+1=3$). Ἄρα $8 \times 3 = 8+8+8$.

Ὅμοιως, $2,5 \times 3,4$ σημαίνει νὰ σχηματίσωμεν ἐκ τοῦ 2,5 τρίτον ἀριθμὸν, ὅπως ὁ 3,4 ἐγένεν ἐκ τῆς 1. Ἄλλ' ὁ 3,4 γίνεται ἐκ τῆς 1, ἂν λάβωμεν τὸ δέκατον αὐτῆς καὶ τοῦτο ἐπαναλάβωμεν 34 φορές· ἄρα $2,5 \times 3,4$ φανερώνει νὰ εὕρωμεν τὸ δέκατον τοῦ 2,5 καὶ τοῦτο νὰ ἐπαναλάβωμεν 34 φορές

στ') Ἄς ἴδωμεν τώρα πῶς θὰ εὕρωμεν τὸ δέκατον ἑνὸς ἀριθμοῦ.

Ἐστω ὅτι θέλομεν νὰ εὐρωμεν τὸ δέκατον τοῦ 6,3. Παρατηροῦμεν ὅτι $6,3 = 63$ δέκατα· τῶν δὲ 63 δεκάτων τὸ δέκατον εἶνε 63 ἑκατοστὰ. Ἐπειδὴ τὸ δέκατον ἐνὸς δεκάτου εἶνε ἓν ἑκατοστὸν.

Ἄρα $6,3 \times 0,1 = 63$ ἑκατοστὰ $= 0,63$.

Ὅμοίως τὸ ἑκατοστὸν τῶν 217,5 εἶνε τὸ αὐτὸ μὲ τὸ ἑκατοστὸν τῶν 2175 δεκάτων· ἦτοι 2175 χιλιοστὰ $= 2,175$.

Ως βλέπομεν, «διὰ νὰ εὐρωμεν τὸ δέκατον, ἑκατοστὸν, χιλιοστὸν, ... ἐνὸς δεκαδικοῦ ἀριθμοῦ, ἀρκεῖ νὰ μεταφέρωμεν τὴν ὑποδιαστολὴν του, μίαν, δύο, τρεῖς, ... θέσεις πρὸς τὰριστερά».

ζ') Ἐπειδὴ πᾶς ἀκέραιος δύναται νὰ θεωρηθῆ ὡς δεκαδικός, δυνατόν ἐστι γενικώτερον νὰ λέγωμεν ὅτι,

«διὰ νὰ εὐρωμεν τὸ δέκατον, ἑκατοστὸν, ... ἐνὸς ἀριθμοῦ, μεταφέρωμεν τὴν ὑποδιαστολὴν του μίαν, δύο, ... θέσεις πρὸς τὰριστερά».

Ὅστω $68 \times 0,001 = 0,068$. Ἐπίσης $13 \times 0,1 = 1,3$.

η') Διὰ νὰ εὐρωμεν τὸ γινόμενον ἀριθμοῦ ἐπὶ δεκαδικόν, π. χ. τὸ $4,53 \times 6,24$ πρέπει πρῶτον νὰ εὐρωμεν τὸ ἑκατοστὸν τοῦ 4,53 ἦτοι τὸ 0,0453 καὶ τοῦτο νὰ πολλαπλασιάσωμεν ἐπὶ 624. Ἀλλὰ τοῦτο εὐρίσκομεν (§ 38), ἐὰν πολλαπλασιάσωμεν τὸ 453 ἐπὶ 624 καὶ εἰς τὸ γινόμενον χωρίσωμεν τέσσαρα δεκαδικὰ ψηφία, ἦτοι $0,0453 \times 624 = 28,2672$. Ὄστε $4,53 \times 6,24 = 28,2672$.

Ἐὰν συγκρίνωμεν τὸ 28,2672 μὲ τὸ γινόμενον 282672 τῶν ἀριθμῶν 453 καὶ 624, παρατηροῦμεν ὅτι διαφέρει μόνον κατὰ τὴν ὑποδιαστολὴν καὶ μάλιστα ὅτι τὸ 28,2672 προκύπτει ἐκ τοῦ 282672 ἐὰν χωρίσωμεν ἐκ δεξιῶν πρὸς τὰριστερά τέσσαρα δεκαδικὰ ψηφία, ἦτοι ὅσα ἔχουν καὶ οἱ δύο παράγοντες. Τὰ αὐτὰ παρατηροῦμεν καὶ εἰς τὸν πολλαπλασιασμὸν αἰσθητῶς ἀριθμοῦ ἐπὶ δεκαδικόν. Ὅθεν ἔχομεν τὸν ἑξῆς κανόνα.

§ 40.— «Διὰ νὰ πολλαπλασιάσωμεν δύο δεκαδικούς ἀριθμούς, πολλαπλασιάζομεν αὐτούς ὡς νὰ ἦσαν ἀκέραιοι καὶ εἰς τὸ γινόμενον χωρίζομεν τόσα δεκαδικὰ ψηφία ἐκ δεξιῶν πρὸς τὰριστερά, ὅσα ἔχουν καὶ οἱ δύο παράγοντες».

Ὅστω ἔχομεν

$$4,53 \times 6,24 = \begin{array}{r} 4,53 \\ 6,24 \\ \hline 1812 \\ 906 \\ \hline 2718 \\ \hline 28,2672 \end{array}$$



Ἦτοι 28,2672 δέκατα χιλιοστοῦ.

Ἀσκήσεις καὶ προβλήματα.

Ὅμας πρώτη. 1) Νὰ πολλαπλασιασθῇ καθεὶς τῶν ἀριθμῶν 4,38· 26,14· 0,876· 163,001 ἐπὶ α') 0,1· β') 0,001· γ') 0,0001· δ') 0,00001.

2) Πόσον εἶνε τὸ δέκατον, ἑκατοστὸν, χιλιοστὸν τῆς δραχμῆς;

3) Πόσον εἶνε τὸ δέκατον, ἑκατοστὸν τῶν 400 δραμίων;

4) Νὰ πολλαπλασιασθῇ καθεὶς τῶν ἀριθμῶν 8,67· 0,413· 119,121· 123,78· 287,123 ἐπὶ α') 8,3· β') 6,12· γ') 0,315.

Ὅμας δευτέρα. 1) Ἀγοράζει τις 6,5 (18,52) ὀκ. τυροῦ πρὸς 25,34 (26,5) δρ. τὴν ὁκᾶν· πόσας δραχμὰς θὰ πληρώσῃ;

164,71 (490,78).

2) Ἀ-μάμαξα διανύει καθ' ὥραν 46,3 (54,62) χμ.· πόσα χιλιόμε. θὰ διανύσῃ εἰς 26,3 (18,4) ὥρας;

1217,69 (1005,008).

3) Ἐν γεωγραφικῶν μίλιον ἔχει 7420,44 μ.· πόσα μέτρα ἔχουν τὰ 3,25 (36,4) γεωγρ. μίλια;

24116,43 (270104,016).

Ὅμας τρίτη. 1) Ἐμπορος ἀγοράζει 84,4 (65,5) ὀκ. κριθῆς πρὸς 5,5 (4,4) δρ. τὴν ὁκᾶν· ἀντὶ πόσων δραχμῶν θὰ πωλήσῃ τὸ ἐμπόρευμα, ἐὰν θέλῃ νὰ κερδίσῃ 0,25 (0,24) δραχ. κατ' ὁκᾶν;

485,3 (303,92).

2) Ἀγοράζει τις 75,12 (8346) ὀκ. ἐλαίου πρὸς 12,75 (13,25) δρ. τὴν ὁκᾶν, πωλεῖ δὲ αὐτὸ πρὸς 15,5 (14,75) δρ. τὴν ὁκᾶν· πόσον εἶνε τὸ κέρδος;

206,58 (12519).

3) Πωλεῖ τις 25,12 (34,35) ὀκ. πράγματος ἀντὶ 865,12 (963,46) δρ. καὶ κερδίζει 3,25 (4,6) δρ. εἰς τὴν ὁκᾶν· πόσον τὸ ἠγόρασεν;

783,48 (805,45).

4) Ἀγοράζει τις ἐμπόρευμα 285,16 (597,94) ὀκ. πρὸς 5,21 (6,58) δρ. τὴν ὁκᾶν. Τὰ μεταφορικὰ στοιχίζουσιν 0,08 (0,

δρ. κατ' ὀκᾶν πόσον πρέπει νὰ τὸ πωλήσῃ, διὰ νὰ κερδίσῃ 0,46 (0,82)
 δρ. εἰς τὴν ὀκᾶν; 1639,67 (4484,55).

Ὅμᾳς τετάρτη. 1) Ἐμπορος ἡγόρασε 318,2 (122) ὀκ. ἐμπορεύμα-
 τος πρὸς 0,45 (0,5ᾶ) δρ. τὴν ὀκᾶν· ἔπειτα 817 / 131,5 / ὀκ. πρὸς 1,25
 (0,26) δρ. τὴν ὀκᾶν καὶ 79,1 (0,375) ὀκ. πρὸς 6,7 (0,8) δρ. τὴν ὀκᾶν·
 πόσα ἐπλήρωσεν ἐν ἑλψ; 1694,41 (101,59).

2) Ἐξ 712(815) ἀνθρώπων, οἱ ὅποιοι ἐμοιράσθησαν ἐν πᾶσιν χρη-
 μάτων, ἔλαβε καθεὶς 35,78 (46,34) δρ. καὶ ἐπερίσσευσαν 413,52
 (518,46) δρ.· πόσα χρήματα ἐμοιράσθησαν; 25888,88 (38285,56).

3) Πόσον εἶνε τὸ ἄθροισμα τριῶν ἀριθμῶν, ἐκ τῶν ὁποίων ὁ πρῶτος
 εἶνε 1,23 (2,34), καθεὶς δὲ τῶν ἄλλων τὰ 0,84 (0,45) τοῦ προηγου-
 μένου του; 3,131088 (3,86685).

Ὅμᾳς πέμπτη. 1) Πόσον εἶνε τὰ 3 δέκατα, τὰ 7 ἑκατοστὰ τοῦ
 100; τὰ 9 δέκατα τοῦ 400;

2) Ποῖον ἐκ τῶν γινομένων $4,385 \times 0,012$ καὶ $0,346 \times 5,017$
 εἶνε μεγαλύτερον καὶ πόσον; τὸ β' κατὰ 1,683262.

3) Δεῖξατε, ὅτι καὶ εἰς τοὺς δεκαδικαὺς ἀριθμοὺς τὸ γινόμενον δὲν
 μεταβάλλεται, ἀν ἀλλαχθῇ ἡ τάξις τῶν παραγόντων.

4) Ἐν κεφάλαιον δίδει τόκον ἐτήσιον 38ᾶ,56 (4758,6) δρ.· πόσον
 θὰ δώσῃ εἰς 18,25 (21,75) ἔτη; 7036,47 (103499,55).

5) Ἐν ἐμπόρευμα ἔχει μικτὸν βάρος 128,46 (365,12) ὀκ., τὸ δὲ
 ἀπόβαρον εἶνε 3,46 (5,12) ὀκ.· πόσον ἐπωλήθη τὸ ἐμπόρευμα, ἐὰν ἡ
 ὀκᾶ στοιχίζῃ 4,6 (5,8) δρ., εἶδιε δὲ κέρδος 0,9 (1) δρ. καθεμία ὀκᾶ;
 687,5 (2448).

6) Ἐν δοχείον, περιέχον καφέ, ζυγίζει 86,42 (93,51) ὀκ.· πόσον
 στοιχίζει ὁ καφές, ἀν τὸ δοχείον ζυγίζῃ 7,18 (9,36) ὀκ. καὶ ἡ ὀκᾶ
 τοῦ καφέ τιμᾶται 45 (38) δρ.; 3565,8 (3197,7).

§ 41. Διαίρεσις δεκαδικοῦ δι' ἀκεραίου.—

α') (Πρόβλημα). «Οἱ 7 πῆχεις ὑφάσματος τιμῶνται 162,4 δρ.·
 πόσον τιμᾶται ὁ εἰς πῆχυς.»

Καθὼς εἰς τοὺς ἀκεραίους οὕτω καὶ ἐδῶ, ζητεῖται εἰς ἀριθμὸς, ὁ
 σὺν ποῖος πολλαπλασιαζόμενος ἐπὶ 7 δίδει γινόμενον 162,4 δρ.

Διὰ νὰ εὗρωμεν τὸν ἀριθμὸν τοῦτον, πρέπει νὰ διαιρέσωμεν

τὸν 162,4 δρ. διὰ 7. Πρὸς τοῦτο παρατηροῦμεν ὅτι 162,4 δρ. =

M δ

162 + 4 τῆς δραχμῆς. Διὰ νὰ διαιρέσωμεν τὰς 162,4 δρ. διὰ 7, ἀρκεῖ νὰ διαιρέσωμεν τὰς 162 δρ. διὰ τοῦ 7 καὶ τὸ 4 δέκατα τῆς δραχμῆς διὰ 7. Τὸ 162 δρ.: $7 = 23$ δρ. καὶ μένει καὶ 1 δρ. Αὐτὴν πάλιν πρέπει νὰ τὴν διαιρέσωμεν διὰ τοῦ 7· ἀλλὰ 1 δρ. = 10 δέκατα τῆς δραχμῆς καὶ 4 δέκατα, τὰ ὅποια ἔχουν δοθῆ ἔξ ἀρχῆς = 14 δέκατα

τα τῆς δραχμῆς. Τὰ 14 τῆς δραχμῆς: $7 = 2$ τῆς δραχμῆς. Ὡστε τὸ πηλίκον εἶνε 23 δρ. + 2 δέκατα τῆς δραχμῆς = 23,2 δρ., ἦτοι $162,4 : 7 = 23,2$.

$$\begin{array}{r|l} 162,4 & 7 \\ 22 & \hline 14 & 23,2 \end{array}$$

Ἐκ τούτων καὶ ἄλλων ὁμοίων παραδειγμάτων συνάγομεν ὅτι,

«διὰ νὰ διαιρέσωμεν δεκαδικὸν δι' ἀκεραίου, διαιροῦμεν αὐτὸν ὡς νὰ εἶνε ἀκέραιος. θέτομεν δὲ τὴν ὑποδιαστολὴν εἰς τὸ πηλίκον, ὅταν τελειώσῃ ἡ διαίρεσις τοῦ ἀκεραίου μέρους καὶ πρόκειται νὰ καταβιβάζωμεν τὸ ψηφίον τῶν δεκάτων τοῦ διαιρετέου».

6') Ἐπειδὴ πᾶς ἀκέραιος δύναται νὰ θεωρηθῆ ὡς δεκαδικός, ἔπεται ὅτι ἡ διαίρεσις αὐτὴ ἰσχύει καὶ ὅταν ἔχωμεν νὰ διαιρέσωμεν ἀκέραιον δι' ἀκεραίου. Π. χ. διὰ τὴν διαίρεσιν $13 : 4$ ἔχωμεν

$$\begin{array}{r|l} 13,00 & 4 \\ 1,0 & \hline 20 & 3,25 \\ 0 & \end{array}$$

Ἀσκήσεις.

1) Νὰ εὑρεθοῦν τὰ πηλίκα τῶν ἑξῆς διαιρέσεων· α') $64,9 : 2$
β') $423,876 : 6$ · γ') $0,0124125 : 125$ · δ') $14,464 : 8$.

2) Ὅμοιως τὰ πηλίκα τῶν διαιρέσεων· α') $825 : 10$ · β') $623 : 100$ · γ') $784 : 1000$ · δ') $621 : 1000$ · ε') $786,1 : 10$ · στ') $0,789 : 100$.

§ 12. Ἐξαγόμενον κατὰ προσέγγισιν.—

α') (Πρόβλημα). ε' Ἐὰν 38 δρ. μοιρασθοῦν ἔξ ἴσου εἰς 7 ἀνθρώπους, πόσα θὰ λάβῃ καθείς;

Συμφώνως πρὸς τὸν ἀνωτέρω κανόνα θὰ διαιρέσωμεν τὸν 38,00... δρ. διὰ τοῦ 7.

Ἐάν ἐκτελέσωμεν τὴν διαίρεσιν ταύτην, μέχρις οὗτου εὐρωμεν τρεῖς δεκαδικὰ ψηφία τοῦ πηλίκου, προκύπτει πηλίκον 5,428 δρ. καὶ ὑπόλοιπον 4 χιλιοστά.

Ἄν περιορισθῶμεν εἰς τὸ πηλίκον αὐτό, βλέπομεν ὅτι καθεὶς ἄνθρωπος θὰ λάβῃ 5 δρ. 42 λ. καὶ 8 δέκατα τοῦ λεπτοῦ.

Ἄλλ' ἐπειδὴ εἰς τὸ σύστημα τῆς μετρήσεως τῶν νομισμάτων δὲν ὑπάρχουν νομίσματα μικρότερα τοῦ λεπτοῦ, περιοριζόμεθα μόνον εἰς τὰ δύο δεκαδικὰ ψηφία τοῦ πηλίκου καὶ φροντίζομεν, ὥστε τὸ σφάλμα, τὸ ὁποῖον προέρχεται ἕνακα τούτου, νὰ εἶνε ὅσω τὸ δυνατόν μικρότερον.

β') Ἐάν ἀντὶ τοῦ ἀριθμοῦ 5,428 δρ. λάβωμεν τὸ 5,42 δρ., λαμβάνομεν ὀλιγώτερον καὶ τὸ σφάλμα εἶνε 8 χιλιοστά.

Ἐάν ἀντὶ τοῦ 5,428 δρ. λάβωμεν 5,43 δρ., λαμβάνομεν περισσότερον καὶ τὸ σφάλμα εἶνε 2 χιλιοστά. Ἐκ τούτων βλέπομεν ὅτι, τὸ δεύτερον εἶνε ἀκριθέστερον τοῦ πρώτου. Εἰς τὸ αὐτὸ συμπέρασμα φθάνομεν καὶ ἔαν ἔχωμεν τὸν ἀριθμὸν 5,426· 5,427· 5,428· 5,429. Καὶ εἰς τὰς περιπτώσεις αὐτὰς εἶνε ἀκριθέστερον, ἀντὶ τῶν ἀριθμῶν αὐτῶν νὰ λάβωμεν τὸ 5,43 δρ. καὶ ὄχι τὸν 5,42 δρ. Διότι κατὰ τὴν πρώτην περίπτωσιν λαμβάνομεν ἀντιστοιχῶς 4·3·2·1 χιλιοστά περισσότερα, ἐνῶ εἰς τὴν δευτέραν 6·7·8·9 χιλιοστά ὀλιγώτερον.

γ') Ἐάν ὁ δοθεὶς ἀριθμὸς εἶνε 5,425 δρ., θὰ ἠδυνάμεθα νὰ λάβωμεν τὸν 5,42 δρ. ἢ 5,43 δρ. πρὸς εὐκολίαν. Διότι καὶ εἰς τὰς δύο περιπτώσεις τὸ σφάλμα εἶνε 5 χιλιοστά ὀλιγώτερον, ἢ περισσότερον. Ἐν τούτοις θὰ λαμβάνωμεν πάντοτε τὸν μεγαλύτερον ἀριθμὸν 5,43 δρ. ἕνεκα τοῦ ἑξῆς λόγου. Ἐάν ὑπῆρχον σημαντικὰ ψηφία μετὰ τὸ τρίτον δεκαδικόν, π. χ. ἂν ὁ ἀριθμὸς ἦτο 5,451 καὶ λαμβάνομεν τὸ 5,42 θὰ ἐγένετο λάθος 51 χιλιοστά ὀλιγώτερον, ἐνῶ, ἔαν λάβωμεν τὸ 5,43 γίνεται λάθος μόνον κατὰ 49 χιλιοστά ἐπὶ πλεόν.

δ') Ἐν γένει, ἔαν θέλωμεν ἀντὶ τοῦ δοθέντος δεκαδικοῦ ἀριθμοῦ νὰ λάβωμεν ἄλλον, ὁ ὁποῖος νὰ ἔχῃ ὀλιγώτερα δεκαδικὰ ψηφία τούτου, περιοριζόμενοι εἰς τὰ δεκαδικὰ ψηφία μιᾶς ὀρισμένης τάξεως, εἰς τρόπον ὥστε τὸ σφάλμα τὸ ὁποῖον γίνεται ἕνεκα τούτου νὰ εἶνε μικρότερον, αὐξάνομεν κατὰ 1 τὸ τελευταῖον

ψηφίον τοῦ δευτέρου ἀριθμοῦ, εἰς τάξιν τοῦ ὅπου περιοριζόμεθα, ἐάν τὸ πρῶτον τῶν παραλειπομένων ψηφίων εἶνε ἴσον ἢ μεγαλύτερον τοῦ 5. Τοῦναντίον δὲ λαμβάνομεν τοῦτο ἀμετάβλητον, ἐάν τὸ πρῶτον τῶν παραλειπομένων εἶνε μικρότερον τοῦ 5. Οὕτω π. χ. ἀντὶ τοῦ 8,35671 θὰ λάβωμεν τὸν 8,36. Ἀντὶ τοῦ 3,0452 τὸν 3,05. Ἀντὶ τοῦ 2,1374 τὸν 2,137 κ. ο. κ.

ε') Ἐπειδὴ τὰ τοιαῦτα ἐξαγόμενα δὲν εἶνε τελείως ἀκριθῆ, διὰ τοῦτο λέγομεν ὅτι εἶνε κατὰ προσέγγισιν μιᾶς μονάδος τῆς τάξεως ταύτης. Οὕτω π. χ. ἀντὶ τοῦ 8,35671 ἔχομεν τὸν 8,36 κατὰ προσέγγισιν ἑκατοστοῦ (καθ' ὑπεροχὴν), ἐπίσης ἀντὶ τοῦ 2,1374 τὸν 2,137 κατὰ προσέγγισιν χιλιοστοῦ (κατ' ἔλλειψιν).

στ') Καθ' ὅμοιον τρόπον συντομεύομεν τὸ δεκαδικὸν πηλίκον μιᾶς διαιρέσεως, ἐάν ἔχη πρὸς δεκαδικὰ ψηφία καὶ ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει λέγομεν ὅτι ἔχομεν τὸ πηλίκον κατὰ προσέγγισιν δεκάτου, ἑκατοστοῦ, χιλιοστοῦ, ... ὅταν περιοριζόμεθα εἰς τὰ δέκατα, ἑκατοστά.... Οὕτω π.χ. ἂν θέλωμεν τὸ πηλίκον τοῦ 139,491 διὰ τοῦ 11 κατὰ προσέγγισιν ἑκατοστοῦ, εὐρίσκομεν $139,491 : 11 = 12,681$ κατ' ἀρχάς, καὶ ἀκολουθῶς λαμβάνομεν 12,68 μὲ προσέγγισιν ἑκατοστοῦ (κατ' ἔλλειψιν), τὸ δὲ σφάλμα εἶναι 9 χιλιοστά καὶ θὰ λέγωμεν, ὅτι ἔχομεν ἔχομεν τὸ πηλίκον καθ' ὑπεροχὴν.

Ἀσκήσεις.

1) Νὰ εὐρεθῆ τὸ πηλίκον τῶν κάτωθι διαιρέσεων κατὰ προσέγγισιν χιλιοστοῦ· α') $27:21$ · β') $124:7$ · γ') $385,62:9$.

2) Ὅμοιως τὰ πηλίκων τῶν ἐπομένων διαιρέσεων κατὰ προσέγγισιν ἑκατοστοῦ καὶ χιλιοστοῦ· α') $423,87:6$ · β') $0,012495:123$ · γ') $7481:1001$ · δ') $8921:107$ · ε') $786,1:13$.

§ 43. Διαίρεσις δεκαδικῶν ἀριθμῶν. —

Ἐστω ὅτι θέλομεν νὰ εὕρωμεν τὸ πηλίκον τῆς διαιρέσεως $8,3326:0,26$.

Ἐπὶ εἰδῆ, καθὼς εἶδομεν (§ 27), ἐάν τὸν διαιρετέον καὶ διαιρέτην πολλαπλασιάσωμεν ἐπὶ τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν, τὸ πηλίκον δὲν μεταβάλλεται, ὁμοίως πολλαπλασιάζομεν αὐτοὺς ἐπὶ 100, ὅτε ὁ μὲν διαιρετέος γίνεται 833,26 ὁ δὲ διαιρέτης 26. Οὕτω ἔχομεν νὰ διαιρέσωμεν δεκαδικὸν ἀριθμὸν ἄκεραίου, ἧτοι ἐπανερχόμεθα εἰς τὴν προηγουμένην περίπτωσιν τῆς διαιρέσεως ἀριθμοῦ δι' ἀκεραίου.

Ὅθεν, «διὰ τὰ διαιρέσωμεν ἀριθμὸν διὰ δεκαδικοῦ, πολλαπλασιάσωμεν διαιρετέον καὶ διαιρέτην ἐπὶ 10· 100... ὥστε ὁ διαιρέτης νὰ γίνῃ ἀκεραῖος, καὶ οὕτω θὰ ἔχωμεν νὰ διαιρέσωμεν ἀριθμὸν δι' ἀκεραίου».

Ἀσκήσεις καὶ προβλήματα.

✓ Ὅμας πρώτη. 1) Νὰ ἐκτελεσθοῦν αἱ ἐπόμεναι διαιρέσεις μετὰ τῶν δοκιμῶν των· α') 23,37:1,23· β') 812,07:25,78· γ') 1,28228: 123,2· δ') 10,8102:12,14.

2) Ἐπὶ ποῖον ἀριθμὸν πρέπει νὰ πολλαπλασιάσωμεν τὸν 23,6 (0,0867) διὰ νὰ εὗρωμεν γινόμενον 19,588 (0,0299115);

0,83 (0,345).

9 Ὅμας δευτέρα. 1) Αἱ 3,456 ὀκ. ἐμπορεύματος τιμῶνται 86,4 δρ. πόσον στοιχίζει ἡ ὀκ. καὶ πόσον θὰ ἀγοράσωμεν μὲ 1 δραχμὴν;

25· 0,04.

3 2) Ἀμαξοστοιχία διανύει 91,685 (77,52) μ. εἰς 5,5' (4,75') πόσον διανύει εἰς 1' καὶ πόσον χρόνον χρειάζεται διὰ νὰ διατρέξῃ 1 μ.;

16,67 μ. 0,0599'.. (16,32· 0,0612'...)

4 Ὅμας τρίτη. 1) Ἀγοράζει τις 7,62 (3,25) ὀκ. ἐμπορεύματος ἀντὶ 419,1 (142,32) δρ. ἔπειτα 6,95 (4,68) ὀκ. ἄλλης ποιότητος ἀντὶ 333,392 (210,6) δρ., καὶ τέλος 7,32 (6,42) ὀκ. ἀντὶ 622,2 (353,1) δρ. α') πόσον τοῦ στοιχίζει ἡ ὀκ. κατὰ μέσον ὄρον; β') πόσον ἀγοράζει κατὰ μέσον ὄρον μὲ 1 δραχμὴν;

62,8· 0,0158 ... (49,2· 0,02032...)

2) Ἀγοράζει τις 14,8 (12,2) ὀκ. πράγματος πρὸς 28,5 (148,5) δρ. τὴν ὀκ. 16,2 (13,4) ὀκ. πρὸς 31,5 (150,5) δρ. τὴν ὀκ. καὶ 19,4 (18,8) ὀκ. πρὸς 30,5 (146,5) δρ. τὴν ὀκ. πόσον τοῦ στοιχίζει ἡ ὀκ. κατὰ μέσον ὄρον καὶ πόσον ἀγοράζει μὲ 1 δραχμὴν;

30,23...· 0,0331... (148,25...· 0,0076...),

Ὅμας τετάρτη. 1) Οἰνοπώλης ἀνέμιξε 3,45 (4,58) στατ. οἴνου τῶν 578 (665) δρ. τὸν στατῆρα, μὲ 4,82 (9,42) στατ. ἄλλου οἴνου τῶν 625 (525) δρ. τὸν στατῆρα, καὶ μὲ 0,53 (0,51) στατ. ὕδατος· πόσον ἐπώλησε τὸν στατῆρα τοῦ κράματος, ἐὰν διὰ τὴν ἀνάμιξιν ἐπλήρωσεν 26,3 (31,7) δρ., ἐκέρδισε (ἐζημιώθη) δὲ καὶ 286,4 (164,5) δρ.;

604,46... (51· 58...).

2) Ἐμπορὸς ἀγοράζει 4,24 (5,26) στατ. ὄρους πρὸς 255 (85) δρ. τὸν στατῆρα πληρώνει δὲ διὰ τὴν φόρτωσιν τοῦ 35,8 (21,4) δρ., καὶ ἀναμιγνύει αὐτὸ μὲ 0,34 (0,47) στατ. ὕδατος· πόσον θὰ πωλῇ τὸν στατῆρα, ἐὰν ἡ ἀνάμιξις τοῦ στοιχίσῃ 11,5 (12,4) δρ., καὶ γι' ἐπώλησιν (ζημιωθῇ) 121,5 (31,7) δρ. ἐν ἑλψ;

272,9 δρ. (εὐ3,12).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΧ

Περὶ τῶν κλασματικῶν ἀριθμῶν.

§ 44. Ἡ σημασία τοῦ κλάσματος.—

α') Διὰ νὰ σχηματίσωμεν τοὺς δεκαδικοὺς ἀριθμοὺς, διηρέσαμεν τὴν μονάδα εἰς 10· 100... ἴσα μέρη, καὶ ἀπὸ ἓν ὠρισμένον πλῆθος τοιούτων μονάδων ἐσχηματίσαμεν τοὺς ἀριθμοὺς τούτους. Ἐὰν διαιρέσωμεν τὴν μονάδα, π. χ. ἐν μῆλον, μίαν γραμμὴν, ἐν σχῆμα ὀρθογώνιον, εἰς ὠρισμένον ἀριθμὸν ἴσων μερῶν, ἔστω εἰς 6 ἴσα μέρη, καὶ λάβωμεν ὠρισμένον πλῆθος ἐξ αὐτῶν, ἔστω 5 τοιαῦτα, θὰ σχηματίσωμεν ἓνα ἀριθμὸν, τὸν ὁποῖον καλοῦμεν κλασματικὸν ἢ κλάσμα. Διὰ νὰ σχηματίσωμεν τὸν κλασματικὸν ἀριθμὸν, ἐκτὸς τῆς μονάδος, πρέπει νὰ γνωρίζωμεν ἀφ' ἑνὸς μὲν εἰς πόσα ἴσα μέρη θὰ διαιρέσωμεν τὴν μονάδα, καὶ ἀφ' ἑτέρου πόσα τοιαῦτα μέρη θὰ λάβωμεν, δηλαδὴ ἔχομεν ἀνάγκην δύο ἀριθμῶν. Ὁ ἀριθμὸς, ὁ ὁποῖος φανερώνει εἰς πόσα ἴσα μέρη χωρίζομεν τὴν μονάδα, λέγεται παρονομαστής τοῦ κλάσματος, ἐκεῖνος δέ, ὁ ὁποῖος φανερώνει πόσα ἴσα μέρη λαμβάνομεν, διὰ νὰ σχηματίσωμεν τὸ κλάσμα, λέγεται ἀριθμητὴς τοῦ κλάσματος. Ὁ ἀριθμητὴς καὶ ὁ παρονομαστής λέγονται μὲ ἓν ὄνομα ὄροι τοῦ κλάσματος.

β') Ἐὰν ἡ μονάς, π. χ. μία εὐθεῖα γραμμὴ, διαιρεθῇ εἰς δύο ἴσα μέρη, τὸ ἓν ἐξ αὐτῶν λέγεται ἐν δεύτερον τῆς γραμμῆς, ἂν δὲ διαιρεθῇ εἰς τρία, τέσσαρα, ... ἴσα μέρη, τὸ ἓν ἐξ αὐτῶν λέγεται ἐν τρίτον, ἐν τέταρτον, ... τῆς γραμμῆς. Ἐὰν λάβωμεν τρία ἐκ τῶν ἴσων μερῶν τῆς μονάδος, τὰ ὁποῖα ἔστω εἶνε πέντε, τὸ κλάσμα λέγεται τρία πέμπτα τῆς γραμμῆς, καὶ γράφεται οὕτω, $\frac{3}{5}$ τῆς γραμμῆς, ἢ συντόμως $\frac{3}{5}$ γρ., γράφομεν δηλαδὴ τὸν παρονομαστήν ὑποκάτω τοῦ ἀριθμητοῦ καὶ χωρίζομεν αὐτοὺς διὰ μικρᾶς ὀριζοντίας γραμμῆς, τὴν ὁποίαν καλοῦμεν γραμμὴν τοῦ κλάσματος. Καθ' ἕμοιον τρόπον γράφομεν καὶ πᾶν ἄλλο κλάσμα. Τὰ κλάσματα τὰ ὁποῖα ἔχουν ἀριθμητὴν τὴν μονάδα λέγονται καὶ κλασματικαὶ μονάδες.


γ') Ὅθεν «κλασματικὴ μονὰς λέγεται τὸ ἐν τῶν ἴσων μερῶν τῆς ἀκεραίας μονάδος». Οὕτω κλασματικαὶ μονάδες εἶνε αἱ $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \frac{1}{6}, \dots, \frac{1}{10}, \frac{1}{11}, \dots$ καὶ ὀνομάζονται

ἐν δευτέρῳ, ἐν τρίτῳ, ἐν τέταρτῳ, ἐν δέκατῳ, ἐν ἐνδέκατῳ....

δ') «Κλάσμα ἢ κλασματικὸς ἀριθμὸς λέγεται ὁ ἀριθμὸς, ὁ ὅποῦς προκύπτει, ἐὰν τὴν μονάδα διαιρέσωμεν εἰς ὁσαδὴποτε ἴσα μέρη καὶ ἐξ αὐτῶν λάβωμεν ἐν πλήθος ὠρισμένον».

Δυνάμεθα ἐπίσης νὰ λέγωμεν ὅτι, «κλάσμα λέγεται τὸ σύνολον κλασματικῶν μονάδων».

ε') Πᾶς κλασματικὸς ἀριθμὸς, π. χ. ὁ $\frac{5}{6}$ ὀκ. δύναται νὰ θεωρηθῆ ὡς ἀκέριος 5 μὲ τὴν ἐπωνυμίαν, τὴν ὅποιαν ὀρίζει ὁ παρονομαστής του, ἕκτα ὀκάς. Ὅμοίως ὁ $\frac{7}{10}$ ὄρ. δύναται νὰ θεωρηθῆ ὡς ἀκέριος 7 μὲ τὴν ἐπωνυμίαν δέκατα ὄρ., κ. ο. κ., $\frac{3}{4}$ μῆλου ὡς ἀκέριος 3 μὲ τὴν ἐπωνυμίαν τέταρτα μῆλου, τὰ $\frac{5}{6}$ ὀρθογωνίου ὡς ἀκέριος 5 μὲ τὴν ἐπωνυμίαν ἕκτα ὀρθογωνίου. Αὐτοὺς δύναται νὰ παρασταθῆ καὶ διὰ τοῦ κατωτέρου σχήματος



στ') Ὁ ἀριθμὸς $4\frac{3}{5}$ ὀκ. σημαίνει 4 ὀκ. + $\frac{3}{5}$ ὀκ., ἀπαγγέλλεται τέσσαρα καὶ τρία πέμπτα ὀκ. καὶ λέγεται μικτὸς ἀριθμὸς, ἀποτελεῖται δὲ ἀπὸ ἀκέριον ἀριθμὸν καὶ ἀπὸ κλάσμη. Ὡστε «μικτὸς ἀριθμὸς λέγεται ὁ ἀποτελούμενος ἀπὸ ἀκέριον ἀριθμὸν καὶ ἀπὸ κλάσμα».

Οὕτω οἱ ἀριθμοὶ $6\frac{1}{2}$ ὄρ., $3\frac{1}{5}$, $8\frac{4}{9}$ εἶνε μικτοί.

ζ') Πᾶς δεκαδικὸς ἀριθμὸς δύναται νὰ θεωρηθῆ ὡς κλασματικὸς, ἐνίοτε δὲ καὶ ὡς μικτὸς ἀριθμὸς. Οὕτω ὁ ἀριθμὸς 0,3 ὄρ. εἶνε ἴσος μὲ τὸν $\frac{3}{10}$ ὄρ. Ὁ $0,73 = \frac{73}{100}$ ὁ 1,7 εἶνε ἴσος μὲ 17 δέκατα

$$= \frac{17}{10} = 1\frac{7}{10} \quad \delta \quad 4,33 = \frac{433}{100} \quad \eta \quad \mu \epsilon \quad 4\frac{33}{100}$$

* Ασκήσεις. *Μηνιαίο*

Όμας πρώτη. 1) Ἐξηγήσατε τὴν σημασίαν τῶν ἐπομένων ἀριθμῶν καὶ ἀπεικονίσατε αὐτὴν διὰ σχήματος ἐπὶ μιᾶς εὐθείας γραμμῆς, ἢ ἐπὶ ἑνὸς ὀρθογωνίου, ὡς ἀνωτέρω· α') $\frac{1}{2}, \frac{5}{2}, \frac{3}{2}, 3\frac{1}{2}$.

β') $\frac{3}{3}, \frac{5}{3}, 2\frac{1}{3}$ · γ') $\frac{3}{4}, \frac{4}{4}, 2\frac{3}{4}$ · δ') $\frac{6}{6}, \frac{1}{6}, 1\frac{5}{6}$ · ε') $\frac{6}{12}, \frac{13}{12}, \frac{7}{12}$.

2) Τρέψατε α') τὰ $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, 3\frac{5}{6}, 4\frac{7}{12}$ τοῦ ἔτους εἰς μῆνας.

β') τὰ $\frac{2}{3}, 1\frac{1}{2}, 2\frac{2}{3}, 2\frac{2}{5}, 3\frac{3}{10}, 4\frac{2}{15}$ τοῦ μηνὸς εἰς ἡμέρας.

γ') τὰ $1\frac{1}{2}, 2\frac{1}{3}, 4\frac{3}{4}, 2\frac{5}{6}, 5\frac{11}{12}$ τῆς ἡμέρας εἰς ὥρας.

δ') τὰ $1\frac{1}{2}, \frac{3}{4}, \frac{3}{8}, 2\frac{3}{4}$ τῆς ὀκτῆς εἰς δράμια.

Όμας δευτέρα. 1) Τρέψατε τὰ $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{3}{4}, \frac{3}{10}, \frac{1}{100}, 2\frac{3}{4}, \frac{1}{10}, \frac{7}{20}, \frac{2}{5}$ τῆς δραχμῆς εἰς λεπτά.

2) Ποῖον μέρος τῆς δραχμῆς εἶνε τὰ 50· 80· 5· 10 λεπτά;

3) Τρέψατε εἰς κλάσματα ἢ εἰς μικτοὺς τοὺς ἀριθμοὺς· α') 11,3·

β') 17,7· γ') 29,04· δ') 0,78· ε') 1,2345.

§ 43. Τροπὴ ἀκεραίου καὶ μικτοῦ εἰς ἰσοδύναμον κλάσμα.—

α') Εἶνε εὐκολον νὰ ἴδωμεν ὅτι, ὁ ἀριθμὸς 1 δύναται νὰ τραπῇ εἰς κλάσμα μὲ οἰονδήποτε παρονομαστήν. Ἐὰν διαιρέσωμεν μονάδα μήλου εἰς 4 ἴσα μέρη καὶ λάβωμεν καὶ τὰ τέσσαρα, τότε τὰ τέσσαρα τέταρτα μήλου ἀποτελοῦν τὴν ἀκεραίαν μονάδα 1 μήλον· ἦτοι $1 \text{ μήλον} = \frac{4}{4} \text{ μήλου}$.

$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$
1			

Καθ' ἕμοιον τρόπον ἂν σκεφθῶμεν, εὐρίσκομεν 1 πήχυς =

$\frac{8}{8}$ πήχ., 1 ὀκτῆ = $\frac{2}{2}$ ὀκτῆς, 1 = $\frac{3}{3}$, 1 = $\frac{6}{6}$ κλπ.

6') Είναι επίσης εύκολον νὰ ἴδωμεν, ὅτι οἰοσδήποτε ἀκέραιος ἀριθμὸς δύναται νὰ τραπῆ εἰς ἰσοδύναμον κλάσμα μὲ οἰοσδήποτε παρονομαστήν. Ἐὰν θέλωμεν π. χ. τὸν ἀριθμὸν 2 δρ. νὰ τρέψωμεν εἰς κλάσμα μὲ παρονομαστήν 5, δηλαδὴ εἰς πέμπτα, σκεπτόμεθα ὅτι ἡ μία δραχμὴ ἔχει 5 εἰκοσάλεπτα ἢ πέμπτα δρ. Ἐπομένως αἱ 2 δραχμαὶ ἔχουν 10 εἰκοσάλεπτα ἢ 10 πέμπτα τῆς δραχμῆς.

$$\text{Ὡστε θὰ ἔχωμεν } 2 \text{ δρ.} = \frac{10}{5} \text{ δραχμῆς.}$$

$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$
1					1				

Καθ' ὅμοιον τρόπον σκεπτόμεθα, ἐὰν θέλωμεν νὰ τρέψωμεν ἀκέραιον ἀριθμὸν, π. χ. τὸν 4 εἰς ἕκτα. Πρὸς τοῦτο λέγομεν. Ἀφοῦ ἡ μία ἀκεραία μονάς ἔχει 6 ἕκτα, αἱ δύο ἀκεραὶαι μονάδες ἔχουν 12 ἕκτα, καὶ αἱ 4 ἀκεραὶαι μονάδες ἔχουν $6 \times 4 = 24$ ἕκτα· ἦτοι

$$4 = \frac{4 \times 6}{6} = \frac{24}{6}.$$

γ') Ἐκ τῶν ἀνωτέρω συνάγομεν ὅτι: «διὰ νὰ τρέψωμεν δοθέντα ἀκέραιον ἀριθμὸν εἰς ἰσοδύναμον κλάσμα μὲ δοθέντα παρονομαστήν, πολλαπλασιάζομεν τὸν ἀκέραιον ἐπὶ τὸν δοθέντα παρονομαστήν καὶ τὸ γινόμενον γράφομεν ἀριθμητὴν, παρονομαστήν δὲ τὸν δοθέντα».

δ') Ἴνα μικτὸν ἀριθμὸν, π. χ. τὸν $2 \frac{1}{4}$ δκ., τρέψωμεν εἰς κλασματικόν, παρατηροῦμεν ὅτι, ἡ μία δκᾶ ἔχει 4 τέταρτα, αἱ δύο δκᾶδες ἔχουν 8 τέταρτα καὶ ἓν τέταρτον, τὸ ὅποιον ἔχει δοθῆ, γίνονται 9 τέταρτα· ἦτοι ἔχομεν $2 \frac{1}{4}$ δκᾶδες = $\frac{9}{4}$ δκᾶς.

$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$
1					1			

Καθ' ὅμοιον τρόπον ἔχομεν $3 \frac{1}{6} = \frac{19}{6}$, $5 \frac{1}{3} = \frac{16}{3}$ κ.ο.κ. Ὡς βλέπομεν «διὰ νὰ τρέψωμεν μικτὸν ἀριθμὸν εἰς κλάσμα, πολλαπλασιάζομεν τὸν παρονομαστήν τοῦ κλάσματος ἐπὶ τὸν

ἀκέραιον, εἰς τὸ γινόμενον προσθέτομεν τὸν ἀριθμητὴν τοῦ κλάσματος, ὅτι εὐρωμεν γράφομεν ἀριθμητὴν καὶ παρονομαστὴν γράφομεν τὸν παρονομαστὴν τοῦ δοθέντος κλάσματος».

ε') Ἀντιστρόφως δυνάμεθα ἐν κλάσμα νὰ τρέψωμεν εἰς ἀκέραιον ἢ μικτόν. Ἐστω ὁ ἀριθμὸς $\frac{8}{2}$ δραχμ. Παρατηροῦμεν ὅτι 2 δευτέρα δρ. ἀποτελοῦν μίαν δραχμὴν. Ἐπομένως τὰ $\frac{8}{2}$ δρ. ἀποτελοῦν 4 δραχμ. Ἦτοι ἔχομεν $\frac{8}{2}$ δρ. = 4 δρ.

$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
1		1		1		1	

Διὰ νὰ τρέψωμεν τὸν ἀριθμὸν $\frac{15}{4}$ εἰς μικτόν παρατηροῦμεν ὅτι τὰ $\frac{4}{4}$ ἀποτελοῦν μίαν ἀκεραίαν μονάδα, ἐπομένως τὰ $\frac{15}{4}$ ἀποτελοῦν τόσας ἀκεραίας μονάδας, ὅσον χωρεῖ τὸ 4 τέταρτα εἰς τὰ 15 τέταρτα ἦτοι $15:4=3$ καὶ μένουσιν 3 τέταρτα. Ὡστε ἔχομεν $\frac{15}{4} = 3 \frac{3}{4}$. Ὁμοίως εὐρίσκομεν ὅτι $\frac{24}{5} = 4$ ἀκεραίας μονάδες καὶ 4 πέμπτα, ἦτοι $\frac{24}{5} = 4 \frac{4}{5}$.

Ἐκ τούτων συνάγομεν ὅτι, ἐν κλάσμα περιέχει μίαν ἢ περισσότερας ἀκεραίας μονάδας, ἐὰν ὁ ἀριθμητὴς του εἴνε ἴσος ἢ μεγαλύτερος τοῦ παρονομαστοῦ του, πρὸς δὲ ὅτι,

«διὰ νὰ ἐξαγάγωμεν τὰς ἀκεραίας μονάδας κλάσματος, διαιροῦμεν τὸν ἀριθμητὴν τοῦ διὰ τοῦ παρονομασμοῦ του, τὸ πηλίκον τῆς διαιρέσεως γράφομεν ὡς ἀκέραιον, τὸ ὑπόλοιπον ἀριθμητὴν καὶ παρονομαστὴν τὸν τοῦ δοθέντος κλάσματος».

στ') Δοθὲν κλάσμα τρέπεται εἰς ἀκέραιον, ἐὰν ὁ ἀριθμητὴς του διαιρῆται ἀκριβῶς διὰ τοῦ παρονομαστοῦ του.

ζ') Κλάσμα, τοῦ ὁποίου ὁ ἀριθμητὴς εἴνε μικρότερος τοῦ παρονομαστοῦ, λέγεται γνήσιον, ἐὰν δὲ ὁ ἀριθμητὴς εἴνε ἴσος ἢ μεγαλύτερος τοῦ παρονομαστοῦ, λέγεται μὴ γνήσιον καὶ τότε τρέπεται εἰς ἀκέραιον ἢ εἰς μικτόν ἀριθμόν.

* Ασκήσεις.

1) Νά τραπῆ ἡ μονάς εἰς δεύτερα, τρίτα, τέταρτα, πέμπτα, ἕκτα, δέκατα, δωδέκατα.

2) Τρέψατε τοὺς ἀκεραίους ἀριθμοὺς $2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 8 \cdot 10 \cdot 12$ εἰς δεύτερα, τρίτα, τέταρτα, πέμπτα, ἕκτα, ἔνατα εἰκοστά.

3) Νά τραπῶν οἱ ἐπόμενοι ἀριθμοὶ ἀπὸ μνήμης εἰς ἰσοδύναμα κλάσματα.

$$\alpha') 1 \frac{1}{2}, 2 \frac{1}{2}, 4 \frac{1}{2}, 5 \frac{1}{2}, 6 \frac{1}{2} \cdot \beta') 1 \frac{1}{3}, 2 \frac{1}{3}, 3 \frac{2}{3}, 4 \frac{2}{3}, 10 \frac{1}{2} \cdot \gamma') 1 \frac{1}{4}, 2 \frac{3}{4}, 6 \frac{3}{4}, 12 \frac{3}{4} \cdot \delta') 1 \frac{1}{5}, 3 \frac{2}{5}, 12 \frac{3}{5}$$

4) Τὰ κάτωθι κλάσματα νά τραποῦν εἰς ἀκεραίους ἢ μικτοὺς.

$$\alpha') \frac{3}{2}, \frac{4}{2}, \frac{5}{2}, \frac{7}{2}, \frac{2}{2}, \frac{31}{2} \cdot \beta') \frac{5}{3}, \frac{9}{3}, \frac{10}{3}, \frac{11}{3}, \frac{35}{3}$$

$$\gamma') \frac{4}{4}, \frac{7}{4}, \frac{8}{4}, \frac{24}{4}, \frac{31}{4} \cdot \delta') \frac{13}{12}, \frac{17}{12}, \frac{24}{12}, \frac{23}{12}, \frac{48}{12}, \frac{18}{12}, \frac{60}{12}$$

§ 46. Τροπὴ κλάσματος εἰς ἄλλο ἰσοδύναμον, ἔχον ὄρους μεγαλυτέρους.—

α') Γνωρίζομεν ὅτι ὁ ἀριθμὸς 5,3 δρ. εἶνε ἴσος μὲ 5,30 δρ., ἢ 5,300 δρ., ἢ 5,3000 δρ.,.. ἔάν δὲ τούτους γράψωμεν ὡς κλάσματα θὰ ἔχωμεν

$$\frac{53}{10} \delta\rho. = \frac{530}{100} \delta\rho. = \frac{5300}{1000} \delta\rho., \dots$$

Τὸ παράδειγμα αὐτὸ δεικνύει, ὅτι δυνάμεθα νὰ τρέψωμεν κλάσμα εἰς ἄλλο, ἔχον τὴν αὐτὴν ἀξίαν, ἀλλ' ὄρους μεγαλυτέρους. Ἐστω τὸ κλάσμα $\frac{1}{3}$. Ἐάν ἀντὶ νὰ διαιρέσωμεν τὴν μονάδα εἰς τρία ἴσα μέρη, τὴν διαιρέσωμεν εἰς διπλάσια μέρη ἴσα, δηλαδή εἰς 6, τότε τὸ $\frac{1}{3}$ θὰ γίνῃ $\frac{2}{6}$, ἤτοι $\frac{1}{3} = \frac{2}{6}$.

$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$
$\frac{1}{6} + \frac{1}{6}$	$\frac{1}{6} + \frac{1}{6}$	$\frac{1}{6} + \frac{1}{6}$
$\frac{1}{3} = \frac{2}{6}$		

δ

Διὰ νὰ τρέψωμεν τὰ $\frac{2}{3}$ εἰς ἕκτα, σκεπτόμεθα ὅτι τὸ $\frac{1}{3}$ ἔχει δύο ἕκτα, ἐπομένως τὰ $\frac{2}{3}$ ἔχουν $\frac{4}{6}$ ἦτοι $\frac{2}{3} = \frac{4}{6}$. Ὁμοίως εὐρίσκομεν ὅτι $\frac{2}{5} = \frac{4}{10}$, $\frac{1}{10} = \frac{3}{30}$ κ. ο. κ.

Ἐκ τούτων βλέπομεν ὅτι εἶνε $\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{3}{6} = \frac{4}{8}$, καὶ ἐπειδὴ καθὲν τῶν κλασμάτων ἀπὸ τοῦ δευτέρου καὶ ἐξῆς προκύπτει ἐκ τοῦ πρώτου, ἐὰν τοὺς ὄρους τοῦ πολλαπλασιάσωμεν ἐπὶ τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν, ἔπεται ὅτι

6) «ἐὰν πολλαπλασιάσωμεν τοὺς ὄρους κλάσματος ἐπὶ τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν, ἡ ἀξία του δὲν μεταβάλλεται».

Διὰ νὰ ἴδωμεν ἂν τοῦτο εἶνε πάντοτε ἀληθές, ἄς πολλαπλασιάσωμεν ἐν πρώτοις τὸν ἀριθμητὴν ἑνὸς κλάσματος, π. χ. τοῦ $\frac{3}{4}$ ἐπὶ ἕνα αἰονδήποτε ἀκέραιον ἀριθμὸν, ἔστω ἐπὶ τὸν 5. Ἐπειδὴ τὰ 3 τέταρτα ἐπὶ 5 δίδουν 15 τέταρτα, ἔπεται ὅτι τὸ νέον κλάσμα $\frac{15}{4}$ εἶνε 5 φορές μεγαλύτερον τοῦ $\frac{3}{4}$, δηλαδή τὸ δοθὲν κλάσμα πολλαπλασιάζεται ἐπὶ 5, ἔταν ὁ ἀριθμητὴς του πολλαπλασιασθῇ ἐπὶ 5. Ἄν τώρα πολλαπλασιάσωμεν τὸν παρονομαστήν τοῦ νέου κλάσματος $\frac{15}{4}$ ἐπὶ τὸν αὐτὸν ἀκέραιον 5, θὰ εὕρωμεν $\frac{15}{4 \times 5} = \frac{15}{20}$, τὸ ὁποῖον εἶνε 5 φορές μικρότερον τοῦ $\frac{15}{4}$. Διότι, τὸ $\frac{1}{20}$ εἶνε 5 φορές μικρότερον τοῦ $\frac{1}{4}$, καὶ τὸ $\frac{15}{20}$ εἶνε πέντε φορές μικρότερον τοῦ $\frac{15}{4}$. Ἦτοι τὸ κλάσμα $\frac{15}{4}$ γίνεται 5 φορές μικρότερον, ἐὰν ὁ παρονομαστής του πολλαπλασιασθῇ ἐπὶ 5. Ὅστε μετὰ τὰς δύο πράξεις ἡ ἀξία τοῦ δοθέντος κλάσματος δὲν μεταβάλλεται.

Καθ' ὅμοιον τρόπον δυνάμεθα νὰ ἐξετάσωμεν αἰονδήποτε κλάσμα, π.χ. τὸ $\frac{4}{9}$. Ἄν πολλαπλασιάσωμεν τὸν ἀριθμητὴν του ἐπὶ 2 θὰ ἔχωμεν $\frac{4 \times 2}{9} = \frac{8}{9}$, τὸ ὁποῖον εἶνε διπλάσιον τοῦ $\frac{4}{9}$. ἐξ ἄλλου τὸ $\frac{8}{9 \times 2} = \frac{8}{18}$ εἶνε δύο φορές μικρότερον τοῦ $\frac{8}{9}$ ἐπειδὴ τὸ $\frac{1}{18}$

Εἶνε τὸ ἡμισυ τοῦ $\frac{1}{9}$. Ὡστε ἔχομεν $\frac{4}{9} = \frac{4 \times 2}{9 \times 2} = \frac{8}{18}$.

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω συνάγομεν ὅτι.

γ') «Ἐὰν πολλαπλασιάσωμεν τὸν ἀριθμητὴν κλάσματος ἐπὶ τινὰ ἀριθμὸν, τὸ κλάσμα πολλαπλασιάζεται ἐπὶ τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν.»

δ') «Ἐὰν πολλαπλασιάσωμεν τὸν παρονομαστὴν κλάσματος ἐπὶ τινὰ ἀριθμὸν, τὸ κλάσμα διαιρεῖται διὰ τοῦ αὐτοῦ ἀριθμοῦ.»

ε') «Ἐὰν πολλαπλασιάσωμεν τοὺς ὄρους κλάσματος ἐπὶ τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν, ἡ ἀξία του δὲν μεταβάλλεται.»

στ') «Διὰ τὴν νὰ τρέψωμεν δοθὲν κλάσμα εἰς ἄλλο ἰσοδύναμον, ἔχον ὄρους μεγαλυτέρους, πολλαπλασιάζομεν τὸν ἀριθμητὴν καὶ παρονομαστὴν αὐτοῦ ἐπὶ τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν.»

Ἀ σ κ ῆ σ ε ι ς .

1) α') Νὰ τραπῆ ἀπὸ μνήμης τὸ κλάσμα $\frac{1}{2}$ εἰς ἄλλα ἰσοδύναμα, ἔχοντα παρονομαστὰς ἀντιστοίχως τοὺς 4·6·8·10·12·16·18·20.

β') Ὁμοίως νὰ τραπῆ τὸ $\frac{1}{3}$ εἰς ἄλλα ἰσοδύναμα μὲ παρονομαστὰς τοὺς 6·9·12·15·24·36·90·150.

γ') Τὸ $\frac{1}{4}$ εἰς ἄλλα ἰσοδύναμα μὲ παρονομαστὰς τοὺς 12·16·24·40·60·20·64·36.

2) Νὰ τραπῆ τὸ κλάσμα $\frac{2}{3}$ εἰς ἄλλα ἰσοδύναμα μὲ παρονομαστὰς τοὺς 6·9·12. Ὁμοίως ὁ $1 \frac{1}{3}$ εἰς ἄλλα ἰσοδύναμα μὲ παρονομαστὰς τοὺς 6·12·15·9·45.

3) Νὰ τραποῦν τὰ κλάσματα α') $\frac{3}{2}$, $\frac{5}{4}$ εἰς ἄλλα ἀντιστοίχως ἰσοδύναμα μὲ κοινὸν παρονομαστὴν τὸν 4·8·12·20. β') τὰ $\frac{5}{3}$, $\frac{7}{6}$ εἰς ἄλλα μὲ κοινὸν παρονομαστὴν τὸν 6·12·30. γ') τὰ $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{5}{6}$ εἰς ἄλλα μὲ κοινὸν παρονομαστὴν τὸν 6·12·15.

§ 47. Τροπή ἑτερονόμων κλάσμάτων εἰς ὁμόνυμα. —

α') Δύο ἢ περισσότερα κλάσματα, τὰ ὁποῖα δὲν ἔχουν τὸν αὐτὸν παρονομαστήν, λέγονται ἑτερόνυμα. Τοῦναντίον ἂν δύο ἢ περισσότερα κλάσματα ἔχουν τὸν αὐτὸν παρονομαστήν, λέγονται ὁμόνυμα. Καθὼς εἶδομεν εἰς τὴν ἄνω παραδείγματι δυνάμεθα νὰ τρέψωμεν δύο ἢ περισσότερα κλάσματα εἰς ἄλλα ἀντιστοίχως ἴσα πρὸς τὰ δοθέντα καὶ ὁμόνυμα. Ὁ κοινὸς παρονομαστής τῶν νέων κλάσμάτων πρέπει νὰ εἶνε πολλαπλάσιον καθενὸς τῶν παρονομαστῶν τῶν δοθέντων, ἄρα κοινὸν πολλαπλάσιον αὐτῶν. Ἐστω ὅτι ἔχομεν τὰ κλάσματα

$$\frac{2}{3}, \quad \frac{4}{5}, \quad \frac{5}{6}, \quad \frac{1}{4}$$

καὶ θέλομεν νὰ τὰ τρέψωμεν εἰς ὁμόνυμα, ἀλλ' ὥστε ὁ κοινὸς παρονομαστὴς νὰ εἶνε τὸ ἐ.κ.π. τῶν παρονομαστῶν τῶν δοθέντων. Πρὸς τοῦτο εὐρίσκομεν τὸ ἐ.κ.π. τῶν παρονομαστῶν 3·5·6·4. Τοῦτο εἶνε τὸ 60 (§ 33, γ'). Τὸ 60 διαιροῦμεν διὰ καθενὸς τῶν παρονομαστῶν καὶ εὐρίσκομεν πηλίκα τοὺς ἀριθμοὺς 20· 12· 10· 15. Τέλος τοὺς ὄρους τοῦ πρώτου κλάσματος πολλαπλασιάζομεν ἐπὶ 20, τοὺς τοῦ δευτέρου ἐπὶ 12, τοῦ τρίτου ἐπὶ 10 καὶ τοῦ τετάρτου ἐπὶ 15, εὐρίσκομεν δὲ τὰ ἐξῆς ὁμόνυμα

$$\frac{40}{60}, \quad \frac{48}{60}, \quad \frac{50}{60}, \quad \frac{15}{60}$$

Ἐκ τούτου καὶ ἄλλων ὁμοίων παραδειγμάτων συνάγομεν ὅτι,

β') «διὰ νὰ τρέψωμεν ἑτερόνυμα κλάσματα εἰς ὁμόνυμα, τῶν ὁποίων ὁ κοινὸς παρονομαστής νὰ εἶνε τὸ ἐ.κ.π. τῶν παρονομαστῶν τῶν δοθέντων, εὐρίσκομεν τὸ ἐ.κ.π. αὐτῶν, ἀκολούθως διαιροῦμεν αὐτὸ διὰ καθενὸς τῶν παρονομαστῶν τῶν δοθέντων κλάσμάτων καὶ μὲ τὸ πηλίκον πολλαπλασιάζομεν τοὺς ὄρους τοῦ ἀντιστοίχου κλάσματος».

γ') Συνήθως γράφομεν δεξιὰ τῶν δοθέντων κλάσμάτων τὸ ἐ.κ.π. τῶν παρονομαστῶν τῶν, τὰ πηλίκα τῶν διαιρέσεων τούτων διὰ καθενὸς τῶν παρονομαστῶν ὑπεράνω τοῦ ἀριθμητοῦ τοῦ ἀντιστοίχου κλάσματος, τὰ δὲ νέα κλάσματα ἀντιστοίχως ὑποκάτω καθενὸς τῶν δοθέντων ὡς κάτωθι.

$$\begin{array}{cccc} \frac{20}{3}, & \frac{12}{5}, & \frac{10}{6}, & \frac{15}{4}, \\ \frac{40}{60}, & \frac{48}{60}, & \frac{50}{60}, & \frac{15}{60}, \end{array} \quad \text{ἐ.κ.π. } 60.$$

Ἀσκήσεις.

- 1) Νὰ τραποῦν εἰς ὁμώνυμα μὲ τὸν ἐλάχιστον κοινὸν παρονομαστικὴν τὰ κλάσματα α') $\frac{1}{2}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \frac{1}{6}$. β') $\frac{3}{4}, \frac{5}{8}, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}$.
- 2) Ὅμοίως τὰ α') $\frac{3}{2}, \frac{2}{7}, \frac{9}{10}, \frac{1}{2}, \frac{7}{20}$. β') $\frac{7}{8}, \frac{1}{12}, \frac{5}{6}, \frac{1}{3}$.
- 3) Ὅμοίως τὰ α') $\frac{3}{4}, \frac{2}{5}, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{7}{100}$. β') $\frac{2}{5}, \frac{1}{4}, \frac{1}{3}, \frac{5}{9}$.

§ 48. Πῶς συγκρίνομεν κλάσματα.—

α') Δίδονται δύο ἢ περισσότερα κλάσματα καὶ ζητεῖται νὰ εὐρωμεν ποῖον ἐξ αὐτῶν εἶνε μεγαλύτερον καὶ ποῖον τὸ μικρότερον.

Ἐὰν δύο κλάσματα ἔχουν τὸν αὐτὸν παρονομαστικὴν, π. χ. τὰ $\frac{5}{7}$ καὶ $\frac{3}{7}$ μεγαλύτερον εἶνε τὸ ἔχον μεγαλύτερον ἀριθμητικὴν. Ἦτοι τὸ $\frac{5}{7}$. Διότι, διὰ νὰ σχηματίσωμεν τὸ $\frac{5}{7}$, ἐλάβομεν ἐκ τῶν 7 ἴσων μερῶν, εἰς τὰ ὅποια διηρέθη ἡ μονάς, τὰ 5, ἐνῶ διὰ νὰ σχηματίσωμεν τὰ $\frac{3}{7}$, ἐλάβομεν τὰ 3. Ὅμοίως σκεπτόμενοι, εὐρίσκομεν ὅτι ἐκ πολλῶν ὁμώνυμων κλασμάτων, π. χ. ἐκ τῶν $\frac{4}{9}, \frac{5}{9}, \frac{7}{9}, \frac{1}{9}, \frac{4}{9}$ μεγαλύτερον εἶνε τὸ $\frac{7}{9}$, τὸ ὅποῖον ἔχει τὸν μεγαλύτερον ἀριθμητικὴν, μικρότερον δὲ τὸ $\frac{1}{9}$, τὸ ὅποῖον ἔχει τὸν μικρότερον ἀριθμητικὴν. Ἐκ τούτων συνάγομεν ὅτι,

β) Ἐκ δύο ἢ περισσοτέρων κλασμάτων, ἔχόντων τὸν αὐτὸν παρονομαστικὴν μεγαλύτερον εἶνε τὸ ἔχον τὸν μεγαλύτερον ἀριθμητικὴν, μικρότερον δὲ τὸ ἔχον τὸν μικρότερον ἀριθμητικὴν.

γ) Ἐὰν ἔχωμεν κλάσματα, ἔχοντα τὸν αὐτὸν ἀριθμητικὴν, π. χ. τὰ $\frac{4}{6}, \frac{4}{10}$ μεγαλύτερον εἶνε τὸ $\frac{4}{6}$, τὸ ὅποῖον ἔχει τὸν μικρότερον παρονομαστικὴν. Διότι, διὰ νὰ σχηματίσωμεν τὸ $\frac{4}{6}$, ἐμοιράσαμεν τὴν ἀκεραίαν μονάδα εἰς 6 ἴσα μέρη καὶ ἐλάβομεν τὰ 4. Ἐνῶ διὰ νὰ σχηματίσωμεν τὰ $\frac{4}{10}$, ἐμοιράσαμεν τὴν ἀκεραίαν μονάδα εἰς 10

μέρη, επομένως εις μικρότερα ἢ πρὶν, καὶ ἐλάβομεν τὰ 4. Τὴν δευτέραν φοράν ἐλάβομεν λοιπὸν μικρότερα μέρη ἢ τὴν πρώτην, ἄρα τὸ $\frac{4}{6}$ εἶνε μεγαλύτερον τοῦ $\frac{4}{10}$.

						$\frac{4}{6}$						
$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	

$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	
						$\frac{4}{10}$					

Ὅμοιως σκεπτόμενοι βλέπομεν ὅτι ἐκ τῶν κλασμάτων $\frac{2}{9}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{2}{7}$, $\frac{2}{11}$ μεγαλύτερον εἶνε τὸ $\frac{2}{3}$ ἔχον τὸν μικρότερον παρανομαστήν, μικρότερον δὲ τὸ $\frac{2}{11}$ ἔχον τὸν μεγαλύτερον παρανομαστήν.

δ') Ὅθεν, «ὅταν δύο ἢ περισσότερα κλάσματα ἔχουν τὸν αὐτὸν ἀριθμητὴν, μεγαλύτερον εἶνε τὸ ἔχον τὸν μικρότερον παρανομαστήν καὶ μικρότερον τὸ ἔχον τὸν μεγαλύτερον παρανομαστήν».

ε') Ἐὰν τὰ δοθέντα πρὸς σύγκρισιν κλάσματα δὲν ἔχουν τὸν αὐτὸν παρανομαστήν ἢ τὸν αὐτὸν ἀριθμητὴν, τρέπομεν αὐτὰ εἰς ὁμόνομα καὶ ἀκολούθως εὐρίσκομεν, ποῖον εἶνε τὸ μεγαλύτερον, συμφώνως πρὸς τὰνωτέρω.

§ 49. Ἀπλοποιήσεις τῶν κλασμάτων. —

α') Ὅπως δυνάμεθα νὰ τρέψωμεν κλάσμα εἰς ἄλλο ἰσοδύναμον, ἔχον ὄρους μεγαλύτερους τοῦ δοθέντος, οὕτω δυνάμεθα ἐπίστε νὰ κάμωμεν τὸναντίον, δηλαδὴ δοθέντος κλάσματος, νὰ εὕρωμεν ἄλλο ἴσον πρὸς αὐτὸ καὶ ἔχον ὄρους μικροτέρους.

β') Ἐστω τὸ κλάσμα $\frac{4}{8}$ πήχ. Παρατηροῦμεν ὅτι τὰ 8 ὄγδοα πήχ. ἀποτελοῦν 1 πήχυν, ἐὰν τὴν μονάδα 1 πήχυν διαιρέσωμεν εἰς ὄγδοα. Βλέπομεν ὅτι τὰ $\frac{4}{8}$ πήχ. ἀποτελοῦν τὸν ἥμισυ πήχυν, ἤτοι $\frac{4}{8}$ πήχ. = $\frac{1}{2}$

πήχεως. Ἐπομένως ἔχομεν $\frac{4}{8}$ πήχ. = $\frac{1}{2}$ πήχ.

$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	
$\frac{1}{2}$					$\frac{1}{2}$			

Τὸ $\frac{1}{2}$ πήχ. εὐρίσκομεν ἔμως ἀπὸ τὰ $\frac{4}{8}$ πήχ., ἐὰν τοὺς ἔρους τούτου διαιρέσωμεν διὰ τοῦ αὐτοῦ ἀριθμοῦ 2.

γ') Τὰ κλάσματα $\frac{1}{2}$ καὶ $\frac{4}{8}$ εἶνε ἴσα καὶ τὸ δεῦτερον προκύπτει ἐκ τοῦ πρώτου, ἐὰν πολλαπλασιάσωμεν τοὺς ἔρους του ἐπὶ τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν 4 (§ 46, ε'). Ἀντιστρόφως, δυνατόμεθα νὰ εὕρωμεν τὸ κλάσμα $\frac{1}{2}$ ἀπὸ τὸ $\frac{4}{8}$, ἐὰν διαιρέσωμεν τοὺς ἔρους τοῦ δευτέρου διὰ τοῦ αὐτοῦ ἀριθμοῦ 4. Ὡστε ἔχομεν $\frac{4}{8} = \frac{1}{2}$.

δ') Ἴνα τὸ κλάσμα $\frac{4}{6}$ ἔρ. κάμωμεν ἀπλοῦστερον, παρατηροῦμεν ὅτι τὰ $\frac{2}{6}$ εἶνε ἴσα μὲ $\frac{1}{3}$. Ἐπομένως τὰ $\frac{4}{6} = \frac{2}{3}$. Τὸ $\frac{2}{3}$ εὐρίσκομεν ἐκ τοῦ $\frac{4}{6}$, ἐὰν τοὺς ἔρους τούτου διαιρέσωμεν διὰ τοῦ ἀριθμοῦ 2. Ἐχομεν δὲ καὶ ἐδῶ $\frac{4}{6} = \frac{2}{3}$.

ε') Ἐκ τούτων συνάγομεν ὅτι «ἂν διαιρέσωμεν τοὺς ἔρους κλάσματος διὰ τοῦ αὐτοῦ ἀριθμοῦ, ἡ ἀξία του δὲν μεταβάλλεται».

στ') Λέγομεν ὅτι ἀπλοιοιοῦμεν ἓν κλάσμα, ἐὰν διαιρέσωμεν τοὺς ἔρους του διὰ τοῦ αὐτοῦ ἀριθμοῦ (διαφόρου τῆς μονάδος).

Ὡστε διὰ τῆς ἀπλοιοιήσεως κλάσματος δὲν μεταβάλλεται ἡ ἀξία του, ἀλλ' εὐρίσκεται ἄλλο κλάσμα ἴσον μὲ τὸ δοθὲν καὶ ἔχον ἔρους μικροτέρους.

ζ') Ἐπειδὴ διὰ νὰ ἀπλοιοιήσωμεν ἓν κλάσμα, πρέπει νὰ διαιρέσωμεν τοὺς ἔρους του διὰ τοῦ αὐτοῦ ἀριθμοῦ, εὐρίσκομεν ἐν πρώτοις ἓνα κοινὸν διαιρέτην τῶν ἔρων του· ἀκολουθῶς διαιροῦμεν δι' αὐτοῦ τοὺς ἔρους του· τὴν ἐργασίαν αὐτὴν δυνατόμεθα νὰ ἐπαναλάβωμεν πάλιν εἰς τὸ προκύπτον κλάσμα κ. ο. κ.

μέχρις οτου εϋρωμεν κλάσμα, του οποίου οι ἔροι δὲν ἔχουν κοινόν τινα διαιρέτην.

Οὕτω ἔχομεν

$$\frac{594}{1386} = \frac{297}{693} = \frac{33}{77} = \frac{3}{7}$$

Οἱ ἀριθμοὶ 2, 9, 11 φανερίουν τοὺς κοινούς διαιρέτας τῶν ἔρων του πρὸς τῆριστερά των κλάσματος.

η') Ταχύτερον εὐρίσκομεν ἀπὸ δοθέν κλάσμα τὸ ἴσον του ἀπλούστερον καὶ τοῦ οποίου οἱ ἔροι δὲν ἔχουν κανένα κοινόν διαιρέτην, ἂν ἐν πρώτοις εϋρωμεν τὸν μ. κ. δ. τῶν ἔρων του δοθέντος καὶ ἀκολουθῶς διαιρέσωμεν καθένα τῶν ἔρων του διὰ τοῦ μ.κ.δ. αὐτῶν. Οὕτω διὰ τὸ κλάσμα $\frac{594}{1386}$ ὁ μ.κ.δ. τῶν 594 καὶ 1386 εἶνε ὁ 198, εὐρίσκομεν δ' ἀμέσως τὸ $\frac{3}{7}$ διὰ διαιρέσεως τῶν ἔρων του $\frac{594}{1386}$ διὰ 198.

θ') Τὸ κλάσμα, τοῦ οποίου οἱ ἔροι δὲν ἔχουν κοινόν διαιρέτην, ἀλλ' εἶνε πρώτοι πρὸς ἀλλήλους λέγεται ἀνάγωγον καὶ προφανῶς δὲν ἀπλοποιεῖται.

Διὰ τῆς ἀπλοποιήσεως ἐπιδιώκομεν συνήθως, νὰ τρέψωμεν τὸ δοθέν κλάσμα εἰς ἴσον μὲ αὐτὸ καὶ ἀνάγωγον.

Ἀσκήσεις.

Ὅμας πρώτη. 1) Νὰ τραποῦν α') εἰς δευτέρα τὰ $\frac{2}{4}$, $\frac{3}{6}$, $\frac{4}{8}$
 $\frac{15}{30}$, $\frac{6}{12}$ · β') εἰς τρίτα τὰ $\frac{2}{6}$, $\frac{4}{12}$, $\frac{5}{15}$ · γ') εἰς τέταρτα τὰ $\frac{4}{16}$,
 $\frac{3}{12}$, $\frac{5}{20}$ · δ') εἰς ὄγδοα τὰ $\frac{2}{16}$, $\frac{21}{56}$, $\frac{8}{24}$, $\frac{2}{16}$.

2) Νὰ τραποῦν α') εἰς δευτέρα τὰ $\frac{6}{4}$, $\frac{10}{4}$, $\frac{28}{4}$ · β') εἰς τρίτα τὰ
 $\frac{12}{9}$, $\frac{21}{9}$, $\frac{30}{18}$, $\frac{42}{9}$ · γ') εἰς πέμπτα τὰ $\frac{28}{20}$, $\frac{39}{15}$, $\frac{56}{10}$.

Ὅμας δευτέρα. Ν' ἀπλοποιήσων τὰ ἐξῆς κλάσματα.

α') $\frac{10}{6}$, $\frac{16}{6}$, $\frac{22}{6}$, $\frac{28}{6}$, $\frac{36}{6}$ · β') $\frac{6}{8}$, $\frac{14}{8}$, $\frac{21}{8}$, $\frac{38}{8}$ · γ') $\frac{6}{9}$, $\frac{15}{6}$, $\frac{24}{9}$,
 $\frac{46}{12}$, $\frac{34}{12}$, $\frac{10}{12}$, $\frac{48}{12}$ · δ') $\frac{128}{24}$, $\frac{1431}{27}$, $\frac{400}{80}$, $\frac{900}{200}$.

§ 30. Πρόσθεσις.—

α') Διὰ νὰ εὐρωμεν τὸ ἄθροισμα δύο ἢ περισσοτέρων ὁμώνυμων κλασμάτων, π. χ. τῶν $\frac{5}{6}$ καὶ $\frac{8}{6}$, θεωροῦμεν τὸ $\frac{5}{6}$ ὡς ἀκέραιον 6 μὲ τὴν ἐπωνυμίαν ἕκτα, καὶ τὸ $\frac{8}{6}$ ὡς ἀκέραιον 8 μὲ τὴν ἐπωνυμίαν ἕκτα, καὶ οὕτω ἔχομεν νὰ προσθέσωμεν 5 ἕκτα + 8 ἕκτα, καὶ τὸ ἄθροισμα εἶνε ἴσον μὲ 13 ἕκτα. Ἦτοι $\frac{5}{6} + \frac{8}{6} = \frac{13}{6} = 2 \frac{1}{6}$. Ὁμοίως εὐρίσκομεν ὅτι $\frac{2}{3} + \frac{4}{3} + \frac{1}{3} = \frac{7}{3} = 2 \frac{1}{3}$.

β') Ἐκ τούτων συνάγομεν ἔτι· «διὰ νὰ προσθέσωμεν κλάσματα ὁμώνυμα, προσθέτομεν τοὺς ἀριθμητὰς τῶν καὶ τὰ ἄθροισμα γράφομεν ἀριθμητὴν, παρανομαστὴν δὲ γράφομεν τὸν αὐτὸν».

γ') Διὰ νὰ εὐρωμεν τὸ ἄθροισμα ἑτερώνυμων κλασμάτων, π. χ. τῶν $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{4}{5}$ τρέπομεν αὐτὰ εἰς ἰσοδύναμα ὁμώνυμα, ὅτε λαμβάνομεν τὰ ἀντίστοιχα ἴσα μὲ αὐτὰ $\frac{15}{30}$, $\frac{20}{30}$, $\frac{24}{30}$ καὶ ἀκολουθῶς προσθέτομεν ταῦτα, καθὼς ἀνωτέρω. Ἦτοι εὐρίσκομεν $\frac{59}{30} = 1 \frac{29}{30}$.

Ὁμοίως ἐργαζόμεθα, διὰ νὰ προσθέσωμεν οἰκὴποτε ἄλλα ἑτερώ-
νυμα κλάσματα. Ὅθεν,

δ') «διὰ νὰ προσθέσωμεν ἑτερώνυμα κλάσματα, τρέπομεν αὐτὰ εἰς ὁμώνυμα καὶ προσθέτομεν τοὺς ἀριθμητὰς τῶν ὁμώνυμων, τὸ ἄθροισμὰ τῶν γράφομεν ἀριθμητὴν, παρανομαστὴν δὲ τὸν κοινὸν παρανομαστὴν τῶν».

ε') «Διὰ νὰ προσθέσωμεν μικτοὺς ἀριθμοὺς, π. χ. τοὺς $2\frac{3}{4}$ καὶ $5\frac{1}{3}$ προσθέτομεν χωριστὰ τοὺς ἀκεραίους τῶν, καὶ χωριστὰ τὰ κλάσματα, κατὰ τὰ ἀνωτέρω, καὶ ἀκολουθῶς προσθέτομεν τὰ δύο ἐξαγόμενα».

Οὕτω διὰ τὸ $2\frac{3}{4} + 5\frac{1}{3}$ ἔχομεν $\frac{3}{4} + \frac{1}{3} = \frac{9}{12} + \frac{4}{12} = \frac{13}{12} = 1\frac{1}{12}$, $2 + 5 = 7$. Ἐπομένως τὸ ἄθροισμα τῶν δοθέντων μικτῶν εἶνε $1\frac{1}{12} + 7 = 8\frac{1}{12}$.

Ἀσκήσεις καὶ προβλήματα.

Ὅμας πρώτη 1) Νὰ ἐκτελεσθοῦν αἱ ἐξῆς προσθέσεις:

α') $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$ β') $\frac{5}{5} + \frac{7}{5}$ γ') $\frac{1}{4} + \frac{5}{4}$ δ') $\frac{3}{8} + \frac{5}{8} + \frac{7}{8}$

ε') $\frac{5}{10} + \frac{9}{10} + \frac{7}{10}$

2) Ὅμοιος αἱ α') $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$ β') $\frac{5}{2} + \frac{7}{7}$ γ') $2\frac{1}{2} + \frac{1}{6}$

3) Ἐπίσης αἱ α') $\frac{1}{2} + \frac{4}{8} + 5\frac{1}{4}$ β') $2\frac{1}{8} + 3\frac{1}{2} + \frac{1}{6}$

γ') $\frac{3}{10} + \frac{5}{2} + \frac{7}{10}$ δ') $2\frac{1}{2} + 5\frac{7}{9} + 13\frac{1}{3} + 7\frac{1}{10}$

Ὅμας δευτέρα. 1) Ἐμπορὸς ἐπώλησεν 83 $\frac{69}{105}$ ($36\frac{4}{5}$)

ὄκ. ἐμπορευμάτων· ἔπειτα 94 $\frac{1}{2}$ ($47\frac{3}{4}$) ὄκ., βραδύτερον

120 $\frac{7}{25}$ ($87\frac{4}{25}$) ὄκ. καὶ τέλος 125 $\frac{9}{20}$ ($98\frac{7}{20}$) ὄκ. αὐτοῦ

πόσας ὄκ. ἐπώλησεν ἐν ἑλίφ; 423 $\frac{621}{700}$ ($270\frac{3}{50}$)

2) Βαδίζει τις μίαν ἡμέραν ἐπὶ 2 $\frac{1}{5}$ ($1\frac{1}{4}$) ὥρ. καὶ εἰς
καθεμίαν τῶν ἐπομένων ἡμερῶν 1 $\frac{1}{4}$ ($1\frac{1}{3}$) ὥρας περισσότερον
τῆς προηγουμένης· πόσας ὥρας ἐβάδισεν εἰς 4 (5) ἡμέρας;

16 $\frac{3}{10}$ ($19\frac{7}{12}$)

3) Ἐκ τριῶν γωνιῶν ἡ πρώτη εἶνε 32 $\frac{30}{4}$ ($10\frac{5}{6}$)
ἡ δευτέρα 10 $\frac{10}{2}$ ($7\frac{7}{12}$) μεγαλύτερα τῆς πρώτης, ἡ δὲ τρίτη
εἶνε κατὰ 41 $\frac{30}{20}$ ($28\frac{4}{15}$) μεγαλύτερα τῆς δευτέρας· πόσον εἶνε
τὸ ἄθροισμα καὶ τῶν τριῶν γωνιῶν; 160° 24' (75° 56')

4) Ἀγοράζει τις 71 (41) ὄκ. ἐμπορευμάτων ἀντὶ 127 $\frac{3}{5}$
($225\frac{17}{25}$) δρ. πόσον πρέπει νὰ πωλήσῃ τὴν 1 ὄκ., εἰάν ἡ φόρ-
τωσίς του στοιχίσῃ 3 $\frac{6}{25}$ ($5\frac{1}{5}$) θέλει δὲ νὰ κερδίσῃ καὶ
11 $\frac{4}{25}$ ($15\frac{3}{25}$) δρ. ἐν ἑλίφ; 2 (6)

5) Ἐργάτης τελειώνει εἰς μίαν ἡμ. τὸ $\frac{1}{2} \left(\frac{1}{3} \right)$ ἐνὸς ἔργου·
 δεύτερος τὸ $\frac{1}{3} \left(\frac{2}{5} \right)$ καὶ τρίτος τὸ $\frac{1}{6} \left(\frac{1}{6} \right)$ τοῦ ἔργου· πόσον μέ-
 ρος τοῦ ἔργου τελειώνουν καὶ οἱ τρεῖς, μαζῆ ἔργαζόμενοι, εἰς 1 ἡμ.;
 ὁλόκληρον $\left(\frac{9}{10} \right)$.

6) Δεξαμενὴ δύναται νὰ πληρωθῇ ὑπὸ τριῶν βρῦσεων. Ἡ
 πρώτη πληροὶ εἰς 1 ὥρ. τὸ $\frac{1}{3} \left(\frac{2}{9} \right)$ τῆς δεξαμενῆς, ἡ δευτέρα τὰ
 $\frac{2}{5} \left(\frac{3}{8} \right)$ καὶ ἡ τρίτη τὸ $\frac{1}{10} \left(\frac{11}{72} \right)$ αὐτῆς· ποῖον μέρος τῆς δεξα-
 μενῆς θὰ πληρωθῇ εἰς 1 ὥρ., ἐὰν ρέουν καὶ αἱ τρεῖς βρῦσαι
 μαζῆ; $\frac{5}{6} \left(\frac{3}{4} \right)$.

§ 51. Ἀφαιρέσεις. —

α') Διὰ νὰ εὐρωμεν τὴν διαφορὰν δύο ὁμωνύμων κλασμάτων,
 π. χ. τῶν $\frac{5}{6}$ καὶ $\frac{2}{6}$, θεωροῦμεν αὐτὰ ὡς ἀκεραῖους 5 καὶ 2, μὲ
 τὴν ἐπωνυμίαν ἕκτα, καὶ ἔχομεν τὴν ἀφαίρεσιν 5 ἕκτα — 2 ἕκτα = 3
 ἕκτα· ἦτοι $\frac{5}{6} - \frac{2}{6} = \frac{3}{6}$.

β') Ὅθεν, «διὰ ν' ἀφαιρέσωμεν δύο κλάσματα ὁμωνύμα,
 ἀφαιροῦμεν τὸν ἀριθμητὴν τοῦ ἀφαιρετέου ἀπὸ τὸν τοῦ μειω-
 τέου, τὸ ὑπόλοιπον γράφομεν ἀριθμητὴν, παρονομαστὴν δὲ τὸν
 κοινὸν παρονομαστὴν των».

γ') Ἐὰν τὰ δοθέντα κλάσματα εἴνε ἑτερόνομα, π. χ. ἐὰν θέ-
 λωμεν νὰ εὐρωμεν τὴν διαφορὰν $\frac{3}{4} - \frac{2}{5}$ τρέπομεν αὐτὰ εἰς ὁμό-
 νομα, ὅτε ἔχομεν $\frac{15}{20} - \frac{8}{20}$ καὶ ἀκολουθῶς ἀφαιροῦμεν, καθὼς
 εἰς τὸ προηγούμενον παράδειγμα, οὕτω δ' εὐρίσκομεν διαφορὰν $\frac{7}{20}$.

Ἡ συνέχεια,

δ) «διὰ ν' ἀφαιρέσωμεν κλάσματα ἑτερόνομα, τὰ τρέπομεν
 εἰς ὁμόνομα καὶ ἀφαιροῦμεν ταῦτα».

ε') Ἐστω ὅτι θέλομεν ν' ἀφαιρέσωμεν ἀπὸ τὰς $3 \frac{1}{2}$ δρ. τὰς $1 \frac{1}{4}$ δρ.

Ἐπειδὴ τὰ κλάσματα εἶνε ἑτερόνυμα, τρέπομεν αὐτὰ εἰς ὁμώνυμα, ὅτε θὰ ἔχωμεν νὰ ἐκτελέσωμεν τὴν ἀφαίρεσιν $3 \frac{3}{4}$ δρ. — $1 \frac{1}{4}$ δρ.

Ἀφαιροῦμεν χωριστὰ τὰ κλάσματα καὶ χωριστὰ τοὺς ἀκεραίους τούτων, ὅτε λαμβάνομεν ὑπόλοιπον $2 \frac{1}{4}$ δρ.

$$Ἵστε $3 \frac{1}{4}$ δρ. — $1 \frac{1}{4}$ δρ. = $2 \frac{1}{4}$ δρ.$$

στ') Ἄν ἔχωμεν νὰ εὕρωμεν τὴν διαφορὰν $12 \frac{1}{5}$ δκ. — $5 \frac{3}{4}$ δκ. τρέπομεν τὰ ἑτερόνυμα κλάσματα εἰς ὁμώνυμα καὶ θὰ ἔχωμεν νὰ

εὕρωμεν τὴν διαφορὰν $12 \frac{4}{20}$ δκ. — $5 \frac{15}{20}$ δκ. Ἐπειδὴ τὸ $\frac{12}{20}$ δκ.

δὲν ἀφαιρεῖται ἀπὸ τὰ $\frac{4}{20}$ δκ., λαμβάνομεν ἀπὸ τὸν ἀκέραιον 12 δκ.

μῖαν ὀκτὴν καὶ τὴν τρέπομεν εἰς εἰκοστά. Γράφομεν λοιπὸν ἀντὶ

$12 \frac{4}{20}$ δκ. τὸ $11 \frac{24}{20}$ δκ. καὶ θὰ ἔχωμεν τὴν ἀφαίρεσιν $11 \frac{24}{20}$ δκ. —

$5 \frac{15}{20}$. Ἀφαιροῦμεν τώρα χωριστὰ τὰ κλάσματα καὶ χωριστὰ τοὺς

ἀκεραίους καὶ εὕρισκομεν $6 \frac{9}{20}$ δκ. Ἵστε ἔχομεν

$$12 \frac{1}{5} \delta\kappa. - 5 \frac{3}{4} \delta\kappa. = 12 \frac{4}{20} \delta\kappa. - 5 \frac{15}{20} \delta\kappa. = 11 \frac{24}{20} \delta\kappa. -$$

$$5 \frac{15}{20} \delta\kappa. = 6 \frac{9}{20} \delta\kappa.$$

ζ') Ὅθεν, «διὰ ν' ἀφαιρέσωμεν δύο μικτοὺς ἀριθμοὺς, τρέπομεν τὰ κλάσματα εἰς ὁμώνυμα (ἐὰν εἶνε ἑτερόνυμα). Ἐὰν τὸ κλάσμα τοῦ μειωτέου εἶνε μικρότερον τοῦ ἀφαιρετέου, λαμβάνομεν μίαν μονάδα τοῦ μειωτέου, καὶ τὴν τρέπομεν εἰς κλάσμα, ἔχον παρονομαστὴν τὸ πᾶν κλασμάτων. Τοῦτο προσθέτομεν εἰς τὸ κλάσμα τοῦ μειωτέου ὥστε ἀπὸ τὸ ἀποτέλεσμα τοῦτο ν' ἀφαιρῆται τὸ κλάσμα τοῦ ἀφαιρετέου. Τέλος ἀφαιροῦμεν χωριστὰ τὰ κλάσματα καὶ χωριστὰ τὸν ἀκέραιον τοῦ ἀφαιρετέου ἀπὸ τὸν ὑπολειφθέντα ἀκέραιον τοῦ μειωτέου».

Άσκήσεις και προβλήματα.

Όμας πρώτη. 1) Νὰ γίνουν αἱ κάτωθι ἀφαιρέσεις

α') $\frac{7}{9} - \frac{4}{9}$. β') $3\frac{5}{8} - \frac{3}{8}$. γ') $3\frac{5}{12} - 2\frac{7}{12}$. δ') $8\frac{1}{2} - \frac{3}{4}$
 ε') $17 - 1\frac{1}{2}$. ς') $4\frac{5}{3} - 2\frac{7}{8}$. ζ') $\frac{1}{1} - \frac{1}{2}$. η') $\frac{2}{1} - \frac{3}{3}$.
 θ') $\frac{5}{1} - \frac{1}{5}$. ι') $\frac{6}{1} - \frac{1}{8}$.

2) Ὅμοιως αἱ ἀφαιρέσεις· α') $8\frac{4}{15} - 2\frac{7}{24}$. β') $12\frac{8}{15} - 4\frac{9}{20}$.
 γ') $7\frac{13}{72} - 3\frac{13}{45}$. δ') $85\frac{1}{6} - 48\frac{17}{19}$. ε') $29\frac{1}{8} - 17\frac{1}{24}$.

3) Ἀφαιρέσατε ἀπὸ τὸ 1 τὸ $\frac{1}{4}$, τὰ $\frac{5}{8}$, τὰ $\frac{9}{12}$. Ὅμοιως ἀπὸ τὸ 2 δεκ. τὸ $1\frac{1}{4}$ δεκ., ἀπὸ τὸ 4 πήχ. τὸ $\frac{3}{8}$ πήχ. καὶ εὑρετε ἕνα κανόνα συμφώνως πρὸς τὸν ὅποιον ἀφαιροῦμεν ἀπὸ ἀκέραιον κλάσμα, ἢ μικτόν.

Όμας δευτέρα. 1) Ἐχει τις $36\frac{1}{4} \left(18\frac{2}{3}\right)$ δρα., δεύτερος ἔχει $8\frac{7}{9} \left(1\frac{1}{2}\right)$ δρα. ὀλιγωτέρας τοῦ πρώτου καὶ τρίτος $7\frac{7}{12} \left(3\frac{6}{7}\right)$ δρα. ὀλιγωτέρας τοῦ ἀθροίσματος τῶν δύο πρώτων. Πόσας δραχμὰς ἔχει ἕκαστος καὶ πόσας καὶ οἱ τρεῖς;

$27\frac{17}{36} \left(17\frac{1}{6}\right)$, $56\frac{5}{36} \left(31\frac{41}{42}\right)$, $119\frac{31}{36} \left(67\frac{17}{21}\right)$.

2) Ἐξώδευσέ τις πρώτον $18\frac{4}{5} \left(23\frac{1}{4}\right)$ δρα. ἐκ τῶν $728\frac{3}{4} \left(314\frac{7}{10}\right)$ δρα., τὰς ὁποίας εἶχεν· ἔπειτα $27\frac{1}{20} \left(13\frac{1}{2}\right)$ δρα. καὶ τέλος $54\frac{2}{25} \left(18\frac{4}{5}\right)$ δρα. πόσαι δραχμαὶ τοῦ ἔμειναν;

(Κατὰ δύο τρόπους).

628,82 (259,15).

3) Πωλεῖ τις ἐμπόρευμα $127\frac{11}{20} \left(136\frac{17}{20}\right)$ δρα. μὲ κέρδος $43\frac{1}{2} \left(61\frac{1}{5}\right)$ δρα. πόσον τὸ ἠγόρασεν; 84 δρα. 5% (75,65).

4) Ἐν ἔργον ἤρχισεν εἰς τὰς $8\frac{3}{4} \left(4\frac{5}{12}\right)$ ὥρ. π.μ. καὶ διήρ-
 ησε $10\frac{5}{6} \left(9\frac{7}{36}\right)$ ὥρ.· πότε ἐτελείωσε; 7 ὥρ. 35' (1 ὥρ. 39') μ.μ.

§ 32. Πολλαπλασιασμός.—

α') (Πρόβλημα). «*Αν ἔν πορτοκάλιον τιμᾶται $\frac{3}{4}$ δρ., πόσον τιμῶνται τὰ 5 πορτοκάλια ;*»

Ἀφοῦ τὸ 1 πορτοκ. τιμᾶται $\frac{3}{4}$ δρ., τὰ 2 πορτοκ. θὰ τιμῶνται $\frac{3}{4}$ δρ. \times 2 καὶ τὰ 5 πορτοκ. θὰ τιμῶνται $\frac{3}{4}$ δρ. \times 5. Ἄλλὰ τοῦτο σημαίνει νὰ ἐπαναλάβωμεν τὸν πολλαπλασιαστὴν $\frac{3}{4}$ δρ. ὡς προσθετὸν 5 φορές. Ἦτοι θὰ ἔχωμεν

$$\frac{3}{4} \delta\rho. \times 5 = \frac{3}{4} \delta\rho. + \frac{3}{4} \delta\rho. + \frac{3}{4} \delta\rho. + \frac{3}{4} \delta\rho. + \frac{3}{4} \delta\rho. = \frac{15}{4} \delta\rho. = 3 \frac{3}{4} \delta\rho. = 3,75 \delta\rho.$$

$$\text{Ὁμοίως ἔχομεν } \frac{2}{5} \times 3 = \frac{2}{5} + \frac{2}{5} + \frac{2}{5} = \frac{6}{5} = 1 \frac{1}{5}.$$

Ἐκ τούτων συνάγομεν ὅτι: «*διὰ νὰ πολλαπλασιάσωμεν κλάσμα ἐπὶ ἀκέραιον, πολλαπλασιάζομεν τὸν ἀριθμητὴν ἐπὶ τὸν ἀκέραιον καὶ τὸ γινόμενον γράφομεν ἀριθμητὴν, παρονομαστὴν δὲ τὸν τοῦ δοθέντος κλάσματος.*»

β') (Πρόβλημα). «*Αν ἡ ὀκτὴ κριθὴς τιμᾶται 6 $\frac{3}{4}$ δρ., πόσον τιμῶνται αἱ 3 ὀκ.*»;

Ἀφοῦ ἡ 1 ὀκ. τιμᾶται 6 $\frac{3}{4}$ δρ., αἱ 3 ὀκ θὰ τιμῶνται 3 φορές περισσότερον ἤτοι 6 $\frac{3}{4}$ δρ. \times 3. Ἐπειδὴ τὸ 6 $\frac{3}{4}$ δρ. = 6 δρ. + $\frac{3}{4}$ δρ., ἔπεται ὅτι ἀρκεῖ, νὰ πολλαπλασιάσωμεν τὸ 6 δρ. \times 3 = 18 δρ., τὸ $\frac{3}{4}$ δρ. \times 3 = $\frac{9}{4}$ δρ. καὶ νὰ προσθέσωμεν τὰ ἐξαγόμενα, ὅτε εὕρισκομεν 18 $\frac{9}{4}$ δρ. = 20 $\frac{1}{4}$ δρ. Ἐξ ἄλλου ἔχομεν 6 $\frac{3}{4}$ δρ. \times 3 = $\frac{27}{4}$ δρ. \times 3 = $\frac{81}{4}$ δρ. = 20 $\frac{1}{4}$ δρ.

Ἦτοι: «*διὰ νὰ πολλαπλασιάσωμεν μικτὸν ἐπὶ ἀκέραιον, ἢ πολλαπλασιάζομεν χωριστὰ τὸν ἀκέραιον καὶ χωριστὰ τὸ κλάσμα τοῦ μικτοῦ ἐπὶ τὸν δοθέντα ἀκέραιον καὶ προσθέτομεν τὰ δύο γινόμενα, ἢ τρέπομεν τὸν μικτὸν εἰς ἰσοδύναμον κλάσμα καὶ ἀκολούθως πολλαπλασιάζομεν κλάσμα ἐπὶ ἀκέραιον.*»

γ') (Πρόβλημα). «Πόσον τιμώνται τὰ $\frac{2}{3}$ τοῦ μέτρου ἑνὸς ὑφάσματος, εἰν τὸ ἕν μέτρον αὐτοῦ τιμᾶται 13 δρ.»

Λέγομεν ἔτι, ἀφοῦ 1 μ. τιμᾶται 13 δρ., τὸ $\frac{1}{3}$ μ. θὰ τιμᾶται τὸ $\frac{1}{3}$ τῶν 13 δρ., ἦτοι $\frac{13}{3}$ δρ.· καὶ τὰ $\frac{2}{3}$ μ. θὰ τιμῶνται: $\frac{13}{3} \times 2 = \frac{26}{3} = 8 \frac{2}{3}$ δραχμάς.

Ἐπίσης, εἰν θέλωμεν νὰ πολλαπλασιάσωμεν τὸ 12 ἐπὶ $\frac{4}{9}$, ἀρκεῖ νὰ εὗρωμεν πρῶτον τὸ $\frac{1}{9}$ τοῦ 12 καὶ αὐτὸ νὰ πολλαπλασιάσωμεν ἐπὶ 4, ἦτοι $12 \times \frac{1}{9} = \frac{12}{9} \times 4 = \frac{48}{9} = 5 \frac{3}{9} = 5 \frac{1}{3}$.

Ἐκ τούτων συναγομεν ἔτι: «διὰ νὰ πολλαπλασιάσωμεν ἀκέραιον ἐπὶ κλάσμα, πολλαπλασιάζομεν τὸν ἀκέραιον ἐπὶ τὸν ἀριθμητὴν τοῦ κλάσματος, τὸ γινόμενον γράφομεν ἀριθμητὴν, παρονομαστὴν δὲ τὸν τοῦ δοθέντος κλάσματος».

δ') Ἄν θέλωμεν νὰ εὗρωμεν τὸ γινόμενον $\frac{5}{6} \times \frac{2}{3}$, παρατηροῦμεν ἔτι $\frac{5}{6} \times \frac{3}{3} = \frac{5}{6} \times 1 = \frac{5}{6}$. Ἐπομένως $\frac{5}{6} \times \frac{1}{3} = \frac{5}{6 \times 3} = \frac{5}{18}$ (τρὶς μικρότερον τοῦ προηγούμενου § 46, δ') καὶ $\frac{5}{6} \times \frac{2}{3} = \frac{5 \times 2}{6 \times 3} = \frac{5 \times 2}{18} = \frac{10}{18}$ (δύο μεγαλύτερον τοῦ προηγούμενου).

Ὅμοίως εὐρίσκομεν τὸ γινόμενον $\frac{7}{8} \times \frac{4}{9}$. Ἐχομεν ἔτι $\frac{7}{8} \times \frac{9}{9} = \frac{7}{8} \times 1$. Τὸ $\frac{7}{8} \times \frac{1}{9}$ ἦτοι τὸ ἕνατον τῶν $\frac{7}{8}$ εἶνε $\frac{7}{72}$. Καὶ $\frac{7}{8} \times \frac{4}{9} = \frac{7 \times 4}{72} = \frac{28}{72}$.

Ἐκ τούτων ἔπειτα ἔτι: «διὰ νὰ πολλαπλασιάσωμεν κλάσμα ἐπὶ κλάσμα, πολλαπλασιάζομεν τοὺς ἀριθμητὰς των καὶ τὸ γινόμενον γράφομεν ἀριθμητὴν, ἔπειτα τοὺς παρονομαστὰς των καὶ τὸ γινόμενον γράφομεν παρονομαστὴν».

ε') Ἐὰν ὁ πολλαπλασιαστὴς ἦ καὶ οἱ δύο παράγοντες εἰνε μικροὶ ἀριθμοί, τρέπομεν αὐτοὺς εἰς ἰσοδύναμα κλάσματα καὶ

πολλαπλασιάζομεν τὰ αὐτὰ προκύπτοντα κλάσματα, ἢ πολλαπλασιάζομεν τὸν πολλαπλασιαστὸν χωριστὰ ἐπὶ τὸν ἀκέραιον καὶ χωριστὰ ἐπὶ τὸ κλάσμα τοῦ πολλαπλασιαστοῦ καὶ προσθέτομεν τὰ ἐξαγόμενα. Π.χ. $3 \frac{1}{2} \times \frac{3}{5} = \frac{7}{2} \times \frac{3}{5} = \frac{21}{10} = 2 \frac{1}{10}$.

Ὅμοιος $6 \frac{1}{2} \times 3 \frac{1}{4} = \frac{13}{2} \times \frac{13}{4} = \frac{169}{8} = 21 \frac{1}{8}$. Ἡ καὶ ἄλλως $6 \frac{1}{2} \times 3 \frac{1}{4} = 6 \frac{1}{2} \times 3 + 6 \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{13}{2} \times 3 + \frac{13}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{39}{2} + \frac{13}{8} = 19 \frac{1}{2} + 1 \frac{5}{8} = 20 + \frac{4}{8} + \frac{5}{8} = 20 + \frac{9}{8} = 21 \frac{1}{8}$.

στ') Ἐκ τοῦ ἀνωτέρω κανόνος συνάγομεν εὐκόλως ὅτι τὸ γινόμενον δύο κλασμάτων δὲν μεταβάλλεται, ἐὰν ἀλλάξωμεν τὴν θέσιν τῶν παραγόντων. Διότι τὸ γινόμενον $\frac{2}{5} \times \frac{4}{9}$ π. χ. εἶνε ἴσον μὲ $\frac{2 \times 4}{5 \times 9}$. Ἄλλ' εἰς τὸν ἀριθμητὴν καὶ τὸν παρονομαστὴν τούτου ἔχομεν γινόμενον ἀκεραίων ἀριθμῶν καὶ δυνάμεθα, ὡς γνωστὸν (§ 21), ν' ἀλλάξωμεν τὴν τὴν θέσιν αὐτῶν· ὥστε ἔχομεν

$$\frac{2}{5} \times \frac{4}{9} = \frac{2 \times 4}{5 \times 9} \times \frac{4 \times 2}{9 \times 5} = \frac{4}{9} \times \frac{2}{5}.$$

ζ') «Διὰ νὰ εὕρωμεν τὸ γινόμενον περισσοτέρων τῶν δύο κλασμάτων, γράφομεν ὡς ἀριθμητὴν τὸ γινόμενον πάντων τῶν ἀριθμητῶν τῶν δοθέντων καὶ παρονομαστὴν τὸ γινόμενον τῶν παρονομαστῶν τῶν».

$$\text{Ὅστω τὸ } \frac{2}{3} \times \frac{4}{5} \times \frac{1}{2} \times \frac{2}{5} = \frac{2 \times 4 \times 1 \times 2}{3 \times 5 \times 2 \times 5} = \frac{16}{150}.$$

Ἐπίσης εὐκόλως βλέπομεν, ὅτι τὸ γινόμενον ἑσωνδήποτε κλασμάτων, δὲν μεταβάλλεται, καθ' οἷανδήποτε τάξιν καὶ ἂν γράψωμεν τοὺς παράγοντας.

η') Ἐκ τῆς ιδιότητος αὐτῆς τοῦ γινομένου συνάγομεν, ὅτι δυνάμεθα πρὸ τῆς ἐκτελέσεως τοῦ πολλαπλασιασμοῦ δύο ἢ περισσοτέρων κλασμάτων, νὰ διαιροῦμεν τὸν ἀριθμητὴν ἑνὸς τῶν παραγόντων καὶ τὸν παρονομαστὴν ἑνὸς ὁποιοῦδήποτε ἐξ αὐτῶν διὰ τοῦ αὐτοῦ κοινοῦ διαιρέτου των. Ὅστω καθιστῶμεν τὸν πολλαπλα-

σιασμόν ευκολώτερον. Π. χ. ἂν ἔχωμεν τὸ γινόμενον $\frac{4}{9} \times \frac{3}{8}$ ἐπειδὴ τοῦτο εἶνε ἴσον μετὰ $\frac{4 \times 3}{9 \times 8}$ ἂν διαιρέσωμεν τὸ 4 καὶ 8 διὰ τοῦ 4, εὐρίσκωμεν $\frac{1 \times 3}{9 \times 2}$. Διαιροῦντες πάλιν τὸ 3 καὶ 9 διὰ τοῦ 3 λαμβάνομεν ἐξαγόμενον $\frac{1 \times 1}{3 \times 2} = \frac{1}{6}$.

Γράφομεν συνήθως οὕτω

$$\frac{4}{9} \times \frac{3}{8} = \frac{1}{9} \times \frac{3}{2} = \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$$

Ὅμοίως ἔχομεν

$$\frac{15}{24} \times \frac{2}{5} \times \frac{3}{8} = \frac{15}{12} \times \frac{1}{5} \times \frac{3}{8} = \frac{3}{12} \times \frac{1}{1} \times \frac{3}{8} = \frac{1}{4} \times \frac{1}{1} \times \frac{3}{8} = \frac{3}{32}$$

Ἀσκήσεις καὶ προβλήματα.

Ὅμας πρώτη. 1) Νὰ εὐρεθοῦν τὰ κατωτέρω γινόμενα, ἀφοῦ προηγουμένως γίνουσι αἱ δυναταὶ ἀπλοποιήσεις· α') $\frac{3}{4} \times \frac{5}{9}$ · β') $\frac{18}{25} \times \frac{5}{9}$ · γ') $\frac{45}{56} \times \frac{64}{81}$ · δ') $\frac{9}{14} \times \frac{36}{39}$ · ε') $8 \frac{2}{3} \times \frac{6}{13}$ ·

ς') $8 \frac{1}{8} \times 4 \frac{4}{15}$ · ζ') $8 \frac{14}{15} \times 2 \frac{1}{4}$ · η') $\frac{8}{11} \times 33$ · θ') $\frac{2}{8} \times 42$ ·

2) Ὅμοίως τὰ· α') $\frac{3}{7} \times \frac{7}{10} \times \frac{10}{21}$ · β') $\frac{5}{6} \times \frac{3}{4} \times \frac{8}{9} \times \frac{4}{28} \times \frac{6}{5}$ ·

γ') $362 \times \frac{23}{21} \times \frac{3}{16} \times \frac{9}{27}$ ·

3) Ὅμοίως τὰ· α') $1 \frac{3}{10} \times \frac{15}{26} \times 1 \frac{13}{40}$ · β') $2 \frac{2}{3} \times \frac{9}{10} \times \frac{25}{24} \times \frac{2}{3}$ ·

Ὅμας δευτέρα. 1) Νὰ εὐρεθοῦν τὰ κάτωθι γινόμενα κατὰ τὸν ἀπλούστερον τρόπον· α') $\frac{1}{10} \times \frac{1}{10}$ · β') $\frac{1}{100} \times \frac{1}{100}$ · γ') $\frac{1}{100} \times \frac{1}{1000}$ ·

δ') $\frac{1}{1000} \times 100$ · ε') $10 \times \frac{1}{1000}$ · ς') $\frac{1}{100} \times 100 \times \frac{3}{10}$ · ζ') $\frac{3}{10} \times 100 \times 5$ ·

2) Ὅμοίως τὰ· α') ἓν δέκατον ἐπὶ δέκα· β') μία δεκάς ἐπὶ ἓν δέκατον· γ') ἓν δέκατον ἐπὶ ἓν δέκατον· δ') Ε×ε· ε') Χ×χ· ς') Χ×ε· ζ') δ×δ×Ε· η') χ×Χ×ε×Ε·

Όμας τρίτη. 1) Έάν πολλαπλασιάσωμεν κλάσμα ἐπὶ τὸν παρονομαστήν του, εὐρίσκομεν τὸν ἀριθμητήν του. Διατί;

2) Ἡ ἄκτ᾽ ἀπράγματος στοιχίζει $2 \frac{3}{4} \left(3 \frac{1}{2} \right)$ δρ. πόσον στοιχίζουν $\frac{2}{5}, 1 \frac{3}{5}, 2 \frac{4}{5}$ ἄκτ.; 1.10 (1.40) 4.40(5.60) 7.70 (9.80)

3) Πόσον θὰ στοιχίζουν τὰ $\frac{3}{4} \left(1 \frac{3}{5} \right)$ πηχ., ἔταν ὁ πηχὺς τιμᾶται: $3 \frac{1}{4} \left(250 \frac{1}{4} \right)$ δρ.; 2 $\frac{7}{16}$ (400.40)

4) Ἐν κινήτῳ διανύει εἰς 1 ὥραν $5 \frac{3}{4} \left(7 \frac{1}{8} \right)$ χμ. πόσα διανύει: εἰς $\frac{4}{5}, \frac{3}{10}, 1 \frac{1}{2}, 1 \frac{1}{50}, 1 \frac{3}{20}$ ὥρ.; 4,6 (5.7) 1.725.
(2,1375) 8,625 (10,6875) 5,865 (7,2675) 6,6125 (8,19375)

5) Ἀγοράζει τις $36 \frac{1}{5} \left(48 \frac{1}{4} \right)$ ἄκτ. ἀπράγματος πρὸς $5 \frac{1}{4} \left(6 \frac{1}{5} \right)$ δρ. τὴν ἄκτ., τὸ πωλεῖ δὲ μὲ κέρδος $\frac{1}{4} \left(\frac{2}{5} \right)$ δρ. τὴν ἄκτ. πόσον τὸ ἐπώλησεν; 199,10 (318.45)

6) Ἐχει τις χρήματα διὰ νὰ περάσῃ $18 \frac{3}{4} \left(9 \frac{1}{5} \right)$ ἡμ., ἔάν ἐξοδεύῃ $10 \frac{1}{5} \left(8 \frac{3}{4} \right)$ δρ. καθ' ἡμέραν πόσας δραχμὰς ἔχει; 191,25 (80.50)

Όμας τετάρτη. 1) Νὰ εὐρεθοῦν τὰ γινόμενα: α') $2 \Delta \times 3$ δ' β') $3 \Delta \times 4$ δ' γ') $8 \text{ E} \times 7$ ε' δ') 46×5 ε' $\times 10$.

2) Ἐκ δύο τόπων, οἱ ὁποῖοι ἀπέχουν μεταξύ των $100 \frac{3}{4} \left(607 \frac{4}{5} \right)$ χμ., ἀναχωροῦν δύο ταχυδρόμοι πρὸς συνάντησίν των. Ἐάν ὁ μὲν διανύῃ $8 \frac{3}{4} \left(28 \frac{1}{4} \right)$ χμ. καθ' ἡμέραν, ὁ δὲ $6 \frac{1}{5} \left(32 \frac{1}{2} \right)$ χμ., πόσον θ' ἀπέχουν μετὰ $5 \frac{1}{2} \left(10 \right)$ ἡμ.; 18,525 (0,3)

3) Ἐχει τις $824 \frac{1}{4} \left(526 \frac{1}{5} \right)$ δρ. ἐξοδεύει τὸ $\frac{1}{7} \left(\frac{1}{4} \right)$ αὐτῶν. ἔπειτα τὸ $\frac{1}{3} \left(\frac{1}{5} \right)$ αὐτῶν καὶ τέλος τὰ $\frac{11}{21} \left(\frac{9}{24} \right)$ αὐτῶν πόσαι δραχμαὶ τοῦ ἔμειναν; (Κατὰ δύο ῥόπους). 0 (52,65)

4) Ἐχει τις $855 \left(156 \frac{3}{5} \right)$ δρ. καὶ ἐξοδεύει τὰ $\frac{2}{3} \left(\frac{1}{3} \right)$

Διὰ νὰ λύσωμεν τὸ πρόβλημα, πρέπει νὰ εὐρωμεν πόσον χωρεῖ τὸ $\frac{1}{2}$ δρ. εἰς τὸ $\frac{5}{2}$ δρ., ἤτοι νὰ εὐρωμεν τὸ πηλίκον $\frac{5}{2} : \frac{1}{2}$. Θεωροῦμεν τοὺς κλασματικούς ὡς ἀκεραίους 5 καὶ 1 μὲ τὴν ἐπωνυμίαν δεύτερα καὶ οὕτω ἔχομεν 5 δεύτερα δρ. : 1 δεύτερον δρ. = 5. ἄρα $\frac{5}{2} : \frac{1}{2} = 5$. Ἦτοι θ' ἀγοράσωμεν 5 τετράδια μὲ $\frac{5}{2}$ δρχ.

Ὁμοίως σκεπτόμενοι, εὐρίσκομεν ὅτι $\frac{8}{5} : \frac{3}{5} = 8$ πέμπτα : 3 πέμπτα. Ἀλλὰ τὸ πηλίκον τῆς διαιρέσεως 8 : 3 εἶνε, κατὰ τὰνωτέρω, ἴσον μὲ $\frac{8}{3}$. Ὡστε $\frac{8}{5} : \frac{3}{5} = \frac{8}{3}$.

Κατ' ἀνάλογον τρόπον εὐρίσκομεν τὸ πηλίκον δύο ὁμωνύμων κλασμάτων. θέτοντες τὸν ἀριθμητὴν τοῦ διαιρέτου ὡς ἀριθμητὴν καὶ τὸν τοῦ διαιρέτου ὡς παρανομοστήν.

6') (Πρόβλημα). «Πόσους πήχεις δαντέλας θ' ἀγοράσωμεν μὲ $\frac{7}{3}$ δρ., ἂν ὁ πήχυς τιμᾶται $\frac{5}{6}$ δρ. ;»

Διὰ νὰ λύσωμεν τὸ πρόβλημα, πρέπει νὰ εὐρωμεν, πόσον χωρεῖ τὸ $\frac{5}{6}$ δρ. εἰς τὸ $\frac{7}{3}$ δρ. Ἦτοι, πρέπει νὰ εὐρωμεν τὸ πηλίκον $\frac{7}{3} : \frac{5}{6}$. Τρέπομεν τὰ κλάσματα εἰς ὁμώνυμα καὶ ἀκολουθῶς ἐφαρμόζομεν τὸν ἀνωτέρω κανόνα. Οὕτω ἔχομεν ὅτι $\frac{7}{3} : \frac{5}{6} = \frac{14}{6} : \frac{5}{6} = \frac{14}{5} = 2 \frac{4}{5}$. Ἦτοι θ' ἀγοράσωμεν $2 \frac{4}{5}$ πήχ. δαντέλας.

Καὶ κατ' ἄλλον τρόπον παρατηροῦμεν ὅτι $\frac{3}{7} : \frac{6}{6} = \frac{7}{3} : 1 = \frac{7}{3}$. Ἐπομένως $\frac{7}{3} : \frac{1}{6}$ εἶνε ἐξάκις μεγαλύτερον τοῦ προηγουμένου, ἤτοι $\frac{7 \times 6}{3}$ καὶ $\frac{7}{3} : \frac{5}{6} = \frac{7 \times 6}{3 \times 5}$, δηλαδή πεντάκις μικρότερον τοῦ προηγουμένου.

Τὸ ἐξαγόμενον αὐτὸ εὐρίσκομεν ἀμέσως, ἐὰν τὸν διαιρέτον $\frac{7}{3}$ πολλαπλασιάσωμεν ἐπὶ τὸ κλάσμα τοῦ διαιρέτου $\frac{5}{6}$ ἀντεστραμμένον, ἤτοι ἐπὶ $\frac{6}{5}$, ὅτε ἔχομεν $\frac{7}{3} \times \frac{6}{5} = \frac{42}{15} = 2 \frac{4}{5}$.

Ἐκ τούτων καὶ ἄλλων ὁμοίων παραδειγμάτων ἔπεται ὅτι, «διὰ νὰ διαιρέσωμεν κλάσμα διὰ κλάσματος, πολλαπλασιά-

χομεν τὸν διαιρετέον ἐπὶ τὸ ἀντεστραμμένον κλάσμα τοῦ διαιρέτου.

Ὁ κανὼν ἰσχύει καὶ διὰ τὴν προηγούμενην περίπτωσιν, κατὰ τὴν ὁποίαν τὰ κλάσματα εἶνε ὁμώνυμα. Οὕτω ἔχομεν,

$$\frac{8}{5} : \frac{3}{5} = \frac{8}{5} \times \frac{5}{3} = \frac{8}{1} \times \frac{1}{3} = \frac{8}{3}.$$

γ) Ἐὰν ὁ διαιρέτης εἶνε μικτὸς ἀριθμὸς, τρέπομεν αὐτὸν εἰς ἰσοδύναμον κλάσμα καὶ οὕτω θὰ ἔχωμεν νὰ διαιρέσωμεν διὰ κλάσματος. Τὸ αὐτὸ κάμνομεν καὶ ἐὰν ὁ διαιρετέος ἦ καὶ οἱ δύο εἶνε μικτοὶ ἀριθμοί. Οὕτω π. χ. ἔχομεν $6 \frac{1}{2} : \frac{3}{4} = \frac{13}{2} : \frac{3}{4} = \frac{13}{2} \times \frac{4}{3} = \frac{26}{3} = 8 \frac{2}{3}$. Ὀμοίως $2 \frac{1}{5} : 4 \frac{1}{2} = \frac{11}{5} : \frac{9}{2} = \frac{11}{5} \times \frac{2}{9} = \frac{22}{45}$.

Ἀσκήσεις καὶ προβλήματα.

Ὅμας πρώτη. 1) Νὰ εὑρεθοῦν τὰ πηλίκα τῶν διαιρέσεων
 α') $\frac{3}{4} : \frac{4}{5}$. β') $\frac{35}{12} : \frac{15}{3}$. γ') $\frac{5}{6} : \frac{2}{9}$. δ') $4 \frac{1}{2} : \frac{4}{5}$. ε') $8 \frac{5}{6} : 1 \frac{1}{5}$. ζ') $5 \frac{1}{4} : 4 \frac{2}{7}$. η') $\frac{2}{5} : 1 \frac{13}{15}$. θ') $\frac{21}{37} : \frac{15}{8}$. ι') $4 \frac{11}{15} : \frac{7}{9}$.

2) Ὅμοίως τὰ πηλίκα τῶν α') $6 : \frac{2}{3}$. β') $12 : \frac{6}{7}$. γ') $22 : 3 \frac{2}{3}$.
 δ') $50 : \frac{25}{3}$. ε') $26 : 8 \frac{2}{3}$. ζ') $7 \frac{2}{3} : 9$. η') $13 : 5 \frac{1}{6}$.
 3) Ὅμοίως τῶν α') $7 : 2$. β') $51 : 4$. γ') $13,5 : 8$.

Ὅμας δευτέρα. 1) Νὰ εὑρεθοῦν τὰ πηλίκα α') $\frac{1}{10} : \frac{1}{100}$
 β') $\frac{1}{100} : \frac{1}{10}$. γ') $\frac{1}{1000} : \frac{1}{10}$. δ') $\frac{1}{1000} : \frac{1}{100}$. ε') $10 : \frac{1}{10}$.
 ζ') $\frac{1}{10} : 10$. η') $10000 : \frac{1}{10}$. θ') $\frac{1}{10} : 1000$.

2) Ὅμοίως τὰ α') 1 Ε : 1 ε. β') 1 Ε : 1 ε. γ') 1 Χ : 1 χ.
 3) Ἐπίσης τὰ α') 4 Δ : 2 δ. β') 8 Δ : 2 δ. γ) 9 Ε : 3 ε.
 δ) 6 Χ : 2 χ. ε') 3 δ : 3 ε. ζ') 7 Χ : 7.

Ὅμας τρίτη. 1) Ἐὰν πολλαπλασιάσωμεν ἓν κλάσμα ἐπὶ τὸ ἀντίστροφόν του, εὑρίσκομεν γινόμενον τὴν 1. Διατί;

2) Ἐὰν οἰονδήποτε ἀκέραιον παραστήσωμεν ὡς κλασματικόν, ἔχοντα παρονομαστήν τὴν 1, τὸ γινόμενον τούτου ἐπὶ τὸν ἀντίστροφόν του ἴσεται μὲ 1. Διατί;

1) ~~Ομάς τετάρτη.~~ 1) Τὰ $11 \frac{1}{4} \left(1 \frac{21}{25} \right)$ μέτρα υφάσματος τιμώνται $18 \frac{3}{4} \left(9 \frac{1}{5} \right)$ δρ. πόσα μέτρα αγοράζομεν με 1 δρ.; $\frac{9}{17} \left(\frac{1}{5} \right)$.

2) Έχει τις χρήματα διὰ τὴν περάση $72 \frac{3}{4} \left(18 \frac{3}{2} \right)$ ἡμ., ἐὰν ἐξοδεύη $8 \frac{1}{5} \left(7 \frac{1}{5} \right)$ δρ. καθ' ἡμέραν, πόσα χρήματα ἔχει καὶ πόσας ἡμέρας θὰ περάση μετὰ τὰ χρήματα αὐτά, ἐὰν ἐξοδεύη $9 \frac{7}{10} \left(7 \frac{2}{5} \right)$ δρ. καθ' ἡμέραν; ~~596,55 (133,20) 61,5 (18).~~

3) Αἱ $25 \left(4 \frac{1}{5} \right)$ ὀκ. πράγματα τιμώνται $26 \frac{1}{4} \left(73 \frac{1}{2} \right)$ δρ. πόσον τιμᾶται ἡ 1 ὀκά; ~~1,05 (17,50).~~

4) Ταχυδρόμος διανύει $37 \frac{1}{8} \left(48 \frac{4}{5} \right)$ χμ. καθ' ἡμέραν, πόσας ἡμέρας χρειάζεται διὰ τὴν διανύση $126 \frac{9}{19} \left(204 \frac{24}{25} \right)$ χμ.; ~~$3 \frac{85}{209} \left(4 \frac{1}{5} \right)$.~~

Ομάς πέμπτη. 1) Νὰ εὑρεθοῦν τὰ πηλίκα
 α) $2 \frac{1}{2} \times 1 \frac{1}{2} : \frac{5}{8}$ β) $1 \frac{11}{15} : 1 \frac{5}{9} \times \frac{15}{35}$ γ) $3 \frac{1}{5} \times \frac{4}{9} \times \frac{5}{8} : \frac{1}{2} : \frac{3}{4}$

2) Νὰ εὑρεθῇ ὁ ἀριθμὸς x, ὥστε νὰ εἶνε α) $1 \delta \times x = 1 \epsilon$
 β) $2 \epsilon \times x = 1 \delta$ γ) $3 \epsilon \times x = 1 \epsilon$ δ) $1 \delta \times x = 4 \epsilon$.

3) Ἐὰν εἰς ἀριθμὸς πολλαπλασιασθῇ ἐπὶ $3 \frac{1}{2} \left(4 \frac{1}{6} \right)$ δίδει γινόμενον $1 \frac{2}{3} \left(2 \frac{1}{2} \right)$. ποῖος εἶνε ὁ ἀριθμὸς αὐτός; $\frac{2}{5} \left(\frac{3}{5} \right)$.

4) Ποῖον ἀριθμὸν πρέπει νὰ πολλαπλασιάσωμεν ἐπὶ $2 \frac{1}{7} \left(\frac{2}{5} \right)$ διὰ νὰ εὐρωμεν γινόμενον $9 \left(1 \frac{1}{2} \right)$; $4 \frac{1}{5} \left(3 \frac{3}{4} \right)$.

§ 53. Σύνθετα κλάσματα.—

α) Εἰς τὴν § 53, δ' εἶδομεν ὅτι τὸ πηλίκον δύο ἀκεραίων ἀριθμῶν εὐνάμεθα νὰ παραστήσωμεν ὡς κλάσμα, ἔχον ἀριθμητὴν τὸν διαιρέτην καὶ παρονομαστὴν τὸν διαιρετόν.

Καθ' ὅμοιον τρόπον, ἐὰν ἔχωμεν τὴν διαίρεσιν $\frac{3}{4} : 5$, εὐνάμεθα νὰ παραστήσωμεν τὸ πηλίκον διὰ τοῦ κλάσματος $\frac{3}{4 \cdot 5}$ τὸ ὅποιον

ἔχει ἀριθμητὴν τὸν κλασματικὸν διαιρετὸν $\frac{3}{4}$ καὶ παρονομαστὴν

τὸν διαιρέτην 5. Ὡστε θὰ ἔχωμεν $\frac{3}{4} : 5 = \frac{3}{4 \cdot 5}$.

Ὁμοίως τὸν πηλίκον οἰωνδήποτε ἀριθμῶν παριστάνομεν ὡς κλάσμα, ἔχον ἀριθμητὴν τὸν διαιρετὸν καὶ παρονομαστὴν τὸν διαιρέτην.

Ὁὕτω ἔχομεν $7 : \frac{5}{8} = \frac{7}{\frac{5}{8}} = \frac{7}{1} \cdot \frac{8}{5} = \frac{56}{5}$.

$$8 : 3 \frac{1}{4} = \frac{8}{3 \frac{1}{4}} = \frac{8}{\frac{13}{4}} = \frac{8 \cdot 4}{13} = \frac{32}{13}$$

$$3,58 : 2 \frac{1}{4} = \frac{3,58}{2 \frac{1}{4}} = \frac{3,58}{\frac{5}{2}} = \frac{3,58 \cdot 2}{5} = \frac{7,16}{5}$$

Τὰ κλάσματα τῶν ὁποίων τοὐλάχιστον εἰς ἕνα δὲν εἶνε ἀκέραιος καλοῦμεν σύνθετα, πρὸς διάκρισιν αὐτῶν ἀπὸ τῶν μέχρι τοῦδε γνωστῶν, τὰ ὁποῖα καλοῦμεν ἀπλά.

Τοὺς ἕνας τῶν συνθέτων κλασμάτων κλείομεν συνήθως ἐντὸς παρενθέσεων, εἰς εἰς ἀνάγκη νὰ διακρίνωμεν αὐτούς.

Εἰς τὰ σύνθετα κλάσματα ἔχουν τὰς ιδιότητες τῶν ἀπλῶν, ἐπειδὴ εἶνε πηλίκαι διαιρέσεων τῶν ἀριθμητῶν διὰ παρονομαστῶν τῶν.

Ἐστὼ ὅτι δίδεται ἓν σύνθετον κλάσμα, π. χ. τὸ $\left(\frac{\frac{3}{4}}{\frac{5}{8}}\right)$ καὶ

θέλομεν νὰ τρέψωμεν αὐτὸ εἰς ἀπλοῦν. Ἐχομεν

$$\left(\frac{\frac{3}{4}}{\frac{5}{8}}\right) = \frac{3}{4} : \frac{5}{8} = \frac{3}{4} \times \frac{8}{5} = \frac{3}{1} \times \frac{2}{5} = \frac{6}{5} = 1 \frac{1}{5}$$

Ὁμοίως τὸ

$$\left(\frac{6 \frac{1}{2}}{5}\right) = 6 \frac{1}{2} : 5 = \frac{13}{2} : 5 = \frac{13}{2} \cdot \frac{1}{5} = \frac{13}{10} = 1 \frac{3}{10} = 1,3$$

Ἐπίσης τὸ

$$\frac{2\frac{3}{4}}{\frac{5}{8}} = 2\frac{3}{4} : \frac{5}{8} = \frac{11}{4} : \frac{5}{8} = \frac{11}{4} \times \frac{8}{5} = \frac{11}{1} \times \frac{2}{5} = 4\frac{2}{5}$$

Ἐκ τούτων συνάγομεν ὅτι: «διὰ νὰ τρέψωμεν σύνθετον κλάσμα εἰς ἀπλοῦν, ἀρκεῖ, νὰ ἐκτελέσωμεν τὴν διαίρεσιν, τῆς ὁποίας διαιρετέος εἶνε ὁ ἀριθμητὴς καὶ διαιρέτης ὁ παρανομαστὴς αὐτοῦ».

Προβλήματα πρὸς λύσιν.

1) Νὰ τραποῦν τὰ κάτωθι σύνθετα κλάσματα εἰς ἀπλᾶ.

α') $\frac{6}{7} \cdot \frac{4}{6}$ β') $\frac{3}{\frac{1}{5}}$ γ') $\frac{(2\frac{1}{4})}{\frac{4}{9}}$ δ') $\frac{8,35}{6\frac{1}{5}}$

ε') $3\frac{\frac{13}{5}}{\frac{1}{2}}$ ς') $\frac{3+2\frac{1}{5}}{(7\frac{3}{8})}$ ζ') $\frac{(\frac{28}{3})}{(\frac{2}{3})}$ η') $\frac{(\frac{2}{4\frac{1}{5}})}{(\frac{4}{25})}$

θ') $\frac{(\frac{1}{7})}{(8\frac{\frac{1}{3}}{2})}$ ι') $\frac{2\frac{54}{100} + \frac{3}{4} - \frac{15}{100}}{8-5\frac{1}{2}}$

2) Πόσον χωρεῖ ὁ ἀριθμὸς $2\frac{1}{5} (\frac{1}{4})$ εἰς τὴν ἀριθμὸν $123\frac{1}{4}$ ($616\frac{1}{4}$); 308.125 (24, 65).

3) Ἐὰν ἡ ὀκτὰ τοῦ καφέ τιμᾶται $3\frac{3}{4}$ δρα., πόσας ἐκάδας θὰ ἀγοράσωμεν μετὰ $32\frac{2}{3}$ δρα.; 8 $\frac{32}{45}$.

4) Ἠγόρασέ τις $3\frac{1}{2}$ πήχ. ὑφάσματος, ἔπειτα $\frac{4}{45}$ πήχ. ἄλλου ὑφάσματος καὶ $2\frac{1}{8}$ πήχ. ἄλλου, ἐπλήρωσε δὲ ἐν ἔλῳ $60\frac{4}{5}$ δρα. πόσον τιμᾶται ὁ 1 πήχ. κατὰ μέσον ἔρον 10 $\frac{1318}{2057}$.

5) Τὰ $\frac{2}{3}$ τοῦ πήχους ἑνὸς ὑφάσματος τιμῶνται 6 $\frac{1}{5}$ δρ. πόσον τιμᾶται ὁ 1 πήχυς ; 9,30 δρ.

6) Πόσον χωρεῖ ὁ ἀριθμὸς 6 $\frac{1}{2}$ δκ. εἰς τὸ 150 δκ. ; 23 $\frac{1}{13}$

§ 56. Λύσεις προβλημάτων διὰ τῆς μεθόδου τῆς ἀναγωγῆς εἰς τὴν μονάδα.—

α') Προβλήματα πολλαπλασιασμοῦ.—

1) « Ἡ δὲ ἑνὸς πράγματος τιμᾶται 4 δρ. πόσον τιμῶνται τὰ $\frac{3}{4}$ τῆς δὲ ; »

Διὰ τὴν λύσιν τοῦ προβλήματος, σκεπτόμεθα ὡς ἑξῆς. Ἄφου ἡ 1 δκ. τιμᾶται 4 δρ., τὸ $\frac{1}{4}$ τῆς δὲ, τὸ ὅποιον εἶνε 4 φορές μικρότερον τῆς δὲ, θὰ τιμᾶται 4 φορές ὀλιγώτερον τῶν 4 δρ. ἦτοι 4 δρ. : 4 = 1 δρ. καὶ τὰ $\frac{3}{4}$ δκ., τὸ ὅποιον εἶνε 3 φορές μεγαλύτερον τοῦ $\frac{1}{4}$ δκ., θὰ τιμᾶται 3 φορές περισσότερον τῆς 1 δρ., ἦτοι 1 δρ. × 3 = 3 δρ. Ὡστε τὰ $\frac{3}{4}$ δκ. τιμῶνται 3 δρ.

Ἡ λύσις διατάσσεται συνήθως ὡς ἑξῆς.

Ἡ 1 (= $\frac{4}{4}$) δκ. τιμῶνται 4 δρ.

τὸ $\frac{1}{4}$ 4 δρ. : 4 = 1 δρ.

τὰ $\frac{3}{4}$ 1 δρ. × 3 = 3 δρ.

Παρατηροῦμεν ὅτι, τὸ αὐτὸ ἐξαχόμενον εὐρίσκομεν ταχύτερον, ἐὰν πολλαπλασιάσωμεν τὸ 4 δρ. ἐπὶ $\frac{3}{4}$, ἦτοι διὰ τοῦ πολλαπλασιασμοῦ $4 \times \frac{3}{4}$. Πράγματι $4 \times \frac{3}{4} = 1 \times \frac{3}{1} = 3$.

Ὁ ἀνωτέρω τρόπος τῆς λύσεως τοῦ προβλήματος λέγεται μέθοδος τῆς ἀναγωγῆς εἰς τὴν μονάδα. Διότι, διὰ τὴν εὐρωμεν τὴν τιμὴν τῶν $\frac{3}{4}$ δκ., εὐρήκαμεν πρῶτον τὴν τιμὴν τοῦ $\frac{1}{4}$ δκ. (τῆς μιᾶς κλασματικῆς μονάδος) καὶ ἀκολουθῶν τὴν τιμὴν τῶν $\frac{3}{4}$ δκ. (τῶν παλλῶν κλασματικῶν μονάδων).

2) «Νὰ εὑρεθοῦν τὰ $\frac{5}{6}$ τοῦ ἀριθμοῦ 48».

Παρατηροῦμεν ὅτι, ὁλόκληρος ὁ ἀριθμὸς ἔχει $\frac{6}{6}$ καὶ λύομεν τὸ πρόβλημα ὡς ἑξῆς διὰ τῆς μεθόδου τῆς ἀναγωγῆς εἰς τὴν μονάδα.

Τὸ $\frac{6}{6}$ τοῦ ἀριθμοῦ εἶνε	48
τὸ $\frac{1}{6}$	48 : 6 = 8.
τὰ $\frac{5}{6}$	8 × 5 = 40.

Ὅστε τὰ $\frac{4}{5}$ τοῦ 48 εἶνε 40. Τὸ αὐτὸ ἐξαγόμενον εὐρίσκομεν διὰ τοῦ πολλαπλασιασμοῦ $48 \times \frac{5}{6}$. Πράγματι $48 \times \frac{5}{6} = 8 \times 5 = 40$.

Καθ' ὅμοιον τρόπον γίνεται ἡ λύσις ὁμοίων προβλημάτων εἰς τὰ ἑποῖα οἱ ἀριθμοὶ εἶνε μικτοί. Πρὸς ἐυκολίαν τρέπομεν αὐτοὺς προηγουμένως εἰς κλασματικούς. Ὄστω π.χ. λύομεν τὸ κατωτέρω πρόβλημα.

3) «Ὁ 1 πῆχυς ἐνὸς ὑφάσματος τιμᾶται 15 $\frac{1}{2}$ δρ. πόσον τιμῶνται 4 $\frac{1}{4}$ = $\frac{17}{4}$ πῆχ. αὐτοῦ;»

Ἐν πρώτοις γράφομεν

$$1 \text{ πῆχ. τιμᾶται } 15 \frac{1}{2} = \frac{31}{2} \text{ δρ.}$$

$$4 \frac{1}{4} = \frac{17}{4} \quad \dots \quad x$$

καὶ ἀκολουθῶς λύομεν αὐτὸ διὰ τῆς ἀναγωγῆς εἰς τὴν μονάδα ὡς ἑξῆς.

$$\text{Ὁ } 1 \left(= \frac{4}{4} \right) \text{ πῆχ. τιμᾶται } \dots \frac{31}{2} \text{ δρ.}$$

$$\text{τὸ } \frac{1}{4} \dots \frac{31}{2} : 4 = \frac{31}{8} \text{ δρ.}$$

$$\text{τὰ } \frac{17}{4} \dots \frac{31}{8} \times 17 = \frac{527}{8} = 65 \frac{7}{8} \text{ δρ.}$$

Εἰς τὸ κατωτέρω πρόβλημα καὶ τὰ ὅμοια πρὸς αὐτὰ δίδεται ἡ τιμὴ μιᾶς μονάδος καὶ ζητεῖται ἡ τιμὴ πολλῶν μερῶν τῆς μονάδος. Πρὸς λύσιν αὐτῶν κάμνομεν πολλαπλασιασμὸν καὶ πολλα-

πλασιαστέος εἶνε ἡ τιμὴ τῆς μονάδος, πολλαπλασιαστῆς δὲ ὁ ἀριθμὸς, ὁ ὁποῖος καριστάνει τὰ μέρη τῆς μονάδος, τῶν ὁποίων ἡ τιμὴ ζητεῖται (παράβαλε μὲ τὴν § 19, δ'). Εἰς τὸν κανόνα περιλαμβάνονται καὶ τὰ προβλήματα εἰς τὰ ὁποῖα δίδεται εἰς ἀριθμὸς καὶ ζητεῖται νὰ εὑρεθῇ πολλαπλασίον ἢ καὶ μέρος αὐτοῦ.

Συγκρίνοντας τὸν κανόνα αὐτὸν πρὸς τὸν εἰς τὴν (§ 19, δ') βλέπομεν, ὅτι εἶνε ὁμοῖος πρὸς ἐκεῖνον καὶ συνάγομεν ὅτι,

«δυνάμεθα νὰ λύσωμεν διὰ πολλαπλασιαμοῦ πλεῖστα προβλήματα εἰς τὰ ὁποῖα δίδεται ἡ τιμὴ τῆς μιᾶς μονάδος καὶ ζητεῖται ἡ τιμὴ πολλῶν ὁμοειδῶν μονάδων, ἢ καὶ μερῶν τῆς μονάδος».

Ε') Προβλήματα διαιρέσεως.

(Πρόβλημα) 1). «Τὰ $\frac{5}{8}$ πήχ. ἐνὸς ὑφάσματος τιμῶνται 10 $\frac{1}{2}$ δρ. πόσον τιμᾶται ὁ 1 πήχυς;»

Τρέπομεν τὸν μικτὸν εἰς κλάσμα καὶ γράφομεν

$$\frac{5}{8} \text{ πήχως τιμῶνται } 10 \frac{1}{2} = \frac{21}{2} \text{ δρ.}$$

$$\frac{1 \text{ πήχυς}}{x}$$

Ἀκολουθῶς λύομεν τὸ πρόβλημα διὰ τῆς μεθόδου τῆς ἀναγωγῆς εἰς τὴν μονάδα ὡς ἑξῆς.

$$\text{Τὰ } \frac{5}{8} \text{ πήχ. τιμῶνται } \frac{21}{2} \text{ δρ.}$$

$$\text{τὸ } \frac{1}{8} \text{ } \frac{21}{2} : 5 = \frac{21}{2 \times 5} = \frac{21}{10} \text{ δρ.}$$

$$\text{τὰ } \frac{8}{8} (=1) \text{ } \frac{21}{10} \times 8 = \frac{21}{5} \times 4 = \frac{84}{5} = 16 \frac{4}{5} \text{ δρ.}$$

Τὸ αὐτὸ ἐξαγόμενον εὐρίσκομεν, ἐὰν διαιρέσωμεν τὸ $\frac{21}{2}$ δρ. διὰ τοῦ

$$\frac{5}{8}. \text{ Πράγματι } \frac{21}{2} : \frac{5}{8} = \frac{21}{2} \times \frac{8}{5} = \frac{21}{1} \times \frac{4}{5} = \frac{84}{5} = 16 \frac{4}{5}.$$

(Πρόβλημα) 2). «Αἰ 5 $\frac{1}{2}$ ὀκ. ἐνὸς πράγματος τιμῶνται 27 $\frac{1}{2}$

δραχμάς' πόσον τιμᾶται ἡ ὀκᾶ;»

Ἐν πρώτοις γράφομεν

$$5 \frac{1}{2} = \frac{11}{2} \text{ δκ. τιμώνται } 27 \frac{1}{2} = \frac{55}{2} \text{ δρ.}$$

1 δκ. x

καὶ ἀκολουθῶς λύομεν αὐτὸ ὡς ἑξῆς.

Τὰ $\frac{11}{2}$ δκ. τιμώνται $\frac{55}{2}$ δρ.

τὸ $\frac{1}{2}$ » » $\frac{55}{2} : 11 = \frac{55}{2 \times 11}$ δρ.

τὰ $\frac{2}{2} (=1)$ » $\frac{55}{2 \times 11} \times 2 = 5$ δρ.

Τὸ αὐτὸ ἐξαγόμενον εὐρίσκομεν, ἐὰν διαιρέσωμεν τὸ $27 \frac{1}{2}$ διὰ τοῦ

$5 \frac{1}{2}$. Πράγματι ἔχομεν $27 \frac{1}{2} : 5 \frac{1}{2} = \frac{55}{2} : \frac{11}{2} = \frac{55}{2} \times \frac{2}{11} = \frac{55}{11} = 5$.

(Πρόβλημα 3). «Τὸ τριπλάσιον καὶ τὰ $\frac{2}{3}$ ἑνὸς ἀριθμοῦ ἀποτελοῦν τὸν ἀριθμὸν 11. Ποῖος εἶνε ὁ ἀριθμὸς αὐτός;»

Γράφομεν ἐν πρώτοις

$$3 \frac{2}{3} = \frac{11}{3} \text{ τοῦ ἀριθμοῦ εἶνε } 11$$

1 x

καὶ λύομεν αὐτὸ ὡς ἑξῆς.

Τὰ $\frac{11}{3}$ τοῦ ἀριθμοῦ εἶνε 11

τὸ $\frac{1}{3}$ » » $11 : 11 = 1$

τὰ $\frac{3}{3} (=1)$ » $1 \times 3 = 3$.

Τὸ αὐτὸ ἐξαγόμενον εὐρίσκομεν ἀμέσως, ἐὰν διαιρέσωμεν τὸν 11 διὰ τοῦ $\frac{11}{3}$. Πράγματι εἶνε $11 : \frac{11}{3} = 11 \times \frac{3}{11} = 3$.

Εἰς τ' ἀνωτέρω προβλήματα καὶ τὰ ὅμοια πρὸς αὐτὰ δίδεται ἡ τιμὴ μερῶν τῆς μονάδος καὶ ζητεῖται νὰ εὐρεθῇ ἡ τιμὴ τῆς μιᾶς ἀκεραίας μονάδος. Πρὸς λύσιν αὐτῶν κάμνομεν διαίρεσιν καὶ διαιρητέος μὲν εἶνε ἡ τιμὴ τῶν μερῶν τῆς μονάδος, ἡ ὅποια δίδεται, διαιρέτης δὲ ὁ ἀριθμὸς, ὁ ὅποιος παριστάνει τὰ μέρη τῆς μονάδος (παράβ. § 25, β'). Εἰς τὸν αὐτὸν κανόνα περιλαμ-

θάνεται και ή λύσις τῶν προβλημάτων εἰς τὰ ὅποια δίδεται πολλαπλάσιον ἢ μέρος ἐνὸς ἀριθμοῦ και ζητεῖται νὰ εὔρεθῇ αὐτὸς ὁ ἀριθμός.

Συγκρίνοντας τὸν κανόνα αὐτὸν πρὸς τὸν εἰς τὴν § 25, 6) βλέπομεν, ὅτι εἶνε ὅμοιος μὲ ἐκεῖνον, και συνάγομεν ὅτι·

«δυνάμεθα νὰ λύωμεν διὰ διαιρέσεως πλεῖστα προβλήματα εἰς τὰ ὅποια δίδεται ἡ τιμὴ πολλῶν μονάδων και μερῶν αὐτῆς, ζητεῖται δὲ ἡ τιμὴ τῆς μιᾶς μονάδος.

(Πρόβλημα 4). «Μὲ 2 $\frac{1}{2}$ δρ. ἀγοράζει τις 1 ὀκ. πράγματος μὲ 17 δρ. πόσας ὀκάδας θ* ἀγοράσῃ;»

Γράφομεν ἐν πρώτοις

$$\text{μὲ } 2 \frac{1}{2} = \frac{5}{2} \text{ δρ. ἀγοράζει } 1 \text{ ὀκ.}$$

$$\text{» } 17 \dots \dots \dots x$$

και ἀκολουθῶς λύομεν τὸ πρόβλημα ὡς ἑξῆς

$$\text{Μὲ } \frac{5}{2} \text{ δρ. ἀγοράζει } \dots \dots \dots 1 \text{ ὀκ.}$$

$$\text{» } \frac{1}{2} \quad \text{»} \quad \dots \dots \dots 1:5 = \frac{1}{5} \text{ ὀκ.}$$

$$\text{» } \frac{2}{2} (=1) \quad \text{»} \quad \dots \dots \dots \frac{1}{5} \times 2 = \frac{2}{5} \text{ ὀκ.}$$

$$\text{» } 17 \quad \text{»} \quad \dots \dots \dots \frac{2}{5} \times 17 = \frac{34}{5} = 6 \frac{4}{5} \text{ ὀκ.}$$

Τὸ αὐτὸ ἐξαγόμενον εὐρίσκομεν, ἐὰν ἐκτελέσωμεν τὴν διαίρεσιν

$$17 : 2 \frac{1}{2}. \text{ Ἦτοι } 17 : \frac{5}{2} = 17 \times \frac{2}{5} = 6 \frac{4}{5}.$$

(Πρόβλημα 5). «Εἰς ἐργάτης τελειώνει τὰ $\frac{3}{8}$ ἐνὸς ἔργου εἰς

1 ὥραν· εἰς πόσας ὥρας θὰ τελειώσῃ τὰ $\frac{7}{10}$ τοῦ ἔργου;»

Γράφομεν ἐν πρώτοις

$$\frac{3}{8} \text{ τοῦ ἔργου τελειώνει εἰς } 1 \text{ ὥρ.}$$

$$\frac{7}{10} \dots \dots \dots x$$

και ἀκολουθῶς λύομεν αὐτὸ ὡς ἑξῆς.

τὰ $\frac{3}{8}$ ἔργ.	τελειώνει εἰς	1 ὥρ.
τὸ $\frac{1}{8}$ »	» »	1:3 = $\frac{1}{3}$ ὥρ.
τὰ $\frac{8}{8}$ (=1)	» »	$\frac{1}{3} \times 8 = \frac{8}{3}$ ὥρ.
τὸ $\frac{1}{10}$	» »	$\frac{8}{3} : 10 = \frac{8}{3 \times 10}$ ὥρ.
τὰ $\frac{7}{10}$	» »	$\frac{8}{3 \times 10} \times 7 = \frac{56}{30}$ ὥρ.

Τὸ αὐτὸ ἐξαγόμενον εὐρίσκομεν, ἐὰν ἐκτελέσωμεν τὴν διαίρεσιν

$$\frac{7}{10} : \frac{3}{8}. \text{ Πράγματι } \frac{7}{10} : \frac{3}{8} = \frac{7}{10} \times \frac{8}{3} = \frac{56}{30}.$$

Εἰς καθέν τῶν δύο τελευταίων προβλημάτων καὶ εἰς τὰ ὅμοια πρὸς αὐτὰ δίδεται ἡ τιμὴ μιᾶς μονάδος καὶ ἡ τιμὴ πολλῶν ὁμοειδῶν μονάδων ἢ μερῶν αὐτῆς καὶ ζητεῖται νὰ εὐρεθῇ τὸ πλῆθος τῶν μονάδων τούτων.

Τὰ προβλήματα αὐτὰ λύομεν ἀμέσως διὰ διαιρέσεως καὶ διαιρητέος μὲν εἶνε ἡ τιμὴ τῶν μονάδων, ἢ τῶν μερῶν αὐτῆς, διαιρέτης δὲ ἡ τιμὴ τῆς μονάδος (παράβ. § 25 στ').

§ 57. Τροπὴ κλάσματος εἰς δεκαδικόν.—

α) Διὰ νὰ στρέψωμεν κλάσμα, π. χ. τὸ $\frac{3}{8}$ εἰς δεκαδικόν ἀριθμόν, παρατηροῦμεν ὅτι δυνάμεθα μετατρέψωμεν αὐτὸ εἰς τὴν διαίρεσιν 3 : 8, ἐπειδὴ $3 : 8 = \frac{3}{8}$ (§ 53, δ').

Ἐὰν τὸν διαιρητέον τῆς διαιρέσεως αὐτῆς γράψωμεν ὡς δεκαδικόν 3,00..... θὰ ἔχωμεν $\frac{3}{8} = 3,00 \dots : 8$ καὶ ἐκτελοῦντες τὴν διαίρεσιν αὐτὴν εὐρίσκομεν πηλίκον 0,375. Ὡστε $\frac{3}{8} = 0,375$.

Ὁμοίως εὐρίσκομεν ὅτι τὸ κλάσμα $\frac{13}{20} = 13,000 \dots : 20 = 0,65$.

Ἐκ τούτων ἐπιτεταί ὅτι «διὰ νὰ τρέψωμεν κλάσμα εἰς δεκαδικόν ἀριθμόν, γράφομεν τὸν ἀριθμητὴν ὑπὸ δεκαδικὴν μορφήν καὶ ἀκολούθως διαιροῦμεν τούτον διὰ τοῦ παρονομαστοῦ τοῦ κλάσματος».

β) Ἐστω ὅτι θέλομεν νὰ τρέψωμεν εἰς δεκαδικόν τὸ κλάσμα $\frac{1}{3}$. Κατὰ τὰ ἀνωτέρω θὰ ἔχωμεν $\frac{1}{3} = 1,00 \dots : 3 = 0,333 \dots$

Καθώς βλέπομεν, δυνάμεθα νὰ ἀξακολουθήσωμεν τὴν διαίρεσιν ὅσον θέλομεν, χωρὶς νὰ εὐρωμεν ποτὲ ὑπόλοιπον 0, τὸ δὲ πηλίκον θὰ ἔχη ἀναρίθμητα δεκαδικὰ ψηφία. Τὰ αὐτὰ παρατηροῦμεν, ἐὰν ἔχωμεν τὸ κλάσμα $\frac{2}{7}$ καὶ θέλωμεν νὰ τρέψωμεν αὐτὸ εἰς δεκαδικὸν ἀριθμὸν.

Ἐκ τούτων ἔπεται ὅτι, κατὰ τὴν τροπὴν κλάσματος εἰς δεκαδικόν, ἢ θὰ εὐρωμεν κατὰ τὴν διαίρεσιν ὑπόλοιπον 0, ὅποτε τὸ κλάσμα τρέπεται εἰς δεκαδικὸν ἀριθμὸν, ἢ ἡ διαίρεσις δύναται νὰ ἀξακολουθήσῃ ἐπ' ἄπειρον, ὅποτε δυνάμεθα νὰ εὐρωμεν ἀναρίθμητα ψηφία τοῦ πηλίκου.

Εἰς τὴν δευτέραν περίπτωσιν παρατηροῦμεν ὅτι, ἐν ἡ περισσότερα ψηφία τοῦ πηλίκου ἐπαναλαμβάνονται ἀπὸ τινος καὶ ἐξῆς τὰ αὐτὰ καὶ κατὰ τὴν αὐτὴν τάξιν. Οὕτω π. χ. κατὰ τὴν τροπὴν τοῦ $\frac{1}{3}$ εἰς δεκαδικόν, τὸ πηλίκον ἔχει ἄπειρα δεκαδικὰ ψηφία καὶ πάντα τὰ αὐτὰ. Ὁμοίως κατὰ τὴν τροπὴν τοῦ $\frac{2}{7}$ ἔχομεν ὅτι τὸ πηλίκον εἶνε 0,285714285..., ἤτοι ἔχει ἄπειρα δεκαδικὰ ψηφία, ἐπαναλαμβάνονται δέ, εἰς αὐτὰ κατὰ τὴν αὐτὴν τάξιν τὰ 2· 8· 5· 7· 1· 4.

γ') Δεκαδικοὶ ἀριθμοὶ μὲ ἀναρίθμητα δεκαδικὰ ψηφία, τὰ ὅποια ἐπαναλαμβάνονται ἀπὸ τινος καὶ ἐξῆς κατὰ τὴν αὐτὴν τάξιν, λέγονται περιοδικοὶ δεκαδικοὶ ἀριθμοί, ἢ δὲ ὁμὰς τῶν ἐπαναλαμβανομένων ψηφίων λέγεται περίοδος. Οἱ μέχρι τοῦδε δεκαδικοὶ ἀριθμοί, οἱ ὅποιοι ἔχουν ὀρισμένον πλῆθος δεκαδικῶν ψηφίων λέγονται κοινὸι δεκαδικοὶ πρὸς διάκρισιν ἀπὸ τῶν περιοδικῶν.

* Ἀ σ κ ῆ σ ε ι ς .

1) Νὰ τραποῦν τὰ ἐπόμενα κλάσματα εἰς δεκαδικούς ἀριθμούς, (Ἐὰν ὁ προκύπτων ἀριθμὸς εἶνε περιοδικός, νὰ διακοπῇ ἡ διαίρεσις μετὰ τὴν εὐρεσιν τῆς περιόδου) α')

$$\frac{1}{2}, \frac{3}{4}, \frac{5}{8}, \frac{7}{16}, \frac{11}{21} \quad \beta') \frac{2}{3},$$

$$\frac{3}{10}, \frac{7}{20}, \frac{8}{25} \quad \gamma') \frac{6}{7}, 6\frac{2}{3}, 16\frac{1}{11}, \frac{10}{13}.$$

2) Ὁμοίως τὰ κλάσματα α') $\frac{37}{180}, \frac{57}{200}, \frac{753}{1080}, \frac{8483}{1000}$. β') $\frac{2}{10}, \frac{1}{11}, \frac{2}{9}, \frac{5}{12}$. γ') $\frac{7}{13}, \frac{5}{7}, \frac{4}{24}, \frac{516}{9}$. δ') $\frac{17}{63}, \frac{8}{15}, \frac{51}{12}, \frac{107}{12}$.

3) Νὰ εὐρεθοῦν τὰ ἐξαγόμενα τῶν κάτωθι πράξεων

α') $1\frac{1}{2} + 3,5$. β') $2\frac{3}{4} - 1,52$. γ') $2\frac{4}{55} \times 3,12$. δ') $3\frac{3}{20} \times 4,1$.
 ε') $4\frac{4}{5} : 2,16$.

§ 38. Τροπὴ δεκαδικοῦ ἀριθμοῦ εἰς κλάσμα.—

Διὰ νὰ τρέψωμεν κοινὸν δεκαδικὸν ἀριθμὸν εἰς κλάσμα, π. χ. τὸν 0,345 ἀπαγγέλλομεν αὐτὸν ὡς ἐξῆς· τριακόσια τεσσαράκοντα πέντε χιλιοστά καὶ γράφομεν αὐτὸν ἀμέσως ὑπὸ μορφῆν κλασματικὴν ἧτοι $\frac{345}{1000}$ ἀπλοποιούντες δι' αὐτὸ εὐρίσκομεν $\frac{69}{200}$.

Ὁμοίως εὐρίσκομεν ὅτι $1,43 = \frac{143}{100}$. Ἐκ τούτων συναγομεν ὅτι,

διὰ νὰ τρέψωμεν κοινὸν δεκαδικὸν ἀριθμὸν εἰς κλάσμα, γράφομεν ἀριθμητὴν τὸν δοθέντα ἀριθμὸν χωρὶς κόμμα, παρονομαστήν δὲ τὴν μονάδα ἀκολουθουμένην ἀπὸ τόσα μηδενικά, ὅσα εἶνε τὰ δεκαδικὰ ψηφία τοῦ δοθέντος ἀριθμοῦ.

§ 39. Πράξεις ἐπὶ κλασμάτων καὶ δεκαδικῶν ἀριθμῶν.—

α') (Πρόβλημα). «Ἠγόρασε τις 100 δρ. μήλα πρὸς $7\frac{1}{2}$ δρ. τὴν ὀκτῶν πόσα ἐπλήρωσε;»

Ὡς γνωστὸν, διὰ νὰ λύσωμεν τὸ πρόβλημα αὐτό, πρέπει νὰ πολλαπλασιάσωμεν τὸ $7\frac{1}{2}$ δρ. ἐπὶ 100. Ἀλλὰ πρὸς εὐκολίαν τρέπομεν τὸ $7\frac{1}{2}$ δρ. εἰς δεκαδικὸν 7,5 δρ., ὅτε ὁ πολλαπλασιασμὸς γίνεται εὐκολώτερον καὶ ἔχομεν $7,5 \times 100 = 750$ δρ.

β') Ἐστω ὅτι ἔχομεν ν' ἀφαιρέσωμεν ἀπὸ τοῦ 42,85 δρ. τὸ $7\frac{5}{8}$ δρ. Διὰ νὰ ἐκτελέσωμεν τὴν ἀφαίρεσιν, πρέπει νὰ τρέψωμεν τὸν δεκαδικὸν εἰς κλάσμα, ἢ τοῦναντίον τὸν $\frac{5}{8}$ εἰς δεκαδικόν.

Εἰς τὴν δευτέραν περίπτωσιν ἔχομεν $\frac{5}{8} = 0,625$, ἐπομένως $7\frac{5}{8} = 7,625$. Ἄρα $42,85 \delta\rho. - 7,625 \delta\rho. = 35,225 \delta\rho.$

γ') Ἐκ τούτων καὶ ἄλλων παραδειγμάτων βλέπομεν ὅτι, ἔσταν ἔχωμεν νὰ ἐκτελέσωμεν πράξεις ἐπὶ κλασματικῶν καὶ δεκαδικῶν ἀριθμῶν, ἄλλοτε μὲν τρέπομεν τοὺς κλασματικοὺς εἰς δεκαδικούς, ἄλλοτε δὲ διατηροῦμεν τοὺς ἀριθμοὺς ὅπως ἐδόθησαν. Συνηθέστερον γίνεται τὸ πρῶτον καὶ ἰδίως ἔσταν οἱ κλασματικοὶ ἀριθμοί, τοὺς ὁποίους ἔχομεν, τρέπονται εἰς κοινὰ δεκαδικὰ κλάσματα.

Ἀσκήσεις.

1) Νὰ εὑρεθοῦν τὰ ἐξαγόμενα τῶν κάτωθι πράξεων κατὰ προσέγγισιν χιλιοστοῦ.

$$\alpha') 6.18 + \frac{3}{4} - 1.5 \cdot \beta') \frac{3}{8} : 0.142 \cdot \gamma') 2 \frac{1}{5} + 3.1 - 0.831 \times \frac{1}{9} \cdot \delta') \frac{4}{25} \times 3.12 + \frac{2}{5} \times 0.14 : 0.75.$$

§ 60. Συμβολικὴ παράστασις πράξεων ἐπὶ ἀριθμῶν διὰ γραμμάτων. —

α') (Πρόβλημα). « Ἐν ποσὸν ἐμοιράσθη εἰς 4 ἀνθρώπους. Ὁ πρῶτος ἔλαβε $\frac{1}{5}$ αὐτοῦ, ὁ δεῦτερος τὸ $\frac{1}{4}$ καὶ ὁ τρίτος τὸ $\frac{1}{3}$, ὁ δὲ τέταρτος τὸ ὑπόλοιπον· πόσον μέρος τοῦ ποσοῦ ἔλαβεν ὁ τέταρτος; »

Ἄφου ὁ πρῶτος, ὁ δεῦτερος καὶ ὁ τρίτος ἔλαβον ἀντιστοίχως τὸ $\frac{1}{5}$, $\frac{1}{4}$ καὶ $\frac{1}{3}$ τοῦ ὅλου ποσοῦ καὶ οἱ τρεῖς αὐτοὶ ἔλαβον μαζὴ $\frac{1}{5} + \frac{1}{4} + \frac{1}{3} = \frac{47}{60}$ τοῦ ποσοῦ. Ἐπειδὴ δὲ τὸ ὅλον ποσὸν εἶχεν $\frac{60}{60}$ ἔμειναν $\frac{60}{60} - \frac{47}{60} = \frac{13}{60}$ τὰ ὁποῖα ἔλαβεν ὁ τελευταῖος. Ὡστε ὁ τέταρτος ἔλαβε τὰ $\frac{13}{60}$ τοῦ ποσοῦ.

Ἄν τὸ διανεμηθὲν ποσὸν ἦτο 500 δρ., ὁ τέταρτος ἔλαβε τὰ $\frac{13}{60}$ τῶν 500 δρ., ἦτοι $500 \times \frac{13}{60}$. Ἄν τὸ διανεμηθὲν ποσὸν ἦτο 1200 δραχμαί, ὁ τέταρτος ἔλαβε $1200 \delta\rho. \times \frac{13}{60}$. Ἄν τὸ ποσὸν ἦτο α δρ., ὁ τέταρτος θὰ ἐλάμβανεν $\alpha \delta\rho. \times \frac{13}{60}$.

Ἐν γένει, θὰ παριστάνωμεν διὰ τῶν πρώτων γραμμάτων τοῦ ἀλφαβῆτου ἀριθμούς, οἱ ὁποῖοι ὑποτίθεται ὅτι δίδονται μὲν, ἀλλ' ἡ τιμὴ των δὲν εἶνε ὀρισμένη. Πάντως ἔμως ὑποτίθεται ὅτι ἐν γράμματι ἔχει μίαν καὶ τὴν αὐτὴν τιμὴν, δηλαδὴ παριστάνει ἓνα

καὶ τὸν ἀριθμὸν κατὰ τὴν λύσιν ἑνὸς ζητήματος εἰς τὸ ὁποῖον ὑπάρχει τὸ γράμμα αὐτό.

β') Ἐὰν α, β, γ παριστάνουν τρεῖς ἀφηρημένους ἀριθμοὺς οἰουσδήποτε, ἢ συγκεκριμένους ἀλλ' ὁμοειδεῖς, τὸ ἄθροισμα τῶν θὰ εἶνε τὸ $\alpha + \beta + \gamma$, ἢ τὸ $\alpha + \gamma + \beta$, ἢ τὸ $\beta + \gamma + \alpha$ κλπ.

γ') Ἐὰν α, β εἶνε δύο ἀριθμοί, ἐκ τῶν ὁποίων ὁ β εἶνε μικρότερος τοῦ α ἢ διαφορά τῶν παριστάνεται διὰ τοῦ $\alpha - \beta$. Ἐὰν δὲ ἡ διαφορά αὐτὴ παρασταθῇ διὰ τοῦ γ , θὰ ἔχωμεν $\alpha - \beta = \gamma$ καὶ θὰ εἶνε $\alpha = \beta + \gamma$.

δ') Τὸ γινόμενον ἀριθμοῦ α ἐπὶ ἄλλον, π. χ. τὸν δ , σημαίνει τὸ ἄθροισμα $\alpha + \alpha + \alpha + \alpha + \alpha$ ἤτοι δ φορές τὸν α , σημειώνομεν δ' αὐτὸ διὰ τοῦ $\delta \cdot \alpha$ ἢ καὶ ἀπλῶς διὰ τοῦ $\delta \alpha$. Ὡστε ἔχομεν $\alpha \cdot 5 = 5\alpha$. Ὁμοίως $\alpha \cdot 7 = 7\alpha$.

Ἐν γένει, ἐὰν β εἶνε ἀκέραιος ἀριθμὸς, τὸ γινόμενον $\alpha \cdot \beta$ σημαίνει τὸ ἄθροισμα β προσθετῶν ἴσων μὲ α , ἤτοι τὸ ἄθροισμα $\alpha + \alpha + \alpha + \dots + \alpha$, ἐν ἑλφ β φορές καὶ ἔχομεν $\alpha \times \beta = \beta \times \alpha$, ἐπειδὴ τὸ γινόμενον δύο ἀριθμῶν δὲν μεταβάλλεται, ἐὰν ἀλλάξωμεν τὴν τάξιν τῶν παραγόντων του.

ε') Τὸ πηλίκον δύο ἀριθμῶν α καὶ β σημειώνεται διὰ τοῦ $\alpha : \beta$ παριστάνεται δέ, ὡς γνωστὸν (§ 53, δ'), διὰ τοῦ κλάσματος $\frac{\alpha}{\beta}$.

στ') Τὸ γινόμενον ἑνὸς κλάσματος $\frac{\alpha}{\beta}$ ἐπὶ ἀκέραιον ἀριθμὸν λ εἶνε ἴσον μὲ $\frac{\alpha}{\beta} \times \lambda = \frac{\alpha \times \lambda}{\beta}$ (§ 52). Ὁμοίως ἔχομεν $\lambda \times \frac{\alpha}{\beta} = \frac{\lambda \times \alpha}{\beta}$.

Τὸ γινόμενον δύο κλασμάτων $\frac{\alpha}{\beta}$ καὶ $\frac{\gamma}{\delta}$ εἶνε $\frac{\alpha}{\beta} \times \frac{\gamma}{\delta}$ καὶ ἰσοῦται μὲ $\frac{\alpha \times \gamma}{\beta \times \delta}$ (§ 52, δ').

Τὸ πηλίκον τοῦ κλάσματος $\frac{\alpha}{\beta}$ διὰ τοῦ ἀκέραιου λ ἰσοῦται μὲ $\frac{\alpha}{\beta} : \lambda = \frac{\alpha}{\beta \times \lambda}$ τὸ δὲ πηλίκον τοῦ

$$\frac{\alpha}{\beta} : \frac{\gamma}{\delta} = \frac{\alpha}{\beta} \times \frac{\delta}{\gamma} = \frac{\alpha \times \delta}{\beta \times \gamma}$$

Ἐὰν ἡ ὁκτὴ ἑνὸς πράγματος τιμᾶται α δρ., ἔπου α παριστάνει ἕνα οἰονδήποτε ὠρισμένον ἀριθμὸν καὶ ζητῆται ἡ τιμὴ β ὁκάδων, θὰ ἔχωμεν (§ 19), ἂν διὰ τοῦ x παραστήσωμεν τὸν ζητούμενον ἀριθμὸν, $x = \alpha \beta$ δρ.

Ἄν τοῦναντίον αἱ α μονάδες ἐξ αὐτῶν τιμῶνται β δρ., εὐρίσκομεν τὴν τιμὴν αὐτῆς, ἂν διαιρέσωμεν τὸ β : α ἤτοι ἡ τιμὴ τῆς μιᾶς μονάδος παριστάνεται ὑπὸ τοῦ $\frac{\beta}{\alpha}$ δρ.

Αί τοιαῦται συμβολικαὶ γραφαί, ὡς αἱ ἀνωτέρω εἰς τὰς ὁποίας ὑπάρχουν γράμματα παριστάνοντα ἀριθμούς, λέγονται καὶ τύποι.

Διὰ νὰ εὐρωμεν τὴν ἀριθμητικὴν τιμὴν ἐνὸς τύπου, δηλαδὴ τὸν ἀριθμὸν, τὸν ὁποῖον παριστάνει, πρέπει νὰ γνωρίζωμεν τὸν ἀριθμὸν τὸν ὁποῖον παριστάνει καθὲν γράμμα. Ἐὰν δὲ δοθοῦν οἱ ἀριθμοὶ αὐτοί, ἀφοῦ πρῶτον γράψωμεν ἀντὶ τῶν γραμμάτων τὴν τιμὴν των, ἐκτελοῦμεν τὰς σημειωμένας μεταξὺ αὐτῶν πράξεις.

Ὁῦτω π.χ. ὁ τύπος $\alpha + \beta$ ἔστω εἶνε $\alpha = 2$, $\beta = 3$, ἔχει τὴν τιμὴν $2 + 3 = 5$. ἔστω $\alpha = 4$ καὶ $\beta = 6$, εἶνε $4 + 6 = 10$. ἔστω $\alpha = 2 \frac{1}{2}$ καὶ $\beta = 3 \frac{3}{4}$

$$\text{εἶνε } 2 \frac{1}{2} + 3 \frac{3}{4} = 2 \frac{2}{4} + 3 \frac{3}{4} = 5 \frac{5}{4} = 6 \frac{1}{4}$$

Ἀσκήσεις καὶ προβλήματα.

Ὅμας πρώτη. 1) Νὰ εὐρεθοῦν αἱ τιμαὶ τοῦ κάτωθι τύπου

$\alpha + \beta - \gamma$ α') ἔστω $\alpha = 2$, $\beta = 3$, $\gamma = 1$. β') $\alpha = 5 \frac{1}{2}$, $\beta = 3$, $\gamma = 5, 3$.

2) Ὁμοίως τῶν α') $(\alpha + \delta)$. γ, ἔστω $\alpha = 4$, $\beta = 5$, $\gamma = 2$. β') $(\alpha + \delta) \times (\gamma + \delta)$ ἔστω $\alpha = 4$, $\delta = 1 \frac{1}{3}$, $\gamma = \frac{1}{3}$, $\delta = 1$, δ' γ') $(\alpha - \delta) \cdot (\gamma - \delta)$ ἔστω $\alpha = 15$, $\beta = 4$, $\gamma = 3$, $\delta = 2$.

3) Ὁμοίως τοῦ $(\alpha + \beta)$: γ, ἔστω τὸ $\alpha = \frac{3}{8}$, $\beta = \frac{3}{5}$, $\gamma = \frac{7}{2}$.

4) $(\alpha + \delta) : (\gamma - \delta)$, ἔστω $\alpha = 12$, $\delta = 6$, $\gamma = 8$, $\delta = 1$.

5) Τοῦ $(\alpha^2 + 2\alpha + 1) : (\alpha + 1)$ ἔστω $\alpha = 1$

Ὅμας δευτέρα. 1) Ἐχει τις α δραχμὰς καὶ λαμβάνει ἀκόμη 5 δραχμὰς, πόσας ἔχει ἐν ὄλῳ;

2) Ἐχει τις α δραχμὰς καὶ λαμβάνει ἀκόμη τριπλάσιον ταύτων πόσας ἔχει ἐν ὄλῳ;

3) Ἐχει τις β δραχμὰς καὶ ἐξ αὐτῶν δίδει α') 6 δραχμὰς β') $3 \frac{3}{4}$ δρ. καὶ τέλος δ δρ. πόσαι δραχμαὶ τοῦ ἔμειναν;

4) Ἐχει τις α δρ. καὶ ἐξοδεύει τὸ ἡμισυ αὐτῶν. πόσα τοῦ μένου; Πόσα τοῦ μένου, ἂν ἐξοδεύῃ τὸ τρίτον, τὸ τέταρτον, τὸ πέμπτον αὐτῶν;

5) Ἐὰν α φανερώνη ἓνα ἀριθμὸν ἀκέραιον, πῶς θὰ παρασταθῇ ὁ κατὰ μονάδα μεγαλύτερός του, πῶς ὁ κατὰ μονάδα μικρότερός του;

6) Ἡ δεκά ἐνὸς ἔμπορεύματος στοιχίζει μ δραχμὰς πόσον στοιχίζουν αἱ 2 δεκάδες, αἱ 3 δεκάδες, αἱ 6 δεκάδες, αἱ β δεκάδες;

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Χ

Περὶ μέτρων σταθμῶν καὶ ἰσομισμάτων.

§ 61. Περὶ μετρήσεως ποσῶν.—

Καλοῦμεν ποσὸν πᾶν ἕ,τι ἐπιδέχεται αὐξησιν καὶ ἐλάττωσιν. Π. χ. τὸ μήκος, τὸ βάρος, τὸν ὄγκον, τὸν χρόνον κλπ.

Ἐὰν ἔχωμεν ἓν ποσόν, π.χ. χρήματα καὶ θέλωμεν νὰ γνωρίσωμεν ἀκριβῶς πόσα ἔχομεν, πρέπει νὰ μετρήσωμεν αὐτά· δηλαδὴ νὰ λάβωμεν ἓν ὄρισμένον ποσὸν χρημάτων, π.χ. μίαν δραχμὴν καὶ νὰ εὕρωμεν πόσας φορὰς χωρεῖ αὐτὴ εἰς τὸ δοθὲν ποσόν. Ὁ ἀριθμὸς τὸν ὁποῖον θὰ εὕρωμεν, θὰ παριστάνη τὸ ποσὸν τοῦτο.

Γενικῶς, διὰ νὰ προσδιορίσωμεν ἀκριβῶς ἓν οἰονδήποτε ποσόν, λαμβάνομεν ἓν ἄλλο ὁμοειδές του καὶ πρὸς τοῦτο συγκρίνομεν τὸ δοθὲν, δηλαδὴ εὕρισκομεν πόσας φορὰς τὸ δεύτερον χωρεῖ εἰς τὸ πρῶτον. Ἡ σύγκρισις αὐτὴ ἐνὸς ποσοῦ πρὸς ἄλλο ὁμοειδές καὶ ὄρισμένον λέγεται *μέτρησις τοῦ ποσοῦ*. Τὸ ὄρισμένον ποσὸν μὲ τὸ ὁποῖον μετροῦμεν ἄλλο ὁμοειδές πρὸς αὐτὸ λέγεται *μονὰς μετρήσεως*, ὁ δὲ ἀριθμὸς, ὁ ὁποῖος προκύπτει ἐκ τῆς μετρήσεως, λέγεται *τιμὴ τοῦ δοθέντος ποσοῦ*, ἢ *ἀριθμὸς παριστάνων τὸ ποσόν*.

Διὰ νὰ μετρήσωμεν ἓν ποσὸν χρημάτων, λαμβάνομεν ὡς μονάδα τὴν δραχμὴν, ἀλλὰ δυνάμεθα νὰ λάβωμεν καὶ ἄλλην μονάδα· τὸ ἑκκτοντάδραχμον π.χ. καὶ ἄλλας, ἂν τὸ ποσὸν εἶνε μεγαλύτερον.

Ἐκ τούτων ἔπεται ὅτι διὰ τὴν μέρησιν ἐνὸς ποσοῦ δύνανται νὰ ὑπάρχουν διάφοροι μονάδες.

§ 62. Μονάδες μήκους.—

α.) Διὰ τὴν μέτρησιν τοῦ μήκους ἔχομεν ὡς μονάδα τὸ μέτρον, ἢ βασιλικὸν πῆχυν, τὸ ὁποῖον εἶνε περίπου τὸ ἐν τῶν 10000000 ἰσων μερῶν τοῦ τετάρτου μέρους τοῦ μεσημβρινοῦ τῆς Γῆς. Ἐπειδὴ τὸ μέτρον εἶνε πολὺ μικρὸν διὰ τὴν μέτρησιν μεγάλων ἀποστάσεων, σχηματίζομεν ἐκ τοῦ μέτρου ἄλλας μονάδας, ἀκριβῶς ὅπως εἰς τὸ δεκαδικὸν σύστημα ἐσχηματίσαμεν τὰς μονάδας τῶν διαφόρων τάξεων (§ 3). Οὕτω τὸ μήκος δέκα μέτρων λαμβάνεται ὡς μονὰς καὶ λέγεται *δεκάμετρον*, ὁμοίως τὸ μήκος ἑκατὸν μέτρων λαμβάνεται ὡς μονὰς καὶ λέγεται *ἐκατόμετρον*, τὸ μήκος χιλίων μέτρων *χιλιόμετρον* ἢ *στάδιον* καὶ τὸ μήκος δέκα χιλιάδων μέτρων *μυριάμετρον*.

Ἐπειδὴ ἀφ' ἑτέρου τὸ μέτρον εἶνε πολὺ μέγα διὰ τινὰς μετρήσεις μικρῶν ἀποστάσεων, σχηματίζομεν ἐκ τοῦ μέτρου ἄλλας μονάδας, ὅπως ἐκ τῆς μονάδος ἐσχηματίσαμεν τὰς μονάδας τῶν δεκαδικῶν ἀριθμῶν (§ 34). Οὕτω λαμβάνομεν ὡς μονάδα τὸ δέκατον τοῦ μέτρου, τὸ ὁποῖον λέγεται *παλάμη*, ἢ *δεκατόμετρον*, τὸ ἑκατοστὸν τοῦ μέτρου, τὸ ὁποῖον λέγεται *δάκτυλος*, ἢ κοινῶς *πόντος* ἢ *ἐκατστόμετρον*, τὸ χιλιοστὸν τοῦ μέτρου τὸ ὁποῖον λέγεται *γραμμὴ* ἢ *χιλιοστόμετρον*.

Ἐὰν καθελίαν τῶν ἀνωτέρω μονάδων ἐκφράσωμεν εἰς μέτρα, θὰ ἔχωμεν 1 δεκάμετρον=10 μ., 1 ἑκατόμετρον=100 μ., 1 χιλιόμετρον=1000 μ., 1 μυριάμετρον=10000 μ., 1 παλάμη=0,1 μ., 1 δάκτυλος=0,01 μ., 1 γραμμὴ 0,001 μ.

Τὸ μέτρον, ἐκ τοῦ ὁποῖου σχηματίζομεν τὰς ἄλλας μονάδας, λέγεται *ἀρχικὴ μονάδα*.

β') Ἐκτὸς τῶν ἀνωτέρω μονάδων μεταχειρίζονται εἰς τὴν οἰκοδομικὴν τὸν *τεκτονικὸν πῆχυν*, ὁ ὁποῖος εἶνε 0,75 μ., ἢ $\frac{3}{4}$ μ. Διὰ τὴν μέτρησιν τῶν ὑφασμάτων μεταχειρίζονται ὡς μονάδα τὸν μικρὸν πῆχυν *Κωνσταντινουπόλεως*, ἢ ἀπλῶς τὸν *πῆχυν*, ὁ ὁποῖος ἔχει 0,648 μ., ἢ 64 δακτύλους περίπου, διαιρεῖται δ' εἰς 8 ἴσα μέρη τὰ ὁποῖα λέγονται *ρούπια*.

Εἰς τὴν Ἀγγλίαν μεταχειρίζονται ὡς μονάδα μήκους τὴν *ὑάρδα*, ἢ ὁποῖα εἶνε ἴση μὲ 0,914 μ. καὶ ὑποδιαιρεῖται εἰς 3 πόδας, καθεὶς δὲ πούς εἰς 12 δακτύλους.

γ') Ἐκτὸς τῶν ἀνωτέρω μονάδων μήκους ἀξιοσημεῖωτοι εἶνε καὶ αἱ ἐξῆς.

Ἡ *ὄργυιά*, ἢ ὁποῖα εἶνε ἴση πρὸς 1,919 μ. καὶ ὑποδιαιρεῖται εἰς 6 πόδας, καθεὶς πούς εἰς 12 δακτύλους καὶ καθεὶς δάκτυλος εἰς 12 γραμμάς.

Ἡ *λεῦγα*, ἢ ὁποῖα εἶνε ἴση μὲ 4000 μέτρα. τὸ *γεωγραφικὸν μίλιον*, τὸ ὁποῖον εἶνε ἴσον μὲ 7420 μ., τὸ δὲ *ναυτικὸν μίλιον* μὲ 1852 μέτρα. Τὸ *ἀγγλικὸν μίλιον* εἶνε ἴσον μὲ 1760 ὑάρδας ἢ μὲ 1609 μ.

§ 63. Μονάδες ἐπιφανείας.—

α') Διὰ τὴν μέτρησιν τῆς ἐπιφανείας λαμβάνεται ὡς ἀρχικὴ μονάδα τὸ τετράγωνον, τὸ ὁποῖον ἔχει πλευρὰν ἴσην μὲ 1 μ. λέγεται δὲ *τετραγωνικὸν μέτρον*. Διὰ τὴν μέτρησιν μεγαλυτέρων ἢ μικροτέρων ἐκτάσεων ἐπιφανείας μεταχειρίζομεθα ἐπίσης ἄλλας μονάδας, αἱ ὁποῖαι εἶνε τετράγωνα τῶν ὁποίων ἢ πλευρὰ σχηματίζεται ἐκ τῆς πλευρᾶς τοῦ τετραγωνικοῦ μέτρου, καθὼς αἱ μο-

νάδες τῶν διαφόρων τάξεων τῶν ἀκεραίων καὶ δεκαδικῶν ἀριθμῶν ἐκ τῆς μονάδος. Οὕτω ἔχομεν ἀκόμη τὰς ἐξῆς μονάδας ἐπιφανείας.

Τὸ τετραγωνικὸν δεκάμετρον, ἔχον πλευρὰν δέκα μέτρα, τὸ τετραγωνικὸν ἑκατόμετρον, ἔχον πλευρὰν 100 μ., τὸ τετραγωνικὸν μυριάμετρον, ἔχον πλευρὰν 10000 μ., τὸ τετραγωνικὸν δεκατόμετρον, ἔχον πλευρὰν 0,1 μ., τὸ τετραγωνικὸν ἑκατοστόμετρον καὶ χιλιοστόμετρον, ἔχοντα πλευρὰς ἀντιστοίχως 0,01 μ. καὶ 0,001 μ.

6') Ἐάν λάβωμεν ἓν τετράγωνον π. χ. τὸ ΑΒΓΔ καὶ διαιρέσωμεν καθεμίαν τῶν πλευρῶν τοῦ ΑΒ καὶ ΒΓ εἰς 10 ἴσα μέρη, ἀπὸ δὲ τῶν σημείων τῆς διαιρέσεως τῆς ΑΒ φέρωμεν παραλλήλους πρὸς τὴν ΒΓ καὶ ἀπὸ τῶν σημείων τῆς διαιρέσεως τῆς ΒΓ παραλλήλους πρὸς τὴν ΑΒ, τὸ τετράγωνον θὰ χωρισθῇ εἰς 100 ἴσα τετράγωνα. Καθὲν τούτων θὰ ἔχη πλευρὰν τὸ δέκατον τῆς πλευρᾶς τοῦ ἀρχικοῦ, εἶνε δὲ τὸ ἑκατοστὸν ἐκείνου. Καὶ ἀντιστρόφως, τὸ ἔχον πλευρὰν δεκαπλασίαν τοῦ ἄλλου εἶνε ἑκατονταπλάσιον αὐτοῦ.

Ἐκ τούτων ἔπεται, ὅτι τὸ τετραγωνικὸν δεκάμετρον εἶνε ἴσον μὲ 100 τ. μ., τὸ τετραγωνικὸν ἑκατόμετρον μὲ 10000 τ. μ., τὸ τετραγωνικὸν χιλιοστόμετρον μὲ 1000000 τ. μ.

	A	10											Δ
		9											
		8											
		7											
		6											
		5											
		4											
		3											
		2											
	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		Γ

Τὸ τετραγωνικὸν δεκατόμετρον εἶνε ἴσον μὲ 0,01 τ. μ., τὸ τετραγωνικὸν ἑκατοστόμετρον μὲ 0,0001 τ. μ. καὶ οὕτω καθ' ἑξῆς.

γ') Πρὸς μέτρησιν τῶν οἰκοπέδων μεταχειρίζονται συνήθως ἐν Ἑλλάδι ὡς μονάδα τετράγωνον, ἔχον πλευρὰν μήκους ἑνὸς τεκτονικοῦ πήχους ἢ 0,75 μ. καὶ λέγεται τεκτονικὸς τετραγωνικὸς πήχυς, εἶνε δὲ τὰ $\frac{9}{16}$ τοῦ τετραγωνικοῦ μέτρου. Καὶ ἀντιστρόφως, τὸ τετραγωνικὸν μέτρον εἶνε ἴσον μὲ $\frac{16}{9}$ τοῦ τετραγωνικοῦ τεκτονικοῦ πήχους.

Τὸ στρέμμα εἶνε ἐπιφάνεια 1000 τ. μ., τὸ δὲ παλαιὸν στρέμμα 1270 τ. μ.

Πρὸς συντομίαν καριστάνομεν τὸ τετραγωνικὸν μέτρον διὰ τοῦ (μ^2), τὸ τετραγ. δεκάμετρον διὰ τοῦ ($\delta\mu^2$) τὸ τετραγ. χιλιόμετρον διὰ τοῦ ($\chi\mu^2$), τὸ τετραγ. δεκατόμετρον διὰ τοῦ ($\delta\kappa^2$) κ. ο. κ.

§ 64. Μονάδες ὄγκου καὶ χωρητικότητος.—

α') Διὰ τὴν μέτρησιν τοῦ ὄγκου καὶ τῆς χωρητικότητος λαμβάνομεν ὡς ἀρχικὴν μονάδα τὸ στερεόν, τὸ ὁποῖον περατοῦται εἰς 6 ἴσα τετράγωνα, καθὲν τῶν ὁποίων εἶνε ἓν τετραγωνικὸν μέτρον, καθέμια δὲ κόψις τοῦ ἔχει μήκος 1 μ. Ἡ μονὰς αὕτη λέγεται κυβικὸν μέτρον καὶ σημειώνεται διὰ τοῦ (μ^3). Ἐξ αὐτοῦ σχηματίζομεν ἄλλας μικροτέρας ἢ μεγαλυτέρας μονάδας, ὅπως καὶ τὰς μονάδας διαφόρων τάξεων ἀπὸ τὴν ἀκεραίαν μονάδα.

Ὀὕτω ἔχομεν τὴν κυβικὴν παλάμην ($\delta\kappa^3$) καὶ τὸν κυβικὸν δάκτυλον ($\epsilon\mu^3$), καὶ εἶνε ἡ κυβικὴ παλάμη τὸ $\frac{1}{1000}$ τοῦ (μ^3), ἔ δὲ ($\epsilon\mu^3$) τὸ $\frac{1}{1000000}$ τοῦ (μ^3).

β') Ὅσον χωρεῖ εἰς μίαν κυβικὴν παλάμην λέγεται λίτρον καὶ χρησιμεύει συνήθως ὡς μονὰς πρὸς μέτρησιν τῶν ὑγρῶν. Ἐπειδὴ τὸ (μ^3) ἔχει 1000 κυβικὰς παλάμας, ἔπεται ὅτι τὸ (μ^3) χωρεῖ 1000 λίτρα τὸ δὲ λίτρον εἶνε τὸ χιλιοστὸν τῆς χωρητικότητος τοῦ (μ^3). Ἡ χωρητικότης 100 λιτρῶν λέγεται ἑκατόλιτρον.

§ 65. Μονάδες βάρους.—

α') Διὰ τὴν μέτρησιν τοῦ βάρους λαμβάνομεν ὡς μονάδα τὸ βᾶρος ὕδατος ἀπεσταγμένου καὶ θερμοκρασίας $4, 1^{\circ}$, τὸ ὁποῖον

χωρεῖ εἰς ἓνα κυβικὸν δάκτυλον καὶ λέγεται γραμμάριον (γρ.). Ἐκτὸς τῆς ἀρχικῆς αὐτῆς μονάδος βάρους ἔχομεν καὶ ἄλλας, καθὼς τὸ χιλιόγραμμον ἴσον μὲ 1000 γραμμάρια· τὸν τόνον ἴσον μὲ 1000 χιλιόγραμμα. Καὶ τὸ μὲν χιλιόγραμμον εἶνε τὸ βάρος ὕδατος ἀπὸ σταγμμένου θερμοκρασίας 4,1° τὸ ὁποῖον χωρεῖ εἰς μίαν κυβικὴν παλάμην, ὃ δὲ τόνος εἰς ἓν κυβικὸν μέτρον καὶ ἰσοῦται μὲ 781 δκ. καὶ 100 δρ.

Ἐν Ἑλλάδι μεταχειρίζονται ὡς μονάδα βάρους τὴν ὀκᾶν, ἣ ὁποία εἶνε ἴση μὲ 1280 γραμ., διαιρεῖται δὲ εἰς 100 δράμια. Τὸ ἐν δράμιον εἶνε ἴσον μὲ 3,2 γραμ., τὸ δὲ χιλιόγραμμον, ἣ κοιλόν, μὲ 312,5 δράμια. Βῆρος ἴσον μὲ 44 ὀκάδας λέγεται στατήρ.

§ 66. Μονάδες νομισμάτων. —

α') Ἀρχικὴ μονὰς πρὸς μέτρησιν νομισμάτων διὰ τὴν Ἑλλάδα, Γαλλίαν, Ἰταλίαν, Ἑλβετίαν καὶ Βέλγιον εἶνε τὸ φράγκον, τὸ ὁποῖον ἐν Ἑλλάδι λέγεται καὶ δραχμὴ καὶ ὑποδιαιρεῖται εἰς 100 ἴσα μέρη, τὰ ὁποία λέγονται λεπτά.

Ἐκτὸς τῆς δραχμῆς ὑπάρχουν καὶ τὰ ἑξῆς ἀκόμη νομίσματα.

Τὸ δίδραχμον ἴσον μὲ 2 δραχμάς, τὸ πεντάδραχμον ἢ τάλληρον ἴσον μὲ 5 δραχμάς, τὸ πετηκοντάλεπτον ἴσον μὲ 50 λεπτά ἢ $\frac{1}{2}$ δρ., τὸ εἰκοσάλεπτον ἴσον μὲ 20 λεπτά ἢ $\frac{1}{5}$ δραχμῆς. Αὐτὰ καὶ ἡ δραχμὴ εἶνε νομίσματα ἀργυρᾶ. Χρυσᾶ νομίσματα εἶνε πεντάδραχμον, δεκάδραχμον, εἰκοσάδραχμον, πετηκοντάδραχμον καὶ ἑκοτοντάδραχμον.

Ἐκτὸς τούτων ἔχομεν ἀκόμη τὰ νικέλινα νομίσματα· πεντάλεπτον, δεκάλεπτον, εἰκοσάλεπτον· χαλκᾶ δὲ τὸ μονόλεπτον, δίλεπτον, πεντάλεπτον ἢ ὀβολὸν ἢ πεντάραν καὶ τὸ δεκάλεπτον ἢ διώβολον ἢ δεκάραν.

β') Εἰς τὴν Ἀγγλίαν ἀρχικὴ μονὰς εἶνε ἡ λίρα στερλίνα νόμισμα χρυσοῦν, τὸ ὁποῖον ἰσοδυναμεῖ μὲ 25,23 φράγκα (περίπου)· ὑποδιαιρεῖται εἰς 20 σελλίγια, καθὲν σελλίγιον εἰς 12 πέννας καὶ καθεμὶα πέννα εἰς 4 φαρδίνα.

Ἐκ τούτων τὸ σελλίγιον εἶνε ἀργυροῦν, ἡ δὲ πέννα καὶ τὸ φαρδίγιον χαλκᾶ.

ΟΕΙ

γ') Ἐἰς τὴν Ἀμερικὴν ἀρχικὴ μονὰς εἶνε τὸ δολλάριον καὶ εἶνε ἀξίας 5,18 φρ. Χρυσᾶ νομίσματα ὑπάρχουν 25· 20· 5· 3· καὶ 1 δολ-
λαρίου, ἀργυρᾶ δὲ $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \frac{1}{10}$ τοῦ δολλαρίου. Τὸ δολλάριον ἔχει
100 σέντς.

δ') Περὶ τῶν μονάδων ἄλλων χωρῶν ἀναγράφονται εἰς τὸν ἐπό-
μενον πίνακα τῶν σελίδων 130 καὶ 131.

§ 67. Μονάδες χρόνου καὶ περιφερείας κύκλου.—

α') Ἀρχικὴ μονὰς χρόνου εἶνε ἡ ἡμέρα, ἧτοι τὸ χρονικὸν διάστημα
τὸ παρερχόμενον ἀπὸ ἑνὸς μεσονυκτίου μέχρι τοῦ ἀμέσως ἐπομένου. Ἡ
ἡμέρα διαιρεῖται εἰς 24 ὥρας, ἡ ὥρα εἰς 60' (πρῶτα λεπτά) καὶ 1' εἰς
60" (δεύτερα λεπτά).

Διὰ τὴν μέτρησιν μακρῶν χρονικῶν διαστημάτων λαμβάνεται ὡς
μονὰς τὸ ἔτος, τὸ ὁποῖον ἔχει 365 ἡμέρας καὶ τότε λέγεται κοινόν, ἢ
366 καὶ τότε λέγεται δίσεκτον.

Δίσεκτον εἶνε τὸ ἔτος τοῦ ὁποῖου ὁ ἀριθμὸς διαιρεῖται διὰ τοῦ 4.
Π. χ. τὰ ἔτη 1920, 1924, 1928 εἶνε δίσεκτα.

Τὸ ἔτος διαιρεῖται εἰς 12 μῆνας, τῶν ὁποίων ἄλλοι μὲν ἔχουν 30
ἡμέρας καὶ ἄλλοι 31, ὁ δὲ Φεβρουάριος 28 καὶ ἀνὰ 4 ἔτη 29 ἡμέρας.
Χρονικὸν διάστημα 100 ἐτῶν λέγεται αἰὼν. Ἐβδομάς εἶνε χρονικὸν
διάστημα 7 ἡμερῶν, ἀρχομένη ἀπὸ τῆς Κυριακῆς καὶ λήγουσα τὸ Σάβ-
βατον.

β') Διὰ τὴν μέτρησιν ἑνὸς κυκλικοῦ τόξου λαμβάνομεν ὡς μονάδα
τόξον τῆς αὐτῆς περιφερείας ἴσον μὲ $\frac{1}{360}$ αὐτῆς, τὸ ὁποῖον καλεῖται μοῖρα.

Ὡστε ἡ περιφέρεια τοῦ κύκλου ἔχει μῆκος 360 μοιρῶν. Ἡ μοῖρα
διαιρεῖται εἰς 60 πρῶτα λεπτά (') καὶ καθὲν πρῶτον λεπτὸν εἰς 60
δεύτερα (") λεπτά. Αἱ μοῖραι σημειῶνονται μὲ τὸ σύμβολον (°). Π. χ.
45 μοῖραι σημειῶνονται οὕτω 45°.

§ 68. Δεκαδικὸν μετρικὸν σύστημα.—

Τὰς μονάδας, τὰς ὁποίας ἀνωτέρω ἐγνωρίσαμεν, δυνάμεθα
νὰ διακρίνωμεν εἰς δύο κατηγορίας. Πρῶτον ἐκεῖνας αἱ ὁποῖαι
ἔχουν ὑποδιαίρεσιν ὁμοίαν μὲ τὰς μονάδας τοῦ δεκαδικοῦ
συστήματος τῆς ἀριθμήσεως (§ 3), καὶ τὴν ὁποῖαν καλοῦμεν

ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΤΕΡΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΙ ΠΟΙΑΙ

Α') Μέτρα και σταθμά.

Κράτη εις τὰ ὅποια εἶνε ἐν χρῆσει	Μονάδες μήκους	Μονάδες ἐπιφανείας
Γαλλία	μυριάμετρον = 10000 μ.	τετραγ. μυριάμετρον = 100000000 (μ ²)
Βέλγιον	χιλιόμετρον = 1000 μ.	» χιλιόμετρον = 1000000 (μ ²)
Ἑλβετία	ἐκατόμετρον = 100 μ.	ἐκτάριον = 10000 (μ ²)
Γερμανία	δεκάμετρον = 10 μ.	ἄριον = 100 (μ ²)
Αὐστρία	ἀρχικὴ μονὰς = 1 μ.	τετραγ. μέτρον = 1 (μ ²)
Ἰσπανία	ὑποδεκάμετρ. = 0,1 μ.	τετραγ. ὑποδεκάμετρον = 0,01 (μ ²)
Ρουμανία	ὑφεκατόμετρον = 0,01 μ.	τετραγ. ὑφεκατόμετρον = 0,0001 (μ ²)
Βουλγαρία		
Σερβία		
Τουρκία	χιλιοστόμετρον = 0,001 μ.	τετρ. χιλιοστόμετρον = 0,000001 (μ ²)
Ἑλλὰς		

2) Ἄλλαι

	τεκτονικὸς πῆχυς = 0,75 μ.	τετραγ. τεκτον. πῆχυς = $\frac{9}{16}$ (μ ²)
Ἑλλὰς	ἐμπορικὸς πῆχυς = 0,648 μ.	στρέμμα = 1000 (μ ²)
	ρούπιον = $\frac{1}{8}$ πῆχ.	παλαιὸν στρέμμα = 1270 (μ ²)
Ἄγγλια καὶ Ἡνωμ. Πολιτεῖαι	ἄρδα = 0,914 μ.	τετραγωνικὴ ἄρδα = 0,836 (μ ²)
	πούς = $\frac{1}{3}$ ἄρδ.	
	δάκτυλος = $\frac{1}{12}$ πόδ.	ἄρ (διὰ τοὺς ἀγρούς) = 40,5 στρ.
	Ἄγγλ. μιλιον = 1760 ἄρδ. = 1609 μ.	τετραγ. πούς, τετραγ. δάκτυλος
Ῥωσσία	πῆχυς ἄρσιν = 1,711 μ. Ἄγγλ. πούς = 0,305 μ. βέρτσιον = 1500 π. ἄρσιν	τετραγωνικὸς πούς

B') Μονάδες νομισμάτων (καὶ σχέσεις των προπολεμικαί)

	δραχμὴ	Ἄγγλια	Γερμανία	Σκανδιναυικαὶ χῶραι
Ἑλλὰς	φράγκον	λίρα στερλίνα = 25,23 φρ.	μάρκον = 1,25 φρ.	φλωρίνιον =
Βέλγιον				2,12 φρ.
Γαλλία	λιρέτα	σελίνιον = $\frac{1}{20}$ λίρ.	πρένιγκ = 0,01 μάρ.	αἶρ = 0,01 φλ.
Ἑλβετία				
Ἰταλία	πεσσέτα			
Ἰσπανία	λέι			
Ρουμανία	λέβ:			
Βουλγαρία	λεβ:			
Σερβία	δηνάριον	πέννα = $\frac{1}{12}$ σελ.		

ΕΙΝΕ ΕΝ ΧΡΗΣΕΙ ΕΙΣ ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΡΗ

1) Δεκαδικόν μετρικόν σύστημα (με τιμάς προπολεμικάς)

Μονάδες όγκου	Μονάδες χωρητικότητας	Μονάδες βάρους
κυβικόν χιλιόμετρο = 1000000000 (μ ³) κυβικόν μέτρον = 1 (μ ³) κυβ. υποδεκάμετρον = 0,001 (μ ³) κυβ. δεκατόμετρον = 0,000001 (μ ³) κυβ. χιλιοστόμετρον = 0,000000001 (μ ³)	εκατόλιτρον = 100 λ. λίτρον = χωρητικότης 1 (εμ ³)	τόνος = 1000 χιλιόγρ. χιλιόγραμμα γραμμαρίον = 0,001 του χιλιόγραμμου.
κυβ. τεκτον. πήγυς = $\frac{27}{64}$ (μ ³)	κοιλόν Κων)πόλεως = 35,37 λ.	στατήρ = 44 όκ. όκ = 1280 γραμμ. δράμιον = $\frac{1}{400}$ όκ. Έν. λίτρα = 149 όρμ. χιλιόλιτρον = 375 όκ. Άγ. λίτ = 453,6 γρ. φαρμακευτική λίτρα = 360 γρμ. ούγγιά = $\frac{1}{16}$ λ. καράτιον = $\frac{1}{5}$ του γραμμαρίου
κυβική εάρδα	κουάρτερ = 2,91 έκ. μπούσελ = $\frac{1}{8}$ κουάρ. τόνος (διά τὰ πλοία) = 2,83 (μ ³)	Άγγλ. στατ. = 112 λ. Άγγλ. λ. = 453,6 γρ. ούγγιά = $\frac{1}{16}$ λ.
κυβικός πόδς	ψάθα = 2,10 εκατόλ.	

Κράτη έχοντα μονάδα τής λατινικής συμβάσεως

Πορτογαλλία	Αυστρία	Ρωσσία	Έν. Πολιτεΐαι	Τουρκία
μιλρείς = 5,55 φρ. λί ρέϊς = $\frac{2}{10}$ μιλ. όπ ούτ	κορώννα = 1,08 φρ. χέλλερ = 0,01 κ.	ρούβλιον = 2,65 φρ. καπίχιον = 0,01 του ρουβλίου	δολλάρ. 5,18 φρ. σέντζς = 0,01 δ.	γρόσιον = 40 παρ. 100 γρ. = 1 λίρα λίρα = 22,80 φρ. γρόσιον = 0,01 λ. Άγ. λίρα = 26 φρ. μετζζίτι = 20 γρ.

ὁμοίως δεκαδικὴν ὑποδιαίρεσιν, καὶ ἐκεῖνας, αἱ ὁποῖαι δὲν ἔχουν τοιαύτην ὑποδιαίρεσιν. Αἱ μονάδες αἱ ὁποῖαι ἔχουν δεκαδικὴν ὑποδιαίρεσιν λέγομεν ὅτι ἀποτελοῦν τὸ δεκαδικὸν μετρικὸν σύστημα ἢ δεκαδικὸν σύστημα μετρήσεως κατ' ἀναλογίαν πρὸς τὸ δεκαδικὸν σύστημα ἀριθμώσεως (§ 3). Τὸ σύστημα αὐτὸ ἔχει τὸ προτέρημα ὅτι αἱ μετρήσεις τῶν ποσῶν διὰ τῶν μονάδων του δίδουν ἐξαγόμενα ἀριθμοὺς δεκαδικούς, ἐν γένει, αἱ δ' ἐπ' αὐτῶν πράξεις ἀνάγονται εἰς τὰς πράξεις τῶν δεκαδικῶν καὶ γίνονται μετὰ μεγαλυτέρας εὐκολίας. Οὕτω τὸ μήκος 10 μ., 6 πλ., 3 δ., 7 γρ., γράφεται οὕτω 10,637 μ.

Προβλήματα ἀλλαγῆς μονάδος.

- Ὅμας πρώτη. 1) Νὰ τραποῦν 8,34 μ. εἰς α') δεκάμετρα· β) ἑκατόμετρα· γ') χιλιόμετρα. 0,835· 0,0835· 0,00835
- 2) 6,42 χμ. εἰς μέτρα, δεκάμετρα κλπ. 6420· 642· 64,2
- 3) Ὅμοίως 0,2345678 (μ²) εἰς α') (δ²)· β') (εμ²)· γ') (χμ²). X
- 4) Ὅμοίως 13,845 χιλιόγραμμα εἰς γραμμάρια καὶ αὐτὰ εἰς ὀκάδας. 13845· 10 ὀκ. 326 $\frac{9}{16}$ ὄσμ.
- 5) Ἐπίσης 1,2786 (μ³) εἰς α') κυβ. πηλάμας· β') κυβ. δακτύλους.
- Ὅμας δευτέρα. 3) Πόσας ἡμέρας ἔχουν α') 35 ἔτ., ἔχοντα 365 ἡμ. καὶ ἀνὰ 4 ἔτη 366; β') 8,4 μῆνες. (ἂν καθεὶς ἔχη 30 ἡμ.); 13418· 252
- 2) Πόσας ὥρας ἔχουν· α') 2 μῆνες· β') 2,5 ἡμέραι; 4440· 60
- Ὅμας τρίτη. 1) Νὰ τραποῦν 540,5 (πχ²) εἰς (μ²). 301,031..
- 2) Νὰ τραποῦν 290,5 (245) μ. α') εἰς μικροὺς πήχεις· β') εἰς ὀκάδας. 448,302· 317,833
- 3) Νὰ τραποῦν εἰς ὀκάδας 1,45 χμ. 1586,43
- 4) Νὰ τραποῦν 140 ὀκάδες εἰς μέτρα καὶ ταῦτα εἰς μικροὺς πήχεις. 127,96· 197,47..
- 5) Νὰ τραποῦν α') 35 ὀκ. εἰς γραμμάρια· β') 890 γραμμάρια εἰς δράμια· γ') 30 ὀκ. εἰς χιλιόγρ. 44800· 278· 25· 38,4
- 6) Νὰ τραποῦν εἰς φράγκα 462,5 λίραι τῆς Ἀγγλίας. 168,875
- 7) Νὰ τραποῦν 1582 ὄρ. α') εἰς λίρας Ἀγγλίας· β) μάρκα· γ') εἰς δολάρια. 62,703... λίρ. 1265,6 μάρκ. 30... δολ.

- 8) Πόσα φράγκα κάμνουν 2580,50 μάρκα ; 3225 φρ. 62,5 λ.
- 9) Νά τραποῦν 1400 δολλάρια α') εἰς φράγκα· β') εἰς λίρας Ἀγγλίας· γ') εἰς μάρκα. 4252 φρ.· 287,44 λίρ. 5801, 6 μάρκ.
- 10) Νά τραποῦν 1542 κορῶναι α') εἰς φράγκα· β') εἰς μάρκα. 1665,36 φρ.· 1332,28 μάρκ.
- 11) Τὸ μέτρον ἑνὸς ὑφάσματος τιμᾶται 16,40 (2,45) δρ.· πόσον τιμᾶται ὁ πήχυς ; 40,6272 (1,5876).
- 12) Νά τραποῦν 5 βασιλικὰ στρέμματα εἰς (πχ.²). 8888 $\frac{8}{9}$.
- 13) Πόσον τιμᾶται οἰκόπεδον 2450 (2483,45) (μ²), ἐὰν ὁ (πχ.²) τιμᾶται 80 (72,5) δραχ. ; 34844,44 $\frac{4}{9}$ (320089,11..).
- 14) Οἰκόπεδον 478 (μ²) τιμᾶται 34416 δρ.· πόσον τιμᾶται ὁ (πχ.²) ; 40,5
- 15) Νά τραποῦν 23,5 λίραι Τουρκίας εἰς φράγκα καὶ αὐτὰ εἰς μάρκα. 535,80 φρ. 428,64 μάρκ.
- 16) Νά τραποῦν 258 (πχ.²) εἰς (μ²), 145,125.
- 17) Νά τραποῦν 152, 65 ὑάρδαι εἰς μέτρα καὶ αὐτὰ εἰς τεκτονικούς πήχεις. 139,5· 186,02...
- 18) Νά τραποῦν 15° (658'') εἰς πρῶτα καὶ δευτέρα (πρῶτα) λεπτά. 900· 54000'' $\left(10 \frac{29}{30}\right)$.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ XI

Περὶ τῶν συμμιγῶν ἀριθμῶν.

§ 69. Συμμιγεῖς ἀριθμοί.—

Ἐὰν υποθέσωμεν ὅτι ἐμετρήσαμεν ἓν ὕψος καὶ εὗρήκαμεν, ὅτι τὸ μῆκος τοῦ εἶνε 12 π. καὶ 6ρ.· τότε θὰ λέγωμεν ὅτι ὁ ἀριθμὸς 12 π. 6ρ. παριστάνει τὸ μῆκος τοῦ ὑφάσματος αὐτοῦ. Καθ' ὅμοιον τρόπον, ἐὰν ἐκ τῆς μετρήσεως ἑνὸς χρονικοῦ διαστήματος εὗρωμεν τὸν ἀριθμὸν 47 ὥρ. 20', θὰ λέγωμεν ὅτι ὁ ἀριθμὸς αὐτὸς παριστάνει τὸ χρονικὸν αὐτὸ διάστημα. Καθεὶς τῶν ἀριθμῶν τούτων ἀποτελεῖται ἀπὸ διαφόρους ἄλλους, τῶν ὁποίων αἱ μονάδες εἶνε πολλαπλάσια ἢ ὑποδιαίρεσις τῆς ἀρχικῆς μονάδος. Οὕτω ὁ ἀριθμὸς 12 π. 6. ρούπια ὑφάσματος ἀποτελεῖται ἀπὸ τοῦ ἀριθμοῦ 12 π. καὶ 6 ρούπια, ἐνῶ τὸ ρούπιον εἶνε ὑποδιαίρεσις τοῦ ἑνὸς πήχεως. Τοῦς τοιοῦτους ἀριθμοὺς καλοῦμεν *συμμιγεῖς*.

Ὅπτε, «συμμιγῆς ἀριθμὸς λέγεται ὁ συγκεκριμένος ἀριθμὸς, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖται ἀπὸ ἄλλους, τῶν ὁποίων αἱ μονάδες εἶνε πολλαπλάσια ἢ ὑποδιαίρέσεις τῆς αὐτῆς ἀρχικῆς μονάδος».

§ 70. Τροπὴ συμμιγοῦς εἰς ἀπλοῦν ἀριθμὸν. —

α') Ἐστω ὅτι θέλωμεν νὰ τρέψωμεν τὸν ἀριθμὸν 17 ὥρ. εἰς μονάδας τῆς ἀμέσως κατωτέρας τάξεως, δηλαδὴ εἰς πρῶτα λεπτά. Λέγομεν ἄρα ἡ ὥρα ἔχει 60', αἱ 17 ὥραι ἔχουν $60' \times 17 = 1920'$.

Ὁμοίως, ἂν θέλωμεν νὰ τρέψωμεν 5 στατ. εἰς ὀκτάδας, παρατηροῦμεν ὅτι, ἀφοῦ 1 στατ. ἔχει 44 ὀκ., οἱ 5 στατ. ἔχουν $44 \times 5 = 220$ ὀκ. Ἐκ τούτων καὶ ἄλλων ὁμοίων παραδειγμάτων συνάγομεν ὅτι «διὰ νὰ τρέψωμεν ἓνα ἀριθμὸν εἰς μονάδας τῆς ἀμέσως κατωτέρας τάξεώς του, τὸν πολλαπλασιάζομεν ἐπὶ ἐκεῖνον, ὁ ὁποῖος φανερῶνει πόσας μονάδας τῆς ἀμέσως κατωτέρας τάξεως ἔχει μία τῶν δοθεισῶν».

β') Ἐστω ὅτι ἔχομεν τὸν ἀριθμὸν 2560 λ. καὶ θέλωμεν νὰ τὸν τρέψωμεν εἰς δραχμάς. Παρατηροῦμεν ὅτι ἀφοῦ 100 λ. κάμνουν 1 δραχ., τὰ 2560 λ. θὰ κάμνουν τόσας δραχ., ὅσον χωρεῖ τὸ 100 λ. εἰς τὸ 2560 λ. ἦτοι $\frac{2560}{100} = 25,60$ δρα. Ὁμοίως σκεπτόμενοι εὐρίσκομεν ὅτι αἱ 13 δρα. ἔχουν $\frac{13}{5} = 2,6$ τάλληρα.

Ἐν γένει: «διὰ νὰ τρέψωμεν ἓνα ἀριθμὸν μονάδων μιᾶς τάξεως εἰς μονάδας τῆς ἀμέσως ἀνωτέρας τάξεως, ἀρκεῖ νὰ τὸν διαιρέσωμεν διὰ τοῦ ἀριθμοῦ, ὁ ὁποῖος φανερῶνει πόσαι μονάδες τῆς δοθείσης τάξεως ἀποτελοῦν μιαν τῆς ἀμέσως ἀνωτέρας».

γ') Ἐστω ὅτι θέλωμεν νὰ τρέψωμεν τὸν συμμιγῆ ἀριθμὸν 25 ὥρ. 23' 30" εἰς δευτέρα λεπτά.

Κατὰ τὰνωτέρω, ἐπειδὴ ἡ ὥρα ἔχει 60', αἱ 24 ὥραι ἔχουν $60' \times 24 = 1440'$, καὶ 25', τὰ ὅποια ἐδόθησαν, ἀποτελοῦν ἐν ὅλῳ 1465'. Τώρα τρέπομεν τὰ 1465' εἰς δευτέρα λεπτά. Ἀφοῦ τὸ 1' = 60", τὰ 1465' εἶνε ἴσα μὲ $60'' \times 1465 = 87900$. Προσθέτοντες ἔτι καὶ τὰ 30", τὰ ὅποια ἐδόθησαν, εὐρίσκομεν ὅτι αἱ 23 ὥραι 25' 30" = 87930". Ἐκ τούτου καὶ ἄλλων ὁμοίων παραδειγμάτων συνάγομεν ὅτι:

«διὰ νὰ τρέψωμεν συμμιγῆ εἰς μονάδας τῆς τελευταίας τάξεώς του, τρέπομεν τὸν ἀριθμὸν, ὃ ὁποῖος παριστάνει μονάδας τῆς ἀνωτέρας τάξεως, εἰς μονάδας τῆς ἀμέσως κατωτέρας τῆς, εἰς τὸ ἐξαγόμενον προσθέτομεν καὶ τὰς δοθείσας μονάδας τῆς τάξεως ταύτης· τὸ οὕτω προκύπτον ἄθροισμα τρέπομεν εἰς μονάδας τῆς ἀμέσως κατωτέρας τάξεως, εἰς δὲ τὸ ἐξαγόμενον προσθέτομεν καὶ τὰς δοθείσας μονάδας τῆς τάξεως ταύτης· καὶ οὕτω καθεξῆς προχωροῦμεν μέχρι τῶν μονάδων τῆς τελευταίας τάξεως.»

Γ') Ἐστω ὅτι θέλομεν νὰ τρέψωμεν τὸν συμμιγῆ 3 στ. 20 ὀκ. 250 δρμ. εἰς ὀκάδας. Ἐν πρώτοις ἔχομεν ὅτι 1 στ. = 44 ὀκ., 3 στ. = 132 ὀκ. προσθέτοντες εἰς αὐτὰς καὶ τὰς 20 ὀκ., αἱ ὁποῖαι ἐδόθησαν, εὐρίσκομεν 152 ὀκ. Τώρα τρέπομεν καὶ τὰ 250 δρμ. εἰς ὀκάδας, καὶ ἔχομεν ὅτι $250 \text{ δρμ.} = \frac{250}{400} = 0,625 \text{ ὀκ.}$ καὶ ἐπομένως θὰ ἔχωμεν ὅτι 3 στατ. 20 ὀκ. 250 δρμ. = 152,625 ὀκ.

Ἐκ τούτων καὶ ἄλλων ὁμοίων παραδειγμάτων συνάγομεν ὅτι: «διὰ νὰ τρέψωμεν συμμιγῆ εἰς ἄλλον ἀριθμὸν, παριστάνοντα μονάδας μιᾶς ὀρισμένης τάξεως, διαφόρου τῆς τελευταίας, τρέπομεν τοὺς ἀριθμοὺς, τοὺς παριστάνοντας μονάδας τάξεως μεγαλυτέρας καὶ μικροτέρας τῆς δοθείσης εἰς μονάδας τῆς τάξεως ταύτης, καὶ τὰ ἐξαγόμενα προσθέτομεν μετὰ τὸν ἀριθμὸν, ὃ ὁποῖος παριστάνει μονάδας τῆς ὀρισθείσης τάξεως.»

Οὔτω ἂν θέλωμεν ὃ συμμιγῆς 3 τάλ. 4 δρ. 50 λ. νὰ τραπῆ εἰς δραχμάς, θὰ ἔχωμεν 3 τάλ. = 5 δρ. $\times 3 = 15 \text{ δρ.}$, καὶ 4 δρ. = 19 δρ. τὰ 50 λ. = $\frac{50}{100} \text{ δρ.} = \frac{1}{2} \text{ δρ.}$ Ἐπομένως εἶνε 3 ταλ., 4 δ., 50 λ. = $19 \frac{1}{2} \text{ δρ.} = 19,5 \text{ δρ.}$

Προβλήματα πρὸς λύσιν.

Ἄμας πρώτη. 1) Νὰ τραποῦν 7,34 μ. α') εἰς δεκατόμ. β') εἰς ἑκατοστόμ. γ') εἰς χιλιοστόμ. 73,4 · 734 · 7340.

2) Ὅμοίως 6,42 χμ. εἰς α') μέτρα· β') δεκατόμετρα· γ') ἑκατοστόμετρα. 6420 · 64200 · 642000.

3) Ὅμοίως τὰ 2345678 μ. α') εἰς ἑκατόμ. καὶ β') εἰς χιλιόμ. 23456,78 · 2345,678.

4) Πόσα λεπτά έχουν α') 8,25 ὄρ.; β') 18,47 ὄρ.;

Ὅμας δευτέρα. 1) Νὰ τραποῦν εἰς μέτρα α') 25 παλ. β') 317 δάκ. γ') 314,5 γρ.

2) Ὅμοιος εἰς δραχμὰς 825 λ., 1375 λ.

3) Νὰ τραποῦν εἰς ἔτη α') 18 μῆνες β') 180 ἡμ. $1 \frac{1}{2}, \frac{36}{73}$.

Ὅμας τρίτη. 1) Νὰ τραποῦν εἰς μέτρα α') 9 χμ. 16,4 μ. β') 2 δεκάμετρα 6 μ. 8 δάκτ.

2) Νὰ τραποῦν εἰς στατήρας α') 12 στατ. 40 ὄκ. 300 ὄρμ. β') 132,25 ὄκ. $12 \frac{163}{176}, 3 \frac{1}{176}$

3) Πόσα δευτερόλεπτα κάμνουν 4 (2) μῆν., 5 (6) ὄρ., 56' (54' 36''); (ὁ μῆν ὑποτίθεται ὅτι ἔχει 30 ἡμέρας).

Ὅμας τετάρτη. 1) Νὰ τραποῦν εἰς πήχεις α') 132 μ. β') 14,3 μ. γ') 8 μ. 7 π. 3 δ. 8 γρ. $10389360 (5208876), 203,703 \cdot 22,678 \cdot 13,48..$

2) Νὰ τραποῦν εἰς ὀκάδας (στατήρας) α) 3 (5) στατ. 5 (28) ὄκ. 100 (320) δράμια. $437,25 \left(5 \frac{36}{55} \right)$

3) Νὰ τραποῦν εἰς μοίρας $7^\circ (28^\circ) 15' (30') 18'' (27'')$. $7,255 \cdot (28,5075).$

Ὅμας πέμπτη. 1) Πόσας ὥρας ἔχουν $2,5 \left(3 \frac{1}{5} \right)$ μῆνες; 1800·2304.

2) Πόσα δεύτερα λεπτά ἔχει α') ἓν κοινὸν ἔτος β') ἓν δίσεκτον ἔτος; $31536000'' \cdot 31622400''.$

3) Πόσα δραμ. ἔχουν α') 3,17 στατ. β') 14,35 ὄκ.; $5579200 \cdot 5740.$

4) Νὰ τραποῦν εἰς στατήρας α') 145 (14,35) ὄκ. $3,295.. (0,326..).$

5) Νὰ τραποῦν εἰς ἡμέρας α') 7 (9) ἡμ. 18 (12) ὄρ. 36' (54') β') 84 (30,6) ὄραι. $7,775 (9,5375) \cdot 3,5 (1,275).$

6) Νὰ τραποῦν εἰς ἡμέρας (ὄρας) 217 (5) ἡμ. (18) ὄραι. 36' (20' καὶ 40'). $217 \frac{1}{40} \left(138 \frac{31}{90} \right).$

§ 21. Τροπὴ ἀκεραίου εἰς συμμιγῆ.—

Ἐστω ὅτι θέλομεν νὰ τρέψωμεν τὰ 7756' εἰς συμμιγῆ ἀριθμὸν. Ἐπειδὴ 60' κάμνουν 1 ὄραν, τὰ 7756' κάμνουν $7756' : 60$

= 129 ώρας και 16'. Ὡστε 7756' = με 129 ώρας και 16'. Ἐπειδὴ δὲ αἱ 24 ώραι ἀποτελοῦν 1 ἡμ. αἱ 129 ώραι ἀποτελοῦν $129 : 24 = 5$ ἡμ. και μένουν 9 ώραι. Ὡστε αἱ 129 ώραι = 5 ἡμ. 6 ώρας. Ὅθεν τὰ 7756' = 5 ἡμ. 9 ὡρ. 16'.

Ὅμοίως σκεπτόμεθα, ἐὰν θέλωμεν νὰ τρέψωμεν τὸν ἀριθμὸν 75325 δράμια εἰς συμμιγῆ. Εὐρίσκομεν δηλαδὴ πρῶτον, πόσας δεκάδας κάμνουν τὰ 75325 δρ., διαιροῦντες τὸν 75325 διὰ τοῦ 400, τὸ δὲ προκύπτον πηλίκον διαιροῦμεν διὰ τοῦ 14, διὰ νὰ εὕρωμεν πόσους στατήρας περιέχουν. Τὸ τελευταῖον πηλίκον και τὰ ὑπόλοιπα δίδουν τὸν ζητούμενον συμμιγῆ.

Συνήθως ἡ σειρά τῶν διαιρέσεων διατάσσεται ὡς κάτωθι.

$$\begin{array}{r|l}
 75325 & 400 \\
 3532 & \hline
 3325 & 188 \quad 44 \\
 125 & 12 \quad \hline
 & 4
 \end{array}$$

και εὐρίσκομεν ὅτι 75325 δρμ = 4 στ. 12 δεκ. 125 δρμ. Ἐκ τούτων ἔπεται ὅτι «διὰ νὰ τρέψωμεν ἀκέραιον ἀριθμὸν, παριστάνοντα μονάδας μιᾶς τάξεως εἰς συμμιγῆ, διαιροῦμεν αὐτὸν διὰ τοῦ ἀριθμοῦ, ὁ ὁποῖος φανερώνει πόσαι μονάδες τῆς δοθείσης τάξεως ἀποτελοῦν μίαν τῆς ἀμέσως ἀνωτέρας· τὸ προκύπτον πηλίκον παριστάνει μονάδας τῆς ἀμέσως ἀνωτέρας τάξεως, τὸ δὲ ὑπόλοιπον μονάδας τῆς δοθείσης. Ὅμοίως ἐργαζόμεθα ἐπὶ τοῦ εὐρεθέντος πηλίκου, και οὕτω προχωροῦμεν μέχρις ὅτου εὕρωμεν πηλίκον, τοῦ ὁποῖου αἱ μονάδες νὰ μὴ περιέχουν μονάδας ἀνωτέρας τάξεως. Τὸ τελευταῖον πηλίκον και τὰ ὑπόλοιπα τῶν διαιρέσεων ἀποτελοῦν τὸν ζητούμενον συμμιγῆ».

§ 22. Τροπὴ κλάσματος εἰς συμμιγῆ. —

α') Ἐστω ὅτι θέλωμεν νὰ τρέψωμεν τὸν κλασματικὸν ἀριθμὸν $\frac{7}{8}$ στ. εἰς συμμιγῆ. Διαιροῦντες τὸ 47 διὰ τοῦ 8 εὐρίσκομεν πόσους ἀκεραίους στατήρας περιέχει τὸ δοθὲν κλάσμα. Οὕτω ἔχωμεν 5 στ. και $\frac{7}{8}$ στ. Τὸ $\frac{7}{8}$ στ. τρέπομεν εἰς δεκάδας, πολλαπλασιάζοντες 44 δεκ. $\times \frac{7}{8}$, ὅτε εὐρίσκομεν $\frac{308}{8}$ δεκ. = 38 $\frac{1}{2}$ δεκ. Τὸ $\frac{1}{2}$ δεκ. τρέπο-

μεν εἰς δράμια καὶ οὕτω ἔχομεν ὅτι $\frac{44}{8}$ στ. = 5 στ. 38 ἔκ. 200 δρμ.

Ἡ πράξις δικτάσεται συνήθως ὡς ἑξῆς.

47	8
7	5 στ. 38 ἔκ. 200 δράμια.
$\times 44$	
<hr style="width: 100%;"/>	
308	
68	
4	
$\times 400$	
<hr style="width: 100%;"/>	
1600	
0	

6') Ἐστω ὅτι θέλομεν νὰ τρέψωμεν τὸν ἀριθμὸν 3,45 ἡμ. εἰς συμμιγῆ.

Παρατηροῦμεν ὅτι 3,45 ἡμ. = 3 ἡμ. καὶ 0,45 ἡμ. Αἰ 0,45 ἡμ. = 24 ὥρ. $\times 0,45 = 10,8$ ὥρ. ἢ 10 ὥρ. καὶ 0,8 ὥρ. Αἰ 0,8 ὥρ. = 48'. Εἰς τὸ αὐτὸ ἐξαχγόμενον φθάνομεν καὶ ἐὰν τὸ δοθέντι δεκαδικὸν ἀριθμὸν γράψωμεν ὑπὸ κλασματικὴν μορφήν καὶ ἐργασθῶμεν καθὼς καὶ εἰς τὸ προηγούμενον παράδειγμα.

Ἐκ τούτων ἔπεται ὅτι «διὰ νὰ τρέψωμεν κλάσμα, τὸ ὁποῖον παριστάνει μονάδας δοθείσης τάξεως, εἰς συμμιγῆ, διαιροῦμεν τὸν ἀριθμητὴν διὰ τοῦ παρονομαστοῦ· τὸ πηλίκον παριστάνει μονάδας τῆς δοθείσης τάξεως, τὸ δὲ ὑπόλοιπον τρέπομεν εἰς μονάδας τῆς ἀμέσως κατωτέρας τάξεως διὰ πολλαπλασιασμοῦ· τὸ γινόμενον διαιροῦμεν διὰ τοῦ παρονομαστοῦ καὶ οὕτω προχωροῦμεν ὁμοίως μέχρις ὅτου φθάσωμεν εἰς μονάδας τῆς τελευταίας τάξεως».

Ἀσκήσεις.

- 1) Νὰ τραποῦν εἰς συμμιγεῖς ἀριθμοὺς· α') 784 κιλ. β') 12347 γρ.
- 2) Ὅμοίως α') 24867 (μ²)· β') 124 μῆν. γ') 3867 ἡμ.
- 3) Νὰ τραποῦν εἰς συμμιγεῖς οἱ α') 3.124 μ.² β') 29.45 γ') 3,15 τάλ. δ') 82565". ε') 1345'.
- 4) Ὅμοίως α') 2,37 ἔτ. β') $\frac{4}{9}$ λίρ. γ') $\frac{13}{9}$ ἔτ. δ') $\frac{142}{23}$ ἡμ. ε') 82,12 δρ. ς') 1223 ἔτη ζ') 38,52 στατ.

§ 73. Πρόσθεσις.—

Ἐπειδὴ οἱ συμμιγεῖς δύνανται νὰ τραποῦν εἰς ἀκεραίους ἢ κλασματικούς, αἱ ἐπ' αὐτῶν πράξεις δύνανται ν' ἀναχθοῦν εἰς πράξεις ἀκεραίων καὶ κλασματικῶν.

α') Οὕτω διὰ νὰ προσθέσωμεν συμμιγεῖς ἀριθμούς, τρέπομεν αὐτοὺς εἰς ἀκεραίους καὶ ἀκολουθῶς προσθέτομεν αὐτοὺς, τὸ δὲ ἄθροισμα τρέπομεν εἰς συμμιγῆ ἀριθμόν. Π. χ. τὸ ἄθροισμα 3 ἔτ. 7 μῆν. 18 ἡμ. + 4 ἔτ. 9 μ. 17 ἡμ. = 1308 ἡμ. + 1727 ἡμ. = 3035 ἡμ., ἐκ τοῦ ὁποίου εὐρίσκομεν, ἂν τρέψωμεν αὐτὸν εἰς συμμιγῆ, 8 ἔτ., 5 μῆν., 5 ἡμ.

β') Ἐν τούτοις δυνάμεθα νὰ προσθέσωμεν συμμιγεῖς, ἂν προσθέσωμεν χωριστὰ τοὺς ἀριθμούς, τοὺς παριστάνοντας μονάδας τῆς αὐτῆς τάξεως. Οὕτω διὰ τὴν πρόσθεσιν τῶν συμμιγῶν 3 ἔτ. 7 μῆν. 18 ἡμ. καὶ 4 ἔτ. 9 μῆν. 17 ἡμ. γράφομεν αὐτοὺς ὡς κάτωθι καὶ προσθέτομεν ὡς συνήθως κατὰ στήλην.

3 ἔτ.	7 μῆν.	18 ἡμ.
4	9	17
7	16	35
8	5	5

καὶ εὐρίσκομεν τὸ ἄθροισμα 7 ἔτ. 16 μῆν. 35 ἡμ. Ἐὰν ἀπὸ καθένα τῶν ἀριθμῶν 35 ἡμ. 16 μῆνας ἐξάγωμεν τὰς μονάδας τῆς ἀνωτέρας τάξεως, ἐκείνης τὴν ὁποίαν παριστάνει, καὶ προσθέσωμεν αὐτὰς εἰς τὰς ἀνωτέρας, εὐρίσκομεν 8 ἔτ. 5 μῆν. 5 ἡμ.

Ὅμοιως ἂν ἔχωμεν πρὸς λύσιν τὸ πρόβλημα :

« Παιδίον ἐγεννήθη τὴν 8ην Φεβρουαρίου τοῦ 1825 καὶ ἀπέθανεν εἰς ἡλικίαν 2 ἔτ. 2 μῆν. 28 ἡμ. πότε ἀπέθανε ; »

Παρατηροῦμεν ὅτι, ἀπὸ τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ μέχρι τῆς γεννήσεως τοῦ παιδίου ἐπέρασεν 1824 ἔτ. 1 μῆν., 7 ἡμ. (ἐπειδὴ ὁ Φεβρουάριος εἶνε δεύτερος μῆν τοῦ ἔτους καὶ δὲν εἶχε περάσει). Μέχρι δὲ τοῦ θανάτου τοῦ παιδίου ἐπέρασεν 1824 ἔτ. 1 μῆν., 7 ἡμ. + 2 ἔτ. 2 μῆν. 28 ἡμ. ἦτοι, διὰ νὰ εὕρωμεν πότε ἀπέθανε. θὰ ἐκτελέσωμεν τὴν πρόσθεσιν

	1824 ἔτ.	1 μῆν	7 ἡμ.	
α.	2	2	28	ἐξ ἧς εὐρίσκο-
καὶ				
	1826	3	35	μην
ὁκ.	1826	4	5	

ἦτοι ἀπέθανε τὴν 6 Μαΐου τοῦ 1827, ἐπειδὴ εἶχον περάσει αἱ 5 πρῶται ἡμέραι του.

(Τὸ ἐξαγόμενον αὐτὸ εἶνε κατὰ προσέγγισιν, διότι ὑπεθέσαμεν ὅτι καθελς μὴν ἔχει 30 ἡμέρας).

Ἀσκήσεις.

Ἑομάς πρώτη. Νὰ εὑρεθοῦν τὰ ἀθροίσματα α') 8 μ., 7 π., 2 δ. + 12 μ., 9 π., 8 δ. + 16 μ., 2 π., 2 δ. β') 18 δρ., 25 λ. + 8 τάλ., 4 δ., 20 λ.

Ἑομάς δευτέρα. 1) Ἐν ὠρολόγιον δεικνύει εἰς τὴν Ῥώμην 12' 4" ὀλιγώτερον ἄλλου εἰς τὴν Βιέννην· ποία εἶνε ἡ ὥρα εἰς τὴν Βιέννην, ἂν εἰς τὴν Ῥώμην εἶνε 7 (10) ὥρ. 8' (9') 59" (29'') π. (μ.) μ.;

7 (10) ὥρ. 21' (21') 3" (33'').

2) Ἡ ὥρα εἰς τὴν Βιέννην εἶνε 52' 4" ὀλιγώτερον ἢ εἰς τὴν Πετροῦπολιν· ποία εἶνε ἡ ὥρα εἰς τὴν Πετροῦπολιν, ἂν εἰς τὴν Βιέννην εἶνε 7 (9) ὥρ. 58' (48') 12" (56'') π. (μ.) μ.;

8 (10) ὥρ. 50' (41') 16" π. (μ.) μ.

Ἑομάς τρίτη. 1) Ἐμπορος ἀγοράζει ἐμπόρευμα ἀντὶ 47 (127) δρ. 26 (5) λ. καὶ τὸ πωλεῖ μὲ κέρδος 6 (28) δρ., 49 (95) λ.· πόσον τὸ ἐπώλησε;

53.75 (156) δρχ.

2) Ἐμπορος πωλεῖ ἐμπόρευμα ἀντὶ 8720 δρ. 9 λ. (4125 δρ. 16 λ.) μὲ ζημίαν 185 δρ., 16 λ. (325 δρ., 28 λ.)· πόσον εἶχεν ἀγοράσει τὸ ἐμπόρευμα;

8905, 25 (4450, 44) δρχ.

Ἑομάς τετάρτη. 1) Ὁ φιλόσοφος Κάντιος ἐγενήθη τὴν 22 Ἀπριλίου τοῦ 1724, ἀπέθανε δὲ εἰς ἡλικίαν 79 ἔτ. 9 μην. 19 ἡμ.· πότε ἀπέθανεν;

11 Φεβρ. 1804.

2) Ὁ Α εἶνε ἡλικίας 14 (64) ἔτ. 6 (8) μην. 18 (9) ἡμερ.· ὁ Β 8 (14) ἔτ. 8 (10) μην. 26 (26) ἡμ., πρεσβύτερος· πόσην ἡλικίαν ἔχει ὁ Β;

23 (79) ἔτ. 3 (7) μην. 14 (5) ἡμ.

3) Ἐμπορος εἰσπράττει τὴν α' ἡμέραν 248 δρ. 26 λ. (118 δρ. 9 λ.)· τὴν β' 35 δρ. 16 λ. (18 δ. 35 λ.) περισσότερον ἢ τὴν α'· τὴν γ' 6 δρ. 24 λ. (19 δ. 43 λ.) περισσότερον τῆς β', καὶ τὴν δ' 22 δρ. 48 λ. (9 δ. 33 λ.) περισσότερον τῆς γ'· πόσα εἰσπράττει ἐν ὅλῳ;

1133 (575) δρ. 48 (60) λ.

§ 74. Αφαίρεσεις.—

α') Διὰ ν' ἀφαιρέσωμεν συμμιγεῖς ἀριθμούς, δυνάμεθα νὰ τρέψωμεν αὐτοὺς εἰς ἀκεραίους ἢ κλασματικούς, παριστάνοντας μονάδας τῆς αὐτῆς τάξεως, μετὰ δὲ τὴν ἀφαίρεσιν αὐτῶν νὰ τρέψωμεν τὸ ὑπόλοιπον εἰς συμμιγῆ. Οὕτω διὰ τὴν ἀφαίρεσιν 12 στ. 8 δκ. 250 δρμ., πλὴν 6 στ. 10 δκ. 150 δρμ. ἔχομεν τὴν ἀφαίρεσιν τῶν ἀκεραίων 214650 δρμ. πλὴν 109750 δρμ. = 10505 δρμ. Ἐκ τούτου εὐρίσκομεν, τρέποντες αὐτὸν εἰς συμμιγῆ 5 στ. 42 δκ. 100 δράμια.

β') Ἐν τούτοις δυνάμεθα ν' ἀφαιρέσωμεν συμμιγεῖς, ἀφαιροῦντες χωριστὰ τοὺς ἀριθμούς, οἱ ὅποιοι παριστάνουν μονάδας τῆς αὐτῆς τάξεως. Οὕτω διὰ νὰ εὐρωμεν τὴν διαφορὰν 4 ἔτ. 3 μῆν. 8 ἡμ.—2 ἔτ. 1 μῆν 12 ἡμ., γράφομεν τοὺς ἀριθμούς ὡς κάτωθι καὶ ἀφαιροῦμεν κατὰ στήλας.

		38
		—
4 ἔτ.	3 μῆν.	8 ἡμ.
2	1	12
2	1	26

λέγοντες· 12 ἡμέραι ἀπὸ 8 ἡμ. δὲν ἀφαιροῦνται· προσθέτομεν 1 μῆν. ἢ 30 ἡμ. εἰς τὰς 8 ἡμ., ὅτε ἔχομεν 38 ἡμ., καὶ ἀφαιροῦντες 12 ἡμ. ἀπὸ 38 ἡμ., εὐρίσκομεν 26 ἡμ.: γράφομεν αὐτὸ ὑπὸ κάτω τῆς γραμμῆς εἰς τὴν στήλην τῶν ἡμερῶν 1 μῆν καὶ 1 μῆν ἴσον 2 μ., ἀπὸ 3 μ. ἴσον 1 μῆν· γράφομεν τὸ 1 εἰς τὴν στήλην τῶν μηνῶν· 2 ἔτη ἀπὸ 4 ἔτ. = 2 ἔτη. Ὡστε τὸ ὑπόλοιπον εἶνε 2 ἔτ. 1 μῆν 26 ἡμ.

Προβλήματα πρὸς λύσιν.

Ἅμας πρῶτη. 1) Νὰ εὐρεθοῦν τὰ ὑπόλοιπα καὶ νὰ γίνουν αἱ δοκιμαὶ τῶν ἀφαιρέσεων· α') 18 μ. 4 π. 2 δ—5 μ. 8 π. 6 δ. β') 12 εἰκασ. 3 τάλ. 2 δρ. 30 λ.—5 εἰκ. 3 τάλ. 4 δρ. 80 λ.

γ') 8 στ. 32 δκ. 250 δρμ.—5 στ. 40 δκ. 120 δρ.

2) Ὅμοίως α') 3 ἔτ. 8 μῆν.—2 ἔτ. 10 μῆν. β') 16 ὥραι 25' 4" —14 ὥρ. 28' 49". γ') 12 τάλ. 3 δρ. 75 λ.—10 τάλ. 2 δρ. 85 λ.

*Ομάς δευτέρα. 1) Ἀπὸ βαρέλιον, περιέχον 385 στ. 32 ὄκ. 200 δρμ. ἀφηρέθησαν 30 στ. 6 ὄκ. 100 δρμ., ἔπειτα 12 στ. 43 ὄκ. καὶ 16 στ. 17 ὄκ. 120 δρμ: πόσος οἶνος ἔμεινεν εἰς τὸ βαρέλιον;

326 στ. 9 ὄκ. 380 δρ.

2) Ἔχει τις 628 δρ. 25 λ. (1364 δρ. 83 λ.) καὶ ἐξοδεύει πρῶτον 46 δρ. 18 λ. (9 δρ. 18 λ.), ἔπειτα 16 δρ. 42 λ. (283 δρ. 6 λ.) καὶ τέλος 7 δρ. 18 λ. (19 δρ. 25 λ.)· πόσα τοῦ μένου;

558 δρ. 47 λ. (1053 δρ. 34 λ.).

*Ομάς τρίτη. 1) Ἀγοράζει τις ἐμπόρευμα ἀντὶ 128 δρ. 26 λ. (215 δρ. 48 λ.) καὶ τὸ πωλεῖ μὲ ζημίαν 6 δρ. 25 λ. (9 δρ. 35 λ.)· πόσον ἐπωλήθη τὸ ἐμπόρευμα;

122 δρ. 1 λ. (206 δρ. 13 λ.).

2) Ἐμπορος πωλεῖ ἐμπόρευμα ἀντὶ 788 δρ. 35 λ. (727 δρ. 85 λ.) μὲ κέρδος 22 δρ. 48 λ. (46 δρ. 27 λ.)· πόσον τὸ ἠγόρασε;

765 δρ. 87 λ. (881 δρ. 58 λ.).

*Ομάς τετάρτη. 1) Εἰς πόλεμος διήρκησεν 6 ἔτη, 5 μῆν., 17 ἡμ., ἐτελείωσε δὲ τὴν 15 Φεβρουαρίου τοῦ 1763· πότε ἤρχισεν;

(28 Αὐγ. 1756).

2) Ἀπέθανέ τις εἰς ἡλικίαν 64 ἐτῶν 8 μῆν. 3 ἡμ. (43 ἐτ. 6 μῆν. 24 ἡμ.) τὴν 18ην Αὐγούστου τοῦ 1872 (14 Ἰαν. τοῦ 1901)· πότε ἐγεννήθη;

15 Δεκ. 1808 (20 Ἰουν. 1857).

3) Ἐν συμφάν, τὸ ὅποτον ἤρχισε τὴν 8ην Αὐγ. 1891 τὴν 4 ὥρ. 26' 18" π. μ., ἐτελείωσε τὴν 25 Δεκεμβρίου 1895 τὴν 6 ὥρ. 25' 13" π. μ.· πόσον διήρκεσε τὸ γεγονός αὐτό;

4 ἔτ. 4 μῆν. 17 ἡμ. 1 ὥρ. 58' 55".

4) Νὰ γίνῃ ἡ ἀφαίρεσις καὶ ἡ δοκιμὴ

20 λίρ. 12 σελ. 4 πέν.—10 λίρ. 15 σελ. 2 πέν.

§ 75. Πολλαπλασιασμὸς καὶ διαίρεσις, ὅταν ὁ πολλαπλασιαστὴς καὶ ὁ διαιρέτης εἶνε ἀκέραιοι.—

α') Ἐστω ὅτι θέλομεν νὰ πολλαπλασιάσωμεν τὸν συμμιγῆ 2 ἔτ. 3 μῆν. 9 ἡμ. ἐπὶ 4. Ἔχομεν 2 ἔτ. 3 μῆν. 9 ἡμ. ἐπὶ 4 = 819 ἡμ. × 4 = 3276 ἡμ: τρέποντες δ' αὐτὸν εἰς συμμιγῆ, εὐρίσκομεν 9 ἔτ. 1 μῆν. 6 ἡμέρας.

Ὅμοιως ἐργαζόμεθα καὶ ὅταν ὁ πολλαπλασιαστὴς εἶνε δεκαδικὸς ἀριθμὸς. Π. χ. 2 ἔτ. 3 μῆν. 9 ἡμ. × 1,2 = 819 ἡμ. × 1,2 = 782, 8 ἡμ. = 2 ἔτ. 8 μῆν. 22,8 ἡμ.

Ἐκ τούτων καὶ ἄλλων ὁμοίων παραδειγμάτων ἔπεται ὅτι «διὰ τὴν πολλαπλασιάσωμεν συμμιγῆ ἐπὶ ἀκέραιον, δυνάμεθα τὴν τρέψωμεν τὸν συμμιγῆ εἰς ἀκέραιον ἢ κλασματικὸν, παριστάνοντα μονάδας μιᾶς ὠρισμένης τάξεως, καὶ τὸ ἐξαγόμενον αὐτὸ τὴν πολλαπλασιάσωμεν ἐπὶ τὸν ἀκέραιον, τὸ δὲ γινόμενον τὴν τρέψωμεν εἰς συμμιγῆ».

β') Ἐάν ὁ πολλαπλασιαστής εἴνε ἀκέραιος εἴνε προτιμότερον ἐνίοτε, τὴν πολλαπλασιάσωμεν καθένα τῶν ἀριθμῶν ἐκ τῶν ὁποίων ἀποτελεῖται ὁ συμμιγῆς ἐπὶ τὸν ἀκέραιον, καὶ τὴν προσθέσωμεν τὰ ἐξαγόμενα. Οὕτω π. χ. διὰ τὴν τὴν πολλαπλασιάσωμεν τὸν συμμιγῆ $8^{\circ} 27' 14''$ ἐπὶ 5, πολλαπλασιάζομεν καθένα τῶν ἀριθμῶν $14'' 27' 8^{\circ}$ ἐπὶ 5 καὶ εὐρίσκομεν ἀντιστοίχως τὰ γινόμενα $70'', 135', 40^{\circ}$. Ἐάν δὲ ἀπὸ καθέναν τῶν $70'', 135'$ ἐξαγάγωμεν τὰς περιεχομένας μονάδας τῆς ἀμέσως ἀνωτέρας τάξεώς των, καὶ προσθέσωμεν αὐτὰς εἰς τὸν ἀριθμὸν, ὁ ὁποῖος παριστάνει μονάδας τῆς αὐτῆς τάξεως, εὐρίσκομεν τελικὸν ἐξαγόμενον $42^{\circ} 16' 10''$.

Ἡ πρᾶξις διατάσσεται συνήθως ὡς κάτωθι

8°	27'	14''
		5
40°	135'	70''
42°	16'	10''.

γ') Ἐστὼ ὅτι ἔχομεν τὴν διαιρέσωμεν τὸν $25^{\circ} 27' 44''$ διὰ τοῦ 0,8. Τρέπομεν τὸν συμμιγῆ εἰς δευτέρην λεπτά, καὶ οὕτω ἔχομεν τὴν διαίρεσιν $91624 : 0,8 = 114530'$. Ἐάν τὸ πηλίκον αὐτὸ τρέψωμεν εἰς συμμιγῆ, εὐρίσκομεν ὅτι εἴνε ἴσον μὲ $31^{\circ} 48' 5''$.

Ὁμοίως ἐργαζόμενοι, εὐρίσκομεν ὅτι $29 \mu. 4 \pi. 7 \delta\acute{\alpha}\kappa\tau.: 421 = 2947 \delta\acute{\alpha}\kappa\tau.: 421 = 7 \delta\acute{\alpha}\kappa\tau.$

Ἐκ τούτων συνάγομεν ὅτι «διὰ τὴν διαιρέσωμεν συμμιγῆ δι' ἀκέραιον ἢ δεκαδικὸν ἀριθμὸν, δυνάμεθα τὴν τρέψωμεν τὸν συμμιγῆ εἰς ἀκέραιον ἢ κλασματικὸν, παριστάνοντα μονάδας ὠρισμένης τάξεως, καὶ τοῦτον τὴν διαιρέσωμεν ἀκολουθῶν διὰ τοῦ δοθέντος ἀκέραιου ἢ δεκαδικοῦ, τὸ δὲ πηλίκον τὴν τρέψωμεν εἰς συμμιγῆ, ἐάν θέλωμεν.»

δ') Ἐάν ὁ διαιρέτης εἴνε ἀριθμὸς ἀκέραιος, εἴνε προτιμότερον

ένιοτε, νά διαιρούμεν καθένα τῶν ἀριθμῶν ἐκ τῶν ὁποίων ἀποτελεῖται ὁ διαιρετέος συμμιγῆς διὰ τοῦ ἀκεραίου.

Π. χ., ἐάν θέλωμεν νά διαιρέσωμεν τὸν $6^{\circ} 35' 36''$ διὰ τοῦ 6, διαιρούμεν πρῶτον τὸν 6° διὰ τοῦ 6 καὶ εὐρίσκομεν πηλίκον 1° . Ἐπειτα διαιρούμεν τὰ $35'$ διὰ τοῦ 6, ὅτε εὐρίσκομεν πηλίκον $5'$ καὶ ὑπόλοιπον $5'$ τὰ $5'$ τρέπομεν εἰς δεύτερα λεπτὰ καὶ εὐρίσκομεν $60'' \times 5 = 300''$ καὶ $36''$, τὰ δοθέντα, κάμνουν ἐν ὄλῳ $336''$. Διαιροῦντες καὶ τοῦτο διὰ 6 εὐρίσκομεν πηλίκον $56''$. Ὡστε τὸ πηλίκον εἶνε $1^{\circ} 5' 56''$. Ἡ πρᾶξις διατάσσεται ὡς ἑξῆς.

6°	$35'$	36	6
	5		$1^{\circ} 5' 56''$
	$\times 60$		
	300		
	$+ 36$		
	336		
	36		
	0		

Ἐάν τὸ τελευταῖον ὑπόλοιπον τῆς διαιρέσεως δὲν εἶνε 0, γράφομεν τὸ πηλίκον τοῦ διὰ τοῦ διαιρέτου ὑπὸ μορφήν κλασματικὴν. Οὕτω εὐρίσκομεν ὅτι $33 \delta\kappa. 147 \delta\rho\mu. : 2 = 16 \delta\kappa. 273 \frac{1}{2} \delta\rho\mu.$

§ 76. Πολλαπλασιασμὸς καὶ διαιρέσεις, ὅταν ὁ πολλαπλασιαστικὸς ἢ ὁ διαιρέτης εἶνε κλάσμα. —

α') Ὅταν ἔχωμεν νά πολλαπλασιάσωμεν συμμιγῆ ἐπὶ κλάσμα, π. χ. τὸν 5 στ. 38 δκ. 250 δρμ. ἐπὶ $\frac{3}{4}$ πρέπει νά εὐρωμεν τὸ τέταρτον τοῦ πολλαπλασιαστέου καὶ τοῦτο νά πολλαπλασιάσωμεν ἐπὶ 3. Ἦτοι πρέπει νά διαιρέσωμεν τὸν συμμιγῆ διὰ 4 καὶ καὶ τὸ πηλίκον νά πολλαπλασιάσωμεν ἐπὶ 3. Ἀλλὰ τὸ αὐτὸ ἐξαγόμενον εὐρίσκομεν, ἐάν πρῶτον πολλαπλασιάσωμεν τὸν δοθέντα συμμιγῆ ἐπὶ 3, καὶ τὸ γινόμενον διαιρέσωμεν διὰ 4. Οὕτω ἔχομεν ὅτι 5 στ. 38 δκ. 250 δρμ. $\times \frac{3}{4}$ ἰσοῦται μὲ $\frac{5 \text{ στ. } 38 \delta\kappa. 250 \delta\rho\mu. \times 3}{4}$. Ἐκτελοῦντες τὸν πολλαπλασιασμόν, εὐρίσκομεν γινόμενον 17 στ. 27 δκ. 250 δρμ., ἂν δὲ τοῦτο διαιρέσωμεν διὰ τοῦ 4, εὐρίσκομεν ἐξαγόμενον 4 στατ. 17 δκ. $38 \frac{1}{4} \delta\rho\mu.$

Ἐὰν ἔχωμεν νὰ πολλαπλασιάσωμεν συμμιγῆ ἐπὶ μικτόν, ἢ τρέπομεν τὸν μικτόν εἰς ἰσοδύναμον κλάσμα καὶ οὕτω πολλαπλασιάζομεν συμμιγῆ ἐπὶ κλάσμα, ἢ πολλαπλασιάζομεν τὸν συμμιγῆ χωριστὰ ἐπὶ τὸν ἀκέραιον καὶ χωριστὰ ἐπὶ τὸ κλάσμα τοῦ μικτοῦ καὶ τέλος προσθέτομεν τὰ δύο ἐξαγόμενα. Ἐπίσης, ὅταν ὁ πολλαπλασιαστής εἶνε δεκαδικός, δυνάμεθα νὰ τρέψωμεν αὐτὸν εἰς κλάσμα καὶ οὕτω νὰ πολλαπλασιάσωμεν ἐπὶ κλάσμα.

β') Ὅταν ἔχωμεν νὰ διατρέσωμεν συμμιγῆ διὰ κλάσματος, ἀντιστρέφομεν τοὺς ὅρους τοῦ διαιρέτου καὶ ἀκολουθῶς πολλαπλασιάζομεν τὸν συμμιγῆ ἐπὶ τὸ νέον κλάσμα.

Παράδειγμα. $18^{\circ} 45' 20'' : \frac{5}{9}$ εἶνε ἴσον μὲ $18^{\circ} 45' 20'' \times \frac{9}{5} = 32^{\circ} 21' 36''$.

γ') Ἐὰν ὁ διαιρέτης εἶνε μικτὸς ἀριθμὸς, τρέπομεν αὐτὸν εἰς κλάσμα καὶ ἀκολουθῶς διαιροῦμεν τὸν συμμιγῆ διὰ τοῦ κλάσματος αὐτοῦ. Κατὰ ταῦτα ἔχομεν ὅτι $17 \text{ δκ. } 150 \text{ δρ.} : 2 \frac{3}{5}$ εἶνε ἴσον μὲ $17 \text{ δκ. } 150 \text{ δρμ.} : \frac{13}{5} = 17 \text{ δκ. } 150 \text{ δρμ.} \times \frac{5}{13}$ καὶ ἐκτελοῦντες τὸν πολλαπλασιασμόν, εὐρίσκομεν ἐξαγόμενον $6 \text{ δκάδας } 273 \frac{1}{13} \text{ δρμ.}$

Ἐπίσης ἐὰν ὁ διαιρέτης εἶνε δεκαδικὸς ἀριθμὸς, δυνάμεθα νὰ γράψωμεν αὐτὸν ὑπὸ κλασματικὴν μορφήν καὶ νὰ διατρέσωμεν διὰ κλάσματος.

Οὕτω ἔχομεν ὅτι $5 \text{ π. } 4\rho. : 0,8 = 5 \text{ π. } 4\rho. : \frac{8}{10} = 5 \text{ π. } 4\rho. \times \frac{10}{8} = 6 \text{ π. } 7 \rho.$

Ἀσκήσεις καὶ προβλήματα.

Ὅμας πρώτη. 1) Νὰ εὐρεθῆ τὸ γινόμενον. $3 (64) \text{ τάλ. } 4 (4) \text{ δρ. } 25 (25) \text{ λ.} \times 17 (3,44)$. 327,25 (1115,42) δρ.

2) Ὅμοίως τὸ $1 (8) \text{ ἔτ. } 4 (7) \text{ μῆν. } 6 (24) \text{ ἡμ.} \times 17 (29)$. 22 (250) ἔτ. } 11 (10) μ. } 12 (6) ἡμ.

Ὅμας δευτέρα. 1) Ἐργάτης λαμβάνει τὴν ἡμέραν $5 \text{ δρ. } 45 \text{ λ.}$ πόσα θὰ λάβῃ εἰς $8,5 \text{ ἡμ.}$; 46 δρ. 32,5 λ.

2) Ἐάν κεφάλαιον δίδῃ ἐτήσιον τόκον 13 τάλ. 3 δρ. 85 λ., πόσον τόκον θά δώσῃ εἰς 4,75 ἔτη; 327 δρ. 03,75 λ.

Ἑομάς τρίτη. 1) Ἐξ ἐνός τόπου ἀναχωροῦν συγχρόνως δύο ταχυδρόμοι, διευθυνόμενοι πρὸς τὴν αὐτὴν φεράν. Ὁ μὲν δανύει 8 (12) χμ. 16 (613) μ., ὁ δὲ 6(8) χμ. 54 (625) μ. καθ' ὥραν (ἡμέραν) πόση θά εἴνε ἡ ἀπόστασις των μετὰ 3 (2) ἡμ. 18 (12) ὥρ.;

176 (9) χμ. 580 (970) μ.

2) Πόση θά εἴνε ἡ ἀπόστασις τῶν ταχυδρόμων, ἐάν διευθύνωνται ἀντιθέτως; 1266 (53) χμ. 300 (095) μ.

3) Ἀτμάμαξα διανύει 40 (80) χμ. 325 (26) μ. εἰς $8 \frac{1}{4} \left(4 \frac{2}{5}\right)$ ὥρ. πόσον δανύει εἰς 1 ὥραν; 4 χμ. 887,87. μ. (18 χμ. 187,72. μ.)

Ἑομάς τετάρτη. 1) Θέλει τις νὰ μοιράσῃ ἐν ποσὸν μετὰξὺ 85 προσώπων, ὥστε νὰ λάβῃ καθὲν 5 δρ. 83 λ., ἀλλ' ἐλλείπουν πρὸς τοῦτο 8 δρ. 35 λ. πόσον εἴνε τὸ ποσόν; 487,20 δρ.

2) Ἐμπορος ἀγοράζει 3, 753 (48,250) χιλ. ἐμπορεύματος ἀντὶ 332 (407) δρ. 28 (23) λ., πωλεῖ δ' αὐτὸ ἀντὶ 383 (393) δρ. 40 (72) λ. πόσον ἐκέρδισεν εἰς καθὲν χιλιόγραμμον; 13,621. (0,28 ζημία).

Ἑομάς πέμπτη. 1) Νὰ εὑρεθῇ τὸ γινόμενον $3^{\circ} 16' 25'' \times 52^{\circ}$.

. . . 170° 13' 40''.

2) Ἀτμάμαξα διανύει 118 (181) χμ. 701 (917) μ. εἰς $1 \frac{3}{8} \left(4 \frac{1}{2}\right)$ ὥρ. : πόσον δανύει εἰς 1 ὥρ.; 86 (44) χμ. 328 (826) μ.

3) Αἱ 3 ὀκ. ἐμπορεύματος τιμῶνται 20 δρ. 70 λ. πόσον τιμᾶται ἡ 1 (3,5) ὀκ.; 6,9 (24,15) δρ.

4) Ἐμπορος ἀγοράζει 50 χιλιόγρ. 6 γρ. ἐμπορεύματος ἀντὶ 54 δρ. ἔπειτα 70 χιλ. 2 γρ. ἀντὶ 43 δρ. 20 λ., καὶ τέλος 10 χιλ. 6 γρ. ἀντὶ 21 δρ. 50 λ. πόσον τοῦ στοιχίζει τὸ χιλιόγραμμον κατὰ μέσον ὄρον; 0,91. δρ.

§ 77. Πολλαπλασιασμός κατὰ τὴν μέθοδον τῶν ἀπλῶν μερῶν.—

Ἐστω ὅτι ἔχομεν νὰ πολλαπλασιάσωμεν 35 ὄργ. 4 κόδ. καὶ 10 δακτ. ἐπὶ τὸν ἀκέρατον 548.

Ἀντὶ νὰ πολλαπλασιάσωμεν καθένα τῶν ἀριθμῶν τοῦ πολλα-

πλασιαστέου ἐπὶ 548 καὶ νὰ προσθέσωμεν τὰ ἐξαγόμενα, ἐργαζόμεθα ὡς ἑξῆς.

1) Πολλαπλασιάζομεν τὰς 35 ὄργ. ἐπὶ 548 καὶ εὐρίσκομεν 19180 ὄργ.

2) Διὰ νὰ πολλαπλασιάσωμεν τοὺς 4 πόδας ἐπὶ 548, λέγομεν ὅτι· ἐπειδὴ 4 π. = 3 π. + 1 π. ἀρκεῖ νὰ πολλαπλασιάσωμεν τοὺς 3 π. καὶ τὸν 1 π. ἐπὶ 548 καὶ νὰ προσθέσωμεν τὰ ἐξαγόμενα. Ἄλλ' ἐπειδὴ 1 ὄργ. ἐπὶ 548, δίδει 548 ὄργ., οἱ 3 πόδ. οἱ ὅποιοι εἶνε τὸ ἥμισυ τῆς ὄργου, θὰ δώσουν τὸ ἥμισυ τῶν 548 ὄργ., ἦτοι 274 ὄργ.: ὁ δὲ 1 πὺς θὰ δώσῃ τὸ τρίτον τῶν 274 ὄργ., ἦτοι 91 ὄργ.: 3=91 ὄργ. 2 π.

3) Διὰ νὰ πολλαπλασιάσωμεν τοὺς 10 δακ. ἐπὶ 548, παρατηροῦμεν ὅτι οἱ 10 δ. = 6 δ. + 3δ. + 1δ. καὶ ἀρκεῖ νὰ πολλαπλασιάσωμεν καθένα τῶν προσθετέων αὐτῶν ἐπὶ 548. Ἄλλ' ἀφοῦ ὁ 1 πὺς ἐπὶ 548 ἔδωκε γινόμενον 548 ὄργ. καὶ 2π., οἱ 6 δ. οἱ ὅποιοι εἶνε τὸ $\frac{1}{2}$ τοῦ 1 π., θὰ δώσουν τὸ ἥμισυ τῶν 548 ὄργ. καὶ 2 πόδ. ἦτοι, 274 ὄργ. 2 π.: 2=45 ὄργ. καὶ 4 πόδ. Οἱ τρεῖς δάκτυλοι οἱ ὅποιοι εἶνε τὸ ἥμισυ τῶν 6 δακτ., θὰ δώσουν τὸ ἥμισυ τῶν 45 ὄργ. καὶ 4 π., ἦτοι 22 ὄργ. 4 π.: 2=22 ὄργ. 5 π. Τέλος ὁ 1 δ., ὁ ὅποιος εἶνε τὸ τρίτον τῶν 3 δ., θὰ δώσῃ τὸ τρίτον τῶν 22 ὄργ. καὶ 5 πόδ., ἦτοι 7 ὄργ. 3 π. 8 δ. Ὡστε εὐρήκαμεν

	ὄργ.	
35 ὄργ. × 548	=	19180
4 π. × 548	{	3 π. × 548 . . = 274 π.
		1 π. × 548 . . = 91 2
10 δ. × 548	{	6 δ. × 548 . . = 45 4
		3 δ. × 548 . . = 22 5
		1 δ. × 538 . . = 7 3 8 δ.

καὶ προσθέτοντες αὐτὰ εὐρίσκομεν 19619 ὄργ. 14 π. 8 δ. ἢ 19621 ὄργ. 2 π. 8 δ.

Ἡ ἀνωτέρω τρόπος τῆς εὐρέσεως τοῦ γινομένου συμμιγρῶς ἐπὶ ἀκέραιον λέγεται μέθοδος τῶν ἀπλῶν μερῶν, ἢ πολλαπλασιασμὸς κατὰ τὴν μέθοδον τῶν ἀπλῶν μερῶν. Ἐπειδὴ καθεὶς τῶν ἀριθμῶν τοῦ πολλαπλασιαστέου ἀναλύεται εἰς μέρη ἀπλᾶ. Ἡ μέθοδος αὕτη ἐφαρμό-

ζεται ἰδίως, όταν ὁ πολλαπλασιαστής εἶνε πολυψήφιος ἀριθμός.

° *Α σ κ ή σ ε ι ς.*

Νὰ γίνουν οἱ κάτωθι πολλαπλασιασμοὶ κατὰ τὴν μέθοδον τῶ ἀπλῶν μερῶν.

- 1) 15 δργ. 4 π. 8 δ. 10 γρ. \times 64. (Ἄπ. 1010 δργ. 3 π. 1 δ. 4 γρ.).
- 2) 25 τάλ. 3 δρ. 60 λ. \times 148. (Ἄπ. 3806 τάλ. 2 δρ. 80 λ.).
- 3) 32 στ. 28 δκ. 150 δρμ. \times 623. (Ἄπ. 20347 στ. 33 δκ. 250 δρμ.).

§ 78. Πολλαπλασιασμός ὅταν ὁ πολλαπλασιαστής ὀρέζεται ὑπὸ συμμιγοῦς ἀριθμοῦ.—

(Πρόβλημα 1). «*Ἡ δὲ ἑνὸς πράγματος τιμᾶται 2 τάλ. 3 δρ. 60 λ: πόσον τιμῶνται 3 στ. 18 δκ. 300 δρμ. τοῦ αὐτοῦ πράγματος;*»

Εἰς τὸ πρόβλημα αὐτὸ δίδεται ἡ τιμὴ τῆς μιᾶς ὀκᾶς καὶ ζητεῖται ἡ τιμὴ τῶν 3 στ. 18 δκ 300 δρμ.

Παρατηροῦμεν ὅτι 3 στ. = 44 δκ. \times 3 = 132 δκ., καὶ 18 δκ. αἰ δοθεῖσαι, κάμνουν ἐν ὅλῳ 150 δκ. Ἐξ ἄλλου τὰ 300 δρμ. = $\frac{3}{4}$ δκ.

Ἐπομένως ζητεῖται ἡ τιμὴ τῶν 150 $\frac{3}{4}$ δκ. καὶ διὰ νὰ λύσωμεν τὸ πρόβλημα, θὰ πολλαπλασιάσωμεν τὰ 2 τάλ. 3 δρ. 60 λ. ἐπὶ 150 $\frac{3}{4}$. Ἐκτελοῦντες τὸν πολλαπλασιασμόν, εὐρίσκομεν ὅτι οἱ 3 στ. 18 δκ. καὶ 300 δρμ. τιμῶνται 2050, 20 δρ.

(Πρόβλημα 2). «*Μία δὲ βουτύρου ἀνταλλάσσεται μὲ 4 δκ. 100 δρμ. σάπωνος· αἱ 10 δκ. 300 δρμ. βουτύρου μὲ πόσας ὀκᾶδας σάπωνος ἀνταλλάσσονται;*»

Καὶ εἰς τὸ πρόβλημα αὐτὸ δίδεται ἡ τιμὴ τῆς μιᾶς ὀκᾶς, δηλαδὴ ὅτι ἡ 1 δκ. βουτ. ἀνταλλάσσεται μὲ 4 δκ. 100 δρμ. σάπωνος, ζητεῖται δὲ ἡ τιμὴ 10 δκ. 300 δρμ. Ἀλλὰ τὰ 300 δρμ. εἶνε $\frac{3}{4}$ δκ. Ἐπο-

μένως ζητεῖται ἡ τιμὴ τῶν 10 $\frac{3}{4}$ δκ. καὶ διὰ τοῦτο ἀρκεῖ, νὰ πολλαπλασιάσωμεν τὴν τιμὴν τῆς μιᾶς μονάδος ἐπὶ 10 $\frac{3}{4}$. Ἦτοι θὰ ἔχωμεν 4 δκ. 100 δρμ. \times 10 $\frac{3}{4}$. Ἐκτελοῦντες τὸν πολλαπλασιασμόν, εὐρίσκομεν 45 δκ. 275 δρμ. Ὡστε αἱ 10 δκ. 300 δρμ. βουτύρου ἀνταλλάσσονται μὲ 45 δκ. 275 δρμ. σάπωνος.

Εἰς τ' ἀνωτέρω δύο προβλήματα καὶ εἰς ἄλλα ὅμοια μὲ αὐτὰ βλέπομεν ὅτι δίδεται ἡ τιμὴ μιᾶς μονάδος καὶ ζητεῖται ἡ τιμὴ πολλῶν μονάδων ἢ καὶ μερῶν τῆς μονάδος, λύονται δὲ διὰ πολλαπλασιασμοῦ. Ὁ μὲν πολλαπλασιαστέος εἶνε ἡ τιμὴ τῆς μονάδος, ὁ δὲ πολλαπλασιαστῆς εὐρίσκεται ἀπὸ τὸν ἄλλον δοθέντα συμμιγῆ, ἂν τρέψωμεν αὐτὸν εἰς ἀριθμὸν, παριστάνοντα μονάδας τῆς τάξεως τῆς ὁποίας ἡ τιμὴ ἔχει δοθῆ.

Προβλήματα πρὸς λύσιν.

1) Ἀγοράζει τις 13 ὀκ. 350 ὄρμ. ἐμπορεύματος πρὸς 1 τάλ. 1 ὄρ. 20 λ. τὴν ὀκᾶν πόσα θὰ πληρώσῃ;

86,025,

2) Ἀτμάμαξα διανύει καθ' ὥραν 40 (80) χμ. 325 (26) μ' πόσα θὰ διανύσῃ εἰς 8 (4) ὥρ. 15' (15') καὶ (21'');

332 (340) χμ. 681,25 (644,006). μ.

3) Ἐν κεφάλαιον εἶδει τόκον κατ' ἔτος 228 (125) ὄρ. 4 (36) λ: πόσον θὰ δώσῃ εἰς 13 (12) ἔτ. 9 (6) μῆν. ;

3135,55 (1567)

4) Ἐδιδέ τις 1 μάρκον καὶ ἐλάμβανε 1 ὄρ. 20 λ: πόσας δραχ. θὰ ἐλάμβανεν ἂν εἶδιδε 3 εἰκοσάμαρκα, 2 πεντάμ., 2 μάρκα, 50 φρένιγκ.;

87.

5) Δίδει τις 1 ὀκ. καφέ καὶ λαμβάνει 2 ὀκ. 200 ὄρμ. ζαχάρους. Ἐὰν δώσῃ 20 (40) ὀκ. 350 (200) ὄρμ. καφέ, πόσας ὀκάδας ζαχάρους θὰ λάβῃ;

52 (101) ὀκ. 75 (100) ὄρμ.

§ 79. Ἐφαρμογὴ τῆς μεθόδου τῶν ἀπλῶν μερῶν. —

(Πρόβλημα). «Ὁ στατήρ ἐνὸς πράγματος τιμᾶται 12 ὄρ. 40 λ. πόσον τιμῶνται 17 στ. 35 ὀκ. 300 ὄρμ. τοῦ αὐτοῦ πράγματος ;»

Καθὼς εἰς τὴν § 77 διὰ νὰ πολλαπλασιάσωμεν συμμιγῆ ἐπὶ ἀκέραιον, δυνάμεθα νὰ κάμωμεν τὸν πολλαπλασιασμὸν κατὰ τὴν μέθοδον τῶν ἀπλῶν μερῶν, οὕτω καὶ ἐδῶ, ἀντὶ νὰ τρέψωμεν τὸν συμμιγῆ 17 στ. 35 ὀκ. 300 ὄρμ. εἰς στατήρας, δυνάμεθα νὰ ἐφαρμόσωμεν τὴν αὐτὴν μέθοδον. Πρὸς τοῦτο λέγομεν.

Ἡ ἀξία 10 στ. εἶνε 12 ὄρ. 40 λ. $\times 10 = 124$ ὄρ.

» » 7 στ. » 12 » 40 $\times 7 = 86,80$

» » 22 ὀκ. = $\frac{1}{2}$ στ. » 12 » 40 : 2 = 6,20

» » 11 ὀκ. » 6 » 20: 2 = 3,10

» » 2 ὀκ. » 6 » 20: 11 = 0,56 περίπου

» » 200 ὄρμ. » 56: 4 = 0,14

» » 100 ὄρμ. 14: 2 = 0,17

δραχ. λ.
220 97 περίπου

ῆτοι ἐν ὄλφ

§ 80. Διαίρεσις ὅταν ὁ διαιρέτης ὀρίζεται ὑπὸ
 συμμεγούσ ἀριθμοῦ.—

α') (Πρόβλημα) 1). «Οἱ 30 πῆχ. 6 ρ. ἐνὸς ὑφάσματος τιμῶν
 ταί 3 εἰκ. 2 τάλ. 80 λ: πόσον τιμᾶται ὁ 1 πῆχυς τοῦ αὐτοῦ ὑφά-
 σματος;»

Εἰς τὸ πρόβλημα αὐτὸ δίδεται ἡ τιμὴ τῶν 30 πῆχ. καὶ τῶν 6 ρ.
 Ἄλλὰ τὰ 6 ρ. = $\frac{6}{8}$ π. = $\frac{3}{4}$ π. Ὡστε δίδεται ἡ τιμὴ τῶν 30 $\frac{3}{4}$ π. καὶ
 ζητεῖται ἡ τιμὴ τοῦ 1 π. Πρὸς λύσιν αὐτοῦ θὰ διαιρέσωμεν τὰ 3 εἰκ. 2 τάλ.
 80 λ. εἰς τὸ 30 $\frac{3}{4}$. Ἦτσι ἔχομεν τὴν διαίρεσιν 3 εἰκ. 2 τάλ. 80 λ.:
 30 $\frac{3}{4}$ τὴν ὁποῖαν ἐκτελεῦντες εὐρίσκομεν 2 ὄρ. καὶ 30 λ. περίπου.

(Πρόβλημα) 2). «Ἐν κινητόν, κινούμενον ὁμαλῶς, διανύει εἰς 3
 ὄρ. 30' 20" διάστημα 45 $\frac{1}{2}$ μιλίων πόσα μίλια διανύει εἰς 1';»

Καὶ εἰς τὸ πρόβλημα αὐτὸ ζητεῖται ἡ τιμὴ τοῦ 1', δίδεται δὲ ἡ τιμὴ
 τῶν 3 ὄρ. 30' 20". Ἄλλ' ἂν τὸν ἀριθμὸν αὐτὸν τρέψωμεν εἰς πρῶτα
 λεπτά, ἔχομεν $210 + \frac{20}{60} = 210 \frac{1}{3}$.

Ἐπομένως πρὸς λύσιν τοῦ προβλήματος τούτου θὰ διαιρέσωμεν τὸν
 ἀριθμὸν $45 \frac{1}{2}$ μιλ.: $210 \frac{1}{3}$. Ἐκτελοῦντες τὴν διαίρεσιν εὐρίσκομεν ἔξα-
 γόμενον $\frac{273}{1262}$ μίλια ἢ, ἐπειδὴ τὸ μίλιον ἔχει 1852 μ., τρέποντες εἰς
 μέτρα, λαμβάνομεν $\frac{273}{1262} \times 1852 \mu. = 400,631 \mu.$ περίπου.

Τὰ δύο ἀνωτέρω προβλήματα καὶ τὰ ὅμοια πρὸς αὐτὰ λύονται
 διὰ διαιρέσεως μερισμοῦ. Ἐπειδὴ δίδεται ἡ τιμὴ πολλῶν μονάδων
 καὶ ζητεῖται ἡ τιμὴ τῆς μιᾶς.

Διὰ νὰ ἐκτελέσωμεν τὴν διαίρεσιν, τρέπομεν τὸν συμμεγῆ, ὁ
 ὅποτος ὀρίζει τὸν διαιρέτην, εἰς ἀριθμὸν παριστάοντα μονάδας τῆς
 τάξεως τῆς ὁποίας ζητεῖται ἡ τιμὴ τῆς μιᾶς καὶ οὕτω θὰ ἔχομεν
 νὰ διαιρέσωμεν διὰ κλάσματος ἢ δι' ἀκεραίου.

β') (Πρόβλημα) 1). «Εἰς πεζὸς χρειάζεται 20' 45", διὰ νὰ
 διανύσῃ 1 χμ: πόσα χιλιόμετρα θὰ διανύσῃ εἰς 4 ὄρ. 30';»

Ἄφου εἰς 20' 45" διανύει 1 χιλ., εἰς 4 ὥρ. 30' θὰ διανύσῃ τόσα χιλιόμετρα, ὅσας φορὰς ἀφαιρεῖται τὸ 20' 45" ἀπὸ τὸν 4 ὥρ. 30', ἢ ὅσον χωρεῖ τὸ 20' 45" εἰς τὸ 4 ὥρας 30'. Τρέπομεν καὶ τοὺς δύο συμμιγεῖς εἰς δευτέρα λεπτά καὶ ἔχομεν τὴν διαίρεσιν 16200 : 1245, ἐκ τῆς ὁποίας εὐρίσκομεν $13 \frac{5}{249}$ χιλ.

Ὡστε εἰς 4 ὥρ. 30' θὰ διανύσῃ $13 \frac{5}{249}$ χιλ.

(Πρόβλημα 2). «Οἱ 2 στ. 2 ὀκ. 200 δρμ. ἐνὸς πράγματος τιμῶνται 1 εἰκοσ. πόσον τιμῶνται 1 στ. 10 ὀκ. 150 δρμ. τοῦ αὐτοῦ πράγματος;»

Ὅμοίως σκεπτόμεθα διὰ τὴν λύσιν καὶ τοῦ προβλήματος τούτου. Ἄφου διὰ 2 στ. 2 ὀκ. 200 δρμ. δίδομεν 1 εἰκ., διὰ τὸν 1 στ. 10 ὀκ. 150 δρμ. θὰ δώσωμεν τόσα εἰκ., ὅσον χωρεῖ ὁ 1 στ. 10 ὀκ. 150 δρμ. εἰς τὸν 2 στ. 2 ὀκ. 200 δρ. Τρέπομεν καὶ τοὺς δύο συμμιγεῖς εἰς δράμια καὶ οὕτω ἔχομεν τὴν διαίρεσιν 21750 : 36200

$$= \frac{2175}{3620} = \frac{435}{724} \text{ Ὡστε ὁ 1 στ. 10 ὀκ. 150 δρμ. τιμῶνται}$$

$\frac{435}{724}$ εἰκ., ἢ τρέποντες τὸ κλάσμα τοῦτο εἰς συμμιγῆ, εὐρίσκομεν

$$12 \text{ δρ. } 1 \frac{119}{181} \lambda.$$

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω προβλημάτων βλέπομεν ὅτι,

«ὅταν ἡ διαίρεσις εἶνε μετρήσεως, τρέπομεν καὶ τοὺς δύο συμμιγεῖς εἰς μονάδας τῆς κατωτάτης τάξεως καὶ οὕτω ἔχομεν νὰ διαιρέσωμεν ἀκεραίους ἀριθμούς».

Προβλήματα πρὸς λύσιν.

Ὁμὰς πρώτη. 1) Ἀτμόπλοιο διανύει 120 μιλ. εἰς 2 ἡμερονύκτια 8 ὥρ. 45'. πόσα μιλ. διανύει εἰς 1 ὥρ. κατὰ μέσον ὄρον;

$$2 \frac{26}{227} \mu\lambda.$$

2) Ὁρολόγιον μένει ὀπίσω 1 ὥρ. (18') καὶ 30' (20") εἰς διάστημα τριῶν ἡμερονυκτίων (8 ὥρ. 25'). πόσον μένει ὀπίσω εἰς 1 ὥρ.;

$$1' 15'' \left(2' 10'' \frac{70}{101} \right)$$

3) Ὁδοιπόρος ἐβάδισε 200 ὄργ. καὶ 3 π. εἰς 3 ὥρ. 40' 30" πόσον ἐβάδισεν εἰς 1 ὥραν κατὰ μέσον ὄρον;

$$54 \text{ ὄργ. } 3 \text{ π. } 4 \text{ δ. } 1 \frac{47}{49} \gamma\epsilon.$$

Ὅμας δευτέρα. 1) Ἀτμάμαξα διανύει 118 χμ. 701 μ. εἰς 1 ὥρ. 22" 30'· πόσον διανύει εἰς 1 ὥρ.; 36 χμ. 328 μ.

2) Οἱ 5 στ. 35 (5) ὀκ. 250 (200) δρμ. πράγματος ἐπωλήθησαν ἀντὶ 291 (2) ταλ. 3 (3) δρ. 50 (60) λ.· πόσον ἐπωλήθη ἢ 1 ὀκά; 5,70. (2,47.) δρ.

3) Κινητὸν διατρέχει εἰς 3 ὥρ. 18' 32" διάστημα 23 χμ. 824 μ.· εἰς πόσον χρόνον διατρέχει 1 μ.; 0,5".

Ὅμας τρίτη. 1) Ἡ ὀκά πράγματος τιμᾶται 5 δρ. 25 λ.· πόσας ὀκάδας ἀγοράζομεν μὲ 2 τάλ. 3 δρ.; 2 ὀκ. 190 $\frac{10}{21}$ δρμ.

2) Ἀμαξοστοιχία διανύει 38 χμ. εἰς 1 ὥρ.· εἰς πόσας ὥρας θὰ διατρέξῃ 400 χμ.; 10 ὥρ. 31'34 $\frac{14''}{19}$

3) Ἐργάτης λαμβάνει καθ' ὥραν ἐργασίας 4 δρ. 50 λ.· εἰς πόσας ὥρας θὰ λάβῃ 120 δρ. 80 λ.; 26 $\frac{38}{45}$

Ὅμας τετάρτη. 1) Μὲ 1 τάλ. ἀγοράζει τις 5 ὀκ. 350 δρμ. πράγματος· πόσον ἀγοράζει μὲ 3 δρ.; 3 ὀκ. 210 δρμ.

2) Μὲ 1 δρχ. ἀγοράζει τις 1 π. 2 ρ ὑφάσματος· πόσον ἀγοράζει μὲ 10 δρ. καὶ 20 λ.; 12 π. 6 ρ.

3) Ἐὰν οἰκονομῇ τις καθ' ἡμέραν 1 δρ. 25 λ. εἰς πόσας ἡμέρας θὰ οἰκονομήσῃ 75 δρ.; 60 ἡμ.

4) Ἡ ὀκά πράγματος τιμᾶται 3 δρ. 80 λ.· πόσας ὀκάδας θ' ἀγοράσωμεν μὲ 12 δρ. 60 λ.; 3 ὀκ. 126 $\frac{6}{19}$ δρ.

5) Ἠγόρασέ τις 43 χιλ. 240 γρ. ἐμπορεύματος ἀντὶ 316 δρ. 25 λ. καὶ τὸ ἐπώλησε μὲ κέρδος 40 δρ. 48 λ.· πόσον ἐπώλησε τὸ 1 χιλιόγραμμα; 8,24 δρ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ XII.

Περὶ λόγων καὶ ἀναλογιῶν.

§ 81. Λόγος δύο ὁμοειδῶν μεγεθῶν.—

Εἰς τὴν § 61 εἶδομεν ὅτι, διὰ νὰ μετρήσωμεν ἓν μέγεθος, συγκρίνομεν αὐτὸ πρὸς ἄλλο ὁμοειδές του, τὸ ὁποῖον λαμβάνομεν ὡς μονάδα μετρήσεως. Τὸ ἐξαγόμενον τῆς μετρήσεως αὐτῆς εἶνε εἰς ἀριθμὸς ὁ ὁποῖος, καθὼς εἶδομεν, παριστάνει τὸ ποσόν. Γενικῶς, δυνάμεθα νὰ συγκρίνωμεν ἓν ποσὸν ἢ ἓν μέγεθος, πρὸς ἄλλο ὁμοειδές του καὶ τὸ ἐξαγόμενον τῆς συγκρίσεως αὐτῆς θὰ καλοῦμεν λόγον τοῦ πρώτου μεγέθους πρὸς τὸ δεύτερον. Π. χ., ἐὰν ἓν οἰκόπεδον συγκριθῆ πρὸς τὸν τεκτονικὸν τετραγ. πῆχυν καὶ εὔρεθῆ 355 τ. τεκ. π., ὁ ἀριθμὸς 355 παριστάνει τὸν λόγον τῆς ἐπιφανείας τοῦ δοθέντος οἰκοπέδου πρὸς τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ τετραγ. τεκτον. πῆχεως. Ἐὰν ὁ πληθυσμὸς μιᾶς πόλεως συγκριθῆ πρὸς τὸν πληθυσμὸν ἄλλης καὶ εὔρεθῆ ὅτι, ἡ πρώτη ἔχει τὸ $\frac{1}{4}$ τοῦ πληθυσμοῦ τῆς δευτέρας, τὸ $\frac{1}{4}$ θὰ λέγεται λόγος τοῦ πληθυσμοῦ τῆς πρώτης πρὸς τὸν τῆς δευτέρας. Ὡστε,

«λόγος δύο ὁμοειδῶν μεγεθῶν λέγεται ὁ ἀριθμὸς, ὁ ὁποῖος παριστάνει τὸ ἐξαγόμενον τῆς μετρήσεως τοῦ ἐνὸς τῶν δύο μεγεθῶν διὰ τοῦ ἄλλου».

§ 82. Λόγος δύο ἀριθμῶν.—

α.) Καλοῦμεν λόγον δύο ἀριθμῶν τὸ πηλίκον τῆς διαιρέσεως τοῦ πρώτου διὰ τοῦ δευτέρου. Ἐπειδὴ, ὡς γνωστὸν (§ 53), τὸ πηλίκον τῆς διαιρέσεως δύο ἀριθμῶν παριστάνεται διὰ κλάσματος, ἔχοντος ἀριθμητὴν τὸν διαιρετέον καὶ παρονομαστὴν τὸν διαιρέτην, ἔπεται ὅτι, ὁ λόγος τοῦ 12 πρὸς τὸν 3 εἶνε ἴσος μὲ $\frac{12}{3} = 4$. ὁ λόγος τοῦ 5,2 πρὸς τὸν 7,48 ἰσοῦται μὲ $\frac{5,2}{7,48} = \frac{520}{748}$ κ.ο.κ.

Ἐν γένει, ὁ λόγος ἐνὸς ἀριθμοῦ α πρὸς ἄλλον β εἶνε ἴσος μὲ

$$\alpha : \beta = \frac{\alpha}{\beta}$$

6') Οί δύο ἀριθμοί ἐνὸς λόγου λέγονται ὄροι, ὁ μὲν πρῶτος ἡγούμενος, ὁ δὲ δεύτερος ἐπόμενος. Οὕτω τοῦ λόγου $\frac{\alpha}{\beta}$ ὁ μὲν α εἶνε ὁ ἡγούμενος, ὁ δὲ β ἐπόμενος.

γ') Ἐπειδὴ ὁ λόγος δύο ἀριθμῶν δύναται νὰ παριστάνεται διὰ κλάσματος, ἔπεται ὅτι

«ὁ λόγος δύο ἀριθμῶν ἔχει τὰς ιδιότητες τοῦ κλάσματος.»
Κατὰ ταῦτα,

«ὁ λόγος δύο ἀριθμῶν δὲν μεταβάλλεται, ἐὰν οἱ δύο ἀριθμοὶ πολλαπλασιασθοῦν ἢ διαιρεθοῦν μὲ τὸν αὐτὸν ἀριθμόν».

Οὕτω ὁ λόγος $\frac{10}{20} = \frac{1}{2} = \frac{20}{40} = \frac{60}{120}$ κ.ο.κ. Ἦτοι ὁ λόγος τῶν 10 καὶ 20 ἰσοῦται μὲ τὸν λόγον τῶν 1 καὶ 2, ἢ τῶν 20 καὶ 40, ἢ τῶν 60 καὶ 120 κ. ο. κ.

§ 83. Ἰδιότης τοῦ λόγου ὁμοειδῶν μεγεθῶν. —

Ἔστω ὅτι θέλομεν νὰ εὕρωμεν τὸν λόγον δύο ὁμοειδῶν μεγεθῶν, π. χ. δύο ὑφασμάτων. Καθὼς εἶδομεν εἰς τὴν § 82 θὰ μετρήσωμεν τὸ [ἐν διὰ τοῦ ἄλλου. Ἄς ὑποτεθῇ ὅτι ἐγένεν ἡ μέτρησις τοῦ πρώτου διὰ τοῦ δευτέρου καὶ εὗρέθη ὁ λόγος τῶν ἴσος μὲ 4. Ἄν τώρα μετρήσωμεν καθὲν διὰ τῆς αὐτῆς μονάδος, π. χ. διὰ τοῦ 1 μ. καὶ εὕρωμεν ὅτι τὸ δεύτερον ἔχει μῆκος 3 μ., τὸ πρῶτον ὡς τετραπλάσιον τοῦ δευτέρου θὰ ἔχη μῆκος $3 \times 4 = 12$ μ. Ὡστε τὰ δύο ὑφάσματα, μετρηθέντα διὰ τῆς αὐτῆς μονάδος (1 μ.), θὰ παριστάνωνται ὑπὸ τῶν ἀριθμῶν 12 (τὸ πρῶτον) καὶ 3 (τὸ δεύτερον). Ἀλλὰ καὶ ὁ λόγος τοῦ 12 πρὸς τὸν 3 εἶνε ὁ 4· ἦτοι εἶνε ἴσος μὲ τὸν λόγον τῶν δύο δοθέντων μεγεθῶν. Ἐκ τούτου καὶ ἄλλων ὁμοίων παραδειγμάτων ἔπεται ὅτι «ὁ λόγος δύο ὁμοειδῶν μεγεθῶν ἰσοῦται μὲ τὸν λόγον τῶν παριστανόντων αὐτὰ ἀριθμῶν, ὅταν ταῦτα μετρηθοῦν διὰ τῆς αὐτῆς μονάδος». Κατὰ ταῦτα, ἂν οἱ πληθυσμοὶ δύο πόλεων, ἔστω τῶν Α καὶ Β, εἶνε 8000 καὶ 12000, ὁ λόγος τοῦ πληθυσμοῦ τῶν εἶνε ἴσος μὲ τὸν λόγον $\frac{8000}{12000} = \frac{2}{3}$.

§ 84. Περὶ ἀναλογιῶν. —

α') Καλοῦμεν ἀναλογίαν τὴν ἰσότητα δύο λόγων. Π. χ. ἡ ἰσότης $\frac{12}{3} = \frac{20}{5}$ λέγεται ἀναλογία. Διότι οἱ λόγοι $\frac{12}{3}$ καὶ $\frac{20}{5}$ εἶνε ἴσοι μὲ 4, γράφεται δὲ καὶ οὕτω $12 : 3 = 20 : 5$, καὶ ἀπαγγέλλ-

λεται ως εξής: 12 πρὸς 3 ἴσον μὲ 20 πρὸς 5, ἢ καὶ $\frac{12}{3}$ ἴσον μὲ $\frac{20}{5}$.

Ἐὰν οἱ δύο ἴσοι λόγοι εἶνε $\frac{a}{\beta}$ καὶ $\frac{\gamma}{\delta}$, ἡ ἀναλογία εἶνε $\frac{a}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta}$.

ἢ $a : \beta = \gamma : \delta$.

Β') Οἱ τέσσαρες ἀριθμοί, οἱ ἀποτελοῦντες τὴν ἀναλογίαν, λέγονται ὄροι αὐτῆς καὶ ὁ μὲν πρῶτος καὶ ὁ τρίτος λέγονται ἡγούμενοι, οἱ δὲ ἄλλοι ἐπόμενοι· ὁ πρῶτος καὶ τέταρτος λέγονται ἄκροι, ὁ δὲ δευτέρος καὶ τρίτος μέσοι ὄροι τῆς ἀναλογίας. Τῆς ἀναλογίας

$$\frac{a}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta} \text{ οἱ } a, \delta \text{ εἶνε ἄκροι, οἱ δὲ } \beta, \gamma, \text{ μέσοι.}$$

γ') Ἰδιότης τῶν ἀναλογιῶν.

Ἐστω ἡ ἀναλογία $\frac{a}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta}$. Ἐὰν πολλαπλασιάσωμεν τοὺς ὄρους τοῦ πρώτου κλάσματος ἐπὶ δ , τοὺς δὲ τοῦ δευτέρου ἐπὶ β , λαμβάνομεν $\frac{a\delta}{\beta\delta} = \frac{\gamma\beta}{\delta\beta}$. Ἐπειδὴ τὰ δύο αὐτὰ κλάσματα ἔχουν παρονομαστὰς ἴσους, θὰ ἔχουν καὶ ἀριθμητὰς ἴσους, δηλαδὴ θὰ εἶνε $a \times \delta = \gamma \times \beta$, ἐκ τοῦ ὁποίου ἐπεται ὅτι,

«εἰς πᾶσαν ἀναλογίαν τὸ γινόμενον τῶν ἄκρων αὐτῆς ἰσοῦται μὲ τὸ γινόμενον τῶν μέσων».

Κατὰ ταῦτα εἰς τὴν ἀναλογίαν $\frac{2}{3} = \frac{4}{6}$ ἔχομεν πράγματι ὅτι $2 \times 6 = 3 \times 4 = 12$. Ὅμοίως εἰς τὴν $\frac{5}{6} = \frac{15}{18}$ ὅτι $5 \times 18 = 6 \times 15 = 90$.

δ') Εὐρεσις εἰς τῶν ὄρων ἀναλογίας ἐκ τῶν τριῶν ἄλλων. Στηριζόμενοι εἰς τὴν ἀνωτέρω ἰδιότητα, δυνάμεθα νὰ εὕρωμεν ἓνα τῶν τεσσάρων ὄρων ἀναλογίας, ὅταν δοθοῦν οἱ τρεῖς ἄλλοι. Πράγματι, ἔστω ὅτι ὁ ζητούμενος ὄρος εἶνε ὁ πρῶτος, οἱ δὲ τρεῖς ἄλλοι εἶνε κατὰ σειρὰν οἱ β, γ, δ . Ἄν παραστήσωμεν τὸν ἄγνωστον διὰ τοῦ x , θὰ ἔχωμεν τὴν ἀναλογίαν $\frac{x}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta}$, καὶ κατὰ τὴν ἀνωτέρω ἰδιότητα θὰ εἶνε, $\delta \times x = \beta \times \gamma$. Διαιροῦντες δὲ τοὺς δύο ἴσους τούτους ἀριθμοὺς διὰ τοῦ δ , εὕρισκομεν ὅτι $x = \frac{\beta \times \gamma}{\delta}$.

Ὅμοίως, ἂν ζητῆται ὁ τέταρτος ὄρος ἀναλογίας, οἱ δὲ τρεῖς ἄλλοι εἶνε κατὰ σειρὰν a, β, γ , θὰ ἔχωμεν τὴν ἀναλογίαν $\frac{a}{\beta} = \frac{\gamma}{x}$,

παριστάνοντες τὸν τέταρτον διὰ τοῦ x . Ἐφαρμόζοντες τὴν ἀνωτέρω ἰδιότητα, εὐρίσκομεν $\alpha \times x = \beta \times \gamma$. Ἐν τοῦ ὁποίου ἔχομεν ὅτι $x = \frac{\beta \times \gamma}{\alpha}$.

Ἐκ τούτων ἔπεται ὅτι, «διὰ νὰ εὕρωμεν ἕνα τῶν ἄκρων ὄρων ἀναλογίας, τῆς ὁποίας δίδονται οἱ τρεῖς ἄλλοι, πολλαπλασιάζομεν τοὺς δύο μέσους ὄρους τῆς καὶ τὸ γινόμενον διαιροῦμεν διὰ τοῦ δοθέντος ἄκρου».

ε') Ἐὰν ζητῆται εἰς τῶν μέσων ὄρων, δίδονται δ' οἱ τρεῖς ἄλλοι, π. χ. ἐὰν ἔχομεν τὴν ἀναλογίαν $\frac{a}{x} = \frac{y}{\delta}$ καὶ ζητεῖται νὰ εὕρεθῇ ὁ x , ἔχομεν, $\gamma \times x = \alpha \times \delta$, ἐξ οὗ $x = \frac{\alpha \times \delta}{\gamma}$ ἤτοι

«διὰ νὰ εὕρωμεν ἕνα τῶν μέσων ὄρων ἀναλογίας, τῆς ὁποίας δίδονται οἱ τρεῖς ἄλλοι, διαιροῦμεν τὸ γινόμενον τῶν δύο ἄκρων διὰ τοῦ δοθέντος μέσου».

Οὕτω ἐκ τῆς ἀναλογίας $\frac{3}{x} = \frac{4}{5}$ ἔχομεν $x = \frac{3 \times 5}{4} = \frac{15}{4}$. Ἐκ τῆς $\frac{7}{3} = \frac{x}{2}$ εὐρίσκομεν $x = \frac{2 \times 7}{3} = \frac{14}{3}$. Ἐκ τῆς $\frac{2}{3} = \frac{5}{x}$ εὐρίσκομεν $x = \frac{3 \times 5}{2} = \frac{15}{2} = 7,5$.

Ἀσκήσεις.

1) Νὰ εὕρεθῇ ὁ x ἐκ τῶν ἀναλογιῶν

α') $45 : 68 = 90 : x$ β') $6 : 3 = x : 7$ γ') $x : 4 = 9 : 7$.

δ') $1,6 : 3 = x : 2,7$ ε') $3,5 : x = 8 : 1,8$ ς') $3 \frac{1}{4} : 6 = x : 9$.

ζ') $x : 1 \frac{1}{2} = \frac{15}{7} : 1 \frac{4}{5}$ η') $1,9 : x = 2,3 : 2$ θ') $x : 6 = 0,6 : 1,5$.

2) Ποῦτος εἶνε ὁ ἀντίστροφος λόγος τοῦ $\frac{7}{9}$; τοῦ $\frac{2}{3}$; τοῦ 3,5;

3) Μὲ τί ἴσους τὸ γινόμενον δύο ἀριθμῶν ἀντιστρόφων ἢ δύο ἀντιστρόφων λόγων, π. χ. τοῦ 5 $\left(\frac{3}{7}\right)$ καὶ τοῦ ἀντιστρόφου του;

§ 85. Περὶ ἐξαρτήσεως τῶν ποσῶν. —

α') Καθὼς γνωρίζομεν, ὅσω περισσοτέρας ὀκάδας ἑνὸς ἐμπορεύματος ἀγοράζομεν, τόσω περισσότερα χρήματα πληρώνομεν τὸ βάρος λοιπὸν καὶ ἡ τιμὴ ἑνὸς ἐμπορεύματος εὐρίσκονται εἰς τοιαύτην σχέσιν μεταξύ των, ὥστε ἡ αὔξησις τοῦ βάρους νὰ φέρῃ τὴν αὔξησιν τῆς τιμῆς καὶ τοῦναντίον, ἡ ἐλάττωσις τοῦ βάρους νὰ φέρῃ τὴν ἐλάττωσιν τῆς τιμῆς του. Τοιοῦτα ποσὰ ἀπαντῶνται συχνά. Οὕτω, ἐὰν αὐξηθῇ τὸ εἰσόδημα ἐκ μιᾶς οἰκίας, αὐξάνεται

καὶ ὁ φόρος, τὸν ὁποῖον πληρώνομεν δι' αὐτήν. Ἐὰν αὐξήσωμεν τοὺς ἐργάτας, οἱ ὁποῖοι ἐργάζονται εἰς ἓν ἔργον, θὰ αὐξηθῆ καὶ τὸ ἔργον, τὸ ὁποῖον αὐτοὶ ἐκτελοῦν.

β') Ὅσω περισσοτέρους ἐργάτας λαμβάνει τις διὰ τὴν ἀνοικοδόμησιν μιᾶς οἰκίας, εἰς τόσω ὀλιγώτερον χρόνον θὰ γίνῃ ἡ ἀνοικοδόμησις. Ὁ ἀριθμὸς τῶν ἐργατῶν καὶ τῶν ἡμερῶν ἐργασίας των εὐρίσκονται εἰς τοιαύτην σχέσιν μεταξύ των, ὥστε ἡ αὐξησης τοῦ ἑνὸς αὐτῶν ἐπιφέρει τὴν ἐλάττωσιν τοῦ ἄλλου. Ἐπίσης τοιαῦτα ποσὰ ὑπάρχουν ἀρκετὰ π. χ. αὐξάνει τις τὸ μῆκος τοῦ βήματός του, ἐλαττοῦται τότε ὁ ἀριθμὸς τῶν βημάτων, τὰ ὁποῖα χρειάζεται διὰ νὰ διανύσῃ μίαν ὀρισμένην ἀπόστασιν.

γ') Ἄς ὑποθέσωμεν ὅτι μετροῦμεν τὴν θερμοκρασίαν ἑνὸς ἀσθενοῦς ἀπὸ ὥρας εἰς ὥραν καὶ εὐρίσκομεν ὅτι αὕτη ἄλλοτε αὐξάνει καὶ ἄλλοτε ἐλαττοῦται. Τότε ὁ χρόνος καὶ ἡ θερμοκρασία τοῦ ἀσθενοῦς εὐρίσκονται εἰς τοιαύτην σχέσιν μεταξύ των, ὥστε ἡ αὐξησης τοῦ χρόνου ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα ἄλλοτε μὲν τὴν αὐξησην ἄλλοτε δὲ τὴν ἐλάττωσιν τῆς θερμοκρασίας τοῦ ἀσθενοῦς, καθ' ὅσον αὕτη ἀνέρχεται ἢ κατέρχεται κατὰ τὸ διάστημα τοῦτο τοῦ χρόνου.

Ἐκ τῶν ἐνωτέρω συνάγομεν ὅτι,

1) Ὑπάρχουν ποσὰ τοιαῦτα, ὥστε ὅταν τὸ ἓν μεταβάλλεται καὶ τὸ ἄλλο παθαίνει μεταβολὴν τινα· ἐπίσης καὶ ἄλλα διὰ τὰ ὁποῖα δὲν συμβαίνει τοῦτο. Εἰς τὴν πρώτην περίπτωσιν λέγομεν ὅτι τὰ ποσὰ ἐξαρτῶνται τὸ ἓν ἀπὸ τὸ ἄλλο, εἰς δὲ τὴν δευτέραν, ὅτι εἶνε ἀνεξάρτητα τὸ ἓν ἀπὸ τὸ ἄλλο.

2) Ἐν ποσόν, ἔστω τὸ Α, δύναται νὰ ἐξαρτᾶται ἀπὸ ἓν ἄλλο ἔστω τὸ Β, κατὰ ἓνα ἐκ τῶν ἐξῆς δύο τρόπων. α') Δύναται, ὅταν αὐξάνῃ τὸ Β, ν' αὐξάνῃ καὶ τὸ Α· β') ὅταν αὐξάνῃ τὸ Β, νὰ ἐλαττοῦται τὸ Α.

β') Ἐν ποσόν δύναται νὰ ἐξαρτᾶται ἀπὸ ἄλλα ποσὰ περισσότερα τοῦ ἑνός. Οὕτω τὸ ποσόν, τὸ ὁποῖον πληρώνει ἓν ἐργαστάσιον εἰς τοὺς ἐργάτας του, ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸν ἀριθμὸν τῶν ἐργατῶν, ἀπὸ τὸν ἀριθμὸν τῶν ἡμερῶν κατὰ τὰς ὁποίας αὐτοὶ ἐργάζονται καὶ ἀπὸ τὸν χρόνον, κατὰ τὸν ὁποῖον ἐργάζονται καθ' ἡμέραν οἱ ἐργάται.

Ἀσκήσεις.

1) Ἐβρετε παραδείγματα διὰ καθὲν τῶν ἀνωτέρω εἰδῶν τῆν ἐξαρτήσεως τῶν ποσῶν.

2) Ἐκ δύο ποσῶν Α καὶ Β, ἔταν τὸ Α αὐξάνη, αὐξάνει καὶ τὸ Β.
α') τί παθαίνει τὸ Β, ἔταν τὸ Α ἐλαττοῦται; β') τί παθαίνει τὸ Α, ἔταν τὸ Β αὐξάνη;

3) Ἐκ δύο ποσῶν Α καὶ Β, ἔταν αὐξάνη τὸ Α, ἐλαττοῦται τὸ Β.
α') τί παθαίνει τὸ Β, ἐὰν ἐλαττοῦται τὸ Α; β') τί παθαίνει τὸ Α, ἐὰν αὐξάνη τὸ Β; τί, ἐὰν ἐλαττοῦται τὸ Β;

§ 86. Περὶ τῶν εὐθέως ἀναλόγων ποσῶν.—

α) Ὁ τρόπος τῆς ἐξαρτήσεως τῶν ποσῶν, τὰ ὁποῖα μεταβάλλονται οὕτως, ὥστε ἔταν τὸ ἓν ἐξ αὐτῶν αὐξάνη, αὐξάνει καὶ τὸ ἄλλο· δύναται νὰ εἶνε διαφόρων εἰδῶν.

Ἐὰν 2 ὄκ. ἐνὸς ἐμπορεύματος στοιχίζουσι 5 δρ., αἱ 4·6·8 ὀκάδες θὰ στοιχίζουσι ἀντιστοιχῶς 10· 15· 20 δραχμάς· ἡ τιμὴ λοιπὸν τοῦ ἐμπορεύματος αὐξάνει οὕτως, ὥστε εἰς διπλάσιον ἀριθμὸν, τριπλάσιον ἀριθμὸν ὀκάδων ἀντιστοιχεῖ διπλάσιος, τριπλάσιος ἀριθμοῦ δραχμῶν.

Ἐὰν ἡ πλευρὰ ἐνὸς τετραγώνου γίνη 2· 3 φορές μεγαλύτερα, ἡ ἐπιφάνειά του θὰ γίνη μεγαλύτερα, ἀλλ' ὄχι μόνον 2·3 φορές, καθὼς δυνάμεθα νὰ τὸ ἴδωμεν, ἂν κλησθεύσωμεν τὸ σχῆμα. Ποσὰ τοῦ πρώτου εἶδους ὑπάρχουσι πολλὰ. Οὕτω εἰς διπλάσιον, τριπλάσιον χρόνον τῆς ἐργασίας ἀντιστοιχεῖ διπλασία, τριπλασία ἀμοιβὴ κ.ο.κ. Τὰ τοιαῦτα ποσὰ καλοῦμεν καὶ εὐθεῖαν ἀνάλογα.

Ἐν γένει, «δύο ποσὰ λέγονται κατ' εὐθεῖαν ἀνάλογα, ἐὰν πολλαπλασιαζομένου ἢ διαιρουμένου τοῦ ἐνὸς ἐπὶ ἓνα ἀριθμὸν, πολλαπλασιάζεται ἢ διαιρεῖται καὶ τὸ ἄλλο μὲ τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν».

β) Ἰδιότης τῶν ἀναλόγων ποσῶν.

✕ Ἐὰν δύο ποσὰ εἶνε ἀνάλογα, ὁ λόγος δύο τιμῶν τοῦ ἐνὸς ἐξ αὐτῶν ἰσοῦται μὲ τὸν λόγον τῶν ἀντιστοιχῶν τιμῶν τοῦ ἄλλου».

Πράγματι, ἐὰν 3 ὄκ. ἐνὸς πράγματος τιμῶνται 14 δρ., αἱ διπλάσιαι ὀκάδες, δηλαδὴ αἱ 6 ὄκ., θὰ τιμῶνται 28 δρ., ὁ δὲ λό-

γος τῶν δύο τιμῶν 3 δκ. καὶ 6 δκ. εἶνε $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$. Ἐπίσης ὁ λόγος

τῶν ἀντιστοιχουσῶν τιμῶν τοῦ ἄλλου ποσοῦ εἶνε $\frac{14}{28} = \frac{1}{2}$.

Ἦτοι οἱ δύο λόγοι εἶνε ἴσοι. Διὰ τοῦτο δυνάμεθα νὰ γράψωμεν ὅτι $\frac{3}{6} = \frac{14}{28}$. Ἐπομένως ἔχομεν ὅτι, «ἐὰν δύο ποσὰ εἶνε ἀνάλογα, ἔν ζεύγος τιμῶν τοῦ ἑνὸς μετὰ τοῦ ἀντιστοίχου ζεύγους τιμῶν τοῦ ἄλλου ἀποτελοῦν ἀναλογίαν».

§ 87. Περὶ τῶν ἀντιστρόφως ἀναλόγων ποσῶν. —

• α) Καὶ εἰς τὰ ποσὰ εἰς τὰ ὁποῖα ὅταν τὸ ἓν αὐξάνη τὸ ἄλλο ἐλαττοῦται, ὁ τρόπος τῆς ἐξαρτήσεως των εἶνε διαφόρων εἰδῶν. Ἐὰν ὁ ἔργ. τελειῶνουν ἓν ἔργον εἰς 12 ἡμ., διπλάσιοι, τριπλάσιοι... ἐργάται, ἐργαζόμενοι ὑπὸ τὰς αὐτὰς συνθήκας, θὰ τελειώσουν τὸ ἔργον εἰς 6·4... ἡμέρας. Ὡστε, ἐὰν αὐξάνη ὁ ἀριθμὸς τῶν ἐργατῶν, ἐλαττοῦται ὁ χρόνος καθ' ὃν παρατοῦται τὸ ἔργον καὶ μάλιστα εἰς 2·3... φορές περισσοτέρους ἐργάτας ἀντιστοιχεῖ 2·3... φορές ὀλιγώτερος χρόνος. Ἐὰν ἡ χορδὴ ἑνὸς κυκλικοῦ τόξου γίνη διπλασία, τριπλασία,.. ἐλαττοῦται ἡ ἀπόστασις τῆς ἀπὸ τὸ κέντρον τοῦ κύκλου, ἀλλὰ δὲν γίνεται δύο, τρεῖς,.. φορές μικρότερα, καθὼς φαίνεται, ἂν κατασκευάσωμεν τὸ σχῆμα. Ποσὰ τοῦ πρώτου εἶδους λέγονται ἀντιστρόφως ἀνάλογα.

Ἐν γένει, «δύο ποσὰ λέγονται ἀντιστρόφως ἀνάλογα, ἐὰν πολλαπλασιαζομένου ἢ διαιρουμένου τοῦ ἑνὸς ἐξ αὐτῶν ἐπὶ ἓνα ἀριθμόν, διαιρεῖται ἢ πολλαπλασιάζεται τὸ ἄλλο μὲ τὸν αὐτὸν ἀριθμόν».

β) Ἰδιότης τῶν ἀντιστρόφως ἀναλόγων ποσῶν.

Ἐὰν δύο ποσὰ εἶνε ἀντιστρόφως ἀνάλογα, ὁ λόγος δύο τιμῶν τοῦ ἑνὸς ἰσοῦται μὲ τὸν ἀντίστροφον λόγον τῶν ἀντιστοίχων τιμῶν τοῦ ἄλλου».

Πράγματι, ἐὰν ἐξοδεύη τις 8 δρ. καθ' ἡμέραν καὶ περναῖ μὲ ἓν χρηματικὸν ποσὸν 30 ἡμ., ἐξοδεύων 16 δρ. καθ' ἡμέραν, θὰ περάσῃ 15 ἡμ. Ὁ λόγος τῶν δύο τιμῶν 8 δρ. καὶ 16 δρ. εἶνε $\frac{1}{2}$ ἐνῶ ὁ λόγος τῶν ἀντιστοίχων πρὸς αὐτὰς εἶνε $\frac{30}{15} = 2$, ὁ ὁποῖος εἶνε ἀντίστροφος τοῦ $\frac{1}{2}$. Διὰ τοῦτο δυνάμεθα νὰ γράψωμεν ὅτι $\frac{16}{8} = \frac{30}{15}$.

ἦτοι «ἐὰν ἔχωμεν δύο ποσὰ ἀντιστρόφως ἀνάλογα, ὁ λόγος δύο τιμῶν τοῦ ἐνὸς καὶ ὁ ἀντίστροφος τῶν ἀντιστοίχων τιμῶν τοῦ ἄλλου ἀποτελοῦν ἀναλογία».

γ') Διὰ νὰ διακρίνωμεν ἂν δύο ποσὰ εἶνε ἀνάλογα ἢ ἀντιστρόφως ἀνάλογα ἢ καὶ μή, συγκρίνομεν αὐτά, καθὼς φαίνεται καὶ εἰς τὰ κάτωθι παραδείγματα.

1) 6 ἐργάται κερδίζουσι 15 δρ. Λέγομεν, ἀφοῦ 6 ἐργάται κερδίζουσι 15 δρ., οἱ διπλάσιοι, τριπλάσιοι... ἐργάται ὑπὸ τὰς αὐτὰς συνθήκας κερδίζουσι διπλασίας, τριπλασίας... δραχμάς. Ἐπομένως τὰ ποσὰ εἶνε ἀνάλογα.

2) 10 ἄνθρωποι ἔχουσι τροφὰς διὰ νὰ περάσουν 18 ἡμέρας. Λέγομεν, ἀφοῦ οἱ 18 ἄνθρωποι περνοῦσι μὲ τὰς τροφὰς, τὰς ὁποίας ἔχουσι, 18 ἡμ., οἱ διπλάσιοι, τριπλάσιοι... ἄνθρωποι μὲ τὰς αὐτὰς τροφὰς ὑπὸ τὰς αὐτὰς συνθήκας θὰ περάσουν τὸ ἥμισυ, τὸ τρίτον... τῶν ἡμερῶν. Ἐπομένως τὰ ποσὰ εἶνε ἀντιστρόφως ἀνάλογα.

Περὶ μεθόδων.

§ 88. Περὶ τῆς (ἀπλῆς) μεθόδου τῶν τριῶν.—

α') (Πρόβλημα) 1). «Ἐὰν 8 δκ. μῆλα στοιχίζουσι 60 δρχ., πόσον στοιχίζουσι αἱ 20 δκ. μῆλα ;»

Δανάμεθα νὰ λύσωμεν τὸ πρόβλημα αὐτὸ διὰ τῆς μεθόδου τῆς ἀναγωγῆς εἰς τὴν μονάδα ὡς ἐξῆς. Γράφομεν ἐν πρώτοις, παριστάνοντες διὰ τοῦ x τὸν ἄγνωστον ἀριθμὸν.

$$\begin{array}{r} 8 \text{ δκ. μῆλα} \\ 20 \\ \hline \end{array} \qquad \begin{array}{r} 60 \text{ δρχ.} \\ x \\ \hline \end{array}$$

καὶ ἀκολουθῶς λέγομεν (§ 56)

$$\begin{aligned} \text{αἱ } 8 \text{ δκ. μῆλα στοιχίζουσι } 60 \text{ δρ.} \\ \text{ἢ μία δκ. μῆλα στοιχίζει } 60 \text{ δρ.} : 8 = \frac{60}{8} \text{ δρ.} \\ \text{αἱ } 20 \text{ δκ. στοιχίζουσι } \frac{60}{8} \times 20 = 150 \text{ δρ.} \end{aligned}$$

Τὴν λύσιν τοῦ αὐτοῦ προβλήματος δυνάμεθα νὰ κάμωμεν καὶ ὡς ἐξῆς μὲ τὴν βοήθειαν τῶν ἀναλογιῶν.

Ἐν πρώτοις παρατηροῦμεν ὅτι τὰ ποσὰ τῶν μῆλων καὶ λεπτῶν εἶνε ἀνάλογα. Ἐπομένως ὁ λόγος τῶν δύο τιμῶν τοῦ ποσοῦ τῶν μῆλων εἶνε ἴσος μὲ τὸν λόγον τῶν ἀντιστοιχῶν τιμῶν τῶν λεπτῶν (§ 87, 6'). ἦτοι θὰ ἔχωμεν τὴν ἀναλογίαν $\frac{8}{20} = \frac{60}{x}$, ἐκ τῆς ὁποίας εὐρίσκομεν ὅτι

$$x = \frac{60 \times 20}{8} = 150 \text{ δραχ.} \quad (\S 84)$$

(Πρόβλημα 2). «Αἱ 2 $\frac{3}{4}$ ὀκ. ἑνὸς ἔμπορεύματος τιμῶνται 9 $\frac{1}{2}$ δρα. πόσας ὀκάδας ἀγοράζομεν μὲ 12 $\frac{2}{3}$ δραχμάς;»

Παριστάνομεν τὸν ἄγνωστον ἀριθμὸν διὰ τοῦ x , καὶ ἔχομεν

$$2 \frac{3}{4} = \frac{11}{4} \text{ ὀκ. τιμῶνται } 9 \frac{1}{2} = \frac{19}{2} \text{ δραχ.}$$

$$x \qquad \qquad 12 \frac{2}{3} = \frac{38}{3}$$

Λύοντες αὐτὸ διὰ τῆς μεθόδου τῆς ἀναγωγῆς εἰς τὴν μονάδα (§ 56), εὐρίσκομεν ὅτι ὁ $x = \frac{11 \times 2 \times 38}{4 \times 19 \times 3} = 3 \frac{2}{3}$ ὀκάδας.

Τὴν λύσιν τοῦ αὐτοῦ προβλήματος δυνάμεθα νὰ κάμωμεν καὶ διὰ τῶν ἀναλογιῶν, παρατηροῦντες, ὅτι τὰ ποσὰ τῶν δραχμῶν καὶ τῶν ὀκάδων εἶνε ἀνάλογα. Ἐπομένως θὰ ἔχωμεν τὴν ἀναλογίαν

$$\frac{\left(\frac{11}{4}\right)}{x} = \frac{\left(\frac{19}{2}\right)}{\left(\frac{38}{3}\right)}$$

ἐκ τῆς ὁποίας εὐρίσκομεν ὅτι

$$x = \frac{11}{3} = 3 \frac{2}{3} \text{ ὀκάδ.}$$

Καὶ εἰς τὰ δύο ἀνωτέρω προβλήματα ἔχομεν ποσὰ ἀνάλογα, διόσονταί δ' εἰς καθὲν αὐτῶν δύο ἀντίστοιχοι τιμαὶ τῶν ποσῶν καὶ ἄλλη τιμὴ τοῦ ἑνὸς ἐξ αὐτῶν, ζητεῖται δὲ ἡ ἀντιστοιχοῦσα εἰς ταύτην τιμὴ τοῦ ἄλλου ποσοῦ. Οὕτω εἰς τὸ 1) πρόβλημα αἱ ἀντιστοιχοῦσαι τιμαὶ εἶνε 8 ὀκ. μῆλα καὶ 60 δραχ., ἡ ἄλλη τιμὴ τοῦ ἑνὸς τῶν δύο ποσῶν εἶνε 20 ὀκ. μῆλα, ζητεῖται δὲ ἡ εἰς ταύτην ἀντιστοιχοῦσα τιμὴ τοῦ ἄλλου ποσοῦ, τὴν ὁποίαν παρεστήσαμεν διὰ τοῦ x .

Ἐκ τῆς λύσεως τῶν προβλημάτων τούτων βλέπομεν ὅτι
 «ὅταν τὰ ποσὰ εἶνε ἀνάλογα, διὰ νὰ εὗρωμεν τὴν τιμὴν τοῦ
 ἀγνώστου x , ἀρκεῖ νὰ πολλαπλασιάσωμεν τὸν ὑπεράνω του
 ἀριθμὸν ἐπὶ τὸ κλάσμα, τὸ ὁποῖον ἀποτελοῦν οἱ δύο ἄλλοι
 ἀριθμοί, ἀντεστραμμένον».

6') Καθ' ὅμοιον τρόπον ἐργαζόμεθα, ἐὰν τὰ ποσὰ εἶνε ἀντιστρό-
 φως ἀνάλογα. Ἔστω π. χ. ὅτι ἔχομεν πρὸς λύσιν τὸ ἑξῆς

(Πρόβλημα) 1). «Ἐὰν 16 ἐργάται τελειώσουν ἐν ἔργον εἰς
 28 ἡμέρας, εἰς πόσας ἡμέρας 14 ἐργάται τῆς αὐτῆς ἰκανό-
 τητος θὰ ἐκτελέσουν τὸ αὐτὸ ἔργον;»

Γράφομεν, παριστάνοντες τὸν ἄγνωστον ἀριθμὸν διὰ τοῦ x ,

$$\begin{array}{r} 16 \text{ ἔργ.} \\ 14 \\ \hline \end{array} \qquad \begin{array}{r} 28 \text{ ἡμ.} \\ x \end{array}$$

Παρατηροῦμεν τώρα, ὅτι τὰ δύο ποσὰ τῶν ἐργατῶν καὶ τῶν ἡμε-
 ρῶν εἶνε ἀντιστρόφως ἀνάλογα. Ἐπομένως ὁ λόγος τῶν δύο τιμῶν τοῦ
 ποσοῦ τῶν ἐργατῶν, ὁ $\frac{16}{14}$, θὰ εἶνε ἴσος μὲ τὸν ἀντίστροφον τοῦ λό-
 γου τῶν ἀντιστοιχουσῶν τιμῶν τῶν ἡμερῶν, ἦτοι μὲ τὸν $\frac{x}{28}$. Ὡστε
 ἔχομεν τὴν ἀναλογίαν

$$\frac{16}{14} = \frac{x}{28}$$

ἐκ τῆς ὁποίας εὐρίσκομεν $x = \frac{16 \times 28}{14} = 32$ ἡμ.

Τὸ πρόβλημα αὐτὸ λύομεν καὶ διὰ τῆς ἀναγωγῆς εἰς τὴν μονάδα,
 ὡς ἑξῆς.

Ἄφοῦ οἱ 16 ἐργάται τελειώσουν τὸ ἔργον εἰς 28 ἡμ., ὁ 1 ἔργ.
 θὰ τὸ τελειώσῃ εἰς 16 φορές περισσοτέρας ἡμέρας, ἦτοι εἰς 28×16
 ἡμ. καὶ οἱ 14 ἔργ. εἰς 14 φορές ὀλιγωτέρας τοῦ ἑνὸς, δηλαδὴ
 εἰς $\frac{28 \times 16}{14} = 32$ ἡμ.

(Πρόβλημα) 2). «Ὅταν τὸ πλάτος ὑφάσματος εἶνε 7 ρ.,
 ἀπαιτοῦνται 44 ρ. διὰ τὴν κατασκευὴν μιᾶς ἐνδυμασίας πό-
 σοι πήχεις ἀπαιτοῦνται, ὅταν τὸ ὑφασμα ἔχῃ πλάτος 10 ρ;»

Καὶ ἐνταῦθα γράφομεν ἐν πρώτοις

$$\begin{array}{r} 7 \text{ ρ. πλ.} \\ 10 \\ \hline \end{array} \qquad \begin{array}{r} 44 \text{ ρ. μήκος} \\ x \end{array}$$

Ἐπειδὴ τὰ δύο ποσὰ εἶνε ἀντιστρόφως ἀνάλογα, ἔχομεν τὴν ἀναλογίαν.

$$\frac{7}{10} = \frac{x}{44}$$

ἐκ τῆς ὁποίας εὐρίσκομεν $x = \frac{44 \times 7}{10} = \frac{308}{10} = 30 \frac{4}{5} \rho. = 3 \pi. 6 \frac{4}{5} \rho.$

Ἐκ τῆς λύσεως τῶν δύο τούτων προβλημάτων βλέπομεν ὅτι «ὅταν τὰ ποσὰ εἶνε ἀντιστρόφως ἀνάλογα, ὁ ἄγνωστος x εὐρίσκεται, ἐὰν πολλαπλασιάσωμεν τὸν ὑπεράνω του ἀριθμὸν ἐπὶ τὸ κλάσμα τῶν δύο ἄλλων ἀριθμῶν».

γ') Ὁ γενικὸς τρόπος τῆς λύσεως προβλημάτων ἐνὸς εἴδους λέγεται μέθοδος.

Ἐπειδὴ εἰς τὰ ἀνωτέρω α') καὶ β') προβλήματα καὶ τὰ ὅμοια πρὸς αὐτὰ δίδονται τρεῖς ἀριθμοί, καὶ ἐξ αὐτῶν εὐρίσκομεν τὸν ἄγνωστον, διὰ τοῦτο λέγονται προβλήματα τῆς μεθόδου τῶν τριῶν.

Ὅθεν «μέθοδος τῶν τριῶν λέγεται ὁ τρόπος, κατὰ τὸν ὁποῖον λύονται προβλήματα εἰς τὰ ὁποῖα δίδονται δύο ἀντιστοιχοῦσαι τιμαὶ δύο ποσῶν ἀναλόγων, ἢ ἀντιστρόφως ἀναλόγων, καὶ ἄλλη τιμὴ τοῦ ἐνὸς ἐξ αὐτῶν, ζητεῖται δὲ ἡ ἀντιστοιχοῦσα τιμὴ τοῦ ἄλλου.»

δ') Ἐὰν συγκρίνωμεν τοὺς δύο προηγουμένους κανόνας α') καὶ β'), συνάγομεν ὅτι πρὸς λύσιν ἐνὸς προβλήματος τῆς μεθόδου τῶν τριῶν,

1) Παριστάνομεν τὸν ἄγνωστον διὰ τοῦ x .

2) Γράφομεν τὰς δοθείσας ἀντιστοιχοῦσας τιμὰς τῶν ποσῶν ἐπ' εὐθείας γραμμῆς, καὶ ὑποκάτω αὐτῶν τὰς ὁμοιοεῖς τῶν.

3) Σύρομεν γραμμὴν ὀριζοντίαν καὶ ὑπ' αὐτὴν γράφομεν ὅτι, ὁ x ἰσοῦται μὲ τὸν ὑπεράνω του ἀριθμὸν ἐπὶ τὸ κλάσμα, τὸ ὁποῖον ἀποτελοῦν οἱ δύο ἄλλοι ἀριθμοὶ ἀντεστραμένον μὲν, ἂν τὰ ποσὰ εἶνε ἀνάλογα, ὅπως ἔχει δέ, ἂν εἶνε ἀντίστροφα.

Παρατήρησις. Ἄξιον παρατηρήσεως εἶνε ὅτι, ὁ κανὼν αὐτὸς ἰσχύει μόνον διὰ τὰ προβλήματα εἰς τὰ ὁποῖα ἔχομεν ποσὰ ἀνάλογα, ἢ ἀντιστρόφως ἀνάλογα, ὅχι δὲ καὶ δι' ἐκεῖνα εἰς τὰ ὁποῖα τὰ ποσὰ μεταβάλλονται οὕτως, ὥστε ὅταν αὐξάνῃ τὸ ἓν, αὐξάνει ἢ ἐλαττοῦται ὁπωσδήποτε τὸ ἄλλο.

Προβλήματα πρὸς λύσιν.

Ὅμας πρώτη. (Ἐμπόρευμα καὶ ἀξία.) 1) 15 (45) ὄκ. ἐμπορεύματος τιμῶνται 18 (63,9) δρ.· πόσον τιμῶνται 27 (425) ὄκ.;
32,4 (603,5).

2) Τὰ 2,4 (7,2) μ. ὑφάσματος τιμῶνται 16,5 (23,4) δρ.· πόσον τιμῶνται $5 \frac{1}{3}$ (2,4) μ. αὐτοῦ;
36 $\frac{2}{3}$ (7,8).

3) Αἱ 3,5 λίτραι οἴνου τιμῶνται 28 δρ.· πόσον τιμῶνται 15,5 λίτραι αὐτοῦ;
124.

4) 16 (28) ὄκ. μῆλα τιμῶνται 84 (140) δρ.· πόσα μῆλα ἀγοράζομεν μὲ 63 (250) δρ.;
12 (50).

Ὅμας δευτέρα. (Ἐργάται καὶ χρόνος ἐργασίας· χρόνος ἐργασίας καὶ ἀμοιβή· ἐργάται καὶ ἀμοιβή.) 1) Ἐὰν 30 (18) ἐργάται τελειῶνουν ἓν ἔργον εἰς 8,75 (10,5) ἡμ., πόσοι τοιοῦτοι ἐργάται τὸ τελειῶνουν εἰς 3,5 (13,5) ἡμέρας;
75 (14).

2) Ἐὰν 12 (30) ἐργάται τελειῶνουν ἓν ἔργον εἰς 7,5 (1,5) ἡμ., εἰς πόσας ἡμ. θὰ τὸ τελειώσουν 27 (12) τοιοῦτοι ἐργάται;
3 ἡμ. 8 ὠρ. (3 ἡμ. 18 ὠρ.).

3) 16 (18) ἐργάται κερδίζουσι εἰς ἓνα ὠρισμένον χρόνον 505,2 (220,5) δρ.· πόσον κερδίζουσι 12 (22) ἐργάται εἰς τὸν αὐτὸν χρόνον;
378,9 (269,5).

4) Ἐργάτης κερδίζει εἰς 12,5 (7) ἑβδομάδας 3125 (1976,8) δραχ.· πόσα κερδίζει εἰς 14 (8,5) ἑβδομάδας;
3500 (2400,40).

Ὅμας τρίτη. (Αριθμὸς ἴσων μερῶν καὶ μέγεθος των.) 1) Ἐὰν 18 (27) ἄνθρωποι ἔχουν τροφὰς διὰ $4 \frac{1}{3}$ ($2 \frac{2}{3}$) μῆνας, πόσον χρόνον θὰ ἐπαρκέσουν αἱ τροφαὶ αὐταὶ διὰ 10 (24) ἄνθρώπους;
7 μ. 24 ἡμ. (3).

2) Ἐὰν 12 (18) ἄνθρωποι ἔχουν τροφὰς διὰ 4 μῆν. 5 ἡμ. (1 μ. 26 ἡμ.), πόσοι ἄνθρωποι θὰ περάσουν μὲ τὰς αὐτὰς τροφὰς 6, 25 μῆν. (16) ἡμ.;
8 (63).

3) Διὰ νὰ διανύσῃ τις ὠρισμένην ἀπόστασιν, χρειάζεται 286 (243) βήματα μήκους 0,84 (0,8) μ.· πόσα βήματα θὰ κάμῃ, ἐὰν καθὲν βημά του ἔχη μήκος 0,77 (0,9) μ.;
312 (216).

Ὅμας τετάρτη. 1) Ἐὰν 18 (14) ἐργάται ἐργαζόμενοι 8 (9)

ὥρας καθ' ἡμέραν τελειώνουν ἕν ἔργον, πόσοι τοιοῦτοι ἐργάται ἐργαζόμενοι 9 (7) ὥρας καθ' ἡμέραν, τελειώνουν τὸ ἔργον εἰς τὸν αὐτὸν χρόνον; 16 (18).

2) Ἐὰν ἐργάτης εἰς $2 \frac{1}{3} \left(2 \frac{2}{3} \right)$ μῆνας κερδίσῃ 1591,8 (180) δραχ., εἰς πόσον χρόνον θὰ κερδίσῃ 1023,3 (2925); 1,5 μ. (43 μ. 10 ἡμ.).

3) Μοιράζων τις ἕν ποσὸν χρημάτων εἰς 32 (48) πρόσωπα, δίδει εἰς καθέν 36 (20) δρ.· πόσον θὰ δώσῃ εἰς καθέν, ἂν τὸ αὐτὸ ποσὸν μοιράσῃ εἰς 28 (60) πρόσωπα; $41 \frac{1}{7}$ (16).

4) 5 (7) σωλῆνες πληροῦν δεξαμενὴν εἰς $\frac{9}{10} \left(1 \frac{2}{15} \right)$ ὥρ.· εἰς πόσον χρόνον θὰ τὴν πληρώσουν 9 (17) τοιοῦτοι σωλῆνες; 30' (38').

5) 20 (36) ἐργάται τελειώνουν ἕν ἔργον, ἐργαζόμενοι 9 (8) ὥρας καθ' ἡμέραν· πόσον πρέπει νὰ ἐργάζωνται καθ' ἡμέραν 18 (32) ἐργάται, διὰ νὰ τὸ τελειώσουν εἰς τὸν αὐτὸν χρόνον; 10 ὥρ. (9).

6) Ἄν 14 (9) ἐργάται κερδίσουν εἰς τινὰ χρόνον 36,4 (39,24) δραχ., πόσοι ἐργάται εἰς τὸν αὐτὸν χρόνον θὰ κερδίσουν 39 (196,20) δραχ.; 15 (45).

§ 89. Σύνθετος μέθοδος τῶν τριῶν.—

α') (Πρόβλημα 1). «Ἐργάτης ἐργαζόμενος 6 ὥρας καθ' ἡμέραν ὑφαίνει 80 μ. ὑφάσματος εἰς 25 ἡμ.· πόσας ὥρας πρέπει νὰ ἐργάζεται διὰ νὰ ὑφάνῃ 120 μέτρα τοῦ αὐτοῦ ὑφάσματος εἰς 30 ἡμ.;»

Πρὸς λύσιν τοῦ προβλήματος καριστάνομεν τὸν ἀγνωστον διὰ τοῦ x , καὶ γράφομεν

80 μ.	25 ἡμ.	6 ὥρ.
120	30	x

Συγκρίνομεν τὸ ποσὸν τοῦ ὑφάσματος μὲ τὸ ποσὸν τῶν ὥρῶν ἐπίσης τὸ ποσὸν τῶν ἡμερῶν μὲ τὸ τῶν ὥρῶν, καὶ εὐρίσκομεν ὅτι τὰ μὲν πρῶτα εἶνε ἀνάλογα, τὰ δὲ δευτέρα ἀντιστρόφως ἀνάλογα. Ἐὰν τώρα ὑποθέσωμεν, ὅτι αἱ ἡμέραι εἶνε 25 καὶ διὰ τὰ 120 μέτρα, θὰ ἔχωμεν νὰ λύσωμεν τὸ ἐξῆς πρόβλημα τῆς μεθόδου τῶν τριῶν.

80 μ.	1	6 ὥρ.
120	x	x

εις τὸ ὅποιον παρελείφθη ἡ τιμὴ 25 τοῦ δευτέρου ποσοῦ, ἐπειδὴ ὑπεθέσαμεν ὅτι ἔμεινεν ἀμετάβλητος. Ἐκ τῆς λύσεως τούτου ἔχομεν

$$x = 6 \times \frac{120}{80} = 9 \text{ ὥρ.}, \text{ ἀφοῦ τὰ ποσὰ εἶνε ἀνάλογα.}$$

Ἦτοι διὰ νὰ ὑφάνη ὁ ἐργάτης 120 μ. εἰς 25 ἡμ., πρέπει νὰ ἐργάζεται 9 ὥρας καθ' ἡμέραν.

Ἐὰν τώρα θέλῃ νὰ ὑφάνη τὰ 120 μ. εἰς 30 ἡμ., καὶ ζητοῦμεν πόσας ὥρας πρέπει νὰ ἐργάζεται τὴν ἡμέραν, θὰ λύσωμεν τὸ ἐξῆς πρόβλημα τῆς μεθόδου τῶν τριῶν

120 μ.	25 ἡμ.	9
»	30	x
<hr/>		

καὶ ἐπειδὴ ἐδῶ τὰ ποσὰ εἶνε ἀντιστρόφως ἀνάλογα, ἔχομεν

$$x = 9 \times \frac{25}{30} = 9 \times \frac{5}{6} = 3 \times \frac{5}{2} = 7 \frac{1}{2} \text{ ὥρ.}$$

Ὡστε 7 $\frac{1}{2}$ ὥρ. τὴν ἡμέραν πρέπει νὰ ἐργάζεται ὁ ἐργάτης, διὰ νὰ ὑφάνη 120 μ. εἰς 30 ἡμέρας.

(Πρόβλημα 2). «16 ἐργάται ἐργαζόμενοι 9 ὥρας καθ' ἡμέραν τελειῶνουν ἓν ἔργον εἰς 28 ἡμ.: εἰς πόσας ἡμέρας 14 ἐργάται ἐργαζόμενοι 8 ὥρας καθ' ἡμέραν, θὰ τελειώσουν τὸ ἔργον;»

Πρὸς λύσιν καὶ τούτου γράφωμεν

16 ἐργ.	9 ὥρ.	28 ἡμ.
14	8	x
<hr/>		

Συγκρίνομεν τὸ ποσὸν τῶν ἐργατῶν μὲ τὸ ποσὸν τῶν ἡμερῶν ἐπίσης τὸ ποσὸν τῶν ὥρῶν ἐργασίας μὲ τῶν ἡμερῶν καὶ εὐρίσκομεν ὅτι καὶ τὰ δύο αὐτὰ ποσὰ εἶνε ἀντιστρόφως ἀνάλογα μὲ τὸ τρίτον. Ἐὰν ὑποθέσωμεν, ὅτι αἱ ὥραι τῆς καθ' ἡμέραν ἐργασίας εἶνε 9 καὶ διὰ τοὺς 14 ἐργάτας, θὰ ἔχωμεν νὰ λύσωμεν τὸ ἐξῆς πρόβλημα τῆς μεθόδου τῶν τριῶν.

16 ἐργ.	28 ἡμ.
14	x
<hr/>	

Ἐκ τῆς λύσεως τοῦ ὁποίου εὐρίσκομεν, ἀφοῦ τὰ ποσὰ εἶνε ἀντιστρόφως ἀνάλογα,

$$x = 28 \times \frac{16}{14} = 32 \text{ ἡμ.} \quad (\S 88, 6').$$

Ἐὰν τώρα αἱ 14 ἐργάται ἐργάζωνται 8 ὥρ., διὰ νὰ εὕρωμεν

εις πόσας ημέρας θά τελειώσουν τὸ ἔργον, λύομεν τὸ ἐξῆς πρόβλημα τῆς μεθόδου τῶν τριῶν

14 ἔργ.	9 ὥρ.	32 ἡμ
»	8	x

καὶ ἐπειδὴ, καθὼς εἶδομεν, τὰ ποσὰ εἶνε ἀντιστρόφως ἀνάλογα, εὐρίσκομεν $x = 32 \times \frac{9}{8} = 36$ ἡμέρας.

Ὡστε εἰς 36 ἡμέρας οἱ 18 ἐργάται, ἐργαζόμενοι 8ῶρ. καθ' ἡμέραν, θά τελειώσουν τὸ ἔργον.

6') Εἰς τὰνωτέρω προβλήματα καὶ τὰ ὅμοια μὲ αὐτὰ δίδεται ἡ τιμὴ ἑνὸς ποσοῦ, ἢ ὅποια ἀντιστοιχεῖ εἰς δοθείσας τιμὰς δύο ἄλλων ποσῶν, τὰ ὅποια εἶνε ἀνάλογα, ἢ ἀντιστρόφως ἀνάλογα πρὸς αὐτό, καὶ ζητεῖται ἡ νέα τιμὴ τοῦ ποσοῦ τούτου, ἢ ἀντιστοιχοῦσα εἰς ἄλλας δοθείσας τιμὰς τῶν δύο ἄλλων ποσῶν. Ἐν γένει, τὰ προβλήματα, εἰς τὰ ὅποια δίδονται αἱ τιμαὶ περισσοτέρων τῶν δύο ποσῶν ἀναλόγων, ἢ ἀντιστρόφως ἀναλόγων, καὶ ζητεῖται ἡ νέα τιμὴ τοῦ ἑνὸς ἐξ αὐτῶν, ἢ ὅποια ἀντιστοιχεῖ εἰς ἄλλας τιμὰς τῶν ἄλλων ποσῶν, λέγονται προβλήματα τῆς συνθέτου μεθόδου τῶν τριῶν, καὶ ἡ λύσις των ἀνάγεται εἰς τὴν λύσιν τῶν προβλημάτων τῆς μεθόδου τῶν τριῶν, ἢ ὅποια λέγεται καὶ ἀπλῆ μέθοδος τῶν τριῶν, πρὸς διάκρισιν ἀπὸ τῆς συνθέτου.

γ') Διὰ τὸ εὐρωμεν σύντομον κανόνα πρὸς λύσιν τῶν προβλημάτων τῆς συνθέτου μεθόδου τῶν τριῶν, παρατηροῦμεν ὅτι, πρὸς εὑρεσιν τοῦ ἐξαγομένου τοῦ προβλήματος 1) ἀρκεῖ νὰ πολλαπλασιάσωμεν τὸν ὑπεράνω τοῦ x ἀριθμὸν 6 ὥρ. ἐπὶ τὸ ἀντίστροφον κλάσμα τοῦ

$\frac{80}{120}$ καὶ ἐπὶ τὸ $\frac{25}{30}$ τὰ ὅποια ἀποτελοῦν αἱ τιμαὶ τῶν δύο ἄλλων ποσῶν, ἐκ τῶν ὁποίων τὸ πρῶτον εἶνε ἀνάλογον, τὸ δὲ δευτέρον ἀντιστρόφως ἀνάλογον πρὸς τὸ ποσὸν τῶν ὥρῶν. Ἀνάλογα παρατηροῦμεν εἰς τὴν λύσιν τοῦ προβλήματος 2) καὶ παντὸς προβλήματος τῆς συνθέτου μεθόδου τῶν τριῶν.

Ἐκ τούτων ἔπεται ὅτι

«Διὰ τὸ λύσωμεν πρόβλημα τῆς συνθέτου μεθόδου τῶν τριῶν, 1) γράφομεν τὰς δοθείσας τιμὰς τῶν ποσῶν ἐπ' εὐθείας γραμμῆς· 2) παριστάνομεν διὰ τοῦ x τὴν ζητούμενην νέαν τιμὴν τοῦ ἑνὸς τῶν ποσῶν, καὶ γράφομεν ὑποκάτω τῶν ἀριθμῶν τῆς πρῶ-

της σειρᾶς τὴν νέαν τιμὴν καθενός· 3) ὑποκάτω σύρομεν γραμμὴν ὀριζοντίαν, καὶ γράφομεν ὅτι, ὁ x ἰσοῦται μὲ τὸν ὑπεράνω του ἀριθμὸν ἐπὶ καθὲν τῶν κλασμάτων, τὰ ὁποῖα σχηματίζουν αἱ δύο τιμαὶ καθενός ποσοῦ, ὅπως ἔχει μὲν, ἂν τὸ ποσοῦν εἶνε ἀντιστρόφως ἀνάλογον πρὸς τὸ τοῦ ἀγνώστου, ἀντεστραμμένον δέ, ἂν εἶνε ἀνάλογον».

Πρὸς ἐφαρμογὴν λύομεν τὸ ἐξῆς

(Πρόβλημα). «10 ἐργάται τελειώνουν τὰ $\frac{3}{4}$ ἐνὸς ἔργου εἰς 15 ἡμ.· εἰς πόσας ἡμέρας 12 ἐργάται ὑπὸ τὰς αὐτὰς συνθήκας ἐργαζόμενοι, θὰ τελειώσουν τὸ $\frac{1}{4}$ τοῦ ἔργου;»

10 ἐργ.	$\frac{3}{4}$ ἔργου	15 ἡμ.
12	$\frac{1}{4}$	x

Συκρίνοντας τὰ ποσὰ εὐρίσκομεν ὅτι, ἐργάται καὶ ἡμέραι εἶνε ἀντιστρόφως ἀνάλογα: ἔργον καὶ ἡμέραι ἀνάλογα. Ἐπομένως ἔχομεν

$$x = 15 \times \frac{10}{12} \times \frac{1}{\frac{3}{4}} = 15 \times \frac{10}{12} \times \frac{4}{3} = 5 \times \frac{5}{6} \times \frac{4}{1} = \frac{25}{6} =$$

$4 \frac{1}{6}$ ἡμέρας.

Προβλήματα πρὸς λύσιν.

- Ἑομὰς πρώτη. 1) Πόσα λαμβάνει 1 ἐργάτης εἰς 1 ἡμ., ἂν 9 (8) τοιοῦτοι ἐργάται εἰς 7 (6) ἡμ., λαμβάνουν 1562,4 (2280) ὄρ.; 24,80 (47,5).
- 2) 18 (28) ἐργάται κερδίζουν εἰς 5 (22) ἡμ. 2340 (16016) ὄρ. πόσον κερδίζουν εἰς 27 (16) ἐργάται εἰς 6 (18) ἡμ.; 4212 (7488).
- 3) 5 (13) ἐργάται κερδίζουν εἰς 7 (9) ἡμ. 847 (292,5) ὄρ.· εἰς πόσας ἡμ. 11 (17) ἐργάται θὰ κερδίσουν 2129,6 (3400) ὄρ.; 8 (80).
- Ἑομὰς δευτέρα. 1) 8 (7) ἐργάται ἐργαζόμενοι 10 (9) ὄρ. καθ' ἡμέραν λαμβάνουν διὰ 12 (12) ἡμ. 1920 (990) ὄρ.· πόσοι ἐργάται ἐργαζόμενοι 9 (10) ὄρ. τὴν ἡμέραν, θὰ λάβουν 4284 (3575) ὄρ. διὰ 14 (13) ἡμ.; 17 (21).

2) 13 (15) ἐργάται ἐργαζόμενοι 9 (8) ὥρ. τὴν ἡμέραν λαμβάνουν 3088, 8 (4416) δρ. εἰς 12 (16) ἡμ.· πόσας δραχ. θὰ λάβουν 16 (18) ἐργάται ἐργαζόμενοι 10 (9) ὥρ. τὴν ἡμέραν ἐπὶ 19 (17) ἡμ.; 6688 (6334,20).

3) Ἐὰν 25 (22) ἐργάται ἐργαζόμενοι 9 (10) ὥρ. τὴν ἡμέραν σκάπτουν τάφρον μήκους 120 (825) μ. εἰς 12 (15) ἡμ., εἰς πόσας ἡμέρας 36 (18) ἐργάται ἐργαζόμενοι 10 (8) ὥρας καθ' ἡμέραν θὰ σκάψουν τάφρον μήκους 240 (432) μ.; 15 (12).

Ὅμοις τρίτη. 1) 8 (17) ἐργάται σκάπτουν εἰς 5,4 (8) ἡμ. ἔδαφος 99,36 (134,4) (μ³).· πόσα κυβικά μέτρα θὰ σκάψουν 9 (12) ἐργάται εἰς 6 (9) ἡμ.; 124,2 (106,729...).

2) Τάφρος μήκους 15 (27) μ., πλάτους 2 (1,5) μ. καὶ βάθους 0,75 (0,8) μ. στοιχίζει 337,5 (518,4) δρ.· πόσον μήκος θὰ ἔχη τάφρος πλάτους 2,25(2) μ. καὶ βάθους 0,8 (0,75) μ., ἡ ὁποία στοιχίζει 675 (528) δραχ.; 25 (22).

3) 16 (19) ἐργάται ὑφάνουν 51 (114) μ. ὑφάσματος εἰς 17 (6) ἡμ. ἐργαζόμενοι 9 (8) ὥρ. καθ' ἡμέραν· πόσοι ἐργάται ἐργαζόμενοι 8 (9) ὥρ. καθ' ἡμέραν θὰ ὑφάνουν 57 (189) μ. τοῦ αὐτοῦ ὑφάσματος εἰς 18 (7) ἡμ.; 19 (24).

4) Ἐὰν ἑνὸς βιβλίου καθεμία σελὶς ἔχη 40 (44) στίχους, καὶ καθεὶς στίχος 63 (72) γράμματα, τὸ βιβλίον ἀποτελεῖται ἀπὸ 15 (20) τυπογραφικὰ φύλλα. Ἀπὸ πόσα τυπογραφικὰ φύλλα θ' ἀποτελεῖται τὸ αὐτὸ βιβλίον, ἐὰν καθεμία σελὶς ἔχη 45 (48) στίχους, καὶ καθεὶς στίχος 60 (55) γράμματα; 14(24).

✓ Προβλήματα ὑπολογισμοῦ ποσοστῶν.

§ 90. Ἡ σημασία τοῦ τόσου τοῖς ἑκατόν.—

α') Εἰς τὸν κοινὸν βίον ἀκούομεν συνήθως τὴν φράσιν «ὁ ἔμπορος πωλεῖ τὸ ἐμπόρευμά του μὲ κέρδος 8 τοῖς ἑκατόν» π. χ. Δι' αὐτοῦ ἐννοοῦμεν ὅτι εἰς τὰς ἑκατόν δραχμάς, ὅπου τοῦ στοιχίζει τὸ ἐμπόρευμα, κερδίζει 8 δρ. κατὰ τὴν πώλησίν του. Ἐπομένως ἐξ ἐκείνου τὸ ὅποιον τοῦ στοιχίζει 50 δρ., 25 δρ., 200 δρ... κερδίζει αὐτὰς 4 δρ., 2 δρ., 16 δρ....

Πρόκειται δηλαδή περί δύο ποσών αναλόγων (τιμή αγοράς και κέρδους), και μάλιστα δίδεται το κέρδος, το όποιον αντιστοιχεί εις τιμήν αγοράς 100 δρ.

Ἐν γένει, μεταχειριζόμεθα τὴν ἔκφρασιν «τόσον τοῖς ἑκατόν» καὶ τὴν σημειώσωμεν διὰ τοῦ $\frac{\circ}{\circ}$, ἔταν πρόκειται περί αναλόγων ποσῶν, καὶ δίδεται πόσαι μονάδες τοῦ ἑνὸς ἀντιστοιχοῦν εἰς 100 τοῦ ἄλλου. Κατ' ἀναλογίαν μεταχειριζόμεθα τὴν ἔκφρασιν «τόσον ἐπὶ τοῖς χιλίοις» καὶ τὴν σημειώσωμεν οὕτω $\frac{\circ}{\circ\circ}$, ἐὰν εἰς ἀνάλογα ποσὰ δίδεται πόσαι μονάδες τοῦ ἑνὸς ἀντιστοιχοῦν εἰς 1000 τοῦ ἄλλου.

β') Ἐκ τῶν ἀνωτέρω εἶνε φανερὰ καὶ ἡ σημασία τῶν ἐξῆς ἐκφράσεων.

- 1) Ἐν ἐμπόρευμα θὰ πωληθῆ με ζηνίαν $5 \frac{\circ}{\circ}$ π. χ.
- 2) Ὁ πληθυσμὸς μιᾶς πόλεως ηὔξήθη κατὰ $5 \frac{\circ}{\circ}$.
- 3) Ποσὸν τι ηὔξήθη κατὰ $10 \frac{\circ}{\circ}$ ἑνὸς ἄλλου.
- 4) Ὁ φόρος ἐπὶ τοῦ εἰσοδήματος ἀνέρχεται εἰς $5 \frac{\circ}{\circ}$.
- 5) Μία οἰκία δίδει $5 \frac{\circ}{\circ}$ εἰσόδημα.
- 6) Ἡ θνησιμότης εἶνε $1 \frac{\circ}{\circ\circ}$ κ.ο.κ.

γ') Αἱ ἐπόμεναι ἐκφράσεις εἶνε ἐπίσης ἀξίαι προσοχῆς.

- 1) Συνεβιβάσθη τις με $70 \frac{\circ}{\circ}$, σημαίνει ὅτι ἐπλήρωσε ἀντὶ 100 (δραχμῶν, δκάδων...) μόνον 70.
- 2) Ἐμπορος κάμνει ἔκπτωσιν $5 \frac{\circ}{\circ}$, σημαίνει ὅτι ὁ ἔμπορος δίδει εἰς τὸν ἀγοραστὴν ἐμπόρευμα ἀξίας 100 δρ. ἀντὶ 95 δραχμῶν.
- 3) Τὰ ἐξόδα ἐμπορεύματος ἀνέρχονται εἰς $5 \frac{\circ}{\circ}$, σημαίνει ὅτι ἡ ἀξία τοῦ ἐμπορεύματος 100 δρ. αὐξάνεται ἕνεκα ἐξόδων κατὰ 5 δρ.
- 4) Τὸ ἀπόβαρον εἶνε $3 \frac{\circ}{\circ}$, σημαίνει ὅτι εἰς 100 δκ. μικτὸν βάρος τὸ ἀπόδκρον εἶνε 3 δκ.
- 5) Ὅταν λέγωμεν, ὅτι τὸ οἰνόπνευμα εἶνε καθαρότητος 80° , ἐννοοῦμεν ὅτι τοῦτο δὲν εἶνε καθαρὸν, ἀλλ' ὅτι εἰς 100 μέρη αὐτοῦ μόνον τὰ 80 μέρη εἶνε καθαρὸν οἰνόπνευμα.
- 6) Ὁ βαθμὸς καθαρότητος τοῦ ἀργύρου, χρυσοῦ,... εἶνε 850 χιλιοστά, π. χ. σημαίνει ὅτι ἐκ χιλίων χιλιοστῶν αὐτοῦ μόνον τὰ 850 χιλιοστά εἶνε καθαρὸς ἄργυρος, χρυσός...

δ') Ἐὰν δοθῇ τὸ τόσον τοῖς ἑκατόν, ἢ τοῖς χιλίοις, καὶ εὐρωμεν τὸ πόσον (κέρδος, ζημία π. χ.) ἀντιστοιχεῖ εἰς δοθὲν ποσόν, τὸ ἐξαγόμενον τοῦτο λέγεται συνήθως ποσοστὸν, τὸ δὲ ποσὸν εἰς τὸ ὁποῖον ἀντιστοιχεῖ τὸ ποσοστὸν θὰ καλοῦμεν κυρίαν τιμὴν.

§ 91. Εὗρεσις τοῦ ποσοστοῦ. —

(Πρόβλημα). «Πόσον κερδίζει εἰς ἔμπορος ἐκ τῆς πωλήσεως ἐμπορευμάτων, τὰ ὁποῖα τοῦ στοιχίζουσι 365 δρ., καὶ τὰ πωλεῖ μὲ κέρδος 8 %;»

Εἰς τὸ πρόβλημα τοῦτο δίδεται ἡ κυρία τιμὴ 365 δρ., τὸ τόσον τοῖς ἑκατόν 8 δρ., καὶ ζητεῖται νὰ εὐρωμεν τὸ ποσοστὸν. Δυνάμεθα νὰ λύσωμεν αὐτὸ διὰ τῆς μεθόδου τῶν τριῶν, ἀναχωροῦντες ἐκ τῆς σημασίας τοῦ τόσον τοῖς ἑκατόν. Πράγματι ἔχομεν

$$\begin{array}{r} 100 \text{ δρ. τιμὴ ἀγορᾶς δίδει } 8 \text{ δρ. κέρδος} \\ 365 \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad x \end{array}$$

ἐκ τοῦ ὁποῖου εὐρίσκομεν $x = 8 \text{ δρ.} \times \frac{365}{100} = 29,20 \text{ δρ.}$

Ἦτοι ὁ ἔμπορος θὰ κερδίσῃ 29,20 δρ.

Ἐκ τούτων καὶ ἄλλων ὁμοίων προβλημάτων ἔπεται ὅτι

«διὰ νὰ εὐρωμεν τὸ ποσοστὸν ἐκ τῆς κυρίας τιμῆς καὶ τοῦ τόσον τοῖς ἑκατόν, πολλαπλασιάζομεν τὴν κυρίαν τιμὴν ἐπὶ τὸ τόσον τοῖς ἑκατόν, καὶ τὸ γινόμενον διαιροῦμεν διὰ 100».

Π ρ ο β λ ῆ μ α τ α π ρ ὸ ς λ ὕ σ ι ν .

Ἔστω πρότερον. 1) Νὰ εὐρεθοῦν τὰ ποσοστὰ τῶν 200 δρ., 300 δρ.,

1700 δρ., 385 δρ. πρὸς 1 % , 2 % , 3 % . $\left(\begin{array}{l} 2 \cdot 3 \cdot 17 \cdot 3,85 \\ 4 \cdot 6 \cdot 34 \cdot 7,7 \\ 6 \cdot 9 \cdot 51 \cdot 11,55 \end{array} \right)$

2) Νὰ εὐρεθοῦν τὰ ποσοστὰ τῶν 100 δρ., 627 δρ., 357 δρ.,

12,3 μ. πρὸς $\frac{1}{2}$ % , $1\frac{1}{3}$ % . $\left(\begin{array}{l} 0,5 \\ 1 \frac{1}{3} \end{array} \begin{array}{l} 3,135 \cdot 1,785 \cdot 0,0765 \\ 8,36 \cdot 4,76 \cdot 0,204 \end{array} \right)$

3) Ὅμοιως τῶν 1000 δρ., 1875 δρ., 38645 δρ., 13820 δρ.,

πρὸς 1 % , 2 % , $1\frac{1}{2}$ % . $\left(\begin{array}{l} 1 \cdot 1,875 \cdot 38,645 \cdot 13,82 \\ 2 \cdot 3,75 \cdot 77,29 \cdot 27,64 \\ 1,5 \cdot 2,8125 \cdot 57,9675 \cdot 20,73 \end{array} \right)$

4) Ἐχει τις ἐτήσιον εἰσοδήμα 6428 (8424) δρ., ὀφείλει δὲ νὰ πληρώσῃ φόρον 4 (4,5) % ἐπὶ τοῦ εἰσοδήματος· πόσον φόρον πληρῶνει ἐτησίως; 257,12 (379,08).

5) Έμπορος αγοράζει εμπόρευμα αντί 428 (53165) δρ., πωλεί δ' αυτό με κέρδος 6,5 (6,4) %· πόσον είνε τὸ κέρδος καὶ πόσον τὸ πωλεῖ;

27,82 (3402,56) 455,82 (56567,56).

Όμάς δευτέρα. 1) Αγοράζει τις 35 (14) μ. ύφασματος πρὸς 10,85 (12,12) δρ. τὸ μέτρον, μεταπωλεῖ δ' αὐτὸ με κέρδος 8

($4\frac{1}{6}$) %· πόσα εισπράττει;

410,45 (176,75).

2) Οἱ 125 (45) στ. οἴνου τιμῶνται 8125 (3060) δρ.· πόσον στοιχίζει ὁ στατήρ, ἂν τὰ ἐξοδα εἴνε 2,4 (3,5) %;

66,56 (70,38).

3) Ἐν ποσὸν πρέπει νὰ μετασθῆ μεταξύ δύο προσώπων, ὥστε τὸ β' νὰ λαβῆ 6,4 (7,5) % περισσότερα τοῦ α'· πόσον εἴνε τὸ ποσόν, ἂν τὸ α' ἔλαβε 2315 (851,6) δρ.;

4778,16 (1767,07).

Όμάς τρίτη. 1) Πόσος εἴνε ὁ καθαρὸς ἄργυρος εἰς 817 (324) χιλ. ἄργύρου, ἔχοντος καθαρότητα 0,835 (0,643);

682,495 (208,332).

2) Πόσος εἴνε ὁ καθαρὸς χρυσὸς εἰς χρυσὸν 25,345 (48,124) χιλ. καθαρότητος 0,900 (0,650);

22,8105 (31,2806).

§ 92. Εὗρεσις τῆς κυρίας τιμῆς.—

(Πρόβλημα). «Πόση εἴνε ἡ τιμὴ τῆς ἀγορᾶς ἑνὸς ἐμπορεύματος, τὸ ὁποῖον πωληθὲν με κέρδος 5 % ἔδωκε κέρδος 41,1 δρ.»

Καὶ τὸ πρόβλημα τοῦτο λύομεν διὰ τῆς ἀπλῆς μεθόδου τῶν τριῶν ὡς ἑξῆς.

100 δρ. τιμὴ ἀγορᾶς	5 δρ. κέρδος
x	41,1

Ἐπειδὴ τὰ ποσὰ εἴνε ἀνάλογα, ἔχομεν

$$x = 100 \times \frac{41,1}{5} = 822 \text{ δραχμᾶς.}$$

Προβλήματα πρὸς λύσιν.

Όμάς πρώτη. 1) Πόση εἴνε ἡ κυρία τιμὴ, ἂν τὸ ποσοστὸν πρὸς 5 (4) % εἴνε 85·175·218,34·7821,58·58 $\frac{1}{2}$ · 129,60 δρ.;

1700 (2125)· 3500 (4375)· 4366,8 (5458,5)· 456431,6 (495539,5)· 4170 (462,50)· 2592 (3240).

2) Ποῖου ποσοῦ τὸ ποσοστὸν εἴνε 882 δρ., πρὸς 3·3,5· 4,5·5· 6%;

29400· 25200· 49600· 17640· 14700.

3) Πόσον εἶνε τὸ εἰσοδήμα, τὸ ὅποιον πληρώνει 84 (54) δρ. φόρον πρὸς 3,5 (4,5) % ἐπὶ τοῦ εἰσοδήματος; 2400 (1200).

4) Ἐμπορος πωλεῖ τὰ ἐμπορεύματά του μὲ ζημίαν 5,4 (12,75) %· πόσον τὰ ἠγόρασε, καὶ πόσον τὰ ἐπώλησεν, ἂν ἡ ζημία εἶνε 47,25 (127,5) δρ.; 875 (1000)· 827,75 (872,5).

5) Πόσον ἐστοίχιζε καὶ πόσον ἐπωλήθη ἐμπόρευμα, ἂν τὸ κέρδος του πρὸς 8,5 (12) % ἦτο 38, 25 (210) δρ.; 450· 1750 (188,25) (1960).

6) Βιβλιοπώλης κάμνει ἔκπτωσιν 10 (8) %· πόσον ἀξίζουσι βιβλία διὰ τὰ ὁποῖα ἡ ἔκπτωσις εἶνε 84,5 (32,48) δρ.; 845 (406).

Ομάς δευτέρα. 1) Μιᾶς χώρας τὰ 85 (82) % τοῦ ἐδάφους εἶνε εὐφρα, τὰ δὲ ὑπόλοιπα 1596 (1125) (χμ²) ἄφορα· πόσον % εἶνε ἄφορον, πόση εἶνε ἡ ἔκτασις τῆς χώρας καὶ τοῦ εὐφόρου μέρους τῆς; 15 (18) %· 10640 (6250)· 9044 (5125).

2) Ἐκ τῶν μαθητῶν μιᾶς σχολῆς 322 (344) προήχθησαν, ἐνῶ 8 (14) % ἔμειναν εἰς τὴν αὐτὴν τάξιν· πόσοι τοῖς % προήχθησαν; πόσους μαθητὰς εἶχεν ἡ σχολή; πόσοι μαθηταὶ ἔμειναν εἰς τὴν αὐτὴν τάξιν; 92 (86) %· 350 (400)· 28 (56).

§ 93. Εὗρεσις τοῦ τύπου τοῖς ἑκατόν.—

(Πρόβλημα). «Εἷς ἔμπορος ἀγοράσας ἐν ἐμπόρευμα ἀντὶ 80 δρ. τὸ πωλεῖ μὲ κέρδος 20 δρ. πόσον τοῖς ἑκατόν ἐκέρδιος;»

Πρὸς λύσιν αὐτοῦ ἐφαρμόζομεν τὴν ἀπλὴν μέθοδον τῶν τριῶν καὶ ἔχομεν

80 δρ. τιμὴ ἀγορᾶς	20 δρ. κέρδος
100 »	x

$$x = 20 \times \frac{100}{80} = 25 \text{ δραχμάς.}$$

Προβλήματα πρὸς λύσιν.

1) Πόσον % εἶνε ἡ ἔκπτωσις ἐμπορεύματος, τὸ ὅποιον στοιχίζει 268 (368,75) δρ. καὶ πωλεῖται 8,71 (8,26) δρ. ὀλιγώτερον; 3,25 (2,24).

2) Ὁ φόρος ἐτησίου εἰσοδήματος 8624 (6725) δρ. εἶνε 280,28 (215,2) δρ.· πόσον % πληρώνει; 3,25 (3,2).

3) Ἀγοράζων τις ἐν ἐμπόρευμα ἀντὶ 824,8 (624,4) δρ. τὸ μεταπωλεῖ καὶ κερδίζει 30, 93 (78,05) δρ.· πόσον % κερδίζει; 3,75 (12,5).

4) Έμπορος πωλεί εμπόρευμα, τὸ ὁποῖον ἠγόρασεν ἀντὶ 624,8 (325,5) δρ. μὲ ζημίαν 101,53 (43,4) δρ.· πόσον % ζημιώνεται;
16,25 (13,33...).

5) Διὰ τὴν πώλησιν οἰκίας ἀντὶ 38724 (68524) δρ. λαμβάνει τις 1258,53 (856,55) δρ. ὡς προμήθειαν· πόσον % λαμβάνει; 3,25 (1,25)

6) Εἰς κραμα οἶνοπνεύματος 3645,5 (85,4) λίτρ. περιέχεται μόνον 3208,04 (81,14) λίτρα καθαρὸν οἶνόπνευμα· πόσον % εἶνε τὸ καθαρὸν οἶνόπνευμα;
88 (95,01).

7) Ἀσφαλίζει τις τὴν οἰκίαν του ἀντὶ 454680 (85795) δρ., καὶ πληρώνει δ' ἀσφάλιστρα 1023,03 (171,59) δρ.· πόσον τοῖς χιλίοις εἶνε τὰ ἀσφάλιστρα;
2,25 (2)

8) Πόσον τοῖς ἑκατὸν εἶνε τὸ 4 τοῦ 25; τὸ $2\frac{1}{5}$ τοῦ 20; τὸ 40 τοῦ 500; τὸ 44 τοῦ 400;
 $16\% \cdot 11\% \cdot 8\% \cdot 11\%$.

§ 94. Προβλήματα ἀναγόμενα εἰς τὰ τῶν ποσοστῶν.—

(Πρόβλημα). «Ἐν εμπόρευμα ἀγορασθὲν ἀντὶ 432 δρ., ἐπωλήθη μὲ κέρδος 5%. Πόση εἶνε ἡ τιμὴ τῆς πωλήσεώς του;»

Εἰς τὸ πρόβλημα τοῦτο δίδεται ἡ κυρία τιμὴ καὶ τὸ τόσον τοῖς ἑκατόν, ζητεῖται δὲ νὰ εὑρεθῇ τὸ ἄθροισμα τῆς δοθείσης κυρίας τιμῆς καὶ τοῦ ποσοστοῦ τῆς. Εἶνε φανερὸν ὅτι, διὰ νὰ λύσωμεν τὸ πρόβλημα, ἀρκεῖ νὰ εὑρωμεν τὸ ποσοστὸν τῶν 432 δρ. πρὸς 5%, καὶ τοῦτο νὰ προσθέσωμεν εἰς τὴν κυρίαν τιμὴν.

Ἐὰν ὑποθέσωμεν ὅτι δίδεται τὸ ἄθροισμα τῆς κυρίας τιμῆς καὶ τοῦ ποσοστοῦ τῆς, καθὼς καὶ καὶ ἐν τῶν δύο ἄλλων ποσῶν (κυρίας τιμῆς, τόσον τοῖς ἑκατόν) τοῦ ἀνωτέρω προβλήματος, ζητεῖται δὲ τὸ ἄλλο, θὰ ἔχωμεν τὰ ἐξῆς δύο εἴδη προβλημάτων.

1) Δίδεται τὸ ἄθροισμα τῆς κυρίας τιμῆς καὶ τοῦ ποσοστοῦ τῆς, προσέτι δὲ τὸ τόσον τοῖς ἑκατόν, καὶ ζητεῖται ἡ κυρία τιμὴ.

2) Δίδεται τὸ ἄθροισμα τῆς κυρίας τιμῆς καὶ τοῦ ποσοστοῦ τῆς, προσέτι δὲ ἡ κυρία τιμὴ, καὶ ζητεῖται τὸ τόσον τοῖς ἑκατόν.

Διὰ νὰ γνωρίσωμεν τὸν τρόπον τῆς λύσεως τῶν προβλημάτων τοῦ πρώτου εἴδους 1) ἐκ τούτων, ἔστω τὸ

(Πρόβλημα) 2). « Ἐν ἐμπόρευμα ἐπωλήθη ἀντὶ 453,6 δρ. μὲ κέρδος 5%· πόσον ἐστοίχιζε τὸ ἐμπόρευμα; »

Παρατηροῦμεν ὅτι, ἐμπόρευμα ἀξίας 100 δρ. πωλεῖται 105 δρ., ἀφοῦ τὸ κέρδος εἶνε 5%. Ἐπομένως ἔχομεν πρὸς λύσιν τὸ ἐξῆς πρόβλημα τῆς ἀπλῆς μεθόδου τῶν τριῶν.

$$\begin{array}{r} 100 \text{ δρ. ἀξίας ἀγορᾶς} \\ x \end{array} \quad \begin{array}{r} 105 \text{ δρ. ἀξία καὶ κέρδος} \\ 453,6 \end{array}$$

Ἐπειδὴ τὰ ποσὰ εἶνε ἀνάλογα, ἔχομεν ὅτι

$$x = 100 \times \frac{453,6}{105} = 432 \text{ δραχμᾶς.}$$

Ὅθεν διὰ νὰ εὐρωμεν τὴν κυρίαν τιμὴν ἀπὸ τὸ τόσον τοῖς ἑκατόν, καὶ τὸ ἄθροισμα τῆς κυρίας τιμῆς καὶ τοῦ ποσοστοῦ, προσθέτομεν εἰς τὸ 100 τὸ τόσον τοῖς ἑκατόν, καὶ ἀκολουθῶς λύομεν πρόβλημα τῆς ἀπλῆς μεθόδου τῶν τριῶν.

Τὰ προβλήματα τοῦ δευτέρου εἴδους 2) λύνονται ἐπίσης ἀπλούστατα διὰ τῆς ἀπλῆς μεθόδου τῶν τριῶν.

Προβλήματα πρὸς λύσιν.

1) Πωλεῖ τι ἐμπόρευμα μὲ κέρδος 8,4 (4) % ἀντὶ 785,9 (711,88) δρ.· πόσον ἐστοίχιζε τὸ ἐμπόρευμα; καὶ πόσον εἶνε τὸ κέρδος;— 725 (684,5) 60,9 (27,38).

2) Ἐμπορὸς πωλεῖ ἐμπόρευμα μὲ ζημίαν 9,5 (7) % ἀντὶ 754,77 (2152,95) δρ.· α') πόσον τοῦ ἐστοίχιζε τὸ ἐμπόρευμα;· β') πόσον ἐζημιώθη; 834 (2315)· 79,23 (162,05).

3) Τὸ καθαρὸν βάρος ἐμπορεύματος εἶνε 220,02 (309,075) χιλ.· πόσον εἶνε τὸ μίκτον, ἐὰν τὸ ἀπόβαρον εἶνε 3,5 (2,5) %; 228 (317).

4) Εἰς τινα ἔγινεν ἔκπτωση τοῦ χρέους τοῦ 8,4 (4,5) %, ἐπλήρωσε δ' οὕτω 6270,02 (2070,44) δρ.· πόσον ἦτο τὸ χρέος, καὶ πόση ἡ ἔκπτωση; 6845 (2168).

5) Ἡ περιουσία ἐμπόρου αὐξηθεῖσα κατὰ 3,5 (15) % ἔγινε 4994,91 (18906) δρ.· πόση ἦτο ἀρχικῶς; 4826 (16410).

Περὶ τόκου.

§ 95. Ὅρισμοὶ καὶ ἰδιότητες τοῦ τόκου. —

α') Τόκος λέγεται τὸ κέρδος, τὸ ὁποῖον λαμβάνει ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος δανείζει χρήματα.

Ἐπιτόκιον λέγεται ὁ τόκος τῶν ἑκατὸν δραχμῶν εἰς ἓν ἔτος, ἢ τὸ τόσον τοῖς ἑκατὸν εἰς 1 ἔτος.

Κεφάλαιον λέγεται τὸ ποσὸν τῶν δανειζομένων χρημάτων.

Χρόνος καλεῖται ἡ χρονικὴ διάρκεια κατὰ τὴν ὁποίαν διαρκεῖ τὸ δάνειον.

Ὁ τόκος ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ κεφάλαιον, τὸ ἐπιτόκιον, καὶ τὸν χρόνον.

Ὁ τόκος λέγεται ἀπλοῦς μὲν, ὅταν τὸ κεφάλαιον μένη τὸ αὐτὸ καθ' ἑλὴν τὴν διάρκειαν τοῦ δανείου, σύνθετος δέ, ὅταν ὁ τόκος καθενὸς ἔτους δίδει τόκον εἰς τὰ ἐπόμενα ἔτη, ὥστε εἰς τὸ τέλος καθενὸς ἔτους ὁ τόκος προστίθεται εἰς τὸ κεφάλαιον, καὶ τὸ ἐκ τῆς προσθέσεως προκύπταν ποσὸν λαμβάνεται ὡς κεφάλαιον διὰ τὸ ἐπόμενον ἔτος. Θὰ ἐξετάσωμεν τὸν ἀπλοῦν τόκον.

β') Εἰς προβλήματα τόκου παρουσιάζονται 4 ποσά· τὸ κεφάλαιον, ὁ τόκος, τὸ ἐπιτόκιον, καὶ ὁ χρόνος. Διὰ τὴν γενικότητα θὰ παριστάνωμεν τὰ ποσὰ αὐτὰ κατὰ σειρὰν διὰ τῶν γραμμάτων K, T, E, X. Εἰς καθὲν πρόβλημα τόκου δίδονται συνήθως τρία ἐκ τῶν ποσῶν τούτων, καὶ ζητεῖται τὸ τέταρτον. Ἐπειδὴ δὲ τὸ ζητούμενον δύναται νὰ εἴνε ὁ τόκος, ἢ τὸ κεφάλαιον, ἢ ὁ χρόνος, ἢ τὸ ἐπιτόκιον, ἔπεται ὅτι τὰ προβλήματα τοῦ τόκου εἴνε τεσσάρων εἰδῶν.

Διὰ τὴν λύσιν τῶν προβλημάτων τοῦ τόκου εἴνε ἀνάγκη νὰ γνωρίζωμεν, ἂν τὰ ποσὰ K, T, E, X ἀνὰ δύο συγκρινόμενα εἴνε ἀνάλογα, ἢ ἀντιστρόφως ἀνάλογα.

γ') Ὁ τόκος εἴνε ἀνάλογος πρὸς καθὲν τῶν τριῶν ἄλλων ποσῶν K, E, X.

Πράγματι, ἂν ἓν κεφάλαιον δίδῃ τόκον τινά, τὸ διπλάσιον (ἡμισυ), τριπλάσιον (τὸ τρίτον)... κεφάλαιον θὰ δώσῃ διπλάσιον (ἡμισυ), τριπλάσιον (τὸ τρίτον)... τόκον.

Ὁμοίως, ἂν ἓν κεφάλαιον εἰς χρόνον τινά, π. χ. εἰς 3 ἔτη,

δίδη ἓνα ὠρισμένον τόκον, τὸ αὐτὸ κεφάλαιον θὰ δώσῃ εἰς διπλάσιον (ἥμισυ), τριπλάσιον (τὸ τρίτον)... χρόνον τὸν διπλάσιον (ἥμισυ), τριπλάσιον (τὸ τρίτον)... τόκον. Ἐπίσης: ἐὰν διπλασιάσωμεν, τριπλασιάσωμεν (διαιρέσωμεν διὰ δύο, τρία)... τὸ ἐπιτόκιον, διπλασιάζεται τριπλασιάζεται (διαιρεῖται διὰ δύο, τρία)... καὶ ὁ τόκος, τοῦ κεφαλαίου καὶ τοῦ χρόνου μενόντων ἀμεταβλήτων.

Γ') Τὸ κεφάλαιον καὶ ὁ χρόνος εἶνε ποσὰ ἀντιστρόφως ἀνάλογα. Διότι, ἐὰν ἓν κεφάλαιον π. χ. 1000 δρ., εἰς 2 ἔτη δίδη τόκον τινὰ πρὸς ἓν ἐπιτόκιον, διπλάσιον (τὸ ἥμισυ), τριπλάσιον (τὸ τρίτον).. κεφάλαιον, θανειζόμενον μὲ τὸ αὐτὸ ἐπιτόκιον θὰ δώσῃ τὸν αὐτὸν τόκον, εἰς τὸ ἥμισυ (διπλάσιον), τὸ ἓν τρίτον (τριπλάσιον)... τοῦ χρόνου.

Ἐπειδὴ εἰς τὰ προβλήματα τοῦ τόκου ἔχομεν ποσὰ ἀνάλογα, καὶ ἀντιστρόφως ἀνάλογα, ἔπεται ὅτι ταῦτα λύονται κατὰ τὴν ἀπλήν, ἢ τὴν σύνθετον μέθοδον τῶν τριῶν.

Διὰ τὴν ἀσκήσιν περὶ τὴν σχέσιν τῶν ποσῶν κεφαλαίου, τόκου, ἐπιτοκίου καὶ χρόνου παραθέτομεν τὰ ἑξῆς προβλήματα.

Προβλήματα πρὸς λύσιν.

Ὅμας πρώτη. 1) Κεφάλαιον 252,25 δρ. ὑπὸ ὠρισμένης συνθήκας δίδει 8,25 δρ. τόκον· πόσον τόκον δίδει κεφάλαιον 201,8 δρ. ὑπὸ τὰς αὐτὰς συνθήκας ; 6,6.

2) Ἐν κεφάλαιον φέρει εἰς 2,5(2,75) ἔτη τόκον 8325 (6417) δρ.· πόσον τόκον θὰ δώσῃ τὸ αὐτὸ κεφάλαιον ὑπὸ τὰς αὐτὰς συνθήκας εἰς 4,5 (4, 25) ἔτη; 14985 (9917, 18.).

Ὅμας δευτέρα. 1) Κεφάλαιον 328 (526) δρ. δίδει ἓνα ὠρισμένον τόκον εἰς 4 $\left(6\frac{2}{3}\right)$ ἔτ. καὶ 6 μῆν.· εἰς πόσον χρόνον 369 (2630) δρ. ὑπὸ τὰς αὐτὰς συνθήκας θὰ δώσῃ τὸν αὐτὸν τόκον ; 4 ἔτ. (1 ἔτ. 4 μ.).

2) Κεφάλαιον 3280 (5340) δρ. δίδει τόκον τινὰ εἰς 7 $\left(8\frac{1}{3}\right)$ ἔτη καὶ 6 μῆν.· ποῖον κεφάλαιον ὑπὸ τὰς αὐτὰς συνθήκας θὰ δώσῃ εἰς 6 ἔτ. (14 ἔτ. 10 μ.) τὸν αὐτὸν τόκον; 4100(3000).

3) Κεφάλαιον 3420 (8404) δρ. δίδει τόκον τινὰ πρὸς 4 (5) %· ποῖον κεφάλαιον πρὸς 4,5 (5,5) % δίδει τὸν αὐτὸν τόκον ὑπὸ τὰς αὐτὰς συνθήκας ; 3040(7640).

Όμας τρίτη. 1) Ἐν κεφάλαιον εἰς 3 (2,5) ἔτη, 9 μῆν. φέρει τόκον 148,95 (187,5) δρ. εἰς πόσον χρόνον ὑπὸ τὰς αὐτὰς συνθήκας θὰ φέρῃ τόκον 662 (406,25) δραχ.;

16 (5) ἔτ. 8(5) μ'

Κεφάλαιον 6714 (9327) δρ. δίδει πρὸς 3 $\left(3 \frac{1}{3}\right)^{\circ}/_{0}$ τόκον τινά πρὸς πόσον $\%_{0}$ ὑπὸ τὰς αὐτὰς συνθήκας κεφάλαιον 5035,5 (4352,6) δρ. δίδει τὸν αὐτὸν τόκον;

4 (7,14).

3) Κεφάλαιον δίδει τόκον τινά πρὸς 3,5 (3) $\%_{0}$ εἰς 4,5 (5) ἔτη πρὸς πόσον $\%_{0}$ ὑπὸ τὰς αὐτὰς συνθήκας εἰς 9 (6) ἔτη δίδει τὸν αὐτὸν τόκον;

1 ἔτ. 9 μῆν. (2 ἔτ. 6 μῆν).

§ 96. Εὐρεσις τοῦ τόκου. —

(Πρόβλημα) 1). «Πόσον τόκον φέρουν αἱ 3524 δρ. εἰς 7 ἔτη πρὸς 5 $\%_{0}$;»

Τὸ πρόβλημα τοῦτο λύομεν κατὰ τὴν σύνθετον μέθοδον τῶν τριῶν, ἀναχωροῦντες ἀπὸ τὴν σημασίαν τοῦ ἐπιτοκίου. Ἀφοῦ ἡ ἔκφρασις «πρὸς 5 $\%_{0}$ » σημαίνει ὅτι κεφάλαιον 100 δρ. εἰς 1 ἔτος δίδει τόκον 5 δρ., ἔπεται ὅτι ἔχομεν πρὸς λύσιν τὸ ἐξῆς πρόβλημα

100 δρ. κεφαλ.	εἰς 1 ἔτ.	5 δρ. τόκον
3524	7	x
»		

Ἐπειδὴ ὁ τόκος εἶνε ἀνάλογος πρὸς τὸ κεφάλαιον καὶ τὸν χρόνον, ἔχομεν ὅτι

$$x = 5 \times \frac{3524 \times 7}{100 \times 1} = 1233,5 \text{ δραχ.}$$

(Πρόβλημα) 2) «Πόσον τόκον φέρουν 3250 δρ. πρὸς 3 $\%_{0}$ εἰς 2 ἔτη καὶ 6 μῆν.;»

Ἐν πρώτοις τρέπομεν τὸν συμμιγῆ ἀριθμὸν 2 ἔτ. 6 μῆν. εἰς ἔτη, ὅτε ἔχομεν 2 ἔτ. 6 μῆν. = 2,5 ἔτη. Ἀκολουθῶς λύομεν τὸ πρόβλημα, καθὼς τὸ ἀνωτέρω, καὶ ἔχομεν

100 δρ. κεφάλ.	εἰς 1 ἔτ.	3 δρ. τόκον
3250	» 2,5	x
»		

$$\text{καὶ } x = 3 \times \frac{3250}{100} \times \frac{2,5}{1} = 3 \times \frac{3250}{100} \times \frac{5}{2} = 243,75 \text{ δρ.}$$

6') Διὰ νὰ εὐρωμεν κανόνα συμφώνως πρὸς τὸν ὁποῖον θὰ

δυνάμεια συντόμως νά εὑρίσκωμεν τὸν τόκον, ὅταν δίδωνται τὰ τρία ἄλλα ποσά, παρατηροῦμεν ὅτι, τὸ ἐξαγόμενον τοῦ 1) προβλήματος

$$\frac{5 \times 3524 \times 7}{100}$$

εὑρίσκεται, ἐὰν πολλαπλασιάσωμεν τοὺς ἀριθμοὺς $3524 \times 5 \times 7$ οἱ ὅποιοι παριστάνουν τὸ κεφάλαιον, τὸ ἐπιτόκιον, καὶ τὸν χρόνον, τὸ δὲ γινόμενόν των διαιρέσωμεν διὰ τοῦ 100. Τὰ αὐτὰ παρατηροῦμεν καὶ διὰ τὸ ἐξαγόμενον τοῦ 2) προβλήματος

$$\frac{3250 \times 3 \times 2,5}{100}$$

Ἐκ τούτων συνάγομεν ὅτι·

«διὰ νά εὑρωμεν τὸν τόκον, πολλαπλασιάσωμεν τὸ κεφάλαιον, τὸ ἐπιτόκιον, καὶ τὸν χρόνον (εἰς ἔτη), τὸ δὲ γινόμενον διαιροῦμεν διὰ τοῦ 100».

Ἐὰν, χάριν γενικότητος, μεταχειρισθῶμεν τὰ K, E, T, X πρὸς παράστασιν τοῦ κεφαλαίου, ἐπιτοκίου, τόκου, καὶ χρόνου (εἰς ἔτη), θὰ ἔχωμεν τὸν τύπον

$$T = \frac{K \times E \times X}{100} \quad (1)$$

εἰς τὸν ὅποιον θ' ἀντικαθίστῶμεν τὰ K, E, X διὰ τῶν δεδομένων τιμῶν των, διὰ νά εὑρωμεν τὸν τόκον.

Ἐφαρμογή. «Πόσον τόκον δίδουν 2255 δρ. πρὸς 4 % εἰς 7 μῆνας;»

Ἐπειδὴ οἱ 7 μῆν. = $\frac{7}{12}$ ἔτη, θὰ ἔχωμεν $K = 2255$, $E = 4$,

$X = \frac{7}{12}$ Ἐπομένως

$$T = \frac{2255 \times 4}{100} \times \frac{7}{12} = 52,62 \text{ δρ.}$$

γ') Ἐὰν ὁ χρόνος εἶνε μῆνες, καὶ παραστήσωμεν αὐτοὺς διὰ τοῦ M, ἐπειδὴ ὁ 1 μῆν εἶνε τὸ $\frac{1}{12}$ τοῦ ἔτους, οἱ M μῆνες θὰ εἶνε $\frac{M}{12}$ τοῦ ἔτους. Ἄρα ὁ ἀνωτέρω τύπος (1) γίνεται, ἐὰν ἀντὶ τοῦ X θέσωμεν τὸ $\frac{M}{12}$,

$$T = \frac{K \times E \times M}{1200}$$

Ἐὰν δὲ ὁ χρόνος εἶνε ἡμέραι, καὶ παραστήσωμεν αὐτὸν διὰ

τοῦ Η, ἐπειδὴ ἡ ἡμέρα εἶνε τὸ $\frac{1}{360}$ τοῦ ἔτους (τοῦ ἔτους λογαριαζομένου μὲ 360 ἡμέρας), αἱ Η ἡμέραι εἶνε $\frac{H}{360}$ ἔτη. Ἐὰν ἀντικαταστήσωμεν εἰς τὸν ἀνωτέρω τύπον (1) ἀντὶ τοῦ X τὸ $\frac{H}{360}$ λαμβάνομεν $T = \frac{K \times E \times H}{36000}$.

Γ') Διαιροῦντες ἀριθμητὴν καὶ παρονομαστὴν τοῦ κλάσματος τούτου διὰ τοῦ ἐπιτοκίου E, λαμβάνομεν

$$T = \frac{K \times H}{\frac{36000}{E}} \quad \text{ἢ} \quad T = \frac{K \times H}{\Delta}$$

ἐὰν διὰ τοῦ Δ παραστήσωμεν τὸ πηλίκον $\frac{36000}{E}$.

Τὸ γινόμενον $K \times H$, τοῦ κεφαλαίου ἐπὶ τὰς ἡμέρας, λέγεται τοκάρριθμος τοῦ κεφαλαίου, τὸ Δ, ἦτοι τὸ πηλίκον τῆς διαιρέσεως τοῦ 36000 διὰ τοῦ ἐπιτοκίου, καλεῖται σταθερὸς διαιρέτης τοῦ ἐπιτοκίου.

Ὅθεν ἔχομεν τὸν ἑξῆς κανόνα διὰ τὴν εὕρεσιν τοῦ τόκου.

«Διὰ νὰ εὕρωμεν τὸν τόκον ἐνὸς κεφαλαίου δι' ἕνα ἀριθμὸν ἡμερῶν, διαιροῦμεν τὸν τοκάρριθμον τοῦ κεφαλαίου διὰ τοῦ σταθεροῦ διαιρέτου τοῦ ἐπιτοκίου».

Ὅστω π. χ. ὁ τόκος 4800 δρα. εἰς 75 ἡμέρας πρὸς 8 % εἶνε

$$\frac{4800 \times 75}{4500} = 80 \text{ δραχμαί.}$$

Διότι ὁ σταθερὸς διαιρέτης τοῦ ἐπιτοκίου εἶνε ἐδῶ $36000 : 8 = 4500$.

ε') Καλὸν εἶνε νὰ γνωρίζομεν ἀπὸ μνήμης τοὺς σταθεροὺς διαιρέτας μερικῶν ἐπιτοκίων. Διὰ τοῦτο παραθέτομεν τὸν κατωτέρω πίνακα σταθερῶν διαιρέτων, οἱ ὁποῖοι ἀντιστοιχοῦν εἰς τὰ ἀπέναντί των ἐπιτόκια.

Ἐπιτόκια	σταθεροὶ διαιρέται
3	(36000 : 3) 12000
4	(36000 : 4) 9000
4,5	(36000 : 4,5) 8000
5 7200
6 6000
7 5143
7,5 4800
8 4500
9 4000.

Προβλήματα πρὸς λύσιν.

Ὅμας πρώτη. 1) Νὰ εὑρεθῇ ὁ τόκος τῶν 200· 500· 600, 2000· 7125· 238· 534· 6824 δρχ. πρὸς 3 % εἰς 5 ἔτη.

50· 75· 90· 300· 1068,75· 35,7· 80,1· 1023,6.

√2) Νὰ εὑρεθῇ ὁ τόκος τῶν 4848 δρ. εἰς 5 ἔτη πρὸς 2 %, 2,5 %, 3,5 %, 4,5 %.

484,8· 606· 848,4· 1090,8.

√3) Πόσον τόκον φέρουν 4820 δρ. πρὸς 4 % εἰς 2· 2,25· 3· 4,75· 5· 6 ἔτη;

385,6· 433,8· 578,4· 915,8· 964· 1156,8.

√4) Νὰ εὑρεθῇ ὁ ἐλικὸς τόκος 4800 (5000) δρ. εἰς 75 (90) ἡμ· 5600 (3000) δρ. εἰς 45 (70) ἡμ· 8400 δρ. εἰς 35 ἡμ. πρὸς 8 (9 %) (διὰ τῶν τοκαριθμῶν).

201,33.. (165).

√5) Ποσον τόκον φέρουν α') 482,75 (5331) δρ. πρὸς 4 % εἰς 2 $\frac{1}{3}$ ($1 \frac{1}{6}$) ἔτη (διὰ τῶν τοκαριθμῶν).

45,06 προσέγγισις ἑκατοστοῦ· (248,78).

Ὅμας δευτέρα. 1) *Εὰν ἀφήσῃ τις εἰς τὸ ταμειυτήριον 3824 (768,4) δρ. ἐπὶ 3 (2) ἔτη πρὸς 4,25 (3,75) %, πόσα θὰ λάβῃ ἐν ἔλω εἰς τὸ τέλος;

4311,56 (826,03).

2) *Ἐδάνεισέ τις 564,8 (7611) δρ. πρὸς 3,75 (4) %· πόσα θὰ λάβῃ ἐν ἔλω μετὰ 2 (4) ἔτη (καὶ 7 μῆνας);

607,16 (9006,35).

√3) *Ὁφειλέ τις νὰ πληρώσῃ πρὸ 4 (2) ἔτ. 2 (8) μην. 121,7 (123,1) δρ· πόσα θὰ πληρώσῃ σήμερον. ἐὰν τοῦ λογαριασθῇ καὶ τόκος πρὸς 2,4 (3,75) %;

133,87 (135,41).

√4) Ὅμας τρίτη. 1) Πόσον τόκον φέρουν α') 382,5 (625,8) δρ. πρὸς 4 (4,5) % εἰς 4 (3) ἔτη 6 (4) μην.;

68,85 (93,87).

√2) Πόσον τόκον φέρουν 31440 δρ. πρὸς 3,75 % εἰς 2 ἔτη 5 μῆνας 12 ἡμέρας;

2888,55.

√3) Πόσος εἶνε ὁ τόκος 2144 (8600) δρ. πρὸς 3,75 (4,5) % ἀπὸ 1 (2) Μαΐου (Μαρτίου) μέχρι 15 (25) Ἰουνίου (*Ἀπριλίου) τοῦ αὐτοῦ ἔτους;

10,05 (58,05).

√4) Ὁφείλει τις νὰ πληρώσῃ σήμερον 7128 (7116) δρ., καὶ συμφωνεῖ νὰ τὰ πληρώσῃ μετὰ 5 $\frac{3}{4}$ ($4 \frac{2}{3}$) ἔτ. μὲ τόκον πρὸς 4,5 (4,5) %· πόσα θὰ πληρώσῃ;

8972,37 (8610,36).

§ 97. Εύρεσις τοῦ κεφαλαίου.—

(Πρόβλημα). «Ποῖον κεφάλαιον τοκίζομεν πρὸς 4% ἐπὶ 6 ἔτη φέρει τόκον 204 δρ.;»

Τὸ πρόβλημα τοῦτο λύομεν κατὰ τὴν σύνθετον μέθοδον τῶν τριῶν λέγοντες

$$\begin{array}{rcc} 100 \text{ δρ. κεφάλ.} & \text{εἰς 1 ἔτ.} & 4 \text{ δρ. τόκον} \\ x & \text{»} & 6 & 204 \end{array}$$

Ἐπειδὴ τὸ κεφάλαιον καὶ ὁ χρόνος εἶνε πρὸς ἀντιστρόφως ἀνάλογα, τὸ δὲ κεφάλαιον καὶ ὁ τόκος ἀνάλογα, θὰ ἔχωμεν ὅτι

$$x = \frac{100 \times 204}{4 \times 6} = 850 \text{ δρ.}$$

Τὸ ἐξαγόμενον αὐτὸ δυνάμεθα νὰ εὐρωμεν ἀμέσως, ἐὰν πολλαπλασιάσωμεν τὸν ἀριθμὸν, ὁ ὁποῖος παριστάνει τὸν τόκον, ἤτοι τὸν 204 ἐπὶ 100, καὶ τὸ γινόμενον διαιρέσωμεν διὰ τοῦ γινομένου τῶν ἀριθμῶν 4 καὶ 6, οἱ ὁποῖοι παριστάνουσι τὸ ἐπιτόκιον καὶ τὸν χρόνον.

Ἢθελον «διὰ νὰ εὐρωμεν τὸ κεφάλαιον πολλαπλασιάσωμεν τὸν τόκον ἐπὶ 100, τὸ δὲ γινόμενον αὐτὸ διαιροῦμεν διὰ τοῦ ἐπιτοκίου ἐπὶ τὸν χρόνον (εἰς ἔτη)».

Ἐὰν, χάριν γενικότητος, μεταχειρισθῶμεν τὰ K, E, X, T πρὸς παράστασιν τοῦ κεφαλαίου, ἐπιτοκίου, χρόνου, καὶ τόκου, θὰ ἔχωμεν τὸν τύπον

$$K = \frac{T \times 100}{E \times X}$$

εἰς τὸν ὁποῖον θ' ἀντικαθιστῶμεν τὰ T, E, X διὰ τῶν δεδομένων ἀριθμῶν, διὰ νὰ εὐρωμεν τὸ κεφάλαιον.

Ἐφαρμογή. «Πόσον κεφάλαιον τοκισθὲν ἐπὶ 3 ἔτη καὶ 6 μῆν. πρὸς 5% ἔδωκεν τόκον 357 δρ.;»

Ἐπειδὴ 3 ἔτη καὶ 6 μῆνες = 3,5 ἔτη, θὰ ἔχωμεν $T=357, E=5, X=3,5$. Ἐπομένως $K = \frac{357 \times 100}{5 \times 3,5} = \frac{35700}{17,5} = \frac{35700 \times 2}{35} = 2040 \text{ δρ.}$

Προβλήματα πρὸς λύσιν.

Ἢμᾶς πρώτῃ. 1) Ποῖον κεφάλαιον τοκίζομενον πρὸς 4% εἰς 3 ἔτη δίδει τόκον 381·462·3185, 1·56, 25·869,7·41,58 δρ.;
3175·3850·26542,5·468,75·7247,5·346,5.

Κ2) Ποῖον κεφάλαιον τοκισθὲν πρὸς 5% ἔδωκε τόκον 357 δρ. εἰς 3·3,5·3,75·4·4,25·5 ἔτη; 2380·2040·1904·1785·1680·1428.

3) Ποῖον κεφάλαιον τοκίζομενον πρὸς 2%·2,5%·3%·3,5%·3,75%·4%·4,5%·5% ἐπὶ 4 ἔτη δίδει τόκον 252 δρ.;
3150·2520·2100·1800·1680·1575·1400·1260.

Ὁμὰς δευτέρα. 1) Κ¹ Ἐξοδεύει τις 12,5 (13,25) δρ. καθ' ἡμέραν, τὰ ὅποια εἶνε ὁ τόκος τῶν χρημάτων του, τοκισμένων πρὸς 4,5 (3,5)⁰/₁₀₀· πόσον εἶνε τὸ κεφάλαιόν του; 100000 (136285,71..).

Κ²) Ποῖον κεφάλαιον φέρει εἰς 5 (5) ἔτη πρὸς 4,5 (5,6)⁰/₁₀₀ τὸν αὐτὸν τόκον, τὸν ὅποιον φέρουν 4812 (8417) δρ. πρὸς 5 (4)⁰/₁₀₀ εἰς 6 (7) ἔτη; 6416 (8416,85..).

Κ³ Ὁμὰς τρίτη. 1) Ποῖον κεφάλαιον, τοκιζόμενον πρὸς 2,75 (4,5)⁰/₁₀₀ ἐπὶ 5 ἔτ. 8 μ. (3 ἔτ. 8 μ.) δίδει τόκον 1365,1 (5,61) δρ.; 8760 (34).

Κ²) Πόσον κεφάλαιον, τοκιζόμενον πρὸς 5,5 (4,2)⁰/₁₀₀ ἐπὶ 2 (3) ἔτ. 3 (6) μῆν. 10 (20) ἡμ., δίδει τόκον 7667 (728) δρ.; 61200 (4875).

Κ³) Ποῖον κεφάλαιον, τοκιζόμενον ἐπὶ 6 μῆν. 9 ἡμ. (1 ἔτ. 1,5 μῆν.) πρὸς 7,5 (4)⁰/₁₀₀, δίδει τόκον 598,5 (384,3) δρ.; 15200 (8540).

§ 98. Εὗρεσις τοῦ χρόνου. —

(Πρόβλημα). « Ἐπὶ πόσον χρόνον κεφάλαιον 648 δρ. τοκισθὲν πρὸς 4⁰/₁₀₀ φέρει τόκον 77,76 δρ.; »

Καὶ τὸ πρόβλημα αὐτὸ λύομεν ὡς ἑξῆς διὰ τῆς συνθέτου μεθόδου τῶν τριῶν.

Κεφάλαιον	100 δρ.	εἰς 1	ἔτ. φέρει τόκον	4 δρ.
	648	» x »		77,76

Ἐπειδὴ ὁ χρόνος καὶ τὸ κεφάλαιον εἶνε ποσὰ ἀντιστρόφως ἀνάλογα ὁ δὲ τόκος καὶ ὁ χρόνος ἀνάλογα, ἔχομεν ὅτι

$$x = \frac{1 \times 100 \times 77,76}{648 \times 4} = 3 \text{ ἔτη.}$$

Παρατηροῦμεν τώρα ὅτι τὸ ἐξαγόμενον τοῦτο εὐρίσκομεν ἀμέσως, ἂν πολλαπλασιάσωμεν τὸν ἀριθμὸν 77,76, ὁ ὅποιος παριστάνει τὸν τόκον, ἐπὶ 100, καὶ τὸ γινόμενον διαιρέσωμεν διὰ τοῦ γινομένου τοῦ 648, ὁ ὅποιος παριστάνει τὸ κεφάλαιον, ἐπὶ τὸν 4, ὁ ὅποιος παριστάνει τὸν ἐπιτόκιον.

Ὅθεν « διὰ νὰ εὗρωμεν τὸν χρόνον, πολλαπλασιάζομεν τὸν τόκον ἐπὶ 100, τὸ δὲ γινόμενον αὐτὸ διαιροῦμεν διὰ τοῦ κεφαλαίου ἐπὶ τὸ ἐπιτόκιον ».

Ἐὰν μεταχειρισθῶμεν τὰ Κ, Ε, Χ, Τ πρὸς παράστασιν τοῦ κεφαλαίου, ἐπιτοκίου, χρόνου, καὶ τόκου, θὰ ἔχωμεν τὸν τύπον

$$X = \frac{T \times 100}{K \times E}$$

εις τὸν ὁποῖον ἐὰν ἀντικαταστήσωμεν τὰ T , K , E διὰ τῶν τιμῶν τῶν εὐρίσκομεν τὸν χρόνον (εις ἔτη).

Ἐφαρμογή. «*Εἰς πόσον χρόνον κεφάλαιον 900 δρ. τοκισθὲν πρὸς 4⁰/₁₀₀ ἔδωκε τόκον 36 δρ.*»

Ἐχομεν $K=900$, $E=4$, $T=36$. Ἐπομένως $X = \frac{36 \times 100}{900 \times 4} = \frac{36}{90} = 1$ ἔτος.

Προβλήματα πρὸς λύσιν.

Ὁμάς πρώτη. 1) Εἰς πόσον χρόνον κεφάλαιον 900 δρ. πρὸς 4⁰/₁₀₀ τοκισθόμενον φέρει τόκον 36· 45· 54· 57· 72· 87· 94, 5 δρ.;

1 ἔτ. · 1 ἔτ. 3 μ. · 1 ἔτ. 6 μ. · 1 ἔτ. 7 μ. · 2 ἔτ. · 2 ἔτ. 5 μ. · 2 ἔτ. 7 μ. 15 ἡμ.

2) Ἐπὶ πόσον χρόνον πρὸς 5⁰/₁₀₀ τοκισθόμενον φέρει τόκον 144 δρ. κεφάλαιον 96 δρ. 86,4 δρ., 72 δρ., 87,6· 43,2 δρ.;

30 ἔτ. · 33 ἔτ. 4 μ. · 40 ἔτ. · 50 ἔτ. · 66 ἔτ. 8 μ.

3) Ἐπὶ πόσον χρόνον πρέπει νὰ τοκίσωμεν 6414 (7416) δρ. πρὸς 4,5 (3,5)⁰/₁₀₀ διὰ νὰ λάβωμεν τόκον 481,05 (735,42) δρ.;

1 (2) ἔτ. 8 (10) μῆν.

4) Ἐπὶ πόσον χρόνον πρέπει νὰ μείνη τοκισθόμενον κεφάλαιον 30400 (36480) δρ. πρὸς 3,75 (7,5)⁰/₁₀₀, διὰ νὰ φέρῃ τόκον 598,5 (1641,6) δρ.;

6 (7) μ. 9 (6) ἡμ.

Ὁμάς δευτέρα. 1) Κεφάλαιον 4228 (8634) δραχ. τοκισθὲν πρὸς 3 $\frac{1}{2}$ (4,5)⁰/₁₀₀ ἔγινε μὲ τὸν τόκον του 4775,76 (10317,63) δρ. ἐπὶ πόσον χρόνον ἐτοκίσθη;

3 (4) ἔτ. 8 (4) μῆν. 12 ἡμ.

2) Εἰς πόσον χρόνον κεφάλαιον 997,2 (2817) δρ. τοκισθόμενον πρὸς 5 (4)⁰/₁₀₀ γίνεται 1011,05 (2867,08) δρ.;

3 (5) μ. 10 (10) ἡμ.

3) Πόσον χρόνον κεφάλαιον 1 δραχ. μένον τοκισθόμενον πρὸς 3⁰/₁₀₀; 4⁰/₁₀₀; 5⁰/₁₀₀ γίνεται (μετὰ τοῦ τόκου του) διπλάσιον; Πότε θὰ συμβῇ τοῦτο, ἂν τὸ κεφάλαιον εἶνε οἴονδήποτε;

33 ἔτη 4 μῆν. 25 ἔτη 20 ἔτη.

4) Εἰς πόσον χρόνον κεφάλαιον 4250 (1808,8) δρ. φέρει πρὸς 6 (5)⁰/₁₀₀ τὸν αὐτὸν τόκον, τὸν ὁποῖον φέρουν 3825 (5814) δρ. πρὸς

5 (4)⁰/₁₀₀ εἰς 4 $\left(2\frac{1}{3} \right)$ ἔτη;

3 μῆν. 18 ἡμ. (6) ἔτη.

§ 99. Εύρεσις τοῦ ἐπιτοκίου.—

(Πρόβλημα) «Κεφάλαιον 455 δρ. φέρει εἰς 3 ἔτη τόκον 54,6 δρ. πρὸς πόσον τοῖς ἑκατὸν ἐτοκίσθη;»

Εἰς τὸ πρόβλημα αὐτὸ ζητεῖται τὸ ἐπιτόκιον, τὸ λύομεν δὲ κατὰ τὴν σύνθετον μέθοδον τῶν τριῶν λέγοντες,

κεφάλαιον 455 δρ. εἰς 3 ἔτη φέρει τόκον 54,6 δρ.
 » 100 » » 1 » x

Ἐπειδὴ ὁ τόκος εἶνε ἀνάλογος πρὸς τὸ κεφάλαιον καὶ τὸν χρόνον θὰ ἔχωμεν

$$x = \frac{54,6 \times 100 \times 1}{455 \times 3} = 4 \text{ δρ.}$$

Καθ' ὅμοιον τρόπον δυνάμεθα νὰ λύσωμεν οἰονδήποτε πρόβλημα ὅμοιον πρὸς αὐτὸ, καθὼς δὲ βλέπομεν, «διὰ νὰ εὕρωμεν τὸ ἐπιτόκιον πολλαπλασιάζομεν τὸν τόκον ἐπὶ 100, τὸ δὲ γινόμενον αὐτὸ διαιροῦμεν διὰ τοῦ κεφαλαίου ἐπὶ τὸν χρόνον (εἰς ἔτη)».

Ἦτοι θὰ ἔχωμεν τὸν τύπον

$$E = \frac{T \times 100}{K \times X}$$

εἰς τὸν ὁποῖον ἀντικαθιστῶντες τὰς δοθείσας τιμὰς ἀντὶ τῶν T, K, X εὕρισκομεν τὸ ἐπιτόκιον.

Ἐφαρμογή. «Πρὸς πόσον τοῖς ἑκατὸν ἐτοκίσθη κεφάλαιον 75 δρ. ἐπὶ 4 ἔτη καὶ ἔδωκε τόκον 12 δρ.»

Ἐδῶ ἔχομεν T=12, K=75, X=4. Ἐπομένως $E = \frac{12 \times 100}{75 \times 4} = \frac{1200}{300} = 4$. Ἄρα τὸ ἐπιτόκιον ἦτο 4 δρ.

Προβλήματα πρὸς λύσιν.

Ἄμας πρώτη. 1) Πρὸς ποῖον ἐπιτόκιον κεφάλαιον 180 δρ. φέρει εἰς 3 ἔτη τόκον 10,8· 16,2· 18,9· 20,25· 21,6· 24,39· 22,68 δρ.;
 2· 3· 3,5· 3,75· 4· 4,51· 4,2 δρ.

2) Κεφάλαιον 75· 60· 50· 100· 90· 37,5 δρ. φέρει εἰς 4 ἔτη τόκον 12 δρ. πρὸς πόσον τοῖς % ἐτοκίσθη; 4· 5· 6· 3· 3 $\frac{1}{3}$ · 8%.

3) Διμεθάνει τις ἀπὸ κεφάλαιον 3808 (7242) δρ. τοκισθὲν ἐπὶ 3,5 $\left(4\frac{1}{3}\right)$ ἔτη, τόκον 699,72 (1412,19) δρ. πρὸς πόσον τοῖς % ἐτοκίσθη; 5,25 (4,5).

Ὅμας δευτέρα. 1) Κεφάλαιον 7845 (6145) δρ. ηὐξήθη εἰς 1(1) ἔτ. 5 (8) μην. 18 (12) ἡμ. καὶ ἔγινεν 8305,24 (6771,79) δρ. πρὸς ποῖον ἐπιτόκιον ἐτοκίσθη; 4(6).

2) Πρὸ 6 (7) μην. 18 (15) ἡμ. ἔπρεπε νὰ πληρωθῇ χρέος 3860 (598) δρ., καὶ πληρώνεται σήμερον μὲ τὸν τόκον του μὲ 3987,38 (612,35) δρ. πρὸς ποῖον ἐπιτόκιον ἐλογαριάσθη ὁ τόκος; 6 (3,83..).

3) Πρὸς πόσον τοῖς $\frac{0}{100}$ πρέπει νὰ τοκισθῇ κεφάλαιον 5826 (6125) δρ., διὰ νὰ γίνῃ μετὰ 23 (17) ἔτη μὲ τὸν τόκον του 11185,92 (11331,25) δρ.; 4 (5).

4) Πρὸς πόσον τοῖς $\frac{0}{100}$ πρέπει νὰ τοκισθῇ 1 δρ., ὥστε μετὰ τῶν τῆς εἰς 10· 15· 20 ἔτη νὰ διπλασιασθῇ;

10· 6 ἔτ. 8 μ. 5 (καὶ οἷονδήποτε κεφάλαιον).

Ὅμας τρίτη. 1) Πρὸς πόσον τοῖς $\frac{0}{100}$ κεφάλαιον 4780 (15396) δρ. εἰς 2,5 (5) ἔτη φέρει τόκον, ὅσον 3824 (6415) δρ. πρὸς 5 (3) $\frac{0}{100}$ εἰς 3 (C) ἔτη; 4,8 (1,5).

2) Πρὸς πόσον τοῖς $\frac{0}{100}$ πρέπει νὰ τοκισθῇ ἓν κεφάλαιον, ὥστε εἰς 10 (15) ἔτ. νὰ τριπλασιασθῇ (ἑπταπλασιασθῇ); 20 (40).

3) Ἔχει τις δύο κεφάλαια· τὸ ἓν 9856 δρ., καὶ τὸ ἄλλο 7864 δρ. Τὸ α' εἶνε τοκιομένον πρὸς 5 $\frac{0}{100}$. Πρὸς πόσον τοῖς $\frac{0}{100}$ πρέπει νὰ τοκίσῃ τὸ β', διὰ νὰ ἔχῃ ἐν ἑλω ἐτήσιον τόκον 807,36 δρ.; 4.

§ 100. Προβλήματα ὑπαγόμενα εἰς τὰ τοῦ τόκου.—

(Πρόβλημα 1). «Εἰς τοκίζει κεφάλαιον 526 δρ. πρὸς 5 $\frac{0}{100}$ πόσα χρήματα θὰ λάβῃ ἐν ἑλω μετὰ 3 ἔτη;»

Εἰς τὸ πρόβλημα τοῦτο δίδεται τὸ κεφάλαιον, τὸ ἐπιτόκιον καὶ ὁ χρόνος, ζητεῖται δὲ τὸ ἄθροισμα τοῦ κεφαλαίου, καὶ τοῦ τόκου του. Εἶνε φανερόν, ὅτι πρὸς λύσιν αὐτοῦ ἀρκεῖ νὰ εὕρωμεν τὸν τόκον, ὁ ὅποιος εἶνε 78,9 δρ., καὶ νὰ τὸν προσθέσωμεν εἰς τὸ δοθὲν κεφάλαιον, ὅτε εὕρισκομεν 604,9 δρ.

Ἐὰν ὑποθέσωμεν ὅτι δίδεται τὸ ἄθροισμα τοῦ κεφαλαίου καὶ τοῦ τόκου του, καὶ δύο ἐκ τῶν τριῶν δεδομένων τοῦ προηγουμένου προβλήματος (κεφαλαίου, ἐπιτοκίου, χρόνου), ζητεῖται δὲ τὸ τρίτον ἐξ αὐτῶν, θὰ ἔχωμεν τὰ ἐξῆς τρία εἶδη προβλημάτων.

α') Δίδεται τὸ κεφάλαιον, τὸ ἐπιτόκιον, καὶ τὸ ἄθροισμα τοῦ κεφαλαίου καὶ τοῦ τόκου του ζητεῖται δὲ ὁ χρόνος.

β') Δίδεται τὸ κεφάλαιον, ὁ χρόνος, καὶ τὸ ἄθροισμα τοῦ κεφαλαίου καὶ τοῦ τόκου του, ζητεῖται δὲ τὸ ἐπιτόκιον.

γ') Δίδεται τὸ ἄθροισμα τοῦ κεφαλαίου καὶ τοῦ τόκου, τὸ ἐπιτόκιον, καὶ ὁ χρόνος, ζητεῖται δὲ τὸ κεφάλαιον.

Ἐκ τούτων τὰ δύο πρῶτα εἶδη λύονται εὐκόλως (καθὼς εἶδομεν εἰς προηγούμενα πρὸς λύσιν προβλήματα).

Ἐστω τώρα πρὸς λύσιν τὸ (Πρόβλημα) 2). «Ποῖον κεφάλαιον τοκισθὲν πρὸς 5% ἐπὶ 3 ἔτη γίνεται μετὰ τοῦ τόκου 604,9 δρ.»

Πρὸς λύσιν παρατηροῦμεν ὅτι, ἀφοῦ αἱ 100 δρ. εἰς 1 ἔτος φέρουν τόκον 5 δρ., εἰς 3 ἔτη φέρουν 15 δρ. Ἐπομένως γίνονται μετὰ τὸν τόκον των εἰς 3 ἔτ., 115 δρ. Οὕτω λύομεν τὸ πρόβλημα διὰ τῆς ἀπλῆς μεθόδου τῶν τριῶν λέγοντες,

$$\begin{array}{r} 100 \text{ δρ. κεφ. γίνονται } 115 \text{ δρ. μετὰ τὸν τόκον των} \\ x \qquad \qquad \qquad 604,9 \end{array}$$

ἐκ τοῦ ὁποίου εὐρίσκομεν ὅτι $x = 100 \times \frac{604,9}{115} = 526$ δρ: Ὡστε τὸ κεφάλαιον ἦτο 526 δραχμαί.

Ἀσκήσεις. 1) Ὅφειλει τις νὰ πληρώσῃ μετὰ 3 (8) ἔτη 416,30 (32045,32) δρ., συμφωνεῖ δὲ νὰ πληρώσῃ σήμερον πόσον θὰ πληρώσῃ ἂν ὁ τόκος λογαριάζεται πρὸς 5 (3)% ; 362 (25843).

2) Ποῖον κεφάλαιον τοκίζομεν ἐπὶ 2 (4) μῆν. πρὸς 4 (5)% γίνε-
ται μετὰ τοῦ τόκου του 730,84 (329,40) δρ ; 726 (324).

Περὶ ὑφαιρέσεως.

§ 101. Ὅρισμοί.—

α') Ὑφαίρεσις λέγεται τὸ πρῶτον, τὸ ὁποῖον ἀφαιρεῖται ἀπὸ ἓν χρέος, ὅταν τὸ χρέος αὐτὸ πληρώνεται πρὸ τῆς διορίας του.

Οὕτω, ἐὰν χρέος 416,30 δρ. πληρωθῇ 3 ἔτη πρὸ τῆς διορίας του ἀντὶ 326 δραχμῶν, ἡ διαφορά 416,30—326 = 90,30 δρ. λέγεται ὑφαίρεσις.

β') Ὁ δανειζὼν χρήματα λαμβάνει συνήθως ἀπὸ τὸν δανειζόμενον ἓν ἔγγραφον διὰ τοῦ ὁποῖου ἐνυπογράφως ὑπόσχεται ὁ δανειζόμενος, ὅτι θέλει πληρώσει κατὰ τὴν ἡμέραν τῆς λήξεως

τοῦ δανείου τὸ ποσόν, τὸ ὅποιον ἐδανείσθη. Τὸ ἔγγραφον αὐτὸ λέγεται *γραμμάτιον*, ἢ *συναλλαγματικὴ**, τὸ εἰς αὐτὸ ἀναφερόμενον ποσὸν *ονομαστικὴ ἀξία* τοῦ γραμματίου, ἢ δὲ ἐποχὴ κατὰ τὴν ὁποίαν θέλει πληρωθῆ ἢ ἀξία αὐτὴ *λήξις* τοῦ γραμματίου.

Ἐὰν ὁ κάτοχος ἐνὸς γραμματίου θελήσῃ νὰ τὸ πωλήσῃ πρὸ τῆς λήξεως του, ἐπειδὴ ἡ *ονομαστικὴ ἀξία* τοῦ γραμματίου πληρώνεται πρὸ τῆς διορίας τῆς, ἐλαττώνεται αὕτη κατὰ τὴν ὑφαίρεσιν.

γ') Ὁ χρόνος ὁ ὅποιος παρέρχεται ἀπὸ τὴν ἐποχὴν κατὰ τὴν ὁποίαν πωλεῖται ἐν γραμμάτιον πρὸ τῆς λήξεώς του μέχρι τῆς λήξεώς του καλεῖται *χρόνος τῆς προεξοφλήσεως* τοῦ γραμματίου, τὸ δὲ ποσὸν ἀντὶ τοῦ ὁποίου προεξοφλεῖται τὸ γραμμάτιον *παροῦσα ἀξία* τοῦ γραμματίου. Ἡ *παροῦσα ἀξία* διαφέρει τῆς *ονομαστικῆς* κατὰ τὴν ὑφαίρεσιν.

Ἐχομεν δύο εἰδῶν ὑφαίρεσιν, τὴν *ἐξωτερικὴν*, καὶ τὴν *ἐσωτερικὴν*.

§ 102. Ὑφαίρεσις ἐξωτερικὴ.—

α') Ἡ *ἐξωτερικὴ ὑφαίρεσις*, ἢ ἀπλῶς *ὑφαίρεσις*, εἶνε ὁ τόκος τῆς *ονομαστικῆς ἀξίας* τοῦ γραμματίου διὰ τὸν χρόνον τῆς *προεξοφλήσεως* μὲ ὀρισμένον ἐπιτόκιον.

Εἰς τὰ προβλήματα τῆς *ἐξωτερικῆς ὑφαίρεσεως* παρεμβαίνουν τὰ ἐξῆς τέσσαρα ποσά: ἡ *ονομαστικὴ ἀξία* τοῦ γραμματίου, ὁ *χρόνος*, τὸ *ἐπιτόκιον*, καὶ ἡ *ὑφαίρεσις*, τὰ δὲ προβλήματα εἰς τὰ ὁποῖα ζητεῖται ἐν ἀπὸ αὐτά, ὅταν δοθοῦν τὰ ἄλλα τρία, δὲν διαφέρουν ἀπὸ τὰ τέσσαρα προβλήματα τοῦ τόκου. Ἐπομένως «τὰ προβλήματα τῆς *ἐξωτερικῆς ὑφαίρεσεως* δὲν διαφέρουν καθόλου ἀπὸ τὰ προβλήματα τοῦ τόκου, εἰμὴ μόνον καθότι τὸ κεφάλαιον θὰ εἶνε ἡ *ονομαστικὴ ἀξία* τοῦ γραμματίου, ὁ δὲ τόκος ἡ *ἐξωτερικὴ ὑφαίρεσις*».

β') Εἰς τὰ προβλήματα τῆς *ἐξωτερικῆς ὑφαίρεσεως* ὑπάγονται καὶ ἐκεῖνα, εἰς τὰ ὁποῖα δίδεται ἡ *παροῦσα ἀξία* τοῦ γραμματίου τὸ *ἐπιτόκιον*, καὶ ὁ *χρόνος*, ζητεῖται δὲ ἡ *ονομαστικὴ ἀξία*, καὶ ἡ *ὑφαίρεσις* τοῦ γραμματίου. Διὰ νὰ γνωρίσωμεν τὴν λύσιν τῶν προβλημάτων τούτων, ἔστω τὸ

* Ἡ *συναλλαγματικὴ* εἶνε ἔγγραφον διὰ τοῦ ὁποίου ὁ δανείζων διατάσσει τὸν εἰς ἄλλην ἢ εἰς τὴν αὐτὴν πόλιν διαμένοντα χρεώστην του νὰ πληρώσῃ εἰς ἐποχὴν ὀρισμένην, καὶ εἰς διαταγὴν ὀρισμένου προσώπου τὸ σημειούμενον εἰς αὐτὴν ποσόν.

Τὰ ἔγγραφα αὐτὰ συντάσσονται ἐπὶ χαρτοσήμου, τοῦ ὁποίου ἡ ἀξία ὀρίζεται ὑπὸ τοῦ Νόμου.

(Πρόβλημα). «Ποία εἶνε ἡ ὀνομαστικὴ ἀξία γραμματίου, τὸ ὁποῦ-
 ὄν ἐξωφλήθη 3 μῆν. πρὸ τῆς λήξεώς του πρὸς 8% ἀντὶ 3699,50
 δρ.»

Ἐν πρώτοις εὐρίσκομεν ὅτι αἱ 100 δρ. εἰς 3 μῆν. πρὸς 8%
 φέρουν τόκον 2 δρ. Ἐπομένως ὀνομαστικὴ ἀξία 100 δρ. θὰ ἔχη παροῦ-
 σαν 98 δρ. διὰ τὴν προεξόφλησιν 3 μῆν. πρὸ τῆς λήξεως πρὸς 8%.
 Ὄστε θὰ ἔχωμεν νὰ λύσωμεν τὸ ἐξῆς πρόβλημα τῆς μεθόδου τῶν τριῶν

100 δρ. ὀνομ. ἀξία ἔχουν	98 δρ. παροῦσαν
x	3699,50

ἐκ τοῦ ὁποῦ εὐρίσκομεν $x = \frac{100 \times 3699,50}{98} = 3775,46$ δρ. περίπου.

Ὄστε ἡ ὀνομαστικὴ ἀξία τοῦ γραμματίου εἶνε 3775,46 δρ.

Διὰ νὰ εὐρωμεν τὴν ὑφαίρεσιν, ἀρκεῖ ν' ἀφαιρέσωμεν τὴν παροῦσαν
 ἀξίαν ἀπὸ τὴν ὀνομαστικὴν, ὅτε προκύπτει 75,96 δραχ.

ΥΠΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΡὸς ΛΥΣΙΝ. 1) Ὄφειλει τις νὰ πληρώσῃ μετὰ 2 (3) μῆν.
 χρέος 730,86 (1640) δρ. πόσα θὰ πληρώσῃ σήμερον, ἐὰν τοῦ γίνῃ
 ἔκπτωσις 4 (10)%; 725,9876 (ὑφ 41).

2) Χρέος 108,78 (522,69) δρ. εἶνε πληρωτέον μετὰ 1 μῆν. 10 ἡμ.
 πόση θὰ εἶνε ἡ ὑφαίρεσις, καὶ πόσα θὰ πληρώσῃ ὁ ὀφειλέτης, ἐὰν ἐξο-
 φλήσῃ τὸ χρέος του σήμερον πρὸς 6,5 (8,5)%; ὑφαίρεσις περίπου 0,79 (4,94).

3) Συμφώνως πρὸς διαθήκην ἔχει τις νὰ λάβῃ μετὰ 8 (6) ἔτη
 ποσὸν 32045,32 (23399,75) δρ. πόσα θὰ λάβῃ σήμερον, ἐὰν τοῦ
 γίνῃ ἔκπτωσις 3 (4,5)%; περίπου 7690,87 (6317,93) ὑφ.

4) Ποίαν ἀξίαν ἔχει σήμερον χρέος 781,61 (219,38) δρ. πληρω-
 τέον μετὰ 3 μῆν. 18 (20) ἡμ., ἐὰν ἡ ὑφαίρεσις γίνῃ πρὸς 4,5
 (6,5)%; περίπου 771,06 (218,59).

4) Γραμμάτιον 2450 δρ. λήγον μετὰ 65 ἡμ., δεύτερον 3200 δρ.
 λήγον μετὰ 80 ἡμ. καὶ ἄλλο 2740 δρ. λήγον μετὰ 3 μῆν. ἀντικαθί-
 στανται δι' ἐνὸς 8400 δρ. ποία εἶνε ἡ λήξις τούτου, τοῦ ἐπιτοκίου
 ὄντος 8%;

Λύσις. Εὐρίσκομεν τὴν παροῦσαν ἀξίαν καθενὸς τῶν γραμματίων, καὶ προσθέτομεν
 αὐτά, τὸ δὲ ἄθροισμα ἀφαιρούμεν ἀπὸ τὸ 8400. Ἡ διαφορὰ αὕτη παριστάνει τὴν
 ὑφαίρεσιν τοῦ γραμματίου 8400 δρ. πρὸς 8% εἰς τὸν ζητούμενον χρόνον, ἐκ τούτων
 δι' εὐρίσκομεν αὐτὸν.

✓ 6) Πόση είνε ἡ ὀνομαστικὴ ἀξία γραμματίου ἐξοφληθέντος 4 μῆν (24 ἡμ.) πρὸ τῆς λήξεώς του πρὸς 9 (6) % ἀντὶ 834,2(3386,6) δρ.;
860 (3400).

7) Γραμμάτιον 1800 δρ. λήγει μετὰ 40 ἡμ., 6' 1240 ερ. μετὰ 63 ἡμ., καὶ γ' 2500 δρ. μετὰ 115 ἡμ. Ἄν ἀντικατασταθοῦν 5' ἐνὸς γραμματίου, λήγοντος μετὰ 3 μῆνας, ποία θὰ είνε ἡ ὀνομαστικὴ ἀξία τοῦ κοινοῦ γραμματίου, ἐὰν τὸ ἐπιτόκιον είνε 4 %;

Λύσις. Εὐρίσκομεν τὴν παροῦσαν ἀξίαν τῶν δοθέντων γραμματίων, καὶ τὸ ἄθροισμὰ των δίδει τὴν παροῦσαν ἀξίαν τοῦ κοινοῦ γραμματίου. Ἀκολουθῶς λέγομεν, 100 δρ. ὀνομ. ἀξία ἔχει παροῦσαν 99 δρ. κλπ. Διότι αἱ 100 εἰς 3 μ. πρὸς 4% δίδουν 1 δρ. τόκον.

§ 103. Ὑφαίρεσις ἐσωτερικῆ. —

α) Ἡ ἐσωτερικὴ ὑφαίρεσις είνε ὁ τόκος τῆς παρούσης ἀξίας τοῦ γραμματίου διὰ τὸν χρόνον, ὃ ὁποῖος θὰ περάσῃ ἀπὸ τὴν ἡμέραν τῆς προεξοφλήσεως μέχρι τῆς λήξεώς του.

Διὰ νὰ γνωρίσωμεν πῶς εὐρίσκεται ἡ ἐσωτερικὴ ὑφαίρεσις, ἔστω τὸ (Πρόβλημα) 1) «Γραμμάτιον 416, 30 δρ. προεξοφλεῖται 3 ἔτη πρὸ τῆς λήξεώς του πρὸς 5 %· πόση είνε ἡ ἐσωτερικὴ ὑφαίρεσις;».

Κατὰ τὸν ὀρισμὸν τῆς ἐσωτερικῆς ὑφαίρεσεως τὸ ἄθροισμα τῆς παρουσίας ἀξίας, καὶ τῆς ἐσωτερικῆς ὑφαίρεσεως τοῦ γραμματίου είνε ἴσον μὲ τὴν ὀνομαστικὴν ἀξίαν του. Ἐπομένως, πρὸς εὑρεσιν τῆς ἐσωτερικῆς ὑφαίρεσεως καὶ τῆς παρουσίας ἀξίας τοῦ γραμματίου ἔχομεν νὰ λύσωμεν πρόβλημα ὁμοιον μὲ τὸ εἰς τὴν § 100. Πρόβλημα 2).

Κατὰ ταῦτα εὐρίσκομεν τὸν τόκον τῶν 100 δρ. εἰς 3 ἔτη πρὸς 5 % ὅτε ἔχομεν 15 δρ. Ἀκολουθῶς παρατηροῦμεν ὅτι, ἐὰν εἶχομεν γραμμάτιον 115 δρ., καὶ προεξοφλεῖτο 3 ἔτ. πρὸ τῆς λήξεώς του πρὸς 5%, θὰ εἶχεν ἐσωτερικὴν ὑφαίρεσιν 15 δρ. Ὡστε ἔχομεν τώρα τὸ ἐξῆς πρόβλημα τῆς μεθόδου τῶν τριῶν.

115 δρ. ὀνομ. ἀξία ἔχει	15 δρ. ἐσωτ. ὑφ.
416,30 » » »	x » »

ἐκ τοῦ ὁποῖου εὐρίσκομεν ὅτι $x = 15 \times \frac{416,30}{115} = 54,30$ δρ.

Ἦτοι ἡ ἐσωτερικὴ ὑφαίρεσις είνε 54,30 δρ.

Πρὸς εὑρεσιν τῆς παρουσίας ἀξίας δυνάμεθα νὰ λύσωμεν ὁμοιον πρόβλημα τῆς μεθόδου τῶν τριῶν, παρατηροῦντες ὅτι

115 δρ. ὄνομ. ἀξία ἔχουν 100 δρ. παροῦσαν, ἢ μετὰ τὴν εὑρεσιν τῆς ἐσωτερικῆς ὑφαιρέσεως ἀφαιροῦμεν αὐτὴν ἀπὸ τὴν ὀνομαστικὴν ἀξίαν τοῦ γραμματίου, ὅτε προκύπτει 36% δρ.

6) Εἰς τὰ προβλήματα τῆς ἐσωτερικῆς ὑφαιρέσεως παρεμβάδινουν τὰ ἐξῆς 4 ποσά· ἢ ὀνομαστικὴ ἀξία τοῦ γραμματίου, ὁ χρόνος, τὸ ἐπιτόκιον καὶ ἢ ἐσωτερικὴ ὑφαίρεσις, ζητεῖται δὲ ἐν ἓκ τούτων, ὅταν δοθοῦν τὰ τρία ἄλλα. Ἐκ τῶν τεσσάρων τούτων προβλημάτων τὸ ἐν ἐλύσαμεν ἀνωτέρω, τὰ δὲ λοιπὰ τρία δὲν διαφέρουν καθόλου τῶν προβλημάτων τοῦ τόκου, εἰμὴ μόνον καθότι ὡς κεφάλαιον θὰ λαμβάνεται ἢ παροῦσα ἀξία, καὶ ὡς τόκος ἢ ἐσωτερικὴ ὑφαίρεσις τοῦ γραμματίου.

Ἀσκήσεις. 1) Γραμμάτιον 1200 (1640) δρ. προεξοφλεῖται 3 (3) μῆν. πρὸ τῆς λήξεώς του πρὸ 8 (10) %· νὰ εὑρεθῇ ἢ ἐσωτερικὴ ὑφαίρεσις καὶ ἢ παροῦσα ἀξία του. 23,53·1176,47 (40·1600).

√2) Τοῦ αὐτοῦ γραμματίου νὰ εὑρεθῇ ἢ ἐξωτερικὴ ὑφαίρεσις καὶ ἀκολουθῶς νὰ δειχθῇ ὅτι, ἢ διαφορά τῶν δύο ὑφαιρέσεων εἶνε ὁ τόκος τῆς ἐσωτερικῆς πρὸς τὸ δοθὲν ἐπιτόκιον καὶ εἰς τὸν δοθέντα χρόνον.

√3) Ὅταν ἐνὸς γραμματίου εὔρωμεν τὴν ἐσωτερικὴν ὑφαίρεσιν καὶ γνωρίζωμεν τὸν χρόνον, καὶ τὸ ἐπιτόκιον, πῶς δυνάμεθα, νὰ εὔρωμεν ἐκ τῶν τριῶν αὐτῶν τὴν ἐξωτερικὴν ὑφαίρεσιν;

Ἀύσις. Ἡ ἐξωτερικὴ ὑφαίρεσις ἴσεται μὲ τὴν ἐσωτερικὴν, προστιθεμένου καὶ τοῦ τόκου τῆς.

√4) Ποῖα τῶν δύο ὑφαιρέσεων εἶνε μεγαλυτέρα καὶ διατί;

5) Νὰ λυθοῦν τὰ προβλήματα πρὸς λύσιν τῆς προηγουμένης παραγράφου (σελ. 189—190) δι' ἐσωτερικῆς ὑφαιρέσεως.

Προβλήματα μίξεως.

§ 104. α') Εἰς τὰ προβλήματα μίξεως, ὑπάγονται καὶ ἐκεῖνα εἰς τὰ ὅποια δίδεται ἢ τιμὴ τῆς μονάδος τοῦ μίγματος, ζητεῖται δὲ ἢ τιμὴ τῆς μονάδος ἐνὸς τῶν ἀναμιγνυομένων πραγμάτων. Ἐστω τοιοῦτον τὸ ἐξῆς.

(Πρόβλημα) «Διὰ νὰ σχηματίσωμεν κρᾶμα οἴνου ἀξίας 8 δρ. κατ' ὀκᾶν, ἀναμιγνύομεν 12 ὀκ. οἴνου τῶν 7,5 δρ., 16,5 ὀκ.

οίνου τῶν 6 δρ., καὶ 32 ὀκ. τῶν 9,5 δρ., πρὸς δὲ 9 ὀκ. ἀγνώστου ἀξίας πόσον ἐτιμάτο ἢ ὀκᾶ τοῦ τελευταίου οἴνου;

Πρὸς λύσιν τοῦ προβλήματος εὐρίσκομεν τὴν τιμὴν δλοκλήρου τοῦ κράματος $12 \text{ ὀκ.} + 16,5 \text{ ὀκ.} + 32 \text{ ὀκ.} + 9 \text{ ὀκ.} = 69,5 \text{ ὀκ.}$ πρὸς 8 δρ. τὴν ὀκᾶν. Ἦτοι $8 \text{ δρ.} \times 69,5 = 556 \text{ δρ.}$ Ἀπὸ τὴν τιμὴν αὐτὴν ἀφαιροῦμεν τὴν τιμὴν τῶν τοιῶν πρώτων δοθέντων εἰδῶν τοῦ οἴνου, τῶν ὁποίων γνωρίζομεν τὴν τιμὴν τῆς μιᾶς μονάδος, ὅτε εὐρίσκομεν

$$7,5 \text{ δρ.} \times 12 = 90 \text{ δρ.}$$

$$6 \text{ δρ.} \times 16,5 = 99 \text{ δρ.}$$

$$9,5 \text{ δρ.} \times 32 = 304 \text{ δρ.}$$

$$493 \text{ δρ., καὶ } 556 - 493 = 63 \text{ δρ.}$$

Ἐπειδὴ τὸ 63 δρ. παριστάνει τὴν τιμὴν τῶν 9 ὀκ. τοῦ οἴνου, ἔπεται ὅτι ἡ τιμὴ τῆς μιᾶς ὀκᾶς τούτου θὰ εἶνε 63 δρ.: $9 = 7 \text{ δρ.}$

Ἀσκήσεις.

1) Οἴνοπώλης ἀνέμιξε 450 (100) ὀκ. οἴνου τῶν 4,9 (8) δρ. κατ' ὀκᾶν, 250 (200) ὀκ. τῶν 6 (7,5) δρ., καὶ 12 (500) ὀκ. οἴνο-
πνεύματος τῶν 15 (7,2) δρ.. Πόσον θὰ πωλῆ τὴν ὀκᾶν τοῦ κρά-
ματος καὶ πόσον ἂν κερδίξῃ 2 (1,125) δρ. κατ' ὀκᾶν;

$$5,45 \dots 7,45 \dots (7,375 \cdot 8,5).$$

2) Ἀνέμιξέ τις 1500 (2400) ὀκ. οἴνου τῶν 9 (6) δρ., 450
(1800) ὀκ. τῶν 6,5 (4) δρ., καὶ 250 (300) ὀκ. ὕδατος (πρὸς 0 τὴν
ὀκᾶν). Ποῖα εἶνε ἡ τιμὴ τῆς μονάδος τοῦ κράματος καὶ τίς με κέρδος
12 %;

$$7,456 \dots \text{ περίπου } 8,35 (4,8 \cdot 5,376).$$

3) Συνεχωνεύθησαν 230 (250) γραμ. ἀργύρου καθαρότητος
0,875 (0,830) μετὰ 140 (180) γρ. καθαρότητος 0,9 (0,9) καὶ 75
(320) γρ. καθαρότητος $\frac{5}{6}$ (0,875). Ποῖος ὁ βαθμὸς καθαρότητος τοῦ
κράματος;

$$0,875 \dots (0,866).$$

4) Συνεχωνεύθησαν 15 γραμ. ἀργύρου καθαρότητος 0,900 μετὰ
23 γραμ. ἄλλου ἀργύρου. Ποῖος ὁ βαθμὸς καθαρότητος τοῦ τελευταίου,
ἐὰν ὁ τοῦ κράματος εἶνε 0,827;

$$9,779 \dots$$

5) Ἐπώλησέ τις ποσὸν ἐλαίου τριῶν ποιοτήτων ἡ τιμὴ τῆς ὀκᾶς
τῆς α' ποιότητος ἦτο 11,5 δρ., τῆς β' 12,8 δρ., καὶ τῆς γ'

13 δρ. Ἐκ τῆς β' ἐπώλησε τριπλασίαν ποσότητα τῆς α', ἐκ δὲ τῆς γ' ὅσον ἐκ τῆς α' καὶ β' ὁμοῦ· ποία εἶνε ἡ τιμὴ τοῦ κράματος;

12,7375.

6') Ἄλλο εἶδος προβλημάτων μίξεως εἶνε ἐκεῖνα εἰς τὰ ὁποῖα δίδονται αἱ τιμαὶ καθεμιᾶς μονάδος δύο πραγμάτων, καὶ ζητεῖται πόσον θὰ λάβωμεν ἀπὸ καθέν, διὰ νὰ σχηματίσωμεν μίγμῃ ὠρισμένον, καὶ τοῦ ὁποῖου ἡ μονὰς νὰ ἔχῃ δεδομένην τιμὴν, κειμένην μεταξὺ τῶν τιμῶν τῶν μονάδων τῶν πραγμάτων, τὰ ὁποῖα πρόκειται ν' ἀναμιξώμεν.

Διὰ νὰ γνωρίσωμεν τὴν λύσιν τῶν τοιούτων προβλημάτων, ἔστω τὸ (Πρόβλημα) 1). «Οἶνοπώλης ἔχει οἶνον δύο εἰδῶν· τοῦ πρώτου εἶδους ἡ ὀκτὰ ἀξίζει 4,5 δρ., τοῦ δευτέρου 8 δρ. θέλει νὰ σχηματίσῃ ἐξ αὐτῶν μίγμῃ 1600 ὀκ., τοῦ ὁποῖου ἡ ὀκτὰ ν' ἀξίξῃ 6 δρ. πόσον θὰ λάβῃ ἀπὸ καθέν εἶδος ;»

Διὰ νὰ λύσωμεν τὸ πρόβλημα τοῦτο, παρατηροῦμεν ὅτι, μίᾳ ὀκτὰ τοῦ πρώτου εἶδους ἐπωλεῖτο χωριστὰ 4,5 δρ., τώρα δὲ εἰς τὸ μίγμῃ εὐρισκομένη θὰ πωλῆται 6 δρ. ὥστε ἀπὸ καθεμίαν ὀκτὰν τοῦ πρώτου θὰ κερδίξῃ ὁ οἶνοπώλης 6 δρ. — 4,5 δρ. = 1,5 δρ. Ἀλλὰ πάλιν θὰ ζημιώνεται ἀπὸ καθεμίαν ὀκτὰν τοῦ δευτέρου εἶδους 2 δρ. Διότι χωριστὰ ἐπωλεῖτο 8 δρ. καὶ τώρα εἰς τὸ μίγμῃ 6 δρ. Λοιπὸν 1 ὀκτὰ τοῦ α' εἶδους δίδει κέρδος 1,5 δρ. 1 ὀκτὰ τοῦ β' εἶδους ζημίαν 2 δρ. Ἄρα ἂν μὲν βάλῃ ἐκ τοῦ α' εἶδους 2 ὀκ., θὰ κερδίσῃ $1,5 \times 2$ δρ., ἂν δὲ ἐκ τοῦ δευτέρου εἶδους βάλῃ 1,5 ὀκ. θὰ χάσῃ $2 \times 1,5$ δρ. Ἐκ τούτου συμπεραίνομεν ὅτι, οὔτε κέρδος θὰ ἔχῃ οὔτε ζημίαν, ἂν ἀναμιξῇ 2 ὀκ. ἐκ τοῦ α' εἶδους καὶ 1,5 ὀκ. ἐκ τοῦ β'. Ὡστε ἂν ἤθελε νὰ κάμῃ μίγμῃ 3,5 ὀκ., ἔπρεπε νὰ λάβῃ 2 ὀκ. ἐκ τοῦ πρώτου, καὶ 1,5 ἐκ τοῦ δευτέρου. Ἐπειδὴ δὲ θέλει νὰ κάμῃ μίγμῃ 1600 ὀκ., διὰ νὰ εὕρωμεν πόσον θὰ βάλῃ ἐκ τοῦ πρώτου, λύομεν τὸ ἐξῆς πρόβλημα τῆς μεθόδου τῶν τριῶν.

	3,5 ὀκ. μίγμῃ θέτει	2 ὀκ. ἐκ τοῦ α'	
»	1600	»	x »

ἐκ τῆς λύσεως τοῦ ὁποῖου εὐρίσκομεν ὅτι ὁ $x = 2 \times \frac{1600}{3,5} = 914 \frac{2}{7}$ ὀκ.

Διὰ νὰ εὕρωμεν πόσας δακάδας θὰ βάλῃ ἐκ τοῦ β' εἴδους ἐργαζόμεθα ὁμοίως, λύοντες τὸ πρόβλημα,

$$\begin{array}{rcc} \text{εἰς } 3,5 \text{ δκ. μίγμα θέτει } 1,5 \text{ δκ. τοῦ β'} & & \\ \text{» } 1600 & \text{»} & \text{ } x \text{ »} \end{array}$$

ὅτε εὕρισκομεν $x = 1,5 \times \frac{1600}{3,5} = 625 \frac{5}{7}$ δκ.

Ἡ καὶ ἄλλως ἀφαιροῦμεν ἀπὸ τὰς 1600 δκ. τοῦ μίγματος τὰς $914 \frac{2}{7}$ δκ., τὰς ὁποίας θὰ βάλῃ ἐκ τοῦ α' εἴδους.

(Πρόβλημα 2). «Ἐχομεν δύο ὄγκους ἀργύρου καὶ τοῦ μὲν πρώτου ὁ βαθμὸς καθαρότητος εἶνε 0,935 τοῦ δὲ δευτέρου 0,880 πόσον πρέπει νὰ λάβωμεν ἀπὸ καθέν τῶν εἰδῶν διὰ νὰ σχηματίσωμεν 5 δράμια ἀργύρου, ἔχοντος βαθμὸν καθαρότητος 0,900;»

Πρὸς λύσιν τούτου παρατηροῦμεν ὅτι καθεμίᾳ μὲν μονάῃ τοῦ πρώτου εἴδους εἰσάγει εἰς τὸ κράμα 0,035 ἀργύρου περισσότερον τοῦ ἀπαιτουμένου. Διότι τὸ κράμα πρέπει νὰ ἔχῃ βαθμὸν καθαρότητος 0,900 καθεμίᾳ δὲ μονάῃ τοῦ δευτέρου εἰσάγει εἰς τὸ κράμα 0,020 ἀργύρου ὀλιγώτερον τοῦ ἀπαιτουμένου. Ὡστε ἀπὸ καθεμίαν μὲν μονάδα τοῦ α' εἴδους περισσεύει ἄργυρος 0,035 τῆς μονάδος, ἀπὸ καθεμίαν δὲ τοῦ β' εἴδους λείπει ἄργυρος 0,020 τῆς μονάδος.

Ἐὰν λοιπὸν βάλωμεν 20 δράμια ἐκ τοῦ α' εἴδους, θὰ περισσεύῃ ἄργυρος $0,035 \times 20$ δράμια, ἐὰν δὲ βάλωμεν 35 δράμια ἐκ τοῦ β' εἴδους, θὰ λείψῃ ἄργυρος $0,020 \times 35$ δράμια. Ἐπειδὴ δὲ εἶνε $0,035 \times 20 = 0,020 \times 35$, ἔπεται ὅτι, ἂν βάλωμεν 20 δράμια ἐκ τοῦ α' καὶ 35 δράμια ἐκ τοῦ β' εἴδους ὅσος ἄργυρος περισσεύει ἐκ τοῦ α', τόσος λείπει ἐκ τοῦ β'. Ἐπομένως, τὸ κράμα οὔτε περισσότερο οὔτε ὀλιγώτερον τοῦ ἀπαιτουμένου ἀργύρου θὰ ἔχῃ.

Ἄν λοιπὸν ἠθέλωμεν νὰ κάμωμεν κράμα 55 δραμίων, ἔπρεπε νὰ βάλωμεν 20 δρμ. ἐκ τοῦ α' εἴδους, καὶ 35 δρ. ἐκ τοῦ β'. Διὰ νὰ εὕρωμεν πόσον θὰ βάλωμεν ἐκ τοῦ α' εἴδους, διὰ νὰ κάμωμεν κράμα 5 δρμ. λύομεν τὸ ἐξῆς πρόβλημα τῆς μεθόδου τῶν τριῶν.

$$\begin{array}{rcc} \text{Εἰς } 55 \text{ δρ. κράμα θέτομεν} & & \text{20 δρμ. α' εἴδους} \\ 5 & \text{»} & x \end{array}$$

ἐκ τῆς λύσεως τοῦ ὁποίου εὐρίσκομεν $x = 20 \times \frac{5}{55} = 1 \frac{9}{11}$ δρμ.

Ἐκ τοῦ β' εἴδους θὰ βάλωμεν $5 - 1 \frac{9}{11} = 3 \frac{2}{11}$ δρμ.

(Πρόβλημα) 3). «Ἐμπορος θέλει ν' ἀναμίξη 180 ὀκ. καφέ, τοῦ ὁποίου ἡ ὀκᾶ τιμᾶται 32 δρ. μὲ καφέ ἄλλης ποιότητος, τοῦ ὁποίου ἡ ὀκᾶ τιμᾶται 37 δρ. πόσας ὀκάδας πρέπει νὰ λάβῃ ἐκ τῆς δευτέρας ποιότητος, διὰ νὰ τιμᾶται ἡ ὀκᾶ τοῦ μίγματος 35 δρ.»

Διὰ νὰ λύσωμεν τὸ πρόβλημα τοῦτο, παρατηροῦμεν ὅτι

ἀπὸ 1 ὀκ. τοῦ α' εἴδους κερδίζει 3 δρ.

ἀπὸ 1 ὀκ. τοῦ β' εἴδους χάνει 2 δρ.

Ἄρα, ἂν λάβῃ ἐκ τοῦ α' εἴδους 2 ὀκ., θὰ κερδίσῃ 3×2 δρ. ἂν βάλῃ ἐκ τοῦ β' εἴδους 3 ὀκ., θὰ χάσῃ 2×3 δρ. ἦτοι οὔτε κερδίζει οὔτε χάνει. Ὡστε, ἂν ἐκ τοῦ α' εἴδους βάλῃ 2 ὀκ., πρέπει νὰ βάλῃ 3 ὀκ. ἐκ τοῦ β' εἴδους. Διὰ νὰ εὑρωμεν πόσας ὀκ. πρέπει νὰ βάλῃ ἐκ τῆς δευτέρας ποιότητος, λύομεν τὸ ἐξῆς πρόβλημα τῆς μεθόδου τῶν τριῶν.

Εἰς 2 ὀκ. τοῦ α' εἴδους θέτομεν 3 ὀκ. τοῦ β'

» 180

»

» x

»

ἐκ τοῦ ὁποίου εὐρίσκομεν $x = 3 \times \frac{180}{2} = 270$ ὀκ.

Προβλήματα πρὸς λύσιν.

1) Ἐἰς οἰνοπώλης ἔχει οἶνον τῶν 8 (12,5) δραχ. καὶ τῶν 4,5 (10,2) δραχ. τὴν ὀκᾶν, καὶ θέλει νὰ κάμῃ ἐξ αὐτῶν κραμά 2800 (840,75) ὀκ., τοῦ ὁποίου ἡ ὀκᾶ νὰ τιμᾶται 5,4 (11,5) δραχ. πόσας ὀκάδας πρέπει νὰ βάλῃ ἀπὸ καθὲν εἶδος;

Ἐκ τοῦ α' 720 (475 ὀκ. $82 \frac{14}{23}$ δρμ.)

2) Κατὰ ποίαν ἀναλογίαν θὰ ἀναμίξωμεν σίτον (καφέ) ἀξίας 3,5 (37) δρ. τὴν ὀκᾶν μὲ ἄλλον (180 ὀκ.) ἀξίας 2,4 (32) δρ. τὴν ὀκᾶν διὰ νὰ σχηματίσωμεν μίγμα ἀξίας 3 (35) δρ. τὴν ὀκᾶν;

Εἰς 6 ὀκ. τοῦ α' θὰ βάλωμεν 5 τοῦ β' (270).

3) Κατὰ ποίαν ἀναλογίαν πρέπει νὰ ἀναμίξωμεν οἰνόπνευμα τῶν 8 (9,5) δρ. τὴν ὀκᾶν μὲ ὕδωρ (ἄλλο τῶν 8 δρ.) διὰ νὰ τιμᾶται ἡ ὀκᾶ τοῦ κραμάτος 5 (8,4) δρ.;

Ἄνὰ 5 ὀκ. οἰνοπν. θὰ θέσωμεν 3 ὀκ. ὕδατος (εἰς 4 τοῦ α' 11 τοῦ β').

4) Πόσον χαλκόν (ὑδρ) πρέπει νά συγχωνεύσωμεν με 5 δρμ. (40 γρμ.) ἀργύρου (οἰνοπνεύματος) καθαρότητος 0,990° (90°), ὥστε νά λάβωμεν κράμα καθαρότητος 0,850° (75°); $\frac{5}{17}$ (8).

5) Ἐμπορος ἔχει δύο ποιότητας ζαχάρως· τῆς α' ἢ ὀκτὰ τιμᾶται 15 δρ., τῆς δὲ β' 13 δρ. καὶ θέλει νά κάμη μίγμα ἐξ αὐτῶν 2500 ὀκ., τὸ ὅποιον νά πωλῆ πρὸς 14,8 δρ. τὴν ὀκάν, καὶ νά κερδίσῃ 10% ἐπὶ τῆς ἀξίας τοῦ μίγματος· πόσας ὀκάδας πρέπει νά βάλλῃ ἀπὸ καθέν εἶδος; Ἐκ τοῦ α' 568 $\frac{2}{11}$.

Περὶ μερισμοῦ εἰς μέρη ἀνάλογα.

§ 105. Ὅρισμοί.—

α') Δύο ἢ περισσότεροι ἀριθμοὶ λέγονται ἀνάλογοι ἄλλων ἰσοπληθῶν, ἐὰν καθεὶς τῶν πρώτων προκύπτῃ ἐκ τοῦ ἀντιστοίχου τῶν δευτέρων διὰ τοῦ πολλαπλασιασμοῦ ἐπὶ τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν.

Οὕτω οἱ ἀριθμοὶ 2· 6· 8· 10 εἶνε ἀνάλογοι τῶν 1· 3· 4· 5· διότι προκύπτουν ἐκ τούτων διὰ πολλαπλασιασμοῦ καθενὸς τῶν 1· 3· 4· 5 ἐπὶ τὸν ἀριθμὸν 2.

Ὁ ἀριθμὸς ἐπὶ τὸν ὅποιον πολλαπλασιάζομεν τοὺς ἀριθμοὺς τῆς μιᾶς σειρᾶς, διὰ νά εὐρωμεν τοὺς τῆς ἄλλης, δύναται νά εἶνε οἰοσδήποτε. Διὰ τοῦτο καὶ οἱ ἀριθμοὶ 1· 3· 4· 5 ἐπειδὴ γίνονται ἐκ τῶν 2· 6· 8· 10, ἂν πολλαπλασιασθοῦν ἐπὶ $\frac{1}{2}$ εἶνε καὶ αὐτοὶ ἀνάλογοι τῶν πρώτων.

Ἐκ τοῦ ἀνωτέρω ὀρισμοῦ συνάγομεν ὅτι, οἱ λόγοι τῶν ἀριθμῶν τῆς μιᾶς σειρᾶς πρὸς τοὺς ἀντιστοίχους τῆς ἄλλης εἶνε ἴσοι· ἤτοι ἔχομεν τὴν ἰσότητα τῶν λόγων

$$\frac{2}{1} = \frac{6}{3} = \frac{8}{4} = \frac{10}{5} \quad \text{καὶ} \quad \frac{1}{2} = \frac{3}{6} = \frac{4}{8} = \frac{5}{10}.$$

β') Δύο ἢ περισσότεροι ἀριθμοὶ λέγονται ἀντιστρόφως ἀνάλογοι ἄλλων ἰσοπληθῶν, ἐὰν εἶνε ἀνάλογοι τῶν ἀντιστρόφων αὐτῶν.

Π. χ. οἱ ἀριθμοὶ 10· 14· 12 εἶνε ἀντιστρόφως ἀνάλογοι τῶν $\frac{1}{5}$, $\frac{1}{7}$, $\frac{1}{6}$, διότι εἶνε ἀνάλογοι τῶν ἀντιστρόφων τούτων, δηλαδὴ τῶν ἀριθμῶν 5· 7· 6. Πράγματι, ἐὰν τοὺς ἀριθμοὺς 5· 7· 6 πολλαπλασιάσωμεν ἐπὶ 2, εὐρίσκωμεν τοὺς 10· 14· 12.

§ 106. Μερισμὸς εἰς μέρη εὐθέως ἢ ἀντιστρόφως ἀνάλογα. —

α') Μερισμὸς ἑνὸς ἀριθμοῦ, π. χ. τοῦ 1800, εἰς μέρη εὐθέως ἀνάλογα δοθέντων ἀριθμῶν, π. χ. τῶν 2·3·5, σημαίνει νὰ γίνῃ τόσα μέρη ὅ 1800 ὅσοι εἶνε οἱ δοθέντες ἀριθμοί, καὶ ἀνάλογα πρὸς αὐτοῦς.

Διὰ νὰ λύσωμεν τὸ πρόβλημα τοῦτο, παρατηροῦμεν ὅτι, ἂν ὁ ἀριθμὸς ὁ ὁποῖος πρόκειται νὰ μερισθῇ εἰς μέρη ἀνάλογα τῶν 2·3·5 ἦτο ἴσος μὲ τὸ ἄθροισμα αὐτῶν 2+3+5, ἦτοι 10, τὰ μέρη θὰ ἦσαν προφανῶς 2·3·5 Ἄν ὁ μεριστέος ἀριθμὸς ἦτο διπλάσιος (τὸ ἥμισυ), τριπλάσιος (τὸ τρίτον),... τοῦ 10, τὰ μέρη θὰ ἦσαν διπλάσια (τὸ ἥμισυ), τριπλάσια (τὸ τρίτον),... τῶν 2·3·5. Ἐκ τούτου ἔπεται ὅτι, καθὲν μέρος εἶνε ἀνάλογον πρὸς τὸν μεριστέον ἀριθμὸν.

Ἐπομένως, δυνάμεθα νὰ λύσωμεν τὸ πρόβλημα τοῦτο κατὰ τὴν μέθοδον τῶν τριῶν ὡς ἐξῆς πρὸς εὑρεσιν τοῦ πρώτου μέρους.

Ὅταν ἔχωμεν 10 μεριστέον εἶνε 2 τὸ πρῶτον μέρος
 , 1800 » x

ἔκ τοῦ ὁποίου εὐρίσκωμεν $x = 2 \times \frac{1800}{10} = 360$.

Καθ' ὅμοιον τρόπον εὐρίσκομεν, ὅτι τὰ δύο ἄλλα μέρη κατὰ σειράν εἶνε

$$\frac{1800 \times 3}{10} = 540, \quad \frac{1800 \times 5}{10} = 900.$$

Ἐκ τούτων συνάγομεν τὸν ἐξῆς κανόνα.

« Διὰ νὰ μερίσωμεν ἀριθμὸν εἰς μέρη ἀνάλογα δοθέντων ἀριθμῶν, πολλαπλασιάζομεν αὐτὸν ἐπὶ καθένα τῶν δοθέντων, καὶ τὰ γινόμενα διαιροῦμεν διὰ τοῦ ἄθροισματός των ».

β') Οἱ ἀριθμοί, ἀναλόγως τῶν ὁποίων μερίζομεν, δύνανται νὰ πολλαπλασιασθοῦν, ἢ νὰ διαιρεθοῦν, ἔλοι μὲ τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν, χωρὶς νὰ βλαφθοῦν τὰ μέρη. Διότι, ἂν π. χ. πρόκειται νὰ μερίσωμεν τὸν ἀριθμὸν 360 ἀναλόγως τῶν 2·3·5, τὰ μέρη θὰ εἶνε $360 \times \frac{2}{10}$, $360 \times \frac{3}{10}$, $360 \times \frac{5}{10}$ ἔπου τὸ 10 εὐρέθη ἐκ τῆς προσθέσεως τῶν 2·3·5. Ἄν ἀντὶ τῶν 2·3·5 λάβωμεν π. χ. τοὺς ἑξαπλασίους των 2×6 , 3×6 , 5×6 , τὰ μέρη θὰ εἶνε

$$360 \times \frac{2 \times 6}{10 \times 6}, \quad 360 \times \frac{3 \times 6}{10 \times 6}, \quad 360 \times \frac{5 \times 6}{10 \times 6}.$$

Διότι τὸ ἄθροισμα

$2 \times 6 \cdot 3 \times 6 \cdot 5 \times 6$ θὰ εἶνε 10×6 . Ἀλλὰ τὰ μέρη εἶνε τὰ αὐτὰ ὡς καὶ πρὶν, ἐπειδὴ $\frac{2 \times 6}{10 \times 6} = \frac{2}{10}$, $\frac{3 \times 6}{10 \times 6} = \frac{3}{10}$, $\frac{5 \times 6}{10 \times 6} = \frac{5}{10}$. Ὀμοίως ἢ διαίρεσις τῶν ἀριθμῶν 2·3·5 διὰ τοῦ τυχόντος ἀριθμοῦ, τοῦ αὐτοῦ δι' ἄλλου, δὲν βλάπτει τὰ μέρη.

γ') Διὰ τοῦτο, ἐὰν ἔχωμεν νὰ μερίσωμεν ἀριθμὸν εἰς μέρη ἀνάλογα δοθέντων κλασματικῶν ἀριθμῶν, π. χ. τὸν 420 εἰς μέρη ἀνάλογα τῶν $\frac{2}{3}$, $\frac{5}{1}$, $\frac{1}{4}$, τρέπομεν πρῶτον τοὺς κλασματικούς εἰς ὁμωνύμους, καὶ ἀκολουθῶς πολλαπλασιάζομεν ἄλλους τούτους ἐπὶ τὸν κοινόν των παρονομαστήν, οὕτω δὲ μερίζομεν τὸν μεριστέον ἀριθμὸν εἰς μέρη ἀνάλογα ἀκεραίων ἀριθμῶν. Οὕτω ἀντὶ τῶν $\frac{2}{3}$, 5, $\frac{1}{4}$ εὐρίσκομεν τοὺς $\frac{8}{12}$, $\frac{60}{12}$, $\frac{3}{12}$ καὶ ἀντ' αὐτῶν λαμβάνομεν τοὺς ἀριθμητάς των 8·60·3. Ἐὰν τὸ μεριστέον 420 μερίσωμεν εἰς μέρη ἀνάλογα τῶν ἀριθμῶν τούτων, εὐρίσκομεν, ὅτι τὰ μέρη θὰ εἶνε ἴσα μὲ $420 \times \frac{8}{71}$, $420 \times \frac{60}{71}$, $420 \times \frac{3}{71}$.

δ') Μερισμὸς ἑνὸς ἐνὸς ἀριθμοῦ, π. χ. τοῦ 600, εἰς μέρη ἀντιστρόφως ἀνάλογα δοθέντων ἀριθμῶν, π. χ. τῶν 2, 3, $\frac{2}{5}$, σημαίνει, νὰ μερισθῇ ὁ δοθεὶς ἀριθμὸς εἰς μέρη, τὰ ὁποῖα εἶνε ἀνάλογα πρὸς τοὺς ἀντιστρόφους ἀριθμοὺς τῶν δοθέντων.

Κατὰ ταῦτα, διὰ νὰ εὑρωμεν τὰ ζητούμενα μέρη τοῦ 600, πρέπει, νὰ μερίσωμεν αὐτὸν εἰς μέρη ἀνάλογα τῶν ἀριθμῶν $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{5}{2}$, οἱ ὁποῖοι εἶνε οἱ ἀντίστροφοι τῶν δοθέντων 2·3· $\frac{2}{5}$. Διὰ νὰ εὑρωμεν τὰ μερίδια, τρέπομεν τὰ $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{5}{2}$ εἰς ὁμώνυμα $\frac{3}{6}$, $\frac{2}{6}$, $\frac{15}{6}$ καὶ μερίζομεν τὸν 600 εἰς μέρη ἀνάλογα τῶν ἀριθμῶν 3·2·15, ὅτε εὐρίσκομεν $600 \times \frac{3}{20}$, $600 \times \frac{2}{20}$, $600 \times \frac{15}{20}$.
ἢ 90· 60· 450.

Προβλήματα πρὸς λύσιν.

- Ὀμὰς πρώτη. 1) Νὰ μερισθῇ α') ὁ ἀριθμὸς 18 εἰς μέρη ἀνάλογα τῶν 3·6·9. β') ὁ 640,8 εἰς μέρη ἀνάλογα τῶν 4·5·9. γ') ὁ 76 εἰς μέρη ἀνάλογα τῶν 3·4·12.

2) Νὰ μερισθῆ ὁ 520 (36) εἰς μέρη ἀνάλογα τῶν $\frac{2}{3} \left(\frac{1}{2}\right)$
 $\frac{4}{7} \left(\frac{3}{4}\right)$, καὶ $\left(\frac{5}{6}\right)$. ὁ α' 280 $\left(8 \frac{16}{25}\right)$.

3) Ὅμοιος α') ὁ 90 εἰς ἀνάλογα τῶν $2, \frac{3}{4}, 1 \frac{1}{4}$. ὁ α' 45.

β') ὁ 95 (96) εἰς μέρη ἀντιστρόφως ἀνάλογα τῶν $3 (2), 6 (4), 9 (15)$.
 ὁ α' 51 $\frac{9}{11} \left(58 \frac{38}{49}\right)$.

Ὅμας δευτέρα. 1) Νὰ μερισθῆ ὁ 560 (40) εἰς τέσσαρα (τρία) μέρη,
 ἐκ τῶν ὁποίων τὸ β' νὰ εἶνε τὰ $\frac{3}{5}$ (3πλάσιον) τοῦ α', τὸ γ' νὰ εἶνε τὸ
 ἡμισυ (2 πλάσιον) τοῦ β', καὶ τὸ δ' τριπλάσιον τοῦ γ'. τὸ α' 200(4).

2) Νὰ μερισθοῦν 100δρ. εἰς 4 ἐργάτας, ἐκ τῶν ὁποίων ὁ α' εἰργάσθη
 4 ἡμ., ὁ β' 3 ἡμ. 8 ὥρ., ὁ γ' 2 ἡμ. 8 ὥρ., καὶ ὁ δ' 18 ὥρ. Πόσας
 δραχμὰς πρέπει νὰ λάβῃ καθεὶς ἐξ αὐτῶν (ἢ ἐργάσιμος ἡμέρα λογιζε-
 ται μὲ 10 ὥρ.) ὁ α' 32,25...

3) Πρὸς κατασκευὴν τῆς πυρίτιδος λαμβάνονται 16 μέρη νίτρου,
 3 ἄνθρακος καὶ 2 θείου. Πόσας ὄκ. θὰ λάβωμεν ἀπὸ καθὲν εἶδος, διὰ
 τὴν κατασκευὴν 840 ὄκ. πυρίτιδος; 640 νίτρου.

4) Δύο ἀμαξηλάται ἀνέλαβον ἀντὶ 2445 δρ. νὰ μετακομίσουν σίτον
 εἰς δύο μέρη, ἀπέχοντα ἀπὸ τοῦ κοινοῦ τόπου τῆς ἀναχωρήσεως τὸ μὲν
 75 χμ., τὸ δὲ 55 χμ. Ὁ μὲν μετέφερε 2000 ὄκ. εἰς τὸ πρῶτον, ὁ δὲ
 3200 ὄκ. εἰς τὸ δεύτερον μέρος. Πόσας δραχμὰς θὰ λάβῃ καθεὶς, ἀν ἡ
 πληρωμὴ γίνῃ ἀναλόγως τῶν ὀκιάδων, τὰς ὁποίας καθεὶς μετέφερε, καὶ
 ἀναλόγως τῶν ἀποστάσεων εἰς τὰς ὁποίας μετεφέρθη ὁ σίτος;

Λύσις. Παρατηροῦμεν ὅτι, ὁ πρῶτος ἀμαξηλάτης θὰ ἐλάμβανε τὸ αὐτὸ ποσὸν
 χρημάτων, τὸ ὁποῖον θὰ λάβῃ τώρα, ἂν μετέφερε 2000×75 ὄκ. εἰς ἀπόστασιν ἑνὸς
 χιλιομέτρου. Ὁ δεύτερος θὰ ἐλάμβανε τὸ αὐτὸ ποσόν, τὸ ὁποῖον θὰ λάβῃ τώρα, ἂν
 μετέφερε 3200×55 ὄκ. εἰς ἀπόστασιν ἑνὸς χιλιομέτρου. Ἐπομένως, ἀρκεῖ νὰ μερίσωμεν
 τὸν ἀριθμὸν 2445 δρ. εἰς μέρη ἀνάλογα τῶν ἀριθμῶν 2000×75 , καὶ 3200×55 .

Προβλήματα ἑταιρείας.

§ 107. Προβλήματα ἑταιρείας λέγονται ἐκεῖνα, εἰς τὰ ὁποῖα ζη-
 τεῖται νὰ μοιρασθῆ τὸ κέρδος ἢ ἡ ζημία, μιᾶς ἐπιχειρήσεως εἰς ἐκεί-
 νους οἱ ὁποῖοι τὴν ἀνέλαβον.

Τὰ τοιαῦτα προβλήματα ἀνάγονται εἰς τὸν μερισμὸν εἰς μέρη ἀνάλογα, ὡς φαίνεται ἐκ τῶν ἐπομένων παραδειγμάτων.

(Πρόβλημα) 1). «Τρεῖς ἔμποροι ἔκαμαν ἑταιρείαν διὰ μίαν ἐπιχείρησιν, καὶ κατέβαλον τὰ ἐξῆς ποσά: ὁ πρῶτος 2000 δραχ., ὁ δευτέρος 4000 δρ., καὶ ὁ τρίτος 3000 δρ. Ἐκ τῆς ἐπιχειρήσεως ἐκέρδισαν 1260 δρ.: πόσας θὰ λάβῃ ὁ καθεὶς;»

Εἶνε φανερόν, ὅτι τὰ μερίδια τῶν συνεταίρων πρέπει νὰ εἶνε ἀνάλογα πρὸς τὰς χρηματικὰς καταβολὰς των. Διότι ὁ καταθέτων διπλάσιον (τὸ ἥμισυ), τριπλάσιον (τὸ τρίτον)...θὰ λάβῃ διπλάσιον (τὸ ἥμισυ)... κέρδος. Ἐπομένως, διὰ νὰ εὑρωμεν τὸ μερίδιον καθενός, πρέπει νὰ μερίσωμεν τὸ κέρδος 1260 δρ. εἰς μέρη ἀνάλογα τῶν καταβολῶν 2000 δρ., 4000 δρ., 3000 δρ.

Ἐκτελοῦντες τὸν μερισμὸν τοῦτον εὐρίσκομεν τὰ μερίδια,

$$1260 \times \frac{2000}{9000}, \quad 1260 \times \frac{4000}{9000}, \quad 1260 \times \frac{3000}{9000} \text{ δραχμάς}$$

ἢ 280 δρ., 560 δρ., 420 δραχμάς.

(Πρόβλημα) 2) «Ἐμπόρος ἤρχισεν ἐπιχείρησιν μὲ κεφάλαιον 4000 δρ. Μετὰ 6 μῆνας προσέλαβε συνέταιρον, ὁ ὁποῖος κατέθεσε τὸ αὐτὸ ποσόν· μετὰ 10 δὲ μῆνας καὶ τρίτον, ὁ ὁποῖος κατέβαλε τὸ αὐτὸ κεφάλαιον· 20 μῆνας μετὰ τὴν ἑναρξιν τῆς ἐπιχειρήσεως εὐρέθη, ὅτι ἐκέρδισαν 3800 δρ.: πόσας πρέπει νὰ λάβῃ ὁ καθεὶς;»

Εἰς τὸ πρόβλημα τοῦτο αἱ μὲν καταβολαὶ εἶνε αἱ αὐταί, ἐπειδὴ καθεὶς τῶν συνεταίρων κατέβαλε 4000 δραχμάς, ἀλλ' οἱ χρόνοι κατὰ τοὺς ὁποίους ἔμειναν αἱ καταβολαὶ εἰς τὴν ἐπιχείρησιν εἶνε διάφοροι. Διότι τοῦ μὲν α' τὰ χρήματα ἔμειναν εἰς τὴν ἐπιχείρησιν 20 μῆν., τοῦ β' 14 μῆν., τοῦ δὲ γ' 4 μῆνας.

Τὰ μερίδια τῶν συνεταίρων θὰ εἶνε ἀνάλογα τῶν χρονικῶν διαστημάτων, κατὰ τὰ ὁποῖα αἱ καταβολαὶ των ἔμειναν εἰς τὴν ἐπιχείρησιν. Ἐπομένως, διὰ νὰ λύσωμεν τὸ πρόβλημα τοῦτο, ἀρκεῖ, νὰ μερίσωμεν τὸ κέρδος τῶν 3800 δρ. εἰς μέρη ἀνάλογα τῶν ἀριθμῶν 20, 14, 4. Ἐκτελοῦντες τὸν μερισμὸν τοῦτον εὐρίσκομεν ὅτι τὰ μερίδια θὰ εἶνε

$$3800 \times \frac{20}{38}, \quad 3800 \times \frac{14}{38}, \quad 3800 \times \frac{4}{38}$$

ἢ 2000 δρ.: 1400 δρ. 400.

(Πρόβλημα) 3). «Ἐμπόρος ἤρχισεν ἐπιχείρησιν μὲ 4000 δρ.: μετὰ 1 ἔτος προσέλαβε συνέταιρον, ὁ ὁποῖος κατέβαλεν 7000 δρ., 8 δὲ μῆνας μετὰ τοῦτον καὶ τρίτον, ὁ ποῖος κατέ-

βαλεν 6000 δρ. 3 έτ. μετά την πρόσληψιν τούτου εύρέθη, ότι έκέρδισαν 14960 δρ. πόσον θά λάβη καθείς;>

Είς τό πρόβλημα τούτο διαφέρουν τά κεφάλαια τών συνεταίρων και οί χρόνοι κατά τους όποιους ταύτα έμειναν εις την έπιχειρησιν. Διότι ό α' κατέβαλε 4000 δρ. διά 56 μήνας, έπειδή τό ποσόν τούτο τών 4000 δρ. έμεινεν εις την έπιχειρησιν από της ένάρξεως της έπιχειρήσεως μέχρι τέλους αυτής· ό β' κατέβαλεν 7000 δρ. διά 44 μήν., έπειδή προσήλθεν έν έτος βραδύτερον του α'. ό δε γ' κατέβαλεν 6000 δρ. διά 36 μήνας.

Διά νά λύσωμεν τό πρόβλημα, δεχόμεθα ότι, αν ό α' κατέθετε 4000×56 δραχμάς δι' ένα μήνα, ό β' 7000×44 δραχμάς δι' ένα μήνα, και ό γ' 6000×36 δραχμάς δι' ένα μήνα, θά έλάμβανε καθείς έξ αυτών τό αυτό κέρδος, τό όποιον τώρα θά λάβη. Έπομένως, διά νά εύρωμεν τό μερίδιον καθενός, άρκει νά μερίσωμεν τάς 14960 δρ. εις μέρη ανάλογα τών αριθμων 4000×56 , 7000×44 , 6000×36 , ή τών 224000· 308000· 216000. Έάν εκτελέσωμεν τόν μερισμόν τούτον εύρίσκομεν, ότι τά μερίδια είνε 4480, 6160, 4320.

Έπομένως ό πρώτος θά 4480 δρ., ό δεύτερος 6160 δρ., και ό τρίτος 4320 δραχμάς.

Προβλήματα προς λύσιν.

Όμάς πρώτη. 1) Διέταξέ τις διά διαθήκης νά μερισθῆ ή εκ δραχ. 75000 περιουσία του εις τους άνεψιούς του αναλόγως της ηλικίας των. Πόσα θά λάβη καθείς, αν αί ηλικίαι των είνε κατά σειράν 8 έτών, 12 έτ., 13 έτ., και 17 έτών; ό α' 12000.

2) Τρεις έμποροι κατέβαλον δι' έμπορικην έπιχειρησιν άντιστοιχως 6000 (3564, 5) δρ., 7480 (4127, 8) δρ., 5200 (813, 9) δρ., και εκέρδισαν 4582 (1053, 37) δρ. πόσον κέρδος θά λάβη ό καθείς; 1471, 74 (441, 41).

3) Τρεις έμποροι κατέθεσαν συγχρόνως 2000 (4000) δρ., 3000 (6000) δρ., 4000 (5000) δρ. άντιστοιχως. Έξημιώθησαν (εκέρδισαν) 1500 (τά 0, 4 τών κατατεθέντων). Πόσα εξημιώθη (εκέρδισεν) ό καθείς; ό α' 333, 33 (1600).

Όμάς δευτέρα. 1) Δύο συνέταιροι κατέβαλον ό α' 2000 (1000) δρ., ό β' 5000 (3000) δρ., και μετά 8 μήνας (20 ήμ.) προσέλαβον γ', ό όποιος κατέβαλε 3000 (5000) δρ., μετά 6(2) δε μήν. ό δ όποιος κατέβαλε 2000 (6000) δρ. Μετά πάροδον 4 (7) μηνών (απ' άρχης) εκέρδισαν 4000 (5140) δρ. πόσον θά λάβη καθείς; ό α' 878, 04 $\frac{36}{41}$ (420).

2) Πατήρ διέταξε διὰ διαθήκης νὰ μερισθῇ ἢ ἐκ 12000 (7800) δρ. περιουσία του εἰς τοὺς 3 υἱοὺς του ὡς ἑξῆς. Ὁ β' νὰ λάβῃ διπλάσια $\left(\frac{5}{6}\right)$ τοῦ α', καὶ ὁ γ' ὅσον οἱ δύο ἄλλοι ὁμοῦ (ὁ α' καὶ 0,5 τοῦ β'). Ζητεῖται τὸ μερίδιον καθενός. ὁ α' 2000 (2400).

3) Δύο ποιμένες ἐνοικίωσαν ἐν λειβάδιον ἀντὶ 800 (700) δρ. Ὁ α' ἔθρεψεν ἐκεῖ 60 (100) πρόβατα ἐπὶ 4 μῆν. (50 ἡμ.), ὁ β' 80 (300) πρόβατα ἐπὶ 3 (1) μῆν. πόσον θὰ πληρώσῃ καθεὶς; α' 400 (250).

4) Ἐμπορος ἤρχισεν ἐπιχείρησιν μὲ 5000 δρ. Μετὰ 16 μῆν. προσέλαβε συνέταιρον, ὁ ὅποιος κατέβαλε 3000 δρ. Δύο ἔτη μετὰ ταῦτα εὔρον, ὅτι κέρδισαν 4800 δρ. πόσας πρέπει νὰ λάβῃ ὁ καθεὶς; ὁ α' 3529, 41..

Ὁμάς τρίτη. 1) Νὰ μερισθῇ κέρδος 10000 δρ. μεταξὺ τῶν συνεταίρων, ἐκ τῶν ὁποίων κατέβαλον ὁ α' 3000 δρ. διὰ 2 ἔτ. καὶ 6 μῆν., ὁ β' 5000 δρ. διὰ 2 ἔτ. καὶ 1 μῆν., ὁ γ' 4000 δρ. διὰ 1 ἔτος καὶ 1 μῆνα. ὁ α' 3370,79..

2) Νὰ μοιρασθοῦν 1580 δρ. εἰς τέσσαρα μερίδια, ὥστε τὸ β' νὰ εἶνε 0,75 τοῦ α', τὸ γ' τὰ 0,25 τοῦ β', καὶ τὸ δ' τὰ $\frac{2}{3}$ τοῦ γ'. τὸ α' 766,06..

§ 108. Περὶ τῶν προβλημάτων μέσου ὄρου. —

Εἰς τὴν § 25, γ' εἶδομεν πῶς εὐρίσκομεν τὴν μέσσην τιμὴν διαφόρων πραγμάτων, τῶν ὁποίων εἶδεται ἡ τιμὴ τῆς μιᾶς μονάδος.

Κατ' ἀνάλογον τρόπον καλοῦμεν μέσον ὄρον, ἢ ἀριθμητικὸν μέσον διαφόρων ὁμοειδῶν ποσῶν τὸ ἄθροισμά των διηρημένον διὰ τοῦ ἀριθμοῦ, ὁ ὅποιος ἐκφράζει τὸ πλῆθος των. Οὕτω ὁ μέσος ὄρος τῶν ἀριθμῶν 15· 18· 22 εἶνε

$$\frac{15+18+22}{3} = \frac{55}{3}$$

Ὁ μέσος ὄρος τῶν 10 δρ., 2 ταλ., 12 δρ., 8 δρ. εἶνε

$$\frac{10+10+12+8}{4} = 10 \text{ δραχμαί.}$$

Τῶν μέσων ὄρων γίνεται χρῆσις εἰς διαφόρους περιστάσεις καὶ ἰδίως, ὅταν ζητοῦμεν τὴν μέσσην μερησίαν, ἢ μηνιαίαν, ἢ ἔτησίαν εἰσπραξιν ἑνὸς ἐμπορικοῦ καταστήματος, ἑνὸς ταμείου, ἐν γένει, τὴν μέσσην θερμοκρασίαν τοῦ ἡμερονοκτίου, ἢ τοῦ ἔτους, τὸν μέσον ὄρον τῶν μηνιαίων ἐξόδων μιᾶς οἰκογενείας κλπ. Ἰδίως ὁμοίως τῶν μέσων ὄρων γίνεται χρῆσις εἰς τὰς μετρήσεις, εἰς τὰς ὁποίας συμβαίνουν ἀναπόφευκτα λάθη. Διὰ τοῦτο μετροῦμεν πολλάκις τὸ περὶ τοῦ ὁποίου πρόκειται ποσόν, καὶ λαμβάνομεν ὡς τιμὴν του μᾶλλον πιθανὴν τὸν μέσον ὄρον τῶν εὐρεθεισῶν τιμῶν του.

Ἀσκήσεις. 1) Ἐν κτήμα ἔφερε τὸ α' ἔτος εἰσόδημα 2600 (600) δρ., τὸ β' 6800 (475) δρ., καὶ τὸ γ' 2000 (554) δραχμῶν ποῖος ὁ μέσος ὄρος τοῦ εἰσοδήματός του κατὰ τὴν τριετίαν ταύτην; 3800 (543).

2) Μία οἰκογένεια ἐδαπάνησε τὸν Ἰανουάριον 4502,5 δρ., τὸν Φεβρουάριον 3200 δρ., τὸν Μάρτιον 3807,5 δρ., τὸν δὲ Ἀπρίλιον 4654 δρ.: ποῖα ἢ μέση τιμὴ τῆς δαπάνης κατὰ τοὺς τέσσαρας τούτους μῆνας; 4041.

3) Μία ὑπηρέτρια ἐλάμβανε κατὰ μῆνα 30 δρ., δύο ἐνδυμασίας κατ' ἔτος ἀξίας 130 δρ., καὶ διάφορα δῶρα ἀξίας 95 δρ.: πόσος ἦτο ὁ μηνιαῖος μισθός της κατὰ μέσον ὄρον; 48,75.

4) Οἰκόπεδον, μετρηθὲν δύο φορές, εὐρέθη, ἔχον ἑκτασίον 537 (μ^2) καὶ 539,25 (μ^2): πόσον εἶνε κατὰ μέσον ὄρον; 538,125 (μ^2).

5) Ἐργάτης ἔλαβε τὴν Δευτέραν 40 δρ., τὰς δὲ ἄλλας τῆς ἑβδομάδος μέχρι τοῦ Σαββάτου 45 δρ. καθ' ἑκάστην: πόσον ἐλάμβανε κατὰ μέσον ὄρον τὴν ἡμέραν; 44,16..

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ XIII.

Περὶ τετραγωνικῆς ρίζης.

§ 109. Ὅρισμοί.—

α') Ἐστω ὅτι δίδεται εἰς ἀριθμὸς, π. χ. ὁ 25, καὶ ζητεῖται νὰ εὐρεθῇ ἄλλος, ὁ ὁποῖος ὑψούμενος εἰς τὸ τετράγωνον δίδει τὸν δοθέντα.

Ἐἶνε φανερόν, ὅτι ὁ ζητούμενος ἀριθμὸς εἶνε ὁ 5, διότι $5^2 = 5 \times 5 = 25$. Ὁ 5 λέγεται τετραγωνικὴ ρίζα τοῦ 25. Ὁμοίως τοῦ 16 ἢ τετραγωνικὴ ρίζα εἶνε ὁ 4, διότι $4^2 = 4 \times 4 = 16$.

Ἐν γένει, καλοῦμεν τετραγωνικὴν ρίζαν δοθέντος ἀριθμοῦ τὸν ἀριθμόν, ὁ ὁποῖος ὑψούμενος εἰς τὸ τετράγωνον δίδει τὸν δοθέντα, τὴν δὲ εὐρεσιν αὐτῆς καλοῦμεν ἐξαγωγήν τῆς τετραγωνικῆς ρίζης.

Ἡ τετραγωνικὴ ρίζα ἑνὸς ἀριθμοῦ, π. χ. τοῦ 9, σημειώνεται ὡς ἑξῆς.

$\sqrt{9}$ ἢτοι $\sqrt{9} = 3$, καλεῖται δὲ τὸ σύμβολον $\sqrt{\quad}$ ριζικόν,

ὁ δὲ ὑπ' αὐτὸ γραμμένος ἀριθμὸς, τοῦ ὁποῖου ζητεῖται ἡ τετραγωνικὴ ρίζα, λέγεται ὑπόρριζος ποσότης.

Ἀσκήσεις. Νὰ σημειωθῇ καὶ νὰ εὑρεθῇ ἡ τετρ. ρίζα τῶν ἀριθμῶν 0· 1· 4· 9· 25· 36· 49· 64· 81· 100· 10000.

6') Ἐστω ὅτι ζητεῖται ἡ τετρ. ρίζα τοῦ ἀριθμοῦ 24. Εὐκόλως παρατηροῦμεν, ὅτι αὐτὴ εἶνε μεγαλύτερα τοῦ 4, διότι $4^2 = 16$, ἀλλὰ μικρότερα τοῦ 5 ἐπειδὴ $5^2 = 25$. Ἐπομένως ἡ $\sqrt{24}$ περιέχεται μεταξὺ τῶν 4 καὶ 5. Εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν λαμβάνομεν ὡς τετρ. ρίζαν τοῦ 24 τὸν μικρότερον τῶν δύο τούτων ἀριθμῶν, μεταξὺ τῶν ὁποίων αὐτὴ περιέχεται, ἦτοι τὸν 4, καλεῖται δὲ τότε ὁ 4, τετρ. ρίζα τοῦ 24 κατὰ προσέγγισιν μονάδος.

Ἐν γένει, καλοῦμεν τετρ. ρίζαν ἀριθμοῦ κατὰ προσέγγισιν μονάδος τὸν μεγαλύτερον ἀκέραιον ἀριθμὸν, τοῦ ὁποῖου τὸ τετράγωνον χωρεῖ εἰς τὸν δοθέντα.

Οὕτω τοῦ 56 ἡ τετρ. ρίζα κατὰ προσέγγισιν μονάδος εἶνε ὁ 7. Διότι τὸ τετράγωνον τοῦ 7 εἶνε $7^2 = 49$, καὶ χωρεῖ εἰς τὸ 56, ἐνῶ τὸ τετράγωνον τοῦ 8 εἶνε μεγαλύτερον τοῦ 56. Ὀμοίως παρατηροῦμεν, ὅτι ἡ τετρ. ρίζα τοῦ 18,5 κατὰ προσέγγισιν μονάδος εἶνε ὁ 4, διότι ὁ $4^2 = 16$ χωρεῖ εἰς τὸν 18,5 ἐνῶ τὸ $5^2 = 25$ εἶνε μεγαλύτερον τοῦ 18,5.

§ 110. Πρακτικὸς κανὼν πρὸς εὔρεσιν τῆς τετρ. ρίζης τῶν ἀριθμῶν.—

α') Ἄν ὁ δοθεὶς ἀκέραιος ἀριθμὸς εἶνε μικρότερος τοῦ 100, ἡ τετρ. ρίζα του (ἢ ἀκριβῆς, ἢ ἡ κατὰ προσέγγισιν μονάδος) θὰ εἶνε μικρότερα τῆς τετρ. ρίζης τοῦ 100, ἦτοι μικρότερα τοῦ 10· ἄρα θὰ εἶνε ἀριθμὸς μονοψήφιος, εὐρίσκομεν δ' αὐτὸν ἀμέσως ἀπὸ μνήμης. Διότι, ἐκ τοῦ πολλαπλασιασμοῦ ἐνθυμούμεθα τὰ τετράγωνα ἑλῶν τῶν μονοψηφίων ἀριθμῶν. Οὕτω ἔχομεν ὅτι

$$\sqrt{49} = 7, \quad \sqrt{64} = 8.$$

Ἀσκήσεις. Εὑρετε τὴν τετρ. ρίζαν τῶν κάτωθι ἀριθμῶν, καὶ σημειώσατε ποῖαι ἐξ αὐτῶν εἶνε κατὰ προσέγγισιν μονάδος· 38· 42· 56· 61· 92· 98· 17· 34· 38· 5· 47 $\frac{3}{4}$, 93· 75.

β') Διὰ νὰ εὑρωμεν τὴν τετρ. ρίζαν ἀριθμοῦ ἀκεραίου, ἔχοντος περισσότερα τῶν δύο ψηφίων, ἐφαρμόζομεν τὸν ἐξῆς κανόνα.

1) Χωρίζομεν τὸν ἀριθμὸν εἰς διψήφια τμήματα ἐκ δεξιῶν πρὸς τᾶριστερά (τὸ πρῶτον τμήμα πρὸς τᾶριστερά δύναται νὰ εἶνε καὶ μονοψήφιον).

2) Ἐξάγομεν τὴν τετρ. ρίζαν ἀκριβῆ ἢ κατὰ προσέγγισιν μονάτος τοῦ πρώτου τμήματος ἐξ ἀριστερῶν καὶ οὕτω εὐρίσκομεν τὸ πρῶτον ψηφίον τῆς ζητουμένης ρίζης.

3) Ἀφαιροῦμεν τὸ τετράγωνον τοῦ εὑρεθέντος ψηφίου τῆς ρίζης ἀπὸ τὸ τμήμα ἐκ τοῦ ὁποίου εὑρέθη, καὶ δεξιὰ τοῦ μένοντος ὑπολοίπου καταβιδάζομεν τὸ ἐπόμενον τμήμα, ὅτε σχηματίζεται εἰς ἀριθμὸς. Τοῦ ἀριθμοῦ τούτου χωρίζομεν τὸ ψηφίον τῶν ἀπλῶν μονάδων, καὶ διαιροῦμεν τὸν ἀπομένοντα ἀριθμὸν διὰ τοῦ διπλασίου τοῦ εὑρεθέντος ψηφίου τῆς ρίζης.

4) Τὸ πηλίκον τῆς διαιρέσεως αὐτῆς γράφομεν πρὸς τὰ δεξιὰ τοῦ διαιρέτου τῆς, καὶ τὸν οὕτω προκύπτοντα ἀριθμὸν πολλαπλασιάζομεν ἐπ' αὐτὸ τὸ πηλίκον, ἂν τὸ γινόμενον ἀφαιρῆται ἀπὸ τὸν σχηματισθέντα ἀριθμὸν, τὸ εὑρεθὲν πηλίκον εἶνε τὸ δεῦτερον ψηφίον τῆς ζητουμένης ρίζης, εἰ δὲ μὴ, δοκιμάζομεν κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον τὸ κατὰ μονάδα μικρότερον ψηφίον, καὶ οὕτω καθεξῆς, μέχρις ὅτου εὑρωμεν ψηφίον, τοῦ ὁποίου τὸ γινόμενον ν' ἀφαιρῆται. Τὸ ψηφίον τοῦτο θὰ εἶνε τὸ δεῦτερον ψηφίον τῆς ρίζης. ἂν ἐκτελέσωμεν τὴν ἀφαίρεσιν, καὶ δεξιὰ τοῦ ὑπολοίπου καταβιδάσωμεν τὸ ἀκόλουθον τμήμα, σχηματίζεται εἰς νέος ἀριθμὸς.

5) Καὶ τοῦ ἀριθμοῦ τούτου διαιροῦμεν τὰς δεκάδας διὰ τοῦ διπλασίου τοῦ εὑρεθέντος μέρους τῆς ρίζης, καὶ γράφομεν τὸ πηλίκον δεξιὰ τοῦ διαιρέτου· πολλαπλασιάζομεν δὲ τὸν προκύπτοντα ἀριθμὸν ἐπ' αὐτὸ τὸ πηλίκον· καὶ, ἂν μὲν τὸ γινόμενον ἀφαιρῆται ἀπὸ τοῦ δευτέρου σχηματισθέντος ἀριθμοῦ, τὸ εὑρεθὲν ψηφίον εἶνε τὸ τρίτον ψηφίον τῆς ρίζης· εἰ δὲ μὴ, δοκιμάζομεν κατὰ τὸ αὐτὸν τρόπον τὸ κατὰ μονάδα μικρότερον ψηφίον, καὶ οὕτω καθεξῆς.

6) Τοιοῦτοτρόπως ἐξακολουθοῦμεν, μέχρις ὅτου καταβιδασθοῦν πάντα τὰ διψήφια τμήματα. Τὸ εἰς τὸ τελευταῖον τμήμα ἀντιστοιχοῦν πηλίκον θὰ εἶνε τὸ τελευταῖον ψηφίον τῆς ρίζης· τὸ δὲ εἰς αὐτὸ ἀντιστοιχοῦν ὑπόλοιπον θὰ εἶνε τὸ ὑπόλοιπον τῆς ρίζης.

$$\sqrt{96} = 9.79$$

Ἐάν τὸ ὑπόλοιπον εἶνε μηδέν, ὁ δοθεὶς ἀριθμὸς λέγεται τέλειον τετράγωνον, καὶ ἡ τετρ. ρίζα τοῦ εὐρέθη ἀκριβῶς, εἰ δὲ μή, εὐρέθη κατὰ προσέγγισιν μονάδος.

Παράδειγματα. 1) Νὰ ἐξαχθῇ ἡ τετρ. ρίζα τοῦ ἀριθμοῦ 454276.
Ἡ πράξις διατάσσεται ὡς ἑξῆς.

$\begin{array}{r} \sqrt{45' 42' 76'} \\ \underline{36} \\ 94' 2 \\ \underline{88 9} \\ 5 37' 6 \\ \underline{5 37 6} \\ 0 \end{array}$	$\begin{array}{r} 674 \\ \hline 127 \quad \quad 1344 \\ \times 7 \quad \quad \times 4 \\ \hline 889 \quad \quad 5376 \end{array}$
--	---

Εὐρίσκομεν δὲ ὅτι $\sqrt{454276} = 674$.

Διὰ τὴν κάμωμεν τὴν δοκιμὴν, ὑψοῦμεν τὸν 674 εἰς τὸ τετράγωνον καὶ εὐρίσκομεν τὸν δοθέντα ἀριθμόν.

2) Ὅμοίως ἐργαζόμενοι εὐρίσκομεν ὅτι ἡ τετρ. ρίζα τοῦ 7000 εἶνε 204, τὸ δὲ ὑπόλοιπον 304.

Διὰ τὴν κάμωμεν τὴν δοκιμὴν, ὑψοῦμεν τὴν εὐρεθεῖσαν ρίζαν εἰς τὸ τετράγωνον, καὶ εἰς τὸ γινόμενον αὐτὸ προσθέτομεν τὸ ὑπόλοιπον, ὅτε πρέπει νὰ εὕρωμεν τὸν δοθέντα ἀριθμόν.

Ἐάν κατὰ τὴν εὐρεσιν τῆς τετρ. ρίζης διαίρεσις τις διδῇ πηλίκον 0, γράφομεν εἰς τὴν ρίζαν ὡς ψηφίον 0, καὶ ἐξακολουθοῦμεν ὁμοίως τὴν πράξιν.

§ III. Τετραγ. ρίζα ἀριθμοῦ κατὰ προσέγγισιν δεκαδικῆς μονάδος. —

α') Ἐστω ὅτι ζητοῦμεν τὴν τετρ. ρίζαν τοῦ ἀριθμοῦ 20. Αὕτη περιέχεται, ὡς γνωστόν, μεταξὺ τῶν ἀριθμῶν 4 καὶ 5.

Διὰ τὴν εὕρωμεν τὸ πρῶτον δεκαδικὸν ψηφίον τῆς ρίζης, δοκιμάζομεν, ἂν τοῦτο εἶνε τὸ 5. Πρὸς τοῦτο εὐρίσκομεν τὸ τετράγωνον τοῦ ἀριθμοῦ 4,5 καὶ βλέπομεν ὅτι εἶνε $(4,5)^2 = 20,25$, δηλαδὴ μεγαλύτερον τοῦ 20. Ὅμοίως εὐρίσκομεν ὅτι τὸ τετράγωνον τοῦ 4,4 εἶνε $(4,4)^2 = 19,36$, ἧτοι μικρότερον τοῦ 20.

Ἐπομένως ἡ τετρ. ρίζα τοῦ 20 περιέχεται μεταξύ τῶν ἀριθμῶν 4,4 καὶ 4,5. Δι' ὁμοίων δοκιμῶν δυνάμεθα νὰ εὕρωμεν καὶ ἄλλα δεκαδικὰ ψηφία τῆς τετρ. ρίζης τοῦ 20.

Ὁ ἀριθμὸς 4,4 λέγεται τετρ. ρίζα τοῦ 20 κατὰ προσέγγισιν ἐνὸς δεκάτου, ὁ δὲ μεγαλύτερος δεκαδικὸς ἀριθμὸς, ὁ ἔχων δύο δεκαδικὰ ψηφία, τοῦ ὁποίου τὸ τετράγωνον περιέχεται εἰς τὸ 20, λέγεται τετραγωνικὴ ρίζα τοῦ 20 κατὰ προσέγγισιν ἑκατοστοῦ.

Ἐν γένει, καλεῖται τετρ. ρίζα ἐνὸς ἀριθμοῦ κατὰ προσέγγισιν 0,1 ἢ 0,01 ἢ 0,001 κλπ. ὁ μεγαλύτερος δεκαδικὸς ἀριθμὸς, ὁ ὁποῖος ἔχει ἐν, ἢ δύο, ἢ τρία κλπ. δεκαδικὰ ψηφία, καὶ τοῦ ὁποίου τὸ τετράγωνον χωρεῖ εἰς τὸν δοθέντα ἀριθμὸν.

β') Πρὸς εὕρεσιν τῆς τετρ. ρίζης ἀριθμοῦ κατὰ προσέγγισιν 0,1 ἢ 0,01 κλπ. ἔχομεν τὸν ἑξῆς κανόνα.

«Διὰ νὰ εὕρωμεν τὴν τετρ. ρίζαν ἀριθμοῦ κατὰ προσέγγισιν 0,1 ἢ 0,01 κλπ. πολλαπλασιάζομεν αὐτὸν ἐπὶ τὸ τετράγωνον τοῦ 10, ἢ τοῦ 100 κλπ. καὶ ἐξάγομεν τὴν τετρ. ρίζαν τοῦ γινομένου κατὰ προσέγγισιν μονάδος, τὴν δὲ ρίζαν αὐτὴν διαιροῦμεν διὰ τοῦ 10 ἢ 100 κλπ.»

Ἐφαρμογή. Νὰ ἐξαχθῇ ἡ τετρ. ρίζα τοῦ 2 κατὰ προσέγγισιν 0,0001.

Πολλαπλασιάζομεν τὸν 2 ἐπὶ τὸ τετράγωνον τοῦ 10000, ἦτοι ἐπὶ 100000000, καὶ τοῦ προκύπτοντος ἀριθμοῦ 200000000 ἐξάγομεν τὴν τετρ. ρίζαν κατὰ προσέγγισιν μονάδος, ὅτε εὕρισκομεν 14142. Αὐτὴν διαιροῦμεν διὰ τοῦ 10000 καὶ οὕτω ἔχομεν ἕτι ἡ τετρ. ρίζα τοῦ 2 κατὰ προσέγγισιν 0,0001 εἶνε 1,4142.

γ') Ἐὰν θέλωμεν νὰ εὕρωμεν τὴν τετρ. ρίζαν κλασματικοῦ ἀριθμοῦ, εὕρισκομεν τὴν τετρ. ρίζαν τοῦ γινομένου τῶν ὄρων τοῦ κλάσματος (ἀκριβῶς, ἢ κατὰ προσέγγισιν), καὶ αὐτὴν διαιροῦμεν διὰ τοῦ παρονομαστοῦ τοῦ κλάσματος. Ἄν ζητῆται ἡ τετραγωνικὴ ρίζα κλάσματος κατὰ προσέγγισιν 0,1 ἢ 0,01 κλπ. τρέπομεν συνήθως τὸν κλάσμακὸν εἰς δεκαδικόν, καὶ ἐπὶ τοῦ δεκαδικοῦ τούτου ἐφαρμόζομεν τὸν ἀνωτέρω

κανόνα. Οὕτω, ἂν ζητῆται ἡ τετρ. ρίζα τοῦ ἀριθμοῦ $\frac{12}{7}$ κατὰ προσέγγισιν 0,001 τρέπομεν τὸν $\frac{12}{7}$ εἰς δεκαδικόν, ὅτε εὕρισκομεν 1,714285.

τουτου πολλαπλασιάζομεν ἐπὶ τὸ τετράγωνον τοῦ 1000, καὶ τοῦ γινομένου 1714285 εὐρίσκομεν τὴν τετρ. ρίζαν κατὰ προσέγγισιν μονάδος, ἕτε προκύπτει 1309· αὐτὴν διαιροῦμεν διὰ τοῦ 1000, καὶ οὕτω ἔχομεν, ὅτι ἡ ζητούμενη ρίζα εἶνε 1,309.

δ') Ἡ τετρ. ρίζα δεκαδικοῦ ἀριθμοῦ κατὰ προσέγγισιν μονάδος εὐρίσκεται, ἂν εὐρεθῇ ἡ τετρ. ρίζα κατὰ προσέγγισιν μονάδος τοῦ ἀκεραίου μέρους του.

Ἀσκήσεις.

Ὅμας πρώτη. 1) Νὰ ὑψωθοῦν εἰς τὸ τετράγωνον οἱ $\underline{125 \cdot 368 \cdot 1473}$ καὶ νὰ εὐρεθῇ ἡ τετρ. ρίζα τῶν ἐξαγομένων.

(2) Νὰ εὐρεθῇ ἡ τετρ. ρίζα κατὰ προσέγγισιν μονάδος τῶν $\underline{15129 \cdot 170669 \cdot 339889 \cdot 121104 \cdot 122 \cdot 413583 \cdot 348}$.

√ 3) Νὰ εὐρεθοῦν αἱ

α) $\sqrt{1263587}$, β) $\sqrt{4601175}$, γ) $\sqrt{9872264}$,
 (ἐξαγόμε. 1124 ὑπολ. 211· 2145 ὑπ. 150· 3142 ὑπ. 100).

4) Ὁμοίως αἱ

√ $\sqrt{1044^2 + 1392^2}$, $\sqrt{12595^2 - 10077^2}$, $\sqrt{110224 + 576081}$.

Ὅμας δευτέρα. 1) Νὰ εὐρεθῇ ἡ τετρ. ρίζα κατὰ προσέγγισιν 0,01 τῶν $\underline{5 \cdot 10 \cdot 27 \cdot 1543}$.

√ 2) Ὁμοίως τῶν $\underline{278,89 \cdot 13,9876 \cdot 108,17 \cdot 16,70 \cdot 3,74 \cdot 10,40}$.

√ 3) Νὰ ἐξελθῇ ἡ τετρ. ρίζα κατὰ προσέγγισιν μονάδος ἢ (0,01 ἢ 0,001) τῶν ἀριθμῶν $\underline{1543,26 \cdot 853,9 \cdot 143,23}$.

§ 112. Διάφορα προβλήματα πρὸς λύσιν. —

1) Ἐμπόρος ἠγόρασεν 155 πήχ. ὑφάσματος ἀντὶ 8960 δραχ· ἀντὶ πόσων δρ. πρέπει νὰ πωλήσῃ τὸν πήχυν, διὰ νὰ κερδίσῃ 4% ; 60,11.

2) Ἐμπόρος ἠγόρασε 265 ὀκ. ἐλαίου πρὸς 12,5 δρ. τὴν ὀκάν, μετὰ 7 δὲ μῆνας μετεπώλησεν αὐτὸ πρὸς 14 δραχ. τὴν ὀκάν πρὸς πόσον τοῖς % ἔπρεπε νὰ τοκίσῃ τὰ χρήματά του, διὰ νὰ λάβῃ εἰς 7 μῆνας τὸ αὐτὸ κέρδος ; 20,57.

3) Μὲ πόσους βαθμοὺς Κελσίου ἰσοδυναμοῦν 17 βαθμοὶ Ῥωμύρου ; 21,25.

4) Μὲ πόσας ὀκ. ἰσοδυναμοῦν 30 χιλιόγραμμα ; 23 ὀκ. 125 δρ.

5) Κατὰ ποίαν ἀναλογίαν πρέπει νὰ λάβωμεν ἀπὸ καθέν ἓκ δύο εἰδῶν

οίνου, τῶν ὁποίων ὁ μὲν τιμᾶται 4 δρ. κατ' ὀκτῶν ὁ δὲ 10 δρχ. διὰ νὰ σχηματίσωμεν κρᾶμα ἀξίας 5δρ. κατ' ὀκτῶν; (εἰς 5 τοῦ α' 1 τοῦ β').

6) Διὰ νὰ ποτελεσθῇ κρᾶμα ἀργύρου θαλαμῶς καθαρότητος $\frac{5}{6}$ ἐξ ἀργύρου, ἔχοντος βαθμὸν καθαρότητος $\frac{11}{12}$ καὶ ἐξ ἄλλου τοιούτου, ἔχοντος βαθμὸν καθαρότητος $\frac{3}{4}$, πόσον μέρος πρέπει νὰ ληφθῇ ἀπὸ καθέν τούτων; Ἰσα μέρη.

7) Ἐν ποσὸν τοκισθὲν ἐπὶ 6 (4) ἔτ. 9 (5) μῆν. πρὸς 4,5 (4)% ἔγινε 4985,54 (8535,45) δρ. πόσον ἦτο τὸ ποσόν; 3824(7254).

8) Ἐμπορὸς ὀφείλει νὰ πληρώσῃ δι' ἀξίαν ἐμπορευμάτων 316,57 δρ. μετὰ 1 μῆνα καὶ 12 ἡμ. Ἐπειδὴ ὁμοῦ θέλει νὰ πληρώσῃ τοῖς μετρητοῖς, τοῦ γίνεται ἔκπτωσις 4%· πόση εἶνε ἡ ἔκπτωσις καὶ πόσα θὰ πληρώσῃ; 1, 48· 315, 09.

9) Μία οἰκία ἀξίζει 58120 δρ.· καὶ δίδει εἰσόδημα 2,5%· πόσον εἶνε τὸ μηνιαῖον εἰσόδημά της; 121,08..

10) Ἐμπορὸς ἀγοράσας ἐμπορεύματα ἀντὶ 3824,6 (3481,2) δραχ. παρατηρεῖ ὅτι εἶνε ἠναγκασμένος νὰ πωλήσῃ αὐτὰ μὲ ζημίαν 15 (5)%· α') πόση εἶνε ἡ ζημία του; β') ἀντὶ πόσων δραχμῶν ἐπώλησε τὰ ἐμπορεύματα; ζ. 573,69 (174,0,6).

11) Εἰς ἀσφαλίζει τὴν οἰκίαν του ἀντὶ 12500 δραχ. πρὸς 1,4%· πόσον πληρώνει δι' ἀσφάλιστρα; 17,50

12) Πόσον α') καθαρὸν οἰνόπνευμα β') ὕδωρ περιέχεται εἰς 65,2 (350) λίτρας οἰνοπνεύματος, εἰς τὸ ὁποῖον μόνον 85 (70) % εἶνε καθαρόν; α' 55,42(245).

13) Ὁ ἀτμοσφαιρικὸς ἀήρ περιέχει 21 % ὀξυγόνον, τὸ δὲ ὑπόλοιπον αὐτοῦ εἶνε ἄζωτον· πόσον ὀξυγόνον καὶ πόσον ἄζωτον περιέχεται εἰς 2518 (1000) (μ.³) ἀέρος; ὀξυγ. 528,78 (210).

14) Ἐκ χρέους 1864 δραχ. ἔγινεν ἔκπτωσις 3,5%· πόσα ἐπληρώθησαν; ἔκπτωσις 65, 24·

15) Κτῆμα ἐπωλήθη ἀντὶ 225640 δρ. μὲ προμήθειαν 1 $\frac{1}{4}$ %· πόσα ἐπληρώθησαν διὰ προμήθειαν; 2820,5.

16) Ἐκ σταθμοῦ ἀναχωρεῖ ἀμαξοστοιχία, διατρέχουσα 20 χμ. τὴν ὥραν. Μετὰ 9 ὥρας ἀναχωρεῖ ἐκ τοῦ αὐτοῦ σταθμοῦ ἄλλη, διατρέ-

χουσα 25 χμ. τὴν ὥραν· μετὰ πόσον χρόνον ἡ δευτέρα θα εἶνε ὀπίσω τῆς πρώτης 1 χμ.; 35 ὥρ. 48'.

17) Νὰ εὑρεθῇ τὸ ἐξαγόμενον $13 \frac{4}{5} + 6 \frac{7}{10} - \frac{7}{8}$.

$$\left(\frac{6}{6 \frac{3}{10} - \frac{3}{4}} \right) \quad 17,598125.$$

18) Τὸ $\frac{1}{3} \left(\frac{1}{5} \right)$ τῶν χρημάτων μου διαιρούμενον δια τοῦ 8 (9) εἶδει πηλίκον 20 (100) δρ.· πόσα χρήματα ἔχω; 480 (4500)

19) Ποῖον χρηματικὸν ποσὸν αὐξανόμενον κατὰ τὸ $\frac{1}{3} \left(\frac{2}{5} \right)$ αὐτοῦ καὶ κατὰ $\frac{1}{3}$ (2) δρ. γίνεται 5 (72) δραχμαί; 3,5 (50).

20) Ποῖον ποσὸν αὐξανόμενον κατὰ 0,2 (0,75) αὐτοῦ, καὶ ἐλαττούμενον κατὰ 0,2 (1) γίνεται 10 (20); 8,5 (12).

21) Ὑπάλληλος ἀποταμιεύει τὰ 0,2 (0,3) τοῦ μισθοῦ του. Ἐὰν αὐξηθῇ ὁ μισθὸς του κατὰ τὰ 0,2 (0,4) αὐτοῦ, ποῖον μέρος τοῦ νέου μισθοῦ θὰ ἀποταμιεύῃ, ὥστε τὸ ἀποταμίευμα νὰ εἶνε ὅποιον ἦτο πρὸ τῆς αὐξήσεως; $\frac{1}{6} \left(\frac{3}{14} \right)$.

22) Δύο λυχνίαι πετρελαίου ἔκαυσαν ἡ μὲν 1 ὁκ. καὶ 350 δρμ. πετρελαίου εἰς 9 ὥρ. καὶ 30', ἡ δὲ 1 ὁκ. καὶ 20 δρμ. εἰς 6 ὥρας· ποῖα τῶν δύο εἶνε οἰκονομικωτέρα; Διατί; ἡ β'.

23) Ποῖος εἶνε ὁ βαθμὸς καθαρότητος κράματος, ἀποτελουμένου ἐκ 15 (25) μερῶν χρυσοῦ καὶ 5 (15) χαλκοῦ; 0,75 (0,625).

24) Κατὰ ποῖαν ἀναλογίαν πρέπει ν' ἀναμιξῶμεν οἶνον τῶν 3,6 (4,5) δρ. μὲ ὕδωρ, ὥστε ἡ ὀκθὰ τοῦ μίγματος νὰ τιμᾶται 2,8 (4) δρ.; εἰς 7 (8) οἴνου 2(1) ὕδωρ.

25) Νὰ μερισθοῦν 100 (455) δραχμαί εἰς τρεῖς ἀνθρώπους οὕτως, ὥστε ὁ πρῶτος νὰ λάβῃ τὰ 0,75 (0,5) τοῦ δευτέρου καὶ ὁ τρίτος τὰ 0,8 (0,25) τοῦ πρώτου. Πόσα θὰ λάβῃ καθεὶς; ὁ α' 31 $\frac{43}{47}$ (140).

26) Ἐμπορος πτωχεύσας, ἀφήνει ἐνεργητικὸν μὲν 10000 δρ., παθητικὸν δὲ τὸ ἐξῆς. Εἰς τὸν Α ὀφείλει 25000 δρ., εἰς τὸν Β 12450 δρ. καὶ εἰς τὸν Γ 1000 δρ.· τὰ ἐξοδα τῆς ἐκκαθαρίσεως εἶνε 6,5 % ἐπὶ τοῦ ἐνεργητικοῦ του. Πόσας δραχμάς θα λάβῃ καθεὶς τῶν Α, Β, Γ;

• Α 6079,32..

26) Εἰς πληρώνει σήμερον διὰ γραμματίων, λήγον μετὰ 2 μῆν. 20 ἡμ. (24 ἡμ.) καὶ ἀξίας 860 (3400) δρ. μόνον 842,8 (3386,4) δρ.· πρὸς πόσον τοῖς % ἐγένινεν ἡ ἐξωτ. ὑφαίρεσις; 9 (6).

27) Γραμματίων 1800 (480) δρ. εἶνε πληρωτέον μετὰ τινα χρόνον. Ἐπειδὴ ὁμως πληρώνεται τοῖς μετρητοῖς, γίνεται ἐξωτ. ὑφαίρεσις 32,5 (18) δρ., ἡ ὁποία λογαριάζεται πρὸς 6,5 (9) %· πότε λήγει τὸ γραμματίων; 3 μ. 10 ἡμ. (5 μ.).

28) Κατὰ τὴν ἀγορὰν μιᾶς οἰκίας ὁ ἀγοραστὴς προσφέρει ἢ 64228 δρ. πληρωτέας ἀμέσως ἢ 36137,6 δρ. πληρωτέας μετὰ 3 ἔτη καὶ 39374,4 δρ. μετὰ 4 ἔτη· ποία ἐκ τῶν δύο προσφορῶν εἶνε προτιμότερα, ἐὰν ἡ ὑφαίρεσις (ἐξωτ.) λογίζεται πρὸς 5 %; ἡ α'.

29) Τοκίζει τις ἐν πόσῳ πρὸς 3,75 %· Μετὰ 4 ἔτ. 5 μ. ἀποσύρει τὸ κεφάλαιον καὶ τὸν τόκον του καὶ τοκίζει τὸ ὅλον ποσὸν πρὸς 4,5 % καὶ ἔχει οὕτω ἐτήσιον εισόδημα 1250 δρ.· ποῖον τὸ ἀρχικὸν κεφάλαιον; 23830,8.

30) Κεφάλαιον τοκισζόμενον ἐπὶ 15 μῆνας αὐξάνεται κατὰ τὰ 0,0625 αὐτοῦ. Ποῖον εἶνε τὸ ἐπιτόκιον; 5.

31) Τὸ ἐτήσιον εισόδημα 40000 δρ. εἶνε κατὰ 1600 δρ. μικρότερον τοῦ τῶν 40000 δρ. τοκισμένον πρὸς 6 %· Πρὸς ποῖον ἐπιτόκιον ἐτοκίσθη τὸ α' κεφάλαιον; 5.

33) Γραμματίων, πληρωτέον μετὰ 3 μῆν. καὶ 10 ἡμ. ἐξοφλεῖται ἀντὶ 612 δρ. ταῖς μετρητοῖς· πόση εἶνε ἡ ὀνομαστικὴ ἀξία τοῦ γραμματίου, ἐὰν ἡ ὑφαίρεσις λογαριάζεται πρὸς 5 %; 621, 01.

34) Εἰς ἀναμιγνύει 3 χιλιόγρ. (40 γρ.) χρυσοῦ καθαρότητος 0,94 (0,9) καὶ 2 χιλιόγρ. (8 γρ. χαλκοῦ) ἄλλου χρυσοῦ καθαρότητος (0,9)· ποῖος ὁ βαθμὸς καθαρότητος τοῦ κράματος; 0,924 (0,75).

35) Εἰς ἀναμιγνύει 2 (13) χιλιόγρ. ἀργύρου βαθμοῦ καθαρότητος 0,94(0,9) καὶ 3 (2) χιλ. χαλκοῦ· πόσον ἀργυρον περιέχει τὸ μίγμα καὶ ποῖος ὁ βαθμὸς καθαρότητός του 1,88·0,376 (0,78).

36) Τὸ καθαρὸν βάρος ἑνὸς ἐμπορεύματος εἶνε 607,5 (779,28) χιλιόγρ., τὸ δὲ ἀπόδαρον (μικτὸν) 17,5 (816) χιλιόγρ.· πόσον τοῖς ἑκατὸν εἶνε τὸ ἀπόδαρον; 2,8 (4,5).

37) Εἰς ἀγοράζει 25 πηχτεῖς ὑφάσματος πρὸς 200 δρ. τὸν

πήχυν και πωλεί τούς 16,75 πήχεις πρὸς 240 δρ. τὸν πήχυν, τὸ δὲ ὑπόλοιπον πρὸς 250 δρ. τὸν πήχυν· πόσον τοῖς % ἐκέρδισεν; 21,65.

38) Εἰς 458 δκ. οἶνοπνεύματος περιέχονται 27,45 δκ. ὕδατος· πόσον τοῖς ἑκατὸν εἶνε το καθαρὸν οἶνόπνευμα; 94,00.

39) Εἰς πωλεῖ 17 μ. ὑφάσματος πρὸς 11 $\frac{11}{17}$ δρ. τὸ μέτρον· πόσον % ζημιώνεται, ἐὰν ἠγόρασεν αὐτὸ ἀντὶ 225 δρ.; 12,44...

40) Ἀντὶ 437,5 (842,8) δρ. ἐπληρώθησαν (80 ἡμέρας ἐνωρίτερον) μόνον 402,7 (825,6) δρ.· πόσον τοῖς ἑκατὸν εἶνε ἡ ἔκπτωσις; 7,95..(9,18..)

41) Ἀγοράζει τις 45 χιλιόγρ. ἐμπορεύματος πρὸς 13 δρ. τὸ χιλιόγραμμον και πωλεῖ αὐτὸ ἀντὶ 545, 22 δρ.· πόσον τοῖς ἑκατὸν ζημιώνεται; 6,8.

42) Ἐμπορος ἀγοράζει ἐμπόρευμα ἀντὶ 328,25 δρ. πωλεῖ δὲ αὐτὸ ἀντὶ 341, 38 δρ.· πόσον ἐκέρδισεν ἐπὶ τῆς ἀξίας του; 4.

43) Εἰς πωλεῖ ἐμπόρευμα, κερδίζων 333,66 δρ., ἀντὶ 6400, 2 δρ.· πόσον τοῖς ἑκατὸν εἶνε τὸ κέρδος του; (5,5..)

44) 12 σωλῆνες πληροῦν δεξαμενὴν εἰς 6 ὥρ. και 25'· πόσοι τοιοῦτοι σωλῆνες θὰ πληρώσουν τὴν δεξαμενὴν εἰς 7 ὥρ. και 42'; 10.

45) Ἐὰν ἔν ποσὸν μοιρασθῆ μεταξὺ 30 προσώπων, λαμβάνει καθὲν 90 δρ.· εἰς πόσα πρόσωπα θὰ μοιρασθῆ τὸ αὐτὸ ποσόν, διὰ τὴν λάβῃ καθὲν 75 δρ.; 36.

46) Διὰ τὴν διανύσῃ τις ὀρισμένην ἀπόστασιν κάμνει 154 βήματα μήκους 0,75 μ. καθέν· πόσον πρέπει τὴν εἶνε τὸ μήκος καθενὸς βήματος, ἐὰν θέλῃ τὴν διανύσῃ τὴν ἀπόστασιν αὐτὴν μὲ 165 βήματα; 0,7μ.

47) Ἐν ἐμπόρευμα στοιχίζει 655 δρ.· τὰ ἐξοδα ἦσαν 2%· πόσον πρέπει τὴν πωλήσῃ τὸ ἐμπόρευμα, ἐὰν θέλῃ τὴν κερδίσῃ 10 % ἐπὶ τῆς ὀλης δαπάνης; 734,91.

48) Ἀμαξοστοιχία, διατρέχουσα 56 χμ. τὴν ὥραν, διανύει μίαν ἀπόστασιν εἰς 1 ὥραν και 15'· ἐὰν διατρέχῃ 42 χμ. τὴν ὥραν, εἰς πόσον χρόνον θὰ διατρέξῃ τὴν αὐτὴν ἀπόστασιν; 1 ὥρ. 40'.

49) 24 ἐργάται, ἐργαζόμενοι 9,5 ὥρ. καθ' ἡμέραν, τελειώνουν ἓν ἔργον· ἐὰν προστεθοῦν 14 ἐργάται (τοιοῦτοι) πόσον πρέπει τὴν ἐργάζονται καθ' ἡμέραν, διὰ τὴν τελειώσουν τὸ ἔργον εἰς τὸν αὐτὸν χρόνον; 6 ὥρας.

50) Τροχός κάμνει 3648 στροφάς εις 1 ὥραν καὶ 16'. Πόσας στροφάς κάμνει εις 1 ὥρ. καὶ 25' ; 4080.

51) Ἐὰν μοιράσω μῆκος εις 35 ἴσα μέρη, καθὲν μέρος θὰ ἔχη μῆκος 0,18 μ.· εις πόσα ἴσα μέρη πρέπει νὰ διαιρέσω τὸ αὐτὸ μῆκος, διὰ νὰ εἶνε καθὲν τούτων 52,5 δάκτ. ; 12.

52) Λυχνία καίει καθ' ἡμέραν ἐπὶ 4,05 ὥρας καὶ περνᾷ τις μὲ ὀρισμένον ποσὸν ἐλαίου 16 ἡμ.· πόσον χρόνον θὰ καίῃ καθ' ἡμέραν ἢ λυχνία, εἰ μὲ τὸ αὐτὸ ποσὸν ἐλαίου περνᾷ 16,2 ἡμ. ; 4 ὥρ.

53) Ἄμαξα εις 6 ὥρ. 35' καὶ 45" διατρέχει διάστημα 120 χμ.· πόσα διατρέχει εις 1 ὥρ. ; 18, 193..χμ.

54) Ἐν ὥρολόγιον εις 5 (10) ὥρ. καὶ 20' (30') προχωρεῖ 2' (8') ἔμπρός· πόσον προχωρεῖ εις μίαν ὥραν ; $\frac{3'}{8} \left(\frac{16'}{21} \right)$.

55) Μία κρήνη πληροῖ δεξαμενὴν εις 3 ὥρας 20' καὶ 45"· πόσον μέρος τῆς δεξαμενῆς θὰ πληρώσῃ εις 1 ὥραν ; $\frac{240}{803}$

56) Μὲ 5 λίρας 3 σελ. 8 πέν. ἀγοράζει τις 3 ὄκ. καὶ 200 δρμ. μετάξης· πόσῃν μέταξαν ἀγοράζει μὲ 1 λίραν ; $270 \frac{30}{311}$ δρμ.

57) Ἄν ἡ ὀκᾶ μετάξης τιμᾶται 5 τάλ. καὶ 3 δρ., πόσον τιμῶνται 8 ὄκ. 250 δρμ. τῆς μετάξης ταύτης ; 241,5 δρ.

58) Ἄν ὁ πήχυς ἑνὸς ὑφάσματος τιμᾶται 2,70 δρ., πόσον τιμῶνται 8 πήχεις καὶ 6 ρούπια τοῦ αὐτοῦ ὑφάσματος ; 23, 625 δρ.

59) Νὰ τραποῦν 5 ἡμ. 3 ὥρ. 50' 45" εις ὥρας (ἂν ἡ ἡμέρα λογαριάζεται πρὸς 12 ὥρας). $63 \frac{203}{240}$ ὥρ.

60) Νὰ τραπῇ εις συμμιγῆ ὁ ἀριθμὸς $\frac{12}{7}$ πῆχ. 1 π. $5 \frac{5}{7}$ ρ.

61) Ἄν 65 ὄκ. σίτου ἐπωλήθησαν ἀντὶ 32,60 δρ., πόσον ἐπωλήθη ἡ ὀκᾶ ; $50 \frac{2}{13}$ λ.

62) Κρήνη πληροῖ δεξαμενὴν εις 5 (3,5) ὥρας· ἑτέρα κρήνη δύναται νὰ πληρώσῃ αὐτὴν εις 4 (7,25) ὥρας· εις πόσας ὥρας αἱ δύο κρήναι, συγχρόνως ρέουσαι, θὰ πληρώσουν αὐτὴν ; $2 \frac{2}{9} \left(2 \frac{31}{86} \right)$.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΧΙΥ

Στοιχεῖα Λογιστικῆς καὶ Κατασκευογραφίας.

§ 113. Σκοπὸς τῆς Λογιστικῆς.—

Ἐὰν εἰς ἔμπορος, ἢ ἔμπορικόν, βιομηχανικόν, τραπεζικόν κατάστημα, θέλῃ νὰ γνωρίζῃ καθ' ὁσονδήποτε στιγμὴν τὸ ἀποτέλεσμα καὶ τὴν ἐν γένει κατάστασιν εἰς τὴν ὁποίαν εὐρίσκονται αἱ ἔμπορικαὶ τοῦ ἐπιχειρήσεις, πρέπει νὰ κρατῇ λεπτομερῶς πᾶσαν ἔμπορικὴν του πράξιν καὶ νὰ καταγράφῃ αὐτὰ εἰς βιβλία μετὰ τινος μεθοδικότητος, ὥστε νὰ δύναται εἰς πᾶσαν στιγμὴν μὲ τὴν βοήθειαν τῶν βιβλίων τούτων, νὰ εὐρίσκῃ τὸ ἀποτέλεσμα τῶν ἐργασιῶν του. Τὸ μάθημα, τὸ ὅποιο διδάσκει, πῶς δυνάμεθα νὰ ἐγγράψωμεν μεθοδικῶς τὰς ἔμπορικὰς ἐργασίας ἐνὸς ἔμπορικοῦ οἴκου ἐν γένει εἰς τρόπον, ὥστε νὰ δυνάμεθα εὐκόλως, νὰ εὐρίσκωμεν καθ' ὁσονδήποτε στιγμὴν τὸ ἀποτέλεσμα αὐτῶν, λέγεται *Λογιστικὴ*. Μὲ τὴν βοήθειαν τῆς Λογιστικῆς λοιπὸν δύναται πᾶς ἔμπορος, ἢ ἐπιχειρηματίας, νὰ εὐρίσκῃ τὴν κατάστασιν εἰς τὴν ὁποίαν εὐρίσκεται ἔμπορικῶς· ἦτοι, τί κατέχει, τί ἐξῶσων εἶχε τοῦ ἐλλείπει, τί ἐπὶ πλεόν ἔχει, τί ὀφείλει εἰς ἄλλους μετὰ τῶν ὁποίων εὐρίσκεται εἰς ἔμπορικὰς σχέσεις, καὶ τί ἄλλοι ὀφείλουσιν εἰς αὐτόν.

Ἐν γένει, διὰ τῆς Λογιστικῆς δύναται καθεὶς, νὰ εὐρίσκῃ εὐκόλως, ἂν ἠδξήθη ἢ ἠλαττώθη ἡ περιουσία του, ἢ ὅποια ἔχει διατεθῇ διὰ τὰς ἔμπορικὰς του ἐπιχειρήσεις μετὰ τινος περιόδου ἔμπορικῶν ἐργασιῶν, δηλαδὴ τί ἐκέρδισεν, ἢ τί ἐζημιώθη ἐκ τῆς ἐπιχειρήσεως του.

§ 114. Λογιστικὴ ἀπλογραφικὴ καὶ διπλογραφικὴ.—

α') Ὁ λαμβάνων παρ' ἄλλου ἐν χρηματικὸν ποσόν ἢ ἐν ἐμπόρευμα ὑπὸ τῶν ὅρων νὰ ἐπιστρέψῃ τὰ χρήματα, ἢ τὴν ἀξίαν τοῦ ἐμπορεύματος μετὰ τινος χρόνον εἰς τὸν πρῶτον, λέγεται *χρεώστης*.

Ὁ δίδων τι, χωρὶς νὰ λάβῃ τὴν ἀξίαν του, ἀλλὰ δικαιούμενος νὰ λάβῃ αὐτήν, λέγεται *πιστωτής*. Οὕτω, ἐὰν ὁ Γεώργιος ἐδάνεισε 500 δρ. εἰς τὸν Ἰωάννην, ὁ μὲν Γεώργιος εἶνε ὁ πιστωτής, ὁ δὲ Ἰωάννης ὁ χρεώστης. Διότι, αὐτὸς ἔλαβε τὰς 500 δρ. ὑπὸ τῶν ὅρων νὰ τὰς ἐπιστρέψῃ εἰς τὸν πιστωτήν.

Ὅμοίως, ἂν ἀγοράσωμεν ἐν ἐμπόρευμα ἀξίας 500 δρ. παρὰ τοῦ Ν ἐπὶ πιστώσει, ὁ μὲν Ν εἶνε πιστωτής, ἡμεῖς δὲ χρεώστης.

Ἐὰν πωλήσωμεν εἰς τὸν Γ δέμα μαλλίων καὶ λάβωμεν τὴν ἀξίαν του εἰς μετρητὰς δραχμὰς 500, ὁ Γ δὲν εἶνε χρεώστης, διότι ἔλαβεν μὲν ἐν δέμα μαλλίων ἀξίας 500 δρ., ἀλλ' ἐμέτρησεν αὐτὰς κατὰ τὴν παραλαβὴν τοῦ ἐμπορεύματος.

Ἐὰν δώσω εἰς τὸν Α 1000 δρ. ἐπὶ πιστώσει, καὶ ἐγγράψω τὴν πρᾶξιν αὐτὴν εἰς τὰ βιβλία τῆς Λογιστικῆς εἰς τρόπον, ὥστε νὰ διακρίνεται ὅτι ὁ Α εἶνε χρεώστης τῶν 1000 δρ., λέγω ὅτι ἐχρέωσα τὸν Α μὲ 1000 δραχμὰς.

Ἐὰν λάβω παρ' ἑνὸς ἐν ἐμπόρευμα 1000 δρ. ἐπὶ πιστώσει, π. χ. παρὰ τοῦ Α, καὶ ἐγγράψω εἰς τὰ βιβλία τὴν πρᾶξιν αὐτὴν, ὥστε νὰ φαίνεται ὅτι ὁ Α εἶνε πιστωτής τῶν 1000 δρ., λέγω ὅτι ἐπίστωσα τὸν Α μὲ 1000 δραχμὰς.

6) Ὑπάρχουν δύο σηστήματα Λογιστικῆς. 1) ἡ ἀπλογραφικὴ, ἢ Ἀπλογραφία, καὶ 2) ἡ διπλογραφικὴ, ἢ Διπλογραφία.

Ἡ οὐσιώδης διαφορὰ τῶν δύο αὐτῶν συστημάτων συνίσταται, εἰς τὸ ὅτι εἰς μὲν τὴν Ἀπλογραφίαν εἰς καθεμίαν ἐμπορικὴν πρᾶξιν κάμνομεν μίαν μόνον ἐγγραφὴν τοῦ ἀντιστοιχοῦντος εἰς τὴν πρᾶξιν ποσοῦ, δηλαδὴ τὴν χρέωσιν, ἢ τὴν πίστωσίν του· εἰς δὲ τὴν Διπλογραφίαν τοῦναντίον κάμνομεν δύο ἐγγραφὰς τοῦ αὐτοῦ ποσοῦ, μίαν διὰ τὴν χρέωσιν καὶ ἄλλην διὰ τὴν πίστωσίν του.

Οὕτω π. χ., ἐὰν δώσω εἰς τὸν Α ἐπὶ πιστώσει 1000 δρ., κατὰ τὴν Ἀπλογραφίαν, ἐγγράψω τὴν πρᾶξιν αὐτὴν εἰς τὰ βιβλία μου, χρεώνων τὸν Α μὲ τὸ ποσὸν τῶν 1000 δρ., ἐνῶ κατὰ τὴν Διπλογραφίαν, πρέπει νὰ χρεώσω τὸν Α μὲ τὸ ποσὸν τῶν 1000 δρ., καὶ νὰ πιστώσω τὸν ἑαυτὸν μου μὲ τὸ ποσὸν τῶν 1000 δρ., διότι ἔδωκα αὐτὰς.

Ἡ Ἀπλογραφία εἶνε πολὺ ἀπλῆ καὶ εὐκόλος, ἀλλ' ἀτελής. Διότι δὲν εἶνε τοιαύτη, ὥστε νὰ δύναται νὰ παρέχη πάντοτε λεπτομερεῖς πληροφορίας περὶ τῆς ἐν γένει ἐμπορικῆς καταστάσεως τοῦ ἐμπόρου, οὐδὲ παρέχει πλήρη ἔλεγχον τῶν ἐγγραφῶν, αἱ ὁποῖαι γίνονται εἰς τὰ λογιστικὰ βιβλία.

Τοῦναντίον, ἡ Διπλογραφία εἶνε συστηματικὴ καὶ τελειοτέρα, παρέχουσα λεπτομερεῖς πληροφορίας περὶ τῆς ἐν γένει καταστά-

σεως τῆς ἐμπορικῆς ἐπιχειρήσεως καὶ πλήρη ἐλεγχον τῶν ἐγγραφῶν, αἱ ὁποῖαι γίνονται εἰς τὰ λογιστικά βιβλία.

Διὰ ταῦτα, ἡ μὲν Ἀπλογραφία ἐφαρμόζεται εἰς μικρὰς ἐμπορικὰς ἐπιχειρήσεις, ἐνῶ ἡ Διπλογραφία εἰς τὰς μεγάλας καὶ τὰς καλῶς ὀργανωμένας.

§ 115. Λογαριασμός, χρέωσις, πίστωσις.—

α') Πᾶς ἔμπορος κατὰ τὴν διεξαγωγὴν τῶν ἐμπορικῶν του ἐπιχειρήσεων ἔρχεται εἰς ἐμπορικὰς οἰκονομικὰς σχέσεις μετὰ διαφόρων προσώπων, ἢ ἐμπορικῶν καταστημάτων, ἐνεργῶν μὲ καθένα τούτων ἐμπορικὰς ὁσοληψίας ὑπὸ ὀρισμένης συνθήκας.

Ἐὰν ὁ ἔμπορος θέλῃ νὰ εὐρίσκη εὐκόλως τὴν ἐμπορικὴν του θέσιν ἀπέναντι καθενὸς τούτων, μετὰ τῶν ὁποίων ἐνεργεῖ τὰς ὁσοληψίας, δὲν πρέπει νὰ ἐμπιστεύεται μόνον εἰς τὴν μνήμην του τὴν διεξαγωγὴν τῶν διαφόρων πράξεων μετὰ τῶν ἐν λόγῳ προσώπων, ἀλλὰ νὰ κρατῇ ἀκριβῆ καὶ ὅσω τὸ δυνατόν λεπτομερῆ σημείωσιν αὐτῶν εἰς τὰ λογιστικά βιβλία.

Συνήθως ἐγγράφομεν πᾶσαν ἐμπορικὴν πράξιν, ἀφορῶσαν τὸ αὐτὸ πρόσωπον ἢ ἐμπορικὸν κατάστημα εἰς μίαν σελίδα ἐνὸς τῶν λογιστικῶν βιβλίων, διὰ νὰ δυνάμεθα ταχύτερον καὶ εὐκολώτερον ἐκ τῆς παρατηρήσεως τῶν ἐγγραφῶν αὐτῶν, νὰ εὐρίσκωμεν εἰς πᾶσαν στιγμὴν τὴν κατάστασιν μας πρὸς τὸ ἐν λόγῳ πρόσωπον.

Ἡ τοιαύτη σημείωσις τῶν ἐμπορικῶν πράξεων, αἱ ὁποῖαι ἀποβλέπουν πρόσωπόν τι ἢ κατάστημα ὀρισμένον, λέγεται λογαριασμός, ἢ μερὶς τοῦ θεωρουμένου προσώπου εἰς τὰ βιβλία τοῦ ἐμπόρου (βλέπε σελ. 218).

Αἱ ἀφορῶσαι τὸ αὐτὸ πρόσωπον ἐμπορικαὶ πράξεις ἐγγράφονται εἰς τὸ λογαριασμόν του ὅχι ὅλως τυχαίως καὶ ἀπλῶς μόνον ἢ μία μετὰ τὴν ἄλλην, καθὼς αὐταὶ ἐγιναν, ἀλλὰ μεθοδικώτερον πως, ὡς ἐξῆς. Χρησιμοποιεῖται συνήθως μίξ σελὶς τοῦ βιβλίου, διηρημένη εἰς δύο μέρη· εἰς τὸ ἀριστερὸν μέρος ἐγγράφονται πᾶσαι αἱ πράξεις κατὰ τὰς ὁποίας ἔτυχε τὸ πρόσωπον, τὸ ὁποῖον ἀφορᾷ ὁ λογαριασμός αὐτός, νὰ λάβῃ παρ' ἡμῶν ἀμέσως ἢ ἐμμέσως, δηλαδὴ παρ' ἄλλου διὰ λογαριασμόν ἡμῶν, ἐν πρᾶγμα ἐπὶ πιστώσει. Καθεμία τῶν πράξεων αὐτῶν ἐκτίθεται συντόμως μὲν, ἀλλὰ σαφῶς, συνοδεύεται δὲ ἀφ' ἐνὸς μὲν ὑπὸ τῆς χρονολογίας κατὰ τὴν ὁποίαν ἐγινεν ἢ πράξις αὐτή, ἀφ' ἑτέρου δὲ ὑπὸ τοῦ ποσοῦ, τὸ ὁποῖον φανερώνει τὴν συμφωνηθεῖσαν ἀξίαν τοῦ ἐμπορεύματος, καὶ μὲ τὸ ὁποῖον χρεώνομεν τὸ πρόσωπον, τὸ παριστανόμενον ὑπὸ

τοῦ λογαριασμοῦ. Εἰς τὸ δεξιὸν μέρος ἐγγράφονται πᾶσαι αἱ πράξεις κατὰ τὰς ὁποίας τὸ πρόσωπον, τὸ ὁποῖον παριστάνει ὁ λογαριασμός, ἔτυχε νὰ δώσῃ εἰς ἡμᾶς ἀμέσως ἢ ἐμμέσως ἐν πράγμα. Καθεμία τῶν πράξεων τούτων ἐκτίθεται ὡς καὶ εἰς τὸ ἀριστερὸν μέρος.

β') Τὸ πρὸς τὰριστερὰ μέρος ἐνὸς λογαριασμοῦ λέγεται *χρέωσις*, τὸ δὲ πρὸς τὰ δεξιὰ του *πίστωσις*.

Ὁ λόγος τῆς ὀνομασίας αὐτῆς τῶν δύο μερῶν εἶε ὁ ἑξῆς. Ἐπειδὴ τὸ πρόσωπον, τὸ ὁποῖον παριστάνει ὁ λογαριασμός, λαμβάνον πρᾶγμα τι παρ' ἡμῶν, λαμβάνει αὐτὸ ὄχι δωρεάν, ἀλλ' ὑπὸ τὸν ὄρον νὰ μᾶς δώσῃ τὸ ἀντίτιμὸν του, αὐτὰ δὲ τὰ ποσὰ γράφομεν εἰς τὸ ἀριστερὸν μέρος, ἔπεται ὅτι, τὸ ἀριστερὸν μέρος παριστάνει τὸ χρέος τοῦ ἐν λόγῳ προσώπου πρὸς ἡμᾶς, καὶ καλεῖται *χρέωσις* του. Ἐπίσης τὸ δεξιὸν μέρος παριστάνει τὰ ποσὰ, τὰ ὁποῖα μᾶς ἔδωκε τὸ πρόσωπον, τὸ ὁποῖον ἀντιπροσωπεύει ὁ λογαριασμός· ἄρα περιέχει τοῦτο κατάλογον τῶν χρεῶν μᾶς, ἢ τῶν ἀπαιτήσεών του παρ' ἡμῶν, καὶ διὰ τοῦτο καλεῖται *πίστωσις* του.

§ 116. Δοῦναι, Λαβεῖν. —

α') Τὸ ἀριστερὸν μέρος ἐνὸς λογαριασμοῦ λέγεται καὶ *Δοῦναι*, τὸ δὲ δεξιὸν καὶ *Λαβεῖν*. Διότι τὸ μὲν παριστάνει, καθὼς ἀνωτέρω εἶδομεν, τὰ ποσὰ, τὰ ὁποῖα χρεωστεῖ, ἢ ὀφείλει νὰ μᾶς δώσῃ τὸ πρόσωπον, τὸ ὁποῖον παριστάνει ὁ λογαριασμός, τὸ δὲ δεξιὸν ὅτι δικαιοῦται νὰ λάβῃ αὐτὸ ἀπὸ ἡμᾶς. Διὰ τοῦτο οἱ δύο ὄροι *Δοῦναι*, καὶ *Χρέωσις*, εἶνε συνώνυμοι, καθὼς καὶ οἱ *Λαβεῖν*, καὶ *Πίστωσις*.

Ἄν τὸ Δοῦναι ἐνὸς λογαριασμοῦ ὑπερβαίῃ τὸ Λαβεῖν, συνάγομεν ὅτι τοῦ ἐδώκαμεν περισσότερα τῶν ὅσα μᾶς ἔδωκεν αὐτός, καὶ ἐπομένως ὅτι μᾶς ὀφείλει τὸ πλεονάζον ποσόν. Ἄν δὲ τοῦναντίον τὸ Λαβεῖν εἶνε μεγαλύτερον τοῦ Δοῦναι, συνάγομεν ὅτι ἐλάδομεν ἀπὸ αὐτὸν περισσότερα τῶν ὅσο τοῦ ἐδώκαμεν, καὶ ἐπομένως τοῦ ὀφείλομεν τὸ πλεονάζον ποσόν.

β') Ὅταν τὸ ἄθροισμα τῶν ποσῶν τοῦ Δοῦναι ὑπερβαίῃ τὸ ἄθροισμα τῶν ποσῶν τοῦ Λαβεῖν, τὸ πλεονάζον εἰς τὸ Δοῦναι ποσόν καλεῖται *χρεωστικὸν ὑπόλοιπον*, ἐπειδὴ προέρχεται ἀπὸ τὴν χρέωσιν.

Ὅταν τὸ ἄθροισμα τῶν ποσῶν τοῦ Λαβεῖν ὑπερβαίῃ τὸ τοῦ Δοῦναι, τὸ πλεονάζον ποσόν εἰς τὸ Λαβεῖν καλεῖται *πιστωτικὸν ὑπόλοιπον*, ἐπειδὴ προέρχεται ἀπὸ τὴν πίστωσιν. Εἰς λογαριασμός λέγεται *χρεώσις*, ὅταν ἔχῃ χρεωστικὸν ὑπόλοιπον· *πιστωτὴς* δέ, ὅταν ἔχῃ *πιστωτικὸν ὑπόλοιπον*.

ΤΥΠΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Δοῦναι ἢ χρέωσις

Λαβεῖν ἢ πίστωσις

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

	(z)					(z)				

Ἡ στήλη 1 χρησιμεύει διὰ νὰ γράφωμεν τὸν μῆνα κατὰ τὸν ὁποῖον ἔγινεν ἡ ἐμπορικὴ πράξις· ἡ 2 χρησιμεύει διὰ τὴν ἡμέραν τοῦ μηνός· ἡ 3 διὰ τὴν λεπτομέρειαν τῆς πράξεως· ἡ 4 καὶ 5 διὰ τὰς δραχμὰς καὶ τὰ λεπτὰ τοῦ ποσοῦ. Εἰς τὴν θέσιν (α) γράφεται τὸ ἔτος κατὰ τὸ ὁποῖον γίνεται ἡ πράξις.

γ') Χρεώομεν ἓνα λογαριασμὸν σημαίνει, ὅτι ἐγγράφομεν εἰς τὴν χρέωσίν του ἓν ποσόν· πιστώνομεν δὲ ἓνα λογαριασμὸν σημαίνει, ὅτι ἐγγράφομεν ἓν ποσὸν εἰς τὴν πίστωσίν του.

Παράδειγμα. Πρὸς ἐφαρμογὴν τῶν ἀνωτέρω ἔστω ὅτι ἐνήργησαμεν τὰς κάτωθι ἐμπορικὰς πράξεις μετὰ τινος προσώπου, ἔστω τοῦ Νικολάου.

- 1) 1913 Ὀκτωβρίου 10. Ἐπωλήσαμεν εἰς τὸν Νικολάου ἐπὶ πιστώσει ἐμπορεύματα ἀξίας δρ. 250.
- 2) » Ὀκτωβρίου 20. Ἐλάβομεν παρὰ τοῦ Νικολάου εἰς μετρητὰ δρ. 200.
- 3) 1914 Φεβρουαρίου 5. Κατεθέσαμεν παρὰ τῷ Νικολάου διὰ τοῦ Ἰωάννου διὰ λογαριασμὸν μας γραμμάτιον εἰς βῆρος τοῦ Ἰωάννου λήγον τῇ 5 Μαΐου δρ. 1500.

Προκειμένου νὰ ἐγγράψωμεν τὰς πράξεις αὐτὰς εἰς τὸν λογαριασμὸν τοῦ Νικολάου, εὐρίσκομεν πρῶτον, ποῖαι τῶν πράξεων αὐτῶν πρέπει νὰ ἐγγραφῶν εἰς τὴν χρέωσιν, καὶ ποῖαι εἰς τὴν πίστωσιν τοῦ λογαριασμοῦ τοῦ Νικολάου.

Ἡ πράξις 1) θὰ ἐγγραφῆ εἰς τὴν χρέωσιν· διότι ὁ Νικολάου ὀφείλει νὰ μᾶς πληρώσῃ τὰς 250 δρ. διὰ τὰ ἐμπορεύματα, τὰ ὁποῖα τοῦ ἐπωλήσαμεν ἐπὶ πιστώσει. Ἡ πράξις 2) θὰ ἐγγραφῆ εἰς τὴν πίστωσιν τοῦ λογαριασμοῦ. Ἡ 3) θὰ ἐγγραφῆ εἰς τὴν χρέωσιν, διότι ὁ Νικολάου ἔλαβε παρὰ τοῦ Ἰωάννου γραμμάτιον 1500.

Κατὰ ταῦτα καὶ συμφώνως πρὸς τὸν ἀνωτέρω τύπον λογαριασμοῦ ὁ λογαριασμὸς τοῦ Νικολάου θὰ εἶνε ὡς κατωτέρω σελ. 219.

Εἰς τὸν λογαριασμὸν τοῦτον τοῦ Νικολάου τὸ ἄθροισμα τῶν ποσῶν τῆς χρέωσεως εἶνε μεγαλύτερον τοῦ ἄθροισματος τῶν πο-

σῶν τῆς πιστώσεως. Διὰ τοῦτο ὁ λογαριασμός αὐτός, ἦτοι ὁ Νικολάου, εἶνε χρεώστης μας τοῦ ἐπὶ πλέον ποσοῦ, τὸ ὁποῖον εὐρίσκεται, ἐὰν ἀπὸ τὰς 1750 δρ. τῆς χρεώσεως ἀφαιρέσωμεν τὰς 200 δρ. τῆς πιστώσεως, ἦτοι τοῦ ποσοῦ τῶν 1550 δραχμῶν. Τὸ ποσὸν αὐτὸ εἶνε τὸ χρεωστικὸν ὑπόλοιπον τοῦ Νικολάου.

Δοῦναι	Νικολάου (ὀδὸς...)	Λαβεῖν
1913	Δρ.Λ. 1913	Δρ.Λ.
8/βρίου 10	'Αξίαν 'Εμπορευμάτων 250	8/βρίου 20
1914		Μέτρη-
Φεβρ. 5	Κατάθεσις μας κατ'	τάς 200
	αὐτῆ διὰ τοῦ Ι.	
	<u>1500</u>	
	'Εν ὄλῳ 1750	'Εν ὄλῳ <u>200</u>

'Ασκήσεις. 1) Εἰς καθεμίαν τῶν κάτωθι ἐμπορικῶν πράξεων νὰ εὐρεθῇ ποῖος εἶνε ὁ χρεώστης καὶ ὁ πιστωτής, καὶ ἐπομένως ποίας χρεώσεις ἢ πιστώσεις θὰ κάμῃ καθεὶς τῶν ἐνδιαφερομένων.

α') Τὴν 2αν Ὀκτωβρίου 1915 ἠγόρασα ἀπὸ Πυρρῆν καὶ Σίαν 20 βαρέλια ἐλαίου ὀκ. 3240 πρὸς 1,15 δρ. τὴν ὀκᾶν Δρ. 3726.

β') Ἐμέτρησα εἰς Πυρρῆν καὶ Σίαν πρὸς ἐξόφλησιν τῆς ἀξίας τῶν 20 βαρελίων ἐλαίου » 3726.

γ') ἠγόρασα ἀπὸ Δ. Ξένον 40 κιβώτια σάπωνος ἐκ 3548 ὀκ. πρὸς 98 λ. τὴν ὀκᾶν » 3477,05

Ἐμέτρησα ἐναντι » 1477,05

'Υπόλοιπον » 2000.

δ') Τὴν 4ην τοῦ ἰδίου ἠγόρασα ἀπὸ Δ. Ξένον 35 κιβώτια σάπωνος ἐκ 3080 ὀκάδων πρὸς 97 λ. τὴν ὀκᾶν τοῖς μετρητοῖς δρ. 5987,60.

ε') Τὴν 9ην ἰδίου ἐμέτρησα εἰς Δ. Ξένον πρὸς ἐξόφλησιν τῆς ἀξίας τῶν 40 κιβωτίων σάπωνος τῆς 2ας τρέχοντος δρ. 2000.

ς') Τὴν 27ην Ὀκτωβρίου ἠγόρασα ἀπὸ Δ. Ξένον 30 κιβώτια σάπωνος ἐκ 2620 ὀκ. πρὸς 85 λ. τὴν ὀκᾶν δρ. 2227.

Πρὸς πληρωμὴν αὐτῶν τοῦ παρεχώρησα γραμματίων ὡς ἑξῆς

ἀξία γραμματίου	1714,50
μείον τόκος προεξοφλήσεως	9,10 = 1705,40
μετρητὰς πρὸς ἐξόφλησιν	<u>521,60</u>

'Εν ὄλῳ 2227.

ζ') Ὁ ἐν Πειραιεὶ Βούρβουλης ἐπλήρωσε τὴν 15 Ἰουλίου εἰς τὸν Γιάγκιπαν τῆς αὐτῆς πόλεως κατὰ διαταγὴν καὶ διὰ λογαριασμὸν τοῦ ἐν Σύρῳ Ταμβακίδου δρ. 1000.

2) Ἐκ τῶν ἀνωτέρω πράξεων ποῖται ἐξ ἐκείνων αἱ ὁποῖαι ἀποδέ-
πουν τὸν Δ. Ξένον θὰ ἐγγραφοῦν εἰς τὴν χρέωσιν καὶ ποῖται εἰς τὴν
πίστωσιν τοῦ λογαριασμοῦ του ;

3) Σχηματίσατε ἐκ τῶν ἀνωτέρω πράξεων τὸν λογαριασμὸν τοῦ Δ.
Ξένου κατὰ τὸ παράδειγμα τοῦ λογαριασμοῦ τοῦ Νικολάου.

§ 117. "Ἄνοιγμα, περάτωσις καὶ μεταφορὰ λογα-
ριασμοῦ.—

α') Ὅταν εἰς ἔμπορος ἐνεργῆ μετὰ τινος προσώπου ἐμπορικὰς πρά-
ξεις, διαθέτει μίαν σελίδα ἐνὸς βιβλίου, τὸ ὁποῖον περιέχει τοὺς λογα-
ριασμοὺς ἐκείνων μετὰ τῶν ὁποίων συναλλάσσεται, καὶ εἰς αὐτὴν ἐγγρά-
φει ἕλας τὰς πράξεις, τὰς ἀφορώσας τὸ περὶ τοῦ ὁποίου ὁ λόγος πρό-
σωπον. Ἡ πράξις αὐτὴ λέγεται ἄνοιγμα λογαριασμοῦ, γίνεται δὲ ὡς
ἑξῆς.

Γράφομεν μὲ παχέα καὶ καλλιγραφικὰ γράμματα τὸ ὀνοματεπώνυ-
μον τοῦ προσώπου, τὸ ὁποῖον ἀντιπροσωπεύει ὁ λογαριασμός, τὸν
ὁποῖον ἀνοίγωμεν. Ὑποκάτω τοῦ ὀνόματος, ἢ δεξιὰ αὐτοῦ, ἐν παρενθέ-
σει γράφομεν διὰ μικροτέρων γραμμῶν τὴν διεύθυνσίν του. Ἐπίσης
γράφομεν τὰς λέξεις «Δοῦναι» καὶ «Λαβεῖν» ἑκατέρωθεν τοῦ ὀνοματε-
πώνυμου καὶ εἰς τὰς γωνίας τῆς σελίδος (συνήθως αἱ λέξεις Δοῦναι,
Λαβεῖν εἶνε ἐκ τῶν προτέρων τυπωμένοι εἰς καθεμίαν σελίδα τοῦ
βιβλίου).

β') Καλεῖται περάτωσις λογαριασμοῦ ἡ πράξις, διὰ τῆς ὁποίας
εὐρίσκεται τὸ ὑπόλοιπον, τὸ ὁποῖον παρουσιάζει εἰς λογαριασμοῦς
κατὰ τινα ἐποχὴν. Τὸ ὑπόλοιπον αὐτὸ θὰ εἶνε χρεωστικὸν ἢ πιστω-
τικὸν ἢ καὶ μηδέν; Ἐὰν τὸ ἄθροισμα τῶν ποσῶν τὰ ὁποῖα εἶνε
ἀναγεγραμμένα εἰς τὴν χρέωσιν εἶνε μεγαλύτερον μικρότερον ἢ ἴσον
ἀντιστοίχως πρὸς τὸ ἄθροισμα τῶν ποσῶν τῆς πιστώσεως.

Πρὸς περάτωσιν ἐνὸς λογαριασμοῦ προσθέτομεν ἰδιαιτέρως ἕλα
τὰ ποσὰ τῆς χρεώσεώς του, καὶ τὸ ἄθροισμα γράφομεν εἰς αὐτὸν καὶ
ὑπὸ τὰ ἄλλα ποσὰ εἰς τὸ αὐτὸ κάμνομεν καὶ διὰ τὰ ποσὰ τῆς πιστώσεώς
του. Ἐὰν τὰ δύο ποσὰ τῶν ἄθροισμάτων εἶνε ἴσα, λέγομεν ὅτι ὁ λογα-
ριασμός αὐτὸς εἶνε ἐξωφλημένος, ἂν δὲ ἄνισα, θὰ ἐξισώσωμεν αὐτόν,
δηλαδὴ θὰ κάμωμεν τὰ ποσὰ τῆς χρεώσεως καὶ πιστώσεώς του ἴσα,
ὡς ἑξῆς.

"Ἄς ὑποτεθῆ ὅτι ἐκ τῆς συγκρίσεως τῶν δύο ἄθροισμάτων,
τὰ ὁποῖα εὐρήκαμεν, μεγαλύτερον εἶνε τὸ τῆς χρεώσεως, καὶ ἐπο-
μένως μετὰ τὴν ἀφαίρεσίν των προκύπτει χρεωστικὸν ὑπόλοιπον.
Διὰ νὰ κάμωμεν τὴν ἐξίσωσιν τοῦ λογαριασμοῦ, πιστώνομεν αὐτόν
μὲ τὸ χρεωστικὸν ὑπόλοιπον, γράφοντες εἰς τὴν περιληψίν τὰς

λέξεις απρὸς ἐξίσωσιν». Ἀκολουθῶς προσθέτομεν τὸ ποσὸν αὐτὸ εἰς τὸ ἄθροισμα τῶν ποσῶν τῆς πιστώσεως, καὶ εὐρίσκομεν ὅτι καὶ τὰ δύο ἄθροισματα τῆς χρεώσεως καὶ πιστώσεως εἶνε ἴσα, ἦτοι ὅτι ὁ λογαριασμός εἶνε ἐξισωμένος. Μετὰ τὴν ἐξίσωσιν τοῦ λογαριασμοῦ γράφομεν ὑποκάτω καθενὸς τῶν ἴσων τούτων ἄθροισμάτων εἰς τὸ αὐτὸ ὕψος μικρὰν διπλὴν ὀριζοντίαν γραμμὴν, ἣ ὁποία φανερώνει ὅτι ὁ λογαριασμός αὐτός ἐπερατώθη, καὶ ὅτι δὲν πρέπει τὰ ποσὰ αὐτὰ νὰ συγχωνευθοῦν βραδύτερον μὲ ἄλλα, τὰ ὁποῖα τυχὸν νὰ γράφοντο ὑπὸ τὴν διπλὴν γραμμὴν.

Ὅστω π. χ. διὰ νὰ περατώσωμεν τὸν κάτωθι λογαριασμὸν τοῦ Ι. Πετρίδου, προσθέτομεν τὰ ποσὰ τῆς χρεώσεως τοῦ 350,80· 1000· 200 ἰδιαιτέρως ἐπὶ προχείρου φύλλου χάρτου, καὶ εὐρίσκομεν ἄθροισμα 1550,80 τὸ ὁποῖον γράφομεν κάτωθεν τῶν ἄλλων ποσῶν, ἐνῶ εἰς τὴν οἰκείαν στήλην τῆς περιλήψεως γράφομεν τὰς λέξεις «ἐν ὅλῳ». Τὸ αὐτὸ κάμνομεν καὶ διὰ τὰ ποσὰ τῆς πιστώσεως, καὶ εὐρίσκομεν ἄθροισμα 1250. Ἀφαιροῦντες ἀπὸ τοῦ 1550,80 τὸ 1250 εὐρίσκομεν τὸ χρεωτικὸν ὑπόλοιπον 300,80. Διὰ νὰ ἐξισώσωμεν τὸν λογαριασμὸν καὶ ἐπομένως νὰ περατώσωμεν αὐτόν, πιστώνομεν αὐτόν μὲ τὸ ποσὸν τῶν 300,80 δρ.· ἀκολουθῶς προσθέτομεν αὐτὸ εἰς τὸ προηγούμενον ἄθροισμα τῆς πιστώσεως καὶ εὐρίσκομεν ἄθροισμα τῆς πιστώσεως 1550,80, τὸ ὁποῖον γράφομεν εἰς τὸ αὐτὸ ὕψος, εἰς τὸ ὁποῖον εὐρίσκεται καὶ τὸ ἀντιστοιχὸν ἄθροισμα τῆς χρεώσεως.

Δοῦναι **I. Πετρίδης (ἐν Πειραιεῖ δόδός...)** **Λαβεῖν**

1916		Δρ.	Λ.	1916		Δρ.	Λ.
Μαρτ.	7	'Αξίαν ἐμπορευμάτων	350	80	Μαρτ. 26	Μετρητὰς	250
					Μαΐου 2	»	1000
'Απρ.	12	Γραμματίου	1000	—		'Εν ὅλῳ	1250
»	15	'Αξίαν ἐμπορευμάτων	200			Πρὸς ἐξόφλ.	300
		'Εν ὅλῳ	<u>1550</u>	<u>80</u>			<u>1550</u>
'Ιουν.	1	'Υπόλ. ὡς ἄνω	300	80			<u>80</u>

Ἐὰν τὸ νέον τοῦτο ἄθροισμα τῆς πιστώσεως εὐρίσκεται κατωτέρω τοῦ πρώτου, γράφομεν ἐκ νέου τὸ πρῶτον εἰς τὸ αὐτὸ ὕψος μὲ τὸ δεύτερον. Μετὰ ταῦτα σύρομεν διπλὴν ὀριζοντίαν γραμμὴν ὑποκάτω καθενὸς τῶν τελικῶν ἄθροισμάτων 1550,80 καὶ οὕτω ὁ λογαριασμός θεωρεῖται ἐξισωμένος καὶ περατωμένος.

Ὅμοίως περατοῦται εἰς λογαριασμός, ἐὰν ἔχη πιστωτικὸν ὑπό-

λοιπον προσθέτομεν τούτο εις τὸ ἄθροισμα τῶν ποσῶν τῆς χρεώσεως, ὅτε ἐξισοῦμεν πάλιν τὸν λογαριασμόν.

Μετὰ τὴν περάτωσιν ἐνὸς λογαριασμοῦ τὸ ὑπόλοιπον ἐγγράφεται μετὰ τῆς σχετικῆς χρονολογίας ὑπὸ τὴν διπλὴν γραμμὴν καὶ εἰς τὸ μέρος τῶν χρεώσεων μὲν, ἐὰν εἴνε χρεωστικόν, εἰς τὸ μέρος τῶν πιστώσεων δέ, ἂν εἴνε πιστωτικόν. Εἰς τὴν στήλην τῆς αἰτιολογίας γράφομεν ἐδῶ τὰς λέξεις «ὕπολοιπον ὡς ἄνω». Ὁ σκοπὸς τῆς ἐγγραφῆς αὐτῆς εἶνε, νὰ λάδωμεν ὑπ' ὄψιν τὸ ἀποτέλεσμα τοῦ περατωθέντος λογαριασμοῦ κατὰ τὴν ἔναρξιν τοῦ νέου τοιούτου, καὶ πρὸ τῆς ἐγγραφῆς τῶν νέων ἐμπορικῶν πράξεων εἰς τὸ μέρος τῶν χρεώσεων καὶ τῶν πιστώσεων.

Ἡ περάτωσις τοῦ λογαριασμοῦ γίνεται συνήθως περιοδικῶς εἰς τὸ τέλος καθενὸς ἔτους, ἐξαμήνου, ἢ τριμήνου. Δύνεται ὁμοίως εἰς πᾶσαν ἐποχὴν νὰ γίνῃ ἡ περάτωσις ἐνὸς λογαριασμοῦ, ἐὰν ὑπάρχουν λόγοι συντρέχοντες εἰς τούτο.

Ἐὰν ἡ χρέωσις καὶ ἡ πίστωσις ἐνὸς λογαριασμοῦ ἔχουν ἴσα ἄθροίσματα, λέγομεν ὅτι ὁ λογαριασμὸς εἶνε ἐξισωμένος ἀφ' ἑαυτοῦ, ἢ ἐξωφλημένος.

γ') Ὅταν αἱ ἐγγραφαὶ τῶν χρεώσεων, ἢ πιστώσεων, ἢ μόνον ἢ μίᾳ ἐξ αὐτῶν καταλάβῃ ὀλόκληρον τὸν χῶρον τὸν προσδιορισμένον δι' αὐτὰς εἰς τὸ Δοῦναι, ἢ τὸ Λαβεῖν τοῦ λογαριασμοῦ ὥστε νὰ μὴ μένη πλέον χῶρος διὰ μίαν νέαν ἐγγραφὴν, σχηματίζομεν τὴν συνέχειαν τοῦ λογαριασμοῦ τούτου εἰς ἄλλην σελίδα τοῦ βιβλίου ὡς ἑξῆς.

1) Προσθέτομεν ὄλα τὰ ποσὰ τῆς χρεώσεως, καθὼς καὶ τῆς πιστώσεως τοῦ λογαριασμοῦ. Καθὲν τῶν ἄθροισμάτων αὐτῶν γράφομεν εἰς τὴν τελευταίαν σειρὰν τοῦ ἀντιστοίχου χώρου τοῦ λογαριασμοῦ, σημειοῦντες πρὸ καθενὸς τούτων καὶ εἰς τὴν στήλην τῆς περιλήψεως τὰς λέξεις «εἰς μεταφοράν».

2) Ἄν ὁ χῶρος τοῦ Δοῦναι ἢ τοῦ Λαβεῖν δὲν εἴνε πλήρης, ἀφήνομεν τὸν ἐλεύθερον χῶρον, ἀκυροῦντες αὐτὸν διὰ τεθλασμένης γραμμῆς, ἢ ὁποῖα ἀπολήγει εἰς τὸ ἄκρον τοῦ χώρου αὐτοῦ.

3) Ἀνοίγομεν εἰς ἄλλην σελίδα τοῦ βιβλίου, ἢ ὁποῖα εἶνε ἐλεύθερα, νέον λογαριασμόν, φέροντα τὸ ὄνομα τοῦ προηγουμένου. Εἰς τούτον ἐγγράφομεν ἀντιστοίχως εἰς τὸν χῶρον τῆς χρεώσεως καὶ τῆς πιστώσεως τὰ δύο ἄθροίσματα, τὰ ὁποῖα εὐρήκαμεν εἰς τὸν προηγούμενον λογαριασμόν. Πρὸ καθενὸς τῶν ποσῶν τούτων γράφομεν εἰς τὴν στήλην τῆς περιλήψεως τὰς λέξεις «Ἐκ μεταφορᾶς».

Πᾶσαν ἄλλην χρέωσιν ἢ πίστωσιν τοῦ λογαριασμοῦ ἐγγράφομεν τώρα, ὡς συνήθως, ὑπὸ τὴν γενομένην ἤδη ἐγγραφὴν καθημιᾶς τῶν μεταφορῶν. Τὸ σύνολον τῆς ἀνωτέρω ἐργασίας λέγεται μεταφορὰ λογαριασμοῦ. Ἐἵησθε ἡ μεταφορὰ ἐνὸς λογαριασμοῦ γίνεται μετὰ τὴν περάτωσίν του, δηλαδὴ ἀφοῦ περατώσωμεν τὸν λογαριασμόν, μεταφέρομεν εἰς τὸν νέον λογαριασμόν, τὸν ὁποῖον ἀνοίγομεν, ὄχι καὶ τὰ δύο ἀθροίσματα τῆς χρεώσεως καὶ πιστώσεως τοῦ μεταφερομένου, ἀλλὰ μόνον τὸ ποσὸν τῆς ἐξισώσεώς του. Εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν ἀντὶ εἰς τὸν παλαιὸν λογαριασμόν νὰ γράψωμεν πρὸ τοῦ μεταφερομένου ποσοῦ τὰς λέξεις «Πρὸς ἐξίσωσιν» γράφομεν «Υπόλοιπον εἰς νέον», εἰς δὲ τὸν νέον λογαριασμόν γράφομεν «Υπόλοιπον ἐκ μεταφορᾶς».

Δοῦναι Ν. Ἀντωνίου (Ὀδός...) σελίς 17 Δαβεῖν

1916		Δρχ.	Λ.	1916		Δρχ.	Λ.		
Μαρτ.	4	Ἀξίαν ἐμπορευμάτων	4000	50	Μαρτ.	8	Μετρητὰς	250	—
					>	20	"	500	—
"	8	Μετρητὰς	500	—					
"	15	Ἀξίαν ἐμπορ.	219	50					
"	30	Εἰς μεταφορὰν (σελ. 25)	4720	—	>	30	Εἰς μεταφορὰν (σελ. 25)	750	—

Παράδειγμα. Πρὸς ἐφαρμογὴν τῶν ἀνωτέρω ἔστω ὁ παρακείμενος λογαριασμός τοῦ Ν. Ἀντωνίου τῆς σελίδος 17 τοῦ βιβλίου μας, τὸν ὁποῖον μεταφέρομεν εἰς τὴν σελίδα 25 τοῦ αὐτοῦ βιβλίου, ὡς κατωτέρω. Καθὼς βλέπομεν εἰς τὸν νέον λογαριασμόν, ἐγγράφομεν εἰς μὲν τὴν χρέωσιν πρῶτον τὸ ποσὸν τῶν 4720 δραχμῶν ἐκ μεταφορᾶς τοῦ παλαιοῦ τῆς σελίδος 17, εἰς δὲ τὴν πίστωσιν τὸ ποσὸν τῶν 750 δρχ. ἐκ μεταφορᾶς τῆς αὐτῆς σελίδος 17, καὶ ἀκολούθως ἐργαζόμεθα εἰς τὸν νέον λογαριασμόν ὡς συνήθως.

Δοῦναι Ν. Ἀντωνίου (Ὀδός...) σελίς 25 Δαβεῖν

1916		Δρχ.	Λ.	1916		Δρχ.	Λ.		
Μαρτ.	30	Ἐκ μεταφορᾶς (σελ. 17)	4720	—	Μαρτ.	30	Ἐκ μεταφορᾶς (σελ. 17)	750	—
Ἀπρ.	10	Ἀξίαν ἐμπορευμάτων	150	—	Ἀπρ.	15	Μετρητὰς	300	—
"	13	Ἀξίαν ἐμπορευμάτων	630	—	>	20	Γραμμάτιον εἰς διαταγὴν μας	500	—

Ἀσκήσεις.

- 1) Ἐπὶ τῇ βάσει τῶν πράξεων, αἱ ὁποῖαι ἀποδλέπουσιν τὸν Δ.

Ἐένον (σελ. 219 Ἀσκήσεις) σχηματίσατε τὸν λογαριασμὸν τοῦ καὶ περατώσατε αὐτόν.

2) Σχηματίσατε τὸν λογαριασμὸν Πυρρῆ καὶ Σία ἐκ τῶν πράξεων αἱ ὁποῖαι ἀποβλέπουν αὐτοὺς (σελ. 219 Ἀσκήσεις) καὶ μεταφέρατε αὐτὸν εἰς νέον α') ἄνευ περατώσεώς του. β') ἀφοῦ προηγουμένως περατώσετε αὐτόν.

3) Συγκέντρωσις λογαριασμῶν. Διὰ τὰς διαφόρους ἀνάγκας τῆς Λογιστικῆς δυνάμεθα ἐνίοτε νὰ συγκεντρώσωμεν πολλοὺς λογαριασμοὺς εἰς ἓνα.

Παράδειγμα. Ἐστω ὅτι ἔχομεν τοὺς κάτωθι λογαριασμοὺς Α, Β, Γ μὲ διάφορα ποσὰ εἰς τὴν χρέωσιν καὶ τὴν πίστωσιν των

$\frac{A}{1500 \quad \quad 650}$	$\frac{B}{800 \quad \quad 1200}$	$\frac{\Gamma}{1850 \quad \quad 2100}$
------------------------------------	------------------------------------	--

ἦτοι αἱ μὲν χρεώσεις των εἶνε ἀντιστοιχῶς 1500 δρ., 800 δρ., 1850 δρ., αἱ δὲ πιστώσεις αὐτῶν 650 δρ., 1200 δρ., 2100 δρ. Δυνάμεθα νὰ συγκεντρώσωμεν τοὺς τρεῖς αὐτοὺς λογαριασμοὺς εἰς ἓνα, ἔστω εἰς τὸν Δ., ἦτοι τὰς τρεῖς χρεώσεις εἰς μίαν μόνην, ὡς καὶ τὰς τρεῖς πιστώσεις εἰς μίαν, ὡς κάτωθι φαίνεται.

Δ		
	1500	650
Α.	800	1200
Β.	1850	2100
Γ.	4150	3950

Διὰ τῆς συγκεντρώσεως αὐτῆς τὰ διάφορα ποσὰ, τὰ διεσπαρμένα εἰς διαφόρους λογαριασμοὺς, συγκεντροῦνται εἰς ἓνα μόνον λογαριασμὸν, εἰς τὸν ὁποῖον τὸ ποσὸν τῆς γενικῆς χρεώσεως καὶ πιστώσεως μένει ἀμετάβλητον.

4) Ἐκ τῶν κάτωθι πράξεων, αἱ ὁποῖαι ἔγιναν μεταξὺ τῶν Σπ. Βαρβιτσιώτου (ἐν Ἀθήναις) καὶ Ν. Μέρμηγκας (ἐν Πειραιεῖ) νὰ συνταχθοῦν α') ὁ λογαριασμὸς τοῦ πρώτου εἰς τὰ βιβλία τοῦ δευτέρου· β') ὁ λογαριασμὸς τοῦ δευτέρου εἰς τὰ βιβλία τοῦ πρώτου· γ') νὰ περατωθοῦν καὶ οἱ δύο λογαριασμοὶ αὐτοὶ τὴν 30ὴν Ἀπριλίου καὶ νὰ μεταφερθοῦν εἰς νέους τοιοῦτους.

1916 Ἰανουαρίου 1. Ὁ Ν. Μέρμηγκας ἐδικαιοῦτο νὰ λάβῃ παρὰ τοῦ Σπ. Βαρβιτσιώτου ὑπόλοιπον ἐκ προηγουμένου λογαριασμοῦ
δρ. 2800,40.

1916 Ἰανουαρίου 4. Ὁ Σπ. Βαρβιτσιώτης ἔλαβε παρὰ τοῦ Ν. Μέρμηγκας ἔμπορεύματα ἀξίας
δρ. 140,80.

1916 Ἰανουαρίου 10. Ὁ Σπ. Βαρβιτσιώτης ἀπέστειλε εἰς τὸν Ν. Μέρμηγκαν γραμμάτιον λήγόν τῇ 1 Σεπτεμβρίου
δρ. 500.

- 1916 Φεβρουαρίου 6. Ὁ Ν. Μέρμηγκας ἀπέστειλεν εἰς Σπ. Βαρβι-
τσιώτην ἔμπορεύματα ἀξίας δρ. 450.
- 1916 Μαρτίου 7. Ὁ Ν. Μέρμηγκας ἀπέστειλεν εἰς Σπ. Βαρβιτσιώ-
την ἔμπορεύματα ἀξίας δρ. 670,20.
- 1916 Μαρτίου 26. Ὁ Σπ. Βαρβιτσιώτης ἐπλήρωσεν εἰς Ν. Μέρμηγκαν
μετρητὰς δρ. 500.
- 1916 Ἀπριλίου 3. Ὁ Σπ. Βαρβιτσιώτης ἐπλήρωσεν εἰς τὴν Ἐθνι-
κὴν Τράπεζαν συναλλαγματικὴν εἰς βάρους τοῦ Ν. Μέρμηγκα
δρ. 250.
- 1916 Ἀπριλίου 12. Ὁ Ν. Μέρμηγκας ἀπέστειλεν εἰς Σπ. Βαρβιτσιώ-
την ἔμπορεύματα ἀξίας δρ. 680,20.
- 1916 Ἀπριλίου 21. Ὁ Σπ. Βαρβιτσιώτης ἀπέστειλεν εἰς Ν. Μέρμηγ-
καν γραμμάτιον εἰς βάρους ἑαυτοῦ δρ. 530.

§ 118. Ἐνεργητικόν, Παθητικόν, Κεφάλαιον. —

α') Πᾶς ἔμπορος δύναται νὰ ὑπαχθῆ εἰς μίαν τῶν ἐξῆς κατη-
γοριῶν. 1) ἐπαρκεῖ διὰ τῶν ἰδικῶν του κεφαλαίων πρὸς διεξαγωγὴν
τῶν ἐμπορικῶν του ἐπιχειρήσεων· 2) ἐκτὸς τῶν ἰδικῶν του κεφαλαίων
ἀναγκάζεται νὰ προστρέξῃ καὶ εἰς ξένα τοιαῦτα κατὰ τὴν ἀρχὴν ἢ
κατὰ τὴν πρόοδον τῶν ἐπιχειρήσεών του· 3) διεξάγει τὰς ἐπιχειρή-
σεις του διὰ ξένων μόνον κεφαλαίων.

Κατὰ τὰς τρεῖς περιπτώσεις τὸ ποσόν, τὸ ὁποῖον διαχειρίζεται,
ἀποτελεῖται ἀπὸ μετρητὰ χρήματα, ἔμπορεύματα, γραμμάτια, ἀκίνητα
ἔμπορεύματα ἐν γένει, ἔπιπλα, ἐργαλεῖα κλπ.

β') Ἐνεργητικόν ἐνὸς ἐμπόρου καλεῖται τὸ σύνολον τῶν προηγμέ-
των, τὰ ὁποῖα αὐτὸς κατέχει ὡς μετρητὰ, ἔμπορεύματα, ἔπιπλα, συ-
ναλλαγματικὰς κλπ., καθὼς καὶ τὰ χρεωστικὰ ὑπόλοιπα τῶν εἰς τὰ
βιβλία του λογαριασμῶν ἄλλων.

Παθητικόν ἐνὸς ἐμπόρου καλεῖται τὸ σύνολον τῶν ποσῶν, τὰ ὁποῖα
αὐτὸς ὀφείλει εἰς ἄλλους ὑπὸ οἰανδήποτε μορφήν.

Κεφάλαιον ἐνὸς ἐμπόρου κατὰ τινὰ ἐποχὴν καλεῖται ἡ διαφορὰ
τοῦ Ἐνεργητικοῦ του κατὰ τὴν ἐποχὴν αὐτὴν ἀπὸ τοῦ Παθητικοῦ του.

Κατὰ ταῦτα, τὸ κεφάλαιον ἐνὸς ἐμπόρου κατὰ τινὰ ἐποχὴν παρι-
στάνει τὴν καθαρὰν περιουσίαν του, ἢ ὁποῖα κατὰ τὴν ἐποχὴν αὐτὴν
εἶνε διατεθειμένη εἰς τὰς ἐμπορικὰς του ἐπιχειρήσεις.

Ὅταν ὁ ἔμπορος ἐπαρκῆ διὰ τῶν ἰδικῶν του κεφαλαίων καὶ
οὐδὲν ὀφείλει εἰς τρίτους, τὸ κεφάλαιόν του ἀποτελεῖται ἀπὸ δλόκλη-
ρον τὸ Ἐνεργητικόν του.

Όταν ὁ ἔμπορος ἐκτὸς τῶν ἰδικῶν του κεφαλαίων ἔχη προστρέξει καὶ εἰς ξένα τοιαῦτα, τὸ κεφάλαιόν του ἀποτελεῖται ἀπὸ μέρος μόνον τοῦ ἐνεργητικοῦ του, τοῦ ἄλλου ὀφειλομένου εἰς ἄλλους. Όταν δὲ διεξάγῃ τὰς ἐπιχειρήσεις του διὰ ξένων μόνον κεφαλαίων, ὀλόκληρον τὸ Ἐνεργητικὸν του ὀφείλει εἰς ἄλλους καὶ ἐπομένως δὲν ἔχει κεφάλαιον.

γ') Διὰ νὰ παραστήσωμεν τὸ Ἐνεργητικὸν καὶ Παθητικὸν, καταστρώνημεν αὐτὰ εἰς πίνακα διηρημένον εἰς δύο μέρη κατὰ τὸν τύπον τοῦ λογαριασμοῦ. Τὸ Ἐνεργητικὸν ἀντιστοιχεῖ πρὸς τὴν χρέωσιν, τὸ δὲ Παθητικὸν πρὸς τὴν πίστωσιν, ὡς κάτωθι φαίνεται.

Ἐνεργητικὸν			Παθητικὸν		
	Δρχ.	Λ.		Δρχ.	Λ.
Μετρητὰ	2000	—	Πιστωτικά		
Ἐμπορεύματα	5000	—	ὑπόλοιπα λογαρια-		
Ἀκίνητα	20000	—	σμῶν	6000	—
Χρεωστικὰ			Κεφάλαιον	28000	—
ὑπόλοιπα λογαρια-	7000	—			
σμῶν					
Ἐν ὅλῳ	34000	—	Ἐν ὅλῳ	34000	—

Αἱ 34000 δρ. (ἀριστερὰ) παριστάνουν τὸ Ἐνεργητικὸν, ἀποτελούμενον ἀπὸ διαφόρους ἀξίας καὶ ποσὰ ὀφειλόμενα ὑπὸ τρίτων, ἤτοι ὀλόκληρον τὸ ποσόν, τὸ ὁποῖον διαχειριζόμεθα. Αἱ 6000 δρ. παριστάνουν τὸ Παθητικόν· ἤτοι ὅσα ποσὰ ὀφείλομεν εἰς διάφορα πρόσωπα. Ἐὰν ἀπὸ τοῦ Ἐνεργητικοῦ ἀφαιρέσωμεν τὸ Παθητικόν, θέλομεν εὑρεῖ τὸ καθαρὸν κεφάλαιον· ἐκτελοῦντες τὴν ἀφαίρεσιν 34000 — 6000 εὐρίσκομεν κεφάλαιον ἐκ δραχμῶν 28000.

Διὰ νὰ ἐξισώσωμεν τὸν ἀνωτέρω πίνακα, θεωρούμενον ὡς λογαριασμόν, δηλαδὴ διὰ νὰ καταστήσωμεν τὰ ποσὰ τοῦ Ἐνεργητικοῦ καὶ Παθητικοῦ ἴσα, γράφομεν εἰς τὸ μέρος τοῦ Παθητικοῦ τὸ Κεφάλαιον τῶν 28000 δραχ., ὡς ἀνωτέρω, καὶ τὸ τελικὸν ἄθροισμα γράφομεν εἰς τὸ αὐτὸ ὕψος μετὰ τοῦ ἄθροίσματος τοῦ Ἐνεργητικοῦ, ὡς καὶ εἰς τὸν ἀνωτέρω πίνακα φαίνεται.

Ἐὰν οὐδὲν παθητικὸν ἔχωμεν, ἀλλὰ μόνον Ἐνεργητικόν, τότε αὐτὸ εἶνε καὶ τὸ Κεφάλαιον, τὴν δὲ θέσιν τοῦ Παθητικοῦ λαμβάνει τὸ Κεφάλαιον. Ἐὰν συμβαίῃ τὸναντίον, τότε τὸ Κεφάλαιον λαμβάνει τὴν θέσιν τοῦ Ἐνεργητικοῦ.

Ἐὰν τὸ Ἐνεργητικὸν εἶνε ἴσον πρὸς τὸ Παθητικόν, οὐδὲν Κεφάλαιον μένει ὑπὲρ τοῦ ἐμπόρου. Ἐὰν τὸ Ἐνεργητικὸν εἶνε

μικρότερον τοῦ παθητικοῦ, λέγομεν ὅτι ὁ ἔμπορος εἶνε χρεώστης τῆς διαφορᾶς τοῦ Ἐνεργητικοῦ ἀπὸ τοῦ Παθητικοῦ.

Π. χ. ἐὰν τὴν 1ην Ἰανουαρίου 1915 ἡ κατάστασις τοῦ Νικ. Δαρβὰ ἦτο ὡς ἑξῆς

Ἐνεργητικὸν	δρ.	10852,80
Παθητικὸν	»	15800

συνάγομεν ὅτι ἦτο χρεώστης τῆς διαφορᾶς $15800 - 10852,80 = 4947,20$ δρχ.

§ 119. Κέρδη, Ζημίαι. —

α') Ἐστω ὅτι κατὰ τὸ τέλος τοῦ ἔτους 1914 τὸ Κεφάλαιον ἐνὸς ἐμπόρου ἀνήρχετο εἰς 30850 δραχμάς, εἰς τὸ τέλος δὲ τοῦ 1915 ἀνήρχετο εἰς 42500 δρ., ἠῤῥῆσε δηλαδὴ τὸ Κεφάλαιον τοῦ ἐμπόρου αὐτοῦ ἐν διαστήματι ἐνὸς ἔτους κατὰ τὴν διαφορὰν $42500 - 30850 = 11650$ δραχμάς. Τὸ ποσὸν αὐτὸ τῶν δραχμῶν λέγεται κέρδος τοῦ ἐμπόρου τούτου κατὰ τὸ ἔτος 1915.

Ἐν γένει, καλοῦμεν κέρδος ἐνὸς ἐμπόρου εἰς ἓν ὠρισμένον χρονικὸν διάστημα τὴν αὔξησιν τοῦ Κεφαλαίου τοῦ ἐμπόρου ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τοῦ χρονικοῦ αὐτοῦ διαστήματος μέχρι τέλους αὐτοῦ, ἐὰν ὑπάρχη τοιαύτη.

β') Τὸ κεφάλαιον ἐνὸς ἐμπόρου ἦτο κατὰ τὴν 30ὴν Ἰουνίου 1915 δραχμαὶ 25700, κατὰ δὲ τὴν 1ην Ἰανουαρίου 1916 ἦτο 20000 δρ., δηλαδὴ κατὰ τὸ διάστημα τῆς ἑξαμηνίας ἠλαττώθη τὸ Κεφάλαιον τοῦ ἐμπόρου αὐτοῦ κατὰ 5700 δραχμάς. Ἡ διαφορὰ αὕτη λέγεται ζημία τοῦ ἐν λόγῳ ἐμπόρου κατὰ τὴν ἑξαμηνίαν ταύτην.

Ἐν γένει, καλοῦμεν ζημίαν ἐνὸς ἐμπόρου εἰς ἓν ὠρισμένον χρονικὸν διάστημα τὴν ἐλάττωσιν, τὴν ὁποίαν παθαίνει τὸ Κεφάλαιόν του ἀπὸ τῆς ἀρχῆς μέχρι τέλους τοῦ χρονικοῦ τούτου διαστήματος.

Ἐὰν εἰς τὴν ἀρχὴν καὶ τὸ τέλος ἐνὸς χρονικοῦ ὠρισμένου διαστήματος τὸ Κεφάλαιον ἐνὸς ἐμπόρου εἶνε τὸ αὐτό, λέγομεν ὅτι ὁ ἔμπορος δὲν ἔχει οὔτε κέρδος οὔτε ζημίαν.

§ 120. Ἀπογραφὴ, Ἰσολογισμὸς. —

α') Ἀπογραφὴ καλεῖται πίναξ, περιέχων λεπτομερῶς ἀναγεγραμμένα κατ' εἶδος, ποσότητες καὶ ἀξίαν τὰ μέρη τοῦ Ἐνεργητικοῦ καὶ Παθητικοῦ.

Διὰ τὸν καταρτισμὸν τῆς Ἀπογραφῆς εἶνε ἀνάγκη, νὰ γίνῃ ἀκριβῆς καὶ λεπτομερῆς καταγραφὴ 1) πάντων τῶν ὑπαρχόντων

ἐμπορευμάτων· 2) τῶν ὑπαρχόντων ἐπίπλων· 3) τῶν μετρητῶν χρημάτων εἰς τὸ ταμεῖον· 4) τῶν ὑπαρχόντων πρὸς εἰσπραξίν γραμματίων· 5) τῶν χρεωστικῶν ὑπολοίπων τῶν λογαριασμῶν· ἐπίσης τῶν πιστωτικῶν ὑπολοίπων καὶ τῶν πληρωτέων γραμματίων.

Ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος τῆς ἐργασίας αὐτῆς καταρτίζομεν ἀκολούθως τὸν πίνακα, ὁ ὁποῖος περιέχει τὰ μέρη τοῦ Ἑνεργητικοῦ καὶ τοῦ Παθητικοῦ.

Ὡς γνωστόν, ἡ διαφορὰ τοῦ Παθητικοῦ ἀπὸ τοῦ Ἑνεργητικοῦ δίδει τὸ Κεφάλαιον. Διὰ τοῦτο δυνάμεθα νὰ λέγωμεν Ἀπογραφὴν τὴν ἑλληνὴν ἐργασίαν, διὰ τῆς ὁποίας προσδιορίζομεν τὸ Κεφάλαιον ἐνὸς ἐμπορίου κατὰ τινὰ ἐποχὴν.

Ὅτι ἡ Ἀπογραφὴ ἔχει σπουδαίαν σηµασίαν διὰ πάντα ἔμπορον εἶνε φανερόν. Διότι δι' αὐτῆς γνωρίζει ὁ ἔμπορος ὄχι μόνον τὸ Κεφάλαιον, τὸ ὅποιον αὐτὸς ἔχει κατὰ τινὰ ἐποχὴν, ἀλλὰ καὶ τὸν τρόπον κατὰ τὸν ὅποιον τοῦτο ἀποτελεῖται. Ἐξ ἄλλου διὰ τῆς συγκρίσεως τῶν Ἀπογραφῶν μεταξὺ τῶν εὐρίσκει ὁ ἔμπορος ἂν ἐκέρδισεν ἢ ἐζημιώθη κατὰ τὸ χρονικὸν διάστημα, τὸ παρεμπίπτον μεταξὺ τῶν Ἀπογραφῶν. Διὰ τοῦτο ὀρίζεται ὑπὸ τοῦ Νόμου, ἵνα ὁ ἔμπορος συντάσῃ Ἀπογραφὴν· 1) κατὰ τὴν ἴδρυσιν τοῦ ἐμπορικοῦ τοῦ καταστήματος· 2) κατὰ τὸ τέλος καθενὸς ἔτους, ἢ ἐξαμηνίας· 3) εἰς ἄλλας ἐκτάκτους περιστάσεις· π. χ. ἐν περιπτώσει θανάτου τοῦ ἐμπορίου, πτωχεύσεώς του, διαλύσεως ἢ διαδοχῆς τῆς ἐπιχειρήσεως κλπ.

6') Ἐπειδὴ ἡ Ἀπογραφὴ καταλαμβάνει συνήθως πολλὰς σελίδας, διότι εἶνε λεπτομερής, διὰ τοῦτο συντάσσεται μεθοδικῆ περιλήψις αὐτῆς ἢ ὅποια καλεῖται Ἴσολογισµός.

Ὁ Ἴσολογισµός εἶνε πίναξ, ἀποτελούμενος ἐκ δύο μερῶν. Εἰς τὸ ἀριστερὸν μέρος φέρει τὸν τίτλον «Ἑνεργητικόν», εἰς δὲ τὸ δεξιὸν τὸν τίτλον «Παθητικόν». Εἰς τὸ πρῶτον μέρος ἐγγράφομεν ἐν περιλήψει πᾶν ὅ,τι ἀνήκει εἰς τὸ Ἑνεργητικόν, εἰς δὲ τὸ δεύτερον πᾶν ὅ,τι ἀνήκει εἰς τὸ Παθητικόν.

Ἐκτελοῦμεν τὴν ἐξίσωσιν τοῦ Ἴσολογισμοῦ, προσθέτοντες εἰς τὸ Παθητικόν του τὴν διαφορὰν τοῦ Ἑνεργητικοῦ καὶ Παθητικοῦ, ἦτοι τὸ Κεφάλαιον· ἀκολούθως προσθέτομεν τὰ ποσὰ τῶν δύο μερῶν τοῦ Ἴσολογισμοῦ χωριστὰ καθενός, καὶ γράφομεν τὰ ἴσα ἀθροίσματα εἰς τὸ αὐτὸ ὕψος, σύρομεν δ' ὑποκάτω διπλὴν ὀρίζοντιαν γραμμὴν.

Παράδειγμα. Ἐὰς ὑποθέσωμεν ὅτι τὸ ἐξαγόμενον τῆς Ἀπογραφῆς ἔχει ὡς ἑξῆς.

Εὐρέθησαν ἔμπορεύματα ἀπώλητα Δρ. 4000.

Ἡ σημερινὴ ἀξία τῶν ἐπίπλων εἶνε ἠλαττωμένη τῆς παλαιᾶς τῶν ἀξίας, ἕνεκα τῆς φθορᾶς τὴν ὅποιαν ἔπαθον κατὰ 5 %.

Δρ. 2375.

Ἐἰς τὸ χαρτοφυλάκιον ὑπάρχει ἓν γραμματίον ἀποδοχῆς Κ. Θεοδώρου, λήγον τῇ 15 Ἰανουαρίου

Δρ. 270.

Ἐἰς τὸ ταμεῖον ὑπάρχουν μετρητὰ

Δρ. 5400.

Ἐκ τοῦ βιβλίου λογαριασμῶν ἔχομεν τὰ ἑξῆς ἐξαγόμενα.

Χρεῶσται

Δ. Μαρκίδης

Δρ. 100.

Π. Μανούσος

» 720.

Κ. Θανόπουλος

» 2060.

Δ. Πετρίδης

» 100.

Πιστωταὶ

Κ. Γεωργιάδης

Δρ. 950.

Μ. Λάμπρος

» 2500.

Ἐπάρχει ἓν γραμματίον εἰς βάρους μας ἓν κυκλοφορῶν

» 600.

Ἐκ τῶν ἄνω στοιχείων συντάσσομεν τὴν Ἀπογραφὴν, ἀναγράφοντες εἰς ἰδιαιτέρον μέρος τὰς εἰς τὸ Ἐνεργητικὸν ἀνηκούσας ἔκ τῶν ἀνωτέρω πράξεων καὶ εἰς ἄλλο τὰς εἰς τὸ Παθητικόν, ἀλλὰ μετὰ τῆς αὐτῆς λεπτομερείας, ὡς ἄνω.

Μετὰ τὸ πέρας τῆς ἀπογραφῆς καὶ ὑποκάτω αὐτῆς κάμνομεν τὴν περιλήψιν τῆς, ἣτοι τὸν Ἰσολογισμόν, τὸν ὅποιον καὶ ἐξισοῦμεν, καθὼς φαίνεται καὶ εἰς τὸν κατωτέρω πίνακα.

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1915.

Α'. Ἐνεργητικὸν

	Δρ.	Λ.
Ἐμπορεύματα εὐρεθέντα ἀπώλητα	4000	—
Ἀξία ἐπίπλων σημερινή, ἠλαττωμένη τῆς παλαιᾶς τοιαύτης ἕνεκα φθορᾶς κατὰ 5 %	2375	—
Γραμματίον ἓν τῷ χαρτοφυλάκιῳ ἀποδοχῆς Κ. Θεοδώρου, λήγον τῇ 15 Ἰανουαρίου	270	—
Μετρητὰ ἓν τῷ ταμείῳ	5400	—
Χρεῶσται		
Δ. Μαρκίδης	100	—
Π. Μανούσος	720	—
Κ. Θανόπουλος	2060	—
Δ. Πετρίδης	100	—
Ἐν ὅλῳ	15025	—

Β' Παθητικὸν

Πιστωταὶ

Κ. Γεωργιάδης
Μ. Λάμπρος
Γραμμάτιον εἰς βάρος μας ἐν κυκλοφορίᾳ

Κεφάλαιον σημερινόν

Δρ.	Λ.
950	—
2500	—
600	—
<hr/>	
4050	—
10975	—
<hr/>	
Εν ὅλῳ	15025

Ἰσολογισμὸς.

Ἐνεργητικὸν

	Δρ.	Λ.
Ἐμπορεύματα	4000	—
Ἐπιπλα	2375	—
Μετρητὰ	5400	—
Γραμμάτια εἰς-πρακτεῖα	270	—
Χρεῶσταί	2980	—
	<hr/>	
	15025	—

Παθητικὸν

	Δρ.	Λ.
Γραμμάτια πληρωτέα	600	—
Πιστωταὶ	3450	—
Κεφάλαιον	10975	—
	<hr/>	
	15025	—

Ἡ Ἀπογραφὴ καὶ ὁ Ἰσολογισμὸς συντάσσονται κατ' ἀρχὰς προχειρῶς ἐπὶ προχείρου χάρτου καὶ ἀκολουθῶς μεθοδικῶς, καθὼς ἀνωτέρω, γράφονται δὲ εἰς εἰδικὸν βιβλίον, τὸ ὁποῖον καλεῖται βιβλίον «Ἀπογραφῶν».

Πᾶς ἔμπορος ὀφείλει νὰ γράφῃ ὑπεράνω τῆς Ἀπογραφῆς, ἢ κάτω τοῦ Ἰσολογισμοῦ, τὴν χρονολογίαν κατὰ τὴν ὁποίαν ταῦτα ἐγίναν, νὰ βεβαιώσῃ δ' ὅτι ἡ Ἀπογραφὴ καὶ ὁ Ἰσολογισμὸς συνετάχθησαν ἐπὶ τῇ βάσει καὶ συμφώνως πρὸς τὰ λογιστικά του βιβλία, θέτων προσέτι τὴν ὑπογραφὴν του εἰς τὸ τέλος.

§ 121. Λογιστικὰ βιβλία.—

Καλοῦνται λογιστικὰ βιβλία ἐκεῖνα, εἰς τὰ ὁποῖα ὁ ἔμπορος ἐγγράφει μεθοδικῶς τὰς διαφόρους ἐμπορικὰς πράξεις, τὰς ὁποίας ἐνεργεῖ καθ' ἡμέραν, καὶ διὰ τῶν ὁποίων δύναται ἀνά πάσαν στιγμὴν νὰ γνωρίζῃ τὴν οἰκονομικὴν του κατάστασιν.

Τὰ λογιστικὰ βιβλία χρησιμεύουν ἀκόμη, διὰ ν' ἀποδεικνύῃ ὁ ἔμπορος τὰς ὑπ' αὐτοῦ ἐνεργουμένας δικαίας ἐμπορικὰς πράξεις. Διὰ ταῦτα ὑποχρεῦται ὁ ἔμπορος ὑπὸ τοῦ Νόμου, ὄχι μόνον νὰ τηρῇ τοιαῦτα βιβλία, ἀλλὰ καὶ νὰ τὰ τηρῇ καθ' ὀρισμένας διατυπώσεις πρὸς δὲ τάσσεται συνέπεια τῆς μὴ τηρήσεώς των κατὰ τὰς διατυπώσεις ταύτας· 1) ὅτι δὲν δύναται νὰ κάμῃ χρῆσιν τοῦ πλεονεκτήματος τοῦ ν' ἀποδεικνύῃ δι' αὐτῶν τὰς δικαιοπραξίας του, ἐὰν τοῦ παρουσιασθῇ ἀνάγκη· 2) ὅτι δύναται νὰ κηρυχθῇ ἔνοχος δολίας χρεωκοπίας καὶ ἐν περιπτώσει κατὰ τὴν ὁποίαν τοῦ συμβῇ τοιαύτη, ὄχι δολία ἴσως

Τὰ ὑπὸ τοῦ Νόμου ὑποχρεωτικὰ βιβλία εἶνε τὰ ἐξῆς τρία· τὸ Ἑμερολόγιον, τὸ βιβλίον τῶν Ἀπογραφῶν, τὸ τῆς Ἀντιγραφῆς τῶν ἐπιστολῶν. Ἐκτὸς τούτων τηροῦν οἱ ἔμποροι καὶ ἄλλα βιβλία προαιρετικῶς, τῶν ὁποίων ὁ ἀριθμὸς καὶ ὁ τύπος ποικίλει ἀναλόγως τῆς ἐπιχειρήσεως καὶ τῶν ἀναγκῶν τῆς Λογιστικῆς.

Τοιαῦτα εἶνε π. χ. τὸ «Πρόχειρον», τὸ «Καθολικόν», τὸ «Ταμεῖον» καὶ ἄλλα.

Τὰ ὑποχρεωτικὰ βιβλία πρέπει νὰ τηροῦνται κατὰ τὰς ἐξῆς νομίμους διατάξεις· 1) πρέπει πρὸ τῆς χρήσεώς των νὰ εἶνε βιβλιοδετημένα, ἡριθμημένα καὶ μονογραφημένα ὑπὸ τῆς ἀρμοδίας Ἀρχῆς (τοῦ προέδρου τῶν Πρωτοδικῶν, ἢ τοῦ εἰρηνοδίκου)· 2) πρέπει νὰ τηροῦνται εἰς τὴν ἑλληνικὴν γλῶσσαν· 3) αἱ διάφοροι πράξεις πρέπει νὰ ἐγγράφονται εἰς αὐτὰ κατὰ χρονολογικὴν σειρὰν, ἄνευ κενῶν διαστημάτων, διορθώσεων, παρεγγραφῶν, προσθήκης ἢ ἀφαιρέσεως φύλλων· 4) ἐὰν συμβῆ λάθος τι, τοῦτο διορθώνεται διὰ νέας ἐγγραφῆς καταλλήλου, γινομένης κατὰ τὴν ἡμέραν κατὰ τὴν ὁποίαν ἀνακαλύπτεται τοῦτο· 5) πρέπει νὰ εἶνε νομίμως χαρτοσημασμένα. Μόνον τὸ βιβλίον τῆς Ἀντιγραφῆς τῶν ἐπιστολῶν δὲν ὑπόκειται εἰς τὰς διατυπώσεις αὐτάς, ἐπειδὴ δύναται νὰ ἐξελεγχθῆ διὰ τῶν ἀνταλλασσομένων ἐπιστολῶν.

§ 122. Πρόχειρον. —

Πρόχειρον, καλεῖται τὸ βιβλίον, εἰς τὸ ὁποῖον ὁ ἔμπορος σημειώνει προχείρως τὰς εἰς τὸ κατάστημά του καθ' ἡμέραν διεξαγομένας πράξεις κατὰ τὴν χρονολογικὴν σειρὰν κατὰ τὴν ὁποίαν γίνονται. Τὸ βιβλίον τοῦτο τηρεῖται κατὰ θέλησιν, ἀρκεῖ νὰ ἐξιστορήται εἰς αὐτὸ σαφῶς καθεμία πρᾶξις. Διὰ τοῦτο καὶ ὁ τύπος αὐτοῦ ποικίλει εἰς τοὺς διαφόρους ἐμπορικὰς οἴκους. Ἐν τούτοις εἰς πάντα τύπον Προχείρου, σχεδὸν πάντοτε, καθεμία ἐγγραφομένη πρᾶξις συνοδεύεται ὑπὸ τῆς ἡμερομηνίας κατὰ τὴν ὁποίαν ἐγένετο, καὶ φέρει ἓνα αὐξοντα ἀριθμὸν πρὸς διάκρισιν ἀπὸ τῶν ἄλλων τοιούτων.

Ὁ μᾶλλον ἐν χρήσει τύπος Προχείρου εἶνε ὁ κάτωθι.

Πρόχειρον.

Τῆ 1ῃ Ὀκτωβρίου 1915.

1) Κατέβεσα Κεφάλαιον εἰς μετρητὰ

20000.

— τῆ αὐτῆ —

2) Ἠγόρασα διάφορα ἐπιπλα, ὡς φαίνονται λεπτομερῶς εἰς τὸν σχετικὸν λογαριασμὸν ὑπ' ἀριθ. 1 Δρ. 2450.

— τῆ αὐτῆ —
 3) Ἠγόρασα διάφορα εἶδη γραφικῆς ὕλης Δρ. 124.

— τῆ 2α ἰδίου —
 4) Ἠγόρασα ἀπὸ Πυρρῆν καὶ Σίαν 20 βαρέλια ἐλαίου
 3210 ὀκ. πρὸς 1, 15 τὴν ὀκᾶν Δρ. 3726.

— τῆ αὐτῆ —

Εἰς μεγάλους ἐμπορικῶν οἴκων τὸ Πρόχειρον ἀναπληροῦται συνήθως ὑπὸ διαφόρων προχείρων βιβλίων, καθὲν τῶν ὁποίων περιλαμβάνει ἰδιαίτερον τμῆμα ἐργασίας. Οὕτω πρόχειρα βιβλία εἰς πλεῖστα τῶν ἐπιχειρήσεων εἶνε τὰ ἐξῆς π. χ.

Βιβλίον ταμείου διὰ τὰς εἰσπράξεις καὶ τὰς πληρωμάς.

Βιβλίον ἀγορῶν διὰ τὰς ἀγορὰς ἐμπορευμάτων.

Βιβλίον πωλήσεων διὰ τὰς πωλήσεις ἐμπορευμάτων.

Βιβλίον γραμματίων εἰσπρακτέων καὶ πληρωτέων, διὰ τὰ λαμβανόμενα καὶ διδόμενα γραμμάτια.

Βιβλίον ἐξόδων διὰ τὰ διάφορα ἐξοδα.

Βιβλίον διαφόρων πράξεων διὰ τὰς πράξεις, αἱ ὁποῖαι εἰς κανὲν τῶν ἀνωτέρω βιβλίων δὲν δύνανται νὰ ἐγγραφῶν.

§ 123. Ἡμερολόγιον. —

γ') Τὸ Ἡμερολόγιον εἶνε τὸ οὐσιωδέστερον βιβλίον ἐξ ὧν ὅσα ἔχει ὁ ἔμπορος. Εἰς αὐτὸ ἐγγράφονται καθ' ἡμέραν πᾶσαι αἱ πράξεις τοῦ ἐμπόρου, ἀγοραί, πωλήσεις, εἰσπράξεις, πληρωμαὶ κλπ., ὡς καὶ αἱ κατὰ μῆνα οἰκιακαὶ του δαπάναι.

Τὸ Ἡμερολόγιον συγκεντρώνει ὅλας, ἐν γένει, τὰς πράξεις τοῦ ἐμπόρου, τὰς ἐγγραφείσας εἰς τὰ πρόχειρα βιβλία καὶ εἰς ὅποιανδήποτε ἄλλαν σημειώσιν, ἢ ἐγγραφα, μεταφερομένας δὲ εἰς αὐτὸ ἠσύχως καὶ ἐπισταμένως.

Αἱ πράξεις αὗται διατυποῦνται εἰς τρόπον, ὥστε νὰ ὑποδεικνύουν σαφῶς καὶ διὰ παχέων γραμμάτων τὸ πρόσωπον, τὸ ὅποιον ἀφορᾷ ἢ πράξις, καὶ τὸ ὅποιον ὀφείλει νὰ χρεωθῆ, ἢ νὰ πιστωθῆ. Ἐὰν π. χ. πωλήσωμεν τὴν 25 8/βρίου εἰς τὸν Πέτρον ἐμπορεύματα ἀξίας 200 δραχμῶν, θὰ σημειώσωμεν τοῦτο εἰς τὸ Πρόχειρον, καὶ θὰ μεταφέρωμεν τὴν πρᾶξιν εἰς τὸ Ἡμερολόγιον ὡς ἐξῆς

— 25 8/βρίου —

Εἰς Πέτρον πώλησιν ἐμπορευμάτων (λεπτομερῶς εἶδος, ποσόν, τιμὴν . . .) Δρ. 200

Ἐὰν εἰσπράξωμεν ἀπὸ τὸν Ἰωάννην τὴν αὐτὴν ἡμέραν 150 δραχμάς, θὰ σημειώσωμεν τοῦτο εἰς τὸ Πρόχειρον, καὶ θὰ μεταφέρωμεν τὴν

πράξιν ταύτην εἰς τὸ Ἡμερολόγιον κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον ἦτοι

τῇ αὐτῇ

Ἀπὸ Ἰωάννην μετρητᾶς

Δρ. 150.

Μεθοδικώτερον ἔμως μεταφέρονται αἱ πράξεις ἐκ τοῦ Προχείρου εἰς τὸ Ἡμερολόγιον, ἐὰν εἰς ὠρισμένην στήλην εἰς αὐτὸ γράψωμεν αὐξοντα ἀριθμὸν τῆς πράξεως, ὡς εἰς τὸ Πρόχειρον, διὰ τὴν εὐκολον εὑρεσιν αὐτῆς, πρὸς δὲ εἰς ἄλλην στήλην τὴν σελίδα τοῦ Καθολικοῦ, ἢ τοῦ Ταμείου, εἰς τὴν ὁποίαν μεταφέρεται ἀκολουθῶς ἐκ τοῦ Ἡμερολογίου. Τὴν τοιαύτην διάταξιν παρέχει τὸ κατωτέρω εἰς τὴν ἀρχὴν τῆς ἐπομένης σελίδος ὑπόδειγμα Ἡμερολογίου.

Ἡ μετάβασις ἀπὸ μιᾶς σελίδος εἰς ἄλλην εἰς τὸ Ἡμερολόγιον γίνεται ὡς ἑξῆς.

Εἰς τὸ τέλος τῆς στήλης τῶν δραχμῶν καὶ λεπτῶν γράφομεν τὸ ἄθροισμα τῶν εἰς τὴν σελίδα ἀναγεγραμμένων ποσῶν καὶ πρὸ τοῦ ἄθροίσματος τούτου τὰς λέξεις «Εἰς μεταφορὰν»· εἰς τὴν ἀρχὴν τῆς ἐπομένης σελίδος γράφομεν εἰς τὰς οἰκείας στήλας τὸ ἄθροισμα τῶν ποσῶν τῆς προηγουμένης καὶ πρὸ αὐτοῦ τὴν φράσιν «Ἐκ μεταφορᾶς», ἀκολουθῶς δ' ἐξακολουθοῦμεν τὴν ἐγγραφὴν καὶ εἰς τὴν σελίδα αὐτὴν ὡς συνήθως.

Αἱ λέξεις «Δοῦναι», καὶ «Λαβεῖν», αἱ ὁποῖαι σημειοῦνται εἰς τὰς πράξεις τοῦ Ἡμερολογίου, φανερῶνουν ὅτι ὁ λογαριασμὸς τοῦ ἀναφερομένου προσώπου θὰ χρεωθῆ ἢ θὰ πιστωθῆ μὲ τὸ ἀντίστοιχον ποσὸν τῆς πράξεως, ἐὰν αὐτὴ φέρῃ τὸ «Δοῦναι» ἢ τὸ «Λαβεῖν». Αἱ πράξεις, αἱ ὁποῖαι οὐδεμίαν τῶν λέξεων αὐτῶν φέρουν εἰς τὸ Ἡμερολόγιον, δὲν ἀπαιτοῦν χρέωσιν ἢ πίστωσιν ἐνὸς προσωπικοῦ λογαριασμοῦ εἰς τὸ Καθολικόν.

6') Πρὸς ἀποφυγὴν τῆς εἰς καθεμίαν πρᾶξιν ἀναγραφῆς τῆς λέξεως «Δοῦναι» ἢ «Λαβεῖν» εἰς τὸ Ἡμερολόγιον, ἐὰν αὐταὶ ἀπαιτοῦν χρέωσιν ἢ πίστωσιν ἐνὸς λογαριασμοῦ, διατίθεται ἐνίοτε εἰδικὴ στήλη διὰ τὴν ἀναγραφὴν τῶν ποσῶν τῶν πράξεων, τῶν ἀντιστοιχουσῶν εἰς τὸ Λαβεῖν, εἰς ἄλλην δὲ στήλην ἀναγράφονται τὰ ποσὰ τῶν πράξεων, αἱ ὁποῖαι δὲν ἀπαιτοῦν χρέωσιν ἢ πίστωσιν ἐνὸς προσωπικοῦ λογαριασμοῦ. Κατὰ τοιοῦτον τρόπον εἶνε διατεταγμένον τὸ κάτωθι ὑπόδειγμα Ἡμερολογίου.

§ 124. Καθολικόν.—

Καθολικὸν καλεῖται τὸ βιβλίον εἰς τὸ ὁποῖον ὁ ἔμπορος ἀνοίγει τοὺς λογαριασμοὺς τῶν διαφόρων προσώπων, μετὰ τῶν

Σελίς 1.

Ἡμερολόγιον

		2 Ὀκτωβρίου 1915.		
1	Καθ. 3	Εἰς Κ. Γεωργιάδην ἄξιαν τιμολ. (Δοῦναι)		1600
		» » » ἐμέτρησεν ἀμέσως (Λαβεῖν)		1000
2	Καθ. 4	4 ἰδίου.		
		Ἐκ Δ. Μαρξίδην (Λαβεῖν) ἄξιαν ἐμπορευμάτων		250
		κατὰ τὸ τιμολόγιον 4		
3	Καθ. 2	Ἐθνικὴ Τράπεζα διὰ κατάθεσίν μας		500
	Ταμ. 7	σημερινὴν (Δοῦναι)		
4	Ταμ. 7	Λιανικὴ πώλησις σημερινὴ		600
		4 ἰδίου.		
5	Καθ. 17	Δ. Παυλίδης (Λαβεῖν) διὰ σημερινὴν του πληρω-		150
		μῆν		
6	Καθ. 15	4 ἰδίου.		
		Ἐκ Κ. Θεοδώρου (Λαβεῖν) διὰ γραμμα-		360
		τίον του εἰς βάρος του		
		Τῆ αὐτῆ.		
7	Ταμ. 7	Πώλησις σημερινὴ		450

Σελίς 12

Ἡμερολόγιον

		Δοῦναι		Λαβεῖν	
		Δρ.	Λ.	Δρ.	Λ.
				Ἐκ μεταφορᾶς	
				3 Νοεμβρίου	
57	Καθ. 3	Κ. Γεωργιάδης ἄξιαν ἐμπορευμά-		12600	—
		των	1540	80	4842
		τῆ αὐτῆ			50
58	Ταμ. 3	Πώλησις λιανικὴ σημερινὴ	450		
		τῆ αὐτῆ		400	—
59	Καθ. 3	Κ. Γεωργιάδης μετρητὰ			1000
	Ταμ. 3	τῆ αὐτῆ			
60	Καθ. 2	Ἐθνικὴ Τράπεζα			
	Ταμ. 7	δι' ὅσα ἀπεσώραμεν σήμερον		10000	

ὁποίων συναλλάσσεται ἐμπορικῶς.

Εἰς τὸ Καθολικὸν ἐγγράφονται αἱ διάφοροι πράξεις ὄχι κατὰ χρονολογικὴν σειρὰν, καθὼς εἰς τὸ Ἡμερολόγιον, ἀλλὰ κατὰ λογαριασμοὺς, δηλαδὴ τὰ διάφορα ποσὰ τῶν χρεώσεων καὶ πιστώσεων μεταφέρονται ἐκ τοῦ Ἡμερολογίου εἰς τὰς ἀντιστοίχους μερίδας (Χρέωσις, Πίστωσις) τῶν εἰς τὸ Καθολικὸν λογαριασμῶν.

Διὰ τὴν εὐκολον εὑρεσιν τῶν λογαριασμῶν εἰς τὸ Καθολικὸν γίνεται συνήθως χρῆσις βιβλιαρίου, τὸ ὅποιον καλεῖται «*Εὐρετήριο*» καὶ περιέχει κατ' ἀλφαβητικὴν τάξιν τὰ ὀνόματα τῶν τιτλοῦχων τῶν διαφόρων λογαριασμῶν καὶ καθὲν μετὰ τῆς σελίδος

τὴν ὁποῖαν κατέχει εἰς τὸ Καθολικόν. Αἱ σελίδες αὐταὶ εὐρίσκονται καὶ εἰς τὴν στήλην τῆς παραπομπῆς εἰς τὸ Ἡμερολόγιον.

Διὰ τὴν ταχείαν εὐρεσιν τῆς εἰς τὸ Ἡμερολόγιον πράξεως, ἐκ τῆς ὁποίας προέρχεται ἢ εἰς τινα λογαριασμὸν τοῦ Καθολικοῦ συντόμως ἀναγεγραμμένη, ἀναγράφεται εἰς ἰδιαιτέραν στήλην τοῦ Καθολικοῦ ὁ αὐξων ἀριθμὸς τῆς πράξεως (ἢ ἄλλοτε ἢ σελὶς τοῦ Ἡμερολογίου, εἰς τὴν ὁποῖαν εἶνε ἀναγεγραμμένη ἢ πράξις) εἰς τὸ Ἡμερολόγιον.

Παράδειγμα. Κατωτέρω παραθέτομεν μερικoὺς λογαριασμοὺς τοῦ Καθολικοῦ εἰς τοὺς ὁποίους ἔχουν μεταφερθῆ τὰ ποσὰ τῶν χρεώσεων καὶ πιστώσεων ἐκ τοῦ Ἡμερολογίου (§ 123).

Σελὶς 3

Δοῦναι			Κ. Γεωργιάδης			Λαβεῖν			
1915	ΑΞ.		Δρ.	Λ.	1915	ΑΞ.		Δρ.	Λ.
8)βρ. 2	ἀριθ. 1	Ἐξίαι ἐμπορευμάτων	1600		8)βρ. 2	ἀριθ. 1	Μετρητὰς	1000	

Δοῦναι			Δ. Παυλίδης			Λαβεῖν			
1915	ΑΞ.		Δρ.	Λ.	1915	ΑΞ.		Δρ.	Λ.
	ἀριθ.				8)βρ. 12	ἀριθ. 5	Διὰ πληρωμῆν του	150	

Σελὶς 2

Δοῦναι			Ἐθνικὴ Τράπεζα			Λαβεῖν			
1915	ΑΞ.		Δρ.	Λ.		ΑΞ.		Δρ.	Λ.
8)βρ. 10	ἀριθ. 3	Διὰ κατάθεσίν μας	500			ἀριθ.			

Ἀσκήσεις.

Ἐκ τῶν κάτωθι πράξεων νὰ σχηματισθοῦν α') τὸ Ἡμερολόγιον. β') οἱ προσωπικοὶ λογαριασμοὶ ἐκ τῶν πράξεων αἱ ὁποῖαι θὰ ἐγγραφοῦν εἰς τὸ Ἡμερολόγιον.

- 1) 8)βρίου 1. Κατέθεσα κεφάλαιον εἰς μετρητὰ δρ. 10000.
- 2) Τῇ αὐτῇ. Ἠγόρασα διάφορα ἐπιπλα τοῦ καταστήματος τοῖς μετρητοῖς δρ. 2500.
- 3) 8)βρίου 2. Ἠγόρασα ἐπὶ πιστώσει ἀπὸ Κ. Γεωργιάδην διάφορα ἐμπορεύματα, ὡς τὸ ὑπ' ἀριθ. 1 τιμολόγιόν του δρ. 1600.
- 4) 8)βρίου 4. Ἐπώλησα ἐπὶ πιστώσει εἰς Δ. Μαρκίδην διάφορα ἐμπορεύματα δρ. 250.

5) 8/δρίου 5. Ἐπλήρωσα διὰ γραφικὴν ὕλην	δρ.	20.
6) 8/δρίου 7. Ἐπλήρωσα δι' ἐνοίκιον καταστήματος	δρ.	200.
7) 8/δρίου 10. Εἰσέπραξα ἀπὸ Δ. Μαρκίδην ἔναντι λογαριασμοῦ του	δρ.	150.
8) 8/δρίου 11. Ἀπεδέχθην δύο συναλλαγματικὰς εἰς διαταγὴν Κ. Γεωργιάδου ὡς ἐξῆς. Συναλλαγματικὴ λήξεως 30 Ν/δρίου δρ. 1000 Συναλλαγματικὴ λήξεως 5 Ἰανουαρίου δρ. 600 Ἐν ἔλῳ	δρ.	1600.
9) 8/δρίου 12. Ἠγόρασα ἀπὸ Μ. Λάμπρον διάφορα ἔμπορεύματα ἐπὶ πιστώσει ὡς τὸ ὑπ' ἀριθ. 1 τιμολόγιόν του	δρ.	3300.
10) 8/δρίου 18. Ἐπώλησα εἰς διαφόρους διάφορα ἔμπορεύματα τοῖς μετρητοῖς	δρ.	120.
11) 8/δρίου 21. Ἐλαβον ἀπὸ Δ. Μαρκίδην συναλλαγματικὴν εἰς διαταγὴν μου, λήγουσαν τῇ 6 Δ/δρίου	δρ.	200.
12) 8/δρίου 24. Ἐπώλησα εἰς Π. Μανούσον διάφορα ἔμπορεύματα ἐπὶ πιστώσει	δρ.	340.
13) 8/βρίου 31. Ἐπλήρωσα τοὺς μισθοὺς τῶν ὑπαλλήλων μου διὰ τὸν μῆνα 8/δριον	δρ.	180.
14) Ν/δρίου 3. Ἐπώλησα εἰς Κ. Θεοδώρου διάφορα ἔμπορεύματα ἐπὶ πιστώσει	δρ.	260.
15) Ν/δρίου 7. Ἐλαβον ἀπὸ Π. Μανούσον μετρητὰς ἔναντι λογαριασμοῦ του	δρ.	100.
16) Ν/δρίου 12. Ἐμέτρησα εἰς Μ. Λάμπρον ἄπέναντι λογαριασμοῦ του	δρ.	500.
17) Ν/βρίου 20. Ἐλαβον ἐκ τοῦ ταμείου διὰ προσωπικά μου ἔξοδα	δρ.	200.
18) Ν/δρίου 27. Ἐπώλησα εἰς διαφόρους διάφορα ἔμπορεύματα τοῖς μετρητοῖς	δρ.	140.
19) Ν/δρίου 30. Ἐλαβον παρὰ τοῦ Κ. Θεοδώρου συναλλαγματικὴν εἰς διαταγὴν μου, λήγουσαν τῇ 15 Ἰανουαρίου	δρ.	260.
20) Δ/δρίου 1. Ἐπλήρωσα τὴν λήξασαν συναλλαγματικὴν εἰς διαταγὴν τοῦ Κ. Γεωργιάδου	δρ.	1000.
21) Δ/δρίου 2. Ἐπλήρωσα τοὺς μισθοὺς τῶν ὑπαλλήλων τοῦ μηνὸς Ν/δριου	δρ.	180.
22) Δ/δρίου 3. Ἐπλήρωσα διὰ γραφικὴν ὕλην	δρ.	20.

§ 125. Ταμεῖον. —

Ταμεῖον καλεῖται τὸ βιβλίον εἰς τὸ ὁποῖον ὁ ἔμπορος ἐγγράφει μεθωδικῶς ἀφ' ἑνὸς μὲν τὰ καθ' ἡμέραν εἰσερχόμενα εἰς τὸ

κατάστημά του χρηματικά ποσά, ἤτοι τὰς εἰσπράξεις του, ἀφ' ἑτέρου δὲ τὰ καθ' ἡμέραν ἐξερχόμενα χρηματικά ποσά, ἤτοι τὰς πληρωμὰς του.

Μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ βιβλίου αὐτοῦ δύναται ὁ ἔμπορος νὰ γνωρίζῃ καθ' οἵανδήποτε στιγμήν τὰ εἰς τὸ χρηματοκιβώτιόν του εὑρισκόμενα μετρητά.

Ἡ τήρησις τοῦ βιβλίου τοῦ Ταμείου εἶνε ὁμοία μὲ τὴν τοῦ Καθολικοῦ. Αἱ εἰσπράξεις σημειοῦνται εἰς τὸ πρὸς τὰ ἀριστερὰ μέρος, ἤτοι εἰς τὸ Λαβεῖν. Διὰ καθὲν εἰσπραττόμενον ποσὸν σημειοῦται ἡ ἡμερομηνία εἰς τὴν ἐπὶ τούτῳ στήλῃν, κατόπιν σαφῆς καὶ σύντομος αἰτιολογικῆ ἐκθεσις ἀναφέρουσα τὸν μετρήσαντα τὸ ποσὸν καὶ τὸν λόγον τῆς εἰσπράξεως ταύτης. Εἰς ἰδιαιτέραν στήλῃν γράφεται ὁ αὐξων ἀριθμὸς καθημιᾶς πράξεως, εἰλημμένος ἐκ τοῦ Ἡμερολογίου (ἢ ἡ σελίς τοῦ Ἡμερολογίου εἰς τὴν ὁποίαν εἶνε ἀναγεγραμμένη ἡ πράξις).

Κατωτέρω παραθέτομεν ὑπόδειγμα Ταμείου τῶν εἰς τὰς ἀσκήσεις τῆς προηγουμένης παραγράφου πράξεων.

Εἰς τὴν στήλῃν τοῦ αὐξοντος ἀριθμοῦ γράφομεν τοὺς ἀριθμοὺς τῶν πράξεων, εἰλημμένους ἐξ αὐτῶν τῶν πράξεων ὡς ἐδόθησαν, ἀλλὰ δύναται νὰ ληφθοῦν καὶ ἐκ τοῦ Ἡμερολογίου, μετὰ τὴν εἰς αὐτὸ ἐγγραφὴν τῶν πράξεων τούτων.

Ἡ περάτωσις καὶ ἡ μετφορὰ εἰς τὸ βιβλίον τοῦ Ταμείου γίνεται ἀκριθῶς καθὼς φαίνεται καὶ εἰς τὸν ἀνωτέρω πίνακα.

Ὡς πρόχειρον τοῦ βιβλίου τοῦ Ταμείου θεωρεῖται ἄλλο βιβλίον, τὸ ὁποῖον καλεῖται βιβλίον Ἐξόδων. Εἰς τοῦτο γράφονται προχειρῶς τὰ διάφορα μικρὰ ἐξόδα τοῦ καταστήματος, ἤτοι γραφικῆς ὕλης, γραμματοσύμων κλπ., τηροῦν δὲ τὸ βιβλίον τοῦτο, διὰ νὰ μὴ φέρουν εἰς τὸ Ταμεῖον τὰ μικρὰ ταῦτα ποσὰ τμηματικῶς. Ὅσακις λοιπὸν πληρώνει ὁ ταμίης τοῦ καταστήματος τοιαῦτα ἐξόδα, δὲν ἐγγράφει αὐτὰ εἰς πίστωσιν τοῦ βιβλίου τοῦ Ταμείου, ἀλλὰ σημειώνει αὐτὰ μόνον εἰς τὸ βιβλίον τῶν ἐξόδων, καθ' ἑβδομάδα δὲ ἢ κατὰ μῆνα, φέρει τὸ ὅλικόν ἄθροισμα τῶν ἐξόδων εἰς τὴν πίστωσιν αὐτοῦ τοῦ Ταμείου. Διὰ τοῦτο τὸ βιβλίον τοῦτο εἶνε βρηθητικὸν τοῦ Ταμείου.

Ἀσκήσεις. 1) Σχηματίσατε τὸ Ταμεῖον ἐκ τῶν εἰς τὸ Ἡμερολόγιον (σελ. 235), ἀναγεγραμμένων πράξεων.

2) Ἐκ τοῦ Ἡμερολογίου σας διὰ τὰς πράξεις αἱ ὁποῖαι ἐδόθησαν εἰς σελ. 235 Ἀσκήσεις, φέρατε τὴν πρέπουσαν μεταβολὴν τοῦ αὐξοντος ἀριθμοῦ τῶν εἰσπράξεων καὶ πληρωμῶν τοῦ Ταμείου.

Εισπράξεις

Ταμείον

Πληρωμαί

1909			Δρ.	Λ.	1909			Δρ.	Λ.		
	Αρ.	Αρ.				Αρ.	Αρ.				
8)βρ.	1	1	Κατάθεσις κε- φαλαίου	10000	—	8)βρ.	1	2	Δι' αγοράν επί- πλων	2500	—
>	10	7	'Από Δ. Μαρ- κίδην	150	—	>	5	5	Δι' γραφ. ὕλην	20	—
>	18	40	Πώλησις τοῖς μετρητοῖς	120	—	>	7	6	δι' ἐνοίκιον κα- ταστήματος	200	—
N)βρ	7	15	'Από Π. Μα- νοῦσον	100	—	>	31	13	Διὰ μισθοῦς ὑ- παλλήλων	180	—
>	27	18	Πώλησις τοῖς μετρητοῖς	140	—	N)βρ	12	16	Εἰς Μ. Λάμ- προν	500	—
						>	20	17	Ἐξοδά μου προσωπικά	200	—
						Δ)βρ	1	20	Πληρωμή γραμματίου	1000	—
						>	2	21	Μισθοὶ ὑπαλ- λήλων	180	—
						>	3	22	Γραφικὴ ὕλη	60	—
									Ὑπόλοιπον εἰς νέον	5670	—
1910			Ἐν ὄλῳ	10510	—				Ἐν ὄλῳ	10510	—
Ἰαν. 1			Ὑπόλοιπον ὡς ἄνω	5670	—						—

§ 126. Βιβλίον Ἀπογραφῶν καὶ Ἰσολογισμῶν.—

Τὸ βιβλίον Ἀπογραφῶν καὶ Ἰσολογισμῶν ἐπιβάλλεται, καθὼς εἶπμεν, ὑπὸ τοῦ Νόμου καὶ χρησιμεύει διὰ νὰ ἐγγράφωμεν εἰς αὐτὸ τὰς διαφόρους Ἀπογραφὰς καὶ τοὺς Ἰσολογισμοὺς.

Περὶ τοῦ τρόπου τῆς τηρήσεως τοῦ βιβλίου αὐτοῦ εἶδομεν εἰς τὴν σελ. 229—30.

Ἀσκήσεις. Ἐκ τοῦ βιβλίου Καθολικοῦ, τὸ ὅποιον κκτηρίσατε διὰ τὰς πράξεις αἱ ὁποῖαι ἐδόθησαν εἰς τὴν § 124 Ἀσκήσεις καὶ ἐκ τοῦ Ταμείου τῶν αὐτῶν πράξεων (§ 125) νὰ συνταχθῇ ἡ Ἀπογραφὴ καὶ ὁ Ἰσολογισμὸς εἰς τὸ βιβλίον τῶν Ἀπογραφῶν καὶ Ἰσολογισμῶν κατὰ τὸ ὑπόδειγμα τῆς § 118.

§ 127. Βιβλίον Ἀντιγραφῆς ἐπιστολῶν.—

Εἰς τὸ βιβλίον τῆς ἀντιγραφῆς ἐπιστολῶν, τὸ ὅποιον ἐπιβάλλεται ὑπὸ τοῦ Νόμου, κρατεῖται ἀντίγραφον τῶν ἐπιστολῶν καὶ τῆς ἐν γίνει ἀλληλογραφίας τοῦ ἐμπόρου μετὰ τῶν τρίτων, μετὰ τῶν ὁποίων εὐρίσκεται εἰς ἐμπορικὰς σχέσεις. Πρὸς τοῦτο

γράφεται συνήθως ή προς άντιγραφήν έπιστολή δι' ειδικής μελάνης διά γραφίδος, ή διά γραφομηχανής, και λαμβάνεται άντιγραφον εις τό βιβλίον διά τής βοηθείας ειδικού πιστηρίου.

Ά σ κ ή σ ε ι ς .

1) Έκ των κάτωθι πράξεων ενός καταστήματος, αί όποϊαι υποτίθεται ότι εϊνε άναγεγραμμένα εις τό πρόχειρον να καταρτισθῆ α') τό 'Ημερολόγιον του καταστήματος' β') τό Καθολικόν γ') τό Ταμείον δ') ή Άπογραφή και ό 'Ισολογισμός αυτού την 31 Μαρτίου του 1914.

1 Ιανουαρίου 1914

Κατέθεσα επί σκοποῦ έμπορίου Δρ. 50000.

2 Ιανουαρίου

2) 'Ηγόρασα τοίς μετρητοίς είδη επίπλων (βλέπε πρόχειρον επίπλων) Δρ. 500.
άντι

3 Ιανουαρίου

3) 'Ηγόρασα τοίς μετρητοίς είδη γραφικής ύλης (βλέπε πρόχειρον επίπλων) άντι Δρ. 62.

5 Ιανουαρίου

4) 'Ηγόρασα επί πιστώσει από τον Π. Παυλίδην 20 δέματα μαλλίων προς 400 Δρ. καθέν Δρ. 8000.

10 Ιανουαρίου

5) 'Ηγόρασα από Π. Παυλίδην 10 δέματα μαλλίων προς 500 Δρ. καθέν τοίς μετρητοίς Δρ. 5000.

15 Ιανουαρίου

6) 'Ηγόρασα από Π. Παυλίδην 10 δέματα μαλλίων προς 1000 Δρ. καθέν, και έπλήρωσα την αξίαν των διά γραμματίου μου λήγοντος τῆ 15 'Ιουλίου Δρ. 10000.

20 Ιανουαρίου

7) 'Εμέτρησα εις Π. Παυλίδην προς έξόφλησιν των αγορασθέντων μαλλίων τῆ 5 τρέχοντος Δρ. 8000.

28 Ιανουαρίου

8) 'Επλήρωσα δι' ενοίκιον γραφείου και αποθήκης από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 31ης Μαρτίου προς 150 Δρ. μηνιαίως Δρ. 450.

29 Ιανουαρίου

9) 'Επλήρωσα δια ταχυδρομικά του τρέχοντος μηνός Δρ. 450.

30 Ιανουαρίου

10) 'Ελαδον εκ του ταμείου δι' έξοδά μου (προσωπικά) του 'Ιανουαρίου Δρ. 300.

31 Ιανουαρίου

11) 'Επλήρωσα δια μισθός των υπαλλήλων Δρ. 300.

5 Φεβρουαρίου

12) 'Ηγόρασα παρά των κάτωθι: τὰ έπόμεινα επί πιστώσει α') παρά του Α. Άγαθοκλέους 10000 Δρ. αλεύρων προς 50 λεπτά την Δρ. 5000 β') παρά του Δ. Δημητριάδου 2000 Δρ. ζαχαρώς προς 1,75 Δρ. την Δρ. 3500. 'Εν όλω Δρ. 8500.

10 Φεβρουαρίου

13) Έπώλησα επί πιστώσει εις Τ. Εὐαγγελίδην 5 δέματα μαλλίων πρὸς 1100 δρ. καθὲν δρ. 5500.

15 Φεβρουαρίου

14) Έπώλησα εις Τ. Εὐαγγελίδην 20 δέματα μαλλίων πρὸς 450 δρ. καθὲν δρ. 9000.

20 Φεβρουαρίου

15) Εἰσέπραξα ἀπὸ Τ. Εὐαγγελίδην ἔναντι τοῦ λογαριασμοῦ του δρ. 5000.

25 Φεβρουαρίου

16) Έπώλησα εις Τ. Εὐαγγελίδην 10 δέματα μαλλίων πρὸς 1125 δρ. καθὲν, καὶ ἔλαβον τὴν ἀξίαν αὐτῶν διὰ γραμματίου εις διαταγὴν μου, λήρον τῇ 6 Αὐγούστου δρ. 11250.

28 Φεβρουαρίου

17) Έπλήρωσα δι' ἔξοδα τοῦ λήξαντος μηνὸς (βλέπε πρόχειρον Ταμείου) δρ. 613,50.

1 Μαρτίου

18) Έπώλησα εις ἐπομένους τὰ κάτωθι.

1) Εἰς Ι. Ἰωαννίδην 30000 ὀκ. σίτου πρὸς 50 λ.

τὴν ὀκᾶν, πληρωτέας τῆς ἀξίας του ὡς ἑξῆς

α') τοῖς μετρητοῖς ἐντὸς 10 ἡμερῶν δρ. 10000

β') διὰ γραμματίου " 5000

Ἦτοι δρ. 15000.

2) Εἰς Ζαχαρίαν Νεόφυτον 5000 ὀκ. ἀλεύρου πρὸς 65 λ.

τὴν ὀκᾶν τοῖς μετρητοῖς δρ. 3250.

Ἦτοι ἐν ὄλῳ δρ.

18250

10 Μαρτίου

10) Ἐλαβον παρὰ τοῦ Ι. Ἰωαννίδου πρὸς ἐξόφλησιν τοῦ πωληθέντος σίτου τὴν 1ην τρέχοντος

α') εἰς μετρητὰ δρ. 10000

β') εἰς γραμμάτιον εἰς διαταγὴν μου λήγον τῇ 10 Ἰουλίου δρ. 5000. Ἐν ὄλῳ δρ. 15000.

14 Μαρτίου

20) Εἰσέπραξα παρὰ τοῦ Τ. Εὐαγγελίδου δρ. 9000.

18 Μαρτίου

21) Ἠγόρασα παρὰ τοῦ Φ. Ἡλιοπούλου τὴν 28ην Φεβρ. 30000 ὀκ. σίτου πρὸς 45 λ. τὴν ὀκᾶν, ἐπλήρωσα δὲ τὴν ἀξίαν των τοῖς μετρητοῖς. Τὴν πρᾶξιν ταύτην δὲν ἀνέγραψα τῇ 28 Φεβρουαρίου κατὰ λάθος. δρ. 16000.

31 Μαρτίου

22) Έπλήρωσα δι' ἔξοδα τοῦ μηνὸς Μαρτίου (βλέπε πρόχειρον Ταμείου). δρ. 610,90.

~~4000~~/96
2800/96

ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ

ΕΚ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

(Εγκριμ.) *Πρακτικὴ Γεωμετρία*, διὰ τὰ ἑλληνικὰ σχολεῖα, τὰ ἀστικὰ καὶ τὰ ἀνώτερα Παρθεναγωγεῖα, ἐκδόσεις 1—3.

(Εγκριμ.) *Στοιχειώδης Γεωμετρία*, διὰ τὰ Γυμνάσια.

(Εγκριμ.) *Στοιχειώδης Ἀλγεβρα*, διὰ τὰ Γυμνάσια. ἐκδόσεις 1—4.

ΕΚ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Στοιχ. τὰ Ἀναλυτικῆς Γεωμετρίας, μέρος Α' μετὰ προλόγου διὰ τοῦ Ἀκαδημαϊκοῦ κ. Κ. Καραθεοδωρῆ (Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου) ἐκ. σελ. 288+ιβ', διὰ τοὺς φοιτητὰς τοῦ Πανεπιστημίου, τοῦ Πολυτεχνείου, τῶν ἀνωτέρων στρατιωτικῶν Σχολῶν καὶ τοὺς μαθητὰς τῶν Πρακτικῶν Λυκείων.

Μεθήματα Γεωμετρίας τῆς θέσεως (λιθογραφον) διὰ τοὺς φοιτητὰς τοῦ Πανεπιστημίου ἐκ. σελ. 100.

Ἄρθ. Πρωτ. 36398

Ἔτος Γ'

Ἐν Ἀθήναις τῇ 4 Νοεμβρίου 1917

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

Πρὸς

τὸν κ. Νεῖλον Σακελλαρίου

Γνωρίζομεν ὑμῶν διὰ κατ' ἀπόφασιν τοῦ Ἐκπαιδευτικοῦ συμβουλίου ἀνεκρίθη ἡ χορῆσι τῆς ὑπ' ὑμῶν ἐπιβληθείσης Πρακτικῆς Ἀριθμητικῆς διὰ τοὺς μαθητὰς τῶν ἑλληνικῶν σχολείων, τῶν ἰστανῶν καὶ τῶν ἀνατίκτων παρθεναγωγείων διὰ τὰ ἔτη 1917—1918 καὶ τῆς κατὰ τὴν ἐπ' ἀριθ. 138 πράξιν αὐτοῦ.

Ο Ἐπίτροπος

Σ. ΜΥΚΑΣ

Δ ΤΣΙΡΙΜΟΚΙΣ