


ΕΥΑΓΟΡΑ Μ. ΠΑΝΤΕΛΟΥΡΗ

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ




ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1957

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ

ΔΩΡΕΑ
ΜΛΕΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΤΗΝ ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑ
ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΑΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

ΕΥΑΓΟΡΑ Μ. ΠΑΝΤΕΛΟΥΡΗ

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ



18980

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1957


ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τὸ κύτταρον. Εἰς τὴν Φυσικὴν Ἰστορίαν τῶν προηγουμένων ἐτῶν ἐμελετήσαμεν γενικῶς τὰ φυτὰ καὶ τὰ ζῶα, δηλ. τὰ φυσικὰ σώματα, τὰ ὅποια ἔχουν ζωὴν (ἔμβια ὄντα). Χαρακτηριστικὸν τῆς κατασκευῆς τῶν ἐμβίων ὄντων εἶναι, ὅτι ἀποτελοῦνται ἀπό κύτταρα, καὶ μάλιστα ἄλλα μὲν ἀπὸ ἓν μόνον (μονοκύτταροι ὁργανισμοί), ἄλλα δὲ ἀπὸ πολλὰ (πολυκύτταροι ὁργανισμοί).

Εις τὸ μικροσκόπιον διακρίνομεν εύθυνς ἀμέσως τρία μέρη εἰς τὸ κύτταρον: τὴν κυτταρικὴν μεμβρᾶν αν, ἡ δποία τὸ περιβάλλει, τὸ κυτταρόπλασμα καὶ τὸν πυρῆνα (εἰκ.1).

The diagram illustrates the ultrastructure of a Purkinje cell. It shows a cross-section of the cell with various organelles labeled: Σ (S) for the nucleus, Mx (Mx) for mitochondria, and Λn (Λn) for the endoplasmic reticulum. A large, irregularly shaped structure is labeled Κπ. (Κπ.) representing the soma. The text below the diagram discusses the Purkinje cell's morphology and its relationship to granule cells.

³ Έκτὸς τοῦ κυππαροπλάσματος διακρίνονται εἰς τὰ μικροσκοπικὰ παρασκευάσματα διάφορα κοκκια, διάφορα κενοτόπια, καθώς καὶ ώρισμένα νημάτια ἢ σφαιρίδια καλούμενα μιτοχόν-



Εἰκ. 1. Σχηματική παράστασις κυττάρου. Π. Πυρήν. Πρ. Πυρηνίσκος. πΜ. Πυρηνική μεμβράνα. κΜ. Κυτταρική μεμβράνα. Μχ. Μιτοχόνδρια. Κπ. Κυτταρόπλασμα. Κ. Κενοτόπιον. Εἰς τὸ σχῆμα τοῦτο, πλὴν τῶν ἀνωτέρω, παρίστανται καὶ διάφορα ὅλλα μορφολογικά στοιχεῖα τῶν ζωικῶν κυττάρων.

δρια. Τὸ κυτταρόπλασμα εύρισκεται εἰς μίαν διαρκῆ ροήν ἐντὸς τοῦ κυττάρου. Ἡ κίνησις αὕτη τοῦ πρωτοπλάσματος δύναται νὰ παρατηρηθῇ καλῶς εἰς κινηματογραφικάς ταινίας, αἱ ὅποιαι ἔχουν ληφθῆ ἀπὸ τὴν ζωὴν μονοκυττάρων ὄργανισμῶν, ὡς εἶναι ἡ ἀμοιβάς κ.ἄ.

Ἐντὸς τοῦ πυρῆνος διακρίνονται εἰς ἡ περισσότεροι πυρηνίσκοι. Ἰδιαιτέραν σημασίαν ἔχουν ὥρισμένα κοκκία ἐσκορπισμένα ἐντὸς τοῦ πυρῆνος, τὰ ὅποια ὡνομάσθησαν χρώματικά κοκκία, ἐπειδὴ χρωματίζονται εὐκόλως ἀπὸ ὥρισμένας (βασικάς) χρωστικάς ούσιας. Ὅταν τὸ κύτταρον πρόκειται νὰ διαιρεθῇ, τὰ κοκκία ταῦτα σχηματίζουν ἐν νήμα (σπείραμα), τὸ ὅποιον τελικῶς τέμνεται εἰς τμήματα καλούμενα χρωματοσώματα. Τὰ κύτταρα κάθε είδους ζώου χαρακτηρίζονται ἀπὸ ὥρισμένον ἀριθμὸν χρωματοσωμάτων, τὰ ὅποια εἶναι ἀνὰ δύο ὅμοια. Ὁ ἀνθρωπός π.χ. ἔχει 24 τοιαῦτα ζεύγη χρωματοσωμάτων εἰς κάθε κύτταρον τοῦ σώματός του.

Ἐν ὅσῳ ζῇ τὸ κύτταρον, ἔξιδεύει μέρος τοῦ πρωτοπλάσματος του, διασπᾶ τοῦτο εἰς ἀπλουστέρας ἐνώσεις καὶ οὔτω κερδίζει τὴν ἰκανότητα κινήσεως, θερμότητα κλπ. Διὰ τὴν διάσπασιν αὐτὴν χρειάζεται γενικῶς ὀξυγόνον, τὸ ὅποιον παραλαμβάνεται ἀπὸ τὸ περιβάλλον. Ἐξ ἄλλου τὸ κύτταρον, ἀπὸ διαφόρους ούσιας τοῦ περιβάλλοντος, μὲ τὰς ὅποιας τρέφεται, σχηματίζει νέον πρωτόπλασμα, τὸ ὅποιον ἐνσωματώνει. Δι᾽ αὐτοῦ αὔξανεται καὶ ἀναπληρώνει καὶ τὸ συνεχῶς διασπώμενον κατὰ τὴν ζωὴν πρωτόπλασμα. (Ἐν αλλαγῇ τῆς ὑλῆς).

Οἱ ιστοί. Εἰς τοὺς πολυκυττάρους ὄργανισμοὺς τὰ κύτταρα δὲν ἔκτελοῦν ὅλα τὰς ἴδιας ἐργασίας. Εἰς τοὺς ὄργανισμοὺς τούτους αἱ ἐργασίαι εἶναι καταμερισμέναι. Ἐκ τῶν διαφόρων κυττάρων ἄλλα π.χ. ἀναλαμβάνουν τὴν προστασίαν τοῦ ὄργανισμοῦ ἀπὸ τὰς ἐπιδράσεις τοῦ περιβάλλοντος (κύτταρα τοῦ δέρματος), ἄλλα τὴν παραγωγὴν ὥρισμένων ούσιῶν (κύτταρα τῶν ἀδένων) κ.ο.κ. Ὁλα τὰ κύτταρα, τὰ ὅποια ἔχουν διαμορφωθῆναι κατὰ τοιοῦτον τρόπον, ὥστε νὰ ἔκτελοῦν τὴν αὐτὴν ἐργασίαν, ἀποτελοῦν ἓνα ἴστον. Π.χ. τὰ κύτταρα, τὰ ὅποια καλύπτουν τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ σώματος, ἀποτελοῦν τὸν ἐπιθηλιακὸν ἴστον. Ἀλλο εἶδος ιστοῦ εἶναι ὁ συνδετικὸς ἴστος, ὁ ὅποιος παρεμβάλλεται μεταξὺ

τῶν λοιπῶν καὶ προσδίδει εἰς αὐτοὺς στερεότητα καὶ ἐλαστικότητα.
Ἀναλόγως διακρίνομεν ἀ δενικὸν ἴστον, νευρικὸν ἴστον
κ.ο.κ.

Ἐκαστος ἴστος, ἐκτὸς τῶν ζώντων κυττάρων του, δύναται νὰ περιλαμβάνῃ καὶ κύτταρα ἡλλοιωμένα (ἐπιδερμὶς), ἢ καὶ νεκρὰ κύτταρα, καθὼς καὶ διαφόρους ούσιας μεταξὺ τῶν κυττάρων (ἄλατα τῶν ὁστῶν).

Εἰς τὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου, ώς καὶ τῶν ἀνωτέρων ζώων καὶ φυτῶν, δυνάμεθα νὰ διακρίνωμεν μέρη, τὰ ὅποια περιλαμβάνουν διάφορα εἰδη ἴστων, καὶ εἶναι κατάλληλα δι' ὥρισμένην ἐργασίαν. Τὰ τμήματα αὐτὰ καλοῦνται ὅργανα. Ἀθροίσματα ὄργανων συνεργαζομένων πρὸς ἐκτέλεσιν μιᾶς φυσιολογικῆς λειτουργίας ἀποτελοῦν τὰ ὄργανα της συστήματος (πεπτικὸν σύστημα, νευρικὸν σύστημα κ.ο.κ.).

Ο ἀνθρωπος. Ἐφέτος θὰ μελετήσωμεν ἴδιαιτέρως τὸν ὄργανισμὸν τοῦ ἀνθρώπου. Μέσα ἀπὸ ὅλον τὸν ἔμβιον κόσμον ὁ ἀνθρωπος ξεχωρίζει μὲ τὰς ἰκανότητάς του, τὴν νόησιν καὶ τὸν πολιτισμόν, τὸν ὅποιον ἐδημιούργησεν.

Εἰς τὰς γενικὰς γραμμὰς ὁ ὄργανισμὸς τοῦ ἀνθρώπου ὅμοιάζει πρὸς τὸν ὄργανισμὸν τῶν λοιπῶν Θηλαστικῶν, καὶ μάλιστα τῶν ἀνωτέρων ἐξ αὐτῶν, τῶν Πρωτεύοντων. Παρουσιάζει ὅμως ἡ κατασκευὴ τοῦ σώματός του καὶ σημαντικὰς διαφορὰς πρὸς αὐτά, αἱ ὅποιαι ἔχουν μεγάλην σπουδαιότητα διὰ τὴν ἔξαιρετικὴν ἔξτριξιν, τὴν ὅποιαν ἡκολούθησεν ὁ ἀνθρωπος. Εἰς τὴν περιγραφὴν τῶν διαφόρων συστημάτων τοῦ ἀνθρωπίνου ὄργανισμοῦ θὰ μᾶς δοθῇ ἡ εὐκαιρία νὰ παρατηρήσωμεν ὥρισμένας ἐκ τῶν διαφορῶν τούτων καὶ νὰ ἀντιληφθῶμεν τὴν σημασίαν των.

Τὸ βιβλίον τοῦτο θέλει νὰ συντροφεύσῃ τὸ ‘Ελληνόπουλον τῆς Δ’ Γυμνασίου κατὰ τὴν ὥραν τῆς μελέτης του. Ἔχει σκοπὸν νὰ βιοθήσῃ τὸν μαθητήν, διὰ νὰ ἐπαναλάβῃ καὶ νὰ ἀφομοιώσῃ ὅ, τι καὶ εἰς τὸ μάθημα ἐδιδάχθη. Οὕτω θ’ ἀποκτήσῃ ὁ μαθητὴς μίαν σαφῆ ἰδέαν τοῦ ἀνθρωπίνου ὄργανισμοῦ.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ


ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ

Ο ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

1. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΦΗ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ

Τὰ μαλακὰ μέρη τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος, ὅπως καὶ τοῦ σώματος τῶν ἄλλων Σπονδυλωτῶν, στηρίζονται ἐπάνω εἰς σκληρὰ μέρη, τὰ ὅποια καλούνται ὁ στ. Ἄ τὰ ὅστα στηρίζονται ἀκόμη καὶ διὰ νὰ περικλείουν ώρισμένα εὐπαθῆ ὅργανα καὶ νὰ ἐκτελοῦν, ἐλκόμενα ὑπὸ τῶν μυῶν, διαφόρους κινήσεις.

Τὰ περισσότερα ὅστα ἀρχικῶς εἶναι χόνδρινα. Βαθμιαίως ὅμως ὁ χονδρώδης ίστος, ἐκ τοῦ ὅποιου ἀποτελοῦνται, ἀντικαθίσταται ὑπὸ ὅστεώδους ίστοῦ, ὡς ἔξης: εἰδικὰ κύτταρα, οἱ ὁστεοβλαστοί, ἐξέρχονται ἀπὸ τὰ αἷμοφόρα ἀγγεῖα καὶ ἐκκρίνουν μίαν μαλακὴν ὄργανικὴν ούσιαν, τὴν ὁστείνην. Διὰ τοῦτο τὰ ὅστα τῶν μικρῶν παιδιῶν εἶναι μαλακὰ καὶ εὔκαμπτα. "Οσον ὅμως προχωρεῖ ἡ ἡλικία, τὸ αἷμα προσκομίζει καὶ ἀποθέτει διάφορα ἀλατά. Οὕτω τὰ ὅστα καθίστανται σκληρότερα, συγχρόνως ὅμως καὶ περισσότερον εὔθραστα. Μέχρι τοῦ εἰκοστοῦ περίπου ἔτους τῆς ἡλικίας ἡ ἀποστέωσις αὔτη συμπληρώνεται καὶ ἡ αὔξησις τῶν ὅστῶν σταματᾷ πλέον.



Εἰκ. 2. Μικροσκοπικὴ τομὴ ὅστοῦ.

σκληρότερα, συγχρόνως ὅμως καὶ περισσότερον εὔθραστα. Μέχρι τοῦ εἰκοστοῦ περίπου ἔτους τῆς ἡλικίας ἡ ἀποστέωσις αὔτη συμπληρώνεται καὶ ἡ αὔξησις τῶν ὅστῶν σταματᾷ πλέον.

"Ωστε, ἂν παρατηρήσωμεν εἰς τὸ μικροσκόπιον μίαν τομὴν ὅστοῦ

(εἰκ. 2), θὰ διακρίνωμεν ἐδῶ καὶ ἑκεῖ διαφόρους δπάς, αἱ δποῖαι εἶναι αἱ τομαὶ τῶν αἵμοφόρων ἀγγείων. Περὶ αὐτὰς θὰ παρατηρήσωμεν, συγκεντρικῶς τοποθετημένας, πολλὰς μικροτέρας δπάς, αἱ δποῖαι εἶναι αἱ θέσεις τῶν κυττάρων. 'Ο λοιπὸς χῶρος κατέχεται ἀπὸ τὴν δστείνην, ἡ ὁποία ἔχει σκληρυνθῆ διὰ τῆς ἀποθέσεως τῶν δλάτων ἀσβεστίου, μαγνησίου καὶ ἄλλων.


'Εκτὸς τῶν οὔτω σχηματιζομένων δστῶν, ὑπάρχουν καὶ ἄλλα, τὰ δποῖα σχηματίζονται δι' ἀποστεώσεως μεμβρανῶν, χωρὶς νὰ σχηματισθῇ προηγουμένως χόνδρος. Τὰ τοιαῦτα δστᾶ καλοῦνται δερμικά, ἀνήκουν δὲ εἰς αὐτὰ κυρίως τὰ δστᾶ τοῦ κρανίου.

'Εκ τῶν δστῶν ἄλλα μὲν εἶναι συμπαγῆ, ἄλλα δὲ σπιργώδη δη. Γενικῶς εἶναι συμπαγῆ τὰ τοιχώματα τῶν μακρῶν κοίλων δστῶν, ἐνῷ τὰ μικρὰ καὶ πλατέα δστᾶ, καθὼς καὶ τὰ ἀκραῖα τμήματα τῶν μακρῶν δστῶν, εἶναι σπογγώδη.

Εἰς τὰ διάκενα τῶν σπογγωδῶν δστῶν καὶ εἰς τὰς κοιλότητας τῶν μακρῶν δστῶν εύρισκεται ἔνας μαλακὸς ὑπέρυθρος ἴστος, δυνελός τῶν δστῶν. Κατὰ τὴν γεροντικὴν ἥλικίαν, λόγῳ τῆς ἀποθέσεως λίπους, δυνελός τῶν δστῶν ἀποκτᾷ ὑποκίτρινον χρῶμα. 'Η ἐπιφάνεια τῶν δστῶν καλύπτεται ἀπὸ ἔνα λεπτὸν ὑμενώδες περιόστεον. 'Επὶ τῆς ἐπιφανείας πολλῶν δστῶν διακρίνομεν δπάς, διὰ τῶν δποίων διέρχονται αἵμοφόρα ἀγγεῖα, καλουμένας τρόματα, διαφόρους ἔξογκώσεις, καλουμένας φύματα καὶ διαφόρους προεκτάσεις καλουμένας ἀποφύσεις.

2. ΣΥΝΔΕΣΙΣ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ. ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ

Σχεδὸν ὅλα τὰ δστᾶ τοῦ σώματος εἶναι συνηρμολογημένα μεταξὺ των, ὡστε ν' ἀποτελοῦν ἐν ἔνιαιον σύνολον, τὸν σκελόν, (εἰκ. 3 καὶ 4). 'Η σύνδεσις δύο δστῶν δύναται νὰ γίνῃ κατὰ δύο τρόπους. 'Ο πρῶτος καλεῖται συνάρθρωσις καὶ δὲν ἐπιτρέπει τὴν κίνησιν τῶν συνδεομένων δστῶν. 'Ο δεύτερος ἐπιτρέπει τὴν κίνησιν καὶ καλεῖται διάρθρωσις. Εἰς τὴν διάρθρωσιν (εἰκ. 5) αἱ ἐφαπτόμεναι ἐπιφάνειαι τῶν δστῶν καλύπτονται μὲν ἐν στρῶμα ἀρθρικοῦ χόνδρου. "Ολη ἡ διάρθρωσις περιβάλλεται ἀπὸ ἵνωδη σάκκον, σχηματιζόμενον ὑπὸ τοῦ περιοστέου καὶ ταινιῶν συνδετικοῦ ἴστοῦ. 'Ο σάκκος οὔτος καλεῖται ἀρθρικὸς θύλακος



Εἰκ. 4. Ἀκτινογραφία ὀλοκλήρου τοῦ σκελετοῦ.

Εἰκ. 3. Ὁ σκελετός τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος. 1. Κεφαλή. — 2. Σπινδυλική στήλη. — 3. Τό στέρνον. — 5. Βραχιόνιον δόστοῦν. — 6. Ἡ λεκάνη. — 7. Κερκίς. — 8. Ὄλένη. — 9. Οστᾶ τῆς ἄκρας χειρός. — 10. Μητριαῖον δόστοῦν. — 11. Περόνη. — 12. Κνήμη. — 13. Ἐπιγονατίς. — 14. Οστᾶ τοῦ ἄκρου ποδός. — 15. Τροχιλία. — 16. Κόνδυλος. — 17. Ἀκρώμιον.

καὶ χρησιμεύει διὰ τὴν συγκράτησιν τῶν ὀστῶν τῆς διαρθρώσεως. Οἱ ἀρθρικοὶ χόνδροι διαβρέχονται ἀπὸ ἐν ὑγρόν, καλούμενον ἀρθρικὸν ύγρόν, τὸ ὅποιον διευκολύνει τὴν ὀλίσθησιν τῶν ὀστῶν.

Εἰς τὸν σκελετὸν διακρίνομεν τὰ ἔξης τμήματα: τὸν σκελετὸν τῆς κεφαλῆς, τὸν σκελετὸν τοῦ κορμοῦ καὶ τὸν σκελετὸν τῶν ἄκρων.

3. Ο ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ


Ο σκελετὸς τῆς κεφαλῆς ἀποτελεῖται ἀπὸ δύο ὁμάδας ὀστῶν, τὰ ὀστᾶ τοῦ κρανίου καὶ τὰ ὀστᾶ τοῦ προσώπου.

Τὰ ὀστᾶ τοῦ κρανίου εἶναι λεπτά καὶ πλατέα καὶ σχηματίζουν μίαν κλειστήν κοιλότητα, τὴν κρανιακὴν κοιλότητα.

Τὰ ὀστᾶ τοῦ προσώπου σχηματίζουν τὰς δύο ὁφθαλμικὰς κόγχας, τὴν ρινικήν κοιλότητα καὶ τὴν στοματικήν κοιλότητα.

Ἐξ ὅλων τῶν ὀστῶν τῆς κεφαλῆς μόνον τὸ ὀστοῦν τῆς κάτω σιαγόνος εἶναι κινητόν, συνδεόμενον διὰ διαρθρώσεως πρὸς τὰ ἄλλα.

Λεπτομερέστερον, ἡ ὀνομασία, ἡ μορφὴ καὶ ἡ θέσις τῶν ὀστῶν τῆς κεφαλῆς (εἰκ. 6 καὶ 7) ἔχουν ὡς ἔξης:



Εἰκ. 5. Διάρθρωσις τοῦ ὠμού.

4. Τομὴ τῆς ὠμοπλάτης. — 5. Τομὴ τοῦ βραχιονίου ὀστοῦ. — 6. Ἀρθρικὸς θύλακος.

Α) ΟΣΤΑ ΤΟΥ ΚΡΑΝΙΟΥ


1) **Τὸ μετωπικόν.** Τοῦτο κατέχει τὸ πρόσθιον καὶ ἄνω τοίχωμα τῆς κρανιακῆς κοιλότητος καὶ σχηματίζει ἐπάνω ἀπὸ κάθε ὁφθαλμὸν μίαν ἐλαφρὰν ὑπέγερσιν, τὸ ὑπερόφρυνον τόξον.

2) **Τὰ δύο βρεγματικὰ** (ἀριστερὸν καὶ δεξιὸν). Ταῦτα ἀποτελοῦν τὸ μεγαλύτερον μέρος τοῦ θόλου τῆς κρανιακῆς κοιλότητος

καὶ συναρθροῦνται κατὰ τὸ μέσον πρὸς ἄλληλα, ἐμπρὸς πρὸς τὸ μετωπικόν, δύπισω πρὸς τὸ Ἰνιακόν καὶ πλαγίως πρὸς τὸ σφηνοειδές καὶ τὸ κροταφικόν.

3) **Τὸ Ἰνιακόν.** Τοῦτο συμπληρώνει τὸν θόλον τοῦ κρανίου πρὸς τὰ δύπισω καὶ, καμπτόμενον, ἀποτελεῖ προσέτι μέρος τῆς βάσεως τοῦ κρανίου. Τὸ τμῆμα του τὸ ἀνήκον εἰς τὴν βάσιν τοῦ κρανίου φέρει τὸ Ἰνιακόν τρῆμα, διὰ τοῦ ὅποιου διέρχεται ὁ νωτιαῖος μυελός. Ἐκατέρωθεν τοῦ τρήματος ὑπάρχει ἀνά ἐν ἔξογκωμα καλούμενον Ἰνιακός κόνδυλος. Διὰ τῶν Ἰνιακῶν κονδύλων στηρίζεται ἡ κεφαλὴ ἐπὶ τῆς σπονδυλικῆς στήλης.

4) **Τὰ δύο κροταφικὰ** (ἀριστερὸν καὶ δεξιόν). Ταῦτα σχηματίζουν μετὰ τοῦ σφηνοειδοῦς τὰς πλευρὰς τῆς κρανιακῆς κοιλότητος. Ἐκαστον κροταφικὸν συναρθροῦται δύπισω πρὸς τὸ Ἰνιακόν, ἐπάνω μὲ τὸ ἀντίστοιχον βρεγματικὸν καὶ ἐμπρὸς μὲ τὸ σφηνοειδές. Πρὸς τὰ κάτω παρουσιάζει μίαν ἐλευθέραν ἀπόφυσιν, τὴν μαστοειδῆ ἢ ἀπόφυσιν, μίαν ἀπόφυσιν συνδεομένην μὲ τὸ ζυγωματικὸν καὶ μίαν μικρὰν κοίλην ἐπιφάνειαν, πρὸς τὴν ὅποιαν ἀρθροῦται ἡ κάτω σιαγών. Κατὰ τὴν βάσιν καὶ πρὸ τῆς μαστοειδοῦς ἀποφύσεως, φέρει ἐκαστον κροταφικὸν τὴν κοιλότητα, ἐντὸς τῆς ὅποιας εύρισκονται τὰ ὄργανα τῆς ἀκοῆς.



Εἰκ. 6. Ὁ σκελετὸς τῆς κεφαλῆς.


1. Μετωπικόν.
2. Βρεγματικόν.
3. Κροταφικόν.
4. Σφηνοειδές.
5. Ἰνιακόν.
6. Ζυγωματικόν.
7. Ἀνω γναθικόν.
8. Κάτω γναθικόν.
9. Ρινικόν.
10. Μαστοειδῆς ἀπόφυσις τοῦ κροταφικοῦ.
11. Βελονοειδῆς ἀπόφυσις τοῦ κροταφικοῦ.
12. Ἀκουστικός πόρος.

ζόντιον τμῆμα, τοῦ ὅποιου τὰ ἄκρα κάμπτονται πρὸς τὰ ἄνω, ἀποτελοῦντα τὰς πτέρυγας τοῦ σφηνοειδοῦς. Τὸ διάτρητον τμῆμα κατέχει τὸ μέσον τῆς βάσεως τοῦ κρανίου, αἱ δὲ πτέρυ-

5) **Τὸ σφηνοειδές.** Τοῦτο ἀποτελεῖται ἀπὸ ἐν ὅρι-

γες συμμετέχουν εἰς τὸν σχηματισμὸν τῶν πλευρικῶν τοιχωμάτων τῆς κρανιακῆς κοιλότητος.

6) Τὸ ἡθμοειδές. Τοῦτο ἀποτελεῖται κυρίως ἀπὸ ἐν ὄριζόν-



Εἰκ. 7. Τὰ ὄστα τῆς κεφαλῆς.

1. Μετωπικόν. — 2. Βρεγματικόν. — 3. Ἰνιακόν. — 4. 5. Κροταφικόν.—
6. Σφηνοειδές. — 7. Ἡθμοειδές. — 8. Ζυγωματικόν. — 9. Ἀνω γναθικόν. — 10. Κάτω γναθικόν. — 11. Ὑνις. — 12. Ρινικόν. — 13. Δακρυϊκόν.

τιον καὶ τρία κάθετα τμήματα. Ἐκ τούτων τὸ ὄριζόντιον συμπληρώνει πρὸ τοῦ σφηνοειδοῦς τὴν βάσιν τῆς κρανιακῆς κοιλότητος, τὴν ὅποιαν χωρίζει ἀπὸ τὴν ρινικήν. Τὰ δύο ἀκραία κάθετα πέταλα μαζὶ μὲ τὰς δύο ρινικὰς κόγχας ἀποτελοῦν τὰ πλάγια τοιχώματα τῆς ρινικῆς κοιλότητος (εἰκ. 7). Τὸ μεσαῖον πέταλον συμμετέχει εἰς τὸν σχηματισμὸν τοῦ ρινικοῦ διαφράγματος.

B) ΟΣΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

1) **Ἡ ύνις.** Αὕτη είναι ἐν τετράπλευρον ὄστεϊνον πέταλον, τὸ δόποιον, μαζὶ μὲ τὸ κάθετον τμῆμα τοῦ ἡθμοειδοῦς, σχηματίζει τὸ

ρινικὸν διάφραγμα. Μὲ τὸ ἄνω καὶ τὸ ὅπισθιον χεῖλος του συναρθροῦται πρὸς τὸ σφηνοειδὲς καὶ τὸ ἡμοειδές, μὲ τὸ κάτω δὲ χεῖλος ἀκουμβᾶξ εἰς τὴν ὁροφήν τῆς στοματικῆς κοιλότητος.

2) Τὰ δύο ρινικά. Ταῦτα εἶναι μικρὰ τετραπλευρικὰ πετάλια, τὰ ὅποια σχηματίζουν τὴν ράχιν τῆς ρινός.

3) Τὰ δύο δακρυϊκά. Καὶ αὐτὰ εἶναι μικρὰ πετάλια, τὰ ὅποια εὑρίσκονται ἀνὰ ἐν τῷ ἐσωτερικὸν τοίχωμα ἑκάστης ὀφθαλμικῆς κόγχης.

4) Τὰ δύο ζυγωματικὰ (δεξιὸν καὶ ἀριστερὸν). "Εκαστον σχηματίζει ἀπὸ τοῦ κροταφικοῦ μέχρι τοῦ ἄνω γναθικοῦ ἐν ὀστεῖνον τόξον παράλληλον πρὸς τὸ πλευρικὸν τοίχωμα τῆς κρανιακῆς κοιλότητος. Τὰ τόξα ταῦτα, καλούμενα ζυγωματικὰ τόξα, σχηματίζουν τὰ λεγόμενα μῆλα τοῦ προσώπου, τὰ ὅποια ἔχουν περισσότερον εἰς τὰς μογγολικὰς φυλάς.

5) Τὸ ἄνω γναθικὸν ὄστοον. Τοῦτο ἔχει σχῆμα πεταλοειδὲς καὶ φέρει εἰς τὸ κάτω χεῖλος του κοιλότητας, τὰ φατνία, διὰ τὴν στερέωσιν τῶν ὀδόντων.

6) Τὰ δύο ὑπερώια. Ταῦτα εἶναι δύο ὀστεῖνα πέταλα, τὰ ὅποια ἀποτελοῦν τὸ ὀστεῖνον μέρος τῆς ὁροφῆς τοῦ στόματος (σκληρὰ ὑπερώα).

7) Τὸ κάτω γναθικόν. Τοῦτο εἶναι τὸ ἰσχυρότερον καὶ τὸ μόνον κινητὸν ὄστοον τῆς κεφαλῆς. Διακρίνομεν εἰς αὐτὸν ἀφ' ἐνὸς ἐν πεταλοειδὲς σῶμα, τὸ ὅποιον εἰς τὸ ἄνω του χεῖλος φέρει ἐπίστης σειρὰν φατνίων, καὶ ἀφ' ἐτέρου δύο κλάδους. Οἱ κλάδοι οὗτοι κατευθύνονται πρὸς τὰ ἄνω καὶ διχάζονται ἑκαστος εἰς δύο ἀποφύσεις, διὰ τῶν ὅποιων γίνεται ἡ σύνδεσις τῆς κάτω σιαγόνος πρὸς τὰ ὀστᾶ τῆς κεφαλῆς.

8) Τὸ διοειδὲς ὄστοον. Τοῦτο δὲν συνδέεται πρὸς τὰ ἄλλα ὀστᾶ καὶ εὑρίσκεται κατὰ τὴν βάσιν τῆς γλώσσης, ἐπάνω ἀπὸ τὸν θυρεοειδῆ χόνδρον τοῦ λάρυγγος. Ἐχει σχῆμα ἀνοικτοῦ ὑψιλον.


4. Ο ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΡΜΟΥ

‘Ο σκελετὸς τοῦ κορμοῦ (εἰκ. 8) περιλαμβάνει τὴν σπινδυλικὴν στήλην καὶ τὰς πλευρὰς μετὰ τοῦ στέρνου.



Α) ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ

^τΗ σπονδυλική στήλη είναι μία σειρά μικρών όστων, τῶν σ π ο ν-δύλων, ή όποια ἀρχίζει ἀπό τὴν βάσιν τοῦ κρανίου καὶ διατρέχει κατὰ τὸ μέσον τῆς ράχεως τὸν κορμόν. Ἀποτελεῖται ἀπὸ 33 σπονδύλους, ἐκ τῶν ὅποιών οἱ πρῶτοι ἐπτά καλοῦνται αὐχενικοί, οἱ ἔπομενοι δώδεκα θωρακικοί καὶ οἱ ἔπομενοι πέντε ὄσφυικοί. Ἐκ τῶν ύπολοίπων, οἱ πέντε συνενοῦνται καὶ σχηματίζουν ἕνα πλατύ τριγωνικὸν όστοῦν, τὸ ἵερὸν ὄστοῦν, οἱ δὲ τελευταῖοι τέσσαρες είναι ἀτροφικοί, ἀποτελοῦντες ἐν όστάριον, τὸν κόκκυγα, δόποιος κατέχει τὸ ἄκρον τῆς σπονδυλικῆς στήλης (εἰκ. 13). Μεταξὺ τῶν σωμάτων τῶν σπονδύλων παρεμβάλλονται λεπταὶ πλάκες χόνδρου, οἱ μεσοσπονδύλιοι χόνδροι.

Εἰς κάθε σπόνδυλον (εἰκ. 9) διακρίνομεν ἔν κυλινδρικὸν σῶμα καὶ ἔν τόξον, μεταξύ δὲ τούτων παραμένει διάκενον, καλούμενον τρίγμα τοῦ σπονδύλου. Τὸ τόξον φέρει διαφόρους ἀποφύσεις, οἵ δόποιαι χρησιμεύουν ἀλλαι μὲν διὰ τὴν στήριξιν τῶν σπονδύλων μεταξύ των, ἀλλαι δὲ διὰ τὴν πρόσφυσιν μυῶν καὶ τὸν περιορισμὸν τῶν κινήσεων τῆς σπονδυλικῆς στήλης. Εἰς τοὺς πλείστους



Εἰκ. 8. Ὁ σκελετὸς τοῦ κορμοῦ καὶ τῶν ἄνω ἄκρων.
The skeletal structure of the torso and the upper extremities.



Εικ. 9. Σχῆμα σπονδύλων.

1. Σῶμα τοῦ σπονδύλου.
2. Τόξον τοῦ σπονδύλου.
3. Τρῆμα τοῦ σπονδύλου.
4. Ἀκανθώδης ἀπόφυσις.
5. Μεσοσπονδύλιος χόνδρος.


Τὰ τρήματα τῶν σπονδύλων εὐρίσκονται τὸ ἐν κάτωθεν τοῦ ἄλλου καὶ ἀποτελοῦν ἔνα συνεχῆ νωτιαῖον σῶλῆνα, ἐντὸς τοῦ ὅποιου εὐρίσκεται ὁ νωτιαῖος μυελός.

Ἡ σπονδυλικὴ στήλη δὲν εἶναι εὐθεῖα, ἀλλὰ κυρτοῦται εἰς μὲν τὴν αὐχενικὴν καὶ ὀσφυϊκὴν μοῖραν πρὸς τὰ ἔμπρός, εἰς δὲ τὴν θωρακικὴν καὶ ἵερὰν

σπονδύλους μεγαλυτέρα ἀπόφυσις εἶναι ἡ ἀκανθώδης, ἡ ὅποια εὐρίσκεται εἰς τὸ μέσον τοῦ τόξου καὶ κατευθύνεται πρὸς τὰ ὄπίσω.

“Ολοι οἱ σπόνδυλοι δὲν εἶναι ἀπολύτως ὅμοιοι μεταξύ των. Π.χ. οἱ δύο πρῶτοι (ὁ ἄτλας καὶ ὁ ἐπιστροφεὺς) δὲν ἔχουν ἀνεπτυγμένον σῶμα καὶ ὅμοιάζουν πρὸς δακτυλίους (εἴκ. 10). Αἱ ἀποφύσεις των εἶναι διαμορφωμέναι κατὰ τοιοῦτον τρόπον, ὥστε νὰ διευκολύνουν τὴν στήριξιν καὶ περιστροφὴν τῆς κεφαλῆς. Εἰς τοὺς θωρακικούς σπονδύλους πάλιν παρατηροῦμεν, ὅτι αἱ ἀκανθώδεις ἀποφύσεις κατευθύνονται ὅχι μόνον πρὸς τὰ ὄπίσω, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὰ κάτω, παρεμποδίζουσαι οὕτω τὴν ἔκτασιν τῆς σπονδυλικῆς στήλης πέραν ἐνὸς δρίου.

“Οσον προχωροῦμεν ἀπὸ τοὺς πρώτους πρὸς τοὺς τελευταίους, συναντῶμεν σπονδύλους ὅλοεν ἴσχυροτέρους, καταλλήλους διὰ νὰ βαστάσουν μεγαλύτερον βάρος.



Εικ. 10. Οἱ δύο πρῶτοι αὐχενικοὶ σπόνδυλοι. *Ανω ὁ ἄτλας, κάτω ὁ ἐπιστροφεύς.

πρὸς τὰ ὄπίσω. Τὰ κυρτώματα αὐτὰ δὲν ὑπάρχουν ἐξ ἀρχῆς, ἀλλὰ διαμορφώνονται, ὅταν ἀρχίζῃ τὸ βρέφος νὰ βαδίζῃ καὶ νὰ κάθηται.

B) ΑΙ ΠΛΕΥΡΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΣΤΕΡΝΟΝ

Πρὸς τὰς πλαγίας ἀποφύσεις τῶν θωρακικῶν σπονδύλων ἀρθροῦνται αἱ πλευραὶ. Αὗται, 12 ἐν ὅλῳ ζεύγῃ, ἥτοι ἐν ζεύγος δι’ ἕκαστον θωρακικὸν σπόνδυλον, εἰναι ἐπιμήκη τοξοειδῆ δοστᾶ, τὰ ὄποια περικλείουν τὴν θωρακικὴν κοιλότητα. Τὰ πρῶτα ἐπτά ζεύγη συνεχίζονται ἐμπρὸς μὲν χόνδρινα τμῆματα, τὰ ὄποια ἐνώνονται μὲν τὸ στέρνον τοῦ οὐρού. Τοῦτο εἶναι ξιφοειδὲς δοστοῦν, τὸ ὄποιον εύρισκεται εἰς τὸ μέσον τοῦ προσθίου τοιχώματος τοῦ θώρακος. Τὰ χόνδρινα τμῆματα τῶν ἐπομένων τριῶν ζευγῶν δὲν φθάνουν μέχρι τοῦ στέρνου, ἀλλ’ ἀπολήγουν εἰς τὸ χόνδρινον τμῆμα τοῦ ἐβδόμου ζεύγους. Τέλος, τὰ δύο τελευταῖα ζεύγη πλευρῶν εἶναι ἀτροφικὰ καὶ δὲν ἔχουν χόνδρινα τμῆματα.

5. Ο ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΤΩΝ ΑΚΡΩΝ


Θὰ ἔξετάσωμεν ἴδιαιτέρως τὸν σκελετὸν τῶν ἄνω ἄκρων καὶ τῶν ὅμων καὶ τὸν σκελετὸν τῶν κάτω ἄκρων καὶ τῆς λεκάνης.

A) Ο ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩ ΑΚΡΩΝ (ΧΕΙΡΩΝ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΩΜΩΝ

Ἐκαστον ἐκ τῶν δύο ἄνω ἄκρων ἀρθροῦται πρὸς τὰ δοστᾶ τοῦ ἀντιστοίχου ὅμου. Τὰ δοστᾶ ταῦτα εἶναι δύο, ἡ κλειδικὴ καὶ ἡ ωμοπλάτη.

Ἡ κλειδικὴ εἶναι ἐπιμήκης δοστοῦν, τὸ ὄποιον ἐκτείνεται δριζοντίως ἀπὸ τὸ ἄνω ἄκρον τοῦ στέρνου μέχρι τῆς ωμοπλάτης.

Ἡ ωμοπλάτη (εἰκ. 11) εἶναι πλατὺ δοστοῦν, τὸ δοστοῖον κατέχει τὸ ἄνω καὶ ἔξω ἄκρον τῆς ραχιαίας ἐπιφανείας τοῦ θώρακος. Ἐχει σχῆμα τριγώνου, τοῦ ὄποιού ἡ βάσις εἶναι σχεδὸν παράλληλος πρὸς τὴν δευτέραν πλευράν, ἡ δὲ κορυφὴ φθάνει τὴν ἐβδόμην πλευράν. Πρὸς τὰ ἔξω




Εἰκ. 11. Ἡ ωμοπλάτη
(ἐκ τῶν δοστῶν).
1. Τὸ ἄκρωμιον.
2.

σχηματίζει ἡ ὠμοπλάτη μίαν ἀπόφυσιν, καλουμένην ἀκρώμιον, πρὸς τὴν ὅποιαν ἀρθροῦται τὸ ἄκρον τῆς κλειδός.

Ο σκελετὸς ἑκάστου ἄκρου περιλαμβάνει τρία τμήματα: τὸν βραχίονα, τὸν πῆχυν ἢ ἀντιβραχίονα καὶ

τὴν ἄκραν ἢ κυρίως χεῖρα (εἰκ. 3, 4, 8).



Εἰκ. 12. Ο σκελετὸς τῆς ἄκρας χειρός. 1. Ὀστᾶ τοῦ καρποῦ. — 2 - 6. Ὀστᾶ τοῦ μετακαρπίου. — 7-20. Άι φάλαγγες τῶν δάκτυλων.

τὴν κερκίδα καὶ τὴν ὠλένην. Ταῦτα ἀρθροῦνται ἀφ' ἐνὸς μὲν πρὸς τὸ βραχιόνιον (ἡ κερκίς διὰ τοῦ κονδύλου καὶ ἡ ὠλένη διὰ τῆς τροχιλίας), ἀφ' ἔτέρου δὲ πρὸς τὴν ἄκραν χεῖρα. Τὸ κάτω ἄκρον τῆς ὠλένης εἶναι λεπτότερον τοῦ ἀνωτέρου καὶ ἀντιστοιχεῖ εἰς τὸν μικρὸν δάκτυλον τῆς χειρός. Ἀντιστρόφως, εἰς τὴν κερκίδα τὸ κατώτερον ἄκρον εἶναι δύγκωδέστερον τοῦ ἀνωτέρου καὶ ἀντιστοιχεῖ εἰς τὸν μεγάλον δάκτυλον. Ἡ ὠλένη εἶναι δλίγον μακροτέρα τῆς κερκίδος.

Ἡ κυρίως χεῖρ σχηματίζεται ἀπὸ τρεῖς ὁμάδας ὀστῶν, τὰ δύστα τοῦ καρποῦ, τοῦ μετακαρπίου καὶ τῶν δακτύλων (εἰκ. 12).

Τὰ ὀστᾶ τοῦ καρποῦ ἢ καρπικά εἶναι ὀκτὼ μικρὰ δύσταρια,

Ο βραχίων ἀποτελεῖται ἀπὸ ἓν μακρὸν ὀστοῦν, τὸ βραχίόνιον. Τοῦτο εἶναι κοῖλον ἐσωτερικῶς καὶ εἰς τὸ ἄνω ἄκρον του ἀπολήγει εἰς μίαν σφαιρικήν κεφαλήν, ἡ ὅποια χρησιμεύει διὰ τὴν ἀρθρωσιν εἰς μίαν κοιλότητα τῆς ὠμοπλάτης, καλουμένην ὠμογλήνην καὶ κειμένην πλησίον τοῦ ἄκρωμίου. Εἰς τὸ κάτω ἄκρον τὸ βραχιόνιον ἀπολήγει εἰς δύο δύγκωματα, ἐκ τῶν ὅποιων τὸ ἐν πρὸς ἔξω εἶναι μικρότερον καὶ καλεῖται κόδυλος, τὸ δὲ πρὸς τὰ ἔσω εἶναι μεγαλύτερον καὶ καλεῖται τροχιλία. Τὰ δύγκωματα αὐτὰ χρησιμεύουν διὰ τὴν διάρθρωσιν τοῦ βραχιονίου πρὸς τὰ δύο δύστα τοῦ πήχεως.

Ο πῆχυς περιλαμβάνει δύο δύστα, τὴν κερκίδαν καὶ τὴν ὠλένην. Ταῦτα ἀρθροῦνται ἀφ' ἐνὸς μὲν πρὸς τὸ βραχιόνιον (ἡ κερκίς διὰ τοῦ κονδύλου καὶ ἡ ὠλένη διὰ τῆς τροχιλίας), ἀφ' ἔτέρου δὲ πρὸς τὴν ἄκραν χεῖρα. Τὸ κάτω ἄκρον τῆς ὠλένης εἶναι λεπτότερον τοῦ ἀνωτέρου καὶ ἀντιστοιχεῖ εἰς τὸν μικρὸν δάκτυλον τῆς χειρός. Ἀντιστρόφως, εἰς τὴν κερκίδα τὸ κατώτερον ἄκρον εἶναι δύγκωδέστερον τοῦ ἀνωτέρου καὶ ἀντιστοιχεῖ εἰς τὸν μεγάλον δάκτυλον. Ἡ ὠλένη εἶναι δλίγον μακροτέρα τῆς κερκίδος.

Ἡ κυρίως χεῖρ σχηματίζεται ἀπὸ τρεῖς ὁμάδας ὀστῶν, τὰ δύστα τοῦ καρποῦ, τοῦ μετακαρπίου καὶ τῶν δακτύλων (εἰκ. 12).

Τὰ ὀστᾶ τοῦ καρποῦ ἢ καρπικά εἶναι ὀκτὼ μικρὰ δύσταρια,

περίπου στρογγύλα, διατεταγμένα εἰς δύο σειράς ἀνὰ τέσσαρα.


Τὰ δόστᾶ τοῦ μετακαρπίου ḥ μετακαρπικὰ εἶναι πέντε, ἐπιμήκη, διαφρούμενα ἀφ' ἐνὸς μὲ τὰ καρπικὰ καὶ ἀφ' ἑτέρου μὲ τοὺς δακτύλους.

"Εκαστος δάκτυλος ἀποτελεῖται ἀπὸ τρία διαδοχικὰ ἐπιμήκη δόστάρια, τὰς φάλαγγας, πλὴν τοῦ πρώτου δακτύλου ḥ ἀντίχειρος, ὁ δόποιος περιλαμβάνει δύο φάλαγγας.

B) Ο ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ (ΠΟΔΩΝ)

KAI THS LEKANHS

Τὰ δόστᾶ τῆς λεκάνης (εἰκ. 13) χρησιμεύουν ἀφ' ἐνὸς διὰ τὴν στερέωσιν τῶν κάτω ἀκρων καὶ ἀφ' ἑτέρου διὰ τὴν ὑποστήριξιν τῶν σπλάγχνων. Ἡ κοιλότης τῆς λεκάνης σχηματίζεται ἀπὸ τὸ ἕτερον δόστοῦν καὶ ἀπὸ τὰ δύο ἀνώνυμα ματαία ταῦτα εἶναι πλατέα καὶ ἰσχυρὰ καὶ συνενοῦνται ἀκίνητως μὲ τὸ ἕτερον δόστοῦν. Πρὸς τὰ ἔμπρός συνενοῦνται μεταξύ τῶν καὶ σχηματίζουν τὴν ἡμίκην σύμφυσιν. Μεταξὺ τῶν δόστῶν τῆς λεκάνης παραμένει ἐν εὐρύν διάκενον, τὸ στόμιον τῆς λεκάνης. "Εκαστον ἀνώνυμον δόστοῦν φέρει κατὰ τὸ πρόσθιον ἄκρον του ἐν τῷ ματαίῳ, τὸ δόποιον καλεῖται θυρεός εἰς τοῦ ματαίου πρόσθιου πρόσθιον. Παρὰ τὸ θυρεοειδὲς τρῆμα ὑπάρχει ἐν κοίλωμα εἰς τὴν ἔξωτερικὴν ἐπιφάνειαν ἐκάστου ἀνωνύμου δόστοῦ. Τὸ




Eik. 13. 'Ο σκελετός τῆς λεκάνης.

1. Ιερὸν δόστοῦν.— 5. Κόκκυς.— 2. Ἀνώνυμον δόστοῦν.— 3. Ἡβική σύμφυσις.— 6. Στόμιον τῆς λεκάνης.— 4. Θυρεοειδές τρῆμα.— 7. Κοτύλη.

κοίλωμα τοῦτο, καλούμενον κοτύλη, χρησιμεύει διὰ τὴν ἄρθρωσιν τοῦ μητριαίου δόστοῦ.

Εἰς τὸν σκελετὸν ἑκάστου ποδὸς διακρίνομεν τρία



Εἰκ. 14. 'Ο σκελετὸς τοῦ ἄκρου ποδὸς: 1 - 7. 'Οστᾶ τοῦ ταρσοῦ. — 8 - 12. 'Οστᾶ τοῦ μεταταρσίου. — 13 - 26. Φάλαγγες τῶν δακτύλων.



Εἰκ. 15. 'Ακτινογραφία τοῦ ἄκρου ποδός.

τμήματα, τὸν μηρόν, τὴν κνήμην καὶ τὸν ἄκρον πόδα (εἰκ. 3).

Ο μηρὸς σχηματίζεται ἀπὸ ἐν μακρὸν δόστοῦν, τὸ μηριαῖον. Τοῦτο ἔχει μῆκος ὅσον ὁ πῆχυς καὶ ἡ ἄκρα χείρ ὅμοιη καὶ εἶναι τὸ μακρότερον δόστοῦν τοῦ σώματος. Εἰς τὸ ἀνώτερον ἄκρον του

ἀπολήγει εἰς μίαν κεφαλήν, ἡ δόποια διαρθροῦται πρὸς τὴν κοτύλην τοῦ ἀνωνύμου ὁστοῦ.

‘Η κυνήμη περιλαμβάνει δύο μακρὰ ὁστᾶ, τὴν κνήμην καὶ τὴν περὶ όντην. Ἐκ τούτων ἡ κυνήμη εἶναι τὸ ἴσχυρότερον καὶ διὰ τοῦ ἀνωτέρου ἄκρου της ὀρθροῦται πρὸς τὸ μηριαῖον ὁστοῦν. Η περόνη εἶναι ὁστοῦν λεπτότερον καὶ τὸ ἄκρον αὐτῆς δὲν φθάνει μέχρι τοῦ μηροῦ, ἀλλὰ εἶναι προσκολλημένον ἐπὶ τῆς κυνήμης. Μὲ τὸ κατώτερον ἄκρον τῶν ἀρθροῦνται πρὸς τὸν ἀστράγαλον.

‘Εμπροσθεν τῆς ἀρθρώσεως τοῦ γόνατος ὑπάρχει ἐν μικρὸν φακοειδὲς ὁστοῦν, ἡ ἐπιγόνατις.

‘Ο σκελετὸς τοῦ ἄκρου ποδὸς περιλαμβάνει, ὅπως καὶ τῆς ἄκρας χειρός, τρία τμήματα, τὸν ταρσόν, τὸ μετατάρσιον καὶ τοὺς δακτύλους (εἰκ. 14 καὶ 15).

‘Ο ταρσὸς ἀποτελεῖται ἀπὸ ἑπτά ὁστάρια, τοποθετημένα εἰς τρεῖς σειράς. Η πρώτη σειρά περιλαμβάνει δύο ἴσχυρὰ ὁστάρια, ἐκ τῶν ὄποιών τὸ ἐσωτερικὸν εἶναι ὁ ἀστράγαλος, τὸ δὲ ἄλλο ἡ πτέρυξ, ἡ δόποια προεκτείνεται πρὸς τὰ δόπιστα καὶ ἀκουμβᾶ ἐπὶ τοῦ ἔδαφους.

Τὸ μετατάρσιον, ὅπως καὶ τὸ μετακάρπιον, περιλαμβάνει πέντε ἐπιμήκη ὁστάρια, ἀρθρούμενα ἀφ’ ἐνὸς μὲ τὰ ὁστᾶ τοῦ ταρσοῦ καὶ ἀφ’ ἑτέρου μὲ τοὺς δακτύλους.

‘Εκαστος τῶν πέντε δακτύλων περιλαμβάνει τρεῖς φάλαγγας, πλήν τοῦ μεγάλου, ὁ ὄποιος περιλαμβάνει δύο μόνον.

‘Ο ἄκρος ποὺς στηρίζεται ἐπὶ τοῦ ἔδαφους ἀφ’ ἐνὸς μὲ τὴν πτέρυναν καὶ ἀφ’ ἑτέρου μὲ τὸ ἄκρον τοῦ μεταταρσίου καὶ τοὺς δακτύλους.

Τὸ ὑπόλοιπον μέρος δὲν ἀκουμβᾷ ἐπὶ τοῦ ἔδαφους, ἀλλὰ σχηματίζει ἐλαφρὸν κύρτωμα, τὴν καμάραν τοῦ ἄκρου ποδός.

6. ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ

Τὰ ὁστᾶ τοῦ σκελετοῦ ἀρχικῶς εἶναι ἄλλα μὲν χόνδρινα, ἄλλα δὲ μεμβρανώδη, σκληρύνονται δὲ δι’ ἐναποθέσεως ἀνοργάνων ἀλάτων. Διακρίνομεν:

α) τὸν σκελετὸν τοῦ κορμοῦ (σπουδυλικὴ στήλη, πλευραί, στέρνον).


β) τὸν σκελετὸν τῆς κεφαλῆς (κρανίον, πρόσωπον).

γ) τὸν σκελετὸν τῶν ἀνωτέρων ἄκρων (δύοις καὶ χεῖρες) καὶ

δ) τὸν σκελετὸν τῶν κάτω ἄκρων (λεκάνη καὶ πόδες).

7. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1) 'Ο λόγος τοῦ μεγίστου πλάτους πρὸς τὸ μέγιστον μῆκος τοῦ κρανίου καλεῖται κεφαλικὸς δείκτης. Π. χ. ἂν τὸ μῆκος τοῦ κρανίου εἴναι 20 ἔκ. καὶ τὸ πλάτος 15 ἔκ., δικεφαλικὸς δείκτης είναι $15/20 = 0.75$, ἢ ἀπλῶς: 75. Οἱ ἔχοντες ἐπίμηκες κρανίον (δηλ. μικρὸν δείκτην, κάτω τοῦ 75) καλοῦνται δολιχοκέφαλοι, οἱ δὲ ἔχοντες μεγάλον δείκτην (ἄνω τοῦ 83) καλοῦνται βραχυκέφαλοι (εἰκ. 16). Μεταξὺ τούτων ὑπάρχουν καὶ ὄλλαι ἐνδιάμεσοι κατηγορίαι.



Εἰκ. 16. 'Ο κεφαλικὸς δείκτης ($\frac{\gamma \delta}{\alpha \beta}$)
Δεξιά: δολιχοκέφαλος.
'Αριστερά: βραχυκέφαλος.

δοχεῖον μὲν ὑδροχλωρικὸν δέξυ, εἷς λύχνος καὶ συρμάτινον πλέγμα. 'Αφήνομεν τὸ ἐν τεμάχιον δύτοῦ ἐντὸς τοῦ δέξεος ἐπὶ 1–12 ἡμέρας καὶ παρατηροῦμεν, ὅτι ἀπομένει μία μαλακὴ μᾶζα. Αὕτη είναι ἡ δργανικὴ οὐσία τοῦ δύτοῦ, ἐνῷ τὰ ἀνόργανα ἄλατα διελύθησαν. 'Ἐπίστης διαπυροῦμεν ἐπὶ τοῦ πλέγματος τὸ ἄλλο τεμάχιον καὶ παρατηροῦμεν, ὅτι ἀπομένει τέφρα. Αὕτη ἀποτελεῖται ἀπὸ τὰ ἀνόργανα ἄλατα, ἐνῷ ἡ δργανικὴ οὐσία ἔχει καῆ.

3) 'Αποχώρησε τὸ περιόστεον ἀπὸ ἐν δύτοῦ ζώου. 'Ἐπίστης, παρατήρησε ἔνα ἀρθρικὸν θύλακον καὶ τὸν ἀρθρικὸν χόνδρον.

4) Σχεδίασε τὰς κάμψεις τῆς σπονδυλικῆς στήλης τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἐνὸς τετραπόδου.

5) Σχεδίασε τὴν φορὰν τῶν μηρῶν καὶ τῶν κνημῶν διαφόρων ἀτόμων.

6) 'Ανυπόδητος καὶ μὲν βρεγμένον πόδα πάτησε τὸ πάτωμα. Κάμε τὸ ἴδιον καθήμενος, καθὼς καὶ ὅρθιος καὶ κρατῶν ἐν βάρος. Σύγκρινε τὰ ἵχνη τοῦ ποδός σου εἰς τὸ πάτωμα.

7) Παρατήρησε ότι οι δάκτυλοι τῶν πιοδῶν σου δὲν ἀκουμβοῦν δλόκληροι εἰς τὸ ἔδαφος, ἀλλὰ σχηματίζουν καὶ αὐτοὶ μίαν μικράν καμάραν.

8) Παρακολούθησε εἰς τὸν ἀντιβραχίονα τὴν φορὰν τῆς κερκίδος καὶ τῆς ὥλενης, ὅταν ἡ παλάμη εἶναι ὑπτία καὶ ὅταν εἶναι πρηνής. Πρόσεξε, ότι εἰς τὴν πρηνὴν θέσιν τὰ δύο ὀστᾶ διασταυροῦνται. (Μνημονικὸς κανών: Ἡ κερκίς ἀπολήγει εἰς τὸν μέγαν δάκτυλον ἔχοντα δύο φάλαγγας. Ἡ ὥλενη εἰς τὸν μικρόν, δ ὄποιος ἔχει τρεῖς φάλαγγας).

9) Καθόρισε εἰς τὸ σῶμα τὴν θέσιν τῶν κυριωτέρων δοστῶν.

10) Εἶναι πολὺ σπουδαῖον τὸ γεγονὸς τῆς δρθίας στάσεως τοῦ ἀνθρώπου ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὴν στάσιν τῶν λοιπῶν Πρωτεύοντων. Ποία δύοταξία Σπουδυλωτῶν παρουσιάζει ἐπίσης στήριξιν ἐπὶ τῶν δόπισθίων μόνον ἄκρων;

11) Σύγκρινε τὸ σχῆμα τῆς τομῆς τοῦ ἀνθρωπίνου θώρακος καὶ ἐνὸς ἄλλου θηλαστικοῦ. Ἐπίσης σύγκρινε τὴν φορὰν τῶν πλευρῶν. Ποία εἶναι ἡ αἰτία τῶν παρατηρουμένων διαφορῶν;

12) Πῶς χρησιμοποιοῦν οἱ πίθηκοι τὰ πρόσθια ἄκρα των καὶ πῶς δ ἀνθρωπος; Ποϊον εἶναι τὸ μέγεθος τῶν προσθίων ἄκρων εἰς τὰς ἀνωτέρω κατηγορίας ἐν σχέσει πρὸς τὸ σῶμα;

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

ΟΙ ΜΥΕΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

1. ΟΙ ΜΥΕΣ. ΑΙ ΜΥ·Ι·ΚΑΙ ΙΝΕΣ

Μύες είναι τὰ ὅργανα, διὰ τῶν ὅποιών γίνονται αἱ κινήσεις τῶν διαφόρων μερῶν τοῦ σώματος. Οἱ μύες ἐφαρμόζουν ἐπὶ ὁστῶν ἥ εύρισκονται εἰς τὰ τοιχώματα τῶν μαλακῶν ὅργάνων τοῦ σώματος. Ἀνέρχονται εἰς 300 περίπου καὶ ἀποτελοῦν σχεδὸν τὸ ἦμισυ τοῦ βάρους τοῦ σώματος.

Τὰ μυϊκὰ κύτταρα είναι σχετικῶς μακρὰ καὶ ἔλαστικὰ καὶ καλοῦνται μυϊκαὶ ἵνες, ἔχουν δὲ τὴν ἴκανότητα νὰ συστέλλωνται. Πολλαὶ μυϊκαὶ ἵνες συνενοῦνται καὶ ἀποτελοῦν μίαν μυϊκὴν δέσμην, ἥ ὅποια περιβάλλεται ἀπὸ λεπτὴν μεμβρᾶναν, καλουμένην ἐνδομύϊον. "Ἐκαστος μῆσς ἀποτελεῖται ἀπὸ πολλὰς τοιαύτας μυϊκὰς δέσμας. Διὰ τῆς συστολῆς τῶν μυϊκῶν ἵνῶν ὅλος ὁ μῆσς βραχύνεται, ἐνῷ κατὰ τὸ μέσον αὐτοῦ (γαστήρ τοῦ μυὸς) διογκοῦται. Διακρίνουν γραμματικά τοὺς καὶ λείους μῆσες.


2. ΓΡΑΜΜΩΤΟΙ ΜΥΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΥΤΩΝ

Οἱ γραμμωτοὶ μύες καλοῦνται οὔτω, διότι εἰς τὰς ἵνας τῶν τὸ πρωτόπλασμα εὑρίσκεται κατὰ λεπτὰ στρώματα, τὰ ὅποια ὑπὸ τὸ μικροσκόπιον διακρίνονται ως γραμμώσεις. Λόγω τῆς ἀφθονίας τῶν αἵμοφόρων ἀγγείων, οἱ γραμμωτοὶ μύες παρουσιάζουν ζωηρὸν ἐρυθρωπόν χρῶμα.

Οἱ μύες οὗτοι καταφύονται ἐπὶ τῶν ὁστῶν, καὶ, συστελλόμενοι, ἔλκουν αὐτά. Τὰ ἄκρα τῶν, διὰ τῶν ὅποιών στερεοῦνται ἐπὶ τῶν ὁστῶν, συνίστανται ἀπὸ σκληρὸν λευκὸν ἰστὸν καὶ καλοῦνται τένοντες τῶν μυῶν. Αἱ κινήσεις τῶν γραμμωτῶν μυῶν τελοῦνται κατὰ τὰς ἐπιταγὰς τῆς βουλήσεως.

Οἱ μύες σχηματίζουν μετὰ τῶν ὁστῶν, ἐπὶ τῶν ὅποιών προσ-

φύονται, μοχλούς (εἰκ. 17). Π.χ. οἱ μύες τοῦ τραχήλου, οἱ ὅποιοι συγκρατοῦν τὴν κεφαλὴν καὶ ἡ κεφαλὴ ἀποτελοῦν μοχλὸν πρώτου εἴδους μὲ νόπομόχλιον τὴν σπονδυλικὴν στήλην. Ὁμοίως, οἱ μύες τῆς



Εἰκ. 17. Μοχλοί σχηματιζόμενοι ύπό τῶν ὁστῶν καὶ τῶν μυῶν,
οἱ ὅποιοι προσφύονται εἰς αὐτά.

κνήμης, οἱ καταφύομενοι εἰς τὴν πτέρωναν καὶ οἱ ὅποιοι ύψωνουν τὸν πόδα ἀνήκουν εἰς μοχλὸν β' εἴδους. Οἱ μύες τοῦ βραχίονος, οἱ προσφύομενοι εἰς τὸν ἀντιβραχίονα, ἀνήκουν εἰς μοχλὸν γ' εἴδους.


3. ΟΙ ΛΕΙΟΙ ΜΥΕΣ

Ἄντιθέτως πρὸς τοὺς γραμμωτούς, οἱ λεῖοι μύες δὲν καταφύονται ἐπὶ ὁστῶν, ἀλλὰ εύρισκονται εἰς τὰ τοιχώματα τῶν σπλάγχνων καὶ τῶν ἀγγείων. Αἱ ἵνες τῶν δὲν παρουσιάζουν ύπό τὸ μικροσκόπιον γραμμώσεις. Κινοῦνται ἀνεξαρτήτως τῆς βουλήσεως, συστέλλοντες καὶ διαστέλλοντες τὰ σπλάγχνα καὶ τὰ ὀγγεῖα, εἰς τὰ τοιχώματα τῶν ὄποιων εύρισκονται. Οἱ μύες τῆς καρδίας ἐνεργοῦν καὶ αὐτοὶ ἀνεξαρτήτως τῆς βουλήσεως, είναι ὅμως, κατ' ἔξαρτεσιν, γραμμωτοί.

4. Ο ΜΥΙΚΟΣ ΤΟΝΟΣ

Ἐγνωρίσαμεν ἀνωτέρω δύο ἴδιότητας τῶν μυῶν, τὴν συντακτικότηταν καὶ τὴν ἐλαστικότηταν αὐτῶν. Μία ἄλλη σπουδαία ἴδιότης τῶν εἶναι ὁ μυϊκὸς τόνος. Οὗτω καλεῖται

ή ίδιότης τῶν μυῶν νὰ μὴ χαλαροῦνται τελείως, ὀλλὰ νὰ παραμένουν διαρκῶς εἰς μίαν μετρίαν ἢ πολὺ μικράν σύσπασιν. Λόγω τοῦ μυϊκοῦ τόνου, ὁ στόμαχος π.χ., καὶ ὅταν δὲν περιέχῃ τροφάς, δὲν εἶναι συρρικνωμένος, ώς ἔνας κενὸς ἀσκός. ‘Ομοίως κρατεῖται ἡ κεφαλὴ ὀρθία, κλίνει δὲ μόνον, ὅταν ἀποκοιμηθῇ κανείς. Γενικῶς, ὁ τόνος δίδει εἰς τὸ σῶμα μίαν ὄψιν ζωηράν, ἣ ὅποια ἔρχεται εἰς ἀντίθεσιν μὲ τὴν ὄψιν τοῦ νεκροῦ σώματος.



Εἰκ. 18. Αἱ διαδοχικαὶ φάσεις τῆς βαδίσεως.

5. ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ

Οἱ μύες περιλαμβάνουν μυϊκάς δέσμας, αἱ δόποιαι ἀποτελοῦνται ἀπὸ μυϊκὰς Ἰνας. Χαρακτηριστικαὶ ίδιότητες τῶν μυῶν εἶναι ἡ συσταλτικότης, ἡ ἐλαστικότης καὶ ὁ μυϊκὸς τόνος. Διακρίνομεν γραμμωτούς καὶ λείους μύς. Οἱ πρῶτοι καταφύνονται ἐπὶ τῶν δστῶν καὶ κινοῦν αὐτὰ κατὰ τὴν θέλησίν μας. Οἱ λεῖοι εύρισκονται εἰς τὰ τοιχώματα τῶν σπλάγχνων καὶ τῶν ὀγγείων καὶ εἶναι ἀνεξάρτητοι τῆς βουλήσεως.

6. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

- 1) Καθόρισε μερικά παραδείγματα μοχλῶν εἰς τὸ ἀνθρώπινον σῶμα.
 - 2) Μέτρησε μὲ ἔνα δυναμόμετρον τὴν δύναμιν τοῦ δεξιοῦ καὶ τοῦ ἀριστεροῦ χεριοῦ καὶ σύγκρινε τὰς δύο μετρήσεις.
 - 3) Παρατήρησε εἰς τὸ βρασμένο κρέας τὰς μυϊκὰς δέσμας, αἱ ὁποῖαι ἀποτελοῦν ἔνα μῦν.
 - 4) Ἡ ἔργασία ἔνδος μυὸς δύναται νὰ γίνῃ ἐντονωτέρα, ὅταν τὸ δόστοῦν, ἐπὶ τοῦ ὁποίου οὔτος καταφύεται, μένη ἀκίνητον. Διὰ τοῦτο, διὰ νὰ ἀνυψώσωμεν μέγα βάρος, «κρατοῦμε τὴν ἀναπνοή μας», ὡστε τὰ δόστᾶ τοῦ κορμοῦ (ἀμιοπλάτη, πλευραὶ κλπ.) νὰ παραμείνουν ἀκίνητα.
 - 5) Παρακολούθησε καὶ καθόρισε, βοηθούμενος καὶ ἀπὸ τὴν εἰκόνα 18, τὰς διαφόρους φάσεις τοῦ βαδίσματος.
 - 6) Καθόρισε πῶς κινεῖται κατὰ τὴν βάδισιν ὁ κορμὸς (ἄν ἀνυψοῦται καὶ πότε, ἄν κλίνῃ, πότε καὶ πρὸς ποῖον σκέλος, ἄν στρέφεται καὶ πότε). Ἐπίσης, πῶς κινοῦνται αἱ χεῖρες. Δοκίμασε νὰ βαδίσῃς ταχέως μὲ ἀκινήτους τὰς χεῖρας.
 - 7) Κατὰ τὴν βάδισιν πάντοτε τὸ ἔνα πόδι ἀκουμβᾷ ἐπὶ τοῦ ἐδάφους. Κατὰ τί διαφέρει, ὡς πρὸς τοῦτο, ἡ βάδισις ἀπὸ τὸ ἄλμα καὶ τὸν δρόμον;
-

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ

ΑΙ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑΙ ΥΠΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΟΥΣΙΑΙ ΑΙ ΚΑΥΣΕΙΣ. Η ΘΡΕΨΙΣ

1. ΑΙ ΘΡΕΠΤΙΚΑΙ ΟΥΣΙΑΙ

Ἐκ πείρας γνωρίζομεν, ὅτι, ὅπως καὶ οἱ ἄλλοι ζῶντες ὄργανισμοί, οὗτα καὶ ὁ ἀνθρώπινος ὄργανισμός, διὰ τὸ συντηρηθῆναι καὶ νῦν ἀναπτυχθῆναι, καταναλίσκει ώρισμένας ὑλας, τὰς ὅποιας λαμβάνει ἀπὸ τὸν ἔξωτερικὸν κόσμον, τὰς τροφάς. Αἱ χρησιμοποιούμεναι ὑπὸ τοῦ ἀνθρώπου τροφαὶ προέρχονται κυρίως ἀπὸ τὸ ζωϊκὸν καὶ φυτικὸν βασίλειον καὶ μόνον τὸ ὕδωρ καὶ ώρισμένα ἄλατα ἀπὸ τὴν ἀνόργανον φύσιν.

Εἰς τὰς τροφὰς εύρισκει ὁ ἀνθρώπινος ὄργανισμὸς χρησίμους δι’ αὐτὸν ούσιας, ἐκ τῶν ὅποιων ἄλλαι μὲν εἶναι ἀνόργανοι, ἄλλαι δὲ ὄργανικαί. Ἀν ὁ γανοι μὲν καλοῦνται αἱ ούσιαι, αἱ ὅποιαι δὲν περιέχουν ἐνωμένον ἀνθρακα, δργανικαὶ δὲ ἀντιθέτως, ὅσαι περιέχουν ἀνθρακα ἐνωμένον μὲν ἄλλα στοιχεῖα. Αἱ χρήσιμοι αὗται θρεπτικαὶ ούσιαι εἶναι ὕδωρ καὶ ἀνόργανα αἷλατα, ὕδατάνθρακες, λιπαραὶ ούσιαι καὶ λευκῶματα. Τέλος εἶναι ἀπαραίτητοι καὶ αἱ βιταμίναι, τὰς ὅποιας ἐπίσης ἀνευρίσκει ὁ ὄργανισμὸς εἰς τὰς τροφάς.

2. ΥΔΩΡ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΛΑΤΑ

Τὸ ὕδωρ εἶναι συστατικὸν τῶν ἰστῶν τοῦ σώματος εἰς μεγάλην ἀναλογίαν καὶ ἀποτελεῖ καὶ τὸ μέγιστον μέρος τοῦ αἵματος. Ἐπίσης, ἐντὸς τοῦ ὄργανισμοῦ τὸ ἐλεύθερον ὕδωρ εἶναι ἀπαραίτητον διὰ τὰς χημικὰς μεταβολὰς τῶν ούσιῶν, αἱ ὅποιαι γίνονται κατὰ τὰς λειτουργίας τοῦ ὄργανισμοῦ. Ὅπολογίζουν, ὅτι τὰ 60% τοῦ βάρους τοῦ σώματος ἀποτελοῦνται ἔξι ὕδατος. Τὸ ὕδωρ πίνεται αὐτούσιον, ἄλλα μεγάλαι ποσότητες αὐτοῦ εἰσάγονται καὶ διὰ τῶν τροφίμων.

Τὰ χόρτα π.χ. περιέχουν 85 % ύδωρ, τὸ κρέας 70 %, ὁ ἄρτος 36 %.

Διάφορα ἀνόργανα ἀλατά είναι ἐπίσης ἀπαραίτητα, εἰς μικρὰς ὅμις ποσότητας, διὰ τὸν δργανισμόν. Τὸ αἷμα π.χ. περιέχει 0,6 % μαγειρικὸν ἀλατό, τὰ δὲ δοστὰ είναι σκληρά, λόγω τῶν ἀλάτων ἀσβεστίου, τὰ ὅποια περιέχουν. Συνήθως αἱ τροφαὶ καὶ τὸ ύδωρ περιέχουν ἐπαρκῆ ποσότητα ἀλάτων. Αὐτούσιον προσθέτει εἰς τὰς τροφὰς ὁ ἄνθρωπος τὸ μαγειρικὸν ἀλατό.

3. ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΣ

Οἱ ύδατα τὰς ακετικές είναι μία κατηγορία δργανικῶν ούσιῶν ἔξι ἑκείνων, αἱ ὅποιαι περιέχουν ἄνθρακα ἔνωμένον μὲ δέξιγόνον καὶ ύδρογόνον. Σπουδαιότεροι ύδατάνθρακες είναι τὰ σάκχαρα καὶ τὸ ἄμυλον. Τροφαὶ μὲ πολλὰ σάκχαρα είναι οἱ καρποί, τὸ μέλι, τὰ γλυκίσματα. Τροφαὶ μὲ πολὺ ἄμυλον είναι τὰ γεώμηλα, τὰ ἀλευρά, τὰ ὅσπρια κλπ.

Οἱ ύδατάνθρακες ἔχουν τὴν ἰδιότητα νὰ ἑνοῦνται μὲ τὸ δέξιγόνον ἐντὸς τοῦ δργανισμοῦ. Τὸ δέξιγόνον είναι ἐν ἀέριον, τὸ ὅποιον προσλαμβάνει ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ τὴν ἀτμόσφαιραν διὰ τῆς ἀναπνοῆς. Ἡ ἔνωσις μιᾶς ούσιας μὲ δέξιγόνον καλεῖται καῦσις καὶ προκαλεῖ τὴν παραγωγὴν θερμότητος. "Οταν, ὅπως, εἰς τὸν δργανισμὸν συμβαίνει, ἡ καιομένη ούσια περιέχῃ ἄνθρακα, τότε παράγεται καὶ τὸ ἀέριον διοξείδιον τοῦ ἀνθρώπου".

Μὲ τοὺς ύδατάνθρακας λοιπὸν καὶ τὸ δέξιγόνον γίνονται ἐντὸς τοῦ σώματος καύσεις. Ἡ παραγομένη θερμότης χρησιμοποιεῖται διὰ τὰς κινήσεις τῶν μυῶν καὶ διὰ τὴν διατήρησιν τῆς θερμοκρασίας τοῦ σώματος (ζωϊκὴ θερμότης).

4. ΑΙ ΛΙΠΑΡΑΙ ΟΥΣΙΑΙ

Αἱ λιπαραὶ ούσιαι, αἱ ὅποιαι περιέχονται εἰς τὰς τροφὰς, είναι διάφορα λίπη καὶ ἔλαια. Χρησιμοποιοῦνται καὶ αύται ὑπὸ τοῦ δργανισμοῦ, ὅπως καὶ οἱ ύδατάνθρακες, διὰ τὰς καύσεις. "Οταν πλεονάζουν, ἀποτίθενται ὑπὸ μορφὴν λίπους κάτωθεν τοῦ δέρματος καὶ μεταξὺ τῶν ἴστῶν.

5. ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ

Τὰ λευκώματα είναι δργανικαὶ ἔνώσεις, αἱ ὅποιαι περιέ-

χουν πάντοτε καὶ ἄζωτον, ἀποτελοῦν δὲ συστατικὰ τοῦ πρωτοπλάσματος τῶν ζωϊκῶν καὶ φυτικῶν κυττάρων. Τροφαὶ μὲν πολλὰ λευκώματα είναι τὰ κρέατα, τὰ ωά, τὸ γάλα, τὰ ὅσπρια κλπ.

Τὰ κύτταρα τοῦ δργανισμοῦ χρησιμοποιοῦν τὰ λευκώματα, διὰ νὰ σχηματίσουν πρωτόπλασμα. Δι’ αὐτοῦ, ἀφ’ ἐνὸς μὲν ἀντικαθιστοῦν τὸ μέρος ἔκεινο τοῦ ἴδικοῦ των πρωτοπλάσματος, τὸ ὅποιον συνεχῶς φθείρεται, ἀφ’ ἑτέρου δὲ αὔξανονται καὶ περαιτέρω.

6. ΑΙ ΒΙΤΑΜΙΝΑΙ

Βιταμίναι είναι ώρισμέναι δργανικαὶ ἐνώσεις, τὰς ὅποιας εύρισκει ὁ δργανισμὸς εἰς τὰς τροφάς, εἰς ἐλαχίστας ποσότητας. Ἐν τούτοις, είναι ἀπαραίτητοι διὰ τὴν κανονικὴν θρέψιν τοῦ δργανισμοῦ καὶ ἡ ἔλλειψις αὐτῶν προκαλεῖ διαφόρους ἀσθενείας, καλουμένας ἀβιταμίνωσεις.

Αἱ ἀβιταμινώσεις θεραπεύονται διὰ τῆς χρήσεως τροφῶν, αἱ ὅποιαι περιέχουν τὴν κατάλληλον βιταμίνην ἢ διὰ τῆς χρήσεως βιταμινῶν, τὰς ὅποιας παρασκευάζουν στήμερον οἱ χημικοί. Ἀπὸ τὸ ἥπαρ π.χ. ἐνὸς ἰχθύος, τοῦ ὀνίσκου, ἔξαγεται τὸ γνωστόν μας μουρουνέλαιον. Τοῦτο περιέχει κυρίως δύο βιταμίνας, αἱ ὅποιαι καλοῦνται βιταμίνη Α ἢ ἀντιξηροφθαλμική, καὶ βιταμίνη D ἢ ἀντιρραχιτική.

Ἐλλειψις τῆς βιταμίνης Α ἐλαττώνει τὴν ἀντοχὴν τοῦ δργανισμοῦ, δύναται δὲ νὰ προκαλέσῃ τὴν νόσον ξηροφθαλμίαν, ἡ ὅποια καταστρέφει τὸν κερατοειδῆ χιτῶνα τοῦ δρφαλμοῦ. Ἡ βιταμίνη Α δὲν είσάγεται πάντοτε ἐτοίμη εἰς τὸν δργανισμόν. Πολλάκις εἰσάγεται διὰ τῶν τροφῶν (λαχανικά κλπ.) μία ἄλλη ούσια, ἡ ὅποια είναι, ως λέγουν, ἡ προβιταμίνη Α. Ἔχει δηλαδὴ ἡ ούσια αὗτη τὴν ἴδιότητα νὰ μετατρέπεται ἐντὸς τοῦ δργανισμοῦ εἰς βιταμίνη Α.

Ἡ βιταμίνη D διευκολύνει τὴν πρόσληψιν ἀνοργάνων ούσιῶν καὶ τὴν χρησιμοποίησίν των διὰ τὴν ἀνάπτυξιν τῶν δστῶν. Καὶ ἡ βιταμίνη αὕτη παρασκευάζεται καὶ ἐντὸς τοῦ δργανισμοῦ, ἀπὸ μίαν ἀντίστοιχον προβιταμίνην, διὰ τῆς ἐπιδράσεως τῶν ἡλιακῶν ἀκτίνων. Διὰ τὸν λόγους τούτους καὶ τὸ μουρουνέλαιον καὶ αἱ ἡλιακαὶ ἀκτίνες ἔχουν μεγάλην χρησιμότητα ως προφυλακτικὰ καὶ θεραπευτικὰ μέσα κατὰ τῆς ραχίτιδος.

Μὲ τὸ γράμμα Β χαρακτηρίζουν ὄλόκληρον ὁμάδα βιταμινῶν, αἱ ὅποιαι ἀφθονοῦν κυρίως εἰς τοὺς φλοιοὺς τῶν δημητριακῶν. Ἡ ἔλλειψις τῆς βιταμίνης Β προκαλεῖ τὴν νόσον *Beriberi*. Ἡ νόσος αὕτη ἐξεδηλώθη πολὺ εἰς τὴν "Απω' Ανατολήν, ὅταν εἰσήχθη ἐκεῖ ἡ συνήθεια νὰ ἀποφλοιώνεται τὸ ρύζι.

Ἡ Βιταμίνη Κ ἀφθονεῖ εἰς τοὺς χυμοὺς τῶν ἐσπεριδοειδῶν κυρίως καὶ ἡ ἔλλειψις τῆς προκαλεῖ τὸ σκορβούτον. Ἡ πάθησις αὕτη ἦτο συνήθης ἀλλοτε εἰς τοὺς ναυτικούς, οἱ ὅποιοι ἐπὶ μακρὸν ἐτρέφοντο μὲν διατηρημένα τρόφιμα. Τὸ σκορβούτον χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὰς συχνὰς καὶ ἐπωδύνους αἷμορραγίας τοῦ δέρματος, τοῦ στόματος καὶ ἐσωτερικῶν μερῶν τοῦ σώματος.

Πλὴν τῶν ἀνωτέρω βιταμινῶν ὑπάρχουν καὶ ἄλλαι, ισως δὲ μερικαὶ εἶναι ἀκόμη ἄγνωστοι.

7. ΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙ ΤΗΣ ΘΡΕΨΕΩΣ

Ἡ συντήρησις καὶ ἡ αὔξησις τοῦ ὄργανισμοῦ ἔξασφαλίζεται χάρις εἰς μίαν μεγάλην λειτουργίαν, ἡ ὅποια καλεῖται θρέψις. Ἡ θρέψις περιλαμβάνει τὰς ἔξης ἐπὶ μέρους λειτουργίας:

α) Τὴν ἀναπνοήν, κατὰ τὴν ὅποιαν τὸ αἷμα δεσμεύει ὁξυγόνον ἀπὸ τὸν ἀτμοσφαιρικὸν ἀέρα. Συγχρόνως τὸ αἷμα ἀποδίδει εἰς τὴν ἀτμόσφαιραν τὸ ἀέριον διοξείδιον τοῦ ἀνθρακοῦ, τὸ ὅποιον προϊλθεν ἀπὸ τὰς καύσεις καὶ εἶναι ἐπιβλαβὲς διὰ τὸν ὄργανισμόν.

β) Τὴν πέψιν, κατὰ τὴν ὅποιαν ὁ ὄργανισμός ἀποχωρίζει ἀπὸ τὰς τροφὰς καὶ διασπᾷ τὰς θρεπτικὰς οὐσίας.

γ) Τὴν ἀπομύζησιν καὶ ἀφομοίωσιν, κατὰ τὰς ὅποιας ὁ ὄργανισμὸς ἀπορροφᾷ τὰ προϊόντα τῆς πέψεως καὶ συνθέτει ἔξι αύτῶν τὰς χρησίμους διὰ τὰς ἀνάγκας του οὐσίας.

δ) Τὴν κυκλοφορίαν τοῦ αἵματος, διὰ τῆς ὅποιας αἱ θρεπτικαὶ οὐσίαι καὶ τὸ ὁξυγόνον μεταφέρονται εἰς τοὺς ίστούς.

ε) Τὴν ἀπέκκρισιν, διὰ τῆς ὅποιας τὰ ἀχρηστά προϊόντα τῶν καύσεων ἀπομακρύνονται ἀπὸ τὸν ὄργανισμόν.

Τὰς ἀνωτέρω λειτουργίας τῆς θρέψεως καὶ τὰ ὄργανα τοῦ σώματος, διὰ τῶν ὅποιων αὕται τελοῦνται, θὰ γνωρίσωμεν λεπτομερέστερον εἰς ἐπόμενα κεφάλαια.

8. ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ

Αἱ θρεπτικαὶ οὐσίαι, τὰς ὁποίας δὲ ὄργανισμὸς ἀνευρίσκει εἰς τὰς τροφάς, εἶναι ὕδωρ, ἀνόργανα ἄλατα, ὕδατάνθρακες, λιπαραὶ οὖσιαι καὶ λευκώματα. Ἀπαραίτητοι εἶναι ἀκόμη καὶ αἱ βιταμῖναι, εἰς μικροτάτας ποσότητας (ἀβιταμίνωσεις).

Ἡ μεγάλη λειτουργία διὰ τῆς ὁποίας ἔξασφαλίζεται ἡ συντήρησις καὶ ἡ ἀνάπτυξις τοῦ ὄργανισμοῦ, εἶναι ἡ θρέψις καὶ περιλαμβάνει ὀρισμένας ἄλλας ἐπὶ μέρους λειτουργίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ


ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΙΣ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΟΣ. ΟΙ ΟΔΟΝΤΕΣ

1. Η ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΣ

Η κοιλότης αὗτη περικλείεται ἀπὸ τὰ δόστα τῆς κάτω γνάθου, τῆς ἄνω γνάθου καὶ τὰ ὑπερώια. Συγκοινωνεῖ πρὸς τὰ ἔξω διὰ τοῦ στοματικοῦ ἀνοίγματος, τὸ δόπιον φράσσεται ὑπὸ τῆς ὀδοντοστοιχίας καὶ τῶν χειλέων. Τὸ δάπεδον τῆς κοιλότητος κατέχεται ὑπὸ τῆς μυώδους καὶ εὐκινήτου γλώσσης. Τὸ πρόσθιον ἄκρον τῆς γλώσσης εἶναι ἐλεύθερον, τὸ δὲ ὅπισθιον στερεοῦται ἐπὶ τοῦ δαπέδου καὶ τοῦ νοειδοῦς δόστοῦ. Διὰ τῶν κινήσεών της καὶ διὰ τῶν αἰσθητικῶν σωματίων, τὰ δόπια φέρει, ἐξυπηρετεῖ ἢ γλῶσσα τὴν γεῦσιν, τὴν μάστην καὶ τὴν ὁμιλίαν.


Η ὁροφὴ τοῦ στόματος καλεῖται ὑπερῷα καὶ χωρίζει τοῦτο ἀπὸ τὴν ρινικὴν κοιλότητα. Τὸ πρόσθιον καὶ τὸ μεγαλύτερον μέρος τῆς ὑπερώας σχηματίζεται ἀπὸ τὸ ἄνω γναθικὸν καὶ τὰ ὑπερώια δόστα, καλεῖται δὲ σκληρός ὑπερῷα. Τὸ ὅπισθιον τμῆμα εἶναι σαρκώδες (μαλακή ὑπερῷα) καὶ ἀπολήγει εἰς μίαν προεξοχήν, τὴν σταφυλὴν ἡ κιονίδα.

Εἰς τὸ βάθος τοῦ στόματος, ὅπισθεν τῆς μαλακῆς ὑπερώας, καταλήγουν αἱ δύο χοάναι, διὰ τῶν ὅποιών συγκοινωνεῖ ἢ στοματικὴ πρὸς τὴν ρινικὴν κοιλότητα. Ἀπὸ



Εἰκ. 19. Τομὴ διὰ τοῦ προσώπου: 1. Ρινικὴ κοιλότης. — 4. Σκληρά ὑπερώα (ὑπερώιον δόστοῦ). — 3. Μαλακὴ ὑπερώα ἀπολήγουσα εἰς τὴν κιονίδα. — 2. Ἡ γλῶσσα. — 5. Ἡ ἐπιγλωττίς. — 6. Τὸ νοειδές δόστοῦ. — 7. Ὁ θυρεοειδής χόνδρος τοῦ λάρυγγος. — 8. Κρικοειδής χόνδρος. — 9. Λάρυγξ. — 10. Ἀρυταινοειδής. — 11. Φάρυγξ.

τὴν στοματικὴν κοιλότητα ἀρχίζει ὁ ἀναπνευστικὸς σωλὴν (λάρυγξ) καὶ ὁ πεπτικὸς (φάρυγξ). Παρὰ τὴν ἀρχὴν τοῦ φάρυγγος καταλήγουν καὶ αἱ εὐσταχιαναὶ σάλπιγγες, διὰ τῶν ὅποιων συγκοινωνεῖ ἡ στοματικὴ κοιλότης μὲ τὴν κοιλότητα τοῦ μέσου ὥτος.




Εἰκ. 20. Οἱ σιαλογόνοι ἀδένες: 1. Παρωτίδες. — 2. 'Υπογλώσσιοι. — 3. 'Υπογνάθιοι.

Εἰς τὸ στόμα χύνεται ὁ σίαλος ἀπὸ τρία ζεύγη βιτρυοειδῶν ὄργανων, τὰ ὅποια καλοῦνται σιαλογόνοι ἀδένες. Ἐκ τούτων τὸ ἐν ζεύγος εύρισκεται εἰς τὰς παρειὰς (παρωτίδες), τὰ δὲ δύο ἄλλα εὑρίσκονται κάτωθεν τῆς γλώσσης (ὑπογλώσσιοι καὶ ὑπογνάθιοι) (εἰκ. 20).

2. ΟΙ ΟΔΟΝΤΕΣ

Οὗτοι εἶναι μικρὰ ὅστᾶ στερεούμενα ἐντὸς μικρῶν κοιλοτήτων τῶν γναθικῶν ὄστων, τῶν φατνίων. Εἰς ἕκαστον ὄστον διακρίνομεν τὰ ἔξης τμῆματα: α) τὴν μύλην, δηλαδὴ τὸ ἐλεύθερον τμῆμα, β) τὸν αὔχενα, περιβαλλόμενον ἀπὸ τὰ οὐλα, γ) τὴν ρίζαν, ἡ ὅποια εἰσδύει ἐντὸς τοῦ φατνίου καὶ δ) τὴν πολικὴν κοιλότητα, εἰς τὸ ἐσωτερικὸν τοῦ ὄστον. Ἡ πολιφικὴ κοιλότης περιλαμβάνει ἀγγεῖα καὶ νεῦρα, πληροῦται δὲ ὑπὸ μαλακοῦ ἰστοῦ καλουμένου πολόφου.



Εἰκ. 21. Τομὴ ὄστον.
1. Ἀδαμαντίνη. — 2. Οδοντίνη. — 3. Πολφικὴ κοιλότης. — 4. Οστείνη. — 5. Γναθικὸν ὄστον.

Εις μίαν τομήν όδόντος παρατηροῦμεν, ὅτι οὗτος δὲν ἀποτελεῖ-
ται ἀπὸ μίαν μόνον ούσίαν (εἰκ. 21). Ἡ πολφικὴ κοιλότης περιβάλ-
λεται ύπὸ στρώματος σκλη-
ρᾶς ούσίας, τῆς ὁδοντίνης.
Την ούσιαν τομής μὲν τὸν αὐχένα καὶ
τὴν ρίζαν ύπὸ δόστερην την,
εἰς δὲ τὴν μύλην ύπὸ στρώ-
ματος τῆς σκληροτάτης ἀ-
δαμαντίνης.

Εἰς τὸν ἄνθρωπον ἡ ἀνω-
τέρα ἐπιφάνεια ὅλων τῶν ό-
δόντων εύρισκεται σχεδὸν εἰς
τὸ ἵδιον ὑψος. Διαφέρουν ὅ-
μως οἱ όδόντες μεταξύ των
κατὰ τὸ σχῆμα καὶ τὸ μέγεθος
(εἰκ. 22) καὶ διακρίνονται
εἰς τὰς ἔξης κατηγορίας:



α) Τομεῖς. Οὗτοι παρουσιάζουν μίαν ρίζαν καὶ ἀπολήγουν
εἰς λεπτήν ἐπιμήκη μύλην. β) Κυνόδοντες. Χαρακτηρίζονται
ἀπὸ μίαν ρίζαν καὶ ἀπὸ τὸ κωνι-
κὸν σχῆμα τῆς μύλης. γ) Προγόμφιοι.

"Ἔχουν μίαν ρίζαν καὶ
πλατεῖαν μύλην μὲ δύο φύματα.
δ) Γομφίοι. Ἡ τραπεζίτας.
Ἡ ρίζα των εἶναι διπλῇ ἢ
τριπλῇ, ἡ δὲ πλατεῖα ἐπιφάνεια
των φέρει τέσσαρα φύματα.

Κατὰ τὴν νηπιακὴν ἡλικίαν ἐκ-
φύεται ἡ πρώτη όδοντοφυΐα, ἀπο-
τελουμένη ἔξι εἴκοσιν όδόντων, κα-
λουμένων νεογιλῶν. Οἱ νεο-
γιλοὶ όδόντες εἶναι τοποθετημένοι
ἀνὰ δέκα εἰς κάθε γνάθον ὡς ἔξης:

Εἰκ. 23. Ἀκτινογραφία όδόντων.
Διακρίνονται οἱ μόνιμοι όδόντες, οἱ
όποιοι ἀναπτύσσονται καὶ θ' ἀντι-
καταστήσουν τοὺς νεογιλούς.

Τέσσαρες τομεῖς εἰς τὸ μέσον τῆς γνάθου, ὀνὰς εἰς κυνόδοντος δεξιά καὶ ἀρι-
στερὰ τῶν τομέων καὶ δύο προγόμφιοι ὅπισθεν ἐκάστου κυνόδοντος.



Κατά τὴν παιδικήν ἡλικίαν οἱ νεογιλοὶ ἀντικαθίστανται ὑπὸ τῶν μονίμων ὁδόντων (εἰκ. 23). Οὕτοι περιλαμβάνουν ἐπὶ πλέον τῶν νεογιλῶν δόκτω γομφίους, ἀνὰ δύο δόπισθεν τῶν προγομφίων. Τέλος, μετὰ τὸ 19ον ἔτος ἐκφύονται καὶ οἱ τέσσαρες τελευταῖοι γομφίοι, οἱ δόποιοι καλοῦνται σωφροὶ στῆρες. Οὕτω συμπληροῦνται ἡ μόνιμος δόδοντοφυΐα, ἀποτελουμένη ἐκ τριάκοντα δύο ὁδόντων.

Σημείωσις. Εἰς τὴν βάσιν τῆς γλώσσης καὶ εἰς τὸ ὄπίσθιον καὶ τὰ πλάγια τοιχώματα τοῦ φάρυγγος εὑρίσκονται ἀθροίσματα λεμφαδένων, τὰ δόποια καλοῦνται ἀμυγδαλαῖ. Αἱ εὐρισκόμεναι εἰς τὰ πλάγια τοιχώματα τοῦ φάρυγγος φαρυγγικαὶ ἀμυγδᾶλαι εἰναι γνωστότεραι, διότι συχνὰ ἐρεθίζονται.

3. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1) Ἐπανάλαβε τὴν κίνησιν τῆς καταπόσεως πολλάκις καὶ πρόσεξε τὴν θέσιν τῆς γλώσσης καὶ τὴν κίνησιν τοῦ λάρυγγος.

2) Παρατήρησε εἰς τὸν καθρέπτην (καθαρὰ χέρια!) τὰ διάφορα εἶδη τῶν ὁδόντων σου. Εἰς ἔξαρχέντας δόδόντας παρατήρησε τὴν ρίζαν καὶ τὴν πολφικήν κοιλότητα. Γράψε τὸν δόδοντικὸν τύπον τοῦ ἀνθρώπου (παιδίου ἢ ἐνήλικου).

3) Παρατήρησε εἰς τὸν καθρέπτην τὸ ὑπερώιον ἰστίον καὶ τὴν κιονίδα, εἰς τὴν ὅποιαν τοῦτο ἀπολήγει.

4) Παρατήρησε ἀνὰ κατὰ τὴν σύγκλεισιν τῶν ὁδόντων οἱ ἄνω τομεῖς εὐρίσκονται πρὸ τῶν κάτω ἢ δόπισθεν αὐτῶν. Παρατήρησε τὸ ἴδιον καὶ εἰς ἄλλα ἄπομα.

4. ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ

Ἡ στοματικὴ κοιλότης συγκοινωνεῖ πρὸς τὴν ρινικήν καὶ πρὸς τὸ μέσον οὖς (εὔσταχιαναι σάλπιγγες). Ἔξ αὐτῆς ἀρχονται ὁ ἀναπνευστικὸς σωλήν (λάρυγξ) καὶ ὁ πεπτικὸς (φάρυγξ). Ἡ γλῶσσα καὶ οἱ δόδόντες ἔχουν πρητεροῦν τόσον τὴν μάστησιν δσον καὶ τὴν δμιλίαν. Ἡ στοματικὴ κοιλότης ἀποφράσσεται ὑπὸ τῶν χειλέων καὶ τῶν ὁδόντων. Οἱ δόδόντες τῆς μὲν πρώτης δόδοντοφυΐας (νεογιλοὶ) εἶναι εἴκοσι, τῆς δὲ δευτέρας δόδοντοφυΐας (μόνιμοι) τριάκοντα δύο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ

ΠΕΨΙΣ, ΑΠΟΜΥΖΗΣΙΣ ΚΑΙ ΑΦΟΜΟΙΩΣΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟ·Ι·ΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΨΕΩΣ


1. Η ΠΕΨΙΣ. Ο ΠΕΠΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝ

Ἡ πέψις εἶναι μία σειρὰ μεταβολῶν, τὰς ὅποιας ὑφίστανται αἱ τροφαὶ ἐντὸς τοῦ ὄργανισμοῦ. Διὰ τῶν μεταβολῶν τούτων ὁ ὄργανισμὸς ἀποχωρίζει τὰς θρεπτικὰς οὐσίας καὶ τὰς διασπᾶς εἰς ἀπλουστέρας ἔνώσεις, αἱ ὅποιαι εἶναι εὔδιάλυτοι καὶ δύνανται ν' ἀπορροφηθοῦν ὑπὸ τοῦ ἐντέρου.

Ἡ πέψις τῶν τροφῶν ἀρχίζει εἰς τὸ στόμα καὶ συμπληρώνεται εἰς τὰ διάφορα τμῆματα τοῦ συνεχοῦς πεπτικοῦ σωλῆνος. Ὁ πεπτικὸς οὖτος σωλὴν περιλαμβάνει τὰ ἔξῆς κατὰ σειρὰν τμήματα: τὸν φάρυγγα, τὸν οἰσοφάγον, τὸν στόμαχον καὶ τὸ ἐντερόν (εἰκ. 24). Κατωτέρω θὰ γνωρίσωμεν τὴν κατασκευὴν τῶν τμημάτων τούτων καὶ τὰς μεταβολάς, τὰς ὅποιας ὑφίστανται αἱ τροφαὶ ἐντὸς ἔκάστου ἔξι αὐτῶν.

2. ΣΤΟΜΑ. ΜΑΣΗΣΙΣ. ΣΙΑΛΟΣ. ΚΑΤΑΠΟΣΙΣ ΤΟΥ ΒΛΩΜΟΥ

Εἰς τὸ στόμα ἡ τροφὴ κατατεμαχίζεται καὶ κατατρίβεται διὰ τῶν ὁδόντων. Ἡ κατεργασία αὕτη τῆς



Εἰκ. 24. Τὸ πεπτικὸν σύστημα.
1. Οἰσοφάγος. — 2. Στόμαχος. —
3. Δωδεκαδάκτυλον. — 4. Πάγκρεας.—
5, 6, 7, 8, 9. Παχὺ ἐντερον. — 11.
Λεπτὸν ἐντερον. — 12. Σκωληκοειδῆς
ἀπόφυσις. — 13. Ἡπαρ. — 14. Χοληδόχος κύστις.

τροφῆς καλεῖται μάσησις. Προσέτι εἰς τὸ στόμα ὑφίσταται ἡ τροφὴ καὶ τὴν ἐπίδρασιν τοῦ σιάλου, δ ὅποιος μεταβάλλει τὸ ἄμυλον εἰς σάκχαρον. Διὰ τοῦτο αἱ ἄμυλώδεις τροφαὶ ἀποκτοῦν εἰς τὸ στόμα γλυκεῖαν γεῦσιν. ‘Ο σίαλος χύνεται εἰς τὴν στοματικὴν κοιλότητα ἀπὸ τὰ γνωστά μας τρία ζεύγη σιαλογόνων ἀδένων (εἰκ. 20).

’Αφοῦ ὑποστῇ τὰς ἀνωτέρω κατεργασίας, λαμβάνει ἡ τροφὴ διὰ τῶν κινήσεων τῆς γλώσσης τὸ σχῆμα μιᾶς μικρᾶς σφαίρας, ἡ ὅποια καλεῖται βλωμὸς (μπουκιά). ‘Ο βλωμὸς οὗτος διὰ τῆς καταπόσεως εἰσέρχεται εἰς τὸν φάρυγγα.

3. ΦΑΡΥΓΞ ΚΑΙ ΟΙΣΟΦΑΓΟΣ. ΣΤΟΜΑΧΟΣ ΚΑΙ ΓΑΣΤΡΙΚΟΝ ΥΓΡΩΝ

‘Ο φάρυγξ εἶναι, ὡς εἴπομεν, ἡ ἀρχὴ τοῦ ἴδιως πεπτικοῦ σωλῆνος καὶ ἔχει σχῆμα χωνίου. ‘Ο βλωμὸς διέρχεται αὐτὸν καὶ διατρέχει τὸν οἰσοφάγον. Οὗτος εἶναι μυώδης σωλήν, δ ὅποιος διαπερᾷ τὸν θώρακα ἐμπρὸς ἀπὸ τὴν σπονδυλικὴν στήλην καὶ ἀπολήγει εἰς τὸν στόμαχον.

‘Ο στόμαχος εἶναι μυώδης ἀσκός, δ ὅποιος εύρισκεται εἰς τὸ ἀριστερὸν μέρος τῆς κοιλίας. Τὸ ἐσωτερικὸν στρῶμα τοῦ τοιχώματός του, τὸ ὅποιον καλεῖται βλεννογόνος χιτών, περιλαμβάνει ἀδένας, οἱ ὄποιοι ἐκκρίνουν βλέψιν ναν καὶ γαστρικὸν ύγρον. Διὰ τῶν κινήσεων τοῦ μυώδους τοιχώματος ἡ τροφὴ ἀναμιγνύεται καλῶς μὲ τὸ γαστρικὸν ύγρον. Τοῦτο ἔχει τὴν ἴδιότητα νὰ προσβάλῃ τὰ λευκώματα τῆς τροφῆς καὶ νὰ τὰ διασπᾷ εἰς ἀπλουστέρας ἐνώσεις.

4. ΛΕΠΤΟΝ ΕΝΤΕΡΟΝ. ΠΑΓΚΡΕΑΣ. ΗΠΑΡ. ΧΟΛΗΔΟΧΟΣ ΚΥΣΤΙΣ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΙΣ ΤΗΣ ΠΕΥΕΩΣ

Τὸ ἔντερον εἶναι μακρὸς σωλήν (8 ½ μ. περίπου) «κουλουριασμένος» ἐντὸς τῆς κοιλιακῆς κοιλότητος. Τὸ πρῶτον τμῆμα του, τὸ ὅποιον περιλαμβάνει τὰ 3/4 περίπου τοῦ ὅλου μήκους του, καλεῖται λεπτὸν ἔντερον καὶ ἔχει διάμετρον 3 - 5 ἑκ. Συνέχεια αὐτοῦ εἶναι τὸ παχύ ἔντερον, τὸ ὅποιον εἶναι χονδρότερον καὶ ἀπολήγει εἰς τὴν ἔδραν.

Τὸ ἀρχικὸν τμῆμα τοῦ λεπτοῦ ἔντερου εἶναι κεκαμμένον πετα-

λοειδῶς καὶ στερεοῦται ἐπὶ τοῦ ὄπισθίου τοιχώματος τῆς κοιλιακῆς κοιλότητος. Τὸ τμῆμα τοῦτο καλεῖται δωδεκάτη λογική.

Εἰς τὸ δωδεκαδάκτυλον εἰσέρχεται ἡ τροφὴ διὰ συστολῶν τοῦ κατωτέρου στομίου τοῦ στομάχου, τὸ δποῖον καλεῖται πυλωρός.

Ἐδῶ συνεχίζεται ἡ πέψις τῆς τροφῆς διὰ τῶν ύγρῶν, τὰ ὄποια χύνονται εἰς τὸ τμῆμα τοῦ τοῦ πεπτικοῦ σωλήνος. Τὰ ύγρά ταῦτα είναι τὰ ἔξης:

α) **Τὸ ἐντερικὸν ύγρόν.** Τοῦτο παράγεται ἀπὸ τοὺς ἀδένας τοῦ βλεννογόνου χιτῶνος τοῦ ἐντέρου.

β) **Τὸ παγκρεατικὸν ύγρόν.** Τοῦτο παράγεται ἀπὸ τὸ πάγκρεατον. Οἱ ἐπιμήκης οὔτος ἀδήνη ἐκτείνεται ὥριζοντίως ἀπὸ τοῦ δωδεκαδακτύλου μέχρι τοῦ σπληνός. Μὲ τὴν προσθίαν ἐπιφάνειαν ἀκουμβᾷ ἐπὶ τοῦ στομάχου καὶ μὲ τὴν ὄπισθίαν ἐπὶ τῆς σπονδυλικῆς στήλης καὶ τοῦ ἀριστεροῦ νεφροῦ. Ἐκβάλλει εἰς τὸ δωδεκαδάκτυλον μὲ δύο ἐκφορητικούς ἀγωγούς. Ἐκ τούτων δὲ εἰς ἑνώνεται μὲ τὸν ἀγωγὸν τῆς χολῆς.

γ) **Ἡ χολή.** Αὕτη είναι ἐν κιτρινοπράσινον ύγρόν, τὸ ὄποιον παράγεται εἰς τὸ ἡπαρ (σηκώτι) καὶ συναθροίζεται εἰς τὴν χοληδόχον κύστιν. Ἀπὸ τὴν χοληδόχον κύστιν, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ εὐθείας ἀπὸ τὸ ἡπαρ, ἡ χολὴ χύνεται καὶ αὐτὴ εἰς τὸ δωδεκαδάκτυλον.

Τὸ ἡπαρ είναι δομημένος ἀδήνη τοῦ σώματος, φθάνων μέχρι βάρους 2 χλγρ. Ἀποτελεῖται ἀπὸ δύο λοβούς καὶ εύρισκεται, ίσούψιδας μὲ τὸν στόμαχον, εἰς τὴν δεξιὰν πλευρὰν τῆς κοιλίας.

Μὲ τὴν ἐπίδρασιν τῶν ἀνωτέρω ύγρῶν συμπληρώνεται εἰς τὸ λεπτὸν ἔντερον ἡ διάσπασις ὅλων τῶν θρεπτικῶν ούσιῶν τῶν τροφῶν, δηλ. τῶν λευκωμάτων, τῶν ύδατανθράκων καὶ τῶν λιπῶν. Αἱ ἀπλούστεραι ἑνώσεις, αἱ ὄποιαι προκύπτουν καὶ τὰς ὄποιας θὰ καλοῦμεν προϊόντα τῆς πέψεως, είναι εὐδιάλυτοι εἰς τὸ υδωρ καὶ δύνανται νὰ ἀπορροφηθοῦν ὑπὸ τοῦ ἐντέρου.


5. ΑΠΟΜΥΖΗΣΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΨΕΩΣ ΔΙΑ ΤΩΝ ΛΑΧΝΩΝ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ

Ἡ ἀπορρόφησις τῶν προϊόντων τῆς πέψεως γίνεται διὰ τοῦ τοιχώματος πολυπληθῶν, μικρῶν, μικροτάτων προεξοχῶν τοῦ βλεννογόνου τοῦ λεπτοῦ ἐντέρου, αἱ ὄποιαι καλοῦνται λάχναι.

Αἱ λάχναι εἰναι εὐκίνητοι, ἔχουν λεπτότατον τοίχωμα καὶ περιλαμβάνουν αἵμοφόρα καὶ λεμφικά ἀγγεῖα (εἰκ. 25). Τὰ προϊόντα τῆς πέψεως διέρχονται τὸ τοίχωμα τῶν λαχνῶν τούτων καὶ εἰσέρχονται εἰς τὰ ἀγγεῖα.

6. ΑΦΟΜΟΙΩΣΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟ·Ι·ΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΨΕΩΣ

Ἄπο τὰ προϊόντα αὐτὰ τῆς πέψεως, τὰ όποια ἀπορροφᾶ, σχηματίζει ὁ ὄργανισμὸς τὰ λίπη, τὰ λευκώματα καὶ τοὺς ὑδατάνθρακας τοῦ ἴδιοῦ του σώματος. Τὰ συστατικὰ αὐτὰ τοῦ σώματός του διαφέρουν ἀπὸ τὰ ἀντίστοιχα συστατικὰ τοῦ σώματος ζώου ἄλλου εἴδους. Πρὸ παντὸς τὸ λεύκωμα τοῦ ἀνθρώπου, ὅπως καὶ παντὸς ζώου, παρουσιάζει σημαντικὴν διαφορὰν ἀπὸ τὸ λεύκωμα ζώου ἄλλου εἴδους.



Εἰκ. 25. Σχῆμα ἐντερικῆς λάχνης.

1. Βλεννογόνος. — 2. Λεία μυϊκή στοιβάδας. — 3. Ἀρτηρία. — 4. Φάλευ. — 5. Λεμφικὸν ἀγγεῖον.

Ο σχηματισμὸς τῶν συστατικῶν τῶν ἰστῶν ἀπὸ τὰ προϊόντα τῆς πέψεως καλεῖται ἀφομοίωσις. Αὕτη πραγματοποιεῖται διὰ μὲν τὰ λίπη κυρίως εἰς τὸ τοίχωμα τοῦ ἐντέρου, διὰ δὲ τοὺς ὑδατάνθρακας κυρίως εἰς τὸ ἡπαρ. Διὰ τὰ λευκώματα ἡ ἀφομοίωσις τελεῖται ἐν μέρει μὲν εἰς τὸ ἡπαρ, κυρίως ὅμως εἰς τὰ ἴδια τὰ κύτταρα τῶν ἰστῶν. Δηλαδὴ τὰ διάφορα κύτταρα ἐκλέγουν ἀπὸ τὸ αἷμα τὰ ἀναγκαῖα προϊόντα τῆς πέψεως καὶ ἔξ αὐτῶν παρασκευάζουν μόνα τὰ λευκώματά των.

7. ΠΑΧΥ ENTEPON. ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ ΤΟΥ ENTEPOΥ. ΠΕΡΙΤΤΩΜΑΤΑ

Μετὰ τὴν ἀπορρόφησιν τῶν θρεπτικῶν ούσιῶν μένουν εἰς τὸ ἐντερον τὰ στερεὰ ὑπολείμματα τῶν τροφίμων, ὕδωρ καὶ πεπτικὰ ὑγρά. "Ολα αὐτὰ διὰ τῶν συστολῶν τοῦ ἐντέρου προχωροῦν εἰς τὸ τελευταῖον τμῆμα του, τὸ παχύ ἐντερον." Εδῶ γίνεται ἀκόμη

μία μικρὰ ἀπορρόφησις, ἵδιως ὕδατος, καὶ τέλος τὰ ὑπολείμματα ἀποβάλλονται ἐκ τῆς ἔδρας ώς περιττώς ματα. Εἰς τὸ παχὺ ἔντερον ἀναπτύσσονται καὶ ὠρισμένα εῖδη μικροοργανισμῶν (βακτηριδίων). Τὰ βακτηρίδια ταῦτα δὲν προξενοῦν βλάβην εἰς τὸν δργανισμόν. Ἀντιθέτως μάλιστα τὸν ὡφελοῦν, διότι παρεμποδίζουν τὴν ἀνάπτυξιν ἔντος τοῦ ἔντερου ἀλλων μικροβίων, παθογόνων. Μέρος τῶν βακτηριδίων τούτων ἔσερχεται ἐκάστοτε μετὰ τῶν περιττωμάτων.

8. ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ ΞΕΝΩΝ ΛΕΥΚΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

‘Ως εἴδομεν, τὰ λευκώματα ἐκάστου ζώου καὶ τοῦ ἀνθρώπου διαφέρουν ἀπὸ τὰ λευκώματα ζώου ἄλλου εἶδους. Δι’ αὐτὸν ὁ δργανισμὸς δὲν δέχεται ξένα λευκώματα, τὰ ὅποια εἰσάγονται εἰς αὐτὸν ἀπ’ εύθειας, χωρὶς δῆλον. νὰ διασπασθοῦν εἰς τὸν πεπτικὸν σωλήνα. Ἐάν τοιαῦτα λευκώματα εἰσχωρήσουν εἰς τοὺς ίστούς, ὁ δργανισμὸς βλάπτεται καὶ παρουσιάζει συμπτώματα δηλητηριάσεως.

Τοῦτο π.χ. συμβαίνει, ὅταν ὁ δργανισμὸς μολυνθῇ, ὅταν δηλαδὴ ἀναπτυχθοῦν ἔντος τῶν ίστῶν του μικρόβια. Ἀπὸ τὰ καταστρεφόμενα μικροβιακὰ κύτταρα ἐλευθερώνονται μέσα εἰς τὸ αἷμα λευκώματα, τὰ ὅποια εἶναι ξένα διὰ τὸν δργανισμόν.

Εἰς τοῦτο ὀφείλονται ἐν μέρει τὰ συμπτώματα, τὰ ὅποια παρατηροῦνται μετὰ τὴν μόλυνσιν (πυρετός κλπ.).

9. ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ

‘Ο πεπτικὸς σωλήνη περιλαμβάνει κατά σειρὰν ἀπὸ τοῦ στόματος τὸν φάρυγγα, τὸν οἰσοφάγον, τὸν στόμαχον, τὸ λεπτὸν καὶ τὸ παχὺ ἔντερον. Εἰς τὸν στόμαχον ἔκβαλλουν: α) οἱ ἀδένες τοῦ βλεννογόνου του (βλέννα καὶ γαστρικὸν ύγρον), β) τὸ πάγκρεας, γ) ὁ ἀγωγὸς τῆς χολῆς (ἥπαρ καὶ χοληδόχος κύστις), δ) οἱ ἀδένες τοῦ βλεννογόνου τοῦ ἔντερου. ‘Η πέψις ἀρχίζει ἀπὸ τὸ στόμα (μάστησις, σίαλος) καὶ συμπληροῦται μὲ τὴν ἐπίδρασιν τῶν ἐκκριμάτων τῶν ὡς ἄνω ἀδένων.

Τὰ προϊόντα τῆς πέψεως ἀπομυζῶνται διὰ τῶν λαχνῶν τοῦ λεπτοῦ ἔντερου καὶ ἀφομοιώνονται πρὸς τὰ συστατικὰ τῶν ἀνθρωπίνων ίστῶν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΚΤΟΝ

Η ΑΝΑΠΝΟΗ


1. ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ

Ἐμάθομεν ὅτι ὁ ὄργανισμὸς προσλαμβάνει ἀπὸ τὸν ἀτμοσφαιρικὸν ἀέρα τὸ ὀξυγόνον, τὸ ὅποιον χρειάζεται διὰ τὰς καύσεις. Ἡ

δέσμευσις τοῦ ὀξυγόνου γίνεται ὑπὸ τοῦ αἷματος εἰς τοὺς πνεύμονας, τὰ κυριώτερα ὄργανα τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος.

Ολόκληρον τὸ ἀναπνευστικὸν σύστημα περιλαμβάνει δύο τμῆματα: α) τὴν ἀναπνευστικὴν δοποίας κυκλοφορεῖ μέχρι τῶν πνεύμονων ὁ ἀέρος, καὶ β) τοὺς πνεύμονας (εἰκ. 26).

Ἡ ἀναπνευστικὴ δόδος εἶναι ἔνας σωλήν, ὁ δοποίος ἀρχίζει ἀπὸ τὴν στοματικὴν κοιλότητα καὶ προχωρεῖ κατὰ μῆκος τῆς προσθίας ἐπιφανείας τοῦ λαιμοῦ. Ὁ σωλήν ὡὗτος σχηματίζεται ἀπὸ ἀλλεπαλλήλους χονδρίνους δακτυλίους καὶ ἐσωτερικῶς



Εἰκ. 26. Τὸ ἀναπνευστικὸν σύστημα.
1. Ὁ θυρεοειδῆς χόνδρος τοῦ λάρυγγος. —
2. Θυρεοειδῆς ἀδήνη. — 3. Τραχεῖα. — 4. Βρόγχοι. —
5. Τομὴ διὰ τοῦ πνεύμονος. — 6. Οἰσοφάγος. —
7. Διάφραγμα. — α. Ἀριστερὸς πνεύμονας. —
δ. Δεξιὸς πνεύμονας.

καλύπτεται ἀπὸ βλεφαριδωτὸν βλεννογόνον. Τὸ πρόσθιον μέρος τοῦ σωλήνος τούτου εἶναι ἴδιαιτέρως διαμορφωμένον διὰ τὴν παραγω-

γήν τῆς φωνῆς καὶ καλεῖται λάρυγξ. Τὸ ὑπόλοιπον τμῆμα, ἡ τραχεῖα, δταν φθάστη εἰς τὸ ψυκτόνου, διχάζεται εἰς δύο κλάδους, οἱ δύοι καλοῦνται βρόγχοι καὶ οἱ δύοι εἰσέρχονται ἀνὰ εἰς ἕκαστον πνεύμονα.

Οἱ πνεύμονες κατέχουν τὸ μεγαλύτερον μέρος τῆς θωρακικῆς κοιλότητος. Ἐντὸς αὐτῶν οἱ βρόγχοι διακλαδίζονται εἰς ἀπειρίαν μικρῶν κυστιδίων, τὰς κυψελίδας. Εἰς τὰ τοιχώματα τῶν κυψελίδων τούτων διακλαδίζονται τριχοειδῆ αίμοφόρα ἀγγεία. “Ωστε ἡ μᾶζα τῶν πνευμόνων ἀποτελεῖται ἀπὸ τὰ βρόγχια, τὰ ἀγγεία, τὰς κυψελίδας καὶ ἀπὸ συνδετικὸν ίστόν. Ο δεξιὸς πνεύμων εἶναι τρίλοβος, ὁ δὲ ἀριστερὸς εἶναι μικρότερος (δίλοβος), ἀφήνων χῶρον καὶ διὰ τὴν καρδίαν εἰς τὸ ἀριστερὸν ἥμισυ τοῦ θώρακος.

“Οπως θὰ ἴδωμεν καὶ ἀργότερον, ἀπὸ τὴν καρδίαν (καὶ μάλιστα τὴν δεξιὰν κοιλίαν αὐτῆς) ἀρχίζει ἔνα μεγάλο ἀγγεῖον, ἡ πνευμονική ἀρτηρία. Αὕτη διχάζεται εἰς ἓν ἀγγεῖον διὰ κάθε πνεύμονα καὶ τοῦτο διακλαδίζεται περαιτέρω καὶ δίδει τὰ τριχοειδῆ ἀγγεία τῶν πνευμόνων. Διὰ τῆς πνευμονικῆς ταύτης ἀρτηρίας προσάγεται ἀπὸ τὴν καρδίαν αἷμα εἰς τοὺς πνεύμονας. Ἐδῶ τοῦτο συναντᾶται μὲ τὸν ἀτμοσφαιρικὸν ἀέρα, ὁ δύοιος διὰ τῆς ἀναπνευστικῆς δόδοι εἰσέρχεται εἰς τοὺς πνεύμονας καὶ πληροῖ τὰς κυψελίδας.

Διὰ μέσου τῶν λεπτοτάτων τοιχωμάτων τῶν τριχοειδῶν τὸ διξυγόνον τοῦ ἀέρος διεισδύει (διαπιδύει) εἰς τὰ ἀγγεία καὶ δεσμεύεται ὑπὸ τοῦ αἵματος. Ἀντιστρόφως, ἐκ τοῦ αἵματος διαπιδύει εἰς τὸν ἀέρα τῶν κυψελίδων τὸ διοξείδιον τοῦ ἄνθρακος. “Ωστε γίνεται μία ἀνταλλαγὴ ἀερίων μεταξὺ αἵματος καὶ ἀέρος. Δι’ αὐτῆς τὸ αἷμα πλουτίζεται εἰς διξυγόνον καὶ καθαρίζεται ἀπὸ τὸ διοξείδιον τοῦ ἄνθρακος, τὸ δύοιον προκύπτει ἐκ τῶν καύσεων. Μετὰ τοῦτο τὸ αἷμα ἐπιστρέφει εἰς τὴν καρδίαν (τὸν ἀριστερὸν κόλπον αὐτῆς) διὰ τῶν πνευμονικῶν φλεβῶν. Ἐξ ἀλλού δὲ φορτισμένος μὲ διοξείδιον τοῦ ἄνθρακος καὶ πτωχὸς πλέον εἰς διξυγόνον ἀπὸ τῶν κυψελίδων ἐκδιώκεται ἀπὸ τοὺς πνεύμονας.

Αἱ πολυπληθεῖς κυψελίδες παρέχουν, ὅλαι μαζί, μίαν μεγάλην ἐπιφάνειαν, εἰς τὴν δύοιαν τὸ αἷμα καὶ ὁ ἀπὸ τοῦ πνεύμονας μέχρι τῶν 130 τ. μ.

2. ΑΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ

‘Η είσοδος τοῦ ἀέρος μέχρι τῶν πνευμόνων καὶ κατόπιν ἡ ἔξοδος αὐτοῦ ἔξασφαλίζονται διὰ τῶν ἀναπνευστικῶν κινήσεων. Αὗται τελοῦνται εἰς δύο χρόνους: πρῶτον, αἱ πλευραὶ κινοῦνται πρὸς τὰ ἔξω καὶ τὸ διάφραγμα πρὸς τὰ κάτω. Οὕτως ἡ θωρακικὴ κοιλότης εὐρύνεται καὶ οἱ πνεύμονες, διογκούμενοι, ἀποκτοῦν μεγαλυτέραν χωρητικότητα. Τότε ρεῦμα ἀέρος διὰ τῆς ρινὸς ἢ τοῦ στόματος εἰσέρχεται εἰς τὴν ἀναπνευστικὴν δόδον καὶ φθάνει μέχρι τῶν κυψελίδων (εἰσ π ν ο ἡ). Δεύτερον, διὰ χαλαρώσεως τῶν μυῶν τῶν πλευρῶν καὶ τοῦ διαφράγματος ἡ θωρακικὴ κοιλότης ἐπανακτᾷ τὸν προηγούμενον ὅγκον της. Οὕτως οἱ πνεύμονες πιέζονται καὶ ὁ ἀήρ, ὁ δόπιος εἰσῆλθε κατὰ τὴν εἰσπνοήν, ἐκδιώκεται ἔξ αὐτῶν (ἐκ π ν ο ἡ). ‘Η συμπίεσις ὅμως τῶν πνευμόνων δὲν είναι τελεία καὶ πάντοτε παραμένει ἐντὸς αὐτῶν μικρὰ ποσότης ἀέρος.

Σημείωσις. Κατὰ τὴν ἀναπνοήν ὁ ὀργανισμὸς ἀποδίδει, πλὴν τοῦ διοξειδίου τοῦ ἀνθρακος, καὶ μίαν ποσότητα ύδραστμῶν. Διὰ τοῦ τρόπου τούτου ἀποβάλλεται καὶ μέρος τῆς θερμότητος τοῦ σώματος.

3. ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ

Χάρις εἰς τὰς ἀναπνευστικὰς κινήσεις κυκλοφορεῖ διὰ τῆς ἀναπνευστικῆς δόδοῦ μέχρι τῶν πνευμόνων ὁ ἀτμοσφαιρικὸς ἀήρ. Ἐξ ἀλλού, διὰ τῶν ἀγγείων φέρεται μέχρις αὐτῶν τὸ αἷμα. Διὰ μέσου τῶν τοιχωμάτων τῶν τριχοειδῶν γίνεται ἀνταλλαγὴ δερίων, διὰ τῆς δόπιας τὸ αἷμα πλουτίζεται εἰς ὀξυγόνον καὶ καθαρίζεται ἀπὸ τὸ διοξείδιον τοῦ ἀνθρακος.

4. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ


1) Ἡ ἐπιφάνεια τῶν κυψελίδων ὑπολογίζεται μέχρι 130 τ. μ. Παρατήρησε ἐπὶ τοῦ ἔδαφους μίαν ἵσην ἐπιφάνειαν.

2) Κατὰ τὴν ἥρεμον ἀναπνοήν ὁ ἀνθρωπος εἰσάγει 500 κυβ. ἐκ. ἀέρος εἰς τοὺς πνεύμονας. Δεδομένου ὅτι εἰς κάθε 1' ἐκτελεῖ 16 ἀναπνοάς, πόσον ὅγκον ἀέρος εἰσπνέει εἰς μίαν ὥραν, εἰς ἓν ἡμερονύκτιον; Κατὰ τὴν παιδικὴν ἡλικίαν αἱ ἀναπνοαὶ είναι περισσότεραι, ἀνερχόμεναι εἰς 25 - 30 κατὰ 1'.

3) Ο εἰσπνεόμενος ἀήρ, διερχόμενος διὰ τῆς ρινός, ὅχι μόνον

καθαρίζεται, ἀλλὰ καὶ θερμαίνεται. Παρατήρησε τοῦτο εἰσπνέων μίαν φορὰν διὰ τῆς ρινὸς καὶ μίαν διὰ τοῦ στόματος.

4) Εἰς τὴν ρινικὴν κοιλότητα ὁ εἰσπνεόμενος ἀήρ καθαρίζεται ἀπὸ τὴν σκόνην καὶ τὰ μικρόβια. Ἐλλὰ καὶ εἰς τὴν τραχεῖαν αἱ βλεφαρίδες τοῦ ἐπιθηλίου της, διὰ τῶν κινήσεών των, ἀναγκάζουν κάθε μόριον σκόνης, τὸ ὅποιον τυχὸν εἰσέδυσε, νὰ ἔξελθῃ. Ὅπολογίζουν,



Εἰκ. 27. Οἱ τρεῖς ἀναπνευστικοὶ τύποι.

ὅτι εἰς τὸ ὑπαιθρὸν αἰωροῦνται 1000 μικροσκοπικὰ μόρια σκόνης εἰς 1 κυβ. ἑκατοστ., εἰς δὲ τὰς πόλεις 100.000 - 500.000.

5) Παρατήρησε κατὰ τὴν ἥρεμον ἀναπνοὴν τοὺς ἔξης τρεῖς «ἀναπνευστικοὺς τύπους»: α) Κατωτέρα πλευρική (διαφραγματική) ἀναπνοή, συνήθης εἰς τοὺς ἄνδρας· β) Ἀνωτέρα πλευρική (θωρακική) ἀναπνοή, συνήθης εἰς τὰς γυναῖκας· γ) Κοιλιακή ἀναπνοή, συνήθης εἰς τὰ παιδία (εἰκ. 27).


ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΒΔΟΜΟΝ

Ο ΛΑΡΥΓΞ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ

1. Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΛΑΡΥΓΓΟΣ. ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ

Έξετάζοντες τὴν κατασκευὴν τοῦ ἀναπνευστικοῦ σωλῆνος, παρατηροῦμεν, διτὶ τὸ ἀνώτερον μέρος του, ὁ λάρυγξ, σχηματίζεται ἀπὸ χόνδρινα τμήματα, παρουσιάζοντα ἴδιαίτερον σχῆμα καὶ μέγεθος (εἰκ. 19, 26). Ἐκ τῶν χόνδρων τούτων μεγαλύτερος εἶναι ὁ θυρεοειδής ή στην αγγλική γλώσσα laryngeal cartilage, ὁ δὲ διπλοῖος κατέχει τὴν προσθίαν ἐπιφάνειαν τοῦ λάρυγγος,

κάτωθεν τοῦ νοειδοῦς δόστοι. Εἰς τὴν δόπισθίαν ἐπιφάνειαν τοῦ λάρυγγος εύρισκονται δύο μικρότεροι χόνδροι, οἱ διπλοί, οἱ διπλοί φυσικοί ή διπλοί χόνδροι. Κάτωθεν τοῦ θυρεοειδοῦς εύρισκεται ὁ κρικοειδής ή στην αγγλική γλώσσα crikoid cartilage. Τέλος δὲ λάρυγξ δύναται νὰ κλεισθῇ ὑπὸ ἐνὸς δάλου χόνδρου, τῆς ἐπιγλωττικῆς, ή διποία εύρισκεται εἰς τὴν βάσιν τῆς γλώσσης.



Εἰκ. 28. Τομὴ διὰ τοῦ λάρυγγος: 1. Ἀνώτεραι φωνητικαὶ χορδαὶ. — 2. Κατώτεραι φωνητικαὶ χορδαὶ. — 3. Φωνητικὴ σχισμή. — 5. Θυρεοειδής. — 4. Κρικοειδής.

Μεταξὺ τοῦ θυρεοειδοῦς χόνδρου καὶ τῶν δύο μικροτερούντων ἔκτείνονται δύο ζεύγη σαρκωδῶν πτυχῶν, αἱ διποίαι καλούνται φωνητικαὶ χορδαί. Ἐκ τούτων μόνον αἱ κατώτεραι ἔχουν σημασίαν διὰ τὴν παραγωγὴν τῆς φωνῆς καὶ κυρίως αὐτάς θὰ ἐνοοῦμεν ως φωνητικὰς χορδάς. Αὗται ἀφήνουν μεταξὺ τῶν τὴν φωνητικὴν σχισμήν,

διὰ τῆς διποίας διέρχεται διπτερός (εἰκ. 28).

Διὰ τῶν διαφόρων μυῶν εἶναι δυνατὸν αἱ δύο κατώτεραι φωνητικαὶ χορδαὶ νὰ ἔκταθοῦν καὶ ἡ φωνητικὴ σχισμὴ νὰ ἀποστενωθῇ. Οἱ ἐκπνεόμενοι τότε ἀήρ, διερχόμενοι διὰ τῆς στενῆς σχισμῆς, θέτει εἰς παλμικὰς κινήσεις τὰς δύο χορδάς, καὶ οὕτω παράγεται ἡ φωνὴ.

2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ ΑΡΘΡΩΣΙΣ ΑΥΤΗΣ ΕΙΣ ΦΘΟΓΓΟΥΣ. ΛΟΓΟΣ

“Οπως καὶ εἰς κάθε ἥχον, διακρίνομεν εἰς τὴν ἀνθρωπίνην φωνὴν τρεῖς χαρακτῆρας: τὸ ὑψός (βαρειὰ ἡ ψιλὴ φωνή), τὴν ἐν τασιν (δυνατὴ ἡ ἀσθενής) καὶ τέλος τὸ ποιὸν τῆς φωνῆς. Διὰ τοῦ ποιοῦ τῆς φωνῆς ἀναγνωρίζομεν τὸ πρόσωπον, τὸ ὅποιον παράγει αὐτήν, ἔστω καὶ ἄν δὲν βλέπομεν αὐτό.

Τὸ ὑψός τῆς φωνῆς ἔξαρτᾶται ἀπὸ τὴν τάσιν τῶν χορδῶν καὶ ἀπὸ τὸ μῆκος τοῦ λαιμοῦ. Ἡ ἔντασις ἔξαρτᾶται ἀπὸ τὴν δύναμιν τῆς ἐκπνοῆς. Τὸ ποιόν τέλος ἔξαρτᾶται ἀπὸ τὴν ἴδιαιτέραν κατασκευὴν τοῦ λάρυγγος καὶ τῆς στοματικῆς κοιλότητος ἐκάστου ἀτόμου.

Ἡ φωνή, ἡ ὅποια παράγεται εἰς τὸν λάρυγγα, φθάνει εἰς τὸ στόμα, ὃπου ἀρθροῦται, δηλ. μετατρέπεται εἰς φθόγγους. Οἱ διάφοροι φθόγγοι προκύπτουν ἀναλόγως τῆς θέσεως, τὴν ὅποιαν λαμβάνει ἡ γλῶσσα, οἱ δόδοντες καὶ τὰ χείλη. Διὰ τῶν φθόγγων σχηματίζονται αἱ λέξεις.

Ο λόγος εἶναι ἔξαιρετικὸν προνόμιον τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἐν ἀπὸ τὰ σπουδαιότερα μέσα, τὰ ὅποια ἔκαμαν δυνατὴν τὴν διανοητικὴν ἀνάπτυξιν αὐτοῦ.

3. ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ

Ἡ φωνὴ παράγεται, ὅταν αἱ κυρίως φωνητικαὶ χορδαὶ ἐκταθοῦν καὶ ὁ ἐκπνεόμενος ἀρθρός θέσῃ αὐτὰς εἰς παλμικήν κίνησιν. Εἰς τὸ στόμα ἡ φωνὴ ἀρθροῦται εἰς φθόγγους, ἐκ τῶν ὅποιων σχηματίζονται αἱ λέξεις.

4. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1) Κατὰ τὸ 12ον ἔτος περίπου τῆς ἡλικίας παρατηρεῖται μία ταχυτέρα αὔξησις τοῦ λάρυγγος καὶ τοῦτο προκαλεῖ τὴν ἀλλαγὴν τῆς φωνῆς κατὰ τὴν ἡλικίαν ταύτην (μετάπλασις τῆς φωνῆς). Ἐπειδὴ τὸ ἀτομὸν δὲν συνθήζει ἀμέσως εἰς τὰς νέας συνθήκας, παρατηροῦνται κατὰ τὴν περίοδον ταύτην δυσκολίαι εἰς τὴν προφοράν.

2) Πρόσεξε καὶ καθόρισε τὴν θέσιν τῆς γλώσσης κατὰ τὴν προφορὰν τῶν ἑνῆς φθόγγων: 1) π, 2) φ, β, 3) θ, δ, 4) τ, 5) κι, χι, 6) κα, χα, 7) α, 8) ι, καὶ 9) ου.

3) Ἐκτὸς τοῦ ἀνθρώπου ποία κατηγορία ζώων ἔχει ἀνεπτυγμένην φωνητικήν συσκευήν; Πῶς χρησιμοποιεῖ ἡ κατηγορία αὗτη τὰ πρόσθια ἄκρα, πῶς δὲ ἀνθρωπος καὶ πῶς τὰ ἄλλα τετράποδα;

4) Εἰς τὸν ἄνδρα τὸ μῆκος τοῦ λάρυγγος εἶναι μεγαλύτερον παρὰ εἰς τὴν γυναικά. Ὁμοίως αἱ φωνητικαὶ χορδαὶ εἶναι μακρότεραι. Ποία διαφορὰ εἰς τὴν φωνὴν παρατηρεῖται διὰ τοῦτο;

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΟΓΔΟΟΝ

Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΜΦΟΥ. Η ΑΠΕΚΚΡΙΣΙΣ

1. ΤΟ ΑΙΜΑ

Εἰς ὅλα τὰ μέρη τοῦ σώματος διακλαδίζονται λεπτά τὰ σωληνάρια μὲ ίνωδη, ἔλαστικὰ καὶ συσταλτικὰ τοιχώματα, τὰ αἱ μοφόρα ἀγγεῖα, ἐντὸς τῶν ὁποίων κυκλοφορεῖ τὸ αἷμα.

Τὸ αἷμα ἀποτελεῖται ἀπὸ ἓν ύγρον, καλούμενον πλάσμα, καὶ ἀπὸ κύτταρα, τὰ ὁποῖα κινοῦνται μέσα εἰς τὸ ύγρὸν τοῦτο, καλούμενα αἱ μοσφαῖραι προσθήκη. Τὸ πλάσμα ἔχει χρῶμα ἀνοικτοκίτρινον καὶ ἀποτελεῖται ἀπὸ ὕδωρ (90 %) καὶ οὐσίας διαλευμένας ἐντὸς αὐτοῦ. Αἱ οὐσίαι εἶναι διάφοροι ἐνώσεις ἀνόργανοι καὶ ὄργανικοι.

Τὰ αἱμοσφαίρια διακρίνονται εἰς ἐρυθρά καὶ λευκά.


Τὰ ἐρυθρὰ αἱμοσφαίρια εἶναι κύτταρα, τὰ ὁποῖα ἔχασσαν τὸν πυρῆνα τῶν καὶ περιέχουν αἱμοσφαιρίνην, μίαν ἐνώσιν σιδηρούχων, ἡ ὁποία τοὺς προσδίδει καὶ τὸ ἐρυθρὸν χρῶμα. Τὰ ἐρυθρὰ αὗτὰ αἱμοσφαίρια, φθάνοντα εἰς τὰ τριχοειδῆ ἀγγεῖα τῶν πνευμόνων, ἔρχονται εἰς ἐπαφὴν μὲ τὸν ἀτμοσφαιρικὸν ἀέρα. Τότε ἡ αἱμοσφαιρίνη δεσμεύει τὸ δέιγμόν τον, τὸ ὁποῖον διαπιδύει διὰ τῶν τοιχωμάτων τῶν τριχοειδῶν ἀπὸ τὸν ἀέρα. Τὸ δέιγμόν τοῦτο, διὰ τῆς κυκλοφορίας, μεταφέρεται εἰς τοὺς ιστούς.

Τὰ λευκὰ αἱμοσφαίρια, ἀντιθέτως πρὸς τὰ ἐρυθρά, διατηροῦν τὸν πυρῆνα τῶν καὶ ἐπομένως εἶναι κύτταρα ζῶντα. Ἰδιαιτέρων σημασίαν ἔχει μία κατηγορία λευκῶν αἱμοσφαιρίων, τὰ λευκοκύτταρα παρουσιάζουν ιδίαν κίνησιν. "Οταν τυχὸν εἰσέλθουν μικρόβια, τὰ λευκοκύτταρα προστρέχουν, τὰ περικλείουν καὶ τὰ διαλύουν ἐντὸς τοῦ κυτταρικοῦ τῶν σώματος, ὅπως ἡ ἀμοβάτης τὴν τροφήν της. Τὰ λευκοκύτταρα δύνανται νὰ διέρχωνται καὶ διὰ τοῦ τοιχώματος τῶν ἀγγείων, καὶ οὕτω π. χ. ἀνευρίσκονται εἰς τὸ πῦον.

ΕΠΙΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

Ἐν κυβ. χιλιοστόμετρον αῖματος ύγιοις ἀνθρώπου περιέχει περίπου $4 \frac{1}{9}$ —5 ἑκατομμ. ἐρυθρὰ αἷμασφαίρια καὶ μόνον 6—8 χιλ. λευκά.

Ἐάν τὸ αἷμα ἔξελθῃ ἀπὸ τὰ ἀγγεῖα διά τινος πληγῆς, πήγνυται συντομώτατα. Δημιουργεῖται ἐν δίκτυον μιᾶς οὐσίας καλουμένης ἢ ν ὁ δ ο ν s, τὸ δποῖον περικλείει καὶ συγκρατεῖ τὰ αἵμασφαίρια καὶ οὕτω σχηματίζεται ἐν στερεόν ἐρυθρὸν στρῶμα, ὃ πλακοῦντα μένει ἐνα κιτρινωπὸν ύγρόν, ὃρρος, ἀποτελούμενον κυρίως ἀπὸ τὸ πλάσμα.



Εἰκ. 29. Σχῆμα τῆς καρδίας. 1 καὶ 2. Ἀνω καὶ κάτω κοιλαὶ φλέβες. — 3. Τριγλῶχιν βαλβίς. — 4. Νήματα συγκρατοῦντα τὴν βαλβίδα ὡστε αὐτὴ νὰ μὴ δύναται ν' ἀντιστραφῇ. — 5. Σιγμοειδεῖς βαλβίδες. — 6. Πνευμονικὴ ἀρτηρία. — 7, 8, 9, 10. Αἱ τέσσαρες πνευμονικαὶ φλέβες, ἀπολήγουσσαι εἰς τὸν ἀριστερὸν κόλπον. — 11. Διγλῶχιν βαλβίς. — 12. Σιγμοειδεῖς βαλβίδες. — 13. Ἀνιοῦσα ἀορτή.

χῶροι καλοῦνται κόλποι, οἱ δύο δὲ κατώτεροι κοιλίαι. Ο ἀριστερὸς κόλπος καὶ ἡ ἀριστερὰ κοιλία συγκοινωνοῦν δι' ἐνὸς πόρου, ὃ δποῖος ἀνοιγοκλείει μὲ μίαν βαλβίδα (μιτροειδὴς διγλῶχιν βαλβίς).

2. Η ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΓΓΕΙΑ


Η καρδία είναι τὸ κεντρικὸν ἀγγεῖον, τὸ δποῖον, διὰ τῶν κινήσεών του, κανονίζει τὴν ροήν τοῦ αἵματος. Εύρισκεται εἰς τὴν κοιλότητα τοῦ θώρακος, μεταξὺ τῶν δύο πνευμόνων καὶ ἀριστερὰ τοῦ στέρνου. "Ἔχει μέγεθος πυγμῆς καὶ τὸ τοίχωμά της ἀποτελεῖται ἀπὸ γραμμωτούς μῆσ.

Η καρδία (εἰκ. 29 καὶ 30) χωρίζεται εἰς τέσσαρας χώρους. Οἱ δύο ἀνώτεροι

Κατά τὸν ἴδιον τρόπον συγκοινωνεῖ καὶ ὁ δεξιὸς κόλπος μὲ τὴν δεξιὰν κοιλίαν.

Αἱ κοιλίαι ἔχουν ἵσχυρότερον τοίχωμα παρὰ οἱ κόλποι, καὶ τοῦτο διότι, ὡς θὰ ἴδωμεν, ἀποστέλλουν τὸ αἷμα εἰς μακρὰν ἀπόστασιν. Ἀντιθέτως, οἱ κόλποι τὸ διοχετεύουν ἀπλῶς ἔκαστος εἰς τὴν ἀντίστοιχον κοιλίαν. Ἐκ δὲ τῶν κοιλιῶν ἵσχυρότερά εἶναι ἡ ἀριστερά, ἡ δόποια ἀποστέλλει τὸ αἷμα εἰς ὅλα τὰ μέρη τοῦ σώματος, ἐνῷ ἡ δεξιὰ τὸ ἀποστέλλει μόνον εἰς τοὺς πλησίους πνεύμονας (μηνοειδῆς ἢ τριγλῶχιν βαλβίσ).

Ἄπὸ τὴν καρδίαν ἀρχίζουν μεγάλα ἀγγεῖα, τὰ δόποια ἔξαπλοῦνται εἰς ὅλα τὰ μέρη τοῦ σώματος καὶ διακλαδίζονται τελικῶς εἰς λεπτότατα τριχοειδῆ. Ὅσα πάλιν ἀγγεῖα ἀπολήγουν εἰς τοὺς δύο κόλπους καλοῦνται φλέβες καὶ ἐντὸς αὐτῶν τὸ αἷμα κινεῖται κατευθυνόμενον πρὸς τὴν καρδίαν. Εἰς τὸν ἀριστερὸν κόλπον, διὰ τεσσάρων φλεβῶν καλούμένων πνευμονικῶν φλεβῶν καλούμένων πνευμονικῶν φλεβῶν, προσάγεται τὸ αἷμα ἀπὸ τοὺς πνεύμονας, ἐμπλουτισμένον εἰς ὀξυγόνον. Ἐκ τοῦ κόλπου τούτου τὸ αἷμα μεταβαίνει εἰς τὴν ἀριστερὰν κοιλίαν καὶ κατόπιν εἰσέρχεται εἰς μίαν μεγάλην ἀρτηρίαν, ἡ δόποια δνομάζεται ἀνοσοφρήσις ἢ αρτηρία. Αὕτη διακλαδίζεται εἰς μικρότερα ἀγγεῖα καὶ τελικῶς εἰς λεπτότατα τριχοειδῆ, τὰ δόποια ἀποδίδουν εἰς τοὺς ἰστούς τὸ πλούσιον εἰς ὀξυγόνον αἷμα. Εἰς τὴν ἀρχὴν τῆς ἀρτηρίας ὑπάρχουν τρεῖς βαλβίδες, καλούμεναι στριγμοειδῆς.




Εἰκ. 30. Ἡ καρδία καὶ τὰ ἔξ αὐτῆς ἀρχίζοντα ἀγγεῖα.

1. Ἀριστερὸς κόλπος.
2. Πνευμονικὴ ἀρτηρία.
3. Ἀνιοῦσα ἀρτηρία.
4. Δεξιὰ κοιλία.
5. Αριστερὰ κοιλία.
6. Δεξιὸς κόλπος.
7. Πνευμονικαὶ ἀρτηρίαι.

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Τὸ δξυγόνον τοῦτο καταναλίσκεται εἰς τοὺς ἴστους διὰ τὰς καύσεις, συνάμα δὲ τὸ αἷμα φορτίζεται μὲ τὸ σχηματιζόμενον διοξείδιον τοῦ ἄνθρακος. Τὸ φορτισμένον οὕτως αἷμα εἰσέρχεται ἀπὸ τὰ τριχοειδῆ τῶν ἀρτηριῶν εἰς τὰ τριχοειδῆ τῶν φλεβῶν. Ταῦτα συνενοῦνται εἰς φλέβας, αἵ ὅποιαι κατευθύνονται πρὸς τὴν καρδίαν. "Ολαι αἱ φλέβες ἐνώνονται εἰς δύο μεγάλας, τὴν ἄνω καὶ κάτω κοιλην φλέβα, αἱ ὅποιαι



Εἰκ. 31. Τὸ ἀπεκκριτικὸν σύστημα.
1. Νεφρός.—3. Τομὴ οὐροφόρων σωληναριών.—5. Φλέψ.—6. Ἀρτηρία.—
7. Ούρητήρ.—8. Οὐροδόχος κύστις.—
2. Ἐπινεφρίδιον.

πνευμονικὴν ἀρτηρίαν, ἡ ὅποια τὸ δόδηγει εἰς τοὺς πνεύμονας. Εἰς τὴν εἴσοδον τῆς πνευμονικῆς ἀρτηρίας ὑπάρχουν σιγμοειδεῖς βαλβίδες. Εἰς τοὺς πνεύμονας τὸ αἷμα, διὰ μέσου τῶν λεπτοτάτων τοιχωμάτων τῶν τριχοειδῶν ἀγγείων, ἔρχεται εἰς ἐπαφήν μὲ τὸν ἀτμοσφαιρικὸν ἀέρα, ἀποδίδει τὸ διοξείδιον τοῦ ἄνθρακος καὶ δεσμεύει νέον δξυγόνον. Μετὰ τὸν καθαρισμὸν τοῦτον ἐπιστρέφει πάλιν εἰς τὸν ἀριστερὸν κόλπον κ.ο.κ.



Εἰκ. 32. Ἀκτινογραφία,
εἰς τὴν ὁποίαν διακρίνονται οἱ οὐρητήρες καὶ αἱ πύελοι τῶν νεφρῶν.

χύνονται εἰς τὸν δεξιὸν κόλπον. Τὸ ἐπιστρέψαν εἰς τὴν καρδίαν αἷμα κατέρχεται ἀπὸ τὸν δεξιὸν κόλπον εἰς τὴν δεξιὰν κοιλίαν. 'Εξ αὐτῆς εἰσέρχεται εἰς τὴν

3. ΔΙΟΔΟΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΔΙΑ ΤΩΝ ΝΕΦΡΩΝ. ΑΠΕΚΚΡΙΣΙΣ

Τὸ αἷμα κατὰ τὴν διαδρομήν του διέρχεται διὰ τῶν νεφρῶν (εἰκ. 31 καὶ 32). Οὗτοι εἶναι δύο ὅργανα, τὰ δόποια ἔχουν σχῆμα φασολιοῦ καὶ μέγεθος 10 ἑκατοστῶν περίπου (εἰκ. 31). Εὐρίσκονται δὲ ἀμέσως πρὸ τοῦ δόπισθίου τοιχώματος τῆς κοιλίας, ἀνὰ εἰς δεξιὰ καὶ ἀριστερὰ τῶν πρώτων δοσφυϊκῶν σπονδύλων. Ἡ ἀρτηρία, ἡ δόποια εἰσέρχεται εἰς ἕκαστον νεφρόν, διακλαδίζεται ἐντὸς αὐτοῦ εἰς λεπτότατα τριχοειδῆ. Διὰ τοῦ τοιχώματος τούτων ἔξερχονται ἀπὸ τὸ αἷμα Ὂδωρ καὶ ὠρισμέναι ἄχρηστοι οὐσίαι. Ἐξέρχονται ἀκόμη καὶ διάφορα ἄλατα ἥ σάκχαρον, ὅταν ταῦτα πλεονάζουν εἰς τὸν ὄργανισμόν.

Μετὰ τὸν καθαρισμὸν τοῦτον, τὸ αἷμα συναθροίζεται ἐξ ἕκαστου νεφροῦ εἰς μίαν φλέβα, ἡ δόποια ἀποιλήγει εἰς τὴν κάτω κοίλην φλέβα.

“Ολαι αἱ κατακρατηθεῖσαι εἰς τὸν νεφρὸν οὐσίαι συναθροίζονται εἰς τὰ λεπτὰ σωληνάρια, τὰ δόποια περιέχει ὁ νεφρός, καὶ οὕτω σχηματίζονται τὰ οὖρα. Ἔνας μακρὸς σωλήν ἐξ ἕκαστου νεφροῦ, καλούμενος οὐρὴ τὴν ρ., φέρει τὰ οὖρα κατὰ σταγόνας εἰς τὴν οὐρὴν δόχον κύστιν, ἡ δόποια εὑρίσκεται εἰς τὸ πρόσθιον μέρος τῆς λεκάνης. Ὄταν ἡ κύστις πληρωθῇ, τὰ οὖρα ἀποβάλλονται τοῦ σώματος.


Ἡ ἀνωτέρῳ λειτουργίᾳ, διὰ τῆς ὄποιας οἱ νεφροὶ συγκρατοῦν ἀπὸ τὸ αἷμα ἀχρήστους οὐσίας καὶ τὰς ἀποβάλλουν τοῦ σώματος, καλεῖται ἀπέκκριτικὰ ὅργανα.

“Ως ἐμάθομεν, ἀπεκκριτικὴν λειτουργίαν ἔκτελοῦν καὶ οἱ πνεύμονες, οἱ δόποιοι ἀπομακρύνουν τὸ διοξείδιον τοῦ ἀνθρακος. Τέλος θὰ ἴδωμεν ἀργότερον, ὅτι καὶ ἀπὸ τὸ δέρμα ἀποβάλλονται, εἰς μικρὰν ὅμως ποσότητα, μερικαὶ ἄχρηστοι διὰ τὸ σῶμα οὐσίαι.

4. ΔΙΟΔΟΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΔΙΑ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ

“Οπως ἐμάθομεν εἰς τὸ κεφάλαιον περὶ πέψεως, τὰ προϊόντα τῆς πέψεως, διερχόμενα τὸ τοίχωμα τοῦ ἐντέρου, εἰσδύουν εἰς τὰ ἀγγεῖα τοῦ ἐντέρου. Τὰ αἱ μοφόραι ἀγγεῖα παραλαμβάνουν κυρίως τοὺς ὑδατάνθρακας καὶ τὰ λευκώματα. Τὰ λίπη παραλαμβάνοντα

πρὸ παντὸς ἀπὸ τὰ λεμφικὰ ἀγγεῖα, τὰ ὅποια θὰ γνωρίσωμεν ἀργότερα.



Εἰκ. 33. Σχηματική παράστασις τῆς κυκλοφορίας.
π. Πνεύμονες. — α, β, γ.
Οδοὶ τῆς μεγάλης κυκλοφορίας: διὰ τοῦ ἐντέρου καὶ τοῦ ἡπατοῦ, διὰ τῶν νεφρῶν καὶ διὰ τῶν ίστῶν.

λη δὲ κυκλοφορία καλεῖται ἡ διαδρομὴ ἀπὸ τὴν ἀριστερὰν κοιλίαν εἰς τὰ διάφορα μέρη τοῦ σώματος καὶ ἡ ἐπάνοδος εἰς τὸν ἀριστερὸν κόλπον. Μεγάλη

Ἄπὸ τὸ ἔντερον τὰ αἷμοφόρα ἀγγεῖα δὲν ἔρχονται ἀπὸ εὐθείας εἰς τὴν κοίλην φλέβα, ἀλλὰ προηγουμένως διέρχονται ἀπὸ τὸ ἡπατοῦ (σηκώτι). Ἐντὸς αὐτοῦ γίνεται ἡ ἀφομοίωσις ἐν μέρει μὲν τῶν λευκωμάτων, πρὸ παντὸς ὅμως τῶν ὑδατανθράκων.

Κατὰ τὴν ἀφομοίωσιν αὔτὴν σχηματίζεται εἰς σύνθετος ὑδατάνθραξ, καλούμενος γλυκόγόνον. Τοῦτο ἀποθηκεύεται εἰς τὸ ἡπατοῦ καὶ, ἀναλόγως τῶν ἀναγκῶν, ἀποστέλλεται διὰ τῆς κυκλοφορίας εἰς τοὺς μῆσας, ὅπου ἔξοδεύεται, μαζὶ μὲ τὸ ὁξύγόνον διὰ τὰς καύσεις.

Εἰς τὸ ἡπατοῦ τὸ αἷμα ἀπαλλάσσεται ἐν μέρει καὶ ἀπὸ διάφορα μικρόβια καὶ δηλητηριώδεις οὐσίας. Τὸ ἡπατοῦ παράγει, ως ἐμάθομεν, καὶ τὴν χολήν.

Ἀφοῦ διέλθουν ἀπὸ τὸ ἡπατοῦ, τὰ αἷμοφόρα ἀγγεῖα συναθροίζονται εἰς μίαν φλέβα, τὴν πυλαίαν φλέβα, ἡ ὅποια ἀπολήγει εἰς τὴν κάτω κοίλην φλέβα.

5. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΙΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (εἰκ. 33)

Κατὰ τὰ προηγούμενα, διακρίνομεν τὴν μικρὰν καὶ τὴν μεγάλην κυκλοφορίαν τοῦ αἵματος. Μεγάλη κυκλοφορία καλεῖται ἡ διαδρομὴ ἀπὸ τὴν δεξιὰν κοιλίαν τῆς καρδίας εἰς τοὺς πνεύμονας καὶ ἡ ἐπάνοδος εἰς τὸν ἀριστερὸν κόλπον. Μεγάλη

δεξιόν κόλπον. 'Ως είδομεν, κατά τὴν μεγάλην κυκλοφορίαν ὑπάρχουν τρεῖς δόσοι, τὰς δόποιας ἀκολουθεῖ τὸ αἷμα: α) διέρχεται ἀπὸ τὸ τοίχωμα τῶν ἐν τέρῳ καὶ ἀπὸ τὸ ή παρ, ἐμπλουτισμένον εἰς θρεπτικάς ούσιας, β) διέρχεται ἀπὸ τοὺς νεφρούς, ὅπου καθαρίζεται ἀπὸ ἀχρήστους ούσιας καὶ γ) διασκορπίζεται εἰς τοὺς ίστοὺς τοῦ σώματος καὶ τρέφει τὰ ἀκίνητα καὶ εἰδικευμένα κύτταρα τῶν ιστῶν.

Δυνάμεθα νὰ συνοψίσωμεν τὰς ἔργασίας, τὰς δόποιας ἐκτελεῖ τὸ αἷμα, ώς ἔξῆς:

α) Μεταφέρει τὰς θρεπτικάς ούσιας καὶ τὰς διαμοιράζει εἰς τοὺς ίστούς.

β) Μεταφέρει τὸ δξυγόνον εἰς τοὺς ίστούς.

γ) Ἀποκομίζει τὰς ἀχρήστους ούσιας, αἱ δόποιαι παράγονται κατὰ τὰς καύσεις. Ἐκ τῶν οὔσιῶν τούτων τὸ μὲν ἀέριον διοξείδιον τοῦ ἄνθρακος τὸ ἀποδίδει διὰ τῶν πνευμόνων, τὰς δὲ λοιπὰς διὰ τῶν νεφρῶν.

δ) Καταπολεμεῖ τὰ μικρόβια διὰ τῶν λευκοκυττάρων του.

Πλὴν τῶν ἀνωτέρω, τὸ αἷμα ἐκτελεῖ καὶ ἄλλας ἔργασίας. Μεταφέρει π.χ. τὰς όρμόν ας, ὡρισμένας δηλ. ούσιας ἀπαραίτητους διὰ τὴν λειτουργίαν τοῦ ὀργανισμοῦ, αἱ δόποιαι παράγονται ὑπὸ εἰδικῶν ἀδένων. Τέλος, διὰ τῆς κυκλοφορίας του συντελεῖ τὸ αἷμα καὶ εἰς τὴν δμοιόμορφον κατανομὴν τῆς θερμότητος εἰς τὸ σῶμα.

6. Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ

'Η ἀδιάκοπος ροὴ τοῦ αἵματος ἐντὸς τῶν ἀγγείων, ἀκόμη καὶ ἀντιθέτως πρὸς τὴν διεύθυνσιν τῆς βαρύτητος, ἔξασφαλίζεται διὰ τῶν ρυθμικῶν συστολῶν καὶ διαστολῶν τῆς καρδίας.

Εἰς τὰς κινήσεις αὐτὰς διακρίνομεν δύο χρόνους: πρῶτον, συστέλλονται οἱ δύο κόλποι καὶ ὥθιοῦν τὸ αἷμα, τὸ δόποιον περιέχουν, εἰς τὰς δύο κοιλίας. Κατόπιν συστέλλονται αἱ δύο κοιλίαι καὶ ὥθιοῦν τὸ αἷμα, τὸ δόποιον περιέχουν, εἰς τὰς ἀρτηρίας, ἐνῷ συγχρόνως εἰς τοὺς κενωθέντας κόλπους εἰσέρχεται νέον αἷμα ἀπὸ τὰς φλέβας. Ἀκολουθεῖ μία στιγμὴ ἡρεμίας, μετ' αὐτὴν ἐπαναλαμβάνονται αἱ ἴδιαι κινήσεις τῆς καρδίας κ.ο.κ. Ἀπὸ τὰς κοιλίας τὸ αἷμα δὲν δύναται νὰ ἐπιστρέψῃ εἰς τοὺς κόλπους, διότι ἐμποδίζεται ὑπὸ τῶν κολποκοι-

λιασκῶν βαλβίδων. Μία συστολὴ τῶν κόλπων καὶ μία συστολὴ τῶν κοιλιῶν ἀποτελοῦν μίαν σφύξιν τῆς καρδίας. Διὰ τῶν σφύξεων ὡθεῖται, ως εἴδομεν, τὸ αἷμα εἰς τὰ ἀγγεῖα καὶ κινεῖται ἐντὸς αὐτῶν μέχρι καὶ τῶν πλέον μακρινῶν σημείων τοῦ σώματος. Εἰς τὴν κίνησιν αὐτὴν ὑποβοηθεῖται τὸ αἷμα καὶ ἀπὸ συστολᾶς καὶ διαστολᾶς τῶν αἱμοφόρων ἀγγείων. Τέλος, ὑπάρχουν εἰς τὰς φλέβας κατὰ διαστήματα καὶ βαλβίδες, ἐμποδίζουσαι τὴν δπισθοδρόμησιν τοῦ αἵματος.

“Ωστε, ἐντὸς τῶν ἀγγείων τὸ αἷμα δὲν ρέει ὅμαλῶς, ὅλλα κινεῖται μὲν ἀλλεπαλλήλους ὡθήσεις. Τὰς ὡθήσεις αὐτὰς ἀντιλαμβανόμεθα, ὅν πιέσωμεν μίαν ἀρτηρίαν, καὶ τὰς καλοῦμεν σφυγμῶν ἀνέρχεται περίπου εἰς 75 κατὰ 1' καὶ ἐλαττούται κατὰ τὴν ἀνάπausin καὶ τὸν ὑπνον.

Ἡ κίνησις τοῦ αἵματος ἐντὸς τῶν ἀγγείων γίνεται μὲν τόσην ταχύτητα, ὥστε τοῦτο νὰ ἐπανέρχεται εἰς τὴν καρδίαν, ἀνὰ 8—9'' ἀπὸ τοὺς πνεύμονας καὶ ἀνὰ 23'' περίπου ἀπὸ τὴν μεγάλην κυκλοφορίαν. Μὲ τὴν ταχύτητα αὐτὴν προφθάνουν οἱ ἴστοι τοῦ σώματος νὰ ἀνεφοδιάζωνται ἐπαρκῶς μὲν δξυγόνον καὶ νὰ ἀπαλλάσσωνται ἀπὸ τὰς ἀχρήστους οὐσίας. “Οταν οἱ μῆνες ἐργάζονται ἐντατικῶς καὶ ἐπομένως αἱ ἀνάγκαι εἰς δξυγόνον εἰναι μεγαλύτεραι, ἡ κυκλοφορία καὶ ἡ ἀναπνοὴ ἐπιταχύνονται (λαχάνιασμα). ”Εὰν μ' ὅλα ταῦτα αἱ ἀχρηστοι οὐσίαι παραμείνουν εἰς τοὺς μῆνας, προκαλεῖται ὁ κάματος αὐτῶν, ὁ δποϊος παρέρχεται, ὅταν αἱ οὐσίαι αὔται τέλος ἀπομακρυνθοῦν.

7. Η ΛΕΜΦΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΛΕΜΦΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ

Πλὴν τοῦ αἵματος, καὶ ἐν ἄλλῳ ἀχρουν, ὑγρόν, ἡ λέμφος, κυκλοφορεῖ ἐντὸς ιδιαιτέρων ἀγγείων, τὰ ὅποια ἐπίσης διακλαδίζονται εἰς ὅλον τὸ σῶμα. Τὰ λεμφοφόρα ταῦτα ἀγγεῖα βαίνουν παραπλήλως πρὸς τὰς φλέβας, ἡ λέμφος κινεῖται ἐντὸς αὐτῶν βραδέως καὶ κατευθύνεται μόνον πρὸς τὸ κέντρον, δηλ. τὴν καρδίαν.

Ἡ λέμφος ἀποτελεῖται ἀπὸ πλάσμα, ἐντὸς τοῦ δποϊού αἰωροῦνται τὰ λεμφοκύτταρα. Ταῦτα παράγονται ὑπὸ τῶν λεμφοφόρων, οἱ δποϊοι εἰναι πολλὰ μικρὰ ὅργανα, ἐσκορπισμένα εἰς τὸ σῶμα καὶ ιδίως εἰς τὸν ὑποδόριον ἴστον. Εἰς διάφορα σημεῖα ὑπάρχουν πολλοὶ λεμφαδένες μαζὶ καὶ ἀποτελοῦν τὰ λεμφοφόρα σημεῖα ἀγγεῖα. Ἀπὸ τοὺς λεμφαδένας διέρχονται τὰ ἀνωτέρω λεμφοφόρα ἀγγεῖα,

τὰ ὅποια διατρέχουν ὅλα τὰ μέρη τοῦ σώματος. Τελικῶς ταῦτα ἐνώνυνται εἰς ἔνα μεγαλύτερον ἀγγεῖον, καλούμενον θωρακικὸν πόρον, τὸ ὅποιον χύνεται εἰς τὴν ἄνω κοίλην φλέβα. "Ωστε ἡ λέμφος κινεῖται ἐντὸς τῶν λεμφαγγείων μόνον ἀπὸ τὴν περιφέρειαν πρὸς τὸ κέντρον καὶ διὰ τοῦ θωρακικοῦ πόρου χύνεται εἰς τὸ κυκλοφοροῦν αἷμα.

Κατὰ τὴν διαδρομὴν αὐτήν, ἐν μέρος τῆς λέμφου διέρχεται τὸ τοίχωμα τῶν ἀγγείων καὶ εἰσδύει μεταξὺ τῶν κυττάρων τῶν ιστῶν. Οὕτως, ὅλα τὰ κύτταρα τοῦ σώματος περιλούονται ἀπὸ τὸ ὑγρὸν τοῦτο.

"Ἡ λέμφος παραλαμβάνει ἀπὸ τὰ κύτταρα τὰς ὀχρήστους οὔσιας καὶ τὰς μεταβιβάζει εἰς τὸ αἷμα. Ἀντιστρόφως, παραλαμβάνει ἐκ τοῦ αἵματος τὸ ὀξυγόνον καὶ τὰς θρεπτικὰς ούσιας, τὰς ὅποιας χρησιμοποιοῦν τὰ κύτταρα.

Τὸ μέρος ἕκεīνο τῆς λέμφου, τὸ ὅποιον κυκλοφορεῖ ἐντὸς τῶν λεμφοφόρων ἀγγείων, χύνεται, ώς εἴδομεν, εἰς τὴν ἄνω κοίλην φλέβα καὶ εἰσέρχεται εἰς τὴν κυκλοφορίαν τοῦ αἵματος. Οὕτως εἰσάγονται εἰς τὸ αἷμα νέα λεμφοκύτταρα. Προσέτι τὰ λεμφοφόρα ἀγγεῖα παραλαμβάνουν ἀπὸ τὸ τοίχωμα τοῦ ἐντέρου τὰ λίπη καί, χωρὶς νὰ διέλθουν ἀπὸ τὸ ήπαρ, τὰ φέρουν εἰς τὴν κυκλοφορίαν.

8. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΩΝ

"Ως εἴδομεν ἀνωτέρω, τὰ λεμφοκύτταρα παράγονται εἰς τοὺς λεμφοφόρους αἵματος. Τὰ ἄλλα λευκά αίμοσφαίρια, καθὼς καὶ τὰ ἐρυθρά, παράγονται κυρίως εἰς τὸν μυελὸν τῶν ὀστῶν. Κατὰ τὴν νεαρὰν ἡλικίαν, καθὼς καὶ τὴν ἐμβρυϊκήν, ἐρυθρὰ αίμοσφαίρια παράγονται καὶ εἰς τὸν σπλαγχνόν.

"Ο σπλὴν ἔχει διαστάσεις περίπου $12 \times 8 \times 3$ ἑκ. καὶ βάρος 150 – 300 γραμμαρίων. Εύρισκεται ὅπισθεν τοῦ στομάχου καὶ ἀνωθεν τοῦ ἀριστεροῦ νεφροῦ.

Τὰ αίμοσφαίρια διαφράσσονται. Συχνὰ π.χ. καταστρέφονται λεμφοκύτταρα εἰς τὸν ἀγῶνα των κατὰ τῶν μικροβίων. Τὸ πλασμώδιον τῆς ἐλονοσίας καὶ ἄλλα μικρόβια καταστρέφονται τὰ ἐρυθρά αίμοσφαίρια. Ἐκτὸς ὅμως τῶν τοιούτων περιπτώσεων, τὰ αίμοσφαίρια καταστρέφονται καὶ φυσιολογικῶς, ὅταν φθάνουν εἰς ώρισμένην ἡλικίαν. "Ἡ ἡλικία αὗτη εἶναι π.χ. διὰ τὰ ἐρυθρὰ αίμο-

σφαίρια 3 - 4 έβδομάδες. 'Η καταστροφή τῶν αίμοσφαιρίων γίνεται κυρίως εἰς τὸν σπλῆνα καὶ εἰς τὸ ἡπαρ.

Τὰ φθειρόμενα αίμοσφαιρία ἀντικαθίστανται ἀπὸ ἄλλα σχηματιζόμενα εἰς τὰ προσαναφερθέντα αίμοποιητικὰ ὅργανα, δηλ. κυρίως τὸν μυελὸν τῶν ὀστῶν καὶ τοὺς λεμφικούς ἀδένας.

9. ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ

Τὸ αἷμα, ἀποτελούμενον ἀπὸ τὸ πλάσμα καὶ τὰ αίμοσφαιρία (ἔρυθρὰ καὶ λευκά), διατρέχει δύο κυκλοφορίας: α) Μεγάλη κυκλοφορία: ἀπὸ τὴν ἀριστερὰν κοιλίαν διὰ τῆς ἀρτῆς εἰς τοὺς ίστους τοῦ σώματος (τρεῖς δρόμοι!) καὶ ἐπιστροφὴ διὰ τῆς ἀνω καὶ κάτω κοιλης φλεβὸς εἰς τὸν δεξιὸν κόλπον καὶ β) Μικρὰ κυκλοφορία: ἀπὸ τὴν δεξιάν κοιλίαν διὰ τῆς πνευμονικῆς ἀρτηρίας εἰς τοὺς πνεύμονας καὶ ἐπιστροφὴ, διὰ τῶν τεσσάρων πνευμονικῶν φλεβῶν, εἰς τὸν ἀριστερὸν κόλπον.

'Εντὸς ίδιαιτέρων ἀγγείων, τὰ δόποια κατευθύνονται μόνον πρὸς τὸ κέντρον καὶ ἀπολήγουν εἰς τὰ αίμοφόρα, κυκλοφορεῖ καὶ ἡ λέμφος. Αὕτη περιλούει ἐπίσης καὶ ὅλα τὰ κύτταρα τῶν ίστῶν.

10. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1) Παρατήρησε εἰς πηγμένον αἷμα ζώου τὸν πλακοῦντα καὶ τὸν ὀρρόν.

2) Μέτρησε τοὺς σφυγμούς σου ἐν ἡρεμίᾳ καὶ ἔπειτα ἀπὸ ἐντονούν μυϊκήν ἔργασίαν.

3) 'Ο σφυγμὸς μετρεῖται διὰ πιέσεως μιᾶς ἀρτηρίας (όχι φλεβός). Διὰ νὰ γίνῃ αἰσθητός, πρέπει ἡ ἀρτηρία αὐτῇ νὰ εύρισκεται πλησίον τῆς ἐπιφανείας τοῦ δέρματος. Δοκίμασε τοῦτο εἰς τὸν καρπὸν καὶ εἰς τὸν λαιμόν.

4) 'Η ὁρθία στάσις τοῦ ἀνθρώπου καθιστῷ δυσκολωτέραν ἢ εὐκολωτέραν τὴν λειτουργίαν τῆς καρδίας καὶ τῶν ἀγγείων ἀπὸ τῶν λοιπῶν θηλαστικῶν καὶ διατί;

5) 'Η κίνησις τοῦ αἵματος ἐντὸς τῶν φλεβῶν πρὸς τὴν καρδίαν ὑποβοηθεῖται σημαντικῶς καὶ ἀπὸ τὴν πίεσιν, τὴν δόποιαν ἀσκοῦν ἐπ' αὐτῶν οἱ μῦες. Π.χ. ἡ βάδισις ὑποβοηθεῖ τὰς φλέβας τῶν κάτω ὅκρων, αἱ δόποιαι πρέπει ν' ἀναβιβάσουν τὸ αἷμα μέχρι τοῦ ὕψους τῆς καρδίας. 'Αντιθέτως, ἡ ὁρθοστασία ἡ ἡ βραδυτάτη βάδισις προκαλοῦν στάσιν τοῦ αἵματος εἰς τὰς φλέβας τῶν κάτω ὅκρων καὶ ἐπιφέρουν κούρασιν.


ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΝΑΤΟΝ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΟΣ

‘Ο κορμὸς περιλαμβάνει δύο μεγάλας κοιλότητας, τὴν θωρακικήν καὶ τὴν κοιλιακήν, ἐντὸς τῶν δποίων εὑρίσκονται τὰ σπλάγχνα (εἰκ. 34, 35).


‘Η θωρακικὴ κοιλότης περικλείεται ἀπὸ τὰς πλευρὰς καὶ χωρίζεται ἀπὸ τὴν κοιλιακὴν δι’ ἐνὸς μυϊκοῦ πετάλου, τοῦ διαφράγματος, διὰ τοῦ ἐντέρου του ἐπενδύει τὰ θωρακικὰ τοιχώματα, διὰ τοῦ ἄλλου δὲ καλύπτει τὴν ἐπιφάνειαν τῶν πνευμόνων. Μεταξὺ τῶν δύο πετάλων τοῦ ὑπεζωκότος ὑπάρχει ἐν ὑγρόν, τὸ δποίον ἐμποδίζει τὴν τριβὴν τῶν πνευμόνων ἐπὶ τῶν τοιχωμάτων. ‘Η καρδία δὲν περιβάλλεται ὑπὸ τοῦ ὑπεζωκότος, ἀλλὰ ὑπὸ ἴδιατέρου ὑμένος, τοῦ περικαρδίου.

‘Η κοιλιακὴ κοιλότης περιλαμβάνεται μεταξὺ τοῦ διαφράγματος, τῆς λεκάνης καὶ τῶν κοιλιακῶν τοιχωμάτων. Ἐντὸς αὐτῆς συναντῶνται



Εἰκ. 34. Σχηματικὴ παράστασις τῆς θωρακικῆς καὶ κοιλιακῆς κοιλότητος. 1. Ἐγκέφαλος. — 2. Παρεγκεφαλίς. — 3. Προμήκης. — 4. Λάρυγξ. — 5. Φάρυγξ. — 6. Πνεύμονες. — 7. Καρδία. — 8. Στέρνον. — 9. Διάφραγμα. — 10. Ἡπαρ. — 11. Στόμαχος. — 12. Σπλήν. — 13. Νεφρός. — 14. Τὸ ἐπίπλον. — 15. Μεσεντέριον. — 16. Τομῇ τοῦ λεπτοῦ ἐντέρου. — 17. Οὐρητήρ. — 18. Τομῇ τοῦ παχέος ἐντέρου. — 19. Κύστις.

δ στόμαχος, τὸ ἡπαρ, τὸ πάγκρεας, δ σπλήν, τὸ ἔντερον, οἱ νεφροὶ καὶ τὸ γεννητικὸν σύστημα. Τὰ σπλάγχνα, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ πάγκρεας, τοὺς νεφροὺς καὶ τὸ γεννητικὸν σύστημα, περιβάλλονται ἀπὸ ἔνα



Εἰκ. 35. Ἡ θωρακικὴ καὶ ἡ κοιλιακὴ κοιλότης.
 1. Πνεύμονες.—
 2. Καρδία.— 3. Θυμοειδῆς χόνδρος.—
 4. Θυμοειδῆς ἀδήν.—
 5. Τραχεῖα.— 6. Διάφραγμα.— 7. Στόμαχος.— 8. Σπλήν.—
 9. Ἡπαρ.— 10. Χοληδόχος κύστις.—
 11, 12, 13. Παχύ ἔντερον.— 14. Σκωληκοειδῆς ἀπόφυσις τοῦ παχέος ἔντερου.— 15. Οὐροδόχος κύστις.—
 16. Λεπτόν ἔντερον.

νμένα καλούμενον περιτόναιον. Τοῦτο δίδει δύο πέταλα, ἐκ τῶν ὅποιών τὸ ἔξωτερικὸν ἐπενδύει τὰ τοιχώματα τῆς κοιλιακῆς κοιλότητος. Τὸ περιτόναιον σχηματίζει προσέτι τὸ μεσεντέριον, τὸ διποίον συγκρατεῖ τὸ ἔντερον. Τέλος τὸ ἐπιπλον καλύπτει τὴν προσθίαν ἐπιφάνειαν τῆς ὅλης μάζης τῶν ἔντερων ὡς μία ποδιά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΚΑΤΟΝ

ΑΙ ΕΚΚΡΙΣΕΙΣ

1. ΑΔΕΝΕΣ. ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ. ΑΔΕΝΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

’Αδένες καλοῦνται ώρισμένα δργανα τοῦ σώματος, τὰ ὅποια παρασκευάζουν, μέσα εἰς τὰ κύτταρά των, ώρισμένας ούσίας, τὰς ὅποιας ἀποδίδουν εἰς τὸν δργανισμόν. Μέχρι τώρα ἐγνωρίσαμεν τοὺς σιαλογόνους καὶ ἄλλους ἀδένας τοῦ πεπτικοῦ συστήματος (πάγκρεας, ἀδένες τοῦ στομάχου κλπ.). “Ολοὶ αὐτοὶ ἀποδίδουν τὰς ούσίας, τὰς ὅποιας παράγουν, δι’ ἐνὸς ἐκφορητικοῦ ἀγωγοῦ, εἰς τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ πεπτικοῦ σωλῆνος. ’Αργότερον θὰ γνωρίσωμεν καὶ ἀδένας, τῶν ὅποιών τὰ ἔκκριματα ἀποδίδονται εἰς τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ δέρματος (ὰρωτοποιοὶ κλπ.).


’Υπάρχουν ὅμως καὶ ἀδένες στερούμενοι ἐκφορητικοῦ ἀγωγοῦ, τῶν ὅποιών τὸ ἔκκριμα παραλαμβάνεται ὑπὸ τοῦ αἷματος. Οὗτοι καλοῦνται ἐνδοκρινεῖς ἢ ἐσω ἔκκρισεως ἀδένες, τὰ δὲ ἔκκριματά των δρμόν αι.

Κάθε ἐνδοκρινής ἀδήνη παράγει, εἰς ἐλαχίστας ποσότητας, ώρισμένας δρμόνας, αἱ ὅποιαι εἶναι ούσιαι ἀπαραίτητοι διὰ τὴν κανονικὴν λειτουργίαν τοῦ δργανισμοῦ. ’Εκάστη δρμόνη ἔχει τὴν ἴδιότητα νὰ ἐνισχύῃ ἢ νὰ ἐξασθενῇ ώρισμένην λειτουργίαν ἢ ώρισμένα δργανα, ὥστε ὅλαι μαζὶ αἱ δρμόναι ρυθμίζουν τὴν λειτουργίαν καὶ ἀνάπτυξιν διοκλήρου τοῦ δργανισμοῦ.

’Εὰν ἔνας ἐνδοκρινής ἀδήνη ὑπολειτουργῇ ἢ ὑπερλειτουργῇ, παρουσιάζονται διάφοροι παθήσεις.

Μερικοὶ ἀδένες εἶναι συγχρόνως ἐνδοκρινεῖς καὶ ἐξωκρινεῖς. Τὸ πάγκρεας π.χ. δὲν παράγει μόνον τὸ παγκρεατικὸν ὑγρόν, τὸ ὅποιον χύνεται εἰς τὸ ἔντερον, ἀλλὰ προσέτι παράγει καὶ μίαν δρμόνην, ἡ ὅποια χύνεται εἰς τὸ αἷμα. ’Η δρμόνη αὕτη, καλουμένη ἵνσούλην, ἔχει τὴν ἴδιότητα νὰ ρυθμίζῃ τὴν κατεργασίαν τοῦ σακχάρου ὑπὸ τοῦ δργανισμοῦ. ’Εὰν ἡ ποσότης τῆς ἵνσουλίνης,

είναι άνεπαρκής (ύπολειτουργία τοῦ παγκρέατος), δ ὁργανισμὸς δὲν δύναται νὰ χρησιμοποιῆσῃ τὸ σάκχαρον τῶν τροφῶν. Τοῦτο παραμένει εἰς τὸ αἷμα καὶ προκαλεῖται οὕτω ἡ νόσος διαβήτης.



Εἰκ. 36. Σχηματικὴ παράστασις δεικνύουσα τὴν θέσιν τῶν ἐνδοκρινῶν ἀδένων. 1. Ἐπίφυσις. — 2. Ὑπόφυσις. — 3. Θυρεοειδῆς. — 4. Παραθυρεοειδῆς. — 5. Θύμος. — 6. Ἐπινεφρίδια. — 7. Πάγκρεας. — 8. Ὁσθῆκαι. (Χαρακτηρίζουν τὰ θήλεα ἄτομα). — 9. Ἀρρενες γεννητικοὶ ἀδένες. (Χαρακτηρίζουν τὰ ἄρρενα ἄτομα).

δοῦς ἀδένος.

2. ΟΙ ΑΔΕΝΕΣ ΕΣΩ ΕΚΚΡΙΣΕΩΣ

Ἐνδοκρινεῖς ἀδένες είναι οἱ ἔξης κυρίως (εἰκ. 36):

α) Ὁ θυρεοειδῆς ἀδήν. Οὗτος εὑρίσκεται δὲν δύναται κάτωθεν τῆς προσθίας ἐπιφανείας τοῦ θυρεοειδοῦς χόνδρου. Ἐκκρίνει ἡμερησίως ἐν ἑκατοστὸν τοῦ γραμμαρίου δρμόντης. Ἡ ὑπερλειτουργία τοῦ ἀδένος τούτου προκαλεῖ τὴν ἐμφάνισιν τῆς λεγομένης νόσου τοῦ Basedow. Ἐξωτερικὰ συμπτώματα χαρακτηριστικὰ τῆς νόσου είναι ἡ ἔξωφθαλμία, ἡ βρογχοκήλη καὶ ἡ ταχυκαρδία. Ἡ νόσος αὕτη προκαλεῖ νευρικότητα καὶ ἔξαντλησιν τοῦ ἀσθενοῦς. Ἀντιστρόφως, ἡ ὑπολειτουργία τοῦ θυρεοειδοῦς προκαλεῖ πτῶσιν τῆς θερμοκρασίας, βραδύτητα εἰς τὰς λειτουργίας τοῦ ὁργανισμοῦ καὶ σταμάτημα τῆς ἀναπτύξεως, τόσον τῆς σωματικῆς ὅσον καὶ τῆς πνευματικῆς. Κρετινισμὸς (εἰκ. 37) είναι μία ἀσθένεια, τῆς ὁποίας ἐν τῶν αἰτίων θεωρεῖται ἡ ὑπολειτουργία τοῦ θυρεοει-

β) Οι παραθυρεοειδεῖς ἀδένες εἶναι τέσσαρα μικρὰ σωμάτια εὑρίσκομενα ὅπισθεν τοῦ θυρεοειδοῦς. Οὗτοι, διὰ τῆς ὀρμόνης των, ρυθμίζουν τὴν ἀνάπτυξιν τῶν ὀστῶν καὶ τὸν τόνον τῶν μυῶν.

γ) Τὰ ἐπινεφρίδια εἶναι δύο ἀδένες εὑρίσκομενοι ἀνὰ εἰς ἐπὶ ἑκάστου νεφροῦ. Αἱ ὀρμόναι τῶν ἐπινεφρίδιων ρυθμίζουν τὴν λειτουργίαν τοῦ συμπαθητικοῦ καὶ παρασυμπαθητικοῦ νευρικοῦ συστήματος.

δ) Ὁ θύμος ἀδήν. Οὗτος εὑρίσκεται ὅπισθεν τῆς κορυφῆς τοῦ στέρνου. Κατὰ τὴν ἐμβρυϊκήν περίοδον λειτουργεῖ, μαζὶ μὲ τὸν σπλῆνα, ώς αἷμοποιητικὸν ὄργανον. Κατὰ τὴν νεαρὰν ἡλικίαν εἶναι ἀπαραίτητος διὰ τὴν κανονικήν ἀνάπτυξιν τοῦ σώματος. Κατὰ τὴν ὥριμον τέλος ἡλικίαν, ὅταν ἡ ἀνάπτυξις ἔχει συντελεσθῇ, ὁ θύμος συρρικνύεται καὶ ἔξαφανίζεται.

ε) Ἡ ἐπίφυσις. Αὕτη εὑρίσκεται εἰς τὸν ἐγκέφαλον καὶ κατὰ τὴν νεαρὰν ἡλικίαν συνεργάζεται μὲ τὸν θύμον. Μετὰ τὸ δέκατον ἔτος ἐκφύλιζεται βαθμιαίως.

Ϛ) Εἰς τὸν ἐγκέφαλον ἐπίστης εὑρίσκεται ἡ ὑπόφυσις, ἡ ὅποια συντελεῖ εἰς τὴν ρύθμισιν τῆς ἀναπτύξεως τοῦ σώματος, τῆς ἀνταλλαγῆς τῆς ὑλῆς καὶ τῆς ὥριμάνσεως τῶν γεννητικῶν ἀδένων. Αἱ παραγόμεναι ὑπὸ αὐτῆς ὀρμόναι εἶναι πολλαῖ.

3. ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ

Διακρίνομεν ἀδένας ἐν δοκρινεῖς, οἱ ὅποιοι παράγουν ὀρμόνας, τὰς ὅποιας παραλαμβάνει τὸ αἷμα καὶ ἀδένας ἔξωκρινεῖς. Οἱ ἔξωκρινεῖς ἀποδίδουν τὸ ἐκκριμά των εἰς τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ πεπτικοῦ σωλήνος ἢ τοῦ δέρματος. Ἡ διαταραχὴ τῆς λειτουργίας τῶν ἐνδοκρινῶν ἀδένων προκαλεῖ σοβαρὰς ἀνωμαλίας εἰς τὴν ἀνάπτυξιν καὶ λειτουργίαν τοῦ ὄργανισμοῦ.



Εἰκ. 37. Κακὴ ἀνάπτυξις λόγῳ κρετινισμοῦ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΝΔΕΚΑΤΟΝ

ΤΟ ΝΕΥΡΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ

1. ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΑ. ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ. ΤΑ ΝΕΥΡΑ. ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Η ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ

Εις τὸν ἔξωτερικὸν κόσμον διαρκῶς συμβαίνουν διάφοροι παροδικαὶ μεταβολαί. Π.χ. διάφορα ἀντικείμενα κινοῦνται, ἀλλάσσει ὁ φωτισμὸς ἢ ἡ θερμοκρασία, τὸ σῶμα μας ψαύει διάφορα ἀντικείμενα κ.ο.κ. Προσέτι καὶ ἐντὸς τοῦ σώματός μας συμβαίνουν τοιαῦται μεταβολαί, ὡς π.χ. μετακινήσεις τῶν σπλάγχνων κ.ἄ.

“Ολαι αὐταὶ αἱ μεταβολαὶ ἐπιδροῦν ἐπὶ εἰδικῶν κυττάρων τοῦ ὅργανισμοῦ καὶ παράγουν τὰ ἐρεθίσματα, καλοῦνται αἱ στήτικα κύττατα ρα καὶ ἀνήκουν εἰς ἓνα σύστημα ὅργάνων, τὸ δποῖον καλεῖται νευρικὸν σύστημα.

Εἰς τὰ ἐρεθίσματα ἀπαντᾷ ὁ ὅργανισμὸς μὲ κινήσεις κυρίως, τὰς δόποιας ἔκτελει κατὰ βούλησιν ἢ καὶ ἀνεξαρτήτως τῆς βουλήσεως. Π.χ. ἂν κινήσωμεν πρὸ τῶν βλεφάρων ἐν ἀντικείμενον, προκαλεῖται ἀκούσιον κλείσιμον τῶν βλεφάρων, ἀν ἔγγισωμεν ἐν καίον σῶμα, αὐτομάτως τότε ἀποσύρεται τὸ χέρι μας κ.ο.κ. Αἱ ἐνέργειαι αὐταὶ καλοῦνται ἀντιδράσεις.

Αἱ ἀντιδράσεις ρυθμίζονται ἀπὸ τὰ κεντρικά τμήματα τοῦ νευρικοῦ συστήματος, ὡς π.χ. εἶναι ὁ ἔγκεφαλος. Εἰς τὰ κεντρικά αὐτὰ τμήματα ἔρχονται τὰ ἐρεθίσματα διὰ τῶν νεύρων.

Τὰ νεῦρα ὁμοιάζουν πρὸς λεπτὰ λευκὰ νήματα, τὰ δόποια διακλαδίζονται εἰς ὅλον τὸ σῶμα. “Ἐκαστὸν νεῦρον ἀποτελεῖται ἀπὸ νευρικὰς ίνας, δηλ. μικρὰς πρωτοπλασματικὰς ἀποφυάδας νευρικῶν κυττάρων. ‘Ἐκάστη νευρικὴ ἵς περιβάλλεται ἀπὸ λευκὸν περιβλήμα καλούμενον μετεικόνη θήκη. ’Επίσης ὅλον τὸ νεῦρον περιβάλλεται ἀπὸ ἄλλο περιβλήμα, τὸ νευρικόν μας. Διὰ τῶν νεύρων συνδέονται τὰ αἰσθητικὰ κύτταρα μὲ τὸ κεντρικὸν νευ-

ρικὸν σύστημα καὶ τοῦτο μὲ τοὺς μῆνας, οἱ ὅποῖοι πραγματοποιοῦν τὰς ἀντιδράσεις εἰς τὰ ἐρεθίσματα.

“Ωστε διὰ τοῦ νευρικοῦ συστήματος ὁ ἄνθρωπος λαμβάνει γνῶσιν τῶν μεταβολῶν, αἱ ὅποιαι γίνονται εἰς τὸν ἔξωτερικὸν κόσμον ἥ καὶ εἰς τὸ σῶμα του, καὶ ἀντιδρᾶ εἰς αὐτάς.

Ίδιαιτέρων σπουδαιότητα ἀπέκτησε τὸ πρόσθιον τμῆμα τοῦ νευρικοῦ συστήματος, ὃ ἐγκέφαλος αἱ ὅποιοις ἔχει ἔξελιχθῆ εἰς τὸν ἄνθρωπον καὶ ἀπέβη ἡ ἔδρα τῆς νοήσεως. Διὰ τῆς νοήσεως ἐδημιούργησεν ὁ ἄνθρωπος τὸν πολιτισμόν, ὃ ὅποιος τόσον τὸν διακρίνει ἀπὸ τὸ ὑπόλοιπον ζωϊκὸν βασίλειον. Πῶς ὅμως τελοῦνται αἱ νοητικαὶ λειτουργίαι εἰς τὸν ἔγκεφαλον, δὲν εἴναι, σήμερον τούλαχιστον, γνωστόν.

‘Ολόκληρον τὸ νευρικὸν σύστημα τοῦ ἄνθρωπου διακρίνεται εἰς τὰ ἔξης τμῆματα: α) Τὸ ἐγκέφαλον ωτιαῖον νευρικὸν σύστημα· β) Τὸ συμπαθητικὸν καὶ παρασυμπαθητικὸν νευρικὸν σύστημα καὶ γ) Τὰ αὔτόν ομανευρικὰ συστήματα.


2. ΤΟ ΕΓΚΕΦΑΛΟΝΩΤΙΑΙΟΝ ΝΕΥΡΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ

Τοῦτο περιλαμβάνει ἐν κεντρικὸν καὶ ἐν περιφερικὸν τμῆμα:

α) **Τὸ κεντρικὸν τμῆμα.** Τοῦτο ἀποτελεῖται ἀπὸ τὸν ἐγκέφαλον καὶ τὸν νωτιαῖον μυελόν (εἰκ. 38).

Ο ἔγκεφαλος περικλείεται ἐντὸς τοῦ κρανίου, δὲ νωτιαῖος μυελός εἴναι συνέχεια τοῦ ἔγκεφάλου καὶ περικλείεται ἐντὸς τοῦ νωτιαίου σωλήνος τῆς σπονδυλικῆς στήλης, φθάνων μέχρι τῶν πρώτων δοσφυϊκῶν σπονδύλων.

Εἰς τὸν ἔγκεφαλον διακρίνομεν τρία τμῆματα. Οὕτω τὸ πρόσθιον τμῆμα του εἴναι διγκῶδες καὶ χωρίζεται μὲ βαθεῖαν πτυχὴν εἰς




Εἰκ. 38. Σχηματική τομὴ διὰ τοῦ ἔγκεφάλου.

η. Ἡμισφαίρια τοῦ ἔγκεφάλου. — γ. Τρίτη κοιλία. — δ. Τετάρτη κοιλία. — πα. Παρεγκεφαλίς. — π. Προμήκης. — μ. Νωτιαῖος μυελός. — α. Ἔγκεφαλικὰ νεῦρα.

δύο μέρη, καλούμενα ἡ μισφαίρια συναντῶμεν τὴν παρεγκεφαλίδα καὶ μετ' αὐτὴν τὸν προμήκη μυελόν. Οὗτος φθάνει μέχρι τοῦ ἴνιακοῦ τρίματος, ἀπὸ τὸ διποίον ἄρχεται διωτισίος μυελός. Εἰς τὸ ἔξωτερικὸν τοῦ ἐγκεφάλου ὑπάρχει ἔνας αὐλός, ὁ διποίος χωρίζεται εἰς διάφορα τμήματα, καλούμενα κοιλίαι. ‘Ο αὐλὸς οὗτος συνεχίζεται καὶ εἰς τὸν νωτιαῖον μυελόν. ‘Ο ἐγκέφαλος τοῦ ἀνθρώπου παρουσιάζει πλῆθος ἐλικοειδῶν αὐλῶν, διὰ τῶν διποίων ἐπαυξάνεται ἡ ἐπιφάνειά του. Τὸ ἔξωτερικὸν στρῶμα τοῦ ἐγκεφάλου ἀποτελεῖται ἀπὸ νευρικὰ κύτταρα καὶ βραχείας ἀποφυάδας αὐτῶν, λόγω δὲ τοῦ χρώματός του καλεῖται φαιὰ οὐσία. Τὸ ἔξωτερικὸν ἀντιθέτως ἀποτελεῖται ἀπὸ τὰς μακρὰς ἀποφυάδας, τὰ δένδρα, τὰ διποία περιβάλλονται ἀπὸ λευκὸν νευρείλημα. Διὰ τοῦτο τὸ στρῶμα τοῦτο καλεῖται λευκὴ οὐσία.

Εἰς τὸν νωτιαῖον μυελὸν ἀντιθέτως ἡ φαιὰ οὐσία εἶναι εἰς τὸ κέντρον, περὶ τὸν κεντρικὸν αὐλόν, ἡ δὲ λευκὴ περιβάλλει τὴν φαιάν.

Διὰ νὰ μὴ προσκρούσουν ἐπὶ τῶν δοτῶν, ὁ ἐγκέφαλος καὶ διωτισίος μυελός, περιβάλλονται ἀπὸ τρεῖς ὑμένας, οἵ διποίοι καλούνται



Εἰκ. 39. Ἀπομονωμένον περιφ. νευρικὸν σύστημα καὶ νωτιαῖος μυελός.

μήνιγγες. Ἡ ἔξωτερικὴ εἶναι ἡ σκληρὰ μῆνιγξ, ἡ μεσαία εἶναι ἡ ἀραχνοειδής, ἡ διποία σχηματίζει δύο πέ-

ταλα, καὶ ἡ ἐσωτερικὴ εἶναι ἡ χοριοειδής, ἡ ὅποια φέρει αίμοφόρα ἀγγεῖα.

Ἐντὸς τῶν κοιλιῶν τοῦ ἐγκεφάλου καὶ τοῦ κεντρικοῦ αὐλοῦ καὶ μεταξύ τῆς ἀραχνοειδοῦς καὶ τῆς χοριοειδοῦς μήνιγγος ὑπάρχει τὸ ἐγκεφαλικὸν ωτιαῖον ὑγρόν.

β) Τὸ περιφερικὸν νευρικὸν σύστημα (ἐγκεφαλικὰ καὶ νωτιαῖα νεῦρα) (εἰκ. 39). Τοῦτο ἀποτελεῖται ἀπὸ τὰ νεῦρα, τὰ ὅποια ἔξερχονται ἀπὸ τὸν ἐγκέφαλον καὶ τὸν νωτιαῖον μυελὸν καὶ διακλαδίζονται εἰς τὸ σῶμα. Τὰ νεῦρα, τὰ ὅποια ἔξερχονται ἀπὸ τὸν ἐγκέφαλον, καλοῦνται ἐγκεφαλικά καὶ εἶναι δώδεκα ζεύγη, ἕκεινα δέ, τὰ ὅποια ἔξερχονται ἀπὸ τὸν νωτιαῖον μυελόν, καλοῦνται νωτιαῖα καὶ εἶναι τριάκοντα καὶ ἓν ζεύγη. Ἐκ τῶν νεύρων τούτων ὠρισμένα μεταφέρουν τὰ ἐρεθίσματα ἐκ τῶν αἰσθητικῶν κυττάρων εἰς τὸ κεντρικὸν νευρικὸν σύστημα καὶ καλοῦνται αἱ σθητικά, ἄλλα δὲ προκαλοῦν τὴν ἀντίδρασιν τῶν μυῶν καὶ καλοῦνται κινητικά. Τέλος, ὑπάρχουν καὶ νεῦρα, τὰ ὅποια ἔκτελοῦν καὶ τὰς δύο αὐτάς λειτουργίας, καλούμενα διὰ τοῦτο μεικτά. Τὰ νωτιαῖα νεῦρα εἶναι ὅλα μεικτά.

γ) Ἡ διαδρομὴ τοῦ ἐρεθίσματος. Τὸ ἐρεθίσματα παράγεται εἰς τὰ αἰσθητικά κύτταρα, τὰ ὅποια εύρισκονται εἰς τὰ αἰσθητήρια ὅργανα ἡ εἶναι διεσκορπισμένα εἰς τὸ δέρμα. Τὰ νεῦρα, τὰ ὅποια ἀπολήγουν εἰς τὰ αἰσθητικά αὐτὰ κύτταρα, παραλαμβάνουν τὸ ἐρεθίσμα καὶ τὸ μεταφέρουν εἰς τὸ κεντρικὸν σύστημα. Καὶ τὰ μὲν ἐγκεφαλικὰ νεῦρα μεταφέρουν τὸ ἐρεθίσμα ἀπ’ εύθείας εἰς τὸν ἐγκέφαλον, τὰ δὲ νωτιαῖα μεταφέρουν αὐτὸν πρῶτον εἰς τὸν νωτιαῖον μυελόν, ἔξ αυτοῦ δὲ κατόπιν τὸ ἐρεθίσμα διαβιβάζεται πάλιν εἰς τὸν ἐγκέφαλον. Τοῦτο ὅμως δὲν συμβαίνει πάντοτε. Ὑπάρχουν ἐρεθίσματα, τὰ ὅποια, καταφθάνοντα εἰς τὸν νωτιαῖον μυελόν, διαβιβάζονται ἀμέσως εἰς τὰ κινητικά νεῦρα, χωρὶς δῆλον. προηγουμένως νὰ διέλθουν ἀπὸ τὸν ἐγκέφαλον. Αἱ προκαλούμεναι οὕτω κινήσεις καλοῦνται ἀντανακλαστικῶς πλέον (κολύμβησις, βάδισις, παίξιμον ὄργανων κλπ.).

Εἰς τὸν ἐγκέφαλον, ὅπου καταφθάνουν τὰ διάφορα ἐρεθίσματα,


δημιουργοῦνται αἱ ἐντυπώσεις ἐκ τοῦ ἔξωτερικοῦ κόσμου, συνδυάζονται αὗται καὶ γενικῶς τελείται ἡ λειτουργία τῆς σκέψεως. Τέλος, γεννᾶται ἡ ἀντίδρασις εἰς τὰ ἐρεθίσματα, ἡ δποία ρυθμίζεται ὑπὸ τῶν κινητικῶν καὶ μεικτῶν νεύρων. Ταῦτα ἀπολήγουν εἰς τοὺς γραμματοὺς μῆς, τῶν δποίων τοιουτοτρόπως αἱ κινήσεις διέπονται ὑπὸ τῆς βουλήσεως.

3. ΤΟ ΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ

Τοῦτο ἀποτελεῖται ἀπὸ νεῦρα, τὰ δποία ἀρχίζουν ἀπὸ τὸν νωτιαῖον μυελὸν καὶ ἀπολήγουν εἰς τοὺς λείους μῆς τῶν σπλάγχνων. Πρὶν ὅμως φθάσουν εἰς αὐτούς, διέρχονται ἀπὸ τὰ συμπαθητικὰ γάγγλια, τὰ δποία εύρισκονται εἰς δύο σειρὰς ἑκατέρωθεν τῆς σπονδυλικῆς στήλης (εἰκ. 40). Ολίγα ἐν τούτοις συμπαθητικὰ γάγγλια δὲν περιλαμβάνονται εἰς τὰς σειρὰς αὐτὰς καὶ εύρισκονται μακρότερον εἰς ὠρισμένα μέρη τῆς κοιλίας. Τὰ γάγγλια ἑκάστης σειρᾶς συνδέονται μεταξύ των διὰ νεύρων. Αἱ δύο αὗται σειραι γαγγλίων καλοῦνται συμπαθητικὰ στελέχη.

“Ωστε τὸ συμπαθητικὸν συνδέεται μὲ τὸ κεντρικὸν νευρικὸν σύστημα στενῶς.

Εἰς τὰ σπλάγχνα διακλαδίζονται καὶ τὰ νεῦρα τοῦ παρασυμπαθητικοῦ. Αὔτα ἐκφύονται ἀπὸ τὸ ἄκρον τοῦ νωτιαίου μυελοῦ, δὲν διέρχονται δὲ ἀπὸ τὰ συμπαθητικὰ γάγγλια. Μὲ τὰ νεῦρα αὐτὰ τοῦ παρασυμπαθητικοῦ συστήματος συν-



Εἰκ. 40. Σχῆμα τῶν συμπαθητικῶν γάγγλιων.

n. v. Νωτιαῖον νεῦρον γ. Συμπαθητικὰ γάγγλια.
S. Σπονδυλικὴ στήλη.

εργάζεται καὶ ἐν ἐγκεφαλικὸν νεῦρον, τὸ πνευμόνογαστρικόν, τὸ δποίον διακλαδίζεται εἰς τὸν θώρακα, τὸν στόμαχον κλπ. Δι’ αὐτὸν καλεῖται τοῦτο καὶ παρασυμπαθητικὸν νεῦρον. Άλλα καὶ ἄλλα ἐγκεφαλικὰ νεῦρα περιλαμβάνουν καὶ παρασυμπαθητικάς ίνας.

Τὰ συμπαθητικὰ καὶ παρασυμπαθητικὰ νεῦρα ρυθμίζουν τὰς κινήσεις τῶν σπλάγχνων καὶ ἀνταγωνίζονται πρὸς ἄλληλα. Π. χ. ἐνῷ τὰ συμπαθητικὰ νεῦρα ἐπιταχύνουν τὰς κινήσεις τῆς καρδίας καὶ ἐπιβραδύνουν τὰς κινήσεις τοῦ ἐντέρου, ἀντιθέτως τὰ παρασυμπαθητικὰ ἐπιβραδύνουν τὰς κινήσεις τῆς καρδίας καὶ ἐπιταχύνουν τὰς τοῦ ἐντέρου. Διὰ τοῦ ἀνταγωνισμοῦ τούτου ἔξασφαλίζεται ἡ ἀναγκαῖα ἰσορροπία διὰ τὴν κανονικὴν λειτουργίαν τῶν σπλάγχνων.

Τὰ συμπαθητικὰ καὶ παρασυμπαθητικὰ νεῦρα δροῦν ἀνεξαρτήτως τῆς βουλήσεως, καὶ διὰ τοῦτο αἱ κινήσεις τῶν λείων μυῶν καὶ τῆς καρδίας γίνονται ἀσυναισθήτως. Ἐν τούτοις ὅμως, ἐπειδὴ τὰ νεῦρα αὐτὰ συνδέονται, ὡς εἴδομεν, καὶ μὲ τὸν ἔγκεφαλον, συμβαίνει ώστε νὰ συνδυάζωνται, νὰ συντονίζωνται, ὡς λέγουν, αἱ κινήσεις τῶν λείων μυῶν τῶν σπλάγχνων, καθὼς καὶ τῶν μυῶν τῆς καρδίας, μὲ τὰς κινήσεις τῶν γραμμωτῶν μυῶν. Οὕτω λ.χ. ὅταν διὰ τῆς βουλήσεως θέτῃ τις εἰς ἐντατικὴν ἐργασίαν τοὺς γραμμωτοὺς μῆς τοῦ σώματος (δρόμος, ἐργασία κλπ.), τότε καὶ ἡ καρδία καὶ τὰ ἀναπνευστικὰ ὅργανα ἐργάζονται ἐντατικώτερον, ἀν καὶ νευροῦνται ἀπὸ τὸ συμπαθητικὸν καὶ παρασυμπαθητικὸν νευρικὸν σύστημα.

4. ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΝΕΥΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

Ως εἴδομεν, τὸ ἔγκεφαλονωτιαῖον, τὸ συμπαθητικὸν καὶ τὸ παρασυμπαθητικὸν νευρικὸν σύστημα συνδέονται μεταξύ των καὶ ἀποτελοῦν ἐν σύνολον.

Εἰς ὡρισμένα σπλάγχνα τοῦ σώματος ὑπάρχουν, ἐκτὸς ἀπὸ τὰς διακλαδώσεις τῶν νευρικῶν τούτων συστημάτων, καὶ ἄλλα νεῦρα καὶ γάγγλια, τὰ δόποια δὲν συνδέονται μὲ τὰ προηγούμενα νευρικά συστήματα. Τοιαῦτα «αὔτόνομα» νευρικὰ συστήματα τοῦ ὑπάρχουν εἰς τὰ τοιχώματα τοῦ ἐντέρου καὶ τῆς καρδίας.

Τὸ αὐτόνομον νευρικὸν σύστημα τοῦ ἐντέρου ἐρεθίζεται ἀπὸ χημικὰς ούσιας τῶν τροφῶν καὶ προκαλεῖ τὰς κινήσεις τοῦ ἐντέρου καὶ τῶν λαχνῶν αὐτοῦ.

Τὸ αὐτόνομον νευρικὸν σύστημα τῆς καρδίας ἐρεθίζεται ἀπὸ τὸ διοξείδιον τοῦ ἄνθρακος, τὸ δόποιον περιέχεται εἰς τὸ αἷμα τοῦ

δεξιοῦ κόλπου. Εἰς τὸν ἐρεθισμὸν αὐτὸν ἀντιδρᾷ διὰ τῶν κινήσεων τῆς καρδίας.

“Ωστε αἱ κινήσεις τοῦ ἐντέρου καὶ τῆς καρδίας δὲν ρυθμίζονται μόνον ὑπὸ τῶν συμπαθητικῶν καὶ παρασυμπαθητικῶν νεύρων, ἀλλὰ καὶ ὑπὸ αὐτονόμων νευρικῶν συστημάτων τῶν ὄργάνων τούτων.

5. Ο ΥΠΝΟΣ

‘Ο ὑπνος εἶναι μία κατάστασις, εἰς τὴν ὅποιαν διέρχεται ὁ ἀνθρώπος τὸ ἐν τρίτον καὶ πλέον τῆς ζωῆς του. Κατὰ μέσον ὅρου, τὸ βρέφος κοιμᾶται κατὰ τὸ πρῶτον ἔτος τῆς ζωῆς του ἐπὶ 18 ὥρας τὸ εἰκοσιτετράωρον, τὸ παιδίον κατὰ τὸ 2ον - 5ον ἔτος κοιμᾶται ἐπὶ 14 ὥρας, κατὰ τὸ 5ον - 6ον ἔτος ἐπὶ 12 ὥρας καὶ κατὰ τὸ 7ον - 14ον ἔτος ἐπὶ 10 ὥρας. Κατὰ τὴν ἐφηβικήν καὶ ὡριμον ἡλικίαν συνήθως διατίθενται διὰ τὸν ὑπνον 8 ὥραι. Κατὰ τὸ γῆρας αἱ ὥραι τοῦ ὑπνου ἐλαττοῦνται περισσότερον.

Κατὰ τὸν ὑπνον, οἱ μῆνες οἱ ἔξαρτώμενοι ἐκ τῆς βουλήσεως γενικῶς δὲν ἐργάζονται, καθ' ὃσον δὲν διαβιβάζονται εἰς αὐτοὺς ἐκ τοῦ ἐγκεφάλου ἐρεθίσματα. Οἱ μῆνες τῶν σπλάγχνων ὅμως, καθὼς καὶ μερικοὶ ἄλλοι (ώς οἱ κλείοντες τὰ βλέφαρα), συνεχίζουν τὴν ἐργασίαν των. Εἰς τινα ζῷα μάλιστα κατὰ τὸν ὑπνον ἐργάζονται πλεῖστοι μῆνες, ώς οἱ τῶν ποδῶν εἰς τὰ ζῷα τὰ κοιμώμενα ὅρθια (ἴππος κλπ.). Ἡ κρατούμενα ἐπὶ κλάδων (πτηνὰ κλπ.).

Οἱ ἐρεθισμοὶ ἐπὶ τοῦ ὄργανισμοῦ εἶναι κατὰ τὸν ὑπνον περιωρισμένοι, διότι τὰ βλέφαρα εἶναι κλειστά, ὁ τόπος συνήθως ἥσυχος καὶ ἡ προσοχὴ δὲν διεγείρεται πλέον ἀπὸ τὸ περιβάλλον. Ἀλλὰ καὶ τὰ ἐρεθίσματα, τὰ ὅποια παρ’ ὅλα αὐτὰ τυχόν παράγονται, δὲν δημιουργοῦν ἐντυπώσεις εἰς τὸν ἐγκεφάλον, παρὰ μόνον ὃν εἶναι, ἀναλόγως καὶ τῆς βαθύτητος τοῦ ὑπνου, ἀρκετὰ ἔντονα. Ἀκριβῶς τοῦτο χαρακτηρίζει τὸν ὑπνον, ὅτι ὁ ἐγκέφαλος ἐν μέρει ἀδρανεῖ καὶ δὲν ἐπεξεργάζεται τὰ ἐρεθίσματα, τὰ ὅποια τυχόν καταφάνουν εἰς αὐτόν. Οὕτως ὁ ὑπνος ἐπιφέρει τὴν ἀνάπτασιν τοῦ ἐγκεφάλου καὶ γενικῶς τοῦ νευρικοῦ συστήματος.

‘Ο ἐπαρκής ὑπνος εἶναι ἀπαραίτητος διὰ τὸν ὄργανισμόν, ἡ δὲ στέρησις αὐτοῦ εἶναι βλαβερά. Πειραματικῶς παρετηρήθη ἐπὶ ζῷων, ὅτι ἡ στέρησις τοῦ ὑπνου προκαλεῖ, μετά τινας ἡμέρας ἀπνίας, τὸν θάνατον.

6. ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ

Τὸ νευρικὸν σύστημα περιλαμβάνει: α) τὸ ἐγκεφαλονωτιαῖον σύστημα (κεντρικὸν τμῆμα ὁ ἐγκέφαλος καὶ ὁ νωτιαῖος μυελός, περιφερικὸν τὰ 12 ζεύγη τῶν ἐγκεφαλικῶν νεύρων καὶ τὰ 31 τῶν νωτιαίων). β) τὸ συμπαθητικὸν ἀποτελεῖται ἀπὸ Ἰνας, αἱ ὄποιαι ἐκφύουνται ἀπὸ τὸν νωτιαῖον μυελὸν καὶ, πρὶν διακλαδισθοῦν εἰς τὰ σπλάγχνα, ἔκατέρωθεν τῆς σπονδυλικῆς στήλης διέρχονται ἀπὸ τὰ συμπαθητικὰ γάγγγλια, τὸ δὲ παρασυμπαθητικὸν ἀποτελεῖται ἀπὸ Ἰνας ἐκφυομένας ἐπίστης ἐκ τοῦ νωτιαίου μυελοῦ καὶ ἀπὸ τοῦ πνευμονογαστρικοῦ κυρίως ἐγκεφαλικοῦ νεύρου τὸ συμπαθητικὸν καὶ τὸ παρασυμπαθητικὸν ὀνταγωνίζονται πρὸς ἀλληλα καὶ γ) τὰ αὐτόνομα νευρικὰ συστήματα τῆς καρδίας καὶ τοῦ ἑντέρου, τὰ δποία δὲν συνδέονται πρὸς τὰ προηγούμενα.


Διὰ τὴν ἀνάπτασιν τοῦ ἐγκεφάλου εἶναι ἀπαραίτητος ὁ ὑπνος, μία κατάστασις, κατὰ τὴν ὄποιαν οῦτος μερικῶς ὀδρανεῖ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΩΔΕΚΑΤΟΝ

ΑΙ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ


1. ΑΙΣΘΗΣΙΣ. ΑΙΣΘΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

Είς τὸ κεφάλαιον περὶ τοῦ νευρικοῦ συστήματος ἐμάθομεν, ὅτι τὰ ἔρεθίσματα προσλαμβάνονται ἀπὸ εἰδικὰ αἱ σ θ ι κ ἄ κ ύ τ - τ α ρ α, εἰς τὰ δόποια ἀπολήγουν τὰ αἰσθητικὰ νεῦρα. Ἐκεῖθεν μεταφέρονται εἰς τὸ κεντρικὸν νευρικὸν σύστημα καὶ οὕτως ἀντιλαμβανόμεθα τὰς μεταβολάς, αἱ δόποιαι τὰ προκαλοῦν. Ἡ λειτουργία αὗτη, διὰ τῆς δόποιας προσλαμβάνομεν τὰ διάφορα ἔρεθίσματα καὶ ἀντιλαμβανόμεθα τὰ φαινόμενα, τὰ δόποια τὰ προκαλοῦν, καλεῖται αἱ σ θ η -



Εἰκ. 41. Σχῆμα μιᾶς θηλῆς φερούσης γευστικούς κάλυκας.

1. Γευστικός κάλυξ. — 2. Νευρικὴ ἵση.



Εἰκ. 42. Γευστικός κάλυξ
ἐν μεγενθύσει.

σις. Τὰ ὅργανα τοῦ σώματος, τὰ δόποια περιλαμβάνουν τὰ αἰσθητικὰ κύτταρα καὶ είναι καταλλήλως διαμορφωμένα διὰ τὴν ὑποδοχὴν τῶν ἔρεθισμάτων, καλοῦνται αἱ σ θ η τ ἡ ρ ι α ὅργανα.


Είς τὸ δέρμα είναι διασκορπισμένα διάφορα τοιαῦτα ἀπλὰ ὅργανα (αἱ σ θ η τ ι κ ἄ σ ω μ ἀ τ ι α) χρησιμεύοντα διὰ τὴν αἰσθησιν τῆς θερμότητος, τοῦ ψύχους καὶ τῆς πιέσεως (ἀφή). Ἐκαστον τοιοῦτον αἰσθητικὸν σωμάτιον ἀποτελεῖται ἀπὸ μερικὰ αἰσθητικὰ κύτταρα, τὰ δόποια περιβάλλουν τὴν ἀπόληξιν ἐνὸς αἰσθητικοῦ νεύρου (βλ. εἰκ. 51, 12).

2. ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΓΕΥΣΕΩΣ


Τὴν γεῦσιν μιᾶς ούσίας ἀντιλαμβανόμεθα, ἂν ἡ ούσια αὐτὴ ἐλθῇ, ἐν διαιλύσει, εἰς ἐπαφήν καὶ ἐρεθίσῃ τὰ αἰσθητικὰ σωμάτια τῆς γεύσεως. Τὰ σωμάτια αὗτὰ καλοῦνται γευστικοί καὶ λυκεῖς καὶ εύρισκονται εἰς τὴν ἐπιφάνειαν τῆς γλώσσης, ιδίως εἰς τὸ πρόσθιον καὶ ὅπισθιον μέρος αὐτῆς (εἰκ. 41 καὶ 42).

3. ΤΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΟΣΦΡΗΣΕΩΣ

Τὴν ὁσμὴν μιᾶς ούσίας ἀντιλαμβανόμεθα, ἐὰν λεπτότατα μόρια αὐτῆς παρασυρθοῦν ύπό τοῦ εἰσπνεομένου ἀέρος εἰς τὴν ρινικὴν κοι-



Εἰκ. 43. Τομὴ ἔγκαρσία διὰ τοῦ προσώπου. 1, 2. Αἱ δύο ἀνώτεραι ρινικαὶ κόγχαι. — 8. Κάτω ρινικὴ κόγχη. — 6. Ρινικὸν διάφραγμα. — 5. Ὀφθαλμικὴ κόγχη. — 7. "Υνις.



Εἰκ. 44. Ὁσφρητικὰ κύτταρα.
1. Ἰνίδια τῶν αἰσθητικῶν κυττάρων. — 2. Ἐπιθηλιακὰ κύτταρα τῶν βλεννογόνων. — 3. Νευρικαὶ Ἰνες.

λότητα καὶ ἐρεθίσουν τὰ αἰσθητικὰ κύτταρα τῆς ὁσφρήσεως. Τὰ κύτταρα αὗτὰ εύρισκονται ἐπὶ τῶν βλεννογόνου τῆς ρινικῆς κοιλότητος καὶ ιδίως εἰς τὴν ἀνωτέραν ρινικὴν κόγχην (εἰκ. 43 καὶ 44).

4. ΤΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΟΡΑΣΕΩΣ


Διὰ τῆς ὄράσεως ἀντιλαμβανόμεθα τὰς φωτεινὰς ἀκτῖνας, τὰς ὄποιας ἐκπέμπουν τὰ διάφορα ἀντικείμενα, τὴν ἀπόστασιν, τὴν μορφὴν καὶ τὸ σχῆμα τῶν ἀντικειμένων τούτων.

Τὰ δύο αἰσθητικὰ νεῦρα, τὰ δόποια χρησιμεύουν διὰ τὴν ὄρασιν (ὅπτικὰ νεῦρα), ἀπολήγουν εἰς τὸ ἐσωτερικὸν τῶν αἰσθητηρίων

όργάνων τῆς όράσεως, δηλ. τῶν δύο ὁ φ θ α λ μῶν. Τὸ ἀριστερὸν ὅπτικὸν νεῦρον ἀπολήγει εἰς τὸν δεξιὸν ὄφθαλμὸν καὶ τὸ δεξιὸν εἰς τὸν ἀριστερὸν ὄφθαλμόν.

Κατασκευὴ τῶν ὄφθαλμῶν. "Εκαστος ὄφθαλμὸς ὅμοιάζει μὲ σφαιρικὸν θάλαμον, ὁ ὅποιος ἔχει ἀδιαφανῆ τοιχώματα καὶ καλεῖται βολβός. Εἰς τὸ πρόσθιον μόνον μέρος τὰ τοιχώματα τοῦ βολβοῦ γίνονται διαφανῆ καὶ ἀφήνουν τὰς φωτεινὰς ἀκτῖνας νὰ εἰσέλθουν.

Τὸ τοίχωμα τοῦ βολβοῦ ἀποτελεῖται ἀπὸ τρία τοιχώματα, τὰ ὅποια καλοῦνται χιτῶνες (εἰκ. 45). Ὁ ἔξωτερικὸς χιτὼν καλεῖται σκληρωτικός. Εἰναι ἀδιαφανῆς καὶ λευκός καὶ εὔκολα δυνάμεθα νὰ τὸν παρατηρήσωμεν (ἀσπράδι τοῦ ματιοῦ). Εἰς τὸ ἐμπρόσθιον μόνον μέρος τοῦ βολβοῦ, ἐν κυκλικὸν τμῆμα τοῦ σκληρωτικοῦ χιτῶνος εἶναι διαφανές. Τὸ τμῆμα τοῦτο καλεῖται κερατοειδῆς χιτών καὶ είναι κυρτότερον ἀπὸ τὸν σκληρωτικόν.



Εἰκ. 45. Σχῆμα τοῦ ὄφθαλμοῦ.
1. Σκληρωτικὸς χιτὼν. — 2. Χοριοειδῆς. — 3. Ἀμφιβληστροειδῆς. — 4. Ωχρὰ κηλίς. — 5. Ὁπτικὸν νεῦρον. — 6. Κερατοειδῆς χιτὼν. — 7. Ιρις. — 8. Φακός. — 9. Χῶρος κατεχόμενος ἀπὸ τὸ ύδαταῶδες ὑγρόν. — 10. Χῶρος κατεχόμενος ἀπὸ τὸ ύαλωδες σῶμα.

Ειδῆ εύρισκεται δὲ μεριμνή στροειδῆς χιτών, εἰς τὸν ὅποιον είναι διακλαδισμένον τὸ ὅπτικὸν νεῦρον. Καὶ αὐτὸς διακόπτεται κάτω ἀπὸ τὸν κερατοειδῆ.

Κάτω ἀπὸ τὸν κερατοειδῆ καὶ χωρὶς νὰ ἀκουμβᾶ ἐπ' αὐτοῦ εύρισκεται ἐν διάφραγμα μυῶδες, ἡ ἵρις. Τὸ διάφραγμα τοῦτο ἀφήνει εἰς τὸ κέντρον μίαν ὅπτην, ἡ ὅποια καλεῖται κόρη τοῦ ὄφθαλμοῦ. Ἀμέσως ὅπισθεν τῆς ἵριδος ὑπάρχει δὲ διαφανῆς ἀμφίκυρτος φακός. Οὗτος συγκρατεῖται καὶ συσφίγγεται ἀπὸ μίαν μυικὴν ζώην, ἡ ὅποια τὸν περιβάλλει.

Κάτω ἀπὸ τὸν σκληρωτικὸν είναι δὲ χιριοειδῆς χιτών. Οὗτος είναι μέλας καὶ ἀγγειοβριθής, ἀφήνει δὲ ἀκάλυπτον τὸ μέρος κάτω ἀπὸ τὸν κερατοειδῆ.


Τέλος, μέσα ἀπὸ τὸν χοριο-

‘Ο χῶρος μεταξύ τοῦ κερατοειδοῦς καὶ τῆς ἵριδος εἶναι πλήρης ἐνὸς διαφανοῦς ρευστοῦ, τὸ ὅποιον καλεῖται ύδατος εὐγρόν. ‘Ο ὅπισθεν τῆς ἵριδος καὶ τοῦ φακοῦ χῶρος τοῦ βολβοῦ εἶναι πλήρης ἀπό ἕν διαφανές ρευστόν, τὸ ὅποιον καλεῖται ύδωμα.

Τὸ ὅπτικὸν νεῦρον εἰσέρχεται εἰς τὸν βολβὸν ἀπέναντι τῆς κόρης καὶ διακλαδίζεται ἐπὶ τοῦ ἀμφιβληστροειδοῦς πλησίον τῆς εἰσόδου τοῦ ὅπτικοῦ νεύρου. Τὸ σημεῖον τοῦτο καλεῖται ὡχρὰ κηλίσ.

‘Ο βολβὸς κινεῖται δι’ ἔξ μυῶν, οἱ ὅποιοι ἐφαρμόζουν ἐπ’ αὐτοῦ.

Σχηματισμὸς τοῦ εἰδώλου. Αἱ φωτειναὶ ἀκτίνες, αἱ ὅποιαι ἀναχωροῦν ἀπὸ τὰ διάφορα ἀντικείμενα, διέρχονται τὸν κερατοειδῆ χιτῶνα, τὸ ὑδατῶδες ὑγρόν, τὸν φακὸν καὶ τὸ ὑαλῶδες σῶμα (εἰκ. 6).



Εἰκ. 46. Πορεία τῶν ἀκτίνων καὶ σχηματισμὸς τοῦ εἰδώλου ἀνεστραφμένου.

Ως εἶναι γνωστὸν ἐκ τῆς Φυσικῆς, ἐὰν ἀκτίνες, αἱ ὅποιαι προέρχονται ἀπὸ ἕν σημεῖον, συναντήσουν ἕνα φακὸν ἀμφίκυρτον, θὰ συγκεντρωθοῦν ὅλαι εἰς ἕν διαφανές σημεῖον, ὅπισθεν τοῦ φακοῦ. Τοῦτο γίνεται δι’ ὅλα τὰ σημεῖα ἐνὸς ἀντικειμένου καὶ οὕτω σχηματίζεται ὅπισθεν τοῦ φακοῦ τὸ εἰδώλον τοῦ ἀντικειμένου τούτου.

Τὸ εἰδώλον τοῦτο ἀναλόγως τῆς ἀποστάσεως αὐτοῦ, εἶναι μικρότερον ἢ μεγαλύτερον.

Τὸ ᾱδιον γίνεται καὶ μὲ τὸν φακὸν τοῦ ὀφθαλμοῦ· οὕτω σχηματίζεται εἰς τὸ βάθος τοῦ βολβοῦ ἐπὶ τοῦ ἀμφιβληστροειδοῦς τὸ εἰδώλον τῶν ἔξωτερικῶν ἀντικειμένων (εἰκ. 46). Τὸ εἰδώλον αὐτὸν εἶναι μικρὸν καὶ ἀνεστραφμένον καὶ σχηματίζεται συγχρόνως καὶ εἰς τοὺς δύο ὀφθαλμούς.

Τὰ φωτεινὰ εἰδῶλα, τὰ ὅποια οὕτω σχηματίζονται, ἐρεθίζουν τὰ δπτικὰ νεῦρα καὶ τὰ ἐρεθίσματα αὐτὰ μεταβιβάζονται εἰς τὸν ἐγκέφαλον. 'Εφ' ὅσον οἱ δύο δόφθαλμοι εύρισκονται εἰς τὴν κανονικήν των θέσιν, τὰ δύο εἰδῶλα γίνονται ἀντιληπτὰ ὡς ἔν. 'Εὰν ὅμως πιέσωμεν τὸν ἔνα βολβόν, ὥστε οὗτος νὰ μετατοπισθῇ ὄλιγον, τότε τὰ ἀντικείμενα μᾶς φαίνονται διπλᾶ.

Προσαρμογὴ τοῦ δόφθαλμοῦ. 'Η μυϊκὴ ζώη, ἡ ὅποια περιβάλλει τὸν φακόν, δύναται νὰ χαλαρωθῇ, δπότε ὁ φακός, γίνεται κυρτότερος καὶ ἐπομένως σχηματίζει τὸ εἰδῶλον πλησιέστερον. Τοῦτο γίνεται, ὅταν παρατηροῦμεν ἀντικείμενα εύρισκόμενα πολὺ πλησίον, τῶν ὅποιών τὸ εἰδῶλον ἄλλως θὰ ἐσχηματίζετο πολὺ μακράν τοῦ φακοῦ. Οὕτω ἐπιτυγχάνεται νὰ σχηματίζεται τὸ εἰδῶλον πάντοτε ἐπὶ τοῦ ἀμφιβληστροειδοῦς καὶ νὰ ἐρεθίζεται τὸ δπτικὸν νεῦρον. 'Η ἀλλαγὴ τῆς κυρτότητος τοῦ φακοῦ καλεῖται προσαρμογὴ τοῦ δόφθαλμοῦ. 'Ο δόφθαλμὸς δὲν δύναται νὰ προσαρμοσθῇ διὰ νὰ ἴδῃ ἀντικείμενα εύρισκόμενα πλησιέστερον τῶν 25 – 30 ἑκ.

Προστασία τοῦ δόφθαλμοῦ. 'Ο δόφθαλμὸς εἶναι εύπαθες ὅργανον καὶ ἔχει ἀνάγκην προστασίας. Πρὸς τοῦτο οἱ βολβοὶ εύρισκονται εἰς κοιλώματα, σχηματιζόμενα ὑπὸ τῶν δοτῶν τοῦ προσώπου, τὰς δόφθαλμικάς κόγχας. Ἐπάνω ἀπὸ αὐτὰς τὸ μετωπικὸν δόστοιν παρουσιάζει δύο ἐπάρματα, τὰ ὑπερόφρυντά τόξα. Εἰς τὴν ἴδιαν θέσιν φύονται ἐπὶ τοῦ δέρματος τὰ «φρύδια». Ἐμπρὸς ἀπὸ τὴν ἐλευθέραν ἐπιφάνειαν τοῦ βολβοῦ κινοῦνται τὰ βλέφαρα. Ταῦτα ἐσωτερικῶς καλύπτονται ἀπὸ ἔνα βλεννογόνον, τὸν ἐπιπλεόντα, μὲ ἀφθονούς ἀδένας, καὶ εἰς τὰ χείλη των φέρουν τὰς βλεφαρίδας.

'Η ἐλευθέρα ἐπιφάνεια τοῦ βολβοῦ διατηρεῖται λεία καὶ καθαρὰ μὲ τὸ δάκρυ, τὸ ὅποιον ἐκκρίνεται ἀπὸ ἔνα δακρυγόνον ἀδένα, εύρισκόμενον δπισθεν τοῦ ἀνω βλεφάρου. Τὸ περισσεῦον δάκρυ ἔρχεται εἰς τὴν ρινικὴν κοιλότητα διὰ τῶν δακρυούς τοῦ ἀνω βλεφάρου, οἱ ὅποιοι ἀρχίζουν ἀπὸ τὸ ἐσωτερικὸν ἄκρον τῶν βλεφάρων (δακρυούς τοῦ πόροι).


Ἀνωμαλίαι τῆς δράσεως. Αἱ κυριώτεραι ἀνωμαλίαι τῆς δράσεως εἶναι αἱ ἔξης:

α) 'Α λλοι ι θωρισμός. 'Αλλοι θωρισμοί καλοῦνται οἱ δόφθαλμοι ἐνὸς ἀτόμου, ὅταν αἱ κόραι δὲν βλέπουν καὶ αἱ δύο ἀκριβῶς παραλλήλως. Τοῦτο δφείλεται εἰς τὸ ὅτι ὥρισμένοι μύες ἔξ εκείνων, οἱ ὅποιοι συγ-

κρατοῦν καὶ κινοῦν τὸν βολβόν, εἶναι ἀσθενέστεροι τῶν ἄλλων.
Οἱ ἄλλοι θώραοι θὰ ἔπειπε νὰ βλέπουν διπλᾶ τὰ ἀντικείμενα, ἀλλὰ ἔχουν συνηθίσει νὰ προσέχουν τὸ ἐν μόνον εἰδώλον.

β) Πρεσβύτεροι πάσι. Αὕτη εἶναι μία ἀνωμαλία παρουσιαζομένη συνήθως κατὰ τὸ γῆρας. Ὁφείλεται εἰς τὸ ὅτι ὁ φακὸς δὲν δύναται πλέον νὰ κυρτωθῇ ἀρκετά διά τὰ πλησίον του ἀντικείμενα καὶ τὸ εἰδώλον αὐτῶν σχηματίζεται μακρύτερα ἀπὸ τὸν ἀμφιβληστροειδῆ (εἰκ. 47, α). Οἱ πρεσβύτερες βοηθοῦνται μὲν ὀρματούάλια ἀποτελούμενα ἀπὸ ἀμφικύρτους φακούς, οἵ τοι συγκεντρώνουν πλησιέστερα τὰς ἀκτίνας. Εἰς ἄλλας περιπτώσεις ὁ σχηματισμὸς τοῦ εἰδώλου ὅπισθεν τοῦ ἀμφιβληστροειδοῦς, ὀφείλεται ὅχι εἰς ἐλάττωμα τοῦ φακοῦ, ἀλλ' εἰς τὸ ὅτι ὁ βολβὸς εἶναι βραχύτερος τοῦ κανονικοῦ (ὑπερμετρωπία) (εἰκ. 47, γ).

γ) Μυωπία. Ἡ ἀνωμαλία αὕτη ὑπάρχει, ὅταν τὸ εἰδώλον τῶν μακράν ἀντικείμενων σχηματίζεται πρὸ τοῦ ἀμφιβληστροειδοῦς, ὅπότε πάλιν τὸ ὅπτικὸν νεῦρον δὲν ἔρεθιζεται. Ὁφείλεται εἰς τὸ ὅτι ὁ φακὸς δὲν δύναται νὰ προσαρμοσθῇ ἡ εἰς τὸ ὅτι ὁ βολβὸς εἶναι μακρύτερος τοῦ κανονικοῦ. Οἱ μύωψ, διὰ νὰ ἴδῃ τὰ μακράν ἀντικείμενα, βοηθεῖται μὲν ὀρματούάλια μὲν ἀμφικοίλους φακούς. Οἱ φακοὶ οὗτοι, ὀτιθέτως πρὸς τοὺς ἀμφικύρτους, φέρουν τὸ εἰδώλον, ώστε νὰ σχηματίζεται τοῦτο ἀκριβῶς ἐπὶ τοῦ ἀμφιβληστροειδοῦς.



Εἰκ. 47. Ἡ ἀνωμαλία τῆς δράσεως.

β. Κανονικὸς ὀφθαλμὸς πρὸς σύγκρισιν.

5. ΤΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΑΚΟΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

Αἰσθησις τῆς ἀκοῆς εἶναι ἐκείνη, διὰ τῆς ὁποίας ἀντιλαμβανόμεθα τοὺς ἔχοντας. Ὡς εἶναι γνωστὸν ἐκ τῆς Φυσικῆς, οἱ ἔχοι παράγονται, ὅταν ἔν σῶμα τεθῇ εἰς παλμικὴν κίνησιν, καὶ μεταδίδονται διὰ κυμάνσεων τοῦ ἀέρος.

Αἱσθησιν τοῦ χώρου καλούμεν εἰκείνην, διὰ τῆς ὁποίας συναισθιανόμεθα τὴν στάσιν τοῦ σώματος καὶ τηρούμεν κατὰ τὴν κίνησιν τὴν ἴσορροπίαν.

Τὰ αἱσθητήρια ὅργανα τῆς ἀκοῆς καὶ τοῦ χώρου εἶναι τὰ ὡτα, τὰ ὁποῖα εύρισκονται ἐντὸς κοιλοτήτων τῶν κροταφικῶν ὁστῶν.



Εἰκ. 48. Σχῆμα τοῦ ὅργανου τῆς ἀκοῆς. 1. Πτερύγιον τοῦ ὡτοῦ. — 2. Τύμπανον. — 3. Ἐξω ἀκουστικὸς πόρος. — 4. Κοιλότης τοῦ μέσου ὡτοῦ. — 5. Εὐσταχιανὴ σάλπιγξ. — 6. Ἐσω οὖς.

Μέσον οὖς. Τοῦτο εἶναι συνέχεια τῆς κοιλότητος τοῦ κροταφικοῦ ὁστοῦ καὶ συγκοινωνεῖ μὲ τὴν στοματικήν κοιλότητα δι’ ἐνὸς στενοῦ σωλῆνος, τῆς εὔσταχιανῆς σάλπιγγος. Ἀπὸ τὸν ἀκουστικὸν πόρον τὸ μέσον οὖς χωρίζεται διὰ τῆς μεμβράνης τοῦ τυμπάνου. Ἡ κοιλότης τοῦ μέσου ὡτὸς συγκοινωνεῖ μὲ τὴν κοιλότητα τοῦ ἔσω ὡτὸς διὰ δύο μικρῶν ὁπῶν, τῆς στρογγύλης καὶ τῆς ὠοειδοῦς θυρίδος, αἱ ὁποῖαι καλύπτονται ὑπὸ μεμβρανῶν. Ἀπὸ τοῦ τυμπάνου μέχρι τῆς ὠοειδοῦς θυρίδος ἐκτείνεται μία σειρὰ ἀπὸ τρία ὁστάρια ἐφαπτόμενα πρὸς ἄλληλα, τὴν σφυραντανήν, τὸν ἄκμονα καὶ τὸν ἄναβολον (εἰκ. 49).

Ἐσω οὖς. Εἰς τὴν κοιλότητα τοῦ ἔσω ὡτὸς (εἰκ. 49), ἡ ὁποία εἶναι πλήρης ἐνὸς ὑγροῦ, τῆς ἔξω λύματος, παρατηροῦμεν:

α) Δύο κυστίδια συγκοινωνοῦντα καὶ καλούμενα ἐλλειπτικά πτικὰ καὶ σφαίρικά καὶ τοῖν κυστίδιον.

β) Τρεῖς ἡμικυκλίους σωλῆνας στοιχεῖος. Οὗτοι ἀρχίζουν ἀπὸ τὸ ἔλλειπτικὸν κυστίδιον καὶ ἐπιστρέφουν πάλιν εἰς αὐτό, εύρι-

Εἰς ἕκαστον οὓς διακρίνομεν τρία τμήματα, τὸ ἔξω, τὸ μέσον καὶ τὸ ἔσω οὖς (εἰκ. 48).

Ἐξω οὖς. Τοῦτο ἀποτελεῖται ἀπὸ τὸ πτερύγιον καὶ τὸν ἀκουστικὸν πόρον. Τὸ πτερύγιον εἶναι χόνδρινον καὶ φέρει διαφόρους πτυχάς. Ὁ ἀκουστικὸς πόρος εἶναι ἔνας σωλήνης ἐντὸς τοῦ κροταφικοῦ ὁστοῦ, ὁ ὁποῖος ἀρχίζει ἀπὸ τὸ πτερύγιον καὶ εἰς τὸ βάθος φράσσεται ἀπὸ μίαν μεμβράνην καλουμένην τύμπανον πανον (εἰκ. 48).

σικονται δὲ ἐπὶ τριῶν καθέτων ἐπιπέδων. Εἰς τὴν ἀρχήν του ἔκαστος παρουσιάζει μίαν διεύρυνσιν, τὴν λήκυθον ἢ λάγην.


γ) Τὸν κοχλίαν αν. Οὗτος εἶναι τυφλὸς σωλήνης τριγωνικῆς τομῆς, περιελιγμένος εἰς 2 1/2 σπείρας ἐντὸς ἑνὸς ἀντιστοίχου σωλήνος τοῦ κροταφικοῦ ὅστοῦ, ὃ ὁποῖος καλεῖται ὀστεῖον κοχλίας καὶ ἀπολήγει εἰς τὴν ὠοειδῆ θυρίδα. Ὁ κοχλίας συγκοινωνεῖ μὲ τὸ σφαιρικὸν κυστίδιον.

Τὰ ἀνωτέρω ὑμενώδη ὅργανα, τὰ ὄποια, ὡς εἴδομεν, συγκοινωνοῦν μεταξύ των, πληροῦνται ὑπὸ ὑγροῦ, καλουμένου ἐν δολύματι. Τὰ αἰσθητικὰ κύτταρα τῆς ἀκοῆς εὑρίσκονται εἰς τὸ δάπεδον τοῦ ὑμενώδους κοχλίου (εἰκ. 50).

"Οταν τὰ ἡχητικὰ κύματα φθάσουν εἰς τὴν μεμβράνην τοῦ τυμπάνου, μεταδίδουν εἰς αὐτὴν παλμικὴν κίνησιν. Ἡ κίνησις αὕτη διὰ τῶν ὀσταρίων τοῦ μέσου


ώτος μεταδίδεται εἰς τὴν μεμβράνην τῆς ὠοειδοῦς θυρίδος. Ἐξ αὐτῆς περαιτέρω, διὰ τῆς ἔξωλύμφης, μεταδίδεται εἰς τὰ τοιχώματα τῶν κυστιδίων καὶ εἰς τὴν ἐνδολύμφην. Αἱ κυμάνσεις τέλος τῆς ἐνδολύμφης ἐρεθίζουν τὰ αἰσθητικὰ κύτταρα, τῶν δποίων τὸ ἐρέθισμα παραλαμβάνεται ὑπὸ τοῦ ἀκουστικοῦ νεύρου.

Ἡ αἰσθησις τοῦ χώρου ἐξασφαλίζεται μὲ τοὺς τρεῖς ἡμικυκλίους σωλήνας. Ἀναλόγως τῆς στάσεως τοῦ σώματος



Εἰκ. 49. Τομὴ διὰ τοῦ ὠτός.

1. Τύμπανον. — 2. Σφῦρα. — 3. Ἀκμῶν. —
4. Ἀναβολεύς ἀκουμβῶν ἐπὶ τῆς μεμβράνης τῆς ὠοειδοῦς θυρίδος. — 5. Στρογγύλη θυρίς. — 6. Ἐλλειπτικὸν κυστίδιον. —
7. Λήκυθος. — 8. Ἡμικύκλιοι σωλήνες. —
9. Σφαιρικὸν κυστίδιον. — 10. Κοχλίας. —
11. Εὔσταχιανή σάλπιγξ. — 12. Ἔξω ἀκουστικός πόρος.



Εἰκ. 50. Τομὴ διὰ τοῦ κοχλίου.

1. Δάπεδον τοῦ ὑμενώδους κοχλίου. — 2. Νεύρον. — 6. Αἰσθητικὰ κύτταρα.

ἡ ἐνδοιλύμφη φθάνει ἐντὸς αὐτῶν εἰς διάφορον σημεῖον καὶ τοῦτο προκαλεῖ ἀνάλογα ἔρεθίσματα, τὰ δποῖα μεταβιβάζονται εἰς τὸν ἐγκέφαλον.

6. ΤΟ ΑΙΣΘΗΜΑ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ

“Ολοι γνωρίζομεν τὸ ἴδιαζον τοῦτο δυσάρεστον αἴσθημα. Συνήθως προκαλεῖται εἰς τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ σώματος μαζὶ μὲ ἵσχυρὰ ἔρεθίσματα θερμότητος, πιέσεως κλπ. Ἐν τούτοις τὸ αἴσθημα τοῦ πόνου προκαλεῖται ὅχι εἰς τὰ γνωστά μας αἰσθητικά σωμάτια, ἀλλὰ εἰς ἄλλα σημεῖα τοῦ δέρματος. Εἰς τὰ σημεῖα ταῦτα ἀπολήγουν Ἰνες τῶν αἰσθητικῶν νεύρων, χωρὶς νὰ ὑπάρχουν εἰδικὰ αἰσθητικὰ κύτταρα. Δέχονται δηλαδή, ὅτι ὁ πόνος προκαλεῖται ἀπὸ τὸν ἔρεθισμὸν ἐλευθέρων ἀπολήξεων τῶν αἰσθητικῶν νεύρων. Πόνος προκαλεῖται ὅχι μόνον εἰς τὸ δέρμα, ἀλλὰ καὶ εἰς ἐσωτερικὰ ὅργανα (στόμαχος, μύες κλπ.). Χαρακτηριστικὸν διὰ τὸν πόνον, ἰδίως τὸν προκαλούμενον εἰς τὸ ἐσωτερικὸν τοῦ σώματος, εἶναι, ὅτι δὲν δυνάμεθα πάντοτε νὰ καθορίσωμεν τὸ μέρος, ἐκ τοῦ δποίου προέρχεται. Συχνὰ νομίζομεν, ὅτι ὁ πόνος προέρχεται ἀπὸ ἄλλα μέρη τοῦ σώματος, τὰ δποῖα εύρισκονται μακράν, εἰς τὰ ἄκρα τῶν ἀντιστοίχων νεύρων. Οὕτω συμβαίνει π.χ. ἀτομα, τῶν δποίων ἀπεκόπη ἐν ἄκρον, νὰ αἰσθάνωνται μετὰ τὴν ἐγχείρησιν πόνον καὶ νὰ νομίζουν, ὅτι οὗτος προέρχεται ἀπὸ τὸ μέρος, ὃπου εύρισκετο τὸ ἀποκοπὲν ἄκρον.

‘Ο πόνος εἶναι χρησιμοτάτη αἰσθησις, διότι εἰδοποιεῖ τὸν ἀνθρώπον περὶ βλαβερῶν ἐπιδράσεων καὶ παθήσεων. Ἐκτὸς τούτου ὁ ἀνθρωπός, φοβούμενος τὸν πόνον, προφυλάσσεται ἀπὸ τοιωτας βλαβερὰς ἐπιδράσεις.

7. ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ

Κάθε αἰσθησις πραγματοποιεῖται διὰ τοῦ ἔρεθισμοῦ τῶν αἰσθητικῶν κυττάρων. Ταῦτα εύρισκονται διεσκορπισμένα ἡ συγκεντρωμένα εἰς τὰ αἰσθητήρια ὅργανα. Περιεγράψαμεν τὰ αἰσθητικά σωμάτια τοῦ δέρματος, τοὺς γευστικοὺς κάλυκας, τὰ αἰσθητικὰ τῆς ὁσφρήσεως κύτταρα, τοὺς ὀφθαλμούς, τὰ ὄτα. ‘Ο πόνος τέλος προκαλεῖται ἀπὸ ἔρεθισμὸν ἐλευθέρων ἀπολήξεων τῶν αἰσθητικῶν νευρικῶν Ἰνῶν.

8. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1) Τὰ διάφορα αἰσθητικά σωμάτια εἶναι ἀνίσως διαμοιρασμένα

είς τὰ διάφορα μέρη τοῦ δέρματος. Διὰ τοῦτο ὡρισμένα μέρη εἶναι περισσότερον εὐαίσθητα ἀπὸ ἄλλα διὰ τὸ αὐτὸ ἐρέθισμα. Π.χ. διὰ τὴν ἄφην εἶναι ἴδιαιτέρως εὐαίσθητα τὰ ἄκρα τῶν δακτύλων. (Πῶς δοκιμάζεις τὴν ὑφὴν τοῦ χαρτιοῦ, τοῦ ὑφάσματος κλπ.;). Παρατήρησε, ὅτι μερικαὶ γυναῖκες συνηθίζουν νὰ δοκιμάζουν τὴν θερμοκρασίαν τοῦ ὕδατος μὲ τὸν ἀγκῶνα ἢ τοῦ σιδήρου, κατὰ τὸ σιδέρωμα, πλησιάζουσαι αὐτὸ εἰς τὰς παρειάς.

2) Παρατήρησε εἰς τὸν καθρέπτην (καθαρὰ χέρια!) τὴν ἐπιφάνειαν τῆς γλώσσης. Εἰς ὅλην τὴν ἄνω ἐπιφάνειαν θὰ ἔδης πολλὰς μικρὰς θηλάσ, αἱ ὅποιαι χρησιμεύουν διὰ τὴν αἰσθησιν τῆς θερμότητος, πιέσεως κλπ. καὶ προσδίδουν χνοῶδη ὄψιν εἰς τὴν γλώσσαν. Εἰς τὸ ὁπίσθιον τμῆμα ὑπάρχουν αἱ θηλαὶ μὲ τοὺς γευστικοὺς κάλυκας, αἱ ὅποιαι εἶναι μεγαλύτεραι καὶ σχηματίζουν ἓνα Λ (γευστικὸν λάμδα). Πλήγη αὐτῶν καὶ εἰς ἄλλα τμήματα τῆς γλώσσης ὑπάρχουν θηλαὶ μὲ γευστικοὺς κάλυκας.

3) Δοκίμασε μὲ διαφόρους ούσιας εἰς ποια σημεία ἢ γλώσσα εἶναι περισσότερον εὐάίσθητος εἰς τὰ διάφορα ἐρεθίσματα.

4) Σχεδίασε ἀπὸ πλησίον ἓνα κύβον, ὅπως ἀκριβῶς τὸν βλέπεις μὲ τὸ ἓνα μάτι, κατόπιν μὲ τὸ ἄλλο, καὶ τέλος καὶ μὲ τὰ δύο. Σύγκρινε τὰ σχέδια.

5) Παρατήρησε (μὲ καθαρὰ χέρια!) εἰς τὸν καθρέπτην τοὺς δακρυϊκοὺς πάροις. "Οταν κλαίῃ κανεὶς πολύ, πρόσεξε, ὅτι κάθε λίγο «ρουφᾶ τὴ μύτη του». Διατί;

6) "Αν ἐρεθίσθῃ ὁ ὀφθαλμὸς ὅχι μὲ φῶς, ἄλλὰ μὲ ἄλλο ἐρέθισμα (πίεσιν π.χ.), προκαλεῖται πάλιν φωτεινὸν αἰσθημα. Διὶ αὐτὸ λέγουν ὅτι ἀπὸ ἓνα κτύπημα «ἄστραψαν τὰ μάτια μου». Τὸ ἀνάλογον συμβαίνει καὶ μὲ τὰ ἄλλα αἰσθητήρια.

7) Πρόσεξε ὅτι τὸ βράδυ (λυκόφως) δὲν διακρίνει κανεὶς χρώματα, ὅλλα μόνον λευκὸ καὶ μαύρο.

8) Γνωρίζεις διατὶ «τρίβουμε τὰ μάτια μας» τὸ πρωΐ; Διὰ νὰ πιέσωμεν τοὺς δακρυϊκοὺς ἀδένας, οἱ ὅποιοι ἀδρανοῦν κατὰ τὸν ὑπνον, ὥστε μὲ τὸ δάκρυ νὰ ὑγράνουν τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ βολβοῦ.

9) "Οπισθεν τοῦ βολβοῦ τοῦ ὀφθαλμοῦ ὑπάρχει λίπος, τὸ ὅποιον συμπληρώνει τὸν χῶρον τῆς ὀφθαλμικῆς κόγχης. "Οταν ἀδυνατίσῃ κανείς, τὸ λίπος αὐτὸ ἔξαντλεῖται καὶ τότε τὰ μάτια «μπαίνουν μέσα στὶς κόγχες τους».

10) Κάποτε θὰ ἔτυχε νὰ παρουσιασθῇ εἰς τὸ μάτι σου «κριθαράκι». Τοῦτο σχηματίζεται, ὅταν οἱ ἀδένες τοῦ ἐπιπεφυκότος ἀποφραγχθοῦν.

11) 'Ο βλεννογόνος τῆς ρινὸς διατηρεῖ πάντοτε μίαν ὑγρασίαν, χωρὶς τὴν δόποίαν δὲν εἶναι δυνατή ἡ ὅσφρησις. Διὰ νὰ προκληθῇ ἡ αἴσθησις μιᾶς ὄσμῆς, πρέπει τὰ λεπτότατα τεμάχια τῆς οὐσίας, τὰ ὅποια ἔφθασαν εἰς τὴν ρινικὴν κοιλότητα, νὰ διαλυθοῦν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΤΟΝ


ΤΟ ΔΕΡΜΑ

1. ΣΤΟΙΒΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ. ΥΠΟΔΟΡΙΟΣ ΙΣΤΟΣ. ΠΕΡΙΤΟΝΙΑ

Τὸ δέρμα, τὸ ὅποιον καλύπτει τὸ σῶμα ἔξωτερικῶς, προστατεύει τοὺς λοιποὺς ἴστους ἀπὸ τὴν ἄμεσον ἐπίδρασιν τοῦ περιβάλλοντος (ψυχος κλπ.). Ὅπὸ τὸ μικροσκόπιον, εἰς μίαν κάθετον τομὴν τοῦ δέρματος διακρίνονται αἱ ἔξης στοιβάδες (εἰκ. 51):

α) 'Η ἐπιδερμίς, ἀποτελουμένη ἀπὸ πολλὰ στρώματα κυττάρων. Ἐκ τούτων τὰ ἔξωτερικὰ ἔχουν ὑποστῆ κερατινοποίησιν, δηλ. ἀπεξηράνθησαν, καὶ τὸ πρωτόπλασμά των ἀντικατεστάθη διὰ κερατίνης. "Ωστε ἡ ἐπιδερμίς περιλαμβάνει δύο μικροτέρας στοιβάδας: 1) τὴν κερατίνην στοιβάδα, ἡ ὅποια ἀποτελεῖται ἀπὸ κύτταρα κερατινοποιημένα καὶ νεκρά καὶ 2) τὴν κατωτέραν μαλπιγιανή στοιβάδα, ἡ ὅποια περιλαμβάνει ζῶντα καὶ ἀνανεούμενα διαρκῶς κύτταρα. Ἡ κερατίνη στοιβάς συνεχῶς ἀποπίπτει κατὰ μικρὰ λέπια, ἀντικαθίσταται δὲ ἐν τῷ μεταξὺ ἀπὸ τὰ ἀνώτερα στρώματα τῆς μαλπιγιανῆς, τὰ ὅποια βαθυτέρων καὶ αὐτὰ κερατινοποιοῦνται.

β) Τὸ χόριον. Τοῦτο εύρισκεται κάτωθεν τῆς ἐπιδερμίδος καὶ εἰσιδύει ἐντὸς αὐτῆς ὑπὸ μορφὴν θηλῶν. Εἰς κάθε θηλὴν ἀπολήγουν λεπτὰ αἷμοφόρα ἀγγεῖα. Τὸ χόριον περιλαμβάνει μεταξὺ τῶν κυττάρων του ἐλαστικὰ ἴνδια.



Εἰκ. 51. Σχηματική τομὴ διὰ τοῦ δέρματος. 1. Κερατίνη στοιβάς. — 2. Μαλπιγιανή στοιβάς. — 3. Χόριον. — 4. 5. Ιδρωτοποίησ ἀδήν. — 6. Λιπώδης ιστός. — 7. Ἀρτηρία. — 8. Φλέψ. — 9. Τομὴ τριχός. — 10. Συμγυαστογόνος ἀδήν. — 11. Μυϊκὴ ἵς τῆς τριχός. — 12. Ἀπτικὸν σωμάτιον.

γ) Ό υποδόριος ιστός. Ούτος εύρισκεται κάτωθεν τοῦ χορίου καὶ ἀποτελεῖται ἀπὸ ἐν στρῶμα ἀπὸ συνδετικὸν ιστόν, ὁ ὄποιος δύναται νὰ περιλαμβάνῃ καὶ λίπος. Κάτωθεν τοῦ στρῶματος τούτου συναντῶνται τὰ μεμβρανώδη περιβλήματα τῶν μυῶν. Ταῦτα εἶναι ἡ περιτονία, ἡ ὄποια καλύπτει ὅλην τὴν μυϊκὴν μᾶζαν, καὶ τὸ περιμύιον ἐκάστου μυός.

2. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ. ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΧΩΝ

Αἱ τρίχες ἔχουν τὴν ρίζαν των εἰς τὸ χόριον καὶ, διερχόμεναι τὴν ἐπιδερμίδα, φθάνουν εἰς τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ σώματος. Εἰς τὴν ρίζαν ἑκάστης τρίχως ἀπολήγει εἰς λεῖος μῆς, ὁ ὄποιος κινεῖ αὐτήν. Αἱ τρίχες σχηματίζονται ἀπὸ τὸ δέρμα διὰ κερατινοποιήσεως καὶ δὶ’ αὐτό, εἰς μίαν κάθετον τομὴν τριχός, διακρίνονται ὑπὸ τὸ μικροσκόπιον στρῶματα ἀντίστοιχα πρὸς τὰς στοιβάδας τοῦ δέρματος.

Εἰς τὸ δέρμα συναντῶμεν καὶ τοὺς ἵδρω τοπούς καὶ τοὺς σμηγματογόνους ἀδένες. Οἱ πρῶτοι εἶναι συνεσπειρωμένοι καὶ ἀπολήγουν εἰς τὴν ἐπιφάνειαν. Οἱ δεύτεροι γενικῶς ἀπολήγουν εἰς τὰς ρίζας τῶν τριχῶν καὶ ἀποδίδουν τὸ λιπαρὸν σμῆγμα, τὸ ὄποιον διατηρεῖ τὴν ἑλαστικότητα τοῦ δέρματος καὶ τῶν τριχῶν. "Αλλοι ἀδένες τοῦ δέρματος εἶναι οἵ κυψελοί διοποιοί τοῦ ώτος καὶ οἵ γαλακτικοί ἀδένες τῶν θηλαστικῶν.

Οἱ ὄνυχες εἶναι πλάκες κεράτινοι προερχόμεναι ἀπὸ τὴν ἐπιδερμίδα καὶ καλύπτουσσαι τὸ ἄκρον τῆς ἄνω ἐπιφανείας τῶν δακτύλων. Εἰς ἕκαστον ὄνυχα διακρίνομεν: 1) τὴν κορυφήν, ἡ ὄποια εἶναι ἐλευθέρα· 2) τὸ σῶμα, τὸ ὄποιον εἶναι προσκολλημένον εἰς τὸ χόριον καὶ δὶ’ αὐτὸν φαίνεται ροδόχρουν καὶ 3) τὴν ρίζαν, ἡ ὄποια εἶναι λευκή, καὶ ἀπὸ τὴν ὄποιαν αὐξάνεται ὁ ὄνυξ.

Τὸ δέρμα περιλαμβάνει ἀκόμη διάφορα αἰσθητικὰ σωμάτια διὰ τὴν ἀφήνει τὴν θερμότητα.

Τὸ χρῶμα τοῦ δέρματος καὶ τῶν τριχῶν, καθὼς καὶ τῆς ἱρίδος τοῦ ὀφθαλμοῦ, ὀφείλεται εἰς μίαν χρωστικήν, ἡ ὄποια ὑπάρχει ἐντὸς ἣ καὶ μεταξὺ τῶν κυττάρων τῆς ἐπιδερμίδος. "Η ἀπόχρωσις τοῦ δέρματος, ἴδιως ὅταν τοῦτο εἶναι λεπτὸν καὶ ἐπομένως μᾶλλον διαφανές, ἔξαρτᾶται ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὰ αίμοφόρα ἀγγεῖα καὶ τὸ ὑποδό-

ριον λίπος. "Οταν ἡ ἀνωτέρω χρωστικὴ εύρισκεται εἰς τὰς τρίχας ἄφθονος, αὗται παρουσιάζουν χρῶμα μαῦρον. "Οταν εύρισκεται εἰς μικροτέραν ποσότητα, καστανὸν καὶ κατόπιν ξανθὸν καὶ ὅταν τέλος εἴναι ἐλαχίστη, αἱ τρίχες ἔχουν χρῶμα πυρρόν. Κατὰ τὸ γῆρας αἱ τρίχες τῆς κεφαλῆς λευκαίνονται, λόγῳ καταστροφῆς τῆς χρωστικῆς.

3. ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ

Τὸ δέρμα περιλαμβάνει : α) τὴν ἐπιδερμίδα (κερατίνη καὶ μαλπιγιανή στοιβάς)· β) τὸ χόριον καὶ γ) τὸν ὑποδόριον ίστον. Ἐκ τοῦ δέρματος ἐκφύονται, διάφορα ἔξαρτήματα (τρίχες καὶ ὄνυχες). Ἐπίστης περιλαμβάνει τὸ δέρμα ἀδένας (σμηγματογόνους, ιδρωτοποιούς, γάλακτικούς, κυψελιδοποιούς) καὶ αἰσθητικά σωμάτια (ἀφή, θερμοκρασία).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΚΑΤΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ

Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

1. Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ.
Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΙΣΥΜΒΑΙΝΟΥΣΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΑΣ

(Παραδείγματα αίμορραγίας και διατηρήσεως της θερμοκρασίας).

Διὰ νὰ μελετήσωμεν τὸν ἀνθρώπινον ὄργανισμόν, ἐξητάσαμεν ζεχωριστὰ εἰς προηγούμενα κεφάλαια κάθε λειτουργίαν του καὶ κάθε σύστημα ὄργάνων του. Εἰς τὴν ζωὴν ὅμως τοῦ ὄργανισμοῦ τὰ διάφορα συστήματα συνεργάζονται μεταξύ των καὶ κάθε λειτουργία ἔξαρτᾶται καὶ ἀπὸ τὰς ὑπολοίπους. Π.χ. διὰ τὴν λειτουργίαν τῆς πέψεως ἀπαιτεῖται ἡ συνεργασία: α) τοῦ νευρικοῦ συστήματος (αὐτονόμου καὶ συμπαθητικοῦ), β) τοῦ μυϊκοῦ συστήματος (λείων καὶ γραμμωτῶν μυῶν), γ) διαφόρων αἰσθητικῶν σωματίων (γεῦσις, πείνα κλπ.) καὶ δ) τῶν διαφόρων ἀδένων τοῦ πεπτικοῦ συστήματος κ.ο.κ. Ὁμοίως, ἡ ὅλη θρέψις ἔξασφαλίζεται πάλιν διὰ τῆς συνεργασίας διαφόρων συστημάτων τοῦ ὄργανισμοῦ.

Ἄσ παρακολουθήσωμεν μίαν περίπτωσιν συνεργασίας διαφόρων συστημάτων πρὸς ἀντιμετώπισιν ἐνὸς τυχαίου γεγονότος, π.χ. μιᾶς αίμορραγίας. Λόγῳ τῆς αίμορραγίας, ὁ ὅγκος τοῦ αἵματος καὶ ὁ ἀριθμὸς τῶν αἵμοσφαιρίων μειοῦνται. Θ' ἀνέμενε κανεὶς ἐκ τούτου, ὅτι ἡ πίεσις τοῦ αἵματος θὰ καταπέσῃ καὶ ὅτι τὰ ἐρυθρὰ αἵμοσφαιρία δὲν θὰ ἐπαρκοῦν πλέον, διὰ νὰ δεσμεύουν ἀρκετὸν δύσγόνον. Τὰ βλαβερὰ ὅμως αὐτὰ ἀποτελέσματα τῆς αἵμορραγίας ἀποτρέπονται διὰ τῆς συνεργασίας διαφόρων συστημάτων. Τὸ νευρικὸν σύστημο συστέλλει τὰ ἀγγεῖα καὶ ἐπομένως ἡ πίεσις τοῦ αἵματος, παρὰ τὴν ἐλάττωσιν τοῦ ὅγκου, διατηρεῖται σταθερά. Μετὰ τὴν ἐπείγουσαν αὐτὴν τακτοποίησιν, ὁ ὄργανισμὸς φροντίζει ώστε νὰ ἐπανέλθῃ ὁ ὅγκος καὶ ἡ σύστασις τοῦ αἵματος εἰς τὸ κανονικόν. Πρὸς τοῦτο λέμφος εἰσδύει εἰς τὰ ἀγγεῖα ἀπὸ τοὺς ίστούς, ὁ δὲ ἀσθενής, αἰσθά-

νόμενος μεγάλην δίψαν, πίνει πολὺ ύδωρ. 'Ο μυελὸς τῶν ὀστῶν ἔξ
ἄλλου παράγει μεγάλας ποσότητας ἐρυθρῶν αἷμοσφαιρίων πρὸς
ἀντικατάστασιν τῶν ἀπωλεσθέντων διὰ τῆς αἵμορραγίας.

Εἰς τὸ ἀνωτέρω παράδειγμα, συνέβη μία μεταβολὴ (ἀπώλεια
ἔνδος ὅγκου αἵματος), ή ὅποια θά ἡδύνατο νὰ διαταράξῃ τὴν λειτουρ-
γίαν τοῦ ὄργανισμοῦ. Διότι, ἐὰν ἡ πίεσις ἐντὸς τῶν ἀγγείων κατέ-
πιπτε πολύ, θὰ διεκόπητε ή κίνησις τοῦ αἵματος. Ἐπίσης, ἂν ὁ
ἀριθμὸς τῶν αἵμοσφαιρίων παρέμενε μικρός, δὲν θὰ ἐπήρκει, διὰ νὰ
δεσμεύσῃ τὴν ἀναγκαίαν ποσότητα ὀξυγόνου. 'Ο ὄργανισμὸς ἐν
τούτοις κατέβαλεν ὠρισμένας προσπαθείας καὶ κατώρθωσε νὰ συνε-
χίσῃ τὴν λειτουργίαν του.

'Η τοιαύτη προσπάθεια, τὴν ὅποιαν καταβάλλει ὁ ὄργανισμός,
διὰ νὰ ἔξασφαλίσῃ τὴν λειτουργίαν του, παρὰ τὰς τυχὸν συμβαι-
νούσας μεταβολάς, αἱ ὅποιαι δύνανται νὰ διαταράξουν αὐτήν,
καλεῖται προστικὴ λειτουργία. Μεταβολαὶ ὡς
αἱ ἀνωτέρω δύνανται νὰ συμβοῦν ἐντὸς τοῦ ὄργανισμοῦ (π.χ. ἐλάτ-
τωσις τοῦ αἵματος) ἢ εἰς τὸ περιβάλλον (π.χ. ἀλλαγὴ κλίματος).

⁹Αναφέρομεν ἀκόμη ἐν παράδειγμα, εἰς τὸ ὅποιον ξαναφαίνεται
ἡ προσαρμοστικὴ ἱκανότης τοῦ ὄργανισμοῦ.

Είναι γνωστὸν ὅτι ἡ θερμοκρασία τοῦ ἀέρος μεταβάλλεται.
Ἐπίσης ἐντὸς τοῦ σώματος διὰ τῶν καύσεων παράγεται διάφορον
ἐκάστοτε ποσὸν θερμότητος. Παρ' ὅλα αὐτά, ἡ θερμοκρασία τοῦ
ύγιοῦς ἀνθρώπου διατηρεῖται σταθερά. Τοῦτο ἐπιτυγχάνεται ὡς ἔξῆς:

"Οταν ἡ ποσότης τῆς θερμότητος, ἐκ τῶν καύσεων καὶ ἐκ τοῦ
περιβάλλοντος, τείνῃ νὰ αὔξησῃ τὴν θερμοκρασίαν τοῦ σώματος,
παρατηροῦνται ὠρισμένα φαινόμενα, ἀποτρέποντα τὸ ἀποτέλεσμα
τοῦτο. Αἱ ἀναπνευστικὲς κινήσεις ἐπιταχύνονται, ἥτοι γίνεται
μεγαλυτέρα ἔξατμιστικὴ ὕδατος καὶ συχνοτέρα ἐπαφὴ τοῦ αἵματος
πρὸς τὸν ἀέρα εἰς τοὺς πνεύμονας. Τὰ ἀγγεῖα τοῦ δέρματος διαστέλ-
λονται καὶ ἐπομένως περισσότερον αἷμα κυκλοφορεῖ εἰς αὐτὰ καὶ
ἔρχεται εἰς ἐπαφὴν μὲν τὸν ἀέρα. (Λέγουν τότε «κοκκίνισα ἀπὸ τὴ
ζέστη»). "Ολα αὐτὰ προκαλοῦν μίαν ἀπώλειαν θερμότητος ἀπὸ τὸ
αἷμα. Τέλος καὶ ὁ ἴδρως, ὁ ὅποιος ἐκκρίνεται, ἔξατμιζόμενος, ἀφαιρεῖ
θερμότητα ἀπὸ τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ σώματος.

Ἐὰν ἀντιθέτως ἡ θερμοκρασία τοῦ περιβάλλοντος ταπεινωθῇ
σημαντικῶς, παρατηροῦνται φαινόμενα ἐμποδίζοντα τὴν πτῶσιν

τῆς θερμοκρασίας τοῦ σώματος. Τὰ ἀγγεῖα τοῦ δέρματος συστέλλονται, ὡστε δλιγώτερον αἷμα νὰ ἔρχεται εἰς ἐπαφὴν μὲ τὸν ψυχρὸν ἀέρα. (Λέγουν τότε « κιτρίνισα ἀπὸ τὸ κρύο »). Ἀντιθέτως, εἰς τὰ ἐσωτερικά ὅργανα κυκλοφορεῖ περισσότερον αἷμα καὶ οὕτω ἀφ' ἐνὸς μὲν διαφυλάσσει τὴν θερμότητά του, ἀφ' ἑτέρου δὲ αὐξάνει τὰς καύσεις. Ἐπίσης διάφοροι μύες τίθενται εἰς κίνησιν μὲ σκοπὸν πάλιν τὴν αὔξησιν τῶν καύσεων. Τοιοῦτοι εἶναι π.χ. οἱ μύες τῶν τριχῶν (λέγουν τότε « ἀνατρίχιασσα ἀπὸ τὸ κρύο »), καθὼς καὶ οἱ μύες οἱ κινοῦντες τὴν γνάθον (« κτυποῦν τὰ δόντια μου ἀπ' τὸ κρύο »). Ἀκριβῶς διὰ ν' αὐξήσωμεν τὰς καύσεις, θέτομεν εἰς λειτουργίαν καὶ ἕκουσίως τοὺς μῆς « γιὰ νὰ ζεσταθοῦμε » .

Μετὰ τὰ προηγούμενα παραδείγματα κατανοοῦμεν καλύτερον, ὅτι αἱ διάφοροι μεταβολαί, εἰς τὸ σῶμα ἢ τὸ περιβάλλον προκαλοῦν, διεγείρουν, ὡς λέγομεν, τὴν προσαρμοστικὴν λειτουργίαν τοῦ ὄργανισμοῦ. Ἡ λειτουργία αὕτη τελεῖται ὑφ' ὅλου τοῦ ὄργανισμοῦ, δηλ. διάφορα συστήματα ἐργάζονται πρὸς ἀντιμετώπισιν ἀπὸ κοινοῦ τῶν ἀποτελεσμάτων κάθε μεταβολῆς.

Ἡ προσαρμοστικὴ λειτουργία ἐπιτυγχάνει τὸν σκοπὸν της, ἐφ' ὅσον αἱ συμβαίνουσαι μεταβολαὶ δὲν ὑπερβοῦν ὠρισμένα ὅρια.

2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΧΝΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. ΣΚΛΗΡΑΓΩΓΙΑ

(Παράδειγμα ζωῆς εἰς ὑψηλὰ μέρη).

Ἡ ἀνάγκη τῆς προσαρμογῆς ὑποχρεώνει διάφορα συστήματα νὰ ἐργάζωνται ζωηρότερον καὶ ἐντατικώτερον. Ἄσ τὸ ποθέσωμεν π.χ., ὅτι εἰς ἀνθρώπινος ὄργανισμὸς πρέπει νὰ ζήσῃ εἰς μέγα ὕψος ἐπὶ τίνος ὑψηλοῦ ὅρους. Ὁ ἀτμοσφαιρικὸς ἀὴρ εἰς τὸ ὕψος τοῦτο εἶναι ἀραιός, ἐπομένως, διὰ νὰ δεσμεύῃ ὁ ὄργανισμὸς τὸ ἀναγκαῖον δξυγόνον, πρέπει νὰ εἰσάγῃ εἰς τοὺς πνεύμονας μεγαλύτερον ὅγκον ἀέρος. Πρὸς τοῦτο ἡ ἀναπνοὴ γίνεται βαθυτέρα, οἱ μύες τοῦ θώρακος ἐργάζονται περισσότερον, ἡ θωρακικὴ κοιλότης εύρυνεται. Ἐξ ἄλλου παράγονται περισσότερα ἐρυθρὰ αἷμοσφαιρία. Ἐάν ἀργότερον ὁ ἵδιος ὄργανισμὸς ἐπιστρέψῃ εἰς τὴν πεδιάδα, ὁ ἀριθμὸς τῶν αἵμοσφαιρίων κατέρχεται καὶ πάλιν, ὅπωσδήποτε ὅμως ἡ

ζωή είς τὸ ὑψηλὸν ὅρος ἀφήνει τὰ ἔχνη της. Ἡ ἀναπνοὴ παραμένει βαθεῖα, ὁ θώραξ καλύτερον ἀνεπτυγμένος, τὸ μυϊκὸν σύστημα, τὸ κυκλοφοριακὸν καὶ τὰ αἱμοποιητικὰ ὄργανα ἔχουν συνηθίσει νὰ ἐργάζωνται καλύτερον. Ἀποτέλεσμα τῆς ἔξασκήσεως αὐτῆς εἶναι, ὅτι τὰ διάφορα συστήματα ἐνδυναμώνονται καὶ ὅλος ὁ ὄργανισμὸς τονώνεται καὶ ἀποκτᾷ μεγαλυτέραν ἀντοχήν.

Ἐὰν λοιπὸν ὑποβάλλωμεν τὸν ὄργανισμὸν εἰς ἐντατικὴν ἐργασίαν καὶ τὸν ἀφήνωμεν ν' ἀντιμετωπίσῃ μὲ τὰς ἴδικὰς του δυνάμεις τὰς μεταβολὰς τοῦ περιβάλλοντος, διεγείρεται ἡ προσαρμοστικὴ λειτουργία καὶ αὐξάνεται ἡ ἀντοχὴ καὶ ἡ ζωηρότης του. Τοιαύτη εἶναι ἡ ἐπίδρασις π.χ. τῆς ἀγροτικῆς καὶ τῆς στρατιωτικῆς ζωῆς.

Εἶναι ὅμως φανερόν, ὅτι ἡ σκληραγωγία δὲν δύναται νὰ ὑπερβαίνῃ ὥρισμένα ὄρια. Τὰ ὄρια αὐτὰ εἶναι διάφορα δι' ἕκαστον ὄργανισμόν. Εἶναι γνωστόν, ὅτι ἄλλοι ὀντέχουν εἰς ἐντατικὴν προσπάθειαν ἢ εἰς τὰς ἀσθενείας, ἐνῷ ἄλλοι κουράζονται ἢ ἀσθενοῦν εὔκόλως. Ἰδιαιτέρα μάλιστα προσοχὴ ἀπαιτεῖται κατὰ τὴν νεαράν ἥλικίαν, κατὰ τὴν δποίαν ἔξακολουθεῖ ἡ ἀνάπτυξις τοῦ σώματος καὶ ὁ ὄργανισμὸς εἶναι εὐπαθής.

3. ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ

Εἰς τὴν κατάστασιν τοῦ σώματος καὶ τοῦ περιβάλλοντος ἐπέρχονται ἐνίστε μεταβολαί, αἱ δποίαι θὰ ἡδύνωντο νὰ δυσκολεύσουν τὴν ὁμαλήν λειτουργίαν τοῦ ὄργανισμοῦ. Ἀλλὰ τὰ διάφορα ὄργανικά συστήματα ἔχουν τὴν ἰκανότητα νὰ συνεργάζωνται καὶ διὰ κοινῆς προσπιθείας ν' ἀντιμετωπίζουν τὰς νέας συνθήκας ζωῆς. Τοῦτο ἀποτελεῖ τὴν προσαρμοστικὴν λειτουργίαν τοῦ ὄργανισμοῦ. "Οταν τὰ ὄργανικά συστήματα ὑποβάλλωνται συχνά εἰς τὴν προσπάθειαν τῆς προσαρμογῆς εἰς δυσκολωτέρους δρους, τὰ συστήματα ταῦτα ἔξασκοῦνται καὶ ἐνδυναμώνονται καὶ ὁ ὄργανισμὸς ἀποκτᾷ μεγαλυτέραν ἀντοχὴν καὶ ζωηρότητα (σκληραγωγία).

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
ΓΕΝΕΣΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ
ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΖΩΑ

Εις τὴν Φυτολογίαν ἔμάθομεν, ὅτι γενικῶς, διὰ νὰ σχηματισθῇ ἔνα νέον φυτόν, πρέπει νὰ ἔνωθοῦν δύο διάφορα γεννητικά κύτταρα. Τὸ ἐν ἔξ αὐτῶν, καλούμενον σπερματοζῷαριον, εύρισκεται εἰς τὸν κόκκον τῆς γύρεως, τὸ δὲ ἄλλο, καλούμενον ωάριον, εύρισκεται ἐντὸς τῆς ὡσθήκης. "Οταν ὁ κόκκος τῆς γύρεως πέσῃ ἐπὶ τοῦ ὑπέρου, τὰ δύο αὐτὰ κύτταρα, συναντώμενα, ἔνώνονται (γ ν ο ν μ ο π ο ι η-σις), καὶ τὸ γονιμοποιούμενον πλέον ωάριον ἔχει τὴν ἴκανότητα νὰ τμηθῇ καὶ νὰ σχηματίσῃ δύο κύτταρα, τὰ δόποια ὁμοίως τέμνονται καὶ δίδουν τέσσαρα, ὀκτὼ κ.ο.κ. Τὰ δημιουργούμενα τοιουτοτρόπως κύτταρα σχηματίζουν τὸ ἐμβρύον τοῦ νέου φυτοῦ. Τὸ ἔμβρυον τοῦτο μένει ἐντὸς τοῦ σπόρου ἐν ἡρεμίᾳ, ἐπὶ μῆνας ἥ καὶ ἔτη. Τέλος, ὅταν εύρεθῇ εἰς καταλλήλους συνθήκας, αὐξάνεται, σχηματίζει ρίζας καὶ ἀναπτύσσεται εἰς τὸ νέον φυτὸν (β λ ἀ σ τ η σις).

Ἄναλόγως καὶ εἰς τὰ ζῷα, μετὰ τὴν συνένωσιν τῶν δύο γεννητικῶν κυττάρων, σχηματίζεται πάλιν τὸ ἔμβρυον. Τοῦτο ἀναπτύσσεται εἰς ἄλλα μὲν ζῷα ἐκτὸς τοῦ σώματος τῆς μητρὸς (ῳ ο τ ὄ-κ α), εἰς ἄλλα δὲ ἐντὸς αὐτοῦ (ζωοτόκα).

2. ΕΜΒΡΥ·Ι·ΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ


Εις τὰ θηλαστικά, τὰ δόποια, ὡς γνωστόν, είναι ζωοτόκα, ἡ ἀναπτυξις τοῦ ἔμβρυου τελεῖται ἐντὸς ἔνδος μυώδους, ἀσκοειδοῦς ὀργάνου, τῆς μήτρας. Αὕτη εύρισκεται εἰς τὴν κοιλότητα τῆς λεκάνης καὶ συγκοινωνεῖ πρὸς τὰς ὡσθήκας. Τὸ ἔμβρυον συγκρατεῖται ὑπὸ τῶν λαχνῶν τοῦ βλεννογόνου τῆς μήτρας, αἱ δόποιαι ἀποτελοῦν τὸν πλακοῦντα. Αἱ λάχναι αὔται είναι πλούσιαι εἰς αἷμαφόρα ἀγγεῖα, τὰ δόποια προσάγουν θρεπτικάς ούσίας ἀπὸ τὴν κυκλοφορίαν τῆς μητρὸς πρὸς διατροφὴν τοῦ ἔμβρυου. Διὰ νὰ προ-

στατεύεται καὶ τὸ ἔμβρυον καὶ ἡ μήτηρ ἀπὸ ἀποτόμους μετατοπίσεις τοῦ ἔμβρυου, τοῦτο εύρισκεται ἐντὸς σάκκου πλήρους ύγρου. "Οταν ἡ ἀνάπτυξις τοῦ ἔμβρυου συμπληρωθῇ, τὸ ἔμβρυον ἔξερχεται ἀπὸ τὸ μητρικὸν σῶμα (τοκετός) καὶ ἀρχίζει τὴν ἀνεξάρτητον ζωήν του.

Εἰς τὸν ἄνθρωπον, ὁ ὅποιος ἀνήκει ἐπίστης εἰς τὰ Θηλαστικά, ἡ ἔμβρυϊκὴ ἀνάπτυξις, ἀπὸ τῆς στιγμῆς κατὰ τὴν δοποίαν ἀρχίζει τὸ ὠάριον νὰ τέμνεται μέχρι τοῦ τοκετοῦ, διαρκεῖ περίπου 280 ἡμέρας. "Οσον προχωρεῖ ἡ ἀνάπτυξις, τόσον τὸ ἔμβρυον τελειοποιεῖται καὶ τέλος φθάνει εἰς τὴν μορφὴν τοῦ ἀνθρωπίνου νεογνοῦ.

3. ΑΙ ΗΛΙΚΙΑΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Τὸ νεογνὸν τοῦ ἀνθρώπου, τὸ ὅποιον ἔχει μέγεθος περίπου 50 ἔκ., μόλις ἔξελθῃ τοῦ μητρικοῦ σώματος, ἀρχίζει ν' ἀναπτνέῃ καὶ νὰ κραυγάζῃ. Κατὰ τὸ πρῶτον ἔτος τῆς ἡλικίας του τὸ βρέφος τρέφεται διὰ τοῦ θηλασμοῦ, αὐξάνει δὲ περίπου κατὰ 25 ἔκ. Κατὰ τὸ τέλος τοῦ πρώτου ἔτους ἀναφαίνονται οἱ πρῶτοι τομεῖς ὁδόντες. Τὸ 2ον καὶ 3ον ἔτος τῆς ζωῆς ἀποτελοῦν τὴν νηπιακὴν ἡλι-




Eik. 52. Αἱ πηγαὶ τοῦ κρανίου: α) νεογνοῦ, β) εἰς ἡλικίαν 9 μηνῶν, γ) εἰς ἡλικίαν ἐνὸς ἔτους, δ) εἰς ἡλικίαν τριῶν ἔτων.

κίαν, κατὰ τὴν δοποίαν ὁ ἄνθρωπος ἀρχίζει νὰ βαδίζῃ, νὰ κάθηται καὶ νὰ ὅμιλῃ. Κατὰ τὸ 2ον ἔτος παρατηρεῖται αὔξησις κατὰ 10 περίπου ἔκ., συμπληροῦται δὲ καὶ ἡ πρώτη ὁδοντοφύΐα ἐξ 20 νεογιλῶν ὁδόντων. Κατὰ τὴν νηπιακὴν ἡλικίαν τὰ ὀστᾶ τοῦ κρανίου ἀφήνουν μεταξύ των μεμβρανώδη διάκενα, καλούμενα πηγάς, διὰ νὰ μὴ ἐμποδίζεται ἡ αὔξησις τοῦ ἐγκεφάλου (εἰκ. 52). Γενικῶς δὲ τὰ ὀστᾶ τοῦ νηπίου εἶναι πολὺ εὔπλαστα.

Τὴν νηπιακὴν διαδέχεται ἡ παιδικὴ ἡλικία. Ἐνῷ γενικῶς

ή ἐτησία αὔξησις τοῦ σώματος φθάνει τὰ 5 ἔκ., ὑπάρχουν δύο περίοδοι τῆς παιδικῆς ἡλικίας, κατὰ τὰς ὅποιας ή ἀνάπτυξις τελεῖται γοργότερον. Ἡ πρώτη τοιαύτη περίοδος συμπίπτει μὲ τὸ 6ον ή 7ον ἔτος, ή δὲ δευτέρα μὲ τὸ τέλος τῆς παιδικῆς ἡλικίας. Κατὰ τὴν παιδικὴν ἡλικίαν ἀποπίπτουν βαθμιαίως οἱ νεογιλοί ὁδόντες, ἐκφύονται δὲ οἱ μόνιμοι, πλὴν τῶν τρίτων γομφίων.

Ἐκ τῶν ἐνδοκρινῶν ἀδένων λειτουργοῦν ἐντατικώτερον δὲ θύμος, ή ὑπόφυσις καὶ ή ἐπίφυσις. Ἐκ τούτων ή ἐπίφυσις μετὰ τὸ 10ον ἔτος καταστρέφεται.



Εἰκ. 53. Ἡ μεταβολὴ τῶν ἀναλογιῶν τοῦ σώματος. α) Ἐμβρυον. β) Παιδίον. γ) Ὡρίμος ἄνθρ. σεως, ἔντείνεται ή λειτουργία ἄλλων ἐνδοκρινῶν ἀδένων, ὡς π.χ. τοῦ θυρεοειδοῦς. Γενικῶς ή ἐφηβική ἡλικία είναι τὸ στάδιον, κατὰ τὸ διποῖον δύναται νὰ παραταθῇ ἐπὶ πολλὰ ἔτη. Κατ' αὐτὸ διάφορα ὅργανα ἀρχίζουν νὰ ἀτροφοῦν καὶ γενικῶς ὁ ὥριμος ἄνδρος ἐπιφύ-

τείνεται πλέον αὔξησις καθ' ὑψος τοῦ σώματος, τὸ ὅποιον ἀποκτᾷ τὴν δριστικήν του ἀνάπτυξιν καὶ τὰς δριστικάς του ἀναλογίας (εἰκ. 53). Τέλος, τὴν ὥριμον ἡλικίαν ἀκολουθεῖ τὸ γῆρας, τὸ διποῖον δύναται νὰ παραταθῇ ἐπὶ πολλὰ ἔτη. Κατ' αὐτὸ διάφορα ὅργανα ἀρχίζουν νὰ ἀτροφοῦν καὶ γενικῶς ὁ ὥριμος ἄνδρος ἐπιφύ-

τείνεται πλέον αὔξησις καθ' ὑψος τοῦ σώματος, τὸ ὅποιον ἀποκτᾷ τὴν δριστικήν του ἀνάπτυξιν καὶ τὰς δριστικάς του ἀναλογίας (εἰκ. 53). Τέλος, τὴν ὥριμον ἡλικίαν ἀκολουθεῖ τὸ γῆρας, τὸ διποῖον δύναται νὰ παραταθῇ ἐπὶ πολλὰ ἔτη. Κατ' αὐτὸ διάφορα ὅργανα ἀρχίζουν νὰ ἀτροφοῦν καὶ γενικῶς ὁ ὥριμος ἄνδρος ἐπιφύ-

4. ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ

‘Ο ἄνθρωπος γεννᾶται ἔπειτα ὀπὸ κύησιν 280 ἡμερῶν. Κατὰ τὴν διάρκειαν αὐτῆς τρέφεται δι’ ούσιῶν, τὰς ὁποίας παραλαμβάνει ὀπὸ τὸ κυκλοφορικὸν σύστημα τῆς μητρός. Τὸ 1ον ἔτος ὀπὸ τῆς γεννήσεως ἀνήκει εἰς τὴν βρεφικήν ἡλικίαν, τὸ 2ον καὶ 3ον εἰς τὴν νηπιακήν. ’Ακολουθεῖ δὲ παιδική ἡλικία μέχρι τοῦ 12ου — 14ου ἔτους, ὅπερ ἀρχίζει δὲ ἐφηβική, τὴν δοτούνταν πάλιν διαδέχεται δὲ ὥριμος ἡλικία. ’Απὸ τῆς γεννήσεως, δὲ αὔξησις τοῦ σώματος ἔξακολουθεῖ μέχρι τῆς ἐφηβικῆς ἡλικίας εἰς τὰ θήλεα, εἰς τὰ ἄρρενα δὲ συνεχίζεται καὶ μέχρι τῆς ὥριμου.

5. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1) Κάμνε κάθε χρόνο τὴν ίδιαν ἡμέραν (π.χ. τῶν γενεθλίων) μίαν ἀκριβῆ μέτρησιν τοῦ ἀναστήματος καὶ τοῦ βάρους σου καὶ σημείωνε τὶ εύρισκεις. Κάμνε τὸ ἴδιο καὶ εἰς τοὺς ἀδελφούς σου.

2) Λόγω ὥρισμένων μικρῶν διαφορῶν μεταξὺ τοῦ δεξιοῦ καὶ τοῦ ἀριστεροῦ μέρους τοῦ σώματος, εἶναι ἀδύνατον νὰ βαδίσῃ κανεὶς μὲ κλειστούς δόφθαλμούς κατ’ εὐθεῖαν γραμμήν. Δοκίμασέ το εἰς μίαν δύμαλήν ἔκτασιν, προσπαθῶν νὰ φθάσῃς, μὲ κλειστούς δόφθαλμούς, κατ’ εὐθεῖαν ἀπὸ ἐν σημεῖον εἰς ἄλλο.

3) Καὶ τὸ πρόσωπον παρουσιάζει γενικῶς μίαν μικράν ἀσυμμετρίαν εἰς τὰς διαστάσεις καὶ τὴν «μιμικήν» τῶν δύο τμημάτων του. Παρατίρησε εἰς μίαν φωτογραφίαν τὸ ἀριστερόν μέρος ἐνὸς προσώπου, καλύπτων τὸ δεξιόν, καὶ ἀντιστρόφως.

4) Μέτρησε καὶ σύγκρινε τὰς ἔξης διαδοχικὰς ἀποστάσεις: κορυφὴ κρανίου — ἄκρον ρινὸς — ἀρχὴ στέρνου — τέλος τοῦ στέρνου — ὀμφαλὸς — ἡβικὴ σύμφυσις — πέλμα.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ

ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

1. ΦΥΣΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Κάθε ἄνθρωπος ζῇ εἰς ἓνα τόπον τῆς γῆς, δὲ ὅποιος παρουσιάζει ώρισμένα γεωγραφικά γνωρίσματα, ώρισμένον κλῖμα καὶ ώρισμένον φυτικὸν καὶ ζωικὸν κόσμον. Αὐτὰ ὅλα ἀποτελοῦν τὸ φυσικὸν περιβάλλον. Ἐξ ἄλλου, κάθε ἄνθρωπος εἶναι καὶ μέλος μιᾶς κοινωνίας, ἣ ὅποια ἔχει ώρισμένον πολιτισμὸν καὶ ἡ ὅποια ἀποτελεῖ τὸ κοινωνικὸν περιβάλλον.

Μὲ τὸ φυσικὸν περιβάλλον δὲ ὁργανισμὸς ἔρχεται εἰς ἐπικοινωνίαν διὰ τῆς ἐπιφανείας τοῦ σώματος, τόσον τῆς ἔξωτερικῆς ὅσον καὶ τῆς ἔσωτερικῆς. Καὶ ἡ μὲν ἔξωτερικὴ ἐπιφάνεια ἀποτελεῖται ἀπὸ τὸ δέρμα, ἡ δὲ ἔσωτερικὴ ἀπὸ τοὺς βλεννογόνους, οἱ ὅποιοι ὑπενδύουν τὰς κοιλότητας τοῦ σώματος καὶ τοῦ πεπτικοῦ καὶ ἀναπνευστικοῦ σωλῆνος. Ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὸ δέρμα, οἱ βλεννογόνοι στεροῦνται κερατίνης στοιβάδος καὶ ἐπομένως δύνανται οὔσιαι ἐκ τοῦ περιβάλλοντος νὰ διέλθουν δι' αὐτῶν. Τέλος, δὲ ὁργανισμὸς ἐπικοινωνεῖ μὲ τὸ περιβάλλον καὶ διὰ τῶν αἰσθητηρίων του ὄργάνων.

Δυνάμεθα νὰ συνοψίσωμεν τὰς σχέσεις, εἰς τὰς ὅποιας ἔρχεται διὰ τῶν ἀνωτέρω ἐπιφανειῶν δὲ ὁργανισμὸς πρὸς τὸ περιβάλλον, ὡς ἔξῆς:

α) Μεταξὺ ὁργανισμοῦ καὶ περιβάλλοντος γίνεται ἀνταλλαγὴ διαφόρων οὐσιῶν.

β) Τὸ σῶμα ὑφίσταται διὰ τῆς ἐπιφανείας του τὴν ἐπίδρασιν τῶν φυσικῶν ὕρων τοῦ περιβάλλοντος (θερμοκρασία, φῶς κλπ.).

γ) Ὁ ὁργανισμὸς ἔρχεται εἰς βιολογικὰς σχέσεις μὲ τὸν ἄλλον

δργανικὸν κόσμον. Ἰδίως διάφοροι μικροοργανισμοὶ ἀσκοῦν σπουδαι-
στάτην ἐπίδρασιν ἐπ’ αὐτοῦ.

δ) Διὰ τῶν αἰσθητηρίων καὶ τοῦ νευρικοῦ συστήματος δέχεται
ὅ δργανισμὸς διαρκῶς ἐκ τοῦ ἔξωτερικοῦ κόσμου ἐρεθίσματα
καὶ δημιουργεῖ ἐν τυπώσεις.

2. ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΣ ΟΥΣΙΩΝ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ἐκ τῆς ἀτμοσφαίρας δργανισμὸς προσλαμβάνει τὸ δέχυ-
γόνον. Τοῦτο εἰς τὸ κατώτερον λεπτὸν στρῶμα τῆς ἀτμοσφαίρας,
ἐντὸς τοῦ ὅποιού ζῇ ὁ ἄνθρωπος, ύπάρχει ὑπὸ σταθερὰν ἀναλογίαν
(21%). Διὰ τοπικοὺς λόγους (ἔλη, πόλεις, σπήλαια κλπ.), εἶναι δυ-
νατὸν ὁ ἀτμοσφαιρικὸς ἀτμός νὰ περιέχῃ διαφόρους ἐπιβλαβεῖς προσ-
μείζεις εἰς μίαν μικράν περιοχὴν (σκόνη, διάφορα ἀέρια κλπ.).

Κατὰ τὰς λειτουργίας τῆς θρέψεως δργανισμὸς προσλαμ-
βάνει ὕδωρ καὶ θρεπτικάς οὐσίας. Ἡ σύστασις τοῦ ὕδατος καὶ τὸ
εἶδος τῶν τροφῶν ἔχει ταῦτα ἐν μέρει ἀπὸ τὸ φυσικὸν περιβάλλον,
διότι οἱ διάφοροι πληθυσμοὶ χρησιμοποιοῦν κυρίως τρόφιμα παραγό-
μενα εἰς τὸν τόπον των. Τοῦτο ισχύει περισσότερον διὰ τοὺς ἀγρο-
τικούς πληθυσμούς, οἱ ὅποιοι εἶναι οἱ ἴδιοι παραγωγοί, καὶ δι’ ἀπο-
μονωμένους πληθυσμούς. Διὰ τοῦτο συμβαίνει εἰς τινας τόπους ἡ
διατροφὴ τοῦ μεγαλυτέρου μέρους τοῦ πληθυσμοῦ νὰ εἶναι μονομε-
ρής. Π.χ. εἰς τὴν Ἀπωλήσεις κυρία τροφὴ μεγάλων μαζῶν
εἶναι τὸ ρύζι, οἱ δὲ Ἐσκιμῶι τρέφονται σχεδὸν ἀπὸ ψάρια καὶ κυ-
νήγιον.

Εἶναι φανερόν, ὅτι διὰ τοῦ τρόπου τούτου τὸ ἄμεσον φυσικὸν
περιβάλλον ἐπιδρᾷ ἐπὶ τῆς ἀναπτύξεως καὶ τῆς ὑγείας τοῦ ἀνθρώπου.

Ἐν τούτοις, ἡ ἐπίδρασις αὗτη τοῦ περιβάλλοντος ἔχει ἐλαττωθῆ⁷
διὰ τοῦ πολιτισμοῦ. Διότι, χάρις εἰς τὸ ἐμπόριον, τὰ προϊόντα τῶν
διαφόρων χωρῶν κυκλοφοροῦν εἰς ὅλον τὸν κόσμον, αἱ δὲ συνήθειαι
τῶν ἀνθρώπων τείνουν νὰ ἔξομοιωθοῦν.

3. ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ἡ θερμοκρασία μεταβάλλεται εἰς ἓνα τόπον ἀναλόγως τῆς ἐπο-
χῆς, τῆς ὥρας τοῦ ἡμερονυκτίου, τῆς νεφώσεως κλπ. Ἐπίσης ἀπὸ

τόπου εις τόπον διαφέρει ή θερμοκρασία άναλόγως τής γεωγραφικής θέσεως.

Γνωρίζουμεν ἡδη, πῶς ὁ ὑγιὴς ὀργανισμὸς κατορθώνει, παρ’ ὅλα αὐτά, νὰ διατηρῇ σταθεράν τὴν θερμοκρασίαν του. Ἐὰν ἐν τούτοις ἡ θερμοκρασία τοῦ περιβάλλοντος ἔξελθῃ ἀπὸ τὰ ὅρια τῆς ἀντοχῆς του, ἡ λειτουργία τοῦ ὀργανισμοῦ διαταράσσεται καὶ παρουσιάζονται διάφοροι παθήσεις (θερμοπληξία).

Αἱ ἡλιακαὶ ἀκτῖνες ὡφελοῦν τὸν ὀργανισμόν. Διὰ τοῦτο μάλιστα καὶ χρησιμοποιοῦνται πρὸς ἐνδυνάμωσίν του καὶ πρὸς θεραπείαν ὥρισμένων παθήσεων, ἵδια τῶν δυστῶν καὶ τοῦ δέρματος (ἥλιοθεραπεία). Εἰς τὴν ἐπίδρασιν τῶν ἀκτίνων τούτων ἀπαντᾶ ὁ ὀργανισμὸς διὰ τοῦ σχηματισμοῦ χρωστικῆς εἰς τὸ δέρμα. Ἡ χρωστικὴ αὗτη δυσκόλως σχηματίζεται εἰς τὰ ξανθὰ καὶ ἀνοικτόχρωμα ἄτομα. Διὰ τοῦτο αἱ ἡλιακαὶ ἀκτῖνες προκαλοῦν εἰς τὸ ἀπροστάτευτον δέρμα τῶν ἀτόμων τούτων εὔκόλως ἐγκαύματα (φυσαλίδες, ξεφλούδισμα).

Εἰς τοὺς διαφόρους τόπους τῆς γῆς ἡ λιόφανεια δὲν είναι τῇ αὐτῇ καὶ τοῦτο ἔχει ἐπίσης σημασίαν διὰ τὸν ὀργανισμόν. Εἰς τὴν Ἀγγλίαν π. χ., ὅπου ἐλάχισται ἡμέραι ἡλιοφανείας ὑπάρχουν, είναι συχνὴ ἡ ρωχīτις (ἀγγλικὴ νόσος).

Ἐκ τῶν ἄλλων φυσικῶν ὅρων τοῦ περιβάλλοντος μεγάλην ἐπίδρασιν ἔπι τοῦ ὀργανισμοῦ ἀσκεῖ ἡ ἀτμοσφαίρικὴ πίεσις. Αὕτη, ὃσον ἀνερχόμεθα καθ’ ὑψος, ἐλαττοῦται, λόγῳ τῆς ἀραιώσεως τοῦ ἀτμοσφαιρικοῦ ἀέρος. Ἐνῷ εἰς μικρὰς μεταβολὰς τῆς πιέσεως ὁ ὀργανισμὸς προσαρμόζεται, αἱ μεγάλαι μεταβολαὶ προκαλοῦν εἰς αὐτὸν σοβαρὰς βλάβας. Διάφοροι τοιαῦται παθήσεις παρατηροῦνται εἰς τοὺς δρειβάτας καὶ τοὺς ἀεροπόρους, οἱ δόποιοι ἀνέρχονται εἰς μεγάλα ὑψη, καθὼς καὶ εἰς τοὺς δύτας, οἱ δόποιοι ὑφίστανται ἐντὸς τοῦ ὄντος ἰσχυροτάτας πιέσεις.

4. ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Διάφοροι μικροοργανισμοὶ ἐπιζητοῦν νὰ ἐγκατασταθοῦν εἰς τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος καὶ νὰ τρέφωνται ἀπὸ τοὺς ιστούς του. Τοιοῦτοι ὀργανισμοὶ είναι διάφορα ἔντομα καὶ ἀκάρεα

(ψώρα κλπ.). "Αλλα ἔντομα ἀπομυζοῦν αἷμα καὶ μάλιστα δύνανται διὰ τοῦ τρόπου τούτου νὰ μεταδώσουν καὶ διαφόρους ἀσθενείας (κώνωπες κλπ.).

Μερικοὶ ὄργανισμοὶ ἐγκαθίστανται ἐντὸς τοῦ πεπτικοῦ σωλήνος τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἀπορροφοῦν θρεπτικὰς οὐσίας. Τοιαῦτα παράσιτα εἶναι ἡ ταινία, αἱ ἀμοιβάδες κλπ. Τέλος, ἄλλοι μικροοργανισμοὶ εἰσδύουν ἐντὸς τῶν ἰστῶν τοῦ σώματος, ἀναπτύσσονται ἐκεῖ καὶ προκαλοῦν τὰς μολυσματικὰς ἀσθενείας. Οἱ ὄργανισμοὶ οὗτοι ὑπάγονται εἰς τὰ βακτήρια ἢ τὰ πρωτόζωα ἢ τοὺς μύκητας, ἐνίστε ὅμως εἶναι καὶ ἀνώτερα ζῷα, ὡς ὁ ἔχινόκοκκος.

Κατὰ τῶν ἀνωτέρω παθογόνων μικροοργανισμῶν ἀμύνεται ὁ ἀνθρώπινος ὄργανισμὸς διὰ τῶν λευκῶν αἵμοσφαιρίων, διὰ διαφόρων οὖσιῶν (ἀντιοξεῖναι), τὰς ὅποιας πρὸς τοῦτο παράγει, καὶ δι' ἄλλων μέσων. Ἡ ἔξέτασις τοῦ τρόπου, μὲ τὸν δόποιον δύναται νὰ ἔνισχυθῇ ὁ ὄργανισμὸς εἰς τὸν ἀγῶνα του τοῦτον, ἀποτελεῖ θέμα τῆς Ἱατρικῆς.

5. ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ

Τὸ φυσικὸν περιβάλλον ἐπιδρᾷ ἐπὶ τοῦ ὄργανισμοῦ τοῦ ἀνθρώπου κατὰ τοὺς ἔξης τρόπους: α) διὰ τῆς ἀνταλλαγῆς οὔσιῶν, ἡ ὅποια γίνεται μεταξὺ τούτου καὶ τοῦ ὄργανισμοῦ (ἀήρ, τροφαί)· β) διὰ τῶν φυσικῶν συνθηκῶν τοῦ περιβάλλοντος (ἡλιακοὶ ἀκτῖνες, πίεσις κλπ.) καὶ γ) διὰ τῶν ὄργανισμῶν, οἱ δόποιοι ἔρχονται εἰς σχέσεις μὲ τὸ ἀνθρώπινον σῶμα (παράσιτα, μικρόβια).

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ

ΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑΙ ΦΥΛΑΙ

1. ΠΟΙΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΙΜΕΥΟΥΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΡΙΣΙΝ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΦΥΛΩΝ. ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ


Ἐκ πείρας διακρίνομεν τοὺς ἀνθρώπους εἰς φυλάς, στηριζόμενοι εἰς διάφορα σωματικὰ γνωρίσματα, τὰ δποῖα παρουσιάζουν οὗτοι. Είναι ὅμως δυνατὸν νὰ παρατηρήσωμεν σημαντικὰς διαφορὰς μεταξὺ ὡρισμένων ἀτόμων καὶ ἐν τούτοις νὰ μὴ τὰς λάβωμεν ὑπ’ ὅψιν, διὰ νὰ κατατάξωμεν τὰ ἄτομα εἰς διαφόρους φυλάς. Τοιαῦται διαφοραὶ εἰναι δσαι δφείλονται εἰς τὸ φῦλον καὶ τὴν ἡλικίαν (σύγκρισις ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν, νεαρῶν καὶ ἐνηλίκων ἀτόμων τῆς αὐτῆς φυλῆς). Ἐπίστης δὲν λαμβάνονται ὑπ’ ὅψιν δσα σωματικὰ γνωρίσματα ἔδημιουργήθησαν ἀπὸ τὸν τρόπον τῆς ζωῆς (ἐπάγγελμα κλπ.), ή ἀπὸ τυχαῖα γεγονότα (ἀσθένεια κλπ.).

Διαφοραὶ ὡς αἱ ἀνωτέρω ὑπάρχουν ἐντὸς κάθε φυλῆς. Διὰ νὰ διακρίνωμεν ἐπομένως τὰς φυλάς, πρέπει νὰ στηριχθῶμεν εἰς ἄλλα γνωρίσματα, τὰ δποῖα νὰ παρουσιάζωνται ὁμοιομόρφως ἐντὸς ἑκάστης φυλῆς. Ἀκόμη πρέπει τὰ γνωρίσματα αὐτὰ νὰ εἰναι κληρονομικά. Βεβαίως τὰ γνωρίσματα αὐτὰ δὲν θὰ παρουσιάζωνται κατὰ τὸν αὐτὸν ἀκριβῶς βαθμὸν ἀνεπτυγμένα εἰς ὅλα τὰ ἄτομα, αἱ παρατηρούμεναι ὅμως διαφοραὶ θὰ εἰναι μικραί.

Ἐάν ἔχωμεν ὑπ’ ὅψιν τ’ ἀνωτέρω, δυνάμεθα νὰ καθορίσωμεν μὲ μεγαλυτέρων ἀκρίβειαν τὶ ἐννοοῦμεν μὲ τὸν ὄρον φυλή: Φυλὴ εἶναι μία μεγάλη συνήθως ὁμάς ἀνθρώπων, τὴν δποίαν διακρίνομεν ἀπὸ τὰς ἄλλας, διότι παρουσιάζει ἐν σύνολον ἰδικῶν της γνωρισμάτων, τὰ γνωρίσματα δὲ αὐτὰ εἰναι κληρονομικά καὶ παρουσιάζονται μὲ μικρὰς μόνον διαφορὰς μεταξὺ τῶν ἀτόμων τῆς φυλῆς.

Πολλοὶ ἐπιστήμονες ἐπρότειναν διαφόρους διακρίσεις τῶν ἀν-

θρωπίνων φυλῶν. Π.χ. ὁ Blumenbach διέκρινε 5 μεγάλας φυλᾶς τὰς ἔξης: 1) τὴν Λευκὴν ἢ Καυκασίαν φυλήν, 2) τὴν Μογγολικήν ἢ Κιτρίνην, 3) τὴν Αἰθιοπικήν ἢ



Εἰκ. 54. Αἱ τρεῖς μεγάλαι περιοχαὶ τῆς Εὐρωποασίας.

Μαύρην, 4) τὴν Ἀμερικανικὴν ἢ Ἐρυθρόδερμον καὶ 6) τὴν Μαλαϊκὴν φυλήν.

Κατωτέρω θὰ περιγράψωμεν τὰς σημερινὰς ἀνθρωπίνας φυλᾶς συμφώνως πρὸς νεωτέρας διακρίσεις.

2. ΑΙ ΤΡΕΙΣ ΜΕΓΑΛΑΙ ΠΕΡΙΟΧΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΑΣΙΑΣ.
ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΜΕΓΑΛΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΦΥΛΩΝ

"Ας φέρωμεν μίαν γραφμήν διὰ τῶν Ἰμαλαῖων ὄρέων καὶ, διαγωνίως πρὸς αὐτήν, μίαν ἄλλην διὰ τῆς ὁροσειρᾶς τοῦ Τιὲν Σᾶν καὶ τῶν Ἀλταίων μέχρι τοῦ Βεριγγείου πορθμοῦ. Αἱ γραφμαὶ αὗται ξεχωρίζουν τρεῖς μεγάλας περιοχάς εἰς τὴν Εύρωποασίαν. Ἡ βορεία περιοχὴ περιλαμβάνει τὴν Εύρωπην καὶ τὴν Βόρειον Ἀσίαν, ἡ ἀνατολικὴ περιλαμβάνει τὴν Κεντρικὴν Ἀσίαν καὶ τὰς γειτονικὰς νήσους καὶ ἡ νοτία περιοχὴ περιλαμβάνει τὰς νοτίους χερσονήσους τῆς Ἀσίας καὶ τὰς πλησίους νήσους. Εἰς τὰς ἀρχὰς τῆς σημερινῆς γεωλογικῆς ἐποχῆς, ὅταν ἥρχισε νὰ ἀναπτύσσεται ὁ ἄνθρωπος, αἱ τρεῖς αὗται περιοχαὶ ἔχωριζοντο μεταξύ των περισσότερον παρὰ σήμερον, ἀπὸ τὰ ὅρη καὶ τὰς θαλάσσας, καθὼς καὶ τοὺς παγετῶνας καὶ τὰς ἐρήμους τῆς ἐποχῆς ἐκείνης (εἰκ. 54).

Εἰκ. 55. *Ατομον μὲ ἔντονα τὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ μογγολοειδοῦς κλάδου. Γυνὴ ἐκ Μαντζουρίας.

Ποιοῖαι δύμοιάζουν μεταξύ των, διαφέρουν δὲ πολὺ ἀπὸ τὰς φυλὰς τῶν ἄλλων περιοχῶν. Τὰ τρία αὗτά μεγάλα ἀθροίσματα τῶν φυλῶν, τὰ δόποια ἀνεπτύχθησαν εἰς τὰς περιοχὰς αὗτάς, καλοῦνται κ λ ἀ δ ο 1 φ υ λ ἃ ν.

3. Ο ΜΟΓΓΟΛΟΕΙΔΗΣ ΚΛΑΔΟΣ.
ΑΙ ΦΥΛΑΙ ΤΑΣ ΟΠΟΙΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

'Ο κλάδος οὗτος περιλαμβάνει τὰς φυλάς, αἱ δόποιαι ἀνεπτύχθησαν εἰς τὴν ἀνατολικὴν περιοχήν, ἀργότερα δὲ ἔξηπλώθησαν καὶ εἰς τὴν Ἀμερικήν.

Γενικῶς τὰ σωματικὰ γνωρίσματα τῶν φυλῶν τοῦ κλάδου τούτου (εἰκ. 55) εἶναι τὰ ἔξῆς: βραχυκεφαλία καὶ ἀνάστημα μέτριον ἢ μικρόν. Ἡ κόμη εἶναι μαύρη, λεία καὶ ἀραιά, τὸ δὲ τρίχωμα εἰς τὸ σῶμα εἶναι σπάνιον. Τὸ δέρμα ἔχει χρῶμα κιτρινωπόν, οἱ δόφθαλμοὶ



είναι λοξοί καὶ στενοί, ἀπέχουν πολὺ μεταξύ των καὶ τὰ βλέφαρα εύρισκονται ύψηλά. Τὸ πρόσωπον εἶναι ἐπίπεδον καὶ τὸ μέτωπον λοξόν. Ὡς ὅμως θὰ ἴδωμεν, τὰ χαρακτηριστικὰ αὐτὰ δὲν παρουσιάζονται εἰς ὅλας τὰς φυλὰς τοῦ κλάδου τούτου μὲ τὴν ίδιαν ζωηρότητα.

Αἱ κύριαι φυλαί, τὰς ὁποίας διακρίνουν εἰς τὸν κλάδον τοῦτον, εἶναι αἱ ἔξης:

1) Σιβηρίδαι. Οὗτοι ζοῦν εἰς τὰ δάση τῆς Σιβηρίας καὶ ἔχουν ἔλθει εἰς ἐπαφήν μὲ τὸν εὐρωποειδῆ κλάδον. Διὰ τοῦτο δὲν παρουσιάζουν πολὺ ἔντονα τὰ μογγολοειδῆ χαρακτηριστικά.

2) Τουγκίδαι. Οὗτοι εἶναι οἱ γνωστοὶ ὡς κυρίως Μογγόλοι. Ζοῦν νομαδικῶς εἰς τὰς ἑρήμους τῆς Κεντρικῆς Ασίας. Παρουσιάζουν τὰ μογγολοειδῆ χαρακτηριστικά ἐντόνως ἀνεπτυγμένα. "Αλλοτε ἐσάρωσαν ὡς ἐπιδρομεῖς ὅλην τὴν Εύρωπην καὶ τὴν Ασίαν. (Τσεγγις Χάν – ΙΓ' αἰών, Ταμερλάνος – ΙΔ' αἰών).

3) Σινίδαι (εἰκ. 56). Εἰς αὐτούς ὑπάγονται οἱ Κινέζοι, οἱ ὁποῖοι ὁμοιάζουν πρὸς τοὺς Εύρωπαίους περισσότερον ἀπὸ κάθε ἄλλην μογγολοειδῆ φυλήν. Παρουσιάζουν τὴν μεγαλυτέραν ἀναλογίαν ἀτόμων μὲ ὄγκωδες κρανίον (1400 κυβ. ἑκατ. καὶ ἄνω). "Ανέπτυξαν τὸν ἀρχαιότερον πολιτισμὸν καὶ ἡ ιστορία τῆς αὐτοκρατορίας των ἀρχίζει εἴκοσι δύο αἰώνας π.Χ.

Οἱ Ἰάπωνες εἶναι ἔθνος, τὸ ὁποῖον προῆλθεν ἐκ τῆς ἀναμείξεως διαφόρων γειτονικῶν φυλῶν.

4) Παλαιμογγολίδαι. Οὗτοι εἶναι οἱ νεώτεροι τοῦ μογγολοειδοῦς κλάδου καὶ ζοῦν εἰς τὸ Σιάμ καὶ τὰς νοτιοανατολικὰς νήσους τῆς Ασίας.

5) Ἰνδιανίδαι. Είναι τὸ τμῆμα τοῦ μογγολοειδοῦς κλάδου, τὸ δόποιον ἐπέρασεν εἰς τὴν Αμερικήν. "Αλλοτε εἶχον ἀναπτύξει ἐκεῖ ἰσχυρὰ κράτη, τὰ ὁποῖα κατεστράφησαν τελειωτικῶς ὑπὸ τῶν ἀποίκων τῆς Αμερικῆς. Σήμερον βαίνουν οἱ Ἰνδιανίδαι πρὸς τὴν ἔξαφάνισιν, μὴ δυνάμενοι νὰ προσαρμοσθοῦν εἰς τὸν εὐρωπαϊκὸν



Εἰκ. 56. Κινέζος.

πολιτισμόν. Εἰς τὴν Βόρειον Ἀμερικήν καλοῦνται συνήθως Ἐρυθρόδερμοι (εἰκ. 57) καὶ ζοῦν ἀκόμη νομαδικῶς.

Σημείωσις. Δευτερεύουσα φυλὴ τοῦ μογγολοειδοῦς κλάδου θεωροῦνται καὶ οἱ Ἐσκιμῶοι, οἱ δόποιοι κατοικοῦν εἰς τὴν βορείαν ἀρκτικὴν περιοχὴν (εἰκ. 58).

4. Ο ΝΕΓΡΟΕΙΔΗΣ ΚΛΑΔΟΣ. ΑΙ ΦΥΛΑΙ ΤΑΣ ΟΠΟΙΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

‘Ο κλάδος οὗτος περιλαμβάνει φυλάς, αἱ δόποιαι ἀνεπτύ-



Εἰκ. 58. Ἐσκιμώος.

Αἱ κύριαι φυλαὶ τοῦ κλάδου τούτου εἶναι αἱ ἔξης :

1) Αἴθιοπίδαι. Ἡ φυλὴ αὕτη ἀποτελεῖ τὸν κύριον πληθυσμὸν



Εἰκ. 57. Ἐρυθρόδερμος.

χθησαν εἰς τὴν νοτίαν μεγάλην περιοχὴν τῆς Εύρωποασίας. Σήμερον εἶναι ἔξηπλωμένος ὁ κλάδος οὗτος εἰς τὴν Ἀφρικήν καὶ τὴν Μελανησίαν.

Εἰς τὸν κλάδον τοῦτον παρουσιάζονται ποικίλα ἀνάστηματα. Οὔτως ὡρισμέναι φυλαὶ τῆς Ἀφρικῆς παρουσιάζουν τὸ ὑψηλότερον ἀνάστημα, ἐνῷ ἄλλαι τὸ βραχύτερον (Πυγμαῖοι κάτω τῶν 140 ἑκ.). Χαρακτηρίζουν τὸν νεγροειδῆ κλάδον (εἰκ. 59), τὸ μαῦρον χρῶμα τοῦ δέρματος, τὰ χονδρά προέχοντα χείλη κλπ.

τῆς Ἀβησσουνίας. Λόγω τῆς μακρᾶς ἐπαφῆς της μὲ τὸν εὐρωποειδῆ κλάδον, μέσῳ τῆς Ἀραβίας καὶ τῆς Αἰγύπτου, δὲν παρουσιάζει ἔντονα τὰ νεγροειδῆ χαρακτηριστικά.

2) Αἱ φυλαὶ τῶν σαβανῶν. Είναι ἔξηπλωμέναι εἰς τὴν ζόνην τῶν σαβανῶν, μεταξὺ τῶν ἐρήμων τῆς Βορείου Ἀφρικῆς καὶ τοῦ τροπικοῦ δάσους.

3) Παλαινεγρίδαι. Οὗτοι ζοῦν εἰς τὴν τροπικὴν ζώνην.

4) Μελανησίδαι. Οὗτοι κατοικοῦν ἔκτὸς τῆς Ἀφρικῆς, εἰς τὰς νήσους ΝΑ τῆς Ἀσίας. Προσέτι εἰς τὸν Νεγροειδῆ κλάδον τάσσονται καὶ δύο ἀκόμη φυλαί, αἱ δποῖαι παρουσιάζουν τὰ ἀτελέστερα χαρακτηριστικά καὶ τείνουν νὰ ἐκλείψουν, οἱ Πυγμαῖοι καὶ οἱ Αὔστραλίδαι. Οἱ πρῶτοι διατηροῦνται ἀκόμη εἰς τὸ ἐσωτερικὸν τῶν τροπικῶν δασῶν καὶ οἱ δεύτεροι εἰς τὰς ἐρήμους τῆς Αὔστραλίας. Αἱ ἀνωτέρω δύο φυλαὶ χαρακτηρίζονται ὡς δευτερεύουσαι φυλαὶ τοῦ νεγροειδοῦς κλάδου.



Εἰκ. 59. "Ατομα νεγρικῆς φυλῆς.
Αἱ φυλαὶ τὰς οποιας περιλαμβανει

5. Ο ΕΥΡΩΠΟΕΙΔΗΣ ΚΛΑΔΟΣ.


ΑΙ ΦΥΛΑΙ ΤΑΣ ΟΠΟΙΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

Ο Εύρωποειδῆς τέλος κλάδος περιλαμβάνει τὰς φυλάς, αἱ δποῖαι ἀνεπτύχθησαν εἰς τὴν βορειοδυτικὴν περιοχὴν τῆς Εύρωποασίας. Πρὸς τὴν Εύρωπην ἔξηπλώθη διὰ δύο διευθύνσεων: διὰ μέσου τῆς Σιβηρίας καὶ διὰ μέσου τῆς Πρόσω Ασίας. Εἰς τοὺς νεωτέρους χρόνους ἔξηπλώθη εἰς τὴν Ἀμερικὴν καὶ τὰς ἄλλας ἡπείρους καὶ πρωτοστατεῖ εἰς τὸν πολιτισμόν.

Διακρίνομεν τρεῖς ζώνας φυλῶν τοῦ κλάδου τούτου (εἰκ. 60):

Α) Τὴν ζώνην τῶν ἀνοικτοχρώμων βορείων φυλῶν. Αὕτη περιλαμβάνει δύο φυλάς: α) τὴν Βορείων φυλήν καὶ β) τὴν Ἀνατολικοευρωπαϊκήν.

Β) Τὴν κεντρικὴν ζώνην τῶν βραχυκεφάλων. Αὕτη περι-



Εἰκ. 60. Σχηματικὴ παράστασις τῶν τριῶν ζωνῶν ἔξαπλώσεως τῶν φυλῶν τοῦ εὐρωποειδοῦς κλάδου. Α. Βορεία ζώνη: 1. Βορεία φυλή. 2. Ἀνατολικοευρωπαϊκή. — Β. Κεντρικὴ ζώνη: 3. Ἀλπική φυλή. 4. Διναρική. 5. Ἀρμενική. 6. Τουρανική. — Γ. Νοτία ζώνη: 7. Μεσογειακή φυλή. 8. Ἀνατολική. 9. Ἰνδική φυλή.

λαμβάνει τέσσαρας φυλάς: α) τὴν Ἀλπικήν, β) τὴν Διναρικήν, γ) τὴν Ἀρμενικήν καὶ δ) τὴν Τουρανικήν.

Γ) Τὴν ζώνην τῶν νοτίων Εὐρασιατικῶν φυλῶν. Αὕτη περιλαμβάνει τρεῖς φυλάς: α) τὴν Μεσογειακήν, β) τὴν Ἀνατολικήν καὶ γ) τὴν Ἰνδικήν.

A'. Η ΖΩΗ ΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΧΡΩΜΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΦΥΛΩΝ

α) Βορεία φυλή. Τὰ χαρακτηριστικὰ τῆς φυλῆς αὐτῆς είναι τὰ ἔξῆς: Δέρμα καὶ κόμη πτωχὰ εἰς χρωστικήν. "Ωστε τὸ δέρμα είναι λευκὸν καὶ ἡ κόμη ξανθὴ ἢ πυρρόχρωμος καὶ οἱ ὄφθαλμοι γαλανοί.

Πρόσωπον ώοειδές καὶ μύτη εὐθεῖα καὶ στενόμακρος. Ἡ σιαγῶν προεξέχει καὶ τὸ μέτωπον κυρτοῦται κανονικῶς. Κρανίον δολιχοκέφαλον καὶ ἀνάστημα ὑψηλόν.

Διακρίνομεν ἐντὸς τῆς φυλῆς ταύτης τρεῖς τύπους: τὸν Τευτοβόρειον, ἵσχνὸν μὲν ξανθὴν κόμην, τὸν Δανο-βόρειον, μὲ βαρὺ σῶμα, πυρρὰν κόμην καὶ πλαστύτερον πρόσωπον καὶ τέλος τὸν Φιννο-βόρειον, λεπτόν, μὲ πυρρὰν κόμην καὶ πολὺ ἀνοικτοχρώμους ὄφθαλμούς.

Ἡ Βορεία φυλὴ εἶναι ἔξηπλωμένη κυρίως εἰς τὴν βόρειον Εύρωπην καὶ ἀνέκαθεν, λόγῳ τῆς ἀγονίας τοῦ ἐδάφους, παρουσίαζε μετακινήσεις. Εἶναι γνωσταὶ ἐκ τῆς Ἰστορίας αἱ πολλαὶ ἐπιδρομαὶ τῶν βορείων πρὸς τὴν νότιον Εύρωπην. Οὕτω π.χ. κατῆλθον τὰ Ἱνδογερμανικὰ ἔθνη μέχρι τῆς Βαλκανικῆς καὶ τῆς Μικρασίας δώδεκα περίπου αἰῶνας π.Χ. Ἐν τοιούτον φύλον ἥσαν οἱ Δωριεῖς. Τὸν δον αἰῶνα π.Χ. κατέρχονται οἱ Κέλται εἰς τὴν Ἱβηρικὴν Χερσόνησον. Τὸν 3ον καὶ 4ον αἰῶνα μ.Χ. βόρεια ἔθνη κατέρχονται μέχρι τῆς Βαλκανικῆς, τῆς Μικρασίας καὶ τῆς Ἰταλίας (Γότθοι).

Εἰς τοὺς νεωτέρους χρόνους τὰ βόρεια ἔθνη ἴδρυσαν τὰς μεγαλυτέρας ἀποικίας καὶ ἔξηπλωθήσαν εἰς τὴν Β. Ἀμερικήν, τὴν Αὐστραλίαν, τὴν Νέαν Ζηλανδίαν κλπ.

β) Ἀνατολικοευρωπαϊκὴ φυλή. Κύρια χαρακτηριστικὰ τῆς φυλῆς αὐτῆς εἶναι: Ἀνάστημα συνήθως μέτριον, χρῶμα στακτόξανθον εἰς τὴν κόμην καὶ πολὺ ἀνοικτὸν εἰς τὸ δέρμα καὶ τοὺς ὄφθαλμούς, ἡ ρὶς εἶναι μικρὰ καὶ ἀνεγείρεται κατὰ τὸ ἄκρον, τὸ δὲ στόμα εἶναι σχετικῶς μεγάλον καὶ τὸ δόλον πρόσωπον στρογγύλον. Εἰς τὴν αὐτὴν φυλὴν ἀνήκουν τὰ Σλαυϊκὰ ἔθνη, τὰ δόποια κατοικοῦν τὴν Α. Εύρωπην καὶ τὴν Β. Ἀσίαν, δηλαδὴ μίαν περιοχὴν εύφορον, πεδινὴν καὶ πλουσίαν εἰς δάση καὶ ἔλη.

Ἡ Ἀνατολικοευρωπαϊκὴ εἶναι ἡ γονιμωτέρα φυλὴ τοῦ εὐρωποειδοῦς κλάδου, ἀριθμοῦσα σήμερον περίπου 230 ἑκατομμύρια ψυχῶν.

Β'. Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΖΩΝΗ ΤΩΝ ΒΡΑΧΥΚΕΦΑΛΩΝ

α) Ἀλπικὴ φυλή. Κύρια χαρακτηριστικὰ τῆς φυλῆς ταύτης εἶναι τὰ ἔξῆς: ἀνάστημα μέτριον, σῶμα συχνὰ παχύ, κεφαλὴ στρογγύλη. Ἡ ρὶς εἶναι μικρά, ἡ ἀπόστασις δὲ μεταξὺ τῶν ὄφθαλ-

μῶν μεγάλη. Κρανίον βραχυκέφαλον καὶ χρῶμα κόμης ὀρφνόν.



Εἰκ. 61. Λασπωνίς.

‘Η Ἀλπικὴ φυλὴ κατοικεῖ εἰς τὴν ὁρεινὴν καὶ δασώδη Κεντρικήν Εύρωπην. Τμῆμα τῆς φυλῆς ταύτης εἶναι καὶ οἱ Λάπωνες, οἱ διποῖοι ἀποχωρισθέντες αὐτῆς, ζοῦν νομαδικῶς εἰς τὴν βόρειον Σκανδιναվίαν (εἰκ. 61).

β) Διναρικὴ φυλὴ. Αὕτη εἶναι ἔξηπλωμένη ἀνατολικῶν τῆς προηγουμένης, κυρίως εἰς τὰς ὁρεινὰς περιοχὰς τῶν Διναρικῶν “Αλπεων. Χαρακτηρίζεται ἀπὸ ὑψηλότατον ἀνάστημα καὶ ἴσχυρὰν βραχυκεφαλίαν. Τὸ κρανίον πρὸς τὰ ὄπισθα εἶναι ἐπίπεδον καὶ ἡ ρίς κυρτή. Τὸ χρῶμα τῶν τριχῶν καὶ τοῦ δέρματος εἶναι βαθὺ (εἰκ. 62).

γ) Αρμενικὴ φυλὴ. Αὕτη παρουσιάζει ὅμοιότητα μὲ τὴν Διναρικὴν καὶ μὲ τὴν ἐπομένην Τουρανικὴν φυλήν. Παρουσιάζει ἀνάστημα μέτριον, μέτωπον ἀπότομον καὶ ρίνα μεγάλην καὶ κεκαμένην.

δ) Τουρανικὴ φυλὴ. Αὕτη εἶναι ἔξηπλωμένη εἰς τὴν περιοχὴν τῆς Ἀνατολίας. Παρουσιάζει ἀνάστημα μέτριον, βραχυκεφαλίαν, μέτωπον ἀπότομον. Τὰ ζυγωματικὰ τόξα προεξέχουν. Τρίχωμα ἴσχυρὸν καὶ χείλη στενά.

Γ'. Η ΖΩΝΗ ΤΩΝ ΝΟΤΙΩΝ ΕΥΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΦΥΛΩΝ

α) Μεσογειακὴ φυλὴ (εἰκ. 63). Παρουσιάζει ἀνάστημα μέτριον ἡ μικρόν, πρόσωπον ὠοειδές καὶ κρανίον δολιχοκέφαλον. Δέρμα μελαχροινὸν καὶ κόμη ἐλαφρῶς κυματοειδῆς. Σωματικαὶ ἀναλογίαι ὁμοιάζουσαι μὲ τὰς τῆς Βορείας φυλῆς.

‘Η φυλὴ αὕτη εἶναι ἔξηπλωμένη εἰς τὰς νοτίους χερσονήσους τῆς Εύρωπης, ἵδιως εἰς τὴν Ἰβηρικήν. Συναντᾶται ἐπίστης καὶ εἰς πολλὰς ἄλλας περιοχάς, χωρὶς ὅμως συνοχήν.



Εἰκ. 62. *Ατομον τῆς Διναρικῆς φυλῆς.

Τοιαῦται περιοχαὶ εἰναι ἡ Ἰρλανδία, ἡ Οὐαλλία, ἡ Ρουμανία, ἡ Νότιος Γαλλία, ἡ Βόρειος Ἀφρική. Διὰ τῶν Ἰσπανικῶν καὶ Πορτογαλλικῶν Ἀποικιῶν ἔξηπλώθη εἰς τὴν Νότιον καὶ κεντρικὴν Ἀμερικήν. Εἰς τὴν Ἀνατολικὴν Μεσόγειον ἔχει ἀναμειχθῆ μὲ πλείστας φυλάς.

β) Ἀνατολικὴ φυλὴ. Αὕτη εἰναι κυρίως ἔξηπλωμένη εἰς τὰς ξηρὰς περιοχὰς τῆς Πρόσω Ασίας (Ἀραβία, Μεσοποταμία, Συρία κλπ.). Εἰς τὴν αὐτὴν φυλὴν ἀνήκουν καὶ οἱ Ἀραβεῖς καὶ οἱ Ἐβραῖοι.

γ) Ἰνδικὴ φυλὴ. Αὕτη εἰναι ἔξηπλωμένη εἰς τὸ Ἀγγανιστάν καὶ τὰς Ἰνδίας. Μερικὰ ἐκ τῶν χαρακτηριστικῶν της εἰναι : χρῶμα δέρματος βαθὺ καὶ ἐνίοτε ἀραβοσιτόχρουν, μέτωπον στενόν, κνῆμαι καὶ ἀντιβραχίονες λεπτοί.

Σημείωσις. Εἰς τὸν εύρωποιδῆ κλάδον τάσσονται καὶ ώρισμέναι δευτερεύουσαι φυλαί. Ἐκ τούτων ἀναφέρομεν τὴν φυλὴν Ἀινώ, ἡ δόποια ζῆι εἰς τὰς βορείους νήσους τῆς Ιαπωνίας.

6. ΦΥΛΑΙ ΚΑΙ ΕΘΝΗ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕΙΞΙΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Ἀνωτέρω ἀνεφέραμεν τοὺς τρεῖς κλάδους ἀνθρωπίνων φυλῶν καὶ εἴδομεν, ὅτι ἕκαστος ἔξι αὐτῶν περιλαμβάνει ώρισμένας κυρίας φυλάς, τὰς δόποιας περιεγράψαμεν, καὶ ἐγνωρίσαμεν τὰς γενικὰς γραμμὰς τῆς γεωγραφικῆς κατανομῆς των. Πλὴν τούτων ἕκαστος κλάδος εἴδομεν, ὅτι περιλαμβάνει καὶ ώρισμένας δευτερευούσας φυλάς, αἱ δόποια γενικῶς εἰναι ἀριθμητικῶς μικραί. Ἐκ τῶν δευτερευουσῶν τούτων φυλῶν μερικαὶ ἀποτελοῦν διαμέσους τύπους μεταξὺ τῶν διαφόρων κλάδων.

Τὰς ἀνωτέρω περιγραφείσας φυλὰς δὲν συναντῶμεν μόνον εἰς τὰς ἀντιστοίχως ἀναφερθείσας περιοχάς. Ἀντιθέτως σήμερον καὶ ἐκτὸς τῶν περιοχῶν τούτων ἀνευρίσκομεν πολυπληθεῖς δύμαδας τῶν διαφόρων φυλῶν. Ἀπὸ τὰς ἀρχικὰς περιοχὰς τῶν διαφόρων φυλῶν



Εἰκ. 63. Ἀτομον τῆς Μεσογειακῆς φυλῆς.

μεγάλος ἀριθμός ἀτόμων ἔχει μεταφερθῆ ἀλλοῦ. ‘Ως διδάσκει ἡ ‘Ιστορία, ἡ ἐπικοινωνία μεταξὺ τῶν διαφόρων φυλῶν εἶναι ζωηρὰ καὶ γίνεται εἴτε δι’ εἰρηνικούς σκοπούς (μεταναστεύσεις κλπ.), εἴτε διὰ πολεμικούς (ἐπιδρομαί, κατακτήσεις κλπ.).

Οὕτω π.χ. εἰς τὴν Βόρειον Ἀμερικὴν ὑπάρχουν σήμερον ἑκατομμύρια Κινέζων καὶ Νέγρων, οἱ δὲ Εὐρωπαῖοι εἶναι ἔξηπλωμένοι εἰς τὰ περισσότερα μέρη τῆς γῆς.

‘Η ἐπικοινωνία μεταξὺ τῶν διαφόρων φυλῶν ἐπέφερε τὴν μεῖξιν αὐτῶν. Τοιουτοτρόπως ἐδημιουργήθησαν ποικίλοι ἀνθρωπολογικοὶ τύποι, ἐκτὸς τῶν τυπικῶν φυλῶν.

Διὰ τοῦτο γενικῶς εἰς μίαν χώραν, ἵδιως ἔχουσαν μακρὰν ‘Ιστορίαν, ὁ πληθυσμὸς δὲν παρουσιάζει πλήρη φυλετικὴν δόμοιομορφίαν. ‘Επομένως τὰ ἔθνη δὲν περιλαμβάνουν ἄτομα ἐνὸς καὶ τοῦ αὐτοῦ μόνον ἀνθρωπολογικοῦ τύπου.

7. ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ

Διακρίνομεν τὰς φυλὰς μεταξύ των, διότι ἑκάστη παρουσιάζει ἐν σύνολον γνωρισμάτων, τὰ ὅποια εἶναι κληρονομικὰ καὶ ἐμφανίζονται εἰς δλα τὰ ἄτομα τῆς φυλῆς, μὲ μικρὰς διαφοράς.

Εἰς ὥρισμένον τόπον δὲν κατοικοῦν πάντοτε ἄτομα καταγόμενα ἀπὸ γονεῖς, οἱ ὅποιοι ἀνήκουν καὶ οἱ δύο εἰς τὴν αὐτὴν φυλήν. Διὰ τοῦτο ὁ πληθυσμὸς ἐνὸς τόπου δὲν παρουσιάζει, γενικῶς, φυλετικὴν δόμοιομορφίαν.

Γενικωτάτη διαίρεσις δύναται νὰ γίνη εἰς τρεῖς κλάδους: α) τὸν Εὐρωποειδῆ, β) τὸν Μογγολοειδῆ καὶ γ) τὸν Νεγροειδῆ. ‘Εκαστος κλάδος περιλαμβάνει ὥρισμένας κυρίας φυλάς, αἱ ὅποιαι δύνανται πάλιν καὶ περαιτέρω νὰ ὑποδιαιρεθοῦν.

ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Εἰσαγωγή.	Σελίς
Τὸ κύτταρον — Οἱ ἴστοι — 'Ο ἀνθρωπος	5
ΜΕΡΟΣ Α'.	
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ	8
Κεφ. 1.— 'Ο σκελετός τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος	8
1. Σχηματισμὸς καὶ ὑφὴ τῶν ὁστῶν. — 2. Σύνδεσις τῶν ὁστῶν, μέρη τοῦ σκελετοῦ. — 3. 'Ο σκελετός τῆς κεφαλῆς: α) τὰ ὁστᾶ τοῦ κρανίου, β) τὰ ὁστᾶ τοῦ προσώπου. — 4. 'Ο σκελετός τοῦ κορμοῦ: α) ἡ σπονδυλικὴ στήλη, β) αἱ πλευραὶ καὶ τὸ στέρνον. — 5. 'Ο σκελετός τῶν ὅκρων: α) ὁ σκελετός τῶν ὅμων καὶ τῶν χειρῶν, β) ὁ σκελετός τῆς λεκάνης καὶ τῶν ποδῶν. — 6. Περιληψις. — Διάφοροι παρατηρήσεις καὶ ἀσκήσεις.	8
Κεφ. 2.— Οἱ μύες τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος	24
1. Οἱ μύες, αἱ μυϊκαὶ Ἰνες. — 2. Γραμματοὶ μύες καὶ τρόπος τῆς ἐργασίας αὐτῶν. — 3. Οἱ λεῖοι μύες. — 4. 'Ο μυϊκὸς τόνος. — 5. Περιληψις — Διάφοροι παρατηρήσεις καὶ ἀσκήσεις.	24
Κεφ. 3.— Αἱ προσλαμβανόμεναι ὑπὸ τοῦ ὄργανισμοῦ οὐσίαι. — Αἱ καύσεις, ἡ θρέψις.	28
1. Αἱ θρεπτικαὶ οὐσίαι. — 2. "Υδωρ καὶ ἀνόργανα δλατα. — 3. "Υδατάνθρακες καὶ καύσις. — 4. Αἱ λιπαραὶ οὐσίαι. — 5. Λευκώματα. — 6. Βιταμίναι. — 7. Αἱ λειτουργίαι τῆς θρέψεως. — 8. Περιληψις.	28
Κεφ. 4.— Μορφολογικὴ ἐπισκόπησις τῆς στοματικῆς κοιλότητος. Οἱ ὁδόντες.	33
1. 'Η στοματικὴ κοιλότης. — 2. Οἱ ὁδόντες. — 3. Διάφοροι παρατηρήσεις καὶ ἀσκήσεις. — 4. Περιληψις.	33
Κεφ. 5.— Πέψις. 'Απομύζησις καὶ ἀφομοίωσις τῶν προϊόντων τῆς πέψεως . .	37
1. 'Η πέψις, ὁ πεπτικὸς σωλήν. — 2. Στόμα, μάστησις, σίαλος, κατάποσις τοῦ βλαωμοῦ. — 3. Φάρυγξ καὶ οἰσοφάγος. Στόμαχος καὶ γαστρικὸν ύγρόν. — 4. Λεπτὸν ἔντερον, πάγκρεας, ήπαρ, χοληδόχος κύστις. Συμπλήρωσις τῆς πέψεως. — 5. 'Απομύζησις τῶν προϊόντων τῆς πέψεως διὰ τῶν λαχνῶν τοῦ ἔντερου. — 6. 'Αφομοίωσις τῶν προϊόντων τῆς πέψεως. — 7. Παχύ ἔντερον, βακτηρίδια τοῦ ἔντερου, περιττώματα. — 8. 'Επιδρασις ξένων λευκωμάτων ἐπὶ τοῦ ὄργανισμοῦ. — 9. Περιληψις.	37

Κεφ. 6. — ‘Η ἀναπνοή	42
1. Τὸ ἀναπνευστικὸν σύστημα καὶ ἡ ἀνταλλαγὴ τῶν ἀερίων. — 2. Αἱ ἀναπνευστικαὶ κινήσεις. — 3. Περίληψις. — 4. Διάφοροι παρατηρήσεις καὶ ἀσκήσεις.	
Κεφ. 7. — ‘Ο λάρυγξ καὶ ἡ παραγωγὴ τῆς φωνῆς	46
1. Κατασκευὴ τοῦ λάρυγγος. Τρόπος παραγωγῆς τῆς φωνῆς. — 2. Χαρακτῆρες φωνῆς. *Ἀρθρωσις αὐτῆς εἰς φθόγγους. Λόγος.— 3. Περίληψις.— 4. Διάφοροι παρατηρήσεις καὶ ἀσκήσεις.	
Κεφ. 8. — ‘Η κυκλοφορία τοῦ αἵματος καὶ τῆς λέμφου. ‘Η ἀπέκκρισις.	49
1. Τὸ αἷμα. — 2. ‘Η καρδία καὶ τὰ ἀγγεῖα. — 3. Δίοδος τοῦ αἵματος διὰ τῶν νεφρῶν. Ἀπέκκρισις. — 4. Δίοδος τοῦ αἵματος διὰ τοῦ ἡπατος. — 5. Ἀνασκόπησις τῆς μικρᾶς καὶ τῆς μεγάλης κυκλοφορίας. — 6. ‘Η κίνησις τοῦ αἵματος ἐντὸς τῶν ἀγγείων. — 7. ‘Η λέμφος καὶ τὸ λεμφικὸν σύστημα. — 8. Σχηματισμὸς καὶ καταστροφὴ τῶν αἵμοσφαιρίων. — 9. Περίληψις. — 10. Διάφοροι παρατηρήσεις καὶ ἀσκήσεις.	
Κεφ. 9. — Μορφολογικὴ ἀνασκόπησις τῆς θωρακικῆς καὶ τῆς κοιλιακῆς κοιλότητος.	59
Κεφ. 10. — Αἱ ἔκκρισεις.	61
1. ‘Αδένες. Ἐνδοκρινεῖς ἀδένες. Ἀδένες διπλῆς λειτουργίας (παράδ. πτάγκρεας). — 2. Οἱ ἀδένες ἐσω ἔκκρισεως. — 3. Περίληψις.	
Κεφ. 11. — Τὸ νευρικὸν σύστημα.	64
1. Ἐρεθίσματα, ἀντιδράσεις. Τὰ νεῦρα. Τὰ τμῆματα τοῦ νευρικοῦ συστήματος. ‘Η ἴδιατέρα σημασία τοῦ ἐγκεφάλου. — 2. Τὸ ἐγκεφαλονωτιστὸν νευρικὸν σύστημα: α) τὸ κεντρικὸν τμῆμα, β) τὸ περιφερικὸν τμῆμα, γ) ἡ διαδρομὴ τοῦ ἐρεθίσματος. — 3. Τὸ συμπαθητικὸν σύστημα. — 4. Τὰ αὐτόνομα νευρικὰ συστήματα τοῦ ἐντέρου καὶ τῆς καρδίας. — 5. ‘Ο ύπνος. — 6. Περίληψις.	
Κεφ. 12. — Αἱ αἰσθήσεις	72
1. Αἰσθησις. Αἰσθητικὰ σωμάτια τοῦ δέρματος. — 2. Αἰσθητήριον τῆς γεύσεως. — 3. Τὸ αἰσθητήριον τῆς δοσφρήσεως. — 4. Τὸ αἰσθητήριον τῆς δράσεως. Κατασκευὴ τοῦ ὁφθαλμοῦ. Σχηματισμὸς τοῦ εἰδώλου. Προσαρμογὴ τοῦ ὁφθαλμοῦ. Προστασία τοῦ ὁφθαλμοῦ. ‘Ανωμαλίαι τῆς δράσεως. — 5. Τὸ αἰσθητήριον τῆς ἀκοῆς καὶ τοῦ χώρου. *Ἐξω οὖς. Μέσον οὖς. *Ἐσω οὖς. — 6. Τὸ αἰσθήμα τοῦ πόνου. — 7. Περίληψις. — 8. Διάφοροι παρατηρήσεις καὶ ἀσκήσεις.	
Κεφ. 13. — Τὸ δέρμα.	
1. Στοιβάδες τοῦ δέρματος. *Υποδόριος ίστος. Περιτονία. — 2. *Εξαρ- 83 τήματα τοῦ δέρματος. Χρῶμα τοῦ δέρματος καὶ τῶν τριχῶν. — 3. Περίληψις.	

Κεφ. 14. — 'Η συνεργασία τῶν διαφόρων συστημάτων καὶ ἡ προσαρμοστική λειτουργία τοῦ ὄργανισμοῦ	86
1. 'Η συνεργασία τῶν συστημάτων τοῦ ὄργανισμοῦ. 'Η προσαρμογὴ εἰς τὰς ἐπισυμβαινούσας μεταβολές. (Παραδείγματα αίμορραγίας καὶ διατηρήσεως τῆς θερμοκρασίας). — 2. 'Αποτέλεσμα τῆς συνοχῆς διεγέρσεως τῆς προσαρμοστικῆς λειτουργίας. Σκληραγγία. (Παράδειγμα ζωῆς εἰς ύψηλὸν μέρη). — 3. Περίληψις.	

ΜΕΡΟΣ Β'.

ΓΕΝΕΣΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

1. Γενικά περὶ τοῦ πολλαπλασιασμοῦ εἰς τὰ φυτὰ καὶ τὰ ζῷα. — 2. 'Εμβρυϊκὴ ἀνάπτυξις. — 3. Αἱ ήλικιαὶ τοῦ ἀνθρώπου. — 4. Περίληψις. — 5. Διάφοροι παρατηρήσεις καὶ ἀσκήσεις	90
--	----

ΜΕΡΟΣ Γ'.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

1. Φυσικὸν καὶ κοινωνικὸν περιβάλλον. 'Επικοινωνία τοῦ ὄργανισμοῦ καὶ τοῦ περιβάλλοντος. — 2. 'Επιδρασις ἐπὶ τοῦ ὄργανισμοῦ λόγῳ τῆς προσλήψεως οὐσιῶν ἐκ τοῦ περιβάλλοντος. — 3. 'Επιδρασις ἐπὶ τοῦ ὄργανισμοῦ τῶν φυσικῶν ὅρων τοῦ περιβάλλοντος. — 4. 'Επιδρασις ἐπὶ τοῦ ἀνθρωπίνου ὄργανισμοῦ διαφόρων μικροοργανισμῶν. — 5. Περίληψις	94
--	----

ΜΕΡΟΣ Δ'.

ΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΦΥΛΑΙ

1. Ποῖα γνωρίσματα χρησιμεύουν διὰ τὴν διάκρισιν τῶν ἀνθρωπίνων φυλῶν. 'Εννοια τῆς φυλῆς. — 2. Αἱ τρεῖς μεγάλαι περιοχαὶ τῆς Εύρωπας. Διάκρισις τῶν τριῶν μεγάλων κλάδων φυλῶν. — 3. 'Ο Μογγολοειδής κλάδος. Αἱ φυλαί, τὰς ὁποίας περιλαμβάνει. — 4. 'Ο Νεγροειδής κλάδος. — 5. 'Ο Εύρωποειδής κλάδος. — 6. Φυλαὶ καὶ ἔθνη. 'Επικοινωνία καὶ μεῖξις τῶν φλαγμῶν. — 7. Περίληψις	98
---	----

'Επιμελητής έκδόσεως Δ. ΑΡΚΟΥΔΕΑΣ (Άπ. Δ. Σ. ΟΕΣΒ 11048/12.3.57)

Τὰ ἀντίτυπα τοῦ βιβλίου φέρουν τὸ κάτωθι βιβλιόσημον εἰς ἀπόδειξιν τῆς γνησιότητος αὐτῶν.

³ Αντίτυπον στερούμενον τοῦ βιβλιοσήμου τούτου θεωρεῖται κλεψύτυπον. Ο διαθέτων, πωλῶν ἢ χρησιμοποιῶν αὐτό διώκεται κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ ἅρθρου 7 τοῦ νόμου 1129 τῆς 15/21 Μαρτίου 1946 (Ἐφ. Κυβ. 1946, Α 108).



ΕΚΔΟΣΙΣ Η', 1957 (V) — ANTITYPPA 30.000

³ Εκτύπωσις — Βιβλιοδεσία Π. ΓΑΡΜΠΗ — Ψαρομηλίγου 22

