

ΕΥΑΓΟΡΑ Μ. ΠΑΝΤΕΛΟΥΡΗ

---

# ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ  
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1954

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής



# ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ



# ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗΝ ΤΑΞΙΝ ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ



18995

ΔΩΡΕΑ  
ΤΑΞΙΝΙΑΣ  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ  
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1954




## ΕΙΣΑΓΩΓΗ

**Τὸ κύτταρον.** Εἰς τὴν Φυσικὴν Ἰστορίαν τῶν προηγουμένων ἔτῶν ἐμελετήσαμεν γενικῶς τὰ φυτὰ καὶ τὰ ζῷα, δηλ. τὰ φυσικὰ σώματα, τὰ δόποια ἔχουν ζωὴν (ἔμβια ὅντα). Χαρακτηριστικὸν τῆς κατασκευῆς τῶν ἐμβίων ὅντων εἶναι, ὅτι ἀποτελοῦνται ἀπὸ κύτταρος, καὶ μάλιστα ἄλλα μὲν ἀπὸ ἓν μόνον (μονοκύτταροι ὁργανισμοί), ἄλλα δὲ ἀπὸ πολλὰ (πολυκύτταροι ὁργανισμοί).

Εἰς τὸ μικροσκόπιον διακρίνομεν εὐθύς ἀμέσως τρία μέρη εἰς τὸ κύτταρον: Τὴν κυτταρικὴν μεμβράναν αν, ἥ δόποια τὸ περιβάλλει, τὸ κυτταρόπλαστα μακριὰ τὸν πυρῆνα (εἰκ.1).

Τὸ κυτταρόπλασμα καὶ ὁ πυρῆνας ἀποτελοῦν ώς πρὸς τὴν σύστασιν δύο μορφὰς τοῦ πρωτοπλάσματος. Τὸ πρωτόπλαστο μασμάτων. Τὸ πρωτόπλαστον σύνθεσιν, ἄλλα συνίσταται κυρίως ἀπὸ ποικίλα λευκώματα. Τὸ λευκὸν τοῦ ὡδοῦ εἶναι κοινὸν παράδειγμα οὐσίας ἀποτελουμένης ἐκ λευκωμάτων. Ἡ κυτταρικὴ μεμβρᾶνα εἰς τοὺς ζωικοὺς ὁργανισμοὺς εἶναι καὶ αὕτη λεπτὴ στοιβάς πυκνοτέρου πρωτοπλάσματος, ἥ δόποια προστατεύει τὸ κύτταρον.

Ἐκτὸς τοῦ κυτταροπλάσματος διακρίνονται εἰς τὰ μικροσκοπικὰ παρασκευάσματα διάφορα κοκκία, διάφορα κενοτόπια, καθὼς καὶ ώρισμένα νημάτια ἢ σφαιρίδια καλούμενα μιτοχόνδρια. Τὸ κυτταρόπλασμα εύρισκεται εἰς μίαν διαρκῆ ροήν ἐντὸς τοῦ



Εἰκ. 1. Σχηματικὴ παράστασις κυττάρου Π. Πυρήν.—Πρ. Πυρηνίσκος.—π. Μ. Πυρηνικὴ μεμβρᾶνα.—κ. Μ. Κυτταρικὴ μεμβρᾶνα.—Μχ. Μιτοχόνδρια.—Κπ. Κυτταρόπλασμα.—Κ. Κενοτόπιον.—Εἰς τὸ σχῆμα τοῦτο, πλὴν τῶν ἀνωτέρω, παρίστανται καὶ διάφορα ἄλλα μορφολογικὰ στοιχεῖα τῶν ζωικῶν κυττάρων.

κυττάρου. Ή κίνησις αύτη τοῦ πρωτοπλάσματος δύναται νὰ παρατηρηθῆ<sup>ται</sup> καλῶς εἰς κινηματογραφικάς ταινίας, αἱ ὅποιαι ἔχουν ληφθῆ<sup>ται</sup> ἀπὸ τὴν ζωὴν μονοκυττάρων ὄργανισμῶν, ὡς εἶναι ἡ ἀμοιβή<sup>ται</sup> κ.ἄ.

Ἐντὸς τοῦ πυρῆνος διακρίνονται εἰς ἡ περισσότεροι πυρηνίσκοι. Ἰδιαιτέραν σημασίαν ἔχουν ώρισμένα κοκκία ἐσκορπισμένα ἐντὸς τοῦ πυρῆνος, τὰ ὅποια ὡνομάσθησαν χρωματίκα<sup>τικά</sup> κοκκία, ἐπειδὴ χρωματίζονται εὐκόλως ἀπὸ ώρισμένας (βασικάς) χρωστικάς οὐσίας. “Οταν τὸ κύτταρον πρόκειται νὰ διαιρεθῇ, τὰ κοκκία ταῦτα σχηματίζουν ἐν νήμα (σπειραματίκα), τὸ ὅποιον τελικῶς τέμνεται εἰς τμήματα καλούμενα χρωματοσώματα. Τὰ κύτταρα κάθε εἰδούς ζώου χαρακτηρίζονται ἀπὸ ώρισμένον ἀριθμὸν χρωματοσωμάτων, τὰ ὅποια εἶναι ἀνὰ δύο ὅμοια. Ὁ ἄνθρωπος π.χ. ἔχει 24 τοιαῦτα ζεύγη χρωματοσωμάτων εἰς κάθε κύτταρον τοῦ σώματός του.

Ἐν ὕσσῳ ζῇ τὸ κύτταρον, ἔξοδεύει μέρος τοῦ πρωτοπλάσματός του, διασπᾶ<sup>ται</sup> τοῦτο εἰς ἀπλουστέρας ἐνώσεις καὶ οὕτω κερδίζει τὴν ἴκανότητα κινήσεως, θερμότητα κλπ. Διὰ τὴν διάσπασιν αὐτὴν χρειάζεται γενικῶς ὁξυγόνον, τὸ ὅποιον παραλαμβάνεται ἀπὸ τὸ περιβάλλον. Ἐξ ἄλλου τὸ κύτταρον, ἀπὸ διαφόρους οὐσίας τοῦ περιβάλλοντος, μὲ τὰς ὅποιας τρέφεται, σχηματίζει νέον πρωτόπλασμα, τὸ ὅποιον ἐνσωματώνει. Δι’ αὐτοῦ αὐξάνεται καὶ ἀναπληρώνει καὶ τὸ συνεχῶς διασπώμενον κατὰ τὴν ζωὴν πρωτόπλασμα. (Ἐν αλλαγῇ τῆς ψυχῆς).

**Οἱ ιστοί.** Εἰς τοὺς πολυκυττάρους ὄργανισμοὺς τὰ κύτταρα δὲν ἔκτελοῦν ὅλα τὰς ἴδιας ἐργασίας. Εἰς τοὺς ὄργανισμοὺς τούτους αἱ ἐργασίαι εἶναι καταμερισμέναι. Ἐκ τῶν διαφόρων κυττάρων ἄλλα π.χ. ἀναλαμβάνουν τὴν προστασίαν τοῦ ὄργανισμοῦ ἀπὸ τὰς ἐπιδράσεις τοῦ περιβάλλοντος (κύτταρα τοῦ δέρματος), ἄλλα τὴν παραγωγὴν ώρισμένων οὐσιῶν (κύτταρα τῶν ἀδένων) κ.ο.κ. Όλα τὰ κύτταρα, τὰ ὅποια ἔχουν διαμορφωθῆ<sup>ται</sup> κατὰ τοιοῦτον τρόπον, ὥστε νὰ ἔκτελοῦν τὴν αὐτὴν ἐργασίαν, ἀποτελοῦν ἔνα ἴστον. Π.χ. τὰ κύτταρα, τὰ ὅποια καλύπτουν τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ σώματος, ἀποτελοῦν τὸν ἐπιθηλιακὸν ιστόν. Ἀλλοι εἴδος ιστοῦ εἶναι ὁ συνδετικὸς ιστός, ὁ ὅποιος παρεμβάλλεται μεταξὺ

τῶν λοιπῶν καὶ προσδίδει εἰς αὐτούς στερεότητα καὶ ἔλαστικότητα.  
Ἀναλόγως διακρίνομεν ἀδενικὸν ἰστόν, νευρικὸν ἰστὸν  
κ.ο.κ.

Ἐκαστος ἰστός, ἐκτὸς τῶν ζώντων κυττάρων του, δύναται νὰ περιλαμβάνῃ καὶ κύτταρα ἡλλοιωμένα ( ἐπιδερμὶς ), η καὶ νεκρὰ κύτταρα, καθὼς καὶ διαφόρους οὔσιας μεταξὺ τῶν κυττάρων ( ἄλατα τῶν ὁστῶν ).

Εἰς τὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου, ώς καὶ τῶν ἀνωτέρων ζώων καὶ φυτῶν, δυνάμεθα νὰ διακρίνωμεν μέρη, τὰ δόποια περιλαμβάνουν διάφορα εἴδη ἰστῶν, καὶ εἶναι κατάλληλα δι’ ὠρισμένην ὄργασίαν. Τὰ τμήματα αὐτὰ καλοῦνται ὅργανα ( Ἀθροίσματα ὄργανων συνεργαζομένων πρὸς ἐκτέλεσιν μιᾶς φυσιολογικῆς λειτουργίας ἀποτελοῦν τὰ ὅργανα της συστήματος πεπτικὸν σύστημα, νευρικὸν σύστημα κ.ο.κ. ).

**Ο ἀνθρωπος.** Ἐφέτος θὰ μελετήσωμεν ἴδιαιτέρως τὸν ὄργανισμὸν τοῦ ἀνθρώπου. Μέσα ἀπὸ ὅλον τὸν ἔμβιον κόσμον ὁ ἀνθρωπὸς ξεχωρίζει μὰ τὰς ἴκανότητάς του, τὴν νόησιν καὶ τὸν πολιτισμόν, τὸν ὅποιον ἔδημοιούργησεν.

Εἰς τὰς γενικὰς γραμμὰς ὁ ὄργανισμὸς τοῦ ἀνθρώπου ὁμοιάζει πρὸς τὸν ὄργανισμὸν τῶν λοιπῶν Θηλαστικῶν, καὶ μάλιστα τῶν ἀνωτέρων ἐξ αὐτῶν, τῶν Πρωτεύοντων. Παρουσιάζει ὅμως ἡ κατασκευὴ τοῦ σώματός του καὶ σημαντικὰς διαφορὰς πρὸς αὐτά, οἵ δόποια ἔχουν μεγάλην σπουδαιότητα διὰ τὴν ἔξαιρετικὴν ἔξελιξιν, τὴν ὅποιαν ἡ κοιλούθησεν ὁ ἀνθρωπός. Εἰς τὴν περιγραφὴν τῶν διαφόρων συστημάτων τοῦ ἀνθρωπίνου ὄργανισμοῦ θὰ μᾶς δοθῇ ἡ εὐκαιρία νὰ παρατηρήσωμεν ὠρισμένας ἐκ τῶν διαφορῶν τούτων καὶ νὰ ἀντιληφθῶμεν τὴν σημασίαν των.


Τὸ βιβλίον τοῦτο θέλει νὰ συντροφεύσῃ τὸ ‘Ελληνόπουλον τῆς Δ’ Γυμνασίου κατὰ τὴν ὥραν τῆς μελέτης του. Ἐχει σκοπὸν νὰ βοηθήσῃ τὸν μαθητὴν, διὰ νὰ ἐπαναλάβῃ καὶ νὰ ἀφομοιώσῃ ὅτι καὶ εἰς τὸ μάθημα ἐδιδάχθη. Οὕτω θ’ ἀποκτήσῃ ὁ μαθητὴς μίαν σαφῆ ἰδέαν τοῦ ἀνθρωπίνου ὄργανισμοῦ.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ  
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ  
Ο ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

1. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΦΗ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ

Τὰ μαλακὰ μέρη τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος, ὅπως καὶ τοῦ σώματος τῶν ἄλλων Σπουδυλωτῶν, στηρίζονται ἐπάνω εἰς σκληρὰ μέρη, τὰ ὅποια καλοῦνται δ σ τ ἄ. Τὰ δόστα στηρίζονται ἀκόμη καὶ διὰ νὰ περικλείουν ὡρισμένα εύπαθη ὄργανα καὶ νὰ ἐκτελοῦν, ἔλκομενα ὑπὸ τῶν μυῶν, διαφόρους κινήσεις.



Εἰκ. 2. Μικροσκοπική τομὴ τὸ αἷμα προσκομίζει καὶ ἀποθέτει διάφορα δόστοι.

Τὰ αἷμα προσκομίζει καὶ ἀποθέτει διάφορα ἄλατα. Οὕτω τὰ δόστα καθίστανται σκληρότερα, συγχρόνως ὅμως καὶ περισσότερον εὐθραστα. Μέχρι τοῦ εἰκοστοῦ περίπου ἔτους τῆς ἡλικίας ἡ ἀποστέωσις αὔτη συμπληρώνεται καὶ ἡ αὔξησις τῶν δόστῶν σταματᾷ πλέον.

“Ωστε, ἀν παρατηρήσωμεν εἰς τὸ μικροσκόπιον μίαν τομὴν δόστοῦ (εἰκ. 2), θὰ διακρίνωμεν ἐδῶ καὶ ἐκεῖ διαφόρους ὀπάς, αἱ ὅποιαι

Τὰ περισσότερα δόστα ἀρχικῶς εἶναι χόνδρινα. Βαθμιαίως ὅμως ὁ χονδρώδης ἰστὸς, ἐκ τοῦ ὅποιου ἀποτελοῦνται, ἀντικαθίσταται ὑπὸ δόστεώδους ἰστοῦ, ὡς ἔξῆς: Εἰδικὰ κύτταρα, οἱ δ σ τ ε ο β λ ἀ σ τ α i, ἔζερχονται ἀπὸ τὰ αἷμοφόρα ἀγγεῖα καὶ ἐκκρίνουν μίαν μαλακὴν ὄργανικὴν ούσίαν, τὴν δ σ τ ε ἔ ν η ν. Διὰ τοῦτο τὰ δόστα τῶν μικρῶν παιδιῶν εἶναι μαλακὰ καὶ εὔκαμπτα. “Οσον ὅμως προχωρεῖ ἡ ἡλικία,

είναι αἱ τομαὶ τῶν αἱμοφόρων ἀγγείων. Περὶ αὐτὰς θὰ παρατηρήσωμεν, συγκεντρικῶς τοποθετημένας, πολλὰς μικροτέρας ὅπας, αἱ ὅποιαι εἰναι αἱ θέσεις τῶν κυττάρων. Ὁ λοιπὸς χῶρος κατέχεται ἀπὸ τὴν ὁστείνην, ἡ ὅποια ἔχει σκληρυνθῆ διὸ τῆς ἀποθέσεως τῶν ἀλάτων ἀσβεστίου, μαγνησίου καὶ ἄλλων.


Ἐκτὸς τῶν οὕτω σχηματιζομένων ὁστῶν, ὑπάρχουν καὶ ἄλλα, τὰ ὅποια σχηματίζονται δι’ ἀποστεώσεως μεμβρανῶν, χωρὶς νὰ σχηματισθῇ προηγουμένως χόνδρος. Τὰ τοιαῦτα ὁστᾶ καλοῦνται δὲ ρικὰ, ἀνήκουν δὲ εἰς αὐτὰ κυρίως τὰ ὁστᾶ τοῦ κρανίου.

Ἐκ τῶν ὁστῶν ἄλλα μὲν εἰναι συμπαγῆ, ἄλλα δὲ σπογγώδη. Γενικῶς εἰναι συμπαγῆ τὰ τοιχώματα τῶν μακρῶν κοίλων ὁστῶν, ἐνῷ τὰ μικρὰ καὶ πλατέα ὁστᾶ, καθὼς καὶ τὰ ἀκραῖα τμῆματα τῶν μακρῶν ὁστῶν, εἰναι σπογγώδη.

Εἰς τὰ διάκενα τῶν σπογγώδων ὁστῶν καὶ εἰς τὰς κοιλότητας τῶν μακρῶν ὁστῶν εὑρίσκεται ἔνας μαλακὸς ὑπέρυθρος ἴστός, ύμενελὸς τῶν ὁστῶν. Κατὰ τὴν γεροντικὴν ἥλικιαν, λόγῳ τῆς ἀποθέσεως λίπους, ὁ μυελὸς τῶν ὁστῶν ἀποκτᾷ ὑποκίτρινον χρῶμα. Ἡ ἐπιφάνεια τῶν ὁστῶν καλύπτεται ἀπὸ ἔνα λεπτὸν ὑμενῶδες περιστερονέας πολλῶν ὁστῶν διακρίνομεν ὅπας, διὰ τῶν ὅποιων διέρχονται αἱμοφόρα ἀγγεῖα, καλουμένας τρίματα, διαφόρους ἔξογκώσεις, καλουμένας φύματα, καὶ διαφόρους προεκτάσεις καλουμένας ἀποφύσεις.

## 2. ΣΥΝΔΕΣΙΣ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ. ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ

Σχεδὸν ὅλα τὰ ὁστᾶ τοῦ σώματος εἰναι συνηρμολογημένα μεταξύ των, ὥστε ν’ ἀποτελοῦν ἔναν ἔνιαστον σύνολον, τὸν σκελόν, (εἰκ. 3 καὶ 4). Ἡ σύνδεσις δύο ὁστῶν δύναται νὰ γίνῃ κατὰ δύο τρόπους. Ὁ πρῶτος καλεῖται συνάρθρωσις καὶ δὲν ἐπιτρέπει τὴν κίνησιν τῶν συνδεομένων ὁστῶν. Ὁ δεύτερος ἐπιτρέπει τὴν κίνησιν καὶ καλεῖται διάρθρωσις. Εἰς τὴν διάρθρωσιν (εἰκ. 5) αἱ ἐφαπτόμεναι ἐπιφάνειαι τῶν ὁστῶν καλύπτονται μὲν ἔνα στρῶμα ἀρθρικοῦ χόνδρου. "Ολη ἡ διάρθρωσις περιβάλλεται ἀπὸ ἵνωδη σάκκου, σχηματιζόμενον ὑπὸ τοῦ περιοστέου καὶ ταινιῶν συνδετικοῦ ἴστοῦ. Ὁ σάκκος οὗτος καλεῖται ἀρθρικὸς θύλακος καὶ χρησιμεύει διὰ τὴν συγκράτησιν τῶν ὁστῶν τῆς διαρθρώσεως.



Εἰκ. 3.



Εἰκ. 4. Ἀκτινογραφία ὅλοκλήρου τοῦ σκελετοῦ

Εἰκ. 3. Ο σκελετός τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος: 1. Κεφαλή. — 2. Σπονδυλική στήλη. — 3. Τὸ στέρνον. — 5. Βραχιόνιον δστοῦν. — 6. Ἡ λεκάνη. — 7. Κερκίς. — 8. Ὀλένη. — 9. Ὁστᾶ τῆς ἄκρας χειρός. — 10. Μηριαίον δστοῦν. — 11. Περόνη. — 12. Κνήμη. — 13. Ἐπιγονατίς. — 14. Ὁστᾶ τοῦ ἄκρου ποδός. — 15. Τροχιλία. — 16. Κόνδυλος. — 17. Ἀκρώμιον.

Οι ἀρθρικοὶ χόνδροι διαβρέχονται ἀπὸ ἐν ὑγρὸν, καλούμενον ἀρθρικὸν ὑγρόν, τὸ δόποιον διευκολύνει τὴν δλίσθησιν τῶν ὁστῶν.

Εἰς τὸν σκελετὸν διακρίνομεν τὰ ἔξῆς τμήματα: τὸν σκελετὸν τῆς κεφαλῆς, τὸν σκελετὸν τοῦ κρανίου καὶ τὸν σκελετὸν τῶν ἄκρων.

### 3. Ο ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ


Ο σκελετὸς τῆς κεφαλῆς ἀποτελεῖται ἀπὸ δύο ὁμάδας ὁστῶν, τὰ ὁστᾶ τοῦ κρανίου καὶ τὰ ὁστᾶ τοῦ προσώπου. Τὰ ὁστᾶ τοῦ κρανίου εἶναι λεπτὰ καὶ πλατέα καὶ σχηματίζουν μίαν κλειστὴν κοιλότητα, τὴν κρανιακὴν κοιλότητα. Τὰ ὁστᾶ τοῦ προσώπου σχηματίζουν τὰς δύο δόφθαλμικὰς κόγχας, τὴν ρινικὴν κοιλότητα καὶ τὴν στοματικὴν κοιλότητα. Ἐξ ὅλων τῶν ὁστῶν τῆς κεφαλῆς μόνον τὸ ὁστοῦν τῆς κάτω σιαγόνος εἶναι κινητόν, συνδέομενον διὰ διαρθρώσεως πρὸς τὰ ἄλλα.

Λεπτομερέστερον, ἡ ὀνομασία, ἡ μορφὴ καὶ ἡ θέσις τῶν ὁστῶν τῆς κεφαλῆς (εἰκ. 6 καὶ 7) ἔχουν ὡς ἔξῆς:

#### a') Ὁστᾶ τοῦ κρανίου

1) Τὸ μετωπικόν. Τοῦτο κατέχει τὸ πρόσθιον καὶ ἄνω τοῖχωμα τῆς κρανιακῆς κοιλότητος καὶ σχηματίζει ἐπάνω ἀπὸ κάθε δόφθαλμὸν μίαν ἐλαφρὰν ὑπέγερσιν, τὸ ὑπερόφρυνον τόξον.

2) Τὰ δύο βρεγματικὰ (ἀριστερὸν καὶ δεξιὸν). Ταῦτα ἀποτελοῦν τὸ μεγαλύτερον μέρος τοῦ θόλου τῆς κρανιακῆς κοιλότητος καὶ συναρθροῦνται κατὰ τὸ μέσον πρὸς ἄλληλα, ἐμπρὸς πρὸς τὸ




Εἰκ. 5. Διάρθρωσις τοῦ ὠμού.—  
4. Τομὴ τῆς ὠμοπλάτης.—5. Τομὴ τοῦ βραχιονίου ὁστοῦ.—6. Ἀρθρικὸς θύλακος.

μετωπικόν, δπίσω πρὸς τὸ Ἰνιακὸν καὶ πλαγίως πρὸς τὸ σφηνοειδές καὶ τὸ κροταφικόν.

3 ) **Τὸ Ἰνιακόν.** Τοῦτο συμπληρώνει τὸν θόλον τοῦ κρανίου πρὸς τὰ δπίσω καὶ, καμπτόμενον, ἀποτελεῖ καὶ μέρος τῆς βάσεως τοῦ κρανίου. Τὸ τμῆμα του τὸ ἀνήκον εἰς τὴν βάσιν τοῦ κρανίου φέρει τὸ Ἰνιακὸν τρῆμα, διὰ τοῦ ὅποίου διέρχεται ὁ νωτιαῖος μυελός. Ἐκατέρωθεν τοῦ τρήματος ὑπάρχει ἀνὰ ἓν ἔξογκωμα καλούμενον Ἰνιακὸς κόνδυλος. Διὰ τῶν Ἰνιακῶν κονδύλων στηρίζεται ἡ κεφαλὴ ἐπὶ τῆς σπονδυλικῆς στήλης.

4 ) **Τὰ δύο κροταφικά** (ἀριστερὸν καὶ δεξιόν). Ταῦτα σχηματίζουν μετὰ τοῦ σφηνοειδᾶς τὰς πλευρὰς τῆς κρανιακῆς κοιλότητος. "Εκαστον κροταφικὸν συναρθροῦται δπίσω πρὸς τὸ Ἰνιακόν, ἐπάνω μὲ τὸ ἀντίστοιχον βρεγματικὸν καὶ ἐμπρὸς μὲ τὸ σφηνοειδές. Πρὸς τὰ κάτω παρουσιάζει μίαν ἐλευθέραν ἀπόφυσιν, τὴν μαστοειδῆ ἀπόφυσιν, μίαν ἀπόφυσιν συνδεομένην μὲ τὸ ζυγωματικὸν καὶ μίαν μικρὰν κοίλην ἐπιφάνειαν, πρὸς τὴν ὅποιαν ἀρθροῦται ἡ κάτω σιαγών. Κατὰ τὴν βάσιν καὶ πρὸ τῆς μαστοειδοῦς ἀποφύσεως, φέρει ἐκαστον κροταφικὸν τὴν κοιλότητα, ἐντὸς τῆς ὅποιας εύρισκονται τὰ ὄργανα τῆς ἀκοῆς.



Εἰκ. 6. 'Ο σκελετός τῆς κεφαλῆς.

1. Μετωπικόν. — 2. Βρεγματικόν. — 3. Κροταφικόν. — 4. Σφηνοειδές. — 5. Ἰνιακόν. — 6. Ζυγωματικόν. — 7. Ἀνά γναθικόν. — 8. Κάτω γναθικόν. — 9. Ρινικόν. — 10. Μαστοειδῆς ἀπόφυσις τοῦ κροταφικοῦ. — 11. Βελονοειδῆς ἀπόφυσις τοῦ κροταφικοῦ. — 12.


'Ακουστικὸς πόρος.

ζόντιον τμῆμα, τοῦ ὅποίου τὰ ἄκρα κάμπτονται πρὸς τὰ ἄνω, ἀποτελοῦντα τὰς πτέρυγας τοῦ σφηνοειδοῦς. Τὸ διριζόντιον τμῆμα κατέχει τὸ μέσον τῆς βάσεως τοῦ κρανίου, αἱ δὲ πτέρυ-

5 ) **Τὸ σφηνοειδές.** Τοῦτο ἀποτελεῖται ἀπὸ ἓν δρι-

γες συμμετέχουν εἰς τὸν σχηματισμὸν τῶν πλευρικῶν τοιχωμάτων τῆς κρανιακῆς κοιλότητος.

6 ) Τὸ ἡθμοειδές. Τοῦτο ἀποτελεῖται κυρίως ἀπὸ ἕν δριζόν-



Εἰκ. 7. Τὰ ὁστᾶ τῆς κεφαλῆς.

1. Μετωπικόν. — 2. Βρεγματικόν. — 3. Ἰνιακόν. — 4. 5. Κροταφικόν—  
6. Σφηνοειδές. — 7. Ἡθμοειδές. — 8. Ζυγωματικόν. — 9. Ἀνω γναθικόν. — 10. Κάτω γναθικόν. — 11. Υνις. — 12. Ρινικόν. — 13. Δακρυϊκόν.

τιον καὶ τρία κάθετα τμήματα. Ἐκ τούτων τὸ δριζόντιον συμπληρώνει πρὸ τοῦ σφηνοειδοῦς τὴν βάσιν τῆς κρανιακῆς κοιλότητος, τὴν ὅποιαν χωρίζει ἀπὸ τὴν ρινικήν. Τὰ δύο ἀκραῖα κάθετα πέταλα μαζὶ μὲ τὰς δύο διαφοράς κόγχας ἀποτελοῦν τὰ πλάγια τοιχώματα τῆς ρινικῆς κοιλότητος (εἰκ. 7). Τὸ μεσαῖον πέταλον συμμετέχει εἰς τὸν σχηματισμὸν τοῦ ρινικοῦ διαφράγματος.

### β') Ὁστᾶ τοῦ προσώπου

1 ) **Η ύνις.** Αὕτη εἶναι ἐν τετράπλευρον ὁστέινον πέταλον, τὸ διποῖον, μαζὶ μὲ τὸ κάθετον τμῆμα τοῦ ἡθμοειδοῦς, σχηματίζει τὸ ρινικὸν διάφραγμα. Μὲ τὸ ἄνω καὶ τὸ ὅπισθιον χεῖλος του συναρ-

θρούται πρὸς τὸ σφηνοειδὲς καὶ τὸ ἡθμοειδὲς, μὲ τὸ κάτω δὲ χεῖλος ἀκουμβᾶς εἰς τὴν ὄροφήν τῆς στοματικῆς κοιλότητος.

**2 ) Τὰ δύο ρινικά.** Ταῦτα εἶναι μικρὰ τετραπλευρικὰ πετάλια, τὰ ὅποια σχηματίζουν τὴν ράχιν τῆς ρινός.

**3 ) Τὰ δύο δακρυϊκά.** Καὶ αὐτὰ εἶναι μικρὰ πετάλια, τὰ ὅποια εύρισκονται ἀνὰ ἐν εἰς τὸ ἐσωτερικὸν τοίχωμα ἑκάστης ὁφθαλμικῆς κόγχης.

**4 ) Τὰ δύο ζυγωματικά** (δεξιὸν καὶ ἀριστερὸν). "Εκαστον σχηματίζει ἀπὸ τοῦ κροταφικοῦ μέχρι τοῦ ἄνω γναθικοῦ ἐν ὁστεῖνον τόξον παράλληλον πρὸς τὸ πλευρικὸν τοίχωμα τῆς κρανιακῆς κοιλότητος. Τὰ τόξα ταῦτα, καλούμενα ζυγωματικὰ τόξα, σχηματίζουν τὰ λεγόμενα μῆλα τοῦ προσώπου, τὰ ὅποια ἔχουν περισσότερον εἰς τὰς μοιγγολικὰς φυλάς.

**5 ) Τὸ ἄνω γναθικὸν ὁστοῦν.** Τοῦτο ἔχει σχῆμα πεταλοειδές καὶ φέρει εἰς τὸ κάτω χεῖλος του κοιλότητας, τὰ φατνία, διὰ τὴν στερέωσιν τῶν ὀδόντων.

**6 ) Τὰ δύο ὑπερώια.** Ταῦτα εἶναι δύο ὁστεῖνα πέταλα, τὰ ὅποια ἀποτελοῦν τὸ ὁστεῖνον μέρος τῆς ὄροφῆς τοῦ στόματος (σκληρὰ ὑπερώα).

**7 ) Τὸ κάτω γναθικόν.** Τοῦτο εἶναι τὸ ἰσχυρότερον καὶ τὸ μόνον κινητὸν ὁστοῦν τῆς κεφαλῆς. Διακρίνομεν εἰς αὐτὸν ἀφ' ἐνὸς ἐν πεταλοειδές σῶμα, τὸ ὅποιον εἰς τὸ ἄνω του χεῖλος φέρει ἐπίσης σειρὰν φατνίων, καὶ ἀφ' ἐτέρου δύο κλάδους. Οἱ κλάδοι οὗτοι κατευθύνονται πρὸς τὰ ἄνω καὶ διχάζονται ἑκαστος εἰς δύο ἀποφύσεις, διὰ τῶν ὅποιών γίνεται ἡ σύνδεσις τῆς κάτω σιαγόνος πρὸς τὰ ὁστᾶ τῆς κεφαλῆς.


**8 ) Τὸ νοειδὲς ὁστοῦν.** Τοῦτο δὲν συνδέεται πρὸς τὰ ἄλλα ὁστᾶ καὶ εύρισκεται κατὰ τὴν βάσιν τῆς γλώσσης, ἐπάνω ἀπὸ τὸν θυρεοειδῆ χόνδρον τοῦ λάρυγγος. "Εχει σχῆμα ἀνοικτοῦ ὕψιλον.

#### 4. Ο ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΡΜΟΥ


"Ο σκελετὸς τοῦ κορμοῦ (εἰκ. 8) περιλαμβάνει τὴν σπονδυλικὴν στήλην καὶ τὰς πλευρὰς μετὰ τοῦ στέρνου.

### α') Σπονδυλική στήλη

Ἡ σπονδυλικὴ στήλη εἶναι μία σειρὰ μικρῶν ὀστῶν, τῶν σ π ο ν-  
δύλων, ἡ ὅποια ἀρχίζει ἀπὸ τὴν βάσιν τοῦ κρανίου καὶ διατρέ-  
χει κατὰ τὸ μέσον τῆς ρά-  
χεως τὸν κορμόν. Ἀποτε-  
λεῖται ἀπὸ 33 σπονδύλους, ἐκ  
τῶν ὅποιών οἱ πρῶτοι ἔπιτά  
καλοῦνται αὔχενικοί, οἱ  
ἐπόμενοι δώδεκα θωρακικοί  
καὶ κατέχει τὸ ἄκρον  
τῆς σπονδυλικῆς στήλης (εἰκ.  
13). Μεταξὺ τῶν σωμάτων  
τῶν σπονδύλων παρεμβάλ-  
λονται λεπταὶ πλάκες χόν-  
δρου, οἱ μεσοσπονδύλιοι.  
Εἰς κάθε σπόνδυλον (εἰκ.  
9) διακρίνομεν ἓν κυλινδρικὸν  
σῶμα καὶ ἓν τόξον, με-  
ταξὺ δὲ τούτων παραμένει  
διάκενον, καλούμενον τρηματόν  
τοῦ σπονδύλου. Τὸ τό-  
ξον φέρει διαφόρους ἀποφύ-  
σεις, οἵ ὅποιαι χρησιμεύουν  
ἄλλαι μὲν διὰ τὴν στήριξιν τῶν σπον-  
δύλων μεταξύ των, ἄλλαι δὲ διὰ τὴν πρόσφυσιν μυῶν καὶ τὸν περιο-  
ρισμὸν τῶν κινήσεων τῆς σπονδυλικῆς στήλης. Εἰς τοὺς πλείστους



Εἰκ. 8. Ὁ σκελετὸς τοῦ κορμοῦ  
καὶ τῶν ἀνω ἄκρων.  
Εἰς τοὺς πλείστους



Εἰκ. 9. Σχῆμα σπονδύλων.

1. Σῶμα τοῦ σπονδύλου.
2. Τόξον τοῦ σπονδύλου.
3. Ἀκανθώδης ἀπόφυσις.
5. Μεσοσπονδύλιος χόνδρος.

Τὰ τρήματα τῶν σπονδύλων εὐρίσκονται τὸ ἐν κάτωθεν τοῦ ἄλλου καὶ ἀποτελοῦν ἔνα συνεχῆ νωτιαῖον σωλῆνα, ἐντὸς τοῦ ὅποιου εὐρίσκεται ὁ νωτιαῖος μυελός.


Ἡ σπονδυλικὴ στήλη δὲν εἶναι εὐθεῖα, ἀλλὰ κυρτοῦται εἰς μὲν τὴν αὐχενικὴν καὶ ὀσφυϊκὴν μοῖραν πρὸς τὰ ἔμπρός, εἰς δὲ τὴν θωρακικὴν καὶ ἴερὰν

σπονδύλους μεγαλυτέρα ἀπόφυσις εἶναι ἡ ἀκανθώδης, ἡ ὅποια εύρισκεται εἰς τὸ μέσον τοῦ τόξου καὶ κατευθύνεται πρὸς τὰ ὅπισω.

“Ολοι οἱ σπόνδυλοι δὲν εἶναι ἀπολύτως ὅμοιοι μεταξύ των. Π.χ. οἱ δύο πρῶτοι (ὁ ἄτλας καὶ ὁ ἐπιστροφεὺς) δὲν ἔχουν ἀνεπτυγμένον σῶμα καὶ δμοιάζουν πρὸς δακτυλίους (εἰκ. 10). Αἱ ἀποφύσεις των εἶναι διαμορφωμέναι κατὰ τοιοῦτον τρόπον, ὥστε νὰ διευκολύνουν τὴν στήριξιν καὶ περιστροφὴν τῆς κεφαλῆς. Εἰς τοὺς θωρακικοὺς σπονδύλους πάλιν παρατηροῦμεν, ὅτι αἱ ἀκανθώδεις ἀποφύσεις κατευθύνονται ὅχι μόνον πρὸς τὰ ὅπισω, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὰ κάτω, παρεμποδίζουσαι οὕτω τὴν ἔκτασιν τῆς σπονδυλικῆς στήλης πέραν ἐνὸς ὄριου.

“Οσον προχωροῦμεν ἀπὸ τοὺς πρώτους πρὸς τοὺς τελευταίους, συναντῶμεν σπονδύλους ὅλοὲν ἵσχυροτέρους, καταλλήλους

διὰ νὰ βαστάσουν μεγαλύτερον βάρος.



Εἰκ. 10. Οἱ δύο πρῶτοι αὐχενικοὶ σπόνδυλοι. Ἀνω ὁ ἄτλας, κάτω ὁ ἐπιστροφεύς.

πρὸς τὰ δόπισω. Τὰ κυρτώματα αὐτὰ δὲν ὑπάρχουν ἐξ ἀρχῆς, ἀλλὰ διαμορφώνονται, ὅταν ἀρχίζῃ τὸ βρέφος νὰ βαδίζῃ καὶ νὰ κάθηται.

### β') Αἱ πλευραὶ καὶ τὸ στέρνον

Πρὸς τὰς πλαγίας ἀποφύσεις τῶν θωρακικῶν σπονδύλων ἀρθροῦνται αἱ πλευραί. Αὗται, 12 ἐν σλῷ ζεύγη, ἦτοι ἐν ζεῦγος δι’ ἕκαστον θωρακικὸν σπόνδυλον, εἴναι ἐπίμηκη τοξειδῆ δόστᾶ, τὰ ὅποια περικλείουν τὴν θωρακικήν κοιλότητα. Τὰ πρῶτα ἐπτά ζεύγη συνεχίζονται ἐμπρὸς μὲν χόνδρινα τμήματα, τὰ ὅποια ἐνώνονται μὲν τὸ στέρνον, τὸ οὐροντόν, τὸ δόστον, τὸ δόποιον εὐρίσκεται εἰς τὸ μέσον τοῦ προσθίου τοιχώματος τοῦ θώρακος. Τὰ χόνδρινα τμήματα τῶν ἐπομένων τριῶν ζευγῶν δὲν φθάνουν μέχρι τοῦ στέρνου, ἀλλὰ ἀπολήγουν εἰς τὸ χόνδρινον τμῆμα τοῦ ἐβδόμου ζεύγους. Τέλος, τὰ δύο τελευταῖα ζεύγη πλευρῶν εἴναι ἀτροφικὰ καὶ δὲν ἔχουν χόνδρινα τμήματα.

### 5. Ο ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΤΩΝ ΑΚΡΩΝ


Θὰ ἔξετάσωμεν ἰδιαιτέρως τὸν σκελετὸν τῶν ἄνω ἄκρων καὶ τῶν ὕμων καὶ τὸν σκελετὸν τῶν κάτω ἄκρων καὶ τῆς λεκάνης.

### α') 'Ο σκελετὸς τῶν ἄνω ἄκρων (χειρῶν) καὶ τῶν ὕμων

Ἐκαστον ἐκ τῶν δύο ἄνω ἄκρων ἀρθροῦται πρὸς τὰ δόστᾶ τοῦ ἀντιστοίχου ὕμου. Τὰ δόστᾶ ταῦτα εἴναι δύο, ἡ κλείσις καὶ ἡ ὠμοπλάτη.

Ἡ κλείσις εἴναι ἐπίμηκες δόστον, τὸ δόποιον ἐκτείνεται δριζοντίως ἀπὸ τὸ ἄνω ἄκρον τοῦ στέρνου μέχρι τῆς ὠμοπλάτης.


Ἡ ὠμοπλάτη (εἰκ. 11) εἴναι πλατύ δόστον, τὸ δόποιον κατέχει τὸ ἄνω καὶ ἔξω ἄκρον τῆς ραχιαίας ἐπιφανείας τοῦ θώρακος. Ἐχει σχῆμα τριγώνου, τοῦ δόποιού ἡ βάσις εἴναι σχεδὸν παράλληλος πρὸς τὴν δευτέραν πλευράν, ἡ δὲ κορυφὴ φθάνει τὴν ἐβδόμην πλευράν. Πρὸς τὰ ἔξω



Εἰκ. 11. Ἡ ὠμοπλάτη,  
(ἐκ τῶν ὅπισθεν).  
1. Τὸ ἄκρωμιον.

σχηματίζει ἡ ὠμοπλάτη μίαν ἀπόφυσιν, καλουμένην ἀκρώμιον, πρὸς τὴν ὅποιαν ἀρθροῦται τὸ ἄκρον τῆς κλειδός.

‘Ο σκελετὸς ἑκάστου ἄνω ἄκρου περιλαμβάνει τρία τμήματα: τὸν βραχίονα, τὸν πῆχυν ἥ ἀντιβραχίονα καὶ τὴν ἄκραν ἥ κυρίως χεῖρα (εἰκ. 3, 4, 8).



Εἰκ. 12. ‘Ο σκελετὸς τῆς ἄκρας χειρός. 1. Οστᾶ τοῦ καρποῦ — 2-6. Οστᾶ τοῦ μετακαρπίου — 7-20. Άι φάλαγγες τῶν δακτύλων.

τὴν κερκίδα καὶ τὴν ὠλένην. Ταῦτα ἀρθροῦνται ἀφ' ἐνὸς μὲν πρὸς τὸ βραχιόνιον (ἡ κερκίς διὰ τοῦ κονδύλου καὶ ἡ ὠλένη διὰ τῆς τροχιλίας), ἀφ' ἔτέρου δὲ πρὸς τὴν ἄκραν χεῖρα. Τὸ κάτω ἄκρον τῆς ὠλένης εἶναι λεπτότερον τοῦ ἀνωτέρου καὶ ἀντιστοιχεῖ εἰς τὸν μικρὸν δάκτυλον τῆς χειρός. Ἀντιστρόφως, εἴς τὴν κερκίδα τὸ κατώτερον ἄκρον εἶναι δύγκωδέστερον τοῦ ἀνωτέρου καὶ ἀντιστοιχεῖ εἰς τὸν μεγάλον δάκτυλον. Ἡ ὠλένη εἶναι ὀλίγον μακροτέρα τῆς κερκίδος.

‘Η κυρίως χεὶρ σχηματίζεται ἀπὸ τρεῖς ὁμάδας ὀστῶν, τὰ ὀστᾶ τοῦ καρποῦ, τὸ μετακαρπίον καὶ τῶν δακτύλων (εἰκ. 12).

‘Ο βραχίων ἀποτελεῖται ἀπὸ ἕν μακρὸν ὀστοῦν, τὸ βραχίονιον. Τοῦτο εἶναι κοῖλον ἐσωτερικῶς καὶ εἰς τὸ ἄνω ἄκρον του ἀπολήγει εἰς μίαν σφαιρικήν κεφαλήν, ἡ ὅποια χρησιμεύει διὰ τὴν ἀρθρωσιν εἰς μίαν κοιλότητα τῆς ὠμοπλάτης, καλουμένην ὠμογλήνην καὶ κειμένην πλησίον τοῦ ἀκρωμίου. Εἰς τὸ κάτω ἄκρον τὸ βραχιόνιον ἀπολήγει εἰς δύο δύγκωματα, ἐκ τῶν ὅποιών τὸ ἐν πρὸς ἔξω εἶναι μικρότερον καὶ καλεῖται κόνδυλος, τὸ δὲ πρὸς τὰ ἔσω εἶναι μεγαλύτερον καὶ καλεῖται τροχιλία. Τὰ δύγκωματα αὐτὰ χρησιμεύουν διὰ τὴν διάρθρωσιν τοῦ βραχιονίου πρὸς τὰ δύο ὀστᾶ τοῦ πήχεως.

‘Ο πῆχυς περιλαμβάνει δύο ὀστᾶ, ταῦτα ἀρθροῦνται ἀφ' ἐνὸς μὲν πρὸς τὸ βραχιόνιον (ἡ κερκίς διὰ τοῦ κονδύλου καὶ ἡ ὠλένη διὰ τῆς τροχιλίας), ἀφ' ἔτέρου δὲ πρὸς τὴν ἄκραν χεῖρα. Τὸ κάτω ἄκρον τῆς ὠλένης εἶναι λεπτότερον τοῦ ἀνωτέρου καὶ ἀντιστοιχεῖ εἰς τὸν μικρὸν δάκτυλον τῆς χειρός. Ἀντιστρόφως, εἴς τὴν κερκίδα τὸ κατώτερον ἄκρον εἶναι δύγκωδέστερον τοῦ ἀνωτέρου καὶ ἀντιστοιχεῖ εἰς τὸν μεγάλον δάκτυλον. Ἡ ὠλένη εἶναι ὀλίγον μακροτέρα τῆς κερκίδος.

Τὰ δόστα τοῦ καρποῦ ἡ καρπικὰ εἶναι δόκτω μικρὰ δόστάρια, περίποιου στρογγύλα, διατεταγμένα εἰς δύο σειρὰς ἀνὰ τέσσαρα.

Τὰ δόστα τοῦ μετακαρπίου ἡ μετακαρπικὰ εἶναι πέντε, ἐπιμήκη, διαφρούμενα ἀφ' ἐνὸς μὲ τὰ καρπικὰ καὶ ἀφ' ἑτέρου μὲ τοὺς δακτύλους.

"Εκαστος δάκτυλος ἀποτελεῖται ἀπὸ τρία διαδοχικά ἐπιμήκη δόστάρια, τὰς φάλαγγας, πλὴν τοῦ πρώτου δακτύλου ἡ ἀντίχειρος, ὁ δόποιος περιλαμβάνει δύο φάλαγγας.


β) 'Ο σκελετὸς τῶν κάτω ἄκρων (ποδῶν)  
καὶ τῆς λεκάνης

Τὰ δόστα τῆς λεκάνης (εἰκ. 13) χρησιμεύουν ἀφ' ἐνὸς διὰ τὴν στερέωσιν τῶν

κάτω ἄκρων καὶ ἀφ' ἑτέρου διὰ τὴν ὑποστήριξιν τῶν σπλάγχνων.


"Η κοιλότης τῆς λεκάνης σχηματίζεται ἀπὸ τὸ ἴερον δόστοιν καὶ ἀπὸ τὸ δύο ἀνώνυμον ματαίον. Ταῦτα εἶναι πλατέα καὶ ἵσχυρά καὶ συνενοῦνται ἀκινήτως μὲ τὸ ἴερόν δόστοιν. Πρὸς τὰ ἔμπρός συν-

ενοῦνται μεταξύ των καὶ σχηματίζουν τὴν ἡβικὴν σύμφυσιν. Μεταξὺ τῶν δόστῶν τῆς λεκάνης παραμένει ἐν εὐρὺ διάκενον, τὸ στόμιον τῆς λεκάνης. "Εκαστον ἀνώνυμον δόστοιν φέρει κατὰ τὸ πρόσθιον ἄκρον του ἐν τμῆμα, τὸ δόποιον καλεῖται θυρεοειδὲς τρῆμα. Παρὰ τὸ θυρεοειδὲς τρῆμα ὑπάρχει ἐν κοί-



Εἰκ. 13. 'Ο σκελετὸς τῆς λεκάνης.  
1. Ἱερὸν δόστοιν. — 2. Κόκκυξ. — 3. Ἀνώνυμον δόστοιν. —  
4. Θυρεοειδὲς τρῆμα. — 5. Κοτύλη.  
3. Ἡβικὴ σύμφυσις. — 6. Στόμιον τῆς λεκάνης. — 7. Θυρεοειδὲς τρῆμα.

λωμα εις τὴν ἔξωτερικὴν ἐπιφάνειαν ἑκάστου ἀνωνύμου δόστοῦ. Τὸ κοίλωμα τοῦτο, καλούμενον κοτύλη, χρησιμεύει διὰ τὴν ἄρθρωσιν τοῦ μητριαίου δόστοῦ.



Εἰκ. 14. 'Ο σκελετὸς τοῦ ἄκρου ποδός: 1 - 7. 'Οστᾶ τοῦ ταρσοῦ.— 8 - 12. 'Οστᾶ τοῦ μεταταρσίου.— 13 - 26. Φάλαγγες τῶν δακτύλων.



Εἰκ. 15. 'Ακτινογραφία τοῦ ἄκρου ποδός.

Εἰς τὸν σκελετὸν ἑκάστου ποδὸς διακρίνομεν τρία τμήματα, τὸν μηρόν, τὴν κνήμην καὶ τὸν ἄκρον πόδα (εἰκ. 3).

Ο μηρὸς σχηματίζεται ἀπὸ ἐν μακρὸν δόστοῦν, τὸ μηριαῖον. Τοῦτο ἔχει μῆκος ὅσον ὁ πτῆχυς καὶ ἡ ἄκρα χείρ δμοῦ καὶ εἶναι τὰ

φακρότερον δύτοιν τοῦ σώματος. Εἰς τὸ ἀνώτερον ἄκρον του ἀπολήγει εἰς μίαν κεφαλήν, ἡ ὅποια διαρθροῦται πρὸς τὴν κοτύλην τοῦ ἀνωνύμου δύτοιν.

‘Η κνήμη περιλαμβάνει δύο μακρὰ δύτα, τὴν κνή μην καὶ τὴν πτερόνην. ’Εκ τούτων ἡ κνήμη εἶναι τὸ ἰσχυρότερον καὶ διὰ τοῦ ἀνωτέρου ἄκρου της ἀρθροῦται πρὸς τὸ μηριαῖον δύτοιν. ‘Η περόνη εἶναι δύτοιν λεπτότερον καὶ τὸ ἄκρον αὐτῆς δὲν φθάνει μέχρι ποῦ μηροῦ, ἀλλὰ εἶναι προσκολλημένον ἐπὶ τῆς κνήμης. Μὲ τὸ ἀκατώτερον ἄκρον τῶν ἀρθροῦνται πρὸς τὸν ἀστράγαλον.

‘Εμπροσθεν τῆς ἀρθρώσεως τοῦ γόνατος ὑπάρχει ἐν μικρὸν φακοειδὲς δύτοιν, ἡ ἐπιγόνατη.

‘Ο σκελετὸς τοῦ ἄκρου ποδὸς περιλαμβάνει, ὅπως καὶ τῆς ἄκρας χειρός, τρία τμήματα, τὸν ταρσὸν, τὸ μετατάρσιον καὶ τοὺς δακτύλους (εἰκ. 14 καὶ 15).

‘Ο ταρσὸς ἀποτελεῖται ἀπὸ ἑπτά δύτάρια, τοποθετημένα εἰς τρεῖς σειράς. ‘Η πρώτη σειρὰ περιλαμβάνει δύο ἰσχυρὰ δύτάρια, ἔκ τῶν ὅποιων τὸ ἐσωτερικὸν εἶναι δαστράγαλος, τὸ δὲ ἄλλο ἡ πτέρνα, ἡ ὅποια προεκτείνεται πρὸς τὰ δύπιστα καὶ ἀκουμβᾶ ἐπὶ τοῦ ἐδάφους.

Τὸ μετατάρσιον, ὅπως καὶ τὸ μετακάρπιον, περιλαμβάνει πέντε ἐπιμήκη δύτάρια, ἀρθρούμενα ἀφ’ ἐνὸς μὲ τὰ δύτα τοῦ ταρσοῦ καὶ ἀφ’ ἐτέρου μὲ τοὺς δακτύλους.

‘Εκαστος τῶν πέντε δακτύλων περιλαμβάνει τρεῖς φάλαγγας, πλὴν τοῦ μεγάλου, δόπτοιος περιλαμβάνει δύο μόνον.

‘Ο ἄκρος ποὺς στήριζεται ἐπὶ τοῦ ἐδάφους ἀφ’ ἐνὸς μὲ τὴν πτέρναν καὶ ἀφ’ ἐτέρου μὲ τὸ ἄκρον τοῦ μετατάρσιου καὶ τοὺς δακτύλους.

Τὸ ὑπόλοιπον μέρος δὲν ἀκουμβᾶ ἐπὶ τοῦ ἐδάφους, ἀλλὰ σχηματίζει ἐλαφρὸν κύρτωμα, τὴν καμάραν τοῦ ἄκρου ποδός.


## 6. ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ

Τὰ δύτα τοῦ σκελετοῦ ἀρχικῶς εἶναι ἄλλα μὲν χόνδρινα, ἄλλα δὲ μεμβρανώδη, σκληρύνονται δὲ δι’ ἐναποθέσεως ἀνοργάνων ἀλάτων.

Διακρίνομεν: α’) τὸν σκελετὸν τοῦ κορμοῦ (σπονδυλικὴ στήλη, πλευραί, στέρνον); β’) τὸν σκελετὸν τῆς κεφαλῆς (κρανίον, πρόσωπον); γ’) τὸν σκελετὸν τῶν ἀνω ἄκρων (ῷμοι καὶ χεῖρες); δ’) τὸν σκελετὸν τῶν κάτω ἄκρων (λεκάνη καὶ πόδες).

## 7. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1) 'Ο λόγος τοῦ μεγίστου πλάτους πρὸς τὸ μέγιστον μῆκος τοῦ κρανίου καλεῖται κεφαλικὸς δείκτης. Π.χ. ἂν τὸ μῆκος τοῦ κρανίου εἴναι 20 ἔκ. καὶ τὸ πλάτος 15 ἔκ., δικεφαλικὸς δείκτης είναι  $15/20 = 0.75$ , ἢ ἀπλῶς : 75. Οἱ ἔχοντες ἐπίμηκες κρανίου (δηλ. μικρὸν δείκτην, κάτω τοῦ 75) καλοῦνται δολιχοκέφαλοι, οἱ δὲ ἔχοντες μεγάλον δείκτην (ἄνω τοῦ 83) καλοῦνται βραχυκέφαλοι (εἰκ. 16). Μεταξὺ τούτων ὑπάρχουν καὶ ἄλλαι ἐνδιάμεσοι κατηγορίαι.



Εἰκ. 16. 'Ο κεφαλικὸς δείκτης ( $\frac{\gamma}{\alpha} \frac{\delta}{\beta}$ )  
Δεξιά: δολιχοκέφαλος.  
Αριστερά: βραχυκέφαλος.

δοχεῖον μὲν ὑδροχλωρικὸν ὁξύν, εἷς λύχνος καὶ συρμάτινον πλέγμα. 'Αφήνομεν τὸ ἔν τεμάχιον δόστοῦ ἐντὸς τοῦ ὁξέος ἐπὶ 1–12 ἡμέρας καὶ παρατηροῦμεν, ὅτι ἀπομένει μία μαλακὴ μᾶζα. Αὕτη είναι ἡ ὄργανικὴ οὐσία τοῦ δόστοῦ, ἐνῷ τὰ ἀνόργανα ἄλλα τεμάχια καὶ παρατηροῦμεν, ὅτι ἀπομένει τέφρα. Αὕτη ἀποτελεῖται ἀπὸ τὰ ἀνόργανα ἄλλατα, ἐνῷ ἡ ὄργανικὴ οὐσία ἔχει καῆ.

3) 'Αποχώρησε τὸ περιόστεον ἀπὸ ἔν δόστοῦν ζέψου. 'Επίσης παρατήρησε ἔνα ἀρθρικὸν θύλακον καὶ τὸν ἀρθρικὸν χόνδρον.

4) Σχεδίασε τὰς κάμψεις τῆς σπονδυλικῆς στήλης τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἔνδε τετραπόδου.

5) Σχεδίασε τὴν φορὰν τῶν μηρῶν καὶ τῶν κνημῶν διαφόρων ἀτόμων.

6) 'Ανυπόδητος καὶ μὲν βρεγμένον πόδα πάτησε τὸ πάτωμα. Κάμε τὸ ἴδιον καθήμενος, καθώς καὶ ὅρθιος καὶ κρατῶν ἐν βάρος. Σύγκρινε τὰ ἵχνη τοῦ ποδός σου εἰς τὸ πάτωμα.

7 ) Παρατήρησε ὅτι οἱ δάκτυλοι τῶν ποδῶν σου δὲν ἀκομμένοιν ὀλόκληροι εἰς τὸ ἔδαφος, ἀλλὰ σχηματίζουν καὶ αὐτοὶ μίαν μικράν καμάραν.

8 ) Παρακολούθησε εἰς τὸν ἀντιβραχίονα τὴν φορὰν τῆς κερκίδος καὶ τῆς ὠλένης, ὅταν ἡ παλάμη εἶναι ὑπτία καὶ ὅταν εἶναι πρηνής. Πρόσεξε, ὅτι εἰς τὴν πρηνὴν θέσιν τὰ δύο δοτᾶ διασταυροῦνται. ( Μημονικὸς κανών : ‘Η κερ-κὶς ἀπολήγει εἰς τὸν μέγαν δάκτυλον ἔχοντα δύο φάλαγγας. ‘Η ὠ-λέ-νη εἰς τὸν μικρόν, ὁ ὄποῖος ἔχει τρεῖς φάλαγγας ).

9 ) Καθόρισε εἰς τὸ σῶμα τὴν θέσιν τῶν κυριωτέρων δόστῶν.

10 ) Εἶναι πολὺ σπουδαῖον τὸ γεγονός τῆς ὀρθίας στάσεως τοῦ ἀνθρώπου ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὴν στάσιν τῶν λοιπῶν Πρωτευόντων. Ποία ὁμοταξία Σπονδυλωτῶν παρουσιάζει ἐπίσης στήριξιν ἐπὶ τῶν ὀπισθίων μόνον ἄκρων ;

11 ) Σύγκρινε τὸ σχῆμα τῆς τομῆς τοῦ ἀνθρωπίνου θώρακος καὶ ἐνὸς ἄλλου θηλαστικοῦ. Ἐπίσης σύγκρινε τὴν φορὰν τῶν πλευρῶν. Ποία εἶναι ἡ αἵτια τῶν παρατηρουμένων διαφορῶν ;

12 ) Πῶς χρησιμοποιοῦν οἱ πίθηκοι τὰ πρόσθια ἄκρα των καὶ πῶς ὁ ἀνθρωπός ; Ποῖον εἶναι τὸ μέγεθος τῶν προσθίων ἄκρων εἰς τὰς ἀνωτέρω κατηγορίας ἐν σχέσει πρὸς τὸ σῶμα ;

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ  
ΟΙ ΜΥΕΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

1. ΟΙ ΜΥΕΣ. ΑΙ ΜΥ·Ι·ΚΑΙ ΙΝΕΣ

**Μύες** είναι τὰ ὅργανα, διὰ τῶν ὅποιών γίνονται αἱ κινήσεις τῶν διαφόρων μερῶν τοῦ σώματος. Οἱ μύες ἐφαρμόζουν ἐπὶ ὁστῶν ἥ τι εύρισκονται εἰς τὰ τοιχώματα τῶν μαλακῶν ὅργάνων τοῦ σώματος. Ἀνέρχονται εἰς 300 περίπου καὶ ἀποτελοῦν σχεδὸν τὸ ἥμισυ τοῦ βάρους τοῦ σώματος.

Τὰ μυϊκὰ κύτταρα είναι σχετικῶς μακρὰ καὶ ἔλαστικὰ καὶ καλοῦνται μυϊκαὶ ἵνες, ἔχουν δὲ τὴν ἱκανότητα νὰ συστέλλωνται. Πολλαὶ μυϊκαὶ ἵνες συνενοῦνται καὶ ἀποτελοῦν μίαν μυϊκὴν δέσμην, ἥ ὅποια περιβάλλεται ἀπὸ λεπτὴν μεμβρᾶναν, καλουμένην ἐν δομῇ οὐ μόνον. Ἐκαστος μῆσις ἀποτελεῖται ἀπὸ πολλὰς τοιαύτας μυϊκὰς δέσμας. Διὰ τῆς συστολῆς τῶν μυϊκῶν ἴνῶν ὅλος διογκοῦται, ἐνῶ κατὰ τὸ μέσον αὐτοῦ (γαστήρ τοῦ μυὸς) διογκοῦται. Διακρίνουν γραμματικά τοὺς μυϊκοὺς μύες.


2. ΓΡΑΜΜΑΤΟΙ ΜΥΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΥΤΩΝ

Οἱ γραμματοὶ μύες καλοῦνται οὕτω, διότι εἰς τὰς Ἱνας τῶν τὸ πρωτόπλασμα εύρισκεται κατὰ λεπτὰ στρώματα, τὰ ὅποια ὑπὸ τὸ μικροσκόπιον διακρίνονται ως γραμμώσεις. Λόγῳ τῆς ἀφθονίας τῶν αἵμοφόρων ἄγγείων, οἱ γραμματοὶ μύες παρουσιάζουν ζωηρὸν ἐρυθρωπόν χρῶμα.

Οἱ μύες οὗτοι καταφύονται ἐπὶ τῶν ὁστῶν, καὶ, συστελλόμενοι, ἔλκουν αὐτά. Τὰ ἄκρα τῶν, διὰ τῶν ὅποιών στερεοῦνται ἐπὶ τῶν ὁστῶν, συνίστανται ἀπὸ σκληρὸν λευκὸν ἴστὸν καὶ καλοῦνται τένοντες τῶν μυῶν. Αἱ κινήσεις τῶν γραμματῶν μυῶν τελοῦνται κατὰ τὰς ἐπιταγὰς τῆς βουλήσεως.

Οἱ μύες σχηματίζουν μετὰ τῶν ὁστῶν, ἐπὶ τῶν ὅποιών προσ-

φύονται, μοχλούς (Εἰκ. 17). Π.χ. οἱ μύες τοῦ τραχήλου, οἱ ὅποιοι συγκρατοῦν τὴν κεφαλήν, καὶ ἡ κεφαλὴ ἀποτελοῦν μοχλὸν πρώτου εἴδους μὲ νόπομόχλιον τὴν σπονδυλικὴν στήλην. Ὁμοίως, οἱ μύες τῆς



Εἰκ. 17. Μοχλοί σχηματιζόμενοι ὑπὸ τῶν ὁστῶν καὶ τῶν μυῶν,  
οἱ ὅποιοι προσφύονται εἰς αὐτά.

κνήμης, οἱ καταφυόμενοι εἰς τὴν πτέρναν καὶ οἱ ὅποιοι ὑψώνονται πόδα ἀνήκουν εἰς μοχλὸν β' εἴδους. Οἱ μύες τοῦ βραχίονος, οἱ προσφυόμενοι εἰς τὸν ἀντιβραχίονα, ἀνήκουν εἰς μοχλὸν γ' εἴδους.

### 3. ΟΙ ΛΕΙΟΙ ΜΥΕΣ

Ἄντιθέτως πρὸς τοὺς γραμμωτούς, οἱ λεῖοι μύες δὲν καταφύονται ἐπὶ ὁστῶν, ἀλλ᾽ εὐρίσκονται εἰς τὰ τοιχώματα τῶν σπλάγχνων καὶ τῶν ἀγγείων. Αἱ ἵνες τῶν δὲν παρουσιάζουν ὑπὸ τὸ μικροσκόπιον γραμμώσεις. Κινοῦνται ἀνεξαρτήτως τῆς βουλήσεως, συστέλλοντες καὶ διαστέλλοντες τὰ σπλάγχνα καὶ τὰ ἀγγεῖα, εἰς τὰ τοιχώματα τῶν ὅποιων εὐρίσκονται. Οἱ μύες τῆς καρδίας ἐνεργοῦν καὶ αὐτοὶ ἀνεξαρτήτως τῆς βουλήσεως, εἶναι ὅμως, κατ' ἔξαρτεσιν, γραμμωτοί.

### 4. Ο ΜΥ·Ι·ΚΟΣ ΤΟΝΟΣ

Ἐγνωρίσαμεν ἀνωτέρω δύο ἴδιότητας τῶν μυῶν, τὴν συσταλτικότητα καὶ τὴν ἐλαστικότητα αὐτῶν. Μία ἄλλη

σπουδαία ιδιότης των είναι ό μυϊκὸς τόνος. Οὕτω καλεῖται  
ἡ ιδιότης τῶν μυῶν νὰ μὴ χαλαροῦνται τελείως, ὅλλὰ νὰ παραμέ-  
νουν διαρκῶς εἰς μίαν μετρίαν ἢ πολὺ μικράν σύσπασιν. Λόγω τοῦ  
μυϊκοῦ τόνου, ὁ στόμαχος π.χ., καὶ ὅταν δὲν περιέχῃ τροφάς, δὲν  
είναι συρρικυμένος, ὡς ἔνας κενὸς ἀσκός. Ὁμοίως κρατεῖται ἡ κεφαλὴ  
ὅρθια, κλίνει δὲ μόνον, ὅταν ἀποκοιμηθῇ κανείς. Γενικῶς, ὁ τόνος  
δίδει εἰς τὸ σῶμα μίαν ὄψιν ζωτιράν, ἢ ὅποια ἔρχεται εἰς ἀντίθεσιν  
μὲ τὴν ὄψιν τοῦ νεκροῦ σώματος.

## 5. ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ

Οἱ μύες περιλαμβάνουν μυϊκὰς δέσμας, αἱ ὅποιαι ἀποτελοῦνται ἀπὸ μυϊκὰς  
ἶναι. Χαρακτηριστικαὶ ιδιότητες τῶν μυῶν είναι ἡ συσταλτικότης, ἡ ἐλαστικότης  
καὶ ὁ μυϊκὸς τόνος. Διακρίνομεν γραμμωτοὺς καὶ λείους μῆς. Οἱ πρῶτοι καταφύον-  
ται ἐπὶ τῶν ὀστῶν καὶ κινοῦν αὐτὰ κατὰ τὴν θέλησίν μας. Οἱ λεῖοι εύρισκονται  
εἰς τὰ τοιχώματα τῶν σπλάχνων καὶ τῶν ἀγγείων καὶ είναι ἀνεξάρτητοι τῆς  
βουλήσεως.

## 6. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1 ) Καθόρισε μερικὰ παραδείγματα μοχλῶν εἰς τὸ ἀνθρώπινον  
σῶμα.

2 ) Μέτρησε μὲ ἔνα δυναμόμετρον τὴν δύναμιν τοῦ δεξιοῦ καὶ  
τοῦ ἀριστεροῦ χεριοῦ καὶ σύγκρινε τὰς δύο μετρήσεις.


3 ) Παρατήρησε εἰς τὸ βρασμένο κρέας τὰς μυϊκὰς δέσμας, αἱ  
ὅποιαι ἀποτελοῦν ἔνα μῦν.

4 ) Ἡ ἐργασία ἔνδος μυὸς δύναται νὰ γίνῃ ἐντονώτερα, ὅταν τὸ  
όστοῦν, ἐπὶ τοῦ ὅποιου οὗτος καταφύεται, μένη ἀκίνητον. Διὰ  
τοῦτο, διὰ νὰ ἀνυψώσωμεν μέγα βάρος, « κρατοῦμε τὴν ἀναπνοή  
μας », ὥστε τὰ ὀστᾶ τοῦ κορμοῦ ( ὡμοπλάτη, πλευραὶ κλπ. ) νὰ  
παραμείνουν ἀκίνητα.

5 ) Παρακολούθησε καὶ καθόρισε, βοηθούμενος καὶ ἀπὸ τὴν  
εἰκόνα, 18, τὰς διαφόρους φάσεις τοῦ βαδίσματος.

6 ) Καθόρισε πῶς κινεῖται κατὰ τὴν βάδισιν ὁ κορμὸς ( ἂν ἀνυ-  
ψοῦται καὶ πότε, ἂν κλίνῃ, πότε καὶ πρὸς ποῖον σκέλος, ἂν στρέ-  
φεται καὶ πότε. ). Ἐπίσης, πῶς κινοῦνται αἱ χεῖρες. Δοκίμασε νὰ  
βαδίσης ταχέως μὲ ἀκινήτους τὰς χεῖρας.

7) Κατὰ τὴν βάδισιν πάντοτε τὸ ἔνα πόδι ἀκουμβᾷ ἐπὶ τοῦ



Εἰκ. 18. Αἱ διαδοχικαὶ φάσεις τῆς βαδίσεως

ἔδάφους. Κατὰ τί διαφέρει, ὡς πρὸς τοῦτο, ἡ βάδισις ἀπὸ τὸ ἄλμα καὶ τὸν δρόμον;

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ

### ΑΙ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑΙ ΥΠΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΟΥΣΙΑΙ ΑΙ ΚΑΥΣΕΙΣ. Η ΘΡΕΨΙΣ

#### 1. ΑΙ ΘΡΕΠΤΙΚΑΙ ΟΥΣΙΑΙ

Ἐκ πείρας γνωρίζομεν, ὅτι, ὅπως καὶ οἱ ἄλλοι ζῶντες ὀργανισμοί, οὕτω καὶ ὁ ἀνθρώπινος ὀργανισμός, διὰ νὰ συντηρηθῇ καὶ ν' ἀναπτυχθῇ, καταναλίσκει ώρισμένας ὕλας, τὰς ὅποιας λαμβάνει ἀπὸ τὸν ἔξωτερικὸν κόσμον, τὰς τροφάς. Αἱ χρησιμοποιούμεναι ὑπὸ τοῦ ἀνθρώπου τροφαὶ προέρχονται κυρίως ἀπὸ τὸ ζωικὸν καὶ φυτικὸν βασίλειον καὶ μόνον τὸ ὕδωρ καὶ ώρισμένα ἀλατα ἀπὸ τὴν ἀνόργανον φύσιν.

Εἰς τὰς τροφὰς εύρισκει ὁ ἀνθρώπινος ὀργανισμὸς χρησίμους δι' αὐτὸν ούσιας, ἐκ τῶν ὅποιων ἄλλαι μὲν εἴναι ἀνόργανοι, ἄλλαι δὲ ὀργανικαῖ. Καὶ ἀνόργανοι μὲν καλοῦνται αἱ ούσιαι, αἱ ὅποιαι δὲν περιέχουν ἐνωμένον ἀνθρακα, ὁργανικαὶ δὲ ἀντιθέτως, ὅσαι περιέχουν ἀνθρακα ἐνωμένον μὲν ἄλλα στοιχεῖα. Αἱ χρήσιμοι αὗται θρεπτικαὶ ούσιαι εἴναι ὕδωρ καὶ ἀνόργανα ἀλατα, ὕδατα, λιπαραὶ οὔσιαι καὶ αἱ βιταμίναι, τὰς ὅποιας ἐπίσης ἀνευρίσκει ὁ ὀργανισμὸς εἰς τὰς τροφάς.

#### 2. ΥΔΩΡ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΛΑΤΑ

Τὸ ὕδωρ εἴναι συστατικὸν τῶν ἰστῶν τοῦ σώματος εἰς μεγάλην ἀναλογίαν καὶ ἀποτελεῖ καὶ τὸ μέγιστον μέρος τοῦ αἵματος. Ἐπίσης, ἐντὸς τοῦ ὀργανισμοῦ τὸ ἐλεύθερον ὕδωρ εἴναι ἀπαραίτητον διὰ τὰς χημικὰς μεταβολὰς τῶν ούσιῶν, αἱ ὅποιαι γίνονται κατὰ τὰς λειτουργίας τοῦ ὀργανισμοῦ. Ὅπολογίζουν, ὅτι τὰ 60 ο)ο τοῦ βάρους τοῦ σώματος ἀποτελοῦνται ἔξι ὕδατος. Τὸ ὕδωρ πίνεται αὐτούσιον, ἄλλα μεγάλαι πισσότητες αὐτοῦ εἰσάγονται καὶ διὰ τῶν τροφίμων.

Τὰ χόρτα π.χ. περιέχουν 85 ο)ο ὕδωρ, τὸ κρέας 70 ο)ο, ὁ ἄρτος 36 ο)ο.

Διάφορα ἀνόργανα καὶ λαταῖ εἰναι ἐπίσης ἀπαραίτητα, εἰς μικρὰς ὅμιλους ποσότητας, διὰ τὸν ὄργανισμόν. Τὸ αἷμα π. χ. περιέχει 0,6 ο)ο μαγειρικὸν ἄλας, τὰ δὲ ὀστᾶ εἰναι σκληρὰ, λόγω τῶν ἀλάτων ἀσβεστίου, τὰ ὄποια περιέχουν. Συνήθως αἱ τροφαὶ καὶ τὸ ὕδωρ περιέχουν ἐπαρκῆ ποσότητα ἀλάτων. Αὐτούσιον προσθέτει εἰς τὰς τροφὰς ὁ ἄνθρωπος τὸ μαγειρικὸν ἄλας.

### 3. ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΣ

Οἱ ὑδατάνθρακες εἰναι μία κατηγορία ὄργανικῶν οὔσιῶν ἔξι ἑκείνων, αἱ ὄποιαι περιέχουν ἄνθρακα ἐνωμένον μὲ δξυγόνον καὶ ὑδρογόνον. Σπουδαιότεροι ὑδατάνθρακες εἰναι τὰ σάκχαρα καὶ τὰ ἄμυλον. Τροφαὶ μὲ πολλὰ σάκχαρα εἰναι οἱ καρποὶ, τὸ μέλι, τὰ γλυκίσματα. Τροφαὶ μὲ πολὺ ἄμυλον εἰναι τὰ γεώμηλα, τὰ ἄλευρα, τὰ ὄσπρια κλπ.

Οἱ ὑδατάνθρακες ἔχουν τὴν ἴδιότητα νὰ ἑνοῦνται μὲ τὸ δξυγόνον ἐντὸς τοῦ ὄργανισμοῦ. Τὸ δξυγόνον εἰναι ἐν ἀέριον, τὸ ὄποιον προσλαμβάνει δ ἄνθρωπος ἀπὸ τὴν ἀτμόσφαιραν διὰ τῆς ἀναπνοῆς. Ἡ ἑνωσις μιᾶς ούσιας μὲ δξυγόνον καλεῖται καὶ σις καὶ προκαλεῖ τὴν παραγωγὴν θερμότητος. "Οταν, ὄπως, εἰς τὸν ὄργανισμὸν συμβαίνει, ἡ καιομένη ούσια περιέχῃ ἄνθρακα, τότε παράγεται καὶ τὸ ἀέριον διοξείδιον ἢ θερμότης".

Μὲ τοὺς ὑδατάνθρακας λοιπὸν καὶ τὸ δξυγόνον γίνονται ἐντὸς τοῦ σώματος καύσεις. Ἡ παραγομένη θερμότης χρησιμοποιεῖται διὰ τὰς κινήσεις τῶν μυῶν καὶ διὰ τὴν διατήρησιν τῆς θερμοκρασίας τοῦ σώματος (ζωϊκὴ θερμότης).

### 4. ΑΙ ΛΙΠΑΡΑΙ ΟΥΣΙΑΙ

Αἱ λιπαραὶ ούσιαι, αἱ ὄποιαι περιέχονται εἰς τὰς τροφὰς, εἰναι διάφορα λίπη καὶ ἔλαια. Χρησιμοποιοῦνται καὶ αὐταὶ ὑπὸ τοῦ ὄργανισμοῦ, ὄπως καὶ οἱ ὑδατάνθρακες, διὰ τὰς καύσεις. "Οταν πλεονάζουν, ἀποτίθενται ὑπὸ μορφὴν λίπους κάτωθεν τοῦ δέρματος καὶ μεταξὺ τῶν ίστῶν.

### 5. ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ

Τὰ λευκῶματα εἰναι ὄργανικαὶ ἑνώσεις, αἱ ὄποιαι περιέ-

χουν πάντοτε καὶ ἄζωτον, ἀποτελοῦν δὲ συστατικὰ τοῦ πρωτο-πλάσματος τῶν ζωϊκῶν καὶ φυτικῶν κυττάρων. Τροφαὶ μὲν πολλὰ λευκώματα εἰναι τὰ κρέατα, τὰ ὡά, τὸ γάλα, τὰ ὅσπρια κλπ.

Τὰ κύτταρα τοῦ ὄργανισμοῦ χρησιμοποιοῦν τὰ λευκώματα, διὰ νὰ σχηματίσουν πρωτόπλασμα. Δι’ αὐτοῦ, ἀφ’ ἐνὸς μὲν ἀντικαθιστοῦν τὸ μέρος ἐκεῖνο τοῦ ἴδικοῦ των πρωτοπλάσματος, τὸ ὅποιον συνεχῶς φθείρεται, ἀφ’ ἑτέρου δὲ αὔξανονται καὶ περαιτέρω.

#### 6. ΑΙ BITAMINAI

Βιταμίναι εἰναι ώρισμέναι ὄργανικαι ἐνώσεις, τὰς ὅποιας εὑρίσκει ὁ ὄργανισμὸς εἰς τὰς τροφάς, εἰς ἐλαχίστας ποσότητας. Ἐν τούτοις, εἰναι ἀπαραίτητοι διὰ τὴν κανονικὴν θρέψιν τοῦ ὄργανισμοῦ καὶ ἡ ἔλλειψις αὐτῶν προκαλεῖ διαφόρους ἀσθενείας, καλουμένας ἀβιταμίνησις.

Αἱ ἀβιταμινώσεις θεραπεύονται διὰ τῆς χρήσεως τροφῶν, αἱ ὅποιαι περιέχουν τὴν κατάλληλον βιταμίνην ἢ διὰ τῆς χρήσεως βιταμινῶν, τὰς ὅποιας παρασκευάζουν σήμερον οἱ χημικοί. Ἀπὸ τὸ ἥπαρ π.χ. ἐνὸς ἵχθυος, τοῦ ὀνίσκου, ἔξαγεται τὸ γνωστόν μας μουρουνέλαιον. Τοῦτο περιέχει κυρίως δύο βιταμίνας, αἱ ὅποιαι καλοῦνται βιταμίνη Α ἢ αντιξηροφθαλμική, καὶ βιταμίνη Δ ἢ ἀντιρραχιτική.

Ἐλλειψις τῆς βιταμίνης Α ἐλασττώνει τὴν ἀντοχὴν τοῦ ὄργανισμοῦ, δύναται δὲ νὰ προκαλέσῃ τὴν νόσον ξηροφθαλμίαν, ἡ ὅποια καταστρέφει τὸν κερατοειδῆ τοῦ ὄφθαλμοῦ. Ἡ βιταμίνη Α δὲν εἰσάγεται πάντοτε ἐτοίμη εἰς τὸν ὄργανισμόν. Πολλάκις εἰσάγεται διὰ τῶν τροφῶν (λαχανικά κλπ.) μία ἀλληλούσια, ἡ ὅποια εἰναι, ως λέγουν, ἡ προβιταμίνη Α. Ἔχει δηλαδὴ ἡ ούσια αὕτη τὴν ἰδιότητα νὰ μετατρέπεται ἐντὸς τοῦ ὄργανισμοῦ εἰς βιταμίνην Α.

Ἡ βιταμίνη Δ διευκολύνει τὴν πρόσληψιν ἀνοργάνων ούσιῶν καὶ τὴν χρησιμοποίησιν των διὰ τὴν ἀνάπτυξιν τῶν ὀστῶν. Καὶ ἡ βιταμίνη αὕτη παρασκευάζεται καὶ ἐντὸς τοῦ ὄργανισμοῦ, ἀπὸ μίαν ἀντιστοιχὸν προβιταμίνην, διὰ τῆς ἐπιδράσεως τῶν ἡλιακῶν ἀκτίνων Διὰ τοὺς λόγους τούτους καὶ τὸ μουρουνέλαιον καὶ αἱ ἡλιακαὶ ἀκτίνες ἔχουν μεγάλην χρησιμότητα ὡς προφυλακτικὰ καὶ θεραπευτικὰ μέσα κατὰ τῆς ραχίτιδος.

Μὲ τὸ ψηφίον Β χαρακτηρίζουν ὄλόκληρον ὅμαδα βιταμινῶν, αἱ ὄποιαι ἀφθονοῦν κυρίως εἰς τοὺς φλοιούς τῶν δημητριακῶν. Ἡ ἔλλειψις τῆς βιταμίνης Β προκαλεῖ τὴν νόσον Beriberi. Ἡ νόσος αὕτη ἔξεδηλώθη πολὺ εἰς τὴν Ἀπωλήσανταν, ὅταν εἰσήχθη ἐκεῖ ἡ συνήθεια νὰ ἀποφλοιώνεται τὸ ρύζι.

Ἡ Βιταμίνη Κ ἀφθονεῖ εἰς τοὺς χυμούς τῶν ἑσπεριδοειδῶν κυρίως καὶ ἡ ἔλλειψις της προκαλεῖ τὸ σκορβούτον. Ἡ πάθησις αὕτη ἦτο συνήθης ἀλλοτε εἰς τοὺς ναυτικούς, οἱ ὄποιοι ἐπὶ μακρὸν ἐτρέφοντο μὲν διατηρημένα τρόφιμα. Τὸ σκορβοῦτον χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὰς συχνὰς καὶ ἐπωδύνους αἷμορραγίας τοῦ δέρματος, τοῦ στόματος καὶ ἐσωτερικῶν μερῶν τοῦ σώματος.

Πλὴν τῶν ἀνωτέρω βιταμινῶν ὑπάρχουν καὶ ἄλλαι, οὓς δὲ μερικαὶ εἶναι ἀκόμη ἄγνωστοι.

## 7. ΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙ ΤΗΣ ΘΡΕΨΕΩΣ

Ἡ συντήρησις καὶ αὔξησις τοῦ ὄργανισμοῦ ἔξασφαλίζεται χάρις εἰς μίαν μεγάλην λειτουργίαν, ἡ ὄποια καλεῖται θρέψις. Ἡ θρέψις περιλαμβάνει τὰς ἔξης ἐπὶ μέρους λειτουργίας :

α) Τὴν ἀναποίαν, κατὰ τὴν ὄποιαν τὸ αἷμα δεσμεύει ὀξυγόνον ἀπὸ τὸν ἀτμοσφαιρικὸν ἀέρα. Συγχρόνως τὸ αἷμα ἀποδίδει εἰς τὴν ἀτμόσφαιραν τὸ ἀέριον διοξείδιον τοῦ ἀνθρακοῦ, τὸ διοίον προϊλθεν ἀπὸ τὰς καύσεις καὶ εἶναι ἐπιβλαβής διὰ τὸν ὄργανισμόν.

β) Τὴν πρέψιν, κατὰ τὴν ὄποιαν ὁ ὄργανισμὸς ἀποχωρίζει ἀπὸ τὰς τροφὰς καὶ διασπᾶ τὰς θρεπτικὰς οὐσίας.

γ) Τὴν απομύζησιν καὶ ἀφομοίωσιν, κατὰ τὰς ὄποιας ὁ ὄργανισμὸς ἀπορροφᾷ τὰ προϊόντα τῆς πέψεως καὶ συνθέτει ἔξι αὐτῶν τὰς χρησίμους διὰ τὰς ἀνάγκας του ούσιας.

δ) Τὴν κυκλοφορίαν τοῦ αἵματος, διὰ τῆς ὄποιας αἱ θρεπτικαὶ οὐσίαι καὶ τὸ ὀξυγόνον μεταφέρονται εἰς τοὺς ίστούς.

ε) Τὴν απέκκρισιν, διὰ τῆς ὄποιας τὰ ἄχρηστα προϊόντα τῶν καύσεων ἀπομακρύνονται ἀπὸ τὸν ὄργανισμόν.

Τὰς ἀνωτέρω λειτουργίας τῆς θρέψεως καὶ τὰ ὄργανα τοῦ σώματος, διὰ τῶν ὄποιων αὗται τελοῦνται, θὰ γνωρίσωμεν λεπτομερέστερον εἰς ἐπόμενα κεφάλαια.

## 8. ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ

Αἱ θρεπτικαὶ ούσίαι, τὰς ὁποίας δὲ δργανισμὸς ἀνευρίσκει εἰς τὰς τροφάς, εἶναι ὑδωρ, ὄνόργανα δλατα, ὑδατάνθρακες, λιπαραὶ ούσίαι καὶ λευκώματα. Ἀπαραίτητοι εἶναι ἀκόμη καὶ αἱ βιταμῖναι, εἰς μικροτάτος ποσότητας ( ἀβιταμίνωσεις ).

Ἡ μεγάλη λειτουργία διὰ τῆς ὁποίας ἔξασφαλίζεται ἡ συντήρησις καὶ ἡ ἀνάπτυξις τοῦ δργανισμοῦ, εἶναι ἡ θρέψις, καὶ περιλαμβάνει ὥρισμένας ἄλλας ἐπὶ μέρους λειτουργίας.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ


### ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΙΣ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΟΣ. ΟΙ ΟΔΟΝΤΕΣ

#### 1. Η ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΣ

Η κοιλότης αὗτη περικλείεται ἀπὸ τὰ ὄστα τῆς κάτω γνάθου, τῆς ἄνω γνάθου καὶ τὰ ὑπερώα. Συγκοινωνεῖ πρὸς τὰ ἔξω διὰ τοῦ στοματικοῦ ἀνοίγματος, τὸ ὅποιον φράσσεται ὑπὸ τῆς ὁδοντοστοιχίας καὶ τῶν χειλέων. Τὸ δάπεδον τῆς κοιλότητος κατέχεται ὑπὸ τῆς μυώδους καὶ εύκινήτου γλώσσης. Τὸ πρόσθιον ἄκρον τῆς γλώσσης είναι ἐλεύθερον, τὸ δὲ ὅπισθιον στερεοῦται ἐπὶ τοῦ δαπέδου καὶ τοῦ ὑοειδῆ ὄστοῦ. Διὰ τῶν κινήσεών της καὶ διὰ τῶν αἰσθητικῶν σωματίων, τὰ ὅποια φέρει, ἔχυτηρετεῖ ἡ γλῶσσα τὴν γεῦσιν, τὴν μάσησιν καὶ τὴν ὅμιλίαν.

Ἡ ὁροφὴ τοῦ στόματος καλεῖται ὑπερώα καὶ χωρίζει τοῦτο ἀπὸ τὴν ρινικήν κοιλότητα. Τὸ πρόσθιον καὶ τὸ μεγαλύτερον μέρος τῆς ὑπερώας σχηματίζεται ἀπὸ τὸ ἄνω γναθικὸν καὶ τὰ ὑπερώα ὄστα, καλεῖται δὲ σκληρὰ ὑπερώα. Τὸ ὅπισθιον τμῆμα είναι σαρκώδες (μαλακή ὑπερώα) καὶ ἀπολήγει εἰς μίαν προεξοχήν, τὴν σταφυλὴν κιονίδα.


Εἰς τὸ βάθος τοῦ στόματος, ὅπισθεν τῆς μαλακῆς ὑπερώας, καταλήγουν αἱ δύο χοάνες, διὰ τῶν ὅποιων συγκοινωνεῖ ἡ στοματικὴ πρὸς τὴν ρινικὴν κοιλότητα. Ἀπό



Εἰκ.19. Τομὴ διὰ τοῦ πρωστώπου : 1. Ρινικὴ κοιλότητα. —

4. Σκληρὰ ὑπερώα (ὑπερώιον δόστοῦ). — 3. Μαλακὴ ὑπερώα ἀπολήγουσα εἰς τὴν κιονίδα. — 2. Ἡ γλῶσσα. — 5. Ἡ ἐπιγλωττίς. — 7. Τὸ ὑοειδὲς δόστον. — 7. Ὁ θυρεοειδῆς χόνδρος τοῦ λάρυγγος. — 8. Κρικοειδῆς χόνδρος. — 10. Ἄρυταινοειδής. — 9. Λάρυγξ. — 11. Φάρυγξ.

τὴν στοματικὴν κοιλότητα ἀρχίζει δὲ ἀναπνευστικὸς σωλήν (λάρυγξ) καὶ ὁ πεπτικὸς (φάρυγξ). Παρὰ τὴν ἀρχὴν τοῦ φάρυγγος καταλήγουν καὶ αἱ εὐσταχιαὶ σὰλπιγγεῖς, διὰ τῶν ὅποιών συγκοινωνεῖ ἡ στοματικὴ κοιλότης μὲ τὴν κοιλότητα τοῦ μέσου ὥτος.




Εἰκ. 20. Οἱ σιαλογόνοι ἀδένες: 1. Παρωτίδες.—2. 'Υπογλώσσιοι. —3. 'Υπογνάθιοι.

Κατὰ τὴν κατάποσιν τοῦ βλωμοῦ ἡ ρινικὴ κοιλότης φράσσεται ὑπὸ τοῦ ὑπερώου ἰστίου καὶ ὁ λάρυγξ ὑπὸ τῆς ἐπιγλωττίδος. Κατὰ τὴν εἰσπνοὴν ἀντιθέτως ἡ ἐπιγλωττίς ἀφήνει ἀνοικτὸν τὸν λάρυγγα, ὁ δὲ φάρυγξ δὲν εἶναι ἀνάγκη νὰ ἀποφραχθῇ, καθ' ὃσον δὲν δημιουργεῖται πρὸς αὐτὸν ρεῦμα ἀέρος.

Εἰς τὸ στόμα χύνεται ὁ σιαλος ἀπὸ τρία ζεύγη βοτρυοειδῶν ὄργάνων, τὰ ὅποια καλοῦνται σιαλογόνοι ἀδένες. Ἐκ τούτων τὸ ἔν ζεύγος εύρισκεται εἰς τὰς παρειὰς (παρωτίδες), τὰ δὲ δύο ἄλλα εύρισκονται κάτωθεν τῆς γλώσσης (ὑπογλώσσιοι καὶ ὑπογνάθιοι) (εἰκ. 20).

## 2. ΟΙ ΟΔΟΝΤΕΣ

Οὗτοι εἰναι μικρὰ ὀστᾶ στερεούμενα ἐντὸς μικρῶν κοιλοτήτων τῶν γναθικῶν ὄστῶν, τῶν φατνίων. Εἰς ἕκαστον ὀδόντα διακρίνομεν τὰ ἔξης τμῆματα: α) τὴν μύλην, δηλαδὴ τὸ ἐλεύθερον τμῆμα, β) τὸν αὐχένα, περιβαλλόμενον ἀπὸ τὰ οὖλα, γ) τὴν ρίζαν, ἡ ὅποια εἰσδύει ἐντὸς τοῦ φατνίου, καὶ δ) τὴν πολιφικὴν κοιλότητα, εἰς τὸ ἐσωτερικὸν τοῦ ὀδόντος. Ἡ πολιφικὴ κοιλότης περιλαμβάνει ἀγγεῖα καὶ νεῦρα, πληροῦται δὲ ὑπὸ μαλακοῦ ἰστοῦ καλουμένου πολφοῦ.



Εἰκ. 21. Τομὴ ὀδόντος.  
1. 'Αδαμαντίνη.—2. 'Οδοντίνη.—3. Πολιφικὴ κοιλότης.—4. 'Οστείνη.—5. Γναθικὸν ὄστον.

Εἰς μίαν τομὴν δόδοντος παρατηροῦμεν, ὅτι οὗτος δὲν ἀποτελεῖται ἀπὸ μίαν μόνον ούσιαν (εἰκ. 21). Ἡ πολφική κοιλότης περιβάλλεται ὑπὸ στρώματος σκληρᾶς ούσιας, τῆς ὁδοντίνης καλύπτεται εἰς μὲν τὸν αὐχένα καὶ τὴν ρίζαν ὑπὸ ὁστείνης, εἰς δὲ τὴν μύλην ὑπὸ στρώματος τῆς σκληροτάτης ἀδαμαντίνης.


Εἰς τὸν ἄνθρωπον ἡ ἀνωτέρα ἐπιφάνεια ὄλων τῶν δόδοντων εὑρίσκεται σχεδὸν εἰς τὸ ἴδιον ὑψος. Διαφέρουν ὅμως οἱ δόδοντες μεταξύ των κατὰ τὸ σχῆμα καὶ τὸ μέγεθος (εἰκ. 22) καὶ διακρίνονται εἰς τὰς ἔξης κατηγορίας:

α') Τομεῖς. Οὗτοι παρουσιάζουν μίαν ρίζαν καὶ ἀπολήγουν εἰς λεπτὴν ἐπιμήκη μύλην· β') Κυνόδοντες. Χαρακτηρίζονται


ἀπὸ μίαν ρίζαν καὶ ἀπὸ τὸ κωνικὸν σχῆμα τῆς μύλης· γ') Προγόμφιοι. Εχουν μίαν ρίζαν καὶ πλατεῖαν μύλην μὲν δύο φύματα· δ') Γομφίοι ἢ τραπεζίται. Η ρίζα των είναι διπλῇ ἢ τριπλῇ, ἢ δὲ πλατεῖα ἐπιφάνειά των φέρει τέσσαρα φύματα.

Κατὰ τὴν νηπιακὴν ἡλικίαν ἐκφύεται ἡ πρώτη δόδοντοφυΐα, ἀποτελουμένη ἐξ εἰκοσιν δόδοντων, καλουμένων νεογιλῶν. Οἱ νεογίλοι δόδοντες είναι τοποθετημένοι ἀνὰ δέκα εἰς κάθε γνάθον ὡς ἔξης:

Τέσσαρες τομεῖς εἰς τὸ μέσον τῆς γνάθου, ἀνὰ εἰς κυνόδους δεξιὰ



Εἰκ. 22. Ἡ δόδοντοστοιχία τῆς ἄνω γνάθου. 1, 2. Τομεῖς. — 3. Κυνόδους. — 4, 5. Προγόμφιοι. — 6, 7, 8. Γομφίοι (8 : Σωφρονιστήρ).



Εἰκ. 23. Ἀκτινογραφία δόδοντων. Διακρίνονται οἱ μόνιμοι οἱ δόδοντες, οἱ δόποιοι ἀναπτύσσονται καὶ θ' ἀντικαταστήσουν τοὺς νεογίλους.

καὶ ἀριστερὰ τῶν τομέων καὶ δύο προγόμφιοι ὅπισθεν ἐκάστου κυνόδοντος.

Κατὰ τὴν παιδικὴν ἡλικίαν οἱ νεογιλοὶ ἀντικαθίστανται ὑπὸ τῶν μονίμων ὁδόντων (εἰκ. 23). Οὗτοι περιλαμβάνουν ἐπὶ πλέον τῶν νεογιλῶν ὀκτὼ γομφίους, ἀνὰ δύο ὅπισθεν τῶν προγομφίων. Τέλος, μετὰ τὸ 19ον ἔτος ἐκφύονται καὶ οἱ τέσσαρες τελευταῖοι γομφίοι, οἱ ὄποιοι καλοῦνται σῶν φροντίστηκες τῇ μόνιμοις ὁδοντοφυΐᾳ, ἀποτελουμένη ἐκ τριάκοντα δύο ὁδόντων..

Σημείωσις. — Εἰς τὴν βάσιν τῆς γλώσσης καὶ εἰς τὸ ὅπισθιον καὶ τὰ πλάγια τοιχώματα τοῦ φάρυγγος εὐρίσκονται ὀδροίσματα λεμφαδένων, τὰ δόποια καλοῦνται ἀμυγδαλίαι. Αἱ εὐρίσκομεναι εἰς τὰ πλάγια τοιχώματα τοῦ φάρυγγος φαρυγγικαὶ ἀμυγδάλαι εἶναι γνωστότεραι, διότι συχνά ἐρεθίζονται..

### 3. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1) Ἐπανάλαβε τὴν κίνησιν τῆς καταπόσεως πολλάκις καὶ πρόσεξε τὴν θέσιν τῆς γλώσσης καὶ τὴν κίνησιν τοῦ λάρυγγος.

2) Παρατήρησε εἰς τὸν καθρέπτην (καθαρὰ χέρια!) τὰ διάφορα εἴδη τῶν ὁδόντων σου. Εἰς ἔξαρχέντας ὁδόντας παρατήρησε τὴν ρίζαν καὶ τὴν πολφικήν κοιλότητα. Γράψε τὸν ὁδοντικὸν τύπον τοῦ ἀνθρώπου (παιδίου ἢ ἐνήλικου).

3) Παρατήρησε εἰς τὸν καθρέπτην τὸ ὑπερώιον ίστίον καὶ τὴν κιονίδα, εἰς τὴν ὄποιαν τοῦτο ἀπολήγει.

4) Παρατήρησε ἀνὰ τὴν σύγκλεισιν τῶν ὁδόντων οἱ ἀνωτομεῖς εὐρίσκονται πρὸ τῶν κάτω ἢ ὅπισθεν αὐτῶν. Παρατήρησε τὸ ἕδιον καὶ εἰς ἄλλα ἄτομα.

### 4. ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ

“Η στοματική κοιλότης συγκοινωνεῖ πρὸς τὴν ρινικὴν καὶ πρὸς τὸ μέσον οὖς (εὐσταχιανοὶ σάλπιγγες). Ἔξ αὐτῆς ἄρχονται ὁ ἀναπνευστικὸς σωλήν (λάρυγξ), καὶ ὁ πεπτικὸς (φάρυγξ). Η γλῶσσα καὶ οἱ ὁδόντες ἐκυπηρετοῦν τόσον τὴν μάστησιν ὅσον καὶ τὴν δημιλίαν. Η στοματικὴ κοιλότης ἀποφράσσεται ὑπὸ τῶν χειλέων καὶ τῶν ὁδόντων. Οἱ ὁδόντες, τῆς μὲν πρώτης ὁδοντοφυΐας (νεογιλοὶ) εἶναι είκοσι, τῆς δὲ δευτέρας ὁδοντοφυΐας (μόνιμοι) τριάκοντα δύο.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ

### ΠΕΨΙΣ, ΑΠΟΜΥΖΗΣΙΣ ΚΑΙ ΑΦΟΜΟΙΩΣΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟ·Ι·ΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΨΕΩΣ


#### 1. Η ΠΕΨΙΣ. Ο ΠΕΠΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝ

Η πέψις είναι μία σειρά μεταβολῶν, τὰς ὁποίας ὑφίστανται αἱ τροφαὶ ἐντὸς τοῦ ὄργανισμοῦ. Διὰ τῶν μεταβολῶν τούτων ὁ ὄργανισμὸς ἀποχωρίζει τὰς θρεπτικὰς οὔσιας καὶ τὰς διασπᾶ εἰς ἀπλουστέρας ἔνώσεις, αἱ ὁποῖαι είναι εὐδιάλυτοι καὶ δύνανται ν' ἀπορροφηθοῦν ὑπὸ τοῦ ἐντέρου.

Η πέψις τῶν τροφῶν ἀρχίζει εἰς τὸ στόμα καὶ συμπληρώνεται εἰς τὰ διάφορα τμήματα τοῦ συνεχοῦς πεπτικοῦ σωλῆνος. Ο πεπτικὸς οὗτος σωλὴν περιλαμβάνει τὰ ἔξης κατὰ σειρὰν τμήματα: Τὸν φάρυγγα, τὸν οἰσοφάγον, τὸν στόμαχον καὶ τὸ ἔντερον (εἰκ. 24). Κατωτέρω θὰ γνωρίσωμεν τὴν κατασκευὴν τῶν τμημάτων τούτων καὶ τὰς μεταβολάς, τὰς ὁποίας ὑφίστανται αἱ τροφαὶ ἐντὸς ἐκάστου ἔξ αὐτῶν.

#### 2. ΣΤΟΜΑ. ΜΑΣΗΣΙΣ. ΣΙΑΛΟΣ. ΚΑΤΑΠΟΣΙΣ ΤΟΥ ΒΛΑΜΟΥ

Εἰς τὸ στόμα ἡ τροφὴ κατατεμαχίζεται καὶ κατατρίβεται διὰ τῶν ὅδοντων. Η κατεργασία αὕτη τῆς



Εἰκ. 24. Τὸ πεπτικὸν σύστημα.

1. Οἰσοφάγος. — 2. Στόμαχος. — 3. Δωδεκαδάκτυλον. — 4. Πάγκρεας. — 5, 6, 7, 8, 9. Παχὺ ἔντερον. — 11. Λεπτόν ἔντερον. — 12. Σκωληκοειδῆς ἀπόφυσις. — 13. Ἡπαρ. — 14. Χοληδόχος κύστις.

τροφῆς καλεῖται μάσησις. Προσέτι εἰς τὸ στόμα ύψισταται ἡ τροφὴ καὶ τὴν ἐπίδρασιν τοῦ σιάλου, δὲ ὅποιος μεταβάλλει τὸ ἀμυλον εἰς σάκχαρον. Διὰ τοῦτο αἱ ἀμυλώδεις τροφαὶ ἀποκτοῦν εἰς τὸ στόμα γῆλυκειαν γεῦσιν. Ὁ σιάλος χύνεται εἰς τὴν στοματικὴν κοιλότητα ἀπὸ τὰ γνωστὰ μας τρία ζεύγη σιαλογόνων ἀδένων (εἰκ. 20).

Ἄφοῦ ὑποστῇ τὰς ἀνωτέρω κατεργασίας, λαμβάνει ἡ τροφὴ διὰ τῶν κινήσεων τῆς γλώσσης τὸ σχῆμα μιᾶς μικρᾶς σφαίρας, ἡ δόποια καλεῖται βλωμὸς (μπουκιά). Ὁ βλωμὸς αὗτος διὰ τῆς καταπόσεως εἰσέρχεται εἰς τὸν φάρυγγα.

### 3. ΦΑΡΥΓΖ ΚΑΙ ΟΙΣΟΦΑΓΟΣ ΣΤΟΜΑΧΟΣ ΚΑΙ ΓΑΣΤΡΙΚΟΝ ΥΓΡΟΝ

‘Ο φάρυγξ εἶναι, ώς εἴπομεν, ἡ ἀρχὴ τοῦ ἴδιως πεπτικοῦ σωλῆνος καὶ ἔχει σχῆμα χωνίου. Ὁ βλωμὸς διέρχεται αὐτὸν καὶ διατρέχει τὸν οἰσοφάγον. Οὕτος εἶναι μυώδης σωλήν, δὲ ὅποιος διαπερᾷ τὸν θώρακα ἐμπρὸς ἀπὸ τὴν σπονδυλικὴν στήλην καὶ ἀπολήγει εἰς τὸν στόμαχον.

‘Ο στόμαχος εἶναι μυώδης ἀσκός, δὲ ὅποιος εύρισκεται εἰς τὸ ἀριστερὸν μέρος τῆς κοιλίας. Τὸ ἐσωτερικὸν στρῶμα τοῦ τοιχώματός του, τὸ ὅποιον καλεῖται βλεννογόνος χιτών, περιλαμβάνει ἀδένας, οἱ ὅποιοι ἐκκρίνουν βλέψιν ανθεκτικὸν ψυχρόν. Διὰ τῶν κινήσεων τοῦ μυώδους τοιχώματος ἡ τροφὴ ἀναμιγνύεται καλῶς μὲ τὸ γαστρικὸν υγρόν. Τοῦτο ἔχει τὴν ἰδιότητα νὰ προσβάλῃ τὰ λευκώματα τῆς τροφῆς καὶ νὰ τὰ διασπᾷ εἰς ἀπλουστέρας ἐνώσεις.

### 4. ΛΕΠΤΟΝ ΕΝΤΕΡΟΝ. ΠΑΓΚΡΕΑΣ. ΗΠΑΡ. ΧΟΛΗΔΟΧΟΣ ΚΥΣΤΙΣ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΙΣ ΤΗΣ ΠΕΨΕΩΣ

Τὸ ἔντερον εἶναι μακρὸς σωλήν (8<sup>1</sup>/<sub>2</sub> μ. περίπου) «κουλουριασμένος» ἐντὸς τῆς κοιλιακῆς κοιλότητος. Τὸ πρῶτον τμῆμα του, τὸ ὅποιον περιλαμβάνει τὰ 3/4 περίπου τοῦ ὅλου μήκους του, καλεῖται λεπτὸν ἔντερον καὶ ἔχει διάμετρον 3 - 5 ἑκ. Συνέχεια αὐτοῦ εἶναι τὸ παχύ ἔντερον, τὸ ὅποιον εἶναι χονδρότερον καὶ ἀπολήγει εἰς τὴν ἔδραν.

Τὸ ἀρχικὸν τμῆμα τοῦ λεπτοῦ ἔντερου εἶναι κεκαμμένον πετα-

λοειδῶς καὶ στερεοῦται ἐπὶ τοῦ ὀπισθίου τοιχώματος τῆς κοιλιακῆς κοιλότητος. Τὸ τμῆμα τοῦτο καλεῖται δωδεκάκτυλον.

Εἰς τὸ δωδεκαδάκτυλον εἰσέρχεται ἡ τροφὴ διὰ συστολῶν τοῦ κατωτέρου στομάτου τοῦ στομάχου, τὸ ὄποιον καλεῖται πυλωρός.

Ἐδῶ συνεχίζεται ἡ πέψις τῆς τροφῆς διὰ τῶν ύγρῶν, τὰ ὄποια χύνονται εἰς τὸ τμῆμα τοῦτο τοῦ πεπτικοῦ σωλήνος. Τὰ ύγρά ταῦτα εἶναι τὰ ἔξης :

α) **Τὸ ἐντερικὸν ύγρόν.** Τοῦτο παράγεται ἀπὸ τοὺς ἀδένας τοῦ βλεννογόνου χιτῶνος τοῦ ἐντέρου.

β) **Τὸ παγκρεατικὸν ύγρόν.** Τοῦτο παράγεται ἀπὸ τὸ πάγκρεατον. Ὁ ἐπιμήκης οὔτος ἀδὴν ἐκτείνεται δριζοντίως ἀπὸ τοῦ δωδεκαδακτύλου μέχρι τοῦ σπληνός. Μὲ τὴν προσθίαν ἐπιφάνειαν ἀκουμβᾷ ἐπὶ τοῦ στομάχου καὶ μὲ τὴν ὀπισθίαν ἐπὶ τῆς σπονδυλικῆς στήλης καὶ τοῦ ἀριστεροῦ νεφροῦ. Ἐκβάλλει εἰς τὸ δωδεκαδάκτυλον μὲ δύο ἐκφορητικούς ἀγωγούς. Ἐκ τούτων δὲ εἶς τὸ δωδεκαδάκτυλον μὲ τὸν ἀγωγὸν τῆς χολῆς.

γ) **Η χολή.** Αὕτη εἶναι ἐν κιτρινοπράσινον ύγρόν, τὸ ὄποιον παράγεται εἰς τὸ ἡπαρ (σηκώτι) καὶ συναθροίζεται εἰς τὴν χοληδόχον κύστιν, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ εὐθείας ἀπὸ τὸ ἡπαρ, ἡ χολὴ χύνεται καὶ αὐτῇ εἶς τὸ δωδεκαδάκτυλον.

Τὸ ἡπαρ εἶναι διηγαλύτερος ἀδὴν τοῦ σώματος, φθάνων μέχρι βάρους 2 χλγρ. Ἀποτελεῖται ἀπὸ δύο λοβούς καὶ εύρισκεται, ισούψως μὲ τὸν στόμαχον, εἰς τὴν δεξιὰν πλευρὰν τῆς κοιλίας.

Μὲ τὴν ἐπίδρασιν τῶν ἀνωτέρω ύγρῶν συμπληρώνεται εἰς τὸ λεπτὸν ἔντερον ἡ διάσπασις ὅλων τῶν θρεπτικῶν ούσιῶν τῶν τροφῶν, δηλ. τῶν λευκωμάτων, τῶν ύδατανθράκων καὶ τῶν λιπῶν. Αἱ ἀπλούστεραι ἐνώσεις, αἱ ὄποιαι προκύπτουν καὶ τὰς ὄποιας θάλασσαν μὲ τὸ ροΐόν τας τῆς πέψεως, εἶναι εύδιάλυτοι εἰς τὸ ύδωρ καὶ δύνανται νὰ ἀπορροφηθοῦν ὑπὸ τοῦ ἐντέρου.


## 5. ΑΠΟΜΥΖΗΣΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟ·Ι·ΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΨΕΩΣ ΔΙΑ ΤΩΝ ΛΑΧΝΩΝ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ

Ἡ ἀπορρόφησις τῶν προϊόντων τῆς πέψεως γίνεται διὰ τοῦ τοιχώματος πολυπληθῶν, μικρῶν, μικροτάτων προεξοχῶν τοῦ βλεννογόνου τοῦ λεπτοῦ ἐντέρου, αἱ ὄποιαι καλοῦνται λάχναι.

Αἱ λάχναι εἰναι εὐκίνητοι, ἔχουν λεπτότατον τοίχωμα καὶ περιλαμβάνουν αἷμοφόρα καὶ λεμφικὰ ἀγγεῖα (εἰκ. 25). Τὰ προϊόντα τῆς πέψεως διέρχονται τὸ τοίχωμα τῶν λαχνῶν τούτων καὶ εἰσέρχονται εἰς ἀγγεῖα.

#### 6. ΑΦΟΜΟΙΩΣΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟ·Ι·ΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΨΕΩΣ

Ἄπὸ τὰ προϊόντα αὐτὰ τῆς πέψεως, τὰ ὄποια ἀπορροφᾶ, σχηματίζει ὁ ὄργανισμὸς τὰ λίπη, τὰ λευκώματα καὶ τοὺς ὑδατάνθρακας τοῦ ἴδικοῦ του σώματος. Τὰ συστατικὰ αὐτὰ τοῦ σώματός του διαφέρουν ἀπὸ τὰ ἀντίστοιχα συστατικὰ τοῦ σώματος ζῷου ἄλλου εἶδους. Πρὸ παντὸς τὸ λεύκωμα τοῦ ἀνθρώπου, ὅπως καὶ παντὸς ζῷου, παρουσιάζει σημαντικήν διαφορὰν ἀπὸ τὸ λεύκωμα ζῷου ἄλλου εἶδους.



Εἰκ. 25. Σχῆμα ἐντερικῆς λάχνης  
1. Βλεννογόνος. — 2. Λεία μυτίκῃ στοιβάς. — 3. Ἀρτηρία. — 4. Φλέψ. — 5. Λεμφικὸν ἀγγεῖον.

Οἱ σχηματισμὸι τῶν συστατικῶν τῶν Ἰστῶν ἀπὸ τὰ προϊόντα τῆς πέψεως καλεῖται ἀφομοίωσις. Αὕτη πραγματοποιεῖται διὰ μὲν τὰ λίπη κυρίως εἰς τὸ τοίχωμα τοῦ ἐντέρου, διὰ δὲ τοὺς ὑδατάνθρακας κυρίως εἰς τὸ ἡπαρ. Διὰ τὰ λευκώματα ἡ ἀφομοίωσις τελεῖται ἐν μέρει μὲν εἰς τὸ ἡπαρ, κυρίως ὅμως εἰς τὰ ἴδια τὰ κύτταρα τῶν Ἰστῶν. Δηλαδὴ τὰ διάφορα κύτταρα ἐκλέγουν ἀπὸ τὸ αἷμα τὰ ἀναγκαῖα προϊόντα τῆς πέψεως καὶ ἐξ αὐτῶν παρασκευάζουν μόνα τὰ λευκώματά των.

#### 7. ΠΑΧΥ ΕΝΤΕΡΟΝ. ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ. ΠΕΡΙΤΤΩΜΑΤΑ

Μετὰ τὴν ἀπορρόφησιν τῶν θρεπτικῶν ούσιῶν μένουν εἰς τὸ ἐντερον τὰ στερεὰ ὑπολείμματα τῶν τροφίμων, ὕδωρ καὶ πεπτικὰ ὑγρά. "Ολα αὐτὰ διὰ τῶν συστολῶν τοῦ ἐντέρου προωχροῦν εἰς τὸ τελευταῖον τμῆμα του, τὸ παχὺ ἐντερον. Ἐδῶ γίνεται ἀκόμη

μία μικρά ἀπορρόφησις, ἵδιως ὕδατος, καὶ τέλος τὰ ὑπολείμματα ἀποβάλλονται ἐκ τῆς ἔδρας ὡς περιττά ως ματα. Εἰς τὸ παχὺ ἔντερον ἀναπτύσσονται καὶ ώρισμένα εῖδη μικροοργανισμῶν (βακτηριδίων). Τὰ βακτηρίδια ταῦτα δὲν προξενοῦν βλάβην εἰς τὸν ὄργανισμόν. Ἀντιθέτως μάλιστα τὸν ὀφελοῦν, διότι παρεμποδίζουν τὴν ἀνάπτυξιν ἐντὸς τοῦ ἔντερου ἄλλων μικροβίων, παθογόνων. Μέρος τῶν βακτηριδίων τούτων ἔξερχεται ἐκάστοτε μετὰ τῶν περιττωμάτων.

#### 8. ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ ΖΕΝΩΝ ΛΕΥΚΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

‘Ως εἶδομεν, τὰ λευκώματα ἐκάστου ζώου καὶ τοῦ ἀνθρώπου διαφέρουν ἀπὸ τὰ λευκώματα ζώου ἄλλου εἶδους. Δι’ αὐτὸν ὁ ὄργανισμὸς δὲν δέχεται ξένα λευκώματα, τὰ ὅποια εἰσάγονται εἰς αὐτὸν ἀπ’ εὐθείας, χωρὶς δηλ. νὰ διασπασθοῦν εἰς τὸν πεπτικὸν σωλήνα. Ἐὰν τοιαῦτα λευκώματα εἰσχωρήσουν εἰς τοὺς ίστούς, ὁ ὄργανισμὸς βλάπτεται καὶ παρουσιάζει συμπτώματα δηλητηριάσεως.

Τοῦτο π. χ. συμβαίνει, ὅταν ὁ ὄργανισμὸς μολυνθῇ, ὅταν δηλαδὴ ἀναπτυχθοῦν ἐντὸς τῶν ίστῶν του μικρόβια. Ἀπὸ τὰ καταστρεφόμενα μικροβιακὰ κύτταρα ἐλευθερώνονται μέσα εἰς τὸ αἷμα λευκώματα, τὰ ὅποια εἶναι ξένα διὰ τὸν ὄργανισμόν.

Εἰς τοῦτο ὀφείλονται ἐν μέρει τὰ συμπτώματα, τὰ ὅποια παρατηροῦνται μετὰ τὴν μόλυνσιν (πυρετὸς κλπ.).

#### 9. ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ

‘Ο πεπτικὸς σωλήνη περιλαμβάνει κατὰ σειρὰν ἀπὸ τοῦ στόματος τὸν φάρυγγα, τὸν οἰσοφάγον, τὸν στόμαχον, τὸ λεπτόν καὶ τὸ παχύ ἔντερον. Εἰς τὸν στόμαχον ἐκβάλλουν : 1) οἱ ἀδένες τοῦ βλεννογόνου του ( βλέννα καὶ γαστρικὸν ύγρόν ), 2) τὸ πάγκρεας, 3) ὁ ἀγωγὸς τῆς χολῆς ( ήπαρ καὶ χοληδόχος κύστις ), 4 ) οἱ ἀδένες τοῦ βλεννογόνου τοῦ ἔντερου. Ή πέψις ἀρχίζει ἀπὸ τὸ στόμα ( μάστισις, σίαλος ) καὶ συμπληροῦται μὲ τὴν ἐπίδρασιν τῶν ἐκκριμάτων τῶν ὡς ἀναδένων.


Τὰ προϊόντα τῆς πέψεως ἀπομιζῶνται διὰ τῶν λαχνῶν τοῦ λεπτοῦ ἐντέρου καὶ ἀφομοιώνονται πρὸς τὰ συστατικά τῶν ἀνθρωπίνων ίστῶν.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΚΤΟΝ

### Η ΑΝΑΠΝΟΗ

#### 1. ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ

Έμάθομεν ότι δύο δργανισμός προσλαμβάνει από τὸν ἀτμοσφαιρικὸν ὅέρα τὸ διγυόνον, τὸ δόποῖον χρειάζεται διὰ τὰς καύσεις. Η



Εἰκ. 26. Τὸ ἀναπνευστικὸν σύστημα.

1. Ο θυρεοειδής χόνδρος τοῦ λάρυγγος. —
2. Θυρεοειδής ἀδήν. — 3. Τραχεῖα. — 4. Βρόγχοι. — 5. Τομὴ διὰ τοῦ πνεύμονος. — 6. Οἰσοφάγος. — 7. Διάφραγμα. — α. Ἀριστερὸς πνεύμων. — δ. Δεξιὸς πνεύμων.

καλύπτεται από βλεφαριδωτὸν βλεννογόνον. Τὸ πρόσθιον μέρος τοῦ σωλῆνος τούτου εἶναι ἴδιαιτέρως διαμορφωμένον διὰ τὴν παραγω-

δέσμευσις τοῦ διγυόνου γίνεται ύπό τοῦ αἷματος εἰς τοὺς πνεύμονας, τὰ κυριώτερα δργανα τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος.

Ολόκληρον τὸ ἀναπνευστικὸν σύστημα περιλαμβάνει δύο τμήματα: α) τὴν ἀναπνευστικὴν δόσην, διὰ τῆς ὁποίας κυκλοφορεῖ μέχρι τῶν πνευμόνων δόση, καὶ β) τοὺς πνεύμονας (εἰκ. 26).

Η ἀναπνευστικὴ δόσης εἶναι ἔνας σωλὴν, ὁ ὅποιος ἀρχίζει από τὴν στοματικὴν κοιλότητα καὶ προχωρεῖ κατὰ μῆκος τῆς προσθίας ἐπιφανείας τοῦ λασιμοῦ. Ο σωλὴν οὕτος σχηματίζεται από ἄλλεπαλλήλους χονδρίνους δακτυλίους καὶ ἐσωτερικῶς

γήν τῆς φωνῆς καὶ καλεῖται λάρυγξ. Τὸ ὑπόλοιπον τμῆμα, ἡ τραχεῖα, δταν φθάσῃ εἰς τὸ ὑψος τοῦ στέρνου, διχάζεται εἰς δύο κλάδους, οἱ δόποιοι καλοῦνται βρόγχοι καὶ οἱ δόποιοι εἰσέρχονται ἀνὰ εἰς εἰς ἔκαστον πνεύμονα.

Οἱ πνεύμονες κατέχουν τὸ μεγαλύτερον μέρος τῆς θωρακικῆς κοιλότητος. Ἐντὸς αὐτῶν οἱ βρόγχοι διακλαδίζονται εἰς ἀπειρίαν μικρῶν κυστιδίων, τὰς κυψελίδας. Εἰς τὰ τοιχώματα τῶν κυψελίδων τούτων διακλαδίζονται τριχοειδῆ αίμοφόρα ἄγγεια. "Ωστε ἡ μᾶζα τῶν πνευμόνων ἀποτελεῖται ἀπὸ τὰ βρόγχια, τὰ ἄγγεια, τὰς κυψελίδας καὶ ἀπὸ συνδετικὸν ίστόν. 'Ο δεξιὸς πνεύμων εἶναι τρίλοβος, ὁ δὲ ἀριστερὸς εἶναι μικρότερος (δίλοβος), ἀφήνων χῶρον καὶ διὰ τὴν καρδίαν εἰς τὸ ἀριστερὸν ἥμισυ τοῦ θώρακος.

"Οπως θὰ ἴδωμεν καὶ ἀργότερον, ἀπὸ τὴν καρδίαν (καὶ μάλιστα τὴν δεξιὰν κοιλίαν αὐτῆς) ἀρχίζει ἔνα μεγάλο ἄγγειον, ἡ πνευμονικὴ ἀρτηρία. Αὕτη διχάζεται εἰς ἓν ἄγγειον διὰ κάθε πνεύμονα καὶ τοῦτο διακλαδίζεται περαιτέρω καὶ δίδει τὰ τριχοειδῆ ἄγγεια τῶν πνευμόνων. Διὰ τῆς πνευμονικῆς ταύτης ἀρτηρίας προσάγεται ἀπὸ τὴν καρδίαν αἷμα εἰς τοὺς πνεύμονας. 'Εδῶ τοῦτο συναντᾶται μὲ τὸν ἀτμοσφαιρικὸν ἀέρα, ὁ δόποιος διὰ τῆς ἀναπνευστικῆς ὁδοῦ εἰσέρχεται εἰς τοὺς πνεύμονας καὶ πληροῖ τὰς κυψελίδας.

Διὰ μέσου τῶν λεπτοτάτων τοιχωμάτων τῶν τριχοειδῶν τὸ ὀξυγόνον τοῦ ἀέρος διεισδύει (διαπιδύει) εἰς τὰ ἄγγεια καὶ δεσμεύεται ὑπὸ τοῦ αἵματος. Ἀντιστρόφως, ἐκ τοῦ αἵματος διαπιδύει εἰς τὸν ἀέρα τῶν κυψελίδων τὸ διοξείδιον τοῦ ἀνθρακος. "Ωστε γίνεται μία ἀνταλλαγὴ ἡ ἀερίων μεταξὺ αἵματος καὶ ἀέρος. Δι' αὐτῆς τὸ αἷμα πλουτίζεται εἰς ὀξυγόνον καὶ καθαρίζεται ἀπὸ τὸ διοξείδιον τοῦ ἀνθρακος, τὸ δόποιον προκύπτει ἐκ τῶν καύσεων. Μετὰ τοῦτο τὸ αἷμα ἐπιστρέφει εἰς τὴν καρδίαν (τὸν ἀριστερὸν κόλπον αὐτῆς) διὰ τῶν πνευμονικῶν φλεβῶν. 'Εξ ἀλλού ὁ φορτισμένος μὲ διοξείδιον τοῦ ἀνθρακος καὶ πτωχὸς πλέον εἰς ὀξυγόνον ἀπὸ τῶν κυψελίδων ἐκδιώκεται ἀπὸ τοὺς πνεύμονας.

Αἱ πολυπληθεῖς κυψελίδες παρέχουν, ὅλαι μαζί, μίαν μεγάλην ἐπιφάνειαν, εἰς τὴν δόποιαν τὸ αἷμα καὶ ὁ ἀπὸ τῶν πνευμονικῶν φλεβῶν φορτισμένος μὲ διοξείδιον τοῦ ἀνθρακος καὶ πτωχὸς πλέον εἰς ὀξυγόνον ἀπὸ τῶν κυψελίδων ἐκδιώκεται ἀπὸ τοὺς πνεύμονας.

## 2. ΑΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ

‘Η είοδος τοῦ ἀέρος μέχρι τῶν πνευμόνων καὶ κατόπιν ἡ ἔξοδος αὐτοῦ ἔξασφαλίζονται διὰ τῶν ἀναπνευστικῶν κινήσεων. Αὗται τελοῦνται εἰς δύο χρόνους: Πρῶτον, αἱ πλευραὶ κινοῦνται πρὸς τὰ ἔξω καὶ τὸ διάφραγμα πρὸς τὰ κάτω. Οὕτως ἡ θωρακικὴ κοιλότης εὔρυνται καὶ οἱ πνεύμονες, διογκούμενοι, ἀποκτοῦν μεγαλυτέραν χωρητικότητα. Τότε ρεῦμα ἀέρος διὰ τῆς ρινὸς ἢ τοῦ στόματος εἰσέρχεται εἰς τὴν ἀναπνευστικὴν ὅδὸν καὶ φθάνει μέχρι τῶν κυψελίδων (εἰσπνοή). Δευτέρου, διὰ χαλαρώσεως τῶν μυῶν τῶν πλευρῶν καὶ τοῦ διαφράγματος ἡ θωρακικὴ κοιλότης ἐπανακτᾶ τὸν προηγούμενον ὅγκον της. Οὕτως οἱ πνεύμονες πιέζονται καὶ ὁ ἄτηρ, ὁ ὄποιος εἰσῆλθε κατὰ τὴν εἰσπνοήν, ἐκδιώκεται ἐξ αὐτῶν (ἐκ πνοής). ‘Η συμπίεσις ὅμως τῶν πνευμόνων δὲν εἶναι τελεία καὶ πάντοτε παραμένει ἐντὸς αὐτῶν μικρὰ ποσότης ἀέρος.

Σημείωσις. Κατὰ τὴν ἀναπνοήν, ὁ δργανισμὸς ἀποδίδει, πλὴν τοῦ διοξείδιου τοῦ ἄνθρακος, καὶ μίαν ποσότητα ὑδρατμῶν. Διὰ τοῦ τρόπου τούτου ἀποβάλλεται καὶ μέρος τῆς θερμότητος τοῦ σώματος.

## 3. ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ

Χάρις εἰς τὰς ἀναπνευστικὰς κινήσεις κυκλοφορεῖ διὰ τῆς ἀναπνευστικῆς ὅδοῦ μέχρι τῶν πνευμόνων ὁ ἀτμοσφαιρικὸς ἄτηρ. Ἐξ ἃλλου, διὰ τῶν δγγείων φέρεται μέχρις αὐτῶν τὸ αἷμα. Διὰ μέσου τῶν τοιχωμάτων τῶν τριχοειδῶν γίνεται ἀνταλλαγὴ ἀερίων, διὰ τῆς ὄποιας τὸ αἷμα πλουτίζεται εἰς ὀξυγόνον καὶ καθαρίζεται ἀπό τὸ διοξείδιον τοῦ ἄνθρακος.


## 4. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1) ‘Η ἐπιφάνεια τῶν κυψελίδων ὑπολογίζεται ἀνω τῶν 100 τ.μ. Παρατήρησε ἐπὶ τοῦ ἔδαφους μίαν ἵσην ἐπιφάνειαν.

2) Κατὰ τὴν ἥρεμον ἀναπνοὴν ὁ ἄνθρωπος εἰσάγει 500 κυβ. ἔκ. ἀέρος εἰς τοὺς πνεύμονας. Δεδομένου ὅτι εἰς κάθε 1' ἐκτελεῖ 16 ἀναπνοάς, πόσον ὅγκον ἀέρος εἰσπνέει εἰς μίαν ὥραν, εἰς ἓν ἡμερονύκτιον; Κατὰ τὴν παιδικὴν ἡλικίαν αἱ ἀναπνοαὶ εἶναι περισσότεραι, ἀνερχόμεναι εἰς 25 - 30 κατὰ 1'.

3) Ο εἰσπνεόμενος ἀήρ, διερχόμενος διὰ τῆς ρινός, ὅχι μόνον καθαρίζεται, ἀλλὰ καὶ θερμαίνεται. Παρατήρησε τοῦτο εἰσπνέων μίαν φοράν διὰ τῆς ρινὸς καὶ μίαν διὰ τοῦ στόματος.

4) Εἰς τὴν ρινικὴν κοιλότητα ὁ εἰσπνεόμενος ἀήρ καθαρίζεται ἀπὸ τὴν σκόνην καὶ τὰ μικρόβια. Ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν τραχεῖαν αἱ βλεφαρίδες τοῦ ἐπιθηλίου τῆς, διὰ τῶν κινήσεών των, ἀναγκάζουν κάθε μόριον σκόνης, τὸ δποῖον τυχόν εἰσέδυσε, νὰ ἔξελθῃ. Ὅπολογίζουν,



Εἰκ. 27. Οἱ τρεῖς ἀναπνευστικοὶ τύποι

ὅτι εἰς τὸ ὑπαιθρὸν αἱ ωροῦνται 1000 μικροσκοπικὰ μόρια σκόνης εἰς 1 κυβ. ἑκατοστ., εἰς δὲ τὰς πόλεις 100.000 - 500.000.


5) Παρατήρησε κατὰ τὴν ἥρεμον ἀναπνοὴν τοὺς ἔξης τρεῖς «ἀναπνευστικοὺς τύπους»: α) Κατωτέρα πλευρικὴ (διαφραγματικὴ) ἀναπνοή, συνήθης εἰς τοὺς ἄνδρας· β) Ἀνωτέρα πλευρικὴ (θωρακικὴ) ἀναπνοή, συνήθης εἰς τὰς γυναῖκας· γ) Κοιλιακὴ ἀναπνοή, συνήθης εἰς τὰ παιδία (εἰκ. 27).

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΒΔΟΜΟΝ

### Ο ΛΑΡΥΞ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ

#### 1. Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΛΑΡΥΓΓΟΣ. ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ

Ἐξετάζοντες τὴν κατασκευὴν τοῦ ἀναπνευστικοῦ σωλῆνος, παρατηροῦμεν, ὅτι τὸ ἀνώτερον μέρος του, ὁ λάρυγξ, σχηματίζεται ἀπὸ χόνδρινα τμήματα, παρουσιάζοντα ἴδιαίτερον σχῆμα καὶ μέγεθος (εἰκ. 19, 26). Ἐκ τῶν χόνδρων τούτων μεγαλύτερος εἶναι ὁ θυρεός οὗ δέδισ, ὁ ὅποῖος κατέχει τὴν προσθίαν ἐπιφάνειαν τοῦ λάρυγγος,



Εἰκ. 28. Τομὴ διὰ τοῦ λάρυγγος: 1. Ανώτεραι φωνητικαὶ χορδαὶ. — 2. Κατώτεραι φωνητικαὶ χορδαὶ. — 3. Φωνητικὴ σχισμή. — 5. Θυρεοειδῆς. — 4. Κρικοειδῆς.

κάτωθεν τοῦ θυρεοειδοῦς δόστοῦ. Εἰς τὴν ὄπισθίαν ἐπιφάνειαν τοῦ λάρυγγος εὐρίσκονται δύο μικρότεροι χόνδροι, οἱ ὅρυταινοι εἰδῆς. Κάτωθεν τοῦ θυρεοειδοῦς εὐρίσκεται ὁ κρικοειδῆς χόνδρος. Τέλος ὁ λάρυγξ δύναται νὰ κλεισθῇ ὑπὸ ἐνὸς ἄλλου χόνδρου, τῆς ἐπιγλωττίδος, ἡ ὅποία εὐρίσκεται εἰς τὴν βάσιν τῆς γλώσσης.

Μεταξὺ τοῦ θυρεοειδοῦς χόνδρου καὶ τῶν ἀρυταίνονται δύο ζεύγη σαρκωδῶν πτυχῶν, αἱ ὅποιαι καλοῦνται φωνητικαὶ χορδαί. Ἐκ τούτων μόνον αἱ κατώτεραι ἔχουν σημασίαν διὰ τὴν παραγωγὴν τῆς φωνῆς καὶ κυρίως αὐτάς θὰ ἐννοοῦμεν ὡς φωνητικὰς χορδάς. Αὗται ἀφήνουν μεταξύ των τὴν φωνητικὴν σχισμήν,

διὰ τῆς ὅποιας διέρχεται ὁ εἰσπνεόμενος ἀήρ (εἰκ. 28).

Διὰ τῶν διαφόρων μυῶν εἶναι δυνατόν αἱ δύο κατώτεραι φωνητικαὶ χορδαὶ νὰ ἐκταθοῦν καὶ ἡ φωνητικὴ σχισμή νὰ ἀποστενθῇ. Ο ἐκπνεόμενος τότε ἀήρ, διερχόμενος διὰ τῆς στενῆς σχισμῆς, θέτει εἰς παλμικὰς κινήσεις τὰς δύο χορδάς, καὶ οὕτω παράγεται ἡ φωνή.

## 2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ ΑΡΘΡΩΣΙΣ ΑΥΤΗΣ ΕΙΣ ΦΘΟΓΓΟΥΣ. ΛΟΓΟΣ

"Οπως και εις κάθε ήχον, διακρίνομεν εις τὴν ἀνθρωπίνην φωνὴν τρεῖς χαρακτήρας: τὸ ὑψός (βαρειὰ ἡ ψιλὴ φωνὴ), τὸ ν ἐν τασιν (δυνατὴ ἡ ἀσθενὴς) και τέλος τὸ ποιὸν τὸν τῆς φωνῆς. Διὰ τοῦ ποιοῦ τῆς φωνῆς ἀναγνωρίζομεν τὸ πρόσωπον, τὸ ὅποιον παράγει αὐτήν, ἔστω και ἀν δὲν βλέπομεν αὐτό.

Τὸ ὑψός τῆς φωνῆς ἔξαρτᾶται ἀπὸ τὴν τάσιν τῶν χορδῶν και ἀπὸ τὸ μῆκος τοῦ λαιμοῦ. Ἡ ἐντασις ἔξαρτᾶται ἀπὸ τὴν δύναμιν τῆς ἐκπνοῆς. Τὸ ποιὸν τέλος ἔξαρτᾶται ἀπὸ τὴν ἰδιαιτέρων κατασκευὴν τοῦ λάρυγγος και τῆς στοματικῆς κοιλότητος ἔκαστου ἀτόμου.

Ἡ φωνή, ἡ ὅποια παράγεται εις τὸν λάρυγγα, φθάνει εις τὸ στόμα, ὅπου ἀρθροῦται, δηλ. μετατρέπεται εις φθόγγους. Οἱ διάφοροι φθόγγοι προκύπτουν ἀναλόγως τῆς θέσεως, τὴν ὅποιαν λαμβάνει ἡ γλῶσσα, οἱ δόδοντες και τὰ χείλη. Διὰ τῶν φθόγγων σχηματίζονται αἱ λέξεις.

Ο λόγος εἶναι ἔξαιρετικὸν προνόμιον τοῦ ἀνθρώπου και ἐν ἀπὸ τὰ σπουδαιότερα μέσα, τὰ ὅποια ἔκαμαν δυνατὴν τὴν διανοητικὴν ἀνάπτυξιν αὐτοῦ.

### 3. ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ

Ἡ φωνὴ παράγεται, δταν αἱ κυρίως φωνητικαὶ χορδαὶ ἐκταθοῦν και ὁ ἐκπνεόμενος ἀπὸ τὴν θέση αὐτὰς εἰς παλμικὴν κίνησιν. Εἰς τὸ στόμα ἡ φωνὴ ἀρθροῦται εἰς φθόγγους, ἐκ τῶν ὅποιων σχηματίζονται αἱ λέξεις.

### 4. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1) Κατὰ τὸ 12ον ἔτος περίπου τῆς ἡλικίας παρατηρεῖται μία ταχυτέρα αὔξησις τοῦ λάρυγγος και τοῦτο προκαλεῖ τὴν ὄλλαγὴν τῆς φωνῆς κατὰ τὴν ἡλικίαν ταύτην (μετάπλασις τῆς φωνῆς). Ἐπειδὴ τὸ ἀτομὸν δὲν συνηθίζει ἀμέσως εἰς τὰς νέας συνθήκας, παρατηροῦνται κατὰ τὴν περίοδον ταύτην δυσκολίαι εἰς τὴν προφοράν.

2) Πρόσεξε και καθόρισε τὴν θέσιν τῆς γλώσσης κατὰ τὴν προφορὰν τῶν ἔξης φθόγγων: 1) π, 2) φ, β, 3) θ, δ, 4) τ, 5) κι, χι, 6) κα, χα, 7) α, 8) ι, και 9) ου.

3) Ἐκτὸς τοῦ ἀνθρώπου ποία κατηγορία ζώων ἔχει ἀνεπτυγμένην φωνητικήν συσκευήν; Πῶς χρησιμοποιεῖ ἡ κατηγορία αὗτη τὰ πρόσθια ἄκρα, πῶς ὁ ἀνθρωπός καὶ πῶς τὰ ὄλλα τετράποδα;

4) Εἰς τὸν ἄνδρα τὸ μῆκος τοῦ λάρυγγος εἶναι μεγαλύτερον παρὰ εἰς τὴν γυναῖκα. Ὁμοίως αἱ φωνητικαὶ χορδαὶ εἶναι μακρότεραι. Ποία διαφορὰ εἰς τὴν φωνὴν παρατηρεῖται διὰ τοῦτο;

---

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΟΓΔΟΟΝ

### Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΜΦΟΥ. Η ΑΠΕΚΚΡΙΣΙΣ

#### 1. ΤΟ ΑΙΜΑ

Είς ὅλα τὰ μέρη τοῦ σώματος διακλαδίζονται λεπτά σωληνάρια μὲν ἵνωδη, ἐλαστικὰ καὶ συσταλτικὰ τοιχώματα, τὰ αἱ μοφόρια  
ἀγγεῖα, ἐντὸς τῶν ὁποίων κυκλοφορεῖ τὸ αἷμα.

Τὸ αἷμα ἀποτελεῖται ἀπὸ ἓν ύγρὸν, καλούμενον πλάσμα, καὶ ἀπὸ κύτταρα, τὰ ὁποῖα κινοῦνται μέσα εἰς τὸ ύγρὸν τοῦτο, καλούμενα αἱ μοσφαῖραί τοις. Τὸ πλάσμα ἔχει χρῶμα ἀνοικτοκίτρινον καὶ ἀποτελεῖται ἀπὸ ὕδωρ (90%) καὶ οὐσίας διαλελυμένας ἐντὸς αὐτοῦ. Αἱ οὐσίαι εἶναι διάφοροι ἐνώσεις ἀνόργανοι καὶ δργανικαί.

Τὰ αἷμοσφαίρια διακρίνονται εἰς ἑρυθρά καὶ λευκά.


Τὰ ἐρυθρὰ αἷμοσφαίρια εἶναι κύτταρα, τὰ ὁποῖα ἔχασαν τὸν πυρῆνα των καὶ περιέχουν αἷμοσφαιρίνην, μίαν ἐνωσιν σιδηροῦχον, ἥτις ὁποία τοὺς προσδίδει καὶ τὸ ἐρυθρὸν χρῶμα. Τὰ ἐρυθρὰ αὔτα αἷμοσφαίρια, φθάνοντα εἰς τὰ τριχοειδῆ ἀγγεῖα τῶν πνευμόνων, ἔρχονται εἰς ἐπαφήν μὲν τὸν ἀτμοσφαιρικὸν ἀέρα. Τότε ἡ αἷμοσφαιρίνη δεσμεύει τὸ δξυγόνον, τὸ δποῖον διαπιδύει διὰ τῶν τοιχωμάτων τῶν τριχοειδῶν ἀπὸ τὸν ἀέρα. Τὸ δξυγόνον τοῦτο, διὰ τῆς κυκλοφορίας, μεταφέρεται εἰς τοὺς ιστούς.

Τὰ λευκὰ αἷμοσφαίρια, ἀντιθέτως πρὸς τὰ ἐρυθρά, διατηροῦν τὸν πυρῆνα των καὶ ἐπομένως εἶναι κύτταρα ζῶντα. Ἰδιαιτέρων σημασίαν ἔχει μία κατηγορία λευκῶν αἷμοσφαιρίων, τὰ λευκοκύτταρα παρουσιάζουν ίδιαν κίνησιν. "Οταν τυχόν εἰσέλθουν μικρόβια, τὰ λευκοκύτταρα προστρέχουν, τὰ περικλείουν καὶ τὰ διαλύουν ἐντὸς τοῦ κυτταρικοῦ τῶν σώματος, ὅπως ἡ ἀμοιβᾶς τὴν τροφήν της. Τὰ λευκοκύτταρα δύνανται νὰ διέρχωνται καὶ διὰ τοῦ τοιχώματος τῶν ἀγγείων, καὶ οὕτω π.χ. ἀνευρίσκονται εἰς τὸ πῦον.

“Ἐν κυβ. χιλιοστόμετρον αἷματος ὑγιοῦς ἀνθρώπου περιέχει περί που 4 1)2—5 ἑκατομμ. ἐρυθρὰ αἵμοσφαίρια καὶ μόνον 6—8 χιλ. λευκά.

Ἐὰν τὸ αἷμα ἔξελθῃ ἀπὸ τὰ ἀγγεῖα διὰ τίνος πληγῆς, πήγνυ-

ται συντομώτατα. Δημιουργεῖται ἐν δίκτυον μιᾶς οὐσίας καλουμένης Ἰνώδους, τὸ ὅποιον περικλείει καὶ συγκρατεῖ τὰ αἵμοσφαίρια καὶ οὕτω σχηματίζεται ἐν στερεὸν ἐρυθρὸν στρῶμα, ὃ πλακοῦντα μένει ἔνα κιτρινωπὸν ὑγρὸν, δὲ δρρός, ἀποτελούμενον κυρίως ἀπὸ τὸ πλάσμα.



Εἰκ. 29. Σχῆμα τῆς καρδίας. 1. καὶ 2. Ἀνω καὶ κάτω κοιλαὶ φλέβες. — 3. Τριγλῶχιν βαλβίς. — 4. Νήματα συγκρατοῦντα τὴν βαλβίδα ὡστε αὔτη νὰ μὴ δύναται ν' ἀντιστραφῇ. — 5. Σιγμοειδεῖς βαλβίδες. — 6. Πνευμονική ἀρτηρία. — 7, 8, 9, 10. Αἱ τέσσαρες πνευμονικαὶ φλέβες, ἀπολήγουσαὶ εἰς τὸν ἀριστερὸν κόλπον. — 11. Διγλῶχιν βαλβίς. — 12. Σιγμοειδεῖς βαλβίδες. — 13. Ἀνιοῦσα ἀορτή.

## 2. Η ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΓΓΕΙΑ

‘Η καρδία εἶναι τὸ κέντρικὸν ἀγγεῖον, τὸ ὅποιον, διὰ τῶν κινήσεών του, κανονίζει τὴν ροήν τοῦ αἵματος. Εὑρίσκεται εἰς τὴν κοιλότητα τοῦ θώρακος, μεταξὺ τῶν δύο πνευμόνων καὶ ἀριστερὰ τοῦ στέρνου. Ἐχει μέγεθος πυγμῆς καὶ τὸ τοίχωμά της ἀποτελεῖται ἀπὸ γραμμωτούς μῆσης.


‘Η καρδία (εἰκ. 29 καὶ 30) χωρίζεται εἰς τέσσαρας χώρους. Οἱ δύο ἀνώτεροι

χῶροι καλοῦνται κόλποι, οἱ δύο δὲ κατώτεροι κοιλίαι. Οἱ ἀριστερὸς κόλπος καὶ ἡ ἀριστερὰ κοιλία συγκοινωνοῦν δι' ἐνὸς πόρου, δὲ ὅποιος ἀνοιγοκλείει μὲ μίαν βαλβίδα (μιτροειδής ἢ διγλῶχιν βαλβίς).

Κατὰ τὸν ἕδιον τρόπον συγκοινωνεῖ καὶ ὁ δεξιὸς κόλπος μὲ τὴν δεξιάν κοιλίαν.

Αἱ κοιλίαι ἔχουν ἴσχυρότερον τοίχωμα παρὰ οἱ κόλποι, καὶ τοῦτο διότι, ὡς θὰ ἴδωμεν, ἀποστέλλουν τὸ αἷμα εἰς μακρὰν ἀπόστασιν. Ἀντιθέτως, οἱ κόλποι τὸ διοχετεύουν ἀπλῶς ἔκαστος εἰς τὴν ἀντίστοιχον κοιλίαν. Ἐκ δὲ τῶν κοιλιῶν ἴσχυροτέρα εἶναι ἡ ἀριστερά, ἡ διόποια ἀποστέλλει τὸ αἷμα εἰς δόλα τὰ μέρη τοῦ σώματος, ἐνῷ ἡ δεξιά τὸ ἀποστέλλει μόνον εἰς τοὺς πλησίουν πνεύμονας (μηνοειδῆς ἢ τριγλῶς χιν βαλβίσ).


Ἀπὸ τὴν καρδίαν ἀρχίζουν μεγάλα ἀγγεῖα, τὰ ὅποια ἔξαπλουνται εἰς ὅλα τὰ μέρη τοῦ σώματος καὶ διακλαδίζονται τελικῶς εἰς λεπτότατα τριχοειδῆ. "Οσα πάλιν ἀγγεῖα ἀπολήγουν εἰς τοὺς δύο κόλπους καλοῦνται φλέβες, καὶ ἔντος αὐτῶν τὸ αἷμα κινεῖται κατευθυνόμενον πρὸς τὴν καρδίαν. Εἰς τὸν ἀριστερὸν κόλπον, διὰ τεσσάρων φλεβῶν, πνευμονικῶν φλεβῶν, προσάγεται τὸ αἷμα ἀπὸ τοὺς πνεύμονας, ἐμπλουτισμένον εἰς δέξυγόν. Ἐκ τοῦ κόλπου τούτου τὸ αἷμα μεταβαίνει εἰς τὴν ἀριστερὰν κοιλίαν καὶ κατόπιν εἰσέρχεται εἰς μίαν μεγάλην ἀρτηρίαν, ἡ διόποια ὀνομάζεται ἀνιοῦσσα ἀρτήρη. Αὕτη διακλαδίζεται εἰς μικρότερα ἀγγεῖα καὶ τελικῶς εἰς λεπτότατα τριχοειδῆ, τὰ ὅποια ἀποδίδουν εἰς τοὺς ἰστοὺς τὸ πλούσιον εἰς δέξυγόν αἷμα. Εἰς τὴν ἀρχὴν τῆς ἀρτῆς ὑπάρχουν τρεῖς βαλβίδες, καλούμεναι σιγμοειδεῖς.



Εἰκ. 30. Ἡ καρδία καὶ τὰ ἔξαπλα αὐτῆς ἀρχίζοντα ἀγγεῖα.  
1. Ἀριστερὸς κόλπος. — 2. Πνευμονική ἀρτηρία. — 3. Ἀνιοῦσσα ἀρτήρη. — 9. Δεξιά κοιλία. — 10. Ἀριστερὰ κοιλία. — 8. Δεξιός κόλπος. — 5, 7. Πνευμονικαὶ ἀρτηρίαι.

πνευμονικῶν φλεβῶν, προσάγεται τὸ αἷμα ἀπὸ τοὺς πνεύμονας, ἐμπλουτισμένον εἰς δέξυγόν. Ἐκ τοῦ κόλπου τούτου τὸ αἷμα μεταβαίνει εἰς τὴν ἀριστερὰν κοιλίαν καὶ κατόπιν εἰσέρχεται εἰς μίαν μεγάλην ἀρτηρίαν, ἡ διόποια ὀνομάζεται ἀνιοῦσσα ἀρτήρη. Αὕτη διακλαδίζεται εἰς μικρότερα ἀγγεῖα καὶ τελικῶς εἰς λεπτότατα τριχοειδῆ, τὰ ὅποια ἀποδίδουν εἰς τοὺς ἰστοὺς τὸ πλούσιον εἰς δέξυγόν αἷμα. Εἰς τὴν ἀρχὴν τῆς ἀρτῆς ὑπάρχουν τρεῖς βαλβίδες, καλούμεναι σιγμοειδεῖς.

Τὸ δξυγόνον τοῦτο καταναλίσκεται εἰς τοὺς ἴστοὺς διὰ τὰς καύσεις, συνάμα δὲ τὸ αἷμα φορτίζεται μὲ τὸ σχηματιζόμενον διοξείδιον τοῦ ἄνθρακος. Τὸ φορτισμένον οὔτως αἷμα εἰσέρχεται ἀπὸ τὰ τριχοειδῆ τῶν ἀρτηριῶν εἰς τὰ τριχοειδῆ τῶν φλεβῶν. Ταῦτα συνενοῦνται εἰς φλέβας, αἱ ὅποιαι κατεύθυνονται πρὸς τὴν καρδίαν. "Ολαι αἱ φλέβες ἐνώνονται εἰς δύο μεγάλας, τὴν ἣν ω καὶ κάτω κοιλήν φλέβα, αἱ ὅποιαι



Εἰκ. 31. Τὸ ἀπεκκριτικὸν σύστημα.  
1. Νεφρός. — 3. Τομὴ οὐροφόρων σωληναρίων. — 5. Φλέψ. — 6. Ἀρτηρία. — 7. Ούρητήρ. — 8. Ούροδόχος κύστις. — 2. Ἐπινεφρίδιον.

πνευμονικὴν ἀρτηρίαν, ἡ ὅποια τὸ ὀδηγεῖ εἰς τοὺς πνεύμονας. Καὶ εἰς τὴν εἴσοδον τῆς πνευμονικῆς ἀρτηρίας ὑπάρχουν σιγμοειδεῖς βαλβίδες. Εἰς τοὺς πνεύμονας τὸ αἷμα, διὰ μέσου τῶν λεπτοτάτων τοιχωμάτων τῶν τριχοειδῶν ἀγγείων, ἔρχεται εἰς ἐπαφὴν μὲ τὸν ἀτμοσφαιρικὸν ἀέρα, ἀποδίδει τὸ διοξείδιον τοῦ ἄνθρακος καὶ δεσμεύει νέον δξυγόνον. Μετὰ τὸν καθαρισμὸν τοῦτον ἐπιστρέφει πάλιν εἰς τὸν ἀριστερὸν κόλπον κ.ο.κ..



Εἰκ. 32. Ἀκτινογραφία,  
εἰς τὴν ὅποιαν διακρίνονται  
οἱ ούρητῆρες καὶ αἱ  
πύελοι τῶν νεφρῶν.

χύνονται εἰς τὸν δεξιὸν κόλπον. Τὸ ἐπιστρέψαν εἰς τὴν καρδίαν αἷμα κατέρχεται ἀπὸ τὸν δεξιὸν κόλπον εἰς τὴν δεξιὰν κοιλίαν.

Ἐξ αὐτῆς εἰσέρχεται εἰς τὴν

### 3. ΔΙΟΔΟΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΔΙΑ ΤΟΝ ΝΕΦΡΩΝ. ΑΠΕΚΚΡΙΣΙΣ

Τὸ αἷμα κατὰ τὴν διαδρομήν του διέρχεται διὰ τῶν νεφρῶν (εἰκ. 31 καὶ 32). Οὗτοι εἶναι δύο ὄργανα, τὰ δόποια ἔχουν σχῆμα φασολιοῦ καὶ μέγεθος 10 ἑκατοστῶν περίπου (εἰκ. 31). Εὐρίσκονται δὲ ἀμέσως πρὸ τοῦ δόπισθίου τοιχώματος τῆς κοιλίας, ἀνὰ εἴς δεξιὰ καὶ ἀριστερά τῶν πρώτων ὀσφυϊκῶν σπονδύλων. Ἡ ἀρτηρία, ἡ δόποια εἰσέρχεται εἰς ἕκαστον νεφρόν, διακλαδίζεται ἐντὸς αὐτοῦ εἰς λεπτότατα τριχοειδῆ. Διὰ τοῦ τοιχώματος τούτων ἔξερχονται ἀπὸ τὸ αἷμα ὅδωρ καὶ ὠρισμέναι ἄχρηστοι οὐσίαι. Ἐξέρχονται ἀκόμη καὶ διάφορα ἄλατα ἢ σάκχαρον, ὅταν ταῦτα πλεονάζουν εἰς τὸν δργανισμόν.

Μετὰ τὸν καθαρισμὸν τοῦτον, τὸ αἷμα συναθροίζεται ἐξ ἕκαστου νεφροῦ εἰς μίαν φλέβα, ἡ δόποια ἀπολήγει εἰς τὴν κάτω κοίλην φλέβα.

“Ολαι αἱ κατακρατηθεῖσαι εἰς τὸν νεφρὸν οὐσίαι συναθροίζονται εἰς τὰ λεπτὰ σωληνάρια, τὰ δόποια περιέχει ὁ νεφρός, καὶ οὕτω σχηματίζονται τὰ οὖρα. Ἔνας μακρὸς σωλὴν ἐξ ἕκαστου νεφροῦ, καλούμενος οὐρὴ ρητή, φέρει τὰ οὖρα κατὰ σταγόνας εἰς τὴν οὐρὴν δόχον κύστιν, ἡ δόποια εύρισκεται εἰς τὸ πρόσθιον μέρος τῆς λεκάνης. Ὅταν ἡ κύστις πληρωθῇ, τὰ οὖρα ἀποβάλλονται τοῦ σώματος.


Ἡ ἀνωτέρω λειτουργία, διὰ τῆς δόποιας οἵ νεφροὶ συγκρατοῦν ἀπὸ τὸ αἷμα ἄχρήστους οὐσίας καὶ τὰς ἀποβάλλουν τοῦ σώματος, καλεῖται ἀπεκκριτικὰ ὄργανα.

“Ως ἐμάθομεν, ἀπεκκριτικὴν λειτουργίαν ἔκτελοῦν καὶ οἱ πνεύμονες, οἵ δόποιοι ἀπομακρύνουν τὸ διοξείδιον τοῦ ἀνθρακοῦ. Τέλος θὰ ἴδωμεν ἀργότερον, ὅτι καὶ ἀπὸ τὸ δέρμα ἀποβάλλονται, εἰς μικρὰν ὅμως ποσότητα, μερικαὶ ἄχρηστοι διὰ τὸ σῶμα οὐσίαι.

### 4. ΔΙΟΔΟΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΔΙΑ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ

“Οπως ἐμάθομεν εἰς τὸ κεφάλαιον περὶ πέψεως, τὰ προϊόντα τῆς πέψεως, διερχόμενα τὸ τοίχωμα τοῦ ἐντέρου, εἰσδύουν εἰς τὰ ἀγγεῖα τοῦ ἐντέρου. Τὰ αἱ μοφέρα ἀγγεῖα παραλαμβάνουν κυρίως τοὺς ὑδατάνθρακας καὶ τὰ λευκώματα. Τὰ λίπη παραλαμβάνονται

πρὸ παντὸς ἀπὸ τὰ λεμφικὰ ἀγγεῖα, τὰ ὅποια θὰ γνωρίσωμεν ἀργότερα.



Εἰκ. 33. Σχηματικὴ παράστασις τῆς κυκλοφορίας.  
π. Πνεύμονες. -α, β, γ.  
Οδοὶ τῆς μεγάλης κυκλοφορίας: διὰ τοῦ ἐντέρου καὶ τοῦ ἡπατοῦ, διὰ τῶν νεφρῶν καὶ διὰ τῶν ιστῶν.

ληδὲ κυκλοφορία καλεῖται ἡ διαδρομὴ ἀπὸ τὴν ἀριστερὰν κοιλίαν εἰς τὰ διάφορα μέρη τοῦ σώματος καὶ ἡ ἐπάνοδος εἰς τὸν ἀριστερὸν κόλπον. Μεγάλη δὲ καρδία εἰς τὸν ἀριστερὸν καλεῖται τὴν δεξιὰν κοιλίαν διαδρομὴν ἀπὸ τῆς πνεύμονας καὶ τὴν ἀποστολὴν τῆς πνεύμονας τοῦ αἵματος.

Ἄπὸ τὸ ἐντερον τὰ αίμοφόρα ἀγγεῖα δὲν ἔρχονται ἀπὸ εὐθείας εἰς τὴν κοιλην φλέβα, ἀλλὰ προηγουμένως διέρχονται ἀπὸ τὸ ἡπατο (σηκώτι). Ἐντὸς αὐτοῦ γίνεται ἡ ἀφομοίωσις ἐν μέρει μὲν τῶν λευκωμάτων, πρὸ παντὸς ὅμως τῶν ὑδατανθράκων.

Κατὰ τὴν ἀφομοίωσιν αὐτὴν σχηματίζεται εἰς σύνθετος ὑδατάνθραξ, καλούμενος γλυκόν ον. Τοῦτο ἀποθηκεύεται εἰς τὸ ἡπατο καὶ, ἀναλόγως τῶν ἀναγκῶν, ἀποστέλλεται διὰ τῆς κυκλοφορίας εἰς τοὺς μῆνας, ὅπου ἔξοδεύεται, μαζὶ μὲ τὸ ὄξυγόνον διὰ τὰς καύσεις.

Εἰς τὸ ἡπατο τὸ αἷμα ἀπαλλάσσεται ἐν μέρει καὶ ἀπὸ διάφορα μικρόβια καὶ δηλητηριώδεις ούσιας. Τὸ ἡπατο παράγει, ως ἐμάθομεν, καὶ τὴν χολήν.

Ἄφοῦ διέλθουν ἀπὸ τὸ ἡπατο, τὰ αίμοφόρα ἀγγεῖα συναθροίζονται εἰς μίαν φλέβα, τὴν πυλαίαν φλέβα, ἡ ὅποια ἀποιλήγει εἰς τὴν κάτω κοιλην φλέβα.

## 5. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΙΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (Εἰκ. 33).

Κατὰ τὰ προηγούμενα, διακρίνομεν τὴν μικρὰν καὶ τὴν μεγάλην κυκλοφορίαν τοῦ αἵματος. Μικρὰ κυκλοφορία καλεῖται ἡ διαδρομὴ ἀπὸ τὴν δεξιὰν κοιλίαν τῆς καρδίας εἰς τοὺς πνεύμονας καὶ ἡ ἐπανοδος εἰς τὸν ἀριστερὸν κόλπον. Μεγάλη δὲ καρδία εἰς τὸν ἀριστερὸν καλεῖται τὴν δεξιὰν κοιλίαν διαδρομὴν ἀπὸ τῆς πνεύμονας τοῦ αἵματος.

δεξιὸν κόλπον. Ὡς εἰδομεν, κατὰ τὴν μεγάλην κυκλοφορίαν ὑπάρχουν τρεῖς ὄδοι, τὰς ὁποίας ἀκολουθεῖ τὸ αἷμα: α) διέρχεται ἀπὸ τὸ τοίχωμα τῶν ἐν τέρῳ καὶ ἀπὸ τὸ ἡπαρίσταρο, ἐμπλουτισμένον εἰς θρεπτικὰς οὐσίας, β) διέρχεται ἀπὸ τοὺς νεφρούς, ὅπου καθαρίζεται ἀπὸ ἀχρήστους οὐσίας καὶ γ) διασκορπίζεται εἰς τοὺς ίστοὺς τοῦ σώματος καὶ τρέφει τὰ ἀκίνητα καὶ εἰδικευμένα κύταρα τῶν ίστων.

Δυνάμεθα νὰ συνοψίσωμεν τὰς ἐργασίας, τὰς ὁποίας ἔκτελεῖ τὸ αἷμα, ὡς ἔξῆς:

α) Μεταφέρει τὰς θρεπτικὰς οὐσίας καὶ τὰς διαμοιράζει εἰς τοὺς ίστούς.

β) Μεταφέρει τὸ δξυγόνον εἰς τοὺς ίστούς.

γ) Ἀποκομίζει τὰς ἀχρήστους οὐσίας, αἱ ὁποῖαι παράγονται κατὰ τὰς καύσεις. Ἐκ τῶν οὐσιῶν τούτων τὸ μὲν ἀέριον διοξείδιον τοῦ ἄνθρακος τὸ ἀποδίδει διὰ τῶν πνευμόνων, τὰς δὲ λοιπὰς διὰ τῶν νεφρῶν.

δ) Καταπολεμεῖ τὰ μικρόβια διὰ τῶν λευκοκυττάρων του.

Πλὴν τῶν ἀνωτέρω, τὸ αἷμα ἔκτελεῖ καὶ ἄλλας ἐργασίας. Μεταφέρει π.χ. τὰς δρυμόνας, ὡρισμένας δηλ. οὐσίας ἀπαραίτητους διὰ τὴν λειτουργίαν τοῦ ὄργανισμοῦ, αἱ ὁποῖαι παράγονται ὑπὸ εἰδικῶν ἀδένων. Τέλος, διὰ τῆς κυκλοφορίας του συντελεῖ τὸ αἷμα καὶ εἰς τὴν ὁμοιόμορφον κατανομήν τῆς θερμότητος εἰς τὸ σῶμα.

## 6. Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ

Ἡ ἀδιάκοπος ροὴ τοῦ αἵματος ἐντὸς τῶν ἀγγείων, ἀκόμη καὶ ἀνιθέτως πρὸς τὴν διεύθυνσιν τῆς βαρύτητος, ἔξασφαλίζεται διὰ τῶν ρυθμικῶν συστολῶν καὶ διαστολῶν τῆς καρδίας.

Εἰς τὰς κινήσεις αὗτὰς διακρίνομεν δύο χρόνους: Πρῶτον, συστέλλονται οἱ δύο κόλποι καὶ ὡθοῦν τὸ αἷμα, τὸ ὄποιον περιέχουν, εἰς τὰς δύο κοιλίας. Κατόπιν συστέλλονται αἱ δύο κοιλίαι καὶ ὡθοῦν τὸ αἷμα, τὸ ὄποιον περιέχουν, εἰς τὰς ἀρτηρίας, ἐνῶ συγχρόνως εἰς τοὺς κενωθέντας κόλπους εἰσέρχεται νέον αἷμα ἀπὸ τὰς φλέβας. Ἀκολουθεῖ μία στιγμὴ ἡρεμίας, μετ' αὐτὴν ἐπαναλαμβάνονται αἱ ἴδιαι κινήσεις τῆς καρδίας κ.ο.κ. Ἀπὸ τὰς κοιλίας τὸ αἷμα δὲν δύναται νὰ ἐπιστρέψῃ εἰς τοὺς κόλπους, διότι ἐμποδίζεται ὑπὸ τῶν κολποκοι-

λιακῶν βαλβίδων. Μία συστολὴ τῶν κόλπων καὶ μία συστολὴ τῶν κοιλιῶν ἀποτελοῦν μίαν σ φύξιν τῆς καρδίας. Διὰ τῶν σφύξεων ὥθεται, ὡς εἴδομεν, τὸ αἷμα εἰς τὰ ἀγγεῖα καὶ κινεῖται ἐντὸς αὐτῶν μέχρι καὶ τῶν πλέον μακρινῶν σημείων τοῦ σώματος. Εἰς τὴν κίνησιν αὐτὴν ὑποβοήθεται τὸ αἷμα καὶ ἀπὸ συστολάς καὶ διαστολάς τῶν αίμοφόρων ἀγγείων. Τέλος, ὑπάρχουν εἰς τὰς φλέβας κατὰ διαστήματα καὶ βαλβίδες, ἐμποδίζουσαι τὴν ὅπισθιδρόμησιν τοῦ αἵματος.

“Ωστε, ἐντὸς τῶν ἀγγείων τὸ αἷμα δὲν ρέει δμαλῶς, ἀλλὰ κινεῖται μὲν ἀλεπαλλήλους ὡθήσεις. Τὰς ὡθήσεις αὐτὰς ὀντιλαμβανόμεθα, ὃν πιέσωμεν μίαν ἀρτηρίαν, καὶ τὰς καλοῦμεν σφυγμούς. ‘Ο ἀριθμὸς τῶν σφυγμῶν ἀνέρχεται περίπου εἰς 75 κατὰ 1' καὶ ἔλαττονται κατὰ τὴν ἀνάπτωσιν καὶ τὸν ὑπνον.

“Η κίνησις τοῦ αἵματος ἐντὸς τῶν ἀγγείων γίνεται μὲν τόσην ταχύτητα, ὡστε τοῦτο νὰ ἐπανέρχεται εἰς τὴν καρδίαν, ἀνά 8–9'' ἀπὸ τοὺς πνεύμονας καὶ ἀνὰ 23'' περίπου ἀπὸ τὴν μεγάλην κυκλοφορίαν. Μὲ τὴν ταχύτητα αὐτὴν προφθάνουν οἱ ίστοι τοῦ σώματος νὰ ὀνεφοδιάζωνται ἐπαρκῶς μὲν ὀξυγόνον καὶ νὰ ἀπαλλάσσωνται ἀπὸ τὰς ἀχρήστους οὐσίας. ‘Οταν οἱ μῆες ἐργάζονται ἐντατικῶς καὶ ἐπομένως αἱ ἀνάγκαι εἰς ὀξυγόνον εἶναι μεγαλύτεραι, ἡ κυκλοφορία καὶ ἡ ἀναπνοὴ ἐπιταχύνονται (λαχάνιασμα). ‘Εὰν μ' ὅλα ταῦτα αἱ ἀχρηστοὶ οὐσίαι παραμείνουν εἰς τοὺς μῆς, προκαλεῖται δὲ ματικός αὐτῶν, δὲ ποιοῖς παρέρχεται, ὅταν αἱ οὐσίαι αὗται τέλος ἀπομακρυνθοῦν.

## 7. Η ΛΕΜΦΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΛΕΜΦΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ

Πλὴν τοῦ αἵματος, καὶ ἐν ἄλλῳ ὑγρόν, ἡ λέμφος, ἀχρουν, κυκλοφορεῖ ἐντὸς ιδιαιτέρων ἀγγείων, τὰ ὅποια ἐπίστης διακλαδίζονται εἰς ὅλον τὸ σῶμα. Τὰ λεμφοκύτταρα ταῦτα ἀγγεῖα βαίνουν παραλλήλως πρὸς τὰς φλέβας, ἡ λέμφος κινεῖται ἐντὸς αὐτῶν βραδέως καὶ κατευθύνεται μόνον πρὸς τὸ κέντρον.

“Η λέμφος ἀποτελεῖται ἀπὸ πλάσμα, ἐντὸς τοῦ ὅποιού αἱ ὠροῦνται τὰ λεμφοκύτταρα. Ταῦτα παράγονται ὑπὸ τῶν λεμφοκύτταρων, οἱ δένων, οἱ δένων εἶναι πολλὰ μικρὰ ὅργανα, ἐσκορπισμένα εἰς τὸ σῶμα καὶ ιδίως εἰς τὸν ὑποδόριον ίστόν. Εἰς διάφορα σημεῖα ὑπάρχουν πολλοὶ λεμφαδένες μαζί καὶ ἀποτελοῦν τὰ λεμφοκύτταρα τὰ λεμφοφόρα ἀγγεῖα, Ἀπὸ τοὺς λεμφαδένας διέρχονται τὰ ἀνωτέρω λεμφοφόρα ἀγγεῖα,

τὰ δόποια διατρέχουν ὅλα τὰ μέρη τοῦ σώματος. Τελικῶς ταῦτα ἐνώνυνται εἰς ἔνα μεγαλύτερον ἀγγείον, καλούμενον θωρακικόν πόρον, τὸ δόποιον χύνεται εἰς τὴν ἄνω κοίλην φλέβα. "Ωστε ἡ λέμφος κινεῖται ἐντὸς τῶν λεμφαγγείων μόνον ἀπὸ τὴν περιφέρειαν πρὸς τὸ κέντρον καὶ διὰ τοῦ θωρακικοῦ πόρου χύνεται εἰς τὸ κυκλοφοροῦν αἷμα.

Κατὰ τὴν διαδρομὴν αὐτήν, ἐν μέρος τῆς λέμφου διέρχεται τὸ τοίχωμα τῶν ἀγγείων καὶ εἰσδύει μεταξὺ τῶν κυττάρων τῶν ίστῶν. Οὕτως, ὅλα τὰ κύτταρα τοῦ σώματος περιλούνται ἀπὸ τὸ ίγρὸν τοῦτο.

"Η λέμφος παραλαμβάνει ἀπὸ τὰ κύτταρα τὰς ἀχρήστους οὐσίας καὶ τὰς μεταβιβάζει εἰς τὸ αἷμα. Ἀντιστρόφως, παραλαμβάνει ἐκ τοῦ αἵματος τὸ δύγυγόν τον καὶ τὰς θρεπτικὰς οὐσίας, τὰς δόποιας χρησιμοποιοῦν τὰ κύτταρα.

Τὸ μέρος ἐκεῖνο τῆς λέμφου, τὸ δόποιον κυκλοφορεῖ ἐντὸς τῶν λεμφοφόρων ἀγγείων, χύνεται, ὡς εἴδομεν, εἰς τὴν ἄνω κοίλην φλέβα καὶ εἰσέρχεται εἰς τὴν κυκλοφορίαν τοῦ αἵματος. Οὕτως εἰσάγονται εἰς τὸ αἷμα νέα λεμφοκύτταρα. Προσέτι τὰ λεμφοφόρα ἀγγεία παραλαμβάνουν ἀπὸ τὸ τοίχωμα τοῦ ἐντέρου τὰ λίπτη καὶ, χωρὶς νὰ διέλθουν ἀπὸ τὸ ἥπαρ, τὰ φέρουν εἰς τὴν κυκλοφορίαν.

#### 8. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΩΝ

"Ως εἴδομεν ἀνωτέρω, τὰ λεμφοκύτταρα παράγονται εἰς τοὺς λεμφατίδες ναστούς. Τὰ ἄλλα λευκά αἷμοσφαίρια, καθὼς καὶ τὰ ἐρυθρά, παράγονται κυρίως εἰς τὸν μυελὸν τῶν στῶν στῶν. Κατὰ τὴν νεαράν τήλικίαν, καθὼς καὶ τὴν ἐμβρυϊκήν, ἐρυθρά αἷμοσφαίρια παράγονται καὶ εἰς τὸν σπλαγχνόν.

**Ο σπλήν** ἔχει διαστάσεις περίπου  $12 \times 8 \times 3$  ἑκ. καὶ βάρος 150–200 γραμμαρίων. Εύρισκεται ὅπισθεν τοῦ στομάχου καὶ ἀνωθεν τοῦ ἀριστεροῦ νεφροῦ.

Τὰ αἷμοσφαίρια διαρκῶς φθείρονται. Συχνὰ π. χ. καταστρέφονται λεμφοκύτταρα εἰς τὸν ἀγῶνα των κατὰ τῶν μικροβίων. Τὸ πλασμώδιον τῆς ἑλονοσίας καὶ ἄλλα μικρόβια καταστρέφουν τὰ ἐρυθρά αἷμοσφαίρια. Ἐκτὸς ὅμως τῶν τοιούτων περιπτώσεων, τὰ αἷμοσφαίρια καταστρέφονται καὶ φυσιολογικῶς, δταν φθάνουν εἰς ὥρισμένην τήλικίαν. "Η τήλικία αὔτη εἶναι π.χ. διὰ τὰ ἐρυθρά αἷμο-

σφαίρια 3 - 4 έβδομάδες. Ή καταστροφή τῶν αίμοσφαιρίων γίνεται κυρίως εἰς τὸν σπλήνα καὶ εἰς τὸ ήπαρ.

Τὰ φθειρόμενα αίμοσφαίρια ἀντικαθίστανται ἀπὸ ἄλλα σχηματιζόμενα εἰς τὰ προαναφερθέντα αίμοποιητικὰ ὅργανα, δηλ. κυρίως τὸν μυελὸν τῶν ὁστῶν καὶ τοὺς λεμφικούς ἀδένας.

## 9. ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ

Τὸ αἷμα, ἀποτελούμενον ἀπὸ τὸ πλάσμα καὶ τὰ αίμοσφαίρια (ἐρυθρὰ καὶ λευκά), διατρέχει δύο κυκλοφορίας: α) Μεγάλη κυκλοφορία: ἀπὸ τὴν ἀριστερὰν κοιλίαν διὰ τῆς ἀροτῆς εἰς τοὺς ίστοὺς τοῦ σώματος (τρεῖς δρόμοι!) καὶ ἐπιστροφὴ διὰ τῆς ἀνω καὶ κάτω κοίλης φλεβὸς εἰς τὸν δεξιὸν κόλπον· β) Μικρὰ κυκλοφορία: ἀπὸ τὴν δεξιὰν κοιλίαν διὰ τῆς πνευμονικῆς ἀρτηρίας εἰς τοὺς πνεύμονας καὶ ἐπιστροφὴ, διὰ τῶν τεσσάρων πνευμονικῶν φλεβῶν, εἰς τὸν δριστερὸν κόλπον.

Ἐντὸς ίδιαιτέρων ἀγγείων, τὰ ὅποια κατευθύνονται μόνον πρὸς τὸ κέντρον καὶ ἀπολήγουν εἰς τὰ αίμοφόρα, κυκλοφορεῖ καὶ ἡ λέμφος. Αὕτη περιλούει ἐπίσης καὶ δλα τὰ κύτταρα τῶν ίστων.

## 10. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1) Παρατήρησε εἰς πηγμένον αἷμα ζώου τὸν πλακοῦντα καὶ τὸν δρρόν.

2) Μέτρησε τοὺς σφυγμοὺς σου ἐν ἡρεμίᾳ καὶ ἔπειτα ἀπὸ ἐντονούν μυϊκήν ἐργασίαν.

3) Ο σφυγμὸς μετρεῖται διὰ πιέσεως μιᾶς ἀρτηρίας (οχι φλεβός). Διὰ νὰ γίνῃ αἰσθητός, πρέπει ἡ ἀρτηρία αὗτη νὰ εύρισκεται πλησίον τῆς ἐπιφανείας τοῦ δέρματος. Δοκίμασε τοῦτο εἰς τὸν καρπὸν καὶ εἰς τὸν λαιμόν.

4) Ή όρθιά στάσις τοῦ ἀνθρώπου καθιστῷ δυσκολωτέραν ἡ εύκολωτέραν τὴν λειτουργίαν τῆς καρδίας καὶ τῶν ἀγγείων ἀπὸ τῶν λοιπῶν θηλαστικῶν καὶ διατί;

5) Ή κίνησις τοῦ αἵματος ἐντὸς τῶν φλεβῶν πρὸς τὴν καρδίαν ὑποβοηθεῖται σημαντικῶς καὶ ἀπὸ τὴν πίεσιν, τὴν ὅποιαν ἀσκοῦν ἐπ' αὐτῶν οἱ μύες. Π. χ. ἡ βάδισις ὑποβοηθεῖ τὰς φλέβας τῶν κάτω ἄκρων, αἱ ὅποιαι πρέπει ν' ἀναβιβάσουν τὸ αἷμα μέχρι τοῦ ὕψους τῆς καρδίας. Αντιθέτως, ἡ όρθοστασία ἡ βραδυτάτη βάδισις προκαλοῦν στάσιν τοῦ αἵματος εἰς τὰς φλέβας τῶν κάτω ἄκρων καὶ ἐπιφέρουν κούρασιν.


## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΝΑΤΟΝ

### ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΙΣ ΤΗΝ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΟΣ

Ό ορμός περιλαμβάνει δύο μεγάλας κοιλότητας, τήν θωρακικήν καὶ τήν κοιλιακήν, ἐντὸς τῶν ὅποιων εύρισκονται τὰ σπλάγχνα (εἰκ. 34-35).


**Η θωρακικὴ κοιλότης** περικλείεται ἀπὸ τὰς πλευρὰς καὶ χωρίζεται ἀπὸ τήν κοιλιακήν δι' ἐνὸς μυϊκοῦ πετάλου, τοῦ διαφράγματος. Εἰς τήν κοιλότητα ταύτην περιέχονται οἱ πνεύμονες, ἡ καρδία καὶ ὁ οἰσοφάγος. Εἰς διπλοῦς ύμήν, ὁ πτερόν, διὰ τοῦ ἐνὸς μὲν πετάλου του ὑπενδύει τὰ θωρακικὰ τοιχώματα, διὰ τοῦ ἄλλου δὲ καλύπτει τήν ἐπιφάνειαν τῶν πνευμόνων. Μεταξὺ τῶν δύο πετάλων τοῦ ὑπεζωκότος ὑπάρχει ἐν ὑγρόν, τὸ ὅποιον ἐμποδίζει τήν τριβὴν τῶν πνευμόνων ἐπὶ τῶν τοιχωμάτων. Η καρδία δὲν περιβάλλεται ὑπὸ τοῦ ὑπεζωκότος, ἀλλὰ ὑπὸ ἴδιαιτέρου ύμένος, τοῦ περικαρδίου.

**Η κοιλιακὴ κοιλότης** περιλαμβάνεται μεταξὺ τοῦ διαφράγματος, τῆς λεκάνης καὶ τῶν κοιλιακῶν τοιχωμάτων. Ἐντὸς αὐτῆς συναντῶνται



Εἰκ. 34. Σχηματικὴ παράστασις τῆς θωρακικῆς καὶ κοιλιακῆς κοιλότητος. 1. Εγκέφαλος. — 2. Παρεγκεφαλίς. — 3. Προμήκης. — 4. Λάρυγξ. — 5. Φάρυγξ. — 6. Πνεύμονες. — 7. Καρδία. — 8. Στέρνον. — 9. Διάφραγμα. — 10. Ήπαρ. — 11. Στόμαχος. — 12. Σπλήν. — 13. Νεφρός. — 14. Τὸ ἐπίπλουν. — 15. Μεσεντέριον. — 16. Τομὴ τοῦ λεπτοῦ ἐντέρου. — 17. Ούρητήρ. — 18. Τομὴ τοῦ παχέος ἐντέρου. — 19. Κύστις.

δ στόμαχος, τὸ ἡπαρ, τὸ πάγκρεας, δ σπλήν, τὸ ἔντερον, οἱ νεφροί, καὶ τὸ γεννητικὸν σύστημα. Τὰ σπλάγχνα, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ πάγκρεας, τοὺς νεφροὺς καὶ τὸ γεννητικὸν σύστημα, περιβάλλονται ἀπὸ ἔνα



Eik. 35. Ἡ θωρακικὴ καὶ ἡ κοιλιακὴ κοιλότης. 1. Πνεύμονες.—2. Καρδία.—3. Θυρεοειδής χόνδρος.—4. Θυρεοειδής ἀδήνη.—5. Τραχεῖα.—6. Διάφραγμα.—7. Στόμαχος.—8. Σπλήν.—9. Ἡπαρ.—10. Χοληδόχος κύστις.—11, 12, 13. Παχύ ἔντερον. 14. Σκωληκοειδής διπόδυστις τοῦ παχέος ἔντερου.—15 Ούροδόχος κύστις.—16. Λεπτόν ἔντερον.

ύμένα καλούμενον περιτόναον. Τοῦτο δίδει δύο πέταλα, ἐκ τῶν ὅποιων τὸ ἔξωτερικὸν ὑπενδύει τὰ τοιχώματα τῆς κοιλιακῆς κοιλότητος. Τὸ περιτόναιον σχηματίζει προσέτι τὸ μεσεντέρον, τὸ ὅποιον συγκρατεῖ τὸ ἔντερον. Τέλος τὸ ἐπίπλον καλύπτει τὴν προσθίαν ἐπιφάνειαν τῆς ὅλης μάζης τῶν ἔντέρων ὡς μία ποδιά.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΚΑΤΟΝ

### ΑΙ ΕΚΚΡΙΣΕΙΣ

#### 1. ΑΔΕΝΕΣ, ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ. ΑΔΕΝΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

\***Αδένες** καλούνται ώρισμένα όργανα τοῦ σώματος, τὰ δόποια παρασκευάζουν, μέσα εἰς τὰ κύτταρά των, ώρισμένας ούσίας, τὰς δόποιας ἀποδίδουν εἰς τὸν ὄργανισμόν. Μέχρι τώρα ἐγνωρίσαμεν τοὺς σιαλογόνους καὶ ἄλλους ἀδένας τοῦ πεπτικοῦ συστήματος (πάγκρεας, ἀδένες τοῦ στομάχου κλπ.). "Ολοι αὗτοὶ ἀποδίδουν τὰς ούσίας, τὰς δόποιας παράγουν, δι' ἐνὸς ἐκφορητικοῦ ἀγωγοῦ, εἰς τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ πεπτικοῦ σωλῆνος." Αργότερον θὰ γνωρίσωμεν καὶ ἀδένας, τῶν δόποιων τὰ ἐκκρίματα ἀποδίδονται εἰς τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ δέρματος (ίδρωτοποιοὶ κλπ.).


\*Πάρχουν ὅμως καὶ ἀδένες στερούμενοι ἐκφορητικοῦ ἀγωγοῦ, τῶν δόποιων τὸ ἐκκριμα παραλαμβάνεται ὑπὸ τοῦ αἷματος. Οὗτοι καλούνται ἐν δοκρινεῖς ή ἔσω ἐκκρίσεως ἀδένες, τὰ δὲ ἐκκρίματά των δρυμόνα.

Κάθε ἐνδοκρινής ἀδήνη παράγει, εἰς ἐλαχίστας ποσότητας, ώρισμένας δρμόνας, αἱ δόποιαι εἶναι ούσίαι ἀπαραίτητοι διὰ τὴν κανονικήν λειτουργίαν τοῦ ὄργανισμοῦ. Ἐκάστη δρμόνη ἔχει τὴν ἴδιοτηταν νὰ ἐνισχύῃ ή νὰ ἐξασθενῇ ώρισμένην λειτουργίαν ή ώρισμένα όργανα, ὥστε ὅλαι μαζὶ αἱ δρμόναι ρυθμίζουν τὴν λειτουργίαν καὶ ἀνάπτυξιν διοκλήρου τοῦ ὄργανισμοῦ.

\*Ἐὰν ἔνας ἐνδοκρινής ἀδήνη ὑπολειτουργῇ ή ὑπερλειτουργῇ παρουσιάζονται διάφοροι παθήσεις.

Μερικοὶ ἀδένες εἶναι συγχρόνως ἐνδοκρινεῖς καὶ ἔξωκρινεῖς. Τὸ πάγκρεας π. χ. δὲν παράγει μόνον τὸ παγκρεατικὸν ὑγρόν, τὸ δόποιον χύνεται εἰς τὸ ἔντερον, ἀλλὰ προσέτι παράγει καὶ μίαν δρμόνην, ή δόποια χύνεται εἰς τὸ αἷμα. Ἡ δρμόνη αὕτη, καλουμένη ἐνσούλην, ἔχει τὴν ἴδιοτηταν νὰ ρυθμίζῃ τὴν κατεργασίαν τοῦ σακχάρου ὑπὸ τοῦ ὄργανισμοῦ. Ἐὰν η ποοσότης τῆς ἴνσουλίνης,

είναι άνεπαρκής ( ύπολειτουργία τοῦ παγκρέατος ), δ ὁργανισμὸς δὲν δύναται νὰ χρησιμοποιήσῃ τὸ σάκχαρον τῶν τροφῶν. Τοῦτο παραμένει εἰς τὸ αἷμα καὶ προκαλεῖται οὕτω ἡ νόσος διαβήτης.



Εἰκ. 36. Σχηματικὴ παράστασις δεικνύουσα τὴν θέσιν τῶν ἐνδοκρινῶν ἀδένων. 1. Ἐπίφυσις. — 2. Ὑπόφυσις. — 3 Θυρεοειδῆς. — 4. Παραθυρεοειδῆς. — 5. Θύμος. — 6. Ἐπινεφρίδια. — 7. Πλάγκρεας. — 8. Ὠσθῆκα. (Χαρακτηρίζουν τὰ θήλεα ἀτομα). — 9. Ἀρενες γεννητικοὶ ἀδένες. (Χαρακτηρίζουν τὰ ἄρρενα ἀτομα).

β') Οἱ παραθυρεοειδεῖς ἀδένες είναι τέσσαρα μικρὰ σωμάτια

## 2. ΟΙ ΑΔΕΝΕΣ ΕΣΩ ΕΚΚΡΙΣΕΩΣ

Ἐνδοκρινεῖς ἀδένες είναι οἱ ἔξῆς κυρίως ( εἰκ. 36 ).

α') Ὁ θυρεοειδῆς ἀδήν. Οὕτος εύρισκεται δὲλιγον κάτωθεν τῆς προσθίας ἐπιφανείας τοῦ θυρεοειδοῦς χόνδρου. Ἐκκρίνει ἡμερησίως ἐν ἑκατοστὸν τοῦ γραμμαρίου δρυμόνης. Ἡ ὑπερλειτουργία τοῦ ἀδένος τούτου προκαλεῖ τὴν ἐμφάνισιν τῆς λεγομένης νόσου τοῦ *Βασεδώ*. Ἐξατερικὰ συμπτώματα χαρακτηριστικά τῆς νόσου είναι ἡ ἔξωφθαλμία, ἡ βρογχοκήλη καὶ ἡ ταχυκαρδία. Ἡ νόσος αὕτη προκαλεῖ νευρικότητα καὶ ἔξαντλησιν τοῦ ἀσθενοῦς. Ἀντιστρόφως, ἡ ύπολειτουργία τοῦ θυρεοειδοῦς προκαλεῖ πτῶσιν τῆς θερμοκρασίας, βραδύτητα εἰς τὰς λειτουργίας τοῦ ὁργανισμοῦ καὶ σταμάτημα τῆς ἀναπτύξεως, τόσον τῆς σωματικῆς ὅσον καὶ τῆς πνευματικῆς. Κρετινισμὸς είναι μία ἀσθένεια, τῆς ὁποίας ἐν τῶν αἰτίων θεωρεῖται ἡ ύπολειτουργία τοῦ θυρεοειδοῦς ( εἰκ. 37 ).

εύρισκόμενα ὅπισθεν τοῦ θυρεοειδοῦς. Οὕτοι, διὰ τῆς ὁρμόνης των, ρυθμίζουν τὴν ἀνάπτυξιν τῶν ὀστῶν καὶ τὸν τόνον τῶν μυῶν.

γ') **Τὰ ἐπινεφρίδια** εἰναι δύο ἀδένες εύρισκόμενοι ἀνὰ εἰς ἐπὶ ἑκάστου νεφροῦ. Αἱ ὁρμόναι τῶν ἐπινεφρίδιων ρυθμίζουν τὴν λειτουργίαν τοῦ συμπαθητικοῦ καὶ παρασυμπαθητικοῦ νευρικοῦ συστήματος.

δ') **Ο θύμος ἀδήν.** Οὗτος εύρισκεται ὅπισθεν τῆς κορυφῆς τοῦ στέρνου. Κατὰ τὴν ἔμβρυϊκὴν περίοδον λειτουργεῖ, μαζὶ μὲ τὸν σπλῆνα, ὡς αἷμοποιητικὸν ὄργανον. Κατὰ τὴν νεαρὰν ἡλικίαν εἰναι ἀπαραίτητος διὰ τὴν κανονικὴν ἀνάπτυξιν τοῦ σώματος. Κατὰ τὴν ὥριμον τέλος ἡλικίαν, ὅταν ἡ ἀνάπτυξις ἔχει συντελεσθῇ, ὁ θύμος συρρικνοῦται καὶ ἔξαφανίζεται.

ε') **Η ἐπίφυσις.** Αὕτη εύρισκεται εἰς τὸν ἔγκεφαλον καὶ κατὰ τὴν νεαρὰν ἡλικίαν συνεργάζεται μὲ τὸν θύμον. Μετὰ τὸ δέκατον ἔτος ἐκφυλίζεται βαθμιαίως.

σ') Εἰς τὸν ἔγκεφαλον ἐπίστης εύρισκεται **ἡ ὑπόφυσις**, ἡ ὅποια συντελεῖ εἰς τὴν ρύθμισιν τῆς ἀναπτύξεως τοῦ σώματος, τῆς ἀνταλλαγῆς τῆς ὑλῆς καὶ τῆς ὥριμάνσεως τῶν γεννητικῶν ἀδένων. Αἱ παραγόμεναι ὑπ' αὐτῆς ὁρμόναι εἰναι πολλαῖ.



Eik. 37. Κακὴ ἀνάπτυξις λόγω κρετινισμοῦ

### 3. ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ

Διακρίνομεν ἀδένας ἐν δοκρινεῖς, οἱ ὅποιοι παράγουν ὁρμόνας, τὰς δοποίας παραλαμβάνει τὸ αἷμα, καὶ ἀδένας ἐξ ακρινεῖς ὁρμόνας, τὰς δοποίδιουν τὸ ἔκκριμά των εἰς τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ πεπτικοῦ σωλῆνος ἢ τοῦ δέρματος. Η διαταραχὴ τῆς λειτουργίας τῶν ἐνδοκρινῶν ἀδένων προκαλεῖ σοβαρὰς ἀνωμαλίας εἰς τὴν ἀνάπτυξιν καὶ λειτουργίαν τοῦ ὄργανισμοῦ.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΝΔΕΚΑΤΟΝ

### ΤΟ ΝΕΥΡΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ

#### I. ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΑ. ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ. ΤΑ ΝΕΥΡΑ. ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Η ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ

Είς τὸν ἔξωτερικὸν κόσμον διαρκῶς συμβαίνουν διάφοροι παροδικαὶ μεταβολαὶ. Π.χ. διάφορα ἀντικείμενα κινοῦνται, ἀλλάσσει ὁ φωτισμὸς ἢ ἡ θερμοκρασία, τὸ σῶμα μας ψαύει διάφορα ἀντικείμενα κ.ο.κ. Προσέτι καὶ ἐντὸς τοῦ σώματός μας συμβαίνουν τοιαῦται μεταβολαί, ὡς π.χ. μετακινήσεις τῶν σπλάγχνων κ.ἄ.

“Ολαι αὐταὶ αἱ μεταβολαὶ ἐπιδροῦν ἐπὶ εἰδικῶν κυττάρων τοῦ ὄργανισμοῦ καὶ παράγουν τὰ ἐρεθίσματα καλοῦνται αἱ στοιχεῖα τοῦ τοπίου, τὰ δόπιοι δέχονται τὰ ἐρεθίσματα καλοῦνται αἱ στοιχεῖα τοῦ τοπίου, καὶ ἀνήκουν εἰς ἓνα σύστημα ὄργάνων, τὸ δόπιον καλεῖται νευρικὸν σύστημα.

Εἰς τὰ ἐρεθίσματα ἀπαντᾶ ὁ ὄργανισμὸς μὲ κινήσεις κυρίως, τὰς ὅποιας ἔκτελεῖ κατὰ βούλησιν ἢ καὶ ἀνεξαρτήτως τῆς βούλήσεως. Π.χ. ἂν κινήσωμεν πρὸ τῶν βλεφάρων ἐν ἀντικείμενον, προκαλεῖται ἀκούσιον κλείσιμον τῶν βλεφάρων, ἂν ἐγγίσωμεν ἐν καϊον σῶμα, αὐτομάτως τότε ἀποσύρεται τὸ χέρι μας κ.ο.κ. Αἱ ἐνέργειαι αὐταὶ καλοῦνται ἀντιδράσεις, ὡς π.χ. εἰς τὰ ἐρεθίσματα.

Αἱ ἀντιδράσεις ρυθμίζονται ἀπὸ τὰ κεντρικὰ τμήματα τοῦ νευρικοῦ συστήματος, ὡς π.χ. εἶναι ὁ ἔγκεφαλος. Εἰς τὰ κεντρικὰ αὐτὰ τμήματα ἔρχονται τὰ ἐρεθίσματα διὰ τῶν νεύρων.

Τὰ νεῦρα ὁμοιάζουν πρὸς λεπτὰ λευκὰ νήματα, τὰ ὅποια διακλαδίζονται εἰς ὅλον τὸ σῶμα. Ἐκαστον νεῦρον ἀποτελεῖται ἀπὸ νευρικῶν κυττάρων. Ἐκάστη νευρικὴ ἵς περιβάλλεται ἀπὸ λευκὸν περιβλήμα καλούμενον μετατοπλασματικάς ἀποφυάδας νευρικῶν κυττάρων. Ἐκάστη νευρικὴ ἵς περιβάλλεται ἀπὸ λευκὸν περιβλήμα καλούμενον μετατοπλασματικάς ἀποφυάδας νευρικῶν κυττάρων. Τὸ νεῦρον περιβάλλεται ἀπὸ ἄλλο περιβλήμα, τὸ νεῦρον μετατοπλασματικάς ἀποφυάδας νευρικῶν κυττάρων. Διὰ τῶν νεύρων συνδέονται τὰ αἰσθητικὰ κύτταρα μὲ τὸ κεντρικὸν νευρικόν.

ρικὸν σύστημα καὶ τοῦτο μὲ τοὺς μῆνας, οἱ ὅποιοι πραγματοποιοῦν τὰς ἀντιδράσεις εἰς τὰ ἐρεθίσματα.

“Ωστε διὰ τοῦ νευρικοῦ συστήματος ὁ ἄνθρωπος λαμβάνει γνῶσιν τῶν μεταβολῶν, αἱ ὅποιαι γίνονται εἰς τὸν ἔξωτερικὸν κόσμον ἥ καὶ εἰς τὸ σῶμα του, καὶ ἀντιδρᾶ εἰς αὐτάς.

Ίδιαιτέραν σπουδαιότητα ἀπέκτησε τὸ πρόσθιον τμῆμα τοῦ νευρικοῦ συστήματος, ὃ ἐγκέφαλος, ὁ δόποιος ἔχει ἔξελιχθῆ εἰς τὸν ἄνθρωπον καὶ ἀπέβη ἡ ἔδρα τῆς νοήσεως. Διὰ τῆς νοήσεως ἐδημιούργησεν ὁ ἄνθρωπος τὸν πολιτισμόν, δό δόποιος τόσον τὸν διακρίνει ἀπὸ τὸ ὑπόδοιπον ζωϊκὸν βασίλειον. Πᾶς ὅμως τελοῦνται αἱ νοητικαὶ λειτουργίαι εἰς τὸν ἔγκεφαλον, δὲν εἶναι, σήμερον τουλάχιστον, γνωστόν.

Ολόκληρον τὸ νευρικὸν σύστημα τοῦ ἄνθρωπου διακρίνεται εἰς τὰ ἔξης τμήματα: α) Τὸ ἐγκέφαλον καὶ τὸν νωτιαῖον νευρικὸν σύστημα· β) Τὸ συμπαθητικὸν καὶ παραγκεφαλικὸν νευρικὸν σύστημα καὶ γ) Τὰ αὔτρια ματαρικὰ συστήματα.


## 2. ΤΟ ΕΓΚΕΦΑΛΟΝΩΤΙΑΙΟΝ ΝΕΥΡΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ

Τοῦτο περιλαμβάνει ἐν κεντρικὸν καὶ ἐν περιφερικὸν τμῆμα:

α') **Τὸ κεντρικὸν τμῆμα.** Τοῦτο ἀποτελεῖται ἀπὸ τὸν ἐγκέφαλον καὶ τὸν νωτιαῖον μυελόν (εἰκ. 38).

Ο ἔγκεφαλος περικλείεται ἐντὸς τοῦ κρανίου, δὲ νωτιαῖος μυελὸς εἶναι συνέχεια τοῦ ἔγκεφάλου καὶ περικλείεται ἐντὸς τοῦ νωτιαίου σωλήνος τῆς σπονδυλικῆς στήλης, φθάνων μέχρι τῶν πρώτων ὀσφυϊκῶν σπονδύλων.


Εἰς τὸν ἔγκεφαλον διακρίνομεν τρία τμήματα. Οὕτω τὸ πρόσθιον τμῆμα του εἶναι δύγκωδες καὶ χωρίζεται μὲ βαθεῖαν πτυχὴν εἰς



Εἰκ. 38. Σχηματικὴ τομὴ διὰ τοῦ ἔγκεφάλου.

η. Ἡμισφαίρια τοῦ ἔγκεφάλου.—γ. Τρίτη κοιλία.—δ. Τετάρτη κοιλία.—πα. Παρεγκεφαλίς.—π. Προμήκης.—μ. Νωτιαῖος μυελός.—α. Ἔγκεφαλικὰ νεῦρα.

δύο μέρη, καλούμενα ἡ μισφαίρια τοῦ ἐγκεφάλου. Ἀμέσως μετά τὰ ἡμισφαίρια συναντῶμεν τὴν παρεγκεφαλίδα καὶ μετ' αὐτὴν τὸν προμήκη μυελόν. Οὗτος φθάνει μέχρι τοῦ ἴνιακοῦ τρίματος, ἀπὸ τὸ ὅποιον ἀρχεται ὁ νωτιαῖος μυελός. Εἰς τὸ ἔσωτερικὸν τοῦ ἐγκεφάλου ὑπάρχει ἔνας αὐλός, ὁ ὅποιος χωρίζεται εἰς διάφορα τμήματα, καλούμενα κοιλίας. Ὁ αὐλός οὗτος συνεχίζεται καὶ εἰς τὸν νωτιαῖον μυελόν.



Εἰκ. 39. Ἀπομονωμένον περιφ. νευρικό σύστημα καὶ νωτιαῖος μυελός.

μήνιγγες. Ἡ ἔξωτερικὴ εἶναι ἡ σκληρὰ μῆνιγξ, ἡ μεσαία εἶναι ἡ ἀραχνοειδὴς, ἡ ὅποια σχηματίζει δύο πέ-

τρίματος, ἀπὸ τὸ ὅποιον ἀρχεται ὁ νωτιαῖος μυελός. Εἰς τὸ ἔσωτερικὸν τοῦ ἐγκεφάλου ὑπάρχει ἔνας αὐλός, ὁ ὅποιος χωρίζεται εἰς διάφορα τμήματα, καλούμενα κοιλίας. Ὁ αὐλός οὗτος συνεχίζεται καὶ εἰς τὸν νωτιαῖον μυελόν. Ὁ ἐγκέφαλος τοῦ ἀνθρώπου παρουσιάζει πλῆθος ἑλικοειδῶν αὔλων, διὰ τῶν ὅποιών ἐπαυξάνεται ἡ ἐπιφάνειά του. Τὸ ἔξωτερικὸν στρῶμα τοῦ ἐγκεφάλου ἀποτελεῖται ἀπὸ νευρικὰ κύτταρα καὶ βραχείας ἀποφυάδας αὐτῶν, λόγω δὲ τοῦ χρώματός του καλεῖται φαιὰ οὔσια σία. Τὸ ἔσωτερικὸν ἀντιθέτως ἀποτελεῖται ἀπὸ τὰς μακρὰς ἀποφυάδας, τὰ νεῦρα, τὰ ὅποια περιβάλλονται ἀπὸ λευκῶν νευρείλημα. Διὰ τοῦτο τὸ στρῶμα τοῦτο καλεῖται λευκή οὔσια.

Εἰς τὸν νωτιαῖον μυελὸν ἀντιθέτως ἡ φαιὰ ούσια εἶναι εἰς τὸ κέντρον, περὶ τὸν κεντρικὸν αὐλόν, ἡ δὲ λευκὴ περιβάλλει τὴν φαιάν.

Διὰ νὰ μὴ προσκρούουν ἐπὶ τῶν ὀστῶν, δὲ ἐγκέφαλος καὶ δὲ νωτιαῖος μυελός, περιβάλλονται ἀπὸ τρεῖς ὑμένας, οἱ ὅποιοι καλοῦνται

παλα, καὶ ἡ ἐσωτερικὴ εἶναι ἡ χοριοειδής, ἡ ὅποια φέρει αἰμοφόρα ἀγγεῖα.

Ἐντὸς τῶν κοιλιῶν τοῦ ἐγκεφάλου καὶ τοῦ κεντρικοῦ αὐλοῦ καὶ μεταξὺ τῆς ἀραχνοειδοῦς καὶ τῆς χοριοειδοῦς μήνιγγος ὑπάρχει τὸ ἐγκεφαλικὸν νεύρων ὑγρόν.

β') Τὸ περιφερικὸν νευρικὸν σύστημα (ἐγκεφαλικὰ καὶ νωτιαῖα νεῦρα) (εἰκ. 39). Τοῦτο ἀποτελεῖται ἀπὸ τὰ νεῦρα, τὰ ὅποια ἔξερχονται ἀπὸ τὸν ἐγκέφαλον καὶ τὸν νωτιαῖον μυελόν καὶ διακλαδίζονται εἰς τὸ σῶμα. Τὰ νεῦρα, τὰ ὅποια ἔξερχονται ἀπὸ τὸν ἐγκέφαλον, καλοῦνται ἐγκεφαλικὰ καὶ εἶναι δώδεκα ζεύγη, ἔκεινα δέ, τὰ ὅποια ἔξερχονται ἀπὸ τὸν νωτιαῖον μυελόν, καλοῦνται νωτιαῖα καὶ εἶναι τριάκοντα καὶ ἑνν ζεύγη. Ἐκ τῶν νεύρων τούτων ὠρισμένα μεταφέρουν τὰ ἐρεθίσματα ἐκ τῶν αἰσθητικῶν κυττάρων εἰς τὸ κεντρικὸν νευρικὸν σύστημα καὶ καλοῦνται αἱ σθητικά, ἄλλα δὲ προκαλοῦν τὴν ἀντίδρασιν τῶν μυῶν καὶ καλοῦνται κινητικά. Τέλος, ὑπάρχουν καὶ νεῦρα, τὰ ὅποια ἔκτελοῦν καὶ τὰς δύο αὐτὰς λειτουργίας, καλούμενα διὰ τοῦτο μεικτά. Τὰ νωτιαῖα νεῦρα εἶναι ὅλα μεικτά.


γ') Η διαδρομὴ τοῦ ἐρεθίσματος. Τὸ ἐρέθισμα παράγεται εἰς τὰ αἰσθητικὰ κύτταρα, τὰ ὅποια εύρισκονται εἰς τὰ αἰσθητήρια ὅργανα ἡ εἶναι διεσκορπισμένα εἰς τὸ δέρμα. Τὰ νεῦρα, τὰ ὅποια ἀπολήγουν εἰς τὰ αἰσθητικὰ αὐτὰ κύτταρα, παραλαμβάνουν τὸ ἐρέθισμα καὶ τὸ μεταφέρουν εἰς τὸ κεντρικὸν σύστημα. Καὶ τὰ μὲν ἐγκεφαλικὰ νεῦρα μεταφέρουν τὸ ἐρέθισμα ἀπ' εύθειας εἰς τὸν ἐγκέφαλον, τὰ δὲ νωτιαῖα μεταφέρουν αὐτὸν πρῶτον εἰς τὸν νωτιαῖον μυελόν, ἔξ αυτοῦ δὲ κατόπιν τὸ ἐρέθισμα διαβιβάζεται πάλιν εἰς τὸν ἐγκέφαλον. Τοῦτο ὅμως δὲν συμβαίνει πάντοτε. Υπάρχουν ἐρεθίσματα, τὰ ὅποια, καταφθάνοντα εἰς τὸν νωτιαῖον μυελόν, διαβιβάζονται ἀμέσως εἰς τὰ κινητικὰ νεῦρα, χωρὶς δηλ. προηγουμένως νὰ διέλθουν ἀπὸ τὸν ἐγκέφαλον. Αἱ προκαλούμεναι οὖτα κινήσεις καλοῦνται ἀντανακλαστικῶς πλέον (κολύμβησις, βάδισις, παίξιμον ὄργανων κλπ.).

Εἰς τὸν ἐγκέφαλον, ὅπου καταφθάνουν τὰ διάφορα ἐρεθίσματα,

δημιουργοῦνται αἱ ἔντυπώσεις ἐκ τοῦ ἔξωτερικοῦ κόσμου, συνδύα-  
ζονται αὖται καὶ γενικῶς τελεῖται ἡ λειτουργία τῆς σκέψεως. Τέλος,  
γεννᾶται ἡ ἀντίδρασις εἰς τὰ ἐρεθίσματα, ἡ δόποία ρυθμίζεται ὑπὸ-  
τῶν κινητικῶν καὶ μεικτῶν νεύρων. Ταῦτα ἀπολήγουν εἰς τοὺς γραμ-  
ματοὺς μῆς, τῶν δόποίων τοιουτοτρόπως αἱ κινήσεις διέπονται ὑπὸ-  
τῆς βουλήσεως.

### 3. ΤΟ ΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ

Τοῦτο ἀποτελεῖται ἀπὸ νεῦρα, τὰ δόποῖα ἀρχίζουν ἀπὸ τὸν νω-  
τιαῖον μυελὸν καὶ ἀπολήγουν εἰς τοὺς λεί-  
ους μῆς τῶν σπλάγχνων. Πρὶν ὅμως φθά-  
σουν εἰς αὐτούς, διέρχονται ἀπὸ τὰ συμμα-  
ταθητικά γάγγλια, τὰ δόποῖα εὑρίσκονται εἰς δύο σειρὰς ἐκατέρωθεν τῆς σπονδυλικῆς στήλης (εἰκ. 40). Ὁλίγα ἐν-  
τούτοις συμπαθητικὰ γάγγλια δὲν περι-  
λαμβάνονται εἰς τὰς σειρὰς αὐτὰς καὶ εὑρί-  
σκονται μακρότερον εἰς ὠρισμένα μέρη τῆς κοιλίας. Τὰ γάγγλια ἐκάστης σειρᾶς συν-  
δέονται μεταξύ των διὰ νεύρων. Αἱ δύο αὗται σειραὶ γαγγύλιων καλοῦνται συμμα-  
ταθητικά στελέχη.



The diagram illustrates the sympathetic nervous system. It shows a cross-section of the spinal cord with the sacral plexus (S.P.) at the bottom. Two main nerve fibers descend from the cord. Labels include: V.V. (Ventral Vertebral), Y (Yerv), A (Afferent), and S (Spinal). The diagram depicts the arrangement of ganglia along these fibers, with some ganglia located near the cord and others further down the nerve fibers, particularly in the sacral region.

Εἰκ. 40. Σχῆμα τῶν συμ-  
παθητικῶν γαγγύλων.  
ν. ν. Νωτιαῖον νεῦρον. γ.  
Συμπαθητικά γάγγλια.  
Σ. Σπονδυλικὴ στήλη.  
εργάζεται καὶ ἐν ἐγκεφαλικὸν νεῦρον, τὸ πνευμονικόν  
στρικόν, τὸ δόποιον διακλαδίζεται εἰς τὸν θώρακα, τὸν στό-  
μαχον κλπ. Δι’ αὐτὸν καλεῖται τοῦτο καὶ πρᾶσυ μπαθητικὸν νεῦρον. Ἀλλὰ καὶ ἄλλα ἐγκεφαλικὰ νεῦρα περιλαμβάνουν καὶ παρασυμπαθητικὰ ἴνας.

“Ωστε τὸ συμπαθητικὸν συνδέεται μὲτὸ κεντρικὸν νευρικὸν σύστημα στενῶς..

Εἰς τὰ σπλάγχνα διακλαδίζονται καὶ τὰ νεῦρα τοῦ πρᾶσυ μπαθητικοῦ. Αὔτα ἐκφύονται ἀπὸ τὸ ἄκρον τοῦ νωτιαῖον μυελοῦ, δὲν διέρχονται δὲ ἀπὸ τὰ συμπαθητικὰ γάγγλια. Μὲ τὰ νεῦρα αὗτὰ τοῦ παρασυμπαθητικοῦ συστήματος συν-

Τὰ συμπαθητικὰ καὶ παρασυμπαθητικὰ νεῦρα ρυθμίζουν τὰς κινήσεις τῶν σπλάγχνων καὶ ἀνταγωνίζονται πρὸς ἄλληλα. Π.χ. ἐνῶ τὰ συμπαθητικὰ νεῦρα ἐπιταχύνουν τὰς κινήσεις τῆς καρδίας καὶ ἐπιβραδύνουν τὰς κινήσεις τοῦ ἐντέρου, ἀντιθέτως τὰ παρασυμπαθητικὰ ἐπιβραδύνουν τὰς κινήσεις τῆς καρδίας καὶ ἐπιταχύνουν τὰς τοῦ ἐντέρου. Διὰ τοῦ ἀνταγωνισμοῦ τούτου ἔξασφαλίζεται ἡ ἀναγκαία ἴσορροπία διὰ τὴν κανονικὴν λειτουργίαν τῶν σπλάγχνων.

Τὰ συμπαθητικὰ καὶ παρασυμπαθητικὰ νεῦρα δροῦν ἀνεξαρτήτως τῆς βουλήσεως, καὶ διὰ τοῦτο αἱ κινήσεις τῶν λείων μυῶν καὶ τῆς καρδίας γίνονται ἀσυναισθήτως. Ἐν τούτοις ὅμως, ἐπειδὴ τὰ νεῦρα αὐτὰ συνδέονται, ὡς εἴδομεν, καὶ μὲ τὸν ἐγκέφαλον, συμβαίνει ώστε νὰ συνδυάζωνται, νὰ συντονίζωνται, ὡς λέγουν, αἱ κινήσεις τῶν λείων μυῶν τῶν σπλάγχνων, καθὼς καὶ τῶν μυῶν τῆς καρδίας, μὲ τὰς κινήσεις τῶν γραμμωτῶν μυῶν. Οὕτω λ.χ. ὅταν διὰ τῆς βουλήσεως θέτῃ τις εἰς ἐντατικὴν ἐργασίαν τοὺς γραμμωτοὺς μῆς τοῦ σώματος (δρόμος, ἐργασία κλπ.), τότε καὶ ἡ καρδία καὶ τὰ ἀναπνευστικὰ ὅργανα ἐργάζονται ἐντατικώτερον, ὥν καὶ νευροῦνται ἀπὸ τὸ συμπαθητικὸν καὶ παρασυμπαθητικὸν νευρικὸν σύστημα.

#### 4. ΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΝΕΥΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

‘Ως εἴδομεν, τὸ ἐγκεφαλονωτιαῖον, τὸ συμπαθητικὸν καὶ τὸ παρασυμπαθητικὸν νευρικὸν σύστημα συνδέονται μεταξύ των καὶ ἀποτελοῦν ἐν σύνολον.

Εἰς ώρισμένα σπλάγχνα τοῦ σώματος ὑπάρχουν, ἐκτὸς ἀπὸ τὰς διακλαδώσεις τῶν νευρικῶν τούτων συστημάτων, καὶ ἄλλα νεῦρα καὶ γάγγλια, τὰ ὅποια δὲν συνδέονται μὲ τὰ προηγούμενα νευρικά συστήματα. Τοιαῦτα «αὔτόν ο μα» νευρικὰ συστήματα ὑπάρχουν εἰς τὰ τοιχώματα τοῦ ἐντέρου καὶ τὴν καρδίαν.

Τὸ αὐτόνομον νευρικὸν σύστημα τοῦ ἐντέρου ἐρεθίζεται ἀπὸ χημικὰς ούσιας τῶν τροφῶν καὶ προκαλεῖ τὰς κινήσεις τοῦ ἐντέρου καὶ τῶν λαχνῶν αὐτοῦ.

Τὸ αὐτόνομον νευρικὸν σύστημα τῆς καρδίας ἐρεθίζεται ἀπὸ τὸ διοξείδιον τοῦ ανθρακος, τὸ ὅποιον περιέχεται εἰς τὸ αἷμα τοῦ

δεξιοῦ κόλπου. Εἰς τὸν ἐρεθίσμὸν αὐτὸν ἀντιδρᾷ διὰ τῶν κινήσεων τῆς καρδίας.

“Ωστε αἱ κινήσεις τοῦ ἐντέρου καὶ τῆς καρδίας δὲν ρυθμίζονται μόνον ὑπὸ τῶν συμπαθητικῶν καὶ παρασυμπαθητικῶν νεύρων, ἀλλὰ καὶ ὑπὸ αὐτονόμων νευρικῶν συστημάτων τῶν ὄργανων τούτων.

## 5. Ο ΥΠΝΟΣ

‘Ο ὑπνος εἶναι μία κατάστασις, εἰς τὴν ὅποιαν διέρχεται ὁ ἀνθρωπός τὸ ἐν τρίτον καὶ πλέον τῆς ζωῆς του. Κατὰ μέσον ὅρου, τὸ βρέφος κοιμᾶται κατὰ τὸ πρῶτον ἔτος τῆς ζωῆς του ἐπὶ 18 ὥρας τὸ εἰκοσιτετράρον, τὸ παιδίον κατὰ τὸ 2ον - 5ον ἔτος κοιμᾶται ἐπὶ 14 ὥρας, κατὰ τὸ 5ον - 6ον ἔτος ἐπὶ 12 ὥρας καὶ κατὰ τὸ 7ον - 14ον ἔτος ἐπὶ 10 ὥρας. Κατὰ τὴν ἐφηβικήν καὶ ὡριμον ἡλικίαν συνήθως διατίθενται διὰ τὸν ὑπνον 8 ὥραι. Κατὰ τὸ γῆρας αἱ ὥραι τοῦ ὑπνου ἐλαττοῦνται περισσότερον.

Κατὰ τὸν ὑπνον, οἱ μύες οἱ ἔξαρτώμενοι ἐκ τῆς βουλήσεως γενικῶς δὲν ἐργάζονται, καθ’ ὅσον δὲν διαβιβάζονται εἰς αὐτοὺς ἐκ τοῦ ἐγκεφάλου ἐρεθίσματα. Οἱ μύες τῶν σπλάγχνων ὅμως, καθὼς καὶ μερικοὶ ἄλλοι ( ὡς οἱ κλείοντες τὰ βλέφαρα ), συνεχίζουν τὴν ἐργασίαν των. Εἰς τινα ζῶα μάλιστα κατὰ τὸν ὑπνον ἐργάζονται πλειστοί μύες, ὡς οἱ τῶν ποδῶν εἰς τὰ ζῶα τὰ κοιμώμενα ὅρθια ( ἵππος κλπ. ) ἢ κρατούμενα ἐπὶ κλάδων ( πτηνὰ κλπ. ).

Οἱ ἐρεθίσμοι ἐπὶ τοῦ ὄργανισμοῦ εἶναι κατὰ τὸν ὑπνον περιωρισμένοι, διότι τὰ βλέφαρα εἶναι κλειστά, ὁ τόπος συνήθως ἡσυχος καὶ ἡ προσοχὴ δὲν διεγίρεται πλέον ἀπὸ τὸ περιβάλλον. Ἀλλὰ καὶ τὰ ἐρεθίσματα, τὰ ὅποια παρ’ ὅλα αὐτὰ τυχὸν παράγονται, δὲν δημιουργοῦν ἐντυπώσεις εἰς τὸν ἐγκέφαλον, παρὰ μόνον ἂν εἶναι, ἀναλόγως καὶ τῆς βαθύτητος τοῦ ὑπνου, ἀρκετά ἔντονα. Ἀκριβῶς τοῦτο χαρακτηρίζει τὸν ὑπνον, ὅτι ὁ ἐγκέφαλος ἐν μέρει ἀδρανεῖ καὶ δὲν ἐπεξεργάζεται τὰ ἐρεθίσματα, τὰ ὅποια τυχὸν καταφθάνουν εἰς αὐτόν. Οὕτως ὁ ὑπνος ἐπιφέρει τὴν ἀνάπτωσιν τοῦ ἐγκεφάλου καὶ γενικῶς τοῦ νευρικοῦ συστήματος.

‘Ο ἐπαρκής ὑπνος εἶναι ἀπαραίτητος διὰ τὸν ὄργανισμόν, ἡ δὲ στέρησις αὐτοῦ εἶναι βλαβερά. Πειραματικῶς παρετηρήθη ἐπὶ ζώων, ὅτι ἡ στέρησις τοῦ ὑπνου προκαλεῖ, μετά τινας ἡμέρας ἀϋπνίας, τὸν θάνατον.

## 6. ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ

Τὸ νευρικὸν σύστημα περιλαμβάνει: α') τὸ ἐγκεφαλὸν ωτιαῖον σύστημα (κεντρικὸν τμῆμα ὁ ἐγκέφαλος καὶ ὁ νωτιαῖος μυελός, περιφερικὸν τὰ 12 ζεύγη τῶν ἐγκεφαλικῶν νεύρων καὶ τὰ 31 τῶν νωτιαίων)· β') τὸ συμπαθητικὸν ἀποτελεῖται ἀπὸ ἵνας, αἱ διαδικασίαι τῆς σπονδυλικῆς στήλης διέρχονται ἀπὸ τὰ συμπαθητικά γάγγλια· τὸ παρασυμπαθητικὸν ἀποτελεῖται ἀπὸ ἵνας ἐκφυομένας ἐπίστης ἐκ τοῦ νωτιαίου μυελοῦ καὶ ἀπὸ τοῦ πνευμονογαστρικοῦ κυρίως ἐγκεφαλικοῦ νεύρου· τὸ συμπαθητικὸν καὶ τὸ παρασυμπαθητικὸν ἀνταγωνίζονται πρὸς ἄλληλα· γ') Τὰ αὐτόν ομαδεύρικὰ συστήματα τῆς καρδίας καὶ τοῦ ἔντερου, τὰ διποῖα δὲν συνδέονται πρὸς τὰ προηγούμενα.


Διὰ τὴν ἀνάπτουσιν τοῦ ἐγκεφάλου εἶναι ἀπαραίτητος ὁ ὑπνος, μία κατάστασις, κατὰ τὴν διποίαν οὕτος μερικῶς ἀδρανεῖ.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΩΔΕΚΑΤΟΝ

### ΑΙ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ


#### 1. ΑΙΣΘΗΣΙΣ. ΑΙΣΘΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

Εις τὸ κεφάλαιον περὶ τοῦ νευρικοῦ συστήματος ἐμάθομεν, ὅτι τὰ ἔρεθίσματα προσλαμβάνονται ἀπὸ εἰδικὰ αἱ σ θ τ ι κ ἀ κύτταρα, εἰς τὰ ὅποῖα ἀπολήγουν τὰ αἰσθητικὰ νεῦρα. Ἐκεῖθεν μεταφέρονται εἰς τὸ κεντρικὸν νευρικὸν σύστημα καὶ οὕτως ἀντιλαμβάνομεν τὰς μεταβολάς, αἱ ὅποῖαι τὰ προκαλοῦν. Ἡ λειτουργία αὕτη, διὰ τῆς ὅποίας προσλαμβάνομεν τὰ διάφορα ἔρεθίσματα καὶ ἀντιλαμβανόμεθα τὰ φαινόμενα, τὰ ὅποῖα τὰ προκαλοῦν, καλεῖται αἱ σ θ η-



Εἰκ. 41. Σχῆμα μιᾶς θηλῆς φερούστης γευστικούς κάλυκας.

1. Γευστικός κάλυξ. — 2. Νευρικὴ ἵσ.



Εἰκ. 42. Γευστικὸς κάλυξ  
ἐν μεγεθύνσει.

σις. Τὰ ὄργανα τοῦ σώματος, τὰ ὅποῖα περιλαμβάνουν τὰ αἰσθητικὰ κύτταρα καὶ εἴναι καταλλήλως διαμορφωμένα διὰ τὴν ὑποδοχὴν τῶν ἔρεθισμάτων, καλοῦνται αἱ σ θ τ ή ρια ὅργανα.


Εις τὸ δέρμα εἴναι διασκορπισμένα διάφορα τοιαῦτα ἀπλᾶ ὄργανα (αἱ σ θ τ ι κ ἀ σωμάτια) χρησιμεύοντα διὰ τὴν αἰσθησιν τῆς θερμότητος, τοῦ ψύχους καὶ τῆς πιέσεως (ἀφή). Ἐκαστον τοιοῦτον αἰσθητικὸν σωμάτιον ἀποτελεῖται ἀπὸ μερικὰ αἰσθητικὰ κύτταρα, τὰ ὅποῖα περιβάλλουν τὴν ἀπόληξιν ἐνὸς αἰσθητικοῦ νεύρου (βλ. εἰκ. 51, 12).

## 2. ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΓΕΥΣΕΩΣ


Τὴν γεῦσιν τῆς μιᾶς ούσίας ἀντιλαμβανόμεθα, ἃν ἡ ούσία αὐτὴ ἔλθῃ, ἐν διαιλύσει, εἰς ἐπαφὴν καὶ ἐρεθίσῃ τὰ αἰσθητικὰ σωμάτια τῆς γεύσεως. Τὰ σωμάτια αὗτὰ καλοῦνται γευστικοὶ καὶ λυκεῖς καὶ εύρισκονται εἰς τὴν ἐπιφάνειαν τῆς γλώσσης, ἵδιως εἰς τὸ πρόσθιον καὶ ὅπισθιον μέρος αὐτῆς (εἰκ. 41 καὶ 42).

## 3. ΤΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΟΣΦΡΗΣΕΩΣ

Τὴν ὁσμὴν μιᾶς ούσίας ἀντιλαμβανόμεθα, ἐὰν λεπτότατα μόρια αὐτῆς παρασυρθοῦν ὑπὸ τοῦ εἰσπνεομένου ἀέρος εἰς τὴν ρινικὴν κοι-



Εἰκ. 43. Τομὴ ἐγκαρπία διὰ τοῦ προσώπου. 1, 2. Αἱ δύο ἀνώτεραι ρινικαὶ κόγχαι.—8. Κάτω ρινικὴ κόγχη.—6. Ρινικὸν διάφραγμα.—5. Ὁφθαλμικὴ κόγχη.—7. Ὕνις.



Εἰκ. 44. Ὁσφρητικὰ κύτταρα.

1. Ἰνίδια τῶν αἰσθητικῶν κυτάρων.—2. Ἐπιθηλιακὰ κύτταρα τῶν βλεννογόνων.—3. Νευρικὰ ἴνες.

λότητα καὶ ἐρεθίσουν τὰ αἰσθητικὰ κύτταρα τῆς ὁσφρήσεως. Τὰ κύτταρα αὗτὰ εύρισκονται ἐπὶ τοῦ βλεννογόνου τῆς ρινικῆς κοιλότητος καὶ ἵδιως εἰς τὴν ἀνωτέραν ρινικὴν κόγχην (εἰκ. 43 καὶ 44).

## 4. ΤΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΟΡΑΣΕΩΣ


Διὰ τῆς ὄράσεως ἀντιλαμβανόμεθα τὰς φωτεινὰς ἀκτῖνας, τὰς ὄποιας ἐκπέμπουν τὰ διάφορα ἀντικείμενα, καὶ τὴν ἀπόστασιν, τὴν μορφὴν καὶ τὸ σχῆμα τῶν ἀντικειμένων τούτων.

Τὰ δύο αἰσθητικὰ νεῦρα, τὰ δποῖα χρησιμεύουν διὰ τὴν ὅρασιν (ὅπτικὰ νεῦρα), ἀπολήγουν εἰς τὸ ἐσωτερικὸν τῶν αἰσθητηρίων

δργάνων τῆς δράσεως, δηλ. τῶν δύο ὁ φ θ α λ μ ς ν. Τὸ ἀριστερὸν ὄπτικὸν νεῦρον ἀπολήγει εἰς τὸν δεξιὸν ὀφθαλμὸν καὶ τὸ δεξιὸν εἰς τὸν ἀριστερὸν ὀφθαλμόν.

**Κατασκευὴ τῶν ὀφθαλμῶν.** Ἐκαστος ὀφθαλμὸς ὁμοιάζει μὲν σφαιρικὸν θάλαμον, δ ὅποιος ἔχει ἀδιαφανῆ τοιχώματα καὶ καλεῖται β ο λ β ς. Εἰς τὸ πρόσθιον μόνον μέρος τὰ τοιχώματα τοῦ βολβοῦ γίνονται διαφανῆ καὶ ἀφήνουν τὰς φωτεινὰς ἀκτῖνας νὰ εἰσέλθουν.

Τὸ τοίχωμα τοῦ βολβοῦ ἀποτελεῖται ἀπὸ τρία τοιχώματα, τὰ δόποια καλοῦνται χιτῶνες (εἰκ. 45). Ὁ ἔξωτερικός χιτών καλεῖται σκληρωτικός. Εἶναι ἀδιαφανής καὶ λευκός καὶ εὔκολα δυνάμεθα νὰ τὸν παρατηρήσωμεν (ἀσπράδι τοῦ ματιοῦ). Εἰς τὸ ἐμπρόσθιον μόνον μέρος τοῦ βολβοῦ, ἐν κυκλικὸν τμῆμα τοῦ σκληρωτικοῦ χιτῶνος είναι διαφανές. Τὸ τμῆμα τοῦτο καλεῖται κερατοειδής χιτών καὶ είναι κυρτότερον ἀπὸ τὸν σκληρωτικόν.



Εἰκ. 45. Σχῆμα τοῦ ὀφθαλμοῦ.

1. Σκληρωτικός χιτών.
2. Χοριοειδής.
3. Ἀμφιβληστροειδής.
4. ὜χρά κηλίς.
5. Ὁπτικὸν νεῦρον.
6. Κερατοειδής χιτών.
7. Ἰρις.
8. Φακός.
9. Χῶρος κατεχόμενος ἀπὸ τὸ δύνατῶντος ὑγρόν.
10. Χῶρος κατεχόμενος ἀπὸ τὸ ὑαλώδες σῶμα.

ειδῆ εύρισκεται δ ἀ μ φ ι β λ η σ τ ρ ο ε i δ ή s χιτών, εἰς τὸν δόποιον είναι διακλαδισμένον τὸ ὄπτικὸν νεῦρον. Καὶ αὐτὸς διακόπτεται κάτω ἀπὸ τὸν κερατοειδῆ.

Κάτω ἀπὸ τὸν κερατοειδῆ καὶ χωρὶς νὰ ἀκουμβᾶ ἐπ’ αὐτοῦ εύρισκεται ἐν διάφραγμα μυῶδες, ἡ Ἰρις. Τὸ διάφραγμα τοῦτο ἀφήνει εἰς τὸ κέντρον μίαν ὀπήν, ἡ ὅποια καλεῖται κόρη τοῦ ὀφθαλμοῦ. Ἀμέσως ὅπισθεν τῆς Ἰριδος ὑπάρχει διαφανής ἀμφίκυρτος φακός. Οὗτος συγκρατεῖται καὶ συσφίγγεται ἀπὸ μίαν μυικὴν ζώνην, ἡ ὅποια τὸν περιβάλλει.

Κάτω ἀπὸ τὸν σκληρωτικὸν είναι δ χ ο ρ i o e i δ ή s χιτών. Οὗτος είναι μέλας καὶ ἀγγειοβριθής, ἀφήνει δὲ ἀκάλυπτον τὸ μέρος κάτω ἀπὸ τὸν κερατοειδῆ.


Τέλος, μέσα ἀπὸ τὸν χοριοειδῆ εύρισκεται δ ἀ μ φ ι β λ η σ τ ρ ο ε i δ ή s χιτών, εἰς τὸν δόποιον είναι διακλαδισμένον τὸ ὄπτικὸν νεῦρον. Καὶ αὐτὸς διακόπτεται κάτω ἀπὸ τὸν κερατοειδῆ.

‘Ο χῶρος μεταξύ τοῦ κερατοειδοῦς καὶ τῆς ἥριδος εἶναι πλήρης. ἐνὸς διαφανοῦς ρευστοῦ, τὸ ὄποιον καλεῖται ὑδατός δε σύριγχος. Οἱ σπισθεῖσαι τῆς ἥριδος καὶ τοῦ φακοῦ χῶρος τοῦ βολβοῦ εἶναι πλήρης ἀπὸ ἐν ἄλλῳ διαφανεῖς ρευστόν, τὸ ὑδατός δε σύριγχος.

Τὸ διπτικόν νεῦρον εἰσέρχεται εἰς τὸν βολβὸν ἀπέναντι τῆς κόρης καὶ διακλαδίζεται ἐπὶ τοῦ ἀμφιβληστροειδοῦς πλησίον τῆς εἰσόδου τοῦ διπτικοῦ νεύρου. Τὸ σημεῖον τούτο καλεῖται ψυχή λίστης.

‘Ο βολβὸς κινεῖται διὰ τοῦ μυῶν, οἵ ὅποιοι ἐφαρμόζουν ἐπὶ αὐτοῦ.

**Σχηματισμὸς τοῦ εἰδώλου.** Αἱ φωτειναὶ ἀκτίνες, οἵ ὅποιαι ἀναχωροῦν ἀπὸ τὰ διάφορα ἀντικείμενα, διέρχονται τὸν κερατοειδῆ χιτῶνα, τὸ ὑδατῶδες ὕγρον, τὸν φακὸν καὶ τὸ ὑαλῶδες σῶμα (εἰκ. 46).



Εἰκ. 46. Πορεία τῶν ἀκτίνων καὶ σχηματισμὸς τοῦ εἰδώλου ἀνεστραμμένου.

‘Ως εἶναι γνωστὸν ἐκ τῆς φυσικῆς, ἐὰν ἀκτίνες, οἵ ὅποιαι προέρχονται ἀπὸ ἐν σημεῖον, συναντήσουν ἔνα φακὸν ἀμφίκυρτον, θὰ συγκεντρωθοῦν ὅλαι εἰς ἐν ἄλλῳ σημεῖον, ὅπισθεν τοῦ φακοῦ. Τοῦτο γίνεται διὰ ὅλα τὰ σημεῖα ἐνὸς ἀντικειμένου καὶ οὕτω σχηματίζεται ὅπισθεν τοῦ φακοῦ τὸ εἴδωλον τοῦ ἀντικειμένου τούτου.

Τὸ εἴδωλον τοῦτο ἀναλόγως τῆς ἀποστάσεως αὐτοῦ, εἶναι μικρότερον ἢ μεγαλύτερον.

Τὸ ἴδιον γίνεται καὶ μὲ τὸν φακὸν τοῦ ὄφθαλμοῦ οὕτω σχηματίζεται εἰς τὸ βάθος τοῦ βολβοῦ ἐπὶ τοῦ ἀμφιβληστροειδοῦς τὸ εἴδωλον τῶν ἔξωτερικῶν ἀντικειμένων (εἰκ. 46). Τὸ εἴδωλον αὐτὸν εἶναι μικρὸν καὶ ἀνεστραμμένον καὶ σχηματίζεται συγχρόνως καὶ εἰς τοὺς δύο ὄφθαλμούς.

Τὰ φωτεινὰ εἰδῶλα, τὰ ὄποια οὕτω σχηματίζονται, ἐρεθίζουν τὰ ὄπτικὰ νεῦρα καὶ τὰ ἐρεθίσματα αὐτὰ μεταβιβάζονται εἰς τὸν ἐγκέφαλον. Ἐφ' ὅσον οἱ δύο ὀφθαλμοὶ εύρισκονται εἰς τὴν κανονικὴν των θέσιν, τὰ δύο εἰδῶλα γίνονται ἀντιληπτὰ ὡς ἔν. Ἐὰν ὅμως πιέσωμεν τὸν ἔνα βολβόν, ὥστε οὗτος νὰ μετατοπισθῇ διλίγον, τότε τὰ ἀντικείμενα μᾶς φαίνονται διπλά.

**Προσαρμογὴ τοῦ ὀφθαλμοῦ.** Ὡς μυϊκή ζώνη, ἡ ὄποια περιβάλλει τὸν φακόν, δύναται νὰ χαλαρωθῇ, δπότε ὁ φακός, γίνεται κυρτότερος καὶ ἐπομένως σχηματίζει τὸ εἴδωλον πλησιέστερον. Τοῦτο γίνεται, ὅταν παρατηροῦμεν ἀντικείμενα εύρισκόμενα πολὺ πλησίον, τῶν ὄποιων τὸ εἴδωλον ἄλλως θὰ ἐσχηματίζετο πολὺ μακρὰν τοῦ φακοῦ. Οὕτω ἐπιτυγχάνεται νὰ σχηματίζεται τὸ εἴδωλον πάντοτε ἐπὶ τοῦ ἀμφιβληστροειδοῦς καὶ νὰ ἐρεθίζεται τὸ ὄπτικὸν νεῦρον. Ὡς ἀλλαγὴ τῆς κυρτότητος τοῦ φακοῦ καλεῖται προσαρμογὴ τοῦ ὀφθαλμοῦ. Ὁ ὀφθαλμὸς δὲν δύναται νὰ προσαρμοσθῇ, διὰ νὰ ἴδῃ ἀντικείμενα εύρισκόμενα πλησιέστερον τῶν 25 – 30 ἑκ.

**Προστασία τοῦ ὀφθαλμοῦ.** Ὁ ὀφθαλμὸς εἶναι εύπαθες ὅργανον καὶ ἔχει ἀνάγκην προστασίας. Πρὸς τοῦτο οἱ βολβοὶ εύρισκονται εἰς κοιλώματα, σχηματιζόμενα ὑπὸ τῶν δοτῶν τοῦ προσώπου, τὰς ὀφθαλμικὰς κόγχας. Ἐπάνω ἀπὸ αὐτὰς τὸ μετωπικὸν ὀστοῦν παρουσιάζει δύο ἐπάρματα, τὰ ὑπερόφρυνα τόξα. Εἰς τὴν ἴδιαν θέσιν φύονται ἐπὶ τοῦ δέρματος τὰ «φρύνια». Ἐμπρὸς ἀπὸ τὴν ἐλευθέραν ἐπιφάνειαν τοῦ βολβοῦ κινοῦνται τὰ βλέφαρα. Ταῦτα ἐσωτερικῶς καλύπτονται ἀπὸ ἔνα βλεννογόνον, τὸν ἐπιπεκτικόν περισσότερον τοῦ φέρουν τὰς βλεφαρίδας.

Ἡ ἐλευθέρα ἐπιφάνεια τοῦ βολβοῦ διατηρεῖται λεία καὶ καθαρὰ μὲ τὸ δάκρυ, τὸ ὄποιον ἐκκρίνεται ἀπὸ ἔνα δακρυγόνον ἀδένα, εύρισκόμενον ὅπισθεν τοῦ ἀνω βλεφάρου. Τὸ περισσεῦον δάκρυ ἔρχεται εἰς τὴν ρινικὴν κοιλότητα διὰ τῶν δακρυούς τοῦ ἀγωγῶν, οἱ ὄποιοι ἀρχίζουν ἀπὸ τὸ ἐσωτερικὸν ὅκρον τῶν βλεφάρων (δακρυϊκοὶ πόροι).

**Ἀνωμαλίαι τῆς ὀράσεως.** Αἱ κυριώτεραι ἀνωμαλίαι τῆς ὀράσεως εἶναι αἱ ἔξῆς :

**α')** **Ἀλλοιοθωρισμός.** Ἀλλοιόθωροι καλοῦνται οἱ ὀφθαλμοὶ ἐνὸς ἀτόμου, ὅταν αἱ κόραι δὲν βλέπουν καὶ αἱ δύο ἀκριβῶς παραλλήλως.

Τοῦτο διείλεται εἰς τό ὅτι ὡρισμένοι μύες ἔξ ἐκείνων, οἱ ὄποιοι συγκρατοῦν καὶ κινοῦν τὸν βολβόν, εἶναι ἀσθενέστεροι τῶν ἄλλων. Οἱ ἄλλοιθωροι θὰ ἔπρεπε νὰ βλέπουν διπλά τὰ ἀντικείμενα, ἀλλὰ ἔχουν συνηθίσει νὰ προσέχουν τὸ ἐν μόνον εἶδωλον.


**β')** **Πρεσβυωπία.** Αὕτη εἶναι μία ἀνωμαλία παρουσιαζομένη συνήθως κατὰ τὸ γῆρας. Ὁφείλεται εἰς τὸ ὅτι ὁ φακὸς δὲν δύναται πλέον νὰ κυρτωθῇ ἀρκετὰ διάτα τὰ πλησίον του ἀντικείμενα καὶ τὸ εἶδωλον αὐτῶν σχηματίζεται μακρύτερα ἀπὸ τὸν ἀμφιβληστροειδῆ (εἰκ. 47, α). Οἱ πρεσβύωπες βοηθοῦνται μὲν διματογυάλια ἀποτελούμενα ἀπὸ ἀμφικύρτους φακούς, οἱ ὄποιοι συγκεντρώνουν πλησιέστερα τὰς ἀκτίνας.

Εἰς ἄλλας περιπτώσεις ὁ σχηματισμὸς τοῦ εἶδώλου δημιουργεῖται τοῦ ἀμφιβληστροειδοῦς, ὁφείλεται ὅχι εἰς ἐλάττωμα τοῦ φακοῦ, ἀλλ' εἰς τὸ ὅτι ὁ βολβὸς εἶναι βραχύτερος τοῦ κανονικοῦ (ὑπερμετρωπία) (εἰκ. 47, γ).

**γ')** **Μυωπία.** Ἡ ἀνωμαλία αὗτη ὑπάρχει, ὅταν τὸ εἶδωλον τῶν μακρὰν ἀντικειμένων σχηματίζεται πρὸ τοῦ ἀμφιβληστροειδοῦς, διπότε πάλιν τὸ ὅπτικὸν νεῦρον δὲν ἐρεθίζεται. Ὁφείλεται εἰς τὸ ὅτι ὁ φακὸς δὲν δύναται νὰ προσαρμοσθῇ ἥ εἰς τὸ ὅτι ὁ βολβὸς εἶναι μακρύτερος τοῦ κανονικοῦ. Οἱ μύωψ, διὰ νὰ ἴδῃ τὰ μακρὰν ἀντικείμενα, βοηθεῖται μὲν διματογυάλια μὲν ἀμφικιόλους φακούς. Οἱ φακοὶ οὗτοι, ἀντιθέτως πρὸς τοὺς ἀμφικύρτους, φέρουν τὸ εἶδωλον, ὡστε νὰ σχηματίζεται τοῦτο ἀκριβῶς. ἐπὶ τοῦ ἀμφιβληστροειδοῦς.

## 5. ΤΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΑΚΟΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

Αἴσθησις τῆς ἀκοῆς εἶναι ἐκείνη, διὰ τῆς ὄποιας ἀντιλαμβανόμεθα τοὺς ἥχους. Ως εἶναι γνωστὸν ἐκ τῆς Φυσικῆς, οἱ ἥχοι παρά-




Εἰκ. 47. Ἡ ἀνωμαλία τῆς δράσεως.

β. Κανονικός ὀφθαλμὸς πρὸς σύγκρισιν.

γονται, όταν ἔν σῶμα τεθῆ εἰς παλμικήν κίνησιν, καὶ μεταδίδονται διὰ κυμάνσεων τοῦ ἀέρου.

Αἱσθησιν τοῦ χώρου καλοῦμεν ἐκείνην, διὰ τῆς ὁποίας συναισθιανόμεθα τὴν στάσιν τοῦ σώματος καὶ τηροῦμεν κατὰ τὴν κίνησιν τὴν ἰσορροπίαν.

Τὰ αἰσθητήρια ὄργανα τῆς ἀκοῆς καὶ τοῦ χώρου εἶναι τὰ ὡς τα, τὰ ὁποῖα εὑρίσκονται ἐντὸς κοιλοτήτων τῶν κροταφικῶν ὀστῶν.



Ἐικ. 48. Σχῆμα τοῦ ὄργάνου τῆς ἀκοῆς.  
1. Πτερύγιον τοῦ ὡτός. — 2. Τύμπανον. — 3. Ἐξω ἀκουστικός πόρος. — 4. Κοιλότης τοῦ μέσου ὡτός. — 5. Εὐσταχιανὴ σάλπιγξ. — 6. Ἐσω οὖς.

**Μέσον οὖς.** Τοῦτο εἶναι συνέχεια τῆς κοιλότητος τοῦ κροταφικοῦ ὀστοῦ καὶ συγκοινωνεῖ μὲ τὴν στοματικήν κοιλότητα δι' ἐνὸς στενοῦ σωλῆνος, τῆς εὔσταχιανῆς σάλπιγγος. Ἀπὸ τὸν ἀκουστικὸν πόρον τὸ μέσον οὖς χωρίζεται διὰ τῆς μεμβράνης τοῦ τυμπάνου. Ἡ κοιλότης τοῦ μέσου ὡτὸς συγκοινωνεῖ μὲ τὴν κοιλότητα τοῦ ἔσω ὡτὸς διὰ δύο μικρῶν ὀπῶν, τῆς στρογγύλης καὶ τῆς ὠοειδοῦ θυρίδος, αἵ ὁποῖαι καλύπτονται ὑπὸ μεμβρανῶν. Ἀπὸ τοῦ τυμπάνου μέχρι τῆς ὠοειδοῦ θυρίδος ἐκτείνεται μία σειρὰ διπλὸς τρία δοτάρια ἐφαπτόμενα πρὸς ἄλληλα, τὴν σφῦραν, τὸν ἄκμονα καὶ τὸν ἄναβολέα (εἰκ. 49).

**Ἐσω οὖς** (εἰκ. 49). Εἰς τὴν κοιλότητα τοῦ ἔσω ὡτὸς, ἡ ὁποία εἶναι πλήρης ἐνὸς ὑγροῦ, τῆς ἔξω λόμφης, παρατηροῦμεν :

Εἰς ἑκαστον οὓς διακρίνομεν τρία τμήματα, τὸ ἔξω, τὸ μέσον καὶ τὸ ἔσω οὖς (εἰκ. 48).

**Ἐξω οὖς.** Τοῦτο ἀποτελεῖται ἀπὸ τὸ πτερύγιον καὶ τὸν ἀκουστικὸν πόρον. Τὸ πτερύγιον εἶναι χόνδρινον καὶ φέρει διαφόρους πτυχάς. Ὁ ἀκουστικὸς πόρος εἶναι ἔνας σωλῆνος ἐντὸς τοῦ κροταφικοῦ ὀστοῦ, ὁ ὁποῖος ἀρχίζει ἀπὸ τὸ πτερύγιον καὶ εἰς τὸ βάθος φράσσεται ἀπὸ μίαν μεμβράνην καλούμενην τύμπανον (εἰκ. 48).

α') Δύο κυστίδια συγκοινωνοῦντα καὶ καλούμενα ἐλλειπτικὰ καὶ σφαιρικὰ κυστίδια.


β') Τρεῖς ἡμικυκλίους σωλήνας. Οὗτοι ἀρχίζουν ἀπὸ τὸ ἑλλειπτικὸν κυστίδιον καὶ ἐπιστρέφουν πάλιν εἰς αὐτό, εὑρίσκονται δὲ ἐπὶ τριῶν καθέτων ἐπιπέδων. Εἰς τὴν ἀρχήν του ἔκαστος παρουσιάζει μίαν διεύρυνσιν, τὴν λήκυθον ἥλαγηνον.

γ') Τὸν κοχλίαν. Οὗτος εἶναι τυφλὸς σωλήνης τριγωνικῆς τομῆς, περιειλιγμένος εἰς 2 1/2 σπείρας ἐντὸς ἀντιστοίχου σωλήνος τοῦ κροταφικοῦ ὀστοῦ, δὲ ὅποιος καλεῖται ὀστείνος κοχλίας καὶ ἀπολήγει εἰς ὠοειδῆ θυρίδα. Ο κοχλίας συγκοινωνεῖ μὲ τὸ σφαιρικὸν κυστίδιον.

Τὰ ἀνωτέρω ὑμενώδη ὅργανα, τὰ ὅποια, ὡς εἰδομενοὶ συγκοινωνοῦν μεταξύ των, πληροῦνται ὑπὸ ὑγροῦ, καλούμενον


ἐνδολύματος. Τὰ αἰσθητικὰ κύτταρα τῆς ἀκοῆς εὑρίσκονται εἰς τὸ δάπεδον τοῦ ὑμενώδους κοχλίου (εἰκ. 50).

“Οταν τὰ ἡχητικὰ κύματα φθάσουν τὴν μεμβρᾶν τοῦ τυμπάνου, μεταδίδουν εἰς αὐτὴν παλμικήν κίνησιν. Η κίνησις αὕτη διὰ τῶν δοταρίων τοῦ μέσου ωτὸς μεταδίδεται εἰς τὴν μεμβρᾶν τῆς ὠοειδοῦς θυρίδος. Έξ αὐτῆς περαίτέρω, διὰ τῆς ἔξωλύμφης, μεταδίδεται εἰς τὰ τοιχώματα τῶν κυστιδίων καὶ εἰς τὴν ἐνδολύμφην. Αἱ κυ-



Εἰκ. 49. Τομὴ διὰ τοῦ ωτός.

1. Τύμπανον.
2. Σφῦρα.
3. Ἀκμῶν.
4. Ἀναβολεύς ἀκουμβῶν ἐπὶ τῆς μεμβράνης τῆς ὠοειδοῦς θυρίδος.
5. Στρογγύλη θυρίς.
6. Ἑλλειπτικὸν κυστίδιον.
7. Λήκυθος.
8. Ἡμικύλιοι σωλήνες.
9. Σφαιρικὸν κυστίδιον.
10. Κοχλίας.
11. Εύσταχιανή σάλπιγξ.
12. Ἐξωκουστικὸς πόρος.



Εἰκ. 50. Τομὴ διὰ τοῦ κοχλίου.

1. Δάπεδον τοῦ ὑμενώδους κοχλίου.
2. Νεῦρον.
3. Αἰσθητικὰ κύτταρα.

μάνσεις τέλος τῆς ἐνδολύμφης ἔρεθίζουν τὰ αἰσθητικὰ κύτταρα, τῶν δποίων τὸ ἐρεθίσμα παραλαμβάνεται ὑπὸ τοῦ ἀκουστικοῦ νεύρου.

Ἡ αἰσθησις τοῦ χώρου ἔξασφαλίζεται μὲ τοὺς τρεῖς ἡμικυκλίους σωλήνας. Ἀναλόγως τῆς στάσεως τοῦ σώματος ἡ ἐνδολύμφη φθάνει ἐντὸς αὐτῶν εἰς διάφορον σημεῖον καὶ τοῦτο προκαλεῖ ἀνάλογα ἔρεθίσματα, τὰ δποία μεταβιβάζονται εἰς τὸν ἐγκέφαλον.

## 6. ΤΟ ΑΙΣΘΗΜΑ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ

“Ολοι γνωρίζομεν τὸ ἴδιάζον τοῦτο δυσάρεστον αἰσθημα. Συνήθως προκαλεῖται εἰς τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ σώματος μαζὶ μὲ ἵσχυρὰ ἔρεθίσματα θερμότητος, πιέσεως κλπ. Ἐν τούτοις τὸ αἰσθημα τοῦ πρόνου προκαλεῖται ὅχι εἰς τὰ γνωστὰ μας αἰσθητικὰ σωμάτια, ἀλλὰ εἰς ἄλλα σημεῖα τοῦ δέρματος. Εἰς τὰ σημεῖα ταῦτα ἀπολήγουν Ἰνες τῶν αἰσθητικῶν νεύρων, χωρὶς νὰ ὑπάρχουν εἰδικὰ αἰσθητικὰ κύτταρα. Δέχονται δηλαδή, ὅτι ὁ πόνος προκαλεῖται ἀπὸ τὸν ἐρεθισμὸν ἐλευθέρων ἀπολήγεων τῶν αἰσθητικῶν νεύρων. Πόνος προκαλεῖται ὅχι μόνον εἰς τὸ δέρμα, ἀλλὰ καὶ εἰς ἐσωτερικὰ ὅργανα (στόμαχος, μύες κλπ.). Χαρακτηριστικὸν διὰ τὸν πόνον, ἴδιως τὸν προκαλούμενον εἰς τὸ ἐσωτερικὸν τοῦ σώματος, εἶναι, ὅτι δὲν δυνάμεθα πάντοτε νὰ καθορίσωμεν τὸ μέρος, ἐκ τοῦ δποίου προέρχεται. Συχνὰ νομίζομεν, ὅτι ὁ πόνος προέρχεται ἀπὸ ἄλλα μέρη τοῦ σώματος, τὰ δποία εύρισκονται μακράν, εἰς τὰ ἄκρα τῶν ἀντιστοίχων νεύρων. Οὕτω συμβαίνει π.χ. ἄτομα, τῶν δποίων ἀπεκόπη ἐν ἄκρον, νὰ αἰσθάνωνται μετὰ τὴν ἐγχείρησιν πόνον καὶ νὰ νομίζουν, ὅτι οὗτος προέρχεται ἀπὸ τὸ μέρος, ὅπου εύρισκετο τὸ ἀποκοπέν ἄκρον.

‘Ο πόνος εἶναι χρησιμοτάτη αἰσθησις, διότι εἰδοποιεῖ τὸν ἀνθρώπον περὶ βλαβερῶν ἐπιδράσεων καὶ παθήσεων. Ἐκτὸς τούτου ὁ ἀνθρωπός, φοβούμενος τὸν πόνον, προφυλάσσεται ἀπὸ τοιαύτας βλαβερὰς ἐπιδράσεις.

## 7. ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ

Κάθε αἰσθησις πραγματοποιεῖται διὰ τοῦ ἐρεθισμοῦ τῶν αἰσθητικῶν κυττάρων. Ταῦτα εύρισκονται διεσκορπισμένα ἢ συγκεντρωμένα εἰς τὰ αἰσθητήρια ὅργανα. Περιεγράψαμεν τὰ αἰσθητικὰ σωμάτια τοῦ δέρματος, τοὺς γευστικοὺς κάλυκας, τὰ αἰσθητικὰ τῆς δσφρήσεως κύτταρα, τοὺς ὀφθαλμούς, τὰ ὄτα. ‘Ο πόνος τέλος προκαλεῖται ἀπὸ ἐρεθισμὸν ἐλευθέρων ἀπολήγεων τῶν αἰσθητικῶν νευρικῶν Ἰνῶν.

## 8. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1 ) Τὰ διάφορα αἰσθητικὰ σωμάτια εἶναι ἀνίσως διαμοιρασμένα εἰς τὰ διάφορα μέρη τοῦ δέρματος. Διὰ τοῦτο ὥρισμένα μέρη εἶναι περισσότερον εὐάισθητα ἀπὸ ἄλλα διὰ τὸ αὐτὸ δέρματος. Π.χ. διὰ τὴν ἀφήν εἶναι ἰδιαιτέρως εὐάισθητα τὰ ἄκρα τῶν δακτύλων. (Πῶς δοκιμάζεις τὴν ὑφὴν τοῦ χαρτιοῦ, τοῦ ὑφάσματος κλπ. ;). Παρατήρησε, ὅτι μερικαὶ γυναικεῖς συνηθίζουν νὰ δοκιμάζουν τὴν θερμοκρασίαν τοῦ ὅρματος μὲ τὸν ἀγκῶνα ἢ τοῦ σιδήρου, κατὰ τὸ σιδέρωμα, πλησιάζουσαι αὐτὸ εἰς τὰς παρειάς.

2 ) Παρατήρησε εἰς τὸν καθρέπτην ( καθαρὰ χέρια ! ) τὴν ἐπιφάνειαν τῆς γλώσσης. Εἰς ὅλην τὴν ὅνω ἐπιφάνειαν θὰ ἔδης πολλὰς μικρὰς θηλὰς, αἱ ὅποιαι χρησιμεύουν διὰ τὴν αἴσθησιν τῆς θερμότητος, πιέσεως κλπ. καὶ προσδίδουν χνοώδη ὄψιν εἰς τὴν γλῶσσαν. Εἰς τὸ ὅπισθιον τμῆμα ὑπάρχουν αἱ θηλαὶ μὲ τοὺς γευστικοὺς κάλυκας, αἱ ὅποιαι εἶναι μεγαλύτεραι καὶ σχηματίζουν ἓνα Λ ( γευστικὸν λάμδα ). Πλὴν αὐτῶν καὶ εἰς ἄλλα τμήματα τῆς γλώσσης ὑπάρχουν θηλαὶ μὲ γευστικοὺς κάλυκας.

3 ) Δοκίμασε μὲ διαφόρους οὐσίας εἰς ποια σημεῖα ἢ γλῶσσα εἶναι περισσότερον εὐάισθητος εἰς τὰ διάφορα ἐρεθίσματα.

4 ) Σχεδίασε ἀπὸ πλησίον ἓνα κύβον, ὅπως ἀκριβῶς τὸν βλέπεις μὲ τὸ ἓνα μάτι, κατόπιν μὲ τὸ ἄλλο, καὶ τέλος καὶ μὲ τὰ δύο. Σύγκρινε τὰ σχέδια.

5 ) Παρατήρησε ( μὲ καθαρὰ χέρια ) εἰς τὸν καθρέπτην τοὺς δακρυϊκοὺς πόρους. "Οταν κλαίῃ κανεὶς πολύ, πρόσεξε, ὅτι κάθε λίγο «ρουφᾶ τὴ μύτη του». Διατί ;

6 ) "Αν ἐρεθισθῇ ὁ ὀφθαλμὸς ὅχι μὲ φῶς, ἄλλὰ μὲ ἄλλο ἐρεθίσμα ( πίεσιν π. χ. ), προκαλεῖται πάλιν φωτεινὸν αἴσθημα. Δι᾽ αὐτὸ λέγουν ὅτι ἀπὸ ἓνα κτύπημα «ἀστραφαν τὰ μάτια μου». Τὸ ἀνάλογον συμβαίνει καὶ μὲ τὰ ἄλλα αἰσθητήρια.

7 ) Πρόσεξε ὅτι τὸ βράδυ ( λυκόφως ) δὲν διακρίνει κανεὶς χρώματα, ἄλλὰ μόνον λευκὸ καὶ μαῦρο.

8 ) Γνωρίζεις διατί «τρίβουμε τὰ μάτια μας» τὸ πρωί ; Διὰ νὰ πιέσωμεν τοὺς δακρυϊκοὺς ἀδένας, οἱ ὅποιοι ἀδρανοῦν κατὰ τὸν ὕπνον, ὡστε μὲ τὸ δάκρυ νὰ ὑγράνουν τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ βολθοῦ.

9 ) ”Οπισθεν τοῦ βιολβοῦ τοῦ δόφθαλμοῦ ὑπάρχει λῖπος, τὸ ὅποιον συμπληρώνει τὸν χῶρον τῆς δόφθαλμικῆς κόγχης. ”Οταν ἀδυνατίσῃ κανείς, τὸ λῖπος αὐτὸν ἔχαντλείται καὶ τότε τὰ μάτια «μπαίνουν μέσα στὶς κόγχες τους».

10 ) Κάποτε θὰ ἔτυχε νὰ παρουσιασθῇ εἰς τὸ μάτι σου «κριθαράκι». Τοῦτο σχηματίζεται, ὅταν οἱ ἀδένες τοῦ ἐπιπεφυκότος ἀπορραχθοῦν.

11 ) ‘Ο βλεννογόνος τῆς ρινὸς διατηρεῖ πάντοτε μίαν ὑγρασίαν, χωρὶς τὴν ὅποιαν δὲν εἶναι δυνατὴ ἡ ὅσφρησις. Διὰ νὰ προκληθῇ ἡ αἴσθησις μιᾶς ὀσμῆς, πρέπει τὰ λεπτότατα τεμάχια τῆς ούσιας, τὰ ὅποια ἔφθασαν εἰς τὴν ρινικὴν κοιλότητα, νὰ διαλυθοῦν.

---

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΤΟΝ


### ΤΟ ΔΕΡΜΑ

#### 1. ΣΤΟΙΒΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ. ΥΠΟΔΟΡΙΟΣ ΙΣΤΟΣ. ΠΕΡΙΤΟΝΙΑ

Τὸ δέρμα, τὸ ὅποιον καλύπτει τὸ σῶμα ἔξωτερικῶς, προστατεύει τοὺς λοιποὺς ιστοὺς ἀπὸ τὴν ἄμεσον ἐπίδρασιν τοῦ περιβάλλοντος (ψῦχος κλπ.). Ὅπο τὸ μικροσκόπιον, εἰς μίαν κάθετον τομὴν τοῦ δέρματος διακρίνονται αἱ ἔξης στοιβάδες (εἰκ. 51):

**α) Ἡ ἐπιδερμίς, ἀποτελουμένη ἀπὸ πολλὰ στρώματα κύτταρων.** Ἐκ τούτων τὰ ἔξωτερικὰ ἔχουν ύποστῆ κερατινοποίησιν, δηλ. ἀπεξηράνθησαν, καὶ τὸ πρωτόπλασμά των ἀντικατεστάθη διὰ κερατίνης. Ωστε ἡ ἐπιδερμίς περιλαμβάνει δύο μικροτέρας στοιβάδας: 1) τὴν κερατίνην στοιβάδα, ἡ ὅποια ἀποτελεῖται ἀπὸ κύτταρα κερατινοποιημένα καὶ νεκρά καὶ 2) τὴν κατωτέραν μιαλπιγιανήν τὴν στοιβάδα, ἡ ὅποια περιλαμβάνει ζῶντα καὶ ἀνανεούμενα διαρκῶς κύτταρα. Ἡ κερατίνη στοιβάς συνεχῶς ἀποπίπτει κατὰ μικρὰ λέπια, ἀντικαθίσταται δὲ ἐν τῷ μεταξὺ ἀπὸ τὰ ἀνώτερα στρώματα τῆς μαλπιγιανῆς, τὰ ὅποια βαθμηδὸν καὶ αὐτὰ κερατινοποιοῦνται.

**β) Τὸ χόριον.** Τοῦτο εύρισκεται κάτωθεν τῆς ἐπιδερμίδος καὶ εἰσδύει ἐντὸς αὐτῆς ύποδ μορφὴν θηλῶν. Εἰς κάθε θηλὴν ἀπολήγουν λεπτὰ αἵμοφόρα ἄγγεια. Τὸ χόριον περιλαμβάνει μεταξὺ τῶν κυττάρων του ἐλαστικὰ ίνδια.



Εἰκ. 51. Σχηματικὴ τομὴ διὰ τοῦ δέρματος. 1. Κερατίνη στοιβάς. – 2. Μαλπιγιανή στοιβάς. – 3. Χόριον. – 4. 5. Ιδρωτοποιὸς ἀδήν. – 6. Λιπώδης ιστός. – 7. Ἀρτηρία. – 8. Φλέψ. – 9. Τομὴ τριχός. – 10. Συμματογόνος ἀδήν. – 11. Μυϊκὴ ἵς τῆς τριχός. – 12. Ἀπτικὸν σωμάτιον

γ') Κάτωθεν καὶ τοῦ χωρίου ὑπάρχει ἐν στρῶμα ἀπὸ συνδετικὸν ἴστόν, ὁ ὄποιος δύναται νὰ περιλαμβάνῃ καὶ λῖπος. Τὸ στρῶμα τοῦτο καλεῖται **ὑποδόριος ἴστός**. Κάτωθεν τοῦ στρώματος τούτου συναντῶνται τὰ μεμβρανώδη περιβλήματα τῶν μυῶν. Ταῦτα εἶναι. ἡ **περιτονία**, ἡ ὄποια καλύπτει ὅλην τὴν μυϊκὴν μᾶζαν καὶ τὸ **περιμύϊον** ἑκάστου μυός.

## 2. ΕΖΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ. ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΧΩΝ

**Αἱ τρίχες** ἔχουν τὴν ρίζαν τῶν εἰς τὸ χόριον καὶ, διερχόμεναι τὴν ἐπιδερμίδα, φθάνουν εἰς τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ σώματος. Εἰς τὴν ρίζαν ἑκάστης τριχὸς ἀπολήγει εἰς λεῖος μῆς, ὁ ὄποιος κινεῖ αὐτήν.. Αἱ τρίχες σχηματίζονται ἀπὸ τὸ δέρμα διὰ κερατινοποίησεως καὶ δι’ αὐτό, εἰς μίαν κάθετον τομὴν τριχός, διακρίνονται ὑπὸ τὸ μικροσκόπιον στρώματα ἀντίστοιχα πρὸς τὰς στοιβάδας τοῦ δέρματος.

Εἰς τὸ δέρμα συναντῶμεν καὶ τοὺς Ἰδρῶν τοῦ ποιοὶ οὐσίας καὶ τοὺς σμηγματικοὺς ὄγκους ἀδένας. Οἱ πρῶτοι εἶναι συνεσπειρωμένοι, καὶ ἀπολήγουν εἰς τὴν ἐπιφάνειαν. Οἱ δεύτεροι γενικῶς ἀπολήγουν εἰς τὰς ρίζας τῶν τριχῶν καὶ ὀποδίδουν τὸ λιπαρὸν σμῆγμα, τὸ ὄποιον διατηρεῖ τὴν ἐλαστικότητα τοῦ δέρματος καὶ τῶν τριχῶν. "Ἄλλοι ἀδένες τοῦ δέρματος εἶναι οἱ κυψελοὶ ποιοὶ τοῦ ὥτος, καὶ οἱ γαλακτικοὶ ἀδένες τῶν θηλαστικῶν.

**Οἱ ὄνυχες** εἶναι πλάκες κερότινοι προερχόμεναι ἀπὸ τὴν ἐπιδερμίδα καὶ καλύπτουσαι τὸ ἄκρων τῆς ἀνω ἐπιφανείας τῶν δακτύλων. Εἰς ἕκαστον ὄνυχα διακρίνομεν: 1) Τὴν κορυφήν, ἡ ὄποια εἶναι ἐλευθέρα. 2) Τὸ σῶμα, τὸ ὄποιον εἶναι προσκολλημένον εἰς τὸ χόριον καὶ δι’ αὐτὸν φαίνεται ρωδόχρουν. 3) Τὴν ρίζαν, ἡ ὄποια εἶναι λευκή, καὶ ἀπὸ τὴν ὄποιαν αὐξάνεται ὁ ὄνυξ.

Τὸ δέρμα περιλαμβάνει ἀκόμη διάφορα αἰσθητικὰ σωμάτια διὰ τὴν ἀφήνη καὶ τὴν θερμότητα.

**Τὸ χρῶμα** τοῦ δέρματος καὶ τῶν τριχῶν, καθὼς καὶ τῆς ἱρίδος: τοῦ ὄφθαλμοῦ, διφείλεται εἰς μίαν χρωστικήν, ἡ ὄποια ὑπάρχει ἐντὸς: ἣ καὶ μεταξὺ τῶν κυττάρων τῆς ἐπιδερμίδος. Ἡ ἀπόχρωσις τοῦ δέρματος, ἴδιως ὅταν τοῦτο εἶναι λεπτὸν καὶ ἐπομένως μᾶλλον διαφανές, ἔξαρτᾶται ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὰς αίμωφόρα ἀγγεῖα καὶ τὸ ὑποδό-

φριον λῖπος. "Οταν ἡ ἀνωτέρω χρωστικὴ εύρισκεται εἰς τὰς τρίχας ἄφθονος, αὗται παρουσιάζουν χρῶμα μαῦρον. "Οταν εύρισκεται εἰς μικροτέραν ποσότητα, καστανόν, καὶ κατόπιν ξανθόν, καὶ ὅταν τέλος εἴναι ἔλαχίστη, αἱ τρίχες ἔχουν χρῶμα πυρρόν. Κατὰ τὸ γῆρας αἱ τρίχες τῆς κεφαλῆς λευκαίνονται, λόγω καταστροφῆς τῆς χρωστικῆς.

### 3. ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ

Τὸ δέρμα περιλαμβάνει : α ) τὴν ἐπιδερμίδα ( κερατίνη καὶ μαλπιγιανή στοιβάς )· β ) τὸ χόριον καὶ γ ) τὸν ύποδόριον ίστόν. Ἐκ τοῦ δέρματος ἐκφύονται διάφορα ἔξαρτήματα ( τρίχες καὶ ὄνυχες ). Ἐπίσης περιλαμβάνει τὸ δέρμα ἀδένας ( σιηγματογόνους, ίδρωτοποιούς, γαλακτικούς, κυψελιδοποιούς ) καὶ αἱσθητικὰ οὐλαμάτια ( ἀφή, θερμοκρασία ).

---

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΚΑΤΟΝ ΤΕΤΡΑΠΤΟΝ

### Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

#### 1. Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ. Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΙΣΥΜΒΑΙΝΟΥΣΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΑΣ

( Παραδείγματα αίμορραγίας και διατηρήσεως της θερμοκρασίας ).

Διά νὰ μελετήσωμεν τὸν ἀνθρώπινον ὄργανισμὸν, ἔξητάσαμεν ἔχωριστὰ εἰς προτυγούμενα κεφάλαια κάθε λειτουργίαν του καὶ κάθε σύστημα ὄργάνων του. Εἰς τὴν ζωὴν ὅμως τοῦ ὄργανισμοῦ τὰ διάφορα συστήματα συνεργάζονται μεταξύ των καὶ κάθε λειτουργία ἔξαρταται καὶ ἀπὸ τὰς ὑπολοίπους. Π.χ. διὰ τὴν λειτουργίαν τῆς πέψεως ἀπαιτεῖται ἡ συνεργασία: α') τοῦ νευρικοῦ συστήματος ( αὐτονόμου καὶ συμπαθητικοῦ ), β') τοῦ μυϊκοῦ συστήματος ( λείων καὶ γραμμωτῶν μυῶν ), γ') διαφόρων αἰσθητικῶν σωματίων ( γεῦσις, πεῖνα κλπ. ), δ') τῶν διαφόρων ἀδένων τοῦ πεπτικοῦ συστήματος κ.ο.κ. Ὁμοίως, ἡ δῆλη θρέψις ἔξασφαλίζεται πάλιν διὰ τῆς συνεργασίας διαφόρων συστημάτων τοῦ ὄργανισμοῦ.

"Ἄσ παρακολουθήσωμεν μίαν περίπτωσιν συνεργασίας διαφόρων συστημάτων πρὸς ἀντιμετώπισιν ἐνὸς τυχαίου γεγονότος, π.χ. μιᾶς αίμορραγίας. Λόγω τῆς αίμορραγίας, ὁ ὅγκος τοῦ αἵματος καὶ ὁ ἀριθμὸς τῶν αἵμοσφαιρίων μειοῦνται. Θ' ἀνέμενε κανεὶς ἐκ τούτου, ὅτι ἡ πίεσις τοῦ αἵματος θὰ κατατέσῃ καὶ ὅτι τὰ ἐρυθρὰ αἵμοσφαιρία δὲν θὰ ἐπαρκοῦν πλέον, διὰ νὰ δεσμεύουν ἀρκετὸν ὁξυγόνον. Τὰ βλαβερὰ ὅμως αὐτὰ ἀποτελέσματα τῆς αίμορραγίας ἀποτρέπονται διὰ τῆς συνεργασίας διαφόρων συστημάτων. Τὸ νευρικὸν σύστημα συστέλλει τὰ ἀγγεῖα καὶ ἐπομένως ἡ πίεσις τοῦ αἵματος, παρὰ τὴν ἐλάττωσιν τοῦ ὅγκου, διατηρεῖται σταθερά. Μετὰ τὴν ἐπείγουσαν αὐτὴν τακτοποίησιν, ὁ ὄργανισμὸς φροντίζει ὥστε νὰ ἐπανέλθῃ ὁ ὅγκος καὶ ἡ σύστασις τοῦ αἵματος εἰς τὸ κανονικόν. Πρὸς τοῦτο λέμφος εἰσδύει εἰς τὰ ἀγγεῖα ἀπὸ τοὺς ίστούς, ὁ δὲ ἀσθενής, αἰσθά-

νόμενος μεγάλην δίψαν, πίνει πολὺ ύδωρ. 'Ο μυελὸς τῶν ὁστῶν ἔξ  
ἄλλου παράγει μεγάλας ποσότητας ἐρυθρῶν αίμοσφαιρίων πρὸς  
ἀντικατάστασιν τῶν ἀπωλεσθέντων διὰ τῆς αἵμορραγίας.

Εἰς τὸ ἀνωτέρω παράδειγμα, συνέβη μία μεταβολὴ ( ἀπώλεια  
ἐνὸς ὅγκου αἵματος ), ή ὅποια θὰ ἡδύνατο νὰ διαταράξῃ τὴν λειτουρ-  
γίαν τοῦ ὄργανισμοῦ. Διότι, ἐὰν ἡ πίεσις ἐντὸς τῶν ἀγγείων κατέ-  
πιπτε πολὺ, θὰ διεκόπητο ἡ κίνησις τοῦ αἵματος. Ἐπίστης, ἂν ὁ  
ἀριθμὸς τῶν αἵμοσφαιρίων παρέμενε μικρός, δὲν θὰ ἐπήρκει, διὰ νὰ  
δεσμεύσῃ τὴν ἀναγκαῖαν ποσότητα ὁργάνου. 'Ο ὄργανισμὸς ἐν  
τούτοις κατέβαλεν ὠρισμένας προσπαθείας καὶ κατώρθωσε νὰ συνε-  
χίσῃ τὴν λειτουργίαν του.

Ἡ τοιαύτη προσπάθεια, τὴν ὅποιαν καταβάλλει ὁ ὄργανισμός,  
διὰ νὰ ἔξασφαλίσῃ τὴν λειτουργίαν του, παρὰ τὰς τυχὸν συμβαι-  
νούσας μεταβολάς, αἱ ὅποιαι δύνανται νὰ διαταράξουν αὐτήν,  
καλεῖται προσαρμοστικὴ λειτουργία. Μεταβολαὶ ὡς  
αἱ ἀνωτέρω δύνανται νὰ συμβοῦν ἐντὸς τοῦ ὄργανισμοῦ ( π.χ. ἐλάτ-  
τωσις τοῦ αἵματος ) ἢ εἰς τὸ περιβάλλον ( π.χ. ἀλλαγὴ κλίματος ).

Ἄναφέρομεν ἀκόμη ἐν παράδειγμα, εἰς τὸ ὅποιον ξαναφαίνεται  
ἡ προσαρμοστικὴ ίκανότης τοῦ ὄργανισμοῦ.

Εἶναι γνωστὸν ὅτι ἡ θερμοκρασία τοῦ ἀέρος μεταβάλλεται.  
Ἐπίστης ἐντὸς τοῦ σώματος διὰ τῶν καύσεων παράγεται διάφορον  
ἐκάστοτε ποσὸν θερμότητος. Παρ' ὅλα αὐτά, ἡ θερμοκρασία τοῦ  
ὑγιοῦς ἀνθρώπου διατηρεῖται σταθερά. Τοῦτο ἐπιτυγχάνεται ὡς ἔξης:

"Οταν ἡ ποσότης τῆς θερμότητος, ἐκ τῶν καύσεων καὶ ἐκ τοῦ  
περιβάλλοντος, τείνῃ νὰ αὔξησῃ τὴν θερμοκρασίαν τοῦ σώματος,  
παρατηροῦνται ὠρισμένα φαινόμενα, ἀποτρέποντα τὸ ἀποτέλεσμα  
τοῦτο. Αἱ ἀναπνευστικαὶ κινήσεις ἐπιταχύνονται, ἥτοι γίνεται  
μεγαλυτέρα ἔξατμισις ὕδατος καὶ συχνοτέρα ἐπαφὴ τοῦ αἵματος  
πρὸς τὸν ἀέρα εἰς τοὺς πνεύμονας. Τὰ ἀγγεῖα τοῦ δέρματος διαστέλ-  
λονται καὶ ἐπομένως περισσότερον αἷμα κυκλοφορεῖ εἰς αὐτὰ καὶ  
ἔρχεται εἰς ἐπαφὴν μὲ τὸν ἀέρα. ( Λέγουν τότε «κοκκίνισα ἀπὸ τὴ  
ζέστη»). "Ολα αὐτὰ προκαλοῦν μίαν ἀπώλειαν θερμότητος ἀπὸ τὸ  
αἷμα. Τέλος καὶ ὁ ἴδρως, ὁ ὅποιος ἐκκρίνεται, ἔξατμιζόμενος, ἀφαιρεῖ  
θερμότητα ἀπὸ τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ σώματος.

Ἐὰν ἀντιθέτως ἡ θερμοκρασία τοῦ περιβάλλοντος ταπεινωθῇ

σημαντικῶς, παρατηροῦνται φαινόμενα ἐμποδίζοντα τὴν πτῶσιν τῆς θερμοκρασίας τοῦ σώματος. Τὰ ὁγγεῖα τοῦ δέρματος συστέλλονται, ὡστε δλιγώτερον αἷμα νὰ ἔρχεται εἰς ἐπαφήν μὲ τὸν ψυχρὸν ἀέρα. (Λέγουν τότε «κιτρίνισα ἀπὸ τὸ κρύο»). Ἐντιθέτως, εἰς τὰς ἐσωτερικὰ ὄργανα κυκλοφορεῖ περισσότερον αἷμα καὶ οὕτω ἀφ' ἐνὸς μὲν διαφυλάσσει τὴν θερμότητά του, ἀφ' ἑτέρου δὲ αὔξανει τὰς καύσεις. Ἐπίσης διάφοροι μύες τίθενται εἰς κίνησιν μὲ σκοπόν πάλιν τὴν αὔξησιν τῶν καύσεων. Τοιοῦτοι εἶναι π.χ. οἱ μύες τῶν τριχῶν (λέγουν τότε «ἀνατρίχιασσα ἀπὸ τὸ κρύο»), καθὼς καὶ οἱ μύες οἵ κινοῦντες τὴν γνάθον («κτυποῦν τὰ δόντια μου ἀπ' τὸ κρύο»). Ἀκριβῶς διὰ ν' αὐξήσωμεν τὰς καύσεις, θέτομεν εἰς λειτουργίαν καὶ ἔκουσίως τοὺς μύες «γιὰ νὰ ζεσταθοῦμε».

Μετὰ τὰ προηγούμενα παραδείγματα κατανοοῦμεν καλύτερον, ὅτι αἱ διάφοροι μεταβολαί, εἰς τὸ σῶμα ἢ τὸ περιβάλλον προκαλοῦν, διεγείρουν, ὡς λέγομεν, τὴν προσαρμοστικὴν λειτουργίαν τοῦ ὄργανισμοῦ. Ἡ λειτουργία αὕτη τελείται ὑφ' ὅλου τοῦ ὄργανισμοῦ, δηλ. διάφορα συστήματα ἐργάζονται πρὸς ἀντιμετώπισιν ἀπὸ κοινοῦ τῶν ἀποτελεσμάτων κάθε μεταβολῆς.

Ἡ προσαρμοστικὴ λειτουργία ἐπιτυγχάνει τὸν σκοπόν της, ἐφ' ὅσον αἱ συμβαίνουσαι μεταβολαὶ δὲν ὑπερβοῦν ὥρισμένα ὅρια.

## 2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΧΝΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. ΣΚΛΗΡΑΓΩΓΙΑ

(Παράδειγμα ζωῆς εἰς ὑψηλὰ μέρη).

Ἡ ἀνάγκη τῆς προσαρμογῆς ὑποχρεώνει διάφορα συστήματα νὰ ἐργάζωνται ζωηρότερον καὶ ἐντατικότερον. Ἡ ὑποθέσωμεν π.χ., ὅτι εἰς ἀνθρώπινος ὄργανισμὸς πρέπει νὰ ζήσῃ εἰς μέγα ὕψος ἐπὶ τινος ὑψηλοῦ ὅρους. 'Ο ἀτμοσφαιρικὸς ἀήρ εἰς τὸ ὕψος τοῦτο εἴναι ἀραιός, ἐπομένως, διὰ νὰ δεσμεύῃ ὁ ὄργανισμὸς τὸ ἀναγκαῖον ὀξυγόνον, πρέπει νὰ εἰσάγῃ εἰς τοὺς πνεύμονας μεγαλύτερον ὅγκον ἀέρος. Πρὸς τοῦτο ἡ ἀναπνοὴ γίνεται βαθυτέρα, οἱ μύες τοῦ θώρακος ἐργάζονται περισσότερον, ἡ θωρακικὴ κοιλότης εὐρύνεται. Ἔξ ἄλλου παράγονται περισσότερα ἐρυθρὰ αἷμοσφαιρία. Ἐὰν ἀργότερον ὁ ἵδιος ὄργανισμὸς ἐπιστρέψῃ εἰς τὴν πεδιάδα, ὁ ὀριθμὸς τῶν αἷμοσφαιρίων κατέρχεται καὶ πάλιν, διπλασιάζονται οἱ μύες τοῦ

ζωή είς τὸ ὑψηλὸν ὅρος ἀφήνει τὰ ἵχνη της. Ἡ ἀναπτυνοὴ παραμένει βαθεῖα, ὁ θώραξ καλύτερον ἀνεπτυγμένος, τὸ μυϊκὸν σύστημα, τὸ κυκλοφοριακὸν καὶ τὰ αἵμοποιητικὰ ὅργανα ἔχουν συνηθίσει νὰ ἐργάζωνται καλύτερον. Ἀποτέλεσμα τῆς ἔξασκήσεως αὐτῆς εἶναι, ὅτι τὰ διάφορα συστήματα ἐνδυναμώνονται καὶ ὅλος ὁ ὄργανισμὸς τονώνεται καὶ ἀποκτῷ μεγαλυτέραν ἀντοχήν.

Ἐὰν λοιπὸν ὑποβάλλωμεν τὸν ὄργανισμὸν εἰς ἐντατικὴν ἐργασίαν καὶ τὸν ἀφήνωμεν ν' ἀντιμετωπίζῃ μὲ τὰς ἴδιας του δυνάμεις τὰς μεταβολὰς τοῦ περιβάλλοντος, διεγείρεται ἡ προσαρμοστικὴ λειτουργία καὶ αὔξανεται ἡ ἀντοχὴ καὶ ἡ ζωηρότης του. Τοιαύτη εἶναι ἡ ἐπίδρασις π.χ. τῆς ἀγροτικῆς καὶ τῆς στρατιωτικῆς ζωῆς.

Είναι ὅμως φανερόν, ὅτι ἡ σκληραγωγία δὲν δύναται νὰ ὑπερβαίνῃ ὥρισμένα ὅρια. Τὰ ὅρια αὐτὰ εἶναι διάφορα δι' ἕκαστον ὄργανισμόν. Είναι γνωστόν, ὅτι ἄλλοι ἀντέχουν εἰς ἐντατικὴν προσπάθειαν ἡ εἰς τὰς ἀσθενείας, ἐνῶ ἄλλοι κουράζονται ἡ ἀσθενοῦν εὐκόλως. Ἰδιαιτέρα μάλιστα προσοχὴ ἀπαιτεῖται κατὰ τὴν νεαράν ἡλικίαν, κατὰ τὴν δύποιαν ἔξακολουθεῖ ἡ ἀνάπτυξις τοῦ σώματος καὶ ὁ ὄργανισμὸς εἶναι εὐπαθής.

### 3. ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ

Εἰς τὴν κατάστασιν τοῦ σώματος καὶ τοῦ περιβάλλοντος ἐπέρχονται ἔνιοτε μεταβολαί, αἱ δύποιαι θὰ ἡδύνωντο νὰ δυσκολεύσουν τὴν δμαλὴν λειτουργίαν τοῦ ὄργανισμοῦ. Ἀλλὰ τὰ διάφορα ὄργανικὰ συστήματα ἔχουν τὴν ίκανότητα νὰ συνεργάζωνται καὶ διὰ κοινῆς προσπαθείας ν' ἀντιμετωπίζουν τὰς νέας συνθήκας ζωῆς. Τοῦτο ἀποτελεῖ τὴν προσαρμοστικὴν λειτουργίαν τοῦ ὄργανισμοῦ. "Οταν τὰ ὄργανικὰ συστήματα ὑποβάλλωνται συχνά εἰς τὴν προσπάθειαν τῆς προσαρμογῆς εἰς δυσκολωτέρους δρους, τὰ συστήματα ταῦτα ἔξασκοῦνται καὶ ἐνδυναμώνονται καὶ ὁ ὄργανισμὸς ἀποκτῷ μεγαλυτέραν ἀντοχὴν καὶ ζωηρότητα ( σκληραγωγία ).

## ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

### ΓΕΝΕΣΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

#### 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΖΩΑ

Εἰς τὴν Φυτολογίαν ἐμάθομεν, ὅτι γενικῶς, διὰ νὰ σχηματισθῆνα νέον φυτόν, πρέπει νὰ ἔνωθοῦν δύο διάφορα γεννητικὰ κύτταρα.. Τὸ ἐν ἐξ αὐτῶν, καλούμενον σπερματοζῷον, εύρισκεται εἰς τὸν κόκκον τῆς γύρεως, καὶ τὸ ἄλλο, καλούμενον ωάριον, εύρισκεται. ἐντὸς τῆς ωοθήκης. “Οταν ὁ κόκκος τῆς γύρεως πέσῃ ἐπὶ τοῦ ὑπέρου, τὰ δύο αὐτὰ κύτταρα, συναντώμενα, ἔνώνονται (γ ο ν ι μ ο π ο ι η-σις), καὶ τὸ γονιμοποιούμενον πλέον ωάριον ἔχει τὴν ίκανότητα νὰ τμηθῇ καὶ νὰ σχηματίσῃ δύο κύτταρα, τὰ ὅποια δικοίως τέμνονται καὶ δίδουν τέσσαρα, δόκτῳ κ.ο.κ. Τὰ δημιουργούμενα τοιουτοτρόπως κύτταρα σχηματίζουν τὸ ἐμβρύον τοῦ νέου φυτοῦ. Τὸ ἐμβρυον τοῦτο μένει ἐντὸς τοῦ σπόρου ἐν ἡρεμίᾳ, ἐπὶ μῆνας ἥ καὶ ἔτη.. Τέλος, ὅταν εύρεθῇ εἰς καταλλήλους συνθήκας, αὔξανεται, σχηματίζει ρίζας καὶ ἀναπτύσσεται εἰς τὸ νέον φυτόν (β λ ἀ σ τ η σ ις).

Ἀναλόγως καὶ εἰς τὰ ζῷα, μετὰ τὴν συνένωσιν τῶν δύο γεννητικῶν κυττάρων, σχηματίζεται πάλιν τὸ ἐμβρύον. Τοῦτο ἀναπτύσσεται εἰς ἄλλα μὲν ζῷα ἐκτὸς τοῦ σώματος τῆς μητρὸς (ώοτόκα), εἰς ἄλλα δὲ ἐντὸς αὐτοῦ (ζωοτόκα).

#### 2. ΕΜΒΡΥΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ


Εἰς τὰ Θηλαστικά, τὰ ὅποια, ὡς γνωστόν, εἶναι ζωοτόκα, ή ἀνάπτυξις τοῦ ἐμβρύου τελεῖται ἐντὸς ἐνὸς μυώδους, ἀσκοειδοῦς, ὀργάνου, τῆς μήτρας. Αὗτη εύρισκεται εἰς τὴν κοιλότητα τῆς λεκάνης καὶ συγκοινωνεῖ πρὸς τὰς ωοθήκας. Τὸ ἐμβρυον συγκρατεῖται ὑπὸ τῶν λαχνῶν τοῦ βλεννογόνου τῆς μητρας, οἵ ὅποιαι ἀποτελοῦν τὸν πλακοῦντα. Αἱ λάχναι αῦται εἶναι πλούσιαι εἰς αἷμαφόρα ἀγγεῖα, τὰ ὅποια προσάγουν θρεπτικὰς ούσιας ἀπὸ τὴν

κυκλοφορίαν τῆς μητρὸς πρὸς διατροφὴν τοῦ ἐμβρύου. Διὰ νὰ προστατεύεται καὶ τὸ ἐμβρύον καὶ ἡ μήτηρ ἀπὸ ἀποτόμους μετατοπίσεις τοῦ ἐμβρύου, τοῦτο εὑρίσκεται ἐντὸς σάκκου πλήρους ὑγροῦ. "Οταν ἡ ἀνάπτυξις τοῦ ἐμβρύου συμπληρωθῇ, τὸ ἐμβρύον ἔξερχεται ἀπὸ τὸ μητρικὸν σῶμα (τοκετὸς) καὶ ἀρχίζει τὴν ἀνεξάρτητον ζωὴν του.

Εἰς τὸν ἄνθρωπον, ὁ ὄποιος ἀνήκει ἐπίσης εἰς τὰ Θηλαστικά, ἡ ἐμβρυϊκὴ ἀνάπτυξις, ἀπὸ τῆς στιγμῆς κατὰ τὴν ὄποιαν ἀρχίζει τὸ ὠάριον νὰ τέμνεται μέχρι τοῦ τοκετοῦ, διαρκεῖ περίπου 280 ἡμέρας. "Οσον προχωρεῖ ἡ ἀνάπτυξις, τόσον τὸ ἐμβρύον τελειοποιεῖται καὶ τέλος φθάνει εἰς τὴν μορφὴν τοῦ ἄνθρωπίνου νεογνοῦ.

### 3. ΑΙ ΗΛΙΚΙΑΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Τὸ νεογνὸν ὄν τοῦ ἄνθρωπου, τὸ ὄποιον ἔχει μέγεθος περίπου 50 ἔκ., μόλις ἔξελθη τοῦ μητρικοῦ σώματος, ἀρχίζει ν' ἀναπνέῃ καὶ νὰ κραυγάζῃ. Κατὰ τὸ πρῶτον ἔτος τῆς ήλικίας του τὸ βρέφος τρέφεται διὰ τοῦ θηλασμοῦ, αὔξανει δὲ περίπου κατὰ 25 ἔκ. Κατὰ τὸ τέλος τοῦ πρώτου ἔτους ἀναφαίνονται οἱ πρῶτοι τομεῖς ὀδόντες. Τὸ 2ον καὶ 3ον ἔτος τῆς ζωῆς ἀποτελοῦν τὴν νηπιακὴν ἥλικα-




Εἰκ. 52. Αἱ πηγαὶ τοῦ κρανίου : α) νεογνοῦ, β) εἰς ήλικίαν 9 μηνῶν, γ) εἰς ήλικίαν ἑνὸς ἔτους, δ) εἰς ήλικίαν τριῶν ἔτων.

κίαν, κατὰ τὴν ὄποιαν δὲ ἄνθρωπος ἀρχίζει νὰ βαδίζῃ, νὰ κάθηται καὶ νὰ ὅμιλη. Κατὰ τὸ 2ον ἔτος παρατηρεῖται αὔξησις κατὰ 10 περίπου ἔκ., συμπληροῦται δὲ καὶ ἡ πρώτη ὀδοντοφυΐα ἐξ 20 νεογιλῶν ὀδόντων. Κατὰ τὴν νηπιακὴν ήλικίαν τὰ ὀστᾶ τοῦ κρανίου ἀφήνουν μεταξύ των μεμβρανώδη διάκενα, καλούμενα πηγάσ, διὰ μὴ ἐμποδίζεται ἡ αὔξησις τοῦ ἐγκεφάλου (εἰκ. 52). Γενικῶς δὲ τὰ ὀστᾶ τοῦ νηπίου είναι πολὺ εὔπλαστα.

Τὴν νηπιακὴν διαδέχεται ἡ παιδικὴ ἡλικία. Ἐνῶ γενικῶς ἡ ἐτησία αὐξησις τοῦ σώματος φθάνει τὰ 5 ἔτ., ὑπάρχουν δύο περίοδοι τῆς παιδικῆς ἡλικίας, κατὰ τὰς ὅποιας ἡ ἀνάπτυξις τελεῖται γοργότερον. Ἡ πρώτη τοιαύτη περίοδος συμπίπτει μὲ τὸ διάστημα τῶν 7ov ἔτος, ἡ δὲ δευτέρα μὲ τὸ τέλος τῆς παιδικῆς ἡλικίας. Κατὰ τὴν παιδικὴν ἡλικίαν ἀποπίπτουν βαθμιαίως οἱ νεογιλοί δόδοντες, ἔκφυονται δὲ οἱ μόνιμοι, πλήν τῶν τρίτων γομφίων.

Ἐκ τῶν ἐνδοκρινῶν ἀδένων λειτουργοῦν ἐντατικώτερον ὁ θύμος, ἡ ὑποφυσις καὶ ἡ ἐπίφυσις. Ἐκ τούτων ἡ ἐπίφυσις μετὰ τὸ 10ov ἔτος καταστρέφεται.

Ἄπό τοῦ 12ou μέχρι τοῦ 14ou ἔτους τὰ θήλεα, δύο δὲ περίπου ἔτη ἀργότερον τὰ ἄρρενα εἰσέρχονται εἰς τὴν ἐφικήν ἡλικίαν. Κατ' αὐτὴν τὰ θήλεα δὲν αὐξάνουν σχεδὸν καθόλου, ἐνῶ τὰ ἄρρενα ἔχακολουθοῦν νὰ αὔξανουν μέχρι τοῦ 21ou ἔτους. Ὁ σκελετὸς καὶ τὸ μυϊκὸν σύστημα ἴσχυροποιούνται. Ἐνῶ ὑποχωρεῖ ἡ λειτουργία τοῦ θύμου καὶ τῆς ἐπιφύσεως, ἐντείνεται ἡ λειτουργία ἀλλων ἐνδοκρινῶν ἀδένων, ὡς π. χ. τοῦ θυρεοειδούς. Γενικῶς ἡ ἐφηβικὴ ἡλικία είναι τὸ στάδιον, κατὰ τὸ διάστημα ὃ ἀνθρωπος τείνει νὰ φθάσῃ εἰς τὴν κατάστασιν τοῦ ὥριμου ἀνδρὸς ἢ τῆς ὥριμου γυναικός.



Εἰκ. 53. Ἡ μεταβολὴ τῶν ἀναλογιῶν τοῦ σώματος. α) Ἔμβρυον. β) Παιδίον. γ) Ὦριμος ἀνήρ. Εντείνεται ἡ λειτουργία ἀλλων ἐνδοκρινῶν ἀδένων, ὡς π. χ. τοῦ θυρεοειδούς. Γενικῶς ἡ ἐφηβικὴ ἡλικία είναι τὸ στάδιον, κατὰ τὸ διάστημα ὃ ἀνθρωπος τείνει νὰ φθάσῃ εἰς τὴν κατάστασιν τοῦ ὥριμου ἀνδρὸς ἢ τῆς ὥριμου γυναικός.

Κατὰ τὴν ὥρα μονοντὴν ἡλικίαν, ἡ ὅποια διαδέχεται τὴν ἐφηβικήν, δὲν γίνεται πλέον αὐξησις καθ' ὑψος τοῦ σώματος, τὸ ὅποιον ἀποκτᾷ τὴν ὁριστικήν του ἀνάπτυξιν καὶ τὰς ὁριστικάς του ἀναλογίας (εἰκ. 53). Τέλος, τὴν ὥριμον ἡλικίαν ἀκολουθεῖ τὸ γῆρας, τὸ

δύοιον δύναται νὰ παραταθῇ ἐπὶ πολλὰ ἔτη. Κατ' αὐτὸν διάφορα ὅργανα ἀρχίζουν νὰ ἀτροφοῦν καὶ γενικῶς ὁ ὅργανισμὸς ἔξασθενε...

#### 4. ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ

Ο ἄνθρωπος γεννᾶται ἔπειτα ἀπὸ κύνησιν 280 ἡμερῶν. Κατὰ τὴν διάρκειαν αὐτῆς τρέφεται δι' ούσιῶν, τὰς δόποιας παραλαμβάνει ἀπὸ τὸ κυκλοφορικὸν σύστημα τῆς μητρός. Τὸ ίον ἔτος ἀπὸ τῆς γεννήσεως ἀνήκει εἰς τὴν βρεφικὴν ἡλικίαν, τὸ 2ον καὶ 3ον εἰς τὴν νηπιακήν. <sup>3</sup> Ακολουθεῖ ἡ παιδικὴ ἡλικία μέχρι τοῦ 12ου – 14ου ἔτους, ὅτε ἀρχίζει ἡ ἐφηβική, τὴν δόποιαν πάλιν διαδέχεται ἡ ὥριμος ἡλικία. <sup>4</sup> Απὸ τῆς γεννήσεως, ἡ αὔξησις τοῦ σώματος ἔξακολουθεῖ μέχρι τῆς ἐφηβικῆς ἡλικίας εἰς τὰ θήλεα, εἰς τὰ ἄρρενα δὲ συνεχίζεται καὶ μέχρι τῆς ὥριμου.

#### 5. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1) Κάμνε κάθε χρόνο τὴν ἴδιαν ἡμέραν (π. χ. τῶν γενεθλίων), μίαν ἀκριβῆ μέτρησιν τοῦ ἀναστήματος καὶ τοῦ βάρους σου καὶ σημείωνε τί εύρισκεις. Κάμνε τὸ ὕδιο καὶ εἰς τοὺς ἀδελφούς σου.

2) Λόγω ὡρισμένων μικρῶν διαφορῶν μεταξύ τοῦ δεξιοῦ καὶ τοῦ ἀριστεροῦ μέρους τοῦ σώματος, εἶναι ἀδύνατον νὰ βαδίσῃ κανεὶς μὲ κλειστούς ὀφθαλμούς κατ' εὐθείαν γραμμήν. Δοκίμασέ το εἰς μίαν διμαλήν ἔκτασιν, προσπαθῶν νὰ φέάσῃς, μὲ κλειστούς ὀφθαλμούς, κατ' εὐθείαν ἀπὸ ἐν σημείον εἰς ἄλλο.

3) Καὶ τὸ προσωπικὸν παρουσιάζει γενικῶς μίαν μικρὰν ἀσυμμετρίαν εἰς τὰς διαστάσεις καὶ τὴν «μιμικήν» τῶν δύο τμημάτων του. Παρατήρησε εἰς μίαν φωτογραφίαν τὸ ἀριστερὸν μέρος ἐνὸς προσώπου, καλύπτων τὸ δεξιόν, καὶ ἀντιστρόφως.

4) Μέτρησε καὶ σύγκρινε τὰς ἔξῆς διαδοχικὰς ἀποστάσεις: Κορυφὴ κρανίου—ἄκρον ρινὸς—άρχὴ στέρνου—τέλος τοῦ στέρνου—ὅμοιαλὸς—ἡβικὴ σύμφυσις—πέλμα.

## ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ

### ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

#### 1. ΦΥΣΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Κάθε ανθρωπος ζῇ εἰς ἓνα τόπον τῆς γῆς, ὁ ὅποιος παρουσιάζει ἄγρισμένα γεωγραφικὰ γνωρίσματα, ὡρισμένον κλῖμα καὶ ὡρισμένον φυτικὸν καὶ ζωικὸν κόσμον. Αὐτὰ δὲ ἀποτελοῦν τὸ φυσικὸν περιβάλλον. Εἶτα δὲ ἀλλού, κάθε ανθρωπος εἴναι καὶ μέλος μιᾶς κοινωνίας, ἣ ὅποια ἔχει ὡρισμένον πολιτισμὸν καὶ ἣ ὅποια ἀποτελεῖ τὸ κοινωνικὸν περιβάλλον.

Μὲ τὸ φυσικὸν περιβάλλον ὁ ὄργανισμὸς ἔρχεται εἰς ἐπικοινωνίαν διὰ τῆς ἐπιφανείας τοῦ σώματος, τόσον τῆς ἐξωτερικῆς ὅσον καὶ τῆς ἐσωτερικῆς. Καὶ ἡ μὲν ἐξωτερικὴ ἐπιφάνεια ἀποτελεῖται ἀπὸ τὸ δέρμα, ἡ δὲ ἐσωτερικὴ ἀπὸ τοὺς βλεννογόνους, οἱ ὅποιοι ὑπενδύουν τὰς κοιλότητας τοῦ σώματος καὶ τοῦ πεπτικοῦ καὶ ἀναπνευστικοῦ σωλῆνος. Ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὸ δέρμα, οἱ βλεννογόνοι στεροῦνται κερατίνης στοιβάδος καὶ ἐπομένως δύνανται οὐσίαι ἐκ τοῦ περιβάλλοντος νὰ διέλθουν δι' αὐτῶν. Τέλος, ὁ ὄργανισμὸς ἐπικοινωνεῖ μὲ τὸ περιβάλλον καὶ διὰ τῶν αἰσθητηρίων του ὄργάνων.

Δυνάμεθα νὰ συνοψίσωμεν τὰς σχέσεις, εἰς τὰς ὅποιας ἔρχεται διὰ τῶν ἀνωτέρω ἐπιφανειῶν ὁ ὄργανισμὸς πρὸς τὸ περιβάλλον, ὡς ἔξης:

α) Μεταξὺ ὄργανισμοῦ καὶ περιβάλλοντος γίνεται ἀνταλλαγὴ διαφόρων οὐσιῶν.

β') Τὸ σῶμα ὑφίσταται διὰ τῆς ἐπιφανείας του τὴν ἐπίδρασιν τῶν φυσικῶν ὅρων τοῦ περιβάλλοντος (θερμοκρασία, φῶς ἥλιπτ.).

γ') Ο ὄργανισμὸς ἔρχεται εἰς βιολογικὰς σχέσεις μὲ τὸν ἄλλον

δργανικὸν κόσμον. Ἰδίως διάφοροι μικροοργανισμοὶ ἀσκοῦν σπουδαι-  
στάτην ἐπίδρασιν ἐπ’ αὐτοῦ.

δ') Διὰ τῶν αἰσθητηρίων καὶ τοῦ νευρικοῦ συστήματος δέχεται  
ό δργανισμὸς διαρκῶς ἐκ τοῦ ἔξωτερικοῦ κόσμου ἐρεθίσματα  
καὶ δημιουργεῖ ἐν τυπώσεις.

## 2. ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΣ ΟΥΣΙΩΝ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ἐκ τῆς ἀτμοσφαίρας ὁ δργανισμὸς προσλαμβάνει τὸ ὄξυ-  
γόνον. Τοῦτο εἰς τὸ κατώτερον λεπτὸν στρῶμα τῆς ἀτμοσφαίρας,  
ἐντὸς τοῦ ὅποιου ζῇ ὁ ἀνθρωπός, ύπάρχει ὑπὸ σταθερὰν ἀναλογίαν  
(21 ο). Διὰ τοπικούς λόγους (ἔλη, πόλεις, σπήλαια κλπ.), εἶναι δυ-  
νατὸν ὁ ἀτμοσφαιρικὸς ἀτμὸς νὰ περιέχῃ διαφόρους ἐπιβλαβεῖς προσ-  
μείξεις εἰς μίαν μικρὰν περιοχὴν (σκόνη, διάφορα ἀέρια κλπ.).

Κατὰ τὰς λειτουργίας τῆς θρεπτικὰς ούσιας. Ἡ σύστασις τοῦ ὄργανου καὶ τὸ  
εἶδος τῶν τροφῶν ἔχεται ἐν μέρει ἀπὸ τὸ φυσικὸν περιβάλλον,  
διότι οἱ διάφοροι πληθυσμοὶ χρησιμοποιοῦν κυρίως τρόφιμα παραγό-  
μενα εἰς τὸν τόπον των. Τοῦτο ἴσχύει περισσότερον διὰ τοὺς ἀγρο-  
τικούς πληθυσμούς, οἱ ὅποιοι εἶναι οἱ ἴδιοι παραγωγοὶ καὶ δι’ ἀπο-  
μονωμένους πληθυσμούς. Διὰ τοῦτο συμβαίνει εἰς τινας τόπους ἡ  
διατροφὴ τοῦ μεγαλυτέρου μέρους τοῦ πληθυσμοῦ νὰ εἶναι μονομε-  
ρής. Π. χ. εἰς τὴν Ἀπωλεῖαν ἡ κυρία τροφὴ μεγάλων μαζῶν  
εἶναι τὸ ρύζι, οἱ δὲ Ἐσκιμῶι τρέφονται σχεδὸν ἀπὸ ψάρια καὶ κυ-  
νῆγιον.

Εἶναι φανερόν, ὅτι διὰ τοῦ τρόπου τούτου τὸ ἀμεσον φυσικὸν  
περιβάλλον ἐπίδρᾷ ἐπὶ τῆς ἀναπτύξεως καὶ τῆς ὑγείας τοῦ ἀνθρώπου.

Ἐν τούτοις, ἡ ἐπίδρασις αὗτη τοῦ περιβάλλοντος ἔχει ἐλαττωθῆ<sup>τη</sup>  
διὰ τοῦ πολιτισμοῦ. Διότι, χάρις εἰς τὸ ἐμπόριον, τὰ προϊόντα τῶν  
διαφόρων χωρῶν κυκλοφοροῦν εἰς ὅλον τὸν κόσμον, αἱ δὲ συνήθειαι  
τῶν ἀνθρώπων τείνουν νὰ ἔξιμοιωθοῦν.

## 3. ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

**Ἡ θερμοκρασία** μεταβάλλεται εἰς ἓνα τόπον ἀναλόγως τῆς ἐπο-  
χῆς, τῆς ὥρας τοῦ ἡμερονυκτίου, τῆς νεφώσεως κλπ. Ἐπίσης ἀπὸ

τόπου εις τόπον διαφέρει ή θερμοκρασία ἀναλόγως τῆς γεωγραφικῆς θέσεως.

Γνωρίζομεν ἡδη πῶς ὁ ὑγιὴς ὄργανισμὸς κατορθώνει, παρ’ ὅλα αὐτά, νὰ διατηρῇ σταθερὰν τὴν θερμοκρασίαν του. Ἐὰν ἐν τούτοις ἡ θερμοκρασία τοῦ περιβάλλοντος ἔξελθῃ ἀπὸ τὰ ὄρια τῆς ἀντοχῆς του, ἡ λειτουργία τοῦ ὄργανισμοῦ διαταράσσεται καὶ παρουσιάζονται διάφοροι παθήσεις (θερμοπληξία).

**Αἱ ἡλιακαὶ ἀκτῖνες** ὡφελοῦν τὸν ὄργανισμόν. Διὰ τοῦτο μάλιστα καὶ χρησιμοποιοῦνται πρὸς ἐνδυνάμωσίν του καὶ πρὸς θεραπείαν ὥρισμένων παθήσεων, ἵδια τῶν ὀστῶν καὶ τοῦ δέρματος (ἡλιοθεραπεία). Εἰς τὴν ἐπίδρασιν τῶν ἀκτίνων τούτων ἀπαντᾷ ὁ ὄργανισμὸς διὰ τοῦ σχηματισμοῦ χρωστικῆς εἰς τὸ δέρμα. Ἡ χρωστικὴ αὔτη δυσκόλως σχηματίζεται εἰς τὰ ξανθὰ καὶ ἀνοικτόχρωμα ἄτομα. Διὰ τοῦτο αἱ ἡλιακαὶ ἀκτῖνες προκαλοῦν εἰς τὸ ἀπροστάτευτον δέρμα τῶν ἀτόμων τούτων εὐκόλως ἐγκαύματα (φυσαλίδες, ξεφλούδισμα).

Εἰς τοὺς διαφόρους τόπους τῆς γῆς ἡ ἡλιοφάνεια δὲν εἶναι ἡ αὐτή, καὶ τοῦτο ἔχει ἐπίσης σημασίαν διὰ τὸν ὄργανισμόν. Εἰς τὴν Ἀγγλίαν π.χ., ὅπου ἐλάχισται ἡμέραι ἡλιοφανείας ὑπάρχουν, εἶναι συχνὴ ἡ ραχίτις (ἀγγλικὴ νόσος).

Ἐκ τῶν ὅλων φυσικῶν ὅρων τοῦ περιβάλλοντος μεγάλην ἐπίδρασιν ἔπι τοῦ ὄργανισμοῦ ἀσκεῖ ἡ ἀτμοσφαίρικὴ πίεσις. Αὕτη, ὅσον ἀνερχόμεθα καθ’ ὑψοῦ, ἐλαττοῦται, λόγῳ τῆς ἀραιώσεως τοῦ ἀτμοσφαιρικοῦ ἀέρος. Ἔνω εἰς μικρὰς μεταβολὰς τῆς πιέσεως ὁ ὄργανισμὸς προσταρμόζεται, αἱ μεγάλαι μεταβολαὶ προκαλοῦν εἰς αὐτὸν σοβαράς βλάβες. Διάφοροι τοιαῦται παθήσεις παρατηροῦνται εἰς τοὺς ὀρειβάτας καὶ τοὺς ἀεροπόρους, οἵ δποῖοι ἀνέρχονται εἰς μεγάλα ὑψη, καθὼς καὶ εἰς τοὺς δύτας, οἵ δποῖοι ὑφίστανται ἐντὸς τοῦ ὕδατος ἴσχυροτάτας πιέσεις.

#### 4. ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Διάφοροι μικροοργανισμοὶ ἐπιζητοῦν νὰ ἐγκατασταθοῦν εἰς τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος καὶ νὰ τρέφωνται ἀπὸ τοὺς ιστούς του. Τοιοῦτοι ὄργανισμοὶ εἶναι διάφορα ἐντομα καὶ ἀκάρεα.

(ψώρα κλπ.). "Άλλα ἔντομα ἀπομυζοῦν αἷμα καὶ μάλιστα δύνανται διὰ τοῦ τρόπου τούτου νὰ μεταδώσουν καὶ διαφόρους ἀσθενείας (κώνωπες κλπ.).

Μερικοὶ όργανισμοὶ ἐγκαθίστανται ἐντὸς τοῦ πεπτικοῦ σωλῆνος τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἀπορροφοῦν θρεπτικάς οὐσίας. Τοιαῦτα παράσιτα εἰναι ἡ ταινία, οἱ ἀμοιβάδες κλπ. Τέλος, ἄλλοι μικροοργανισμοὶ εἰσδύουν ἐντὸς τῶν ίστῶν τοῦ σώματος, ἀναπτύσσονται ἐκεῖ καὶ προκαλοῦν τάς μολυσματικάς ἀσθενείας. Οἱ όργανισμοὶ οὗτοι ὑπάγονται εἰς τὰ βακτήρια ἢ τὰ πρωτόζωα ἢ τοὺς μύκητας, ἐνίοτε ὅμως εἰναι καὶ ἀνώτερα ζῶα, ὡς ὁ ἔχινοκοκκος.

Κατὰ τῶν ἀνωτέρω παθογόνων μικροοργανισμῶν ἀμύνεται ὁ ἀνθρώπινος όργανισμὸς διὰ τῶν λευκῶν αἵμοσφαιρίων, διὰ διαφόρων οὐσιῶν (ἀντιοξεία), τὰς ὅποιας πρὸς τοῦτο παράγει, καὶ δι' ἄλλων μέσων. Ἡ ἔξετασις τοῦ τρόπου, μὲ τὸν ὅποιον δύναται νὰ ἔνισχυθῇ ὁ όργανισμὸς εἰς τὸν ἀγῶνα του τοῦτον, ἀποτελεῖ θέμα τῆς Ἱατρικῆς.

## 5. ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ

Τὸ φυσικὸν περιβάλλον ἐπιδρᾷ ἐπὶ τοῦ όργανισμοῦ τοῦ ἀνθρώπου κατὰ τοὺς ἔξης τρόπους: α) διὰ τῆς ἀνταλλαγῆς ούσιῶν, ἡ ὅποια γίνεται μεταξύ τούτου καὶ τοῦ όργανισμοῦ (ἀήρ, τροφαί )· β) διὰ τῶν φυσικῶν συνθηκῶν τοῦ περιβάλλοντος (ἡλιακαὶ ἀκτῖνες, πίεσης κλπ.)· γ) διὰ τῶν όργανισμῶν, οἱ ὅποιοι ἔρχονται εἰς σχέσεις μὲ τὸ ἀνθρώπινον σῶμα (παράσιτα, μικρόβια).

## ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ

### ΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑΙ ΦΥΛΑΙ

#### 1. ΠΟΙΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΙΜΕΥΟΥΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΡΙΣΙΝ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΦΥΛΩΝ. ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ


Έκ πείρας διακρίνομεν τούς ἀνθρώπους εἰς φυλάς, στηριζόμενοι εἰς διάφορα σωματικά γνωρίσματα, τὰ δόποια παρουσιάζουν οὗτοι. Είναι ὅμως δυνατὸν νὰ παρατηρήσωμεν σημαντικὰς διαφορὰς μεταξὺ ὥρισμένων ἀτόμων καὶ ἐν τούτοις νὰ μὴ τὰς λάβωμεν ὑπ’ ὄψιν, διὰ νὰ κατατάξωμεν τὰ ἄτομα εἰς διαφόρους φυλάς. Τοιαῦται διαφοραὶ εἰναι ὅσαι ὁφείλονται εἰς τὸ φῦλον καὶ τὴν ἡλικίαν (σύγκρισις ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν, νεαρῶν καὶ ἐνηλίκων ἀτόμων τῆς αὐτῆς φυλῆς). Ἐπίσης δὲν λαμβάνονται ὑπ’ ὄψιν ὅσα σωματικά γνωρίσματα ἔδημιουργήθησαν ἀπὸ τὸν τρόπον τῆς ζωῆς (ἐπάγγελμα κλπ.) ἢ ἀπὸ τυχαῖα γεγονότα (ἀσθένεια κλπ.).

Διαφοραὶ ως αἱ ἀνωτέρω ὑπάρχουν ἐντὸς κάθε φυλῆς. Διὰ νὰ διακρίνωμεν ἐπομένως τὰς φυλάς, πρέπει νὰ στηριχθῶμεν εἰς ἄλλα γνωρίσματα, τὰ δόποια νὰ παρουσιάζωνται ὁμοιομόρφως ἐντὸς ἑκάστης φυλῆς. Ἀκόμη πρέπει τὰ γνωρίσματα αὐτὰ νὰ εἰναι κληρονομικά. Βεβαίως τὰ γνωρίσματα αὐτὰ δὲν θὰ παρουσιάζωνται κατὰ τὸν αὐτὸν ἀκριβῶς βαθμὸν ἀνεπτυγμένα εἰς ὅλα τὰ ἄτομα, αἱ παρατηρούμεναι ὅμως διαφοραὶ θὰ εἰναι μικραί.

Ἐάν ἔχωμεν ὑπ’ ὄψιν τ’ ἀνωτέρω, δυνάμεθα νὰ καθορίσωμεν μὲ μεγαλυτέραν ἀκρίβειαν τὶ ἐννοοῦμεν μὲ τὸν ὄρον φυλή: Φυλὴ εἶναι μία μεγάλη συνήθως ὁμάδας ἀνθρώπων, τὴν δόποιαν διακρίνομεν ἀπὸ τὰς ὄλλας, διότι παρουσιάζει ἐν σύνολον ἰδικῶν της γνωρισμάτων, τὰ γνωρίσματα δὲ αὐτὰ εἶναι κληρονομικὰ καὶ παρουσιάζονται μὲ μικρὰς μόνον διαφορὰς μεταξὺ τῶν ἀτόμων τῆς φυλῆς.

Πολλοὶ ἐπιστήμονες ἐπρότειναν διαφόρους διακρίσεις τῶν ἀνθρωπίνων φυλῶν. Π. χ. ὁ Blumenbach διέκρινε 5 μεγάλας φυλὰς

τὰς ἑξῆς: 1) τὴν Λευκὴν ἢ Καυκασίαν φυλήν, 2) τὴν Μογγολικὴν ἢ Κιτρίνην, 3) τὴν Αἰθιοπικὴν ἢ



Εἰκ. 54. Οι τρεῖς μεγάλαι περιοχαὶ τῆς Εύρωποςσίας.

Μαύρην, 4) τὴν Ἀμερικανικὴν ἢ Ἐρυθρόδερμον καὶ 6) τὴν Μαλαικὴν φυλήν.

Κατωτέρω θὰ περιγράψωμεν τὰς σημερινὰς ἀνθρωπίνους φυλὰς συμφώνως πρὸς νεωτέρας διακρίσεις.

2. ΑΙ ΤΡΕΙΣ ΜΕΓΑΛΑΙ ΠΕΡΙΟΧΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΑΣΙΑΣ.  
ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΜΕΓΑΛΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΦΥΛΩΝ

“Ας φέρωμεν μίαν γραμμήν διὰ τῶν Ἰμαλαίων ὀρέων καὶ, διαγωνίως πρὸς αὐτήν, μίαν ἄλλην διὰ τῆς ὁροσειρᾶς τοῦ Τιέν Σάν καὶ τῶν Ἀλταίων μέχρι τοῦ Βεριγγέου πορθμοῦ. Αἱ γραμμαὶ αὗται ξεχωρίζουν τρεῖς μεγάλας περιοχὰς εἰς τὴν Εύρωποασίαν. Ἡ βορείως



Εἰκ. 55. Ἄτομον μὲν ἔντονα τὰ χαρακτηριστικά τοῦ μογγολοειδοῦς κλάδου. Γυνὴ ἐκ Μαντζουρίας.

περιοχὴ περιλαμβάνει τὴν Εύρωπην καὶ τὴν Βόρειον Ἀσίαν, ἡ ἀνατολικὴ περιλαμβάνει τὴν Κεντρικὴν Ἀσίαν καὶ τὰς γειτονικὰς νήσους καὶ ἡ νοτία περιοχὴ περιλαμβάνει τὰς νοτίους χερσονήσους τῆς Ἀσίας καὶ τὰς πλησίους νήσους. Εἰς τὰς ἀρχὰς τῆς σημερινῆς γεωλογικῆς ἐποχῆς, ὅταν ἥρχισε νὰ ἀναπτύσσεται ὁ ἀνθρωπος, αἱ τρεῖς αὗται περιοχαὶ ἔχωρίζοντο μεταξύ των περισσότερον παρὰ σήμερον, ἀπὸ τὰ ὅρη καὶ τὰς θαλάσσας, καθὼς καὶ τοὺς παγετῶνας καὶ τὰς ἐρήμους τῆς ἐποχῆς ἐκείνης (εἰκ. 54).

Οὔτως, εἰς ἑκάστην τῶν ἀνωτέρω περιοχῶν ἀνεπτύχθησαν φυλαί, αἱ ὁποῖαι ὅμοιάζουν μεταξύ των, διαφέρουν δὲ πολὺ ἀπὸ τὰς φυλὰς τῶν ἄλλων περιοχῶν. Τὰ τρία αὗτά μεγάλα ἀθροίσματα τῶν φυλῶν, τὰς ὁποῖας ἀνεπτύχθησαν εἰς τὰς περιοχὰς αὗτάς, καλοῦνται κ λ ἀ δ ο η φ υ λ ω ν.

3. Ο ΜΟΓΓΟΛΟΕΙΔΗΣ ΚΛΑΔΟΣ.  
ΑΙ ΦΥΛΑΙ ΤΑΣ ΟΠΟΙΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

‘Ο κλάδος οὗτος περιλαμβάνει τὰς φυλάς, αἱ ὁποῖαι ἀνεπτύχθησαν εἰς τὴν ἀνατολικὴν περιοχήν, ἀργότερα δὲ ἐξηπλώθησαν καὶ εἰς τὴν Ἀμερικήν.

Γενικῶς τὰ σωματικὰ γνωρίσματα τῶν φυλῶν τοῦ κλάδου τούτου (εἰκ. 55) εἶναι τὰ ἔξης: Βραχυκεφαλία καὶ ἀνάστημα μέτριον ἢ μικρόν. Ἡ κόμη εἶναι μαύρη, λεία καὶ ἀραιά, τὸ δὲ τρίχωμα εἰς τὸ σῶμα εἶναι σπάνιον. Τὸ δέρμα ἔχει χρῶμα κιτρινωπόν, οἱ ὁφθαλμοὶ

είναι λοξοί καὶ στενοί, ἀπέχουν πολὺ μεταξύ των καὶ τὰ βλέφαρα εὐρύσκονται ύψηλά. Τὸ πρόσωπον εἶναι ἐπίπεδον καὶ τὸ μέτωπον λοξόν. Ὡς ὅμως θὰ ἴδωμεν, τὰ χαρακτηριστικὰ αὐτὰ δὲν παρουσιάζονται εἰς ὅλας τὰς φυλὰς τοῦ κλάδου τούτου μὲ τὴν ἴδιαν ζωηρότητα.

Αἱ κύριαι φυλαί, τὰς δόποιας διακρίνουν εἰς τὸν κλάδον τοῦτον, εἶναι αἱ ἔξῆς:

**1) Σιβαρίδαι.** Οὗτοι ζοῦν εἰς τὰ δάση τῆς Σιβηρίας καὶ ἔχουν ἔλθει εἰς ἐπαφὴν μὲ τὸν εὐρωποειδῆ κλάδον. Διὰ τοῦτο δὲν παρουσιάζουν πολὺ ἔντονα τὰ μογγολοειδῆ χαρακτηριστικά.


**2) Τουγκίδαι.** Οὗτοι εἶναι οἱ γνωστοὶ ὡς κυρίως Μογγόλοι. Ζοῦν νομαδικῶς εἰς τὰς ἑρήμους τῆς Κεντρικῆς Ἀσίας. Παρουσιάζουν τὰ μογγολοειδῆ χαρακτηριστικά ἔντονως ἀνεπτυγμένα. "Ἀλλοτε ἐσάρωσαν ὡς ἐπιδρομεῖς ὅλην τὴν Εὐρώπην καὶ τὴν Ἀσίαν. (Τσεγγὶς Χάν—ΙΓ' αἰών, Ταμερλᾶνος—ΙΔ' αἰών).

**3) Σινίδαι** (εἰκ. 56). Εἰς αὐτούς ὑπάγονται οἱ Κινέζοι, οἱ δόποιοι ὁμοιάζουν πρὸς τοὺς Εύρωπαίους περισσότερον ἀπὸ κάθε ιᾶλλην μογγολοειδῆ φυλήν. Παρουσιάζουν τὴν μεγαλυτέραν ἀναλογίαν ἀτόμων μὲ δύκινδες κρανίουν (1400 κυβ. ἑκατ. καὶ ἄνω). Ἀνέπτυξαν τὸν ἀρχαιότερον πολιτισμὸν καὶ ἡ ἱστορία τῆς αὐτοκρατορίας των ἀρχίζει εἴκοσι δύο αἰῶνας π. Χ.

Οἱ Ἰάπτωνες εἶναι ἔθνος, τὸ δόποιον προϊλθεν ἐκ τῆς ἀναμείξεως διαφόρων γειτονικῶν φυλῶν.

**4) Παλαιμογγολίδαι.** Οὗτοι εἶναι οἱ νεώτεροι τοῦ μογγολοειδοῦς κλάδου καὶ ζοῦν εἰς τὸ Σιάμ καὶ τὰ N.A. νήσους τῆς Ἀσίας.

**5) Ἰνδιανίδαι.** Είναι τὸ τμῆμα τοῦ μογγολοειδοῦς κλάδου, τὸ δόποιον ἐπέρασεν εἰς τὴν Ἀμερικήν. "Ἀλλοτε εἶχον ἀναπτύξει ἐκεῖ ἵσχυρὰ κράτη, τὰ δόποια κατεστράφησαν τελειωτικῶς ὑπὸ τῶν ἀποικιῶν τῆς Ἀμερικῆς. Σήμερον βαίνουν οἱ Ἰνδιανίδαι πρὸς τὴν ἔξαφάνισιν, μὴ δυνάμενοι νὰ προσαρμοσθοῦν εἰς τὸν εὐρωπαϊκὸν



Εἰκ. 56. Κινέζος

πολιτισμόν. Εἰς τὴν Β. Ἀμερικὴν καλοῦνται συνήθως Ἐρυθρόδερμοι (εἰκ. 57) καὶ ζοῦν ἀκόμη νομαδικῶς.

Σημείωσις. Δευτερεύουσα φυλὴ τοῦ μογγολειδοῦς κλάδου θεωροῦνται καὶ οἱ Ἐσκιμῶοι, οἱ δύσιοι κατοικοῦν εἰς τὴν βορείαν ἀρκτικήν περιοχήν (εἰκ. 58).

#### 4. Ο ΝΕΓΡΟΙΔΗΣ ΚΛΑΔΟΣ. ΑΙ ΦΥΛΑΙ ΤΑΣ ΟΠΟΙΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

Ο κλάδος οὗτος περιλαμβάνει φυλάς, αἱ δύοιαι ἀνεπτύ-



Εἰκ. 57. Ἐρυθρόδερμος



Εἰκ. 58. Ἐσκιμώος.

Εἰς τὸν κλάδον τοῦτον διακρίνουν τὰς ἔξης κυρίως φυλάς ::

χθησαν εἰς τὴν νοτίαν μεγάλην περιοχὴν τῆς Εύρωποασίας. Σήμερον εἶναι ἔξηπλωμένος ὁ κλάδος οὗτος εἰς τὴν Ἀφρικὴν καὶ τὴν Μελανησίαν.


Εἰς τὸν κλάδον τοῦτον παρουσιάζονται ποικίλα ἀναστήματα. Οὔτως ὡρισμέναι φυλαὶ τῆς Ἀφρικῆς παρουσιάζουν τὸ ὑψηλότερον ἀνάστημα, ἐνῶ ἄλλαι τὸ βραχύτερον (Πιγμαῖοι κάτω τῶν 140 ἑκ.). Χαρακτηρίζουν τὸν νεγροειδῆ κλάδον (εἰκ. 59), τὸ μαῦρον χρῶμα τοῦ δέρματος, τὰ χονδρὰ προέχοντα χείλη κλπ.

**1) Αιθιοπίδαι.** Ή φυλή αύτη ἀποτελεῖ τὸν κύριον πληθυσμὸν τῆς Ἀβησσηνίας. Λόγω τῆς μακρᾶς ἐπαφῆς της μὲ τὸν εὐρωποειδῆ κλάδον, μέσω τῆς Ἀραβίας καὶ τῆς Αἰγύπτου, δὲν παρουσιάζει ἔντονα τὰ νεγροειδῆ χαρακτηριστικά.

**2) Αἱ φυλαὶ τῶν σαβανῶν.** Εἶναι ἔξηπλωμέναι εἰς τὴν ζώνην τῶν σαβανῶν, μεταξὺ τῶν ἔρημών τῆς Βορείου Ἀφρικῆς καὶ τοῦ τροπικοῦ δάσους.

**3) Παλαινεγρίδαι.** Οὗτοι ζοῦν εἰς τὴν τροπικὴν ζώνην.

**4) Μελανησίδαι.** Οὗτοι κατοικοῦν ἐκτὸς τῆς Ἀφρικῆς, εἰς τὰς νήσους ΝΑ τῆς Ἀσίας. Προσέτι εἰς τὸν Νεγροειδῆ κλάδον τάσσονται καὶ δύο ἀκόμη φυλαί, αἱ ὅποιαι παρουσιάζουν τὰ ἀτελέστερα χαρακτηριστικά καὶ τείνουν νὰ ἐκλείψουν: Οἱ Πιγμαῖοι καὶ οἱ Αὔστραλίδαι. Οἱ πρῶτοι διατηροῦνται ἀκόμη εἰς τὸ ἐσωτερικὸν τῶν τροπικῶν δασῶν καὶ οἱ δεύτεροι εἰς τὰς ἔρημους τῆς Αὔστραλίας. Αἱ ἀνωτέρω δύο φυλαὶ χαρακτηρίζονται ὡς δευτερεύουσαι φυλαὶ τοῦ νεγροειδοῦς κλάδου.



Εἰκ. 59. Ἀτομα νεγρικῆς φυλῆς.


##### 5. Ο ΕΥΡΩΠΟΕΙΔΗΣ ΚΛΑΔΟΣ. ΑΙ ΦΥΛΑΙ ΤΑΣ ΟΠΟΙΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

‘Ο Εύρωποειδὴς τέλος κλάδος περιλαμβάνει τὰς φυλάς, αἱ ὅποιαι ἀνεπτυχθησαν εἰς τὴν βορειοδυτικὴν περιοχὴν τῆς Εὐρωποασίας. Πρὸς τὴν Εὐρώπην ἔξηπλώθη διὰ δύο διευθύνσεων: διὰ μέσου τῆς Σιβηρίας καὶ διὰ μέσου τῆς Πρόσω Ασίας. Εἰς τοὺς νεωτέρους χρόνους ἔξηπλώθη εἰς τὴν Ἀμερικὴν καὶ τὰς ἄλλας ἡπείρους καὶ πρωτοστατεῖ εἰς τὸν πολιτισμόν.

Διακρίνομεν τρεῖς ζώνας φυλῶν τοῦ κλάδου τούτου (εἰκ. 60):

Α') Τὴν ζώνην τῶν ἀνοικτοχρώμων βορείων φυλῶν. Αὕτη περιλαμβάνει δύο φυλάς: α) Τὴν Βορείαν φυλὴν καὶ β) τὴν Ἀνατολικοευρωπαϊκήν.

Β') Τὴν κεντρικὴν ζώνην τῶν βραχυκεφάλων. Αὕτη περιλαμβάνει τέσσαρας φυλάς: α) Τὴν Ἀλπικήν, β) τὴν Διναρικήν, γ) τὴν Ἀρμενικήν καὶ δ) τὴν Τουρανικήν.



Εἰκ. 60. Σχηματική παράστασις τῶν τριῶν ζωνῶν ἔξαπλώσεως τῶν φυλῶν τοῦ εὐρωποειδοῦς κλάδου. Α. Βορεία ζώνη: 1. Βορεία φυλή. 2. Ἀνατολικοευρωπαϊκή. —Β. Κεντρική ζώνη: 3. Ἀλπική φυλή. 4. Διναρική. 5. Ἀρμενική. 6. Τουρανική. —Γ. Νοτιά ζώνη: 7. Μεσογειακή φυλή. 8. Ἀνατολική. 9. Ἰνδική φυλή.

Γ') Τὴν ζώνην τῶν νοτίων Εύρασιατικῶν φυλῶν. Αὕτη περιλαμβάνει τρεῖς φυλάς: α) Τὴν Μεσογειακήν, β) τὴν Ἀνατολικήν καὶ γ) τὴν Ἰνδικήν.

Α'. Ἡ ζώνη τῶν ἀνοικτοχρώμων βορείων φυλῶν.

α) **Βορεία φυλή.** Τὰ χαρακτηριστικὰ τῆς φυλῆς αὐτῆς εἶναι τὰ ἔξῆς: Δέρμα καὶ κόμη πτωχὰ εἰς χρωστικήν. "Ωστε τὸ δέρμα εἶναι

λευκὸν καὶ ἡ κόμη ξανθὴ ἥ πυρρόχρωμος καὶ οἱ ὄφθαλμοι γαλανοί. Πρόσωπον ὀωειδές καὶ μύτη εὐθεῖα καὶ στενόμακρος. Ἡ σιαγών προεξέχει καὶ τὸ μέτωπον κυρτοῦται κανονικῶς. Κρανίον δοιλιχό-κέφαλον καὶ ἀνάστημα ύψηλόν.

Διακρίνομεν ἐντὸς τῆς φυλῆς ταύτης τρεῖς τύπους, τὸν Τευτο-βόρειον, ισχνὸν μὲ ξανθὴν κόμην, τὸν Δανο-βόρειον, μὲ βαρὺ σῶμα, πυρρὸν κόμην καὶ πλατύτερον πρόσωπον, τέλος τὸν Φιννο-βόρειον, λεπτόν, μὲ πυρρὰν κόμην καὶ πολὺ ἀνοικτοχρώμους ὄφθαλμούς.

Ἡ Βορεία φυλὴ εἶναι ἔξηπλωμένη κυρίως εἰς τὴν βόρειον Εύρω-πην καὶ ἀνέκαθεν, λόγῳ τῆς ἀγονίας τοῦ ἐδάφους, παρουσίαζε μετακινήσεις. Εἶναι γνωσταὶ ἐκ τῆς Ἰστορίας αἱ πολλαὶ ἐπιδρομαὶ τῶν βορείων πρὸς τὴν νότιον Εύρωπην. Οὕτω π. χ. κατῆλθον τὰ Ἰνδογερμανικὰ ἔθνη μέχρι τῆς Βαλκανικῆς καὶ τῆς Μικρασίας δώδεκα περίπου αἰῶνας π. χ. "Ἐν τοιοῦτον φῦλον ἥσαν οἱ Δωριεῖς. Τὸν δον αἰῶνα π. χ. κατέρχονται οἱ Κέλται εἰς τὴν Ἰβηρικὴν Χερσόνη-σον. Τὸν 3ον καὶ 4ον αἰῶνα μ. χ. βόρεια ἔθνη κατέρχονται μέχρι τῆς Βαλκανικῆς, τῆς Μικρασίας καὶ τῆς Ἰταλίας (Γότθοι).

Εἰς τοὺς νεωτέρους χρόνους τὰ βόρεια ἔθνη ἴδρυσαν τὰς μεγα-λυτέρας ἀποικίας καὶ ἔξηπλώθησαν εἰς τὴν Β. Ἀμερικήν, τὴν Αὐ-στραλίαν, τὴν Νέαν Ζηλανδίαν κλπ.

**β)** Ἀνατολικοευρωπαϊκὴ φυλὴ. Κύρια χαρακτηριστικὰ τῆς φυλῆς αὐτῆς εἶναι: Ἀνάστημα συνήθως μέτριον. Χρῶμα στακτό-ξανθον εἰς τὴν κόμην καὶ πολὺ ἀνοικτὸν εἰς τὸ δέρμα καὶ τοὺς ὄφθαλ-μούς. Ἡ ρἱς εἶναι μικρὰ καὶ ἀνεγείρεται κατὰ τὸ ἄκρον, τὸ δὲ στόμα εἶναι σχετικῶς μεγάλον καὶ τὸ ὅλον πρόσωπον στρογγύλον. Εἰς τὴν αὐτὴν φυλὴν ἀνήκουν τὰ Σλανϊκά ἔθνη, τὰ δόποια κατοικοῦν τὴν Α. Εύρωπην καὶ τὴν Β. Ἀσίαν, δηλαδὴ μίαν περιοχὴν εὐφορον, πεδινὴν καὶ πλουσίαν εἰς δάση καὶ ἔλη.

Ἡ Ἀνατολικοευρωπαϊκὴ εἶναι ἡ γονιμωτέρα φυλὴ τοῦ εύρω-ποειδοῦς κλάδου, ἀριθμοῦσα σήμερον περίπου 230 ἑκατομμύρια ψυχῶν.

## B'. Ἡ Κεντρικὴ ζώνη τῶν βραχυκεφάλων.

**α)** Ἀλπικὴ φυλὴ. Κύρια χαρακτηριστικὰ τῆς φυλῆς ταύτης εἶναι τὰ ἔξῆς: Ἀνάστημα μέτριον, σῶμα συχνὰ παχύ, κεφαλὴ

στρογγύλη. Ή ρίς είναι μικρά, ή ἀπόστασις δὲ μεταξύ τῶν ὀφθαλμῶν μεγάλη. Κρανίον βραχυκέφαλον, χρώματα κόμης ὄρφνά.



Εἰκ. 61. Λαπωνίς.

Ἡ Ἀλπικὴ φυλὴ κατοικεῖ εἰς τὴν ὁρεινὴν καὶ δασώδη Κεντρικὴν Εύρωπην. Τμῆμα τῆς φυλῆς ταύτης είναι καὶ οἱ Λάπωνες, οἱ ὅποιοι ἀποχωρισθέντες αὐτῆς, ζοῦν νομαδικῶς εἰς τὴν βόρειον Σκανδιναվίαν (εἰκ. 61).

**β) Διναρικὴ φυλὴ.** Αὕτη είναι ἔξηπλωμένη ἀνατολικῶν τῆς προηγουμένης, κυρίως εἰς τὰς ὁρεινὰς περιοχὰς τῶν Διναρικῶν Ἀλπεων. Χαρακτηρίζεται ἀπὸ ὑψηλότατον ἀνέστημα καὶ ισχυρὸν βραχυκέφαλίαν. Τὸ κρονίον πρὸς τὰ ὅπισω είναι ἐπίπεδον καὶ ἡ ρίς κυρτή. Τὸ χρῶμα τῶν τριχῶν καὶ τοῦ δέρματος είναι βαθὺ (εἰκ. 62).

**γ) Ἀρμενικὴ φυλὴ.** Αὕτη παρουσιάζει ὁμοιότητα μὲ τὴν Διναρικὴν καὶ μὲ τὴν ἔπομένην Τουρανικὴν φυλήν. Παρουσιάζει ἀνάστημα μέτριον, μέτωπον ἀπότομον καὶ ρίνα μεγάλην καὶ κεκαμμένην.

**δ) Τουρανικὴ φυλὴ.** Αὕτη είναι ἔξηπλωμένη εἰς τὴν περιοχὴν τῆς Ἀνατολίας. Παρουσιάζει ἀνάστημα μέτριον, βραχυκέφαλίαν, μέτωπον ἀπότομον. Τὰ ζυγωματικὰ τόξα προεξέχουν. Τρίχωμα ισχυρὸν καὶ χείλη στενά.

### Γ'. Ζώνη τῶν νοτίων Εύρασιατικῶν φυλῶν.

**α) Μεσογειακὴ φυλὴ** (εἰκ. 63). Παρουσιάζει ἀνάστημα μέτριον ἢ μικρόν, πρόσωπον ὠοειδές καὶ κρανίον δολιχοκέφαλον. Δέρμα μελαχροινὸν καὶ κόμη ἐλαφρῶς κυματοειδής. Σωματικαὶ ἀναλογίαι δμοιάζουσαι μὲ τὰς τῆς Βορείας φυλῆς.

Ἡ φυλὴ αὕτη είναι ἔξηπλωμένη εἰς τὰς νοτίους χερσονήσους.



Εἰκ. 62. "Ατομον τῆς Διναρικῆς φυλῆς.

τῆς Εύρωπης, ιδίως εἰς τὴν Ἰβηρικήν. Συναντᾶται ἐπίσης καὶ εἰς πολλὰς ἄλλας περιοχάς, χωρὶς ὅμως συνοχήν.

Τοιαῦται περιοχαὶ εἰναι ἡ Ἰρλανδία, ἡ Οὐαλλία, ἡ Ρουμανία, ἡ Νότιος Γαλλία, ἡ Βόρειος Ἀφρική. Διὰ τῶν Ἰσπανικῶν καὶ Πορτογαλλικῶν Ἀποικιῶν ἔξηπλώθη εἰς τὴν Νότιον καὶ Κεντρικὴν Ἀμερικήν. Εἰς τὴν Ἀνατολικὴν Μεσόγειον ἔχει ἀναμειχθῆ μὲτα πλείστας φυλάς.

**β) Ἀνατολικὴ φυλὴ.** Αὕτη εἰναι κυρίως ἔξηπλωμένη εἰς τὰς ξηρὰς περιοχὰς τῆς Πρόσω Ασίας (Ἀραβία, Μεσοποταμία, Συρία κλπ.). Εἰς τὴν αὐτὴν φυλὴν ἀνήκουν καὶ οἱ Ἀραβεῖς καὶ οἱ Ἐβραῖοι.

**γ) Ἰνδικὴ φυλὴ.** Αὕτη εἰναι ἔξηπλωμένη εἰς τὸ Ἀφγανιστάν καὶ τὰς Ἰνδίας. Μερικὰ ἐκ τῶν χαρακτηριστικῶν της εἰναι: Χρῶμα δέρματος βαθὺ καὶ ἐνίστε ἀραβιστόχρουν, μέτωπον στενόν, κνῆμαι καὶ ἀντιθραχίονες λεπτοί.

Σημείωσις. Καὶ εἰς τὸν εὐρωπείδη κλάδον τάσσονται ὥρισμέναι δευτερεύουσαι φυλαί. Ἐκ τούτων ἀναφέρομεν τὴν φυλὴν Ἀϊνώ, ἡ ὅποια ζῇ εἰς τὰς βορείους νήσους τῆς Ἰαπωνίας.

#### 6. ΦΥΛΑΙ ΚΑΙ ΕΘΝΗ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕΙΞΙΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Ἄνωτέρω ἀνεφέραμεν τοὺς τρεῖς κλάδους ἀνθρωπίνων φυλῶν· καὶ εἴδομεν, ὅτι ἔκαστος ἔξ αὐτῶν περιλαμβάνει ὥρισμένας κυρίας φυλάς, τὰς ὅποιας περιεγράψαμεν, καὶ ἐγνωρίσαμεν τὰς γενικάς γραμμὰς τῆς γεωγραφικῆς κατανομῆς των. Πλὴν τούτων ἔκαστος κλάδος εἴδομεν, ὅτι περιλαμβάνει καὶ ὥρισμένας δευτερευούσας φυλάς, οἵ ὅποιαι γενικῶς εἰναι ἀριθμητικῶς μικραί. Ἐκ τῶν δευτερευουσῶν τούτων φυλῶν μερικαὶ ἀποτελοῦν διαμέσους τύπους μεταξὺ τῶν διαφόρων κλάδων.

Τὰς ἀνωτέρω περιγραφείσας φυλὰς δὲν συναντῶμεν μόνον εἰς τὰς ἀντιστοίχως ἀναφερθείσας περιοχάς. Ἀντιθέτως σήμερον καὶ



Εἰκ. 63. \*Ατομον τῆς Μεσογειακῆς φυλῆς.

έκτός τῶν περιοχῶν τούτων ἀνευρίσκομεν πολυπληθεῖς ὁμάδας τῶν διαφόρων φυλῶν.<sup>3</sup> Απὸ τὰς ἀρχικὰς περιοχὰς τῶν διαφόρων φυλῶν μεγάλος ἀριθμὸς ἀτόμων ἔχει μεταφερθῆ ἀλλοῦ. ‘Ως διδάσκει ἡ Ἱστορία, ἡ ἐπικοινωνία μεταξὺ τῶν διαφόρων φυλῶν εἶναι ζωηρὰ καὶ γίνεται εἴτε δι’ εἰρηνικοὺς σκοπούς (μεταναστεύσεις κλπ.), εἴτε διὰ πολεμικούς (ἐπιδρομαί, κατακτήσεις κλπ.).

Οὕτω π. χ. εἰς τὴν Βόρειον Ἀμερικὴν ὑπάρχουν σήμερον ἕκατομμύρια Κινέζων καὶ Νέγρων, οἱ δὲ Εὐρωπαῖοι εἶναι ἔξηπλωμένοι εἰς τὰ περισσότερα μέρη τῆς γῆς.

Ἡ ἐπικοινωνία μεταξὺ τῶν διαφόρων φυλῶν ἐπέφερε τὴν μεῖζην αὐτῶν. Τοιουτοτρόπως ἐδημιουργήθησαν ποικίλοι ἀνθρωπολογικοί τύποι, ἔκτός τῶν τυπικῶν φυλῶν.

Διὰ τοῦτο γενικῶς εἰς μίαν χώραν, ἵδιας ἔχουσαν μακρὰν Ἱστορίαν, διὰ πληθυσμὸς δὲν παρουσιάζει πλήρη φυλετικὴν ὅμοιομορφίαν. ‘Επομένως τὰ ἔθνη δὲν περιλαμβάνουν ἄτομα ἐνὸς καὶ τοῦ αὐτοῦ μόνον ἀνθρωπολογικοῦ τύπου.

## 7. ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ

Διακρίνομεν τὰς φυλὰς μεταξύ των, διότι ἑκάστη παρουσιάζει ἐν σύνολον γνωρισμάτων, τὰ δόποια εἶναι κληρονομικὰ καὶ ἐμφανίζονται εἰς ὅλα τὰ ἄτομα τῆς φυλῆς, μὲν μικρὰς διαφοράς.

Εἰς ώρισμένον τόπον δὲν κατοικοῦν πάντοτε ἄτομα καταγόμενα ἀπὸ γονεῖς οἱ δόποιοι ἀνήκουν καὶ οἱ δύο εἰς τὴν αὐτήν φυλήν. Διὰ τοῦτο διὰ πληθυσμὸς ἐνὸς τόπου δὲν παρουσιάζει, γενικῶς, φυλετικὴν ὅμοιομορφίαν.

Γενικωτάτη διαίρεσις δύναται νὰ γίνῃ εἰς τρεῖς κλάδους : α) τὸν Εὐρωποειδῆ, β) τὸν Μογγολοειδῆ καὶ γ) τὸν Νεγροειδῆ. ‘Εκαστος κλάδος περιλαμβάνει ώρισμένας κυρίας φυλάς, αἱ δόποιαι δύνανται πάλιν καὶ περαιτέρω νὰ ύποδιαιτεθοῦν.

ΠΙΝΑΚ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

---

	Εισαγωγή.	Σελίς
Tὸ κύτταρον — Οἱ ἴστοι — Ὁ ἄνθρωπος	5	
ΜΕΡΟΣ Α'.		
KΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ	8	
Κεφ. 1. — Ὁ σκελετὸς τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος .....	.....	8
1. Σχηματισμὸς καὶ ὑψὴ τῶν δόστῶν. — 2. Σύνδεσις τῶν δόστῶν, μέρη τοῦ σκελετοῦ. — 3. Ὁ σκελετὸς τῆς κεφαλῆς : α ) τὰ δόστὰ τοῦ κρανίου β ) τὰ δόστὰ τοῦ προσώπου. — 4. Ὁ σκελετὸς τοῦ κορμοῦ : α ) ἡ σπουδυλικὴ στήλη, β ) αἱ πλευραὶ καὶ τὸ στέρνον. — 5. Ὁ σκελετὸς τῶν ἄκρων : α ) δ σκελετὸς τῶν ὅμων καὶ τῶν χειρῶν, β ) δ σκελετὸς τῆς λεκάνης καὶ τῶν ποδῶν. — 6. Περίληψις. — Διάφοροι παρατηρήσεις καὶ ἀσκήσεις.		
Κεφ. 2. — Οἱ μῆνες τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος .....	.....	24
1. Οἱ μῆνες, αἱ μυῖκαι ἵνες. — 2. Γραμματοί μῆνες καὶ τρόπος τῆς ἐργασίας αὐτῶν. — 3. Οἱ λειτοί μῆνες. — 4. Ὁ μυϊκὸς τόνος. — 5. Περίληψις — Διάφοροι παρατηρήσεις καὶ ἀσκήσεις.		
Κεφ. 3. — Αἱ προσλαμβανόμεναι ὑπὲρ τοῦ ὄργανισμοῦ οὔσιαι. — Αἱ καύσεις, ἡ θρέψις .....	.....	28
1. Αἱ θρεπτικαὶ οὔσιαι. — 2. "Yδωρ καὶ ἀνόργανα ὀλατα. — 3. "Yδατάνθρακες καὶ καῦσις. — 4. Αἱ λιπαραὶ οὔσιαι. — 5. Λευκώματα. — 6. Βιταμίναι. — 7. Αἱ λειτουργίαι τῆς θρέψεως. — 8. Περίληψις.		
Κεφ. 4. — Μορφολογικὴ ἐπισκόπησις τῆς στοματικῆς κοιλότητος. Οἱ ὁδόντες. 1. Ἡ στοματικὴ κοιλότης. — 2. Οἱ ὁδόντες. — 3. Διάφοροι παρατηρήσεις καὶ ἀσκήσεις. — 4. Περίληψις.		
Κεφ. 5. — Πέψις. Ἀπομύζησις καὶ ὀφομοίωσις τῶν προϊόντων τῆς πέψεως....	.....	37
1. Ἡ πέψις, δ πεπτικὸς σωλήν. — 2. Στόμα, μάσησις, σίαλος, κατάποσις τοῦ βλωμοῦ. — 3. Φάρυγξ καὶ οἰσοφάγος. Στόμαχος καὶ γαστρικὸν ύγρόν. — 4. Λεπτὸν ἔντερον, πάγκρεας, ἥπαρ, χοληδόχος κύστις. Συμπλήρωσις τῆς πέψεως. — 5. Ἀπομύζησις τῶν προϊόντων τῆς πέψεως διὰ τῶν λαχνῶν τοῦ ἔντερου. — 6. Ἀφομοίωσις τῶν προϊόντων τῆς πέψεως. — 7. Παχὺ ἔντερον, βακτηρίδια τοῦ ἔντερου, περιττώματα. — 8. Ἐπίδρασις ξένων λευκωμάτων ἐπὶ τοῦ ὄργανισμοῦ. 9. Περίληψις.		

Κεφ. 6. — Ἡ ἀναπνοὴ .....	42
1. Τὸ ἀναπνευστικὸν σύστημα καὶ ἡ ἀνταλλαγὴ τῶν ἀερίων. — 2. Αἱ ἀναπνευστικαὶ κινήσεις. — 3. Περίληψις. — 4. Διάφοροι παρατηρήσεις καὶ ἀσκήσεις.	
Κεφ. 7. — Ὁ λάρυγξ καὶ ἡ παραγωγὴ τῆς φωνῆς .....	46
1. Κατασκευὴ τοῦ λάρυγγος. Τρόπος παραγωγῆς τῆς φωνῆς.— 2. Χαρακτῆρες φωνῆς. Ἀρθρωσις αὐτῆς εἰς φθόγγους. Λόγος. — 3. Περίληψις. 4. Διάφοροι παρατηρήσεις καὶ ἀσκήσεις.	
Κεφ. 8. — Ἡ κυκλοφορία τοῦ αἵματος καὶ τῆς λέμφου. Ἡ ἀπέκκρισις.....	49
1. Τὸ αἷμα. — 2. Ἡ καρδία καὶ τὰ ὄγγεια. — 3. Δίοδος τοῦ αἵματος διὰ τῶν νεφρῶν. Ἀπέκκρισις. — 4. Δίοδος τοῦ αἵματος διὰ τοῦ ἤπατος.— 5. Ἀνασκόπησις τῆς μικρᾶς καὶ τῆς μεγάλης κυκλοφορίας. — 6. Ἡ κίνησις τοῦ αἵματος ἐντὸς τῶν ὄγγειων. — 7. Ἡ λέμφος καὶ τὸ λεμφικὸν σύστημα. — 8. Σχηματισμὸς καὶ καταστροφὴ τῶν αἷμοσφαιρίων. — 9. Περίληψις. — 10. Διάφοροι παρατηρήσεις καὶ ἀσκήσεις.	
Κεφ. 9. — Μορφολογικὴ ἀνασκόπησις τῆς θωρακικῆς καὶ τῆς κοιλιακῆς κοιλότητος. ....	59
Κεφ. 10. — Αἱ ἔκκρισεις .....	61
1. Ἀδένες, Ἐνδοκρινεῖς ἀδένες. Ἀδένες διπλῆς λειτουργίας (παράδ. : πάγκρεας). — 2. Οἱ ὀδένες ἐσω ἔκκρισεως. — 3. Περίληψις.	
Κεφ. 11. — Τὸ νευρικὸν σύστημα .....	64
1. Ἐρεθίσματα, ὀντιδράσεις. Τὰ νεῦρα. Τὰ τμήματα τοῦ νευρικοῦ συστήματος. Ἡ ιδιαιτέρα σημασία τοῦ ἐγκεφάλου. — 2. Τὸ ἐγκεφαλονωτιαῖον νευρικὸν σύστημα : α) τὸ κεντρικὸν τμῆμα, β) τὸ περιφερικὸν τμῆμα, γ) ἡ διαδρομὴ τοῦ ἐρεθίσματος.— 3. Τὸ συμπαθητικὸν σύστημα.—4. Τὰ αὐτόνομα νευρικά συστήματα τοῦ ἐντέρου καὶ τῆς καρδίας. — 5. Ὁ ὑπνος. — 5. Περίληψις.	
Κεφ. 12. — Αἱ αἰσθήσεις .....	72
1. Αἰσθητικά σωμάτια τοῦ δέρματος. — 2. Αἰσθητήριον τῆς γεύσεως. — 3. Τὸ αἰσθητήριον τῆς ὁσφρήσεως. — 4. Τὸ αἰσθητήριον τῆς όράσεως.— Κατασκευὴ τοῦ ὁφθαλμοῦ. Σχηματισμὸς τοῦ εἰδώλου. Προσαρμογὴ τοῦ ὁφθαλμοῦ. Προστασία τοῦ ὁφθαλμοῦ. Ἀνωμαλίαι τῆς όράσεως. — 5. Τὸ αἰσθητήριον τῆς ἀκοῆς καὶ τοῦ χώρου. Ἐξω οὖς. Μέσον οὓς. Ἐσω οὖς. — 6. Τὸ αἰσθητημα τοῦ πόνου.— 7. Περίληψις. — 8. Διάφοροι παρατηρήσεις καὶ ἀσκήσεις.	
Κεφ. 13. — Τὸ δέρμα .....	83
1. Στοιβάδες τοῦ δέρματος. Ὕποδόριος ἴστος. Περιτονία. — 2. Ἐξαρτήματα τοῦ δέρματος. Χρῶμα τοῦ δέρματος καὶ τῶν τριχῶν.3.Περίληψις.	

ΙΚεφ.	14. — 'Η συνεργασία τῶν διαφόρων συστημάτων καὶ ἡ προσαρμοστική λειτουργία τοῦ ὄργανισμοῦ .....	86
	1. 'Η συνεργασία τῶν συστημάτων τοῦ ὄργανισμοῦ. 'Η προσαρμογὴ εἰς τὰς ἐπισυμβαίνουσας μεταβολάς. (Παραδείγματα αίμορραγίας καὶ διατηρήσεως τῆς θερμοκρασίας). — 2. Ἀποτέλεσμα τῆς συνοχῆς διεγέρσεως τῆς προσαρμοστικῆς λειτουργίας. Σκληραγωγία. (Παράδειγμα ζωῆς εἰς ύψηλά μέρη). — 3. Περίληψις.	

## ΜΕΡΟΣ Β'.

## ΓΕΝΕΣΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

1. Γενικά περὶ τοῦ πολλαπλασιασμοῦ εἰς τὰ φυτά καὶ τὰ ζῶα. — 2. Ἐμβρυϊκή ἀνάπτυξις. — 3. Αἱ ήλικίαι τοῦ ἀνθρώπου. — 4. Περίληψις. — 5. Διάφοροι παρατηρήσεις καὶ ἀσκήσεις. ....	90
---	----

## ΜΕΡΟΣ Γ'.

## ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΥ-ΣΙΚΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

1. Φυσικὸν καὶ κοινωνικὸν περιβάλλον. Ἐπικοινωνία τοῦ ὄργανισμοῦ καὶ τοῦ περιβάλλοντος. — 2. Ἐπίδρασις ἐπὶ τοῦ ὄργανισμοῦ λόγῳ τῆς προστήψεως ούσιῶν ἐκ τοῦ περιβάλλοντος. — 3. Ἐπίδρασις ἐπὶ τοῦ ὄργανισμοῦ τῶν φυσικῶν ὅρων τοῦ περιβάλλοντος. — 4. Ἐπίδρασις ἐπὶ τοῦ ἀνθρωπίνου ὄργανισμοῦ διαφόρων μικροοργανισῶν. — Περίληψις. ....	94
--	----

## ΜΕΡΟΝ Δ'.

## ΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΦΥΛΑΙ

1. Ποῖος γνωρίσματα χρησιμεύουν διὰ τὴν διάκρισιν τῶν ἀνθρωπίνων φυλῶν. "Εννοια τῆς φυλῆς. — 2. Αἱ τρεῖς μεγάλαι περιοχαὶ τῆς Εὐρωποασίας. Διάκρισις τῶν τριῶν μεγάλων κλάδων φυλῶν. — 3. 'Ο Μογγογιοειδής κλάδος. Αἱ φυλαί, τὰς ὅποιας περιλαμβάνει!. — 4. 'Ο Νεγροειδής κλάδος. — 5. 'Ο Εύρωποειδής κλάδος. — 6. Φυλαὶ καὶ ἔθνη. Ἐπικοινωνία καὶ μεῖζις τῶν φυλῶν. — 7. Περίληψις. ....	98
---	----



Έπιμελητής έκδόσεως Α. ΚΑΛΥΒΙΑΡΗΣ (άπ. Α.Σ. ΟΕΣΒ 2386/9.3.54)

Στοιχειοθεσία-έκτύπωσις βιβλιοδεσία: Ν. ΑΛΙΚΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ



