

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Ε' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΗΛΙΑ Β. ΝΤΖΙΩΡΑ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΑΘΗΝΑΙ 1974

1929T

ΕΠΟΥΡΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΣ ΚΑΙ ΕΡΗΜΕΤΗΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

(επίπεδη γνώση)

ΕΩΣ ΜΧ ΔΡΟΣΩ

ΗΛΙΑΣ ΝΤΖΙΟΡΑ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΛΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΔΩΡΕΑΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Ε' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

(ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΣ)

ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΗΛΙΑ Β. ΝΤΖΙΩΡΑ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΑΘΗΝΑΙ 1974

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΛΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚ ΤΟΥ ΠΡΟΤΑΣΙΑΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ *

§ 1. Πρότασις (άπλη, κατηγορική) ή δήλωσις. — Ή εννοια τῆς ἀπλῆς προτάσεως ή δηλώσεως, ἀκριβέστερον τῆς «λογικῆς προτάσεως», θεωρεῖται ως μία πρωταρχική εννοια, ως εννοια μὴ ἐπιδεχομένη δρισμόν. Εἰς τὸ συντακτικόν, λ.χ., ή (ἀπλή) πρότασις δρίζεται ως «λόγος συντομώτατος (προφορικός ή γραπτός) μὲ ἐντελῶς ἀπλοῦν περιεχόμενον».

Εἰς τὰ Μαθηματικὰ καὶ γενικῶς εἰς τὴν λογικήν (κλασσικὴν λογικήν) διὰ τοῦ ὄρου «πρότασις ή δήλωσις» ἐννοοῦμεν μίαν ἔκφρασιν μὲ νόημα, ἀκριβέστερον ἐννοοῦμεν τὸ περιεχόμενον, τὸ δποῖον ἐκφράζομεν διὰ μιᾶς προτάσεως μὲ τὴν ἐννοιαν τοῦ συντακτικοῦ καὶ διὰ τὸ δποῖον δυνάμεθα κατὰ ἀκριβῶς ἔνα τρόπον γὰρ ἀποφαθῆμεν, ὅν εἶναι ἀληθὲς ή ψευδές, ἀποκλείοντες ἀλλην περίπτωσιν. Οὕτω, π.χ., ή ἔκφρασις :

«δ ἀριθμὸς 10 εἶναι ἀρτιος»,

εἶναι μία λογική πρότασις, καθόσον ὅ,τι αὕτη ἔκφράζει εἶναι ἀληθές.

‘Ομοίως ή ἔκφρασις :

«δ ἀριθμὸς 4 εἶναι πρῶτος»,

εἶναι μία λογική πρότασις, καθόσον ὅ,τι αὕτη ἔκφράζει εἶναι ψευδές.

Τὸ περιεχόμενον λοιπὸν μιᾶς προτάσεως (λογικῆς προτάσεως) ἐπιδέχεται ὅν α γ κ α σ τ ι κ ὅς ἔνα καὶ μόνον ἔνα τῶν χαρακτηρισμῶν «ἀληθές», «ψευδές» οὐδέποτε ὅμως εἶναι καὶ ἀληθὲς καὶ ψευδὲς (ἀρχὴ τῆς ἀντιφάσεως).

Τὰς προτάσεις, ως γνωρίζομεν καὶ ἐκ τῶν μαθημάτων τῆς προηγουμένης τάξεως, τὰς παριστάνομεν συμβολικῶς μὲ μικρὰ γράμματα τοῦ λατινικοῦ ἀλφαριθμοῦ, κατὰ προτίμησιν μὲ p, q, r, . . .

Ἐάν μία πρότασις p εἶναι ἀληθής, τότε, καὶ μόνον τότε, λέγομεν ὅτι αὕτη ἔχει «τιμὴν ἀληθείας α» καὶ γράφομεν τ(p) = α, ἐάν δὲ αὕτη εἶναι ψευδής, τότε, καὶ μόνον τότε, λέγομεν ὅτι ἔχει «τιμὴν ἀληθείας ψ» καὶ γράφομεν τ(p) = ψ. Ἐπομένως, ἐάν πρότασις εύρεθῇ ἔχουσα συγχρόνως καὶ τὰς δύο τιμὰς ἀληθείας α καὶ ψ, τότε τοῦτο ἀποτελεῖ ἀντίφασιν.

* Θεμελιωτής τῆς Λογικῆς τῶν προτάσεων ὑπῆρξεν ὁ στωϊκὸς φιλόσοφος Χρύσιππος (281–208 π.Χ.).

Παραδείγματα: 1ον: «Η έκφρασης p : « $O 2 + 3i \equiv (2,3)$ είναι μιγαδικός αριθμός»» είναι μία πρότασης (λογική πρότασης), καθόσον τὸ περιεχόμενον αὐτῆς είναι ἀληθές, ἢτοι $\tau(p) = \alpha$.

2ον: «Η έκφρασης q : « $O \sqrt{2}$ είναι ρητός αριθμός»» είναι μία λογική πρότασης, καθόσον τὸ περιεχόμενόν της είναι ψευδές, ἢτοι $\tau(q) = \psi$.

3ον: «Η έκφρασης « δ αριθμός x είναι μεγαλύτερος τοῦ 10» δὲν είναι πρότασης, διότι δὲν ἐπιδέχεται ἔνα τῶν χαρακτηρισμῶν «ἀληθής», «ψευδής».

Εἰς τὴν διατύπωσιν τῶν προτάσεων καὶ γενικώτερον τῶν έκφρασεων, Ιδίως δὲ εἰς τὰ Μαθηματικά, συναντῶμεν ὅρους καὶ σύμβολα, ὅπως π.χ. εἰς τὰ δύο πρῶτα παραδείγματα : «μιγαδικός ἀριθμός», «ρητός ἀριθμός», « $2 + 3i$ », « $\sqrt{2}$ » καὶ πλήθις ἄλλα παρόμοια, τὰ ὅποια ἔχουν μίαν καθωρισμένην καὶ μόνιμον σημασίαν εἰς ὅλην τὴν διάρκειαν τῆς ἐπεξεργασίας ἐνὸς θέματος. Εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν καλοῦμεν τοὺς ὅρους καὶ τὰ σύμβολα σταθεράς. Ἀντιθέτως εἰς τὸ παράδειγμα 3 τὸ σύμβολον x δὲν ἔχει μοναδικὴν σημασίαν, δύναται λ.χ. τὸ x νὰ είναι εἰς οἰσδήποτε φυσικός ἀριθμός ἢ ἀκόμη εἰς οἰσδήποτε πραγματικός ἀριθμός. Τὸ αὐτὸ συμβαίνει εἰς τὴν έκφρασιν $2x = 6$. Ὁμοίως εἰς τὴν έκφρασιν $x^2 + \sqrt{2} > y^3$ τὰ σύμβολα x καὶ y (ἄρα καὶ τὰ x^2 καὶ y^3) ἔχουν ἀκαθόριστον καὶ μὴ μόνιμον σημασίαν, κατέχουν δὲ τὴν θέσιν δύο οἰωνδήποτε, ἀπὸ μίαν ειδικήν κατηγορίαν, ἀντικειμένων, λ.χ. τὸ x είναι εἰς οἰσδήποτε φυσικός καὶ τὸ y εἰς οἰσδήποτε πραγματικός ἀριθμός. Τὰ τοιαῦτα σύμβολα δύνομεν μεταβλητάς. Φανερὸν είναι πλέον ὅτι έκφρασεις περιέχουσαι μεταβλητάς δὲν είναι προτάσεις.

§ 2. Προτασιακὸς τύπος ἢ ἀνοικτὴ πρότασις. — Ἐλέχθη ἀνωτέρω ὅτι μία έκφρασης περιέχουσα μεταβλητάς δὲν ἔχει νόημα προτάσεως, καθόσον δὲν γνωρίζομεν ἂν τὸ περιεχόμενον αὐτῆς είναι ἀληθές ἢ ψευδές. Μία τοιαύτη έκφραση γίνεται πρότασης, ὅταν αἱ ἔναρχοι μεταβληταὶ ἀντικατασταθοῦν μὲ σταθερὰς ώρισμένης κατηγορίας. Οὕτως ἡ έκφρασις :

« δ x είναι μεγαλύτερος τοῦ 10».

Θὰ γίνῃ πρότασις, ἂν ἡ μεταβλητὴ x ἀντικατασταθῇ μὲ ἔνα οἰωνδήποτε πραγματικὸν ἀριθμόν. Ἐάν λ.χ. ἀντικαταστήσωμεν τὸ x διὰ τοῦ 12, θὰ προκύψῃ ἡ πρότασις : « δ 12 είναι μεγαλύτερος τοῦ 10» μὲ τιμὴν ἀληθείας α . Ἐάν πάλιν ἀντικαταστήσωμεν τὸ x διὰ τοῦ 7, θὰ προκύψῃ ἡ πρότασις : « δ 7 είναι μεγαλύτερος τοῦ 10» μὲ τιμὴν ἀληθείας ψ . Ὁμοίως ἡ έκφρασις :

« δ φυσικὸς ἀριθμὸς x διαιρεῖ τὸν φυσικὸν ἀριθμὸν y ».

γίνεται πρότασις, ἐὰν ἀντικατασταθοῦν π.χ. τὸ $x = 5$ καὶ $y = 35$ μὲ τιμὴν ἀληθείας α , καθὼς καὶ διὰ $x = 7$, $y = 33$ μὲ τιμὴν ἀληθείας ψ . Παρατηροῦμεν ἐδῶ ὅτι ὑπάρχουν ζεύγη τιμῶν τῶν μεταβλητῶν x καὶ y ἀπὸ δύο καθοριζόμενα σύνολα, ἐν προκειμένῳ ἀπὸ τὸ σύνολον τῶν φυσικῶν καὶ ἀπὸ τὸ σύνολον τῶν πραγματικῶν ἀριθμῶν, διὰ τὰ ὅποια ἡ έκφρασης γίνεται ἀληθής πρότασις καὶ ἄλλα ζεύγη τιμῶν τῶν x καὶ y , διὰ τὰ ὅποια αὔτη γίνεται ψευδής πρότασις.

Αἱ έκφρασεις : « δ x είναι μεγαλύτερος τοῦ 10», « δ φυσικὸς ἀριθμὸς x διαιρεῖ

τὸν πραγματικὸν ἀριθμὸν γ» κ.ἄ., καλοῦνται προτασιακοὶ τύποι ή ἀνοικταὶ πρότασεις, ἄλλως προτασιακαὶ συναρτήσεις μιᾶς, ἀντιστοίχως δύο μεταβλητῶν.

Γενικῶς : Προτασιακὸς τύπος (ἢ ἀνοικτὴ πρότασις) μιᾶς ή περισσοτέρων μεταβλητῶν καλεῖται μία ἔκφρασις, η ὁποία περιέχει μίαν ή περισσοτέρας μεταβλητάς, καὶ η ὁποία καθίσταται πρότασις τότε, καὶ μόνον τότε, ἂν αἱ ἐν λόγῳ μεταβληταὶ ἀντικατασταθοῦν ἀπὸ στοιχεία ἐνδὸς ή περισσοτέρων συνόλων.

Οὕτως αἱ ἔξισώσεις καὶ αἱ ἀνισώσεις εἰναι προτασιακοὶ τύποι.

Χάριν συντομίας συμβολίζομεν τοὺς προτασιακοὺς τύπους μὲ μίαν μεταβλητὴν π.χ. τὴν x διὰ τῶν : $p(x)$, $q(x)$, $r(x)$, ..., μὲ δύο μεταβλητὰς π.χ. τὰς x , y διὰ τῶν : $p(x, y)$, $q(x, y)$..., καὶ γενικῶς διὰ n μεταβλητάς : $p(x_1, x_2, \dots, x_n)$ καὶ ἐννοοῦμεν ὅτι : ἡ μεταβλητὴ x διατρέχει ἐν σύνολον ἀντικειμένων, ἀντιστοίχως τῷ ζεῦγος τῶν μεταβλητῶν (x, y) ἐν σύνολον ζευγῶν ἀντικειμένων, ἀντιστοίχως ἐν σύνολον n -άδων ἀντικειμένων, εἰς τὰ ὅποια ἀναφέρεται ἡ ἔκφρασις p , ... Τὸ σύνολον αὐτὸς καλοῦμεν σύνολον ἀναφορᾶς τοῦ προτασιακοῦ τύπου.

Τὸ σύνολον τῶν τιμῶν τῆς μεταβλητῆς ή τῶν μεταβλητῶν, διὰ τὰς ὅποιας ὁ προτασιακὸς τύπος καθίσταται ἀληθής πρότασις, καλεῖται σύνολον τιμῶν ἀληθείας τοῦ προτασιακοῦ τύπου.

Εἶναι φανερὸν ὅτι εἰς τὴν περίπτωσιν προτασιακοῦ τύπου περισσοτέρων τῆς μιᾶς μεταβλητῶν τὸ σύνολον ἀληθείας του εἶναι, ἐν γένει, ἐν σύνολον διατεταγμένων ζευγῶν ἡ γενικώτερον n -άδων ἀντικειμένων. Οὕτως εἰς τὸν προτασιακὸν τύπον $p(x, y)$: « $3x + y = 8$ », ως σύνολον ἀναφορᾶς δυνάμεθα νὰ θεωρήσωμεν τὸ σύνολον $R \times R$, δηλ. τὸ σύνολον ζευγῶν πραγματικῶν ἀριθμῶν. Τότε τὸ σύνολον ἀληθείας του εἶναι τὸ σύνολον (ὅλων) τῶν διατεταγμένων ζευγῶν (x, y) , τὰ ὅποια ἐπαληθεύουν τὴν ίσοτητα $3x + y = 8$, λ.χ.

τὰ ζεύγη $(1,5), (2,2), \left(\frac{5}{3}, 3\right)$ κ.ἄ.

Σημεῖα : Προφανῶς οἱ συμβολισμοὶ $p(x)$ καὶ $p(y)$ νοοῦνται ως ταυτόσημοι, ἢτοι τὸ γράμμα, τὸ ὅποιον συμβολίζει τὴν μεταβλητὴν δὲν μεταβάλλει τὸ εἶδος τοῦ προτασιακοῦ τύπου. Κατὰ συνέπειαν, ἀλλαγὴ τοῦ ἀγνώστου εἰς μίαν ἔξισωσιν ἡ ἀνισωσιν, δίδει ίσοδύναμον ἔξισωσιν ἡ ἀνισωσιν.

§ 3. Ποσοδεῖκται.—”Εστω $p(x)$ εἰς προτασιακὸς τύπος καὶ Ω τὸ σύνολον ἀναφορᾶς του. Τότε τὸ σύνολον Ω χωρίζεται εἰς δύο σύνολα, ἢτοι εἰς τὸ σύνολον Ω_a , διὰ τὰ στοιχεία τοῦ ὅ προτασιακὸς τύπος $p(x)$ γίνεται λογικὴ πρότασις μὲ τιμὴν ἀληθείας α καὶ τὸ σύνολον $\Omega_{\neg a}$, διὰ τὰ στοιχεία τοῦ ὅ προτασιακὸς $p(x)$ γίνεται λογικὴ πρότασις μὲ τιμὴν ἀληθείας ψ.

Πολλάκις διὰ νὰ διατυπώσωμεν προτάσεις, αἱ ὅποιαι χρησιμοποιοῦνται εἰς τὰ Μαθηματικά, προτάσσομεν τοὺς καλουμένους ποσοδείκτας.

Οἱ ποσοδείκται, ὅπως γνωρίζομεν καὶ ἐκ τῆς προηγουμένης τάξεως, είναι δύο, ἢτοι :

1). ‘Ο καλούμενος ὑπαρξιακὸς ποσοδείκτης, συμβολιζόμενος μὲ « \exists », ὅστις ἀναγιγνώσκεται «ὑπάρχει τοὐλάχιστον ἐν...» εἴτε καὶ ἄλλως «διὰ μερικά...».

2). 'Ο καλούμενος καθολικός ποσοδείκτης, συμβολιζόμενος μὲ « \forall », δύστις άναγιγνώσκεται «διὰ κάθε...» εἴτε καὶ ὅλως «δι' ὅλα τά...».

Οἱ ποσοδείκται προτάσσονται*) προτασιακῶν τύπων οὕτω :

1). «Ἐ xp(x)» άναγιγνώσκεται : «ὑπάρχει ἐν τούλαχιστον x, ὡστε νὰ ἴσχυῃ p(x)», εἴτε καὶ οὕτω «διὰ μερικὰ x, ἴσχυει p(x)».

2). « \forall xp(x)» άναγιγνώσκεται : «διὰ κάθε x ἴσχυει p(x)» εἴτε καὶ οὕτω «δι' ὅλα τὰ x ἴσχυει p(x)».

Παρατηροῦμεν τώρα τὰ ἔξῆς : "Αν p(x) είναι εἰς προτασιακὸς τύπος, λ.χ. «ὅ x είναι πρῶτος ἀριθμὸς» καὶ Ω είναι τὸ σύνολον ἀναφορᾶς, εἰς τὸ παράδειγμά μας, λ.χ. τὸ σύνολον N τῶν φυσικῶν ἀριθμῶν, τότε :

1). 'Η ἔκφρασις «Ἐ xp(x)» είναι μία λογικὴ πρότασις, καθόσον αὗτη λαμβάνει τὴν τιμὴν α τότε, καὶ μόνον τότε, ἢν τὸ σύνολον Ω_a δὲν είναι κενὸν (δηλαδὴ τὸ σύνολον Ω_ψ είναι γνήσιον ὑποσύνολον τοῦ Ω) καὶ τὴν τιμὴν ψ τότε, καὶ μόνον τότε, ἢν τὸ σύνολον Ω_a είναι κενὸν (ἥτοι τὸ $\Omega_\psi = \Omega$).

2). 'Η ἔκφρασις « \forall xp(x)» είναι μία λογικὴ πρότασις, καθόσον αὗτη λαμβάνει τὴν τιμὴν α τότε, καὶ μόνον τότε, ἢν $\Omega_a = \Omega$ (δηλαδὴ τὸ Ω_ψ είναι ἵσον μὲ τὸ κενὸν) καὶ τιμὴν ψ τότε, καὶ μόνον τότε, ἢν Ω_a είναι γνήσιον ὑποσύνολον τοῦ Ω (δηλαδὴ τὸ Ω_ψ είναι διάφορον τοῦ κενοῦ).

Προτάσεις τῶν μορφῶν 1) καὶ 2) καλοῦνται ὑπαρξιακαί, ἀντιστοίχως ποσοτικαὶ προτάσεις. 'Εκ τῶν ἀνωτέρω συνάγομεν τώρα δῖ : Μία ὑπαρξιακὴ ἀντιστοίχως μία ποσοτικὴ πρότασις είναι πάντοτε μία λογικὴ πρότασις.

Π α ρ α δ εί γ μ α τ α : 1ον : 'Εὰν p(x) είναι δ προτασιακὸς τύπος : «x + 5 ≥ 13» μὲ σύνολον ἀναφορᾶς τὸ σύνολον N τῶν φυσικῶν ἀριθμῶν, τότε ἡ πρότασις : « \forall xp(x)», ἐκτενῶς ἡ : « \forall x, xεN μὲ x + 5 ≥ 13», είναι ψευδῆς, διότι τὸ $\Omega_a = \{8, 9, 10, \dots\}$ είναι γνήσιον ὑποσύνολον τοῦ N, ἐνῶ ἡ πρότασις : «Ἐ xp(x)», ἐκτενῶς ἡ : «Ἐ x, xεN μὲ x + 5 ≥ 13», είναι ἀληθῆς, διότι τὸ σύνολον τιμῶν ἀληθείας $\Omega_a = \{8, 9, \dots\}$ είναι διάφορον τοῦ κενοῦ.

2ον : 'Εὰν p(x) είναι δ προτασιακὸς τύπος : «(x + 1)² = x² + 2x + 1» μὲ σύνολον ἀναφορᾶς τὸ σύνολον R τῶν πραγματικῶν ἀριθμῶν, τότε ἡ πρότασις : « \forall xp(x)» λαμβάνει τὴν τιμὴν α, διότι $\Omega_a \equiv R$.

'Επίσης ἡ : «Ἐ xp(x)» λαμβάνει τὴν τιμὴν α, διότι τὸ Ω_ψ είναι ἵσον μὲ τὸ κενὸν σύνολον.

3ον : 'Εὰν p(x) : «x² + x + 1 < 0» μὲ σύνολον ἀναφορᾶς τὸ σύνολον R τῶν πραγματικῶν ἀριθμῶν, τότε ἡ πρότασις :

« \forall xp(x)» ἐκτενῶς ἡ : « \forall x, xεR μὲ x² + x + 1 < 0» είναι ψευδῆς, διότι Ω_a είναι τὸ κενὸν σύνολον καὶ συνεπῶς Ω_a γνήσιον ὑποσύνολον τοῦ R.

'Επίσης ἡ πρότασις :

«Ἐ xp(x)» ἐκτενῶς ἡ : «Ἐ x, xεR : x² + x + 1 < 0» λαμβάνει τὴν τιμὴν ψ, διότι $\Omega_a = \emptyset$.

* Κατωτέρω, χάριν εὐκολίας, οἱ ποσοδείκται ἐπονται ἐνίστε τῶν προτασιακῶν τύπων.

Οι ποσοδείκται προτάσσονται καὶ προτασιακῶν τύπων δύο ἢ περισσότερων μεταβλητῶν οὕτω :

$\forall x \forall y p(x,y)$, δηλαδὴ διὰ κάθε x καὶ κάθε y ισχύει $p(x, y)$.

$\exists x \exists y p(x,y)$, δηλαδὴ ὑπάρχει (τούλαχιστον) ἐν x καὶ ἐν y , ὡστε νὰ ισχύῃ $p(x, y)$.

$\forall x \exists y p(x,y)$, δηλαδὴ διὰ κάθε x ὑπάρχει ἐν y , ὡστε νὰ ισχύῃ $p(x, y)$.

$\exists x \forall y p(x,y)$, δηλαδὴ ὑπάρχει x , ὡστε διὰ κάθε y νὰ ισχύῃ $p(x, y)$.

Αἱ ἀνωτέρω ἔκφράσεις εἰναι λογικαὶ προτάσεις.

Παρατηροῦμεν ὅτι εἰς τὰς δύο πρώτας περιπτώσεις ἐπιτρέπεται μετάθεσις

$\forall x \forall y$ καὶ $\exists x \exists y$, ἦτοι ισχύει :

$$\forall x \forall y p(x,y) \equiv \forall y \forall x p(x,y)$$

$$\exists x \exists y p(x,y) \equiv \exists y \exists x p(x,y).$$

Τοῦτο δὲν ἐπιτρέπεται εἰς τὰς δύο τελευταίας περιπτώσεις, ὡς δεικνύει τὸ κάτωθι :

Παράδειγμα : "Εστω $p(x, y)$ δὲ προτασιακὸς τύπος : «'Ο x εἰναι μικρότερος τοῦ y »· μὲ σύνολον ἀναφορᾶς τὸ σύνολο R τῶν πραγματικῶν ἀριθμῶν, τότε ἡ πρότασις :

$\forall x \exists y p(x,y)$ λαμβάνει τὴν τιμὴν α , ἐνῷ ἡ πρότασις

$\exists y \forall x p(x,y)$ λαμβάνει τὴν τιμὴν ψ .

"Η πρώτη ἔκφράζει : «διὰ κάθε πραγματικὸν ἀριθμὸν ὑπάρχει εἰς μεγαλύτερος», ἐνῷ ἡ δευτέρα ἔκφράζει : «ὑπάρχει εἰς ἀριθμός, ὡστε κάθε ἄλλος νὰ εἰναι μικρότερος».

§ 4. Σύνθετοι προτάσεις. — "Ας θεωρήσωμεν τὴν πρότασιν :

«ὁ 4 εἰναι ἄρτιος ἀριθμός».

Αὕτη εἰναι μία ἀπλῆ λογικὴ πρότασις, καθόσον εἰς αὐτὴν ἀντιστοιχεῖ ἡ τιμὴ «ἀληθῆς». Αὕτη ἔκφράζει μίαν ίδιότητα, τὴν ὅποιαν ἔχει ἐν ἀντικείμενον (πρᾶγμα), δηλ. δὲ ἀριθμὸς 4, ἦτοι τὴν ίδιότητα :

(1) «... εἰναι ἄρτιος ἀριθμός».

Προφανῶς ἡ ίδιότης αὕτη ἀναφέρεται καὶ εἰς ἄλλα ἀντικείμενα (ἀριθμούς). Οὕτως, ἐὰν εἰς τὴν θέσιν τοῦ 4 γράψωμεν τὸ 7, τότε ἡ πρότασις :

«ὁ 7 εἰναι ἄρτιος ἀριθμός»,

εἶναι ἐπίστης λογικὴ πρότασις, καθόσον εἰς αὐτὴν ἀντιστοιχεῖ ἡ τιμὴ «ψευδῆς». Τὴν ίδιότητα (1) καλοῦμεν ἐν «κατηγόρημα».

Αἱ προτάσεις : «ὁ 4 εἰναι ἄρτιος ἀριθμός», «ὁ 7 εἰναι ἄρτιος ἀριθμός», δὲν δύνανται νὰ χωρισθοῦν εἰς δύο ἢ περισσότερας ἄλλας προτάσεις, δὲν συμβαίνει ὅμως τὸ αὐτὸν καὶ μὲ τὴν πρότασιν :

(1) «Οἱ ἀριθμοὶ 10 καὶ 12 εἰναι ἄρτιοι».

Αὕτη εἰναι μία λογικὴ πρότασις μὲ τιμὴν ἀληθείας α , ἀλλὰ χωρίζεται εἰς δύο ἄλλας προτάσεις, ἦτοι :

(2) «ὁ ἀριθμὸς 10 εἰναι ἄρτιος» καὶ «ὁ ἀριθμὸς 12 εἰναι ἄρτιος».

Έδω ό σύνδεσμος «καὶ» παίζει ένα ρόλον σχηματισμοῦ μιᾶς νέας προτάσεως, τῆς (1) ἐκ τῶν δύο ἀπλῶν προτάσεων (2). Τὴν ώς ἄνω πρότασιν (1) καλοῦμεν σύνθετον πρότασιν.

Γενικῶς : Μία πρότασις καλεῖται σύνθετος τότε, καὶ μόνον τότε, ἂν συνίσταται ἔξι ἀπλῶν προτάσεων συνδεδεμένων μεταξύ των μὲ διάφορα συνδετικά, τὰ δόπια καλοῦμεν λογικοὺς συνδέσμους.

Γενικῶς εἰς τὴν λογικὴν τῶν προτάσεων θεωροῦνται ώς λογικοὶ σύνδεσμοι αἱ ἑκφράσεις : «καί», «εἴτε», «ἐάν..., τότε...», «τότε, καὶ μόνον τότε, ἢν», ἐπίσης ἡ ἑκφραστικής «ὅχι», ὅταν τίθεται πρὸ μιᾶς προτάσεως.

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω λογικῶν συνδέσμων δὲ μὲν «ὅχι» εἶναι μονομελῆς σύνδεσμος, διότι προτάσσεται μιᾶς προτάσεως, οἱ ὑπόλοιποι δύμως εἶναι διμελεῖς, διότι συνδέουν δύο προτάσεις.

Παραδείγματα σύνθετων προτάσεων.

α). «Ο ἀριθμὸς 3 εἴτε ὁ ἀριθμὸς 4 εἶναι περιττός».

β). «Ἐὰν ὁ 4 εἶναι ἄρτιος, τότε ὁ $\sqrt{2}$ εἶναι ἄρρητος».

γ). «Ο φυσικὸς ἀριθμὸς 16 εἶναι ἄρτιος τότε, καὶ μόνον τότε, ἂν διαιρῆται ἀκριβῶς διὰ τοῦ 2».

δ). «Οχι ὁ 3 εἶναι ἄρτιος» = «ὁ 3 δὲν εἶναι ἄρτιος».

Εύκόλως δυνάμεθα νὰ ἀποφασιθῶμεν ὅτι αἱ ἀνωτέρω σύνθετοι προτάσεις εἶναι λογικαὶ προτάσεις μὲ τιμὴν ἀληθείας α. Κατὰ τὸν χαρακτηρισμὸν τῶν ἀνωτέρω συνθέτων προτάσεων εὐκόλως διαπιστοῦται ὅτι ἡ τιμὴ ἀληθείας των ἔξαρταται ἐκ τῶν τιμῶν ἀληθείας τῶν ἀπλῶν προτάσεων, ἔξι ὡν αὗται συνίστανται.

Εἰς τὴν λογικὴν τῶν προτάσεων δεχόμεθα γενικῶς ὅτι ἐκ δύο λογικῶν προτάσεων συνίσταται διὰ συνθέσεως αὐτῶν μὲ ἔνα ἐκ τῶν λογικῶν συνδέσμων «καί», «εἴτε», «ἐάν..., τότε...», «τότε, καὶ μόνον τότε, ἢν» μία νέα λογικὴ πρότασις. Ἐπίσης ἐκ μιᾶς προτάσεως (λογικῆς) διὰ προτάξεως τῆς ἀρνήσεως «ὅχι», προκύπτει μία λογικὴ πρότασις.

Αἱ προτάσεις θεωρούμεναι εἴτε μεμονωμένως, εἴτε ἐντὸς λογικοῦ συνδυασμοῦ μετ' ἄλλων προτάσεων, δύμως ὡς ἐν σύνολον, ἀποτελοῦν ἀντικείμενον μελέτης τοῦ μέρους ἕκεινου τῆς Μαθηματικῆς Λογικῆς, τὸ δόπιον καλεῖται **Προτασιακὸς Λογισμός**.

§ 5. "Αλγεβρα (λογισμὸς) τῶν προτάσεων. — Δεχόμεθα ὅτι ὑπάρχει ἐν σύνολον ἀπλῶν λογικῶν προτάσεων, τὸ δόπιον συμβολίζομεν μὲ Π: τὰ στοιχεῖα, ἔξι ὡν τὸ Π συνίσταται, δηλ. τὰς προτάσεις, συμβολίζομεν, ως ἐλέχθη καὶ εἰς τὴν § 1, μὲ τὰ γράμματα p, q, r, s,... Δεχόμεθα ἐπὶ πλέον ὅτι εἰς ἑκάστην πρότασιν p ἐκ τοῦ Π ἀντιστοιχεῖ ἀκριβῶς εἰς ἐκ τῶν δύο χαρακτηρισμῶν : «ἀληθής» (α), «ψευδής» (ψ), ἥτοι δεχόμεθα ὅτι ὑφίσταται μία μονοσήμαντος ἀπεικόνισις τοῦ συνόλου Π εἰς τὸ διμελὲς σύνολον {α, ψ}: Γράφομεν δέ :

τ : Π → {α, ψ} ἥ καὶ ἄλλως Πέρ → τ (p) ∈ {α, ψ}.

Διὰ τῆς μονοσήμαντος ταύτης ἀπεικονίσεως τ ἑκάστη πρότασις p λαμβάνει ἀκριβῶς μίαν τιμὴν τ(p) ἐν {α, ψ}, τὴν καλουμένην τιμὴν ἀληθείας τῆς προτάσεως p.

Θεωροῦμεν τώρα τοὺς κάτωθι λογικούς συνδέσμους, τῇ βοηθείᾳ τῶν ὅποιων ἐφοδιάζομεν τὸ σύνολον Π τῶν ἀπλῶν προτάσεων μὲ «λογικὰς πράξεις» :

1). 'Ο σύνδεσμος «καί», ὅστις συμβολίζεται μὲ «Λ» καὶ διαβάζεται «σύνενξις», ἢ «καί», χρησιμοποιεῖται διὰ τὸν σχηματισμὸν τῆς λογικῆς πράξεως τῆς συζεύξεως.

2). 'Ο σύνδεσμος «εἴτε» ἢ «ἢ», δ ὅποιος συμβολίζεται μὲ «V» καὶ διαβάζεται «διάζενξις», χρησιμοποιεῖται διὰ τὸν σχηματισμὸν τῆς λογικῆς πράξεως τῆς (ἐγκλειστικῆς) διαζεύξεως.

3). 'Η ἔκφρασις «εἰὰν . . . , τότε . . . », ἢ ὅποια συμβολίζεται μὲ «==>» καὶ διαβάζεται «ἔπεται», «συνεπάγεται», χρησιμοποιεῖται διὰ τὸν σχηματισμὸν τῆς λογικῆς πράξεως τῆς συνεπαγωγῆς.

4). 'Η ἔκφρασις «τότε, καὶ μόνον τότε, ἂν», ἢ ὅποια συμβολίζεται μὲ «=<>» καὶ διαβάζεται «ἔπεται καὶ ἀντιστρόφως» ἢ «συνεπάγεται καὶ ἀντιστρόφως», χρησιμοποιεῖται διὰ τὸν σχηματισμὸν τῆς λογικῆς πράξεως τῆς (λογικῆς) ισοδυναμίας.

5). 'Ο λογικὸς σύνδεσμος «ὅχι», ὅστις συμβολίζεται μὲ «~» καὶ διαβάζεται «ὅχι» ἢ «δέν», χρησιμοποιεῖται διὰ τὸν σχηματισμὸν τῆς λογικῆς πράξεως τῆς ἀρνήσεως.

Δεχόμεθα τώρα τὰ ἔξῆς : α). 'Εάν εἰς τῶν τεσσάρων πρώτων συνδέσμων τεθῆ μεταξὺ δύο οἰώνδηποτε ἀπλῶν προτάσεων p καὶ q ἐκ τοῦ Π, τότε προκύπτει μία σύνθετος πρότασις, ἢ ὅποια καλεῖται σύνθετος πρότασις πρώτης βαθμίδος. "Ητοι διὰ κάθε ζεύγος ἀπλῶν προτάσεων p καὶ q ἐκ τοῦ Π αἱ προτάσεις : pΛq, p∨q, p⇒q, p↔q είναι σύνθετοι προτάσεις πρώτης βαθμίδος. Φανερὸν είναι ὅτι οἱ ὄροι τοῦ ζεύγους p καὶ q ἐπιτρέπεται νὰ συμπίπτουν, ἥτοι αἱ

$$p \vee p, \quad p \wedge p, \quad p \Rightarrow p, \quad p \Leftrightarrow p,$$

είναι ἐπίσης σύνθετοι προτάσεις πρώτης βαθμίδος διὰ κάθε πρότασιν p ἐκ τοῦ Π.

β). 'Εάν ὁ πέμπτος λογικὸς σύνδεσμος τεθῆ πρὸ τυχούστης προτάσεως ἐκ τοῦ Π, τότε προκύπτει μία σύνθετος πρότασις, καλουμένη ἐπίσης πρώτης βαθμίδος, ἥτοι ~p είναι σύνθετος πρότασις πρώτης βαθμίδος.

§ 6. Πράξεις μεταξὺ λογικῶν προτάσεων. — Δι' ἑκάστην σύνθετον πρότασιν πρώτης βαθμίδος ὁρίζεται ἀκριβῶς μία τιμὴ ἐν {α, ψ} τῇ βοηθείᾳ τῶν κατωτέρω πινάκων. 'Η τιμὴ τῆς συνθέτου προτάσεως ἐν {α, ψ}, ἢ ὅποια καλεῖται καὶ τιμὴ ἀληθείας τῆς συνθέτου προτάσεως, ὁρίζεται πλήρως ἐκ τῶν τιμῶν ἀληθείας ἑκάστης τῶν ἀπλῶν προτάσεων ἐκ τῶν ὅποιων συνίσταται καὶ τοῦ τρόπου συνδέσεως αὐτῶν πρὸς σχηματισμὸν τῆς συνθέτου προτάσεως, οὐχὶ ὅμως ἀπὸ τὸ περιεχόμενον αὐτῶν.

Οἱ διάφοροι τρόποι συνδέσεως ἀπλῶν προτάσεων πρὸς σχηματισμὸν συνθέτου τοιαύτης, ἀποτελοῦν τὰς «λογικὰς πράξεις» μεταξὺ τῶν προτάσεων.

Αἱ θεμελιώδεις λογικαὶ πράξεις είναι αἱ ἔξῆς :

1. Σύνενξις : Τὰ ἔξαγόμενα τῆς λογικῆς πράξεως τῆς συζεύξεως Λ παρέχονται σχηματικῶς, ὅπως γνωρίζομεν καὶ ἐκ τῶν μαθημάτων τῆς προη-

γουμένης τάξεως, διὰ τοῦ κάτωθι πίνακος καλουμένου πίνακος τιμῶν ἀληθείας

τῆς σύζευξεως $p \wedge q$.

(1)

p	q	$p \wedge q$
a	a	a
a	ψ	ψ
ψ	a	ψ
ψ	ψ	ψ

Δυνάμει τοῦ ἔναντι πίνακος, ἡ τιμὴ $\tau(p \wedge q)$ τῆς προτάσεως $p \wedge q$ δρίζεται ἵση μὲ α, δηλαδὴ $\tau(p \wedge q) = \alpha$ τότε, καὶ μόνον τότε, ὅν τ(p) = $\tau(q) = \alpha$. εἰς πᾶσαν ἄλλην περίπτωσιν ἡ τιμὴ $p \wedge q$ εἶναι ἵση μὲ ψ, ἤτοι $\tau(p \wedge q) = \psi$.

"Ωστε : 'Η σύζευξις δύο προτάσεων εἶναι ἀληθεῖς.

Παράδειγμα : Εστωσαν αἱ προτάσεις :

p : «Ο $\frac{2}{3}$ εἶναι ρητὸς ἀριθμός» καὶ q : «Ο 5 εἶναι ἀρνητικὸς ἀριθμός».

Τότε ἡ σύζευξις αὐτῶν $p \wedge q$: «Ο $\frac{2}{3}$ εἶναι ρητὸς ἀριθμός καὶ δέ 5 εἶναι ἀρνητικὸς ἀριθμός» εἶναι μία σύνθετος πρότασις, ἡ δόποια εἶναι ψευδής (διατί ;).

2. Ἐγκλειστικὴ διάζευξις :

Δυνάμει τοῦ κάτωθι πίνακος, ἡ τιμὴ $\tau(p \vee q)$ τῆς προτάσεως $p \vee q$ δρίζεται ἵση μὲ ψ, ἤτοι $\tau(p \vee q) = \psi$ τότε, καὶ μόνον τότε, ὅν $\tau(p) = \tau(q) = \psi$. εἰς πᾶσαν ἄλλην περίπτωσιν ἡ τιμὴ τῆς $p \vee q$ εἶναι ἵση μὲ α.

(2)

p	q	$p \vee q$
a	a	a
a	ψ	a
ψ	a	a
ψ	ψ	ψ

"Ωστε : 'Η (ἐγκλειστικὴ) διάζευξις δύο προτάσεων εἶναι ἀληθής τότε, καὶ μόνον τότε, ἢν μία τοιύλαχιστον τῶν (ἀπλῶν) προτάσεων εἶναι ἀληθής.

Παράδειγμα : Εἶναι ἀληθής ἡ εἶναι ψευδής ἡ πρότασις :

«Ο ἀριθμὸς 17 εἶναι τέλειον τετράγωνον εἴτε δέ $\sqrt{2}$ εἶναι ἄρρητος»;

Ἀπάντησις : 'Η σύνθετος αὐτὴ πρότασις εἶναι ἀληθής, διότι, ὅν ταραστήσωμεν διὰ p τὴν πρότασιν : «Ο ἀριθμὸς 17 εἶναι τέλειον τετράγωνον» καὶ διὰ q τὴν πρότασιν : «Ο $\sqrt{2}$ εἶναι ἄρρητος», ἔχομεν $\tau(p) = \alpha$ καὶ $\tau(q) = \alpha$. "Οθεν, συμφώνως πρὸς τὸν ἀνωτέρω πίνακα (2), ἡ σύνθετος πρότασις :

$p \vee q$: «Ο ἀριθμὸς 17 εἶναι τέλειον τετράγωνον εἴτε δέ $\sqrt{2}$ εἶναι ἄρρητος» εἶναι ἀληθής.

3. Συνεπαγωγὴ :

Δυνάμει τοῦ κάτωθι πίνακος, ἡ τιμὴ $\tau(p \rightarrow q)$ τῆς προτάσεως $p \rightarrow q$ δρίζεται ἵση μὲ ψ τότε, καὶ μόνον τότε, ὅν $\tau(p) = \alpha$ καὶ $\tau(q) = \psi$. εἰς πᾶσαν ἄλλην περίπτωσιν ἡ τιμὴ τῆς $p \rightarrow q$ εἶναι ἵση μὲ α, ἤτοι :

(3)

p	q	$p \rightarrow q$
a	a	a
a	ψ	ψ
ψ	a	a
ψ	ψ	a

$\tau(p \rightarrow q) = \alpha$.

"Ωστε : 'Η συνεπαγωγὴ $p \rightarrow q$ εἶναι ψευδής τότε, καὶ μόνον τότε, ὅν ἡ p εἶναι ἀληθής καὶ ἡ q εἶναι ψευδής. Εἰς πάσας τὰς ἄλλας περιπτώσεις εἶναι ἀληθής.

Πῶς φαίνεται ὅτι ἡ συνεπαγωγὴ δὲν εἶναι ἀντιμεταθετικὴ λογικὴ πρᾶξις ;

Παράδειγμα: Είναι άληθης ή ψευδής η πρότασις: « $(3 = 4) \Rightarrow (7 > 2)$ »;

'Απάντησις: 'Η πρότασης είναι άληθης, διότι, όταν παραστήσωμεν διά p τήν: « $3 = 4$ » και διά q τήν: « $7 > 2$ », παρατηρούμεν διτή ή p είναι ψευδής (ψ) καὶ ή q είναι άληθης (α). Συνεπώς, συμφώνως πρός τὸν πίνακα (3), ή σύνθετος πρότασις:

$$p \Rightarrow q : \text{«} \text{ἐὰν } 3 = 4, \text{ τότε } 7 > 2 \text{»}$$

είναι άληθης.

Παρατήρησις: "Άλλοι τρόποι διατυπώσεως τῆς συνεπαγωγῆς $p \Rightarrow q$ είναι καὶ οἱ ἔξις :

1. «p είναι ίκανη συνθήκη διὰ q»
2. «q είναι ἀναγκαῖα συνθήκη διὰ p»
3. «ύπόθεσις : p, συμπέρασμα : q»
4. «p, δθεν q»
5. «p, ἄρα q»
6. «q συνάγεται ἐκ τοῦ p».

Παράδειγμα: "Εστω ἡ συνεπαγωγή : «'Εὰν τὰ τρίγωνα ΑΒΓ, Α'Β'Γ' είναι ίσα, τότε αἱ γωνίαι τῶν είναι ίσαι μία πρὸς μίαν».

'Η ύπόθεσης p : «τὰ τρίγωνα ΑΒΓ, Α'Β'Γ' είναι ίσα» είναι ίκανη συνθήκη διὰ τὸ συμπέρασμα τῆς ίσότητος τῶν ἀντιστοίχων γωνιῶν.

Τὸ συμπέρασμα q : «αἱ γωνίαι τῶν τριγώνων είναι ίσαι μία πρὸς μίαν» είναι ἀναγκαῖα συνθήκη διὰ τὴν ίσότητα τῶν τριγώνων· δηλαδὴ δὲν δύνανται τὰ τρίγωνα νὰ είναι ίσα χωρὶς αἱ γωνίαι τῶν νὰ είναι ίσαι μία πρὸς μίαν.

4) Λογικὴ ίσοδυναμία.

Δυνάμει τοῦ κάτωθι πίνακος, ή τιμὴ τ($p \Leftrightarrow q$) τῆς προτάσεως $p \Leftrightarrow q$

p	q	$p \Leftrightarrow q$
a	a	a
a	ψ	ψ
ψ	a	ψ
ψ	ψ	a

"Ωστε : 'Η (λογικὴ) ίσοδυναμία είναι άληθης τότε, καὶ μόνον τότε, ὅταν $\tau(p) = \tau(q)$. δῆθεν ἡ τιμὴ τ($p \Leftrightarrow q$) είναι ίση μὲν ψ , ἀν, καὶ μόνον ὅταν $\tau(p) \neq \tau(q)$.

'Η λογικὴ ίσοδυναμία είναι ἀντιμεταθετικὴ λογικὴ πρᾶξις ; Νὰ σχηματισθῇ δὲ σχετικὸς πίνακας άληθείας.

Παράδειγμα: Είναι άληθης η είναι ψευδής η πρότασις: « $(2 = 5) \Leftrightarrow (4 > 7)$ »;

'Απάντησις: 'Η δοθεῖσα ίσοδυναμία είναι άληθης, διότι, όταν παραστήσωμεν διά p : « $2 = 5$ » καὶ διά q : « $4 > 7$ », ἔχομεν $\tau(p) = \psi$ καὶ $\tau(q) = \psi$. 'Επομένως, συμφώνως πρός τὸν πίνακα (4), ή σύνθετος πρότασις :

$$p \Leftrightarrow q : \text{«} \text{Ο } 2 = 5 \text{ τότε, καὶ μόνον τότε, ἂν } 4 > 7 \text{ »}$$

είναι άληθης.

Παρατήρησις: a). 'Εκ τοῦ δρισμοῦ τῆς (λογικῆς) ίσοδυναμίας ἐννοοῦμεν διτή ίσχύουν αἱ ἔξις ίδιότητες :

1. $p \Leftrightarrow p$
2. $(p \Leftrightarrow q) \Leftrightarrow (q \Leftrightarrow p)$
3. $(p \Leftrightarrow q \wedge q \Leftrightarrow r) \Rightarrow (p \Leftrightarrow r)$.

β). "Άλλοι τρόποι λεκτικής διατυπώσεως της ίσοδυναμίας « $p \iff q$ » είναι και οι έξῆς :

1. « p έάν, καὶ μόνον έάν, q ».
2. « p είναι ίκανὴ καὶ ἀναγκαῖα συνθήκη διὰ q ».
3. « p πρέπει καὶ ἀρκεῖ q ».
4. « p καὶ q είναι λογικῶς ίσοδύναμοι» ή ἀπλῶς «ίσοδύναμοι».
5. « $p \implies q$ καὶ ἀντιστρόφως».

Σημείωσις : 'Εάν θέλωμεν νὰ δηλώσωμεν ότι ή ίσοδυναμία $p \iff q$ δύο προτάσεων υφίσταται έξι δρισμοῦ, τότε χρησιμοποιούμεν τὸ σύμβολον \iff , ήτοι γράφομεν $p \iff q$.

5) "Αρνησις": Κατά τὴν λογικὴν αὐτὴν πρᾶξιν διὰ κάθε πρότασιν p δεχόμεθα μίαν πρότασιν τῆς μορφῆς « $\delta\chi p$ », συμβολιζομένη « $\sim p$ », ή ὅποια είναι ἀληθῆς τότε, καὶ μόνον τότε, ἀν ἡ p είναι ψευδῆς, ψευδῆς δὲ ἀν ἡ p είναι ἀληθῆς.

Οὕτως ὁ πίνακας τιμῶν ἀληθείας τῆς ἀρνήσεως « $\sim p$ » είναι ὁ κάτωθι :

(5)	p	$\sim p$	Δυνάμει τοῦ ἔναντι πίνακος, ή τιμὴ $\tau(\sim p)$ τῆς πράξεως $\sim p$ δρίζεται πάντοτε διάφορος (ἀντίθετος) τῆς τιμῆς $\tau(p)$ τῆς προτάσεως p .
	α	ψ	"Οθεν, ἐάν $\tau(p) = \alpha$, τότε $\tau(\sim p) = \psi$ καὶ ἐάν $\tau(p) = \psi$, τότε $\tau(\sim p) = \alpha$.
	ψ	α	

Ωστε : Αἱ τιμαὶ ἀληθείας τῶν p καὶ $\sim p$ είναι πάντοτε ἀντίθετοι.

Παράδειγμα : 'Εάν p : « $\delta\sqrt{2}$ είναι ρητὸς ἀριθμός»' νὰ εὑρεθῇ ή τιμὴ $\tau(\sim p)$ τῆς προτάσεως $\sim p$.

Λύσις : "Έχομεν $\tau(p) = \psi$, ἄρα $\tau(\sim p) = \alpha$, ἐνθα :

$\sim p$: « $\delta\sqrt{2}$ είναι ρητὸς ἀριθμός» = « $\delta\sqrt{2}$ δὲν είναι ρητὸς ἀριθμός».

Παρατήρησις : 'Εκτὸς τῶν ἀνωτέρω λογικῶν συνδέσμων χρησιμοποιεῖται ἐνίστε ως σύνδεσμος καὶ ή ἔκφραστις « $\text{ἢ } μόνον \dots \text{ἢ } μόνον \dots$ », ή ὅποια συμβολίζεται μὲ $\underline{\vee}$ ή ∇ . Τῇ βιοθείᾳ τοῦ ἀνωτέρω συνδέσμου σχηματίζεται η λεγομένη ἀποκλειστικὴ διάζευξις. Οὕτως, ή ἀποκλειστικὴ διάζευξις δύο προτάσεων p , q συμβολίζεται μέ : $p \underline{\vee} q$ η $p \nabla q$ καὶ ἀναγιγνώσκεται « $\text{ἢ } μόνον } p \text{ η } μόνον } q$ ». Η σύνθετος πρότασις $p \underline{\vee} q$, κατατασσομένη καὶ αὕτη εἰς τὴν πρώτην βαθμίδα είναι, ὅπως γνωρίζομεν ἐκ τῆς προηγουμένης τάξεως, ἀληθῆς τότε, καὶ μόνον τότε, ἀν αἱ τιμαὶ ἀληθείας τῶν p καὶ q είναι διάφοροι, ψευδῆς δέ, ὅταν αἱ τιμαὶ ἀληθείας τῶν p καὶ q είναι ἴσαι.

Οθεν ἔχομεν τὸν ἔναντι πίνακα τιμῶν ἀληθείας τῆς ἀποκλειστικῆς διάζευξεως $p \underline{\vee} q$.

Δυνάμει τοῦ πίνακος τούτου, ή τιμὴ $\tau(p \underline{\vee} q)$ τῆς προτάσεως $p \underline{\vee} q$ δρίζεται ἵση μὲ α , τότε, καὶ μόνον τότε, ἀν $\tau(p) \neq \tau(q)$ καὶ $\tau(p \underline{\vee} q) = \psi$, τότε, καὶ μόνον τότε, ἀν $\tau(p) = \tau(q)$.

Ωστε : 'Η ἀποκλειστικὴ διάζευξις δύο προτάσεων είναι ἀληθῆς τότε, καὶ μόνον τότε, ἀν η μία είναι ἀληθῆς καὶ η ἄλλη ψευδῆς.

Παράδειγμα 1ον : Εἰς τὰ Μαθηματικὰ ἡ ἔκφρασις : « δ α εἶναι μεγαλύτερος ἢ ίσος τοῦ β » δρίζεται ως ἐξῆς :

$$a \geqq \beta \Leftrightarrow a > \beta \quad \text{ἢ} \quad a = \beta.$$

Κατόπιν τοῦ ἀνωτέρω ὄρισμον ποία ἡ τιμὴ ἀληθείας τῆς προτάσεως : « $a \geqq b$ ».

Άπαντη σις : Δυνάμει τοῦ ως ἀνω δρισμοῦ ἢ ἀνωτέρω πρότασις εἶναι ίσοδύναμος μὲ τὴν : « $a > b$ ἢ $a = b$ ». Αὕτη δῶμας εἶναι ἀληθής, διότι, ἂν παραστήσωμεν μὲτα τῆς πρότασης : « $a > b$ » καὶ \neg τῆς : « $a = b$ », ἔχομεν : $\tau(p) = \alpha$ καὶ $\tau(q) = \psi$. \neg Επὶ πλέον δὲ οὐδέποτε ἔνας ἀριθμός εἶναι καὶ μεγαλύτερος καὶ ίσος ἐνὸς ἄλλου ἀριθμοῦ. \neg Επομένως ἡ σύνθετος πρότασις :

« $a > b$ ἢ $a = b$ » ἀποτελεῖ μίαν ἀποκλειστικήν διάλεξιν, συνεπῶς, συμφώνως πρὸς τὸν πίνακα (6), ἔχομεν : $\tau(p \vee q) = \alpha$.

Σημείωσις. \neg Εκ τοῦ ἀνωτέρω παραδείγματος συμπεραίνομεν ὅτι εἶναι δρήθων νὰ γράφωμεν : « $a \geqq b$ » καὶ γενικῶς « $x \geqq y$ $\forall x, y \in \mathbb{R}$ (διατί ;).

Παράδειγμα 2ον : Κατόπιν τοῦ δρισμοῦ, τὸν ὁποῖον ἔδωσαμεν εἰς τὴν § 1 διὰ τὴν λογικὴν πρότασιν ἢ δήλωσιν, τί εἶναι ἡ ἔκφρασις : « \neg Η δήλωσις εἶναι μία ἀληθής ἢ ψευδής πρότασις».

Άπαντη σις : Η ἀνωτέρω ἔκφρασις εἶναι ἀποκλειστική διάλεξις, διότι ἡ (λογική) πρότασις ἢ δήλωσις εἶναι ἢ μόνον ἀληθής (καὶ δχι ψευδής), ἢ μόνον ψευδής (καὶ δχι ἀληθής). Δηλαδὴ ἡ δήλωσις οὐδέποτε εἶναι καὶ ἀληθής καὶ ψευδής.

Παράδειγμα 3ον : Εστω μία οἰκογένεια μὲδόν τέκνα, ἀμφότερα ἀγόρια. Εστω ρήπτη πρότασις : «Τὸ μεγαλύτερον τέκνον εἶναι ἀγόρι» καὶ \neg ἡ πρότασις : «Τὸ μικρότερον τέκνον εἶναι ἀγόρι». Νὰ ἀποδόσητε λεκτικῶς τὴν σύνθετον πρότασιν $p \vee \neg p$ καὶ νὰ εὑρητε τὴν τιμὴν ἀληθείας ταῦτης.

Άπαντη σις : Η σύνθετος πρότασις $p \vee \neg p$ σημαίνει :

$\neg \neg p$: «Η μόνον τὸ μεγαλύτερον τέκνον εἶναι ἀγόρι ἢ μόνον τὸ μικρότερον».

Αὕτη εἶναι ίσοδύναμος μὲτα τῆς :

«Η οἰκογένεια ἔχει ἔνα ἀγόρι καὶ ἔνα κορίτσι».

Προφανῶς ἡ τιμὴ ἀληθείας τῆς προτάσεως ταῦτης εἶναι ψ (=ψεῦδος). Εἰς τὸ αὐτὸν συμπέρασμα καταλήγομεν καὶ ἐκ τοῦ πίνακος 6, ὃν ληφθῆ $\neg p$ ὅψιν ὅτι : $\tau(p) = \alpha$, $\tau(\neg p) = \psi$.

“Ωστε :

$$\tau(p \vee \neg p) = \psi.$$

Άνακεφαλίωσις. Οἱ ἔξι ἀνωτέρω πίνακες τιμῶν ἀληθείας τῶν λογικῶν πράξεων τῆς συζεύξεως, ἐγκλειστικῆς διατάξεως, ἀποκλειστικῆς διατάξεως, συνεπαγωγῆς, ίσοδυναμίας καὶ ἀρνήσεως δύο προτάσεων p , q συνοψίζονται εἰς τὸν κάτωθι πίνακα :

p	q	Σύζευξις	Έγκλ. Διάζ.	Άπ. Διάζ.	Συνεπαγωγὴ	Ισοδυναμία	Άρνησις	
		$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \neg q$	$p \Rightarrow q$	$p \Leftrightarrow q$	$\sim p$	$\sim q$
α	α	α	α	ψ	α	α	ψ	ψ
α	ψ	ψ	α	α	ψ	ψ	ψ	α
ψ	α	ψ	α	α	α	ψ	α	ψ
ψ	ψ	ψ	ψ	ψ	α	α	α	α

§ 7. Ταυτολογίαι καὶ αὐτοαντιφάσεις.

1). Ταυτολογίαι. Μία σύνθετος πρότασης A , εἰς τὴν ὅποιαν ἐμφανίζονται αἱ ἀπλαῖ προτάσεις p_1, p_2, \dots, p_k ἐκ τοῦ συνόλου Π , καλεῖται μία ταυτολογία αἴ τότε, καὶ μόνον τότε, ἂν ἡ τιμὴ ἀληθείας αὐτῆς εἰναι ἡ α (=ἀληθεία), διὸ κάθε «συνδυασμὸν» τιμῶν ἀληθείας τῶν ἀπλῶν προτάσεων p_1, p_2, \dots, p_k . Αἱ ταυτολογίαι συμβολίζονται μὲν πρόταξιν τοῦ συμβόλου : \vdash , ἢτοι :

$\vdash A$ σημαίνει : ἡ πρόταση A εἰναι μία ταυτολογία.

Ἄξιόλογοι ταυτολογίαι εἰναι αἱ ἔξῆς :

- 1). *Νόμος τῆς ταυτότητος* : $\vdash p \implies p$.
- 2). *Νόμος διπλῆς ἀρνήσεως* : $\vdash p \iff \sim(\sim p)$.
- 3). *Νόμος ἀποκλείσεως τρίτου* : $\vdash p \vee \sim(p)$.
- 4). *Νόμος ἀντιφάσεως* : $\vdash \sim[p \wedge (\sim p)]$.

Τὸ ὅτι εἰναι ταυτολογίαι, φαίνεται σαφῶς ἐκ τῶν κάτωθι πινάκων :

p	$\sim p$	$\sim(\sim p)$	$p \wedge (\sim p)$	$p \implies p$	$p \iff \sim(\sim p)$	$p \vee \sim p$	$\sim[p \wedge (\sim p)]$
α	ψ	α	ψ	α	α	α	α
ψ	α	ψ	ψ	α	α	α	α

Παρατηρήσεις: 1). Ὡρισμέναι ταυτολογίαι, λόγῳ τῆς γενικῆς ἴσχυος των, καλοῦνται ἀρχαι ἡ νόμοι. Παραδείγματα τοιούτων ταυτολογιῶν εἰναι αἱ ἀνωτέρω ταυτολογίαι (1), (3), (4), αἱ ὅποιαι εἰναι τρεῖς ἐκ τῶν τεσσάρων νόμων τῆς Λογικῆς τοῦ Ἀριστοτέλους *).

Οἱ νόμοι τῆς Λογικῆς τοῦ Ἀριστοτέλους εἰναι οἱ κάτωθι τέσσαρες :

- a'). ‘Ο νόμος τῆς ταυτότητος
- β'). ‘Ο νόμος τῆς ἀντιφάσεως
- γ'). ‘Ο νόμος τοῦ ἀποχρῶντος λόγου καὶ
- δ'). ‘Ο νόμος τῆς τοῦ τρίτου ἀποκλείσεως.

2). Ἡ ταυτολογία (3), κατὰ τὴν ὅποιαν ἐκ δύο ἀντιφατικῶν προτάσεων p καὶ $\sim p$ ἡ μία εἰναι ἀληθής καὶ ἡ ἄλλη ψευδής, μέσῃ κατάστασις δὲν χωρεῖ, καλεῖται καὶ ἀρχὴ τῆς τοῦ μέσου ἡ τρίτου ἀποκλείσεως.

Παράδειγμα : Νὰ δειχθῇ ὅτι ἡ κάτωθι ἴσοδυναμία :

$\sim(p \wedge q) \iff \sim p \vee \sim q$ (Νόμος τοῦ De Morgan)
είναι ταυτολογία.

* Θεμελιώτης τῆς Λογικῆς, γενικῶς ὡς ἐπιστήμης τῶν νόμων τῆς σκέψεως, ὑπῆρξεν δὲ ἐκ Σταγείρων τῆς Μακεδονίας μέγας φιλόσοφος Ἀριστοτέλης (384 - 321 π.Χ.).

Λύσις : Σχηματίζομεν τὸν ἀκόλουθον πίνακα τιμῶν ἀληθείας τῆς δοθείσης ἰσοδυναμίας :

p	q	~ p	~ q	p ∧ q	~ (p ∧ q)	~ p ∨ ~ q	~ (p ∧ q) ⇔ ~ p ∨ ~ q
α	α	ψ	ψ	α	ψ	ψ	α
α	ψ	ψ	α	ψ	α	α	α
ψ	α	α	ψ	ψ	α	α	α
ψ	ψ	α	α	ψ	α	α	α

* Εκ τοῦ ἀνωτέρω πίνακος παρατηροῦμεν ὅτι ἡ τιμὴ ἀληθείας τῆς δοθείσης ἰσοδυναμίας είναι πάντοτε α, διὰ κάθε συνδυασμὸν τιμῶν ἀληθείας τῶν p καὶ q.

* Αρα ἡ δοθεῖσα ἰσοδυναμία είναι ταυτολογία.

* Ωστε : $\vdash \sim (p \wedge q) \Leftrightarrow \sim p \vee \sim q$.

Σημείωσις : Κατά τὸν αὐτὸν τρόπον ἀποδεικνύεται καὶ ὁ ἔτερος νόμος τοῦ De Morgan.
 $\sim (p \vee q) \Leftrightarrow \sim p \wedge \sim q$.

2). Αντοντιφάσεις. Μία σύνθετος πρότασις B, εἰς τὴν ὁποίαν ἐμφανίζονται αἱ ἀπλαῖ προτάσεις p_1, p_2, \dots, p_n , καλεῖται αὐτονόμη αστις τότε, καὶ μόνον τότε, ὃν ἡ τιμὴ ἀληθείας αὐτῆς είναι ψ (=ψεῦδος), διὰ κάθε συνδυασμὸν τιμῶν ἀληθείας τῶν ἀπλῶν προτάσεων p_1, p_2, \dots, p_n ἡ συντομώτερον, ὅταν ἡ ἄρνησις αὐτῆς είναι μία ταυτολογία.

Μία αὐτοαντίφασις συμβολίζεται μὲν πρόταξιν τοῦ συμβόλου $\sim \vdash$.

Παράδειγμα : Νὰ δειχθῇ ὅτι ἡ πρότασις : $(p \Rightarrow q) \Leftrightarrow (p \wedge \sim q) \equiv B(p, q)^*$ είναι αὐτοαντίφασις.

Λύσις : Σχηματίζομεν τὸν πίνακα τιμῶν ἀληθείας τῆς προτάσεως B (p, q).

p	q	~ q	$p \Rightarrow q$	$p \wedge \sim q$	B (p, q)	$\sim B (p, q)$
α	α	ψ	α	ψ	ψ	α
α	ψ	α	ψ	α	ψ	α
ψ	α	ψ	α	ψ	ψ	α
ψ	ψ	α	α	ψ	ψ	α

* Εκ τοῦ ἀνωτέρω πίνακος παρατηροῦμεν ὅτι ἡ τιμὴ ἀληθείας τῆς προτάσεως B (p, q) είναι πάντοτε ψ, διὰ κάθε συνδυασμὸν τιμῶν ἀληθείας τῶν p καὶ q.

* Επίσης ἐκ τῆς τελευταίας στήλης τοῦ ἀνωτέρω πίνακος βλέπομεν ὅτι : $\sim B (p, q)$ είναι ταυτολογία. * Αρα : $\sim \vdash B (p, q)$.

Γενικὴ παρατήρησις. Τὰ ἀναπτυχθέντα μέχρι τοῦδε περὶ λογισμοῦ τῶν προτάσεων ισχύουν καὶ ἀν εἰς τοὺς ἀνωτέρω πίνακας τὰ σύμβολα p

* Ενταῦθα τὸ σύμβολον « \equiv » σημαίνει : συντόμως συμβολίζομεν τὴν ἀριστερὰ πρότασιν μὲ...

καὶ οἱ ἀντικατασταθοῦν μὲν προτασιακοὺς τύπους (ἀνοικτὰς προτάσεις), τῶν δόπιοιν ὅμως τὸ ἀληθὲς η̄ ψευδές θὰ ἀναφέρηται εἰς τὸ σύνολον τιμῶν τῆς μεταβλητῆς η̄ τῶν μεταβλητῶν τῶν ἐν λόγῳ προτασιακῶν τύπων.

AΣΚΗΣΕΙΣ

1. Ἐστωσαν αἱ ἀνοικταὶ προτάσεις :

ρ : «Ο χ είναι ρητὸς ἀριθμός», q : «Ο χ είναι φυσικὸς ἀριθμός».

α). Νὰ γραφοῦν ὑπὸ συμβολικήν μορφὴν αἱ κάτωθι ἔκφράσεις :

1. «Ο χ δὲν είναι ρητὸς ἀριθμός»,
2. «Ο χ δὲν είναι φυσικὸς ἀριθμός»,
3. «Ο χ είναι ρητὸς καὶ δχι φυσικὸς ἀριθμός».

β). Νὰ διατυπωθοῦν μὲν λέξεις οἱ κάτωθι (λογικοὶ) τύποι :

p ∨ q, p ∧ q, ~ p ∧ ~ q, p ∧ ~ q, p ∨ ~ q, q → p, ~ p ↔ ~ q.

2. Τί σημαίνει ἐκάστη τῶν κάτωθι λογικῶν προτάσεων ;

- α) $(5 < 7) \wedge (7 < 8)$, β) $\sim (\alpha = \beta)$,
γ) $(x < 0) \vee (x = 0) \vee (x > 0)$.

3. Ἐχουν νόημα συνθέτου προτάσεως αἱ ἔκφράσεις ;

α) «σχῆμα υ τύπος». β) $7 \leftrightarrow 3$. γ) «Ἀνατολὴ υ Δύσις».
(Ἀπάντησις : ζητ. (διατί ;)).

4. Νὰ εύρεθοῦν αἱ τιμαὶ ἀληθείας τῶν κάτωθι συνθέτων προτάσεων :

- α) $(4 = \frac{12}{3}) \vee (3 = 8)$, β) $(3 - \frac{1}{7} < 5) \rightarrow (2 = 2)$,
γ) $(7 = 4 + 3) \rightarrow (2 > 5)$, δ) $(2 = 3) \leftrightarrow (5 = 7)$,
ε) $(27 = 3 \cdot 8) \vee (5^2 = 25)$, στ) $(2 > 5) \leftrightarrow (3 = 8)$.

5. Δικαιολογήσατε διατί η πρότασις : «Ἐὰν ὁ Περικλῆς ήτο ποταμός, τότε ὁ Παρθενώνευρός εὑρίσκεται εἰς τὰς Ἀθήνας» είναι ἀληθής.

6. Δείξατε διτὶ ἐκάστη τῶν ἐπομένων συνθέτων προτάσεων είναι ταυτολογία.

- α) $\sim (p \wedge q) \leftrightarrow (p \rightarrow \sim q)$, β) $p \wedge q \rightarrow p \vee q$,
γ) $p \wedge (p \vee q) \leftrightarrow p$, δ) $p \vee (p \wedge q) \leftrightarrow p$,
ε) $(p \rightarrow q) \leftrightarrow (\sim p) \vee q$, στ) $(p \vee \sim p) \wedge (q \vee \sim q)$,
ζ) $[p \wedge (p \rightarrow q)] \rightarrow q$, η) $[(p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow \sim q)] \rightarrow \sim p$,
θ) $[(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)] \rightarrow (p \rightarrow r)$, ι) $(p \vee q) \wedge r \leftrightarrow (p \wedge r) \vee (q \wedge r)$.
7. Δείξατε διτὶ ἐκάστη τῶν ἐπομένων συνθέτων προτάσεων είναι αὐτοαντίφασις.
- α) $(p \wedge q) \wedge (\sim p \vee \sim q)$, β) $(p \vee q) \wedge (\sim p \wedge \sim q)$,
γ) $\sim (p \wedge q) \leftrightarrow \sim (\sim p \vee \sim q)$, δ) $\sim p \wedge \sim q \leftrightarrow p \vee q$.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ

§ 8. Η έννοια τοῦ συνόλου.— Η έννοια τοῦ συνόλου, ώς καὶ ἡ έννοια τῆς λογικῆς προτάσεως, θεωρεῖται ώς πρωταρχική έννοια, ώς έννοια μὴ ἐπιδεχομένη δρισμόν, ώς έννοια μὴ δυναμένη ν' ἀναχθῆ εἰς ἄλλην έννοιαν.

Εἰς τὰ Μαθηματικὰ δεχόμεθα ὅτι ἐπιτρέπεται πολλὰ ἀντικείμενα σαφῶς καθωρισμένα καὶ διακεκριμένα μεταξύ των νὰ θεωρηθοῦν ώς ἐν ν ἐ ο ν ἀ ν τ ι κ ε ί - μ ε ο ν, τὸ ὅποιον καλοῦμεν τὸ σύνολον τῶν θεωρουμένων ἀντικειμένων.

Τὰ ἀντικείμενα συμβολίζονται συνήθως μὲ μικρὰ γράμματα τοῦ ἀλφαριθμοῦ, π.χ. α, β, γ, . . . Ἐν σύνολον ἀντικειμένων συμβολίζεται μὲ ἐν κεφαλαῖον γράμμα τοῦ ἀλφαριθμοῦ, π.χ. Σ, Α, Χ, χωρὶς βεβαίως τοῦτο νὰ είναι ὑποχρεωτικόν, π.χ. εἰς τὴν γεωμετρίαν συμβαίνει συχνὰ τὸ ἀντίστροφον. Τὰ ἀντικείμενα α, β, γ, . . . , τὰ ὅποια δρίζουν ἐν σύνολον, λ.χ. τὸ Σ, καλοῦνται εἰς τὴν «γλῶσσαν τῶν συνόλων», στοιχεῖα τοῦ συνόλου Σ, πολλάκις δὲ καὶ σημεῖα τοῦ συνόλου Σ.

Δι' ἐν τυχὸν στοιχείον x καὶ δι' ἐν τυχὸν σύνολον Σ δεχόμεθα ὅτι ίσχύει μία μόνον ἀπὸ τὰς σχέσεις :

1) $x \in \Sigma$ (δηλαδὴ τὸ x ἀνήκει εἰς τὸ Σ ἢ τὸ x είναι στοιχεῖον τοῦ Σ).

2) $x \notin \Sigma$ (δηλ. τὸ x δὲν ἀνήκει εἰς τὸ Σ ἢ τὸ x δὲν είναι στοιχεῖον τοῦ Σ).

Η έννοια τοῦ συνόλου είναι συνδεδεμένη μὲ τὴν έννοιαν μιᾶς «σχέσεως ισότητος» ωρισμένης μεταξύ τῶν στοιχείων του, βάσει τῆς ὅποιας θεωροῦμεν ταῦτα, ἔὰν δὲν συνδέωνται διὰ τῆς σχέσεως =, ώς διακεκριμένα μεταξύ των. Ἀκριβέστερον : δεχόμεθα ὅτι κάθε σύνολον Σ στοιχείων $a, b, g, \dots, x, y, z, \dots$ είναι ἐφωδιασμένον μὲ μία σχέσιν ισότητος, ἥτοι ὅτι: διὰ κάθε ζεῦγος στοιχείων x, y ἐκ τοῦ Σ είναι βέβαιον καὶ κατὰ ἓνα ἀκορύθως τρόπον (\equiv μονοσημάντως), ὅν τὰ στοιχεῖα ταῦτα είναι ἵσα, ὅπότε γράφομεν $x = y$, ἢ διάφορα, ὅπότε γράφομεν $x \neq y$. Η σχέσις αὕτη πληροῖ τὰς ἔξης χαρακτηριστικὰς ἰδιότητας (\equiv ἀξιώματα) τῆς ισότητος :

α) $x = x \quad \forall x \in \Sigma$ (αὐτοπαθής ἰδιότητα)

β) $\exists v x = y, \text{ τότε } y = x$ (συμμετρική ἰδιότητα)

γ) $\exists v x = y \text{ καὶ } y = z, \text{ τότε } x = z$ (μεταβατική ἰδιότητα).

Τὴν ώς ἀνω ισότητα, ἢ ὅποια δρίζει τὸ Σ (διακρίνει τὰ στοιχεῖα του) καλοῦμεν «βασικήν ισότητα» πρός διάκρισιν ἀπὸ κάθε ἄλλην «ισότητα» δριζομένην ἐν Σ.

Προσέξ α τε ! Τὸ σύμβολον = συμβολίζει τὴν βασικήν ισότητα καὶ δὲν πρέπει νὰ συγχέηται μὲ τὸ \equiv , τοῦ ὅποιου ἡ σημασία ἔχει ἡδη ἔξηγηθῆ.

Παραδείγματα συνόλων.

1. Τὸ σύνολον τῶν φυσικῶν ἀριθμῶν : 1, 2, 3, . . . , ν, . . . Τοῦτο συμβολίζεται μὲ τὸ γράμμα : N.

2. Τὸ σύνολον τῶν ἀκεραίων ἀριθμῶν : 0, +1, -1, +2, -2, . . . , +ν, -ν, . . . Τοῦτο συμβολίζεται μὲ τὸ γράμμα : Z.

3. Τὸ σύνολον τῶν ρητῶν ἀριθμῶν, ὅπερ συμβολίζομεν μέ : Q.

4. Τὸ σύνολον τῶν πραγματικῶν ἀριθμῶν, ὅπερ συμβολίζομεν μὲ τὸ γράμμα R, ἐνῶ μὲ τὰ σύμβολα R+, R0+ συμβολίζομεν τοὺς θετικοὺς πραγματικούς ἀριθμούς, ἀντίστοιχως τοὺς μὴ ἀρνητικούς πραγματικούς ἀριθμούς.

5. Τὸ σύνολον τῶν μιγαδικῶν ἀριθμῶν, ὅπερ συμβολίζομεν μὲ τὸ γράμμα C. Οὕτω, δυνάμει τῶν ἀνωτέρω συμβολισμῶν, θὰ ἔχωμεν :

$$1 \in N, -\frac{2}{3} \in N, \quad \sqrt{2} \in Q, \quad \sqrt{2} \in R^+, \quad -\frac{7}{8} \in Q^+, \quad -2 \in Z, \quad 3+5i \in C.$$

§ 9. Παράστασις συνόλου.— Συνήθεις τρόποι παραστάσεως ἐνὸς συνόλου εἶναι οἱ κάτωθι δύο :

a). Δι' ἀναγραφῆς τῶν στοιχείων του. Εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν ἔκαστον σύνολον δρίζεται διὰ δηλώσεως (ἀναγραφῆς) δῶλων τῶν στοιχείων τῶν ἀνηκόντων εἰς αὐτό. Οὕτω, π.χ., τὸ σύνολον μὲ στοιχεῖα αὐτοῦ τοὺς ἀριθμούς 1, 2, 3, 4 θὰ συμβολίζωμεν γράφοντες τὰ στοιχεῖα του μεταξὺ ἀγκίστρων, ἢτοι :

$$\{ 1, 2, 3, 4 \}.$$

Κατὰ τὸν συμβολισμὸν τοῦτον δὲν ἔχει σημασίαν ἡ σειρὰ μὲ τὴν ὅποιαν γράφομεν τὰ στοιχεῖα τοῦ συνόλου μεταξὺ τῶν ἀγκίστρων. "Οθεν τά: { 1, 2, 3, 4 }, { 1, 3, 4, 2 }, { 2, 3, 4, 1 } κ.τ.λ. συμβολίζουν τὸ αὐτὸ σύνολον. Γενικῶς: { α, β, γ, . . . } συμβολίζει ἐν σύνολον, τὸ ὅποιον δρίζεται ἀπὸ τὰ στοιχεῖα α, β, γ καὶ ἄλλα ἀκόμη, τὰ ὅποια ἐκ τοῦ τρόπου δηλώσεως τῶν α, β, γ ἐννοοῦνται καὶ — χάριν συντομίας — παραλείπονται.

Οὕτω τὸ σύνολον τῶν φυσικῶν ἀριθμῶν συμβολίζεται ὡς κάτωθι :

$$N \equiv \{ 1, 2, 3, \dots \} *.$$

b). Διὰ περιγραφῆς τῶν στοιχείων του. 'Ο ἀνωτέρω τρόπος παραστάσεως ἐνὸς συνόλου δι' ἀναγραφῆς τῶν στοιχείων του δὲν δύναται νὰ ἐφαρμοσθῇ πρακτικῶς (τούλαχιστον) εἰς τὴν περίπτωσιν συνόλου μὲ μεγάλον ἀριθμὸν στοιχείων, λ.χ. εἰς τὴν περίπτωσιν τοῦ συνόλου τῶν ὀνομάτων δῶλων τῶν κατοίκων τῆς Εύρωπης καὶ θεωρητικῶς εἰς τὴν περίπτωσιν συνόλου μὲ ἀπειρον πλῆθος στοιχείων λ.χ. τοῦ συνόλου Q τῶν ρητῶν ἀριθμῶν. Εἰς τὰς περιπτώσεις αὐτὰς τὰ σύνολα δρίζονται δι' ίδιοτήτων ἀναφερομένων εἰς τὰ στοιχεῖα αὐτῶν. "Ολα τὰ ἀντικείμενα μιᾶς ὥρισμένης ίδιότητος θεωροῦμεν ὡς ἐν σύνολον. "Αν ἡ ίδιότης συμβολίζεται μέ: p(), τότε p(x) συμβολίζει τὴν (ἀνοικτήν) πρότασιν ἡ ἄλλως τὴν συνθήκην: «τὸ ἀντικείμενον x ἔχει τὴν ίδιότητα p()».

* Τὸ σύμβολον \equiv (ίσον) σημαίνει, δπου συναντᾶται, «τὸ αὐτὸ δυνάμει δρισμοῦ (εἴτε συμβολισμοῦ) μέ».

Μὲ { $x : p(x)$ } συμβολίζομεν τότε τὸ σύνολον τῶν ἀντικειμένων μὲ τὴν ίδιότητα $p(\)$. Οὔτως, ἀν λ.χ. $p(\)$ συμβολίζῃ τὴν ίδιότητα :

«... εἰναι ἄρτιος ἀριθμός»,

τότε $p(x)$ συμβολίζει τὴν (ἀνοικτὴν) πρότασιν : «ὅ x εἰναι ἄρτιος ἀριθμός». Αὕτη καθίσταται λογική πρότασις, ἀν ἀντικαταστήσωμεν τὸ x μὲ ἔνα ἀριθμὸν δ ὅποιος μάλιστα, ἐὰν συμβῇ νὰ εἰναι ἄρτιος καθιστῷ τὴν πρότασιν ἀληθῆ. Τότε τὸ { $x : p(x)$ } συμβολίζει τὸ σύνολον (ὅλων) τῶν ἀρτίων ἀριθμῶν.

Πρός ἀποφυγὴν παρερμηνεῖῶν καὶ ἀντινομῶν δεχόμεθα ὅτι μία ίδιότης $p(\)$ ἀναφέρεται εἰς ἀντικείμενα, τὰ ὅποια ἀνήκουν εἰς ἐν ὡρισμένον σύνολον Ω . Εάν τώρα ἐν ἀντικείμενον $\alpha \in \Omega$ τεθῇ ἐν $p(\)$, ἥτοι ἀν γράψωμεν $p(\alpha)$, τότε τὸ $p(\alpha)$ συμβολίζει μίαν λογικὴν πρότασιν, διὰ τὴν ὅποιαν δυνάμεθα ν' ἀποφανθῶμεν κατὰ ἔνα καὶ μόνον τρόπον, ἀν αὐτῇ εἰναι ἀληθῆς ή ψευδῆς. Τότε διὰ τοῦ συμβόλου :

$$\{x \in \Omega : p(x)\} \text{ εἴτε } \text{ἄλλως } \{x \in \Omega | p(x)\}$$

δορίζεται ἐν ὑποσύνολον A τοῦ Ω , τοῦ ὅποιου τὰ στοιχεῖα καὶ μόνον αὐτὰ εἰναι δλα ἐκεῖνα τὰ $x \in \Omega$, διὰ τὰ ὅποια ἡ $p(x)$, ὡς λογικὴ πρότασις, λαμβάνει τὴν τιμὴν «ἀληθῆς». «Ωστε δεχόμεθα ὅτι : Διὰ κάθε σύνολον Ω καὶ μίαν ίδιότητα $p(\)$ δορίζεται διὰ τοῦ συμβόλου { $x \in \Omega : p(x)$ } πάντοτε ἐν σύνολον, τοῦ ὅποιου στοιχεῖα εἰναι δλα ἐκεῖνα τὰ $x \in \Omega$, διὰ τὰ ὅποια ἡ πρότασις $p(x)$ εἰναι ἀληθῆς.

Ὑπὸ τὴν ὡς ἀνω σημασίαν θὰ θεωρῶμεν εἰς τὰ ἐπόμενα τὸ σύμβολον : { $x \in \Omega : p(x)$ }. Ἐπομένως, ἐὰν $A \equiv \{x \in \Omega : p(x)\}$, τότε εἰναι :

$$\forall x, x \in A \iff p(x) \text{ ἀληθῆς.}$$

Π α ρ ά δ ει γ μ α : «Εστω ὁ προτασιακὸς τύπος $p(x)$: « $x^2 - 3x + 2 = 0$ » μὲ σύνολον ἀναφορᾶς τὸ σύνολον R τῶν πραγματικῶν ἀριθμῶν. Αἱ τιμαὶ τῆς μεταβλητῆς x , αἱ ὅποιαι καθιστοῦν τὸν $p(x)$ ἀληθῆ πρότασιν εἰναι : 1, 2.

Ἐπομένως τό : { $x \in R : x^2 - 3x + 2 = 0$ } εἰναι τὸ διμελὲς σύνολον {1, 2}.

Π αρ α τήρησις : Τὸ σύμβολον «::» ή «|» ἀναγιγνώσκεται «τοιοῦτον, ὡστε», τὸ δὲ πρὸ τοῦ ὡς ἀνω συμβόλου γράμμα δημιουργεῖ τὸ σύνολον συμφώνως πρὸς τὴν μετά τοῦτο συνθήκην.

§ 10. Τὸ κενὸν σύνολον.—Δεχόμεθα τὴν ὑπαρξίν ἐνὸς συνόλου, τὸ ὅποιον καλοῦμεν «τὸ κενὸν σύνολον» καὶ συμβολίζομεν τοῦτο μὲ { } ἡ ἄλλως μὲ \emptyset . Τοῦτο εἰναι ἐν σύνολον, εἰς τὸ ὅποιον οὐδὲν στοιχεῖον ἀνήκει, ἥτοι διὰ κάθε ἀντικείμενον x ἴσχυει $x \notin \emptyset$. Οὔτω τὸ σύνολον : { $x \in R : x^2 + 1 = 0$ } εἰναι τὸ κενόν. Ὁμοίως, ἀν θεωρήσωμεν τό : { $x \in R : x \neq x$ } $\equiv K$, διαπιστώνομεν ἀμέσως ὅτι τοῦτο δὲν δύναται νὰ ἔχῃ στοιχεῖα, ἥτοι $\forall x \in R$ ἴσχυει $x \notin K$.

§ 11. Ὑποσύνολον ἄλλου συνόλου. Ὑπερσύνολον. Ἰσότης δύο συνόλων.

Ἐστωσαν A καὶ B δύο μὴ κενὰ σύνολα.

α). Θὰ λέγωμεν : «Τὸ σύνολον A εἰναι ὑποσύνολον τοῦ B » εἴτε ἄλλως «τὸ A περιέχεται (= ἐγκλείεται) εἰς τὸ B » καὶ θὰ συμβολίζωμεν τοῦτο μὲ : « $A \subseteq B$ » τότε, καὶ μόνον τότε, ἀν διὰ κάθε $x \in A$ ἔπειται $x \in B$.

‘Ο δινωτέρω όρισμός μὲ χρῆσιν τῶν συμβόλων τῆς λογικῆς διατυποῦται συντόμως οὕτω :

$$A \subseteq B \Leftrightarrow_{\text{օրσ}} (x \in A \implies x \in B)$$

β). Θὰ λέγωμεν : «Τὸ σύνολον A εἶναι ύπερσύνολον τοῦ B » καὶ θὰ συμβολίζωμεν τοῦτο μὲ « $A \supseteq B$ » τότε, καὶ μόνον τότε, ἀν τὸ B εἶναι ύποσύνολον τοῦ A .

”Ητοι :

$$A \supseteq B \Leftrightarrow_{\text{օրσ}} B \subseteq A.$$

Τὸ σύμβολον « \supseteq » ἀναγιγνώσκεται «περιέχει τὸ» ἢ ἄλλως «έγκλειει τό».

γ). Θὰ λέγωμεν : «Τὸ A εἶναι γνήσιον ύποσύνολον τοῦ B » καὶ θὰ συμβολίζωμεν τοῦτο μὲ $A \subset B$ τότε, καὶ μόνον τότε, ἀν τὸ $A \subseteq B$ καὶ υπάρχει ἐν (τούλαχιστον) $y \in B$ μὲ $y \notin A$.

”Ητοι : $A \subset B \Leftrightarrow_{\text{օրσ}} (\forall x \in A \implies x \in B) \wedge (\exists y \in B : y \notin A)$.

δ). Θὰ λέγωμεν : «Τὸ A εἶναι ἴσον μὲ τὸ B » καὶ θὰ συμβολίζωμεν τοῦτο μὲ $A = B$ τότε, καὶ μόνον τότε, ἀν ἰσχύουν συγχρόνως : $A \subseteq B$ καὶ $B \subseteq A$.

Συντόμως δ ὁρισμὸς οὗτος δίδεται ώς κάτωθι :

$$A = B \Leftrightarrow_{\text{օրσ}} (A \subseteq B \wedge B \subseteq A).$$

‘Ο δρισμὸς οὗτος εἶναι ἴσοδύναμος μὲ :

$$(A = B) \Leftrightarrow (\forall x : x \in A \implies x \in B) \wedge (y : y \in B \implies y \in A) \Leftrightarrow (x \in A \iff x \in B).$$

’Εὰν τὰ σύνολα A , B δὲν εἶναι ἴσα γράφομεν : $A \neq B$ (A διάφορον τοῦ B).

”Ωστε :

$$A \neq B \Leftrightarrow \sim (A = B).$$

Κατόπιν τούτου δ ὁρισμὸς τοῦ γνησίου ύποσυνόλου διατυποῦται συντόμως οὕτω :

$$A \subset B \Leftrightarrow_{\text{օրσ}} A \subseteq B \text{ καὶ } A \neq B.$$

’Ισχύουν αἱ κάτωθι ἴδιότητες :

- 1). $A \subseteq A$, διὰ κάθε σύνολον A (ἀντοπαθής)
- 2). ’Εὰν $A \subseteq B$ καὶ $B \subseteq A \implies A = B$ (ἀντισυμμετρική)
- 3). ’Εὰν $A \subseteq B$ καὶ $B \subseteq C \implies A \subseteq C$ (μεταβατική).

Σημεῖοι σεις : Μία σχέσις, ήτις εἶναι αντοπαθής, ἀντισυμμετρική καὶ μεταβατική καλεῖται σχέσις διατάξεως. ’Η σχέσις « \subseteq » εἶναι δὲν σχέσις διατάξεως.

Παρατηρήσεις : 1). ”Εκαστον σύνολον εἶναι ύποσύνολον τοῦ ἑαυτοῦ του.

- 2). ”Εκαστον σύνολον δὲν εἶναι γνήσιον ύποσύνολον τοῦ ἑαυτοῦ του (διατί;)
- 3). Τὸ κενὸν σύνολον θεωρεῖται ἐξ ὁρισμοῦ ώς ύποσύνολον κάθε συνόλου.

4). Δι' ἔκαστον σύνολου ἐκ ν στοιχείων ὑπάρχουν 2^ν ὑποσύνολα. Τὸ σύνολον δὲ τῶν ὑποσυνόλων ἐνὸς συνόλου Σ καλεῖται δυναμοσύνολον τοῦ συνόλου Σ καὶ συμβολίζεται μὲ: $\mathcal{P}(\Sigma)$.

5). Πρέπει νὰ γίνεται διάκρισις μεταξὺ τῶν συμβόλων «ε», τὸ δποῖον καλεῖται σύμβολον τοῦ «ἀνήκει εἰς...» καὶ « \subseteq », τὸ δποῖον καλεῖται σύμβολον τοῦ «περιέχεται», διότι τὸ μὲν «ε» συσχετίζει στοιχεῖον πρὸς συνόλον, τὸ δὲ « \subseteq » σύνολον πρὸς σύνολον, εἰς δὲ τὴν θεωρίαν τῶν συνόλων στοιχεῖον καὶ σύνολον παίζουν διαφορετικοὺς ρόλους. Τοιουτοτρόπως ἔξηγεῖται διατὶ πάντοτε ισχύει $\{\alpha\} \neq \alpha$. Πρὸς πληρεστέραν κατανόησιν τοῦ τελευταίου δίδομεν τὸ ἔξῆς χαρακτηριστικὸν παράδειγμα: Μία καστίνα, ἡ δποῖα περιέχει ἔνα διαβήτην καὶ τίποτε ἄλλο δὲν εἶναι τὸ αὐτὸ πρᾶγμα μὲ τὸν διαβήτην.

§ 12. Βασικὸν σύνολον ἡ σύνολον ἀναφορᾶς. — Ἐὰν κατὰ τὴν ἀνάπτυξιν ἐνὸς «ζητήματος» θεωρῶμεν τὰ ὑποσύνολα ἐνὸς γενικωτέρου συνόλου Ω , τότε τὸ Ω καλεῖται βασικὸν σύνολον ἡ σύνολον ἀναφορᾶς, (ἐπειδὴ εἰς αὐτὸ — κατὰ τὴν ἔξετασιν τοῦ ζητήματος — ἀναφέρονται ὅλα τὰ ἄλλα σύνολα). Γενικῶς εἰς κάθε «ζητημά» ποὺ ἀφορᾷ σύνολα, ἐπιβάλλεται νὰ καθορίζηται πρῶτα τὸ βασικὸν σύνολον, τοῦ δποίου ὑποσύνολον δφείλει νὰ εἶναι κάθε ἄλλο σύνολον, τὸ δποῖον ἐμφανίζεται κατὰ τὴν ἀνάπτυξιν τοῦ ὑπ' ὅψιν ζητήματος. Ἀλλως ὑπάρχει κίνδυνος νὰ περιπέσωμεν εἰς ἀντιφάσεις (ἀντινομίας). Οὔτω π.χ. εἰς ἐν πρόβλημα ἐπιπεδομετρίας βασικὸν σύνολον ἡ σύνολον ἀναφορᾶς θὰ εἶναι τὸ σύνολον τῶν σημείων τοῦ ἐπιπέδου. Ἐπίσης εἰς ἐν πρόβλημα ἀλγέβρας αἱ μεταβληταὶ ποὺ θὰ παρουσιασθοῦν εἰς τοὺς ἀντιστοίχους προτασιακοὺς τύπους θὰ ἀναφέρωνται εἰς ἐν γενικὸν σύνολον λ.χ. εἰς τὸ σύνολον R τῶν πραγματικῶν ἀριθμῶν. Τοῦτο θὰ εἶναι τὸ βασικὸν σύνολον δι' ὅλα τὰ ὑποσύνολα, τὰ δποῖα θὰ παρουσιασθοῦν εἰς τὸ πρόβλημα.

Τὸ βασικὸν σύνολον διαφέρει ἀπὸ πρόβλημα εἰς πρόβλημα καὶ μάλιστα πολλάκις παραλείπεται ὁ ἀκριβῆς καθορισμός του, διότι ἀπὸ τὸ περιεχόμενον τοῦ προβλήματος καθορίζεται καὶ τὸ ἴδιον.

Πράξεις μεταξὺ συνόλων.

«Ἄσ θεωρήσωμεν ἐν βασικὸν σύνολον Ω , μὴ κενὸν καὶ τελείως ὡρισμένον (λ.χ. $\Omega = R$), τοῦ δποίου τὰ ὑποσύνολα ὃς συμβολίσωμεν μὲ κεφαλαῖα γράμματα τῆς ἀλφαριθμήτου A, B, \dots, S, X, Y . τότε δυνάμεθα νὰ ὀρίσωμεν ἐν σύνολον, τὸ δποῖον συμβολίζομεν μὲ $\mathcal{P}(\Omega)$, καὶ τοῦ δποίου στοιχεῖα εἶναι ὅλα τὰ ὑποσύνολα τοῦ Ω . Τοῦτο ὀρίζεται καὶ μὲ ἰδιότητα ὡς ἔξῆς :

$$\mathcal{P}(\Omega) \equiv \{X : X \subseteq \Omega\} \equiv \{X : \text{ἄν } x \in X \implies x \in \Omega\}.$$

Μεταξὺ στοιχείων τοῦ συνόλου $\mathcal{P}(\Omega)$ δυνάμεθα τώρα νὰ ὀρίσωμεν πράξεις ὡς ἔξῆς :

«Εστωσαν $A \in \mathcal{P}(\Omega)$ καὶ $B \in \mathcal{P}(\Omega)$. τότε ὀρίζεται :

§ 13. Τομή δύο συνόλων. — Καλείται τομή του A μὲ τὸ B καὶ συμβολίζεται μὲ $A \cap B$ τὸ κάτωθι σύνολόν :

$$A \cap B \equiv \{x \in \Omega : x \in A \wedge x \in B\}$$

Οὕτως, ἐὰν $A = \{0, 1, 3, 4\}$ καὶ $B = \{1, 2, 3, 5\}$, τότε $A \cap B = \{1, 3\}$. Ἐκ τοῦ ἀνωτέρου ὁρισμοῦ συνάγεται ὅτι :

$A \cap \emptyset = \emptyset \cap A = \emptyset$ καὶ $A \cap \Omega = \Omega \cap A = A$ διὰ κάθε $A \subseteq \Omega$. Ἐὰν ἡ τομὴ δύο συνόλων εἴναι τὸ κενὸν σύνολον τότε, καὶ μόνον τότε, τὰ σύνολα καλοῦνται ἔνα μεταξύ των.

§ 14. Ἡ τομὴ συνόλων καὶ ἡ σύζευξις. — "Εστωσαν δύο σύνολα A , B ὁρίζομεν διὰ περιγραφῆς καὶ $p(x)$, $q(x)$ ἀντιστοίχως οἱ προτασιακοὶ τύποι μεταβλητῆς x μὲ σύνολον ἀναφορᾶς τὸ Ω , ἦτοι ἔστωσαν :

$$A \equiv \{x \in \Omega : p(x)\} \text{ καὶ } B \equiv \{x \in \Omega : q(x)\}.$$

"Ἄσ σχηματίσωμεν τὸ σύνολον $\Sigma \equiv \{x \in \Omega : p(x) \wedge q(x)\}$, δηλαδὴ τὸ σύνολον (ὅλων) τῶν τιμῶν τῆς μεταβλητῆς x , αἱ ὅποιαι καθιστοῦν συγχρόνως ἀληθεῖς προτασίεις τοὺς προτασιακούς τύπους $p(x)$, $q(x)$. Προφανῶς τότε τὸ Σ εἴναι ἡ τομὴ τῶν συνόλων A , B . "Ωστε :

$$A \cap B \equiv \{x \in \Omega : p(x)\} \cap \{x \in \Omega : q(x)\} = \{x \in \Omega : p(x) \wedge q(x)\}.$$

Παράδειγμα : "Εστωσαν τὰ σύνολα :

$$A \equiv \{x \in \mathbb{R} : x^2 - 5x + 6 = 0\}, \quad B \equiv \{x \in \mathbb{R} : x^2 - 9 = 0\}.$$

Ο προτασιακὸς τύπος : « $x^2 - 5x + 6 = 0$ » καθίσταται ἀληθῆς πρότασις διὰ $x = 2$ ἢ $x = 3$, ἕξ ἄλλου δ προτασιακὸς τύπος : « $x^2 - 9 = 0$ » γίνεται ἀληθῆς πρότασις διὰ $x = 3$ ἢ $x = -3$. Τομὴ τῶν συνόλων A καὶ B εἴναι τὸ μονομελές ἢ μονοστοιχειακὸν σύνολον {3}· συμβολικῶς γράφομεν :

$$\{x \in \mathbb{R} : x^2 - 5x + 6 = 0\} \cap \{x \in \mathbb{R} : x^2 - 9 = 0\} = \{x \in \mathbb{R} : (x^2 - 5x + 6 = 0) \wedge (x^2 - 9 = 0)\} = \{3\}.$$

§ 15. Ἔνωσις συνόλων. — Καλείται ἔνωσις τοῦ A μὲ τὸ B καὶ συμβολίζεται μὲ $A \cup B$ τὸ κάτωθι σύνολον :

$$A \cup B \equiv \{x \in \Omega : x \in A \vee x \in B\}$$

Οὕτως, ἐὰν $A = \{0, 1, 2, 3\}$, $B = \{2, 3, 4\}$, τότε $A \cup B = \{0, 1, 2, 3, 4\}$.

Ἐκ τοῦ ἀνωτέρω ὁρισμοῦ συνάγεται ὅτι :

$A \cup \emptyset = \emptyset \cup A = A$ καὶ $A \cup \Omega = \Omega \cup A = \Omega$ διὰ κάθε $A \subseteq \Omega$, καθώς καὶ :

$\forall x : x \in A \implies x \in (A \cup B)$ καὶ $\forall y : y \in B \implies y \in (A \cup B)$, ἦτοι : $A \subseteq A \cup B$ καὶ $B \subseteq A \cup B$ διὰ κάθε $A, B \in \mathcal{P}(\Omega)$.

§ 16. Ἡ ἔνωσις συνόλων καὶ ἡ (ἐγκλειστικὴ) διάζευξις. — "Εστωσαν τὰ σύνολα : $A \equiv \{x \in \Omega : p(x)\}$ καὶ $B \equiv \{x \in \Omega : q(x)\}$. Θεωροῦμεν καὶ τὸ σύνολον $\Sigma \equiv \{x \in \Omega : p(x) \vee q(x)\}$, ἦτοι τὸ σύνολον, τὸ ὅποιον ὁρίζεται ἀπὸ διαστάσης τὰς τιμὰς τῆς μεταβλητῆς x , αἱ ὅποιαι καθιστοῦν τὸν προτασιακὸν τύπον

$p(x)$ είτε τὸν $q(x)$ διληθῆ πρότασιν καὶ μόνον αὐτάς. Προφανῶς τὸ Σ δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ ἡ ἔνωσις τῶν δύο συνόλων A καὶ B . "Ωστε :

$$A \cup B \equiv \{x \in \Omega : p(x)\} \cup \{x \in \Omega : q(x)\} = \{x \in \Omega : p(x) \vee q(x)\}.$$

Παράδειγμα :

"Εστω : $A \equiv \{x \in \mathbb{R} : 2 < x \leq 7\}$, $B \equiv \{x \in \mathbb{R} : 5 \leq x \leq 12\}$

τότε : $A \cup B \equiv \{x \in \mathbb{R} : (2 < x \leq 7) \vee (5 \leq x \leq 12)\} = \{x \in \mathbb{R} : 2 < x \leq 12\}$.

§ 17. Διαφορὰ δύο συνόλων (συνολοθεωρητικὴ διαφορά). — 'Ως (συνολοθεωρητικήν) διαφορὰν τοῦ συνόλου A πλὴν τὸ B , συμβολιζομένη μὲ $A - B$, δρίζομεν τὸ κάτωθι σύνολον :

$$A - B \equiv \{x \in \Omega : x \in A \wedge x \notin B\}$$

Οὕτως, ἐὰν $A \equiv \{\alpha, \beta, \gamma, \delta\}$, $B \equiv \{\alpha, \beta, \delta, \epsilon, \eta\}$, τότε $A - B = \{\gamma\}$. 'Ομοίως, ἐὰν $A \equiv \mathbb{R}$ (\equiv σύνολον τῶν πραγματικῶν ἀριθμῶν), $B \equiv \mathbb{Q}$ (\equiv σύνολον τῶν ρητῶν ἀριθμῶν), τότε $\mathbb{R} - \mathbb{Q}$ εἶναι τὸ σύνολον τῶν ἀρρήτων (ἀσυμμέτρων) ἀριθμῶν.

Σχηματικῶς τὸ $A - B$ παρίσταται μὲ τὸ ἐσκιασμένον μέρος τοῦ A εἰς τὸ παραπλεύρως διάγραμμα τοῦ Venn (σχ. 1).


'Εὰν τὰ A καὶ B δρίζωνται διὰ περιγραφῆς (§ 9, β), ἦτοι, ἐὰν

$$A \equiv \{x \in \Omega : p(x)\} \text{ καὶ}$$

$$B \equiv \{x \in \Omega : q(x)\}, \text{ τότε :}$$

$$A - B \underset{\text{օρσ}}{\equiv} \{x \in \Omega : p(x) \wedge \sim q(x)\}^*.$$

Σχ. 1




§ 18. Διαζευκτικὸν ἄθροισμα ἢ συμμετρικὴ διαφορὰ δύο συνόλων. 'Ως διαζευκτικὸν ἄθροισμα ἢ συμμετρικὴν διαφοράν, συντόμως συμμετροδιαφοράν, δύο συνόλων A καὶ B , τὴν δόποίσαν παριστῶμεν διὰ τοῦ συμβόλου : $A \dot{+} B$ καὶ διαβάζομεν : « A σὺν B » ἢ « A κόντρα σὺν B », δρίζομεν τὸ κάτωθι σύνολον :

$$A \dot{+} B \equiv \{x \in \Omega : (x \in A \wedge x \in B) \vee (x \in B \wedge x \in A)\}$$

Εἶναι συνεπῶς :

$$A \dot{+} B = (A - B) \cup (B - A).$$

Εἰς τὸ παραπλεύρως διάγραμμα τοῦ Venn παρίσταται ἡ συμμετρικὴ διαφορὰ $A \dot{+} B$ ἀπὸ τὸ ἐσκιασμένον μέρος τῶν συνόλων A καὶ B (σχ. 2).



Σχ. 2

* Τὸ σύμβολον : \equiv σημαίνει, ὅπου συναντᾶται ἐδῶ, «ἴσον ἢξ δρισμοῦ».

§ 19. Τὸ διαζευκτικὸν ἄθροισμα καὶ ἡ ἀποκλειστικὴ διάζευξις.

Ἐστωσαν τὰ σύνολα: $A \equiv \{x \in \Omega : p(x)\}$ καὶ $B \equiv \{x \in \Omega : q(x)\}$. τότε είναι:

$$A + B \equiv \{x \in \Omega : (p(x) \wedge \sim q(x)) \vee (q(x) \wedge \sim p(x))\}.$$

Θεωροῦμεν καὶ τὸ σύνολον $\Sigma \equiv \{(x \in \Omega : p(x) \vee q(x)\}$, ἵνα τὸ σύνολον, τὸ δόποιον ὁρίζεται ἀπὸ ὅλας τὰς τιμὰς τῆς μεταβλητῆς x , αἱ δόποιαι καθιστοῦν ἡ μόνον τὸν προτασιακὸν τύπον $p(x)$ ἀληθῆ πρότασιν εἴτε ἡ μόνον τὸν $q(x)$ ἀληθῆ πρότασιν. Προφανῶς τὸ Σ είναι ἡ συμμετρικὴ διαφορὰ τῶν δύο συνόλων A, B .

$$\text{“Ωστε: } A + B \equiv \{x \in \Omega : p(x)\} + \{x \in \Omega : q(x)\} = \{x \in \Omega : p(x) \vee q(x)\}.$$

Σημ. Ἐὰν $A \cap B = \emptyset$, δηλαδὴ τὰ σύνολα A, B είναι ξένα μεταξύ των, τότε: $A + B = A \cup B$.


§ 20. Συμπληρωματικὸν σύνολον. —

Ἐστω Ω τὸ βασικὸν σύνολον καὶ A ἐν ὑποσύνολον αὐτοῦ. Τὸ σύνολον τῶν στοιχείων τοῦ Ω , τὰ δόποια δὲν ἀνήκουν εἰς τὸ A , καλεῖται συμπληρωματικὸν σύνολον τοῦ A , ἀλλως συμπλήρωμα τοῦ A ὡς πρὸς τὸ (ὑπερσύνολον) Ω καὶ συμβολίζεται μὲν: A^c , ἢ A' , ἢ \bar{A} , ἢ $C_\Omega A$.

“Ωστε:

$$A^c \underset{\text{opp}}{=} \{x \in \Omega : x \notin A\} = \Omega - A.$$

Εἰς τὸ κάτωθι σχῆμα τὸ ὁρθογώνιον μὲ τὴν περιμέτρον του παριστᾶ τὸ βασικὸν σύνολον Ω , ὁ κύκλος τὸ ὑποσύνολον A , τὸ δὲ «ἀπομένον» ἀπὸ τὸ Ω ἐσκιασμένον μέρος τοῦ σχ. 3 παριστᾶ τὸ συμπλήρωμα τοῦ A .



Σχ. 3

Ίσχυουν προφανῶς αἱ ἔξῆς ισότητες:

$$C_\Omega \Omega \equiv \Omega^c = \emptyset \quad \text{καὶ} \quad C_\Omega \emptyset \equiv \emptyset^c = \Omega.$$

Παράδειγμα:

Ἐὰν $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ καὶ $A = \{2, 4\}$

$$\text{τότε:} \quad A^c = \{1, 3, 5\}.$$

Σημ. Διὰ τὸ συμπληρωματικὸν σύνολον ίσχυουν αἱ συνεπαγωγαὶ:

$$\forall x, x \in A \implies x \notin A^c \quad \text{καὶ} \quad \forall x, x \in A^c \implies x \notin A.$$

§ 21. Τὸ συμπλήρωμα καὶ ἡ ἄρνησις. — Ἐστω $p(x)$ εἰς προτασιακὸς τύπος μὲ σύνολον ἀναφορᾶς Ω καὶ σύνολον ἀληθείας τὸ A , ἵνα: $A \equiv \{x \in \Omega : p(x)\}$, τότε:

$$\forall x, x \in A \iff p(x) \quad \text{ἀληθής πρότασις,}$$

ἄρα ἡ ἄρνησίς της είναι ψευδής, ἵνα $\sim p(x)$ ψευδής. Ἐπὶ πλέον :

$$\forall x, x \in A \iff p(x) \quad \text{ψευδής,} \quad \text{ἄρα } \sim p(x) \quad \text{ἀληθής πρότασις.}$$

Οὕτω τὸ σύνολον: $\{x \in \Omega : \sim p(x)\}$, τὸ δόποιον ὁρίζεται ἀπὸ ὅλας τὰς τιμὰς τῆς μεταβλητῆς x , αἱ δόποιαι καθιστοῦν τό: $\sim p(x)$ ἀληθῆ πρότασιν, είναι τὸ συμπλήρωμα A^c τοῦ A .

$$\text{“Ωστε: } 'E\acute{a}n A \equiv \{x \in \Omega : p(x)\}, \text{ τότε } A^c \equiv \{x \in \Omega : \sim p(x)\}.$$

Παράδειγμα : Εάν $\Omega \equiv N$ και $p(x)$: «Ο χ είναι άρτιος φυσικός άριθμός», τότε τὸ συμπλήρωμα τοῦ συνόλου $A \equiv \{x \in N : p(x)\}$ είναι τὸ σύνολον τῶν περιττῶν φυσικῶν άριθμῶν, ἢτοι τό: $A^c \equiv \{x \in N : \sim p(x)\}$.

§ 22. Ιδιότητες τῶν πράξεων τῶν συνόλων.— Βάσει τῶν προηγουμένων ὀρισμῶν ἀποδεικνύονται εὐκόλως αἱ κάτωθι ιδιότητες τῶν πράξεων:

A). Τῆς τομῆς.

α₁) $A \cap \Omega = A$, ἢτοι τὸ βασικὸν σύνολον είναι οὐδέτερον στοιχείον τῆς πράξεως \cap .

α₂) $A \cap B = B \cap A$, ἢτοι ἡ πρᾶξις \cap είναι μεταθετική.

α₃) $A \cap (B \cap \Gamma) = (A \cap B) \cap \Gamma$, ἢτοι ἡ πρᾶξις \cap είναι προσεταιριστική.

α₄) $A \cap A = A$, ἢτοι ἡ πρᾶξις \cap είναι ἀδύναμος.

α₅) $A \cap B \subseteq A$, $A \cap B \subseteq B$.

α₆) Ισχύει $A \subseteq B \iff A \cap B = A$.

B). Τῆς Ἐνώσεως.

β₁) $A \cup B = B \cup A$, ἢτοι ἡ πρᾶξις \cup είναι μεταθετική.

β₂) $A \cup (B \cup \Gamma) = (A \cup B) \cup \Gamma$, ἢτοι ἡ πρᾶξις \cup είναι προσεταιριστική.

β₃) $A \cup A = A$, ἢτοι ἡ πρᾶξις \cup είναι ἀδύναμος.

β₄) $A \subseteq A \cup B$, $B \subseteq A \cup B$.

β₅) Ισχύει: $A \subseteq B \iff A \cup B = B$.

Ισχύουν ἐπὶ πλέον αἱ κάτωθι δύο ἐπιμεριστικαὶ ιδιότητες:

$$A \cap (B \cup \Gamma) = (A \cap B) \cup (A \cap \Gamma)$$

$$A \cup (B \cap \Gamma) = (A \cup B) \cap (A \cup \Gamma).$$

C). Τῆς διαφορᾶς.

γ₁) $A - B = A \cap B^c$.

γ₂) $A - (A - B) = A \cap B$.

γ₃) $A \cap (B - \Gamma) = (A \cap B) - (A \cap \Gamma)$.

γ₄) $(A - B) \cup B = A \cup B$, ἢτοι ἡ ἔνωσις δὲν είναι ἐπιμεριστικὴ ὡς πρὸς τὴν διαφοράν.

γ₅) Ισχύει: $A \subseteq B \iff A - B = \emptyset$.

D). Τοῦ διαζευκτικοῦ ἀθροίσματος.

δ₁) $A + B = B + A$.

δ₂) $A + (B + \Gamma) = (A + B) + \Gamma$.

δ₃) $A + \emptyset = A$, $A + \Omega = A^c$, $A + A = \emptyset$, $A + A^c = \Omega$.

δ₄) $A \cap (B + \Gamma) = (A \cap B) + (A \cap \Gamma)$.

δ₅) $A^c + B^c = A + B$.

δ₆) $A \cup B = A + B + A \cap B$.

E). Τοῦ συμπληρώματος.

$$\varepsilon_1) (A^c)^c = A \text{ διάκριση } A \subseteq \Omega.$$

$$\varepsilon_2) A \cap A^c = \emptyset, A \cup A^c = \Omega.$$

$$\varepsilon_3) \text{ 'Ισχύει: } A \subseteq B \iff B^c \subseteq A^c.$$

§ 23. Νόμοι τοῦ De Morgan.—'Ισχύουν οἱ κάτωθι δύο τύποι :

$$1. (A \cap B)^c = A^c \cup B^c \quad 2. (A \cup B)^c = A^c \cap B^c.$$

'Απόδειξις τοῦ τύπου 1.

$$\alpha) \forall x: x \in (A \cap B)^c \implies x \notin (A \cap B) \implies x \notin A \vee x \notin B \cdot \text{ τοῦτο δηλοῖ ότι:} \\ x \in A^c \vee x \in B^c, \text{ ἥτοι } x \in (A^c \cup B^c). \text{ 'Αρα } (A \cap B)^c \subseteq A^c \cup B^c \quad (1.\alpha)$$

$$\beta) \forall y: y \in (A^c \cup B^c) \implies (y \in A^c) \vee (y \in B^c) \cdot \text{ τοῦτο δηλοῖ:} \\ (y \notin A) \vee (y \notin B), \text{ θέν } y \notin (A \cap B) \implies y \in (A \cap B)^c.$$

$$'Αρα: \quad A^c \cup B^c \subseteq (A \cap B)^c. \quad (1.\beta)$$

'Εκ τῶν (1.α) καὶ (1.β) ἔπειται ἀμέσως ὁ τύπος 1.

'Ο τύπος 2 ἀποδεικνύεται ἥδη εὐκόλως (πῶς;).

Σημείωσις : Ἡ ὀπόδειξις θὰ ἡδύνατο νὰ γίνῃ καὶ ὡς ἔξῆς :

'Εστω $A \equiv \{x: p(x)\}$ καὶ $B \equiv \{x: q(x)\}$, τότε κατὰ τὰς §§ 14, 21 ἔχομεν ἀντιστοίχως $A \cap B \equiv \{x: p(x) \wedge q(x)\}$ καὶ

$$(A \cap B)^c \equiv \{x: \sim(p(x) \wedge q(x))\}.$$

$$'Αλλά: \quad \sim(p(x) \wedge q(x)) \iff \sim p(x) \vee \sim q(x) \quad (\S 7, \text{ παρδ. 1}).$$

'Επομένως :

$$(A \cap B)^c \equiv \{x: \sim(p(x) \wedge q(x))\} = \{x: \sim p(x) \vee \sim q(x)\} = \\ = \{x: \sim p(x)\} \cup \{x: \sim q(x)\} = A^c \cup B^c.$$

§ 24. Διαγράμματα τοῦ Venn καὶ λογισμὸς τῶν προτάσεων.—'Εστωσαν δύο σύνολα $A \equiv \{x \in \Omega: p(x)\}$ καὶ $B \equiv \{x \in \Omega: q(x)\}$, τὰ ὅποια παρίστανται διὰ κύκλων εἰς τὸ σχ. 4, ὑποσύνολα τοῦ βασικοῦ συνόλου Ω . Θὰ ζητήσωμεν νὰ δρίσωμεν τό :


$$\Gamma \equiv \{x \in \Omega: p(x) \implies q(x)\},$$

ἥτοι τὸ σύνολον τῶν τιμῶν τῆς μεταβλητῆς x , αἱ ὅποιαι καθιστοῦν τὴν συνεπαγωγὴν $p(x) \implies q(x)$ ἀληθῆ πρότασιν. 'Ως γνωστὸν ἡ συνεπαγωγὴ $p(x) \implies q(x)$ εἶναι ἀληθῆς πρότασις εἰς τὰς ἔξῆς τρεῖς περιπτώσεις :

1) 'Εὰν p καὶ q εἶναι συγχρόνως ἀληθεῖς προτάσεις.

2) 'Εὰν p ψευδής καὶ q ἀληθῆς καὶ 3) 'Εὰν ἀμφότεραι εἶναι ψευδεῖς.

Δυνάμει τοῦ ἔναντι σχήματος ὁ προτασιακὸς τύπος $p(x)$ καθίσταται ἀληθῆς πρότασις διὰ τιμᾶς τῆς μεταβλητῆς εἰς τὰς «περιοχὰς» I, II, δὲ $q(x)$ διὰ τιμᾶς τῶν περιοχῶν II, III. 'Ο $p(x)$ καθίσταται ψευδής καὶ δὲ $q(x)$ ἀληθῆς πρότασις διὰ τιμᾶς τῆς περιοχῆς III. Τέλος καθίστανται ἀμφότεροι ψευδεῖς διὰ τιμᾶς τῆς μεταβλητῆς x εἰς τὴν περιοχὴν IV.



Σχ. 4

Ούτω τὸ σύνολον $\Gamma \equiv \{x \in \Omega : p(x) \Rightarrow q(x)\}$ ἔχει ὡς εἰκόνα, εἰς τὸ σχ. 4, τὰ σημεῖα τῶν περιοχῶν II, III, IV. Ἀλλὰ αἱ περιοχαὶ II, III καὶ IV εἰναι ἀκριβῶς ἡ εἰκὼν τοῦ συνόλου $A^c \cup B$.

*Αρα : $\Gamma \equiv \{x \in \Omega : p(x) \Rightarrow q(x)\} = A^c \cup B$.

§ 25. Καρτεσιανὸν γινόμενον συνόλων. — "Ἄσθεωρήσωμεν δύο μὴ σύνολα A καὶ B , ὑποσύνολα ἐνὸς βασικοῦ συνόλου Ω . Ἀπὸ τὸ δύο αὐτὰ σύνολα σχηματίζεται (δρίζεται) ἐν νέον σύνολον, τὸ ὅποιον καλεῖται καρτεσιανὸν γινόμενον μὲ πρῶτον παράγοντα τὸ A καὶ δεύτερον τὸ B καὶ συμβολίζεται μὲ $A \times B$. τὸ νέον τοῦτο σύνολον δρίζεται ὡς ἔξῆς :

$$A \times B \equiv \{(a, b) : \forall a \in A \text{ καὶ } \forall b \in B\}$$

Τὸ στοιχεῖον $(\alpha, \beta) \in A \times B$ καλεῖται ἐν διατεταγμένον ζεῦγος ὅθεν τὸ $A \times B$ δρίζεται ὡς τὸ σύνολον πάντων τῶν διατεταγμένων ζευγῶν (α, β) , μὲ $\alpha \in A$ καὶ $\beta \in B$.

Τὰ στοιχεῖα α καὶ β τοῦ ζεύγους καλοῦνται ἀντιστοίχως πρώτη καὶ δευτέρα συντεταγμένη (ἢ προβολὴ) τοῦ ζεύγους.

* Ή βασικὴ ἴσστης δρίζεται ἐν $A \times B$ ὡς ἔξῆς :

$$(\alpha, \beta) = (\alpha', \beta') \iff \alpha = \alpha' \text{ καὶ } \beta = \beta'.$$

* Εὰν $A = B$, τότε τὸ $A \times A$ συμβολίζεται μὲ A^2 .

Τὸ σύνολον Δ τῶν ζευγῶν (α, α) μὲ $\alpha \in A$ καλεῖται διαγώνιος τοῦ A^2 . Προφανῶς $\Delta \subseteq A^2$.

* Εὰν $A = \emptyset$ ἢ $B = \emptyset$, τότε δρίζομεν : $A \times \emptyset = \emptyset \times B = \emptyset \times \emptyset = \emptyset$.

Παράδειγμα: * Εὰν $A = \{1, 2, 3\}$ καὶ $B = \{\alpha, \beta\}$, τότε :

$$A \times B \equiv \{(1, \alpha), (1, \beta), (2, \alpha), (2, \beta), (3, \alpha), (3, \beta)\} \text{ ἐνῶ}$$

$$B \times A \equiv \{(\alpha, 1), (\alpha, 2), (\alpha, 3), (\beta, 1), (\beta, 2), (\beta, 3)\}.$$

Παρατηροῦμεν δτὶ : $A \times B \neq B \times A$.

Γενικῶς : Εἰς τὸ καρτεσιανὸν γινόμενον δὲν ἰσχύει ἡ μεταθετικὴ ἴδιότης.

Καθ' ὅμοιον τρόπον δρίζεται τὸ καρτεσιανὸν γινόμενον μὲ περισσοτέρους ἀπὸ δύο παράγοντας π.χ. ἂν A, B, Γ εἰναι μὴ κενὰ ὑποσύνολα τοῦ Ω , δρίζομεν ὡς καρτεσιανὸν γινόμενον A ἐπὶ B ἐπὶ Γ καὶ συμβολίζομεν μὲ $A \times B \times \Gamma$ τὸ κάτωθι σύνολον :

$$A \times B \times \Gamma \equiv \{(\alpha, \beta, \gamma) : \alpha \in A, \beta \in B \text{ καὶ } \gamma \in \Gamma\},$$

δηλαδὴ τὸ σύνολον τῶν «διατεταγμένων τριάδων» $(\alpha, \beta, \gamma) \quad \forall \alpha \in A, \beta \in B \text{ καὶ } \gamma \in \Gamma$.

Σημείωσις : Θεωροῦμεν τὸ σύνολον R τῶν πραγματικῶν ἀριθμῶν *) καὶ σχηματίζομεν τὸ καρτεσιανὸν γινόμενον :

$$R \times R \equiv \{(x, y) : \forall x \in R \text{ καὶ } \forall y \in R\},$$

ἵτοι τὸ σύνολον τῶν διατεταγμένων ζευγῶν πραγματικῶν δρίθμων.

* Τὸ σύνολον R τῶν πραγματικῶν ἀριθμῶν καλεῖται συχνά : Εδόθεα τῶν πραγματικῶν ἀριθμῶν είτε ἄλλως Εὐκλείδειος χῶρος διαστάσεως 1.

Τὸ $\mathbb{R} \times \mathbb{R} = \mathbb{R}^2$ καλεῖται, ἔόν θέλωμεν υὰ ἑκφρασθῶμεν μὲ τὴν γλῶσσαν τῆς Γεωμετρίας, Ἐδκλείδειον ἐπίπεδον ἢ Ἐδκλείδειος χῶρος διαστάσεως δύο.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

8. Νὰ δρισθοῦν καὶ δι' ἀναγραφῆς τῶν στοιχείων των τὰ κάτωθι σύνολα :

$$1) A \equiv \{ x \in \mathbb{N} : x^2 < 50 \}, \quad 2) B \equiv \{ x \in \mathbb{Z} : x \text{ διαιρέτης τοῦ } 24 \},$$

$$3) \Gamma \equiv \{ x \in \mathbb{N} : 5 \leq x \leq 29 \text{ τῆς μορφῆς } v^2 + 1 \text{ μὲν } v \in \mathbb{N} \}, 4) \Delta \equiv \{ x \in \mathbb{N} : 5 < x < 6 \}.$$

9. Νὰ δρισθοῦν καὶ διὰ περιγραφῆς ἕκαστον τῶν δικοιούθων συνόλων συνόλων :

$$1) A \equiv \{ 1, 2, 3, 4, 5 \}, \quad 2) B \equiv \{ 1, 4, 9 \}, \quad 3) \Gamma \equiv \{ 2, 4, 6, 8, 10 \},$$

$$4) \Delta \equiv \{ \alpha, \epsilon, \eta, \iota, \sigma, \upsilon, \omega \}, 5) E \equiv \{ 11, 13, 15, 17, 19 \}, 6) \Sigma \equiv \{ \pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4, \pm 6, \pm 12 \}.$$

10. Δίδονται τὰ σύνολα :

$$A \equiv \{ x \in \mathbb{N} : 3 < x \leq 7 \} \quad \text{καὶ} \quad B \equiv \{ 5, 6, 7, 4 \}. \quad \text{Νὰ δειχθῇ διτὶ : } B = A.$$

$$11. \text{'Εάν } A \equiv \{ x \in \mathbb{R} : 3x = 21 \} \quad \text{καὶ} \quad y = 7, \quad \text{εἶναι } y = A;$$

$$12. \text{'Εάν } B \equiv \{ x \in \mathbb{R} : x^2 - 25 = 0 \} \quad \text{καὶ} \quad \Gamma = \{ 5 \}, \quad \text{εἶναι } \Gamma \subset B;$$

13. Δίδεται τὸ σύνολον : $A \equiv \{ \alpha, \beta, \gamma \}$. Ποία ἐκ τῶν κάτωθι σχέσεων εἶναι ἀληθῆς καὶ ποία δχι ; Δικαιολογήσατε τὴν ἀπάντησιν.

$$1) \{ \alpha \} \in A, \quad 2) \alpha \subset A, \quad 3) \{ \gamma \} \subset A, \quad 4) \{ \alpha, \beta \} \in \{ \alpha, \beta, \gamma \}, \quad 5) \{ \emptyset, A, \{ \alpha, \beta \} \} \subset A.$$

$$14. \text{'Εάν } A \equiv \{ 1, 2, 3, 4 \}, \text{ νὰ ἀναγραφοῦν δλα τὰ στοιχεῖα τοῦ δυναμοσύνολου } \mathcal{P}(A).$$

$$15. \text{Tὸ δυναμοσύνολον ἐνὸς συνόλου } \exists \text{ει } 32 \text{ στοιχεῖα. Πόσα στοιχεῖα } \exists \text{ει } \text{Tὸ σύνολον} ;$$

16. 'Εάν Δ_{18} εἴναι τὸ σύνολον τῶν ἀκεραίων διαιρετῶν τοῦ 18 καὶ Δ_{42} τὸ σύνολον τῶν διαιρετῶν τοῦ ἀριθμοῦ 42, δρίσατε τὰ σύνολα $\Delta_{18} \cap \Delta_{42}$ καὶ $\Delta_{18} \cup \Delta_{42}$.

17. 'Εάν A, B, Γ ὑποσύνολα ἐνὸς βασικοῦ συνόλου Ω , δείξατε διτὶ :

$$1) A \cap (A \cup B) = A \quad \text{καὶ} \quad A \cup (A \cap B) = A, \quad 2) (A - B) \cap B = \emptyset,$$

$$3) A + B = (A \cap B^c) \cup (B \cap A^c), \quad 4) (A - B) \cup (A - B^c) = A,$$

$$5) \text{'Εάν } \Gamma \cap A = B \cap A \quad \text{καὶ} \quad \Gamma \cup A = B \cup A \implies B = \Gamma,$$

$$6) A - (B \cup \Gamma) = (A - B) \cap (A - \Gamma), \quad 7) (A \cup B) + (A \cap B) = A + B,$$

$$8) A - (B \cap \Gamma) = (A - B) \cup (A - \Gamma), \quad 9) A - (B - A) = A, \quad 10) A + (A + B) = B.$$

18. Δίδεται ὡς βασικὸν σύνολον τὸ $\Omega \equiv \{ 1, 2, 3, 4, 5 \}$. Νὰ δρισθοῦν τὰ ὑποσύνολά του A, B, Γ (δι' ἐφαρμογῆς τῶν νόμων τοῦ De Morgan), γνωστοῦ διτος διτὶ :

$$A \cap B = \{ 2, 4 \}, \quad A \cup B = \{ 2, 3, 4, 5 \}, \quad A \cap \Gamma = \{ 2, 3 \}, \quad A \cup \Gamma = \{ 1, 2, 3, 4 \}.$$

*Ἀκολούθως νὰ δρισθοῦν καὶ τά : $A \cap (A \cup B), \Gamma \cap (A \cup B)$.

19. Δίδονται τὰ σύνολα : $A \equiv \{ 1, 2, 5 \}, B = \{ 2, 4 \}$. Νὰ δρισθοῦν τά :

$$1) A \times B, \quad 2) B \times A, \quad 3) A^2, \quad 4) B^2, \quad 5) A \times (A \cap B).$$

20. 'Εάν $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ εἴναι τυχόντα ἀντικείμενα, νὰ δειχθῇ διτὶ :

$$(\{ \alpha \}, \{ \alpha, \beta \}) = (\{ \gamma, \delta \}, \{ \gamma \}) \implies (\alpha = \gamma \wedge \beta = \delta).$$

21. Δίδονται διὰ περιγραφῆς τὰ σύνολα :

$$A \equiv \{ x \in \mathbb{R} : x^2 - 5x^2 + 6x = 0 \} \quad \text{καὶ} \quad B \equiv \{ x \in \mathbb{R} : x^2 - 3x = x \}.$$

Παραστήσατε τὰ κάτωθι σύνολα διὰ περιγραφῆς καὶ ἀναγραφῆς τῶν στοιχείων των :

$$1) A \cap B, \quad 2) A \cup B, \quad 3) A - B, \quad 4) B - A, \quad 5) A + B.$$

22. 'Εάν $A \equiv \{ x \in \Omega : p(x) \}$ καὶ $B \equiv \{ x \in \Omega : q(x) \}$, δείξατε διτὶ τὸ σύνολον τιμῶν ἀληθείας τῆς Ισοδυναμίας $p(x) \iff q(x)$ εἴναι τό : $(A \cap B) \cup (A^c \cap B^c)$, ἤτοι :

$$\{ x \in \Omega : p(x) \iff q(x) \} = (A \cap B) \cup (A^c \cap B^c).$$

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ή ΤΕΛΕΙΑ ΕΠΑΓΩΓΗ

§ 26. Εισαγωγή. — "Ας παρακολουθήσωμεν τάς έκφωνήσεις τῶν κατωτέρω προτάσεων :

1). Διὰ κάθε φυσικὸν ἀριθμὸν v ἵσχει τὸ ισότης :

$$1 + 2 + 3 + \cdots + v = \frac{1}{2} v \cdot (v + 1).$$

2). Εάν $a > -1$, δείξατε ότι ἵσχει : $(1 + a)^v \geq 1 + va$, διὰ κάθε φυσικὸν ἀριθμὸν v .

3). Τὸ πλῆθος τῶν διαγωνίων πολυγώνου ἔχοντος v κορυφὰς ἰσοῦται μέ :

$$\frac{v(v-3)}{2}.$$

4). Διὰ $v \in \mathbb{N}$ μὲν $v \geq 4$ νὰ δειχθῇ ότι : $\left(\frac{3}{2}\right)^v > v + 1$.

5). Δείξατε ότι : $\forall v \in \mathbb{N}$ ὁ ἀριθμὸς $7^{2v} + 16v - 1$ διαιρεῖται διὰ τοῦ 64.

'Εκ τῶν ἀνωτέρω ἔκφωνήσεων παρατηροῦμεν ότι ὑπάρχουν μαθηματικὰ προτάσεις, ἔξαρτώμεναι ἀπὸ ἓνα φυσικὸν ἀριθμὸν v , τῶν ὅποιών τὴν ἀλήθειαν θέλομεν νὰ δείξωμεν διὰ κάθε $v \in \mathbb{N}$ ἢ διὰ κάθε φυσικὸν ἀριθμὸν μεγαλύτερον ἢ ἵσον ἐνὸς δοθέντος φυσικοῦ ἀριθμοῦ v_0 .

Διὰ τὴν ἀπόδειξιν τοιούτων προτάσεων ἐφαρμόζομεν εἰδικὴν ἀποδεικτικὴν μέθοδον γνωστὴν ὡς : «Μαθηματικὴ ἢ τελεία ἐπαγωγή».

"Οστε : Μαθηματικὴ ἢ τελεία ἐπαγωγὴ καλεῖται μία γενικὴ μέθοδος ἀποδείξεως, ἡ ὁποία ἐφαρμόζεται προκειμένου v ἀποδειχθῆντι μία πρότασις, εἰς τὴν διατύπωσιν τῆς ὁποίας ἀναφέρεται φυσικὸς ἀριθμὸς v , ἀληθεύει διὰ κάθε $v \in \mathbb{N}$ ἢ διὰ κάθε φυσικὸν ἀριθμὸν $v \geq v_0 \in \mathbb{N}$.

Κατωτέρω θὰ ἴδωμεν εἰς ποιάν κατὰ βάσιν ἀρχὴν στηρίζεται ἢ ἐν λόγῳ ἀποδεικτικὴ μέθοδος.

§ 27. Θεμελιώδεις ιδιότητες τῶν φυσικῶν ἀριθμῶν (ἀξιώματα τῶν φυσικῶν ἀριθμῶν κατὰ Peano *).

Τὸ σύνολον \mathbb{N} τῶν φυσικῶν ἀριθμῶν ὀρίζεται τῇ βοηθείᾳ τῶν κάτωθι ἀξιώμάτων :

Άξιώμα I. 'Ο 1 εἶναι φυσικὸς ἀριθμός, ἢτοι $1 \in \mathbb{N}$.

Άξιώμα II. Διὰ κάθε φυσικὸν ἀριθμὸν ὑπάρχει εἷς, καὶ μόνον εἷς, «έπόμενος» φυσικὸς ἀριθμός, ἢτοι $\forall v \in \mathbb{N} \implies v + 1 \in \mathbb{N}$.

Άξιώμα III. Δὲν ὑπάρχει φυσικὸς ἀριθμὸς v μὲν ἐπόμενον τὸν 1, ἢτοι $v + 1 \neq 1$ (ἀκριβέστερον $v + 1 > 1$) $\forall v \in \mathbb{N}$.

Άξιώμα IV. Δύο φυσικοὶ ἀριθμοί, οἱ ὅποιοι ἔχουν τὸν αὐτὸν ἐπόμενον εἶναι ίσοι, ἢτοι $\forall v \in \mathbb{N}$ καὶ $\forall \mu \in \mathbb{N}$ μὲν $v + 1 = \mu + 1 \implies v = \mu$.

* G. Peano (1858 - 1932). Ιταλός μαθηματικός καὶ φιλόσοφος.

Άξιωμα V. Κάθε σύνολου φυσικών άριθμῶν, εἰς τὸ ὅπτοιν ἀνήκει ὁ 1 καὶ μαζὺ μὲ οἰονδήποτε φυσικὸν άριθμὸν ν ἀνήκει εἰς αὐτὸν καὶ ὁ ἐπόμενός του ν + 1, συμπίπτει μὲ τὸ σύνολον N τῶν φυσικῶν άριθμῶν, ἥτοι, ἂν ἐν ὑποσύνολον S τοῦ συνόλου N πληροῖ τὰς ἔξης δύο ιδιότητας :

$$\left. \begin{array}{l} \text{(a)} \quad 1 \in S \\ \text{(b)} \quad \forall v \in S \implies v + 1 \in S \end{array} \right\} \implies S \equiv N.$$

Τὸ τελευταῖο ἄξιωμα χαρακτηρίζεται καὶ ὡς «ἀρχὴ τῆς μαθηματικῆς ἢ τελείας (πλήρους) ἐπαγγωγῆς» τῇ βοηθείᾳ τῆς ὅποιας ἀποδεικνύεται τὸ κάτωθι :

§ 28. Θεώρημα (τῆς τελείας ἐπαγγωγῆς).—'Εὰν διὰ μίαν πρότασιν p(v), εἰς τὴν διατύπωσιν τῆς ὅποιας ἀναφέρεται ὁ φυσικὸς ἀριθμὸς ν, εἶναι γνωστὸν ὅτι :

1) Ἡ πρότασις ἀληθεύει διὰ ν = 1, ἥτοι p(1) ἀληθής καὶ ἐπὶ πλέον

2) μὲ τὴν ὑπόθεσιν ὅτι ἀληθεύει διὰ ν = k, ἀποδεικνύεται ὅτι αὕτη ἀληθεύει καὶ διὰ ν = k + 1, ἥτοι p(k + 1) ἀληθής, ἀν p(k) ἀληθής καὶ τοῦτο διὰ κάθε k ∈ N, τὸ τε ἡ πρότασις p(v) ἀληθεύει διὰ κάθε φυσικὸν ἀριθμὸν ν.

Τὸ ἀνώτερω θεώρημα μὲ χρῆσιν τῶν συμβόλων τῆς λογικῆς διατυποῦται συντόμως οὕτω :

$$\{ p(1) \wedge \{ \forall K \in N : p(k) \implies p(k + 1) \} \} \text{ ἀληθής} \implies p(v) \text{ ἀληθής} \quad \forall v \in N$$

Α πόδειξις : "Εστω S τὸ σύνολον (ὅλων) τῶν φυσικῶν άριθμῶν, διὰ τούς ὅποιους ἡ p(v) εἶναι ἀληθής, ἥτοι ἔστω

$$S \equiv \{v \in N : p(v)\}$$

τὸ σύνολον τοῦτο δὲν εἶναι κενόν, διότι τὸ 1 ∈ S ἐφ' ὅσον p(1) ἀληθής. Ἐπὶ πλέον, ἀν k ∈ S, τότε καὶ k + 1 ∈ S, διότι, ἀν k ∈ S, τότε p(k) ἀληθής, ὅθεν (ὑπόθ. 2) καὶ p(k + 1) ἀληθής, συνεπῶς k + 1 ∈ S. "Οστε τὸ S ἔχει τὰς ιδιότητας (a) καὶ (b) τοῦ ἄξιωματος V, συμπίπτει ὅθεν μὲ τὸ σύνολον N. Κατὰ συνέπειαν ἡ (λογική) πρότασις p(v) ἀληθεύει διὰ κάθε φυσικὸν ἀριθμὸν ν.

Παρατήρησις : Συμβαίνει πολλάκις μία πρότασις p(v) νὰ ἔχῃ νόημα διὰ τιμᾶς τοῦ ν μεγαλυτέρας ἡ ἵσας ὡρισμένου φυσικοῦ ἀριθμοῦ ν₀. Εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν τὸ θεώρημα τῆς τελείας ἐπαγγωγῆς ἴσχυει (προφανῶς) ὑπὸ τὴν ἔξης ὅμως διατύπωσιν μὲ χρῆσιν τῶν συμβόλων τῆς λογικῆς :

$$\{ p(v₀) \wedge \{ \forall K \in N (K \geq v₀) : p(k) \implies p(k + 1) \} \} \text{ ἀληθής} \implies p(v) \text{ ἀληθής} \quad \forall v \in N : v \geq v₀$$

ἥτοι : 'Εὰν μία πρότασις p(v) ἀληθεύῃ διὰ ν = ν₀ καὶ ὑποθέτοντες ὅτι ἀληθεύει διὰ τινα τιμὴν τοῦ φυσικοῦ ἀριθμοῦ ν, ἔστω ν = k > ν₀, ἀποδείξωμεν ὅτι ἀληθεύει καὶ διὰ τὴν τιμὴν ν = k + 1, τότε ἡ πρότασις p(v) ἀληθεύει διὰ κάθε φυσικὸν ἀριθμὸν ν ≥ ν₀.

Σημείωσις. Εἰς τὸ ἀνώτερω θεώρημα στηρίζεται ἡ ἀποδεικτικὴ μέθοδος τῆς Μαθηματικῆς ἢ τελείας ἐπαγγωγῆς. Κατ' αὐτὴν διὰ νὰ ἀποδείξωμεν τὴν ἀληθειαν μιᾶς προτάσεως p(v) ἐργαζόμεθα ὡς ἔξης :

α). 'Αποδεικνύομεν τὴν ἀλήθειαν τῆς προτάσεως διὰ $v = 1$, (ἐφ' ὅσον διὰ $v = 1$ ἔχει νόημα). Εάν διὰ $v = 1$ ἡ πρότασις δέν ἔχῃ νόημα, τὴν ἐπαληθεύομεν διὰ τὸν ἐλάχιστον φυσικὸν ἀριθμὸν v_0 , διὰ τὸν ὅποιον ἔχει νόημα.

β). 'Υποθέτοντες ὅτι ἡ πρότασις ἀληθεύει διὰ $v = k$, $k \in \mathbb{N}$, δηλ. $p(k)$ ἀληθής, ἀποδεικνύομεν τῇ βοηθείᾳ τῆς ἀληθείας τῆς $p(k)$ πιθανῶς δὲ καὶ τοῦ $p(1)$ τὴν ἀλήθειαν τῆς $p(k+1)$.

γ). Συμπεραίνομεν, συμφώνως πρὸς τὸ θεώρημα τῆς τελείας ἐπαγωγῆς (§ 28), ὅτι ἡ πρότασις ἀληθεύει διὰ κάθε $v \in \mathbb{N}$.

ΕΦΑΡΜΟΓΑΙ

1η : Διὰ κάθε φυσικὸν ἀριθμὸν v ἴσχυει ἡ ἴσοτης :

$$1 + 2 + 3 + \cdots + v = \frac{1}{2} v \cdot (v + 1). \quad (\text{i})$$

'Α πόδειξις : "Ἄσ συμβολίσωμεν διὰ τοῦ S τὸ σύνολον τῶν $v \in \mathbb{N}$, διὰ τὰ ὅποια ἡ (i) ἀληθεύει. Τότε $1 \in S$, διότι ἡ (i) ἀληθεύει διὰ $v = 1$, καθ' ὅτι :

$$1 = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot (1 + 1).$$

"Πυοθέσωμεν τώρα ὅτι ὁ ἀριθμὸς k ἀνήκει εἰς τὸ S . Τότε ἡ (i) ἀληθεύει δι' αὐτὸν τὸν (φυσικὸν) ἀριθμὸν k . ήτοι εἶναι :

$$1 + 2 + 3 + \cdots + k = \frac{1}{2} k \cdot (k + 1).$$

Ἐάν προσθέσωμεν τὸ $k + 1$ εἰς ἀμφότερα τὰ μέλη, λαμβάνομεν :

$$\begin{aligned} 1 + 2 + 3 + \cdots + k + (k + 1) &= (1 + 2 + \dots + k) + (k + 1) = \\ &= \frac{1}{2} k (k + 1) + (k + 1) = \frac{k (k + 1) + 2 (k + 1)}{2} = \frac{1}{2} (k + 1) \cdot [(k + 1) + 1]. \end{aligned}$$

Συνεπῶς, ἀν ἡ (i) ἀληθεύῃ διὰ $v = k$, τότε ἡ (i) ἀληθεύει καὶ διὰ $v = k + 1$, ὅθεν ἀν $k \in S$, τότε $k + 1 \in S$. Ἀρα κατὰ τὴν ἀρχὴν τῆς μαθηματικῆς ἐπαγωγῆς ἔχομεν $S \equiv \mathbb{N}$. Ἐπειδὴ δὲ τὸ S εἶναι τὸ σύνολον τῶν $v \in \mathbb{N}$ διὰ τὰ ὅποια ἡ (i) ἀληθεύει, συμπεραίνομεν ὅτι ἡ (i) ἀληθεύει διὰ κάθε φυσικὸν ἀριθμὸν v .

2α : "Ἄν $a \geq -1$ καὶ $v \in \mathbb{N}$, νὰ δειχθῇ ὅτι :

$$(1 + a)^v \geq 1 + va \quad (\text{ἀνισότης τοῦ Bernoulli}). \quad (\text{ii})$$

'Α πόδειξις : α). Διὰ $v = 1$ ἴσχυει ὡς ἴσοτης, ἐπειδή :

$$(1 + a)^1 = 1 + a = 1 + 1 \cdot a.$$

β). Ἐστω ὅτι διὰ $v = k$ ($k \in \mathbb{N}$) ἡ ἀνισότης ἀληθεύει, δηλαδὴ ἔστω ὅτι :

$$(1 + a)^k \geq 1 + ka. \quad (\text{p})$$

'Εκ τῆς ἀληθείας τῆς (p) θὰ ἀποδείξωμεν ὅτι ἡ ἀνισότης (ii) ἴσχυει καὶ διὰ $v = k + 1$, ήτοι :

$$(1 + a)^{k+1} \geq 1 + (k + 1) a, \quad (\text{q})$$

δηλαδὴ θὰ ἀποδείξωμεν τὴν ἀλήθειαν τῆς συνεπαγωγῆς (p) \implies (q).

Πράγματι, πολλαπλασιάζοντες άμφοτέρα τὰ μέρη τῆς (p) ἐπὶ τὸν θετικὸν ἀριθμὸν $(1 + \alpha)$ ἔχομεν διαδοχικῶς :

$$(1 + \alpha)^{k+1} \geq (1 + k\alpha)(1 + \alpha) = 1 + k\alpha^2 + (k + 1)\alpha \geq 1 + (k + 1)\alpha,$$

ἵπτοι : $(1 + \alpha)^{k+1} \geq 1 + (k + 1)\alpha.$

*Άρα ὅταν ἀληθεύῃ ἡ (p), ἀληθεύει καὶ ἡ (q), συνεπῶς ἡ ἀποδεικτέα ἀνισότητα (ii) ἀληθεύει διὰ κάθε φυσικὸν ἀριθμὸν v .

3η : Διὰ κάθε φυσικὸν ἀριθμὸν $v \geq 4$ νὰ δειχθῇ ὅτι : $\left(\frac{3}{2}\right)^v > v + 1.$ (iii)

*Α πόδειξις : Διὰ $v = v_0 = 4$ ἡ ἀνισότητα ἴσχυει, διότι :

$$\left(\frac{3}{2}\right)^4 = \frac{81}{16} > 5 = 4 + 1.$$

*Εστω ὅτι διὰ $v = k$ ($k \in \mathbb{N}$ μὲν $k \geq 4$) ἡ ἀνισότητα (iii) ἴσχυει, ἥτοι :

$$\left(\frac{3}{2}\right)^k > k + 1.$$

*Εξ αὐτῆς θὰ δείξωμεν ὅτι ἡ ἀνισότητα (iii) ἴσχυει καὶ διὰ $v = k + 1$, ἥτοι ὅτι :

$$\left(\frac{3}{2}\right)^{k+1} > (k + 1) + 1.$$

Πράγματι, ἐπειδὴ $\left(\frac{3}{2}\right)^{k+1} > \frac{3}{2}(k + 1)$
ἀρκεῖ νὰ δείξωμεν ὅτι :

$$\frac{3}{2}(k + 1) > (k + 1) + 1 \quad \text{ἢ} \quad \frac{3}{2}(k + 1) - (k + 1) > 1,$$

δηλαδή : $k + 1 > 2.$

*Η τελευταία ὅμως ἀνισότητα ἴσχυει (διότι $k \geq 4$). "Οθεν ἡ ἀποδεικτέα ἀνισότητα

$$\left(\frac{3}{2}\right)^v > v + 1$$

ἴσχυει διὰ κάθε φυσικὸν ἀριθμὸν $v \geq 4$.

Παρατήρησης : Πολλάκις, διὰ νὰ ἀποδείξωμεν ὅτι μία πρότασις $p(v)$ ἀληθεύει διὰ κάθε φυσικὸν ἀριθμὸν v , ἀποδεικύομεν τὴν ἀλήθειαν αὐτῆς δι' ἓνα σημαντικὸν ἀριθμὸν διαδοχικῶν φυσικῶν τιμῶν τοῦ v , λ.χ. διὰ $v = 1, 2, \dots, v_0$ καὶ ἀκολούθως συμπεραίνομεν ὅτι αὕτη θὰ ἀληθεύῃ διὰ κάθε $v \in \mathbb{N}$ (ἀτελῆς ἐπαγγείλη).

*Η μέθοδος αὗτη δόδηγει πολλάκις εἰς ἐσφαλμένην πρότασιν, καὶ δὲν πρέπει νὰ τὴν μεταχειρίζωμεθα. "Ἐν κλασικὸν παράδειγμα τοιαύτης πλάνης είναι ἡ ἔξης ψευδής πρότασις τοῦ Euler :

«Ἐὰν v φυσικὸς ἀριθμός, τότε ὁ ἀριθμὸς $(v^2 - v + 41)$ εἶναι πρῶτος».

*Η παράστασις $v^2 - v + 41$ διὰ $v = 1, 2, 3, \dots, 40$ δίδει πρώτους ἀριθμοὺς (μὴ ἔχοντας δῆλον διαιρέτην ἑκτὸς τοῦ ἑαυτοῦ των καὶ τῆς μονάδος), ὅμως διὰ $v = 41$ δίδει :

$$v^2 - v + 41 = 41^2 - 41 + 41 = 41^2,$$

δῆλον ἀριθμὸν μὴ πρῶτον.

Όμοιώς ἐκ τοῦ γεγονότος ὅτι ἡ ἔκφρασις $2^v + 1$ δίδει διὰ $v = 1, 2, 3, 4$ πρώτους ἀριθμούς δὲν δυνάμεθα νὰ συμπεράνωμεν ὅτι ἡ εἰρημένη ἔκφρασις δίδει πρώτους ἀριθμούς διὰ πάντας τοὺς φυσικοὺς ἀριθμούς, καθ' ὅσον διὰ $v = 5$ ἡ ἐν λόγῳ ἔκφρασις δίδει σύνθετον ἀριθμόν.

Ἐπίστης δὲν ἀρκεῖ ἡ ἀπόδειξις τῆς ἀληθείας τῆς προτάσεως διὰ $v = k + 1$, μὲ τὴν ὑπόθεσιν ὅτι αὕτη ἀληθεύει διὰ $v = k$. Πρέπει ὁ πωσδήποτε νὰ ἀποδεικνύωμεν τὴν ἀληθείαν αὐτῆς διὰ $v = 1$ (ἢ, ἂν δὲν ἔχῃ νόημα διὰ $v = 1$, ἀπόδεικνύομεν τὴν ἀληθείαν διὰ $v = v_0$, ἔνθα v_0 δὲ ἐλάχιστος φυσικὸς ἀριθμός, δι' ὃν ἔχει νόημα ἡ πρότασις). Περὶ τούτου βεβαιούμεθα ἀπὸ τὴν ἔξῆς ψευδῆ πρότασιν :

$$\text{«Διὰ } v \in \mathbb{N} \text{ ἰσχύει : } v = v + 17. \text{»}$$

Πράγματι, ὃς παραλείψωμεν νὰ ἔξακριβώσωμεν κατὰ πόσον ἡ ἀνωτέρω πρότασις ἀληθεύει διὰ $v = 1$.

Ὑποθέσωμεν ὅτι αὕτη εἶναι ἀληθής διὰ $v = k$, ἢτοι : $k = k + 17$, τότε ἔχομεν

$$k + 1 = (k + 17) + 1$$

$$\ddots \quad k + 1 = (k + 1) + 17,$$

δηλ. ἡ πρότασις ἀληθεύει διὰ $v = k + 1$ μὲ τὴν ὑπόθεσιν ὅτι ἀληθεύει διὰ $v = k$.

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω λοιπὸν συνάγομεν ὅτι: εἶναι ἀναγκαῖον ὅπως καὶ αἱ δύο ὑπόθεσεις 1) καὶ 2) τοῦ θεωρήματος τῆς τελείας ἐπαγωγῆς πληροῦνται, ἵνα εἶναι τὸ συμπέρασμα ἀληθές.

§ 29. Γενικεύσεις τοῦ Θεωρήματος τῆς τελείας ἐπαγωγῆς. — Ἐκτὸς τῆς μορφῆς τῆς (ἀπλῆς) τελείας ἐπαγωγῆς, τὴν ὅποιαν ἀνεπτύξαμεν προηγουμένως, ὑπάρχουν καὶ δύο ἄλλαι μορφαὶ αὐτῆς, αἱ ὅποιαι παρέχονται ὑπὸ τῶν κάτωθι δύο θεωρημάτων, τὰ ὅποια ἀναφέρομεν ἀνευ ἀποδείξεως.

§ 30. Θεώρημα I. — Ἐὰν $p(v)$ εἶναι μία (λογικὴ) πρότασις, εἰς τὴν διατύπωσιν τῆς ὁποίας ἀναφέρεται ὁ φυσικὸς ἀριθμὸς v , ἡ ὁποίᾳ πληροὶ τὰς ἔξῆς ὑποθέσεις : 1) « $p(1)$ εἶναι ἀληθής». 2) μὲ τὴν ὑπόθεσιν ὅτι ἡ $p(v)$ ἀληθεύει διὰ κάθε $v \in \mathbb{N}$ μὲ $v < k$, ἀποδεικνύεται ὅτι ἡ $p(v)$ ἀληθεύει καὶ διὰ $v = k$ καὶ τοῦτο διὰ τυχὸν $k \in \mathbb{N}$ μὲ $k > 1$, τὸ τε : ἡ $p(v)$ ἀληθεύει διὰ κάθε $v \in \mathbb{N}$.

Ἐφαρμογή. Νὰ δειχθῇ (διὰ τῆς τελείας ἐπαγωγῆς) ὅτι ἡ ἀνισότης :

$$2^{10^v} > 10^{3v} \text{ ἀληθεύει διὰ κάθε } v \in \mathbb{N}.$$

Ἀπόδειξις : Διὰ $v = 1$ ἡ ἀνισότης ἀληθεύει, ἢτοι $2^{10} > 10^3$.

Ἐστω διτὶ αὕτη ἀληθεύει διὰ κάθε $v < k$ (καὶ τοῦτο διὰ τυχὸν $k \in \mathbb{N}$ μὲ $k > 1$), ὅπότε

ἰσχύουν αἱ σχέσεις :

$$2^{10} > 10^3 \text{ καὶ } 2^{10(k-1)} > 10^{3(k-1)},$$

ἐκ τῶν ὁποίων διὰ πολλαπλασιασμοῦ κατὰ μέλη προκύπτει : $2^{10k} > 10^{3k}$, ἢτοι ἡ ἐν λόγῳ ἀνισότης ισχύει καὶ διὰ $v = k$. συνεπῶς ισχύει $2^{10^v} > 10^{3v}$ διὰ κάθε $v \in \mathbb{N}$.

§ 31. Θεώρημα II. — Υπόθεσεις : 1) Ἰσχύει : «ἡ $p(1)$ καὶ $p(2)$ εἶναι ἀληθεῖς», 2) μὲ τὴν ὑπόθεσιν ὅτι ἀληθεύουν αἱ $p(k-2)$ καὶ $p(k-1)$ ἀποδεικνύεται ὅτι ἡ $p(k)$ ἀληθεύει καὶ τοῦτο διὰ τυχὸν $k \in \mathbb{N}$ μὲ $k > 2$.

Συμπέρασμα : ἡ $p(v)$ ἀληθεύει διὰ κάθε $v \in \mathbb{N}$.

Έφαρμογή. Νὰ δειχθῇ ὅτι διὰ κάθε φυσικὸν ἀριθμὸν ν ισχύει :

$$S_v \equiv (3 + \sqrt{5})^v + (3 - \sqrt{5})^v = \text{πολ. } 2^v.$$

Α πόδειξις: Διὰ ν = 1 καὶ ν = 2 ἔχομεν ἀντιστοίχως :

$$S_1 = (3 + \sqrt{5}) + (3 - \sqrt{5}) = 6 = 3 \cdot 2^1$$

$$S_2 = (3 + \sqrt{5})^2 + (3 - \sqrt{5})^2 = 28 = 7 \cdot 2^2.$$

Άρα ἡ πρότασις ισχύει διὰ ν = 1 καὶ ν = 2.

Εστω ὅτι αὐτὴ ισχύει διὰ ν = k - 2, k - 1 (διὰ τυχὸν k ∈ N, k > 2), ἤτοι :

$$S_{k-2} \equiv (3 + \sqrt{5})^{k-2} + (3 - \sqrt{5})^{k-2} = \text{πολ. } 2^{k-2} \text{ καὶ}$$

$$S_{k-1} \equiv (3 + \sqrt{5})^{k-1} + (3 - \sqrt{5})^{k-1} = \text{πολ. } 2^{k-1}.$$

Θὰ δείξωμεν τότε ὅτι ἡ πρότασις αὐτὴ ισχύει καὶ διὰ ν = k.

Πρὸς τοῦτο θεωροῦμεν τὴν ἔξισωσιν μὲριζας $x_1 = 3 + \sqrt{5}$ καὶ $x_2 = 3 - \sqrt{5}$.

Αὗτη εἶναι ἡ $x^2 - 6x + 4 = 0$.

Εύκολως τώρα διαπιστοῦται ὅτι :

$$(3 + \sqrt{5})^k + (3 - \sqrt{5})^k \equiv S_k = 6 S_{k-1} - 4 S_{k-2}$$

καὶ ἐπομένως :

$$S_k = 6 \cdot \text{πολ. } 2^{k-1} - 4 \cdot \text{πολ. } 2^{k-2} = \text{πολ. } 2^k,$$

ἥτοι ἡ ἐν λόγῳ πρότασις ισχύει καὶ διὰ ν = k.

Άρα ἡ πρότασις, δυνάμει τοῦ θεωρήματος II, ισχύει διὰ κάθε φυσικὸν ἀριθμὸν ν.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

23. Νὰ ἀποδειχθοῦν διὰ τῆς μεθόδου τῆς Μαθηματικῆς Ἐπαγωγῆς αἱ κάτωθι προτάσεις :

$$1. 1^a + 2^a + 3^a + \cdots + v^a = \frac{v(v+1)(2v+1)}{6} \quad \forall v \in N$$

$$2. 1^a + 2^a + 3^a + \cdots + v^a = (1+2+3+\cdots+v)^2 \quad \forall v \in N$$

$$3. 1 + 3 + 5 + \cdots + (2v-1) = v^2 \quad \forall v \in N$$

$$4. \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \cdots + \frac{1}{v(v+1)} = \frac{v}{v+1} \quad \forall v \in N$$

$$5. \frac{(v+1)(v+2)\cdots(2v)}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2v-1)} = 2^v \quad \forall v \in N.$$

24. Διὰ κάθε φυσικὸν ἀριθμὸν ν, νὰ δειχθῇ ὅτι :

$$1. \text{Ο } \alpha \text{ ἀριθμὸς } 7^{2v} + 16v - 1 \text{ διαιρεῖται διὰ τοῦ } 64$$

$$2. \text{» } 3^{4v+2} + 2^{6v+3} \text{ » » » } 17$$

$$3. \text{» } 2^{2v+1} - 9v^2 + 3v - 2 \text{ » » » } 54.$$

25. Εάν ν τυχῶν φυσικὸς ἀριθμός, νὰ ἀποδειχθοῦν ἐπαγωγικῶς αἱ ἀνισότητες :

$$1. (1-\alpha)^v \geq 1 - v\alpha, \quad \text{ὅπου } \alpha \leq 1$$

$$2. (1-\alpha)^v < \frac{1}{1+v\alpha}, \quad \text{ὅπου } 0 < \alpha \leq 1$$

$$3. \left(1 - \frac{1}{v^a}\right)^v \geq 1 - \frac{1}{v}, \quad 4. \left(1 + \frac{1}{6v}\right)^{-v} > \frac{5}{6},$$

$$5. \frac{v^a}{2} < 1 + 2 + 3 + \cdots + v < \frac{(v+1)^a}{2}.$$

26. Εάν $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_v$ θετικοὶ ἀριθμοί, διάφοροι τοῦ 1, νὰ δειχθῇ ὅτι :

$$(1 + \alpha_1)(1 + \alpha_2) \cdots (1 + \alpha_v) > 2^v \sqrt{\alpha_1 \alpha_2 \cdots \alpha_v}$$

27. Έάν $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_v \in \mathbb{R}^+$ και $\sigma_v = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_v$, δείξατε ότι :

1. $(1 + \alpha_1)(1 + \alpha_2) \cdots (1 + \alpha_v) \geq 1 + \sigma_v \quad \forall v \in \mathbb{N}$.
2. $(1 - \alpha_1)(1 - \alpha_2) \cdots (1 - \alpha_v) \leq 1 - \sigma_v$, όπου $0 < \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_v < 1$.
3. $(1 + \alpha_1)(1 + \alpha_2) \cdots (1 + \alpha_v) < \frac{1}{1 - \sigma_v}$, όπου σμως $\sigma_v < 1$.
4. $(\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_v) \left(\frac{1}{\alpha_1} + \frac{1}{\alpha_2} + \dots + \frac{1}{\alpha_v} \right) \geq v^2 \quad \forall v \in \mathbb{N}$.

28. Νά δειχθῇ (διά τῆς μεθόδου τῆς μαθηματικῆς ἐπαγωγῆς) ότι τὸ πλῆθος τῶν διαγωνίων πολυγώνου ἔχοντος v -κορυφάς δίδεται ὑπὸ τοῦ τύπου : $\frac{v(v-3)}{2}$.

29. Νά δειχθοῦν (διά τῆς μεθόδου τῆς μαθηματικῆς ἐπαγωγῆς) αἱ κάτωθι ἀνισότητες :

1. $2^v > v^3 \quad \forall v \geq 10$,
2. $\sqrt[3]{3} > \sqrt[v]{v} \quad \forall v > 3$,
3. $2^{\mu} < 10^{-v}$, διά κάθε $\mu, v \in \mathbb{N}$ μὲ : $\mu > \frac{10}{3}v$,
4. $\frac{\sqrt[3]{1} + \sqrt[3]{2} + \sqrt[3]{3} + \dots + \sqrt[3]{v}}{v} > \frac{2}{3}\sqrt[v]{v}, \quad \forall v \in \mathbb{N}$.

30. Νά δποδειχθῇ ότι: $1^2 + 3^2 + 5^2 + \dots + (2v-1)^2 = \frac{v(4v^2-1)}{3}, \quad \forall v \in \mathbb{N}$.

31. Όμοιώς $1^2 + 3^2 + 5^2 + \dots + (2v-1)^2 = v^2(2v^2-1), \quad \forall v \in \mathbb{N}$.

32. Νά δποδειχθῇ ότι δ ἀριθμός $10^v + 3 \cdot 4^{v+2} + 5$ διαιρεῖται διά 9, $\forall v \in \mathbb{N}$.

33. Εάν θ ἀριθμός θετικός $\neq 1$, νὰ δποδειχθῇ ότι διά κάθε $v \in \mathbb{N}$ ισχύει ἡ ἀνισότης :

$$\frac{1 + \theta^2 + \theta^4 + \dots + \theta^{2v}}{\theta + \theta^3 + \dots + \theta^{2v-1}} > 1 + \frac{1}{v}.$$

34. Εάν $\alpha^v - \beta^v\gamma = \text{πολ. } 4$, ἔνθα $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{Z}$ μὲ $\gamma \geq 0$, τότε δείξατε ότι διά κάθε φυσικόν ἀριθμὸν v ισχύει :

$$S_v \equiv (\alpha + \beta\sqrt{\gamma})^v + (\alpha - \beta\sqrt{\gamma})^v = \text{πολ. } 2^v.$$

Επιπλέον είναι το γεγονός ότι διά την προσθήση των πολυτελεστών S_v και S_{v+1} η πολυτελεστή S_{v+1} αποτελείται από πολυτελεστή της S_v που παραπομπής από την πολυτελεστή S_v και από πολυτελεστή της β την οποίαν οι πολυτελεστές S_v και S_{v+1} μοιάζουν μεταξύ τους ως οι πολυτελεστές S_v και S_{v+1} μοιάζουν μεταξύ τους.

Τα παραπάνω γεγονότα μαρτυρούνται στην πολυτελεστή S_{v+1} ότι η πολυτελεστή S_{v+1} είναι πολυτελεστή της πολυτελεστής S_v .



Επιπλέον είναι το γεγονός ότι διά την προσθήση των πολυτελεστών S_v και S_{v+1} η πολυτελεστή S_{v+1} αποτελείται από πολυτελεστή της S_v που παραπομπής από την πολυτελεστή S_v και από πολυτελεστή της β την οποίαν οι πολυτελεστές S_v και S_{v+1} μοιάζουν μεταξύ τους ως οι πολυτελεστές S_v και S_{v+1} μοιάζουν μεταξύ τους.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ III

ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΤΙΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ

I. ΟΡΙΣΜΟΙ — ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

§ 32. Όρισμός. — Άπολυτος τιμή ένδος πραγματικού άριθμού καλείται αὐτός ούτος δ ἀριθμός, ἐὰν είναι θετικός ή μηδέν, δ ἀντίθετός του, ἐὰν δ ἀριθμός είναι ὑρνητικός.

‘Η ἀπόλυτος τιμὴ ένδος πραγματικοῦ ἀριθμοῦ α συμβολίζεται μὲ : $|\alpha|$ καὶ ἀναγιγνώσκεται : «ἀπόλυτος τιμὴ τοῦ α » *). ‘Ως ἄμεσον συνέπειαν τοῦ ἀνωτέρω ὁρισμοῦ ἔχομεν :

$$|\alpha| = \alpha, \quad \text{ἐὰν } \alpha \geq 0$$

$$\text{καὶ } |\alpha| = -\alpha, \quad \text{ἐὰν } \alpha < 0.$$

$$\text{Οὕτω : } |2| = 2, \quad |0| = 0, \quad \left| -\frac{3}{4} \right| = -\left(-\frac{3}{4} \right) = \frac{3}{4}.$$

‘Ἐκ τοῦ ἀνωτέρω ὁρισμοῦ προκύπτει ὅτι :

$$\forall \alpha \in \mathbb{R} \quad \text{είναι : } |\alpha| \geq 0.$$

‘Αναλυτικώτερον ἔχομεν :

$$|\alpha| > 0 \iff \alpha \neq 0$$

$$\text{καὶ } |\alpha| = 0 \iff \alpha = 0.$$

‘Οθεν ἡ παράστασις $|\alpha|$ είναι μὴ ὑρνητικὸς ἀριθμός.

‘Εντεῦθεν ἔπειται δ ἔχης ισοδύναμος ὁρισμὸς τῆς ἀπολύτου τιμῆς πραγματικοῦ ἀριθμοῦ :

‘Άπολυτος τιμὴ (ἢ μέτρον) ένδος πραγματικοῦ ἀριθμοῦ α καλείται δ μὴ ὑρνητικὸς ἀριθμός, δ ὅποιος ὁρίζεται οὕτω :

$$|\alpha| \stackrel{\text{ορ}}{=} \begin{cases} \alpha, & \text{ἐὰν } \alpha \geq 0 \\ -\alpha, & \text{ἐὰν } \alpha < 0 \end{cases}$$

Σημείωσις: ‘Ἐὰν $\alpha = 0$, τότε είναι $|\alpha| = \alpha$ εἴτε $|\alpha| = -\alpha$. ‘Αρα, βάσει καὶ τοῦ ὁρισμοῦ, ισχύουν αἱ ισοδύναμαί : $\alpha \geq 0 \iff |\alpha| = \alpha$, $\alpha \leq 0 \iff |\alpha| = -\alpha$

* Τὸ σύμβολον $|\alpha|$ ὡς καὶ ἡ δυνομασία του, διεθίλονται εἰς τὸν Γερμανὸν μαθηματικὸν Karl Weierstrass (1815 - 1897).

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΤΩΝ ΤΙΜΩΝ

§ 33. Ιδιότης I. — Οι άντιθετοι πραγματικοί άριθμοι έχουν τιςας άπολύτους τιμάς,

ήτοι :

$$\boxed{\forall \alpha \in \mathbb{R} \implies |\alpha| = |\alpha|}$$

Α πόδειξις : Διακρίνομεν τρεις περιπτώσεις :

(i). Εάν $\alpha > 0$, δηλαδή $-\alpha < 0$, $\implies |\alpha| = \alpha$ και $|\alpha| = -(-\alpha) = \alpha$.
Οθεν : $|\alpha| = |\alpha|$.

(ii). Εάν $\alpha = 0$, δηλαδή $-\alpha = 0$, $\implies |\alpha| = 0$ και $|\alpha| = 0$.
Οθεν : $|\alpha| = |\alpha|$.

(iii). Εάν $\alpha < 0$, δηλαδή $-\alpha > 0$, $\implies |\alpha| = -\alpha$ και $|\alpha| = -\alpha$.
Οθεν καὶ εἰς αὐτὴν τὴν περίπτωσιν : $|\alpha| = |\alpha|$.

"Ωστε : $\forall \alpha \in \mathbb{R} \implies |\alpha| = |\alpha|$.

Πόρισμα. — Εάν $\alpha, \beta \in \mathbb{R} \implies |\alpha - \beta| = |\beta - \alpha|$.

§ 34. Ιδιότης II. — Εάν α πραγματικός άριθμός, τότε :

$$-|\alpha| \leq \alpha \leq |\alpha|.$$

Α πόδειξις : Διακρίνομεν δύο περιπτώσεις :

(i). Εάν $\alpha \geq 0 \implies |\alpha| = \alpha$ και ἐπομένως : $-|\alpha| \leq \alpha = |\alpha|$.
Οθεν καὶ : $-|\alpha| \leq \alpha \leq |\alpha|$.

(ii). Εάν $\alpha < 0 \implies |\alpha| = -\alpha$ και ἐπομένως : $-|\alpha| = \alpha < |\alpha|$.
Οθεν καὶ : $-|\alpha| \leq \alpha \leq |\alpha|$.

Οὐδέποτε εἶναι : $-|\alpha| < \alpha < |\alpha|$.

"Ωστε :

$$\boxed{\forall \alpha \in \mathbb{R} \implies -|\alpha| \leq \alpha \leq |\alpha|}$$

Παρατήρησις : Έκ τῆς άνωτέρω Ιδιότητος ἐπεται ἀμέσως :

$$\forall x \in \mathbb{R} \implies |x| + x \geq 0 \text{ καὶ } |x| - x \geq 0.$$

§ 35. Ιδιότης III. — Τὸ τετράγωνον τῆς άπολύτου τιμῆς ἔνὸς πραγματικοῦ άριθμοῦ ισοῦται πρὸς τὸ τετράγωνον τοῦ άριθμοῦ τούτου, ήτοι ίσχύει :

$$\boxed{\forall \alpha \in \mathbb{R} \implies |\alpha|^2 = \alpha^2}$$

Α πόδειξις : Εάν $\alpha \geq 0 \implies |\alpha| = \alpha$ καὶ ἄρα $|\alpha|^2 = \alpha^2$.

Εάν $\alpha < 0 \implies |\alpha| = -\alpha$ καὶ συνεπῶς $|\alpha|^2 = (-\alpha)^2 = \alpha^2$.

"Ωστε : $\forall \alpha \in \mathbb{R} \implies |\alpha|^2 = \alpha^2$.

Σπουδαία παρατήρησις. Εάν $\alpha \notin \mathbb{R} \implies |\alpha|^2 \neq \alpha^2$.

Οὕτως, έάν $\alpha \in \mathbb{C}$, δηλαδὴ $\alpha = x + iy$, ($y \neq 0$) $\implies |\alpha|^2 \neq \alpha^2$ (διατί ;).

Κατά ταῦτα ἡ |σότης| $|\alpha|^2 = \alpha^2$ συνεπάγεται τὸ πραγματικὸν τοῦ α καὶ τὸ διάφορον $|\alpha|^2 \neq \alpha^2$ συνεπάγεται ὅτι ὁ α εἶναι τῆς μορφῆς $\lambda + \mu i$, συμβολικῶς (λ, μ), ὅπου $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ καὶ $\mu \neq 0$.

Πόρισμα 1ον. — Γενικώτερον ισχύουν τὰ κάτωθι :

$$\forall x \in \mathbb{R}, v \in \mathbb{N} \implies \begin{cases} |x|^{2v} = x^{2v} \\ |x|^{2v+1} = \begin{cases} x^{2v+1}, & \text{ἐὰν } x \geq 0 \\ -x^{2v+1}, & \text{ἐὰν } x < 0 \end{cases} \end{cases}$$

Πόρισμα 2ον. — Ἐὰν $a \in \mathbb{R}$ καὶ $v \in \mathbb{N} \implies \sqrt[2v]{a^{2v}} = |a|$.

Κατά ταῦτα εἶναι :

$$\sqrt{x^2} = \begin{cases} x, & \text{ἐὰν } x > 0 \\ -x, & \text{ἐὰν } x < 0 \\ 0, & \text{ἐὰν } x = 0. \end{cases}$$

Εἰς ὅλας τὰς περιπτώσεις δυνάμεθα ὅθεν νὰ γράψωμεν : $\sqrt{x^2} = |x|$.

§ 36. Ἰδιότης IV. — Διὰ πραγματικοὺς ἀριθμοὺς x, ε μὲ $\varepsilon > 0$ ισχύουν αἱ λογικαὶ ισοδυναμίαι :

$$|x| \leq \varepsilon \iff -\varepsilon \leq x \leq \varepsilon \iff x^2 \leq \varepsilon^2$$

Ἀ πόδειξις 1: Ἐστω ὅτι ισχύει $|x| \leq \varepsilon$. Τότε $|x|^2 \leq \varepsilon^2$ ἢ κατὰ τὴν Ἰδιότητα III: $x^2 \leq \varepsilon^2 \implies x^2 - \varepsilon^2 \leq 0 \implies (x - \varepsilon)(x + \varepsilon) \leq 0 \implies -\varepsilon \leq x \leq \varepsilon$.

2) Ἐστω ὅτι ισχύει $-\varepsilon \leq x \leq \varepsilon \implies (x + \varepsilon) \geq 0 \wedge (x - \varepsilon) \leq 0 \implies (x + \varepsilon)(x - \varepsilon) \leq 0 \implies x^2 - \varepsilon^2 \leq 0 \implies x^2 \leq \varepsilon^2$. Ἐκ ταῦτης (πόρισμα II §35) ἐπεταῖ $|x| \leq \varepsilon$, διότι $\varepsilon > 0$.

3) Ἐστω, τέλος, ὅτι ισχύει ἡ $x^2 \leq \varepsilon^2$. Τότε $|x|^2 \leq \varepsilon^2$, ἥτοι $|x| \leq \varepsilon$. Ἀρα καὶ $-\varepsilon \leq x \leq \varepsilon$ ὡς ἀπεδείχθη εἰς τὴν πρώτην περίπτωσιν. Ὁστε

$$\forall x \in \mathbb{R} \text{ καὶ } \varepsilon > 0 \text{ ισχύει: } |x| \leq \varepsilon \iff -\varepsilon \leq x \leq \varepsilon \iff x^2 \leq \varepsilon^2.$$

Παρατήρησις: Ομοίως ἀποδεικνύονται αἱ λογικαὶ ισοδυναμίαι :

$$1η. \quad -\varepsilon < x < \varepsilon \iff |x| < \varepsilon,$$

$$2a. \quad (x < -\varepsilon \text{ ή } x > \varepsilon) \iff |x| > \varepsilon, \text{ ὅπου } \varepsilon > 0.$$

ἘΦΑΡΜΟΓΑΙ. 1η : Νὰ ἀποδειχθῇ ἡ (λογική) ισοδυναμία :

$$2 \leq x \leq 8 \iff |x - 5| \leq 3.$$

Πράγματι, ἐκ τῶν $2 \leq x \leq 8 \iff -3 \leq x - 5 \leq 3 \iff |x - 5| \leq 3$.

2a : Νὰ ἀποδειχθῇ ἡ (λογική) ισοδυναμία :

$$|x - x_0| < \varepsilon \iff x_0 - \varepsilon < x < x_0 + \varepsilon.$$

Πράγματι : $|x - x_0| < \varepsilon \iff -\varepsilon < x - x_0 < \varepsilon \iff x_0 - \varepsilon < x < x_0 + \varepsilon$.

‘Απόλυτος τιμή άθροίσματος ή διαφορᾶς πραγματικῶν ἀριθμῶν.

§ 37. Ιδιότης V.—Η ἀπόλυτος τιμὴ τοῦ ἀθροίσματος δύο πραγματικῶν ἀριθμῶν εἶναι μικροτέρα ή ἵση τοῦ ἀθροίσματος τῶν ἀπολύτων τιμῶν τῶν προσθετέων,

ὅτοι :

$$|\alpha + \beta| \leq |\alpha| + |\beta|$$

’Α πόδειξις : Πράγματι, ἐκ τῶν γνωστῶν σχέσεων (Ιδιότης II) :

$$-|\alpha| \leq \alpha \leq |\alpha|$$

$$-|\beta| \leq \beta \leq |\beta|$$

διὰ προσθέσεως κατὰ μέλη, λαμβάνομεν :

$$-(|\alpha| + |\beta|) \leq \alpha + \beta \leq (|\alpha| + |\beta|)$$

καὶ κατὰ τὴν προηγουμένην ιδιότητα, ἔχομεν :

$$|\alpha + \beta| \leq |\alpha| + |\beta|. \quad (5.1)$$

Παρατήρησις : Η ίσοτης ἀληθεύει τότε, καὶ μόνον τότε, ὅταν : $\alpha\beta \geq 0$ (διατί ;).

”Οθεν μία πολὺ χρήσιμος πρότασις εἶναι ἡ ἔξῆς :

$$|\alpha + \beta| = |\alpha| + |\beta| \iff \alpha\beta \geq 0. \quad (5.2)$$

Πόρισμα Iov.—Η ἀπόλυτος τιμὴ τῆς διαφορᾶς δύο πραγματικῶν ἀριθμῶν εἶναι μικροτέρα ή ἵση τοῦ ἀθροίσματος τῶν ἀπολύτων τιμῶν των,

ὅτοι :

$$|\alpha - \beta| \leq |\alpha| + |\beta| \quad (5.3)$$

Πράγματι, ἐὰν εἰς τὴν (5.1) θέσωμεν ἀντὶ β τὸ $-\beta$, θὰ ἔχωμεν :

$$|\alpha - \beta| \leq |\alpha| + |-\beta| = |\alpha| + |\beta|.$$

Τὸ ίσον ίσχύει τότε, καὶ μόνον τότε, ὅταν : $\alpha\beta \leq 0$ (διατί ;).

”Οθεν ίσχύει ἡ λογικὴ ίσοδυναμία :

$$|\alpha - \beta| = |\alpha| + |\beta| \iff \alpha\beta \leq 0. \quad (5.4)$$

Πόρισμα 2ov.—Ἐὰν $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_v \in \mathbb{R}$, τότε διὰ κάθε $v \in \mathbb{N}$ μὲν $v \geq 2$ ίσχύει :

$$|\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_v| \leq |\alpha_1| + |\alpha_2| + \dots + |\alpha_v|$$

”Η ἀπόδειξις εὔκολος διὰ τῆς μαθηματικῆς (τελείας) ἐπαγωγῆς, γνωστοῦ ὅντος ὅτι διὰ $v = 2$ ίσχύει (§ 37).

’Εφαρμογή : ’Ἐὰν $|\alpha| < \frac{\varepsilon}{2}$ καὶ $|\beta| < \frac{\varepsilon}{2} \implies |\alpha \pm \beta| < \varepsilon$.

Πράγματι, δι’ ἐφαρμογῆς τῶν (5.1) καὶ (5.3) ἔχομεν :

$$|\alpha \pm \beta| \leq |\alpha| + |\beta| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

”Ἄρα : $|\alpha \pm \beta| < \varepsilon$.

§ 38. Ιδιότης VI. — Η ἀπόλυτος τιμὴ τῆς διαφορᾶς δύο πραγματικῶν ἀριθμῶν είναι μεγαλύτερα ἢ ἵση τῆς διαφορᾶς τῶν ἀπολύτων τιμῶν τῶν ἀριθμῶν καθ' οἵανδήποτε τάξιν,

$$\text{ἡτοι : } \boxed{\forall a, b \in \mathbb{R} \implies |a - b| \geq |a| - |b| \text{ καὶ } |a - b| \geq |b| - |a|}$$

Α πόδειξις : Ἐπειδὴ $a = a + b - b = b + (a - b)$, ἔχομεν κατὰ τὴν ιδιότητα V :

$$|a| = |b + (a - b)| \leq |b| + |a - b|, \text{ ἐξ οὗ : } |a - b| \geq |a| - |b|. \quad (6.1)$$

Όμοιώς : $\beta = b + a - a = a + (b - a)$. **Ἄρα :**

$$|\beta| = |a + (b - a)| \leq |a| + |b - a| = |a| + |a - b|, \text{ ἐξ οὗ : } |\alpha - \beta| \geq |\beta| - |\alpha|. \quad (6.2)$$

Πόρισμα. — Η ἀπόλυτος τιμὴ τοῦ ἀθροίσματος δύο πραγματικῶν ἀριθμῶν είναι μεγαλύτερα ἢ ἵση τῆς διαφορᾶς τῶν ἀπολύτων τιμῶν τῶν ἀριθμῶν καθ' οἵανδήποτε τάξιν,

$$\text{ἡτοι : } \boxed{\forall a, b \in \mathbb{R} \implies |a + b| \geq |a| - |b| \text{ καὶ } |a + b| \geq |b| - |a|} \quad (6.3)$$

Πράγματι, ἀρκεῖ εἰς τὰς (6.1) καὶ (6.2) νὰ τεθῇ ἀντὶ β τὸ $-\beta$.

§ 39. Ιδιότης VII. — Διὰ κάθε ζεῦγος πραγματικῶν ἀριθμῶν ἰσχύει :

$$\boxed{| |a| - |b| | \leq |a \pm b|}$$

Α πόδειξις. Ἐκ τῶν (6.1), (6.2) καὶ (6.3) ἔχομεν :

$$\text{ἀφ' ἑνός : } |\alpha| - |\beta| \leq |\alpha \pm \beta| \quad (7.1)$$

$$\text{καὶ ἀφ' ἑτέρου : } |\beta| - |\alpha| \leq |\alpha \pm \beta| \quad \text{ἢ } -|\alpha \pm \beta| \leq |\alpha| - |\beta|. \quad (7.2)$$

Ἐκ τῶν (7.1) καὶ (7.2) συνάγομεν τὴν διπλῆν ἀνίσοτητα :

$$-|\alpha \pm \beta| \leq |\alpha| - |\beta| \leq |\alpha \pm \beta|$$

ἡ δοποία, κατὰ τὴν ιδιότητα IV, γράφεται :

$$\boxed{| |a| - |b| | \leq |a \pm b|}. \quad (7.3)$$

Κατ' ἀκολουθίαν, βάσει καὶ τῆς ιδιότητος V, θὰ είναι :

$$\boxed{\forall a, b \in \mathbb{R} \implies |||a| - |b|| \leq |a \pm b| \leq |a| + |b|} \quad (7.4)$$

Παρατήρησις. Ἐκ τῶν ιδιοτήτων τῶν ἀποδειχθεισῶν εἰς τὰς προηγουμένας παραγράφους, μετὰ τῶν ἀντιστοίχων πορισμάτων, συνάγομεν ὅτι :

$$\boxed{\forall a, b \in \mathbb{R} \implies |a| - |b| \leq |||a| - |b|| \leq |a \pm b| \leq |a| + |b|} \quad (7.5)$$

Άσκησις. Ἐξετάσατε πότε εἰς τὰς σχέσεις (7.5) ἰσχύει τὸ ἵσον.

• Απόλυτος τιμή γινομένου πραγματικῶν ἀριθμῶν.

§ 40. Ἰδιότης VIII. — Ή απόλυτος τιμὴ τοῦ γινομένου δύο πραγματικῶν ἀριθμῶν ισοῦται πρὸς τὸ γινόμενον τῶν ἀπολύτων τιμῶν τῶν παραγόντων.

”Ητοι :

$$|\alpha \cdot \beta| = |\alpha| \cdot |\beta|$$

’Α πόδειξις. ’Ως γνωστὸν (§ 35, πόρισμα 2ον) ισχύει :

$$\sqrt{x^2} = |x|.$$

”Αρα :

$$|\alpha \beta| = \sqrt{(\alpha \beta)^2} = \sqrt{\alpha^2 \cdot \beta^2} = \sqrt{\alpha^2} \cdot \sqrt{\beta^2} = |\alpha| \cdot |\beta|. \quad (8.1)$$

Πόρισμα 1ον. — ’Εάν $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_v \in \mathbb{R}$, τότε διὰ κάθε $v \in \mathbb{N}$ μὲν $v \geq 2$ ισχύει :

$$|\alpha_1 \cdot \alpha_2 \cdot \alpha_3 \dots \alpha_{v-1} \cdot \alpha_v| = |\alpha_1| \cdot |\alpha_2| \cdot |\alpha_3| \dots |\alpha_{v-1}| \cdot |\alpha_v| \quad (8.2)$$

’Η ἀπόδειξις εὔκολος διὰ τῆς μεθόδου τῆς τελείας ἐπαγωγῆς, γνωστοῦ ὄντος ὅτι διὰ $v = 2$ ισχύει (§ 40).

Πόρισμα 2ον. — ’Εάν $\alpha \in \mathbb{R}$ καὶ $v \in \mathbb{N}$ ισχύει πάντοτε :

$$|\alpha^v| = |\alpha|^v$$

Προφανῶς, ἀρκεῖ εἰς τὴν (8.2) νὰ τεθῇ : $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \dots = \alpha_{v-1} = \alpha_v = \alpha$.

• Απόλυτος τιμὴ πηλίκου δύο πραγματικῶν ἀριθμῶν.

§ 41. Ἰδιότης IX. — Ή απόλυτος τιμὴ τοῦ πηλίκου δύο πραγματικῶν ἀριθμῶν ισοῦται πρὸς τὸ πηλίκον τῶν ἀπολύτων τιμῶν αὐτῶν.

”Ητοι : $\left| \frac{\alpha}{\beta} \right| = \frac{|\alpha|}{|\beta|}$, ἔνθα $\beta \neq 0$.

’Α πόδειξις. Προφανῶς, ἔχομεν : $\alpha = \frac{\alpha}{\beta} \cdot \beta$ (ύποτίθεται $\beta \neq 0$)

καὶ ἐπομένως κατὰ τὴν Ἰδιότητα VIII θὰ εἴναι :

$$|\alpha| = \left| \frac{\alpha}{\beta} \cdot \beta \right| = \left| \frac{\alpha}{\beta} \right| \cdot |\beta|, \quad \text{ἴξ oῦ: } \frac{|\alpha|}{|\beta|} = \left| \frac{\alpha}{\beta} \right|.$$

”Ωστε :

$$\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}, \beta \neq 0 \implies \left| \frac{\alpha}{\beta} \right| = \frac{|\alpha|}{|\beta|}$$

Πόρισμα. — Διὰ κάθε $\alpha \in \mathbb{R}$ μὲν $\alpha \neq 0$ καὶ $k \in \mathbb{Z}$ ισχύει :

$$|\alpha^k| = |\alpha|^k.$$

Παραδείγματα έφαρμογής τῶν ἀνωτέρω ἰδιοτήτων.

Παράδειγμα 1ον : Έὰν $\alpha < \beta$ δεῖξατε ότι ή παράστασις :

$$A \equiv ||\alpha - x| + |\beta - x||$$

διατηρεῖ σταθερὰν τιμήν, όταν τὸ x μεταβάλλεται μεταξὺ τῶν α καὶ β , δηλαδὴ $\alpha < x < \beta$.

Απόδειξις : Επειδὴ $\alpha < x < \beta$ έχουμεν :

$$\begin{array}{l} \alpha - x < 0 \\ \beta - x > 0 \end{array} \implies \begin{cases} |\alpha - x| = x - \alpha \\ |\beta - x| = \beta - x \end{cases} \implies A \equiv |x - \alpha + \beta - x| = |\beta - \alpha| = \beta - \alpha,$$

δηλ. ή παράστασις A είναι άνεξάρτητος τοῦ x , ἐφ' ὅσον βεβαίως $\alpha < x < \beta$.

Παρατήρησις : Τὸ αὐτὸν ισχύει καὶ δταν $\alpha \leq x \leq \beta$. Τί συμβαίνει διὰ $x < \alpha$ ή $x > \beta$;

Παράδειγμα 2ον : Έὰν $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, νὰ ἀποδειχθῇ ή ἴσοδυναμία :

$$||\alpha| - |\beta|| = |\alpha + \beta| \iff \alpha\beta \leq 0.$$

Απόδειξις : Εκ τῆς ίσοτητος $||\alpha| - |\beta|| = |\alpha + \beta|$ λαμβάνομεν τήν :

$$(||\alpha| - |\beta||)^2 = (|\alpha + \beta|)^2 \text{ ή } (||\alpha| - |\beta||)^2 = (\alpha + \beta)^2 \text{ ή } \alpha^2 - 2|\alpha||\beta| + \beta^2 = \alpha^2 + 2\alpha\beta + \beta^2 \text{ ή } |\alpha\beta| = -\alpha\beta. \text{ Αρα : } \alpha\beta \leq 0.$$

Αντιστρόφως : Έὰν $\alpha\beta < 0 \implies |\alpha\beta| = -\alpha\beta$ ή $|\alpha||\beta| = -\alpha\beta$
ή $-2|\alpha||\beta| = 2\alpha\beta$ ή $\alpha^2 - 2|\alpha||\beta| + \beta^2 = \alpha^2 + 2\alpha\beta + \beta^2$

$$\text{ή } |\alpha|^2 - 2|\alpha||\beta| + |\beta|^2 = (\alpha + \beta)^2 \text{ ή } (||\alpha| - |\beta||)^2 = (\alpha + \beta)^2.$$

Οθεν :

$$||\alpha| - |\beta|| = |\alpha + \beta|.$$

Παράδειγμα 3ον : Έὰν $x \in \mathbb{R}$ μέ : $-2 \leq x \leq 3$, δεῖξατε ότι :

$$|x^2 + 4x - 2| \leq 23.$$

Απόδειξις : Έχομεν (Πορ. 2ον, § 37).

$$|x^2 + 4x - 2| \leq |x|^2 + 4|x| + 2.$$

Τώρα έκ τῶν $-2 \leq x \leq 3 \implies -3 \leq x \leq 3 \implies |x| \leq 3$; Εξ οὗ : $x^2 \leq 9$.

Συνεπῶς : $|x^2 + 4x - 2| \leq 9 + 12 + 2 = 23$.

Παράδειγμα 4ον : Έὰν $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ καὶ $\alpha^2 \neq \beta^2$, δεῖξατε ότι :

$$\frac{|\alpha| - |\beta|}{||\alpha| - |\beta||} + \frac{||\alpha| - |\beta||}{|\alpha - \beta|} + \frac{|\alpha + \beta|}{|\alpha| + |\beta|} \leq 3.$$

Λύσις : Προφανῶς, ή $\alpha^2 \neq \beta^2$ δίει : $|\alpha| \neq |\beta|$, δηλεν καὶ $\alpha \neq \beta$.

Εκ τῆς (7.5) § 39 έχομεν :

$$|\alpha| - |\beta| \leq ||\alpha| - |\beta||, \quad ||\alpha| - |\beta|| \leq |\alpha - \beta| \text{ καὶ } |\alpha + \beta| \leq |\alpha| + |\beta|.$$

$$\text{Όθεν : } \frac{|\alpha| - |\beta|}{||\alpha| - |\beta||} \leq 1, \quad \frac{||\alpha| - |\beta||}{|\alpha - \beta|} \leq 1, \quad \frac{|\alpha + \beta|}{|\alpha| + |\beta|} \leq 1$$

καὶ ἐξ αὐτῶν, διὰ προσθέσεως κατὰ μέλη, λαμβάνομεν :

$$\frac{|\alpha| - |\beta|}{||\alpha| - |\beta||} + \frac{||\alpha| - |\beta||}{|\alpha - \beta|} + \frac{|\alpha + \beta|}{|\alpha| + |\beta|} \leq 3.$$

Π α ρ á δ ε i γ μ a 5οv: 'Εὰν $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, $\alpha \cdot \beta (\alpha + 2\beta) \neq 0$, δείξατε ότι αἱ ἀνισότητες :

$$\left| \frac{2\alpha + \beta}{\alpha + 2\beta} \right| < 1, \quad \left| \frac{\alpha}{\beta} \right| < 1, \quad \left| \frac{\alpha\beta + 2\alpha^2}{\alpha\beta + 2\beta^2} \right| < 1$$

είναι λογικῶς ισοδύναμοι, δηλαδὴ ἡ ἀλήθεια τῆς μιᾶς συνεπάγεται τὴν ἀλήθειαν τῶν ὑπολοίπων.

'Α π ó δ ε i ξ i c s : i). "Εστω ότι ἀληθεύει ἡ πρώτη. Τότε ἔχομεν :

$$\left| \frac{2\alpha + \beta}{\alpha + 2\beta} \right|^2 < 1 \quad \text{ἢ} \quad 4\alpha^2 + 4\alpha\beta + \beta^2 < \alpha^2 + 4\alpha\beta + 4\beta^2 \quad \text{ἢ} \quad 3\alpha^2 < 3\beta^2 \quad \text{ἢ} \quad \alpha^2 < \beta^2,$$

ἔξ oῦ : $|\alpha| < |\beta|$ καὶ ἐπειδὴ $|\beta| > 0$, ἐπειταὶ $\frac{|\alpha|}{|\beta|} < 1$ ἢ $\left| \frac{\alpha}{\beta} \right| < 1$, ἢτοι,

ἰσχυούσης τῆς πρώτης, ἴσχύει καὶ ἡ δευτέρα.

"Ηδη, ἐκ τῶν δύο πρώτων, διὰ πολλαπλασιασμοῦ κατὰ μέλη, λαμβάνομεν :

$$\frac{|2\alpha + \beta|}{|\alpha + 2\beta|} \cdot \frac{|\alpha|}{|\beta|} < 1 \quad \text{ἢ} \quad \left| \frac{2\alpha^2 + \alpha\beta}{\alpha\beta + 2\beta^2} \right| < 1.$$

(ii). "Εστω ότι ἀληθεύει ἡ δευτέρα. Τότε ἀκολουθοῦντες ἀντίθετον πορείαν φθάνομεν ἐκ τῆς δευτέρας εἰς τὴν πρώτην. Ἀκριβέστερον ἔχομεν διαδοχικῶς :

$$\left| \frac{\alpha}{\beta} \right| < 1 \quad \text{ἢ} \quad \alpha^2 < \beta^2 \quad \text{ἢ} \quad 3\alpha^2 < 3\beta^2 \quad \text{ἢ} \quad 4\alpha^2 + 4\alpha\beta + \beta^2 < \alpha^2 + 4\alpha\beta + 4\beta^2 \\ \text{ἢ} \quad (2\alpha + \beta)^2 < (\alpha + 2\beta)^2 \quad \text{ἢ} \quad \left(\frac{2\alpha + \beta}{\alpha + 2\beta} \right)^2 < 1, \quad \text{καὶ κατὰ τὴν § 35, πορ. 2οv,}$$

ἔχομεν :

$$\left| \frac{2\alpha + \beta}{\alpha + 2\beta} \right| < 1.$$

"Εντεῦθεν, ἐκ ταύτης καὶ τῆς $\left| \frac{\alpha}{\beta} \right| < 1$, διὰ πολλαπλασιασμοῦ κατὰ μέλη, λαμβάνομεν τὴν τρίτην.

(iii). Τέλος ἔστω ότι ἀληθεύει ἡ τρίτη. Τότε ἔχομεν :

$$\left| \frac{\alpha(\beta + 2\alpha)}{\beta(\alpha + 2\beta)} \right| < 1 \quad \text{ἢ} \quad \left| \frac{\alpha}{\beta} \right| \cdot \left| \frac{2\alpha + \beta}{\alpha + 2\beta} \right| < 1.$$

"Ἐκ τῆς τελευταίας ἀνισότητος ἐπειταὶ ότι θὰ ἴσχύῃ ἡ μία τούλάχιστον τῶν ἀνισοτήτων :

$$\therefore \left| \frac{\alpha}{\beta} \right| < 1 \quad \text{ἢ} \quad \left| \frac{2\alpha + \beta}{\alpha + 2\beta} \right| < 1.$$

"ἴσχυούσης δὲ τῆς μίας τῶν ἀνισοτέρων ἀνισοτήτων, ἴσχύει, ὡς ἐδείχθη εἰς τὰς περιπτώσεις (i) καὶ (ii) καὶ ἡ ἄλλη.

Θάξ έξετάσωμεν κατωτέρω καὶ δύο εἰδικὰ παραδείγματα προσέξατε τὴν ἀπόδειξιν :

Π αράδειγμα 6ον : Διὰ τοῦ συμβόλου $\max(a, \beta)$, ἀντιστοίχως $\min(a, \beta)$, συμβολίζομεν τὸν μέγιστον (maximum), ἀντιστοίχως τὸν ἐλάχιστον (minimum), ἐκ δύο πραγματικῶν ἀριθμῶν a, β , τοὺς ὅποιους ὁρίζομεν οὕτω :

$$\max(a, \beta) \equiv \begin{cases} a, & \text{ἐὰν } a \geq \beta \\ \beta, & \text{ἐὰν } \beta > a \end{cases}, \quad \min(a, \beta) \equiv \begin{cases} a, & \text{ἐὰν } a < \beta \\ \beta, & \text{ἐὰν } \beta \leq a \end{cases}$$

Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω δρισμῶν νὰ εὑρεθῇ ἡ ἀναλυτικὴ ἔκφρασις τῶν $\max(a, \beta)$ καὶ $\min(a, \beta)$ συναρτήσει τῶν a καὶ β καὶ τῆς ἀπολύτου τιμῆς τῆς διαφορᾶς αὐτῶν.

Αὐστις I. Ἐὰν $a \geq \beta$ ἔχομεν :

$$\max(a, \beta) = a = \frac{\alpha + \beta + (\alpha - \beta)}{2} = \frac{\alpha + \beta + |\alpha - \beta|}{2} = \frac{\alpha + \beta + |\beta - \alpha|}{2}$$

$$\min(a, \beta) = \beta = \frac{\alpha + \beta - (\alpha - \beta)}{2} = \frac{\alpha + \beta - |\alpha - \beta|}{2} = \frac{\alpha + \beta - |\beta - \alpha|}{2}.$$

II. Ἐὰν $a < \beta$ ἔχομεν :

$$\max(a, \beta) = \beta = \frac{\alpha + \beta + (\beta - \alpha)}{2} = \frac{\alpha + \beta + |\beta - \alpha|}{2} = \frac{\alpha + \beta + |\alpha - \beta|}{2}$$

$$\min(a, \beta) = a = \frac{\alpha + \beta - (\beta - \alpha)}{2} = \frac{\alpha + \beta - |\beta - \alpha|}{2} = \frac{\alpha + \beta - |\alpha - \beta|}{2}.$$

Π αράδειγμα 7ον : Ἐὰν ρ_1 καὶ ρ_2 είναι αἱ ρίζαι τοῦ τριωνύμου $x^2 + \xi x + \eta$ καὶ ισχύουν : $|\xi| \geq 2\eta$ καὶ $\eta > 1$,

νὰ δειχθῇ ὅτι : $\frac{1}{|\rho_1|} + \frac{1}{|\rho_2|} \geq 2$.

Απόδειξις : Ἡ διακρίνουσα τοῦ τριωνύμου είναι :

$$\xi^2 - 4\eta = 4\eta^2 - 4\eta = 4\eta(\eta - 1) > 0, \text{ διότι } \eta > 1,$$

ἄρα τὸ τριώνυμον ἔχει ρίζας πραγματικάς καὶ ὀνίσους, διὰ τὰς ὅποιας θάξ ἔχωμεν :

$$\rho_1 + \rho_2 = -\xi \tag{1}$$

$$\rho_1 \cdot \rho_2 = \eta. \tag{2}$$

Διὰ διαιρέσεως τῶν (1) καὶ (2) κατὰ μέλη λαμβάνομεν :

$$\frac{\rho_1 + \rho_2}{\rho_1 \rho_2} = -\frac{\xi}{\eta}. \tag{3}$$

Ἐκ τῆς (3), ἀν λάβωμεν τὰς ἀπολύτους τιμὰς ἀμφοτέρων τῶν μελῶν, ἔχομεν :

$$\left| \frac{\rho_1 + \rho_2}{\rho_1 \rho_2} \right| = \left| -\frac{\xi}{\eta} \right| \stackrel{\eta > 0}{=} \frac{|\rho_1 + \rho_2|}{|\rho_1 \rho_2|} = \frac{|\xi|}{|\eta|} = \frac{|\xi|}{\eta}, \text{ διότι } \eta > 0.$$

Ἐπειδὴ ἔξι ὑποθέσεως $|\xi| \geq 2\eta$, θὰ ἔχωμεν :

$$\frac{|\rho_1 + \rho_2|}{|\rho_1| \cdot |\rho_2|} = \frac{|\xi|}{\eta} \geq \frac{2\eta}{\eta} = 2. \tag{4}$$

*Άλλα, $|ρ_1| + |ρ_2| = |\rho_1 + \rho_2|$, διότι $\rho_1 \cdot \rho_2 = \eta > 0$ όπότε, λόγω και της (4),

Έχομεν :
$$\frac{|\rho_1| + |\rho_2|}{|\rho_1| \cdot |\rho_2|} = \frac{|\rho_1 + \rho_2|}{|\rho_1| \cdot |\rho_2|} \geq 2,$$

ή
$$\frac{1}{|\rho_1|} + \frac{1}{|\rho_2|} \geq 2.$$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

35. *Έάν $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, νά διποδειχθοῦν αι Ισοδυναμίαι :

1. $||\alpha| - |\beta|| = |\alpha - \beta| \iff \alpha\beta \geq 0$,
2. $\alpha|\beta| - |\beta|\alpha| = 0 \iff |\alpha + \beta| \geq |\alpha - \beta|$.

36. Εύρετε τάς δικέρασις τιμάς τοῦ x διά τάς διποίας είναι :

- 1) $|x| < 3,2$, 2) $|x| > 1,8$ και $|x| \leq 5$.

37. *Έάν $\alpha < \beta < \gamma < \delta$, νά εύρεθη πότε ή παράστασις :

$$A \equiv |\alpha - x| + |\beta - x| + |\gamma - x| + |\delta - x|$$

διατηρεῖ σταθεράν τιμήν.

38. Δίδεται ή συνάρτησις f μὲ τύπον :

$$f(x) = \frac{|x+1| - |x-1|}{|x+1| + |x-1|}.$$

Νά διποδειχθῆ δτι :

$$f(x) = \begin{cases} x, & \text{έάν } |x| < 1 \\ \frac{1}{x}, & \text{έάν } |x| > 1. \end{cases}$$

39. *Έάν $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ μὲ $\alpha\beta \neq 0$, νά διποδειχθῆ δτι :

$$\frac{\alpha^2 + \beta^2}{|\alpha| + |\beta|} + \frac{\beta^2 + \gamma^2}{|\beta| + |\gamma|} + \frac{\gamma^2 + \alpha^2}{|\gamma| + |\alpha|} \geq |\alpha + \beta + \gamma|.$$

40. Διὰ ποίας πραγματικάς τιμάς τοῦ x έχει νόημα πραγματικού άριθμού ή παράστασις :

$$y \equiv \sqrt[v]{\frac{x}{|x|} - \frac{\sqrt{v}x^2}{x}} + \frac{2v}{\sqrt[2v]{2 - |x| + 2x^2 - |x|^2}}, \quad (v = \text{φυσικός άριθμός } > 1).$$

41. *Έάν $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, δείξατε δτι : $|\alpha|\beta| + \beta|\alpha| \leq \alpha\beta + |\alpha\beta|$. Πότε Ισχύει τό = :

42. *Έάν $x, y \in \mathbb{R}$ μὲ $x < 0$ και $y = |5 - 3x| - 2|x|$, νά διποδειχθῆ δτι : $|x| - |y| = -5$.

43. *Έάν $x, y \in \mathbb{R} - \{0\}$ και Ισχύει :

$$\frac{|x| |y| + |y| |x|}{|xy|} = 2,$$

νά διποδειχθῆ δτι οι άριθμοι x και y είναι δόμστημοι.

44. *Έάν $x, y \in \mathbb{R}$, $x \neq \pm y$, νά διποδειχθῆ δτι : $\frac{|x|}{|x+y|} + \frac{|y|}{|x-y|} \geq 1$.

45. *Έάν $x, y \in \mathbb{R}$ και $2x + y + 4 = 0$, νά διποδειχθῆ δτι : $|x| + |y| \geq 2$.

46. *Έάν $\alpha < \beta < \gamma < \delta$, νά διποδειχθῆ δτι : $|\beta - \gamma| < |\alpha - \delta|$.

47. *Έάν οι συντελεσταὶ τῆς έξισώσεως $x^2 + yx + \delta = 0$ πληροῦν τάς σχέσεις :

$$|1 + \gamma + \delta| = |1 - \gamma + \delta| \text{ και } |\gamma| > 1 + |\delta|,$$

δείξατε δτι ή έν λόγω έξισωσις έχει ρίζας πραγματικάς και άνισους.

48. Έάν $\alpha, \beta, \gamma, \delta \in \mathbb{R}$ με $\gamma \neq 0$, να διποδειχθῇ ότι αι σχέσεις:

$$|\beta - \delta| < |\alpha - \gamma| \quad (1) \quad \text{και} \quad |\gamma| < |\beta| \quad (2)$$

συνεπάγονται τήν:

$$\left| \frac{\delta}{\beta} \right| - \left| \frac{\alpha}{\gamma} \right| < 2.$$

49. Έάν $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ και $|\alpha| > 1$, δείξατε ότι ή ισότης: $\beta = \frac{\alpha}{1 - |\alpha|}$

συνεπάγεται τάς:

$$|\beta| > 1 \quad \text{και} \quad \alpha = \frac{\beta}{1 - |\beta|}$$

50. Έάν $x, y, z \in \mathbb{R}$, δείξατε ότι :

$$|x + y - z| + |y + z - x| + |z + x - y| \geq |x| + |y| + |z|.$$

51. Δείξατε ότι: $\max(0, 2x) - \min(0, 2x) = 2|x|.$

52. Δείξατε ότι έξι έκαστης τῶν σχέσεων :

$$\left| \frac{2x+3y}{3x+2y} \right| < 1, \quad \left| \frac{y}{x} \right| < 1, \quad \left| \frac{2xy+3y^2}{2xy+3x^2} \right| < 1 \quad (x, y \in \mathbb{R}, x(3x+2y) \neq 0)$$

έπονται αι άλλαι δύο.

53. Έάν $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, να διποδειχθῇ ότι: $\frac{|\alpha + \beta|}{1 + |\alpha + \beta|} \leq \frac{|\alpha|}{1 + |\alpha|} + \frac{|\beta|}{1 + |\beta|}.$

54. Έάν οι $\alpha, \beta, \gamma, x, y, z \in \mathbb{R}$, είναι διάφοροι του μηδενός και πληροῦν τάς σχέσεις:

$$\alpha = \frac{x}{1 + |x| + |y| + |z|}, \quad \beta = \frac{y}{1 + |x| + |y| + |z|}, \quad \gamma = \frac{z}{1 + |x| + |y| + |z|}$$

να υπολογισθούν οι x, y, z συναρτήσει τῶν α, β, γ .

55. Έάν $x \in \mathbb{R}$ και $|2x + 9| = 3|x + 2|$, να υπολογισθῇ $|x|$.

56. Διὰ πᾶν ζεῦγος τιμῶν τῶν x, y ισχύει ή ισότης:

$$|x^2 - 3y + 1| = |3y - x^2 - 1|.$$

57. Έάν $x, y \in \mathbb{R}$ και $y\sqrt{x^2} - x\sqrt{y^2} + x|x| - y|y| = 0$, δείξατε ότι: $|x| = |y|$.

58. Έάν $\beta \gamma > 0$ και $2|\beta + \gamma| + |\gamma| > 6 + \beta\gamma$, να διειχθῇ ότι θά είναι :

$$(|\gamma| < 2, |\beta| > 3) \quad \vee \quad (|\gamma| > 2, |\beta| < 3).$$

59. Έάν $|x| > |y|$, δείξατε ότι:

$$\frac{|x|}{|x+y|} + \frac{|y|}{|x-y|} + \frac{|x|}{|x|-|y|} - \frac{|y|}{||x|-|y||} \geq 2.$$

60. Έάν $\gamma > 1, |\beta| = 2\gamma$, δείξατε ότι αι ρίζαι x_1, x_2 τῆς έξισώσεως $x^2 - \beta x + \gamma = 0$

πληροῦν τήν σχέσιν:

$$\frac{1}{|x_1|} + \frac{1}{|x_2|} = 2.$$

61. Έάν α και β είναι άριθμοι θετικοί, να διειχθῇ ότι :

$$|\sqrt{\alpha} - \sqrt{\beta}| \leq \sqrt{|\alpha - \beta|}.$$

62. Έάν $x \neq y$, δείξατε ότι :

$$|\sqrt{1+x^2} - \sqrt{1+y^2}| < |x - y|.$$

63. Έάν $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ και $(\beta + \gamma)(\gamma + \alpha)(\alpha + \beta) \neq 0$, δείξατε ότι :

$$\frac{|\alpha|}{|\beta + \gamma|} + \frac{|\beta|}{|\gamma + \alpha|} + \frac{|\gamma|}{|\alpha + \beta|} \geq \frac{3}{2}.$$

64. Μεταξύ ποίων δρίων μεταβάλλεται δ λόγος $\frac{\beta}{\alpha}$, όταν διά τούς πραγματικούς
άριθμούς α, β ισχύη ή άνισότης : $\left| \frac{\alpha + 2\beta}{2\alpha + \beta} \right| < 1$.

65. 'Εάν ξ είναι ρίζα τής έξισώσεως $\alpha x^2 + \beta x + \gamma = 0$, $\alpha \neq 0$, νά δειχθή ότι :

$$|\xi| < \frac{|\alpha| + |\beta| + |\gamma|}{|\alpha|}.$$

66. 'Εάν $\frac{|x| + 1}{x - 1} = \frac{y - 1}{|y| + 1}$, νά διποδειχθή ότι : $xy \geq 0$, ($x, y \in \mathbb{R}$).

67. Θεωροῦμεν τήν έξισωσιν : $x^2 - 2\alpha x + \beta = 0$ μέ συντελεστάς πραγματικούς άριθμούς καὶ ρίζας ρ_1, ρ_2 . 'Εάν $|\rho_2| \leq |\rho_1|$, νά διποδειχθή ότι : $|\alpha| + \sqrt{\alpha^2 + |\beta|^2} \leq (1 + \sqrt{2}) \cdot |\rho_1|$.

68. 'Εάν $|y - \varphi| < |x - \omega|$ καὶ $|\omega| < |\varphi|$, νά διποδειχθή ότι :

$$\left| \frac{y}{\varphi} \right| - \left| \frac{x}{\omega} \right| < 3, \quad (\text{ύποτίθεται: } \omega \neq 0).$$

69. Δίδεται ή έξισωσις $\alpha x^2 + \beta xy - yy^2 = 0$. 'Εάν μεταξύ τῶν ριζῶν x_1, x_2 καὶ τῶν συντελεστῶν αὐτῆς ύφιστανται αἱ σχέσεις :

$$\frac{|x_1 + x_2|}{|x_1 + x_2| + |x_1 x_2|} = |\alpha|, \quad 1 - |\alpha| = \frac{2}{|\beta|}, \quad \alpha y = -6,$$

νά διποδειχθή ότι : $y = \pm \frac{1}{3}$.

70. 'Εάν ξ είναι ρίζα τῆς έξισώσεως $x^4 + \alpha x^2 + \beta = 0$ καὶ είναι $|\xi| < 1$, νά δειχθή ότι θά είναι πάντοτε :

$$\left| \alpha \xi^2 + \frac{\beta}{2} \right| < |\xi|^2 + \left| \frac{\beta}{2} \right|.$$

ΞΙΣΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΟΥΣ ΤΙΜΑΣ ΤΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΠΙΛΥΟΜΕΝΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ \mathbb{R} .

Θά έκθέσωμεν κατωτέρω τὸν τρόπον ἐπιλύσεως, ἐντὸς τοῦ \mathbb{R} , μερικῶν μορφῶν έξισώσεων, εἰς τὰς δποίας ὑπεισέρχονται ἀπόλυτοι τιμαὶ πραγματικῶν άριθμῶν, ὡς ἀγνώστων.

§ 42. I. Έπίλυσις τῆς έξισώσεως $a|x| + \beta = 0$, μὲν $a, \beta \in \mathbb{R}$ καὶ $a \neq 0$.

Διακρίνομεν δύο περιπτώσεις :

α'). "Εστω $x > 0$, τότε (έξ δρισμοῦ) έχομεν $|x| = x$ καὶ ή έξισωσις γίνεται :

$$ax + \beta = 0, \quad \text{έξ οῦ: } x = -\frac{\beta}{a}.$$

Η τιμὴ αὗτη τοῦ x θά είναι δεκτή, ἐάν ίκανοποιῇ τὴν $x > 0$. Δηλαδή :

$$-\frac{\beta}{a} > 0. \tag{1}$$

'Ενταῦθα, έάν $\alpha\beta > 0$, δηλ. έάν οἱ πραγματικοὶ άριθμοὶ α καὶ β είναι δύμοστημοι, ή (1) δὲν ἀληθεύει καὶ ἐπομένως ή διθεῖσα έξισωσις δὲν ἔχει λύσιν.

'Εάν δύμως $\alpha\beta < 0$, δηλ. οἱ α καὶ β είναι ἑτερόσημοι, ή (1) ἀληθεύει καὶ ἐπομένως ή διθεῖσα έξισωσις ἔχει λύσιν, τὴν $x = -\frac{\beta}{\alpha}$.

β). "Εστω $x < 0$, τότε $|x| = -x$ καὶ ἡ διθεῖσα ἔξισωσις γίνεται :

$$-\alpha x + \beta = 0, \text{ ἐξ οὗ: } x = \frac{\beta}{\alpha}.$$

Ἡ τιμὴ αὗτη τοῦ x θά εἶναι δεκτή, ἐὰν πληροὶ τὴν $x < 0$. Δηλαδὴ :

$$\frac{\beta}{\alpha} < 0. \quad (2)$$

Ἡ (2), προφανῶς, ἀληθεύει διὰ $\alpha\beta < 0$.

"Ωστε, ἡ ἔξισωσις $\alpha|x| + \beta = 0$ εἶναι ἀδύνατος, ἢ ἀλλως ἐστερημένη λύσεως ὡς πρὸς x , ὅταν οἱ πραγματικοὶ ἀριθμοὶ α καὶ β εἶναι δύο σημεῖοι, ἔχει δὲ αὕτη λύσεις $x = -\frac{\beta}{\alpha}$ καὶ $x = \frac{\beta}{\alpha}$, ὅταν οἱ α καὶ β εἶναι ἑτερόσημοι. Εἰς τὴν δευτέραν περίπτωσιν λέγομεν δτῇ ἡ ἔξισωσις $\alpha|x| + \beta = 0$ εἶναι ισοδύναμος πρὸς τήν :

$$x^2 = \frac{\beta^2}{\alpha^2}.$$

γ). Ἐὰν $\beta = 0$, ἔχομεν $\alpha|x| = 0$, καὶ συνεπῶς $|x| = 0$, ἐξ οὗ $x = 0$.

Τὰ ἀνωτέρω σύνοψίζονται εἰς τὸν κάτωθι πίνακα :

Πίναξ διερευνήσεως τῆς : $\alpha x + \beta = 0$	
$\alpha\beta > 0$	$\alpha x + \beta = 0 \quad \text{ἀδύνατος}$
$\alpha\beta < 0$	$\alpha x + \beta = 0 \implies x = \pm \frac{\beta}{\alpha}$
$\beta = 0$	$\alpha x + \beta = 0 \implies x = 0$

Παραδείγματα : 1ον : Νὰ ἐπιλυθῇ ἡ ἔξισωσις : $2|x| - 3 = 0$.

Λύσις : Ἐχομεν, ἐν προκειμένῳ, $\alpha = 2$, $\beta = -3$ καὶ ἐπειδὴ $\alpha\beta = -6 < 0$

ἡ ἔξισωσις $2|x| - 3 = 0$ ἔχει τὰς λύσεις : $x = \pm \frac{3}{2}$.

2ον : Νὰ ἐπιλυθῇ ἡ ἔξισωσις : $4|x| = -7$.

Λύσις : Ἡ ἔξισωσις γράφεται $4|x| + 7 = 0$. Ἐνταῦθα εἶναι $\alpha = 4$, $\beta = 7$ καὶ ἐπειδὴ $\alpha\beta = 28 > 0$, ἡ διθεῖσα ἔξισωσις εἶναι ἀδύνατος.

§ 43. II. Ἐπίλυσις ἔξισώσεως τῆς μορφῆς : $a|x| + bx + \gamma = 0$ (1), μὲ $a, b, \gamma \in \mathbb{R} - \{0\}$.

Διακρίνομεν τρεῖς περιπτώσεις :

α'). Ἐὰν $x > 0$, ἔχομεν ἐξ δρισμοῦ $|x| = x$ καὶ ἡ διθεῖσα ἔξισωσις γίνεται :

$$\alpha x + bx + \gamma = 0 \quad \text{ἢ} \quad (\alpha + b)x = -\gamma. \quad (2)$$

Ἐὰν $\alpha + b \neq 0$, ἡ (2) δίδει : $x = -\frac{\gamma}{\alpha + b}$.

Διὰ νὰ είναι δεκτὴ ἡ τιμὴ αὗτη τοῦ x , πρέπει νὰ ικανοποιῇ τὴν $x > 0$. Δηλαδὴ πρέπει :

$$-\frac{\gamma}{\alpha+\beta} > 0 \quad \text{ἢ} \quad \frac{\gamma}{\alpha+\beta} < 0 \quad \text{ἢ} \quad \gamma(\alpha+\beta) < 0$$

Ἐάν $\alpha+\beta=0$, ἡ (2) γίνεται $0x=-\gamma$. Ἐπειδὴ δὲ $\gamma \neq 0$, αὗτη είναι ἀδύνατος. Συνεπῶς καὶ ἡ (1) είναι ἀδύνατος.

β'). Ἐάν $x < 0$, τότε $|x| = -x$ καὶ ἡ (1) γίνεται :

$$-\alpha x + \beta x + \gamma = 0 \quad \text{ἢ} \quad (\beta - \alpha)x = -\gamma \quad \text{ἢ} \quad (\alpha - \beta)x = \gamma. \quad (3)$$

Ἐάν $\alpha - \beta \neq 0$, ἡ (3) δίδει : $x = \frac{\gamma}{\alpha - \beta}$.

Διὰ νὰ είναι ἡ τιμὴ αὗτη τοῦ x δεκτὴ, πρέπει νὰ ικανοποιῇ τὴν $x < 0$.

Δηλαδὴ : $\frac{\gamma}{\alpha - \beta} < 0$, ἐξ οὗ : $\gamma(\alpha - \beta) < 0$.

Ἐάν $\alpha - \beta = 0$, δηλ. $\alpha = \beta$, ἡ (3) είναι ἀδύνατος, ἐφ' ὅσον $\gamma \neq 0$. Κατ' ἀκολουθίαν καὶ ἡ (1) είναι ἀδύνατος.

γ'). Ἐάν $x = 0$, τότε ἡ (1) γίνεται $\gamma = 0$ καὶ ἐφ' ὅσον $\gamma \neq 0$, ἡ ἔξισωσις είναι ἀδύνατος.

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω συνάγομεν τὸν ἀκόλουθον πίνακα :

Πίναξ διερευνήσεως τῆς : $\alpha x + \beta x + \gamma = 0$	
$\gamma(\alpha+\beta) < 0$	$\alpha x + \beta x + \gamma = 0 \implies x = -\frac{\gamma}{\alpha+\beta}$
$\alpha + \beta = 0$	ἡ ἔξισωσις (1) είναι ἀδύνατος ἐν \mathbb{R} .
$\gamma(\alpha - \beta) < 0$	$\alpha x + \beta x + \gamma = 0 \implies x = \frac{\gamma}{\alpha - \beta}$
$\alpha - \beta = 0$	ἡ ἔξισωσις (1) είναι ἀδύνατος ἐν \mathbb{R} .

Σημειώσις: Διὰ $\beta = 0$ ἔχομεν τὴν μερφὴν I (§ 42).

Ασκησις: Ἐξετάσατε τὰς κάτωθι ίδιαιτέρας περιπτώσεις :

(I). $\beta = 1$, $\gamma = 0$, (II). $\alpha = \pm 1$, $\beta = 1$, $\gamma = 0$.

Παραδείγματα: Ιον : Νὰ ἐπιλυθῇ ἡ ἔξισωσις : $3|x| + 2x - 4 = 0$.

Λύσις: Λαμβάνοντες τὰς ἑκφράσεις $\alpha + \beta$, $\gamma(\alpha + \beta)$, παρατηροῦμεν ὅτι :

$$\alpha + \beta = 3 + 2 = 5 \neq 0 \quad \text{καὶ} \quad \gamma(\alpha + \beta) = -4 \times 5 = -20 < 0.$$

Πληροῦνται ὅθεν αἱ συνθῆκαι τῆς περιπτώσεως α') καὶ κατ' ἀκολουθίαν ἡ δοθεῖσα

$$\text{ἔξισωσις ἐπιδέχεται ως λύσιν τὴν : } x = -\frac{\gamma}{\alpha+\beta} = \frac{4}{5}.$$

Ἐξ ἄλλου, ἐπειδὴ $\alpha - \beta = 3 - 2 = 1 \neq 0$ καὶ $\gamma(\alpha - \beta) = -4 \times 1 = -4 < 0$,

ή δοθείσα έξισωσις έπιδέχεται ώς (άρνητικήν) ρίζαν τήν :

$$x = \frac{\gamma}{\alpha - \beta} = \frac{-4}{1} = -4.$$

Συν : Νά έπιλυθη ή έξισωσις : $|x| + x - 2 = 0$. (ε)

Λύσις : "Εστω $x > 0$, τότε $|x| = x$ και ή (ε) γίνεται :

$$x + x - 2 = 0 \quad \text{ή} \quad 2x = 2, \quad \text{έξι} \text{ οὖ} : \quad x = 1.$$

"Επειδή διμος ίππετέθη $x > 0$, ή τιμή $x = 1$ είναι δεκτή.

"Εστω τώρα $x < 0$, τότε $|x| = -x$ και ή (ε) δίδει : $-x + x - 2 = 0$, δηλ. $-2 = 0$ (άδύνατος).

Διὰ $x = 0$ ή (ε) δὲν έπαληθεύεται.

"Άρα ή έξισωσις $|x| + x - 2 = 0$ έχει τήν λύσιν $x = 1$.

§ 44. III. Έπίλυσις έξισώσεως τής μορφής: $\alpha x^2 + \beta |x| + \gamma = 0$ (1), οπου $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ και $\alpha \neq 0$.

"Επειδή διὰ κάθε $x \in \mathbb{R}$ είναι : $x^2 = |x|^2$, ή δοθείσα έξισωσις γράφεται : $\alpha |x|^2 + \beta |x| + \gamma = 0$, ή όποια είναι δευτέρου βαθμού ώς πρὸς $|x|$.

"Έάν θέσωμεν $|x| = y$, ή άνωτέρω έξισωσις είναι ίσοδύναμος πρὸς τὸ σύστημα :

$$\begin{cases} \alpha y^2 + \beta y + \gamma = 0 \\ |x| = y, \end{cases}$$

ύπὸ τὸν ὄρον ὅτι μόνον αἱ (πραγματικαὶ) μὴ άρνητικαὶ ρίζαι τῆς έξισώσεως ώς πρὸς y μᾶς παρέχουν τὰς ρίζας τῆς δοθείσης. "Επομένως ή (1) θὰ έχῃ λύσιν, έφ' ὅσον έχει, τούλάχιστον, μίαν ρίζαν πραγματικήν μὴ άρνητικήν ή έξισωσις :

$$\alpha y^2 + \beta y + \gamma = 0. \quad (2)$$

"Αναλυτικώτερον διακρίνομεν τὰς κάτωθι περιπτώσεις :

1η : "Εάν $\beta^2 - 4\alpha\gamma < 0$, ή (2) έχει ρίζας μιγαδικὰς καὶ συνεπῶς ή (1) οὐδεμίαν λύσιν έχει.

2α : "Εάν $\beta^2 - 4\alpha\gamma = 0$, ή (2) έχει τήν διπλῆν ρίζαν $y = -\frac{\beta}{2\alpha}$ καὶ συνεπῶς :

(i). "Εάν $\frac{-\beta}{2\alpha} > 0$, δηλ. $\alpha\beta < 0$, τότε ή (1) θὰ έχῃ ώς ρίζας τὰς :

$$x_1 = -\frac{\beta}{2\alpha} \quad \text{καὶ} \quad x_2 = \frac{\beta}{2\alpha}.$$

(ii). "Εάν $\frac{-\beta}{2\alpha} < 0$, δηλ. $\alpha\beta > 0$, τότε ή (1) οὐδεμίαν λύσιν έχει.

3η : "Εάν $\beta^2 - 4\alpha\gamma > 0$, ή (2) έχει δύο ρίζας πραγματικάς, διπότε :

(i). "Εάν $\frac{\gamma}{\alpha} > 0$ καὶ $-\frac{\beta}{\alpha} > 0$, διμφότεραι αἱ ρίζαι τῆς (2) εἰναι θετικαὶ

καὶ έὰν καλέσωμεν αὐτὰς y_1 καὶ y_2 , τότε ή (1) θὰ έχῃ ώς λύσεις, τὰς λύσεις τῶν έξισώσεων $|x| = y_1$ καὶ $|x| = y_2$, ἐκ τῶν διποίων λαμβάνομεν $x = \pm y_1$ καὶ

$x = \pm y_2$, ήτοι ή (1) θά έχη είς τὴν περίπτωσιν ταύτην 4 ρίζας, τάς :

$$x_1 = y_1, \quad x_2 = -y_1, \quad x_3 = y_2, \quad x_4 = -y_2.$$

(ii). Εάν $\frac{\gamma}{\alpha} > 0$ και $-\frac{\beta}{\alpha} < 0$, άμφοτεραι αἱ ρίζαι τῆς (2) εἰναι ἀρνητικαί, δηπότε ή (1) οὐδεμίαν λύσιν έχει (ἐν \mathbf{R}).

(iii). Εάν $\frac{\gamma}{\alpha} < 0$, ή (2) έχει δύο ρίζας ἐτεροσήμους, εἴτε τὰς $y_1 < 0 < y_2$, δηπότε ή (1) θά έχη ως λύσεις, τὰς λύσεις τῆς $|x| = y_2$, ἐκ τῆς δηποίας έχομεν :

$$x_1 = y_2, \quad x_2 = -y_2.$$

Συνοψίζοντες τὰ ἀνωτέρω έχομεν τὸν κάτωθι πίνακα :

Πίναξ διερευνήσεως τῆς : $ax^2 + \beta x + \gamma = 0$ (1)			
$\beta^2 - 4\alpha\gamma < 0$	ή ἔξισωσις (1) εἰναι ἀδύνατος ἐντὸς \mathbf{R} .		
$\beta^2 - 4\alpha\gamma = 0$	$-\frac{\beta}{2a} > 0$	$ax^2 + \beta x + \gamma = 0 \implies x = \pm \frac{\beta}{2a}$	
	$-\frac{\beta}{2a} < 0$	ή ἔξισωσις (1) εἰναι ἀδύνατος.	
$\beta^2 - 4\alpha\gamma > 0$	$\frac{\gamma}{\alpha} > 0$	$-\frac{\beta}{\alpha} > 0$	ή $ax^2 + \beta x + \gamma = 0$ έχει 4 ρίζας.
	$\frac{\gamma}{\alpha} > 0$	$-\frac{\beta}{\alpha} < 0$	ή ἔξισωσις (1) εἰναι ἀδύνατος.
	$\frac{\gamma}{\alpha} < 0$		ή $ax^2 + \beta x + \gamma = 0$ έχει 2 ρίζας.

Μερική περίπτωσις : Εάν $\gamma = 0$, έχομεν τὴν ἔξισωσιν :

$$\alpha|x|^2 + \beta|x| = 0 \quad \text{ή } |x| \cdot (\alpha|x| + \beta) = 0, \quad \text{δηπότε :}$$

$$\text{ή } |x| = 0, \quad \text{ἐκ τῆς δηποίας } x = 0.$$

$$\text{ή } \alpha|x| + \beta = 0, \quad \text{ή δηποία έχει ηδη μελετηθῆ εἰς τὴν § 42.}$$

Παραδείγματα : 1ον : Νὰ ἐπιλυθῇ, ἐντὸς τοῦ \mathbf{R} , ή ἔξισωσις :

$$x^2 - 5|x| + 6 = 0.$$

Λύσις : Η δοθεῖσα ἔξισωσις γράφεται : $|x|^2 - 5|x| + 6 = 0$. (1)

Θέτομεν $|x| = y$ ($y > 0$) και ή (1) γίνεται :

$$y^2 - 5y + 6 = 0.$$

Αἱ ρίζαι αὐτῆς εἰναι $y_1 = 2$ και $y_2 = 3$. Ἀρα $|x| = 2$ ή $|x| = 3$, ἐκ τῶν δηποίων έχομεν : $x = \pm 2$ ή $x = \pm 3$.

Ωστε, αἱ ρίζαι τῆς δοθείσης ἔξισώσεως εἰναι :

$$x_1 = 2, \quad x_2 = -2, \quad x_3 = 3, \quad x_4 = -3.$$

2ον : Να έπιλυθη ή έξισωσις : $x^2 - 4|x| - 12 = 0$. (2)

Λύσις : Επειδή είναι $x^2 = |x|^2$, θέτοντες $|x| = y$ ($y > 0$) έχουμε την έξισωσιν :

$$y^2 - 4y - 12 = 0,$$

άπό την δοποίαν λαμβάνομεν $y = 6$ ή $y = -2$. Άρα θά είναι :

$$|x| = 6 \quad (3) \quad \text{ή} \quad |x| = -2 \quad (4)$$

Έκ της (3) έχουμε : $x = \pm 6$.

Ή (4) είναι όδύνατος.

Επομένως, αἱ ρίζαι της (2) είναι : $x_1 = 6$, $x_2 = -6$.

Παρατήρησις : Αναλόγως έργαζόμεθα διά την έπιλυσιν, έντος τοῦ R , έξισώσεων της μορφής : $\alpha x^2 + \beta x + γ|x| + δ = 0$.

Παράδειγμα : Νὰ έπιλυθῇ ή έξισωσις : $x^2 - 3x + 2|x| - 6 = 0$. (1)

Λύσις : Διὰ $x = 0$ ή (1) είναι όδύνατος.

Έστω $x > 0$, τότε $|x| = x$ καὶ ή (1) γίνεται :

$$x^2 - 3x + 2x - 6 = 0 \quad \text{ή} \quad x^2 - x - 6 = 0, \quad \text{ή} \quad \text{όποια} \text{ έχει} \text{ ρίζας} \text{ τάς} : 3, -2$$

Έξ αὐτῶν δεκτή είναι μόνον ή θετική.

Έστω τώρα $x < 0$, τότε $|x| = -x$ καὶ ή (1) γίνεται :

$$x^2 - 3x - 2x - 6 = 0 \quad \text{ή} \quad x^2 - 5x - 6 = 0.$$

Αὗτη έχει ρίζας τάς : $6, -1$

Έξ αὐτῶν δεκτή είναι μόνον ή -1 , ως πληροῦσα την συνθήκην : $x < 0$.

Ωστε, αἱ ρίζαι της (1) είναι : $x_1 = 3$, $x_2 = -1$.

§ 45. IV. Έπιλυσις έξισώσεως της μορφής : $|A(x)| + |B(x)| + \dots + |P(x)| + |Q(x)| = 0$ (1), όπου $A(x)$, $B(x)$, ..., $P(x)$, $Q(x)$ άκεραια πολυώνυμα τοῦ x μὲ πραγματικοὺς συντελεστάς. — Διὰ τὴν εὔρεσιν τῶν πραγματικῶν λύσεων της (1) έξετάζομεν τὰ πρόσημα τῶν $A(x)$, $B(x)$, ..., $P(x)$, ήτοι τῶν παραστάσεων, αἱ όποιαι εύρισκονται ἐντὸς τοῦ συμβόλου της ἀπολύτου τιμῆς, διὰ τὰς διαφόρους πραγματικάς τιμάς τοῦ x καὶ βάσει τῶν προσήμων τούτων έξαλείφομεν τὰ ἀπόλυτα, δηλαδὴ ἀντικαθιστῶμεν τὰς παραστάσεις μὲ ἀπολύτους τιμάς, διὰ τῶν ἴσων των, κατὰ τὸν δρισμόν, ἀνευ ἀπολύτων, εύρισκοντες οὕτως εἰς ἔκαστον διάστημα τιμῶν τοῦ x καὶ μίαν, ἀνευ ἀπολύτων τιμῶν, Ισοδύναμον έξισωσιν πρὸς τὴν (1). Αἱ λύσεις τῶν έξισώσεων τούτων, ἐφ' ὅσον εύρισκονται ἔκάστοτε εἰς τὸ ἀντίστοιχον διάστημα μεταβολῆς τοῦ x , είναι δεκταὶ ὡς λύσεις διὰ τὴν (1), ἀλλως ἀπορρίπτονται.

Παραθέτομεν κατωτέρω μερικά παραδείγματα έπιλύσεως έξισώσεων της μορφής (IV) πρὸς πλήρη κατανόησιν τοῦ θέματος.

Παράδειγμα 1ον : Νὰ έπιλυθῇ, ἐντὸς τοῦ R , ή έξισωσις :

$$-2x + |x| - 3|x - 2| + 5|x + 1| = -5. \quad (1)$$

Λύσις : Η δοθεῖσα έξισωσις γράφεται :

$$|x| - 3|x - 2| + 5|x + 1| - 2x + 5 = 0. \quad (2)$$

Αἱ τιμαὶ τοῦ x , αἱ όποιαι μηδενίζουν έκάστην παράστασιν εύρισκομένην ἐντὸς τοῦ συμβόλου της ἀπολύτου τιμῆς είναι κατὰ σειράν : $x = 0$, $x = 2$, $x = -1$.

Τάς τιμάς ταύτας τοῦ x τοποθετοῦμεν ἐπὶ ἀξονος κατὰ τάξιν αὔξοντος μεγέθους, ώς κάτωθι φαίνεται :



Διακρίνομεν ἡδη τάς ἀκολούθους περιπτώσεις :

α'). Ἐὰν $-\infty < x < -1$; τότε θὰ εἰναι :

$$\begin{array}{l|l} x+1 < 0 & |x+1| = -x-1 \\ x < 0 & |x| = -x \\ x-2 < 0 & |x-2| = -x+2 \end{array} \left. \begin{array}{l} \text{καὶ ἡ (2) εἰναι ἰσοδύναμος πρὸς τὸ σύστημα :} \\ -x-3(-x+2)+5(-x-1)-2x+5=0 \\ x < -1 \end{array} \right\} (\Sigma_1).$$

Ἡ ἔξισωσις τοῦ συστήματος δίδει : $x = -\frac{6}{5}$ (δεκτή), ώς πληροῦσα τήν : $x < -1$.

β'). Ἐὰν $-1 \leq x < 0$, θὰ εἰναι :

$$\begin{array}{l|l} x+1 \geq 0 & |x+1| = x+1 \\ x < 0 & |x| = -x \\ x-2 < 0 & |x-2| = -x+2 \end{array} \left. \begin{array}{l} \text{καὶ ἡ (2) εἰναι ἰσοδύναμος πρὸς τὸ σύστημα :} \\ -x-3(-x+2)+5(x+1)-2x+5=0 \\ -1 \leq x < 0. \end{array} \right\} (\Sigma_2).$$

Ἡ ἔξισωσις τοῦ συστήματος δίδει : $x = -\frac{4}{5}$ (δεκτή), ώς πληροῦσα τήν : $-1 \leq x < 0$.

γ'). Ἐὰν $0 \leq x < 2$, τότε :

$$\begin{array}{l|l} x+1 > 0 & |x+1| = x+1 \\ x \geq 0 & |x| = x \\ x-2 < 0 & |x-2| = -x+2 \end{array} \left. \begin{array}{l} \text{καὶ ἡ (2) εἰναι ἰσοδύναμος πρὸς τὸ σύστημα :} \\ x-3(-x+2)+5(x+1)-2x+5=0 \\ 0 \leq x < 2. \end{array} \right\} (\Sigma_3).$$

Ἡ ἔξισωσις τοῦ συστήματος δίδει : $x = -\frac{4}{7}$ (ἀπορρίπτεται), ώς μὴ πληροῦσα τήν : $0 \leq x < 2$.

δ'). Ἐὰν $2 \leq x < +\infty$, θὰ εἰναι :

$$\begin{array}{l|l} x+1 > 0 & |x+1| = x+1 \\ x > 0 & |x| = x \\ x-2 \geq 0 & |x-2| = x-2 \end{array} \left. \begin{array}{l} \text{καὶ ἡ (2) εἰναι ἰσοδύναμος πρὸς τὸ σύστημα :} \\ x-3(x-2)+5(x+1)-2x+5=0 \\ 2 \leq x. \end{array} \right\} (\Sigma_4).$$

Ἡ ἔξισωσις τοῦ συστήματος δίδει : $x = -16$ (ἀπορρίπτεται), ώς μὴ πληροῦσα τήν : $2 \leq x < +\infty$.

"Ωστε, αἱ ρίζαι τῆς ἔξισώσεως (1) εἰναι : $x_1 = -\frac{6}{5}$, $x_2 = -\frac{4}{5}$.

Παρατήρησις: Πρὸς ταχυτέραν εύρεσιν τῶν πραγματικῶν λύσεων τῆς (1) σχηματίζομεν τὸν εἰς τὴν ἐπομένην σελίδα πίνακα, εἰς τὸν δποῖον σημειούμεν τὰ πρόσημα τῶν ἐντὸς τοῦ συμβόλου τῆς ἀπολύτου τιμῆς παραστάσεων εἰς τὰ ἑκάστοτε διαστήματα τῶν τιμῶν τοῦ x , καθὼς ἐπίσης ἀναγράφομεν καὶ τὰς ἀντιστοίχους εἰς αὐτὰ ἰσοδυνάμους πρὸς τὴν (1) ἔξισώσεις :

x	x-2	x	x+1	$ x -3 x-2 +5 x+1 -2x+5=0$	Συμπεράσματα
$-\infty$	-	-	-	$-x+3(x-2)-5(x+1)-2x+5=0 \Rightarrow x = -\frac{6}{5} \in (-\infty, -1)$, δεκτή.	
-1			0		
	-	-	+	$-x+3(x-2)+5(x+1)-2x+5=0 \Rightarrow x = -\frac{4}{5} \in [-1, 0)$, δεκτή.	
0			0		
	-	+	+	$+x+3(x-2)+5(x+1)-2x+5=0 \Rightarrow x = -\frac{4}{5} \notin [0, 2)$, απορριπτ.	
2	0				
$+\infty$	+	+	+	$x-3(x-2)+5(x+1)-2x+5=0 \Rightarrow x = -16 \notin [2, +\infty)$, απορρ.	

Παράδειγμα 2ον : Νὰ εύρεθοιν αἱ πραγματικαὶ λύσεις τῆς ἔξισώσεως :
 $|x^2-5x+6|-2|x-1|+2x-3=0.$

Λύσις : Θέτομεν :

$$A \equiv x^2-5x+6 = (x-2)(x-3), \text{ τότε: } \frac{x}{A} \begin{array}{c|ccc} \hline & -\infty & 2 & 3 & +\infty \\ \hline & - & + & - & + \end{array}$$

καὶ $B \equiv x-1$

$$\text{, τότε: } \frac{x}{B} \begin{array}{c|ccc} \hline & -\infty & 1 & +\infty \\ \hline & - & + & + \end{array}$$

”Ηδη σχηματίζομεν, ώς καὶ προηγουμένως, τὸν ἀκόλουθον πίνακα :

x	A	B	$ x^2-5x+6 -2 x-1 +2x-3=0$	Συμπεράσματα
$-\infty$	+	-	$x^2-5x+6+2(x-1)+2x-3=0$	Ρίζαι μιγαδικαὶ (ἀπορρίπτονται).
1		0		
	+	+	$x^2-5x+6-2(x-1)+2x-3=0$	$\Rightarrow x = \frac{5 \pm \sqrt{5}}{2}$, δεκτὴ μόνον ἢ: $x = \frac{5 - \sqrt{5}}{2} \in [1, 2].$
2	0			
3	-	+	$-(x^2-5x+6)-2(x-1)+2x-3=0$	Ρίζαι μιγαδικαὶ (ἀπορρίπτονται).
0				
	+	+	$x^2-5x+6-2(x-1)+2x-3=0$	$\Rightarrow x = \frac{5 \pm \sqrt{5}}{2}$, δεκτὴ μόνον ἢ: $x = \frac{5 + \sqrt{5}}{2} \in [3, +\infty).$
$+\infty$				

”Εκ τοῦ ἀνωτέρω πίνακος καθίσταται φανερὸν ὅτι ἡ διοθεῖσα ἔξισωσις ώς μόνας πραγματικᾶς ρίζας ἔχει τάξις : $\frac{5 \pm \sqrt{5}}{2}$.

Παράδειγμα 3ον : Νὰ επιλυθῇ καὶ νὰ διερευνηθῇ ἡ ἔξισωσις :

$$|2x-|2x-1||=-\lambda^2x. \quad (1)$$

Λύσις : Ἐπειδὴ τὸ πρῶτον μέλος εἶναι θετικὸν ἢ μηδέν, διὰ νὰ ισχύῃ ἡ (1) θὰ πρέπει νὰ εἴναι $x \leq 0$. Τούτου τεθέντος, ἐπεταί ὅτι :

$2x \leq 0$ ἢ $2x-1 \leq -1$ ἢ $2x-1 < 0$, ἄρα $|2x-1|=-2x+1$ καὶ ἡ (1) γίνεται :

$$|2x-(1-2x)|=-\lambda^2x \quad \text{ἢ} \quad |4x-1|=-\lambda^2x. \quad (2)$$

Έπειδή $x \leq 0$, έπειται $4x - 1 < 0$, δηλα $|4x - 1| = 1 - 4x$ και ή (2) γίνεται:

$$1 - 4x = -\lambda^2 x.$$

Έπομένως ή διθεῖσα έξισωσις είναι ίσοδύναμος πρός τὸ σύστημα:

$$\left. \begin{array}{l} 1 - 4x = -\lambda^2 x \\ x \leq 0 \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left. \begin{array}{l} (4 - \lambda^2)x = 1 \\ x \leq 0 \end{array} \right\}. \quad (3)$$

Διακρίνομεν τώρα τὰς ἔξις περιπτώσεις:

α'). Εάν $\lambda = \pm 2$, ή έξισωσις τοῦ συστήματος (3) γίνεται: $0 \cdot x = 1$, και είναι ἀδύνατος, διὰ πᾶσαν τιμὴν τοῦ x . Ἀρα καὶ ή έξισωσις (1) είναι ἀδύνατος.

β'). Εάν $\lambda \neq \pm 2$, ή έξισωσις τοῦ συστήματος (3) δίδει:

$$x = \frac{1}{4 - \lambda^2}.$$

Η τιμὴ αὗτη πρέπει νὰ πληροῖ τὴν $x \leq 0$. Δηλαδὴ πρέπει:

$$\frac{1}{4 - \lambda^2} \leq 0 \text{ ή } 4 - \lambda^2 \leq 0 \text{ ή } \lambda^2 \geq 4 \text{ ή } \lambda^2 - 4 \geq 0 \text{ ή } (\lambda + 2)(\lambda - 2) \geq 0.$$

Ἐκ ταύτης ἔπειται ὅτι: $\lambda \leq -2$ καὶ $\lambda \geq 2$. Ἐπειδὴ δὲ ὑπετέθη $\lambda \neq \pm 2$, ἔπειται ὅτι: $\lambda < -2$ καὶ $\lambda > 2$.

Ωστε, ή διθεῖσα έξισωσις (1) ἔχει λύσιν μόνον, δηλαδὴ:

$$\lambda < -2 \text{ καὶ } \lambda > 2.$$

ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΟΥΣ ΤΙΜΑΣ ΤΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ

§ 46. Διὰ τὴν ἐπίλυσιν, ἐντὸς τοῦ R , ἀνισώσεων μὲ διπολύτους τιμὰς τοῦ ἀγνώστου, ἐργαζόμεθα ἐκάστοτε κατὰ τρόπον ἀνάλογον πρὸς τὸν τρόπον ἐπιλύσεως ἔξισώσεων τῆς ἀντιστοίχου μορφῆς, ὡς ἔχετεθησαν εἰς τὰς προηγουμένας παραγράφους (§§ 42, 43, 44, 45).

Οπως εἰς τὰς έξισώσεις μὲ διπολύτους τιμὰς τοῦ ἀγνώστου, οὕτω καὶ εἰς τὰς ἀνισώσεις εὐρίσκομεν εἰς ἔκαστον διάστημα μεταβολῆς τοῦ ἀγνώστου καὶ μίαν, ἀνεῳ διπολύτων τιμῶν, ίσοδύναμον ἀνισωσιν πρὸς τὴν διθεῖσαν. Αἱ τομαὶ τῶν διαστημάτων (λύσεων) ἐκάστης ίσοδυνάμου ἀνισώσεως μετὰ τοῦ ἀντιστοίχου διαστήματος τιμῶν τοῦ ἀγνώστου, διποτελοῦν τὰς λύσεις τῆς διθείστης ἀνισώσεως.

Πρὸς πληρεστέραν κατανόησιν τοῦ θέματος παραθέτομεν κατωτέρω μερικὰ παραδείγματα ἐπιλύσεως ἀνισώσεων διαφόρων μορφῶν.

Παράδειγμα 1ον : Νὰ ἐπιλυθῇ ή ἀνίσωσις: $\frac{|x| - 5}{3} > \frac{x - 8}{4}$ (1)

Λύσις: α). Εάν $x \geq 0$, τότε $|x| = x$ καὶ ή (1) ίσοδυναμεῖ μὲ τὸ σύστημα:

$$\left. \begin{array}{l} \frac{x - 5}{3} - \frac{x - 8}{4} > 0 \\ x \geq 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \left. \begin{array}{l} x > -4 \\ x \geq 0 \end{array} \right\} \text{συμβιβασταί.}$$

Ἀρα: $x \geq 0$. (2)

β). Εάν $x < 0$, τότε $|x| = -x$ και ή (1) ισοδυναμεί μὲ τὸ σύστημα :

$$\left. \begin{array}{l} \frac{-x-5}{3} - \frac{x-8}{4} > 0 \\ x < 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \left. \begin{array}{l} -7x > -4 \\ x < 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \left. \begin{array}{l} x < \frac{4}{7} \\ x < 0 \end{array} \right\} \text{συμβιβασταί.}$$

*Αρα : $x < 0.$

(3)

Έκ τῶν (2) καὶ (3) συνάγομεν δτι ή (1) ἀληθεύει διὰ κάθε $x \in \mathbb{R}$.

Παράδειγμα 2ον : Διὰ ποίας πραγματικὰς τιμὰς τοῦ x ἔχει νόημα πραγματικοῦ ἀριθμοῦ ή παράστασις : $\sqrt{3x^2 - 10|x| + 3}.$

Λύσις : Διὰ νὰ ἔχῃ νόημα πραγματικοῦ ἀριθμοῦ ή παράστασις πρέπει :

$$3x^2 - 10|x| + 3 \geq 0, \quad \text{ή } \text{ἐπειδὴ } x^2 = |x|^2$$

$$3|x|^2 - 10|x| + 3 \geq 0. \quad (2)$$

Θέτοντες $|x| = y$ ($y \geq 0$), ἔχομεν τὸ ισοδύναμον πρὸς τὴν (2) σύστημα :

$$\left. \begin{array}{l} 3y^2 - 10y + 3 \geq 0 \\ y \geq 0 \end{array} \right\} \Rightarrow 3(y-3)\left(y-\frac{1}{3}\right) \geq 0 \quad y \geq 0.$$

Τὸ ὡς ἀνω σύστημα πληροῦται διὰ : $y \geq 3$ καὶ $0 \leq y \leq \frac{1}{3}$.

Τότε δύμας ἔχομεν :

$$|x| \geq 3 \quad \text{καὶ} \quad |x| \leq \frac{1}{3}.$$

Η πρώτη γράφεται : $x^2 \geq 9 \quad \text{ή} \quad x^2 - 9 \geq 0 \quad \text{ή} \quad (x-3)(x+3) \geq 0$
καὶ ἀληθεύει διὰ : $x \leq -3 \quad \text{καὶ} \quad x \geq 3.$

Η δευτέρα, ὡς γνωστὸν (§ 36), εἶναι ισοδύναμος πρὸς τὴν : $-\frac{1}{3} \leq x \leq \frac{1}{3}.$

Οθεν, ή παράστασις $\sqrt{3x^2 - 10|x| + 3}$ ἔχει νόημα πραγματικοῦ ἀριθμοῦ διὰ τὰς ἔξῆς τιμὰς τοῦ x :

$$-\infty < x \leq -3, \quad -\frac{1}{3} \leq x \leq \frac{1}{3}, \quad 3 \leq x < +\infty.$$

Παράδειγμα 3ον : Νὰ ἐπιλυθῇ, ἐντὸς τοῦ \mathbb{R} , ή ἀνίσωσις :

$$|x+1| - 2|x| + |x-1| - \frac{2x+4}{5} > 0. \quad (1)$$

Λύσις : Εργαζόμεθα κατὰ τρόπον ἀνάλογον μὲ τὸν ἐκτεθέντα εἰς τὴν προηγουμένην παράγραφον :

Αἱ τιμαὶ τοῦ x , αἱ ὅποιαι μηδενίζουν τὰς παραστάσεις τὰς ἐντὸς τοῦ συμβόλου τῆς ἀπολύτου τιμῆς, εἶναι κατὰ σειρὰν αἱ ἔξῆς : $x = -1, 0, 1.$

$$\left. \begin{array}{l} A \equiv x+1 \\ B \equiv x \\ \Gamma \equiv x-1 \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{array}{c|ccc} x & -\infty & -1 & +\infty \\ \hline A & - & + & + \\ B & - & 0 & + \\ \hline \Gamma & - & 1 & + \end{array}$$

Καταρτίζομεν άκολουθως τὸν κατωτέρω πίνακα, εἰς τὸν ὅποιον σημειοῦμεν τὰ πρόστιμα τῶν ἐντὸς τοῦ συμβόλου τῆς ἀπολύτου τιμῆς παραστάσεων εἰς τὰ ἔκαστα τοῦ διαστήματος τῶν τιμῶν τοῦ x , ώς ταῦτα καθορίζονται ὑπὸ τῶν εἰς τὴν προτιγουμένην σελίδα πινακίων, καθὼς ἐπίσης ἀναγράφομεν καὶ τὰς ἀντιστοίχους, εἰς τὰ ἔκαστα τοῦ διαστήματος τιμῶν τοῦ x , ἵσοδυνάμους πρὸς τὴν (1) ἀνισώσεις.

x	A	B	Γ	$ x+1 -2 x + x-1 -\frac{2x+4}{5}>0$	Συμπεράσματα
$-\infty$	-	-	-	$-(x+1)+2x-(x-1)-\frac{2x+4}{5}>0$	$\Rightarrow x < -2$. "Αρα : $x \in (-\infty, -2) \cap (-\infty, -1) = (-\infty, -2)$
-1	0			$(x+1)+2x-(x-1)-\frac{2x+4}{5}>0$	$\Rightarrow x > -\frac{3}{4}$. "Αρα : $x \in \left(-\frac{3}{4}, +\infty\right) \cap [-1, 0] = \left(-\frac{3}{4}, 0\right)$
0		0		$(x+1)-2x-(x-1)-\frac{2x+4}{5}>0$	$\Rightarrow x < \frac{1}{2}$. "Αρα : $x \in \left(-\infty, \frac{1}{2}\right) \cap [0, 1] = \left[0, \frac{1}{2}\right)$
1			0	$(x+1)-2x+(x-1)-\frac{2x+4}{5}>0$	$\Rightarrow x < -2$. "Αρα : $x \in (-\infty, -2) \cap [1, +\infty) = \emptyset$
$+\infty$	+	+	+		

Λύσεις τῆς (1) θὰ είναι αἱ λύσεις τῶν κάτωθι συστημάτων :

$$\alpha'). -(x+1)+2x-(x-1)-\frac{2x+4}{5}>0 \quad \left. \begin{array}{l} 2x+4<0 \\ x < -1 \end{array} \right\} \Rightarrow x < -2 \quad \left. \begin{array}{l} \text{συμβι-} \\ \text{βασταῖ.} \end{array} \right.$$

"Αρα : $-\infty < x < -2$.

$$\beta'). (x+1)+2x-(x-1)-\frac{2x+4}{5}>0 \quad \left. \begin{array}{l} 8x+6>0 \\ -1 \leq x < 0 \end{array} \right\} \Rightarrow x > -\frac{3}{4} \quad \left. \begin{array}{l} \text{συμβι-} \\ \text{βασταῖ.} \end{array} \right.$$

"Αρα : $-\frac{3}{4} < x < 0$.

$$\gamma'). (x+1)-2x-(x-1)-\frac{2x+4}{5}>0 \quad \left. \begin{array}{l} 12x-6<0 \\ 0 \leq x < 1 \end{array} \right\} \Rightarrow x < \frac{1}{2} \quad \left. \begin{array}{l} \text{συμβι-} \\ \text{βασταῖ.} \end{array} \right.$$

"Αρα : $0 \leq x < \frac{1}{2}$.

$$\delta'). (x+1)-2x+(x-1)-\frac{2x+4}{5}>0 \quad \left. \begin{array}{l} 2x+4<0 \\ x \geq 1 \end{array} \right\} \Rightarrow x < -2 \quad \left. \begin{array}{l} \text{ἀσυμβι-} \\ \text{βαστοῖ.} \end{array} \right.$$

"Ωστε, ἡ διοθεῖσα ἀνίσωσις (1) ἀληθεύει διὰ : $x < -2$ καὶ $-\frac{3}{4} < x < \frac{1}{2}$.

Παράδειγμα 4ον : Νὰ επιλυθῇ ἡ ἀνίσωσις :

$$||x| - 5| > ||3x| - 3|. \quad (1)$$

Λύσις : 'Υψούμεν ἀμφότερα τὰ μέλη τῆς (1) εἰς τὸ τετράγωνον καὶ ἔχομεν :

$$(|x| - 5)^2 > (3|x| - 3)^2 \quad \text{ἢ} \quad (|x| - 5)^2 - (3|x| - 3)^2 > 0$$

$$\text{ἢ} \quad (4|x| - 8)(-2|x| - 2) > 0 \quad \text{ἢ} \quad 8(|x| - 2)(|x| + 1) < 0. \quad (2)$$

'Αλλὰ $|x| + 1 > 0$, διὰ κάθε $x \in \mathbf{R}$, κατὰ συνέπειαν ἐκ τῆς (2) ἔχομεν :

$$|x| - 2 < 0 \quad \text{ἢ} \quad |x| < 2, \quad \text{ἔξοδος: } -2 < x < 2.$$

Παράδειγμα 5ον : Νὰ δειχθῇ ὅτι διὰ κάθε πραγματικὴν τιμὴν τοῦ x , ισχύει ἡ σχέσις :

$$|x - 2| + |2x - 1| \geq \frac{3}{2}. \quad (1)$$

Δια ποίας τιμάς τοῦ x ισχύει ἡ ισότης ;

Λύσις : 'Εργαζόμενοι, ὅπως καὶ εἰς τὸ παράδειγμα 3, ἔχομεν τὸν κάτωθι πίνακα μετὰ τῶν σχετικῶν συμπερασμάτων :

x	$x - 2$	$2x - 1$	$ x - 2 + 2x - 1 \geq \frac{3}{2}$	Συμπέρασμα
$-\infty$	—	—	$-(x - 2) - (2x - 1) \geq \frac{3}{2}$	$-\infty < x < \frac{1}{2}$
$\frac{1}{2}$	—	0	$-(x - 2) + (2x - 1) \geq \frac{3}{2}$	$\frac{1}{2} \leq x < 2$
2	—	+	$(x - 2) + (2x - 1) \geq \frac{3}{2}$	
0	—	—		
$+\infty$	+	+	$(x - 2) + (2x - 1) \geq \frac{3}{2}$	$2 \leq x < +\infty$.

'Εκ τοῦ ἀνωτέρω πίνακος συνάγομεν ὅτι ἡ σχέσις (1) ισχύει διὰ κάθε $x \in \mathbf{R}$.

Ἡ ισότης, ως εὐκόλως φαίνεται, ισχύει διὰ $x = \frac{1}{2}$.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΟΥΣ ΤΙΜΑΣ ΤΩΝ ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΕΠΙΛΥΟΜΕΝΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ \mathbf{R} .

§ 47. I. Έπιλυσις συστήματος τῆς μορφῆς :

$$\left. \begin{array}{l} \alpha|x| + \beta|y| = \gamma \\ \alpha_1|x| + \beta_1|y| = \gamma_1 \end{array} \right\}, \quad (1)$$

ὅπου $\alpha, \beta, \gamma, \alpha_1, \beta_1, \gamma_1$ πραγματικοί ἀριθμοί, ἀνεξάρτητοι τῶν x, y .

Θέτομεν $|x| = x_1, |y| = y_1$ καὶ τὸ σύστημα (1) λαμβάνει τὴν μορφήν :

$$\left. \begin{array}{l} \alpha_1 x_1 + \beta_1 y_1 = \gamma \\ \alpha_1 x_1 + \beta_1 y_1 = \gamma_1 \end{array} \right\}. \quad (2)$$

Τό σύστημα (2), ύποτιθεμένου ότι: $\alpha\beta_1 - \alpha_1\beta \neq 0$, έχει λύσιν τήν:

$$x_1 = \frac{\gamma\beta_1 - \gamma_1\beta}{\alpha\beta_1 - \alpha_1\beta}, \quad y_1 = \frac{\alpha\gamma_1 - \alpha_1\gamma}{\alpha\beta_1 - \alpha_1\beta}.$$

Έπειδή δι' οίανδηποτε τιμήν τῶν x και y είναι $|x| \geq 0$, $|y| \geq 0$, τὸ σύστημα (1) θὰ έχῃ λύσιν τότε, καὶ μόνον τότε, ἄν:

$$\frac{\gamma\beta_1 - \gamma_1\beta}{\alpha\beta_1 - \alpha_1\beta} \geq 0, \quad \frac{\alpha\gamma_1 - \alpha_1\gamma}{\alpha\beta_1 - \alpha_1\beta} \geq 0.$$

“Υπὸ τὴν προϋπόθεσιν ταύτην αἱ λύσεις τοῦ δοθέντος συστήματος είναι αἱ λύσεις τοῦ ζεύγους τῶν ἔξισώσεων:

$$|x| = \frac{\gamma\beta_1 - \gamma_1\beta}{\alpha\beta_1 - \alpha_1\beta}, \quad |y| = \frac{\alpha\gamma_1 - \alpha_1\gamma}{\alpha\beta_1 - \alpha_1\beta},$$

τὰς διποίας εύρισκομεν ὡς ἔξετέθη εἰς τὴν § 42.

Παράδειγμα 1ον: Νὰ ἐπιλυθῇ τὸ σύστημα:

$$\left. \begin{array}{l} 3|x| - 2|y| = 10 \\ 5|x| + 3|y| = 23 \end{array} \right\}. \quad (1)$$

Λύσις: Θέτομεν $|x| = x_1$, $|y| = y_1$ καὶ τὸ σύστημα (1) λαμβάνει τὴν μορφήν:

$$\left. \begin{array}{l} 3x_1 - 2y_1 = 10 \\ 5x_1 + 3y_1 = 23 \end{array} \right\}. \quad (2)$$

Λύοντες τοῦτο, έχομεν: $x_1 = 4$, $y_1 = 1$.

Τότε αἱ λύσεις τοῦ δοθέντος συστήματος είναι αἱ λύσεις τοῦ ζεύγους τῶν ἔξισώσεων:

$$\left. \begin{array}{l} |x| = 4 \\ |y| = 1 \end{array} \right\}, \quad \text{ἢξ οὐ:} \quad \left. \begin{array}{l} x = \pm 4 \\ y = \pm 1 \end{array} \right.$$

“Ωστε, αἱ ρίζαι τοῦ συστήματος (1) είναι τὰ ζεύγη:

$(x = 4, y = 1)$, $(x = 4, y = -1)$, $(x = -4, y = 1)$, $(x = -4, y = -1)$.

Παράδειγμα 2ον: Νὰ ἐπιλυθῇ τὸ σύστημα:

$$|x| + |y| = 1$$

$$x^2 + y^2 = 1.$$

Λύσις: Τὸ δοθὲν σύστημα γράφεται καὶ οὕτω:

$$|x| + |y| = 1$$

$$|x|^2 + |y|^2 = 1.$$

Τοῦτο είναι ίσοδύναμον πρὸς τὸ σύστημα:

$$|x| + |y| = 1$$

$$|x \cdot y| = 0.$$

Απὸ τὴν δευτέραν ἔξισωσιν έχομεν: $x = 0$ η̄ $y = 0$.

Διὰ $x = 0$ έχομεν ἐκ τῆς πρώτης ἔξισώσεως τοῦ συστήματος $|y| = 1$, ἔξ οὐ $y = \pm 1$ καὶ διὰ $y = 0$ έχομεν $|x| = 1$, ἔξ οὐ: $x = \pm 1$.

"Ωστε, αἱ λύσεις τοῦ διθέντος συστήματος εἰναι :

$$(x = 0, y = 1), (x = 0, y = -1), (x = 1, y = 0), (x = -1, y = 0).$$

§ 48. II. Ἐπίλυσις συστήματος τῆς μορφῆς :

$$\left. \begin{array}{l} \alpha|x| + \beta|y| + \gamma x + \delta y = k \\ \alpha'|x| + \beta'|y| + \gamma'x + \delta'y = k' \end{array} \right\}, \quad (1)$$

ὅπου οἱ συντελεσταὶ τῶν ἀγνώστων καὶ οἱ σταθεροὶ ὅροι εἰναι πραγματικοὶ ἀριθμοί.

Διακρίνομεν τὰς ἔξης τέσσαρας περιπτώσεις :

α'). $x \geq 0, y \geq 0$, ὅπότε $|x| = x, |y| = y$ καὶ τὸ σύστημα (1) εἰναι ἴσοδύναμον πρὸς τό :

$$\left. \begin{array}{l} (\alpha + \gamma)x + (\beta + \delta)y = k \\ (\alpha' + \gamma')x + (\beta' + \delta')y = k' \end{array} \right\} \quad (2)$$

Αἱ μὴ ἀρνητικαὶ λύσεις αὐτοῦ εἰναι λύσεις τοῦ διθέντος συστήματος.

Συνεχίζομεν τὴν ἐπίλυσιν θεωροῦντες ἀκόμη τὰς περιπτώσεις :

$$\beta'). x \geq 0, y < 0, \quad \gamma'). x < 0, y \geq 0, \quad \delta'). x < 0, y < 0.$$

Παράδειγμα : Νὰ εὑρεθοῦν αἱ λύσεις τοῦ συστήματος :

$$\begin{aligned} x|y| + y|x| &= -6 \\ x^2 - |x|(4 + |y|) + 6 &= 0. \end{aligned}$$

Ἀνσις : Ἐκ τῆς πρώτης παρατηροῦμεν ὅτι : $x \neq 0$ καὶ $y \neq 0$.

Διακρίνομεν ἥδη τὰς κάτωθι περιπτώσεις :

$$\alpha'). Eān x > 0, y > 0, \text{ τότε } \eta \text{ πρώτη } \tauῶν ἔξισώσεων γίνεται :$$

$$xy + yx = -6 \quad \eta \quad xy = -3, \text{ τοῦτο ὅμως εἰναι ἀδύνατον, διότι } xy > 0.$$

$$\beta'). Eān x > 0, y < 0, \text{ τότε } \eta \text{ πρώτη } \tauῶν διθεισῶν ἔξισώσεων γίνεται :$$

$$-xy + xy = -6 \quad \eta \quad 0 = -6 \text{ (ἀδύνατον)}.$$

$$\gamma'). Eān x < 0, y > 0, \text{ τότε } \eta \text{ πρώτη } \tauῶν διθεισῶν ἔξισώσεων δίδει ἐπίσης$$

$$xy - xy = -6 \quad \eta \quad 0 = -6 \text{ (ἀδύνατον)}.$$

$$\delta'). Eān x < 0, y < 0, \text{ τότε } \eta \text{ πρώτη } \tauῶν διθεισῶν ἔξισώσεων λαμβάνομεν : xy = 3 \text{ καὶ } \eta \text{ τῆς δευτέρας}$$

$$x^2 + 4x - xy + 6 = 0$$

$$\eta, \text{ λόγω } \tauῆς xy = 3,$$

$$x^2 + 4x + 3 = 0,$$

ἡ δποία ἔχει ρίζας: $x_1 = -3, x_2 = -1$.

"Η $xy = 3$, διὰ $x = x_1 = -3$ δίδει $y_1 = -1$, ἐνῷ διὰ $x = x_2 = -1$ δίδει $y_2 = -3$. "Οθεν αἱ ζητούμεναι λύσεις εἰναι τὰ ζεύγη:

$$\boxed{\begin{array}{l} x = -1 \\ y = -3 \end{array}}$$

$$\boxed{\begin{array}{l} x = -3 \\ y = -1 \end{array}}$$

§ 49. III. Ἐπίλυσις συστημάτων εἰδικῶν μορφῶν.—Παραθέτομεν κατωτέρω παραδείγματα ἐπιλύσεως συστημάτων εἰδικῶν τινων μορφῶν:

Π αράδειγμα 1ον : Νὰ εὑρεθοῦν αἱ τιμαι τῶν x καὶ y , αἱ όποιαι ἰκανοποιοῦν τὸ σύστημα:

$$|x + y - 7| + x - y = 7 \quad (1)$$

$$|x - 3y| \leq 0. \quad (2)$$

Λύσις : Ἐπειδὴ οὐδέποτε εἶναι $|x - 3y| < 0$, θὰ ἔχωμεν ἐκ τῆς (2)

$$|x - 3y| = 0 \iff x = 3y. \quad (3)$$

Δυνάμει ταύτης, ἡ πρώτη γίνεται:

$$|3y + y - 7| + 3y - y = 7 \iff |4y - 7| + 2y = 7 \quad (4)$$

Διακρίνομεν ἥδη δύο περιπτώσεις:

$$\alpha). \text{Ἐὰν } 4y - 7 \geq 0, \text{ δηλ. } y \geq \frac{7}{4}, \text{ τότε } |4y - 7| = 4y - 7 \text{ καὶ } \text{ἡ} \quad (4)$$

$$\text{δίδει: } 4y - 7 + 2y = 7 \iff y = \frac{7}{3}.$$

$$\text{Ἡ τιμὴ αὗτη τοῦ } y \text{ εἶναι παραδεκτή, διότι } \frac{7}{3} > \frac{7}{4}.$$

$$\text{Διὰ } y = \frac{7}{3}, \text{ ἡ (3) δίδει } x = 7.$$

$$\beta). \text{Ἐὰν } 4y - 7 < 0, \text{ δηλ. } y < \frac{7}{4}, \text{ τότε } |4y - 7| = 7 - 4y, \text{ ὅτε } \text{ἡ} \quad (4) \\ \text{γίνεται: } 7 - 4y + 2y = 7 \iff y = 0 \\ \text{τιμὴ παραδεκτή, διότι } 0 < \frac{7}{4}. \text{ Διὰ } y = 0 \text{ ἡ (3) δίδει } x = 0.$$

Αἱ λύσεις ἄρα τοῦ συστήματος εἶναι αἱ:

$$(x = 0, y = 0), (x = 7, y = \frac{7}{3}).$$

Π αράδειγμα 2ον : Νὰ ἐπιλυθῇ, ἐντὸς τοῦ R , τὸ σύστημα:

$$4|x - 2| + |y - 1| = 5 \quad (1)$$

$$4x - 3y = 6. \quad (2)$$

Λύσις : Διακρίνομεν τὰς ἔξης τέσσαρας περιπτώσεις:

Περίπτωσις 1η : Ἐὰν $x - 2 \geq 0, y - 1 \geq 0$, τότε τὸ σύστημα γράφεται:

$$\left| \begin{array}{l} 4(x - 2) + (y - 1) = 5 \\ 4x - 3y = 6 \end{array} \right. \text{ἢ} \left| \begin{array}{l} 4x + y = 14 \\ 4x - 3y = 6 \end{array} \right., \text{ἔξ οὖ: } \left| \begin{array}{l} x = 3 \\ y = 2. \end{array} \right.$$

Τὸ ζεῦγος τοῦτο ἀποτελεῖ λύσιν τοῦ συστήματος, καθ' ὅσον αἱ τιμαι $x = 3$ καὶ $y = 2$ ἰκανοποιοῦν τὰς συνθήκας $x - 2 \geq 0$ καὶ $y - 1 \geq 0$.

Περίπτωσις 2α : Ἐὰν $x - 2 \geq 0, y - 1 < 0$, τότε τὸ σύστημα γράφεται:

$$\left| \begin{array}{l} 4(x - 2) - (y - 1) = 5 \\ 4x - 3y = 6 \end{array} \right. \text{ἢ} \left| \begin{array}{l} 4x - y = 12 \\ 4x - 3y = 6 \end{array} \right., \text{ἔξ οὖ: } \left| \begin{array}{l} x = \frac{15}{4} \\ y = 3. \end{array} \right.$$

* Επειδή ή τιμή $y = 3$ δὲν ίκανοποιεῖ τὴν $y - 1 < 0$, αἱ τιμαὶ $x = \frac{15}{4}$, $y = 3$ δὲν ἀποτελοῦν λύσιν τοῦ συστήματος.

Περίπτωσις 3η: Εὰν $x - 2 < 0$, $y - 1 \geq 0$, τότε τὸ σύστημα γράφεται:

$$\left| \begin{array}{l} -4(x-2) + (y-1) = 5 \\ 4x - 3y = 6 \end{array} \right. \quad \left| \begin{array}{l} 4x - y = 2 \\ 4x - 3y = 6 \end{array} \right., \text{ ἐξ οὗ: } \left| \begin{array}{l} x = 0 \\ y = -2 \end{array} \right.$$

* Επειδή ή τιμὴ $y = -2$ δὲν ίκανοποιεῖ τὴν συνθήκην $y - 1 \geq 0$, αἱ τιμαὶ $x = 0$, $y = -2$ δὲν ἀποτελοῦν λύσιν τοῦ συστήματος.

Περίπτωσις 4η: Εὰν $x - 2 < 0$, $y - 1 < 0$, τότε τὸ σύστημα γράφεται:

$$\left| \begin{array}{l} -4(x-2) - (y-1) = 5 \\ 4x - 3y = 6 \end{array} \right. \quad \left| \begin{array}{l} 4x + y = 4 \\ 4x - 3y = 6 \end{array} \right., \text{ ἐξ οὗ: } \left| \begin{array}{l} x = \frac{9}{8} \\ y = -\frac{1}{2} \end{array} \right.$$

Τὸ ζεῦγος τοῦτο ἀποτελεῖ λύσιν τοῦ συστήματος, καθ' ὅσον αἱ τιμαὶ $x = \frac{9}{8}$ καὶ $y = -\frac{1}{2}$ ίκανοποιοῦν τὰς συνθήκας $x - 2 < 0$ καὶ $y - 1 < 0$.

* Οθεν αἱ λύσεις τοῦ συστήματος εἰναι τὰ ζεύγη :

$$\boxed{\begin{array}{l} x = 3 \\ y = 2 \end{array}}$$

$$\boxed{\begin{array}{l} x = 9/8 \\ y = -1/2 \end{array}}$$

AΣΚΗΣΕΙΣ

71. Νὰ ἐπιλυθοῦν, ἐντὸς τοῦ \mathbb{R} , αἱ ἀκόλουθοι ἔξισώσεις :

1. $2|x| - 3 = 0$,
2. $\frac{3}{5}|x| - 2x = 7$,
3. $\frac{3x+5}{3|x|+5} = -2$,
4. $x^2 - 7|x| + 12 = 0$,
5. $x^2 - 3|x| + 2x - 6 = 0$,
6. $x^2 - 4x + 2|x| - 3 = 0$,
7. $|x|^3 - 5|x^2| - 17|x| + 21 = 0$,
8. $|x^8| - |3x^4| + 2 = 0$,
9. $|x| - |x-1| = 5 - 3x$,
10. $2x - 3|x| + 3|-5|x+1| + 4|x-5| + 6 = 0$,
11. $|2x-1| - 3|x-1| = 1$,
12. $|2x-1| + |x| + |4x+1| - 3|x-3| + 7 = 0$,
13. $|x-2| - 3|x-1| + 2x - 5 = 0$,
14. $|x-2| + x^2 - 4x + 10 = 0$,
15. $|x^2 - 3x + 2| + |x-4| - 13 = 0$,
16. $\frac{1}{|x-1|} - \frac{2}{|x-2|} + \frac{1}{|x-3|} = 0$
17. $|x^2 - 3x^2 + 2x - 1| = |x^2 - 1| + |3x^2 - 2x|$.

72. Νὰ ἐπιλυθοῦν καὶ νὸ διερευνηθοῦν αἱ ἀκόλουθοι ἔξισώσεις :

1. $2x + 3|x| = \lambda x + 2$,
2. $|x - |x-1|| = \lambda x + 1$,
3. $|x-3| - \lambda|x-1| = 2$,
4. $\lambda|x| + 3x = -1$,
5. $|\mu-1|x + (\mu-1)|x| = \mu^2 - 1$.

73. Νὰ ἐπιλυθοῦν αἱ ἀκόλουθοι ἀνισώσεις :

1. $|3x| - 2 > |x| + 8$,
2. $3|x| + 4|x-1| > 5$,
3. $2|x| + x > 10$,
4. $\frac{3|x|+1}{4} - \frac{4-x}{3} > 1$,
5. $|2x+1| + |6x| > 9$,
6. $\frac{|2x^2-5|}{3|x|} > \frac{|x|+1}{2}$,
7. $|x|^3 - 4x^2 + |x| + 6 > 0$,
8. $|x-1| + |x-2| - 1 < 2x$,

9. $|2x + 1| - 4|x - 3| - |x - 4| > 3$, 10. $|x| + |x - 1| + |x - 2| > 9$,
 11. $||x| + x| - ||x| - x| < |x - 2|$, 12. $|x - 1| + |x - 2| + |x - 3| < x + 1$.

* 74. Νά επιλυθοῦν καὶ νὰ διερευνηθοῦν αἱ ἀνισώσεις :

$$1. \lambda|x| + 2x > 2\lambda - 3, \quad 2. |x - 1| + \lambda|x - 2| > 1.$$

75. Νά δειχθῇ ὅτι διὰ κάθε πραγματικὴν τιμὴν τοῦ x ίσχύει ἡ σχέσις :

$$f(x) \equiv \left| x + \frac{5}{2} \right| + \left| x - \frac{1}{2} \right| + |x - 2| \geq \frac{9}{2}.$$

Διὰ ποίας τιμᾶς τοῦ x ίσχύει ἡ Ισότης ;

76. Διὰ ποίας πραγματικὰς τιμᾶς τοῦ x ἔχει νόημα πραγματικοῦ ἀριθμοῦ ἵκαστη τῶν κάτωθι παραστάσεων ;

$$A \equiv \sqrt{|x|^2 + 2|x| - 4}, \quad B \equiv \sqrt{|x^2 + 8x - 9| - 24}.$$

77. Νά επιλυθοῦν τὰ κάτωθι συστήματα :

$$\begin{array}{lll} 1. \begin{aligned} 2|x| + 3|y| &= 11 \\ 3|x| - 5|y| &= 7 \end{aligned} & 2. \begin{aligned} 3|x| - 2|y| &= 5 \\ |x| + 3|y| &= 9 \end{aligned} & 3. \begin{aligned} |x| - 2y &= 3 \\ x + |y| &= 6 \end{aligned} \\ 4. \begin{aligned} |2x - 3y| &= 12 \\ 3x + y &= 7 \end{aligned} & 5. \begin{aligned} |x - 1| + |y - 3| &= 4 \\ x^2 - y^2 &= 8 \end{aligned} & 6. \begin{aligned} |x| + |y - 1| &= 3 \\ |x| + |y - 2| &= 4. \end{aligned} \end{array}$$

78. Ὁμοίως τὰ κάτωθι :

$$1. |x - 2y| + |x + y - 1| = 2 \quad 2. 2|x - y| + |x + y - 3| = 9 \\ x + 3y = 2 \quad 2x + 3y = 19.$$

79. Ἐάν $\alpha \in \mathbb{R}$ νὰ επιλυθῇ τὸ σύστημα :

$$\begin{aligned} |x| + |y| &= \alpha \\ \alpha y &= x^2 \end{aligned}$$

80. Νά εύρεθοῦν αἱ λύσεις τοῦ συστήματος :

$$\begin{aligned} y + |y|x &= 6 \\ |y| - |x| &= 2. \end{aligned}$$

81. Νά εύρεθοῦν τὰ ζεύγη τῶν ἀκέραιών x, y , τὰ δόποια ίκανοποιοῦν τὰς σχέσεις :

$$y - |x^2 - 2x| + \frac{1}{2} > 0 \\ y + |x - 1| < 2.$$

82. Νά εύρεθοῦν αἱ ἀκέραιαι λύσεις τοῦ συστήματος :

$$\begin{aligned} x^2 &= yz \\ |y + z| &> x^2 + 1. \end{aligned}$$

Ἐνθα oī z, y ἔχουν τὰς ἐλαχίστας ἀπολύτους τιμᾶς

83. Νά επιλυθῇ καὶ νὰ διερευνηθῇ τὸ σύστημα :

$$\begin{aligned} |\lambda x + y| &= 2x \\ 3x + 5y &= 2. \quad \text{Ἐνθα } \lambda \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

ΓΕΝΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΤΩΝ

84. Ἐάν $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ τί συμπεραίνετε ἐκ τῆς σχέσεως $|\alpha| + |\beta| \neq 0$;

85. Ἐάν $\alpha, \beta, x, y \in \mathbb{R}$, μὲ $\alpha\beta \neq 0$, ίσχύουν δὲ αἱ δύο σχέσεις :

$$x = \alpha(|\alpha| + |\beta|) \quad \text{καὶ} \quad y = \beta(|\alpha| + |\beta|),$$

τότε θὰ ίσχύουν καὶ αἱ :

$$\alpha = \frac{x}{\sqrt{|x| + |y|}}, \quad \beta = \frac{y}{\sqrt{|x| + |y|}}$$

καὶ ἀντιστρόφως, αἱ δύο τελευταῖαι συνεπάγονται τὰς δύο πρώτας.

86. Έάν $\alpha\beta \neq 0$ και $\alpha^2 < 16\beta^2$, να δειχθῇ ότι :

$$\left| \frac{\alpha}{\beta} \right| - \left| \frac{\beta}{\alpha} \right| < \frac{15}{4}.$$

87. Έάν $|\alpha| > 1$, δείξατε ότι :

$$\left| \alpha + \frac{1}{\alpha} \right| - 1 < |\alpha| < \left| \alpha + \frac{1}{\alpha} \right|.$$

88. Έάν $(x \neq y) \in \mathbb{R}$ και διάφοροι τοῦ μηδενός, δείξατε ότι :

$$\frac{\sqrt{x^2 y^2}}{xy} + \frac{\sqrt{(x-y)^2}}{x-y} \left[\frac{\sqrt{x^2}}{x} - \frac{\sqrt{y^2}}{y} \right] = 1.$$

89. Έάν διπλαγματικός ἀριθμός α ίκανοποιήσῃ τὴν σχέσιν $|\alpha| < \sqrt{2} - 1$, να διπλαγματική ότι:

$$\frac{|1-\alpha|}{1-|\alpha|} < \sqrt{2} + 1.$$

90. Έάν $\alpha, \beta, \gamma, x, y, z \in \mathbb{R}$, δείξατε ότι ἀπὸ τὰς σχέσεις :

$$\alpha = \frac{x}{|y| + |z|}, \quad \beta = \frac{y}{|z| + |x|}, \quad \gamma = \frac{z}{|x| + |y|},$$

ἔπονται αἱ σχέσεις :

$$|\alpha\beta\gamma| \leq \frac{1}{8}, \quad \frac{1}{|\alpha|} + \frac{1}{|\beta|} + \frac{1}{|\gamma|} \geq 6.$$

91. Ήνα ἡ Ισότης $|\alpha|x| + \beta x| = \alpha|x| + \beta x$ είναι ταυτότης ὡς πρὸς x, πρέπει καὶ ἀρκεῖ : $\alpha + \beta \geq 0$ καὶ $\alpha - \beta \geq 0$.

92. Νὰ λέξετε, ἐάν αἱ σχέσεις $\alpha + \beta \geq 0$ καὶ $\alpha - \beta \leq 0$ είναι αἱ ίκαναι καὶ ἀναγκαῖαι συνθῆκαι, Ήνα ἡ Ισότης $|\alpha|x| + \beta x| = \beta|x| + \alpha x$ είναι ταυτότης ὡς πρὸς x.

93. Έάν $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ καὶ $|x| = \alpha x + \beta x + 1$, να δύναται διπλαγματική ότι $|\alpha + \beta| < 1$.

94. Νὰ εύρεθοῦν τὰ διαστήματα μεταβολῆς τοῦ x, εἰς τὰ ὅποια ἡ παράστασις :

$$y = |x-5| + |3x+1| + |2x-3|$$

είναι ἀνεξάρτητος τοῦ x.

95. Δείξατε διὰ πραγματικοὺς ἀριθμούς α, β ότι ἀπὸ τὴν σχέσιν :

$$2\beta(1+|\alpha|) = 1 + \alpha + |\alpha|$$

ἔπονται αἱ : $|2\beta-1| < 1$ καὶ $\alpha(1-|2\beta-1|) = 2\beta-1$

καὶ ἀντιστρόφως, ἀπὸ τὰς δύο τελευταῖς ἔπειται ἡ πρώτη.

96. Ήνα ἡ Ισότης $|\alpha|x| + \beta x| = A|x| + Bx$ είναι ταυτότης ὡς πρὸς x, πρέπει καὶ ἀρκεῖ :

$$A = \frac{|\alpha+\beta|}{2} + \frac{|\alpha-\beta|}{2} \quad \text{καὶ} \quad B = \frac{|\alpha+\beta|}{2} - \frac{|\alpha-\beta|}{2}.$$

97. Έάν $x, y, z \in \mathbb{R}$ καὶ $|x+y| < \frac{z}{|z|+1}$, τότε : $||x|-|y|| < 1$.

98. Νὰ εύρεθοῦν τὰ διαστήματα μεταβολῆς τοῦ x καὶ αἱ ἀντίστοιχοι τιμαὶ τοῦ λ, Ήνα ἡ παράστασις : $y = |\lambda^2 x + 1| + |2\lambda x + 3|$ είναι ἀνεξάρτητος τοῦ x.

99. Δίδεται ἡ παράστασις : $y = \left| x + \frac{3}{2} \right| + \left| x - \frac{1}{2} \right| + |x-2|$, να εύρεθοῦν :

- 1). Αἱ ἀκροφάσεις αὐτῆς ἀνεύ του συμβόλου τῆς ἀπολύτου τιμῆς διὰ τὰς διαφόρους τιμὰς τοῦ x.
- 2). Βάσει τούτων νὰ εύρεθῇ ἡ ἀλαχίστη τιμὴ αὐτῆς, δταν τὸ x διατρέχῃ τὴν εύθειαν τῶν πραγματικῶν ἀριθμῶν.

100. Έάν αἱ ρίζαι τῆς ἔξισώσεως $x^2 + \xi x + \eta = 0$ είναι πραγματικαὶ καὶ οἱ συντελεσταὶ ξ καὶ η πληροῦν τὴν σχέσιν $\xi^2 - 2\eta^2 < \xi|\eta|$, να δειχθῇ ότι αἱ ρίζαι ρ_1, ρ_2 τῆς ἔξισώσεως $\eta x^2 + \xi x + 1 = 0$ πληροῦν τὴν : $|\rho_1| - |\rho_2| < 2$.

101. Έκ της σχέσεως : $x_1 = \frac{y_1}{1 + |y_1|}$ επονται αι σχέσεις :

$$1 - |x_1| > 0 \text{ και } y_1 = \frac{x_1}{1 - |x_1|} \text{ και } \text{άντιστρόφως.}$$

Ένω έκ τῶν σχέσεων :

$$x_1 = \frac{y_1}{1 + |y_1| + |y_2|}, \quad x_2 = \frac{y_2}{1 + |y_1| + |y_2|}$$

επονται αι σχέσεις :

$$1 - |x_1| - |x_2| > 0, \quad y_1 = \frac{x_1}{1 - |x_1| - |x_2|}, \quad y_2 = \frac{x_2}{1 - |x_1| - |x_2|} \text{ και } \text{άντιστρόφως.}$$

102. Έάν $|\lambda| < 1$, νά διποδειχθῇ δτι λ εκάστης τῶν σχέσεων :

$$|x + \lambda y| < |\lambda x + y|, \quad |x| < |y|, \quad |x^2 + \lambda xy| < |\lambda xy + y^2|$$

επονται αι δλλαι δύο σχέσεις.

103. Έάν $\alpha, \beta, v \in \mathbb{Z}$ και $\alpha\beta = -1$, $v \geq 5$, $x = \frac{\alpha\sqrt{3}}{2v} + \frac{\beta\sqrt{3}}{2(v-1)}$, νά δειχθῇ δτι : $40|x| \leq \sqrt{3}$.

104. Διδεται ή εξίσωσις : $x^2 + \beta x + \gamma = 0$, ένθα $\beta < \gamma < 0$. Νά δειχθῇ δτι, έάν

$$\rho_1, \rho_2 (\rho_1 > \rho_2) \text{ είναι αι ρίζαι αυτής, θά είναι : } |\rho_2| < \rho_1 < 1 + |\beta|.$$

105. Νά εύρεθῃ ή σχέσης μεταξύ τῶν συντελεστῶν της εξίσωσεως :

$$\alpha|x|^3 + bx^2 + \beta|x| + \gamma = 0,$$

Ίνα αύτη ξχη τό δινώτερον δυνατόν πλήθος πραγματικῶν ριζῶν.

106. Έάν $\alpha, \beta \in \mathbb{R} - \{0\}$ και $|\alpha| - |\beta| > 1$, νά δειχθῇ δτι ή εξίσωσις $x^2 + \alpha x + \beta = 0$ δύναται νά ξχη άμφοτέρας τάς ρίζας της άκεραίας.

107. Δείξατε δτι διά πραγματικούς άριθμούς α, β, γ από τάς σχέσεις : $2|\beta| \leq \alpha \leq \gamma$, επεται δτι : $\alpha \leq \frac{2}{\gamma^2} \sqrt{\alpha\gamma - \beta^2}$. Κατόπιν τούτου δείξατε δτι άκεραιοι άριθμοι α, β, γ πληροῦντες τάς άνω σχέσεις είναι μόνον οι $\alpha = 1, \beta = 0, \gamma = 1$, έφ' δσον $\alpha\gamma = 1 + \beta^2$.

108. Εστω β πραγματικός άριθμός διάφορος τοῦ μηδενός και τοιούτος, ώστε $|\beta| < 1$. Εστω ξ πραγματικός άριθμός κείμενος άλγεβρικῶς μεταξύ 0 και β .

Νά δειχθῇ δτι : $\left| \frac{\beta - x}{1 + x} \right| < |\beta|$.

109. Έάν ξ_1, ξ_2 είναι αι ρίζαι της εξίσωσεως $x^2 - 2\alpha x + \beta = 0$ μὲ πραγματικούς συντελεστάς και ισχύη : $0 < |\xi_1| < |\xi_2|$,

νά δειχθῇ δτι : $2\alpha^2 - \beta - \left| \frac{\beta}{2} \right| < \left| \frac{\xi_2}{\sqrt{2}} \right|^2 < 2\alpha^2 - \beta$.

110. Έάν $v > 0$ και $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$, δείξατε δτι :

$$\left| \alpha + \beta + \frac{v - \alpha\beta}{\alpha + \beta} \right| \geq |V3v| \quad (1) \quad \text{και} \quad \left| \alpha + \beta + \gamma + \frac{v - \alpha\beta - \beta\gamma - \gamma\alpha}{\alpha + \beta + \gamma} \right| \geq \left| \sqrt{\frac{8v}{3}} \right| \quad (2)$$

111. Διδονται τά τριώνυμα $f(x) \equiv \alpha x^2 + \beta x + \gamma$, $\varphi(x) \equiv \alpha' x^2 + \beta' x + \gamma'$ μὲ συντελεστάς έν \mathbb{R} και ρίζας πραγματικάς και άνίσους. Έάν x_1, x_2 ($x_1 < x_2$) αι ρίζαι τοῦ $f(x)$ και ρ_1, ρ_2 ($\rho_1 < \rho_2$) αι ρίζαι τοῦ $\varphi(x)$, νά διποδειχθῇ ή ισοδυναμία :

$$(|f(x)| \geq |\varphi(x)| \forall x \in \mathbb{R}) \Leftrightarrow (x_1 = \rho_1, x_2 = \rho_2, |\alpha| > |\alpha'|).$$

112. Διδεται ή εξίσωσις :

$$x^2 + x + \lambda |x| + 1 = 0.$$

Νά δρισθῇ δ λ ώστε αύτη νά ξχη τέσσαρας ρίζας πραγματικάς και άνίσους.

113. Έάν $x, y, z \in \mathbb{R}$ νά δειχθῇ ότι ἐκ τῆς σχέσεως :

$$(x^2 - y^2 + z^2)^2 \leq 4x^2z^2 \quad (1)$$

ἐπονται αἱ σχέσεις :

$$||x| - |y|| \leq |z| \quad (2) \quad \text{καὶ} \quad |z| \leq |x| + |y| \quad (3)$$

καὶ ἀντιστρόφως, ἀπὸ τὰς δύο τελευταίας ἔπειται ἡ πρώτη.

114. Έάν $x, y, z \in \mathbb{R} - \{0\}$ καὶ ισχύουν αἱ σχέσεις :

$$x^2y^2 + x^2z^2 = y^2z^2 \quad \text{καὶ} \quad x^2 + z^2 > |xz| + |zy|,$$

νά δειχθῇ ότι :

$$1) \quad |x| < |y| < |z|$$

$$2) \quad \frac{x^2 + y^2}{z^2} < \frac{|x| + |y|}{|z|}.$$

115. Νά εύρεθῃ τὸ σημεῖον τῆς παραστάσεως :

$$y = \frac{\alpha - \beta}{\sqrt{|\gamma - x|}} + \frac{\beta - \gamma}{\sqrt{|\alpha - x|}} + \frac{\gamma - \alpha}{\sqrt{|\beta - x|}}$$

εἰς τὰς κάτωθι περιπτώσεις :

- 1). Διὰ $x < \alpha < \beta < \gamma$
- 2). Διὰ $\alpha > \beta > \gamma > x$.

*Υπόδειξις : Θέσατε $\sqrt{|\alpha - x|} = k$, $\sqrt{|\beta - x|} = \lambda$, $\sqrt{|\gamma - x|} = \mu$ καὶ ἐκφράσατε τὴν παράστασιν γ συναρτήσει τῶν k, λ, μ .

116. Έάν $|\alpha| + |\beta| = 1$, ἔνθα $\alpha, \beta \in \mathbb{R} - \{0\}$, νά δειχθῇ ότι :

$$\left| \alpha + \frac{1}{\alpha} \right|^2 + \left| \beta + \frac{1}{\beta} \right|^2 \geq \frac{25}{2}.$$

117. Δίδεται ἡ ἔξισωσις $\alpha x^2 + \beta x + \gamma = 0$, ἔνθα $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$, μέ σγ ≠ 0 καὶ $|\rho_1| \neq |\rho_2|$, ἔνθα ρ_1, ρ_2 αἱ ρίζαι τῆς ἔξισώσεως. Έάν $M \equiv \max \left\{ \left| \frac{\rho_1}{\rho_2} \right|, \left| \frac{\rho_2}{\rho_1} \right| \right\}$, δείξατε ότι :

$$1). \quad 2 \left| 1 - \frac{\beta^2}{2\alpha\gamma} \right| - 1 < M < 2 \left| 1 - \frac{\beta^2}{2\alpha\gamma} \right|$$

$$2). \quad 1 < \left| 1 - \frac{\beta^2}{2\alpha\gamma} \right|$$

3). Πληρουμένων τῶν ὑποθέσεων είναι $\beta \neq 0$.

118. Νά ἐπιλυθῇ τὸ σύστημα :

$$2|x - 1| + |y + 1| = 7$$

$$|x - 2| + |y| + x - y = 4.$$

119. Όμοιώς τὸ σύστημα :

$$x^2 = \frac{z^2}{2|yz| - y^2}$$

$$0 < x \leq \frac{3}{3 + |y + 2|}.$$

120. Νά εύρεθοῦν αἱ ἀκέραιαι λύσεις τοῦ συστήματος :

$$(x^2 + 4y^2)(z^2 + 4) = (xz + 4y)^2$$

$$16z^2 - 56 \left| \frac{x}{y} \right| + 45 < 0$$

$$x^2 + y^2 + |xy| < 64.$$

121. Δίδεται ἡ ἔξισωσις : $\alpha|x|^3 + \beta|x|^2 + \beta|x| + \alpha = 0$.

Δείξατε ότι αὗτη είναι ισοδύναμος πρὸς τὴν

$$\alpha|x|^2 + (\beta - \alpha)|x| + \alpha = 0.$$

*Ακολούθως, ἐπιλύσατε ταύτην ἐν \mathbb{R} .

122. Έάν $\alpha, \beta, x \in \mathbb{R}$, δείξατε ότι :

$$(x - \alpha)(x - \beta) \leq 0 \iff \min(\alpha, \beta) \leq x \leq \max(\alpha, \beta).$$

123. Έάν $\frac{\alpha_1}{\beta_1}, \frac{\alpha_2}{\beta_2}, \dots, \frac{\alpha_v}{\beta_v}$ είναι οιαδήποτε κλάσματα μὲ παρονομαστὰς δημοσήμους, νὰ ἀποδειχθῇ ότι :

$$\min\left(\frac{\alpha_1}{\beta_1}, \frac{\alpha_2}{\beta_2}, \dots, \frac{\alpha_v}{\beta_v}\right) \leq \frac{\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_v}{\beta_1 + \beta_2 + \dots + \beta_v} \leq \max\left(\frac{\alpha_1}{\beta_1}, \frac{\alpha_2}{\beta_2}, \dots, \frac{\alpha_v}{\beta_v}\right).$$

124. Έάν $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ καὶ ισχύουν αἱ σχέσεις :

$$\gamma = \frac{\alpha\beta}{|\alpha| - |\beta|} \quad \text{καὶ} \quad |\alpha| > |\beta| > 0,$$

νὰ ἀποδειχθῇ ότι θὰ ισχύουν καὶ αἱ σχέσεις :

$$\alpha = \frac{\beta\gamma}{|\gamma| - |\beta|} \quad \text{καὶ} \quad \beta = \frac{\alpha\gamma}{|\alpha| + |\gamma|}.$$

125. Έάν οἱ x, y, ω πραγματικοὶ ἀριθμοί, νὰ δειχθῇ ότι :

$$\left| \frac{1}{y + \omega} \right| + \left| \frac{1}{\omega + x} \right| + \left| \frac{1}{x + y} \right| \geq \frac{9}{2} \left(\frac{1}{|x| + |y| + |\omega|} \right).$$

126. Νὰ λυθῇ τὸ σύστημα :

$$3x - 5|y| = 1$$

$$x|y| + y|x| = 4.$$

127. Έάν οἱ πραγματικοὶ ἀριθμοὶ x, y, z πληροῦν τὰς σχέσεις :

$$x^3 + y^3 + z^3 > 3xyz$$

$$xyz < 0 \quad \text{καὶ}$$

$$x^{2v+1} - y|y| = 0,$$

νὰ ἀποδειχθῇ ότι οἱ x, y είναι θετικοί.

128. Έάν οἱ πραγματικοὶ ἀριθμοὶ α, β, γ πληροῦν τὴν σχέσιν :

$$|\alpha + \beta| + |\beta + \gamma| + |\gamma + \alpha| \geq \alpha\beta\gamma (|\alpha| + |\beta| + |\gamma|),$$

νὰ ἀποδειχθῇ ότι θὰ πληροῦν καὶ τὴν σχέσιν :

$$\alpha\beta\gamma \leq 2.$$

129. Έάν ξ είναι ρίζα τῆς ἑξισώσεως : $\alpha_0x^v + \alpha_1x^{v-1} + \dots + \alpha_v = 0$, τοιαύτη ὥστε $|\xi| > 1$, είναι δὲ ἐπὶ πλέον : $|\alpha_0| > \max(|\alpha_1|, |\alpha_2|, \dots, |\alpha_v|)$, τότε δείξατε ότι :

$$1 < |\xi| < 2.$$

130. Έάν οἱ συντελεσταὶ τοῦ τριωνύμου : $x^2 - 2\alpha x + \beta$ είναι πραγματικοὶ ἀριθμοὶ μὲ $\beta \neq 0$ καὶ ρ_1, ρ_2 είναι αἱ ρίζαι του μὲ $|\rho_1| \neq |\rho_2|$, θέσωμεν δέ :

$$M \equiv \max\left(\left|\frac{\rho_1}{\rho_2}\right|, \left|\frac{\rho_2}{\rho_1}\right|\right), \quad m \equiv \min\left(\left|\frac{\rho_1}{\rho_2}\right|, \left|\frac{\rho_2}{\rho_1}\right|\right) \quad \text{καὶ} \quad \lambda = 2 \left| \frac{2\alpha^2 - \beta}{\beta} \right|,$$

νὰ ἀποδειχθῇ ότι :

α). Αἱ ρίζαι τοῦ τριωνύμου είναι ἀριθμοὶ πραγματικοὶ καὶ ἄνισοι.

β). Ισχύουν αἱ σχέσεις :

$$1. \quad \lambda - 1 < M < \lambda, \quad 2. \quad \lambda > 2, \quad 3. \quad \frac{1}{\lambda} < m < \frac{1}{\lambda - 1}.$$

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IV

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΚΕΡΑΙΩΝ ΠΟΛΥΩΝΥΜΩΝ

I. ΑΚΕΡΑΙΑ ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ

§ 50. "Εννοια τοῦ πολυωνύμου. — "Εστω R τὸ σύνολον τῶν πραγματικῶν ἀριθμῶν καὶ ἐν σύμβολον x , καλούμενον «μεταβλητὴ» *), τὸ δόποιον κατ' ἀρχὴν οὐδένα πραγματικὸν ἀριθμὸν παριστᾶ, μετὰ τοῦ ὅποιού ὅμως σημειοῦμεν πράξεις τῶν στοιχείων τοῦ R , ὡς ἐάν ἦτο καὶ τὸ x εἰς πραγματικὸς ἀριθμὸς ἢ γενικώτερον εἰς μιγαδικὸς ἀριθμός. Οὔτως ἢ παράστασις x^k , δῆπον $k \in R$ καὶ $k \in N$, θὰ συμβολίζῃ ἀπλῶς μίαν μορφὴν γινομένου $xx \dots x$, δῆπον τὸ x θὰ περιλαμβάνεται ὡς παράγων k φορές, ὁμοίως ἢ παράστασις αx^k , δῆπον $\alpha \in R$ καὶ $k \in N$, θὰ συμβολίζῃ μίαν μορφὴν γινομένου τοῦ πραγματικοῦ ἀριθμοῦ α ἐπὶ τὸ σύμβολον x^k . 'Ορίζομεν ἀκόμη, δῆτα τὸ $x^0 = 1$, δῆπότε $\alpha x^0 = \alpha$ διὰ κάθε $\alpha \in R$. Κατόπιν τούτων δίδομεν τὸν κάτωθι δρισμόν :

Καλεῖται ἀκέραιον πολυώνυμον τοῦ x , κάθε ἔκφρασις τῆς μορφῆς :

$$\alpha_v x^v + \alpha_{v-1} x^{v-1} + \dots + \alpha_1 x + \alpha_0, \quad (1)$$

ὅπου $\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_{v-1}, \alpha_v$ σταθεροὶ ἀριθμοὶ καὶ ν φυσικὸς ἀριθμὸς ἢ μηδέν. Οἱ ἀριθμοὶ α_k καλοῦνται συντελεστοὶ **), τοῦ πολυωνύμου. Τὸ α_0 θεωρεῖται ὡς συντελεστής τοῦ x^0 . Αἱ ἔκφρασεις τῆς μορφῆς $\alpha_k x^k$, ἔνθα κ φυσικὸς ἢ μηδέν, καλοῦνται ἀκέραια μονώνυμα καὶ ἀποτελοῦν τούς δρόους τοῦ πολυωνύμου.

Ἡ παράστασις (1) εἶναι ἐν νέον σύμβολον ***), δηλ. δὲν σημαίνει πρόσθεσιν, οὔτε ὅλλην τινὰ πρᾶξιν μεταξὺ τῶν πραγματικῶν ἀριθμῶν α_k ($k = 0, 1, 2, \dots, v$) καὶ τῆς μεταβλητῆς x . Ἡ σημασία τῆς παραστάσεως (1), δηλ. τοῦ ἀκεραίου πολυωνύμου, θὰ προκύψῃ κατωτέρῳ κατόπιν ὡρισμένων ιδιοτήτων τὰς ὅποιας θὰ δρίσωμεν ἐπ' αὐτῆς.

Κατωτέρῳ ἀντὶ ἀκέραιον πολυώνυμον τοῦ x θὰ λέγωμεν ἀπλῶς καὶ πολυώνυμον τοῦ x .

Διὰ τὰ πολυώνυμα τῆς μεταβλητῆς x μὲ πραγματικούς συντελεστὰς θὰ χρησιμοποιῶμεν τούς συμβολισμούς : $f(x), \varphi(x), \pi(x), g(x), \dots$

* Διὰ τοῦ δροῦ «μεταβλητὴ» x ἐννοοῦμεν ἐν σύμβολον, τὸ δόποιον δύναται νὰ βάντιπροσωπεύῃ τὸ τυχόν στοιχεῖον ἐνὸς συνόλου ἀριθμῶν. 'Υπάρχει διαφορὰ μεταξὺ τῆς μεταβλητῆς x καὶ τοῦ ἀγνώστου x , τὸν δόποιον συναντῶμεν εἰς τάς ἔξισώσεις. 'Η μὲν μεταβλητὴ x εἶναι ἀπλῶς ἐν σύμβολον καὶ ἐπομένως ἔχει ἀπροσδιόριστον τιμήν, ἐνῷ δ ἀγνώστος x ἔχει προσδιοριστέαν τιμήν.

**) Γενικώτερον, οἱ συντελεσταὶ δύνανται νὰ εἶναι παραστάσεις μὴ περιέχουσαι τὸ x .

***) Τὸ x κατά τὴν παράστασιν (1) ἐνὸς πολυωνύμου παίζει τὸν ρόλον ἐνὸς ἀκαθορίστου συμβόλου, ἄλλως ἀκαθορίστου μεταβλητῆς.

Ούτω θὰ γράφωμεν :

$$f(x) \equiv \alpha_v x^v + \alpha_{v-1} x^{v-1} + \cdots + \alpha_1 x + \alpha_0, \quad (2)$$

Ενθα τὸ σύμβολον «≡» σημαίνει ὅτι διὰ τοῦ $f(x)$ παρίσταται τὸ πολυώνυμον, τὸ ὄποιον ἀναγράφεται εἰς τὸ β' μέλος.

Ἐάν $\alpha_v \neq 0$, τότε ὁ ἐκθέτης ν τῆς μεταβλητῆς x καλεῖται βαθμὸς τοῦ πολυωνύμου (2). "Ωστε :

Βαθμὸς ἐνὸς ἀκέραιου πολυωνύμου $f(x) \equiv \alpha_v x^v + \alpha_{v-1} x^{v-1} + \cdots + \alpha_1 x + \alpha_0$ καλεῖται ὁ μεγαλύτερος ἐκθέτης τῆς μεταβλητῆς x , τῆς ὥποιας ὁ συντελεστὴς εἶναι διάφορος τοῦ μηδενός.

Ούτω τοῦ πολυωνύμου $f(x) \equiv 5x^3 - 2x^2 + 3x - 1$, ὁ βαθμὸς εἶναι 3, ἐνῷ τοῦ πολυωνύμου $(x) \equiv 2x^2 - \sqrt{3}x + 1$, ὁ βαθμὸς εἶναι 2.

Ἐάν $v = 0$, τότε ἔχομεν τὸ σταθερὸν πολυώνυμον, τὸ ὄποιον ἀποτελεῖται ἀπὸ τὸν σταθερὸν μόνον ὄρον καὶ συνεπῶς εἶναι ἀνεξάρτητον τοῦ x . Εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτήν, ἐφ' ὅσον ὁ σταθερὸς ὄρος $\alpha_0 \neq 0$, θὰ διμιῶμεν περὶ πολυωνύμου βαθμοῦ μηδέν, δηλαδὴ κάθε σταθερὸς πραγματικὸς ἀριθμὸς α θεωρεῖται ὡς πολυώνυμον τοῦ x , βαθμοῦ μηδέν, ἐφ' ὅσον $\alpha \neq 0$. Οὔτω, λ.χ., ὁ ἀριθμὸς 4 δύναται νὰ θεωρηθῇ ὡς ἀκέραιον πολυώνυμον τοῦ x βαθμοῦ μηδέν, διότι δυνάμεθα νὰ γράψωμεν $4 \equiv 4x^0$.

Ἐάν πάντες οἱ συντελεσταὶ τοῦ (2) εἶναι διάφοροι τοῦ μηδενός, τότε τὸ $f(x)$ λέγεται πλήρες πολυώνυμον τοῦ x , ὅλως λέγεται ἐλλιπές.

Τὸ πολυώνυμον νιοστοῦ βαθμοῦ ὡς πρὸς x δύναται ἐπίσης νὰ γραφῇ :

$$f(x) \equiv \alpha_0 + \alpha_1 x + \alpha_2 x^2 + \cdots + \alpha_{v-1} x^{v-1} + \alpha_v x^v, \quad \alpha_v \neq 0 \quad (3)$$

δηλ. κατὰ τὰς ἀνιούσας δυνάμεις τοῦ x .

Κάθε πολυώνυμον δύναται νὰ ἐπεκταθῇ καὶ πέραν τοῦ βαθμοῦ του, ὅρκει πρὸς τοῦτο νὰ ἐπισυνάψωμεν ὄρους μὲ συντελεστὰς μηδέν.

Ούτω τὸ πολυώνυμον (3), βαθμοῦ v , δύναται νὰ γραφῇ :

$$f(x) \equiv \alpha_0 + \alpha_1 x + \cdots + \alpha_v x^v + \alpha_{v+1} x^{v+1} + \alpha_{v+2} x^{v+2} + \cdots + \alpha_{v+k} x^{v+k} \quad (4)$$

μὲ $\alpha_v \neq 0$ καὶ $\alpha_{v+1} = \alpha_{v+2} = \cdots = \alpha_{v+k} = 0 \quad \forall k = 1, 2, 3 \dots$

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω συνάγομεν τώρα ὅτι δυνάμεθα νὰ γράψωμεν δύο πολυώνυμα μὲ τὸ αὐτὸ πλῆθος ὄρων, προσθέτοντες εἰς τὸ μικροτέρου βαθμοῦ πολυώνυμον ὄρους μὲ συντελεστὰς μηδέν.

Ἐάν πάντες οἱ συντελεσταὶ τοῦ πολυωνύμου (2) εἶναι μηδέν, τότε τὸ $f(x)$ καλεῖται μηδενικὸν πολυώνυμον. "Ωστε : Τὸ ἀκέραιον πολυώνυμον :

$f(x) \equiv \alpha_v x^v + \alpha_{v-1} x^{v-1} + \cdots + \alpha_1 x + \alpha_0, \quad \alpha_k \in \mathbb{R}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, v$
καλεῖται μηδενικὸν πολυώνυμον ἢ πολυώνυμον ἐκ ταυτότητος ἵσον πρὸς μηδέν ἐν \mathbb{R} τότε, καὶ μόνον τότε, ἂν πάντες οἱ συντελεσταὶ του εἶναι μηδέν.

Εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν γράφομεν :

$$f(x) \equiv 0$$

καὶ ἀναγιγνώσκομεν : « $f(x)$ ἐκ ταυτότητος ἵσον πρὸς μηδέν ».

Κατόπιν τοῦ ἀνωτέρω συμβολισμοῦ, ὁ δρισμὸς τοῦ μηδενικοῦ πολυωνύμου δίδεται συντόμως οὕτω :

Ἐάν $f(x) \equiv \alpha_v x^v + \alpha_{v-1} x^{v-1} + \dots + \alpha_1 x + \alpha_0$, $\alpha_k \in \mathbb{R}$, $k = 0, 1, 2, \dots, v$, τότε :

$$f(x) \equiv 0 \Leftrightarrow \underset{\text{ορσ}}{\alpha_v = \alpha_{v-1} = \dots = \alpha_1 = \alpha_0 = 0}.$$

Πολυωνύμα ἐκ ταυτότητος ἵσα πρὸς μηδὲν οὐδένα βαθμὸν ἔχουν.

Ἐάν τὸ $f(x)$ δὲν εἶναι τὸ μηδενικὸν πολυωνύμον γράφομεν : $f(x) \not\equiv 0$.

§ 51. "Αλγεβρα (λ γισμὸς) τῶν πολυωνύμων. — "Ἄς θεωρήσωμεν τὸ σύνολον τῶν ἀκέραιών πολυωνύμων τοῦ x μὲ συντελεστὰς πραγματικούς ἀριθμούς, τὸ δόπιον παριστῶμεν μὲ $R[x]$: τὰ στοιχεῖα ἐξ ὧν τὸ $R[x]$ συνίσταται, δηλ. τὰ ἀκέραια πολυωνύμα τοῦ x συμβολίζομεν, ὡς ἐλέχθη εἰς τὴν προηγουμένην παράγραφον μέ : $f(x), \varphi(x), \pi(x), \dots$

Ως γνωστὸν (§ 8) ἡ ἔννοια τοῦ συνόλου εἶναι συνδεδεμένη μὲ τὴν ἔννοιαν μιᾶς σχέσεως βασικῆς ἴσοτητος. Ἡ βασικὴ ἴσοτης δρίζεται ἐν $R[x]$ οὕτω :

Ἐάν $f(x), \varphi(x) \in R[x]$ καὶ εἶναι :

$$f(x) \equiv \alpha_v x^v + \alpha_{v-1} x^{v-1} + \dots + \alpha_1 x + \alpha_0$$

$$\varphi(x) \equiv \beta_v x^v + \beta_{v-1} x^{v-1} + \dots + \beta_1 x + \beta_0,$$

τότε θὰ λέγωμεν ὅτι : τὰ δύο πολυώνυμα $f(x), \varphi(x)$ εἶναι ἵσα, ἐὰν καὶ μόνον ἐὰν οἱ συντελεσταὶ τῶν δυοθαμίων ὅρων εἶναι ἵσοι.

Εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν γράφομεν :

$$f(x) \equiv \varphi(x)$$

καὶ ἀναγιγνώσκομεν : « $f(x)$ ἐν ταυτότητος ἵσον πρὸς τὸ $\varphi(x)$ ».

Κατόπιν τοῦ ἀνωτέρω συμβολισμοῦ, ἡ βασικὴ ἴσοτης ἐν $R[x]$ δρίζεται συντόμως οὕτω :

$$f(x) \equiv \varphi(x) \Leftrightarrow \underset{\text{ορσ}}{\alpha_k = \beta_k} \text{ διὰ κάθε } k = 0, 1, 2, \dots, v.$$

Προφανῶς δύο μηδενικὰ πολυωνύμα εἶναι ἐκ ταυτότητος ἵσα.

Μεταξὺ τῶν στοιχείων τοῦ συνόλου $R[x]$ δυνάμεθα τώρα νὰ δρίσωμεν πράξεις ὡς ἐξῆς : "Εστωσαν $f(x), \varphi(x) \in R[x]$, τότε *):

a). Καλοῦμεν **ἀθροισμα** τῶν πολυωνύμων $f(x) \equiv \alpha_v x^v + \alpha_{v-1} x^{v-1} + \dots + \alpha_1 x + \alpha_0$ καὶ $\varphi(x) \equiv \beta_v x^v + \beta_{v-1} x^{v-1} + \dots + \beta_1 x + \beta_0$ καὶ συμβολίζομεν τοῦτο μέ : $f(x) + \varphi(x)$ τὸ πολυωνύμον :

$$(\alpha_v + \beta_v) x^v + (\alpha_{v-1} + \beta_{v-1}) x^{v-1} + \dots + (\alpha_1 + \beta_1) x + (\alpha_0 + \beta_0).$$

* Δεχόμεθα, ἃνει βλάβης τῆς γενικότητος, ὅτι τὰ πολυώνυμα $f(x)$ καὶ $\varphi(x)$ ἔχουν τὸ αὐτὸ πλήθος ὅρων. Ἐάν τὰ $f(x)$ καὶ $\varphi(x)$ δὲν ἔχουν τὸ αὐτὸ πλήθος ὅρων, προσθέτομεν εἰς τὸ πολυώνυμον μὲ ὀλιγωτέρους ὅρους, τοὺς ἀπαιτούμενους ὅρους μὲ συντελεστὰς μηδέν.

β). Καλοῦμεν **άντιθετον** τοῦ πολυωνύμου $\phi(x) = \beta_v x^v + \beta_{v-1} x^{v-1} + \dots + \beta_1 x + \beta_0$ καὶ συμβολίζομεν τοῦτο μέ : $-\phi(x)$ τὸ πολυώνυμον :

$$(-\beta_v) x^v + (-\beta_{v-1}) x^{v-1} + \dots + (-\beta_1) x + (-\beta_0)$$

καὶ γράφομεν :

$$-\phi(x) \equiv -\beta_v x^v - \beta_{v-1} x^{v-1} - \dots - \beta_1 x - \beta_0.$$

γ). Καλοῦμεν **διαφοράν** τοῦ πολυωνύμου $\phi(x) \equiv \beta_v x^v + \beta_{v-1} x^{v-1} + \dots + \beta_1 x + \beta_0$ ἀπὸ τὸ πολυώνυμον $f(x) \equiv \alpha_v x^v + \alpha_{v-1} x^{v-1} + \dots + \alpha_1 x + \alpha_0$ καὶ συμβολίζομεν τοῦτο μέ : $f(x) - \phi(x)$, τὸ πολυώνυμον $f(x) + [-\phi(x)]$. Ἡτοὶ ἡ διαφορὰ $f(x) - \phi(x)$ δύο πολυωνύμων $f(x)$, $\phi(x)$ ἀνάγεται εἰς ἄθροισμα τοῦ $f(x)$ καὶ τοῦ ἀντιθέτου τοῦ πολυωνύμου $\phi(x)$.

Δυνάμει τῶρα τῶν α) καὶ β) ἡ διαφορὰ $f(x) - \phi(x)$ εἶναι τὸ πολυώνυμον :

$$(\alpha_v - \beta_v) x^v + (\alpha_{v-1} - \beta_{v-1}) x^{v-1} + \dots + (\alpha_1 - \beta_1) x + (\alpha_0 - \beta_0).$$

Ἐκ τῶν ὁρισμῶν τούτων προκύπτουν ὅμεσως τὰ ἔξῆς :

1. Τὸ σύνολον τῶν πολυωνύμων $R[x]$ εἶναι «*κλειστὸν*» ὡς πρὸς τὴν πρόσθεσιν, δηλ. τὸ ἄθροισμα δύο πολυωνύμων ἐκ τοῦ $R[x]$ ἀνήκει εἰς τὸ $R[x]$.

2. Τὸ πολυώνυμον συμβολίζει ἐν ἄθροισμα ὅρων τῆς μορφῆς $\alpha_k x^k$.

3. Ἡ πρόσθεσις τῶν πολυωνύμων ἔχει τὴν μεταθετικὴν καὶ προσεταιριστικὴν ἰδιότητα, ἦτοι : ἐὰν $\pi_1(x), \pi_2(x), \pi_3(x) \in R[x]$, τότε ἴσχύουν :

$$\pi_1(x) + \pi_2(x) = \pi_2(x) + \pi_1(x) \text{ καθώς καὶ}$$

$$\pi_1(x) + [\pi_2(x) + \pi_3(x)] = [\pi_1(x) + \pi_2(x)] + \pi_3(x).$$

4. Ὅπαρχει οὐδέτερον στοιχεῖον ὡς πρὸς τὴν πρόσθεσιν καὶ εἶναι τὸ μηδενικὸν πολυώνυμον, ἦτοι, ἐὰν $\phi(x) \equiv 0$, τότε ἴσχύει :

$$f(x) + \phi(x) \equiv f(x) + 0 \equiv f(x) \text{ διὰ κάθε } f(x) \in R[x].$$

Π α ρ α τ ἡ ρ η σ i c : Ο βαθμὸς τοῦ ἄθροισματος ἡ τῆς διαφορᾶς δύο πολυωνύμων εἶναι μικρότερος ἢ ἵσος τοῦ μεγίστου ἐκ τῶν βαθμῶν τῶν δύο πολυωνύμων. Οὕτω :

Ἐὰν k εἶναι ὁ βαθμὸς τοῦ ἄθροισματος ἡ τῆς διαφορᾶς δύο πολυωνύμων $f(x)$ καὶ $g(x)$ βαθμῶν v καὶ μ ἀντιστοίχως, ἔχομεν :

$$k \leq \max(v, \mu).$$

Τὸ ὅτι οὗτος δύναται νὰ εἶναι μικρότερος φαίνεται ἀπὸ τὸ ἔξῆς παράδειγμα :

Ἄν $f(x) \equiv 5x^4 + 4x^3 - 3x + 1$ καὶ $g(x) \equiv -5x^4 + 3x^3 - 2x + 2$, τότε εἶναι :

$$f(x) + g(x) \equiv 7x^3 - 5x + 3.$$

δ). Καλοῦμεν **γινόμενον** δύο μονωνύμων αx^v καὶ βx^μ τὸ μονώνυμον $\alpha \beta x^{v+\mu}$, ἦτοι :

$$(\alpha x^v) \cdot (\beta x^\mu) = \alpha \beta x^{v+\mu}.$$

ε). Καλοῦμεν **γινόμενον** δύο ἀκεραίων πολυωνύμων $f(x), g(x)$ καὶ συμβολίζομεν τοῦτο μὲ $f(x) \cdot g(x)$, τὸ πολυώνυμον τὸ ὄποιον σχηματίζεται ἀπὸ τὰ $f(x)$ καὶ $g(x)$ βάσει τοῦ «*ἐπιμεριστικοῦ νόμου*», ἦτοι ἀν πολλαπλασιάσωμεν

δλους τοὺς ὅρους τοῦ $f(x)$ ἐπὶ ἕκαστον ὅρου τοῦ $g(x)$ καὶ προσθέσωμεν δλα τὰ προκύπτοντα μερικά γινόμενα : Οὔτως, ἔαν

$$f(x) \equiv \alpha_0 + \alpha_1 x + \cdots + \alpha_v x^v \quad \text{καὶ}$$

$$g(x) \equiv \beta_0 + \beta_1 x + \cdots + \beta_u x^u,$$

τότε τὸ γινόμενον αὐτῶν είναι τὸ πολυώνυμον :

$$\begin{aligned} \pi(x) \equiv f(x) \cdot g(x) &= \alpha_0 \beta_0 + (\alpha_0 \beta_1 + \alpha_1 \beta_0) x + (\alpha_0 \beta_2 + \alpha_1 \beta_1 + \alpha_2 \beta_0) x^2 + \\ &+ (\alpha_0 \beta_3 + \alpha_1 \beta_2 + \alpha_2 \beta_1 + \alpha_3 \beta_0) x^3 + \cdots + \alpha_v \beta_u x^{v+u}. \end{aligned}$$

Παρατηροῦμεν ὅτι : ὁ βαθμὸς τοῦ γινημένου ισοῦται μὲ τὸ ἄθροισμα τῶν βαθμῶν τῶν παραγόντων.

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω δρισμῶν προκύπτουν τώρα τὰ ἔξῆς :

1. Τὸ σύνολον τῶν πολυωνύμων $R[x]$ είναι κλειστὸν ὡς πρὸς τὸν πολλαπλασιασμόν, δηλ. τὸ γινόμενον δύο πολυωνύμων ἐκ τοῦ $R[x]$ ἀνήκει πάντοτε εἰς τὸ $R[x]$.

2. Ἰσχύει ἡ ἐπιμεριστικὴ ἴδιότης τοῦ πολλαπλασιασμοῦ ὡς πρὸς τὴν πρόσθεσιν, ἥτοι ἔαν $\pi_1(x), \pi_2(x), \pi_3(x) \in R[x]$, τότε Ἰσχύει :

$$[\pi_1(x) + \pi_2(x)] \pi_3(x) = \pi_1(x) \pi_3(x) + \pi_2(x) \pi_3(x).$$

3. Ὁ πολλαπλασιασμὸς τῶν πολυωνύμων ἔχει τὴν μεταθετικὴν καὶ προσεταιριστικὴν ἴδιότητα, ἥτοι ἔαν $\pi_1(x), \pi_2(x), \pi_3(x) \in R[x]$, τότε Ἰσχύουν :

$$\pi_1(x) \cdot \pi_2(x) = \pi_2(x) \cdot \pi_1(x)$$

$$\pi_1(x) [\pi_2(x) \pi_3(x)] = [\pi_1(x) \pi_2(x)] \cdot \pi_3(x).$$

4. Ὅπάρχει οὐδέτερον στοιχεῖον ὡς πρὸς τὸν πολλαπλασιασμὸν καὶ είναι τὸ πολυώνυμον $f(x) \equiv 1$, ἥτοι Ἰσχύει :

$$f(x) \cdot \phi(x) \equiv 1 \cdot \phi(x) \equiv \phi(x) \quad \text{διὰ κάθε } \phi(x) \in R[x].$$

στ'). Καλοῦμεν v —οστὴν δύναμιν ἐνὸς ἀκεραίου πολυωνύμου $f(x) \equiv \alpha_v x^v + \alpha_{v-1} x^{v-1} + \cdots + \alpha_0$ καὶ συμβολίζομεν ταύτην μὲ $[f(x)]^v$, τὸ πολυώνυμον :

$$[f(x)]^v =_{\text{օρ}} f(x) \cdot f(x) \cdots f(x),$$

ὅπου οἱ παράγοντες τοῦ δευτέρου μέλους είναι ν τὸ πλῆθος.

Συνέπειαι τοῦ ἀνωτέρου δρισμοῦ είναι :

$$1. [f(x)]^v \cdot [f(x)]^u = [f(x)]^{v+u}$$

$$2. [[f(x)]^u]^v = [f(x)]^{uv}$$

$$3. [f(x) \cdot g(x)]^v = [f(x)]^v \cdot [g(x)]^v.$$

Π α ρ α τ ἡ ρ η σις : Τὸ σύνολον $R[x]$ τῶν πολυωνύμων μὲ προσγματικοὺς συντελεστὰς ἐφωδιασμένον μὲ δύο πράξεις : τὴν πρόσθεσιν καὶ τὸν πολλαπλασιασμόν, ὡς αὗται ὠρίσθησαν ἀνωτέρω καὶ αἱ ὅποιαι πληροῦν τὰς προσαναφερθεῖσας ἴδιότητας, ἀποτελεῖ ἐν χαρακτηριστικὸν παράδειγμα μιᾶς θεμελιώδους ἀλγεβρικῆς ἐννοίας, τῆς τοῦ δακτυλίου, ἐννοιαν τὴν δποίαν θὰ μάθωμεν εἰς τὴν ἔκτην τάξιν.

‘Ο δακτύλιος οὗτος λέγεται «πολυωνυμικός δακτύλιος» καὶ συμβολίζεται μὲν $R[x]$.

’Αποδεικνύομεν κατωτέρω δύο θεωρήματα :

§ 52. Θεώρημα I.—Ἐὰν $\phi(x) \not\equiv 0$, τότε ἀναγκαῖα καὶ ἵκανὴ συνθήκη διὰ νὰ εἶναι $f(x) \cdot \phi(x) \equiv 0$ εἶναι $f(x) \equiv 0$.

’Απόδειξις : α). Ἡ συνθήκη εἶναι ἀναγκαῖα. Ἐστω ὅτι $f(x) \cdot \phi(x) \equiv 0$ καὶ $f(x) \not\equiv 0$, $\phi(x) \not\equiv 0$. Ἐφ' ὅσον $f(x) \not\equiv 0$, ὑπάρχει συντελεστὴς αὐτοῦ $\alpha_v \neq 0$ (ν βαθμὸς τοῦ $f(x)$). Ἐπίσης ἐφ' ὅσον $\phi(x) \not\equiv 0$, ὑπάρχει συντελεστὴς αὐτοῦ $\beta_\mu \neq 0$ (μ βαθμὸς τοῦ $\phi(x)$). Τότε τὸ γινόμενον $f(x) \cdot \phi(x)$ θὰ περιλαμβάνῃ ὡς ὅρον τὸν $\alpha_v \beta_\mu x^{v+\mu}$ μὲν $\alpha_v \beta_\mu \neq 0$ καὶ ἐπομένως $f(x) \cdot \phi(x) \not\equiv 0$, ὅπερ ἄστοπον. Ἀρα $f(x) \equiv 0$.

β). Ἡ συνθήκη εἶναι ἵκανὴ. Πρόγυματι, ὅντας $\phi(x) \equiv \beta_\mu x^\mu + \beta_{\mu-1} x^{\mu-1} + \dots + \beta_1 x + \beta_0$ καὶ $f(x) \equiv 0$, τότε : $f(x) \cdot \phi(x) \equiv 0 \cdot (\beta_\mu x^\mu + \beta_{\mu-1} x^{\mu-1} + \dots + \beta_1 x + \beta_0) \equiv (0 \cdot \beta_\mu) x^\mu + (0 \cdot \beta_{\mu-1}) x^{\mu-1} + \dots + (0 \cdot \beta_1) x + (0 \cdot \beta_0) \equiv 0 \cdot x^\mu + \dots + 0x + 0 \equiv 0$.

§ 53. Θεώρημα II.—Ἐὰν $f(x), g(x), \phi(x) \in R[x]$ καὶ εἶναι $\phi(x) \not\equiv 0$, τότε διὰ νὰ εἶναι $f(x) \cdot \phi(x) \equiv g(x) \cdot \phi(x)$, πρέπει καὶ ἀρκεῖ νὰ εἶναι $f(x) \equiv g(x)$.

’Απόδειξις : Πράγματι, ἡ $f(x) \cdot \phi(x) \equiv g(x) \cdot \phi(x)$ εἶναι ἰσοδύναμος πρὸς τὴν :

$$f(x)\phi(x) - g(x)\phi(x) \equiv 0$$

$$\text{ή} \quad \phi(x) \cdot [f(x) - g(x)] \equiv 0$$

καὶ ἐπειδὴ $\phi(x) \not\equiv 0$, κατὰ τὸ θεώρημα I, ἡ τελευταία σχέσις εἶναι ἰσοδύναμος πρὸς τὴν :

$$f(x) - g(x) \equiv 0, \quad \text{δηλαδή : } f(x) \equiv g(x).$$

’Αξιόλογος σημείωσις : Ἐξ ὅλων τῶν μέχρι τοῦδε συμπερασμάτων συνάγομεν ὅτι τὸ σύνολον τῶν ἀκεραίων πολυωνύμων $R[x]$ μὲν συντελεστὰς πραγματικοὺς ἀριθμοὺς εἶναι ακλειστὸν ὡς πρὸς τὰς τρεῖς πράξεις, τὴν πρόσθεσιν, τὴν ἀφαίρεσιν καὶ τὸν πολλαπλασιασμόν, εἰς τὸν ὁποῖον μάλιστα ἴσχυει ἡ μεταθετικὴ ίδιότης. Ἐξ ἄλλου (θεώρ. I) γινόμενον δύο πολυωνύμων εἶναι ἵσον μὲ τὸ μηδὲν τότε, καὶ μόνον τότε, ἂν ἐν τούλαχιστον ἔξι αὐτῶν εἶναι τὸ μηδενικὸν πολυώνυμον. Πάντα ταῦτα χαρακτηρίζουν τὸ σύνολον $R[x]$ τῶν ἀκεραίων πολυωνύμων ὡς μίαν «ἀκεραίαν περιοχήν». Περὶ τῆς ἐννοίας τοῦ δακτυλίου καὶ τῆς ἀκεραίας περιοχῆς θὰ γνωρίσωμεν περισσότερα εἰς τὴν ἔκτην τάξιν.

§ 54. Ἀριθμητικὴ τιμὴ πολυωνύμου.—‘Ως ἐλέχθη εἰς τὴν § 50 εἰς ἐν πολυώνυμον $f(x)$ σημειοῦνται πράξεις, αἱ ὁποῖαι, ἂν τὸ x ἀντικατασταθῇ μὲ τυχόντα πραγματικὸν ἀριθμὸν α , δύνανται νὰ ἐκτελεσθοῦν, ὅποτε προκύπτει εἰς πραγματικὸς ἀριθμός, τὸν ὁποῖον συμβολίζομεν διὰ τοῦ $f(\alpha)$ καὶ καλοῦμεν ἀριθμητικὴν τιμὴν τοῦ πολυωνύμου $f(x)$ διὰ $x = \alpha$. Οὕτως, ἐὰν

$$f(x) \equiv 2x^4 - 5x^3 + 3x^2 - x - 5$$

$$\text{θὰ εἶναι : } f(2) = 2 \cdot 2^4 - 5 \cdot 2^3 + 3 \cdot 2^2 - 2 - 5 = -3.$$

Ό αριθμός -3 είναι ή αριθμητική τιμή τοῦ πολυωνύμου $f(x)$ διὰ τὴν τιμὴν $x = 2$. Τὸ αὐτὸ πολυώνυμον διὰ $x = 3$ δίδει: $f(3) = 46$.

³Εκ τοῦ ἀνωτέρω δρισμοῦ προκύπτει ὅτι ή αριθμητική τιμή τοῦ ἀριθμητικοῦ (γινομένου) δύο πολυωνύμων ἴσοῦται μὲ τὸ ἀντίστοιχο (γινόμενον) τῶν ἀριθμητικῶν τιμῶν τῶν πολυωνύμων.

⁴Εκ τοῦ δρισμοῦ τῆς ἴσοτητος δύο πολυωνύμων προκύπτει ὅτι: δύο ἐκ ταυτητοῖς ἵσα πολυώνυμα ἔχουν ἵσας ἀριθμητικὰς τιμάς. Πράγματι, ἐὰν

$$f(x) \equiv \alpha_v x^v + \alpha_{v-1} x^{v-1} + \cdots + \alpha_1 x + \alpha_0$$

$$\phi(x) = \beta_v x^v + \beta_{v-1} x^{v-1} + \cdots + \beta_1 x + \beta_0$$

καὶ $f(x) \equiv \phi(x)$, ὅτε $\alpha_v = \beta_v$, $\alpha_{v-1} = \beta_{v-1}$, ..., $\alpha_1 = \beta_1$, $\alpha_0 = \beta_0$ (βλ. § 51)
θὰ είναι καὶ: $f(\alpha) = \phi(\alpha)$ διὰ κάθε πραγματικὸν ἀριθμὸν α , διότι:

$$f(\alpha) \equiv \alpha_v \alpha^v + \alpha_{v-1} \alpha^{v-1} + \cdots + \alpha_1 \alpha + \alpha_0 =$$

$$= \beta_v \alpha^v + \beta_{v-1} \alpha^{v-1} + \cdots + \beta_1 \alpha + \beta_0 \equiv \phi(\alpha).$$

Τέλος, ἐκ τοῦ δρισμοῦ τοῦ μηδενικοῦ πολυωνύμου, προκύπτει ὅτι ή αριθμητική τιμὴ παντὸς μηδενικοῦ πολυωνύμου είναι σταθερὰ καὶ ἵση πάντοτε πρὸς τὸ μηδέν, διὰ κάθε τιμὴν τῆς μεταβλητῆς x .

Παρατήρησις: Εἴδομεν ἀνωτέρω ὅτι τὸ σύμβολον x ἐν τῷ πολυωνύμῳ $f(x) \equiv \alpha_v x^v + \alpha_{v-1} x^{v-1} + \cdots + \alpha_1 x + \alpha_0$, $f(x) \in R[x]$ δύναται νὰ ἀντικατασταθῇ δι’ οἰουδήποτε πραγματικοῦ ἀριθμοῦ, δι’ δ καὶ καλεῖται μεταβλητὴ τοῦ πολυωνύμου. Διὰ τῆς τοιαύτης ἀντικαταστάσεως εἰς ἕκαστον πραγματικὸν ἀριθμὸν x ἀντιστοιχεῖ εἰς πραγματικὸς ἀριθμὸς $y = \alpha_v x^v + \alpha_{v-1} x^{v-1} + \cdots + \alpha_1 x + \alpha_0$, ἦτοι τὸ πολυώνυμον $f(x) \equiv \alpha_v x^v + \alpha_{v-1} x^{v-1} + \cdots + \alpha_1 x + \alpha_0$ δρίζει μίαν συνάρτησιν, τὴν δόποίαν παριστῶμεν ἐπίστης διὰ τοῦ $f(x)$, μὲ πεδίον δρισμοῦ τὸ σύνολον R τῶν πραγματικῶν ἀριθμῶν καὶ τιμᾶς ἐν R , μὲ τύπον:

$$y = f(x) \equiv \alpha_v x^v + \alpha_{v-1} x^{v-1} + \cdots + \alpha_1 x + \alpha_0. \quad (1)$$

Αἱ συναρτήσεις τοῦ τύπου (1) καλοῦνται πολυωνυμικαὶ συναρτήσεις ἢ ἀκέραιαι ρηταὶ συναρτήσεις τοῦ x .

⁵Ορίζομεν ὅτι δύο πολυωνυμικαὶ συναρτήσεις $f(x)$ καὶ $\phi(x)$ λέγονται ἐκ ταυτότητος ἵσαι καὶ σημειοῦμεν $f(x) \equiv \phi(x)$ τότε, καὶ μόνον τότε, ἐὰν αὗται είναι ἵσαι διὰ πάσας τὰς τιμὰς τῆς μεταβλητῆς x ἐντὸς τοῦ R .

⁶Ἐὰν βεβαίως δύο πολυώνυμα $f(x)$ καὶ $\phi(x)$ μὲ πραγματικοὺς συντελεστὰς είναι ἐκ ταυτότητος ἵσα, ἔχουν δηλαδὴ τοὺς αὐτοὺς συντελεστάς, ταῦτα δρίζουν ἐντὸς τοῦ R καὶ ἵσας πολυωνυμικὰς συναρτήσεις.

⁷Ἐν τοῖς ἐπομένοις θὰ γίνεται χρῆσις τῆς ἑκφράσεως: «Θεωροῦμεν τὴν ἀπεικόνισιν $f: x \longrightarrow \alpha_v x^v + \alpha_{v-1} x^{v-1} + \cdots + \alpha_1 x + \alpha_0$

τοῦ R ἐν τῷ R . Διὰ τῆς ἀνωτέρω ἑκφράσεως θὰ ἐννοῶμεν ὅτι θεωροῦμεν τὴν συνάρτησιν f ὡρισμένην ἐπὶ τοῦ R μὲ τιμὰς ἐν R , δριζομένην ὑπὸ τοῦ τύπου:

$$f(x) \equiv \alpha_v x^v + \alpha_{v-1} x^{v-1} + \cdots + \alpha_1 x + \alpha_0, \text{ διὰ } x \in R.$$

§ 55. "Εννοια τῆς ρίζης ἐνδός πολυωνύμου. — "Εστω τὸ μὴ μηδενικὸν πολυώνυμον :

$$f(x) \equiv \alpha_v x^v + \alpha_{v-1} x^{v-1} + \cdots + \alpha_1 x + \alpha_0, \quad (1)$$

τοῦ δποίου οἱ συντελεστάὶ εἰναι πραγματικοὶ ἀριθμοί. Ἐὰν διὰ $x = \rho$ ἡ ἀριθμητικὴ τιμὴ τοῦ πολυωνύμου (1) εἰναι ἵση μὲ μηδέν, ἦτοι $f(\rho) = 0$, τότε ὁ ρ καλεῖται ρίζα τοῦ πολυωνύμου (1).

Π.χ. τοῦ πολυωνύμου $f(x) \equiv x^3 + 4x^2 + x - 6$ ρίζαι εἰναι οἱ ἀριθμοὶ 1, -2, -3, διότι εἰναι : $f(1) = 0$, $f(-2) = 0$, $f(-3) = 0$.

Ἐὰν ἐν ἀκέραιον πολυώνυμον ἔξισώσωμεν μὲ μηδέν, τότε λέγομεν ὅτι ἔχομεν μίαν ἀλγεβρικὴν ἔξισωσιν.

Οὔτως, ἐκ τοῦ πολυωνύμου (1), ἔχομεν τὴν ἀλγεβρικὴν ἔξισωσιν ν βαθμοῦ :

$$\alpha_v x^v + \alpha_{v-1} x^{v-1} + \cdots + \alpha_1 x + \alpha_0 = 0. \quad (2)$$

Αἱ ρίζαι τοῦ πολυωνύμου (1) εἰναι καὶ ρίζαι τῆς ἔξισώσεως (2). Ἀξίζει νὰ τονισθῇ ὅτι εἰναι ἐντελῶς διάφορος ἡ ἔννοια τῆς ἔξισώσεως $f(x) = 0$ ἀπὸ τὴν ἔννοιαν $f(x) \equiv 0$ τοῦ μηδενικοῦ πολυωνύμου.

"Ἐν πολυώνυμον ἔχει ἔννοιαν ἀκόμη καὶ ἐὰν τὸ σύμβολον x ἀντικατασταθῇ μὲ μιγαδικοὺς ἀριθμούς, συνεπῶς τὸ πολυώνυμον (1) δυνατὸν νὰ ἔχῃ καὶ μιγαδικὰς ρίζας.

Π.χ. τὸ πολυώνυμον $f(x) \equiv x^3 + 1$ ἔχει ὡς ρίζας τοὺς ἀριθμούς :

$$-1, \quad \frac{1+i\sqrt{3}}{2}, \quad \frac{1-i\sqrt{3}}{2}$$

Κατόπιν τούτων δίδομεν τὸν ἔξισης γενικὸν δρισμὸν τῆς ρίζης :

Καλεῖται ρίζα ἐνδός ἀκεραιού πολυωνύμου $f(x) \not\equiv 0$ κάθε ἀριθμὸς πραγματικὸς ἢ μιγαδικός, ὅστις τιθέμενος ἀντὶ τοῦ x εἰς τὸ πολυώνυμον τὸ μηδενίζει.

Συντόμως δρισμὸς οὕτος δίδεται ὡς ἔξιση :

$$\text{Ο } \rho \text{ εἶναι ρίζα τοῦ } f(x) \iff_{\text{ορσ}} f(\rho) = 0.$$

Ἡ ρίζα ἀλγεβρικῆς ἔξισώσεως μὲ ρητοὺς συντελεστὰς λέγεται ἀλγεβρικὸς ἀριθμός. Ἀκριβέστερον : *Εἰς ἀριθμὸς $\zeta \in \mathbb{C}$ λέγεται ἀλγεβρικὸς ὑπεράνω τοῦ \mathbb{Q} τότε, καὶ μόνον τότε, ἂν ὑπάρχῃ ἀκέραιον πολυώνυμον $f(x)$, ἦτοι $f(x) \in \mathbb{Q}[x]$, μὲ $f(\zeta) = 0$. Εἰς ἀριθμός, ὅστις δὲν εἶναι ἀλγεβρικός, καλεῖται ὑπερβατικός.* Ὅπερ-βατικὸς ἀριθμὸς εἶναι, λ.χ., δ γνωστὸς ἀριθμὸς $\pi = 3,14159\dots$ ὡς καὶ δ ἀριθμὸς e , περὶ τοῦ δποίου γίνεται λόγος εἰς ἐπόμενον κεφάλαιον.

Οἱ ἀλγεβρικοὶ ἀριθμοὶ δύνανται νὰ εἶναι ρητοὶ ἢ ἄρρητοι, ἀλλὰ δὲν ἔπειται ὅτι ἄρρητος εἶναι ἀλγεβρικὸς ἀριθμός. Παράδειγμα οἱ ἀριθμοὶ π καὶ e .

Εἰς τὴν Ἀνωτέραν "Ἀλγεβραν καὶ τὴν Θεωρίαν τῶν Ἀναλυτικῶν Συναρτήσεων ἀποδεικνύεται τὸ κάτωθι θεώρημα :

§ 56. Θεώρημα τοῦ D' Alembert. — Πᾶν ἀκέραιον πολυώνυμον μὲ συντελεστὰς πραγματικοὺς (ἢ μιγαδικοὺς) ἀριθμοῦ, βαθμοῦ $n \geq 1$, ἔχει ἐντὸς τοῦ συνόλου C τῶν μιγαδικῶν ἀριθμὸν μίαν τοὐλάχιστον ρίζαν.

Τὸ θεώρημα τοῦτο ὀνομάζεται θεμελιῶδες θεώρημα τῆς Ἀλγέβρας. Τοῦτο διετυπώθη τὸ πρῶτον ὑπὸ τοῦ D' Alembert κατὰ τὸ 1764, ὅλον ἢ ἀπόδειξις ὡς αὐτοῦ δὲν ἔγενετο τὸ 1799 παρὰ τοῦ Gauss. "Εκτοτε ἐδόθησαν καὶ ἄλλαι ἀπόδειξεις (Cauchy, κ.ἄ.).

Τὸ θεώρημα τοῦ D' Alembert ἔχεισαφαλίζει μὲν τὴν ὑπαρξίν ρίζης (πραγματικῆς ἢ μιγαδικῆς) διὰ κάθε πολυώνυμον βαθμοῦ $n \geq 1$, δὲν παρέχει ὅμως μέθοδον εὑρέσεως ταύτης.

"Η ἀναζήτησις μεθόδων διὰ τὴν εὕρεσιν ριζῶν μιᾶς ἀλγεβρικῆς ἔξισώσεως ν βαθμοῦ συνίσταται εἰς τὴν εὕρεσιν γενικῶν τύπων, διὰ τῶν ὅποιων αἱ ρίζαι τῆς ἔξισώσεως ἐκφράζονται συναρτήσει τῶν συντελεστῶν αὐτῆς διὰ τῶν πράξεων τῆς προσθέσεως, ἀφαιρέσεως, πολλαπλασιασμοῦ, διαιρέσεως καὶ τῆς ἔξαγωγῆς τῶν ριζικῶν. Ἀποδεικνύεται ὅτι διὰ τὰς ἔξισώσεις μέχρι τετάρτου βαθμοῦ εἰναι δυνατὸν νὰ εὑρεθοῦν τοιοῦτοι τύποι. 'Ο Abel ἀπέδειξεν ὅτι δὲν εἰναι δυνατόν, εἰς κάθε περίπτωσιν, νὰ εὑρεθοῦν γενικοὶ τύποι διὰ τὰς ἔξισώσεις βαθμοῦ μεγαλυτέρου τοῦ τετάρτου.

§ 57. Ἐφαρμογαὶ ἐπὶ τῶν ἐκ ταυτότητος ἵσων πολυωνύμων — Μέθοδος τῶν προσδιοριστέων συντελεστῶν.

"Η ἴστης τῶν συντελεστῶν τῶν ὁμοιβαθμίων ὅρων δύο ἐκ ταυτότητος ἵσων πολυωνύμων (§ 51) μᾶς ἐπιτρέπει νὰ προσδιορίσωμεν τοὺς συντελεστὰς ἐνὸς πολυωνύμου εἰς τρόπον, ὥστε νὰ πληροὶ τοῦτο ὠρισμένας συνθήκας. Η μέθοδος αὗτη εἰναι γνωστὴ ὡς μέθοδος τῶν προσδιοριστέων συντελεστῶν. "Ας ἴσωμεν πῶς ἐφαρμόζεται ἡ μέθοδος αὗτη εἰς συγκεκριμένα παραδείγματα :

Ἐφαρμογὴ 1η : Νὰ προσδιορισθοῦν αἱ ἀριθμητικαὶ τιμαὶ τῶν α, β, γ οὗτως, ὥστε νὰ ἴσχῃ ἡ ταυτότης :

$$2x^3 + ax^2 - 13x + \beta \equiv 2x^3 + (\gamma - 2)x^2 - (\gamma + 12)x - 6\gamma.$$

Λύσις : Ἐπειδὴ τὰ πολυώνυμα ταῦτα εἰναι ἐκ ταυτότητος ἵσα, οἱ συντελεσταὶ τῶν αὐτῶν δυνάμεων τοῦ x καὶ οἱ γνωστοὶ ὅροι θὰ εἰναι ἴσοι: δηλαδὴ θὰ εἰναι :

$$\begin{aligned} \gamma - 2 &= \alpha \\ -(\gamma + 12) &= -13 \\ -6\gamma &= \beta \end{aligned} \implies \begin{cases} \gamma - 2 = \alpha \\ \gamma + 12 = 13 \\ 6\gamma = -\beta \end{cases}$$

Λύοντες τὸ σύστημα τοῦτο εύρισκομεν :

$$\alpha = -1, \quad \beta = -6, \quad \gamma = 1.$$

Ἐφαρμογὴ 2a : Νὰ εὑρεθῇ ἀκέραιον πολυώνυμον $f(x)$ τρίτου βαθμοῦ, τὸ ὅποιον δέχεται ως ρίζαν τὸν ἀριθμὸν μηδὲν καὶ ἐπαληθεύει τὴν ταυτότητα :

$$f(x) - f(x - 1) \equiv x^2.$$

Ακολούθως, βάσει αυτοῦ, νὰ ύπολογισθῇ τὸ ἄθροισμα :

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + v^2, \quad (v \in \mathbb{N}).$$

Λύσις : Τὸ ζητούμενον πολυώνυμον θὰ είναι τῆς μορφῆς : $f(x) \equiv \alpha x^3 + \beta x^2 + \gamma x + \delta$, ἔνθα $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ προσδιοριστέοι συντελεσταί. Ἐπειδὴ $f(0) = 0$ θὰ πρέπει $\delta = 0$ καὶ τὸ πολυώνυμον γίνεται : $f(x) \equiv \alpha x^3 + \beta x^2 + \gamma x$.

Λόγῳ τῆς ύποθέσεως θὰ ἔχωμεν :

$$\begin{aligned} f(x) - f(x-1) &\equiv \alpha x^3 + \beta x^2 + \gamma x - \alpha(x-1)^3 - \beta(x-1)^2 - \gamma(x-1) \equiv \\ &\equiv 3\alpha x^2 - (3\alpha - 2\beta)x + (\alpha - \beta + \gamma) \equiv x^2. \end{aligned}$$

Ἐξ αὐτῆς, συμφώνως πρὸς τὸν δρισμὸν τῆς ίσοτητος δύο πολυωνύμων (§ 51), προκύπτει :

$$\left. \begin{array}{l} 3\alpha = 1 \\ 3\alpha - 2\beta = 0 \\ \alpha - \beta + \gamma = 0 \end{array} \right\}, \quad \begin{array}{l} \alpha = 1/3 \\ \beta = 1/2 \\ \gamma = 1/6. \end{array}$$

Ἐπομένως τὸ ζητούμενον πολυώνυμον είναι :

$$f(x) \equiv \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{6}x. \quad (1)$$

Ἐκ τῆς ταυτότητος $f(x) - f(x-1) \equiv x^2$ εύρισκομεν, θέτοντες διαδοχικῶς $x = 1, x = 2, \dots, x = v$:

$$\begin{aligned} f(1) - f(0) &= 1^2 \\ f(2) - f(1) &= 2^2 \\ f(3) - f(2) &= 3^2 \\ \dots \dots \dots \\ f(v) - f(v-1) &= v^2. \end{aligned}$$

Προσθέτοντες τὰς ίσοτητας ταύτας κατὰ μέλη, εύρισκομεν :

$$f(v) - f(0) = 1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + v^2, \quad \text{ἢ ἐπειδὴ } f(0) = 0 \text{ ἔχομεν τελικῶς :}$$

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + v^2 = f(v) = \frac{1}{3}v^3 + \frac{1}{2}v^2 + \frac{1}{6}v = \frac{v(v+1)(2v+1)}{6}.$$

Ἐφαρμογὴ 3η : Ἡ ίκανὴ καὶ ἀναγκαία συνθήκη, διὰ νὰ είναι τὸ κλάσμα :

$$\frac{\alpha_v x^v + \alpha_{v-1} x^{v-1} + \dots + \alpha_1 x + \alpha_0}{\beta_v x^v + \beta_{v-1} x^{v-1} + \dots + \beta_1 x + \beta_0}, \quad v \in \mathbb{N}, \quad \alpha_v \beta_v \neq 0$$

$$\text{ἀνεξάρτητον τοῦ } x, \text{ είναι } \text{ἢ} : \frac{\alpha_v}{\beta_v} = \frac{\alpha_{v-1}}{\beta_{v-1}} = \dots = \frac{\alpha_1}{\beta_1} = \frac{\alpha_0}{\beta_0}.$$

Ἀπόδειξις : Ἐστω ὅτι τὸ κλάσμα είναι ἀνεξάρτητον τοῦ x , ἢτοι, ὅτι ἰσοῦται, οἷου δήποτε ὄντος τοῦ x , πρὸς ἀριθμὸν k . Τότε θὰ ἔχωμεν :

$$\frac{\alpha_v x^v + \alpha_{v-1} x^{v-1} + \dots + \alpha_1 x + \alpha_0}{\beta_v x^v + \beta_{v-1} x^{v-1} + \dots + \beta_1 x + \beta_0} \equiv k \quad (1)$$

$$\text{ἢ} \quad \alpha_v x^v + \alpha_{v-1} x^{v-1} + \dots + \alpha_1 x + \alpha_0 \equiv k \beta_v x^v + k \beta_{v-1} x^{v-1} + \dots + k \beta_1 x + k \beta_0.$$

Έπειδή τὰ δύο ταῦτα πολυώνυμα εἶναι ἐκ ταυτότητος ἵσα, θὰ ἔχωμεν τὰς ἴσότητας : $\alpha_v = k\beta_v$, $\alpha_{v-1} = k\beta_{v-1}$, ..., $\alpha_1 = k\beta_1$, $\alpha_0 = k\beta_0$.

*Ἐκ τῶν ἰσοτήτων τούτων λαμβάνομεν :

$$\frac{\alpha_v}{\beta_v} = \frac{\alpha_{v-1}}{\beta_{v-1}} = \dots = \frac{\alpha_1}{\beta_1} = \frac{\alpha_0}{\beta_0}. \quad (2)$$

*Ἡτοι, ἔδείχθη ὅτι ἡ συνθήκη εἶναι ἀναγκαῖα.

Θὰ δείξωμεν ὅτι αὕτη εἶναι καὶ ἰκανή. Πράγματι ἄν ἰσχύῃ ἡ (2) καὶ καλέσωμεν k τοὺς ἴσους λόγους, θὰ ἔχωμεν :

$$\alpha_v = k\beta_v, \alpha_{v-1} = k\beta_{v-1}, \dots, \alpha_1 = k\beta_1, \alpha_0 = k\beta_0.$$

Τὸ δοθὲν κλάσμα τότε γράφεται :

$$\frac{\alpha_v x^v + \alpha_{v-1} x^{v-1} + \dots + \alpha_1 x + \alpha_0}{\beta_v x^v + \beta_{v-1} x^{v-1} + \dots + \beta_1 x + \beta_0} = \frac{k(\beta_v x^v + \beta_{v-1} x^{v-1} + \dots + \beta_1 x + \beta_0)}{\beta_v x^v + \beta_{v-1} x^{v-1} + \dots + \beta_1 x + \beta_0} = k,$$

ἵτοι, εἶναι ἀνεξάρτητον τοῦ x καὶ ἵσον πάντοτε πρὸς $\frac{\alpha_v}{\beta_v}$.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

131. Νὰ προσδιορισθοῦν οἱ πραγματικοὶ ἀριθμοὶ α , β , γ , ἵνα τὸ πολυώνυμον :

$$(2\alpha + 1)x^2 + (3\beta - 1)x + (2\gamma + \beta - \alpha) \text{ εἶναι ἐκ ταυτότητος μηδέν.}$$

132. Ὑπάρχουν τιμαι τῶν λ καὶ μ διὰ τὰς ὁποίας τὸ πολυώνυμον :

$$(\lambda - 1)x^2 + (2\mu + 2)x + (\lambda + \mu - 3) \text{ εἶναι ἐκ ταυτότητος μηδέν ;}$$

133. Ἐάν $\alpha^3 + \beta^3 + \gamma^3 = 3\alpha\beta\gamma$ καὶ $\alpha + \beta + \gamma \neq 0$, ἔνθα $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$, δείξατε ὅτι τὸ $f(x) \equiv (\alpha - \beta)x^2 + (\beta - \gamma)x + (\gamma - \alpha)$ εἶναι τὸ μηδενικόν πολυώνυμον.

134. Νὰ προσδιορισθοῦν τὰ α, β, γ , ἵνα τὸ πολυώνυμον $2x^2 + 4x + 5$ ἰσοῦται ἐκ ταυτότητος μέ : $\alpha(x+2)(x+3) + \beta x(x-1) + \gamma$.

135. Νὰ προσδιορισθοῦν οἱ πραγματικοὶ ἀριθμοὶ α, β, γ , ἵνα τὸ πολυώνυμον :

$$f(x) \equiv x^4 - 2x^3 + \alpha x^2 + \beta x + 4 \text{ εἶναι τετράγωνον τοῦ τριωνύμου } x^2 - x + \gamma.$$

136. Ποιᾶται ἐκ τῶν κάτωθι παραστάσεων εἶναι ἀνεξάρτητοι τοῦ x ;

$$\alpha) \frac{3x^2 - 5x + 2}{6x^2 - 10x + 4}, \quad \beta) \frac{4x^2 - 5x - 1}{8x^2 - 10x + 1}, \quad \gamma) \frac{2x^3 - 6x^2 + 2x - 2}{x^3 - 3x^2 + x - 1}.$$

137. Προσδιορίσατε τὰ λ, μ, ν , ἵνα τὰ κλάσματα :

$$\alpha) \frac{(\lambda - 1)x^2 + (\mu + 1)x + 1}{x^2 + 5x + 1} \quad \beta) \frac{x^2 + (\lambda - \mu)x + \lambda\mu}{4x^2 + (2\lambda - \mu)x + \lambda - \mu}$$

ἔχουν τιμὴν ἀνεξάρτητον τοῦ x .

138. Λέγομεν ὅτι τὸ πολυώνυμον $f(x) \equiv \alpha x^3 + \beta x^2 + \gamma x + \delta$ εἶναι τέλειος κύβος, τότε καὶ μόνον τότε, ἔαν τίθεται ὑπὸ τὴν μορφήν : $\alpha(x+k)^3$, $k \in \mathbb{R}$. Κατόπιν τούτου, δείξατε ὅτι αἱ ἰκαναὶ καὶ ἀναγκαῖαι συνθῆκαι, ἵνα τὸ $f(x)$ εἶναι τέλειος κύβος, εἶναι : $\beta^3 = 27\alpha^2\delta$, $\beta^2 = 3\alpha\gamma$. Ἀκολούθως δείξατε ὅτι τὸ πολυώνυμον : $8x^3 + 36x^2 + 54x + 27$ εἶναι τέλειος κύβος.

139. Προσδιορίσατε τὰ λ, μ, ν, ν , ἵνα ἡ παράστασις

$$\frac{(\lambda - 1)x^3 + (\mu + 1)x^2 + (\nu - 1)x - 15}{3x^3 - 6x^2 + x - 5}$$

εἶναι ἀνεξάρτητος τοῦ x .

140. Έάν τὸ πολυώνυμον $f(x) \equiv x^4 + \alpha x^3 + \beta x^2 + \gamma x + \delta$ είναι τέλειον τετράγωνον, νὰ δειχθῇ ὅτι: $\gamma^2 = \delta\alpha^2$ καὶ $(4\beta - \alpha^2)^2 = 64\delta$.

141. Προσδιορίσατε τὰ A, B, Γ ώστε νὰ ύφισταται ἡ ταυτότης:

$$\frac{2x^3 + 10x - 3}{(x+1)(x^2-9)} \equiv \frac{A}{x+1} + \frac{B}{x+3} + \frac{\Gamma}{x-3}.$$

*Υπόδειξις: Έκτελέσατε πράξεις εἰς τὸ δεύτερον μέλος καὶ ἔξισώσατε τοὺς ἀριθμητάς τῶν δύο μελῶν.

142. Νὰ εύρεθῃ ἀκέραιον πολυώνυμον $f(x)$ τετάρτου βαθμοῦ, τὸ δοποῖον δέχεται ὡς ρίζαν τὸν ἀριθμὸν μηδὲν καὶ ἐπαληθεύει τὴν ταυτότητα: $f(x) - f(x-1) \equiv x^3$. Βάσει τούτων νὰ εύρεθῇ τὸ ἄθροισμα: $1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3, n \in \mathbb{N}$.

143. Έάν $\alpha + \beta + \gamma = 30$, νὰ προσδιορισθοῦν οἱ πραγματικοὶ ἀριθμοὶ α, β, γ , ἵνα τὸ κλάσμα $\frac{(\alpha-2)x^2 + (\beta-4)x + \gamma-6}{x^2 + 2x + 3}$ ἔχῃ τιμὴν ἀνεξάρτητον τοῦ x.

144. Νὰ δρισθοῦν οἱ $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ οὕτως, ώστε:

$$\alpha v^4 + \beta v^3 + \gamma v^2 + \delta v \equiv 1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3, \quad v \in \mathbb{N}.$$

145. Νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι, ἐὰν τὰ ἀκέραια πολυώνυμα:

$$f(x) \equiv Ax^2 + 2Bxy + Gy^2 + 2\Delta x + 2Ey + Z$$

$$\varphi(x) \equiv \alpha x^2 + 2\beta xy + \gamma y^2 + 2\delta x + 2ey + \zeta$$

είναι ἑκ ταυτότητος ἵσα, θὰ είναι:

$$A = \alpha, \quad B = \beta, \quad \Gamma = \gamma, \quad \Delta = \delta, \quad E = e, \quad Z = \zeta.$$

Διαιρετότης ἀκέραιων πολυωνύμων

§ 58. Τελεία διαιρεσις. — Εστωσαν $f(x)$ καὶ $\varphi(x)$ δύο ἀκέραια πολυώνυμα τοῦ πολυωνυμικοῦ δακτυλίου $R[x]$. Θὰ λέγωμεν:

Τὸ πολυώνυμον $f(x)$ διαιρεῖται (ἀκριβῶς) διὰ τοῦ πολυωνύμου $\varphi(x) \not\equiv 0$ τότε, καὶ μόνον τότε, ἂν ὑπάρχῃ ἀκέραιον πολυώνυμον $\pi(x) \in R[x]$ τοιοῦτον, ώστε:

$$f(x) \equiv \varphi(x) \cdot \pi(x). \quad (1)$$

Εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν λέγομεν ἐπίσης ὅτι: Τὸ $f(x)$ είναι διαιρετὸν διὰ $\varphi(x)$, ἢ τὸ $f(x)$ είναι πολλαπλάσιον τοῦ $\varphi(x)$, ἢ ἡ διαιρεσις $f(x) : \varphi(x)$ είναι τελεία, ἢ ἀκόμη τὸ $\varphi(x)$ διαιρεῖ (ἀκριβῶς) τὸ $f(x)$ καὶ γράφομεν $\varphi(x) | f(x)$.

Κατόπιν τοῦ συμβολισμοῦ τούτου δὲ ἀνωτέρω δρισμὸς δίδεται συντόμως ὡς ἔξης:

$$\boxed{\varphi(x) | f(x) \iff_{\text{ορσ}} \exists \pi(x) \in R[x] : f(x) \equiv \varphi(x) \pi(x).} \quad (2)$$

*Έάν τὸ πολυώνυμον $f(x)$ δὲν διαιρῆται διὰ τοῦ $\varphi(x) \not\equiv 0$, τότε γράφομεν: $\varphi(x) \nmid f(x)$.

Τὰ πολυώνυμα $f(x), \varphi(x)$ καὶ $\pi(x)$ καλοῦνται ἀντιστοίχως διαιρετέος, διαιρέτης καὶ πηλίκον τῆς τελείας διαιρέσεως τοῦ $f(x)$ διὰ τοῦ $\varphi(x)$.

*Αμεσοὶ συνέπειαι τοῦ δρισμοῦ.

α). *Έάν $v, \mu (v \geq \mu)$ καὶ λ είναι ἀντιστοίχως οἱ βαθμοὶ τῶν $f(x), \varphi(x)$ καὶ

$\pi(x)$ θὰ ἔχωμεν (\S 51,ε) $\mu + \lambda = v$, ὅτε $\lambda = v - \mu$, ἢτοι : « ὁ βαθμὸς τοῦ πηλίκου ἵσοιται πρὸς τὴν διάφορὰν τῶν βαθμῶν διαιρετέου καὶ διαιρέτου ».

β). Τὸ μηδενικὸν πολυώνυμον διαιρεῖται (ἀκριβῶς) ὑπὸ παντὸς μὴ μηδενικοῦ πολυωνύμου $\varphi(x)$ καὶ δίδει πηλίκον μηδέν. Πράγματι ἴσχύει : $0 \equiv \varphi(x) \cdot 0$.

γ). Πᾶν πολυώνυμον διαιρεῖται (ἀκριβῶς) ὑπὸ παντὸς σταθεροῦ πολυωνύμου $\not\equiv 0$, (δηλ. σταθερᾶς ποσότητος $\neq 0$). Πράγματι, ἐὰν

$f(x) \equiv \alpha_v x^v + \alpha_{v-1} x^{v-1} + \cdots + \alpha_1 x + \alpha_0$ καὶ $\varphi(x) = c^*$, $c \in \mathbb{R}$, $c \neq 0$ ἔχομεν τὴν προφανῆ ταυτότητα :

$$\alpha_v x^v + \alpha_{v-1} x^{v-1} + \cdots + \alpha_1 x + \alpha_0 \equiv c \cdot \left\{ \frac{\alpha_v}{c} x^v + \frac{\alpha_{v-1}}{c} x^{v-1} + \cdots + \frac{\alpha_1}{c} x + \frac{\alpha_0}{c} \right\},$$

ὅπου τὸ ἐντὸς τῆς ὀγκύλης ἀκέραιον πολυώνυμον εἶναι τὸ πηλίκον.

Ἐκ τοῦ δρισμοῦ (2) καὶ τοῦ θεωρήματος \S 52, προκύπτει τὸ μονοσήμαντον τοῦ πηλίκου. Ἀκριβέστερον ἴσχύει ἡ πρότασις :

*Ἐὰν $\varphi(x) | f(x)$, τότε ὑπάρχει ἀκριβῶς ἐν πολυώνυμον $\pi(x) \in R[x]$ τοιοῦτον, ὥστε νὰ ἴσχῃ ἡ ταυτότης :

$$f(x) \equiv \varphi(x) \cdot \pi(x).$$

Πράγματι, ἐὰν ὑπῆρχε καὶ ἔτερον πολυώνυμον $\pi_1(x) \in R[x]$ τοιοῦτον, ὥστε :

$$f(x) \equiv \varphi(x) \cdot \pi_1(x),$$

τότε θὰ ἴσχυε : $\varphi(x)[\pi(x) - \pi_1(x)] \equiv 0$, καὶ ἐπειδὴ $\varphi(x) \not\equiv 0$, θὰ εἶναι, κατὰ τὸ θεώρημα \S 52, $\pi(x) - \pi_1(x) \equiv 0$, ἐξ οὗ : $\pi(x) \equiv \pi_1(x)$.

Τῇ βοηθείᾳ τῶν ἀνωτέρω ἀποδεικνύομεν τὰ κάτωθι θεωρήματα :

§ 59. Θεώρημα. — *Ἐὰν $\varphi(x) | f(x) \implies \varphi(x) | f(x) \cdot \sigma(x)$, διὰ κάθε πολυώνυμον $\sigma(x) \in R[x]$.

*Α πόδειξις. *Ἐπειδὴ $\varphi(x) | f(x)$ ἔχομεν : $f(x) \equiv \varphi(x) \cdot \pi(x)$, ὅθεν καὶ :

$$f(x) \sigma(x) \equiv \varphi(x) \cdot [\pi(x) \cdot \sigma(x)] \equiv \varphi(x) \cdot \pi_1(x),$$

ενθα $\pi_1(x) \equiv \pi(x) \cdot \sigma(x)$, δηλαδή : $\varphi(x) | f(x) \sigma(x)$.

Παρατήρησις : Διὰ $\sigma(x) = c$ ἴσχύει : *Ἐὰν $\varphi(x) | f(x) \implies \varphi(x) | cf(x)$, $c \in \mathbb{R}$.

§ 60. Θεώρημα. — *Ἐὰν $\varphi(x) | f_1(x)$ καὶ $\varphi(x) | f_2(x) \implies \varphi(x) | f_1(x) \pm f_2(x)$.

*Α πόδειξις. *Ἔχομεν : $f_1(x) \equiv \pi_1(x) \cdot \varphi(x)$

$$f_2(x) \equiv \pi_2(x) \cdot \varphi(x).$$

*Οθεν : $f_1(x) \pm f_2(x) \equiv [\pi_1(x) \pm \pi_2(x)] \cdot \varphi(x)$,

ἢτοι $\varphi(x) | f_1(x) \pm f_2(x)$.

*Ἐκ τοῦ θεωρήματος τούτου καὶ τῆς παρατηρήσεως τοῦ θεωρήματος \S 59 προκύπτει τὸ κάτωθι :

* Τὸ γράμμα c εἶναι τὸ ἀρχικὸν τῆς λέξεως constant = σταθερὰ καὶ δὲν πρέπει νὰ συγχέται μὲ τὸ σύμβολον $C \equiv$ σύνολον τῶν μιγαδικῶν ἀριθμῶν (Complex numbers).

§ 61. Θεώρημα. — 'Εὰν $\phi(x) | f_1(x), \phi(x) | f_2(x), \dots, \phi(x) | f_v(x)$, τότε $\phi(x) | c_1f_1(x) + c_2f_2(x) + \dots + c_v f_v(x)$, ξνθα c_1, c_2, \dots, c_v τυχοῦσαι σταθεραί.

§ 62. Θεώρημα. — 'Εὰν $\phi(x) | f_1(x), \phi(x) | f_2(x), \dots, \phi(x) | f_v(x)$, τότε $\phi(x) | f_1(x) \cdot f_2(x) \cdots f_v(x)$.

Η ἀπόδειξις ως εύκολος παραλείπεται.

Πόρισμα. — 'Εὰν $\phi(x) | f(x) \implies \phi(x) | [f(x)]^v \quad \forall v \in \mathbb{N}$.

§ 63. Θεώρημα. — 'Εὰν $\phi(x) | f(x)$ καὶ $f(x) | \phi(x) \implies f(x) = c \cdot \phi(x)$, $c \in \mathbb{R}$.

Α πόδειξις. — Εχομεν $f(x) \equiv \pi_1(x) \cdot \phi(x)$

καὶ

$$\phi(x) \equiv \pi_2(x) \cdot f(x)$$

συνεπῶς

$$f(x) \equiv \pi_1(x) \pi_2(x) f(x) \quad \text{καὶ ἐπειδὴ } f(x) \not\equiv 0$$

κατὰ τὸ θεώρημα § 53 προκύπτει: $\pi_1(x) \pi_2(x) \equiv 1$.

Τότε δύναμες ἔκαστον τῶν πολυωνύμων $\pi_1(x), \pi_2(x)$ πρέπει νὰ εἰναι βαθμοῦ μηδέν, δηλαδὴ σταθεραὶ (διατί;).

"Ωστε $\pi_1(x) = c_1, \pi_2(x) = c_2$, ξνθα $c_1, c_2 \in \mathbb{R} - \{0\}$.

"Αρα $f(x) \equiv c_1 \phi(x) \text{ ή } \phi(x) \equiv c_2 f(x)$, δόποτε $f(x) = \frac{1}{c_2} \phi(x)$, δηλαδὴ γενικῶς: $f(x) = c \cdot \phi(x)$.

Σημείωσις. — Εκ τοῦ θεωρήματος τούτου προκύπτει ἀμέσως ὅτι:

'Εὰν $\phi(x) | f(x) \implies c\phi(x) | f(x), c \in \mathbb{R} - \{0\}$.

Οἱ διαιρέται $\phi(x)$ καὶ $c\phi(x)$ τοῦ $f(x)$ καλοῦνται **ισοδύναμοι διαιρέται**. Εξ ὅλων τῶν ισοδυνάμων διαιρετῶν ἐνὸς πολυωνύμου $f(x)$ ἐκεῖνος, δότις ἔχει ως συντελεστὴν τῆς μεγαλυτέρας δυνάμεως τοῦ x τὴν μονάδα, καλεῖται **κύριος διαιρέτης**.

§ 64. Ταυτότης τῆς ἀλγορίθμικῆς διαιρέσεως. — 'Εν γένει ἡ διαιρεσις δύο τυχόντων ἀκεραίων πολυωνύμων δὲν εἰναι τελεία. Εἰς τρόπος διὰ νὰ ἐλέγχωμεν ἂν ἐν πολυώνυμον διαιρῆ ἐν ἄλλῳ εἰναι ὁ ἀκόλουθος:

"Εστωσαν, π.χ., τὰ πολυώνυμα $2x^2 - 7x + 6$ καὶ $3x + 1$. "Ινα τὸ δεύτερον διαιρῆ ἀκριβῶς τὸ πρῶτον, πρέπει νὰ ὑπάρχῃ ἀκέραιον πολυώνυμον $\pi(x)$ τοιοῦτον, ὥστε:

$$2x^2 - 7x + 6 \equiv (3x + 1) \cdot \pi(x). \quad (1)$$

Ἐπειδή, ως ἐλέχθη § 58, ὁ βαθμὸς τοῦ πηλίκου ισοῦται πρὸς τὴν διαφορὰν τῶν βαθμῶν διαιρετέου καὶ διαιρέτου, ἔπειτα ὅτι τὸ $\pi(x)$ πρέπει νὰ εἰναι πρώτου βαθμοῦ, ἦτοι τῆς μορφῆς $\alpha x + \beta$. Τότε ἡ (1) γίνεται:

$2x^2 - 7x + 6 \equiv (3x + 1) (\alpha x + \beta) \equiv 3\alpha x^2 + (\alpha + 3\beta)x + \beta$,
δόποτε, κατὰ τὸ διαιρέσιμὸν τῆς ισότητος δύο πολυωνύμων, θὰ ἔχωμεν συγχρόνως:

$$3\alpha = 2$$

$$\text{Η πρώτη τούτων δίδει } \alpha = \frac{2}{3}. \text{ Διὰ } \alpha = \frac{2}{3} \text{ καὶ } \beta = 6$$

$$\alpha + 3\beta = -7$$

ἡ δευτέρα δὲν ἀληθεύει, διότι:

$$\beta = 6.$$

$$\frac{2}{3} + 3 \cdot 6 = \frac{2}{3} + 18 = 18 \frac{2}{3} \neq -7.$$

Συνεπώς δὲν ύπάρχει πολυώνυμον $\pi(x)$ πληροῦν τὴν (1), ἀρα τὸ $2x^2 - 7x + 6$ δὲν διαιρεῖται ὀκριβῶς διὰ τοῦ $3x + 1$. Ἐκ τούτων συμπεραίνομεν ὅτι κατ' ἐξαίρεσιν μόνον ἡ διαιρέσις δύο ἀκεραίων πολυωνύμων εἶναι τελεία.

Εἰς τὴν γενικήν περίπτωσιν ἀντὶ τῆς ταυτότητος (1) τῆς § 58 ισχύει ἡ καλουμένη ταυτότης τῆς ἀλγορίθμικῆς διαιρέσεως, ἡ δποία διαιμορφοῦται καὶ ἀποδεικνύεται ἀπό τὸ κάτωθι θεώρημα:

Θεώρημα.—Δοθέντων δύο ἀκεραίων πολυωνύμων $f(x)$ καὶ $\phi(x)$, βαθμῶν v καὶ μ ἀντιστοίχως ($\mu \geq 0$), ὑπάρχουν πάντοτε δύο μονοσημάντως ὥρισμένα πολυώνυμα $\pi(x)$ καὶ $u(x)$ ἐκ τοῦ $R[x]$ μὲ βαθμὸς $v < \text{βαθμοῦ } \phi(x)$, ὥστε :

$$f(x) \equiv \phi(x) \cdot \pi(x) + u(x). \quad (2)$$

Ἡ εὔρεσις τῶν $\pi(x)$ καὶ $u(x)$ καλεῖται ἀλγορίθμικὴ ἢ **Εύκλειδειος διαιρέσις** τοῦ $f(x)$ διὰ $\phi(x)$.

Τὸ $\pi(x)$ καλεῖται ἀκέραιον πηλίκον ἢ ἀλγορίθμικόν πηλίκον (συντόμως πηλίκον) καὶ τὸ $u(x)$ καλεῖται ὑπόλοιπον τῆς διαιρέσεως τοῦ $f(x)$ διὰ τοῦ $\phi(x)$, ἡ δὲ ταυτότης (2) ἡ συνδέουσα διαιρέτον, διαιρέτην, πηλίκον καὶ ὑπόλοιπον καλεῖται ταυτότης τῆς (ἀλγορίθμικῆς) διαιρέσεως.

Α πόδειξις. Εστωσαν τὰ πολυώνυμα :

$$f(x) \equiv \alpha_v x^v + \alpha_{v-1} x^{v-1} + \cdots + \alpha_1 x + \alpha_0, \quad (\alpha_v \neq 0)$$

$$\phi(x) \equiv \beta_\mu x^\mu + \beta_{\mu-1} x^{\mu-1} + \cdots + \beta_1 x + \beta_0, \quad (\beta_\mu \neq 0).$$

Θὰ ἀποδείξωμεν :

a). Τὴν ὑπαρξίν τῶν $\pi(x)$ καὶ $u(x)$. Πρὸς τούτοις διακρίνομεν δύο περιπτώσεις :

Περίπτωσις 1η : Ἐὰν $v < \mu$, τότε τὸ θεώρημα ισχύει, ἀρκεῖ νὰ λάβωμεν $\pi(x) \equiv 0$ καὶ $u(x) \equiv f(x)$, ὅτε ἡ (2) ισχύει, διότι ἔχομεν :

$$f(x) \equiv \phi(x) \cdot 0 + f(x).$$

Περίπτωσις 2α: Ἐὰν $v \geq \mu$, τότε διαιροῦντες τὸν πρῶτον ὄρον $\alpha_v x^v$ τοῦ διαιρετοῦ διὰ τοῦ πρώτου ὄρου $\beta_\mu x^\mu$ τοῦ διαιρέτου λαμβάνομεν ὡς πηλίκον τὸ ἀκέραιον μονώνυμον $\frac{\alpha_v}{\beta_\mu} x^{v-\mu}$, τὸ δποῖον ἃς καλέσωμεν $\pi_1(x)$, ἥτοι :

$$\pi_1(x) \equiv \frac{\alpha_v}{\beta_\mu} x^{v-\mu}.$$

Πολλαπλασιάζοντες τὸν διαιρέτην $\phi(x)$ ἐπὶ τὸ $\pi_1(x)$ λαμβάνομεν ὡς γινόμενον τὸ πολυώνυμον :

$$\phi(x) \pi_1(x) \equiv \alpha_v x^v + \frac{\alpha_v}{\beta_\mu} \beta_{\mu-1} x^{v-1} + \frac{\alpha_v}{\beta_\mu} \beta_{\mu-2} \cdot x^{v-2} + \cdots + \frac{\alpha_v}{\beta_\mu} \beta_0 x^{v-\mu},$$

τὸ δποῖον ἔχει μετὰ τοῦ $f(x)$ κοινὸν τὸν πρῶτον ὄρον $\alpha_v x^v$.

Σχηματίζομεν τὴν διαφοράν :

$$f(x) - \phi(x) \pi_1(x) \equiv \left(\alpha_{v-1} - \frac{\alpha_v}{\beta_\mu} \beta_{\mu-1} \right) x^{v-1} + \left(\alpha_{v-2} - \frac{\alpha_v}{\beta_\mu} \beta_{\mu-2} \right) x^{v-2} + \cdots$$

Ἐὰν καλέσωμεν $u_1(x)$ τὸ πολυώνυμον τοῦ δευτέρου μέλους, ἔχομεν :

$$f(x) - \phi(x) \pi_1(x) \equiv u_1(x)$$

$$\text{ἢ } f(x) \equiv \phi(x) \pi_1(x) + u_1(x), \quad \text{μὲ βαθμὸν } u_1(x) \leq v-1.$$

(3)

Τότε : (i). 'Εάν $v - 1 < \mu$ ή (3) ἀποδεικνύει τὸ θεώρημα.

(ii). 'Εάν $v - 1 \geq \mu$, ἐργαζόμενοι δύοις ἐπὶ τῶν $u_1(x)$ ὡς διαιρέτεον καὶ $\phi(x)$ ὡς διαιρέτην, λαμβάνομεν :

$$u_1(x) \equiv \phi(x) \cdot \pi_2(x) + u_2(x), \text{ μὲν βαθμὸν } u_2(x) < \text{βαθμοῦ } u_1(x).$$

'Εάν τώρα εἰναι πάλιν: βαθμὸς $u_2(x) \geq \mu (= \text{βαθμὸς } \phi(x))$, συνεχίζομεν τὴν αὐτήν ἐργασίαν ἐπὶ τῶν $u_2(x)$ καὶ $\phi(x)$, ἤτοι: Θὰ ὑπάρχῃ πάλιν ἐν πηλίκον $\pi_3(x)$ καὶ ἐν πολυωνυμον $u_3(x)$, ὡστε νὰ εἰναι :

$$u_2(x) \equiv \phi(x) \cdot \pi_3(x) + u_3(x), \text{ μὲν βαθμὸν } u_3(x) < \text{βαθμ. } u_2(x).$$

Οἱ βαθμοὶ τῶν $u_1(x)$, $u_2(x)$, $u_3(x)$ βαίνουσιν διαιροχιῶς ἐλαττούμενοι, ἅρα θὰ φθάσωμεν τελικῶς εἰς ἐν πολυωνυμον βαθμοῦ μικροτέρου τοῦ βαθμοῦ μ τοῦ $\phi(x)$, ὅτε θὰ λήξῃ ἡ ἐργασία αὕτη. Οὕτω θὰ ἔχωμεν τὰς ίσότητας:

$$\begin{aligned} f(x) &\equiv \phi(x)\pi_1(x) + u_1(x) \\ u_1(x) &\equiv \phi(x)\pi_2(x) + u_2(x) \\ u_2(x) &\equiv \phi(x)\pi_3(x) + u_3(x) \\ \dots \dots \dots \\ u_k(x) &\equiv \phi(x)\pi_{k+1}(x) + u_{k+1}(x), \end{aligned} \tag{4}$$

ὅπου τὸ $u_{k+1}(x)$ εἶναι πολυωνυμον βαθμοῦ μικροτέρου τοῦ βαθμοῦ μ τοῦ $\phi(x)$. Αθροίζοντες τὰς ίσότητας (4) κατὰ μέλη λαμβάνομεν μετὰ τὰς ἀπλοποιήσεις :

$$f(x) \equiv \phi(x) \{ \pi_1(x) + \pi_2(x) + \dots + \pi_{k+1}(x) \} + u_{k+1}(x).$$

Θέτοντες: $\pi_1(x) + \pi_2(x) + \dots + \pi_{k+1}(x) \equiv \pi(x)$ καὶ $u_{k+1}(x) = u(x)$, φθάνομεν εἰς τὴν ἀποδεικτέαν ταυτότητα :

$$f(x) \equiv \phi(x) \pi(x) + u(x), \text{ μὲν βαθμ. } u(x) < \mu (\equiv \text{βαθμὸς } \phi(x)).$$

β). Τὸ μονοσήμαντον τῶν $\pi(x)$ καὶ $u(x)$ εἰς τὴν (2).

Τὸ ζεύγος τῶν πολυωνύμων $\pi(x)$ καὶ $u(x)$ εἶναι τὸ μόνον διὰ τὸ ὅποιον ίσχύει ἡ (2), διότι, ἐάν εἰναι καὶ :

$$f(x) \equiv \phi(x) \cdot \pi'(x) + u'(x), \text{ μὲν βαθμὸν } u'(x) < \mu,$$

τότε : $\pi'(x) \equiv \pi(x)$ καὶ $u'(x) \equiv u(x)$.

Πράγματι, ἐπειδή :

$$\begin{aligned} \phi(x) \cdot \pi(x) + u(x) &\equiv \phi(x) \cdot \pi'(x) + u'(x), \\ [\pi(x) - \pi'(x)]\phi(x) &\equiv u'(x) - u(x). \end{aligned} \tag{5}$$

Ἡ ταυτότης (5) δὲν δύναται νὰ ίσχύῃ, εἰμὴ μόνον ἂν $\pi(x) - \pi'(x) \equiv 0$ καὶ $u'(x) - u(x) \equiv 0$, δηλαδή :

$$\pi(x) \equiv \pi'(x) \text{ καὶ } u(x) \equiv u'(x),$$

διότι ἀλλως τὸ πρῶτο μέλος τῆς (5) εἶναι πολυωνυμον βαθμοῦ $\geq \mu$, ἐνῶ τὸ δεύτερον μέλος εἶναι πολυωνυμον βαθμοῦ $< \mu$.

Τὸ θεώρημα ὅθεν ἀπεδείχθη πλήρως.

Παρατηρήσεις ἐπὶ τῆς ταυτότητος διαιρέσεως (2).

1). 'Εάν $u(x) \equiv 0$, τότε ἐκ τῆς (2) προκύπτει ἡ ταυτότης (1) τῆς τελείας διαιρέσεως.

2). 'Εκ τῆς (2) ἔπειται : $\phi(x) \mid f(x) - v(x)$, δηλαδὴ ή διαφορὰ τοῦ διαιρέτου μεῖον τὸ ὑπόλοιπον εἶναι διαιρέτη διὰ τοῦ διαιρέτου.

3). 'Ο βαθμὸς τοῦ ἀκεραίου πηλίκου ἴσοῦται πρὸς τὴν διαφορὰν τῶν βαθμῶν διαιρέτου καὶ διαιρέτου.

4). 'Εάν $\phi(x) \not\equiv 0$ ή ταυτότης (2) γράφεται :

$$\frac{f(x)}{\phi(x)} \equiv \pi(x) + \frac{v(x)}{\phi(x)},$$

μὲ βαθμὸν $v(x) < \beta$ βαθμοῦ $\phi(x)$.

Τὸ πολυώνυμον $\pi(x)$ καλεῖται «τὸ ἀκέραιον μέρος» καὶ τὸ $\frac{v(x)}{\phi(x)}$ «τὸ γνήσιον κλασματικὸν μέρος» τοῦ $\frac{f(x)}{\phi(x)}$.

5). 'Η μέθοδος τὴν ὅποιαν ἡκολουθήσαμεν διὰ νὰ ἀποδείξωμεν τὸ ἀνωτέρῳ θεώρημα μᾶς δῖει ἐναν ἀλγόριθμον διὰ τοῦ ὅποιου δυνάμεθα νὰ εύρισκωμεν τὰ πολυώνυμα $\pi(x)$ καὶ $v(x)$.

Παράδειγμα. 'Εάν $f(x) = x^3 - 1$, $\phi(x) = x + 1$ εὕρετε τὰ μονοστημάντως ὥρισμένα πολυώνυμα $\pi(x)$ καὶ $v(x)$, ὥστε νὰ εἴναι :

$$f(x) \equiv \phi(x) \cdot \pi(x) + v(x), \text{ μὲ βαθμ. } v(x) < \beta \text{ βαθμ. } \phi(x) = 1.$$

Λύσις. ^Έχομεν :

$$v_1(x) \equiv f(x) - \pi_1(x) \cdot \phi(x) = (x^3 - 1) - x^2 \cdot (x + 1) = -x^2 - 1, \quad \pi_1(x) = x^2$$

$$v_2(x) \equiv v_1(x) - \pi_2(x) \cdot \phi(x) = -x^2 - 1 - (-x)(x + 1) = x - 1, \quad \pi_2(x) = -x$$

$$v_3(x) \equiv v_2(x) - \pi_3(x) \cdot \phi(x) = (x - 1) - 1(x + 1) = -2, \quad \pi_3(x) = 1$$

Ἄρα :

$$\pi(x) = \pi_1(x) + \pi_2(x) + \pi_3(x) = x^2 - x + 1$$

$$v(x) = v_3(x) = -2.$$

Πόρισμα I. — Τὸ ὑπόλοιπον τῆς διαιρέσεως ἐνὸς ἀκεραίου πολυωνύμου $f(x)$ διὰ τοῦ διωνύμου $x - a$ ἴσοῦται πρὸς τὴν ὀριθμητικὴν τιμὴν τοῦ πολυωνύμου διὰ $x - a$, ἢτοι :

$$v = f(a)$$

Γενικώτερον, ἴσχύει ὅτι : Τὸ ὑπόλοιπον τῆς διαιρέσεως τοῦ $f(x)$ διὰ τοῦ $ax + \beta$, $a, \beta \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$ εἴναι :

$$v = f\left(-\frac{\beta}{a}\right).$$

'Εκ τοῦ ὁρισμοῦ τῆς ρίζης ἐνὸς ἀκεραίου πολυωνύμου καὶ τοῦ ἀνωτέρῳ πτορίσματος συμπεραίνομεν :

Πόρισμα II. — 'Εάν ρ εἴναι ρίζα τοῦ $f(x) \iff x - \rho \mid f(x)$, ἢτοι :

$$f(\rho) = 0 \iff f(x) \equiv (x - \rho) \cdot \pi(x)$$

Ἐνθα $\pi(x)$ ἀκέραιον πολυώνυμον τοῦ x , ἢτοι $\pi(x) \in \mathbb{R}[x]$.

Ίδιότητες τῶν ἀκεραίων πολυωνύμων

§ 65. Θεώρημα. — 'Εάν ἀκέραιον πολυώνυμον $f(x)$ διαιρήται δι' ἑνὸς ἐκάστου τῶν διωνύμων : $(x - p_1), (x - p_2), \dots, (x - p_v)$, ἔνθα p_1, p_2, \dots, p_v ἀριθμοὶ διάφοροι ἀλλήλων ἀνὰ δύο, τότε θὰ διαιρῆται (ἀκριβῶς) καὶ διὰ τοῦ γινομένου :

$$(x - p_1)(x - p_2) \dots (x - p_v)$$

καὶ ἀντιστρόφως.

'Α πόδειξις. 'Εκ τοῦ πορ. II τῆς § 64 καὶ τῆς ὑποθέσεως, λαμβάνομεν:

$$f(p_1) = 0, f(p_2) = 0, \dots, f(p_v) = 0. \quad (1)$$

'Εξ ὅλου, ἐπειδὴ $(x - p_1) / f(x)$, θὰ εἴναι :

$$f(x) \equiv (x - p_1) \cdot f_1(x) \quad (2)$$

'Η (2), διὰ $x = p_2$ γίνεται : $f(p_2) = (p_2 - p_1) \cdot f_1(p_2)$, ἥτις, λόγῳ τῆς β' τῶν (1) καὶ δεδομένου ὅτι $p_1 \neq p_2$, δίδει $f_1(p_2) = 0$. **"Αρα,** κατὰ τὸ αὐτὸ πόρ. II τῆς § 64, ἔχομεν $f_1(x) \equiv (x - p_2) f_2(x)$ συνεπείᾳ τῆς ὁποίας ἡ (2) γίνεται :

$$f(x) \equiv (x - p_1)(x - p_2) f_2(x). \quad (3)$$

'Ομοίως, ἡ (3) διὰ $x = p_3$ γίνεται : $f(p_3) = (p_3 - p_1)(p_3 - p_2) f_2(p_3)$, ἥτις λόγῳ τῶν $f(p_3) = 0, p_3 \neq p_1, p_3 \neq p_2$, δίδει $f_2(p_3) = 0$. **"Αρα** $f_2(x) \equiv (x - p_3) f_3(x)$ καὶ ἡ (3) γίνεται :

$$f(x) \equiv (x - p_1)(x - p_2)(x - p_3) f_3(x).$$

'Εργαζόμενοι δμοίως καὶ μετὰ $v-3$ βήματα λαμβάνομεν τελικῶς:

$$f(x) \equiv (x - p_1)(x - p_2) \dots (x - p_v) f_v(x).$$

"Αρα $(x - p_1)(x - p_2) \dots (x - p_v) / f(x)$ μὲ p_1, p_2, \dots, p_v διαφόρους ἀνὰ δύο. Τὸ ἀντίστροφον εἴναι προφανές.

"Α σκησις. 'Αποδείξατε τὸ ἀνωτέρω θεώρημα καὶ διὰ τῆς τελείας ἐπαγωγῆς.

§ 66. Θεώρημα. — Πᾶν ἀκέραιον πολυώνυμον ν βαθμοῦ

$$f(x) \equiv a_v x^v + a_{v-1} x^{v-1} + \dots + a_0$$

ἔχει ν τὸ πλῆθος ρίζας p_1, p_2, \dots, p_v καὶ ἀληθεύει :

$$f(x) \equiv a_v (x - p_1)(x - p_2) \dots (x - p_v).$$

'Α πόδειξις. Μὲ $v \geqq 1$, κατὰ τὸ θεώρημα τοῦ D'Alembert, τὸ $f(x)$ ἔχει μίαν ρίζαν $p_1 \in \mathbf{C}$. **"Αρα** $f(p_1) = 0$ ἢ ισοδυνάμως

$$f(x) \equiv (x - p_1) f_1(x) \text{ μὲ } f_1(x) \text{ βαθμοῦ } v-1 \quad (1)$$

Μὲ $v-1 \geqq 1$, τὸ $f_1(x)$ ἔχει μίαν ρίζαν $p_2 \in \mathbf{C}$ καὶ ἐπομένως

$$f_1(x) \equiv (x - p_2) f_2(x) \text{ μὲ } f_2(x) \text{ βαθμοῦ } v-2 \quad (2)$$

Συνεχίζοντες δύοις, λαμβάνομεν :

$$f_2(x) \equiv (x - p_3) f_3(x) \text{ μὲ } f_3(x) \text{ βαθμοῦ } n-3 \quad (3)$$

$$f_{n-1}(x) \equiv (x - p_n) f_n(x) \text{ βαθμοῦ } n-n = 0. \quad (n)$$

Πολ/ζοντες τὰς ταύτητας (1), (2), (3), ..., (n) κατὰ μέλη, λαμβάνομεν :

$$f(x) \cdot f_1(x) \cdot f_2(x) \cdots f_{n-1}(x) \equiv (x - p_1)(x - p_2) \cdots (x - p_n) f_n(x) \cdot f_{n-1}(x) \cdots f_1(x). \quad (\sigma)$$

? Άλλα, είναι $f_1(x) \cdot f_2(x) \cdots f_{n-1}(x) \not\equiv 0$ ώς έχον βαθμὸν $(n-1) + (n-2) + \dots + 1$.

? Αρα ἐκ τῆς (σ) καὶ τοῦ θεωρήματος § 53, συνάγομεν :

$$f(x) \equiv f_n \cdot (x - p_1)(x - p_2) \cdots (x - p_n)$$

εἰς τὸ β' μέλος τῆς δόποιας δ συντελεστῆς τοῦ x^n είναι f_n . ? Αρα $f_n = \alpha_n$, ὅτε

$$f(x) \equiv \alpha_n (x - p_1)(x - p_2) \cdots (x - p_n).$$

Π αρατήρησις. ? Εὰν εἰς τὴν τελευταίαν ταυτότητα (2) είναι $p_1 = p_2$, τότε τὸ γινόμενον $(x - p_1)(x - p_2)$ γίνεται $(x - p_1)^2$ καὶ λέγομεν ὅτι ἡ ρίζα p_1 είναι διπλῆ, ἢ είναι βαθμοῦ πολλαπλότητος δύο. ? Ομοίως ἐὰν είναι $p_1 = p_2 = p_3$, τότε τὸ γινόμενον $(x - p_1)(x - p_2)(x - p_3)$ γίνεται $(x - p_1)^3$ καὶ λέγομεν ὅτι ἡ ρίζα p_1 είναι τριπλῆ, ἢ είναι βαθμοῦ πολλαπλότητος τρία.

Διὰ νὰ είμεθα περισσότερον ἀκριβεῖς δίδομεν τὸν κάτωθι γενικὸν ὄρισμόν :

Mia rίza ρ ἐνὸς πολυωνύμου $f(x)$, διαφόρου τοῦ μηδενικοῦ, θὰ λέγομεν ὅτι είναι πολλαπλῆ τάξεως k , ἢ είναι βαθμοῦ πολλαπλότητος k (k ἀκέραιος ≥ 1), τότε καὶ μόνον τότε, ἄν :

$$(x - \rho)^k \mid f(x) \text{ καὶ } (x - \rho)^{k+1} \nmid f(x).$$

? Εὰν $k = 1$, τότε ἡ ρίζα ρ λέγεται ἀπλῆ, ἐὰν $k = 2$ διπλῆ, κ.ο.κ.

Είναι φανερὸν ὅτι, ἐὰν ἔν αὐτέραιον πολυώνυμον $f(x)$ ἔχῃ μίαν ρίζαν ρ βαθμοῦ πολλαπλότητος k , τότε δ βαθμὸς n αὐτοῦ είναι $\geq k$.

? Εκ τοῦ ἀνωτέρω ὄρισμοῦ προκύπτει τώρα ἡ ἔξης σπουδαία πρότασις :

? Η ἀναγκαία καὶ ίκανὴ συνθήκη, ἵνα εἰς ἀριθμὸς ρ είναι ρίζα, βαθμοῦ πολλαπλότητος k , ἐνὸς πολυωνύμου $f(x)$, είναι : νὰ ὑπάρχῃ ἀκέραιον πολυώνυμον $\phi(x)$ τοιοῦτον, ὥστε :

$$(1) \quad f(x) \equiv (x - \rho)^k \cdot \phi(x) \text{ καὶ } (2) \quad \phi(\rho) \neq 0.$$

? Α πόδειξις : ? Η συνθήκη είναι ἀναγκαία. Πράγματι, τὸ ὅτι ὑπάρχει ἀκέραιον πολυώνυμον $\phi(x)$, προκύπτει ἀπὸ τὸ γενονός, ὅτι τὸ $f(x)$ είναι διαιρετὸν διὰ $(x - \rho)^k$, ἀρα ἔχομεν :

$$f(x) \equiv (x - \rho)^k \cdot \phi(x).$$

? Εξ ἄλλου, ἐὰν ἦτο $\phi(\rho) = 0$, τότε $x - \rho \mid \phi(x)$, δηλ. $\phi(x) = (x - \rho) \cdot \pi(x)$ καὶ ἐπομένως θὰ ἴσχυε :

$$f(x) \equiv (x - \rho)^{k+1} \cdot \pi(x), \text{ δηλ. } (x - \rho)^{k+1} \mid f(x), \text{ ὅπερ ἀτοπον.}$$

? Η συνθήκη είναι ίκανή. Πράγματι, ὑποθέσωμεν ὅτι :

$$f(x) \equiv (x - \rho)^k \cdot \phi(x) \quad (1)$$

$$\mu \epsilon \phi(\rho) \neq 0. \quad (2)$$

‘Η (1) δεικνύει, ότι πράγματι τὸ $f(x)$, είναι διαιρέτὸν διὰ $(x - \rho)^k$, ήτοι $(x - \rho)^k | f(x)$.

Έὰν καὶ $(x - \rho)^{k+1} | f(x)$, τότε δυνάμεθα νὰ εὔρωμεν ἀκέραιον πολυώνυμον $g(x)$, ὥστε :

$$\begin{aligned} f(x) &\equiv (x - \rho)^{k+1} \cdot g(x) \\ \text{ή} \quad f(x) &\equiv (x - \rho)^k \cdot (x - \rho) g(x). \end{aligned} \quad (3)$$

Συγκρίνοντες τὰς (1) καὶ (3) λαμβάνομεν :

$$\phi(x) \equiv (x - \rho) \cdot g(x). \quad (4)$$

‘Η (4), διὰ $x = \rho$, γίνεται :

$$\begin{aligned} \phi(\rho) &\equiv 0 \cdot g(\rho) \\ \text{ή} \quad \phi(\rho) &= 0, \end{aligned}$$

ὅπερ ἄτοπον, διότι ἀντίκειται εἰς τὴν (2). ‘Η πρότασις ὅθεν ἀπεδείχθη.

Έὲν τῶν ἀνωτέρω συνάγομεν ὅτι : Εἰς κάθε ρίζαν πολυώνυμου $f(x) \not\equiv 0$ ἀντιστοιχεῖ μονοσημάντως εἰς μέγιστος ἀκέραιος $k \geq 1$. Έὰν συνεπῶς τὸ πολυώνυμον $f(x)$, βαθμοῦ v , ἔχῃ ὡς ρίζας τοὺς ἀριθμοὺς $\rho_1, \rho_2, \dots, \rho_k$ καὶ ἐκάστην μὲ βαθμὸν πολλαπλότητος $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ ἀντιστοίχως, θὰ ἔχωμεν :

$$f(x) \equiv \alpha_v (x - \rho_1)^{\lambda_1} \cdot (x - \rho_2)^{\lambda_2} \cdots (x - \rho_k)^{\lambda_k},$$

ἔνθα είναι $\lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_k = v$, $(k \leq v)$.

‘Η παράστασις αὕτη, ἢτις είναι μονοσημάντως ὠρισμένη διὰ κάθε πολυώνυμον, ἂν δὲν λαμβάνεται ὑπὸ ὅψιν ἡ θέσις τῶν παραγόντων ἐν αὐτῇ, καλεῖται : «ἀνάλυσις τοῦ πολυωνύμου $f(x)$ εἰς γινόμενον πρωτοβαθμίων παραγόντων».

Έ φαρμογή : Τὸ πολυώνυμον $f(x) \equiv x^6 + 3x^5 - 4x^4 - 6x^3 + x^2 + 3x + 2$ ἀναλύεται εἰς γινόμενον πρωτοβαθμίων παραγόντων ὡς κάτωθι :

$$f(x) \equiv (x - 1)^2(x + 1)^3(x + 2),$$

ήτοι ἔχει τὰς ρίζας $1, -1, -2$ εἰς βαθμούς πολλαπλότητος ἀντιστοίχως $2, 3, 1$.

§ 67. Θεώρημα. — Έὰν τὸ ἀκέραιον πολυώνυμον :

$$f(x) \equiv a_v x^v + a_{v-1} x^{v-1} + \cdots + a_1 x + a_0$$

μηδενίζεται διὰ $v+1$ τιμᾶς τοῦ x , διαφόρους μεταξύ των, τότε τοῦτο είναι τὸ μηδενικὸν πολυώνυμον.

Α πόδειξις. Άς ὑποθέσωμεν ὅτι αἱ $v+1$ διάφοροι ἀλλήλων τιμαὶ τοῦ x :

$$\rho_1, \rho_2, \dots, \rho_v, \rho_{v+1}$$

μηδενίζουν τὸ πολυώνυμον $f(x)$. Τότε, συμφώνως πρὸς τὸ προηγούμενον θεώρημα, θὰ ἔχωμεν :

$$f(x) \equiv \alpha_v (x - \rho_1)(x - \rho_2) \cdots (x - \rho_v). \quad (1)$$

Η ταυτότης (1), διὰ $x = \rho_{v+1}$, γίνεται :

$$f(\rho_{v+1}) \equiv \alpha_v (\rho_{v+1} - \rho_1)(\rho_{v+1} - \rho_2) \cdots (\rho_{v+1} - \rho_v) = 0, \text{ καθόσον } f(\rho_{v+1}) = 0. \quad (2)$$

Έπειδή δέ: $\rho_{v+1} \neq \rho_1 \neq \rho_2 \neq \cdots \neq \rho_v$, θά είναι: $(\rho_{v+1} - \rho_1)(\rho_{v+1} - \rho_2) \cdots (\rho_{v+1} - \rho_v) \neq 0$,

ότε έκ της (2), έπειται ότι: $\alpha_v = 0$. Τότε όμως τὸ πολυώνυμον $f(x)$ γίνεται:

$$f(x) \equiv \alpha_{v-1} x^{v-1} + \alpha_{v-2} x^{v-2} + \cdots + \alpha_1 x + \alpha_0. \quad (3)$$

Έργαζόμενοι όμοιως καὶ εἰς τὸ πολυώνυμον (3) ἀποδεικνύομεν, ότι $\alpha_{v-1} = 0$.

Όμοιως προχωροῦντες εύρισκομεν ότι: $\alpha_{v-2} = 0, \alpha_{v-3} = 0, \dots, \alpha_1 = 0, \alpha_0 = 0$.

Ωστε, ἀπεδείχθη ότι: $\alpha_v = \alpha_{v-1} = \cdots = \alpha_1 = \alpha_0 = 0$. $\quad (4)$

Ή (4) ἀποδεικνύει τὸ θεώρημα.

Ἐφαρμογή: Δεῖξατε ότι τὸ πολυώνυμον:

$$f(x) \equiv (x-a)^2 (\beta-\gamma) + (x-\beta)^2 (\gamma-a) + (x-\gamma)^2 (\alpha-\beta) + (\alpha-\beta) (\beta-\gamma) (\gamma-a)$$

είναι ἐκ ταυτότητος μηδέν.

Λύσις: Εύκολως διαπιστοῦμεν ότι: $f(\alpha) = f(\beta) = f(\gamma) = 0$.

Έπειδὴ τὸ $f(x)$ είναι δευτέρου βαθμοῦ καὶ μηδενίζεται διὰ τιμᾶς τοῦ x περισσοτέρας τοῦ βαθμοῦ του ἔπειται, ότι τὸ $f(x)$ είναι ἐκ ταυτότητος μηδέν.

Πόρισμα I. — Πᾶν ἀκέραιον πολυώνυμον βαθμοῦ n , ἔχει ν τὸ πολὺ διαφόρους πίζας.

Πόρισμα II. — Έὰν τὸ ἀκέραιον πολυώνυμον:

$$f(x) \equiv a_v x^v + a_{v-1} x^{v-1} + \cdots + a_1 x + a_0$$

μηδενίζεται δι' ἀπείρους τιμᾶς τοῦ x , τότε τοῦτο είναι ἐκ ταυτότητος μηδέν.

Πόρισμα III. — Έὰν δύο ἀκέραια πολυώνυμα $f(x)$ καὶ $\phi(x)$, βαθμῶν v, λ αριθμούν τὰς αὐτὰς τιμᾶς διὰ $v+1$ διαφόρους τιμᾶς τοῦ x , τότε τὰ πολυώνυμα ταῦτα είναι ἐκ ταυτότητος ἵσα.

§ 68. Θεώρημα. — Έὰν τὰ ἀκέραια πολυώνυμα :

$$f_1(x) \equiv a_v x^v + a_{v-1} x^{v-1} + \cdots + a_1 x + a_0, \quad a_v \neq 0$$

$$f_2(x) \equiv \beta_v x^v + \beta_{v-1} x^{v-1} + \cdots + \beta_1 x + \beta_0, \quad \beta_v \neq 0$$

ἔχουν τὰς αὐτὰς ν διαφόρους ἀλλήλων πίζας $\rho_1, \rho_2, \dots, \rho_v$, τότε :

$$\frac{\beta_v}{a_v} = \frac{\beta_{v-1}}{a_{v-1}} = \cdots = \frac{\beta_1}{a_1} = \frac{\beta_0}{a_0}$$

καὶ ἀντιστρόφως.

Άποδειξίς: Κατὰ τὰ γνωστὰ (§ 66), θὰ ἔχωμεν

$$f_1(x) \equiv \alpha_v (x - \rho_1) (x - \rho_2) \cdots (x - \rho_v) \quad (1)$$

$$f_2(x) \equiv \beta_v (x - \rho_1) (x - \rho_2) \cdots (x - \rho_v). \quad (2)$$

Ή σχέσις (2) γράφεται :

$$f_2(x) \equiv \frac{\beta_v}{\alpha_v} \cdot \alpha_v (x - \rho_1) (x - \rho_2) \cdots (x - \rho_v) \equiv \frac{\beta_v}{\alpha_v} f_1(x). \quad (3)$$

Έὰν δὲ τεθῇ $\frac{\beta_v}{\alpha_v} = k$, ἐκ της (3) λαμβάνομεν :

$$f_2(x) \equiv k \cdot f_1(x), \text{ δηλαδή :}$$

$$\beta_v x^v + \beta_{v-1} x^{v-1} + \cdots + \beta_1 x + \beta_0 \equiv k \alpha_v x^v + k \alpha_{v-1} x^{v-1} + \cdots + k \alpha_1 x + k \alpha_0,$$

καὶ ἐκ τοῦ δρισμοῦ τῆς ισότητος δύο πολυωνύμων, ἔχομεν τὰς σχέσεις :

$$\beta_v = k\alpha_v, \quad \beta_{v-1} = k\alpha_{v-1}, \quad \dots, \quad \beta_1 = k\alpha_1, \quad \beta_0 = k\alpha_0 \quad (4)$$

ἢ

$$\boxed{\frac{\beta_v}{\alpha_v} = \frac{\beta_{v-1}}{\alpha_{v-1}} = \dots = \frac{\beta_1}{\alpha_1} = \frac{\beta_0}{\alpha_0}} \quad (5)$$

Αντιστρόφως : "Εστω ὅτι ἀληθεύει ἡ (5). Θέτομεν τοὺς ισους λόγους (5) ἵσον μὲν k , ὅτε ἔχομεν :

$$\beta_v = k\alpha_v, \quad \beta_{v-1} = k\alpha_{v-1}, \quad \dots, \quad \beta_1 = k\alpha_1, \quad \beta_0 = k\alpha_0.$$

Τότε :

$$f_2(x) \equiv k\alpha_v x^v + k\alpha_{v-1} x^{v-1} + \dots + k\alpha_0 \equiv k(\alpha_v x^v + \alpha_{v-1} x^{v-1} + \dots + \alpha_0),$$

ἵτοι :

$$f_2(x) \equiv k f_1(x).$$

Έξ αὐτῆς προκύπτει ὅτι κάθε ρίζα τοῦ $f_1(x)$ εἶναι καὶ ρίζα τοῦ πολυωνύμου $f_2(x)$.

Παρατήρησις : Αἱ ισότητες (4) δὲν ἀντικαθίστανται ὑπὸ τῶν ισοτήτων (5), δταν εἰς τῶν συντελεστῶν β_j , $j = 0, 1, 2, \dots, v$, π.χ. $\delta_{v-\lambda}$, εἶναι μηδέν. Ἐκ τῆς (4), ἡ σχέσις $\beta_{v-\lambda} = k \cdot \alpha_{v-\lambda}$ μᾶς δίδει καὶ $\alpha_{v-\lambda} = 0$, ὅτε τὰ πολυώνυμα $f_1(x)$, $f_2(x)$ δὲν θὰ ἔχουν τὸν δρόν μὲ τὸ $x^{v-\lambda}$ καὶ ἀπό τὰς ισότητες (5) θὰ λείπῃ ὁ λόγος $\frac{\beta_{v-\lambda}}{\alpha_{v-\lambda}}$. Ἐάν πάλιν τὸ $\alpha_{v-\lambda}$ εἶναι μηδέν, ὁ λόγος $\frac{\beta_{v-\lambda}}{\alpha_{v-\lambda}}$ δὲν ἔχει νόημα πραγματικοῦ ἀριθμοῦ καὶ συνεπῶς καὶ πάλιν μεταξύ τῶν λόγων τῶν ισοτήτων (5) δὲν θὰ ὑπάρχῃ ὁ λόγος $\frac{\beta_{v-\lambda}}{\alpha_{v-\lambda}}$.

§ 69 Θεώρημα. — "Ἐάν τὸ ἀκέραιον πολυνόμυμον $f(x) \equiv a_v x^v + a_{v-1} x^{v-1} + \dots + a_1 x + a_0$, $a_v \neq 0$, μὲ πραγματικοὺς συντελεστὰς $a_v, a_{v-1}, \dots, a_1, a_0$, δέχεται ὡς ρίζαν τὸν μιγαδικὸν ἀριθμὸν $\alpha + i\beta$ ($\alpha, \beta \in \mathbb{R}, \beta \neq 0$), τότε θὰ δέχεται ὡς ρίζαν καὶ τὸν συζυγὴν αὐτοῦ $\alpha - i\beta$.

"Υποτίθεται ὅτι ὁ βαθμὸς τοῦ πολυωνύμου $f(x)$ εἶναι μεγαλύτερος ἢ ἴσος τοῦ 2.

Α πόδειξις : "Εστω $\phi(x)$ τὸ πολυωνύμον δευτέρου βαθμοῦ, τὸ ὅποιον ἔχει ὡς ρίζας τοὺς ἀριθμοὺς $\alpha + i\beta$ καὶ $\alpha - i\beta$, ἵτοι :

$$\phi(x) \equiv [x - (\alpha + i\beta)][x - (\alpha - i\beta)] \equiv x^2 - 2\alpha x + (\alpha^2 + \beta^2).$$

Τὸ $f(x)$ διαιρούμενον διὰ τοῦ $\phi(x)$ θὰ δώσῃ, κατὰ τὰ γνωστὰ (§ 64), πηλίκον ἀκέραιον πολυωνύμον, ἔστω τὸ $\pi(x)$ καὶ πρωτοβάθμιον ὑπόλοιπον μὲ πραγματικοὺς συντελεστάς, ἔστω τὸ $\gamma x + \delta$. Τότε, κατὰ τὴν ταυτότητα διαιρέσεως ἀκέραιών πολυωνύμων, θὰ ἔχωμεν :

$$f(x) \equiv \phi(x) \cdot \pi(x) + (\gamma x + \delta). \quad (1)$$

"Επειδὴ $f(\alpha + i\beta) = 0$ καὶ $\phi(\alpha + i\beta) = 0$, ἐκ τῆς (1) ἐπεταί :

$$\gamma(\alpha + i\beta) + \delta = 0$$

$$\text{ἢ } (\alpha\gamma + \delta) + i\beta\gamma = 0, \text{ ἐξ οὗ : } \begin{cases} \alpha\gamma + \delta = 0 \\ \beta\gamma = 0. \end{cases} \quad (2)$$

* Επειδή όμως $\beta \neq 0$, έπειται, έκ της δευτέρας τῶν (2), $\gamma = 0$. Τότε, έκ της πρώτης τῶν (2), προκύπτει $\delta = 0$.

Διὰ $\gamma = \delta = 0$ ἡ (1) γίνεται :

$$f(x) \equiv \phi(x) \cdot \pi(x). \quad (3)$$

* Έκ της (3) προκύπτει :

$$f(\alpha - i\beta) \equiv \phi(\alpha - i\beta) \pi(\alpha - i\beta)$$

καὶ ἐπειδὴ $\phi(\alpha - i\beta) = 0$, θὰ είναι : $f(\alpha - i\beta) = 0$, ἥτοι τὸ $f(x)$ δέχεται ως ρίζαν καὶ τὸν μιγαδικὸν ἀριθμὸν $\alpha - i\beta$.

Γενικώτερον ισχύει τὸ κάτωθι θεώρημα :

§ 70. Θεώρημα.—'Εὰν ἀκέραιον πολυώνυμον, μὲ πραγματικοὺς συντελεστάς, δέχεται ως ρίζαν τὸν μιγαδικὸν ἀριθμὸν $a + i\beta$ ($a, \beta \in \mathbb{R}, \beta \neq 0$) εἰς βαθμὸν πολλαπλότητος k , θὰ δέχεται ἐπίσης ως ρίζαν καὶ τὸν συζυγῆ του $a - i\beta$ καὶ μάλιστα μὲ τὸν αὐτὸν βαθμὸν πολλαπλότητος k .

'Η ἀπόδειξης διὰ τῆς εἰς ἄποπον ἀπαγωγῆς.

Πόρισμα I.—'Εὰν ἀκέραιον πολυώνυμον $f(x)$, μὲ πραγματικοὺς συντελεστάς, ἔχῃ μιγαδικὰς ρίζας, τὸ πλήθος τῶν μιγαδικῶν ριζῶν είναι ἀρτίος ἀριθμός.

Πόρισμα II.—'Ακέραιον πολυώνυμον περιττοῦ βαθμοῦ μὲ πραγματικοὺς συντελεστάς ἔχει τούλαχιστον μίαν πραγματικὴν ρίζαν, ἀρτίου δὲ βαθμοῦ δύναται νὰ ἔχῃ καὶ πάσας τὰς ρίζας του μιγαδικάς.

§ 71. Θεώρημα.—'Εὰν ἀκέραιον πολυώνυμον μὲ ρητοὺς συντελεστάς δέχεται ρίζαν τὴν $a + \sqrt{\beta}$ ($a \in \mathbb{Q}, \beta \in \mathbb{Q}^+, \beta \neq \theta^2$, ὅπου $\theta \in \mathbb{Q}$) θὰ δέχεται ἐπίσης καὶ τὴν $a - \sqrt{\beta}$ καὶ μάλιστα μὲ τὸν αὐτὸν βαθμὸν πολλαπλότητος.

'Η ἀπόδειξης είναι ἀνάλογος τῆς τοῦ προηγουμένου θεωρήματος καὶ ως ἐκ τούτου ἐπαφίεται ώς ἀσκησις.

'Ε φ α ρ μ ο γ ή. Νὰ ενρεθῇ πολυώνυμον τετάρτου βαθμοῦ μὲ ἀκέραιους συντελεστάς, τὸ δόποιον νὰ διαιρῆται διὰ τοῦ : $x^2 - (\sqrt{2} + i)x + i\sqrt{2}$.

Α ν σ i c. Παρατηροῦμεν ὅτι :

$$x^2 - (\sqrt{2} + i)x + i\sqrt{2} \equiv (x - \sqrt{2})(x - i).$$

'Εὰν $f(x)$ είναι τὸ ζητούμενον πολυώνυμον, τότε, ἐπειδὴ διαιρεῖται διὰ $x - \sqrt{2}$, δυνάμει τοῦ ἀνωτέρω θεωρήματος, θὰ διαιρῆται καὶ διὰ $x + \sqrt{2}$, δύοις ἐπειδὴ διαιρεῖται διὰ $x - i$, δυνάμει τοῦ θεωρήματος § 69, θὰ διαιρῆται καὶ διὰ $x + i$, δθεν, δυνάμει τοῦ θεωρήματος § 65, θὰ διαιρῆται καὶ διὰ τοῦ γινομένου αὐτῶν. Συνεπῶς θὰ ἔχωμεν :

$$f(x) \equiv (x - \sqrt{2})(x + \sqrt{2})(x - i)(x + i) \equiv (x^2 - 2)(x^2 + 1) \equiv x^4 - x^2 - 2.$$

§ 72. Ἐφαρμογαὶ ἐπὶ τῶν ἰδιοτήτων τῶν ἀκεραίων πολυωνύμων.

'Ε φ α ρ μ ο γ ή 1η : Προσδιορίσατε τοὺς πραγματικοὺς ἀριθμοὺς α, β , ἵνα τὸ πολυώνυμον $f(x) \equiv x^3 - 2ax^2 + \beta x + 6$ διαιρῆται διὰ τοῦ γινομένου $(x - 2)(x - 3)$.

Α ν σ i c. Ἐπειδὴ θέλομεν τὸ πολυώνυμον $f(x) \equiv x^3 - 2ax^2 + \beta x + 6$ νὰ διαιρῆται (ἀκριβῶς) διὰ τοῦ γινομένου $(x - 2)(x - 3)$, ἔπειται ὅτι ἀρκεῖ νὰ διαιρῆται ἀκριβῶς διὰ $x - 2$ καὶ διὰ $x - 3$.

Πρός τοῦτο πρέπει καὶ ἀρκεῖ :

$$f(2) = -8\alpha + 2\beta + 14 = 0, \quad \text{ἢτοι} \quad 4\alpha - \beta = 7 \quad (1)$$

$$f(3) = -18\alpha + 3\beta + 33 = 0, \quad \text{ἢτοι} \quad 6\alpha - \beta = 11. \quad (2)$$

Λύοντες τὸ σύστημα τῶν ἔξισώσεων (1) καὶ (2) εὑρίσκομεν :

$$\alpha = 2, \quad \beta = 1.$$

Σημείωσις : Τοὺς πραγματικοὺς ἀριθμοὺς α καὶ β τῆς ἀνωτέρω ἐφαρμογῆς δυνάμεθα νὰ προσδιορίσωμεν καὶ δι' ἄλλων τρόπων. Ἐφαρμόσατε ἐναντὸν ἔξι αὐτῶν διὰ τὴν εὔρεσιν τῶν α καὶ β.

Ἐφαρμογὴ 2a : Ἀκέραιον πολυώνυμον $f(x)$ διαιρούμενον διὰ $x+1$ δίδει ὑπόλοιπον 2, διαιρούμενον διὰ $x-2$ δίδει ὑπόλοιπον 11 καὶ διὰ $x+3$ δίδει ὑπόλοιπον 6. Νὰ εὑρεθῇ τὸ ὑπόλοιπον τῆς διαιρέσεως τοῦ $f(x)$ διὰ τοῦ γινομένου

$$(x+1)(x-2)(x+3).$$

Ἄνσις : Ἐξ ὑποθέσεως εἶναι :

$$f(-1) = 2, \quad f(2) = 11, \quad f(-3) = 6. \quad (1)$$

Τὸ πολυώνυμον $f(x)$ διαιρούμενον διὰ τοῦ γινομένου :

$$(x+1)(x-2)(x+3),$$

τὸ ὅποιον εἶναι τρίτου βαθμοῦ, θὰ δώσῃ ἐν πηλίκον $\pi(x)$ καὶ ἐν ὑπόλοιπον τὸ πολὺ δευτέρου βαθμοῦ, ἔστω τὸ $\alpha x^2 + \beta x + \gamma$.

Κατὰ τὴν ταυτότητα τῆς διαιρέσεως θὰ ἔχωμεν :

$$f(x) \equiv (x+1)(x-2)(x+3) \cdot \pi(x) + \alpha x^2 + \beta x + \gamma. \quad (2)$$

Θέτοντες εἰς τὴν (2) διαδοχικῶς $x = -1, x = 2, x = -3$ καὶ ἔχοντες ὑπὸψιν τὰς (1), λαμβάνομεν τὸ σύστημα :

$$(\Sigma) \begin{cases} \alpha - \beta + \gamma = 2 \\ 4\alpha + 2\beta + \gamma = 11 \\ 9\alpha - 3\beta + \gamma = 6. \end{cases}$$

Λύοντες τὸ σύστημα (Σ) εὑρίσκομεν : $\alpha = 1, \beta = 2, \gamma = 3$.

Ωστε, τὸ ζητούμενον ὑπόλοιπον θὰ εἴναι : $x^2 + 2x + 3$.

§ 73. Σχέσεις μεταξὺ τῶν ριζῶν καὶ τῶν συντελεστῶν ἐνὸς ἀκέραιοις πολυωνύμου. — Ἔστω τὸ ἀκέραιον πολυώνυμον :

$$f(x) \equiv \alpha_v x^v + \alpha_{v-1} x^{v-1} + \cdots + \alpha_1 x + \alpha_0, \quad (\alpha_v \neq 0)$$

μὲριζας $p_1, p_2, p_3, \dots, p_{v-1}, p_v$.

Ὦς γνωστὸν (§ 66) ισχύει :

$$\alpha_v x^v + \alpha_{v-1} x^{v-1} + \cdots + \alpha_1 x + \alpha_0 \equiv \alpha_v (x - p_1)(x - p_2) \cdots (x - p_v). \quad (1)$$

Διαιροῦντες ἀμφότερα τὰ μέλη τῆς (1) διὰ τοῦ $\alpha_v \neq 0$ καὶ ἐκτελοῦντες τὰς πράξεις εἰς τὸ δεύτερον μέλος, τὸ ὅποιον καὶ διατάσσομεν κατὰ τὰς κατιούσας δυνάμεις τοῦ x , ἔχομεν :

$$x^v + \frac{\alpha_{v-1}}{\alpha_v} x^{v-1} + \frac{\alpha_{v-2}}{\alpha_v} x^{v-2} + \cdots + \frac{\alpha_1}{\alpha_v} x + \frac{\alpha_0}{\alpha_v} \equiv x^v - (p_1 + p_2 + \cdots + p_v)x^{v-1} + (p_1 p_2 + p_1 p_3 + \cdots + p_{v-1} p_v)x^{v-2} - \cdots + (-1)^v p_1 p_2 \cdots p_v \cdots$$

Έξισοῦντες τοὺς συντελεστὰς τῶν ἴσοβαθμίων ὅρων· λαμβάνομεν τὰς σχέσεις :

$$\begin{aligned} S_1 &\equiv p_1 + p_2 + p_3 + \cdots + p_{v-1} + p_v = - \frac{\alpha_{v-1}}{\alpha_v} \\ S_2 &\equiv p_1 p_2 + p_1 p_3 + \cdots + p_1 p_v + p_2 p_3 + \cdots + p_2 p_v + \cdots + p_{v-1} p_v = + \frac{\alpha_{v-2}}{\alpha_v} \\ S_3 &\equiv p_1 p_2 p_3 + p_1 p_2 p_4 + \cdots + p_1 p_2 p_v + \cdots + p_{v-2} p_{v-1} p_v = - \frac{\alpha_{v-3}}{\alpha_v} \\ &\dots \\ S_v &\equiv p_1 p_2 p_3 \cdots p_{v-1} p_v = (-1)^v \frac{\alpha_0}{\alpha_v} \end{aligned}$$

Αἱ σχέσεις αὗται μεταξὺ τῶν ρίζῶν καὶ τῶν συντελεστῶν ἐνὸς πολυωνύμου εἶναι γνωσταὶ ὡς σχέσεις τοῦ Vieta.

Διὰ τῶν σχέσεων τούτων δυνάμεθα νὰ εὑρωμεν πολυώνυμον, τοῦ ὁποίου ἔχουν δοθῆ ἀριθμοὶ ρίζαι.

Ἐφαρμογὴ 1η : Δίδεται τὸ πολυώνυμον :

$$f(x) \equiv 2x^3 - 3x^2 + 4x - 8.$$

Ἐὰν p_1, p_2, p_3 εἶναι αἱ ρίζαι τοῦ $f(x)$, νὰ εὑρεθῇ ἡ τιμὴ τῆς παραστάσεως :

$$p_1^2 + p_2^2 + p_3^2.$$

Λύσις : Ἰσχύει προφανῶς ἡ ἴσοτης :

$$p_1^2 + p_2^2 + p_3^2 = (p_1 + p_2 + p_3)^2 - 2(p_1 p_2 + p_1 p_3 + p_2 p_3). \quad (1)$$

$$\text{Άλλα : } p_1 + p_2 + p_3 = -\frac{-3}{2} = \frac{3}{2} \quad (2)$$

$$\text{καὶ } p_1 p_2 + p_1 p_3 + p_2 p_3 = \frac{4}{2} = 2. \quad (3)$$

Ἡ (1), δυνάμει τῶν (2) καὶ (3), γίνεται :

$$p_1^2 + p_2^2 + p_3^2 = \left(\frac{3}{2}\right)^2 - 2 \cdot 2 = \frac{9}{4} - 4 = -\frac{7}{4}.$$

Ἐφαρμογὴ 2a : Νὰ εὑρεθῇ πολυώνυμον τρίτου βαθμοῦ, τοῦ ὁποίου δύο ρίζαι εἶναι οἱ ἀριθμοὶ $p_1 = 5$ καὶ $p_2 = i$.

Λύσις : Ἐστω $\alpha x^3 + \beta x^2 + \gamma x + \delta$, $\alpha \neq 0$ τὸ ζητούμενον πολυώνυμον τρίτου βαθμοῦ.

Προφανῶς ἡ τρίτη ρίζα τοῦ ἐν λόγῳ πολυώνυμον εἶναι : $p_3 = -i$, (διατί;)

Τότε, συμφώνως πρὸς τὰς σχέσεις τοῦ Vieta, θὰ ἔχωμεν :

$$\left. \begin{array}{l} p_1 + p_2 + p_3 = -\frac{\beta}{\alpha}, \\ p_1 p_2 + p_1 p_3 + p_2 p_3 = \frac{\gamma}{\alpha}, \\ p_1 p_2 p_3 = -\frac{\delta}{\alpha}, \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{ήτοι} \\ \text{ήτοι} \\ \text{ήτοι} \end{array} \quad \begin{array}{l} 5 = -\frac{\beta}{\alpha} \\ 1 = \frac{\gamma}{\alpha} \\ 5 = -\frac{\delta}{\alpha} \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{array}{l} \beta = -5\alpha \\ \gamma = \alpha \\ \delta = -5\alpha. \end{array}$$

"Οθεν τὸ ζητούμενον πολυωνυμον εἶναι :

$$f(x) \equiv \alpha(x^3 - 5x^2 + x - 5).$$

* Διαιρετότης ἀκεραίου πολυωνύμου διὰ τοῦ διωνύμου $(x - a)^v$.

§ 74. Θεώρημα. — 'Ακέραιον πολυωνυμον $f(x)$ διαιρεῖται διὰ τοῦ $(x - a)^v$, $v \in \mathbb{N}$, τότε, καὶ μόνον τότε, ἄν :

$$f(a) = 0, \quad f_1(a) = 0, \quad f_2(a) = 0, \dots, \quad f_{v-1}(a) = 0,$$

ἔνθα $f_1(x), f_2(x), \dots, f_{v-1}(x)$ εἶναι ἀντιστοίχως τὰ πηλίκα τῶν διαιρέσεων :

$$f(x) : (x - a), \quad f_1(x) : (x - a), \dots, \quad f_{v-2}(x) : (x - a).$$

'Α πόδειξις: "Εστω $\phi(x)$ τὸ πηλίκον τῆς διαιρέσεως τοῦ $f(x)$ διὰ τοῦ $(x - a)^v$, τότε ἔχομεν : $f(x) \equiv (x - a)^v \cdot \phi(x)$. (1)

Διὰ $x = a$ ἢ (1) δίδει $f(a) = 0$. Τοῦτο σημαίνει ὅτι τὸ $f(x)$ διαιρεῖται διὰ $x - a$. 'Εὰν $f_1(x)$ εἶναι τὸ πηλίκον τῆς διαιρέσεως τοῦ $f(x)$ διὰ $x - a$, τότε, διαιροῦντες ἀμφότερα τὰ μέλη τῆς (1) διὰ $x - a$, λαμβάνομεν τὴν ταυτότητα :

$$f_1(x) \equiv (x - a)^{v-1} \cdot \phi(x). \quad (2)$$

Διὰ $x = a$ ἢ (2) δίδει $f_1(a) = 0$. Τοῦτο σημαίνει ὅτι τὸ πολυωνυμον $f_1(x)$ διαιρεῖται διὰ $x - a$. 'Εὰν $f_2(x)$ εἶναι τὸ πηλίκον τῆς διαιρέσεως $f_1(x) : x - a$, τότε, διαιροῦντες ἀμφότερα τὰ μέλη τῆς (2) διὰ $x - a$, λαμβάνομεν τὴν ταυτότητα : $f_2(x) \equiv (x - a)^{v-2} \cdot \phi(x)$. (3)

Διὰ $x = a$ ἢ (3) δίδει $f_2(a) = 0$, τὸ όποιον σημαίνει ὅτι τὸ $f_2(x)$ διαιρεῖται διὰ $x - a$.

Προχωροῦντες, καθ' ὅμοιον τρόπον, εύρίσκομεν ὅτι τὸ πηλίκον τῆς $v - 1$ τάξεως εἶναι : $f_{v-1}(x) \equiv (x - a) \cdot \phi(x)$. (v)

Διὰ $x = a$ ἢ σχέσις αὗτη γίνεται $f_{v-1}(a) = 0$, δηλαδὴ τὸ πολυωνυμον $f_{v-1}(x)$ διαιρεῖται διὰ $x - a$.

'Αντιστρόφως. 'Εφ' ὅσον $f(a) = 0, f_1(a) = 0, \dots, f_{v-1}(a) = 0$, θὰ ἔχωμεν :

$$\left| \begin{array}{l} f(x) \equiv (x - a) f_1(x) \\ f_1(x) \equiv (x - a) f_2(x) \\ f_2(x) \equiv (x - a) f_3(x) \\ \dots \dots \dots \\ f_{v-1}(x) \equiv (x - a) f_v(x) \end{array} \right.$$

Διὰ πολλαπλασιασμοῦ τούτων κατὰ μέλη, λαμβάνομεν τὴν ταυτότητα : $f(x) \equiv (x - a)^v f_v(x)$, ἢ όποια φανερώνει ὅτι τὸ πολυωνυμον $f(x)$ διαιρεῖται διὰ $(x - a)^v$.

Παρατήρησις. Διὰ νὰ δείξωμεν ὅτι ἀκέραιον πολυώνυμον διαιρεῖται διά τινος δυνάμεως τοῦ $x - \alpha$ ἐργαζόμεθα πολλάκις ὡς ἔξῆς :

Μέθοδος τῆς ἀντικαταστάσεως. "Εστω ὅτι τὸ πολυώνυμον $f(x)$ διαιρεῖται διὰ $(x - \alpha)^2$. Τότε θὰ ἔχωμεν τὴν ταυτότητα :

$$f(x) \equiv (x - \alpha)^2 \cdot \varphi(x). \quad (1)$$

Θεωροῦμεν τὸν μετασχηματισμόν :

$$x - \alpha = y \iff x = y + \alpha \quad (2)$$

καὶ ἡ (1) γίνεται :

$$f(y + \alpha) \equiv y^2 \cdot \varphi(y + \alpha), \quad (3)$$

ὅπου $f(y + \alpha)$ καὶ $\varphi(y + \alpha)$ ἀκέραια πολυώνυμα τοῦ y .

"Εκ τῆς (3) προκύπτει ὅτι τὸ $f(y + \alpha)$ διαιρεῖται ἀκριβῶς διὰ τοῦ y^2 . Πρὸς τοῦτο ἀρκεῖ τὸ $f(y + \alpha)$ νὰ στερῆται σταθεροῦ καὶ πρωτοβαθμίου ὅρου, ἥτοι νὰ εἴναι τῆς μορφῆς :

$$f(y + \alpha) \equiv \alpha_v y^v + \alpha_{v-1} y^{v-1} + \cdots + \alpha_3 y^3 + \alpha_2 y^2.$$

'Ομοίως ἵνα τὸ $f(x)$ διαιρῆται διὰ $(x - \alpha)^3$, πρέπει καὶ ἀρκεῖ τὸ $f(y + \alpha)$ νὰ διαιρῆται διὰ y^3 , ἥτοι νὰ εἴναι τῆς μορφῆς : $f(y + \alpha) \equiv \alpha_v y^v + \alpha_{v-1} y^{v-1} + \cdots + \alpha_4 y^4 + \alpha_3 y^3$, διότι διὰ τοῦ μετασχηματισμοῦ (2) προκύπτει ὅτι :

$$f(x) \equiv (x - \alpha)^3 \cdot \pi(x) \iff f(y + \alpha) \equiv y^3 \cdot \pi(y + \alpha).$$

'Εφαρμογὴ 1η : 'Εὰν ν φυσικὸς ἀριθμός, νὰ δειχθῇ ὅτι τὸ πολυώνυμον :

$$f(x) \equiv v x^{v+1} - (v+1) x^v + 1$$

διαιρεῖται διὰ τοῦ $(x - 1)^2$.

Λύσις. Διὰ $x = 1$ ἔχομεν :

$$f(1) = v - (v+1) + 1 = 0.$$

"Αρα τὸ $f(x)$ διαιρεῖται διὰ $x - 1$. 'Εκτελοῦντες τὴν διαίρεσιν εύρίσκομεν τὴν ταυτότητα :

$$f(x) \equiv (x - 1) \cdot [vx^v - (x^{v-1} + x^{v-2} + \cdots + x + 1)]. \quad (1)$$

'Εὰν θέσωμεν $f_1(x) \equiv vx^v - (x^{v-1} + x^{v-2} + \cdots + x + 1)$ παρατηροῦμεν ὅτι : $f_1(1) = v - (1 + 1 + \cdots + 1 + 1) = v - v = 0$. Τοῦτο δηλοῖ ὅτι τὸ πολυώνυμον $f_1(x)$ διαιρεῖται διὰ $x - 1$, ὅπότε θὰ ἔχωμεν :

$$f_1(x) \equiv (x - 1) \pi(x). \quad (2)$$

"Ενεκα ταύτης, ἡ (1) γίνεται :

$$f(x) \equiv (x - 1)^2 \cdot \pi(x),$$

ἥ δόποια φανερώνει ὅτι τὸ $f(x)$ διαιρεῖται διὰ $(x - 1)^2$.

'Εφαρμογὴ 2α : Νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι τὸ πολυώνυμον :

$$f(x) \equiv x^4 - 9x^3 + 25x^2 - 24x + 4$$

διαιρεῖται (ἀκριβῶς) διὰ τοῦ $(x - 2)^2$.

'Απόδειξις : 'Εκτελοῦμεν τὴν ἀντικατάστασιν :

$$x - 2 = y \iff x = y + 2$$

καὶ ἔχομεν : $f(y+2) = (y+2)^4 - 9(y+2)^3 + 25(y+2)^2 - 24(y+2) + 4.$

Μετὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν πράξεων εύρισκομεν :

$$f(y+2) \equiv y^4 - y^3 - 5y^2 = y^2(y^2 - y - 5)$$

ἡ διὰ τῆς ἀντικαταστάσεως $y = x - 2$ ἔχομεν :

$$f(x) \equiv (x-2)^2 \cdot [(x-2)^2 - (x-2) - 5],$$

ἡ δποία φανερώνει ὅτι τὸ $f(x)$ διαιρεῖται διὰ τοῦ $(x-2)^2$.

* Θεώρημα ἐπὶ τῶν ὑπολοίπων.

§ 75. Θεώρημα Iov. — Ἐὰν $v_1(x)$ καὶ $v_2(x)$ εἰναι τὰ ὑπόλοιπα τῶν διαιρέσεων $f_1(x) : \delta(x)$ καὶ $f_2(x) : \delta(x)$, $\delta(x) \not\equiv 0$, ἀντιστοίχως, τότε ισχύει ἡ λογικὴ ισοδυναμία :

$$\delta(x) | f_1(x) - f_2(x) \iff v_1(x) \equiv v_2(x).$$

*Απόδειξις : "Εστω $\delta(x) | f_1(x) - f_2(x)$, τότε $f_1(x) - f_2(x) \equiv \delta(x) \cdot \pi(x)$. (1)

*Εξ ἄλλου ἔχομεν :

$$f_1(x) \equiv \delta(x) \pi_1(x) + v_1(x), \quad \beta\alpha\theta\mu. v_1(x) < \beta\alpha\theta\mu. \delta(x) \quad (2)$$

$$f_2(x) \equiv \delta(x) \pi_2(x) + v_2(x), \quad \beta\alpha\theta\mu. v_2(x) < \beta\alpha\theta\mu. \delta(x). \quad (3)$$

*Ἐκ τῶν (2) καὶ (3) λαμβάνομεν :

$$f_1(x) - f_2(x) \equiv \delta(x) [\pi_1(x) - \pi_2(x)] + v_1(x) - v_2(x).$$

*Ἀλλά, δυνάμει τῆς (1), ἡ διαιρεσις $[f_1(x) - f_2(x)] : \delta(x)$ εἰναι τελεία καὶ ἐπομένως : $v_1(x) - v_2(x) \equiv 0$, ἐξ οὗ : $v_1(x) \equiv v_2(x)$.

*Ἀντιστρόφως : "Εστω ὅτι $v_1(x) \equiv v_2(x)$ καὶ ὅτι :

$$f_1(x) \equiv \delta(x) \cdot \pi_1(x) + v_1(x) \quad \text{καὶ} \quad f_2(x) \equiv \delta(x) \pi_2(x) + v_2(x).$$

Τότε θὰ ἔχωμεν :

$$f_1(x) - f_2(x) \equiv \delta(x) [\pi_1(x) - \pi_2(x)] \implies \delta(x) | f_1(x) - f_2(x).$$

§ 76. Θεώρημα Zov. — Ἐὰν $v_1(x), v_2(x), \dots, v_v(x)$ εἰναι ἀντιστοίχως τὰ ὑπόλοιπα τῶν διαιρέσεων $f_1(x) : \delta(x), f_2(x) : \delta(x), \dots, f_v(x) : \delta(x)$, τότε ἡ διαιρεσις $[f_1(x) + f_2(x) + \dots + f_v(x)] : \delta(x)$ ἔχει ὑπόλοιπον $v(x) \equiv v_1(x) + v_2(x) + \dots + v_v(x)$.

*Απόδειξις : "Έχομεν, ἂν συμβολίσωμεν τὰ πολυώνυμα ἀπλῶς μὲν f, δ, π, v ἀντὶ $f(x), \delta(x), \pi(x), v(x)$, τὰς σχέσεις :

$$(σ) \quad \begin{array}{l|l} f_1 \equiv \delta\pi_1 + v_1 & \text{Αῦται προστιθέμεναι κατὰ μέλη δίδουν :} \\ f_2 \equiv \delta\pi_2 + v_2 & f_1 + f_2 + \dots + f_v \equiv \delta(\pi_1 + \pi_2 + \dots + \pi_v) + (v_1 + v_2 + \dots + v_v). \\ f_3 \equiv \delta\pi_3 + v_3 & \text{'Εξ αὐτῆς λαμβάνομεν :} \\ \vdots & (f_1 + f_2 + \dots + f_v) - (v_1 + v_2 + \dots + v_v) \equiv \delta(\pi_1 + \pi_2 + \dots + \pi_v). \end{array}$$

*Η τελευταία ταυτότης δηλοῖ ὅτι τὸ διαιρεῖ τὴν διάφοράν τῶν πολυώνυμων $f_1 + f_2 + \dots + f_v$ καὶ $v_1 + v_2 + \dots + v_v$, ἐπομένως, δυνάμει τοῦ προηγουμένου θεωρήματος, ἔκαστον τούτων διαιρούμενον διὰ τοῦ $\delta(x)$ δίδει τὸ αὐτὸν ὑπόλοιπον. *Ἀλλὰ τὸ ὑπόλοιπον τῆς διαιρέσεως $(v_1 + v_2 + \dots + v_v) : \delta$ εἰναι τὸ $(v_1 + v_2 + \dots + v_v)$ (διατί;). *Ἄρα $v(x) \equiv v_1(x) + v_2(x) + \dots + v_v(x)$.

§ 77. Θεώρημα 3ον. — Αἱ ὑποθέσεις τοῦ θεωρήματος 2, τότε αἱ διαιρέσεις $[f_1(x) \cdot f_2(x) \cdots f_v(x)] : \delta(x)$ καὶ $[v_1(x) \cdot v_2(x) \cdots v_v(x)] : \delta(x)$ δίδουν τὸ αὐτὸν ὑπόλοιπον.

***Α πόδειξις:** Τὰς σχέσεις (σ) τῆς προηγουμένης παραγράφου πολλαπλασιάζομεν κατὰ μέλη καὶ ἔχομεν :

$$f_1 f_2 \cdots f_v \equiv \delta \cdot \pi + (v_1 v_2 \cdots v_v), \quad (1)$$

ἔνθα π ἀκέραιον πολυώνυμον τοῦ x .

*Εκ τῆς (1) λαμβάνομεν τὴν σχέσιν :

$$[f_1 f_2 \cdots f_v] - [v_1 v_2 \cdots v_v] \equiv \delta \cdot \pi, \\ \text{ἡ δόποια καὶ ἀποδεικνύει τὸ θεώρημα.}$$

Παρατήρησις: Τὰ θεωρήματα 2 καὶ 3 ἴσχουν καὶ ἀν ἀκόμη δὲν ἀντικατασταθοῦν ὅλα τὰ πολυώνυμα $f_1(x), f_2(x), \dots, f_v(x)$ διὰ τῶν ὑπολοίπων, ἀλλὰ μόνον μερικὰ ἔξ αὐτῶν.

Πόρισμα.— *Εὰν $v(x)$ εἴναι τὸ ὑπόλοιπον τῆς διαιρέσεως $f(x) : \delta(x)$, τότε αἱ διαιρέσεις $[f(x)]^v : \delta(x)$ καὶ $[v(x)]^v : \delta(x)$ δίδουν τὸ αὐτὸν ὑπόλοιπον.

*Εφαρμογή : *Εὰν a, β, γ, δ εἰναι ἀκέραιοι μὴ ἀρνητικοί, νὰ δειχθῇ ὅτι τὸ πολυώνυμον : $x^{4a+3} + x^{4\beta+2} + x^{4\gamma+1} + x^{4\delta}$ διαιρεῖται ἀκριβῶς διὰ τοῦ $x^3 + x^2 + x + 1$.

*Α πόδειξις : Ο διαιρετός γράφεται :

$$(x^4)^a x^3 + (x^4)^\beta x^2 + (x^4)^\gamma x + (x^4)^\delta.$$

*Εάν ἐκτελέσωμεν τὴν διαιρέσιν $x^4 : x^3 + x^2 + x + 1$ εὑρίσκομεν ὑπόλοιπον 1. Ἀρα τὰ γινόμενα $(x^4)^a \cdot x^3$ καὶ $1^a \cdot x^3$ διαιρούμενα διὰ τοῦ $x^3 + x^2 + x + 1$ δίδουν τὸ αὐτὸν ὑπόλοιπον (βλ. θεώρ. 3ον καὶ πόρισμα). Ομοίως τὰ γινόμενα $(x^4)^\beta \cdot x^2$ καὶ $1^\beta \cdot x^2$ διαιρούμενα διὰ τοῦ $x^3 + x^2 + x + 1$ δίδουν τὸ αὐτὸν ὑπόλοιπον. Τὰ αὐτά ἴσχουν καὶ διὰ τὰ $(x^4)^\gamma x$ καὶ $1^\gamma x \cdot \delta\delta'$ ἐνὸς καὶ $(x^4)^\delta$ καὶ $1^\delta \delta'$ ἐπέρου. Ἐπομένως τὰ πολυώνυμα :

$$x^{4a+3} + x^{4\beta+2} + x^{4\gamma+1} + x^{4\delta} \text{ καὶ } 1^a x^3 + 1^\beta x^2 + 1^\gamma x + 1^\delta \equiv x^3 + x^2 + x + 1$$

διαιρούμενα διὰ τοῦ $x^3 + x^2 + x + 1$ δίδουν τὸ αὐτὸν ὑπόλοιπον. Ἀλλὰ τὸ ὑπόλοιπον τῆς διαιρέσεως $(x^3 + x^2 + x + 1) : (x^3 + x^2 + x + 1)$ εἴναι μηδέν. Οθεν ἡ διαιρέσις $(x^{4a+3} + x^{4\beta+2} + x^{4\gamma+1} + x^{4\delta}) : (x^3 + x^2 + x + 1)$ είναι τελεία.

***Υπόλοιπον τῆς διαιρέσεως ἀκέραιού πολυωνύμου $f(x)$ διὰ τοῦ διωνύμου $x^v - a$,** ἔνθα $v \in \mathbb{N}$.

*Εστω ἐν ἀκέραιον πολυώνυμον $f(x)$, βαθμοῦ k , καὶ εἰς φυσικὸς ἀριθμὸς v , μικρότερος ἢ ἵσσος τοῦ βαθμοῦ k τοῦ πολυωνύμου $f(x)$, ἥτοι : $v \leq k$.

Τότε ἴσχυει ἡ κάτωθι πρότασις :

Τὸ πολυώνυμον $f(x)$ δύναται νὰ τεθῇ ὑπὸ τὴν μορφήν :

$$f(x) \equiv x^{v-1} \cdot f_{v-1}(x^v) + x^{v-2} f_{v-2}(x^v) + \cdots + x f_1(x^v) + f_0(x^v), \quad (1)$$

ὅπου $f_{v-1}(x^v), f_{v-2}(x^v), \dots, f_1(x^v), f_0(x^v)$ ἀκέραια πολυώνυμα τοῦ x^v .

Πράγματι οι έκθέται τῶν ὅρων τοῦ $f(x)$ θὰ είναι ἡ πολλαπλάσια τοῦ v ἢ πολλαπλάσια τοῦ v η ξένη μένα κατὰ 1 ἢ πολ.ν + 2 ἢ πολ.ν + 3, κ.ο.κ. Οἱ ὄροι τῶν ὅποιων οἱ έκθέται είναι πολλαπλάσια τοῦ v θὰ δίδουν τὸ $f_0(x^v)$. Οἱ ὄροι τῶν ὅποιων οἱ έκθέται είναι πολ.ν + 1 θὰ δίδουν τὸ $x f_1(x^v)$. Οἱ ὄροι τῶν ὅποιων οἱ έκθέται είναι πολ.ν + 2 θὰ δίδουν τὸ $x^2 f_2(x^v)$ κ.ο.κ.

Σημείωσις: Τὴν ὡς ἄνω πρότασιν δυνάμεθα νὰ ἀποδεῖξωμεν αὐστηρότερον διὰ τῆς μεθόδου τῆς τελείας ἐπαγωγῆς.

Έφαρμογή: Εστω $f(x) \equiv 3x^7 - 5x^6 + 8x^5 - 3x^4 + 2x^3 - 4x^2 + 7x + 3$ καὶ ἔστω ὅτι $v = 3$.

Δυνάμει τῆς ἀνωτέρω προτάσεως τὸ $f(x)$ δύναται νὰ γραφῇ ὑπὸ τὴν μορφήν: $f(x) \equiv x^2(8x^3 - 4) + x(3x^6 - 3x^3 + 7) - (5x^6 - 2x^3 - 3)$.

§ 78. Θεώρημα. — Τὸ ὑπόλοιπον τῆς διαιρέσεως ἀκεραίου πολυωνύμου $f(x)$ τεθέντος ὑπὸ τὴν μορφήν:

$$f(x) \equiv x^{v-1} f_{v-1}(x^v) + x^{v-2} f_{v-2}(x^v) + \cdots + x f_1(x^v) + f_0(x^v)$$

διὰ τοῦ διωνύμου $x^v - a$ είναι :

$$v(x) \equiv x^{v-1} f_{v-1}(a) + x^{v-2} f_{v-2}(a) + \cdots + x f_1(a) + f_0(a).$$

Άπόδειξις: Εκ τοῦ θεωρήματος § 76 προκύπτει ὅτι τὸ ὑπόλοιπον τῆς διαιρέσεως $f(x)$: $(x^v - a)$ είναι: $v(x) \equiv v_{v-1}(x) + v_{v-2}(x) + \cdots + v_1(x) + v_0(x)$, ὅπου $v_{v-1}(x)$, $v_{v-2}(x)$, ..., $v_1(x)$, $v_0(x)$ είναι ἀντιστοίχως τὰ ὑπόλοιπα τῶν διαιρέσεων: $x^{v-1} f_{v-1}(x^v)$: $(x^v - a)$, $x^{v-2} f_{v-2}(x^v)$: $(x^v - a)$, ..., $x f_1(x^v)$: $(x^v - a)$, $f_0(x^v)$: $(x^v - a)$. Τὸ ὑπόλοιπον ὅμως τῆς διαιρέσεως τοῦ $f_{v-1}(x^v)$ διὰ τοῦ $x^v - a$ είναι τὸ $f_{v-1}(a)$, διότι, ἐὰν τεθῇ $x^v = y$, τότε, ὡς γνωστὸν (§ 64, πόρισμα I), τὸ ὑπόλοιπον τῆς διαιρέσεως $f_{v-1}(y)$: $(y - a)$ είναι $v = f_{v-1}(a)$. Ἐξ ἀλλού τὸ ὑπόλοιπον τῆς διαιρέσεως τοῦ x^{v-1} διὰ τοῦ $x^v - a$ είναι αὐτὸ τοῦτο τὸ x^{v-1} , διότι είναι μικροτέρου βαθμοῦ ὁ διαιρετός ἀπὸ τὸν διαιρέτην. Ἀρα τὸ γινόμενον $x^{v-1} \cdot f_{v-1}(x^v)$ καὶ τὸ $x^{v-1} \cdot f_{v-1}(a)$ διαιρούμενα διὰ τοῦ $x^v - a$ δίδουν τὰ αὐτὰ ὑπόλοιπα. Ἀλλὰ τὸ ὑπόλοιπον τῆς διαιρέσεως $x^{v-1} \cdot f_{v-1}(a)$: $(x^v - a)$ είναι τὸ $x^{v-1} f_{v-1}(a)$. Οὐθὲν $v_{v-1}(x) \equiv x^{v-1} f_{v-1}(a)$.

Ομοίως $v_{v-2}(x) \equiv x^{v-2} f_{v-2}(a)$, ..., $v_1(x) \equiv x f_1(a)$, $v_0(x) \equiv f_0(a)$. Ἀρα:

$$v(x) \equiv x^{v-1} f_{v-1}(a) + x^{v-2} f_{v-2}(a) + \cdots + x f_1(a) + f_0(a).$$

Πόρισμα. — Διὰ νὰ διαιρῆται τὸ ἀκέραιον πολυώνυμον:

$$f(x) \equiv x^{v-1} f_{v-1}(x^v) + x^{v-2} f_{v-2}(x^v) + \cdots + x f_1(x^v) + f_0(x^v)$$

διὰ τοῦ $x^v - a$, πρέπει καὶ ἀρκεῖ νὰ είναι :

$$f_{v-1}(a) = 0, f_{v-2}(a) = 0, \dots, f_1(a) = 0, f_0(a) = 0.$$

Έφαρμογαί: **1η:** Νὰ εὑρεθῇ τὸ ὑπόλοιπον τῆς διαιρέσεως τοῦ ἀκεραίου πολυωνύμου $f(x) \equiv 2x^5 - 3x^4 + 4x^3 - 2x^2 + 3x - 4$ διὰ τοῦ διωνύμου $x^3 + 2$.

Ανσις: Τὸ $f(x)$ γράφεται: $f(x) \equiv x^2(2x^3 - 2) - x(3x^3 - 3) + (4x^3 - 4)$. Ἐὰν εἰς τοῦτο θέσωμεν δπου $x^3 = -2$, λαμβάνομεν τὸ ζητούμενον ὑπόλοιπον:

$$v(x) \equiv -6x^2 + 9x - 12.$$

2α : Έάν α, β, γ θετικοί άκεραιοι, νά εύρεθη τό υπόλοιπον τής διαιρέσεως τού άκεραίου πολυωνύμου $f(x) \equiv x^{3\alpha} + x^{3\beta+1} + x^{3\gamma+5}$ διά τού $x^3 - 2$.

Λύσις : Τό $f(x)$ γράφεται :

$$f(x) \equiv x^{\alpha} \cdot (x^3)^{\gamma+1} + x \cdot (x^3)^{\beta} + (x^3)^{\alpha}.$$

Έάν εις τούτο θέσωμεν δημού $x^3 = 2$, λαμβάνομεν τό υπόλοιπον.

$$u(x) \equiv 2^{\gamma+1} \cdot x^{\alpha} + 2^{\beta} \cdot x + 2^{\alpha}.$$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΟΛΥΩΝΥΜΩΝ

146. Νά προσδιορισθοῦν οι πραγματικοί άριθμοι α, β, γ ούτως, ώστε νά πληροῦν τήν σχέσην $\alpha^3 + \beta^3 + \gamma^3 = 3\alpha\beta\gamma$, τό δέ πολυώνυμον $f(x) \equiv x^3 + \alpha x^2 + \beta x + \gamma$ νά λαμβάνη τήν τιμήν 7 διά $x = 1$.

147. Έάν $v \in \mathbb{N}$, νά άποδειχθῇ δτι τό πολυώνυμον :

$$f(x) \equiv (x + 1)^{2v} - x^{2v} - 2x - 1$$

διαιρεῖται διά τού : $2x^3 + 3x^2 + x$.

148. Νά προσδιορισθοῦν οι πραγματικοί άριθμοι α και β , ίνα τό πολυώνυμον :

$$f(x) \equiv 2x^8 + \alpha x^2 - 13x + \beta$$

είναι διαιρετόν διά τού : $(x - 3)(x + 2)$.

149. Νά προσδιορισθοῦν τά k και λ και νά εύρεθοῦν αι ρίζαι p_1, p_2, p_3 τού πολυωνύμου : $f(x) \equiv x^3 - 8x^2 - 8\lambda x + k$, ἀν γνωρίζωμεν δτι : $p_1 = p_2 = -p_3$.

150. Νά άποδειχθῇ δτι τό πολυώνυμον : $f(x) \equiv x^4 + 3x^3 - 3x^2 - 7x + 6$ διαιρεῖται διά τού $(x - 1)^2$.

151. Νά προσδιορισθοῦν οι πραγματικοί άριθμοι α και β , ίνα τό πολυώνυμον : $f(x) \equiv x^v+1 + \alpha x + \beta$ διαιρῆται διά τού $(x - 1)^2$ και νά εύρεθῃ τό πηλίκον.

152. Ακέραιον πολυώνυμον $f(x)$ διαιρούμενον διά $x - 2$ δίδει ύπόλοιπον 12, διαιρούμενον δὲ διά $x - 3$ δίδει ύπόλοιπον 17. Νά εύρεθῃ τό ύπόλοιπον τής διαιρέσεως $f(x)$: $(x - 2)(x - 3)$.

153. Έάν τό πολυώνυμον $x^8 + \alpha x + \beta$ είναι διαιρετόν διά τού $(x - k)^2$, δείξατε δτι μεταξύ τῶν α και β ύφίσταται ή σχέσις : $\left(\frac{\alpha}{3}\right)^3 + \left(\frac{\beta}{2}\right)^2 = 0$.

154. Έάν διά τρεις διαφόρους τιμάς τού x τά τριώνυμα :

$$(\alpha - 2)x^2 + (2\beta - 1)x + \gamma \quad \text{και} \quad x^2 + 5x + \alpha + 1$$

λαμβάνουν ίσας άριθμητικάς τιμάς, νά προσδιορισθοῦν οι πραγματικοί άριθμοι α, β, γ .

155. Έάν άκέραιον πολυώνυμον $f(x)$ διαιρήται διά τού $x - 3$, νά δειχθῇ δτι τό πολυώνυμον $f(4x - 5)$ διαιρεῖται διά τού $x - 2$.

156. Έάν τό πολυώνυμον : $f(x) \equiv x^v + \xi y^v + \eta z^v$, ($v \in \mathbb{N}, v \geq 2$) είναι διαιρετόν διά τού πολυωνύμου $\phi(x) \equiv x^2 - (\alpha y + \beta z)x + \alpha\beta yz$, τότε θά ισχύη ή σχέσις :

$$\frac{\xi}{\alpha^v} + \frac{\eta}{\beta^v} + 1 = 0.$$

('Υπόδειξις : 'Αναλύσατε τό $\phi(x)$ εις γινόμενον παραγόντων κτλ.).

157. Νά δειχθῇ δτι, έάν $\alpha \neq \beta$, τότε τό ύπόλοιπον τής διαιρέσεως τού πολυωνύμου $f(x)$ διά τού γινομένου $(x - \alpha)(x - \beta)$ είναι :

$$u(x) \equiv \frac{f(\alpha) - f(\beta)}{\alpha - \beta} x + \frac{\beta f(\alpha) - \alpha f(\beta)}{\beta - \alpha}.$$

Ποιον τό ύπόλοιπον ἄν $\alpha = \beta$;

158. Εύρετε τήν Ικανήν και άναγκαίαν συνθήκην, ίνα ή έξισωσις : $x^8 - 3ax + 2\beta = 0$ έχῃ διπλήν ρίζαν.

159. Προσδιορίστε τὰ α καὶ β ώστε ή ἔξισωσις $x^3 - 24x - 72 = 0$ νὰ τίθεται ύπο τὴν μορφὴν $\left(\frac{x-\alpha}{x-\beta}\right)^3 = \frac{\alpha}{\beta}$. Ἀκολούθως νὰ λυθῇ ή ἔξισωσις αὕτη.

160. Ἐάν τὸ ύπόλοιπον τῆς διαιρέσεως τοῦ πολυωνύμου $f(x) \equiv \alpha x^4 + \beta x^3 - 18x^2 + + 15x - 5$ διὰ τοῦ $\varphi(x) \equiv x^2 - 3x + 2$ είναι $u(x) \equiv 4x - 7$, νὰ δειχθῇ ὅτι $\alpha = 1$ καὶ $\beta = 4$.

161. Δείξατε ὅτι τὸ ύπόλοιπον τῆς διαιρέσεως ἀκέραιον πολυωνύμου $f(x)$ διὰ τοῦ $x^2 - \alpha^2$ είναι τό : $u(x) \equiv \frac{f(\alpha) - f(-\alpha)}{2\alpha} x + \frac{f(\alpha) + f(-\alpha)}{2}$.

162. Διὰ ποίας τιμᾶς τῶν k καὶ λ τὸ πολυώνυμον : $f(x) \equiv 3x^4 - kx^3 + 5x^2 - 9x + \lambda$ διαιρεῖται διὰ $x^2 - 1$;

163. Ἐάν $(\alpha - \beta)(\beta - \gamma)(\gamma - \alpha) \neq 0$, νὰ ἐπιλυθῇ τὸ σύστημα :

$$\alpha^3 + \alpha^2x + \alpha y + z = 1$$

$$\beta^3 + \beta^2x + \beta y + z = 1$$

$$\gamma^3 + \gamma^2x + \gamma y + z = 1.$$

(Υπόδειξις: Παρατηρήσατε ὅτι τὸ πολυώνυμον $f(t) \equiv t^3 + xt^2 + yt + (z-1)$ ἔχει ρίζας τὰ α , β , γ).

164. Ἀκέραιον πολυώνυμον $f(x)$ διαιρούμενον διὰ $x^2 + x + 1$ δίδει ύπόλοιπον $x - 1$, διαιρούμενον δὲ διὰ $x^2 - x + 1$ δίδει ύπόλοιπον $2x + 1$. Νὰ εὐρεθῇ τὸ ύπόλοιπον τῆς διαιρέσεως $f(x) : (x^4 + x^2 + 1)$.

(Υπόδειξις: Παρατηρήσατε ὅτι : $x^4 + x^2 + 1 \equiv (x^2 + x + 1)(x^2 - x + 1)$).

165. Ἐστω ἡ ἔξισωσις $x^8 + \alpha x^2 + \beta x + \gamma = 0$, τῆς ὀποίας ἡ μία τῶν ρίζῶν είναι ἵση μὲ τὸ ἄκροισμα τῶν δύο ἄλλων. Νὰ εὐρεθῇ ποιά συνθήκη ὑπάρχει μεταξὺ τῶν συντελεστῶν τῆς ἔξισώσεως καὶ νὰ εὐρεθοῦν αἱ ρίζαι της.

166. Ἐάν $k, l, \mu \in \mathbb{N}$ νὰ δειχθῇ ὅτι τὸ πολυώνυμον $x^{3k+2} + x^{3l+1} + x^{3\mu}$ διαιρεῖται διὰ $x^2 + x + 1$.

167. Γνωστοῦ ὄντος ὅτι τὸ πολυώνυμον $f(x) \equiv x^8 + \alpha x^2 + \beta x + \gamma$ μὲ ἀκέραιους συντελεστάς διαιρεῖται διὰ τοῦ $x^8 - 2x + 1$, νὰ δειχθῇ ὅτι : $|\alpha| + |\beta| + |\gamma| \geq 3$.

168. Ἐάν -4 καὶ -164 είναι τὰ ύπόλοιπα τῶν διαιρέσεων $f(x) : (x+1)$ καὶ $f(x) : (x-3)$ ἀντιστοιχῶς, τότε νὰ εὐρεθῇ τὸ ύπόλοιπον τῆς διαιρέσεως $f(x) : (x^2 - 2x - 3)$. Ἐάν τὸ πολυώνυμον $f(x)$ είναι τετάρτου βαθμοῦ μὲ ρίζας $0, 2, -2$, ποιά ἡ ἄλλη ρίζα του ;

169. Ἐάν $v \in \mathbb{N}$, νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι τὸ πολυώνυμον : $x^{4v+2} - (2v+1)x^{2v+2} + (2v+1)x^{2v} - 1$ διαιρεῖται διὰ τοῦ $(x^2 - 1)^v$.

170. Εὑρετε τὴν μεταξὺ τῶν $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ σχέσιν, ἵνα αἱ ρίζαι p_1, p_2, p_3 τοῦ πολυωνύμου : $\alpha x^3 + \beta x^2 + \gamma x + \delta$ πληροῦν τὴν σχέσιν : $p_1 + p_2 = 2p_3$.

171. Νὰ ὀρισθοῦν οἱ πραγματικοὶ ἀριθμοὶ α καὶ β οὕτως, ώστε τὸ πολυώνυμον $x^4 + (\alpha - \beta)x^3 + 2\alpha x^2 - 5x + 4$ νὰ διαιρῆται διὰ τῆς μεγαλύτερας δυνατῆς δυνάμεως τοῦ $x - 1$.

172. Ἐάν τὰ πολυώνυμα $f(x) \equiv x^3 + \alpha x - \beta$ καὶ $\varphi(x) \equiv \beta x^3 - \alpha x - 1$ μὲ $\alpha, \beta \in \mathbb{R}^+$ ἔχουν μίαν πραγματικήν ρίζαν κοινήν, τότε ισχύουν αἱ σχέσεις :

1) $p_1^3 + p_2^3 + p_3^3 = -2\alpha$, 2) $|p_1| + |p_2| + |p_3| > \frac{3}{2}$, ἐνθα p_1, p_2, p_3 είναι ρίζαι τοῦ $f(x)$.

173. Δείξατε ὅτι διὰ κάθε ρίζαν ρ τοῦ πολυωνύμου $f(x) \equiv xv + \alpha_{v-1}x^{v-1} + \dots + \alpha_1x + \alpha_0$, μὲ πραγματικούς συντελεστάς, ισχύει ἡ ἀνισότης :

$$|\rho| < 1 + |\alpha_{v-1}| + |\alpha_{v-2}| + \dots + |\alpha_1| + |\alpha_0|.$$

174. Δίδεται τὸ πολυώνυμον $f(x) \equiv x^2 + \alpha x + \beta$, $(\alpha, \beta \in \mathbb{R})$ καὶ ὁ πραγματικός ἀριθμός η μὲ $\eta \geq 2$. Ἐάν m καλέσωμεν τὸν $\max\{|f(0)|, |f(\eta)|, |f(-\eta)|\}$, τότε δείξατε ὅτι :

$$m \equiv \max\{|f(0)|, |f(\eta)|, |f(-\eta)|\} \geq \eta.$$

175. Εύρετε τὴν μεταξὺ τῶν α , β , γ , δ σχέσιν, ἵνα αἱ ρίζαι p_1 , p_2 , p_3 , p_4 τοῦ πολυωνύμου $x^4 + \alpha x^3 + \beta x^2 + \gamma x + \delta$ συνδέωνται διὰ τῆς σχέσεως : $p_1 + p_2 = p_3 + p_4$.

176. Ἐὰν τὸ πολυώνυμον $f(x) \equiv x^3 + \alpha x^2 + \beta x + \gamma$, ἔνθα $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$, ἔχῃ διπλῆν ρίζαν ἀριθμὸν ρ καὶ εἶναι $\rho \leq 0$ ή $\rho \geq 1 + \sqrt{2}$, νὰ ἀποδειχθῇ δτι :

$$|\alpha| + |\beta| + |\gamma| \geq \rho^3 + 2\rho.$$

177. Νὰ ἀποδειχθῇ δτι τὸ ὑπόλοιπον τῆς διαιρέσεως ἀκέραιου πολυωνύμου $f(x)$ διὰ τοῦ $x^2 - 2px + p^2$ εἶναι τό : $\pi(p)x + f(p) - \rho\pi(p)$, ὅπου $\pi(x)$ εἶναι τὸ πηλίκον τῆς διαιρέσεως $[f(x) - f(p)] : (x - p)$.

178. Ἀκέραιον πολυώνυμον διαιρούμενον διὰ $x + 2$ δίδει ὑπόλοιπον 7, διαιρούμενον διὰ $x - 3$ δίδει ὑπόλοιπον 17. Τί ὑπόλοιπον θὰ δώσῃ ἢν τοῦτο διαιρεθῇ διὰ τοῦ $x^2 - x - 6$? Προσδιορίσατε ἐν τοιοῦτον πολυώνυμον. *Υποθέσατε ἀκολούθως δτι τὸ πολυώνυμον τοῦτο εἶναι τρίτου βαθμοῦ καὶ διαιρεῖται (ἀκριβῶς) διὰ τοῦ $2x^2 + x - 3$. Ποιὸν εἶναι τότε τοῦτο?*

179. Ἐὰν $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$, $\gamma \neq 0$ καὶ αἱ ρίζαι p_1, p_2, p_3 τοῦ πολυωνύμου :

$$f(x) \equiv x^3 + \alpha x^2 + \beta x + \gamma$$

πληροῦν τὰς σχέσεις : $|p_1| = 2 |p_2| = 3 |p_3|$, τότε δείξατε δτι : $|\alpha\beta| < 11 |\gamma|$.

180. Δίδεται τὸ ἀκέραιον πολυώνυμον μὲ πραγματικοὺς συντελεστάς :

$$f(x) \equiv \alpha_v x^v + \alpha_{v-1} x^{v-1} + \cdots + \alpha_1 x + \alpha_0.$$

Θέτομεν $|x| = \theta$, ὑποθέτοντες $\theta \neq 1$, καὶ $m \equiv \max \{ |\alpha_0|, |\alpha_1|, |\alpha_2|, \dots, |\alpha_{v-1}|, |\alpha_v| \}$. Νὰ ἀποδειχθῇ δτι :

$$|f(x)| \leq m \cdot \frac{\theta^{v+1} - 1}{\theta - 1}.$$

II. ΑΚΕΡΑΙΑ ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ ΠΟΛΛΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ

‘Ομογενῆ καὶ συμμετρικὰ πολυώνυμα.

§ 79. Εἰσαγωγικαὶ ἔννοιαι – ‘Ορισμοί. – Ὡς εἰς τὴν § 50 ὠρίσθη ἡ ἔννοια τοῦ ἀκέραιου πολυωνύμου μιᾶς μεταβλητῆς μὲ συντελεστὰς πραγματικούς ἀριθμούς, κατὰ τὸν αὐτὸν ἀκριβῶς τρόπον εἰσάγεται καὶ ἡ ἔννοια τοῦ πολυωνύμου ν τὸ πλήθος μεταβλητῶν x, y, z, \dots, t .

Ἐπειδὴ εἰς ὅλας σχεδὸν τὰς ἐφαρμογὰς ποὺ συναντῶμεν εἰς τὸ παρὸν κεφάλαιον αἱ μεταβληταὶ δὲν εἶναι περισσότεραι τῶν τριῶν, διὰ τοῦτο κατωτέρω θὰ περιορισθῶμεν εἰς πολυώνυμα τριῶν μεταβλητῶν x, y, z αἱ δὲ προτάσεις αἱ διοτοῖαι θὰ διατυπωθοῦν γενικεύονται, ἐν γένει, καὶ διὰ πολυώνυμα περισσοτέρων μεταβλητῶν.

Κατόπιν τούτου δίδομεν τοὺς κάτωθι δρισμούς :

a'). Ἀκέραιον μονώνυμον τῶν x, y, z καλεῖται πᾶσα ἔκφρασις τῆς μορφῆς :

$$\alpha x^k y^\lambda z^\mu \quad (1)$$

ὅπου α (σταθερὸς) πραγματικὸς ἀριθμὸς καὶ k, λ, μ φυσικοὶ ἀριθμοὶ ἢ μηδέν. Οἱ ἀριθμὸι α καλεῖται συντελεστὴς τοῦ μονωνύμου (1), τὰ δὲ σύμβολα x, y, z καλοῦνται μεταβληταί. Τὸ ἄθροισμα $k + \lambda + \mu$ τῶν ἔκθετῶν, ἐφ' ὅσον $\alpha \neq 0$, καλεῖται βαθμὸς τοῦ μονωνύμου (1). Ἐὰν $k = \lambda = \mu = 0$ καὶ $\alpha \neq 0$ τὸ μονώνυμον (1) ἀνάγεται εἰς τὸν σταθερὸν ἀριθμὸν α καὶ λέγομεν εἰς αὐτὴν τὴν περίπτωσιν δτι τὸ μονώνυμον (1) εἶναι βαθμοῦ μηδέν. Ἐὰν $\alpha = 0$, τότε τὸ μονώνυμον κα-

λεῖται μηδενικὸν καὶ δὲν ὁμιλοῦμεν διὰ τὸν βαθμὸν του. Τέλος ἔὰν $\alpha \neq 0$, λέγομεν ὅτι τὸ μονώνυμον (1) εἶναι ως πρὸς x βαθμοῦ k , ως πρὸς y βαθμοῦ λ , ως πρὸς z βαθμοῦ μ , ως πρὸς x καὶ y βαθμοῦ $k + \lambda$, κ.ο.κ. Οὖτω, π.χ., τὸ μονώνυμον: $-3x^2yz^3$ εἶναι δου βαθμοῦ, ἐνῶ ως πρὸς x καὶ z εἶναι βαθμοῦ 5ου.

β'). Δύο μονώνυμα καλοῦνται ὄμοια (ώς πρὸς τὰς μεταβλητάς των), ἂν ἐν τῇ παραστάσει των ἔχουν τὰς αὐτὰς μεταβλητὰς καὶ ἐκάστην μὲ τὸν αὐτὸν ἐκέθετην, διαφέρουν δὲ (ἄν διαφέρουν) μόνον κατὰ τοὺς συντελεστάς των. Οὖτω, π.χ., τὰ μονώνυμα: $-3x^2yz^3$, $2x^2yz^3$ εἶναι ὄμοια.

Τὰ μὴ ὄμοια μονώνυμα καλοῦνται ἀνόμοια.

Τὰ μονώνυμα τῆς μορφῆς: $\alpha x^k y^\lambda z^\mu$ καὶ $-\alpha x^k y^\lambda z^\mu$ καλοῦνται ἀντίθετα.

Δύο μὴ μηδενικὰ μονώνυμα $\alpha x^k y^\lambda z^\mu$ καὶ $\beta x^\nu y^\sigma z^\tau$ καλοῦνται ἐκ ταυτότητος Ἰσα καὶ γράφομεν $\alpha x^k y^\lambda z^\mu \equiv \beta x^\nu y^\sigma z^\tau$ τότε, καὶ μόνον τότε, ἄν:

$$\alpha = \beta, \quad k = \nu, \quad \lambda = \sigma, \quad \mu = \tau.$$

γ'). Τὸ ἄθροισμα τῶν ἀκεραίων μονωνύμων: $\alpha_1 x^{k_1} y^{\lambda_1} z^{\mu_1}$, $\alpha_2 x^{k_2} y^{\lambda_2} z^{\mu_2}$, ..., $\alpha_v x^{k_v} y^{\lambda_v} z^{\mu_v}$ παρίσταται οὕτω:

$$\alpha_1 x^{k_1} y^{\lambda_1} z^{\mu_1} + \alpha_2 x^{k_2} y^{\lambda_2} z^{\mu_2} + \cdots + \alpha_v x^{k_v} y^{\lambda_v} z^{\mu_v}.$$

Ἐάν δὲ τὰ ως ἄνω μονώνυμα εἶναι ὄμοια τὸ ἄθροισμα αὐτῶν εἶναι μονώνυμον ὄμοιον πρὸς αὐτά, ἔχον συντελεστὴν τὸ ἄθροισμα τῶν συντελεστῶν τῶν μονωνύμων, ἦτοι :

$$\alpha_1 x^{k_1} y^{\lambda_1} z^{\mu_1} + \alpha_2 x^{k_2} y^{\lambda_2} z^{\mu_2} + \cdots + \alpha_v x^{k_v} y^{\lambda_v} z^{\mu_v} = (\alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_v) x^k y^\lambda z^\mu.$$

Ἡ εὔρεσις τοῦ ἄθροισματος τῶν ὄμοιών μονωνύμων καλεῖται ἀναγωγὴ αὐτῶν.

* Η διαφορὰ δύο μονωνύμων ὀνάγεται εἰς τὴν πρόσθεσιν τοῦ ἀντιθέτου τοῦ ἀφαιρέτου μονωνύμου.

Γινόμενον τῶν ἀκεραίων μονωνύμων $\alpha_1 x^{k_1} y^{\lambda_1} z^{\mu_1}$, $\alpha_2 x^{k_2} y^{\lambda_2} z^{\mu_2}$, ..., $\alpha_v x^{k_v} y^{\lambda_v} z^{\mu_v}$ καλεῖται τὸ μονώνυμον: $\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_v x^{k_1+k_2+\dots+k_v} y^{\lambda_1+\lambda_2+\dots+\lambda_v} z^{\mu_1+\mu_2+\dots+\mu_v}$.

* Εκ τῆς ἀνωτέρω ἐκφράσεως συνάγομεν ὅτι ὁ βαθμὸς τοῦ γινομένου δύο ἡ περισσοτέρων μὴ μηδενικῶν μονωνύμων ως πρὸς ἐκάστην μεταβλητὴν Ἰσοῦται πρὸς τὸ ἄθροισμα τῶν βαθμῶν τῶν μονωνύμων ως πρὸς τὴν ἐν λόγῳ μεταβλητὴν.

* Ακέραιον μονώνυμον λέγομεν ὅτι εἶναι διαιρετὸν δι' ὅλου, μὴ μηδενικοῦ, ἀκεραίου μονωνύμου, τότε, καὶ μόνον τότε, ἄν ὑπάρχῃ ἀκέραιον μονώνυμον, τὸ ὅποιον πολλαπλασιαζόμενον ἐπὶ τὸ δεύτερον δίδει τὸ πρῶτον, ἦτοι ὅταν τὸ πηλίκον τῶν δύο μονωνύμων εἶναι ἀκέραιον μονώνυμον. Π.χ. τὸ ἀκέραιον μονώνυμον $12x^3y^2z^5$ εἶναι διαιρετὸν διὰ τοῦ ἀκέραιον μονωνύμου $4x^2yz^3$, διότι τὸ πηλίκον εἶναι τὸ ἀκέραιον μονώνυμον $3xyz^2$.

δ'). *Ακέραιον πολυώνυμον τῶν x , y , z καλεῖται κάθε ἄθροισμα ἀκεραίων μονωνύμων τῶν x , y , z , ἐκ τῶν ὅποιων δύο τούλάχιστον εἶναι ἀνόμοια, ἦτοι ἐν ἀκέραιον πολυώνυμον τῶν x , y , z εἶναι μία παράστασις τῆς μορφῆς:

$$\alpha_1 x^{k_1} y^{\lambda_1} z^{\mu_1} + \alpha_2 x^{k_2} y^{\lambda_2} z^{\mu_2} + \cdots + \alpha_v x^{k_v} y^{\lambda_v} z^{\mu_v}, \quad (2)$$

ὅπου $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_v$ (σταθεροί) πραγματικοὶ ἀριθμοὶ καὶ k_i, λ_i, μ_i , $i = 1, 2, \dots, v$

άκεραιοι μή άρνητικοι. Οι άριθμοί $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_v$ καλούνται συντελεσταί τοῦ πολυωνύμου (2). Τὰ μονώνυμα, ἐξ ὧν σύγκειται τὸ πολυώνυμον (2), καλούνται σῆροι αὐτοῦ. Οὕτω, π.χ., ἡ παράστασις :

$$5x^3y^2z - 3xy^3z + 2x^2yz^3 - 7xy$$

εἶναι ἐν ἀκέραιον πολυώνυμον τῶν x, y, z μὲν ὅρους τὰ μονώνυμα :

$$5x^3y^2z, -3xy^3z, 2x^2yz^3, -7xy.$$

Διὰ τὰ πολυώνυμα ν μεταβλητῶν x, y, z, \dots, t θὰ χρησιμοποιῶμεν τοὺς συμβολισμούς :

$$f(x,y,z,\dots,t) \equiv \phi(x,y,z,\dots,t) \equiv \pi(x,y,z,\dots,t) \equiv g(x,y,z,\dots,t) \text{ κ.λ.π.}$$

Οὕτω, π.χ., τὸ πολυώνυμον (2) τῶν μεταβλητῶν x, y, z γράφεται :

$$f(x,y,z) \equiv \alpha_v x^{k_v} y^{\lambda_v} z^{\mu_v} + \dots + \alpha_2 x^{k_2} y^{\lambda_2} z^{\mu_2} + \alpha_1 x^{k_1} y^{\lambda_1} z^{\mu_1}. \quad (3)$$

Καλοῦμεν «ἀνηγμένον» ἐν ἀκέραιον πολυώνυμον εἰς τὸ ὅποιον ἔχουν ἐκτελεσθῆ διὶ σημειωθῆσαι πράξεις καὶ ἡ ἀναγωγὴ τῶν ὁμοίων ὅρων.

Κατωτέρω λέγοντες «πολυώνυμον» θὰ ἐννοῶμεν «ἀκέραιον ἀνηγμένον πολυώνυμον».

Ἐὰν πάντες οἱ συντελεσταί ἐνὸς πολυωνύμου $f(x,y,z,\dots)$, ν τὸ πλῆθος μεταβλητῶν, εἶναι μηδέν, τότε τοῦτο καλεῖται πάλιν μηδενικὸν πολυώνυμον ἢ πολυώνυμον ἐκ ταυτότητος ἵστον πρὸς μηδέν.

Εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν γράφομεν ἐπίσης : $f(x,y,z,\dots) \equiv 0$. Εἰς τὴν ἀντίθετον δὲ περίπτωσιν γράφομεν : $f(x,y,z,\dots) \not\equiv 0$.

Βαθμὸς ἐνός, μὴ μηδενικοῦ, ἀκέραιον πολυωνύμου καλεῖται ὁ μέγιστος βαθμὸς τῶν μονωνύμων αὐτοῦ. Οὕτω, π.χ., τὸ πολυώνυμον :

$$f(x,y,z) \equiv 3xy^3 - 6x^5 + 3x^2y^3z^2 - 5z^4, \text{ εἶναι ἑβδόμου βαθμοῦ.}$$

Βαθμὸς ἐνός πολυωνύμου ὡς πρὸς μίαν μεταβλητὴν καλεῖται ὁ μεγαλύτερος ἐκθέτης τῆς μεταβλητῆς ταύτης. Οὕτω τὸ ἀνωτέρω πολυώνυμον $f(x,y,z)$ ὡς πρὸς τὴν μεταβλητὴν x εἶναι 5ου βαθμοῦ, ὡς πρὸς y 3ου καὶ ὡς πρὸς z 4ου βαθμοῦ.

ε'). "Ἐν ἀκέραιον πολυώνυμον $f(x,y,z,\dots)$ τοῦ ὅποιον πάντες οἱ ὅροι (ὅχι ὁμοίων) εἶναι μονώνυμα τοῦ αὐτοῦ βαθμοῦ ὡς πρὸς τὰς μεταβλητὰς x, y, z, \dots καλεῖται ὁμογενές. Ο κοινὸς βαθμὸς τῶν ὅρων του καλεῖται βαθμὸς ὁμογενείας τοῦ πολυωνύμου.

Κάθε μὴ μηδενικὸν πολυώνυμον $f(x,y,z,\dots)$, ν βαθμοῦ δύναται νὰ γραφῇ κατὰ ἔνα ἀκριβῶς τρόπον ὑπὸ τὴν μορφήν :

$$f(x,y,z,\dots) \equiv f_v(x,y,z,\dots) + f_{v-1}(x,y,z,\dots) + \dots + f_0(x,y,z,\dots), \quad (4)$$

ἔνθα $f_k(x,y,z,\dots)$, $k = 0, 1, 2, \dots, v$ εἶναι ὁμογενὲς πολυώνυμον k βαθμοῦ ὁμογενείας ἢ τὸ μηδενικὸν πολυώνυμον καὶ $f_v(x,y,z,\dots) \not\equiv 0$.

Εἰς περίπτωσιν καθ' ἥν τὸ πολυώνυμον $f(x, y, z, \dots)$ ἔχει γραφῇ ὑπὸ τὴν μορφήν (4) λέγομεν ὅτι τοῦτο ἔχει διαταχθῆ εἰς ὁμογενεῖς ὁμάδας.

Κατόπιν τούτων ἐν ἀκέραιον πολυώνυμον τριῶν μεταβλητῶν x, y, z δύναται νὰ διαταχθῇ εἰς ὁμογενεῖς ὅμάδας ως κάτωθι :

$$f(x,y,z) \equiv a_0 + [a_1x + a_2y + a_3z] + [a_4x^2 + a_5y^2 + a_6z^2 + a_7xy + a_8xz + a_9yz] + \\ + a_{10}x^3 + a_{11}y^3 + a_{12}z^3 + a_{13}x^2y + a_{14}x^2z + a_{15}y^2x + \dots,$$

ἔνθα $a_0, a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, \dots$ οἱ συντελεσταὶ τοῦ πολυωνύμου.

στ'). Τὸ ὅθροισμα, ἡ διαφορὰ καὶ τὸ γινόμενον πολυωνύμων τριῶν καὶ γενικῶς ν μεταβλητῶν ὅρίζεται ως ἀκριβῶς καὶ διὰ πολυώνυμα μιᾶς μεταβλητῆς. Κατὰ συνέπειαν καὶ τὰ πολυώνυμα ν τὸ πλήθος μεταβλητῶν μὲ πραγματικούς συντελεστὰς ἀποτελοῦν δακτύλιον, ὃ δοποῖος συμβολίζεται μέ : $R[x, y, z, \dots]$.

Ἡ ισότης μεταξὺ δύο ἀκέραιών πολυωνύμων, περιεχόντων τὰς αὐτὰς μεταβλητάς, ὅρίζεται ως καὶ διὰ τὰ πολυώνυμα μιᾶς μεταβλητῆς. Ἀκριβέστερον λέγομεν ὅτι :

Δύο ἀκέραια πολυώνυμα $f(x, y, z, \dots)$ καὶ $\phi(x, y, z, \dots)$ εἰναι ἵσα ἢ ἐκ ταυτότητος ἵσα, καὶ γράφομεν $f(x, y, z, \dots) \equiv \phi(x, y, z, \dots)$, τότε, καὶ μόνον τότε, ἂν σύγκεινται ἀπὸ ἵσα μονώνυμα ἢ ὅπερ τὸ αὐτό, ἂν ἡ διαφορά των εἰναι τὸ μηδενικὸν πολυώνυμον. Ἡτοι :

$$f(x, y, z, \dots) \equiv \phi(x, y, z, \dots) \iff_{\text{ορσ}} f(x, y, z, \dots) - \phi(x, y, z, \dots) \equiv 0$$

Οὕτω, π.χ., τὰ πολυώνυμα :

$f(x, y) \equiv \alpha x^2 + \beta xy + \gamma y^2 - \delta x + \varepsilon y + \theta$ καὶ $\phi(x, y) \equiv 2x^2 - 3xy + y^2 + 5x + 4$ θὰ είναι ἐκ ταυτότητος ἵσα, τότε, καὶ μόνον τότε, ἀν :

$$\alpha = 2, \beta = -3, \gamma = 1, \delta = -5, \varepsilon = 0, \theta = 4.$$

ζ'). Καλοῦμεν ἀριθμητικὴν τιμὴν τοῦ πολυωνύμου $f(x, y, z, \dots)$ διὰ $x = \alpha, y = \beta, z = \gamma, \dots$, ἔνθα $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ ἀριθμοὶ πραγματικοί ἢ μιγαδικοί, τὸν ἀριθμὸν $f(\alpha, \beta, \gamma, \dots)$, ὃ δοποῖος προκύπτει, ἂν εἰς τὸ πολυώνυμον $f(x, y, z, \dots)$ ἀντικαταστήσωμεν τὰς μεταβλητὰς x, y, z, \dots διὰ τῶν $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ ἀντιστοίχως.

Ἐκ τοῦ ὅρισμοῦ τῆς ισότητος δύο πολυωνύμων ν μεταβλητῶν καὶ τοῦ ὅρισμοῦ τοῦ μηδενικοῦ πολυωνύμου προκύπτει ὅτι :

Ἐὰν $f(x, y, z, \dots) \equiv \phi(x, y, z, \dots) \implies f(\alpha, \beta, \gamma, \dots) = \phi(\alpha, \beta, \gamma, \dots)$ καὶ ἐὰν $f(x, y, z, \dots) \equiv 0 \implies f(\alpha, \beta, \gamma, \dots) = 0$ διὰ κάθε v -άδα τιμῶν $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ τῶν x, y, z, \dots ἀντιστοίχως.

Παρατήρησις. Διὰ τὴν ἀπόδειξιν προτάσεων, αἱ δοποῖαι ἀναφέρονται εἰς πολυώνυμα πολλῶν μεταβλητῶν, διατάσσομεν συνήθως αὐτὰ ὡς πρὸς μίαν μεταβλητήν. Ἀκριβέστερον Ισχεῖ ἡ ἔξις πρότασις :

Κάθε μὴ μηδενικὸν πολυώνυμον $f(x, y, z)$, ν βαθμοῦ ὡς πρὸς τὴν μεταβλητὴν x , δύναται νὰ διαταχθῇ κατὰ τὰς κατιούσας δυνάμεις τῆς μεταβλητῆς x κατὰ μοναδικὸν (μονοσήμαντον) τρόπον ὑπὸ τὴν μορφή :

$$f(x, y, z) \equiv f_v(y, z) x^v + f_{v-1}(y, z) x^{v-1} + \dots + f_1(y, z) x + f_0(y, z), \quad (4)$$

ἔνθα $f_v(y, z), f_{v-1}(y, z), \dots, f_0(y, z)$ ἀκέραια πολυώνυμα τῶν μεταβλητῶν y, z καὶ $f_v(y, z) \not\equiv 0$.

Προφανῶς ἡ διάταξις αὕτη γίνεται ως ἔξῆς :

Συλλέγομεν πρῶτον τούς όρους οι οἱποῖοι ἔχουν τὸ χ εἰς τὴν μεγαλυτέραν δύναμιν ν καὶ μεταξὺ αὐτῶν ἔξαγομεν κοινὸν παράγοντα τὸ χν , ὅτε ἔχομεν ως συντελεστὴν τοῦ χν ἐν γένει πολυώνυμον τῶν γ καὶ z, τὸ οἱποῖον καλοῦμεν f_n (y,z). Ἀκολούθως συλλέγομεν τούς όρους οἱ οἱποῖοι ἔχουν τὸ χ εἰς τὴν δύναμιν ν – 1 καὶ μεταξὺ αὐτῶν ἔξαγομεν κοινὸν παράγοντα τὸν χn-1 καὶ ἔχομεν οὕτω ως συντελεστὴν τοῦ χn-1 ἐν γένει πολυώνυμον τῶν γ καὶ z, τὸ οἱποῖον καλοῦμεν f_{n-1} (y,z). Προχωροῦντες καθ' ὅμοιον τρόπον συλλέγομεν τέλος τούς όρους οἱ οἱποῖοι δὲν ἔχουν τὴν μεταβλητὴν x καὶ οἱ οἱποῖοι ἀπαρτίζουν τὸν τελευταῖον προσθετέον f₀ (y,z) τοῦ ἀναπτύγματος (4).

Τὸ αὐτὸν πολυώνυμον f(x,y,z), ἐάν εἴναι βαθμοῦ μ ὡς πρὸς μίαν δλλην μεταβλητὴν π.χ. τὴν y δύναται νὰ διαταχθῇ κατά τὰς κατιούσας δυνάμεις τοῦ y, δηλ. νὰ λάβῃ τὴν μορφήν :

$$f(x,y,z) \equiv f_{\mu}(x,z) y^{\mu} + f_{\mu-1}(x,z) y^{\mu-1} + \dots + f_1(x,z) y + f_0(x,z), \quad (4')$$

ἔνθα $f_{\mu}(x,z)$, $f_{\mu-1}(x,z), \dots, f_0(x,z)$ ἀκέραια πολυώνυμα τῶν x,z καὶ $f_{\mu}(x,z) \not\equiv 0$.

*Εφαρμογή. Τὸ πολυώνυμον :

$$f(x,y,z) \equiv 5x^4y^2z^3 - 3x^3yz^5 + 2x^3z - x^4y + 4yx - 7xy^2z + 3z - 2y$$

διατάσσεται κατά τὰς κατιούσας δυνάμεις τῆς μεταβλητῆς x ως κάτωθι :

$$f(x,y,z) \equiv (5y^2z^3 - y)x^4 + (2z - 3yz^5)x^3 + (4y - 7y^2z)x + (3z - 2y).$$

η'). Ἀνάλογοι προτάσεις πρὸς τὰ θεωρήματα I καὶ II τῶν §§ 52, 53 διατυποῦνται καὶ διὰ πολυώνυμα περισσοτέρων τῆς μιᾶς μεταβλητῶν, ἦτοι :

1ον : 'Εὰν τὸ γινόμενον δύο ἀκέραιών πολυωνύμων f(x,y,z,...) καὶ φ(x,y,z,...) είναι ἐκ ταυτότητος μηδὲν ἐν τῷ ἐξ αὐτῶν δὲν είναι τὸ μηδενικὸν πολυώνυμον, τότε τὸ ἄλλο είναι ἐκ ταυτότητος μηδέν. Δηλαδή :

'Εὰν f(x,y,z,...) · φ(x,y,z,...) ≡ 0 καὶ φ(x,y,z,...) ≢ 0 ⇒ f(x,y,z,...) ≡ 0.

2ον : 'Εὰν f(x,y,z,...) · φ(x,y,z,...) ≡ g(x,y,z,...) · φ(x,y,z,...) καὶ

φ(x,y,z,...) ≢ 0, τότε : f(x,y,z,...) ≡ g(x,y,z,...).

Διαιρετότης ἀκέραιών πολυωνύμων πολλῶν μεταβλητῶν.

§ 80. Τελεία διαιρεσίς. – Ἡ τελεία διαιρεσίς ἀκέραιών πολυωνύμων περισσοτέρων τῆς μιᾶς μεταβλητῶν δρίζεται ως καὶ διὰ τὰ πολυώνυμα μιᾶς μεταβλητῆς. Οὕτω θὰ λέγωμεν ὅτι :

Τὸ μὴ μηδενικὸν πολυώνυμον φ(x,y,z,...) διαιρεῖ τὸ f(x,y,z,...) καὶ γράφομεν φ(x,y,z,...) | f(x,y,z,...), τότε, καὶ μόνον τότε, ἂν ὑπάρχῃ ἀκέραιον πολυώνυμον π(x,y,z,...) τοιούτον, ὥστε νὰ ισχύῃ ἡ ταυτότης :

$$f(x,y,z,...) \equiv \phi(x,y,z,...) \cdot \pi(x,y,z,...). \quad (1)$$

Εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν λέγομεν ἐπίσης ὅτι τὸ πολυώνυμον f(x,y,z,...) διαιρεῖται (ἀκριβῶς) ἢ είναι διαιρετὸν διὰ τοῦ πολυωνύμου φ(x,y,z,...) ἢ ἀκόμη ὅτι ἡ διαιρεσίς f(x,y,z,...) : φ(x,y,z,...) είναι τελεία.

Τὸ πολυώνυμον π(x,y,z,...) καλεῖται ἐπίσης πηλίκον τῆς τελείας διαιρέσεως f(x,y,z,...) : φ(x,y,z,...). Οὕτω, π.χ. τὸ πολυώνυμον f(x,y) ≡ x³ + y³ διαιρεῖται (ἀκριβῶς) διὰ τοῦ φ(x,y) ≡ x² – xy + y² καὶ δίδει πηλίκον τὸ ἀκέραιον πολυώνυμον π(x,y) ≡ x + y.

Είναι φανερόν ότι τὸ πηλίκον τῆς τελείας διαιρέσεως $f(x,y,z,\dots) : \varphi(x,y,z,\dots)$, ἥτοι τὸ πολυώνυμον $\pi(x,y,z,\dots)$, δολέζεται μονοσημάντως· πράγματι, ἐὰν ὑπῆρχε καὶ ἀλλο πολυώνυμον $\pi_1(x,y,z,\dots)$ τοιοῦτον, ὥστε :

$$f(x,y,z,\dots) \equiv \varphi(x,y,z,\dots) \cdot \pi_1(x,y,z,\dots), \quad (2)$$

τότε, δυνάμει τῶν (1) καὶ (2), θὰ εἴχομεν :

$$\varphi(x,y,z,\dots) \cdot \pi(x,y,z,\dots) \equiv \varphi(x,y,z,\dots) \cdot \pi_1(x,y,z,\dots)$$

καὶ ἐπομένως :

$$\varphi(x,y,z,\dots) \cdot [\pi(x,y,z,\dots) - \pi_1(x,y,z,\dots)] \equiv 0 \quad (3)$$

Ἄλλα $\varphi(x,y,z,\dots) \not\equiv 0$, ὅθεν (§ 79, η) θὰ εἴναι :

$$\pi(x,y,z,\dots) - \pi_1(x,y,z,\dots) \equiv 0 \quad \text{ἢ} \quad \pi(x,y,z,\dots) \equiv \pi_1(x,y,z,\dots)$$

Δηλαδὴ ἐν μόνον πτηλίκον ὑπάρχει.

Σημεῖος. Εἰς τὴν περίπτωσιν πολυωνύμων περισσοτέρων τῆς μιᾶς μεταβλητῶν δὲν ισχύει ἐν ἀνάλογον θεώρημα πρὸς τὸ τῆς § 64. Κατὰ ταῦτα :

Δοθέντων δύο πολυωνύμων $A(x,y)$ καὶ $B(x,y)$ δὲν ὑπάρχουν πάντοτε δύο πολυώνυμα $Q(x,y)$ καὶ $R(x,y)$ (μὲν βαθμὸν τοῦ $R(x,y)$ μικρότερον τοῦ βαθμοῦ τοῦ $B(x,y)$) τοιούτων, διότε :

$$A(x,y) \equiv B(x,y) \cdot Q(x,y) + R(x,y).$$

Παράδειγμα: $A(x,y) \equiv x^3 + 2xy^2 - x + 1$, $B(x,y) \equiv x + y - 1$.

Ἄποδεικύομεν κατωτέρω μερικὰ βασικὰ θεωρήματα διαιρετότητος.

§ 81. Θεώρημα. — 'Ακέραιον πολυώνυμον $f(x,y,z)$ διαιρεῖται διὰ τοῦ διωνύμου $x - y$ τότε, καὶ μόνον τότε, ἂν : $f(y,y,z) \equiv 0$, δηλ. καθίσταται ἐκ ταυτότητος μηδέν, ὅταν εἰς αὐτὸ τεθῇ ἀντὶ x τὸ y .

'Απόδειξις. "Εστω ὅτι $x - y \mid f(x,y,z)$, τότε, ἐὰν καλέσωμεν $\pi(x,y,z)$ τὸ πτηλίκον τῆς τελείας διαιρέσεως $f(x,y,z) : (x - y)$, θὰ ἔχωμεν τὴν ταυτότητα :

$$f(x,y,z) \equiv (x-y) \cdot \pi(x,y,z) \quad (1)$$

Αντικαθιστῶντες εἰς τὴν (1) τὸ x διὰ τοῦ y λαμβάνομεν :

$$f(y,y,z) \equiv 0. \quad (2)$$

'Αντιστρόφως. "Εστω ὅτι ισχύει ἡ (2) καὶ ὅτι v εἶναι διαίρεσιν τοῦ $f(x,y,z)$ ὡς πρὸς τὴν μεταβλητὴν x . Τότε τὸ $f(x,y,z)$ τίθεται ὑπὸ τὴν μορφήν :

$$f(x,y,z) \equiv f_v(y,z)x^v + f_{v-1}(y,z)x^{v-1} + \cdots + f_1(y,z)x + f_0(y,z).$$

Ἐὰν ἔκτελέσωμεν τὴν διαίρεσιν τοῦ $f(x,y,z)$ διὰ $x - y$, θὰ εύρωμεν ἐν πτηλίκον $\pi(x,y,z)$ καὶ ἐν ὑπόλοιπον μηδενικοῦ βαθμοῦ ὡς πρὸς τὴν μεταβλητὴν x , δηλ. ἐν ἀκέραιον πολυώνυμον μὴ περιέχον τὸ x , ἀλλὰ μόνον τὰς μεταβλητὰς y καὶ z .

Ἐάν $u(y,z)$ καλέσωμεν τὸ ἐν λόγῳ ὑπόλοιπον, θὰ ἔχωμεν τὴν ταυτότητα :

$$f(x,y,z) \equiv (x - y) \cdot \pi(x,y,z) + u(y,z). \quad (3)$$

Αντικαθιστῶντες εἰς τὴν (3) τὸ x μὲ τὸ y καὶ ἔχοντες ὑπὸ δψιν τὴν (2) λαμβάνομεν :

$$u(y,z) \equiv f(y,y,z) \equiv 0,$$

δηλαδὴ τὸ $u(y,z)$ εἶναι τὸ μηδενικὸν πολυώνυμον, ὅτε ἡ (3) γίνεται :

$$f(x,y,z) \equiv (x - y) \cdot \pi(x,y,z), \quad \text{δηλαδὴ } (x - y) \mid f(x,y,z).$$

§ 82. Θεώρημα. — 'Εάν άκέραιον πολυώνυμον $f(x,y,z)$ διαιρήται δι' ένός έκαστου των διωνύμων: $x - y$, $y - z$, $z - x$, τότε θά διαιρήται καὶ διὰ τοῦ γινομένου:

$$(x - y)(y - z)(z - x) \not\equiv 0$$

καὶ ἀντιστρόφως.

'Α πόδεις εἰς ι. 'Εφ' ὅσον, ἐξ ὑποθέσεως, τὸ $f(x,y,z)$ διαιρεῖται διὰ $x - y$ θὰ ἔχωμεν, ἐάν $\pi_1(x,y,z)$ καλέσωμεν τὸ πηλίκον τῆς διαιρέσεως ταύτης:

$$f(x,y,z) \equiv (x - y) \cdot \pi_1(x,y,z). \quad (1)$$

'Εάν εἰς τὴν (1) τεθῇ δόπον γ τὸ z λαμβάνομεν :

$$f(x,z,z) \equiv (x - z) \cdot \pi_1(x,z,z). \quad (2)$$

'Ἐπειδὴ δῶμας τὸ $f(x,y,z)$ διαιρεῖται διὰ $y - z$, θὰ εἴναι (§ 81) $f(x,z,z) \equiv 0$.

Τότε δῶμας ἐκ τῆς (2) προκύπτει: $\pi_1(x,z,z) \equiv 0$, διότι $x - z \not\equiv 0$.

'Εκ τῆς $\pi_1(x,z,z) \equiv 0$ προκύπτει διὰ τὸ πολυώνυμον $\pi_1(x,y,z)$ διαιρεῖται (ἀκριβῶς) διὰ $y - z$, δηθεν θὰ ἔχωμεν, ἐάν $\pi_2(x,y,z)$ καλέσωμεν τὸ πηλίκον τῆς διαιρέσεως ταύτης:

$$\pi_1(x,y,z) \equiv (y - z) \cdot \pi_2(x,y,z). \quad (3)$$

'Η (1), λόγῳ τῆς (3), γίνεται :

$$f(x,y,z) \equiv (x - y)(y - z) \cdot \pi_2(x,y,z). \quad (4)$$

'Εάν εἰς τὴν (4) τεθῇ δόπον γ τὸ x λαμβάνομεν :

$$f(x,y,x) \equiv (x - y)(y - x) \cdot \pi_2(x,y,x). \quad (5)$$

'Ἐπειδὴ δῶμας τὸ $f(x,y,z)$ διαιρεῖται διὰ $z - x$, θὰ εἴναι $f(x,y,x) \equiv 0$.

Τότε δῶμας ἐκ τῆς (5) προκύπτει: $\pi_2(x,y,x) \equiv 0$, διότι $(x - y)(y - x) \not\equiv 0$.

'Αλλὰ $\pi_2(x,y,x) \equiv 0$ δηλοῖ διὰ τὸ πολυώνυμον $\pi_2(x,y,z)$ διαιρεῖται (ἀκριβῶς) διὰ τοῦ $z - x$. "Αρά :

$$\pi_2(x,y,z) \equiv (z - x) \cdot \pi(x,y,z), \quad (6)$$

ἔνθα $\pi(x,y,z)$ εἴναι τὸ πηλίκον τῆς διαιρέσεως $\pi_2(x,y,z)$: $(z - x)$.

'Η (4), δυνάμει τῆς (6), γίνεται :

$$f(x,y,z) \equiv (x - y)(y - z)(z - x) \cdot \pi(x,y,z).$$

Συνεπῶς τὸ $f(x,y,z)$ διαιρεῖται ἀκριβῶς καὶ διὰ τοῦ γινομένου $(x - y)(y - z)(z - x)$.

Τότε ἀντιστροφον είναι προφανές.

Δι' ἀναλόγου τρόπου ἀποδεικνύεται καὶ τὸ κάτωθι :

§ 83. Θεώρημα. — 'Εάν άκέραιον πολυώνυμον $f(x,y,z)$ διαιρήται :

$$(i) \text{ διὰ } x + y, y + z, z + x \iff \text{διαιρεῖται καὶ διὰ } (x + y)(y + z)(z + x)$$

$$(ii) \text{ διὰ } x, y, z \iff \gg \gg \gg x \cdot y \cdot z$$

$$(iii) \text{ διὰ } x + y - z, y + z - x, z + x - y \iff \gg \gg \gg (x + y - z)(y + z - x) \\ (z + x - y).$$

Σημείωσις. Τὰ προηγούμενα θεωρήματα ισχύουν γενικῶς διὰ κάθε πολυώνυμον $f(x,y,z, \dots, t)$, ν τὸ πλῆθος μεταβλητῶν, αἱ δὲ ἀποδείξεις είναι πανομοιότυποι τῶν ἀνωτέρων καὶ διὰ πολυώνυμα τριῶν μεταβλητῶν.

'Εφαρμογή. 'Εάν ο φυσικός ἀριθμός, νὰ δειχθῇ ὅτι τὸ πολυώνυμον :

$$f(x,y,z) \equiv (x + y + z)^{2v+1} - x^{2v+1} - y^{2v+1} - z^{2v+1}$$

διαιρεῖται διὰ τοῦ γινομένου : $(x + y)(y + z)(z + x)$.

Λύσις. 'Αντικαθιστῶντες τὸ x μὲ τὸ $-y$ εἰς τὸ $f(x,y,z)$ εύρισκομεν :

$$f(-y,y,z) \equiv (-y + y + z)^{2v+1} - (-y)^{2v+1} - y^{2v+1} - z^{2v+1} \equiv z^{2v+1} + y^{2v+1} - y^{2v+1} - z^{2v+1} \equiv 0.$$

"Αρά τὸ $f(x,y,z)$ διαιρεῖται (ἀκριβῶς) διὰ $x + y$. 'Ομοίως ἀποδεικνύεται ὅτι διαιρεῖται διὰ $y + z$ καὶ $z + x$. Τότε δῶμας, συμφώνως πρός τὸ τελευταῖον θεώρημα τὸ $f(x,y,z)$ θὰ διαιρήται καὶ διὰ τοῦ γινομένου $(x + y)(y + z)(z + x)$.

'Ομογενή πολυώνυμα

§ 84. Ορισμοί.— Εις τὴν παράγραφον 79 εἴδομεν ὅτι: "Ἐν ἀκέραιον πολυώνυμον δύο ἡ περισσοτέρων μεταβλητῶν καλεῖται ὁμογενὲς τότε, καὶ μόνον τότε, ἂν δῆλοι οἱ δροὶ του, δηλαδὴ τὰ μονώνυμα (μὴ μηδενικὰ) ἐξ ὧν σύγκειται εἶναι τοῦ αὐτοῦ βαθμοῦ ὡς πρὸς τὸ σύνολον τῶν μεταβλητῶν.

Οκοινός βαθμὸς τῶν ὄρων του καλεῖται βαθμὸς ὁμογενείας τοῦ πολυωνύμου. Οὔτω, π.χ., τὸ πολυώνυμον: $f(x,y,z) \equiv 2x^3 - y^3 + 3z^3 + x^2y + y^2z - z^2x + 3xyz$ εἶναι ὁμογενές, τρίτου βαθμοῦ. Ἐπίσης τὸ πολυώνυμον $\phi(x,y) \equiv x^3y - 2x^2y^2 + 3xy^3$ εἶναι ὁμογενὲς τετάρτου βαθμοῦ ὁμογενείας, ἐνῶ τὸ πολυώνυμον: $g(x,y) \equiv x^2 + y^2 + xy + x + y$ δὲν εἶναι ὁμογενές.

Ἐστω τώρα ἐν ὁμογενὲς πολυώνυμον $f(x,y,z)$, βαθμοῦ ὁμογενείας v , τότε δικύων ὄρος αὐτοῦ θὰ εἶναι τῆς μορφῆς: $\alpha x^k y^p z^q$, ἐνθα α (σταθερός) πραγματικὸς ἀριθμὸς καὶ k, p, q φυσικοὶ ἀριθμοὶ ἢ μηδὲν τοιοῦτοι, ὥστε νὰ εἶναι $k + p + q = v$. Ὁ ὄρος οὗτος, ἐὰν τὰ x, y, z ἀντικατασταθοῦν ἀντιστοίχως ὑπὸ τῶν γινομένων: $\lambda x, \lambda y, \lambda z$, ἔνθα λ τυχών πραγματικὸς ἀριθμός, $\lambda \neq 0$, γίνεται:

$$\alpha(\lambda x)^k (\lambda y)^p (\lambda z)^q \equiv \alpha \cdot \lambda^{k+p+q} x^k y^p z^q \equiv \lambda^v \cdot \alpha x^k y^p z^q,$$

ἥτοι πολλαπλασιάζεται ἐπὶ λ^v . Ἐφ' ὅσον δικύων ὄρος τοῦ πολυωνύμου $f(x,y,z)$ πολλαπλασιάζεται ἐπὶ λ^v , ἔπειται ὅτι καὶ τὸ πολυώνυμον $f(x,y,z)$ πολλαπλασιάζεται ἐπὶ λ^v . Ἐντεῦθεν ἔπειται ὁ ἔξῆς ἰσοδύναμος ὁρισμὸς τοῦ ὁμογενοῦς πολυωνύμου:

'Ακέραιον πολυώνυμον $f(x,y,z, \dots)$ καλεῖται ὁμογενές, ν βαθμοῦ, τότε, καὶ μόνον τότε, ἂν ύφεσταται ἡ ταυτότης:

$$f(\lambda x, \lambda y, \lambda z, \dots) \equiv \lambda^v \cdot f(x, y, z, \dots)$$

διὰ κάθε $\lambda \in \mathbb{R}$, $\lambda \neq 0$ καὶ $(x, y, z, \dots) \neq (0, 0, 0, \dots)$.

Π αράδειγμα: Τὸ πολυώνυμον: $f(x,y,z) \equiv x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz$ εἶναι ὁμογενὲς τρίτου βαθμοῦ, διότι ἔχομεν:

$$f(\lambda x, \lambda y, \lambda z) \equiv (\lambda x)^3 + (\lambda y)^3 + (\lambda z)^3 - 3(\lambda x)(\lambda y)(\lambda z) \equiv \lambda^3 \cdot (x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz) \equiv \lambda^3 \cdot f(x, y, z).$$

"Α σκησις. Ἀποδείξατε τὴν ἰσοδυναμίαν τῶν ἀνωτέρω δύο ὁρισμῶν τοῦ ὁμογενοῦς πολυωνύμου.

'Ιδιότητες τῶν 'Ομογενῶν πολυωνύμων

§ 85. Ιδιότης I.— Τὸ γινόμενον δύο ὁμογενῶν πολυωνύμων εἶναι ἐπίσης ὁμογενὲς πολυώνυμον, βαθμοῦ ὁμογενείας ἵσου πρὸς τὸ ὄθροισμα τῶν βαθμῶν τῶν δύο πολυωνύμων.

'Α πόδειξις. Ἐστωσαν τὰ ὁμογενῆ πολυώνυμα $f(x,y,z)$, $\phi(x,y,z)$ βαθμῶν ὁμογενείας v καὶ $μ$ ἀντιστοίχως. Τότε θὰ ἔχωμεν:

$$f(\lambda x, \lambda y, \lambda z) \equiv \lambda^v \cdot f(x, y, z). \quad (1)$$

$$\phi(\lambda x, \lambda y, \lambda z) \equiv \lambda^μ \cdot \phi(x, y, z). \quad (2)$$

Έκ τῶν (1) καὶ (2) λαμβάνομεν τὴν ταυτότητα :

$$f(\lambda x, \lambda y, \lambda z) \cdot \phi(\lambda x, \lambda y, \lambda z) \equiv \lambda^{v+u} \cdot f(x, y, z) \cdot \phi(x, y, z) \quad (3)$$

Ή (3) μᾶς βεβαιώνει ότι τὸ γινόμενον $f(x, y, z) \cdot \phi(x, y, z)$ τῶν δύο δμογενῶν πολυωνύμων εἶναι ἐπίστης δμογενές πολυωνύμον $v + u$ μ βαθμοῦ δμογενείας.

Π αρατήρησις. Τὸ γινόμενον ἐνὸς δμογενοῦς καὶ ἐνὸς μὴ δμογενοῦς πολυωνύμου καθὼς καὶ τὸ γινόμενον δύο μὴ δμογενῶν πολυωνύμων εἶναι πολυωνύμον μὴ δμογενές (διατί;)

§ 86. Ιδιότης II.—Τὸ πηλίκον τῆς τελείας διαιρέσεως δύο δμογενῶν πολυωνύμων εἶναι πολυνύμον δμογενές, βαθμοῦ δμογενείας ἵσου πρὸς τὴν διαφορὰν τῶν βαθμῶν τῶν δύο πολυωνύμων.

Α πόδειξις. Ἐστωσαν $f(x, y, z)$, $\phi(x, y, z)$, $\pi(x, y, z)$ ἀντιστοίχως διαιρετός, δ διαιρέτης καὶ τὸ πηλίκον μᾶς τελείας διαιρέσεως καὶ v , u ($v > u$) ἀντιστοίχως οἱ βαθμοὶ δμογενείας τῶν $f(x, y, z)$ καὶ $\phi(x, y, z)$. Τότε θὰ ἔχωμεν :

$$f(x, y, z) \equiv \phi(x, y, z) \cdot \pi(x, y, z) \quad (1)$$

$$f(\lambda x, \lambda y, \lambda z) \equiv \lambda^v \cdot f(x, y, z) \quad (2)$$

$$\phi(\lambda x, \lambda y, \lambda z) \equiv \lambda^u \cdot \phi(x, y, z). \quad (3)$$

Ή ταυτότης (1), ἐὰν τὰ x, y, z ἀντικατασταθοῦν ἀντιστοίχως ὑπὸ τῶν $\lambda x, \lambda y, \lambda z$ γίνεται :

$$f(\lambda x, \lambda y, \lambda z) \equiv \phi(\lambda x, \lambda y, \lambda z) \cdot \pi(\lambda x, \lambda y, \lambda z)$$

ἢ δυνάμει τῶν (2) καὶ (3) :

$$\lambda^v \cdot f(x, y, z) \equiv \lambda^u \cdot \phi(x, y, z) \cdot \pi(\lambda x, \lambda y, \lambda z). \quad (4)$$

Διαιροῦντες τὰς (4) καὶ (1) κατὰ μέλη λαμβάνομεν μετὰ τὰς πράξεις :

$$\pi(\lambda x, \lambda y, \lambda z) \equiv \lambda^{v-u} \cdot \pi(x, y, z),$$

ἥ δποια δηλοῖ δτι τὸ πηλίκον εἶναι δμογενές πολυωνύμον βαθμοῦ δμογενείας $v - u$.

Σημείωσις. Ή Ιδιότης II ἀποδεικνύεται συντομώτερον διὰ τῆς εἰς ἀτοπὸν ἀπαγωγῆς, ἔχοντες δμως ὑπ' ὅψιν καὶ τὴν παραστήρησιν τῆς προηγουμένης παραγράφου.

Π αρατήρησις. Τὸ ἀθροισμά $\lambda^v \cdot \phi(x, y, z)$ δύο δμογενῶν πολυωνύμων δὲν εἶναι πάντοτε δμογενές πολυωνύμον. Περὶ τούτου βεβαιούμεθα ἐκ τῶν κάτωθι παραδειγμάτων :

$$\text{Ἐὰν } f(x, y, z) \equiv x^8 + y^8 + z^8 - 3xyz \quad (\text{δμογενές πολυωνύμον τρίτου βαθμοῦ})$$

$$\text{καὶ } \phi(x, y, z) \equiv x^8 + y^8 + z^8 + xy + yz + zx \quad (\gg \gg \text{ δευτέρου } \gg)$$

τότε τὸ ἀθροισμά των, ἥτοι τὸ πολυωνύμον :

$$f(x, y, z) \equiv f(x, y, z) + \phi(x, y, z) \equiv x^8 + y^8 + z^8 + x^2 + y^2 + z^2 + xy + yz + zx - 3xyz$$

δὲν εἶναι δμογενές ὡς πρὸς τὰ x, y, z .

Ἀντιθέτως, ἐὰν θεωρήσωμεν τὰ πολυωνύμα :

$$f(x, y, z) \equiv x^8 + y^8 + z^8 - 3xyz \quad (\text{δμογενές πολυωνύμον τρίτου βαθμοῦ})$$

$$g(x, y, z) \equiv x^8y + y^8z + z^8x + 5xyz \quad (\text{δμογενές πολυωνύμον τρίτου βαθμοῦ})$$

τότε καὶ τό :

$$f(x, y, z) + g(x, y, z) \equiv x^8 + y^8 + z^8 + x^2y + y^2z + z^2x + 2xyz$$

εἶναι δμογενές πολυωνύμον καὶ μάλιστα τοῦ αὐτοῦ βαθμοῦ δμογενείας.

Γενικῶς : Τὸ ἀθροισμα δύο ἡ περισσοτέρων ὁμογενῶν πολυωνύμων θὰ εἰναι ὁμογενὲς πολυώνυμον, ἐὰν τὰ πολυώνυμα τὰ ὅποια προστίθενται εἰναι τοῦ αὐτοῦ βαθμοῦ ὁμογενείας.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

181. Δείξατε ὅτι τὸ πολυώνυμον : $f(x,y) \equiv x^8 + y^2 - 8xy$ εἰναι ὁμογενὲς δευτέρου βαθμοῦ ὁμογενείας.

182. Δείξατε ὅτι τὸ πολυώνυμον : $f(x,y) \equiv 8x^3y - 5x^2y^2 + 3xy^3$ εἰναι ὁμογενὲς τετάρτου βαθμοῦ ὁμογενείας,

183. Δείξατε ὅτι τὸ πολυώνυμον : $f(x,y,z) \equiv 5x^3 - y^3 + 2z^3 + x^2y + y^2z - z^2x + 3xyz$ εἰναι ὁμογενὲς τρίτου βαθμοῦ ὁμογενείας.

184. Δείξατε ὅτι τὸ πολυώνυμον : $f(x,y) \equiv 9x^5y^3 + 3x^4y^4 - 14xy^7$ εἰναι ὁμογενὲς, ὁγδόου βαθμοῦ ὁμογενείας.

(Νὰ γίνη εἰς τὰς ἀνωτέρω ἀσκήσεις χρῆστις τοῦ δευτέρου ὄρισμοῦ).

185. Ὁμοίως, τῇ βοηθείᾳ τοῦ δευτέρου ὄρισμοῦ, δείξατε ὅτι τὸ πολυώνυμον :

$$f(x,y) \equiv x^8 - 5x^4y + 6x^3y^2 - 5x^2y^3 + xy^4 - y^5$$

εἰναι ὁμογενὲς 5ου βαθμοῦ ὁμογενείας.

186. Δίδονται τὰ πολυώνυμα : $f(x,y) \equiv x^8 + 2xy^8 + x^8y + xy + x + y$,
 $\varphi(x,y,z) \equiv 3x^2y^2z^2 - 2xy^2z^2 + y^5z - 7x^4yz$.

Εἰναι ὁμογενῆ ; Ἐν καταφατικῇ περιπτώσει νὰ εύρεθῇ ὁ βαθμὸς τῆς ὁμογενείας των.

Συμμετρικὰ πολυώνυμα

§ 87. Βοηθητικαὶ ἔννοιαι – "Ορισμοί. – α')." Εστωσαν ν τὸ πλῆθος διάφορα ἀλλήλων διατεταγμένα στοιχεῖα x_1, x_2, \dots, x_v , τὰ ὅποια θεωροῦνται ὡς στοιχεῖα ἐνὸς συνόλου E , ἦτοι $E \equiv \{x_1, x_2, \dots, x_v\}$.

Καλεῖται μετάθεσις τῶν ν αὐτῶν στοιχείων κάθε ἀμφιμονοσήμαντος ἀπεικόνισις τοῦ συνόλου E ἐπὶ τοῦ ἑαυτοῦ του.

Ούτω, π.χ., ἐὰν $E \equiv \{x, y, z\}$ καὶ θεωρήσωμεν τὴν ἀπεικόνισιν :

$$x \leftrightarrow y, \quad y \leftrightarrow x, \quad z \leftrightarrow z,$$

τότε αὕτη εἰναι μία μετάθεσις τῶν στοιχείων τοῦ τριμελοῦς συνόλου E .

Τὴν ἀνωτέρω ἀπεικόνισιν (μετάθεσιν) παριστῶμεν συμβολικῶς οὕτω :

$$\begin{pmatrix} x & y & z \\ \uparrow & \downarrow & \uparrow \\ y & x & z \end{pmatrix} \text{ ἢ ἀπλούστερον } \begin{pmatrix} x & y & z \\ y & x & z \end{pmatrix}^*$$

Μεταθέσεις τοῦ τριμελοῦς συνόλου $\{x, y, z\}$ εἰναι καὶ αἱ ἔξῆς :

$$\begin{pmatrix} x & y & z \\ x & y & z \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x & y & z \\ x & z & y \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x & y & z \\ y & z & x \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x & y & z \\ z & x & y \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x & y & z \\ z & y & x \end{pmatrix}.$$

"Ωστε ἐκ τοῦ τριμελοῦς συνόλου $\{x, y, z\}$ λαμβάνομεν $6 = 1 \cdot 2 \cdot 3$ μεταθέσεις.


*) Εἰς τὴν πρώτην γραμμὴν γράφονται τὰ πρότυπα καὶ εἰς τὴν δευτέραν κάτωθεν ἐκάστου προτύπου ἡ εἰκὼν αὐτοῦ.

Εις ἐν ἀπόμενον κεφάλαιον θὰ ἀποδείξωμεν ὅτι : Τὸ πλῆθος τῶν μεταθέσεων ἐνὸς συνόλου ἐκ ν στοιχείων εἶναι ἵστον πρὸς τὸ γινόμενον $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots n$.

Μία εἰδικὴ περίπτωσις μεταθέσεως είναι ἑκείνη καθ' ἥν ἕκαστον στοιχεῖον τοῦ συνόλου Ε ἀπεικονίζεται εἰς τὸ ἀπόμενόν του, τὸ δὲ τελευταῖον στοιχεῖον x_v εἰς τὸ πρῶτον x_1 . Δηλαδὴ ἡ μετάθεσις :

$$\begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_{v-1} & x_v \\ x_2 & x_3 & \cdots & x_v & x_1 \end{pmatrix}$$

Μία τοιαύτη μετάθεσις καλεῖται : **κυκλικὴ μετάθεσις.**



Ἡ ὄνομασία αὕτη ἔξηγεῖται ἀμέσως ἐάν τὰ ν διατεταγμένα στοιχεῖα x_1, x_2, \dots, x_v φαντασθῶμεν ὅτι εἴναι τοποθετημένα ἐπὶ μιᾶς περιφερείας κύκλου καὶ θεωρήσωμεν ἐν κινητὸν τὸ ὅποιον διαγράφει τὴν περιφέρειαν (σχ. 5) κατὰ τὴν φορὰν ποὺ δεικνύουν τὰ βέλη, τότε τὸ κινητὸν μετὰ τὸ x_1 θὰ συναντήσῃ τὸ x_2 , μετὰ τὸ x_2 τὸ x_3 ... καὶ τέλος μετὰ τὸ x_v θὰ συναντήσῃ πάλιν τὸ x_1 .

Κυκλικαὶ μεταθέσεις ἐκ δύο στοιχείων καλοῦνται εἰδικώτερον **ἀντιμεταθέσεις.**

β'). Ἄσθεωρήσωμεν ἡδη τὸ πολυώνυμον $f(x,y) \equiv x^2 + y^2 - 3x + 2y + 1$ τῶν μεταβλητῶν x καὶ y . Εάν ἀντιμεταθέσωμεν τὰς μεταβλητὰς x καὶ y , δηλ. ἐάν θέσωμεν ἀντὶ x τὸ y καὶ ἀντὶ y τὸ x θὰ προκύψῃ τὸ πολυώνυμον $f(y,x) \equiv y^2 + x^2 - 3y + 2x + 1$, τὸ ὅποιον προφανῶς εἴναι διάφορον τοῦ $f(x,y)$, ἦτοι ἔχομεν : $f(y,x) \not\equiv f(x,y)$.

Ἄντιθέτως ἐάν θεωρήσωμεν τὸ πολυώνυμον :

$$f(x,y) \equiv x^2 + y^2 - 2xy + 3(x+y) - 5$$

καὶ ἀντιμεταθέσωμεν τὰς μεταβλητὰς του προκύπτει πολυώνυμον ἐκ ταυτότητος ἵστον πρὸς τὸ δοθέν, ἦτοι ἐν προκειμένῳ ἴσχυει : $f(y,x) \equiv f(x,y)$.

Ομοίως, ἐάν θεωρήσωμεν τὸ πολυώνυμον τριῶν μεταβλητῶν :

$$f(x,y,z) \equiv x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz$$

καὶ ἐφαρμόσωμεν ἐπὶ τῶν μεταβλητῶν του x, y, z μίαν οἰασδήποτε μετάθεσιν, λ.χ. τήν : $\begin{pmatrix} x & y & z \\ z & x & y \end{pmatrix}$, ἦτοι ἀν θέσωμεν ἀντὶ x τὸ z , ἀντὶ y τὸ x καὶ ἀντὶ z τὸ y θὰ προκύψῃ τὸ πολυώνυμον :

$$f(z,x,y) \equiv z^3 + x^3 + y^3 - 3zxy.$$

Εἶναι δέ :

$$f(z,x,y) \equiv f(x,y,z).$$

Τὰ πολυώνυμα τῶν δύο τελευταίων παραδειγμάτων καλοῦνται : **συμμετρικά.**

Κατόπιν τούτων δίδομεν τὸν ἔχῆς ὄρισμὸν τοῦ συμμετρικοῦ πολυωνύμου.

Ακέραιον, μὴ μηδενικόν, πολυώνυμον δύο ἢ περισσοτέρων μεταβλητῶν καλεῖται συμμετρικὸν τότε, καὶ μόνον τότε, ἂν δι' οἰασδήποτε μεταθέσεως τῶν μεταβλητῶν του προκύπτῃ πολυώνυμον ἐκ ταυτότητος ἵστον πρὸς τὸ ἀρχικόν.

Ούτως, έὰν $f(x,y,z)$ είναι συμμετρικὸν πολυώνυμον ὡς πρὸς x,y,z θὰ ἔχωμεν :

$f(y,z,x) \equiv f(z,x,y) \equiv f(y,x,z) \equiv f(z,y,x) \equiv f(x,z,y) \equiv f(x,y,z)$.
γ'). "Ας θεωρήσωμεν ἥδη τὸ πολυώνυμον :

$$f(x,y,z) \equiv x^2(y-z) + y^2(z-x) + z^2(x-y). \quad (1)$$

Εὔκόλως διαπιστοῦμεν ὅτι τὸ ἐν λόγῳ πολυώνυμον δὲν είναι συμμετρικόν, κατὰ τὸν διθέντα ὄρισμόν, διότι, έὰν λάβωμεν τὴν μετάθεσιν $\begin{pmatrix} x & y & z \\ z & y & x \end{pmatrix}$ καὶ τὴν ἐφαρμόσωμεν ἐπὶ τῶν μεταβλητῶν του, θὰ προκύψῃ πολυώνυμον $f(z,y,x)$ διάφορον τοῦ διθέντος.

'Αντιθέτως, έὰν ἐπὶ τῶν μεταβλητῶν του x,y,z ἐφαρμόσωμεν τὴν κυκλικὴν μετάθεσιν, ἥτοι ἀν θέσωμεν ἀντὶ x τὸ y , ἀντὶ y τὸ z καὶ ἀντὶ z τὸ x , θὰ ἔχωμεν :

$$f(y,z,x) \equiv y^2(z-x) + z^2(x-y) + x^2(y-z). \quad (2)$$

Συγκρίνοντες τὰς (1) καὶ (2) λαμβάνομεν :

$$f(y,z,x) \equiv f(x,y,z).$$

Εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτῆς λέγομεν ὅτι τὸ πολυώνυμον (1) είναι κυκλικῶς συμμετρικόν. "Ωστε :

'Ακέραιον, μὴ μηδενικόν, πολυώνυμον δύο ἢ περισσοτέρων μεταβλητῶν καλεῖται καὶ κυκλικῶς συμμετρικόν τοις μεταβλητοῖς τότε, καὶ μόνον τότε, ἂν δὲ οἰασδήποτε κυκλικῆς μεταθέσεως τῶν μεταβλητῶν του προκύπτῃ πολυώνυμον ἐκ ταυτότητος ίσον πρὸς τὸ ἀρχικόν.

Εἶναι φανερὸν τώρα ὅτι κάθε συμμετρικὸν πολυώνυμον είναι καὶ κυκλικῶς συμμετρικόν, τὸ ἀντίστροφον δῆμος δὲν ἀληθεύει (διατί;).

Κατωτέρω εἰς περίπτωσεις καθ' ὃς τὸ πολυώνυμον είναι κυκλικῶς συμμετρικόν θὰ τονίζωμεν τοῦτο ἴδιαιτέρως.

Π α ρ α τ ἡ ρ η σ i c s. Εἰς τὴν περίπτωσιν πολυωνύμου δύο μεταβλητῶν αἱ ἔννοιαι : «συμμετρικὸν πολυώνυμον» καὶ «κυκλικῶς συμμετρικὸν πολυώνυμον» εἰναι ταυτόσημοι.

Ίδιότητες τῶν συμμετρικῶν πολυωνύμων

§ 88. Ίδιότης I.—Τὸ ἄθροισμα, ἢ διαφορὰ καὶ τὸ γινόμενον δύο συμμετρικῶν πολυωνύμων είναι πάντοτε συμμετρικὸν πολυώνυμον.

Ἡ ἀπόδειξις ὡς εὔκολος παραλείπεται.

§ 89. Ίδιότης II.—Τὸ πηλίκον τῆς τελείας διαιρέσεως δύο συμμετρικῶν πολυωνύμων (τῶν αὐτῶν μεταβλητῶν) είναι συμμετρικὸν πολυώνυμον.

'Α πόδειξις. "Εστωσαν $f(x,y,z)$, $\phi(x,y,z)$ καὶ $\pi(x,y,z)$ ἀντιστοίχως διαιρετέος, διαιρέτης καὶ τὸ πηλίκον τῆς τελείας διαιρέσεως τῶν συμμετρικῶν πολυωνύμων $f(x,y,z)$ καὶ $\phi(x,y,z) \not\equiv 0$, τότε θὰ ἔχωμεν :

$$f(x,y,z) \equiv \phi(x,y,z) \cdot \pi(x,y,z). \quad (1)$$

Διά μιᾶς τυχούσης μεταθέσεως τῶν x, y, z . π.χ. τῆς $\begin{pmatrix} x & y & z \\ z & x & y \end{pmatrix}$, ή (1) γίνεται :

$$\begin{aligned} f(x, y, z) &\equiv \phi(x, y, z) \cdot \pi(x, y, z) \\ \text{ή} \quad f(x, y, z) &\equiv \phi(x, y, z) \cdot \pi(z, x, y), \end{aligned} \quad (2)$$

διότι τὰ πολυώνυμα $f(x, y, z)$ καὶ $\phi(x, y, z)$ ὑπετέθησαν συμμετρικά.

Διὰ συγκρίσεως τῶν (1) καὶ (2) λαμβάνομεν :

$$\pi(x, y, z) \equiv \pi(x, y, z).$$

Όμοιώς βεβαιούμεθα ὅτι ή οἰασδήποτε ἄλλη μετάθεσις τῶν x, y, z καθιστᾶ τὸ πηλίκον $\pi(x, y, z)$ ἐκ ταυτότητος ἵσον πρὸς ἔσωτό ὅθεν τὸ $\pi(x, y, z)$ εἶναι συμμετρικὸν πολυώνυμον.

Π α ρ α τ ἡ ρ η σ ι ζ. Ἐάν τὰ πολυώνυμα $f(x, y, z)$ καὶ $\phi(x, y, z)$ εἶναι κυκλικῶς συμμετρικά, τότε τὸ πηλίκον $\pi(x, y, z)$ εἶναι κυκλικῶς συμμετρικὸν πολυώνυμον.

§ 90. Ιδιότης III.—Ἐάν ἀκέραιον πολυώνυμον $f(x, y, z)$ εἶναι συμμετρικὸν ὡς πρὸς τὰς μεταβλητὰς x, y, z καὶ διαιρῆται (ἀκριβῶς) διὰ τοῦ ἀκεραίου πολυώνυμου $\phi(x, y, z) \not\equiv 0$ (οὐχὶ κατ' ἀνάγκην συμμετρικοῦ), τότε θὰ διαιρῆται διὰ παντὸς πολυώνυμου, τὸ ὅποιον προκύπτει ἐκ τοῦ $\phi(x, y, z)$ δι' οἰασδήποτε μεταθέσεως τῶν μεταβλητῶν του.

Α π ό δ ειξιζ. Ἐστω $\pi(x, y, z)$ τὸ πηλίκον τῆς τελείας διαιρέσεως $f(x, y, z) : \phi(x, y, z)$, τότε θὰ ἔχωμεν τὴν ταυτότητα :

$$f(x, y, z) \equiv \phi(x, y, z) \cdot \pi(x, y, z). \quad (1)$$

Ἐάν εἰς ἀμφότερα τὰ μέλη τῆς ταυτότητος (1) ἐκτελέσωμεν μίαν οἰανδήποτε μετάθεσιν τῶν x, y, z . π.χ. τὴν $\begin{pmatrix} x & y & z \\ y & x & z \end{pmatrix}$, τὸ πρῶτον μέλος δὲν βλάπτεται, διότι τὸ $f(x, y, z)$ εἶναι συμμετρικὸν πολυώνυμον, ἐνῶ τὸ δεύτερον μέλος γίνεται : $\phi(y, x, z) \cdot \pi(y, x, z)$, καὶ ἐπομένως ή (1) γράφεται :

$$f(x, y, z) \equiv \phi(y, x, z) \cdot \pi(y, x, z). \quad (2)$$

Ή (2) δεικνύει ὅτι τὸ $f(x, y, z)$ διαιρεῖται (ἀκριβῶς) διὰ τοῦ $\phi(y, x, z)$.

Όμοιώς βεβαιούμεθα ὅτι τὸ $f(x, y, z)$ διαιρεῖται διὰ παντὸς ἄλλου πολυώνυμου, τὸ ὅποιον προκύπτει ἐκ τοῦ $\phi(x, y, z)$ δι' οἰασδήποτε ἄλλης μεταθέσεως τῶν x, y, z .

Σ η μ ειωσιζ. Ἐάν τὸ πολυώνυμον $f(x, y, z)$ εἶναι κυκλικῶς συμμετρικὸν ή Ιδιότης III ισχύει ὑπὸ τὴν ἔχησης ὅμως διατύπωσιν :

Ἐάν ἀκέραιον πολυώνυμον $f(x, y, z)$ εἶναι κυκλικῶς συμμετρικὸν ὡς πρὸς τὰς μεταβλητὰς x, y, z καὶ διαιρῆται διὰ τοῦ ἀκεραίου πολυώνυμου $\phi(x, y, z) \not\equiv 0$ (οὐχὶ κατ' ἀνάγκην συμμετρικοῦ), τότε θὰ διαιρῆται καὶ διὰ τῶν πολυώνυμων $\phi(y, z, x)$ καὶ $\phi(z, x, y)$, τὰ ὅποια προκύπτουν ἐκ τοῦ $\phi(x, y, z)$ διὰ κυκλικῆς μεταθέσεως τῶν μεταβλητῶν του.

Πόρισμα. — Κυκλικῶς συμμετρικὸν πολυώνυμον $f(x,y,z)$ διαιρετὸν διὰ $x - y$ θὰ εἶναι διαιρετὸν καὶ διὰ τοῦ γινομένου $(x - y)(y - z)(z - x)$, διαιρετὸν διὰ $x + y$ θὰ εἶναι διαιρετὸν καὶ διὰ τοῦ γινομένου $(x + y)(y + z)(z + x)$, διαιρετὸν δὲ διὰ $x + y - z$ θὰ εἶναι διαιρετὸν καὶ διὰ τοῦ γινομένου :

$$(x + y - z)(y + z - x)(z + x - y).$$

§ 91. Ἱδιότης IV. — Εάν ἐν ἀκέραιον πολυώνυμον $f(x,y)$ συμμετρικὸν ὡς πρὸς τὰς μεταβλητὰς x, y εἶναι διαιρετὸν διὰ $x - y$, θὰ εἶναι διαιρετὸν καὶ διὰ $(x - y)^2$.

*Απόδειξις. Ἐπειδὴ τὸ $x - y$ διαιρεῖ τὸ $f(x,y)$ ὑπάρχει πολυώνυμον $\pi(x,y)$ τοιοῦτον, ὥστε :

$$f(x,y) \equiv (x - y) \cdot \pi(x,y). \quad (1)$$

$$\text{Τότε :} \quad f(y,x) \equiv (y - x) \cdot \pi(y,x). \quad (2)$$

*Ἐκ τῶν (1) καὶ (2), ἐπειδὴ τὸ $f(x,y)$ ὑπετέθη συμμετρικόν, ἔπειται :

$$(x - y) \cdot \pi(x,y) \equiv (y - x) \cdot \pi(y,x) \\ \text{ἢ} \quad (x - y)[\pi(x,y) + \pi(y,x)] \equiv 0. \quad (3)$$

*Ἐπειδὴ $x - y \not\equiv 0$, ἐκ τῆς (3) ἔπειται :

$$\pi(x,y) + \pi(y,x) \equiv 0,$$

ἢ ἀντικαθιστῶντες τὸ x διὰ τοῦ y ἔχομεν :

$$\pi(y,y) + \pi(y,y) \equiv 0, \quad \text{δηλ. } \pi(y,y) \equiv 0,$$

συνεπῶς τὸ $\pi(x,y)$ εἶναι διαιρετὸν διὰ $x - y$. Κατὰ ταῦτα ὑπάρχει πολυώνυμον $\phi(x,y)$ τοιοῦτον, ὥστε :

$$\pi(x,y) \equiv (x - y) \cdot \phi(x,y).$$

Τότε ἢ (1) γίνεται :

$$f(x,y) \equiv (x - y)^2 \cdot \phi(x,y),$$

ἐκ τῆς δύοις συνάγεται ὅτι τὸ $f(x,y)$ εἶναι διαιρετὸν καὶ διὰ τοῦ $(x - y)^2$.

§ 92. Μορφαὶ τῶν κυκλικῶς συμμετρικῶν ἀκεραίων πολυωνύμων. — Ἡ γενικὴ μορφὴ τῶν κυκλικῶς συμμετρικῶν ἀκεραίων πολυωνύμων μέχρι τρίτου βαθμοῦ εἶναι :

a'). Διὰ δύο μεταβλητὰς x καὶ y .

- 1). Πρωτοβάθμια : $\alpha(x + y) + \beta$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, $\alpha \neq 0$.
- 2). Δευτεροβάθμια : $\alpha(x^2 + y^2) + \beta xy + \gamma(x + y) + \delta$, $\alpha, \beta, \gamma, \delta \in \mathbb{R}$ καὶ $\alpha \neq 0$ ἢ $\beta \neq 0$.
- 3). Τριτοβάθμια : $\alpha(x^3 + y^3) + \beta(x^2y + y^2x) + \gamma xy + \delta(x + y) + \epsilon$, $\alpha, \beta, \dots, \epsilon \in \mathbb{R}$ καὶ $\alpha \neq 0$ ἢ $\beta \neq 0$.

β'). Διὰ τρεῖς μεταβλητὰς x, y, z .

- 1). Πρωτοβάθμια : $\alpha(x + y + z) + \beta$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, $\alpha \neq 0$.
- 2). Δευτεροβάθμια : $\alpha(x^2 + y^2 + z^2) + \beta(xy + yz + zx) + \gamma(x + y + z) + \delta$, $\alpha, \beta, \gamma, \delta \in \mathbb{R}$ καὶ α ἢ $\beta \neq 0$.

3). Τριτοβάθμια : $\alpha(x^3 + y^3 + z^3) + \beta(x^2y + x^2z + y^2x + y^2z + z^2x + z^2y) + \gamma xyz + \delta(x^2 + y^2 + z^2) + \epsilon(xy + yz + zx) + \theta(x + y + z) + \eta$, ενθα $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \epsilon, \theta, \eta \in \mathbb{R}$ και ἐν τούλαχιστον τῶν $\alpha, \beta, \gamma \neq 0$.

"Ας ἀποδείξωμεν τὸ α_2 τῶν ἀνωτέρω :

Πράγματι: κάθε πολυώνυμον δευτέρου βαθμοῦ ὡς πρὸς x καὶ γ εἶναι τῆς μορφῆς :

$$f(x,y) \equiv Ax^2 + By^2 + Gxy + \Delta x + Ey + \Theta \quad (1)$$

ενθα $A, B, G, \Delta, E, \Theta$ (σταθεροί) πραγματικοὶ ἀριθμοί, δχι ὅλοι ὑποχρεωτικῶς $\neq 0$.

Διὰ νὰ εἶναι τοῦτο κυκλικῶς συμμετρικὸν πολυώνυμον, πρέπει νὰ παραμένῃ ἐκ ταυτότητος ἵσον πρὸς ἑαυτό, δι' οἰσασθήποτε κυκλικῆς μεταθέσεως τῶν x, y (ἀντιμεταθέσεως).

Δι' ἀντιμεταθέσεως τῶν x καὶ γ εἰπούμενον :

$$f(y,x) \equiv Ay^2 + Bx^2 + Gyx + \Delta y + Ex + \Theta, \quad (2)$$

τὸ δόπιον ὁφείλει νὰ εἴναι ἐκ ταυτότητος ἵσον πρὸς τὸ πολυώνυμον (1), ἥτοι :

$$Ay^2 + Bx^2 + Gyx + \Delta y + Ex + \Theta \equiv Ax^2 + By^2 + Gxy + \Delta x + Ey + \Theta.$$

Λαμβάνοντες ὑπ' ὅψιν τὸν ὄρισμὸν τῆς Ισότητος (§ 79) δύο πολυώνυμων πολλῶν μεταβλητῶν ἔχομεν : $Ay^2 \equiv By^2$, $Bx^2 \equiv Ax^2$, $Gyx \equiv Gxy$, $\Delta y \equiv Ey$, $Ex \equiv \Delta x$, $\Theta = \Theta$, ἔξ ὃν :

$$A = B, \quad \Delta = E.$$

Θέτοντες $A = B = \alpha$, $\Gamma = \beta$, $\Delta = E = \gamma$ καὶ $\Theta = \delta$ εὑρίσκομεν ὅτι τὸ πολυώνυμον (1), πρέπει νὰ εἴναι κατ' ἀνάγκην τῆς μορφῆς :

$$\alpha(x^2 + y^2) + \beta xy + \gamma(x + y) + \delta.$$

Κατ' ἀνάλογον τρόπον εὑρίσκονται καὶ αἱ γενικαὶ μορφαὶ τῶν κυκλικῶς συμμετρικῶν πολυώνυμων, τὰς δόποις ἀνεγράφαμεν ἀνωτέρω.

§ 93. Τὰ στοιχειώδη συμμετρικὰ πολυώνυμα.— "Ας θεωρήσωμεν ν μεταβλητὰς x_1, x_2, \dots, x_v , τότε τὰ ἀπλούστερα συμμετρικὰ πολυώνυμα ὡς πρὸς αὐτάς εἴναι τὰ κάτωθι :

$$S_1 \equiv x_1 + x_2 + \dots + x_v$$

$$S_2 \equiv x_1x_2 + x_1x_3 + \dots + x_1x_v + x_2x_3 + \dots + x_2x_v + \dots + x_{v-1}x_v$$

$$S_3 \equiv x_1x_2x_3 + x_1x_2x_4 + \dots + x_1x_2x_v + x_2x_3x_4 + \dots + x_{v-2}x_{v-1}x_v$$

.....

$$S_v \equiv x_1x_2x_3 \cdots x_v.$$

Τὰ ἀνωτέρω πολυώνυμα καλοῦνται στοιχειώδη συμμετρικὰ πολυώνυμα τῶν μεταβλητῶν x_1, x_2, \dots, x_v .

Οὕτω, π.χ., τὰ στοιχειώδη συμμετρικὰ πολυώνυμα δύο μεταβλητῶν x, y εἴναι τά : $S_1 = x + y$ καὶ $S_2 = xy$, τριῶν μεταβλητῶν x, y, z εἴναι :

$$S_1 = x + y + z, \quad S_2 = xy + yz + zx, \quad S_3 = xyz.$$

*Ἀποδεικνύεται ὅτι : Πᾶν ἀκέραιον συμμετρικὸν πολυώνυμον δύναται νὰ ἐκφρασθῇ πάντοτε κατὰ ἕνα καὶ μόνον τρόπον συναρτήσει τῶν στοιχειωδῶν συμμετρικῶν πολυωνύμων.

Οὕτω, π.χ., τὸ συμμετρικὸν πολυώνυμον :

$$f(x,y) \equiv x^3 - 2x^2y - 2xy^2 + y^3 \quad (1)$$

γράφεται :

$$f(x,y) \equiv (x+y)^3 - 3xy(x+y) - 2xy(x+y) \equiv (x+y)^3 - 5xy(x+y)$$

ή αν :

$$S_1 = x + y \quad \text{καὶ} \quad S_2 = xy,$$

τότε :

$$f(x, \psi) \equiv S_1^3 - 5S_1S_2,$$

ήτοι τὸ συμμετρικὸν πολυώνυμον (1) ἔχει ἐκφρασθῆ συναρτήσει τῶν στοιχειωδῶν συμμετρικῶν πολυωνύμων τῶν μεταβλητῶν του.

§ 94. Ὁμογενῆ καὶ κυκλικῶς συμμετρικὰ πολυώνυμα.— Εἶναι φανερὸν ὅτι ἐν ἀκέραιον πολυώνυμον δύναται νὰ είναι ὁμογενὲς ὡς πρὸς τὰς μεταβλητάς του χωρὶς συγχρόνων νὰ είναι καὶ κυκλικῶς συμμετρικὸν ὡς πρὸς αὐτάς καὶ ἀντιστρόφως, δύναται νὰ είναι κυκλικῶς συμμετρικὸν χωρὶς νὰ είναι καὶ ὁμογενὲς συγχρόνως. Ὑπάρχουν ὅμως περιπτώσεις καθ' ἃς ἐν ἀκέραιον πολυώνυμον ἔχει συγχρόνως ἀμφοτέρας τὰς ιδιότητας τῆς ὁμογενείας καὶ τῆς κυκλικῆς συμμετρίας. Ἐν τοιοῦτον πολυώνυμον δύναται νὰ προκύψῃ ἀπὸ ἐν κυκλικῶς συμμετρικὸν πολυώνυμον, ἐὰν παραλειφθοῦν οἱ ὄροι αὐτοῦ οἱ καταστρέφοντες τὴν ὁμογένειαν. Οὕτως εὑρίσκομεν, π.χ., ὅτι τὰ μόνα ὁμογενῆ καὶ συγχρόνως κυκλικῶς συμμετρικὰ πολυώνυμα τριῶν μεταβλητῶν x, y, z είναι τῶν κάτωθι μορφῶν :

- 1). Πρώτου βαθμοῦ : $\alpha(x + y + z)$, $\alpha \in \mathbb{R}$, $\alpha \neq 0$.
- 2). Δευτέρου βαθμοῦ : $\alpha(x^2 + y^2 + z^2) + \beta(xy + yz + zx)$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.
- 3). Τρίτου βαθμοῦ : $\alpha(x^3 + y^3 + z^3) + \beta(x^2y + x^2z + y^2x + y^2z + z^2x + z^2y) + \gamma xyz$, $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$.

Ολα τὰ στοιχειώδη συμμετρικὰ πολυώνυμα τῆς § 93 είναι συγχρόνως καὶ ὁμογενῆ.

Προφανῶς ἴσχύει ἡ πρότασις :

Τὸ πηλίκον τῆς τελείας διαιρέσεως δύο ὁμογενῶν καὶ κυκλικῶς συμμετρικῶν πολυωνύμων είναι πολυώνυμον ὁμογενὲς καὶ κυκλικῶς συμμετρικὸν (διατί;).

§ 95. Ἐφαρμογαὶ ἐπὶ τῶν ὁμογενῶν καὶ συμμετρικῶν ἀκέραιων πολυωνύμων.— Αἱ μέχρι τοῦτο προτάσεις ἐπὶ τῶν ὁμογενῶν καὶ συμμετρικῶν πολυωνύμων χρησιμέουσιν πολλάκις διὰ νὰ μετατρέπωμεν ταχέως εἰς γινόμενα παραγόντων διάφορα ὁμογενῆ καὶ συμμετρικὰ πολυώνυμα, ὅπως γίνεται φανερὸν ἀπὸ τὰ κάτωθι παραδείγματα :

Παράδειγμα 1ον. Νῦ τραπῇ εἰς γινόμενον παραγόντων τὸ πολυώνυμον :

$$f(x, y, z) \equiv (x - y)(x^3 + y^3) + (y - z)(y^3 + z^3) + (z - x)(z^3 + x^3).$$

Λύσις : Παρατηροῦμεν ὅτι διὰ $x = y$ είναι $f(y, y, z) \equiv 0$, ἅρα τὸ πολυώνυμον $f(x, y, z)$ διαιρεῖται (ἀκριβῶς) διὰ τοῦ $x - y$ καὶ ἐπειδὴ είναι κυκλικῶς συμμετρικὸν θὰ διαιρῆται (§ 90, πόρισμα) καὶ διὰ τοῦ γινομένου $(x - y)(y - z)(z - x)$. Ἐπειδὴ δὲ καὶ ὁ διαιρέτος καὶ ὁ διαιρέτης είναι πολυώνυμα ὁμογενῆ καὶ κυκλικῶς συμμετρικά, διὰ τοῦτο τὸ πηλίκον τῆς διαιρέσεως ταῦτης θὰ είναι ὁμογενὲς καὶ κυκλικῶς συμμετρικὸν πολυώνυμον πρώτου βαθμοῦ, ἀφοῦ τὸ $f(x, y, z)$ είναι τετάρτου βαθμοῦ καὶ ὁ διαιρέτης τρίτου. Θὰ είναι δηλαδὴ τοῦτο τῆς μερφῆς : $\alpha(x + y + z)$, ἐνθα α σταθερὸς ἀριθμός.

Κατόπιν τούτων θὰ ἔχωμεν τὴν ταυτότητα :

$$(x - y)(x^3 + y^3) + (y - z)(y^3 + z^3) + (z - x)(z^3 + x^3) \equiv \alpha(x + y + z)(x - y)(y - z)(z - x) \quad (1)$$

'Η (1) είναι ἀληθής διά πᾶσαν τιμὴν τῶν x, y, z . Δίδομεν εἰς τὰ x, y, z μία τριάδα αὐθαιρέτων

τιμῶν, αἱ δόποιαι διμως δὲν μηδενίζουν τὸν διαιρέτην $(x-y)(y-z)(z-x)$. π.χ. $x = 1$, $y = 2$, $z = 0$ καὶ ἐκ τῆς (1) λαμβάνομεν $\alpha = 1$.

*Ἐπομένως :

$$(x-y)(x^3+y^3)+(y-z)(y^3+z^3)+(z-x)(z^3+x^3) \equiv (x+y+z)(x-y)(y-z)(z-x).$$

Παράδειγμα 2ον. Νὰ δειχθῇ ὅτι τὸ πολυώνυμον $f(x,y,z) \equiv (x+y+z)^5 - x^5 - y^5 - z^5$ είναι διαιρετὸν διὰ $(x+y)(y+z)(z+x)$ καὶ νὰ εὑρεθῇ τὸ πηλίκον ἄνευ ἐκτελέσεως τῆς διαιρέσεως.

Λύσις : Ἐάν εἰς τὸ $f(x,y,z)$ τεθῇ ἀντὶ x τὸ $-y$ εὐρίσκομεν $f(-y,y,z) \equiv 0$. Ἀρα τὸ $f(x,y,z)$ διαιρεῖται διὰ τοῦ $x+y$ καὶ ἐπειδὴ εἶναι συμμετρικὸν θὰ διαιρήται καὶ διὰ τοῦ γινομένου $(x+y)(y+z)(z+x)$. Ἐπειδὴ διμως τὸ $f(x,y,z)$ είναι διμογενὲς καὶ κυκλικῶς συμμετρικὸν πέμπτου βαθμοῦ, δὲ διαιρέτης $(x+y)(y+z)(z+x)$ είναι πολυώνυμον διμογενὲς καὶ κυκλικῶς συμμετρικὸν τρίτου βαθμοῦ, ἔπειτα ὅτι τὸ πηλίκον θὰ είναι πολυώνυμον διμογενὲς καὶ κυκλικῶς συμμετρικὸν δευτέρου βαθμοῦ, ἤτοι τῆς μορφῆς :

$$\alpha(x^2 + y^2 + z^2) + \beta(xy + yz + zx), \text{ ἐνθα } \alpha, \beta \text{ πραγματικοὶ ἀριθμοί.}$$

*Ἀρα θὰ ἔχωμεν τὴν ταυτότητα :

$$(x+y+z)^5 - x^5 - y^5 - z^5 \equiv (x+y)(y+z)(z+x) \cdot [\alpha(x^2 + y^2 + z^2) + \beta(xy + yz + zx)]. \quad (1)$$

*Η (1) είναι ἀληθῆς διὰ πᾶσαν τιμὴν τῶν x, y, z .

Θέτοντες εἰς τὴν (1), π.χ., $x = y = z = 1$ εὐρίσκομεν :

$$\alpha + \beta = 10. \quad (2)$$

Θέτοντες δὲ ἀκολούθως εἰς τὴν (1) $x = 0, y = 2, z = -1$ εὐρίσκομεν :

$$5\alpha - 2\beta = 15. \quad (3)$$

Λύοντες τὸ σύστημα τῶν ἑξισώσεων (2) καὶ (3) εὐρίσκομεν : $\alpha = 5, \beta = 5$ καὶ τὸ ζητούμενον πηλίκον είναι : $5(x^2 + y^2 + z^2 + xy + yz + zx)$.

§ 96. Σύντομος γραφὴ ἀθροίσμάτων καὶ γινομένων.— Ἐνίστε παρουσιάζονται ἀθροίσματα τῆς μορφῆς :

$$\alpha + \beta + \gamma, \quad \alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha, \quad \alpha^2(\beta - \gamma) + \beta^2(\gamma - \alpha) + \gamma^2(\alpha - \beta), \text{ κ.τ.λ.}$$

Τὰ ἀθροίσματα αὗτά παριστάνομεν συμβολικῶς ὡς ἔξῆς (ἀντιστοίχως) :

$$\Sigma\alpha, \quad \Sigma\alpha\beta, \quad \Sigma\alpha^2(\beta - \gamma).$$

*Ομοίως χρησιμοποιοῦμεν τὸ σύμβολον Π διὰ τὴν συμβολικὴν γραφὴν γινομένων. Οὕτω, π.χ., τὸ γινόμενον : $(\beta - \gamma)(\gamma - \alpha)(\alpha - \beta)$ παριστάνομεν συμβολικῶς μέ :

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

187. Νὰ γραφοῦν πλήρως αἱ ἀκόλουθοι ἐκφράσεις :

$$\Sigma\alpha^2(\beta - \gamma)^2, \quad \Sigma(\alpha\beta - \gamma^2)(\alpha\gamma - \beta^2).$$

188. Νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι :

$$\Sigma\alpha^2(\beta + \gamma) + 3\alpha\beta\gamma \equiv (\Sigma\alpha) \cdot (\Sigma\beta\gamma).$$

189. Νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι :

$$\Sigma\beta\gamma(\beta + \gamma) + 2\alpha\beta\gamma \equiv \Pi(\beta + \gamma).$$

190. *Ομοίως ὅτι : $\alpha\beta\gamma(\Sigma\alpha)^2 - (\Sigma\beta\gamma)^2 = \alpha\beta\gamma\Sigma\alpha^2 - \Sigma\beta^2\gamma^2 = \Pi(\alpha^2 - \beta\gamma)$.

191. Νὰ εὑρεθοῦν αἱ τιμαὶ τῶν :

$$\frac{\Sigma\alpha^2(\beta - \gamma)}{\Sigma(\beta - \gamma)^2}, \quad \frac{\Sigma\alpha^2(\beta - \gamma)^2}{\Pi(\beta - \gamma)}.$$

192. Νά διποδειχθῆ ὅτι :

$$(\alpha + \beta + \gamma)^3 \equiv \Sigma \alpha^3 + 3\Sigma \alpha^2(\beta + \gamma) + 6\alpha\beta\gamma.$$

193. Ὁμοίως ὅτι : $(\Sigma \alpha)^3 = \Sigma \alpha^3 + 2\Sigma \alpha\beta$.

194. Νά ύπολογισθοῦν αἱ ἑκφράσεις :

$$\alpha). \quad \Sigma \frac{1}{(\alpha - \beta)(\alpha - \gamma)}, \quad \beta). \quad \Sigma \frac{\beta + \gamma}{(\alpha - \beta)(\alpha - \gamma)}, \quad \gamma). \quad \Sigma \frac{\alpha^3}{(\alpha - \beta)(\alpha - \gamma)}.$$

195. Νά δειχθῆ ὅτι τὸ $\Sigma \frac{4\alpha^2 - 1}{(\alpha - \beta)(\alpha - \gamma)}$ δὲν ἔξαρτᾶται ἐκ τῶν α, β, γ .

Ποιά ἡ τιμὴ τοῦ ἀθροίσματος;

196. Ἐὰν $\alpha + \beta + \gamma = 0$, καὶ διάφοροι ἀλλήλων, νὰ ύπολογισθῆ τό :

$$\left(\Sigma \frac{\alpha}{\beta - \gamma} \right) \cdot \left(\Sigma \frac{\beta - \gamma}{\alpha} \right).$$

197. Νά διποδειχθῆ ὅτι :

$$\Sigma (\alpha\beta - \gamma^2)(\alpha\gamma - \beta^2) = (\Sigma \beta\gamma)(\Sigma \beta\gamma - \Sigma \alpha^2).$$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΩΝ ΠΟΛΥΩΝΥΜΩΝ

198. Ἐὰν $f(0,y,z) \equiv 0$ καὶ $f(-x,y,z) \equiv f(x,y,z)$, τότε τὸ ἀκέραιον πολυώνυμον $f(x,y,z)$ διαιρεῖται διὰ x^2 . Ἐὰν δὲ ἐπὶ πλέον τὸ $f(x,y,z)$ εἶναι καὶ συμμετρικὸν πολυώνυμον, τότε θὰ διαιρῆται διὰ $x^2y^2z^2$.

199. Προσδιορίστε τοὺς πραγματικούς ἀριθμούς α καὶ β, ἵνα τὸ πολυώνυμον : $f(x,y) \equiv 4x^4 + 12x^8y + \alpha x^8y^2 + \beta xy^8 + y^4$ εἶναι τέλειον τετράγωνον ἀκεραίου πολυωνύμου.

200. Ἐὰν τὸ συμμετρικὸν πολυώνυμον $f(x,y)$ διαιρῆται διὰ $(x-y)^{2k+1}$, τότε θὰ διαιρῆται καὶ διὰ $(x-y)^{2k+2}$, $k \in \mathbb{N}$.

201. Νά ἀναλυθοῦν εἰς γινόμενα παραγόντων αἱ κάτωθι παραστάσεις :

- α) $x^2(y-z) + y^2(z-x) + z^2(x-y)$, β) $x(y-z)^2 + y(z-x)^2 + z(x-y)^2 + 8xyz$,
γ) $x^2(y+z) + y^2(z+x) + z^2(x+y) + 2xyz$, δ) $x(y^4 - z^4) + y(z^4 - x^4) + z(x^4 - y^4)$,
ε) $(x-y)(x+y)^2 + (y-z)(y+z)^2 + (z-x)(z+x)^2$.

202. Ὁμοίως αἱ κάτωθι :

- α) $(x+y+z)^5 - (y+z-x)^5 - (z+x-y)^5 - (x+y-z)^5$
β) $(y-z)^2(y+z-2x) + (z-x)^2(z+x-2y) + (x-y)^2(x+y-2z)$.

203. Νά διπλοποιηθοῦν αἱ ρηταὶ παραστάσεις :

$$\alpha) \quad \frac{x^2(y-z)^3 + y^2(z-x)^3 + z^2(x-y)^3}{(x-y)(y-z)(z-x)}, \quad \beta) \quad \frac{x^2(y-z) + y^2(z-x) + z^2(x-y)}{x^3(y-z) + y^3(z-x) + z^3(x-y)}.$$

204. Νά δειχθῆ ὅτι τὸ πολυώνυμον $f(x,y,z) \equiv x^v(y-z) + y^v(z-x) + z^v(x-y)$ εἶναι διαιρέτον διὰ τοῦ $\phi(x,y,z) \equiv (x-y)(y-z)(z-x)$ διὰ κάθε φυσικὸν ἀριθμὸν $v \geq 2$. Νά εὐρεθῆ τὸ πτηλίκον διὰ $v = 3$ ἀνευ ἐκτελέσεως τῆς διαιρέσεως.

205. Νά δειχθῆ ὅτι τὸ συμμετρικὸν πολυώνυμον : $f(x_1, x_2, x_3, x_4) \equiv x_1^3 + x_2^3 + x_3^3 + x_4^3$, λαμβάνει τὴν μορφήν : $f \equiv S_1^3 - 3S_1S_2 + 3S_3$, ἐνθα S_1, S_2, S_3 τὰ στοιχειώδη συμμετρικὰ πολυώνυμα ἀντιστοίχως πρώτου, δευτέρου καὶ τρίτου βαθμοῦ τῶν μεταβλητῶν x_1, x_2, x_3, x_4 .

206. "Ινα τὸ πολυώνυμον $f(x,y,z) \equiv \alpha x + \beta y + \gamma z + \delta$ εἶναι συμμετρικὸν πολυώνυμον, πρέπει καὶ ἀρκεῖ νὰ εἶναι $\alpha = \beta = \gamma \neq 0$.

207. Νά ἀναλυθοῦν εἰς γινόμενα παραγόντων αἱ :

- α) $\Sigma yz(y^2 - z^2)$, β) $\Sigma(y+z)^3 - 2\Sigma x^3 + 6xyz$,
γ) $\Sigma x(y+z)^2 - 4xyz$, δ) $(x+y+z)^4 - (y+z)^4 - (z+x)^4 - (x+y)^4 + x^4 + y^4 + z^4$.

208. Νά προσδιορισθῇ πολυωνυμον $f(x,y,z)$ δόμογενὲς καὶ κυκλικῶς συμμετρικὸν 2ου βαθμοῦ τοιούτον, ὥστε: $f(0,1,1) = 5$ καὶ $f(0,0,1) = 6$.

209. Γνωστοῦ ὅντος δτὶ τὸ πολυωνυμον :

$$3x^2 + 12y^2 + 10z^2 + 26yz + 17zx + 13xy$$

εἶναι γινόμενον δύο δόμογενῶν πολυωνυμῶν 1ου βαθμοῦ δόμογενείας, νά εὑρεθοῦν τὰ πολυωνυμα αὐτά.

210. Νά δειχθῇ δτὶ τὸ πολυωνυμον :

$$f(x,y,z) \equiv x^v [z^2(x-y)^2 - y^2(z-x)^2] + y^v [x^2(y-z)^2 - z^2(x-y)^2] + z^v [y^2(z-x)^2 - x^2(y-z)^2],$$

$v \in \mathbb{N}$, εἶναι διαιρέτὸν διὰ τοῦ γινομένου $P \equiv (x-y)(y-z)(z-x)$. Ποῖον τὸ πηλίκον;

211. Νά ἀποδειχθῇ δτὶ τὸ πολυωνυμον :

$$f(x,y) \equiv \alpha + \beta(x+y) + \gamma(x^2+y^2) + \delta xy + \epsilon(x^3+y^3) + \lambda(x^2y+xy^2)$$

λαμβάνει τὴν μορφήν :

$$F(X,Y) \equiv \alpha + \beta X + (\delta-2\gamma)Y + \gamma X^2 + (\lambda-3\epsilon)XY + \epsilon X^3,$$

ὅπου $X = x + y$ καὶ $Y = xy$.

212. Νά δειχθῇ δτὶ τὸ πολυωνυμον :

$$f(x,y,z) \equiv 12 [(x+y+z)^{2v} - (x+y)^{2v} - (y+z)^{2v} - (z+x)^{2v} + x^{2v} + y^{2v} + z^{2v}], \quad v \in \mathbb{N}, \quad v \geq 2$$

εἶναι διαιρέτὸν διὰ τοῦ πολυωνυμοῦ :

$$f(x,y,z) \equiv (x+y+z)^4 - (x+y)^4 - (y+z)^4 - (z+x)^4 + x^4 + y^4 + z^4.$$

(Υπόδειξις: Παρατηρήστε δτὶ τὸ $\phi(x,y,z)$ καὶ $f(x,y,z)$ μηδενίζονται διὰ $x=0, y=0, z=0$ καὶ δτὶ $x + y + z \mid f(x,y,z)$).

III. ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΡΗΤΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ ΕΙΣ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΑΠΛΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ

§ 97. Ὁρισμός.— Καλοῦμεν ρητὸν κλάσμα ὡς πρὸς x τὸ πηλίκον $\frac{f(x)}{\phi(x)}$

δύο ἀκεραίων πολυωνυμῶν ὡς πρὸς x , δηλαδὴ κάθε παράστασιν τῆς μορφῆς :

$$k(x) \equiv \frac{f(x)}{\phi(x)} \equiv \frac{\alpha_μ x^μ + \alpha_{μ-1} x^{μ-1} + \cdots + \alpha_1 x + \alpha_0}{\beta_v x^v + \beta_{v-1} x^{v-1} + \cdots + \beta_1 x + \beta_0}, \quad (1)$$

ὅπου $\alpha_i, \beta_j, i = 0, 1, \dots, \mu, j = 0, 1, \dots, v$, πραγματικοὶ ἀριθμοί, μ καὶ v ἀκέραιοι θετικοί*) καὶ $\alpha_\mu \neq 0, \beta_v \neq 0$.

Τῇ βοηθείᾳ τῶν ἔκ ταυτότητος ἵσων ἀκεραίων πολυωνυμῶν δυνάμεθα νὰ ἀναλύσωμεν τὸ ρητὸν κλάσμα (1) εἰς ἄθροισμα ὅλων ἀπλῶν κλασμάτων. Πρὸς ἐπίτευξιν ὅμως τῆς ἀναλύσεως ταύτης, πρέπει δ ἀριθμητής τῆς (1), δηλ. τὸ πολυωνυμον $f(x)$ νὰ εἶναι βαθμοῦ μικροτέρου ἀπὸ τὸν βαθμὸν τοῦ παρονομαστοῦ. *Ἐν ἐναντίᾳ περιπτώσει, δηλ. ἐάν δ βαθμὸς τοῦ ἀριθμητοῦ εἶναι μεγαλύτερος ἢ ἵσος τοῦ βαθμοῦ τοῦ παρονομαστοῦ ($\mu \geq v$), ἢ ἀνάλυσις τοῦ κλάσματος $\frac{f(x)}{\phi(x)}$ ἀνάγεται εἰς τὴν ἀνάλυσιν κλάσματος μὲ βαθμὸν ἀριθμητοῦ μικρότερον τοῦ βαθμοῦ τοῦ παρονομαστοῦ.

* Διὰ $\mu = v = 0$ τὸ $k(x)$ γίνεται $\frac{\alpha_0}{\beta_0}$, ἦτοι εἶναι μία σταθερά, διὰ $v = 0, \mu \geq 1$ τὸ $k(x)$ γίνεται ἐν πολυωνυμον.

Πράγματι, έλαν $\pi(x)$ καλέσωμεν τὸ πηλίκον καὶ $v(x)$ τὸ ὑπόλοιπον τῆς διαιρέσεως $f(x) : \phi(x)$, ἔχομεν : $f(x) \equiv \phi(x) \cdot \pi(x) + v(x)$, διπότε :

$$\frac{f(x)}{\phi(x)} \equiv \pi(x) + \frac{v(x)}{\phi(x)}. \quad (2)$$

Προφανῶς τὸ $\pi(x)$ εἶναι μ—ν βαθμοῦ καὶ τὸ $v(x)$ βαθμοῦ μικροτέρου τοῦ v .

Ἐκ τῆς (2) εἶναι τώρα φανερὸν ὅτι ἡ ἀνάλυσις τοῦ κλάσματος $\frac{f(x)}{\phi(x)}$ ἀνάγεται εἰς τὴν ἀνάλυσιν τοῦ κλάσματος $\frac{v(x)}{\phi(x)}$; εἰς τὸ ὄποιον ὅμως ὁ βαθμὸς τοῦ ἀριθμητοῦ εἶναι μικρότερος τοῦ βαθμοῦ τοῦ παρονομαστοῦ.

§ 98. Ἀνάλυσις τοῦ κλάσματος $\frac{f(x)}{\phi(x)}$ εἰς ἄθροισμα ἀπλῶν κλασμάτων, ὅπου ὁ βαθμὸς τοῦ $f(x)$ εἶναι μικρότερος τοῦ βαθμοῦ τοῦ $\phi(x)$.

Διακρίνομεν τὰς κάτωθι περιπτώσεις :

Περίπτωσις I. Ἐάν τὸ $\phi(x)$ ἔχῃ μόνον ἀπλᾶς πραγματικὰς ρίζας p_1, p_2, \dots, p_v , ἥτοι ἔλαν εἶναι τῆς μορφῆς $\phi(x) \equiv (x - p_1)(x - p_2) \dots (x - p_v)^n$, τότε δυνάμεθα νὰ προσδιορίσωμεν ν πραγματικοὺς ἀριθμοὺς A_1, A_2, \dots, A_v τοιούτους, ώστε νὰ ἀληθεύῃ ἡ ταυτότης :

$$\frac{f(x)}{\phi(x)} \equiv \frac{f(x)}{(x - p_1)(x - p_2) \dots (x - p_v)} \equiv \frac{A_1}{x - p_1} + \frac{A_2}{x - p_2} + \dots + \frac{A_v}{x - p_v}. \quad (3)$$

Ἐκ τῆς (3), ἀπαλλασσομένης τῶν παρονομαστῶν, προκύπτει ἡ ταυτότης : $f(x) \equiv A_1(x - p_2)(x - p_3) \dots (x - p_v) + \dots + A_v(x - p_1)(x - p_2) \dots (x - p_{v-1})$. (4)

Ἐκ ταυτῆς*) διὰ $x = p_1, p_2, \dots, p_v$, λαμβάνομεν ἀντιστοίχως :

$$f(p_1) = A_1(p_1 - p_2)(p_1 - p_3) \dots (p_1 - p_v) \implies A_1 = \frac{f(p_1)}{(p_1 - p_2)(p_1 - p_3) \dots (p_1 - p_v)}$$

$$f(p_v) = A_v(p_v - p_1)(p_v - p_2) \dots (p_v - p_{v-1}) \implies A_v = \frac{f(p_v)}{(p_v - p_1)(p_v - p_2) \dots (p_v - p_{v-1})}$$

Παρατήρησις. Τὰ A_1, A_2, \dots, A_v προσδιορίζονται καὶ ἐκ τῆς ταυτότητος (4) ἀρκεῖ νὰ ἔκτελεθοῦν αἱ πράξεις εἰς τὸ δεύτερον μέλος καὶ ἔξισισθοῦν οἱ συντελεσταὶ τῶν Ισοβαθμίων δρῶν τῶν μελῶν τῆς (4), λυθῆ ὃ ἀκολούθως τὸ σύστημα, τὸ ὄποιον θὰ προκύψῃ.

*) Αὕτη ἔξήχθη διὰ $x \neq p_1, p_2, \dots, p_v$. Ἀρα τὸ πολυώνυμον τῆς διαφορᾶς τῶν μελῶν τῆς μηδενίζεται διὰ ὅλας τὰς ἀλλας τιμάς του x . Ἐπομένως ἔχει ἀπειρόνως ρίζας, ἥτοι περισσότερας τοῦ βαθμοῦ του. Ἀρα εἶναι μηδενικὸν (§ 67). Συνεπῶς μηδενίζεται καὶ διὰ $x = p_1, p_2, \dots, p_v$. Ἀληθεύει λοιπὸν αὐτή καὶ διὰ $x = p_1, p_2, \dots, p_v$.

**) Δεχόμεθα, πρὸς εὐκολίαν τῶν ὑπολογισμῶν, διὰ διανυτελεστῆς β_v τοῦ $\phi(x)$ εἶναι τοσοὶ μὲ τὴν μονάδα τούτῳ δὲν περιορίζει τὴν γενικότητα, καθόσον : ἂν διαιρεθῇ διὰ ἀριθμητῆς καὶ παρονομαστῆς τοῦ κλάσματος (1) διὰ β_v , διπέρ ὑπετέθη $\neq 0$, τὸ κλάσμα δὲν μεταβάλλεται, ἐνῶ ἐπιτυγχάνεται, ὅπως διανυτελεστῆς τοῦ x γίνηται πρὸς τὴν μονάδα.

Έφαρμογή. Νάναλυθη τὸ κλάσμα: $\frac{f(x)}{\varphi(x)} \equiv \frac{x^2 + x + 1}{(x-1)(x-2)(x-3)}$ εἰς αθροισμα ἀπλῶν κλασμάτων.

Αὐστις. Συμφώνως πρὸς τὰ ἀνωτέρω ἔχομεν τὴν ἀνάλυσιν:

$$\frac{x^2 + x + 1}{(x-1)(x-2)(x-3)} \equiv \frac{A_1}{x-1} + \frac{A_2}{x-2} + \frac{A_3}{x-3}. \quad (1)$$

Ἐκ τῆς (1) λαμβάνομεν:

$$x^2 + x + 1 \equiv A_1(x-2)(x-3) + A_2(x-1)(x-3) + A_3(x-1)(x-2). \quad (2)$$

Ἡ ταυτότης (2) διὰ $x = 1, 2, 3$ δίδει ἀντιστοίχως: $A_1 = \frac{3}{2}$, $A_2 = -7$, $A_3 = \frac{13}{2}$.

Οὕτω:

$$\frac{x^2 + x + 1}{(x-1)(x-2)(x-3)} \equiv \frac{3}{2(x-1)} - \frac{7}{(x-2)} + \frac{13}{2(x-3)}.$$

Περίπτωσις II. Ἐὰν τὸ $\varphi(x)$ ἔχῃ πραγματικὰς καὶ πολλαπλᾶς ρίζας ἥ γενικώτερον ἀπλᾶς καὶ πολλαπλᾶς πραγματικὰς ρίζας, ἦτοι ἀν εἰναι, π.χ., τῆς μορφῆς:

$$\varphi(x) \equiv (x-\rho_1)(x-\rho_2)(x-\rho_3)^k \dots (x-\rho_\mu)^l, \text{ μὲ } 1+1+k+\dots+l=v,$$

τότε τὸ κλάσμα $\frac{f(x)}{\varphi(x)}$ δύναται νὰ γραφῇ κατὰ ἕνα καὶ μόνον τρόπον ὑπὸ τὴν μορφήν:

$$\begin{aligned} \frac{f(x)}{\varphi(x)} \equiv & \frac{A_1}{x-\rho_1} + \frac{A_2}{x-\rho_2} + \frac{B_1}{x-\rho_3} + \frac{B_2}{(x-\rho_3)^2} + \dots + \frac{B_k}{(x-\rho_3)^k} + \dots + \frac{M_1}{x-\rho_\mu} + \\ & + \frac{M_2}{(x-\rho_\mu)^2} + \dots + \frac{M_l}{(x-\rho_\mu)^l}, \end{aligned}$$

ὅπου $A_1, A_2, B_1, B_2, \dots, B_k, \dots, M_1, M_2, \dots, M_l$ πραγματικοὶ ἀριθμοὶ καταλλήλως προσδιοριζόμενοι.

Ἄσ ἐργασθῶμεν διὰ τὸ ἀπλούστερον ἐπὶ παραδειγμάτων.

Έφαρμογή Ιη: Νάναλυθη τὸ κλάσμα $\frac{f(x)}{\varphi(x)} \equiv \frac{x^2 + 4x + 7}{(x+2)(x+3)^2}$ εἰς αθροισμα ἀπλῶν κλασμάτων.

Αὐστις. Συμφώνως πρὸς τὰ ἀνωτέρω ἔχομεν:

$$\frac{x^2 + 4x + 7}{(x+2)(x+3)^2} \equiv \frac{A}{x+2} + \frac{B_1}{(x+3)} + \frac{B_2}{(x+3)^2}. \quad (1)$$

Ἐκ ταύτης, δι' ἀπαλοιφῆς τῶν παρονομαστῶν, λαμβάνομεν τὴν ταυτότητα:

$$x^2 + 4x + 7 \equiv A(x+3)^2 + B_1(x+2)(x+3) + B_2(x+2). \quad (2)$$

Ἐκτελοῦντες τὰς πράξεις εἰς τὸ δεύτερον μέλος τῆς (2) εὑρίσκομεν:

$$x^2 + 4x + 7 \equiv (A+B_1)x^2 + (6A+5B_1+B_2)x + (9A+6B_1+2B_2). \quad (3)$$

Ἐξισοῦντες τοὺς συντελεστὰς τῶν ἴσων δυνάμεων τοῦ x τῶν μελῶν τῆς (3) λαμβάνομεν τὸ σύστημα:

$$A + B_1 = 1, \quad 6A + 5B_1 + B_2 = 4, \quad 9A + 6B_1 + 2B_2 = 7.$$

Λύοντες τὸ σύστημα τοῦτο εὑρίσκομεν :

$$A = 3, \quad B_1 = -2, \quad B_2 = -4.$$

*Όθεν : $\frac{x^3 + 4x + 7}{(x+2)(x+3)^2} = \frac{3}{x+2} - \frac{2}{(x+3)} - \frac{4}{(x+3)^2}.$

*Εφαρμογὴ ή 2α : Νὰ ἀναλυθῇ τὸ κλάσμα : $\frac{f(x)}{\varphi(x)} \equiv \frac{3x^4 - 9x^3 + 4x^2 - 34x + 1}{(x-2)^3(x+3)^2}$ εἰς ἀθροισμα ἀπλῶν κλασμάτων.

Αὐστις : Συμφώνως πρὸς τὰ ἀνωτέρω ἡ ἀνάλυσις δίδεται ὑπὸ τοῦ τύπου :

$$\frac{3x^4 - 9x^3 + 4x^2 - 34x + 1}{(x-2)^3 \cdot (x+3)^2} \equiv \frac{A_1}{x-2} + \frac{A_2}{(x-2)^2} + \frac{A_3}{(x-2)^3} + \frac{B_1}{x+3} + \frac{B_2}{(x+3)^2}.$$

*Ἐργαζόμενοι ἡδη, ὅπως καὶ εἰς τὴν προηγουμένην ἐφαρμογήν, εὑρίσκομεν :

$$A_1 = 1, \quad A_2 = 0, \quad A_3 = -3, \quad B_1 = 2, \quad B_2 = -5,$$

καὶ ἐπομένως ἡ ζητουμένη ἀνάλυσις εἶναι :

$$\frac{3x^4 - 9x^3 + 4x^2 - 34x + 1}{(x-2)^3(x+3)^2} \equiv \frac{1}{x-2} - \frac{3}{(x-2)^3} + \frac{2}{x+3} - \frac{5}{(x+3)^2}.$$

Περίπτωσις III. *Ἐὰν τὸ ρητὸν κλάσμα εἴναι τῆς μορφῆς :

$$\frac{f(x)}{(x^2 + \beta x + \gamma)^v},$$

ὅπου ὁ βαθμὸς τοῦ $f(x)$ εἴναι μικρότερος τοῦ $2v$, ν ἀκέραιος ≥ 1 καὶ β, γ πραγματικοὶ ἀριθμοὶ μὲν $\beta^2 - 4\gamma < 0$, τότε ὑπάρχουν πραγματικοὶ ἀριθμοὶ $A_1, B_1, A_2, B_2, \dots, A_v, B_v$ τοιοῦτοι, ὥστε νὰ ἴσχύῃ :

$$\frac{f(x)}{(x^2 + \beta x + \gamma)^v} \equiv \frac{A_1 x + B_1}{x^2 + \beta x + \gamma} + \frac{A_2 x + B_2}{(x^2 + \beta x + \gamma)^2} + \dots + \frac{A_v x + B_v}{(x^2 + \beta x + \gamma)^v}.$$

*Ινα καταστήσωμεν σαφέστερον τὸ πρᾶγμα, ἃς ἐργασθῶμεν ἐφ' ἐνὸς παραδείγματος.

*Εφαρμογὴ ή. Νὰ ἀναλυθῇ τὸ κλάσμα $\frac{f(x)}{\varphi(x)} \equiv \frac{x^5 + 1}{(x^2 - x + 1)^3}$ εἰς ἀθροισμα ἀπλῶν κλασμάτων.

Αὐστις : Παρατηροῦμεν ὅτι τὸ $x^2 - x + 1$ ἔχει μιγαδικάς ρίζας, ἐπὶ πλέον δὲ τὸ κλάσμα $\frac{x^5 + 1}{(x^2 - x + 1)^3}$ πληροῖ ὅλας τὰς ὑποθέσεις τῆς περιπτώσεως III, δρα θὰ ἔχωμεν τὴν ἀνάλυσιν :

$$\frac{x^5 + 1}{(x^2 - x + 1)^3} \equiv \frac{A_1 x + B_1}{x^2 - x + 1} + \frac{A_2 x + B_2}{(x^2 - x + 1)^2} + \frac{A_3 x + B_3}{(x^2 - x + 1)^3}. \quad (1)$$

*Ἐκ ταύτης λαμβάνομεν :

$$x^5 + 1 \equiv (A_1 x + B_1) (x^2 - x + 1)^3 + (A_2 x + B_2) (x^2 - x + 1) + A_3 x + B_3.$$

*Ἐκτελοῦντες τὰς πράξεις εἰς τὸ δεύτερον μέλος καὶ ἔξισοῦντες τοὺς συντελεστὰς τῶν ἵσων δυνάμεων τοῦ x τῶν δύο μελῶν, λαμβάνομεν ἐν πρωτοβάθμioν σύστημα ὡς πρὸς τοὺς ἀγνώστους $A_1, B_1, A_2, B_2, A_3, B_3$, τὸ δόποιον λυσόμενον δίδει :

$$A_1 = 1, \quad B_1 = 2, \quad A_2 = 1, \quad B_2 = -3, \quad A_3 = -1, \quad B_3 = 2.$$

*Ἀντικαθιστῶντες εἰς τὴν (1) τὰς τιμὰς αὐτὰς λαμβάνομεν τὴν ἀνάλυσιν :

$$\frac{x^5 + 1}{(x^2 - x + 1)^3} \equiv \frac{x + 2}{x^2 - x + 1} + \frac{x - 3}{(x^2 - x + 1)^2} - \frac{x - 2}{(x^2 - x + 1)^3}.$$

Περίπτωσις IV. Έάν τό φ(x) έχη ρίζας πραγματικάς και μιγαδικάς απλᾶς ή πολλαπλᾶς, τότε ισχύουν συγχρόνως αἱ περιπτώσεις II καὶ III.

*Εφαρμογή. Νὰ ἀναλυθῇ τὸ κλάσμα $\frac{x+2}{(x^2-1)(x^2+1)^2}$ εἰς ἄθροισμα κλασμάτων.

Αντίστοιχος: Ο παρονομαστής τοῦ κλάσματος γράφεται $(x-1)(x+1)(x^2+1)^2$, ἵνα έχει ρίζας πραγματικάς διπλᾶς και μιγαδικάς πολλαπλᾶς (διπλᾶς), δύτεν, συμφώνως πρὸς τὰς περιπτώσεις II καὶ III, θὰ ἔχωμεν τὴν κάτωθι ἀνάλυσιν :

$$\frac{x+2}{(x-1)(x+1)(x^2+1)^2} \equiv \frac{A_1}{x-1} + \frac{A_2}{x+1} + \frac{B_1x+\Gamma_1}{x^2+1} + \frac{B_2x+\Gamma_2}{(x^2+1)^2}. \quad (1)$$

Διὰ πολλαπλασιασμοῦ τῶν μελῶν τῆς (1) ἐπὶ $(x^2-1)(x^2+1)^2$ προκύπτει :

$x+2 \equiv A_1(x+1)(x^2+1)^2 + A_2(x-1)(x^2+1)^2 + (B_1x+\Gamma_1)(x^2-1)(x^2+1) + (B_2x+\Gamma_2)(x^2-1)$, δύτεν τελικῶς :

$$x+2 \equiv (A_1+A_2+B_1)x^5 + (A_1-A_2+\Gamma_1)x^4 + (2A_1+2A_2+B_2)x^3 + (2A_1-2A_2+\Gamma_2)x^2 + (A_1+A_2-B_1-B_2)x + (A_1-A_2-\Gamma_1-\Gamma_2).$$

Διὰ συγκρίσεως τῶν συντελεστῶν τῶν δύο ἵσων πολυωνύμων προκύπτει τὸ κάτωθι γράμμικὸν σύστημα :

$$\begin{aligned} A_1 + A_2 + B_1 &= 0 \\ A_1 - A_2 + \Gamma_1 &= 0 \\ 2A_1 + 2A_2 + B_2 &= 0 \\ 2A_1 - 2A_2 + \Gamma_2 &= 0 \\ A_1 + A_2 - B_1 - B_2 &= 1 \\ A_1 - A_2 - \Gamma_1 - \Gamma_2 &= 2. \end{aligned}$$

Λύοντες τὸ σύστημα τοῦτο εὑρίσκομεν :

$$A_1 = \frac{3}{8}, \quad A_2 = -\frac{1}{8}, \quad B_1 = -\frac{1}{4}, \quad B_2 = -\frac{1}{2}, \quad \Gamma_1 = -\frac{1}{2}, \quad \Gamma_2 = -1$$

καὶ ἐπομένως ἡ ζητουμένη ἀνάλυσις εἶναι :

$$\frac{x+2}{(x^2-1)(x^2+1)^2} = \frac{3}{8} \cdot \frac{1}{x-1} - \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{x+1} - \frac{\frac{1}{4}x + \frac{1}{2}}{x^2+1} - \frac{\frac{1}{2}x+1}{(x^2+1)^2}.$$

ΕΦΑΡΜΟΓΑΙ

1η. Νὰ ἀναλυθῇ τὸ κλάσμα $\frac{2x+1}{(x+1)(x^2+x+1)}$ εἰς ἄθροισμα ἀπλῶν κλασμάτων.

Διάστοιχος: Παρατηροῦμεν δτὶ ἡ διακρίνουσα τοῦ τριωνύμου x^2+x+1 εἶναι ἀρνητική.

"Ἄρα τὸ κλάσμα δέχεται τὴν ἀνάλυσιν :

$$\frac{2x+1}{(x+1)(x^2+x+1)} = \frac{A}{x+1} + \frac{Bx+\Gamma}{x^2+x+1}. \quad (1)$$

*Ἐκ τῆς (1) λαμβάνομεν :

$$2x+1 \equiv A(x^2+x+1) + (Bx+\Gamma)(x+1) \quad (2)$$

ἢ $2x+1 \equiv (A+B)x^2 + (A+B+\Gamma)x + (A+\Gamma).$ (3)

$$A+B=0, \quad A+B+\Gamma=2, \quad A+\Gamma=1.$$

*Ἐκ τῆς ἐπιλύσεως τοῦ συστήματος τούτου εὑρίσκομεν : $A=-1, B=1, \Gamma=2.$

"Οὕτω :

$$\frac{2x+1}{(x+1)(x^2+x+1)} \equiv -\frac{1}{x+1} + \frac{x+2}{x^2+x+1}.$$

Σημ. Ταχεία εύρεσης των A , B , Γ .

'Εκ της ταυτότητος (2) διάλ $x = -1 \implies A = -1$.

» » » » $x = 0 \implies A + \Gamma = 1$, έξ ίσ: $\Gamma = 2$.

'Εξισούντες τούς συντελεστάς του x^2 εις άμφοτέρα τὰ μέλη της (3) εύρισκομεν:

$$0 = A + B \implies B = 1.$$

2a. Νὰ ἀναλυθῇ τὸ κλάσμα $\frac{1}{(x^2 + 1)(x^2 + x)}$ εἰς ἄθροισμα κλασμάτων ἔχοντων ὡς παρονομαστὰς τὸν παράγοντας τοῦ παρονομαστοῦ τοῦ δοθέντος.

Λύσις: 'Ο παρονομαστής τοῦ κλάσματος γράφεται:

$$(x^2 + x)(x^2 + 1) \equiv x(x + 1)(x^2 + 1)$$

καὶ συμφώνως πρὸς τὰ προηγούμενα θὰ ἔχωμεν:

$$\frac{1}{(x^2 + x)(x^2 + 1)} \equiv \frac{A}{x} + \frac{B}{x + 1} + \frac{\Gamma x + \Delta}{x^2 + 1}. \quad (1)$$

'Εκ τῆς (1) λαμβάνομεν, ἐὰν ἐκτελέσωμεν τὰς πράξεις εἰς τὸ β' μέλος:

$$1 \equiv (A + B + \Gamma)x^3 + (A + \Gamma + \Delta)x^2 + (A + B + \Delta)x + A. \quad (2)$$

'Εκ τῆς (2) προκύπτει τὸ κάτωθι σύστημα:

$$A + B + \Gamma = 0, \quad A + \Gamma + \Delta = 0, \quad A + B + \Delta = 0, \quad A = 1.$$

Λύοντες τὸ σύστημα τοῦτο εύρισκομεν: $A = 1$, $B = -\frac{1}{2}$, $\Gamma = -\frac{1}{2}$, $\Delta = -\frac{1}{2}$.

'Αντικαθιστῶντες εἰς τὴν (1) τὰς τιμὰς αὐτὰς λαμβάνομεν τὴν ἀνάλυσιν:

$$\frac{1}{(x^2 + x)(x^2 + 1)} \equiv \frac{1}{x} - \frac{1}{2(x + 1)} - \frac{x + 1}{2(x^2 + 1)}.$$

3η. Νὰ ἀναλυθῇ τὸ κλάσμα $\frac{x^3 - 2x - 13}{x^2 - 2x - 3}$ εἰς ἄθροισμα ἀπλῶν κλασμάτων.

Λύσις: Παρατηροῦμεν δτὶ ὁ ἀριθμητής εἶναι πολυώνυμον μεγαλυτέρου βαθμοῦ ἀπὸ τὸν βαθμὸν τοῦ παρονομαστοῦ. Διαιροῦντες τὸν ἀριθμητὴν διὰ τοῦ παρονομαστοῦ καὶ τρέποντες τὸν παρονομαστὴν εἰς γινόμενον ἔχομεν, συμφώνως πρὸς τὸν τύπον (2) τῆς § 97.

$$\frac{x^3 - 2x - 13}{x^2 - 2x - 3} \equiv (x + 2) + \frac{5x - 7}{(x - 3)(x + 1)}.$$

'Εργαζόμενοι ἡδη εἰς τὸ κλάσμα $\frac{5x - 7}{(x - 3)(x + 1)}$, ὅπως εἰς τὴν περίπτωσιν I, εύρισκομεν δτὶ τοῦτο ισοῦται μέ:

$$\frac{2}{x - 3} + \frac{3}{x + 1}$$

*Άρα ἔχομεν:

$$\frac{x^3 - 2x - 13}{x^2 - 2x - 3} \equiv (x + 2) + \frac{2}{x - 3} + \frac{3}{x + 1}.$$

4η. Νὰ ἀναλυθῇ τὸ κλάσμα $\frac{1}{(2v - 1)(2v + 1)}$ εἰς ἄθροισμα δύο κλασμάτων καὶ τῇ βοηθείᾳ τῆς ἀναλύσεως ταύτης νὰ εὑρεθῇ τὸ ἄθροισμα:

$$\frac{1}{1 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 5} + \frac{1}{5 \cdot 7} + \cdots + \frac{1}{(2v - 1)(2v + 1)}.$$

Λύσις: 'Έχομεν κατά τὰ προηγούμενα:

$$\frac{1}{(2v - 1)(2v + 1)} \equiv \frac{A}{2v - 1} + \frac{B}{2v + 1}.$$

'Εκ ταύτης λαμβάνομεν:

$$1 \equiv A(2v + 1) + B(2v - 1)$$

$$1 \equiv 2(A + B)v + (A - B)$$

Όπότε :

$$A + B = 0$$

$$A - B = 1.$$

Λύοντες τό σύστημα τοῦτο εύρισκομεν : $A = \frac{1}{2}$, $B = -\frac{1}{2}$.

"Οθεν :

$$\frac{1}{(2v-1)(2v+1)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2v-1} - \frac{1}{2v+1} \right). \quad (1)$$

Έκ τῆς (1) λαμβάνομεν :

$$\text{Διὰ } v = 1 : \quad \frac{1}{1 \cdot 3} = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{3} \right)$$

$$\text{Διὰ } v = 2 : \quad \frac{1}{3 \cdot 5} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5} \right)$$

$$\text{Διὰ } v = 3 : \quad \frac{1}{5 \cdot 7} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{7} \right)$$

$$\dots \dots \dots \quad \text{Διὰ } v = v : \quad \frac{1}{(2v-1)(2v+1)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2v-1} - \frac{1}{(2v+1)} \right).$$

Προσθέτοντες τάς ώς ἄνω Ισότητας κατά μέλη, εύρισκομεν :

$$\frac{1}{1 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 5} + \frac{1}{5 \cdot 7} + \dots + \frac{1}{(2v-1) \cdot (2v+1)} = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{2v+1} \right).$$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

213. Νὰ ἀναλυθοῦν εἰς ἀθροισμα ἀπλῶν κλασμάτων τὰ κάτωθι ρητὰ κλάσματα :

$$1) \frac{1}{(x^2-4)(x+1)}, \quad 2) \frac{3x-1}{x^2-5x+6}, \quad 3) \frac{8x^2-19x+2}{(x+2)(x-1)(x-4)}, \quad 4) \frac{1}{(1+x^2)^2 \cdot (1+x)}$$

$$5) \frac{x^5+2}{(x^2+x+1)^3}, \quad 6) \frac{x^2-x+1}{(x^2+1)(x-1)^2}, \quad 7) \frac{3x^2+7x+2}{(x+1)(x^2+2x+5)}, \quad 8) \frac{10x^2+32}{x^3 \cdot (x-4)^2}.$$

214. Όμοιώς :

$$1) \frac{3x+4}{x^2-9x+14}, \quad 2) \frac{3x^2-5x-6}{x^3-6x^2+11x-6}, \quad 3) \frac{x+2}{(x^2-1)(x^2+1)^2}, \quad 4) \frac{x^2}{(x^2-2x+5)^2},$$

$$5) \frac{2x^3+7x^2-2x-2}{2x^2+x-6}, \quad 6) \frac{5x^3-4}{x^4-5x^2+4}, \quad 7) \frac{x^3}{x^3-3x+2}, \quad 8) \frac{7x-10}{(3x-4)(x-1)^2}.$$

215. Νὰ ἀναλυθῇ εἰς ἀθροισμα κλασμάτων τὸ κλάσμα : $\frac{3x^3+x+2}{x^3-1}$.

216. Όμοιώς τό : $\frac{x+1}{x^4-5x^3+9x^2-7x+2}$.

217. Τὸ κλάσμα $\frac{1}{(v+1)(v+2)}$ νὰ ἀναλυθῇ εἰς ἀθροισμα δύο κλασμάτων καὶ τῇ βοη-

θείᾳ τῆς ἀναλύσεως ταύτης νὰ εύρεθῃ τὸ ἀθροισμα :

$$\frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \dots + \frac{1}{(v+1)(v+2)}.$$

218. Τὸ αὐτὸ διὰ τὸ κλάσμα $\frac{1}{v(v+2)}$ καὶ τῇ βοηθείᾳ τῆς ἀναλύσεως ταύτης νὰ εύ-
ρεθῇ τὸ ἀθροισμα : $\frac{1}{1 \cdot 3} + \frac{1}{2 \cdot 4} + \frac{1}{3 \cdot 5} + \dots + \frac{1}{v(v+2)}$.

$$219. \text{ Δείξατε ότι: } \frac{1}{2 \cdot 5} + \frac{1}{5 \cdot 8} + \frac{1}{8 \cdot 11} + \cdots + \frac{1}{(3v-1)(3v+2)} = \frac{1}{2} \cdot \frac{v}{3v+2}.$$

220. Νὰ ἀναλύθῃ τὸ κλάσμα $\frac{1}{v(v+1)(v+2)}$ εἰς ἄθροισμα δύο κλασμάτων μὲ παρονομα- στὰς ἀντιστοίχως $v(v+1)$ καὶ $(v+1)(v+2)$ καὶ τῇ βοηθείᾳ τῆς ἀναλύσεως ταύτης νὰ εὐ- ρεθῇ τὸ ἄθροισμα:

$$\frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3} + \frac{1}{2 \cdot 3 \cdot 4} + \cdots + \frac{1}{v(v+1)(v+2)}.$$

221. Ἀναλύσατε τὸ κλάσμα $\frac{1}{(v+1)(v+2) \dots (v+k)}$ εἰς ἄθροισμα δύο κλασμάτων,

ἐκ τῶν δόποιών τὸ ἐν νὰ ἔχῃ παρονομαστὴν τὸ $(v+1)(v+2) \dots (v+k-1)$ καὶ τὸ ἔτερον τὸ $(v+2)(v+3) \dots (v+k-1)(v+k)$.

IV. ΔΙΩΝΥΜΟΙ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

§ 99. Ὁρισμός.— Καλοῦμεν διώνυμον ἔξισωσιν μὲ ἐναν ἀγνωστον, κάθε ἀκεραίαν ἔξισωσιν τῆς μορφῆς :

$$\boxed{Ax^k + Bx^\mu = 0} \quad (1)$$

ὅπου x ὁ ἀγνωστος, A καὶ B πραγματικοὶ ἀριθμοὶ (συντελεσταί), μὴ ἔξαρτω- μενοι ἐκ τοῦ x , μὲ $A \cdot B \neq 0$ καὶ k , μ ἀκέραιοι μὴ ἀρνητικοί, διάφοροι ἀλλήλων καὶ οὐχὶ ἀμφότεροι μηδέν.

§ 100. Ἐπίλυσης τῆς διωνύμου ἔξισώσεως (1).— Θὰ δείξωμεν εὐθὺς ἀμέσως ότι: πᾶσα διώνυμος ἔξισωσις τῆς μορφῆς (1) ἀνάγεται εἰς τὴν ἐπλήνσιν τῆς διωνύμου ἔξισώσεως $y^v \pm 1 = 0$, ὅπου v φυσικὸς ἀριθμός.

Πράγματι: ἐὰν ὑποτεθῇ, ἃνευ βλάβης τῆς γενικότητος, ότι $k > \mu \geq 0$ ἢ (1) γίνεται :

$$x^\mu (Ax^{k-\mu} + B) = 0$$

καὶ είναι ἰσοδύναμος μὲ τὸ ζεῦγος τῶν ἔξισώσεων :

$$x^\mu = 0 \quad (2) \quad \text{καὶ} \quad Ax^{k-\mu} + B = 0. \quad (3)$$

‘Η (2) ἔχει ρίζαν $x = 0$ εἰς βαθμὸν πολλαπλότητος μ .

‘Η (3) είναι ἰσοδύναμος μὲ τὴν: $x^{k-\mu} = -\frac{B}{A}$, ἢ ὅποια, ἐὰν τεθῇ $v = k - \mu$, $v \in \mathbb{N}$, καὶ $-\frac{B}{A} = \alpha$, γίνεται :

$$\boxed{x^v = \alpha} \quad (4)$$

Τὸ πλῆθος τῶν ριζῶν τῆς (4), πραγματικῶν καὶ μιγαδικῶν, εἶναι v , αἱ νιοσταὶ ρίζαι τοῦ α , καὶ εὐρίσκονται, ὅπως θὰ ἴδωμεν εἰς μίαν τῶν ἐπομένων παραγράφων, διὰ τοῦ τύπου τοῦ De Moivre.

Ἐν τούτοις ὅμως δυνάμεθα νὰ εὕρωμεν τὰς ρίζας τῆς (4) καὶ ὡς ἔξης :

“Εστω γ ἡ πρωτεύουσα νιοστὴ ρίζα τοῦ $|\alpha|$, ἤτοι $\gamma = \sqrt[\nu]{|\alpha|}$, ἐξ οὗ: $\gamma^v = |\alpha|$.

Τότε : έαν $\alpha > 0 \implies |\alpha| = \alpha$ και ή (4) γράφεται : $x^v = y^v$ ή $\left(\frac{x}{y}\right)^v = 1$, ένδη

έαν $\alpha < 0 \implies |\alpha| = -\alpha$ και ή (4) γράφεται : $x^v = -y^v$ ή $\left(\frac{x}{y}\right)^v = -1$.

Θέτομεν $\frac{x}{y} = y$ και αι δύο τελευταίαι έξισώσεις γράφονται άντιστοίχως :

$$y^v - 1 = 0 \quad (5) \quad \text{και} \quad y^v + 1 = 0 \quad (6)$$

Έπομένως ή έπιλυσις της διωνύμου έξισώσεως της μορφής (1) άναγεται εις τὴν έπιλυσιν της διωνύμου έξισώσεως της μορφής (5) ή (6).

Πρός έπιλυσιν τούτων διακρίνομεν δύο περιπτώσεις :

Περιπτώσις I : Έάν $v = 2p + 1$, δηλ. ν περιττός, τότε :

Ή (5) γίνεται : $(y-1)(y^{2p} + y^{2p-1} + \dots + y + 1) = 0$ και είναι ίσοδύναμος μὲ τὸ ζεῦγος τῶν έξισώσεων : $y-1=0$ και $y^{2p} + y^{2p-1} + \dots + y + 1 = 0$ έκ τῶν δόποιών ή τελευταία είναι άντιστροφος.

Ώμοιώς ή (6) γίνεται : $(y+1)(y^{2p} - y^{2p-1} + \dots - y + 1) = 0$ και είναι ίσοδύναμος μὲ τὸ ζεῦγος τῶν έξισώσεων : $y+1=0$ και $y^{2p} - y^{2p-1} + \dots - y + 1 = 0$.

Περιπτώσις II : Έάν $v = 2p$, δηλ. ν ἀρτιός, τότε :

Ή $y^v + 1 = 0$ γίνεται : $y^{2p} + 1 = 0$ ή $y^p + \frac{1}{y^p} = 0$, ή δόποία διὰ τοῦ μετα-

σημηατισμοῦ $y + \frac{1}{y} = z$ άναγεται εις έξισωσιν ρ βαθμοῦ.

Τέλος διὰ $v = 2p$ ή (5) γίνεται : $y^{2p} - 1 = 0$ ή $(y^p - 1)(y^p + 1) = 0$, και είναι ίσοδύναμος μὲ τὸ ζεῦγος τῶν έξισώσεων : $y^p - 1 = 0$ και $y^p + 1 = 0$, έκατέρα τῶν δόποιών άναγεται εις μίαν τῶν προηγουμένων μορφῶν.

§ 101. Έφαρμογαὶ έπὶ τῶν διωνύμων έξισώσεων :

Παράδειγμα 1ον : Νὰ έπιλυθῇ ή έξισωσις :

$$2x^5 + 3x^2 = 0.$$

Άστις : Αὔτη γράφεται $x^2(2x^3 + 3) = 0$ και είναι ίσοδύναμος μὲ τὸ ζεῦγος τῶν έξισώσεων $x^2 = 0$ και $2x^3 + 3 = 0$.

Ή πρώτη έχει τὴν διπλῆν ρίζαν $x_1 = x_2 = 0$.

Ή δευτέρα είναι ίσοδύναμος μὲ τὴν : $x^3 + \frac{3}{2} = 0$. Θέτομεν $x = y \cdot \sqrt[3]{\frac{3}{2}}$ και ή τελευταία γίνεται : $\frac{3}{2}y^3 + \frac{3}{2} = 0$ ή $y^3 + 1 = 0$ ή $(y+1)(y^2 - y + 1) = 0$.

Έκ ταύτης έχομεν $y = -1$ και $y^2 - y + 1 = 0$, ή δόποία λυομένη δίδει : $y = \frac{1 \pm i\sqrt{3}}{2}$.

Θέτοντες τὰς τιμὰς ταύτας εις τὴν $x = y \sqrt[3]{\frac{3}{2}}$, έχομεν ως ρίζας τῆς διθείσης :

$$x_1 = x_2 = 0, \quad x_3 = -\sqrt[3]{\frac{3}{2}}, \quad x_4 = \frac{1+i\sqrt{3}}{2} \cdot \sqrt[3]{\frac{3}{2}}, \quad x_5 = \frac{1-i\sqrt{3}}{2} \cdot \sqrt[3]{\frac{3}{2}}.$$

Παράδειγμα 2ον: Νὰ ἐπιλυθῇ ἡ ἔξιστωσις:

$$x^4 + 81 = 0. \quad (1)$$

Αύσις: Αὗτη γράφεται: $x^4 + 3^4 = 0$ ή $\left(\frac{x}{3}\right)^4 + 1 = 0$. (2)

Θέτομεν: $\frac{x}{3} = y$ (3) καὶ ἡ (2) γίνεται $y^4 + 1 = 0$.

Αὗτη γράφεται: $(y^2 + 1)^2 - 2y^2 = 0$ ή $(y^2 + \sqrt{2}y + 1)(y^2 - \sqrt{2}y + 1) = 0$ καὶ εἰναι ισοδύναμος πρός τὸ ζεῦγος τῶν ἔξισώσεων:

$$y^2 + \sqrt{2}y + 1 = 0 \quad \text{καὶ} \quad y^2 - \sqrt{2}y + 1 = 0.$$

Αὗται λυόμεναι δίδουν ἀντιστοίχως: $y = \frac{-\sqrt{2} \pm i\sqrt{2}}{2}$ καὶ $y = \frac{\sqrt{2} \pm i\sqrt{2}}{2}$.

Θέτοντες τὰς τιμάς ταύτας εἰς τὴν (3) ἔχομεν ὡς ρίζας τῆς διθείσης:

$$x_1 = \frac{3(-\sqrt{2} + i\sqrt{2})}{2}, \quad x_2 = \frac{3(-\sqrt{2} - i\sqrt{2})}{2}, \quad x_3 = \frac{3(\sqrt{2} + i\sqrt{2})}{2}, \quad x_4 = \frac{3(\sqrt{2} - i\sqrt{2})}{2}.$$

Παράδειγμα 3ον: Νὰ εύρεθοιν αἱ κυβικαὶ ρίζαι τῆς μονάδος.

Αύσις: "Εστω x ἡ κυβικὴ ρίζα τῆς μονάδος. Τότε θὰ ἔχωμεν:

$$x^3 = 1 \quad \text{ἢ} \quad x^3 - 1 = 0 \quad \text{ἢ} \quad (x - 1)(x^2 + x + 1) = 0.$$

Ἐκ ταύτης ἔχομεν $x = 1$ καὶ $x^2 + x + 1 = 0$, ἡ δόποια λυομένη δίδει:

$$x = \frac{-1 \pm i\sqrt{3}}{2}. \quad \text{'Επομένως αἱ ζητούμεναι ρίζαι εἰναι:}$$

$$\rho_1 = 1, \quad \rho_2 = \frac{-1 + i\sqrt{3}}{2}, \quad \rho_3 = \frac{-1 - i\sqrt{3}}{2}.$$

Εὐκόλως ἀποδεικνύομεν δτι:

$$\rho_1 + \rho_2 + \rho_3 = 0, \quad \rho_1 \rho_2 = 1, \quad \rho_2 = \rho_3^*, \quad \rho_3 = \rho_2^*.$$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

222. Νὰ ἐπιλυθοῦν αἱ κάτωθι ἔξισώσεις:

- 1) $x^3 - 5 = 0$, 2) $x^4 + 2 = 0$, 3) $x^4 + 16 = 0$, 4) $3x^4 + 7 = 0$,
5) $8x^3 - 27 = 0$, 6) $8x^3 + 125 = 0$, 7) $32x^6 + 1 = 0$, 8) $x^{12} - 1 = 0$.

223. "Ἐὰν ρ_1 καὶ ρ_2 εἶναι αἱ μιγαδικαὶ κυβικαὶ ρίζαι τῆς μονάδος, δεῖξατε δτι:

- 1) $(1 + \rho_1)^4 = \rho_1$, 2) $(1 + \rho_1 - \rho_2)^3 - (1 - \rho_1 + \rho_2)^3 = 0$,
3) $(1 + 2\rho_1 + 3\rho_2)(1 + 3\rho_1 + 2\rho_2) = 3$, 4) $(1 - \rho_1 + \rho_2)(1 + \rho_1 - \rho_2) = 4$.

224. Νὰ εύρεθοῦν αἱ κυβικαὶ ρίζαι τῆς ἀρνητικῆς μονάδος.

225. Νὰ εύρεθοῦν αἱ τετραγωνικαὶ ρίζαι τῶν ἀριθμῶν i καὶ $-i$.

Τριγωνομετρικὴ μορφὴ μιγαδικοῦ ἀριθμοῦ.

Τύπος τοῦ De Moivre.

§ 102. "Ορισμα μιγαδικοῦ ἀριθμοῦ $z \neq 0$."—"Εστω ὁ μιγαδικὸς ἀριθμὸς $z = x + iy$ μὲν $z \neq 0$ καὶ $x, y \in \mathbb{R}$ · ἔχουν τότε ἔννοιαν ἐν \mathbb{R} αἱ παραστάσεις:

$\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \quad \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ καὶ ὁ z δύναται νὰ γραφῇ ὑπὸ τὴν μορφήν:

$$z = x + iy = \sqrt{x^2 + y^2} \cdot \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} + i \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right) \quad (1)$$

Έπειδή : $-1 \leq \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} \leq 1, -1 \leq \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} \leq 1$
καὶ $\left(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)^2 + \left(\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)^2 = 1,$

τὰ $\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}, \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}$ δύνανται νὰ είναι ἀντιστοίχως τὸ συνημίτονον καὶ τὸ ήμίτονον καταλλήλου γωνίας φ, ἢτοι :

$$\text{συνφ} = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}, \quad \etaμφ = \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}. \quad (2)$$


Ως γνωστόν, ὑπάρχουν ἄπειροι τὸ πλῆθος γωνίας, αἱ ὅποιαι πληροῦν τὰς σχέσεις (2), τὰ δὲ μέτρα αὐτῶν εἰς ἀκτίνια διαφέρουν κατὰ ἀκέραιον πολλαπλάσιον τοῦ 2π . Ἐκ τούτων ὑπάρχει ἀ κ ρ β ὡς μία, ἡ ὅποια πληροῖ τὰς (2) καὶ ἐπὶ πλέον τὴν συνθήκην : $-\pi < \phi \leq \pi$. Ταύτην καλοῦμεν : τὸ βασικὸν (πρωτεῦον) ὅρισμα τοῦ μιγαδικοῦ ἀριθμοῦ $z = x + iy (\neq 0)$ καὶ συμβολίζομεν μὲν : $\text{Arg} z$ ($\text{Argument} = \text{ὅρισμα}$).

Παράδειγμα: Διὰ τὸν μιγαδικὸν ἀριθμὸν $z = 1 + i\sqrt{3}$ ἔχομεν τὸ σύστημα :

$$\text{συνφ} = \frac{1}{2}, \quad \etaμφ = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad -\pi < \phi \leq \pi,$$

ἕξ οὖ : $\phi = \frac{\pi}{3}$, ὥστε : $\text{Arg}(1 + i\sqrt{3}) = \frac{\pi}{3}$.

Γεωμετρικῶς τὸ ὅρισμα μιγαδικοῦ ἀριθμοῦ z παριστᾶ τὴν κυρτὴν γωνίαν, τὴν ὅποιαν σχηματίζει ὁ θετικὸς ἡμιάξεων Οχ μετὰ τῆς διανυσματικῆς ἀκτίνος ΟΜ, τῆς παριστώσης τὸν μιγαδικὸν ἀριθμὸν z , ὡς ἐμφαίνεται εἰς τὰς περιπτώσεις τῶν κάτωθι σχημάτων (βλ. Σχ. 6).



Σχ. 6

§ 103. Τριγωνομετρικὴ μορφὴ μιγαδικοῦ ἀριθμοῦ.—Ἐστω εἰς μιγαδικὸς ἀριθμὸς $z = x + iy \neq 0$. Ὁρίζεται τότε ἡ ἀπόλυτος τιμὴ ἡ μέτρον αὐτοῦ,

$$|z| = \sqrt{x^2 + y^2} = \rho \text{ και τὸ δρισμά του } \operatorname{Arg} z = \phi \text{ καὶ ἵσχουν, ὡς εἴδομεν ἀνωτέρω : } \quad \operatorname{συν}\phi = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{x}{\rho}, \quad \operatorname{ημ}\phi = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{y}{\rho}. \quad (1)$$

Ἐκ τῆς (1) ἔχομεν :

$$x = \rho \operatorname{συν}\phi, \quad y = \rho \operatorname{ημ}\phi$$

καὶ δι μιγαδικὸς ἀριθμὸς $z = x + iy$ λαμβάνει τὴν μορφήν :

$$x + iy = \rho (\operatorname{συν}\phi + i \operatorname{ημ}\phi) \quad (2)$$

Ἡ μορφὴ εἰς τὸ 2ον μέλος τῆς (2) καλεῖται : Τριγωνομετρικὴ μορφὴ τοῦ μιγαδικοῦ ἀριθμοῦ $z = x + iy$.

Οὕτως είναι, π.χ., (βλ. καὶ σχῆμα 6, § 102) :

$$\begin{aligned} 1 &= 1 (\operatorname{συν}0 + i \operatorname{ημ}0), & -1 &= 1 (\operatorname{συν}\pi + i \operatorname{ημ}\pi), \\ i &= 1 \left(\operatorname{συν} \frac{\pi}{2} + i \operatorname{ημ} \frac{\pi}{2} \right), & -i &= 1 \left(\operatorname{συν} \left(-\frac{\pi}{2} \right) + i \operatorname{ημ} \left(-\frac{\pi}{2} \right) \right), \\ 1 + i\sqrt{3} &= 2 \left(\operatorname{συν} \frac{\pi}{3} + i \operatorname{ημ} \frac{\pi}{3} \right), & -1 - i &= \sqrt{2} \left(\operatorname{συν} \left(-\frac{3\pi}{4} \right) + i \operatorname{ημ} \left(-\frac{3\pi}{4} \right) \right), \\ -1 + i &= \sqrt{2} \left(\operatorname{συν} \frac{3\pi}{4} + i \operatorname{ημ} \frac{3\pi}{4} \right), & -\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} &= 1 \left(\operatorname{συν} \frac{2\pi}{3} + i \operatorname{ημ} \frac{2\pi}{3} \right). \end{aligned}$$

Κάθε λοιπὸν μιγαδικὸς ἀριθμὸς $z = x + iy \neq 0$ ἔχει ἀκριβῶς μίαν τριγωνομετρικὴν παράστασιν $z = \rho (\operatorname{συν}\phi + i \operatorname{ημ}\phi)$, ὅπου ρ είναι ἡ ἀπόλντος τιμὴ τοῦ z (ἢ ἄλλως τὸ μέτρον τοῦ z) καὶ ϕ τὸ βασικὸν δρισμά τον ($-\pi < \phi \leq \pi$).

Ἀντιστρόφως : Διὰ κάθε διατεταγμένον ζ εῦγος (ρ, ϕ) μὲν $\rho > 0$ καὶ $-\pi < \phi \leq \pi$ ὑπάρχει ἀκριβῶς εἰς μιγαδικὸς ἀριθμὸς $z = x + iy \neq 0$ μὲν τριγωνομετρικὴν μορφήν : $\rho (\operatorname{συν}\phi + i \operatorname{ημ}\phi)$. Οὕτως είναι δι μιγαδικὸς ἀριθμὸς μὲ $x = \rho \operatorname{συν}\phi$ καὶ $y = \rho \operatorname{ημ}\phi$.

Κατόπιν τούτων ἔχομεν τὴν λογικὴν ἴσοδυναμίαν :

$$\left. \begin{array}{l} x = \rho \operatorname{συν}\phi \\ y = \rho \operatorname{ημ}\phi \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \rho = \sqrt{x^2 + y^2} \\ \operatorname{συν}\phi = \frac{x}{\rho}, \quad \operatorname{ημ}\phi = \frac{y}{\rho} \end{array} \right.$$

Παρατήρησις : Ἐπειδὴ $\operatorname{συν}\phi = \operatorname{συν}(2k\pi + \phi)$ καὶ $\operatorname{ημ}\phi = \operatorname{ημ}(2k\pi + \phi)$, διπού $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$, ἡ παράστασις (2) γράφεται ὑπὸ τὴν γενικωτέραν μορφήν :

$$z = x + iy = \rho [\operatorname{συν}(\phi + 2k\pi) + i \operatorname{ημ}(\phi + 2k\pi)] \quad (3)$$

Εὐκόλως ἀποδεικνύεται τώρα τὸ κάτωθι :

§ 104. Θεώρημα.—Δύο μιγαδικοὶ ἀριθμοὶ γεγραμμένοι ὑπὸ τριγωνομετρικὴν μορφὴν είναι ἵσοι τότε, καὶ μόνον τότε, ἂν ἔχουν ἵσα μέτρα καὶ δρίσματα διαφέροντα κατὰ ἀκέραιον πολλαπλάσιον περιφερείας.

Α πόδειξις. Πράγματι, έὰν ἔχωμεν :

$$\rho_1(\sin\varphi_1 + i \cos\varphi_1) = \rho_2(\sin\varphi_2 + i \cos\varphi_2),$$

θὰ εἴναι :

$$\begin{aligned} \rho_1 \sin\varphi_1 &= \rho_2 \sin\varphi_2 \implies \rho_1^2 \sin^2\varphi_1 = \rho_2^2 \sin^2\varphi_2 \\ \rho_1 \cos\varphi_1 &= \rho_2 \cos\varphi_2 \implies \rho_1^2 \cos^2\varphi_1 = \rho_2^2 \cos^2\varphi_2 \end{aligned} \implies \begin{aligned} \rho_1^2 (\sin^2\varphi_1 + \cos^2\varphi_1) &= \rho_2^2 (\sin^2\varphi_2 + \cos^2\varphi_2) \\ \rho_1^2 &= \rho_2^2 \end{aligned}$$

εἰς οὐ : $\rho_1^2 = \rho_2^2$ καὶ ἐπειδὴ $\rho_1 > 0, \rho_2 > 0$, ἔπειται : $\rho_1 = \rho_2$,
ὅποτε θὰ εἴναι :

$$\begin{aligned} \sin\varphi_1 &= \sin\varphi_2 \\ \cos\varphi_1 &= \cos\varphi_2 \end{aligned} \implies \varphi_1 = \varphi_2 + 2k\pi, \quad \text{εἰς οὐ : } \varphi_1 - \varphi_2 = 2k\pi.$$

Άντιστρόφως. Εὰν $\rho_1 = \rho_2$ καὶ $\varphi_1 - \varphi_2 = 2k\pi$, θὰ ἔχωμεν :

$$\sin\varphi_1 = \sin\varphi_2, \quad \cos\varphi_1 = \cos\varphi_2$$

καὶ κατ' ἀκολουθίαν :

$$\rho_1(\sin\varphi_1 + i \cos\varphi_1) = \rho_2(\sin\varphi_2 + i \cos\varphi_2).$$

Χρῆσις τῆς τριγωνομετρικῆς μορφῆς μιγαδικῶν ἀριθμῶν εἰς τὰς πράξεις. — Η τριγωνομετρική μορφή τῶν μιγαδικῶν ἀριθμῶν μᾶς ἐπιτρέπει νὰ ἑκτελέσωμεν ἀπλούστερον τὸν πολλαπλασιάσμόν, τὴν διαίρεσιν καὶ τὴν ἔξαγήν τῶν ριζῶν τῶν μιγαδικῶν ἀριθμῶν.

'Ακριβέστερον ίσχύουν τὰ κάτωθι θεωρήματα :

§ 105. Θεώρημα. — Τὸ γινόμενον δύο μιγαδικῶν ἀριθμῶν εἴναι εἰς μιγαδικὸς ἀριθμὸς ἔχων μέτρον μὲν τὸ γινόμενον τῶν μέτρων τῶν μιγάδων, δρισμα δὲ τὸ ἄθροισμα τῶν δρισμάτων αὐτῶν. "Ητοι, έὰν :

$$\begin{aligned} z_1 &= \rho_1(\sin\varphi_1 + i \cos\varphi_1) \\ z_2 &= \rho_2(\sin\varphi_2 + i \cos\varphi_2) \end{aligned} \implies z_1 z_2 = \rho_1 \rho_2 [\sin(\varphi_1 + \varphi_2) + i \cos(\varphi_1 + \varphi_2)].$$

Α πόδειξις: Εὰν πολλαπλασιάσωμεν κατὰ μέλη τὰς δοθείσας θὰ ἔχωμεν : $z_1 z_2 = \rho_1 \rho_2 (\sin\varphi_1 + i \cos\varphi_1) (\sin\varphi_2 + i \cos\varphi_2) = \rho_1 \rho_2 [(\sin\varphi_1 \sin\varphi_2 - \cos\varphi_1 \cos\varphi_2) + i (\sin\varphi_1 \cos\varphi_2 + \cos\varphi_1 \sin\varphi_2)] = \rho_1 \rho_2 [\sin(\varphi_1 + \varphi_2) + i \cos(\varphi_1 + \varphi_2)].$

§ 106. Πόρισμα. — Εὰν $z_1 = \rho_1(\sin\varphi_1 + i \cos\varphi_1)$, $z_2 = \rho_2(\sin\varphi_2 + i \cos\varphi_2)$...
 $\dots z_v = \rho_v(\sin\varphi_v + i \cos\varphi_v)$,

τότε :

$$z_1 z_2 \dots z_v = \rho_1 \rho_2 \dots \rho_v [\sin(\varphi_1 + \varphi_2 + \dots + \varphi_v) + i \cos(\varphi_1 + \varphi_2 + \dots + \varphi_v)] \quad (1)$$

"Η ἀπόδειξις νὰ δοθῇ διὰ τῆς μεθόδου τῆς μαθηματικῆς ἐπαγωγῆς.

'Ε φαρμογή. Νὰ εὑρεθῇ τὸ ἔξαγόμενον :

$$[2(\sin 30^\circ + i \cos 30^\circ)] \cdot [\sqrt{2}(\sin 40^\circ + i \cos 40^\circ)] \cdot [\sqrt{3}(\sin 50^\circ + i \cos 50^\circ)].$$

Λύσις : "Έχομεν διαδοχικῶς :

$$\begin{aligned} &[2(\sin 30^\circ + i \cos 30^\circ)] \cdot [\sqrt{2}(\sin 40^\circ + i \cos 40^\circ)] \cdot [\sqrt{3}(\sin 50^\circ + i \cos 50^\circ)] = \\ &= 2 \sqrt{2} \sqrt{3} [\sin(30^\circ + 40^\circ + 50^\circ) + i \cos(30^\circ + 40^\circ + 50^\circ)] = \\ &= 2 \sqrt{6} (\sin 120^\circ + i \cos 120^\circ) = 2 \sqrt{6} \left(-\frac{1}{2} + \frac{i \sqrt{3}}{2} \right) = -\sqrt{6} + 3i\sqrt{2}. \end{aligned}$$

§ 107. Θεώρημα.— Ο άντιστροφος ένδος μιγαδικοῦ ἀριθμοῦ z ($\neq 0$) έχει μέτρον μὲν τὸ άντιστροφον τοῦ μέτρου του, δρισμα δὲ τὸ άντιθετον τοῦ δρίσματος του.

*Α πόδειξις. Πράγματι, ἂν $z = \rho (\sin \phi + i \cos \phi)$ έχομεν διαδοχικῶς :

$$[\rho(\sin \phi + i \cos \phi)]^{-1} = \frac{1}{\rho(\sin \phi + i \cos \phi)} = \frac{1(\sin \phi - i \cos \phi)}{\rho(\sin \phi + i \cos \phi)(\sin \phi - i \cos \phi)} = \\ = \frac{\sin \phi - i \cos \phi}{\rho(\sin^2 \phi + \cos^2 \phi)} = \frac{1}{\rho} (\sin \phi - i \cos \phi) = \frac{1}{\rho} [\sin(-\phi) + i \cos(-\phi)].$$

Κατὰ ταῦτα :

$$[\rho(\sin \phi + i \cos \phi)]^{-1} = \frac{1}{\rho} [\sin(-\phi) + i \cos(-\phi)].$$

Τῇ βοηθείᾳ τώρα τῶν θεωρημάτων τῶν § 105, 107, ἐπεται ἀμέσως τὸ κάτωθι :

§ 108. Θεώρημα.— Τὸ πηλίκον δύο μιγαδικῶν ἀριθμῶν είναι μιγαδικὸς ἀριθμὸς ἔχων μέτρον τὸ πηλίκον τῶν μέτρων των καὶ δρισμα τὴν διαφορὰν τῶν δρισμάτων των. Ήτοι, ἔαν :

$$\left. \begin{array}{l} z_1 = \rho_1 (\sin \phi_1 + i \cos \phi_1) \\ z_2 = \rho_2 (\sin \phi_2 + i \cos \phi_2) \neq 0 \end{array} \right\} \implies \frac{z_1}{z_2} = \frac{\rho_1}{\rho_2} [\sin(\phi_1 - \phi_2) + i \cos(\phi_1 - \phi_2)].$$

*Υπόδειξις. Εχομεν : $\frac{z_1}{z_2} = z_1 \cdot \frac{1}{z_2} = z_1 \cdot z_2^{-1}$ κ.τ.λ.

Παράδειγμα. Νὰ ενθεθῃ τὸ πηλίκον : $\frac{-2}{1+i}$.

Λόσις : Εχομεν :

$$\frac{-2}{1+i} = \frac{-2+0i}{1+i} = \frac{2(\sin 180^\circ + i \cos 180^\circ)}{\sqrt{2}(\sin 45^\circ + i \cos 45^\circ)} = \frac{2}{\sqrt{2}} [\sin(180^\circ - 45^\circ) + \\ + i \cos(180^\circ - 45^\circ)] = \frac{2}{\sqrt{2}} (\sin 135^\circ + i \cos 135^\circ) = \frac{2}{\sqrt{2}} \left(-\frac{1}{\sqrt{2}} + i \frac{1}{\sqrt{2}} \right) = \\ = \sqrt{2} \left(-\frac{1}{\sqrt{2}} + i \frac{1}{\sqrt{2}} \right) = -1 + i.$$

§ 109. Θεώρημα (De Moivre). Η νιοστὴ δύναμις μιγαδικοῦ ἀριθμοῦ είναι μιγαδικὸς ἀριθμὸς ἔχων μέτρον τὴν νιοστὴν δύναμιν τοῦ μέτρου τοῦ μιγάδος καὶ δρισμα τὸ ν—πλάσιον τοῦ δρίσματος αὐτοῦ. Ήτοι, ἔαν :

$$z = \rho (\sin \phi + i \cos \phi) \implies z^n = \rho^n [\sin(n\phi) + i \cos(n\phi)]$$

ή

$$[\rho(\sin \phi + i \cos \phi)]^n = \rho^n [\sin(n\phi) + i \cos(n\phi)]$$

(τ)

Ο τύπος (τ) δόποιος δίδει τὴν νιοστὴν δύναμιν ἐνδος μιγαδικοῦ ἀριθμοῦ εἰναι γνωστὸς ύπο τὸ δνομα : τύπος τοῦ De Moivre)

* De Moivre (1667-1754). Γάλλος μαθηματικός.

Α πόδειξις: Έαν είσ τὸν τύπον (1) τῆς παραγράφου 106 θέσωμεν :

$$z_1 = z_2 = \dots = z_v = \rho (\text{συνφ} + i \text{ημφ}), \text{τότε προκύπτει } \delta (\tau).$$

Παρατήρησις I: Τὸ θεώρημα τοῦ De Moivre δύναται νὰ ἀποδειχθῇ καὶ διὰ τῆς μεθόδου τῆς τελείας ἐπαγωγῆς.

Υπόδειξις: Η πρότασις ισχύει διὰ $v = 2$. Υποθέσατε ὅτι ισχύει διὰ $v = k$ καὶ δεῖξατε ὅτι ισχύει διὰ $v = k + 1$.

Παρατήρησις II: Ο τύπος τοῦ De Moivre ισχύει καὶ ὅταν ὁ v εἴναι ἀκέραιος ἀρνητικός. Πράγματι, ἔχομεν :

$$[\rho (\text{συνφ} + i \text{ημφ})]^{-k} = \{ [\rho (\text{συνφ} + i \text{ημφ})]^{-1}\}^k = \{\rho^{-1} \cdot [\text{συν}(-\phi) + i \text{ημ}(-\phi)]\}^k = \rho^{-k} \cdot [\text{συν}(-k\phi) + i \text{ημ}(-k\phi)], \quad k \in \mathbb{N}.$$

Ρίζαι μιγαδικῶν ἀριθμῶν

§ 110. Όρισμός.— Δοθέντος ἑνὸς μιγαδικοῦ ἀριθμοῦ $a \neq (0,0)$ καλοῦμεν νιοστὴν ρίζαν αὐτοῦ, ($\sigmaμβολισμός : \sqrt{a}$), κάθε μιγαδικὸν ἀριθμὸν z τοιοῦτον, ὥστε: $z^v = a$, ἦτοι :

$$\boxed{\sqrt{a} = z \iff z^v = a} \quad (1)$$

Θὰ δείξωμεν τῷρα ὅτι ὑπάρχουν μιγαδικοὶ ἀριθμοὶ πληροῦντες τὴν (1). Πρὸς τοῦτο θὰ ἀποδείξωμεν τὸ κάτωθι θεώρημα :

§ 111. Θεώρημα (ὑπάρξεως νιοστῆς ρίζης μιγάδος).—

Έαν $a = \rho (\text{συν}\theta + i \text{ημ}\theta)$, $a \neq 0$, είναι τυχῶν μιγαδικὸς ἀριθμός, ὑπάρχουν ἀκριβῶς v διάφοροι ἀλλήλων νιοσταὶ ρίζαι αὐτοῦ, δηλαδὴ ἡ ἔξισωσις :

$$z^v = a \quad (1)$$

ἔχει ἀκριβῶς v διαφόρους ἀλλήλων ρίζας, αἱ δοποῖαι δίδονται ἐκ τοῦ τύπου :

$$z_k = \sqrt[p]{\rho} \left[\text{συν} \left(\frac{\theta + 2k\pi}{v} \right) + i \text{ημ} \left(\frac{\theta + 2k\pi}{v} \right) \right],$$

ἔνθα $k = 0, 1, 2, \dots, (v - 1)$.

Α πόδειξις. Εστὼ ὅτι ὁ μιγαδικὸς ἀριθμός :

$$z = r (\text{συν}\phi + i \text{ημ}\phi)$$

ἐπαληθεύει τὴν ἔξισωσιν (1). Τότε, συμφώνως πρὸς τὸν τύπον τοῦ De Moivre, ἔχομεν :

$$r^v [\text{συν}(v\phi) + i \text{ημ}(v\phi)] = \rho \cdot (\text{συν}\theta + i \text{ημ}\theta). \quad (2)$$

Η (2) ὅμως ἀληθεύει τότε, καὶ μόνον τότε, ἄν :

$$r^v = \rho \quad \text{καὶ} \quad v\phi = \theta + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Έξ αὐτῶν λαμβάνομεν :

$$r = \sqrt[p]{\rho^*)} \quad \text{καὶ} \quad \phi = \frac{\theta + 2k\pi}{v}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

.) $\sqrt[p]{\rho^)}$ είναι ἡ θετικὴ νιοστὴ ρίζα τοῦ θετικοῦ ἀριθμοῦ ρ .

"Ωστε :

$$z = \sqrt[n]{\rho} \cdot \left[\operatorname{συν} \frac{\theta + 2k\pi}{n} + i \operatorname{ημ} \frac{\theta + 2k\pi}{n} \right], \quad k \in \mathbb{Z}. \quad (3)$$

'Εδείχθη λοιπόν ότι ύπαρχουν μιγαδικοί άριθμοι, δριζόμενοι ύπο της (3) διά τάς διαφόρους άκεραίας τιμάς του k , οίτινες έπαληθεύουν τήν (1).

Θὰ δείξωμεν τώρα ότι ν μόνον άπό αύτούς είναι διάφοροι μεταξύ των, διά τάς διαφόρους άκεραίας τιμάς του k . 'Ακριβέστερον θὰ δείξωμεν ότι :

'Έαν δ άκεραιος άριθμός k λάβῃ τάς τιμάς $0, 1, 2, \dots, \lambda, \dots, \mu, \dots, v-1$ άπό τήν (3) προκύπτουν άντιστοίχως ν άριθμοί : $z_0, z_1, z_2, \dots, z_\lambda, \dots, z_\mu, \dots, z_{v-1}$ διάφοροι άλλήλων καὶ ότι ἂν k λάβῃ τιμήν διάφορον τῶν $0, 1, 2, \dots, v-1$, δηλ. ἂν $k \geq v$ ή $k < 0$, τότε δ προκύπτων άπό τήν (3) μιγαδικός άριθμός z θὰ συμπίπτῃ πρός ἔνα τῶν $z_0, z_1, z_2, \dots, z_{v-1}$.

Πράγματι, δς δώσωμεν κατ' άρχας εἰς τὸ k τάς ν διαδοχικάς τιμάς : $0, 1, 2, \dots, (v-1)$, τότε ἐκ τής (3) λαμβάνομεν ν άριθμούς $z_0, z_1, z_2, \dots, z_\lambda, \dots, z_\mu, \dots, z_{v-1}$, οἱ δόποιοι ἔχουν τὸ αύτὸ μέτρον $\sqrt[n]{\rho}$, δρίσματα δὲ άντιστοίχως τά :

$$\frac{\theta}{v}, \quad \frac{\theta + 2\pi}{v}, \quad \frac{\theta + 4\pi}{v}, \dots, \frac{\theta + 2\lambda\pi}{v}, \dots, \frac{\theta + 2\mu\pi}{v}, \dots, \frac{\theta + 2(v-1)\pi}{v}.$$

Οἱ ν οὗτοι άριθμοὶ $z_0, z_1, z_2, \dots, z_\lambda, \dots, z_\mu, \dots, z_{v-1}$ είναι διάφοροι άλλήλων, διότι, ἂν δύο τυχόντες ἔξ αὐτῶν ήσαν ἴσοι, ἔστω οἱ z_λ καὶ z_μ , ἔνθα $\lambda, \mu \in \mathbb{Z}, \lambda \neq \mu$ καὶ $0 \leq \lambda, \mu < v$, θὰ ἔπειτε :

$$\frac{\theta + 2\lambda\pi}{v} - \frac{\theta + 2\mu\pi}{v} = 2\lambda'\pi, \quad \lambda' \in \mathbb{Z}.$$

Δηλαδή :

$$\lambda - \mu = \lambda'v, \quad \lambda' \in \mathbb{Z}.$$

Είναι ὅμως $0 < |\lambda - \mu| < v$ καὶ ἐπομένως $0 < |\lambda'v| < v$ ή $0 < |\lambda'| < 1$ ἀτοπον, διότι δι' οὐδὲν $\lambda' \in \mathbb{Z}$ είναι $0 < |\lambda'| < 1$.

"Ωστε : $z_\lambda \neq z_\mu \quad \forall \lambda, \mu \in [0, v-1], \lambda \neq \mu$ καὶ $\lambda, \mu \in \mathbb{Z}$.

"Ἄς ἵδωμεν τώρα τὶ συμβαίνει, ἂν δ k λάβῃ άκεραίας τιμάς ἑκτὸς του διαστήματος $[0, v-1]$, δηλαδὴ τί συμβαίνει διά $k \geq v$ ή $k < 0$.

'Εφ' ὅσον $k \in [0, v-1]$, ἔαν καλέσωμεν λ τὸ πηλίκον καὶ k_1 τὸ ύπόλοιπον τῆς διαιρέσεως k : v θὰ είναι : $k = \lambda v + k_1$, ὅπου λ καὶ k_1 άκέραιοι μὲ $0 \leq k_1 < v$, δηλ. $k_1 \in [0, v-1]$.

"Έχομεν δὲ τότε :

$$\begin{aligned} z_k &= \sqrt[n]{\rho} \cdot \left[\operatorname{συν} \frac{\theta + 2(\lambda v + k_1)\pi}{v} + i \operatorname{ημ} \frac{\theta + 2(\lambda v + k_1)\pi}{v} \right] = \\ &= \sqrt[n]{\rho} \cdot \left[\operatorname{συν} \left(\frac{\theta + 2k_1\pi}{v} + 2\lambda\pi \right) + i \operatorname{ημ} \left(\frac{\theta + 2k_1\pi}{v} + 2\lambda\pi \right) \right] = \\ &= \sqrt[n]{\rho} \cdot \left[\operatorname{συν} \left(\frac{\theta + 2k_1\pi}{v} \right) + i \operatorname{ημ} \left(\frac{\theta + 2k_1\pi}{v} \right) \right] = z_{k_1}, \quad k_1 = 0, 1, 2, \dots, v-1. \end{aligned}$$

"Ήτοι, όταν $k \neq 0, 1, 2, \dots, v-1$, δηλ. όταν $k \geq v$ ή $k < 0$, τότε ο προκύπτων έκ της (3) μιγαδικός όριθμός z συμπίπτει πρόσις έν τῶν $z_0, z_1, z_2, \dots, z_{v-1}$.

"Ωστε, πράγματι, υπάρχουν άκριβώς v διάφοροι άλλήλων όριθμοί, οι οποίοι έπαληθεύουν τήν έξισωσιν :

$$z^v = a = \rho(\operatorname{συν} \theta + i \operatorname{ημ} \theta).$$

Ούτοι δίδονται ύπο τοῦ τύπου :

$$\boxed{z_k = \sqrt[v]{\rho} \cdot \left[\operatorname{συν} \left(\frac{\theta + 2k\pi}{v} \right) + i \operatorname{ημ} \left(\frac{\theta + 2k\pi}{v} \right) \right]} \quad (4)$$

όπου $k = 0, 1, 2, \dots, v-1$.

Παρατήρησις. 'Εκ τοῦ άνωτέρω θεωρήματος προκύπτει ότι κάθε μιγαδικός όριθμός $a \neq 0$ έχει άκριβώς v νιοστάς ρίζας, δηλ. τὸ σύμβολον $\sqrt[v]{a}$ έχει v διαφόρους τιμάς (τὰς (4)), είναι δηλαδή, ως άλλως λέγομεν, v -σήμαντον καὶ πρέπει νὰ καθορίζεται έκαστοτε ἡ σημασία του.

Ούτω, π.χ., $\sqrt[4]{-1} = \pm i$, $\sqrt[5]{25} = \pm \sqrt{5}$, $\sqrt[3]{2} = \pm \sqrt[3]{2}$, δηλου τὸ σύμβολον $\sqrt[v]{a}$ τῆς τετραγωνικῆς ρίζης έχει τήν γνωστήν διὰ πραγματικούς όριθμούς έννοιαν.

Κατά ταῦτα :

Εἰς τήν περιοχήν τῶν μιγαδικῶν όριθμῶν (άκρως καὶ ὃν δὲ όριθμός αἱ είναι πραγματικός όριθμός, δηλαδή γράφεται οὕτω $a = a + i0$ μὲν $a \in \mathbb{R}$) εἰς τὸ σύμβολον $\sqrt[v]{a}$ δίδομεν διττήν σημασίαν, ήτοι άκριβέστερον :

Μὲ $\sqrt[v]{a}$, δηλου $a \in \mathbb{C}$, δρίζονται καὶ αἱ δύο ρίζαι τῆς έξισώσεως $z^v = a$. αὗται συμπίπτουν τότε, καὶ μόνον τότε, διὸ $a = 0$.

Τῇ βοηθείᾳ τῆς άνωτέρω σημασίας τοῦ συμβόλου $\sqrt[v]{a}$ έν \mathbb{C} , δυνάμεθα νὰ έκφράσωμεν τὰς λύσεις τῆς δευτεροβαθμίου έξισώσεως : $az^2 + bz + c = 0$ μὲν $a \neq 0$, $a, b, c \in \mathbb{C}$, διὰ τοῦ τύπου :

$$z = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$$

Ἐφαρμογαὶ : 1η Νὰ εύρεθον αἱ $\sqrt[3]{8i}$.

Αὐταὶ : "Έχομεν : $8i = 8 \left(\operatorname{συν} \frac{\pi}{2} + i \operatorname{ημ} \frac{\pi}{2} \right)$ καὶ δὲ τύπος (4) τῆς § 111 δίδει :

$$\begin{aligned} \sqrt[3]{8i} &= \sqrt[3]{8 \left(\operatorname{συν} \frac{\pi}{2} + i \operatorname{ημ} \frac{\pi}{2} \right)} = \sqrt[3]{8} \left(\operatorname{συν} \frac{\frac{\pi}{2} + 2k\pi}{3} + i \operatorname{ημ} \frac{\frac{\pi}{2} + 2k\pi}{3} \right) = \\ &= 2 \left[\operatorname{συν} \left(\frac{\pi}{6} + \frac{2k\pi}{3} \right) + i \operatorname{ημ} \left(\frac{\pi}{6} + \frac{2k\pi}{3} \right) \right], \quad k = 0, 1, 2. \end{aligned}$$

$$\text{Διὰ } k = 0: \quad 2 \left(\operatorname{συν} \frac{\pi}{6} + i \operatorname{ημ} \frac{\pi}{6} \right) = \sqrt{3} + i$$

$$\text{Διὰ } k = 1: \quad 2 \left(\operatorname{συν} \frac{5\pi}{6} + i \operatorname{ημ} \frac{5\pi}{6} \right) = -\sqrt{3} + i$$

$$\text{Διὰ } k = 2: \quad 2 \left(\operatorname{συν} \frac{3\pi}{2} + i \operatorname{ημ} \frac{3\pi}{2} \right) = 0 - 2i = -2i.$$

$$2a : \text{Νά ενθεθούν αι } \sqrt[4]{2+2i\sqrt{3}}.$$

Λύσις: "Εχομεν: $2+2i\sqrt{3}=4\left(\sin\frac{\pi}{3}+i\cos\frac{\pi}{3}\right)$ και δ τύπος (4) της § 111 διά
 $v=4, \rho=4, \theta=\frac{\pi}{3}$ διδει:

$$z_k \equiv \sqrt[4]{4\left(\sin\frac{\pi}{3}+i\cos\frac{\pi}{3}\right)} = \sqrt[4]{4} \cdot \left[\sin\left(\frac{\frac{\pi}{3}+2k\pi}{4}\right) + i\cos\left(\frac{\frac{\pi}{3}+2k\pi}{4}\right) \right] = \\ = \sqrt[4]{2} \cdot \left[\sin\left(\frac{\pi}{12}+\frac{k\pi}{2}\right) + i\cos\left(\frac{\pi}{12}+\frac{k\pi}{2}\right) \right].$$

Έκ τοῦ τύπου τούτου διά $k=0, 1, 2, 3$ εύρισκομεν άντιστοίχως:

$$z_0 = \sqrt[4]{2}\left(\sin\frac{\pi}{12}+i\cos\frac{\pi}{12}\right), \quad z_1 = \sqrt[4]{2}\left(\sin\frac{7\pi}{12}+i\cos\frac{7\pi}{12}\right),$$


$$z_2 = \sqrt[4]{2}\left(\sin\frac{13\pi}{12}+i\cos\frac{13\pi}{12}\right), \quad z_3 = \sqrt[4]{2}\left(\sin\frac{19\pi}{12}+i\cos\frac{19\pi}{12}\right).$$

§ 112. Γεωμετρική παράστασις τῶν νιοστῶν ριζῶν μιγαδικοῦ ἀριθμοῦ.— "Εστω ὁ μιγαδικός ἀριθμὸς $a=\rho(\sin\theta+i\cos\theta)$, μὲ νιοστὰς ρίζας τάς κάτωθι:

$$z_0 = \sqrt[v]{\rho}\left[\sin\frac{\theta}{v}+i\cos\frac{\theta}{v}\right]$$

$$z_1 = \sqrt[v]{\rho}\left[\sin\left(\frac{\theta}{v}+\frac{2\pi}{v}\right)+i\cos\left(\frac{\theta}{v}+\frac{2\pi}{v}\right)\right]$$

$$z_2 = \sqrt[v]{\rho}\left[\sin\left(\frac{\theta}{v}+\frac{4\pi}{v}\right)+i\cos\left(\frac{\theta}{v}+\frac{4\pi}{v}\right)\right]$$



$$z_{v-1} = \sqrt[v]{\rho}\left[\sin\left(\frac{\theta}{v}+(v-1)\frac{2\pi}{v}\right)+i\cos\left(\frac{\theta}{v}+(v-1)\frac{2\pi}{v}\right)\right].$$

Παρατηροῦμεν ὅτι πᾶσαι αἱ νιοσταὶ ρίζαι τοῦ αἱ ἔχουν τὸ αὐτὸ μέτρον, ἥτοι $|z_k| = \sqrt[v]{\rho}$, $k=0, 1, \dots, (v-1)$, καὶ δρίσματα τοιαῦτα, ώστε ἀπό τίνος ἀρχικῆς τιμῆς $\frac{\theta}{v}$ αὐξάνουν διαρκῶς κατὰ $\frac{2\pi}{v}$. Τοῦτο σημαίνει ὅτι, ἢν λάβωμεν τὰς εἰκόνας αὐτῶν $M_0, M_1, M_2, \dots, M_{v-1}$ εἰς τὸ μιγαδικὸν ἐπίπεδον, αὐταὶ θὰ κείνται ἐπὶ κύκλου κέντρου Ο καὶ ἀκτῖνος $\sqrt[v]{\rho}$, θὰ εἴναι δὲ κωρυφαὶ κανονικοῦ v -πολυγώνου ἔγγεγραμμένου εἰς τὸν κύκλον τοῦτον.

**§ 113. Έφαρμογαί τῶν ἀνωτέρω εἰς τὴν λύσιν διωνύμων ἔξι-
σώσεων.**

Παράδειγμα 1ον : Νὰ ἐπιλυθῇ ἡ ἔξισωσις : $x^v - 1 = 0$. (1)

Λύσις : Αὔτη γράφεται $x^v = 1$. Ἐπειδὴ $1 = 1$ (συν0 + iημ0), δ τύπος (4) τῆς § 111 δίδει ἀμέσως διὰ $v = v$, $\rho = 1$, $\theta = 0$:

$$x_k = \sigma v \frac{2k\pi}{v} + i \eta \mu \frac{2k\pi}{v}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, v-1. \quad (2)$$

Δι’ ἑκάστην τῶν τιμῶν αὐτῶν τοῦ k προκύπτει ἐκ τῆς (2) καὶ μία ρίζα τῆς ἔξισώσεως (1).

“Αρα ἡ (1) ἔχει ν ρίζας, αἱ ὄποιαι καλοῦνται νιοσταὶ ρίζαι τῆς μονάδος.

Διὰ $k = 0$ ἔχομεν ἐκ τῆς (2) τὴν ρίζαν $x_0 = 1$. Καὶ ἐπειδὴ κατὰ τὸν τύπον τοῦ De Moivre εἶναι :

$$\sigma v \frac{2k\pi}{v} + i \eta \mu \frac{2k\pi}{v} = \left(\sigma v \frac{2\pi}{v} + i \eta \mu \frac{2\pi}{v} \right)^k. \quad k \in \mathbb{N},$$

αἱ νιοσταὶ ρίζαι τῆς μονάδος εἶναι αἱ δυνάμεις :

$$1, \omega, \omega^2, \dots, \omega^{v-1},$$

ὅπου : $\omega = \sigma v \frac{2\pi}{v} + i \eta \mu \frac{2\pi}{v}$.

Σημ. Κάθε ρίζα x_k τῆς μονάδος, ἡ ὄποια ἔχει τὴν ίδιότητα νὰ δίδῃ τὰς ἀλλας ρίζας ὡς δυνάμεις αὐτῆς, καλεῖται ἀρχική ν-οστή ρίζα τῆς μονάδος. Π.χ. ἡ $x_1 = \sigma v \frac{2\pi}{v} + i \eta \mu \frac{2\pi}{v} \equiv \omega$ εἶναι ἀρχική ν-οστή ρίζα τῆς μονάδος, διότι :

$$x_1^0 = x_0, \quad x_1^1 = x_1, \quad x_1^2 = x_2, \quad x_1^3 = x_3, \quad \dots, \quad x_1^{v-1} = x_{v-1}.$$

Παράδειγμα 2ον : Νὰ ἐπιλυθῇ ἡ ἔξισωσις : $x^6 + 64i = 0$.

Λύσις : “Εχομεν :

$$x^6 = -64i = 64(-i) = 64 \left(\sigma v \left(-\frac{\pi}{2} \right) + i \eta \mu \left(-\frac{\pi}{2} \right) \right).$$

“Αρα ἡ τυχούσα ἕκτη ρίζα θὰ εἶναι κατὰ τὸν τύπον (4) τῆς μορφῆς :

$$x_k = \sqrt[6]{64} \left[\sigma v \left(\frac{-\frac{\pi}{2} + 2k\pi}{6} \right) + i \eta \mu \left(\frac{-\frac{\pi}{2} + 2k\pi}{6} \right) \right], \quad k = 0, 1, 2, 3, 4, 5.$$

Διὰ $k = 0$ εἶναι : $x_0 = 2 \left(\sigma v \frac{\pi}{12} - i \eta \mu \frac{\pi}{12} \right) = \sqrt{2 + \sqrt{3}} - i \sqrt{2 - \sqrt{3}}$.

Διὰ $k = 1$ εἶναι : $x_1 = 2 \left(\sigma v \frac{\pi}{4} + i \eta \mu \frac{\pi}{4} \right) = \sqrt{2}(1+i)$. κ.λ.π.

Παράδειγμα 3ον : Νὰ ἐπιλυθῇ ἡ ἔξισωσις : $z^3 = 1 + i\sqrt{3}$.

Λύσις. Θέτομεν πρῶτον τὸν $1 + i\sqrt{3}$ ὑπὸ τριγωνομετρικὴν μορφὴν. Εἰς τὴν προκειμένην περίπτωσιν ἔχομεν :

$$\rho = \sqrt{1^2 + 3} = 2 \quad \text{καὶ} \quad \theta = \operatorname{Arg}(1 + i\sqrt{3}) = \frac{\pi}{3},$$

ἄρα : $1 + i\sqrt{3} = \rho (\sigma v \theta + i \eta \mu \theta) = 2 \cdot \left(\sigma v \frac{\pi}{3} + i \eta \mu \frac{\pi}{3} \right)$.

Συνεπῶς ὁ τύπος (4) τῆς § 111 διὰ $v = 3$, $\rho = 2$, $\theta = \frac{\pi}{3}$ δίδει :

$$z_k = \sqrt[3]{2} \left[\sigma v \frac{\frac{\pi}{3} + 2k\pi}{3} + i \eta \mu \frac{\frac{\pi}{3} + 2k\pi}{3} \right] = \sqrt[3]{2} \cdot \left[\sigma v \frac{(6k+1)\pi}{9} + i \eta \mu \frac{(6k+1)\pi}{9} \right].$$

Έκ τοῦ τύπου τούτου διὰ $k = 0, 1, 2$ εύρισκομεν τὰς ζητουμένας ρίζας, ἵνα :

$$z_0 = \sqrt[3]{2} \left(\cos \frac{\pi}{9} + i \sin \frac{\pi}{9} \right), \quad z_1 = \sqrt[3]{2} \left(\cos \frac{7\pi}{9} + i \sin \frac{7\pi}{9} \right),$$

$$z_2 = \sqrt[3]{2} \left(\cos \frac{13\pi}{9} + i \sin \frac{13\pi}{9} \right).$$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

226. Νὰ τεθοῦν ὑπὸ τριγωνομετρικὴν μορφὴν οἱ κάτωθι μιγαδικοὶ ἀριθμοὶ :

α) $\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$, β) $-3 + 4i$, γ) $\sqrt{3} - 3i$, δ) $2 + 2\sqrt{3}i$, ε) $3\sqrt{3} + 3i$,

στ) $-\frac{1}{2} + \frac{1}{2}i\sqrt{3}$, ζ) $-\sqrt{3} + i$, η) $\frac{1+i\sqrt{3}}{-\sqrt{3}+i}$, θ) $1 + \cos \theta + i \sin \theta$.

227. Νὰ εύρεθῇ τὸ μέτρον καὶ τὸ δρισμα τοῦ :

$$\left[\frac{1+i+\sqrt{3}(1-i)}{1+i} \right]^3.$$

228. Δείξατε διὰ τῶν μιγαδικῶν ἀριθμῶν ὅτι : $2 \times (-3) = -6$ καὶ $(-2) \times (-3) = +6$.

229. Εάν ν φυσικὸς ἀριθμός, νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι :

(α). $(\cos \theta - i \sin \theta)^v = \cos(v\theta) - i \sin(v\theta)$

(β). $(\cos \theta + i \sin \theta)^{-v} = \cos(-v\theta) + i \sin(-v\theta)$.

230. Εάν $z = \cos \theta + i \sin \theta$ καὶ $v \in \mathbb{N}$, νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι :

$$z^v + z^{-v} = 2 \cos(v\theta)$$

$$z^v - z^{-v} = 2i \sin(v\theta).$$

231. Νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι :

α) $(1+i)^{12} = -64$, β) $(1+i)^{-6} = (2i)^{-3}$, γ) $(1+i)^{10} = 32i$,

δ) $(\sqrt{3}+i)^{150} = -2^{150}$, ε) $\left(\frac{\sqrt{3}+i}{2}\right)^{18} = \frac{\sqrt{3}+i}{2}$, στ) $\left(-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^{17} =$

$$= -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \zeta) \left(\frac{-1+i\sqrt{3}}{2}\right)^{3k} = 1 \quad \forall k \in \mathbb{Z}.$$

232. Νὰ ἐκφρασθῇ τὸ $\eta \omega^{\theta}$ συναρτήσει τοῦ ημθ καὶ τὸ $\sigma \nu \omega^{\theta}$ συναρτήσει τοῦ συνθ δι' ἐφαρμογῆς τοῦ τύπου τοῦ De Moivre.

233. Νὰ εύρεθοῦν τὰ ἔξαγαμένα :

α) $\left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^{24}$, β) $\left(\frac{-1+i\sqrt{3}}{2}\right)^8 + i^{288}$, γ) $(\cos 12^\circ + i \sin 12^\circ)^{10} - \frac{i\sqrt{3}}{2}$.

234. Νὰ ἐπιλυθοῦν αἱ κάτωθι ἔξισώσεις :

α). $x^3 = 1 - i\sqrt{3}$, β) $x^6 \pm 64 = 0$, γ) $4x^7 + 1 = 0$, δ) $x^3 + 8i = 0$,

ε). $x^{12} + 1 = 0$, στ) $x^6 = -8 - 8\sqrt{3}i$, ζ) $x^5 = -\sqrt{3} + i$, η) $3x^5 + 24x^2 = 0$.

235. Νὰ εύρεθοῦν αἱ ἑκται ρίζαι τοῦ : $\frac{1}{2}(\sqrt{3}-i)$.

236. Νὰ εύρεθοῦν αἱ τέταρται ρίζαι τοῦ : $-8 + 8i\sqrt{3}$.

237. Νὰ εύρεθῇ τὸ μέτρον καὶ τὸ δρισμα τοῦ ἀριθμοῦ $(1 + \cos \theta + i \sin \theta)^2$.

238. Δίδεται : $E = (1+i\sqrt{3})^8 + (1-i\sqrt{3})^8$. Δείξατε ὅτι : $E = -2^8$.

(Υπόδειξις : Νὰ γίνῃ χρῆσις τῆς τριγωνομετρικῆς μορφῆς τῶν μιγαδικῶν ἀριθμῶν).

239. Δείξατε ότι ο μιγαδικός άριθμός $z = \sigma u\theta + i \eta \mu$ δύναται να τεθή ύπο την μορφήν $z = \frac{1+i\lambda}{1-i\lambda}$, δημοσιεύοντας πραγματικός άριθμός. Νά δρισθή λ.

240. Νά δποδειχθή ότι :

$$\alpha) \quad (1+i)^v + (1-i)^v = 2^{\frac{v+2}{2}} \cdot \sigma v \frac{v\pi}{4}, \quad v \in \mathbb{N}$$

$$\beta) \quad (1+i)^v - (1-i)^v = i 2^{\frac{v+2}{2}} \cdot \eta v \frac{v\pi}{4}, \quad v \in \mathbb{N}.$$

241. Έάν ω_k , $k = 0, 1, 2, \dots, v-1$ είναι αι $v - \text{οσται}$ ρίζαι τής μονάδος, νά δποδειχθή ότι:

$$\alpha) \quad 1 + \omega_1 + \omega_2 + \dots + \omega_{v-1} = 0$$

$$\beta) \quad \omega_1 \omega_2 \omega_3 \dots \omega_{v-1} = 1.$$

242. Γράψατε τόν μιγαδικόν άριθμόν $1 + i\sqrt{3}$ ύπο τριγωνομετρικήν μορφήν και θείξατε ότι :

$$(1 + i\sqrt{3})^4 = -8 - 8i\sqrt{3}.$$

243. Νά άναλυθή τό ρητόν κλάσμα εις δημοτικά άπλων κλασμάτων :

$$\frac{1}{x^4 + 4}$$

*Υπόδειξις : Παρατηρήσατε ότι : $x^4 + 4 \equiv (x^2 - 2x + 2)(x^2 + 2x + 2)$.

244. Δείξατε ότι :

$$\frac{(\sin 70^\circ + i \eta 70^\circ)^5}{(\sin 40^\circ + i \eta 40^\circ)^6} = \frac{1}{2} (-\sqrt{3} + i).$$

245. Νά έπιλυθή (τριγωνομετρικώς) ή έξισωσις $x^6 + 64 = 0$. Νά σημειωθούν τά δρισμάτα τών 6 ρίζων. Πώς παριστάνονται γεωμετρικώς αι ρίζαι τής έξισώσεως ταύτης;

246. Νά προσδιορισθούν τά λ, μ, ινα δ μιγαδικός άριθμός : $\sqrt{2} (\sin 45^\circ + i \eta 45^\circ)$ είναι ρίζα τής έξισώσεως : $x^6 + 2x^5 + 3x^4 + \lambda x + \mu = 0$. Ποιαi αι λοιπά ρίζαι αύτής;

247. Νά εύρεθούν αι ρίζαι τής έξισώσεως :

$$\left(\frac{1+x}{1-x} \right)^v - 1 = 0.$$

248. Δείξατε ότι αι ρίζαι τής έξισώσεως :

$(1+z)^{2v} + (1-z)^{2v} = 0$ παρέχονται ύπο τής σχέσεως : $z = i \epsilon \phi \frac{2k+1}{4v} \pi$, δημοσιεύοντας τάς τιμάς : 0, 1, 2, ..., 2v-1.

—οίματα ίσα καὶ οἱ αριθμοὶ τῶν πραγμάτων ὁπλισθεῖσαί εἰσιν.
Αὐτοὶ δὲ οἱ πραγματικοὶ ἀριθμοὶ τῶν πραγμάτων εἰσὶν αἱ ἀριθμοὶ τῶν
πραγμάτων, προσαρτοῦσαι τὸν αὐτὸν αριθμόν τους στὸν αὐτὸν αριθμόν τους.
Αὐτοὶ δέ τοι οἱ πραγματικοὶ αριθμοὶ τῶν πραγμάτων εἰσὶν αἱ
κεφαλαῖαν τῶν πραγμάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ V

ΠΕΡΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

ΟΡΙΣΜΟΙ — ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

§ 114. Εἰσαγωγικαὶ ἔννοιαι.—α'). Διαστήματα. Ἐστωσαν α καὶ β πραγματικοὶ ἀριθμοὶ *) μὲν α < β· τότε καλοῦμεν :

1ον. «Ἀνοικτὸν διάστημα ἀπὸ α ἕως β» καὶ συμβολίζομεν τοῦτο μὲν (α, β) τὸ κάτωθι ὑποσύνολον τοῦ R :

$$(\alpha, \beta) \equiv \{ x \in R : \alpha < x < \beta \}.$$

Τὰ σημεῖα (δηλαδὴ οἱ πραγματικοὶ ἀριθμοὶ) α καὶ β καλοῦνται καὶ «ἄκρα τοῦ διαστήματος» (α, β), τὸ δὲ σημεῖον $\frac{\alpha + \beta}{2}$ «μέσον» ἢ ἄλλως «κέντρον» τοῦ διαστήματος. Παρατηροῦμεν ὅτι εἰς τὸ ἀνοικτὸν διάστημα (α, β) δὲν συμπεριλαμβάνονται τὰ ἄκρα α καὶ β τοῦ διαστήματος, ἥτοι α ∈ (α, β) καὶ β ∉ (α, β).

Παράδειγμα : (3, 8) ≡ { x ∈ R : 3 < x < 8 }

2ον. «Κλειστὸν διάστημα μὲν ἄκρα α, β» καὶ συμβολίζομεν τοῦτο μὲν [α, β] τὸ κάτωθι ὑποσύνολον τοῦ R :

$$[\alpha, \beta] \equiv \{ x \in R : \alpha \leq x \leq \beta \}.$$

Εἰς τοῦτο συμπεριλαμβάνονται καὶ τὰ δύο ἄκρα α καὶ β, ἥτοι α, β ∈ [α, β].

Παράδειγμα : [-1, +1] ≡ { x ∈ R : -1 ≤ x ≤ +1 }.

3ον. «Κλειστὸν ἀριστερά, ἀνοικτὸν δεξιὰ διάστημα μὲν ἄκρα α, β» καὶ συμβολίζομεν τοῦτο μὲν [α, β] τὸ κάτωθι ὑποσύνολον τοῦ R :

$$[\alpha, \beta) \equiv \{ x \in R : \alpha \leq x < \beta \}.$$

Εἰς τὸ [α, β) συμπεριλαμβάνεται μόνον τὸ ἀριστερὸν ἄκρον α, οὐχὶ ὅμως καὶ τὸ β, ἥτοι α ∈ [α, β), ἀλλὰ β ∉ [α, β).

* Ως γνωστὸν τὸ σύνολον τῶν ρητῶν (συμμέτρων) καὶ ἀρρήτων (ἀσυμμέτρων) καλεῖται σύνολον τῶν πραγματικῶν ἀριθμῶν. Τὸ σύνολον τοῦτο καλοῦμεν καὶ «εὐθεῖα τῶν πραγματικῶν ἀριθμῶν» (ἐάν θέλωμεν νὰ ἐκφρασθῶμεν μὲ τὴν γλῶσσαν τῆς Γεωμετρίας). οἱ πραγματικοὶ ἀριθμοὶ θεωροῦνται τότε ὡς σημεῖα τῆς εὐθείας. Διὰ τὰ σημεῖα χρησιμοποιοῦμεν τὰ αὐτὰ σύμβολα μὲ τοὺς πραγματικούς ἀριθμούς. Ἡ ταυτοποίησις αὐτῆς τῶν πραγματικῶν ἀριθμῶν μὲ τὰ σημεῖα μιᾶς εὐθείας βασίζεται εἰς τὸ ἀξίωμα τῆς ἀντιστοιχίας τῆς Ἀναλυτικῆς Γεωμετρίας. Κατὰ τὸ ἀξίωμα τοῦτο μεταξὺ τῶν πραγματικῶν ἀριθμῶν καὶ τῶν σημείων ἐνὸς ἀξονος ὑφίσταται μία ὀμφιμονοσήμαντος ἀντιστοιχία, δηλαδὴ εἰς ἕκαστον πραγματικὸν ἀριθμὸν ἀντιστοιχεῖ ἐν δρισμένον σημεῖον τοῦ ἀξονος καὶ ἀντιστρόφως.

4ον. «'Ανοικτὸν ἀριστερά, κλειστὸν δεξιὰ διάστημα μὲ ἄκρα α, β » καὶ συμβολίζομεν τοῦτο μὲ $(\alpha, \beta]$ τὸ κάτωθι ύποσύνολον τοῦ \mathbf{R} :

$$(\alpha, \beta] \equiv \{ x \in \mathbf{R} : \alpha < x \leq \beta \}.$$

Εἰς τοῦτο συμπεριλαμβάνεται **μόνον** τὸ δεξιὸν ἄκρον β , οὐχὶ ὅμως καὶ τὸ ἀριστερόν, ἢτοι $\alpha \in (\alpha, \beta]$, ἀλλὰ $\beta \in (\alpha, \beta]$.

Παράδειγμα: $(0, 1] \equiv \{ x \in \mathbf{R} : 0 < x \leq 1 \}$.

*Ἐπὶ τῆς εὐθείας τῶν πραγματικῶν ἀριθμῶν τὰ ὡς ἄνω διαστήματα παρίστανται μὲ εὐθύγραμμα τμήματα ὡς κάτωθι:

$$(\alpha, \beta) : \text{---} \circ \text{---} \circ \text{---} [\alpha, \beta) : \text{---} \bullet \text{---} \circ \text{---} \circ \text{---} \bullet \text{---} \circ \text{---} \circ \text{---}$$

$$[\alpha, \beta] : \text{---} \bullet \text{---} \bullet \text{---} (\alpha, \beta] : \text{---} \circ \text{---} \bullet \text{---} \circ \text{---} \bullet \text{---} \circ \text{---} \bullet \text{---}$$

Κατ' ἐπέκτασιν τῶν ἄνωτέρω διαστημάτων, ἔχομεν καὶ τὰ ἀκόλουθα διαστήματα:

$$(-\infty, \alpha) \equiv \{ x \in \mathbf{R} : x < \alpha \} : \text{---} \leftarrow \bullet \text{---}$$

$$(-\infty, \alpha] \equiv \{ x \in \mathbf{R} : x \leq \alpha \} : \text{---} \leftarrow \bullet \text{---} \circ \text{---} \bullet \text{---}$$

$$(\beta, +\infty) \equiv \{ x \in \mathbf{R} : \beta < x \} : \text{---} \circ \text{---} \bullet \text{---} \beta \text{---} \rightarrow$$

$$[\beta, +\infty) \equiv \{ x \in \mathbf{R} : \beta \leq x \} : \text{---} \bullet \text{---} \circ \text{---} \rightarrow$$


Τὰ δποια καλοῦνται «ἀπέραντα» (ἀριστερά, ὡς τὰ δύο πρῶτα, ἀντιστοίχως δεξιά, ὡς τὰ δύο τελευταῖα), ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὰ προηγούμενα τὰ δποια καλοῦνται «πεπερασμένα».

Τὰ διαστήματα παρίστανται ἀντιστοίχως ὑπὸ τῶν δεξιῶν σχημάτων.

*Υπάρχουν ἐν ὅλῳ ἐννέᾳ τύποι διαστημάτων. *Ἐνίστε θὰ γράφωμεν: $\mathbf{R} \equiv (-\infty, +\infty)$. Εἰς τὰ ἐπόμενα θὰ συμβολίζωμεν συχνὰ τὰ διαστήματα ἐν \mathbf{R} μὲ τὸ γράμμα Δ .

Σημ. Τὰ σύμβολα $-\infty$ (πλὴν ἀπειρον) καὶ $+\infty$ (σὺν ἀπειρον) δὲν παριστάνουν πραγματικοὺς ἀριθμούς. Ταῦτα χρησιμοποιοῦνται ἀνωτέρω μόνον πρὸς εύκολιν εἰς τὸν συμβολισμόν.

β'). Περιοχὴ σημείου ἐν \mathbf{R} . *Ἐστω ἐν σημεῖον $\alpha \in \mathbf{R}$ καὶ εἰς θετικὸς ἀριθμὸς ($\epsilon > 0$). Κάθε ἀνοικτὸν διάστημα τῆς μορφῆς $(\alpha - \epsilon, \alpha + \epsilon)$ καλεῖται «περιοχὴ τοῦ σημείου α μὲ κέντρον τὸ α καὶ ἀκτῖνα ϵ .



Γενικώτερον: «Περιοχὴ ἐνὸς σημείου ξ » καλεῖται κάθε ἀνοικτὸν διάστημα (α, β) τὸ δποιον περιέχει τὸ σημεῖον ξ , ἢτοι $\xi \in (\alpha, \beta)$.

Ούτω, λ.χ., τὸ διάστημα $(1, 2)$ εἶναι περιοχὴ τοῦ $\sqrt{2}$, διότι $\sqrt{2} \in (1, 2)$.

γ'). Ἀπόστασις πραγματικοῦ ἀριθμοῦ ἀπὸ ἄλλον. Ἐστωσαν $x \in \mathbb{R}$ καὶ $y \in \mathbb{R}$ Καλοῦμεν «ἀπόστασιν τοῦ x ἀπὸ τοῦ y » τὸν μὴ ἀρνητικὸν ἀριθμὸν $|x - y|$, συμβολίζομεν δὲ ταῦτην μὲν $d(x, y)$. Ὡστε εἶναι :

$$d(x, y) =_{\text{օր}} |x - y| \quad \forall x \in \mathbb{R} \quad \text{καὶ} \quad \forall y \in \mathbb{R}.$$

Αὕτη ἔχει τὰς ἔξης ἰδιότητας :

$$d_1 : \quad d(x, y) \geq 0 \quad \text{καὶ} \quad d(x, y) = 0 \iff x = y$$

$$d_2 : \quad d(x, y) = d(y, x) \quad (\text{συμμετρικὴ ἰδιότητς})$$

$$d_3 : \quad d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y) \quad (\text{τριγωνικὴ ἰδιότητς}).$$

*Από δε εἰς ις. Αἱ d_1 καὶ d_2 εἶναι προφανεῖς, ἐκ τοῦ δρισμοῦ τῆς $d(x, y)$ καὶ τῶν γνωστῶν ἰδιοτήτων τῶν ἀπολύτων τιμῶν. Θά ἀποδείξωμεν τὴν d_3 .

*Ἀπὸ τὴν γνωστὴν ἰδιότητα (τοῦ ἀθροίσματος) τῶν ἀπολύτων τιμῶν ἔχομεν :

$$d(x, y) = |x - y| = |(x - z) + (z - y)| \leq |x - z| + |z - y| = d(x, z) + d(z, y).$$

Σημείωσις. Τὸ σύνολον \mathbb{R} τῶν πραγματικῶν ἀριθμῶν, μὲ τὴν ἀπόστασιν d , ὡς αὔτη ὠρίσθη ἀνωτέρω, λέγομεν ὅτι εἶναι εἰς «μετρικὸς χώρος» καὶ γράφομεν (\mathbb{R}, d) . Γενικῶς θὰ λέγωμεν ὅτι : ἐν σύνολον E εἶναι εἰς μετρικὸς χῶρος τότε, καὶ μόνον τότε, ἂν εἰς κάθε ζεῦγος (x, y) στοιχείων αὐτοῦ ἀντιστοιχῇ εἴται πραγματικὸς ἀριθμὸς $d(x, y)$, δοποῖος καλεῖται ἀπόστασις τῶν $x \in E, y \in E$ καὶ ὅστις πληροῖ τὰς ἀνωτέρω τρεῖς ἰδιότητας d_1, d_2, d_3 .

Ἀσκησις. Ἐὰν $d(x, y)$ παριστῇ τὴν ἀπόστασιν τοῦ $x \in \mathbb{R}$ ἀπὸ τοῦ $y \in \mathbb{R}$ δείξατε ὅτι καὶ ἡ $d^(x, y) = \frac{d(x, y)}{1 + d(x, y)}$ ἔχει τὰς ἀνωτέρω ἰδιότητας d_1, d_2, d_3 , ἥτοι, ὅτι καὶ ἡ $d^*(x, y)$ εἶναι ἐπίσης μία ἀπόστασις ἐπὶ τοῦ \mathbb{R} .

δ'). Μῆκος διαστήματος. Ἐστω Δ ἐν διάστημα ($\in \mathbb{R}$) μὲ ἄκρα α, β . «ἡ ἀπόστασις $|\alpha - \beta|$ καλεῖται τὸ μῆκος τοῦ διαστήματος Δ » καὶ συμβολίζεται μὲ $\mu(\Delta)$. Ὡστε εἶναι :


$$\mu(\Delta) =_{\text{օր}} |\alpha - \beta| = d(\alpha, \beta).$$

Ούτω διὰ τὴν περιοχὴν $(\alpha - \epsilon, \alpha + \epsilon)$ ἔχομεν ὡς μῆκος τῆς τὸ 2ϵ .

Μία χρήσιμος παρατήρησις εἶναι ή ἔξης : Ἐστω $x_0 \in \mathbb{R}$ καὶ $(x_0 - \epsilon, x_0 + \epsilon)$ ἡ περιοχὴ τοῦ x_0 μὲ ἀκτῖνα ϵ . Τότε ἴσχύει :

$$x \in (x_0 - \epsilon, x_0 + \epsilon) \iff |x - x_0| < \epsilon$$

Πρὸς ἐπιβεβαίωσιν παρατηρήσατε καὶ τὴν κάτωθι εἰκόνα :



Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ

§ 115. "Ορισμοί.— Γνωρίζομεν ήδη, άπό τά μαθήματα τῶν προηγουμένων τάξεων, τὴν ἔννοιαν τῆς συναρτήσεως· ἡς ἐπαναλάβωμεν ἐνταῦθα τὸν δριμὸν τῆς:

Καλοῦμεν συνάρτησιν μὲ πεδίον δρισμοῦ ἐνα σύνολον A καὶ πεδίον τιμῶν ἐνα σύνολον B (τὰ A, B ὑποτίθενται $\neq \emptyset$) κάθε μονοσήμαντον ἀπεικόνισιν f τοῦ A εἰς τὸ B . Γράφομεν δέ:

$$f : A \longrightarrow B \quad \text{ἢ καὶ ἄλλως} \quad A \ni x \longrightarrow f(x) \in B.$$

"Εστω τώρα μία συνάρτησις α μὲ πεδίον δρισμοῦ τὸ σύνολον N τῶν φυσικῶν ἀριθμῶν καὶ τιμὰς ἐν B , αὐτῇ θὰ συμβολισθῇ οὕτω:

$$\alpha : N \longrightarrow B \quad \text{ἢ καὶ ἄλλως} \quad N \ni n \longrightarrow \alpha(n) \in B.$$

Κάθε συνάρτησις ὡς ἡ ἀνωτέρω α καλεῖται: «μία ἀκολουθία στοιχείων τοῦ συνόλου B ». Ειδικῶς, ἂν $B \subset R$ ἡ ἀκολουθία α καλεῖται: «ἀκολουθία πραγματικῶν ἀριθμῶν».

"Ωστε: ἀκολουθία πραγματικῶν ἀριθμῶν εἶναι κάθε συνάρτησις μὲ πεδίον δρισμοῦ τὸ σύνολον N τῶν φυσικῶν ἀριθμῶν καὶ τιμὰς εἰς τὸ σύνολον R τῶν πραγματικῶν ἀριθμῶν, δηλαδὴ μία μονοσήμαντος ἀπεικόνισις τοῦ N εἰς τὸ R .

Τὴν τιμὴν $\alpha(n)$ μιᾶς ἀκολουθίας α συνηθίζομεν νὰ τὴν συμβολίζωμεν μὲ α_n , γράφοντες δηλαδὴ τὸν φυσικὸν ἀριθμὸν n ὡς κάτω δείκτην τοῦ α . Αἱ τιμαὶ μιᾶς ἀκολουθίας α καλοῦνται «ὅροι» αὐτῆς καὶ δυνάμεθα νὰ καταχωρίσωμεν αὐτοὺς εἰς ἐνα πίνακα ὡς κάτωθι:

1	2	3	n	...
α_1	α_2	α_3	α_n	...

εἰς τὸν ὅποιον παραλείπεται συνήθως ἡ πρώτη γραμμὴ καὶ γράφονται μόνον οἱ ὄροι τῆς ἀκολουθίας, ἥτοι:

$$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_n, \dots \tag{1}$$

"Ο ὄρος α_1 καλεῖται πρῶτος ὄρος τῆς ἐν λόγῳ ἀκολουθίας, ὁ α_2 δεύτερος ὄρος καὶ γενικῶς ὁ α_n νιοστὸς ἢ γενικὸς ὄρος τῆς ἀκολουθίας (1).

Εἰς τὰ ἐπόμενα θὰ χρησιμοποιῶμεν πολλάκις τὴν ἀκολουθίαν ἔκφρασιν:

«ἡ ἀκολουθία $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_n, \dots$ »

Δι' αὐτῆς ἔννοοῦμεν, ὅτι θεωροῦμεν τὴν ἀκολουθίαν $\alpha : N \longrightarrow R$ δριζομένην οὕτω:

$$\alpha(n) = \alpha_n \quad \text{διὰ κάθε } n \in N.$$

Συντομώτερον μία ἀκολουθία παρίσταται καὶ οὕτω:

$$\alpha_n, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad \text{ἢ καὶ ἄλλως } \alpha_n, \quad n \in N.$$

Θὰ δώσωμεν τώρα μερικὰ παραδείγματα ἀκολουθιῶν πραγματικῶν ἀριθμῶν.

1. Ή άκολουθία τῶν φυσικῶν ἀριθμῶν, ἢτοι ἡ άκολουθία:

$$1, 2, 3, \dots, v, \dots$$

τῆς δποίας νιοστὸς ὅρος εἶναι ὁ ἀριθμὸς v , ἢτοι $\alpha_v = v$.

2. Ή άκολουθία :

$$1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{v}, \dots$$

τῆς δποίας νιοστὸς ὅρος εἶναι ὁ ἀριθμὸς $\frac{1}{v}$, ἢτοι $\alpha_v = \frac{1}{v}$.

3. Ή άκολουθία : $1, 1, 1, \dots, 1, \dots$

4. Ή άκολουθία : c, c, c, \dots, c, \dots (Ἐνθα $c \in \mathbb{R}$).

Ἡ άκολουθία τοῦ παραδείγματος 4 καλεῖται: «ἡ σταθερὰ άκολουθία $a_v = c$, $v = 1, 2, \dots$ ». «Οθεν ἡ άκολουθία τοῦ παραδείγματος 3, εἶναι ἡ σταθερὰ άκολουθία $\alpha_v = 1$, $v = 1, 2, \dots$

5. Ή άκολουθία : $-1, \frac{1}{2}, -\frac{1}{3}, \dots, (-1)^v \cdot \frac{1}{v}, \dots$

6. Εὰν ἀπεικονίσωμεν τοὺς περιπτοὺς φυσικούς ἀριθμούς εἰς τὸν ἀριθμὸν 0 καὶ τοὺς ἀρτίους φυσικούς εἰς τὸν ἀριθμὸν 1, θὰ προκύψῃ ἡ άκολουθία :

$$0, 1, 0, 1, \dots, 0, 1, \dots$$

Συνήθως ἡ ὡς ἄνω άκολουθία συμβολίζεται ὡς ἔξης :

$$\text{Ν} \rightarrow v \longrightarrow \alpha_v = \begin{cases} 1, & \text{ἄν } v \text{ ἀρτίος} \\ 0, & \text{ἄν } v \text{ περιπτός.} \end{cases}$$

7. Ή άκολουθία : $\alpha_v = \frac{2v}{v+3}$, $v = 1, 2, \dots$, γράφεται ἐκτενῶς :

$$\frac{2}{4}, \frac{4}{5}, \frac{6}{6}, \frac{8}{7}, \dots, \frac{2v}{v+3}, \dots$$

Παρατήρησις. Ἐνίστε ὁ δείκτης v τοῦ αὐ λαμβάνεται οὔτως, ώστε νὰ διατρέχῃ τὰς τιμάς : 0, 1, 2, 3, ..., δπότε ἡ άκολουθία γράφεται :

$$\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{v-1}, \alpha_v, \dots$$


ὁ δὲ ὅρος α_{v-1} εἶναι τότε ὁ «νιοστὸς ὅρος» τῆς άκολουθίας.

§ 116. Γραφικὴ παράστασις άκολουθίας. — Ξετω α_v , $v = 1, 2, \dots$ μία άκολουθία πραγματικῶν ἀριθμῶν. Τὸ διάγραμμα αὐτῆς εἶναι τότε τὸ σύνολον :

$$\{(1, \alpha_1), (2, \alpha_2), \dots, (v, \alpha_v), \dots\} \equiv \Sigma$$

τὸ δποίον εἶναι ὑποσύνολον τοῦ καρτεσιανοῦ γινομένου $\mathbb{N} \times \mathbb{R}$ καὶ οὐχὶ τοῦ συνόλου τῶν πραγματικῶν ἀριθμῶν. Τὰ στοιχεῖα τοῦ συνόλου Σ είνοι (προφανῶς) διάφορα μεταξύ των καὶ παρίστανται διὰ «μεμονωμένων» σημείων τοῦ καρτεσιανοῦ ἐπιπέδου $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$. Τὸ σύνολον αὐτῶν τῶν μεμονωμένων σημείων εἶναι ἡ γραφικὴ παράστασις τῆς άκολουθίας α_v , $v = 1, 2, \dots$


Εις τὸ κάτωθι σχῆμα παρίστανται ἐννέα ὄροι μιᾶς ἀκολουθίας α_v , $v = 1, 2, \dots$



Σχ. 8

Ἐὰν θεωρήσωμεν μόνον τὰς τεταγμένας τῶν σημείων τοῦ ἐπιπέδου, δι' ὧν παρίσταται γραφικῶς ἡ ἀκολουθία α_v , $v = 1, 2, \dots$, ἔχομεν τὴν συνήθη ἐπὶ ἑνὸς μόνον ἄξονος παράστασιν τῆς ἀκολουθίας α_v , $v = 1, 2, \dots$

Οὕτως ἐκ τοῦ ἀνωτέρῳ σχήματος ἔχομεν :



ΑΣΚΗΣΕΙΣ

249. Γράψατε τοὺς πέντε πρώτους ὄρους τῆς ἀκολουθίας : $\alpha_v = \frac{2v+1}{v^2}$, $v = 1, 2, \dots$

250. Γράψατε τοὺς ὅκτω πρώτους ὄρους τῆς ἀκολουθίας : $\beta_v = \frac{1}{v+2}$, $v = 1, 2, \dots$

251. Γράψατε τὴν ἀκολουθίαν τῶν ἀρτίων φυσικῶν ἀριθμῶν : 2, 4, 6, 8, ... ὑπὸ τὴν μορφὴν α_v , $v = 1, 2, \dots$

252. Γράψατε τὴν ἀκολουθίαν τῶν περιττῶν φυσικῶν ἀριθμῶν : 1, 3, 5, 7, ... ὑπὸ τὴν μορφὴν β_v , $v = 1, 2, \dots$

253. Γράψατε τοὺς ἑπτά πρώτους ὄρους τῆς ἀκολουθίας :

$$\alpha_v = \frac{(-1)^v}{v} + \frac{v}{2v+1}, \quad v = 1, 2, \dots$$

254. Ὁμοίως γράψατε τοὺς ἐννέα πρώτους ὄρους τῆς ἀκολουθίας :

$$\alpha_v = (-1)^v \cdot \frac{v+1}{v}, \quad v = 1, 2, \dots$$

255. Ὁμοίως γράψατε τοὺς πέντε πρώτους ὄρους τῆς ἀκολουθίας :

$$\alpha_v = \frac{(-1)^{v-1}}{2v-1}, \quad v = 1, 2, \dots$$

§ 117. Φραγμένη άκολουθία.—α'). Εστω ή άκολουθία $\alpha_v = \frac{1}{v}$, $v=1,2,\dots$

έκτενῶς ή : $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{v}, \dots$

Διὰ τὴν ἀνωτέρω άκολουθίαν παρατηροῦμεν ὅτι ισχύει :

$$\alpha_v = \frac{1}{v} \leqq 1 \quad \text{διὰ κάθε } v = 1, 2, \dots$$

ἡτοι, ὅλοι οἱ ὄροι τῆς άκολουθίας ταύτης είναι μικρότεροι ἢ ἵσοι τοῦ πραγματικοῦ ἀριθμοῦ 1· λέγομεν δὲ ὅτι ή άκολουθία αὕτη είναι «φραγμένη πρὸς τὰ ἄνω» ἀπὸ τὸν ἀριθμὸν 1.

Γενικῶς : Μία άκολουθία πραγματικῶν ἀριθμῶν a_v , $v=1, 2, \dots$ καλεῖται φραγμένη πρὸς τὰ ἄνω ἐν \mathbb{R} τότε, καὶ μόνον τότε, ἂν ύπάρχῃ πραγματικὸς ἀριθμὸς s τοιοῦτος, ὥστε νὰ ισχύῃ :

$$\alpha_v \leqq s \quad \forall v \in \mathbb{N}.$$

Ο ἀριθμὸς s καλεῖται «ἄνω φράγμα τῆς άκολουθίας a_v , $v=1, 2, \dots$ ». Οὐτως, ὁ ἀριθμὸς 1 είναι ἄνω φράγμα τῆς άκολουθίας $\alpha_v = \frac{1}{v}$, $v=1, 2, \dots$

Προφανῶς, ἀν s είναι ἐν ἄνω φράγμα μιᾶς άκολουθίας, τότε καὶ κάθε ἀλλος πραγματικὸς ἀριθμὸς μεγαλύτερος τοῦ s είναι ἐπίσης ἄνω φράγμα τῆς άκολουθίας.

β'). Ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὰς άκολουθίας, αἱ ὄποιαι είναι φραγμέναι πρὸς τὰ ἄνω ἐν \mathbb{R} , ύπαρχουν άκολουθίαι, τῶν ὄποιων ὅλοι οἱ ὄροι είναι μεγαλύτεροι ἢ ἵσοι ἐνὸς πραγματικοῦ ἀριθμοῦ· λ.χ. ή άκολουθία $\alpha_v = 2v$, $v=1, 2, \dots$, έκτενῶς :

$$2, 4, 6, 8, \dots, 2v, \dots$$

Διὰ τὴν άκολουθίαν ταύτην παρατηροῦμεν ὅτι ισχύει :

$$2 \leqq \alpha_v = 2v \quad \text{διὰ κάθε } v = 1, 2, \dots,$$

λέγομεν δὲ ὅτι ή άκολουθία αὕτη είναι «φραγμένη πρὸς τὰ κάτω» ἀπὸ τὸν ἀριθμὸν 2. Γενικῶς : Μία άκολουθία πραγματικῶν ἀριθμῶν a_v , $v=1, 2, \dots$ καλεῖται φραγμένη πρὸς τὰ κάτω ἐν \mathbb{R} τότε, καὶ μόνον τότε, ἂν ύπάρχῃ πραγματικὸς ἀριθμὸς σ τοιοῦτος, ὥστε νὰ ισχύῃ :

$$\sigma \leqq \alpha_v = 2v \quad \forall v \in \mathbb{N}.$$

Ο ἀριθμὸς σ καλεῖται «κάτω φράγμα τῆς άκολουθίας a_v , $v=1, 2, \dots$ ».

γ'). Τέλος ύπαρχουν άκολουθίαι, αἱ ὄποιαι είναι καὶ πρὸς τὰ ἄνω καὶ πρὸς τὰ κάτω φραγμέναι ἐν \mathbb{R} · λ.χ. ή άκολουθία $\alpha_v = \frac{1}{v}$, $v=1, 2, \dots$, διότι ισχύει :

$$0 \leqq \alpha_v = \frac{1}{v} \leqq 1 \quad \forall v \in \mathbb{N}$$

ἥτοι, ὅλοι οἱ ὄροι της ἀνήκουν εἰς τὸ κλειστὸν διάστημα $[0, 1]$, λέγομεν δὲ εἰς τὴν περίπτωσιν αὕτην, ὅτι ή άκολουθία αὕτη είναι «φραγμένη».

Γενικῶς : Μία ἀκολουθία πραγματικῶν ἀριθμῶν a_v , $v = 1, 2, \dots$ καλεῖται φραγμένη ἐν \mathbf{R} τότε, καὶ μόνον τότε, ἂν ἡ ἀκολουθία αὕτη εἶναι καὶ πρὸς τὰ ἄνω καὶ πρὸς τὰ κάτω φραγμένη ἐν \mathbf{R} , ἢτοι, ἂν σ εἶναι ἐν ἀνωφέρουσα φράγμα τῆς ἀκολουθίας a_v , $v = 1, 2, \dots$ καὶ σ τὸ ἀντίστοιχον κάτω φράγμα, τότε ἴσχύει :

$$\sigma \leqq a_v \leqq s \quad \text{διὰ κάθε } v = 1, 2, \dots \quad (1)$$

"Αν τώρα φ εἶναι ἀριθμὸς μεγαλύτερος ἢ ἵσος τῶν $|\sigma|$ καὶ $|s|$, τότε ἡ (1) συνεπάγεται, ἀφ' ἐνὸς μέν :

$$\begin{aligned} \text{ἀφ' ἔτερου δέ :} \quad a_v &\leqq s \leqq |\sigma| \leqq \phi \quad \forall v \in \mathbf{N} \\ &\alpha_v \geqq \sigma \geqq -|\sigma| \geqq -\phi \quad \forall v \in \mathbf{N}. \end{aligned}$$

"Αρα ἴσχυει τότε :

$$\begin{aligned} -\phi &\leqq a_v \leqq \phi \quad \forall v \in \mathbf{N} \\ \text{ἢ ἰσοδυνάμως :} \quad |\alpha_v| &\leqq \phi \quad \forall v \in \mathbf{N}. \end{aligned} \quad (2)$$

'Αλλὰ καὶ ἀντιστρόφως, ἂν ἴσχύῃ ἡ (3), τότε προφανῶς ἡ ἀκολουθία a_v , $v = 1, 2, \dots$ εἶναι φραγμένη, διότι ἡ (3) εἶναι ἰσοδύναμος πρὸς τὴν (2). 'Εδείχθη λοιπὸν ὅτι :

Μία ἀκολουθία πραγματικῶν ἀριθμῶν a_v , $v = 1, 2, \dots$ εἶναι φραγμένη ἐν \mathbf{R} (ἢ καὶ ἄλλως «ἀπόλντως φραγμένη ἐν \mathbf{R} ») τότε, καὶ μόνον τότε, ἂν ὑπάρχῃ πραγματικὸς ἀριθμὸς φ τοιοῦτος, ὥστε νὰ ἴσχυῃ :

$$|\alpha_v| \leqq \varphi \quad \text{διὰ κάθε } v = 1, 2, \dots$$

'Ο ἀριθμὸς φ καλεῖται φράγμα, ἀκριβέστερον «ἀπόλντον φράγμα» τῆς ἀκολουθίας a_v , $v = 1, 2, \dots$ ἐν \mathbf{R} .

Φραγμένη ἀκολουθία εἶναι π.χ. ἢ $\frac{2\eta\mu\nu}{v^3}$, $v = 1, 2, \dots$, διότι ἴσχυει :

$$\left| \frac{2\eta\mu\nu}{v^3} \right| = \frac{2|\eta\mu\nu|}{v^3} \leqq \frac{2}{v^3} \leqq 2 \quad \text{διὰ κάθε } v = 1, 2, \dots$$

'Ομοίως ἡ ἀκολουθία :

$$a_v = \frac{4\sigma\nu 3v}{5v}, \quad v = 1, 2, \dots, \quad \text{διότι :}$$

$$|\alpha_v| = \left| \frac{4\sigma\nu 3v}{5v} \right| = \frac{4|\sigma\nu 3v|}{5v} \leqq \frac{4}{5} \cdot \frac{1}{v} \leqq \frac{4}{5} \quad \text{διὰ κάθε } v = 1, 2, \dots$$

'Αντιθέτως αἱ ἀκολουθίαι :

$$\begin{aligned} &1, 4, 9, 16, \dots, v^2, \dots \\ \text{καὶ} \quad &10, 10^2, 10^3, \dots, 10^v, \dots \end{aligned}$$

Δὲν εἶναι φραγμέναι (διατί ;).

§ 118. "Εστω μία ἀκολουθία πραγμ. ἀριθμῶν a_v , $v = 1, 2, \dots$, π.χ. ἡ ἀκολουθία $a_v = \frac{1}{v}$, $v = 1, 2, \dots$ καὶ μία συνθήκη π.χ. ἢ : $a_v < \frac{1}{998}$. παρατηροῦμεν

ὅτι, ἂν $v = 1, 2, 3, \dots, 998$ ἦτοι, ἂν $v \in \{1, 2, 3, \dots, 998\}$, ἡ συνθήκη $a_v < \frac{1}{998}$

δὲν πληροῦται, ἀντιθέτως ἂν $v = 999, 1000, 1001, \dots$, ἔτοι ἂν καλέσωμεν $v_0 \equiv 999$, τότε διὰ κάθε δείκτην $v \geq v_0 = 999$ ή συνθήκη: $\alpha_v = \frac{1}{v} < \frac{1}{998}$ πληροῦται παρὰ τοῦ ὄρου α_v , λέγομεν δὲ εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν ὅτι: «τελικῶς ὅλοι οἱ ὅροι τῆς ἀκολουθίας $\alpha_v = \frac{1}{v}$, $v = 1, 2, \dots$ πληροῦν τὴν ὡς ἄρα συνθήκην».

Γενικῶς: ἂν α_v , $v = 1, 2, \dots$ είναι μία ἀκολουθία πραγματικῶν ἀριθμῶν, θὰ λέγωμεν: «τελικῶς ὅλοι οἱ ὅροι τῆς ἀκολουθίας α_v , $v = 1, 2, \dots$ πληροῦν μίαν συνθήκην ἢ ἰδιότητα» τότε, καὶ μόνον τότε, ἂν ἡ συνθήκη ἢ ἡ ἰδιότης πληροῦται παρὰ τοῦ ὄρου α_v διὰ κάθε δείκτην $v \in \mathbb{N}$ ἐξαιρέσει ἐνὸς $\pi \in \varrho \text{ a } \sigma \mu \in \nu$ τονόλου δεικτῶν, δηλαδὴ τότε, καὶ μόνον τότε, ἂν ὑπάρχῃ εἰς δείκτης $v_0 \in \mathbb{N}$ τοιοῦτος, ὥστε διὰ κάθε δείκτην $v \geq v_0$, ὁ ὅρος α_v πληροῦ τὴν συνθήκην ἢ ἰδιότητα ταύτην.

§ 119. "Εστωσαν δύο ἀκολουθίαι: α_v , $v = 1, 2, \dots$ καὶ β_v , $v = 1, 2, \dots$ ἐκτενῶς αἱ:

$$\alpha_1, \quad \alpha_2, \quad \alpha_3, \dots, \quad \alpha_v, \dots$$

$$\beta_1, \quad \beta_2, \quad \beta_3, \dots, \quad \beta_v, \dots$$

Μεταξὺ αὐτῶν δρίζονται τὰ κάτωθι:

'Ισοτης. Αἱ α_v , $v = 1, 2, \dots$ καὶ β_v , $v = 1, 2, \dots$ καλοῦνται ἵσαι τότε, καὶ μόνον τότε, ἂν ίσχύῃ: $\alpha_v = \beta_v$ διὰ κάθε $v \in \mathbb{N}$.

"Αθροισμα τῆς α_v , $v = 1, 2, \dots$ καὶ β_v , $v = 1, 2, \dots$ καλεῖται ἡ ἀκολουθία $(\alpha_v + \beta_v)$, $v = 1, 2, \dots$, δηλαδὴ ἡ: $\alpha_1 + \beta_1, \alpha_2 + \beta_2, \alpha_3 + \beta_3, \dots, \alpha_v + \beta_v, \dots$

Διαφορὰ τῆς α_v , $v = 1, 2, \dots$ μείον β_v , $v = 1, 2, \dots$ καλεῖται ἡ ἀκολουθία $\alpha_v - \beta_v$, $v = 1, 2, \dots$, δηλαδὴ ἡ: $\alpha_1 - \beta_1, \alpha_2 - \beta_2, \dots, \alpha_v - \beta_v, \dots$

Γινόμενον ἐνὸς πραγματικοῦ ἀριθμοῦ ξ ἐπὶ τὴν ἀκολουθίαν α_v , $v = 1, 2, \dots$ καλεῖται ἡ ἀκολουθία: $\xi \alpha_v$, $v = 1, 2, \dots$, ἐκτενῶς ἡ ἀκολουθία:

$$\xi \alpha_1, \xi \alpha_2, \dots, \xi \alpha_v, \dots$$

Γινόμενον τῆς α_v , $v = 1, 2, \dots$ ἐπὶ τὴν β_v , $v = 1, 2, \dots$ καλεῖται ἡ ἀκολουθία $\alpha_v \beta_v$, $v = 1, 2, \dots$, δηλαδὴ ἡ: $\alpha_1 \beta_1, \alpha_2 \beta_2, \dots, \alpha_v \beta_v, \dots$

Πηλίκον τῆς α_v , $v = 1, 2, \dots$ διὰ β_v , $v = 1, 2, \dots$ μὲν $\beta_v \neq 0 \quad \forall v \in \mathbb{N}$, καλεῖται ἡ ἀκολουθία, ἡ ὅποια ἔχει ὄρους τὰ πηλίκα τῶν ἀντιστοίχων ὄρων τῶν ἐν λόγῳ ἀκολουθιῶν, δηλαδὴ ἡ ἀκολουθία $\frac{\alpha_v}{\beta_v}$, $v = 1, 2, \dots$ ἐκτενῶς ἡ:

$$\frac{\alpha_1}{\beta_1}, \quad \frac{\alpha_2}{\beta_2}, \quad \dots, \quad \frac{\alpha_v}{\beta_v}, \quad \dots$$

Τετραγωνικὴ ρίζα ἀκολουθίας α_v , $v = 1, 2, \dots$ μὲν $\alpha_v \geq 0 \quad \forall v \in \mathbb{N}$, καλεῖται ἡ ἀκολουθία: $\sqrt{\alpha_v}$, $v = 1, 2, \dots$ ἐκτενῶς ἡ:

$$\sqrt{\alpha_1}, \quad \sqrt{\alpha_2}, \quad \dots, \quad \sqrt{\alpha_v}, \quad \dots$$

ΜΗΔΕΝΙΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ


§ 120. **Όρισμός.**—*Έστω ή άκολουθία α_v , $v = 1, 2, \dots$ μὲ γενικὸν όρον*

$$\alpha_v = (-1)^{v-1} \cdot \frac{1}{v}, \text{ ήτοι ή άκολουθία :}$$

$$1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{4}, \dots, (-1)^{v-1} \cdot \frac{1}{v}, \dots$$

Αὕτη παρίσταται γραφικῶς ὡς εἰς τὸ κατωτέρω σχῆμα ἐμφαίνεται.

“Ἄσ θεωρήσωμεν τώρα ἔνα θετικὸν ἀριθμὸν ϵ , π.χ. τὸν $\epsilon = 0,17$, ὃς ἐπίσης καὶ τὰς εὐθείας μὲ ἔξισώσεις $y = \epsilon = 0,17$ καὶ $y = -\epsilon = -0,17$, αἱ ὅποιαὶ εἴναι παράλληλοι πρὸς τὸν ἄξονα τῶν x καὶ δρίζουν ἐπὶ τοῦ ἐπιπέδου τῶν ἄξονων μίαν «ταινίαν» (βλ. Σχ. 9).



Σχ. 9

Παρατηροῦμεν εἰς τὸ ἀνωτέρω σχῆμα, ὅτι τὰ σημεῖα M_1, M_2, M_3, M_4 καὶ M_5 κείνται ἐκτὸς τῆς ταινίας, ἐνῷ τὰ ἀπὸ τοῦ δείκτου $v = 6$ καὶ «πέραν» ἀντίστοιχα σημεῖα, ήτοι τὰ M_6, M_7, M_8, \dots εύρισκονται ὅλα ἐντὸς τῆς ταινίας τῶν δύο παραλλήλων εὐθειῶν $y = \epsilon$ καὶ $y = -\epsilon$. Τοῦτο σημαίνει ὅτι αἱ τεταγμέναι τῶν M_1, M_2, M_3, M_4 καὶ M_5 , ήτοι οἱ ὅροι $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ τῆς ἐν λόγῳ ἀκολουθίας κείνται ἐκτὸς τοῦ ἀνοικτοῦ διαστήματος $(-\epsilon, +\epsilon)$, ἐνῷ οἱ ἀπὸ τοῦ δείκτου $v = 6$ καὶ πέραν ἀντίστοιχοι ὅροι, ήτοι οἱ: $\alpha_6, \alpha_7, \alpha_8, \dots$ κείνται ὅλοι εἰς τὸ ἀνοικτὸν διάστημα $(-\epsilon, +\epsilon)$, δηλαδὴ εἰς μίαν περιοχὴν τοῦ μηδενός, καθόσον τὸ $(-\epsilon, +\epsilon)$ γράφεται καὶ οὕτω: $(0 - \epsilon, 0 + \epsilon)$.

“Ωστε: $-\epsilon < \alpha_v < +\epsilon \quad \forall v \geq v_0 = 6 \quad (\epsilon = 0,17)$
ἢ Ισοδυνάμως:

$$|\alpha_v| < \epsilon \quad \forall v \geq v_0 = 6.$$

Ἐὰν τώρα λάβωμεν ἔνα ἄλλον θετικὸν ἀριθμὸν ϵ , μικρότερον τοῦ προηγουμένου, π.χ. τὸν $\epsilon = 0,09$, καὶ ἐπαναλάβωμεν τὰ ἀνωτέρω, τότε καταλήγομεν

εις τὸ συμπέρασμα ὅτι τὰ σημεῖα M_1, M_2, \dots καὶ M_{11} κείνται ἐκτὸς τῆς ταινίας τῶν δύο παραλήγων $y = \varepsilon = 0,09$ καὶ $y = -\varepsilon = -0,09$, ἐνῷ τὰ ἀπὸ τοῦ δείκτου $v = 12$ καὶ πέραν ἀντίστοιχα σημεῖα, ἥτοι τὰ $M_{12}, M_{13}, \dots, M_v, \dots$ εύρισκονται ἐντὸς τῆς ἐν λόγῳ ταινίας, δηλαδὴ αἱ τεταγμέναι τῶν σημείων τούτων, ἥτοι οἱ ὄροι: $\alpha_{12}, \alpha_{13}, \dots, \alpha_v, \dots$ τῆς ἐν λόγῳ ἀκολουθίας κείνται εἰς τὸ ἀνοικτὸν διάστημα $(-\varepsilon, +\varepsilon)$, ἥτοι ἴσχύει:

$$-\varepsilon < \alpha_v < +\varepsilon \quad \forall v \geq v_0 = 12 \quad (\varepsilon = 0,09)$$

ἢ ισοδυνάμως:

$$|\alpha_v| < \varepsilon \quad \forall v \geq v_0 = 12.$$

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω παρατηροῦμεν ὅτι εἰς ἑκάστην ἔκλογήν τοῦ θετικοῦ ἀριθμοῦ ε ὑπάρχει εἰς δείκτης v_0 , δ ὅποιος ἔχει τὸν ε , ἥτοι $v_0 = v_0(\varepsilon)$. Οὕτω, διὰ $\varepsilon = 0,17$ ἔχομεν, ὡς ἐλέχθη ἀνωτέρω, $v_0 = v_0(\varepsilon) = 6$, ἐνῷ διὰ $\varepsilon = 0,09$ ἔχομεν $v_0 = v_0(\varepsilon) = 12$.

Τὴν ἐν λόγῳ ἀκολουθίαν $\alpha_v, v = 1, 2, \dots$ μὲν $\alpha_v = (-1)^{v-1} \cdot \frac{1}{v}$, ἢ ὅποια πληροῖ τὰ ἀνωτέρω χαρακτηρίζομεν ὡς «μηδενικὴν ἀκολουθίαν».

Γενικῶς: *Mία ἀκολουθία πραγματικῶν ἀριθμῶν $a_v, v = 1, 2, \dots$ καλεῖται μηδενικὴ ἀκολουθία καὶ θὰ συμβολίζωμεν τοῦτο μὲν $a_v \rightarrow 0$ τότε, καὶ μόνον τότε, ἂν: διὰ κάθε $\varepsilon > 0$ ὑπάρχῃ δείκτης $v_0 = v_0(\varepsilon)$ (ἔχει τώρα μενος, ἐν γένει, ἐκ τοῦ ε) τοιοῦτος, ὥστε $v \geq v_0$:*

$$|a_v| < \varepsilon \text{ διὰ κάθε } v \geq v_0(\varepsilon).$$

Συντόμως, μὲν χρῆσιν τῶν γνωστῶν μας συμβόλων, δ ὁρισμὸς οὗτος διδεται ὡς ἔξῆς:

$$a_v \rightarrow 0 \iff_{\text{օρσ}} \forall \varepsilon > 0 \exists v_0 = v_0(\varepsilon) : |a_v| < \varepsilon \quad \forall v \geq v_0$$

§ 121. Παραδείγματα μηδενικῶν ἀκολουθιῶν.

1ον. Ἡ σταθερὰ ἀκολουθία $a_v = 0, v = 1, 2, \dots$ εἶναι μηδενικὴ ἀκολουθία.

2ον. Ἡ ἀκολουθία $a_v = \frac{1}{v}, v = 1, 2, \dots$ εἶναι μηδενική, διότι διὰ τυχόντα θετικὸν ἀριθμὸν ε ὑπάρχει δείκτης $v_0 = v_0(\varepsilon)$, καὶ ὡς τοιοῦτος δύναται νὰ ληφθῇ ἐδῶ εἰς φυσικὸς ἀριθμὸς μεγαλύτερος τοῦ $\frac{1}{\varepsilon}$) τοιοῦτος, ὥστε διὰ κάθε $v \geq v_0 > \frac{1}{\varepsilon}$ ίσχύει: $|\alpha_v| = \left| \frac{1}{v} \right| = \frac{1}{v} \leq \frac{1}{v_0} < \varepsilon$, διότι ἐκ τῆς $v_0 > \frac{1}{\varepsilon} \implies \frac{1}{v_0} < \varepsilon$.

“Ωστε ἐδείχθη ὅτι:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists v_0 = v_0(\varepsilon) \left(\text{ἀρκεῖ νὰ ληφθῇ } v_0 \geq \frac{1}{\varepsilon} \right) : |\alpha_v| = \left| \frac{1}{v} \right| < \varepsilon \quad \forall v \geq v_0.$$

* Τοῦτο συμπεραίνομεν, διότι ίσχύει: $|\alpha_v| = \frac{1}{v} < \varepsilon \iff v > \frac{1}{\varepsilon}$.

Αρα: $\alpha_v = \frac{1}{v} \rightarrow 0.$

Σημείωσις: Ή ακολουθία $\alpha_v = \frac{1}{v}$, $v = 1, 2, \dots$ ύπενθυμίζει τὰς ἀποσβεννυμένας ἀναπτηδήσεις μιᾶς ἐλαστικῆς σφαίρας ἐπὶ ἑνὸς ἐπιπέδου. Τὸ ὑψος εἰς τὸ ὅποιον ἀνέρχεται ἡ σφαίρα εἰς ἑκάστην ἀναπήδησιν εἶναι μικρότερον τῶν προηγουμένων καὶ τελικῶς ἡ σφαίρα ἰσορροπεῖ ἐπὶ τοῦ ἐπιπέδου αὐτοῦ (ὑψος ἀναπηδήσεως μηδέν).

3ον. Ή ἀκολουθία $\alpha_v = (-1)^v \cdot \frac{1}{v} \rightarrow 0$, διότι $\forall \epsilon > 0$ ύπάρχει $v_0(\epsilon)$, καὶ

ώς τοιοῦτος δύναται ἐπίστης νὰ ληφθῇ εἰς φυσικὸς ἀριθμὸς μεγαλύτερος τοῦ $\frac{1}{\epsilon}$ (διατί;) τοιοῦτος, ὥστε νὰ ἴσχύῃ :

$$|\alpha_v| = \left| (-1)^v \cdot \frac{1}{v} \right| = \frac{1}{v} < \epsilon \text{ διὰ κάθε } v \geq v_0(\epsilon).$$

4ον. Η ἀκολουθία $a_v = \frac{1}{\sqrt{v}}$, $v = 1, 2, \dots$ εἶναι μηδενική, διότι διὰ τυχόντα θετικὸν ἀριθμὸν εύπάρχει δείκτης $v_0 \equiv v_0(\epsilon)$, καὶ ὡς τοιοῦτος δύναται νὰ ληφθῇ ἔδῶ εἰς φυσικὸς ἀριθμὸς μεγαλύτερος τοῦ $\frac{1}{\epsilon^2}$, τοιοῦτος, ὥστε: διὰ κάθε $v \geq v_0 > \frac{1}{\epsilon^2}$ ισχύει : $|\alpha_v| = \frac{1}{\sqrt{v}} \leq \frac{1}{\sqrt{v_0}} < \epsilon$, διότι ἐκ τῆς: $v \geq v_0 > \frac{1}{\epsilon^2} \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{v}} \leq \frac{1}{\sqrt{v_0}} < \epsilon$.

"Ωστε ἐδείχθη δτι :

$$\forall \epsilon > 0 \exists v_0 = v_0(\epsilon) \left(\text{ἀρκεῖ νὰ ληφθῇ } v_0 > \frac{1}{\epsilon^2} \right); |\alpha_v| = \left| \frac{1}{\sqrt{v}} \right| < \epsilon \quad \forall v \geq v_0.$$

Αρα:

$$\alpha_v = \frac{1}{\sqrt{v}} \rightarrow 0.$$

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

§ 122. Ιδιότης I. – Διὰ μίαν ἀκολουθίαν α_v , $v = 1, 2, \dots$ πραγματικῶν ἀριθμῶν ισχύει :

$$\text{'Εὰν } \alpha_v \rightarrow 0 \iff -\alpha_v \rightarrow 0 \text{ ώς καὶ } |\alpha_v| \rightarrow 0$$

Α πόδειξις: Πράγματι διότι, ἂν $|\alpha_v| < \epsilon$, τότε θὰ είναι καὶ :

$$|-\alpha_v| = |\alpha_v| < \epsilon \quad \text{καθὼς ἐπίστης καὶ } ||\alpha_v|| = |\alpha_v| < \epsilon.$$

Αντιστρόφως: ἂν : $-\alpha_v \rightarrow 0$, τότε $|\alpha_v| < \epsilon$, δηλαδὴ $|\alpha_v| < \epsilon$, ἕπειτα $\alpha_v \rightarrow 0$, ὅπότε καὶ $|\alpha_v| \rightarrow 0$.

§ 123. Ιδιότης II. — 'Εάν ή άκολουθία α_v , $v = 1, 2, \dots$ είναι μηδενική, τότε και ή προκύπτουσα ἐκ ταύτης διάγραφης ή διαγραφής ένδος πεπερασμένου πλήθους δρων είναι ἐπίσης μηδενική άκολουθία.

Παράδειγμα: Η $\alpha_v = \frac{1}{v} \rightarrow 0$, τότε και ή άκολουθία: $\beta_v = \frac{1}{v+4}$, $v = 1, 2, \dots$ ἐκτενῶς ή:

$$\frac{1}{5}, \quad \frac{1}{6}, \quad \frac{1}{7}, \dots$$

ή διότι προκύπτει διάδικτης τῶν τεσσάρων πρώτων δρων τῆς $\alpha_v = \frac{1}{v}$, $v = 1, 2, \dots$ είναι ἐπίσης μηδενική άκολουθία.

§ 124. Ιδιότης III. — Κάθε μηδενική άκολουθία είναι φραγμένη.

Ητοι: 'Εάν $\alpha_v \rightarrow 0$, τότε α_v , $v = 1, 2, \dots$ είναι φραγμένη.

'Απόδειξη. Ας έφαρμόσωμεν τὸν όρισμὸν τῆς μηδενικῆς άκολουθίας διὰ $\epsilon = 1 > 0$, τότε ύπάρχει δείκτης $v_0 = v_0(\epsilon)$ τοιοῦτος, ώστε νὰ ισχύῃ:

$$|\alpha_v| < 1 \quad \forall v > v_0. \quad (1)$$

Έστω τώρα $A \equiv \max(|\alpha_1|, |\alpha_2|, \dots, |\alpha_{v_0}|)$.

Τότε θὰ ξέχωμεν:

$$|\alpha_v| \leq A < A + 1 \quad \forall v = 1, 2, \dots, v_0. \quad (2)$$

Έκ τῶν (1) καὶ (2) προκύπτει:

$$|\alpha_v| < A + 1 \equiv \phi \quad \forall v \in \mathbb{N}.$$

Οθεν ή α_v , $v = 1, 2, \dots$ είναι φραγμένη.

Παρατήρησης. Η ἀνωτέρω ιδιότης δὲν ἀντιστρέφεται, ητοι κάθε φραγμένη άκολουθία δὲν είναι πάντοτε μηδενική. Περὶ τούτου βεβαιούμεθα ἀπὸ τὸ ἔντις παράδειγμα:

Έστω ή άκολουθία: $\alpha_v = (-1)^v$, $v = 1, 2, \dots$ ἐκτενῶς ή άκολουθία:

$$-1, 1, -1, 1, \dots$$

Αὕτη είναι φραγμένη, διότι: $|\alpha_v| = |(-1)^v| = 1 \leq 1 \quad \forall v = 1, 2, 3, \dots$, ἐν τούτοις ὅμως αὔτη δὲν είναι μηδενική (διατί;).

Αντιθέτως ή άκολουθία $\alpha_v = (-1)^v \cdot \frac{1}{v}$, $v = 1, 2, \dots$ είναι φραγμένη, διότι

Ισχύει:

$$|\alpha_v| = \left| (-1)^v \cdot \frac{1}{v} \right| = \frac{1}{v} \leq 1 \quad \forall v \in \mathbb{N} \text{ καὶ συγχρόνως } \alpha_v \rightarrow 0.$$

§ 125. Ιδιότης IV. — Τὸ αθροισμα ἡ ή διαφορὰ δύο μηδενικῶν άκολουθιῶν είναι μηδενικὴ άκολουθία.

Ητοι: 'Εάν: $\begin{cases} \alpha_v \rightarrow 0 \\ \beta_v \rightarrow 0 \end{cases} \implies \alpha_v \pm \beta_v \rightarrow 0$

Α πόδειξις. Επειδή κατά τὴν ὑπόθεσιν αἱ α_v καὶ β_v , $v = 1, 2, \dots$ είναι μηδενικαὶ ἀκολουθίαι θὰ ἔχωμεν, συμφώνως πρὸς τὸν δρισμὸν μηδενικῆς ἀκολουθίας : Διὰ κάθε $\epsilon > 0$, ἄρα καὶ διὰ $\frac{\epsilon}{2} > 0$, ὑπάρχει δείκτης $v'_0\left(\frac{\epsilon}{2}\right)$ καὶ $v''_0\left(\frac{\epsilon}{2}\right)$, ὥστε νὰ ἴσχύῃ :

$$|\alpha_v| < \frac{\epsilon}{2} \quad \text{διὰ κάθε } v \geq v'_0\left(\frac{\epsilon}{2}\right) \equiv v'_0 \quad (1)$$

$$|\beta_v| < \frac{\epsilon}{2} \quad \text{διὰ κάθε } v \geq v''_0\left(\frac{\epsilon}{2}\right) \equiv v''_0. \quad (2)$$

Ἐὰν καλέσωμεν $v_0(\epsilon)$ τὸν μέγιστον τῶν $v'_0\left(\frac{\epsilon}{2}\right)$ καὶ $v''_0\left(\frac{\epsilon}{2}\right)$, ἦτοι ἂν $v_0(\epsilon) \equiv \max(v'_0, v''_0)$, τότε διὰ κάθε $v \geq v_0(\epsilon)$, αἱ ἀνισότητες (1) καὶ (2) πληροῦνται συγχρόνως καὶ ἐπομένως θὰ ἔχωμεν :

$$|\alpha_v \pm \beta_v| \leq |\alpha_v| + |\beta_v| < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon \quad \text{διὰ κάθε } v \geq v_0(\epsilon),$$

Ἔτοι : $|\alpha_v + \beta_v| < \epsilon$ καὶ $|\alpha_v - \beta_v| < \epsilon$ διὰ κάθε $v > v_0(\epsilon)$.

Αἱ τελευταῖαι ἀνισότητες μᾶς πληροφοροῦν δτι αἱ ἀκολουθίαι : $\alpha_v + \beta_v$, καὶ $\alpha_v - \beta_v$, $v = 1, 2, \dots$ είναι μηδενικαὶ.

§ 126. Ιδιότης Σ.—Τὸ γινόμενον μηδενικῆς ἀκολουθίας ἐπὶ φραγμένην είναι μηδενικὴ ἀκολουθία.

Ἔτοι :
$$\boxed{\begin{array}{l} \text{Ἐὰν } \begin{cases} \alpha_v \rightarrow 0 \\ \beta_v, v=1, 2, \dots \text{ φραγμένη} \end{cases} \end{array}} \implies \alpha_v \beta_v \rightarrow 0$$

Α πόδειξις : Εστω φ ἐν φράγμα τῆς ἀκολουθίας β_v , $v = 1, 2, \dots$ Τότε ἔχομεν :

$$|\beta_v| \leq \phi \quad \text{διὰ κάθε } v = 1, 2, \dots \quad (1)$$

Ἐξ ἀλλου, ἐπειδὴ $\alpha_v \rightarrow 0 \implies \forall \epsilon > 0$, ἄρα καὶ διὰ $\frac{\epsilon}{\phi} > 0$, ὑπάρχει δείκτης $v_0 = v_0\left(\frac{\epsilon}{\phi}\right)$ τοιοῦτος, ὥστε νὰ ἴσχύῃ :

$$|\alpha_v| < \frac{\epsilon}{\phi} \quad \text{διὰ κάθε } v \geq v_0. \quad (2)$$

Τότε ὅμως, διὰ κάθε $v \geq v_0$, ἔχομεν δυνάμει τῶν (1) καὶ (2) δτι :

$$|\alpha_v \beta_v| = |\alpha_v| \cdot |\beta_v| < \frac{\epsilon}{\phi} \cdot \phi = \epsilon.$$

Ωστε ἐδείχθη δτι :

$$\forall \epsilon > 0 \ \exists v_0 = v_0\left(\frac{\epsilon}{\phi}\right) : |\alpha_v \beta_v| < \epsilon \ \forall v \geq v_0.$$

Ἄρα :

$$\alpha_v \beta_v \rightarrow 0.$$

§ 127. Ιδιότης VI.— Τὸ γινόμενον δύο, ἡ γενικώτερον ἐνὸς πεπερασμένου πλήθους, μηδενικῶν ἀκολουθιῶν είναι μηδενικὴ ἀκολουθία.

"Ητοι :

$$\boxed{\begin{array}{l} \text{'Εὰν } \left. \begin{array}{l} \alpha_v \rightarrow 0 \\ \beta_v \rightarrow 0 \end{array} \right\} \implies \alpha_v \beta_v \rightarrow 0 \end{array}}$$

'Α πόδεις. 'Η $\beta_v, v=1, 2, \dots$ ως μηδενικὴ ἀκολουθία είναι (Ιδιότης III) φραγμένη, ἄρα ἡ $\alpha_v \beta_v, v=1, 2, \dots$, ως γινόμενον μηδενικῆς ἐπὶ φραγμένην είναι (Ιδιότης V) μηδενικὴ ἀκολουθία.

Παράδειγμα: $\alpha_v = \frac{1}{v} \rightarrow 0, \beta_v = \frac{1}{v} \rightarrow 0 \implies \alpha_v \beta_v = \frac{1}{v^2} \rightarrow 0$.

"Α σημείος : 'Αποδείξατε τὴν ἀνωτέρω Ιδιότητα ἀνεξαρτήτως τῶν προηγουμένων Ιδιοτήτων, ἀλλὰ μόνον τῇ βοηθείᾳ τοῦ δρισμοῦ μηδενικῆς ἀκολουθίας.

'Εκ τῶν Ιδιοτήτων IV καὶ V ἔπονται ἀμέσως αἱ κάτωθι δύο Ιδιότητες :

§ 128. Ιδιότης VII.— 'Εὰν $a_v \rightarrow 0$, τότε $\xi a_v \rightarrow 0$ διὰ κάθε $\xi \in \mathbb{R}$.

Οὔτως, ἐκ τῆς $\frac{1}{v} \rightarrow 0 \implies \frac{3}{v} = 3 \cdot \frac{1}{v} \rightarrow 0$.

§ 129. Ιδιότης VIII.— Διὰ κάθε $\xi, \eta \in \mathbb{R}$, ἐὰν $\left. \begin{array}{l} \alpha_v \rightarrow 0 \\ \beta_v \rightarrow 0 \end{array} \right\} \implies \xi \alpha_v + \eta \beta_v \rightarrow 0$.

§ 130. Ιδιότης IX.— 'Εὰν $\beta_v \rightarrow 0$ καὶ διὰ μίαν ἀκολουθίαν $\alpha_v, v=1, 2, \dots$ ισχύει : $|\alpha_v| \leq |\beta_v|$ διὰ κάθε $v=1, 2, \dots$, τότε ἡ ἀκολουθία $\alpha_v, v=1, 2, \dots$ είναι μηδενική.

"Ητοι : $\boxed{\begin{array}{l} \text{'Εὰν } \left. \begin{array}{l} |\alpha_v| \leq |\beta_v| \quad \forall v \in \mathbb{N} \\ \beta_v \rightarrow 0 \end{array} \right\} \implies \alpha_v \rightarrow 0 \end{array}}$

'Α πόδεις. 'Εκ τοῦ ὅτι $\beta_v \rightarrow 0$ ἔπειται : Διὰ κάθε $\epsilon > 0$ ὑπάρχει $v_0 = v_0(\epsilon)$ τοιοῦτος, ὥστε νὰ ισχύῃ :

$|\beta_v| < \epsilon$ διὰ κάθε $v \geq v_0(\epsilon)$.

Τότε ὅμως ἔχομεν :

$|\alpha_v| \leq |\beta_v| < \epsilon$, ητοι $|\alpha_v| < \epsilon$ διὰ κάθε $v \geq v_0(\epsilon)$.

'Αρα : $\alpha_v \rightarrow 0$.

'Εφαρμογή : Δείξατε ὅτι : $\alpha_v = \frac{1}{v^2 + v + 1} \rightarrow 0$.

Πράγματι :

$|\alpha_v| = \frac{1}{v^2 + v + 1} < \frac{1}{v^2 + v} < \frac{1}{v}$ καὶ κατὰ τὴν ἀνωτέρω Ιδιότητα ($\frac{1}{v} \rightarrow 0$) είναι $\alpha_v \rightarrow 0$.

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

§ 131. Παραδείγματα έφαρμογής τῶν ἀνωτέρω ίδιοτήτων.

Παράδειγμα 1ον. Δείξατε ότι η ἀκολουθία $a_v = \omega^v$, $v = 1, 2, \dots$ μὲν σταθερὸν πραγματικὸν ἀριθμὸν καὶ $|\omega| < 1$ εἶναι μηδενική.

*Απόδειξις. α). Διὰ $\omega = 0 < 1$ εἶναι προφανές.

β). Διὰ $\omega \neq 0$, ἔχομεν: $0 < |\omega| < 1 \implies \frac{1}{|\omega|} > 1$. Ἐφαρμογὴ $\frac{1}{|\omega|} = 1 + \theta$, $\theta > 0$ καὶ ἐπομένως:

$$|\alpha_v| = |\omega^v| = |\omega|^v = \frac{1}{(1+\theta)^v} \quad \forall v \in \mathbb{N}. \quad (1)$$

*Άλλα ἀπό τὴν γνωστὴν ἀνισότητα τοῦ Bernoulli (§ 28, παρδ. 2), ἡτοι τὴν ἀνισότητα:

$$(1+\theta)^v \geq 1+v\theta,$$

ἔχομεν: $(1+\theta)^v > v\theta \quad \forall v \in \mathbb{N}$.

Τότε ἡ (1) δίδει:

$$|\alpha_v| = |\omega^v| < \frac{1}{v\theta} = \frac{1}{\theta} \cdot \frac{1}{v} \quad \forall v \in \mathbb{N}.$$

*Ἐπειδὴ $\frac{1}{v} \rightarrow 0$, δυνάμει τῶν ίδιοτήτων VII καὶ IX εἶναι καὶ $\alpha_v = \omega^v \rightarrow 0$.

*Ωστε ἡ ἀκολουθία:

μὲν $|\omega| < 1$ εἶναι μηδενική.

Οὕτω, π.χ., αἱ ἀκολουθίαι: $\frac{1}{2^v}$, $v = 1, 2, \dots$, $\frac{1}{10^v}$, $v = 1, 2, \dots$, $\frac{1}{3-v}$, $v = 1, 2, \dots$ εἶναι πᾶσαι μηδενικαὶ ἀκολουθίαι.

Παράδειγμα 2ον. Ἡ ἀκολουθία: $a_v = \omega^v$, $v = 0, 1, 2, \dots$ μὲν $|\omega| < 1$ καὶ $\omega \in \mathbb{R}$, ἡτοι ἡ: a , $a\omega$, $a\omega^2$, $a\omega^3, \dots, a\omega^v, \dots$, εἶναι μηδενική.

Πράγματι δύναμει τοῦ ἀνωτέρῳ παραδείγματος καὶ τῆς ίδιότητος VII.

Παράδειγμα 3ον. Δείξατε ότι ἡ ἀκολουθία $a_v = \sqrt{v^2+2} - \sqrt{v^2+1}$, $v = 1, 2, \dots$ εἶναι μηδενική.

*Απόδειξις. Εἶναι γνωστὸν ότι: $x - y = \frac{x^2 - y^2}{x + y}$. Εάν θέσωμεν $x = \sqrt{v^2+2}$, $y = \sqrt{v^2+1}$, ἔχομεν:

$$|\alpha_v| = \left| \sqrt{v^2+2} - \sqrt{v^2+1} \right| = \left| \frac{(\sqrt{v^2+2})^2 - (\sqrt{v^2+1})^2}{\sqrt{v^2+2} + \sqrt{v^2+1}} \right| = \frac{1}{\sqrt{v^2+2} + \sqrt{v^2+1}} < \frac{1}{\sqrt{v^2+1}} < \frac{1}{v}.$$

*Ἐφαρμογὴ $\frac{1}{v} \rightarrow 0$, δυνάμει τῆς ίδιότητος IX, προκύπτει ότι καὶ ἡ ἀκολουθία:

$$\alpha_v = \sqrt{v^2+2} - \sqrt{v^2+1}, \quad v = 1, 2, \dots \quad \text{εἶναι μηδενική.}$$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

256. Δείξατε ότι αἱ κάτωθι ἀκολουθίαι εἶναι μηδενικαὶ :

$$1) \frac{v}{v^3+v+1}, \quad 2) \frac{(-1)^v}{(v+1)^2}, \quad 3) \frac{1+\sqrt{v}}{v^3}, \quad 4) \sqrt{v^2+3} - \sqrt{v^2+1}.$$

257. *Ομοίως αἱ ἀκολουθίαι :

$$1) \frac{\eta v + \sigma v^5}{\sqrt{v}}, \quad 2) v^{1/2} \cdot (\sqrt{v^4+4}-v^2), \quad 3) \frac{3}{\sqrt{v+1}} - \frac{3}{\sqrt{v}}, \quad 4) v \cdot (\sqrt{v^4+4}-v^2).$$

258. Διὰ $\epsilon > 0$, νὰ προσδιορισθῇ δείκτης $v_0 = v_0(\epsilon)$, ὥστε διὰ $v \geq v_0(\epsilon)$, νὰ εἶναι

$$|\alpha_v| < \epsilon,$$

δπου : α_v , $v = 1, 2, \dots$ είναι :

1) $\alpha_v = \frac{2}{v^2+v}$, 2) $\alpha_v = \frac{3}{4v^2-2v}$, 3) $\alpha_v = \frac{\eta v + \sigma v^3}{\sqrt{v}}$, 4) $\alpha_v = \frac{3}{\sqrt{v^2+2}}$.

259. Έαν ή άκολουθία α_v , $v = 1, 2, \dots$ είναι μηδενική, θά είναι μηδενική καὶ ή $\sqrt{|\alpha_v|}$.

ΣΥΓΚΛΙΝΟΥΣΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ.

§ 132. **Όρισμός.**— Εστω ή άκολουθία :

$$\alpha_v = \frac{3v+1}{v}, \quad v = 1, 2, 3, \dots$$

Διὰ τὴν ὡς ἄνω άκολουθίαν παρατηροῦμεν δτι ἴσχυει : $\alpha_v - 3 = \frac{1}{v}$, ἢτοι ή
άκολουθία $\alpha_v - 3$, $v = 1, 2, \dots$ είναι μηδενική άκολουθία. Εἰς τὴν περίπτωσιν
ταύτην λέγομεν δτι ή άκολουθία $\frac{3v+1}{v}$, $v = 1, 2, \dots$ «συγκλίνει πρὸς τὸν ἀριθμὸν 3».

Γενικῶς θὰ λέγωμεν : «ἡ ἀκολουθία α_v , $v = 1, 2, \dots$ πραγματικῶν ἀριθμῶν συγκλίνει πρὸς τὸν πραγματικὸν ἀριθμὸν a ἢ ἀλλως τείνει πρὸς τὸν πραγματικὸν ἀριθμὸν a καὶ θὰ συμβολίζωμεν τοῦτο μὲν : $\alpha_v \rightarrow a$ τότε, καὶ μόνον τότε, ἢν ή ἀκολουθία $(\alpha_v - a)$, $v = 1, 2, \dots$, δηλαδὴ ή άκολουθία :

$\alpha_1 - a, \alpha_2 - a, \alpha_3 - a, \dots, \alpha_v - a, \dots$ είναι μηδενική.

Τὸν ἀριθμὸν a καλοῦμεν «ὅριον» ἢ «օριακὴν τιμὴν» τῆς άκολουθίας α_v , $v = 1, 2, \dots$ καὶ γράφομεν : όρος $\alpha_v = a$ ἢ ἀλλως $\lim a_v = a$.

Τὸ \lim είναι συγκοπὴ τῆς λατινικῆς λέξεως limes = ὅριον καὶ χρησιμοποιεῖται διεθνῶς.

Ἐκ τοῦ ἀνωτέρω ὅρισμοῦ συνάγεται δτι :

ἢ α_v , $v = 1, 2, \dots$ είναι μία μηδενική άκολουθία $\iff \alpha_v \rightarrow 0 \iff \lim \alpha_v = 0$.

Οθεν δ ὁρισμὸς τῆς συγκλινούσης άκολουθίας διατυποῦται συντόμως οὕτω :

$$\boxed{\lim \alpha_v = a \iff \underset{\text{ορος}}{\lim} (\alpha_v - a) = 0}$$

Οὔτω διὰ τὸ παράδειγμά μας ἔχομεν :

$$\lim \frac{3v+1}{v} = 3, \text{ διότι } \lim \left(\frac{3v+1}{v} - 3 \right) = \lim \frac{1}{v} = 0.$$

§ 133. **Πρότασις.**— Η ὥριακὴ τιμὴ μιᾶς συγκλινούσης άκολουθίας είναι μονοσημάντως ώρισμένη, δηλ. κάθε συγκλίνουσα άκολουθία ἔχει ἀκριβῶς ἓνα ὅριον.

Α πόδειξις. Έαν συνέβαινε $\alpha_v \rightarrow \alpha$ καὶ συγχρόνως $\alpha_v \rightarrow \alpha'$ μὲν $\alpha \neq \alpha'$, τότε θὰ ἔπειπε αἱ : $\alpha_v - \alpha$, $v = 1, 2, \dots$ καὶ $\alpha_v - \alpha'$, $v = 1, 2, \dots$ νὰ είναι μηδενικαὶ άκολουθίαι, συνεπῶς καὶ ή διαφορά των, ἢτοι ή άκολουθία :

$$\beta_v \equiv (\alpha_v - \alpha) - (\alpha_v - \alpha') = \alpha' - \alpha, \quad v = 1, 2, \dots$$

είναι μηδενική· αύτη οīμως είναι σταθερά, ήτοι $\beta_v = \alpha' - \alpha$ διά κάθε $v = 1, 2, \dots$ είναι οīθεν μηδενική τότε, καὶ μόνον τότε, ἀν $\alpha' - \alpha = 0$ (διατί ;).

Διά τὰς συγκλινούσας ἀκολουθίας ισχύει τὸ κάτωθι :

§ 134. Θεώρημα.— (Ισοδύναμοι δρισμοὶ συγκλινούστης ἀκολουθίας).

Ἐστω $a_v, v = 1, 2, \dots$ μία ἀκολουθία πραγματικῶν ἀριθμῶν· αἱ κάτωθι πράσεις εἰναι ίσοδύναμοι :

(i). Ἡ ἀκολουθία $a_v, v = 1, 2, \dots$ συγκλίνει πρὸς τὸν πραγματικὸν ἀριθμὸν a , ήτοι $\lim a_v = a, a \in \mathbb{R}$.

(ii). Διὰ κάθε $\varepsilon > 0$ ὑπάρχει δείκτης $v_0 = v_0(\varepsilon)$ (ἐξαρτώμενος ἐκ τοῦ ε) τοιοῦτος, ὥστε νὰ ισχύῃ :

$$|a_v - a| < \varepsilon \text{ διὰ κάθε } v \geq v_0.$$

Ἡ ὅπερ τὸ αὐτὸν :

$$a - \varepsilon < a_v < a + \varepsilon \text{ διὰ κάθε } v \geq v_0.$$

Ἄποδειξις. (i) \implies (ii). Πράγματι: $\lim a_v = a \implies \lim(a_v - a) = 0$, τὸ ὅποιον, δυνάμει τοῦ δρισμοῦ τῆς μηδενικῆς ἀκολουθίας, σημαίνει ὅτι :

$$\forall \varepsilon > 0 \exists v_0 = v_0(\varepsilon) \text{ τοιοῦτος, } \text{ώστε διὰ κάθε } v \geq v_0 \text{ ισχύει :} \\ |a_v - a| < \varepsilon \iff a - \varepsilon < a_v < a + \varepsilon.$$

(ii) \implies (i). Πράγματι: δυνάμει τοῦ δρισμοῦ τῆς μηδενικῆς ἀκολουθίας ἡ πρότασις (ii) δηλοῖ ὅτι ἡ ἀκολουθία $a_v - a, v = 1, 2, \dots$ είναι μηδενική, τότε ὅīμως, κατὰ τὸν δριθμὸν τῆς συγκλινούστης ἀκολουθίας, ἔπειται ὅτι : $\lim a_v = a$.

Παραδείγματα συγκλινουσῶν καὶ μὴ συγκλινουσῶν ἀκολουθιῶν :

1ον: Ἡ ἀκολουθία $a_v = 1, v = 1, 2, \dots$, δηλαδὴ ἡ ἀκολουθία : 1, 1, 1, ..., 1, ... συγκλίνει πρὸς τὸν ἀριθμὸν 1, διότι ἡ ἀκολουθία $a_v - 1, v = 1, 2, \dots$ είναι μηδενικὴ ἀκολουθία.

Γενικῶς κάθε «σταθερὰ ἀκολουθία» : c, c, c, ..., c, ... διὰ c ∈ R, συγκλίνει πρὸς τὸν ἀριθμὸν c.

2ον: Δείξατε ὅτι ἡ ἀκολουθία $a_v = \frac{2v-1}{3v}, v = 1, 2, \dots$

συγκλίνει πρὸς τὸν ἀριθμὸν $\frac{2}{3}$, ἢτοι $\lim a_v = \lim \frac{2v-1}{3v} = \frac{2}{3}$.

Ἀπόδειξις. Ἐχομεν :

$$\frac{2v-1}{3v} - \frac{2}{3} = -\frac{1}{3v} = -\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{v}, \quad v = 1, 2, \dots$$

καὶ ἐπειδή :

$$-\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{v} \rightarrow 0, \quad \text{ἔπειται :} \quad \lim \frac{2v-1}{3v} = \frac{2}{3}.$$

Ομοίως είναι :

$$\lim \frac{3v-5}{4v} = \frac{3}{4} \quad (\text{διατί ;}).$$

Δίδομεν κατωτέρω καὶ δύο παραδείγματα ἀκολουθιῶν αἱ ὅποιαι δὲν συγκλίνουν ἐν R· προσέξατε τὴν ἀπόδειξιν :

3ον : Δείξατε ὅτι ἡ ἀκολουθία $a_v = (-1)^v, v = 1, 2, \dots$ δὲν συγκλίνει ἐν R.

Ἀπόδειξις. Ὅποθέσωμεν ὅτι ἡ ἀκολουθία $a_v = (-1)^v, v = 1, 2, \dots$ συγκλίνει πρὸς τὸν ἀριθμὸν x ∈ R. Τότε διὰ κάθε $\varepsilon > 0$, ἄρα καὶ διὰ $\varepsilon = \frac{1}{2}$, ὑπάρχει δείκτης $v_0 \in \mathbb{N}$ τοιοῦτος, ὥστε νὰ ισχύῃ :

$$|(-1)^v - x| < \frac{1}{2} \quad \forall v \geq v_0.$$

Ειδικῶς :

$$|(-1)^{v_0} - x| < \frac{1}{2} \quad \text{καὶ} \quad |(-1)^{v_0+1} - x| < \frac{1}{2},$$

διότι $v_0 \geq v_0$ καὶ $v_0 + 1 \geq v_0$. Τότε δύος ἔχομεν :

$$|(-1)^{v_0} - (-1)^{v_0+1}| = |(-1)^{v_0} - x + x - (-1)^{v_0+1}| \leq |(-1)^{v_0} - x| + |x - (-1)^{v_0+1}| < \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1,$$

ἡτοι : $|(-1)^{v_0} - (-1)^{v_0+1}| < 1.$ (1)

Αλλά : $|(-1)^{v_0} - (-1)^{v_0+1}| = 2.$ (2)

Έκ τῶν (1) καὶ (2) συμπεραίνομεν δτι $2 < 1$, ἀτοπον. Ἐπειδὴ ἡ ὑπόθεσις δτι ἡ ἀκολουθία $(-1)^v$, $v = 1, 2, \dots$ συγκλίνει ἐν \mathbf{R} δδηγεῖ εἰς ἀτοπον, συμπεραίνομεν δτι αὐτῇ δὲν συγκλίνει ἐν \mathbf{R} .

4ον. Δείξατε δτι ἡ ἀκολουθία $a_v = v$, $v = 1, 2, \dots$ δὲν συγκλίνει ἐν \mathbf{R} .

Απόδειξις. Ὅποθεσωμεν δτι ἡ ἀκολουθία : $1, 2, \dots, v, \dots$ συγκλίνει πρὸς τινα ἀριθμὸν $y \in \mathbf{R}$. Τότε δοθέντος $\epsilon = \frac{1}{3}$, ὑπάρχει δείκτης $v_0 \in \mathbf{N}$ τοιοῦτος, ὥστε :

$$|v - y| < \frac{1}{3} \quad \forall v \geq v_0.$$

Ειδικῶς :

$$|v_0 - y| < \frac{1}{3} \quad \text{καὶ} \quad |v_0 + 1 - y| < \frac{1}{3},$$

διότι : $v_0 \geq v_0$ καὶ $v_0 + 1 \geq v_0$. Τότε δύος ἔχομεν :

$$1 = |(v_0 + 1) - v_0| \leq |v_0 + 1 - y| + |y - v_0| < \frac{1}{3} + \frac{1}{3}.$$

ἡτοι : $1 < \frac{2}{3}.$

Ἐπειδὴ ἡ ὑπόθεσις δτι ἡ ἀκολουθία $a_v = v$, $v = 1, 2, \dots$ συγκλίνει ἐν \mathbf{R} δδηγεῖ εἰς ἀτοπον, συμπεραίνομεν δτι αὐτῇ ἡ ἀκολουθία δὲν συγκλίνει ἐν \mathbf{R} .

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΛΙΝΟΥΣΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

§ 135. Ιδιότης I.—Ἐστω ἡ ἀκολουθία a_v , $v = 1, 2, \dots$ Τότε ισχύει :

$$\text{'}\mathbf{\bar{E}}\mathbf{\acute{a}}\mathbf{v} \quad a_v \rightarrow a \implies -a_v \rightarrow -a$$

Α πόδειξις. Πράγματι· ἐπειδὴ $a_v \rightarrow a \implies (a_v - a) \rightarrow 0$, τότε δύος ($\S 122$, ίδ. I) καὶ $- (a_v - a) = -a_v + a$, $v = 1, 2, \dots$ είναι μηδενικὴ ἀκολουθία, ἡτοι : $-a_v - (-a) \rightarrow 0$. Ἀρα : $-a_v \rightarrow -a$.

§ 136. Ιδιότης II.—Ἐστω ἡ ἀκολουθία a_v , $v = 1, 2, \dots$ Τότε ισχύει :

$$\text{'}\mathbf{\bar{E}}\mathbf{\acute{a}}\mathbf{v} \quad a_v \rightarrow a \implies |a_v| \rightarrow |a|$$

Τὸ ἀντίστροφον δὲν ἀληθεύει πάντοτε, δηλαδὴ τὸ γεγονός, δτι ἡ ἀκολουθίας a_v , $v = 1, 2, \dots$ συγκλίνει πρὸς τὸ $|a|$ δὲν συνεπάγεται δτι $a_v \rightarrow a$.

Α πόδειξις. Πράγματι· ἀπὸ $a_v \rightarrow a \implies (a_v - a) \rightarrow 0$, τότε δύος ($\S 122$, ίδ. I) καὶ $|a_v - a| \rightarrow 0$.

*Αλλά $|\alpha_v - \alpha| \leq |\alpha_v - \alpha| \rightarrow 0$, οπότε $(|\alpha_v - \alpha|) \rightarrow 0$ (§ 130, Ιδ. IX)

Τότε ομως : $\lim |\alpha_v| = |\alpha|$.

Τὸ ὅτι τὸ ἀντίστροφον δὲν ἴσχυει πάντοτε δεικνύει τὸ ἔξης παράδειγμα :

*Η ἀκολουθία : $1, -1, 1, -1, \dots, (-1)^{v+1}, \dots$ δὲν συγκλίνει (διατί;) καὶ ομως ή ἀκολουθία : $|1|, |-1|, |1|, |-1|, \dots, |(-1)^{v+1}|, \dots$ συγκλίνει εἰς τὸ 1.

Παρατηρήσεις : 1). Εἰς τὴν περίπτωσιν καθ' ἥν ή ἀκολουθία $\alpha_v, v = 1, 2, \dots$ είναι μηδενική, τότε ή ιδιότης II, ως ἐδείχθη § 122, ἀντιστρέφεται, ἦτοι, ἂν $|\alpha_v| \rightarrow 0 \implies \alpha_v \rightarrow 0$.

2). Ἐκ τοῦ συμπεράσματος τῆς ἀνωτέρω ιδιότητος II συνάγεται ὅτι ἐπιτρέπεται νὰ γράψωμεν :

$$\lim |\alpha_v| = \lim \alpha_v$$

ήτοι : Τὸ δριὸν τῆς ἀπολύτου τιμῆς μιᾶς ἀκολουθίας πραγματικῶν ἀριθμῶν, ἰσοῦται μὲ τὴν ἀπόλυτον τιμὴν τοῦ δρίου αὐτῆς.

§ 137. *Ιδιότης III. — *Ἐστωσαν αἱ ἀκολουθίαι $\alpha_v, v = 1, 2, \dots$ καὶ $\beta_v, v = 1, 2, \dots$ Τότε ἴσχύει :

$$\boxed{\text{Ἐὰν } \begin{cases} \alpha_v \rightarrow \alpha \\ \beta_v \rightarrow \alpha \end{cases} \implies \alpha_v - \beta_v \rightarrow 0}$$

*Α πόδειξις. Πράγματι, ἐπειδὴ $\alpha_v - \alpha$ καὶ $\beta_v - \alpha, v = 1, 2, \dots$ είναι μηδενικαὶ ἀκολουθίαι καὶ ή διαφορὰ αὐτῶν :

$$(\alpha_v - \alpha) - (\beta_v - \alpha) = \alpha_v - \beta_v, \quad v = 1, 2, \dots$$

είναι μία μηδενικὴ ἀκολουθία.

§ 138. *Ιδιότης IV. — Κάθε συγκλίνουσα ἐν \mathbb{R} ἀκολουθία είναι φραγμένη.

Ήτοι : $\boxed{\text{Ἐὰν } \alpha_v \rightarrow \alpha \implies \alpha_v, v = 1, 2, \dots \text{ είναι φραγμένη}}$

*Α πόδειξις. Πράγματι ἀπὸ $\alpha_v \rightarrow \alpha \implies (\alpha_v - \alpha) \rightarrow 0$, τότε ομως (Ιδ. III, § 124) ή $\alpha_v - \alpha, v = 1, 2, \dots$ είναι φραγμένη, ἦτοι ὑπάρχει πραγματικὸς ἀριθμὸς $\theta > 0$ τοιοῦτος, ὃστε νὰ ἴσχύῃ :

$$|\alpha_v - \alpha| \leq \theta \quad \text{διὰ κάθε } v = 1, 2, \dots$$

*Αλλά :

$$|\alpha_v| - |\alpha| \leq |\alpha_v - \alpha|$$

ὅπερα κατὰ μείζονα λόγον ἔχομεν :

$$|\alpha_v| - |\alpha| \leq \theta \quad \text{διὰ κάθε } v = 1, 2, \dots$$

δηλαδή :

$$|\alpha_v| \leq |\alpha| + \theta \quad \text{διὰ κάθε } v = 1, 2, \dots$$

$$\text{ή } |\alpha_v| \leq \varphi \quad \text{διὰ κάθε } v = 1, 2, \dots$$

ὅπου $\varphi = |\alpha| + \theta$.

*Αρα ή ἀκολουθία $\alpha_v, v = 1, 2, \dots$ είναι φραγμένη.

Παρατηρήσεις : α'). *Η ιδιότης IV ισχυρίζεται ὅτι μία ἀκολουθία ή ὁποία συγκλίνει ἐν \mathbb{R} είναι φραγμένη. Τὸ ἀντίστροφον δὲν ἀλήθευει πάντοτε, δηλαδὴ κάθε φραγμένη ἀκολουθία δὲν είναι πάντοτε συγκλίνουσα. Περὶ τούτου βεβαιούμεθα ἀπὸ τὸ ἔξης παράδειγμα : *Η ἀκολουθία $(-1)^v, v = 1, 2, \dots$, ἀν καὶ είναι φραγμένη δὲν συγκλίνει (βλ. πρδ. 3, § 134).

β'). Η ιδιότης IV είναι έπισης χρήσιμος προκειμένου νά δποδείξωμεν ότι ώρισμέναι άκολουθίαι δέν συγκλίνουν έν R. Ούτως, ή άκολουθία 1, 2, ..., v, ... δέν συγκλίνει έν R, διότι αύτη δέν είναι φραγμένη (διατί ;).

§ 139. Ιδιότης V.—Τὸ ἄθροισμα ἢ ἡ διαφορὰ δύο συγκλινουσῶν ἀκολουθῶν συγκλίνει ἀντιστοίχως πρὸς τὸ ἄθροισμα ἢ τὴν διαφορὰν τῶν ὄρίων αὐτῶν.

"Ητοι:

$$\boxed{\text{'Εὰν } \left. \begin{array}{l} a_v \rightarrow a \\ \beta_v \rightarrow \beta \end{array} \right\} \implies a_v \pm \beta_v \rightarrow a \pm \beta}$$

'Α πόδειξις. Θὰ δποδείξωμεν τὴν ιδιότητα μόνον διὰ τὸ ἄθροισμα, ἀναλόγως ἐργαζόμεθα καὶ διὰ τὴν διαφορὰν $a_v - \beta_v$, $v = 1, 2, \dots$

Πράγματι· ἐπειδὴ $a_v - a$ καὶ $\beta_v - \beta$, $v = 1, 2, \dots$ είναι μηδενικαὶ ἀκολουθίαι καὶ τὸ ἄθροισμά των :

$$(\alpha_v - a) + (\beta_v - \beta) = (\alpha_v + \beta_v) - (a + \beta), \quad v = 1, 2, \dots$$

είναι μηδενική ἀκολουθία.

$$\text{'Αρα: } \alpha_v + \beta_v \rightarrow a + \beta.$$

Παρατήρησεις: 1). Η ἀνωτέρω ιδιότης γράφεται συνήθως ὡς ἔξῆς :

$$\lim(a_v \pm \beta_v) = \lim a_v \pm \lim \beta_v.$$

"Ητοι: Τὸ δριὸν ἄθροισματος (ἀντιστοίχως διαφορᾶς) δύο συγκλινουσῶν ἀκολουθῶν ίσονται πρὸς τὸ ἄθροισμα (ἀντιστοίχως διαφοράν) τῶν ὄρίων αὐτῶν.

2). Η ἀνωτέρω ιδιότης ισχύει καὶ διὰ πεπερασμένας τὸ πλῆθος συγκλινούσας ἀκολουθίας, ήτοι : $\lim(a_v + \beta_v + \dots + x_v) = \lim a_v + \lim \beta_v + \dots + \lim x_v$.

3). Η ἀνωτέρω ιδιότης δὲν ισχύει διὰ συγκλινούσας ἀκολουθίας ἀπέριον πλήθους. Περὶ τούτου πειθόμεθα ἐκ τοῦ ἔξης παραδείγματος.

"Εστω εὐθύγραμμον τμῆμα AB μήκους ίσου πρὸς τὴν μονάδα, τὸ δποῖον διαιροῦμεν εἰς n ίσα μέρη, ἔνθα $n \in \mathbb{N}$. Τότε τὸ ἄθροισμα :

$$\frac{1}{v} + \frac{1}{v} + \dots + \frac{1}{v},$$

ἔὰν ἔχῃ v προσθετέους, θὰ είναι ίσον πρὸς : $\frac{1}{v} \cdot v = 1$, διὰ κάθε $v \in \mathbb{N}$.

'Εὰν ἐφαρμόσωμεν τὴν ἀνωτέρω ιδιότητα διὰ τὸ ὡς ἄνω ἄθροισμά ἔχομεν :

$$\lim\left(\frac{1}{v} + \frac{1}{v} + \dots + \frac{1}{v}\right) = \lim \frac{1}{v} + \lim \frac{1}{v} + \dots + \lim \frac{1}{v} = 0 + 0 + \dots + 0 = 0,$$

ήτοι ψευδές, καθ' ὅσον τὸ εὐθύγραμμον τμῆμα AB ἐλήφθη μὲ μῆκος ίσου πρὸς τὴν μονάδα.

§ 140. Ιδιότης VI.—"Εστω ἡ ἀκολουθία a_v , $v = 1, 2, \dots$ Τότε ισχύει :

$$\boxed{\text{'Εὰν } a_v \rightarrow a \implies \lambda a_v \rightarrow \lambda a \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}}$$

'Α πόδειξις. Πράγματι· διότι ἡ ἀκολουθία :

$$\lambda a_v - \lambda a = \lambda(a_v - a), \quad v = 1, 2, \dots$$

είναι μηδενική, καθόσον ἡ ἀκολουθία $a_v - a$, $v = 1, 2, \dots$ είναι μηδενική.

Παρατήρησις: Έκ τού συμπεράσματος τής άνωτέρω ιδιότητος συνάγεται ότι έπι-
τρέπεται νά γράφωμεν :

$$\lim(\lambda \cdot \alpha_v) = \lambda \cdot \lim \alpha_v, \quad \text{διάλ κάθε } \lambda \in \mathbb{R} \text{ μὲν } \lambda = \text{σταθερόν.}$$

Ούτω : $\lim \frac{5}{v} = 5 \cdot \lim \frac{1}{v} = 5 \cdot 0 = 0.$

Έκ τῶν ιδιοτήτων V καὶ VI ἔπειται εύκόλως ή :

§ 141. Ιδιότης VII. — "Εστωσαν αἱ ἀκολουθίαι $\alpha_v, \beta_v, v = 1, 2, \dots$ Τότε
ἰσχύει :

'Εὰν	$\alpha_v \rightarrow \alpha$ $\beta_v \rightarrow \beta$	}	⇒	$\xi \alpha_v + \eta \beta_v \rightarrow \xi \alpha + \eta \beta \quad \forall \xi, \eta \in \mathbb{R}.$
------	--	---	---	---

§ 142. Ιδιότης VIII. — Τὸ γινόμενον δύο συγκλινουσῶν ἀκολουθιῶν συγ-
κλίνει πρὸς τὸ γινόμενον τῶν ὄριων αὐτῶν.

"Ητοι :

'Εὰν	$\alpha_v \rightarrow \alpha$ $\beta_v \rightarrow \beta$	}	⇒	$\alpha_v \beta_v \rightarrow \alpha \beta$
------	--	---	---	---

'Απόδειξις. Πράγματι ή ἀκολουθία :

$\alpha_v \beta_v - \alpha \beta = \alpha_v \beta_v - \beta_v \alpha + (\beta_v \alpha - \alpha \beta) = \beta_v (\alpha_v - \alpha) + \alpha (\beta_v - \beta), v = 1, 2, \dots$
είναι μηδενική, διότι ἀφ' ἐνὸς μὲν ή $\alpha_v - \alpha \rightarrow 0$ καὶ $\beta_v, v = 1, 2, \dots$ ώς συγ-
κλίνουσα είναι φραγμένη, ἅρα $\beta_v (\alpha_v - \alpha) \rightarrow 0$, ἀφ' ἔτερου δὲ $\beta_v - \beta \rightarrow 0$ καὶ
α σταθερά, ἅρα $\alpha (\beta_v - \beta) \rightarrow 0$. Επομένως ή $\alpha_v \beta_v - \alpha \beta, v = 1, 2, \dots$ είναι μη-
δενικὴ ἀκολουθία, ώς ἀθροισμα μηδενικῶν ἀκολουθιῶν, ὅθεν : $\alpha_v \beta_v \rightarrow \alpha \beta$.

Παρατήρησεις: 1). Τὸ συμπέρασμα τῆς άνωτέρω ιδιότητος γράφεται συνήθως ώς
έξης :

$$\lim(\alpha_v \cdot \beta_v) = \lim \alpha_v \cdot \lim \beta_v.$$

"Ητοι : Τὸ ὄριον τοῦ γινομένου δύο συγκλινουσῶν ἀκολουθιῶν ισοῦται πρὸς τὸ γινόμενον
τῶν ὄριων τῶν παραγόντων.

2). Η άνωτέρω ιδιότης ισχύει γενικώτερον διὰ περισσοτέρους παράγοντας, ἀλλὰ πεπερα-
σμένον τὸ πλῆθος, ήτοι : $\lim(\alpha_v \cdot \beta_v \cdot \gamma_v \cdots x_v) = \lim \alpha_v \cdot \lim \beta_v \cdot \lim \gamma_v \cdots \lim x_v$.

Τὸ διτί ή άνωτέρω ιδιότης δὲν ισχύει, ὅταν τὸ πλῆθος τῶν παραγόντων δὲν είναι πεπε-
ρασμένον, πειθόμεθα ἐκ τοῦ έξης παραδείγματος : "Εστω ή ἀκολουθία :

$$\left(1 + \frac{1}{v}\right)^v = \left(1 + \frac{1}{v}\right) \cdot \left(1 + \frac{1}{v}\right) \cdots \left(1 + \frac{1}{v}\right), \quad v = 1, 2, \dots$$

Κατὰ τὴν ιδιότητα VIII θὰ ἔχωμεν :

$$\lim \left(1 + \frac{1}{v}\right)^v = \lim \left(1 + \frac{1}{v}\right) \cdot \lim \left(1 + \frac{1}{v}\right) \cdots \lim \left(1 + \frac{1}{v}\right).$$

ἀλλὰ $\lim \left(1 + \frac{1}{v}\right) = 1 + \lim \frac{1}{v} = 1 + 0 = 1$ καὶ τὸ γινόμενον δλων τῶν παραγόντων
είναι ίσον πρὸς τὴν μονάδα, ἅρα $\lim \left(1 + \frac{1}{v}\right)^v = 1$, ὅπερ ἀτοπον, διότι ώς θὰ ίδωμεν κα-

τωτέρω $\lim \left(1 + \frac{1}{v}\right)^v \equiv e = 2,7182818\dots$

§ 143. Ιδιότης IX. — 'Εάν $\beta_v \rightarrow \beta \neq 0$ και $\beta_v \neq 0 \forall v \in \mathbb{N}$, τότε ή άκολουθία $\frac{1}{\beta_v}, v = 1, 2, \dots$ συγκλίνει εις τὸ $\frac{1}{\beta}$, ήτοι $\frac{1}{\beta_v} \rightarrow \frac{1}{\beta}$.

'Απόδειξις: Πράγματι, ή άκολουθία $\frac{1}{\beta_v} - \frac{1}{\beta} = \frac{\beta - \beta_v}{\beta \beta_v} = -\frac{1}{\beta \beta_v} (\beta_v - \beta), v = 1, 2, \dots$ είναι μηδενική, διότι ή $\beta_v - \beta \rightarrow 0$ και ή $\frac{1}{\beta \beta_v}, v = 1, 2, \dots$ είναι φραγμένη ἐν \mathbf{R} , συμβαίνει δὲ τοῦτο, διότι ἔχομεν διαδοχικῶς:

$$\beta_v \rightarrow \beta \Rightarrow \forall \epsilon > 0, \text{ ἄρα καὶ διὰ } \epsilon = \frac{|\beta|}{2} > 0, \exists v_0 = v_p(\epsilon) : |\beta_v - \beta| < \frac{|\beta|}{2} \forall v \geq v_0.$$

'Αλλά, $|\beta_v - \beta| \leq |\beta| - |\beta_v|$. Ωστε $|\beta_v| > |\beta| - \frac{|\beta|}{2} = \frac{|\beta|}{2} > 0 \forall v \geq v_0$ καὶ ἄρα

$$\left| \frac{1}{\beta \beta_v} \right| = \frac{1}{|\beta| |\beta_v|} < \frac{2}{|\beta|^2} = \frac{2}{\beta^2} \quad \forall v \geq v_0 = v_0(\epsilon), \text{ ὅτε ἐάν τεθῇ}$$

$$\phi \equiv \max \left\{ \frac{1}{|\beta \beta_1|}, \frac{1}{|\beta \beta_2|}, \dots, \frac{1}{|\beta \beta_{v_0-1}|}, \frac{2}{\beta^2} \right\}$$

Θὰ είναι $\left| \frac{1}{\beta \beta_v} \right| \leq \phi \quad \forall v \in \mathbb{N}$, ήτοι ή άκολουθία $\frac{1}{\beta \beta_v}, v = 1, 2, \dots$ είναι

φραγμένη. Ἀρα $\left(\frac{1}{\beta_v} - \frac{1}{\beta} \right) \rightarrow 0$. Ήτοι: $\lim \frac{1}{\beta_v} = \frac{1}{\beta} = \lim \beta_v$.

§ 144. Ιδιότης X. — 'Εάν $a_v \rightarrow a, \beta_v \rightarrow \beta \neq 0$ καὶ είναι $\beta_v \neq 0$ διὰ κάθε $v = 1, 2, \dots$, τότε ισχύει :

$$\lim \frac{a_v}{\beta_v} = \frac{a}{\beta} = \frac{\lim a_v}{\lim \beta_v}$$

'Υπόδειξις. Η ἀπόδειξις ἀπλουστάτη, ἃν ληφθοῦν ὑπ' ὅψιν αἱ ιδιότητες VIII καὶ IX.

§ 145. Ιδιότης XI. — 'Εάν δύο άκολουθίαι a_v καὶ $\beta_v, v = 1, 2, \dots$ συγκλίνουν καὶ ισχύῃ $a_v \leq \beta_v, v = 1, 2, \dots$, τότε θὰ ἔχωμεν: $\lim a_v \leq \lim \beta_v$.

'Απόδειξις. Εστωσαν α καὶ β τὰ ὄρια τῶν $a_v, v = 1, 2, \dots$ καὶ $\beta_v, v = 1, 2, \dots$ ἀντιστοίχως, ήτοι $\lim a_v = \alpha$ καὶ $\lim \beta_v = \beta$. Θὰ δείξωμεν ὅτι $\alpha \leq \beta$.

'Ἐν πρώτοις ἔχομεν $\beta_v - a_v \geq 0$ διὰ κάθε $v = 1, 2, \dots$ Εξ ἀλλου ή άκολουθία $\beta_v - a_v \rightarrow \beta - \alpha$. Τοῦτο σημαίνει ὅτι διὰ κάθε $\epsilon > 0$ θὰ ἔχωμεν:

$$(\beta - \alpha) - \epsilon < \beta_v - a_v < (\beta - \alpha) + \epsilon \quad \forall v \geq v_0 = v_0(\epsilon).$$

'Εάν ητο $\alpha > \beta$, τότε $\alpha - \beta > 0$ καὶ ή ἀνωτέρω ἀνισότης διὰ $\epsilon = \alpha - \beta > 0$ γίνεται: $2(\beta - \alpha) < \beta_v - a_v < 0$ διὰ κάθε $v \geq v_0(\epsilon)$,

δηλαδὴ $\beta_v < a_v$ τελικῶς δι' ὅλους τοὺς δείκτας, ὅπερ ἀντίκειται εἰς τὴν ὑπόθεσιν.

Ἀρα:

$$\alpha \leq \beta.$$

Θεωρούντες τὴν β_v , $v = 1, 2, \dots$ ἢ τὴν α_v , $v = 1, 2, \dots$ ὡς σταθεράν ἀκολουθίαν ἔχομεν ἀντ. στοίχως τὰ κάτωθι πορίσματα:

Πόρισμα I. — Εὰν οἱ ὅροι ἀκολουθίας a_v , $v = 1, 2, \dots$ εἰναι ἀπό τινος δείκτου καὶ πέραν μικρότεροι ἢ οἱ ἀριθμοῦ β , τότε ἴσχυει : $\lim a_v \leq \beta$.

Ητοι :
$$\begin{array}{l} \text{'Εὰν } \left. \begin{array}{l} \alpha_v \rightarrow \alpha \\ \alpha_v \leq \beta, \forall v \geq v_0 \end{array} \right\} \implies \alpha \leq \beta. \end{array}$$

Πόρισμα II. — Εστω ἡ ἀκολουθία β_v , $v = 1, 2, \dots$ Τότε ἴσχυει :

Εὰν
$$\left. \begin{array}{l} \beta_v \rightarrow \beta \\ \alpha \leq \beta_v, \forall v \geq v_0 \end{array} \right\} \implies \alpha \leq \beta = \lim \beta_v$$

§ 146. Ιδιότης XII. — Εστωσαν αἱ ἀκολουθίαι α_v , β_v , γ_v , $v = 1, 2, \dots$ Τότε ἴσχυει :

Εὰν
$$\left. \begin{array}{l} \beta_v \rightarrow \alpha, \quad \gamma_v \rightarrow \alpha \\ \beta_v \leq \alpha_v \leq \gamma_v, v = 1, 2, \dots \end{array} \right\} \implies \alpha_v \rightarrow \alpha$$

Α πόδειξις. Απὸ $\beta_v \rightarrow \alpha$ ἐπεταί: διὰ κάθε $\epsilon > 0$ ὑπάρχει δείκτης $v_1(\epsilon)$ τοιοῦτος, ὥστε νὰ ἴσχύῃ : $\alpha - \epsilon < \beta_v < \alpha + \epsilon$ διὰ κάθε $v \geq v_1(\epsilon)$. Ομοίως ἀπὸ $\gamma_v \rightarrow \alpha$ ἐπεταί ὅτι ὑπάρχει δείκτης $v_2(\epsilon)$ τοιοῦτος, ὥστε νὰ ἴσχύῃ : $\alpha - \epsilon < \gamma_v < \alpha + \epsilon$ διὰ κάθε $v \geq v_2(\epsilon)$.

Τότε ὅμως, ἐὰν $v_0 = \max [v_1(\epsilon), v_2(\epsilon)]$, θὰ ἔχωμεν διὰ κάθε $v \geq v_0$ $\alpha - \epsilon < \beta_v \leq \alpha_v \leq \gamma_v < \alpha + \epsilon$,

Ητοι $\alpha - \epsilon < \alpha_v < \alpha + \epsilon$
ἢ ισοδυνάμως $|\alpha_v - \alpha| < \epsilon$ διὰ κάθε $v \geq v_0$.

Άρα : $\lim \alpha_v = \alpha$.

§ 147. Παραδείγματα ἐφαρμογῆς τῶν ἀνωτέρω ιδιοτήτων.

Παράδειγμα 1ον : Δείξατε ὅτι :

$$\lim \frac{2v^2 + 4v - 7}{3v^2 + 1} = \frac{2}{3}.$$

Λύσις. Διαιροῦμεν ἀριθμητὴν καὶ παρονομαστὴν τοῦ κλάσματος διὰ τῆς μεγαλυτέρας δυνάμεως τοῦ v , δηλ. διὰ v^2 καὶ ἡ ἀκολουθία γράφεται :

$$\frac{2v^2 + 4v - 7}{3v^2 + 1} = \frac{2 + \frac{4}{v} - \frac{7}{v^2}}{3 + \frac{1}{v^2}}.$$

Αἱ ἀκολουθίαι ὅμως $\frac{4}{v} = 4 \cdot \frac{1}{v}$, $v = 1, 2, \dots$, $\frac{1}{v^2}, v = 1, 2, \dots$ καὶ $\frac{7}{v^2} = 7 \cdot \frac{1}{v^2}$
 $v = 1, 2, \dots$ εἰναι πᾶσαι μηδενικαὶ ἀκολουθίαι. Ἐπομένως ἔχομεν κατὰ σειράν :

$$\lim_{v \rightarrow \infty} \frac{2v^2 + 4v - 7}{3v^2 + 1} = \lim_{v \rightarrow \infty} \frac{2 + \frac{4}{v} - \frac{7}{v^2}}{3 + \frac{1}{v^2}} = \frac{\lim \left(2 + \frac{4}{v} - \frac{7}{v^2} \right)}{\lim \left(3 + \frac{1}{v^2} \right)} = \\ = \frac{2 + \lim \frac{4}{v} - \lim \frac{7}{v^2}}{3 + \lim \frac{1}{v^2}} = \frac{2 + 0 - 0}{3 + 0} = \frac{2}{3}.$$

"Ωστε : $\lim_{v \rightarrow \infty} \frac{2v^2 + 4v - 7}{3v^2 + 1} = \frac{2}{3} \equiv$ μὲ τὸν λόγον τῶν συντελεστῶν τῶν μεγιστοβαθμίων ὅρων ἀριθμητοῦ καὶ παρονομαστοῦ.

Γενικῶς : "Οταν ὁ βαθμὸς τοῦ ἀριθμητοῦ εἴναι ἵσος μὲ τὸν βαθμὸν τοῦ παρονομαστοῦ, τὸ κλάσμα ἔχει δριον τὸν λόγον τῶν συντελεστῶν τῶν μεγιστοβαθμίων ὅρων ἀριθμητοῦ καὶ παρονομαστοῦ.

Παράδειγμα 2ον : Δείξατε ὅτι ἡ ἀκολουθία a_v , $v = 1, 2, \dots$, ἡ ὥποια ὀρίζεται ὑπὸ τοῦ τύπου :

$$a_v \equiv \frac{v^3 - v^2 + 1}{v^5 + 2v^4 - 3}$$

εἶναι μηδενική.

Λύσις. Διαιροῦμεν ἀριθμητὴν καὶ παρονομαστὴν τοῦ κλάσματος διὰ τῆς μεγαλυτέρας δυνάμεως τοῦ v , δηλ. διὰ v^5 , ὅτε λαμβάνομεν τὸ ἴσοδύναμον κλάσμα:

$$\frac{\frac{1}{v^2} - \frac{1}{v^3} + \frac{1}{v^5}}{1 + \frac{2}{v} - \frac{3}{v^5}}.$$

Ἄλλα $\lim \left(\frac{1}{v^2} - \frac{1}{v^3} + \frac{1}{v^5} \right) = \lim \frac{1}{v^2} - \lim \frac{1}{v^3} + \lim \frac{1}{v^5} = 0 - 0 + 0 = 0$

καὶ $\lim \left(1 + \frac{2}{v} - \frac{3}{v^5} \right) = 1 + 2 \lim \frac{1}{v} - 3 \lim \frac{1}{v^5} = 1 + 2 \cdot 0 - 3 \cdot 0 = 1$.

Τότε, δυνάμει τῆς ἴδιότητος X τῶν συγκλινουσῶν ἀκολουθιῶν, ἔχομεν :

$$\lim a_v \equiv \lim \frac{v^3 - v^2 + 1}{v^5 + 2v^4 - 3} = \lim \frac{\frac{1}{v^2} - \frac{1}{v^3} + \frac{1}{v^5}}{1 + \frac{2}{v} - \frac{3}{v^5}} = \frac{\lim \left(\frac{1}{v^2} - \frac{1}{v^3} + \frac{1}{v^5} \right)}{\lim \left(1 + \frac{2}{v} - \frac{3}{v^5} \right)} = \frac{0}{1} = 0.$$

Γενικῶς : "Οταν ὁ βαθμὸς τοῦ ἀριθμητοῦ εἴναι μικρότερος τοῦ βαθμοῦ τοῦ παρονομαστοῦ τὸ κλάσμα ἔχει δριον τὸ μηδέν.

Παράδειγμα 3ον. Νά εύρεθη τὸ δριον τῆς ἀκολουθίας a_v , $v = 1, 2, \dots$ μὲν

$$a_v = \sqrt[v]{a}, \quad \text{ενθα } a > 0.$$

Λύσις (i). Θεωρήσωμεν τὴν περίπτωσιν καθ' ἥν $\alpha > 1$, τότε εἶναι καὶ $\sqrt[v]{\alpha} > 1$. Θέτοντες $\sqrt[v]{\alpha} = 1 + \epsilon_v$, ὅπου $\epsilon_v > 0$, ἔχομεν: $\alpha = (1 + \epsilon_v)^v$, κατὰ τὴν ἀνισότητα τοῦ Bernoulli (βλ. ἐφαρμογὴ 2α, § 28),

$$\alpha = (1 + \epsilon_v)^v \geq 1 + v\epsilon_v > v\epsilon_v$$

$$\text{ὅποτε: } 0 < \epsilon_v < \alpha \cdot \frac{1}{v}.$$

Αλλὰ $\lim \alpha \cdot \frac{1}{v} = 0$ καὶ κατ' ἀκολουθίαν (§146) $\lim \epsilon_v = 0$.

"Οθεν $\lim \sqrt[v]{\alpha} = \lim (1 + \epsilon_v) = 1 + \lim \epsilon_v = 1$.

(ii). "Εστω ὅτι $\alpha < 1$, τότε εἶναι καὶ $\sqrt[v]{\alpha} < 1$.

Θέτοντες $\sqrt[v]{\alpha} = \frac{1}{1 + \epsilon_v}$, $\epsilon_v > 0$, ἔχομεν:

$$\alpha = \frac{1}{(1 + \epsilon_v)^v} \leq \frac{1}{1 + v\epsilon_v} < \frac{1}{v \cdot \epsilon_v} \implies \epsilon_v < \frac{1}{\alpha} \cdot \frac{1}{v} \quad (\alpha > 0)$$

Αλλὰ $\lim \frac{1}{\alpha} \cdot \frac{1}{v} = \frac{1}{\alpha} \lim \frac{1}{v} = 0$ καὶ ἐπομένως $\lim \epsilon_v = 0$.

"Οθεν $\lim \sqrt[v]{\alpha} = 1$.

(iii). Διὰ $\alpha = 1$, τότε $\sqrt[v]{\alpha} = \sqrt[v]{1} = 1$, ἀρα $\lim \sqrt[v]{\alpha} = \lim \sqrt[v]{1} = 1$.

Παράδειγμα 4ον. Δεῖξατε ὅτι :

$$\lim \sqrt[v]{v} = 1.$$

Απόδειξις. Ἐν πρώτοις παρατηροῦμεν ὅτι ἰσχύει $\sqrt[v]{v} > 1$ διὰ κάθε $v = 2, 3, \dots$ ὅθεν δυνάμεθα νὰ θέσωμεν :

$$(1) \quad \sqrt[v]{v} = (1 + \delta_v)^v, \quad \text{ὅπου } \delta_v > 0 \quad \text{διὰ κάθε } v = 2, 3, \dots$$

Ἐκ τῆς (1) ἔχομεν: $\sqrt[v]{v} = (1 + \delta_v)^v$ ἢ κατὰ τὴν ἀνισότητα τοῦ Bernoulli

$$(2) \quad \sqrt[v]{v} = (1 + \delta_v)^v \geq 1 + v\delta_v > v\delta_v$$

$$\text{ἢ } 0 < \delta_v < \frac{\sqrt[v]{v}}{v} = \frac{1}{\sqrt[v]{v}}.$$

Αλλὰ $\lim \frac{1}{\sqrt[v]{v}} = 0$ (βλ. πρδ. 4, § 121) καὶ συνεπῶς $\lim \delta_v = 0$.

Τότε ὅμως $1 + \delta_v \rightarrow 1 + 0 = 1$ καὶ $(1 + \delta_v)^v \rightarrow 1 \cdot 1 = 1$.

"Οθεν ἐκ τῆς (1) ἔχομεν: $\lim \sqrt[v]{v} = 1$.

Παράδειγμα

'Εάν $\lim \alpha_v = a$, $a_v > 0$, $a \neq 0 \implies \lim \sqrt{a_v} = \sqrt{a}$.

'Απόδειξη. Προφανώς ισχύει :

$$0 < \frac{1}{\sqrt{a_v} + \sqrt{a}} < \frac{1}{\sqrt{a}}.$$

Έπομένως :

$$|\sqrt{a_v} - \sqrt{a}| = \frac{|a_v - a|}{\sqrt{a_v} + \sqrt{a}} < \frac{1}{\sqrt{a}} \cdot |a_v - a|.$$

'Αλλά $a_v - a \rightarrow 0$ (διότι $a_v \rightarrow a$), και συνεπώς $\sqrt{a_v} - \sqrt{a} \rightarrow 0$.

"Οθεν : $\lim \sqrt{a_v} = \sqrt{a}$.

Παρατηρήσεις :

1). Έκ τοῦ συμπεράσματος τοῦ παραδείγματος 5 συνάγεται ότι έπιτρέπεται νὰ γράφωμεν:

$$\lim \sqrt{a_v} = \sqrt{\lim a_v}$$

ήτοι : τὰ σύμβολα \lim καὶ $\sqrt{\quad}$ έπιτρέπεται νὰ ἐναλλάσσωνται ἀριστερὰ τῆς ἀκολουθίας a_v , $v = 1, 2, \dots$

2). Μὲ τὰς ύποθέσεις τοῦ παραδείγματος 5 ισχύει γενικώτερον :

$$\lim \sqrt[k]{a_v} = \sqrt[k]{\lim a_v}, \quad \text{ενθα} \ k \in \mathbb{N} \ (\text{διαστί};).$$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

260. Νὰ εύρεθοῦν, ἔὰν ὑπάρχουν, τὰ δρια τῶν ἀκολουθίῶν μὲ γενικοὺς δρους :

$$1) \quad a_v = \frac{v^2 + 3}{2v^2 - 5v + 7}, \quad 2) \quad a_v = \sqrt{1 + \frac{4}{v}}, \quad 3) \quad a_v = \frac{v}{v^2 + 3},$$

$$4) \quad a_v = \left(2 + \frac{1}{v}\right)^2, \quad 5) \quad a_v = \frac{2v^3 - 3v + 2}{5v^3 + 7}, \quad 6) \quad a_v = \sqrt[3]{\frac{8v^3 + 5}{64v^2 + v + 1}}$$

261. Διὰ $\epsilon > 0$, νὰ προσδιορισθῇ δείκτης $v_0 = v_0(\epsilon)$, ὥστε διὰ $v \geq v_0(\epsilon)$ νὰ είναι :

$$\left| \frac{v^2 + 1}{v^2 - 1} - 1 \right| < \epsilon.$$

262. Δείξατε ότι ή ἀκολουθία $a_v = (-1)^v \cdot v$, $v = 1, 2, \dots$ δὲν συγκλίνει ἐν \mathbb{R} .

263. Όμοιώς ή ἀκολουθία $a_v = v^2$, $v = 1, 2, \dots$

264. Είναι ή ἀκολουθία $a_v = \frac{2v^2}{v^2 + 1}$, $v = 1, 2, \dots$ φραγμένη ;

265. Έάν ή ἀκολουθία a_v , $v = 1, 2, \dots$ είναι φραγμένη, δείξατε ότι καὶ ή ἀκολουθία : $\frac{1}{v} \cdot a_v$, $v = 1, 2, \dots$ είναι φραγμένη καὶ ισχύει :

$$\lim \frac{1}{v} a_v = 0.$$

266. Δείξατε ότι : $\lim \frac{v^4 - 4v^3 + v + 6}{2v^4 + 7v^2 + 2v - 1} = \frac{1}{2}$.

267. Έάν ή ἀκολουθία a_v , $v = 1, 2, \dots$ συγκλίνῃ ἐν \mathbb{R} , δείξατε ότι καὶ ή ἀκολουθία β_v , $v = 1, 2, \dots$, δπου $\beta_v = a_{v+1} \quad \forall v \in \mathbb{N}$, συγκλίνει ἐν \mathbb{R} καὶ ισχύει :

$$\lim a_{v+1} = \lim a_v.$$

268. Δείξατε ότι : $\lim \sqrt[v]{v^2 + v} = 1$.

MONOTONOI AKOLOUThIAI

§ 148. Όρισμοί.— Η άκολουθία $\alpha_v = 2^v$, $v = 1, 2, \dots$, δηλαδή ή άκολουθία:

$$2, 2^2, 2^3, \dots, 2^v, \dots$$

διατηρεῖ προφανῶς τὴν διάταξιν τῶν φυσικῶν ἀριθμῶν, δηλαδή ισχύει

$$v < \mu \implies 2^v = \alpha_v < \alpha_\mu = 2^\mu.$$

Γενικῶς μία άκολουθία πραγματικῶν ἀριθμῶν διατηροῦσα, ώς καὶ ή $\alpha_v = 2^v$, $v = 1, 2, \dots$ τὴν διάταξιν τῶν φυσικῶν ἀριθμῶν καλεῖται «γνησίως αὐξουσα». Ακριβέστερον διὰ μίαν άκολουθίαν α_v , $v = 1, 2, \dots$ δρίζομεν:

Η άκολουθία α_v , $v = 1, 2, \dots$ καλεῖται γνησίως αὐξουσα τότε, καὶ μόνον τότε, ἂν ισχύῃ: $\alpha_v < \alpha_{v+1}$ διὰ κάθε $v = 1, 2, \dots$

Κατ' ἀναλογίαν δρίζομεν:

Η άκολουθία α_v , $v = 1, 2, \dots$ καλεῖται γνησίως φθίνουσα τότε, καὶ μόνον τότε, ἂν ισχύῃ: $\alpha_v > \alpha_{v+1}$ διὰ κάθε $v = 1, 2, \dots$

Οὕτως ή άκολουθία $\alpha_v = \frac{1}{v}$, $v = 1, 2, \dots$ εἶναι γνησίως φθίνουσα, διότι

διὰ πᾶν v εἶναι: $\alpha_v = \frac{1}{v} > \frac{1}{v+1} = \alpha_{v+1}$.

Ἄσθεωρήσωμεν ἡδη τὴν άκολουθίαν: $1, 1, 2, 2, 3, 3, \dots, v, v, \dots$ Διὰ τὴν ἐν λόγῳ άκολουθίαν παρατηροῦμεν ὅτι ισχύει:

$$v < \mu \implies \alpha_v \leq \alpha_\mu$$

λέγομεν δὲ εἰς τὴν περίπτωσιν αὗτὴν ὅτι ή άκολουθία α_v , $v = 1, 2, \dots$ εἶναι αὐξουσα.

Ακριβέστερον: θὰ λέγομεν ὅτι ή άκολουθία α_v , $v = 1, 2, \dots$ εἶναι αὐξουσα τότε, καὶ μόνον τότε, ἂν ισχύῃ: $\alpha_v \leq \alpha_{v+1}$ διὰ κάθε $v = 1, 2, \dots$

Όμοίως: Η άκολουθία α_v , $v = 1, 2, \dots$ εἶναι φθίνουσα τότε, καὶ μόνον τότε, ἂν ισχύῃ: $\alpha_v \geq \alpha_{v+1}$ διὰ κάθε $v = 1, 2, \dots$

Οὕτω, λ.χ., ή άκολουθία $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \frac{1}{5}, \dots$ εἶναι φθίνουσα

(μὴ αὔξουσα). Κατὰ ταῦτα λέγομεν ὅτι μία άκολουθία α_v , $v = 1, 2, \dots$ εἶναι γνησίως μονότονος τότε, καὶ μόνον τότε, ἂν αὕτη εἶναι γνησίως αὔξουσα ή γνησίως φθίνουσα.

Ἀντιστοίχως δὲ λέγομεν ὅτι ή α_v , $v = 1, 2, \dots$ εἶναι μονότονος, ἂν αὕτη εἶναι αὔξουσα ή φθίνουσα. Προφανῶς κάθε γνησίως μονότονος άκολουθία εἶναι καὶ μονότονος, δὲν ισχύει δῆμως τὸ ἀντίστροφον (διατί;)

Διὰ νὰ δηλώσωμεν τὸ εἶδος τῆς μονοτονίας μιᾶς άκολουθίας χρησιμοποιοῦμεν τὰ κάτωθι σύμβολα:

$$\alpha_v \uparrow \iff \alpha_v \text{ εἶναι γνησίως αὔξουσα}$$

$$\alpha_v \downarrow \iff \alpha_v \text{ εἶναι γνησίως φθίνουσα}$$

$$\alpha_v \uparrow \iff \alpha_v \text{ εἶναι αὔξουσα}$$

$$\alpha_v \downarrow \iff \alpha_v \text{ εἶναι φθίνουσα}$$

‘Η άκολουθία : $\alpha, \alpha, \alpha, \dots, \alpha, \dots$ μὲ δόλους τούς όρους της ίσους μὲ α ἡμπορεῖ νὰ θεωρηθῇ ώς ή (μοναδική) περίπτωσις άκολουθίας, ή δποία εἶναι συγχρόνως αὔξουσα καὶ φθίνουσα. Δηλαδὴ Ισχύει :

‘Η $\alpha_v, v = 1, 2, \dots$ εἶναι σταθερά \iff ή $\alpha_v, v = 1, 2, \dots$ εἶναι ταυτοχρόνως αὔξουσα καὶ φθίνουσα.

Είναι προφανές ὅτι κάθε αὔξουσα άκολουθία εἶναι πάντοτε φραγμένη κάτωθεν μὲ κάτω φράγμα τὸν πρῶτον όρον της, ἐνῶ κάθε φθίνουσα άκολουθία εἶναι φραγμένη ἀνωθεν μὲ ἕνω φράγμα τὸν πρῶτον όρον αὐτῆς. “Οθεν δσάκις κατωτέρω λέγομεν ὅτι : μία μονότονος άκολουθία εἶναι φραγμένη, θὰ ἐννοοῦμεν πάντοτε : ἂν μὲν εἶναι αὔξουσα ή γνησίως αὔξουσα ὅτι : αὗτη ἔχει καὶ ἐν ἕνω φράγμα, ἂν δὲ εἶναι φθίνουσα ή γνησίως φθίνουσα ὅτι : αὗτη ἔχει καὶ ἐν κάτω φράγμα.

§ 149. Τὸ μονότονον καὶ ή σύγκλισις άκολουθίας.—“Ας θεωρήσωμεν πρῶτον τὴν άκολουθίαν $v^2, v = 1, 2, \dots$, ήτοι τὴν :

$$1, 4, 9, 16, \dots, v^2, \dots$$

καὶ δεύτερον τὴν άκολουθίαν $\frac{v}{v+1}, v = 1, 2, \dots$, ήτοι τὴν :

$$\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \dots, \frac{v}{v+1}, \dots$$

Δι’ ἀμφοτέρας παρατηροῦμεν ὅτι εἶναι αὔξουσαι καὶ μάλιστα γνησίως αὔξουσαι άκολουθίαι. Ἐκ τούτων ή πρώτη δὲν εἶναι φραγμένη (πρβλ. § 117), οὔτε δὲ συγκλίνει πρὸς πεπερασμένον ἀριθμόν. Ἀντιθέτως ή δευτέρα, δηλαδὴ ή άκολουθία

$\frac{v}{v+1}, v = 1, 2, \dots$ εἶναι φραγμένη, διότι : $\left| \frac{v}{v+1} \right| = \frac{v}{v+1} \leq 1$ διὰ κάθε $v = 1, 2, \dots$ Ἐπὶ πλέον παρατηροῦμεν ὅτι ή άκολουθία αὗτη συγκλίνει καὶ μάλιστα $\lim \frac{v}{v+1} = 1$.

Τὸ γεγονὸς ὅτι ή αὔξουσα καὶ φραγμένη άκολουθία $\frac{v}{v+1}, v = 1, 2, \dots$

συγκλίνει πρὸς πραγματικὸν ἀριθμὸν δεχόμεθα ὅτι Ισχύει γενικῶς διὰ κάθε αὔξουσαν καὶ φραγμένην άκολουθίαν. Ἀκριβέστερον δεχόμεθα τὸ άκόλουθον :

§ 150. Αξίωμα.—Κάθε μονότονος καὶ φραγμένη άκολουθία $\alpha_v, v = 1, 2, \dots$ εἶναι συγκλίνουσα ἐν R .

Παρατηροῦμεν ὅτι τὸ ἀνωτέρω ἀξίωμα ἔξασφαλίζει τὴν ὑπαρξιν τοῦ όρου εἰς τὸ σύνολον R μιᾶς άκολουθίας $\alpha_v, v = 1, 2, \dots$ ὑπὸ ὠρισμένας ὑποθέσεις. Δὲν παρέχει βεβαίως οὐδεμίαν ἔνδειξιν περὶ τοῦ πῶς θὰ ὑπολογισθῇ σαφῶς τὸ όριον, δπωσδήποτε ὅμως εἶναι σπουδαῖον νὰ γνωρίζωμεν εἰς πολλὰς περιπτώσεις διότι μία άκολουθία συγκλίνει ἐν R , διότι τότε εἴμεθα περισσότερον εἰς θέσιν νὰ ὑπολογίσωμεν τὴν δριακήν τιμὴν τῆς άκολουθίας. Τὸ ἀνωτέρω ἀξίωμα ἀπαντᾶται εἰς τὰ Ἀνώτερα Μαθηματικὰ ώς θεώρημα, ή ἀπόδειξις τοῦ όποιου στηρίζεται εἰς ἔτερον ἀξίωμα.


Έκ τοῦ ἀνωτέρω ἀξιώματος ἔπονται αἱ εἰδικώτεραι προτάσεις :

α). Ἐὰν μία ἀκολουθία a_v , $v = 1, 2, \dots$ είναι αὔξουσα καὶ ἔχει ἐν ἄνω φράγμα τὸν ἀριθμὸν s , τότε είναι συγκλίνουσα καὶ ισχύει : $\lim a_v \leq s$.

β). Ἐὰν μία ἀκολουθία a_v , $v = 1, 2, \dots$ είναι φθίνουσα καὶ ἔχει ἐν κάτω φράγμα τὸν ἀριθμὸν σ , τότε είναι συγκλίνουσα καὶ ισχύει : $\sigma \leq \lim a_v$.

Παράδειγμα 1ον : Ἡ ἀκολουθία $\frac{v-1}{v}$, $v = 1, 2, \dots$ είναι προφανῶς


αὔξουσα καὶ φραγμένη (δ ιότι : $\frac{v-1}{v} = 1 - \frac{1}{v} < 1$), ὅθεν συγκλίνει πρὸς ἀριθμὸν μικρότερον ἢ ἵσον τοῦ 1. Δίδομεν εἰς τὸ κατωτέρῳ σχῆμα τοὺς πέντε πρώτους ὅρους τῆς ἀκολουθίας $\frac{v-1}{v}$, $v = 1, 2, \dots$



Σχ. 10

Παράδειγμα 2ον : Ἡ ἀκολουθία $1 + \frac{1}{v}$, $v = 1, 2, \dots$ είναι προφα-

νῶς φθίνουσα καὶ φραγμένη, μὲν ἐν κάτω φράγμα τὸν ἀριθμὸν 1 (δ ιότι :



Σχ. 11

$1 < 1 + \frac{1}{v}$ διὰ κάθε $v = 1, 2, \dots$), επομένως συγκλίνει πρὸς ἀριθμὸν μεγαλύτερον ἢ ἵσον τοῦ 1.

Εἰς τὸ σχῆμα (11) τῆς ἔναντι σελίδος δίδομεν τοὺς ἐπτὰ πρώτους ὄρους τῆς ἀκολουθίας $\alpha_v = 1 + \frac{1}{v}$, $v = 1, 2, \dots$

Π α ρ α τ ἡ ρ η σις. Εἰς τὴν περιπτωσιν τῆς αὐξούστης καὶ μὴ φραγμένης ἀκολουθίας $\alpha_v = v^2$, $v = 1, 2, \dots$, ἡ ὅποια δὲν συγκλίνει πρὸς πραγματικὸν ἀριθμόν, λέγομεν ὅτι αὕτη ἀπειρόζεται θετικῶς. Ἀλλὰ καὶ γενικώτερον διὰ μίαν αὔξουσαν καὶ μὴ φραγμένην ἀκολουθίαν α_v , $v = 1, 2, \dots$ θὰ λέγωμεν ὅτι αὕτη «ἀπειρόζεται θετικῶς», ἡ ἄλλως «συγκλίνει πρὸς τὸ $+\infty$ » ἢ ἀκόμη «τείνει πρὸς τὸ $+\infty$ » (τὸ σύμβολον $+\infty$ ἀναγιγνώσκεται : «σὺν ἀπειρον»).

Κατ' ἀναλογίαν διὰ μίαν φθίνουσαν καὶ μὴ φραγμένην ἀκολουθίαν πραγματικῶν ἀριθμῶν α_v , $v = 1, 2, \dots$, θὰ λέγωμεν ὅτι αὕτη «ἀπειρόζεται ἀρνητικῶς» ἢ ἄλλως «συγκλίνει πρὸς τὸ $-\infty$ » ἢ ἀκόμη «τείνει πρὸς τὸ $-\infty$ » (τὸ σύμβολον $-\infty$ ἀναγιγνώσκεται : «πλὴν ἀπειρον»).

§ 15t. Ἐφαρμογαὶ ἐπὶ τῶν μονοτόνων ἀκολουθιῶν

Π α ρ α δ ει γ μ α 1ον. Ἐστω ἡ ἀκολουθία τῶν ἐμβαδῶν τῶν εἰς διθέντα κύκλον ἔγγεγραμμένων κανονικῶν πολυγώνων, ἦτοι ἡ ἀκολουθία :

$$E_3, E_4, E_5, \dots, E_v, \dots$$

ὅπου E_v τὸ ἐμβαδὸν τοῦ ἔγγεγραμμένου κανονικοῦ πολυγώνου μὲν τὸ πλευράς.

Εὐκόλως διαπιστοῦμεν ὅτι :

$$E_3 < E_4 < E_5 < \dots < E_v < E_{v+1} < \dots$$

ἦτοι, ἡ ἀκολουθία E_v , $v = 3, 4, \dots$ εἶναι γνησίως αὔξουσα. Ἐπὶ πλέον αὕτη εἶναι πρὸς τὰ ἀνω φραγμένη μὲ ἀνω φράγμα τὸν ἀριθμόν, ὅστις παριστᾶ τὸ ἐμβαδὸν ἐνὸς οἰουδήποτε περιγεγραμμένου εἰς τὸν κύκλον κυρτοῦ πολυγώνου. Ὁθεν, δυνάμει τοῦ ἀνωτέρω ἀξιώματος, συνάγομεν ὅτι ἡ ἐν λόγῳ ἀκολουθία E_v , $v = 3, 4, \dots$ συγκλίνει πρὸς ἔνα πραγματικὸν ἀριθμόν. Τὸν πραγματικὸν αὐτὸν ἀριθμόν, δηλ. τὸ ὅριον τῆς ἀκολουθίας E_v , $v = 3, 4, \dots$, καλοῦμεν, ὡς γνωστὸν ἐκ τῆς Γεωμετρίας, ἐμβαδὸν τοῦ κύκλου.

Π α ρ α δ ει γ μ α 2ον : Μελετήσατε τὴν ὀκολουθίαν :

$$a_1 = \sqrt{2}, \quad a_2 = \sqrt{2 + \sqrt{2}}, \quad a_3 = \sqrt{2 + a_2} = \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2}}}, \dots, \quad a_v = \sqrt{2 + a_{v-1}}, \dots$$

ώς πρὸς τὸ μονότονον καὶ τὴν σύγκλισιν.

Λ ὑ σις : Προφανῶς ἔχομεν : $a_1 < a_2$. Ἐστω ὅτι : $a_k < a_{k+1}$, τότε $2 + a_k < 2 + a_{k+1}$ ἢ $\sqrt{2 + a_k} < \sqrt{2 + a_{k+1}}$. δηλαδὴ $a_{k+1} < a_{k+2}$. Ἀρα, δυνάμει τοῦ θεωρ. τῆς τελείας ἐπαγγωγῆς (§ 28), θὰ ἔχωμεν : $a_v < a_{v+1}$ διὰ κάθε $v = 1, 2, \dots$, ἦτοι ἡ ἀκολουθία $a_v = \sqrt{2 + a_{v-1}}$, $v = 2, 3, \dots$ εἶναι γνησίως αὔξουσα (μονότονος).

Έξετάζομεν τώρα τήν άκολουθίαν ጳν είναι φραγμένη άνωθεν. Πράγματι: $\alpha_1 = \sqrt{2} < 2$, εστω ότι καὶ $\alpha_{v-1} < 2$, τότε $2 + \alpha_{v-1} < 4$, έξοϋ: $\sqrt{2 + \alpha_{v-1}} < 2$ δηλ. $\alpha_v < 2$. "Αρα, κατά τήν άρχην τῆς τελείας έπαιγωγῆς, ίσχύει: $\alpha_v < 2$ διὰ κάθε $v = 1, 2, \dots$, ήτοι ή άκολουθία $\alpha_v = \sqrt{2 + \alpha_{v-1}}$, $v = 2, 3, \dots$ μὲν $\alpha_1 = \sqrt{2}$ είναι φραγμένη άνωθεν.

"Επομένως, δυνάμει τοῦ ἀξιώματος § 150, ή ὡς άνω άκολουθία συγκλίνει πρὸς πραγματικὸν ἀριθμόν, ὅστις θὰ είναι μικρότερος ή ἵσος τοῦ 2 (διατί;).

"Εστω λοιπὸν $\alpha = \lim \alpha_v$, τότε λαμβάνοντες τὰ ὄρια ἀμφοτέρων τῶν μελῶν τῆς $\alpha_v = \sqrt{2 + \alpha_{v-1}}$ ἔχομεν (ἐπειδὴ $\lim \alpha_v = \lim \alpha_{v+1} = \alpha$):

$$\lim \alpha_v = \lim \sqrt{2 + \alpha_{v-1}} = \sqrt{2 + \lim \alpha_{v-1}}$$

$$\text{ἢ } \alpha = \sqrt{2 + \alpha} \quad \text{ἢ } \alpha^2 - \alpha - 2 = 0, \quad \text{ἐκ τῆς ὁποίας εύρισκομεν:} \\ \alpha = 2 \quad \text{καὶ} \quad \alpha = -1.$$

"Η ρίζα $\alpha = -1$ ἀπορρίπτεται, διότι τὸ ὄριον α πρέπει νὰ είναι θετικὸς ἀριθμός, καθ' ὃσον ὅλοι οἱ ὄροι τῆς αὐξούσης άκολουθίας α_v , $v = 1, 2, \dots$ είναι θετικοὶ ἀριθμοί.

"Οθεν:

$$\lim \alpha_v = 2.$$

Παράδειγμα 3ον. Δείξατε ότι ή άκολουθία α_v , $v = 1, 2, \dots$ μὲν:

$$\alpha_{v+1} = \frac{2\alpha_v + 4}{3} \quad \text{καὶ} \quad \alpha_1 = 0$$

συγκλίνει ἐν R. Ποῖον τὸ ὄριον τῆς ἐν λόγῳ άκολουθίας;

"Απόδειξις. Προφανῶς $\alpha_1 < \alpha_2$ (διότι: $\alpha_1 = 0 < \frac{2\alpha_1 + 4}{3} = \frac{4}{3}$).

"Εστω ότι $\alpha_k < \alpha_{k+1}$ δηλ. $\alpha_{k+1} - \alpha_k > 0$, τότε είναι καὶ $\alpha_{k+1} < \alpha_{k+2}$, διότι:

$$\alpha_{k+2} - \alpha_{k+1} = \frac{2\alpha_{k+1} + 4}{3} - \frac{2\alpha_k + 4}{3} = \frac{2(\alpha_{k+1} - \alpha_k)}{3} > 0.$$

"Αρα $\alpha_v < \alpha_{v+1}$ διὰ κάθε $v = 1, 2, \dots$, ήτοι ή άκολουθία α_v , $v = 1, 2, \dots$ είναι αὔξουσα. Αὕτη είναι καὶ φραγμένη μὲν ἐν άνω φράγμα τὸν ἀριθμὸν 5, ητοι $|\alpha_v| \leq 5 \quad \forall v = 1, 2, \dots$ Πράγματι: $|\alpha_1| = 0 \leq 5$. "Εστω ότι ίσχύει: $|\alpha_k| \leq 5$, θά δείξωμεν ότι καὶ: $|\alpha_{k+1}| \leq 5$. Πράγματι: ἔχομεν:

$$|\alpha_{k+1}| = \left| \frac{2\alpha_k + 4}{3} \right| \leq \frac{2|\alpha_k| + 4}{3} \leq \frac{2 \cdot 5 + 4}{3} = \frac{14}{3} \leq 5.$$

"Αρα α_v , $v = 1, 2, \dots$ φραγμένη άνωθεν, ἐπειδὴ δὲ είναι καὶ αὔξουσα, κατὰ τὸ ἀξιώμα τῆς § 150, συγκλίνει ἐν R πρὸς ἀριθμὸν μικρότερον ή ἵσον τοῦ πέντε.

"Εστω $x \equiv \lim \alpha_v$, τότε ἔχομεν:

$$x = \lim \alpha_{v+1} = \lim \frac{2\alpha_v + 4}{3} = \frac{2x + 4}{3}$$

$$\text{ἢ } 3x = 2x + 4, \quad \text{ἐκ τῆς ὁποίας λαμβάνομεν: } x = 4.$$

"Οθεν ή α_v , $v = 1, 2, \dots$ συγκλίνει πρὸς τὸν ἀριθμὸν 4, δηλ. $\lim \alpha_v = 4$.

Παράδειγμα 4ον: Μελετήσατε την άκολουθιαν: α_v , $v = 1, 2, \dots$ με

$$\alpha_{v+1} = \frac{1}{2} \left(\alpha_v + \frac{3}{\alpha_v} \right) \quad \text{και} \quad \alpha_1 = \frac{1}{2} \left(\theta + \frac{3}{\theta} \right), \quad \text{ενθα } \theta > 0,$$

ώς πρός τὸ μονότονον καὶ τὴν σύγκλισιν. Ποῖον τὸ δριόν τῆς ἐν λόγῳ άκολουθίας;

Λύσις. Παρατηροῦμεν κατ' ἀρχὴν ὅτι: $\alpha_v > 0$ διὰ κάθε $v = 1, 2, \dots$

Ἐξ ἄλλου ἔχομεν, ἀπὸ τὴν γνωστὴν ἀνισότητα: $\frac{x+y}{2} \geq \sqrt{xy}$, ενθα $x, y > 0$:

$$\alpha_v = \frac{1}{2} \left(\alpha_{v-1} + \frac{3}{\alpha_{v-1}} \right) \geq \sqrt{\alpha_{v-1} \cdot \frac{3}{\alpha_{v-1}}} = \sqrt{3}, \quad \text{ἥτοι } \alpha_v \geq \sqrt{3} \text{ διὰ κάθε } v = 1, 2, \dots$$

Ἐπίσης ἔχομεν:

$$\alpha_{v+1} - \alpha_v = \frac{1}{2} \left(\alpha_v + \frac{3}{\alpha_v} \right) - \alpha_v = \frac{3 - \alpha_v^2}{2\alpha_v} \leq 0 \quad (\text{διότι: } \alpha_v^2 \geq 3 \iff 3 - \alpha_v^2 \leq 0),$$

ἥτοι: $\alpha_v \geq \alpha_{v+1}$ διὰ κάθε $v = 1, 2, \dots$, δηλαδὴ ἡ άκολουθία α_v , $v = 1, 2, \dots$ εἶναι φθίνουσα. Ἐπειδὴ δὲ εἶναι καὶ φραγμένη ἐκ τῶν κάτω, διότι

$$\alpha_v \geq \sqrt{3} \quad \forall v = 1, 2, \dots, \quad \text{θὰ συγκλίνῃ ἐν } \mathbf{R}.$$

Ἐστω x τὸ $\lim \alpha_v$, τότε εἶναι καὶ:

$$x = \lim \alpha_{v+1} = \frac{1}{2} \left(\lim \alpha_v + \frac{3}{\lim \alpha_v} \right) = \frac{1}{2} \left(x + \frac{3}{x} \right)$$

ἢ $x^2 = 3$, ἐκ τῆς δόποιας λαμβάνομεν: $x = \sqrt{3}$ καὶ $x = -\sqrt{3}$ (ἀπορρίπτεται).

Οθεν:

$$\lim \alpha_v = \sqrt{3}.$$

ΓΕΝΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

269. Γράψατε τοὺς πέντε πρώτους δρους τῶν κάτωθι άκολουθιῶν:

$$\alpha) \quad 1 + \frac{1}{v}, \quad v = 1, 2, \dots, \quad \beta) \quad \alpha + (v-1)\omega, \quad v = 1, 2, \dots, \quad \gamma) \quad \frac{v}{\sqrt{1+v^2}}, \quad v = 1, 2, \dots$$

$$\delta) \quad \frac{1}{v(v+1)}, \quad v = 1, 2, \dots, \quad \epsilon) \quad (-1)^{v+1} \alpha \omega^{v-1}, \quad v = 1, 2, \dots, \quad \sigma) \quad \frac{\sqrt{v+1}}{v}, \quad v = 1, 2, \dots$$

270. Ποῖαι ἐκ τῶν άκολουθιῶν α_v , $v = 1, 2, \dots$, αἱ δόποιαι ὀρίζονται ύπό τῶν κάτωθι τύπων εἶναι φραγμέναι καὶ ποῖαι δὲν εἶναι:

$$1) \quad \alpha_v = \frac{2v}{v^2 + 1}, \quad 2) \quad \alpha_v = \frac{v \text{ ημ } 3v}{v^2 + 1}, \quad 3) \quad \alpha_v = \frac{v^2 + 1}{2v},$$

$$4) \quad \alpha_v = \frac{1}{v} \text{ ημ } \frac{\pi v}{2}, \quad 5) \quad \alpha_v = v \cdot 3^{-v}, \quad 6) \quad \alpha_v = \frac{\eta \mu v + \sigma v^2 5v}{v^2 \sqrt{v}}$$

271. Ποῖαι ἐκ τῶν άκολουθιῶν τῆς προηγουμένης ἀσκήσεως εἶναι μονότονοι καὶ ποῖαι δὲν εἶναι; Καθορίσατε τὸ εἶδος μονοτονίας διὰ τὰς μονοτόνους ἐξ αὐτῶν. Ποῖαι εἶναι συγκλίνουσαι καὶ ποῖαι αἱ ὁριακαὶ τιμαὶ τῶν;

272. Υπολογίσατε τὰς ὁριακὰς τιμὰς τῶν άκολουθιῶν α_v , $v = 1, 2, \dots$ μὲν γενικοὺς δρους:

$$1) \quad \alpha_v = \frac{3v + 2}{v^2 + 1}, \quad 2) \quad \alpha_v = \frac{3v^2 - 5}{v^2}, \quad 3) \quad \alpha_v = \left(\frac{2v^2 - 3}{3v^2 - 2} \right)^2,$$

$$4) \alpha_v = \sqrt{\frac{3v^2 + 2}{4v^2 + v + 1}}, \quad 5) \alpha_v = \frac{\sqrt{v} - 1}{\sqrt{v+1}}, \quad 6) \alpha_v = \frac{v+1}{v \cdot \sqrt{v}},$$

$$7) \alpha_v = (\sqrt{v+1} - \sqrt{v}) \cdot \sqrt{v + \frac{1}{2}}, \quad 8) \alpha_v = \sqrt{v+\sqrt{v}} - \sqrt{v-\sqrt{v}}.$$

273. Όμοιως :

$$1) \alpha_v = \frac{v^2 + 3}{2v^2 - 3v + 1}, \quad 2) \alpha_v = \frac{2v^2 + 3v - 1}{5v^3 - v + 7}, \quad 3) \alpha_v = \frac{v^4 + 2}{v^2 - 4} - \frac{2v^5 - 3v^3}{2v^3 + 1},$$

$$4) \alpha_v = \sqrt{v^2+v} - v, \quad 5) \alpha_v = \frac{1+2+\dots+v}{v^2}, \quad 6) \alpha_v = \frac{1^2+2^2+\dots+v^2}{v^3}.$$

274. Εάν $\lim \alpha_v = \alpha$ και $p \in \mathbb{N}$, δείξατε ότι : $\lim(\alpha_v^p) = \alpha^p$, δηλ. $\lim(\alpha_v^p) = (\lim \alpha_v)^p$

275. Διά $\epsilon > 0$, νά προσδιορισθῇ δείκτης $v_0 = v_0(\epsilon)$, ώστε διά $v \geq v_0(\epsilon)$, νά είναι $|\alpha_v| < \epsilon$,

δπου $\alpha_v, v = 1, 2, \dots$ είναι :

$$1) \alpha_v = \frac{1}{2v+1}, \quad 2) \alpha_v = \frac{v-1}{v^2+1}, \quad 3) \alpha_v = \frac{\pi \mu v + 2 \sin \pi v}{\sqrt{v}}, \quad 4) \alpha_v = \sqrt{v+1} - \sqrt{v}.$$

Έφαρμογή διά $\epsilon = 10^{-6}$.

276. Νά διποδειχθῇ ότι :

$$1) \lim \sqrt{\frac{9v^2}{v^2+3}} = 3, \quad 2) \lim \sqrt{\frac{v^2+v-1}{27v^2-4}} = \frac{1}{3}.$$

277. Νά διποδειχθῇ ότι αἱ ἀκολουθίαι :

$$\alpha_v = \frac{2v^2-1}{3v^2+2}, \quad \beta_v = \frac{2v+3}{3v-2}, \quad \gamma_v = \sqrt{\frac{4v-3}{9v+5}}, \quad v = 1, 2, \dots$$

είναι συγκλίνουσαι καὶ ἔχουν κοινὸν δριον.

278. Δίδονται αἱ ἀκολουθίαι :

$$\alpha_v = v^2, \quad \beta_v = v, \quad \gamma_v = v^3, \quad v = 1, 2, \dots$$

Νά διποδειχθῇ ότι :

$$(i) \lim \alpha_v = \lim \beta_v = \lim \gamma_v = +\infty$$

$$(ii) \lim \frac{\alpha_v}{\beta_v} = +\infty, \quad \lim \frac{\gamma_v}{\beta_v} = +\infty, \quad \lim \frac{\gamma_v}{\alpha_v} = +\infty$$

$$(iii) \lim \frac{\alpha_v}{\gamma_v} = \lim \frac{\beta_v}{\alpha_v} = \lim \frac{\beta_v}{\gamma_v} = 0.$$

279. Γνωστοῦ ὅντος, ότι $\lim \left(1 + \frac{1}{v}\right)^v = e$, νά εύρεθοῦν τὰ δρια τῶν ἀκολουθιῶν $\alpha_v, v = 1, 2, \dots$, αἱ ὀποῖαι δρίζονται ὑπό τῶν τύπων :

$$1) \alpha_v = \left(1 + \frac{1}{2v}\right)^v, \quad 2) \alpha_v = \left(1 + \frac{1}{v-1}\right)^{v-1}, \quad 3) \alpha_v = \left(1 - \frac{1}{v^2}\right)^v.$$

280. Νά διποδειχθῇ ότι :

$$\lim \left[\frac{1}{\sqrt{v^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{v^2+2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{v^2+v}} \right] = 1$$

(Υπόδειξις: Προσθέσατε κατά μέλη τὰς προφανεῖς ἀνισότητας :

$$\frac{1}{\sqrt{v^2+v}} \leqq \frac{1}{\sqrt{v^2+k}} \leqq \frac{1}{\sqrt{v^2+1}}, \quad k = 1, 2, \dots, v \text{ καὶ } \text{έφαρμόσατε τὴν Ιδιότητα XII, § 146).}$$

281. Νὰ λυθῇ ἡ ἀνισότης :

$$\left| \lim_{v \rightarrow \infty} \frac{v^2 + 3}{2v^2 - 1} + x \right| < \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

282. Δείξατε ὅτι αἱ κάτωθι ἀκολουθίαι εἰναι μονότονοι καὶ φραγμέναι :

$$1) \quad \alpha_v = \frac{v+1}{v}, \quad 2) \quad \alpha_v = \frac{1}{v^2+1}, \quad 3) \quad \alpha_v = \frac{v}{v^2+1}, \quad 4) \quad \alpha_v = \frac{4v+1}{5v}.$$

283. Δείξατε ὅτι ἡ ἀκολουθία α_v , $v = 1, 2, \dots$ μέ :

$$\alpha_{v+1} = \sqrt{1 + \alpha_v} \quad \text{καὶ} \quad \alpha_1 = 1$$

εἶναι γνησίως αὔξουσα, φραγμένη καὶ ὅτι : $\lim_{v \rightarrow \infty} \alpha_v = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$.

284. Δίδεται ἡ ἀκολουθία α_v , $v = 1, 2, \dots$, μὲ $\alpha_{v+1} = \sqrt{4\alpha_v + 3}$ καὶ $\alpha_1 = 5$.

Νὰ δειχθῇ ὅτι εἶναι συγκλίνουσα καὶ νὰ εύρεθῇ τὸ δριόν της.

(Ὑπόδειξις : Δείξατε ὅτι εἶναι φθίνουσα καὶ φραγμένη κάτωθεν ὑπὸ τοῦ $\sqrt{3}$ κτλ.).

285. Δίδεται ἡ ἀκολουθία α_v , $v = 1, 2, \dots$, εἰς τὴν ὅποιαν εἶναι :

$$\alpha_1 = \theta > 0 \quad \text{καὶ} \quad \alpha_{v+1} = \frac{1}{2} \left(\alpha_v + \frac{\lambda^2}{\alpha_v} \right), \quad 0 < \lambda < \theta, v = 1, 2, \dots$$

Νὰ δειχθῇ ὅτι εἶναι συγκλίνουσα καὶ νὰ εύρεθῇ τὸ δριόν της.

(Ὑπόδειξις : Στηριχθῆτε ἐπὶ τῆς γνωστῆς ἀνισότητος $\frac{x^2 + y^2}{2} \geq xy$ καὶ δείξατε ὅτι ἡ ἐν λόγῳ ἀκολουθία εἶναι φραγμένη καὶ φθίνουσα).

286. Δείξατε ὅτι ἡ ἀκολουθία α_v , $v = 1, 2, \dots$ μέ : $\alpha_{v+1} = \frac{3\alpha_v + 1}{4}$ καὶ $\alpha_1 = 0$ εἶναι αὔξουσα καὶ φραγμένη πρὸς τὰ ἄνω ὑπὸ τῆς μονάδος. Ποῖον τὸ δριόν τῆς ἐν λόγῳ ἀκολουθίας ;

(Ὑπόδειξις : Προχωρήσατε ὡς εἰς τὸ παράδειγμα 3, § 151).

287. Δείξατε ὅτι ἡ ἀκολουθία α_v , $v = 1, 2, \dots$ μέ : $\alpha_{v+1} = \sqrt{2\alpha_v}$ καὶ $\alpha_1 = 1$ εἶναι αὔξουσα καὶ φραγμένη. Ποῖον τὸ δριόν τῆς ἐν λόγῳ ἀκολουθίας ;

288. Μελετήσατε ὡς πρὸς τὸ μονότονον καὶ τὴν σύγκλισιν τὴν ἀκολουθίαν : β_v , $v = 1, 2, \dots$

$$\text{μέ : } \beta_{v+1} = \frac{3\beta_v - 4}{5} \quad \text{διὰ κάθε } v = 1, 2, \dots \quad \text{καὶ } \beta_1 = -3.$$

Ποῖον τὸ δριόν τῆς ἐν λόγῳ ἀκολουθίας ;

289. Δείξατε ὅτι ἡ ἀκολουθία : α_v , $v = 1, 2, \dots$ μέ :

$$\alpha_{v+1} = \alpha + \alpha_v^2 \quad \text{καὶ} \quad \alpha_1 = \alpha, \quad \text{δῆπου} \quad 0 < \alpha \leq \frac{1}{4}$$

εἶναι γνησίως αὔξουσα καὶ ὅτι συγκλίνει εἰς τὴν μικροτέραν ρίζαν τῆς ἔξισώσεως : $t^3 - t + \alpha = 0$.

290. Δείξατε ὅτι ἡ ἀκολουθία :

$$\alpha_v = \left(1 + \frac{1}{v} \right)^v, \quad v = 1, 2, \dots$$

εἶναι γνησίως αὔξουσα.

291. Νὰ εύρεθοῦν, ἔαν ὑπάρχουν, αἱ ὁριακαὶ τιμαὶ τῶν ἀκολουθιῶν μὲ γενικούς δρους :

$$1) \quad \alpha_v = \frac{1^3 + 2^3 + \cdots + v^3}{v^4}, \quad 2) \quad \alpha_v = \frac{2v^2(v-3+4v^2)}{5(v-1)^3 \cdot (3v+4)}.$$

292. Γνωστοῦ ὄντος ὅτι : $\lim_{v \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{v} \right)^v = e$, νὰ εύρεθοῦν τὰ ὁριακὰ τῶν ἀκολουθιῶν α_v , $v = 1, 2, \dots$, αἱ ὁποῖαι ὁρίζονται ὑπὸ τῶν κάτωθι τύπων :

$$1) \quad \alpha_v = \left(1 - \frac{1}{v} \right)^v, \quad 2) \quad \alpha_v = \left(1 + \frac{2}{v} \right)^v, \quad 3) \quad \alpha_v = \left(1 + \frac{3}{v} \right)^v.$$

293. Δείξατε ότι η άκολουθία :

$$\alpha_v = \left(1 + \frac{1}{v}\right)^{v+1}, \quad v = 1, 2, \dots$$

είναι γνησίως φθίνουσα.

294. Νά διποδειχθή ότι :

$$1) \quad \lim \left(1 + \frac{\alpha}{v}\right)^v = e^\alpha, \quad \alpha \in \mathbb{R}_0^+$$

γνωστού δντος, ότι : $\lim \left(1 + \frac{1}{v}\right)^v = e$.

295. Έάν $\alpha, \beta \in \mathbb{R}^+$ δείξατε ότι :

$$\lim (\sqrt{v+\alpha}(v+\beta) - v) = \frac{\alpha+\beta}{2}.$$

296. Δείξατε ότι αι άκολουθίαι $\alpha_v, v = 1, 2, \dots$, αι δποιαι δρίζονται ύπό τών κάτωθι τύπων, είναι πράσαι μηδενικά :

$$1) \quad \alpha_v = \frac{2^v}{v!}, \quad 2) \quad \alpha_v = \frac{v!}{v^v}, \quad 3) \quad \alpha_v = \frac{2^v \cdot v!}{(3v)^v},$$

όπου το σύμβολον $v!$ (v παραγοντικόν) παριστά το γινόμενον : $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots v \equiv v!$

Επειδή το $v!$ είναι το προϊόν των πρώτων v θετικών αριθμών, έχει την μορφή :

(παραγοντικός προϊόν των πρώτων v θετικών αριθμών) $= 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots v$ $\leq v^v$ $\leq v^{v+1}$ $\leq v^{v+1} \cdot v! < v^{v+1} \cdot v^{v+1} = v^{2v+2}$

καταλαβαίνουμε ότι $v!$ είναι πολύ μεγάλος αριθμός για τα μεγάλα v . Το μετατόπισμα της συνέπειας είναι ότι $v!$ είναι πολύ μεγάλος αριθμός για τα μεγάλα v .

Επειδή $v!$ είναι πολύ μεγάλος αριθμός για τα μεγάλα v , οι πρώτες τρεις συντεταγμένες της σειράς είναι πολύ μεγάλες, αλλά μετά την τρίτη συντεταγμένη της σειράς, οι συνεπειώνες της σειράς είναι πολύ μεγάλες.

Επειδή $v!$ είναι πολύ μεγάλος αριθμός για τα μεγάλα v , οι πρώτες τρεις συντεταγμένες της σειράς είναι πολύ μεγάλες, αλλά μετά την τρίτη συντεταγμένη της σειράς, οι συνεπειώνες της σειράς είναι πολύ μεγάλες.

Επειδή $v!$ είναι πολύ μεγάλος αριθμός για τα μεγάλα v , οι πρώτες τρεις συντεταγμένες της σειράς είναι πολύ μεγάλες, αλλά μετά την τρίτη συντεταγμένη της σειράς, οι συνεπειώνες της σειράς είναι πολύ μεγάλες.

Επειδή $v!$ είναι πολύ μεγάλος αριθμός για τα μεγάλα v , οι πρώτες τρεις συντεταγμένες της σειράς είναι πολύ μεγάλες, αλλά μετά την τρίτη συντεταγμένη της σειράς, οι συνεπειώνες της σειράς είναι πολύ μεγάλες.

Επειδή $v!$ είναι πολύ μεγάλος αριθμός για τα μεγάλα v , οι πρώτες τρεις συντεταγμένες της σειράς είναι πολύ μεγάλες, αλλά μετά την τρίτη συντεταγμένη της σειράς, οι συνεπειώνες της σειράς είναι πολύ μεγάλες.

Επειδή $v!$ είναι πολύ μεγάλος αριθμός για τα μεγάλα v , οι πρώτες τρεις συντεταγμένες της σειράς είναι πολύ μεγάλες, αλλά μετά την τρίτη συντεταγμένη της σειράς, οι συνεπειώνες της σειράς είναι πολύ μεγάλες.

Επειδή $v!$ είναι πολύ μεγάλος αριθμός για τα μεγάλα v , οι πρώτες τρεις συντεταγμένες της σειράς είναι πολύ μεγάλες, αλλά μετά την τρίτη συντεταγμένη της σειράς, οι συνεπειώνες της σειράς είναι πολύ μεγάλες.

Επειδή $v!$ είναι πολύ μεγάλος αριθμός για τα μεγάλα v , οι πρώτες τρεις συντεταγμένες της σειράς είναι πολύ μεγάλες, αλλά μετά την τρίτη συντεταγμένη της σειράς, οι συνεπειώνες της σειράς είναι πολύ μεγάλες.

Επειδή $v!$ είναι πολύ μεγάλος αριθμός για τα μεγάλα v , οι πρώτες τρεις συντεταγμένες της σειράς είναι πολύ μεγάλες, αλλά μετά την τρίτη συντεταγμένη της σειράς, οι συνεπειώνες της σειράς είναι πολύ μεγάλες.

Επειδή $v!$ είναι πολύ μεγάλος αριθμός για τα μεγάλα v , οι πρώτες τρεις συντεταγμένες της σειράς είναι πολύ μεγάλες, αλλά μετά την τρίτη συντεταγμένη της σειράς, οι συνεπειώνες της σειράς είναι πολύ μεγάλες.

Επειδή $v!$ είναι πολύ μεγάλος αριθμός για τα μεγάλα v , οι πρώτες τρεις συντεταγμένες της σειράς είναι πολύ μεγάλες, αλλά μετά την τρίτη συντεταγμένη της σειράς, οι συνεπειώνες της σειράς είναι πολύ μεγάλες.

Επειδή $v!$ είναι πολύ μεγάλος αριθμός για τα μεγάλα v , οι πρώτες τρεις συντεταγμένες της σειράς είναι πολύ μεγάλες, αλλά μετά την τρίτη συντεταγμένη της σειράς, οι συνεπειώνες της σειράς είναι πολύ μεγάλες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VI

ΠΕΡΙ ΠΡΟΟΔΩΝ

ΟΡΙΣΜΟΙ – ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

§ 152. Εισαγωγή. — Εις τὸ προηγούμενον κεφάλαιον ὠρίσαμεν τὴν ἔννοιαν τῆς ἀκολουθίας καὶ ἀπεδείξαμεν τὰς κυριωτέρας ἰδιότητας τῶν ἀκολουθιῶν. Εις τὸ παρὸν κεφάλαιον θὰ μελετήσωμεν τρεῖς εἰδίκας κατηγορίας ἀκολουθιῶν, ἐκάστη τῶν ὅποιών ἔχει καὶ μίαν χαρακτηριστικὴν ἰδιότητα. Ἀναλόγως τῆς χαρακτηριστικῆς ταύτης ἰδιότητος διακρίνομεν τὰς ἀκολουθίας αὐτάς, τὰς ὅποιας καλοῦμεν πρόσδοτος, εἰς : α) Ἀριθμητικὰς προόδους, β) Ἀρμονικὰς προόδους καὶ γ) Γεωμετρικὰς προόδους.

I. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΙ

§ 153. Ὁρισμοί. — Ἐστω α_v , $v = 1, 2, \dots$ μία ἀκολουθία ἀριθμῶν. Θὰ λέγωμεν ὅτι «ἡ ἀκολουθία :

$$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_v, \dots \quad (1)$$

εἶναι μία ἀριθμητικὴ πρόοδος ἢ πρόοδος κατὰ διαφορὰν τότε, καὶ μόνον τότε, ἢν ἔκαστος ὅρος τῆς (ἐκτὸς τοῦ πρώτου) προκύπτῃ ἐκ τοῦ προηγουμένου διὰ προσθέσεως ἐνὸς καὶ τοῦ αὐτοῦ σταθεροῦ ἀριθμοῦ».

Ο σταθερὸς αὐτὸς ἀριθμός, ὃστις προστίθεται εἰς κάθε ὅρον τῆς προόδου διὰ νὰ δώσῃ τὸν ἐπόμενον, καλεῖται «λόγος» τῆς ἀριθμ. προόδου καὶ παρίσταται συνήθως μὲ τὸ γράμμα ω . Οἱ ὅροι τῆς ἀκολουθίας (1) καλοῦνται ὅροι τῆς ἀριθμητικῆς προόδου.

Οὕτω, π.χ., ἡ ἀκολουθία :

$$5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, \dots \quad (2)$$

εἶναι μία ἀριθμητικὴ πρόοδος μὲ λόγον $\omega = 2$.

Ομοίως ἡ ἀκολουθία :

$$19, 16, 13, 10, 7, 4, 1, -2, -5, \dots \quad (3)$$

εἶναι μία ἀριθμητικὴ πρόοδος μὲ λόγον $\omega = -3$.

Ἐκ τοῦ δρισμοῦ τῆς ἀριθμητικῆς προόδου, τὸν ὅποιον διετυπώσαμεν ἀνωτέρω, συνάγομεν ὅτι : ἐὰν α_v καὶ α_{v+1} εἶναι δύο διαδοχικοὶ ὅροι ἀριθμητικῆς προόδου μὲ λόγον ω , τότε θὰ ἔχωμεν :

$$\alpha_{v+1} = \alpha_v + \omega, \quad v = 1, 2, \dots \quad (4)$$

Ἐκ τῆς (4) προκύπτει : $\alpha_{v+1} - \alpha_v = \omega$ καὶ τοῦτο διὰ κάθε $v = 1, 2, \dots$

Έντεῦθεν ἔπειται ὁ ἔξης ἴσοδύναμος δρισμὸς τῆς ἀριθμητικῆς προόδου :

Ἀριθμητικὴ πρόσδος εἶναι μία ἀκολουθία ἀριθμῶν, τῆς δόποιας δύο οἰωνδή-ποτε διαδοχικοὶ δροὶ της ἔχον διαφοράν, η δόποια ἴσοιςται μὲ τὸν αὐτὸν πάντοτε ἀριθμόν, δῆτις καλεῖται λόγος τῆς ἀριθμητικῆς προόδου.

Ἐκ τοῦ ἀνωτέρω δρισμοῦ συνάγομεν τώρα τὰ ἔξης :

α'). Ἐὰν δὲ λόγος ω εἴναι θετικὸς ἀριθμός, τότε $\alpha_{v+1} - \alpha_v > 0$ ή $\alpha_{v+1} > \alpha_v$ διὰ κάθε $v = 1, 2, \dots$, δηλ. η πρόσδος α_v , $v = 1, 2, \dots$ εἴναι γνησίως αὔξουσα (ἄρα καὶ αὔξουσα).

β'). Ἐὰν $\omega < 0$, τότε $\alpha_{v+1} < \alpha_v$ διὰ κάθε $v = 1, 2, \dots$, δηλ. η πρόσδος α_v , $v = 1, 2, \dots$ εἴναι γνησίως φθίνουσα. Οὕτως η ἀριθμητικὴ πρόσδος (2) εἴναι γνησίως αὔξουσα, ἐνῷ η (3) εἴναι γνησίως φθίνουσα.

Παρατήρησις. Εἰς τὴν τετριμένην περίπτωσιν καθ' ήν $\omega = 0$, η ἀριθμητικὴ πρόσδος εἴναι μία ἀκολουθία ἴσων ἀριθμῶν (σταθερά ἀκολουθία) καὶ ὡς τοιαύτη εἴναι τότε, καὶ μόνον τότε συγχρόνως αὔξουσα καὶ φθίνουσα, ὡς ἐλέχθη καὶ εἰς τὸ προηγούμενον κεφάλαιον.

Ίδιότητες τῆς ἀριθμητικῆς προόδου

§ 154. Ίδιότης I.— Ο νιοστὸς δρος α_v ἀριθμητικῆς προόδου μὲ πρῶτον δρον α_1 καὶ λόγον ω εὑρίσκεται, ἢν εἰς τὸν πρῶτον δρον αὐτῆς προστεθῇ τὸ γινόμενον τοῦ λόγου ἐπὶ τὸ πλῆθος τῶν προηγούμενων αὐτοῦ δρων.

Ητοι :

$$\alpha_v = \alpha_1 + (v - 1) \omega \quad (1)$$

Απόδειξις. Διὰ $v = 1$ η (1) προφανῶς ἀληθεύει.

Δεχόμεθα ὅτι ἀληθεύει διὰ $v = k$, ητοι ὅτι ίσχύει : $\alpha_k = \alpha_1 + (k - 1) \omega$.

Ἐξ αὐτῆς, διὰ προσθέσεως εἰς ἀμφότερα τὰ μέλη τοῦ λόγου ω, ἔχομεν :

$\alpha_k + \omega = \alpha_1 + (k - 1) \omega + \omega$. Ἀλλὰ $\alpha_k + \omega = \alpha_{k+1}$ (δρισμὸς ἀριθμ. προόδου).

Ἄρα : $\alpha_{k+1} = \alpha_1 + (k - 1) \omega + \omega$ ή $\alpha_{k+1} = \alpha_1 + k\omega = \alpha_1 + [(k + 1) - 1] \omega$, ητοι η ίδιότης I ἀληθεύει καὶ διὰ $v = k + 1$, ἐπομένως, κατὰ τὴν ἀρχὴν τῆς τελείας ἐπαγωγῆς, ἀληθεύει διὰ κάθε $v = 1, 2, \dots$

Εφαρμογή: Νὰ εὑρεθῇ διά 15ος δρος τῆς ἀριθμητικῆς προόδου 7, 15, 23, 31,...

Λύσις : Ενταῦθα ἔχομεν : $\alpha_1 = 7$, $\omega = 8$, $v = 15$, $\alpha_{15} =$;

Δι' ἐφαρμογῆς τοῦ τύπου $\alpha_v = \alpha_1 + (v - 1) \omega$ εὑρίσκομεν :

$$\alpha_{15} = 7 + (15 - 1) \cdot 8 = 7 + 14 \cdot 8 = 119.$$

Παρατηρήσεις: α'). Ἐκ τῆς ἀνωτέρω ίδιότητος συμπεραίνομεν διτι μία ἀριθμητικὴ πρόσδος εἴναι τελείως ὀρισμένη, ὅταν δοθῇ δ πρῶτος δρος τῆς α_1 καὶ δ λόγος τῆς ω, διότι τότε οἱ δροὶ τῆς θὰ είναι ἀντιστοίχως :

1ος δρος,	2ος δρος,	3ος δρος,	4ος δρος,	5ος δρος, ...
α_1 ,	$\alpha_1 + \omega$,	$\alpha_1 + 2\omega$,	$\alpha_1 + 3\omega$,	$\alpha_1 + 4\omega$, ...

(2)


β'). Ο τύπος (1) είναι μία έξισωσις μεταξύ τῶν τεσσάρων μεταβλητῶν α_v , α_1 , v , ω . 'Ως πρός έκαστην μεταβλητήν ή έξισωσις είναι πρώτου βαθμοῦ. Όρα έάν δοθούν αἱ τιμαὶ τριῶν ἐκ τῶν τεσσάρων μεταβλητῶν, δυνάμεθα νὰ προσδιορισωμεν καὶ τὴν τετάρτην, ἐπιλύοντες μίαν έξισωσιν πρώτου βαθμοῦ.

γ'). Εὲ τῆς ἀνωτέρω παραπτρήσεως (β) ἀγόμεθα εἰς μίαν «γεωμετρικὴν παράστασιν» τῶν δρῶν τῆς ἀριθμητικῆς προόδου μὲ πρῶτον δρὸν τὸν α_1 καὶ λόγον ω . Πράγματι· ὅς θεωρήσωμεν δρθιγώνιον σύστημα ἀξόνων Ox , Oy καὶ ὃς λάβωμεν ἐπὶ τοῦ ἀξονοῦ Ox τὰς διαδοχικὰς τιμὰς τοῦ v , n , δηλ.

$v = 1, 2, \dots$

Σημειοῦμεν ἀκολούθως τὰ σημεῖα:

$$\begin{aligned} A_1 &\text{ μὲ συντεταγμένας } 1 \text{ καὶ } \alpha_1. \\ A_2 &\text{ » } 2 \text{ καὶ } \alpha_2 = \alpha_1 + \omega \\ A_3 &\text{ » } 3 \text{ καὶ } \alpha_3 = \alpha_1 + 2\omega \\ \vdots & \\ A_v &\text{ » } v \text{ καὶ } \alpha_v = \alpha_1 + (v-1)\omega \end{aligned}$$



Σχ. 12

Τὰ μεμονωμένα αὐτὰ σημεῖα δίδουν μίαν γεωμετρικὴν παράστασιν τῶν δρῶν τῆς ἀριθμητικῆς προόδου μὲ πρῶτον δρὸν τὸ α_1 καὶ λόγον ω . Διὰ νὰ ἔχωμεν τὴν έξισωσιν τῆς γραμμῆς (εὐθεῖας), ἡ ὁποία διέρχεται ἀπὸ τὰ σημεῖα $A_1, A_2, \dots, A_v, \dots$, ὀρκεῖ εἰς τὸν τύπον (1) νὰ ἀντικαταστήσωμεν τὸ v μὲ τὸ x καὶ τὸ α_v μὲ τὸ y , τότε:

$$y = \alpha_1 + (x-1)\omega. \quad (\epsilon)$$

§ 155. Ιδιότης II. — Εἰς πεπερασμένον πλῆθος διαδοχικῶν δρῶν ἀριθμητικῆς προόδου, τὸ ἄθροισμα δύο δρῶν ισάκις ἀπεχόντων (ισαπεχόντων) τῶν ἄκρων είναι ίσον πρὸς τὸ ἄθροισμα τῶν «ἄκρων» δρῶν.

'Απόδειξις: Εἴτω μία ἀριθμητικὴ προόδος α_v , $v = 1, 2, \dots$ μὲ λόγον ω . Θεωροῦμεν τοὺς v πρώτους δρους αὐτῆς $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{v-1}, \alpha_v$. Τότε οἱ δροὶ α_1 καὶ α_v είναι οἱ ἄκροι δροὶ. Δύο δὲ ἐκ τῶν θεωρουμένων δρῶν τῆς προόδου λέγονται «ισαπεχόντες» τῶν ἄκρων, ἐὰν δὲ εἰς ἔχῃ τόσους δρους πρὸς αὐτοῦ, δύος δὲ ἄλλος μετ' αὐτοῦ. Οὔτω, λ.χ., οἱ δροὶ α_2 καὶ α_{v-1} είναι ισαπεχόντες.

'Ομοίως οἱ: α_3, α_{v-2} .

Παρατηροῦμεν τώρα ὅτι:

$$\alpha_2 + \alpha_{v-1} = (\alpha_1 + \omega) + \alpha_{v-1} = \alpha_1 + (\alpha_{v-1} + \omega) = \alpha_1 + \alpha_v$$

$$\alpha_3 + \alpha_{v-2} = (\alpha_2 + \omega) + \alpha_{v-2} = \alpha_2 + (\alpha_{v-2} + \omega) = \alpha_2 + \alpha_{v-1} = \alpha_1 + \alpha_v$$

$$\alpha_4 + \alpha_{v-3} = (\alpha_3 + \omega) + \alpha_{v-3} = \alpha_3 + (\alpha_{v-3} + \omega) = \alpha_3 + \alpha_{v-2} = \alpha_1 + \alpha_v \text{ K.O.K.}$$

$$\text{"Ωστε, } (\alpha_2 + \alpha_{v-1}) = (\alpha_3 + \alpha_{v-2}) = \dots = \alpha_1 + \alpha_v.$$

Οὔτω, π.χ., οἱ ὀκτὼ ἀριθμοὶ: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 ἀποτελοῦντες διαδοχικοὺς δρους ἀριθμ. προόδου, πληροῦν τὴν ἀνωτέρω Ιδιότητα, διότι είναι:

$$3 + 17 = 20, \quad 5 + 15 = 20, \quad 7 + 13 = 20, \quad 9 + 11 = 20.$$

Παρατήρησις : Έάν ύπάρχῃ «μεσαίος όρος», ήτοι όρος προηγούμενος και έπομενος τοῦ αὐτοῦ πλήθους όρων (καὶ τοῦτο θὰ συμβαίνῃ δόσακις τὸ θεωρούμενον πλῆθος τῶν όρων τῆς προόδου είναι περιττόν), τότε τὸ διπλάσιον τοῦ μεσαίου όρου ίσουται πρὸς τὸ ἄθροισμα τῶν ἄκρων όρων. Π.χ., ἃς θεωρήσωμεν τὴν ἀριθμητικὴν πρόοδον ἐκ τῶν πέντε όρων :

$$3, 5, 7, 9, 11, \text{ τότε } 3+11=5+9=2\cdot7.$$

§ 156. Πόρισμα.— Αναγκαία καὶ ίκανὴ συνθήκη ἵνα τρεῖς ἀριθμοὶ α, β, γ είναι διαδοχικοὶ όροι. ἀριθμητικῆς προόδου, καθ' ἣν τάξιν γράφονται, είναι :

$$2\beta = \alpha + \gamma \quad (1)$$

Εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν ὁ $\beta = \frac{\alpha + \gamma}{2}$ καλεῖται ἀριθμητικὸς μέσος τῶν α καὶ γ .

Γενικῶς ἔὰν ἔχωμεν n ἀριθμοὺς $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ καλοῦμεν ἀριθμητικὸν μέσον τῶν n αὐτῶν ἀριθμῶν καὶ παριστῶμεν τοῦτον μὲν M_A , τὸν πραγματικὸν ἀριθμόν :

$$M_A = \frac{\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n}{n} \quad (2)$$

§ 157. Ιδιότης III.— Τὸ ἄθροισμα $\Sigma_v = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_v$ τῶν v πρώτων όρων ἀριθμητικῆς προόδου δίδεται ὑπὸ τοῦ τύπου :

$$\Sigma_v = \frac{(\alpha_1 + \alpha_v) v}{2} \quad (1)$$

Απόδειξις. Δυνάμεθα νὰ ἀποδείξωμεν τὸν ἀνωτέρω τύπον διὰ τῆς μεθόδου τῆς μαθηματικῆς ἐπαγγωγῆς, ἡ ἀπόδειξις ὅμως αὔτη, ὡς εύκολος, ἐπαφίεται εἰς τὸν ἀναγνώστην. Θά δώσωμεν μίαν ἀλλήλην ἀπόδειξιν, ἡ ὅποια στηρίζεται εἰς τὴν προηγουμένην ίδιότητα :

Γράφομεν ἀφ' ἑνός : $\Sigma_v = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \dots + \alpha_{v-2} + \alpha_{v-1} + \alpha_v$
καὶ ἀφ' ἑτέρου : $\Sigma_v = \alpha_v + \alpha_{v-1} + \alpha_{v-2} + \dots + \alpha_3 + \alpha_2 + \alpha_1$.
Προσθέτοντες τὰς δύο ταύτας ίσοτήτας κατὰ μέλη λαμβάνομεν :

$2\Sigma_v = (\alpha_1 + \alpha_v) + (\alpha_2 + \alpha_{v-1}) + \dots + (\alpha_{v-1} + \alpha_2) + (\alpha_v + \alpha_1)$
ἢ ἐπειδὴ $\alpha_1 + \alpha_v = \alpha_2 + \alpha_{v-1} = \dots = \alpha_{v-1} + \alpha_2 = \alpha_v + \alpha_1$ (λόγα, τῆς ίδιότ. II)
καὶ αἱ παρενθέσεις είναι ν τὸ πλῆθος, θὰ ἔχωμεν :

$$2\Sigma_v = (\alpha_1 + \alpha_v) \cdot v \quad \text{ἢ} \quad \Sigma_v = \frac{(\alpha_1 + \alpha_v) \cdot v}{2}.$$

Πόρισμα.— Τὸ ἄθροισμα Σ_v τῶν v πρώτων όρων ἀριθμητικῆς προόδου συναρτήσει τοῦ πρώτου όρου $\alpha_1 = a$, τοῦ λόγου ω καὶ τοῦ πλήθους v τῶν όρων, δίδεται ὑπὸ τοῦ τύπου :

$$\Sigma_v = \frac{[2a + (v-1)\omega] \cdot v}{2} \quad (2)$$

Παρατήρησις. Οι δύο τύποι :

$$\alpha_v = \alpha_1 + (v-1) \omega \quad \text{και} \quad \Sigma_v = \frac{(\alpha_1 + \alpha_v) \cdot v}{2}$$

περιέχουν πέντε άγνωστους, τούς $\alpha_1, \alpha_v, \omega, v, \Sigma_v$.

'Εάν λοιπόν μᾶς δοθοῦν οι τρεῖς έξι αὐτῶν, τότε οι άνωτέρω δύο τύποι άποτελοῦν σύστημα δύο έξισώσεων μὲ δύο άγνωστους, λύοντες δὲ τοῦτο εύρισκομεν ἵνας ύπολοί πους δύο.

Έφαρμογή. 'Αριθμητικῆς προόδου ὁ πρῶτος ὅρος εἶναι 2 καὶ ὁ ἐνδέκατος 92. Νὰ εὑρεθῇ ἡ πρόοδος καὶ τὸ ἄθροισμα τῶν 20 πρώτων ὅρων αὐτῆς.

Άνσας : "Έχομεν $\alpha_1 = 2, \alpha_{11} = 92, \omega = ;, \Sigma_{20} = ;$

'Εκ τοῦ τύπου $\alpha_v = \alpha_1 + (v-1) \omega$ έχομεν διὰ $v = 11, 92 = 2 + 10 \cdot \omega$, έξι οὖς : $\omega = 9.$

"Αρα ἡ πρόοδος εἶναι : $2, 11, 20, 29, 38, \dots$

Εξ ἀλλού ἐκ τοῦ τύπου : $\Sigma_v = \frac{[2\alpha + (v-1)\omega] \cdot v}{2}$ λαμβάνομεν διὰ $v = 20$

$$\Sigma_{20} = \frac{(4 + 19 \cdot 9) \cdot 20}{2} = 1750.$$

§ 158. Παρεμβολὴ ἀριθμητικῶν ἐνδιαμέσων. — **Ορισμοί :** Οι ἀριθμοὶ x_1, x_2, \dots, x_μ καλοῦνται ἀριθμητικοὶ ἐνδιάμεσοι διθέντων ἀριθμῶν α, τ τότε, καὶ μόνον τότε, ἂν οἱ ἀριθμοὶ :

$$\alpha, x_1, x_2, \dots, x_\mu, \tau$$

εἶναι διαδοχικοὶ ὅροι ἀριθμ. προόδου.

Διθέντων δύο ἀριθμῶν α, τ καλοῦμεν παρεμβολὴν μ ἀριθμητικῶν ἐνδιαμέσων τὴν εὕρεσιν μ ἀριθμῶν x_1, x_2, \dots, x_μ τοιούτων, ὥστε οἱ ἀριθμοὶ :

$\alpha, x_1, x_2, \dots, x_\mu, \tau$ νὰ εἶναι διαδοχικοὶ ὅροι ἀριθμ. προόδου.

Διὰ τὴν εὕρεσιν τῶν ὡς ἂνω ἀριθμητικῶν ἐνδιαμέσων ἀρκεῖ νὰ ύπολογίσωμεν τὸν λόγον τῆς ἀριθμητικῆς προόδου εἰς ἣν οὔτοι ἀνήκουν.

'Εάν παραστήσωμεν μὲ ω' τὸν λόγον τῆς προόδου εἰς ἣν οὔτοι ἀνήκουν, τότε, ἐπειδὴ τὸ πλῆθος τῶν θεωρουμένων ὅρων εἶναι $\mu + 2$, ὁ τὸ θὰ εἶναι ὁ ὅρος δικατέχων τὴν $\mu + 2$ τάξιν καὶ συνεπῶς θὰ ισοῦται μέ : $\alpha + (\mu + 2 - 1) \omega' = \alpha + (\mu + 1) \omega$.

"Ωστε :

$$\tau = \alpha + (\mu + 1) \omega'$$

"Αρα :

$$\omega' = \frac{\tau - \alpha}{\mu + 1}. \tag{1}$$

'Ο τύπος οὗτος καλεῖται τύπος παρεμβολῆς ἀριθμητικῶν ἐνδιαμέσων ἢ συντόμως τύπος τῆς ἀριθμητικῆς παρεμβολῆς.

'Ορισθέντος, ἐκ τοῦ τύπου (1), τοῦ «λόγου παρεμβολῆς» ω' , οἱ ζητούμενοι ἀριθμοὶ εἶναι οἱ :

$$x_1 = \alpha + \frac{\tau - \alpha}{\mu + 1}, \quad x_2 = \alpha + 2 \frac{\tau - \alpha}{\mu + 1}, \dots, x_\mu = \alpha + \mu \frac{\tau - \alpha}{\mu + 1}.$$

Έφαρμογή : Μεταξύ των άριθμών 9 και 41 νά παρεμβληθούν 7 άριθμητικοί ένδιαμεσοί.
Λύσις : 'Ο τύπος (1) της § 158 δίδει διά $\tau = 41$, $\alpha = 9$, $\mu = 7$

$$\omega' = \frac{41 - 9}{7 + 1} = 4$$

καὶ ἡ ζητουμένη πρόδος είναι ἡ :

$$9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41.$$

§ 159. Συμμετρική παράστασις τῶν ὅρων ἀριθμητικῆς προόδου!

Ἐπειδὴ εἰς διάφορα προβλήματα ἀριθμητικῶν προόδων εἰσέρχονται τρεῖς ἡ περισσότεροι ἄγνωστοι διὰ τοῦτο πρὸς περιορισμὸν τῶν ἀγνώστων, ίδια ὅταν δίδεται τὸ ἀθροισμα τῶν ἀριθμῶν, οἱ δόποιοι είναι διαδοχικοὶ δροὶ ἀριθμητικῆς προόδου, σκόπιμον είναι νά ἔχωμεν ὑπὸ δψιν τὰς ἔξῆς δύο περιπτώσεις :

Περίπτωσις 1η : Τὸ πλῆθος τῶν ἀγνώστων ὅρων είναι περιττόν.

'Εὰν οἱ ἄγνωστοι δροὶ είναι πλήθους ($2v + 1$), τότε ὑπάρχει μεσαῖος τὸν δόποιον παριστῶμεν μὲ ἐν γράμμα λ.χ. μὲ x καὶ ἐὰν δ λόγος τῆς προόδου είναι ω , γράφομεν τοὺς ζητουμένους ὅρους ὡς ἔξῆς :

$$x - v\omega, \dots, x - 2\omega, x - \omega, x, x + \omega, x + 2\omega, \dots, x + v\omega.$$

Περίπτωσις 2a : Τὸ πλῆθος τῶν ἀγνώστων ὅρων είναι ἀρτιον (Ἐστω $2v$).

Εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν ὑπάρχουν δύο « μεσαῖοι » δροὶ τοὺς δόποιους παριστῶμεν μέ : $x - \lambda$ καὶ $x + \lambda$, δτε δ λόγος ω τῆς προόδου είναι :

$$\omega = (x + \lambda) - (x - \lambda) = 2\lambda. \quad \text{Tότε οἱ ζητούμενοι δροὶ γράφονται ὡς}$$

$$\text{ἔξῆς : } x - (2v - 1)\lambda, \dots, x - 3\lambda, x - \lambda, x + \lambda, x + 3\lambda, \dots, x + (2v - 1)\lambda.$$

Πρέπει νά σημειωθῇ δτι εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν δ x δὲν είναι δρος τῆς ἀριθμ. προόδου.

Έφαρμογή : Νά εύρεθοιν τρεῖς ἀριθμοί, οἱ δόποιοι είναι διαδοχικοὶ δροὶ ἀριθμητικῆς προόδου, τῶν δοπίων τὸ μὲν ἀθροισμα είναι 33, τὸ δὲ γινόμενον 1287.

Λύσις : 'Εὰν μὲ x παραστήσωμεν τὸν μεσαῖον τῶν ζητουμένων καὶ μὲ ω τὸν λόγον, οἱ τρεῖς ἀριθμοὶ θά είναι : $x - \omega, x, x + \omega$. Κατά τὴν ἐκφώνησιν θά ἔχωμεν :

$$(x - \omega) + x + (x + \omega) = 33 \quad \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} \quad 3x = 33 \quad (1)$$

$$(x - \omega) \cdot x \cdot (x + \omega) = 1287 \quad \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} \quad x(x^2 - \omega^2) = 1287 \quad (2)$$

'Η (1) δίδει ἀμέσως $x = 11$. Τότε δτι (2) λυομένη ὡς πρὸς ω δίδει : $\omega = \pm 2$.

"Ἄρα οἱ ζητούμενοι ἀριθμοὶ είναι : 9, 11, 13 δη 13, 11, 9.

A S K H S E I S

297. Γράψατε τοὺς ὁκτὼ πρώτους ὅρους τῆς ἀριθμητικῆς προόδου, τῆς δόποίας δ πρῶτος δρος καὶ δ λόγος είναι ρίζαι τῆς ἔξισώσεως : $x^3 - 5x + 6 = 0$.

298. Νά εύρεθῇ δ λόγος ἀριθμητικῆς προόδου ἐδαν $\alpha_1 = 3$ καὶ $\alpha_{12} = 80$.

299. Νά εύρεθῇ τὸ ἀθροισμα τῶν ν πρώτων φυσικῶν ἀριθμῶν.

300. Νά ἀποδειχθῇ δτι τὸ ἀθροισμα τῶν ν πρώτων περιττῶν ἀριθμῶν Ισοῦται πρὸς τὸ τετράγωνον τοῦ πλήθους αὐτῶν.

301. Νά εύρεθῇ τὸ ἀθροισμα τῶν τετραγώνων τῶν ν πρώτων φυσικῶν ἀριθμῶν.

(**Υπόδειξις** : Χρησιμοποιήσατε τὴν ταυτότητα : $(x + 1)^n = x^n + 3x^{n-1} + 3x + 1$ καὶ θέσατε διαδοχικῶς $x = 1, 2, \dots, n$ ἐπὶ πλέον λάβατε ὑπὸ δψιν τὸ ἀποτέλεσμα τῆς ἀσκήσεως 299).

302. Ἐὰν $\Sigma_3 = 1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3$ καὶ $\Sigma_1 = 1 + 2 + 3 + \dots + n$, ὑπολογίσατε τὸ Σ_3 ἀναχωροῦντες ἐκ τῆς ταυτότητος : $(x + 1)^4 = x^4 + 4x^3 + 6x^2 + 4x + 1$ καὶ ἀκολούθως δείξατε δτὶ : $\Sigma_3 = (\Sigma_1)^2$.

303. Νὰ εὐρεθῇ τὸ ἀθροισμα τῶν 25 πρώτων πολλαπλασίων τοῦ ἀριθμοῦ 11.

304. Εἰς ἀριθμητικὴν πρόδοσον δίδονται ἐκ τῶν πέντε στοιχείων $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ τρία οιαδήποτε. Πόσα διάφορα προβλήματα δυνάμεθα νὰ σχηματίσωμεν καὶ ποῖα; Εἰς ἔκαστον πρόβλημα νὰ ὑπολογισθῶν τὰ ἄγνωστα συναρτήσει τῶν ἔκαστοτε γνωστῶν καὶ νὰ γίνῃ, διπου ἀπαιτεῖται, ἡ σχετικὴ διερεύνησις.

305. Ὁρίσατε τὸν κ οὔτως, ὁστε οἱ κάτωθι ἀριθμοὶ ἀποτελοῦν διαδοχικοὺς δρους ἀριθμητικῆς προόδου : (i) $3k, k + 4, k - 1$, (ii) $3k - 7, k + 2, 12 - 2k$.

306. Δείξατε δτὶ, ἐὰν οἱ ἀριθμοὶ α, β, γ είναι διαδοχικοὶ δροὶ ἀριθμ. προόδου, τότε καὶ οἱ ἀριθμοὶ :

$$x = \alpha^2 - \beta\gamma, \quad y = \beta^2 - \alpha\gamma, \quad z = \gamma^2 - \alpha\beta$$

είναι διαδοχικοὶ δροὶ ἀριθμητικῆς προόδου. Ποῖος ὁ λόγος τῶν λόγων τῶν δύο αὐτῶν προόδων;

307. Νὰ εὐρεθῇ ὁ πρῶτος δρος καὶ ὁ λόγος ἀριθμ. προόδου γνωστοῦ ὅντος δτὶ τὸ ἀθροισμα τῶν ν πρώτων δρων αὐτῆς διὰ πᾶσαν τιμὴν τοῦ ν Ισοῦται πρός : $3v^2 + v$.

308. Νὰ ὑπολογισθῇ τὸ κάτωθι ἀθροισμα ἐκ ν δρων :

$$\Sigma = 1 \cdot 2 \cdot 3 + 2 \cdot 3 \cdot 4 + \dots$$

(**Υπόδειξις** : Παρατηρήσατε δτὶ : $\alpha_v = v(v + 1)(v + 2) = v^3 + 3v^2 + 2v$).

309. Νὰ παρεμβληθοῦν μεταξὺ τῶν ἀριθμῶν 9 καὶ 34 ἄλλοι ἀριθμοὶ οὔτως, ὁστε νὰ προκύψουν 11 διαδοχικοὶ δροὶ ἀριθμ. προόδου.

310. Δείξατε δτὶ ἡ ἱκανὴ καὶ ἀναγκαῖα συνθήκη, ἵνα οἱ ἀριθμοὶ α, β, γ , καθ' ἥν τάξιν δίδονται, ἀνήκουν εἰς ἀριθμητικὴν πρόσδου (χωρὶς κατ' ἀνάγκην νὰ είναι διαδοχικοί) είναι : ἡ ἔξισσωσις :

$$\frac{\beta - \alpha}{x + 1} = \frac{\gamma - \beta}{y + 1}$$

ἔχει ἀκεραίαν καὶ θετικὴν λύσιν ως πρὸς x, y, γ είναι τὸ πλήθος τῶν δρων τῆς ἀριθμητικῆς προόδου τῶν εύρισκομένων μεταξὺ α καὶ β καὶ y τῶν εύρισκομένων μεταξὺ β καὶ γ .

311. Ἐξετάσατε ἂν οἱ ἀριθμοὶ : $\sqrt{2}, \sqrt{5}, \sqrt{7}$ ἀποτελοῦν δρους (οἰασδήποτε τάξεως) μιᾶς καὶ τῆς αὐτῆς ἀριθμητικῆς προόδου.

312. Πόσους ἀριθμ. ἐνδιαμέσους πρέπει νὰ παρεμβάλωμεν μεταξὺ τῶν ἀριθμῶν 1 καὶ 19, ὁστε δεύτερος ἐνδιάμεσος νὰ ἔχῃ πρὸς τὸν τελευταῖον ἐνδιάμεσον λόγον ἵσον μὲ 1/6.

313. Νὰ εὐρεθοῦν τέσσαρες ἀριθμοὶ, οἱ δηποῖοι είναι διαδοχικοὶ δροὶ ἀριθμητικῆς προόδου, τῶν δηποίων τὸ ἀθροισμα Ισοῦται πρὸς 26, τὸ δὲ ἀθροισμα τῶν τετραγώνων των πρὸς 214.

314. Ο τέταρτος καὶ δ δγδοος δρος ἀριθμ. προόδου εἶχουν ἀθροισμα 18, οἱ δὲ κύριοι των εἶχουν ἀθροισμα 3402. Νὰ εὐρεθῇ ἡ πρόδοση.

315. Νὰ εὐρεθοῦν πέντε ἀριθμοί, ἀποτελοῦντες διαδοχικοὺς δρους ἀριθμητικῆς προόδου, ἐὰν γνωρίζωμεν δτὶ τὸ ἀθροισμα των είναι 45 καὶ τὸ ἀθροισμα τῶν ἀντιστρόφων των είναι 137/180.

316. Εἰς μίαν ἀριθμητικὴν πρόσδου τὸ ἀθροισμα Σv τῶν ν πρώτων δρων αὐτῆς διὰ πᾶσαν τιμὴν τοῦ ν $v \in \mathbb{N}$ δίδεται ὑπὸ τοῦ τύπου : $\Sigma v = 8v^2 - v$. Νὰ εὐρεθῇ ἡ τάξις τοῦ δρου, δηποῖος ἔχει τιμὴν 263.

317. Τὰ ἀθροισματα τῶν ν πρώτων δρων δύο ἀριθμητικῶν προόδων εἶχουν λόγον $\frac{7v + 2}{v + 1}$ διὰ πᾶσαν τιμὴν τοῦ ν $v \in \mathbb{N}$. Νὰ εὐρεθῇ δ λόγος τῶν πέμπτων δρων τῶν δύο προόδων.

318. Έάν οι θετικοί άριθμοί $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ άποτελούν διαδοχικούς όρους άριθμ. προόδου, νά διποδειχθῆ δτι ἀληθεύει ἡ σχέσις :

$$\frac{\alpha + \delta}{2} > \sqrt[4]{\alpha \beta \gamma \delta}.$$

319. Προσδιορίσατε τὰ α καὶ β οὐτως, ὅστε αἱ ρίζαι p_1, p_2 τῆς ἔξισώσεως $x^3 - \alpha x + \beta = 0$ καὶ αἱ ρίζαι p_3, p_4 τῆς $x^3 - (5\alpha - 4)x + \beta = 0$, γραφόμεναι κατὰ τὴν τάξιν p_1, p_2, p_3, p_4 εἰναι διαδοχικοὶ δροὶ ἀριθμητικῆς προόδου.

320. Νά ἐπιλυθῆ ἡ ἔξισώσις $x^3 - 3x^2 - 13x + 15 = 0$, ἐάν γνωρίζωμεν δτι αἱ ρίζαι τῆς ἀποτελούν διαδοχικούς δρους ἀριθμ. προόδου.

321. Νά εὔρεθῆ ἡ σχέσις μεταξύ τῶν α, β, γ , ὅστε αἱ ρίζαι τῆς διτετραγώνου ἔξισώσεως : $\alpha x^4 + \beta x^2 + \gamma = 0$, νά είναι διαδοχικοὶ δροὶ ἀριθμητικῆς προόδου.

II. APMONIKAI PΡΟΟΔΟΙ

§ 160. ΟΡΙΣΜΟΣ. — Μία ἀκολουθία πραγματικῶν ἀριθμῶν

$$a_1, a_2, \dots, a_v, \dots \quad (1)$$

είναι ἀρμονικὴ πρόοδος τότε, καὶ μόνον τότε, ἂν $l_{\sigma} \neq 0 \forall v \in \mathbb{N}$ καὶ

$$\frac{1}{a_1}, \frac{1}{a_2}, \dots, \frac{1}{a_v}, \dots \quad (2)$$

είναι ἀριθμητικὴ πρόοδος.

Οὐτως, ἡ ἀκολουθία τῶν ἀριθμῶν :

$$\frac{1}{3}, \frac{1}{5}, \frac{1}{7}, \frac{1}{9}, \dots$$

είναι ἀρμονικὴ πρόοδος, διότι οἱ ἀντίστροφοί των, κατὰ τὴν αὐτήν τάξιν,
3, 5, 7, 9, ...

ἀποτελοῦν ἀριθμητικὴν πρόοδον (μὲ λόγον $\omega = 2$).

Ἐκ τοῦ ἀνωτέρου δρισμοῦ τῆς ἀρμονικῆς προόδου συνάγομεν, δτι ζητήματα ἀφορῶντα ἀρμονικήν πρόοδον ἀνάγονται εἰς ἐπίλυσιν ζητημάτων τῆς ἀντιστοίχου ἀριθμητικῆς προόδου. "Ενεκα τούτου θὰ μελετήσωμεν κατωτέρω τὰς κυριωτέρας ἴδιότητας τῶν ἀρμονικῶν προόδων ὑπὸ μορφὴν ἐφαρμογῶν τῶν ἴδιοτήτων τῶν ἀριθμητικῶν προόδων.

§ 161. Εὕρεσις τοῦ νιοστοῦ όρου μιᾶς ἀρμονικῆς προόδου τῆς ὁποίας δίδονται οἱ δύο πρῶτοι όροι. — Εστω ἡ ἀρμονικὴ πρόοδος :

$$a_1, a_2, \dots, a_v, \dots \quad (1)$$

$$\text{Tότε, κατὰ τὸν δρισμὸν ταύτης, ἡ ἀκολουθία : } \frac{1}{a_1}, \frac{1}{a_2}, \dots, \frac{1}{a_v}, \dots \quad (2)$$

είναι ἀριθμητικὴ πρόοδος μὲ λόγον $\omega = \frac{1}{a_2} - \frac{1}{a_1}$.

Ἄλλὰ ὁ νιοστὸς όρος τῆς (2) δίδεται ὑπὸ τοῦ τύπου (1) τῆς § 154, ἦτοι ::

$$\frac{1}{a_v} = \frac{1}{a_1} + (v-1) \cdot \left(\frac{1}{a_2} - \frac{1}{a_1} \right)$$

$$\text{ἢ } \frac{1}{a_v} = \frac{a_2 + (v-1)(a_1 - a_2)}{a_1 a_2} = \frac{a_1(v-1) - a_2(v-2)}{a_1 a_2}$$

Άρα δ νιοστός όρος ανά τής άρμονικής προόδου (1) είναι τότε δ :

$$\alpha_v = \frac{\alpha_1 \alpha_2}{\alpha_1 (v-1) - \alpha_2 (v-2)} \quad (3)$$

§ 162. Συνθήκη, ίνα οι άριθμοί α, β, γ είναι, κατά τήν δοθεῖσαν τάξιν, διαδοχικοί όροι άρμονικής προόδου.

'Εφ' ίσον οι άριθμοί α, β, γ είναι, κατά τήν δοθεῖσαν τάξιν, διαδοχικοί όροι άρμονικής προόδου, οι άντιστροφοί των $\frac{1}{\alpha}$, $\frac{1}{\beta}$, $\frac{1}{\gamma}$, κατά τὸν δοθέντα όρισμὸν (§ 160), είναι διαδοχικοί όροι άριθμητικῆς προόδου καὶ συνεπῶς (§ 156) θὰ ἔχωμεν :

$$2 \cdot \frac{1}{\beta} = \frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\gamma} \quad \text{ἢ} \quad \beta = \frac{2}{\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\gamma}}$$

Άρα :

$$\beta = \frac{2\alpha\gamma}{\alpha + \gamma} \quad (1)$$

'Άλλὰ καὶ άντιστρόφως, έάν άληθεύῃ ἡ (1), τότε οἱ τρεῖς άριθμοί α, β, γ είναι διαδοχικοί όροι άρμονικῆς προόδου (διατί;).

"Οθὲν : Ικανὴ καὶ ἀναγκαία συνθήκη, ίνα οι άριθμοί α, β, γ είναι, κατά τήν δοθεῖσαν τάξιν, διαδοχικοί όροι άρμονικῆς προόδου είναι ἡ ίσότης (1).

Εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν δ β καλεῖται άρμονικὸς μέσος τῶν α καὶ γ.

Γενικῶς : Δοθέντων ν ἀριθμῶν $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_v$ καλοῦμεν άρμονικὸν μέσον αὐτῶν καὶ τὸν συμβολίζομεν διὰ M_H , τὸν ἀριθμὸν :

$$M_H = \frac{v}{\frac{1}{\alpha_1} + \frac{1}{\alpha_2} + \dots + \frac{1}{\alpha_v}} \quad (2)$$

Παρατήρησις : Ή σχέσις (1) δύναται νὰ λάβῃ τήν μορφήν :

$$\frac{\alpha}{\gamma} = \frac{\alpha - \beta}{\beta - \gamma} \quad (\text{διατί;}) \quad (3)$$

Κατὰ ταῦτα, ή ἀναγκαία καὶ ίκανὴ συνθήκη, ίνα οι άριθμοί α, β, γ είναι, κατά τήν δοθεῖσαν τάξιν, διαδοχικοί όροι άρμονικῆς προόδου, είναι οι άριθμοί α, β, γ νὰ ἀποτελοῦν ἀρμονικὴν ἀναλογίαν.

§ 163. Παρεμβολὴ άρμονικῶν ἐνδιαμέσων.— Οἱ άριθμοί x_1, x_2, \dots, x_μ καλοῦνται άρμονικοί ἐνδιάμεσοι δοθέντων άριθμῶν α, τ τότε, καὶ μόνον τότε, ἂν οἱ άριθμοί α, x_1, x_2, \dots, x_μ , τ είναι διαδοχικοί όροι άρμον. προόδου.

Δοθέντων τῶν ἀριθμῶν α , τ καλοῦμεν παρεμβολὴν μ ἀρμονικῶν ἐνδιαμέσων, τὴν εὑρεσιν μ ἀριθμῶν x_1, x_2, \dots, x_μ τοιούτων, ὥστε οἱ ἀριθμοὶ $\alpha, x_1, x_2, \dots, x_\mu$, τ εἶναι διαδοχικοὶ δροὶ ἀρμον. προόδου.

Τίθεται τώρα τὸ ἔξῆς πρόβλημα :

Μεταξὺ τῶν ἀριθμῶν α καὶ τ νὰ παρεμβληθοῦν μ ἀρμονικοὶ ἐνδιάμεσοι.

Πρὸς τοῦτο ἀρκεῖ νὰ παρεμβληθοῦν μ ἀριθμητικοὶ ἐνδιάμεσοι μεταξὺ τῶν ἀριθμῶν $\frac{1}{\alpha}$ καὶ $\frac{1}{\tau}$. Ἐκ τοῦ τύπου (1) (§ 158) τῆς ἀριθμητικῆς παρεμβολῆς εὐρίσκομεν ἐν προκειμένῳ :

$$\omega' = \frac{\frac{1}{\tau} - \frac{1}{\alpha}}{\mu + 1} = \frac{\alpha - \tau}{(\mu + 1) \alpha \tau}. \quad (1)$$

Ο τύπος (1) καλεῖται τύπος τῆς ἀρμονικῆς παρεμβολῆς.

Ορισθέντος ἐκ τοῦ τύπου (1) τοῦ λόγου ω' εὐρίσκομεν τοὺς μ ἀριθμητικοὺς ἐνδιαμέσους τῶν $\frac{1}{\alpha}$ καὶ $\frac{1}{\tau}$, δπότε οἱ ἀντίστροφοί των θὰ εἶναι οἱ ζητούμενοι μ ἀρμονικοὶ ἐνδιάμεσοι τῶν α καὶ τ , ἦτοι θὰ ἔχωμεν :

$$x_1 = \frac{1}{\frac{1}{\alpha} + \frac{\alpha - \tau}{(\mu + 1) \alpha \tau}}, \quad x_2 = \frac{1}{\frac{1}{\alpha} + 2 \frac{\alpha - \tau}{(\mu + 1) \alpha \tau}}, \quad \dots, \quad x_\mu = \frac{1}{\frac{1}{\alpha} + \mu \frac{\alpha - \tau}{(\mu + 1) \alpha \tau}}.$$

Ἐφ αρμονική. Μεταξὺ τῶν ἀριθμῶν $\frac{5}{2}$ καὶ $\frac{5}{11}$ νὰ παρεμβληθοῦν 5 ἀρμονικοὶ ἐνδιάμεσοι.

Λύσις. Πρὸς τοῦτο παρεμβάλομεν πέντε ἀριθμητικοὺς ἐνδιαμέσους μεταξὺ τῶν ἀντίστροφῶν τῶν δοθέντων, ἦτοι μεταξὺ $\frac{2}{5}$ καὶ $\frac{11}{5}$.

Ο τύπος (1), διὰ $\tau = \frac{5}{11}$, $\alpha = \frac{5}{2}$, $\mu = 5$ δίδει: $\omega' = \frac{3}{10}$.

Τότε οἱ πέντε ἀριθμητικοὶ ἐνδιάμεσοι τῶν $\frac{2}{5}$ καὶ $\frac{11}{5}$ εἶναι οἱ: $\frac{7}{10}, 1, \frac{13}{10}, \frac{8}{5}, \frac{19}{10}$ κατὰ συνέπειαν οἱ ζητούμενοι ἀρμονικοὶ ἐνδιάμεσοι εἶναι οἱ ἀντίστροφοί των, ἦτοι οἱ :

$$\frac{10}{7}, 1, \frac{10}{13}, \frac{5}{8}, \frac{10}{19}.$$

καὶ μετὰ τῶν δοθέντων οἱ: $\frac{5}{2}, \frac{10}{7}, 1, \frac{10}{13}, \frac{5}{8}, \frac{10}{19}, \frac{5}{11}$.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

322. Νὰ εὐρεθῇ δ 31ος δρος τῆς ἀρμονικῆς προόδου $\frac{1}{25}, \frac{1}{33}, \frac{1}{41}, \dots$ καὶ δ 8ος δρος τῆς προόδου: $1, \frac{3}{8}, \frac{3}{13}, \dots$

323. Νὰ προσδιορισθῇ δ οὕτως, ὥστε οἱ ἀριθμοὶ: $1 + k, 3 + k, 9 + k$, καθ' ἣν τάξιν δίδονται, εἶναι διαδοχικοὶ δροὶ ἀρμονικῆς προόδου.

324. Έάν $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ είναι διαδοχικοί δροι άρμονικής προόδου, νά άποδειχθῇ ὅτι :

$$\frac{5\alpha - 3\beta}{\alpha\beta} = \frac{\gamma + \delta}{\gamma\delta}.$$

325. Έάν $\frac{\alpha + \beta}{1 - \alpha\beta}, \beta, \frac{\beta + \gamma}{1 - \beta\gamma}$ είναι διαδοχικοί δροι άριθμ. προόδου, τότε οι $\alpha, \frac{1}{\beta}, \gamma$ είναι διαδοχικοί δροι άρμονικής προόδου.

326. Νά παρεμβληθοῦν 19 άριθμητικοί ένδιαμεσοί και 19 άρμονικοί ένδιαμεσοί μεταξύ τῶν άριθμῶν 2 και 3. Έάν δέ ξ είναι εἰς άριθμητικός ένδιαμεσος και η δ ἀντίστοιχος άρμονικός θά είναι :

$$\xi + \frac{6}{\eta} = 5.$$

327. Έάν οι άριθμοι α, β, γ είναι διαδοχικοί δροι άρμονικής προόδου, τότε και οι άριθμοι :

$$\frac{\alpha}{\beta + \gamma - \alpha}, \quad \frac{\beta}{\gamma + \alpha - \beta}, \quad \frac{\gamma}{\alpha + \beta - \gamma}$$

συνιστοῦν ἐπίσης άρμονικήν πρόσδον.

328. Έάν οι δύμσημοι άριθμοι α, β, γ είναι διαδοχικοί δροι άρμον. προόδου, νά δειχθῇ ὅτι :

$$1) \quad \frac{\alpha + \beta}{2\alpha - \beta} + \frac{\gamma + \beta}{2\gamma - \beta} > 4$$

$$2) \quad \beta^2(\alpha - \gamma)^2 = 2[\gamma^2(\beta - \alpha)^2 + \alpha^2(\gamma - \beta)^2].$$

329. Έάν οι α, β, γ είναι διαδοχικοί δροι άρμονικής προόδου, νά δειχθῇ ὅτι :

$$\frac{\beta + \alpha}{\beta - \alpha} + \frac{\beta + \gamma}{\beta - \gamma} = 2.$$

330. Έάν οι άριθμοι $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_v$ είναι διαδοχικοί δροι άρμονικής προόδου, νά άποδειχθῇ ὅτι : $\alpha_1\alpha_2 + \alpha_2\alpha_3 + \dots + \alpha_{v-1}\alpha_v = (v-1)\alpha_1\alpha_v$

331. Τὸ ἀθροισμα τριῶν διαδοχικῶν δρων μιᾶς άρμονικῆς προόδου είναι $\frac{33}{40}$, τὸ δὲ ἄθροισμα τῶν ἀντιστρόφων των είναι 15. Νά ὑπολογισθοῦν οι τρεῖς άριθμοι.

332. Νά ἐπιλυθῇ ἡ ἔξισωσις $15x^3 - 46x^2 - 36x - 8 = 0$, γνωστοῦ δντος ὅτι αἱ ρίζαι τῆς είναι διαδοχικοί δροι άρμονικῆς προόδου, θά είναι :

333. Έάν $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ είναι δροι άριθμητικής προόδου καὶ $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$ είναι δροι άρμονικής προόδου καὶ ισχύουν : $\alpha_1 = \beta_1 = \alpha$ καὶ $\alpha_5 = \beta_5 = \beta$, νά εύρεθῇ τὸ γινόμενον $\alpha_3\beta_3$.

334. Έάν ή παράστασις : $\alpha(\beta - \gamma)x^2 + \beta(\gamma - \alpha)xy + \gamma(\alpha - \beta)y^2$ είναι τέλειον τετράγωνον οι άριθμοι α, β, γ είναι διαδοχικοί δροι άρμονικῆς προόδου.

335. Έάν οι άριθμοι α, β, γ είναι δροι άρμονικῆς προόδου τάξεως λ, μ, ν ἀντιστοίχως, νά δειχθῇ ἡ ισότης :

$$(\mu - v)\beta\gamma + (v - \lambda)\gamma\alpha + (\lambda - \mu)\alpha\beta = 0.$$

336. Εύρετε τὴν συνθήκην, ἵνα τρεῖς άριθμοι α, β, γ είναι δροι άρμονικῆς προόδου, ούχι κατ' ἀνάγκην διαδοχικοί καὶ ἐπὶ τῇ βάσει τῆς εὐρεθείσης συνθήκης ἔχετάσσατε ἐάν οι άριθμοι $\frac{1}{2}, \frac{1}{15}, \frac{1}{32}$ ἀνήκουν εἰς άρμονικήν πρόσδον καὶ ποιάν.

337. Έάν αἱ ρίζαι x_1, x_2, x_3 τῆς ἔξισώσεως : $x^3 + 3\alpha x^2 + 3\beta x + \gamma = 0$, $\beta \neq 0$, είναι διαδοχικοί δροι άρμονικῆς προόδου θὰ είναι :

$$3\alpha\beta\gamma - \gamma^3 = 2\beta^3.$$

III. ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΙ

§ 164. Ορισμοί.— "Εστω $\alpha_v, v = 1, 2, \dots$ μία ἀκολουθία άριθμῶν, διαφόρων τοῦ μηδενός. Θὰ λέγωμεν ὅτι «ἡ ἀκολουθία :

$$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_v, \dots \quad (1)$$

είναι μία γεωμετρική πρόοδος ή πρόσδος κατά πηλίκον τότε, καὶ μόνον τότε, ἂν ἔκαστος δρος της, ἀπὸ τοῦ δευτέρου καὶ ἐφεξῆς, προκύπτῃ ἐκ τοῦ προηγουμένου διὰ πολλαπλασιασμοῦ ἐπὶ ἔνα καὶ τὸν αὐτὸν σταθερὸν ἀριθμὸν».

‘Ο σταθερὸς αὐτὸς ἀριθμὸς καλεῖται λόγος τῆς γεωμετρικῆς προόδου καὶ παρίσταται συνήθως καὶ αὐτὸς μὲ τὸ γράμμα ω .

Οἱ δροι τῆς ἀκολουθίας (1) καλοῦνται καὶ ὄροι τῆς γεωμετρικῆς προόδου.
Οὔτως ἡ ἀκολουθία :

$$2, -4, 8, -16, 32, -64, \dots \quad (2)$$

είναι μία γεωμετρικὴ πρόοδος μὲ λόγον $\omega = -2$.

‘Ομοίως ἡ ἀκολουθία :

$$1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}, \dots \quad (3)$$

είναι μία γεωμετρικὴ πρόοδος μὲ λόγον $\omega = \frac{1}{2}$.

Ἐκ τοῦ διθέντος δρισμοῦ τῆς γεωμετρικῆς προόδου συνάγομεν ὅτι : ἔὰν α_v καὶ α_{v+1} είναι δύο διαδοχικοὶ δροι γεωμετρικῆς προόδου μὲ λόγον ω , θὰ ἔχωμεν :

$$\alpha_{v+1} = \alpha_v \cdot \omega, \quad v = 1, 2, \dots \quad (4)$$

Ἐκ τῆς-(4) προκύπτει : $\alpha_{v+1} : \alpha_v = \omega$ καὶ τοῦτο διὰ κάθε $v = 1, 2, \dots$
Ἐντεῦθεν ἔπειται ὁ ἔξῆς ἰσοδύναμος δρισμὸς τῆς γεωμετρικῆς προόδου :

Γεωμετρικὴ πρόοδος είναι μία ἀκολουθία ἀριθμῶν, τῆς δοποίας τὸ πηλίκον $\alpha_{v+1} : \alpha_v$ δύο οἰωνδήποτε διαδοχικῶν δρων τῆς ἴσονται μὲ τὸν αὐτὸν πάντοτε ἀριθμόν, δ δοποῖος καλεῖται λόγος τῆς γεωμετρικῆς προόδου.

Ἐκ τοῦ ἀνωτέρω δρισμοῦ συνάγομεν τώρα τὰ ἔξῆς :

(i). Ἐὰν $|\omega| > 1$, τότε $|\alpha_{v+1}| > |\alpha_v|$ διὰ κάθε $v = 1, 2, \dots$, δηλαδὴ ἡ γεωμετρικὴ πρόοδος α_v , $v = 1, 2, \dots$ είναι ἀπολύτως αὔξουσα.

Οὔτως ἡ πρόοδος (2) είναι ἀπολύτως αὔξουσα.

(ii). Ἐὰν $|\omega| < 1$, τότε $|\alpha_{v+1}| < |\alpha_v|$ διὰ κάθε $v = 1, 2, \dots$, δηλ. ἡ γεωμετρικὴ πρόοδος α_v , $v = 1, 2, \dots$ είναι ἀπολύτως φθίνουσα.

Οὔτως ἡ πρόοδος (3) είναι ἀπολύτως φθίνουσα, διότι $|\omega| = \frac{1}{2} < 1$.

Παρατήρησις. Ἐὰν $|\omega| = 1$, δηλαδὴ $\omega = \pm 1$, ἔχομεν :

(i). Διὰ $\omega = 1$ ἡ γεωμ. πρόοδος είναι μία ἀκολουθία ἴσων ἀριθμῶν (σταθερὰ ἀκολουθία $\alpha_v = \alpha_1$, $\forall v = 1, 2, \dots$) καὶ ὡς τοιαύτη είναι συγχρόνως αὔξουσα καὶ φθίνουσα.

(ii). Διὰ $\omega = -1$ ἡ γεωμετρικὴ πρόοδος είναι ἀπολύτως σταθερά, διότι :

$|\alpha_{v+1}| = |\alpha_v \cdot \omega| = |\alpha_v| = |\alpha_1|$ καὶ ὡς τοιαύτη είναι συγχρόνως ἀπολύτως αὔξουσα καὶ φθίνουσα.

'Ιδιότητες τής γεωμετρικής προόδου

§ 165. Ιδιότης I.— Εἰς πᾶσαν γεωμετρικήν πρόοδον ἔκαστος ὄρος τῆς ἰσοῦται μὲ τὸ γινόμενον τοῦ πρώτου ὄρου αὐτῆς ἐπὶ δύναμιν τοῦ λόγου, ἔχουσαν ἐκθέτην τὸν ἀριθμόν, ὅστις φανερώνει τὸ πλήθος τῶν προηγουμένων αὐτοῦ ὄρων.

"Ητοι :

$$\alpha_v = \alpha_1 \cdot \omega^{v-1}, \quad v=1,2,\dots \quad (1)$$

'Απόδειξις : 'Η ιδιότης προφανῶς ἴσχυει διὰ $v = 1$.

Δεχόμεθα ὅτι ἀληθεύει διὰ $v = k$, ἢτοι ὅτι ἴσχυει : $\alpha_k = \alpha_1 \cdot \omega^{k-1}$.

'Εξ αὐτῆς προκύπτει $\alpha_k \cdot \omega = \alpha_1 \cdot \omega^k$. 'Άλλα $\alpha_k \cdot \omega = \alpha_{k+1}$ (ὅρισμὸς γεωμ. προόδου).

"Άρα :

$$\alpha_{k+1} = \alpha_1 \cdot \omega^k = \alpha_1 \cdot \omega^{(k+1)-1}$$

ἡτοι, ἡ ιδιότης ἀληθεύει καὶ διὰ $v = k + 1$, ἐπομένως, κατὰ τὴν ἀρχὴν τῆς μαθηματικῆς ἐπαγωγῆς, ἀληθεύει διὰ κάθε φυσικὸν ἀριθμὸν v .

'Εφαρμογαί. 1η : Νὰ εὑρεθῇ ὁ 7ος ὄρος τῆς γεωμετρικῆς προόδου : $\frac{1}{2}, 1, 2, 4, \dots$

Λύσις. "Έχομεν $\alpha_1 = \frac{1}{2}$, $\omega = 2$, $v = 7$, $\alpha_v = ?$

Δι! ἐφαρμογῆς τοῦ ἀνωτέρω τύπου (1) εύρισκομεν : $\alpha_v = \frac{1}{2} \cdot 2^{v-1} = 32$.

2α : Νὰ εὑρεθῇ τὸ πλήθος ν τῶν δρων μιᾶς γεωμετρικῆς προόδου ἡ δοκία ἔχει :

$$\alpha_1 = 6, \quad \omega = 2, \quad \alpha_v = 3072.$$

Λύσις. Εἰς τὸν τύπον $\alpha_v = \alpha_1 \cdot \omega^{v-1}$ θέτομεν ἀντὶ τῶν α_1 , ω , α_v τὰ ἵσα τῶν καὶ ἔχομεν : $3072 = 6 \cdot 2^{v-1} \quad \text{ἢ} \quad 2^{v-1} = 512$.

'Ἐπειδὴ $512 = 2^9$ ἢ τελευταία ἴστης γράφεται :

$$2^{v-1} = 2^9, \quad \text{ἕξ οὐ: } v - 1 = 9 \quad \text{ἢ} \quad v = 10.$$

Παρατήρησις : 'Εκ τῆς ἀνωτέρω ιδιότητος συμπεραίνομεν ὅτι μία γεωμετρική πρόοδος είναι τελείως ώρισμένη, ὅταν δοθῇ ὁ πρῶτος ὄρος τῆς α_1 καὶ ὁ λόγος τῆς ω , διότι τότε οἱ ὄροι τῆς θὰ είναι ἀντιστοίχως :

1ος ὄρος	2ος ὄρος	3ος ὄρος	4ος ὄρος	5ος ὄρος . . .
$\alpha_1,$	$\alpha_1\omega,$	$\alpha_1\omega^2,$	$\alpha_1\omega^3,$	$\alpha_1\omega^4, \dots \text{Κ.Ο.Κ.}$

§ 166. Ιδιότης II.— Εἰς πεπερασμένον πλήθος διαδοχικῶν δρων γεωμ. προόδου τὸ γινόμενον δύο δρων ἴσακις ἀπεχόντων τῶν ἄκρων, ἴσοῦται πρὸς τὸ γινόμενον τῶν ἄκρων δρων. 'Εὰν τὸ πλήθος τῶν δρων είναι περιττόν, τότε ὁ μεσαῖος ὄρος είναι μέσος ἀνάλογος τῶν ἄκρων δρων.

'Απόδειξις. a'). Θεωροῦμεν τοὺς ν πρώτους ὄρους : $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{v-1}, \alpha_v$ μιᾶς γεωμ. προόδου μὲ λόγον ω . Παρατηροῦμεν ὅτι ἴσχυει :

$$\alpha_2 \cdot \alpha_{v-1} = (\alpha_1\omega) \left(\frac{\alpha_v}{\omega} \right) = \alpha_1\alpha_v$$

$$\alpha_3 \cdot \alpha_{v-2} = (\alpha_1\omega^2) \left(\frac{\alpha_v}{\omega^2} \right) = \alpha_1 \cdot \alpha_v$$

καὶ γενικῶς, ἐὰν ὁ εἶς ἔχῃ κ τὸ ὄρος πρὸ αὐτοῦ, θὰ εἶναι ἵσος μέ : $\alpha_1 \cdot \omega^k$, τότε ὁ ἔχων κ τὸ ὄρος μετ' αὐτὸν θὰ εἶναι ἵσος μέ : $\frac{\alpha_v}{\omega^k}$ συνεπῶς τὸ γινόμενον τῶν δύο αὐτῶν ὄρων εἶναι : $(\alpha_1 \omega^k) \cdot \left(\frac{\alpha_v}{\omega^k} \right) = \alpha_1 \alpha_v$.

β'). Ἐστω ὅτι τὸ πλήθος τῶν θεωρουμένων ὄρων εἶναι περιττόν, τότε ὑπάρχει μεσαῖος ὄρος, ἔστω ὁ α_λ . Ἐξ ὀρισμοῦ εἶναι $\alpha_\lambda = \alpha_{\lambda-1} \cdot \omega$ καὶ $\alpha_\lambda = \frac{\alpha_{\lambda+1}}{\omega}$. Ἐξ αὐτῶν λαμβάνομεν :

$$\alpha_\lambda^2 = (\alpha_{\lambda-1} \cdot \omega) \cdot \left(\frac{\alpha_{\lambda+1}}{\omega} \right) = \alpha_{\lambda-1} \cdot \alpha_{\lambda+1} = \alpha_1 \alpha_v,$$

ἥτοι ὁ μεσαῖος ὄρος εἶναι μέσος ἀνάλογος τῶν ἄκρων ὄρων.

§ 167. Πόρισμα I.— Ἀναγκαία καὶ ίκανὴ συνθήκη, ἵνα τρεῖς ἀριθμοὶ α, β, γ , καθ' ἣν τάξιν γράφονται, εἶναι διαδοχικοὶ ὄροι γεωμετρικῆς προόδου εἶναι :

$$\boxed{\beta^2 = \alpha\gamma} \quad (1)$$

Εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν ὁ β καλεῖται γεωμετρικὸς μέσος ἢ μέσος ἀνάλογος τῶν α καὶ γ .

Γενικῶς : Καλοῦμεν γεωμετρικὸν μέσον v τὸ πλήθος ἀριθμῶν a_1, a_2, \dots, a_v καὶ συμβολίζομεν τοῦτον μὲν M_v , τὸν ἀριθμόν, δστις ὀρίζεται οὕτω :

$$\boxed{M_v = \sqrt[v]{a_1 a_2 \dots a_v}} \quad (2)$$

§ 168. Πόρισμα II.— Τὸ γινόμενον $\Pi_v \equiv a_1 a_2 \dots a_v$ τῶν v πρώτων ὄρων γεωμετρικῆς προόδου δίδεται ὑπὸ τοῦ τύπου :

$$\boxed{\Pi_v^2 = (a_1 \cdot a_v)^v} \quad (1)$$

Σημείωσις. Ὁ ἀνωτέρω τύπος δύναται νὰ γραφῇ καὶ ὡς ἔξῆς :

$$\Pi_v = \alpha_1^v \cdot \omega^{\frac{v(v-1)}{2}}, \text{ δπου } \omega \text{ δ λόγος τῆς προόδου. (Διατ!;)}. \quad (2)$$

§ 169. Ἰδιότης III.— Τὸ ἄθροισμα $\Sigma_v \equiv a_1 + a_2 + \dots + a_v$ τῶν v πρώτων ὄρων γεωμετρικῆς προόδου μὲ λόγον $\omega \neq 1$ δίδεται ὑπὸ τοῦ τύπου :

$$\boxed{\Sigma_v = \frac{\alpha_v \omega - \alpha_1}{\omega - 1}} \quad (1)$$

Ἀπόδειξις : Πολλαπλασιάζοντες ἀμφότερα τὰ μέλη τῆς ισότητος :

$$\Sigma_v = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_v \quad (2)$$

ἐπὶ τὸν λόγον ω εύρισκομεν :

$$\omega \Sigma_v = \alpha_1 \omega + \alpha_2 \omega + \dots + \alpha_v \omega \quad (3)$$

Αφαιρούντες κατά μέλη τάς (3) καὶ (2) καὶ λαμβάνοντες ύπ' ὅψιν δτι :

$$\alpha_1\omega = \alpha_2, \alpha_2\omega = \alpha_3, \dots, \alpha_{v-1}\omega = \alpha_v, \\ \text{εύρισκομεν :}$$

$$\omega\Sigma_v - \Sigma_v = \alpha_v\omega - \alpha_1 \quad \text{ή} \quad (\omega - 1) \cdot \Sigma_v = \alpha_v\omega - \alpha_1.$$

Ἐκ τῆς τελευταίας Ισότητος, διὰ $\omega \neq 1$, προκύπτει :

$$\Sigma_v = \frac{\alpha_v\omega - \alpha_1}{\omega - 1}.$$

Ἄσκησις. Νὰ ἀποδειχθῇ ὁ τύπος (1) τοῦ ἀθροίσματος διὰ τῆς μεθόδου τῆς μαθηματικῆς ἐπαγγωγῆς.

§ 170. Πόρισμα.— Τὸ ἀθροίσμα $\Sigma_v \equiv a_1 + a_2 + \dots + a_v$ τῶν ν πρώτων ὅρων γεωμετρικῆς πρόδοου μὲ λόγον $\omega \neq 1$ δίδεται συναρτήσει τοῦ πρώτου ὅρου a_1 , τοῦ λόγου ω καὶ τοῦ πλήθους ν τῶν ὅρων του ὑπὸ τοῦ τύπου :

$$\boxed{\Sigma_v = \frac{\alpha_1(\omega^v - 1)}{\omega - 1}} \quad (1)$$

Ο τύπος (1) δίδει τὸ ἀθροίσμα τῶν ν πρώτων ὅρων τῆς γεωμ. προόδου, χωρὶς νὰ παρίσταται ἀνάγκη νὰ εὑρωμεν τὸν νιοστὸν ὅρον αὐτῆς.

Ἐφαρμογή : Νὰ ὑπολογισθῇ τὸ ἀθροίσμα τῶν δικτῶν πρώτων ὅρων τῆς προόδου : 2, 6, 18, 54, ...

Λύσις : Εἰς τὸν τύπον (1) (§ 170) θέτοντες $\alpha_1 = 2$, $\omega = 3$, $v = 8$ λαμβάνομεν :

$$\Sigma_8 = \frac{2(3^8 - 1)}{3 - 1} = \frac{2(6561 - 1)}{2} = 6560.$$

Παρατηρήσεις : α'). Ἐάν εἰς μίαν γεωμετρικὴν πρόδοον εἶναι $\omega = 1$ οἱ τύποι (1) τῶν § 169, 170 διὰ τὸ Σ_v δὲν δύνανται νὰ ἐφαρμοσθῶν (διατί;). Εἰς τὴν εἰδικὴν αὐτὴν περίπτωσιν, δηλ. ἔάν $\omega = 1$, ἡ πρόδοος ἔχει δῆλους τοὺς ὅρους τῆς ίσους μὲ τὸν πρῶτον καὶ συνεπῶς τὸ ἀθροίσμα τῶν ν πρώτων ὅρων ίσουται μέ : $\Sigma_v = \alpha_1 + \alpha_1 + \dots + \alpha_1 = v \cdot \alpha_1$.

β'). Οἱ δύο τύποι :

$$\alpha_v = \alpha_1\omega^{v-1} \quad (1) \quad \text{καὶ} \quad \Sigma_v = \frac{\alpha_v\omega - \alpha_1}{\omega - 1} \quad (2)$$

περιέχουν πέντε ἀγνώστους, τοὺς $\alpha_1, \alpha_v, \omega, v, \Sigma_v$. Ἐάν λοιπὸν μᾶς δοθοῦν οἱ τρεῖς ἔξι αὐτῶν, τότε δυνάμεθα νὰ εὑρωμεν τοὺς ὑπόλοιπους δύο ἐπιπλύοντες τὸ σύστημα τῶν ἔξισώσεων (1) καὶ (2). Ἡ ἐπιλύσις τοῦ ἐν λόγῳ συστήματος εἶναι, ἐν γένει, εὐκολος πλὴν τῶν ἔξις δύο περιπτώσεων :

(i). Ἐάν ζητοῦνται οἱ α , καὶ ω . Τότε τὸ σύστημα τῶν (1) καὶ (2) δίδει τὴν ἔξισώσιν :

$$(\Sigma_v - \alpha_v)\omega^v - \Sigma_v\omega^{v-1} + \alpha_v = 0. \quad (3)$$

(ii). Ἐάν ζητοῦνται οἱ α_v καὶ ω . Τότε τὸ σύστημα τῶν (1) καὶ (2) δίδει τὴν ἔξισώσιν :

$$\alpha_1\omega^v - \Sigma_v\omega + (\Sigma_v - \alpha_1) = 0. \quad (4)$$

Αἱ ἔξισώσεις (3) καὶ (4) εἶναι ν βαθμοῦ καὶ ἔάν μὲν ὁ $v \leq 4$ αὔτα ἐπιλύονται, ἔάν δμως δ $v > 4$, πρᾶγμα συνηθέστερον, τότε δὲν καθίσταται δυνατὴ ἡ ἐπιλύσις αὐτῶν μὲ τὰς στοιχείωδεις γνώσεις τῆς Ἀλγέβρας.

Μερικὸς ἀπὸ τὰ παρουσιαζόμενα προβλήματα ἐπιλύονται μὲ τὴν βοήθειαν τῶν λογαρίθμων, τὴν θεωρίαν τῶν ὁποίων ἀναπτύσσομεν εἰς ἐν τῶν ἐπομένων κεφαλαίων.

Έφαρμογή 1η : Γεωμετρικής προόδου ό τηγδοιος όρος ισοῦται πρὸς 384 καὶ δ λόγος ισοῦται πρὸς 2. Νὰ εὐρεθῇ δ πρῶτος όρος της καὶ τὸ ἄθροισμα τῶν ὀκτὼ πρώτων όρων της.

Άνσις : "Εστωσαν α_1 δ πρῶτος όρος, ω δ λόγος καὶ α_v δ νιοστὸς όρος τῆς γεωμ. προόδου.

"Εκ τῶν τύπων $\alpha_v = \alpha_1 \omega^{v-1}$ καὶ $\Sigma_v = \frac{\alpha_v \omega - \alpha_1}{\omega - 1}$ διὰ $\omega = 2$, $v = 8$, $\alpha_v = 384$ λαμβάνομεν ἀντιστοίχως :

$$384 = \alpha_1 \cdot 2^7 \quad (1) \quad \text{καὶ} \quad \Sigma_8 = \frac{384 \cdot 2 - \alpha_1}{2 - 1} \quad (2)$$

"Εκ τῆς πρώτης ἔχομεν $\alpha_1 = 3$.

"Αντικαθιστῶντες εἰς τὴν (2) τὸ α_1 μὲ τὸ ίσον του εύρισκομεν :

$$\Sigma_8 = \frac{384 \cdot 2 - 3}{2 - 1} = 765.$$

Έφαρμογή 2α : Εἰς γεωμετρικὴν προόδουν μὲ πρῶτον όρον τὸ 5 δ ἔβδομος όρος της ισοῦται πρὸς 3645. Νὰ εὐρεθῇ δ πρόδος καὶ νὰ ὑπολογισθῇ τὸ ἄθροισμα τῶν ἐπτὰ πρώτων όρων της.

Άνσις : "Εκ τῶν τύπων $\alpha_v = \alpha_1 \omega^{v-1}$ καὶ $\Sigma_v = \frac{\alpha_v \omega - \alpha_1}{\omega - 1}$, διὰ $\alpha_1 = 5$, $v = 7$, καὶ $\alpha_v = 3645$ λαμβάνομεν ἀντιστοίχως :

$$3645 = 5 \cdot \omega^6 \quad (1) \quad \text{καὶ} \quad \Sigma_7 = \frac{3645 \cdot \omega - 5}{\omega - 1} \quad (2)$$

"Εκ τῆς (1) ἔχομεν $\omega^6 = 729$, ἐξ ής : $\omega = \pm 3$.

Διὰ $\omega = 3$ διὰ πρόδος εἶναι : 5, 15, 45, 135, ... (3)

Διὰ $\omega = -3$ διὰ πρόδος εἶναι 5, -15, 45, -135, ... (4)

"Η πρώτη εἶναι γνησίως αὔξουσα, ή δευτέρα δὲν εἶναι οὔτε αὔξουσα οὔτε φθίνουσα, εἶναι δὲν μως ἀπολύτως αὔξουσα καὶ μάλιστα γνησίως.

"Εκ τῆς (2) δι' ἀντικαταστάσεως τοῦ ω μὲ τὰς τιμάς του +3 καὶ -3 εύρισκομεν ἀντιστοίχως :

$$\Sigma_7 = \frac{3645 \cdot 3 - 5}{3 - 1} = 5465, \quad \Sigma'_7 = \frac{3645 (-3) - 5}{-3 - 1} = 2735.$$

Τὸ πρῶτον ἄθροισμα διαφέρεται εἰς τὴν πρόδον (3), τὸ δευτέρον εἰς τὴν πρόδον (4).

§. 171. Παρεμβολὴ γεωμετρικῶν ἐνδιαμέσων.—Ορισμοί. Οἱ ἀριθμοὶ x_1, x_2, \dots, x_μ καλοῦνται γεωμετρικοὶ ἐνδιάμεσοι διθέντων ἀριθμῶν α καὶ β, τότε καὶ μόνον τότε, ἂν οἱ ἀριθμοί :

$$\alpha, x_1, x_2, \dots, x_\mu, \beta \quad (1)$$

εἶναι διαδοχικοὶ όροι γεωμ. προόδου.

Διθέντων δύο ἀριθμῶν α καὶ β καλοῦμεν παρεμβολὴν μ γεωμετρικῶν ἐνδιαμέσων τὴν εὑρεσιν μ ἀριθμῶν x_1, x_2, \dots, x_μ τοιούτων, ὡστε οἱ ἀριθμοί :

$$\alpha, x_1, x_2, \dots, x_\mu, \beta \quad \text{νὰ εἶναι διαδοχικοὶ όροι γεωμ. προόδου.}$$

Διὰ τὴν εὑρεσιν τῶν ὧς ἀνω γεωμετρικῶν ἐνδιαμέσων ἀρκεῖ νὰ εὕρωμεν τὸν λόγον τῆς γεωμετρικῆς προόδου εἰς ἦν οὔτοι ἀνήκουν. Ἐὰν παραστήσωμεν μὲ τὸν λόγον τῆς προόδου αὐτῆς τότε, ἐπειδὴ τὸ πλήθος ὅλων τῶν όρων (1) εἶναι $\mu + 2$, δ β θὰ κατέχῃ τὴν $\mu + 2$ θέσιν καὶ συνεπῶς θὰ ἔχωμεν :

$$\beta = \alpha \cdot \omega^{(\mu+2)-1} \quad \text{ἢ} \quad \beta = \alpha \cdot \omega^{\mu+1}$$

Αρα : $\omega = e \cdot \sqrt[m+1]{\frac{\beta}{\alpha}}$

(1)

όπου $e = 1$, όταν μ αρτιος και $e = \pm 1$, όταν μ περιττός, διά $\omega \in \mathbb{R}$. Εάν άναγκητώμεν $\omega \notin \mathbb{R}$, τότε θά εύρωμεν αύτὸν ἐκ τῆς ἐπιλύσεως τῆς διωνύμου ἔξισθεως $\alpha \omega^{\mu+1} - \beta = 0$.

Ο τύπος (1) καλεῖται τύπος παρεμβολῆς γεωμετρικῶν ἐνδιαμέσων ἢ συντόμως τύπος τῆς γεωμετρικῆς παρεμβολῆς..

Όρισθέντος ἐκ τοῦ τύπου (1) τοῦ λόγου ω , οἱ ζητούμενοι ἀριθμοὶ εἰναι :

$$x_1 = \alpha \omega, \quad x_2 = \alpha \omega^2, \dots, \quad x_{\mu} = \alpha \omega^{\mu}.$$

Έφαρμογή. Μεταξὺ τῶν ἀριθμῶν 3 και 48 νὰ παρεμβληθοῦν τρεῖς πραγματικοὶ γεωμ. ἐνδιάμεσοι.

Λύσις : Έκ τοῦ τύπου (1) διά $\alpha = 3$, $\beta = 48$ και $\mu = 3$, λαμβάνομεν :

$$\omega = \pm \sqrt[4]{\frac{48}{3}} = \pm \sqrt[4]{16}, \quad \text{εἰς οὐ: } \omega = \pm 2.$$

Συνεπῶς οἱ ζητούμενοι γεωμετρικοὶ ἐνδιάμεσοι εἰναι οἱ : 6, 12, 24 ἢ οἱ : -6, -12, -24.

§ 172. Συμμετρικὴ παράστασις τῶν δρων μιᾶς γεωμετρικῆς προσδοου.— Πρὸς περιορισμὸν τῶν ἀγνώστων εἰς διάφορα προβλήματα γεωμετρικῶν προσδῶν, ίδία ὅταν δίδεται τὸ γινόμενον τῶν ἀριθμῶν, οἱ δποὶοι εἰναι διαδοχικοὶ δροὶ γεωμετρικῆς προσδου καλὸν εἰναι νὰ ἔχωμεν ὑπ' ὅψιν τὰς ἔξης δύο περιπτώσεις :

Περίπτωσις 1η : Τὸ πλήθος τῶν ἀγνώστων δρων εἰναι περιττόν.

Έάν οἱ ἀγνωστοὶ δροὶ εἰναι πλήθους $(2v+1)$, τότε ὑπάρχει μεσοῖς, τὸν δποῖον συμβολίζομεν μὲ x και ἔάν ὁ λόγος τῆς προόδου εἰναι ω γράφομεν τοὺς ζητούμενους δρους ώς ἔξης :

$$\frac{x}{\omega^v}, \dots, \frac{x}{\omega^2}, \frac{x}{\omega}, x, x\omega, x\omega^2, \dots, x\omega^v.$$

Περίπτωσις 2a : Τὸ πλήθος τῶν ἀγνώστων δρων εἰναι ἄρτιον (ξτω $2v$).

Εἰς αὐτὴν τὴν περίπτωσιν ὑπάρχουν δύο «μεσαῖοι» δροὶ ίσαπέχοντες τῶν ἄκρων, τοὺς δποὶους παριστῶμεν μέ : $\frac{x}{\lambda}$ και $x\lambda$, ὅτε ὁ λόγος ω τῆς γεωμ. προόδου εἰναι : $\omega = x\lambda : \frac{x}{\lambda} = \lambda^2$ και οἱ ζητούμενοι δροὶ γράφονται ώς ἔξης :

$$\frac{x}{\lambda^{v+1}}, \dots, \frac{x}{\lambda^3}, \frac{x}{\lambda}, x\lambda, x\lambda^3, \dots, x\lambda^{v+1}.$$

Δέον νὰ σημειωθῇ ὅτι εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν ὁ x δὲν εἰναι δρος τῆς γεωμετρικῆς προόδου και ὁ λόγος τῆς προόδου, ώς ἐλέχθη, εἰναι λ^2 .

Ἐφαρμογή ή. Νὰ εὐρεθοῦν τέσσαρες πραγμ. ἀριθμοί, οἱ ὅποιοι είναι διαδοχικοὶ ὅροι γεωμ. προόδου, ἐάν τὸ γινόμενόν των ισοῦται πρὸς 729 καὶ ὁ τέταρτος ισοῦται πρὸς τὸ γινόμενον τῶν δύο μεσαίων.

Λύσις : Κατά τὰ δυνατέρω, περίπτωσις 2α, παριστῶμεν τοὺς ζητουμένους ἀριθμούς ὡς ἔξις :

$$\frac{x}{\lambda^3}, \quad \frac{x}{\lambda}, \quad x\lambda, \quad x\lambda^3.$$

Ἐπειδὴ τὸ γινόμενόν των ισοῦται πρὸς 729, θὰ ἔχωμεν :

$$\frac{x}{\lambda^3} \cdot \frac{x}{\lambda} \cdot x\lambda \cdot x\lambda^3 = 729 \\ \text{η} \quad x^4 = 729 = 27^2, \quad \text{ἴξοῦ :} \quad x = \pm 3\sqrt[4]{3}.$$

Ἐξ ἀλλου, κατά τὴν ἑκφώνησιν, ἔχομεν : $x\lambda^3 = \left(\frac{x}{\lambda}\right) \cdot (x\lambda) = x^2$ η $\lambda^3 = x$, ἐκ τῆς ὅποιας εύρισκομεν : $\lambda = \pm \sqrt[3]{3}$.

Διὰ $x = 3\sqrt[4]{3}$ καὶ $\lambda = \sqrt[3]{3}$ οἱ ζητούμενοι ἀριθμοὶ είναι : 1, 3, 9, 27.

Διὰ $x = -3\sqrt[4]{3}$ καὶ $\lambda = -\sqrt[3]{3}$ εύρισκομεν πάλιν τοὺς ίδιους ἀριθμούς.

§ 173. Ἀθροισμα ἀπείρων ὅρων ἀπολύτως φθινούσης γεωμετρικῆς προόδου.— Ἐστω μία γεωμετρικὴ πρόοδος μὲ πρῶτον ὅρον τὸ α καὶ λόγον ω, ἦτοι ἔστω ἡ πρόοδος :

$$\alpha, \alpha\omega, \alpha\omega^2, \dots, \alpha\omega^{v-1}, \dots \quad (1)$$

Ἄσ συμβολίσωμεν μὲ Σ_v τὸ ἀθροισμα τῶν ν πρώτων ὅρων τῆς (1), τὸ ὅποιον, ὡς γνωστόν, δίδεται ὑπὸ τοῦ τύπου :

$$\Sigma_v = \frac{\alpha(\omega^v - 1)}{\omega - 1}.$$

Ἐστω τώρα ὅτι ὁ λόγος ω τῆς (1) πληροῖ τὴν συνθήκην : $0 < |\omega| < 1$, δηλαδὴ ἡ (1) είναι ἀπολύτως φθίνουσα γεωμετρικὴ πρόοδος, τότε ισχύει τὸ κάτωθι θεώρημα :

§ 174. Θεώρημα.— Διὰ κάθε θετικὸν ἀριθμὸν ε (δόσονδήποτε μικρὸν) ὑπάρχει δείκτης $v_0 = v_0(\epsilon)$ τοιοῦτος, ὥστε νὰ ισχύῃ :

$$\left| \Sigma_v - \frac{\alpha}{1-\omega} \right| < \epsilon \quad \text{διὰ κάθε } v \geq v_0.$$

Ἡ διπερ τὸ αὐτό : $\lim \Sigma_v = \frac{\alpha}{1-\omega}$.

Ἀπόδειξις. Πράγματι : $\Sigma_v = \alpha + \alpha\omega + \dots + \alpha\omega^{v-1}$

$$\text{η} \quad \Sigma_v = \frac{\alpha\omega^v - \alpha}{\omega - 1} \quad \text{η} \quad \Sigma_v = \frac{\alpha}{1-\omega} - \frac{\alpha}{1-\omega} \omega^v.$$

Ἡ ἀκολουθία ὅμως ω^v , $v = 1, 2, \dots$ μὲ $|\omega| < 1$ είναι μηδενικὴ (βλ. Κεφ. V § 131, παράδειγμα 1ον).

Οθεν : $\lim \Sigma_v = \frac{\alpha}{1-\omega}$, διότι $\lim \frac{\alpha}{1-\omega} \cdot \omega^v = 0$.

Έκ τοῦ ἀνωτέρω θεωρήματος δδηγούμεθα εἰς τὸ νὰ δώσωμεν τὸν ἔξῆς δρισμόν :

Καλοῦμεν ἄθροισμα τῶν ἀπείρων ὅρων τῆς ἀπολύτως φθινούσης γεωμετρικῆς προόδου μὲ πρῶτον ὅρον τὸν α καὶ λόγον ω τὸν πραγματικὸν ἀριθμὸν $\frac{\alpha}{1-\omega}$ πρὸς τὸν ὅποιον συγκλίνει τὸ ἄθροισμα Σ , τῶν ν πρώτων ὅρων τῆς γεωμετρικῆς προόδου. Γράφομεν δὲ συμβολικῶς :

$$\Sigma_{\infty} \quad \text{ἢ} \quad \Sigma = \alpha + \alpha\omega + \alpha\omega^2 + \cdots + \alpha\omega^{\nu-1} + \cdots = \frac{\alpha}{1-\omega}.$$

"Ωστε :

$$\boxed{\text{'Εὰν } |\omega| < 1 \implies \Sigma_{\infty} \equiv \Sigma = \frac{\alpha}{1-\omega}} \quad (1)$$

Λέγομεν δὲ τότε : «Τὸ ἄθροισμα τῶν ἀπείρων ὅρων γεωμετρικῆς προόδου μὲ πρῶτον ὅρον τὸν α καὶ λόγον ω μὲ $0 < |\omega| < 1$ ισοῦται μὲ : $\frac{\alpha}{1-\omega}$.

Σημ. 'Εάν $\alpha = 1$ τότε : $\Sigma = 1 + \omega + \omega^2 + \cdots + \omega^{\nu-1} + \cdots = \frac{1}{1-\omega}$.

'Εφαρμογὴ 1η : Νὰ ὑπολογισθῇ τὸ ἄθροισμα : $4 + \frac{4}{3} + \frac{4}{3^2} + \cdots + \frac{4}{3^{\nu}} + \cdots$

Αύσις : Οἱ ἀπειροὶ προσθετέοι τοῦ ἄθροισματος συνιστοῦν γεωμ. πρόοδον μὲ πρῶτον ὅρον $\alpha = 4$ καὶ λόγον $\omega = \frac{1}{3}$. 'Επομένως τὸ ζητούμενον ἄθροισμα δίζεται ὑπὸ τοῦ τύπου (1),

$$\text{ἵτοι: } 4 + \frac{4}{3} + \frac{4}{3^2} + \cdots + \frac{4}{3^{\nu}} + \cdots = \frac{4}{1 - \frac{1}{3}} = 6.$$

'Εφαρμογὴ 2α : Νὰ εὑρεθῇ τὸ κοινὸν κλάσμα, ἀπὸ τὸ ὅποιον παράγεται τὸ δεκαδικὸν περιοδικὸν κλάσμα 4,513513...

Αύσις : Τὸ δεκαδικὸν περιοδικὸν κλάσμα 4, 513513... γράφεται :

$$4 + \frac{513}{1000} + \frac{513}{1000^2} + \cdots$$

$$\text{'Αλλά } \frac{513}{1000} + \frac{513}{1000^2} + \frac{513}{1000^3} + \cdots = \frac{\frac{513}{1000}}{1 - \frac{1}{1000}} = \frac{513}{999}.$$

$$\text{'Αρα: } 4,513513\dots = 4 + \frac{513}{999} = \frac{4509}{999}.$$

Παρατηροῦμεν λοιπὸν δτὶ δ δεκαδικὸς ἀριθμὸς 4,513513..., δτῶν τὸ πλῆθος τῶν δεκαδικῶν του ψηφίων αὐξάνει ἀπεριορίστως, τείνει πρὸς τὸν ρητὸν ἀριθμὸν $\frac{4509}{999}$.

A S K H S E I S

338. Χαρακτηρίσατε τὰς κάτωθι προόδους ὡς πρὸς τὸ μονότονον καὶ τὸ εἶδος μονοτονίας :

- α) 12, 6, 3, ..., β) $\frac{1}{9}, \frac{1}{3}, 1, 3, \dots$, γ) 3, -6, 12, ..., δ) $-4, \frac{8}{3}, -\frac{16}{9}, \dots$

339. "Εστω ή γεωμ. πρόσδοσις 1, 3, 9, 27, 81, ... Δείξατε ότι αἱ διαφοραὶ μεταξὺ δύο διαδοχικῶν δρων σχῆματίζουν μίαν νέαν γεωμ. πρόσδοσιν. Ἡ ιδιότης αὐτῆς δύναται νὰ γενικευθῇ δι' οἰανδήποτε γεωμ. πρόσδοσιν;

340. Προσδιορίσατε τὸν πραγματικὸν ἀριθμὸν x οὗτως, ὅπερε οἱ κάτωθι ἀριθμοὶ ἀποτελοῦν διαδοχικούς δρους γεωμ. πρόσδοσιν: 1) $x - 2x, 7x + 4$, 2) $2x - 2, 3x + 6, 12x + 6$.

341. Νὰ εὑρεθῇ τὸ πλῆθος τῶν δρων γεωμετρικῆς προσδοσι, εἰς τὰς κάτωθι περιπτώσεις:

$$\alpha) \alpha_1 = 4, \quad \omega = 4, \quad \Sigma_v = 5460, \quad \beta) \alpha_4 = 13, \quad \alpha_6 = 117, \quad \alpha_v = 9477,$$

$$\gamma) \alpha_1 = 4, \quad \alpha_v = 972, \quad \Sigma_v = 1456, \quad \delta) \alpha_v = 81, \quad \omega = \frac{3}{4}, \quad \Sigma_v = 781.$$

342. Νὰ σχηματισθῇ γεωμ. πρόσδοσις, ἡ ὁποία ἔχει ὡς πρῶτον δρον τὴν μικροτέραν ρίζαν τῆς ἔξισώσεως $x^3 - 2x^2 - 25x + 50 = 0$ καὶ ὡς λόγον τὴν μεγαλυτέραν ρίζαν. Ἐπὶ πλέον νὰ εὔρεθῇ τὸ ἀθροισμα τῶν δρων αὐτῆς, τῶν ὁποίων τὸ πλῆθος εἶναι τριπλάσιον τῆς τρίτης ρίζης τῆς ἀνωτέρω ἔξισώσεως.

343. Νὰ παρεμβληθοῦν 4 γεωμετρικοὶ ἐνδιάμεσοι μεταξὺ τῆς μικροτέρας καὶ τῆς μεγαλυτέρας ρίζης τῆς ἔξισώσεως $2x^2 - 5x - 3 = 0$.

344. Νὰ δειχθῇ ὅτι τὸ ἀθροισμα ν γεωμετρικῶν ἐνδιάμεσων παρεμβαλλομένων μεταξὺ 1 καὶ αἱ Ισοῦται πρός:

$$\sqrt[n+1]{\alpha} \left(\sqrt[n+1]{\alpha^n - 1} \right) : \left(\sqrt[n+1]{\alpha - 1} \right).$$

345. Γεωμετρικῆς προσδοσι τὸ ἀθροισμα τῶν 4 πρώτων δρων εἶναι 40, τῶν δὲ τεσσάρων ἐπομένων τὸ ἀθροισμα εἶναι 3240. Νὰ εὑρεθῇ δ λόγος καὶ δ πρῶτος δρος τῆς πρόσδοσι.

346. Τὸ ἀθροισμα τῶν τεσσάρων πρώτων δρων φθινούστης γεωμ. προσδοσι εἶναι 65, τὸ δὲ ἀθροισμα τῶν ἀπείρων δρων τῆς 81. Νὰ εὑρεθῇ ἡ πρόσδοσι.

347. Ἀπολύτως φθινούστης γεωμ. προσδοσι ὁ ἡρῶτος δρος τῆς εἶναι τὸ 1/2 τοῦ ἀθροίσματος τῶν ἀπείρων δρων τῆς, τὸ δὲ ἀθροισμα τῶν δύο πρώτων δρων τῆς εἶναι 20. Νὰ εὑρεθῇ ἡ πρόσδοσι.

348. Νὰ εὑρεθοῦν τρεῖς ἀριθμοὶ διαδοχικοὶ δροι γεωμ. προσδοσι, ἐὰν γνωρίζωμεν τὸ ἀθροισμα τῶν 52 καὶ τὸ ἀθροισμα τῶν τετραγώνων τῶν 1456.

349. Τὸ ἀθροισμα τῶν ἀπείρων δρων ἀπολύτως φθινούστης γεωμετρικῆς προσδοσι εἶναι 12, τὸ δὲ ἀθροισμα τῶν τετραγώνων τῶν ἀπείρων δρων τῆς εἶναι 48. Νὰ εὑρεθῇ ἡ πρόσδοσι.

350. Νὰ εὑρεθοῦν τὰ κάτωθι ἀθροίσματα:

$$\alpha) \frac{\sqrt[3]{2} + 1}{\sqrt[3]{2} - 1} + \frac{1}{2 - \sqrt[3]{2}} + \frac{1}{2} + \dots \quad \beta) 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{9} - \frac{1}{27} + \dots$$

$$\gamma) \alpha + \beta + \frac{\beta^2}{\alpha} + \frac{\beta^3}{\alpha^2} + \dots \quad (\alpha > \beta > 0).$$

351. Πρὸς ποῖον ἀριθμὸν τείνει τὸ πηλίκον τοῦ ἀθροίσματος: $1 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^4 + \dots + \left(\frac{1}{2}\right)^{2v} + \dots$ διὰ τοῦ ἀθροίσματος: $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots + \left(\frac{1}{2}\right)^v + \dots$, δταν τὸ $v \rightarrow \infty$.

352. Νὰ εὑρεθοῦν τὰ κοινὰ κλάσματα ἐκ τῶν ὁποίων παράγονται τὰ κάτωθι δεκαδικὰ περιοδικὰ κλάσματα:

$$1) 0, 17651651\dots, 2) 2,341702702\dots, 3) 27,327575\dots, 4) 3,7292929\dots$$

353. Εἰς Ιστόπλευρον τριγώνων πλευρᾶς αὶ συνδέομεν τὰ μέσα τῶν πλευρῶν του καὶ εύρισκομεν νέον τοιοῦτον. Τὸ αὐτὸ ἐπαναλαμβάνομεν εἰς τὸ νέον τοῦτο καὶ οὕτω καθεξῆς. Νὰ εὑρεθῇ τὸ ἀθροισμα τῶν ἐμβαδῶν καὶ τῶν περιμέτρων τῶν ἀπείρων τούτων τριγώνων.

354. Ἐὰν $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ εἰναι διαδοχικοὶ δροι γεωμ. προσδοσι νὰ δειχθῇ :

$$1) (\alpha + \delta) \cdot (\beta + \gamma) - (\alpha + \gamma) \cdot (\beta + \delta) = (\beta - \gamma)^2$$

$$2) (\beta - \gamma)^2 + (\gamma - \alpha)^2 + (\delta - \beta)^2 = (\alpha - \delta)^2.$$

355. Νά ύπολογισθή ή παράστασις: $\sqrt{\alpha\beta}\sqrt{\beta\alpha}\sqrt{\alpha\beta}\dots$, όταν τὸ πλῆθος τῶν πριζικῶν εἶναι ἀπεριόριστον.

356. 'Εάν αἱ πλευραὶ τριγώνου εἶναι διαδοχικοὶ ὅροι γεωμ. προόδου νὰ δειχθῇ, ὅτι ὁ λόγος ω τῆς προόδου ἐπαληθεύει τὴν σχέσιν: $\frac{\sqrt{5}-1}{2} < \omega < \frac{\sqrt{5}+1}{2}$.

357. Τρεῖς ἀριθμοὶ x, y, z έχουν ἀθροισμα 147, ἔαν οἱ x, y, z εἶναι διαδοχικοὶ ὅροι ἀριθμ. προόδου καὶ οἱ x, y, z γεωμετρικῆς προόδου, νὰ εὔρεθοῦν οἱ τρεῖς αὐτοὶ ἀριθμοί.

358. 'Εάν $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ εἶναι θετικοὶ πραγματικοὶ ἀριθμοὶ καὶ ισχύει:

$$\beta^2 - \alpha\gamma = 0, \quad \gamma^2 - \beta\delta = 0, \quad \text{τότε } \theta\alpha \text{ εἶναι: } |\alpha - \delta| \geq 3|\beta - \gamma|.$$

359. 'Εάν οἱ ἀριθμοὶ σ, β, γ εἶναι διαδοχικοὶ ὅροι γεωμ. προόδου νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι:

$$\alpha^2 \beta^2 \gamma^2 \left(\frac{1}{\alpha^3} + \frac{1}{\beta^3} + \frac{1}{\gamma^3} \right) = \alpha^3 + \beta^3 + \gamma^3.$$

360. 'Εάν $\alpha^2 + \alpha\beta + \beta^2 = 0$ καὶ $\alpha^3 + \beta^3 = \gamma^3$, νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι οἱ ἀριθμοί: $\alpha, \gamma, \beta\sqrt[4]{4}$ εἶναι διαδοχικοὶ ὅροι γεωμ. προόδου.

ΓΕΝΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΟΔΩΝ

361. 'Εάν $x, y, z \in \mathbb{R}^+$ καὶ M_A, M_Γ, M_H είναι ἀντιστοίχως ὁ μέσος ἀριθμητικός, μέσος γεωμετρικός καὶ μέσος ἀρμονικός αὐτῶν, νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι:

$$M_A \geq M_\Gamma \geq M_H. \quad (\text{ἀνισότης τοῦ Cauchy}).$$

362. 'Εάν $x \geq 0, y \geq 0$ δείξατε ὅτι:

$$\frac{1}{3}x + \frac{2}{3}y \geq x^{1/3} \cdot y^{2/3}.$$

Πότε ισχύει τὸ ίσον;

363. Τὴν ἀκόλουθιαν τῶν φυσικῶν ἀριθμῶν χωρίζομεν εἰς ὄμάδας ὡς ἀκολούθως:

$$1, (2, 3, 4, 5), (6, 7, 8, \dots, 12), (13, 14, \dots, 22), (23, 24, \dots), \dots$$

Νὰ εὔρεθῇ ὁ πρῶτος ὅρος τῆς n -οστῆς ὄμάδος συναρτήσει τοῦ n καὶ νὰ δειχθῇ ὅτι τὸ ἀθροισμα τῶν ἀριθμῶν τῶν περιλαμβανομένων εἰς τὴν n -οστὴν ὄμάδα ισοῦται πρός:

$$(3n - 2) \cdot \left[(n - 1)^2 + \frac{v^2 + 1}{2} \right]$$

364. 'Εάν S_1 εἶναι τὸ ἀθροισμα τῶν n δρων ἀριθμητικῆς προόδου, τῆς ὁποίας ὁ λόγος εἶναι ω καὶ S_2 τὸ ἀθροισμα τῶν τετραγώνων τῶν αὐτῶν δρων, νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι:

$$S_2 - \frac{1}{v} S_1^2 = \frac{1}{12} v\omega^2 (v^2 - 1).$$

365. 'Εάν $F(x) \equiv \sqrt{\frac{x^2 - 5x + 6}{x^2 - 6x + 8}} \cdot \sqrt{\frac{x^2 - 5x + 6}{x^2 - 6x + 8}} \cdot \sqrt{\frac{x^2 - 5x + 6}{x^2 - 6x + 8}}$

νὰ δειχθῇ ὅτι:

$$F\left(\frac{33}{55}\right) = \frac{132}{187}$$

366. "Εστωσαν $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots$ οἱ πρῶτοι ὅροι ἀριθμ. προόδων μὲ λόγους 1, 2, 3, ... ἀντιστοίχως. 'Εάν τὸ ἀθροισμα τῶν n πρώτων δρων ἑκάστης εἶναι n^2 , δείξατε ὅτι οἱ $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots$ εἶναι διαδοχικοὶ ὅροι ἀριθμ. προόδου, τῆτις καὶ νὰ δρισθῇ.

367. Νὰ εὔρεθῇ ἡ συνθήκη, ἵνα αἱ ρίζαι τῆς ἔξισώσεως: $x^3 + \alpha x^2 + \beta x + \gamma = 0$ εἶναι διαδοχικοὶ ὅροι: α). 'Αριθμητικῆς προόδου, β). Γεωμετρικῆς προόδου.

368. Νὰ δρισθῇ ὁ k οὕτως, ώστε αἱ ρίζαι τῆς ἔξισώσεως $x^3 - 8x^2 - 6x - k = 0$ νὰ εἶναι διαδοχικοὶ ὅροι προόδου ἀριθμητικῆς η γεωμετρικῆς καὶ νὰ λυθῇ η ἔξισώσης αὗτη.

(‘Υπόδειξις. Λάβετε ύπ’ δημιν τὰ συμπεράσματα τῆς προηγουμένης ὀστκήσεως).

369. Χωρίζομεν 4200 ἀντικείμενα εἰς $n + 1$ διμάδας οὔτως, ὥστε ἡ πρώτη διμάδα νὰ περιλαμβάνῃ 5 ἀντικείμενα, ἡ δευτέρα 8, ἡ τρίτη 11, κ.ο.κ. Νὰ εύρεθῇ τὸ πλῆθος τῶν διμάδων, τὰς δόποις δυνάμεθα νὰ σχηματίσωμεν καὶ τὸ πλῆθος τῶν ὑπολειπομένων ἀντικειμένων.

370. Ἐάν οἱ $\alpha, \beta, \gamma, x, y, z$ εἰναι θετικοὶ ἀριθμοὶ καὶ δὲ μὲν α εἶναι μέσος ἀριθμητικὸς τῶν β γε τότε, καὶ μόνον τότε, ἄν : $\frac{y}{z} + \frac{z}{y} = \frac{\beta}{\gamma} + \frac{\gamma}{\beta}$.

371. Ἐάν οἱ διάφοροι ἀλλήλων θετικοὶ ἀριθμοὶ α, β, γ εἶναι διαδοχικοὶ δροὶ ἀριθμητικῆς ἢ γεωμετρικῆς ἢ ἀρμονικῆς προόδου, νὰ ἀποδειχθῇ δτι διὰ κάθε φυσικὸν ἀριθμὸν $n \geq 2$ ισχύει ἡ δινιστότης :

$$\alpha^n + \gamma^n > 2\beta^n.$$

(‘Υπόδειξις. Ἐφαρμόσατε τὴν μέθοδον τῆς τελείας ἐπαγγωγῆς).

372. Ἐστω ἡ ἀκολουθία : $\alpha_v, v = 1, 2, \dots$ (1), διὰ τὴν δόποιαν εἶναι :

$$\alpha_{v+2} = \xi \cdot \alpha_{v+1} + \eta \cdot \alpha_v \quad \forall v \in \mathbb{N} \quad (\xi, \eta \in \mathbb{R}).$$

Νὰ ἀποδειχθῇ δτι :

Ἐάν δὲ λόγος $\frac{\alpha_2}{\alpha_1}$, δποι $\alpha_1 \neq 0$, εἶναι ρίζα τῆς ἔξισώσεως :
 $x^2 - \xi x - \eta = 0$,

τότε ἡ ἀκολουθία (1) εἶναι γεωμετρικὴ πρόοδος.

373. Ἐάν S_v εἶναι τὸ ἀθροίσμα τῶν v πρώτων δρων γεωμετρικῆς προόδου τῆς δόποιας δ πρῶτος δρος εἶναι $\alpha = -5$ καὶ δὲ λόγος $\omega = -\frac{3}{4}$, νὰ ἀποδειχθῇ δτι :

$$\left(\forall \epsilon > 0 \text{ καὶ } \forall v \in \mathbb{N}, \text{ μὲν } v > 3 \left(\frac{20}{7\epsilon} - 1 \right) \right) \implies \left| -\frac{20}{7} - S_v \right| < \epsilon.$$

Ποιῶν τὸ $\lim S_v$;

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VII

ΣΕΙΡΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

§ 175. Συμβολισμὸς ἀθροισμάτων.—Ἐπειδὴ συχνότατα συναντῶμεν ἀθροίσματα τῆς μορφῆς :

$$\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \cdots + \alpha_v$$

χρησιμοποιοῦμεν, διὰ τὴν συντομωτέραν καὶ ἀπλουστέραν γραφήν, τὸ ἐλληνικὸν γράμμα Σ πρὸς συμβολισμὸν τῶν ἐν λόγῳ ἀθροισμάτων. Οὕτω γράφομεν :

$$\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \cdots + \alpha_v \equiv \sum_{k=1}^v \alpha_k.$$

Τὸ δεύτερον μέλος τῆς ισότητος, δηλαδὴ ἡ συμβολικὴ ἔκφρασις $\sum_{k=1}^v \alpha_k$ ἀναγιγνώσκεται : «ἄθροισμα τῶν (ἀριθμῶν) α_k ἀπὸ $k = 1$ ἕως $k = v$ ». Ο συμβολισμὸς $k = 1$ κάτωθεν τοῦ συμβόλου Σ σημαίνει ὅτι 1 εἶναι ἡ πρώτη τιμή, τὴν ὅποιαν λαμβάνει ὁ δείκτης k , ἐνῷ ὁ συμβολισμὸς $k = v$ ἀναθεν τοῦ συμβόλου Σ σημαίνει ὅτι ὁ δείκτης k θὰ διατρέξῃ τοὺς φυσικοὺς ἀριθμοὺς μέχρι καὶ τοῦ φυσικοῦ ἀριθμοῦ v . Τέλος τὸ σύμβολον Σ σημαίνει ὅτι πρέπει νὰ προσθέσωμεν ὅλους τοὺς ὄρους ποὺ ἔλαβομεν θέτοντες διαδοχικῶς $k = 1, k = 2, k = 3, \dots, k = v$.

Συμβατικῶς κατωτέρω θὰ θέτωμεν : $\sum_{k=1}^1 \alpha_k \equiv \alpha_1$.

Δυνάμει τῶν ἀνωτέρω ἔχομεν τώρα :

$$\alpha). \quad 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 \equiv \sum_{k=1}^{10} k$$

$$\beta). \quad 1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + 5^2 + 6^2 + 7^2 + 8^2 + 9^2 \equiv \sum_{k=1}^9 k^2$$

$$\gamma). \quad x_3 + x_4 + x_5 + x_6 + x_7 + x_8 + x_9 + x_{10} + x_{11} + x_{12} \equiv \sum_{k=3}^{12} x_k$$

$$\delta). \quad \alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_9 = (\alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_5) + (\alpha_6 + \alpha_7 + \alpha_8 + \alpha_9) = \\ = \sum_{k=1}^5 \alpha_k + \sum_{k=6}^9 \alpha_k$$

$$\text{Ἔτοι : } \sum_{k=1}^9 \alpha_k = \sum_{k=1}^5 \alpha_k + \sum_{k=6}^9 \alpha_k.$$

Γενικώτερον ἔχομεν :

$$\sum_{k=1}^v \alpha_k = \sum_{k=1}^{\rho} \alpha_k + \sum_{k=\rho+1}^v \alpha_k, \quad \rho \in \mathbb{N} \text{ καὶ } \rho < v.$$

Δίδομεν κατωτέρω μερικὰ ἀκόμη παραδείγματα πρὸς πληρεστέραν κατανόησιν τοῦ συμβόλου Σ .

Παράδειγμα 1ον : Εις τὴν παράγραφον 28 ἔχομεν ἀποδείξει, ὅτι :

$$1 + 2 + 3 + \cdots + v = \frac{v(v+1)}{2}.$$

Τὴν σχέσιν ταύτην γράφομεν, τῇ βοηθείᾳ τοῦ συμβούλου Σ , συντόμως οὕτω :

$$\sum_{k=1}^v k = \frac{v(v+1)}{2}.$$

Παρατήρησις. Ἀλλα ἀξιοσημείωτα ἀθροίσματα, τὰ ὅποια συναντᾶ κανεὶς εἰς τὰς ἐφαρμογὰς, εἶναι καὶ τὰ ἐξῆς :

$$\alpha). 1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + v^2 \equiv \sum_{k=1}^v k^2 = \frac{v(v+1)(2v+1)}{6}$$

$$\beta). 1^3 + 2^3 + 3^3 + \cdots + v^3 \equiv \sum_{k=1}^v k^3 = \frac{v^2(v+1)^2}{4}, \text{ ἢ τοι } \text{ἰσχύει : } \sum_{k=1}^v k^3 = \left[\sum_{k=1}^v k \right]^2$$

$$\gamma). 1^4 + 2^4 + 3^4 + \cdots + v^4 \equiv \sum_{k=1}^v k^4 = \frac{v(v+1)(2v+1)(3v^2+3v-1)}{30}.$$

*Α σ κη σις : Ἐποδείξατε τὴν ἀλήθειαν τῶν (α), (β), (γ) διὰ τῆς μεθόδου τῆς τελείας ἐπαγγωγῆς.

Παράδειγμα 2ον : Εις τὴν § 50 ὡρίσαμεν, ὅτι ἀκέραιον πολυώνυμον ὡς πρὸς x , βαθμοῦ v , εἶναι μία ἀλγεβρικὴ παράστασις τῆς μορφῆς :

$$f(x) \equiv \alpha_0 + \alpha_1 x + \alpha_2 x^2 + \cdots + \alpha_v x^v. \quad (1)$$

*Ηδη δυνάμεθα νὰ γράφωμεν τὸ πολυώνυμον (1) συντόμως οὕτω :

$$f(x) \equiv \sum_{k=0}^v \alpha_k x^k, \quad \alpha_k \in \mathbb{R}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, v \quad \text{καὶ} \quad \alpha_v \neq 0.$$

§ 176. Βασικαὶ ἴδιότητες τοῦ συμβόλου Σ .— Αἱ ἀκόλουθοι ἴδιότητες ἐπιτρέπουν ἔνα ἄνετον λογισμὸν τῇ βοηθείᾳ τοῦ συμβόλου Σ .

$$\text{i). } \text{Ἐὰν } \alpha_k = \alpha \text{ διὰ κάθε } k = 1, 2, \dots, v, \text{ τότε } \text{ἰσχύει : } \sum_{k=1}^v \alpha_k = v\alpha.$$

Εἰδικῶς, ἐὰν $\alpha = 1$ ἔχομεν : $\sum_{k=1}^v 1 \equiv \sum_{k=1}^v 1 = v$.

ii). Ἡ *ἰσχύει* ἡ προσθετικὴ ἴδιότης, ἢτοι :

$$\sum_{k=1}^v (\alpha_k + \beta_k) = \sum_{k=1}^v \alpha_k + \sum_{k=1}^v \beta_k \quad \text{καὶ} \quad \sum_{k=1}^v (\alpha_k - \beta_k) = \sum_{k=1}^v \alpha_k - \sum_{k=1}^v \beta_k.$$

iii). Ἐὰν λ σταθερὸς πραγματικὸς ἀριθμὸς (μὴ ἔξαρτώμενος ἐκ τοῦ δείκτου k), τότε *ἰσχύει* :

$$\sum_{k=1}^v \lambda \alpha_k = \lambda \cdot \sum_{k=1}^v \alpha_k \quad (\text{ἴδιότης } \text{όμογενείας}).$$

iv). *ἰσχύει* :

$$\sum_{k=1}^v (\lambda \alpha_k + \mu \beta_k) = \lambda \cdot \sum_{k=1}^v \alpha_k + \mu \cdot \sum_{k=1}^v \beta_k, \quad \forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}.$$

ν). Ισχύει :

$$\sum_{k=1}^v (\alpha_k - \alpha_{k-1}) = \alpha_v - \alpha_0 \quad (\text{Ιδιότης συμπτύξεως}).$$

Α σ κ η σ 15: Αποδείξατε τάς άνωτέρω πρέντε ίδιότητας τοῦ συμβόλου Σ .

Παρατήρησις. Μέχρι τώρα έχρησιμο ποιήσαμεν ώς δείκτην τὸ γράμμα k . Τοῦτο είναι ανθαίρετον καὶ οὐδένα ρόλον παίζει, δυνάμεθα δηλαδή νὰ χρησιμοποιήσωμεν διὰ τὸ αὐτὸ δύρισμα καὶ άλλο γράμμα, ώς δείκτην. Οὕτως ἔχομεν :

$$\alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_v \equiv \sum_{k=1}^v \alpha_k = \sum_{p=1}^v \alpha_p = \sum_{v=1}^v \alpha_v.$$

Ἐπίσης αἱ τιμαὶ τάς δόποιας λαμβάνει ὁ δείκτης δύνανται νὰ μεταβάλλωνται, τότε δημοσὰ θὰ μεταβάλλεται συγχρόνως καὶ ὁ ὑπὸ τὸ σύμβολον Σ δείκτης, οὔτω λ.χ. ἔχομεν :

$$\alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_5 = \sum_{k=1}^5 \alpha_k = \sum_{k=0}^4 \alpha_{k+1} = \sum_{k=11}^{15} \alpha_{k-10},$$

δηλαδή : δυνάμεθα νὰ αὐξήσωμεν (ἢ νὰ ἐλαττώσωμεν) τὸν δείκτην ὑπὸ τὸ σύμβολον Σ , ἀρκεῖ νὰ ἐλαττώσωμεν (ἢ νὰ αὐξήσωμεν) κατὰ τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν τὰ δρια (τὰς ἄκρας τιμᾶς) τοῦ συμβόλου Σ .

*Εφαρμογὴ 1η: Υπολογίσατε τὸ δύρισμα τῶν v πρώτων περιττῶν ἀριθμῶν.
Αὐσις: Ἐχομεν :

$$\sum_{k=1}^v (2k-1) = \sum_{k=1}^v 2k - \sum_{k=1}^v 1 = 2 \sum_{k=1}^v k - \sum_{k=1}^v 1 = 2 \cdot \frac{v(v+1)}{2} - v = v^2.$$

*Ωστε : $\sum_{k=1}^v (2k-1) = v^2.$

*Εφαρμογὴ 2α: Νὰ ἀπλοποιηθῇ τὸ κλάσμα : $\frac{\sum_{v=1}^v (3v^2 + 5v)}{\sum_{v=1}^v (3v^2 - 3v)}$.

Αὐσις: Ἐχομεν :

$$\frac{\sum_{v=1}^v (3v^2 + 5v)}{\sum_{v=1}^v (3v^2 - 3v)} = \frac{3 \sum_{v=1}^v v^2 + 5 \sum_{v=1}^v v}{3 \sum_{v=1}^v v^2 - 3 \sum_{v=1}^v v} = \frac{3 \frac{v(v+1)(2v+1)}{6} + 5 \frac{v(v+1)}{2}}{3 \frac{v(v+1)(2v+1)}{6} - 3 \frac{v(v+1)}{2}} = \\ = \frac{v(v+1)(v+3)}{v(v+1)(v-1)} = \frac{v+3}{v-1}.$$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

374. Υπολογίσατε τὰ κάτωθι δύρισματα :

$$\alpha) \sum_{k=1}^v k(k+1), \quad \beta) \sum_{k=1}^v \frac{1}{k(k+1)}, \quad \gamma) \sum_{k=1}^v (k^2 + 5k + 3),$$

$$\delta) \sum_{k=1}^v (k^3 + 7k^2 + 12k), \quad \epsilon) \sum_{k=1}^v k(k+2)(k+4), \quad \sigma) \sum_{k=1}^v (k^4 + 3k^3 + 4k^2).$$

375. Τὰ κάτωθι δύρισματα νὰ γραφοῦν διὰ χρήσεως τοῦ συμβόλου Σ καὶ ἀκολούθως νὰ υπολογισθοῦν :

$$\alpha) 1 \cdot 4 + 2 \cdot 5 + 3 \cdot 6 + \cdots + v \cdot (v+3), \quad \beta) 2x + 4x^3 + 8x^5 + 16x^7 + 32x^9, \\ \gamma) 1^2 + 4^2 + 7^2 + \cdots + (3v-2)^2, \quad \delta) 1^2 + 3^2 + 5^2 + \cdots + (2v-1)^2.$$

376. Νὰ ἀποδείχθῃ ὅτι : $\sum_{k=1}^v k^3 = \frac{v^4}{4} + \frac{v^3}{2} + \frac{v^2}{4}$

377. Νὰ ἀπλοποιηθοῦν τὰ κλάσματα :

$$\alpha) \frac{\sum_{v=1}^k (v^4 + 6v^3 + 5v^2)}{\sum_{v=1}^k (v^4 + 2v^3 + v^2)}, \quad \beta) \frac{\sum_{v=1}^k (2v^3 - v)}{\sum_{v=1}^k (v^2 - v)}, \quad \gamma) \frac{\sum_{v=1}^k (v^3 + 3v^2 + 2v)}{k^2 + 5k + 6}.$$

378. Ἐάν $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_v$ καὶ $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_v$ εἰναι πραγματικοὶ ἀριθμοί, νὰ ἀποδειχθῇ ἡ ἀνισότης τῶν Cauchy – Schwarz.

$$\left(\sum_{k=1}^v \alpha_k \beta_k \right)^2 \leq \left(\sum_{k=1}^v \alpha_k^2 \right) \cdot \left(\sum_{k=1}^v \beta_k^2 \right).$$

379. Ἐάν $v \in \mathbb{N}$ δείξατε ὅτι είναι :

$$\left[\sum_{k=1}^v \frac{1}{k} \right]^2 \leq v \left(2 - \frac{1}{v} \right).$$

380. Νὰ ἀποδειχθῇ διὰ τῆς μεθόδου τῆς τελείας ἐπαγωγῆς ὅτι, διὰ $v \geq 1$, είναι :

$$\alpha). \quad \frac{v^3}{3} < \sum_{k=1}^v k^2 < \frac{(v+1)^3}{3}, \quad \beta). \quad \left\{ \sum_{k=1}^v \frac{1}{k} \right\}^2 < 2v.$$

§. 177. Η ἔννοια τῆς σειρᾶς.— «Υποθέσωμεν ὅτι μᾶς ἔχει δοθῆ μία ἀκολουθία $\alpha_v, v = 1, 2, \dots$ τῆς ὁποίας οἱ ὄροι :

$$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_v, \dots \quad (1)$$

είναι πραγματικοὶ ἀριθμοί. Διὰ κάθε $v \in \mathbb{N}$, δρίζομεν τὸ ἀθροισμα :

$$\sigma_v = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_v = \sum_{k=1}^v \alpha_k \quad (2)$$

τῶν πρώτων v ὄρων τῆς (1). Οὕτως ἔχομεν :

$$\sigma_1 = \alpha_1, \quad \sigma_2 = \alpha_1 + \alpha_2, \quad \sigma_3 = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, \dots$$

Κατ' αὐτὸν τὸν τρόπον μορφώνομεν μία νέαν ἀκολουθίαν $\sigma_v, v = 1, 2, \dots$ μὲν ὄρους

$$\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3, \dots, \sigma_v, \dots \quad (3)$$

οἱ ὄροι οἵτιναι ἀθροίσματα τῶν ὄρων τῆς (1).

Τὴν ἀκολουθίαν (3) συμφωνοῦμεν νὰ τὴν συμβολίζωμεν οὕτω :

$$\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_v + \dots \quad \text{ἢ συντόμως } \alpha_1 + \alpha_2 + \dots$$

ἢ συντομώτερα καὶ ἀκριβέστερα : $\sum_{v=1}^{\infty} \alpha_v.$ (4)

Τὸ συμβολικὸν ἀθροισμα $\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_v + \dots$ ἢ $\sum_{v=1}^{\infty} \alpha_v$ καλεῖται σειρὰ τῶν πραγματικῶν ἀριθμῶν $\alpha_v, v \in \mathbb{N}$. Κάθε ὄρος τῆς (3), δηλ. κάθε ἀθροισμα

$\sigma_v = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_v$ καλεῖται «μερικὸν ἀθροισμα» ἢ καὶ «τμῆμα τῆς σειρᾶς» (4). Οἱ ὄροι τῆς ἀκολουθίας (1), δηλαδὴ οἱ $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_v, \dots$ καλοῦνται «ὄροι τῆς σειρᾶς», δὲ α_v εἰδικώτερον καλεῖται «γενικὸς ὄρος» τῆς σειρᾶς.

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω συνάγομεν τώρα ὅτι: διὰ τοῦ ὄρου σειρὰ ἔννοοῦμεν ἐν μαθηματικὸν σύμβολον, τὸ ὄποιον παριστᾶ τὴν ἀκολουθίαν τῶν μερικῶν ἀθροισμάτων τῆς (1).

Σημείωσις : Δέν πρέπει νὰ γίνεται σύγχυσις τῆς ἑννοίας τῆς ἀκολουθίας α_v , $v = 1, 2, \dots$ τῶν πραγματικῶν ἀριθμῶν α_v μὲ τὴν δρισθεῖσαν ἀνωτέρω ἑννοίαν τῆς σειρᾶς $\sum_{v=1}^{\infty} \alpha_v$ τῶν αὐτῶν πραγματικῶν ἀριθμῶν. Αὗται καίτοι σχηματίζονται μὲ τοὺς αὐτοὺς ὅρους εἶναι δύο ἑννοίαι ἐντελῶς διάφοροι.

Παραδείγματα σειρῶν :

$$1\text{ον. } "Εστω \eta \text{ σειρά } \sum_{v=1}^{\infty} v \equiv 1 + 2 + 3 + \dots + v + \dots$$

Διά τὴν ὡς ἄνω σειράν ἔχομεν :

$$\sigma_1 = 1, \quad \sigma_2 = 3, \quad \sigma_3 = 6, \dots, \quad \sigma_v = \frac{v(v+1)}{2}, \dots$$

$$2\text{ον. } "Εστω \eta \text{ ἀκολουθία } \alpha_v = \omega^{v-1}, \quad v = 1, 2, \dots, \text{ ἔκτενῶς } \eta :$$

$$1, \quad \omega, \quad \omega^2, \quad \omega^3, \dots, \quad \omega^{v-1}, \dots \quad (1)$$

τῆς ὅποιας οἱ ὅροι ἀποτελοῦν πρόσοδον γεωμετρικήν μὲ πρῶτον ὅρον τὸ 1 καὶ λόγον τὸ ω . Τὴν ἀκολουθίαν τῶν μερικῶν ἀθροισμάτων τῆς (1), ἥτοι τὴν :

$$\sigma_v \equiv 1 + \omega + \omega^2 + \dots + \omega^{v-1}, \quad v = 1, 2, \dots$$

καλούμεν «γεωμετρικὴν σειράν» καὶ τὴν συμβολίζομεν, κατὰ τὰ λεχθέντα, οὕτω :

$$\sum_{v=1}^{\infty} \omega^{v-1} \equiv 1 + \omega + \omega^2 + \dots + \omega^{v-1} + \dots \quad (2)$$

Σημείωσις : Ἐνίστεται ἡ ἀρίθμησις τῶν ὅρων μιᾶς σειρᾶς ἀρχεται μὲ δείκτην $v = 0$, τότε γράφομεν :

$$\sum_{v=0}^{\infty} \alpha_v \equiv \alpha_0 + \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_v + \dots$$

Οὕτως ἡ γεωμετρικὴ σειρά (2) δύναται νὰ γραφῇ καὶ ὡς ἔξῆς :

$$\sum_{v=0}^{\infty} \omega^v \equiv 1 + \omega + \omega^2 + \dots + \omega^v + \dots$$

3ον. Ἡ σειρά : $\sum_{v=0}^{\infty} \frac{1}{2^v} \equiv 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2^v} + \dots$, (γεωμετρικὴ σειρά μὲ λόγον $\omega = \frac{1}{2}$) μὲ μερικὸν ἀθροισμα :

$$\sigma_v \equiv 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2^{v-1}} = 2 - \frac{1}{2^{v-1}}.$$

$$4\text{ον. } "Η σειρά : \sum_{v=1}^{\infty} v(v+1) \equiv 1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 4 + \dots + v(v+1) + \dots$$

μὲ μερικὸν ἀθροισμα :

$$\begin{aligned} \sigma_v &\equiv 1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + \dots + v \cdot (v+1) = \sum_{k=1}^v k(k+1) = \sum_{k=1}^v k^2 + \sum_{k=1}^v k = \\ &= \frac{v(v+1)(2v+1)}{6} + \frac{v(v+1)}{2} = \frac{1}{3} v(v+1)(v+2). \end{aligned}$$

Παρατήρησις : Ἡ ἑννοία τῆς ἀκολουθίας τὴν ὅποιαν εἴδομεν εἰς προηγούμενον κεφάλαιον ἀντιστοιχεῖ εἰς τὴν ἑννοίαν τῆς συναρτήσεως καὶ ἡ ἑννοία τῆς σειρᾶς ἀντιστοιχεῖ εἰς τὴν ἑννοίαν τοῦ ὀλοκληρώματος, ἑννοίαν τὴν ὅποιαν θὰ μάθωμεν εἰς τὴν ἔκτην τάξιν.

§ 178. Σύγκλισις σειρᾶς. — Θεωρήσωμεν τὴν σειρὰν τοῦ παραδείγματος 3 τῆς προηγουμένης παραγράφου, ἢτοι τὴν σειράν :

$$\sum_{v=0}^{\infty} \frac{1}{2^v} \equiv 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2^v} + \cdots, \text{ μὲν μερικὸν ἀθροισμα } \sigma_v \equiv 2 - \frac{1}{2^{v-1}}.$$

Ἡ ἀκολουθία τῶν μερικῶν ἀθροισμάτων :

$$\sigma_v = 2 - \frac{1}{2^{v-1}}, \quad v = 1, 2, 3, \dots,$$

εὐκόλως διαπιστοῦμεν, ὅτι συγκλίνει εἰς τὸν ἀριθμὸν 2, ἢτοι $\lim \sigma_v = 2$, καθόσον $\lim \frac{1}{2^{v-1}} = 0$. Εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν λέγομεν ὅτι ἡ σειρὰ $\sum_{v=0}^{\infty} \frac{1}{2^v}$ συγκλίνει

πρὸς τὸν ἀριθμὸν 2 καὶ γράφομεν : $\sum_{v=0}^{\infty} \frac{1}{2^v} = 2$.

‘Ομοίως ἔστω ἡ σειρὰ $\sum_{v=1}^{\infty} \frac{1}{(2v-1)(2v+1)}$ μὲν μερικὸν ἀθροισμα (§ 98)

$$\sigma_v = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{2v+1} \right). \text{ Ἡ ἀκολουθία τῶν μερικῶν ἀθροισμάτων :}$$

$$\sigma_v = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{2v+1} \right), \quad v = 1, 2, \dots$$

βλέπομεν ὅτι συγκλίνει εἰς τὸν ἀριθμὸν 1/2, ἢτοι εἶναι $\lim \sigma_v = 1/2$, καθόσον

$\lim \frac{1}{2v+1} = 0$. Ἀρα ἡ σειρὰ $\sum_{v=1}^{\infty} \frac{1}{(2v-1)(2v+1)}$ συγκλίνει εἰς τὸν ἀριθμὸν 1/2 καὶ κατ’ ἀκολουθίαν

$$\sum_{v=1}^{\infty} \frac{1}{(2v-1)(2v+1)} = \frac{1}{2}.$$

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω παραδειγμάτων ὁδηγούμεθα εἰς τὸ νὰ δώσωμεν τὸν ἔξῆς γενικὸν δρισμόν :

Θὰ λέγωμεν ὅτι : ἡ σειρὰ $\sum_{v=1}^{\infty} \alpha_v$ συγκλίνει πρὸς τὸν πραγματικὸν ἀριθμὸν σ καὶ θὰ γράφωμεν $\sum_{v=1}^{\infty} \alpha_v = \sigma$, τότε, καὶ μόνον τότε, ἂν ἡ ἀκολουθία τῶν μερικῶν ἀθροισμάτων $\sigma_v \equiv \alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_v$, $v = 1, 2, 3, \dots$ συγκλίνῃ πρὸς τὸν πραγματικὸν ἀριθμὸν σ .

Συντόμως :

$$\sum_{v=1}^{\infty} \alpha_v = \sigma \iff \lim \sigma_v = \lim (\alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_v) \equiv \lim_{k=1}^v \sum_{k=1}^v \alpha_k = \sigma$$

‘Ο πραγματικὸς ἀριθμὸς σ , πρὸς τὸν ὃποῖον συγκλίνει ἡ ἀκολουθία σ_v , $v = 1, 2, \dots$ καλεῖται «ἀθροισμα τῆς σειρᾶς $\sum_{v=1}^{\infty} \alpha_v$ ». Δηλαδὴ καλοῦμεν ἀθροισμα τῆς σειρᾶς $\sum_{v=1}^{\infty} \alpha_v$, τὸ δριον τοῦ ἀθροίσματος τῶν ν πρώτων ὅρων αὐτῆς.

τῆς σειρᾶς $\sum_{v=1}^{\infty} \alpha_v$, τὸ δριον τοῦ ἀθροίσματος τῶν ν πρώτων ὅρων αὐτῆς.

Όχθεν δσάκις γράφομεν :

$$\alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_v + \cdots = \sigma \quad \text{ή} \quad \sum_{v=1}^{\infty} \alpha_v = \sigma$$

έννυοοῦμεν ότι ή σειρά $\sum_{v=1}^{\infty} \alpha_v$ είναι συγκλίνουσα καὶ τὸ ἄθροισμά της είναι σ .

Ἐὰν ὅλοι οἱ ὅροι τῆς σειρᾶς $\sum_{v=1}^{\infty} \alpha_v$ είναι θετικοί, ή ἀκολουθία σ_v , $v = 1, 2, \dots$

είναι αὔξουσα καὶ διὰ νὰ συγκλίνῃ θὰ πρέπει νὰ είναι φραγμένη, ἀλλως ή σ_v , $v = 1, 2, \dots$ ως αὔξουσα καὶ μὴ φραγμένη (βλ. § 150, παρατ.) ἀπειρίζεται θετικῶς.

Εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν λέγομεν ότι «ή σειρά $\sum_{v=1}^{\infty} \alpha_v$ ἀπειρίζεται θετικῶς» καὶ

γράφομεν συμβολικῶς : $\sum_{v=1}^{\infty} \alpha_v = +\infty$.

Ωστε :

$$\sum_{v=1}^{\infty} \alpha_v = +\infty \iff \lim_{\text{ορσ}} \sigma_v \equiv \lim (\alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_v) \equiv \lim_{k=1}^{\infty} \sum_{k=1}^v \alpha_k = +\infty$$

Ούτως ή γεωμετρική σειρά :

$$\sum_{v=0}^{\infty} 2^v = 1 + 2 + 2^2 + 2^3 + \cdots$$

μὲ μερικὸν ἄθροισμα :

$$\sigma_v \equiv 1 + 2 + 2^2 + \cdots + 2^{v-1} = 2^v - 1$$

ἀπειρίζεται θετικῶς, διότι $\lim \sigma_v = \lim (2^v - 1) = +\infty$, καθόσον ή ἀκολουθία σ_v , $v = 1, 2, \dots$ είναι αὔξουσα καὶ μὴ φραγμένη.

Κατ' ἀνάλογον τρόπον δρίζομεν :

$$\sum_{v=1}^{\infty} \alpha_v = -\infty \iff \lim_{\text{ορσ}} \sigma_v \equiv \lim (\alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_v) \equiv \lim_{k=1}^{\infty} \sum_{k=1}^v \alpha_k = -\infty$$

Εἰς τὰς δύο τελευταίας περιπτώσεις λέγομεν ότι «ή σειρά $\sum_{v=1}^{\infty} \alpha_v$ συγκλίνει κατ' ἐκδοχήν».

Τέλος ὑπάρχουν σειραί, αἱ ὅποιαι δὲν συγκλίνουν, οὕτε πρὸς πραγματικὸν ἀριθμόν, οὕτε πρὸς ἐν τῶν συμβόλων $+\infty$ ή $-\infty$. Μία τοιαύτη σειρά καλεῖται «ἀποκλίνουσα» ή «κυμανομένη». Ούτως, ἔαν $\alpha_v = (-1)^{v+1}$, $v = 1, 2, \dots$, τότε ή σειρά, ή ὅποια μορφώνεται ἐκ τῆς ἀκολουθίας α_v , $v = 1, 2, \dots$ ἀποκλίνει. Πράγματι, ή ἀκολουθία α_v , $v = 1, 2, \dots$ δύναται νὰ γραφῇ :

$$1, -1, 1, -1, \dots$$

καὶ ἔξ αὐτῆς λαμβάνομεν :

$$\sigma_1 = 1, \sigma_2 = 1 + (-1) = 0, \sigma_3 = 1 + (-1) + 1 = 1, \sigma_4 = 0, \dots,$$

ήτοι ή άκολουθία τῶν μερικῶν ἀθροισμάτων εἶναι :

$$1, 0, 1, 0, \dots$$

Αὕτη ὅμως ἀ π ο κ λ ī ν ε i (≡ δέν συγκλίνει πρὸς πραγματικὸν ἀριθμὸν η πρὸς ἐν τῶν συμβόλων $+\infty, -\infty$). Κατὰ συνέπειαν καὶ η σειρά, η ὁποία προκύπτει ἐκ τῆς άκολουθίας $\alpha_v = (-1)^{v+1}, v = 1, 2, \dots$ ἀποκλίνει.

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω δρισμῶν συνάγομεν τώρα ὅτι :

Διὰ κάθε σειράν $\sum_{v=1}^{\infty} \alpha_v$ πραγματικῶν ἀριθμῶν ἰσχύει ἀκριβῶς μία ἐκ τῶν κάτωθι προτάσεων :

a). $'H$ σειρὰ $\ddot{\epsilon}$ χει ἀθροισμα \iff συγκλίνη πρὸς ἕνα πραγματικὸν ἀριθμόν.

β). $'H$ σειρὰ ἀπειρίζεται θετικῶς εἴτε ἀρνητικῶς \iff η σειρὰ συγκλίνη κατ' ἐκδοχήν.

γ). $'H$ σειρὰ ἀποκλίνει (κυμαίνεται).

Παρατήρησις 1η : Ἐκ τῶν προηγουμένων εἶναι φανερὸν ὅτι η ἔννοια : σειρὰ πραγματικῶν ἀριθμῶν ἀποτελεῖ γενίκευσιν τῆς ἀλγεβρικῆς ἔννοιας : ἀθροισμα πραγματικῶν ἀριθμῶν (μὲ δύο, τρεῖς, κτλ. δρους). Διὰ τοῦτο η σειρά ὀνομάζεται ἔνιστε καὶ «ἀθροισμα μὲ ἀπέλεος δρους». Δέν πρέπει δημοσίευτος νὰ γίνεται σύγχυσις μεταξὺ τῶν δύο ἔννοιῶν (ἀθροισμα πραγματικῶν ἀριθμῶν καὶ σειρὰ πραγματικῶν ἀριθμῶν), διότι τὸ μὲν ἀθροισμα πεπερασμένου πλήθους πραγματικῶν ἀριθμῶν εἶναι εἰς μ ο ν ο σ η μ ἄ ν τ ω σ ὡρισμένος πραγματικὸς ἀριθμός, ἐνῷ διὰ μίαν σειράν δὲν ὑπάρχει πάντοτε τὸ ἀθροισμα, καθ' ὅτι η σειρά ἡμπορεῖ νὰ συγκλίνῃ πρὸς τὸ $+\infty$ η πρὸς τὸ $-\infty$ η ἀκόμη καὶ νὰ μὴν συγκλίνῃ. Ἀλλὰ καὶ ὅταν η σειρά συγκλίνῃ πρὸς πραγματικὸν ἀριθμὸν, τὸ ἀθροισμα αὐτῆς δὲν δρίζεται ἀλγεβρικῶς, ἀλλὰ μέσω τῆς ἔννοιας τῆς συγκλίσεως ἀκολουθίας, δηλαδὴ τὸ ἀθροισμα μιᾶς συγκλίνουσθης σειρᾶς δὲν λαμβάνομεν μὲ τὴν συνθητισμένην πρόσθεσιν, ἀλλὰ ὡς τὸ δρισμὸν τῆς ἀκολουθίας τῶν μερικῶν ἀθροισμάτων κατὰ ταῦτα η λέξις «ἀθροισμα» χρησιμοποιεῖται έδω μὲ μίαν πολὺ εἰδικήν σημασίαν. 'Επιτίσης ἀξίζει νὰ τονισθῇ έδω ὅτι τὸ σύμβολον $\sum^{\infty}_{v=1} \alpha_v$ διὰ μίαν συγκλίνουσαν σειράν σημαίνει καὶ τὴν σειράν καὶ τὸ ἀθροισμά της, ἀν καὶ

αἱ δυὸι αὖται ἔννοιαι εἶναι, ὡς ἐλέχθη, διάφοροι.

Παρατήρησις 2α : Ἐκ τοῦ δρισμοῦ συγκλίσεως σειρᾶς, συνάγομεν δότι : προκειμένου νὰ ἔξετάσωμεν ἔδω μία σειρὰ συγκλίνη η ὅχι καὶ εἰς τὴν πρώτην περίπτωσιν διὰ νὰ εὔρωμεν τὸ ἀθροισμά της, ἐργαζόμεθα ὡς ἔξης : *Ἐνέργοιον συναρτήσει τοῦ ν τὸ ἀθροισμα σ_v τῶν ν πρώτων δρῶν της (μερικῶν ἀθροισμα) – έδω τοῦτο δύναται νὰ εὑρεθῇ – καὶ ἀκολούθως εὐρύσκομεν τὸ lim σ_v.* 'Εδῶ τὸ lim σ_v εἶναι ὁ πραγματικός ἀριθμὸς σ, τότε η σειρά συγκλίνει καὶ ἔχει ἀθροισμα τὸ σ, έδω τὸ lim σ_v = $+\infty$ η $-\infty$, τότε η σειρά ἀπειρίζεται θετικῶς η ἀρνητικῶς (ἀντιστοίχως) καὶ τέλος έδω τὸ lim σ_v δὲν ὑπάρχῃ, τότε η σειρά ἀποκλίνει.

Ἄσ ιδωμεν πῶς θὰ ἐφαρμόσωμεν τὰ ἀνωτέρω εἰς συγκεκριμένα παραδείγματα.

§ 179. Παραδείγματα σειρῶν συγκλίνουσῶν καὶ μῆ.

Παράδειγμα 1ον : Νὰ ἀποδειχθῇ δότι η «δεκαδικὴ σειρᾶ»

$$\sum_{v=1}^{\infty} \frac{3}{10^v} \equiv \frac{3}{10} + \frac{3}{10^2} + \cdots + \frac{3}{10^v} + \cdots$$

συγκλίνει καὶ μάλιστα ἰσχύει :

$$\frac{3}{10} + \frac{3}{10^2} + \cdots + \frac{3}{10^v} + \cdots = \frac{1}{3}.$$

Πράγματι, έχομεν :

$$\sigma_v = \frac{3}{10} + \frac{3}{10^2} + \cdots + \frac{3}{10^v} = \frac{3}{10} \left(1 + \frac{1}{10} + \frac{1}{10^2} + \cdots + \frac{1}{10^{v-1}} \right) = \frac{1}{3} - \frac{1}{3} \left(\frac{1}{10} \right)^v.$$

*Οθεν :

$$\lim \sigma_v = \frac{1}{3}, \quad \text{διότι} \quad \lim \frac{1}{10^v} = 0.$$

Παράδειγμα 2ον : Νὰ μελετηθῇ ἡ σειρά :

$$\alpha + (\alpha + \omega) + (\alpha + 2\omega) + \cdots + [\alpha + (v-1)\omega] + \cdots \quad (\alpha \neq 0)$$

τῆς όποιας οἱ δροὶ ἀποτελοῦν ἀριθμητικὴν πρόσοδον.

Λύσις. Ως γνωστὸν (§ 157) έχομεν :

$$\sigma_v = \alpha + (\alpha + \omega) + (\alpha + 2\omega) + \cdots + [\alpha + (v-1)\omega] = \frac{2\alpha + (v-1)\omega}{2} \cdot v$$

*Ἄρα :

$$\lim \sigma_v = \begin{cases} +\infty, & \text{ἐὰν } \omega > 0 \\ -\infty, & \text{ἐὰν } \omega < 0. \end{cases}$$

*Οθεν : Κάθε σειρὰ τῆς όποιας οἱ δροὶ ἀποτελοῦν ἀριθμητικὴν πρόσοδον συγκλίνει κατ' ἐκδοχήν, ἀκριβέστερον : ἀπειρίζεται θετικῶς μέν, ἐὰν ἡ ἀντίστοιχος πρόσοδος είναι αὔξουσα ($\omega > 0$), ἀρνητικῶς δέ, ἐὰν ἡ πρόσοδος είναι φθίνουσα ($\omega < 0$).

Παράδειγμα 3ον : Νὰ μελετηθῇ ὡς πρὸς τὴν σύγκλισιν ἡ γεωμετρικὴ σειρά :

$$\alpha + \alpha\omega + \alpha\omega^2 + \cdots + \alpha\omega^{v-1} + \cdots \quad (\alpha \neq 0) \quad (1)$$

διὰ τὰς διαφόρους πραγματικὰς τιμὰς τοῦ λόγου ω .

Λύσις : Τὸ ἀθροισμα τῶν ν πρώτων δρων τῆς (1) είναι :

$$\sigma_v = \alpha + \alpha\omega + \alpha\omega^2 + \cdots + \alpha\omega^{v-1} = \alpha \cdot \frac{\omega^v - 1}{\omega - 1} = \frac{\alpha}{1 - \omega} - \frac{\alpha\omega^v}{1 - \omega}.$$

Διακρίνομεν ἡδη τὰς κάτωθι περιπτώσεις :

α'). *Ἐὰν $|\omega| < 1$, δηλ. $-1 < \omega < 1$, τότε, ὡς δείχθη εἰς τὴν § 174, είναι $\lim \sigma_v = \frac{\alpha}{1 - \omega}$ καὶ ἐπομένως ἡ γεωμετρικὴ σειρὰ συγκλίνει (ἐν \mathbb{R}).

β'). *Ἐὰν $\omega > 1$, τότε ἡ ἀκολουθία ω^v , $v = 1, 2, \dots$ είναι αὔξουσα καὶ μὴ φραγμένη, ἕπειδε $\lim \omega^v = +\infty$, δητὸν ἐκ τοῦ τύπου $\sigma_v = \frac{\alpha(\omega^v - 1)}{\omega - 1} = \frac{\alpha}{\omega - 1} \cdot (\omega^v - 1)$, έχομεν :

$$\lim \sigma_v = \begin{cases} +\infty, & \text{ἐὰν } \alpha > 0 \\ -\infty, & \text{ἐὰν } \alpha < 0. \end{cases}$$

γ'). *Ἐὰν $\omega = 1$, τότε ἡ σειρὰ είναι : $\alpha + \alpha + \alpha + \cdots$ καὶ ἐπειδὴ $\sigma_v = n\alpha$, έχομεν :

$$\lim \sigma_v = +\infty \quad \text{ἢ} \quad -\infty, \quad \text{καθόσον } \alpha > 0 \quad \text{ἢ} \quad \alpha < 0 \quad (\text{ἀντίστοιχως}).$$

δ'). *Ἐὰν $\omega = -1$, τότε ἡ σειρὰ είναι : $\alpha - \alpha + \alpha - \alpha + \cdots$, δητὸν :

$$\sigma_1 = \alpha, \quad \sigma_2 = \alpha + (-\alpha) = 0, \quad \sigma_3 = \alpha + (-\alpha) + \alpha = \alpha, \quad \sigma_4 = 0, \dots$$

καὶ γενικῶς :

$$\sigma_v = \begin{cases} \alpha, & \text{ἐὰν } v \text{ περιττός} \\ 0, & \text{ἐὰν } v \text{ ἄρτιος.} \end{cases}$$

*Ητοι, ἡ ἀκολουθία τῶν μερικῶν ἀθροισμάτων είναι : $\alpha, 0, \alpha, 0, \dots$

Αὕτη δῆμος δὲν συγκλίνει. *Οθεν διὰ $\omega = -1$, ἡ σειρὰ (1) ἀποκλίνει.

ε'). Έάν $\omega < -1$, τότε ή σειρά (1) γίνεται : $\alpha - \alpha\omega + \alpha\omega^2 - \alpha\omega^3 + \dots \pm \alpha\omega^k \mp \dots$

*Επειδή $\omega < -1$, δύποτε $|\omega| > 1$, έπειτα $\lim \omega^v = +\infty$ ή $-\infty$, καθόσον ότι ω είναι αριτμητικός άντιστοχός, δην τότε $\sigma_v = \frac{\alpha}{\omega - 1} (\omega^v - 1)$, $v = 1, 2, \dots$ ούδεν οριον έχει καὶ κατά συνέπειαν ή (1) άποκλίνει. Συνοψίζοντες τὰ ἀνωτέρω έχομεν :

$$\sum_{v=0}^{\infty} \alpha\omega^v \equiv \alpha + \alpha\omega + \alpha\omega^2 + \dots + \alpha\omega^v + \dots = \begin{cases} \frac{\alpha}{1-\omega}, & \text{έάν } |\omega| < 1 \\ +\infty, & \text{έάν } \omega \geq 1 \text{ καὶ } \alpha > 0 \\ -\infty, & \text{έάν } \omega \geq 1 \text{ καὶ } \alpha < 0 \\ \text{άποκλίνει,} & \text{έάν } \omega \leq -1. \end{cases}$$

Ούτως ή σειρά : $\sum_{v=1}^{\infty} \frac{1}{3^v} \equiv \frac{1}{3} + \frac{1}{9} + \frac{1}{27} + \dots$, συγκλίνει πρός τὸν πραγματικὸν άρι-

θμόν.

$$\frac{\frac{1}{3}}{1-1/3} = \frac{1}{2}, \quad \text{διότι } |\omega| = \frac{1}{3} < 1.$$

*Αντιθέτως ή σειρά :

$$\sum_{v=0}^{\infty} (-1)^v = 1 + (-1) + 1 + (-1) + \dots, \quad \text{άποκλίνει, διότι } \omega = -1.$$

*Άστρωμεν τώρα καὶ ἐν παράδειγμα σειρᾶς τῆς δοποίας δὲν δυνάμεθα νὰ εύρωμεν τὸ άθροισμα τῶν ν πρώτων δρων τῆς.

Παράδειγμα 4ον. *Η σειρά :

$$\sum_{v=1}^{\infty} \frac{1}{v} \equiv 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{v} + \dots \quad (1)$$

καλεῖται ἀρμονική, διότι ἔκαστος δρος της (ἐκτὸς τοῦ πρώτου) εἶναι μέσος ἀρμονικὸς ἔκεινων ποὺ τὸν περιέχουν.

Θὰ ἀποδείξωμεν δτὶ ή ως ἄνω σειρά ἀπειρίζεται θετικῶς.

*Έστω $S_v \equiv 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{v}$, $v = 1, 2, \dots$ ή ἀκολουθία τῶν μερικῶν άθροισμάτων τῆς

(1). Εύκολως διαπιστοῦμεν δτὶ ή S_v , $v = 1, 2, \dots$ εἶναι γνησίως αὐξουσα ἀκολουθία θετικῶν δρων, ἥτοι Ισχύει :

$$S_v < S_{v+1} \quad \text{διὰ κάθε } v = 1, 2, \dots$$

*Άστρωμεν δτὶ ή S_v , $v = 1, 2, \dots$ εἶναι φραγμένη ἐν \mathbb{R} . Τότε, συμφώνως πρός τὸ άξιωμα (§ 150), ή S_v , $v = 1, 2, \dots$ ως αὐξουσα καὶ φραγμένη ἀκολουθία συγκλίνει ἔστω δὲ δτὶ :

$$\lim S_v = S.$$

*Επειδὴ $S_v \rightarrow S$ έπειτα δτὶ : διὰ κάθε $\epsilon > 0$ (ἄρα καὶ διὰ $\epsilon = \frac{1}{4}$) οὐπάρχει δείκτης $v_0 \in \mathbb{N}$ τοιοῦτος, ὥστε :

$$|S_v - S| \leq \frac{1}{4} \quad \text{διὰ κάθε } v \geq v_0.$$

*Οθεν, έάν $m \geq v_0$ καὶ $v \geq v_0$ έχομεν :

$$|S_m - S_v| = |(S_m - S) + (S - S_v)| \leq |S_m - S| + |S_v - S| \leq \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$$

Ειδικῶς έάν $v \geq v_0$ καὶ $m = 2v$ έχομεν :

$$|S_{2v} - S_v| \leq \frac{1}{2} \quad (2)$$

*Εξ ἀλλου, έάν $v > 1$ έχομεν :

$$\begin{aligned} S_{2v} - S_v &= \left(1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{v} + \frac{1}{v+1} + \dots + \frac{1}{2v}\right) - \left(1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{v}\right) = \\ &= \frac{1}{v+1} + \frac{1}{v+2} + \dots + \frac{1}{2v}. \end{aligned}$$

Άλλα : $\frac{1}{v+1} > \frac{1}{2v}$, $\frac{1}{v+2} > \frac{1}{2v}$, ..., $\frac{1}{2v} \geq \frac{1}{2v}$ διά κάθε $v > 1$.

*Οθεν :

$$S_{2v} - S_v = \frac{1}{v+1} + \frac{1}{v+2} + \dots + \frac{1}{2v} > \frac{1}{2v} + \frac{1}{2v} + \dots + \frac{1}{2v} = v \cdot \frac{1}{2v} = \frac{1}{2}.$$

όποτε συνάγεται ότι :

$$|S_{2v} - S_v| = S_{2v} - S_v > \frac{1}{2}, \quad (3)$$

τὸ δόπιον ἀντιφάσκει πρὸς τὴν (2). Ἐπομένως ἡ ὑπόθεσις ὅτι ἡ ἀκολουθία S_v , $v = 1, 2, \dots$ εἶναι φραγμένη ὁδηγεῖ εἰς ἀτοπον. Συνεπῶς, ἡ ἀκολουθία τῶν μερικῶν ἀθροισμάτων τῆς ἀρμονικῆς σειρᾶς, ὡς αὐξουσα καὶ μὴ φραγμένη, ἀπειρίζεται θετικῶς, ἤτοι $\lim S_v = +\infty$ ὅποτε, κατὰ τὸν δρισμὸν συγκλίσεως σειρᾶς, ἔχομεν :

$$\sum_{v=1}^{\infty} \frac{1}{v} = +\infty.$$

§ 180. Μέθοδοι εύρεσεως τοῦ ἀθροίσματος τῶν ν πρώτων ὅρων σειρᾶς.— Υπάρχουν διάφοροι μέθοδοι εύρεσεως τοῦ ἀθροίσματος τῶν ν πρώτων ὅρων σειρᾶς τίνος ἀναλόγως τῆς μορφῆς τοῦ γενικοῦ ὅρου αὐτῆς. Υπάρχουν ὅμως καὶ σειραὶ τῶν δόπιον δὲν δυνάμεθα νὰ εύρωμεν τὸ ἀθροισμα τῶν ν πρώτων ὅρων, λ.χ. ἡ ἀρμονικὴ σειρὰ $\sum_{v=1}^{\infty} \frac{1}{v}$. Παραδείγματα ἀθροίσεως σειρῶν, δηλ.

εύρεσεως τοῦ ἀθροίσματος τῶν ν πρώτων ὅρων των, συναρτήσει τοῦ v , ἔχομεν ἢδη γνωστὰ τὰ ἀθροίσματα τῶν ν πρώτων ὅρων ἀριθμητικῶν καὶ γεωμετρικῶν προόδων. Δὲν ὑπάρχει ὅμως γενικὴ μέθοδος διὰ τὸν ὑπολογισμὸν τοῦ ἀθροίσματος s_v τῶν ν πρώτων ὅρων οἰασδήποτε σειρᾶς. Εἰς τὴν παρούσαν παράγραφον θὰ ἔξετάσωμεν μόνον ὡρισμένας περιπτώσεις εἰς τὰς δόπιας εἶναι δυνατὴ ἡ εύρεσις τοῦ ἀθροίσματος s_v τῶν ν πρώτων ὅρων σειρῶν μὲν γενικὸν ὅρον αὐτῆς εἰδικῆς μορφῆς.

Περίπτωσις I. Εάν ὁ γενικὸς ὅρος a_v τῆς σειρᾶς $\sum_{v=1}^{\infty} a_v$ δύναται νὰ τεθῇ ὑπὸ τὴν μορφὴν : $a_v = \varphi(v) - \varphi(v+1)$ (1), δησου $\varphi(v)$ συνάρτησις τοῦ φυσικοῦ ἀριθμοῦ v (ἀκολουθία), τότε τὸ ἀθροισμα τῶν ν πρώτων ὅρων αὐτῆς s_v εἶναι :

$$s_v = \varphi(1) - \varphi(v+1) \quad (2)$$

Πράγματι, ἐὰν θέσωμεν εἰς τὴν $a_v = \varphi(v) - \varphi(v+1)$, $v = 1, 2, \dots, v$, ἔχομεν :

$$\alpha_1 = \varphi(1) - \varphi(2)$$

$$\alpha_2 = \varphi(2) - \varphi(3)$$

.....

$$\alpha_v = \varphi(v) - \varphi(v+1).$$

Προσθέτοντες κατὰ μέλη τὰς ἴσοττας ταύτας, ἔχομεν :

$$\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_v = \varphi(1) - \varphi(v+1)$$

$$\text{ή } s_v = \varphi(1) - \varphi(v+1).$$

Παρατήρησις. Έάν ύπάρχῃ τὸ $\lim \phi(v)$ καὶ εἰναι k , τότε ἐκ τῆς (2) ἔχομεν :

$$\sum_{v=1}^{\infty} \alpha_v = \lim \sigma_v = \phi(1) - k.$$

Έφαρμογὴ 1η : Νὰ εὑρεθῇ τὸ ἄθροισμα τῶν ν πρώτων δρων τῆς σειρᾶς :

$$\sum_{v=1}^{\infty} \frac{2v+1}{v^2(v+1)^2}$$

καθὼς καὶ τὸ ἄθροισμα αὐτῆς.

$$\text{Άνσις : } \text{Ο γενικὸς δρος αὐτῆς εἶναι : } \alpha_v = \frac{2v+1}{v^2(v+1)^2}.$$

Ἐπειδὴ $2v+1 = (v+1)^2 - v^2$ θὰ ἔχωμεν :

$$\alpha_v = \frac{(v+1)^2 - v^2}{v^2(v+1)^2} = \frac{1}{v^2} - \frac{1}{(v+1)^2} = \phi(v) - \phi(v+1), \quad \deltaπου \phi(v) = \frac{1}{v^2}$$

τότε δηλα, συμφώνως πρὸς τὴν (2), θὰ εἴναι :

$$\sigma_v = \phi(1) - \phi(v+1) = 1 - \frac{1}{(v+1)^2}$$

$$\text{καὶ } \sum_{v=1}^{\infty} \frac{2v+1}{v^2(v+1)^2} = \lim \sigma_v = 1, \quad \deltaιότι \lim \frac{1}{(v+1)^2} = 0.$$

Έφαρμογὴ 2α : Νὰ εὑρεθῇ τὸ ἄθροισμα τῆς σειρᾶς :

$$\frac{4}{1 \cdot 2} \cdot \frac{2}{3} + \frac{5}{2 \cdot 3} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^2 + \frac{6}{3 \cdot 4} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^3 + \cdots + \frac{v+3}{v(v+1)} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^v + \cdots \quad (\Sigma)$$

$$\text{Άνσις : } \text{Ο γενικὸς δρος τῆς σειρᾶς } (\Sigma) \text{ εἶναι : } \alpha_v = \frac{v+3}{v(v+1)} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^v.$$

Πρὸς μετασχηματισμὸν τοῦ γενικοῦ δρου, ἀναλύομεν πρῶτον τὸ κλάσμα $\frac{v+3}{v(v+1)}$ εἰς ἀθροισμάτων. Πρὸς τοῦτο θέτομεν :

$$\frac{v+3}{v(v+1)} \equiv \frac{A}{v} + \frac{B}{v+1}.$$

Ἐξ αὐτῆς, ἐργαζόμενοι κατὰ τὰ γνωστὰ (§ 98), εύρίσκομεν $A = 3$, $B = -2$, δτε ἔχομεν :

$$\frac{v+3}{v(v+1)} \equiv \frac{3}{v} - \frac{2}{v+1}.$$

Τότε δ γενικὸς δρος τῆς σειρᾶς γίνεται :

$$\alpha_v = \frac{v+3}{v(v+1)} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^v = \frac{3}{v} \cdot \frac{2^v}{3^v} - \frac{2}{v+1} \cdot \frac{2^v}{3^v} = \frac{2^v}{v \cdot 3^{v-1}} - \frac{2^{v+1}}{(v+1) \cdot 3^v},$$

ἥτοι ὁ α_v ἔτεθη ὑπὸ τὴν μορφὴν $\alpha_v = \phi(v) - \phi(v+1)$, δπου $\phi(v) = \frac{2^v}{v \cdot 3^{v-1}}$.

Τότε, κατὰ τὸν τύπον (2), θὰ εἴναι :

$$\sigma_v = \phi(1) - \phi(v+1) = 2 - \frac{2^{v+1}}{(v+1) \cdot 3^v}, \quad \deltaιότι \phi(1) = 2.$$

Οθεν :

$$\lim \sigma_v = 2 - \lim \frac{2^{v+1}}{(v+1) \cdot 3^v} = 2 - \lim \frac{2}{v+1} \cdot \lim \left(\frac{2}{3}\right)^v = 2 - 0 = 2,$$

Ἡτοι ἡ σειρά (Σ) συγκλίνει πρὸς τὸν ἀριθμὸν 2.

Περίπτωσης ΙΙ. Εάν ο γενικός όρος α_v της σειρᾶς $\sum_{v=1}^{\infty} \alpha_v$ δύναται να τεθῇ ύποτη τήν μορφήν :

$$\alpha_v = A\varphi(v) + B\varphi(v+1) + \Gamma\varphi(v+2), \text{ öπου } A + B + \Gamma = 0 \quad (3)$$

τότε το αθροισμα σ_v τῶν ν πρώτων όρων αὐτῆς εἶναι :

$$\sigma_v = A\varphi(1) - \Gamma\varphi(2) - A\varphi(v+1) + \Gamma\varphi(v+2) \quad (4)$$

Πράγματι, ἔχομεν :

$$\begin{aligned} \sigma_v &= \sum_{k=1}^v \alpha_k = \sum_{k=1}^v \{ A\varphi(k) + B\varphi(k+1) + \Gamma\varphi(k+2) \} = A \sum_{k=1}^v \varphi(k) + B \sum_{k=1}^v \varphi(k+1) + \\ &+ \Gamma \sum_{k=1}^v \varphi(k+2) = A \sum_{k=-1}^{v-2} \varphi(k+2) + B \sum_{k=0}^{v-1} \varphi(k+2) + \Gamma \sum_{k=1}^v \varphi(k+2) = \\ &= A\{\varphi(1) + \varphi(2)\} + A \sum_{k=1}^{v-2} \varphi(k+2) + B\varphi(2) + B \sum_{k=1}^{v-2} \varphi(k+2) + B\varphi(v+1) + \\ &+ \Gamma \sum_{k=1}^{v-2} \varphi(k+2) + \Gamma\{\varphi(v+1) + \varphi(v+2)\} = A\varphi(1) + (A+B)\varphi(2) + \\ &+ (B+\Gamma)\varphi(v+1) + \Gamma\varphi(v+2) + (A+B+\Gamma) \sum_{k=1}^{v-2} \varphi(k+2). \end{aligned}$$

Έπειδη $A + B + \Gamma = 0$, δτε $A + B = -\Gamma$, $B + \Gamma = -A$, ἔχομεν :

$$\sigma_v = A\varphi(1) - \Gamma\varphi(2) - A\varphi(v+1) + \Gamma\varphi(v+2).$$

Έφαρμογή : Νὰ εὑρεθῇ τὸ αθροισμα τῶν ν πρώτων όρων τῆς σειρᾶς :

$$\frac{5}{1 \cdot 2 \cdot 3} + \frac{8}{2 \cdot 3 \cdot 4} + \cdots + \frac{3v+2}{v(v+1)(v+2)} + \cdots \quad (5)$$

Αύστις : Άναλύομεν τὸν γενικὸν όρον $\alpha_v = \frac{3v+2}{v(v+1)(v+2)}$ εἰς αθροισμα τριῶν ἀπλῶν κλασμάτων. Πρὸς τοῦτο θέτοντες :

$$\frac{3v+2}{v(v+1)(v+2)} \equiv \frac{A}{v} + \frac{B}{v+1} + \frac{\Gamma}{v+2}$$

εύρισκομεν, κατὰ τὰ γνωστά, $A = B = 1$ καὶ $\Gamma = -2$.

Παρατηροῦμεν δτι : $A + B + \Gamma = 0$ καὶ ο γενικὸς όρος τῆς σειρᾶς (5) έτέθη ύποτη τήν μορφήν :

$$\alpha_v = A\varphi(v) + B\varphi(v+1) + \Gamma\varphi(v+2), \text{ öπου } \varphi(v) = \frac{1}{v}.$$

Δι' ἐφαρμογῆς τοῦ τύπου (4) εύρισκομεν :

$$\sigma_v = 1 + 2 \cdot \frac{1}{2} - \frac{1}{v+1} - 2 \cdot \frac{1}{v+2} = 2 - \frac{1}{v+1} - \frac{2}{v+2}.$$

Παρατήρησις. Γενικῶς, εὰν $\alpha_v = A\varphi(v) + B\varphi(v+k) + \Gamma\varphi(v+\lambda)$ μὲ $A + B + \Gamma = 0$, τότε τὸ σ_v ύπολογίζεται.

Περίπτωσης ΙΙΙ. Εάν ο γενικός όρος α_v τῆς σειρᾶς $\sum_{v=1}^{\infty} \alpha_v$ εἶναι τῆς μορφῆς :

$$\alpha_v = f(v) + \varphi(v) + g(v),$$

ὅπου $f(v)$, $\varphi(v)$, $g(v)$ εἶναι οἱ γενικοὶ όροι σειρῶν, τῶν όποιων εἶναι γνωστὴ ἡ εύρεσις τοῦ αθροίσματος τῶν ν πρώτων όρων, τότε τὸ αθροισμα τῶν ν πρώτων όρων αὐτῆς ύπολογίζεται.

Παράδειγμα. Νὰ εύρεθῇ τὸ ἄθροισμα τῶν ν πρώτων ὅρων τῆς σειρᾶς μὲ γενικὸν ὅρον
 $\alpha_v = \frac{2^v - 1}{2^{2v-2}}$, καθὼς καὶ τὸ ἄθροισμα αὐτῆς (\equiv ἄθροισμα ἀπείρων ὅρων της).

Λύσις: Ὁ γενικὸς ὅρος γράφεται :

$$\alpha_v = \frac{2^v - 1}{2^{2v-2}} = \frac{2^v}{2^{2v-2}} - \frac{1}{2^{2v-2}} = \frac{4}{2^v} - \frac{4}{4^v},$$

ἥτοι δ α_v ἐτέθη ὑπὸ τὴν μερφήν : $\alpha_v = f(v) + \phi(v)$, ὅπου $f(v) = \frac{4}{2^v}$ καὶ $\phi(v) = -\frac{4}{4^v}$,

δηλαδὴ δ α_v ἀνελύθη εἰς διαφορὰν δύο ὅρων, ἔκαστος τῶν ὁποίων ἀποτελεῖ τὸν νιοστὸν ὅρον φθινούσης γεωμετρικῆς προόδου.

Τότε :	διὰ ν = 1	ἔχομεν :	$\alpha_1 = 4 \cdot \frac{1}{2} - 4 \cdot \frac{1}{4}$
διὰ ν = 2	» :	$\alpha_2 = 4 \cdot \frac{1}{2^2} - 4 \cdot \frac{1}{4^2}$	
.....			
διὰ ν = ν	» :	$\alpha_v = 4 \cdot \frac{1}{2^v} - 4 \cdot \frac{1}{4^v}$	

"Οθεν :

$$\sigma_v \equiv \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_v = 4 \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{2^v} \right) - 4 \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4^2} + \dots + \frac{1}{4^v} \right) = \\ = 4 \cdot \frac{\frac{1}{2^{v+1}} - \frac{1}{2}}{\frac{1}{2} - 1} - 4 \cdot \frac{\frac{1}{4^{v+1}} - \frac{1}{4}}{\frac{1}{4} - 1} = 4 \left(1 - \frac{1}{2^v} \right) - \frac{4}{3} \left(1 - \frac{1}{4^v} \right) = \frac{8}{3} - \frac{1}{2^{v-1}} + \frac{1}{3 \cdot 4^{v-1}}$$

καὶ τὸ ἄθροισμα τῆς σειρᾶς $\sum_{v=1}^{\infty} \alpha_v$ εἶναι :

$$\sum_{v=1}^{\infty} \alpha_v = \lim \sigma_v = \frac{8}{3}.$$

Περίπτωσις IV : Ἐὰν δὲ γενικὸς ὅρος α_v τῆς σειρᾶς $\sum_{v=1}^{\infty} \alpha_v$ εἶναι τῆς μορφῆς:
 $\alpha_v = f(v) \cdot x^v$, ὅπου $f(v)$ ἀκέραιον πολυώνυμον τοῦ ν,
τότε τὸ ἄθροισμα τῶν ν πρώτων ὅρων αὐτῆς ὑπολογίζεται.

Παράδειγμα 1ον. Νὰ ὑπολογισθῇ τὸ ἄθροισμα τῶν ν πρώτων ὅρων τῆς σειρᾶς :

$$\sum_{v=1}^{\infty} v x^{v-1} \equiv 1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + \dots + vx^{v-1} + \dots$$

Λύσις. Ἔστω :

$$\Sigma_v \equiv 1 + 2x + 3x^2 + \dots + vx^{v-1}. \quad (1)$$

Πολλαπλασιάζοντες τὰ μέλη τῆς (1) ἐπὶ τὸ λαμβάνομεν :

$$x \Sigma_v = x + 2x^2 + 3x^3 + \dots + vx^v. \quad (2)$$

Δι' ἀφαιρέσεως τῶν (1) καὶ (2) προκύπτει :

$$(1-x) \Sigma_v = 1 + x + x^2 + \dots + x^{v-1} - vx^v.$$

Ἄυτη, ἐπειδὴ εἶναι $1 + x + x^2 + \dots + x^{v-1} = \frac{x^v - 1}{x - 1}$, γίνεται :

$$(1-x) \cdot \Sigma_v = \frac{x^v - 1}{x - 1} - vx^v$$

$$\Sigma_v = \frac{1 - x^v}{(1-x)^2} - \frac{vx^v}{1-x}.$$

Παράδειγμα 2ον. Νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι τὸ ἄθροισμα τῶν ν πρώτων ὅρων τῆς σειρᾶς :

$$\frac{2}{3} + \frac{3}{3^2} + \frac{4}{3^3} + \cdots + \frac{v+1}{3^v} + \cdots \quad (1)$$

είναι : $\frac{5}{4} - \frac{2v+5}{4 \cdot 3^v}.$

Λύσις. Ὁ γενικὸς ὅρος τῆς (1), δηλ. ὁ $\frac{v+1}{3^v}$ είναι γινόμενον τοῦ νιοστοῦ ὅρου μιᾶς ἀριθμητικῆς προοόδου ($v: 2, 3, \dots, v, v+1, \dots$) καὶ τοῦ νιοστοῦ ὅρου μιᾶς γεωμετρικῆς ($v: \frac{1}{3}, \frac{1}{3^2}, \dots, \frac{1}{3^v}, \dots$), ἥτοι είναι ὁ νιοστὸς ὅρος μιᾶς μικτῆς προοόδου *).

Θέτομεν :

$$\Sigma_v = \frac{2}{3} + \frac{3}{3^2} + \frac{4}{3^3} + \cdots + \frac{v+1}{3^v}. \quad (2)$$

Πολλαπλασιάζοντες τὰ μέλη τῆς (2) ἐπὶ τὸν λόγον τῆς γεωμετρικῆς προοόδου λαμβάνομεν :

$$\frac{1}{3} \Sigma_v = \frac{2}{3^2} + \frac{3}{3^3} + \frac{4}{3^4} + \cdots + \frac{v+1}{3^{v+1}}. \quad (3)$$

Δι' ἀφαιρέσεως τῶν (2) καὶ (3) προκύπτει :

$$\frac{2}{3} \Sigma_v = \frac{2}{3} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{3^3} + \cdots + \frac{1}{3^v} - \frac{v+1}{3^{v+1}} = \frac{1}{3} + \frac{\frac{1}{3^v} \cdot \frac{1}{3} - \frac{1}{3}}{\frac{1}{3} - 1} - \frac{v+1}{3^{v+1}}$$

καὶ τελικῶς :

$$\Sigma_v = \frac{5}{4} - \frac{2v+5}{4 \cdot 3^v}.$$

Περίπτωσις V : Ἐάν ὁ γενικὸς ὅρος μιᾶς σειρᾶς είναι ἀκεραία ρητὴ συνάρτησις τοῦ v , δηλαδὴ $\alpha_v = \phi(v)$, $v \in \mathbb{N}$, δυνάμεθα νὰ εὕρωμεν τὸ ἄθροισμα τῶν ν πρώτων ὅρων αὐτῆς.

Παράδειγμα 1ον. Νὰ εὑρεθῇ τὸ ἄθροισμα τῶν ν πρώτων ὅρων τῆς σειρᾶς, τῆς ὡποίας ὁ γενικὸς ὅρος είναι : $\alpha_v = 12v^2 - 6v + 1$.

Λύσις : Ἐστω $\sigma_v \equiv \alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_v = \sum_{v=1}^v \alpha_v \equiv \sum_{v=1}^v (12v^2 - 6v + 1)$, τὸ ζητούμενον ἄθροισμα.

Λόγῳ τῶν γνωστῶν ιδιοτήτων τοῦ συμβόλου Σ (βλ. § 176) ἔχομεν :

$$\sigma_v = \sum_{v=1}^v (12v^2 - 6v + 1) = \sum_{v=1}^v 12v^2 - \sum_{v=1}^v 6v + \sum_{v=1}^v 1$$

$$\text{ή } \sigma_v = 12 \sum_{v=1}^v v^2 - 6 \sum_{v=1}^v v + \sum_{v=1}^v 1 = 12 \cdot \frac{v(v+1)(2v+1)}{6} - 6 \cdot \frac{v(v+1)}{2} + v = v^2(4v+3).$$

Παράδειγμα 2ον. Νὰ εὑρεθῇ τὸ ἄθροισμα τῶν ν πρώτων ὅρων τῆς σειρᾶς :

$$1 \cdot 3 \cdot 5 + 3 \cdot 5 \cdot 7 + 5 \cdot 7 \cdot 9 + \cdots \quad (\Sigma)$$

* **Μικτὴ πρόοδος** καλεῖται μίσ ἀκολουθία ἀριθμῶν, ἕκαστος ὅρος τῆς ὡποίας προκύπτει ἀπὸ τὸν πολλαπλασιασμὸν τῶν ἀντιστοίχων (όμοταξίων) ὅρων δύο προοόδων, μιᾶς ἀριθμητικῆς καὶ μιᾶς γεωμετρικῆς.

Λύσις. "Εν πρώτοις εύρισκομεν τὸν γενικὸν δρον τῆς σειρᾶς (Σ). Παρατηροῦμεν ὅτι οἱ πρῶτοι παράγοντες τῶν γινομένων τῆς δοθείστης σειρᾶς εἰναι οἱ ἀριθμοὶ 1, 3, 5, ..., οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦν ἀριθμητικὴν πρόσδον λόγου 2, συνεπῶς δὲ πρῶτος δρος τοῦ γινομένου τοῦ γενικοῦ δρου τῆς σειρᾶς θὰ εἰναι δὲ : $1 + (v - 1) \cdot 2 = 2v - 1$.

*Ομοίως : δὲ γενικὸς δρος τῆς ἀριθμητικῆς προόδου 3, 5, 7, ... εἰναι $2v + 1$
 » » » » » 5, 7, 9, ... » $2v + 3$.

*Ο γενικὸς δθεν δρος τῆς δοθείστης σειρᾶς εἰναι : $(2v - 1)(2v + 1)(2v + 3)$.

Τότε τὸ ζητούμενον ἀθροισμα τῶν ν πρώτων δρων τῆς (Σ) εἰναι :

$$\begin{aligned} \sigma_v &\equiv 1 \cdot 3 \cdot 5 + 3 \cdot 5 \cdot 7 + \dots + (2v - 1)(2v + 1)(2v + 3) = \sum_{v=1}^v (2v - 1)(2v + 1)(2v + 3) = \\ &= \sum_{v=1}^v (8v^3 + 12v^2 - 2v - 3) = 8 \sum_{v=1}^v v^3 + 12 \sum_{v=1}^v v^2 - 2 \sum_{v=1}^v v - 3 \sum_{v=1}^v 1 = \\ &= 8 \cdot \frac{v^2(v+1)^2}{4} + 12 \frac{v(v+1)(2v+1)}{6} - 2 \frac{v(v+1)}{2} - 3v \end{aligned}$$

καὶ τελικῶς :

$$\sigma_v = v(2v^3 + 8v^2 + 7v - 2).$$

AΣΚΗΣΕΙΣ

381. Νὰ γραφοῦν οἱ ἑπτὰ πρῶτοι δροι τῶν ἀκολούθων σειρῶν :

$$\alpha). \sum_{v=1}^{\infty} \frac{v}{v^2 + 1}, \quad \beta). \sum_{v=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{v}}, \quad \gamma). \sum_{v=1}^{\infty} \frac{1+v}{1+v^2}, \quad \delta). \sum_{v=1}^{\infty} (-1)^{v^2} \cdot \frac{v}{v(v+1)}.$$

382. Νὰ εύρεθῇ τὸ ἀθροισμα τῶν ἀκολούθων σειρῶν :

$$\alpha) \sum_{v=0}^{\infty} \frac{1}{3^v}, \quad \beta) \sum_{v=1}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^v, \quad \gamma) \sum_{v=1}^{\infty} \left(\frac{3}{4}\right)^v.$$

383. Νὰ εύρεθῇ μία σειρὰ τῆς δοποίας ή ἀκολουθία τῶν μερικῶν ἀθροισμάτων εἰναι :

$$\alpha). \left(1 - \frac{1}{2^v}\right), v = 1, 2, \dots, \beta). \frac{v}{v+1}, v = 1, 2, \dots$$

384. Δείξατε ὅτι ἡ σειρά : $\sum_{v=1}^{\infty} \frac{1}{v(v+2)}$ εἰναι συγκλίνουσα ἔχουσα ἀθροισμα $\frac{3}{4}$.

385. Νὰ εύρεθῇ τὸ ἀθροισμα τῆς σειρᾶς $\sum_{v=1}^{\infty} \alpha_v$, διπού $\alpha_v = \frac{1}{(3v-2)(3v+1)}$.

386. *Ομοίως τῆς σειρᾶς : $\frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \dots + \frac{1}{(v+1)(v+2)} + \dots$

387. Νὰ εύρεθῇ τὸ ἀθροισμα τῶν ν πρώτων δρων τῆς σειρᾶς μὲ γενικὸν δρον :

$$\alpha_v = \frac{v+2}{v(v+1)} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^v \text{ καθὼς καὶ τὸ ἀθροισμά της.}$$

388. Νὰ εύρεθῇ τὸ ἀθροισμα τῶν ν πρώτων δρων τῆς σειρᾶς μὲ γενικὸν δρον :

$$\alpha_v = \frac{2^v - 1}{3^{v+1}} \text{ καὶ ἀκολούθως νὰ δειχθῇ ὅτι : } \sum_{v=1}^{\infty} \alpha_v = \frac{1}{2}.$$

389. Νὰ εύρεθῇ τὸ ἀθροισμα τῶν ν πρώτων δρων τῶν σειρῶν, τῶν δποίων οἱ γενικοὶ δροι εἰναι :

$$\alpha) 3v^3 - v, \quad \beta) 8v^3 - 1, \quad \gamma) 8v^3 - 3v^2, \quad \delta) v^3 + 3v + 2.$$

390. Νὰ εύρεθοῦν οἱ γενικοὶ δροι τῶν κάτωθι σειρῶν καὶ ἀκολούθως τὰ ἀθροίσματα τῶν ν πρώτων δρων αὐτῶν.

$$\alpha). 1 \cdot 4 \cdot 7 + 2 \cdot 5 \cdot 8 + \dots \quad \beta). \frac{1}{2 \cdot 5} + \frac{1}{5 \cdot 8} + \frac{1}{8 \cdot 11} + \dots$$

391. Νὰ εύρεθοῦν τὰ ἀθροίσματα τῶν ν πρώτων δρῶν τῶν ἀκολούθων σειρᾶς.

$$\alpha) 1 \cdot 2 \cdot 4 + 2 \cdot 3 \cdot 5 + \dots + v(v+1)(v+3) + \dots$$

$$\beta) 1 + \left(1 + \frac{1}{2}\right) + \dots + \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{2^{v-1}}\right) + \dots$$

$$\gamma) 4\alpha + 5\alpha^2 + 6\alpha^3 + \dots + (v+3)\alpha^v + \dots$$

392. Νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι τὸ ἀθροίσμα τῶν ν πρώτων δρῶν τῆς σειρᾶς :

$$\frac{1}{2} + \frac{2}{2^2} + \frac{3}{2^3} + \dots + \frac{v}{2^v} + \dots$$

$$\text{εἶναι : } 2 - \frac{1}{2^{v-1}} - \frac{v}{2^v}$$

$$393. \text{Νὰ δειχθῇ ὅτι: } 1 + \frac{2}{5} + \frac{3}{5^2} + \dots + \frac{v}{5^{v-1}} = \frac{5^{v+1} - 4v - 5}{16 \cdot 5^{v-1}}.$$

394. Νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι :

$$1 + 2\left(1 + \frac{1}{v}\right) + 3\left(1 + \frac{1}{v}\right)^2 + \dots + v\left(1 + \frac{1}{v}\right)^{v-1} = v^2.$$

$$395. \text{Νὰ δειχθῇ ὅτι: } \sum_{v=1}^{\infty} \frac{1}{v(v+2)(v+3)} = \frac{5}{36}.$$

$$396. \text{Νὰ δειχθῇ ὅτι: } \frac{3}{4} + \frac{4}{8} + \frac{5}{16} + \dots + \frac{v}{2^{v-1}} = 2 - \frac{v+2}{2^{v-1}}.$$

Ίδιότητες συγκλίσεως σειρῶν

Εἰς τὴν παράγραφον ταύτην θὰ ἀποδείξωμεν μερικὰς βασικὰς ίδιότητας συγκλινουσῶν σειρῶν, ἐπὶ τῇ βάσει τῶν ὁποίων δύναται τις νὰ συνδυάσῃ συγκλινούσας σειρὰς κατὰ ποικίλους τρόπους. Θὰ ἀναφέρωμεν ἐπίσης μίαν πολὺ ἀπλῆ συνθήκην, ἡ ὁποία εἶναι ἀναγκαῖα διὰ τὴν σύγκλισιν, ἐπὶ πλέον δὲ κατάληπτος, εἰς πολλὰς περιπτώσεις, προκειμένου νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι μία σειρὰ δὲν συγκλίνει ἐν \mathbb{R} .

§ 181. Ίδιότης I.- 'Ἐὰν μία σειρὰ $a_1 + a_2 + \dots + a_v + \dots$ (1) εἶναι συγκλίνουσα μὲν ἀθροίσμα $a \in \mathbb{R}$, τότε καὶ ἡ σειρὰ : $a_{k+1} + a_{k+2} + \dots$ (2), ἡ ὁποία προκύπτει ἀπὸ τὴν διοθεῖσαν διὰ παραλείψεως τῶν k πρώτων δρῶν τῆς, εἶναι ἐπίσης συγκλίνουσα.

'Απόδειξις : "Ἐστωσαν s_v , $v = 1, 2, \dots$ καὶ t_v , $v = 1, 2, \dots$ αἱ ἀκολουθίαι τῶν μερικῶν ἀθροίσμάτων τῶν σειρῶν (1) καὶ (2) ἀντιστοίχως, ἥτοι :

$$s_v \equiv a_1 + a_2 + \dots + a_v \quad (3)$$

$$t_v \equiv a_{k+1} + a_{k+2} + \dots + a_{k+v} \quad (4)$$

Τὸ (πεπερασμένον) ἀθροίσμα $a_1 + a_2 + \dots + a_k$ εἶναι εἰς πραγματικὸς ἀριθμός, τὸν ὁποῖον ἔσται καλέσωμεν s , ἥτοι : $s \equiv a_1 + a_2 + \dots + a_k$.

Θέτομεν : $s_{k+v} \equiv a_1 + a_2 + \dots + a_k + a_{k+1} + \dots + a_{k+v}$, ὅτε ἔχομεν :

$$s_{k+v} = s + a_{k+1} + a_{k+2} + \dots + a_{k+v}$$

$$\text{ή} \quad s_{k+v} - s = a_{k+1} + a_{k+2} + \dots + a_{k+v}. \quad (5)$$

Η (5), δυνάμει τῆς (4), γίνεται :

$$\sigma_{k+v} - s = t_v, \quad v = 1, 2, \dots$$

Έκ ταύτης ἔχομεν : $\lim \sigma_{k+v} - s = \lim t_v.$ (6)

Ἐπειδὴ ἔξ οὐ ποθέσεως εἶναι $\lim \sigma_v = \alpha,$ ἀρα καὶ $\lim_{v \rightarrow \infty} \sigma_{k+v} = \alpha,$ ή Ισότης (6) δίδει :
 $\lim t_v = \alpha - s.$

Ἐκ ταύτης παρατηροῦμεν ὅτι ή ἀκολουθία τῶν μερικῶν ἀθροισμάτων τῆς σειρᾶς (2) συγκλίνει ὅτε, κατὰ τὸν δρισμὸν συγκλίσεως σειρᾶς, καὶ ή σειρὰ (2) συγκλίνει.

Παρατήρησις. Παρατηροῦμεν ὅτι παραλείποντες τοὺς κ πρώτους δρους μιᾶς συγκλινούστης σειρᾶς $\sum_{v=1}^{\infty} a_v,$ τὸ ἀθροισμα αὐτῆς α ἐλαττοῦται κατὰ τὸ ἀθροισμα s τῶν παραλειπομένων δρων. Προφανῶς ἔαν ή (1) δὲν συγκλίνῃ ἐν R, τότε καὶ ή (2) ἐπίσης δὲν συγκλίνει. Οὕτως αἱ σειραι (1) καὶ (2) εἶναι πάντοτε τῆς αὐτῆς φύσεως, δηλαδὴ ή καὶ αἱ δύο συγκλινουσσαι ἐν R (ἀσχέτως ἔαν δὲν ἔχουν τὸ αὐτὸ ἀθροισμα) ή καὶ αἱ δύο μὴ συγκλινουσσαι. Ἀντιστρέφοντες τοὺς ρόλους τῶν (1) καὶ (2) συμπεραίνομεν ὅτι ή σύγκλισις ή μὴ μιᾶς σειρᾶς δὲν βλάπτεται, ἔαν εἰς τὴν ἀρχὴν αὐτῆς προσθέσσαμεν ἓν πεπερασμένον πλῆθος δρων. Οὕτως ή σειρὰ :

$$\sum_{v=11}^{\infty} \frac{1}{v} = \frac{1}{11} + \frac{1}{12} + \frac{1}{13} + \dots$$

ώς προκύπτουσσα ἐκ τῆς ἀρμονικῆς σειρᾶς $\sum_{v=1}^{\infty} \frac{1}{v}$ διὰ παραλείψεως τῶν δέκα πρώτων δρων τῆς, ἀπειρίζεται θετικῶς.

$$\S\ 182. \text{ Ἰδιότης II. — Εστωσαν } \sum_{v=1}^{\infty} a_v = a \quad \text{καὶ} \quad \sum_{v=1}^{\infty} \beta_v = \beta$$

δύο συγκλινουσσαι σειραι. Τότε :

1). Ἐὰν $\lambda \in R,$ ή σειρὰ $\sum_{v=1}^{\infty} (\lambda a_v)$ εἶναι ἐπίσης συγκλινουσσα ἔχουσα ἀθροισμα $\lambda a,$

$$\text{Ἔτοι : } \sum_{v=1}^{\infty} (\lambda a_v) = \lambda a = \lambda \cdot \sum_{v=1}^{\infty} a_v,$$

δηλαδὴ διὰ τὰς συγκλινουσσας σειρᾶς, ὅπως καὶ διὰ τὰ συνήθη ἀθροισματα, ισχύει ὁ ἐπιμεριστικὸς νόμος.

2). Ἡ σειρὰ $\sum_{v=1}^{\infty} (a_v + \beta_v)$ εἶναι συγκλινουσσα ἔχουσα ἀθροισμα τὸν ἀριθμὸν $a + \beta,$

$$\text{Ἔτοι : } \sum_{v=1}^{\infty} (a_v + \beta_v) = \sum_{v=1}^{\infty} a_v + \sum_{v=1}^{\infty} \beta_v.$$

*Απόδειξις : "Εστωσαν $s_v, v = 1, 2, \dots$ καὶ $t_v, v = 1, 2, \dots$ αἱ ἀκολουθίαι τῶν μερικῶν ἀθροισμάτων τῶν σειρῶν $\sum_{v=1}^{\infty} a_v$ καὶ $\sum_{v=1}^{\infty} \beta_v$ ἀντιστοίχως, τότε :

$$s_v = a_1 + a_2 + \dots + a_v$$

$$t_v = \beta_1 + \beta_2 + \dots + \beta_v, \quad v = 1, 2, \dots$$

1). Έαν s'_v είναι τὸ ἀθροισμα τῶν ν πρώτων ὅρων τῆς $\sum_{v=1}^{\infty} (\lambda \alpha_v)$, ἔχομεν :

$$s'_v = \lambda \alpha_1 + \lambda \alpha_2 + \cdots + \lambda \alpha_v = \lambda (\alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_v) = \lambda \cdot s_v.$$

Έκ ταύτης ἔχομεν : $\lim s'_v = \lim (\lambda \cdot s_v) = \lambda \cdot \lim s_v = \lambda \alpha$, διότι $\lim s_v = \alpha$.

Έκ ταύτης συνάγομεν διτὶ ἡ σειρὰ $\sum_{v=1}^{\infty} (\lambda \alpha_v)$ συγκλίνει καὶ μάλιστα πρὸς τὸ $\lambda \cdot \alpha$.

2). Έαν σ_v , $v = 1, 2, \dots$ είναι ἡ ἀκολουθία τῶν μερικῶν ἀθροισμάτων τῆς $\sum_{v=1}^{\infty} (\alpha_v + \beta_v)$, θὰ είναι :

$$\begin{aligned} \sigma_v &\equiv (\alpha_1 + \beta_1) + (\alpha_2 + \beta_2) + \cdots + (\alpha_v + \beta_v) = (\alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_v) + \\ &+ (\beta_1 + \beta_2 + \cdots + \beta_v) = s_v + t_v, \quad \forall v = 1, 2, \dots \end{aligned}$$

Ότε : $\lim \sigma_v = \lim (s_v + t_v) = \lim s_v + \lim t_v = \alpha + \beta$, διότι ἐξ ὑποθέσεως $\lim s_v = \alpha$, $\lim t_v = \beta$.

Τότε, συμφώνως πρὸς τὸν δρισμὸν συγκλίσεως σειρᾶς, ἡ σειρὰ $\sum_{v=1}^{\infty} (\alpha_v + \beta_v)$ συγκλίνει εἰς τὸ $\alpha + \beta$.

Έκ τῶν συμπερασμάτων (1) καὶ (2) τῆς ίδιότητος II ἔπειται ἡ γενικωτέρα ίδιότης :

§ 183. Ιδιότης III. — Έαν $\sum_{v=1}^{\infty} \alpha_v = \alpha$ καὶ $\sum_{v=1}^{\infty} \beta_v = \beta$ μὲν $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, ἐπὶ πλέον δὲ ξ καὶ η τυχόντες πραγματικοὶ ἀριθμοί, τότε ισχύει :

$$\sum_{v=1}^{\infty} (\xi \alpha_v + \eta \beta_v) = \xi \alpha + \eta \beta.$$

Εἰδικῶς διὰ $\xi = 1$, $\eta = -1$ ἔχομεν :

$$\sum_{v=1}^{\infty} (\alpha_v - \beta_v) = \alpha - \beta = \sum_{v=1}^{\infty} \alpha_v - \sum_{v=1}^{\infty} \beta_v.$$

Έφαρμογή : Ἡ σειρὰ $\sum_{v=0}^{\infty} \frac{1}{3 \cdot 2^v}$ συγκλίνει, διότι : $\frac{1}{3 \cdot 2^v} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2^v}$, ἐπὶ πλέον δὲ ἡ $\sum_{v=0}^{\infty} \frac{1}{2^v}$ συγκλίνει καὶ μάλιστα, ώς ἐδείχθη εἰς τὸ παράδειγμα 1 § 178 ισχύει $\sum_{v=0}^{\infty} \frac{1}{2^v} = 2$,

$$\text{δην : } \sum_{v=0}^{\infty} \frac{1}{3 \cdot 2^v} = \frac{1}{3} \sum_{v=0}^{\infty} \frac{1}{2^v} = \frac{1}{3} \cdot 2 = \frac{2}{3}.$$

§ 184. Ιδιότης IV. — Έαν ἡ σειρὰ $\sum_{v=1}^{\infty} \alpha_v$ συγκλίνῃ (ἐν \mathbb{R}), τότε :

α'). ἡ ἀκολουθία σ_v , $v = 1, 2, \dots$ τῶν μερικῶν ἀθροισμάτων είναι φραγμένη,
β'). ἡ ἀκολουθία α_v , $v = 1, 2, \dots$ είναι μηδενική.

*Απόδειξις. α'). Έαν $\sum_{v=1}^{\infty} \alpha_v = \alpha$, τότε $\lim \sigma_v = \alpha$ καὶ ἡ ἀκολουθία σ_v , $v = 1, 2, \dots$

ώς συγκλίνουσα είναι φραγμένη (βλ. § 138).

β'). Διὰ νὰ ἀποδεῖξωμεν τὸ δεύτερον συμπέρασμα, παρατηροῦμεν διτὶ :

$$\alpha_v = \sigma_v - \sigma_{v-1} \quad \text{διὰ κάθε } v = 2, 3, \dots$$

Έκ ταύτης ἔχομεν : $\lim \alpha_v = \lim (\sigma_v - \sigma_{v-1}) = \lim \sigma_v - \lim \sigma_{v-1} = \alpha - \alpha = 0$. Αἱ συνθῆκαι (α) καὶ (β) τῆς ἀνωτέρω ἴδιότητος εἶναι ἀναγκαῖαι, ἀλλ' οὐχὶ καὶ ἵκαναι. Οὕτως ὑπάρχουν μὴ συγκλίνουσαι σειραὶ διὰ τὰς ὅποιας ἡ (α) ἢ ἡ (β) ἰσχεῖ : Π.χ. ἡ σειρά : $\sum_{v=0}^{\infty} (-1)^v$ ἀποκλίνει (βλ. § 178), ἐν τούτοις ὅμως ἡ ἀκολουθία τῶν μερικῶν ἀθροισμάτων της εἶναι φραγμένη.

Ἐπίσης ἡ ἀρμονικὴ σειρὰ $\sum_{v=1}^{\infty} \frac{1}{v}$ ἀπειρίζεται θετικῶς, ἐν τούτοις ἡ ἀκολουθία $\alpha_v = \frac{1}{v}$, $v = 1, 2, \dots$ εἶναι μηδενική.

Πόρισμα.— Ἐστω α_v , $v = 1, 2, \dots$ μία ἀκολουθία πραγματικῶν ἀριθμῶν μὲν $\lim \alpha_v \neq 0$, τότε ἡ σειρὰ $\sum_{v=1}^{\infty} \alpha_v$ δὲν συγκλίνει ἐν \mathbf{R} .

Παράδειγμα : Ἡ σειρὰ $\sum_{v=1}^{\infty} \frac{2v+1}{3v+5}$ δὲν συγκλίνει πρὸς πραγματικὸν ἀριθμόν, διότι :

$$\lim \frac{2v+1}{3v+5} = \frac{2}{3} \neq 0.$$

Συμπέρασμα : Θά προχωρῶμεν εἰς τὴν μελέτην μᾶς σειρᾶς ὡς πρὸς τὴν σύγκλισιν, μόνον ἐφ' ὅσον διεγείρεται της ὁρος συγκλίνει εἰς τὸ μηδέν.

§ 185. Ἰδιότης V.— Ἐὰν ἡ σειρὰ $\sum_{v=1}^{\infty} a_v$ συγκλίνῃ καὶ ἡ $\sum_{v=1}^{\infty} \beta_v$ δὲν συγκλίνῃ ἐν \mathbf{R} , τότε ἡ σειρὰ $\sum_{v=1}^{\infty} (a_v + \beta_v)$ δὲν συγκλίνει ἐν \mathbf{R} .

Ἀπόδειξις : Ἐπειδὴ $\beta_v = (\alpha_v + \beta_v) - \alpha_v$ καὶ ἡ $\sum_{v=1}^{\infty} \alpha_v$ συγκλίνει, κατὰ τὴν ἴδιότητα III ἡ σύγκλισις τῆς $\sum_{v=1}^{\infty} (\alpha_v + \beta_v)$ συνεπάγεται τὴν σύγκλισιν τῆς $\sum_{v=1}^{\infty} \beta_v$.

Ἀποκλείεται συνεπῶς ἡ σύγκλισις τῆς $\sum_{v=1}^{\infty} (\alpha_v + \beta_v)$, ἐφ' ὅσον ἔξ $\sum_{v=1}^{\infty} \beta_v$ δὲν συγκλίνει ἐν \mathbf{R} .

Παράδειγμα : Ἡ σειρὰ $\sum_{v=1}^{\infty} \left(\frac{1}{v} + \frac{1}{2^v} \right)$ δὲν συγκλίνει (ἐν \mathbf{R}), διότι ἡ σειρὰ $\sum_{v=1}^{\infty} \frac{1}{v}$ ἀπειρίζεται θετικῶς καὶ ἡ σειρὰ $\sum_{v=1}^{\infty} \frac{1}{2^v}$ συγκλίνει.

Παρατήρησις : Ἐὰν αἱ σειραὶ $\sum_{v=1}^{\infty} \alpha_v$ καὶ $\sum_{v=1}^{\infty} \beta_v$ ἀμφότεραι δὲν συγκλίνουν ἐν \mathbf{R} , τότε ἡ σειρὰ $\sum_{v=1}^{\infty} (\alpha_v + \beta_v)$ δυνατὸν νὰ συγκλίνῃ, δυνατὸν ὅμως καὶ νὰ μὴν συγκλίνῃ ἐν \mathbf{R} .

Παράδειγμα: Έὰν $\alpha_v = \beta_v = 1 \quad \forall v \in \mathbb{N}$, τότε ή $\sum_{v=1}^{\infty} (\alpha_v + \beta_v) = +\infty$,
έὰν διμος $\alpha_v = 1$ καὶ $\beta_v = -1 \quad \forall v \in \mathbb{N}$, τότε ή $\sum_{v=1}^{\infty} (\alpha_v + \beta_v)$ συγκλίνει.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

397. Ποῖαι σειραὶ μὲ γενικοὺς ὄρους τοὺς κάτωθι εἰναι συγκλίνουσαι καὶ ποῖαι δχι:

$$1). \alpha_v = \left(1 + \frac{1}{v}\right)^{-v}, \quad 2). \alpha_v = \frac{1}{v}, \quad 3). \alpha_v = \frac{\sqrt{v+1} - \sqrt{v}}{v}.$$

398. Έὰν $\alpha_v, v = 1, 2, \dots$ καὶ $\beta_v, v = 1, 2, \dots$ εἰναι δύο ἀκολουθίαι τοιαῦται, ώστε:

$$\alpha_v = \beta_v - \beta_{v+1} \quad \forall v = 1, 2, \dots$$

τότε ή σειρὰ $\sum_{v=1}^{\infty} \alpha_v$ συγκλίνει, έὰν, καὶ μόνον έὰν, ή ἀκολουθία $\beta_v, v = 1, 2, \dots$ συγκλίνῃ. Εἰς
τὴν περίπτωσιν αὐτὴν ἔχομεν:

$$\sum_{v=1}^{\infty} \alpha_v = \beta_1 - l, \text{ ὅπου } l = \lim \beta_v.$$

('Υπόδειξις: $\sigma_v \equiv \sum_{k=1}^v \alpha_k = \sum_{k=1}^v (\beta_k - \beta_{k+1}) = \beta_1 - \beta_{v+1}$ κ.τ.λ.).

399. Δεῖξατε δτι:

$$\sum_{v=1}^{\infty} \frac{1}{v^2 + v} = 1$$

('Υπόδειξις Παρατηρήσατε δτι: $\alpha_v = \frac{1}{v^2 + v} = \frac{1}{v(v+1)} = \frac{1}{v} - \frac{1}{v+1} \equiv \beta_v - \beta_{v+1}$

καὶ ἀκολούθως λάβετε ύπ' ὅψιν τὸ συμπέρασματῆς προηγουμένης ἀσκῆσεως).

§ 186. Σειραὶ μὲ θετικοὺς ὄρους.— Εἰς τὴν παράγραφον ταύτην θὰ θεωρήσωμεν σειρὰς μὲ ὄρους θετικούς, δηλ. σειρὰς αἱ ὅποιαι προκύπτουν ἐξ ἀκολουθῶν $\alpha_v, v = 1, 2, \dots$, ὅπου $\alpha_v \geq 0$ διὰ κάθε $v = 1, 2, \dots$ Τότε ή ἀκολουθία τῶν μερικῶν ἀθροισμάτων $\sigma_v \equiv \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_v, v = 1, 2, \dots$ εἰναι πάντοτε αὔξουσα καὶ ἐπομένως ή σειρά: α') συγκλίνει πρὸς πραγματικὸν ὀριθμὸν τότε, καὶ μόνον τότε, ἢν ή ἀκολουθία $\sigma_v, v = 1, 2, \dots$ εἰναι φραγμένη, β') ἀπειρίζεται θετικῶς τότε, καὶ μόνον τότε, ἢν ή ἀκολουθία $\sigma_v, v = 1, 2, \dots$ δὲν εἰναι φραγμένη.

'Αποδεικνύμεν κατωτέρω μίαν βασικὴν πρότασιν, δυνάμει τῆς ὅποιας δυνάμεθα νὰ ἔχακριβώνωμεν εἰς πολλὰς περιπτώσεις, έὰν μία σειρὰ μὲ θετικοὺς ὄρους συγκλίνῃ ή ἀπειρίζεται θετικῶς συγκρίνοντες αὐτὴν πρὸς μίαν ἄλλην γνωστὴν σειράν, δι' ὃ καὶ ή πρότασις αὕτη καλεῖται «κριτήριον συγκρίσεως σειρῶν».

§ 187. Κριτήριον συγκρίσεως.— Έὰν $\sum_{v=1}^{\infty} \alpha_v$ καὶ $\sum_{v=1}^{\infty} \beta_v$ εἰναι δύο σειραι τοιαῦται, ώστε :

$$0 \leq \alpha_v \leq \beta_v, \quad \text{διὰ κάθε } v = 1, 2, \dots$$

Τότε : (1) Έὰν $\sum_{v=1}^{\infty} \beta_v$ συγκλίνῃ, τότε καὶ ή $\sum_{v=1}^{\infty} \alpha_v$ συγκλίνει.

(2) Έὰν $\sum_{v=1}^{\infty} \alpha_v$ ἀπειρίζεται θετικῶς, τότε καὶ ή $\sum_{v=1}^{\infty} \beta_v$ ἀπειρίζεται θετικῶς.

Απόδειξις της (1). "Εστωσαν s_v , $v = 1, 2, \dots$ και t_v , $v = 1, 2, \dots$ αι άκολουθίαι τῶν μερικῶν άθροισμάτων τῶν $\sum_{v=1}^{\infty} \alpha_v$ και $\sum_{v=1}^{\infty} \beta_v$ ἀντιστοίχως.

Λόγω τῆς ύποθέσεως $\alpha_v \leq \beta_v$ διὰ κάθε $v = 1, 2, \dots$ έχομεν, ὅτι :

$$s_v = \alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_v \leq \beta_1 + \beta_2 + \cdots + \beta_v \equiv t_v. \quad (1)$$

'Εφ' ὅσον ἡ σειρὰ $\sum_{v=1}^{\infty} \beta_v$ συγκλίνει, ἡ άκολουθία t_v , $v = 1, 2, \dots$ εἶναι φραγμένη

(βλ. § 184), τότε ὅμως, ὡς εὐκόλως φαίνεται ἐκ τῆς (1), και ἡ s_v , $v = 1, 2, \dots$ εἶναι φραγμένη ἀνωθεν και ἐπειδὴ $\alpha_v \geq 0 \quad \forall v = 1, 2, \dots$, ἡ άκολουθία s_v , $v = 1, 2, \dots$ εἶναι αὔξουσα και φραγμένη, ἅρα συγκλίνει ἐν \mathbf{R} . Τότε, συμφώνως πρὸς τὸν δρισμὸν συγκλίσεως σειρᾶς, και ἡ $\sum_{v=1}^{\infty} \alpha_v$ συγκλίνει.

Εἰς τὴν περίπτωσιν αύτὴν έχομεν : $\sum_{v=1}^{\infty} \alpha_v \leq \sum_{v=1}^{\infty} \beta_v$.

Απόδειξις της (2). "Ας ύποθέσωμεν ὅτι ἡ $\sum_{v=1}^{\infty} \beta_v$ συγκλίνει. Τότε, συμφώνως πρὸς τὴν (1), ἡ σειρὰ $\sum_{v=1}^{\infty} \alpha_v$ συγκλίνει, ἀτοπον, διότι ἐξ ύποθέσεως ἡ $\sum_{v=1}^{\infty} \alpha_v$ ἀπειρίζεται θετικῶς. Ἐφαρ ἡ $\sum_{v=1}^{\infty} \beta_v$ ὡς σειρὰ θετικῶν δρῶν και μὴ συγκλίνουσα ἐν \mathbf{R} ἀπειρίζεται θετικῶς.

'Εφαρμογὴ Ιη : 'Η σειρὰ $\sum_{v=1}^{\infty} \frac{v}{2^v(v+1)}$ συγκλίνει, διότι : $\frac{v}{2^v(v+1)} < \frac{1}{2^v}$, $v = 1, 2, \dots$ και ἡ σειρὰ $\sum_{v=1}^{\infty} \frac{1}{2^v}$ συγκλίνει, ὡς ἐδείχθη εἰς τὸ παράδειγμα 1 τῆς § 178.

'Εφαρμογὴ Ιι : 'Η σειρὰ $\sum_{v=1}^{\infty} \frac{1}{v^p}$ ἀπειρίζεται θετικῶς διὰ $p \in \mathbf{R}$ μὲν $p \leq 1$.

Πράγματι, ἐὰν $p \leq 1$, τότε $v^p \leq v \quad \forall v \in \mathbf{N}$. "Οθεν $\frac{1}{v} \leq \frac{1}{v^p}$, $v = 1, 2, \dots$ 'Αλλὰ ἡ

ἀρμονικὴ σειρὰ $\sum_{v=1}^{\infty} \frac{1}{v}$ ἀπειρίζεται θετικῶς και κατὰ συνέπειαν και ἡ σειρὰ $\sum_{v=1}^{\infty} \frac{1}{v^p}$, $p \leq 1$, ἀπειρίζεται θετικῶς, συμφώνως πρὸς τὸ δεύτερον συμπέρασμα τοῦ κριτηρίου συγκρίσεως σειρῶν.

Οὕτω διὰ $p = \frac{1}{2} < 1$ έχομεν ὅτι :

$$\sum_{v=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{v}} \equiv 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{v}} + \cdots = + \infty.$$

'Εφαρμογὴ Ιιι : 'Η σειρὰ $\sum_{v=1}^{\infty} \frac{1}{v^p}$ συγκλίνει διὰ $p \in \mathbf{R}$ μὲν $p > 1$.

Πράγματι, αὐτὴ γράφεται :

$$\begin{aligned} \frac{1}{1^p} + \left(\frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} \right) + \left(\frac{1}{4^p} + \frac{1}{5^p} + \frac{1}{6^p} + \frac{1}{7^p} \right) + \left(\frac{1}{8^p} + \frac{1}{9^p} + \cdots + \frac{1}{15^p} \right) + \\ + \left(\frac{1}{16^p} + \frac{1}{17^p} + \cdots + \frac{1}{31^p} \right) + \cdots \end{aligned} \quad (1)$$

Έπειδή είναι :

$$\frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} < \frac{1}{2^p} + \frac{1}{2^p} = \frac{2}{2^p} = \frac{1}{2^{p-1}},$$

$$\frac{1}{4^p} + \frac{1}{5^p} + \frac{1}{6^p} + \frac{1}{7^p} < \frac{1}{4^p} + \frac{1}{4^p} + \frac{1}{4^p} + \frac{1}{4^p} = \frac{4}{4^p} = \frac{1}{4^{p-1}} = \frac{1}{2^{2p-2}},$$

$$\frac{1}{8^p} + \frac{1}{9^p} + \dots + \frac{1}{15^p} < \frac{1}{8^p} + \frac{1}{8^p} + \dots + \frac{1}{8^p} = \frac{8}{8^p} = \frac{1}{8^{p-1}} = \frac{1}{2^{3p-3}}, \dots$$

έπειτα διτι οι δροι της σειράς (1), (ήτοι αι παρενθέσεις) είναι μικρότεροι τῶν ἀντιστοίχων δρων τῆς σειρᾶς :

$$\frac{1}{1^p} + \frac{1}{2^{p-1}} + \frac{1}{2^{2p-2}} + \frac{1}{2^{3p-3}} + \dots \quad (2)$$

Η σειρά (2), έπειδή είναι $\frac{1}{2^{p-1}} < 1$, συγκλίνει (διατί;). Τότε όμως, συμφώνως πρός τὸ πρῶτον συμπέρασμα τοῦ κριτήριου συγκρίσεως, θὰ συγκλίνῃ καὶ ἡ (1).

Ωστε, διὰ $p \in \mathbb{R}$, $p > 1$ η σειρά $\sum_{v=1}^{\infty} \frac{1}{v^p}$ συγκλίνει (ἐν \mathbb{R}).

Παρατήρησις : Η σειρά $\sum_{v=1}^{\infty} \frac{1}{v^p}$, δηπου p τυχών πραγματικός ἀριθμός, καλεῖται ἀρμονικὴ σειρά p -τάξεως καὶ ὡς ἔδειχθη εἰς τὰς ἐφαρμογάς 2 καὶ 3 Ισχύει :

$$\boxed{\sum_{v=1}^{\infty} \frac{1}{v^p} = \begin{cases} +\infty, & \text{ἄν } p \leq 1 \\ \text{συγκλίνει,} & \text{ἄν } p > 1. \end{cases}}$$

Διὰ $p = 1$ ἔχομεν τὴν ἀρμονικὴν σειρὰν $\sum_{v=1}^{\infty} \frac{1}{v}$ (βλ. πρδ. 4, § 179).

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

400. Νὰ εύρεθῇ ποῖαι ἑκ τῶν κατωτέρω σειρῶν είναι συγκλίνουσαι καὶ ποῖαι δχι :

$$\begin{array}{lll} 1. \quad \sum_{v=1}^{\infty} \frac{v^2 + 1}{v^4}, & 2. \quad \sum_{v=1}^{\infty} \frac{v + 1}{2v}, & 3. \quad \sum_{v=1}^{\infty} \frac{v^2 - 3v + 2}{v^4}, \\ 4. \quad \sum_{v=1}^{\infty} \frac{v - 1}{v^2}, & 5. \quad \sum_{v=1}^{\infty} \frac{\sqrt{v} + 1}{v^3}, & 6. \quad \sum_{v=2}^{\infty} \frac{\sqrt{v}}{v + \sqrt{v}}. \end{array}$$

401. Αποδείξατε διτι : 'Εάν $\sum_{v=1}^{\infty} \alpha_v$ καὶ $\sum_{v=1}^{\infty} \beta_v$ είναι δύο σειραὶ θετικῶν δρων καὶ

$$\lim \frac{\alpha_v}{\beta_v} = A,$$

ὅπου $A > 0$, τότε ἡ καὶ αἱ δύο σειραι είναι συγκλίνουσαι ἡ καὶ αἱ δύο δχι.

(Υπόδειξις : Δείξατε διτι : $\frac{1}{2} A \leq \frac{\alpha_v}{\beta_v} \leq \frac{3}{2} A$ τελικῶς διὰ κάθε $v \in \mathbb{N}$).

402. Στηριζόμενοι εἰς τὸ συμπέρασμα τῆς ἀνωτέρω ἀσκήσεως ἔχετάσατε ὡς πρὸς τὴν σύγκλισιν τὰς ἀκολούθους σειράς :

$$1) \quad \sum_{v=1}^{\infty} \frac{1}{v^2 - 2v - 1} \quad \left(\text{Υπόδειξις : Θεωρήσατε ὡς } \beta_v = \frac{1}{v^2} \right)$$

$$2) \quad \sum_{v=1}^{\infty} \frac{v + 3}{2v^2 - 1}, \quad 3) \quad \sum_{v=1}^{\infty} \frac{2v + 2}{2v^3 + v^2 - 1}, \quad 4) \quad \sum_{v=1}^{\infty} \frac{3v - 1}{v^4 + 1}.$$

§ 188. Σειραὶ ἀπολύτως συγκλίνουσαι.—Θά λέγωμεν ὅτι:

Ἡ σειρὰ $\sum_{v=1}^{\infty} \alpha_v$ συγκλίνει ἀπολύτως τότε, καὶ μόνον τότε, ἂν ἡ σειρὰ $\sum_{v=1}^{\infty} |\alpha_v|$ τῶν ἀπολύτων τιμῶν τῶν ὄρων της, δηλαδὴ ἡ :

$$|\alpha_1| + |\alpha_2| + \cdots + |\alpha_v| + \cdots$$

συγκλίνῃ πρὸς πεπερασμένον ἀριθμόν.

Εἶναι φανερὸν ὅτι, ἐὰν $\alpha_v \geqq 0 \quad \forall v = 1, 2, \dots$, τότε $|\alpha_v| = \alpha_v$ καὶ ἡ σειρὰ $\sum_{v=1}^{\infty} \alpha_v$ συγκλίνει, ἐάν, καὶ μόνον ἐάν, συγκλίνῃ ἀπολύτως. Ἐάν δημοσίευτοι ἔχει τῶν ὄρων α_v εἴναι θετικοὶ καὶ μερικοὶ ἀρνητικοὶ, τότε ἀπλῆ σύγκλισις καὶ ἀπόλυτος σύγκλισις δὲν εἴναι τὸ αὐτό.

Ἄκριβέστερον ἴσχυει τὸ κάτωθι θεώρημα :

§ 189. Θεώρημα : Ἐάν μία σειρὰ $\sum_{v=1}^{\infty} \alpha_v$ συγκλίνῃ ἀπολύτως, τότε αὕτη συγκλίνει καὶ ἀπλῶς. Τὸ ἀντίστροφον δὲν ἴσχυει πάντοτε.

Ἄποδειξις : Ἐστω ὅτι ἡ $\sum_{v=1}^{\infty} \alpha_v$ συγκλίνει ἀπολύτως.

Θέτομεν :

$$\beta_v = |\alpha_v| - \alpha_v \quad \text{διὰ κάθε } v = 1, 2, \dots$$

Τότε ἔχομεν :

$$0 \leqq \beta_v = |\alpha_v| - \alpha_v \leqq |\alpha_v| + |\alpha_v| \leqq 2 \cdot |\alpha_v| \quad \forall v = 1, 2, \dots \quad (1)$$

Ἔχομεν δεχθῆ ὅτι ἡ σειρὰ $\sum_{v=1}^{\infty} |\alpha_v|$ συγκλίνει. Τότε δημοσίευτος ἔχει τῆς (1) προκύπτει,

συμφώνως πρὸς τὸ γνωστὸν κριτήριον συγκρίσεως, ὅτι καὶ ἡ $\sum_{v=1}^{\infty} \beta_v$ συγκλίνει.

Κατὰ συνέπειαν καὶ ἡ $\sum_{v=1}^{\infty} \alpha_v$ συγκλίνει, διότι ἐκ τῆς $\beta_v = |\alpha_v| - \alpha_v$ ἔχομεν :

$$\alpha_v = |\alpha_v| - \beta_v, \quad v = 1, 2, \dots \quad \text{καὶ αἱ σειραὶ } \sum_{v=1}^{\infty} |\alpha_v|, \sum_{v=1}^{\infty} \beta_v, \text{ συγκλίνουν.}$$

Παράδειγμα : Ἡ σειρὰ $\sum_{v=1}^{\infty} \frac{(-1)^v}{v^2} \equiv -1 + \frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} - \frac{1}{5^2} + \cdots$ συγκλίνει.

Πράγματι, ἔχομεν :

$$\left| \frac{(-1)^v}{v^2} \right| = \frac{1}{v^2}, \quad v = 1, 2, \dots$$

Ἄλλὰ ἡ $\sum_{v=1}^{\infty} \frac{1}{v^2}$ συγκλίνει, ὅθεν καὶ ἡ $\sum_{v=1}^{\infty} \frac{(-1)^v}{v^2}$ συγκλίνει ἀπολύτως, ὅπότε, κατὰ τὸ ἀνωτέρω θεώρημα, αὕτη συγκλίνει καὶ ἀπλῶς.

Παρατηρήσεις: α'). Ἐάν ἡ $\sum_{v=1}^{\infty} \alpha_v$ συγκλίνῃ ἀπολύτως, τότε αὕτη συγκλίνει καὶ ἴσχυει :

$$\left| \sum_{v=1}^{\infty} \alpha_v \right| \leqq \sum_{v=1}^{\infty} |\alpha_v|.$$

β'). Τὸ ἀντίστροφον τοῦ ἀνωτέρῳ θεωρήματος δὲν ἀληθεύει πάντοτε. Δηλαδὴ, δυνατὸν μία σειρὰ νὰ συγκλίνῃ, ἐνῷ δὲ σειρὰ τῶν ἀπολύτων τιμῶν τῶν ὄρων τῆς νὰ μήν συγκλίνῃ.

Συμπέρασμα. Ἡ ἔννοια ὅτεν τῆς ἀπολύτου συγκλίσεως εἶναι «ἰσχυροτέρα» τῆς ἔννοιας τῆς ἀπλῆς συγκλίσεως.

Παράδειγμα 2ον : Δεῖξατε ὅτι ή σειρὰ $\sum_{v=1}^{\infty} \frac{\eta \mu v}{2^v}$ συγκλίνει.

Πράγματι, ἔχομεν :

$$\left| \frac{\eta \mu v}{2^v} \right| \leq \frac{1}{2^v} \quad \forall v \in \mathbb{N}.$$

Αλλά, ως ἔδειχθη εἰς τὸ παρδ. 1 § 178, ή σειρὰ $\sum_{v=1}^{\infty} \frac{1}{2^v}$ συγκλίνει, ὅτεν καὶ ή $\sum_{v=1}^{\infty} \left| \frac{\eta \mu v}{2^v} \right|$ συγκλίνει, δηλαδὴ ή $\sum_{v=1}^{\infty} \frac{\eta \mu v}{2^v}$ συγκλίνει ἀπολύτως. Τότε ὅμως αὕτη θὰ συγκλίνῃ καὶ ἀπλῶς.

A S K H S E I S

403. Ποῖαι ἑκ τῶν ἀκολούθων σειρῶν εἶναι ἀπολύτως συγκλίνουσαι; Ποῖαι εἶναι συγκλίνουσαι; Ποῖαι δὲν συγκλίνουν ἐν \mathbb{R} ;

1. $\sum_{v=1}^{\infty} (-1)^v \cdot \frac{v-2}{v^3+1}$,
2. $\sum_{v=1}^{\infty} (-1)^v \cdot \frac{1}{(2v)^z}$,
3. $\sum_{v=1}^{\infty} \frac{\sigma vv v}{1+v^z}$,
4. $\sum_{v=1}^{\infty} (-1)^v \cdot \eta \mu (v^{-\frac{3}{2}})$,
5. $\sum_{v=1}^{\infty} (-1)^v \cdot \frac{v}{v+1}$,
6. $\sum_{v=1}^{\infty} \frac{(-1)^v}{v^v}$.

404. Εάν $\sum_{v=1}^{\infty} |\alpha_v|$ συγκλίνῃ, δεῖξατε ὅτι καὶ ή σειρὰ $\sum_{v=1}^{\infty} \alpha_v^2$ συγκλίνει. Δώσατε ἀκολούθως ἐν παράδειγμα ἑκ τοῦ ὅποιους νὰ ἐμφαίνηται ὅτι δὲν ἴσχει πάντοτε τὸ ἀντίστροφον.

405. Εστω $\sum_{v=1}^{\infty} |\alpha_v| = \alpha$ καὶ $\sum_{v=1}^{\infty} \alpha_v^2 = \beta$, $\alpha_v > 0 \quad \forall v = 1, 2, \dots$, δεῖξατε ὅτι : $\alpha^2 > \beta$.

§ 190. Παράστασις πραγματικῶν ἀριθμῶν μὲ δεκαδικὰς σειράς.

Εστω ή ἀκολουθία $\alpha_v = \frac{\psi_v}{10^v}$, $v = 0, 1, 2, \dots$, ἔκτενῶς ή :

$$\psi_0, \frac{\psi_1}{10}, \frac{\psi_2}{10^2}, \frac{\psi_3}{10^3}, \dots, \frac{\psi_v}{10^v}, \dots$$

ὅπου ψ_0 εἶναι ἀκέραιος ἀριθμὸς καὶ $\psi_1, \psi_2, \psi_3, \dots, \psi_v, \dots$ εἶναι ψηφία, δηλαδὴ ἀκέραιοι ἀριθμοὶ μέ :

$$0 \leq \psi_v \leq 9 \quad \forall v \in \mathbb{N}.$$

Θεωρήσωμεν τὴν ἀντίστοιχον σειράν $\sum_{v=0}^{\infty} \alpha_v$, ἥτοι τὴν :

$$\sum_{v=0}^{\infty} \frac{\psi_v}{10^v} \equiv \psi_0 + \frac{\psi_1}{10} + \frac{\psi_2}{10^2} + \dots + \frac{\psi_v}{10^v} + \dots \quad (1)$$

τὴν δποίαν καλοῦμεν «δεκαδικὴν σειρὰν» ή καὶ ἄλλως «δεκαδικὸν ἀριθμὸν» μὲ δκέραιον μέρος ψ_0 καὶ ἀπειρα δεκαδικά ψηφία ψ_1, ψ_2, \dots . Ταύτην συμβολίζομεν συντόμως καὶ ὡς ἔξῆς :

$$\psi_0, \psi_1 \psi_2 \psi_3 \dots \psi_v \dots$$

“Ἄσ μελετήσωμεν τώρα, ὡς πρὸς τὴν σύγκλισιν, τὴν δεκαδικὴν σειρὰν (1). Τὸ ἀθροισμα σ, ν τῶν ν πρώτων ὅρων (μερικὸν ἀθροισμα) εἶναι :

$$\sigma_v = \psi_0 + \frac{\psi_1}{10} + \frac{\psi_2}{10^2} + \dots + \frac{\psi_{v-1}}{10^{v-1}}, \quad v = 1, 2, \dots, \quad (2)$$

ἄναλυτικώτερον ἔχομεν :

$$\sigma_1 = \psi_0, \quad \sigma_2 = \psi_0 + \frac{\psi_1}{10}, \quad \sigma_3 = \psi_0 + \frac{\psi_1}{10} + \frac{\psi_2}{10^2}, \quad \text{καὶ γενικῶς}$$

$$\sigma_{v+1} = \psi_0 + \frac{\psi_1}{10} + \dots + \frac{\psi_{v-1}}{10^{v-1}} + \frac{\psi_v}{10^v}, \dots$$

Παρατηροῦμεν ὅτι :

$$\psi_0 \leq \psi_0 + \frac{\psi_1}{10} \leq \psi_0 + \frac{\psi_1}{10} + \frac{\psi_2}{10^2} \leq \dots$$

δηλαδὴ ίσχύει :

$$\sigma_v \leq \sigma_{v+1} \quad \text{καὶ τοῦτο-διὰ κάθε } v = 1, 2, 3, \dots,$$

ἥτοι ἡ ἀκολουθία (2) εἶναι αὔξουσα. Ἐπὶ πλέον, ἐπειδὴ

$$\frac{\psi_1}{10} + \frac{\psi_2}{10^2} + \dots + \frac{\psi_v}{10^v} < 1 \quad \forall v \in \mathbb{N} \quad (\text{διατί;})$$

ἡ ἀκολουθία (2) εἶναι φραγμένη πρὸς τὰ ἄνω μὲ ἄνω φράγμα τὸν ἀκέραιον ἀριθμὸν $\psi_0 + 1$. Ἐπομένως, κατὰ τὸ ἀξίωμα τῆς § 150, Κεφ. V, ἡ ἀκολουθία (2), ὡς αὔξουσα καὶ φραγμένη συγκλίνει πρὸς ἓνα πραγματικὸν ἀριθμὸν $\xi \leq \psi_0 + 1$, ἥτοι : $\lim \sigma_v = \xi$. Τότε ὅμως καὶ ἡ δεκαδικὴ σειρὰ (1) συγκλίνει, ἐξ ὁρισμοῦ, καὶ ίσχύει :

$$\sum_{v=0}^{\infty} \frac{\psi_v}{10^v} \equiv \psi_0 + \frac{\psi_1}{10} + \frac{\psi_2}{10^2} + \dots + \frac{\psi_v}{10^v} + \dots \equiv \psi_0, \psi_1 \psi_2 \dots \psi_v \dots = \\ = \lim \sigma_v = \xi.$$

Ἐδείχθη ὅτεν τὸ ἔξῆς :

§ 191. Θεώρημα.— Μία δεκαδικὴ σειρὰ $\sum_{v=0}^{\infty} \frac{\psi_v}{10^v} \equiv \psi_0, \psi_1 \psi_2 \dots \psi_v \dots$ συγκλίνει πάντοτε καὶ ὁρίζει ἀκριβῶς ἔνα πραγματικὸν ἀριθμὸν ξ .

Δίδομεν τώρα τὸν κάτωθι ὁρισμόν :

§ 192. Ὁρισμός.— Θὰ λέγωμεν ὅτι ὁ πραγματικὸς ἀριθμὸς ξ παρίσταται ὡς μία δεκαδικὴ σειρὰ ἢ ἔχει δεκαδικὸν ἀνάπτυγμα $\psi_0, \psi_1 \psi_2 \dots \psi_v \dots$ τότε, καὶ μόνον τότε, ἂν ὑπάρχῃ μία δεκαδικὴ σειρὰ $\sum_{v=0}^{\infty} \frac{\psi_v}{10^v}$ τοιαύτη, ὥστε νὰ ίσχύῃ :

$$\xi = \psi_0, \psi_1 \psi_2 \dots \psi_v \dots \equiv \psi_0 + \frac{\psi_1}{10} + \frac{\psi_2}{10^2} + \dots + \frac{\psi_v}{10^v} + \dots$$

Σημ. Τὸ ψ₀ καλεῖται τὸ «ἀκέραιον μέρος», τὰ δὲ ψ₁, ψ₂... τὰ «δεκαδικὰ ψηφία» τοῦ ἀναπτύγματος.

Αποδεικνύεται εἰς τὰ μαθηματικὰ τὸ κάτωθι βασικὸν θεώρημα:

§ 193. Θεώρημα παραστάσεως πραγματικοῦ ἀριθμοῦ διὰ δεκαδικῆς σειρᾶς.— Διὰ κάθε πραγματικὸν ἀριθμὸν ξ ὑπάρχει ἀκριβῶς μία παραστασίς αὐτοῦ διὰ δεκαδικῆς σειρᾶς, ἡτοι :

$$\xi = \psi_0, \psi_1 \psi_2 \dots \psi_v \dots \equiv \sum_{v=0}^{\infty} \frac{\psi_v}{10^v},$$

εἰς τὴν ὥποιαν τὰ δεκαδικὰ ψηφία δὲν εἶναι ὅλα ἐννέα, ἀπό τινος θέσεως καὶ πέραν.

Οὕτω, π.χ.

$$\begin{array}{c|c} \frac{1}{3} = 0,333\dots & \frac{1}{2} = 0,5000\dots \\ 3,27 = 3,27000\dots & \sqrt{2} = 1,414213564\dots \\ \frac{29}{4} = 7 + \frac{2}{10} + \frac{5}{10^2} + \frac{0}{10^3} + \dots = 7,2500\dots & \end{array}$$

Παρατήρησις : Διὰ τὸ 3,27 ἀντιστοίχως τὸ 1/2 ὑπάρχουν καὶ αἱ παραστάσεις $3,27 = 3,269999\dots$ ἀντιστοίχως $1/2 = 0,4999\dots$

Αὗται ὅμως ἀποκλείονται, διότι ἐπαναλαμβάνεται ἀπό τίνος θέσεως καὶ πέραν τὸ ψηφίον 9.

Ἐφαρμογή : Νὰ εὑρεθῇ τὸ δεκαδικὸν ἀνάπτυγμα τοῦ ἀριθμοῦ 7/11.

Λύσις : "Εστω δὲτι εἶναι: $\frac{7}{11} = \psi_0 + \frac{\psi_1}{10} + \frac{\psi_2}{10^2} + \frac{\psi_3}{10^3} + \dots$ " (1)

Ἡ (1) γράφεται καὶ οὕτω:

$$0 + \frac{7}{11} = \psi_0 + \frac{\psi_1}{10} + \frac{\psi_2}{10^2} + \frac{\psi_3}{10^3} + \dots$$

ἄρα $\psi_0 = 0$ καὶ ἐπομένως:

$$\frac{7}{11} = \frac{\psi_1}{10} + \frac{\psi_2}{10^2} + \frac{\psi_3}{10^3} + \dots + \frac{\psi_v}{10^v} + \dots \quad (2)$$

Ἐκ τῆς (2) προκύπτει:

$$\frac{70}{11} = \psi_1 + \frac{\psi_2}{10} + \frac{\psi_3}{10^2} + \dots + \frac{\psi_v}{10^{v-1}} + \dots$$

ἢ $6 + \frac{4}{11} = \psi_1 + \frac{\psi_2}{10} + \frac{\psi_3}{10^2} + \dots$

ἄρα $\psi_1 = 6$ καὶ ἐπομένως:

$$\frac{4}{11} = \frac{\psi_2}{10} + \frac{\psi_3}{10^2} + \frac{\psi_4}{10^3} + \dots \quad (3)$$

Ἐκ τῆς (3) προκύπτει:

$$\frac{40}{11} = \psi_2 + \frac{\psi_3}{10} + \frac{\psi_4}{10^2} + \dots$$

ἢ $3 + \frac{7}{11} = \psi_2 + \frac{\psi_3}{10} + \frac{\psi_4}{10^2} + \dots$

ἄρα $\psi_2 = 3$ κ.ο.κ.

Οὕτω τελικῶς θὰ ἔχωμεν:

$$\frac{7}{11} = \psi_0, \psi_1 \psi_2 \psi_3 \dots = 0,6363\dots$$

* § 194. Γινόμενα πραγματικῶν ἀριθμῶν μὲ πεπερασμένους τὸ πλῆθος παράγοντας.— Πολλάκις παρουσιάζονται γινόμενα τῆς μορφῆς :

$$\alpha_1 \cdot \alpha_2 \cdot \alpha_3 \cdots \alpha_v.$$

Διὰ τὴν συντομωτέραν γραφήν χρησιμοποιοῦμεν τὸ ἔλληνικὸν γράμμα Π διὰ τὸν συμβολισμὸν τῶν γινομένων τούτων. Γράφομεν :

$$\prod_{k=1}^v \alpha_k \equiv \alpha_1 \cdot \alpha_2 \cdot \alpha_3 \cdots \alpha_v.$$

Τὸ πρῶτον μέλος ἀναγιγνώσκεται : *Γινόμενον τῶν (ἀριθμῶν) α_k ἀπὸ $k = 1$ ἕως $k = v$.* Τὸ σύμβολον Π σημαίνει, ὅτι πρέπει νὰ πολλαπλασιάσωμεν τοὺς ἀριθμούς, τοὺς ὅποιους λαμβάνομεν, θέτοντες διαδοχικῶς $k = 1, k = 2, \dots, k = v$.

*Ἐκ τοῦ δρ̄οισμοῦ τούτου, ἔπειται ὅτι :

$$\alpha'). \quad \prod_{k=1}^v k = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots v, \quad \beta'). \quad \prod_{k=1}^{v+1} \alpha_k = \alpha_{k+1} \cdot \prod_{k=1}^v \alpha_k, \quad \gamma'). \quad \prod_{k=1}^v \alpha = \alpha^v.$$

Εὐκόλως ἀποδεικύονται αἱ κάτωθι ιδιότητες γινομένων :

$$1). \quad \prod_{k=1}^v (\alpha_k \beta_k) = \left(\prod_{k=1}^v \alpha_k \right) \cdot \left(\prod_{k=1}^v \beta_k \right)$$

$$2). \quad \prod_{k=1}^v (\lambda \cdot \alpha_k) = \lambda^v \cdot \prod_{k=1}^v \alpha_k$$

$$3). \quad \prod_{k=1}^v \frac{\alpha_k}{\alpha_{k-1}} = \frac{\alpha_v}{\alpha_0}, \quad \alpha_k \neq 0 \quad \forall \quad k = 0, 1, 2, \dots, v.$$

$$\text{Παράδειγμα : Δείξατε ὅτι : } \prod_{k=2}^v \left(1 - \frac{1}{k} \right) = \frac{1}{v}.$$

Πράγματι εἶναι :

$$\prod_{k=2}^v \left(1 - \frac{1}{k} \right) = \left(1 - \frac{1}{2} \right) \left(1 - \frac{1}{3} \right) \cdots \left(1 - \frac{1}{v} \right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdots \frac{v-1}{v} = \frac{1}{v}.$$

AΣΚΗΣΕΙΣ

$$406. \quad \text{Νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι : } \prod_{k=2}^v \left(1 - \frac{1}{k^2} \right) = \frac{v+1}{2v}.$$

$$407. \quad \text{Νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι : } \lim_{v \rightarrow \infty} \left(\prod_{k=2}^v \left(1 - \frac{1}{k^2} \right) \right) = \frac{1}{2}.$$

408. *Ἐὰν $x \neq 1$, δείξατε ὅτι :

$$\prod_{k=1}^v (1 + x^{2^{k-1}}) = \frac{1 - x^{2^v}}{1 - x}.$$

Ποία εἶναι ἡ τιμὴ τοῦ γινομένου αὐτοῦ ὅταν $x = 1$;

$$409. \quad \text{Νὰ εύρεθῃ τὸ } \lim_{v \rightarrow \infty} \prod_{k=2}^v \frac{v^3 - 1}{v^3 + 1}.$$

$$410. \quad \text{Νὰ ἀποδειχθῇ ἡ ἀνισότης : } \prod_{k=0}^v \left(1 + \frac{1}{2k+1} \right) > (2v+3)^{\frac{1}{2}}.$$

* § 195. Απειρογινόμενα.— "Εστω α_v , $v = 1, 2, \dots$ μία ἀκολουθία πραγματικῶν ἀριθμῶν. Καλούμεν *ἀπειρογινόμενον* μὲ δρους (εἴτε ἄλλως παράγοντας) τοὺς ἀριθμοὺς $\alpha_1, \alpha_2, \dots$ τὴν παράστασιν :

$$\alpha_1 \cdot \alpha_2 \cdots \alpha_v \cdots,$$

δηλαδὴ γινόμενον μὲ ἀπείρους παράγοντας.

"Ἐν τοιοῦτον γινόμενον συμβολίζομεν διὰ τοῦ συμβόλου : $\prod_{v=1}^{\infty} \alpha_v$, ἢτοι :

$$\prod_{v=1}^{\infty} \alpha_v \equiv \alpha_1 \cdot \alpha_2 \cdots \alpha_v \cdots \quad (1)$$

"Ἐκαστὸν γινόμενον

$$\gamma_v = \alpha_1 \cdot \alpha_2 \cdots \alpha_v \equiv \prod_{k=1}^v \alpha_k, \quad v = 1, 2, \dots$$

καλεῖται *μερικὸν γινόμενον* τοῦ ἀπειρογινομένου (1).

Τὰ πρῶτα ἀπειρογινόμενα ἐδόθησαν ὑπὸ τῶν μεγάλων μαθηματικῶν Viète (1646) καὶ Wallis (Οὐώλλις).

"Ἐκ τοῦ ὁρισμοῦ ἐνὸς ἀπειρογινομένου, ἔπειται ὅτι :

$$\prod_{k=1}^{\infty} (1 + \alpha_k) = \prod_{k=1}^v (1 + \alpha_k) \cdot \prod_{k=v+1}^{\infty} (1 + \alpha_k).$$

* § 196. Σύγκλισις ἐνὸς ἀπειρογινομένου (πραγματ. ἀριθμῶν).

Θὰ λέγωμεν : τὸ ἀπειρογινόμενον $\prod_{v=1}^{\infty} \alpha_v$ μὲ $\alpha_v \neq 0$, $v = 1, 2, \dots$ συγκλίνει πρὸς

ἕνα ἀριθμὸν γ καὶ θὰ γράφωμεν $\prod_{v=1}^{\infty} \alpha_v = \gamma$ τότε, καὶ μόνον τότε, ἂν $\gamma \neq 0$, $\gamma \neq \pm \infty$

καὶ ἐπὶ πλέον *ἰσχύη* : $\lim_{k=1}^v \prod_{k=1}^v \alpha_k = \gamma$.

Συντόμως :

$$\prod_{v=1}^{\infty} \alpha_v = \gamma \iff \lim_{\text{ορσ}} \prod_{k=1}^v \alpha_k = \gamma, \quad \gamma \neq 0, \pm \infty$$

Παράδειγμα 1ον : Νὰ ὑπολογισθῇ τὸ $\prod_{v=2}^{\infty} \left[1 - \frac{2}{v(v+1)} \right]$.

Λύσις : "Ἐχομεν :

$$1 - \frac{2}{k(k+1)} = \frac{(k-1)(k+2)}{k(k+1)}.$$

Κατὰ ταῦτα :

$$\begin{aligned} \prod_{k=2}^v \left[1 - \frac{2}{k(k+1)} \right] &= \prod_{k=2}^v \frac{(k-1)(k+2)}{k(k+1)} = \frac{1 \cdot 4}{2 \cdot 3} \cdot \frac{2 \cdot 5}{3 \cdot 4} \cdots \frac{(v-1)(v+2)}{v(v+1)} = \\ &= \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots (v-1)}{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdots v} \cdot \frac{4 \cdot 5 \cdot 6 \cdots (v+1)(v+2)}{3 \cdot 4 \cdot 5 \cdots v(v+1)} = \frac{v+2}{3v}. \end{aligned}$$

"Οθεν :

$$\lim_{k=2}^{\infty} \left[1 - \frac{2}{k(k+1)} \right] = \frac{1}{3}, \quad \text{καὶ συνεπῶς } \prod_{v=2}^{\infty} \left[1 - \frac{2}{v(v+1)} \right] = \frac{1}{3}.$$

Παράδειγμα 2ον : Τὰ ἀπειρογινόμενα $\prod_{v=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{v}\right)$ καὶ $\prod_{v=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{v+1}\right)$ δὲν συγκλίνουν πρὸς πεπερασμένον ἀριθμόν.

Πράγματι, διὰ τὸ πρῶτον ἔχομεν :

$$\gamma_v \equiv \prod_{k=1}^v \left(1 + \frac{1}{k}\right) = v + 1, \text{ ἕπειτα } \lim \gamma_v = +\infty,$$

ἐνῷ διὰ τὸ δεύτερον :

$$\gamma'_v \equiv \prod_{k=1}^v \left(1 - \frac{1}{k+1}\right) = \frac{1}{v+1}, \text{ ἕπειτα } \lim \gamma'_v = 0.$$

Διὰ τὸ πρῶτον θὰ λέγωμεν ὅτι συγκλίνει καὶ ἐκδοχὴν πρὸς τὸ $+\infty$.

Διὰ τὸ δεύτερον θὰ λέγωμεν ὅτι συγκλίνει καὶ ἐκδοχὴν πρὸς τὸ 0.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

411. Νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι : $\prod_{v=2}^{\infty} \left(1 - \frac{2}{v^2 + 1}\right) = \frac{2}{3}$.

412. Νὰ μελετηθοῦν ὡς πρὸς τὴν σύγκλισιν τὰ κάτωθι ἀπειρογινόμενα :

$$1. \quad \prod_{v=2}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{v}\right), \quad 2. \quad \prod_{v=2}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{v^2 - 1}\right).$$

ΓΕΝΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΕΙΡΩΝ

413. Νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι :

$$\sum_{k=1}^v (k^3 + 3k^2 - k + 1) = \frac{v}{4} (v^3 + 6v^2 + 5v + 4).$$

414. Νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι ἡ σειρὰ $\sum_{v=2}^{\infty} \frac{1}{v^2 - 1}$ συγκλίνει πρὸς τὸν ἀριθμὸν $\frac{3}{4}$.

415. Δεῖξοτε ὅτι :

$$\sum_{v=0}^{\infty} \frac{1}{(v + 1/2)(v + 3/2)(v + 5/2)} = \frac{2}{3}.$$

416. Νὰ εύρεθῃ τὸ ἀθροισμα τῶν ν πρώτων ὅρων τῆς σειρᾶς :

$$\frac{1}{1 \cdot 4} + \frac{1}{4 \cdot 7} + \frac{1}{7 \cdot 10} + \dots$$

417. Εὰν $\sum_{k=1}^v \alpha_k = 3v^2 + 4v$, νὰ εύρεθῃ τὸ $\sum_{k=1}^{v-1} \alpha_k$ καὶ ἀκολούθως νὰ εύρεθῇ ὁ α_v .

418. Νὰ εύρεθῃ τὸ ἀθροισμα τῆς σειρᾶς : $1 + \frac{4}{5} + \frac{7}{5^2} + \frac{10}{5^3} + \dots$

419. Νὰ εύρεθῃ τὸ ἀθροισμα τῶν ν πρώτων ὅρων τῆς σειρᾶς :

$$1 + \frac{3}{2} + \frac{5}{4} + \frac{7}{8} + \dots$$

420. Γνωστοῦ ὄντος ὅτι :

$$\sum_{v=1}^{\infty} \frac{1}{v^2} = \frac{1}{6} \pi^2, \text{ νὰ δειχθῇ ὅτι : } \sum_{v=1}^{\infty} \frac{1}{v^3 (v+1)^3} = 10 - \pi^2.$$

421. Δεῖξατε ὅτι ἡ σειρὰ $\sum_{v=1}^{\infty} \frac{1}{v^{v+2}}$ συγκλίνει (ἐν \mathbb{R}), ἐνῷ δὲν συμβαίνει τὸ αὐτὸ καὶ διὰ

τὴν σειράν : $\sum_{v=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[v]{v+1}}$.

422. Νὰ ξετασθῆ, ως πρός τὴν σύγκλισιν, ἡ σειρὰ μὲ γενικὸν ὅρον $\alpha_v = \frac{3v-1}{v^4+1}$.

$$* 423. \text{ \'E\'etv}\ \alpha_k, \beta_k \in \mathbb{R}^+ \quad \forall k = 1, 2, \dots, v \text{ k\'at } p, q \in \mathbb{R}^+ \text{ m\'e} \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1,$$

νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι :

$$\sum_{k=1}^v \alpha_k \beta_k \leq \left(\sum_{k=1}^v \alpha_k^p \right)^{\frac{1}{p}} \cdot \left(\sum_{k=1}^v \beta_k^q \right)^{\frac{1}{q}}. \quad (\text{Ανισότης του Hölder}).$$

* 424. Δείξατε ὅτι :

$$\sqrt[n]{\prod_{k=1}^n \alpha_k} \leq \frac{1}{n} \cdot \sum_{k=1}^n \alpha_k, \quad \alpha_k > 0, \quad k = 1, 2, \dots, n.$$

425. ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΤΙ:

$$\frac{\prod_{\mu=1}^{v-1} \mu \cdot \prod_{\mu=2}^v (\mu^2 + \mu + 1)}{\prod_{\mu=3}^{v+1} \mu \cdot \prod_{\mu=1}^{v-1} (\mu^2 + \mu + 1)} = \frac{2}{v(v+1)} \cdot \frac{v^4 + v + 1}{3}.$$

426. ΔΕΙΞΑΤΕ ΌΤΙ :

$$\prod_{v=1}^n \frac{1}{1 + \frac{m}{v+c}} = \prod_{v=m+1}^{n+m} \left(1 - \frac{m}{v+c}\right).$$

427. ΑΕΙΞΩΤΕ ΟΤΙ :

$$\frac{\prod_{k=2}^v (k-1) \cdot \prod_{k=2}^v (k+1)}{\prod_{k=2}^v k^2} = \frac{v+1}{2v}.$$

428. Νὰ μελετηθῇ, ὡς πρὸς τὴν σύγκλισιν, τὸ ἀπειρογιγόνευον :

$$\prod_{v=1}^{\infty} \frac{(v+1)^2}{v(v+2)}.$$

429. Δίδεται τό πολυώνυμον $f(x) \equiv x^2 + bx - y$ μὲριζας $p_1 < p_2$, τοῦ ὅποιουν οἱ συντελεσταὶ εἰναι πραγματικοὶ ἀριθμοὶ καὶ πληροῦν τὴν σχέσιν $1 + 2b < 4y$. Νὰ ἀποδειχθῇ δῆτα:

$$\rho_1 < \prod_{v=2}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{v^2}\right) < \rho_2.$$

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VIII

ΛΟΓΑΡΙΘΜΟΙ — ΕΚΘΕΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΘΜΙΚΑΙ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

I. ΛΟΓΑΡΙΘΜΟΙ. ΟΡΙΣΜΟΙ — ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Είσαγωγικαὶ ἔννοιαι

§ 197. Δυνάμεις μὲ ἐκθέτην ἄρρητον ἀριθμόν.—Εἰς τὴν προηγουμένην τάξιν ὡρίσαμεν δυνάμεις μὲ ἐκθέτην ἀκέραιον ἢ κλασματικόν, ἵτοι μὲ ἐκθέτην ρητὸν ἀριθμὸν καὶ ἀπεδείξαμεν τὰς κυριωτέρας ιδιότητας αὐτῶν, τὰς ὅποιας καὶ ὑπενθυμίζομεν ἐνταῦθα :

Ἐὰν $\alpha, \beta \in \mathbf{R}^+$ καὶ $x, y \in \mathbf{Q}$, (\mathbf{Q} τὸ σύνολον τῶν ρητῶν ἀριθμῶν), τότε ἰσχύουν αἱ κάτωθι ιδιότητες :

$$\begin{array}{ll} 1) \quad \alpha^x \cdot \alpha^y = \alpha^{x+y} & 3) \quad (\alpha \cdot \beta)^x = \alpha^x \cdot \beta^x \\ 2) \quad \alpha^x : \alpha^y = \alpha^{x-y} & 4) \quad (\alpha^x)^y = \alpha^{xy}. \end{array}$$

Ἐπὶ πλέον :

5) Ἐὰν $x < y$, τότε ἰσχύει :

$$\alpha^x \left\{ \begin{array}{lll} < \alpha^y & \text{διὰ} & \alpha > 1 \\ = \alpha^y & \text{διὰ} & \alpha = 1 \\ > \alpha^y & \text{διὰ} & 0 < \alpha < 1. \end{array} \right.$$

“Ωστε : Διὰ $\alpha > 0$ τὸ σύμβολον α^x εἶναι τελείως ὡρισμένον εἰς τὴν περίπτωσιν καθ’ ἥν ὁ ἐκθέτης x εἶναι τυχών ρητὸς ἀριθμός.

Εἰς τὴν παροῦσαν παράγραφον γενικεύομεν, ἔστω καὶ στοιχειωδῶς, τὴν ἔννοιαν τῆς δυνάμεως μὲ ἐκθέτην τυχόντα πραγματικὸν ἀριθμόν. Πρὸς τοῦτο δρίζομεν τὴν ἔννοιαν τοῦ συμβόλου α^x , ὅταν ὁ ἐκθέτης x εἶναι ἄρρητος ἀριθμός. Πρὸς πληρεστέραν κατανόησιν τοῦ θέματος, ὃς θεωρήσωμεν κατ’ ἀρχὴν τὸ ἔξῆς συγκεκριμένον παράδειγμα :

“Ἐστω ὅτι θέλομεν νὰ δρίσωμεν τὴν δύναμιν $\alpha^{\sqrt{2}}$, $\alpha \in \mathbf{R}^+$. Πρὸς τοῦτο θεωροῦμεν μίαν αὔξουσαν ἀκολουθίαν ρητῶν ἀριθμῶν ρ_v , $v = 1, 2, \dots$ μὲ $\lim \rho_v = \sqrt{2}$, π.χ. τὴν ἀκολουθίαν :

$$1, \quad 1.4, \quad 1.41, \quad 1.414, \quad 1.4142, \quad 1.41421, \dots \tag{1}$$

ἢ ὅποια συγκλίνει πρὸς τὸν ἄρρητον $\sqrt{2}$.

Σχηματίζομεν ἀκολούθως τὴν ἀκολουθίαν α^{ρ_v} , $v = 1, 2, \dots$ τῶν δυνάμεων μὲ ρητοὺς ἐκθέτας, ἐκτενῶς τὴν ἀκολουθίαν :

$$\alpha^1, \alpha^{1.4}, \alpha^{1.41}, \alpha^{1.414}, \alpha^{1.4142}, \alpha^{1.41421}, \dots \tag{2}$$

* Εάν $\alpha > 1$, τότε κατά τὴν ιδιότητα 5, θὰ ἔχωμεν :

$$\alpha^1 < \alpha^{1.4} < \alpha^{1.41} < \alpha^{1.414} < \alpha^{1.4142} < \dots < \alpha^{1+\frac{1}{n}} = \alpha^{\frac{n}{n}},$$

ήτοι ἡ ἀκολουθία (2) εἶναι αὔξουσα καὶ φραγμένη, συνεπῶς συγκλίνει (§ 150).

* Εάν πάλιν $0 < \alpha < 1$ ἡ ἀκολουθία (2) εἶναι φθίνουσα καὶ φραγμένη καὶ ως τοιαύτη πάλιν συγκλίνει.

Τὸ ὄριον τῆς ἀκολουθίας (2), τὸ ὅποιον ως ἐλέχθη ὑπάρχει $\forall \alpha \in \mathbb{R}^+$, ὁρίζομεν ως τὴν δύναμιν $\alpha^{\frac{1}{2}}$.

* Εστω τώρα x τυχών ἄρρητος ἀριθμός, ἔχων, δυνάμει τοῦ θεωρήματος (§ 193), δεκαδικὸν ἀνάπτυγμα :

$$x = \psi_0 + \psi_1 \cdot \frac{1}{10} + \psi_2 \cdot \frac{1}{10^2} + \dots + \psi_v \cdot \frac{1}{10^v} + \dots$$

καὶ α εἰς θετικὸς πραγματικὸς ἀριθμός.

Δεχόμεθα, ἀνευ βλάβης τῆς γενικότητος, ὅτι $\alpha > 1$ καὶ $x > 0$. Θέτομεν :

$$x_v = \psi_0 + \frac{\psi_1}{10} + \frac{\psi_2}{10^2} + \dots + \frac{\psi_v}{10^v}, \quad v = 0, 1, 2, \dots \quad (3)$$

Παρατηροῦμεν τώρα ὅτι ἡ ἀκολουθία (3) εἶναι μία αὔξουσα ἀκολουθία ρητῶν ἀριθμῶν, ἐπὶ πλέον δὲ φραγμένη πρὸς τὰ ἄνω μὲ ἄνω φράγμα τὸν ἀκέραιον $\psi_0 + 1$ (διατί;). Ἐπειδὴ ἔκαστος ὄρος τῆς ἀκολουθίας x_v , $v = 1, 2, \dots$ εἶναι ρητὸς ἀριθμός, ἡ δύναμις α^{x_v} ἔχει μίαν ἐντελῶς καθωρισμένην ἔννοιαν. Ἐξ ἄλλου, ἐπειδὴ $\alpha > 1$, ἔχομεν :

$$\alpha^{\psi_0} < \alpha^{\psi_0 + \frac{\psi_1}{10}} < \alpha^{\psi_0 + \frac{\psi_1}{10} + \frac{\psi_2}{10^2}} < \dots < \alpha^{\psi_0 + 1}, \quad \frac{\psi_1}{10} < \frac{\psi_2}{10^2} < \dots < \frac{\psi_v}{10^v} \quad (4)$$

ήτοι, ἡ ἀκολουθία τῶν δυνάμεων μὲ ρητοὺς ἐκθέτας α^{x_v} , $v = 0, 1, 2, \dots$ εἶναι αὔξουσα καὶ μάλιστα γνησίως, ἐπὶ πλέον δὲ φραγμένη πρὸς τὰ ἄνω ἀπὸ τὸν $\alpha^{\psi_0 + 1}$, ἀρα θὰ συγκλίνῃ πρὸς πραγματικὸν ἀριθμὸν μικρότερον ἢ ἵσον τοῦ $\alpha^{\psi_0 + 1}$ (§ 150).

* Εάν πάλιν $0 < \alpha \leq 1$ ἡ ἀκολουθία α^{x_v} , $v = 0, 1, 2, \dots$ εἶναι φθίνουσα καὶ φραγμένη πρὸς τὰ κάτω καὶ ως τοιαύτη εἶναι πάλιν συγκλίνουσα.

* Ωστε, διὰ κάθε $\alpha \in \mathbb{R}^+$ ὑπάρχει τὸ ὄριον τῆς ἀκολουθίας α^{x_v} , $v = 0, 1, 2, \dots$

* Εξ ὁρισμοῦ θέτομεν τώρα :

$$\alpha^x = \lim_{\text{ορ}} \alpha^{x_v}$$

* Ήτοι : *Ορίζομεν ως δύναμιν τοῦ α εἰς τὸν ἀρρητὸν ἐκθέτην x , τὸν πραγματικὸν ἀριθμὸν πρὸς τὸν ὃποιον τείνει ἡ ἀκολουθία τῶν δυνάμεων μὲ ρητοὺς ἐκθέτας :

$$\alpha^{\psi_0}, \alpha^{\psi_0 \cdot \psi_1}, \alpha^{\psi_0 \cdot \psi_1 \cdot \psi_2}, \dots, \alpha^{\psi_0 \cdot \psi_1 \cdot \psi_2 \dots \psi_v}, \dots$$

* Σημείωσις. *Ἐν προκειμένῳ ἀποδεικνύονται τὰ ἔξης :

1). *Εάν δύο ἀκολουθίαι x_v , x_v^* , $v = 1, 2, \dots$ ρητῶν ἀριθμῶν συγκλίνουν ἀμφότεραι εἰς τὸν ἄρρητον x , τότε αἱ ἀκολουθίαι α^{x_v} , $\alpha^{x_v^*}$, $v = 1, 2, \dots$ συγκλίνουν ἐπίσης εἰς τὸν αὐτὸν ἀριθμόν, τὸν ὃποιον παριστῶμεν μὲ α^x καὶ καλοῦμεν δύναμιν τοῦ α εἰς τὸν ἄρρητον ἐκθέτην x .

2). Αι γνωσται ιδιότητες των δυνάμεων μὲ ρητούς έκθέτας, τὰς ὅποιας ἀνεφέραμεν εἰς τὴν ἀρχὴν τῆς παρούσης παραγράφου, ίσχύουν καὶ εἰς τὴν περίπτωσιν δυνάμεων μὲ έκθέτας ἀρθρίους ἀριθμούς, κατὰ συνέπειαν μὲ έκθέτας τυχόντας πραγματικούς ἀριθμούς.

Ἐν τῇ πράξει, ἡ δύναμις α^x , ὅπου x ἄρρητος, ἀντικαθίσταται διὰ τῆς προσεγγίσεώς της α^θ , ὅπου θ ρητὸς ἐπαρκῶς προσεγγίζων τὸν ἄρρητον ἀριθμὸν x .

”Εννοια τοῦ λογαρίθμου

§ 198. Λογάριθμος μὲ βάσιν τυχόντα θετικὸν ἀριθμὸν $a \neq 1$.

Αποδεικνύεται εἰς τὰ μαθηματικὰ ὅτι : Διὰ κάθε θετικὸν πραγματικὸν ἀριθμὸν a , διάφορον τῆς μονάδος ($0 < a \neq 1$) καὶ κάθε πραγματικὸν ἀριθμὸν $\theta > 0$, ὑπάρχει ἀκριβῶς εἰς πραγματικὸς ἀριθμὸς x (οητὸς ἢ ἀριθμὸς), εἰς τὸν ὃποῖον ὑψούμενος ὁ a δίδει τὸν θ ,

ἡτοι :

$$a^x = \theta \quad (1)$$

Ο μονοσημάντως δριζόμενος πραγματικὸς ἀριθμὸς x , ὅστις πληροῖ τὴν (1), καλεῖται «λογάριθμος τοῦ θ ως πρὸς βάσιν a » καὶ συμβολίζεται οὕτω :

$$x = \lambda \circ \gamma_a \theta \quad (2)$$

Κατὰ τὰ ἀνωτέρω ἔχομεν τὴν λογικὴν ἰσοδυναμίαν :

$$\lambda \circ \gamma_a \theta = x \iff a^x = \theta \quad (3)$$

Δίδομεν τώρα τὸν κάτωθι δρισμὸν τοῦ λογαρίθμου μὲ βάσιν τυχόντα θετικὸν ἀριθμὸν $a \neq 1$.

Λογάριθμος ἐνὸς θετικοῦ ἀριθμοῦ θ , ως πρὸς βάσιν a ($0 < a \neq 1$), καλεῖται ὁ ἐκθέτης εἰς τὸν ὃποῖον πρέπει νὰ ὑψωθῇ ἡ βάσις a διὰ νὰ δώσῃ τὸν θ .

Ἡ (1), λόγῳ τῆς (2), δίδει :

$$a^{\lambda \circ \gamma_a \theta} = \theta \quad (4)$$

Παραδείγματα :

1) $\lambda \circ \gamma_{10} 100 = 2$, διότι $10^2 = 100$	5) $\lambda \circ \gamma_{10} 0,001 = -3$, διότι $10^{-3} = 0,001$
2) $\lambda \circ \gamma_2 8 = 3$, » $2^3 = 8$	6) $\lambda \circ \gamma_{1/2} \left(\frac{1}{16}\right) = 4$, » $\left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{1}{16}$
3) $\lambda \circ \gamma_2 \sqrt[3]{2} = \frac{1}{3}$, » $2^{1/3} = \sqrt[3]{2}$	7) $\lambda \circ \gamma_{1/\sqrt[3]{2}} 1 = 0$, » $\left(\frac{1}{\sqrt[3]{2}}\right)^0 = 1$
4) $\lambda \circ \gamma_{1/3} 9 = -2$, » $\left(\frac{1}{3}\right)^{-2} = 9$	8) $\lambda \circ \gamma_3 \sqrt[3]{2} = \frac{1}{2}$, » $(3)^{1/2} = \sqrt[3]{2}$.

Γενικὴ παρατήρησις. Παντοῦ κατωτέρω, οἱ ἀριθμοὶ τῶν ὃποίων λαμβάνομεν

τούς λογαρίθμους, θά θεωροῦνται θετικοί. Λογαρίθμους ἀρνητικῶν ἀριθμῶν οὔτε δρίζομεν, οὔτε μεταχειρίζόμεθα.

§ 199. Βάσις λογαρίθμων — λογαριθμικὰ συστήματα.— 'Ο πραγματικὸς ἀριθμὸς α, ὅστις εἶναι θετικὸς καὶ διάφορος τῆς μονάδος, καλεῖται βάσις τῶν λογαρίθμων. Ἐπειδὴ ὡς βάσις α δύναται νὰ ληφθῇ οἰστρόποτε θετικὸς πραγματικὸς ἀριθμὸς διάφορος τῆς μονάδος, διὰ τοῦτο δύνανται νὰ σχηματισθοῦν διάφορα λογαριθμικὰ συστήματα. Τὰ χρησιμοποιούμενα ὅμως εἶναι τὰ ἔξις :

1ον. Τὸ δεκαδικὸν λογαριθμικὸν σύστημα. Οὕτω καλεῖται τὸ σύστημα ἐκεῖνο, εἰς τὸ ὅποιον ἡ βάσις α εἶναι ὁ ἀριθμὸς 10. 'Ο λογάριθμος ἐνὸς ἀριθμοῦ θ εἰς τὸ σύστημα τοῦτο καλεῖται δεκαδικὸς λογάριθμος καὶ συμβολίζεται ἀπλῶς λογ₁₀ ἀντὶ λογ₁₀.

Οἱ δεκαδικοὶ λογάριθμοι καλοῦνται καὶ «κοινοὶ λογάριθμοι» ἢ «Briggs λογάριθμοι»*) καὶ χρησιμοποιοῦνται εὐρέως εἰς τὰ στοιχειώδη μαθηματικὰ διὰ πρακτικούς κυρίως σκοπούς.

2ον. Τὸ Νεπέριον λογαριθμικὸν σύστημα**). Οὕτω καλεῖται τὸ σύστημα ἐκεῖνο, εἰς τὸ ὅποιον ἡ βάσις α εἶναι ὁ ἄρρητος ἀριθμὸς $e = 2,71828\dots$, ὅστις, ὡς θὰ ἴδωμεν εἰς ἑπόμενον κεφάλαιον, εἶναι τὸ ὅριον τῆς ἀκολουθίας $\left(1 + \frac{1}{v}\right)^v$, $v=1,2,\dots$. 'Ο λογάριθμος ἐνὸς ἀριθμοῦ θ εἰς τὸ σύστημα αὐτὸν καλεῖται «νεπέριος λογάριθμος»**) ἢ «φυσικὸς λογάριθμος» τοῦ θ καὶ συμβολίζεται διεθνῶς μὲ «logθ» εἴτε «lnθ» παραλειπομένου τοῦ δείκτου e , ἥτοι καὶ εἰς τὸ σύστημα αὐτὸν ἀντὶ $y = \log_e \theta$ γράφομεν $y = \log \theta$ ἢ $y = \ln \theta$. Οἱ νεπέριοι λογάριθμοι χρησιμοποιοῦνται κυρίως εἰς θεωρητικὰς μελέτας καὶ ὡς ἐκ τούτου τὸ ὡς ἄνω σύστημα δεσπόζει τῶν ἄλλων συστημάτων κυρίως εἰς τὰ ἀνώτερα μαθηματικά.

Παρατήρησις. Ἐκ τοῦ ὄρισμοῦ τοῦ λογαρίθμου μὲ βάσιν τυχόντα θετικὸν ἀριθμὸν $\alpha \neq 1$ προκύπτει ὅτι εἰς κάθε θετικὸν πραγματικὸν ἀριθμὸν x ἀντιστοιχεῖ ἀκριβῶς εἰς πραγματικὸς ἀριθμὸς y , ὅστις ἱκανοποιεῖ τὴν ἔξιστωσιν :

$$\alpha^y = x.$$

Τοιουτοτρόπως δρίζεται μία συνάρτησις, ἡ $y = f(x) \equiv \log_a x$ μὲ πεδίον δρισμοῦ τὸ σύνολον R^+ τῶν θετικῶν ἀριθμῶν καὶ πεδίον τιμῶν τὸ σύνολον R τῶν πραγματικῶν ἀριθμῶν, ἥτοι :


$$R^+ \ni x \longrightarrow y = f(x) \equiv \log_a x \in R.$$

Ἡ ὡς ἄνω συνάρτησις $f: R^+ \longrightarrow R$ δονομάζεται λογαριθμικὴ συνάρτησις καὶ ὅπως θὰ μάθωμεν εἰς τὴν ἔκτην τάξιν αὐτὴ εἶναι «ἡ ἀντίστροφος συνάρτησις τῆς ἐκθετικῆς συναρτήσεως $x = a^y$ ».


* Πρὸς τιμὴν τοῦ "Αγγλου Μαθηματικοῦ Henry Briggs (1556–1630)", ὅστις πρῶτος ἐλαβεν ὡς βάσιν τῶν λογαρίθμων τὸν ἀριθμὸν 10.

** Πρὸς τιμὴν τοῦ John Napier (1550–1617), ὅστις ἐπενόησε πρῶτος τοὺς λογαρίθμους καὶ ἐλαβεν ὡς βάσιν τὸν ἀριθμὸν $e = 2,7182\dots$.

- Εις όρθοκανονικόν σύστημα ἀξόνων ἡ γραφική παράστασις τῆς λογαριθμικῆς συναρτήσεως $y = \log_a x$ δίδεται, κατὰ πρόχειρον σχεδίασιν, εἰς τὰ κάτωθι σχήματα.



Σχ. 13



Σχ. 14

Ἐκ τῶν μέχρι τοῦδε λεχθέντων καὶ τῇ βοηθείᾳ τῶν ἀνωτέρω γραφικῶν παραστάσεων ἐννοοῦμεν εὐκόλως τὰ ἔξης :

- 1). "Εκαστος πραγματικὸς ἀριθμὸς εἶναι λογάριθμος ἐνδὲ καὶ μόνον θετικοῦ ἀριθμοῦ.
- 2). "Εκαστος θετικὸς ἀριθμὸς ἔχει λογάριθμον ἔνα καὶ μόνον πραγματικὸν ἀριθμόν.
- 3). "Οταν ἡ βάσις συστήματος τινὸς λογαρίθμων εἶναι > 1 , οἱ μεγαλύτεροι τῆς μονάδος ἀριθμοὶ ἔχουν λογαρίθμους θετικούς, ἐνῷ οἱ μικρότεροι αὐτῆς ἔχουν λογαρίθμους ἀρνητικούς, τὸ ἀντίθετον δὲ συμβαίνει, ὅταν ἡ βάσις εἶναι < 1 .
- 4). "Οταν ἡ βάσις a εἶναι > 1 , αὐξανομένου τοῦ ἀριθμοῦ, αὔξανεται καὶ δλογάριθμος αὐτοῦ καὶ ἀντιστρόφως· ἐὰν δὲ $a < 1$, αὐξανομένου τοῦ ἀριθμοῦ, ἐλαττοῦται δλογάριθμος.

Σημείωσις. Εἰς τὴν ἑκτην τάξιν θὰ ἀποδείξωμεν ὅτι ἰσχύουν τὰ κάτωθι :

$a > 1$	$\lim_{x \rightarrow +0} \log_a x = -\infty$	καὶ	$\lim_{x \rightarrow +\infty} \log_a x = +\infty$
$0 < a < 1$	$\lim_{x \rightarrow +0} \log_a x = +\infty$	καὶ	$\lim_{x \rightarrow +\infty} \log_a x = -\infty$

Πρὸς ἐπιβεβαίωσιν παρατηρήσατε καὶ τὰ ἀνωτέρω σχήματα (Σχ. 13 καὶ Σχ. 14).

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

430. Προσδιορίσατε τὸν x ἐκ τῶν κάτωθι ἰσοτήτων :

- 1) $\log_4 x = 3$,
- 2) $\log x = -3$,
- 3) $\log_2 \left(\frac{1}{2}\right) = x$,
- 4) $\log_{\sqrt[3]{3}} (9 \sqrt[3]{3}) = x$,
- 5) $\log_{\sqrt[4]{8}} \frac{27}{8} = x$,
- 6) $\log_8 x = -\frac{7}{3}$,
- 7) $\log_{2a} \sqrt{2a} = x$,
- 8) $\log_3 \left(\frac{1}{\sqrt[3]{32}}\right) = x$.

431. Εύρετε τὴν σύγνωστον βάσιν $x \in \mathbb{R}^+$, $x \neq 1$, ἵνα τῶν κάτωθι Ισοτήτων :

$$1) \log_x 25 = 2, \quad 2) \log_x 16 = \frac{2}{3}, \quad 3) \log_x 5 = \frac{1}{3}, \quad 4) \log_x \left(\frac{81}{16}\right) = 4.$$

432. Υπολογίσατε τοὺς λογαρίθμους τῶν ἀριθμῶν :

$$81, \quad 64, \quad \frac{1}{32}, \quad \sqrt[3]{2}, \quad \frac{1}{125}, \quad 27, \quad 4\sqrt[3]{2}, \quad 1000$$

ὡς πρὸς βάσεις ἀντιστοίχως τάξ :

$$3, \quad \frac{1}{2}, \quad 2, \quad 4, \quad 5, \quad 3, \quad 2, \quad 0,01.$$

433. Υπολογίσατε τὰς κάτωθι παραστάσεις :

$$\alpha) \frac{\log_3 81 - \log_8 64}{\log_{0,5} 64 + \log_2 \frac{1}{32} + \log_2 4\sqrt[3]{2}}$$

$$\beta) \frac{\log_3 9\sqrt[3]{3} : \log_{49} 7}{\log_3 \frac{1}{125} - \log_2 \frac{1}{32} + \log_3 27 \cdot \log_{1/2} 64}$$

$$\gamma) \frac{-5 + \log_7 (\log_2 a \cdot 2) - 4 \log_a \sqrt{a}}{\log_3 27 + 7 \cdot \log_{0,1} 10 + \log 0,001}$$

434. Εὰν $\alpha \in \mathbb{R}^+$, $\alpha \neq 1$ καὶ καλέσωμεν : $x = \log_{\sqrt{a}} \alpha$, $y = \log_a \alpha^2$, $z = \log_a \alpha^4$, νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι :

$$xyz = x + y + z + 2.$$

435. Νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι ὁ λογ3 είναι ἀριθμὸς ἄρρητος (= ἀσύμμετρος).

Ίδιότητες τῶν λογαρίθμων

§ 200. Ίδιότης I.— Εἰς πᾶν σύστημα λογαρίθμων, ὁ λογάριθμος τῆς μονάδος εἶναι τὸ μηδέν, ὁ δὲ λογάριθμος τῆς βάσεως εἶναι ἡ μονάς, ἢτοι :

$$\boxed{\lambda \log_a 1 = 0} \quad \text{καὶ} \quad \boxed{\lambda \log_a a = 1} \quad \forall \alpha \in \mathbb{R}^+ - \{1\}.$$

Πράγματι, ἐκ τοῦ δρισμοῦ τοῦ λογαρίθμου ὡς ἐκθέτου, ἔχομεν :

$$\alpha^0 = 1 \implies \log_a 1 = 0 \quad \text{καὶ} \quad \alpha^1 = \alpha \implies \log_a \alpha = 1 \quad \forall \alpha \in \mathbb{R}^+ - \{1\}.$$

§ 201. Ίδιότης II.— Ο λογάριθμος τοῦ γινομένου δύο (θετικῶν) ἀριθμῶν ὡς πρὸς βάσιν a ($0 < a \neq 1$), ισοῦται πρὸς τὸ ἀθροισμα τῶν λογαρίθμων τῶν ἀριθμῶν αὐτῶν, ὡς πρὸς τὴν αὐτὴν βάσιν.

*Ἀπόδειξις. "Εστωσαν θ_1 καὶ θ_2 δύο (θετικοί) ἀριθμοί καὶ x, y ἀντιστοίχως οἱ λογάριθμοί των, ὡς πρὸς βάσιν a . Κατὰ τὸν δρισμὸν τῶν λογαρίθμων ἔχομεν τὰς λογικὰς Ισοδυναμίας :

$$\alpha^x = \theta_1 \iff x = \log_a \theta_1 \quad \text{καὶ} \quad \alpha^y = \theta_2 \iff y = \log_a \theta_2. \quad (1)$$

*Ἐξ αὐτῶν λαμβάνομεν :

$$\alpha^x \cdot \alpha^y = \theta_1 \cdot \theta_2 \quad \text{ἢ} \quad \alpha^{x+y} = \theta_1 \theta_2.$$

Άλλα διαδικτυαία ισότητες δεικνύει ότι :

$$\lambda \circ \gamma_a (\theta_1 + \theta_2) = x + y = \lambda \circ \gamma_a \theta_1 + \lambda \circ \gamma_a \theta_2$$

"Ωστε : $\left| \begin{array}{c} \forall \theta_1, \theta_2 \in \mathbb{R}^+ \\ 0 < a \neq 1 \end{array} \right| \implies \lambda \circ \gamma_a (\theta_1 + \theta_2) = \lambda \circ \gamma_a \theta_1 + \lambda \circ \gamma_a \theta_2$

Πόρισμα. — Εάν $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_v$ είναι θετικοί πραγματικοί αριθμοί, τότε ισχύει :

$$\lambda \circ \gamma_a (\theta_1 \cdot \theta_2 \cdots \theta_v) = \lambda \circ \gamma_a \theta_1 + \lambda \circ \gamma_a \theta_2 + \cdots + \lambda \circ \gamma_a \theta_v$$

Ή οπέρ τό αύτό :

$$\lambda \circ \gamma_a (\prod_{k=1}^v \theta_k) = \sum_{k=1}^v \lambda \circ \gamma_a \theta_k$$

Η απόδειξης εύκολος διά της μεθόδου της τελείας έπαγωγής.

Παράδειγμα. — Έχομεν π.χ. $\lambda \circ \gamma (7 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3) = \lambda \circ \gamma 7 + \lambda \circ \gamma 5 + \lambda \circ \gamma 4 + \lambda \circ \gamma 3$ και άντιστροφώς : $\lambda \circ \gamma 5 + \lambda \circ \gamma 3 + \lambda \circ \gamma 4 + \lambda \circ \gamma 2 = \lambda \circ \gamma (5 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 2) = \lambda \circ \gamma 180$.

§ 202. Ιδιότης III. — Ο λογάριθμος πηλίκου δύο αριθμῶν (θετικῶν) ως πρὸς βάσιν a ($0 < a \neq 1$), ισοῦται πρὸς τὸν λογάριθμὸν τοῦ διαιρετέου μεῖον τὸν λογάριθμὸν τοῦ διαιρέτου, ως πρὸς τὴν αὐτὴν βάσιν.

Απόδειξις. — Εστωσαν θ_1 καὶ θ_2 δύο αριθμοὶ (θετικοὶ) καὶ x, y ἀντιστοίχως οἱ λογάριθμοί των, ως πρὸς βάσιν a . Κατὰ τὸν δρισμὸν τῶν λογαρίθμων ἔχομεν τὰς λογικὰς ισοδυναμίας :

$$\alpha^x = \theta_1 \iff x = \lambda \circ \gamma_a \theta_1 \quad \text{καὶ} \quad \alpha^y = \theta_2 \iff y = \lambda \circ \gamma_a \theta_2.$$

Ἐξ αὐτῶν λαμβάνομεν :

$$\alpha^x : \alpha^y = \theta_1 : \theta_2 \quad \text{ή} \quad \alpha^{x-y} = \frac{\theta_1}{\theta_2}.$$

Άλλα διαδικτυαία ισότητες δεικνύει ότι :

$$\lambda \circ \gamma_a \left(\frac{\theta_1}{\theta_2} \right) = x - y = \lambda \circ \gamma_a \theta_1 - \lambda \circ \gamma_a \theta_2.$$

"Ωστε : $\left| \begin{array}{c} \forall \theta_1, \theta_2 \in \mathbb{R}^+ \\ 0 < a \neq 1 \end{array} \right| \implies \lambda \circ \gamma_a \left(\frac{\theta_1}{\theta_2} \right) = \lambda \circ \gamma_a \theta_1 - \lambda \circ \gamma_a \theta_2$

Οὕτως ἔχομεν π.χ. $\lambda \circ \gamma \frac{3}{5} = \lambda \circ \gamma 3 - \lambda \circ \gamma 5$

καὶ άντιστροφώς : $\lambda \circ \gamma 7 - \lambda \circ \gamma 13 = \lambda \circ \gamma 7/13$.

Πόρισμα I. — Οἱ ἀντίστροφοι αριθμοὶ ἔχουν ἀντιθέτους λογαρίθμους.

Πράγματι :

$$\lambda \circ \gamma_a \left(\frac{1}{\theta} \right) = \lambda \circ \gamma_a 1 - \lambda \circ \gamma_a \theta = 0 - \lambda \circ \gamma_a \theta = -\lambda \circ \gamma_a \theta.$$

Πόρισμα II.— Δύο θετικοί ἀριθμοί είναι ίσοι τότε, καὶ μόνον τότε, ἂν οἱ λογάριθμοι αὐτῶν, ὡς πρὸς τὴν αὐτὴν βάσιν, είναι ίσοι, ἢτοι :

$$\log_a \theta_1 = \log_a \theta_2 \iff \theta_1 = \theta_2$$

Ἡ ἀπόδειξις εὔκολος.

Ἄξιόλογος παρατήρησις. Δέον νὰ ἔχωμεν πάντοτε ὑπ' ὅψιν ὅτι :

$$\log_a (\theta_1 + \theta_2) \neq \log_a \theta_1 + \log_a \theta_2$$

$$\log_a (\theta_1 - \theta_2) \neq \log_a \theta_1 - \log_a \theta_2$$

$$\log_a \theta_1 \cdot \log_a \theta_2 \neq \log_a (\theta_1 \cdot \theta_2) = \log_a \theta_1 + \log_a \theta_2$$

$$\log_a \theta_1 : \log_a \theta_2 \neq \log_a \left(\frac{\theta_1}{\theta_2} \right) = \log_a \theta_1 - \log_a \theta_2.$$

§ 203. Ἰδιότης IV.— Ὁ λογάριθμος οίασδήποτε δυνάμεως ἐνδὲ θετικοῦ ἀριθμοῦ ίσοῦται πρὸς τὸ γινόμενον τοῦ ἐκθέτου τῆς δυνάμεως ἐπὶ τὸν λογάριθμον τῆς βάσεως τῆς δυνάμεως.

Ἀπόδειξις. Ἐστω ὅτι είναι $\log_a \theta = x$, ἐνθα $\theta \in \mathbb{R}^+$ καὶ $0 < a \neq 1$. Ἐὰν θ^k , $k \in \mathbb{R}$, είναι μία δύναμις τοῦ θετικοῦ ἀριθμοῦ θ , τότε, ἐπειδὴ $\theta = a^x$, ἔχομεν $\theta^k = (a^x)^k = a^{kx}$.

Ἐκ ταύτης, κατὰ τὸν δρισμὸν τῶν λογαρίθμων, προκύπτει :

$$\log_a \theta^k = k \cdot x = k \cdot \log_a \theta.$$

Ωστε :

$$\boxed{\forall \theta \in \mathbb{R}^+, k \in \mathbb{R} \quad | \quad 0 < a \neq 1 \quad \implies \quad \log_a \theta^k = k \cdot \log_a \theta}$$

§ 204. Ἰδιότης V.— Ὁ λογάριθμος οίασδήποτε ρίζης, μὲν ὑπόρριζον θετικόν, ίσοῦται πρὸς τὸ πηλίκον τοῦ λογαρίθμου τοῦ ὑπορρίζου διὰ τοῦ δείκτου τῆς ρίζης.

Ἀπόδειξις. Ἡ ἀνωτέρω ιδιότης ἀποτελεῖ πόρισμα τῆς προηγουμένης ιδιότητος. Πράγματι, ἀρκεῖ εἰς τὴν ἀποδειχθεῖσαν ίσοτητα $\log_a \theta^k = k \cdot \log_a \theta$, νὰ τεθῇ π.χ. $k = \frac{1}{v}$.

Λαμβάνομεν τότε :

$$\log_a \theta^{\frac{1}{v}} = \log_a \sqrt[v]{\theta} = \frac{1}{v} \cdot \log_a \theta.$$

Ωστε :

$$\boxed{\forall \theta \in \mathbb{R}^+, v \in \mathbb{N} \quad | \quad 0 < a \neq 1 \quad \implies \quad \log_a \sqrt[v]{\theta} = \frac{1}{v} \cdot \log_a \theta}$$

$$\text{Οὕτως ἔχομεν π.χ. } \log \sqrt[3]{205} = \frac{1}{3} \log 205$$

$$\text{καὶ ἀντιστρόφως : } \frac{1}{5} \log 1014 = \log \sqrt[5]{1014}.$$

§ 205. Ιδιότης VI.—'Εὰν ἡ βάσις α τῶν λογαρίθμων εἶναι >1 , οἱ ἀριθμοὶ οἱ μεγαλύτεροι τοῦ 1 ἔχουν θετικοὺς λογαρίθμους, ἐνῷ οἱ θετικοὶ καὶ μικρότεροι τοῦ 1 ἔχουν ἀρνητικοὺς λογαρίθμους, ἦτοι :

$$\text{Έὰν } \alpha > 1 \implies \begin{cases} \log_a \theta > 0 \iff \theta > 1 \\ \log_a \theta < 0 \iff 0 < \theta < 1 \end{cases}$$

'Απόδειξις. "Εστω ὅτι $\log_a \theta > 0$. ἐκ τῆς $\alpha > 1$ προκύπτει :

$$\alpha^{\log_a \theta} > 1^{\log_a \theta}$$

'Εξ οὗ : $\theta > 1$.

'Αντιστρόφως. "Εστω $\theta > 1$ ἢ ὅπερ τὸ αὐτὸ οἱ $\alpha^{\log_a \theta} > 1^{\log_a \theta}$. Ἐξ αὐτῆς, ἐπειδὴ $\alpha > 1$, προκύπτει : $\log_a \theta > 0$.

'Ομοίως ἀποδεικνύεται καὶ ἡ δευτέρα ίσοδυναμία.

Πόρισμα.—Τῆς βάσεως α τῶν λογαρίθμων οὕστης >1 , ὁ μεγαλύτερος ἐκ δύο θετικῶν ἀριθμῶν ἔχει μεγαλύτερον λογάριθμον καὶ ἀντιστρόφως, ἦτοι :

$$\text{Έὰν } \alpha > 1, \text{ τότε : } \log_a \theta_1 > \log_a \theta_2 \iff \theta_1 > \theta_2$$

§ 206. Ιδιότης VII.—'Εὰν ἡ βάσις α τῶν λογαρίθμων εἶναι : $0 < \alpha < 1$, οἱ ἀριθμοὶ οἱ μεγαλύτεροι τοῦ 1 ἔχουν ἀρνητικοὺς λογαρίθμους, ἐνῷ οἱ θετικοὶ καὶ μικρότεροι τοῦ 1 ἔχουν θετικοὺς λογαρίθμους, ἦτοι :

$$\text{Έὰν } 0 < \alpha < 1 \implies \begin{cases} \log_a \theta < 0 \iff \theta > 1 \\ \log_a \theta > 0 \iff 0 < \theta < 1. \end{cases}$$

'Υπόδειξις. Παρατηρήσατε ὅτι : $\log_a \theta = -\log_{1/\alpha} \theta$ καὶ ἐφαρμόσατε ἀκολούθως τὴν προηγούμενην ιδιότητα.

Πόρισμα.—Τῆς βάσεως α τῶν λογαρίθμων οὕστης θετικῆς καὶ μικροτέρας τῆς μονάδος, ὁ μεγαλύτερος ἐκ δύο θετικῶν ἀριθμῶν ἔχει μικρότερον λογάριθμον καὶ ἀντιστρόφως, ἦτοι :

$$\text{Έὰν } 0 < \alpha < 1, \text{ τότε : } \log_a \theta_1 > \log_a \theta_2 \iff \theta_1 < \theta_2$$

Παρατήρησις. 'Εκ τῶν ἀνωτέρω ιδιοτήτων τῶν λογαρίθμων καθίσταται φανερόν, ὅτι μὲ τὴν βοήθειαν ἐνὸς «λογαρίθμικοῦ πίνακος», περὶ τῶν δημοίων θά διμιλήσωμεν κατωτέρω, δυνάμεθα νὰ ἀπλοποιήσωμεν ἔνα ἀριθμητικὸν ύπολογισμὸν καὶ τοῦτο διότι δυνάμεθα νὰ ἀντικαταστήσωμεν ἔνα γινόμενον μὲ ἔνα ἀθροισμα, ἔνα πηλίκον μὲ μίαν διαφορὰν, μίαν ἑξαγωγὴν ρίζης μὲ μίαν διαίρεσιν κ.τ.λ.

Εις τὴν τελευταίαν μάλιστα περίπτωσιν ὁ λογαριθμικὸς ὑπολογισμὸς εἶναι ἀναπόφευκτος, ὅταν ὁ δείκτης τοῦ ριζικοῦ εἴναι μεγαλύτερος τοῦ 3.

Ἐφαρμογαὶ τῶν ἰδιοτήτων τῶν λογαρίθμων

1η. Νὰ ἐκφρασθῇ ὁ λογ₃ $\left(\frac{3\alpha^2}{5\beta \sqrt[4]{\gamma}} \right)$ ὑπὸ μορφὴν ἀλγεβρικοῦ ἀθροίσματος λογαρίθμων.

Λύσις. Ἐχομεν :

$$\begin{aligned} \lambda \log_3 \left(\frac{3\alpha^2}{5\beta \sqrt[4]{\gamma}} \right) &= \lambda \log_3 (3\alpha^2) - \lambda \log_3 (5\beta \cdot \sqrt[4]{\gamma}) = \lambda \log_3 3 + \lambda \log_3 \alpha^2 - (\lambda \log_3 5 + \lambda \log_3 \beta + \\ &+ \lambda \log_3 \sqrt[4]{\gamma}) = 1 + 2 \lambda \log_3 \alpha - \lambda \log_3 5 - \lambda \log_3 \beta - \frac{1}{4} \lambda \log_3 \gamma. \end{aligned}$$

2a. Νὰ ἐφαρμοσθοῦν πᾶσαι αἱ δυναται ἰδιότητες τῶν λογαρίθμων ἐπὶ τοῦ

$$\lambda \log \frac{3\alpha^3 \cdot \sqrt[4]{\beta^2 \cdot \gamma}}{5\beta^2 \cdot \sqrt[3]{\alpha^2 \cdot \beta \cdot \gamma^2}}, \quad \text{ἐνθα } \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}^+.$$

Λύσις. Ἐχομεν :

$$\begin{aligned} \lambda \log \frac{3\alpha^3 \cdot \sqrt[4]{\beta^2 \cdot \gamma}}{5\beta^2 \cdot \sqrt[3]{\alpha^2 \cdot \beta \cdot \gamma^2}} &= \lambda \log (3\alpha^3 \cdot \sqrt[4]{\beta^2 \cdot \gamma}) - \lambda \log (5\beta^2 \cdot \sqrt[3]{\alpha^2 \cdot \beta \cdot \gamma^2}) = \\ &= \left[\lambda \log 3 + 3 \lambda \log \alpha + \frac{1}{4} (2 \lambda \log \beta + \lambda \log \gamma) \right] - \left[\lambda \log 5 + 2 \lambda \log \beta + \frac{1}{3} (2 \lambda \log \alpha + \lambda \log \beta + \right. \\ &\quad \left. + 2 \lambda \log \gamma) \right] = \lambda \log 3 - \lambda \log 5 + \frac{7}{3} \lambda \log \alpha - \frac{11}{6} \lambda \log \beta - \frac{5}{12} \lambda \log \gamma. \end{aligned}$$

3η. Ἐὰν $\lambda \log_e I = -\frac{Rt}{L} + \lambda \log_e I \implies I = I \cdot e^{-\frac{Rt}{L}}$.

Λύσις : Ἡ δοθεῖσα γράφεται :

$$\lambda \log_e I - \lambda \log_e I = -\frac{Rt}{L} \quad \text{ἢ} \quad \lambda \log_e \frac{I}{I} = -\frac{Rt}{L}.$$

Κατὰ τὸν δρισμὸν τοῦ λογαρίθμου ἔχομεν ἐκ τῆς τελευταίας ισότητος :

$$e^{-\frac{Rt}{L}} = \frac{i}{I}, \quad \text{ἔξօδος: } i = I \cdot e^{-\frac{Rt}{L}}.$$

4η. Ἐὰν $\alpha > \beta > 0$ καὶ $\alpha^2 + \beta^2 = 11\alpha\beta$, δεῖξατε ὅτι :

$$\lambda \log \frac{\alpha - \beta}{3} = \frac{1}{2} (\lambda \log \alpha + \lambda \log \beta).$$

Απόδειξις : Ἐχομεν :

$$\alpha^2 + \beta^2 - 2\alpha\beta = 9\alpha\beta \quad \text{ἢ} \quad (\alpha - \beta)^2 = 9\alpha\beta \quad \text{ἢ} \quad \alpha - \beta = 3\sqrt{\alpha\beta}$$

$$\frac{\alpha - \beta}{3} = \sqrt{\alpha\beta}.$$

Τότε δῆμως θὰ ἔχωμεν καί :

$$\lambda \log \left(\frac{\alpha - \beta}{3} \right) = \lambda \log \sqrt{\alpha\beta} = \frac{1}{2} (\lambda \log \alpha + \lambda \log \beta).$$

5η. Νὰ δειχθῇ ἡ ἀλήθεια τῆς ισότητος :

$$\frac{7}{16} \lambda \log (3 + 2\sqrt{2}) - 4 \lambda \log (\sqrt{2} + 1) = \frac{25}{8} \lambda \log (\sqrt{2} - 1).$$

Λύσις. Παρατηρούμεν ότι: $3 + 2\sqrt{2} = (\sqrt{2} + 1)^2$.

$$\begin{aligned} \text{Άρα: } & \frac{7}{16} \lambda \circ g(3 + 2\sqrt{2}) - 4 \lambda \circ g(\sqrt{2} + 1) = \frac{7}{16} \lambda \circ g(\sqrt{2} + 1)^2 - 4 \lambda \circ g(\sqrt{2} + 1) = \\ & = \frac{7}{8} \lambda \circ g(\sqrt{2} + 1) - 4 \lambda \circ g(\sqrt{2} + 1) = -\frac{25}{8} \lambda \circ g(\sqrt{2} + 1) \end{aligned} \quad (1)$$

Αλλά κατά τὸ πόρισμα I § 202 ἔχομεν:

$$-\lambda \circ g(\sqrt{2} + 1) = \lambda \circ g\left(\frac{1}{\sqrt{2} + 1}\right) = \lambda \circ g(\sqrt{2} - 1) \quad (2)$$

Η (1), λόγω τῆς (2), γίνεται:

$$\frac{7}{16} \lambda \circ g(3 + 2\sqrt{2}) - 4 \lambda \circ g(\sqrt{2} + 1) = \frac{25}{8} \lambda \circ g(\sqrt{2} - 1).$$

§ 207. Μετάβασις ἐξ ἑνὸς λογαριθμικοῦ συστήματος εἰς ἕτερον (ἀλλαγὴ βάσεως λογαρίθμων).— Αἱ ἀνωτέρω Ιδιότητες τῶν λογαρίθμων ἀναφέρονται ως πρὸς τὴν αὐτὴν βάσιν. Πολλάκις ὅμως παρουσιάζονται, εἰς ἓν καὶ τὸ αὐτὸ πρόβλημα, λογάριθμοι ως πρὸς διαφορετικὰς βάσεις, ὅτε ὁ λογισμὸς, ἀν δχι ἀδύνατος, δὲν εἶναι εὔκολος καὶ διὰ τοῦτο ἔκεινο τὸ ὄποιον ἐπιδιώκομεν, εύθὺς ἐξ ἀρχῆς, εἶναι: πάντες οἱ λογάριθμοι νὰ ἀναφερθοῦν ως πρὸς τὴν αὐτὴν βάσιν.

Τοῦτο ἐπιτυγχάνεται δι' ἐφαρμογῆς τοῦ κάτωθι θεωρήματος:

Θεώρημα.— Ἐὰν γνωρίζωμεν τὸν λογάριθμὸν ἑνὸς ἀριθμοῦ, ως πρὸς βάσιν τινὰ α, εὑρίσκομεν τὸν λογάριθμὸν του, ως πρὸς νέαν βάσιν β, ἐὰν διαιρέσωμεν τὸν γνωστὸν λογάριθμὸν (ώς πρὸς βάσιν α) διὰ τοῦ λογαρίθμου τῆς νέας βάσεως β, ως πρὸς τὴν παλαιάν, ἦτοι:

$\forall \theta \in \mathbb{R}^+$ $0 < \alpha \neq 1$ $0 < \beta \neq 1$	$\longrightarrow \lambda \circ g_{\beta} \theta = \frac{\lambda \circ g_{\alpha} \theta}{\lambda \circ g_{\alpha} \beta}$	(τ)
--	---	-----

Ἀπόδειξις. Ἐστω x ὁ λογάριθμος τοῦ θ , ως πρὸς τὴν νέαν βάσιν β, ἦτοι
ἔστω ὅτι: $\lambda \circ g_{\beta} \theta = x$. (1)

Τότε, κατὰ τὸν ὄρισμὸν τῶν λογαρίθμων, θὰ ἔχωμεν:

$$\beta^x = \theta. \quad (2)$$

Λαμβάνοντες τοὺς λογαρίθμους τῶν μελῶν τῆς Ισότητος (2), ως πρὸς βάσιν α, εὑρίσκομεν:

$$x \lambda \circ g_{\alpha} \beta = \lambda \circ g_{\alpha} \theta, \quad \text{ἐξ οὗ: } x = \frac{\lambda \circ g_{\alpha} \theta}{\lambda \circ g_{\alpha} \beta}.$$

Ἡ τελευταία Ισότης, ἀν ληφθῆ ὑπὸ ὅψιν ἡ (1), γράφεται:

$$\lambda \circ g_{\beta} \theta = \frac{\lambda \circ g_{\alpha} \theta}{\lambda \circ g_{\alpha} \beta}. \quad \text{ὅ.ἔ.δ.}$$

Παρατήρησις. Ὁ τύπος (τ) παρέχει τὸν κανόνα εύρέσεως τῶν λογαρίθμων ως πρὸς τὸ λογαριθμικὸν σύστημα μὲ βάσιν β, ἐὰν φυσικὰ γνωρίζωμεν τοὺς λο-

γαρίθμους ώς πρὸς τὸ σύστημα μὲ βάσιν τὸ α. Λαμβανομένου δὲ ὑπὸ ὅψιν ὅτι ὑπάρχουν λογαριθμικοὶ πίνακες ώς πρὸς βάσιν 10, δυνάμεθα, τῇ βοηθείᾳ τοῦ τύπου (τ) χωρὶς τὴν σύνταξιν νέων πινάκων, νὰ εὕρωμεν τὸν λογάριθμον οἰουδήποτε θετικοῦ ἀριθμοῦ ώς πρὸς οἰανδήποτε βάσιν θέλομεν.

Ο τύπος (τ), ἐὰν ληφθῇ $\alpha = 10$, διότι ώς πρὸς βάσιν 10 ὑπάρχουν πίνακες, γράφεται :

$$\log_{\beta} \theta = \frac{\log \theta}{\log \beta}. \quad (\tau')$$

Πόρισμα.—Τὸ γινόμενον τῶν λογαριθμῶν δύο (θετικῶν) ἀριθμῶν διαφόρων τῆς μονάδος ἔκατέρου ἔχοντος βάσιν τὸν ἔτερον εἶναι ἡ μονάς.

Πράγματι, διὰ $\theta = \alpha$ δ τύπος (τ) δίδει :

$$\log_{\beta} \alpha = \frac{\log_a \alpha}{\log_a \beta} = \frac{1}{\log_a \beta}, \text{ καθ' ὅσον } \log_a \alpha = 1.$$

"Οθεν :

$$\log_a \beta \times \log_{\beta} a = 1$$

'Αξιοσημείωτος ἴστοτης.

Ο τύπος (τ), τῇ βοηθείᾳ τοῦ ἀνωτέρω πορίσματος, γράφεται :

$$\log_{\beta} \theta = \log_a \theta \times \log_{\beta} a$$

Σημ. Μνημονικὸς κανὼν : $\frac{\theta}{\beta} = \frac{\theta}{\alpha} \times \frac{\alpha}{\beta}$.

'Ε φαρμογαὶ : 1η. 'Εὰν $\log 2 = 0,301$ καὶ $\log 5 = 0,698$ νὰ εὑρεθῇ ὁ $\log 250$ καὶ ὁ $\log_2 250$.

Δύσις : α) $\log 250 = \log(2 \cdot 5^3) = \log 2 + 3 \log 5 = 0,301 + 3 \cdot 0,698 = 0,301 + 2,094 = 2,395$.

$$\beta) \log_2 250 = \frac{\log 250}{\log 2} = \frac{2,395}{0,301} = 7,956.$$

2a. Νὰ υπολογισθῇ ἡ ἀριθμητικὴ τιμὴ τῆς παραστάσεως :

$$k = \frac{(\log_2 5 + \log_5 2) \cdot \log_5 5}{\log_2 5 \cdot \log_5 2}.$$

Δύσις : "Εχομεν, δυνάμει τοῦ πορίσματος τῆς § 207 :

$$k = \frac{\left(\frac{1}{\log_2 5} + \frac{1}{\log_5 2} \right) \cdot \frac{1}{\log_5 5}}{1} = \frac{\log_5 2 + \log_2 5}{\log_5 2} = \frac{\log_5(2 \cdot 5)}{\log_5 2} = 1.$$

§ 208. Συλλογάριθμος ἐνδὸς ἀριθμοῦ.— Καλεῖται συλλογάριθμος ἐνὸς θετικοῦ ἀριθμοῦ θ ώς πρὸς βάσιν α, δ λογάριθμος τοῦ ἀντιστρόφου τοῦ θ, ἦτοι τοῦ $\frac{1}{\theta}$ ώς πρὸς τὴν ίδιαν βάσιν καὶ σημειοῦται οὕτω :

συλλογα θ.

Έχομεν κατά ταῦτα :

$$\text{συλλογ}_a \theta = \lambda \text{ογ}_a \frac{1}{\theta} = \lambda \text{ογ}_a 1 - \lambda \text{ογ}_a \theta = -\lambda \text{ογ}_a \theta.$$

Έντεῦθεν ἔπειται ἡ πρότασις :

Ο συλλογάριθμος θετικοῦ τινος ἀριθμοῦ θ ἴσονται πρὸς τὸν ἀντίθετον τοῦ λογαρίθμου τοῦ θ.

Ωστε :

$$\boxed{\text{συλλογ}_a \theta = \lambda \text{ογ}_a \frac{1}{\theta} = -\lambda \text{ογ}_a \theta} \quad (1)$$

Η εἰσαγωγὴ τῶν συλλογαρίθμων ἐπιτρέπει νὰ ἀντικαθιστῶμεν μίαν διαφορὰν λογαρίθμων διὰ τοῦ ἀθροίσματός των. Οὕτως ἔχομεν :

$$\lambda \text{ογ}_a \frac{\theta_1}{\theta_2} = \lambda \text{ογ}_a \theta_1 - \lambda \text{ογ}_a \theta_2 = \lambda \text{ογ}_a \theta_1 + \text{συλλογ}_a \theta_2.$$

Σημ. Ἐκ τῆς (1) ἔχομεν ὅτι :

$$\boxed{\lambda \text{ογ}_a \theta + \text{συλλογ}_a \theta = 0} \quad (2)$$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

436. Νὰ ἐφαρμοσθοῦν πᾶσαι αἱ δυναταιὶ ιδιότητες τῶν λογαρίθμων ἐπὶ τῶν :

$$1) \lambda \text{ογ}_3 3x \frac{\sqrt[3]{x}}{\sqrt[3]{2x}}, \quad 2) \lambda \text{ογ} \frac{\sqrt[4]{x^3} \sqrt{y}}{4\sqrt[4]{x} \cdot y^3}, \quad 3) \lambda \text{ογ} \frac{\sqrt[4]{5} \cdot \sqrt[10]{2}}{\sqrt[4]{18} \sqrt[10]{2}},$$

$$4) \lambda \text{ογ} \frac{3(x^2 - y^2)}{\sqrt[3]{x^2 + y^2}}, \quad 5) \lambda \text{ογ} \frac{5x^3 \sqrt[4]{y^2 z}}{7y^2 \cdot \sqrt[4]{x^2 y z^2}}.$$

437. Εὗρετε τὴν τιμὴν τοῦ : $\lambda \text{ογ}_2 \sqrt[3]{32 \cdot \sqrt{16 \cdot \sqrt[3]{2}}}.$

438. Νὰ ἀποδειχθῇ ἡ ἀλήθεια τῶν κάτωθι Ισοτήτων :

$$1. \lambda \text{ογ} 3 + 2 \lambda \text{ογ} 4 - \lambda \text{ογ} 12 = 2 \lambda \text{ογ} 2$$

$$2. 3 \lambda \text{ογ} 2 + \lambda \text{ογ} 5 - \lambda \text{ογ} 4 = 1$$

$$3. \frac{1}{2} \lambda \text{ογ} 25 + \frac{1}{3} \lambda \text{ογ} 8 + \frac{1}{5} \lambda \text{ογ} 32 = 2 \lambda \text{ογ} 2 + \lambda \text{ογ} 5$$

$$4. \lambda \text{ογ}_\beta \frac{\alpha}{\beta y} = \lambda \text{ογ}_\beta \alpha + \text{συλλογ}_\beta y - 1, \quad \text{ὅπου } \alpha, \beta, y \in \mathbf{R}^+, \beta \neq 1.$$

439. Έάν $\lambda \text{ογ} 2 = 0,30103$ νὰ ὑπολογισθῇ ἡ τιμὴ τῆς παραστάσεως :

$$y = \frac{1}{2} \lambda \text{ογ} 2 + \frac{1}{2} \lambda \text{ογ} (2 + \sqrt{2}) + \frac{1}{2} \lambda \text{ογ} (2 + \sqrt{2 + \sqrt{2}}) + \frac{1}{2} \lambda \text{ογ} (2 - \sqrt{2 + \sqrt{2}}).$$

440. Δείξατε ὅτι : $x^{\lambda \text{ογ} y} = y^{\lambda \text{ογ} x}.$

441. Έάν α, β πραγματικοὶ ἀριθμοὶ μεγαλύτεροι τῆς μονάδος, νὰ ἀπλοποιηθῇ ἡ παράστασις :

$$y = \lambda \text{ογ} (\alpha^2 - 1) + \lambda \text{ογ} (\beta^2 - 1) - \lambda \text{ογ} [(\alpha \beta + 1)^2 - (\alpha + \beta)^2].$$

442. Έάν $\log 2 = 0,301$ και $\log 14 = 1,146$ εύρετε τούς έπομένους λογαρίθμους :

λογ 28, λογ 8, λογ 5, λογ 56, λογ 32, λογ $\frac{4}{7}$, λογ $\sqrt[5]{\frac{5}{64}}$, λογ 35, λογ $\sqrt[3]{70.000}$.

443. Δείξατε ότι : $\log_a \beta \cdot \log_b \gamma \cdot \log_c \alpha = 1$ διά κάθε $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}^+ - \{1\}$.

444. Έάν $\log_x y = \log_y z \cdot \log_z x$, τότε θά είναι : $x = y$ ή $x = \frac{1}{y}$.

445. Γνωρίζοντες, ότι $\log 2 = \alpha$ και $\log 15 = \beta$, νά υπολογισθοῦν συναρτήσει τῶν α και β αἱ παραστάσεις :

1) $\log_3 \sqrt[5]{7,2}$, 2) $\log \sqrt[5]{\frac{5}{6}}$.

446. Έάν $\log(x^2y^3) = \alpha$ και $\log x - \log y = \beta$ νά υπολογισθοῦν οἱ λογχ και λογγ συναρτήσει τῶν α και β.

447. Έάν $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}^+ - \{1\}$ και θέσωμεν: $x = \log_a(\beta\gamma)$, $y = \log_\beta(\gamma\alpha)$, $z = \log_\gamma(\alpha\beta)$ νά υποδειχθῇ ότι : $xyz = x + y + z + 2$.

448. Έάν είναι $\log a - \log b > 0$, τί συνάγεται διά τούς άριθμούς α και β ;

449. Νά εύρεθῃ ἡ βάσης τοῦ λογαριθμικοῦ συστήματος εἰς τὸ δόποιον είναι άληθής ἡ Ισότης :

$$2 (\log_x 8)^2 + \log_x 64 + \log_x 8 = 9.$$

450. Όμοιώς :

$$\log_x \sqrt[3]{625} - \log_x \sqrt[5]{125} + \frac{1}{6} = 0.$$

451. Έάν $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}^+$, διάφοροι άλλήλων και $\frac{\log \alpha}{\beta - \gamma} = \frac{\log \beta}{\gamma - \alpha} = \frac{\log \gamma}{\alpha - \beta}$, νά υποδειχθῇ ότι :

$$\alpha^\alpha \cdot \beta^\beta \cdot \gamma^\gamma = 1.$$

452. Έάν οἱ α, β, γ είναι θετικοὶ και κατέχουν άντιστοίχως τὰς τάξεις μ, ν, ρ εἰς μίαν γεωμετρικήν και μίαν άρμονικήν πρόσδον, δείξατε ότι :

$$\alpha(\beta - \gamma) \log \alpha + \beta(\gamma - \alpha) \log \beta + \gamma(\alpha - \beta) \log \gamma = 0.$$

453. Νά εύρεθῃ τὸ ἀθροισμα τῶν ν πρώτων δρων τῆς σειρᾶς :

$$\sum_{v=1}^{\infty} \alpha_v, \text{ μὲν γενικὸν δρον : } \alpha_v = \log 3^v.$$

454. Έάν οἱ άριθμοι α, β, γ είναι διαδοχικοὶ δροι γεωμετρικῆς προόδου, νά υποδειχθῇ ότι οἱ λογαριθμοι ἐνός άριθμοι (θετικοῦ) ὡς πρὸς βάσεις άντιστοίχως α, β, γ είναι διαδοχικοὶ δροι άρμονικῆς προόδου.

455. Έάν $x, y, z \in \mathbb{R}^+$, διάφοροι τοῦ α, δπου $0 < \alpha \neq 1$, και είναι :

$$y = \alpha^{\frac{1}{1-\log_a x}}, \quad z = \alpha^{\frac{1}{1-\log_a y}}$$

τότε θά είναι :

$$x = \alpha^{\frac{1}{1-\log_a z}}.$$

456. Αριθμητικῆς προόδου ὁ πρῶτος δρος είναι ὁ λογα και ὁ δεύτερος δρος τῆς ὁ λογβ. Νά δειχθῇ ότι τὸ ἀθροισμα Σ_v τῶν ν πρώτων δρων τῆς είναι :

$$\Sigma_v = \frac{1}{2} \cdot \log \frac{\beta^v (v-1)}{\alpha^{v(v-3)}}.$$

457. Έάν $x, y \in \mathbb{R}^+$, δείξατε ότι Ισχύει :

$$x^x \cdot y^y \geqq x^y \cdot y^x.$$

458. Έάν $\alpha \in \mathbb{R}^+$ και $\mu, v \in \mathbb{N}$ τοιούτοι, ώστε $\mu > v$, νά υποδειχθῇ ότι :

$$\frac{1}{\mu} \cdot \log(1 + \alpha^\mu) < \frac{1}{v} \cdot \log(1 + \alpha^v).$$

Δεκαδικοί λογάριθμοι

§ 209. Όρισμός.— Καλείται δεκαδικός λογάριθμος άριθμοῦ τινὸς $\theta > 0$, δὲ $\log_{10}\theta$, ἢτοι ὁ λογάριθμος αὐτοῦ ὡς πρὸς βάσιν 10.

Συνήθως τὸν δεκαδικὸν λογάριθμὸν ἀριθμοῦ $\theta > 0$ καλοῦμεν καὶ ἀπλῶς λογάριθμὸν τοῦ θ καὶ ἀντὶ τοῦ συμβόλου λογ₁₀ θ χρησιμοποιοῦμεν τό : λογ θ (ἄνευ δείκτου).

Ἐκ τοῦ ὄρισμοῦ τοῦ δεκαδικοῦ λογαρίθμου καὶ τοῦ συμβολισμοῦ ἔχομεν τὴν λογικὴν ἴσοδυναμίαν :

$$\boxed{\log \theta = x \iff 10^x = \theta} \quad (1)$$

Οὕτως, ἔχομεν π.χ.

$$\log 100 = \log 10^2 = 2, \quad \log 1000 = \log 10^3 = 3, \quad \log 0,01 = \log 10^{-2} = -2,$$

$$\log \sqrt[5]{10^3} = \log 10^{3/5} = \frac{3}{5}.$$

Γενικῶς : Πᾶσα δύναμις τοῦ 10 μὲ ἐκθέτην ἀριθμὸν ρητὸν (σύμμετρον) ἔχει λογάριθμον τὸν ρητὸν τοῦτον ἐκθέτην, ἢτοι :

$$\log 10^p = p, \quad \forall p \in \mathbb{Q}.$$

Εἰς τὴν εἰδικὴν περίπτωσιν, καθ' ἣν $p \in \mathbb{Z}$, ὁ λογάριθμος τοῦ 10^p εἶναι δὲ ἀκέραιος ἀριθμὸς p . Οὕτως ἔχομεν τὸν ἀκόλουθον πίνακα :

x	...	0,0001	0,001	0,01	0,1	1	10	100	1000	10000	...
$\log x$...	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	...

Οἱ λογάριθμοι τῶν ἀριθμῶν, οἱ δόποι δὲν εἶναι σύμμετροι δυνάμεις τοῦ 10, εἶναι ἀριθμοὶ ἀσύμμετροι. Πράγματι, ἐνθα δεν εἶναι εἰς τοιοῦτος ἀριθμὸς καὶ ὑποθέσωμεν ὅτι οὗτος ἔχει λογάριθμον σύμμετρον ἀριθμὸν π.χ. τὸν $\frac{\mu}{v}$, ἐνθα $\mu \in \mathbb{Z}$,

$v \in \mathbb{N}$, δηλ. ὅτι εἶναι $\log \theta = \frac{\mu}{v}$, τότε $10^{\frac{\mu}{v}} = \theta$, ἀτοπον, λόγω τῆς γενομένης ὑποθέσεως διὰ τὸν θ .

Οὕτω π.χ. ὁ $\log 35$ εἶναι ἀριθμὸς ἀσύμμετρος, διότι ἀν ἢτο : $\log 35 = \frac{\mu}{v}$,

ὅπου $\mu \in \mathbb{Z}$, $v \in \mathbb{N}$, τότε θὰ εἴχομεν : $10^{\frac{\mu}{v}} = 35$ ή $2^\mu \cdot 5^\mu = 5^v \cdot 7^v$.

* Ή τελευταία ὅμως ἴσοτης εἶναι ἀδύνατος (διατί;).

* Άρα ὁ $\log 35$ εἶναι ἀριθμὸς ἀσύμμετρος.

*Ωστε : Οἱ λογάριθμοι δὲν τῶν (θετικῶν) ἀριθμῶν, ἐκτὸς τῶν συμμέτρων δυνάμεων τοῦ 10, δὲν δύνανται νὰ ὑπολογισθοῦν ἀκριβῶς, ἀλλὰ κατὰ προσέγγισιν μιᾶς δεκαδικῆς μονάδος (συνήθως ὑπολογίζονται κατὰ προσέγγισιν 0,00001).

Γενική παρατήρησις. Έν τοῖς ἐπομένοις γίνεται λόγος μόνον περὶ δεκαδικῶν λογαρίθμων. Ἐπειδὴ δὲ ἡ βάσις $\alpha = 10 > 1$, προκύπτει ἐκ τῆς ίδιότητος VI (§ 205) ὅτι: οἱ ἀριθμοὶ οἱ μεγαλύτεροι τῆς μονάδος ἔχουν θετικούς δεκαδικούς λογαρίθμους, οἱ δὲ θετικοὶ καὶ μικρότεροι τῆς μονάδος ἔχουν ἀρνητικούς λογαρίθμους.

§ 210. Χαρακτηριστικὸν καὶ δεκαδικὸν μέρος ἐνὸς λογαρίθμου.

Ἐστω ὅτι θέλομεν νὰ εῦρωμεν τὸν λογ 557.

Ἐπειδὴ $10^2 < 557 < 10^3$

θὰ ἔχωμεν, ἃν λάβωμεν τοὺς λογαρίθμους τῶν τριῶν μελῶν :

$$2 < \text{λογ } 557 < 3.$$

Ἡτοι : $\text{λογ } 557 = 2, \dots$

Δηλαδὴ : λογ 557 = $d + d$, ὅπου d θετικὸς ἀριθμὸς μικρότερος τῆς μονάδος.

Τὸ ἀκέραιον μέρος (εἰς τὸ ἀνωτέρω παραδείγμα ὁ ἀριθμὸς 2) καλεῖται «χαρακτηριστικὸν» τοῦ λογαρίθμου, ὁ δὲ θετικὸς καὶ μικρότερος τῆς μονάδος δεκαδικὸς ἀριθμὸς d καλεῖται «δεκαδικὸν μέρος» τοῦ λογαρίθμου.

Τὸ χαρακτηριστικὸν ἐνὸς λογαρίθμου, π.χ. τοῦ λογθ, παρίσταται συμβολικῶς οὕτω : [λογθ].

Ἐκ τοῦ ἀνωτέρω παραδείγματος καὶ τοῦ ὀρισμοῦ τοῦ χαρακτηριστικοῦ ἐνὸς λογαρίθμου, καθίσταται φανερὸν ὅτι ὡς χαρακτηριστικὸν ἐνὸς λογαρίθμου δρίζομεν τὸν μικρότερον ἐκ δύο διαδοχικῶν ἀκεραίων, μεταξὺ τῶν δυοίων περιέχεται ὁ λογάριθμος αὐτός.

Οὕτως, ἔχομεν :

Ἐάν $\text{λογ} \alpha = 5,03426$, τότε $[\text{λογ} \alpha] = 5$ καὶ $d = 0,03426$.

Ἐάν $\text{λογ} \beta = 0,63752$, τότε $[\text{λογ} \beta] = 0$ καὶ $d = 0,63752$.

Ἐάν $\text{λογ} \gamma = -2,32715$, τότε $[\text{λογ} \gamma] = -3$, διότι $-3 < -2,32715 < -2$.

Τὸ δεκαδικὸν μέρος εἶναι μηδὲν μόνον διὰ τὰς ἀκεραίας δυμάμεις τοῦ 10.

Εἰς πάσας τὰς ἄλλας περιπτώσεις τὸ δεκαδικὸν μέρος λαμβάνεται ὡς θετικὸν.

Ωστε :

Τὸ δεκαδικὸν μέρος ἐνὸς λογαρίθμου εἶναι μὴ ἀρνητικὸς ἀριθμός.

Ἐάν d εἶναι τὸ δεκαδικὸν μέρος τοῦ λογθ καὶ $[\text{λογ} \theta]$ τὸ χαρακτηριστικόν, τότε ἐκ τῆς σχέσεως :

$$\text{λογ} \theta = [\text{λογ} \theta] + d$$

προκύπτει :

$$d = \text{λογ} \theta - [\text{λογ} \theta]$$

Οὕτως ἔχομεν :

Ἐάν $\text{λογ} \theta = -3,45217$, τότε $[\text{λογ} \theta] = -4$ καὶ $d = -3,45217 - (-4) = 0,54783$.

§ 211. Τροπὴ ἀρνητικοῦ λογαρίθμου εἰς ήμιαρνητικόν.— Ἐλέχθη ἀνωτέρω ὅτι τὸ δεκαδικὸν μέρος ἐνὸς λογαρίθμου εἶναι μὴ ἀρνητικὸς ἀριθμός. Ἐπειδὴ ὅμως οἱ λογάριθμοι τῶν θετικῶν ἀριθμῶν τῶν μικροτέρων τῆς μονάδος

είναι άρνητικοί, οἱ δὲ τοιοῦτοι λογάριθμοι δὲν είναι εύχρηστοι εἰς τὸν λογισμόν, διὸ τοῦτο τρέπομεν τοὺς άρνητικοὺς λογαρίθμους εἰς «ἡμιαρνητικούς», δηλαδὴ εἰς λογαρίθμους τῶν δποίων μόνον τὸ ἀκέραιον μέρος (χαρακτηριστικόν) είναι άρνητικόν, τὸ δὲ δεκαδικὸν θετικόν.

* Ή τροπή αὕτη γίνεται ώς ἔξης :

*Εστω π.χ. δ (δλως) άρνητικὸς λογαρίθμος ἀριθμοῦ τινὸς

$$\delta = -2,54327 \quad \eta\tauοι \quad \delta = -2 - 0,54327.$$

*Εάν εἰς αὐτὸν προσθέσωμεν -1 καὶ $+1$, ὅπερ δὲν τὸν μεταβάλλει, λαμβάνομεν:

$$-2 - 1 + 1 - 0,54327 = -3 + (1 - 0,54327) = -3 + 0,45673.$$

*Ωστε είναι : $-2,54327 = -3 + 0,45673.$

*Αλλὰ τὸ ἀθροισμα τοῦ ἀκέραιου άρνητικοῦ μέρους -3 καὶ τοῦ δεκαδικοῦ $0,45673$ συμφωνοῦμεν νὰ τὸ γράφωμεν, ώς ἔξης : $\bar{3},45673$. δηλαδὴ γράφομεν τὸ πλήν ύπεράνω τοῦ ἀκέραιου μέρους, ἵνα δηλώσωμεν, ὅτι τοῦτο μόνον είναι άρνητικόν. *Υπὸ τὴν μορφὴν αὕτην φαίνεται, ὅτι χαρακτηριστικὸν τοῦ λογαρίθμου είναι τὸ ἀκέραιον μέρος -3 , διότι ὁ λογαρίθμος περιλαμβάνεται μεταξὺ τῶν διαδοχικῶν ἀκέραιών -3 καὶ -2 καὶ δεκαδικὸν μέρος τοῦ λογαρίθμου, τὸ ἀναγραφόμενον δεκαδικὸν μέρος, διότι τοῦτο είναι ἡ διαφορά, ἡ ὅποια προκύπτει, ἀν ἀπὸ τὸν λογαρίθμον $-3 + 0,45673$ ἀφαιρεθῆ τὸ χαρακτηριστικὸν αὐτοῦ -3 .

*Ομοίως ἔχομεν :

$$\begin{aligned} -3,75632 &= -3 - 0,75632 = -3 - 1 + 1 - 0,75632 = -4 + (1 - 0,75632) = \\ &= -4 + 0,24368 = \bar{4},24368. \end{aligned}$$

*Εκ τῶν ἀνωτέρω παραδειγμάτων συνάγομεν τὸν κάτωθι κανόνα :

Κανών. Διὰ νὰ τρέψωμεν ἀρνητικὸν λογάριθμον εἰς ἡμιαρνητικόν, ανξάνομεν τὴν ἀπόλυτον τιμὴν τοῦ ἀκέραιον κατὰ 1 καὶ γράφομεν τὸ — ύπεράνω τοῦ εὐρισκομένου ἀθροίσματος, δεξιὰ δὲ τούτον γράφομεν ώς δεκαδικὰ ψηφία τὰς διαφορὰς τῶν δεκαδικῶν ψηφίων τοῦ δοθέντος, τοῦ μὲν τελευταίου (σημαντικοῦ) ἀπὸ τοῦ 10 τῶν δὲ ἄλλων ἀπὸ τὸ 9.

Οὔτως, ἔχομεν π.χ.

*Εάν λογ $\theta = -3,85732$, θὰ ἔχωμεν : λογ $\theta = \bar{4},14268.$

*Εάν λογ $\theta = -2,35724$, θὰ ἔχωμεν : λογ $\theta = \bar{3},64276.$

§ 212. Ιδιότητες τῶν δεκαδικῶν λογαρίθμων.—α'). Τὸ χαρακτηριστικὸν ἐνὸς λογαρίθμου είναι ὁ ἐκθέτης τῆς μεγαλυτέρας ἀκέραιας δυνάμεως τοῦ 10, ἡ ὅποια δὲν ύπερβαίνει τὸν ἀριθμόν.

*Ἀπόδειξις. Πράγματι ἔάν 10^k είναι ἡ μεγαλυτέρα ἀκέραια δύναμις τοῦ 10 ἡ μὴ ύπερβαίνουσα τὸν (θετικὸν) ἀριθμὸν θ , τότε θὰ ἔχωμεν :

$$10^k \leq \theta < 10^{k+1}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

*Εξ οὗ :

$$k \leq \log \theta < k + 1.$$

*Ἄρα δὲ λογθ ἡ θὰ είναι ἵσος μὲν k ἡ μὲν $k + d$, ὅπου $0 < d < 1$.

*Οθεν τὸ χαρακτηριστικὸν τοῦ λογαρίθμου θ είναι ἵσον πρὸς k .

β'). Τὸ χαρακτηριστικὸν τοῦ λογαρίθμου ἐνὸς ἀριθμοῦ μεγαλυτέρου τῆς μονάδος ἰσοῦται πρὸς τὸ πλῆθος τῶν ψηφίων τοῦ ἀκέραιου μέρους αὐτοῦ, ἐλαττωθὲν κατὰ μονάδα.

*Απόδειξις. Ἐστω ὅτι ὁ ἀριθμὸς θ εἶναι μεγαλύτερος τῆς μονάδος. Ἐάν τὸ ἀκέραιον μέρος τοῦ θ ἔχῃ k ψηφία, τότε ὁ θ θὰ περιέχεται μεταξὺ 10^{k-1} καὶ 10^k ἥτοι θὰ ἔχωμεν :

$$10^{k-1} \leq \theta < 10^k.$$

*Εξ οὗ : $(k - 1) \leq \log \theta < k.$

Οθεν τὸ χαρακτηριστικὸν τοῦ λογθ εἶναι ἵσον πρὸς $(k - 1)$.

Οὔτω π.χ. $\log 235 = 2, \dots$

$$\log 5378,4 = 3, \dots$$

$$\log 3,748 = 0, \dots$$

γ'). Τὸ χαρακτηριστικὸν τοῦ λογαρίθμου ἐνὸς θετικοῦ ἀριθμοῦ μικροτέρου τῆς μονάδος γεγραμμένου ὑπὸ δεκαδικὴν μορφὴν, ἔχει τόσας ἀρνητικὰς μονάδας, ὅση εἶναι ἡ τάξις τοῦ πρώτου σημαντικοῦ ψηφίου του μετὰ τὴν ὑποδιαστολήν.

*Απόδειξις. Ἐστω ὅτι ὁ θετικὸς ἀριθμὸς θ εἶναι μικρότερος τῆς μονάδος ($0 < \theta < 1$). Ἐάν k εἶναι ἡ θέσις τοῦ πρώτου σημαντικοῦ ψηφίου μετὰ τὴν ὑποδιαστολὴν εἰς τὴν δεκαδικὴν μορφὴν τοῦ θ , θὰ εἶναι :

$$10^{-k} \leq \theta < 10^{-k+1}$$

*Εξ οὗ : $\log 10^{-k} \leq \log \theta < \log 10^{-k+1}$

ἢ $-k \leq \log \theta < -k + 1.$

Οθεν τὸ χαρακτηριστικὸν τοῦ λογθ εἶναι ἵσον πρὸς $-k$.

Οὔτω π.χ. $\log 0,00729 = \bar{3}, \dots$

$$\log 0,27508 = \bar{1}, \dots$$

$$\log 0,08473 = \bar{2}, \dots$$

Παρατήρησις. Τῇ βοηθείᾳ τῶν ἀνωτέρω ἴδιοτήτων δυνάμεθα νὰ εύρισκωμεν νοερῶς (ἀπὸ μήνης) τὸ χαρακτηριστικὸν τοῦ λογαρίθμου ἐνὸς ἀριθμοῦ.

*Αντιστρόφως τώρα ἐκ τῶν ἴδιοτήτων β' καὶ γ' ἐπεται ὅτι :

δ'). Ἐάν τὸ χαρακτηριστικὸν τοῦ λογαρίθμου ἐνὸς ἀριθμοῦ (θετικοῦ) x εἶναι ἀριθμὸς θετικὸς ἢ μηδὲν, τότε ὁ ἀριθμὸς x ἔχει τόσα ἀκέραια ψηφία ὅσας μονάδας ἔχει τὸ χαρακτηριστικὸν καὶ ἔν ἀκόμη. Ἐάν ὁ λογαρίθμος τοῦ x εἶναι ἡμιαρνητικός, τότε τὸ ἀκέραιον μέρος τοῦ x εἶναι τὸ μηδέν, τὸ δὲ πρώτον σημαντικὸν ψηφίον τοῦ x μετὰ τὴν ὑποδιαστολὴν κατέχει τάξιν ἵσην μὲ τὸ πλῆθος τῶν μονάδων τῆς ἀπολύτου τιμῆς τοῦ χαρακτηριστικοῦ.

Οὔτως, ἐὰν τὸ χαρακτηριστικὸν τοῦ λογαρίθμου ἀριθμοῦ τίνος εἴναι 3, τὸ ἀκέραιον μέρος τοῦ ἀριθμοῦ ἔχει τέσσαρα ψηφία· ἐάν τὸ χαρακτηριστικὸν εἶναι 0, τὸ ἀκέραιον μέρος τοῦ ἀριθμοῦ ἔχει ἔν ψηφίον· ἐάν τὸ χαρακτηριστικὸν εἶναι 2, ὁ ἀριθμὸς εἶναι δεκαδικὸς τῆς μόρφης $0,0y_1y_2y_3y_4\dots$, ἔνθα $1 \leq y_1 \leq 9$.

* ε'). Έαν πολλαπλασιάσωμεν (ή διαιρέσωμεν) ἔνα ἀριθμὸν $\epsilon_{\pi} 10^v$, $v \in \mathbb{N}$, τὸ δεκαδικὸν μέρος τοῦ λογαρίθμου δὲν μεταβάλλεται, τὸ χαρακτηριστικὸν ὅμως αὐτοῦ αὐξάνεται (ή ἐλαττούται) κατὰ v μονάδας.

*Απόδειξις. Ἐστω ὁ θετικὸς ἀριθμὸς θ μὲν λογθ = $y_0, y_1y_2y_3\dots$

Πολλαπλασιάζοντες τὸν ἀριθμὸν θ ἐπὶ 10^v , $v \in \mathbb{N}$ ἔχομεν τότε :

$$\begin{aligned}\text{λογ} (10^v \cdot \theta) &= \text{λογ} 10^v + \text{λογ} \theta = v + \text{λογ} \theta = v + y_0, y_1y_2y_3\dots = \\ &= (y_0 + v), y_1y_2y_3\dots\end{aligned}\quad (1)$$

*Ομοίως, διαιροῦντες τὸν θ διὰ τοῦ 10^v , $v \in \mathbb{N}$ ἔχομεν :

$$\begin{aligned}\text{λογ} \left(\frac{\theta}{10^v} \right) &= \text{λογ} \theta - \text{λογ} 10^v = -v + \text{λογ} \theta = -v + y_0, y_1y_2y_3\dots = \\ &= (y_0 - v), y_1y_2y_3\dots\end{aligned}\quad (2)$$

Αἱ ἰσότητες (1) καὶ (2) δεικνύουν ὅτι τὸ δεκαδικὸν μέρος τοῦ λογαρίθμου τοῦ ἀριθμοῦ $\theta \cdot 10^k$, $k \in \mathbb{Z}$, εἶναι τὸ αὐτὸν μὲν τὸ δεκαδικὸν μέρος τοῦ λογθ, τὸ χαρακτηριστικὸν ὅμως τοῦ λογ ($\theta \cdot 10^k$) αὐξάνεται (ή ἐλαττούται, ἢν k ἀρνητικὸς ἀκέραιος) κατὰ k μονάδος ἐν σχέσει πρὸς τὸ χαρακτηριστικὸν τοῦ λογθ.

Δυνάμει τῆς ἀνωτέρω ἴδιότητος οἱ ἀριθμοὶ π.χ. 5, 50, 500, 5000, ... ἔχουν τὸ αὐτὸν δεκαδικὸν μέρος εἰς τὸν λογαρίθμον τους. Ἐπίσης οἱ ἀριθμοί :

$$0,5 \cdot 0,05 \cdot 0,005 \cdot 0,0005\dots$$

Πόρισμα. — *Έαν δύο ἀριθμοὶ ἔχουν τὰ αὐτὰ ψηφία καὶ κατὰ τὴν αὐτὴν τάξιν, διαφέρουν δὲ μόνον ὡς πρὸς τὴν θέσιν τῆς ὑποδιαστολῆς, οἱ λογάριθμοί των διαφέρουν μόνον κατὰ τὸ χαρακτηριστικὸν των.

Οὕτως, ἐὰν εἴναι π.χ. $\text{λογ } 312,865 = 2,49536$,
τότε θὰ εἴναι : $\text{λογ } 31,2865 = 1,49536$
 $\text{λογ } 0,312865 = 1,49536$
 $\text{λογ } 31286,5 = 4,49536$
 $\text{λογ } 3,12865 = 0,49536$.

§ 213. Πράξεις ἐπὶ τῶν δεκαδικῶν λογαρίθμων. — Αἱ πράξεις ἐπὶ τῶν δεκαδικῶν λογαρίθμων γίνονται καθὼς καὶ οἱ πράξεις ἐπὶ τῶν δεκαδικῶν σχετικῶν ἀριθμῶν, μὲν παραλλαγὰς τινας, ὅταν οἱ λογάριθμοι ἔχουν ἀρνητικὸν χαρακτηριστικόν. Ἐκτενέστερον ἔχομεν τὰ ἔξι :

a'). Πρόσθεσις λογαρίθμων. Διὰ νὰ προσθέσωμεν δεκαδικοὺς λογαρίθμους προσθέτομεν τὰ δεκαδικὰ μέρη, τὰ δόποια εἴναι δλα θετικὰ καὶ τὸ ἀκέραιον μέρος τοῦ ἀθροίσματος αὐτῶν τὸ προσθέτομεν ἀλγεβρικῶν εἰς τὸ ἀλγεβρικὸν ἀθροίσμα τῶν ἀκέραιών μερῶν τῶν λογαρίθμων.

Π.χ. 1) Νὰ γίνῃ ἡ πρόσθεσις : $\bar{5},57834 + \bar{3},67641$. Ἐχομεν :

$\bar{5},57834$

$\bar{3},67641$

$\bar{7},25475$

Προσθέτομεν τὰ δεκαδικὰ μέρη των, ὡς συνήθως, καὶ ἔχομεν τελικὸν κρατούμενον 1, δτε τὸ ἀκέραιον μέρος τοῦ ἀθροίσματος εἴναι :

$$1 + (-3) + (-5) = -7 = \bar{7}.$$

2) Νὰ γίνῃ ἡ πρόσθεσις : $\bar{2},85643 + \bar{2},24482 + \bar{3},42105 + \bar{1},24207$. "Εχομεν :

$\bar{2},85643$

$\bar{2},24482$

$\bar{3},42105$

$\bar{1},24207$

$\bar{3},76437$

'Ενταῦθα τὸ ἀθροισμα τῶν δεκαδικῶν μερῶν ἔχει μίαν ἀκεραίαν μονάδα καὶ συνεπῶς τὸ ἀκέραιον μέρος τοῦ ἀθροίσματος εἶναι :
 $1 + (-1) + (-3) + 2 + (-2) = -3 = \bar{3}$.

β'). 'Αφαίρεσις λογαρίθμων. 'Η ἀφαίρεσις λογαρίθμων γίνεται, ὅπως καὶ ἡ ἀφαίρεσις τῶν συνήθων δεκαδικῶν ἀριθμῶν, ἡ δὲ διαφορά τῶν δεκαδικῶν μερῶν εἶναι θετικὸς ἀριθμός. 'Εάν ἐκ τῆς ἀφαίρέσεως τῶν δεκαδικῶν μερῶν προκύψῃ τελικῶς κρατούμενον, τοῦτο εἶναι θετικὸν καὶ προστίθεται (ἀλγεβρικῶς) μὲ τὸ χαρακτηριστικὸν τοῦ ἀφαιρετέου, ἀκολούθως δὲ τὸ ἀθροισμα τοῦτο ἀφαιρεῖται ἀπὸ τὸ χαρακτηριστικὸν τοῦ μειωτέου.

Π.χ. 1) Νὰ γίνῃ ἡ ἀφαίρεσις : $\bar{2},83754 - \bar{5},32452$. "Εχομεν :

$\bar{2},83754$

$\bar{5},32452$

$\bar{3},51302$

'Ενταῦθα δὲν ὑπάρχει κρατούμενον, τὸ δὲ χαρακτηριστικὸν ίσοῦται πρός : $-2 - (-5) = 3$.

2) Νὰ γίνῃ ἡ ἀφαίρεσις : $\bar{3},48765 - \bar{2},75603$. "Εχομεν :

$\bar{3},48765$

$\bar{2},75603$

$\bar{2},73162$

'Ενταῦθα τὸ τελικὸν κρατούμενον εἶναι 1, τὸ δὲ χαρακτηριστικὸν ίσοῦται πρός : $-3 - (-2 + 1) = -3 - (-1) = -2 = \bar{2}$.

3) 'Ομοιώς ἔχομεν :

$$\begin{array}{r} \bar{2},95842 \\ \bar{5},76923 \\ \hline 3,18919 \end{array} \quad \begin{array}{r} \bar{5},67835 \\ 0,85632 \\ \hline 6,82203 \end{array} \quad \begin{array}{r} 0,35893 \\ \bar{3},44972 \\ \hline 2,90921 \end{array} \quad \begin{array}{r} 2,72125 \\ 5,28582 \\ \hline 3,43543 \end{array}$$

Παρατήρησις. 'Ως γνωστὸν (§ 208) εἶναι :

$$\text{λογα} - \text{λογβ} = \text{λογα} + \text{συλλογβ},$$

Ἔτοι ἡ ἀφαίρεσις ἐνὸς λογαρίθμου ἀνάγεται εἰς τὴν πρόσθεσιν τοῦ συλλογαρίθμου τοῦ.

"Υπολογισμὸς τοῦ συλλογαρίθμου ἐνὸς ἀριθμοῦ, γνωστοῦ ὅντος τοῦ λογαρίθμου τοῦ.

"Εστω ὅτι εἶναι $\text{λογβ} = 2,54675$. Τότε θὰ ἔχωμεν :

$$\text{συλλογβ} = -\text{λογβ} = -2,54675. \quad (1)$$

'Επειδὴ (§ 211)

$$-2,54675 = \bar{3},45325, \text{ ἡ ἴσοτης (1) γίνεται :}$$

$$\text{συλλογβ} = \bar{3},45325.$$

Ἐντεῦθεν ἔπειται ὁ ἔξῆς :

Κανὼν. Διὰ νὰ εὑρωμεν τὸν συλλογάριθμον ἐνὸς ἀριθμοῦ, τοῦ ὅποιον γνωρίζομεν τὸν λογάριθμον, προσθέτομεν εἰς τὸ χαρακτηριστικὸν τοῦ λογαρίθμου τὸ $+1$ καὶ τοῦ ἀθροίσματος ἀλλάσσομεν τὸ σημεῖον, ἀκολούθως ἀφαιροῦμεν τὰ φηφία τοῦ δεκαδικοῦ μέρους ἀπὸ τοῦ 9, ἐκτὸς τελευταίου σημαντικοῦ, τὸ ὅποιον ἀφαιροῦμεν ἀπὸ τοῦ 10.

Κατά ταῦτα ἔχομεν :

$$\text{Έάν } \log \alpha = \bar{1},37260 \implies \text{συλλογα} = 0,62740$$

$$\text{Έάν } \log 0,06543 = \bar{2},81578 \implies \text{συλλογ} 0,06543 = 1,18422.$$

γ). Πολλαπλασιασμὸς ἐνδὸς λογαρίθμου ἐπὶ ἀκέραιον ἀριθμόν.

Διακρίνομεν δύο περιπτώσεις :

i). Έάν ὁ ἀκέραιος εἶναι θετικός, τότε πολλαπλασιάζομεν τὸ δεκαδικὸν μέρος τοῦ λογαρίθμου ἐπὶ τὸν θετικὸν ἀκέραιον καὶ γράφομεν μόνον τὰ δεκαδικὰ ψηφία τοῦ γινομένου, τὸ δὲ ἀκέραιον μέρος τοῦ γινομένου τὸ προσθέτομεν ἀλγεβρικῶς εἰς τὸ γινόμενον τοῦ χαρακτηριστικοῦ ἐπὶ τὸν θετικὸν ἀκέραιον.

Π.χ. Νὰ γίνῃ ὁ πολλαπλασιασμός : $\bar{2},65843 \times 4$. Ἐχομεν :

$\bar{2},65843$

$\frac{4}{\bar{6},63372}$

'Ἐνταῦθα τὸ τελικὸν κρατούμενον εἶναι 2, τὸ δὲ χαρακτηριστικὸν τοῦ γινομένου ισοῦται πρός : $(-2) \cdot 4 + 2 = -6 = \bar{6}$.

ii). Έάν ὁ ἀκέραιος εἶναι ἀρνητικός, τότε πολλαπλασιάζομεν τὸν συλλογάριθμον τοῦ ἀριθμοῦ ἐπὶ τὸν ἀντίθετον τοῦ ἀκέραιου καὶ οὕτως ἀγόμεθα εἰς τὴν πρώτην περίπτωσιν.

Π.χ. Νὰ γίνῃ ὁ πολλαπλασιασμός : $\bar{3},67942 \times (-4)$.

Έάν $\log x = \bar{3},67942 \implies \text{συλλογ} x = 2,32058$ καὶ συνεπῶς :

$$\bar{3},67942 \times (-4) = 2,32058 \times 4 = 9,28232.$$

δ'). Διαιρέσις ἐνδὸς λογαρίθμου δι' ἀκέραιον ἀριθμοῦ.

1). Διὰ νὰ διαιρέσωμεν τὸν λογθ διὰ θετικοῦ ἀκέραιου (φυσικοῦ) ἀριθμοῦ k, ἐφ' ὅσον μὲν λογθ > 0 ἐργαζόμεθα ὅπως εἰς τοὺς δεκαδικοὺς ἀριθμούς· ἔάν ὅμως ὁ λογθ εἶναι ἡμιαρνητικὸς ἐργαζόμεθα ὡς ἔξῆς :

1α). Έάν ὁ k διαιρῇ (ἀκριβῶς) τὸ χαρακτηριστικὸν τοῦ λογθ, τότε διαιροῦμεν χωριστὰ τὸ δεκαδικὸν μέρος καὶ χωριστὰ τὸ χαρακτηριστικὸν καὶ προσθέτομεν τὰ πηλίκα.

1β). Έάν ὁ k δὲν διαιρῇ τὸ χαρακτηριστικόν, τότε προσθέτομεν εἰς αὐτὸ τὸν μικρότερον ἀρνητικὸν ἀκέραιον —μ οὔτως, ὥστε νὰ καταστῇ διαιρετὸν διὰ τοῦ k, ἀκολούθως προσθέτομεν τὸν $+μ$ εἰς τὸ ἀκέραιον μέρος (τὸ δποῖον εἶναι τὸ μηδὲν) τοῦ δεκαδικοῦ μέρους καὶ εύρισκομεν χωριστὰ τὰ πηλίκα τῶν δύο αὐτῶν μερῶν διὰ τοῦ k, τὰ δποῖα καὶ προσθέτομεν τελικῶς.

Π.χ. Νὰ γίνουν αἱ διαιρέσεις : 1) $(\bar{6},54782) : 3$ καὶ 2) $(\bar{5},62891) : 3$:

Αῦται γίνονται ὡς ἔξῆς :

1)	$\bar{6},54782$	3	$\bar{2} + 0,18260 =$	$\bar{2},18260$
	$\bar{6}$			
	$0 + 0,54782$			
	24			
	07			
	18			
	02			

2)	$\bar{5},62891$	3	$\bar{2} + 0,54297 =$	$\bar{2},54297$
	$\bar{5} + \bar{1} + \bar{1} + 0,62891$			
	$\bar{6} + 1,62891$			
	$\bar{6}$			
	$0 + 1,62891$			
	12			
	08			
	29			
	21			
	0			

2. Διά την διαιρέσωμεν τὸν λογθ διά τοῦ ἀρνητικοῦ ἀκεραίου κ διαιροῦμεν τὸν συλλογθ διά τοῦ — k > 0.

Π.χ. Νὰ γίνῃ ἡ διαιρέσις : (5,92158) : (-2). "Εχομεν :

Ἐάν λογx = 5,92158 \Rightarrow συλλογx = 6,07842, δτε θὰ έχωμεν :

$$(5,92158) : (-2) = (6,07842) : 2 = 3,03921.$$

AΣΚΗΣΕΙΣ

459. Νὰ γίνουν ἡμιαρνητικοὶ οἱ λογάριθμοι :

- 1) -2,32254 2) -0,69834 3) -1,27218 4) -3,54642
5) -0,41203 6) -5,78952 7) -0,00208 8) -2,05024.

460. Γράψατε τὸ χαρακτηριστικὸν τῶν λογαριθμῶν τῶν κάτωθι ἀριθμῶν :

- 1) 135 2) 2050 3) 9,5 4) 0,003 5) 382,27
6) 47,5 7) $\frac{17}{3}$ 8) 12,25 9) 0,56 10) 3041,7.

461. Πόσα ἀκέραια ψηφία έχει ἀριθμός, τοῦ ὅποιου ὁ λογάριθμος έχει χαρακτηριστικό :

- 3, 5, 0, 1, 7, 4, 2 ;

462. Ποία είναι ἡ τάξις τοῦ πρώτου σημαντικοῦ ψηφίου μετά τὴν ὑποδιαστολὴν τοῦ ἀριθμοῦ, τοῦ ὅποιου δ λογάριθμος έχει χαρακτηριστικόν : -1, -2, -3, -4, -5, -7 ;

463. 'Ἐάν λογα = 1,63819 καὶ λογ 4347 = 3,63819, νὰ εύρεθῇ δ α.

464. Διθέντος δτι λογ 7 = 0,84510, εύρετε τοὺς λογαριθμοὺς τῶν ἀριθμῶν :

$$7 \cdot 10^3, \quad 7 \cdot 10^4, \quad \frac{7}{10^2}, \quad \frac{7}{10^5}.$$

465. 'Ἐάν λογ 7283 = 3,86231, νὰ εύρεθῇ δ λογάριθμος τῶν ἀριθμῶν :

$$0,7283, \quad 7,283, \quad 0,007283, \quad 728300, \quad 728,3.$$

466. Νὰ εύρεθοῦν τὰ ἔξαγομενα :

$$\text{λογ } 724 - \text{λογ } 7,24, \quad \text{λογ } 0,65 - \text{λογ } 6,5, \quad \text{λογ } 17,62 - \text{λογ } 1,762.$$

467. Νὰ εύρεθοῦν οἱ συλλογάριθμοι τῶν ἀριθμῶν μὲ τοὺς κάτωθι λογαριθμοὺς :

1. 3,27284 2. 0,07257 3. 1,71824,
4. 5,27203 5. 4,75304 6. 1,03275.

468. 'Ἐάν λογα = 2,29814 καὶ λογβ = 2,84212, ὑπολογίσατε τά :

1. λογα + λογβ, 2. λογα - λογβ, 3) 3 λογα + 5 λογβ,
4. 2 λογβ - $\frac{3}{4}$ λογα, 5. $\frac{7}{5}$ (λογα + λογβ) - $\frac{3}{4}$ (λογα - λογβ).

469. Νὰ εύρεθοῦν τὰ κάτωθι ἀθροίσματα :

1. 5,27214 + 3,4751 + 1,81523 + 0,47214
2. 4,67471 + 2,14523 + 0,67215 + 3,04703.

470. Νὰ εύρεθῇ τὸ ἔξαγόμενον τῶν κάτωθι πράξεων :

1. 3,24518 + 1,41307 - 2,47503
2. 0,03182 - 4,27513 + 3,82504 - 1,08507.

471. Νὰ ὑπολογισθοῦν τὰ κάτωθι γινόμενα :

1. 3,82307 × 5, 2. 0,24507 × (-2), 3. 1,24513 × 4.

472. Νὰ ἑκτελεσθοῦν αἱ κάτωθι διαιρέσεις :

1. $\overline{4,89524} : 3$,
2. $\overline{5,60106} : (-3)$,
3. $\overline{4,57424} : \left(-\frac{3}{7}\right)$,
4. $\overline{1,42118} : 4$,
5. $\overline{6,27508} : (-2)$,
6. $\overline{8,32403} : 4$.

473. Ἐάν Κ είναι τὸ πλῆθος τῶν ἀκεραίων ἀριθμῶν, τῶν δποίων οἱ λογάριθμοι ἔχουν χαρακτηριστικόν καὶ Λ είναι τὸ πλῆθος τῶν ἀκεραίων, τῶν δποίων οἱ ἀντίστροφοι ἔχουν λογαρίθμους μὲ χαρακτηριστικόν $-λ$ ($\lambda > 0$), νὰ δειχθῇ δτι :

$$\log K - \log \Lambda = k - \lambda + 1.$$

Περὶ λογαριθμικῶν πινάκων

§ 214.—Εἰδομεν εἰς τὴν § 209 δτι, ἑκτὸς τῶν συμμέτρων δυνάμεων τοῦ 10, πάντων τῶν ἄλλων θετικῶν ἀριθμῶν οἱ λογάριθμοι είναι ἀσύμμετροι ἀριθμοὶ καὶ ἔχουν διὰ τοῦτο ἀπειρα δεκαδικὰ ψηφία μὴ περιοδικά. Ἐνεκα τούτου εύρισκομεν τοὺς λογαρίθμους τῶν ἀριθμῶν τούτων κατὰ προσέγγισιν (συνήθως 0,00001). Ἐπειδὴ ἔξ ἄλλου λογ $\frac{1}{\alpha} = -\log \alpha$, ἐπεται δτι, ἂν γνωρίζωμεν τοὺς λογαρίθμους τῶν ἀριθμῶν > 1 , δυνάμεθα νὰ ὑπολογίσωμεν καὶ τοὺς λογαρίθμους τῶν θετικῶν ἀριθμῶν < 1 .

Ἐξ ἄλλου εἰδομεν δτι ὁ λογάριθμος ἐνὸς ἀριθμοῦ ἀποτελεῖται ἀπὸ δύο μέρη : Ἀπὸ τὸ χαρακτηριστικόν του καὶ ἀπὸ τὸ δεκαδικόν του μέρους.

Τὸ χαρακτηριστικόν του ἐδείξαμεν εἰς τὴν § 212, πῶς ὑπολογίζεται ἀπὸ μνήμης.

Τὸ δεκαδικὸν μέρος τοῦ λογαρίθμου δύναται νὰ ὑπολογισθῇ εἰς οίονδήποτε ἐπιθυμητὸν βαθμὸν προσεγγίσεως μὲ δεκαδικὰ ψηφία, τῇ βοηθείᾳ μεθόδων αἱ δποῖαι ἀναπτύσσονται εἰς τὰ ἀνώτερα μαθηματικά. Τῇ βοηθείᾳ τῶν μεθόδων τούτων τὸ δεκαδικὸν μέρος τῶν λογαρίθμων ὅλων τῶν ἀκεραίων ἀριθμῶν ἀπὸ τοῦ 1 καὶ ἐφεξῆς, συνήθως μέχρι τοῦ 10.000, εὑρέθη καὶ κατεγράφη εἰς πίνακας, οἱ δποῖοι λέγονται λογαριθμικοὶ πίνακες ἢ «πίνακες τοῦ δεκαδικοῦ μέρους».

Τοιοῦτοι πίνακες ὑπάρχουν διαφόρων εἰδῶν. Εἰς περιέχει τοὺς λογαρίθμους τῶν ἀκεραίων ἀριθμῶν ἀπὸ τοῦ 1 ἕως 10.000 μὲ 7 δεκαδικὰ ψηφία. «Ἄλλος μὲ 11 δεκαδικὰ ψηφία. »Άλλος μὲ 14 δεκαδικὰ ψηφία καὶ ἄλλος μὲ 5 δεκαδικὰ ψηφία. Διὰ τὰς συνήθεις ὅμως ἐφαρμογὰς ἀρκεῖ δ πενταψήφιος πίναξ, τοῦ δποίου ὑπάρχουν καὶ Ἑλληνικαὶ ἐκδόσεις κατὰ τὸ σύστημα Dupuis.

Τοῦτον θὰ περιγράψωμεν συντόμως εἰς τὰ ἐπόμενα καὶ θὰ ἐκθέσωμεν καὶ τὸν τρόπον τῆς χρήσεως αὐτοῦ.

§ 215. Περιγραφὴ τῶν λογαριθμικῶν πινάκων Dupuis.— Οἱ λογαριθμικοὶ πίνακες Dupuis περιέχουν τοὺς λογαρίθμους τῶν ἀκεραίων ἀριθμῶν ἀπὸ 1 ἕως 10.000. Ἡ διάταξις τῶν λογαριθμικῶν πινάκων φαίνεται εἰς τὸν ἔναντι «πίνακα», ὅστις ἔχει ληφθῆ ἐκ τῆς γαλλικῆς ἐκδόσεως τοῦ J. Dupuis.

N	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
500	69897	906	914	923	932	940	949	958	966	975
1	984	992	*001	*010	*018	*027	*036	*044	*053	*062
2	70070	079	088	096	105	114	122	131	140	148
3	157	165	174	183	191	200	209	217	226	236
4	243	252	260	269	278	286	295	303	312	321
5	329	338	346	355	364	372	381	389	398	406
6	415	424	432	441	449	458	467	475	484	492
7	501	509	518	526	535	544	552	561	569	578
8	586	595	603	612	621	629	638	646	655	663
9	672	680	689	697	706	714	723	731	740	749
510	757	766	774	783	791	800	808	817	825	834
1	842	851	859	868	876	885	893	902	910	919
2	927	935	944	952	961	969	978	986	995	*003
...
549	73957	965	973	981	989	997	*005	*013	*020	*028
N	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Εις τὴν πρὸς τὰ ἀριστερὰ στήλην, ἀνωθεν τῆς ὁποίος ὑπάρχει τὸ γράμμα N (Nombres = ἀριθμοί), εἰς δὲ τὰς Ἑλληνικὰς ἔκδόσεις τὸ γράμμα A (ἀριθμοί), είναι γραμμέναι αἱ δεκάδες τῶν ἀριθμῶν, αἱ δὲ μονάδες αὐτῶν είναι εἰς τὴν αὐτὴν δριζοντίαν γραμμήν μετὰ τοῦ N. Εἰς τὰς ἄλλας στήλας είναι γραμμένα τὰ δεκαδικὰ μέρη τῶν λογαριθμών. Τὰ δύο ψηφία, τὰ ὁποῖα εἰς τὴν δευτέραν στήλην βλέπομεν ὅτι ἔχουν, νοοῦνται ἐπαναλαμβανόμενα, μέχρις οὗ ἀλλάξουν. Καὶ τοῦτο, διότι πολλοὶ ἐφεξῆς λογάριθμοι ἔχουν τὰ δύο πρῶτα ψηφία κοινά.

Ο λογάριθμος ἑκάστου ἀριθμοῦ εύρισκεται ἐκεī ὅπου διασταυροῦνται αἱ δύο νοηταὶ γραμμαί, ἡ ἐκ τοῦ ψηφίου τῶν μονάδων ἀγομένη κατακόρυφος καὶ ἡ ἐκ τοῦ συνόλου τῶν δεκάδων τοῦ ἀριθμοῦ ἀγομένη δριζοντία.

Ο ἀστερίσκος τὸν ὁποῖον βλέπομεν νὰ προτάσσεται τῶν τριῶν τελευταίων δεκαδικῶν ψηφίων εἰς τινας λογαριθμούς, φανερώνει ὅτι τὰ δύο παραλειπόμενα πρῶτα ψηφία ἥλαξαν καὶ πρέπει νὰ λάβωμεν τὰ ἀμέσως ἐπόμενα.

Συμφώνως πρὸς τὰ ἀνωτέρω ἔκτεθέντα καὶ βάσει τοῦ ἀνωτέρω «πίνακος», ἔχομεν ὅτι :

$$\begin{array}{lll} \text{λογ } 500 = 2,69897, & \text{λογ } 5047 = 3,70303, & \text{λογ } 5084 = 3,70621 \\ \text{λογ } 503 = 2,70157, & \text{λογ } 5128 = 3,70995, & \text{λογ } 5017 = 3,70044 \\ \text{λογ } 512 = 2,70927, & \text{λογ } 5129 = 3,71003, & \text{λογ } 5060 = 3,70415. \end{array}$$

§ 216. Χρήσις τῶν λογαριθμικῶν πινάκων.—Τοὺς λογαριθμικοὺς πίνακας χρησιμοποιοῦμεν πρὸς ἐπίλυσιν τῶν ἀκολούθων προβλημάτων :

- 1) Νὰ εὑρεθῇ ὁ λογαριθμός διθέντος ἀριθμοῦ, καὶ
- 2) Νὰ εὑρεθῇ ὁ ἀριθμός, ὁ ὁποῖος ἀντιστοιχεῖ εἰς διθέντα λογαριθμον.

§ 217. Πρόβλημα I.— Νὰ εύρεθῇ ὁ λογάριθμος δοθέντος ἀριθμοῦ.

Διὰ τὴν ἐπίλυσιν τοῦ προβλήματος τούτου ὑποθέτομεν πρῶτον, ὅτι ὁ δοθεὶς ἀριθμὸς εἶναι πάντοτε γεγραμμένος ὑπὸ δεκαδικήν μορφήν, καὶ δεύτερον, ὅτι χρησιμοποιοῦμεν πενταψηφίους πίνακας. Οἱ πίνακες οὗτοι θὰ μᾶς δώσουν τὸ δεκαδικὸν μέρος τοῦ λογαρίθμου, διότι τὸ χαρακτηριστικὸν αὐτοῦ θὰ τὸ εὔρωμεν ἀπὸ μνήμης, συμφώνως πρὸς τὰς ἴδιοτητας β' καὶ γ' τῆς § 212. Διὰ τὴν εὕρεσιν τοῦ δεκαδικοῦ μέρους, δέον νὰ ἔχωμεν ὑπὸ ὄψιν ὅτι :

Τὸ δεκαδικὸν μέρος τοῦ λογαρίθμου ἐνὸς ἀριθμοῦ ἔξαρταται μόνον ἀπὸ τὴν ἀκολουθίαν τῶν καλουμένων σημαντικῶν ψηφίων, ἡ ὅποια ἐπιτυγχάνεται παραλείποντες τὴν τυχὸν ὑπάρχουσαν ὑποδιαστολήν καὶ τὰ μηδενικὰ τὰ ὅποια τυχὸν ὑπάρχουν εἰς τὴν ἀρχὴν ἢ εἰς τὸ τέλος τοῦ ἐν λόγῳ ἀριθμοῦ.

Συνεπῶς κατὰ τὴν εὕρεσιν τοῦ δεκαδικοῦ μέρους τοῦ λογαρίθμου θὰ καθιστῶμεν τὸν δοθέντα ἀριθμὸν ἀκέραιον, ἥτοι θὰ παραλείπωμεν τὴν ὑποδιαστολήν. Τοῦτο, ὡς εἴδομεν (§ 212, ἰδ. ε'), δὲν μεταβάλλει τὸ ζητούμενον δεκαδικὸν μέρος. Κατὰ ταῦτα ἔχομεν, ὅτι τὰ δεκαδικὰ μέρη τῶν ἀριθμῶν :

$$50,87 \quad 0,05087 \quad 508,70 \quad 5087000 \quad 5,0870$$

είναι τὰ αὐτὰ μὲ τὸ δεκαδικὸν μέρος τοῦ ἀριθμοῦ 5087.

"Ηδη πρὸς ἐπίλυσιν τοῦ τεθέντος προβλήματος διακρίνομεν τὰς κάτωθι δύο περιπτώσεις.:

Περὶ πιθανοῦ α'. 'Ο ἀριθμὸς περιέχεται εἰς τοὺς πίνακας, ἥτοι ὁ ἀριθμὸς δὲν ἔχει περισσότερα τῶν τεσσάρων σημαντικῶν ψηφίων.

Εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτήν, ἀφοῦ εὔρωμεν κατ' ἀρχὴν τὸ χαρακτηριστικὸν τοῦ λογαρίθμου τοῦ ἐν λόγῳ ἀριθμοῦ, εύρισκομεν ἀκολούθως καὶ τὸ δεκαδικὸν μέρος τοῦ λογαρίθμου του ἀμέσως ἐκ τῶν πινάκων, ἀρκεῖ νὰ εὔρωμεν τὸν ἐν λόγῳ ἀριθμὸν εἰς τοὺς πίνακας, ὡς ἔξετέθη εἰς προηγουμένην παράγραφον (§ 215).

Παράδειγμα : Νὰ εύρεθῃ ὁ λογάριθμος τοῦ 56,82.

Λύσις : Τὸ χαρακτηριστικὸν τοῦ ζητούμενου λογαρίθμου είναι 1. Τὸ δεκαδικὸν μέρος είναι τὸ αὐτό (§ 212) μὲ τὸ δεκαδικὸν μέρος τοῦ λογαρίθμου τοῦ ἀριθμοῦ 5682. 'Αλλὰ τὸ δεκαδικὸν μέρος τοῦ λογ 5682, ὡς εἰς τοὺς πίνακας φαίνεται, είναι τὸ 75450. "Αρα λογ 56,82 = 1,75450.

'Ομοίως εύρισκομεν ὅτι :

$$\begin{array}{rcl} \text{λογ } 568,2 = 2,75450 & \parallel & \text{λογ } 0,8703 = 1,93967 \\ \text{λογ } 0,000507 = 4,70501 & \parallel & \text{λογ } 3,74 = 0,57287. \end{array}$$

Περὶ πιθανοῦ β'.—'Ο ἀριθμὸς δὲν περιέχεται εἰς τοὺς πίνακας, ἥτοι οὗτος ἔχει περισσότερα τῶν τεσσάρων ψηφίων.

Εύρισκομεν πρῶτον, ὡς καὶ εἰς τὴν περίπτωσιν α', τὸ χαρακτηριστικὸν τοῦ ζητούμενου λογαρίθμου. Κατόπιν, διὰ τὴν εὕρεσιν τοῦ δεκαδικοῦ μέρους τοῦ λογαρίθμου, χωρίζομεν δι' ὑποδιαστολῆς τὰ τέσσαρα πρῶτα ψηφία τοῦ δοθέντος ἀριθμοῦ. Κατ' αὐτὸν τὸν τρόπον γεγραμμένος πλέον ὁ ἀριθμός, περιέχεται μεταξύ δύο διαδοχικῶν ἀκέραιών μὲ τέσσαρα ψηφία. 'Η εὕρεσις ἐν συνεχείᾳ τοῦ δεκαδικοῦ μέρους ἐπιτυγχάνεται ἔχοντες ὑπὸ ὄψιν, ἀφ' ἐνὸς μὲν τὴν γνωστὴν ἴδιοτητα, καθ' ἣν :

'Εὰν $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbf{R}^+$ καὶ είναι $\alpha < \beta < \gamma \iff \log \alpha < \log \beta < \log \gamma$
καὶ αφ' ἑτέρου τὴν παραδοχήν, καθ' ἥν :

Διὰ μικρὰς μεταβολὰς τῶν ἀριθμῶν, αἱ μεταβολαὶ τοῦ δεκαδικοῦ μέρους εἰναι
ἀνάλογοι τῶν μεταβολῶν τῶν ἀριθμῶν (κατὰ προσέγγισιν, ὅταν αἱ μεταβολαὶ τῶν
ἀριθμῶν εἰναι μικρότεραι τῆς μονάδος) καὶ ἀντιστρόφως.

Ἡ ἀνωτέρω παραδοχὴ δὲν εἰναι τελείως ἀληθής, ἀκριβέστερον αἱ μεταβο-
λαὶ τῶν λογαρίθμων δὲν εἰναι ἀνάλογοι πρὸς τὰς μεταβολὰς τῶν ἀριθμῶν.

Πράγματι, θεωρήσωμεν δύο διαδοχικοὺς ἀκεραίους α καὶ $\alpha + 1$, $\alpha > 0$
καὶ καλέσωμεν δ τὴν διαφοράν : $\log(\alpha + 1) - \log \alpha$, ἥτοι :

$$\delta = \log(\alpha + 1) - \log \alpha \quad \text{ἢ} \quad \delta = \log \frac{\alpha + 1}{\alpha}$$

$$\delta = \log \left(1 + \frac{1}{\alpha} \right).$$

Παρατηροῦμεν τώρα ὅτι : διὰ $\alpha \rightarrow \infty$, ὅτε $\frac{1}{\alpha} \rightarrow 0$, ἔχομεν :

$$\log \left(1 + \frac{1}{\alpha} \right) \rightarrow 0,$$

$$\delta \rightarrow 0.$$

ἥτοι

"Ωστε, ἡ διαφορὰ τῶν λογαρίθμων δύο διαδοχικῶν ἀκεραίων δὲν μένει πάντοτε
ἡ αὐτή, ἀλλὰ ἐλαττοῦται καθ' ὃσον οἱ ἀριθμοὶ αὔξανον καὶ κατ' ἀκολουθίαν
δὲν ἀληθεύει ὅτι ἡ αὔξησις τῶν λογαρίθμων εἰναι ἀνάλογος τῆς αὔξησεως τῶν
ἀριθμῶν.

'Επειδὴ ὅμως ἡ διαφορὰ αὕτη μένει ἐπὶ πολλοὺς ἀριθμοὺς ἀμετάβλητος,
δυνάμεθα νὰ θεωρήσωμεν, ὡς ἔγγιστα, τὴν αὔξησιν τῶν λογαρίθμων ἀνάλογον
πρὸς τὴν αὔξησιν τῶν ἀριθμῶν.

Κατόπιν τούτων, διὰ τὴν εὕρεσιν τοῦ δεκαδικοῦ μέρους τοῦ λογαρίθμου
τοῦ ἀριθμοῦ ἐργαζόμεθα ὡς εἰς τὰ κατωτέρω παραδείγματα ἐμφαίνεται.

Παράδειγμα 1ον : Νὰ εὑρεθῇ ὁ λογάριθμος τοῦ 1742.

Λύσις : Τὸ χαρακτηριστικὸν τοῦ ζητούμενου λογαρίθμου εἰναι 4. Χωρίζομεν τοῦ διθέντος
ἀριθμοῦ δι' ὑποδιαστολῆς τὰ τέσσαρα πρῶτα ψηφία καὶ οὖτως ἔχομεν τὸν ἀριθμὸν 1742,4. 'Ο
δεῖθεις ἀριθμὸς καὶ ὁ 1742,4 ἔχουν (§ 212) τὸ αὐτὸ δεκαδικὸν μέρος τοῦ λογαρίθμου των. 'Αρ-
κεὶ λοιπὸν νὰ εὕρωμεν τὸ δεκαδικὸν μέρος τοῦ λογαρίθμου τοῦ ἀριθμοῦ 1742,4.

Πρὸς τοῦτο ἐργαζόμεθα ὡς ἔξῆς : 'Επειδή, προφανῶς, εἶναι :

$$1742 < 1742,4 < 1743,$$

ἔπειται ὅτι :

$$\log 1742 < \log 1742,4 < \log 1743.$$

'Εκ τῆς ἀνισότητος ταύτης, ἐπειδή, ὡς ἔκ τῶν πινάκων φαίνεται, εἶναι :

$$\log 1742 = 3,24105 \quad \text{καὶ} \quad \log 1743 = 3,24130, \quad \text{προκύπτει :}$$

$$3,24105 < \log 1742,4 < 3,24130.$$

"Ητοι ὁ ζητούμενος λογάριθμος περιέχεται μεταξὺ τῶν ἀριθμῶν 3,24105 καὶ 3,24130, οἱ
ὅποιοι διαφέρουν κατὰ 25 μονάδας πέμπτης δεκαδικῆς τάξεως (μ.ε'.δ.τ.)

'Εκ τῶν πινάκων βλέπομεν ἐπίστης ὅτι τοῦ ἀριθμοῦ αὔξανομένου κατὰ 2, 3, 4, 5, ... ἀκε-
ραίας μονάδας ὁ λογάριθμος αὐτοῦ αὔξανεται ἀντιστοίχως κατὰ 50, 75, 99, 125, ... μ.ε'.δ.τ.

Δυνάμεθα δύνονται νὰ θεωρήσωμεν τὴν αὔξησιν τοῦ λογαρίθμου ὡς ἔγγιστα ἀνάλογον πρὸς τὴν αὔξησιν τοῦ ἀριθμοῦ καὶ νὰ ὑπολογίσωμεν πόσον πρέπει νὰ αὔξηθῇ ὁ λογ $1742 = 3,24105$ διὰ νὰ προκύψῃ ὁ λογ $1742,4$ καὶ ἐξ αὐτοῦ ὁ λογ 17424 . 'Ο ὑπολογισμὸς γίνεται ὡς ἔξῆς :

Εἰς αὔξησιν τοῦ ἀριθμοῦ κατὰ 1 ἀντιστοιχεῖ αὔξ. τοῦ λογ. κατὰ 25 μ.ε'.δ.τ.

$$\begin{array}{ccccccccc} \gg & \gg & \gg & 0,4 & \gg & \gg & \gg & x ; & \gg \\ \text{"Ἄρα :} & x = 25 \cdot 0,4 = 10 & \mu.\epsilon.'.δ.τ. \end{array}$$

Κατ' ἀκολουθίαν :

$$\lambda\sigma\gamma 1742,4 = 3,24105 + 0,00010 = 3,24115$$

καὶ συνεπῶς $\lambda\sigma\gamma 17424 = 4,24115$.

Αἱ ἀνωτέρω πράξεις διατάσσονται καὶ ὡς ἔξῆς :

$$\begin{array}{ccl} \lambda\sigma\gamma 1742 = 3,24105 & \parallel & \text{Αὔξησις ἀριθμῶν 1 αὔξησις λογαρίθμων 25 μ.ε'.δ.τ.} \\ \lambda\sigma\gamma 1743 = 3,24130 & & \gg \quad \gg \quad 0,4 \quad \gg \quad \gg \quad x ; \quad \gg \\ \Delta = 25 & & x = 25 \cdot 0,4 = 10 \quad \mu.\epsilon.'.δ.τ. \end{array}$$

$$\text{"Ἄρα :} \quad \lambda\sigma\gamma 17424 = 4,24105 + 0,00010 = 4,24115.$$

Εὑρεθέντος δτι $\lambda\sigma\gamma 17424 = 4,24115$ ἔχομεν :

$$\lambda\sigma\gamma 17,424 = 1,24115, \quad \lambda\sigma\gamma 0,0017424 = \bar{3},24115,$$

$$\lambda\sigma\gamma 1,7424 = 0,24115, \quad \lambda\sigma\gamma 174,24 = 2,24115.$$

Παράδειγμα 2ον. Νὰ εὑρεθῇ ὁ λογαρίθμος τοῦ ἀριθμοῦ 24,3527.

Ἄντις : Τὸ χαρακτηριστικὸν τοῦ ζητουμένου λογαρίθμου εἴναι προφανῶς 1. 'Εὰν δὲ πολλαπλασιάσωμεν τὸν δοθέντα ἀριθμὸν ἐπὶ 100, τὸ δεκαδικὸν μέρος τοῦ λογαρίθμου μένει (§ 212) ἀμετάβλητον. 'Αρκεῖ λοιπὸν νὰ εὕρωμεν τὸ δεκαδικὸν μέρος τοῦ λογαρίθμου τοῦ ἀριθμοῦ 2435,27.

Πρὸς τοῦτο ἔργαζόμεθα ὡς καὶ εἰς τὸ προηγούμενον παράδειγμα, ἦτοι :

$$\begin{array}{ccl} \lambda\sigma\gamma 2435 = 3,38650 & \parallel & \text{Αὔξησις ἀριθμῶν 1 αὔξησις λογαρίθμων 18 μ.ε'.δ.τ.} \\ \lambda\sigma\gamma 2436 = 3,38668 & & \gg \quad \gg \quad 0,27 \quad \gg \quad \gg \quad x ; \quad \gg \\ \Delta = 18 & & x = 18 \cdot 0,27 = 4,86 \simeq 5 \quad \mu.\epsilon.'.δ.τ. \end{array}$$

$$\text{"Ἄρα :} \quad \lambda\sigma\gamma 24,3527 = 1,38650 + 0,00005 = 1,38655.$$

Σημείωσις : Εἰς τὸν λογαρίθμικοὺς πίνακας ὑπάρχουν ἐκτὸς τοῦ πλαισίου τηνακίδια, ἐκαστὸν τῶν ὅποιών φέρει ὡς ἐπικεφαλίδα μίαν τῶν ἐν τῇ αὐτῇ σελίδῃ διαφορῶν μεταξὺ τῶν λογαρίθμων δύο διαδοχικῶν ἀριθμῶν. 'Εκαστον πινακίδιον διαιρεῖται δι' εὐθείας γραμμῆς εἰς δύο στήλας. Τούτων ἡ πρώτη φέρει τοὺς φυσικοὺς ἀριθμοὺς 1,2, ..., 9, οἱ ὅποιοι φανερώνουν δέκατα τῆς ἀκεραίας μονάδων, ἡ δὲ ἀλλή τὰς ἀντιστοιχους τῶν λογαρίθμων αὐξήσεις εἰς μονάδας τῆς τελευταίας δεκαδικῆς τάξεως. Τῇ βοηθείᾳ τούτων ὑπολογίζομεν ἀμέσως τὰς αὐξήσεις τῶν λογαρίθμων, οἱ ὅποιοι ὄφελονται εἰς διθείσας διαφορὰς (Δ) τῶν ἀριθμῶν καὶ τοῦτο διότι ταῦτα δίδουν ἀπ' εὐθείας, διὰ τὰς διαφόρους διαφορὰς Δ , τὰς τιμάς :

$$\frac{\Delta \times 1}{10}, \quad \frac{\Delta \times 2}{10}, \quad \dots, \quad \frac{\Delta \times 9}{10}.$$

Οὔτως, ὁ ὑπολογισμὸς τοῦ λογαρίθμου τοῦ παραδείγματος 2 γίνεται μὲ τὴν βοηθείαν τοῦ πινακίδιου, τὸ ὅποιον φέρει ἐπικεφαλίδα τὴν διαφορὰν $\Delta = 18$.

Εἰς τὸ πινακίδιον τοῦτο ἀπέναντι τοῦ 2 (στήλη α') εἴναι 3,6 καὶ ἀπέναντι τοῦ 7 εἴναι 12,6, ἀλλὰ ἐπειδὴ τὸ ψηφίον 7 παριστᾶ εἰς τὸν ἀριθμὸν 2435,27 ἐκατοστά, ἦτοι μονάδας 10 φορὰς μικροτέρας, πρέπει νὰ λάβωμεν 1,26. 'Ωστε εἰς αὔξησιν τοῦ λογαρίθμου κατὰ 0,27 ἀντιστοιχεῖ αὔξησις τοῦ λογαρίθμου κατὰ $3,6 + 1,26 = 4,86 \simeq 5 \mu.\epsilon.'.δ.τ.$

18	
1	1,8
2	3,6
3	5,4
4	7,2
5	9,0
6	10,8
7	12,6
8	14,4
9	16,2

Διάταξις τῶν πράξεων.

λογ	2435		= 3,38650
Εἰς αὔξησιν	0,2	αὔξησις λογ	3,6
»	0,07	»	1,26
ἄρα	λογ 2435,27		= 3,3865486

$\Delta = 18$

καὶ ἐπειδὴ τὸ διό ψηφίον τοῦ δεκ. μέρους εἶναι μεγαλύτερον τοῦ 5, αὔξανομεν κατὰ μονάδα τὸ 5ον ψηφίον. Ἐάν τοῦ εἴναι λογ 2435,27 = 3,38655 καὶ κατ' ἀκολουθίαν λογ 24,3527 = 1,38655.

§ 218. Πρόβλημα II. (ἀντίστροφον).— Νὰ εὑρεθῇ ὁ ἀριθμός, ὁ ὥποιος ἀντιστοιχεῖ εἰς δοθέντα λογάριθμον.

Διὰ τὴν ἐπίλυσιν τοῦ προβλήματος τούτου ἀναζητοῦμεν πρῶτον εἰς τοὺς λογαριθμικούς πίνακας τὸ δεκαδικὸν μέρος τοῦ δοθέντος λογαρίθμου. "Ἐνεκα τούτου διακρίνομεν δύο περιπτώσεις, καθόσον τὸ δεκαδικὸν τοῦτο μέρος ἀναγράφεται ἢ μὴ εἰς τοὺς λογαριθμικούς πίνακας. Τὸ χαρακτηριστικὸν τοῦ δοθέντος λογαρίθμου ἐπιτρέπει τὸν καθορισμόν, συμφώνως πρὸς τὴν ιδιότητα δ' τῆς § 212, τοῦ πλήθους τῶν ψηφίων τοῦ ἀκεραίου μέρους τοῦ ζητούμενου ἀριθμοῦ.
Ἄκριβέστερον ἐργαζόμεθα ὡς κάτωθι :

Περὶ πτωσις α'.— Τὸ δεκαδικὸν μέρος τοῦ λογαρίθμου εὑρίσκεται εἰς τοὺς πίνακας.

"Ἔστω ὅτι θέλομεν νὰ εὕρωμεν τὸν θετικὸν ἀριθμὸν x , διὰ τὸν ὥποιον εἴναι:
 $\log x = 2,62716.$

Λύσις : Χωρὶς νὰ λάβωμεν ὑπὸ δψιν τὸ χαρακτηριστικὸν 2 ἀναζητοῦμεν πρῶτον εἰς τὴν στήλην Ο τῶν λογαριθμικῶν πινάκων τὸν ἀριθμὸν 62, ποὺ ἀποτελοῦν τὰ δύο πρῶτα ψηφία τοῦ δεκαδικοῦ μέρους τοῦ λογαρίθμου, ἀκολούθως ἀναζητοῦμεν εἰς τὸν πίνακα τὰ ἔτερα τρία ψηφία 716. Οὕτω βλέπομεν τὰ ταῦτα κείνατα εἰς τὴν 423ην ὄριζοντιαν γραμμὴν καὶ στήλην 8· τὰ ψηφία λοιπόν, μὲ τὰ ὥποια γράφεται ὁ ζητούμενος ἀριθμὸς καὶ ἡ διαδοχὴ αὐτῶν εἴναι ἡ ἀκόλουθος 4, 2, 3, 8. "Ο ζητούμενος ἀριθμὸς λοιπὸν θὰ εἴναι ὁ ἔχων 423 δεκάδας καὶ 8 μονάδας, ἥτοι δ' 4238. "Ἐπειδὴ δὲ ὁ λογάριθμος του ἔχει χαρακτηριστικὸν 2, ἐπειταὶ (§ 212, δ') ὅτι ὁ ζητούμενος ἀριθμὸς θὰ ἔχῃ τρία ἀκέραια ψηφία. "Αρα ἔχομεν :

$$x = 423,8.$$

Καθ' ὅμοιον τρόπον εύρισκομεν, διὰ εἰς τὸν λογάριθμον π.χ. 3,75343 ἀντιστοιχεῖ ὁ ἀριθμὸς 0,005668. Τὸ χαρακτηριστικὸν του 3 = -3 φανερώνει ὅτι ὑπάρχουν τρία μηδενικά πρὸ τοῦ πρῶτου σημαντικοῦ ψηφίου 5 τοῦ 5668 (βλ. § 212, δ').

Σημείωσις: "Ἔστω ὅτι θέλομεν νὰ εὕρωμεν τὸν ἀριθμὸν x , διὰ τὸν ὥποιον εἴναι $\log x = 2,63022$. Εργαζόμενοι ὡς ἀνωτέρω, παραπτηρῦμεν διὰ τὸ 022 δὲν εύρισκεται εἰς τὰς σειρὰς τοῦ 63. Τότε ἀναζητοῦμεν αὐτὸν εἰς τὰς σειρὰς τοῦ 62 φέρον ἔμπροσθὲν του ἀστερίσκου (*). Πράγματι τοῦτο συμβαίνει, διότι τὸ 022 μετ' ἀστερίσκου εύρισκεται εἰς τὴν τελευταίαν σειράν τοῦ 62. "Ο ζητούμενος ἀριθμὸς x εἴναι συνεπῶς ὁ 426,8. "Ομοίως εύρισκομεν :

'Εάν λογ $x = 2,63003$, τότε $x = 426,9$
 » λογ $x = 2,63002$, » $x = 426,6.$

Περὶ πτωσις β'.— Τὸ δεκαδικὸν μέρος τοῦ λογαρίθμου δὲν εὑρίσκεται εἰς τοὺς πίνακας.

Ιον : "Ἔστω ὅτι θέλομεν νὰ εὕρωμεν τὸν θετικὸν ἀριθμὸν x , διὰ τὸν ὥποιον εἴναι :
 $\log x = 1,25357.$

Λύσις : Παρατηροῦμεν ότι τὸ δεκαδικὸν μέρος τοῦ δοθέντος λογαρίθμου ἀναζητούμενον, ὡς προηγουμένως, εἰς τοὺς πινακας εύρισκεται μεταξὺ τοῦ 0,25334 καὶ τοῦ 0,25358, εἰς τοὺς διποίους ἀντιστοιχοῦν οἱ ἀριθμοὶ 1792 καὶ 1793 ἀντιστοίχως. "Ητοι ἔχομεν :

$$1,25334 < 1,25357 < 1,25358$$

καὶ κατ' ἀκόλουθίαν :

$$17,92 < x < 17,93.$$

"Ηδη παρατηροῦμεν ότι :

$$\Delta = 1,25358 - 1,25334 = 24 \text{ μ.ε'.δ.τ.}$$

καὶ

$$\delta = 1,25357 - 1,25334 = 23 \text{ μ.ε'.δ.τ.}$$

Λαμβανομένου δὲ ὑπ' ὅψιν ότι κατὰ προσέγγισιν ἡ αὔξησις τῶν λογαρίθμων είναι ἀνάλογος τῆς αὔξησεως τῶν ἀριθμῶν καὶ καταρτίζοντες τὴν ἀκόλουθον διάταξιν, ἔχομεν :

Αὔξησις λογαρίθμου κατὰ 24 μ.ε'.δ.τ. φέρει αὔξησιν τοῦ ἀριθμοῦ κατὰ 1

$$\begin{array}{ccccccccc} \gg & \gg & \gg & 23 & \gg & \gg & \gg & \gg & y; \\ \hline \end{array}$$

$$y = 1 \cdot \frac{23}{24} = \frac{23}{24} = 0,958.$$

Προσθέτοντες εἰς τὸν 1792 τὸν 0,958 εὐρίσκομεν 1792,958, δηλαδὴ τὸ 958 τὸ προσαρτώμεν εἰς τὸν ἀριθμὸν 1792. 'Ο προκύπτων ἀριθμὸς 1792,958 ἔχει προφανῶς τὰ αὐτὰ μὲ τὸν x ψηφία καὶ κατὰ τὴν αὐτὴν σειράν, πλὴν ὅμως ἡ θέσις τῆς ὑποδιαστολῆς ἐν τῷ x κανονίζεται ἀπὸ τὸ χαρακτηριστικὸν τοῦ λογικοῦ, διπέρ ἐν προκειμένῳ είναι 1.

Θὰ εἴναι λοιπόν :

$$x = 17,92958.$$

Συντομώτερον ἡ ἐργασία αὕτη διατάσσεται ὡς ἔξις :

1,25357	1,25358	⇒	1793		24	1
1,25334	1,25334	⇒	1792		23	y;
Διαφοραί : δ = 23	Δ = 24		1		$y = 1 \times \frac{23}{24} = 0,958.$	

"Ἄρα :

$$x = 17,92958.$$

Σημείωσις : 'Η διαφορὰ Δ τῶν ἄκρων τῶν λογαρίθμων, μεταξὺ τῶν ὀποίων περιέχεται ὁ δοθεῖς λογάριθμος, καλεῖται μεγάλῃ διαφορᾷ· ἡ δὲ διαφορὰ δ τοῦ μικροτέρου τούτων ἀπὸ τοῦ δοθέντος καλεῖται μικρῇ διαφορᾷ.

2ον : Διδεται ότι : λογ x = 3,47647 καὶ ζητεῖται νὰ εὑρεθῇ ὁ x.

Λύσις : 'Εκ τῶν πινάκων παρατηροῦμεν ότι :

$$\overline{3},47640 < \overline{3},47647 < \overline{3},47654$$

καὶ ἄρα $0,002995 < x < 0,002996$.

"Ηδη, πρὸς εὑρεσιν τοῦ x, κάμνομεν τὴν ἀκόλουθον διάταξιν :

3,47647	3,47654	⇒	2996		14	1
3,47640	3,47640	⇒	2995		7	y;
Διαφοραί : δ = 7	Δ = 14		1		$y = 1 \times \frac{7}{14} = 0,5.$	

Οὖτω τὰ σημαντικὰ ψηφία τοῦ x είναι κατὰ σειράν 2, 9, 9, 5, 5. "Ἄρα ὁ ζητούμενος ἀριθμὸς x είναι ὁ 0,0029955, διότι τὸ χαρακτηριστικὸν τοῦ δοθέντος λογαρίθμου είναι 3. 'Ομοίως θὰ ἔχωμεν :

'Ἐὰν λογ x = 0,47647, τότε x = 2,9955
 » λογ x = 5,47647, » x = 299550.

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω ἔξαγεται τώρα δ ἀκόλουθος :

Κανών. Διὰ νὰ εῦρωμεν τὸν ἀριθμὸν ἐκ τοῦ λογαρίθμου αὐτοῦ, εἰς περίπτωσιν καθ' ἥν ὁ λογάριθμος (ἐνν. τὸ δεκαδικόν του μέρος) δὲν εὑρίσκεται εἰς τὸν πίνακας, παραθέτομεν δεξιὰ τοῦ μικροτέρου ἀριθμοῦ, δστις ἀντιστοιχεῖ εἰς τὸν μικρότερον τῶν λογαρίθμων τοῦ πίνακος μεταξὺ τῶν δποίων δ δοθεὶς λογάριθμος περιέχεται, πάντα τὰ δεκαδικὰ ψηφία τοῦ πηλίκου τῆς διαιρέσεως δ : Δ, ἔνθα δ ἡ μικρὰ καὶ Δ ἡ μεγάλη διαφορά. Μετὰ ταῦτα καθορίζομεν τὴν θέσιν τῆς ὑποδιαστολῆς, λαμβάνοντες ὑπὲρ δψιν τὸ χαρακτηριστικὸν τοῦ δοθέντος λογαρίθμου.

Ἐφαρμογαὶ τῶν λογαρίθμων

§ 219. Μὲ τὴν βοήθειαν τῶν ἰδιοτήτων τῶν λογαρίθμων καὶ τῶν λογαρίθμικῶν πινάκων δυνάμεθα νὰ ἀνάγωμεν τὰς πρόξεις ἐπὶ τῶν ἀριθμῶν εἰς ὅλας ἀπλουστέρας, ἤτοι τὸν πολλαπλασιασμὸν εἰς πρόσθεσιν, τὴν διαίρεσιν εἰς ἀφαίρεσιν, τὴν ὑψώσιν εἰς δυνάμεις εἰς πολλαπλασιασμὸν καὶ τὴν ἔξαγωγὴν τῶν ριζῶν εἰς διαίρεσιν. Οὕτω μὲ χρῆσιν τῶν λογαρίθμων ἐκτελοῦνται πράξεις, αἱ δποῖαι ὅλως θὰ ἥσαν μακρόταται καὶ δυσχερεῖς, ἢν μὴ δυναταί.

Τὰ ἐπόμενα παραδείγματα θὰ καταστήσουν περισσότερον σαφὲς πόσον μεγάλως ἀπλοποιεῖ τὴν ἐκτέλεσιν διαφόρων πράξεων ἡ ἔφαρμογὴ τοῦ λογισμοῦ διὰ τῶν λογαρίθμων.

Παράδειγμα 1ον : Νὰ ὑπολογισθῇ διὰ τῶν λογαρίθμων τὸ γινόμενον :

$$x = 180,2 \times 35,32 \times 0,724.$$

Λύσις : Ἐχομεν :

$$\log x = \log 180,2 + \log 35,32 + \log 0,724.$$

Ἐκ τῶν πινάκων εύρισκομεν δτι :

$$\log 180,2 = 2,25575$$

$$\log 35,32 = 1,54802$$

$$\log 0,724 = 1,85974$$

$$\log x = 3,66351$$

$$x = 4608.$$

Ἀρα :

Παράδειγμα 2ον : Νὰ εύρεθῇ δ x, ἐὰν είναι $x = \frac{7,56 \times 4667 \times 567}{899,1 \times 0,00337 \times 23435}$.

Λύσις : Λαμβάνοντες τοὺς λογαρίθμους ἀμφοτέρων τῶν μελῶν τῆς δοθείστης παραστάσεως ἔχομεν :

$$\log x = \log 7,56 + \log 4667 + \log 567 - (\log 899,1 + \log 0,00337 + \log 23435).$$

Ἐκ τῶν πινάκων εύρισκομεν :

$$\log 7,56 = 0,87852$$

$$\log 4667 = 3,66904$$

$$\log 567 = 2,75358$$

$$7,30114$$

$$\log 899,1 = 2,95381$$

$$\log 0,00337 = 3,52763$$

$$\log 23435 = 4,36986$$

$$4,85130.$$

Μετὰ τὴν ἀφαίρεσιν προκύπτει :

$$\log x = 2,44984$$

$$x = 281,73.$$

Ἀρα :

Παράδειγμα 3ον : Νά εύρεθη τό πλήθος τῶν ψηφίων τοῦ ἀριθμοῦ $8^{(8)}$.

Λύσις : Θέτοντες $x = 8^{(8)}$ καὶ $y = 8^8$ εύρισκομεν δτι :

$$x = 8^y \quad \text{καὶ} \quad \log x = y \cdot \log 8.$$

Ἐπειδὴ δὲ $\log y = 8 \log 8 = 7,22472$, ἐπεται δτι $y = 16777300$ περίπου καὶ
 $\log x = 16777300 \cdot \log 8 = 15151412$.

Ἐκ τούτου βλέπομεν δτι δ χθά ἔχῃ περίπου 15151413 ἀκέραια ψηφία.

Σημ. "Ανευ τῆς χρήσεως τῶν λογαρίθμων ἔπειτε πρὸς εύρεσιν τοῦ γ νὰ κάμωμεν 7 πολλαπλασιασμούς καὶ πρὸς εύρεσιν τοῦ x ἄλλους 16777300 περίπου πολλαπλασιασμούς.

Παράδειγμα 4ον : Νά ύπολογισθῇ, κατὰ προσέγγισιν, ἡ ἀριθμητικὴ τιμὴ τῆς παραστάσεως :

$$x = \frac{27,32 \times (1,04)^{20} \times \sqrt[5]{0,003}}{\sqrt[4]{0,0042} \times (345,6)^2}.$$

Λύσις : Λαμβάνοντες λογαρίθμους ἀμφοτέρων τῶν μελῶν τῆς διθείσης Ισότητος ἔχομεν συμφώνως πρὸς τὰς ιδιότητας τῶν λογαρίθμων :

$$\log x = (\log 27,32 + 20 \cdot \log 1,04 + \frac{1}{5} \log 0,003) - \left(\frac{1}{4} \cdot \log 0,0042 + 2 \log 345,6 \right).$$

Ἐκ τῶν πινάκων εύρισκομεν :

Βοηθητικαὶ πράξεις

$$\log (1,04) = 0,01703$$

20

$$0,34060$$

$$\log 0,003 = \overline{3},47712$$

$$\frac{1}{5} \log 0,003 = \frac{\overline{3},47712}{5} = \frac{\overline{5} + 2,47712}{5} = \\ = \overline{1} + 0,49542 = \overline{1},49542$$

$$\log 0,0042 = \overline{3},62325$$

$$\frac{1}{4} \log 0,0042 = \frac{\overline{3},62325}{4} = \frac{\overline{4} + 1,62325}{4} = \\ = \overline{1} + 0,40581 = \overline{1},40581$$

$$\log 345,6 = 2,53857$$

$$2$$

$$5,07714$$

Ἐκ τῶν πινάκων εύρισκομεν : $x = 0,000615957$.

Τελικαὶ πράξεις

$$\log 27,32 = 1,43648$$

$$20 \cdot \log (1,04) = 0,34060$$

$$\frac{1}{5} \cdot \log (0,003) = \overline{1},49542$$

$$\text{"Αθροισμα} = 1,27250$$

$$\frac{1}{4} \log (0,0042) = \overline{1},40581$$

$$2 \cdot \log 345,6 = 5,07714$$

$$\text{"Αθροισμα} = 4,48295$$

"Ωστε εἶναι :

$$\log x = 1,27250 - 4,48295 =$$

$$= -3,21045 = \overline{4},78955.$$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

474. Νά εύρεθῇ δ λογάριθμος ἑκάστου ἐκ τῶν κάτωθι ἀριθμῶν :

- | | | |
|-------------|------------|---------------|
| 1. 0,2507 | 5. 6,8372 | 9. 85,007 |
| 2. 45,72 | 6. 5278,37 | 10. 0,0004124 |
| 3. 0,003817 | 7. 63,347 | 11. 326,537 |
| 4. 107,3 | 8. 25234 | 12. 14,1606 |

13. $0,00643598$

15. $31,2865$

17. $524 \frac{3}{8}$

14. $0,0682947$

16. $5378,92$

18. $4,72 + \frac{6}{7}$.

475. Νὰ εύρεθῇ ὁ θετικός ἀριθμὸς x , γνωστοῦ ὅντος ὅτι :

1. $\log x = 2,48001$

5. $\log x = 4,87622$

9. $\log x = 0,70020$

2. $\log x = 1,96895$

6. $\log x = 2,99348$

10. $\log x = 1,66325$

3. $\log x = 4,97534$

7. $\log x = 1,79100$

11. $\log x = 4,15050$

4. $\log x = 3,69636$

8. $\log x = 2,78000$

12. $\log x = 5,25865$.

476. Νὰ υπολογισθοῦν διάτα λογαρίθμων αἱ κάτωθι παραστάσεις :

1. $82,75 \times 0,3974$

2. $25200 \times 3,1416$

3. $437 \times 0,5223$

4. $4,25 \times 308 \times 0,295$

5. $3,72 \times 7,8 \times 9312$

6. $3,14 \times 25,2 \times 395$

7. $56314 : 9$

8. $0,8276 : 25,2$

9. $10025 : 4,35$

10. $4,36^a$

11. $0,895^a$

12. $10,25^a$

13. $3,02^{10}$

14. $\sqrt[5]{2,8314}$

15. $\sqrt[10]{2}$

16. $\sqrt[10]{1,414}$

17. $\sqrt[10]{\pi}$

18. $9,35^a \times 3,1416$

19. $18,2^a \times 1,33$

20. $0,45^a \times 2,25 \times \sqrt[10]{3}$

21. $\sqrt[4,5]{27,3 \times 0,139}$

22. $\sqrt[2,5^a]{1258 \times 0,824}$

23. $\sqrt[0,85]{25,6 \times 0,312}$

477. Ἐπιλύσατε τὰς κάτωθι ἔξισώσεις :

1. $x^4 = 5\,832,6$

2. $x^5 = 0,0247.$

478. Χρησιμοποιοῦντες τὸν τύπον :

$$E = \sqrt{\tau(\tau - \alpha)(\tau - \beta)(\tau - \gamma)}$$

ὑπολογίσατε τὸ ἐμβαδὸν E ἐνὸς τριγώνου, εὑρίσκοντας τὴν πλευρὰν τ εἶναι :

$$\alpha = 202,5 \text{ m}, \quad \beta = 180,2 \text{ m} \quad \text{καὶ} \quad \gamma = 75,3 \text{ m} \quad (\tau = \frac{1}{2} \text{ περιμέτρου}).$$

479. Ὑπολογίσατε τὴν ἀριθμητικὴν τιμὴν τοῦ x , ὅστις δρίζεται ὑπὸ τῆς σχέσεως :

$$\frac{x^2}{\alpha^2} = \sqrt{\frac{\beta}{\gamma}},$$

ὅπου $\alpha = 0,27355, \quad \beta = 29,534, \quad \gamma = 44,340.$

480. Τρεῖς ἀριθμοὶ α, x, y συνδέονται διὰ τῆς σχέσεως :

$$\alpha xy^2 = \sqrt[3]{x}.$$

1ον. Ὑπολογίσατε τὸ y , ἂν εἴναι $\alpha = 0,3$ καὶ $x = 1,8215$

2ον. Ὑπολογίσατε τὸ x , ἂν εἴναι $\alpha = 10$ καὶ $y = 0,5242.$

481. Γεωμετρικῆς προσόδου δίδονται $\alpha_1 = 3, \omega = 8$ καὶ $v = 13$. Νὰ εύρεθῇ ὁ 13ος ὄρος τῆς καὶ τὸ ἀθροισμα Σ_{13} τῶν ὅρων αὐτῆς.

482. Ἐπαληθεύσατε διὰ τῆς χρήσεως τῶν λογαριθμικῶν πινάκων τὰς ἀκολούθους ισότητας:

1. $\sqrt[0,75 \times 3,107]{577,8 \times 69} = 6,431,$

2. $\sqrt[8,5273 \times \sqrt[3]{51,3388}]{8,5273 \times \sqrt[3]{51,3388}} = 5,62962$

3. $\sqrt[81,3 \times 32,41]{4,632 \times (2,96)^a} = 0,225855,$

4. $\frac{312,415 \times \sqrt[10]{3,5781^a}}{17,1826^a \times \sqrt[10]{0,002987^a}} = 14,1606.$

483. Νὰ ὑπολογισθῇ διὰ τῶν λογαριθμικῶν πινάκων ἡ ἀριθμητικὴ τιμὴ τῆς παραστάσεως:

$$y = \frac{4,37 \times \sqrt[3]{0,0004975}}{\sqrt[3]{0,312}} + \sqrt{\frac{217^2 \times \sqrt[3]{595}}{137 \times \sqrt[3]{0,03}}}.$$

(Ὑπόδ. Ὑπολογίσατε χωριστὰ ἔκαστον δρον τῆς παραστάσεως καὶ προσθέσατε ἀκολούθως τὰ ἔξαγόμενα).

II. ΕΚΘΕΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΘΜΙΚΑΙ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Ἐκθετικαὶ ἔξισώσεις

§ 220. Ὀρισμοί.— Καλεῖται ἐκθετικὴ ἔξισώσεις πᾶσα ἔξισώσις, ἡ ὅποια περιέχει μίαν τούλαχιστον δύναμιν μὲ ἐκθέτην τὸν ἀγνωστὸν ἢ συνάρτησίν τινα τοῦ ἀγνώστου.

Π.χ. αἱ ἔξισώσεις :

$$3^x = 81, \quad 2^{3x+1} - 5 \cdot 4^x + 3 = 0, \quad 5^{x^2-2x+3} = 1$$

εἶναι ἐκθετικαὶ ἔξισώσεις.

Ἐπίλυσις ἐκθετικῆς ἔξισώσεως καλεῖται ἡ εὕρεσις τῶν τιμῶν τῶν ἀγνώστων αὐτῆς, αἱ ὅποιαι τὴν ἐπαληθεύουν.

Αἱ συνηθέστεραι ἐκθετικαὶ ἔξισώσεις ἔχουσιν ἢ δύνανται νὰ λάβωσι μίαν τῶν ἀκολούθων μορφῶν :

α'). Ἐκθετικαὶ ἔξισώσεις τῆς μορφῆς :

$$a^x = \beta$$

(1)

Ἐνθα $a, \beta \in R^+$ καὶ $a \neq 1$.

Πρὸς ἐπίλυσιν τῆς ἀνωτέρω ἐκθετικῆς ἔξισώσεως διακρίνομεν δύο περιπτώσεις:

Περί πτωσις I.—'Ο β εἰναι δύναμις τοῦ α ἢ δύναται νὰ μετατραπῇ εἰς δύναμιν τοῦ α. Τότε, ἐὰν εἶναι $\beta = a^k$ θὰ ἔχωμεν : $a^x = a^k$ καὶ συνεπῶς $x = k$.

Παράδειγμα : Νὰ ἐπιλυθῇ ἡ ἔξισώσις : $3^x = 729$.

Ἐπίλυσις : 'Επειδὴ $729 = 3^6$, ἡ δοθεῖσα ἔξισώσις γράφεται :

$$3^x = 3^6 \quad \text{καὶ} \quad \delta\delta\epsilon \quad x = 6.$$

Περί πτωσις II.—'Ο β δὲν δύναται νὰ μετατραπῇ εἰς δύναμιν τοῦ α. Εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν λαμβάνοντες τοὺς λογαρίθμους ἀμφοτέρων τῶν μελῶν τῆς (1) ἔχομεν :

$$x \cdot \log \alpha = \log \beta \quad \text{καὶ} \quad \text{συνεπῶς} \quad \theta\theta\epsilon \quad x = \frac{\log \beta}{\log \alpha}.$$

$$\text{Παράδειγμα :} \quad \text{Νὰ ἐπιλυθῇ} \quad \text{ἡ} \quad \text{ἔξισώσις} : \quad 2^x = \frac{5}{6}.$$

Ἐπίλυσις : Λαμβάνομεν τοὺς λογαρίθμους ἀμφοτέρων τῶν μελῶν τῆς δοθείσης ἔξισώσεως καὶ ἔχομεν :

$$x \cdot \log 2 = \log 5 - \log 6 \quad \text{ἢ} \quad x = \frac{\log 5 - \log 6}{\log 2} = \frac{-0,07918}{0,30103} = -0,26303.$$

β'). Έκθετικαί ἔξισώσεις τῆς μορφῆς :

$$a^{g(x)} = \beta$$

(2)

Ἐνθα $g(x)$ εἶναι δεδομένη συνάρτησις τοῦ ἀγνώστου καὶ $a, \beta \in \mathbb{R}^+$ μὲν $a \neq 1$.

Προφανῶς διὰ $g(x) = x$ ἔχομεν ἐκθετικὴν ἔξισώσιν τῆς προηγουμένης μορφῆς.

Πρὸς ἐπίλυσιν τῶν ἔξισώσεων τῆς μορφῆς (2) διακρίνομεν, ὡς καὶ προηγουμένως, δύο περιπτώσεις, καθ' ὅσον οἱ ἀριθμοὶ a καὶ β εἶναι ἢ μὴ δυνάμεις ἐνὸς καὶ τοῦ αὐτοῦ ἀριθμοῦ.

Παράδειγμα 1ον : Νὰ ἐπιλυθῇ ἡ ἔξισωσις $3^{x^2-5x+11} = 243$.

Ἐπίλυσις : Ἐπειδὴ $243 = 3^5$, ἡ δοθεῖσα ἔξισωσις γράφεται :

$$3^{x^2-5x+11} = 3^5 \text{ καὶ } \delta\text{ίδει } x^2 - 5x + 11 = 5 \quad \text{ἢ} \quad x^2 - 5x + 6 = 0. \quad (1)$$

Αἱ ρίζαι τῆς ἔξισώσεως (1) εἶναι $x_1 = 2$, $x_2 = 3$, αἱ δόποιαι εἶναι καὶ ρίζαι τῆς δοθείσης ἔξισώσεως.

Παράδειγμα 2ον : Νὰ ἐπιλυθῇ ἡ ἔξισωσις : $[3^{(x-1)}]^{(x^2-9)} = 1$.

Ἐπίλυσις : Ἡ δοθεῖσα ἔξισωσις γράφεται :

$$3^{(x-1)(x^2-9)} = 3^0 \text{ καὶ } \delta\text{ίδει } (x-1)(x^2-9) = 0 \quad \text{ἢ} \quad (x-1)(x-3)(x+3) = 0.$$

Αἱ ρίζαι τῆς ἔξισώσεως αὐτῆς εἶναι $x_1 = 1$, $x_2 = 3$, $x_3 = -3$. Αὕτα δὲ εἶναι καὶ ρίζαι τῆς δοθείσης ἔξισώσεως.

Παράδειγμα 3ον : Νὰ ἐπιλυθῇ ἡ ἔξισωσις $5^{3x-2} = 437$.

Ἐπίλυσις : Λαμβάνομεν τοὺς λογαρίθμους ἀμφοτέρων τῶν μελῶν τῆς δοθείσης ἔξισώσεως καὶ ἔχομεν :

$$(3x-2) \cdot \log 5 = \log 437 \quad \text{ἢ} \quad 3x-2 = \frac{\log 437}{\log 5} \quad \text{ἢ} \quad 3x-2 = \frac{2,64048}{0,69897}$$

$$\text{ἢ} \quad 3x-2 = 3,77767 \quad \text{καὶ } \text{ἔξι } \alpha \text{ αὐτῆς :} \quad x = 1,92589.$$

Παράδειγμα 4ον : Νὰ ἐπιλυθῇ ἡ ἔξισωσις :

$$a^{\beta x} = \gamma, \quad (1)$$

Ἐνθα $a, \beta, \gamma \in \mathbb{R}^+$ καὶ $\alpha \neq 1$, $\beta \neq 1$.

Ἐπίλυσις : Λαμβάνοντες τοὺς λογαρίθμους ἀμφοτέρων τῶν μελῶν τῆς (1) ἔχομεν :

$$\beta^x \cdot \log \alpha = \log \gamma \quad \text{ἢ} \quad \beta^x = \frac{\log \gamma}{\log \alpha} \quad (2)$$

Ἐκ τῆς (2), λαμβάνοντες ἐκ νέου τοὺς λογαρίθμους, εύρισκομεν :

$$x \cdot \log \beta = \log \left(\frac{\log \gamma}{\log \alpha} \right)$$

$$x = \frac{1}{\log \beta} \cdot \log \left(\frac{\log \gamma}{\log \alpha} \right) \quad (3)$$

Διὰ νὰ ἔχῃ νόημα τό δεύτερον μέλος τῆς (3) πρέπει νὰ εἶναι $\frac{\log \gamma}{\log \alpha} > 0$. Τοῦτο ὑφίσταται ὅταν οἱ λογγ. καὶ λογα. εἶναι διμόσημοι, δηλ. ἢ ἀμφότεροι οἱ α καὶ γ νὰ εἶναι > 1 ἢ ἀμφότεροι < 1 .

γ'). Έκθετικαί ἔξισώσεις τῆς μορφῆς :

$$\boxed{f(a^x) = g(a^x)} \quad (3)$$

ἔνθα $a \in \mathbf{R}^+ - \{1\}$.

Ειδικῶς κατωτέρω θά μελετήσωμεν ἔξισώσεις τῶν μορφῶν :

$$y_1 : A\alpha^{2x} + B\alpha^x + \Gamma = 0$$

$$y_2 : A_1\alpha^{\mu_1 x + v_1} + A_2\alpha^{\mu_2 x + v_2} + \dots + A_k\alpha^{\mu_k x + v_k} = 0,$$

ἔνθα $\mu_i, v_i \in \mathbf{Z}, i = 1, 2, \dots, k$.

Αἱ ἔξισώσεις αὗται ἀνάγινται εἰς τὴν μορφὴν (1) διὰ τῆς ἀντικαταστάσεως :

$$\boxed{a^x = y}$$

Παράδειγμα 1ον : Νὰ ἐπιλυθῇ ἡ ἔξισωσις $4^x - 7 \cdot 2^x - 8 = 0$.

'Επίλυσις : 'Η διθεῖσα ἔξισωσις γράφεται : $2^{2x} - 7 \cdot 2^x - 8 = 0$ καὶ ἐὰν τεθῇ $2^x = y$,

ἔχομεν : $y^2 - 7y - 8 = 0$.

Αἱ ρίζαι τῆς ἔξισώσεως αύτῆς εἰναι : $y_1 = 8$ καὶ $y_2 = -1$.

"Ἄρα θὰ εἰναι :

$$2^x = 8 \quad (1) \quad \text{καὶ} \quad 2^x = -1 \quad (2).$$

'Η ἔξισωσις (1) γράφεται $2^x = 2^3$ καὶ δίδει : $x = 3$.

'Η ἔξισωσις (2) είναι ἀδύνατος, διότι $2^x > 0$ διὰ κάθε $x \in \mathbf{R}$.

"Ωστε ἡ ρίζα τῆς διθείσης ἔξισώσεως είναι $x = 3$.

Παράδειγμα 2ον : Νὰ ἐπιλυθῇ ἡ ἔξισωσις :

$$3^{x+2} + 5 \cdot 3^x + 3^{x-1} - 3^{x-2} = 128.$$

'Επίλυσις : Αύτη γράφεται :

$$3^x \cdot 3^2 + 5 \cdot 3^x + \frac{3^x}{3} - \frac{3^x}{9} = 128.$$

Θέτομεν $3^x = y$ καὶ ἔχομεν τὴν ἔξισωσιν :

$$9y + 5y + \frac{y}{3} - \frac{y}{9} = 128$$

ή

$$128y = 1152,$$

ἔξ ής :

$$y = 9.$$

Τότε ἔχομεν : $3^x = 9$ ή $3^x = 3^2$ καὶ ἄρα $x = 2$.

Παράδειγμα 3ον : Νὰ ἐπιλυθῇ ἡ ἔξισωσις : $5^{2x-1} + 3 \cdot 5^{x+1} = 80$.

'Επίλυσις : Αύτη γράφεται :

$$\frac{(5^x)^2}{5} + 3 \cdot 5^x \cdot 5 - 80 = 0$$

ή

$$(5^x)^2 + 75 \cdot 5^x - 400 = 0.$$

(1)

Θέτομεν $5^x = y$ καὶ ἔχομεν τὴν ἔξισωσιν :

$$y^2 + 75 \cdot y - 400 = 0.$$

Αύτη λυομένη δίδει :

$$y_1 = 5, \quad y_2 = -80.$$

*Οθεν ή (1) είναι Ισοδύναμος μὲν

$$5^x = 5 \quad \text{ή} \quad 5^x = -80.$$

$$x = 1.$$

*Η πρώτη δίδει :
*Η δευτέρα είναι άδύνατος, διότι $5^x > 0$ διάκαθε $x \in \mathbb{R}$.

δ'). Έκθετικαὶ ἔξισώσεις τῆς μορφῆς :

$$\boxed{f(a^x) = g(\beta^x)} \quad (4)$$

ενθα α, β ∈ ℝ+ - {1} καὶ α ≠ β.

Συνήθεις περιπτώσεις τῆς ἀνωτέρω μορφῆς είναι αἱ κάτωθι :

$$\delta_1: A \cdot \alpha^x = B \cdot \beta^x$$

$$\delta_2: A \cdot \alpha^{2x} + B \cdot \alpha^x \cdot \beta^x + C \cdot \beta^{2x} = 0.$$

Αἱ ἔξισώσεις αὗται ἀνάγονται εἰς τὴν μορφὴν (1) διὰ τῆς ἀντικαταστάσεως :

$$\boxed{\left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^x = y}$$

Πρόγματι, διὰ διαιρέσεως ἀμφοτέρων τῶν μελῶν τῆς ἔξισώσεως δ_2 διὰ β^{2x} αὕτη μετασχηματίζεται εἰς τὴν :

$$\delta_2: A \cdot \left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^{2x} + B \left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^x + C = 0$$

καὶ διὰ τῆς ἀντικαταστάσεως $\left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^x = y$ (1), ἡ ἔξισωσις δ_2 γίνεται :

$$Ay^2 + By + C = 0.$$

Λυομένη αὕτη καὶ ἐφ' ὅσον $B^2 - 4AC \geq 0$, θὰ δώσῃ δύο πραγματικὰς ρίζας y_1 καὶ y_2 . Διὰ τὰς τιμὰς $y = y_1$, $y = y_2$ ἡ (1) δίδει τὰς ἔκθετικὰς ἔξισώσεις :

$$\left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^{y_1} = y_1, \quad \left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^{y_2} = y_2, \quad \text{αἱ ὅποιαι λύονται κατὰ τὰ γνωστά.}$$

Παράδειγμα 1ον : Νὰ ἐπιλυθῇ ἡ ἔξισωσις :

$$3 \cdot 2^{x-4} - 2^{x-1} = 5^{x-2} - 6 \cdot 5^{x-3}.$$

*Ἐπίλυσις : Η δοθεῖσα ἔξισωσις γράφεται :

$$3 \cdot \frac{2^x}{2^4} - \frac{2^x}{2} = \frac{5^x}{5^2} - 6 \cdot \frac{5^x}{5^3}$$

$$\text{ή} \quad 2^x \cdot \left(\frac{3}{16} - \frac{1}{2}\right) = 5^x \cdot \left(\frac{1}{25} - \frac{6}{125}\right)$$

$$\text{ή} \quad \left(\frac{2}{5}\right)^x = \frac{16}{625}$$

$$\text{ή} \quad \left(\frac{2}{5}\right)^x = \left(\frac{2}{5}\right)^4$$

*Άρα είναι :

$$x = 4.$$

Παράδειγμα 2ον : Νὰ ἐπιλυθῇ ἡ ἔξισωσις : $3 \cdot 9^x - 5 \cdot 6^x + 2^{2x+1} = 0$.

*Ἐπίλυσις : Η δοθεῖσα ἔξισωσις γράφεται : $2 \cdot 2^{2x} - 5 \cdot 2^x \cdot 3^x + 3 \cdot 3^{2x} = 0$.

Διαιρούντες δημόφτερα τά μέλη αυτής διά 3^{2x} λαμβάνομεν τήν Ισοδύναμον έξισωσιν :

$$2 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^{2x} - 5 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^x + 3 = 0. \quad (1)$$

Θέτομεν $\left(\frac{2}{3}\right)^x = y$ και ή (1) γράφεται : $2y^2 - 5y + 3 = 0.$

Αὗτη έχει ρίζας : $y_1 = \frac{3}{2}$, $y_2 = 1$ και έπομένως ή (1) είναι Ισοδύναμος μέ :

$$\left(\frac{2}{3}\right)^x = \frac{3}{2} \quad \text{ή} \quad \left(\frac{2}{3}\right)^x = 1.$$

Ήτοι :

$$\left(\frac{2}{3}\right)^x = \left(\frac{2}{3}\right)^{-1} \quad \text{ή} \quad \left(\frac{2}{3}\right)^x = \left(\frac{2}{3}\right)^0$$

όποτε :

$$x = -1 \quad \text{ή} \quad x = 0.$$

ε'). Έκθετικαι έξισώσεις τής μορφής :

$$\boxed{\{f(x)\}^{g(x)} = 1} \quad (5)$$

Ένθα $f(x)$, $g(x)$ πολυωνυμικαι συναρτήσεις τοῦ x .

Αἱ έξισώσεις τῆς ἀνωτέρω μορφῆς έχουν προφανῶς λύσεις τὰς λύσεις τῶν έξισώσεων :

$$(i). f(x) = 1$$

$$(ii). g(x) = 0 \quad f(x) \neq 0.$$

$$(iii). f(x) = -1 \wedge g(x) = 2k, k \in \mathbb{Z}.$$

Παράδειγμα : Νὰ έπιλυθῇ ή έξισωσι : $(x^2 - 3x + 2)^{x^2 - 2x} = 1.$

*Επίλυσις : (i). Αἱ ρίζαι τῆς $x^2 - 3x + 2 = 1$ είναι προφανῶς λύσεις τῆς δοθείστης.

Αὗτη γράφεται $x^2 - 3x + 1 = 0$ και λυομένη δίδει :

$$x_1 = \frac{3 + \sqrt{5}}{2} \quad \text{και} \quad x_2 = \frac{3 - \sqrt{5}}{2}.$$

(ii). Αἱ λύσεις τοῦ συστήματος :

$$x^2 - 2x = 0$$

$$x^2 - 3x + 2 \neq 0$$

προφανῶς ικανοποιοῦν τήν δοθείσαν.

$$\text{Είναι δὲ} \quad x(x - 2) = 0 \quad \text{και} \quad (x - 1)(x - 2) \neq 0.$$

$$x = 0.$$

*Άρα :

*Επομένως ή δοθείσα έξισωσις έχει τὰς ρίζας :

$$x = 0, \quad x = \frac{3 + \sqrt{5}}{2}, \quad x = \frac{3 - \sqrt{5}}{2}.$$

(iii). Νὰ έξετασθῇ ή περίπτωσις $x^2 - 3x + 2 = -1 \wedge x^2 - 2x = 2k, k \in \mathbb{Z}.$

Παρατήρησις : *Η έξισωσις $\{f(x)\}^{g(x)} = \beta$, ένθα $f(x)$ πολυωνυμικὴ συνάρτησης τοῦ x , έπιλύεται, όταν τὸ β δύναται νὰ τεθῇ ύπο τήν μορφήν : $\beta = \alpha^a$. Θά έχωμεν τότε : $\{f(x)\}^{g(x)} = \alpha^a$ και συνεπῶς θὰ είναι $f(x) = \alpha$.

Παράδειγμα : Νὰ έπιλυθοῦν αἱ έξισώσει :

$$(i). x^x = 4, \quad (ii). x^x = -1, \quad (iii). (x^2 - 7x + 15)^{x^2 - 7x + 15} = 27.$$

$$(i). \text{Έχομεν } 4 = 2^2 \text{ και συνεπῶς θὰ είναι } x^x = 2^2. \text{ Έκ ταύτης προκύπτει } x = 2.$$

$$(ii). \text{Έχομεν } -1 = (-1)^{-1} \text{ και συνεπῶς θὰ είναι } x^x = (-1)^{-1}, \text{ δηλαδε } x = -1.$$

(iii). Έχομεν $27 = 3^3$ και συνεπώς θά είναι $(x^2 - 7x + 15)^{x^2 - 7x + 15} = 3^3$. Αυτη είναι ισοδύναμος με την: $x^2 - 7x + 15 = 3$ ή $x^2 - 7x + 12 = 0$, ή όποια λυομένη δίδει:

$$x_1 = 3 \quad , \quad x_2 = 4.$$

Έκθετικά Συστήματα

§ 221. Ορισμοί.— Καλεῖται σύστημα έκθετικών έξισώσεων με δύο ή περισσότερους άγνωστους, πᾶν σύστημα έξισώσεων έκ τῶν δποίων μία τούλαχιστον είναι έκθετική.

Αἱ τιμαὶ τῶν ἀγνώστων διὰ τὰς δποίας συναληθεύουν αἱ έξισώσεις τοῦ συστήματος συνιστοῦν λύσιν αὐτοῦ.

Ἡ ἐπίλυσις τῶν έκθετικῶν συστημάτων στηρίζεται ἐπὶ τῶν ίδιοτήτων τῶν δυνάμεων καὶ τῶν λογαρίθμων καὶ τῆς εἰς τὴν προηγουμένην παράγραφον ἐκτεθείστης θεωρίας ἐπιλύσεως τῶν έκθετικῶν έξισώσεων.

Παραδείγματα : 1ον. Νὰ ἐπιλυθῇ τὸ σύστημα :

$$4^x \cdot 2^{y-2} = 32$$

$$3^{x+2} \cdot 3^{y-4} = 27.$$

Ἐπίλυσις : Τὸ δοθὲν σύστημα είναι ισοδύναμον μὲ τό :

$$2^{2x+y-2} = 2^5$$

$$3^{x+y-2} = 3^3.$$

Τοῦτο ἀληθεύει δταν :

$$\begin{cases} 2x + y = 7 \\ x + y = 5. \end{cases}$$

Λύοντες τὸ σύστημα τοῦτο εύρισκομεν τὴν λύσιν : $x = 2, y = 3$.

2ον : Νὰ ἐπιλυθῇ τὸ σύστημα :

$$3^x \cdot 4^y = 3981312 \quad (1)$$

$$2^y \cdot 5^x = 400000. \quad (2)$$

Ἐπίλυσις : Λαμβάνοντες τοὺς λογαρίθμους ἀμφοτέρων τῶν μελῶν τῶν έξισώσεων (1) καὶ (2) εύρισκομεν τὸ ισοδύναμον πρὸς τὸ δοθὲν σύστημα :

$$x \cdot \log 3 + y \cdot \log 4 = \log 3981312 \quad (1')$$

$$y \cdot \log 2 + x \cdot \log 5 = \log 400000. \quad (2')$$

Θέτοντες $\log 4 = \log 2^2 = 2 \log 2$ καὶ πολλαπλασιάζοντες τὰ μέλη τῆς (2') ἐπὶ 2, εύρισκομεν :

$$x \log 3 + 2y \cdot \log 2 = \log 3981312 \quad (1'')$$

$$2x \log 5 + 2y \cdot \log 2 = \log 400000. \quad (2'')$$

Λύοντες τὸ σύστημα τῶν έξισώσεων (1'') καὶ (2'') εύρισκομεν :

$$x = \frac{2 \log 400000 - \log 3981312}{2 \log 5 - \log 3} = \frac{2 \cdot \log (2^2 \cdot 10^5) - \log (2^{14} \cdot 3^8)}{2 \log 5 - \log 3} =$$

$$= \frac{10 - 10 \log 2 - 5 \log 3}{2 - 2 \log 2 - \log 3} = 5.$$

*Αντικαθιστῶντες τὴν τιμὴν ταύτην τοῦ χ εἰς τὴν δευτέραν τῶν δοθεισῶν έξισώσεων εύρισκομεν :

$$2^y = \frac{400000}{5^5} = \frac{4 \cdot 10^5}{5^5} = \frac{2^2 \cdot 2^5 \cdot 5^5}{5^5} = 2^7,$$

ἐκ τῆς δποίας έχομεν $y = 7$.

"Αρα αι ρίζαι του συστήματος είναι : $x = 5$, $y = 7$.

Ζεν : Νά επιλυθῇ τὸ σύστημα :

$$x^y = y^x \quad (1)$$

$$x^3 = y^2 \quad (2)$$

'Επίλυσις : Προφανής λύοις τοῦ συστήματος είναι : $x = y = 1$. 'Υποθέτοντες τώρα ὅτι : $x > 0$, $y > 0$ καὶ $x \neq 1 \neq y$ εύρισκομεν, ἀν λάβωμεν τοὺς λογαριθμούς ἀμφοτέρων τῶν μελῶν τῶν ἔξισώσεων (1) καὶ (2), ὅτι τὸ δοθὲν σύστημα είναι ισοδύναμον μὲ τό :

$$y \cdot \log x = x \cdot \log y \quad (1')$$

$$3 \cdot \log x = 2 \cdot \log y. \quad (2')$$

$$\text{Διαιροῦντες κατὰ μέλη τὰς (1') καὶ (2') ἔχομεν : } \frac{y}{3} = \frac{x}{2},$$

$$\text{ἐκ τῆς ὅποιας λαμβάνομεν } y = \frac{3x}{2}. \quad (3)$$

Θέτοντες τὴν τιμὴν ταύτην τοῦ y εἰς τὴν δευτέραν τῶν δοθεισῶν ἔξισώσεων ἔχομεν :

$$x^3 = \left(\frac{3x}{2}\right)^2 \quad \text{ἢ} \quad x^3 = \frac{9}{4} x^2$$

$$\text{ἢ } x^2 \left[x - \frac{9}{4} \right] = 0, \text{ καὶ ἐπειδὴ ὑπετέθη } x > 0, \text{ ἔπειται : } x = \frac{9}{4}.$$

Θέτοντες τὴν τιμὴν ταύτην τοῦ x εἰς τὴν (3) λαμβάνομεν :

$$y = \frac{3}{2} \cdot \frac{9}{4} = \frac{27}{8}.$$

'Επομένως, κατὰ τὰ ἀνωτέρω ἐκτεθέντα, αἱ ρίζαι τοῦ συστήματος είναι τὰ ζεύγη :

$$(x = 1, y = 1), \quad , \quad \left(x = \frac{9}{4}, y = \frac{27}{8} \right).$$

Λογαριθμικαὶ ἔξισώσεις καὶ λογαριθμικὰ συστήματα

§ 222. 'Ορισμοί. – α'). Καλεῖται λογαριθμικὴ ἔξισωσις πᾶσα ἔξισωσις, ἡ δποία περιέχει τὸν λογάριθμον ἀγνώστου ἢ ἀγνώστων αὐτῆς ἢ καὶ συναρτήσεων αὐτῶν. Π. χ. αἱ κάτωθι ἔξισώσεις είναι λογαριθμικαὶ :

$$3 \log x - \frac{1}{2} \log (2x + 1) = \log \sqrt{2x - 1} + 2$$

$$\log x + 3 \log y = 7$$

$$\log_2 (3x + 1) - \log x = \log_x (2x - 3).$$

'Η ἐπίλυσις τῶν λογαριθμικῶν ἔξισώσεων στηρίζεται ἐπὶ τῶν ίδιοτήτων τῶν λογαριθμῶν. Πολλάκις δῶμας ἡ ἐπίλυσις μιᾶς λογαριθμικῆς ἔξισώσεως ἀνάγγεται εἰς ἐπίλυσιν ἔξισώσεων τῶν κάτωθι μορφῶν :

$$(i) \log x = y, \quad (ii) \log x = \log a, \quad (iii) \log f(x) = \log a,$$

$$(iv) \log_b f(x) = \log_b g(x),$$

Ἐνθα α γνωστὸς θετικὸς ἀριθμός, $f(x)$ δὲ καὶ $g(x)$ γνωσταὶ συναρτήσεις τοῦ ἀγνώστου, αἱ δποῖαι ὑπόκεινται εἰς τὸν περιορισμὸν $f(x), g(x) > 0$ καὶ $\beta \neq 1$.

* Εκ τοῦ δρισμοῦ τοῦ λογαρίθμου καὶ τοῦ πορίσματος II, ίδ. III τῆς § 202 προκύπτει τώρα ὅτι :

- (i) 'Η ἔξισωσις λογ $x = y$ εἶναι ισοδύναμος μὲ τὴν : $x = 10^y$
- (ii) 'Η » λογ $x = \lambda \text{ag } \alpha$ » μὲ τὸ σύστημα : $x = \alpha$, $\alpha > 0$
- (iii) 'Η » λογ $f(x) = \lambda \text{og } \alpha$ » » » : $f(x) = \alpha$, $\alpha > 0$
- (iv) 'Η » λογ _{β} $f(x) = \lambda \text{og } g(x)$ » » : $f(x) = g(x)$, $g(x) > 0$.

Σημείωσις : Εἰς περίπτωσιν καθ' ἥν οἱ λογάριθμοι ἔχουν ληφθῆ ὡς πρὸς διαφόρους βάσεις, θὰ μετατρέπωνται πάντες ὡς πρὸς τὴν αὐτήν βάσιν.

β'). Καλεῖται σύστημα λογαριθμικῶν ἔξισώσεων πᾶν σύστημα ἔξισώσεων ἐκ τῶν δόπιων μία τούλαχιστον εἶναι λογαριθμική.

Αἱ τιμαὶ τῶν ἀγνώστων διὰ τὰς δόπιας συναληθεύουν αἱ ἔξισώσεις τοῦ συστήματος συνιστοῦν λύσιν αὐτοῦ.

'Η ἐπίλυσις τῶν λογαριθμικῶν συστημάτων στηρίζεται ἐπὶ τῶν ἴδιοτήτων τῶν λογαριθμῶν καὶ τῆς ἀνωτέρω ἐκτεθείσης θεωρίας ἐπιλύσεως λογαριθμικῶν ἔξισώσεων.

'Ως παραδείγματα ἔστωσαν τὰ ἀκόλουθα :

Παράδειγμα 1ον : Νὰ ἐπιλυθῇ ἡ ἔξισωσις :

$$\frac{1}{2} \lambda \text{og}(x+2) + \lambda \text{og}\sqrt{x-3} = 1 + \lambda \text{og}\sqrt{3}.$$

'Επίλυσις : 'Ἐν πρώτοις πρέπει νὰ εἶναι $x+2 > 0$, $x-3 > 0$, δητε $x > 3$.

'Επειδὴ $1 = \lambda \text{og } 10$, ἡ δοθεῖσα ἔξισωσις γράφεται :

$$\lambda \text{og}\sqrt{x+2} + \lambda \text{og}\sqrt{x-3} = \lambda \text{og } 10 + \lambda \text{og}\sqrt{3}$$

$$\lambda \text{og}(\sqrt{x+2} \cdot \sqrt{x-3}) = \lambda \text{og} \cdot 10\sqrt{3}$$

$$\sqrt{(x+2) \cdot (x-3)} = 10\sqrt{3}$$

$$(x+2) \cdot (x-3) = 300$$

$$x^2 - x - 306 = 0.$$

'Εξ αὐτῆς εὑρίσκομεν :

$$x_1 = 18, \quad x_2 = -17.$$

'Η $x_2 = -17$ ἀπορρίπτεται, ὡς μὴ πληρούσα τὸν περιορισμὸν $x > 3$.

Παράδειγμα 2ον : Νὰ ἐπιλυθῇ ἡ ἔξισωσις :

$$\sqrt{x \lambda \text{og}\sqrt{x}} = 10. \quad (1)$$

'Επίλυσις : Περιορισμός : πρέπει νὰ εἶναι $x > 0$.

'Υψώνομεν ἀμφότερα τὰ μέλη τῆς (1) εἰς τὸ τετράγωνον καὶ ἔχομεν :

$$x^{\lambda \text{og}\sqrt{x}} = 100. \quad (2)$$

Λαμβάνομεν τοὺς λογαρίθμους ἀμφοτέρων τῶν μελῶν τῆς (2) καὶ ἔχομεν :

$$\lambda \text{og}\sqrt{x} \cdot \lambda \text{og } x = \lambda \text{og } 100$$

$$\frac{1}{2} (\lambda \text{og } x)^2 = 2$$

$$(\lambda \text{og } x)^2 = 4$$

καὶ ἀρισταὶ :

$$\lambda \text{og } x = \pm 2.$$

*Έάν λάβωμεν λογ $x = 2$ έχουμεν λογ $x = \log 100$, δρα: $x = 100$.

*Έάν λάβωμεν λογ $x = -2$ έχουμεν λογ $x = \log 0,01$, δρα: $x = 0,01$.

Παράδειγμα 3ον : Νά επιλυθῇ ἡ ἔξισωσις :

$$\log_{\sqrt{2}}(2 \cdot \log_4 x \cdot \log_2 x + \log_{\sqrt{2}} x) = 6. \quad (1)$$

Επίλυση : Ή δοθεῖσα ἔξισωσις είναι ίσοδύναμος μὲ τήν :

$$2 \log_4 x \cdot \log_2 x + \log_{\sqrt{2}} x = (\sqrt{2})^6 = 8. \quad (2)$$

*Ως γνωστὸν (§ 207) είναι :

$$\log_a x = \frac{\log x}{\log a}, \text{ ένθα οἱ λογχ καὶ λογα εἰναι ὡς πρὸς βάσιν 10.}$$

Λόγω αὐτοῦ ἔχομεν :

$$\log_4 x = \frac{\log x}{\log 4} = \frac{\log x}{2 \log 2}, \quad \log_2 x = \frac{\log x}{\log 2}, \quad \log_{\sqrt{2}} x = \frac{\log x}{\log \sqrt{2}} = \frac{2 \log x}{\log 2}.$$

Δυνάμει αὐτῶν ἡ (2) γίνεται :

$$2 \frac{\log x}{2 \log 2} \cdot \frac{\log x}{\log 2} + \frac{2 \log x}{\log 2} = 8$$

$$\left(\frac{\log x}{\log 2} \right)^2 + 2 \cdot \left(\frac{\log x}{\log 2} \right) - 8 = 0.$$

*Εξ αὐτῆς εὑρίσκομεν :

$$\frac{\log x}{\log 2} = 2 \quad \text{καὶ} \quad \frac{\log x}{\log 2} = -4.$$

*Έκ τῆς πρώτης ἔχομεν :

$$\log x = 2 \log 2 = \log 4, \quad \text{ἄρα} \quad x = 4$$

καὶ ἐκ τῆς δευτέρας δόμοις ἔχομεν :

$$\log x = -4 \log 2 = \log 2^{-4} = \log \frac{1}{16}, \quad \text{ἄρα} \quad x = \frac{1}{16}.$$

Παράδειγμα 4ον : Νά επιλυθῇ τὸ σύστημα :

$$\log x + \log y = \log 14$$

$$3x - y = 1.$$

Επίλυση : Περιορισμός: $x > 0, y > 0$. Η πρώτη ἔξισωσις τοῦ συστήματος γράφεται:

$$\log(xy) = \log 14 \quad \text{καὶ} \quad \deltaίδει: \quad xy = 14.$$

*Έχομεν οὕτω νὰ ἐπιλύσωμεν τὸ ίσοδύναμον σύστημα :

$$3x - y = 1$$

$$xy = 14.$$

Λύομεν τὸ σύστημα τοῦτο καὶ ἐπειδὴ πρέπει $x > 0, y > 0$ εὑρίσκομεν :

$$x = 7/3 \quad \text{καὶ} \quad y = 6.$$

Παράδειγμα 5ον : Νά επιλυθῇ τὸ σύστημα :

$$x^{\log y + 1} = y^{\log x + 2}$$

$$y^{\sqrt{x+2}} = x^{y-2}.$$

Επίλυση : Προφανής λύσις τοῦ συστήματος είναι: $x = y = 1$. Υποθέτομεν τώρα ὅτι:

$x > 0, y > 0$ καθώς καὶ $x \neq 1 \neq y$.

*Έκ τῆς πρώτης, λογαριθμίζοντες, λαμβάνομεν :

$$(\log y + 1) \cdot \log x = (\log x + 2) \cdot \log y$$

$$\log x \log y + \log y = \log x \log y + 2 \log y$$

$$\log x = \log y^2$$

$$x = y^2. \quad (1)$$

καὶ συνεπῶς :

Λόγω ταύτης ή διευτέρα έξισωσις τοῦ συστήματος γράφεται :

$$y^{\sqrt{y^2+2}} = y^{2(y-2)}.$$

*Έκ ταύτης, επειδή $y \neq 1$, λαμβάνομεν : $\sqrt{y^2 + 2} = 2(y-2)$, ήτις λυομένη κατά τὰ γνωστά δίδει παραδεκτήν τιμήν $y = \frac{8 + \sqrt{22}}{3}$.

*Άρα τὸ δοθὲν σύστημα ἔχει τὰς λύσεις :

$$(x = 1, \quad y = 1), \quad \left(x = \frac{86 + 16\sqrt{22}}{9}, \quad y = \frac{8 + \sqrt{22}}{3} \right).$$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

484. Νὰ ἐπιλυθοῦν αἱ κάτωθι ἔξισώσεις :

$$1. \quad 5^{\sqrt{x}} = 625, \quad 2. \quad 3^{x^2 - 9x + 11} = 27, \quad 3. \quad \sqrt[3]{27^{x+1}} = 3^{2x-4},$$

$$4. \quad \left(\frac{3}{4}\right)^{3x-7} = \left(\frac{4}{3}\right)^{7x-3}, \quad 5. \quad 2 \cdot 9^x - 7 \cdot 3^x + 3 = 0, \quad 6. \quad 3^x - 4 \sqrt[3]{3^x} + 3 = 0,$$

$$7. \quad 5^{x-1} = 2 + \frac{3}{5^{x-2}}, \quad 8. \quad 4^x - 3^{x-\frac{1}{2}} = 3^{x+\frac{1}{2}} - 2^{2x-1}, \quad 9. \quad .2 \cdot 4^x + 3 \cdot 9^x = 5 \cdot 6^x,$$

$$10. \quad (x^2 - 5x + 6)^{x^2-2x} = 1, \quad 11. \quad 3^{x+1} - 2^x = 3^{x-1} + 2^{x+3}, \quad 12. \quad x^{x^4-26x^2+25} = 1.$$

485. Όμοιώσι :

$$1. \quad 18^{8-4x} = (54\sqrt{2})^{3x-2}, \quad 2. \quad \sqrt{\frac{8}{5}} \cdot \frac{5}{8} = 2 \cdot \frac{x}{\sqrt{5}}, \quad 3. \quad x^x - x^{-x} = 3(1 + x^{-x}),$$

$$4. \quad \left(\frac{3}{4}\right)^{x-1} \cdot \sqrt[3]{\frac{4}{3}} = \frac{1}{2} (\frac{4}{3})^{3x-4}, \quad 5. \quad 3^{x-1} - \frac{15}{3^{x+1}} + 3^x - \frac{21}{3^{x+1}} = 0,$$

$$6. \quad 5^{x-2} - 3 \cdot 2^{x-3} = 12 \cdot 5^{x-3} - 2^x, \quad 7. \quad \sqrt[3]{2^{6x-13}} - 3^{2(x-2)} = \sqrt[3]{8^{2x-3}} - 3^{2x-3}.$$

486. Νὰ ἐπιλυθοῦν τὰ κάτωθι συστήματα :

$$1. \quad \begin{array}{l} 2^{3x+y} = 32 \\ 3^{2x-y} = 1 \end{array} \quad 2. \quad \begin{array}{l} x^y = 243 \\ \sqrt[3]{1024} = \left(\frac{2}{3}x\right)^2 \end{array} \quad 3. \quad \begin{array}{l} 4^{2x-9} \cdot 2^{3y-2} = 1024 \\ 3^{x-2} \cdot 3^{y-3} = 3^{-2} \end{array}.$$

$$4. \quad \begin{array}{l} 3^x - 2^{y+3} = 15 \\ 2^y - 3^{x-3} = 3 \end{array} \quad 5. \quad \begin{array}{l} 3^{xy} - y^x = 1 \\ y^x - x = 0 \end{array} \quad 6. \quad \begin{array}{l} 2^x = 3y \\ 3^x = 2y \end{array}$$

487. Όμοιώσι :

$$1. \quad \begin{array}{l} x^y = y^x \\ x = y^2 \end{array} \quad 2. \quad \begin{array}{l} x^{x+y} = y^3 \\ y^{x+y} = x^3 \end{array} \quad 3. \quad \begin{array}{l} x^{x+y} = y^x \\ y^{x+y} = x^y \end{array}$$

488. Νὰ ἐπιλυθοῦν καὶ νὰ διερευνθοῦν τὰ κάτωθι συστήματα (βάσεις θετικαί) :

$$1. \quad \begin{array}{l} \alpha^x = \beta^y \\ x^y = y^x \end{array} \quad 2. \quad \begin{array}{l} \alpha^x = \beta^y \\ x^a = y^b \end{array} \quad 3. \quad \begin{array}{l} x^a = y^b \\ x^y = y^x \end{array}$$

489. Νά έπιλυθοῦν αἱ κάτωθι ἔξισώσεις :

1. $\lambda\circ y(x+1) + 2\lambda\circ y \sqrt{5x} = 2,$
2. $\frac{1}{3}\lambda\circ y(x-2) + \lambda\circ y \sqrt[3]{4x+3} = \frac{2}{3},$
3. $\lambda\circ y \frac{2x}{3} + \lambda\circ y \left(\frac{5x}{4} + 2\right) = 2\lambda\circ y(x-1),$
4. $\lambda\circ y[\lambda\circ y(2x^2+x-11)] = 0,$
5. $x^{\lambda\circ y 3} x - \lambda\circ y 5x = 0,01,$
6. $(4x)^{\lambda\circ y 2 + \lambda\circ y \sqrt{x}} = 100,$
7. $2^{\lambda\circ y x} + 2^{5-\lambda\circ y x} = 12,$
8. $\frac{\lambda\circ y x}{\lambda\circ y x + 2} + \frac{\lambda\circ y x + 3}{\lambda\circ y x - 1} = \frac{11}{2},$
9. $\lambda\circ y_2(\lambda\circ y_3 x) = \lambda\circ y_4(\lambda\circ y_4 x).$

490. Ὁμοίως :

1. $\lambda\circ y(2^x + 2 \cdot 3^x) + \lambda\circ y 81 = x \cdot \lambda\circ y 3 + \lambda\circ y 178$
2. $(\lambda\circ y_3 x)^2 - 3^{\lambda\circ y_5 5 + (\lambda\circ y_3)^{-1}} = \lambda\circ y_3(x^6) - 9^{\lambda\circ y_3 \sqrt[3]{5}},$
3. $10 \cdot x^{\lambda\circ y x} = x^2 \cdot \sqrt{x},$
4. $x^{\lambda\circ y \frac{3x}{10}} = 9 \cdot (3x)^{\lambda\circ y 9x^2},$
5. $\lambda\circ y \sqrt[3]{x} \lambda\circ y_2 x \lambda\circ y_2 \sqrt[3]{x} \lambda\circ y_4 x = 54.$

491. Διὰ ποίας τιμᾶς τοῦ θ ἡ ἔξισωσις : $x^2 - 2(1 + \lambda\circ y \theta)x + 1 - (\lambda\circ y \theta)^2 = 0$ ἔχει ρίζας πραγματικάς καὶ ἴσας ;

492. Νά έπιλυθοῦν τὰ κάτωθι συστήματα :

1. $\lambda\circ y x - \lambda\circ y y = 1$
2. $\frac{x + \lambda\circ y y}{x} = 1$
3. $\left(\frac{x}{5}\right)^{\lambda\circ y 5} = \left(\frac{y}{7}\right)^{\lambda\circ y 7}$
4. $\lambda\circ y x^2 + \lambda\circ y y^2 = \lambda\circ y 32$
5. $\frac{\sqrt{y^2 + 10} = 11 \sqrt[3]{y}}{\sqrt{y^2 + 10} = 11 \sqrt[3]{y}}$
6. $5^{\lambda\circ y x} = 3^{\lambda\circ y y}$
7. $x^{\lambda\circ y y} + y^{\lambda\circ y x} = 20$
8. $\frac{x^{\lambda\circ y y} + y^{\lambda\circ y x} = 200}{\sqrt{x^{\lambda\circ y y} \cdot y^{\lambda\circ y x}} = y^2}$
9. $(3x)^{\lambda\circ y 3} = (5y)^{\lambda\circ y 5}$

493. Ὁμοίως :

1. $x^{\lambda\circ y y} + y^{\lambda\circ y x} = 200$
2. $\frac{\lambda\circ y y}{\sqrt[3]{5^4 x}} = 25$
3. $y^x(1+y^x) = 10100$
4. $\sqrt[x+2]{\frac{\lambda\circ y y}{y^{\lambda\circ y y}}} = 10.000$
5. $\lambda\circ y \sqrt[3]{xy} - \lambda\circ y \sqrt{\frac{x}{y}} = 3.$
6. $(2x)^{\lambda\circ y y} + y^{\lambda\circ y(2x)} = 8x^2$
7. $(3x)^{\lambda\circ y 3} = (5y)^{\lambda\circ y 5}$
8. $y = 4x^2 \cdot y^{\lambda\circ y(2x)}$
9. $x^{\lambda\circ y 5} = y^{\lambda\circ y 3}$

494. Νά εύρεθοῦν αἱ πραγματικαὶ λύσεις τοῦ συστήματος :

$$z^x = y^{2x}, \quad 2^{z-1} = 4^x, \quad x + y + z = 16.$$

495. Εάν $\alpha, \beta \in \mathbb{R}^+ - \{1\}$, νά έπιλυθῇ τὸ σύστημα :

$$\lambda\circ y_\alpha x \cdot \lambda\circ y_\beta y = \lambda\circ y_\alpha \beta, \quad \alpha^{\lambda\circ y_\alpha x} y = \sqrt[3]{x}.$$

496. Νά έπιλυθῇ ἡ ἔξισωσις :

$$\lambda\circ y(21^{\lambda\circ y x+1} - 42) + \lambda\circ y 4 = \lambda\circ y 21 \cdot \lambda\circ y x + \lambda\circ y 76.$$

497. Ὁμοίως :

$$[\lambda\circ y_x(16x - 5 - x^2) + \lambda\circ y_x 2] \cdot \lambda\circ y_{x+5} x \cdot \lambda\circ y_x x = 2.$$

498. Νά εύρεθοῦν αἱ τιμαὶ τὰς δύοις λαμβάνει δὲ $\theta, \theta \in \mathbb{R}^+$, ἀν αἱ ρίζαι τῆς ἔξισώσεως :

$$\lambda\circ y[\lambda\circ y(x^2 + x \lambda\circ y \theta + 110)] = 0,$$

ἀποτελοῦν λύσιν τοῦ συστήματος :

$$y^{\lambda\circ y z} + z^{\lambda\circ y y} = 20, \quad \lambda\circ y \sqrt[3]{yz} = 1.$$

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΧ

ΑΝΑΤΟΚΙΣΜΟΣ — ΙΣΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ — ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ

I. Ἀνατοκισμὸς

§ 223. Εἰσαγωγικαὶ ἔννοιαι — Ὁρισμοί. — Γνωρίζομεν ἐκ τῆς Ἀριθμητικῆς ὅτι τόκος λέγεται τὸ ποσὸν τὸ ὄποιον λαμβάνει τις δανείζων εἰς ἄλλον χρήματα, ἐπὶ πλέον τοῦ δανειζόμενου ποσοῦ. Τὸ ποσὸν τὸ ὄποιον δανείζει τις, λέγεται κεφάλαιον, ὁ δὲ τόκος εἶναι ἡ ἀμοιβὴ τὴν ὄποιαν καταβάλλει ὁ δανειζόμενος διὰ τὴν χρήσιν τοῦ κεφαλαίου. "Οταν τὸ κεφάλαιον μένη τὸ αὐτὸ καθ' ὅλην τὴν διάρκειαν τοῦ δανείου, ὁ τόκος λέγεται ἀπλοῦς" λέγομεν δὲ τότε ὅτι τὰ χρήματα τοκίζονται ἐπὶ ἀπλῷ τόκῳ, ὁ δὲ τόκος τῶν 100 δρχ. εἰς μίαν χρονικὴν περίοδον καλεῖται ἐπιτόκιον. Πολλάκις ὅμως ὁ τόκος ἑκάστης χρονικῆς περιόδου προστίθεται εἰς τὸ κεφάλαιον καὶ ἀποτελεῖ μαζὺν μὲ αὐτὸ τὸ κεφάλαιον τῆς ἐπομένης χρονικῆς περιόδου. Οὕτως ὁ τόκος κεφαλαιοποιεῖται καὶ τοκίζεται ἐν συνεχείᾳ κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον. Ἡ πρόσθετις αὕτη τοῦ τόκου εἰς τὸ κεφάλαιον, ἥτοι ἡ κεφαλαιοποίησις τοῦ τόκου λέγεται ἀνατοκισμός, δὲ τόκος, ὁ ὄποιος λαμβάνεται ἀπὸ τὸν ἀνατοκισμόν, λέγεται σύνθετος.

Εἰς τὸν ἀνατοκισμὸν καλεῖται «ἐπιτόκιον» ὁ τόκος τῆς μιᾶς δραχμῆς εἰς μίαν χρονικὴν περίοδον. Κατὰ συνέπειαν τὸ ἐπιτόκιον εἰς τὸν ἀνατοκισμὸν εἶναι ἵσον πρὸς τὸ 1/100 τοῦ ἐπιτοκίου τοῦ ἀπλοῦ τόκου. Τοῦτο παρίσταται κατωτέρω μὲ τ (τ = τὸ ἑκατοστὸν τοῦ ἐπιτοκίου τοῦ ἀπλοῦ τόκου).

Κεφάλαιόν τι λέγομεν ὅτι ἀνατοκίζεται ὅταν ὁ δανεισμός του γίνεται ἐπὶ ἀνατοκισμῷ.

Συνήθως ἡ χρονικὴ περίοδος κατὰ τὴν ὄποιαν ἀνατοκίζεται ἐν κεφαλαίου, εἶναι τὸ ἔτος ἢ ἡ ἔξαμηνία.

Εἰς τὸν ἀνατοκισμὸν διακρίνομεν ἀρχικὸν καὶ τελικὸν ἢ σύνθετον κεφαλαίου. Τὸ τελικὸν κεφάλαιον εἶναι τὸ ἀρχικὸν ἡγεμένον κατὰ τοὺς τόκους τοῦ δανειζόμενου (ἀρχικοῦ) κεφαλαίου κατὰ τὸ χρονικὸν διάστημα κατὰ τὸ ὄποιον διήρκεσε ὁ δανεισμός.

Τὰ προβλήματα τοῦ ἀνατοκισμοῦ λύομεν διὰ τύπων, τοὺς ὄποιους εύρισκομεν διὰ τῆς λύσεως τοῦ ἀκολούθου γενικοῦ προβλήματος.

§ 224. Πρόβλημα. — Κεφάλαιον k_0 δραχμῶν ἀνατοκίζεται διὰ ἡ εἴτη μὲ ἐπιτόκιον τὸ δραχμῶν. Ζητεῖται νὰ εὑρεθῇ τὸ τελικὸν κεφάλαιον k_v .

Λύσις. Ἡ μία δραχμὴ θὰ φέρῃ μετὰ ἐν ἔτος τόκον τ, ἀρα αἱ k_0 δραχμαὶ θὰ φέρουν εἰς τὸ τέλος τοῦ πρώτου ἔτους k_0t δρχ. καὶ συνεπῶς τὸ κεφάλαιον k_0 δρχ. εἰς τὸ τέλος τοῦ πρώτου ἔτους θὰ γίνῃ :

$$k_0 + k_0t = k_0(1+t)$$

Ήτοι : τὸ κεφάλαιον k_0 πολλαπλασιάζεται ἐπὶ τὸν (σταθερόν) συντελεστὴν $(1+\tau)$, ήνα δώση τὸ ζητούμενον ποσὸν εἰς τὸ τέλος τοῦ πρώτου ἔτους.

Δι’ δικοίου συλλογισμοῦ εύρισκομεν, ὅτι αἱ $k_0(1+\tau)$ δραχμαὶ εἰς τὸ τέλος τοῦ ἔτους θὰ γίνουν (μὲ τοὺς τόκους των) : $k_0(1+\tau) \cdot (1+\tau)$, ήτοι $k_0(1+\tau)^2$ δραχμαὶ. Οὕτω μετὰ δύο ἔτη τὸ κεφάλαιον k_0 θὰ ἀνέλθῃ εἰς :

$$k_0(1+\tau)^2.$$

Ομοίως ἐργαζόμενοι εύρισκομεν ὅτι αἱ k_0 δραχμαὶ εἰς τὸ τέλος τοῦ τρίτου ἔτους θὰ γίνουν :

$$k_0(1+\tau)^3.$$

Τέλος, προχωροῦντες καθ’ ὅμιον τρόπον, εύρισκομεν ὅτι αἱ k_0 δραχμαὶ εἰς τὸ τέλος τοῦ νιοστοῦ ἔτους θὰ γίνουν : $k_0(1+\tau)^v$.

Ἄρα τὸ τελικὸν κεφάλαιον k_v δίδεται ἐκ τοῦ τύπου :

$$k_v = k_0 \cdot (1+\tau)^v \quad (1)$$

Ο τύπος (1) καλεῖται τύπος τοῦ ἀνατοκισμοῦ καὶ συνδέει τὰ τέσσαρα ποσὰ k_0 , τ , v , k_v . Ἀν δίδωνται τὰ τρία ἐξ αὐτῶν, τότε λύομεν λογαριθμικῶς τοῦτον, ὡς πρὸς τὸν ἀπομένοντα ἄγγωστον.

Ἐνίστε ὅμως ὁ ἀνατοκισμὸς γίνεται διὰ ν ἔτη καὶ ἡμέρας τινὰς λ.χ. η ἡμέρας, ($\eta < 360$), τότε πρὸς ὑπολογισμὸν τοῦ τελικοῦ κεφαλαίου k σκεπτόμεθα ὡς ἔξῆς:

Μετὰ παρέλευσιν ν ἔτῶν αἱ k_0 δραχμαὶ θὰ γίνουν : $k_0(1+\tau)^v$. Τὸ ποσὸν τοῦτο θὰ μείνῃ ἀκόμη ἐπὶ ἀπλῷ τόκῳ η ἡμέρας ($\eta < 360$) καὶ τοῦτο διότι αἱ ημέραι δὲν συνιστοῦν μίαν χρονικήν περίοδον, ήτοι ἐν ἔτος. Ἐπειδὴ εἰς τὸν ἀπλούν τόκον τὸ ἐπιτόκιον εἶναι : $\epsilon = 100 \cdot \tau$, τὸ ποσὸν $k_0(1+\tau)^v$ θὰ δώσῃ εἰς η ἡμέρας τόκον :

$$\frac{k_0(1+\tau)^v \cdot 100\tau \cdot \eta}{36000}, \quad \text{ήτοι} \quad \frac{k_0(1+\tau)^v \cdot \tau\eta}{360}.$$

Ἐπομένως τὸ τελικὸν κεφάλαιον μετὰ ν ἔτη καὶ η ἡμέρας θὰ εἶναι :

$$k = k_0(1+\tau)^v + \frac{k_0(1+\tau)^v \cdot \tau\eta}{360}.$$

Οθεν :

$$k = k_0(1+\tau)^v \cdot \left(1 + \frac{\tau\eta}{360} \right) \quad (\eta < 360) \quad (2)$$

Σημ. Εἰς τὴν πρᾶξιν ἀντὶ τοῦ τύπου (2) χρησιμοποιοῦμεν (συνήθως) τὴν κατὰ προσέγγισιν Ισότητα (τύπον) :

$$k = k_0(1+\tau)^v + \frac{\eta}{360} \quad (2')$$

Ο (2') δίδει σχεδὸν τὸ αὐτὸ ἔξαγόμενον μὲ τὸν (2) καὶ εἶναι πλέον εὔχρηστος διὰ τοὺς ὑπολογισμούς.

Παρατήρησις. Ἐὰν ὁ ἀνατοκισμὸς δὲν γίνεται καθ’ ἔτος, ἀλλὰ καθ’ ἵσα χρονικὰ διαστήματα, ήτοι καθ’ ἔξαμηνίαν ἢ κατὰ τριμηνίαν ἢ κατὰ μῆνα κλπ. δυνάμεθα νὰ χρησιμοποιήσωμεν τὸν εὑρεθέντα τύπον $k_v = k_0(1+\tau)^v$ μόνον εἰς τὴν περίπτωσιν καθ’ ἥν τὸ τ παριστᾶ τὸν τόκον τῆς 1 δραχμῆς εἰς ἐν

ἐκ τῶν διαστημάτων τούτων καὶ τὸ ν τὸ πλήθος τῶν χρονικῶν τούτων διαστημάτων.

Ἐάν δ ἀνατοκισμὸς γίνεται καθ' ἔξαμηνίαν ἢ κατὰ τριμηνίαν ἢ κατὰ μῆνα, τότε τὸ ἐπιτόκιον δὲν εἶναι τὸ ἥμισυ ἢ τὸ τέταρτον ἢ τὸ δωδέκατον ἀντιστοίχως τοῦ ἐτησίου ἐπιτοκίου, ἀλλὰ ὅλο, τὸ ὅποιον ὑπολογίζεται ὡς ἔξῆς :

Ἐστω τ_1 τὸ ἐπιτόκιον μὲ χρονικήν περίοδον τὴν ἔξαμηνίαν καὶ τὸ ἐπιτόκιον μὲ χρονικήν περίοδον τὸ ἔτος. Σκεπτόμενοι ὡς ἀνωτέρω (§ 224), εὐρίσκομεν ὅτι ἡ 1 δραχμὴ εἰς τὸ τέλος τῆς πρώτης ἔξαμηνίας θὰ γίνῃ $(1 + \tau_1)$ καὶ εἰς τὸ τέλος τῆς δευτέρας ἔξαμηνίας θὰ γίνῃ $(1 + \tau_1)^2$. Ἐπίστη ἡ μία δραχμὴ εἰς τὸ τέλος τοῦ ἔτους ἀνατοκιζομένη θὰ γίνῃ $(1 + \tau)$. Ἐπειδὴ ἡ μία δραχμὴ εἴτε καθ' ἔξαμηνίαν ἀνατοκισθῇ εἴτε κατ' ἔτος πρέπει νὰ δίδῃ τὸ αὐτὸ ποσὸν χρημάτων, θὰ ἔχωμεν : $(1 + \tau_1)^2 = (1 + \tau)$ καὶ συνεπῶς εἶναι :

$$\tau_1 = \sqrt{1 + \tau} - 1 \quad (3)$$

Ο τύπος (3) συνδέει τὸ ἔξαμηνιαῖον καὶ τὸ ἐτήσιον ἐπιτόκιον.

Ἄν δ ἀνατοκισμὸς γίνεται κατὰ τριμηνίαν, ἐπειδὴ τὸ ἔτος ἔχει 4 τριμηνίας, ἀν τ_2 εἶναι τὸ τριμηνιαῖον ἐπιτόκιον, θὰ ἔχωμεν σκεπτόμενοι ὡς ἀνωτέρω :

$$(1 + \tau_2)^4 = 1 + \tau \quad \text{καὶ συνεπῶς θὰ εἶναι :}$$

$$\tau_2 = \sqrt[4]{1 + \tau} - 1 \quad (4)$$

Ο τύπος (4) συνδέει τὸ τριμηνιαῖον καὶ τὸ ἐτήσιον ἐπιτόκιον.

Παραδείγματα ἐπὶ τοῦ ἀνατοκισμοῦ

Παράδειγμα 1ον : Δανείζει τις 5.000 δρχ. μὲ ἀνατοκισμὸν πρὸς 6 % κατ' ἔτος. Πόσας δραχμὰς θὰ λάβῃ ἐν ὅλῳ μετά 8 ἔτη;

Ἄνσις : "Έχομεν : $k_0 = 5000$, $\tau = 0,06$, $v = 8$, $1 + \tau = 1,06$.

"Οθεν δ τύπος (1) τῆς § 224 γίνεται :

$$k_s = 5000 \cdot (1,06)^8.$$

Λαμβάνοντες τοὺς λογαρίθμους τῶν ἵσων μελῶν ἔχομεν :

$$\lambda\sigma k_s = \lambda\sigma 5000 + 8 \cdot \lambda\sigma (1,06).$$

"Εξ αὐτοῦ, ἐπειδὴ εἶναι $\lambda\sigma 5000 = 3,69897$ καὶ $\lambda\sigma (1,06) = 0,02531$, λαμβάνομεν :

$$\lambda\sigma k_s = 3,90145.$$

"Εξ οὐ :

$$k_s = 7969,83.$$

"Ητοι ὁ τοκίσας τὰς 5000 μὲ ἀνατοκισμὸν κατ' ἔτος πρὸς 6 % θὰ λάβῃ μετά 8 ἔτη ἐν δλῷ 7969,83 δραχμάς.

Σημ. Ἐάν δ ἀνατοκισμὸς ἐγίνετο ἐπὶ 8 ἔτη καὶ ἡμέρας τινάς, ἔστω π.χ. 72, τότε εἰς τὸν τύπον

$$k = k_0 (1 + \tau)^v \cdot \left(1 + \frac{\tau \eta}{360}\right)$$

τὸ μὲν k_0 $(1 + \tau)^v$ είναι 7969,83, τὸ δὲ

$$1 + \frac{\tau\eta}{360} \quad \text{είναι :} \quad 1 + \frac{72 \times 0,06}{360} = 1,012.$$

"Αρα : $k = 7969,83 \times 1,012 = 8065,46.$

Παράδειγμα 2ον : Πόσας δραχμὰς πρέπει νὰ ἀνατοκίσῃ τις κατὰ τὴν ἡμέραν τῆς γεννήσεως τῆς θυγατρός του πρὸς 6 % καὶ ἔτος, διὰ νὰ ἔχῃ προίκα δὲ' αὐτὴν 300.000 δρχ., ὅμα συμπληρώσῃ τὸ 20ον ἔτος;

Λύσις : "Εχομεν $v = 20$, $k_v = 300000$, $\tau = 0,06$, $1 + \tau = 1,06$.

"Ο τύπος (1) τοῦ ἀνατοκισμοῦ λυόμενος ὡς πρὸς k_0 γίνεται :

$$k_0 = \frac{k_v}{(1 + \tau)^v}. \quad (\alpha)$$

"Η (α) λογαριθμιζομένη δίδει :

$$\lambda\circ\gamma k_0 = \lambda\circ\gamma k_v - v \cdot \lambda\circ\gamma (1 + \tau) \quad (\beta)$$

η

$$\lambda\circ\gamma k_0 = \lambda\circ\gamma 300000 - 20 \cdot \lambda\circ\gamma (1,06).$$

"Εκ τῆς Ισότητος ταύτης, ἐπειδὴ είναι $\lambda\circ\gamma 300000 = 5,47712$ καὶ $\lambda\circ\gamma (1,06) = 0,02531$ λαμβάνομεν :

$$\lambda\circ\gamma k_0 = 4,97092.$$

"Εξ οὗ :

$$k_0 = 93524.$$

Παράδειγμα 3ον : Ἀνατοκίζει τις 80.000 δραχμὰς πρὸς 6 % ἐτησίως. Πόσα χρήματα θὰ λάβῃ μετὰ 9 ἔτη, ἂν δὲ ἀνατοκισμὸς γίνεται καθ' ἔξαμηνίαν;

Λύσις : Τὸ ἔξαμηνισθν ἐπιτόκιον τ_1 εὑρίσκομενον ἐκ τοῦ τύπου

$$\tau_1 = \sqrt[1 + \tau - 1]{} \quad \text{είναι :} \quad \tau_1 = \sqrt[1,06 - 1]{} = 0,0295.$$

"Εχομεν δὲ ἐν προκειμένῳ :

$$k_0 = 80000, \quad \tau_1 = 0,0295, \quad v = 9 \times 2 = 18.$$

"Οθεν δὲ τύπος (1) γίνεται :

$$k_{18} = 80000 (1,0295)^{18}.$$

"Εξ αὐτοῦ, ἐργαζόμενοι ὡς καὶ εἰς τὸ παράδειγμα 1, εὑρίσκομεν :

$$k = 135140,6 \text{ δραχμάς.}$$

Παράδειγμα 4ον : Μετὰ πόσον χρόνον 12589 δραχμαὶ ἀνατοκιζόμεναι κατ' ἔτος πρὸς 5 % γίνονται 45818 δρχ.;

Λύσις : "Ο τύπος (1) τοῦ ἀνατοκισμοῦ λυόμενος ὡς πρὸς v δίδει :

$$v = \frac{\lambda\circ\gamma k_v - \lambda\circ\gamma k_0}{\lambda\circ\gamma (1 + \tau)} \quad (1)$$

"Εχομεν : $k_v = 45818$, $k_0 = 12589$, $\tau = 0,05$, $1 + \tau = 1,05$.

"Εξ ἄλλου ἐκ τῶν πινάκων ἔχομεν :

$$\lambda\circ\gamma k_v = \lambda\circ\gamma 45818 = 4,66104$$

$$\lambda\circ\gamma k_0 = \lambda\circ\gamma 12589 = 4,09999$$

$$\Delta\text{ιαφορὰ} = 0,56105$$

$$\lambda\circ\gamma (1 + \tau) = \lambda\circ\gamma (1,05) = 0,02119.$$

καὶ ἐκ τῆς (1) λαμβάνομεν :

$$v = \frac{\lambda\circ\gamma 45818 - \lambda\circ\gamma 12589}{\lambda\circ\gamma 1,05} = \frac{0,56105}{0,02119} = \frac{56105}{2119}. \quad (2)$$

ποτέ μη διαφέρει από την Ε. ποτέ γίνεται μεγαλύτερη ή λιγότερη από την Ε.

*Έκτελούντες τήν διαιρέσιν ταύτην εύρισκομεν πηλίκον 26 και υπόλοιπον 0,01011. Τούτο σημαίνει ότι, διά νά συμβῇ τὸ ζητούμενον πρέπει τὸ δάνειον νὰ διαρκέσῃ 26 ἔτη καὶ ἡμέρας τινάς, ἔστω τῇ.

Διά νά εὑρωμεν τάς ἡμέρας αὐτάς ἐργαζόμεθα ὡς ἔξῆς :

Γνωρίζουμεν, διτὶ δ τύπος τοῦ ἀνατοκισμοῦ, δταν δ χρόνος ἀποτελεῖται ἀπό ἔτη καὶ ἡμέρας

είναι :

$$k = k_0 \left(1 + \tau\right)^v \cdot \left(1 + \frac{\eta \cdot \tau}{360}\right).$$

*Εὰν εἰς τὸν τύπον αὐτὸν θέσωμεν :

$$k = 45818, k_0 = 12589, \tau = 0,05, v = 26$$

εύρισκομεν :

$$45818 = 12589 \cdot \left(1,05\right)^{26} \cdot \left(1 + \frac{0,05 \cdot \eta}{360}\right).$$

*Εὰν λάβωμεν τοὺς λογαρίθμους τῶν ίσων τούτων ἔχομεν :

$$\log 45818 = \log 12589 + 26 \cdot \log (1,05) + \log \left(1 + \frac{0,05 \cdot \eta}{360}\right)$$

$$\log 45818 - \log 12589 - 26 \cdot \log (1,05) = \log \left(1 + \frac{0,05 \cdot \eta}{360}\right). \quad (3)$$

*Έχομεν ἑξ δάλου ἐκ τῆς (2) δτι :

$$\log 45818 - \log 12589 - 26 \cdot \log (1,05) = 0,01011.$$

Παραβάλλοντες ταύτην πρὸς τὴν (3) συμπεραίνομεν δτι :

$$\log \left(1 + \frac{0,05 \cdot \eta}{360}\right) = 0,01011$$

$$\log \left(1 + \frac{\eta}{7200}\right) = 0,01011.$$

*Ἐκ τῆς ισότητος ταύτης εύρισκομεν διαδοχικῶς δτι :

$$1 + \frac{\eta}{7200} = 1,02355 \quad \text{ἢ} \quad \frac{\eta}{7200} = 0,02355.$$

$$\text{Ἐξ οὗ :} \quad \eta = 169,56 \quad \text{ἢ} \quad \eta \approx 170 \text{ ἡμέραι.}$$

*Ωστε δ ζητούμενος χρόνος είναι 26 ἔτη καὶ 170 ἡμέραι, τοῦ ἔτους λογιζομένου μὲ 360 ἡμέρας.

Παρατήρησις. Γενικῶς είναι :

$$v = \frac{\log k_v - \log k_0}{\log (1 + \tau)}.$$

*Αν δὲ υ είναι τὸ υπόλοιπον τῆς διαιρέσεως ταύτης, κατὰ τὴν ἔννοιαν τοῦ ἀνωτέρω παραδείγματος, θὰ είναι :

$$v = \log \left(1 + \frac{\tau \eta}{360}\right)$$

*Ἐκ τῆς ἑξισώσεως ταύτης εύρισκομεν τὸ $1 + \frac{\tau \eta}{360}$ καὶ συνεπῶς τὸ η .

Εἰς τὰ προβλήματα τοῦ ἀνατοκισμοῦ υπάγονται καὶ προβλήματα τινὰ σχέσιν ἔχοντα πρὸς τὴν αὔξησιν ἢ ἐλάττωσιν τοῦ πληθυσμοῦ πόλεως ἢ χώρας, οἷον τὸ κάτωθι:

Παράδειγμα 5ον : Ό πληθυσμός μιᾶς πόλεως είναι Π κάτοικοι· παρετηρήθη δὲ ὅτι ούτος αὐξάνει κατ' ἔτος κατὰ τὸ $\frac{1}{μ}$ τοῦ προηγουμένου ἔτους. Ζητεῖται νὰ εὑρεθῇ πόσος θὰ είναι ὁ πληθυσμός τῆς μετάν ν ἔτη;

Λύσις : Μετά ἐν ἔτος ὁ πληθυσμός τῆς πόλεως θὰ είναι :

$$\Pi + \Pi \cdot \frac{1}{\mu} \quad \text{ἢ} \quad \Pi \cdot \left(1 + \frac{1}{\mu}\right).$$

Μετά ἐν ἀκόμη ἔτος, δηλ. εἰς τὸ τέλος τοῦ δευτέρου ἔτους ὁ πληθυσμός τῆς πόλεως θὰ είναι :

$$\Pi \left(1 + \frac{1}{\mu}\right) + \Pi \left(1 + \frac{1}{\mu}\right) \cdot \frac{1}{\mu} \quad \text{ἢ} \quad \Pi \cdot \left(1 + \frac{1}{\mu}\right)^2.$$

Καθ' ὅμοιον τρόπον προχωροῦντες εύρισκομεν, ὅτι εἰς τὸ τέλος τοῦ νιοστοῦ ἔτους ὁ πληθυσμός τῆς πόλεως θὰ είναι :

$$\Pi_{\nu} = \Pi \cdot \left(1 + \frac{1}{\mu}\right)^{\nu}$$

Σημ. Ἐάν ὁ πληθυσμός Π ἐλαττοῦται κατὰ τὸ $1/\mu$ τοῦ προηγουμένου ἔτους, τότε ὁ ἀνωτέρω τύπος γίνεται :

$$\Pi_{\nu} = \Pi \cdot \left(1 - \frac{1}{\mu}\right)^{\nu}$$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

499. Καταθέτει τις εἰς τὸ ταχυδρομικὸν ταμιευτήριον 7200 δραχμάς αἱ ὀποῖαι ἀνατοκίζονται καθ' ἔξαμηνίαν πρὸς 4,5 % ἑτησίως. Πόσα χρήματα θὰ λάβῃ ἐν δλῷ μετά 15 ἔτη;

500. Πόσον ποσὸν πρέπει νὰ τοκίσωμεν μὲ ἀνατοκισμὸν καθ' ἔξαμηνίαν πρὸς 4 %, ἵνα μετά 18 ἔτη γίνη 200.000 δρχ.;

501. Πρὸς ποιὸν ἐπιτόκιον 24850 δρχ. ἀνατοκίζομεναι κατ' ἔτος γίνονται μετά 12 ἔτη 50000 δραχμαῖς;

502. Μετά πόσον χρόνον 40000 δρχ. ἀνατοκίζομεναι κατ' ἔτος πρὸς 5 % γίνονται 68524 δρχ.;

503. Κατέθεσέ τις εἰς τὸ ταχυδρομικὸν ταμιευτήριον ποσὸν χρημάτων, τὸ ὅποιον ἀνατοκίζεται καθ' ἔξαμηνίαν πρὸς 6 % ἑτησίως. Μετά 5 ἔτη ἔλαβε 26000 δρχ. Πόσα χρήματα εἶχε καταθέσει;

504. Κεφάλαιον τι ἀνατοκίζομενον κατ' ἔτος γίνεται μετά 3 ἔτη 5625 δρχ., μετ' ἀλλα δὲ δύο ἀκόμη γίνεται 6084 δρχ. Πρὸς ποιὸν ἐπιτόκιον ἔγινε δὲ ἀνατοκισμός;

505. Μετά πόσον χρόνον κεφάλαιον τι τριπλασιάζεται ἀνατοκίζομενον καθ' ἔξαμηνίαν πρὸς 6 % ἑτησίως;

506. Δύο κεφάλαια τὸ ἐν ἐκ 5000 δρχ. καὶ τὸ ἐπερον ἕξ 8000 δραχμῶν ἀνατοκίζονται ἀντιστοίχως μὲ ἐπιτόκια 5 % καὶ 3 % ἑτησίως. Μετά πόσον χρόνον τὰ δύο κεφάλαια θὰ καταστοῦν ἴσα;

507. Νὰ ἔξετασθῇ τί είναι συμφέρωτερον νὰ ἀνατοκίσῃ τις 60.000 δρχ. ἐπὶ 10 ἔτη πρὸς 5 % ἑτησίως ἢ νὰ δανείσῃ τὸ αὐτὸ ποσὸν μὲ ἀπλοῦν τόκον πρὸς 7 % καὶ εἰς τὸν αὐτὸν χρόνον;

508. Ποσὸν τι α δραχμῶν ἀνατοκίζεται ἐπὶ τὸ χρονικὸν διάστημα. Ἐάν ἀνετοκίζετο τοῦτο πρὸ ἐτη δλιγώτερον, τότε τὸ τελικὸν κεφάλαιον θὰ ἥτο κατὰ β δραχμάς δλιγώτερον, ἐάν δμως ἀνετοκίζετο πρὸ ἐτη περισσότερον, τότε τὸ τελικὸν κεφάλαιον θὰ ἥτο κατὰ γ δραχμάς περισσότερον. Νὰ εὑρεθῇ τὸ ἐπιτόκιον καὶ ἡ διάρκεια τοῦ ἀνατοκισμοῦ.

509. 'Ο πληθυσμός ἐνὸς κράτους αὐξάνεται κατ' ἔτος κατὰ τὸ δύδοικοστὸν τοῦ προπογου-
μένου ἔτους. Μετὰ πόσα ἔτη θὰ διπλασιασθῇ ἡ θὰ τριπλασιασθῇ δὲ πληθυσμός αὐτοῦ;

510. Μία πόλις ἔχει 8.000 κατοίκους καὶ δὲ πληθυσμός αὐτῆς ἐλαττοῦται ἑτησίως κατὰ 160
κατοίκους. 'Εάν ἡ ἀλάττωσις ἔξακολουθήσῃ κατὰ τὴν αὐτὴν ἀναλογίαν, μετὰ πόσα ἔτη ἡ πόλις
αῦτη θὰ ἔχῃ 5.000 κατοίκους;

511. Εἰς μίαν πόλιν ἡ θητησιμότης εἶναι τὸ $\frac{1}{42}$ τοῦ πληθυσμοῦ τῆς, αἱ δὲ γεννήσεις τὸ $\frac{1}{35}$
τοῦ πληθυσμοῦ. 'Επὶ τῇ παραδοχῇ δὲτη ἡ ἀναλογία αὗτη θὰ εἴναι ἡ αὐτὴ εἰς τὰ ἐπόμενα ἔτη,
νὰ εὐρεθῇ μετὰ πόσον χρόνον θὰ διπλασιασθῇ δὲ πληθυσμός τῆς.

2. "Ισαι καταθέσεις

§ 225.— Συχνὰ οἱ ἄνθρωποι ἀπὸ τὰς οἰκονομίας των καταθέτουν ἔνα σταθε-
ρὸν χρηματικὸν ποσὸν εἴτε εἰς τὴν ἀρχὴν ἐκάστου ἔτους (ἢ συμπεφωνημένης χρο-
νικῆς μονάδος) πρὸς σχηματισμὸν ἐνὸς κεφαλαίου, εἴτε εἰς τὸ τέλος ἐκάστου ἔτους
(ἢ συμπεφωνημένης χρονικῆς μονάδος) πρὸς ἔξοφλησιν ἐνὸς χρέους.

Τὸ σταθερὸν αὐτὸν χρηματικὸν ποσὸν καλεῖται **κατάθεσις**.

Εἰς ζητήματα ἵσων καταθέσεων διακρίνομεν ἐκάστοτε δύο περιπτώσεις :

α'). Αἱ καταθέσεις γίνονται εἰς τὴν ἀρχὴν ἐκάστου ἔτους, καὶ

β'). Αἱ καταθέσεις γίνονται εἰς τὸ τέλος ἐκάστου ἔτους.

Αἱ ἵσαι καταθέσεις δύνανται νὰ γίνωνται καθ' ἔξαμηνίαν ἡ κατὰ τριμηνίαν
καὶ ἐπὶ ἔνα ώρισμένον χρόνον.

Τὰ προβλήματα τῶν ἵσων καταθέσεων λύομεν διὰ δύο τύπων, τοὺς ὅποιους
εύρισκομεν διὰ τῆς λύσεως τῶν ἀκολούθων δύο προβλημάτων.

§ 226. Πρόβλημα I.— Καταθέτει τις εἰς τὴν ἀρχὴν ἐκάστου ἔτους α δρχ.
μὲ ἀνατοκισμὸν καὶ μὲ τόκον τ τῆς μιᾶς δραχμῆς εἰς ἔτος. Ζητεῖται τι ποσὸν θὰ
σχηματίσῃ διὰ τῶν καταθέσεων τούτων μετὰ τὸ ἔτη ;

Λύσις : 'Η πρώτη κατάθεσις τῶν α δραχμῶν θὰ μείνῃ εἰς τὸν ἀνατοκισμὸν
ν ἔτη καὶ συνεπῶς ἀνατοκιζομένη θὰ γίνη : $\alpha (1 + \tau)^v$.

'Η δευτέρα κατάθεσις, ὡς ἀνατοκιζομένη ἐπὶ ἔτος δλιγώτερον, θὰ γίνη ἵση
πρὸς $\alpha (1 + \tau)^{v-1}$, ἡ τρίτη θὰ γίνη : $\alpha (1 + \tau)^{v-2}$ κ.ο.κ.

Κατ' αὐτὸν τὸν τρόπον προχωροῦντες εύρισκομεν, δὲτη ἡ τελευταία κατάθεσις
α δραχμῶν θὰ μείνῃ εἰς τὸν ἀνατοκισμὸν ἔτος θὰ γίνη ἵση πρὸς :

$$\alpha (1 + \tau)^1 = \alpha (1 + \tau).$$

'Εάν συνεπῶς παραστήσωμεν διὰ Σ τὸ ποσόν, ὅπερ διὰ τῶν καταθέσεων
τούτων θὰ σχηματισθῇ εἰς τὸ τέλος τοῦ νιοστοῦ ἔτους, θὰ ἔχωμεν :

$$\Sigma = \alpha (1 + \tau)^v + \alpha (1 + \tau)^{v-1} + \dots + \alpha (1 + \tau)$$

$$\text{ἢ } \Sigma = \alpha (1 + \tau) + \alpha (1 + \tau)^2 + \dots + \alpha (1 + \tau)^{v-1} + \alpha (1 + \tau)^v.$$

Τὸ δεύτερον μέλος τῆς τελευταίας ἴσοτητος εἶναι ἀθροισμα δρων γεωμετρι-

κής προσόδου, μὲ λόγον $(1 + \tau)$, ἅρα κατὰ τὸν τύπον (1), § 169 θὰ ισοῦται μέ:

$$\frac{\alpha (1 + \tau)^v (1 + \tau) - \alpha (1 + \tau)}{1 + \tau - 1}$$

"Ωστε:

$$\Sigma = \alpha \cdot (1 + \tau) \cdot \frac{(1 + \tau)^v - 1}{\tau} \quad (1)$$

'Ο τύπος (1) καλεῖται τύπος τῶν ίσων καταθέσεων, ἐκάστης καταβαλλομένης εἰς τὴν ἀρχὴν τῆς ἐκάστοτε χρονικῆς περιόδου.

Σημ. Αἱ δυνάμεις $(1 + \tau)^v$ διὰ $\tau = 0,03, 0,04, \dots, 0,06$ καὶ διὰ $v = 1,2, \dots, 50$ παρέχονται ἀπὸ εἰδικούς πίνακας καὶ οὕτω διευκολύνεται ὁ ὑπολογισμὸς τοῦ Σ .

Παράδειγμα: Καταθέτει τις εἰς τὴν Τράπεζαν μὲ ἀνατοκισμὸν κατ' ἔτος 5 % ποσὸν 2.500 δρχ. εἰς τὴν ἀρχὴν ἐκάστου ἔτους. Πόσα χρήματα θὰ λάβῃ μετὰ 10 ἔτη;

Λύσις: "Έχομεν $\alpha = 2500, \tau = 0,05, v = 10$ καὶ ἡ ἐξίσωσις (1) γίνεται :

$$\Sigma = 2500 \times 1,05 \times \frac{(1,05)^{10} - 1}{0,05}.$$

'Η παράστασις $(1,05)^{10}$ ὑπολογιζομένη χωριστὰ είναι ίση πρός : 1,628.

*Αρα $(1,05)^{10} - 1 = 0,628$ καὶ ἐπομένως :

$$\Sigma = 2500 \times 1,05 \times \frac{0,628}{0,05}.$$

'Εκ ταύτης, διὰ τῶν λογαρίθμων ἡ δι' ἀπ' εὐθείας ἐκτελέσεως τῶν πράξεων, εύρίσκομεν :

$$\Sigma = 33016,97 \text{ δρχ.}$$

§ 227. Πρόβλημα II.— Καταθέτει τις εἰς τὸ τέλος ἐκάστου ἔτους α δρχ. μὲ ἀνατοκισμὸν καὶ μὲ τόκον τ τῆς μιᾶς δραχμῆς εἰς ἐν ἔτος. Ζητεῖται, τί ποσὸν θὰ σχηματισθῇ εἰς τὸ τέλος τοῦ νιοστοῦ ἔτους, ἥτοι ἄμα τῇ νιοστῇ καταθέσει ;

Λύσις: Αἱ α δραχμαί, αἱ ὁποῖαι κατατίθενται εἰς τὸ τέλος τοῦ πρώτου ἔτους θὰ μείνουν ἐπὶ ἀνατοκισμῷ ἐπὶ $(v - 1)$ ἔτη καὶ συνεπῶς θὰ γίνουν : $\alpha (1 + \tau)^{v-1}$. Αἱ α δραχμαὶ αἱ ὁποῖαι κατατίθενται εἰς τὸ τέλος τοῦ δευτέρου ἔτους θὰ μείνουν ἐπὶ ἀνατοκισμῷ ἐπὶ $(v - 2)$ ἔτη καὶ συνεπῶς θὰ γίνουν : $\alpha (1 + \tau)^{v-2}$.

Δι' ὅμοιον λόγον αἱ α δραχμαὶ τῆς τρίτης καταθέσεως θὰ γίνουν: $\alpha (1 + \tau)^{v-3}$.

Προχωροῦντες ὅμοιώς εύρισκομεν ὅτι αἱ α δραχμαὶ τῆς προτελευταίς καταθέσεως, αἱ ὁποῖαι θὰ μείνουν ἐπ' ἀνατοκισμῷ μόνον ἐν ἔτος, θὰ γίνουν : $\alpha (1 + \tau)$. Τέλος ἡ τελευταία κατάθεσις δὲν τοκίζεται, καθ' ὅσον θὰ γίνῃ εἰς τὸ τέλος τοῦ τελευταίου ἔτους καὶ συνεπῶς θὰ είναι α. Οὕτω τὸ ἄθροισμα τῶν κατατεθέντων ποσῶν (μετὰ τῶν τόκων των) θὰ είναι :

$$\Sigma = \alpha (1 + \tau)^{v-1} + \alpha (1 + \tau)^{v-2} + \cdots + \alpha (1 + \tau) + \alpha$$

ἢ (§ 170, τύπος 1) :

$$\Sigma = \alpha \cdot \frac{(1 + \tau)^v - 1}{\tau} \quad (2)$$

'Ο τύπος (2) καλεῖται τύπος τῶν χρεωλυτικῶν καταταθέσεων καὶ συνδέει τὰ τέσσαρα ποσά Σ, α, τ, v .

Π αράδειγμα. Είς καπνιστής έξοδενει διά τό κάπνισμά του 12 δρχ. ήμερησίως κατά μέσον δρον. Νά υπολογισθῇ τί ποσὸν θὰ εἰσέπραττεν εἰς τό 60ον ἔτος τῆς ἡλικίας του, ἐάν κατέβετε εἰς τό τέλος ἑκάστου ἔτους τὰ χρήματα ποὺ διέθετε διά τὴν ἀγοράν σιγαρέττων εἰς μίαν Τράπεζαν ἐπὶ ἀνατοκισμῷ πρὸς 6 %, γνωστοῦ δητοῦ οὗτος ἡρχιει καπνίζων ἀπὸ τοῦ 20οῦ ἔτους τῆς ἡλικίας του;

Λύσις : Τὰ ἑτήσια ἔξοδα τοῦ καπνιστοῦ ἀνέρχονται εἰς $12 \cdot 365 = 4.380$ δρχ.

"Εχομεν τότε : $\alpha = 4380$, $\tau = 0,06$, $v = 40$.

"Οθεν δ τύπος (2) γίνεται :

$$\Sigma = 4380 \cdot \frac{(1,06)^{40} - 1}{0,06}. \quad (1)$$

"Υπολογίζομεν ἐν πρώτοις τὴν δύναμιν $(1,06)^{40}$. Πρὸς τοῦτο θέτομεν : $y = (1,06)^{40}$ καὶ ἔχομεν :

$$\lambda\gamma y = 40 \cdot \lambda\gamma (1,06) = 1,0124.$$

"Ἐκ ταύτης εὑρίσκομεν : $y = 10,2895$.

"Ἄρα $(1,06)^{40} - 1 = 9,2895$ καὶ συνεπῶς

$$\Sigma = 4380 \cdot \frac{9,2895}{0,06}.$$

"Ἐκ ταύτης λογαριθμίζοντες εύρισκομεν :

$$\lambda\gamma \Sigma = \lambda\gamma 4380 + \lambda\gamma 9,2895 - \lambda\gamma 0,06.$$

"Η Ισότης αὐτῇ, ἐπειδὴ εἴναι : $\lambda\gamma 4380 = 3,64147$, $\lambda\gamma 9,2895 = 0,96800$ καὶ $\lambda\gamma 0,06 = 0,00277815$ γίνεται :

$$\lambda\gamma \Sigma = 5,83132.$$

"Ἐκ ταύτης εὑρίσκομεν : $\Sigma = 678142,86$.

"Ωστε θὰ εἰσέπραττεν 678142,86 δραχμάς (!).

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

512. Καταθέτει τις ἐπὶ ἀνατοκισμῷ ποσὸν 8050 δραχμῶν πρὸς 4,5 % εἰς τὴν ἀρχὴν ἐκάστου ἔτους. Πόσα χρήματα θὰ λάβῃ μετὰ πάροδον 18 ἔτῶν;

513. Πατήρ τις ἀποκτήσας κόρην θέλει νὰ καταθέτῃ κατ' ἔτος ποσὸν τι ὥρισμένον δι' αὐτῆν, ἵνα τοῦτο ἀνατοκίζουμεν κατ' ἔτος πρὸς 5 % γίνη μετὰ 21 ἔτη 250.000 δρχ. Πόση πρέπει νὰ είναι ἡ ἐτησία κατάθεσις;

514. Καταθέτει τις εἰς τὴν ἀρχὴν ἐκάστου ἔτους 10.000 δραχμάς ἐπὶ ἀνατοκισμῷ πρὸς 5 % ἐτησίως. Μετὰ πόσα ἔτη θὰ λάβῃ 150.000 δραχμάς;

515. Καταθέτει τις ἐπὶ ἀνατοκισμῷ ποσὸν 2050 δραχμῶν πρὸς 4,5 % εἰς τὴν ἀρχὴν ἐκάστου ἔτους. Μετὰ πάροδον δεκαπενταετίας ἔπαινε νὰ καταθέτῃ, ἀλλὰ ἀφῆκε τὸ σχηματισθὲν κεφάλαιον ἐπὶ ἀνατοκισμῷ πρὸς 5 % ἐτησίως. Πόσα θὰ λάβῃ εἰς τὸ τέλος τῶν 24 ἔτῶν ἀπὸ τῆς πρώτης καταθέσεως;

516. Καταθέτει τις κατά τὴν ἡμέραν τῶν γενεθλίων τῆς κόρης του εἰς τὸ ταμιευτήριον τῆς Ἐθνικῆς Τράπεζης 5000 δρχ. ἐπὶ ἀνατοκισμῷ πρὸς 4,5 %. Ζητεῖται, τί ποσὸν θὰ ἔχῃ σχηματισθῆ κατά τὴν είκοστήν πρώτην ἐπέτειον τῶν γενεθλίων τῆς κόρης του;

3. Χρεωλυσία

§ 228. **Όρισμοί.—Χρεωλυσία** καλεῖται ἡ ἐντὸς ὥρισμένου χρόνου ἀπόσβεσις χρέους δι' ἵσων δόσεων, αἱ ὁποῖαι καταβάλλονται εἰς τὸ τέλος ἐκάστης χρονικῆς περιόδου, π.χ. εἰς τὸ τέλος τοῦ ἔτους ἢ τοῦ ἔξαμήνου κλπ.

Τὸ ποσὸν ἐκάστης τῶν ἵσων δόσεων, τὸ ὄποιον καταβάλλεται εἰς τὸ τέλος ἐκάστης χρονικῆς περιόδου διά τὴν ἀπόσβεσιν τοῦ χρέους, καλεῖται **χρεωλύσιον**.

Είναι φανερόν ότι μέρος μὲν τοῦ χρεωλυσίου χρησιμεύει διὰ τὴν πληρωμήν τῶν δεδουλευμένων τόκων τοῦ χρέους, τὸ ὑπόλοιπον δὲ συντελεῖ εἰς τὴν βαθμιαίαν ἀπόσβεσιν τοῦ χρέους.

[’]Αποσβέννυται δὲ τὸ χρέος, ὅταν τὸ ἄθροισμα ὅλων τῶν χρεωλυσίων μετὰ τῶν συνθέτων τόκων αὐτῶν ἀποτελεῖ ποσὸν ἵσον πρὸς τὴν τελικὴν ἀξίαν τοῦ ἀνατοκιζόμενου ἀρχικοῦ κεφαλαίου.

Τὰ συνθέστερα προβλήματα τῆς χρεωλυσίας λύομεν διὰ τοῦ τύπου, τὸν ὅποιον εύρισκομεν ἐκ τῆς λύσεως τοῦ ἀκολούθου γενικοῦ προβλήματος.

§ 229. Πρόβλημα.—[’]Εδανείσθη τις α δραχμὰς ἐπὶ ἀνατοκισμῷ μὲ τὴν συμφωνίαν νὰ ἔξιοφλήσῃ τὸ χρέος του διὰ ν ἴσων ἐτησίων δόσεων καταβαλλομένων εἰς τὸ τέλος ἐκάστου ἔτους. Ζητεῖται νὰ εὑρεθῇ τὸ ποσὸν ἐκάστης δόσεως (χρεωλύσιον), γνωστοῖς ὅντος ὅτι ἐκάστη δραχμὴ φέρει εἰς ἐν ἔτος τόκον τ δραχμάς.

Λύσις : Τὸ δανεισθὲν ποσὸν α, ἀνατοκιζόμενον, μετὰ ν ἔτη θὰ ἔχῃ ἀνέλθη εἰς : α (1 + τ)^v, δπερ καὶ ὀφείλει νὰ πληρώσῃ δ δανειστής.

Οὕτος ὁμως πληρώνει εἰς τὸ τέλος ἐκάστου ἔτους ἔνα χρεωλύσιον, ἔστω δὲ τοῦτο x δρχ. Δικαιοῦται λοιπὸν νὰ ζητήσῃ καὶ αὐτὸς τοὺς τόκους τῶν ἐτησίων δόσεων, τοὺς ὅποιους ἄλλως τε θὰ ἐλάμβανε, ἐὰν ἀνετόκιζε ἐκάστην δόσιν. Αἱ δόσεις αὗται (μὲ τοὺς τόκους των) θ' ἀποτελέσουν, κατὰ τὸν τύπον (2) τῶν χρεωλυτικῶν καταθέσεων (§ 227), ποσὸν ἵσον πρός :

$$x \cdot \frac{(1+\tau)^v - 1}{\tau}.$$

’Αλλὰ τὸ ποσὸν αὐτὸν πρέπει νὰ εἴναι ἵσον μὲ τὸ ὀφειλόμενον : α (1 + τ)^v.

’Εντεῦθεν ἔχομεν τὴν ἔξισωσιν τῆς χρεωλυσίας :

$$x \cdot \frac{(1+\tau)^v - 1}{\tau} = a (1 + \tau)^v \quad (1)$$

’Εκ τῆς ἔξισώσεως ταύτης προσδιορίζομεν τὸ ζητούμενον χρεωλύσιον x. Αὕτη λυσιμένη ὡς πρὸς x ή α δίδει τοὺς τύπους :

$$x = \frac{a\tau(1+\tau)^v}{(1+\tau)^v - 1}$$

(1') καὶ

$$a = \frac{x \cdot [(1+\tau)^v - 1]}{\tau(1+\tau)^v}$$

(1'')

’Ενίστε ή πρώτη καταβολὴ τοῦ χρεωλυσίου γίνεται ἔτη τινὰ μετὰ τὴν σύναψιν τοῦ δανείου, λ.χ. μετὰ μ ἔτη. Εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν ή ἀντίστοιχος ἔξισωσις τῆς χρεωλυσίας είναι :

$$x \cdot \frac{(1+\tau)^{v-\mu+1} - 1}{\tau} = a (1 + \tau)^v$$

(διατί;)

Παραδείγματα έπι τής χρεωλυσίας

Παράδειγμα 1ον. Να εύρεθη τό χρεωλυσίου τό δόποιον πρέπει νά πληρώνη μία κοινότης, ή δόποια έδανεισθη έπι άνατοκισμῷ ποσόν 300.000 δραχμῶν πρός 5% μέτ τήν συμφωνίαν νά έξοφλήση τό χρέος τούτο δι' έτησίων χρεωλυτικῶν δόσεων έντος 50 έτῶν.

Άστις : Κατά τόν τύπον (1') είναι

$$x = \frac{300.000 \cdot (1,05)^{50} \cdot 0,05}{(1,05)^{50} - 1}$$

*Επειδή $(1,05)^{50} = 11,4674$ (διατί;), ή άνωτέρω Ισότης γράφεται

$$x = \frac{300.000 \times 11,4674 \times 0,05}{10,4674}$$

ή λογ $x = (\log 300.000 + \log 11,4674 + \log 0,05) - \log 10,4674$.

*Η Ισότης αύτη, έπειδή είναι : λογ 300.000 = 5,47712, λογ 11,4674 = 1,05946, λογ 0,05 = 2,69897 καὶ λογ 10,4674 = 1,01984, γίνεται :

$$\log x = 4,21571.$$

*Έξ οῦ : $x = 16432,69$.

Παράδειγμα 2ον : Ποιον ποσόν δύναται νά δανεισθῇ τις, έὰν θέλῃ νά έξοφλήσῃ τό χρέος αύτοῦ εἰς 20 έτη δι' έτησίου χρεωλυσίου 5000 δρχ., οταν τό έπιτόκιον είναι 4%;

Άστις : "Εχομεν ἑνταῦθα $x = 5000$, $\tau = 0,04$, $v = 20$ καὶ ή έξισωσις (1'') γίνεται :

$$\alpha = \frac{5000 [(1,04)^{20} - 1]}{0,04 \cdot (1,04)^{20}}$$

*Υπολογίζομεν ἐν πρώτοις τήν δύναμιν $(1,04)^{20}$ καὶ ἀκολούθως εὐρίσκομεν διὰ τῶν λογαρίθμων :

$$\alpha = 67953 \text{ δραχμάς.}$$

Παράδειγμα 3ον : Δανείζεται τις ποσόν 120000 δραχμῶν έπι άνατοκισμῷ πρός 8%. Πόσας είτησίας χρεωλυτικῶς δόσεις τῶν 15000 δραχμῶν πρέπει νά πληρώσῃ διὰ νά έξοφλήσῃ τό δάνειον;

Άστις : *Έκ τῆς έξισώσεως (1) λαμβάνομεν :

$$x (1 + \tau)^v - x = \alpha \tau (1 + \tau)^v,$$

$$\text{όθεν } (1 + \tau)^v = \frac{x}{x - \alpha \tau}, \quad (2)$$

*Έξ οῦ : $v \cdot \log (1 + \tau) = \log x - \log (x - \alpha \tau)$

$$v = \frac{\log x - \log (x - \alpha \tau)}{\log (1 + \tau)} \quad (3)$$

*Επειδή είναι $x = 15000$, $\alpha = 120000$, $\tau = 0,08$ καὶ συνεπῶς $x - \alpha \tau = 5400$, δ τύπος (3) δίδει :

$$v = \frac{\log 15000 - \log 5400}{\log 1,08}.$$

*Έξ αύτῆς, έπειδή $\log 15000 = 4,17609$, $\log 5400 = 3,73239$ καὶ $\log 1,08 = 0,03342$, λαμβάνομεν :

$$v = \frac{0,44370}{0,0342} = 13 \text{ έτη...}, \text{ ήτοι } 13 < v < 14.$$

Τό έξαγόμενον τούτο δεικνύει, οτι πρέπει νά πληρώσῃ 13 δόσεις τῶν 15000 δρχ. καὶ μίαν ἀκόμη, ή δόποια θά είναι μικροτέρα τῶν 15000 δρχ., ήτις ύπολογίζεται ως έξης :

*Υπολογίζομεν πόσον γίνεται τό δάνειον τῶν 120000 εἰς τό τέλος τῶν 14 έτῶν, ήτοι ύπολογίζομεν τό : $K = 120000 \cdot (1,08)^{14}$. Μετά ταῦτα ύπολογίζομεν τό ποσόν, τό δόποιον

έχει πληρώσει μὲ τὰς 13 δόσεις τῶν 15000 ἑκάστη εἰς τὸ τέλος τῶν αὐτῶν ἔτῶν, ήτοι τό :

$$\Sigma = \frac{15000 [(1,08)^{14} - 1]}{0,08},$$

ὅτε ἡ διαφορὰ $K - S$ δίδει τὴν τελευταίαν δόσιν. Οὕτως εύρισκομεν διτὶ ἡ δόσις αὗτη ἀνέρχεται εἰς 4252 δραχμάς.

Παρατήρησις. Κατὰ τὴν ἔξισωσιν (2) τῆς παρθ. 3, ἵνα τὸ πρόβλημα είναι δυνατόν, πρέπει νὰ είναι $x > \alpha$, δηλαδὴ τὸ χρεωλύσιον πρέπει νὰ ὑπερβαίνῃ τὸν ἐτήσιον τόκον τοῦ ἀρχικοῦ κεφαλαίου, ὅπερ καὶ προφανές, διότι ἀλλως δὲν θὰ ἔγινετο ποτὲ ἡ ἔξιφλησις τοῦ χρέους. "Ἄν $x = \alpha$, τότε ἡ ἔξισωσις (2) δὲν ἔχει λύσιν, διότι ὁ παρονομαστής τοῦ β' μέλους μηδενίζεται. Εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν τὸ δάνειον λέγεται πάγιον, διότι οὐδέποτε ἔξιφλεῖται, τὸ δὲ καταβαλλόμενον ποσὸν x χρησιμεύει διὰ τὴν πληρωμὴν τῶν ἐτησίων τόκων τοῦ κεφαλαίου.

A S K H S E I S

517. Κοινότης ἔδανείσθη δι' ἀνέγερσιν σχολικοῦ κτηρίου 120.000 δραχμὰς πρὸς 6% ἑτησίως ἔξιφλητέας χρεωλυτικῶς εἰς 25 ἑτησίας δόσεις. Πόσον χρεωλύσιον θὰ πληρώνῃ ἑτησίως;

518. Ἐμπόρος ὑπολογίζει ὅτι δύναται νὰ διαθέτῃ ἐτήσιον χρεωλύσιον 8.650 δραχμῶν ἐπὶ 20 ἑτη. Πόσον δάνειον δύναται νὰ συνάψῃ διὰ τὴν προαγωγὴν τῶν ἐμπορικῶν του ἐπιχειρήσεων πρὸς 6% ἑτησίως;

519. Διανείζεται τις χρεωλυτικῶς ποσὸν α δραχμῶν ἐπὶ διατοκισμῷ μὲ τόκον τ τῆς μιᾶς δραχμῆς. Νὰ εὑρεθῇ τὸ κατ' ἔτος χρεωλύσιον, ἵνα μετὰ ν ἔτη τὸ χρέος του ἐλαττωθῇ κατὰ τὸ ἥμισυ.
(Ἐφαρμογή : $\alpha = 40000$, $\tau = 0,05$, $v = 12$).

520. Ἡ ἔξιφλησις χρέους πρέπει νὰ γίνῃ εἰς 20 ἑτη χρεωλυτικῶς. Ἐκάστη δόσις (έτησία) θὰ είναι 46130 δρχ., θὰ ἀρχίσῃ δὲ ἡ πληρωμὴ μετὰ τὸ 5ον ἔτος ἀπὸ τοῦ δανείου. Πόσον είναι τὸ ἀρχικὸς δανεισθέν ποσόν, διὰ τὸ ἐπιτόκιον είναι 4,5 %;

521. Συνῆψε τις δάνειον χρεωλυτικὸν 250.000 δρχ. πρὸς 7% ἔξιφλητέον ἐντὸς 8 ἔτῶν. Τρεῖς μῆνας μετὰ τὴν κατάθεσιν τῆς πέμπτης χρεωλυτικῆς δόσεως θέλει νὰ ἔξιφλήσῃ τοῦτο ἕξ δλοκλήρου. Πόσα πρέπει νὰ καταβάλῃ;

522. Διὰ πόσων χρεωλυτικῶν δόσεων ἔξιφλεῖται δάνειον 25.000 δρχ. ὅταν τὸ ἐπιτόκιον είναι 6%, διατίθεται δὲ ἑτησίως χρεωλύσιον 3000 δραχμῶν.

523. Συμφωνεῖ τις νὰ πληρώσῃ εἰς ἔνα ἀσφαλιστικὸν ὄργανον δόσεις πρὸς α δρχ. ἐκάστην ὑπὸ τὸν δρόν, διτὶ ὁ ὄργανος δούλως θὰ τοῦ ἔξασφαλίσῃ διὰ τὰ ἐπόμενα 2ν ἑτησίον εἰσόδημα ἐκ β δραχμῶν. Τὸ πρῶτον εἰσόδημα τῶν β δραχμῶν θὰ καταβληθῇ μετὰ τὴν τελευταίαν κατάθεσιν αὐτοῦ. Οἱ τόκοι είναι σύνθετοι καὶ τὸ ἐπιτόκιον είναι τ διὰ μίαν δραχμὴν εἰς ἓν ἔτος. Ζητεῖται :

Iον : Νὰ ύπολογισθῇ δ λόγος $\frac{\alpha}{\beta}$, καὶ

2ον : Νὰ δρισθῇ ἡ τιμὴ τοῦ v , ἐὰν είναι $\beta = 2\alpha$ καὶ $\tau = 0,05$.

524. Πρὸς ποῖον ἐπιτόκιον πρέπει νὰ ἔξιφληθῇ δάνειον 20.000 δραχμῶν διὰ 16 ἑτησίων δόσεων ἐκ 1780,30 δρχ. ἐκάστην ;

τοῦτο τοῦ γενούς δόσης διαφέρει πολλά τοῦ προτύπου ποσού που παρατείνεται στην παραπομπή της. Τοῦτο τοῦ γενούς δόσης διαφέρει πολλά τοῦ προτύπου ποσού που παραπομπή της. Τοῦτο τοῦ γενούς δόσης διαφέρει πολλά τοῦ προτύπου ποσού που παραπομπή της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Χ

ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΒΑΘΜΟΥ

§ 230. Είσαγωγή.— Εις τὴν προηγουμένην τάξιν (βλ. Μαθηματικὰ Δ' Γυμνασίου, τόμος Α, κεφ. IX) εἴδομεν πῶς ἐπίλυονται προβλήματα ἀπροσδιορίστου ἀναλύσεως πρώτου βαθμοῦ, ἀκριβέστερον ἡσχολήθημεν μὲ τὴν ἐπίλυσιν, ἐντὸς τοῦ Z , ἔξισώσεων τῆς μορφῆς :

$$\alpha x + \beta y = \gamma, \quad \text{ὅπου } \alpha, \beta, \gamma \in Z.$$

Εις τὸ παρὸν κεφάλαιον θὰ ἀσχοληθῶμεν μὲ τὴν μελέτην εἰδικῶν τινων περιπτώσεων τοῦ κάτωθι γενικοῦ προβλήματος ἀπροσδιορίστου ἀναλύσεως β' βαθμοῦ, τῆς γενικῆς περιπτώσεως μὴ ὑπαγομένης ἐντὸς τῶν δρίων τοῦ παρόντος βιβλίου.

§ 231. Πρόβλημα.— Νὰ ἐπιλυθῇ, ἐντὸς τοῦ Z , ἡ ἔξισωσις :

$$f(x, y, \dots) = 0, \quad (1)$$

ὅπου $f(x, y, \dots)$ ἀκέραιον πολυώνυμον ὡς πρὸς x, y, \dots , δευτέρου βαθμοῦ, ἔχον πάντας τοὺς συντελεστὰς του ἀκεραίους.

Τὸ πρόβλημα τοῦτο δὲν ἐπιλύεται πάντοτε. Κατωτέρω θὰ ἔξετάσωμεν εἰδικάς τινας περιπτώσεις καθ' ἃς ἐπιτυγχάνεται ἡ ἐπίλυσις τοῦ προβλήματος, ἀσχολούμενοι κυρίως μὲ ἐπίλυσιν εἰδικῶν τινων ἔξισώσεων, δευτέρου βαθμοῦ, μὲ δύο ἀγνώστους.

Ἡ γενικὴ (πλήρης) μορφὴ μιᾶς ἔξισώσεως δευτέρου βαθμοῦ ὡς πρὸς x καὶ y εἶναι ἡ κάτωθι :

$$\alpha x^2 + \beta xy + \gamma y^2 + \delta x + \epsilon y + \eta = 0. \quad (2)$$

Δεχόμεθα, χωρὶς τοῦτο νὰ περιορίζῃ τὴν γενικότητα, ὅτι οἱ συντελεσταὶ $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \epsilon$ καὶ η εἶναι ἀκέραιοι καὶ πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους· ἐν ἐναντίᾳ περιπτώσει τοὺς καθιστῶμεν τοιούτους (πῶς;).

Ἡδη θὰ ἀσχοληθῶμεν μὲ τὴν ἐπίλυσιν τῶν κάτωθι μερικῶν περιπτώσεων τῆς (2):

Περί των σις I. Ἐὰν εἴναι $\gamma = 0, \beta \neq 0$. (Δηλ. ἐλλείπει τὸ y^2). Τότε ἡ (2) ἀνάγεται εἰς τὴν ἔξισωσιν :

$$\alpha x^2 + \beta xy + \delta x + \epsilon y + \eta = 0. \quad (3)$$

Αὗτη εἶναι ίσοδύναμος πρὸς τὴν :

$$(\beta x + \epsilon) y = -\alpha x^2 - \delta x - \eta. \quad (4)$$

Διακρίνομεν ἡδη δύο περιπτώσεις :

Iα. Έάν $\beta x + \epsilon - \alpha x^2 - \delta x - \eta$, τότε: $-\alpha x^2 - \delta x - \eta \equiv (\beta x + \epsilon) \cdot (kx + \lambda)$ καὶ ἡ (4) γίνεται:

$$(\beta x + \epsilon) \dot{y} - (\beta x + \epsilon)(kx + \lambda) = 0 \quad \text{ἢ} \quad (\beta x + \epsilon) \cdot (y - kx - \lambda) = 0.$$

Αὗτη είναι ίσοδύναμος πρὸς τὸ ζεῦγος τῶν ἔξισώσεων:

$$\{\beta x + \epsilon = 0 \text{ (i)}, \quad y - kx - \lambda = 0 \text{ (ii)}\}.$$

Ή (i) ἔχει ἀκέραιαν λύσιν τότε, καὶ μόνον τότε, ἂν $\beta | \epsilon$, δηλ. ἂν $\frac{\epsilon}{\beta} \in \mathbf{Z}$. Τότε ὅμως ἡ (3) ἔχει ἀπείρους τὸ πλῆθος λύσεις τάς:

$$x = -\frac{\epsilon}{\beta}, \quad y = h, \quad (\text{ἔνθα } h \text{ τυχών ἀκέραιος}).$$

Ή (ii), πρωτοβάθμιος ὡς πρὸς x καὶ y, λυομένη κατὰ τὰ γνωστὰ (ἀπροσδ. ἀνάλυσις πρώτου βαθμοῦ) δίδει ἀπείρους ἀκέραιας λύσεις, αἱ ὅποιαι δίδονται ὑπὸ τῶν τύπων:

$$x = x_0 + h, \quad y = y_0 + kh,$$

ἔνθα $h \in \mathbf{Z}$ καὶ (x_0, y_0) μία ἀκέραια λύσις τῆς (ii).

Iβ. Έάν $\beta x + \epsilon - \alpha x^2 - \delta x - \eta$, τότε, ἂν $kx + \lambda$ είναι τὸ πηλίκον καὶ υ τὸ ὑπόλοιπον τῆς διαιρέσεως $(-\alpha x^2 - \delta x - \eta)$: $(\beta x + \epsilon)$, ἡ ἔξισωσις (4) είναι ίσοδύναμος πρὸς τήν:

$$y = (kx + \lambda) + \frac{v}{\beta x + \epsilon} \quad (5)$$

καὶ ἔὰν οἱ ἀριθμοὶ k, λ καὶ υ δὲν είναι πάντες ἀκέραιοι, ἀλλὰ κλασματικοί, ἔστω μὲ ἐλάχιστον κοινὸν πολλαπλάσιον τῶν παρονομαστῶν αὐτῶν τὸν p, πολλαπλασιάζομεν ἀμφότερα τὰ μέλη τῆς (5) ἐπὶ ρ καὶ ἔχομεν πρὸς ἐπίλυσιν τήν:

$$\rho y = (k_1 x + \lambda_1) + \frac{v_1}{\beta x + \epsilon}, \quad (5')$$

ἔνθα οἱ ρ, $k_1 = kp$, $\lambda_1 = \lambda p$, $v_1 = vp$ είναι πάντες ἀκέραιοι.

Ήδη παρατηροῦμεν τὰ ἔξης: Διὰ νὰ ἔχῃ ἀκέραιαν λύσιν ἡ (5') πρέπει καὶ ἀρκεῖ νὰ ὑπάρχῃ ἀκέραιος x τοιοῦτος, ὥστε ὁ $\beta x + \epsilon$ νὰ είναι διαιρέτης τοῦ v_1 . Έξισοῦμεν λοιπὸν τὸν $\beta x + \epsilon$ μὲ ὅλους τοὺς διαιρέτας $\delta_1, \delta_2, \dots$ τοῦ v_1 καὶ ἐκ τῶν προκυπτουσῶν ἔξισώσεων $\beta x + \epsilon = \delta_1, \beta x + \epsilon = \delta_2, \dots$ εύρισκομεν (ἄν ὑπάρχουν) τὰς ἀκέραιας τιμᾶς τοῦ x. Ακολούθως, τὰς εὑρεθεῖσας ἀκέραιας τιμᾶς τοῦ x ἀντικαθιστῶμεν εἰς τήν (5') καὶ ἔξετάζομεν διὰ ποίας ἔξ αὐτῶν λαμβάνομεν ἀκέραιας τιμᾶς τοῦ y. Κατὰ ταῦτα διατηροῦμεν τελικῶς μόνον ἔκείνας (ἄν ὑπάρχουν), αἱ ὅποιαι καθιστοῦν τὸ β' μέλος τῆς (5') πολλαπλάσιον τοῦ ρ.

Παρατήρησις. Όμοίως ἔξετάζεται καὶ ἡ περίπτωσις $\alpha = 0, \beta \neq 0$.

Ἐφαρμογαὶ: Ιη: Νὰ ἐπιλυθῇ, ἐντὸς τοῦ \mathbf{Z} , ἡ ἔξισωσις:

$$2x^2 - 7xy - 3x + 14y - 2 = 0.$$

Λόσις: Αὗτη είναι ίσοδύναμος πρὸς τήν ἔξισωσιν:

$$(7x - 14)y = 2x^2 - 3x - 2.$$

Τὸ $7x - 14 / 2x^2 - 3x - 2$ καὶ τὸ πηλίκον τῆς διαιρέσεως $(2x^2 - 3x - 2) : (7x - 14)$ είναι τὸ $\frac{2}{7}x + \frac{1}{7}$, δθεν: $2x^2 - 3x - 2 \equiv (7x - 14) \cdot \left(\frac{2}{7}x + \frac{1}{7}\right) \equiv (x - 2) \cdot (2x + 1)$.

Τότε ή δοθείσα έξισωσις γίνεται :

$$(x-2)(2x+1)-7y(x-2)=0 \quad \text{ή} \quad (x-2)(2x-7y+1)=0.$$

Αύτη είναι ίσοδύναμος πρός τὸ ζεῦγος τῶν έξισώσεων :

$$\{ x-2=0 \text{ (i), } 2x-7y+1=0 \text{ (ii) } \}.$$

Αἱ ἀκέραιαι λύσεις τῆς (i) είναι αἱ $x = 2$, $y = h$, ἐνθα h τυχών ἀκέραιος.

Ἡ (ii), λυομένη κατά τὰ γνωστά, δίδει τὰς λύσεις :

$$x = 3 + 7h, \quad y = 1 + 2h, \quad h \in \mathbb{Z}.$$

2a : Νὰ ἐπιλυθῇ, ἐντὸς τοῦ \mathbb{Z} , ἡ έξισωσις :

$$3x^2 + 2xy + x + y + 1 = 0.$$

Ἀ ὅ σις : Αύτη είναι ίσοδύναμος πρός τὴν έξισωσιν :

$$(2x+1)y = -3x^2 - x - 1. \quad (\alpha')$$

Τὸ $2x+1 \neq -3x^2 - x - 1$. Ἐκτελοῦντες τὴν διαιρεσιν $(-3x^2 - x - 1)$: $(2x+1)$ εὐρίσκομεν πτηλίκον $-\frac{3}{2}x + \frac{1}{4}$ καὶ ὑπόλοιπον $u = -\frac{5}{4}$, καὶ ἡ (α') είναι ίσοδύναμος πρός τὴν έξισωσιν :

$$y = -\frac{3}{2}x + \frac{1}{4} - \frac{5/4}{2x+1}. \quad (\beta')$$

Πολλαπλασιάζοντες ἀμφότερα τὰ μέλη τῆς (β') ἐπὶ 4 (δηλ. ἐπὶ τὸ E.K.P. τῶν παρονομαστῶν τῶν κλασμάτων $3/2, 1/4, 5/4$) λαμβάνομεν τὴν ίσοδύναμον έξισωσιν :

$$4y = -6x + 1 - \frac{5}{2x+1}. \quad (\gamma')$$

Οἱ διαιρέται τοῦ 5 είναι οἱ $\pm 1, \pm 5$.

*Εξισοῦντες τὸ $2x+1$ πρὸς τοὺς διαιρέτας αὐτοὺς λαμβάνομεν τὰς έξισώσεις :

$$2x+1=1, \quad 2x+1=-1, \quad 2x+1=5, \quad 2x+1=-5.$$

*Εξ αὐτῶν λαμβάνομεν ἀντιστοίχως : $x = 0, x = -1, x = 2, x = -3$.

Αἱ τιμαὶ αὗται τοῦ x τιθέμεναι διαδοχικῶς εἰς τὴν (γ') δίδουν ἀντιστοίχως :

$$y = -1, \quad y = 3, \quad y = -3, \quad y = 5.$$

*Ἄρα ἡ δοθείσα έξισωσις ἔχει 4 ἀκέραιας λύσεις τάς :

$$(x = 0, y = -1), \quad (x = -1, y = 3), \quad (x = 2, y = -3), \quad (x = -3, y = 5).$$

Περίπτωσις II. Ἐὰν είναι $\beta = \gamma = 0$: (Δηλ. ἐλλείπει τὸ y^2 καὶ τὸ xy). Τότε ἡ (2) ἀνάγεται εἰς τὴν έξισωσιν :

$$\alpha x^2 + \delta x + \eta = 0. \quad (6)$$

Αύτη λυομένη ως πρὸς y δίδει :

$$y = -\frac{\alpha x^2 + \delta x + \eta}{\epsilon}. \quad (7)$$

*Ηδη ἀποδεικνύομεν τὰς κάτωθι προτάσεις :

1η: 'Ἐὰν ἡ (6) δέχεται ἀκεραίαν τινα λύσιν (x_0, y_0) , θὰ δέχεται ως ἀκεραίας λύσεις καὶ τάς :

$$\left. \begin{array}{l} x = x_0 + eh \\ y = y_0 - (2ax_0 + \delta)h - ae h^2 \end{array} \right\} \quad (8)$$

ἐνθα $h \in \mathbb{Z}$.

Πράγματι, ጳν είς τήν (7) θέσωμεν όπου $x = x_0 + \epsilon h$, $h \in \mathbb{Z}$, έχομεν :

$$y = -\frac{\alpha(x_0 + \epsilon h)^2 + \delta(x_0 + \epsilon h) + \eta}{\epsilon} = -\frac{\alpha x_0^2 + \delta x_0 + \eta}{\epsilon} - (2\alpha x_0 + \delta)h - \alpha \epsilon h^2.$$

*Αλλά :

$$-\frac{\alpha x_0^2 + \delta x_0 + \eta}{\epsilon} = y_0.$$

"Οθεν : $y = y_0 - (2\alpha x_0 + \delta)h - \alpha \epsilon h^2$, δηλ. άκέραιος άριθμός.

*Εκ της άνωτέρω προτάσεως συνάγομεν τώρα τὸ ἔξῆς : ጳν ἡ ἔξισωσις (6) ἔχῃ ἀκέραιάς λύσεις, ἀρκεῖ νὰ εὔρωμεν μίαν τυχοῦσαν ἔξι αὐτῶν καὶ ἀκολούθως ἐκ τῶν τύπων (8) θὰ ἔχωμεν ἀπόειρους τὸ πλῆθος ἀκέραιάς λύσεις. Τὸ πρόβλημα συνεπῶς ἀνάγεται εἰς τὴν ἀναζήτησιν μιᾶς ἀκέραιάς λύσεως τῆς (6). Πρὸς τοῦτο ἀποδεικνύομεν τὴν κάτωθι πρότασιν :

2a: 'Ἐὰν ἡ ἔξισωσις (6) δέχεται ἀκέραιάς λύσεις, τότε ὑπάρχει ἀκέραια λύσις αὐτῆς (x'_0, y'_0) τοιαύτη, ὥστε νὰ ἴσχῃ :

$$0 \leq x'_0 < |\epsilon|. \quad (9)$$

Πράγματι, ἔστω (x_0, y_0) μία ἀκέραιά λύσις τῆς (6). Τότε, ጳν ὁ x_0 πληροὶ τὴν (9) ἡ πρότασις ἔδειχθη, ጳν ὅχι, ἐπειδή, ὡς ἔδειχθη εἰς τὴν προηγουμένην πρότασιν, ὁ $x_0 + \epsilon h$, $h \in \mathbb{Z}$, τιθέμενος εἰς τὴν (6) ἀντὶ τοῦ x δίδει διὰ τὸ y ἀκέραιαν τιμήν, ἀρκεῖ νὰ δείξωμεν ὅτι ὑπάρχει ἀκέραιος h , ὥστε νὰ είναι :

$$0 \leq x_0 + \epsilon h < |\epsilon|$$

Ἔτοι :

$$-\frac{x_0}{\epsilon} \leq h < 1 - \frac{x_0}{\epsilon} \text{ ἀντιστοίχως } -\frac{x_0}{\epsilon} \geq h > -1 - \frac{x_0}{\epsilon},$$

καθ' ὅσον είναι $\epsilon > 0$ ἀντιστοίχως $\epsilon < 0$.

"Ωστε, ἀρκεῖ νὰ δειχθῇ ὅτι ὑπάρχει ἀκέραιος h τοιοῦτος, ὥστε :

$$h \in \left[-\frac{x_0}{\epsilon}, 1 - \frac{x_0}{\epsilon} \right] \text{ ἀντιστοίχως } h \in \left(-1 - \frac{x_0}{\epsilon}, -\frac{x_0}{\epsilon} \right].$$

Τοῦτο ὅμως συμβαίνει, διότι τὸ μῆκος τοῦ διαστήματος (§ 114, δ')

$$\left[-\frac{x_0}{\epsilon}, 1 - \frac{x_0}{\epsilon} \right] \text{ ἀντιστοίχως } \left(-1 - \frac{x_0}{\epsilon}, -\frac{x_0}{\epsilon} \right]$$

είναι 1. Οὕτως ἔδειχθη ὅτι ὑπάρχει ἀκέραιά τιμὴ τοῦ x , θετικὴ ἡ μηδὲν καὶ μικρότερά τοῦ $|\epsilon|$, δίδουσα, ἐκ τῆς (7), διὰ τὸ y ἀκέραιαν τιμήν.

Κατόπιν τούτου διὰ τὴν εὔρεσιν ἀκέραιάς λύσεως τῆς (6) ἐργαζόμεθα ὡς ἔξῆς : Δίδομεν εἰς τὸ x διαδοχικῶς τὰς ἀκέραιάς τιμάς : $0, 1, 2, 3, \dots, (|\epsilon| - 1)$, ὅτε, ἐάν ἡ (6) ἔχῃ ἀκέραιάς λύσεις, ὁ τύπος (7) θὰ δώσῃ, διὰ μίαν τούλαχιστον τῶν τιμῶν αὐτῶν τοῦ x , ἀκέραιάν τιμὴν διὰ τὸ y . 'Ἐὰν δι' οὐδεμίαν τῶν ἀνωτέρω τιμῶν τοῦ x ὁ τύπος (7) δὲν δώσῃ ἀκέραιάν τιμὴν διὰ τὸ y , τοῦτο θὰ σημαίνῃ ὅτι ἡ (6) δὲν ἐπιδέχεται ἀκέραιάς λύσεις.

Σημείωσις : 'Ἐάν εὔρωμεν διὰ τὸ x τιμάς τοῦ διαστήματος $[0, |\epsilon|]$ π.χ. τάξ : $x_0, x_1, x_2, \dots, x_p$, ὥστε δι' αὐτὰς ἐκ τῆς (7) νὰ λαμβάνωμεν ἀκέραιάς τιμάς τοῦ y , τάξ $y_0, y_1, y_2, \dots, y_p$ ἀντι-

στοίχως, τότε θά έχωμεν διά τήν (6) τάς άκεραίας λύσεις : $(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_p, y_p)$. Εφαρμόζοντες δι' έκαστην τῶν λύσεων τούτων τοὺς τύπους (8) εύρισκομεν άκεραίας λύσεις τῆς ἔξι-σώσεως (6), αἱ διποῖαι δῦμως δὲν εἰναι κατ' ἀνάγκην πᾶσαι αἱ λύσεις αὐτῆς.

Παρατήρησις. Όμοιως ἔχεταί καὶ ἡ περίπτωσις $\alpha = \beta = 0$.

'Εφαρμογή: Νὰ εὑρεθοῦν αἱ άκέραιαι λύσεις τῆς ἔξισώσεως :

$$3x^2 + 2x - 5y - 1 = 0. \quad (\alpha')$$

Λύσις: Λύοντες τήν (α') ως πρὸς y λαμβάνομεν :

$$y = \frac{3x^2 + 2x - 1}{5} \quad (\beta')$$

Ἐνταῦθα εἶναι $\epsilon = -5$. Διὰ νὰ εὑρωμεν άκεραίαν λύσιν τῆς (α'), δίδομεν εἰς τὸ x τάς άκεραίας τιμὰς τοῦ διαστήματος $[0, |\epsilon|] \equiv [0, 5]$, ήτοι τάς τιμὰς : 0, 1, 2, 3, 4 καὶ λαμβάνομεν ἐκ τῆς (β') ἀντιστοίχως τάς τιμὰς :

$$y_0 = -\frac{1}{5}, \quad y_1 = \frac{4}{5}, \quad y_2 = 3, \quad y_3 = \frac{32}{5}, \quad y_4 = 11.$$

Οὕτως ἔχομεν τάς άκεραίας λύσεις :

$$(x = 2, y = 3) \quad \text{καὶ} \quad (x = 4, y = 11).$$

Τότε δῦμως ἡ (α') θὰ δέχεται ἀπείρους άκεραίας λύσεις, αἱ διποῖαι δίδονται ἀπὸ τοὺς τύπους (8). Οὕτω διὰ τὴν λύσιν $(x = 2, y = 3)$ οἱ τύποι (8) δίδουν :

$$x = 2 - 5h, \quad y = 3 - 14h + 15h^2, \quad h \in \mathbb{Z}$$

καὶ διὰ τὴν λύσιν $(x = 4, y = 11)$ οἱ αὐτοὶ τύποι δίδουν :

$$x = 4 - 5h, \quad y = 11 - 26h + 15h^2, \quad h \in \mathbb{Z}.$$

Περίπτωσις III. Εὰν εἴναι $\alpha \neq 0, \gamma \neq 0$ καὶ $\beta^2 - 4\alpha\gamma = k^2, k \in \mathbb{Z}$. (Δηλ. ἡ ποσότης $\beta^2 - 4\alpha\gamma$ εἴναι τέλειον τετράγωνον ἀκεραίου ἀριθμοῦ).

Εἰς τὴν προκειμένην περίπτωσιν δυνάμεθα νὰ ἐπιλύσωμεν, ἐντὸς τοῦ \mathbb{Z} , τὴν ἔξισώσεων (1) : $\alpha x^2 + \beta xy + \gamma y^2 + \delta x + \epsilon y + \eta = 0$, ἔχοντες ὑπὸ σχετικῶν τάς κάτωθι δύο προτάσεις :

Ιη: Εὰν $\alpha \neq 0, \gamma \neq 0$ καὶ $\beta^2 - 4\alpha\gamma$ λοσοῦται πρὸς τὸ τετράγωνον ἀκεραίου τινὸς $k \neq 0$, τότε ἡ (1) τίθεται ὑπὸ τὴν μορφὴν :

$$(px + qy + r) \cdot (p'x + q'y + r') = d, \quad (10)$$

ὅπου p, q, r, p', q', r' καὶ d ἀκέραιοι ἀριθμοί.

Πράγματι, θὰ δείξωμεν ὅτι εἴναι δυνατὸν προσθέτοντες εἰς τὰ μέλη τῆς (1) κατάλληλον ἀριθμὸν λ νὰ φέρωμεν αὐτὴν ὑπὸ τὴν μορφὴν (10).

Ἐστω λοιπὸν ἡ ἔξισώσης :

$$\alpha x^2 + \beta xy + \gamma y^2 + \delta x + \epsilon y + \eta + \lambda = \lambda. \quad (11)$$

Ἡ (11) γράφεται ως τριώνυμον τοῦ x οὕτω :

$$\alpha x^2 + (\beta y + \delta) x + (\gamma y^2 + \epsilon y + \eta + \lambda) = \lambda. \quad (12)$$

Διὰ νὰ φέρωμεν τώρα τὸ πρῶτον μέλος τῆς (12) εἰς τὴν μορφὴν τοῦ πρώτου μέλους τῆς (10), ἀρκεῖ νὰ προσδιορισθῇ δλῶστε ἡ διακρίνουσα $\Delta(y)$ τοῦ τριώνυμου :

$$\alpha x^2 + (\beta y + \delta) x + (\gamma y^2 + \epsilon y + \eta + \lambda) \quad (13)$$

νά είναι τετράγωνον πρωτοβαθμίου πολυωνύμου ώς πρός γ μὲ συντελεστὰς συμμέτρους ἀριθμούς. Τοῦτο είναι δυνατὸν — καὶ μάλιστα τὸ πρωτοβαθμίου πολυώνυμον θὰ είναι τῆς μορφῆς $ky + \sigma$, ὅπου σ σύμμετρος ἀριθμὸς — διότι ἔχομεν :

$$\begin{aligned}\Delta(y) &\equiv (\beta y + \delta)^2 - 4\alpha(\gamma y^2 + \epsilon y + \eta + \lambda) \\ &= (\beta^2 - 4\alpha\gamma)y^2 - 2(2\alpha\epsilon - \beta\delta)y + (\delta^2 - 4\alpha\eta - 4\alpha\lambda)\end{aligned}\quad (14)$$

καὶ τὸ τριώνυμον (14), ἐφ' ὅσον είναι ἔξι ύποθέσεως $\beta^2 - 4\alpha\gamma = k^2$ (k ἀκέραιος $\neq 0$), δύναται νὰ τεθῇ, ώς γνωστόν, ὑπὸ τὴν μορφὴν $(ky + \sigma)^2$, ἐνθα σ σύμμετρος ἀριθμός.

Διὰ νὰ είναι τὸ $\Delta(y)$ τέλειον τετράγωνον ἀρκεῖ νὰ προσδιορισθῇ ὁ λ ὥστε ἡ διακρίνουσα Δ τοῦ $\Delta(y)$ νὰ είναι μηδὲν (διατὶ), δηλ. νὰ είναι :

$$(2\alpha\epsilon - \beta\delta)^2 - k^2(\delta^2 - 4\alpha\eta - 4\alpha\lambda) = 0. \quad (15)$$

*Ἐκ τῆς (15) ὅμως προσδιορίζεται τὸ λ, διότι ἔχομεν :

$$\lambda = \frac{k^2(\delta^2 - 4\alpha\eta) - (2\alpha\epsilon - \beta\delta)^2}{4\alpha k^2}. \quad (16)$$

Οὕτως, δριζομένου τοῦ λ, ἡ (12) λαμβάνει τὴν μορφήν :

$$\alpha \left[x - \frac{-(\beta y + \delta) + (ky + \sigma)}{2\alpha} \right] \cdot \left[x - \frac{-(\beta y + \delta) - (ky + \sigma)}{2\alpha} \right] = \lambda$$

$$\text{ἢ } [2\alpha x + (\beta - k)y + (\delta - \sigma)] \cdot [2\alpha x + (\beta + k)y + (\delta + \sigma)] = 4\alpha\lambda. \quad (17)$$

"Ωστε, πράγματι ἡ (1) τίθεται, ὑπὸ τὰς τεθείσας ύποθέσεις, ὑπὸ τὴν μορφὴν (10). *Ἀποδεικνύομεν τώρα καὶ τὴν ἔξῆς πρότασιν :

2α : 'Εὰν ὁ ἀκέραιος $d \neq 0$ ἔχῃ ν θετικὸν διαιρέτας : $1 = \delta_1, \delta_2, \dots, \delta_v = |d|$, τότε ἡ ἔξισωσις : $(px + qy + r) \cdot (p'x + q'y + r') = d \quad (10')$ καὶ τὰ $2v$ συστήματα :

$$\left\{ px + qy + r = \delta_i, \quad p'x + q'y + r' = \epsilon \frac{d}{\delta_i} \right\} \quad (18)$$

ὅπου $\epsilon = 1$ ἢ -1 καὶ $i = 1, 2, \dots, v$, ἔχοντας τὰς αντὰς ἀκεραίας λύσεις.

Πράγματι, ἂν (x_0, y_0) είναι ἀκέραια λύσις τῆς (10'), τότε: $px_0 + qy_0 + r = k$ καὶ $p'x_0 + q'y_0 + r' = \lambda$, ὅπου $k, \lambda \in \mathbb{Z}$ καὶ $k \cdot \lambda = d$. Ἐάρα $k \mid d$ καὶ $\lambda \mid d$, ἐπομένως $k = \epsilon\delta_i$, ὅπου $\epsilon = \pm 1$ καὶ δ_i , $i = 1, 2, \dots, v$ είναι οἱ φυσικοὶ ἀριθμοί, οἱ ὄποιοι διαιροῦν τὸν d καὶ $\lambda = \frac{d}{k} = \frac{d}{\epsilon\delta_i} = \frac{\epsilon\delta}{\epsilon^2\delta_i} = \epsilon \frac{d}{\delta_i}$, διότι $\epsilon^2 = 1$, ἦτοι ἡ τυχοῦσα ἀκέραια λύσις (x_0, y_0) τῆς (10') είναι καὶ λύσις ἐνὸς ἐκ τῶν συστημάτων (18).

*Ἀντιστρόφως, ἂν (x_0, y_0) είναι ἀκέραια λύσις ἐνὸς ἐκ τῶν συστημάτων (18) ἔχομεν :

$$px_0 + qy_0 + r = \epsilon \delta_i \quad \text{καὶ} \quad p'x_0 + q'y_0 + r' = \epsilon \frac{d}{\delta_i}.$$

Τότε δύναται να λέμε ότι $\delta_1 = \frac{d}{\epsilon}$

$$(px_0 + qy_0 + r) \cdot (p'x_0 + q'y_0 + r') = (\epsilon \delta_1) \cdot \left(\epsilon \frac{d}{\delta_1} \right) = \epsilon^2 \delta_1 \frac{d}{\delta_1} = d,$$

ήτοι ή (x_0, y_0) είναι λύσης και της (10'). Η πρότασις οδηγεί χθη.

"Ηδη, έχοντες ύπτη" δψιν τάς άνωτέρω προτάσεις 1 και 2, δυνάμεθα νά έπιλυσωμεν έντος του Z την (1) εις την περίπτωσιν καθη' ήν είναι : $\alpha \neq 0, \gamma \neq 0, \beta^2 - 4\alpha\gamma = k^2 \neq 0, k \in Z$ έργαζόμενοι ως έξης : Φέρομεν έν πρώτοις την (1) ύπτη την μορφήν (10) και άκολούθως έφαρμόζομεν την πρότασιν 2.

*Εφαρμογαί : 1η : Νά εύρεθούν αιά άκεραια λύσεις της έξισώσεως : $y^2 = 9x^2 - 11$.

Λύσις : "Η δοθείσα έξισώσης γράφεται : $9x^2 - y^2 = 11$. (α')

Ένταυθα έχομεν : $\alpha = 9, \beta = 0, \gamma = -1, \beta^2 - 4\alpha\gamma = 36 = 6^2$.

Η (α') είναι ισοδύναμος πρὸς την : $(3x + y) \cdot (3x - y) = 11$. (β')

Οι διαιρέται του 11 είναι : $\pm 1, \pm 11$. "Αρα ή δοθείσα έξισώσης και τά τέσσαρα συστήματα :

$$\begin{cases} 3x + y = 1 \\ 3x - y = 11, \end{cases} \quad \begin{cases} 3x + y = 11 \\ 3x - y = 1, \end{cases} \quad \begin{cases} 3x + y = -1 \\ 3x - y = -11, \end{cases} \quad \begin{cases} 3x + y = -11 \\ 3x - y = -1, \end{cases}$$

έχουν τάς αύτάς άκεραιας λύσεις. Η έπιλυσης τούτων είναι πολύ άπλη.

2α : Νά έπιλυθη, έντος του Z , ή έξισώσις :

$$2x^2 + 6xy + 4y^2 + 5x + y + 2 = 0. \quad (\gamma')$$

*Επίλυσης : 'Επειδή $\beta^2 - 4\alpha\gamma = 6^2 - 4 \cdot 2 \cdot 2 = 4 = 2^2$ προσδιορίζουμε κατάλληλον άριθμόν λώστε τὸ πρῶτον μέλος της έξισώσεως : $2x^2 + 6xy + 4y^2 + 5x + y + 2 + \lambda = \lambda$ νά τίθεται ύπό πο μορφήν γινομένου δύο πρωτοβαθμίων πολυωνύμων ως πρὸς x και y .

Έκ του τύπου (16) έχομεν :

$$\lambda = \frac{4(25 - 4 \cdot 2 \cdot 2) - (2 \cdot 2 \cdot 1 - 6 \cdot 5)^2}{4 \cdot 2 \cdot 4} = -20.$$

Ο -20 είναι λοιπόν ο κατάλληλος άριθμός, ο οποῖος πρέπει νά προστεθῇ εἰς τὰ μέλη της (γ') ώστε τὸ πρῶτον μέλος αύτῆς νά τίθεται ύπό τὴν μορφήν (10). Πράγματι, ἐκ τῆς (γ') έχομεν :

$$2x^2 + (6y + 5)x + 4y^2 + y - 18 = -20, \quad (\delta')$$

όποτε τὸ πρῶτον μέλος της (δ') θεωρούμενον τριώνυμον ως πρὸς x έχει ρίζας τοὺς άριθμούς :

$$\rho_{1,2} = \frac{-(6y + 5) \pm \sqrt{(6y + 5)^2 - 8(4y^2 + y - 18)}}{4} = \frac{-(6y + 5) \pm (2y + 13)}{4},$$

$$\text{ήτοι : } \rho_1 = -y + 2, \quad \rho_2 = -2y - \frac{9}{2}.$$

Τότε δύναται η έξισώσης (δ') λαμβάνει τὴν μορφήν :

$$\alpha(x - \rho_1)(x - \rho_2) \equiv 2(x + y - 2) \cdot \left(x + 2y + \frac{9}{2} \right) = -20 \quad (\epsilon')$$

$$\text{ή } (x + y - 2) \cdot (2x + 4y + 9) = -20.$$

Οι θετικοί διαιρέται του -20 είναι οι : 1, 2, 4, 5, 10, 20.

Τότε ή (ϵ') είναι ισοδύναμος πρὸς τὰ $2 \cdot 6 = 12$ συστήματα :

$$\left\{ \begin{array}{l} x + y - 2 = \epsilon \delta_1, \\ 2x + 4y + 9 = \epsilon \frac{-20}{\delta_1} \end{array} \right\}$$

όπου $\epsilon = +1$ ή -1 και $\delta_1 \in \{1, 2, 4, 5, 10, 20\}$.

Ούτω, π.χ., διὰ $\epsilon = 1, \delta_1 = 4$ έχομεν τὸ σύστημα :

$$\left. \begin{array}{l} x + y - 2 = 4 \\ 2x + 4y + 9 = -5, \end{array} \right\}, \quad \text{ήτοι : } \left. \begin{array}{l} x + y = 6 \\ x + 2y = -7 \end{array} \right\}$$

τὸ οποῖον δέχεται τὴν λύσην ($x = 19, y = -13$), ή οποία είναι και λύσης της δοθείσης.

Περίπτωσις IV. Εάν είναι $\alpha = \gamma = 0$ και $\beta\delta\eta \neq 0$. Τότε η (2) ανάγεται εις την έξισωσιν : $\beta xy + \delta x + \epsilon y + \eta = 0$.

Αὗτη γράφεται διαδοχικώς :

$$\begin{aligned} & \beta^2 xy + \beta\delta x + \beta\epsilon y + \beta\eta = 0 \\ \text{ή} \quad & \beta^2 xy + \beta\delta x + \beta\epsilon y + \delta\epsilon = \delta\epsilon - \beta\eta \\ \text{ή} \quad & (\beta y + \delta)(\beta x + \epsilon) = \delta\epsilon - \beta\eta. \end{aligned} \quad (19)$$

Αἱ ἀκέραιαι λύσεις τῆς (19) είναι αἱ ἀκέραιαι λύσεις τῶν συστημάτων :

$$\left\{ \begin{array}{l} \beta x + \epsilon = k, \\ \beta y + \delta = \frac{\delta\epsilon - \beta\eta}{k} \end{array} \right\},$$

ὅπου $k | \delta\epsilon - \beta\eta$.

Έφαρμογή : Νὰ ἐπιλυθῇ, ἐντὸς τοῦ Z , ἡ ἔξισωσις :

$$2xy - 3x + y + 1 = 0. \quad (z')$$

Έπιλυσις : "Εχομεν $\alpha = \gamma = 0$, $\beta\delta\eta = -6 \neq 0$.

"Η δοθεῖσα είναι ισοδύναμης πρὸς τὴν έξισωσιν : $4xy - 6x + 2y + 2 = 0$ καὶ αὐτὴ πρὸς τὴν : $(2x + 1)(2y - 3) = -5$.

Οἱ θετικοὶ διαιρέται τοῦ -5 είναι οἱ : 1 καὶ 5. "Η ἐπίλυσις συνεπῶς τῆς (z') ἀνάγεται εἰς τὴν ἐπίλυσιν τῶν τεσσάρων συστημάτων :

$$\left\{ \begin{array}{l} 2x + 1 = 1 \\ 2y - 3 = -5, \end{array} \quad \left\{ \begin{array}{l} 2x + 1 = -5 \\ 2y - 3 = +1, \end{array} \quad \left\{ \begin{array}{l} 2x + 1 = -1 \\ 2y - 3 = 5, \end{array} \quad \left\{ \begin{array}{l} 2x + 1 = 5 \\ 2y - 3 = -1. \end{array} \end{array} \right. \right. \right. \right.$$

Αἱ λύσεις τῶν συστημάτων αὐτῶν είναι ἀντιστοίχως :

$$(x = 0, y = -1), \quad (x = -3, y = 2), \quad (x = -1, y = 4), \quad (x = 2, y = 1).$$

Αὕται είναι αἱ ἀκέραιαι λύσεις τῆς δοθείσης έξισώσεως.

Περίπτωσις V. (Γενικὴ περίπτωσις). Εάν είναι $\alpha \neq 0$, $\gamma \neq 0$ καὶ $\beta^2 - 4\alpha\gamma \neq k^2$, $k \in Z$ (δηλ. τὸ $\beta^2 - 4\alpha\gamma$ δὲν είναι τετράγωνον ἀκεραίον). Τότε η έξισωσις (2) (σελὶς 285) λυομένη ὡς πρὸς x δίδει :

$$x = \frac{-(\beta y + \delta) \pm \sqrt{(\beta^2 - 4\alpha\gamma)y^2 - 2(2\alpha\epsilon - \beta\delta)y + (\delta^2 - 4\alpha\eta)}}{2\alpha}. \quad (20)$$

"Ινα ἡ (1) ἐπιλύεται ἐντὸς τοῦ Z θὰ πρέπει νὰ συμβαίνουν τὰ ἔξης : πρῶτον νὰ είναι : $\Delta \equiv (\beta^2 - 4\alpha\gamma)y^2 - 2(2\alpha\epsilon - \beta\delta)y + (\delta^2 - 4\alpha\eta) = k^2$, ἔνθα y , k ἐν Z καὶ δεύτερον πρέπει : $2\alpha | -(\beta y + \delta) \pm k$. Ζητοῦμεν λοιπὸν κατὰ πρῶτον πτοῖαι τιμαὶ τοῦ y καθιστοῦν τὸ ὑπόρριζον θετικόν. "Εὰν εἰς τὸ δευτεροβάθμιον ὡς πρὸς y τριώνυμον Δ , δ συντελεστὴς $\beta^2 - 4\alpha\gamma$ τοῦ y^2 είναι ἀρνητικὸς καὶ αἱ ρίζαι ρ_1 , ρ_2 πράγματικαί, τότε πρέπει δ y νὰ κείται μεταξὺ τῶν ρ_1 , ρ_2 , διὰ νὰ καθίσταται τοῦτο θετικόν. "Επομένως εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν περιοριζόμεθα εἰς τὰς ἀκεραίας τιμὰς y τὰς πληρούσας τῆν :

$$\rho_1 \leqq y \leqq \rho_2.$$

"Ἐκ τῶν ἀκέραιῶν τούτων τιμῶν τοῦ y ἐκλέγομεν μόνον ἑκείνας, αἱ ὅποιαι καθιστοῦν τὸ ὑπόρριζον Δ τέλειον τετράγωνον ἀκεραίου καὶ τέλος, ἔξ αὐτῶν ἑκείνας αἱ ὅποιαι τιθέμεναι εἰς τὴν (20) καθιστοῦν τὸ x ἀκέραιον.

Έφαρμογή : Νὰ ἐπιλυθῇ, ἐντὸς τοῦ Z , ἡ ἔξισωσις :

$$2x^2 + 2xy + 2y^2 - 2x - 7y - 9 = 0 \quad (a')$$

*Επίλυσης. Αυτή γράφεται: $2x^2 + 2(y-1)x + (2y^2 - 7y - 9) = 0$.

Λύοντες ταύτην ως πρός x έχουμε:

$$x = \frac{-(y-1) \pm \sqrt{(y-1)^2 - 2(2y^2 - 7y - 9)}}{2} = \frac{-y+1 \pm \sqrt{-3y^2 + 12y + 19}}{2} \quad (\beta')$$

*Έν πρώτοις πρέπει:

$$-3y^2 + 12y + 19 \geq 0, \quad \text{δηλ. } -1 \leq y \leq 5 \quad \text{καὶ ἐπειδὴ } y \in \mathbb{Z}, \quad \text{έχομεν:}$$

$y = -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5$. *Έκ τῶν τιμῶν αὐτῶν λαμβάνομεν μόνον ἕκείνας αἱ δόποιαὶ καθιστοῦν τὸ ὑπόρριζον τέλειον τετράγωνον. Αὗται εἰναι αἱ $y = -1$ καὶ $y = 5$.

Διὰ τὴν τιμὴν $y = -1$ ἡ (β') δίδει: $x = 2, x = 0$.

Διὰ τὴν τιμὴν $y = 5$ ἡ (β') δίδει: $x = -1, x = -3$.

*Αρα ἡ διθεῖσα ἔξισωσις ἔχει τέσσαρας ἀκέραιας λύσεις τάξ:

$$(x = 2, y = -1), \quad (x = 0, y = -1), \quad (x = -1, y = 5), \quad (x = -3, y = 5).$$

§ 232. *Ἀκέραιαι λύσεις τῆς ἔξισώσεως:

$$x^2 + ky^2 = z^2, \quad k \in \mathbb{Z}. \quad (1)$$

*Ανευ βλάβης τῆς γενικότητος δυνάμεθα νὰ θεωρῶμεν τὸν ἀκέραιον k πάντοτε θετικόν, διότι ἄλλως ἡ (1) θὰ ἥδυνατο νὰ γραφῇ ὑπὸ τὴν μορφὴν: $z^2 + (-k)y^2 = x^2$, εἰς ἣν ὁ $(-k)$ θὰ ἤτο πάλιν θετικός.

*Η (1) ἐπιδέχεται προφανῶς τὴν λύσιν: $x = y = z = 0$. *Ἐπίσης διὰ $y = 0$ έχομεν: $x = \pm z$, ὅτε ἡ (1) ἐπιδέχεται τὰς ἀκέραιας λύσεις: $x = z, y = 0$ καὶ $x = -z, y = 0$. Θὰ ζητήσωμεν τώρα ἀκέραιας λύσεις τῆς (1) μὲν $y \neq 0$. Διαιροῦντες ἀμφότερα τὰ μέλη τῆς (1) διὰ y^2 , λαμβάνομεν τὴν ἔξισωσιν:

$$\frac{x^2}{y^2} + k = \frac{z^2}{y^2}. \quad (2)$$

Θέτομεν $\frac{z}{y} = \frac{x}{y} + \frac{n}{m}$ (3) , ἐνθα oī m, n ἀκέραιοι πρῶτοι πρὸς ἄλλήλους.

*Έκ τῆς (3) λαμβάνομεν:

$$\frac{z^2}{y^2} = \frac{x^2}{y^2} + \frac{n^2}{m^2} + \frac{2nx}{my}. \quad (4)$$

*Έκ τῶν (2) καὶ (4) έχομεν:

$$k = \frac{n^2}{m^2} + \frac{2nx}{my} \quad (5)$$

καὶ ἔξ αὐτῆς λαμβάνομεν:

$$\frac{x}{y} = \frac{km^2 - n^2}{2mn}. \quad (6)$$

Είναι προφανὲς ὅτι ἡ (6) ἀληθεύει, ἐὰν εἰναι $x = (km^2 - n^2)h$ καὶ $y = 2mnh$, ἐνθα $h \in \mathbb{Z}$. *Έκ τῆς (3) λαμβάνομεν, ἂν ἀντικαταστήσωμεν τὰς τιμὰς αὐτὰς τῶν x καὶ y : $z = (km^2 + n^2)h$. *Αρα αἱ ἀκέραιαι λύσεις τῆς (1) δίδονται ὑπὸ τῶν τύπων:

$x = (km^2 - n^2)h$	$y = 2mnh$	$z = (km^2 + n^2)h$
---------------------	------------	---------------------

(7)

Ἐνθα oī m, n, h εἰναι ἀκέραιοι ἀριθμοί.

*Ομοίως ἐπιλύεται ἡ ἔξισωσις $kx^2 + y^2 = z^2$.

Σημειώσις. 'Η (1) διάλ k = 1 άναγεται εις τὴν ἔξισωσιν : $x^2 + y^2 = z^2$, ή δοπίσια καλεῖται και πυθαγόρειος ἔξισωσις, διότι δύναται νά θεωρηθῇ διτὶ συνδέει τὰς πλευράς δρθιογωνίου τριγώνου. Αἱ ἀκέραιαι λύσεις αὐτῆς θὰ διδώνται ὑπὸ τῶν τύπων (7), ἐν θέσισιν k = 1, ἢτοι :

$$x = (m^2 - n^2)h, \quad y = 2mnh, \quad z = (m^2 + n^2)h, \quad h \in \mathbb{Z}. \quad (8)$$

Οι θετικοί άκραιοι οι δποτοί επαγληθεύουν τήν $x^2 + y^2 = z^2$ καλούνται πυθαγόρειοι άρθροι. Ή δπλουστέρα τριάς πυθαγορείων δριθμῶν είναι : 3, 4, 5.

Διὰ τὸ οὐκ εἶναι τοῦτοι (8) γίνονται:

$$x = m^2 - 1, \quad y = 2m, \quad z = m^2 + 1 \quad (m \in \mathbb{N}, \quad m \neq 1)$$

καὶ καλούνται πυθαγόρειοι τύποι, ἀν καὶ ὡς πυθαγόρειοι τύποι φέρονται οἱ γνωστοί εἰς τοὺς Πυθαγορείους :

$$x = \frac{m^2 - 1}{2}, \quad y = m, \quad z = \frac{m^2 + 1}{2},$$

Ἐνθα τὸ τυχών περιττός φυσικὸς ἀριθμὸς $\neq 1$.

Ἐφαρμογή. Νὰ εύρεθοιν αἱ ἀκέραιαι λύσεις τῆς ἐξισώσεως :

$$x^2 + 4y^2 = z^2.$$

Αν σις : Αὕτη προφανῶς ἐπιδέχεται τὴν λύσιν: $x = y = z = 0$, καθώς ἐπίσης και τὰς λύσεις: $x = z$, $y = 0$ και $x = -z$, $y = 0$. Αἱ λοιπαὶ ἀκέραιαι λύσεις εὑρίσκονται ἐκ τῶν τύπων (7) διὰ $k = 4$ και είναι αἱ κάτωθι:

$$x = (4m^2 - n^2)h, \quad y = 2mnh, \quad z = (4m^2 + n^2)h, \quad \forall \theta \in \mathbb{R} \quad m, n, h \in \mathbb{Z}.$$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

525. Νὰ εύρεθοῦν αἱ ἀκέραιαι λύσεις τῶν ἔξισώσεων:

$$1. \quad 2x^2 - 2xy - 5x - y - 3 = 0, \quad 2. \quad 3xy - 2y^2 + 2x - 3y + 4 = 0,$$

$$3. \quad 3y^2 - 2y - 5x - 1 = 0, \quad 4. \quad 5xy - 2x - 3y - 18 = 0.$$

526. Νὰ ἐπιλυθοῦν, ἐντὸς τοῦ Ζ, αἱ ἔξισώσεις :

$$1. \quad 2x^2 - xy - 3y^2 - 13x + 17y + 6 = 0, \quad 2. \quad (x + 7)(y + 8) = 5xy,$$

$$3. \quad 2x^3 + 5xy - 12y^2 - 28 = 0, \quad 4. \quad 2x^2 + 7xy + 3y^2 - 5y - 2 = 0.$$

527. Ὁμοίως αἱ ἔξιστεις:

$$1. \quad 3x^2 + 4xy + 2y^2 - 6x - 4y + 2 = 0, \quad 2. \quad x^2 - 2xy + 2y^2 - 3x + 3y - 4 = 0,$$

$$3x^2 - 6xy + 4x - 5y - 31 = 0, \quad 4. \quad x^2 + 2xy + y^2 - x + y - 4 = 0,$$

$$5. \ x^2 - 3y^2 = z^2, \quad 6. \ 5x^2 + y^2 = z^2, \quad 7. \ z^2 - y^2 = 2x^2.$$

528. Νὰ εύρεθοῦν αἱ ἀκέραιαι λύσεις τῆς ἔξισώσεως :

$$x(3 - |y|) + y(3 - |x|) + |xy| = 6.$$

529. Νά εύρεθῇ διψήφιος ἀριθμός, ὁ ὅποιος πολλαπλασιαζόμενος ἐπὶ τὸ ἄθροισμα τῶν ψηφίων του δίδει γινόμενον ἵσον πρὸς τὸ ἄθροισμα τῶν κύβων τῶν ψηφίων του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΧΙ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΣ

§ 233. Εισαγωγικαὶ ἔννοιαι – συμβολισμοί. – Ἡ Συνδυαστική Ἀνάλυσις ἐμφανίζεται τὸ πρῶτον κατὰ τὸν 17ον αἰῶνα εἰς ἑργασίας τῶν Fermat καὶ Pascal διὰ τὴν συστηματικὴν ἐπίλυσιν τῶν προβλημάτων τὰ ὅποια παρουσιάζονται εἰς τὰ «τυχηρὰ παιγνίδια». Ἐκτοτε ἡ ἀνάλυσις αὕτη εὗρε πλείστας ἐφαρμογάς. Ἡ ἐφαρμογή τῆς εἰς τὴν Θεωρίαν τῶν Πιθανοτήτων, περὶ τῆς ὅποιας γίνεται λόγος εἰς τὸ ἐπόμενον κεφάλαιον, εἶναι ὅχι μόνον ἡ ἀρχαιοτέρα, ὀλλὰ καὶ μία ἀπὸ τὰς πλέον σημαντικάς.

Διὰ τὴν συντομωτέραν καὶ αὐστηροτέραν διατύπωσιν τῶν ἐν τῷ παρόντι κεφαλαίῳ διαπραγματευομένων θεμάτων, δρίζομεν τὰ κάτωθι :

α'). Καλοῦμεν **τμῆμα** T_v τῶν φυσικῶν ἀριθμῶν μέχρι καὶ τοῦ φυσικοῦ v τὸ ὑποσύνολον : $T_v \equiv \{ k \in \mathbb{N} : \text{μὲ } k \leq v \}$ τοῦ \mathbb{N} .

Τὸ T_v συμβολίζεται, συνήθως, καὶ μέ : $T_v \equiv \{ 1, 2, 3, \dots, v \}$.

Παράδειγμα : $T_5 \equiv \{ 1, 2, 3, 4, 5 \}$.

β'). Τὸ γινόμενον τῶν θετικῶν ἀκεραίων (φυσικῶν) ἀπὸ 1 ἕως v θὰ τὸ παριστῶμεν συντόμως μὲ $v!$ (Τὸ σύμβολον $v!$ ἀναγιγνώσκεται «*ν παραγοντικόν*»). Τὸ σύμβολον $v!$ δρίζεται ως κάτωθι :

$1! = 1, \quad 2! = (1!) 2 = 1 \cdot 2, \quad 3! = (2!) 3 = 1 \cdot 2 \cdot 3$ καὶ ἐπαγωγικῶς

$$v! = (v - 1)! v = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots (v - 2) \cdot (v - 1) \cdot v \quad (1)$$

Διὰ τὴν πληρότητα τοῦ συμβόλου $v!$ δεχόμεθα ὅτι : $0! = 1$.

Διὰ τὸ σύμβολον $v!$ ἴσχυει ἡ ἴδιότης :

$$v! = (v - k)! (v - k + 1) (v - k + 2) \cdots (v - 1) v, \quad k \leq v.$$

Οὔτω : $10! = 7! 8 \cdot 9 \cdot 10$.

Ἡ χρησιμοποίησις τοῦ θαυμαστικοῦ (!) εἰς τὸν συμβολισμὸν τῶν παραγοντικῶν σχετίζεται μὲ τὴν καταπληκτικὴν αὐξῆσιν αὐτῶν. Τοῦτο φαίνεται ἀπὸ τὸν κάτωθι πίνακα :

$1! = 1$	$4! = 24$	$7! = 5040$	$10! = 3628800$
$2! = 2$	$5! = 120$	$8! = 40320$	$11! = 39916800$
$3! = 6$	$6! = 720$	$9! = 362880$	$12! = 479001600$

I. ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

§ 234. Ἀπλαῖ μεταθέσεις.— "Εστω τὸ πεπερασμένον σύνολον :

$$E \equiv \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_v\}.$$

Καλοῦμεν μετάθεσιν τῶν στοιχείων τοῦ συνόλου E κάθε ἀμφιμονοσήμαντον ἀπεικόνισιν τοῦ E ἐπὶ τοῦ ἑαυτοῦ του, ἥτοι :

$$M : E \longleftrightarrow E.$$

Καλοῦμεν ἀπαρίθμησιν τοῦ συνόλου E κάθε ἀμφιμονοσήμαντον ἀπεικόνισιν τοῦ τμήματος τῶν φυσικῶν ἀριθμῶν $T_v \equiv \{1, 2, 3, \dots, v\}$ ἐπὶ τοῦ E , ἥτοι :

$$T_v \ni k \longleftrightarrow \alpha_i \in E, \quad i \in T_v.$$

'Εκάστη ἀπαρίθμησις, ὡς καὶ ἡ μετάθεσις, παρίσταται συμβολικῶς (§ 87) δι' ἐνὸς ὁρθογωνίου σχήματος (πίνακος) ἐκ δύο γραμμῶν, π.χ. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & v \\ \alpha_3 & \alpha_5 & \dots & \alpha_v \end{pmatrix}$.

Εἰς τὴν πρώτην γραμμὴν τοῦ πίνακος γράφονται τὰ πρότυπα καὶ εἰς τὴν δευτέραν κάτωθεν ἔκάστου προτύπου ἡ εἰκὼν αὐτοῦ. Συνήθως ὅμως ἡ πρώτη γραμμὴ παραλείπεται καὶ γράφονται (παρατάσσονται) μόνον αἱ εἰκόνες κατὰ μῆκος μιᾶς εύθείας, π.χ. ὡς κάτωθι :

$$\alpha_3 \qquad \alpha_5 \qquad \alpha_v$$

εἰς τρόπον ὡστε τὸ πρῶτον στοιχεῖον τῆς παρατάξεως νὰ εἶναι εἰκὼν τοῦ 1, τὸ δεύτερον εἰκὼν τοῦ 2, τὸ τρίτον εἰκὼν τοῦ 3, κ.ο.κ. "Ενεκα τούτου καὶ διὰ παιδαγωγικούς κυρίως σκοπούς πολλοὶ συγγραφεῖς ὅριζουν ὡς μετάθεσιν ν πραγμάτων (στοιχείων) κάθε κατάταξιν αὐτῶν εἰς μίαν σειράν. Είναι φανερὸν ὅτι δύο μεταθέσεις ν πραγμάτων εἶναι διάφοροι μεταξύ των, ἃν καὶ μόνον, ἃν ἐν (έπομένως τούλαχιστον δύο) ἐν τῶν ν πραγμάτων εύρισκεται τοποθετημένον εἰς διαφορετικὴν θέσιν ἐντὸς αὐτῶν.

"Ἐπειδὴ τὸ T_v καὶ τὸ E ἔχουν τὸ αὐτὸ πλῆθος στοιχείων, εἶναι φανερὸν ὅτι τὸ πλῆθος τῶν μεταθέσεων τοῦ E ἵσοῦται πρὸς τὸ πλῆθος τῶν ἀπαρίθμησεων αὐτοῦ. Είναι ἐπίσης φανερὸν ὅτι τὸ πλῆθος τοῦτο δὲν ἔξαρτᾶται ἀπὸ τὴν φύσιν τῶν στοιχείων τοῦ E , ὅλλα μόνον ἀπὸ τὸ πλῆθος τῶν στοιχείων αὐτοῦ. "Αρα τοῦτο ἵσοῦται πρὸς τὸ πλῆθος τῶν μεταθέσεων τοῦ T_v . Διὰ τὸν λόγον τοῦτον πολλάκις ν διακεκριμένα πράγματα, διὰ τὰ δόποια δὲν μῆδεν ἐνδιαφέρει ἡ φύσις, τὰ σημειώνομεν μὲν τοὺς ἀριθμοὺς 1, 2, ..., v . Κατόπιν τούτου αἱ ἐννοιαὶ ἀπαρίθμησις καὶ μετάθεσις θὰ χρησιμοποιῶνται κατωτέρω ἀδιακρίτως.

"Ἄσ οπολογίσωμεν ἡδη τὸ πλῆθος δλων τῶν μεταθέσεων τῶν ν διαφόρων μεταξύ των στοιχείων. Είναι φανερὸν ὅτι τὸ πλῆθος τοῦτο ἵσοῦται πρὸς τὸ πλῆθος δλων τῶν δυνατῶν παρατάξεων τῶν ν στοιχείων (πραγμάτων) εἰς μίαν σειράν. Τὸ πλῆθος τοῦτο τῶν μεταθέσεων τῶν ν στοιχείων θὰ παριστῶμεν μὲ τὸ σύμβολον M_v .

Είναι φανερὸν ὅτι δι' ἐν πρᾶγμα ὑπάρχει μία μόνον μετάθεσις, ἥτοι :

$$M_1 = 1 = 1!$$

Αἱ δυναταὶ μεταθέσεις δύο πραγμάτων, π.χ. τῶν α_1 , α_2 εἶναι δύο, αἱ :

$$\alpha_1\alpha_2 \quad \text{καὶ} \quad \alpha_2\alpha_1,$$

διότι τὸ α_1 ἢ θὰ εἶναι πρῶτον ἢ θὰ εἶναι δεύτερον. Συνεπῶς ἔχομεν :

$$M_2 = 2 = 1 \cdot 2 = 2!$$

Αἱ μεταθέσεις τριῶν στοιχείων $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ εἶναι αἱ ἀκόλουθοι ἔξι :

$$\alpha_1\alpha_2\alpha_3, \quad \alpha_1\alpha_3\alpha_2, \quad \alpha_3\alpha_1\alpha_2, \quad \alpha_2\alpha_1\alpha_3, \quad \alpha_2\alpha_3\alpha_1, \quad \alpha_3\alpha_2\alpha_1.$$

Δηλαδὴ :

$$M_3 = 6 = 1 \cdot 2 \cdot 3 = 3!$$

Γενικῶς ισχύει ἡ ἀκόλουθος :

Πρότασις.—Τὸ πλῆθος M_v τῶν μεταθέσεων ν στοιχείων εἶναι ἵσον πρὸς τὸ γινόμενον $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots v$, ἥτοι :

$$M_v = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots v = v! = \prod_{k=1}^v k \quad (1)$$

Ἀπόδειξις. Διὰ τὴν ἀπόδειξιν τῆς (1) θὰ χρησιμοποιήσωμεν τὴν ἀποδεικτικὴν μέθοδον τῆς τελείας ἐπαγωγῆς.

Ἡ πρότασις ισχύει διὰ $v = 1$ (ἐπίσης, ὡς ἀνωτέρω ἐλέχθη, ισχύει καὶ διὰ $v = 2, 3$).

Ἐστω ὅτι αὕτη ισχύει διὰ $v = k$, ἥτοι :

$$M_k = 1 \cdot 2 \cdots k = k! \quad (k \geq 1) \quad (2)$$

Θὰ ἀποδείξωμεν ὅτι ισχύει καὶ διὰ $v = k + 1$, ἥτοι :

$$M_{k+1} = 1 \cdot 2 \cdots k (k+1) = (k+1)! \quad (3)$$

Πράγματι, ὃς θεωρήσωμεν ὅλας τὰς μεταθέσεις τῶν $(k+1)$ στοιχείων καὶ χωρίσωμεν αὐτάς εἰς ὅμαδας θέτοντες εἰς τὴν πρώτην ὅμαδα ὅλας τὰς μεταθέσεις αἱ ὁποῖαι ἀρχίζουν π.χ. ἀπὸ τὸ στοιχεῖον α_1 , εἰς μίαν δευτέραν ὅμαδα ὅλας τὰς μεταθέσεις αἱ ὁποῖαι ἀρχίζουν ἀπὸ τὸ στοιχεῖον α_2 , κ.ο.κ. καὶ τέλος εἰς μίαν $k+1$ τάξεως ὅμαδα τὰς μεταθέσεις αἱ ὁποῖαι ἀρχίζουν ἀπὸ τὸ στοιχεῖον α_{k+1} .

Εἶναι φανερὸν ὅτι αἱ διάφοροι ἀλλήλων μεταθέσεις ἑκάστης ὅμαδος εἶναι $k!$, διότι αὗται λαμβάνονται διὰ μετὰ τὸ πρῶτον στοιχεῖον, μὲ τὸ ὁποῖον ἀρχίζουν, γράψωμεν ὅλας τὰς μεταθέσεις τῶν λοιπῶν k στοιχείων, αἱ ὁποῖαι λόγῳ τῆς γενομένης ὑποθέσεως (2) τῆς τελείας ἐπαγωγῆς εἶναι : $M_k = 1 \cdot 2 \cdots k = k!$

Ἐπομένως τὸ πλῆθος τῶν μεταθέσεων τῶν $(k+1)$ στοιχείων εἶναι :

$$M_{k+1} = (k+1) M_k = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots k (k+1) = (k+1)!$$

Δηλ. ἡ πρότασις (1) ισχύει καὶ διὰ $v = k + 1$, ἀρα ισχύει διὰ κάθε φυσικὸν ἀριθμὸν v .

Ἐφαρμογαί : Ιη : Κατὰ πόσους τρόπους δύνανται νὰ παραταχθοῦν ἐφ' ἐνὸς ζυγοῦ 10 μαθηταῖ;

Λένσις : Τὸ πλῆθος ὅλων τῶν δυνατῶν παρατάξεων θὰ εἶναι ἀκριβῶς δσαι αἱ ἀπλαὶ μεταθέσεις τῶν 10 πραγμάτων, ἥτοι :

$$M_{10} = 10! = 3\,628\,800.$$

2α : Νά εύρεθη τό πλήθος δλων τῶν ἀριθμῶν τῶν μεγαλυτέρων τοῦ 1000, οἱ δοιοὶ σχηματίζονται μὲ δλα τὰ ψηφία 5, 3, 0, 9 μὴ ἐπιτρεπομένης τῆς ἐπαναλήψεως ψηφίου τινός.

Λόσις : Κάθε ἀριθμὸς μεγαλύτερος τοῦ 1000 ἀντιστοιχεῖ εἰς κάποιαν μετάθεσιν τῶν ψηφίων 5, 3, 0, 9 ύπό τὴν προϋπόθεσιν δλως δτὶ τὸ ψηφίον 0 δὲν κατέχει τὴν πρώτην πρὸς τὰ ἀριστερὰ θέσιν. Οἱ ἀριθμοὶ δλως εἰς τοὺς δποίους προηγεῖται τὸ μηδὲν (π.χ. 0395, 0539, ...) εἰναι τόσοι τὸ πλήθος, δσαι καὶ αἱ μετάθεσις τῶν τριῶν ψηφίων 5, 3, 9, ἥτοι $M_3 = 3! = 6$. Οἱ τετραψηφιοὶ ἀριθμοὶ εἰναι $M_4 = 4! = 24$. "Αρα τὸ ζητούμενον πλήθος εἰναι :

$$M_4 - M_3 = 4! - 3! = 18.$$

§ 235. Κυκλικὰ μεταθέσεις.— Μία ειδικὴ περίπτωσις μεταθέσεως εἰναι ἔκεινη καθ' ἥν ἔκαστον στοιχεῖον τοῦ συνόλου Ε ἀπεικονίζεται εἰς τὸ ἐπόμενόν του τὸ δὲ «τελευταῖον» στοιχεῖον α_v εἰς τὸ «πρῶτον» α_1 . Δηλαδὴ ἡ μετάθεσις :

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \dots & \alpha_{v-1} & \alpha_v \\ \alpha_2 & \alpha_3 & \dots & \alpha_v & \alpha_1 \end{pmatrix}.$$

Μία τοιαύτη μετάθεσις καλεῖται **κυκλικὴ** (§ 87).

Ἡ δύναμις αὐτῆς ἔχειται ἀμέσως, ἃν τὰ ν διάφορα στοιχεῖα $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_v$ φαντασθῶμεν δτὶ εἰναι τοποθετημένα ἐπὶ ἑνὸς κύκλου, ὡς δεικνύει καὶ τὸ κάτωθι σχῆμα (Σχ. 15). Κατὰ ταῦτα μία κυκλικὴ μετάθεσις εἰναι ἡ παράταξις τῶν ν στοιχείων κατὰ μῆκος ἐνὸς κύκλου. Οὔτω θεωρουμένη μία κυκλικὴ μετάθεσις ν στοιχείων δὲν ἔχει οὔτε ἀρχὴν οὔτε πέρας, δυνάμεθα δθεν νὰ θεωρῶμεν οἰονδήποτε ἐκ τῶν ν στοιχείων ὡς πρῶτον κατὰ τὴν ἐν λόγῳ μετάθεσιν. Εἰναι τώρα φανερὸν δτὶ : τὸ πλήθος δλων τῶν κυκλικῶν μεταθέσεων ν στοιχείων, τὸ δποῖον συμβολίζεται μὲ k_v , εἰναι ἵσον πρός : $(v - 1)!$, ἥτοι :

$$k_v = (v - 1)! = 1 \cdot 2 \cdots (v - 2) (v - 1) = \prod_{k=1}^{v-1} k.$$

Πράγματι, ἂς φαντασθῶμεν δλας τὰς κυκλικὰς μεταθέσεις τῶν ν στοιχείων $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_v$ ἀναγεγραμμένας εἰς ἓνα πίνακα. Εἰναι φανερὸν δτὶ ἔξ ἔκάστης κυκλικῆς μεταθέσεως τῶν ν στοιχείων, π.χ. τὴν $\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \dots \alpha_v$ προκύπτουν ν ἀπλαὶ μεταθέσεις, αἱ κάτωθι :

$$\alpha_2 \alpha_3 \dots \alpha_v \alpha_1, \quad \alpha_3 \alpha_4 \dots \alpha_v \alpha_1 \alpha_2, \dots, \quad \alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_{v-1} \alpha_v.$$

Κατόπιν τούτου, ἐπειδὴ ἀπὸ κάθε κυκλικὴν μετάθεσιν τῶν ν στοιχείων προκύπτουν ν ἀπλαὶ μεταθέσεις τῶν ν στοιχείων, ἐπεται δτὶ ἔξ δλων τῶν κυκλικῶν μεταθέσεων, αἱ δποῖαι εἰναι k_v τὸ πλήθος, θὰ προκύψουν ν $\cdot k_v$ ἀπλαὶ μεταθέσεις, αἱ δποῖαι θὰ ἴσοῦνται μὲ τὸν συνολικὸν ἀριθμὸν τῶν ἀπλῶν μεταθέσεων ν στοιχείων δηλ. $v!$ "Αρα θὰ ἔχωμεν :

$$v \cdot k_v = M_v = v!$$

'Εξ οῦ :

$$k_v = \frac{M_v}{v} = (v - 1)! \quad (1)$$

Ἐφαρμογή. Κατά πόσους τρόπους τὰ μέλη μιᾶς ἐπαμελοῦς οἰκογενείας δύνανται νὰ καθήσουν πέριξ μιᾶς κυκλικῆς τραπέζης;

Λύσις: Κάθε ἔνας ἀπὸ τοὺς τρόπους αὐτοὺς εἶναι μία κυκλικὴ μετάθεσις τῶν 7 ἀτόμων.

Άρα: $k_7 = 6! = 720.$

§ 236. Ἐπαναληπτικὴ μετάθεσις.— "Εστω ἐν πλήθος ν πραγμάτων

$$\underbrace{\alpha, \alpha, \dots, \alpha}_{k_1}, \quad \underbrace{\beta, \beta, \dots, \beta}_{k_2}, \quad \dots, \quad \underbrace{\theta, \theta, \dots, \theta}_{k_p}$$

ὅπου τὰ k_1 εἶναι ἵσαι μὲν α , τὰ k_2 μὲν β, \dots , τὰ k_p μὲν θ , ὅποτε φυσικὰ θὰ εἶναι

$$k_1 + k_2 + \dots + k_p = v.$$

Καλοῦμεν ἐπαναληπτικὴν μετάθεσιν τῶν ν αὐτῶν πραγμάτων μίαν ἀπεικόνισιν τοῦ τμήματος $T_v \equiv \{1, 2, \dots, v\}$ ἐπὶ τοῦ συνόλου $E \equiv \{\alpha, \beta, \dots, \theta\}$, τὸ δοποῖον ἔχει ὡς στοιχεῖα τὰ διάφορα δάλλήλων πράγματα $\alpha, \beta, \dots, \theta$, τοιαύτη ὥστε αἱ k_1 εἰκόνες νὰ εἶναι ἵσαι μὲν α , αἱ k_2 εἰκόνες νὰ εἶναι ἵσαι μὲν β, \dots , αἱ k_p εἰκόνες νὰ εἶναι ἵσαι μὲν θ .

Ἐὰν ρ τὸ πλήθος τῶν στοιχείων τοῦ E , τότε: $\rho \leqq v$.

Οὔτω π.χ. αἱ ἐπαναληπτικὴ μεταθέσεις τῶν τριῶν πραγμάτων α, α, β εἶναι αἱ:

$$\alpha\alpha\beta, \quad \alpha\beta\alpha, \quad \beta\alpha\alpha.$$

Ἐὰν παραστήσωμεν μὲν τὸ δύμβολον M_v^e τὸ πλήθος δλων τῶν ἐπαναληπτικῶν μεταθέσεων ν πραγμάτων, ἔξ δν k_1 τὸ πλήθος εἶναι ἵσον μὲν τὸ α , k_2 τὸ πλήθος ἵσον μὲν τὸ β, \dots, k_p τὸ πλήθος ἵσον μὲν τὸ θ , τότε ἴσχύει:

$$M_v^e = \frac{v!}{k_1! k_2! \dots k_p!} = \frac{(k_1 + k_2 + \dots + k_p)!}{k_1! k_2! \dots k_p!} \quad (1)$$

Α πόδειξις. Ἀς ὑποθέσωμεν πρὸς στιγμήν, δτι τὰ ν πράγματα εἶναι διάφορά μεταξύ των καὶ δτι σχηματίζουμεν τὰς $v!$ μεταθέσεις των. Θεωροῦμεν τὰς ἐν λόγῳ μεταθέσεις χωρισμένας εἰς δμάδας ὡς ἔξης: Θέτομεν εἰς τὴν αὐτὴν δμάδα μίαν μεταθέσιν μαζὶ μὲ δλας δσαι προκύπτουν ἀπὸ αὐτῆν, ὅταν διατηρήσωμεν τὴν τάξιν δλων τῶν στοιχείων, τὰ δποια ἀρχικῶν διέφερον τοῦ α κατατάξωμεν δὲ τὰ λοιπά (δηλ. τὰ ταυτίζόμενα ἀρχικῶς μὲ τὸ α) καθ' δλους τοὺς δυνατοὺς τρόπους. Είναι φανερόν δτι μετὰ τὸ πέρας τῆς τοιαύτης διαδικασίας θὰ προκύψουν $k_1!$ μεταθέσεις, αἱ ὅποιαι θὰ παριστοῦν (ἐὰν ἐπαναθέσωμεν $\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_{k_1} = \alpha$) τὴν αὐτὴν ἐπαναληπτικὴν μετάθεσιν. Άρα τὸ πλήθος τῶν μεταθέσεων ν πραγμάτων, δπου μεταξύ των ὑπάρχουν μόνον k_1 τὸ πλήθος ἵσα μὲ τὸ α , τὰ δὲ δλλα διαφέρουν μεταξύ των καὶ ἀπὸ τὸ α , εἶναι $\frac{v!}{k_1!}$.

Ἄν τώρα εἰς τὰ, μέχρι τοῦδε ὡς διάφορα θεωρηθέντα $v - k_1$ λοιπά πράγματα ἔξισώσωμεν k_2 τὸ πλήθος μὲ τὸ β , τότε, κατὰ τὸν αὐτὸν συλλογισμὸν, $k_2!$ τὸ πλήθος διαφέρουσα πρὶν μεταθέσεις θὰ παριστοῦν τὴν αὐτὴν ἐπαναληπτικὴν μετάθεσιν καὶ ἐπομένως τὸ πλήθος τῶν μεταθέσεων ν πραγμάτων δπου μεταξύ των ὑπάρχουν k_1 τὸ πλήθος ἵσα μὲ τὸ α καὶ k_2 τὸ πλήθος ἵσα μὲ τὸ β ($\alpha \neq \beta$), τὰ δὲ λοιπά διαφέρουν μεταξύ των καθώς ἐπίστης καὶ ἀπὸ τὰ α καὶ β εἶναι:

$$\frac{v!}{k_1! k_2!}.$$

Κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον σκεπτόμενοι, μετὰ ρ βίματα, φθάνομεν εἰς τὴν (1).

*Εφαρμογαί: 1η: Πόσας λέξεις * (άναγραμματισμούς) σχηματίζομεν μεταθέτοντες τὰ γράμματα τῆς λέξεως «Ἐλλάς»;

Λύσις: Εἰς τὴν λέξιν «Ἐλλάς» τὸ γράμμα λ ἐπαναλαμβάνεται 2 φοράς. Κατὰ τὰ ἀνωτέρω ἔχομεν:

$$M_5^{\epsilon} = \frac{5!}{2!} = 60 \quad \text{λέξεις.}$$

2α: Πόσας λέξεις δυνάμεθα νὰ σχηματίσωμεν μεταθέτοντες τὰ γράμματα τῆς λέξεως «Πανεπιστήμιον».

Λύσις: Ἡ λέξις «Πανεπιστήμιον» περιέχει 13 γράμματα, ἐκ τῶν ὅποιων 2 εἶναι π, 2 εἶναι ν καὶ 2 εἶναι 1, ὅπερα πρόκειται περὶ μεταθέσεων 13 γραμμάτων μετ' ἐπαναλήψεως ὡρισμένων ἔξι αὐτῶν. Συνεπῶς τὸ ζητούμενον πλῆθος ισοῦται πρός:

$$M_{13}^{\epsilon} = \frac{13!}{2! 2! 2!} = 778\,377\,600 \quad \text{λέξεις.}$$

Σημείωσις: Διὰ νὰ ἴωμεν πόσα γράμματα θὰ χρειασθοῦν διὰ νὰ γραφοῦν αἱ λέξεις αὗται θὰ πολλαπλασιάσωμεν τὸν εὐρεθέντα ἀριθμὸν ἐπὶ 13, ήτοι :

$$778\,377\,600 \times 13 = 10\,118\,908\,800 \quad \text{γράμματα.}$$

*Ἐάν θέλωμεν νὰ ἀποκτήσωμεν μίαν ίδεαν περὶ τοῦ μεγέθους τοῦ ἀριθμοῦ τούτου, γνωρίζομεν τὰ ἔντονα: Μία σελίς ἐνὸς κανονικοῦ βιβλίου χρειάζεται περίπου 2000 γράμματα. Μὲ τὰ ἀνωτέρω γράμματα θὰ τυπωθοῦν :

$$10\,118\,908\,800 : 2\,000 = 5.059.454 \quad \text{σελίδες.}$$

*Ἀν λάβωμεν τόμους τῶν 300 σελίδων, θὰ γίνονται: 5059454 : 300 = 16865 τόμοι.

Τέλος, ἀν εἰς μίαν κανονικήν βιβλιοθήκην δύνανται νὰ τοποθετηθοῦν 100 τόμοι, θὰ ἀπαιτηθοῦν 16865 : 100 ≈ 169 βιβλιοθήκαι διὰ νὰ τοποθετηθοῦν οἱ ἐν λόγῳ τόμοι.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

530. Νὰ ἀπλοποιηθοῦν τὰ κάτωθι κλάσματα:

$$\alpha) \frac{7! 5!}{6! 4!}, \quad \beta) \frac{v!}{(v-1)!}, \quad \gamma) \frac{(v+2)!}{v!}, \quad \delta) \frac{(v+1)!}{(v-1)!}, \quad \epsilon) \frac{(v-1)!}{(v+2)!}.$$

531. Νὰ ἀπλοποιηθῇ ἡ παράστασις:

$$\frac{(v+1)!}{(v+1)^{v+1}} : \frac{v!}{v^v}.$$

532. Νὰ ἀποδειχθοῦν αἱ ισότητες:

$$\alpha) (v+2)! + (v+1)! + v! = v! (v+2)^2$$

$$\beta) v! + 2(v-1)! = (v-1)! (v+2).$$

$$\gamma) (v-1)! - (v-2)! = (v-2)! (v-2).$$

$$\delta) 2M_v - (v-1) M_{v-1} = M_v + M_{v-1}.$$

533. *Ἀν ὑπάρχουν 3 δρόμοι ἀπό τὴν πόλιν Α πρὸς τὴν πόλιν Β καὶ 4 δρόμοι ἀπό τὴν Β πρὸς τὴν Γ, κατὰ πόσους τρόπους δυνάμεθα νὰ μεταβῶμεν ἐπὶ τῆς Α εἰς τὴν Γ διὰ μέσου τῆς Β; Πόσαι εἶναι αἱ δυναταὶ διαδρομαὶ διὰ ταξείδιον μετ' ἐπιστροφῆς ἐπὶ τῆς Α εἰς τὴν Γ;

534. Κατὰ πόσους τρόπους 6 μαθηταὶ δύνανται νὰ παραταχθοῦν ἐφ' ἐνὸς ζυγοῦ; *Ἐάν ἐκάστη παράταξις ἀπαίτη χρόνον 15 sec, πόσος εἶναι ὁ ἀπαιτούμενος χρόνος δι' ὅλας τὰς δυνατὰς παρατάξεις.

535. Πόσοι ἀναγραμματισμοὶ τῆς λέξεως «γραφεῖον» ὑπάρχουν; Πόσοι ἔξι αὐτῶν ἀρχίζουν μὲ φ; Πόσοι ἀρχίζουν μὲ α καὶ τελειώνουν μὲ ο;

* Αἱ λέξεις δὲν εἶναι ἀπαραίτητον νὰ ἔχουν νόημα.

536. Πόσαι διαφορετικαὶ λέξεις δύνανται νὰ σχηματισθοῦν μὲ δλα τὰ γράμματα τῆς λέξεως «Mississippi».

537. Πόσοι ἀριθμοὶ μεγαλύτεροι τοῦ 10 000 γράφονται μὲ τὰ ψηφία 8, 5, 8, 0, 8.

538. Κατὰ πόσους τρόπους 15 βιβλία δύνανται νὰ διανεμηθοῦν εἰς 3 μαθητάς, ώστε ὁ πρῶτος (α) νὰ λάβῃ 4 βιβλία, ὁ δεύτερος (β) νὰ λάβῃ 5 βιβλία καὶ ὁ τρίτος (γ) νὰ λάβῃ 6 βιβλία;

II. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

§ 237. Ἀπλαῖ διατάξεις.— "Εστωσαν ν τὸ πλῆθος διάφορα μεταξύ των στοιχεία (πράγματα) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{\mu}, \dots, \alpha_v$ τὰ ὅποια θεωροῦνται στοιχεῖα ἐνὸς συνόλου E .

Καλεῖται διάταξις τῶν ν αὐτῶν στοιχείων ἀνὰ μ , ὅπου $1 \leqq \mu \leqq v$, κάθε ἀμφιμονοσήμαντος ἀπεικόνισις τοῦ τμήματος $T_{\mu} \equiv \{1, 2, \dots, \mu\}$ ἐν τῷ συνόλῳ $E \equiv \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_v\}$. Οὕτω μία διάταξις τῶν ν πραγμάτων ἀνὰ μ εἶναι μία παράταξις εἰς σειρὰν μ πραγμάτων ἀπὸ τὰ δοθέντα v . Ἐπομένως δύο διατάξεις τῶν ν στοιχείων ἀνὰ μ θεωροῦνται διάφοροι ὅταν ἡ δὲν ἀποτελοῦνται ἀπὸ τὰ αὐτὰ ἀκριβῶς στοιχεῖα ἡ ἀποτελοῦνται μὲν ἀπὸ τὰ αὐτὰ στοιχεῖα ἀλλὰ διαφέρουν ὡς πρὸς τὴν σειρὰν τῶν στοιχείων. Κατὰ τὸν δρισμὸν τῆς ἀπλῆς διατάξεως ἔκαστον πρᾶγμα περιέχεται εἰς αὐτὴν ἀπαξ. Ἐπὶ πλέον εἰς ἑκάστην διάταξιν, ὡς ἀνωτέρω ἔλεχθη, παίζει ρόλον ὅχι μόνον ποῖα μ πράγματα θὰ λάβωμεν ἐκ τῶν v , ἀλλὰ καὶ πῶς θὰ τὰ τοποθετήσωμεν εἰς σειρὰν ἐπὶ ἀνοικτῆς γραμμῆς (π.χ. εὐθείας). Οὕτως ἔὰν θεωρήσωμεν τὰ 5 στοιχεῖα $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ ἡ μετάθεσις $\alpha_3\alpha_2\alpha_5$ εἶναι μία διάταξις τῶν 5 τούτων πραγμάτων ἀνὰ 3, ἡ δὲ μετάθεσις $\alpha_3\alpha_2\alpha_5$ εἶναι μία ἡληκία διάταξις τῶν αὐτῶν 5 πραγμάτων ἀνὰ 3. Εἶναι φανερὸν τώρα ὅτι αἱ διατάξεις εἶναι καὶ αὐταὶ μεταθέσεις, ἀλλὰ ὅχι συγχρόνως ὅλων τῶν πραγμάτων.

Θὰ ὑπολογίσωμεν ἥδη τὸ πλῆθος τῶν διαφόρων μεταξύ των διατάξεων τῶν ν πραγμάτων ἀνὰ μ . Τὸ πλῆθος τοῦτο θὰ τὸ παριστῶμεν μὲ τὸ σύμβολον Δ_{μ}^v , τὸ ὅποιον ἀναγιγνώσκεται «διατάξεις τῶν ν ἀνὰ μ ». Πρὸς τοῦτο ἀποδεικνύομεν τὴν ἀκόλουθον πρότασιν :

Πρότασις.— Τὸ πλῆθος τῶν διατάξεων τῶν ν πραγμάτων ἀνὰ μ δίδεται ὑπὸ τοῦ τύπου :

$$\Delta_{\mu}^v = v(v-1)(v-2)\cdots(v-\mu+1). \quad (1)$$

Ἀπόδειξις. "Ἄσ ύποθέσωμεν ὅτι ἐσχηματίσαμεν πάσας τὰς διατάξεις τῶν ν πραγμάτων : $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_v$ ἀνὰ $(\mu-1)$, τῶν ὅποιων τὸ πλῆθος εἶναι : $\Delta_{\mu-1}^v$. "Ἄν θεωρήσωμεν τυχοῦσαν ἔξ αὐτῶν, π.χ. τὴν $\alpha_1\alpha_2\dots\alpha_{\mu-1}$, αὐτῇ θὰ περιέχῃ $(\mu-1)$ ἐκ τῶν πραγμάτων $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_v$ καὶ συνεπῶς ὑπάρχουν $v-(\mu-1)==(v-\mu+1)$ ἀκόμη στοιχεῖα (πράγματα) μη ἀνήκοντα εἰς τὴν ἐν λόγῳ διάταξιν. "Ἐὰν δὲ εἰς τὸ τέλος τῆς ἐν λόγῳ διατάξεως ἐπισυνάψωμεν ἐν οἰονδήποτε ἀπὸ τὰ $(v-\mu+1)$ ὑπόλοιπα στοιχεῖα θὰ προκύψῃ μία διάταξις τῶν ν ἀνὰ μ . Οὕτως ἀπὸ τὴν διάταξιν $\alpha_1\alpha_2\dots\alpha_{\mu-1}$ θὰ προκύψουν αἱ $(v-\mu+1)$ διατάξεις τῶν ν ἀνὰ μ :

$$\alpha_1\alpha_2\dots\alpha_{\mu-1}\alpha_{\mu}, \alpha_1\alpha_2\dots\alpha_{\mu-1}\alpha_{\mu+1}, \alpha_1\alpha_2\dots\alpha_{\mu-1}\alpha_{\mu+2}, \dots, \alpha_1\alpha_2\dots\alpha_{\mu-1}\alpha_v.$$

Έπειδή δὲ ἀπὸ ἑκάστην διάταξιν τῶν ν πραγμάτων ἀνὰ ($\mu - 1$) προκύπτουν ($v - \mu + 1$) διατάξεις τῶν ν ἀνὰ μ, ἐπειταὶ διατάξεις θὰ προκύψουν ($v - \mu + 1$) · $\Delta_{\mu-1}^v$ διατάξεις τῶν ν ἀνὰ μ. Αὗται δὲ εἰναι πᾶσαι αἱ διατάξεις τῶν ν πραγμάτων ἀνὰ μ καὶ διάφοροι μεταξύ των (διατί;).

Κατὰ ταῦτα ισχύει ὁ ἀναγωγικὸς τύπος :

$$\Delta_{\mu}^v = (v - \mu + 1) \cdot \Delta_{\mu-1}^v \quad (2)$$

Ἐφαρμόζοντες τὴν (2) διὰ $\mu = 2, 3, \dots, v$ καὶ ἔχοντες ὑπὸ δψιν διατάξεις τῶν ν πραγμάτων ἀνὰ ἓν εἰναι, προφανῶς, ν λαμβάνομεν τὰς μ ισότητας :

$$\begin{aligned} \Delta_1^v &= v \\ \Delta_2^v &= (v - 1) \cdot \Delta_1^v \\ \Delta_3^v &= (v - 2) \cdot \Delta_2^v \\ &\dots \\ \Delta_v^v &= (v - \mu + 1) \cdot \Delta_{\mu-1}^v. \end{aligned} \quad (3)$$

Πολλαπλασιάζοντες τὰς ισότητας ταῦτας κατὰ μέλη καὶ παραλείποντες τοὺς κοινοὺς παράγοντας εύρισκομεν :

$$\Delta_{\mu}^v = v(v - 1)(v - 2) \cdots (v - \mu + 1).$$

Ἡτοι : τὸ πλῆθος τῶν διατάξεων τῶν ν πραγμάτων ἀνὰ μ εἰναι ἵσον πρὸς τὸ γινόμενον μ διαδοχικῶν φυσικῶν ἀριθμῶν ἡλαττουμένων κατὰ μονάδα μὲ πρῶτον παράγοντα τὸ ν.

Κατὰ ταῦτα εἰναι : $\Delta_3^7 = 7 \cdot 6 \cdot 5 = 210.$

Εὔκολως τώρα διαπιστοῦμεν ὅτι :

$$v(v - 1)(v - 2) \cdots (v - \mu + 1) = \frac{v(v - 1)(v - 2) \cdots (v - \mu + 1)(v - \mu)!}{(v - \mu)!} = \frac{v!}{(v - \mu)!}$$

Μὲ ἄλλας λέξεις :

Πόρισμα I.—Τὸ πλῆθος τῶν διατάξεων ν πραγμάτων ἀνὰ μ δίδεται ὑπὸ τοῦ τύπου :

$$\boxed{\Delta_{\mu}^v = \frac{v!}{(v - \mu)!}} \quad (4)$$

Εἰς τὴν εἰδικὴν περίπτωσιν καθ' ἥν $\mu = v$, ἔχομεν :

$$\Delta_v^v = v(v - 1)(v - 2) \cdots 3 \cdot 2 \cdot 1 = v!$$

Μὲ ἄλλας λέξεις :

Πόρισμα II.—Τὸ πλῆθος τῶν διατάξεων ν πραγμάτων ἀνὰ ν ισοῦται πρὸς τὸ πλῆθος τῶν μεταθέσεων τῶν ν πραγμάτων, ἦτοι :

$$\boxed{\Delta_v^v = v! = M_v} \quad (5)$$

Ἐφαρμογαὶ : 1η : Εὰν εἰς μαθητὴς ἔχῃ 9 βιβλία καὶ θέλῃ νὰ τοποθετήσῃ 5 τυχόντα ἐξ αὐτῶν εἰς σναράφι, κατὰ πόσους τρόπους δύναται νὰ πράξῃ τοῦτο;

Λύσις : Οι διάφοροι τρόποι είναι τόσοι, δσαι και αι διατάξεις των 9 άνα 5, ήτοι :

$$\Delta^* = 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 = 15\,120.$$

2α : Πόσοι πενταψήφιοι άριθμοι ίπαρχουν, έχοντες πάντα τα ψηφία διάφορα μεταξύ των ;

Λύσις : "Εκαστος πενταψήφιος άριθμός (π.χ. δ 38906, 72925,...) είναι μία διάταξης των 10 ψηφίων : 0, 1, 2, 3, ..., 8, 9 άνα 5, με μόνην την διαφοράν το ψηφίον 0 δεν πρέπει να κατέχη την πρώτην πρός τα άριστερά θέσιν (π.χ. 05382, 03948,...). Άλλα αι διατάξεις αι έχουσαι ως πρώτον στοιχείον το 0 είναι δσαι και αι διατάξεις των 9 ψηφίων 1, 2, 3, ..., 9 άνα 4. "Αρα το ζητούμενον πλήθος x είναι :

$$x = \Delta^{10} - \Delta^9 = 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 - 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 = 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 (10 - 1) = 9^2 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 = 27216.$$

§ 238. Ἐπαναληπτικαὶ διατάξεις.—"Εστωσαν ν τὸ πλῆθος διάφορα μεταξύ των πράγματα $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_v$ τὰ ὅποια θεωροῦνται στοιχεῖα ἐνδὲ συνόλου E.

Καλούμεν ἐπαναληπτικὴν διάταξιν τῶν ν αὐτῶν πραγμάτων ἀνὰ μ, μίαν τυχοῦσαν ἀπεικόνισιν τοῦ τμήματος $T_\mu \equiv \{1, 2, \dots, \mu\}$ εἰς τὸ σύνολον E. Οὕτω μία ἐπαναληπτικὴ διάταξις τῶν ν πραγμάτων ἀνὰ μ είναι μία παράταξις κατὰ μῆκος μιᾶς εὐθείας μ πραγμάτων ληφθέντων ἐκ τῶν ν, ἀλλὰ εἰς τὰ ὅποια ἔκαστον πρᾶγμα δυνατὸν νὰ ἐπαναλαμβάνεται τὸ πολὺ μ φοράς. Είναι φανερὸν ὅτι ἐν προκειμένῳ δυνάμεθα νὰ ἔχωμεν η $\mu \leq v$ η $\mu > v$.

Θά ὑπολογίσωμεν τώρα τὸ πλῆθος τῶν ἐπαναληπτικῶν διατάξεων τῶν ν πραγμάτων ἀνὰ μ. Διὰ τὸ πλῆθος τοῦτο, ὅπερ παριστῶμεν διὰ τοῦ συμβόλου δ_μ^ν , ισχύει ἡ ἀκόλουθος :

Πρότασις.—Τὸ πλῆθος τῶν ἐπαναληπτικῶν διατάξεων τῶν ν πραγμάτων ἀνὰ μ δίδεται ὑπὸ τοῦ τύπου :

$$\boxed{\delta_\mu^\nu = v^\mu} \quad (1)$$

"Απόδειξις. Διὰ $\mu = 1$ ισχύει, διότι αἱ ἐπαναληπτικαὶ διατάξεις τῶν ν πραγμάτων ἀνὰ ἐν είναι δσαι και τὰ πράγματα, ητοι $\delta_1^\nu = v = v^1$.

"Εστω διτι ισχύει διὰ $\mu = k$, ητοι ἔστω ὅτι $\delta_k^\nu = v^k$ και ἔστω μία τυχοῦσα ἐπαναληπτικὴ διάταξις τῶν ν πραγμάτων ἀνὰ k, π.χ. $\eta \alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_k$. "Εὰν εἰς τὸ τέλος τῆς ἐν λόγῳ ἐπαναληπτικῆς διατάξεως ἐπισυνάψωμεν ἐν οιονδήποτε ἐκ τῶν ν πραγμάτων θὰ προκύψῃ μία ἐπαναληπτικὴ διάταξις τῶν ν πραγμάτων ἀνὰ $(k + 1)$. Οὕτως ἀπὸ την διάταξιν $\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_k$ θὰ προκύψουν ν ἐπαναληπτικαὶ διατάξεις τῶν ν ἀνὰ $k + 1$ αἱ ἔχησι :

$$\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_k \alpha_{k+1}, \alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_k \alpha_{k+2}, \dots, \alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_k \alpha_{k+1}, \dots, \alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_k \alpha_v.$$

"Ἐπειδὴ δὲ ἀπὸ ἑκάστην διάταξιν (ἐπαναληπτικὴν) τῶν ν πραγμάτων ἀνὰ k προκύπτουν ν ἐπαναληπτικαὶ διατάξεις τῶν ν ἀνὰ $k + 1$, ἐπειταὶ διτι ἀπὸ τὰς δ_k^ν ἐπαναληπτικὰς διατάξεις θὰ προκύψουν ν $\cdot \delta_k^\nu$ ἐπαναληπτικαὶ διατάξεις τῶν ν ἀνὰ $k + 1$.

Κατὰ ταῦτα θὰ ἔχωμεν : $\delta_{k+1}^\nu = v \cdot \delta_k^\nu$ και λόγῳ τῆς ὑποθέσεως τῆς τελείας ἐπαγωγῆς, καθ' ἦν $\delta_k^\nu = v^k$, έχομεν : $\delta_{k+1}^\nu = v \cdot v^k = v^{k+1}$, ητοι ἡ πρότασις ισχύει και διὰ $v = k + 1$, ἄρα ισχύει διὰ κάθε φυσικὸν άριθμὸν ν.

"Εφαρμογὴ 1η : Πόσοι πενταψήφιοι άριθμοι ίπαρχουν έχοντες ως ψηφία τοὺς άριθμοὺς 2, 5, 7;

Λύσις : "Εκαστος τῶν άριθμῶν σύτῶν (π.χ. 52752, 77522, 55555,...) είναι μία ἐπαναληπτικὴ διάταξις τῶν 3 ψηφίων 2, 5, 7 ἀνὰ 5.

"Αρα τὸ ζητούμενον πλῆθος εἶναι ἵσον πρός :

$$\delta_s = 3^6 = 243.$$

'Ε φ α μ ο γ ḥ 2a : (Τὸ πρόβλημα τοῦ ΠΡΟ-ΠΟ). Νὰ εύρεθῇ πόσα δελτία τῶν δύο στηλῶν τοῦ ΠΡΟ-ΠΟ πρέπει νὰ συμπληρώσῃ εἰς παίκτης διὰ νὰ ἐπιτύχῃ ἔνα 13-άρι ;

Α ὑ σις : 'Εάν δ ἀγώνις ήτο μοναδικός, θὰ ὑπῆρχον τρία προγνωστικά, τὰ ὅποια σημειούνται μὲ τὰ στοιχεῖα : 1, 2, x καὶ ἐπομένως θὰ ἔπειρπεν δ παίκτης νὰ συμπληρώσῃ 3 στήλας. 'Εάν οι ἀγώνες ήσαν δύο θὰ ἔπειρπεν νὰ συμπληρώσῃ 9 στήλας, εἰς τὰς ὅποιας θὰ ἀναγράψῃ τὰ ἔξις στοιχεῖα :

I	1	1	1	2	2	2	x	x	x
II	1	2	x	1	2	x	1	2	x

(1)

ΑΙ ὡς ἄνω 9 στήλαι είναι αἱ ἐπιτάξιες τῶν τριῶν στοιχείων 1, 2, x ἀνὰ δύο, δηλ. είναι : $\delta_s^2 = 3^3 = 9$.

'Εάν οι ἀγώνες ήσαν τρεῖς θὰ ἔπειρπεν δ παίκτης νὰ συμπληρώσῃ 27 στήλας, εἰς τὰς ὅποιας θὰ ἀναγράψῃ τὰ ἔξις στοιχεῖα :

$$(1, 1, 1), \quad (1, 1, 2), \quad (1, 1, x), \quad (1, 2, 1), \quad \dots, \quad (x, x, x).$$

ΑΙ 27 στήλαι προκύπτουν ἀπὸ τὰ 9 στοιχεῖα τοῦ πίνακος (1), ἐὰν παραπλεύρως ἐκάστης δυάδος τοῦ πίνακος θέσωμεν τὰς ἐνδείξεις : 1, 2, x. Είναι δὲ ἐπίσης αἱ 27 στήλαι, αἱ ἐπαναληπτικαὶ διατάξεις τῶν τριῶν στοιχείων (ἐνδείξεων) 1, 2, x ἀνὰ 3, ἡτοι είναι : $\delta_s^3 = 3^3 = 27$. 'Ἐπομένως διὰ νὰ ἐπιτύχῃ δ παίκτης ἔνα 13-άρι πρέπει νὰ συμπληρώσῃ τόσας στήλας, δσαι καὶ αἱ ἐπαναληπτικαὶ διατάξεις τῶν τριῶν στοιχείων 1, 2, x ἀνὰ 13, ἡτοι :

$$\delta_{12}^3 = 3^{13} = 1\,594\,323 \quad \text{στήλας.}$$

"Αρα : $1\,594\,323 : 2 = 797\,162$ δελτία ΠΡΟ-ΠΟ.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

539. "Υπολογίσατε τάς : Δ_2^6 , Δ_4^8 , Δ_4^{10} καὶ δείξατε ότι : $\Delta_4^{10} = M_7$.

540. Νὰ εύρεθῇ δ εἰς τὰς κάτωθι περιπτώσεις :

α) $\Delta_i^v = 12 \cdot \Delta_i^v$, β) $\Delta_i^{2v} = 2 \cdot \Delta_i^v$

γ) $\Delta_i^v = 18 \cdot \Delta_{i-1}^{v-1}$, δ) $3\Delta_i^v = \Delta_{i-1}^{v-1}$.

541. Νὰ διποδειχθῇ ότι : $\Delta_{\mu}^{v+1} = \Delta_{\mu}^v + \mu \cdot \Delta_{\mu-1}^v$.

542. Νὰ ἀπλοποιηθῇ ἡ παράστασις :

$$\Delta_v^v - 2 \cdot \Delta_{v-1}^{v-1} - (v-1)! (v-2).$$

543. Νὰ εύρεθῇ ἡ τιμὴ τοῦ : $\Delta_1^1 + \Delta_2^1 + \Delta_3^1 + \Delta_4^1 + \Delta_5^1$.

544. Πόσοι τετραψήφιοι ἀριθμοὶ ὑπάρχουν ἔχοντες διαφορετικά ψηφία καὶ μὴ περιέχοντες τὸ 0 καὶ τὸ 9;

545. Δύο πόλεις Α καὶ Β συνδέονται μὲ 6 ἀμαξοστοιχίας. Κατὰ πόσους τρόπους δυνάμεθα νὰ ταξιδεύσωμεν ἐκ τῆς Α πρὸς τὴν Β καὶ ἀντιστρόφως, χρησιμοποιοῦντες κατὰ τὴν ἐπιστροφήν :

α) διαφορετικὴν ἀμαξοστοιχίαν, β) ἔστω καὶ τὴν αὐτὴν ἀμαξοστοιχίαν.

§ 239. "Απλοί συνδυασμοί." Εστω E ἐν σύνολον μὲν στοιχεῖα: $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_v$.

Προτιθέμεθα νὰ δρίσωμεν τὸ πλῆθος τῶν διαφόρων μεταξύ των ὑποσυνόλων τοῦ E , εἰς τὰ δόποια ἀνήκουν κ στοιχεῖα, ἔνθα $k \leqq v$. "Ἄς ἔξετάσωμεν κατ' ἀρχὴν μερικὰ παραδείγματα. Ἐὰν $v = 1$, τότε τὸ σύνολον E ἔχει δύο ὑποσύνολα: \emptyset καὶ E . Ἐὰν $v = 2$, τότε τὸ σύνολον $E \equiv \{\alpha_1, \alpha_2\}$ ἔχει τέσσαρα ὑποσύνολα:

$$\begin{array}{lll} k=0 & k=1 & k=2 \\ \emptyset & \{\alpha_1\}, \{\alpha_2\} & \{\alpha_1, \alpha_2\} \equiv E \end{array}$$

Ἐὰν $v = 3$, τότε τὸ σύνολον $E \equiv \{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\}$ ἔχει ὅκτω ὑποσύνολα:

$$\begin{array}{llll} k=0 & k=1 & k=2 & k=3 \\ \emptyset & \{\alpha_1\} & \{\alpha_1, \alpha_2\} & \{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\} \equiv E \\ & \{\alpha_2\} & \{\alpha_1, \alpha_3\} & \\ & \{\alpha_3\} & \{\alpha_2, \alpha_3\} & \end{array}$$

Οὕτω π.χ. ἀπὸ τὸ σύνολον μὲ τρία στοιχεῖα δυνάμεθα νὰ λάβωμεν τρία ὑποσύνολα μὲ δύο στοιχεῖα. "Εκαστον δὲ τῶν ὑποσυνόλων αὐτῶν καλεῖται καὶ «εἰς συνδυασμὸς τῶν τριῶν στοιχείων (πραγμάτων) ἀνὰ δύο».

Γενικῶς: Καλοῦμεν συνδυασμὸν τῶν n πραγμάτων ἀνὰ k , ἔνθα $k \leqq v$, κάθε ὑποσύνολον τοῦ E μὲ k στοιχεῖα.

'Εκ τοῦ δρισμοῦ τούτου εἶναι φανερὸν ὅτι εἰς ἓνα συνδυασμὸν τῶν n πραγμάτων ἀνὰ k , ἐνδιαφέρομεθα μόνον τὸ διὰ τὴν φύσιν τῶν ληφθέντων πραγμάτων, οὐχὶ δὲ καὶ διὰ τὴν θέσιν, τὴν δόποιαν ἔχουν μεταξύ των, ὅπως εἰς τὰς διατάξεις. Συνεπῶς δύο συνδυασμοὶ τῶν n πραγμάτων ἀνὰ k εἶναι διαφορετικοὶ μόνον δην δὲν ἀποτελοῦνται ἀπὸ τὰ αὐτὰ πράγματα.

Θὰ ύπολογίσωμεν ἡδη τὸ πλῆθος τῶν διαφορετικῶν συνδυασμῶν τῶν n πραγμάτων ἀνὰ k . Διὰ τὸ πλῆθος τοῦτο, ὅπερ παριστῶμεν διὰ τοῦ συμβόλου $\binom{n}{k}$ ή Σ_k^n ισχύει ἡ ἀκόλουθος:

Πρότασις. — Τὸ πλῆθος τῶν συνδυασμῶν n πραγμάτων ἀνὰ k δίδεται ὑπὸ τοῦ τύπου :

$$\boxed{\binom{n}{k} = \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!}} \quad (1)$$

'Απόδειξις: "Ἄς καλέσωμεν x τὸ πλῆθος τῶν συνδυασμῶν τῶν n ἀνὰ k . Ἐὰν εἰς ἓνα τυχόντα συνδυασμὸν τῶν n ἀνὰ k , δηλ. ἔὰν εἰς ἓν τυχὸν ὑποσύνολον μὲ k στοιχεῖα τοῦ E ἐκτελέσωμεν πάσας τὰς δυνατὰς μεταθέσεις τῶν στοιχείων του, αἱ δόποια, ὡς γνωστόν, εἶναι $k!$, θὰ προκύψουν $k!$ διατάξεις τῶν n ἀνὰ k (διότι ἐκάστη ἐκ τῶν μεταθέσεων αὐτῶν περιέχει k στοιχεῖα ἐκ τῶν n). Ἐὰν τοῦτο γίνη εἰς ὅλους τοὺς συνδυασμοὺς τῶν n ἀνὰ k , ὥν τὸ πλῆθος ἐκαλέσαμεν x , θὰ προκύψουν: $x \cdot k!$ διατάξεις τῶν n ἀνὰ k .

Είναι δὲ αὗται πᾶσαι αἱ διατάξεις τῶν ν ἀνὰ k, διότι ἡ τυχοῦσα ἐξ αὐτῶν προέκυψεν ἀπὸ τὸν συνδυασμὸν τὸν ἔχοντα τὰ ἴδια πρόγματα. Αἱ διατάξεις αὗται ἐξ ἄλλου εἰναι διάφοροι μεταξύ των, διότι ὅσαι μὲν προέκυψαν ἐκ τοῦ αὐτοῦ συνδυασμοῦ διαφέρουν κατὰ τὴν τάξιν τῶν πραγμάτων αὐτοῦ, ὅσαι δὲ προέκυψαν ἐκ διαφόρων συνδυασμῶν διαφέρουν κατὰ ἐν τούλαχιστον πρᾶγμα.

Συνεπῶς ἔχομεν : $x \cdot k! = \Delta_k^v$

Ἄλλα (§ 237) : $\Delta_k^v = v(v-1)\cdots(v-k+1).$

$$\text{Άρα : } x = \frac{\Delta_k^v}{k!} = \frac{v(v-1)\cdots(v-k+1)}{k!} \quad (2)$$

ἢ ἂν τεθῇ $x = \binom{v}{k}$ προκύπτει ὁ τύπος (1).

Κατὰ ταῦτα εἶναι :

$$\binom{5}{3} = \frac{5 \cdot 4 \cdot 3}{1 \cdot 2 \cdot 3} = 10, \quad \binom{7}{4} = \Sigma_4^7 = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} = 35.$$

Ἐξ ὀρισμοῦ δεχόμεθα ὅτι :

$$\boxed{\binom{v}{0} = \binom{v}{v} = 1} \quad (3)$$

Ἐάν πολλαπλασιάσωμεν ἀριθμητὴν καὶ παρονομαστὴν τῆς (2) ἐπὶ τὸν ἀριθμὸν : $(v-k)(v-k-1)\cdots 3 \cdot 2 \cdot 1$, ὅστις γράφεται καὶ : $(v-k)!$ ἔχομεν διαδοχικῶς :

$$x = \frac{v(v-1)\cdots(v-k+1)}{k!} = \frac{v(v-1)\cdots(v-k+1)(v-k)(v-k-1)\cdots 3 \cdot 2 \cdot 1}{k!(v-k)(v-k-1)\cdots 3 \cdot 2 \cdot 1} = \\ = \frac{v!}{k!(v-k)!}.$$

Μὲ ἄλλας λέξεις :

Πόρισμα.—Τὸ πλῆθος τῶν συνδυασμῶν v πραγμάτων ἀνὰ k δίδεται ὑπὸ τοῦ τύπου :

$$\boxed{\binom{v}{k} = \frac{v!}{k!(v-k)!}} \quad (4)$$

Ἐφαρμογαὶ : 1η : Δίδονται ἐπτὰ σημεῖα μὴ κείμενα ἀνὰ τρία ἐπὶ εὐθείας. Πόσα τρίγωνα εἶναι δυνατὸν νὰ κατασκευασθοῦν, ἀν ἐνώσωμεν ταῦτα δι' εὐθειῶν.

Αὐτοῖς : Προφανῶς κατασκευάζονται τόσα τρίγωνα, δοι εἰναι οἱ συνδυασμοὶ τῶν 7 πραγμάτων ἀνὰ 3. Οὕτως ἔχομεν :

$$\binom{7}{3} = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5}{1 \cdot 2 \cdot 3} = 35 \text{ τρίγωνα.}$$

2a : Μία ἐκπαιδευτικὴ περιφέρεια πρόκειται νὰ συμμετάσῃ τὶς μίαν ἐορταστικὴν ἐκδήλωσιν διὰ πενταμελοῦς ἀντιπροσωπείας. Ἐπελέγησαν ἀρχικῶς 4 μαθήτριαι καὶ 7 μαθηταί. Ἐκ τῶν 11 αὐτῶν ἀτόμων πόσας διαφορετικὰς πενταμελεῖς διαδόσις δυναμεθα νὰ σχηματίσωμεν ὥστε νὰ περιέχωνται : α) 2 μαθήτριαι, β) τούλαχιστον δύο μαθήτριαι, γ) τὸ πολὺ δύο μαθήτριαι;

Λύσις : α). Αι δύο μαθήτριαι δύνανται νά ληφθούν από τάς 4 έκλεγείσας κατά $\binom{4}{2}$ τρόπους, ένδη οι 3 μαθηταί, οι όποιοι θά συμπληρώσουν τήν ομάδα, δύνανται νά ληφθούν από τούς 7 έκλεγέντας κατά $\binom{7}{3}$ τρόπους. Έάν έκαστος τῶν πρώτων συνδυασμῶν συνδυασθῇ μὲν έκαστον τῶν δευτέρων θά ξέωμεν :

$$x = \binom{4}{2} \binom{7}{3} = \frac{4 \cdot 3}{1 \cdot 2} \cdot \frac{7 \cdot 6 \cdot 5}{1 \cdot 2 \cdot 3} = 210.$$

β). Εις τήν δευτέραν περίπτωσιν ή δμάς θά περιέχῃ ή 2 μαθητρίας και 3 μαθητάς

$$\left(\text{ότε οι τρόποι σχηματισμοῦ είναι : } \binom{4}{2} \cdot \binom{7}{3} = 210 \right), \text{ ή 3 μαθητρίας και 2 μαθητάς}$$

$$\left(\text{ότε οι τρόποι σχηματισμοῦ είναι : } \binom{4}{3} \cdot \binom{7}{2} = 4 \right), \text{ ή 4 μαθητρίας και 1 μαθητήν}$$

$$\left(\text{ότε οι τρόποι σχηματισμοῦ είναι : } \binom{4}{4} \cdot \binom{7}{1} = 7 \right).$$

*Αρα :

$$x = \binom{4}{2} \binom{7}{3} + \binom{4}{3} \binom{7}{2} + \binom{4}{4} \binom{7}{1} = 210 + 4 + 7 = 221.$$

γ). Εις τήν περίπτωσιν αύτήν έκάστη δμάς θά περιέχῃ ή 0 μαθητρίας και 5 μαθητάς, ή 1 μαθητριαν και 4 μαθητάς ή 2 μαθητρίας και 3 μαθητάς. Σκεπτόμενοι ώς και εις τήν περίπτωσιν β) έχομεν :

$$x = \binom{4}{0} \binom{7}{5} + \binom{4}{1} \binom{7}{4} + \binom{4}{2} \binom{7}{3} = 1 \cdot 21 + 4 \cdot 35 + 210 = 371.$$

§ 240. Άξιοσημείωτοι Ιδιότητες τῶν ἀπλῶν συνδυασμῶν.— Έάν εις ἐν ὑποσύνολον Α τοῦ Ε ἀνήκουν k στοιχεῖα, εἰς τὸ συμπληρωματικόν του Α' θά ἀνήκουν v - k στοιχεῖα. Ἐπομένως εἰς έκάστην έκλογήν ἐνὸς ὑποσυνόλου μὲ k στοιχεῖα ἀντιστοιχεῖ καὶ μία ἔκλογή τοῦ συμπληρωματικοῦ του συνόλου μὲ (v - k) στοιχεῖα καὶ ἀντιστρόφως. Κατ' ἀκολουθίαν δ ἀριθμὸς τῶν ὑποσυνόλων μὲ k στοιχεῖα ἐντὸς τοῦ Ε είναι ἵσος πρὸς τὸν ἀριθμὸν τῶν ὑποσυνόλων μὲ v - k στοιχεῖα. Τούτο δὲ διατυποῦται καὶ ώς ἔξῆς :

Ίδιότης I.—Τὸ πλῆθος τῶν συνδυασμῶν τῶν v πραγμάτων ἀνὰ k είναι ἵσον πρὸς τὸ πλῆθος τῶν συνδυασμῶν τῶν v - k.

*Ητοι :

$$\boxed{\binom{v}{k} = \binom{v}{v-k}} \quad (1)$$

‘Η ἀλγεβρικὴ ἀπόδειξις είναι ἐπίστης εὔκολος.

Πράγματι :

$$\binom{v}{v-k} = \frac{v!}{(v-k)! [v-(v-k)]!} = \frac{v!}{(v-k)! k!} = \binom{v}{k}.$$

Παρατηρήσεις : α'). Έκ τοῦ τύπου $\binom{v}{k} = \binom{v}{v-k}$, $k = 0, 1, 2, \dots, v$

έχομεν προφανῶς : $(v-k) + k = v$ διὰ κάθε v καὶ διὰ κάθε k. Μὲ δλλας λέξεις έάν $\alpha + \beta = v$, τότε $\binom{v}{\alpha} = \binom{v}{\beta}$.

Οὕτως ἐκ τῆς $\binom{20}{k} = \binom{20}{k+2}$, ἐπετείαι $k = 9$.

β'). Είσ τήν πρᾶξιν ή ίδιότης | μᾶς δίδει τήν δυνατότητα νὰ περιορισθῶμεν εἰς τὸν ὑπολογισμὸν τοῦ $\binom{v}{k}$ μόνον διὰ $k \leq \frac{v}{2}$, διότι, ἐν $k > \frac{v}{2}$, τότε ὑπολογίζομεν τὸ $\binom{v}{v-k}$ ἀντὶ τοῦ $\binom{v}{k}$, καθόσον εἶναι τότε: $v - k < \frac{v}{2}$.

$$\text{Οὕτω π.χ. } \binom{50}{46} = \binom{50}{4} = \frac{50 \cdot 49 \cdot 48 \cdot 47}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} = 230\,300.$$

Ιδιότης ΙΙ.—Τὸ πλῆθος τῶν συνδυασμῶν τῶν ν πραγμάτων ἀνὰ k ίσοῦται μὲ τὸ πλῆθος τῶν συνδυασμῶν τῶν $v - 1$ πραγμάτων ἀνὰ k, ηὖξημένον κατὰ τὸ πλῆθος τῶν συνδυασμῶν τῶν $v - 1$ πραγμάτων ἀνὰ k - 1.

Ητοι:
$$\boxed{\binom{v}{k} = \binom{v-1}{k} + \binom{v-1}{k-1}} \quad (2)$$

Απόδειξις. Άναχωροῦντες ἀπὸ τὸ δεύτερον μέλος τῆς (2) ἔχομεν:

$$\begin{aligned} \binom{v-1}{k} + \binom{v-1}{k-1} &= \frac{(v-1)!}{k! (v-1-k)!} + \frac{(v-1)!}{(k-1)! (v-1-k+1)!} = \\ &= \frac{(v-1)!}{(k-1)! (v-k-1)!} \left(\frac{1}{k} + \frac{1}{v-k} \right) = \\ &= \frac{(v-1)!}{(k-1)! (v-k-1)!} \cdot \frac{v}{k(v-k)} = \frac{v!}{k! (v-k)!} = \binom{v}{k}. \quad \ddot{\sigma}.\ddot{\epsilon}.\delta. \end{aligned}$$

Ιδιότης ΙΙΙ.—Ισχύει:

$$\boxed{\binom{v}{k+1} = \binom{v}{k} \cdot \frac{v-k}{k+1}} \quad (3)$$

Πράγματι:

$$\binom{v}{k+1} = \frac{v(v-1)\cdots(v-k+1)(v-k)}{1 \cdot 2 \cdots k \cdot (k+1)} = \binom{v}{k} \cdot \frac{(v-k)}{k+1}.$$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

546. Ύπολογίσατε τούς: $\binom{12}{7}, \binom{15}{5}, \binom{11}{8}, \binom{13}{9}, \binom{9}{7}$.

547. Δείξατε ὅτι: $\binom{17}{6} = \binom{16}{5} + \binom{16}{6}$.

548. Εάν $\binom{18}{k} = \binom{18}{k+2}$, νὰ εύρεθοῦν οἱ $\binom{k}{5}$.

549. Εάν $\binom{2v}{3} : \binom{v}{2} = 44 : 3$, νὰ εύρεθῇ ὁ φυσικὸς ἀριθμὸς v.

550. Εάν $\Delta_k^v = 3024$ καὶ $\binom{v}{k} = 126$, νὰ εύρεθῇ ὁ k.

551. Πόσα ὑποσύνολα μὲ k στοιχεῖα, ἔξ δῶν 2 στοιχεῖα εἶναι δώρισμένα, ὑπάρχουν εἰς ἓνα σύνολον μὲ v στοιχεῖα ($v \geq 5$); Όμοιως μὲ 3 δώρισμένα στοιχεῖα; Όμοιως μὲ 4;

552. Πόσαι 5—άδεις χαρτιῶν ἀπὸ μίαν δέσμην 52 παιγνιοχάρτων δύνανται νὰ περιέχουν 4 ἄσσους;

(Υπόδειξις: Λάβετε ὑπ' ὅψιν τὴν προηγουμένην ἀσκησιν).

§ 241. Έπαναληπτικοί συνδυασμοί.— "Εστωσαν ν διαφορετικά πράγματα $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_v$ τὰ δόποια θεωροῦνται στοιχεῖα ἐνὸς συνόλου E.

Καλούμεν ϵ παναληπτικὸν συνδυασμὸν τῶν ν αὐτῶν πραγμάτων ἀνὰ k κάθε συνδυασμὸν εἰς τὸν δόποιον ἔκαστον στοιχεῖον (πρᾶγμα) δύναται νὰ ἐπαναλαμβάνεται τὸ πολὺ k φοράς.

Εἶναι φανερὸν ὅτι τώρα δυνάμεθα νὰ ἔχωμεν ἢ $k \leq v$ ἢ $k > v$.

"Οπως εἰς τοὺς ἀπλούς συνδυασμοὺς οὕτως καὶ εἰς τοὺς ἐπαναληπτικοὺς ἐνδιαφερόμεθα μόνον διὰ τὴν φύσιν τῶν ληφθέντων στοιχείων εἰς ἔκαστον συνδυασμόν, οὐχὶ δὲ διὰ τὰς θέσεις, ἃς ἔχουν ταῦτα μεταξύ των. Ἐπομένως δύο ἐπαναληπτικοὶ συνδυασμοὶ θὰ θεωροῦνται διαφορετικοὶ ἐφ' ὅσον διαφέρουν κατὰ τὴν φύσιν ἐνὸς τούλαχιστον στοιχείου ποὺ περιέχουν. Οὕτως οἱ ἐπαναληπτικοὶ συνδυασμοὶ τῶν $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ ἀνὰ δύο εἶναι οἱ ἔξης :

$$\begin{array}{lll} \alpha_1\alpha_1, & \alpha_1\alpha_2, & \alpha_1\alpha_3 \\ \alpha_2\alpha_1, & \alpha_2\alpha_2, & \alpha_2\alpha_3 \\ & \alpha_3\alpha_3. & \end{array}$$

"Ομοίως, οἱ ἐπαναληπτικοὶ συνδυασμοὶ τῶν α_1, α_2 ἀνὰ τρία εἶναι οἱ ἔξης :

$$\alpha_1\alpha_1\alpha_1, \quad \alpha_1\alpha_1\alpha_2, \quad \alpha_1\alpha_2\alpha_2, \quad \alpha_2\alpha_2\alpha_2,$$

δηλ. κάθε συνδυασμὸς (ἐπαναληπτικὸς) ἀποτελεῖται ἀπὸ 3 στοιχεῖα, ἐκ τῶν δοποίων τὰ δύο ἢ καὶ τὰ τρία δύνανται νὰ εἶναι τὰ αὐτά.

Θὰ ὑπολογίσωμεν ἦδη τὸ πλῆθος τῶν ἐπαναληπτικῶν συνδυασμῶν τῶν ν πραγμάτων ἀνὰ k. Διὰ τὸ πλῆθος τοῦτο, ὅπερ παριστῶμεν διὰ τοῦ συμβόλου \mathcal{E}_k^v , ισχύει ἡ ἀκόλουθος :

Πρότασις.— Τὸ πλῆθος τῶν ἐπαναληπτικῶν συνδυασμῶν τῶν ν διαφόρων μεταξύ των πραγμάτων ἀνὰ k, ισοῦται μὲ τὸ πλῆθος τῶν ἀπλῶν συνδυασμῶν τῶν ν + k - 1 πραγμάτων ἀνὰ k.

"Ητοι :

$$\boxed{\mathcal{E}_k^v = \Sigma_k^{v+k-1} = \binom{v+k-1}{k}} \quad (1)$$

Απόδειξις. Εἶναι φανερὸν ὅτι οἱ ἐπαναληπτικοὶ συνδυασμοὶ τῶν ν ἀνὰ ἐν εἶναι δσα καὶ τὰ πράγματα, ἥτοι: $\mathcal{E}_1^v = v$.

"Υποθέσωμεν δλοὺς τοὺς ἐπαναληπτικοὺς συνδυασμοὺς τῶν ν ἀνὰ k, γεγραμμένους εἰς ἐνα πίνακα. Εἰς αὐτὸν θὰ εύρωμεν, κατὰ δύο τρόπους, πόσας φοράς ἐμφανίζεται τὸ ἐκ τῶν διθέντων πραγμάτων, π.χ. τὸ α_1 .

α'). "Έκαστος ἐπαναληπτικὸς συνδυασμὸς περιέχει k πράγματα, δλοὶ οἱ ὑπ' δψιν συνδυασμοὶ θὰ περιέχουν k · \mathcal{E}_k^v πράγματα. Δοθέντος δὲ ὅτι τὰ ν διαφορετικά πράγματα ἐμφανίζονται Ισάκις εἰς τὸν πίνακα, ἔκαστον ἐξ αὐτῶν, ἄρα καὶ τὸ α_1 , ἐμφανίζεται :

$$\frac{k \cdot \mathcal{E}_k^v}{v} = \frac{k}{v} \mathcal{E}_k^v \text{ φοράς.} \quad (2)$$

β'). Τοὺς συνδυασμοὺς τοῦ πίνακος διακρίνομεν εἰς δύο κατηγορίας: εἰς τοὺς περιέχοντας τὸ στοιχεῖον α_1 καὶ εἰς τοὺς μὴ περιέχοντας αὐτό. Θὰ εύρωμεν τώρα καὶ κατ' ἄλλον τρόπον πόσας φοράς τὸ α_1 τιεριέχεται εἰς τὸν πίνακα τῶν ἐπαναληπτικῶν συνδυασμῶν. Θεωροῦμεν τοὺς ἐπα-

ναληπτικούς συνδυασμούς οἱ δποῖοι περιέχουν τὸ α_1 . Ἐὰν ἀφαιρέσωμεν ἀπό αὐτούς ἕνα μόνον ἀπό τὰ α_1 , τὰ δποῖα περιέχουν, τότε αὐτοὶ θὰ περιέχουν $k - 1$ πράγματα καὶ θὰ είναι δλοὶ οἱ ἐπαναληπτικοὶ συνδυασμοὶ τῶν ν πραγμάτων ἀνά $k - 1$, ήτοι θὰ είναι πλήθους \mathcal{E}_k^v καὶ συνεπῶς κατὰ τὴν α' τὸ στοιχεῖον α_1 θὰ ἐμφανίζεται : $\frac{k-1}{v} \mathcal{E}_{k-1}^v$ φοράς. Ἐὰν τώρα εἰς τὸ πλῆθος $\frac{k-1}{v} \mathcal{E}_{k-1}^v$ τῶν α_1 προσθέσωμεν τὸ πλῆθος τῶν ἀφαιρεθέντων α_1 , τὸ δποῖον είναι \mathcal{E}_{k-1}^v (διότι ἔκαστη ἀφαιρεσίς τοῦ α_1 ἔδωσε ἕνα ἐπαναληπτικὸν συνδυασμὸν τῶν ν ἀνά $k - 1$), εὑρίσκομεν πόσας φοράς ἐμφανίζεται τὸ α_1 εἰς τὸν πίνακα, ήτοι ἐπανευρίσκομεν τὸν ἀριθμόν, δστις παρέχεται ὑπὸ τῆς ἐκφράσεως (2).

Ἐξισοῦντες τὰς δύο ἐκφράσεις ἔχομεν :

$$\frac{k}{v} \mathcal{E}_k^v = \frac{k-1}{v} \mathcal{E}_{k-1}^v + \mathcal{E}_{k-1}^v.$$

Ἐκ τοῦ δποίου προκύπτει ὁ ἀναγωγικὸς τύπος :

$$\mathcal{E}_k^v = \frac{v+k-1}{k} \cdot \mathcal{E}_{k-1}^v. \quad (3)$$

Ἐφαρμόζοντες αὐτὸν διὰ $k = 2, 3, \dots, k$ καὶ πολλαπλασιάζοντες τὰς προκυπτούσας λστήτητας κατὰ μέλη, μετὰ τὰς δπλοποιήσεις εὑρίσκομεν :

$$\mathcal{E}_k^v = \frac{v(v+1)(v+2)\cdots(v+k-1)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots k}. \quad (4)$$

Ἐὰν εἰς τὴν (4) θέσωμεν : $v+k-1 = \mu$, δτε είναι $v = \mu - k + 1$, εὑρίσκομεν :

$$\mathcal{E}_k^v = \frac{\mu(\mu-1)\cdots(\mu-k+1)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots k} = \Sigma_k^\mu.$$

$$\mathcal{E}_k^v = \Sigma_k^{v+k-1} = \binom{v+k-1}{k}.$$

Ἡ πρότασις ὅθεν ἀπεδείχθη.

Κατὰ ταῦτα είναι :

$$\mathcal{E}_3^6 = \Sigma_3^{6+3-1} = \binom{8}{3} = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6}{1 \cdot 2 \cdot 3} = 56.$$

Ἐφαρμογή : Πόσους δρους ἔχει ἐν πλήρες δμογενὲς πολυώνυμον πέμπτου βαθμοῦ ώς πρὸς x, y, z ;

Ἄστις : Οἱ δροὶ τοῦ πολυωνύμου θὰ είναι τῆς μορφῆς : $x^k y^{\lambda} z^{\mu}$, ἔνθα $k + \lambda + \mu = 5$. Ἀλλὰ ἔκαστος δρος είναι εἰς ἐπαναληπτικὸς συνδυασμὸς τῶν τριῶν γράμμάτων x, y, z ἀνά 5 (π.χ. $xy^3z = xyyyz, x^3y^2 = xxxxyy, \dots$)

Ἀρα τὸ ζητούμενον πλῆθος λσοῦται πρὸς τὸ πλῆθος τῶν ἐπαναληπτικῶν συνδυασμῶν τῶν 3 πραγμάτων ἀνά 5, ήτοι :

$$\mathcal{E}_5^3 = \binom{3+5-1}{5} = \binom{7}{5} = \binom{7}{2} = \frac{7 \cdot 6}{1 \cdot 2} = 21.$$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

553. Πόσα ἀκέραια μονώνυμα τῆς μορφῆς $\alpha^k \beta^{\lambda} \gamma^{\mu}$ τετάρτου βαθμοῦ ώς πρὸς δλα δμοῦ τὰ γράμματα α, β, γ δυνάμεθα νὰ σχηματίσωμεν;

554. Ἐὰν $\Delta_4^v = 840$, νὰ ὑπολογισθῇ ὁ ἀριθμός : \mathcal{E}_3^v .

555. Γνωστοῦ δντος δτι $\binom{18}{k} = \binom{18}{k+2}$, νὰ εὑρεθοῦν οἱ Σ_5^v καὶ \mathcal{E}_5^v .

556. Νὰ ἀποδειχθῇ, διὰ τῆς θεωρίας τῶν συνδυασμῶν, δτι τὸ γινόμενον ν διαδοχικῶν ἀκέραιων είναι πάντοτε διαιρετὸν διὰ τοῦ γινομένου : $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots n$.

557. Νὰ εύρεθῇ τὸ πλῆθος τῶν διαγωνίων πολυγώνου ἔχοντος ν κορυφάς.

558. Νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι :

$$\alpha) \binom{v}{k} + 2\binom{v}{k-1} + \binom{v}{k-2} = \binom{v+2}{k}, \quad \beta) \left(\frac{v+1}{k}-1\right)\binom{v}{k-1} = \binom{v}{k}.$$

559. Δεῖξατε ὅτι :

$$1 + \sum_{k=1}^5 \binom{5}{k} = 2^5.$$

560. Νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι :

$$\alpha) \binom{v}{p+1} - \binom{v}{p-1} = \frac{(v+1)! (v-2p)}{(p+1)! (v-p+1)!},$$

$$\beta) \binom{v}{p} + 2\binom{v}{p-1}\binom{v}{p-2} = \binom{v+2}{p}.$$

§ 242. Τὸ διωνυμικὸν θεώρημα.— ‘Η ἐπομένη πρότασις φέρουσα τὸ ὄνομα τοῦ Newton^(*) ἀποτελεῖ τὸ διωνυμικὸν θεώρημα, τὸ ὅποιον δίδει τὴν γενικὴν ἐκφρασιν τοῦ ἀναπτύγματος $(x+\alpha)^v$.

Πρότασις.—Διὰ κάθε ζεῦγος πραγματικῶν ἀριθμῶν x, a καὶ διὰ κάθε $v \in \mathbb{N}$, ἵσχει ὁ τύπος (τοῦ διωνύμου τοῦ Νεύτωνος) :

$$(x+a)^v = \binom{v}{0} x^v + \binom{v}{1} x^{v-1} a + \binom{v}{2} x^{v-2} a^2 + \cdots + \binom{v}{k} x^{v-k} a^k + \cdots \\ \cdots + \binom{v}{v-1} x a^{v-1} + \binom{v}{v} a^v \quad (1)$$

‘Απόδειξις. ‘Ως γνωστόν, ἡ πρώτη ταυτότης τοῦ Newton γράφεται :

$$(x+\alpha_1)(x+\alpha_2)\cdots(x+\alpha_v) \equiv x^v + (\alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_v)x^{v-1} + (\alpha_1\alpha_2 + \alpha_1\alpha_3 + \cdots \\ + \alpha_{v-1}\alpha_v)x^{v-2} + \cdots + (\alpha_1\alpha_2\cdots\alpha_k + \cdots)x^{v-k} + \cdots + \alpha_1\alpha_2\cdots\alpha_v.$$

Τὸ πλῆθος τῶν προσθετέων τοῦ $\alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_v$ εἶναι τὸ πλῆθος $\binom{v}{1}$ τῶν συνδυασμῶν τῶν v πραγμάτων $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_v$ ἀνὰ ἕν.

Τὸ πλῆθος τῶν προσθετέων τοῦ $\alpha_1\alpha_2 + \alpha_1\alpha_3 + \cdots + \alpha_{v-1}\alpha_v$ εἶναι τὸ πλῆθος $\binom{v}{2}$ τῶν συνδυασμῶν τῶν v πραγμάτων ἀνὰ δύο κ.ο.κ.

Τὸ πλῆθος τῶν προσθετέων τοῦ $\alpha_1\alpha_2\cdots\alpha_k + \cdots$ εἶναι τὸ πλῆθος $\binom{v}{k}$ κ.λπ.

Θέτοντες ἄρα $\alpha_1 = \alpha_2 = \cdots = \alpha_v = \alpha$ εἰς τὴν (1), καὶ λόγῳ τοῦ ὅτι $\binom{v}{0} = 1 = \binom{v}{v}$, λαμβάνομεν τὴν (1).

Άσκησις. Δώσατε ἀπόδειξιν τῆς (1) διὰ τῆς τελείας ἐπαγωγῆς χρησιμοποιοῦντες καὶ τὴν ιδιότητα II τῆς § 240.

* Isaak Newton (1642 - 1727) διάσημος Ἀγγλος μαθηματικός, φυσικός καὶ φιλόσοφος.

Ο τύπος (1) τοῦ διωνύμου γράφεται συντόμως ως ἔξης :

$$(x+a)^v = \sum_{k=0}^v \binom{v}{k} x^{v-k} a^k \quad (2)$$

Ἐπειδὴ δὲ (§ 239) εἶναι : $\binom{v}{1} = v$, $\binom{v}{2} = \frac{v(v-1)}{1 \cdot 2}, \dots,$

$$\binom{v}{k} = \frac{v(v-1) \cdots (v-k+1)}{1 \cdot 2 \cdots k},$$

ὁ τύπος (1) δύναται νὰ γραφῇ καὶ οὕτω :

$$(x+a)^v = x^v + vx^{v-1} a + \frac{v(v-1)}{1 \cdot 2} x^{v-2} a^2 + \frac{v(v-1)(v-2)}{1 \cdot 2 \cdot 3} x^{v-3} a^3 + \cdots + a^v \quad (3)$$

Κατὰ ταῦτα εἶναι :

$$(x+a)^6 = x^6 + 6x^5a + \frac{6 \cdot 5}{1 \cdot 2} x^4 \cdot a^2 + \frac{6 \cdot 5 \cdot 4}{1 \cdot 2 \cdot 3} x^3 a^3 + \frac{6 \cdot 5}{1 \cdot 2} x^2 a^4 + 6xa^5 + a^6 = \\ = x^6 + 6x^5a + 15x^4a^2 + 20x^3a^3 + 15x^2a^4 + 6xa^5 + a^6.$$

Παρατηρήσεις ἐπὶ τοῦ ἀναπτύγματος τοῦ διωνύμου : α'). Τὸ ἀνάπτυγμα τοῦ $(x+a)^v$ εἶναι ἐν πλῆρες ὁμογενὲς πολυώνυμον, ν βαθμοῦ, διατεταγμένον κατὰ τὰς κατιούσας δυνάμεις τοῦ x καὶ τὰς ἀνιούσας τοῦ a . Εἰς ἔκαστον ὅρον τούτου τὸ ἄθροισμα τῶν ἐκθετῶν τοῦ x καὶ a εἶναι σταθερὸν καὶ ἵστον πρὸς v .

β'). Τὸ πλῆθος τῶν ὅρων τοῦ ἀναπτύγματος εἶναι $v+1$, διότι ὑπάρχουν πᾶσαι αἱ δυνάμεις τοῦ x ἀπὸ τῆς μηδενικῆς μέχρι τῆς v -οστῆς.

γ'). Οἱ ὅροι τοῦ ἀναπτύγματος τοῦ $(x+a)^v$, οἱ ἵσακις ἀπέχοντες τῶν ἀκρων, ἔχουν ἵστον συντελεστάς. Τοῦτο προκύπτει ἀμέσως ἀπὸ τὸν τύπον (1) τῆς § 240, δεδομένου ὅτι οἱ συντελεσταὶ τῶν ὅρων τοῦ ἀναπτύγματος εἶναι κατὰ σειράν :

$$\binom{v}{0} \binom{v}{1} \binom{v}{2} \cdots \binom{v}{k} \cdots \binom{v}{v-k} \cdots \binom{v}{v-2} \binom{v}{v-1} \binom{v}{v}.$$

δ'). Ο ὅρος τάξεως λ τοῦ ἀναπτύγματος τοῦ $(x+a)^v$ εἶναι ὁ :

$$\binom{v}{\lambda-1} x^{v-\lambda+1} \cdot a^{\lambda-1}.$$

Τοῦτο προκύπτει ἀπὸ τὴν διάταξιν τῶν συντελεστῶν τοῦ ἀναπτύγματος, καθ' ἓν βλέπομεν ὅτι ὁ 1ος ὅρος ἔχει συντελεστὴν $\binom{v}{0}$, ὁ 2ος: $\binom{v}{1}$, ὁ 3ος: $\binom{v}{2}$ καὶ ὁ λοις ἔχει συντελεστὴν $\binom{v}{\lambda-1}$.

ε'). Έαν ν ἀρτιος, ἵσος πρὸς 2μ , τότε τὸ πλῆθος $\nu + 1$ τῶν δρων εἶναι περιττὸν καὶ συνεπῶς ὑπάρχει δρος μὲν μέγιστον συντελεστήν. Ὁ δρος οὗτος καλεῖται μεσαῖος δρος καὶ εἶναι τάξεως $\frac{\nu}{2} + 1 = \mu + 1$, εἶναι δὲ δ : $\binom{\nu}{\mu} x^{\mu} \cdot a^{\mu}$.

στ'). Έαν ν περιττὸς καὶ ἵσος πρὸς $2\mu + 1$, τότε τὸ πλῆθος $\nu + 1$ τῶν δρων τοῦ ἀναπτύγματος $(x + a)^{\nu}$ εἶναι ἀρτιον καὶ συνεπῶς ὑπάρχουν δύο «μεσαῖοι» δροι (οἱ ἔχοντες μεγίστους συντελεστάς). Οὗτοι εἶναι οἱ :

$$\binom{\nu}{\mu} x^{\mu+1} a^{\mu} \text{ καὶ } \binom{\nu}{\mu + 1} x^{\mu} a^{\mu+1}$$

καὶ ἔχουν ἴσους συντελεστάς.

Ἐφαρμογαὶ : 1η : Νὰ εὑρεθῇ ὁ μεσαῖος δρος τοῦ ἀναπτύγματος $(2x - x^2)^{12}$.

Λύσις : Τὸ πλῆθος τῶν δρων τοῦ ἀναπτύγματος εἶναι : $12 + 1 = 13$, ἐπομένως ὁ μεσαῖος δρος εἶναι δ $\frac{\nu}{2} + 1 = 7$ ος, δ ὅποιος θὰ εἶναι :

$$\binom{12}{6} (2x)^6 \cdot (-x^2)^6 = 59136 x^{18}.$$

2α : Νὰ εὑρεθῇ, ἐὰν ὑπάρχῃ, ὁ ἀνεξάρτητος τοῦ x δρος εἰς τὸ ἀνάπτυγμα :

$$(2x^3 + \frac{3}{x})^{16}.$$

Λύσις : Ὁ γενικὸς δρος τοῦ ὡς ἀναπτύγματος εἶναι :

$$\binom{16}{k} (2x^3)^{16-k} \cdot \left(\frac{3}{x}\right)^k = \binom{16}{k} 2^{16-k} \cdot 3^k \cdot x^{48-4k}$$

Διὰ νὰ είναι ὀνειδάρτητος τοῦ x θὰ πρέπει : $48 - 4k = 0$, ἢξος : $k = 12$.

Ἄρα ὁ ὀνειδάρτητος τοῦ x δρος τοῦ ἀναπτύγματος εἶναι δ 13 ος, δστις εἶναι :

$$\binom{16}{12} \cdot 2^4 \cdot 3^{12} = \binom{16}{4} \cdot 2^4 \cdot 3^{12} = \frac{16 \cdot 15 \cdot 14 \cdot 13}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} 2^4 \cdot 3^{12} = 5 \cdot 7 \cdot 13 \cdot 2^6 \cdot 3^{12}.$$

3η : Νὰ εὑρεθῇ ὁ συντελεστής τοῦ x^{12} εἰς τὸ ἀνάπτυγμα : $(2x^3 + a)^{17}$.

Λύσις : Ὁ γενικὸς δρος τοῦ ἀναπτύγματος εἶναι :

$$\binom{17}{k} (2x^3)^{17-k} \cdot a^k = \binom{17}{k} 2^{17-k} \cdot x^{3(17-k)} \cdot a^k.$$

Ἔνα δ x εύρισκεται ὑψωμένος εἰς τὴν 12 ην πρέπει : $3(17 - k) = 12$ ἢ $k = 13$.

Ἄρα δ συντελεστής τοῦ x^{12} εἶναι :

$$\binom{17}{13} \cdot 2^4 = \binom{17}{4} \cdot 2^4 = \frac{17 \cdot 16 \cdot 15 \cdot 14}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} \cdot 16 = 38080.$$

§ 243. Ἱδιότητες τῶν διωνυμικῶν συντελεστῶν.— α'). Έὰν εἰς τὸν τύπον (1) τοῦ ἀναπτύγματος τοῦ διωνύμου § 242 θέσωμεν $x = 1$, $a = 1$, λαμβάνομεν :

$$\boxed{\binom{v}{0} + \binom{v}{1} + \binom{v}{2} + \cdots + \binom{v}{v} = 2^v} \quad (1)$$

Ο τύπος (1) γράφεται συντόμως ὡς ἔξῆς :

$$\sum_{k=0}^v \binom{v}{k} = 2^v \quad \text{ἢ} \quad \sum_{k=1}^v \binom{v}{k} = 2^v - 1. \quad (2)$$

Πόρισμα.—'Από κάθε σύνολον τὸ ὁποῖον περιέχει ν στοιχεῖα, σχηματίζονται 2^v ἀκριβῶς ὑποσύνολα.

Πράγματι, ὑπάρχουν $\binom{v}{0}$ ὑποσύνολα μὲ 0 στοιχεῖα, $\binom{v}{1}$ ὑποσύνολα μὲ ἓν στοιχεῖον, $\binom{v}{2}$ ὑποσύνολα μὲ δύο στοιχεῖα, κ.ο.κ. Τὸ δλικὸν πλῆθος τῶν ὑποσυνόλων αὐτῶν εἶναι, λόγῳ καὶ τῆς 1 :

$$\binom{v}{0} + \binom{v}{1} + \binom{v}{2} + \cdots + \binom{v}{v} = 2^v.$$

β'). 'Εὰν εἰς τὸν τύπον (1) τῆς § 242 θέσωμεν $x = 1$, $\alpha = -1$, λαμβάνομεν :

$$\boxed{\binom{v}{1} + \binom{v}{3} + \binom{v}{5} + \cdots = \binom{v}{0} + \binom{v}{2} + \binom{v}{4} + \cdots = 2^{v-1}} \quad (3)$$

γ'). 'Εὰν τὴν ταυτότητα : $(1+x)^{2v} \equiv (1+x)^v \cdot (x+1)^v$ γράψωμεν ὑπὸ τὴν μορφήν :

$$\begin{aligned} & \binom{2v}{0} + \binom{2v}{1} x + \binom{2v}{2} x^2 + \cdots + \binom{2v}{v} x^v + \cdots + \binom{2v}{2v} x^{2v} \equiv \\ & \equiv \left\{ \binom{v}{0} + \binom{v}{1} x + \binom{v}{2} x^2 + \cdots + \binom{v}{v} x^v \right\} \cdot \left\{ \binom{v}{0} x^v + \binom{v}{1} x^{v-1} + \right. \\ & \quad \left. + \binom{v}{2} x^{v-2} + \cdots + \binom{v}{v} \right\} \end{aligned}$$

καὶ ἔξισώσωμεν τοὺς συντελεστὰς τῶν x^v εἰς τὰ δύο μέλη, λαμβάνομεν :

$$\boxed{\binom{v}{0}^2 + \binom{v}{1}^2 + \binom{v}{2}^2 + \cdots + \binom{v}{v}^2 = \binom{2v}{v}} \quad (4)$$

'Η (4) γράφεται συντόμως ὡς ἔξῆς :

$$\sum_{k=0}^v \binom{v}{k}^2 = \binom{2v}{v}.$$

* § 244. Μία ἀξιόλογος ἐφαρμογὴ τοῦ διωνυμικοῦ τύπου.

"Εστω ἡ ἀκολουθία $\alpha_v = \left(1 + \frac{1}{v}\right)^v$, $v = 1, 2, \dots$

Αὗτη, ὡς θὰ δείξωμεν, εἶναι γνησίως αὐξουσα καὶ φραγμένη, δπότε κατὰ τὸ ἀξιώμα (§ 150) συγκλίνει ἐν R .

Πράγματι, ἔὰν εἰς τὸν τύπον (1) τῆς § 242 θέσωμεν $x = 1$, $\alpha = \frac{1}{v}$, τότε ἔχομεν :

$$\begin{aligned} \alpha_v = \left(1 + \frac{1}{v}\right)^v &= 1 + \frac{v}{1} \cdot \frac{1}{v} + \frac{v(v-1)}{1 \cdot 2} \cdot \frac{1}{v^2} + \cdots + \frac{v(v-1)(v-2)\cdots(v-k+1)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots k} \cdot \frac{1}{v^k} + \\ &\quad + \cdots + \frac{1}{v^v}. \end{aligned}$$

*Ο γενικός δρος τοῦ άνωτέρω άναπτυγματος γράφεται :

$$\frac{v(v-1) \cdot (v-2) \cdots (v-k+1)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots k} \cdot \frac{1}{v^k} = \frac{1}{k!} \cdot \left(1 - \frac{1}{v}\right) \left(1 - \frac{2}{v}\right) \cdots \left(1 - \frac{k-1}{v}\right)$$

*Οθεν :

$$\alpha_v = \left(1 + \frac{1}{v}\right)^v = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} \left(1 - \frac{1}{v}\right) + \frac{1}{3!} \left(1 - \frac{1}{v}\right) \left(1 - \frac{2}{v}\right) + \cdots \\ + \frac{1}{k!} \left(1 - \frac{1}{v}\right) \cdots \left(1 - \frac{k-1}{v}\right) + \cdots + \frac{1}{v!} \left(1 - \frac{1}{v}\right) \left(1 - \frac{2}{v}\right) \cdots \left(1 - \frac{v-1}{v}\right)$$

και

$$\alpha_{v+1} = \left(1 + \frac{1}{v+1}\right)^{v+1} = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} \left(1 - \frac{1}{v+1}\right) + \frac{1}{3!} \left(1 - \frac{1}{v+1}\right) \left(1 - \frac{2}{v+1}\right) + \\ \cdots + \frac{1}{k!} \left(1 - \frac{1}{v+1}\right) \cdots \left(1 - \frac{k-1}{v+1}\right) + \cdots + \frac{1}{(v+1)!} \left(1 - \frac{1}{v+1}\right) \left(1 - \frac{2}{v+1}\right) \cdots \\ \left(1 - \frac{v}{v+1}\right).$$

ὅπου οι δροι εις τὸ άναπτυγμα τοῦ α_{v+1} είναι κατὰ μονάδα περισσότεροι ἐκείνων τοῦ α_v .

*Αν συγκρίνωμεν εἰς τὰ άναπτυγματα τῶν α_v , α_{v+1} ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τοὺς δύο πρώτους δρος, ἔπειτα τοὺς δύο δευτέρους κ.ο.κ. βλέπομεν, διὰ διὰ $2 \leq k \leq v$ οι δροι τοῦ δευτέρου είναι μεγαλύτεροι, διότι :

$$\frac{1}{k!} \left(1 - \frac{1}{v}\right) \cdots \left(1 - \frac{k-1}{v}\right) < \frac{1}{k!} \left(1 - \frac{1}{v+1}\right) \cdots \left(1 - \frac{k-1}{v+1}\right).$$

*Εξ ἄλλου ὁ τελευταῖος δρος τοῦ άναπτυγματος τοῦ α_{v+1} , δ ὅποιος δὲν ἔχει ἀντίστοιχον εις τὸ άναπτυγμα τοῦ α_v , δηλ. δ $\frac{1}{(v+1)^{v+1}}$ είναι > 0 .

*Ωστε είναι :

$$\alpha_v < \alpha_{v+1} \quad \text{διὰ } v = 1, 2, 3, \dots$$

ἡτοι : ἡ ἀκολουθία α_v , $v = 1, 2, \dots$ είναι γνησίως αὔξουσα.

Αὗτη είναι καὶ φραγμένη. *Ἐν ἀνω φράγμα διὰ τὴν ἀκολουθίαν α_v , $v = 1, 2, \dots$ είναι δ ἀριθμὸς 3, διότι :

$$\alpha_v = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} \left(1 - \frac{1}{v}\right) + \cdots + \frac{1}{v!} \left(1 - \frac{1}{v}\right) \left(1 - \frac{2}{v}\right) \cdots \left(1 - \frac{v-1}{v}\right) \leq 1 + \\ + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{v!}.$$

*Ισχύει δῆμως :

$$\frac{1}{k!} = \frac{1}{1 \cdot 2 \cdots k} < \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 2^{k-2}} = \frac{1}{2^{k-1}} \quad \text{διὰ } k = 3, 4, \dots$$

*Οθεν :

$$\alpha_v \leq 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{1}{v!} < 1 + \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^{v-1}}\right) = \\ = 1 + \frac{1 - 2^{-v}}{1 - \frac{1}{2}} < 1 + \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} = 3.$$

*Εξ ἄλλου ἀπὸ τὴν ἀνισότητα τοῦ Bernoulli ἔχομεν :

$$\alpha_v = \left(1 + \frac{1}{v}\right)^v \geq 1 + v \cdot \frac{1}{v} = 1 + 1 = 2 \quad \forall v = 1, 2, \dots$$

"Ητοι τελικῶς :

$$2 < \alpha_v = \left(1 + \frac{1}{v}\right)^v < 3$$

(διότι τὸ 2 εἶναι δι πρῶτος δρος τῆς αὐξούσης ἀκολουθίας α_v , ήτοι $\alpha_1 = 2$).

*Η α_v , $v = 1, 2, \dots$ εἶναι ὅθεν γνησίως αὔξουσα καὶ φραγμένη ἀκολουθία, συνεπῶς συγκλίνει. Καλοῦμεν :

$$\lim_{\text{ορ}} \alpha_v \equiv \lim \left(1 + \frac{1}{v}\right)^v.$$

*Ο ἀνωτέρω δριθμὸς ε παίζει σπουδαίον ρόλον εἰς τὴν Ἀνάλυσιν καὶ γενικῶς τὰ Μαθηματικά, σπουδαιότερον ἀκόμη καὶ αὐτοῦ τοῦ ἀριθμοῦ π (σταθεροῦ λόγου τοῦ κύκλου πρὸς τὴν διάμετρον αὐτοῦ), συνδέονται δὲ μεταξύ των διὰ σχέσεως, ὥστε, ἀν δριθῆ ὁ εἰς νὰ δρίζεται καὶ δ ἀλλος δ συμβολισμὸς μὲ τὸ λατινικὸν γράμμα «e» εἰσήχθη τὸ πρῶτον ὑπὸ τοῦ Euler (1707 – 1783) τὸ 1736.

Δίδομεν κατωτέρω τὰ 20 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία τοῦ ε κατὰ τὴν παράστασιν τούτου ὡς δεκαδικῆς σειρᾶς :

$$e = 2, 71828 1828 4590 4523 536\dots$$

*Ο ἀριθμὸς ε δὲν εἶναι ορητός εἶναι δὲ εἰς ὑπερβατικὸς ἀριθμὸς (§ 55).

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

561. Ἀναπτύξατε τὴν παράστασιν $(x + 3y)^6$ καὶ δι' ἐφαρμογῆς τοῦ ἀναπτύγματος ὑπολογίσατε τὸ $(1,03)^6$ μὲν ἀκρίβειαν 5 δεκαδικῶν ψηφίων.

562. Δείξατε ὅτι :

$$\binom{4}{0} + \binom{4}{1} + \binom{4}{2} + \binom{4}{3} + \binom{4}{4} = 2^4.$$

563. Εὕρετε τὸν δρον εἰς τὸ ἀνάπτυγμα τοῦ $\left(2x^2 - \frac{1}{2}y^3\right)^8$, δ ὅποιος περιέχει τὸ x^8 .

564. Νὰ εύρεθῇ δ ἀνεξάρτητος τοῦ x δρος τῶν κάτωθι ἀναπτυγμάτων :

$$\alpha) \left(2x + \frac{1}{x^2}\right)^{12}, \quad \beta) \left(\frac{9x^3 - 2}{6x}\right)^9.$$

565. Νὰ εύρεθῇ δ συντελεστής τοῦ δρον x^{18} εἰς τὸ ἀνάπτυγμα : $(x + 2x^2)^{10}$.

566. *Υπάρχει εἰς τὸ ἀνάπτυγμα $\left(\frac{3x^2}{2} - \frac{1}{3x}\right)^9$ δρος ἀνεξάρτητος τοῦ x καὶ ποῖος;

567. Νὰ ἀποδειχθοῦν αἱ κάτωθι ταυτότητες :

$$\alpha). \binom{v}{0} + 2\binom{v}{1} + 2^2\binom{v}{2} + \cdots + 2^v\binom{v}{v} = 3^v$$

$$\beta). \binom{v}{1} + 2\binom{v}{2} + 3\binom{v}{3} + \cdots + v\binom{v}{v} = v \cdot 2^{v-1}$$

$$\gamma). 1 + 2\binom{v}{1} + 3\binom{v}{2} + \cdots + (v+1)\binom{v}{v} = 2^v + v \cdot 2^{v-1}$$

$$\delta). 1 + \frac{1}{2} \cdot \binom{v}{1} + \frac{1}{3} \cdot \binom{v}{2} + \cdots + \frac{1}{v+1} \binom{v}{v} = \frac{1}{v+1} \cdot (2^{v+1} - 1).$$

568. *Εὰν $v \in \mathbb{N}$ καὶ $v > 1$, δείξατε ὅτι :

$$\binom{2v}{v} > \frac{4^v}{2\sqrt{v}}.$$

(*Υπόδειξις : Ἐφαρμόσατε τὴν μέθοδον τῆς τελείας ἐπαγωγῆς).

569. *Εὰν $v \in \mathbb{N}$, $v \neq 1$, νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι :

$$\left(\frac{v+1}{2}\right)^v > v! > (v+1)^{\frac{v-1}{2}}.$$

IV. ΠΙΝΑΚΕΣ

§ 245. Εισαγωγικαὶ Ἐννοιαὶ – Ὁρισμοί.— Θεωροῦμεν τὸ σύστημα τῶν ἔξισώσεων :

$$\begin{aligned}\alpha_{11}x_1 + \alpha_{12}x_2 &= \beta_1 \\ \alpha_{21}x_1 + \alpha_{22}x_2 &= \beta_2,\end{aligned}\quad (\Sigma)$$

ὅπου οἱ συντελεσταὶ α_{ij} τῶν ἀγνώστων x_j , ὡς καὶ οἱ γνωστοὶ ὅροι β_i , εἰναι τυχόντες πραγματικοὶ ἀριθμοὶ ($i, j = 1, 2$). Ἡς φαντασθῶμεν τώρα τοὺς συντελεστὰς τῶν ἀγνώστων ἀναγεγραμμένους εἰς ὀρθογώνιον παράταξιν τῆς μορφῆς :

$$\begin{pmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} \end{pmatrix} \text{ ἢ } \begin{bmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} \end{bmatrix}. \quad (1)$$

Τὴν ὀρθογώνιον ταύτην παράταξιν καλοῦμεν **πίνακα τῶν συντελεστῶν τῶν ἀγνώστων**. Ἐὰν εἰς τὴν ὀρθογώνιον παράταξιν (1) συμπεριλάβωμεν καὶ τοὺς σταθεροὺς ὅρους, τότε θὰ ἔχωμεν τὸν πίνακα :

$$\begin{pmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} & \beta_1 \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} & \beta_2 \end{pmatrix} \text{ ἢ } \begin{bmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} & \beta_1 \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} & \beta_2 \end{bmatrix} \quad (2)$$

τὸν ὅποιον καλοῦμεν **πίνακα δὲλων τῶν συντελεστῶν ἢ ἐπηγένημένον πίνακα**.

Ο πίνακας (2) ἔχει δύο γραμμὰς καὶ 3 στήλας, εἰναι, ὡς λέγομεν, εἰς 2×3 πίνακες.

Κατόπιν τῆς ἐνορατικῆς ταύτης εἰσαγωγῆς εἰς τὴν ἔννοιαν τοῦ πίνακος δίδομεν τὸν ἔξις γενικὸν ὄρισμόν :

Καλοῦμεν **πίνακα ἢ μήτρα (matrix)** μὲν γραμμὰς καὶ ν στήλας, καὶ τὸν συμβολίζομεν μὲν $A_{\mu \times v}$ ἢ ἀπλῶς μὲν A , μίαν ὀρθογώνιον (εἴτε τετραγωνικὴν) παράταξιν ἀριθμὸν a_{ij} ($i = 1, 2, \dots, \mu$, $j = 1, 2, \dots, v$), $a_{ij} \in \mathbb{R}$ ἢ γενικώτερον $a_{ij} \in \mathbb{C}$, ἢ τοι :

$$A \equiv \begin{bmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} & \dots & \alpha_{1v} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} & \dots & \alpha_{2v} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \alpha_{\mu 1} & \alpha_{\mu 2} & \dots & \alpha_{\mu v} \end{bmatrix} \quad (3)$$

Ο ἀνωτέρῳ πίνακα συμβολίζεται ἐπίστης καὶ ὡς $[\alpha_{ij}]$, $i = 1, 2, \dots, \mu$, $j = 1, 2, \dots, v$ ἢ $[\alpha_{ij}]_{\mu, v}$ ἢ ἀπλῶς $[\alpha_{ij}]$.

Αἱ μ ὄριζόντιαι ν—άδεις :

$$(\alpha_{11}, \alpha_{12}, \dots, \alpha_{1v}), (\alpha_{21}, \alpha_{22}, \dots, \alpha_{2v}), \dots, (\alpha_{\mu 1}, \alpha_{\mu 2}, \dots, \alpha_{\mu v})$$

εἰναι αἱ γραμμαὶ τοῦ πίνακος, καὶ αἱ ν κατακόρυφοι μ—άδεις :

$$\begin{bmatrix} \alpha_{11} \\ \alpha_{21} \\ \vdots \\ \alpha_{\mu 1} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \alpha_{12} \\ \alpha_{22} \\ \vdots \\ \alpha_{\mu 2} \end{bmatrix}, \dots, \begin{bmatrix} \alpha_{1v} \\ \alpha_{2v} \\ \vdots \\ \alpha_{\mu v} \end{bmatrix}$$

εἰναι αἱ στήλαι αὐτοῦ.

Οι άριθμοί μ και ν καλούνται διαστάσεις του πίνακος και είδικώτερον ό μέν άριθμός μ, όστις φανερώνει τὸ πλῆθος ὅλων τῶν γραμμῶν, καλεῖται «ψφος» τοῦ πίνακος, ό δὲ άριθμός ν, όστις φανερώνει τὸ πλῆθος ὅλων στηλῶν, καλεῖται «μῆκος» αὐτοῦ. Εἰς πίναξ μὲ μ γραμμὰς και ν στήλας καλεῖται εἰς μ ἐπὶ ν πίναξ ή πίναξ διαστάσεων $\mu \times \nu$. Οὔτως, ό πίναξ (1) είναι διαστάσεων 2×2 , ἐνῷ ό πίναξ (2) είναι διαστάσεων 2×3 . Οι άριθμοί α_{ij} καλούνται στοιχεῖα τοῦ πίνακος. Τὸ στοιχεῖον α_{ij} καλεῖται ή «ij-συντεταγμένη» και ἐμφανίζεται εἰς τὴν i-γραμμὴν και j-στήλην. Ό πρῶτος δείκτης i τοῦ στοιχείου α_{ij}, ἐπειδὴ φανερώνει τὴν γραμμήν, εἰς τὴν ὅποιαν ἀνήκει τὸ στοιχεῖον καλεῖται δείκτης γραμμῆς, ό δὲ δεύτερος δείκτης j, ἐπειδὴ φανερώνει τὴν στήλην καλεῖται δείκτης στήλης. Έὰν είναι $\mu = 1$, δηλαδὴ ἀν ό πίναξ (3) ἔχῃ μίαν μόνον γραμμήν, τότε λέγεται «πίναξ-γραμμή», ἐνῷ ἔὰν είναι $\nu = 1$, δηλ. ἀν ό πίναξ ἔχῃ μίαν μόνον στήλην, τότε λέγεται «πίναξ-στήλη». Εἰς τοιούτους πίνακας γράφομεν τὰ στοιχεῖα των συνήθως μὲ ἔνα δείκτην, όστις δηλοὶ ἀντιστοίχως τὴν στήλην ή τὴν γραμμήν, ήτοι γράφομεν :

$$A \equiv (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_\nu) \quad \text{η} \quad B \equiv \begin{bmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_\mu \end{bmatrix} \quad (4)$$

Έὰν είναι $\mu = \nu$, δηλαδὴ ὅταν τὸ πλῆθος τῶν γραμμῶν συμπίπτῃ μὲ τὸ πλῆθος τῶν στηλῶν ἐνὸς πίνακος, τότε οὕτως καλεῖται τετραγωνικὸς πίναξ διαστάσεως ν.

Τὰ στοιχεῖα : $\alpha_{11}, \alpha_{22}, \dots, \alpha_{\nu\nu}$ τοῦ τετραγωνικοῦ πίνακος

$$A \equiv \begin{bmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} & \dots & \alpha_{1\nu} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} & \dots & \alpha_{2\nu} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \alpha_{\nu 1} & \alpha_{\nu 2} & \dots & \alpha_{\nu\nu} \end{bmatrix} \quad (5)$$

λέγομεν δτι ἀποτελοῦν τὴν πρωτεύουσαν διαγώνιον αὐτοῦ, και τὰ στοιχεῖα : $\alpha_{1\nu}, \alpha_{2,\nu-1}, \dots, \alpha_{\nu 1}$, τὴν δευτερεύουσαν διαγώνιον αὐτοῦ.

Έὰν $\mu = \nu = 1$, δηλαδὴ ἀν ό πίναξ ἔχῃ ἐν μόνον στοιχεῖον, τότε γράφεται (α_{11}) ή ἀπλούστερον α_{11} , ἐφ' ὅστον δὲν ὑπάρχει φόβος συγχύσεως.

Εἰς τετραγωνικὸς πίναξ τοῦ ὅποιου ὅλα τὰ στοιχεῖα τὰ κείμενα ἔκτος τῆς πρωτευούστης διαγώνιου είναι μηδὲν καλεῖται διαγώνιος.

Οταν εἰς ἔνα διαγώνιον πίνακα ὅλα τὰ στοιχεῖα τῆς πρωτευούστης διαγώνιου ισοῦνται μὲ 1, τότε οὕτως καλεῖται μοναδιαῖος ή πίναξ μονὰς και παρίσταται συνήθως μὲ τὰ γράμματα E ή I. Οὔτως, ἐκ τῶν κάτωθι πινάκων :

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

δ πρῶτος είναι διαγώνιος και δ δεύτερος μοναδιαῖος.

Είς πίναξ τοῦ όποιου ὅλα τὰ στοιχεῖα εἶναι μηδέν, καλεῖται **μηδενικός** πίναξ, καὶ παρίσταται μὲ **O**, ἢτοι :

$$O \equiv \begin{bmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix} \quad (6)$$

Ἐάν εἰς τετραγωνικός πίναξ ἔχῃ τὰ συμμετρικὰ πρὸς τὴν πρωτεύουσαν διαγώνιον στοιχεῖα ἵσα, δῆλον. ἂν $\alpha_{ij} = \alpha_{ji}$, καλεῖται **συμμετρικός**.

Ἐάν τὰ στοιχεῖα ἐνὸς τετραγωνικοῦ πίνακος τὰ συμμετρικὰ πρὸς τὴν πρωτεύουσαν διαγώνιον εἶναι ἀντίθετα, ἢτοι ἂν $\alpha_{ij} = -\alpha_{ji}$, ὅπότε $\alpha_{ii} = 0$, τότε καλεῖται **ἀντισυμμετρικός**.

Οὕτως, ἐκ τῶν κάτωθι πινάκων :

$$\begin{bmatrix} 3 & 0 & -1 \\ 0 & 4 & 2 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 0 & -3 & 5 \\ 3 & 0 & -4 \\ -5 & 4 & 0 \end{bmatrix}$$

ὅ πρῶτος εἶναι συμμετρικός καὶ ὁ δεύτερος ἀντισυμμετρικός.

Οἱ πίνακες δὲν σημαίνουν πρᾶξιν τινα μεταξὺ τῶν στοιχείων αὐτῶν, τοῦτο ὅμως δὲν ἐμποδίζει νὰ ἔχουν οὗτοι μίαν μαθηματικὴν ἔννοιαν. Οὕτως, π.χ. ὁ πίναξ (α, β) , ὃπου $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, εἶναι ἐν διατεταγμένον ζεῦγος ἀριθμῶν καὶ παριστᾷ, ὡς γνωρίζομεν, ἓνα μιγαδικὸν ἀριθμόν. Οἱ πίνακες δὲν ἀποτελοῦν μόνον νέα μαθηματικὰ σύμβολα, εἰσάγονται καὶ ὡς νέα στοιχεῖα ἐπὶ τῶν όποιών δίδεται ὁ ὄρισμὸς τῆς Ισότητος καὶ δρίζονται πράξεις, ὡς ἡ πρᾶξις τῆς προσθέσεως καὶ τοῦ πολλαπλασιασμοῦ.

Τὸ σύνολον ὅλων τῶν πινάκων μὲν γραμμὰς καὶ ν στήλας, θὰ παρίσταται μὲ **$\mathcal{M}_{\mu\nu}$** .

Μεταξὺ τῶν στοιχείων τοῦ **$\mathcal{M}_{\mu\nu}$** δρίζομεν τὰ ἔξης :

§ 246. Ισότης πινάκων.— Δύο πίνακες $A \equiv [\alpha_{ij}]$ καὶ $B \equiv [\beta_{ij}]$ τῶν αὐτῶν διαστάσεων θὰ λέγωμεν ὅτι εἶναι ἵσοι, καὶ θὰ γράφωμεν : $A = B$, τότε, καὶ μόνον τότε, ἂν τὰ ἀντίστοιχα στοιχεῖα αὐτῶν εἶναι ἵσα, ἢτοι :

$$A_{\mu\nu} = B_{\mu\nu} \iff \alpha_{ij} = \beta_{ij} \quad \forall \begin{cases} i = 1, 2, \dots, \mu \\ j = 1, 2, \dots, v \end{cases} \quad (1)$$

Ἡ σχέσις αὗτη εἶναι προφανῶς **αὐτοπαθής**, συμμετρικὴ καὶ μεταβατικὴ (διατί;) . Ἐκ τῆς (1) προκύπτει ὅτι ἡ ισότης δύο μην πινάκων εἶναι ισοδύναμος πρὸς ἐν σύστημα $\mu \cdot v$ ισοτήτων μίαν δ' ἔκαστον ζεῦγος στοιχείων. Ὁ ὄρισμὸς τῆς Ισότητος πινάκων, μεταξὺ ἀλλών πλέονεκτημάτων, μᾶς παρέχει καὶ μίαν διευκόλυνσιν εἰς τὴν σύντομον γραφήν διαφόρων σχέσεων, ὡς π.χ. διὰ τὴν σύντομον ἔκφρασιν συστημάτων. Κατὰ ταῦτα ἡ ἔκφρασις :

Νὰ λυθῇ ἡ ἔξισωσις : $\begin{pmatrix} x+y & 2z+\omega \\ x-y & z-\omega \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$ εἶναι ἴσοδύναμος,
συμφώνως πρὸς τὸν δρισμὸν (1), μὲ τὸ κάτωθι σύστημα :

$$x+y=3, \quad x-y=1, \quad 2z+\omega=5, \quad z-\omega=4.$$

Ἡ λύσις τοῦ συστήματος τούτου εἶναι : $x=2, \quad y=1, \quad z=3, \quad \omega=-1$.

§ 247. Πρόσθεσις πινάκων καὶ ἀριθμητικὸς πολλαπλασιασμός.—

Διὰ νὰ δρίσωμεν τὸ ἄθροισμα δύο πινάκων, θεωροῦμεν ἀναγκαῖον, ὅπως οἱ δύο πίνακες ἔχουν τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν γραμμῶν καὶ στηλῶν. Κατόπιν τούτου, ἂν οἱ πίνακες $A \equiv [\alpha_{ij}]$ καὶ $B \equiv [\beta_{ij}]$ εἶναι τῶν αὐτῶν διαστάσεων μην, τότε ὡς ἄθροισμα αὐτῶν δρίζεται ὁ μην πίναξ $\Gamma \equiv [\gamma_{ij}]$, τοῦ ὅποιου τυχὸν στοιχεῖον εἶναι ἄθροισμα τῶν ἀντιστοίχων στοιχείων τῶν πινάκων A καὶ B , ἦτοι :

$$\boxed{\Gamma = A + B \iff \gamma_{ij} = a_{ij} + b_{ij} \quad \forall \begin{cases} i = 1, 2, \dots, \mu \\ j = 1, 2, \dots, v \end{cases}} \quad (1)$$

Ἀναλυτικώτερον, ἔάν :

$$A \equiv \begin{bmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} & \dots & \alpha_{1v} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} & \dots & \alpha_{2v} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \alpha_{\mu 1} & \alpha_{\mu 2} & \dots & \alpha_{\mu v} \end{bmatrix} \quad \text{καὶ} \quad B \equiv \begin{bmatrix} \beta_{11} & \beta_{12} & \dots & \beta_{1v} \\ \beta_{21} & \beta_{22} & \dots & \beta_{2v} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \beta_{\mu 1} & \beta_{\mu 2} & \dots & \beta_{\mu v} \end{bmatrix},$$

τότε ὡς ἄθροισμα αὐτῶν δρίζεται ὁ πίναξ :

$$A + B \equiv \begin{bmatrix} \alpha_{11} + \beta_{11} & \alpha_{12} + \beta_{12} & \dots & \alpha_{1v} + \beta_{1v} \\ \alpha_{21} + \beta_{21} & \alpha_{22} + \beta_{22} & \dots & \alpha_{2v} + \beta_{2v} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \alpha_{\mu 1} + \beta_{\mu 1} & \alpha_{\mu 2} + \beta_{\mu 2} & \dots & \alpha_{\mu v} + \beta_{\mu v} \end{bmatrix}.$$

Ως γινόμενον ἐνὸς ἀριθμοῦ $\lambda \in \mathbb{R}$ ἐπὶ πίνακα A δρίζεται εἰς πίναξ, ὅστις σημειοῦται μὲ λ· A ἢ ἀπλῶς λA , καὶ προκύπτει ἐκ τοῦ A ἂν δλα τὰ στοιχεῖα του πολλαπλασιασθοῦν ἐπὶ λ , ἦτοι :

$$\lambda A \equiv \begin{bmatrix} \lambda \alpha_{11} & \lambda \alpha_{12} & \dots & \lambda \alpha_{1v} \\ \lambda \alpha_{21} & \lambda \alpha_{22} & \dots & \lambda \alpha_{2v} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \lambda \alpha_{\mu 1} & \lambda \alpha_{\mu 2} & \dots & \lambda \alpha_{\mu v} \end{bmatrix}$$

Παρατηροῦμεν ὅτι ὁ λA εἶναι ἐπίστης εἰς μην πίναξ.

Ἐπίστης δρίζομεν :

$$-A = (-1) \cdot A \quad \text{καὶ} \quad A - B = A + (-B).$$

Ο πίναξ $-A$ τοῦ ὅποιου στοιχεῖα εἶναι τὰ ἀντίθετα τῶν στοιχείων τοῦ A καλεῖται ἀντίθετος τοῦ A .

*Εφαρμογή. Έστω $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 4 & 5 & -6 \end{pmatrix}$ και $B = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 2 \\ -7 & 1 & 8 \end{pmatrix}$. Τότε:

$$A + B = \begin{pmatrix} 1+3 & -2+0 & 3+2 \\ 4-7 & 5+1 & -6+8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & -2 & 5 \\ -3 & 6 & 2 \end{pmatrix}$$

$$3A = \begin{pmatrix} 3 \cdot 1 & 3 \cdot (-2) & 3 \cdot 3 \\ 3 \cdot 4 & 3 \cdot 5 & 3 \cdot (-6) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -6 & 9 \\ 12 & 15 & -18 \end{pmatrix}$$

$$2A - 3B = \begin{pmatrix} 2 & -4 & 6 \\ 8 & 10 & -12 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -9 & 0 & -6 \\ 21 & -3 & -24 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -7 & -4 & 0 \\ 29 & 7 & -36 \end{pmatrix}.$$

*§ 248. "Εννοια τοῦ διανυσματικοῦ χώρου.—Τὸ σύνολον $\mathcal{M}_{\mu\nu}$ τῶν πινάκων μὲ μ γραμμὰς καὶ ν στήλας ἔχει ἐφωδιασθῆ μὲ δύο πράξεις: τὴν πρόσθεσιν πινάκων καὶ τὸν πολλαπλασιασμὸν ἐνὸς πίνακος ἐπὶ πραγματικὸν ἀριθμὸν. Αἱ πράξεις αὗται ἔχουν τὰς ἀκολούθους βασικὰς ιδιότητας, ὡς δύναται τις νὰ ἀποδεῖξῃ εὐκόλως:

Διὰ τυχόντας πίνακας $A, B, \Gamma \in \mathcal{M}_{\mu\nu}$ καὶ τυχόντας πραγματικὸς ἀριθμοὺς k, λ ίσχύουν:

Πρόσθεσις

- (i) $A + B = B + A$
- (ii) $A + (B + \Gamma) = (A + B) + \Gamma$
- (iii) $A + \mathbf{O} = \mathbf{O} + A = A$
- (iv) $A + (-A) = (-A) + A = \mathbf{O}$

Πολλαπλασιασμὸς ἐπὶ ἀριθμὸν

- $k(A + B) = kA + kB$
- $(k + \lambda)A = kA + \lambda A$
- $k(\lambda A) = (k\lambda)A$
- $1A = A$

Σύνολα, ὡς τὸ σύνολον τῶν πινάκων $\mathcal{M}_{\mu\nu}$ μὲ μ γραμμὰς καὶ ν στήλας, ἐφωδιασμένα μὲ δύο πράξεις τὴν πρόσθεσιν καὶ τὸν πολλαπλασιασμὸν ἐπὶ ἀριθμὸν (συντελεστὴν) καὶ διὰ τὰς δοποὶς ίσχύουν αἱ ἀνωτέρω ιδιότητες, καλοῦνται διανυσματικοὶ χῶροι.

Εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν τὰ στοιχεῖα τοῦ $\mathcal{M}_{\mu\nu}$ καλοῦνται διανύσματα, τὰ δὲ στοιχεῖα τοῦ R καλοῦνται βαθμωτὰ (ἢ ἐκτελεστα). Οἱ πίνακες λοιπὸν εἰναι τὰ διανύσματα ἐνὸς διανυσματικοῦ χώρου. Περὶ τῆς θεμελιώδους ἐννοίας τοῦ διανυσματικοῦ χώρου θὰ γνωρίσωμεν περισσότερα εἰς τὴν ἕκτην τάξιν.

§ 249. Πολλαπλασιασμὸς πινάκων.—"Έστω \mathcal{M} τὸ σύνολον δλων τῶν πινάκων: τότε μεταξὺ ὀρισμένων ζευγῶν ἔξ αὐτῶν ὁρίζεται μία πρᾶξις καλούμενη πολλαπλασιασμὸς ὡς ἔξης:

α'). Πολλαπλασιασμὸς «γραμμὴ ἐπὶ στήλην»: "Έστωσαν $A \equiv (\alpha_i)$ καὶ $B \equiv [\beta_j]$ δύο πίνακες, ἔξ ὧν ὁ πρῶτος εἶναι εἰς πίναξ—γραμμὴ μὲ ν στήλας καὶ ὁ δεύτερος πίναξ—στήλη μὲ ν γραμμὰς: τότε ὁρίζομεν ὡς γινόμενον αὐτῶν $A \cdot B$ ἕνα πίνακα μὲ ἕνα στοιχεῖον οὕτω:

$$A \cdot B = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_v) \cdot \begin{bmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_v \end{bmatrix} = (\alpha_1 \beta_1 + \alpha_2 \beta_2 + \dots + \alpha_v \beta_v) \quad (1)$$

β'). Πολλαπλασιασμὸς πινάκων: "Έστωσαν τώρα δύο πίνακες $A_{\mu\nu} \equiv [\alpha_{ij}] \in \mathcal{M}$ καὶ $B_{\nu\rho} \equiv [\beta_{jk}] \in \mathcal{M}$, οἱ δοποὶ πληροῦν τὴν συνθήκην: Τὸ πλῆθος τῶν στηλῶν τοῦ A ίσοῦται μὲ τὸ πλῆθος τῶν γραμμῶν τοῦ B . Τότε ὁρί-

Ζομεν ώς γινόμενον $A_{\mu\nu} \cdot B_{\nu\rho}$ τῶν πινάκων τούτων, ένα πίνακα $\Gamma_{\mu\rho} = [\gamma_{ik}]$, τοῦ δόπιου τὸ τυχὸν στοιχεῖον γ_{ik} προέρχεται ἐκ τοῦ πολλαπλασιασμοῦ τῆς ἡ γραμμῆς τοῦ πίνακος A ἐπὶ τὴν κ στήλην τοῦ B , εἶναι δηλαδή :

$$A_{\mu\nu} \cdot B_{\nu\rho} \equiv \begin{bmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} & \dots & \alpha_{1v} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} & \dots & \alpha_{2v} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \alpha_{\mu 1} & \alpha_{\mu 2} & \dots & \alpha_{\mu v} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \beta_{11} & \beta_{12} & \dots & \beta_{1\rho} \\ \beta_{21} & \beta_{22} & \dots & \beta_{2\rho} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \beta_{v1} & \beta_{v2} & \dots & \beta_{v\rho} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \gamma_{11} & \gamma_{12} & \dots & \gamma_{1\rho} \\ \gamma_{21} & \gamma_{22} & \dots & \gamma_{2\rho} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \gamma_{\mu 1} & \gamma_{\mu 2} & \dots & \gamma_{\mu \rho} \end{bmatrix} = \Gamma,$$

ὅπου $\gamma_{ik} = \alpha_{i1} \beta_{1k} + \alpha_{i2} \beta_{2k} + \dots + \alpha_{iv} \beta_{vk} = \sum_{j=1}^v \alpha_{ij} \beta_{jk}$.

Προφανῶς δ πίναξ Γ ἔχει μ γραμμὰς (ὅσας δ A) καὶ ρ στήλας (ὅσας δ B), δηλ. θὰ ἔχωμεν : $A_{\mu\nu} \cdot B_{\nu\rho} = \Gamma_{\mu\rho}$.

Τονίζομεν ὅτι : τὸ γινόμενον AB δὲν δρίζεται, ἀν δ A εἶναι εἰς μηκ πίναξ καὶ δ B εἶναι εἰς λχρ πίναξ, ὅπου $k \neq \lambda$.

Παράδειγμα 1ον :

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & 0 & 4 \\ 1 & 3 & -6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot (-2) + 2 \cdot 1 & 1 \cdot 0 + 2 \cdot 3 & 1 \cdot 4 + 2 \cdot (-6) \\ -1 \cdot (-2) + 3 \cdot 1 & -1 \cdot 0 + 3 \cdot 3 & -1 \cdot 4 + 3 \cdot (-6) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 6 & -8 \\ 5 & 9 & -22 \end{pmatrix}$$

2ον :

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + 2 \cdot 0 & 1 \cdot 1 + 2 \cdot 2 \\ 3 \cdot 1 + 4 \cdot 0 & 3 \cdot 1 + 4 \cdot 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 3 & 11 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + 1 \cdot 3 & 1 \cdot 2 + 1 \cdot 4 \\ 0 \cdot 1 + 2 \cdot 3 & 0 \cdot 2 + 2 \cdot 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 6 \\ 6 & 8 \end{pmatrix}.$$

Ἐκ τοῦ δευτέρου παραδείγματος συμπεραίνομεν, ὅτι ἡ ἰδιότης τῆς ἀντιμεταθέσεως ἐν τῷ πολλαπλασιασμῷ δὲν ἴσχυει γενικῶς ἐπὶ τῶν πινάκων.

‘Οπωσδήποτε ὅμως δ πολλαπλασιασμὸς πινάκων ἴκανοποιεῖ τὰς ἀκολούθους ἰδιότητας, ἐφ’ ὅσον βεβαίως αἱ σημειούμεναι κάτωθεν πράξεις εἶναι ἐκτελεσταί, ἢτοι ἐφ’ ὅσον κατὰ τὸν πολλαπλασιασμὸν δύο πινάκων AB τὸ πλῆθος τῶν στηλῶν τοῦ A συμφωνεῖ μὲ τὸ πλῆθος τῶν γραμμῶν τοῦ B :

- 1) $A(B\Gamma) = (AB)\Gamma$ (προσεταιριστικὴ ἰδιότης)
- 2) $A(B + \Gamma) = AB + A\Gamma$ (ἐπιμεριστικὴ ἰδιότης ἐξ ἀριστερῶν)
- 3) $(B + \Gamma)A = BA + \Gamma A$ (ἐπιμεριστικὴ ἰδιότης ἐκ δεξιῶν)
- 4) $k(AB) = (kA)B = A(kB)$, ὅπου $k \in \mathbb{R}$.

Παρατηροῦμεν ὅτι $OA = AO = O$, ὅπου O εἶναι ὁ μηδενικὸς πίναξ.

§ 250. Ὁ ἀνάστροφος ἐνδὲς πίνακος.— Δοθέντος ἐνὸς πίνακος $A_{\mu\nu} = [\alpha_{ij}]$ καλοῦμεν ἀνάστροφον αὐτοῦ καὶ τὸν συμβολίζομεν μὲ A^t , τὸν πίνακα, ὅστις προκύπτει ἐκ τοῦ $A_{\mu\nu}$, ἀν αἱ γραμμαὶ του γραφοῦν, κατὰ τὴν αὐτὴν τάξιν, ὡς στῆλαι (καὶ αἱ στῆλαι του ὡς γραμμαί), ἢτοι :

$$\begin{bmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} & \dots & \alpha_{1v} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} & \dots & \alpha_{2v} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \alpha_{\mu 1} & \alpha_{\mu 2} & \dots & \alpha_{\mu v} \end{bmatrix}^t = \begin{bmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{21} & \dots & \alpha_{\mu 1} \\ \alpha_{12} & \alpha_{22} & \dots & \alpha_{\mu 2} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \alpha_{1v} & \alpha_{2v} & \dots & \alpha_{\mu v} \end{bmatrix}$$

Παρατηροῦμεν ὅτι ὁ ἀνάστροφος τοῦ $A_{\mu\nu}$ εἶναι εἰς νχμ πίναξ.

$$\text{Παράδειγμα : } \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 3 & -4 & 0 \end{pmatrix}^t = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -4 \\ 5 & 0 \end{pmatrix}.$$

Διά τούς άναστρόφους πίνακας διποδεικνύονται εύκολως αἱ ἀκόλουθοι ἴδιοι-τῆτες :

- 1) $(A^t)^t = A$, 2) $O^t = O$, 3) $(-A)^t = -A^t$, 4) $(A+B)^t = A^t + B^t$,
- 5) $(A-B)^t = A^t - B^t$, 6) $(kA)^t = kA^t$, $\forall k \in \mathbb{R}$, 7) $(AB)^t = B^t \cdot A^t$.

§ 251. Ὁ ἀντίστροφος τετραγωνικοῦ πίνακος.— "Εστωσαν δύο τετραγωνικοὶ πίνακες $A_v \equiv A$ καὶ $B_v \equiv B$. Τότε, ὡς γνωστόν, δρίζεται ὁ πίναξ $A \cdot B$ ὡς καὶ ὁ πίναξ $B \cdot A$. "Αν συμβῇ : $A \cdot B = B \cdot A = E$, ἔνθα Ε εἶναι ὁ μοναδιαῖος πίναξ, τότε λέγομεν ὅτι ὁ πίναξ B εἶναι ἀντίστροφος τοῦ πίνακος A καὶ γράφομεν : $B = A^{-1}$. Λόγω τῆς συμμετρίας καὶ ὁ πίναξ A εἶναι ὁ ἀντίστροφος τοῦ πίνακος B , ἦτοι : $A = B^{-1}$.

Παράδειγμα. "Εστω :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 3 & -5 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

"Εχομεν :

$$\begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -5 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6-5 & -10+10 \\ 3-3 & -5+6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & -5 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6-5 & 15-15 \\ -2+2 & -5+6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

"Οθεν οἱ A καὶ B εἶναι ἀντίστροφοι.

§ 252. Πίνακες καὶ συστήματα γραμμικῶν ἔξισώσεων.— Τὸ κάτωθι σύστημα γραμμικῶν ἔξισώσεων :

$$\begin{aligned} 2x + 3y - 4z &= 7 \\ x - 2y - 5z &= 3 \end{aligned} \tag{1}$$

εἶναι ἰσοδύναμον πρὸς τὴν «ἔξισωσιν πίνακος» :

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & -4 \\ 1 & -2 & -5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 3 \end{pmatrix} \text{ ἢ συντόμως } AX = B, \tag{2}$$

$$\text{ὅπου } A \equiv \begin{pmatrix} 2 & 3 & -4 \\ 1 & -2 & -5 \end{pmatrix}, \quad X \equiv \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \text{ καὶ } B \equiv \begin{pmatrix} 7 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

"Ητοι πᾶσα λύσις τοῦ συστήματος (1) εἶναι μία λύσις τῆς ἔξισώσεως (2) καὶ ἀντιστρόφως. Παρατηροῦμεν ὅτι τὸ ἀντίστοιχον ὁμογενὲς σύστημα τοῦ (1) εἶναι τότε ἰσοδύναμον πρὸς τὴν ἔξισωσιν πίνακος : $AX = O$. 'Ο πίναξ A τῶν συντελεστῶν καλεῖται πίναξ τῶν συντελεστῶν τοῦ συστήματος, ἐνῷ ὁ πίναξ :

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & -4 & 7 \\ 1 & -2 & -5 & 3 \end{pmatrix}$$

καλεῖται ἐπηγξημένος πίναξ τοῦ (1). Παρατηροῦμεν ὅτι τὸ σύστημα (1) δρίζεται πλήρως ἐκ τοῦ ἐπηγξημένου πίνακος.

570. Υπολογίσατε τὰ κάτωθι :

$$1) \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 & 4 \\ 0 & -5 & 1 & -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 & -5 & 6 & -1 \\ 2 & 0 & -2 & -3 \end{pmatrix}$$

$$2) \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & -4 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}, \quad 3) -3 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 4 & -5 & 6 \end{pmatrix}.$$

571. Δίδονται :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -5 & 1 \\ 3 & 0 & -4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -3 \\ 0 & -1 & 5 \end{pmatrix}, \quad \Gamma = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -2 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Εύρετε : 1) $3A + 4B - 2\Gamma$, 2) $A + 2B - 4\Gamma$, 3) $A^t + B^t - \Gamma^t$, 4) AA^t , 5) $A^t A$.

572. Εύρετε τὰ x, y, z, ω ἔαν :

$$3 \begin{pmatrix} x & y \\ z & \omega \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x & 6 \\ -1 & 2\omega \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 & x+y \\ z+\omega & 3 \end{pmatrix}.$$

$$573. \Delta\deltaεται : A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & -3 \end{pmatrix}.$$

Εύρετε : 1) A^t , 2) A^3 , 3) $f(A)$, δηπου $f(x) = 2x^3 - 4x + 5$.

574. Δείξατε ότι ὁ πίνακας A τῆς ἀνωτέρω ἀσκήσεως είναι ρίζα τοῦ πολυωνύμου :

$$g(x) = x^2 + 2x - 11.$$

575. Νὰ ἀποδειχθῇ ότι :

$$\begin{bmatrix} \text{συνα} & \eta\mu\alpha \\ -\eta\mu\alpha & \text{συνα} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \text{συνα} & \eta\mu\alpha \\ -\eta\mu\alpha & \text{συνα} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \text{συν}2\alpha & \eta\mu2\alpha \\ -\eta\mu2\alpha & \text{συν}2\alpha \end{bmatrix}.$$

576. Νὰ ἀποδειχθῇ ότι :

$$\begin{pmatrix} \alpha & 1 \\ 0 & \alpha \end{pmatrix}^v = \begin{pmatrix} \alpha^v & v\alpha^{v-1} \\ 0 & \alpha^v \end{pmatrix}.$$

577. Προσδιορίσατε τοὺς πίνακας $X, Y \in \mathcal{M}_{2 \times 2}$, γνωστοῦ ὅντος ότι :

$$3 \cdot X + 4 \cdot Y = \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ -12 & 9 \end{bmatrix}$$

$$-2 \cdot X + 3 \cdot Y = \begin{bmatrix} 8 & -7 \\ -9 & -6 \end{bmatrix}.$$

578. Έὰν $X = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$, νὰ δρισθοῦν οἱ k καὶ λ εἰς τὴν ἑξίσωσιν :

$$X^2 - kX + \lambda E = O, \quad (E = \text{μοναδιαῖος πίνακας}, \quad O = \text{μηδενικὸς πίνακας}).$$

579. Δίδεται ὁ τετραγωνικὸς πίνακς :

$$A = \begin{bmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{bmatrix}.$$

Νὰ εὐρεθοῦν αἱ συνθῆκαι ὑπάρχεισαν τοῦ ἀντιστρόφου πίνακος καὶ νὰ ὑπολογισθῇ οὗτος.

580. Νὰ εὔρεθῃ ὁ ἀντιστροφός τοῦ πίνακος.

$$\begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}.$$

581. Νὰ λυθῇ ἡ «έξισωσις» :

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 4 & 1 & -1 \\ -3 & 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

582. Δείξατε ότι : ὁ ἀντιστροφός τοῦ ἀντιστρόφου ἐνὸς πίνακος A ισοῦται μὲ τὸν ἀντίστροφον τοῦ ἀναστρόφου τοῦ A , ἢτοι : $(A^{-1})^t = (A^t)^{-1}$.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ XII

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΩΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ

I. ΕΝΟΠΑΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣ ΤΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ

§ 253. Ιστορική είσαγωγή.—Η Θεωρία τῶν Πιθανοτήτων διφείλει τὴν γένεσίν της εἰς τὰ τυχηρά παιγνίδια καὶ συγκεκριμένως εἰς τὰ παιγνίδια τῶν κύβων (ζάρια). Πρὸ τριακοσίων περίπου ἑπτῶν ὁ Γάλλος Ιππότης Chevalier de Méré (1614), διάσημος παίκτης, ἐνδιεφέρετο διὰ τὰς περιπτώσεις ἐπιτυχίας εἰς ἔνα τυχηρὸν παιγνίδιον πολὺ διαδεσμένον κατὰ τὸν 17ον αἰώνα. 'Ἐπειδὴ ἔχει τὴν ἐντύπωσιν διτὶ οἱ ὑπολογισμοὶ του ἡσαν λανθασμένοι, συνεβούλευθη τὸν Blaise Pascal (1623 - 1662), τοῦ ὅποιου ἡ μεγαλοφύια κατεγίνετο μὲ τὴν θεολογίαν, τὰ μαθηματικὰ καὶ τὰς φυσικὰς ἐπιστήμας. 'Ἐνῷ ειργάζετο ἐπὶ τοῦ προβλήματος τοῦ de Méré, ὁ Pascal ἀντιμετώπισε καὶ ἀλλα ἐνδιαφέροντα ἔρωτήματα ἐπὶ τῶν πιθανοτήτων. Τὰ ἔρωτήματα αὐτὰ ἔδωσαν ἀφορμὴν διὰ μίαν καρποφόρον ἀλληλογραφίαν μεταξὺ Pascal καὶ Fermat (1608 - 1665), ἐνὸς ἀλλού ἐπίσης μεγάλου μαθηματικοῦ. 'Ο Fermat ἐμελέτησεν τόσον τὰ ἐν λόγῳ προβλήματα, δύον καὶ τὰς λύσεις τὰς δοθείσας ὑπὸ τοῦ Pascal, πολλὰς τῶν ὅποιών καὶ ἐγενίκευσεν. Τοιουτορόπως, εἰς τὴν ἀλληλογραφίαν τῶν δύο αὐτῶν σοφῶν ἐτέθησαν οὐσιαστικῶς αἱ πρῶται βάσεις τῆς Θεωρίας τῶν Πιθανοτήτων, διὰ τὴν ὅποιαν ὁ Pascal ἐπρότεινεν τὸ ὄνομα «Γεωμετρία τῆς τύχης».

Ἡ Θεωρία τῶν Πιθανοτήτων ἀπῆχθόλησεν ἐν συνεχείᾳ πλείστους μεγάλους μαθηματικούς, ώς τὸν J. Bernoulli, τὸν Leibnitz, τὸν De Moivre, τὸν Euler, τὸν Lagrange, τὸν Gauss. 'Ἐπεφυλάσσετο ὅμως εἰς τὸν Laplace (1749 - 1827) ἡ τιμὴ νὰ συστηματοποιήσῃ δλας τὰς μέχρι αὐτοῦ γνωσεις, νὰ ἐπεκτείνῃ αὐτάς, χρησιμοποιῶν τὰς πλέον προηγμένας μεθόδους τῆς 'Ἀναλύσεως καὶ νὰ δώσῃ εἰς τὴν θεωρίαν αὐτὴν τὴν κλασσικήν της μαθηματικήν μορφήν, ὑπὸ τὴν ὅποιαν μᾶς είναι γνωστὴ σήμερον.

'Ἐπι ἔβδομήκοντα καὶ πλέον ἔτη αἱ ἰδέαι τοῦ Laplace ἐκυριάρχησαν καὶ ἐδέσμευσαν τὴν Θεωρίαν τῶν Πιθανοτήτων. Περὶ τὰ τέλη τοῦ παρελθόντος αἰῶνος δύο μεγάλοι μαθηματικοὶ ὁ J. Bertrand καὶ ὁ H. Poincaré ἐσημείωσαν νέαν ἐποχήν. Οὕτοι μὲ τὴν αὐστηράν κριτικήν των κατὰ τοῦ δρισμοῦ τῆς πιθανότητος τοῦ νίσθετηθέντος ὑπὸ τοῦ Laplace ἐδημιούργησαν περίοδον κρίσεως διὰ τὴν Θεωρίαν τῶν Πιθανοτήτων, περίοδον ἡτὶς κατὰ τὴν διαφρεύσασαν πεντηκονταετίαν ὑπῆρχεν ἔξαιρετικὰ γόνιμος ἀπὸ πάστης ἀπόφεως.

'Η νεωτέρα ἀνάπτυξις τῆς Θεωρίας τῶν Πιθανοτήτων χαρακτηρίζεται τόσον ἀπὸ ἐνδιαφέρον πρὸς αὐτὴν ταύτην τὴν θεωρίαν δύον καὶ πρὸς τὴν κατεύθυνσιν διευρύνσεως τῶν ἐφαρμογῶν αὐτῆς. Σημαντική είναι ἡ συμβολὴ τῆς Μαθηματικῶν τοῦ τρέχοντος αἰῶνος Lindeberg, S. Bernstein, A. Kolmogorov, P. Lévy καὶ Emile Borel.

'Η Θεωρία τῶν Πιθανοτήτων, δημιουργηθείσα ἀρχικῶς, ὡς ἐλέχθη ἀνωτέρω, διὰ νὰ ἴκανοποιήσῃ δτορίας, αἱ ὅποιαι προέκυψαν ἀπὸ τὸ τυχηρὰ παιγνίδια, κατέστη σήμερον τόσον σημαντική, ὥστε νὰ ἀποτελῇ βασικὴν συμβολὴν εἰς τὸ ἔργον τῶν κοινωνιῶν καὶ φυσικῶν ἐπιστημῶν καὶ εἰς τὴν ἀντιμετώπισιν τῶν πρακτικῶν προβλημάτων τῆς διοικήσεως καὶ τῆς βιομηχανίας. Τοιουτορόπως, εἰς τὴν Θεωρίαν τῶν Πιθανοτήτων προστέχουν οἱ Φυσικοὶ διὰ νὰ ἐπεκτείνουν τὰ ὄρια τῆς κλασσικῆς Φυσικῆς. Δι' αὐτῆς οἱ Βιολόγοι κατορθώνουν νὰ ἀντιμετωπίζουν τοὺς ποσοτικούς νόμους τῆς κληρονομικότητος. Οἱ Μετεωρολόγοι, οἱ 'Αστρονόμοι δι' αὐτῆς ἐπεξεργά-

ζονται τὰς παρητηρήσεις των καὶ εἰς τὴν θεωρίαν αὐτὴν βασίζουν μέγαν ἀριθμὸν τῶν προβλέψεών των. Οἱ οἰκονομολόγοι δι' αὐτῆς προσπαθοῦν νὰ ἀνακαλύψουν τοὺς νόμους τῶν οἰκονομικῶν φαινομένων. Εἰς τὴν Βιομηχανίαν ἡ ἐν σειρᾷ παραγωγὴ ὑπόκειται εἰς τοὺς νόμους τῶν Πιθανοτήτων. "Ολαι ἀλλως τε αἱ παρατηρήσεις, δλαι αἱ μετρήσεις τῶν Θετικῶν Ἐπιστημῶν ὁφείλουν τελικῶς νὰ ὑποστοῦν ἐπεξεργασίαν διὰ τῶν μεθόδων τῆς Θεωρίας τῶν Πιθανοτήτων. Τέλος ἡ Στατιστική, τῆς δόποις ἡ σημασία ἀποδεικνύεται διαφράγματι μεγαλυτέρᾳ εἰς δλας τὰς περιοχὰς τῆς ἀνθρωπίνης γνώσεως, ὅποτελεῖ τὴν σπουδαιοτέραν ἔφαρμογὴν τῆς Θεωρίας τῶν Πιθανοτήτων.

Τὰ ἀνωτέρω παραδείγματα ἔφαρμογῶν δεικνύουν τὴν εὐρύτητα τῶν ἔφαρμογῶν τῆς Θεωρίας τῶν Πιθανοτήτων, καὶ συνεπῶς τὴν χρησιμότητα ταύτης, ἀνεξαρτήτως τοῦ ἐνδιαφέροντος καὶ τῆς ὥραιαστητος τὴν δόποιαν παρουσιάζει αὕτη ὡς κλάδος τῆς Μαθηματικῆς Ἐπιστήμης μὲ Ιδίας μεθόδους καὶ προβλήματα.

§ 254. Ἀρχικαὶ ἔννοιαι τῆς Θεωρίας τῶν Πιθανοτήτων. — Ὡς γνωστόν, κάθε κλάδος τῶν Μαθηματικῶν θεμέλιοῦται ἐπὶ ἐλαχίστων ἀπλῶν ἔννοιῶν, αἱ δόποιαι εἰναι ἔμφυτοι εἰς τὸν ἀνθρώπινον νοῦν καὶ αἱ ὄποιαι δὲν δύνανται νὰ δρισθοῦν τῇ βοηθείᾳ ἀλλων ἔννοιῶν, δι' ὃ καὶ καλοῦνται ἀρχικαὶ ἔννοιαι. Οὔτω, π.χ. εἰς τὰ δύο πρῶτα κεφάλαια τοῦ παρόντος βιβλίου ἔγνωρίσαμεν τοιαύτας ἔννοιάς, ὡς τὴν ἔννοιαν τῆς «λογικῆς προτάσεως», τὴν ἔννοιαν τοῦ «συνόλου» κ.ἄ. Ἐπίσης εἰς τὴν Γεωμετρίαν ἔχομεν τὴν ἔννοιαν τοῦ σημείου, τῆς εύθείας, τοῦ χώρου κλπ. ὡς ἀρχικὰς ἔννοιας.

Εἰς τὴν Θεωρίαν τῶν Πιθανοτήτων ὡς ἀρχικαὶ ἔννοιαι εἰναι αἱ ἔξῆς δύο :

- α') Ἡ ἔννοια τοῦ «πειράματος τύχης», καὶ
- β') Ἡ ἔννοια τοῦ «ἀπλοῦ συμβάντος ἢ ἐνδεχόμενου», ἢ ἀλλως τοῦ «στοιχειῶδους γεγονότος»

Θὰ κάμωμεν μίαν πρώτην γνωριμίαν μὲ τὰς ἔννοιάς αὐτὰς μὲ μερικὰ παραδείγματα :

Παραδειγμα 1ον : "Ολοι γνωρίζομεν ὅτι κάθε μεταλλικὸν νόμισμα (κέρμα) ἔχει δύο ὅψεις, ἐκ τῶν δόποιων τὴν μίαν καλοῦμεν συνήθως «κορώνα» καὶ τὴν ἄλλην «γράμματα». "Ας ὑποθέσωμεν, ὅτι ρίπτομεν εἰς τὸν ἀέρα ἓν κέρμα καὶ ἀκολούθως ὅς κατευθύνωμεν τὴν προσοχήν μας εἰς τὴν ἔνδειξιν, ἥτις φέρεται ἐπὶ τῆς δρατῆς ὅψεως τοῦ κέρματος, ὅταν τοῦτο καταπέσῃ ἐπὶ τοῦ ἐδάφους καὶ ἥρεμήσῃ (Ἡ ρίψις δὲν λαμβάνεται ὑπὸ ὅψιν ἃν τὸ κέρμα σταθῇ ὅρθιον). "Ἡ ρίψις τοῦ κέρματος εἰς τὸν ἀέρα ἀποτελεῖ ἔνα «πείραμα». Λέγομεν δὲ εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν ὅτι ἔκτελοῦμεν ἔνα «πείραμα τύχης» ἀκριβέστερον ἓν «ἀπλοῦν πείραμα τύχης». Τὸ νόμισμα πίπτον ἐπὶ τοῦ ἐδάφους θὰ ἐμφανίσῃ (ἐπὶ τῆς δρατῆς ὅψεως) τὴν ἔνδειξιν «κορώνα» ἢ τὴν ἔνδειξιν «γράμματος». Τὸ ἀποτέλεσμα δηλαδὴ τοῦ ἀνωτέρω πειράματος εἰναι ἡ ἐμφάνισις ἐπὶ τῆς ἄνω ὅψεως τοῦ νομίσματος ἀκριβῶς μιᾶς τῶν δύο ἔνδειξεων : «κορώνα», «γράμματα». Κάθε δὲ τοιαύτη ἐμφάνισις καλεῖται ἔνα «ἀπλοῦν συμβάν», ἢ ἀλλως ἔνα «στοιχειῶδες γεγονός».

"Ωστε, εἰς τὸ πείραμα «κορώνα-γράμματα» ἔχομεν δύο ἀπλὰ συμβάντα :

1ον). Τὸ ἀπλοῦν συμβάν : «Τὸ νόμισμα δεικνύει τὴν ὅψιν κορώνα» (συμβολ. «Κ»).

2ον). Τὸ ἀπλοῦν συμβάν : «Τὸ νόμισμα δεικνύει τὴν ὅψιν γράμματα» (συμβολ. «Γ»).

“Εχομεν λοιπὸν ἐν προκειμένῳ ἔνα πείραμα τύχης καὶ δύο ἀπλᾶ συμβάντα συνηρητημένα μὲ τὸ πείραμα.

Παράδειγμα 2ον : (*Πείραμα μὲ κύβον*).

“Ολοι γνωρίζομεν ἐπίστης τὸν κύβον (ζάρι), ὁ δποῖος χρησιμοποιεῖται εἰς τὰ τυχηρὰ παιγνίδια. Οὗτος εἶναι μικρὸς κύβος, κατὰ τὸ δυνατὸν συμμετρικός, ἐπὶ τῶν 6 ὅψεων (έδρων) τοῦ δποίου εἶναι ἀναγεγραμμένοι (συνήθως μὲ κοκκίδας) ἀνὰ εἰς τῶν ἀριθμῶν : 1, 2, 3, 4, 5, 6. Αἱ ἐνδείξεις αὐταὶ εἶναι διατεταγμέναι οὕτως ὥστε τὸ ἄθροισμα τῶν ἐνδείξεων δύο παραλλήλων ὅψεων εἶναι πάντοτε 7.

Ρίπτομεν τώρα ἔνα τοιοῦτον κύβον εἰς τὸν ἀέρα καὶ κατευθύνομεν τὴν προσοχὴν μας εἰς τὸν ἀριθμόν, δστις φέρεται ἐπὶ τῆς ἀνω ἔδρας, ὅταν ὁ κύβος ἡρεμήσῃ. Καὶ αὐτὸν εἶναι ἔνα πείραμα τύχης. Τὸ ἀποτέλεσμα τοῦ πειράματος τούτου εἶναι ἡ ἐμφάνισις ἐπὶ τῆς ἀνω ἔδρας τοῦ κύβου, ἐνὸς ἐκ τῶν ἀριθμῶν : 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Κάθε τοιαύτη ἐμφάνισις καλεῖται, ὡς καὶ προηγουμένως ἐλέχθη, ἐν ἀπλοῦ συμβάντα. Φανερὸν εἶναι ὅτι εἰς τὸ πείραμα μὲ κύβον ἔχομεν τὰ ἔξης 6 ἀπλᾶ συμβάντα :

1ον) «*Ο κύβος δεικνύει εἰς τὴν ἀνω ἔδραν τὸ 1.*».

2ον) «*Ο κύβος δεικνύει εἰς τὴν ἀνω ἔδραν τὸ 2.*».

6ον) «*Ο κύβος δεικνύει εἰς τὴν ἀνω ἔδραν τὸ 6.*».

“Εχομεν λοιπὸν εἰς τὸ δεύτερον παράδειγμα ἔνα πείραμα τύχης καὶ 6 ἀπλᾶ συμβάντα.

Ἐάν ρίψωμεν διά δευτέραν φορὰν τὸν κύβον εἰς τὸν ἀέρα ἐκτελοῦντες τὴν αὐτὴν διαδικασίαν, τότε λέγομεν ὅτι ἐπαναλαμβάνομεν τὸ πείραμα τύχης. Κατὰ τὴν ἐπανειλημμένην ἐκτέλεσιν τοῦ ίδιου πειράματος θὰ προκύψῃ μία «ἀκολουθία» ἀπλῶν συμβάντων. Αὕτη δύναται νὰ παρασταθῇ ἀπὸ μίαν ἀκολουθίαν ψηφίων εἰλημμένων ἐκ τοῦ συνόλου τῶν ἐνδείξεων τοῦ κύβου, δηλ. ἐκ τοῦ συνόλου { 1, 2, 3, 4, 5, 6 } καὶ διαδεχομένων ἀτάκτως ἄλληλα. Οὕτως, ἐπαναλαμβάνοντες τὸ πείραμα μὲ κύβον εἴκοσι φοράς δὲν ἀποκλείεται νὰ ἔχωμεν τὴν «πεπερασμένην ἀκολουθίαν» :

3, 5, 2, 2, 6, 1, 6, 3, 4, 4, 4, 2, 1, 5, 3, 5, 6, 4, 2, 5.

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω συνάγομεν ὅτι τὰ χαρακτηριστικὰ ἐνὸς πειράματος τύχης εἶναι :

α). Τὸ ἀποτέλεσμά τον δὲν δύναται μὲ κανέναν τρόπον νὰ προβλεφθῇ.

β). Τὸ πείραμα δύναται νὰ ἐπαναληφθῇ πολλάκις ὑπὸ τὰς αὐτὰς συνθήκας (δηλ. τηρουμένης τῆς αὐτῆς διαδικασίας).

§ 255. Δειγματικὸς χῶρος – Δεῖγμα.— Εἰς τὸ πείραμα τῆς ρίψεως ἐνὸς νομίσματος ὑπάρχουν δύο δυνατὰ ἀποτέλεσματα τὰ δποῖα συμβολίζομεν ὡς

K, Γ, (1)

ὅπου K σημαίνει «κορώνα» καὶ Γ «γράμματα».

Ἐάν ρίψωμεν ἔνα ζάρι ὑπάρχουν 6 δυνατὰ ἀποτέλεσματα, τὰ δποῖα δύνανται νὰ παρασταθοῦν μὲ τοὺς ἀριθμοὺς τῶν ἔδρων :

1, 2, 3, 4, 5, 6.

Αναγράφοντες δλα τὰ δυνατὰ ἀποτελέσματα ἐνὸς πειράματος, λέγομεν ὅτι σχηματίζομεν ἔνα δειγματικὸν χῶρον. Κατὰ ταῦτα :

Δειγματικὸς χῶρος εἶναι τὸ σύνολον τῶν ἀπλῶν συμβάντων, ἢτοι τῶν δυνατῶν ἀποτελεσμάτων, τὰ δποια δύνανται νὰ ἐμφανισθοῦν εἰς ἔνα πείραμα τύχης.

Ἐκαστον δὲ ἀπλοῦν συμβάν, ἢτοι ἀτομικὸν (ἀδιαιρέτον) ἀποτέλεσμα, καλεῖται δεῖγμα.

Οὕτω, π.χ. εἰς τὸ πρῶτον παράδειγμα, ὁ δειγματικὸς χῶρος εἶναι τὸ σύνολον $\Omega \equiv \{K, \Gamma\}$, ἐνῷ εἰς τὸ δεύτερον παράδειγμα ὁ δειγματικὸς χῶρος εἶναι τὸ σύνολον : $\Omega \equiv \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

Πρὸς πληρεστέραν κατανόησιν τῆς ἑννοίας τοῦ δειγματικοῦ χώρου ἀναφέρομεν καὶ τὰ ἔξι ταραχαδείγματα :

α'). *Λῆψις σφαιριδίου* (βώλου) ἐξ ἐνὸς σάκκου. Ἐντὸς σάκκου ὑπάρχει ἀριθμὸς σφαιριδίων δύοις ἀπὸ πάσης ἀπόψεως ἑκτὸς τοῦ χρώματος. Ἐστω ὅτι μερικὰ εἰναι κυανᾶ (κ), ἄλλα λευκά (λ) καὶ ἄλλα ἐρυθρά (ε). Λαμβάνομεν «τυχαίως» (δηλ. μὲ τὴν γνωστὴν διαδικασίαν ἀνακατεύματος τῶν σφαιριδίων κ.τ.λ.) ἑνα σφαιρίδιον καὶ χωρὶς νὰ τὸ ἐπανατοποιητήσωμεν ἐντὸς τοῦ σάκκου ἀνασύρομεν καὶ δεύτερον, προσέχοντες ποιὸν χρώματος σφαιριδίου ἐξήχθη πρῶτον καὶ ποιὸν δεύτερον. Λέγομεν τότε ὅτι ἐκτελοῦμεν ἔνα πείραμα τύχης, ἀκριβέστερον ἔνα σύνθετον πείραμα τύχης, τὸ δὲ ἔξαγόμενον τοῦ πειράματος τούτου εἶναι ἐν διατεταγμένον ζεύγος ἐνδείξεων π.χ. (λ, ε).

Ἄσ ἴδωμεν τώρα ποῖος εἶναι ὁ δειγματικὸς χῶρος αὐτοῦ τοῦ «σύνθετου πειράματος». Ἐπειδὴ αἱ μόναι δυναταὶ ἑκβάσεις (ἀποτελέσματα), τὰς δποιας δύνανται νὰ παρουσιάσῃ ἡ λῆψις ἐνὸς σφαιριδίου ἐκ τοῦ σάκκου εἶναι ἡ ἐμφάνισις ἐνὸς ἐκ τῶν τριῶν γραμμάτων κ, λ, ε ἡ τυχαία ἔξαγωγὴ ἑκάστου σφαιριδίου κεχωρισμένως ἔχει ὡς δειγματικὸν χῶρον τὸ σύνολον $\Sigma \equiv \{\kappa, \lambda, \epsilon\}$. Ἐπομένως αἱ διάφοροι ἑκβάσεις τῆς λήψεως τῶν δύο σφαιριδίων ἀντιστοιχοῦν ἀμφιμονοσημείων των τριῶν γραμμάτων κ, λ, ε. Οὐτονομούνται τοῦ πειράματος τύχης εἶναι τὸ σύνολον :

$$\Omega \equiv \Sigma \times \Sigma = \{(x, y) : x \in \Sigma, y \in \Sigma\} = \left\{ \begin{array}{l} (\kappa, \kappa), (\kappa, \lambda), (\kappa, \epsilon) \\ (\lambda, \kappa), (\lambda, \lambda), (\lambda, \epsilon) \\ (\epsilon, \kappa), (\epsilon, \lambda), (\epsilon, \epsilon) \end{array} \right\}.$$

Κάθε στοιχεῖον τοῦ Ω , δηλ. κάθε διατεταγμένον ζεύγος ἐνδείξεων εἶναι ἐν πλοῦν συμβάν.

β'). *Πλήψις δύο κύβων*. Ἐστω ὅτι ρίπτομεν εἰς τὸν ἀέρα δύο κύβους (ζάρια), ἔνα λευκὸν καὶ ἔνα ἐρυθρόν καὶ ὅτι στημειώνομεν τοὺς ἀριθμοὺς τῶν ἄνω ἔδρῶν. Ὁ λευκὸς κύβος ἔχει ἔξ (6) δυνατὰ ἀποτελέσματα : 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ὁμοίως καὶ ὁ ἐρυθρός. Ἀς συμβολίσωμεν μὲ λ τὴν ἐνδείξιν τῆς ἄνω ἔδρας, τὴν δποιαν θὰ παρουσιάσῃ ὁ λευκὸς κύβος καὶ μὲ ε τὴν ἀντίστοιχον διὰ τὸν ἐρυθρὸν, τότε τὸ ἀποτέλεσμα τῆς συνδυασμένης ρίψεως τῶν δύο κύβων παρίσταται διὰ τοῦ διατεταγμένου ζεύγους (λ, ε). Πόσα τοιαῦτα διατεταγμένα ζεύγη ὑπάρχουν;

Δηλαδή πόσα είναι τὰ ἀπλᾶ συμβάντα τοῦ πειράματος : *Ρίψις δύο κύβων* ; Εὔκολως διαπιστούμεν διότι τὰ ἀπλᾶ συμβάντα τοῦ πειράματος είναι 36 διατεταγμένα ζεύγη :

(1,1), (1,2), (2,1), (1,3), (2,2), (3,1), ..., (5,6), (6,5), (6,6).

(ὅσαι δηλ. καὶ αἱ ἐπαναληπτικαὶ διατάξεις τῶν 6 στοιχείων 1, 2, 3, ..., 6 ἀνὰ δύο, § 238).

Είναι πολλάκις χρήσιμον νὰ γράψωμεν τὰ διατεταγμένα ζεύγη ἀριθμῶν εἰς ἕνα πίνακα διπλῆς εἰσόδου ὡς κάτωθι :

'Αποτέλεσμα λευκοῦ κύβου		'Αποτέλεσμα ἔρυθροῦ κύβου					
λ	ϵ	1	2	3	4	5	6
1	(1,1)	(1,2)	(1,3)	(1,4)	(1,5)	(1,6)	
2	(2,1)	(2,2)	(2,3)	(2,4)	(2,5)	(2,6)	
3	(3,1)	(3,2)	(3,3)	(3,4)	(3,5)	(3,6)	
4	(4,1)	(4,2)	(4,3)	(4,4)	(4,5)	(4,6)	
5	(5,1)	(5,2)	(5,3)	(5,4)	(5,5)	(5,6)	
6	(6,1)	(6,2)	(6,3)	(6,4)	(6,5)	(6,6)	

Ο πίναξ οὗτος παρέχει τὸ σύνολον δλῶν τῶν δυνατῶν ἀποτελεσμάτων (ἀπλῶν συμβάντων) τοῦ πειράματος τῆς ρίψεως δύο κύβων. Τὸ σύνολον τοῦτο είναι ὁ δειγματικὸς χῶρος Ω τοῦ πειράματος. Γράφομεν δὲ συντόμως ἐν προκειμένῳ :

$$\Omega = \Sigma \times \Sigma = \{ (\lambda, \epsilon) : \lambda \in \Sigma, \epsilon \in \Sigma \},$$

ὅπου Σ τὸ σύνολον {1, 2, 3, 4, 5, 6}.

Τὰ διατεταγμένα ζεύγη (λ, ϵ) είναι τὰ στοιχεῖα τοῦ δειγματικοῦ χώρου, δηλ. τὰ ἀπλᾶ συμβάντα.

Γενικεύοντες τώρα ὅσα ἔχετεθησαν εἰς τὰ ἀνωτέρω παραδείγματα δυνάμεθα νὰ δώσωμεν τὸν κάτωθι δρισμὸν τοῦ δειγματικοῦ χώρου :

Δειγματικὸς χῶρος Ω ἐνὸς πειράματος τύχης είναι ἐν σύνολον, τοῦ ὃποίου τὰ στοιχεῖα εὑρίσκονται εἰς ἀμφιμονοσήμαντον ἀντιστοιχίαν πρὸς τὰ στοιχεῖα τοῦ συνόλου τῶν ἐκβάσεων (ἀποτελεσμάτων) τοῦ πειράματος.

'Επειδὴ κάθε στοιχείου ἐνὸς συνόλου καλεῖται καὶ σημεῖον τοῦ συνόλου, διὰ τοῦτο τὰ ἀπλᾶ συμβάντα καλοῦνται καὶ δειγματικὰ σημεῖα ἢ ἀπλῶς σημεῖα (σημεῖα – δείγματα). 'Ο δειγματικὸς χῶρος καλεῖται καὶ βασικὸν σύνολον (ἢ σύνολον ἀναφορᾶς) δι' ἐν πειράμα.

Σημείωσις. Τὸ βασικὸν σύνολον, ὡς εἴδομεν καὶ εἰς τὸ δεύτερον κεφάλαιον, διὰ καθαρῶς ἐποπτικοὺς λόγους, παρίσταται μὲν ἐν δρθογώνιον, οὗτω καὶ ὁ δειγματικὸς χῶρος παρίσταται δομοίς, δηλ. μὲ δρθογώνιον ἐντὸς τοῦ ὅποίου τὰ ἀπλᾶ συμβάντα σημειοῦνται μὲ στιγμάς.

Γενική παρατήρησις. Εις τὸ παρὸν κεφάλαιον θὰ ἀσχοληθῶμεν μὲ πεπερα-
σμένους δειγματικούς χώρους, δηλ. τὸ πλῆθος τῶν ἀπλῶν συμβάντων θὰ εἰναι
πεπερασμένος ἀριθμός.

Παντοῦ κατωτέρω μὲ τὸ γράμμα Ω συμβολίζομεν τὸν δειγματικὸν χῶρον τοῦ
ἐκάστοτε πειράματος τύχης.

§ 256. Συμβάν.— Ἐκτελοῦμεν τὸ πείραμα τῆς ρίψεως δύο κύβων. ‘Ως ἐλέ-
χθῇ εἰς τὴν προηγουμένην παράγραφον τὰ ἀπλᾶ συμβάντα τοῦ πειράματος εἰ-
ναι τὰ 36 διατεταγμένα ζεύγη τοῦ πίνακος τῆς προηγουμένης σελίδος. Ἐὰν
τώρα ἐνδιαφερώμεθα διὰ τὰς περιπτώσεις ἑκείνας, καθ’ ὃς π.χ. τὸ ἄθροισμα τῶν
ἐνδείξεων τῶν δύο κύβων **ἰσοῦται μὲ 7** θὰ πρέπει νὰ θεωρήσωμεν τὸ ὑποσύνολον :

$$A \equiv \{(1,6), (2,5), (3,4), (4,3), (5,2), (6,1)\}$$

τοῦ δειγματικοῦ χώρου Ω . Τὸ ὑποσύνολον A καλεῖται **συμβάν**.

Γενικῶς: Συμβάν ἡ γεγονός καλεῖται κάθε ὑποσύνολον τοῦ δειγματικοῦ χώρου.

Ἐὰν τὸ A εἶναι μονομελές σύνολον, δηλ. ἔχει ἐν μόνον στοιχείον, τὸ συμβάν
καλεῖται **ἀπλοῦν**.

“Οταν ἐν συμβάν ἔχῃ δύο ἢ περισσότερα στοιχεῖα, δηλ. σύγκειται ἐκ δύο
ἢ περισσοτέρων ἀπλῶν συμβάντων, τότε καλεῖται πολλάκις, πρὸς διάκρισιν,
ὅλικὸν συμβάν.

Κατωτέρω διὰ τοῦ ὄρου συμβάν θὰ ἐννοῶμεν τὸ ὅλικὸν συμβάν.

Θὰ λέγωμεν ὅτι ἐν συμβάν A πραγματοποιεῖται (ἢ ἄλλως ἐμφανίζεται) εἰς
ἔνα πείραμα τύχης τότε, καὶ μόνον τότε, ὃν ἡ ἐκτέλεσις τοῦ πειράματος δίδει ἀπο-
τέλεσμα τὸ ὅποιον ἀντιστοιχεῖ πρὸς ἐν στοιχείον τοῦ ὑποσυνόλου A .

Συγκεκριμένως: Ἐὰν $\theta_1, \theta_2, \theta_3, \dots, \theta_v$ εἶναι ὀλα τὰ ἀπλᾶ συμβάντα, τὰ
ὅποια δύνανται νὰ ἐμφανισθοῦν εἰς ἔνα πείραμα τύχης καὶ ἀπὸ τὰ v αὐτὰ ἀπλᾶ
συμβάντα θεωρήσωμεν k ὥρισμένα, ἔστω τὰ $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k$ ($k \leq v$), τότε τὸ ὑπο-
σύνολον $A \equiv \{\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k\}$ τοῦ δειγματικοῦ χώρου $\Omega \equiv \{\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_v\}$ ἀντι-
προσωπεύει ἐν συμβάν, τὸ ὅποιον ἔγκειται εἰς τὴν ἐμφάνισιν εἴτε τοῦ θ_1 , εἴτε
τοῦ $\theta_2, \dots, \theta_k$, εἴτε τοῦ θ_k καὶ **μόνον** αὐτῶν.

Ἐπειδὴ $\{\theta_1\} \cup \{\theta_2\} \cup \dots \cup \{\theta_k\} \equiv \{\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k\}$ λέγομεν ὅτι τὸ συμβάν A
εἶναι **ἴνωσις ἀπλῶν συμβάντων** ἢ ἄλλως τὸ A «ἄναλυται» εἰς k ἀπλᾶ συμβάντα.
Τὸ A πραγματοποιεῖται κάθε φοράν πού παρουσιάζεται ἐν τῶν ἀπλῶν συμβάντων
 $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k$ καὶ ἀντιστρόφως, πραγματοποιουμένου τοῦ A πραγματοποιεῖται
ἀναγκαστικῶς ἐν τῶν ἀπλῶν συμβάντων $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k$.

Τὰ ἀπλᾶ συμβάντα $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k$ ($k \leq v$) λέγομεν ὅτι ἀποτελοῦν τὰς «**εὐ-
νοϊκὰς περιπτώσεις**» τοῦ συμβάντος A , ἐνῷ τὰ $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_v$, δηλ. τὰ στοιχεῖα
τοῦ δειγματικοῦ χώρου Ω λέγομεν ὅτι ἀποτελοῦν τὰς «**δυνατὰς περιπτώσεις**»
τοῦ πειράματος τύχης.

Τέλος, ἐπειδὴ ἔξ δρισμοῦ εἶναι : $\Omega \subseteq \Omega$ καὶ $\emptyset \subseteq \Omega$ ἐπεται ὅτι ὁ δειγματι-
κὸς χῶρος Ω καὶ τὸ κενὸν σύνολον εἶναι συμβάντα.

Τὸ συμβάν τὸ ἀντιστοιχοῦν εἰς τὸν δειγματικὸν χῶρον λέγομεν ὅτι εἶναι
«**βέβαιον συμβάν**» ἢ «**βέβαιον γεγονός**», ἐνῷ τὸ συμβάν τὸ ἀντιστοιχοῦν εἰς τὸ

κενὸν σύνολον, λέγομεν ὅτι εἶναι «ἀδύνατον ἐνδεχόμενον» ή «κενὸν συμβάν» καὶ συμβολίζεται μὲν \emptyset .

Παραδείγματα :

1). Ἐκτελοῦμεν τὸ πείραμα διπλῆς ρίψεως ἐνὸς κέρματος καὶ ἐνδιαφερόμεθα διὰ τὰς ἐνδείξεις του. Ο κατάλληλος δειγματικὸς χῶρος θάτερος εἶναι τὸ σύνολον :

$\Omega = \{(K, K), (K, \Gamma), (\Gamma, K), (\Gamma, \Gamma)\}$ ή ἀπλούστερον $\Omega = \{KK, KG, GK, GG\}$, ὅπου K (= κορώνα) καὶ Γ (= γράμματα).

Τὸ ὑποσύνολον $A = \{KK, KG, GK\}$ δρίζει τὸ συμβάν :

A : «Τὸ νόμισμα εἰς τὰς δύο ρίψεις παρουσιάζει τοὐλάχιστον μίαν φορὰν κορώνα».

'Εξ ἄλλου τὸ ὑποσύνολον $B = \{KK, GG\}$ δρίζει τὸ συμβάν.

B : «Τὸ νόμισμα καὶ εἰς τὰς δύο ρίψεις παρουσιάζει τὴν αὐτήν ἐνδειξιν».

2ον. "Εστω διτεροπλάνη τὸ ἀνωτέρω παράδειγμα 1 ἐνδιαφερόμεθα διὰ τὸ πλῆθος τῶν ἐμφανισθέντων K (καὶ εἰς τὰς δύο ρίψεις). Αἱ δυναταὶ περιπτώσεις εἶναι 0, 1, 2.

"Αρα θὰ ἔχωμεν τώρα νέον δειγματικὸν χῶρον : $\Omega = \{0, 1, 2\}$.

Τὸ ὑποσύνολον $A = \{1, 2\}$ δρίζει τὸ συμβάν :

A : «'Εμφάνισις τοὐλάχιστον μιᾶς K ».

'Αξιόλογος παρατήρησις. 'Έκ τῶν ἀνωτέρω δύο παραδειγμάτων γίνεται καταφανές διτεροπλάνη τὸ πείραμα τύχης δυνάμεθα νὰ ἀντιστοιχίσωμεν, ἀναλόγως τοῦ σκοποῦ τῆς μελέτης μας, πλείονας τοῦ ἐνὸς δειγματικούς χώρους, δρίζοντες ἐκάστοτε διαφορετικὰ ἀπλὰ συμβάντα. Χαρακτηριστικὸν εἶναι ὅμως διτεροπλάνη τὰ ἀπλὰ συμβάντα εἶναι τὰ μονοσύνολα τοῦ δειγματικοῦ χώρου.

3ον. Εἰς ἓν κυτίον ἔχουμεν τέσσαρα σφαιρίδια : Κυανοῦν, λευκόν, ἐρυθρὸν καὶ πράσινον. Έχουμεν κατὰ συνέπειαν τὰ ἔξις 4 ἀπλὰ συμβάντα :

θ_k : «Κυανοῦν σφαιρίδιον»

θ_λ : «Λευκὸν σφαιρίδιον»

θ_ε : «Ἐρυθρὸν σφαιρίδιον»

θ_π : «Πράσινον σφαιρίδιον».

'Ἐν προκειμένῳ δειγματικὸς χῶρος εἶναι : $\Omega \equiv \{\theta_k, \theta_\lambda, \theta_\varepsilon, \theta_\pi\}$.

Τὸ ὑποσύνολον αὐτοῦ $E \equiv \{\theta_k, \theta_\varepsilon, \theta_\pi\}$ δρίζει τὸ συμβάν :

E : «'Εξάγεται ἔγχωμαν σφαιρίδιον».

Τὸ E πραγματοποιεῖται, μόνον δταν ἐν οιονδήποτε ἐκ τῶν τριῶν στοιχείων του $\theta_k, \theta_\varepsilon, \theta_\pi$ πραγματοποιηθῆ καὶ ἀντιστρόφως, ἀν τις ἀναγγείλῃ διτεροπλάνη ἔγχωμον σφαιρίδιον, συνάγομεν διτεροπλάνη ἐκ τῶν τριῶν ἀπλῶν συμβάντων $\theta_k, \theta_\varepsilon, \theta_\pi$ ἔχει πραγματοποιηθῆ.

§ 257. Θεμελιώδεις ὄρισμοι καὶ πράξεις μεταξὺ συμβάντων.

α'). Δύο σύμβαντα θὰ λέγωνται ξένα πρὸς ἄλληλα ή ἀμοιβαίως ἀποκλειόμενα, ἀλλως ἀσυμβίβαστα τότε, καὶ μόνον τότε, ἀν ἡ πραγματοποίησις τοῦ ἐνὸς ἀποκλείει τὴν πραγματοποίησιν τοῦ ἄλλου. Κατόπιν τούτου τὰ ξένα συμβάντα ἀντιστοιχοῦν εἰς ὑποσύνολα τοῦ Ω μὴ ἔχοντα κοινὰ ἀπλὰ συμβάντα.


Προφανῶς δύο ἀπλὰ συμβάντα εἶναι πάντοτε ξένα μεταξὺ των.

Παράδειγμα. Τὰ συμβάντα:


A: «Ο κύβος δεικνύει ἀριθμὸν

B: «Ο κύβος δεικνύει 3»

είναι ξένα πρὸς ἄλληλα, διότι τὸ ἐν ἀποκλείει τὸ ἄλλο.



Σχ. 16



Σχ. 17

Τούναντίον τὰ συμβάντα:


E: «Ο κύβος δεικνύει ἀριθμὸν > 2».

F: «Ο κύβος δεικνύει ἀριθμὸν < 5».

δὲν είναι ξένα μεταξύ των.

Παρατήρησις: Εἰς τὴν περίπτωσιν δύο ξένων συμβάντων ἡ μὴ πραγματοποίησις τοῦ ἐνὸς δὲν συνεπάγεται ἀναγκαῖος τὴν πραγματοποίησιν τοῦ ἄλλου. Οὔτως, εἰς τὸ πρῶτον παράδειγμα, ἔτιν δὲν φέρῃ ἄρτιον ἀριθμὸν, δὲν ἔπειται ἀναγκαῖος ὅτι οὗτος θὰ φέρῃ 3, καθόστον δύναται νὰ φέρῃ τὸν ἀριθμὸν 5 ἢ τὸν 1.

β'). Ἐὰν A καὶ B είναι δύο μὴ ξένα συμβάντα ἐνὸς πειράματος τύχης, τότε θὰ λέγωμεν ὅτι τὸ A περιέχεται εἰς τὸ B (ἢ ὅτι τὸ B περιέχει τὸ A) ἄλλως τὸ A συνεπάγεται τὸ B καὶ θὰ γράφωμεν $A \subseteq B$ (ἢ $B \supseteq A$) τότε, καὶ μόνον τότε, ἀν πραγματοποιουμένου τοῦ A πραγματοποιῆται καὶ τὸ B. Ἐὰν $A \subset B$, τότε ἡ πραγματοποίησις τοῦ B δὲν συνεπάγεται ὑποχρεωτικῶς τὴν πραγματοποίησιν τοῦ A. Ἡ πραγματοποίησις τοῦ B χωρὶς τὴν πραγματοποίησιν τοῦ A ἀποτελεῖ τὸ συμβάν B - A, τὸ δόποιον καλεῖται διαφορὰ τῶν συμβάντων B καὶ A.



Σχ. 18

Παράδειγμα. Θεωρήσωμεν τὰ συμβάντα:

A: «Ο κύβος δεικνύει ἀριθμὸν ≤ 3 ».

B: «Ο κύβος δεικνύει ἀριθμὸν ≤ 5 ».

Προφανῶς $A \subset B$. Ἡ διαφορὰ B - A παριστά τὸ συμβάν:

E: «Ο κύβος δεικνύει 4 ἢ 5».

γ'). Ἐνωσις συμβάντων. Καλεῖται ἔνωσις συμβάντων A_1, A_2, \dots, A_k , ὑπαγομένων εἰς τὸ αὐτὸν πειράματα τύχης, ἐν νέον συμβάν A, τὸ δόποιον πραγματοποιεῖται τότε, καὶ μόνον τότε, ἀν πραγματοποιηθῆ τοὺλάχιστον ἐν τῶν A_1, A_2, \dots, A_k .

Γράφομεν τότε:

$$A = A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_k \equiv \bigcup_{i=1}^k A_i.$$

Ἐὰν τὰ θεωρηθέντα συμβάντα A_1, A_2, \dots, A_k είναι ξένα μεταξύ των ἀνὰ

δύο, τότε τὸ Α λέγεται «ἄθροισμα» αὐτῶν καὶ εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν θὰ γράφωμεν :

$$A = A_1 + A_2 + \cdots + A_k = \sum_{i=1}^k A_i .$$

Εἰς τὴν τελευταίαν περίπτωσιν ἡ ἐμφάνιση (πραγματοποίησις) τοῦ Α συνεπάγεται τὴν ἐμφάνισιν ἐνὸς καὶ μόνον ἐκ τῶν A_1, A_2, \dots, A_k .

Π α ρ α δ ε ί γ μ α τ α :

1ον. Τὸ συμβάν Α : «Ο κύβος παρουσιάζει ἀρτιον ἀριθμὸν» εἶναι ἔνωσις τῶν συμβάντων :

A_1 : «Ο κύβος παρουσιάζει ἀρτιον ἀριθμὸν < 5».

A_2 : «Ο κύβος παρουσιάζει ἀρτιον ἀριθμὸν > 3».

2ον. Τὸ συμβάν : «Ο κύβος παρουσιάζει ἀριθμὸν μεγαλύτερον τοῦ 3» εἶναι ἄθροισμα τῶν τριῶν ἀπλῶν συμβάντων : «Ο κύβος δεικνύει 4», «Ο κύβος δεικνύει 5», «Ο κύβος δεικνύει 6».

δ'). Τομὴ ἡ γινόμενον συμβάντων. Καλεῖται τομὴ συμβάντων A_1, A_2, \dots, A_k ὑπαγομένων εἰς τὸ αὐτὸν πείραμα τύχης, ἐν νέον συμβάν Α, τὸ δόποιον πραγματοποιεῖται τότε, καὶ μόνον τότε, ἢν πραγματοποιοῦνται ὅλα συγχρόνως τὰ συμβάντα A_1, A_2, \dots, A_k . Γράφομεν δὲ τότε :

$$A = A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_k = \bigcap_{i=1}^k A_i .$$

Εἶναι προφανὲς ὅτι, ἐάν δύο συμβάντα A_1, A_2 εἶναι ξένα πρὸς ἄλληλα, τότε $A_1 \cap A_2 = \emptyset$.

Π α ρ α δ ε ί γ μ α. Τὸ συμβάν :

Α : «Ο κύβος παρουσιάζει 4 ή 5»

εἶναι τομὴ τῶν συμβάντων :

A_1 : «Ο κύβος παρουσιάζει ἀριθμὸν ≤ 5».

A_2 : «Ο κύβος παρουσιάζει ἀριθμὸν > 3».

ε'). Συμπληρωματικὸν ἐνὸς συμβάντος. Δύο συμβάντα ξένα πρὸς ἄλληλα, ἔχοντα ἄθροισμα τὸ «βέβαιον γεγονός» καλοῦνται συμπληρωματικὰ ἢ ἀντίθετα συμβάντα.

Τὸ συμπληρωματικὸν ἐνὸς συμβάντος Α παρίσταται μὲν Α' (ἢ A^c).

‘Ως συμπληρωματικὸν τοῦ «βέβαιου συμβάντος» λαμβάνεται τὸ «κενὸν συμβάν» καὶ ἀντιστρόφως. Εἶναι φανερὸν ὅτι, ἐάν δύο συμβάντα εἶναι συμπληρωματικά, τότε ἡ πραγματοποίησις τοῦ ἐνὸς ἀποκλείει τὴν πραγματοποίησιν τοῦ ἄλλου καὶ ἡ μὴ πραγματοποίησις τοῦ ἐνὸς συνέπει ταῖς ἀγκαίως τὴν πραγματοποίησιν τοῦ ἄλλου. Συνεπῶς πᾶσα εύνοϊκὴ περίπτωσις διὰ τὸ ἐν εἶναι «δύσμενής» (μὴ εύνοϊκή) διὰ τὸ ἔτερον καὶ πᾶσα δυσμενής περίπτωσις διὰ τὸ ἐν εἶναι εύνοϊκή διὰ τὸ ἔτερον.

Κατὰ ταῦτα τὸ Α' σημαίνει ὅτι τὸ συμβάν Α δὲν συμβαίνει (δὲν πραγματοποιεῖται).

Π α ρ α δ ε ί γ μ α τ α :

1ον. Τὰ συμβάντα :

Α : «Ο κύβος δεικνύει ἀρτιον ἀριθμὸν»

Α' : «Ο κύβος δεικνύει περιττὸν ἀριθμὸν»

εἶναι συμπληρωματικά.

Σον. Εις τὸ γνωστὸν πείραμα τῆς ρίψεως δύο νομισμάτων, τὸ συμβάν $A = \{ KK \}$, ἢτοι A : «Τὰ δύο νομίσματα δεικνύουν κορώνα» είναι συμπληρωματικὸν τοῦ συμβάντος $A' \equiv \{ KG, GK, GG \}$, ἢτοι τοῦ συμβάντος:

A' : «Παρονταίσανται τονδάζιστον μία φορὰ γράμματα», ἢ ἄλλως

A' : «Δὲν παρονταίσεται κορώνα καὶ τὰς δύο φίγεις».

§ 258. Στοιχειώδης δρισμὸς τῆς πιθανότητος.— 'Ο δρισμὸς αὐτός, τοῦ δποίου ἡ ἀρχὴ εύρισκεται εἰς τὰ τυχηρὰ παιγνίδια, είναι ὁ εἰσαχθεὶς ὑπὸ τῶν θεμελιωτῶν τῆς Θεωρίας τῶν Πιθανοτήτων καὶ διατυπωθεὶς σαφῶς ὑπὸ τοῦ Laplace ὡς ἔξῆς :

Πιθανότης ἐνδὸς συμβάντος καλεῖται ὁ λόγος τοῦ ἀριθμοῦ τῶν εὐνοϊκῶν δι' αὐτὸν περιπτώσεων πρὸς τὸν ἀριθμὸν ὅλων τῶν δυνατῶν περιπτώσεων, ἐφ' ὅσον ὅλαι αἱ περιπτώσεις εἰναι ἔξισον δυναταί.

Ήτοι, ἐὰν A είναι ἐν συμβάντος περιπτώσεων εἰς ἐν πείραμα τύχης καὶ παραστήσωμεν διὰ τοῦ $P(A)$ * τὴν πιθανότητα πραγματοποιήσεως τοῦ A , θὰ ἔχωμεν :

$$P(A) = \frac{\text{'Αριθμὸς τῶν εὐνοϊκῶν περιπτώσεων τοῦ } A}{\text{'Αριθμὸς ὅλων τῶν δυνατῶν περιπτώσεων τοῦ πειράματος}} \quad (1)$$

Εἰς τὸν δρισμὸν τοῦτον ὑπονοεῖται ἡ ὑπόθεσις τοῦ ισαπιθάνου τῶν περιπτώσεων ἡ ἀπλῶν συμβάντων.

'Ἐκ τοῦ δοθέντος δρισμοῦ ἔπονται ἀμέσως αἱ προτάσεις :

α'). *Η πιθανότης συμβάντος A είναι ἀριθμὸς μὴ ἀριθμούς καὶ μικρότερος* ἢ *ἴσος πρὸς τὴν μονάδα*, ἢτοι :

$$0 \leq P(A) \leq 1$$

β'). *Η πιθανότης τοῦ βεβαίου συμβάντος ισοῦται πρὸς τὴν μονάδα*, ἢτοι :

$$P(\Omega) = 1$$

γ'). *Ἐὰν τὸ πλῆθος τῶν ἀπλῶν συμβάντων ἐνδὸς πειράματος τύχης είναι v , τότε ἡ πιθανότης ἐκάστου ἀπλοῦ συμβάντος είναι $\frac{1}{v}$.*

Πράγματι, ἐὰν $\Omega \equiv \{ \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_v \}$ είναι ὁ δειγματικὸς χῶρος τοῦ πειράματος, τότε εὐνοϊκαὶ περιπτώσεις διὰ τὸ ἀπλοῦν συμβάν $\{ \theta_i \}$, $i = 1, 2, \dots, v$ είναι μόνον μία, ἐπειδὴ τὸ $\{ \theta_i \}$ κατὰ ἔνα καὶ μόνον τρόπον δύναται νὰ ἐμφανισθῇ. 'Ἐξ ἄλλου τὸ πλῆθος τῶν δυνατῶν περιπτώσεων τοῦ πειράματος είναι, ἔξι δρισμοῦ (βλ. § 256), ίσον πρὸς τὸ πλῆθος τῶν ἀπλῶν συμβάντων, δηλ. v . *Ἄρα ὁ τύπος (1) δίδει :*

$$P(\{ \theta_i \}) = \frac{1}{v}, \quad \forall i = 1, 2, \dots, v.$$

* Τὸ P είναι τὸ ἀρχικὸν γράμμα τῆς λέξεως Probability (ἀγγλ.) – Probabilité (γαλ.) = Πιθανότης.

δ'). Τὸ ἀθροισμα τῶν πιθανοτήτων δύο συμπληρωματικῶν συμβάντων ἵσονται μὲν.

Πράγματι, ἐὰν κ είναι τὸ πλῆθος τῶν εὔνοϊκῶν περιπτώσεων διὰ τὸ Α καὶ ν τῶν δυνατῶν, τότε τὸ πλῆθος τῶν εὔνοϊκῶν περιπτώσεων διὰ τὸ Α' θὰ είναι ν - k, διότι (§ 257) πᾶσα εὔνοϊκὴ περίπτωσις διὰ τὸ Α είναι δυσμενής διὰ τὸ Α' καὶ πᾶσα δυσμενής διὰ τὸ Α είναι εὔνοϊκὴ διὰ τὸ Α'. Ἐὰν συνεπῶς P(Α) καὶ P(Α') είναι ἀντιστοίχως αἱ πιθανότητες τῶν συμβάντων Α καὶ Α' θὰ ἔχωμεν :

$$P(A) = \frac{k}{v} \quad \text{καὶ} \quad P(A') = \frac{v-k}{v}.$$

Ἐξ αὐτῶν διὰ προσθέσεως λαμβάνομεν :

$$P(A) + P(A') = 1$$

Ἄρα ἡ πιθανότης τοῦ συμπληρωματικοῦ συμβάντος είναι :

$$P(A') = 1 - P(A)$$

§ 259. Ἐφαρμογαὶ ἐπὶ τῶν ἀνωτέρω προτάσεων.

1η : Εἰς τὸ παιγνίδιον «κορώνα - γράμματα», τὰ ἀπλᾶ συμβάντα είναι δύο, αἱ δύο δψεις : «κορώνα», «γράμματα», τὰς δποίας ἀς συμβολίσωμεν, ώς καὶ πρότερον K, Γ ἀντιστοίχως. Συμφώνως πρὸς τὴν πρότασιν (γ') αἱ πιθανότητες αὐτῶν είναι : P(K) = $\frac{1}{2}$, P(G) = $\frac{1}{2}$.

Αὐτὸ δὲν σημαίνει βεβαίως δτι, ἐὰν ρίψωμεν δύο φορὰς κατ' ἐπανάληψιν τὸ νόμισμα, τὴν μίαν φορὰν θὰ ἐμφανίσῃ «κορώνα» καὶ τὴν ἄλλην «γράμματα». Οὔτε δτι εἰς 10 ρίψεις θὰ ἔχωμεν 5 «κορώνας» καὶ 5 «γράμματα». Ἡ στοιχειώδης πιθανότης τὴν δποίαν ὑπελογίσαμεν ἰσχύει δι' ἐν πλῆθος ρίψεων, δηλαδὴ δι' ἔνα πολὺ μεγάλον ἀριθμὸν ρίψεων.

$$\text{Ἐξ ἀλλου ἔχομεν : } P(K) + P(G) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1.$$

Τοῦτο προφανῶς τὸ ἀνεμέναμεν, διότι τὰ δύο συμβάντα είναι συμπληρωματικά.

2α : Εἰς τὸ παιγνίδιον τῆς ρίψεως ἐνὸς κύβου, τὰ ἀπλᾶ συμβάντα είναι ἐν δλῷ 6, αἱ ἔξ δψεις (ἔδραι) τοῦ κύβου. Ἐὰν στοιχειματίσωμεν διὰ τὴν ἐμφάνισιν μιᾶς συγκεκριμένης ἐνδείξεως, ἡ στοιχειώδης πιθανότης είναι $\frac{1}{6}$, ἀφοῦ τὸ πλῆθος τῶν δυνατῶν περιπτώσεων είναι 6, ἡ δὲ εὐνοϊκὴ περίπτωσις είναι μόνον μία. Ὡστε :

$$P(1) = P(2) = P(3) = P(4) = P(5) = P(6) = \frac{1}{6},$$

δπου $P(x)$ = πιθανότης τοῦ ἀπλοῦ συμβάντος : «Ο κύβος παρουσιάζει τὸν ἀριθμὸν x».

Ἐὰν ἀντὶ ἐνὸς χρησιμοποιήσωμεν οἱ δμοῖοις κύβους, τὰ συμβάντα θὰ είναι αἱ ἐπαναληπτικαὶ διατάξεις τῶν 6 ἐνδείξεων ἀνὰ v. Ὁ ἀριθμὸς τῶν διατάξεων αὐτῶν είναι :

6^v

Ἡ στοιχειώδης πιθανότης μιᾶς συγκεκριμένης διατάξεως, δηλ. ἐνὸς ὀρισμένου συμβάντος, θὰ είναι :

$$\frac{1}{6^v}.$$

Ούτως, είσ τήν περίπτωσιν ρίψεως δύο κύβων (§ 255), ή πιθανότης τοῦ συμβάντος : «όλευκός κύβος νὰ φέρῃ 2 καὶ δ ἐξυθρόδες 3» είναι $\frac{1}{6^2} = \frac{1}{36}$, ήτοι :

$$P((2,3)) = \frac{1}{36}, \text{ ή } \text{ἀπλούστερον } P(2,3) = \frac{1}{36}.$$

3η : Εἰς τὰ παιγνίδια τῶν παιγνιοχάρτων χρησιμοποιοῦνται ἀλλοτε $4 \times 13 = 52$ παιγνιόχαρτα καὶ ἀλλοτε $4 \times 8 = 32$ (πρέφα). Εἰς τὰ παιγνίδια τῶν 52 παιγνιοχάρτων, ὑπάρχουν δι' ἔκαστον τῶν τεσσάρων «χρωμάτων» («σπαθί», «καρό», «κούπα», «μπαστούνι»), ἀνὰ 10 ἀριθμοὶ (1 – 10) καὶ 3 φιγοῦραι.

“Η πιθανότης νὰ ἀνασύρῃ τις ἑκ μιᾶς δέσμης, καλῶς ἀναμεμιγμένης ἐν ὥρισμένον παιγνιόχαρτον είναι κατὰ ταῦτα $\frac{1}{52}$, ή πιθανότης νὰ ἀνασύρῃ ἐν ὥρισμένον χρῶμα είναι $\frac{1}{4}$, ή πιθανότης νὰ ἀνασύρῃ φιγούραν (γενικῶς) είναι $\frac{12}{52}$, ή πιθανότης νὰ ἀνασύρῃ ἐνα ὥρισμένον ἀριθμόν, π.χ. δέσσον, ἀνεξαρτήτου χρώματος είναι $\frac{4}{52}$ (ὑπάρχουν 4 δέσσοι, ήτοι 4 εύνοϊκαι περιπτώσεις καὶ 52 παιγνιόχαρτα, ήτοι 52 δυναταὶ περιπτώσεις).

4η : 'Εκ δέσμης 52 παιγνιοχάρτων ἔξαγονται συγχρόνως δύο παιγνιόχαρτα. Ποία ἡ πιθανότης νὰ είναι καὶ τὰ δύο ἄσσοι ;

Λύσις : "Εστω Α τὸ συμβάν : «'Αμφότερα νὰ είναι ἄσσοι».

Αἱ δυναταὶ περιπτώσεις είναι $\binom{52}{2}$. Αἱ εύνοϊκαι είναι τόσαι, δοι αἱ οἱ διάφοροι τρόποι, καθ' οὓς δυνάμεθα νὰ λάβωμεν ἀπὸ τοὺς 4 ἄσσους τοὺς 2, δηλ. $\binom{4}{2}$.

"Ἄρα : $P(A) = \frac{\binom{4}{2}}{\binom{52}{2}} = \binom{4}{2} : \binom{52}{2} = \frac{4 \cdot 3}{1 \cdot 2} : \frac{52 \cdot 51}{1 \cdot 2} = \frac{4 \cdot 3}{52 \cdot 51} = \frac{1}{221} \approx 45\%_{\text{oo}}$.

5η : Ποία ἡ πιθανότης νὰ μὴ παρουσιασθῇ τὸ 3, διὰ τῶν ρίψωνεν Ἑνα κύβον εἰς τὸν ἀέρα;

Λύσις : Τὸ συμβάν «νὰ φέρῃ δ κύβος 3» είναι συμπληρωματικὸν τοῦ συμβάντος «νὰ μὴ φέρῃ δ κύβος 3». Ή πιθανότης τοῦ πρώτου συμβάντος είναι $\frac{1}{6}$, ἀρα ή πιθανότης τοῦ δευτέρου είναι : $1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

583. Ρίπτομεν εἰς τὸν ἀέρα δύο κύβους καὶ μᾶς ἐνδιαφέρει τὸ συμβάν A : «τὸ ἀθροισμα τῶν ἀριθμῶν ἐπὶ τῶν δινω ἑδρῶν είναι ≤ 7 » καὶ τὸ συμβάν B : «τὸ ἀθροισμα τῶν ἀριθμῶν ἐπὶ τῶν δινω ἑδρῶν είναι ἀρτιος ἀριθμός». Ζητοῦνται :

α) Νὰ σχηματισθῇ δ κατάλληλος δειγματικὸς χῶρος καὶ νὰ καθορισθοῦν ἐν αὐτῷ τὰ A καὶ B.

β) Νὰ δρισθοῦν τὰ A', B', A ∪ B, A ∩ B, A' ∪ B', A' ∩ B', (A ∪ B') ∩ A'.

γ) Ποία ἡ πιθανότης τοῦ συμβάντος : «Τὸ ἀθροισμα τῶν ἀριθμῶν ἐπὶ τῶν δινω ἑδρῶν είναι ἀκριβῶς 7».

584. Ρίπτομεν δύο κύβους εἰς τὸν ἀέρα. Ποία ἡ πιθανότης ἔκάστου τῶν κάτωθι συμβάντων :

α) Νὰ φέρωμεν 6,6.

β) Ο εἰς κύβος νὰ φέρῃ 3 καὶ δ ἀλλος 5.

γ) Οι δύο κύβοι νὰ φέρουν διαδοχικούς ἀριθμούς.

δ) Οι κύβοι νὰ φέρουν ἀθροισμα μικρότερον τοῦ 9.

585. Ρίπτει τις δύο κύβους καὶ φέρει ἄθροισμα 9. Ποία ἡ πιθανότης ἵνα ὁ συμπταίκτης του φέρῃ μεγαλύτερον ἄθροισμα;

586. Εἰς ἐν δοχείον ὑπάρχουν 5 σφαῖραι λευκαῖ, 7 κυαναῖ καὶ 4 ἔρυθραι. Τὸ πείραμα συνίσταται εἰς τὴν τυχαίαν ληψιν 3 σφαῖρῶν. Ποία ἡ πιθανότης νὰ εἰναι καὶ αἱ τρεῖς σφαῖραι λευκαῖ;

587. Ἐκ δέσμης 52 παιγνιοχάρτων ἔξαγομεν τυχαίως 5 χαρτιά. Ζητοῦνται :
α) Ποία ἡ πιθανότης νὰ ἔξαχθοῦν μόνον κόκκινα; (Τὰ 26 ἔχουν χρῶμα κόκκινον καὶ τὰ λοιπά 26 μαῦρο).

β) Ποία ἡ πιθανότης νὰ ἔξαχθοῦν 3 μαῦρα καὶ 2 κόκκινα;

588. Εἰς μίαν τάξιν 43 μαθητῶν εἰναι 24 ἀγόρια καὶ 19 κορίτσια. Ἀν λάβωμεν τυχαίως πέντε κλήρους τῆς τάξεως : α) Ποία ἡ πιθανότης νὰ κληθοῦν μόνον ἀγόρια. β) Ποία ἡ πιθανότης νὰ κληθοῦν 3 ἀγόρια καὶ 2 κορίτσια;

589. Ρίπτομεν τρεῖς κύβους, ποία ἡ πιθανότης νὰ ἐμφανισθῇ εἰς τούλάχιστον ἄσσος;

590. Ρίπτομεν δύο κύβους εἰς τὸν ἀέρα. Ποία ἡ πιθανότης ἐκάστου τῶν κάτωθι συμβάντων :

α) Τὸ ἄθροισμα τῶν ἐνδείξεων εἰναι μικρότερον τοῦ 5.

β) Τὸ ἄθροισμα τῶν ἐνδείξεων εἰναι Ἰσον μὲ 8.

γ) » » » εἰναι μεγαλύτερον τοῦ 9.

δ) » » » εἰναι διάφορον τοῦ 4.

591. Ὑποθέσωμεν διτὶ σκοπεύομεν νὰ κάμωμεν μίαν μελέτην ἐπὶ τῶν οἰκογενειῶν, αἱ ὅποιαι ἔχουν τρία παιδιά καὶ διτὶ θέλομεν νὰ καταγράψωμεν τὸ φύλον ἐκάστου παιδιοῦ κατὰ σειρὰν γεννήσεως. Γράψατε τὸν κατάλληλον δειγματικὸν χῶρον. Ὑποθέτοντες ἀκολούθως διτὶ κάθε στοιχείον τοῦ δειγματικοῦ χώρου ἔχει τὴν αὐτὴν πιθανότητα, νὰ εύρεθῇ :

α) Ἡ πιθανότης ἵνα μία οἰκογένεια μὲ τρία παιδιά τὰ δύο πρῶτα εἰναι ἀγόρια καὶ τὸ τρίτο κορίτσιο.

β) Ἡ πιθανότης ἵνα ἔχῃ ἓνα τούλάχιστον ἀγόρι.

γ) Ἡ πιθανότης ἵνα ἔχῃ μόνον ἓνα κορίτσιο.

δ) Ἡ πιθανότης ἵνα ἔχῃ δύο κορίτσια καὶ ἓνα ἀγόρι.

592. Ἐχομεν μίαν δέσμην παιγνιοχάρτων τῶν 52 φύλλων. Ζητεῖται ἡ πιθανότης τῶν ἔξι συμβάντων :

α) Λαμβάνοντες τυχαίως ἓνα χαρτί, τοῦτο νὰ εἰναι ἄσσος μπαστούνι.

β) Λαμβάνοντες τυχαίως ἓνα χαρτί, τοῦτο νὰ εἰναι ἄσσος.

γ) Λαμβάνοντες 6 χαρτιά συγχρόνως, νὰ περιέχωνται εἰς αὐτά οἱ 4 ἀσσοί.

593. Ποία ἡ πιθανότης ρίπτοντες τρεῖς κύβους, νὰ φέρωμεν ἄθροισμα μεγαλύτερον τοῦ 15;

594. Ἐκ δέσμης 52 παιγνιοχάρτων λαμβάνομεν κατὰ σειρὰν ἐκ τῶν ἄνω τὰ παιγνιόχαρτα, ἔως ὃς δια τού εὑρώμεν διὰ πρώτην φορὰν ἄσσον. Ποία ἡ πιθανότης ἵνα τὸ τέταρτον χαρτί εἰναι ἄσσος;

II. ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ

§ 260. Ὁ όρισμὸς τῆς πιθανότητος, τὸν ὅποιον διετυπώσαμεν εἰς τὴν § 258 παρουσιάζει δύο βασικὰ μειονεκτήματα :

1ον) Δὲν εἰναι εὐχερής, ᾳν μὴ δυνατός, ὁ ἀκριβῆς καθορισμὸς ἀφ' ἐνὸς τῶν δυνατῶν καὶ ἀφ' ἔτερου τῶν εύνοϊκῶν περιπτώσεων, ἴδιως ὅταν ὁ δειγματικὸς χῶρος δὲν εἰναι πεπερασμένος.

2ον) Ἡ περικοπὴ αὐτοῦ «... ἐφ' ὅσον ὅλαι αἱ περιπτώσεις εἰναι ἐξ Ἰσον δυναται» εἰναι ταυτόσημος μὲ τὴν «ἐφ' ὅσον ὅλαι αἱ περιπτώσεις εἰναι ἐξ Ἰσον πιθαναι», τοιουτοτρόπως ὅμως ἡ πιθανότης ὁρίζεται ἐκ νέου διὰ τῆς πιθανότητος, διαπράττεται δηλαδὴ φαῦλος κύκλος.

‘Η τοιαύτη θεώρησις τῆς ἐννοίας τῆς πιθανότητος, μολονότι χρησιμωτάτη εἰς τὴν ἑφαρμογὴν, παρουσιάζει δυσχερείας ἀπὸ λογικῆς πλευρᾶς, δι’ ὃ καὶ ἡ νεωτέρα Θεωρία τῶν Πιθανοτήτων ἀναπτύσσεται κατὰ τρόπον τυπικῶς ἀξιωματικόν, διὰ τοῦ καθορισμοῦ ἐνὸς πλήρους συστήματος προτάσεων (ἀξιωμάτων) τῇ βοηθείᾳ τῶν ὅποιων ἔξαγονται, διὰ τῆς παραγωγικῆς πλέον ὁδοῦ ὅλαι αἱ ἐννοιαὶ καὶ προτάσεις τῆς θεωρίας αὐτῆς.

Κατόπιν τούτων, θὰ ἀρχίσωμεν τὴν συστηματικωτέραν ἔξετασιν τῶν πιθανοτήτων μὲ τὴν ἡδη γνωστὴν ἐννοιαν τοῦ δειγματικοῦ χώρου ἐνὸς πειράματος.

§ 261. Πιθανότης ἀπλῶν συμβάντων.— “Εστω ὁ δειγματικὸς χῶρος $\Omega = \{\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_v\}$. Εἰς ἕκαστον ἀπλοῦν συμβάν (θ_k), $k = 1, 2, \dots, v$ ἐκχωροῦμεν ἓνα πραγματικὸν ἀριθμὸν $P(\{\theta_k\})$, τὸν ὅποιον ὀνομάζομεν πιθανότητα τοῦ συμβάντος {θ_k}.

Θὰ λέγωμεν ὅτι μία ἐκχωρησις πιθανοτήτων πρὸς τὰ ἀπλᾶ συμβάντα τοῦ δειγματικοῦ χώρου Ω , δηλαδὴ πρὸς τὰ {θ₁}, {θ₂}, ..., {θ_v} εἶναι δεκτή, ἐὰν ικανοποιῇ τὰς δύο συνθήκας :

P₁: ‘Η πιθανότης ἐκάστου ἀπλοῦ συμβάντος εἶναι μὴ ἀρνητικὸς ἀριθμός, ἢτοι :
 $P(\{\theta_k\}) \geq 0, \quad k = 1, 2, \dots, v.$

P₂: Τὸ ἄρροισμα τῶν πιθανοτήτων τῶν ἐκχωρουμένων εἰς ὅλα τὰ ἀπλᾶ συμβάντα τοῦ δειγματικοῦ χώρου Ω ἰσοῦται πρὸς τὴν μονάδα, ἢτοι :

$$P(\{\theta_1\}) + P(\{\theta_2\}) + \dots + P(\{\theta_v\}) = 1,$$

συντόμως :

$$\sum_{k=1}^v P(\{\theta_k\}) = 1.$$

Ἐνα σύστημα τοιούτων ἀριθμῶν $P(\{\theta_k\})$ πληρούντων τὰς **P₁** καὶ **P₂** εἶναι τό :

$$P(\{\theta_1\}) = P(\{\theta_2\}) = P(\{\theta_3\}) = \dots = P(\{\theta_v\}) = \frac{1}{v}.$$

Εἰς τὴν ειδικὴν αὐτὴν περίπτωσιν λέγομεν ὅτι τὰ ἀπλᾶ συμβάντα εἶναι ισοπίθανα.

§ 262. Πιθανότης συμβάντος (όλικοῦ).— Κάθε συμβάν $A \neq \emptyset$ εἶναι, ὡς ἐλέχθη, ἐνωσις, ἀκριβέστερον ἀθροισμα ἀπλῶν συμβάντων, ἢτοι :

$$A = \{\theta_1\} + \{\theta_2\} + \dots + \{\theta_k\}, \quad (k \leq v).$$

‘Ορίζομεν ὡς πιθανότητα τοῦ A , $A \neq \emptyset$, τὸν ἀριθμὸν $P(A)$, ὅστις εἶναι ἀθροισμα τῶν πιθανοτήτων τῶν {θ₁}, {θ₂}, ..., {θ_k}, ἢτοι :

$$P(A) = P(\{\theta_1\}) + P(\{\theta_2\}) + \dots + P(\{\theta_k\}) = \sum_{i=1}^k P(\{\theta_i\})$$

‘Εὰν A εἶναι τὸ κενὸν συμβάν, ἢτοι ἂν $A = \emptyset$, τότε δεχόμεθα ἐξ ὁρισμοῦ ὅτι :

$$P(\emptyset) = 0$$

Έκ τῶν ἀνωτέρω ἔπονται τώρα αἱ κάτωθι προτάσεις :

α'). Ἡ πιθανότης τοῦ «βεβαίου συμβάντος» εἶναι μονάς, ἢτοι $P(\Omega) = 1$.
Πράγματι, ἔχομεν :

$$P(\Omega) = \sum_{i=1}^v P(\{\theta_i\}) = (\lambda\gamma\omega τῆς συνθήκης P_2, § 261) = 1.$$

β'). Εὰν A καὶ B εἶναι συμβάντα ξένα πρὸς ἄλληλα, τότε :

$$P(A+B) = P(A) + P(B).$$

Πράγματι, ἐὰν $A = \{\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k\}$, $B = \{\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_p\}$ καὶ $A \cap B = \emptyset$,
τότε : $A + B = \{\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k, \epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_p\}$.

Ἔχομεν ὅμως :

$$P(A) = P(\{\theta_1\}) + P(\{\theta_2\}) + \dots + P(\{\theta_k\}) = \sum_{i=1}^k P(\{\theta_i\})$$

$$P(B) = P(\{\epsilon_1\}) + P(\{\epsilon_2\}) + \dots + P(\{\epsilon_p\}) = \sum_{j=1}^p P(\{\epsilon_j\})$$

$$\begin{aligned} P(A+B) &= P(\{\theta_1\}) + P(\{\theta_2\}) + \dots + P(\{\theta_k\}) + P(\{\epsilon_1\}) + P(\{\epsilon_2\}) + \\ &\quad + \dots + P(\{\epsilon_p\}) = \sum_{i=1}^k P(\{\theta_i\}) + \sum_{j=1}^p P(\{\epsilon_j\}) = P(A) + P(B). \end{aligned}$$

Γενικώτερον ισχύει ἡ κάτωθι πρότασις :

γ'). Εὰν A_1, A_2, \dots, A_v εἶναι συμβάντα ἀνὰ δύο ξένα πρὸς ἄλληλα καὶ εἶναι :

$$A = A_1 + A_2 + \dots + A_v,$$

$$\text{τότε : } P(A) = P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_v).$$

Υπόδειξις : Ἡ πρότασις ισχύει διὰ $v = 2$. Υποθέσατε ὅτι ισχύει διὰ $v = k$ καὶ δείξατε ὅτι ισχύει διὰ $v = k + 1$.

Σημείωσις : Ἡ ἀνωτέρω πρότασις καλεῖται : Ἀθροιστικὸν θεώρημα τῶν πιθανοτήτων, διατυποῦται δὲ συντόμως, οὕτω :

$$P(\sum_{i=1}^v A_i) = \sum_{i=1}^v P(A_i)$$

δ'). Δι' οἰονδήποτε συμβάν A , ισχύει : $0 \leq P(A) \leq 1$.

Πράγματι, ἐπειδὴ $P(A) \geq 0$ διὰ κάθε συμβάν A , ὅπερει νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι $P(A) \leq 1$. Τοῦτο ὅμως ισχύει, διότι, ἀν θεωρήσωμεν καὶ τὸ συμπληρωματικὸν A' τοῦ A , ὅτε $A \cup A' = \Omega$ καὶ $A \cap A' = \emptyset$, θὰ ἔχωμεν, δυνάμει τῶν προτάσεων β' καὶ α' , ὅτι :

$$P(A \cup A') = P(A) + P(A') = P(\Omega) = 1.$$

Οθεν : $P(A) = 1 - P(A') \leq 1$, διότι, ὡς ἀνωτέρω ἐλέχθη, $P(A') \geq 0$.

ε'). Εὰν A καὶ B εἶναι δύο οἰαδήποτε συμβάντα, τότε :

$$P(A - B) = P(A) - P(A \cap B).$$

Ἡ ὅπερ τὸ αὐτό :

$$P(A \cap B') = P(A) - P(A \cap B).$$

Πράγματι, έπειδή $A = (A - B) \cup (A \cap B)$ και $(A - B) \cap (A \cap B) = \emptyset$ θὰ
έχωμεν, δυνάμει τῆς ἀνωτέρω προτάσεως β' , δτι :

$$\text{P}(A) = P(A - B) + P(A \cap B),$$

εξ οὗ : $P(A - B) = P(A) - P(A \cap B).$

Ἐφαρμογαὶ

1η : 'Εὰν τὰ ν ἀπλᾶ συμβάντα τοῦ δειγματικοῦ χώρου $\Omega = \{\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_v\}$ είναι ίσοπίθα-
να, τότε :

$$P\left(\sum_{i=1}^v \{\theta_i\}\right) = \sum_{i=1}^v P(\{\theta_i\}) = v \cdot P(\{\theta_i\}). \quad (1)$$

'Αλλὰ $P(\Omega) = P\left(\sum_{i=1}^v \{\theta_i\}\right) = 1.$ (2)

'Εκ τῶν (1) καὶ (2) συνάγομεν δτι : $P(\{\theta_i\}) = \frac{1}{v}, \quad \forall i = 1, 2, \dots, v.$

Δηλαδὴ ἐπανευρίσκομεν τὴν πρότασιν (γ') τῆς § 258.

2α : 'Εὰν τὰ κ ἀπλᾶ συμβάντα ἐνὸς γεγονότος $A = \{\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k\}$ είναι ίσοπίθανα πιθα-
νότητος $\frac{1}{v}$, τότε :

$$P(A) = P\left(\sum_{i=1}^k \{\theta_i\}\right) = \sum_{i=1}^k P(\{\theta_i\}) = k \cdot P(\{\theta_i\}) = k \cdot \frac{1}{v} = \frac{k}{v} = \frac{\text{ἀριθμὸς εύνοϊκῶν περιπτώσεων}}{\text{ἀριθμὸς δυνατῶν περιπτώσεων}}.$$

Δηλαδὴ τῇ βοηθείᾳ τῶν ἀνωτέρω προτάσεων καὶ ὀρισμῶν εύρισκομεν ὡς συνέπειαν τὸν
στοιχειώδη ὀρισμὸν τῆς πιθανότητος κατά Laplace (βλ. § 258).

3η : 'Εάν E καὶ E' είναι δύο συμπληρωματικά συμβάντα ἐνὸς δειγματικοῦ χώρου Ω καὶ
είναι $P(E) = p$, τότε $P(E') = 1 - p$.

'Απόδειξις. 'Αφ' οὐ $E + E' = \Omega$, τότε, συμφώνως πρὸς τὴν πρότασιν β' , θὰ έχωμεν :

$$P(E + E') = P(E) + P(E') = P(\Omega), \quad \text{ἀλλὰ } P(\Omega) = 1,$$

ἄρα $p + P(E') = 1,$

εξ οὗ : $P(E') = 1 - p.$

4η : 'Εάν A καὶ B συμβάντα καὶ $A \subset B$, τότε $P(A) < P(B).$

'Απόδειξις : "Εστω Δ τὸ συμπλήρωμα τοῦ A ὡς πρὸς B , ἤτοι $\Delta = C_B A \equiv B - A$.

Προφανῶς ἔχομεν :

$$A \cup \Delta = B \quad \text{καὶ} \quad A \cap \Delta = \emptyset.$$

'Οπότε :

$$P(A \cup \Delta) = P(A + \Delta) = P(A) + P(\Delta) = P(B).$$

'Αρα : $P(A) < P(B)$, καθόσον $P(\Delta) > 0.$

5η : Ποία ἡ πιθανότης ίνα εἰς κύβος ριπτόμενος εἰς τὸν ἀέρα φέρῃ ἄρτιον ἀριθμόν;

Λύσις : Τὸ συμβάν A : «'Ο κύβος νὰ φέρῃ ἄρτιον ἀριθμὸν» είναι ἀθροισμα τῶν ἑξῆς
τριῶν ἀμοιβαίως ἀποκλειομένων συμβάντων :

A_1 : «'Ο κύβος νὰ φέρῃ 2..

A_2 : «'Ο κύβος νὰ φέρῃ 4..

A_3 : «'Ο κύβος νὰ φέρῃ 6..

ήτοι : $A = A_1 + A_2 + A_3.$

$$\text{Άρα : } P(A) = P(A_1 + A_2 + A_3) = P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}.$$

6η: Ρίπτομεν δύο κύβους. Ποιά ή πιθανότης ωστε τὸ ἄθροισμα τῶν ἐνδείξεων τῶν δύο κύβων νὰ είναι 3 ή 7;

Λ ὑ σις: 'Ως γνωστὸν (§ 255) τὰ ἀπλᾶ συμβάντα τοῦ πειράματος είναι 36 διατεταγμένα ζεύγη: (1,1), (1,2), (2,1), ..., (6,6) εἰς ἕκαστον τῶν διποίων ἑκχωροῦμεν πιθανότητα $\frac{1}{36}$.

Τὸ συμβάν A: «Τὸ ἄθροισμα τῶν ἐνδείξεων τῶν δύο κύβων είναι 3 ή 7», είναι ἄθροισμα τῶν ἑξῆς δύο ξένων ἀλλήλων συμβάντων:

A₁: «Τὸ ἄθροισμα τῶν ἐνδείξεων τῶν δύο κύβων είναι 3».

A₂: «Τὸ ἄθροισμα τῶν ἐνδείξεων τῶν δύο κύβων είναι 7».

Τὸ συμβάν A₁ είναι τὸ σύνολον { (1,2), (2,1) }, μὲν $P(A_1) = \frac{2}{36}$.

Τὸ συμβάν A₂ είναι { (1,6), (2,5), (3,4), (4,3), (5,2), (6,1) }, μὲν $P(A_2) = \frac{6}{36}$.

"Ἄρα: $P(A) = P(A_1 + A_2) = P(A_1) + P(A_2) = \frac{2}{36} + \frac{6}{36} = \frac{8}{36} = \frac{2}{9}$.

7η: 'Εστωσαν A καὶ B δύο συμβάντα μὲν $P(B) = \frac{1}{2}$ καὶ $P(A \cap B) = \frac{1}{4}$. Νὰ εὑρεθῇ η $P(B \cap A')$.

Λ ὑ σις: "Εχομεν, δυνάμει τῆς προτάσεως ε':

$$P(B \cap A') = P(B) - P(A \cap B) = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{1}{4}.$$

Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ

595. "Ἐν δοχεῖον περιέχει 3 λευκά σφαιρίδια, 4 κυανά καὶ 6 μαύρα. Τὸ πείραμα συνίσταται εἰς τὴν τυχαίαν λήψιν 2 σφαιρίδιων ἐκ τῶν 13. Ποιά ή πιθανότης νὰ είναι ἀμφότερα τοῦ ίδιου χρώματος;

596. "Ἐν κυτίον περιέχει λευκά καὶ μαύρα σφαιρίδια, δὲ ἀριθμὸς τῶν λευκῶν είναι δεκαπλάσιος τοῦ ἀριθμοῦ τῶν μαύρων. Ποιά ή πιθανότης νὰ ληφθῇ ἐν λευκὸν σφαιρίδιον;

597. 'Ἐὰν ή πιθανότης νὰ ἐμφανισθῇ ἐν συμβάν είναι τριπλασία τῆς πιθανότητος νὰ μὴν ἐμφανισθῇ, ποιά ή πιθανότης νὰ ἐμφανισθῇ τοῦτο;

598. Ρίπτει τις δύο κύβους. Ποιά ή πιθανότης νὰ δείξουν ἀμφότεροι τὴν ίδιαν δψιν;

599. Εἰς μίαν γραπτήν ἔξετασιν εἰς τὸ μάθημα τῆς Ιστορίας δίδονται τρία Ιστορικὰ γεγονότα ($\Gamma_1, \Gamma_2, \Gamma_3$) καὶ τρεῖς χρονολογίαι (x_1, x_2, x_3), ζητεῖται δὲ δῶς ἕκαστον μαθητῆς συσχετίση τὰ τρία γεγονότα πρὸς τὰς τρεῖς χρονολογίας. "Ἄς ύποθέσουμεν δὲτι εἰς μαθητῆς δὲν κατέχει τὸ θέμα καὶ κάμνει τυχαίαν συσχέτισιν, εἰς τρόπον ὥστε δλαι αἱ δυναται εἰς συσχετίσεις νὰ είναι ἔξι ίσου πιθαναί.

α) Σχηματίσατε τὸν δειγματικὸν χῶρον διὰ τὰ δυνατὰ ἀποτελέσματα.

β) Ποιά ή πιθανότης νὰ μὴν ὑπάρχουν τρεῖς δρθαὶ συσχετίσεις εἰς τὴν ἀπάντησιν τοῦ μαθητοῦ.

γ) Ποιά ή πιθανότης νὰ ὑπάρχουν ἀκριβῶς δύο δρθαὶ συσχετίσεις;

δ) Ποιά ή πιθανότης νὰ δλαι αἱ συσχετίσεις δρθαὶ;

ε) Ποιά ή πιθανότης νὰ ὑπάρχουν περισσότεραι τῆς μιᾶς δρθαὶ συσχετίσεις;

στ) 'Η πιθανότης νὰ περιέχῃ ή ἀπάντησις τρεῖς δρθαὶ συσχετίσεις είναι μεγαλύτερα τῆς πιθανότητος νὰ περιέχῃ μόνον δύο;

600. Ρίπτομεν τρεῖς κύβους συγχρόνως. Ποιά ή πιθανότης τοῦ συμβάντος: «Αἱ ἐνδείξεις τῶν τριῶν κύβων είναι διαδοχικοὶ ἀριθμοί».

601. Δοχεῖον περιέχει 6 λευκάς, 8 ἐρυθράς καὶ 10 μαύρας σφαίρας, δύοις ἀπὸ πάστης ἀπόψεως ἐκτὸς τοῦ χρώματος. Τὸ πείραμα ἔγκειται εἰς τὴν τυχαίαν ἔξαγωγὴν δύο ἐκ τῶν 24 σφαιρῶν. Ποιά ή πιθανότης νὰ είναι ἀμφότεραι αἱ ἔξαγομεναι σφαίραι τοῦ αὐτοῦ χρώματος;

602. Έκ δέσμης 52 παιγνιοχάρτων λαμβάνομεν τυχαίως δύκτω χαρτιά.

α) Ποιά ή πιθανότης νὰ είναι τοῦ αὐτοῦ χρώματος; (*Υπάρχουν 26 «κόκκινα» και 26 «μαύρα»*).

β) Ποιά ή πιθανότης νὰ μήν εύρισκεται «άσσος» μεταξύ αύτῶν;

γ) Ποιά ή πιθανότης νὰ ύπαρχουν δύο τούλαχιστον ἄσσοι;

§ 263. Πιθανότης ύπο συνθήκην.— *Εστωσαν Α και Β δύο συμβάντα τοῦ αὐτοῦ πειράματος τύχης και ὅτι $P(A) > 0$.* Τότε: *Η πιθανότης τοῦ Β ύπο συνθήκην Α, ή ἄλλως ή ύπο συνθήκην πιθανότης τοῦ Β δοθέντος ὅτι τὸ Α συνέβη ή ὅτι θὰ συμβῇ; συμβολιζομένη διὰ τοῦ $P(B|A)$, δρίζεται ύπο τῆς σχέσεως:*

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

Ήτοι: Πιθανότης τοῦ Β ύπο συνθήκην Α καλεῖται ό λόγος τῆς πιθανότητος τοῦ Α και Β πρὸς τὴν πιθανότητα τοῦ Α.

Παράδειγμα: Δοθέντος ὅτι εἰς μίαν οίκογένειαν μὲ δύο τέκνα τὸ ἐν είναι ἀγόρι, ποιά ή πιθανότης ἵνα ἀμφότερα τὰ τέκνα είναι ἀγόρια;

Λύσις: Εχομεν ἐν πρώτοις τὸν δειγματικὸν χῶρον:

$$\Omega = \{ \alpha\alpha, \alpha\kappa, \kappa\alpha, \kappa\kappa \},$$

δπου «α» σημαίνει ἀγόρι και «κ» κορίτσι.

Θεωροῦμεν τὰ συμβάντα:

A: «*Η οίκογένεια ἔχει ἐν τούλαχιστον ἀγόρι*», ήτοι $A = \{ \alpha\alpha, \alpha\kappa, \kappa\alpha \}$.

B: «*Η οίκογένεια ἔχει και τὰ δύο τέκνα ἀγόρια*», ήτοι $B = \{ \alpha\alpha \}$.

Τότε τὸ συμβάν $B|A$: «*Αμφότερα τὰ τέκνα είναι ἀγόρια δοθέντος ὅτι τὸ ἐν είναι ἀγόρι*» έχει πιθανότητα:

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{P[\text{ἀκριβῶς δύο ἀγόρια}]}{P[\text{ἐν τούλαχιστον ἀγόρι}]} = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{3}{4}} = \frac{1}{3}.$$

Σημείωσις. Η $P(B|A)$ δύνομάζεται και δεσμευμένη πιθανότης ἐν ἀντιδιαστολῇ πρὸς τὴν $P(B)$, ήτις καλεῖται και ἀδέσμευτος ή ἄνευ συνθήκης πιθανότης.

Οὔτως, εἰς τὸ προηγούμενον παράδειγμα ή ἀδέσμευτος πιθανότης είναι: $P(B) = 1/4$.

§ 264. Πιθανότης τομῆς δύο συμβάντων (νόμος τῶν συνθέτων πιθανοτήτων).— *Ο ύπολογισμὸς τῆς πιθανότητος τῆς τομῆς δύο συμβάντων Α και Β δύναται νὰ γίνῃ διὰ τῆς χρησιμοποιήσεως τοῦ τύπου τῆς ύπο συνθήκην πιθανότητος.*

Πράγματι, ἐκ τῆς σχέσεως $P(B|A) = \frac{P(B \cap A)}{P(A)}$, (ὅπου $P(A) > 0$)

προκύπτει: $P(B \cap A) = P(A) \cdot P(B|A)$. *Ἐάν δὲ και $P(B) > 0$, τότε δι' ἀντιμεταθέσεως τῶν γραμμάτων Α και Β ἔχομεν:*

$$P(A \cap B) = P(B) \cdot P(A|B).$$

Αλλά $A \cap B = B \cap A$ καὶ ἐπομένως :

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B | A) = P(B) \cdot P(A | B) \quad (1)$$

"Ητοι: 'Η πιθανότης πραγματοποιήσεως συγχρόνως δύο συμβάντων ίσοιται μὲ τὴν πιθανότητα πραγματοποιήσεως τοῦ ἑνός, ἐπὶ τὴν πιθανότητα πραγματοποιήσεως τοῦ ἑτέρου ὑπὸ τὴν συνθήκην ὅμως ὅτι συνέβη τὸ πρῶτον.'

Παράδειγμα: "Ἐν κυτίον περιέχει 15 λευκά καὶ 10 πράσινα σφαιρίδια. Τὸ πείραμα συνίσταται εἰς τὴν ἔξαγωγὴν δύο σφαιριδίων ἀλληλοδιαδόχως, χωρὶς τὸ ἔξαγόμενον σφαιρίδιον νὰ ἐπανατίθεται. Ποιὰ ἡ πιθανότης νὰ ἔξαχθῇ πρῶτα λευκόν καὶ κατόπιν πράσινον σφαιρίδιον;"

Λόσις: "Ἐὰν Λ σημαίνῃ λευκόν σφαιρίδιον καὶ Π πράσινον, θὰ ἔχωμεν :

$$P(\Lambda \cap \Pi) = P(\Lambda) \cdot P(\Pi | \Lambda).$$

"Αλλὰ $P(\Lambda) = \frac{15}{25} = \frac{3}{5}$ καὶ $P(\Pi | \Lambda) = \frac{10}{24} = \frac{5}{12}$ (διότι τὸ ἔξαχθὲν δὲν ἐπανατίθεται).

"Ἄρα : $P(\Lambda \cap \Pi) = \frac{3}{5} \cdot \frac{5}{12} = \frac{1}{4}.$

§ 265. Συμβάντα ἀνεξάρτητα ἀλλήλων.—"Εστωσαν δύο συμβάντα A καὶ B, μὴ κενά, ἀναφερόμενα εἰς ἓνα πείραμα τύχης. Θὰ λέγωμεν ὅτι τὸ συμβάν B εἶναι στατιστικῶς ἢ στοχαστικῶς ἀνεξάρτητον, συντόμως ἀνεξάρτητον τοῦ A τότε, καὶ μόνον τότε, ἢν ισχύῃ ἢ σχέσις :

$$P(B | A) = P(B)$$

"Η σχέσις αὕτη ἔχει ὡς ἄμεσον συνέπειαν ἕνα σημαντικὸν κανόνα πολλαπλασιασμοῦ πιθανοτήτων ἀνεξαρτήτων συμβάντων. Ο κανὼν οὗτος δίδεται διὰ τοῦ κατωτέρω θεωρήματος :

§ 266. Θεώρημα.—"Ἐὰν τὸ συμβάν B εἶναι ἀνεξάρτητον τοῦ A, τότε ἡ πιθανότης τῆς τομῆς των ίσοιται πρὸς τὸ γινόμενον τῶν πιθανοτήτων των.

"Ητοι :

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) \quad (1)$$

"Απόδειξις : Πράγματι, δυνάμει τοῦ ὁρισμοῦ τῶν ἀνεξαρτήτων συμβάντων καὶ τῆς σχέσεως (1) τῆς § 264, ἔχομεν :

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B | A) = P(A) \cdot P(B).$$

Παρατήρησις. "Ἐὰν ἐναλλάξωμεν τοὺς ρόλους τῶν A καὶ B τόσον εἰς τὴν ὑπόθεσιν ὅσον καὶ εἰς τὸ συμπέρασμα τοῦ ἀνωτέρω θεωρήματος, ἔχομεν πάλιν τὴν (1). Δυνάμεθα λοιπὸν νὰ εἴπωμεν ὅτι, ἢν ἐν ἑκ τῶν συμβάντων εἶναι ἀνεξάρτητον τοῦ ἄλλου, τότε ισχύει :

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B).$$

"Οταν ισχύῃ ἡ σχέσις αὕτη λέγομεν ὅτι τὰ δύο συμβάντα εἶναι ἀνεξάρτητα ἀλλήλων.

"Ἐὰν δύο συμβάντα δὲν εἶναι ἀνεξάρτητα, θὰ λέγωμεν ὅτι εἶναι ἐξηρτημένα.

Π αράδειγμα : Ρίπτομεν εἰς τὸν ἀέρα ἔνα κύβον καὶ ἐν νόμισμα. Ποία ἡ πιθανότης τοῦ συνθέτου συμβάντος : «ό κύβος νά φέρει 5 ή 6 καὶ τὸ νόμισμα κορώνα»;

Λόγος : "Εστω Α τὸ συμβάν : «Ο κύβος φέρει 5 ή 6» καὶ Β τὸ συμβάν : «Τὸ νόμισμα φέρει κορώνα (K)»

"Ο δειγματικὸς χῶρος τοῦ συνθέτου πειράματος εἶναι :

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \times \{K, \Gamma\} =$$

$$= \{(1, K), (2, K), (3, K), (4, K), (5, K), (6, K), (1, \Gamma), (2, \Gamma), (3, \Gamma), (4, \Gamma), (5, \Gamma), (6, \Gamma)\}.$$

Είναι : $A = \{(5, K), (6, K), (5, \Gamma), (6, \Gamma)\}$

$B = \{(1, K), (2, K), (3, K), (4, K), (5, K), (6, K)\}$

$$A \cap B = \{(5, K), (6, K)\}.$$

"Επίσης $P(A) = \frac{4}{12}, \quad P(B) = \frac{6}{12}, \quad P(A \cap B) = \frac{2}{12} = \frac{1}{6}.$

Παρατηροῦμεν δτι : $P(A) \cdot P(B) = \frac{4}{12} \cdot \frac{6}{12} = \frac{2}{12} = \frac{1}{6}$ καὶ $P(A \cap B) = \frac{1}{6}.$

"Αρα : $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) = \frac{1}{6}.$

Τοῦτο τὸ ἀνεμέναμεν, διότι τὸ ἀποτέλεσμα τὸ δόποιον θὰ μᾶς δώσῃ ὁ κύβος εἶναι ἀνεξάρτητον τοῦ ἀποτελέσματος τὸ δόποιον θὰ μᾶς δώσῃ τὸ νόμισμα.

§ 267. Ἰδιότητες ἀνεξάρτητων συμβάντων.

1η : 'Εὰν Α καὶ Β ἀνεξάρτητα συμβάντα, θὰ εἴναι ἀνεξάρτητα συμβάντα καὶ τὰ Α καὶ Β'.

"Απόδειξις. 'Ως γνωστὸν (§ 262, ε') $P(A \cap B') = P(A) - P(A \cap B)$,
καὶ ἐπειδὴ ἔξ οὐποθέσεως $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$, θὰ ἔχωμεν :

$$P(A \cap B') = P(A) - P(A) \cdot P(B) = P(A) [1 - P(B)] = P(A) \cdot P(B'),$$

διότι $P(B) + P(B') = 1$.

2α : 'Εὰν Α καὶ Β ἀνεξάρτητα συμβάντα, θὰ εἴναι ἀνεξάρτητα καὶ τὰ Α' καὶ Β.

"Ητοι : $P(A' \cap B) = P(A') \cdot P(B).$

"Υπόδειξις. Παρατηρήσατε δτι $(A \cap B) \cup (A' \cap B) = B$ καὶ ἐργασθῆτε ὡς καὶ προηγουμένως.

3η : 'Εὰν Α καὶ Β ἀνεξάρτητα συμβάντα, θὰ εἴναι ἀνεξάρτητα συμβάντα καὶ τὰ Α' καὶ Β'.

"Ητοι : $P(A' \cap B') = P(A') \cdot P(B').$

"Απόδειξις. 'Επειδὴ $(A' \cap B) \cup (A' \cap B') = A'$ καὶ $(A' \cap B) \cap (A' \cap B') = \emptyset$,
ἔχομεν : $P(A' \cap B) + P(A' \cap B') = P(A')$

$$P(A' \cap B') = P(A') - P(A' \cap B) = \quad (\lambdaόγω τῆς 2ας) \\ = P(A') - P(A') \cdot P(B) = \\ = P(A') \cdot [1 - P(B)] = P(A') \cdot P(B').$$

'Ε φαρμογή : Ή πιθανότης νά λυθῇ ἐν πρόβλημα ἀπό ἐνα μαθητήν χ είναι $\frac{3}{5}$ καὶ ή πιθανότης νά λυθῇ ἀπό ἐνα ἄλλον μαθητήν γ είναι $\frac{2}{3}$. Ποία ή πιθανότης νά λυθῇ τὸ πρόβλημα ἀπό τὸν ἐνα καὶ νά μὴ λυθῇ ἀπό τὸν ἄλλον;

Λύσις : 'Εάν καλέσωμεν Α τὸ συμβάν : «'Ο μαθητῆς χ λύει τὸ πρόβλημα» καὶ Β τὸ συμβάν : «'Ο μαθητῆς γ λύει τὸ πρόβλημα», τότε :

$A \cap B'$ σημαίνει : 'Ο χ θὰ λύσῃ τὸ πρόβλημα, ἀλλ' ὅχι ό γ,

$A' \cap B$ σημαίνει : 'Ο χ δὲν θὰ λύσῃ τὸ πρόβλημα, ἀλλὰ ό γ θὰ τὸ λύσῃ.

($A \cap B'$) \cup ($A' \cap B$) σημαίνει : Νά λυθῇ ἀπό τὸν ἐνα καὶ νά μὴ λυθῇ ἀπό τὸν ἄλλον.

Άρα, ή ζητουμένη πιθανότης είναι, ἂν ληφθῇ ὑπ' ὅψιν δτι $A \cap B'$ καὶ $A' \cap B$ είναι ξένα συμβάντα

$$\begin{aligned} P[(A \cap B') \cup (A' \cap B)] &= P(A \cap B') + P(A' \cap B) = P(A) \cdot P(B') + P(A') \cdot P(B) = \\ &= \frac{3}{5} \left(1 - \frac{2}{3}\right) + \left(1 - \frac{3}{5}\right) \cdot \frac{2}{3} = \frac{3}{5} \cdot \frac{1}{3} + \frac{2}{5} \cdot \frac{2}{3} = \frac{7}{15}. \end{aligned}$$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

603. Ή πιθανότης λύσεως ἐνὸς προβλήματος ἀπό τὸν μαθητήν α είναι $\frac{2}{3}$ καὶ ἀπό τὸν συμμαθητήν του β είναι $\frac{4}{5}$. Ποία ή πιθανότης νά λυθῇ τὸ πρόβλημα ἀπό ἀμφοτέρους ;

604. Δείξατε δτι :

$$\alpha) P(A|B) + P(A'|B) = 1$$

$$\beta) P(A|B) = \frac{P(A)}{P(B)}, \text{ γνωστοῦ δτος } A \subset B \text{ καὶ } P(B) > 0.$$

605. Κατά τὴν ρίψιν ἐνὸς κύβου, ποία είναι ή πιθανότης νά παρουσιασθῇ τὸ «6» διὰ πρώτην φοράν κατά τὴν τετάρτην ρίψιν;

606. 'Εκ μιᾶς κλήρωτίδος περιεχούσης 30 κλήρους, ἡριθμημένους ἀπό 1 ἕως 30 ἀνασύρομεν «τυχαίως» ἔνα κλῆρον. Ποία είναι ή πιθανότης δ ἀνασυρθεῖς κλῆρος νά φέρῃ ἀριθμὸν περιττὸν καὶ διαιρετὸν διὰ τοῦ ἐννέα ;

607. 'Εάν Α καὶ Β συμβάντα ξένα πρὸς ἀλληλα μὲν $P(A \cup B) > 0$, νά δειχθῇ δτι :

$$P(A|A \cup B) = \frac{P(A)}{P(A) + P(B)}.$$

608. Ρίπτομεν δύο κύβους εἰς τὸν ἀέρα. Γνωστοῦ δτος δτος ὁ 1ος κύβος ἔφερε τὸν ἀριθμὸν 5, ποία ή πιθανότης τοῦ συμβάντος : «τὸ ἄθροισμα τῶν ἐνδείξεων είναι \(\geq 10\)» ;

609. 'Εκ δέσμης 52 παιγνιοχάρτων λαμβάνομεν τρία παιγνιόχαρτα. Ποία ή πιθανότης τοῦ συμβάντος : «Οὐδέν ἐκ τῶν τριῶν παιγνιοχάρτων είναι φιγούρα».

610. 'Εκλέγομεν τυχαίως δύο φυσικοὺς ἀριθμοὺς ἐκ τοῦ τμήματος $T_{10} \equiv \{1, 2, 3, \dots, 9, 10\}$. Ποία ή πιθανότης νά είναι δὲν εἶς ἀρτιος καὶ δὲν εἶτε περιττός ;

611. Ρίπτομεν δύο κύβους. Ποία ή πιθανότης νά φέρωμεν διπλοῦν ἔξ ; Ποία δὲ ή πιθανότης νά φέρωμεν τούλάχιστον ἔνα ἔξ ;

612. Πόσας φοράς πρέπει νά ρίψωμεν ἔνα κύβον, ὅστε ή ἐμφάνισις ἐνὸς τούλάχιστον ἔξ νά ἔχῃ πιθανότητα 0,5 ;

§ 268. Πιθανότης τομῆς τριῶν συμβάντων.— 'Εάν Α, Β, Γ συμβάντα τοῦ δειγματικοῦ χώρου Ω , τότε ίσχύει :

$$P(A \cap B \cap \Gamma) = P(A) \cdot P(B|A) \cdot P(\Gamma|A \cap B), \quad (P(A \cap B) > 0)$$

*Απόδειξις : Έάν $A \cap B = E$, έχομεν :

$$\begin{aligned} P(A \cap B \cap \Gamma) &= P(E \cap \Gamma) = P(E) P(\Gamma | E) = P(A \cap B) \cdot P(\Gamma | A \cap B) = \\ &= P(A) \cdot P(B | A) \cdot P(\Gamma | A \cap B), \text{ δ.ε.δ.} \end{aligned}$$

*Ομοίως άποδεικνύεται, δτι :

$$P(A \cap B \cap \Gamma \cap \Delta) = P(A) \cdot P(B | A) \cdot P(\Gamma | A \cap B) \cdot P(\Delta | A \cap B \cap \Gamma).$$

Γενικώς :

$$P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_v) = P(A_1) \cdot P(A_2 | A_1) \cdot P(A_3 | A_1 \cap A_2) \dots P(A_v | A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_{v-1})$$

Παράδειγμα : "Εν δοχείον περιέχει 3 λευκά σφαιρίδια, 4 κυανά και 6 μαύρα. Τόπειραμα συνίσταται εις τὴν ἔξαγωγὴν τριῶν σφαιριδίων, τὸ ἐν κατόπιν τοῦ ἄλλου, χωρὶς τὸ ἔξαγόμενον σφαιρίδιον νὰ ἐπανατίθεται. Ποιὰ ἡ πιθανότης τὰ ἔξαγόμενα σφαιρίδια νὰ είναι κατὰ σειράν : 1) λευκόν, 2) κυανοῦν, 3) μαύρον.

Άνστις : "Έάν Λ σημαίνῃ λευκὸν σφαιρίδιον, Κ κυανοῦν καὶ Μ μαύρον, θὰ ἔχωμεν :

$$P(\Lambda \cap K \cap M) = P(\Lambda) \cdot P(K | \Lambda) \cdot P(M | \Lambda \cap K).$$

$$\begin{aligned} \text{Άλλα} \quad P(\Lambda) &= \frac{3}{13}, \quad P(K | \Lambda) = \frac{4}{12} = \frac{1}{3} \quad (\text{διότι τὸ ἔξαχθὲν δὲν ἐπανατίθεται}) \quad \text{καὶ} \\ P(M | \Lambda \cap K) &= \frac{6}{11} \quad (\text{διότι τὰ ἔξαχθέντα δὲν ἐπανατίθεται}). \end{aligned}$$

"Οθεν :

$$P(\Lambda \cap K \cap M) = \frac{3}{13} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{6}{11} = \frac{6}{143}.$$

§ 269. Ἄνεξαρτησία ν συμβάντων. — Τρία ἡ περισσότερα συμβάντα A_1, A_2, \dots, A_v καλοῦνται ἀμοιβαίως ἡ τελείως ἀνεξάρτητα τότε, καὶ μόνον τότε, ἂν ἡ ὑπὸ συνθήκη (δεσμευμένη) πιθανότης οίουδήποτε τούτων, δοθέντων οἰωνδήποτε τῶν λοιπῶν, ίσοῦται πρὸς τὴν συνήθη (ἀδέσμευτον) πιθανότητα.

Ο ἀνωτέρω δρισμὸς είναι ίσοδύναμος μὲ τὰς ἔξῆς σχέσεις :

$$P(A_i \cap A_j) = P(A_i) \cdot P(A_j), i \neq j, i, j = 1, 2, \dots, v \quad (\text{ἀνεξάρτητα ἀνὰ ζεύγη}).$$

$$P(A_i \cap A_j \cap A_k) = P(A_i) P(A_j) P(A_k), \quad (\text{ἀνεξάρτητα ἀνὰ τρία}), \text{ κ.ο.κ.}$$

$$P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_v) = P(A_1) \cdot P(A_2) \dots P(A_v).$$

Οὖτω, π.χ., τρία συμβάντα τοῦ δειγματικοῦ χώρου Ω , έστω τὰ A, B, Γ θὰ λέγωνται τελείως ἀνεξάρτητα ἔάν, καὶ μόνον ἔάν, ίσχύουν αἱ ἀκόλουθοι σχέσεις :

- | | | |
|--|---|------|
| 1. $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$ | } | (I) |
| 2. $P(A \cap \Gamma) = P(A) \cdot P(\Gamma)$ | | |
| 3. $P(B \cap \Gamma) = P(B) \cdot P(\Gamma)$ | | |
| 4. $P(A \cap B \cap \Gamma) = P(A) \cdot P(B) \cdot P(\Gamma)$ | | (II) |

Δέον νὰ σημειωθῇ δτι ἡ ἀνεξαρτησία τριῶν συμβάντων ἀνὰ δύο λαμβανομένων δὲν ἔξασφαλίζει τὴν τελείαν ἀνεξαρτησίαν αὐτῶν. Ἐπομένως διὰ νὰ είναι τρία συμβάντα τελείως ἀνεξάρτητα πρέπει νὰ ίσχύουν συγχρόνως αἱ (I) καὶ (II).

Παρατήρησις. "Όταν έχωμεν ν ἀνεξάρτητα συμβάντα, τότε :

$$P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_v) = P(A_1) \cdot P(A_2) \cdots P(A_v) \quad (1)$$

"Η σχέσις δύμως (1) δὲν είναι ίκανη συνθήκη διὰ τὴν τελείαν ἀνεξαρτησίαν τῶν A_1, A_2, \dots, A_v .

Π αραδείγματα : 1ον. Κατὰ τρόπους ἀνεξαρτήτους, ρίπτομεν ἔνα νόμισμα, λαμβάνομεν ἔνα παιγνιόχαρτον ἀπὸ μίαν δέσμην καὶ ρίπτομεν ἔνα κύβον. Ποία ἡ πιθανότης νὰ ἐμφανίσουν τὸ νόμισμα «κορώνω», τὸ παιγνιόχαρτον «άσσον» καὶ ὁ κύβος «ῇ»;

Λόγιστας : Εάν Α σημαίνῃ : «Τὸ νόμισμα δεικνύει κορώνα», Β : «Τὸ παιγνιόχαρτον εἶναι ἄσσος» καὶ Γ : «Ο κύβος φέρει ῇ», θὰ έχωμεν :

$$P(A \cap B \cap \Gamma) = P(A) \cdot P(B) \cdot P(\Gamma),$$

διότι τὰ συμβάντα είναι ἀνεξάρτητα.

'Αλλὰ $P(A) = \frac{1}{2}, \quad P(B) = \frac{4}{52} = \frac{1}{13}, \quad P(\Gamma) = \frac{1}{6}.$

"Ἄρα : $P(A \cap B \cap \Gamma) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{13} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{156}.$

Θὰ δώσωμεν τώρα καὶ ἐν χαρακτηριστικὸν παράδειγμα, δι' οὐ ἐμφαίνεται διτὶ ἡ ἀνεξαρτησία τριῶν συμβάντων ἀνὰ δύο λαμβανομένων δὲν ἔξασφαλίζει τὴν πλήρη ἀνεξαρτησίαν αὐτῶν.

Ζων : Αἱ ἔδραι κανονικοῦ τετράεδρον είναι χρωματισμέναι ώς ἓξης : Μαύρη, λευκή, ἐρυθρὰ καὶ ἡ τετάρτη ἔδρα ἔχει καὶ τὰ τρία χρώματα. Ρίπτομεν τὸ τετράεδρον καὶ παρατητούμεν τὸ χρώμα τῆς ἔδρας ἐπὶ τῆς ὁποίας στηρίζεται. Καλούμεν :

Α τὸ συμβάν : «Ο κύβος στηρίζεται ἐπὶ ἔδρας, ἡ ὁποία είναι χρωματισμένη μαύρη»

Β τὸ συμβάν : «Ο » » » » » » » λευκή»

Γ τὸ συμβάν : «Ο » » » » » » » ἐρυθρά».

Τότε : $P(A) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}, \quad P(B) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}, \quad P(\Gamma) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}.$

$$P(A \cap B) = \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = P(A) \cdot P(B).$$

$$P(A \cap \Gamma) = \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = P(A) \cdot P(\Gamma).$$

$$P(B \cap \Gamma) = \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = P(B) \cdot P(\Gamma).$$

Ἐπομένως τὰ Α, Β, Γ είναι ἀνεξάρτητα ἀνὰ δύο.

'Αλλὰ $P(A \cap B \cap \Gamma) = \frac{1}{4} \neq P(A) \cdot P(B) \cdot P(\Gamma) = \frac{1}{8}.$


§ 270. Προσθετικὸν θεώρημα τῶν πιθανοτήτων.— Εάν Α καὶ Β δύο συμβάντα ἐνὸς δειγματικοῦ χώρου Ω , τότε ισχύει :

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

"Ητοι : ἡ πιθανότης διτὶ συμβαίνει ἐν τούλαχιστον ἐκ τῶν Α καὶ Β εὑρίσκεται διὰ τῆς προσθέσεως τῆς πιθανότητος διτὶ συμβαίνει τὸ Α μὲ τὴν πιθανότητα διτὶ συμβαί-

νει τὸ Β καὶ ἀκολούθως διὰ τῆς ἀφαιρέσεως τῆς πιθανότητος ὅτι συμβαίνουν ἀμφότερα.

Απόδειξις. "Ας παρατηρήσωμεν τὸ κατωτέρω διάγραμμα τοῦ Venn (Σχ. 19).



Σχ. 19

$A \cup B$ εἶναι τὸ σύνολον τῶν στοιχείων τὰ ὅποια ἀνήκουν εἴτε εἰς τὸ A , εἴτε εἰς τὸ B , εἴτε εἰς ἄμφοτερα. Πιθανότης αὐτοῦ εἶναι τὸ ἄθροισμα τῶν πιθανοτήτων τῶν στοιχείων του (δηλ. τῶν ἀπλῶν συμβάντων). Ἐπειδὴ $P(A) + P(B)$ εἶναι τὸ ἄθροισμα τῶν πιθανοτήτων τῶν στοιχείων τοῦ A καὶ τῶν στοιχείων τοῦ B , ἔπειται ὅτι αἱ πιθανότητες τῶν στοιχείων τῆς τομῆς $A \cap B$ ἔχουν ληφθῆ δύο φοράς. Ἐάν λοιπὸν ἀφαιρέσωμεν τὴν $P(A \cap B)$, θά ἔχωμεν τὸ ἄθροισμα τῶν πιθανοτήτων δὲν τῶν στοιχείων τοῦ $A \cap B$, ὅπου ἔκαστον ἔχει ληφθῆ μίαν φοράν. Ὁστε :

$$P(A) + P(B) - P(A \cap B) = P(A \cup B). \quad \text{ὅ.ἔ.δ.}$$

Θὰ δώσωμεν ὅμως μίαν αὐστηροτέραν ἀπόδειξιν τοῦ ἀνωτέρω θεωρήματος :

Εύκολως διαπιστοῦμεν ὅτι τὸ συμβάν $A \cup B$ δύναται νὰ παρασταθῇ ὡς ἐνώσις (ἄθροισμα) τῶν ἀμοιβαίως ἀποκλειομένων συμβάντων $A - B$ καὶ B ,

$$\text{ἵπτοι : } A \cup B = (A - B) \cup B, \text{ ἐνθα } (A - B) \cap B = \emptyset.$$

Τότε ὅμως, δυνάμει τῶν προτάσεων β' καὶ ϵ' τῆς § 262, ἔχομεν :

$$\begin{aligned} P(A \cup B) &= P(A - B) + P(B) = P(A) - P(A \cap B) + P(B) = \\ &= P(A) + P(B) - P(A \cap B). \end{aligned}$$

Πόρισμα I. — 'Εὰν A καὶ B εἶναι ἀμοιβαίως ἀποκλειόμενα (ξένα μεταξύ των) συμβάντα, θὰ εἶναι : $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$. (βλ. καὶ § 262, β)

Πόρισμα II. — 'Εὰν A καὶ A' εἶναι δύο συμπληρωματικὰ συμβάντα ἐνὸς δειγματικοῦ χώρου Ω θὰ εἶναι : $P(A) + P(A') = 1$. (βλ. καὶ § 258, δ)

Πόρισμα III. — $P(A \cup B) \leq P(A) + P(B)$ (ὑποπορθετικὴ ἴδιότης τῆς P).

'Ε φαρμοὶ γὴ 1η : 'Έκ δέσμης 32 παιγνιοχάρτων (πρέφα) λαμβάνομεν τυχαίως δύο ἐξ αὐτῶν συγχρόνως. Ποία ἡ πιθανότης νὰ είναι τὸ ἐν τούλαχιστον ἐξ αὐτῶν ἄσσος;

Λύσις : Ονομάζομεν A τὸ συμβάν : «Τὸ ἐν νὰ είναι ἄσσος» καὶ B τὸ συμβάν : «Τὸ ἐτερον νὰ είναι ἄσσος». Τότε $P(A) = \frac{4}{32} = \frac{1}{8}$, $P(B) = \frac{4}{32} = \frac{1}{8}$ καὶ ἡ πιθανότης νὰ είναι ἀμφότερα ἄσσος είναι : $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B | A) = \frac{4}{32} \cdot \frac{3}{31} = \frac{3}{248}$.

Τότε ἡ πιθανότης τοῦ συμβάντος $A \cup B$: «Τὸ ἐν τούλαχιστον ἐξ αὐτῶν νὰ είναι ἄσσος» είναι : $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{1}{8} + \frac{1}{8} - \frac{3}{248} = \frac{59}{248}$.

Έφαρμογή 2α : "Εστωσαν δύο συμβάντα A και B με $P(A \cup B) = \frac{3}{4}$, $P(A') = \frac{2}{3}$
και $P(A \cap B) = \frac{1}{4}$. Νὰ εύρεθη : (i) $P(A)$, (ii) $P(B)$.

Λύσις : (i). 'Ως γνωστόν ($\S 258$, δ') έχουμεν :

$$P(A) = 1 - P(A') = 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}.$$

(ii). 'Εκ τῆς σχέσεως $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ λαμβάνομεν :

$$\frac{3}{4} = \frac{1}{3} + P(B) - \frac{1}{4}, \quad \text{εξ οὗ : } P(B) = \frac{2}{3}.$$

§ 271. 'Εὰν A,B,Γ συμβάντα τοῦ αὐτοῦ δειγματικοῦ χώρου Ω , θὰ είναι :

$$P(A \cup B \cup \Gamma) = P(A) + P(B) + P(\Gamma) - P(A \cap B) - P(A \cap \Gamma) - P(B \cap \Gamma) + P(A \cap B \cap \Gamma)$$

'Απόδειξις. "Εστω $\Delta = B \cup \Gamma$. Τότε έχουμεν $A \cap \Delta = A \cap (B \cup \Gamma) = (A \cap B) \cup (A \cap \Gamma)$ και $P(A \cap \Delta) = P(A \cap B) + P(A \cap \Gamma) - P(A \cap B \cap \Gamma)$,
καθ' ὅσον $(A \cap B) \cap (A \cap \Gamma) = (A \cap B \cap \Gamma)$.

"Οθεν :

$$\begin{aligned} P(A \cup B \cup \Gamma) &= P(A \cup \Delta) = P(A) + P(\Delta) - P(A \cap \Delta) = \\ &= P(A) + P(B) + P(\Gamma) - P(B \cap \Gamma) - [P(A \cap B) + P(A \cap \Gamma) - P(A \cap B \cap \Gamma)] \\ &= P(A) + P(B) + P(\Gamma) - P(B \cap \Gamma) - P(A \cap B) - P(A \cap \Gamma) + P(A \cap B \cap \Gamma). \end{aligned}$$

Πόρισμα. — 'Εὰν A, B, Γ είναι συμβάντα ἀμοιβαίως ἀποκλειόμενα (ξένα μεταξύ των) ἀνὰ δύο, τότε ισχύει :

$$P(A \cup B \cup \Gamma) = P(A) + P(B) + P(\Gamma).$$

Έφαρμογαὶ

1η : 'Η πιθανότης νὰ ζῇ κάποιος μετά 20 έτη είναι $\frac{3}{4}$ και ή πιθανότης νὰ ζῇ ή σύζυγός του μετά 20 έτη είναι $\frac{9}{10}$. Ποία ή πιθανότης νὰ ζῇ τούλαχιστον είς τούτων μετά 20 έτη;

Λύσις : "Εστω A τὸ συμβάν : «'Ο σύζυγος ζῇ μετά 20 έτη» και B τὸ συμβάν : «'Η σύζυγος ζῇ μετά 20 έτη». Τότε :

$$\begin{aligned} P(A \cup B) &= P(A) + P(B) - P(A \cap B) \\ P(A \cup B) &= \frac{3}{4} + \frac{9}{10} - \frac{3}{4} \cdot \frac{9}{10} = \frac{39}{40}. \end{aligned}$$

2α : 'Η πιθανότης νὰ ζῇ κάποιος μετά 40 έτη είναι $\frac{8}{10}$ και ή πιθανότης νὰ ζῇ ή σύζυγός του μετά 40 έτη είναι $\frac{7}{10}$. Ποία ή πιθανότης νὰ ζῇ μόνον ὁ σύζυγος μετά 40 έτη ;

Λύσις : 'Εὰν καλέσωμεν A τὸ συμβάν : «'Ο σύζυγος νὰ ζῇ μετά 40 έτη» και B τὸ συμβάν : «'Νὰ ζῇ ή σύζυγος μετά 40 έτη», τότε ὀρκεῖ νὰ εύρωμεν τὴν $P(A \cap B')$.

'Αλλὰ $P(A \cap B') = P(A) \cdot P(B') = P(A) \cdot [1 - P(B)]$,

$$\text{ὅθεν : } P(A \cap B') = P(A) \cdot [1 - P(B)] = \frac{8}{10} \cdot \left(1 - \frac{7}{10}\right) = \frac{8}{10} \cdot \frac{3}{10} = \frac{24}{100}.$$

613. Έάν $A \subset B$, τότε δείξατε ότι : $P(B|A) = 1$.

614. Δείξατε χρησιμοποιούντες τὸν νόμον τοῦ De Morgan $A' \cap B' = (A \cup B)'$, ότι έάν τὰ A καὶ B είναι ἀνεξάρτητα συμβάντα, θὰ είναι ἀνεξάρτητα καὶ τὰ A' καὶ B' .

615. Εἰς ἀκέραιος περιλαμβάνεται κατὰ τύχην μεταξὺ τῶν πρώτων 200 θετικῶν ἀκεραίων. Ποιά ή πιθανότης ότι δὲ λαμβανόμενος ἀριθμός είναι διαιρέτος εἴτε διὰ 6 εἴτε διὰ 8 ;

616. Ἡ πιθανότης ωὐδὲ ζῆται κάποιος μετὰ 20 ἔτη είναι $\frac{3}{4}$ καὶ η πιθανότης νὰ ζῆται σύζυγός του μετὰ 20 ἔτη είναι $\frac{3}{5}$. Ποιά ή πιθανότης :

- α) Νὰ ζοῦν ἀμφότεροι, β) Νὰ ζῆται μόνον ὁ σύζυγος,
- γ) Νὰ ζῆται μόνον η σύζυγος, δ) Νὰ ζῆται τούλαχιστον εἷς τούτων.

617. Έάν A καὶ B είναι συμβάντα μὲν $P(A) = \frac{3}{8}$, $P(A \cup B) = \frac{5}{8}$ καὶ $P(B') = \frac{1}{2}$, νὰ εύρεθοῦν αἱ : $P(A \cap B)$, $P(A' \cap B')$, $P(A' \cup B')$ καὶ $P(B \cap A')$.

618. Έάν A καὶ B είναι συμβάντα μὲν $P(A) = \frac{1}{2}$, $P(B') = \frac{2}{3}$ καὶ $P(A \cap B) = \frac{1}{4}$, νὰ εύρεθοῦν αἱ : $P(A|B)$, $P(B|A)$, $P(A \cup B)$, $P(A'|B')$, $P(B'|A')$.

619. Νὰ ἀποδειχθῇ ότι :

$$P[(A \cup A')|B] = P(A|B) + P(A'|B).$$

620. Δοθέντος ότι $P(A) = \frac{3}{8}$, $P(B) = \frac{5}{8}$ καὶ $P(A \cup B) = \frac{3}{4}$, νὰ εύρεθοῦν αἱ πιθανότητες : $P(A|B)$ καὶ $P(B|A)$.

621. Έάν E καὶ F ἀνεξάρτητα συμβάντα, θὰ είναι :

$$P(E'|F) = 1 - P(E|F), \quad (P(F) > 0).$$

622. Έάν E καὶ F είναι συμβάντα τοῦ αὐτοῦ δειγματικοῦ χώρου Ω , τότε :

$$1) \quad 0 \leq P(E|F) \leq 1$$

$$2) \quad P(\Omega|F) = 1$$

$$3) \quad P(E) = P(F) \cdot P(E|F) + P(F') \cdot P(E|F').$$

623. Έάν A καὶ B είναι συμβάντα ἀμοιβαίως ἀποκλειόμενα, τότε :

$$P(A \cup B|E) = P(A|E) + P(B|E), \quad (P(E) > 0).$$

624. Δείξατε ότι : Έάν $A \subset B = B_1 \cup B_2 \cup \dots \cup B_v$, ἐνθα $B_i \cap B_j = \emptyset$, $i \neq j$, τότε $P(A) = P(B_1) \cdot P(A|B_1) + P(B_2) \cdot P(A|B_2) + \dots + P(B_v) \cdot P(A|B_v)$.

άποδος έπειτα γενετό δέ τον πυργού μένοντας νότιος σημείος γάτε είναι το
 ΒΑ-Σ.Π. (συναντήσεων) οπότε από την περιφέρεια της πόλης αποτελείται η πόλη της Αθήνας.
 Τοποθετείται δηλαδή στην πόλη της Αθήνας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΚ ΤΟΥ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ*

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι

ΓΕΝΙΚΟΤΗΤΕΣ

I. Ιον : 'Εφαρμοστὸν διάνυσμα.— Καλοῦμεν ἐφαρμοστὸν διάνυσμα ἐν διατεταγμένον ζεύγος δύο σημείων, Α καὶ Β.

Τὸ συμβολίζομεν δὲ ὡς ἔξῆς : \overrightarrow{AB} .

Ζον : Μηδενικὸν διάνυσμα.— Μηδενικὸν διάνυσμα εἶναι τὸ διάνυσμα, τοῦ δποίου τὴ ἀρχή, Α, καὶ τὸ τέλος, Β, συμπίπτουν.

Τοῦτο τὸ συμβολίζομεν ὡς ἔξῆς : $\overrightarrow{0}$.

'Ο φορεὺς τοῦ μηδενικοῦ διανύσματος εἶναι ἀκαθόριστος.

Ζον : Ισοδύναμα ἐφαρμοστὰ διανύσματα.— Δύο ἐφαρμοστὰ διανύσματα, \overrightarrow{AB} καὶ \overrightarrow{GD} , εἶναι ισοδύναμα, ὅταν τὰ τμήματα $A\Delta$ καὶ BG (σχ. 1) ἔχουν τὸ αὐτὸ μέσον.

Ἄρα : $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{GD} \iff A\Delta \text{ καὶ } BG \text{ ξ-χουν τὸ αὐτὸ μέσον.}$

Συνέπειαι : Θὰ ἔχωμεν τὰς ισοδυναμίας :

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{GD} \iff \overrightarrow{AG} = \overrightarrow{BD}$$


$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AG} \iff B \text{ καὶ } G \text{ συμπίπτουν.}$$

Παρατήρησις : Εἰς τὸ Σύνολον τῶν διανύσματων (ἐφαρμοστῶν) θὰ λέγωμεν δτι τὰ ἀνωτέρω διανύσματα ἀποτελοῦν μίαν κλάσιν ισοδυναμίας. Αἱ κλάσεις ισοδυναμίας καλοῦνται ἐλεύθερα διανύσματα.

4ον : 'Ελεύθερον διάνυσμα.— 'Ελεύθερον διάνυσμα καλεῖται τὸ Σύνολον τῶν ἐφαρμοστῶν διανύσματων, ισοδυνάμων πρὸς δοθὲν ἐφαρμοστὸν διάνυσμα.

"Ἐν τοιοῦτον διάνυσμα τὸ συμβολίζομεν εἴτε δι' ἐνὸς γράμματος (ι, π.χ.), εἴτε

* 'Υπὸ 'Ιωάννου Πανάκη



δι' ἑνὸς τυχόντος ἐκ τῶν ἐφαρμοστῶν διανυσμάτων, τὸ δποῖον παριστᾶ αὐτὸν (ἀντιπρόσωπος). Π.χ. \vec{AB} :


Σον: Ἰσα ἐλεύθερα διανύσματα.— Δύο ἐλεύθερα διανύσματα, \vec{u} καὶ \vec{v} , λέγονται ἵσα, ὅταν ἐπιδέχωνται ως ἀντιπροσώπους τὸ αὐτὸν ἐφαρμοστὸν διάνυσμα ἢ δύο ἐφαρμοστὰ διανύσματα ἰσοδύναμα, δηλ. ὅταν ἔχουν τὴν αὐτὴν διεύθυνσιν, τὴν αὐτὴν ἀπόλυτον τιμὴν καὶ φοράν. Συμβολίζομεν δὲ ταῦτα ως ἔξῆς :

Βον: Μῆκος ἐλευθέρου διανύσματος.— Μῆκος ἐλευθέρου διανύσματος καλεῖται τὸ μῆκος, \vec{AB} , ἑνὸς ἀντιπροσώπου \vec{AB} τοῦ διανύσματος τούτου.

Τὸ συμβολίζομεν ως ἔξῆς :

$$|\vec{u}| = u \quad \text{ἢ} \quad |\vec{AB}| = AB$$

Τον: Γωνία δύο διανυσμάτων, \vec{u} καὶ \vec{v} , προσανατολισμένου ἐπιπέδου.— Καλοῦμεν γωνίαν δύο διανυσμάτων \vec{u} καὶ \vec{v} , κειμένων ἐπὶ προσανατολισμένου ἐπιπέδου, τὴν προσανατολισμένην γωνίαν τὴν σχηματίζομένην ὑπὸ δύο ἡμιευθεῶν, OX καὶ OY, τῆς αὐτῆς ἀρχῆς, ἀντιστοίχως παραλλήλων πρὸς τὰ διανύσματα \vec{u} καὶ \vec{v} (σχ. 2) καὶ τῆς αὐτῆς φορᾶς.



Μία τοιαύτη γωνία παρίσταται ως ἔξῆς : (\vec{u}, \vec{v}) . Ἡ δὲ ἀλγεβρικὴ τιμὴ αὐτῆς δίδεται ὑπὸ τοῦ τύπου :

$$(\vec{u}, \vec{v}) = \pm \vartheta + 2k\pi, \text{ μὲ } 0 \leq \vartheta \leq \pi \text{ (}\vartheta \text{ κυρτὴ γωνία), } k \in \mathbb{Z}.$$

Βον: Συγγραμμικὰ διανύσματα.— Δύο διανύσματα, \vec{u} καὶ \vec{v} λέγονται συγγραμμικά, ὅταν ἔχουν τὴν αὐτὴν διεύθυνσιν.

"Αρα θὰ ἔχωμεν :

$$(\vec{u}, \vec{v}) = 0, \text{ ὅταν τὰ διανύσματα εἰναι διμόρροπα } \text{ἢ } (\vec{u}, \vec{v}) = 2k\pi, \text{ } k \in \mathbb{Z} \\ \text{καὶ } (\vec{u}, \vec{v}) = \pi, \text{ ὅταν ταῦτα εἰναι ἀντίρροπα } \text{ἢ } (\vec{u}, \vec{v}) = (2k+1)\pi, \text{ } k \in \mathbb{Z}$$

Τον: Συνεπίπεδα διανύσματα.— Δύο διανύσματα λέγονται συνεπίπεδα, ὅταν αἱ διευθύνσεις των εἰναι παράλληλοι πρὸς τὸ αὐτὸν ἐπίπεδον.

Παρατήρησις: Δύο διανύσματα εἰναι πάντοτε συνεπίπεδα ;

ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΩΝ

2. Ιον: Πρόσθεσις διανυσμάτων.— "Εστωσαν \vec{u} καὶ \vec{v} δύο ἐλεύθερα διανύσματα μὲ ἀντιπροσώπους ἀντιστοίχως τὰ ἐφαρμοστὰ διανύσματα \vec{AB} καὶ \vec{BG} (σχ. 3).

Καλούμεν αθροισμα τῶν δύο τούτων διανυσμάτων τὸ διάνυσμα \vec{s} , τοῦ δποίου ἀντιπρόσωπος εἶναι τὸ ἐφαρμοστὸν διάνυσμα $\vec{A}\vec{G}$. Τὸ συμβολίζομεν δὲ ὡς ἔξῆς :

$$\vec{s} = \vec{u} + \vec{v}.$$

Ο δρισμὸς οὗτος γενικεύεται καὶ διὰ πλείονα τῶν δύο διανυσμάτων.

2ον : Ἀντίθετα διανύσματα. — Δύο διανύσματα λέγονται ἀντίθετα, ὅταν τὸ ἀθροισμά των εἶναι τὸ μηδενικὸν διάνυσμα.

Ἐὰν \vec{AB} εἶναι ἕνας ἀντιπρόσωπος τοῦ διανύσματος \vec{u} , τότε δὲ ἀντιπρόσωπος τοῦ ἄλλου θὰ εἶναι δὲ \vec{BA} . Τὸ ἀντίθετον τοῦ διανύσματος \vec{u} εἶναι τὸ $-\vec{u}$.

3ον : Τριγωνικὴ ἀνισότης δύο διανυσμάτων. — Μεταξὺ τῶν δπολύτων τιμῶν τῶν τριῶν διανυσμάτων \vec{u} , \vec{v} καὶ $\vec{u} + \vec{v}$ ἔχομεν τὴν ἀκόλουθον ἀνισοτικήν σχέσιν :

$$|\vec{u} + \vec{v}| \leq |\vec{u}| + |\vec{v}|,$$

προκύπτουσαν ἐκ τοῦ τριγώνου $AB\Gamma$ τοῦ (σχ. 3), ὅπου τὸ $=$ λαμβάνει χώραν, ὅταν τὰ \vec{u} καὶ \vec{v} εἶναι παράλληλα καὶ τῆς αὐτῆς φορᾶς.

Γενικώτερον, διὰ τὰ διανύσματα : $\vec{u}_1, \vec{u}_2, \dots, \vec{u}_v$ ισχύει :

$$|\vec{u}_1 + \vec{u}_2 + \dots + \vec{u}_v| \leq |\vec{u}_1| + |\vec{u}_2| + \dots + |\vec{u}_v|$$

4ον : Ἰδιότητες τῆς προσθέσεως. — Αὗται συνοψίζονται εἰς τάς :

α) $\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$ (**ἀντιμεταθετική**),

β) $(\vec{u} + \vec{v}) + \vec{w} = \vec{u} + (\vec{v} + \vec{w})$ (**προσεταιριστική**),

γ) $\vec{u} + \vec{0} = \vec{0} + \vec{u} = \vec{u}$ (**0 = οὐδέτερον στοιχεῖον**),


δ) $\vec{u} + (-\vec{u}) = (-\vec{u}) + \vec{u} = \vec{0}$ (**$-\vec{u} =$ ἀντίθετον τοῦ \vec{u}**).

5ον : Αφαιρεστις δύο διανυσμάτων. — Οἰωνδήποτε ὅντων τῶν διανυσμάτων \vec{u} καὶ \vec{v} , ή ἔξισωσις : $\vec{u} + \vec{x} = \vec{v}$,

ἐπιδέχεται πάντοτε μίαν, καὶ μίαν μόνον, λύσιν, τὴν :

$$\vec{x} = \vec{v} + (-\vec{u}), \text{ τὴν δποίαν γράφομεν : } \vec{x} = \vec{v} - \vec{u}.$$

Τὸ διάνυσμα \vec{x} καλεῖται διαφορὰ τῶν διανυσμάτων \vec{u} καὶ \vec{v} .



σον : Γινόμενον διανύσματος \vec{u} έπι k πραγματικόν k .

ΟΡΙΣΜΟΣ: Δεχόμεθα ότι : «Δοθέντος πραγματικοῦ $k \neq 0$ καὶ διανύσματος $\vec{u} \neq 0$, ὑπάρχει διάνυσμα \vec{v} τοιοῦτον ὥστε :

$$\begin{array}{c} \vec{u} \\ \vec{v} = k\vec{u} \quad (k < 0) \\ \xleftarrow{\Sigma x. 4} \end{array}$$

1ον : Τὸ \vec{v} νὰ ἔχῃ τὴν διεύθυνσιν τοῦ \vec{u} .

2ον : Τὸ \vec{v} νὰ είναι τῆς αὐτῆς φορᾶς μὲ τὸ \vec{u} , ἐὰν $k > 0$, ἀντιθέτου δὲ φορᾶς μὲ τὸ \vec{u} , ὅταν $k < 0$.

3ον : 'Ο λόγος $\frac{\vec{v}}{|\vec{u}|}$, δηλαδὴ τὸ μῆκος τοῦ \vec{u} πρὸς τὸ μῆκος τοῦ \vec{u} νὰ είναι ἵσος πρὸς τὴν ἀπόλυτον τιμὴν τοῦ k . ήτοι :

$$\frac{|\vec{v}|}{|\vec{u}|} = |k| \iff |\vec{v}| = |k| \cdot |\vec{u}|.$$

Παρατηρήσεις : α') 'Εὰν $k = 0$, τότε $\vec{v} = 0$, οἰουδήποτε ὄντος τοῦ \vec{u} .

β') 'Εὰν $\vec{u} = 0$, τότε $\vec{v} = 0$, οἰουδήποτε ὄντος τοῦ k .

γ') 'Εὰν $k \cdot \vec{u} = 0$, τότε $\vec{u} = 0$, ή $\vec{u} = 0$ ή $k = 0$ καὶ $\vec{u} = 0$.

δ') Θὰ είναι : $1 \cdot \vec{u} = \vec{u}$ καὶ $(-1) \vec{u} = -\vec{u}$.

Σημείωσις : Διὰ τοῦ ἀνωτέρω α' απεικονίζεται τὸ Σύνολον τῶν πραγματικῶν ἀριθμῶν ἐπὶ τῶν σημειῶν μιᾶς εὐθείας κατὰ τὸν μέχρι τοῦδε γνωστὸν τρόπον. Τὸ ἀξιώματα τοῦτο είναι θεμελιῶδες διὰ τὴν 'Αναλυτικὴν Γεωμετρίαν καὶ συνδέει τὴν "Ἀλγεβραν" μὲ τὴν Γεωμετρίαν. Θεμελιωτής είναι δὲ Γάλλος Μαθηματικός καὶ φιλόσοφος Καρτέσιος.

'Απὸ τοῦδε καὶ εἰς τὸ ἔχης τὰ διανύσματα θεωροῦνται ὡς διατεταγμένα ζεύγη πραγματικῶν ἀριθμῶν : τῶν συντεταγμένων προβολῶν αὐτῶν (13). Ή τοιαύτη θεώρησις ἀποτελεῖ τὴν 'Αναλυτικὴν Γεωμετρίαν.

7ον : 'Ιδιότητες τοῦ γινομένου διανύσματος ἐπὶ ἀριθμὸν $k \in \mathbb{R}$.— Αὗται συνοψίζονται ὡς ἀκολούθως

$$\alpha') \vec{u} = \vec{v} \implies \vec{k}\vec{u} = \vec{k}\vec{v}, \text{ καὶ } \text{ἄν } k \neq 0, \vec{k}\vec{u} = \vec{k}\vec{v} \implies \vec{u} = \vec{v}.$$

$$\beta') \text{ 'Εὰν } \vec{u} \neq 0, \text{ τότε } \vec{k}\vec{u} = \vec{k}_1\vec{u} \implies k = k_1.$$

$$\gamma') \text{ Είναι : } k(\vec{k}_1\vec{u}) = k_1(\vec{k}\vec{u}) = k_1 k_2 \vec{u}.$$

$$\delta') \text{ Είναι : } k(\vec{u} + \vec{v}) = \vec{k}\vec{u} + \vec{k}\vec{v}.$$

$$\text{Γενικώτερα : } k \cdot \sum \vec{u}_i = \sum k \vec{u}_i \quad (i = 1, 2, 3, \dots, v)$$

$$\epsilon') \text{ Είναι : } (k + k_1) \vec{u} = \vec{k}\vec{u} + \vec{k}_1\vec{u}.$$

Γενικώτερα :

$$(k_1 + k_2 + \dots + k_v) \vec{u} = \vec{k}_1\vec{u} + \vec{k}_2\vec{u} + \dots + \vec{k}_v\vec{u} \quad \text{ἢ} \quad \vec{u} \cdot \sum k_i = \sum k_i \vec{u}$$

μὲ $i = 1, 2, 3, \dots, v$

3. ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣ ΜΙΑΣ ΕΥΘΕΙΑΣ.— "Εστω εύθεια xy καὶ διάνυσμα $\vec{i} \neq \vec{0}$, παράλληλον πρὸς τὴν εὐθεῖαν ταύτην (σχ. 5). Πᾶν ἄλλο διάνυσμα, \vec{u} , παράλληλον πρὸς τὴν xy εἶναι τῆς μορφῆς: $\vec{u} = X\vec{i}$.

Διὰ τὸν λόγον τοῦτον, πᾶς ἀντιπρόσωπος

τοῦ \vec{i} φερόμενος ὑπὸ τῆς xy καλεῖται διανυσματικὴ βάσις τῆς εὐθείας ταύτης.

'Ο ἀριθμὸς X καλεῖται τετμημένη τοῦ διανύσματος \vec{u} εἰς τὴν βάσιν \vec{i} .

'Αποκαθίσταται οὕτω μία ἀμφιμονοσήμαντος ἀντιστοιχία μεταξὺ τοῦ Συνόλου τῶν διανυσμάτων τῶν παραλλήλων πρὸς τὴν xy καὶ τοῦ συνόλου, R , τῶν πραγματικῶν ἀριθμῶν.

4. ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΒΑΣΙΣ (ἢ ΦΥΣΙΚΗ).— 'Η βάσις \vec{i} καλεῖται κανονική, ὅταν τὸ διάνυσμα \vec{i} ἔκλεγῃ ὡς τὸ μοναδιαῖον διάνυσμα. Εἰς τὴν περίπτωσιν ταύτην ὁ ἀριθμὸς X καλεῖται ἀλγεβρικὴ τιμὴ τοῦ διανύσματος \vec{u} .

'Ο ἀριθμὸς $|X|$ εἶναι τὸ μῆκος τοῦ διανύσματος τούτου.

5. ΑΞΩΝ.— 'Ἄξων εἶναι ἡ εὐθεῖα ἐπὶ τῆς ὁποίας ἔχει ὄρισθη ἡ θετικὴ φορά, ἡ ἀρχὴ τοῦ ἄξονος καὶ τὸ μοναδιαῖον διάνυσμα, \vec{i} , τοῦ ὁποίου φορὰ εἶναι ἡ τοῦ ἄξονος.

Εἰς τὸ (σχ. 6) εἰκονίζεται ὁ ἄξων $x'OX$, μὲ ἀρχὴν τὸ σημεῖον O , θετικὴν φορὰν τὴν Ox καὶ μὲ μονάδα μῆκους: $|\vec{i}| = 1$.

'Η ἀλγεβρικὴ τιμὴ τοῦ διανύσματος \vec{u} , παραλλήλου πρὸς τὸν ἄξονα $x'OX$, παρίσταται πολλάκις καὶ διὰ τοῦ \vec{u} .

Οὕτως, εἰς τὸ (σχ. 6), ἂν τὸ \vec{AB} κεῖται ἐπὶ τοῦ ἄξονος $x'OX$, ὁ λόγος $\frac{\vec{AB}}{|\vec{i}|} = \vec{AB}$ εἶναι ἡ ἀλγεβρικὴ τιμὴ τοῦ \vec{AB} . Ἀρα:

$$\vec{AB} = \vec{AB} \cdot \vec{i} \quad \text{ἢ} \quad |\vec{AB}| = |\vec{AB}| \cdot |\vec{i}| = AB \cdot 1 = AB.$$

6. ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΣΕΩΣ.— "Εστω \vec{i} μία βάσις (κανονικὴ ἢ οὐ) εὐθείας $x'OX$ καὶ \vec{i}' δευτέρα βάσις, δριζομένη, ὡς πρὸς τὴν πρώτην, ὑπὸ τῆς σχέσεως $\vec{i}' = k\vec{i}$. "Εστω τέλος τὸ διάνυσμα \vec{u} παράλληλον πρὸς τὴν $x'OX$, ἔχον τετμημένην X εἰς τὴν πρώτην βάσιν καὶ X' εἰς τὴν δευτέραν. Θὰ ἔχωμεν:

$$\vec{u} = X\vec{i} \quad \text{καὶ} \quad \vec{u} = X'\vec{i}' = kX'\vec{i}', \quad \frac{x'}{x} \quad \vec{O} \quad \vec{i} \quad \vec{u} \quad \vec{i}' = k\vec{i}$$

ἔξ οὖ: $X = kX'$ καὶ δθεν: $X' = \frac{X}{k}$.

Σχ. 7

7. ΘΕΩΡΗΜΑ.— 'Ο λόγος τῶν μηκῶν δύο συγγραμμικῶν διανυσμάτων ίσος ται πρὸς τὸν λόγον τῶν ἀλγεβρικῶν τιμῶν αὐτῶν ἀντιστοίχως.

'Επι τοῦ ἄξονος κ'Οχ θεωροῦμεν τὰ διανύσματα \vec{AB} καὶ $\vec{ΓΔ}$ (σχ. 8), ἔνθα $\vec{ΓΔ} \neq \vec{0}$. 'Ως γνωστόν, ὑπάρχει ἀριθμὸς k , τοιοῦτος ὥστε : $k = \frac{|\vec{AB}|}{|\vec{ΓΔ}|}$ (1)

'Εκ τοῦ κανόνος τῆς διαιρέσεως δύο πραγμάτων ἔχομεν :

$$\frac{|\vec{AB}|}{|\vec{ΓΔ}|} = \frac{|\overline{AB}|}{|\overline{ΓΔ}|} = \frac{AB}{\Gamma\Delta} = \frac{|\vec{AB}|}{|\vec{ΓΔ}|} = \frac{|\overrightarrow{AB}|}{|\overrightarrow{ΓΔ}|} = |k| \quad (2)$$

'Αλλά : $\frac{\overline{AB}}{\overline{ΓΔ}} > 0$, ἐὰν $\overline{AB}, \overline{ΓΔ}$ ὁμόσημοι $\iff \vec{AB}, \vec{ΓΔ}$ ὁμόρροπα,

καὶ $\frac{\overline{AB}}{\overline{ΓΔ}} < 0$, ἐὰν $\overline{AB}, \overline{ΓΔ}$ ἑτερόσημοι $\iff \vec{AB}, \vec{ΓΔ}$ ἀντίρροπα.

Κατ' ἀκολουθίαν δὲ λόγος $\frac{\overline{AB}}{\overline{ΓΔ}}$ ἔχει τὴν αὐτὴν ἀπόλυτον τιμὴν καὶ τὸ αὐτὸν πρόσημον μὲ τὸν ἀριθμὸν k .

*Ἀρα :
$$\frac{|\vec{AB}|}{|\vec{ΓΔ}|} = \frac{|\overline{AB}|}{|\overline{ΓΔ}|} \quad (3)$$

Παρατηρήσεις : Δὲν πρέπει νὰ συγχέωνται τὰ σύμβολα :

$$AB, \quad \overline{AB}, \quad \vec{AB}$$

Τὸ σύμβολον \vec{AB} παριστᾶ διάνυσμα, ἵτοι γεωμετρικὸν μέγεθος.

Τὸ σύμβολον \overline{AB} παριστᾶ τὴν ἀλγεβρικὴν τιμὴν τοῦ \vec{AB} . Δηλαδὴ \overline{AB} εἶναι πραγματικὸς ἀριθμός, θετικὸς, ἀρνητικὸς ἢ μηδέν.

Τὸ σύμβολον AB ἢ $|\vec{AB}|$ παριστᾶ τὸ μῆκος τοῦ \vec{AB} . Τοῦτο εἶναι πραγματικὸς ἀριθμός, θετικὸς ἢ μηδέν.


Αἱ τιμαὶ τῶν \vec{AB} καὶ \vec{BA} εἶναι ἀντίθετοι. Γράφομεν δὲ τότε : $\overline{BA} = -\overline{AB}$, ἐξ οὗ : $\overline{BA} + \overline{AB} = 0$, καὶ λέγομεν ὅτι τὰ συγγραμμικὰ διανύσματα \vec{AB} καὶ \vec{BA} εἶναι ἀντίθετα.

'Ο λόγος $\frac{\overline{AB}}{\overline{ΓΔ}}$ δὲν μεταβάλλεται, ἂν ἀλλάξωμεν τὴν φορὰν τοῦ ἄξονος κ'Οχ, ἐπὶ τοῦ διποίου κεῖνται. Διότι οἱ δύο δροὶ ἀλλάσσουν πρόσημον ἀμοιβαίως.

8. ΤΕΤΜΗΜΕΝΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΠΙ ΑΞΟΝΟΣ.— 'Επι ἄξονος x' Ox (σχ. 9) θεωροῦμεν σημεῖον A.

'Ο λόγος : $\frac{\overrightarrow{OA}}{1} = \overline{OA} = X_A$ εἶναι, ως γνωστόν, ἡ ἀλγεβρική τιμὴ τοῦ δια-

νύσματος \overrightarrow{OA} καὶ καλεῖται τετμημένη τοῦ σημείου A. Συμβολίζεται δὲ μὲν X_A . Τὸ ο καλεῖται ἀρχὴ τῶν τετμημένων. Τὸ ο ἔχει τετμημένη μηδέν.



Εἰς πᾶν σημεῖον τοῦ ἄξονος x' Ox ἀντιστοιχεῖ μία, καὶ μόνον μία, τετμημένη.

9. ΕΚΦΡΑΣΙΣ ΤΗΣ ΑΛΓΕΒΡΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΠΙ ΑΞΟΝΟΣ.— 'Επι ἄξονος x' Ox (σχ. 10) θεωροῦμεν τὸ διάνυσμα \overrightarrow{AB} .

Θὰ εἶναι :

$$\overline{OA} = X_A \quad \text{καὶ} \quad \overline{OB} = X_B.$$

Κατὰ τὸ θεώρημα τοῦ Chasles θὰ εἶναι :

$$\overline{AB} = \overline{AO} + \overline{OB} = \overline{OB} + \overline{AO} \quad \text{ἢ} \quad \overline{AB} = \overline{OB} - \overline{OA}$$



$$\text{ἢ} \quad \overline{AB} = X_B - X_A. \quad (1)$$

Δηλαδή : Ἡ ἀλγεβρικὴ τιμὴ διανύσματος κειμένου ἐπὶ ἄξονος ισοῦται πρὸς τὴν τετμημένην τοῦ πέρατος μείον τὴν τῆς ἀρχῆς.

$$''\text{Αρα :} \quad AB = |X_B - X_A| \quad (2)$$

Παράδειγμα : 'Εὰν $x_A = +3$ καὶ $x_B = -5$, τότε :

$$\overline{AB} = (-5) - (+3) = -5 - 3 = -8 \quad \text{καὶ} \quad AB = |-8| = 8.$$

10. ΤΕΤΜΗΜΕΝΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ.— 'Εὰν Γ εἶναι τὸ μέσον τοῦ διανύσματος \overrightarrow{AB} (σχ. 10), θὰ ἔχωμεν :

$$\overline{GA} + \overline{GB} = 0 \quad \text{ἢ} \quad (\overline{OA} - \overline{OG}) + (\overline{OB} - \overline{OG}) = 0 \quad \text{ἢ} \quad 2\overline{OG} = \overline{OA} + \overline{OB} \quad \text{ἢ}$$

$$2x_G = x_A + x_B, \quad \text{ἔξ οὖ :} \quad x_G = \frac{x_A + x_B}{2}.$$

Δηλαδή : Ἡ τετμημένη τοῦ μέσου διανύσματος κειμένου ἐπὶ ἄξονος, ισοῦται πρὸς τὸ ήμιάθροισμα τῶν τετμημένων τῶν ἄκρων τοῦ.

Παράδειγμα : 'Εὰν $x_A = +6$ καὶ $x_B = -10$, τότε ἡ τετμημένη x_G , τοῦ μέσου Γ τοῦ διανύσματος \overrightarrow{AB} θὰ εἶναι :

$$x_G = \frac{1}{2} (+6 - 10) = -2.$$

AΣΚΗΣΕΙΣ

1. 'Επι τοῦ ἄξονος x' Ox θεωροῦμεν τὰ σημεῖα A,B,Γ μὲν ἀντιστοίχους τετμημένας $+6, -2 + 8$. Iov) Νὰ ὑπολογισθοῦν οἱ ἀριθμοὶ $\overline{AB}, \overline{BG}, \overline{GA}$. 2ov) Λαμβάνομεν ώς ἀρχὴν τὸ σημεῖον O', τοιοῦτον ὥστε $\overline{OO'} = -3$. Ποῖαι εἶναι αἱ νέαι τετμημέναι τῶν σημείων A,B,Γ καὶ ποῖαι αἱ τιμαὶ τῶν $\overline{AB}, \overline{BG}, \overline{GA}$;

2. "Εστωσαν Α,Β δύο σημεία ενὸς ἀξονος x'Οχ μὲ τετμημένας -2 καὶ 4 ἀντιστοίχως. Νὰ δρισθῇ σημείον Μ τοῦ ἀξονος, τοιοῦτον ὥστε: $\overline{MA} = 2 \cdot \overline{MB}$.

3. 'Εὰν Α,Β είναι δύο σημεία τοῦ ἀξονος x'Οχ μὲ τετμημένας ἀντιστοίχως -1 καὶ 2,5, νὰ δρισθῇ σημείον Μ τοῦ ἀξονος, τοιοῦτον ὥστε: $\overline{MA} + 3\overline{MB} = \overline{AB}$ καὶ νὰ δρισθῇ ὁ λόγος $\overline{MA} : \overline{MB}$.

4. 'Εὰν x_A, x_B είναι ἀντιστοίχως αἱ τετμημέναι τῶν σημείων Α,Β ἐπὶ ἐνὸς ἀξονος x'Οχ, νὰ δρισθοῦν αἱ τετμημέναι τῶν σημείων Γ καὶ Δ τοῦ ἀξονος, οὕτως ὥστε:

$$\overline{AG} = \overline{GD} = \overline{AB}.$$

5. Αἱ τετμημέναι τῶν σημείων Α,Β,Γ, ἐνὸς ἀξονος x'Οχ είναι ἀντιστοίχως -2, +8, +3. 'Υπάρχει σημείον Μ τοῦ ἀξονος, τοιοῦτον ὥστε: $\overline{MA} + \overline{MB} + \overline{MG} = 0$;

6. Τῶν σημείων Α,Β,Γ,Δ ὅπωσδήποτε κειμένων ἐπὶ ἀξονος x'Οχ, νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι:
1ον: $\overline{DA} \cdot \overline{BG} + \overline{DB} \cdot \overline{GA} + \overline{DG} \cdot \overline{AB} = 0$.

2ον: $\Delta A^2 \cdot \overline{BG} + \Delta B^2 \cdot \overline{GA} + \Delta G^2 \cdot \overline{AB} + \overline{BG} \cdot \overline{GA} \cdot \overline{AB} = 0$.

3ον: $\overline{BG} \cdot \overline{GD} \cdot \overline{DB} - \overline{GD} \cdot \overline{DA} \cdot \overline{AG} + \overline{DA} \cdot \overline{AB} \cdot \overline{BD} - \overline{AB} \cdot \overline{BG} \cdot \overline{GA} = 0$.

7. 'Επι ἀξονος x'Οχ δίδονται τὰ σημεῖα Α,Β,Γ. Δεῖξατε ὅτι ὑπάρχει ἐπὶ τοῦ ἀξονος τούτου ἐν μοναδικὸν σημείον I, τοιοῦτον ὥστε: $\overline{IA}^3 + \overline{IB}^3 + \overline{IG}^3 - 3 \cdot \overline{IA} \cdot \overline{IB} \cdot \overline{IG} = 0$.

'Εὰν Μ είναι τυχὸν σημείον τοῦ ἐν λόγῳ ἀξονος, τότε:

$$\overline{MA}^3 + \overline{MB}^3 + \overline{MG}^3 - 3 \cdot \overline{MA} \cdot \overline{MB} \cdot \overline{MG} = \frac{3}{2} \overline{MI} (AB^2 + BG^2 + GA^2)$$

καὶ $\overline{MA}^3 \cdot \overline{BG} + \overline{MB}^3 \cdot \overline{GA} + \overline{MG}^3 \cdot \overline{AB} + 3 \overline{MI} \cdot \overline{AB} \cdot \overline{BG} \cdot \overline{GA} = 0$ (Euler)

11. ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΩΝ.—Καλοῦμεν γραμμι-

κὸν συνδυασμὸν τῶν ν διανυσμάτων, $\overrightarrow{u_1}, \overrightarrow{u_2}, \dots, \overrightarrow{u_v}$, πᾶν διάνυσμα \overrightarrow{u} τῆς μορφῆς: $\overrightarrow{u} = \lambda_1 \overrightarrow{u_1} + \lambda_2 \overrightarrow{u_2} + \dots + \lambda_v \overrightarrow{u_v}$ (η) ($\overrightarrow{u} = \sum_1^v \lambda_i \overrightarrow{u_i}$)

ἐνθα $\lambda_i \in R$.

A) Γραμμικὴ ἔξαρτησις δύο διανυσμάτων: Δύο διανύσματα $\overrightarrow{u_1}$ καὶ $\overrightarrow{u_2}$ λέγονται γραμμικῶς ἔξηρτημένα (η ὅτι ἀποτελοῦν ἐφαρμοστὸν σύστημα), ὅταν ὑπάρχουν δύο πραγματικοὶ ἀριθμοὶ λ_1 καὶ λ_2 , ὅχι μηδὲν καὶ οἱ δύο, οὕτως ὥστε νὰ ἴσχύῃ η ἴσοτης:

$$\lambda_1 \overrightarrow{u_1} + \lambda_2 \overrightarrow{u_2} = \overrightarrow{0}. \quad (1)$$

'Εκ τῆς (1) ἐπεται ὅτι: $\lambda_1 \overrightarrow{u_1} = -\lambda_2 \overrightarrow{u_2}$. 'Εὰν δὲ $\lambda_1 \neq 0$, τότε $\overrightarrow{u_1} = -\frac{\lambda_2}{\lambda_1} \overrightarrow{u_2}$,

ἡ δοποία σχέσις ἐκφράζει ὅτι τὰ διανύσματα $\overrightarrow{u_1}$ καὶ $\overrightarrow{u_2}$ εἰναι συγγραμμικά.

Εὐκόλως δὲ ἀποδεικνύεται καὶ τὸ ἀντίστροφον. "Ωστε:

Δύο διανύσματα, ὅχι ἀμφότερα μηδενικά, εἰναι γραμμικῶς ἔξηρτημένα ὅταν εἰναι συγγραμμικά.

Παρατηρήσεις: $\overrightarrow{u_2} = \overrightarrow{0}$ καὶ $\lambda_2 \neq 0 \implies \overrightarrow{u_1} = \overrightarrow{0}$ (η $\lambda_1 = 0$),

$\overrightarrow{u_2} \neq \overrightarrow{0}$ καὶ $\lambda_2 = 0 \implies \overrightarrow{u_1} = \overrightarrow{0}$ (διότι $\lambda_1 \neq 0$).

B) Δύο διανύσματα γραμμικῶς ἀνεξάρτητα : Δύο διανύσματα \vec{u}_1 και \vec{u}_2 είναι γραμμικῶς ἀνεξάρτητα (συνιστοῦν ἐλεύθερον σύστημα), εάν :

$$\lambda_1 \vec{u}_1 + \lambda_2 \vec{u}_2 = \vec{0} \iff \lambda_1 = \lambda_2 = 0. \quad (1)$$

Ιον : Παρατηρούμεν : α) $\vec{u}_2 = \vec{0}$ και $\vec{u}_1 = \vec{0}$ είναι ἀδύνατον, διότι οι λ_1 και λ_2 δύνανται νὰ ἔκλεγοῦν διάφοροι τοῦ μηδενός.

β) $\vec{u}_2 = \vec{0}$ είναι ἀδύνατον, διότι ή (1) δύναται νὰ ἐπαληθευθῇ διὰ $\lambda_1 = 0$ και $\lambda_2 = 1$, ὅπερ ἀδύνατον. "Αρα.

'Εὰν δύο διανύσματα είναι γραμμικῶς ἀνεξάρτητα, οὐδὲν ἔξι αὐτῶν είναι μηδέν.

Ζον : Τὰ δύο διανύσματα \vec{u}_1 και \vec{u}_2 δὲν είναι παράλληλα (διότι ἄλλως θὰ ἦσαν γραμμικῶς ἔξηρτημένα). Αἱ διευθύνσεις των ὁρίζουν μίαν διεύθυνσιν ἐπιπέδων.

Γ) Τρία διανύσματα γραμμικῶς ἔξηρτημένα : Τρία διανύσματα, μὴ μηδενικά, \vec{u}_1 , \vec{u}_2 , \vec{u}_3 , θὰ λέγωμεν ὅτι είναι γραμμικῶς ἔξηρτημένα (σχηματίζουν σύστημα ἐφαρμοστόν), εάν ύπάρχουν τρεῖς πραγματικοὶ ἀριθμοὶ λ_1 , λ_2 , λ_3 , ὅχι δῆλοι μηδέν, εἰς τρόπον ὡστε νὰ ἔχωμεν :

$$\lambda_1 \vec{u}_1 + \lambda_2 \vec{u}_2 + \lambda_3 \vec{u}_3 = \vec{0}.$$

'Υποθέτομεν τὰ \vec{u}_1 και \vec{u}_2 γραμμικῶς ἀνεξάρτητα, ὅπότε δὲν θὰ είναι $\lambda_3 = 0$ (διότι, ἄλλως, θὰ εἴχομεν $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$). "Αρα δυνάμεθα νὰ γράψωμεν :

$$\lambda_3 \vec{u}_3 = -\lambda_1 \vec{u}_1 - \lambda_2 \vec{u}_2 \quad \text{ἢ} \quad \vec{u}_3 = -\frac{\lambda_1}{\lambda_3} \vec{u}_1 - \frac{\lambda_2}{\lambda_3} \vec{u}_2.$$

'Εὰν δὲ τεθῇ $-\frac{\lambda_1}{\lambda_3} = x_1$ και $-\frac{\lambda_2}{\lambda_3} = x_2$, τότε :

$$\vec{u}_3 = x_1 \vec{u}_1 + x_2 \vec{u}_2 \quad (1)$$

"Ωστε : 'Εὰν δύο διανύσματα \vec{u}_1 , \vec{u}_2 (οὔτε παράλληλα, οὔτε μηδενικά) είναι γραμμικῶς ἀνεξάρτητα, καὶ ἔὰν μετὰ τρίτου είναι γραμμικῶς ἔξηρτημένα, κείνται ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ ἐπιπέδου ἢ είναι παράλληλα πρὸς τὸ αὐτὸ διεύθυνσιν. 'Υπάρχουν δὲ δύο πραγματικοὶ x_1 και x_2 , τοιοῦτοι ὡστε νὰ ἴσχῃ ἡ (1).

'Αντιστρόφως : 'Εὰν τρία διανύσματα \vec{u}_1 , \vec{u}_2 , \vec{u}_3 είναι παράλληλα πρὸς τὸ αὐτὸ διεύθυνσιν, τῶν \vec{u}_1 και \vec{u}_2 ὅντων γραμμικῶς ἀνεξαρτήτων, τὰ διανύσματα $\vec{AB}_1 = \vec{u}_1$, $\vec{AB}_2 = \vec{u}_2$, $\vec{AB}_3 = \vec{u}_3$ κείνται ἐπὶ τοῦ ἐπιπέδου τοῦ διερχομένου διὰ τοῦ A και παραλλήλου πρὸς τοὺς φορεῖς τῶν \vec{u}_2 και \vec{u}_3 .

Κατασκευάζομεν τὸ παραλλήλογραμμὸν $AP_1B_3P_2$ (σχ. 11), τοῦ ὅποίου αἱ πλευραὶ φέρονται ύπὸ τῶν \vec{AB}_1 και \vec{AB}_2 . Θὰ ἔχωμεν : $\vec{AB}_3 = \vec{AP}_1 + \vec{AP}_2$.

$$\text{''Αρα : } \overrightarrow{AB_3} = x_1 \cdot \overrightarrow{u_1} + x_2 \cdot \overrightarrow{u_2} \quad \text{η} \quad \overrightarrow{u_3} = x_1 \cdot \overrightarrow{u_1} + x_2 \cdot \overrightarrow{u_2} \quad (1)$$

Oi x_1 , kai x_2 einai monadikoi. Práymati: éan û-

Οἱ x_1 , καὶ x_2 εἶναι μοναδικοί. Πράγματι: ἔχει ὑπῆρχον δύο ἄλλοι πραγματικοὶ ἀριθμοί, x'_1 καὶ x'_2 , τοιοῦτοι ὡστε $\vec{u}_3 = x'_1 \vec{u}_1 + x'_2 \vec{u}_2$ (2), τότε ἀφαιροῦντες κατὰ μέλη τὰς (1) καὶ (2), θάξεις.

$$\vec{0} = (x_1 - x'_1) \vec{u}_1 + (x_2 - x'_2) \vec{u}_2.$$

"Αρα (§ 11, B) θὰ είναι $x_1 - x'_1 = 0$, εξ οὗ
 $x_1 = x'_1$ καὶ $x_2 - x'_2 = 0$, εξοῦ $x_2 = x'_2$.

"Ωστε: Ἡ ἀναγκαία και ἵκανη συνθήκη ἵνα τρία διανύσματα $\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3$, φν

δύο u_1 και u_2 είναι γραμμικώς ανεξάρτητα, αποτελούν συστήμα εφαρμοστον, είναι νά υπάρχουν δύο πραγματικοί άριθμοι x_1 και x_2 , τοιούτοι ώστε

$$\vec{u}_3 = x_1 \vec{u}_1 + x_2 \vec{u}_2.$$

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΑΙ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ

Ι ΔΙΟΤΗ ΤΕΣ

12. ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΑΙ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑΙ.— Έπι τέταρτον (Π) θεωροῦμεν τὸ διάνυσμα \vec{OM} καὶ δύο διακεκριμένας διευθύνσεις Ox καὶ Oy (σχ. 12). Αἱ ἐκ τοῦ M ἀγόμεναι παράλληλοι πρὸς τὰς Oy καὶ Ox τέμνουν τὴν Ox εἰς τὸ A καὶ τὴν Oy εἰς τὸ σημεῖον B . Σχηματίζεται οὕτω τὸ παραλληλόγραμμὸν $BOAM$. Θὰ ἔχωμεν :

$$\vec{OM} = \vec{OA} + \vec{AM} \iff \vec{OM} = \vec{OA} + \vec{OB}.$$

Παρατηροῦμεν λοιπὸν ὅτι τὸ διάνυσμα \vec{OM} ἀνέλυθη κατὰ τὰς διευθύνσεις Ox καὶ Oy εἰς τὰ διανύσματα \vec{OA} καὶ \vec{OB} .


Τὰ δύο διανύσματα \vec{OA} καὶ \vec{OB} καλοῦνται διανυσματικαὶ συνιστῶσαι τοῦ διανύσματος \vec{OM} ἐπὶ τῶν ἀξόνων Ox καὶ Oy .

Ἄντιστρόφως, εἰς δύο διανυσματικὰς συνιστώσας \vec{OA} καὶ \vec{OB} , δοθείσας, ἀντιστοιχεῖ τὸ ἐφαρμοστὸν διάνυσμα \vec{OM} , καὶ μόνον τοῦτο.


13. ΚΑΡΤΕΣΙΑΝΑΙ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΑΙ.— Εστωσαν δύο ἀξόνες Ox καὶ Oy (σχ. 13), τῶν ὅποιών τὰ μοναδιαῖα διανύσματα εἶναι ἀντιστοιχῶς τὰ διανύσματα i καὶ j ἀντιστοιχῶς, κοινῆς ἀρχῆς O .

Τὸ διατεταγμένον ζεῦγος (i, j) θὰ λέγωμεν ὅτι ἀποτελεῖ μετὰ τοῦ O ἐπί-πεδον βάσεως καὶ θὰ συμβολίζεται οὕτως : (O, i, j) .

‘Ο ἀξών Ox καλεῖται ἀξών τῶν τετμημένων καὶ ὁ ἀξών Oy καλεῖται ἀξών τῶν τεταγμένων. Τὸ σημεῖον O καλεῖται ἀρχὴ τῶν ἀξόνων Ox καὶ Oy , οἱ ὅποιοι καλοῦνται καὶ ἀξόνες τῶν συντεταγμένων.



Σχ. 12



Σχ. 13

Τὸ σύστημα τῶν συντεταγμένων θὰ λέγεται κανονικόν, ὅταν τὰ \vec{i} καὶ \vec{j} ἔχουν τὸ αὐτὸ μῆκος. Θὰ λέγεται δὲ ὁρθογώνιον, ἐὰν τὰ \vec{i} καὶ \vec{j} εἰναι κάθετα, καὶ ὁρθοκανονικόν, ὅταν τὰ \vec{i} καὶ \vec{j} εἰναι κάθετα καὶ τοῦ αὐτοῦ μήκους.

"Ηδη, ἐπὶ τοῦ ἐπιπέδου τῶν ἀξόνων θεωροῦμεν τὸ διάνυσμα \vec{OM} . Ἐὰν ἀ-
χθοῦν αἱ παράλληλοι MA καὶ MB πρὸς τοὺς ἄξονας Oy καὶ Ox ἀντιστοίχως,
προκύπτουν τὰ διανύσματα \vec{OA} καὶ \vec{OB} , τὰ ὅποια εἰναι αἱ συνιστῶσαι τοῦ \vec{OM} .

$$\text{Ο λόγος } \frac{\vec{OA}}{\vec{i}} = x \quad (1) \text{ εἰναι } \text{ἡ ἀλγεβρικὴ τιμὴ τοῦ διανύσματος } \vec{OA} \text{ καὶ κα-}$$

λεῖται τετμημένῃ τοῦ σημείου M .

$$\text{Ο λόγος } \frac{\vec{OB}}{\vec{j}} = y \quad (2) \text{ εἰναι } \text{ἡ ἀλγεβρικὴ τιμὴ τοῦ διανύσματος } \vec{OB} \text{ καὶ}$$

καλεῖται τεταγμένῃ τοῦ σημείου M .

Ἡ τετμημένη καὶ ἡ τεταγμένη τοῦ σημείου M καλοῦνται συντεταγμέναι τοῦ σημείου M καὶ σημειώνομεν $M(x, y)$.

Ἐκ τῶν (1) καὶ (2) λαμβάνομεν :

$$\vec{OA} = x \vec{i} \text{ καὶ } \vec{OB} = y \vec{j}$$

'Επειδὴ δὲ $\vec{OM} = \vec{OA} + \vec{OB}$, ἐπεται ὅτι : $\vec{OM} = x \vec{i} + y \vec{j}$, καὶ ἀν $\vec{OM} = u$,
τότε :

$$u = x \vec{i} + y \vec{j}$$

καὶ θὰ λέγωμεν ὅτι ἀνελύσαμεν τὸ διάνυσμα u εἰς δύο διανύσματα, τῶν ὅποιων
αἱ διευθύνσεις εἰναι αἱ τῶν \vec{i} καὶ \vec{j} .

Θὰ δείξωμεν ὅτι ἡ ἀνάλυσις (3) εἰναι μοναδική. Διότι, ἐὰν εἴχομεν συγχρό-
νως :

$$u = x \vec{i} + y \vec{j} = x_1 \vec{i} + y_1 \vec{j}$$

τότε : $(x - x_1) \vec{i} = (y_1 - y) \vec{j}$

'Ἐὰν δὲ $x \neq x_1$, τότε :

$$\vec{i} = \frac{y_1 - y}{x - x_1} \cdot \vec{j} \quad (4)$$

ἡ ὅποια σχέσις ἐκφράζει ὅτι τὰ διανύσματα \vec{i} καὶ \vec{j} εἰναι συγγραμμικά, ὅπερ
ἄτοπον. "Ἄρα : $x = x_1$ καὶ $y = y_1$.

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω ἐπεται ὅτι: πᾶν ἐφαρμοστὸν διάνυσμα \vec{u} τοῦ ἐπιπέδου

τῶν ἀξόνων χαρακτηρίζεται ὑπὸ τῶν δύο πραγματικῶν ἀριθμῶν x καὶ y (τῶν συντεταγμένων του).

14. ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ.— Ἐπὶ τοῦ ἐπιπέδου τῶν ἀξόνων x' O x καὶ y' O y θεωροῦμεν τὸ ἐλεύθερον διάνυσμα \vec{V} , τοῦ ὅποιου αἱ προβολαὶ ἐπὶ τῶν ἀξόνων Ox καὶ Oy εἰναι τὰ διανύσματα \vec{V}_1 καὶ \vec{V}_2 ἀντιστοίχως. Θεωροῦμεν δὲ καὶ τὸν ἀντιπρόσωπον τοῦ \vec{V} , τὸ διάνυσμα \vec{OM} . Ἐάν \vec{OA} καὶ \vec{OB} εἰναι αἱ προβολαὶ τοῦ \vec{OM} ἐπὶ τῶν ἀξόνων Ox καὶ Oy ἀντιστοίχως, τότε, ὡς γνωστόν, θὰ εἰναι:

$$\vec{V}_1 = \vec{OA} \text{ καὶ } \vec{V}_2 = \vec{OB} \text{ καὶ } \vec{V} = \vec{V}_1 + \vec{V}_2 \quad (1)$$


Ἐάν δὲ X καὶ Y εἰναι αἱ συντεταγμέναι τοῦ M , τότε:

$$\vec{OA} = X \vec{i} \text{ καὶ } \vec{OB} = Y \vec{j}$$

δηπότε: $\vec{V}_1 = X \vec{i}$ καὶ $\vec{V}_2 = Y \vec{j}$ καὶ κατ' ἀ-

κολουθίαν:

$$\vec{V} = X \vec{i} + Y \vec{j} \quad (2)$$



Οἱ ἀριθμοὶ X καὶ Y καλοῦνται συντεταγμέναι προβολαὶ τοῦ διανύσματος \vec{V} καὶ σημειώνομεν: $\vec{V}(X, Y)$.

Τὰ διανύσματα $X \vec{i}$ καὶ $Y \vec{j}$ ὀνομάζονται συνιστῶσαι τοῦ ἐλεύθερου διανύσματος \vec{V} κατὰ τοὺς ἀξόνας Ox καὶ Oy .

Ἀντιστρόφως, διθεισῶν τῶν συντεταγμένων προβολῶν X καὶ Y ἐνὸς ἐλεύθερου διανύσματος \vec{V} , ὑπάρχει ἐπὶ τοῦ ἀξονος Ox διάνυσμα \vec{V}_1 , τοιοῦτον ὥστε $\vec{V}_1 = X$, καὶ ἐπὶ τοῦ ἀξονος Oy διάνυσμα \vec{V}_2 , τοιοῦτον ὥστε $\vec{V}_2 = Y$. Πᾶν δὲ διάνυσμα $\vec{V} = \vec{V}_1 + \vec{V}_2$ ἔχει συνιστῶσας ἐπὶ τῶν ἀξόνων τούτων ἴσας πρὸς X, Y .

Ωστε: Εἰς τᾶν διάνυσμα τοῦ ἐπιπέδου xOy ἀντιστοιχεῖ μονοσημάντως ἐν διατεταγμένον ζεῦγος πραγματικῶν ἀριθμῶν: αἱ συντεταγμέναι του, καὶ ἀντιστρόφως: Πᾶν διατεταγμένον ζεῦγος (X, Y) πραγματικῶν ἀριθμῶν εἰναι ἀντίστοιχον ἐνὸς καὶ μόνον διανύσματος εἰς τὸ ἐπιπέδον μὲ συντεταγμένας τοὺς ἐν λόγῳ ἀριθμούς.

Σημείωσις: Αἱ συντεταγμέναι τοῦ μηδενικοῦ διανύσματος εἰναι $(0,0)$.

Άρα: Τὸ διατεταγμένον ζεῦγος (X, Y) δρίζει ἐπὶ τοῦ ἐπιπέδου τῶν ἀξόνων Ox καὶ Oy ἐν, καὶ μόνον ἐν, ἐλεύθερον διάνυσμα \vec{V} .

Παρατηρήσεις: Ἐάν $\vec{V} = \vec{0}$, τότε $X = Y = 0$ καὶ ἀντιστρόφως.

*Έάν τό \vec{V} είναι παράλληλον πρὸς τὸν ἀξονα x'OX, τότε $Y = 0$ καὶ ἀντιστρόφως.

*Έάν τό \vec{V} είναι παράλληλον πρὸς τὸν ἀξονα y'OY, τότε $X = 0$ καὶ ἀντιστρόφως.

Αἱ καρτεσιαναὶ συντεταγμέναι ἐνὸς σημείου M εἰναι αἱ ἀλγεβρικαὶ τιμαι τῶν συνιστωσῶν τοῦ διανύσματος OM (Ο ἡ ἀρχὴ τῶν ἀξόνων).

Εὔκόλως ἀποδεικνύεται ὅτι : *Έάν δύο ἑλεύθερα διανύσματα \vec{V}_1 καὶ \vec{V}_2 , ἐπὶ τοῦ ἐπιπέδου τῶν ἀξόνων (OX, OY) κείμενα, ἔχουν τὰς διανυσματικὰς συνιστώσας αὐτῶν ἵσας ἐπὶ τῶν ἀξόνων x'OX καὶ y'OY, θὰ είναι ἵσα πρὸς τὸ αὐτὸ ἐφαρμοστὸν διάνυσμα OM καὶ κατ' ἀκολουθίαν ἵσα μεταξύ των.

15. ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΙΑΣ ΔΥΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΩΝ.—

*Ἐπὶ τοῦ ἐπιπέδου τῶν ἀξόνων Ox καὶ Oy θεωροῦμεν δύο παράλληλα διανύσματα \vec{V}_1 (X_1, Y_1) καὶ \vec{V}_2 (X_2, Y_2) ἑλεύθερα. *Ἀφοῦ τὰ \vec{V}_1 καὶ \vec{V}_2 είναι παράλληλα, ἐπεται ὅτι : $\vec{V}_1 = k \vec{V}_2$, ὅπου $k \in R$ ἡ

$$X_1 \vec{i} + Y_1 \vec{j} = k (X_2 \vec{i} + Y_2 \vec{j})$$

ἢ οὐ

$$X_1 = kX_2 \text{ καὶ } Y_1 = kY_2$$

ἢ

$$X_1 Y_2 = k X_2 Y_1 \text{ καὶ } X_2 Y_1 = k X_1 Y_2$$

$$\text{Ἄρα : } X_1 Y_2 = X_2 Y_1 \quad \text{ἢ } \frac{X_1}{X_2} = \frac{Y_1}{Y_2}. \quad (1)$$

*Ἀντιστρόφως, ἔὰν $\vec{V}_2 \neq \vec{0}$ καὶ τεθῇ $\frac{X_1}{X_2} = \frac{Y_1}{Y_2} = \lambda \in R$, τότε

$$\left. \begin{array}{l} X_1 = \lambda X_2 \\ Y_1 = \lambda Y_2 \end{array} \right\} \implies \left. \begin{array}{l} X_1 \vec{i} = \lambda X_2 \vec{i} \\ Y_1 \vec{j} = \lambda Y_2 \vec{j} \end{array} \right\} \implies X_1 \vec{i} + Y_1 \vec{j} = \lambda (X_2 \vec{i} + Y_2 \vec{j}) \quad \text{ἢ} \\ \vec{V}_1 = \lambda \vec{V}_2$$

καὶ κατ' ἀκολουθίαν τὰ διανύσματα \vec{V}_1 καὶ \vec{V}_2 είναι παράλληλα. "Ωστε :

*Ἡ ἀναγκαία καὶ ἴκανὴ συνθήκη ἵνα δύο ἑλεύθερα διανύσματα είναι παράλληλα, είναι ἡ :

$$X_1 Y_2 = X_2 Y_1 \quad \text{ἢ} \quad \left| \begin{array}{cc} X_1 & Y_1 \\ X_2 & Y_2 \end{array} \right| = 0 \quad \text{ἢ} \quad \frac{X_1}{X_2} = \frac{Y_1}{Y_2}$$

*Έάν $X_1 Y_2 \neq X_2 Y_1$ τὰ διανύσματα είναι γραμμικῶς ἀνεξάρτητα.

*Έάν $\vec{V}_1 = \vec{V}_2$, τότε $k = 1$ καὶ κατ' ἀκολουθίαν $\vec{V}_1 = \vec{V}_2 \iff X_1 = X_2$ καὶ $Y_1 = Y_2$, ἐφ' ὃσον είναι ἵσα πρὸς τὸ ἐφαρμοστὸν διάνυσμα OM (σχ. 14).

"Ωστε : Ἱνα δύο ἑλεύθερα διανύσματα είναι ἵσα, πρέπει καὶ ἀρκεῖ αἱ διανύσματα συντεταγμέναι προβολαὶ των νὰ είναι ἵσαι.

16. ΘΕΩΡΗΜΑ I.— Αἱ συντεταγμέναι προβολαὶ τοῦ ἀθροίσματος ἐλευθέρων διανυσμάτων ἵσονται ἀντιστοίχως πρὸς τὸ ἀθροίσμα τῶν ὁμονύμων συντεταγμένων προβολῶν αὐτῶν.

*Ἐστω $\vec{\Sigma}(X, Y)$ τὸ ἀθροίσμα τῶν διανυσμάτων :

$$\vec{V}_1(X_1, Y_1), \vec{V}_2(X_2, Y_2), \dots, \vec{V}_v(X_v, Y_v)$$

Θὰ εἰναι ἀφ' ἔνὸς μὲν $\vec{\Sigma} = \vec{V}_1 + \vec{V}_2 + \dots + \vec{V}_v$, ἀφ' ἐτέρου δέ : $\vec{\Sigma} = X\vec{i} + Y\vec{j}$ καὶ $\vec{V}_1 = X_1\vec{i} + Y_1\vec{j}, \vec{V}_2 = X_2\vec{i} + Y_2\vec{j}, \dots, \vec{V}_v = X_v\vec{i} + Y_v\vec{j}$ ή $X\vec{i} + Y\vec{j} = (X_1\vec{i} + Y_1\vec{j}) + (X_2\vec{i} + Y_2\vec{j}) + \dots + (X_v\vec{i} + Y_v\vec{j}) = (X_1 + X_2 + \dots + X_v)\vec{i} + (Y_1 + Y_2 + \dots + Y_v)\vec{j}$

ἔξ οὖ :
$$\left. \begin{array}{l} X = X_1 + X_2 + \dots + X_v \\ Y = Y_1 + Y_2 + \dots + Y_v \end{array} \right\}$$

17. ΘΕΩΡΗΜΑ II.— Αἱ συντεταγμέναι προβολαὶ τῆς διαφορᾶς δύο ἐλευθέρων διανυσμάτων εἰναι ἀντιστοίχως ἵσαι πρὸς τὴν διαφορὰν τῶν ὁμονύμων συντεταγμένων προβολῶν αὐτῶν.

*Ἐστωσαν $\vec{V}_1 = X_1\vec{i} + Y_1\vec{j}$ καὶ $\vec{V}_2 = X_2\vec{i} + Y_2\vec{j}$ τὰ δύο ἐλεύθερα διανύσματα καὶ $\vec{W} = X\vec{i} + Y\vec{j}$ ἡ διαφορὰ αὐτῶν. Θὰ εἰναι :

$$\vec{W} = \vec{V}_1 - \vec{V}_2$$

ή
$$\begin{aligned} X\vec{i} + Y\vec{j} &= (X_1\vec{i} + Y_1\vec{j}) - (X_2\vec{i} + Y_2\vec{j}) \\ &= (X_1 - X_2)\vec{i} + (Y_1 - Y_2)\vec{j} \end{aligned}$$

ἔξ οὖ :
$$\left. \begin{array}{l} X = X_1 - X_2 \\ Y = Y_1 - Y_2 \end{array} \right\}$$

Παρατήρησις : Ἐὰν $\lambda \in \mathbb{R}$, τότε θὰ ᾖ χωμεν :

$$\vec{V} = X\vec{i} + Y\vec{j} \Rightarrow \lambda \vec{V} = \lambda X\vec{i} + \lambda Y\vec{j}.$$

18. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑΙ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ ΟΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΚΡΩΝ ΤΟΥ.— *Ἐστω \vec{AB} διάνυσμα ἀρχῆς $A(x_1, y_1)$ καὶ πέρατος $B(x_2, y_2)$.


Κατὰ τὰ γνωστὰ θὰ εἴναι :

$$\vec{AB} = \vec{OB} - \vec{OA} \quad (1)$$

*Ἀλλά : $\vec{OB} = X_2\vec{i} + Y_2\vec{j}$ καὶ

$\vec{OA} = X_1\vec{i} + Y_1\vec{j}$ καὶ ή (1) γίνεται :

$$\vec{AB} = (X_2\vec{i} + Y_2\vec{j}) - (X_1\vec{i} + Y_1\vec{j})$$



ΣΧ. 15

ἔξ οὖ :

$$\boxed{\vec{AB} = (x_2 - x_1)\vec{i} + (y_2 - y_1)\vec{j}} \quad (2)$$

Εάν δὲ X καὶ Y είναι αἱ συντεταγμέναι προβολαὶ τοῦ \overrightarrow{AB} , τότε :

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{X} + \overrightarrow{Y},$$

καὶ ἡ (2) γίνεται : $\overrightarrow{X} + \overrightarrow{Y} = (x_2 - x_1)\vec{i} + (y_2 - y_1)\vec{j}$

ἔξ οὖ :


$$\boxed{\begin{aligned} X &= x_2 - x_1 \\ Y &= y_2 - y_1 \end{aligned}}$$

(3)

Δηλαδή : Αἱ συντεταγμέναι προβολαὶ διανύσματος ισοῦνται ἀντιστοίχως πρὸς τὴν διαφορὰν τῶν ὁμονύμων συντεταγμένων τῶν ἄκρων του (τοῦ πέρατος μεῖον τῆς ἀρχῆς).

19. ΣΥΝΘΗΚΗ ΙΝΑ ΤΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΕΙΝΤΑΙ ΕΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ.— "Εστωσαν $M_1(x_1, y_1)$, $M_2(x_2, y_2)$, $M_3(x_3, y_3)$ τρία σημεῖα (σχ. 16).

Ἡ ἀναγκαία καὶ ἵκανὴ συνθήκη ἵνα τὰ τρία ταῦτα σημεῖα κείνται ἐπ' εὐ-



θείας, είναι τὰ διανύσματα $\overrightarrow{V} = \overrightarrow{M_1 M_2}$ καὶ $\overrightarrow{V}' = \overrightarrow{M_1 M_3}$, μὴ μηδενικὰ ἔξ ύποθέσεως, νὰ κείνται ἐπ' εὐθείας. Ἀλλά :

$$\overrightarrow{M_1 M_2} = (x_2 - x_1)\vec{i} + (y_2 - y_1)\vec{j},$$

καὶ $\overrightarrow{M_1 M_3} = (x_3 - x_1)\vec{i} + (y_3 - y_1)\vec{j}$.

*Ἀρα κατὰ τὴν (§ 15) είναι :

$$(x_2 - x_1)(y_3 - y_1) - (x_3 - x_1)(y_2 - y_1) = 0.$$

Ἡ συνθήκη αὗτη γράφεται καὶ ὡς ἔξῆς :

$$(x_1 y_2 - y_1 x_2) + (x_2 y_3 - y_2 x_3) + (x_3 y_1 - y_3 x_1) = 0$$

καὶ ύπὸ μορφὴν δριζούσης ὡς ἔξῆς :

$$M_1, M_2, M_3 \text{ συνευθειακά} \iff \left| \begin{array}{ccc} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{array} \right| = 0$$

20. ΠΡΟΒΛΗΜΑ.— Δίδονται τὰ σημεῖα $A(x_1, y_1)$ καὶ $B(x_2, y_2)$ διακεκριμένα ἀλλήλων. Ἐπὶ τοῦ τμήματος AB νὰ εὑρεθῇ σημεῖον M , τοιοῦτον ὥστε :

$$\frac{\overline{MA}}{\overline{MB}} = -k \neq -1, \text{ ὅπου } k \in \mathbb{R}$$

Έκ της δοθείσης ισότητος ἔπειται ότι : $\vec{MA} = -k \cdot \vec{MB}$ (σχ. 17).


$$\vec{OA} - \vec{OM} = -k(\vec{OB} - \vec{OM})$$

$$\vec{OM}(k+1) = k \cdot \vec{OB} + \vec{OA}$$

$$\begin{aligned} \text{ή } (\vec{x_1} + \vec{y_1})(k+1) &= k(\vec{x_2} + \vec{y_2}) + (\vec{x_1} + \vec{y_1}) \\ &= (kx_2 + x_1)\vec{i} + (ky_2 + y_1)\vec{j} \end{aligned}$$

Εξ ού :

$$x = \frac{kx_2 + x_1}{k+1} \quad (1) \quad \text{καὶ} \quad y = \frac{ky_2 + y_1}{k+1}. \quad (2)$$



Σχ. 17

21. ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΑΙ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ. — Αὗται συνάγονται ἐκ τῶν τύπων (1) καὶ (2) τῆς (§ 20) διὰ $k = 1$. Ἐρα :

$$x = \frac{x_1 + x_2}{2} \quad \text{καὶ} \quad y = \frac{y_1 + y_2}{2}.$$

Δηλαδή: Αἱ συντεταγμέναι τοῦ μέσου ἐνὸς διανύσματος ισοῦνται ἀντιστοίχως πρὸς τὸ ήμιάθροισμα τῶν διμονύμων συντεταγμένων τῶν ἄκρων του.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

8. Δείξατε ότι τὰ διανύσματα $\vec{V}_1(2, -1)$ καὶ $\vec{V}_2(6, -3)$ εἰναι γραμμικῶς ἔξηρτημένα.

9. Δείξατε ότι τὰ διανύσματα $\vec{V}_1(2, 1)$ καὶ $\vec{V}_2(3, 1)$ εἰναι γραμμικῶς ἀνεξάρτητα.

10. Δίδονται τὰ διανύσματα : $\vec{u}_1(-1, 2)$, $\vec{u}_2(2, 3)$, $\vec{u}_3(-5, -4)$.

Νὰ προσδιορισθοῦν τὰ διανύσματα :

$$\vec{x} = \vec{u}_1 + \vec{u}_2 + \vec{u}_3, \quad \vec{y} = \vec{u}_1 + 3\vec{u}_2 + \vec{u}_3, \quad \vec{z} = -\vec{u}_1 + 2\vec{u}_2 + \vec{u}_3.$$

11. Νὰ όρισθῇ ό α , ὥστε τὰ διανύσματα $\vec{u}_1(\alpha, 4)$ καὶ $\vec{u}_2(3, \alpha-1)$ νὰ εἰναι παράλληλα.

12. Διὰ ποίας τιμᾶς τοῦ λ τὰ διανύσματα $\vec{u}_1(\lambda + 3, \lambda + 1)$ καὶ $\vec{u}_2(-3, \lambda - 1)$ συνιστοῦν ἐπίπεδον βάσεως ;

13. α) Διὰ ποίας τιμᾶς τῶν λ καὶ μ τὰ διανύσματα $\vec{u}(\lambda - 4, \mu - 4)$ καὶ $\vec{v}(3\lambda + 8, 4\mu - 1)$ εἰναι ίσα ;

β) Δίδονται τὰ διανύσματα $\vec{u}_1(3, -2)$, $\vec{u}_2(2\lambda - \mu, \lambda + 2\mu - 4)$ καὶ $\vec{u}_3(\lambda - 3\mu + 2, -3\lambda + 3\mu - 2)$ καὶ ζητοῦνται αἱ συνιστώσαι (X, Y) τοῦ διανύσματος $\vec{u} = \vec{u}_1 + \vec{u}_2 + \vec{u}_3$, ὡς καὶ η σχέσις, η δποία πρέπει νὰ ὑπάρχῃ μεταξὺ τῶν λ , μ οντας τὸ \vec{u} εἰναι συγγραμμικὸν τοῦ $\vec{v}(-3, 4)$. Ακολούθως νὰ εύρητε διὰ ποίας τιμᾶς τοῦ λ εἰναι $\vec{u} = \vec{0}$.

γ) Δίδονται τὰ σημεῖα $A(-1, 2)$, $B(3, -1)$ καὶ $G(5, 1)$ καὶ ζητοῦνται αἱ συντεταγμέναι τῆς κορυφῆς Δ τοῦ παραλληλογράμμου $AB\Gamma\Delta$.

14. Δίδονται $A(3, 2)$ καὶ $\vec{AB}(5, -3)$ εἰς τὸ σύστημα βάσεως (O, \vec{i}, \vec{j}) . Νὰ ὑπολογισθοῦν αἱ συντεταγμέναι τοῦ B καὶ νὰ όρισθῇ η θέσις τοῦ AB .

15. Διδονται τα διακεκριμένα σημεία $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ και $\Gamma(x_3, y_3)$. Νά ύπολογισθούν αι συντεταγμέναι του μέσου M του $B\Gamma$ και άκολουθως αι συντεταγμέναι του κέντρου βάρους Z του τριγώνου $AB\Gamma$.

*Εφαρμογή διά: $A(1,2)$, $B(5,3)$, $\Gamma(3,5)$.

16. Εις τό σύστημα (O, \vec{i}, \vec{j}) διδονται τα διανύσματα $\vec{V}_1(1,1)$, $\vec{V}_2(-3,2)$ και $\vec{V}_3(2,1)$. Κατασκευάζομεν τό $\vec{OA} = \vec{V}_1$, $\vec{AB} = -\vec{V}_2$, $\vec{B\Gamma} = \vec{V}_3$. 1ον) Νά γίνη τό σχήμα, 2ον) Νά δρισθούν αι συντεταγμέναι των B , Γ και του μέσου M του $B\Gamma$, 3ον) Κατασκευάζομεν τό $\vec{AD} = \vec{B\Gamma}$, νά δρισθούν αι συντεταγμέναι του Δ .

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΙΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ ΓΙΝΟΜΕΝΟΝ ΔΥΟ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΩΝ


ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

22. ΓΩΝΙΑ ΔΥΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΩΝ.— "Εστωσαν \vec{V}_1 και \vec{V}_2 δύο έλευθερα διανύσματα (σχ. 18).

'Εκ τοῦ τυχόντος σημείου Ο τοῦ χώρου ζγομεν δύο ήμιευθίεις Οχ και Ογ παραλλήλους και όμορρόπους πρὸς τὰ διανύσματα \vec{V}_1 και \vec{V}_2 . 'Η προκύπτουσα γωνία χΟγ είναι :

α) 'Ανεξάρτητος τῆς θέσεως τοῦ σημείου Ο, καθόσον αἱ γωνίαι μὲ πλευρὰς παραλλήλους και όμορρόπους είναι ἴσαι.

β) Είναι μηδὲν, ἀν τὰ διανύσματα \vec{V}_1 και \vec{V}_2 είναι παράλληλα και όμόρροπα· ἵση δὲ πρὸς 2 ὅρθας, ἀν τὰ διανύσματα ταῦτα είναι παράλληλα και ἀντίρροπα.



Σχ. 18

γ) 'Ανεξάρτητος τῆς τάξεως τῶν διανυσμάτων \vec{V}_1 και \vec{V}_2 .

"Οστε : Δοθέντων δύο διανυσμάτων \vec{V}_1 και \vec{V}_2 , ἀντιστοιχίομεν εἰς αὐτὰ τὴν γωνίαν θ ($0 \leq \theta \leq 2$ ὅρθων), ἡ ὁποία καλεῖται γωνία τῶν δύο έλευθερων διανυσμάτων \vec{V}_1 και \vec{V}_2 .

Παρατήρησις : Μία τοιαύτη γωνία θ δὲν είναι προσανατολισμένη.

23. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ ή ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΝ ΓΙΝΟΜΕΝΟΝ ΔΥΟ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΩΝ.— Καλοῦμεν ἐσωτερικὸν ή ἀριθμητικὸν γινόμενον δύο διανυσμάτων τὸν πραγματικὸν ἀριθμόν, δ ὁποῖος είναι Ἰσος πρὸς τὸ γινόμενον τῶν μηκῶν τῶν δύο διανυσμάτων ἐπὶ τὸ συνημίτονον τῆς γωνίας αὐτῶν.

"Εστωσαν δύο διανύσματα \vec{V}_1 και \vec{V}_2 (σχ. 18) και θ ἡ γωνία αὐτῶν. 'Εὰν $|\vec{V}_1|$ και $|\vec{V}_2|$ είναι τὰ μήκη τῶν διανυσμάτων τούτων, τότε τὸ γινόμενον :

$$|\vec{V}_1| |\vec{V}_2| \text{ συνθ } \in \mathbb{R}$$

είναι τὸ ἐσωτερικὸν γινόμενον τῶν διανυσμάτων \vec{V}_1 και \vec{V}_2 και σημειώνεται ὡς ἔξῆς :

$$\vec{V}_1 \cdot \vec{V}_2 = |\vec{V}_1| |\vec{V}_2| \text{ συνθ} = |\vec{V}_1| |\vec{V}_2| \text{ συνθ} \in \mathbb{R} \quad (1)$$

Συνέπεια : **1ον.** "Εστω $0 \leq \theta \leq \pi$, ή γωνία τῶν $\vec{V}_1 \neq \vec{0}$, $\vec{V}_2 \neq \vec{0}$, όπότε :

α) 'Εάν $0 \leq \theta < \frac{\pi}{2} \Rightarrow$ συνθ > 0 , καὶ ἄρα $\vec{V}_1 \cdot \vec{V}_2$ θετικόν

'Αντιστρόφως : 'Εάν $\vec{V}_1 \cdot \vec{V}_2 > 0$, τότε $|\vec{V}_1| |\vec{V}_2|$ συνθ > 0 ή συνθ > 0 ,

έξ οῦ ἐπεται δτι $0 \leq \theta < \frac{\pi}{2}$.

β) 'Εάν $\frac{\pi}{2} < \theta \leq \pi \Rightarrow$ συνθ < 0 καὶ $\vec{V}_1 \cdot \vec{V}_2$ ἀρνητικόν.

'Αντιστρόφως : 'Εάν $\vec{V}_1 \cdot \vec{V}_2 < 0$, τότε $|\vec{V}_1| |\vec{V}_2|$ συνθ < 0 ή συνθ < 0 , έξ οῦ $\frac{\pi}{2} < \theta \leq \pi$.

γ) 'Εάν $\theta = \frac{\pi}{2} \Rightarrow$ συνθ $= 0$ καὶ ἄρα $\vec{V}_1 \cdot \vec{V}_2 = 0$.

"Αν $\vec{V}_1 \cdot \vec{V}_2 = 0$, τότε τοῦτο σημαίνει δτι τὰ \vec{V}_1 καὶ \vec{V}_2 είναι κάθετα (ή ἐνδεχομένως $\vec{V}_1 = \vec{0}$ καὶ $\vec{V}_2 \neq \vec{0}$ ή $\vec{V}_1 \neq \vec{0}$ καὶ $\vec{V}_2 = \vec{0}$ ή $\vec{V}_1 = \vec{0}$ καὶ $\vec{V}_2 = \vec{0}$).

δ) 'Εάν $\vec{V}_1 = \vec{0}$ ή $\vec{V}_2 = \vec{0}$ ή $\vec{V}_1 = \vec{0}$ καὶ $\vec{V}_2 = \vec{0}$, τότε $\vec{V}_1 \cdot \vec{V}_2 = 0$.

'Εκ τῶν ἀνωτέρω ἐπεται δτι :

"Η ἀναγκαία καὶ ίκανή συνθήκη ἵνα δύο διανύσματα είναι κάθετα ἐπ' ἄλληλα, ἐκφράζεται διὰ τοῦ μηδενισμοῦ τοῦ ἐσωτερικοῦ γινομένου αὐτῶν.

Δύο τοιαῦτα διανύσματα θά καλούνται δρθογώνια.

Τὸ μηδενικὸν διάνυσμα είναι κάθετον πρὸς πᾶν διάνυσμα (μὴ ἔξαιρονται τοῦ έαυτοῦ τοῦ).

2ον : 'Επειδὴ $|i| = 1$ καὶ $|j| = 1 \Rightarrow i \cdot j =$ συνθ

3ον : 'Επειδὴ ή γωνία θ είναι ἀνεξάρτητος τῆς τάξεως τῶν διανυσμάτων \vec{V}_1 καὶ \vec{V}_2 , ἐπεται δτι :

$$\vec{V}_1 \cdot \vec{V}_2 = |\vec{V}_1| |\vec{V}_2| \text{ συνθ} = |\vec{V}_2| |\vec{V}_1| \text{ συνθ} = \vec{V}_2 \cdot \vec{V}_1$$

ήτοι : $\vec{V}_1 \cdot \vec{V}_2 = \vec{V}_2 \cdot \vec{V}_1$.

"Ωστε : Εἰς τὸ ἐσωτερικὸν γινόμενον δύο διανυσμάτων ἰσχύει ὁ νόμος τῆς ἀντιμεταθέσεως.

4ον : "Εστω τυχὸν διάνυσμα \vec{V} . Τοῦτο μὲ τὸν έαυτόν του σχηματίζει γωνίαν $\theta = 0$. "Ἄρα συνθ $= 1$ καὶ κατ' ἀκολουθίαν :

$$\vec{V} \cdot \vec{V} = |\vec{V}| \cdot |\vec{V}| \text{ συνθ} = |\vec{V}|^2 \cdot 1 = |\vec{V}|^2$$

ήτοι : $\vec{V}^2 = |\vec{V}|^2$.

5ον : Θεωροῦμεν δύο διανύσματα $\vec{u} \neq \vec{0}$ καὶ $\vec{v} \neq \vec{0}$ γραμμικῶς ἔξηρτη- μένα. Θέτομεν $\vec{u} = k \cdot \vec{v}$.

Εάν $k > 0$, δύο άντιπρόσωποι \vec{AB} και $\vec{A_1B_1}$ τῶν διανυσμάτων τούτων είναι τῆς αὐτῆς φορᾶς. Αρα :

$$\text{γων } (\vec{u}, \vec{v}) = 0 \text{ καὶ } \vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}| |\vec{v}|.$$

Εάν θεωρήσωμεν ἄξονα παράλληλον πρὸς τὸ \vec{u} ή πρὸς τὸ \vec{v} , είναι προφανές ὅτι : $|\vec{u}| = -\vec{u}$ ή $|\vec{u}| = -\vec{u}$. Όμοίως καὶ διὰ τὸ \vec{u} . Αρα :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = -\vec{u} \cdot \vec{v}.$$

Εάν $k < 0$, τότε $\text{γων } (\vec{u}, \vec{v}) = \pi$ καὶ συν $(\vec{u}, \vec{v}) = -1$.

Κατ' ἀκολουθίαν : $\vec{u} \cdot \vec{v} = -|\vec{u}| |\vec{v}|$.

Ἐργαζόμενοι δὲ ὅπως προηγουμένως, εύρισκομεν ὅτι :


$$\vec{u} \cdot \vec{v} = -\vec{u} \cdot \vec{v}.$$

Ωστε : Τὸ ἐσωτερικὸν γινόμενον δύο συγγραμμικῶν διανυσμάτων ισοῦται πρὸς τὸ γινόμενον τῶν ἀλγεβρικῶν τιμῶν αὐτῶν.

Σημείωσις : Εάν ἀλλάξωμεν τὴν φορὰν ἐνὸς τῶν διανυσμάτων, τὸ ἐσωτερικὸν γινόμενον ἀλλάσσει πρόσθμον.

24. ΘΕΩΡΗΜΑ I.—Τὸ ἐσωτερικὸν γινόμενον δύο διανυσμάτων ισοῦται πρὸς τὸ γινόμενον τῶν ἀλγεβρικῶν τιμῶν τοῦ ἐνὸς ἢ \vec{u} αὐτῶν ἐπὶ τὴν δρθογώνιον προβολὴν τοῦ ἄλλου διανύσματος ἐπὶ ἄξονα τῆς αὐτῆς διευθύνσεως καὶ φορᾶς μὲ τὸ πρᾶτον.

Ἐστωσαν $\vec{OA} = \vec{u}$ καὶ $\vec{OB} = \vec{v}$ οἱ ἀντιπρόσωποι τῶν διανυσμάτων \vec{u} καὶ \vec{v} (σχ. 19).



Ἐστω B' ἡ δρθὴ προβολὴ τοῦ B ἐπὶ τὴν εὐθεῖαν OA . Ἐπὶ τοῦ ἄξονος, τοῦ ὅποιού φορεύεται ή εὐθεῖα OA καὶ φορὰ είναι ή τοῦ διανύσματος \vec{OA} , ἔχομεν :

$$\vec{OB}' = OB \text{ συνθ} = u \text{ συνθ}$$

Ἐνθα θὴ γωνία τῶν δύο διανυσμάτων. Αρα :

$$\vec{OA} \cdot \vec{OB}' = u \cdot v \cdot \text{συνθ} = \vec{OA} \cdot \vec{OB}' = \vec{u} \cdot \vec{v}.$$


Ωστε :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{OA} \cdot \vec{OB}'.$$

Εάν ἀλλάξωμεν τὴν φορὰν τοῦ ἄξονος $x'OX$, τὸ γινόμενον $\vec{OA} \cdot \vec{OB}'$ μένει ἀμετάβλητον. Αρα, οἰδήποτε καὶ ἀν είναι ή φορὰ τοῦ ἄξονος $x'OX$, θὰ ἔχωμεν :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{OA} \cdot \vec{OB}' = \vec{OB} \cdot \vec{OA}'.$$

25. ΠΟΡΙΣΜΑ I.—Τὸ ἐσωτερικὸν γινόμενον δύο διανυσμάτων δὲν μεταβάλλεται ἔν τῶν διανυσμάτων ἀντικατασταθῆ ύπὸ τῆς ὁρθῆς προβολῆς του ἐπὶ τὸν φορέα τοῦ ἄλλου.



Οὔτως, εἰς τὸ (σχ. 20) ἔχομεν :

$$\vec{AB} \cdot \vec{OG} = \vec{A_1B_1} \cdot \vec{OG} = \vec{A_1B_1} \cdot \vec{OG}$$

Ἐὰν τὸ A (ἢ B) μετατίθεται ἐπὶ ἐπιπέδου καθέτου πρὸς τὸ διάνυσμα \vec{OG} , τὸ ἐσωτερικὸν γινόμενον $\vec{AB} \cdot \vec{OG}$ μένει ἀμετάβλητον, διότι τὰ A_1 καὶ B_1 μένουν σταθερά.

26. ΠΟΡΙΣΜΑ II.— Ἡ ἀλγεβρικὴ τιμὴ τῆς ὁρθῆς προβολῆς ἐνὸς διανύσματος ἐπὶ ἄξονα εἶναι τὸ ἐσωτερικὸν γινόμενον τοῦ διανύσματος τούτου καὶ τοῦ μοναδιαίου διανύσματος τοῦ ἄξονος τούτου.

Οὔτως, ἔὰν εἰς τὸ (σχ. 20) εἰναι $|\vec{OG}| = 1$, τότε :

$$\vec{AB} \cdot \vec{OG} = \vec{A_1B_1} \cdot \vec{OG} = \vec{A_1B_1}$$

27. ΠΟΡΙΣΜΑ III.—Ἐὰν τὸ ἐν τῶν διανυσμάτων ἐσωτερικοῦ γινομένου πολλαπλασιασθῇ ἐπὶ τὸν πραγματικὸν ἀριθμὸν k, τότε τὸ ἐσωτερικὸν γινόμενον τῶν δύο διανυσμάτων πολλαπλασιάζεται ἐπὶ k.

Δηλαδή : $(k \cdot u) v = k(u \cdot v)$ (Προσεταιριστικὴ ὡς πρὸς τὸ k).


Ἡ ἀπόδειξις ἔκ τοῦ ὁρισμοῦ.

28. ΠΟΡΙΣΜΑ IV.—Ἐὰν $k_1, k_2 \in \mathbb{R}$, νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι :

$$(k_1 \cdot u) \cdot (k_2 \cdot v) = k_1 \cdot k_2 (u \cdot v)$$

Ἡ ἀπόδειξις ἔκ τοῦ ὁρισμοῦ.

29. ΘΕΩΡΗΜΑ.— Νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι : $\vec{u}(\vec{v}_1 + \vec{v}_2) = \vec{u} \cdot \vec{v}_1 + \vec{u} \cdot \vec{v}_2$



‘Απόδειξις : Ἔστωσαν $\vec{OA} = \vec{u}$, $\vec{OB} = \vec{v}_1$

καὶ $\vec{OG} = \vec{v}_2$ οἱ ἀντιπρόσωποι τῶν διανυσμάτων \vec{u} , \vec{v}_1 καὶ \vec{v}_2 ἀντιστοίχως.

Ἐστω ὅτι : $\vec{OS} = \vec{OB} + \vec{OG}$

Ἐὰν Δ, E, Z εἰναι αἱ ὁρθαὶ προβολαὶ τῶν B, G καὶ Σ ἐπὶ τὴν εὐθεῖαν OA, τῆς ὅποις φορὰ εἰναι ἡ φορὰ τοῦ διανύσματος \vec{OA} , θὰ ἔχωμεν :

$$\vec{u}(\vec{v}_1 + \vec{v}_2) = \vec{OA} \cdot \vec{OS} = \vec{OA} \cdot \vec{OZ} \quad (1)$$

0 = 'Επειδή δὲ είναι $\overrightarrow{OZ} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OE}$, ή (1) γίνεται :
 $\vec{u}(\vec{v}_1 + \vec{v}_2) = \overrightarrow{OA} \cdot (\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OE}) = \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OE} = \vec{u} \cdot \vec{v}_1 + \vec{u} \cdot \vec{v}_2$
 ήτοι : $\vec{u} \cdot (\vec{v}_1 + \vec{v}_2) = \vec{u} \cdot \vec{v}_1 + \vec{u} \cdot \vec{v}_2$.

'Η ιδιότης αύτη καλείται **ἐπιμεριστική**.

Γενίκευσις : Είναι : $\vec{u} \cdot \sum_1^v \vec{v}_i = \vec{u} \cdot \vec{v}_1 + \vec{u} \cdot \vec{v}_2 + \cdots + \vec{u} \cdot \vec{v}_v$.

Γενικώτερον διποδεικνύεται ότι :

'Εάν $\vec{u} = u_1 + u_2 + \cdots + u_n$ καὶ $\vec{v} = v_1 + v_2 + \cdots + v_v$

τότε : $\vec{u} \cdot \vec{v} = \sum u_i v_j$, ἐνθα $i = 1, 2, 3, \dots, n$ καὶ $j = 1, 2, 3, \dots, v$.

1ον : 'Ομοίως ἔργαζόμενοι, εύρισκομεν ότι :

$$\begin{aligned} \vec{u}(\vec{v}_1 + \vec{v}_2 + \vec{v}_3) &= \vec{u} \cdot [\vec{v}_1 + (\vec{v}_2 + \vec{v}_3)] = \vec{u} \cdot \vec{v}_1 + \vec{u} \cdot (\vec{v}_2 + \vec{v}_3) = \\ &= \vec{u}_1 \cdot \vec{v}_1 + \vec{u} \cdot \vec{v}_2 + \vec{u} \cdot \vec{v}_3 \end{aligned}$$

2ον : Διὰ νὰ εὕρωμεν τὸ γινόμενον :

$$P = (\vec{u}_1 + \vec{u}_2) \cdot (\vec{v}_1 + \vec{v}_2 + \vec{v}_3)$$

Θέτομεν $\vec{u} = u_1 + u_2$ καὶ ἔχομεν διαδοχικῶς :

$$\begin{aligned} P &= \vec{u} \cdot (\vec{v}_1 + \vec{v}_2 + \vec{v}_3) = \vec{u} \cdot \vec{v}_1 + \vec{u} \cdot \vec{v}_2 + \vec{u} \cdot \vec{v}_3 = \\ &= (\vec{u}_1 + \vec{u}_2) \vec{v}_1 + (\vec{u}_1 + \vec{u}_2) \vec{v}_2 + (\vec{u}_1 + \vec{u}_2) \vec{v}_3 = \\ &= \vec{u}_1 \cdot \vec{v}_1 + \vec{u}_2 \cdot \vec{v}_1 + \vec{u}_1 \cdot \vec{v}_2 + \vec{u}_2 \cdot \vec{v}_2 + \vec{u}_1 \cdot \vec{v}_3 + \vec{u}_2 \cdot \vec{v}_3. \end{aligned}$$

3ον : Εύκόλως διποδεικνύονται αἱ Ισότητες :

$$(\vec{u} + \vec{v})^2 = |\vec{u}|^2 + |\vec{v}|^2 + 2 \vec{u} \cdot \vec{v}$$

$$(\vec{u} - \vec{v})^2 = |\vec{u}|^2 + |\vec{v}|^2 - 2 \vec{u} \cdot \vec{v}$$

$$(\vec{u} + \vec{v})(\vec{u} - \vec{v}) = |\vec{u}|^2 - |\vec{v}|^2.$$

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΑΙ

I. — Τρίγωνον είναι δρθιγώνιον ὅταν, καὶ μόνον ὅταν, τὸ τετράγωνον μιᾶς πλευρᾶς του ισοῦται πρὸς τὸ ὄθροισμα τῶν τετραγώνων τῶν δύο ἄλλων πλευρῶν του.

Πράγματι, ἔστω τὸ τρίγωνον $AB\Gamma$ (σχ. 22). Θὰ είναι :

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{B\Gamma} = \overrightarrow{A\Gamma} \implies \overrightarrow{B\Gamma} = \overrightarrow{A\Gamma} - \overrightarrow{AB}.$$

"Ἄρα : $(\overrightarrow{B\Gamma})^2 = (\overrightarrow{A\Gamma} - \overrightarrow{AB})^2 = (\overrightarrow{A\Gamma})^2 + (\overrightarrow{AB})^2 - 2 \overrightarrow{A\Gamma} \cdot \overrightarrow{AB}$

$$\overrightarrow{B\Gamma}^2 = A\Gamma^2 + AB^2 - 2 \overrightarrow{A\Gamma} \cdot \overrightarrow{AB}.$$

(1)


α) Έάν τὸ τρίγωνον ABG εἶναι δρθιογώνιον εἰς τὸ A , τότε: $\vec{AG} \cdot \vec{AB} = 0$ καὶ ἡ (1) γίνεται: $BG^2 = AG^2 + AB^2$.

β) Έάν τὸ ABG εἶναι τοιοῦτον ὥστε $BG^2 = AG^2 + AB^2$, ἡ (1) γράφεται:

$$2 \vec{AG} \cdot \vec{AB} = 0 \quad \text{ἢ} \quad \vec{AG} \cdot \vec{AB} = 0 \implies AG \perp AB.$$

Π. - Ή σχέσις $AH^2 = -\vec{HB} \cdot \vec{HG}$ (εἰς τὴν δόποιαν H εἶναι ὁ ποὺς τοῦ ύψους AH τριγώνου ABG) χαρακτηρίζει τὸ τρίγωνον δρθιογώνιον εἰς τὸ A .

Πράγματι, οἰονδήποτε καὶ ἄν εἶναι τὸ τρίγωνον ABG , ἐπειδὴ $AH \perp HG$ εἶναι:



$$\begin{aligned} AH \cdot HG &= 0 \\ \text{καὶ} \quad \vec{BH} \cdot \vec{HG} &= (\vec{BA} + \vec{AH}) \cdot \vec{HG} \\ &= \vec{BA} \cdot \vec{HG} + \vec{AH} \cdot \vec{HG} = \vec{BA} \cdot \vec{HG} \\ &= \vec{BA} \cdot (\vec{HA} + \vec{AG}) = \vec{BA} \cdot \vec{HA} + \vec{BA} \cdot \vec{AG} \\ \text{ἡτοι:} \quad \vec{BH} \cdot \vec{HG} &= \vec{BA} \cdot \vec{HA} + \vec{BA} \cdot \vec{AG} \end{aligned} \quad (1)$$

α) Έάν $A = 90^\circ$, τότε $\vec{BA} \cdot \vec{AG} = 0$ καὶ ἡ (1) γίνεται:

$$\vec{BH} \cdot \vec{HG} = \vec{BA} \cdot \vec{HA} = (\vec{BH} + \vec{HA}) \cdot \vec{HA} = \vec{BH} \cdot \vec{HA} + (\vec{HA})^2$$

Ἄλλα $\vec{BH} \perp \vec{HA}$, ἀρα $\vec{BH} \cdot \vec{HA} = 0$, δοπότε

$$\vec{BH} \cdot \vec{HG} = (\vec{HA})^2$$

καὶ ἐπειδὴ τὰ \vec{BH} καὶ \vec{HG} εἶναι συγγραμμικά, ἐπειταὶ:

$$HA^2 = \vec{BH} \cdot \vec{HG} \quad \text{ἢ} \quad HA^2 = -\vec{HB} \cdot \vec{HG}.$$

β) Θεωροῦμεν τρίγωνον ABG , εἰς τὸ δόποιον εἶναι $HA^2 = \vec{BH} \cdot \vec{HG}$. Ή ισότης αὗτη ίσοδυναμεῖ πρὸς τὴν:

$$\vec{BH} \cdot \vec{HG} = (\vec{HA})^2 = \vec{BH} \cdot \vec{HA} + (\vec{HA})^2 = (\vec{BH} + \vec{HA}) \cdot \vec{HA} = \vec{BA} \cdot \vec{HA} \quad (2)$$

Συγκρίνοντες τὰς (1) καὶ (2) ἔχομεν:

$$\vec{BA} \cdot \vec{AG} = 0 \implies AB \perp AG.$$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

17. Εἰς τυχὸν σύστημα ἀξόνων εἶναι:

$\vec{u} (4,3)$	$\vec{u} (-3,5)$	$\vec{u} (3,7)$	Νὰ ὑπολογισθοῦν αἱ συντεταγμέναι τοῦ ἀθροίσματος $\vec{W} = \vec{u} + \vec{v}$.
$\vec{v} (1,-4)$	$\vec{v} (-4,-2)$	$\vec{v} (-2,-7)$	

18. Εις τυχόν σύστημα δξόνων δίδονται :

$$\begin{array}{c|c|c|c} \vec{u}(5,-2) & \vec{u}(2,6) & (-7,4) & \text{καὶ ζητεῖται νὰ ὑπολογισθοῦν αἱ συντεταγμένα.} \\ \hline \vec{v}(-1,4) & \vec{v}(1,8) & \vec{v}(-5,4) & \text{τῆς διαφορᾶς } \vec{W} = \vec{u} - \vec{v}. \end{array}$$

19. Εις τετράεδρον $AB\Gamma\Delta$ νὰ ἀποδειχθῇ δτι :

$$1\text{ον: } \vec{B}\Gamma \cdot \vec{\Delta} + \vec{\Gamma}\Delta \cdot \vec{B}\Delta + \vec{A}\vec{\Delta} \cdot \vec{\Gamma}\Delta = 0 \quad (\text{θέστε } \vec{AB} = \vec{\Delta} + \vec{\Gamma}\Delta)$$

2ον: 'Εάν αἱ ἀκμαὶ $B\Gamma$, $\Delta\Gamma$ εἰναι δρθογώνιοι καὶ $\Gamma\Delta$ δρθογώνιος πρὸς τὴν $B\Delta$, τότε καὶ ἡ AB θὰ εἰναι δρθογώνιος πρὸς τὴν $\Gamma\Delta$.

20. Τρίγωνον εἰναι δρθογώνιον, δταν, καὶ μόνον δταν, μία διάμεσός του εἰναι τὸ ἥμισυ τῆς ἀντιστοίχου πλευρᾶς.

21. 'Εάν AH εἰναι τὸ ὑψος τριγώνου $AB\Gamma$, αἱ σχέσεις :

$$\vec{B}\Gamma \cdot \vec{BH} = BA^2 \quad \text{ἡ} \quad \vec{B}\Gamma \cdot \vec{H\Gamma} = \Gamma A^2$$

χαρακτηρίζουν τὸ τρίγωνον δρθογώνιον εἰς τὸ A .

22. Εις πᾶν δρθογώνιον τρίγωνον $AB\Gamma$ (ἔνθα AH ὑψος) νὰ ἀποδειχθῇ δτι :

$$1\text{ον: } AB \cdot A\Gamma = B\Gamma \cdot AH, \quad 2\text{ον: } \frac{\vec{HB}}{\vec{H\Gamma}} = -\frac{AB^2}{A\Gamma^2}, \quad 3\text{ον: } \frac{1}{AB^2} + \frac{1}{A\Gamma^2} = \frac{1}{AH^2} \quad (\text{αἱ ἀπο-} \\ \text{δεῖξεις νὰ γίνουν διανυσματικῶς}).$$

23. 'Εάν AM εἰναι διάμεσος τοῦ τριγώνου $AB\Gamma$, τότε :

$$1\text{ον: } AB^2 + A\Gamma^2 = 2AM^2 + \frac{B\Gamma^2}{2} \quad (\text{διανυσματικῶς}).$$

$$2\text{ον: } AB^2 - A\Gamma^2 = 2\vec{B}\Gamma \cdot \vec{MH} \quad (AH \text{ ὑψος}).$$

24. Εις πᾶν τρίγωνον $AB\Gamma$ νὰ ἀποδειχθῇ διανυσματικῶς δτι :

$$\alpha' : \alpha^2 = \beta^2 + \gamma^2 - 2\beta\gamma\cos\alpha, \quad \beta' : \beta^2 = \gamma^2 + \alpha^2 - 2\gamma\alpha\cos\beta \quad \text{καὶ}$$

$$\gamma' : \gamma^2 = \alpha^2 + \beta^2 - 2\alpha\beta\cos\gamma.$$

25. 'Εάν H εἰναι τὸ δρθόκεντρον ἐνὸς τριγώνου $AB\Gamma$ καὶ AA' , BB' , $\Gamma\Gamma'$ τὰ ὑψη αὐτοῦ :

$$1\text{ον} : \text{Ποίᾳ ἡ τιμὴ τοῦ } \vec{BH} \cdot \vec{A\Gamma}; \quad 2\text{ον} : \text{Νὰ δειχθῇ δτι: } \vec{A'A} \cdot \vec{A'H} = -\vec{A'B} \cdot \vec{A'\Gamma},$$

$$3\text{ον} : \vec{AH} \cdot \vec{AB} = \vec{AB} \cdot \vec{A\Gamma}' = \vec{AH} \cdot \vec{AA}' \quad \text{καὶ} \quad \vec{AB}' \cdot \vec{A\Gamma} = \vec{AB} \cdot \vec{A\Gamma}', \quad 4\text{ον} : \text{Νὰ δειχθῇ δτι:}$$

$$\vec{HA} \cdot \vec{HB} = \vec{HA} \cdot \vec{AA}' = \vec{HB} \cdot \vec{HB}' \quad \text{καὶ} \quad \vec{HA} \cdot \vec{H\Gamma}' = \vec{HB} \cdot \vec{H\Gamma}' = \vec{H\Gamma} \cdot \vec{H\Gamma}'.$$

26. 'Επι μιᾶς εὐθείας δίδονται τὰ σημεῖα A, B, Γ καὶ M ἄλλο τυχόν σημεῖον, τοῦ ὅποιου ἔστω H ἡ προβολὴ ἐπὶ τὴν εὐθεῖαν AB . Νὰ ἀποδειχθῇ δτι :

$$MA^2 \cdot \vec{B\Gamma} + MB^2 \cdot \vec{\Gamma A} + MG^2 \cdot \vec{AB} + \vec{B\Gamma} \cdot \vec{\Gamma A} \cdot \vec{AB} = 0 \quad (\text{Stewart}).$$

27. 'Εάν $|\vec{u}| = u$, $|\vec{v}| = v$ καὶ $(\vec{u}, \vec{v}) = \theta$, νὰ ὑπολογισθῇ τὸ γινόμενον $\vec{u} \cdot \vec{v}$ εἰς τὰς ἀ-
κολούθους περιπτώσεις :


$$\begin{array}{c|c|c|c|c} u = 5 & u = 12 & u = \sqrt{5} & u = \sqrt{17} \\ \hline \begin{array}{l} 1\text{ον: } v = 7 \\ \theta = 30^\circ \end{array} & \begin{array}{l} 2\text{ον: } v = 18 \\ \theta = 60^\circ \end{array} & \begin{array}{l} 3\text{ον: } v = \frac{2}{3} \\ \theta = 150^\circ \end{array} & \begin{array}{l} 4\text{ον: } v = 7\sqrt{2} \\ \theta = 135^\circ \end{array} \\ \hline \end{array}$$

28. Εις κανονικὸν σύστημα (O, i, j) νὰ κατασκευασθοῦν τὰ διανύσματα $\vec{u} = \vec{i} + \vec{j}$ καὶ $\vec{v} = \vec{i} - \vec{j}$.

'Ακολούθως νὰ εύρεθῃ τὸ γινόμενον $\vec{u} \cdot \vec{v}$. Ποίαν ιδιότητα τῶν διχοτόμων γωνίας ἔπαληθεύ-
ομεν ἐνταῦθα ;

30*. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ ΓΙΝΟΜΕΝΟΝ ΔΥΟ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΩΝ.— Καλούμεν \vec{u}

ξωτερικὸν γινόμενον δύο διανυσμάτων \vec{u} καὶ \vec{v} (προσανατολισμένων) τὸ δρθογώνιον διάνυσμα \vec{w} πρὸς τὰς διευθύνσεις τῶν δοθέντων, τοιοῦτον ὥστε ἡ τρίεδρος $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ νὰ ἔχῃ τὸν θετικὸν προσανατολισμόν, ἐφ' ὅσον $(\vec{u}, \vec{v}) = \text{θετική}$, τὸν ἀρνητικὸν δέ, ἢ $\vec{v}(\vec{u}, \vec{v}) = \text{ἀρνητικὴ}$ καὶ μέτρον $|\vec{w}| = |\vec{u}| |\vec{v}|$ ημθ (1), ἔνθα θὴ γωνία τῶν \vec{u}, \vec{v} καὶ $0 \leq \theta \leq \pi$.



Σχ. 23

'Εὰν $\theta = 0$ ἢ $\theta = \pi$, τότε ημθ = 0 καὶ δ τύπος (1)

δίδει

$$\vec{w} = \vec{0}.$$

α) Σύμφωνα μὲ τὸν δρισμὸν εἶναι : $\vec{u} \cdot \vec{v} = -\vec{v} \cdot \vec{u}$. Δηλαδὴ εἰς τὸ ξωτερικὸν γινόμενον δύο διανυσμάτων δὲν ισχύει δὸνός τῆς ἀντιμεταθέσεως.

β) 'Εὰν $\theta = 0$ ἢ $\theta = \pi$, τότε ημθ = 0 καὶ ἄρα $\vec{w} = \vec{0}$ καὶ ἀντιστρόφως. "Αν $\vec{u} \neq \vec{0}$, $\vec{v} \neq \vec{0}$ καὶ $\vec{w} = \vec{0}$, τότε ημθ = 0 καὶ ἄρα $\theta = 0$ ἢ $\theta = \pi$. "Ωστε :

"Ινα δύο μὴ μηδενικὰ διανύσματα εἶναι συγγραμικά, πρέπει καὶ ἀρκεῖ τὸ ξωτερικὸν γινόμενον αὐτῶν νὰ εἴναι τὸ μὴ μηδενικὸν διάνυσμα.

γ) 'Εὰν $\theta = \frac{\pi}{2}$, τότε ημθ = 1 καὶ ἄρα $|\vec{w}| = |\vec{u}| |\vec{v}|$.

Δηλαδὴ : "Η ἀλγεβρικὴ τιμὴ τοῦ ξωτερικοῦ γινομένου δύο καθέτων διανυσμάτων ισοῦται πρὸς τὸ γινόμενον τῶν ἀλγεβρικῶν τιμῶν τῶν δοθέντων διανυσμάτων.

δ) 'Εὰν $\vec{u} = \vec{0}$ ἢ $\vec{v} = \vec{0}$ ἢ ημθ = 0, τότε $\vec{w} = \vec{0}$ καὶ ἄρα $|\vec{w}| = 0$.

"Ἄρα: Τὸ ξωτερικὸν γινόμενον δύο διανυσμάτων εἶναι μηδὲν δταν, καὶ μόνον δταν, ἐν τούλαχιστον τῶν διανυσμάτων εἶναι τὸ μηδενικὸν διάνυσμα ἢ δταν τὰ δύο διανύσματα εἶναι συγγραμμικά.

ε) Εἰς τὸ ξωτερικὸν γινόμενον διανυσμάτων ισχύει δὲ ἐπιμεριστικὸς νόμος ὡς πρὸς τὴν πρόσθεσιν διανυσμάτων. Ἀποδεικνύομεν τὸν νόμον τοῦτο διὰ τρία τυχόντα διανύσματα $\vec{V}_1, \vec{V}_2, \vec{V}_3$.

Χωρὶς νὰ καταστραφῇ ἡ γενικότης, δυνάμεθα νὰ ύποθέσωμεν ὅτι τὰ διανύσματα $\vec{V}_1, \vec{V}_2, \vec{V}_3$ ἔχουν κοινὴν ἀρχὴν O , καὶ ὅτι τὸ διάνυσμα \vec{V}_1 εἶναι τὸ μοναδικὸν.

Θέτομεν $\vec{S} = \vec{V}_2 + \vec{V}_3$ καὶ $\vec{W} = \vec{V}_1 \cdot (\vec{V}_2 + \vec{V}_3)$, (σχ. 24).

Θεωροῦμεν τὸ ἐπίπεδον (P) κάθετον ἐπὶ τὸ \vec{V}_1 εἰς τὸ O καὶ ἔστωσαν \vec{U}_2, \vec{U}_3 , τὰς αἱ δρθαὶ προβολαὶ ἐπὶ τὸ (P) τῶν $\vec{V}_2, \vec{V}_3, \vec{S}$ ἀντιστοίχως.

1ον : Κατασκευάζομεν τὸ διάνυσμα $\vec{W}_2 = \vec{V}_1 \cdot \vec{V}_2$. Τοῦτο ἔχει, ὡς γνωστόν, διεύθυνσιν κάθετον πρὸς τὰ \vec{V}_1 καὶ \vec{V}_2 . Ἀρα τὸ \vec{W}_2 θὰ εἴναι κάθετον πρὸς τὰ \vec{V}_1 καὶ \vec{u}_2 . Κατ' ἀκολουθίαν :

$$|\vec{W}_2| = |\vec{V}_1| |\vec{V}_2| \text{ ημ } (\vec{V}_1, \vec{V}_2)$$

Ἄλλα $|\vec{V}_1| = 1$ καὶ \vec{u}_2 εἴναι ἡ ὁρθογώνιος προβολὴ τοῦ \vec{V}_2 ἐπὶ τὸ (P). Συνεπῶς : $|\vec{W}_2| = |\vec{u}_2|$ καὶ τὸ \vec{W}_2 προκύπτει ἐκ τοῦ \vec{u}_2 διὰ στροφῆς περὶ τὸ O κατὰ γωνίαν $\frac{\pi}{2}$.

2ον : Κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον κατασκευάζομεν τὸ διάνυσμα $\vec{W}_3 = \vec{V}_1 \cdot \vec{V}_3$

καὶ τὸ \vec{W}_3 προκύπτει ἐκ τοῦ \vec{u}_3 διὰ στροφῆς περὶ τὸ O καὶ κατὰ γωνίαν $\frac{\pi}{2}$.

3ον : Κατασκευάζομεν τὸ διάνυσμα $\vec{W} = \vec{V}_1 \cdot \vec{S}$ κατὰ τὸν προηγουμένως ἐκτεθέντα τρόπον. Τὸ \vec{W} προκύπτει ἐκ τοῦ \vec{s} διὰ στροφῆς περὶ τὸ O κατὰ γωνίαν $\frac{\pi}{2}$.

Ἄλλα τὸ $\vec{s} = \vec{w}_2 + \vec{w}_3$. Ἀρα $\vec{W} = \vec{w}_2 + \vec{w}_3 = \vec{V}_1 \cdot \vec{V}_2 + \vec{V}_1 \cdot \vec{V}_3$
 ἢ $\vec{V}_1 \cdot (\vec{V}_2 + \vec{V}_3) = \vec{V}_1 \cdot \vec{V}_2 + \vec{V}_1 \cdot \vec{V}_3$.

Ἡ ἀνωτέρω ἰδιότης γενικεύεται : Οὔτω, θὰ εἴναι :


$$(\vec{V}_1 + \vec{V}_2) (\vec{V}_3 + \vec{V}_4 + \vec{V}_5) = \vec{V}_1 \cdot \vec{V}_3 + \vec{V}_1 \cdot \vec{V}_4 + \vec{V}_1 \cdot \vec{V}_5 + \vec{V}_2 \cdot \vec{V}_3 + \vec{V}_2 \cdot \vec{V}_4 + \vec{V}_2 \cdot \vec{V}_5$$

Χρήσις τοῦ ἔξωτερικοῦ γινομένου γίνεται εἰς τὴν Φυσικήν, καὶ δὴ εἰς τὸ Κεφάλαιον « περὶ ροπῆς δυνάμεων ».

Σημείωσις : Τὸ ἔξωτερικὸν γινομένον δύο διανυσμάτων εἴναι πραγματικὸς ἀριθμός. Ἐνῷ τὸ ἔξωτερικὸν είναι διάνυσμα.

Ἐπειδὴ $|\vec{u}| |\vec{v}|$ ημθ είναι τὸ ἐμβαδὸν τοῦ παραλληλογράμμου, ὅπερ ἔχει πλευρὰς \vec{u} , \vec{v} καὶ περιεχομένην γωνίαν θ , ἐπεται ὅτι τὸ $|\vec{W}|$ είναι τὸ ἐμβαδὸν τοῦ παραλληλογράμμου τούτου.

31. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΙΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΙΝΟΜΕΝΟΥ ΔΥΟ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΩΝ.— "Εστω xOy (σχ. 25) ὁρθοκανονικὸν σύστημα συντεταγμένων. Δηλαδὴ τὰ μοναδιαῖα διανύσματα \vec{i} καὶ \vec{j} τῶν ἀξόνων Ox καὶ Oy ἔχουν τὸ αὐτὸ μῆκος 1 καὶ είναι κάθετα.




Σχ. 24

Κατά τὰ γνωστά :

$$\vec{i}^2 = 1, \quad \vec{j}^2 = 1 \quad \text{καὶ} \quad \vec{j} \cdot \vec{i} = 0.$$

Έστωσαν X, Y καὶ X_1, Y_1 αἱ συντεταγμέναι προβολαὶ τῶν διανυσμάτων $\vec{OM} = \vec{u}$ καὶ $\vec{OM}_1 = \vec{v}$ τοῦ ἐπιπέδου xOy εἰς τὸ θεωρηθὲν σύστημα.



Σχ. 25

Γνωρίζομεν ὅτι :

$$\vec{u} = X\vec{i} + Y\vec{j} \quad \text{καὶ} \quad \vec{v} = X_1\vec{i} + Y_1\vec{j}.$$

*Αρα :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = (X\vec{i} + Y\vec{j}) \cdot (X_1\vec{i} + Y_1\vec{j}) =$$

$$= XX_1\vec{i}^2 + (XY_1 + YX_1)(\vec{i} \cdot \vec{j}) + YY_1\vec{j}^2 \\ \epsilon\xi οὐ :$$

$$\boxed{\vec{u} \cdot \vec{v} = XX_1 + YY_1} \quad (1)$$

Δηλαδή : Τὸ ἐσωτερικὸν γινόμενον δύο διανυσμάτων ἰσοῦται πρὸς τὸ ἄθροισμα τῶν γινομένων τῶν ὁμονύμων συντεταγμένων προβολῶν αὐτῶν.

Συνέπειαι : Ἐκ τῶν ἀνωτέρω ἔπειται ὅτι :

$$1\text{ον: } |\vec{u}|^2 = XX + YY = X^2 + Y^2, \quad \epsilon\xi οὐ: |\vec{u}| = \sqrt{X^2 + Y^2} \quad (2)$$

2ον: *Επειδὴ $\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}| |\vec{v}| \cos \theta$ συνθ., ἔπειται ὅτι :

$$\sigma u v \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| |\vec{v}|} = \frac{XX_1 + YY_1}{\sqrt{X^2 + Y^2} \cdot \sqrt{X_1^2 + Y_1^2}} \quad (3)$$

32. ΣΥΝΘΗΚΗ ΚΑΘΕΤΟΤΗΤΟΣ ΔΥΟ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΩΝ.— Ἐὰν τὰ διανύσματα εἰναι κάθετα, τότε $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$ καὶ ἡ (1) τῆς (§ 31) γίνεται :

$$XX_1 + YY_1 = 0.$$

*Ἀντιστρόφως, ἐὰν $XX_1 + YY_1 = 0$, τότε, ἂν $\vec{u} \neq 0$ καὶ $\vec{v} \neq 0$

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 0 \quad \text{ἢ} \quad u \cdot v \text{ συνθ} = 0 \quad \text{ἢ} \quad \text{συνθ} = 0, \quad \epsilon\xi οὐ: \theta = \frac{\pi}{2}.$$

*Ωστε : Εἰς τὸ δρθοκανονικὸν σύστημα συντεταγμένων, ἡ ἀναγκαία καὶ ἴκανὴ συνθήκη ἵνα δύο μὴ μηδενικὰ διανύσματα $\vec{u}(X, Y)$ καὶ $\vec{v}(X_1, Y_1)$ εἰναι κάθετα εἰναι ἡ :

$$\boxed{XX_1 + YY_1 = 0}$$

33. ΑΠΟΣΤΑΣΙΣ ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΩΝ.— Είς ένα δρθοκανονικόν σύστημα συντεταγμένων xOy (σχ. 26) θεωροῦμεν δύο σημεῖα $A(x_1, y_1)$ καὶ $B(x_2, y_2)$. Αἱ συντεταγμέναι προβολαὶ τοῦ διανύσματος \vec{AB} εἰναι

$$X = x_2 - x_1 \quad \text{καὶ} \quad Y = y_2 - y_1.$$

*Επειδὴ δέ :

$$\overrightarrow{AB}^2 = \overline{AB}^2 = X^2 + Y^2 = (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2$$

ἔπειται ὅτι :


$$|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

*Έάν τεθῇ $|\overrightarrow{AB}| = AB = d$, τότε :

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}.$$

*Η ἀπόστασις ἐνὸς σημείου $M(x, y)$ ἀπὸ τὴν ἀρχὴν $O(0, 0)$ εἰναι :

$$OM = \sqrt{x^2 + y^2}.$$



Σχ. 26

34. HMITONON ΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ (προσανατολισμένης) **ΔΥΟ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΩΝ.**— *Υποθέτομεν τὸ σύστημα τῶν δξόνων δρθοκανονικὸν καὶ τοῦ προσανατολισμοῦ : $(\vec{i}, \vec{j}) = +\frac{\pi}{2}$. *Εστωσαν α, β, θ αἱ ἀλγεβρικαὶ τιμαὶ τῶν γωνιῶν $(\vec{0}_x, \vec{u})$, $(\vec{0}_x, \vec{v})$ καὶ (\vec{u}, \vec{v}) . Θὰ εἰναι (σχ. 25)

$$\theta = \beta - \alpha \quad \text{καὶ} \quad \eta\mu\theta = \eta\mu\beta \text{ συν} \alpha - \eta\mu\alpha \text{ συν} \beta \quad (1)$$

*Αλλά : $X = OM$ συν α $X_1 = OM_1$ συν β | δόποτε ἡ (1) γίνεται :

$$Y = OM \text{ ημ} \alpha \quad | \quad Y_1 = OM_1 \text{ ημ} \beta$$

$$\eta\mu\theta = \frac{XY_1 - X_1Y}{OM \cdot OM_1} \quad \text{ἢ} \quad \eta\mu\theta = \frac{XY_1 - X_1Y}{\sqrt{X^2 + Y^2} \cdot \sqrt{X_1^2 + Y_1^2}} \quad (2)$$

Εὐκόλως τώρα ἀποδεικνύεται ὅτι :

$$\eta\mu^2\theta + \sigma\nu^2\theta = \frac{(XX_1 + YY_1)^2 + (XY_1 - X_1Y)^2}{(X^2 + Y^2)(X_1^2 + Y_1^2)} = \frac{(X^2 + Y^2)(X_1^2 + Y_1^2)}{(X^2 + Y^2)(X_1^2 + Y_1^2)} = 1$$

καὶ εφ $\theta = \frac{XY_1 - X_1Y}{XX_1 + YY_1}$

*Ινα δὲ τὰ διανύσματα \vec{u} καὶ \vec{v} εἰναι παράλληλα, καὶ ἀρκεῖ τὸ ημθ νὰ είναι μηδέν. Δηλαδὴ

$$XY_1 - X_1Y = 0 \iff \frac{X_1}{X} = \frac{Y_1}{Y}$$

τοῦτο ὅμως ἀπεδείχθη καὶ εἰς τὴν (§ 15).

29. Εις δρθοκανονικὸν σύστημα συντεταγμένων xOy δίδονται τὰ διανύσματα \vec{u} (X, Y) καὶ $\vec{v} (X_1, Y_1)$. Νὰ ύπολογισθῇ τὸ ἐσωτερικὸν γινόμενον αὐτῶν, τὸ συνημίτονον, τὸ ήμιτονον καὶ ἡ γωνία των εἰς τὰς ἀκολούθους περιπτώσεις :

$\alpha')$	$\vec{u} (-5,3)$ καὶ $\vec{v} (6,10)$	$\delta')$	$\vec{u} (2,4)$ καὶ $\vec{v} (-3\sqrt{2}, -\sqrt{2})$
$\beta')$	$\vec{u} (0,2)$ καὶ $\vec{v} (-\sqrt{3}, 1)$	$\epsilon')$	$\vec{u} (\alpha, \beta)$ καὶ $\vec{v} (-\kappa\beta, \kappa\alpha)$
$\gamma')$	$\vec{u} (2,3)$ καὶ $\vec{v} \left(-\frac{5}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$	στ)	$\vec{u} (3,4)$ καὶ $\vec{v} (5,13)$.

30. Εις δρθοκανονικὸν σύστημα συντεταγμένων δίδονται τὰ σημεῖα $A(0, -2)$, $B(-2, -1)$, $\Gamma(2, 2)$. Είναι δρθογώνιον τὸ τρίγωνον $AB\Gamma$;

31. Τὸ αὐτὸ διὰ τὰ σημεῖα $A(4,0)$, $B(-1,0)$, $\Gamma(0,2)$.

32. Νὰ ἀποδειχθῇ δτὶ τὰ σημεῖα $A(4,0)$, $B(7,8)$, $\Gamma(0,10)$ καὶ $\Delta(-3,2)$ είναι κορυφαὶ παραλίου (σύστημα δρθοκανονικόν).

33. Νὰ ἀποδειχθῇ δτὶ τὰ σημεῖα $A(8,0)$, $B(6,6)$, $\Gamma(-3,3)$ καὶ $\Delta(-1,-3)$ είναι κορυφαὶ δρθογώνιου. Ποια τὰ μήκη τῶν πλευρῶν αὐτοῦ ; (σύστημα δρθοκανονικόν).

34. Νὰ ἀποδειχθῇ δτὶ τὰ σημεῖα $A(10,8)$, $B(-3,9)$, $\Gamma(-4,-4)$, καὶ $\Delta(9,-5)$ είναι κορυφαὶ τετραγώνου. Νὰ ύπολογισθοῦν τὰ μήκη τῶν πλευρῶν του, τῶν διαγωνίων του, αἱ συντεταγμέναι τῆς τομῆς τῶν διαγωνίων του καὶ νὰ δειχθῇ δτὶ αἱ διαγωνίοι διχοτομοῦν τὰς γωνίας του (σύστημα δρθοκανονικόν).

35. Νὰ ἀποδειχθῇ δτὶ τὰ σημεῖα $A(-3,-7)$, $B(0,-2)$, $\Gamma(6,8)$ κείνται ἐπ' εύθειας (σύστημα δρθοκανονικόν).

36. Νὰ ἀποδειχθῇ δτὶ τὰ σημεῖα $A(-1,-3)$, $B(8,3)$, $\Gamma(3,4)$, $\Delta(0,2)$ είναι κορυφαὶ ισοσκελοῦς τραπεζίου (σύστημα δρθοκανονικόν).

37. Νὰ δρισθῇ δ x , ὥστε τὰ σημεῖα $A(x,-3)$, $B(1,1)$, $\Gamma(-4,3)$ νὰ κείνται ἐπ' εύθειας (σύστημα δρθοκανονικόν).

38. Εις δρθοκανονικὸν σύστημα συντεταγμένων xOy δίδονται τὰ σημεῖα $A(3,8)$ καὶ $B(2,-3)$.

"Ινα σημεῖον M κείται ἐπὶ τοῦ κύκλου διαμέτρου AB , πρέπει καὶ ἀρκεῖ : $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$.

39. Εις δρθοκανονικὸν σύστημα συντεταγμένων δίδονται τὰ σημεῖα $A(0,3)$, $B(5,2)$ καὶ $\Gamma(-3,7)$. "Ινα σημεῖον M κείται ἐπὶ τοῦ ὑψους AH_1 , πρέπει καὶ ἀρκεῖ $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{BG} = 0$.

40. Δίδονται τὰ σημεῖα $A(-2,-2)$, $B(2,1)$, $\Gamma(0,2)$. Νὰ ἀποδειχθῇ δτὶ τὸ τρίγωνον είναι δρθογώνιον, νὰ ύπολογισθῇ τὸ μῆκος τῆς ύποτεινούστης, καθὼς καὶ τὸ συνημίτονον μιᾶς διείσας γωνίας αὐτοῦ.

ΑΛΛΑΓΗ ΑΞΟΝΩΝ

35. ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΙΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ.—Θεωροῦμεν δύο συστήματα παραλλήλων ἀξόνων xOy καὶ $x_1O_1y_1$ καὶ ύποθέτομεν δτὶ τὰ μοναδιαῖα διανύσματα τῶν ἀξόνων Ox καὶ O_1x_1 είναι ισοδύναμα, καθὼς καὶ τὰ τῶν ἀξόνων Oy καὶ O_1y_1 .

"Υπόθετομεν ἐπίστης γνωστάς τὰς συντεταγμένας (x_0, y_0) τοῦ O_1 .

Θὰ ἔχωμεν τότε :

$$\overrightarrow{OO_1} = x_0 \vec{i} + y_0 \vec{j} \quad (1)$$

"Εστωσαν (x, y) αι συντεταγμέναι ένδος σημείου M τοῦ έπιπέδου ως πρὸς ἄξονας Ox , Oy καὶ (X, Y) αι συντεταγμέναι του M ώς πρὸς ἄξονας Ox_1 καὶ Oy_1 .

Θὰ εἰναι :

$$\vec{OM} = x \vec{i} + y \vec{j} \quad (2), \quad \vec{O_1M} = X \vec{i} + Y \vec{j} \quad (3).$$

$$\text{Άλλα } \vec{OM} = \vec{OO_1} + \vec{O_1M} \quad (4)$$

Ή (4), βάσει τῶν (1), (2) καὶ (3), γίνεται:


$$\begin{aligned} x \vec{i} + y \vec{j} &= x_0 \vec{i} + y_0 \vec{j} + X \vec{i} + Y \vec{j} = \\ &= (x_0 + X) \vec{i} + (y_0 + Y) \vec{j} \end{aligned}$$

ἔξ οὖ : $x = x_0 + X$ καὶ $y = y_0 + Y$,

ἔξ οὗ πάλιν :

$$\begin{cases} X = x - x_0 \\ Y = y - y_0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = x_0 + X \\ y = y_0 + Y \end{cases}$$




Σχ. 27

36. ΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΟΡΘΟΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΑΡΧΗΝ O .—"Εστω xOy ορθοκανονικὸν σύστημα συντεταγμένων (σχ. 28) καὶ $M(x, y)$ τυχὸν σημεῖον τοῦ έπιπέδου.

Τὸ σύστημα xOy στρέφεται περὶ τὸ O κατὰ γωνίαν θ καὶ λαμβάνει τὴν θέσιν x_1Oy_1 .

"Εστωσαν (X, Y) αι συντεταγμέναι του M ώς πρὸς x_1Oy_1 .

"Αγομεν τὴν BD κάθετον πρὸς τὴν Ox καὶ τὴν BG κάθετον πρὸς τὴν MA . Θὰ εἰναι $\widehat{GBM} = \theta$ καὶ



Σχ. 28

$$x = \overline{OA} = \overline{OD} - \overline{AD} = \overline{OD} - \overline{GB} =$$

$$= \overline{OB} \text{ συν } \theta - \overline{BM} \text{ ημ } \theta = X \text{ συν } \theta - Y \text{ ημ } \theta$$

$$\text{καὶ } y = \overline{AM} = \overline{AG} + \overline{GM} = \overline{AB} + \overline{BM} = \overline{OB} \cdot \etaμ \theta + \overline{BM} \text{ συν } \theta = X \etaμ \theta + Y \text{ συν } \theta$$

*Αρα :

$$\left. \begin{array}{l} x = X \text{ συν } \theta - Y \text{ ημ } \theta \\ y = X \etaμ \theta + Y \text{ συν } \theta \end{array} \right\}$$

(1)

Λύοντες τὸ σύστημα τοῦτο ώς πρὸς X καὶ Y εύρισκομεν :

$$\left. \begin{array}{l} X = x \text{ συν } \theta + y \text{ ημ } \theta \\ Y = -x \text{ ημ } \theta + y \text{ συν } \theta \end{array} \right\}$$

(2)

Παράδειγμα : Διὰ $\theta = \frac{\pi}{4}$, οἱ τύποι (1) δίδουν

$$x = \frac{\sqrt{2}}{2} (X - Y) \text{ καὶ } y = \frac{\sqrt{2}}{2} (X + Y)$$

πόστ για να δύνηται ότι Μεταβολή για την πρώτη στην δεύτερη είναι ίση (x, y) να γίνεται
και οι (2) δίδουν : $X = \frac{\sqrt{2}}{2} (x + y)$ και $Y = \frac{\sqrt{2}}{2} (-x + y)$.

37. ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΣ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ.— Γνωρίζομεν ότι, είσι ̄ν σύστημα συντεταγμένων xOy, ό γεωμετρικός τόπος τῶν σημείων M (x, y), τοιούτων ώστε $f(x, y) = 0$ είναι, γενικώς, μία καμπύλη (Γ), καλουμένη γράφημα τῆς έξισώσεως $f(x, y) = 0$. Ἡ έξισώσις αύτη δύνομάζεται έξισώσις τῆς καμπύλης (Γ).

Διὰ τῆς ἀλλαγῆς τῶν ἀξόνων ή έξισώσις αύτη μετασχηματίζεται εἰς μίαν ἀλλη $f_1(X, Y) = 0$. Ἐάν ή έξισώσις αύτη είναι ἀπλουστέρα τῆς πρώτης, ή κατασκευή και ή σπουδὴ αὐτῆς τῆς καμπύλης (Γ) θά είναι εύκολωτέρα.

Παράδειγμα.— "Εστω $x^2 + 2xy + y^2 + \sqrt{2}(x - y) = 0$ ή έξισώσις μιᾶς καμπύλης (Γ) εἰς τὸ ὄρθοκανονικὸν σύστημα συντεταγμένων. Νὰ σχηματισθῇ ή έξισώσις τῆς (Γ) εἰς τὸ σύστημα x_1Oy_1 , διὰ στροφῆς περὶ τὸ O, κατὰ γωνίαν $\frac{\pi}{4}$.

Ἡ δοθεῖσα έξισώσις γράφεται : $(x + y)^2 + \sqrt{2}(x - y) = 0$.

Αύτη, βάσει τῶν $X = \frac{\sqrt{2}}{2}(x + y)$ και $Y = \frac{\sqrt{2}}{2}(-x + y)$, μετασχηματίζεται εἰς τὴν έξισώσιν $Y = X^2$ εἰς τὸ νέον σύστημα, καὶ παριστᾶ, ώς γνωστόν, παραβολὴν.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

41. Δίδεται τὸ σύστημα (O, i, j) και τὸ (ω, i, j) , τοῦ δποίου αἱ συντεταγμέναι τοῦ ω είναι (x_0, y_0) . Νὰ ὑπολογισθοῦν αἱ συντεταγμέναι (x, y) ἐνὸς σημείου M, ως πρὸς τὸ ἀρχικὸν σύστημα, συναρτήσει τῶν νέων συντεταγμένων (X, Y) , εἰς τὰς ἀκολούθους περιπτώσεις :

- | | | |
|--|---|---|
| 1. $x_0 = y_0 = 0$
$\vec{i} = 2\vec{i}, \vec{j} = 3\vec{j}$ | 2. $x_0 = y_0 = 0$
$\vec{i} = -4\vec{i}, \vec{j} = \frac{1}{2}\vec{j}$ | 3. $x_0 = 2, y_0 = 0$
$\vec{i} = \vec{i}, \vec{j} = \vec{j}$ |
| 4. $x_0 = y_0 = 0$
$\vec{i} = \vec{i} + \vec{j}$
$\vec{j} = \vec{i} - \vec{j}$ | 5. $x_0 = 0, y_0 = 3$
$\vec{i} = \vec{i}$
$\vec{j} = 2\vec{i} - 3\vec{j}$ | 6. $x_0 = 1, y_0 = -2$
$\vec{i} = \vec{i} - 2\vec{j}$
$\vec{j} = 2\vec{i} - 5\vec{j}$ |

42. Ὁρθοκανονικὸν σύστημα συντεταγμένων xOy στρέφεται κατὰ τὴν ὄρθην φοράν και κατὰ γωνίαν θ περὶ τὸ O. Νὰ ὑπολογισθοῦν αἱ συντεταγμέναι (x, y) ἐνὸς σημείου εἰς τὸ παλαιὸν σύστημα συναρτήσει τῶν νέων (X, Y) , εἰς τὰς ἀκολούθους περιπτώσεις :

$$\left. \begin{array}{l} \theta = \frac{\pi}{4} \\ \theta = \frac{\pi}{3} \\ \theta = \frac{\pi}{6} \end{array} \right\} \quad \left. \begin{array}{l} \theta = -\frac{\pi}{4} \\ \theta = \frac{2\pi}{3} \\ \theta = -\frac{\pi}{6} \end{array} \right\} \quad \left. \begin{array}{l} \theta = \frac{3\pi}{4} \\ \theta = -\frac{2\pi}{3} \\ \theta = \frac{5\pi}{6} \end{array} \right\}$$

43. Μία καμπύλη $f(x,y) = 0$ διδεται εις τό σύστημα xOy . Νά σχηματισθῇ ἡ ἔξισωσις τῆς καμπύλης ταύτης εις τό νέον σύστημα x_1Oy_1 , εις τὰς ἀκολούθους περιπτώσεις :

$$1. \quad 2x + 3y - 6 = 0, \quad \theta = \frac{\pi}{3} \quad \text{et} \quad \theta = \frac{\pi}{6} \quad \text{et} \quad \theta = -\frac{\pi}{4}$$

$$2. \quad x^2 - y^2 - 6xy + 4y + 5 = 0, \quad \theta = \frac{\pi}{4} \quad \text{or} \quad \theta = \frac{\pi}{8} \quad \text{or} \quad \theta = -\frac{\pi}{6}$$

μήτ εποιεῖται διάνυσμα ούτε προτότυπο έντονος μεταβολή $\vec{v} = (x, y)$ στο θέμα της
εποιείται προτότυπο μεταβολή $\vec{v} = (x, y) \rightarrow (-x, -y)$ στο προτότυπο της ίδιας μεταβολής

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IV

Η ΕΥΘΕΙΑ ΕΙΣ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟΝ

ΕΞΙΣΩΣΙΣ ΕΥΘΕΙΑΣ

38. Εις τὸ κεφάλαιον τοῦτο θὰ ἀναζητήσωμεν τὴν ἀναγκαίαν καὶ ἰκανήν συνθήκην, τὴν δποίαν πρέπει νὰ ἰκανοποιοῦν αἱ συντεταγμέναι μεταβλητοῦ σημείου τοῦ ἐπιπέδου χΟψ, ἵνα τὸ Σύνολον τῶν σημείων τούτων είναι εὐθεῖα.


Ἡ συνθήκη αὕτη ὀνομάζεται ἔξισωσις τῆς εὐθείας εἰς τὸ Καρτεσιανὸν τοῦτο ἐπίπεδον.

Μία εὐθεία είναι ώρισμένη δι' ἑνὸς τῶν σημείων της καὶ ἑνὸς διανύσματος παραλλήλου πρὸς τὴν εὐθεῖαν (διευθύνον διάνυσμα) ή καὶ διὰ δύο διακεκριμένων σημείων της.

39. ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΙΣ ΕΥΘΕΙΑΣ.— Δοθέντος σταθεροῦ σημείου, Ο, τοῦ χώρου, τὸ δποίον καλεῖται ἀρχή, εἰς πᾶν σημείον Μ τοῦ χώρου δυνάμεθα νὰ ἀντιστοιχίσωμεν :

1ον : Τὸ ἐλεύθερον διάνυσμα \vec{u} , τοῦ δποίου εἰς ἀντιπρόσωπος είναι τὸ ἐφαρ-

μοστὸν διάνυσμα \vec{OM} ($\vec{OM} = \vec{u}$) (σχ. 29).



σχ. 29

2ον : Τὸ διάνυσμα \vec{OM} πρὸς τὸν ἔαυτόν του.

Ἀντιστρόφως : Εἰς πᾶν ἐλεύθερον διάνυσμα \vec{u} , ή εἰς πᾶν σημείον Μ, ἀντιστοιχεῖ ἐν ἐφαρμοστὸν διάνυσμα, \vec{OM} , καὶ ἐν μόνον. Οὕτως, δρίζομεν :

1ον : Μίαν ἀμφιμονοσήμαντον ἀπεικόνισιν τοῦ

Συνόλου τῶν σημείων τοῦ χώρου ἐπὶ τοῦ Συνόλου τῶν ἐλευθέρων διανυσμάτων του.

2ον : Μίαν ἀπεικόνισιν ἀμφιμονοσήμαντον τοῦ Συνόλου τῶν σημείων τοῦ χώρου ἐπὶ τοῦ Συνόλου τῶν ἐφαρμοστῶν διανυσμάτων, ἀρχῆς Ο.

Τὸ ἐφαρμοστὸν διάνυσμα \vec{OM} καλεῖται διανυσματικὴ ἀκτὶς τοῦ σημείου Μ.

Ἄλλαγὴ τῆς ἀρχῆς : Ἐστω O_1 μία νέα ἀρχὴ (σχ. 29), δρίζομένη, ὡς πρὸς τὸ Ο, ὑπὸ τῆς διανυσματικῆς της ἀκτίνος $\vec{O_1O}$. Ἡ νέα διανυσματικὴ ἀκτὶς $\vec{O_1M}$ τοῦ σημείου Μ συνδέεται μετὰ τῆς παλαιᾶς διανυσματικῆς ἀκτίνος \vec{OM} διὰ τῆς σχέσεως :

$$\vec{O_1M} = \vec{O_1O} + \vec{OM}$$

↔

$$\vec{O_1M} = \vec{OM} - \vec{OO_1}$$

Διανυσματική έξισωσις εύθειας (δ).—Παριστώμεν διά τοῦ Ο τὴν ἀρχὴν τῶν διανυσμάτων καὶ διακρίνομεν δύο περιπτώσεις :

Πρώτη περίπτωσις : 'Η εύθεια (δ) εἶναι ώρισμένη δι' ἐνὸς σημείου A καὶ τοῦ διευθύνοντος διανύσματος u.

'Η εύθεια (δ) εἶναι τὸ Σύνολον τῶν σημείων M, τοιούτων ὥστε τὰ διανύσματα \vec{AM} καὶ \vec{u} νὰ εἶναι συγγραμμικά. Δηλαδὴ τοιαῦτα ὥστε :

$$\vec{AM} = \lambda \vec{u} \quad (\lambda \in \mathbb{R})$$

$$\text{ἢ } \vec{OA} + \vec{AM} = \vec{OA} + \lambda \vec{u} \quad \text{ἢ}$$

$$\vec{OM} = \vec{OA} + \lambda \vec{u} \quad (1) \quad (\lambda \in \mathbb{R})$$

'Η έξισωσις (1) καλεῖται διανυσματικὴ παραμετρικὴ έξισωσις τῆς εὐθείας (δ).

Ἐάν τὸ σημεῖον A συμπίπτῃ μὲ τὸ O, ἡ (1) γίνεται :

$$\vec{OM} = \lambda \vec{u} \quad (1')$$

Δευτέρα περίπτωσις.—Εύθεια δριζομένη ὑπὸ δύο σημείων : 'Η εύθεια (δ) εἶναι ώρισμένη διὰ δύο σημείων, A καὶ B (σχ. 30).

Τὸ διάνυσμα $\vec{AB} = \vec{OB} - \vec{OA}$ εἶναι τὸ διευθύνον διάνυσμα τῆς (δ). "Αρα ἔχει διανυσματικὴν έξισωσιν :

$$\vec{OM} = \vec{OA} + \lambda (\vec{OB} - \vec{OA}) \quad \text{ἢ} \quad \vec{OM} = (1 - \lambda) \vec{OA} + \lambda \vec{OB} \quad (2) \quad (\lambda \in \mathbb{R})$$

'Η (2) δύναται νὰ γραφῇ ὑπὸ συμμετρικωτέραν μορφήν :

$$(2') \quad \vec{OM} = \alpha \vec{OA} + \beta \vec{OB}, \quad \text{μὲ } \alpha + \beta = 1.$$

"Εκ τοῦ δευτέρου μέλους τῆς (2), ἐπειδὴ εἶναι γραμμικὴ συνάρτησις τοῦ λ προκύπτει ἀμέσως ὅτι τὸ Σύνολον τῶν σημείων M τοῦ τμήματος AB ἀντιστοιχεῖ εἰς τιμᾶς τοῦ λ, τοιαύτας ὥστε : $0 \leqslant \lambda \leqslant 1$. Τοῦτο ἐκφράζομεν καὶ ὡς έξης :

$$M \in AB \iff \lambda \in [0, 1].$$

40. ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΑΙ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΕΥΘΕΙΑΣ.—A' 'Η εύθεια (δ) δριζεται ἀπὸ τὸ σημεῖον $M_0(x_0, y_0)$ καὶ τοῦ διευθύνοντος διανύσματος u (α, β) .


"Ἐν σημείον M(x, y) τοῦ ἐπιπέδου θὰ κείται ἐπὶ τῆς (δ), ὅταν, καὶ μόνον ὅταν, ἔχωμεν

$$\vec{M_0M} = \lambda \vec{u}, \quad \text{δηλαδὴ :}$$

$$(x - x_0) \vec{i} + (y - y_0) \vec{j} = \lambda (\alpha \vec{i} + \beta \vec{j}),$$

ἴξ οὖ :

$$(I) \quad \begin{cases} x = x_0 + \alpha \lambda \\ y = y_0 + \beta \lambda \end{cases} \quad (\lambda \in \mathbb{R})$$




Σχ. 31

Αἱ ἔξισώσεις (I) καλοῦνται παραμετρικαὶ ἔξισώσεις τῆς εὐθείας (δ).


Μερικαὶ περιπτώσεις : 'Εάν $\alpha = 0$, τότε $x = x_0$, καὶ ή εὐθεία (δ) εἶναι παράλληλος πρὸς τὸν ἄξονα Oy (σχ. 32α).

'Εάν $\beta = 0$, τότε $y = y_0$ καὶ ή εὐθεία (δ) εἶναι παράλληλος πρὸς τὸν ἄξονα Ox (σχ. 32).


Οἱ ἀριθμοὶ α καὶ β καθορίζουν τὴν διεύθυνσιν τῆς εὐθείας καὶ τὸ \vec{u} (α, β) εἶναι τὸ ἑλεύθερον διάνυσμα.



Σχ. 32



Σχ. 32α



Σχ. 32β

Παράδειγμα : 'Η εὐθεία (δ) ἡ διερχομένη διὰ τοῦ σημείου $M_0(-4, +7)$ καὶ δριζόμένη ὑπὸ τοῦ διευθύνοντος διάνυσματος $\vec{u}(-2, 3)$ ἔχει παραμετρικὰς ἔξισώσεις :

$$x = -4 - 2\lambda \quad \text{καὶ} \quad y = 7 + 3\lambda.$$

B') 'Η εὐθεία (δ) δρίζεται ἀπὸ δύο σημείων $A(x_0, y_0)$ καὶ $B(x_1, y_1)$.

Τὸ σημεῖον $M(x, y)$, (σχ. 32β) θὰ κείται ἐπὶ τῆς εὐθείας (δ) τῶν A , B ὅταν, καὶ μόνον ὅταν :

$$\vec{MA} + \lambda \vec{MB} = 0, \quad \text{ἢ} \quad \vec{OA} - \vec{OM} + \lambda (\vec{OB} - \vec{OM}) = 0,$$

ἔξ οῦ :

$$\vec{OM} = \frac{\vec{OA} + \lambda \vec{OB}}{1 + \lambda}$$

'Η σχέσις αὕτη ισοδυναμεῖ μὲ τὸ Σύνολον τῶν δύο ἔξισώσεων :

$$(II) \quad \begin{cases} x = \frac{x_0 + \lambda x_1}{1 + \lambda} \\ y = \frac{y_0 + \lambda y_1}{1 + \lambda} \end{cases} \quad \text{μὲ} \quad (\lambda \neq -1).$$

Παράδειγμα : 'Η εὐθεία (δ) ἡ διερχομένη διὰ τῶν σημείων $A(-2, 5)$ καὶ $B(3, -10)$ ἔχει παραμετρικὰς ἔξισώσεις :

$$x = \frac{-2 + 3\lambda}{1 + \lambda} \quad \text{καὶ} \quad y = \frac{5 - 10\lambda}{1 + \lambda}$$

Παρατήρησις : Δυνάμεθα νὰ θεωρήσωμεν ὅτι τὸ διάνυσμα :

$$\vec{u} = \vec{AB}(x_1 - x_0, y_1 - y_0)$$

εἶναι τὸ διευθῦνον διάνυσμα τῆς (δ) καὶ νὰ χρησιμοποιήσωμεν τὴν παραμετρι-

κήν παράστασιν τῆς εύθείας (δ), διερχομένης διὰ τοῦ $A(x_0, y_0)$ καὶ διευθύνσεως \vec{u} . Λαμβάνομεν τότε :

$$(III) \quad \begin{array}{|c|c|} \hline x = x_0 + \mu(x_1 - x_0) & y = y_0 + \mu(y_1 - y_0) \\ \hline \end{array}$$

ἔνθα μ μεταβλητὴ παράμετρος. Εἰς τὴν περίπτωσιν ταύτην δὲν θὰ ἔχωμεν

$$\frac{\overline{MA}}{\overline{MB}} = -\lambda, \quad \text{ἀλλὰ} \quad \frac{\overline{AM}}{\overline{AB}} = \mu.$$

Ἐὰν εἰς τοὺς τύπους (III) τὸ μ μεταβάλλεται ἀπὸ $-\infty$ ἕως $+\infty$, τὸ σημεῖον $M(x, y)$ διαγράφει διλόκληρον τὴν εύθειαν AB .

Ἄλλ' ὅταν τὸ μ μεταβάλλεται ἀπὸ 0 ἕως 1, τότε τὸ M γράφει μόνον τὸ τμῆμα AB .

ΚΑΡΤΕΣΙΑΝΗ ΕΞΙΣΩΣΙΣ ΤΗΣ ΕΥΘΕΙΑΣ

41. ΘΕΩΡΗΜΑ.—Σύνολον σημείων ἀποτελεῖ εύθειαν ὅταν, καὶ μόνον ὅταν, αἱ συντεταγμέναι (x, y) τῶν σημείων τούτων ἴκανοποιοῦν τὴν ἔξιστωσιν : $Ax + By + \Gamma = 0$, ἔνθα οἱ συντελεσταὶ A καὶ B δὲν εἶναι συγχρόνως μηδὲν (A, B, Γ ἀνεξάρτητοι τῶν x, y).

Πράγματι, ἂν μεταξὺ τῶν ἔξισώσεων (I) τῆς (§ 40, A).

$$\left. \begin{array}{l} x = x_0 + \alpha \lambda \\ y = y_0 + \beta \lambda \end{array} \right\} \quad \begin{array}{l} \text{ἀπαλείψωμεν τὸν } \lambda, \text{ εὑρίσκομεν :} \\ \beta(x - x_0) - \alpha(y - y_0) = 0 \end{array} \quad (1)$$

$$\beta x - \alpha y + \alpha y_0 - \beta x_0 = 0.$$

Ἄν δὲ τεθῇ : $A = \beta$, $B = -\alpha$, $\Gamma = \alpha y_0 - \beta x_0$, λαμβάνομεν :

$$Ax + By + \Gamma = 0. \quad (2)$$

Άντιστρόφως : Ἐάς ὑποθέσωμεν ὅτι $A \neq 0$, τὸ δόποιον εἶναι δυνατόν, ἀφοῦ οἱ A καὶ B δὲν δύνανται νὰ εἶναι συγχρόνως μηδέν. Ἐὰν τεθῇ $y = k$, τότε ἐκ τῆς (2) λαμβάνομεν $x = -\frac{Bk + \Gamma}{A}$.

Ἄρα, τὸ σημεῖον $\left(-\frac{Bk + \Gamma}{A}, k \right)$ ἀνήκει εἰς τὸ Σύνολον.

Ἔστω λοιπὸν $P(x_0, y_0)$ ἐν σημεῖον τοῦ Συνόλου : Ἀρα :

$$Ax_0 + By_0 + \Gamma = 0. \quad (3)$$


Ἀφαιροῦντες κατὰ μέλη τὰς (2) καὶ (3), λαμβάνομεν :

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) = 0. \quad (4)$$

Ἡ (4), συγκρινομένη μὲ τὴν (1), ἔκφράζει ὅτι τὰ σημεῖα $M(x, y)$ κείνται ἐπὶ τῆς εύθειας, τῆς διερχομένης διὰ τοῦ P , καὶ τῆς δόποις ἐν διευθύνον διάνυσμα εἶναι τὸ $\vec{u} (-B, A)$.

Ἡ ἔξιστωσις (2) καλεῖται **γραμμικὴ** καὶ εἶναι πρώτου βαθμοῦ ὡς πρὸς x καὶ y .




Παρατηρήσεις*: Άφοῦ ή εύθεια (δ), έξισώσεως $Ax + By + \Gamma = 0$, δέχεται ως διευθύνον διάνυσμα $\overrightarrow{OP_1}$, τὸ ἔχον συντεταγμένα προβολάς $-B$ (ἐπὶ τοῦ δξονος τῶν τετμημένων) καὶ A (ἐπὶ τοῦ δξονος τῶν τεταγμένων), (σχ. 33), ἐπειταὶ ὅτι:



α') Πᾶσα εὐθεῖα, έξισώσεως $Ax + By + \Gamma = 0$ είναι παράλληλος πρὸς τὸν δξονα Ox ὅταν, καὶ μόνον ὅταν, $A = 0$ (σχ. 33α), ὅποτε κατ' ἀνάγκην $B \neq 0$, διότι τὰ A, B δὲν δύνανται νὰ είναι συγχρόνως μηδέν. 'Η (δ) τέμνει τὸν δξονα Oy εἰς τὸ σημεῖον $E\left(0, -\frac{\Gamma}{B}\right)$.

β) Πᾶσα εὐθεῖα, έξισώσεως $Ax + By + \Gamma = 0$, είναι παράλληλος πρὸς τὸν δξονα Oy ὅταν, καὶ μόνον ὅταν, $B = 0$ (σχ. 34), καὶ ή ὅποια τέμνει τὸν δξονα Ox εἰς τὸ σημεῖον $\Delta\left(-\frac{\Gamma}{A}, 0\right)$.

γ') Πᾶσα εὐθεῖα, έξισώσεως $Ax + By + \Gamma = 0$ διέρχεται διὰ τῆς ἀρχῆς O τῶν ἀξόνων ὅταν, καὶ μόνον ὅταν, $\Gamma = 0$, (σχ. 35), διότι αἱ συντεταγμέναι ($0, 0$) τοῦ O ἴκανοποιοῦν τὴν $Ax + By + \Gamma = 0$, ὅπερ ἰσοδυναμεῖ μὲν $\Gamma = 0$.



Εἰς τὸ (σχ. 33) ἔχομεν τὴν εὐθεῖαν (δ) έξισώσεως $Ax + By + \Gamma = 0$, ή ὅποια τέμνει τοὺς δξονας εἰς τὰ σημεῖα $\Delta\left(-\frac{\Gamma}{A}, 0\right)$ καὶ $E\left(0, -\frac{\Gamma}{B}\right)$, τὰ ὅποια προκύπτουν, ὅταν εἰς τὴν έξισώσιν $Ax + By + \Gamma = 0$ θέσωμεν $y = 0$, $x = 0$ ἀντιστοίχως καὶ ἔξ ἀρχῆς ὑποτεθῆ $A \cdot B \neq 0$.

'Η τετμημένη $\left(-\frac{\Gamma}{A}\right)$ τοῦ Δ καλεῖται τετμημένη ἐπὶ τὴν ἀρχὴν τῆς εὐθείας (δ), καὶ ή τεταγμένη $\left(-\frac{\Gamma}{B}\right)$ τοῦ E καλεῖται τεταγμένη ἐπὶ τὴν ἀρχὴν τῆς εὐθείας (δ). 'Αμφότεραι δὲ συντεταγμέναι ἐπὶ τὴν ἀρχὴν τῆς εὐθείας ταύτης.

Παράδειγμα 1ον: 'Η εξίσωσης $2x + 10 = 0$ παριστάξει εύθειαν παράλληλην πρός τὸν άξονα Οy μὲ τετμημένην ἐπὶ τὴν ἀρχὴν $x = -\frac{10}{2} = -5$.

Παράδειγμα 2ον: 'Η εξίσωσης $4y - 24 = 0$ παριστάξει εύθειαν παράλληλον πρός τὸν άξονα Οx μὲ τεταγμένην ἐπὶ τὴν ἀρχὴν $y = \frac{24}{4} = 6$.

Παράδειγμα 3ον: 'Η εξίσωσης $2x + 3y = 0$ παριστάξει εύθειαν διερχομένην διὰ τῆς ἀρχῆς Ο τῶν άξόνων, καθόσον $2 \cdot 0 + 3 \cdot 0 = 0 \quad \text{ή} \quad 0 = 0$.

Παράδειγμα 4ον: 'Η εξίσωσης $4x + 3y - 12 = 0$ παριστάξει εύθειαν παράλληλον πρός τὸ διάνυσμα $\vec{u} (-3, 4)$ καὶ ἔχουσαν συντεταγμένας ἐπὶ τὴν ἀρχὴν

$$x = -\frac{\Gamma}{A} = \frac{12}{4} = 3 \quad \text{καὶ} \quad y = -\frac{\Gamma}{B} = \frac{12}{3} = 4.$$

'Εκ τῶν ὀνωτέρω λεχθέντων προκύπτει δτι: Διὰ νὰ κατασκευάσωμεν μίαν εύθειαν (δ), εξίσωσεως $Ax + By + \Gamma = 0$, ἀρκεῖ νὰ εὑρώμεν τὰς συντεταγμένας ἐπὶ τὴν ἀρχὴν αὐτῆς $x = -\frac{\Gamma}{A}$ καὶ $y = -\frac{\Gamma}{B}$ καὶ νὰ χαράξωμεν τὴν εύθειαν, τὴν διερχομένην διὰ τῶν σημείων τούτων.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

44. Νὰ σχηματισθῇ ἡ εξίσωσης τῆς εύθειας, ἡ δποία διέρχεται ἀπὸ τὸ σημείον M καὶ παραλλήλου πρός τὸ διάνυσμα \vec{V} , ἄν :

- | | | | |
|---------------|-----------------|----------------|------------------|
| 1) $M(-2, 2)$ | $\vec{V}(2, 3)$ | 5) $M(0, -5)$ | $\vec{V}(0, 1)$ |
| 2) $M(-2, 3)$ | $\vec{V}(0, 1)$ | 6) $M(-3, 0)$ | $\vec{V}(0, 2)$ |
| 3) $M(4, 0)$ | $\vec{V}(2, 0)$ | 7) $M(-4, -5)$ | $\vec{V}(-1, 1)$ |
| 4) $M(0, 0)$ | $\vec{V}(2, 5)$ | 8) $M(1, 2)$ | $\vec{V}(2, -3)$ |

καὶ ἀκολούθως νὰ κατασκευασθοῦν αἱ εύθειαι εἰς ἑκάστην περίπτωσιν.

45. Νὰ κατασκευασθοῦν τὰ διευθύνοντα διανύσματα τῶν εύθειῶν :

- | | | |
|-----------------|----------------------|-------------------|
| 1) $x + 2y = 1$ | 3) $4x - 3y + 8 = 0$ | 5) $5x + 10y = 0$ |
| 2) $2x - y = 3$ | 4) $2x + 7y - 5 = 0$ | 6) $2x - 8y = 0$ |

46. Νὰ εύρεθοῦν αἱ συντεταγμέναι ἐπὶ τὴν ἀρχὴν τῶν εύθειῶν :

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1) $3x - 4y - 12 = 0$ | 3) $2x - 6y = -3$ |
| 2) $3x - y + 5 = 0$ | 4) $4x + 6y + 3 = 0$ |

42. ΑΝΗΓΜΕΝΗ ΕΞΙΣΩΣΙΣ ΕΥΘΕΙΑΣ.—Θεωροῦμεν τὴν εύθειαν (δ), εξίσωσεως $Ax + By + \Gamma = 0$, μὴ παράλληλον πρός τὸν άξονα Οy ($B \neq 0$).


'Η δοθεῖσα εξίσωσης γράφεται :

$$\psi = -\frac{A}{B}x - \frac{\Gamma}{B}$$

καὶ ἀν τεθῇ $\lambda = -\frac{A}{B}$, $\beta = -\frac{\Gamma}{B}$, τότε : $y = \lambda x + \beta$ (1)

‘Η έξισωσης (1) καλείται άνηγμένη μορφή της έξισώσεως της εύθειας (δ).

‘Η (δ) τέμνει τὸν ἄξονα Oy εἰς τὸ σημεῖον $\Delta(0, \beta)$ καὶ εἶναι παράλληλος



πρὸς τὸ διάνυσμα $\overrightarrow{OP}(1, \lambda)$, καθόσον ἡ (1) γράφεται

$$\frac{x}{1} = \frac{\psi - \beta}{\lambda}.$$

‘Εξ δρισμοῦ, δ συντελεστὴς β καλεῖται τεταγμένη ἐπὶ τὴν ἀρχὴν καὶ δ συντελεστὴς λ εἶναι ὁ συντελεστὴς* διευθύνσεως τῆς (δ).

Νέα έκφρασης τοῦ συντελεστοῦ διευθύνσεως εύθειας (δ).— ‘Εστωσαν δύο σημεῖα $A_1(x_1, y_1)$ καὶ $A_2(x_2, y_2)$, μὲ $(x_2 \neq x_1)$, τῆς εύθειας (δ), έξισώσεως $y = \lambda x + \beta$. Θὰ εἶναι :

$$\begin{cases} y_1 = \lambda x_1 + \beta \\ y_2 = \lambda x_2 + \beta \end{cases} \implies y_2 - y_1 = \lambda(x_2 - x_1) \implies \lambda = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

43. ΠΡΟΒΛΗΜΑ.— Νὰ εὑρεθῇ ἡ έξισωσης τῆς εύθειας, ἡ ὅποια διέρχεται ἀπὸ τὸ σημεῖον $M_1(x_1, y_1)$ καὶ ἔχει συντελεστὴν διευθύνσεως δοθέντα ἀριθμὸν ($\lambda \in \mathbb{R}$).

‘Εάν $M(x, y)$ εἶναι τυχὸν σημεῖον τῆς ζητουμένης εύθειας, τότε τὸ διάνυσμα $\overrightarrow{M_1M}(x - x_1, y - y_1)$ θὰ ἔχῃ συντελεστὴν διευθύνσεως

$$\lambda = \frac{y - y_1}{x - x_1}, \quad \text{ἢξ οὕ:} \quad y - y_1 = \lambda(x - x_1) \quad (1)$$

‘Η έξισωσης (1) εἶναι ἡ ζητουμένη.

‘Εάν τὸ M_1 κεῖται ἐπὶ τοῦ ἄξονος Oy, τότε $x_1 = 0$ καὶ $y_1 = \beta$, καὶ ἡ (1) λαμβάνει τὴν μορφήν : $y = \lambda x + \beta$.

Μεταβαλλομένου τοῦ λ , ἡ (1) δρίζει τὴν οἰκογένειαν τῶν εὐθειῶν, τῶν διερχομένων διὰ τοῦ $M_1(x_1, y_1)$, έξαιρουμένης τῆς εύθειας τῆς παραλλήλου πρὸς τὸν ἄξονα Oy.

Παράδειγμα: ‘Η έξισωσης τῆς εύθειας (δ) τῆς διερχομένης διὰ τοῦ σημείου $M(3, 5)$ καὶ ἔχούσης συντελεστὴν διευθύνσεως $\lambda = -\frac{3}{4}$ εἶναι :

$$y - 5 = -\frac{3}{4}(x - 3) \iff 3x + 4y - 29 = 0.$$

* Καλούμεν συντελεστὴν διευθύνσεως εύθειας τὸν συντελεστὴν διευθύνσεως διανύσματος (μὴ μηδενικοῦ), παραλλήλου πρὸς τὴν εὐθειὰν.

Συντελεστὴς διευθύνσεως ἡ κλίσις ἐνὸς μὴ μηδενικοῦ διανύσματος $\overrightarrow{u}(a, b)$ καλεῖται τὸ πηλίκον $\frac{b}{a} = \lambda$, διόν $a \neq 0$.

44. ΕΞΙΣΩΣΙΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑ ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΩΝ $A_1(x_1, y_1)$ ΚΑΙ $A_2(x_2, y_2)$. — Είσ την (\S 40, B) εύρομεν ότι αἱ παραμετρικαὶ ἔξισώσεις τῆς εὐθείας A_1A_2 , ἢν $(x_2 \neq x_1)$, είναι :

$$\left. \begin{array}{l} x = \frac{x_1 + \lambda x_2}{1 + \lambda} \\ y = \frac{y_1 + \lambda y_2}{1 + \lambda} \end{array} \right\} \implies \left. \begin{array}{l} x - x_1 = \lambda(x_2 - x) \\ y - y_1 = \lambda(y_2 - y) \end{array} \right\} \implies \frac{x - x_1}{y - y_1} = \frac{x_2 - x}{y_2 - y}$$

ἡ ὁποία, βάσει τῶν ἴδιοτήτων τῶν ἀναλογιῶν, γράφεται :

$$\frac{x - x_1}{y - y_1} = \frac{x_2 - x_1}{y_2 - y_1} \quad (1)$$

καὶ ὑπὸ μορφὴν ὄριζούσης : $\begin{vmatrix} x & y & 1 \\ x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \end{vmatrix} = 0.$ (2)

Παράδειγμα : Ἡ ἔξισώσις τῆς εὐθείας (δ), ἡ ὁποία διέρχεται ἀπό τὰ σημεῖα $A_1(3, -2)$ καὶ $A_2(0, -1)$ είναι :

$$\begin{vmatrix} x & y & 1 \\ 3 & -2 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{vmatrix} = 0 \implies x + 3y + 3 = 0.$$

45. Η ΕΥΘΕΙΑ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ $A_1(a, 0)$, $A_2(0, β)$ ΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ Οχ ΚΑΙ Ογ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΣ. — Ἀν εἰς τὴν ἔξισώσιν (1) τῆς προηγουμένης παραγράφου θέσωμεν $x_1 = a$, $y_1 = 0$, $x_2 = 0$, $y_2 = \beta$, λαμβάνομεν :

$$\frac{x - a}{y - 0} = \frac{0 - a}{\beta - 0} \iff \beta x + a y = a \beta. \quad (1)$$

Ἐπειδὴ είναι δυνατόν νὰ ὑποθέσωμεν $a\beta \neq 0$ (διότι ἄλλως τὰ σημεῖα κείνται ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ ἀξονος, καὶ ἡ ἔξισώσις τῆς A_1A_2 θὰ ἦτο ἡ $x = 0$ ἢ $y = 0$), ἡ (1) γράφεται :

$$\boxed{\frac{x}{a} + \frac{y}{\beta} = 1} \quad (1')$$

Παράδειγμα : Ἡ εὐθεία ἡ ὁποία διέρχεται διὰ τῶν σημείων $A_1(5, 0)$ καὶ $A_2(0, 3)$ ἔχει ἔξισώσιν :

$$\frac{x}{5} + \frac{y}{3} = 1 \iff 3x + 5y - 15 = 0.$$

46. ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΙΑΣ ΔΥΟ ΕΥΘΕΙΩΝ (δ_1) ΚΑΙ (δ_2).

Ἐστωσαν (δ_1) καὶ (δ_2) δύο εὐθεῖαι, ὡν αἱ Καρτεσιαὶ ἔξισώσεις, εἰς τὸ αὐτὸ σύστημα ἀξόνων, είναι ἀντιστοίχως :

$$(1) \quad \left\{ \begin{array}{l} A_1x + B_1y + \Gamma_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + \Gamma_2 = 0 \end{array} \right. \quad \begin{array}{l} \text{μὲ } |A_1| + |B_1| > 0 \\ \text{μὲ } |A_2| + |B_2| > 0 \end{array}$$

Ἡ ἔξισώσις (1) παριστᾶ εὐθεῖαν παράλληλον πρὸς τὸ διάνυσμα $\vec{u}(-B_1, A_1)$

καὶ ἡ (2) παριστᾶ εύθειαν παράλληλον πρὸς τὸ διάνυσμα $\vec{u}(-B_2, A_2)$. "Ινα αἱ εὐθεῖαι (1) καὶ (2) εἰναι παράλληλοι, πρέπει καὶ ἀρκεῖ τὰ \vec{u} καὶ \vec{v} νὰ εἰναι γραμμικῶς ἔξηρτημένα. "Αρα (§ 15), πρέπει καὶ ἀρκεῖ :

$$(-B_1) \cdot A_2 - (A_1) \cdot (-B_2) = 0 \iff A_1 \cdot B_2 - A_2 \cdot B_1 = 0 \quad (3)$$

"Ωστε : "Ινα δύο εὐθεῖαι, ἔξισώσεων $A_1x + B_1y + \Gamma_1 = 0$ καὶ $A_2x + B_2y + \Gamma_2 = 0$ εἰναι παράλληλοι (ύπὸ τὴν εύρειαν σημασίαν), πρέπει καὶ ἀρκεῖ νὰ ἰσχύῃ ἡ ισότης (3).

$$\text{'Η (3) γράφεται καὶ ύπὸ τὴν μορφήν : } \frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2}. \quad (3')$$

Παρατήρησις : "Η συνθήκη παραλληλίας δύο εὐθειῶν, τῶν δποίων αἱ Καρτεσιαναὶ ἔξισώσεις εἰς τὸ αὐτὸ σύστημα ἀξόνων εἰναι :

$$\begin{array}{ll} A_1x + B_1y + \Gamma_1 = 0, & |A_1| + |B_1| > 0 \\ \text{καὶ} & \\ A_2x + B_2y + \Gamma_2 = 0, & |A_2| + |B_2| > 0, \end{array}$$

δύναται νὰ γραφῇ :

$$\left| \begin{array}{cc} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{array} \right| = 0, \text{ ἀλλὰ μία τούλαχιστον τῶν} \left| \begin{array}{cc} A_1 & \Gamma_1 \\ A_2 & \Gamma_2 \end{array} \right|, \left| \begin{array}{cc} B_1 & \Gamma_1 \\ B_2 & \Gamma_2 \end{array} \right|$$

νὰ εἰναι διάφορος τοῦ μηδενός.

Μερικὴ περίπτωσις : "Εάν αἱ εὐθεῖαι (δ_1) καὶ (δ_2) ἔχουν ἔξισώσεις ἀντιστοίχως :

$$\begin{cases} y = \lambda_1x + \beta_1 \\ y = \lambda_2x + \beta_2 \end{cases} \text{ ἡ συνθήκη (3) γίνεται : } \lambda_1 - \lambda_2 = 0 \implies \boxed{\lambda_1 = \lambda_2}$$

ἡ δποία ἔκφράζει δτι :

"Ινα δύο εὐθεῖαι, μὴ παράλληλοι πρὸς τὸν ἄξονα Oy, εἰναι παράλληλοι, πρέπει καὶ ἀρκεῖ οἱ συντελεσταὶ διευθύνσεως αὐτῶν νὰ εἰναι ίσοι.

Παράδειγμα 1ον : Αἱ εὐθεῖαι (δ_1) καὶ (δ_2), ἔξισώσεων $3x - 4y + 1 = 0$ καὶ $9x - 12y + 7 = 0$ ἀντιστοίχως, εἰναι παράλληλοι, διότι :

$$A_1B_2 - A_2B_1 = 3(-12) - (-4). \quad 9 = -36 + 36 = 0.$$

Παράδειγμα 2ον: Αἱ ἔξισώσεις $y = 5x - 3$ καὶ $y = 5x + 7$ παριστάνουν εὐθείας παραλλήλους καὶ πρὸς τὴν εὐθεῖαν, ἔξισώσεως $y = 5x$, διερχομένην διὰ τῆς ἀρχῆς $O(0,0)$.

47. ΕΥΘΕΙΑ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΗ ΔΙΑ ΔΟΘΕΝΤΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ $M_0(x_0, y_0)$ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ ΠΡΟΣ ΔΟΘΕΙΣΑΝ ΕΥΘΕΙΑΝ.—"Εστω (δ) εὐθεία, ἔξισώσεως $Ax + By + \Gamma = 0$ καὶ (δ_1) εὐθεία διερχομένη διὰ τοῦ $M_0(x_0, y_0)$ καὶ παράλληλος πρὸς τὴν (δ).

"Ἐπειδὴ ἡ (δ) εἰναι παράλληλος πρὸς τὸ διάνυσμα $\vec{u}(-B, A)$, ἐὰν $M(x, y)$

είναι τυχόν σημείον τῆς (δ_1), τὸ διάνυσμα $\vec{M_0M}(x-x_0, y-y_0)$ θὰ είναι παράλληλον πρὸς τὸ \vec{u} . "Αρα

$$\begin{vmatrix} x - x_0 & y - y_0 \\ -B & A \end{vmatrix} = 0 \iff A(x - x_0) + B(y - y_0) = 0$$

Παράδειγμα : 'Η εύθεια (δ) ἡ διερχομένη διὰ τοῦ σημείου $M_0(3, -2)$ καὶ παράλληλος πρὸς τὴν εὐθείαν (δ_1), ἔξισώσεως $2x - 3y - 4 = 0$, ἔχει ἔξισώσιν :

$$2(x - 3) + (-3)(y + 2) = 0 \iff 2x - 3y - 12 = 0.$$

Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ

47. Νὰ μορφωθῇ ἡ ἔξισώσις τῆς εὐθείας, ἡ ὅποια διέρχεται διὰ τοῦ σημείου $(3, -4)$ καὶ ἔχει συντελεστήν διευθύνσεως :

$$\begin{array}{lll} 1) \quad \lambda = -2 & 3) \quad \lambda = -\frac{3}{4} & 5) \quad \lambda = 4,25 \\ 2) \quad \lambda = 5 & 4) \quad \lambda = \frac{5}{8} & 6) \quad \lambda = -\frac{\sqrt{2}}{2}. \end{array}$$

48. Νὰ σχηματισθῇ ἡ ἔξισώσις τῆς εὐθείας, τῆς διερχομένης διὰ τῶν σημείων A_1, A_2 , εἰς τὰς ἀκολούθους περιπτώσεις :

$$\begin{array}{lll} 1) \quad A_1(1,2), \quad A_2(-2,3), & 5) \quad A_1(-3,2), \quad A_2(5,2), \\ 2) \quad A_1(-1,-2), \quad A_2(-3,-6), & 6) \quad A_1(0,0), \quad A_2(0,1), \\ 3) \quad A_1(3,0), \quad A_2(0,4), & 7) \quad A_1(-4,5), \quad A_2(2,1), \\ 4) \quad A_1(4,5), \quad A_2(4,7), & 8) \quad A_1(-1,2), \quad A_2(3,2). \end{array}$$

49. Νὰ εύρεθοιν αἱ ἔξισώσεις τῶν πλευρῶν τοῦ τριγώνου, τοῦ ὅποιου κορυφαὶ είναι τὰ σημεῖα $(-3,2), (3,-2)$ καὶ $(0,1)$.

50. Τοῦ προτογονιμένου τριγώνου νὰ εύρεθοιν αἱ ἔξισώσεις τῶν διαμέσων του.

51. Νὰ εύρεθοιν αἱ ἔξισώσεις τῶν πλευρῶν τοῦ τετραπλεύρου, δῆπερ ἔχει κορυφὰς τὰ σημεῖα $(10,8), (-3,9), (-4,-4), (9,-5)$.

52. Νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι τὰ σημεῖα $(-3,-7), (0,-2), (6,8)$ κείνται ἐπ' εὐθείας.

53. Νὰ δρισθῇ ὁ x , εἰς τρόπον ὥστε τὰ σημεῖα $(x,-3), (1,1)$ καὶ $(-4,3)$ νὰ κείνται ἐπ' εὐθείας.

54. Νὰ εύρεθῃ ἡ ἔξισώσις τῆς εὐθείας, τῆς ὅποιας αἱ συντεταγμέναι ἐπὶ τὴν ἀρχὴν είναι :

$$\begin{array}{lll} 1) \quad 4 \text{ καὶ } 5 & 3) \quad -5 \text{ καὶ } -3 \\ 2) \quad -6 \text{ καὶ } 8 & 4) \quad 7 \text{ καὶ } -2. \end{array}$$

55. Ποιαὶ αἱ συντεταγμέναι ἐπὶ τὴν ἀρχὴν ἑκάστης τῶν εὐθειῶν :

$$\begin{array}{lll} 1) \quad 2x + 5y - 10 = 0 & 3) \quad 5x - 4y - 20 = 0 \\ 2) \quad 3x - 4y + 24 = 0 & 4) \quad x - 3y + 9 = 0. \end{array}$$

48. **ΕΥΘΕΙΑΙ ΣΥΜΠΙΠΤΟΥΣΑΙ.** — "Εστωσαν αἱ εὐθεῖαι (δ_1) καὶ (δ_2), ἔξισώσεων ἀντιστοίχως :

$$A_1x + B_1y + \Gamma_1 = 0 \quad \text{καὶ} \quad A_2x + B_2y + \Gamma_2 = 0,$$

μὴ παράλληλοι πρὸς τὸν ἄξονα Oy .

Οι συντελεσταί διευθύνσεως αὐτῶν είναι άντιστοίχως $\lambda_1 = -\frac{A_1}{B_1}$ και $\lambda_2 = -\frac{A_2}{B_2}$. Αἱ δὲ συντεταγμέναι ἐπὶ τὴν ἀρχὴν είναι άντιστοίχως:

$$\beta_1 = -\frac{\Gamma_1}{B_1} \quad \text{καὶ} \quad \beta_2 = -\frac{\Gamma_2}{B_2}.$$

Αφοῦ αἱ (δ_1) καὶ (δ_2) συμπίπτουν, ἐπεται ὅτι :

$$\lambda = \lambda_2 \quad \text{καὶ} \quad \beta_1 = \beta_2 \quad \text{ἢ} \quad -\frac{A_1}{B_1} = -\frac{A_2}{B_2} \quad \text{καὶ} \quad -\frac{\Gamma_1}{B_1} = -\frac{\Gamma_2}{B_2},$$

ἔξι ων λαμβάνομεν: $\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{\Gamma_1}{\Gamma_2}$ (1)

Παρατήρησις: Η συνθήκη (1) δύναται νὰ γραφῇ καὶ ὡς ἔξῆς :

$$\begin{vmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A_1 & \Gamma_1 \\ A_2 & \Gamma_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} B_1 & \Gamma_1 \\ B_2 & \Gamma_2 \end{vmatrix} = 0.$$

Τὸ ἀντίστροφον ἀποδεικνύεται εὐκόλως. "Ωστε :

"Ινα δὸν εὐθεῖα συμπίπτουν, πρέπει καὶ ἀρκεῖ οἱ διμόνυμοι συντελεσταὶ τῶν ἔξισώσεων αὐτῶν νὰ εἰναι ἀνάλογοι.

Παράδειγμα 1ον: Αἱ εὐθεῖαι (δ_1) καὶ (δ_2) , ἔξισώσεων ἀντιστοίχως $3x + 5y - 12 = 0$ καὶ $6x + 10y - 24 = 0$ συμπίπτουν, καθόσον εἰναι :

$$\frac{3}{6} = \frac{5}{10} = \frac{-12}{-24}.$$

Παράδειγμα 2ον: Νῷ ὁρισθῶν οἱ α καὶ β , ίνα αἱ ἔξισώσεις $2\alpha x + 2y - 5 = 0$ καὶ $4x - 3y + 7\beta = 0$ παριστάνουν τὴν αὐτὴν εὐθεῖαν. Πρὸς τοῦτο πρέπει καὶ ἀρκεῖ :

$$\frac{2\alpha}{4} = \frac{2}{-3} = \frac{-5}{7\beta} \implies \frac{2\alpha}{4} = -\frac{2}{3} \quad \text{καὶ} \quad \frac{-2}{3} = \frac{-5}{7\beta}$$

ἔξι δὲν προκύπτει : $\alpha = -\frac{4}{3}$ καὶ $\beta = \frac{15}{14}$.

49. EYTHESIAI TEMNOMENAI.— "Εστωσαν αἱ εὐθεῖαι (δ_1) καὶ (δ_2) , ἔξισώσεων ἀντιστοίχως :

$$\left\{ \begin{array}{l} A_1x + B_1y + \Gamma_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + \Gamma_2 = 0 \end{array} \right. \quad (1)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} A_1x + B_1y + \Gamma_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + \Gamma_2 = 0 \end{array} \right. \quad (2)$$

Ἐὰν αὗται δὲν εἰναι παράλληλοι, θὰ ἔχουν διαφόρους συντελεστὰς διεύθυνσεως. Δηλαδή :

$$-\frac{A_1}{B_1} \neq -\frac{A_2}{B_2} \iff \boxed{A_1B_2 - A_2B_1 \neq 0}$$

καὶ θὰ τέμνωνται εἰς σημεῖον $M(x,y)$, τοῦ δόποιου αἱ συντεταγμέναι θὰ ἴκανοντοιοῦν ἕκαστην τῶν ἔξισώσεων (1), (2).

"Αρα τὸ διατεταγμένον ζεῦγος (x,y) θὰ εἰναι ἡ κοινὴ λύσις τοῦ συστήματος τῶν ἔξισώσεων τούτων.

Εὐκόλως ἀποδεικνύεται καὶ τὸ ἀντίστροφο. "Ωστε :

"Ινα δύο εύθειαι τέμνωνται, πρέπει και άρκει οι συντελεσταὶ διευθύνσεως αὐτῶν νὰ είναι διάφοροι (νὰ πληροῦται ἡ συνθήκη $A_1B_2 - A_2B_1 \neq 0$).

Παράδειγμα: Αι εύθειαι (δ_1) και (δ_2), έξισώσεων ἀντιστοίχως $2x + 4y - 26 = 0$ και $4x - 3y + 3 = 0$, τέμνονται εἰς τὸ σημεῖον M, τοῦ ὅποιου αἱ συντεταγμέναι (x, y) είναι λύσις τοῦ συστήματος

$$\begin{aligned} 2x + 4y - 26 &= 0 \\ 4x - 3y + 3 &= 0 \end{aligned} \quad \left\{ \right. \implies x = 3 \quad \text{καὶ} \quad y = 5$$

καὶ καθόσον είναι $A_1B_2 - A_2B_1 = 2(-3) - 4 \cdot 4 = -6 - 16 = -22 \neq 0$.

AΣΚΗΣΕΙΣ

56. Νὰ εύρεθοῦν αἱ συντεταγμέναι τοῦ σημείου τομῆς M(x,y) ἐκάστης τῶν εύθειῶν (δ_1) καὶ (δ), έξισώσεων ἀντιστοίχως :

- 1) $x - y = 1, \quad x + y = 1.$
- 2) $6x - 2y - 8 = 0, \quad 3x + y = 14.$
- 3) $4x - 5y + 20 = 0, \quad 12x - 15y + 6 = 0.$
- 4) $2x + 3y - 6 = 0, \quad 4x + 6y + 9 = 0.$
- 5) $2 - 3x = y, \quad 6x + 2y = 4.$

57. Νὰ εύρεθοῦν αἱ συντεταγμέναι τῶν κορυφῶν τριγώνου ABC, τοῦ ὅποιου αἱ έξισώσεις τῶν πλευρῶν του είναι : $2x + 3y = 0, \quad x + 3y + 3 = 0, \quad x + y + 1 = 0.$

58. Τοῦ προτιγουμένου τριγώνου νὰ εύρεθοῦν τὰ μῆκη τῶν πλευρῶν του, αἱ έξισώσεις τῶν διαμέσων του καὶ αἱ συντεταγμέναι τοῦ κέντρου βάρους αὐτοῦ.

59. Νὰ εύρεθοῦν αἱ έξισώσεις τῶν εύθειῶν, τῶν παραλλήλων πρὸς τὰς πλευρὰς τοῦ τριγώνου ABC, τοῦ ὅποιου αἱ έξισώσεις τῶν πλευρῶν είναι $2x + 3y = 0, \quad x + 3y + 3 = 0, \quad x + y + 1 = 0$, τῶν ἀγομένων ἐκ τῶν κορυφῶν τοῦ τριγώνου τούτου.

60. Νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι αἱ εύθειαι (δ_1), (δ_2), (δ_3), (δ_4), έξισώσεων ἀντιστοίχως $2x - 3y + 5 = 0, 6x + 10y + 15 = 0, 6x - 9y - 20 = 0, 3x + 5y - 20 = 0$, σχηματίζουν παραλληλόγραμμον. Νὰ εύρεθοῦν αἱ συντεταγμέναι τῶν κορυφῶν του.

61. Νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι ἡ εύθεια (δ_1), έξισώσεως $3x + 4y - 2 = 0$, είναι παραλληλος πρὸς τὴν εύθειαν (δ_2), έξισώσεως $9x + 12y + 7 = 0$, καὶ συμπίπτει μετὰ τῆς εύθειας (δ_3), έξισώσεως $15x + 20y - 10 = 0$.

50. ΣΥΝΘΗΚΗ ΙΝΑ ΤΡΕΙΣ ΕΥΘΕΙΑΙ EXOYN KOINON ΣΗΜΕΙΟΝ.—

"Εστωσαν αἱ εύθειαι (δ_1), (δ_2), (δ_3), έξισώσεων ἀντιστοίχως :

$A_1x + B_1y + \Gamma_1 = 0$ (1), $A_2x + B_2y + \Gamma_2 = 0$ (2) καὶ $A_3x + B_3y + \Gamma_3 = 0$ (3).

"Ινα αὗται ἔχουν κοινὸν σημεῖον $M_0(x_0, y_0)$, πρέπει αἱ συντεταγμέναι :

$$x_0 = \frac{B_1\Gamma_2 - B_2\Gamma_1}{A_1B_2 - A_2B_1} \quad \text{καὶ} \quad y_0 = \frac{A_2\Gamma_1 - A_1\Gamma_2}{A_1B_2 - A_2B_1} \quad (k)$$

τῆς τομῆς τῶν (1) καὶ (2) νὰ ἐπαληθεύουν τὴν (3). "Ητοι :

$$A_3 \cdot \frac{B_1\Gamma_2 - B_2\Gamma_1}{A_1B_2 - A_2B_1} + B_3 \cdot \frac{A_2\Gamma_1 - A_1\Gamma_2}{A_1B_2 - A_2B_1} + \Gamma_3 = 0$$

ή $A_3(B_1\Gamma_2 - B_2\Gamma_1) + B_3(A_2\Gamma_1 - A_1\Gamma_2) + \Gamma_3(A_1B_2 - A_2B_1) = 0 \quad (k_1)$

καὶ ὑπὸ μορφῆς δριζούσης :

$$\Delta = \begin{vmatrix} A_1 & B_1 & \Gamma_1 \\ A_2 & B_2 & \Gamma_2 \\ A_3 & B_3 & \Gamma_3 \end{vmatrix} = 0. \quad (4)$$

*Εάν καλέσωμεν χάριν συντομίας.

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} B_2 & \Gamma_2 \\ B_3 & \Gamma_3 \end{vmatrix}, \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} \Gamma_2 & A_2 \\ \Gamma_3 & A_3 \end{vmatrix}, \quad \Delta_3 = \begin{vmatrix} A_2 & B_2 \\ A_3 & B_3 \end{vmatrix}$$

τάς έλάσσονας δριζουσας της Δ , τότε ή Δ γράφεται :

$$\Delta = A_1\Delta_1 + B_1\Delta_2 + \Gamma_1\Delta_3 \quad (5)$$

και διακρίνομεν τρεις περιπτώσεις.

α) Αι τρεις έλάσσονες είναι μηδέν. Τούτο σημαίνει ότι οι συντελεσταί A_2, B_3, Γ_2 είναι διάλογοι πρός τους A_3, B_2, Γ_3 και αι εύθειαι (2) και (3) ταυτίζονται. Οι A_1, B_1, Γ_1 δύνανται νά είναι ή ού διάλογοι πρός τους A_2, B_3, Γ_2 . Εις τήν πρώτην περίπτωσιν αι τρεις εύθειαι ταυτίζονται, εις τήν δευτέραν, ή πρώτην έχει κοινὸν σημεῖον μετά τῶν δύο τελευταίων, αι δποται ταυτίζονται.

Εις δλας τάς περιπτώσεις έχομεν : $\Delta = A_1\Delta_1 + B_1\Delta_2 + \Gamma_1\Delta_3 = 0$.

β) *Έκ τῶν τριῶν δριζουσῶν $\Delta_1, \Delta_2, \Delta_3$ ή μία, έστω ή $\Delta_3 \neq 0$. Τότε αι (2) και (3) έγουν μίαν κοινὴν λύσιν x_0, y_0 , πεπερασμένην, την (k). "Αρα θά έχωμεν τήν σχέσιν (k_1)."

γ) *Έκ τῶν τριῶν δριζουσῶν $\Delta_1, \Delta_2, \Delta_3$ αι δδο, έστω $\Delta_1 \neq 0, \Delta_2 \neq 0$.

$$\text{Tότε } \Delta_3 = 0 \text{ ή } \frac{A_2}{B_2} = \frac{A_3}{B_3} \text{ και αι (2), (3) είναι παράλληλοι.}$$

Εις τήν περίπτωσιν ταύτην, διά νά έχουν αι τρεις εύθειαι κοινὸν σημεῖον (τὸ ∞), θά πρέπει νά είναι παράλληλοι.

$$\text{"Αρα: } \frac{A_1}{B_1} = \frac{A_2}{B_2} = \frac{A_3}{B_3}$$

"Οταν δμως συμβαίνη τοῦτο, ή Δ είναι πάλιν μηδέν.

*Η συνθήκη $\Delta = 0$ είναι, έπομένως : ἀναγκαία, ίνα εις δλας τάς περιπτώσεις αι εύθειαι (δ_1), (δ_2), (δ_3) έχουν κοινὸν σημεῖον.

*Αποδεικύνεται εύκόλως ότι είναι και έπαρκης.

Παραδειγμα : Αι εύθειαι (δ_1), (δ_2), (δ_3), έξισώσεων δάντιστοίχως :

$$3x - 5y - 10 = 0, \quad x + y + 1 = 0, \quad 21x - 11y - 31 = 0,$$

έχουν κοινὸν σημεῖον, διότι ή δριζουσα :

$$\left| \begin{array}{ccc} 3 & -5 & -10 \\ 1 & 1 & 1 \\ 21 & -11 & -31 \end{array} \right| = 3 \left| \begin{array}{cc} 1 & 1 \\ -11 & -31 \end{array} \right| - (-5) \left| \begin{array}{cc} 1 & 1 \\ 21 & -31 \end{array} \right| + (-10) \left| \begin{array}{cc} 1 & 21 \\ 21 & -11 \end{array} \right| = 0$$

51. ΔΕΣΜΗ ΕΥΘΕΙΩΝ.— Θεωροῦμεν δύο εύθειας (δ_1) και (δ_2) έξισώσεων δάντιστοίχως :

$$A_1x + B_1y + \Gamma_1 = 0 \quad (1) \quad \text{και} \quad A_2x + B_2y + \Gamma_2 = 0, \quad (2)$$

τεμνομένας είς τι σημεῖον $M(x_1, y_1)$. Πᾶσα εύθεια (δ_3) διερχομένη διά τῆς τομῆς τῶν (1) και (2) θά έχη έξισωσιν :

$$(\delta_3) : \quad A_1x + B_1y + \Gamma_1 + k(A_2x + B_2y + \Gamma_2) = 0, \quad (3)$$

διότι, ἀφοῦ τὸ $M(x_1, y_1)$ είναι τομὴ τῶν (1) και (2), έπεται ότι :

$$(4) \quad A_1x_1 + B_1y_1 + \Gamma_1 = 0 \quad \text{και} \quad A_2x_1 + B_2y_1 + \Gamma_2 = 0 \quad (5)$$

$$'Εάν \quad k \neq 0, \quad \text{τότε} \quad k(A_2x_1 + B_2y_1 + \Gamma_2) = 0 \quad (6)$$

διότε διά προσθέσεως τῶν (4) και (6), λαμβάνομεν :

$$A_1x_1 + B_1y_1 + \Gamma_1 + k(A_2x_1 + B_2y_1 + \Gamma_2) = 0 \quad (7)$$

*Η (7) έκφράζει ότι τὸ σημεῖον $M(x_1, y_1)$ κεῖται ἐπὶ τῆς εύθειας :

$$A_1x + B_1y + \Gamma_1 + k(A_2x + B_2y + \Gamma_2) = 0 \quad (8)$$

Παρατήρησις : Έάν αι (δ_1) και (δ_2) είναι παράλληλοι, τότε ή (8) παριστάζεται σύστημα παραλλήλων εύθειών πρός τας (δ_1) και (δ_2) . Διότι τότε θά είναι:

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} \implies \frac{A_1}{kA_2} = \frac{B_1}{kB_2} \implies \frac{A_1 + kA_2}{A_1} = \frac{B_1 + kB_2}{B_1},$$

ή όποια σχέσις έκφραζει ότι αι (δ_1) και (δ_3) είναι παράλληλοι.

Παράδειγμα 1ον : Νά εύρεθη ή έξισωσις της εύθειας, ητης διέρχεται διά το σημείον $M_1(2,1)$ και της τομής τῶν εύθειῶν (δ_1) , (δ_2) , έξισώσεων ἀντιστοίχως: $3x - 5y - 10 = 0$ και $x + y + 1 = 0$.

Λύσις : 'Η ζητουμένη έξισωσις θά είναι της μορφής :

$$3x - 5y - 10 + k(x + y + 1) = 0 \quad (9)$$

'Επειδή τὸ $M_1(2,1)$ κείται ἐπ' αὐτῆς, ἔπειται :

$$3 \cdot 2 - 5 \cdot 1 - 10 + k(2 + 1 + 1) = 0 \implies k = \frac{9}{4}, \text{ διε ή (9) γίνεται :}$$

$$21x - 11y - 31 = 0.$$

Παράδειγμα 2ον : Νά εύρεθη ή έξισωσις της εύθειας, της διερχομένης διά της τομής τῶν εύθειῶν (δ_1) , (δ_2) , έξισώσεων :

$$2x + y + 1 = 0 \text{ και } x - 2y + 1 = 0$$

και παραλλήλου πρός τὴν εύθειαν (δ_3) , έξισώσεως $4x - 3y - 7 = 0$.

Λύσις : 'Η ζητουμένη θά έχῃ έξισωσιν :

$$2x + y + 1 + k(x - 2y + 1) = 0$$

$$(2 + k)x + (1 - 2k)y + (1 + k) = 0 \quad (10)$$

'Εάν αὕτη είναι παράλληλος πρός τὴν (δ_3) , θά έχωμεν :

$$\frac{2+k}{4} = \frac{1-2k}{-3} \implies k=2$$

και ή (10) γίνεται :

$$4x - 3y + 3 = 0$$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

62. Νά εύρεθη ή έξισωσις της εύθειας, η όποια διέρχεται διά της τομής τῶν εύθειῶν (δ_1) , (δ_2) , έξισώσεων ἀντιστοίχως $2x - 3y + 2 = 0$, $3x - 4y - 2 = 0$ και τοῦ σημείου $O(0,0)$.

63. Νά εύρεθούν αι έξισώσεις τῶν εύθειῶν, τῶν διερχομένων διά τῶν κορυφῶν τοῦ τριγώνου τοῦ σχηματιζομένου ὑπὸ τῶν εύθειῶν (δ_1) , (δ_2) , (δ_3) , έξισώσεων ἀντιστοίχως $2x - 3y + 1 = 0$, $x - y = 0$, $3x + 4y - 2 = 0$ και παραλλήλων πρός τὰς ἀπέναντι πλευράς του.

64. Νά εύρεθη ή έξισωσις της εύθειας, η όποια διέρχεται διά της τομής τῶν εύθειῶν $2x + 5y - 3 = 0$, $3x - 2y - 1 = 0$ και της τομής τῶν εύθειῶν $x - y = 0$, $x + 3y - 6 = 0$.

ΕΦΑΡΜΟΓΑΙ

52. ΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΙΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΥΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΜΕ ΔΥΟ ΑΓΝΩΣΤΟΥΣ. — Θεωρούμεν τὸ σύστημα τῶν έξισώσεων.

$$(1) \quad \begin{cases} \alpha x + \beta y = \gamma \\ \alpha_1 x + \beta_1 y = \gamma_1 \end{cases} \quad (1)$$

$$(2)$$

"Εστωσαν (δ) και (δ_1) αι εύθειαι, έξισώσεων (1) και (2), εις τυχόν σύστημα συντεταγμένων. Τὸ σημείον $M(x,y)$, έάν ύπάρχῃ, κοινὸν τῶν δύο εύθειῶν, έχει συντεταγμένας, αι όποιαι είναι λύσις τοῦ συστήματος (1). 'Αντιστρόφως, πᾶσα

λύσις (x, y) τοῦ συστήματος (1), δίδει σημεῖον, τὸ δποτὸν εἶναι ἢ τομὴ τῶν εὐθειῶν (δ) καὶ (δ_1) .


1ον : Εάν $\alpha_1 - \alpha_1\beta \neq 0$, αἱ εὐθεῖαι (δ) καὶ (δ_1) δὲν ἔχουν τὴν αὐτὴν διεύθυνσιν. Θὰ ἔχουν ἐν κοινὸν σημεῖον, M , καὶ ἐν μόνον. Τὸ σύστημα (1) ἐπιδέχεται μίαν μοναδικὴν λύσιν, ἢ δποτία παρέχεται ὑπὸ τῶν τύπων τοῦ Gramer:

$$x = \frac{\gamma\beta_1 - \gamma_1\beta}{\alpha\beta_1 - \alpha_1\beta} \quad \text{καὶ} \quad y = \frac{\alpha\gamma_1 - \alpha_1\gamma}{\alpha\beta_1 - \alpha_1\beta}$$

2ον : Εάν $\frac{\alpha}{\alpha_1} = \frac{\beta}{\beta_1} \neq \frac{\gamma}{\gamma_1}$, αἱ εὐθεῖαι (δ) καὶ (δ_1) εἶναι παράλληλοι ὑπὸ τὴν στενὴν σημασίαν, δηλαδὴ δὲν ἔχουν κοινὸν σημεῖον. Τὸ σύστημα εἶναι ἀδύνατον.


3ον : Εάν $\frac{\alpha}{\alpha_1} = \frac{\beta}{\beta_1} = \frac{\gamma}{\gamma_1}$, αἱ εὐθεῖαι (δ) καὶ (δ_1) συμπίπτουν. Τὸ σύστημα ἐπιδέχεται ἀπείρους λύσεις. Εἶναι ἀδριστον.

Παράδειγμα 1ον : Αἱ εὐθεῖαι (δ) καὶ (δ_1) ἔξισώσεων ἀντιστοίχως: $2x - y = 5$ καὶ $3x + 4y = 24$, τέμνονται εἰς τὸ σημεῖον M , τοῦ δποτού αἱ συντεταγμέναι εἶναι λύσις τοῦ συστήματος:



$$\begin{cases} 2x - y = 5 \\ 3x + 4y = 24 \end{cases} \implies x = 4, y = 3.$$

Αἱ συντεταγμέναι ἐπὶ τὴν ἀρχὴν τῆς μὲν (δ) εἶναι $\frac{5}{2}$ καὶ -5 , τῆς δὲ (δ_1) εἶναι αἱ 8 καὶ 6, ὡς δεικνύει τὸ (σχ. 37).



Παράδειγμα 2ον : Αἱ εὐθεῖαι (δ) καὶ (δ_1) , ἔξισώσεων $2x + 3y - 6 = 0$ καὶ $4x + 6y - 24 = 0$ εἶναι παράλληλοι, διότι $\frac{2}{4} = \frac{3}{6} \neq \frac{6}{24}$, αἱ δὲ σχετικαὶ θέσεις αὐτῶν παρέχονται ὑπὸ τοῦ ἀνωτέρῳ (σχ. 38).

Τὸ σύστημα λοιπὸν $\begin{cases} 2x + 3y = 6 \\ 4x + 6y = 24 \end{cases}$ εἶναι ἀδύνατον.

Παράδειγμα 3ον : Αἱ εὐθεῖαι (δ_2) καὶ (δ_3) ἔξισώσεων $3x + 4y - 24 = 0$ καὶ $6x + 8y = 48$ ἀντιστοίχως, συμπίπτουν, ὡς δεικνύει τὸ (σχ. 38).

Άρα, πᾶν σημεῖον $M(x, y)$ τῆς μᾶς ἔχει συντεταγμένας, αἱ δποτίαι ἐπαληθεύουσιν ἀμφοτέρας τὰς ἔξισώσεις τοῦ συστήματος

$$\begin{cases} 3x + 4y - 24 = 0 & (1) \\ 6x + 8y - 48 = 0 & (2) \end{cases}$$

Διότι, διὰ τυχούσαν τιμὴν τοῦ γ ἐκ τῆς (1), ἔστω γ = 0, εὑρίσκομεν x = 8. Τὸ ζεῦγος (x = 8, y = 0) ἐπαληθεύει καὶ τὴν (2). "Ητοι 6·8 + 8·0 - 48 = 0 ή 48 - 48 = 0.

Όμως, διά $y = 3$, ή (1) δίει $x = 4$. Τό ζευγός τούτο ($x = 4$, $y = 3$) έπαληθεύει και την (2), ήτοι: $6 \cdot 4 + 8 \cdot 3 - 48 = 24 + 24 - 48 = 0$.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

65. Νὰ ἐπιλυθοῦν γραφικῶς τὰ συστήματα τῶν ἀκολούθων ἔξισώσεων:

$$1) \begin{cases} 2x - y = -7 \\ x + 3y = -7 \end{cases} \quad 3) \begin{cases} 4x - 10y = -27 \\ 2x - 14y = -36 \end{cases} \quad 5) \begin{cases} 6x - 3y = -26 \\ 15x + 2y = -27 \end{cases}$$

$$2) \quad \begin{cases} 3x - 2y = 11 \\ 5x - 3y = 17 \end{cases} \quad 4) \quad \begin{cases} 2x + 3y = 1 \\ 6x - 6y = -17 \end{cases} \quad 6) \quad \begin{cases} 2x + 3y = 1 \\ 6x - 2y = -31. \end{cases}$$

66. Νά δρισθή δ k , ίνα αι εύθειαι αι παριστώμεναι ύπο τῶν ἔξισώσεων: $3x - 4y + 15 = 0$, $5x + 2y - 1 = 0$, $kx - (2k - 1)y + 9k - 13 = 0$ ἔχουν κοινὸν σημεῖον.

67. Νὰ ἀποδειχθῇ δτὶ διὰ πᾶσαν τιμὴν τοῦ μ, αἱ εὐθεῖαι αἱ δριζόμεναι ὑπὸ τῶν ἀκολούθων ἐξισώσεων διέρχονται διὰ σταθεροῦ σημείου, τοῦ ὅποιους νὰ δρισθῶν αἱ συντεταγμέναι :

$$1) \quad 3x - 2y + 5 + \mu(x - 2y + 4) = 0,$$

$$2) \quad (2\mu - 3)x + (7 - 2\mu)y + 4 = 0,$$

$$3) \quad \mu x + (5\mu - 3)y + 9 - 3\mu = 0,$$

$$4) \quad (\mu^2 - 1)x + (3\mu^2 - 2\mu + 1)y - 5\mu^2 + 4\mu - 3 = 0.$$

γραμμή δΤ, δ = κ. μεσοτίκης 0 = κ. απόδ. (1), πάντα ότι διατίθεται συγκέντρως της γραμμής δΤ, δ = 0 = δ + δ + δ = 0 + 0 + 0 = 0, λοιπά (2) για την επιδιόρθωση (0 = 0, δ = 0)

θεώρουμε. Θύμανος θεώρουμε την γραμμή δΤ, δ = 0 = δ + δ + δ = 0 + 0 + 0 = 0, λοιπά (2) για την επιδιόρθωση (0 = 0, δ = 0)


ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Τ

ΣΠΟΥΔΗ ΤΗΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΟΡΘΟΚΑΝΟΝΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ

53. Η ΕΥΘΕΙΑ ΕΙΣ ΟΡΘΟΚΑΝΟΝΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΑΣ.— Εις τὸ προηγούμενον κεφάλαιον ἔξητάσαμεν τὴν εὐθεῖαν καὶ τὰς ιδιότητας αὐτῆς, ἀναφερόμενην εἰς τυχόντας ἄξονας συντεταγμένων.

Εις τὸ παρόν κεφάλαιον θὰ ἔξετάσωμεν τὴν εὐθεῖαν εἰς ὁρθοκανονικοὺς ἄξονας συντεταγμένων. "Απαντά τὰ προηγουμένως ἐκτεθέντα ισχύουν καὶ εἰς τὸ σύστημα τοῦτο. Πέραν δὲ τούτων καὶ τὰ ἀκόλουθα.

54. ΘΕΩΡΗΜΑ.— Εις ὁρθοκανονικὸν σύστημα συντεταγμένων, ἡ εὐθεῖα (δ), ἔξισώσεως $Ax+By+\Gamma=0$ εἶναι κάθετος ἐπὶ τὸ διάνυσμα \overrightarrow{OP} (A, B).



"**Απόδειξις:** Εις τὸ ὁρθοκανονικὸν σύστημα ἄξονων xOy (σχ. 39) θεωροῦμεν τὴν εὐθεῖαν (δ), ἔξισώσεως :

$$Ax + By + \Gamma = 0 \quad (1)$$

"Εστωσαν $M_0(x_0, y_0)$ σταθερὸν σημεῖον τῆς (δ), καὶ $M(x, y)$ μεταβλητὸν σημεῖον αὐτῆς. Θὰ εἴναι :

$$Ax_0 + By_0 + \Gamma = 0 \quad (2)$$

"Ἐκ τῶν (1) καὶ (2) ἐπεταί :
 $A(x - x_0) + B(y - y_0) = 0. \quad (3)$

Θεωροῦμεν τὸ διάνυσμα $\overrightarrow{OP}(A, B)$. Ἐπειδὴ $x - x_0$, καὶ $y - y_0$ εἴναι αἱ συντεταγμέναι προβολαὶ τοῦ διανύσματος $\overrightarrow{M_0M}$, καὶ τὸ πρῶτον μέλος τῆς (3) εἴναι ἡ ἀλγεβρικὴ τιμὴ τοῦ ἔσωτερικοῦ γινομένου $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{M_0M}$, ἐπεταί ὅτι :

$$\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{M_0M} = 0.$$

"Ἄρα τὸ διάνυσμα $\overrightarrow{M_0M}$ καὶ ἡ εὐθεῖα (δ) εἶναι κάθετα πρὸς τὸ διάνυσμα \overrightarrow{OP} .

Παράδειγμα 1ον : 'Η εὐθεῖα (δ), ἔξισώσεως $5x + 8y - 10 = 0$ εἶναι κάθετος πρὸς τὸ διάνυσμα $\overrightarrow{OP}(5, 8)$.

Παράδειγμα 2ον : 'Εάν ἡ (δ) ἔχῃ ἔξισωσιν $y = \lambda x + \beta$, τότε :

$$(5) \perp \overrightarrow{OP}(\lambda, -1).$$

55. ΘΕΩΡΗΜΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟΝ.— Πᾶσα εύθεια κάθετος ἐπὶ τὸ διάνυσμα \overrightarrow{OP} (A, B) ἔχει ἔξισθω στην τῆς μορφῆς : $Ax + By + \Gamma = 0$.

***Απόδειξις :** "Εστω $M_0(x_0, y_0)$ τυχὸν σημεῖον τῆς εὐθείας (δ). "Ινα σημεῖον της $M(x, y)$ τοῦ ἐπιπέδου κεῖται ἐπὶ τῆς (δ), πρέπει καὶ ἀρκεῖ $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{M_0 M} = 0$, ἵνα
 $A(x - x_0) + B(y - y_0) = 0$

$$Ax + By - (Ax_0 + By_0) = 0 \quad (1)$$

*Ἐὰν τεθῇ $\Gamma = -(Ax_0 + By_0)$, ἡ (1) γίνεται : $Ax + By + \Gamma = 0$.

*Ἐντεῦθεν προκύπτει ὅτι : πᾶσα ἔξισθωσις τῆς μορφῆς $Ax + By + k = 0$, ($k \in \mathbb{R}$) εἶναι κάθετος πρὸς τὸ διάνυσμα $\overrightarrow{OP}(A, B)$ καὶ κατ' ἀκολουθίαν παράλληλος πρὸς τὴν εὐθείαν (δ), ἔξισθωσις $Ax + By + \Gamma = 0$.

Παρατήρησις : *Η παράστασις $E = Ax + By$ εἶναι τὸ ἔσωτερικὸν γινόμενον τῶν διανυσμάτων $\overrightarrow{OP}(A, B)$ καὶ $\overrightarrow{OM}(x, y)$. *Η ἔξισθωσις τῆς εὐθείας (δ) γράφεται :

$$Ax + By = -\Gamma \iff \overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OM} = -\Gamma.$$

*Ἐὰν Η εἴναι ἡ τομὴ τῶν (δ) καὶ OP , τότε :

$$\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OH} \implies \boxed{\Gamma = -\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OH}}$$

Παράδειγμα : Νὰ εύρεθῇ ἡ ἔξισθωσις τῆς μεσοκαθέτου εὐθυγράμμου τμήματος.

Λύσις : "Εστωσαν $A_1(x_1, y_1)$, $A_2(x_2, y_2)$ αἱ συντεταγμέναι τῶν ἄκρων τοῦ τμήματος $A_1 A_2$. *Η μεσοκάθετος αὐτοῦ είναι κάθετος ἐπὶ τὸ διάνυσμα $\overrightarrow{A_1 A_2}(x_2 - x_1, y_2 - y_1)$ καὶ διέρχεται διὰ τοῦ μέσου $M_1\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}\right)$ τοῦ τμήματος $A_1 A_2$.

*Ἀρα ἡ ἔξισθωσις τῆς μεσοκαθέτου τοῦ τμήματος $A_1 A_2$ είναι :

$$(x_2 - x_1)\left(x - \frac{x_1 + x_2}{2}\right) + (y_2 - y_1)\left(y - \frac{y_1 + y_2}{2}\right) = 0.$$

56. ΣΥΝΘΗΚΗ ΚΑΘΕΤΟΤΗΤΟΣ ΔΥΟ ΕΥΘΕΙΩΝ.— Γνωρίζομεν ὅτι αἱ εὐθεῖαι (δ_1) καὶ (δ_2), ἔξισθωσεων ἀντιστοίχως $A_1x + B_1y + \Gamma_1 = 0$ καὶ $A_2x + B_2y + \Gamma_2 = 0$, εἴναι ἀντιστοίχως κάθετοι πρὸς τὰ διανύσματα $\overrightarrow{OP}_1(A_1, B_1)$ καὶ $\overrightarrow{OP}_2(A_2, B_2)$. "Ινα αἱ (δ_1) καὶ (δ_2) είναι κάθετοι, πρέπει καὶ ἀρκεῖ τὰ διανύσματα \overrightarrow{OP}_1 καὶ \overrightarrow{OP}_2 νὰ είναι κάθετα. *Ἀρα ($\S 32$).

$$\overrightarrow{OP}_1 \cdot \overrightarrow{OP}_2 = 0 \iff \boxed{A_1 A_2 + B_1 B_2 = 0} \quad (1)$$

Παράδειγμα : Αἱ εὐθεῖαι (δ_1) καὶ (δ_2), ἔξισθωσεων ἀντιστοίχως $4x + 8y - 7 = 0$ καὶ $6x - 2y + 11 = 0$ είναι κάθετοι, διότι :

$$A_1 A_2 + B_1 B_2 = 4 \cdot 6 + 8 \cdot (-3) = 24 - 24 = 0.$$

‘Η συνθήκη: $A_1A_2 + B_1B_2 = 0$ γράφεται: $\left(-\frac{A_1}{B_1}\right)\left(-\frac{A_2}{B_2}\right) = -1$, αν $B_1B_2 \neq 0$.

Έπειδή δὲ $-\frac{A_1}{B_1} = \lambda_1$ είναι ό συντελεστής διευθύνσεως της (δ_1) , καὶ

$-\frac{A_2}{B_2} = \lambda_2$ είναι ό συντελεστής διευθύνσεως της (δ_2) , έπειτα:

$$\lambda_1 \cdot \lambda_2 = -1$$

(2)

Έκ τούτων έπειτα δτι :

Ίνα δύο εύθειαι είναι κάθετοι, πρέπει καὶ ἀρκεῖ (εἰς δρθοκανονικὸν σύστημα) τὸ γινόμενον τῶν συντελεστῶν διευθύνσεως αὐτῶν νὰ είναι ίσον πρὸς -1 .

Παράδειγμα : Αἱ εύθειαι (δ_1) καὶ (δ_2) , ἔξισώσεων ἀντιστοίχως: $y = 7x + 4$ καὶ $y = -\frac{1}{7}x + 15$ είναι κάθετοι, διότι :

$$\lambda_1 \lambda_2 = 7 \cdot \left(-\frac{1}{7}\right) = -1.$$

57. ΕΞΙΣΩΣΙΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑ ΔΟΘΕΝΤΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ $M_0(x_0, y_0)$ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΗ ΜΗΔΕΝΙΚΟΝ ΔΙΑΝΥΣΜΑ $\vec{u}(A, B)$.— Έὰν $M(x, y)$ είναι τυχὸν σημεῖον τῆς ζητουμένης εύθειας, τότε :

$$\vec{u} \cdot \vec{M_0M} = 0 \iff A(x - x_0) + B(y - y_0) = 0 \quad (1)$$

Αὕτη είναι ἡ ζητουμένη ἔξισωσις.

58. ΕΞΙΣΩΣΙΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ $M_0(x_0, y_0)$ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΥΘΕΙΑΝ (δ) ΕΞΙΣΩΣΕΩΣ : $Ax + By + \Gamma = 0$.

‘Αν $M(x, y)$ είναι τυχὸν σημεῖον τῆς ζητουμένης εύθειας (δ_1) , τότε τὸ διάνυσμα $\vec{M_0M}(x - x_0, y - y_0)$ θὰ είναι κάθετον πρὸς τὴν εύθειαν (δ) , ἢ ὅποια είναι κάθετος πρὸς τὸ διάνυσμα $\vec{u}(A, B)$. Ἐρα τὰ διανύσματα $\vec{M_0M}$ καὶ \vec{u} θὰ είναι παράλληλα. Κατ’ ἀκολουθίαν :

$$\frac{x - x_0}{A} = \frac{y - y_0}{B} \iff B(x - x_0) - A(y - y_0) = 0 \quad (1)$$

Αὕτη είναι ἡ ζητουμένη ἔξισωσις.

Παράδειγμα : ‘Η ἔξισωσις τῆς εύθειας (δ_1) τῆς διερχομένης διὰ τοῦ σημείου $M_0(3, 5)$ καὶ καθέτου πρὸς τὴν εύθειαν (δ) , ἔξισώσεως $4x - 9y + 7 = 0$, είναι :

$$\frac{x - 3}{4} = \frac{y - 5}{-9} \iff 9x + 4y - 47 = 0.$$

68. Νά αποδειχθῇ ότι ή εύθεια $3x + 4y - 2 = 0$ είναι κάθετος πρός τήν εύθειαν $8x - 6y + 5 = 0$.

69. Νά αποδειχθῇ ότι αἱ ἀκόλουθοι ἔξισώσεις :

$$x - 3y + 2 = 0, \quad 12x + 4y + 31 = 0, \quad 2x - 6y - 7 = 0, \quad 9x + 3y - 40 = 0$$

είναι αἱ ἔξισώσεις τῶν πλευρῶν ἐνὸς δρθιογάνων. Νά κατασκευασθῇ τοῦτο.

70. Νά εύρεθῃ ἡ ἔξισωσις εὐθείας, ἡ ὧποια διέρχεται ἀπό τὸ σημεῖον :

$$1) (-1, 2) \text{ καὶ είναι κάθετος πρός τήν εύθειαν } 3x - 4y + 1 = 0$$

$$2) (-7, 2) \text{ καὶ είναι κάθετος πρός τήν εύθειαν } x - 3y + 4 = 0.$$

71. Τρίγωνον $ABΓ$ ἔχει κορυφὰς τὰ σημεῖα $A(-3, 2)$, $B(3, -2)$ καὶ $Γ(0, -1)$. Νά εύρεθοῦν αἱ ἔξισώσεις τῶν ὑψῶν αὐτοῦ καὶ νὰ ἀποδειχθῇ ότι τὰ ὑψη ταῦτα διέρχονται διὰ τοῦ αὐτοῦ σημείου.

72. Νά εύρεθοῦν αἱ ἔξισώσεις τῶν μεσοκαθέτων τῶν πλευρῶν τοῦ τριγώνου τοῦ προηγουμένου προβλήματος καὶ νὰ ἀποδειχθῇ ότι αὗται διέρχονται διὰ τοῦ αὐτοῦ σημείου, τὸ ὧποιον ἀπέχει Ισάκις τῶν κορυφῶν τοῦ τριγώνου.

59. ΓΩΝΙΑ ΔΥΟ ΕΥΘΕΙΩΝ.— Εἰς τὸ δρθιοκανονικὸν σύστημα δξόνων xOy (σχ. 40) θεωροῦμεν δύο εὐθείας (δ_1) καὶ (δ_2) ἔξισώσεων ἀντιστοίχως :

$$A_1x + B_1y + \Gamma_1 = 0 \quad (1)$$

$$\text{καὶ} \quad A_2x + B_2y + \Gamma_2 = 0 \quad (2)$$

Ἄν αὗται τέμνωνται, αἱ γωνίαι τὰς ὧποιας σχηματίζουν είναι ἵσαι πρὸς τὰς γωνίας τῶν ἐπ' αὐτῶν καθέτων διανυσμάτων $\vec{N}_1(A_1, B_1)$ καὶ $\vec{N}_2(A_2, B_2)$ ἡ παραπληρωματικὴ τούτων.

Ἐστω θὴ γωνία τῶν διανυσμάτων τούτων, τοιαύτη ὥστε $0 \leq \theta \leq \pi$.

Κατὰ τὴν (§ 31) θὰ είναι :

$$\text{συν}\theta = \frac{A_1 \cdot A_2 + B_1 \cdot B_2}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2} \cdot \sqrt{A_2^2 + B_2^2}} \quad (3)$$


Ἐάν φ είναι ἡ δξεῖα γωνία τῶν (δ_1) καὶ (δ_2) , τότε $\theta + \phi = \pi$ καὶ ἄρα $\text{συν}\phi = \pm \text{συν}\theta$. Ἐπειδὴ ὑπετέθη $\phi < \frac{\pi}{2}$, ἔπειται $\text{συν}\phi > 0$. Καὶ ἄρα :

$$\text{συν}\phi = \frac{|A_1 \cdot A_2 + B_1 \cdot B_2|}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2} \cdot \sqrt{A_2^2 + B_2^2}} \quad (4)$$

Παρατηρήσεις : A) Ἐάν $(\delta_1) \perp (\delta_2)$, τότε $\text{συν}\phi = 0$, καὶ ὁ τύπος (4) δίδει :

$$A_1 \cdot A_2 + B_1 \cdot B_2 = 0$$

σχέσις εύρεθείσα καὶ εἰς τὴν (§ 56).



Σχ. 40

B) Γνωρίζομεν ότι :

$$1 + \varepsilon \varphi^2 \varphi = \frac{1}{\sigma u v^2 \varphi} \iff \varepsilon \varphi^2 \varphi = \frac{1}{\sigma u v^2 \varphi} - 1 = \frac{(A_1^2 + B_1^2)(A_2^2 + B_2^2) - (A_1 A_2 + B_1 B_2)^2}{(A_1 A_2 + B_1 B_2)^2}$$

ξεινούσαν :

$$\varepsilon \varphi \varphi = \frac{|A_1 \cdot B_2 - A_2 \cdot B_1|}{|A_1 \cdot A_2 + B_1 \cdot B_2|} = \frac{|\lambda_2 - \lambda_1|}{|1 + \lambda_1 \lambda_2|} \quad (5)$$

καθόσον $\varepsilon \varphi \varphi > 0$, διότι $\varphi < 90^\circ$ και λ_1, λ_2 αἱ συντελεσταὶ διευθύνσεως τῶν εὐθειῶν (δ_1) και (δ_2).

*Αν αἱ (δ_1) και (δ_2) εἰναι παράλληλοι, τότε :

$$\varphi = 0 \iff A_1 \cdot B_2 - A_2 \cdot B_1 = 0 \quad (6)$$

σχέσις εύρεθείσα και εἰς τὴν (§ 46).

Γ) Εάν δὲ τύπος (5) ἐφαρμοσθῇ εἰς τὴν περίπτωσιν τῆς γωνίας τῶν εὐθειῶν (Ox), ἔξισώσεως ($y = 0$), και τῆς εὐθείας (δ), ἔξισώσεως $y = \lambda x + \beta$, τότε :

$$\varepsilon \varphi \varphi = |\lambda|$$

*Εάν $\lambda > 0$, ή ὅξεια γωνία φ εἰναι ή σχηματιζομένη ὑπὸ τοῦ ἄξονος Ox και τοῦ μέρους τῆς (δ), τοῦ ἄνωθεν τοῦ ἄξονος Ox κειμένου.

*Εάν $\lambda < 0$, ή ὅξεια γωνία φ εἰναι ή σχηματιζομένη ὑπὸ τοῦ ἄξονος Ox και τοῦ μέρους τῆς εὐθείας (δ), τοῦ κάτωθεν τοῦ ἄξονος Ox κειμένου.

*Ἐπὶ πλέον λ εἰναι ή ἐφαπτομένη τῆς γωνίας, ἥτις σχηματίζεται ὑπὸ τοῦ ἄξονος Ox και τοῦ μέρους τῆς εὐθείας (δ), τοῦ ἄνωθεν τοῦ ἄξονος Ox κειμένου.

*Ἐκ τῶν ἀνωτέρω ἔπειται ὅτι :

Εἰς ὀρθοκανονικὸν σύστημα συντεταγμένων ὁ συντελεστὴς διευθύνσεως μιᾶς εὐθείας (δ), μὴ παραλλήλου πρὸς τὸν ἄξονα Oy , ἵστωται πρὸς τὴν ἐφαπτομένην τῆς γωνίας, ή ὅποια σχηματίζεται ὑπὸ τοῦ ἄξονος Ox και τοῦ μέρους τῆς εὐθείας (δ) τοῦ κειμένου εἰς τὸ ἡμιεπίπεδον $y \geq 0$.

Τότε δὲ συντελεστὴς διευθύνσεως τῆς (δ) καλεῖται κλίσις αὐτῆς.

Παράδειγμα : Ἡ γωνία τῶν εὐθειῶν (δ_1), (δ_2), ἔξισώσεων ἀντιστοίχως $7x - 3y + 6 = 0$ και $2x - 5y - 4 = 0$, εἰναι :

$$\varepsilon \varphi \varphi = \frac{|A_1 \cdot B_2 - A_2 \cdot B_1|}{|A_1 \cdot A_2 + B_1 \cdot B_2|} = |-1| = 1 \implies \varphi = \frac{\pi}{4} \quad \text{ή} \quad \varphi = \frac{3\pi}{4}.$$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

73. Νὰ ὑπολογισθῇ ή γωνία (δ ὅξεια) τῶν εὐθειῶν (δ_1) και (δ_2) ἔξισώσεων ἀντιστοίχως $7x + 3y + 6 = 0$ και $2x + 5y - 4 = 0$.

74. Νὰ εύρεθοιν αἱ γωνίαι τοῦ τετραπλεύρου $AB\Gamma\Delta$, δπερ ἔχει κορυφὰς τὰ σημεῖα $A(10,8)$, $B(-3,9)$, $\Gamma(-4,-4)$, $\Delta(9,-5)$ και τὸ εἰδος τοῦ τετραπλεύρου τούτου.

75. Νὰ εύρεθοιν αἱ γωνίαι τῶν εὐθειῶν, ἔξισώσεων ἀντιστοίχως :

1) $2x - 5y + 1 = 0$ και $x - 2y + 3 = 0$

2) $x + y + 1 = 0$ και $x - y + 1 = 0$

3) $6x - 3y + 3 = 0$ και $x = 6$.

76. Νὰ εύρεθῇ ή ἔξισωσις τῆς εὐθείας (δ_1), τῆς διερχομένης διὰ τοῦ σημείου $A(3,5)$ και σχηματιζούσης γωνίαν $\frac{\pi}{3}$ μετὰ τῆς εὐθείας (δ_2), ἔξισώσεως $x - y + 6 = 0$.

77. Τὸ αὐτὸ διὰ τὴν εύθειαν τὴν διερχομένην διὰ τοῦ $A(1,-3)$ καὶ τέμνουσαν τὴν (δ_2) , ἐξισώσεως $x + 2y + 4 = 0$ ὑπὸ γωνίαν 135° .

78. Νὰ ὑπολογισθοῦν αἱ γωνίαι τοῦ τριγώνου ABC , ὅπερ ἔχει κορυφάς $A(0,0)$, $B(-4,4)$ καὶ $C(2\sqrt{3}-2, 2\sqrt{3}+\sqrt{2})$.

60. ΑΛΓΕΒΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ $M_0(x_0, y_0)$ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΘΕΙΑΝ (δ) , ΕΞΙΣΩΣΕΩΣ : $Ax + By + \Gamma = 0$, ἀν $|A| + |B| > 0$.

Ἐστω \overrightarrow{OZ} ὁ ἄξων ὁ ἀγόμενος ἐκ τοῦ Ο καθέτως πρὸς τὴν εύθειαν (δ) καὶ προσανατολισμένος κατὰ τὴν φορὰν τοῦ διανύσματος $\vec{u}(A,B)$ καὶ ἔστω $H(x_1, y_1)$ ἡ προβολὴ τοῦ M_0 ἐπὶ τὴν (δ) .

Θάκ ἔχωμεν :

$$\vec{u} \cdot \overrightarrow{HM_0} = u \cdot \overrightarrow{HM_0} = \sqrt{A^2 + B^2} \cdot \overrightarrow{HM_0},$$

δηλαδή :

$$A(x_0 - x_1) + B(y_0 - y_1) = \sqrt{A^2 + B^2} \cdot \overrightarrow{HM_0}$$

ἐξ οὗ :

$$\overrightarrow{HM_0} = \frac{A(x_0 - x_1) + B(y_0 - y_1)}{\sqrt{A^2 + B^2}} \quad (1)$$

Ἐπειδὴ τὸ H κεῖται ἐπὶ τῆς (δ) , θὰ εἰναι $Ax_1 + By_1 = -\Gamma$ καὶ ἡ (1) γίνεται:

$$\overrightarrow{HM_0} = \frac{Ax_0 + By_0 + \Gamma}{\sqrt{A^2 + B^2}}, \quad (\overrightarrow{HM_0} \text{ μετρεῖται ἐπὶ τοῦ ἄξονος } \overrightarrow{OZ}).$$

Ἄρα ἡ ἀπόστασις τοῦ M_0 (κατὰ τὴν ἀντίθετον φορὰν) ἀπὸ τὴν εύθειαν (δ) δίδεται ὑπὸ τοῦ τύπου :

$$d = |M_0H| = \frac{|Ax_0 + By_0 + \Gamma|}{\sqrt{A^2 + B^2}} \quad (2)$$

Ἡ ἀπόστασις OK τῆς ἀρχῆς O τῶν ἀξόνων ἀπὸ τὴν (δ) εἰναι :


$$OK = \frac{|\Gamma|}{\sqrt{A^2 + B^2}}. \quad (3)$$

Παράδειγμα 1ον : Ἡ ἀπόστασις τοῦ σημείου $M_0(2,5)$ ἀπὸ τὴν εύθειαν (δ) , ἐξισώσεως $3x + 4y - 10 = 0$ εἰναι :

$$d = \frac{|3 \cdot 2 + 4 \cdot 5 - 10|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = \frac{|6 + 20 - 10|}{\sqrt{9 + 16}} = \frac{16}{5} = 3,2.$$

Παράδειγμα 2ον : Ἡ ἀπόστασις τῆς ἀρχῆς $O(0,0)$ τῶν ἀξόνων ἀπὸ τὴν εύθειαν (δ) , ἐξισώσεως $6x + 8y - 9 = 0$ εἰναι :

$$d = \frac{|-9|}{\sqrt{6^2 + 8^2}} = \frac{|-9|}{10} = \frac{9}{10} = 0,9.$$



Σχ. 41

79. Διδούνται τά σημεία $A(1,5)$, $B(-3,3)$ και $\Gamma(6,2)$. Να υπολογισθοῦν τά ίψη του τριγώνου $AB\Gamma$.

80. Τό αύτό διά τό τρίγωνον, σπέρ εἶχει κορυφάς τά σημεία 1) $A(2,3)$, $B(-4,0)$, $\Gamma(-1,-4)$ και 2) $A(3,5)$, $B(1,-2)$, $\Gamma(6,-5)$.

81. Διέτεται τό σημείον $A(4,6)$ και αι εύθεται (δ), έξισώσεων :
 $(\mu-1)x - (2\mu-3)y - 4\mu + 1 = 0$ και ζητεῖται νά δρισθῇ δ μ, εις τρόπον ώστε ή άπόστασις τοῦ A από τήν (δ) νά είναι 3.

82. Νά εύρεθῃ ή έξισώσις τῆς εύθειας (δ), ή όποια απέχει ισάκις τῶν εύθειῶν (δ_1) και (δ_2), έξισώσεων άντιστοίχων :

$$3x + 4y - 5 = 0 \text{ και } 3x + 4y + 7 = 0.$$

83. Νά ύπολογισθοῦν αι άποστάσεις τῆς άρχης $O(0,0)$ από τῶν εύθειῶν (δ) και (δ_1) έξισώσεων άντιστοίχων $x + 2y - 1 = 0$, $\sqrt{3}x + \sqrt{2}y - 1 = 0$. Ποιον συμπέρασμα έξαγεται έντευθεν;

61. ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΙΣ ΕΥΘΕΙΑΣ.— 'Εστω $\vec{O}\vec{l}$ (συνω, ημω) μοναδιαίον διάνυσμα κάθετον ἐπί τήν εύθειαν (δ), $\vec{O}\vec{z}$ δ ἀξων τοῦ μοναδιαίου τού-

του διανύσματος $\vec{O}\vec{l}$ και H τό σημείον τομῆς τῆς (δ) και τοῦ $\vec{O}\vec{z}$.

Θέτομεν $\vec{OH} = p$. 'Η εύθεια (δ) είναι τό Σύνολον τῶν σημείων $M(x,y)$, διὰ τά όποια :

$$\vec{O}\vec{l} \cdot \vec{HM} = 0 \text{ ή } (\S \text{ 55 παρατήρησις})$$

$$\vec{O}\vec{l} \cdot \vec{OM} = \vec{O}\vec{l} \cdot \vec{OH} = p \text{ ή}$$

$$x \text{ συνω} + y \text{ ημω} = p \quad (1)$$

'Η (1) είναι ή κανονική έξισώσις τῆς (δ) και δύεται εἰς τὸν Hesse.

Προφανῶς, ή θέσις τῆς εύθειας (δ) έξαρτᾶται ἐκ τῆς άποστάσεως $\vec{OH} = p$, θεωρουμένης πάντοτε θετικής, και τῆς γωνίας ω , θεωρουμένης και ταύτης θετικής, εις τρόπον ώστε : $0 \leq \omega \leq 2\pi$.

Παράδειγμα : 'Εάν $\omega = \frac{\pi}{3}$ και $OH = \frac{5}{2}$, ή έξισώσις τῆς (δ) είναι :

$$x \cdot \text{συν} \frac{\pi}{3} + y \cdot \text{ημ} \frac{\pi}{3} = \frac{5}{2} \iff \frac{x}{2} + y \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{5}{2} = 0 \iff x + \sqrt{3} \cdot y - 5 = 0.$$

62. ΑΝΑΓΩΓΗ ΤΗΣ $Ax + By + \Gamma = 0$ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗΝ ΜΟΡΦΗΝ ΑΥΤΗΣ.— 'Αρκεῖ νά δρισωμεν τήν γωνίαν ω και τό p , εις τρόπον ώστε αι έξισώσεις :

$$(1) \quad x \text{ συν } \omega + y \text{ ημ } \omega - p = 0 \quad \text{και} \quad Ax + By + \Gamma = 0 \quad (2)$$

νά παριστάνουν τήν αύτήν εύθειαν. Πρός τοῦτο, πρέπει και ἀρκεῖ :

$$\frac{\text{συν } \omega}{A} = \frac{\text{ημ } \omega}{B} = \frac{-p}{\Gamma} = p \implies \text{συν } \omega = p A, \quad \text{ημ } \omega = p B, \quad -p = p \Gamma$$

$$\text{Όθεν: } p^2(A^2 + B^2) = \sigma vv^2\omega + \eta \mu^2\omega = 1 \implies p = \frac{1}{\pm \sqrt{A^2 + B^2}} \quad (3)$$

καὶ κατ' ἀκολουθίαν :

$$(4) \quad \sigma vv \omega = \frac{A}{\pm \sqrt{A^2 + B^2}} \quad \text{καὶ} \quad \eta \mu \omega = \frac{B}{\pm \sqrt{A^2 + B^2}} \quad (5)$$

*Αρα ἡ (1) γράφεται :

$$\frac{A}{\pm \sqrt{A^2 + B^2}} x + \frac{B}{\pm \sqrt{A^2 + B^2}} y + \frac{\Gamma}{\pm \sqrt{A^2 + B^2}} = 0 \quad (6)$$

Σημείωσις : Εάν $p > 0$, ἐκ τῆς σχέσεως $-p = p\Gamma$ ἔπειται ὅτι οἱ ρ καὶ Γ θὰ είναι ἔτερόσημοι ἀριθμοί, ἐκτὸς ἐάν $\Gamma = 0$.

Εάν $\Gamma = 0$, τότε $p = 0$ καὶ κατ' ἀκολουθίαν $\omega < \pi$. *Αρα τημ $\omega > 0$, ὅπότε ἐκ τῆς σχέσεως ημ $\omega = \rho B$, ἔπειται ὅτι οἱ ρ καὶ B είναι ὁμόσημοι ἀριθμοί.

*Εκ τῶν ἀνωτέρω ἔπειται ὁ χρήσιμος κανών.

ΚΑΝΩΝ : Διὰ νὰ ἀναγάγωμεν τὴν $Ax + By + \Gamma = 0$ εἰς τὴν καν. μορφήν :

1ον : Εὑρίσκομεν τὴν τιμήν : $\sqrt{A^2 + B^2}$,

2ον : Δίδομεν εἰς τὴν τιμήν $\sqrt{A^2 + B^2}$ ἀντίθετον πρόσημον τοῦ Γ , ή ἂν $\Gamma = 0$, τὸ αὐτὸ πρόσημον μὲ τὸ τοῦ B , καὶ :

3ον : Διαιροῦμεν ἀμφότερα τὰ μέλη τῆς $Ax + By + \Gamma = 0$ διὰ τοῦ ἀποτελέσματος τοῦ 2ον :

Προκύπτει οὕτως ἡ ζητουμένη ἔξισωσις :

Παράδειγμα : Εστω ἡ ἔξισωσις $4x - 3y + 15 = 0$. Είναι :

$\rho = -\sqrt{A^2 + B^2} = -\sqrt{16 + 9} = -5$, διότι πρέπει $\rho \Gamma < 0$. Διαιροῦντες διὰ -5 , λαμβάνομεν τὴν ἔξισωσιν : $-\frac{4}{5}x + \frac{3}{5}y - 3 = 0$, ητις είναι ἡ ζητουμένη, μὲ συν $\omega = -\frac{4}{5}$, ημ $\omega = -\frac{3}{5}$ καὶ $p = 3$.

A S K H S E I S

84. Νὰ μορφωθοῦν αἱ ἔξισώσεις καὶ νὰ κατασκευασθοῦν αἱ εύθεῖαι, διὰ τὰς δύοις είναι :

1. $\omega = 0$, $p = 5$	5. $\omega = \frac{\pi}{2}$, $p = 10$
2. $\omega = \frac{3\pi}{2}$, $p = 3$	6. $\omega = \frac{2\pi}{3}$, $p = 2$
3. $\omega = \frac{\pi}{4}$, $p = 3$	7. $\omega = \pi$, $p = 5$
4. $\omega = \frac{7\pi}{4}$, $p = 4$	8. $\omega = \frac{5\pi}{4}$, $p = 1$

85. Νὰ ἀναχθοῦν ὑπὸ τὴν κανονικὴν μορφὴν αἱ ἔξισώσεις :

1. $3x + 4y - 10 = 0$	3. $x + y + 8 = 0$
2. $5x - 12y + 39 = 0$	4. $\sqrt{3} - y = 0$

63. ΑΠΟΣΤΑΣΙΣ ΣΗΜΕΙΟΥ $M_0(x_0, y_0)$ ΑΠΟ ΕΥΘΕΙΑΣ (δ) ΕΞΙΣΩΣΗΣ

$$x \sin \omega + y \eta \mu \omega - p = 0.$$

Είσ τὴν περίπτωσιν ταύτην (σχ. 41) είναι $u = \sqrt{A^2 + B^2} = \sqrt{\sin^2 \omega + \eta \mu^2 \omega} = 1$ καὶ δὲ τύπος (2) τῆς (§ 60) γίνεται :

$$d = |x_0 \sin \omega + y_0 \eta \mu \omega - p| \quad (1)$$

Ἐάν τὸ M_0 ἔχῃ τὴν θέσιν $O(0, 0)$ τῶν ἀξόνων, τότε ἡ (1) γίνεται :

$$d = |p|. \quad (2)$$


64. ΕΞΙΣΩΣΙΣ ΤΩΝ ΔΙΧΟΤΟΜΩΝ ΤΩΝ ΓΩΝΙΩΝ ΔΥΟ ΕΥΘΕΙΩΝ.—

Ἐστωσαν (δ_1) καὶ (δ_2) δύο εὐθεῖαι ἔξισώσεων :

$$A_1 x + B_1 y + \Gamma_1 = 0 \quad (1)$$

$$\text{καὶ } A_2 x + B_2 y + \Gamma_2 = 0 \quad (2)$$

Θὰ ζητήσωμεν νὰ ἐκφράσωμεν ὅτι τὸ σημεῖον $M(x, y)$ κεῖται ἐπὶ τῆς μιᾶς ἢ τῆς ἄλλης τῶν διχοτόμων τῆς γωνίας A_0 τῶν εὐθεῶν (δ_1) καὶ (δ_2) . Ἀναγκαία καὶ ίκανὴ συνθήκη είναι : αἱ ἀποστάσεις τοῦ $M(x, y)$ ἀπὸ τὰς (δ_1) καὶ (δ_2) νὰ εἰναι ἴσαι : Δηλαδὴ : $MH_1 = MH_2$



Σχ. 43

$$\frac{|A_1 x + B_1 y + \Gamma_1|}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2}} = \frac{|A_2 x + B_2 y + \Gamma_2|}{\sqrt{A_2^2 + B_2^2}}$$

Κατ' ἀκολουθίαν ἡ μία τῶν διχοτόμων ἔχει ἔξισωσιν :

$$\frac{A_1 x + B_1 y + \Gamma_1}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2}} - \frac{A_2 x + B_2 y + \Gamma_2}{\sqrt{A_2^2 + B_2^2}} = 0 \quad (3)$$

καὶ ἡ ἄλλη διχοτόμος θὰ ἔχῃ ἔξισωσιν :

$$\frac{A_1 x + B_1 y + \Gamma_1}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2}} + \frac{A_2 x + B_2 y + \Gamma_2}{\sqrt{A_2^2 + B_2^2}} = 0. \quad (4)$$

Σημείωσις : Διὰ νὰ εύρωμεν ποία ἐκ τῶν ἔξισώσεων (3) καὶ (4) παριστᾶ τὴν ἔσωτερην καὶ ποία τὴν ἔξωτερην διχοτόμον τῆς γωνίας A_0 , ἐργαζόμεθα ὡς ἔξῆς :

Θεωροῦμεν τὰς ἔξισώσεις τῶν (δ_1) καὶ (δ_2) ύπὸ τὴν κανονικὴν μορφὴν αὔτῶν :

$$(\delta_1) : x \sin \omega_1 + \psi \mu \omega_1 - p_1 = 0 \quad \text{καὶ} \quad (\delta_2) : x \sin \omega_2 + y \eta \mu \omega_2 - p_2 = 0.$$

Ο λόγος τῶν ἀποστάσεων αὐτῶν ἀπὸ σημεῖον τῆς εὐθείας :

$$(\delta) : x \sin \omega_1 + y \eta \mu \omega_1 - p_1 + k(x \sin \omega_2 + y \eta \mu \omega_2 - p_2) = 0 \\ \text{είναι} -k, (k \in \mathbb{R}).$$

Πράγματι, έστω $M_0(x_0, y_0)$ τυχόν σημείον τής (δ) . Θά έχωμεν :

$$x_0 \sigma_{\omega_1} + y_0 \eta_{\omega_1} - p_1 + k (x_0 \sigma_{\omega_2} + y_0 \eta_{\omega_2} - p_2) = 0,$$

εξ ού :

$$-k = \frac{x_0 \sigma_{\omega_1} + y_0 \eta_{\omega_1} - p_1}{x_0 \sigma_{\omega_2} + y_0 \eta_{\omega_2} - p_2} \quad (5)$$


Ο άριθμητής τής (5) είναι ή Δ πόστασις τής (δ_1) από τό M_0 , και ή παρονομαστής ή Δ πόστασις τής (δ_2) από τό M_0 . Κατ' άκολουθίαν, $-k$ είναι ή λόγος τῶν Δ πόστασεων τῶν (δ_1) και (δ_2) από τό M_0 τής εύθειας (δ) .

'Εάν $k = \pm 1$, ή (δ) είναι μία ή Δ λλη τῶν διχοτόμων τής γωνίας τῶν (δ_1) και (δ_2) .

Η γωνία τῶν (δ_1) και (δ_2) , έντός τής όποιας εύρισκεται ή Δ ρχή Ο τῶν Δ ξόνων, ή Δ κατακορυφήν τής, είναι ή Δ σωτερική γωνία τῶν (δ_1) και (δ_2) . Αι ίδιαι είναι Δ ξωτερικαι τῶν εύθειῶν τούτων.

Κατά τόν κανόνα τής ($\S 64$) έπειτα θί (δ) κείται εἰς τό Δ σωτερικόν τής γωνίας τῶν (δ_1) και (δ_2) , οταν $k < 0$ και εἰς τό Δ ξωτερικόν, οταν $k > 0$.

'Εάν ή Δ ρχή Ο κείται έπι τής (δ_1) ή τής (δ_2) , θα πρέπει νά κατασκευασθοῦν αι εύθειαι (δ_1) και (δ_2) και αι γωνίαι εἰς τάς όποιας $k > 0$ Δ ντιστοιχοῦν αι διχοτόμοι (Δ σωτερική- Δ ξωτερική) κατά τό σχῆμα.



Σχ. 44

ΑΣΚΗΣΙΣ

86. Νά μορφωθοῦν αι Δ ξισώσεις τῶν διχοτόμων τῶν πλευρῶν είναι :

$$4x - 3y - 12 = 0, \quad 5x - 12y - 4 = 0, \quad 12x - 5y - 13 = 0$$


και νά δειχθῇ θί διέρχονται διὰ τοῦ αύτοῦ σημείου.

65. ΣΗΜΕΙΟΝ ΤΟΥ ΤΡΙΩΝΥΜΟΥ $\alpha x + \beta y + \gamma$.—Τό σημεῖον τής παραστάσεως $E = \alpha x + \beta y + \gamma$ Δ ξαρτάται από τάς Δ ριθμητικάς τιμάς τῶν x και y , δηλαδή έκ τής θέσεως τοῦ σημείου $M(x, y)$ τοῦ Καρτεσιανοῦ Δ πιπέδου xOy (σχ. 45).

"Ινα ή παράστασις E είναι μηδέν, πρέπει και Δ ρκει τό $M(x, y)$ νά κείται έπι τής εύθειας (δ) , Δ ξισώσεως :

$$\alpha x + \beta y + \gamma = 0.$$

"Ωστε : $E = 0 \iff M \in (\delta)$.



Σχ. 45

"Εάν $M \in (\delta)$, παριστῶμεν διὰ τοῦ P τήν τομήν τής (δ) μετά τής έκ τοῦ M παραλλήλου $M\mu$ πρὸς τὸν Δ ξόνα Oy . Τό p έχει συντεταγμένας, προφανῶς, (x, y_0) .

"Αρα : $\alpha x_0 + \beta y_0 + \gamma = 0$ (1)

Διατά σημείον $M(x, y)$ θά έχωμεν :

$$E = \alpha x + \beta y + \gamma = (\alpha x + \beta y + \gamma) - (\alpha x + \beta y_0 + \gamma) = \beta y - \beta y_0$$

ή

$$E = \beta(y - y_0) = \beta \cdot \overline{PM}. \quad (2)$$

Έκ της (2) φαίνεται ότι ή παράστασις E έχει τό σημείον τού β , έλαν τό $\overline{PM} > 0$, δηλαδή έλαν τό M κείται εις τό ήμιεπίπεδον (1), κειμένου άνωθεν της (δ). Θά έχη δὲ σημείον άντιθετον τού β , έλαν τό $\overline{PM} < 0$, δηλαδή τό M κείται εις τό ήμιεπίπεδον (2), τό κειμένον κάτωθεν της εύθειας (δ).

Ωστε : Τό τριώνυμον $\alpha x + \beta y + \gamma$ είναι θετικόν διὰ πᾶν σημείον τού ένδι τῶν ήμιεπίπεδων τῶν δριζομένων ύπο της εύθειας, έξισώσεως $\alpha x + \beta y + \gamma = 0$ καὶ ἀρνητικὸν διὰ πᾶν σημείον τού ἄλλου ήμιεπίπεδου.


Διατά νά διαχωρίσωμεν τά δύο ταῦτα ἀνοικτά ήμιεπίπεδα, ἀναζητούμεν τό πρόσημον τῆς E , τό ἀντιστοιχοῦ εις τήν ἀρχὴν $O(0,0)$ τῶν ἀξόνων, εις τήν περίπτωσιν καθ' ἥν $\gamma \neq 0$. Εις τοῦτο εἰναι $E = \gamma$.

Τό σημεῖον τῆς $E = \alpha x + \beta y + \gamma$ είναι τό τού γ εις τό ήμιεπίπεδον, εις δὲ κείται ή ἀρχὴ $O(0,0)$ τῶν συντεταγμένων.

Παράδειγμα : Τό τριώνυμον $2x + 3y - 6$ είναι ἀρνητικὸν εις τό ἀνοικτόν ήμιεπίπεδον, τό περιέχον τήν ἀρχὴν $O(0,0)$, εις τό δποιον χωρίζεται ύπο της εύθειας (δ), έξισώσεως $2x + 3y - 6 = 0$ (σχ. 46) καὶ θετικόν εις τό ἄλλο ἀνοικτόν ήμιεπίπεδον. Πρὸς διάκρισιν τοποθετούμεν τό σημείον $+$ καὶ τό σημείον $-$ ἐκατέρωθεν τῆς εύθειας (δ) διὰ νά δειχωμεν τό θετικόν ή τό ἀρνητικόν πρόσημον τού τριώνυμου $\alpha x + \beta y + \gamma$.

66. ΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΙΣ ΤΗΣ ΑΝΙΣΩΣΕΩΣ : $\alpha x + \beta y + \gamma > 0$. — **Άρκει** νά εύρωμεν τό Σύνολον τῶν σημείων τού ἐπιπέδου, τῶν δποίων αἱ συντεταγμέναι x καὶ y ἐπαληθεύουν τήν ἀνίσωσιν $\alpha x + \beta y + \gamma > 0$.

Κατασκευάζομεν τήν εύθειαν (δ), έξισώσεως $\alpha x + \beta y + \gamma = 0$ καὶ προσδιορίζομεν τό σημείον τῆς παραστάσεως $\alpha x + \beta y + \gamma$ εις ἐκαστον τῶν ἀνοικτῶν ήμιεπίπεδων, εις τά δποια χωρίζεται τό ἐπιπέδον xOy ύπο τῆς εύθειας (δ). Καλύπτομεν ἀκολούθως διὰ παραλήλων γραμμῶν (γραμμοσκίασμα) τό μέρος τού ἐπιπέδου, τό δποιον δὲν ἀρμόζει εις τήν λύσιν τού προβλήματος.



Σχ. 46

Οὔτω, διὰ νά λάβωμεν τά σημεῖα τού ἐπιπέδου (σχ. 47), τῶν δποίων αἱ συντεταγμέναι ἐπαληθεύουν τήν ἀνίσωσιν

$2x + 3y - 6 > 0$, γραμμοσκιάζομεν τὸ ἀρνητικὸν μέρος τοῦ ἐπιπέδου, τὸ ὅποιον περιέχει τὴν ἀρχὴν $O(0,0)$ τῶν συντεταγμένων.

Ἡ εὐθεῖα (δ) παρίσταται δι’ ἑστιγμένης γραμμῆς, διὰ νὰ δείξωμεν δὲτι αἱ συντεταγμέναι τῶν σημείων αὐτῆς μηδενίζουν τὸ τριώνυμον $2x + 3y - 6$, ἐκτὸς ἐὰν εἰχομεν πρὸς λύσιν τὴν $2x + 3y - 6 \geq 0$, δηπότε ἡ (δ) πρέπει νὰ γραφῇ συνεχῆς γραμμῆς.

67. ΕΦΑΡΜΟΓΑΙ.— Βάσει τῶν προηγουμένων ἐκτεθέντων, δυνάμεθα νὰ ἐπιλύσωμεν σύστημα ἀνισώσεων τοῦ πρώτου βαθμοῦ ἢ νὰ εὑρωμεν τὸ πρόσημον τοῦ γινομένου (ἐπίλυσις ἀνισώσεως) πρωτοβαθμίων παραγόντων ὡς πρὸς x, y .

Παράδειγμα 1ον : Διὰ ποίας τιμᾶς τῶν x, y συναληθεύουν αἱ ἀνισώσεις :

$$x + y - 1 < 0 \quad (1), \quad x - y + 1 > 0 \quad (2),$$


$$y + 1 > 0 \quad (3).$$

Κατασκευάζομεν (σχ. 48) τὰς εὐθείας $(\delta_1), (\delta_2), (\delta_3)$, ἔξισώσεων :

$$x + y - 1 = 0, \quad x - y + 1 = 0,$$

$$y + 1 = 0.$$

Ἐὰν γραμμοσκιάσωμεν ἔκαστον ἡμιεπίπεδον, εἰς δὲ αἱ συντεταγμέναι τῶν σημείων του δὲν ἐπαληθεύουν τὴν ἀντίστοιχον ἀνίσωσιν, καταλήγωμεν εἰς τὸ συμπέρασμα δὲτι μόνον τὰ ἐσωτερικὰ σημεῖα τοῦ τριγώνου ABG ἔχουν συντεταγμένας ἐπαληθευόντας συγχρόνως καὶ τὰς τρεῖς ἀνισώσεις.



Σχ. 48

Παράδειγμα 2ον : Νὰ ἐπιλυθῇ ἡ ἀνίσωσις :


$$(x - y)(x + 2y)(2x + y - 3) < 0, \quad (1)$$

Κατασκευάζομεν (σχ. 49) τὰς εὐθείας $(\delta_1), (\delta_2), (\delta_3)$, ἔξισώσεων ἀντίστοιχων :

$$x - y = 0, \quad x + 2y = 0,$$

$$2x + y - 3 = 0.$$

Αἱ εὐθεῖαι αὐται χωρίζουν τὸ ἐπιπέδον τῶν ἀξόνων xOy εἰς ἑπτά ἐπιπέδα χωρία. Εἰς ἔκαστον τῶν χωρίων τούτων, τὸ γινόμενον τῶν παραγόντων τοῦ πρώτου μέλους τῆς (1) λαμβάνει ἓνα δώρισμένον πρόσημον. Προσδιορίζομεν τὸ σημεῖον τοῦτο καὶ παραλείπομεν τὸ χωρίον ἑκεῖνο, εἰς τὸ δηποῖον τὸ γινόμενον τοῦτο γίνεται θετικόν. Παρατηροῦμεν εὐκόλως δὲτι ἡ ἀνίσωσις (1) ἀληθεύει διὰ τὰς συντεταγμένας τῶν σημείων τῶν κειμένων εἰς τὰ ἐπιπέδα χωρία 1, 3, 5 καὶ 7, ἔξαιρουμένων τῶν σημείων τῶν κειμένων ἐπὶ τῶν εὐθειῶν $(\delta_1), (\delta_2)$ καὶ (δ_3) .



Σχ. 49

87. Να γίνη γραφική έπιλυσης των συστημάτων:

- | | | | |
|----|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1) | $x + y - 3 > 0,$ | $x - y + 4 < 0,$ | $x - 4 > 0$ |
| 2) | $2x - 3y + 6 > 0,$ | $4x - y - 4 < 0,$ | $4x + 3y + 12 > 0$ |
| 3) | $2x - y + 5 < 0,$ | $2x + y + 7 < 0,$ | $3 - y > 0$ |
| 4) | $5x - 2y + 10 < 0,$ | $7x - 2y + 14 > 0,$ | $2x + y - 5 < 0.$ |

Προτεραίως θα ναστούνται τα μέση μεταξύ των δύο αυτών αριθμών κατόπιν να μάθουν τα σύστηματα.

Έτσι γίνεται ότι τα μέσα μεταξύ των δύο αυτών αριθμών είναι $\delta = 1 + \gamma - z$ και αρνητικά με τα πάντα τα άλλα πράγματα $0 < 1 + \gamma - z < (1) > 1 - \gamma + z$

Δια να διαχωρίσουμε (10), πρώτα ανατίθεται $x - y + 4 < 0$ χωρίς να τον οδηγήσει στην αντίθετη πλευρά, το οποίο γίνεται ότι το σύστημα των εξισώσεων είναι πλέον $\left\{ \begin{array}{l} x - y + 4 < 0 \\ 2x - 3y + 6 > 0 \end{array} \right.$ Έτσι γίνεται $\delta = 1 + \gamma - z = 0 = 1 - \gamma + z$

Το αποτέλεσμα της $x - y + 4 < 0$ είναι ότι το y είναι μεγαλύτερο από το x και προσδιορίζεται από την επιβολή της συνθήκης $0 < 1 + \gamma - z < 1 - \gamma + z$ στην y από την x .

Παρόλοτε θα είναι παραγόντας μεταξύ των δύο αυτών αριθμών το πλανόδιο της συνθήκης $0 < 1 + \gamma - z < 1 - \gamma + z$ από την επιβολή της συνθήκης $0 < 1 + \gamma - z < 1 - \gamma + z$ στην y από την x . Επομένως από την παραγόντας μεταξύ των δύο αυτών αριθμών την επιβολή της συνθήκης $0 < 1 + \gamma - z < 1 - \gamma + z$ στην y από την x αποτελείται η συνθήκη $0 < 1 + \gamma - z < 1 - \gamma + z$ στην x από την y .

Το παραπάνω σύστημα είναι πλέον $\left\{ \begin{array}{l} x - y + 4 < 0 \\ 2x - 3y + 6 > 0 \end{array} \right.$ στην x από την y .

88. ΓΡΑΦΙΚΗ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ $x + y + z > 0$ και $x - y + z > 0$ στην πλάνη των δύο αριθμών του έπιπλου, δηλαδή $x + y + z > 0$ και $x - y + z > 0$ στην πλάνη των δύο αριθμών του έπιπλου.



είναι ίδια να προβλέψουμε ότι μεταξύ της θέσης αρχικής και της παραπομπής της είναι
πάντα (Π) αριθμός αριθμός περισσότερος από την περιφέρεια της γωνίας, λόγω της αριθμούς περιφέρειας
όπου την δρόσισαν κανεναν αριθμός περιφέρειας, είναι αυτή την πλάγιη $d\Gamma$ η οποία για την
ένας συντεταγμένας πολικός.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VI

ΠΟΛΙΚΑΙ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΑΙ

68. ΠΟΛΙΚΑΙ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΑΙ ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟΝ.—

Εις τὴν παροῦσαν παράγραφον θὰ θεωρήσωμεν νέαν μέθοδον προσδιορισμοῦ
τῆς θέσεως τῶν σημείων ἐπιπέδου, τῇ βοηθείᾳ δύο πραγματικῶν ἀριθμῶν. ‘Υ-
ποθέτομεν δεδομένα τὸ σημεῖον O , τὸ ὅποιον
καλοῦμεν πόλον, καὶ μίαν σταθερὰν εὐθεῖαν OA ,
καλούμενην πολικὸν ἄξονα (σχ. 50).

‘Υπὸ τὰς συνθήκας ταύτας, τυχὸν σημεῖον P
τοῦ ἐπιπέδου εἶναι ὡρισμένον, ἢν δοθῇ τὸ μῆκος
 $OP = \rho$ καὶ ἡ γωνία $AOP = \theta$. Οἱ ἀριθμοὶ ρ καὶ θ
καλοῦνται πολικαὶ συντεταγμέναι τοῦ σημείου P .
Τὸ ρ καλεῖται διανυσματικὴ ἀκτὶς καὶ ἡ γωνία θ
καλεῖται πολικὴ γωνία.

‘Η πολικὴ γωνία θ εἶναι θετικὴ ἢ ἀρνητι-
κή, ὅπως καὶ εἰς τὴν Τριγωνομετρίαν. ‘Η διανυ-
σματικὴ ἀκτὶς ρ εἶναι θετική, ἐὰν τὸ P κεῖται ἐπὶ
τῆς τελικῆς πλευρᾶς τῆς γωνίας θ , καὶ ἀρνητική, ὅπα τὸ P κεῖται ἐπὶ τῆς προ-
εκτάσεως τῆς τελικῆς πλευρᾶς τῆς γωνίας θ .

Οὔτως, εἰς τὸ (σχ. 50) ἡ διανυσματικὴ ἀκτὶς ρ τοῦ P εἶναι θετική, ἐνῷ ἡ τοῦ
 P_1 εἶναι ἀρνητική.

Σημείωσις: Εἰς πᾶν σημεῖον τοῦ ἐπιπέδου (διάφορον τοῦ O) ἀντιστοιχεῖ
ἐν ὡρισμένον διατεταγμένον ζεῦγος (ρ, θ) πραγματικῶν ἀριθμῶν, πληρούντων τὰς
σχέσεις :

$$0 < \rho \quad \text{καὶ} \quad 0 \leq \theta < 2\pi$$


καὶ ἀντιστρόφως: Πᾶν τοιοῦτον διατεταγμένον ζεῦγος εἶναι ἀντίστοιχον ἐνὸς
καὶ μόνον σημείου τοῦ ἐπιπέδου, τοῦ ὅποιον αἱ πολικαὶ συντεταγμέναι εἶναι
τὸ δοθὲν ζεῦγος.

Εἰναι προφανὲς ὅτι: δύο τυχόντες πραγματικοὶ ἀριθμοὶ (ρ, θ) προσδιορίζουν
ἐν μόνον σημείον, τὸ ὅποιον κατασκευάζεται κατὰ τὸν ἀκόλουθον κανόνα.

ΚΑΝΩΝ.— Διὰ νὰ δρίσωμεν τὴν θέσιν ἐνὸς σημείου, τοῦ ὅποιον δίδονται
αἱ πολικαὶ συντεταγμέναι (ρ, θ):


1ον : Κατασκευάζομεν τὴν τελικὴν πλευρὰν τῆς γωνίας θ , ὅπως καὶ εἰς τὴν
Τριγωνομετρίαν.

2ον : ’Εὰν ἡ διανυσματικὴ ἀκτὶς ρ εἶναι θετική, λαμβάνομεν ἐπὶ τῆς τελικῆς
πλευρᾶς τῆς γωνίας θ τὸ τμῆμα $OP = \rho$. ’Εὰν δὲ ἡ διανυσματικὴ ἀκτὶς εἶναι ἀρ-



Σχ. 50

νητική, προεκτείνομεν τὴν τελικὴν πλευρὰν τῆς γωνίας θ καὶ λαμβάνομεν ἐπὶ τῆς προεκτάσεως, ἐκ τοῦ πόλου, τμῆμα OP ἵστον πρὸς τὴν ἀριθμητικὴν τιμὴν (ἢ ἀπόλυτον) τοῦ ρ. Τὸ σημεῖον P θὰ εἶναι τότε τὸ ζητούμενον.



Σχ. 51

Εἰς τὸ (σχ. 51) ἔχομεν προσδιορίσει τὴν θέσιν τῶν σημείων, τῶν δποίων αἱ πολικαὶ συντεταγμέναι εἶναι :

$$\left(6, \frac{\pi}{3}\right), \left(3, \frac{5\pi}{4}\right), \left(-3, \frac{5\pi}{4}\right), (6, \pi), \left(7, -\frac{2\pi}{3}\right) \text{ καὶ } \left(5, -\frac{\pi}{3}\right).$$

Ἐκ τῶν δινωτέρω ἐκτεθέντων ἐπεται δτι :

Πᾶν σημεῖον P δρίζει ἀπειρίαν διατεταγμένων ζευγῶν (ρ, θ).

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

88. Νὰ δρισθοῦν τὰ σημεῖα, τῶν δποίων αἱ συντεταγμέναι εἶναι :

$$\left(4, \frac{\pi}{4}\right), \left(6, \frac{2\pi}{3}\right), \left(-2, \frac{2\pi}{3}\right), \left(4, \frac{\pi}{3}\right), \left(-4, \frac{4\pi}{3}\right), (5, \pi).$$

89. Ὁμοίως τὰ σημεῖα :

$$\left(6, \pm \frac{\pi}{4}\right), \left(-2, \pm \frac{\pi}{2}\right), (3, \pi), (-4, \pi), (6, 0), (-6, 0).$$

90. Νὰ ἀποδειχθῇ δτι τὰ σημεῖα (ρ, θ) καὶ $(\rho, -\theta)$ εἶναι συμμετρικά ὡς πρὸς τὸν πολικὸν δξονα.

91. Νὰ ἀποδειχθῇ δτι τὰ σημεῖα (ρ, θ) καὶ $(-\rho, \theta)$ εἶναι συμμετρικά ὡς πρὸς τὸν πόλον.

92. Νὰ ἀποδειχθῇ δτι τὰ σημεῖα $(-\rho, \pi - \theta)$ καὶ (ρ, θ) εἶναι συμμετρικά ὡς πρὸς τὸν πολικὸν δξονα.


69. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΘΟΓΩΝΙΩΝ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΙΣ ΠΟΛΙΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΑΣ.— "Εστωσαν Οχ και Ογ οι άξονες τῶν δρθοκανονικῶν συντεταγμένων, Ο δ πόλος, καὶ Οχ δ πολικὸς ἄξων ἐνὸς συστήματος πολικῶν συντεταγμένων (σχ. 52)."

"Εστωσαν (x, y) αἱ δρθογώνιοι συντεταγμέναι καὶ (ρ, θ) αἱ πολικαι τοιαῦται ἐνὸς σημείου P. Διακρίνομεν δύο περιπτώσεις, καθόσον εἰναι $\rho > 0$ καὶ $\rho < 0$.

Ιον : 'Εὰν $\rho > 0$ (σχ. 52-1), ἐκ τοῦ τριγώνου OAP θὰ ἔχωμεν :

$$x = \rho \cos \theta \quad \text{καὶ} \quad y = \rho \sin \theta \quad (1)$$

εἰς οίονδήποτε τεταρτημόριον καὶ ἀν εύρισκεται τὸ σημεῖον P.



Σχ. 52

2ον : 'Εὰν $\rho < 0$ (σχ. 52-2), θεωροῦμεν τὸ συμμετρικὸν σημεῖον P_1 τοῦ P ὡς πρὸς τὸν πόλον Ο, τοῦ δποίου αἱ δρθογώνιοι συντεταγμέναι θὰ εἰναι $(-\rho, -\theta)$ καὶ αἱ πολικαι $(-\rho, \theta)$. Ή διανυσματικὴ ἀκτίς τοῦ $P_1, (-\rho)$ εἰναι θετική, διότι $\rho < 0$ ἔξ ύποτεσεως. Δυνάμεθα, κατὰ συνέπειαν, νὰ χρησιμοποιήσωμεν τὰς ἔξισώσεις (1). Διὰ τὸ P_1 θὰ ἔχωμεν λοιπόν :

$$\begin{cases} -x = -\rho \cos \theta \\ -y = -\rho \sin \theta \end{cases}, \text{ δπότε διὰ τὸ } P \text{ θὰ εἰναι : } \begin{cases} x = \rho \cos \theta \\ y = \rho \sin \theta \end{cases}.$$

'Εντεῦθεν προκύπτει τὸ ἀκόλουθον θεώρημα :

70. ΘΕΩΡΗΜΑ : 'Εὰν δὲ πόλος συμπίπτει μὲ τὴν ἀρχὴν Ο τῶν συντεταγμένων καὶ δ πολικὸς ἄξων μὲ τὸν θετικὸν ήμιάξονα Οχ, θὰ ἔχωμεν :

$$\begin{cases} x = \rho \cos \theta \\ y = \rho \sin \theta \end{cases} \quad (\text{I})$$

ἔνθα (x, y) αἱ δρθογώνιοι συντεταγμέναι τοῦ τυχόντος σημείου P τοῦ ἐπιπέδου καὶ (ρ, θ) αἱ πολικαι συντεταγμέναι αὐτοῦ.

Αἱ ἔξισώσεις (I) φέρουν τὸ δνομα ἔξισώσεις μετασχηματισμοῦ τῶν δρθογώνιων συντεταγμένων εἰς πολικὰς τοιαύτας.

'Εκ τῶν ἔξισώσεων (I) λαμβάνομεν εύκόλως τάς :

$$\begin{cases} \rho^2 = x^2 + y^2 \quad \text{καὶ} \quad \theta = \text{τοξ εφ } \left(\frac{y}{x} \right), \quad x \neq 0 \\ \eta \mu \theta = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \quad \text{καὶ} \quad \sigma u v \theta = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \end{cases} \quad (\text{II})$$

Σημείωσις: 'Η γωνία θ ύπολογίζεται ἀπὸ τοὺς δύο τελευταίους τύπους μαζί.

71.* ΠΟΛΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΙΣ ΕΥΘΕΙΑΣ.— **1ον:** 'Εάν ή εύθεια (δ) έχη^εσισωσιν τής μορφής $Ax + By + \Gamma = 0$, τότε διὰ τῶν τύπων (1) αὐτὴ μετασχηματίζεται εἰς τήν:

$$\rho(\text{συν}\theta + \text{Β ημθ}) + \Gamma = 0 \quad (1)$$

2ον: 'Εάν ή εύθεια (δ) έχη^εσισωσιν τής μορφής:

$$x \text{ συν} \omega + y \text{ ημω} = p,$$

τότε αὐτὴ διὰ τῶν (1) γίνεται:

$$\rho \text{ συν} \theta \text{ συν} \omega + \rho \text{ημθ} \etaμω = p, \quad \text{εἰς οὕ: } \rho \text{ συν} (\theta - \omega) = p \quad (2)$$

Παρατηρήσεις: Διὰ $\omega = 0^\circ$ ή (2) γίνεται: $\rho \text{ συν} \theta = p$
Διὰ $\omega = 180^\circ$ ή (2) γίνεται: $\rho \text{ συν} \theta = -p$.

Εἰς ἀμφοτέρας τὰς περιπτώσεις ταύτας ή εύθεια (δ) είναι κάθετος ἐπὶ τὸν πολικὸν ὅξονα OX.

Διὰ $\omega = 90^\circ$ ή (2) γίνεται: $\rho \text{ ημθ} = p$
καὶ διὰ $\omega = 270^\circ$ ή (2) γίνεται: $\rho \text{ ημθ} = -p$

Εἰς ἀμφοτέρας τὰς περιπτώσεις ταύτας ή (δ) είναι παράλληλος πρὸς τὸν πολικὸν ὅξονα OX.

Πᾶσα εύθεια διερχομένη διὰ τοῦ πόλου έχει ἔξισωσιν: $\theta = k$
ὅπου k ώρισμένος πραγματικὸς ἀριθμός.

72. ΕΦΑΡΜΟΓΗ.— Νά ενθεῖη ή ἀπόστασις τῶν σημείων $A_1(\rho_1, \theta_1)$ καὶ $A_2(\rho_2, \theta_2)$.

Αύστις: Γνωρίζομεν διτὶ ή ἀπόστασις τῶν σημείων A_1 , A_2 εἰς Καρτεσιανὰς συντεταγμένας είναι:

$$d^2 = (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 \quad (1)$$

'Αλλὰ $x_1 = \rho_1 \text{ συν} \theta_1$ καὶ $x_2 = \rho_2 \text{ συν} \theta_2$
 $y_1 = \rho_1 \text{ ημθ}_1$ $y_2 = \rho_2 \text{ ημθ}_2$, διπότε ή (1) γίνεται:

$$d^2 = (\rho_2 \text{ συν} \theta_2 - \rho_1 \text{ συν} \theta_1)^2 + (\rho_2 \text{ ημθ}_2 - \rho_1 \text{ ημθ}_1)^2$$

καὶ μετὰ τὰς καταλλήλους πράξεις λαμβάνομεν τὸν τύπον:

$$d^2 = \rho_1^2 + \rho_2^2 - 2\rho_1 \rho_2 \text{ συν} (\theta_1 - \theta_2) \quad (2)$$

Διὰ $\theta_1 = \theta_2$ έχομεν τὴν ἐπέκτασιν τοῦ Πιθαγορείου θεωρήματος.

Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ

93. Αἱ ἀκόλουθοι ἔξισώσεις νά μετασχηματισθοῦν εἰς πολικάς:

- | | | |
|---------------------|-------------------------------|----------------------|
| 1) $x - 3y = 0$ | 4) $x^2 + y^2 - \alpha x = 0$ | ὅξονες ὀρθοκανονικοὶ |
| 2) $y + 5 = 0$ | 5) $x^2 - y^2 = \alpha^2$ | |
| 3) $x^2 + y^2 = 16$ | 6) $2xy = 7$ | |

94. Αἱ ἀκόλουθοι ἔξισώσεις νά μετασχηματισθοῦν εἰς Καρτεσιανὰς καὶ ὀρθογωνίους συντεταγμένας καὶ κανονικάς.

- | | | |
|-----------------------------------|---|---|
| 1) $\rho = 10$ | 5) $\rho^2 \text{συν}^2 \theta = \alpha^2$ | 9) $\rho = \alpha(1 - \text{συν} \theta)$ |
| 2) $\rho = 16 \text{ συν} \theta$ | 6) $\rho = \alpha \text{ ημ} 2\theta$ | 10) $\rho^2 \text{ημ} 2\theta = 16$ |
| 3) $\rho \text{ ημθ} = 4$ | 7) $\rho = \alpha \text{ συν} 2\theta$ | 11) $\rho^2 = 16 \text{ ημ} 2\theta$ |
| 4) $\rho = \alpha \text{ ημθ}$ | 8) $\rho \text{συν} \theta = \alpha \text{ημ}^2 \theta$ | 12) $\rho = \alpha \text{ημ} 3\theta$ |

95. Νὰ εύρεθοῦν αἱ ὁρθογώνιοι συντεταγμέναι τῶν σημείων :

$$\left(5, \frac{\pi}{2}\right), \left(-2, \frac{3\pi}{4}\right), (3, \pi).$$

96. Νὰ ὑπολογισθῇ τὸ ἐμβαδὸν τριγώνου ABG συναρτήσει τῶν συντεταγμένων τῶν κορυφῶν του εἰς ὁρθοκανονικούς ἄξονας, πρῶτον εἰς Καρτεσιανάς συντεταγμένας καὶ δεύτερον εἰς πολικάς.

97. Νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι τὰ σημεῖα $\left(4, \frac{5\pi}{6}\right)$, $\left(12 - 4\sqrt{3}, \frac{\pi}{2}\right)$, $\left(12, \frac{\pi}{3}\right)$ κεῖνται ἐπ' εὐθείας.

98. Νὰ ὑπολογισθῇ τὸ ἐμβαδὸν τοῦ τριγώνου ABG , τοῦ ὅποιού κορυφαῖ εἶναι τὰ σημεῖα :

1) $A\left(4, \frac{\pi}{3}\right)$, $B\left(6, \frac{2\pi}{3}\right)$, $\Gamma\left(8, \frac{4\pi}{3}\right)$

2) $A\left(12, \frac{\pi}{6}\right)$, $B\left(8, \frac{5\pi}{6}\right)$, $\Gamma\left(5, \frac{5\pi}{6}\right)$.

99. Νὰ ὑπολογισθῇ ἡ ἀπόστασις τῶν σημείων $A\left(5, \frac{2\pi}{3}\right)$, $B\left(8, \frac{\pi}{3}\right)$.

100. Νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι αἱ ἔξισώσεις τῶν διχοτόμων γωνίας δύο τεμνομένων εύθειῶν ὑπὸ τὴν κανονικὴν μορφὴν εἶναι :

$$\begin{aligned} x(\sin\omega_1 + \sin\omega_2) + \beta(\eta\omega_1 + \eta\omega_2) - (p_1 + p_2) &= 0 \\ \text{καὶ} \quad x(\sin\omega_1 - \sin\omega_2) + y(\eta\omega_1 - \eta\omega_2) + (p_2 - p_1) &= 0 \end{aligned} \quad \left. \right\}.$$

101. Εἰς ὁρθοκανονικὸν σύστημα συντεταγμένων θεωροῦμεν τὰ σημεῖα $A(1,6)$, $B(-4,2)$, $\Gamma(3,-1)$. Νὰ ὑπολογισθῇ :

1) Τὸ μῆκος BG .

2) Τὸ ὕψος AH τοῦ τριγώνου ABG .

3) Αἱ ἔξισώσεις τῶν ἐσωτερικῶν διχοτόμων τοῦ τριγώνου ABG .

4) Αἱ ἔξισώσεις καὶ τὰ μήκη τῶν διαμέσων του καὶ τῶν ἐξωτερικῶν διχοτόμων του.

5) Αἱ ἔξισώσεις τῶν μεσοκαθέτων τῶν πλευρῶν του.

6) Αἱ ἔξισώσεις τῶν εὐθειῶν αἱ ὅποιαι συνδέουν τὰ μέσα τῶν πλευρῶν του.

ΓΕΝΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΝ.

102. Νὰ εύρεθοῦν αἱ συντεταγμέναι τοῦ σημείου τῆς εὐθείας (δ) ἔξισώσεως $3x - 5y + 6 = 0$, τὸ ὅποιον ἀπέχει ἵσον τῶν σημείων $(3,-4)$, $(2,1)$.

103. Νὰ εύρεθῇ ἡ ἔξισώσις τῆς εὐθείας, ἡ ὅποια διέρχεται διὰ τοῦ σημείου $(2,5)$ καὶ τοιαύτης ὥστε τὸ μεταξὺ τῶν ἀξόνων τμῆμα αὐτῆς νὰ διαιρεῖται ὑπὸ τοῦ σημείου τούτου εἰς δύο ἴσα μέρη.

104. Νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι αἱ εὐθείαι $y = \lambda x + \beta$, διόπου $\lambda = \beta$, διέρχονται διὰ τοῦ αὐτοῦ σημείου. Ποιαὶ αἱ συντεταγμέναι τοῦ σημείου τούτου;

105. Νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι ἡ παράστασις $E = \alpha x + \beta y$ εἶναι τὸ ἐσωτερικὸν γινόμενον τῶν διαινυσμάτων $\overrightarrow{\text{OB}}(\alpha, \beta)$ καὶ $\overrightarrow{\text{OM}}(x, y)$.

106. Πάσσαι αἱ εὐθείαι $Ax + By + \Gamma = 0$, διὰ τὰς ὅποιας $A + B + \Gamma = 0$, διέρχονται διὰ τοῦ αὐτοῦ σημείου, τοῦ ὅποιου ζητοῦνται αἱ συντεταγμέναι.

107. Νὰ εύρεθῇ ὁ λόγος, εἰς τὸν ὅποιον ἡ εὐθεία $x + 3y - 6 = 0$ διαιρεῖ τὸ τμῆμα, τὸ ἔχον συντεταγμένας τῶν ἀκρων $(-3,2)$, $(6,1)$.

108. Νὰ δρισθῇ ὁ μ , οὕτως ὥστε ἡ εὐθεία $y = \mu x - 7$ νὰ διαιρῇ τὸ τμῆμα $A_1(3,2)$, $A_2(1,4)$ εἰς λόγον $\frac{3}{2}$.

109. Νὰ εύρεθοῦν αἱ ἔξισώσεις τῶν διχοτόμων τῶν γωνιῶν τῶν εὐθειῶν $4x - 3y - 1 = 0$ καὶ $3x - 4y + 2 = 0$ καὶ νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι αὗται εἶναι κάθετοι.

110. Νά εύρεθη δ γεωμ. τόπος τῶν σημείων, δῶν δ λόγος τῶν διποστάσεων διπό τάς εύθειάς, ἔξισώσεων : $4x - 3y + 4 = 0$ καὶ $5x + 12y - 8 = 0$ είναι $\frac{13}{5}$.

111. Αἱ πλευραὶ ἑνὸς τριγώνου ABC ἔχουν ἔξισώσεις :

$$3x + 4y - 12 = 0, \quad 3x - 4y = 0, \quad 4x + 3y + 24 = 0.$$

Νά διποδειχθῇ δτι ἡ διχοτόμος τῆς A καὶ αἱ ἔξωτερικαὶ διχοτόμοι τῶν γωνιῶν B, G διέρχονται διὰ τοῦ αὐτοῦ σημείου, τοῦ δποίου ζητοῦνται αἱ συντεταγμέναι.

112. Νά εύρεθη δ ἡ ἔξισώσις τῆς εύθειας (δ), συντελεστοῦ διευθύνσεως $\lambda = \frac{3}{4}$, καὶ τῆς δποίας ἡ διπόστασις διπό τὸ σημεῖον $(2,4)$ είναι 2.

113. Νά εύρεθοῦν αἱ γωνίαι τοῦ τριγώνου ABC , τοῦ δποίου αἱ πλευραὶ ἔχουν ἔξισώσεις $3x + 2y - 4 = 0, \quad x - 3y + 6 = 0, \quad 4x - 3y - 10 = 0$, καὶ νά διποδειχθῇ δτι :

$$\text{εφ}A + \text{εφ}B + \text{εφ}G = \text{εφ}A + \text{εφ}B + \text{εφ}G, \quad \text{καὶ } A + B + G = 180^\circ.$$

114. Διδεται ἐπίπεδον (P), μία εύθεια (δ) ἐπὶ τοῦ ἐπίπεδου καὶ ἐν σημείον A ἐκτὸς τοῦ ἐπίπεδου. "Εστω H ἡ προβολὴ τοῦ A ἐπὶ τὸ ἐπίπεδον (P) καὶ K ἡ προβολὴ τοῦ H ἐπὶ τὴν (δ). Νά διποδειξητε δτι τὸ K είναι προβολὴ τοῦ A ἐπὶ τὴν (δ).

115. 'Ἐπι τοῦ ἐπίπεδου τῶν ἀξόνων (Ox, Oy) δίδονται τὰ σημεῖα $A(-2, 1), B(4, -1), G(7, 2)$. Νά δρισθοῦν αἱ συντεταγμέναι τῆς κορυφῆς Δ τοῦ παραλληλογράμμου $AB\Gamma\Delta$.

116. 'Ἐπι τοῦ ἐπίπεδου τῶν ἀξόνων (Ox, Oy) θεωροῦμεν τὴν εύθειαν (δ), ἔξισώσεως : $\alpha x + \beta y + \gamma = 0$ καὶ τὰ σημεῖα $M_1(x_1, y_1), M_2(x_2, y_2)$ μὴ κείμενα ἐπὶ τῆς (δ). 'Ἐὰν I είναι ἡ τομὴ τῆς (δ) καὶ τοῦ τμήματος M_1M_2 , νά δρισθῇ δ λόγος $\overrightarrow{IM}_1 : \overrightarrow{IM}_2$.

117. Διδεται τρίγωνον ABC καὶ τὰ σημεῖα M, N, P ἐπὶ τῶν πλευρῶν BG, GA, AB διντιστοίχως. Δείξατε δτι τὰ σημεῖα M, N, P θὰ κείνται ἐπ' εύθειας δταν, καὶ μόνον δταν, ἔχωμεν :

$$\frac{\overline{MB}}{\overline{MP}} \cdot \frac{\overline{NG}}{\overline{NA}} \cdot \frac{\overline{PA}}{\overline{PB}} = 1.$$

118. Δίδονται τὰ σημεῖα $A(2,1)$ καὶ $(B(6,4)$. Νά δρισθοῦν αἱ συντεταγμέναι τῶν κορυφῶν Γ, Δ τοῦ τετραγώνου $AB\Gamma\Delta$, τὸ δποίον ἔχει πλευράν, τὴν AB .

119. Δίδονται τὰ σημεῖα $A(1,0)$ καὶ $B(3,6)$. Νά δρισθοῦν αἱ συντεταγμέναι τῶν κορυφῶν Γ καὶ Δ τοῦ ρόμβου $AB\Gamma\Delta$, οὗτως ωστε $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}) = \frac{2\pi}{3}$.

120. Νά ύπολογισθῇ ἡ γωνία (u, u) τῶν διανυσμάτων :

$$\overrightarrow{u}(\sqrt{2}, -\sqrt{3}) \quad \text{καὶ} \quad \overrightarrow{u}(3 - \sqrt{2}, \sqrt{3} + \sqrt{6}).$$

121. Δίδονται τὰ διανύσματα $\overrightarrow{u}(4\sqrt{3} - 3, 3\sqrt{3} + 4), \overrightarrow{v}(4, 3)$ καὶ ζητοῦνται τά :

$$\text{συν}(u, v) \quad \text{καὶ} \quad \eta\mu(u, v) \quad \text{καὶ} \quad \overrightarrow{(u, v)}.$$

122. Θεωροῦμεν τὰ διανύσματα : $\overrightarrow{u}(-0,5, 6), \overrightarrow{v}(2,5, -1)$.

Νά ύπολογισθῇ ἡ γωνία τῶν διανυσμάτων $\left\{ \overrightarrow{u} + \overrightarrow{v}, \overrightarrow{u} - \overrightarrow{v} \right\}$.

123. 'Ἐπιλύσατε γραφικῶς τάς ἄνισώσεις :

$$0 \leq \frac{(x-1)(y-1)}{x+y-3} \leq 1.$$

124. Διδεται ἡ εύθεια (δ), ἔξισώσεως x συνω + γημω = p.

Δείξατε δτι ἡ διπόστασις τοῦ σημείου $M_1(x_1, y_1)$ διπό τὴν (δ) είναι :

$$d = x_1 \text{ συνω} + y_1 \text{ γημω} - p.$$

'Εφαρμογή (δ) : $7x + y - 10 = 0$ καὶ $M_1(3,4)$.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΣΙΑΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ

- Σελίς
1. Πρότασις—Προτασιακός τύπος—Ποσοδεική γαι—Σύνθετοι προτάσεις—”Αλγεβρα (λογισμός) των προτάσεων—Πράξεις μεταξύ των λογικών προτάσεων—Ταυτολογίαι και α'ύτοαντιφάσεις—”Εφαρμογαί—”Ασκήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΙ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ

- 2 Ἔννοια τοῦ συνόλου—Παράστασις συνόλου—Τὸ κενὸν σύνολον—‘Υποσύνολον ἄλλου συνόλου, ὑπέρσύνολον, ισότης δύο συνόλων—Βασικὸν σύνολον ἢ σύνολον ἀνάφορᾶς—Πράξεις μεταξύ συνόλων—Καρτεσιανὸν γινόμενον συνόλων—Ασκήσεις—Μαθηματικὴ ἢ τελεία ἐπαγγελή—Ἐφαρμογαὶ—Ασκήσεις

ΜΕΡΟΣ ΑΞΥΤΕΡΟΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙII

ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΤΙΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ

3. 'Ορισμός—'Ιδιότητες των άπολυτών τιμῶν—'Εφαρμογαί—'Ασκήσεις—'Εξισώσεις μέ διάπολυτους τιμάς των δύγνωστων ἐπιλυομένας ἐντὸς τοῦ R—'Ανισώσεις μέ διάπολυτους τιμάς των δύγνωστων—Συστήματα μέ διάπολυτους τιμάς των δύγνωστων ἐπιλυόμενα ἐντὸς τοῦ R—'Εφαρμογαί—'Ασκήσεις 38 - 69

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙV

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ ΘΕΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΚΕΒΑΙΩΝ ΠΟΛΥΟΝΥΜΩΝ

4. 'Ακέραια πολυώνυμα μιδς μεταβλητής—*Έννοια του πολυωνύμου*—'Αλγεβρα (λογισμός) τῶν πολυωνύμων—'Εφαρμογαί—Διαιρετότης άκεραίων πολυωνύμων—'Ιδιότητες τῶν άκεραίων πολυωνύμων—'Εφαρμογαί—'Ασκήσεις—'Ακέραια πολυώνυμα πολλῶν μεταβλητῶν—'Ομογενή και συμμετρικά πολυώνυμα—'Εφαρμογαί—'Ασκήσεις—'Ανάλυσις ρητοῦ κλάσματος εἰς ἄδροισμα ἀπλῶν κλασμάτων—'Εφαρμογαί—'Ασκήσεις—Διώνυμοι εξισώσεις—Τριγωνομετρική μορφή μιγαδικού άριθμού—Τύπος του Διε Μοίνου—Ρίζαι μιγαδικῶν ἀριθμῶν—'Εφαρμογαί—'Ασκήσεις . 70 - 140

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ V

ΠΕΡΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

Σελίς

5. 'Η έννοια τῆς ἀκολουθίας—Μηδενικαὶ ἀκολουθίαι—'Ιδιότητες τῶν μηδενικῶν ἀκολουθῶν—Συγκλίνουσαι ἀκολουθίαι, ἔννοια τοῦ ὄριου—'Ιδιότητες τῶν συγκλίνουσῶν ἀκολουθῶν—Ἐφαρμογαὶ—Μονότονοι ἀκολουθίαι—Ἐφαρμογαὶ ἐπὶ τῶν μονοτόνων ἀκολουθῶν—'Ασκήσεις 141 - 176

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VI

ΠΕΡΙ ΠΡΟΟΔΩΝ

6. 'Αριθμητικαὶ πρόοδοι—'Αρμονικαὶ πρόοδοι—Γεωμετρικαὶ πρόοδοι—'Ἐφαρμογαὶ—'Ασκήσεις 177 - 198

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VII

ΣΕΙΡΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

7. Συμβολισμὸς ἀθροισμάτων—'Η έννοια τῆς σειρᾶς—Σύγκλισις σειρᾶς—Μέθοδοι εύρέσεως τοῦ ἀθροισμάτος τῶν ν πρώτων δρῶν σειρᾶς—'Ιδιότητες συγκλίσεως σειρῶν—Σειραὶ μὲ θετικοὺς δρους—Παράστασις πραγματικῶν ἀριθμῶν μὲ δεκαδικὰς σειρᾶς—Γινόμενον πραγματικῶν ἀριθμῶν μὲ πεπερασμένους τὸ πλήθος παράγοντας—'Απειρογνόμενα—'Ἐφαρμογαὶ—'Ασκήσεις 199 - 229

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VIII

ΛΟΓΑΡΙΘΜΟΙ — ΕΚΘΕΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΘΜΙΚΑΙ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ — ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

8. Λογάριθμοι. 'Ορισμοὶ—'Ιδιότητες—Δεκαδικοὶ λογάριθμοι—Περὶ λογαριθμικῶν πινάκων—Χρήσις λογαριθμικῶν πινάκων—'Ἐφαρμογαὶ—'Ασκήσεις—'Εκθετικαὶ καὶ λογαριθμικαὶ ἔξισώσεις καὶ συστήματα—'Ἐφαρμογαὶ—'Ασκήσεις 230 - 272

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IX

ΑΝΑΤΟΚΙΣΜΟΣ — ΙΣΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ — ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ

9. 'Ανατοκισμὸς—Προβλήματα ἐπ' αὐτοῦ—'Ισαι καταθέσεις—Προβλήματα ἐπ' αὐτῆς—Χρεωλυσία—Προβλήματα ἐπ' αὐτῆς—'Ασκήσεις 273 - 284

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ X

ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΒΑΘΜΟΥ

10. Εισαγωγὴ—'Επίλυσις ειδικῶν τινων περιπτώσεων—'Ἐφαρμογαὶ—'Ακέρσιαι λύσεις τῆς ἔξισώσεως: $x^2 + ky^2 = z^2$, $k \in \mathbb{Z}$ —'Ασκήσεις 285 - 294

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ XI

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΣ

11. Μεταθέσεις—Κυκλικαὶ μεταθέσεις—'Ἐπαναληπτικαὶ μεταθέσεις—Διατάξεις—'Ἐπαναληπτικαὶ διστάξεις—Συνδυασμοὶ—'Ἐπαναληπτικοὶ συνδυασμοὶ—Τύπος τοῦ διωνύμου τοῦ Νεύτωνος—'Ἐφαρμογαὶ—'Ασκήσεις—Στοιχεῖα ἐκ τῆς θεωρίας τῶν πινάκων—'Ἐφαρμογαὶ—'Ασκήσεις 295 - 324

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ XII

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΩΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ

12. 'Ενορατική εισαγωγή εις τάς πιθανότητας—Περὶ τοῦ δειγματικοῦ χώρου—Θεμελιώδεις δρισμοὶ καὶ πράξεις μεταξὺ συμβάντων—Στοιχειώδης δρισμὸς τῆς πιθανότητος—'Εφαρμογαὶ—Διαμορφωμένη προσπέλασις εἰς τάς πιθανότητας—'Ορισμὸς τῆς πιθανότητος μὲ τὴν βοήθειαν τῶν ὑποσυνόλων τοῦ δειγματικοῦ χώρου—Πιθανότης ὑπὸ συνήκην—Πιθανότης τομῆς συμβάντων—Συμβάντα ἀνεξάρτητα ἀλλήλων—Προσθετικὸν θεώρημα τῶν πιθανοτήτων—'Εφαρμογαὶ—'Ασκήσεις	Σελίς
	325 - 350

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ I

1. 'Ἐπαναλήψεις ἐκ τῶν στοιχείων τοῦ διανυσματικοῦ λογισμοῦ — Πράξεις ἐπὶ τῶν διανυσμάτων — Λόγος συγγραμμικῶν διανυσμάτων — Τετμημένη σημείου — Γραμμικὸς συνδυασμὸς — 'Ασκήσεις	351 - 360
---	-----------

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II

2. Συντεταγμέναι διανύσματος — Συντεταγμέναι ἔλευθέρου διανύσματος — Συνθήκη παραλληλίας — Συνιστῶσαι διανύσματος διὰ τῶν συντεταγμένων — 'Ασκήσεις	361 - 368
---	-----------

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ III

3. 'Εσωτερικὸν γινόμενον δύο διανυσμάτων — Γεωμετρικαὶ ἐφαρμογαὶ αὐτοῦ — 'Εξωτερικὸν γινόμενον δύο διανυσμάτων — Συνθήκη καθετότητος — 'Αλλαγὴ δξόνων — 'Ασκήσεις	369 - 383
---	-----------

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IV

4. 'Η εύθεια εἰς τὸ ἐπίπεδον — 'Ἐξίσωσις εύθειας — Διάφοροι μορφαὶ αὐτῆς — Παραλληλία — Καθετότης — Διάφοροι συνθῆκαι εύθειῶν — Δέσμη εύθειῶν — 'Εφαρμογαὶ — 'Ασκήσεις	384 - 399
--	-----------

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ V

5. Σπουδὴ τῆς εύθειας εἰς τὸ δρθοκανονικὸν σύστημα συντεταγμένων — Γωνία δύο εύθειῶν — 'Απόστασις σημείου ἀπὸ εύθειαν — Σημεῖον τοῦ τριωνύμου $\alpha\chi + \beta\psi + \gamma$ — Γραφικὴ ἐπίλυσις τῆς ἀνισώσεως $\alpha\chi + \beta\psi + \gamma > 0$ — 'Ασκήσεις	400 - 412
--	-----------

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VI

6. Πολικαὶ συντεταγμέναι — Μετασχηματισμὸς τῶν δρθογωνίων συντεταγμένων σημείου εἰς πολικάς — 'Ασκήσεις	413 - 418
---	-----------

ПАРОРАМАТА

Σελίς	32, στίχος	17	ἄνωθεν ἀντὶ ΚΕΝ, νὰ γραφῆ: kΕΝ
»	32,	»	8 κάτωθεν » ΚΕΝ (ΚΖν ₀), νὰ γραφῆ: kΕΝ (k \geq ν ₀)
»	34,	»	1 ἄνωθεν » θετικόν, νὰ γραφῆ: μή δρυητικὸν
»	88,	»	3 » . » f _y (x) » . » : f _y
»	187,	»	18 κάτωθεν » ... προόδου θὰ είναι:, νὰ γραφῆ:... προόδου.
»	193,	»	1 ἄνωθεν » Ε νὰ τεθῆ: ε
»	193,	»	13 » » -6,-12,-24, νὰ γραφῆ: -6,12,-24.
»	196,	»	24 » » δριθμοι, » » : δριθμοι
»	222,	»	5 κάτωθεν » (-1) ^y , νὰ τεθῆ: (-1) ^y .

ΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Ε.Ο. ΥΠΟΙΚΑΣ ΣΤΗ ΑΙΓΑΙΟΝ ΜΑΡΙΑ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

ΠΑΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Επί της απόφασης της Επιτροπής για την παροχή στην Ελλάδα της Αναγνωρίσεως της Δημοκρατίας της Κύπρου ως μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην παρούσα παρογράμματα παρέχονται στους πολίτες της Ελλάδας που επέζησαν στην Κύπρο κατά τη διάρκεια της πολιορκίας της Βρετανικής Αυτοκρατορίας, στην περιοχή της Αγίας Πετρούπολης, στην περιοχή της Αθηνών και στην περιοχή της Αίγαλης.



024000019691

ΕΚΔΟΣΙΣ Ε'. 1974 (VIII) - ΣΥΜΒΑΣΙΣ 2473/15.6.74

ΕΚΤΥΠΩΣΙΣ : Ε.Τ.Α. ΣΥΝ. Π.Ε. - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ Κ. ΣΤΑΜΟΥ Ο.Ε.



Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής