

ΣΤΕΛΙΟΥ ΣΠΕΡΑΝΤΣΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΗΣ
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ


ΑΘΗΝΑΙ 1974

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

19628

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΩΡΕΑΝ



ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ, ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΝΕΚΡΑ ΦΥΣΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

Όλόκληρος ό κόσμος, ό όποιος μᾶς περιβάλλει, ἀποτελεῖται ἀπό δύο μεγάλας κατηγορίας σωμάτων.

Ἡ μία τῶν κατηγοριῶν αὐτῶν περιλαμβάνει τὰ φυσικὰ ἐκεῖνα σώματα, τὰ όποια κοινὸν βασικὸν γνώρισμα ἔχουν τὴν ζωὴν καὶ τὰ όποια διὰ τοῦτο λέγονται ἐν ζωαῖς ἢ ἐμβιοῖς δοντα. Τί εἶναι ζωὴ δὲν κατώρθωσεν ἀκόμη ἢ ἐπιστήμη νὰ καθορίσῃ τελείως. Ὁπωσδήποτε δύμως δυνάμεθα νὰ εἴπωμεν, ὅτι ζωὴ εἶναι τὸ σύνολον τῶν ἐκδηλώσεων τῶν ἐντὸς τῶν ἐμβίων δοντων τελουμένων ποικίλων ἔξεργασιῶν, αἱ όποιαι κατευθύνονται εἰς κοινὸν ἀποτέλεσμα. Τὰ ἐμβια αὐτὰ δοντα λέγονται καὶ ἐν ὁργανικαῖς ἡ ἀπλῶς ὁργανικοῖς, διότι εἶναι ἐφωδιασμένα μὲ δργανα, κατάλληλα νὰ πληροῦν ὠρισμένας φυσιολογικάς λειτουργίας τῶν δργανισμῶν. Εἰς τὴν κατηγορίαν αὐτὴν ἀνήκουν τὰ φυτά, τὰ ζῶα καὶ ὁ ἀνθρωπός, τῶν όποιών τὸ δινιαῖον σύνολον ἀποτελεῖ τὸν ὁργανικὸν κόσμον.

Ἡ δλλη κατηγορία περιλαμβάνει τὰ φυσικὰ σώματα, τὰ όποια οὔτε ζωὴν ἔχουν, οὔτε δργανα, καὶ τὰ όποια διὰ τοῦτο λέγονται ἀνόργανα. Εἰς τὴν κατηγορίαν αὐτὴν ἀνήκουν π.χ. οἱ λίθοι, τὰ μέταλλα κτλ., τὰ όποια συνολικῶς ἀποτελοῦν τὸν ἀνόργανον κόσμον.

Εἰς μίαν τρίτην ἐνδιάμεσον κατηγορίαν, τὴν κατηγορίαν τῶν νεκρῶν, δυνάμεθα νὰ κατατάξωμεν τοὺς δργανισμοὺς ἐκείνους,

οἱ ὅποιοι ἔπαυσαν νὰ ἔχουν ζωὴν, ἀλλὰ δὲν ἔχουν ἀκόμη μεταβληθῆ διὰ τῆς ἀποσυνθέσεως εἰς τελείως ἀνόργανα συστατικά, ὕδωρ, ἀλατα, ἀέρια κλπ.

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

Γνωρίζομεν, ὅτι τὸ φυτὸν ἀποτελεῖται ἀπὸ ρίζαν, κορμὸν ἢ στέλεχος, φύλλα κτλ. Τὰ μέρη αὐτὰ τοῦ φυτοῦ οὐδεμίαν ἔχουν μεταξύ των δμοιότητα, ὅπως ούδεμίαν ἔχουν δμοιότητα καὶ τὰ μέρη, ἀπὸ τὰ ὅποια ἀποτελεῖται τὸ ζῶον, δηλαδὴ τὸ δέρμα, αἱ σάρκες, τὰ δοτᾶ κτλ. "Ολα λοιπὸν τὰ δργανικὰ ὄντα ἔχουν σύστασιν ἢ νομοιομερῆ. Ἀντιθέτως, τὰ ἀνόργανα σώματα ἔχουν σύστασιν δμοιομερερῆ, ἀνεξαρτήτως ἀν εὑρεθοῦν τυχὸν εἰς τὴν ὑλὴν των μικροσκοπικὰ ἐγκλείσματα. Ἐὰν π.χ. τεμαχίσωμεν ἓνα ὅγκον μαρμάρου καὶ συγκρίνωμεν ἔπειτα μεταξύ των τὰ διάφορα τεμάχια, θὰ εὕρωμεν, ὅτι ὅλα ἔχουν τὴν αὐτὴν σύστασιν.

Τὸ σῶμα τῶν φυτῶν καὶ τῶν ζῴων εἶναι κατεσκευασμένον ἀπὸ ἰδιάζοντα μικρότατα, μικροσκοπικὰ στοιχεῖα, τὰ ὅποια ὀνομάζονται κύτταρα. Λέγομεν λοιπόν, ὅτι τὰ δργανικὰ ὄντα ἔχουν κατασκευὴν κυτταρικήν. Τοιαύτην κατασκευὴν δὲν ἔχουν καὶ τὰ ἀνόργανα σώματα. "Υπάρχουν δργανισμοὶ μονοκύτταροι καὶ δργανισμοὶ πολυκύτταροι.

Εἰς τὰ δργανικὰ σώματα, μαζὶ μὲ ἄλλας ἐπιπλόκους χημικὰς ἐνώσεις, ἀνευρίσκονται καὶ λευκά ματα. Κανένας ὅμως ἀνόργανον σῶμα δὲν εύρεθη νὰ περιέχῃ ούσιαν, δμοιάζουσαν κάπως πρὸς τὰ λευκώματα.

Τὰ δργανικὰ ὄντα εύρισκονται εἰς στενὴν ἔξαρτησιν πρὸς τὸν ἔξωτερικὸν κόσμον καὶ διὰ τοῦτο συνεχῶς μεταβάλλονται. Τὰ ἀνόργανα δμως σώματα εἶναι ἀδρανῆ, δηλαδὴ δὲν μεταβάλλονται ποτὲ ἀφ' ἑαυτῶν. Λ.χ. τεμάχιον σιδήρου, ἀν καλῶς καλυφθῆ διὰ στρώματος ἐλαιοβαφῆς, προστατεύεται ἀπὸ τὴν ύγρασίαν καὶ διατηρεῖται ἀναλλοίωτον.

Τὰ δργανικὰ ὄντα γεννηταὶ ἀπὸ ἄλλους δμοίους δργανισμούς, αὔξανονται μὲ τὴν θρέψιν, πολλαπλασιάζονται μὲ τὴν παραγωγὴν ἀπογόνων καὶ τέλος γηράσκουν καὶ θνή-


σκον. Τὰ ἀνόργανα σώματα οὔτε αὐξάνονται οὔτε πολλαπλασιάζονται. "Αν δὲ μερικὰ ἔξ αύτῶν, ὡς εἶναι οἱ κρύσταλλοι καὶ οἱ σταλακτῖται, αὐξάνωνται, ἡ αὔξησίς των εἶναι ὅλως διόλου μηχανική. Γίνεται δηλαδὴ μὲ τὴν ἀπλῆν ἐπίθεσιν μορίων ὑλῆς ἀπὸ τὸν ἔξωτερικὸν κόσμον, χωρὶς τὴν ὑλὴν αὐτὴν τὸ ἀνόργανον σῶμα νὰ τὴν ἐπεξεργασθῇ διὰ νὰ τὴν ἀφομοιώσῃ, ὡς πράττουν τὰ ὄργανικὰ ὅντα κατὰ τὴν λειτουργίαν τῆς θρέψεως.

ΔΙΑΦΟΡΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΖΩΩΝ

"Αν καὶ τὰ ὄργανικὰ ὅντα εἰς τὸ σύνολόν των ἔχουν κοινὰ τὰ βασικὰ χαρακτηριστικά, τὴν ζωὴν καὶ τὰ ὄργανα, ἐν τούτοις μεταξὺ φυτῶν καὶ ζώων παρατηροῦνται καὶ ὠρισμέναι διαφοραί. Αἱ διαφοραὶ αὐταὶ εἶναι ἀσαφεῖς μὲν εἰς τοὺς κατωτέρους ὄργανισμούς, σαφέστεραι δὲ εἰς τοὺς ἀνωτέρους.

Δύο κυρίως ἴδιότητες δύνανται σήμερον νὰ θεωρηθοῦν ὡς σταθερὰ διακριτικὰ γνωρίσματα μεταξὺ φυτῶν καὶ ζώων. Ἡ μία τῶν ἴδιοτήτων τούτων εἶναι ἡ παρουσία εἰς τὴν μεμβράνην τοῦ φυτικοῦ κυττάρου μιᾶς ὄργανικῆς ούσίας, τῆς κυτταρίας ή σταθερῆς, ἡ διαφοραὶ δὲν ὑπάρχει καὶ εἰς τὸ ζωϊκὸν κύτταρον. Ἡ ἄλλη εἶναι ἡ ἱκανότης, τὴν ὁποίαν ἔχουν τὰ φυτὰ νὰ προσλαμβάνουν ἀπὸ τὸ περιβάλλον διὰ τὰς ἀνάγκας των ἀπλάξ ἢ νοργάνων εἰς πολυπλόκους δργανάς, τοιουτοτρόπως δὲ νὰ δεσμεύουν ἐντὸς αὐτῶν μεγάλα ποσά ἐνεργείας. Τοιαύτην ἴδιότητα δὲν ἔχουν καὶ τὰ ζῷα, τὰ διαφοραὶ δημοσίας ἐπωφελοῦνται ἀπὸ τὴν ἴδιότητα ἐκείνην τῶν φυτῶν, διότι, τρεφόμενα μὲ φυτικάς τροφάς, εύρισκουν ἐντὸς αὐτῶν ἐτοίμην ἐνέργειαν, διὰ νὰ καταναλώσουν κατὰ τὰς ἀνάγκας των. Ἐπίσης ἀλλα εύρισκουν ἐτοίμην ἐνέργειαν ἐντὸς τῶν ζωϊκῶν τροφῶν.

Ἄλλοτε ὡς ἀποκλειστικὴν ἴδιότητα ἀπέδιδον εἰς τὰ ζῷα τὴν κίνησιν. 'Άλλο' ὑπάρχουν καὶ ζῷα ("Οστρεα, Σπόγγοι, Κοράλλια κλπ.), τὰ διαφοραὶ δὲν κινοῦνται, ἐνῷ ἀντιθέτως ὑπάρχουν φυτὰ (Διάτομα), τὰ διαφοραὶ κινοῦνται. Εἰς τὰ ζῷα ἀπέδιδον καὶ τὴν ἐρεθιστότητα ἢ διεγερσιμότητα, δηλαδὴ τὴν ἱκανότητα νὰ



Εικὼν 1.
Διάτομον.

άντιδρούν εις τὴν ἔξωτερικὴν ἐπίδρασιν μὲν μεταβολὴν τῆς καταστάσεώς των. 'Αλλ' εἰναι γνωστόν, ὅτι τοιαύτην ίδιότητα διαθέτουν καὶ τὰ φυτὰ (Μιμόζα ἢ αἰσχυντηλή, Διωναία ἢ μυιοπαγίς κλπ.).

'Ἐπιστεύετο ἐπίστης ἄλλοτε, ὅτι μόνον τὰ ζῶα ἡσαν ἐτερόποτον δηλαδὴ μὲν οὔσιας ἐκ τοῦ ὀργανικοῦ κόσμου, ἐνῷ τὰ φυτὰ ἐτρέφοντο μόνον μὲν ἀνοργάνους ούσιας (αὐτότροφα). 'Αλλ' εἰναι γνωστόν, ὅτι καὶ μερικὰ φυτὰ (τὰ Παράσιτα) τρέφονται ἀποκλειστικῶς μὲν ὀργανικὰς ούσιας. Τέλος ἐπιστεύετο ἄλλοτε, ὅτι χλωρόφυλλη ν ἔχουν μόνον τὰ φυτά. 'Αλλὰ γνωρίζομεν σήμερον, ὅτι τὰ παράσιτα φυτὰ δὲν ἔχουν τὴν ὀργανικὴν αὐτὴν ούσιαν, ἐνῷ ἀντιθέτως μερικὰ Ἐγχυματικὰ ζῶα ἔχουν χλωροφύλλην.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

'Εὰν δλα τὰ ζῆμβια ὅντα ἔχουν ως βασικὸν γνώρισμα τὴν ζωήν, ἐμφανίζουν ὅμως καὶ ἄλλα κοινὰ χαρακτηριστικὰ μεταξύ των (τὴν μορφήν, τὴν ὀργάνωσιν κτλ.), τὰ ὅποια ἔξετάζουν ἢ Μορφολογία, ἢ Ἀνατομική, ἢ Φυσιολογία, ἢ Οἰκολογία καὶ ἢ Συστηματική.

Γνωρίζομεν ἀπὸ τὴν καθημερινὴν παρατήρησιν, ὅτι ἔκαστος ὀργανισμός, ἔξεταζόμενος ἔξωτερικῶς, παρουσιάζει ώρισμένην μορφήν, ὅχι μόνον αὐτὸς ως ἀτομον, ἀλλὰ καὶ ἔκαστον ἀπὸ τὰ διάφορα μέρη του. Τὸ φυτὸν ἐν συνόλῳ ἔχει ίδιαιτέραν μορφήν, ως ἔχουν ίδιαιτέραν μορφήν καὶ τὰ φύλλα του, ἢ ρίζα του κτλ. Τὸ αὐτὸ δέγομεν καὶ δι' ἐν οἰονδήποτε ζῶον. 'Η τοιαύτη ἔξετασις τῶν ὀργανισμῶν ως πρὸς τὴν ἔξωτερικὴν τῶν μορφὴν ἀποτελεῖ τὴν Μορφολογίαν των.

Κατὰ τὴν ἔξετασιν ὅμως τῶν ὀργανισμῶν δὲν περιοριζόμεθα μόνον εἰς τοὺς ἔξωτερικούς των χαρακτῆρας. 'Η περιέργεια μᾶς ὥθει νὰ ἐρευνήσωμεν καὶ τὰ ἔσωτερικά των ὀργανα. 'Η τοιαύτη ἔξετασις τῶν ὀργανισμῶν ως πρὸς τὴν ἔσωτερικὴν θέσιν τῶν ὀργάνων των, ἀλλὰ καὶ ως πρὸς τὴν ἔσωτερικὴν κατασκευὴν καὶ τὴν ύφήν των, ἀποτελεῖ τὴν Ἀνατομικήν των, ἢ ὅποια ἔλαβεν αὐτὸ τὸ δύνομα, διότι γίνεται μὲν καταλλήλους τομὰς ἐπὶ τοῦ ἔξεταζόμενου σώματος. "Οταν ἡ Ἀνατομικὴ ἀντιπαραβάλλῃ τὰ ὀργανα π.χ. τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος πρὸς τὰ ὀργανα τῶν ζώων καὶ ἀνευρίσκῃ τάς μεταξύ των δύοιότητας ἢ διαφορὰς λέγεται Συγκριτικὴ Ἀνατομική.

Αλλά, διὰ νὰ κατανοήσωμεν καὶ πῶς οἱ διάφοροι ὄργανισμοὶ διατηροῦνται εἰς τὴν ζωὴν, ἀνάγκη νὰ γνωρίσωμεν τὴν λειτουργίαν, τὴν ὅποιαν ἐκτελεῖ δι’ αὐτὴν ἔκαστον ἀπὸ τὰ ὄργανα τῶν. Π.χ. πῶς γίνεται ἡ θρέψις τῶν φυτῶν; Πῶς γίνεται ἡ ἀνταλλαγὴ τῶν ἀερίων εἰς τοὺς πνεύμονας τῶν ζώων; Ἡ ἔξετασις τῶν λειτουργιῶν τῶν διαφόρων ὄργανων ἐνδὲς ὄργανισμοῦ ἀποτελεῖ τὴν Φυσιολογίαν του.

Ἡ διατήρησις τῶν ὄργανισμῶν εἰς τὴν ζωὴν ἔξαρτᾶται καὶ ἀπὸ τὰς ἔξωτερικὰς συνθήκας, ὑπὸ τὰς ὅποιας ζοῦν, ὡς καὶ ἀπὸ τὰς σχέσεις των μὲ τὸν ἄλλον ὄργανικὸν κόσμον. Π.χ. ἄλλοι ὄργανισμοὶ ζοῦν ἐντὸς τῶν ὑδάτων, ἄλλοι εἰς τὴν ξηράν, ἄλλοι εἰς θερμά κλίματα, ἄλλοι εἰς ψυχρά, ἄλλο τρέφονται μὲ σάρκας καὶ ἄλλοι μὲ φυτά, ἄλλοι παρασιτοῦν ἐπὶ ἄλλων ὄργανισμῶν κτλ. Ἡ ἔξετασις τῶν ὄργανισμῶν ὡς πρὸς τὰς σχέσεις των μὲ τὸ ἀνόργανον καὶ τὸ ὄργανικὸν περιβάλλον των ἀποτελεῖ τὴν Οἰκολογίαν των.

Ἄν εἰς τοὺς διαφόρους κατὰ τὴν μορφὴν ὄργανισμούς παραβλέψωμεν μερικὰ ἀτομικά των γνωρίσματα καὶ λάβωμεν ὑπ’ ὅψιν μόνον τὰς οὔσιώδεις δμοιότητάς των, δυνάμεθα νὰ κατατάξωμεν αὐτοὺς πρὸς μελέτην εἰς κεχωρισμένα ἀθροίσματα, τὰ ὅποια ὑποδηλώνουν καὶ τὴν συγγένειάν των καὶ τὰ ὅποια ὀνομάζονται εἰδῆ. Διάφορα συγγενή εἴδη, ἃν συνενωθοῦν μὲ βάσιν καὶ πάλιν τὰ οὔσιώδη γνωρίσματά των, θὰ σχηματίσουν τὰ γένη της. Ἀπὸ τὰ γένη σχηματίζονται, βαθμηδὸν κατὰ τὴν ίδιαν μέθοδον, αἱ οἰκογένειαι, αἱ τάξεις, αἱ διατάξεις, αἱ συνομοτάξεις καὶ τέλος τὸ βασίλειον τῶν φυτῶν ἢ τῶν ζώων. Ο τρόπος αὐτὸς τῆς συστηματικῆς κατατάξεως τῶν ὄργανικῶν ὅντων ἀποτελεῖ τὴν Συστηματικήν των.

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΑΙ

Ἡ ἐπιστήμη, ἡ ὅποια ἐρευνᾷ τὰ φαινόμενα τῆς ζωῆς καὶ ἀναζητεῖ τοὺς νόμους, οἱ ὅποιοι τὰ διέπουν, καλεῖται Βιολογία. Διαιρεῖται δὲ εἰς Γενικὴν καὶ εἰς Εἰδικὴν Βιολογίαν.

Καὶ ἡ μὲν Γενικὴ Βιολογία μελετᾷ τὰ γενικὰ φαινόμενα τῆς ζωῆς, τὰ κοινὰ δι’ ὅλους τοὺς ὄργανισμούς.

Ἡ δὲ Εἰδικὴ Βιολογία ἐνασχολεῖται μὲ τοὺς ἐπὶ μέρους

όργανισμούς, οί δποϊοί αποτελοῦν διάφορα μεγάλα άθροίσματα, ήτοι με τὰ φυτά, μὲ τὰ ζῷα καὶ μὲ τὸν άνθρωπον. Ὡς ἐκ τούτου διακρίνεται εἰς Φυτολογίαν ἡ Βοτανική, εἰς Ζωολογίαν καὶ εἰς Ἀνθρωπολογίαν. Ἐκάστη τῶν ἐπὶ μέρους Βιολογικῶν αὐτῶν ἔπιστη μῶν περιλαμβάνει τὴν Μορφολογίαν, τὴν Ανατομικήν, τὴν Φυσιολογίαν καὶ τὴν Οἰκολογίαν τῶν ἐνοργάνων ὄντων, τὰ δποῖα ἔξετάζει. Μερικώτεραι ἀκόμη ύποδιαιρέσεις, τὰς δποίας ἐπιβάλλει ἡ ἔπιστημονικὴ ἀνάγκη, μᾶς δίδουν μικροτέρου περιεχομένου κλάδους, ὅπως είναι ἡ Βακτηριολογία, ἡ Παρασιτολογία, ἡ Ἐντομολογία, ἡ Ιχθυολογία κλπ.

Πρὸς τὴν Φυτολογίαν, τὴν Ζωολογίαν καὶ τὴν Ανθρωπολογίαν, αἱ δποῖαι ἔξετάζουν τοὺς σήμερον ζῶντας ὄργανισμούς, συνδυάζεται καὶ ἡ Παλαιοντολογία. Αὕτη μελετᾷ τὰ ἀπολιθώματα, ήτοι τὰ λείψανα ὄργανισμῶν, οἱ δποῖοι ἔζησαν εἰς παλαιότερας τῆς παρούσης ζωολογικὰς περιόδους καὶ οἱ δποῖοι ἔνεκλείσθησαν καὶ διετηρήθησαν ἐντὸς τῶν γηίνων στρωμάτων, τῶν σχηματισθέντων πρὸ τῆς περιόδου ταύτης.

Διὰ νὰ ἔξηγήσωμεν τὰ διάφορα γενικὰ φαινόμενα, τὰ δποῖα παρουσιάζονται κατὰ τὴν μελέτην τῶν ἐμβίων ὄντων, ἀναγκαζόμεθα πολλάκις νὰ καταφύγωμεν εἰς ὑποθέσεις καὶ θεωρίας, ὅπως είναι αἱ θεωρίαι περὶ τῆς δημιουργίας τῆς ζωῆς, περὶ τῆς ἔξελίξεως τῶν ὄντων κλπ. Τὸ σύνολον τῶν τοιούτων θεωριῶν συνθέτει τὴν Θεωρητικὴν Βιολογίαν, χρησιμωτάτην διὰ τὴν φιλοσοφικὴν ἀνάπτυξιν τοῦ ἀνθρώπου.

Ἐπειδὴ ἡ ἀπλῆ παρατήρησις καὶ ἡ περιγραφὴ τῶν βιολογικῶν φαινομένων δὲν ἔθεωρήθησαν ἀρκεταί, διὰ νὰ δώσουν πειστικὰ συμπεράσματα, ἡ νεωτέρα ἐπιστήμη, διὰ νὰ θέσῃ ἐπὶ ἀσφαλεστέρων βάσεων τὴν Βιολογίαν, ἔχρησιμοποίησε κατὰ τὴν ἔρευναν καὶ τὸ πείραμα μετὰ τῶν μεθόδων μετρήσεως. Τὸ σύνολον τῶν μεθόδων αὐτῶν ἀπετέλεσε τὴν Πειραματικὴν Βιολογίαν.

Τέλος ὁ ἀνθρωπός θέλων, χάριν τῶν ίδίων του ἀναγκῶν, νὰ βελτιώσῃ τὰ διάφορα εἰδῆ τῶν φυτικῶν ἢ τῶν ζῷικῶν ὄργανισμῶν, ἐμελέτησε λεπτομερῶς τὰς βιολογικὰς ίδιότητάς των καὶ ἐφήρμοσεν ἐπ' αὐτῶν καταλλήλους πειραματικὰς μεθόδους. Ἐκ τούτων προέκυψε σειρὰ Ἐφημοσύνων Βιολογικῶν Ἐπιστημῶν, αἱ

όποιαι φέρουν δύναματα ἀνάλογα πρὸς τὸ ἀντικείμενον τῆς ἐνασχο-
λήσεως των : Ἀνθοκομία, Δενδροκομία, Κηπουρι-
κή, Ζωοτεχνία, Μελισσοκομία, Σηροτροφία κλπ.

ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ

‘Ο κόσμος, ὁ ὄποιος μᾶς περιβάλλει, ἀποτελεῖται ἀπὸ ὄργανι-
κὰ καὶ ἀνόργανα φυσικὰ σώματα. Τὰ ὄργανικὰ σώματα (φυτά καὶ
ζῷα) γεννῶνται ἀπὸ ὅντα ὄμοια, ἔχουν ζωὴν καὶ ὄργανα, κυτταρι-
κὴν κατασκευὴν, αὔξανονται μὲ τὴν θρέψιν, παράγουν ἀπογόνους
καὶ τέλος γηράσκουν καὶ θνήσκουν. Τὰ ἀνόργανα (λίθοι, μέταλλα
κλπ.) δὲν ἔχουν ζωὴν, οὐδὲ ὄργανα, εἰναι ὄμοιομερῆ καὶ ἀδρανῆ, δὲν
αὔξανονται, οὐδὲ πολλαπλασιάζονται.

Ἐκ τῶν ὄργανικῶν τὰ φυτὰ διακρίνονται τῶν ζῴων ὃτι τοῦ ὃτι
ἡ μεμβράνη τῶν κυττάρων των περιέχει κυτταρίνην, ἡ ὄποια δὲν
ὑπάρχει εἰς τὸ ζωϊκὸν κύτταρον. Ἐπίσης ἔκ τοῦ ὃτι ἔχουν τὴν ἰκα-
νότητα νὰ προσλαμβάνουν ἀπὸ τὸ περιβάλλον ἀνοργάνους ἐνώσεις
καὶ νὰ τὰς μετατρέπουν εἰς πολυπλόκους ὄργανικάς. Τοιαύτην ἴδιό-
τητα δὲν ἔχουν τὰ ζῷα.

Τῶν ὄργανισμῶν ἔξετάζομεν τὴν ἔσωτερητὴν μορφὴν (Μορφο-
λογία), τὴν ἔσωτερητὴν κατασκευὴν (Αινατομική), τὴν λειτουρ-
γίαν τῶν ὄργάνων των (Φυσιολογία), τὰς σχέσεις των μὲ τὸ περι-
βάλλον (Οἰκολογία) καὶ τὸν τρόπον κατατάξεώς των (Συστημα-
τική).

Βιολογία εἶναι ἡ γενικὴ ἐπιστήμη τῆς ζωῆς. ‘Υποδιαιρεῖται εἰς
πολλοὺς κλάδους : τὴν Γενικὴν Βιολογίαν, τὴν Φυτολογίαν, τὴν
Ζωολογίαν, τὴν Ἀνθρωπολογίαν, τὴν Παλαιοντολογίαν, τὴν Θεω-
ρητικὴν Βιολογίαν, τὴν Πειραματικὴν Βιολογίαν καὶ τὰς Ἐφηρμο-
σμένας Βιολογικὰς Ἐπιστήμας (Ανθοκομίαν, Δασοκομίαν, Ζωοτε-
χνίαν κλπ.).

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

- 1) Πῶς διακρίνονται τὰ ὄργανικὰ ἀπὸ τὰ ἀνόργανα ὅντα ;
- 2) Ποία ἡ διαφορὰ μεταξὺ φυτῶν καὶ ζῷων ;
- 3) Τί εἶναι ζωὴ καὶ ποῦ ἐμφανίζεται ;
- 4) Τί καλεῖται Βιολογία καὶ πῶς διαιρεῖται ;

ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

ΖΩΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙ ΑΥΤΗΣ


Ζωή ν ώνομάσαμεν τὸ σύνολον τῶν ἐκδηλώσεων τῶν ἐντὸς τῶν ἔμβιων ὅντων τελουμένων ποικίλων ἔξεργασιῶν. Αἱ ἔξεργασίαι αὐταὶ ὀφείλονται εἰς μίαν συνεχῆ ἐναλλαγὴν δράσεως, ἡ ὁποία συμβαίνει εἰς τὸ πρωτόπλασμα, ἥτοι τὴν παχύρρευστον μᾶζαν τῶν κυττάρων τῶν ὄργανισμῶν. Τὸ φαινόμενον τῆς ζωῆς, αὐτὸς καθ' ἑαυτό, δὲν δύναται νὰ ἔξηγηθῇ ἀπὸ τοὺς γνωστοὺς φυσικοὺς καὶ χημικοὺς νόμους. Οὕτοι μόνον τὰ ἐπὶ μέρους φαινόμενα ἔξηγοιν, τὰ ὁποῖα καὶ αὐτὰ ἐκδηλώνονται πάλιν μὲ τὴν συμμετοχὴν τῆς ζώστης οὐσίας. 'Η ζωὴ διέπεται ἀπὸ ίδίους νόμους, ἥτοι εἶναι αὐτόνομος.'

"Ἐκαστος ζῶν ὄργανισμός, διὰ νὰ διατηρηθῇ εἰς τὴν ζωήν, ἔχει ἀνάγκην νὰ προσλαμβάνῃ ὀξυγόνον ἀπὸ τὸν ἀτμοσφαιρικὸν ἀέρα, ἦ, ἀν εἶναι ὄργανισμός ύδροβίος, ἀπὸ τὸν διαλελυμένον εἰς τὸ ὕδωρ ἀέρα. 'Η πρόσληψις αὐτὴ τοῦ ὀξυγόνου ἀποτελεῖ τὴν λειτουργίαν τῆς ἀναπνοῆς.

'Ἀλλὰ τὸ ὀξυγόνον, εἰσερχόμενον εἰς τὸν ὄργανισμόν, μετατρέπει τὰς ὕλας τοῦ πρωτοπλάσματος τῶν κυττάρων εἰς χημικὰς ἐνώσεις ἀπλουστέρας συστάσεως. Συγχρόνως δὲ ἐλευθερώνει τὴν χημικὴν ἐνέργειαν, τὴν ἐγκλειομένην εἰς τὰ μόρια τῶν οὐσιῶν τοῦ πρωτοπλάσματος, καὶ τὴν μετατρέπει εἰς κινητικήν, θερμικήν ἢ ἄλλης μορφῆς ἐνέργειαν. 'Η τοιαύτη ἀποσύνθεσις τῶν οὐσιῶν τῶν κυττάρων, μὲ τὴν ὁποίαν ἀποδίδεται ἡ εἰς αὐτὰ ἐγκλειομένη ἐνέργεια, ἀποτελεῖ τὴν λειτουργίαν τῆς αναπνοῆς (ἢ ἀνομοιώσεως ἢ καταβολής μού).

Κατὰ τὴν ἀφετεροίωσιν παράγονται ἀζωτοῦχοι ἐνώσεις, ὕδωρ καὶ διοξείδιον τοῦ ἀνθρακος, ἥτοι προϊόντα περιττὰ καὶ ἐπιζήμια, ἀπὸ τὰ ὁποῖα ταχέως ὁ ὄργανισμὸς φροντίζει ν' ἀπαλλαγῇ μὲ ίδιαίτερα ὄργανα καὶ μὲ τὴν ἀναπνοήν. 'Η ἀποβολὴ τῶν ἀχρήστων καὶ ἐπιβλαβῶν οὐσιῶν ἀπὸ τὸν ὄργανισμὸν ἀποτελεῖ τὴν λειτουργίαν τῆς αναπνοῆς.

'Ἀλλὰ κατὰ τὴν ἀφετεροίωσιν, ως εἶναι εὔνόητον, ἡ μᾶζα τοῦ σώματος φθειρομένη ἐλαττώνεται. "Αν ἡ φθορὰ αὐτὴ τῆς μάζης τῶν ὄργανισμῶν ἥθελε συνεχισθῆ, θὰ ὑπῆρχε κίνδυνος νὰ καταστρα-




Εἰκὼν 2. Αναπνοή φυτοῦ.

1. Σπέρματα κριθῆς, τὰ δόποια ἐβλάστησαν εἰς ἀνοικτὸν ύάλινον δοχεῖον, ἔδωκαν ἐντὸς δικτῶ ἡμερῶν κανονικὰ φυτά. — 2. "Αλλα σπέρματα εἰς τὸν αὐτὸν χρόνον, ἀλλ' εἰς κλειστὸν δοχεῖον, ἀνέστειλαν τὴν ἀνάπτυξίν των, ἔνεκα ἐλλείψεως ἀρκετοῦ ἀέρος.— 3. 'Ανημμένον κηρίον, εἰσαγόμενον εἰς δοχεῖον, τὸ δόποιον ἥτο κλειστὸν καὶ εἰς τὸ δόποιον τὰ σπέρματα εἶχον εἴδη ἀρχίσει νά βλαστάνουν, σβήνεται, ἔνεκα ἐλλείψεως δξευγόνου.— 4. 'Ανημμένον κηρίον, εἰσαγόμενον εἰς δοχεῖον, τὸ δόποιον ἥτο καὶ αὐτὸ κλειστόν, ἀλλ' εἰς τὸ δόποιον τὰ σπέρματα εἶχον νεκρωθῆ, διατηρεῖ τὴν φλόγα του, διότι τὸ δξευγόνον τοῦ ἀέρος δὲν κατηναλώθη.

φοῦν οἱ ὄργανισμοί. Ἐλλ' αὐτὸ δὲν συμβαίνει, διότι μία ἄλλη λει-
τουργία τῆς ζωῆς, ἡ πρόσλαμβανόμενη, διατάσσει τὸ φύλλον, ἀντισταθμίζει τὰς
ἀπωλείας, ἥτοι προσκομίζει ύλικά, τὰ δόποια ἀντικαθιστοῦν τὰς οὐ-
σίας, αἱ δόποιαι ἐφθάρησαν.

Αἱ προσλαμβανόμεναι θρεπτικαὶ οὐσίαι (σιτία) ἐντὸς τοῦ ὄρ-
γανισμοῦ μετασχηματίζονται ποικιλοτρόπως. Εἰς τὰ πράσινα φυτὰ
τὸ διοξείδιον τοῦ ἀνθρακος τοῦ ἀέρος προσλαμβανόμενον διασπᾶται



Εἰκὼν 3. Στέλεχος ὑδροβίου φυτοῦ ἔκ-
λυον ἐντὸς τοῦ ὑδατος φυσικάδιας ἀέ-
ρος, ἀποτελουμένας κατὰ τὸ πλεῖστον
ἀπὸ δξυγόνων.

Εἰκὼν 4. Σχηματικὴ παράστασις
τῶν θρεπτικῶν λειτουργῶν τοῦ φυ-
τοῦ: ἐναλλαγῆς τῆς ὅλης, ἀναπνοῆς
καὶ διαπνοῆς.

μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ ἡλιακοῦ φωτὸς εἰς ἀνθρακα καὶ δξυγόνον. Καὶ
τὸ μὲν δξυγόνον ἀποβάλλεται εἰς τὸν ἀέρα, καὶ χρησιμοποιεῖται
κυρίως εἰς τὴν ἀναπνοήν τῶν ζῴων. 'Ο δὲ ἀνθραξ παραμένει εἰς τὸ
φυτὸν καὶ σχηματίζει μὲ ἄλλα στοιχεῖα τὸ λεύκωμα, τὸ σάκχαρον,
τὸ ἀμυλον. Εἰς δὲ τὰ ζῷα καὶ εἰς τὸν ἀνθρωπὸν αἱ θρεπτικαὶ οὐσίαι
μὲ τὴν πέψιν, ἀποσχιζόμεναι εἰς ἀπλουστάτας ἐνώσεις, φθάνουν εἰς
τὸ πρωτόπλασμα τῶν κυττάρων, ὅπου δι' ἀνασυνθέσεως μετατρέ-

πιονται εις ένωσεις, αι δποιαι άναπληρούν τάς φθοράς τοῦ πρωτο-
πλάσματος. Τὰ πλεονάσματα ἀποτίθενται ως ἐφεδρικαὶ ὑλαι (γλυ-
κογόνον, λίπος) εις τὰ κύτταρα καὶ τοὺς ιστούς. 'Ο τοιοῦτος μετά-
σχηματισμὸς τῶν θρεπτικῶν ούσιῶν εἰς ούσιας δμοίας πρὸς τὰ συ-
στατικὰ τοῦ πρωτοπλάσματος ἀποτελεῖ τὴν ἀφομοίωσιν (ἢ
ἀναβολήσιν).


Βλέπομεν λοιπόν, ὅτι εἰς τοὺς ζῶντας ὄργανισμοὺς συμβαίνουν
ἀφ' ἔνδος μὲν μία συνεχῆς ἀποσύνθεσις τῶν ούσιῶν των, ἀφ' ἔτερου δὲ
μία ἀναδημιουργία. Αἱ δύο αὐταὶ λειτουργίαι τῆς ζωῆς, ἡ ἀφετεροίω-
σις (καταβολισμὸς) καὶ ἡ ἀφομοίωσις (ἀναβολισμός), ἀποτελοῦν
όμοῦ τὴν διάμειψιν ἢ τὴν ἐναλλαγὴν τῆς ὑλῆς (με-
ταξιβολήσιμόν), ἡ δποία εἶναι τὸ σπουδαιότερον χαρακτηριστι-
κὸν φαινόμενον τῆς ζωῆς. 'Αξιοσημείωτον εἶναι, ὅτι οἱ διάφοροι ὄρ-
γανισμοί, παρ' ὅλην τὴν συνεχῆ μεταβολὴν τῆς ὑλῆς καὶ τῆς ἐνερ-
γείας, τὴν δποίαν ύφιστανται, διστηροῦν τὴν ἀτομικότητά των καὶ
τὴν χαρακτηριστικήν των μορφήν.

"Οταν κατὰ τὴν ἐναλλαγὴν τῆς ὑλῆς ὑπάρχῃ ἴσορροπία μεταξὺ¹
ἀφετεροίωσεως καὶ ἀφομοίωσεως, τὸ μέγεθος τῆς μάζης τοῦ ὄργανι-
σμοῦ παραμένει σταθερόν. 'Η ἴσορροπία δὲ αὐτὴ διατηρεῖ τὴν ζωήν.
"Οταν ἡ ἀφετεροίωσις ὑπερβαίνῃ τὴν ἀφομοίωσιν, δὲ ὄργανισμὸς
ὅλιγον κατ' ὀλίγον φθίνει καὶ καταλήγει εἰς θάνατον. "Οταν τούναν-
τίον ἡ ἀφομοίωσις εἶναι μεγαλύτερα ἀπὸ τὴν ἀφετεροίωσιν, δὲ ὄργα-
νισμὸς πολλαπλασιάζει τὰ κύτταρά του καὶ ἀποκτᾷ μεγαλύτερον
ὄγκον καὶ βάρος.

'Η λειτουργία αὐτὴ τῆς αὔξησης, ἦτοι τῆς μεγεθύνσεως
τῆς μάζης τῶν ὄργανισμῶν, παρατηρεῖται κυρίως κατὰ τὴν νεαράν
ἡλικίαν των. 'Αρχίζει μὲ τὴν ἐμβρυϊκὴν ζωὴν καὶ φθάνει κανονικῶς
μέχρις ὥρισμένου ὁρίου τῆς ζωῆς δι' ἕκαστον εἰδος ὄργανισμοῦ, ἦτοι
μέχρις ὅτου δὲ ὄργανισμὸς ἀποκτήσῃ τὴν δριστικήν του διάπλασιν.
'Η αὔξησις π.χ. τοῦ φυτικοῦ ὄργανισμοῦ ἀρχίζει ἀπὸ τὸ σπέρμα.
'Απὸ αὐτὸ τὸ παραλάβη τὸ νέον φυτὸν τὴν πρώτην τροφήν του.
Καὶ ὅταν θ' ἀποκτήσῃ ρίζαν καὶ φύλλα, θὰ παραλάβη αὐτὴν ἀπὸ
τὸ ἔδαφος καὶ ἀπὸ τὸν ἀέρα. 'Η αὔξησις τῆς ὅρνιθος ἀρχίζει ἀπὸ τὸ
φόρον. Τὸ ἐμβρυον θὰ παραλάβη τὴν πρώτην τροφήν του ἀπὸ τὸ λεύ-
κωμα τοῦ φόρον. Καὶ ὅταν θὰ ἔξελθῃ ἀπὸ τὸ κέλυφος ως νεοσσός, θ'
ἀναζητήσῃ καὶ θ' ἀνεύρῃ μόνος του τὴν τροφὴν εἰς τὸ περιβάλλον

του. Ή αὔξησις τῶν θηλαστικῶν καὶ τοῦ ἀνθρώπου ἀρχίζει μὲ τὴν ἐμβρυϊκὴν ζωὴν καὶ γίνεται ἀπὸ τὸν ὄργανισμὸν τῆς μητρός. Ἀρκετὸν δὲ χρόνον μετὰ τὴν γέννησιν τὰ θηλαστικὰ καὶ ὁ ἀνθρωπὸς ἔχουν ἀκόμη ἀνάγκην τῆς μητρός των διὰ τὴν ζωὴν καὶ τὴν αὔξησίν των.

Ἡ αὔξησις τῶν ζώντων ὄργανισμῶν κατὰ τὴν νεαρὰν ηλικίαν




Εἰκὼν 5. Ριζα σπέρματος Πίσου, ἐν δσῳ αὔξανεται, δύναται, πιέζουσα τὸν μοχλὸν, ν' ἀνεγείρῃ βάρος.

είναι συνεχής καὶ δλική, γινομένη εἰς ὅλα τὰ σωματικὰ μέρη. Εἰς τὰ κατόπιν στάδια γίνεται ἀσυνεχής καὶ μερική, δυναμένη νὰ ἐπιτελεσθῇ κατὰ περιόδους εἰς ὥρισμένα μόνον μέρη τοῦ σώματος.

Ἐὰν πρὸς διατήρησιν τῆς ζωῆς πρῶτος φυσικὸς σκοπὸς είναι ἡ λειτουργία τῆς θρέψεως τῶν ἀτόμων, δεύτερος είναι ἡ παραγωγὴ νέων ἀτόμων ἀπὸ τὰ ὑπάρχοντα ἀτομα. Ὁ τοιοῦτος διὰ παραγωγῆς ἀπογόνων πολλαπλασιασμὸς τῶν ὄντων ἀποτελεῖ τὴν λειτουργίαν τῆς διαιωνίσεως τοῦ εἴδους. Ἡ διαιώνισις τοῦ εἴδους είναι ἀναγκαία, διότι, ἀνευ τοῦ πολλαπλασιασμοῦ τῶν διαφόρων ὄργανισμῶν, ἡ ζωὴ μετὰ χρονικόν τι διάστημα θὰ ἔξελειπεν ἀπὸ τὴν ἐπιφάνειαν τῆς Γῆς διὰ τοῦ θανάτου τῶν παλαιοτέρων ὄργανισμῶν. Ἐπειδὴ δὲ τὰ νέα ἀνεγάρτητα ἀτομά, τὰ προκύπτοντα διὰ τοῦ πολλαπλασιασμοῦ, δύοιαζουν μὲ τὸ ἀρχικόν, δ πολλαπλασιασμὸς λέγεται καὶ ἡ ναραργωγή.

Εἰς τὸν ἔξωτερικὸν κόσμον συμβαίνουν διάφοροι μεταβολαὶ φωτισμοῦ, θερμοκρασίας, κινήσεως κλπ., αἱ ὅποιαι παράγουν ἐπὶ τῶν ὄργανισμῶν διάφορα ἐρεθίσματα. Ἡ ίκανότης τῶν ὄργανισμῶν



Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

ν' ἀντιδροῦν καταλλήλως εἰς τὰ ἔρεθίσματα αὐτὰ καλεῖται διεγερ-
σι μότης ἡ ἐρεθιστότης καὶ εἶναι γενικὸν γνώρισμα τῆς
ζώστης ούσιας τῶν κυττάρων. Ἡ ἔρεθιστότης εἰς μὲν τὰ φυτὰ καὶ τὰ
κατώτερα ζῷα ἐκδηλώνεται ως κίνησις, εἰς δὲ τὰ ἀνώτερα ζῷα,
καὶ μάλιστα εἰς τὸν ἄνθρωπον, κυρίως ως αἴσθησις. Διὰ τὴν
ὑποδοχὴν τῶν ἔρεθισμάτων καὶ τὴν μεταβίβασιν αὐτῶν, τὰ ἀνώτε-
ρα ζῷα διαθέτουν ως δέκτας τέλεια αἴσθητήρια ὅργα-
να εἶναι αἱ θύραι, ἀπὸ τὰς δποίας εἰσέρχονται ὅλαι αἱ γνώσεις μας.
Μὲν τὰ αἰσθητήρια ὅργανα ἔχομεν τὸ αἰσθητα τῆς ὁράσεως, τῆς
ἀκοῆς, τῆς γεύσεως κλπ. Εἰς τὴν ἐνέργειαν τῆς αἰσθήσεως ὀφείλον-
ται διὰ τὸν ἄνθρωπον, ὅχι μόνον τὰ αἴσθητα, ἀλλὰ καὶ
τὰ συναίσθητα (χαρά, λύπη, φόβος κλπ.) καὶ αἱ ἀνώτεραι
ψυχικαὶ ἐκδηλώσεις (βούλησις, συνείδησις, δια-
νόησις), αἱ δποίαι ἀποτελοῦν τὴν βάσιν τοῦ ψυχικοῦ βίου τοῦ
ἄνθρωπου.

Πρέπει νὰ ἔννοηθῇ, ὅτι ὅλαι αἱ λειτουργίαι τῆς ζωῆς, τὰς δποίας
περιεγράψαμεν ἀνωτέρω, διὰ νὰ διεξαχθοῦν κανονικῶς, εἶναι ἀνάγκη
νὰ ὑπάρχουν ὥρισμέναι συνθῆκαι ἐσωτερικαὶ καὶ ἔξωτερικαὶ.

ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

‘Ως εἶπομεν, ἡ αὔξησις τοῦ ὅργανισμοῦ ἀρχίζει μὲ τὴν ἐμβρυϊκὴν
ζωὴν καὶ φθάνει μέχρι τῆς πλήρους διαπλάσεώς του. Τὸ χρονικὸν
τοῦτο διάστημα, κατὰ τὸ δποίον ὑπερτερεῖ τῆς ἀφετεροιώσεως ἡ
ἀφομοίωσις, καλεῖται στάδιον τῆς αὔξησεως. ‘Ως συνέ-
χεια εἰς αὐτὸν ἔρχεται τὸ στάδιον τῆς ώριμότητος, κατὰ
τὸ δποίον διελειποιηθεὶς ὅργανισμὸς παύει ν' αὔξανεται, ἡ ἀφο-
μοίωσις δὲ καὶ ἡ ἀφετεροίωσις εύρισκονται εἰς Ισορροπίαν. Ἡ παρα-
γωγὴ ἀπογόνων ὑπὸ τοῦ τελειωθέντος πλέον ὅργανισμοῦ εἶναι κυ-
ρίως χαρακτηριστικὸν τοῦ σταδίου τούτου. Τελευταῖον ἀκολουθεῖ
τὸ στάδιον τοῦ γήρατος, κατὰ τὸ δποίον αἱ θεμελιώδεις
φυσιολογικαὶ λειτουργίαι δὲν ἐκτελοῦνται πλέον τόσον ἐμφανῶς, ὅσον
κατὰ τὴν ἡλικίαν τῆς νεότητος. Τινὲς μάλιστα τελοῦνται λίγην πλημ-
μελῶς. Ἡ ἀφετεροίωσις κατὰ τὸ στάδιον τοῦτο ὑπερτερεῖ τῆς ἀφο-
μοίωσεως. Εἰς τὸν ἄνθρωπον δὲ παραστηρεῖται βαθμιαίᾳ ἀπίσχνανσις

καὶ σημειώνεται σκλήρυνσις τῶν αἵμοφόρων ἀγγείων κλπ. Ὁ δργανισμὸς ὀλίγον κοτ' ὀλίγον φθίνει, διὰ νὰ ὑποστῇ τελικῶς τὸν θάνατον.

Ἡ ζωὴ εύρισκεται εἰς ἐνεργὸν κατάστασιν, ὅταν ὁ δργανισμὸς εἴναι εἰς θέσιν νὰ ἔκδηλωνη ἐμφανῶς ὅλας τὰς φυσιολογικάς του λειτουργίας. Εύρισκεται δὲ εἰς λανθάνονταν κατάστασιν ὁ δργανισμός, χωρὶς νὰ ἔχῃ ἀποθάνει, δεικνύη ἐλάχιστα ἵχνη ή οὐδὲν ἵχνος φυσιολογικῆς λειτουργίας. Εἰς τοιαύτην κατάστασιν εύρισκεται ἡ ζωὴ π.χ. εἰς τὰ σπέρματα τῶν σιτηρῶν ή εἰς τὰ ὧδα τῶν πτηνῶν κλπ., εἰς τὰ ὄποια ὑπὸ ὡρισμένας συνθήκας δύνανται πάλιν νὰ ἔκδηλωθῇ ἐνεργῶς. Εἰς τούς ἀνωτέρους δργανισμούς, καλεῖται νεκρός οφάλης εἰς τὰ κατάστασις ἔκεινη, κατὰ τὴν ὄποιαν ἡ ἐνεργὸς ζωὴ διὰ βαθμιαίας ἐλαττώσεως ἔφθασεν εἰς ἐλάχιστα ἵχνη. Εἰς τὴν κατάστασιν αὐτὴν δύνανται νὰ περιέρχωνται μὲν κατάλληλους ἀσκητινοὺς οὓς ἀσκηταί, οὓς λεγόμενοι φακίραι, καὶ νὰ ἐκλαμβάνωνται ὡς νεκροί.

Ἡ κατάστασις τῆς ἐλαχίστης ζωῆς, εἰς τὴν ὄποιαν δύνανται νὰ φθάσουν ὡρισμένοι ἀνώτεροι δργανισμοί, διὰ ν' ἀντιμετωπίσουν ἐπιτυχῶς τὰς δυσμενεῖς διὰ τούς συνθήκας τῆς ζωῆς, καλεῖται νάρκη, θερινὴ ή χειμερία. Ἀνάλογος εἴναι εἰς τὰ φυτὰ καὶ ἡ ἀναστολὴ τῶν βλαστητικῶν των περιόδων τὸν χειμῶνα καὶ τὸ θέρος.

ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Κατὰ τὸ στάδιον τοῦ γήρατος, ἔνεκα ἐσωτερικῶν μεταβολῶν, τὰς ὄποιας βραδέως θύμιστανται οἱ διάφοροι δργανισμοί, ἔρχεται στιγμή, κατὰ τὴν ὄποιαν οὔτοι δεικνύουν σημεῖα ἔξαντλήσεως καὶ καταπτώσεως. Ἡ ἐκτέλεσις τῶν φυσιολογικῶν λειτουργιῶν των ἔχει πλέον ἔξασθενήσει σημαντικά. Μετὰ ὡρισμένον δὲ χρονικὸν διάστημα, τὸ φαινόμενον τοῦ γήρατος καταλήγει εἰς τὴν ὀλοσχερῆ παῦσιν τῆς ζωῆς, ἥτοι εἰς τὸν θάνατον. Ὁ θάνατος εἴναι τὸ φυσικὸν τέρμα τοῦ βιολογικοῦ κύκλου παντὸς δργανισμοῦ. "Οθεν καὶ αὐτὸς ἀποτελεῖ θεμελιώδες γνώρισμα τῆς ζωῆς.

Διὰ τούς πολυκυττάρους δργανισμούς δὲν εὑρέθη μέσον, διὰ ν' ἀνασταλῇ ἡ βαθμιαία αὐτὴ φυσιολογικὴ ἔξαντλησις. Ἀντιθέτως, διὰ τὰ Πρωτόζωα κατωρθώθη νὰ ἐμποδισθῇ ὁ ἐκφυλισμός, μὲ τρο-

ποποίησιν τοῦ ἔξωτερικοῦ περιβάλλοντος, ἐντὸς τοῦ ὄποιου ταῦτα ζοῦν. Παρετηρήθη μάλιστα, ὅτι τὰ ἴδια αὐτὰ κατώτατα δύναται κατορθώνουν πολλάκις ν' ἀποφεύγουν τὸν θάνατον καὶ ν' ἀνανεώνουν τὸν ὄργανισμόν των διὰ προσωρινῆς συζέύξεώς των ἀνὰ δύο καὶ δι' ἀνταλλαγῆς τῶν πυρήνων των.

Δέν ύπαρχει κανὲν σαφὲς δριον, τὸ ὄποιον ν' ἀφορίζῃ ἀκριβῶς ἀπ' ἀλλήλων τὴν ζωὴν καὶ τὸν θάνατον. ‘Υπάρχει μᾶλλον μία κατάστασις βαθμιαίας μεταβάσεως ἀπὸ τὴν ζωὴν εἰς τὸν θάνατον. ‘Η κατάστασις αὐτὴ δύνομάζεται νεκροβίωσις.

‘Ο ἐκ γήρατος θάνατος, ἐπερχόμενος μὲ τὴν συμπλήρωσιν τῆς ἀτομικῆς ἔξελίξεως τοῦ ὄργανισμοῦ, καλεῖται φυσικὸς θάνατος. ‘Ο θάνατος, δεὶς πᾶσαν ἡλικίαν ἐπερχόμενος, κατόπιν ἀποτόμου διακοπῆς βασικῶν λειτουργιῶν τῆς ζωῆς, εἴτε ἔνεκα ἔξωτερικῆς βίας (τραύματος, ἐγκαύματος κλπ.), εἴτε ἔνεκα νόσου, καλεῖται αἱ φυσικοὶ θάνατοι.

‘Η ἔλλειψις τῶν φαινομένων τῆς ζωῆς ὡς συνόλου καλεῖται ὁ λογικὸς θάνατος. Κατὰ τοῦτον δύμας ὡρισμένα στοιχεῖα τοῦ ὄργανισμοῦ ἔξακολουθοῦν νὰ διατηροῦν τὴν ζωὴν των ἐπί τινα χρόνον. Οὕτω οἱ μύες συστέλλονται, ἡ καρδία δύναται ν' ἀποσπασθῇ ἀπὸ τὸ σῶμα καὶ νὰ τεθῇ καταλλήλως εἰς κίνησιν κλπ. ‘Ο μερικὸς ἢ στοιχειώδης θάνατος ἀκολουθεῖ τὸν δλοκληρωτικὸν καὶ συνίσταται εἰς τὴν τελείαν πλέον νέκρωσιν καὶ τῶν στοιχείων ἐκείνων, τὰ ὄποια διετηρήθησαν προσκαρφώσεις εἰς τὴν ζωὴν. ‘Αλλὰ μερικός λέγεται καὶ δοθάνατος ἐκείνος, κατὰ τὸν ὄποιον, συνήθως ἔνεκα μακροχρονίου νόσου, τμήματα τοῦ ὄργανισμοῦ πολύτιμα καθίστανται ἀγίκανα νὰ ἐπιτελέσουν τὴν λειτουργίαν των καὶ βάθμηδὸν ὑποκύπτουν. ‘Ο τοιοῦτος θάνατος δλοκληρώνεται, ὅταν ὑποκύψουν καὶ τὰ ἀνθεκτικώτερα τμήματα τοῦ ὄργανισμοῦ, τὰ ὄποια εἶναι καὶ τὰ πλέον πρωτόγονα.

Περὶ τῶν αἰτίων, τὰ ὄποια ἐπιφέρουν τὸν φυσικὸν θάνατον, ἐλάχιστα γνωρίζομεν. ‘Αλλοι ἀποδίδουν τοῦτον εἰς φθοράν, τὴν ὄποιαν δοθάνατος ὑφίσταται κατὰ τὴν ζωὴν. ‘Αλλοι δὲ εἰς ἀνα-



Εικὼν 6. Τὸ
ἐντομον Ἐφή-
μερον.

ριθμήτους μικρὰς βλάβας, αἱ δόποιαι συσσωρεύονται βαθμηδὸν εἰς τὸν ὄργανισμὸν καὶ διαταράσσουν τὴν ἀρμονίαν καὶ τὴν ἰσορροπίαν του. Ἀλλὰ τότε πῶς θὰ ἔξηγηθῇ δὲ θάνατος ἐντόμων λίαν βραχυψίων, δῆτας εἶναι τὰ Ἐφήμερα, εἰς τὰ δόποια δὲν εἶναι δυνατὸν μήτε ἐπιβλαβεῖς οὐσίαι νὰ συσσωρεύωνται, μήτε φθοραὶ νὰ συμβαίνουν κατὰ τὸ διάστημα ζωῆς τόσῳ βραχείας;

Μετὰ τὸν θάνατον τὸ σῶμα παθαίνει ἀποσύνθεσιν, ἡ δόποια γίνεται ἀφ' ἐνὸς μὲν μὲν αὐτολυσίαν τῶν ὄργάνων, ἀφ' ἑτέρου δὲ μὲν σηπτικὰς ἔξεργασίας, τὰς δόποιας προκαλοῦν κατώτατοι ὄργανισμοί.

ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ

Ζωὴ εἶναι τὸ σύνολον τῶν ἐκδηλώσεων τῶν ποικίλων ἔξεργασιῶν, τῶν τελουμένων ἐντὸς τῶν ἐμβίων ὅντων. Εἰς τὸ πρωτόπλασμα συμβαίνει συνεχῆς ἐναλλαγὴ ὥλης καὶ ζωϊκῆς ἐνεργείας, ἡ δόποια ἀπαίτει τὴν ἐκτέλεσιν ώρισμένων ζωϊκῶν λειτουργιῶν. Τοιαῦται λειτουργίαι εἶναι ἡ ἀναπνοή, ἡ ἀφετεροίωσις, αἱ ἀπεκκρίσεις, ἡ πρόσληψις τροφῆς, ἡ ἀφομοίωσις, ἡ αὔξησις, ἡ διαιώνισις τοῦ εἴδους, ἡ διεγερσιμότης, ἡ αἰσθησις καὶ τὰ ψυχικὰ φαινόμενα.

Τῆς ζωῆς διακρίνομεν τὸ στάδιον ἀναπτύξεως, τὸ στάδιον ώριμότητος καὶ τὸ στάδιον τοῦ γήρατος. Ἡ ζωὴ εύρισκεται ἡ εἰς ἐνεργὸν κατάστασιν ἡ εἰς λανθάνουσαν ἡ εἰς νεκροφάνειαν. Ἡ δλοσχερής παῦσις τῆς ζωῆς ἀποτελεῖ τὸν θάνατον. Ὁ θάνατος εἶναι φυσικὸς ἢ αἰφνίδιος, ὁλοκληρωτικὸς ἢ μερικός.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

- 1) Πῶς γίνεται ἡ ἐναλλαγὴ τῶν ἀερίων εἰς τὰ φυτά; Πῶς εἰς τὰ ζῷα;
- 2) Ποίον εἶναι τὸ σπουδαιότερον χαρακτηριστικὸν φαινόμενον τῆς ζωῆς;
- 3) Πότε συμπληροῦται ἡ αὔξησις τοῦ ἀνθρώπου;
- 4) Πῶς ἐκδηλώνεται ἡ διεγερσιμότης εἰς τοὺς μονοκυττάρους ὄργανισμούς καὶ πῶς εἰς τοὺς πολυκυττάρους;

ΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟΝ

Ο ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΛΙΘΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ


ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ

Είδομεν, ότι τὰ ὄργανικὰ ὅντα ἔχουν κατασκευὴν κυτταρικήν.
Ἡτοι τὸ σῶμά των εἶναι κατεσκευασμένον ἀπὸ ἴδιάζοντα μικρότατα στοιχεῖα, τὰ ὅποια ὄνομάζονται κύτταρα.

Τὰ στοιχεῖα αὐτὰ εἶναι τόσῳ μικρά, ὥστε δὲν εἶναι ὄρατὰ μὲν γυμνὸν ὁφθαλμόν. Παρετηρήθησαν δὲ διὰ πρώτην φοράν μετὰ τὴν ἀνακάλυψιν τοῦ μικροσκοπίου. Τῷ 1667 δὲ Ἀγγλος φυσικὸς Χοῦκε (Hooke R.), ἔξετάζων μὲ τὸ μικροσκόπιον, τὸ ὅποιον ὁ Ἰδιος εἶχε κατασκευάσει, μικρὰ τεμάχια φελοῦ, παρετήρησεν, ότι ἀπετελοῦντο ἀπὸ μικρὰ διαμερίσματα, ὅμοια μὲ τὰ κελλία τῶν κηρηθρῶν τῆς κυψέλης. Τὰ διαμερίσματα αὐτά, τὰ ὅποια ὁ Χοῦκε ὡνόμασεν ἐκτοτε κύτταρα, τὰ ἔθεωρησεν ὡς κενοὺς χώρους. Ο Χοῦκε οὐδὲ κάνεφαντάζετο, ότι μὲ τὴν λέξιν «κύτταρον» ἐδημιούργει ἐν ὄνομα, ἀπὸ τοῦ ὅποιού τὸν ἦχον θ' ἀντήχει ἡ ἐπιστήμη τοῦ μέλλοντος.

Βραδύτερον ἔξηκριβώθη, ότι καὶ ὅλα τὰ φυτὰ ἀποτελοῦνται ἀπὸ κύτταρα; ότι δὲ οἱ νομιζόμενοι κενοὶ χώροι περιέχουν ούσιαν πυκνόρρευστον, τὴν ὅποιαν καὶ ὡνόμασαν πρωτόπλασμα. Μετέπειτα παρετηρήθη, ότι καὶ τὸ σῶμα τῶν ζῴων συνίσταται ἀπὸ μικρὰς μάζας πρωτοπλάσματος, αἱ ὅποιαι διακρίνονται μεταξύ των.


Τὴν κυτταρικὴν σύστασιν τῶν ὄργανικῶν ὅντων δυνάμεθα ν' ἀποδείξωμεν, ἀν φέρωμεν καὶ ἡμεῖς ὑπὸ τὸ μικροσκόπιον π.χ. ἐλάχιστον τεμάχιον ἀπὸ τὸ σαρκῶδες μέρος ὠρίμου καρποῦ ἢ ἐλάχιστον τεμάχιον βεβρασμένου Γεωμήλου. Ἡ ὠρίμανσις ἢ ὁ βρασμὸς χαλαρώνουν τὴν σύνδεσιν τῶν κυττάρων ἢ καὶ διαχωρίζουν αὐτὰ καὶ τὰ καθιστοῦν καταφανέστερα. Είναι δὲ γνωστόν, ότι καὶ τὸ πολὺ βρασθὲν κρέας διαχωρίζεται ἐπίσης εἰς λεπτοτάτας ίνας, τὰς μυϊκὰς ίνας, αἱ ὅποιαι εἶναι μυϊ-



Εἰκὼν 7. Κύτταρα γεωμήλου χαλαρωθέντα διὰ βρασμοῦ.

καὶ κύτταρα μὲ τὴν ἐπιμήκη μορφὴν τῆς κλωστῆς ἢ τῆς τριχός.

Τὰ κύτταρα εἰναι διάφορα κατὰ τὴν μορφὴν καὶ τὸ μέγευθος. ‘Υπάρχουν κύτταρα σφαιρικά, κυλινδρικά, κορυνοειδῆ, ἀτρακτοειδῆ, κυβοειδῆ, πολυεδρικά, πλακοειδῆ, ἴνόμορφα, ἀστεροειδῆ, ἀνάλογα πάντοτε πρὸς τὸ εἶδος τοῦ φυτοῦ ἢ τοῦ ζῴου, πρὸς τὴν θέσιν των εἰς τὸν ὄργανισμόν, πρὸς τὴν λειτουργίαν των, πρὸς τὴν ἡλικίαν των κτλ. Αἱ διαστάσεις των εἶναι διαφορετικαὶ εἰς τὰ φυτὰ καὶ εἰς τὰ ζῷα, ποικίλλουσαι ἀπὸ εἶδους εἰς εἶδος καὶ ἀπὸ κυτταρικῆς όμάδος εἰς κυτταρικήν όμάδα. Εἶναι ὅμως αἱ αὐταὶ διάμιαν καὶ τὴν αὐτὴν κατηγορίαν ὄργανισμῶν. Ἡ συνήθης διάμετρος τῶν κυττάρων ἰσοῦται μὲ δλίγα χιλιοστὰ τοῦ χιλιοστομέτρου (μ =μικρά). Αἱ μικραὶ ἵνες φθάνουν τὰ 1 - 2 ἑκατοστόμετρα καὶ τὰ νευρικὰ κύτταρα εἶναι λίαν ἐπιμήκη. Τὸ μέγευθος τῶν κυττάρων ἐνὸς ὄργανισμοῦ οὐδεμίαν σχέσιν ἔχει μὲ τὸ μέγευθος τοῦ ὅλου ὄργανισμοῦ.



Εἰκὼν 8. Διάφοροι μορφαὶ κυττάρων.

Εἰς ἑκαστὸν κύτταρον διακρίνομεν τὸ ἔξωτερικόν του περίβλημα, τὸ ὅποιον καλεῖται κυτταρικὴ μεμβράνη, καὶ τὸ ἐσωτερικὸν περιεχόμενον ἢ τὸ πρωτόπλασμα μὲ τὸν πυρῆνα.


ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ

Εἰς ἑκαστὸν κύτταρον διακρίνομεν τὸ ἔξωτερικόν του περίβλημα, τὸ ὅποιον καλεῖται κυτταρικὴ μεμβράνη, καὶ τὸ ἐσωτερικὸν περιεχόμενον ἢ τὸ πρωτόπλασμα μὲ τὸν πυρῆνα.

Ἡ κυτταρικὴ μεμβράνη εἰς τὰ φυτικὰ κύτταρα εἶναι λίαν εύδιάκριτος, ἀποτελεῖται δὲ κυρίως ἀπὸ κυτταρίνην, ἢ ὁποία, ώς εἴπομεν, εἶναι χαρακτηριστικὸν στοιχεῖον τῶν φυτῶν. Ἡ μεμβράνη εἶναι ἀνθεκτική, ἡμιπερστή, ἐπιτρέπει δηλαδὴ τὴν διαπίδυσιν, ἐν ὅσῳ τὸ κύτταρον ζῇ. Εἰς τὰ ζωϊκὰ κύτταρα δὲν ὑπάρχει κυτταρικὴ μεμβράνη. Τὸ πρωτόπλασμα εἰς αὐτά, διὰ νὰ προστατεύηται,

περιβάλλεται άπό μίαν λεπτήν στιβάδα κάπως πυκνοτέρου πρωτοπλάσματος, ή όποια σχηματίζει είδος δυσδιακρίτου κυτταρικής μεμβράνης. Είς μερικά ζῷα ή στιβάς έμποτίζεται άπό μίαν ούσιαν, τὴν λεγομένην χυτίνη (ἔλυτρα τῶν Κολεοπτέρων).

Τὸ πρωτόπλασμα (ή κυτταρόπλασμα) εἶναι μᾶζα δμοιογενής, παχύρρευστος, ἄχρους καὶ διαφανής, ἀποτελουμένη άπό ύδωρ (κατὰ τὸ 70 - 90 % τοῦ βάρους του), άπό λευ-



Εἰκὼν 9. Σχηματικὴ παράστασις κυττάρου.


ΚΜ = Κυτταρική μεμβράνη, ΠΡ = πρωτόπλασμα, Π = πυρήν, Χ = χρωματίνη, ΠΥ = πυρηνίσκος, Κ = κεντροσωμάτιον, ΚΣ = κεντρόσφαιρα, ΧΤ = χυμοτόπια, ΧΦ = χρωματόφρα, ΕΚ = ἐκαρίματα, ΕΓ = ἐγκλείσματα, ΛΙ = λίπος.

κωματοειδεῖς ούσιας, άπό ύδατάνθρακας καὶ άπό διάφορα ἄλατα. 'Ο μυστηριώδης συνδυασμὸς τῶν στοιχείων τούτων, τὰ δέποια αὐτὰ καθ' ἑαυτὰ εἶναι νεκρά, καθιστᾶ τὸ πρωτόπλασμα ἔδραν τῶν φαινομένων τῆς ζωῆς. 'Η Χημεία, ή όποια εἰς τὴν ἀνάλυσιν τοῦ πρωτοπλάσματος ἀνεῦρεν 22 διαφόρους πολυπλόκους ούσιας, δὲν ἡδυνήθη ν' ἀνεύρῃ καὶ τὸ μυστικὸν τῆς ζωῆς. 'Ο τρόπος τῆς προσπαθείας της, ὡς εἶπε Γερμανὸς ἐπιστήμων, ὑπῆρξεν ὅμοιος μὲ τὴν προσπάθειαν ἐκείνου, δέ διποτίσ, διὰ νὰ σπουδάσῃ τὸν μηχανισμὸν τοῦ ὥρολογίου, διήνοιξεν αὐτὸν μὲ ἓνα πέλεκυν.

Ἐντὸς τοῦ πρωτοπλάσματος, τὸ ὄποιον εύρισκεται εἰς μίαν δι-
αρκή καὶ ἀέναον κίνησιν, ὑπάρχει ὁ π ρ ἡ ν, μικρὸν σῶμα, σφαιρι-
κὸν συνήθως ἢ ὠοειδές, τὸ ὄποιον καὶ αὐτὸ ἔχει ύψιστην σημασίαν
διὰ τὴν ζωήν. Είναι ὁ ρυθμιστὴς τῶν λειτουργιῶν τοῦ κυττάρου.
Μὲ αὐτόν, ὅχι μόνον ἐκτελεῖται ἡ λειτουργία τῆς ἀφομοιώσεως εἰς τὸ
πρωτόπλασμα, ἀλλὰ καὶ κληροδοτοῦνται εἰς τοὺς ἀπογόνους αἱ
ἰδιότητες τῶν γεννητόρων. ‘Ο πυρήνη εἶναι καὶ αὐτὸς ἄχρους, ἔχει δὲ
χημικὴν σύστασιν ὁμοίαν μὲ τὴν σύστασιν τοῦ πρωτοπλάσματος.
Τὰ λευκώματά του ὅμως περιέχουν περισσότερον φωσφόρον. ’Απὸ
τὸ πρωτόπλασμα χωρίζεται μὲ τὴν π ρ η ν ι κ ḥ ν μεμβράνην
λινίνης. ‘Ο πυρήνη συνίσταται ἀπὸ πολύπλοκον δίκτυον, τὸ δίκτυον τῆς
λινίνης, ἐπὶ τοῦ ὄποιού ἐπικάθηνται τὰ κοκκία τῆς χρωματίσωμαν
χρωματίνη, δταν χρωματίσωμεν τεχνητῶς τὸ κύτταρον, λαμβάνει ζωηρὸν χρῶμα. ‘Η ύπαρξις τῆς λινίνης ἀμφισβητεῖ-
ται ὑπό τινων, οἱ ὄποιοι δέχονται ὅτι τὸ δίκτυον δὲν εἶναι πραγμα-
τικῶς ίδια ούσια, ἀλλὰ μᾶλλον ἀποτέλεσμα πήξεως τοῦ χυμοῦ τοῦ
πυρῆνος.

Ἐπὶ τοῦ πυρῆνος διακρίνονται καὶ εἰς ἡ περισσότεροι π ρ η-
νίσκοι, σφαιρικὰ σωμάτια. Πλησίον δὲ τοῦ πυρῆνος καὶ εἰς μίαν

ἐγκόλπωσιν τῆς μεμβράνης του εύ-
ρισκεται ἀλλο σωμάτιον, τὸ ὄποιον κα-
τέχει τὸ κέντρον μιᾶς σφαίρας, τῆς
κεντροσφαίρας. ‘Υπάρχουν
κύτταρα μὲ ἔνα πυρῆνα (μονοπύ-
ρηνα) καὶ ἀλλα μὲ περισσοτέ-
ρους τοῦ ἐνὸς πυρῆνας (πολυπύ-
ρηνα).



Εἰκὼν 10. Φυτικὸν κύτταρον.

ἄλλα μικρὰ σωμάτια, τὰ καλούμενα χρωματοφόρα. Τοιαῦτα
εἶναι καὶ οἱ κόκκοι τῆς χλωροφύλλης τῶν κυττάρων τῶν πρασίνων
μερῶν τοῦ φυτοῦ, οἱ ὄποιοι μὲ τὸ ἡλιακὸν φῶς συνθέτουν τὰς ὀργα-
νικὰς ούσιας του. ’Ἐπίστης εἶναι τὰ σωμάτια, τὰ ὄποια εύρισκονται
εἰς τὰ κύτταρα τῶν πετάλων τῶν ἀνθέων καὶ τῆς ἐπιδερμίδος τῶν
ώριμων καρπῶν καὶ δίδουν εἰς τὰ μέρη αὐτὰ τῶν φυτῶν τὰ ποικίλα

ώρατα χρώματα. Τὰ χρωματοφόρα θεωροῦνται καὶ ὡς φορεῖς τῶν κληρονομικῶν παραγόντων τοῦ πρωτοπλάσματος. Εἰς τὸ πρωτόπλασμα τῶν φυτικῶν κυττάρων, ἴδιως τῶν ἥλικιωμένων, ὑπάρχουν καὶ μερικαὶ κοιλότητες, αἱ δποῖαι λέγονται χ υ μ ο τ ὁ π i α, διότι εἶναι πλήρεις κυτταρικοῦ χυμοῦ. Ἐντὸς τοῦ κυτταρικοῦ τούτου χυμοῦ ἀπαντῶνται διαλελυμέναι εἰς ὄνδωρ διάφοροι ούσιαι, ὡς ἀσβέστιον, ταννίνη, ἀλκαλοειδῆ, αιθέρια ἔλαια κλπ.

Καὶ εἰς τὸ πρωτόπλασμα τῶν ζωϊκῶν κυττάρων εἶναι ἐγκεκλεισμένα χυμοτόπια κτλ. Ἐκτὸς τούτων εἰς ὥρισμένα κύτταρα ἀπαντᾶται καὶ γλυκογόνον, εἰς ἄλλα δὲ λίπος.

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ

Τὸ κύτταρον πολλαπλασιάζεται διὰ διαιρέσεώς του. Ὅταν τὸ κύτταρον λάβῃ ὥρισμένας διαστάσεις, χωρίζεται εἰς δύο ἥμιση, τὰ δποῖα ἀπαρτίζουν δύο νέα κύτταρα. Τὰ νέα αὐτὰ κύτταρα καλοῦνται




Εἰκὼν 11. Ἀμεσος κυτταροτομία (διαιρέσια).

θυγατρικά, ἐνῷ τὸ πρῶτον, ἀπὸ τὸ δποῖον προηλθον, καλεῖται μητρικὸν κύτταρον. Ἡ διαιρεσίς τοῦ μητρικοῦ κυττάρου εἰς δύο θυγατρικά, ἥτοι ἡ κυτταροτομία, εἶναι ἡ ἀμεσος ἢ ἔμμεσος. Προτιγεῖται δὲ κατ' αὐτὴν ἡ πυρηνότομία, ἥτοι ἡ τμῆσις τοῦ πυρῆνος, ἥ δποία εἶναι καὶ ἡ κυριωτέρα φάσις τῆς κυτταροτομίας.

Ἡ ἀμεσος κυτταροτομία (ἄλλως ἀμιτωσία) εἶναι σπανία καὶ ἀπαντᾶται μᾶλλον εἰς κύτταρα, τὰ δποῖα ἐγήρασαν. Κατ' αὐτὴν ὁ πυρήνης τοῦ κυττάρου, χωρὶς νὰ ὑποστῇ ἐντός του

αλλην μεταβολήν, ἐπιμηκύνεται και συσφίγγεται εἰς τὸ μέσον του, μέχρις ὅτου χωρισθῇ εἰς δύο ἡμίση. Ἐπειτα συσφίγγεται και χωρίζεται εἰς δύο ἡμίση και τὸ πρωτόπλασμα, ἔκαστον δὲ τμῆμά του περιβάλλει ἔνα ἀπὸ τοὺς δύο νέους πυρῆνας. Τὰ οὕτω παραχθέντα δύο θυγατρικά κύτταρα μεγεθύνονται, μέχρις ὅτου ἀποκτήσουν τὸν δύκον τοῦ μητρικοῦ κυττάρου.

Ἡ ἔμμεσος κυτταροτομία (ἄλλως μίτωσις) εἶναι ἔξεργασία πολυπλοκωτέρα. Ἀποτελεῖ δὲ τὸν συνηθέστερον εἰς τὴν



Εἰκὼν 12 Ἔμμεσος κυτταροτομία (μίτωσις) ἐπὶ ζωϊκοῦ κυττάρου.

φύσιν τρόπον διαιρέσεως τοῦ κυττάρου. Κατ' αὐτήν, ἀπὸ τὴν κεντρόσφαιραν ἀναχωροῦν ἀκτινοειδῶς λεπτότατα νήματα, τὰ δόποια σχηματίζουν μὲ αὐτὴν τὸν ἀστέρα. Ἐντὸς τῆς κεντροσφαίρας τὸ κεντροσωμάτιον διαιρεῖται εἰς δύο μέρη, τὰ δόποια ἀπομακρυνόμενα ὀλλήλων καταλαμβάνοντας τοὺς πόλους τοῦ πυρῆνος, περιβαλλόμενα ἔκαστον ὑπὸ ἴδιας κεντροσφαίρας καὶ ἀστέρος. Οἱ δύο ἀστέρες ἔνοῦνται μεταξύ των μὲ λεπτὰς Ἰνας, αἱ δόποιαι ἐμφανίζουν σχῆμα ἀτράκτου. Συγχρόνως ἡ χρωματίνη τοῦ πυρῆνος συγκεντρώνεται εἰς θέσεις, ὅπου ἡ λινίνη εἶναι πικνοτέρα καὶ σχηματίζει ἐν περιπεπλεγμένον νῆμα, τὸ λεγόμενον σπείραμα. Τὸ σπείραμα τοῦτο τέμνεται κατόπιν εἰς τεμάχια, τὰ δόποια καλοῦνται χρωματικά τοιούτα. Τὰ χρωματοσωμάτια, τῶν δόποιων ὁ ἀριθμὸς εἶναι σταθερὸς καὶ χαρακτηριστικὸς δι' ἔκαστον εἶδος ὀργανισμῶν, κινοῦνται καὶ τοποθετοῦνται εἰς τὸν ιστημερινὸν τοῦ πυρῆνος. Ἐν τῷ μεταξὺ ἡ μεμβράνη τοῦ πυρῆνος ἔξαφανίζεται.

Μετὰ τὸ προπαρασκευαστικὸν αὐτὸ στάδιον, τὰ χρωματοσωμάτια διὰ μιᾶς κατὰ μῆκος τομῆς σχίζονται εἰς δύο μέρη ἐκαστόν ποσοτικῶς καὶ ποιοτικῶς ἵσα. Τοιουτορόπως δὲ ὁ ὅλος ἀριθμός των διπλασιάζεται. Ἀπὸ τὰ δύο τότε μέρη ἑκάστου χρωματοσωματίου, τὸ ἐν διολισθαίνει ἐπὶ τῶν ἴνδων τῆς ἀτράκτου πρὸς τὸν ἔνα ἀστέρα καὶ τὸ ἄλλο πρὸς τὸν ἄλλον. Κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπον εἰς ἔνα ἐκαστον πόλον τοῦ πυρῆνος συγκεντρώνεται ἵσος ἀριθμὸς δύοιων χρωματοσωματίων, τὰ ὅποια, ἀφοῦ συγκολληθοῦν διὰ τῶν ἀκρων των, σχηματίζουν ἀνὰ ἐν δίκτυον νέου πυρῆνος.

Μετὰ ταῦτα τὸ πρωτόπλασμα τοῦ ἀρχικοῦ κυττάρου, εἴτε διὰ συσφίγξεως τῆς κυτταρικῆς μεμβράνης, εἴτε διὰ σχηματισμοῦ ἐνὸς διαχωριστικοῦ στρώματος, χωρίζεται καὶ αὐτὸ εἰς δύο μέρη. Ἐκαστον δὲ μέρος, ἐγκλείον ἔνα πυρῆνα, σχηματίζει ἴδιον θυγατρικὸν κύτταρον, τῆς ἴδιας ἀκριβῶς συστάσεως μὲ τὸ μητρικὸν καὶ μὲ τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν χρωματοσωματίων πρὸς τὸ ἀρχικὸν κύτταρον.


Ἡ διάρκεια τῆς μιτώσεως εἰς μὲν τὰ φυτικὰ κύτταρα εἶναι μέχρι 5 ὥρῶν, εἰς δὲ τὰ ζωϊκὰ εἶναι 30 λεπτῶν μέχρι 2 ὥρῶν.

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω καταφαίνεται, ὅτι ἐκαστον κύτταρον προέρχεται διὰ διαιρέσεως ἐξ ἄλλου κυττάρου, δύοιο πρὸς αὐτό, καὶ κατὰ τὸ πρωτόπλασμα καὶ κατὰ τὸν πυρῆνα, καὶ ὅτι δὲν ὑπάρχει ἄλλος τρόπος παραγωγῆς του. Είναι ἐπίσης φανερόν, ὅτι ὁ πολύπλοκος μηχανισμὸς τῆς διαιρέσεως εἰς οὐδὲν ἄλλο ἀποβλέπει παρὰ εἰς τὴν κατὰ τὸ δυνατὸν ἵσην κατανομὴν τῆς πυρηνικῆς ούσίας εἰς τὰ δύο θυγατρικὰ κύτταρα. Ο σκοπὸς δὲ αὐτὸς ἐπιτυγχάνεται μὲ τὴν διχοτόμησιν τῶν χρωματοσωματίων, τὰ ὅποια, ὡς θὰ ἴδωμεν, εἶναι μεγάλης σπουδαιότητος στοιχεῖα.


ΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΜΟΝΑΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Ἐφ' ὃσον ὑπάρχουν ὀργανισμοί, οἱ ὅποιοι ἀποτελοῦνται ἀπὸ ἐν μόνον κύτταρον, ὅπως εἶναι αἱ Ἀμοιβάδες, τὸ κύτταρον πρέπει νὰ θεωρηθῇ ὡς ἡ στοιχεῖω δημονάς τῆς ζωῆς. Οι μονοκύτταροι ὀργανισμοί, οἱ ὅποιοι ἀνεκαλύφθησαν εἰς τὰ ἐγχύματα (ἐξ οὐ καὶ Ἐγχυματικά), πολλαπλασιάζονται δι’ ἀπλῆς τομῆς. Τὰ δύο δὲ νέα κύτταρα, τὰ ὅποια παράγονται, ἀποτελοῦν δύο νέα ἀτομα. Τὰ ἀτομα αὐτὰ ζοῦν ἢ ἀνεξάρτητα ἢ σχηματίζουν μὲ ἄλλα

άποικιας, ήτοι κυτταρικά άθροίσματα, όπου και πάλιν ἔκαστον ἄτομον διατηρεῖ τὴν αὐτότελειάν του και τὴν αὐτονομίαν του. Εἰς πολλὰς ὅμως ἀποικίας τὰ διάφορα ἄτομα κατανέμονται μεταξύ των τὸ ὅλον φυσιολογικὸν ἔργον τῆς ἀποικίας καί, ἀποκτῶντα βαθμηδὸν εἰδικότητας, διαφοροποιοῦνται κατὰ τὴν μορφὴν καὶ τὴν ὁργάνωσιν,



Εἰκὼν 13. Ἐγχυματικὰ Πρωτόζωα ἐντὸς σταγόνος ὕδατος δρώμενα διὰ μικροσκοπίου.




Εἰκὼν 14. Ἀποικία ἀπὸ μονοκυττάρους δργανισμοὺς τοῦ Πρωτοζόφου Εὔδορίνης.

μεταβαλλόμενα π.χ. τὰ μὲν εἰς τροφικὰ διὰ τὴν ὀλότητα κύτταρα, τὰ δὲ εἰς γενητικά.

Οἱ μονοκύτταροι δργανισμοί, γνωστοὶ μὲ τὸ ὄνομα Πρώτιστα, ἀποτελοῦν τὰ Πρωτόφυτα (Θαλλόφυτα) καὶ τὰ Πρωτόζωα (Μαστιγοφόρα, Ριζόποδα, Σπορόζωα, καὶ Βλεφαριδοφόρα). Σαφεῖς διαφοραὶ μεταξύ των δὲν ὑπάρχουν.

Καὶ εἰς τοὺς πολυκυττάρους δργανισμοὺς ἡ ζωὴ ἀρχίζει ἀπὸ ἓν κύτταρον, τὸ ὄρον, τὸ δόποιον τέμνεται εἰς δύο, ἔπειτα δὲ τὰ δύο εἰς τέσσαρα κ.ο.κ. Τὰ κύτταρα τῶν πολυκυττάρων δργανισμῶν πολλαπλασιαζόμενα δὲν χωρίζονται ἀπ' ἀλλήλων, ἀλλὰ συνενοῦνται καὶ συγκροτοῦν τοὺς ἴστοὺς καὶ ἐκ τῶν ἴστων τὰ διάφορα δργανα. Χάνουν βέβαιοι ἐν μέρει τὴν αὐτότελειάν των, ἀλλ' ὅχι καὶ τὴν ζωὴν των. "Ἐκαστον ζῇ δι' ἑαυτὸν καὶ συγχρόνως ἔξυπηρετεῖ καὶ τὴν ζωὴν τῶν ἄλλων κυττάρων τοῦ ἴστοῦ. Εἰς τὴν ἀρμονικὴν αὐτὴν συνεργασίαν τῶν μελῶν τῆς κυτταρικῆς κοινωνίας χρεωστεῖ ὁ μὲν ἐργάτης τὴν

ένέργειαν τῶν μυῶν του, ὁ δὲ συγγραφεὺς τὴν μεγαλοφυῖαν του.
Ἄν δὲ ἀπὸ ἔνα ίστόν ἀποσπάσωμεν τεμάχιον αὐτοῦ, διὰ νὰ τὸ μετα-
μοσχεύσωμεν εἰς ἄλλον ὅμοειδῆ ίστόν, ὑπὸ καταλλήλους συνθήκας.



Εἰκὼν 15. Διάφορα Πρώτιστα.

Α = Χλαμυδομονάς, Β = Μαστιγοφόρον, Γ = Ριζόποδον, Δ = Σπορόζωον, Ε = Βλεφαριδοφόρον.

τὰ κύτταρά του θὰ ἔξακολουθήσουν νὰ ζοῦν καὶ μετὰ τὴν ἀπόσπασιν.

Τὸ κύτταρον λοιπὸν εἶναι ὁ οίκοδομικὸς λίθος, ἢ στοιχειώδης μονάς τῆς ζωῆς, ἢ μικροτέρα ὄργανικὴ μονάς.

ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ

"Όλα τὰ ὄργανικὰ ὅντα ἀποτελοῦνται ἀπὸ διαφόρου μορφῆς μικρότατα στοιχεῖα, τὰ κύτταρα. Εἰς ἕκαστον κύτταρον διακρίνομεν τὴν κυτταρικὴν μεμβράνην, τὸ πρωτόπλασμα καὶ τὸν ἐντὸς αὐτοῦ πυρῆνα. Τὰ ζωϊκὰ κύτταρα δὲν ἔχουν κυτταρικὴν μεμβράνην.

‘Ο πυρήν ἀποτελεῖται ἀπὸ τὸ δίκτυον τῆς λινίνης, ἐπὶ τοῦ δποίου ὑπάρχουν τὰ κοκκία χρωματίνης. Παρὰ τὸν πυρῆνα εύρισκεται τὸ κεντροσωμάτιον. Εἰς τὸ πρωτόπλασμα τῶν φυτικῶν κυττάρων ἔγκλειονται καὶ τὰ χρωματοφόρα. Εἰς ὅλων τῶν ἡλικιωμένων κυττάρων τὸ πρωτόπλασμα ὑπάρχουν τὰ χυμοτόπια, χῶροι πλήρεις κυτταρικοῦ χυμοῦ μὲ διαλελυμένας διαφόρους ούσιας.

Τὸ κύτταρον πολλαπλασιάζεται διαιρούμενον εἰς δύο ἡμίση. Τῆς κυτταροτομίας προηγεῖται ἡ πυρηνοτομία. Αὕτη γίνεται ἡ χωρὶς καμμίαν μεταβολὴν τοῦ πυρῆνος (ἀμιτωσία), ἡ μὲ πολύπλοκον αὐτοῦ ἔξεργασίαν (μίτωσις). Κατά τινα φάσιν τῆς μιτώσεως σχηματίζεται ἀπὸ τὴν λινίνην μὲ τὴν χρωματίνην ἐν σπείραμα, τὸ δποίον κατόπιν τέμνεται εἰς τεμάχια. Τὰ τεμάχια αὐτά, καλούμενα χρωματοσωμάτια, διχοτομοῦνται καὶ σχηματίζουν δύο πυρῆνας διὰ τὰ δύο θυγατρικὰ κύτταρα, τὰ δποία θὰ παραχθοῦν μὲ τὴν διαίρεσιν καὶ τοῦ πρωτοπλάσματος. Τὰ θυγατρικὰ κύτταρα ὁμοιάζουν πρὸς τὸ μητρικόν. Τὸ κύτταρον εἶναι ἡ μικροτέρα δργανικὴ μονάς, ἡ δποία ἔχει αὐτοτελῆ καὶ αὐτόνομον ζωήν. Εἶναι ἡ ἐστία τοῦ πυρὸς τῆς ζωῆς.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

- 1) Τί εἶναι τὸ κύτταρον ;
- 2) Ποῖον τὸ μέγεθος τοῦ κυττάρου τῶν μικρῶν δργανισμῶν καὶ ποῖον τὸ μέγεθος τοῦ κυττάρου τῶν μεγάλων ;
- 3) Τί συντελεῖ εἰς τὴν ἀφομοιωτικὴν λειτουργίαν τοῦ πρωτοπλάσματος ;
- 4) Πῶς γίνεται ἡ πυρηνοτομία ;
- 5) Ποία ἡ σημασία τῶν χρωματοσωματίων ;
- 6) Πόσα χρωματοσωμάτια ἔχει τὸ κύτταρον τοῦ ἀνθρώπου, τοῦ πιθήκου, τοῦ ἵππου, τοῦ πίσου, τοῦ ἀράβοσίτου ;

ΣΥΝΘΗΚΑΙ

ΕΞΩΝ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ Η ΖΩΗ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑΙ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΑΙ


‘Η διατήρησις τῆς ζωῆς τῶν ὄργανισμῶν ἔξαρτᾶται στενῶς ἀπό ώρισμένας συνθήκας, ἐξωτερικάς καὶ ἐξωτερικάς.

Καὶ ἐσωτερικά ἀλλὰ μὲν συνθῆκαι εἰναι ἡ κυτταρικὴ κατασκευὴ τῶν ὄργανισμῶν καὶ ἡ παρουσία εἰς τὰ κύτταρά των τῶν χαρακτηριστικῶν ἔκεινων χημικῶν ἐνώσεων, τῶν ὅποιων διαφορά συνδυασμὸς δημιουργεῖ τὴν ζῶσαν ψύχην. Μᾶς εἰναι ἀκόμη ἀγνωστος ἡ τεχνικὴ τῆς συνθέσεως καὶ τοῦ συνδυασμοῦ ὅλων αὐτῶν τῶν ἐνώσεων. Οὔτε δυνάμεθα νὰ μεταβάλλωμεν τὰς ἐξωτερικάς συνθήκας, μὲν τὰς ὅποιας ἡ ζωὴ εἰναι συνυφασμένη.

Ἐξωτερικά δὲ συνθῆκαι εἰναι, δσα συναποτελοῦν τὸ λεγόμενον περιβάλλον, ἐντὸς τοῦ ὅποιου ζοῦν οἱ διάφοροι ὄργανισμοί. Τὸ περιβάλλον συνίσταται ἀφ’ ἐνὸς μὲν ἀπὸ ἀλλούς ὄργανισμοὺς (ὄργανικὸν περιβάλλον), ἀφ’ ἑτέρου δὲ ἀπὸ πλήθος παραγόντων, φυσικῶν καὶ χημικῶν, (ἀνόργανον περιβάλλον). Τὰς ἐξωτερικάς συνθήκας τῆς ζωῆς δυνάμεθα νὰ μεταβάλλωμεν τεχνητῶς, προκειμένου νὰ ὠφελήσωμεν ἡ νὰ μελετήσωμεν τοὺς ὄργανισμούς.

Οπως γνωρίζομεν, μὲ τὴν μελέτην τῶν σχέσεων μεταξὺ ὄργανισμῶν καὶ περιβάλλοντος καταγίνεται ἡ Οἰκολογία.

Ἀπὸ τοὺς ἐξωτερικοὺς παράγοντας, τοὺς ἀσκοῦντας ἐπίδρασιν ἐπὶ τῆς ζωῆς τῶν ἐμβίων ὅντων, κυριώτατοι εἰναι τὸ φῶς, ἡ




Εἰκὼν 16. Υδρόβιον φυτόν, ἐπὶ τοῦ ὅποιου ἐπιδροῦν διάφορα εἴδη, παραγόντων.

θερμότης, ή ύγρασία, ή πίεσις, ή τροφή κτλ. 'Εκ τούτων δυνατὸν εἰς καὶ μόνος νὰ ἐπιδρᾷ ἐπὶ τῶν ὀργανισμῶν. 'Αλλ' εἶναι ἐπίσης δυνατὸν νὰ ἐπιδροῦν συγχρόνως πολλὰ ή καὶ ὅλα τὰ εἴδη τῶν παραγόντων. Λ.χ. ἐπὶ τῆς ρίζης ἐνὸς ὄντος φυτοῦ ἐπιδρᾶ τὸ ἔδαφος, ἐπὶ τοῦ στελέχους του τὸ ὕδωρ καὶ ἐπὶ τοῦ ἀνωτέρου τμήματός του ὁ ὄχηρ (Εἰκ. 16).

ΤΟ ΦΩΣ

Τὸ φῶς, ἀφθόνως ἀπλούμενον ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας τῆς γῆς, ἀποτελεῖ παράγοντα σπουδαιότατον διὰ τὴν ζωὴν τῶν ἐμβίων δντων. Διὰ τὰ χλωροφυλλοῦντα μάλιστα φυτὰ ή σημασία του εἶναι μεγάλη. Αὐτὸν μαζὶ μὲ τὴν χλωροφύλλην συνθέτει διὰ τὸ φυτὸν ἀπὸ ἀνόργανα στοιχεῖα ὀργανικὰς οὐσίας. 'Η ἀσκησίς τῆς χλωροφυλλικῆς λειτουργίας εἶναι ἀδύνατος εἰς τὸ σκότος. "Οταν αὐξάνεται ή ἔντασις τοῦ φωτός, ή ἀφομοίωσις τοῦ ἀνθρακος ἐκ τοῦ διοξειδίου τοῦ ἀνθρακος τοῦ ἀέρος ή τοῦ ὕδατος ἐπιτυγχάνεται. Κατὰ τὴν λειτουργίαν αὐτήν, ἐκ τῶν ἀκτίνων τοῦ ἡλίου ἐνεργοῦν κυρίως αἱ φωτειναί, ἐντονώτερον μάλιστα αἱ ἐρυθραὶ ἀκτίνες. Παρομοίαν ἐνέργειαν δύναται νὰ κάμη καὶ ή συνεχῆς ἐπίδρασις τοῦ ἡλεκτρικοῦ φωτός.


Πολλὰ σπέρματα βλαστάνουν καὶ ἀναπτύσσονται μόνον ὑπὸ τὴν ἐπίδρασιν τοῦ φωτός. "Αν σπέρμα τι βλαστήσῃ εἰς τὸ σκότος, τὸ φυτικὸν ἐμβρυον δύναται ν' ἀναπτυχθῇ, ἐφ' ὅσον εἰς τὸ σπέρμα ὑπάρχουν πρὸς κατανάλωσιν θρεπτικὰ στοιχεῖα. "Οταν δῶμας ἔχαντηθοῦν τὰ ἀποθέματα, τὸ φυτικὸν ἐμβρυον θ' ἀποθάνῃ ἀνευ ἡλίου. 'Ο Κισσός ἀνθεῖ εἰς τὸ φῶς, δχι δὲ καὶ εἰς τὸ ἐσωτερικὸν τῶν δασῶν. 'Ελλείψει φωτός, ἐπιταχύνεται ή φυλλοβολία. Λ.χ. Βεγόνιαι καὶ Φούξιαι φυλλοβολοῦν, ἀν ζήσουν εἰς σκότος 1 - 2 ἑβδομάδας. Γενικῶς τὸ φῶς ρυθμίζει τὴν μορφὴν τοῦ φυτοῦ. Φυτὰ μὲ χλωροφύλλην, αὐξανόμενα εἰς τὸ σκότος, ἀναπτύσσουν τὰ μεσογονάτια διαστήματά των καὶ κάμνουν τὰ, φύλλα των μικρὰ καὶ πλούσια εἰς χλωροφύλλην. 'Η χροιὰ τοῦ στελέχους των παραμένει λευκὴ ή κιτρινωπή, ὅπως καὶ ή χροιὰ τῶν βλαστῶν, τοὺς ὅποιους ἀνέδωκαν Γεώμητλα ἐντὸς ὑπογείων. 'Αντιθέτως, τὰ αὐξανόμενα εἰς ἐντονον φῶς ἔχουν μικρὸν τὸ ἀνάστημα, φύλλα δὲ κάποτε



Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

κιτρινισμένα. "Οταν τὰ σιτηρά ἀναπτυχθοῦν πυκνά, τὰ μέρη τοῦ βλαστοῦ των, ἐπειδὴ εύρισκονται ύπό σκιάν, ἐπιμηκύνονται καὶ παραμένουν μαλακά. Διὰ τοῦτο δὲ καὶ κάμπτονται εὐκόλως καὶ κατακλίνονται εἰς τὸ ἔδαφος.

"Υπάρχουν φυτά, τὰ ὄποια ἔχουν μεγάλας ἀπαιτήσεις πρὸς τὸ φῶς, ὅπως εἶναι ἡ Πεύκη, ὁ Ἡλίανθος κλπ. Αὐτὰ καλοῦνται φιλόφωτα. Ἀντιθέτως ἄλλα, ὅπως ἡ Ἐλάτη, ἡ Ὁξύα, ἡ Πτέρις, τὰ Βρύα κλπ., ἀρκοῦνται καὶ εἰς ὀλίγον φῶς. Αὐτὰ καλοῦνται



Εικών 17. A = φυτὸν ἀναπτυχθὲν εἰς τὸ φῶς. B = φυτὸν ἀναπτυχθὲν εἰς τὸ σκότος.


σκιατραφῆ. Ἔκαστος φυτικὸς ὄργανισμὸς εὐημερεῖ μεταξὺ ὥρισμένων ὄριων φωτεινῆς ἐντάσεως. Τὰ ὄρια αὐτὰ εἶναι τὸ μέγιστον, τὸ ἐλάχιστον καὶ τὸ μεταξὺ τούτων ἀριστον.

"Υπερέντασις φωτὸς ἐπιφέρει ἀναστολὴν τῆς ἀναπτύξεως τοῦ φυτοῦ ἢ καὶ θάνατον αὐτοῦ. Μερικὰ φυτά, διὰ νὰ προστατεύσουν τὴν

ζωὴν τῶν κυπτάρων τῶν ἀπὸ τὸ ἔντονον φῶς σχηματίζουν χρωστικὰς οὐσίας. Τοιαῦτα εἶναι τὰ διάφορα Φύκη τῶν ὑγρῶν τοίχων, τῶν φλοιῶν τῶν δένδρων, τῶν παραθαλασσίων βράχων καὶ τῶν τελμάτων, τὰ ὅποια ἔχουν διαφόρους χροιάς: κυανίζουσαν, πρασίνην, μελανίζουσαν, ἐρυθράν. Ἡ ἀνω ἐπιφάνεια τῶν φύλλων, τὰ ὅποια ἐκτίθενται εἰς τὸ φῶς, καλύπτεται ὑπὸ τριχῶν καὶ εἶναι στιλπνή, διὰ ν' ἀνακλᾶ τὸ φῶς.

Πολλὰ φυτὰ ζοῦν εἰς τὸ σκότος, π.χ. τὰ φυτὰ τῶν σπηλαίων καὶ τοῦ βυθοῦ τῶν θαλασσῶν, πολλὰ Βακτηρίδια κλπ. Τὸ ἡλιακὸν φῶς εἶναι ἀνωφελές ἢ καὶ βλαβερὸν εἰς τὴν φυσικὴν ἀνάπτυξιν τῶν Μυκήτων καὶ ιδίως τῶν Βακτηριδίων. Εἰς τοῦτο δὲ ὁφείλεται καὶ ἡ ὑγιεινὴ σημασία του. Διὰ τῶν ὑπεριωδῶν ἀκτίνων του τὸ ἡλιακὸν φῶς καθαρίζει κατὰ μέγα μέρος καὶ τὰ ὄντα τῶν μεγάλων ποταμῶν ἀπὸ τοὺς βλαβερούς μικροοργανισμούς.

Ἡ ἐπίδρασις τοῦ φωτὸς εἰς τὰ ζῷα εἶναι μικροτέρας σημασίας



Εἰκὼν 18. Πρωτεύς.

παρὰ εἰς τὰ φυτά. Ἡ ἐνέργειά του ἐπὶ Πρωτοζῷων καὶ Παρασίτων ἔχει σχέσιν μὲ τὴν ἐναλλαγὴν τῆς υλῆς. Πολλὰ ζῷα, διὰ νὰ προστατευθοῦν ἀπὸ τὸν Ισχυρὸν φωτισμόν, μεταβάλλουν τὸν χρωματισμόν των. Λ.χ. ὁ Πρωτεύς, ὁ ὅποιος εἰς φυσικὴν κατάστασιν ἔχει χρῶμα ἄχρουν, γίνεται μελανός, ὅταν τοποθετηθῇ εἰς ἐνυδρεῖον, ὅπου τὸ φῶς εἶναι διάχυτον. Νυκτόβιοι Ψιττακοί ἔχουν πτέρωμα πυρρὸν ἢ τεφρόν, ἐνῷ οἱ ἡμερόβιοι ἔχουν ζωτρὰ στίλβοντα χρώματα. Τὰ πλείστα τῶν πτηνῶν ἐπὶ τῆς ράχεως των, ἡ ὅποια εἰς τὰ ὑψη τῆς ἀτμοσφαίρας εἶναι περισσότερον ἐκτεθειμένη εἰς τὴν ὑπεριωδή ἀκτινοβολίαν τοῦ ἡλίου, ἔχουν πτήλωμα φαιόχρουν, ἐνῷ ἐπὶ τῆς κοιλίας συνήθως ἔχουν πτήλωμα λευκόν. Καὶ ὁ

άνθρωπος, ύποδη τὴν ἐπίδρασιν τοῦ ἡλιακοῦ φωτός, ἀναπτύσσει εἰς τὸ δέρμα του τὸ γυνωστὸν μελάγχρωμα. Τὸ μελάγχρωμα θεωρεῖται καὶ ὡς εὐμενὲς προγνωστικὸν σημεῖον δι' ἐκεῖνον, ὁ ὅποιος ὑποβάλλεται εἰς ἡλιοθεραπείαν.

Πολλὰ ζῶα (Ἐρπετά, Ἀμφίβια, Ἐντομα, Καρκινοειδῆ) ἔχουν τὴν ίκανότητα τῆς προσαρμογῆς πρὸς τὴν χροιὰν τοῦ περιβάλλοντος διὰ τῆς λεγομένης χρωματικῆς παραλλαγῆς. Ἡ ἀλλαγή, ἡ ὅποια ὀφείλεται εἰς μετάθεσιν τῶν χρωματοφόρων κυττάρων τῆς ἐπιδερμίδος των, σκοπὸν ἔχει νὰ προφύλαστη τὰ ζῶα αὐτὰ ἀπὸ τοὺς ἔχθρους των. Λ. χ. Ψυχὴ ἡ Κάλλιμος, ὅταν εύρισκεται ἐπὶ κλάδου, δυσκόλως διακρίνεται ἀπὸ τὸ φύλλον, τοῦ ὅποιου ἀπομιμεῖται τὸν χρωματισμὸν καὶ τὸ σχῆμα. "Ἄλλα ζῶα, μὴ ἔχοντα τὴν ίκανότητα αὐτήν, ἀναζητοῦν περιβάλλον σύμφωνον πρὸς τὴν χροιὰν τοῦ σώματός των.

'Ο χαμαιλέων ἀλλάσσει ταχέως χρωματισμὸν ἀναλόγως τοῦ περιβάλλοντος.

Καὶ ἡ ἔλλειψις τοῦ φωτὸς προκαλεῖ διαφόρους προσαρμογάς. Π.χ. δσα ζῶα ζοῦν ύποδη σκιὰν ἢ εἰς σπάλαια ἢ ύπο τὴν γῆν (Χοῖρος, Ἀράχναι, Μυριάποδα, Ἀσπάλαξ κλπ.), ἔχουν χρώματα ἀτονα καὶ δρθαλμούς ἀτροφικούς. 'Αντ' αὐτῶν ἔχουν ἀνεπτυγμένην τὴν δσφρησιν ἢ τὴν ἀφήν κλπ.

Η ΘΕΡΜΟΤΗΣ

'Εκ τοῦ ποσοῦ τῆς θερμότητος ἔξαρτᾶται ἡ θερμοκρασία τοῦ περιβάλλοντος. Καὶ αὐτὴ ἔχει σπουδαίαν σημασίαν διὰ τὴν ζωὴν τῶν ἐμβίων διντων. "Οπως δὲ διὰ τὴν φωτεινὴν ἔντασιν, οὔτω καὶ διὰ τὴν θερμοκρασίαν ύπάρχουν δι' ἔκαστον ὄργανισμὸν ώρισμένα δρια, ἐντὸς τῶν ὅποιων οὗτος δύναται νὰ ζήσῃ. 'Υπάρχουν τὸ ὄριον τῆς ἐλαχίστης καὶ τὸ δριον τῆς μεγίστης θερμοκρασίας. Μεταξὺ δὲ τῶν δύο αὐτῶν ἀκρων θερμοκρασιῶν ύπάρχει ἡ ἀρίστη θερμοκρασία.


Τὰ δρια τῆς θερμοκρασίας, μεταξὺ τῶν ὅποιων δύνανται νὰ ζήσουν τὰ περισσότερα φυτά, εἶναι ἀνώτατον μὲν οἱ 45 βαθμοὶ Κελσίου, κατώτατον δὲ οἱ 5 - 10 βαθμοὶ ύπο τὸ μηδέν. Εύνόητον, ὅτι διὰ τὸν καλλιεργητὴν ἡ γνῶσις τῶν δριῶν τούτων ἔχει ἔξαιρετηκὴν στοιχαιότητα. Ἡ ἀνθησις ἀπαιτεῖ ύψηλοτέραν θερμοκρασίαν παρὰ ἡ βλάστησις.

Ἐφ' ὅσον ἡ θερμοκρασία τοῦ περιβάλλοντος αὔξάνεται, αἱ λειτουργίαι τῆς ζωῆς τοῦ φυτοῦ (ἀναπνοή, ἀφομοίωσις κλπ.) κατ' ἀρχὰς μὲν ἐπιταχύνονται, ἔπειτα δὲ ἀναστέλλονται. Καὶ ὅταν ἡ θερμοκρασία ὑπερβῇ τὸ μέγιστον δριον, τὸ ὕδωρ τὸ εὐρισκόμενον εἰς τὸ πρωτόπλασμα τῶν κυττάρων τοῦ φυτοῦ ἔξατμίζεται καὶ τὸ φυτὸν θνήσκει ἀπὸ θερμοπληξίαν.

Ἐν τούτοις μερικὰ κακτώδη δύνανται νὰ ζήσουν εἰς τὸν ἥλιον καὶ μὲ θερμοκρασίαν τῶν ἴστων των 60 βαθμῶν. Φυτικὰ μόρια, τὰ ὅποια ἀντέχουν εἰς τὴν ξηρασίαν, λ. Χ. σπέρματα, ἀντέχουν καὶ εἰς θερμοκρασίαν 65 - 80 βαθμῶν, ἐνῷ διογκούμενα μὲ ὕδωρ θνήσκουν εἰς 50 βαθμούς. Τὰ μᾶλλον ἀπρόσβλητα εἰς ύψηλὰς θερμοκρασίας εἰναι τὰ σπόρια τῶν Βακτηριδίων. Ταῦτα θνήσκουν εἰς 85 βαθμούς.

Ἀντιθέτως, ἐφ' ὅσον ἡ θερμοκρασία τοῦ περιβάλλοντος ἐλαττούται, αἱ λειτουργίαι τῆς ζωῆς τοῦ φυτοῦ ἐπιβραδύνονται. Καὶ ὅταν ἡ θερμοκρασία κατέληθε κάτω τοῦ ἐλαχίστου δρίου, ἐπιφέρει ἀκαμψίαν εἰς τὸ φυτόν, τὸ ὅποιον τέλος θνήσκει ἀπὸ παγοπληξίαν, διότι τὸ ὕδωρ τοῦ πρωτοπλάσματος τῶν κυττάρων του πήγυνται. ᘾ ΕΝ ΤΟΥΤΟΙΣ ΜΕΡΙΚΑ ΚΑΝΟΦΟΡΑ ΤΗΣ ΣΙΒΗΡΙΑΣ ἀντέχουν

καὶ εἰς θερμοκρασίαν 65 βαθμῶν ὑπὸ τὸ μηδέν. Βακτηρίδια χολέρας διετήρησαν τὴν ζωτικότητά των καὶ εἰς 252 βαθμούς ὑπὸ τὸ μηδέν. Εἰς μερικὰς περιπτώσεις ἡ ἐπίδρασις τοῦ ψύχους μετατρέπει τὸ ἄμυλον εἰς σάκχαρον. Διὰ τὸν λόγον αὐτὸν Γεώμηλα, τὰ ὅποια διατηρούνται εἰς ψυχροὺς χώρους, γίνονται γλυκύτερα. Ἡ μετατροπὴ τοῦ ἄμυλου εἰς σάκχαρον θεωρεῖται ὡς μέσον προστατευτικὸν κατὰ τοῦ ψύχους.




Εἰκὼν 19. Κάκτος.

‘Απὸ τὴν θερμοκρασίαν τοῦ περιβάλλοντος ἔξαρτᾶται καὶ ὡς βλαστική περίοδος τῶν φυτῶν, ἡ ὅποια εἰς τὰ εὔκρατα κλίματα διαρκεῖ ἀπὸ τῆς ἀνοίξεως μέχρι τοῦ φθινοπώρου. Ἐξαρτᾶται ἐπίσης καὶ ἡ χειμερία ἀνάπτυξη, δηλαδὴ ἡ κατάστασις ἐκείνη, κατὰ τὴν ὅποιαν τὸν χειμῶνα τὰ μέρη τοῦ φυτοῦ ἡρεμοῦν. ’Αλλ’ οἱ καλλιεργηταὶ μεταβάλλουν κατὰ βούλησιν τὴν περίοδον αὐτὴν τῆς ἡρεμίας τῶν φυτῶν, ὑποβάλλοντες αὐτὰ εἰς πολύωρα λουτρά, θερμοκρασίας 30-35 βαθμῶν, καὶ τόποθετοῦντες εἰς θερμοκήπια μὲν θερμοκρασίαν ἐσωτερικήν 15-18 βαθμῶν. Ἐκεῖ τὰ φυτά βλαστάνουν ταχέως. Πολλὰ ὄμως φυτά, τῶν ὅποιων τοιουτορόπως διακόπτεται ἡ χειμερία ἀνάπτυξα, δὲν ἐπανεύρισκουν πλέον κατὰ τὴν ἀνοίξιν τὴν φυσιολογικήν των δραστηριότητα. ’Υπάρχουν καὶ φυτά, τὰ ὅποια δὲν παρουσιάζουν τὴν χειμερίαν ἀνάπτυξαν, διότι ἀνθοῦν ἡ βλαστάνουν δις τοῦ ἔτους (λεμονία δίφορη).

Μὲ τὴν ὑψωσιν τῆς θερμοκρασίας ἐμφανίζονται ἐνίστε εἰς τὰ φυτὰ πρόσκαιροι ιδιότητες. Παράδειγμα ἔχομεν τὸ διακο-



Εἰκὼν 20. Βλάστησις διὰ θερμοῦ λουτροῦ.



Εἰκὼν 21. Δύο φυτὰ Ἀκολήφης.
Τὸ Α διῆλθε τὸν χειμῶνα ὑπὸ χιόνων
τὸ Β εἰς θερμοκήπιον.

συμητικόν φυτὸν Πρίμουλα, τὸ δποῖον ἔχει δύο παραλλαγάς, μίαν μὲ ἄνθη λευκὰ καὶ μίαν μὲ ἐρυθρά. Σπόρος τῆς δευτέρας παραλλαγῆς εἰς θερμοκρασίαν 10 - 15 βαθμῶν παράγει ἐρυθρὰ ἄνθη. "Αν καλλιεργηθῇ εἰς θερμοκήπιον μὲ θερμοκρασίαν 35 βαθμῶν, θὰ παραγάγῃ φυτὸν μὲ λευκὰ ἄνθη. "Αν σπόρος τοῦ εἰς θερμοκήπιον ἀναπτυχθέντος φυτοῦ καλλιεργηθῇ εἰς θερμοκρασίαν 15 βαθμῶν, θὰ παραγάγῃ φυτὸν μὲ ἐρυθρὰ ἄνθη. "Η ἴδιότης δηλαδὴ θὰ ἔξαφανισθῇ, ὡς παύση νὰ δρᾶ ἡ ὑψηλὴ θερμοκρασία.

Τέλος ἡ θερμοκρασία ἀποτελεῖ τὸν κυριώτατον κλιματικὸν παράγοντα διὰ τὴν γεωγραφικὴν ἐξάπλωσιν τῶν φυτῶν, ήτοι διὰ τὴν ὁρίζοντίαν καὶ τὴν κατακόρυφον κατανομὴν αὐτῶν εἰς διαφόρους φυτικὰς ζώνας. Οὕτω παρ' ἡμῖν ἡ Ὀξύα φθάνει μέχρι τῆς Στερεάς Ἑλλάδος. Νοτιώτερον δὲν ἀναπτύσσεται. "Η Πεύκη ἡ ρητινοφόρος φύεται εἰς ὑψη μέχρις 800 μέτρων, ἡ Ἐλάτη εἰς ὑψη ἄνω τῶν 800 μέτρων. Εἰς ὑψη ἄνω τῶν 2000 μέτρων δὲν φύονται πλέον οὐδὲ θάμνοι. "Αλλην ὅψιν παρουσιάζουν τὰ δάση τῶν πολικῶν χωρῶν μὲ τοὺς θάμνους καὶ ἀλλην τὰ τροπικὰ δάση μὲ τὰ πανύψηλα δένδρα.



Εἰκὼν 22. 'Ηλίανθος ὁ βολβώδης.
Α = Τὸ φυτόν, μετὰ ὑψηλοῦ στελέχους, φυὲν εἰς πεδιάδα. Β = Τὸ φυτὸν φυὲν ἐπὶ ὅρους. Β' = Μεγέθυνσις τοῦ φυτοῦ Β.

διάφορος ἀπὸ τὴν θερμοκρασίαν πολλά καὶ μάλιστα εἰς ὑψηλὰ ὅρη.

Μὲ τὴν θερμοκρασίαν τοῦ περιβάλλοντος σχέσιν ἔχουν καὶ πολλὰ φαινόμενα τοῦ βίου τῶν ζῷων. "Αν ἔξετάσωμεν τὴν θερμοκρασίαν τοῦ σώματός των ἐν σχέσει μὲ τὴν θερμοκρασίαν τοῦ περι-

βάλλοντος, διακρίνομεν τὰ ζῷα εἰς δύμοις θερμακίας καὶ εἰς ποικιλόθερμα. Τὰ πρῶτα, ὅπεις εἶναι δύναμις θερμοκρασίας, τὰ πιτηνά κλπ., διατηροῦν σταθερά τὴν θερμοκρασίαν τοῦ σώματός των, ἀνεξάρτητα ἀπό τὴν θερμικήν κατάστασιν τοῦ περιβάλλοντος. Αὐτὸς ἐπιτυγχάνει δύναμις τῶν μὲν τὴν διαστολὴν ἢ τὴν συστολὴν τῶν περιφερικῶν ἀγγείων, μὲν τὴν ἐφίδρωσιν, μὲν τὴν αὔξησιν ἢ τὴν ἐλάττωσιν τῶν καύσεων, μὲν τὴν πύκνωσιν ἢ τὴν ἀραίωσιν τοῦ ππιλώματος ἢ τοῦ τριχώματος κτλ. Τὰ ποικιλόθερμα ἔχουν θερμοκρασίαν, ἢ ὅποια μεταβάλλεται μὲν τὴν ἐξωτερικήν θερμοκρασίαν. Ποικιλόθερμα εἶναι τὰ ἔρπετά, τὰ ἀμφίβια κλπ. Πολλὰ ἔξι αὐτῶν κατὰ τὴν χαμηλήν θερμοκρασίαν περιπίπτουν εἰς τὴν λεγομένην χειμερίαν νάρκην, κατὰ τὴν ὅποιαν οὔτε τροφήν λαμβάνουν, οὔτε δεικνύουν σημεῖα ζωῆς. ‘Η κυκλοφορία καὶ ἡ ἀναπνοή των ἐπιβραδύνονται πολύ. ‘Η χειμερία νάρκη διαφέρει ἀπό τὸν χειμέριον ύπνον, δύοποιος εἶναι ύπνος μακρᾶς ἢ βραχείας διαρκείας, εἰς τὸν ὅποιον περιπίπτουν ώρισμένα θηλαστικά, λ.χ. ἡ Ἀρκτος, ὁ Σκίουρος, ὁ Ἀκανθόχοιρος, ἡ Νυκτερίς κλπ. ‘Ο χειμέριος ύπνος ἐπέρχεται, διότι ἡ πτώσις τῆς θερμοκρασίας τὸν χειμῶνα δημιουργεῖ εἰς τὰ ζῷα αὐτὰ δυσκολίας εἰς τὴν διατροφήν. ‘Ενεκα τῆς αὐτῆς δυσκολίας διατροφῆς ώρισμένα πτηνά, ἄλλα καὶ θηλαστικά, ἀναγκάζονται ν' ἀποδημήσουν εἰς ἄλλα θερμότερα κλίματα.

Μὲ τὴν θερμοκρασίαν τοῦ περιβάλλοντος σχέσιν ἔχουν ἐπίσης τὸ χρῶμα, ὡς καὶ ἡ πυκνότης τοῦ τριχώματος ἢ τοῦ πτερώματος τῶν ζῴων. Λ.χ. τὸ χρῶμα τοῦ Σκιούρου εἰς τὴν Ἐλβετίαν εἶναι καστανὸν τὸ θέρος καὶ ξανθὸν τὸν χειμῶνα. Εἰς τὴν Σιβηρίαν τὸ χρῶμα τοῦ Σκιούρου τὸν χειμῶνα εἶναι λευκότατον, ὅπεις εἶναι καὶ τοῦ Λαγωοῦ εἰς τὰς Ἀλπεις. Τὸ λευκὸν τρίχωμα τῶν κονίκλων τῶν Ἰμαλαΐων γίνεται μέλαν μετὰ τὴν ἀποτρίχωσιν, ἀν τὸ ζῷον διαμείνῃ εἰς χαμηλάς θερμοκρασίας. ‘Ἐπίσης τὰ πλεῖστα τῶν ζῷων τῶν πολικῶν χωρῶν εἶναι λευκά. Αὐτὸς βέβαια δὲν εἶναι ἀποτέλεσμα προσαρμογῆς πρὸς τὸ χρῶμα τοῦ περιβάλλοντος, ὡς ύπεστηριξαν μερικοί, ἀλλὰ προσαρμογῆς πρὸς τὴν θερμοκρασίαν, διότι τὸ λευκὸν χρῶμα τοῦ τριχώματος παρατηρεῖται κατὰ τὴν χαμηλήν θερμοκρασίαν καὶ εἰς περιβάλλον ὅχι λευκόν. ‘Ψυγλή θερμοκρασία ζωηρεύει τὰ χρώματα τῶν ἐντόμων. Λεπιδόπτερα, τὰ ὅποια προῆλ-

θον ἀπὸ προνύμφας τοῦ θέρους, ἔχουν χρωματα ζωηρότερα ἀπὸ τὰ χρώματα τῶν ἐντόμων τοῦ αὐτοῦ είδους, τὰ δόποια προῆλθον ἀπὸ προνύμφας τοῦ χειμῶνος. Τὸ τρίχωμα καὶ τὸ πτέρωμα πολλῶν ζώων τὸν χειμῶνα γίνονται πυκνότερα καὶ μακρότερα.

Καὶ ἡ γεωγραφικὴ διανομὴ τῶν ζώων τέλος ἔξαρτᾶται κατὰ πολὺ ἀπὸ τὴν θερμοκρασίαν τοῦ περιβάλλοντος, ἃν καὶ τὰ ζῷα, μεταφερόμενα ἀπὸ τόπου εἰς τόπον ἔγκλιματίζονται εὔκόλως. Εἰς τόπους, οἱ δόποιοι παρουσιάζουν τὰς αὐτὰς περίπου κλιματικὰς συνθήκας, παρὰ τὴν διαφοράν τοῦ γεωγραφικοῦ πλάτους των, ὑπάρχει ὁμοιότης τοῦ ζωϊκοῦ κόσμου. Ὁπερασδήποτε, γνωρίζομεν ὅτι εἰς τὰς πολικὰς χώρας ζῆ δ Τάρανδος καὶ ἡ λευκὴ Ἀρκτος, εἰς τὴν εὔκρατον ζώνην ζοῦν τὰ γνωστά μας κατοικίδια ζῷα, εἰς τὸν ἴσημερινὸν δὲ ὁ Λέων, ὁ Ρινόκερως, οἱ Πίθηκοι, ἡ Στρουθοκάμηλος κλπ.

Η ΥΓΡΑΣΙΑ

Τὸ ὄδωρ εἶναι ἀπαραίτητον διὰ τὴν ζωὴν τῶν ὄργανισμῶν, ὅχι μόνον διότι είναι γενικὸν συστατικὸν τῆς ζώσης οὐσίας, ἀλλὰ καὶ διότι εἰς πολλοὺς ἔξ αὐτῶν ἀποτελεῖ τὸ φυσικὸν περιβάλλον. "Ενεκα τούτου ἡ ἐλάττωσις τοῦ ὄδατος ἡ ἡ ἀποξήρανσις τῶν ὄργανισμῶν ἐπιφέρει εἰς αὐτοὺς διαφόρους ἀλλοιώσεις καὶ αὐτὸν ἀκόμη τὸν θάνατον. "Εχει σημασίαν ἡ θερμοκρασία τοῦ ὄδατος, ἡ χημική του σύνθεσις, ἡ πυκνότης τῶν ἀλάτων του, ἡ κίνησίς του κλπ.

Εἰς τὴν φυτικὴν ζωὴν τὸ ὄδωρ εἶναι ἀναγκαιότατον στοιχεῖον, διότι αὐτὸν είναι ὁ φορεύς τῶν θρεπτικῶν ούσιῶν εἰς τὸ φυτὸν καὶ αὐτὸν μετέχει εἰς τὰς χημικὰς ἀντιδράσεις, αἱ δόποια γίνονται εἰς τὸ κύτταρον. "Αλλ' ὅλα τὰ φυτὰ δὲν ζοῦν ὑπὸ τὰς αὐτὰς συνθήκας ὑγρασίας.

Τὰ ξηρόφυτα ζοῦν ὑπὸ δυσμενεῖς συνθήκας ὑγρασίας τοῦ ἐδάφους καὶ τοῦ ἀέρος. Μὲ τὴν ἐλάττωσιν ὅμως τῆς διαπνοῆς των καὶ μὲ τὴν ἀποταμίευσιν ὄδατος εἰς τοὺς ἴστούς των, προσαρμόζονται καλῶς πρὸς τὰς συνθήκας αὐτάς. Διὰ τὸν σκοπὸν αὐτὸν διαθέτουν ἡ μικρά καὶ σκληρὰ φύλλα ἡ σαρκώδη, μορφῆς κυλινδρικῆς, τῶν ὅποιων τὰ ἀραιά στόματα εύρισκονται κατὰ βάθος. Διὰ νὰ σμικρύνουν δὲ καὶ τὴν ὅλην ἐπιφάνειάν των, ἀπορρίπτουν

τὸ φύλλωμά των ἡ συμπλέκουν τοὺς κλάδους των. Τοιαῦτα φυτὰ εἶναι ἡ Πεύκη, ἡ Συκῆ, ἡ Πικροδάφνη, οἱ Λειχῆνες καὶ τὰ Βρύα τῶν βράχων, τὰ φυτὰ τῶν ἐρήμων καὶ τῶν στεππῶν. Ἐν Καπλανίᾳ φυτὰ μὲ κονδύλους καὶ βολβούς παρέμειναν ἐπὶ ἔτη ἀνευ φύλλων, ἔνεκα ἐλλείψεως βροχῶν.

Τὰ ύγρό φυτα εύδοκιμοῦν, ὅπου ύπαρχουν εὔμενεῖς συνθῆκαι ύγρασίας τοῦ ἐδάφους. Ἐχουν φύλλα λεπτὰ καὶ μεγάλα, μὲ πολλὰ καὶ πυκνὰ στόματα, διὰ τῶν ὅποιων ἀποβάλλεται τὸ ὕδωρ, συχνὰ ὑπὸ μορφὴν σταγόνων (σταγονόρροια). Μεταξὺ τῶν ἴστῶν των ἐγκλείσουν μεγάλην ποσότητα ὕδατος. Ἀν ἀποσπασθοῦν ἀπὸ τὸ ύγρὸν ἔδαφός των, ταχέως μαραίνονται. Τοιοῦτον φυτὸν εἶναι ὁ Πλάτανος.


Τὰ τροπόφυτα δύνανται νὰ προσαρμοσθοῦν εἰς οἰονδήποτε ἔδαφος, εἴτε ξηρὸν εἶναι τοῦτο, εἴτε ύγρόν, καὶ εἰς οἰασδήποτε κλιματικὰς ἀλλαγάς. Κατὰ τὸν χειμῶνα ἀποβάλλουν τὰ φύλλα των, οὕτω δὲ διαπνέουν ἐλάχιστα.

Τὰ ύδροβια ἡ ύδροχαρηζοῦν πάντοτε ἐντὸς τοῦ ὕδατος. Ἐχουν βλαστοὺς καὶ φύλλα ἐναέρια, ἐπιπλέοντα ἡ ύποβρύχια, τὰ ὅποια παρουσιάζουν σχήματα πολύμορφα, διφειλόμενα εἰς τὰς διαφορὰς τῆς θρέψεως. Ἐντὸς τοῦ κορμοῦ των διαθέτουν μεγάλα χάσματα πλήρη ἀέρος, μὲ τὰ ὅποια γίνεται ἡ ἐναλλαγὴ τῶν ἀερίων. Στεροῦνται συνήθως στομάτων. Πολλὰ ύδροβια ἀποτελοῦνται κατὰ τὰ 35 % ἀπὸ ὕδωρ. Τὰ ἄνθη των ὑψώνονται μέχρι τῆς ἐπιφανείας τοῦ ὕδατος, ὅπου καὶ γονιμοποιοῦνται ἀπὸ ἔντομα ἡ ἀπὸ τὸν ἄνεμον. Ο ποδίσκος τῶν τοιούτων ἀνθέων ἔχει πολλάκις μῆκος πολλῶν μέτρων. Εἰς ὀλίγα σχετικῶς ύδροβια γίνεται ἡ ἐπικονίασις κάτω ἀπὸ τὸ ὕδωρ. Οἱ καρποὶ εἰς τὰ περισσότερα ύδροβια ὥριμάζουν κάτω ἀπὸ τὸ ὕδωρ. Καὶ ἡ πλέουν διὰ τοῦ ὕδατος ἡ κατέρχονται εἰς τὸν βυθὸν καὶ ἀπὸ ἐκεῖ διαδίδονται μὲ τὰ ρεύματα ἡ μὲ τὰ ύδροβια ζῶσα, ὡς οἱ καρποὶ τοῦ Κερατοφύλλου καὶ τοῦ Μυριοφύλλου.

Καὶ εἰς τοὺς ζωϊκοὺς ὄργανισμοὺς εἶναι ἀπαραίτητος ἡ ύγρασία. Γνωστὸν εἶναι, ὅτι εἰς τὰς ἐρήμους, ὅπου ἐλλείπει τὸ ὕδωρ, ὁ ἀριθμὸς τῶν ζωϊκῶν εἰδῶν εἶναι αἰσθητῶς περιωρισμένος. Τὰ χερσαῖα ζῶσα προστατεύονται ἀπὸ τὴν ξηρασίαν μὲ πᾶν μέσον. Καὶ ἄλλα μὲν ἔχουν τὰ ἀναπνευστικά των ὅργανα, τοὺς πνεύμονας,

εἰς τὸ βάθος τοῦ σώματος. Ἀλλα, ὅπως τὰ ἔντομα, ἀναπνέουν μὲ τραχείας. Οἱ Κοχλίας κατὰ τὴν ἐποχὴν τῆς ξηρασίας φράττει τὸ στόμιον τοῦ κελύφους του μὲ διάφραγμα. Οἱ Σκώληξ περιβάλλει τὸ σῶμά του μὲ γλοιώδη ούσιαν κλπ. Πολλὰ ἐκ τῶν χερσαίων ζῷων, τὰ ὄποια κατάγονται ἀπὸ ὑδρόβια, εἶναι ἔξαιρετικῶς φίλυγρα.

‘Αφ’ ἔτερου τὰ ὑδρόβια ζῷα εἶναι πάμπολλα. Τὸ ὕδωρ



Εἰκὼν 23. Διάφορα ὕδροβια ζῷα.


ὑπῆρξε τὸ πρῶτον φυσικὸν περιβάλλον ὄλων τῶν ὄργανισμῶν Ἡ ἐντὸς τοῦ ὕδατος ζωὴ ἀπαίτει κατάλληλον κατασκευὴν τοῦ σώματος. Τὰ ὕδροβια ἀναπνέουν διὰ βραγχίων, ἔχουν δὲ ἀνάγκην ὕδατος γλυκέος ἢ ἀλμυροῦ, καλῶς ἀεριζομένου, διότι ἐξ αὐτοῦ παραλαμβάνουν τὸ διὰ τὴν ἀναπνοὴν χρήσιμον ὄξυγόνον. Συνήθως γενοῦν ἄφθονα ωά. Μερικὰ ἐκ τῶν σημερινῶν ὕδροβιών, τὰ Κήτη, καταγόμενα ἐκ χερσαίων θηλαστικῶν, ἐνῷ ἔχουν προσαρ-

μοσθῆ εἰς τὸν βίον ἐντὸς τοῦ ὄντος, ἔξακολουθοῦν ν' ἀναπνέουν διὰ πνευμόνων καὶ νὰ γεννοῦν ζωντανά.

Η ΤΡΟΦΗ

‘Η ζωὴ τῶν ὄργανισμῶν ἔξαρτᾶται καὶ ἀπὸ τὴν ἔξασφάλισιν τῆς ἀναγκαῖας δι’ αὐτούς τροφῆς. Ἐλλειψις τροφῆς ἐπιφέρει καχεξίαν εἰς τὸν ὄργανισμὸν ἥ καὶ αὐτὸν τὸν θάνατον.

Διὰ τὰ φυτὰ ἀναγκαῖον εἶναι νὰ παραλαμβάνουν ἀπὸ τὸ ἔδα-



Εἰκὼν 24. Ἐπίδρασις θρεπτικῶν διαλυμάτων κατὰ διαφόρους συνθέσεις ἐπὶ τῆς ἀναπτύξεως τοῦ φυτοῦ Ἀραβοσίτου. Εἰς τὸ τελευταῖον δοχεῖον ἐτέθησαν ὅλα τὰ θρεπτικὰ ύλικά.


φος ὡρισμένα ἀνόργανα συστατικά. Ἀλλὰ διὰ τὴν θρέψιν αὐτῶν σημασίαν ἔχουν, ὡς εἴδομεν, καὶ τὸ φῶς, διὰ τὴν ἐκ τοῦ ὄρεος πρόσληψιν τοῦ ἄνθρακος, ὡς καὶ ἡ ὑγρασία. Ἀν καλλιεργήσωμεν δενδρύλλιον ἐντὸς γλάστρας, ἐνεκα τῆς ἐλλείψεως τοῦ ἀπαιτουμένου ποσοῦ θρεπτικῶν ούσιῶν, θὰ γίνῃ καχεκτικόν. Οἱ ἱάπωνες παράγουν δένδρα νανοφυῆ ἐντὸς μικρῶν γαστρῶν. Διὰ νὰ βελτιώσωμεν

τὸ πτοιὸν τοῦ ἔδαφους, τροποποιοῦμεν τὴν χημικὴν σύστασίν του μὲ τὴν προσθήκην καταλλήλων λιπασμάτων. Μὲ τὴν τεχνητὴν λίπανσιν συνδυάζομεν καὶ τὴν ἀροσίν. Τοῦτο συντελεῖ εἰς τὸ νὰ προσλαμβάνῃ τὸ φυτὸν εὐκολώτερον τὴν τροφὴν του διὰ τῶν μυζητικῶν τριχιδίων τῆς ρίζης του.



Εἰκὼν 25. Μελάμπυρον.

Μερικὰ φυτὰ ἔχουν τὴν τάσιν νὰ ζοῦν εἰς βάρος ἄλλων ὅργανισμῶν, χρησιμοποιοῦντα τὰς θρεπτικὰς ούσίας, αἱ ὅποιαι προορίζονται διὰ τὴν διατροφὴν ἐκείνων. Τὰ φυτὰ αὐτὰ λέγονται παράσιτα, οἱ δὲ ὅργανισμοί, ἐπὶ τῶν ὅποιών παρασιτοῦν, λέγονται ξενισταί ἢ τροφεῖς. Φυτικὰ παράσιτα ἐπὶ τῶν φυτῶν εἶναι διάφοροι Μύκητες, ἐπίσης δὲ τὸ Μελάμπυρον τὸ ὅποιον παρασιτεῖ ἐπὶ τῶν σιτηρῶν, ἢ Ὁροβάγχη, ἢ ὅποια παρασιτεῖ εἰς τὰς




Εἰκὼν 26. Διάφορα παθογόνα μικρόβια.

Α = Σταφυλόκοκκος, Β = Στρεπτόκοκκος, Γ = Μικρόκοκκος, Δ = Βακτηρίδιον ξυθρακος, Α = Ψευδομονάς, Ζ = Βακτηρίδιον διφθερίτιδος, Η = Βακτηρίδιον φυματιάσεως, Θ = Βακτηρίδιον τύφου, Ι = Βακτηρίδιον χολέρας.

ρίζας τῶν Κυάμων καὶ ἄλλων φυτῶν, ὁ Ἰησός, ὁ ὅποιος παρασιτεῖ ἐπὶ τῶν κλάδων τῆς Ἐλάτης κλπ. Φυτικὰ παράσιτα ἐπὶ τῶν ζῷων καὶ τῶν ἀνθρώπων εἰναι πολλὰ παθογόνα Μικρόβια, ὅπως εἰναι τὰ Βακτηρίδια τῆς φυματιάσεως, τοῦ τύφου, τῆς χολέρας, τῆς διφθερίτιδος κτλ. "Αλλα φυτὰ ζοῦν παρασιτικῶς ἐπὶ ὄργανικῶν ὑλῶν εύρισκομένων ἐν σήψει. Τὰ φυτὰ αὐτὰ λέγονται σαρκοφάγα τα. Τέλος ἄλλα φυτὰ εἰναι ἐφωδιασμένα μὲν εἰδικὰ παγιδευτικὰ ὄργανα, μὲν τὰ ὅποια συλλαμβάνουν ἔντομα, διὰ τῶν ὅποιων τρέφονται. Τὰ σαρκοφάγα

αὐτὰ φυτά, ἀφοῦ ὑποβάλουν εἰς εἰδικὴν πεπτικὴν διεργασίαν τὰ συλληφθέντα ἔντομα, ἀπορροφοῦν τὸν χυμόν των. "Υπολογίζεται, ὅτι ὑπάρχουν περὶ τὰ 400 εἶδη τοιούτων σαρκοβόρων φυτῶν. Μεταξὺ αὐτῶν εἰναι τὸ Νηπενθές, ἡ Δροσερά καὶ ἡ Διωναία.

Τὰ ζῷα ὅποια τὸ ἀνόρ-




Εἰκὼν 27. Τὸ σαρκοβόρον φυτὸν Δροσερά.

γανον μὲν περιβάλλον τῶν λαμβάνουν τὸ ὕδωρ καὶ τὸ ὄξυγόνον, ἀπὸ τὸν ὄργανικὸν δὲ κόσμον τὰς ὄργανικὰς τροφάς. Διακρίνονται δὲ εἰς φυτοφάγα, σαρκοφάγα καὶ παμφάγα. 'Ο πε-

πτικός των σωλήνην ἔχει προσαρμοσθῆ πρὸς τὸ εἶδος τῆς τροφῆς, τὴν ὅποιαν χρησιμοποιοῦν. Φυτοφάγα εἰναι κυρίως πολλὰ χερσαῖα θηλαστικά, πτηνά, μερικὰ ἑρπετά, κοχλίαι καὶ ἐντομα. Εἰς αὐτὰ ὁ πεπτικὸς σωλήνην είναι μακρός, ὥστε ἡ φυτικὴ τροφὴ νὰ εύρισκῃ τὸν καιρὸν νὰ πέπτεται, μέχρις ὅτου τὸν διατρέξῃ. Τὸ μῆκος τοῦ πεπτικοῦ σωλῆνος βραχύνεται, ἀν μετὰ ὠρισμένην περίοδον τὸ φυτοφάγον ζῶον μεταβληθῆ εἰς σαρκοφάγον. Αὔτὸ παρατηρεῖται π.χ. εἰς τὸν Βάτραχον, ὃ ὅποιος ὡς σαρκοφάγος ἔχει πεπτικὸν σωλῆνα βραχύν, ἐνῷ ὡς φυτοφάγος γυρινὸς ἔχει μακρότερον. Κατὰ τῶν φυτοφάγων ζώων τὰ φυτὰ ἀμύνονται μὲ διάφορα αἰθέρια ἔλαια, μὲ ἀκάνθας, μὲ τρίχας κλπ.

Σαρκοφάγα λέγονται ὅσα ζῶα τρέφονται μὲ τὰς σάρκας ἄλλων ζώων, τὰ ὅποια καταδιώκουν ἢ συλλαμβάνουν δι’ ἐνέδρας. Τοιουτορόπως ἀντιδροῦν κατὰ τῆς μεγάλης διαδόσεως τῶν φυτοφάγων. Τὰ σαρκοφάγα εἰναι ἐφωδιασμένα μὲ διάφορα ἐπιθετικὰ μέσα, ὅδόντας καταλλήλους πρὸς κατασπάραξιν τῆς λείας, λαβίδας, ἀρπάγας, πλοκάμους, ὄνυχας, ναρκωτικὰ ἢ δηλητηριώδη ἐκκρίματα κλπ. ‘Ο πεπτικὸς σωλῆν τῶν σαρκοφάγων εἰναι σχετικῶς βραχύτερος ἀπὸ τὸν πεπτικὸν σωλῆνα τῶν φυτοφάγων ζώων. Καὶ τοῦτο, διότι είναι ἀρκετὸς νὰ πέψῃ τὰς ζωϊκὰς ούσιας, ἐνῷ διὰ τὰς φυτικὰς είναι ἀνεπαρκῆς. Κατὰ τῶν σαρκοφάγων τὰ διωκόμενα ζῶα ἀμύνονται μὲ τὴν φυγὴν, μὲ κέρατα, μὲ ὅπλάς, μὲ πλῆκτρα, μὲ χαυλιόδοντας, μὲ ἡλεκτρικὰς ἐκκενώσεις, μὲ ὀσμηρὰς ούσιας κλπ.

Εἰκὼν 28. Φυλλοξήρα εἰς μεγέθυνσιν.




βραχύτερος ἀπὸ τὸν πεπτικὸν σωλῆνα τῶν φυτοφάγων ζώων. Καὶ τοῦτο, διότι είναι ἀρκετὸς νὰ πέψῃ τὰς ζωϊκὰς ούσιας, ἐνῷ διὰ τὰς φυτικὰς είναι ἀνεπαρκῆς. Κατὰ τῶν σαρκοφάγων τὰ διωκόμενα ζῶα ἀμύνονται μὲ τὴν φυγὴν, μὲ κέρατα, μὲ ὅπλάς, μὲ πλῆκτρα, μὲ χαυλιόδοντας, μὲ ἡλεκτρικὰς ἐκκενώσεις, μὲ ὀσμηρὰς ούσιας κλπ.

Παμφάγον ζῶον είναι ὁ ἄνθρωπος, ὁ ὅποιος διὰ τοῦτο διαθέτει πεπτικὸν σωλῆνα μετρίου μῆκους. Οἱ ὁδόντες του ἔχουν μορφὴν ἀνάλογον πρὸς τὴν λειτουργίαν, τὴν ὅποιαν ἐκτελοῦν.

Μερικὰ ζῶα παρασιτοῦν ἐπὶ φυτῶν. Τοιαῦτα εἰναι διάφοροι Σκώληκες, ἢ Φυλλοξήρα, ὁ Φυτόφθειρ κλπ. “Ἄλλα ζῶα παρασιτοῦν ἐπὶ ζώων, ὅπως είναι ὁ Κρότων, ὁ Κώνωψ, ὁ Ψύλλος, τὸ Πλασμώδιον, ἢ Ἀμοιβάς, τὸ Διάτομον, ἢ Ταινία, ἢ Ἀσκαρίς, τὸ Ἀκαρι τῆς ψώρας κλπ.

‘Η ποιότης καὶ ἡ ποσότης τῆς τροφῆς προκαλεῖ μεταβολὴν εἰς τὴν γονιμότητα τῶν ζώων. ‘Ενεκα τούτου, ἐνῷ ὁ κατοικίδιος Χοῖρος γεννᾷ 3 - 4 φοράς τὸ ἔτος ἀνὰ 10 - 12 νεογνά, ὁ Ἀγριόχοιρος γεννᾷ διπαξ μόνον τοῦ ἔτους 3 - 4 νεογνά. Ἐλλὰ καὶ ἐπὶ τοῦ τριχώματος καὶ τοῦ χρώματος τῶν ζώων ἔχει ἐπίδρασιν ἡ τροφή. Ἀπὸ αὐτὴν λ. χ. ἔξαρτῶνται αἱ διάφοροι ποιότητες τοῦ ἑρίου. Καὶ ἀπὸ αὐτὴν ἔξαρτῶνται τὰ ἀσυνήθη χρώματα τῶν ἐντόμων, ὅταν αἱ κάμπαι τραφοῦν μὲ τροφὴν διάφορον τῆς συνήθους. Τὸ πράσινον χρῶμα εἴδους τινὸς Ψιττακοῦ μεταβάλλεται εἰς ἐρυθρόν, ὅταν οὗτος τραφῇ μὲ λίπος ἵχθυος τινός.

Ἐκ τῶν τροφῶν, τὰς ὄποιας τὰ ζῷα λαμβάνουν ἀπὸ τὸ περι-



Εἰκὼν 29. Ὁ ἰχθὺς *Edriolychmus*. Ὁ ἄρρην, νάνος ὕδν, στερούμενος ὀδόντων καὶ πεπτικοῦ σωλῆνος, παρασιτεῖ ἐπὶ τοῦ σώματος τῆς θηλείας.

βάλλον, αἱ μετὰ τὴν ἀφομοίωσιν ἀποβαλλόμεναι περιτταὶ οὔσιαι (διοξείδιον τοῦ ἀνθρακος, ὕδωρ, διζωτοῦχα προϊόντα κλπ.) ἐπανέρχονται εἰς τὴν φύσιν, ὅπου καὶ ἀπλουστεύονται ἀκόμη περισσότερον. Τὰ ἀπλᾶ αὐτὰ συστατικὰ παραλαμβάνονται ἀπὸ τὰ φυτὰ καὶ μετατρέπονται ἐντὸς αὐτῶν καὶ πάλιν εἰς ὄργανικὰς ὄλσις, τὰς ὄποιας δύνανται νὰ χρησιμοποιήσουν καὶ πάλιν τὰ ζῷα. Κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπον αἱ θρεπτικαὶ οὔσιαι διατρέχουν ἔνα κύκλον, ὁ ὄποιος καταδεικνύει πόσον ἡ διατροφὴ τῶν φυτῶν ἔξαρτᾶται ἀπὸ τὴν διατροφὴν τῶν ζώων καὶ τάναπαλιν.

Καὶ ἡ τροφὴ ἀποτελεῖ σημαντικὸν παράγοντα γεωγρα-

φικῆς ἐξ απλώσεως τῶν ζῷων. Εἰς τόπους, ὅπου τὰ ζῷα δὲν δύνανται νὰ εύρουν κατάληλον τροφήν, δὲν παραμένουν ἐπὶ πολὺ. Ἡ Ἀρίγγη καὶ ἡ Σαρδίνη μεταναστεύουν συνεχῶς, παρακολουθοῦσαι τὴν θαλασσίαν χλωρίδα, ἢ ὅποια ἀποτελεῖ τὴν τροφήν των. Δενδρόβια δὲ ζῷα δὲν δύνανται ν' ἀπομακρυνθοῦν ἀπὸ τὰ δάση, ὅπου εύρισκουν ἄφθονον τροφήν.

Η ΠΙΕΣΙΣ

‘Ως διδάσκει ἡ Φυσική, τὰ ὄργανικὰ δύνται, ἐφ' ὅσον ζοῦν εἰς τὸν ἄερα ἢ ἐντὸς τοῦ ὕδατος, δέχονται ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας τοῦ σώματός των ὥρισμένην πίεσιν. Ἡ πίεσις αὐτὴ δὲν γίνεται αἰσθητή, οὐδὲ εἶναι ἐπιβλαβής, διότι ἀντιρροπεῖται ἀπὸ τὴν πίεσιν, ἢ ὅποια ἀναπτύσσεται ἐντὸς τῶν κυττάρων τῶν ὄργανισμῶν. ‘Αν δύμας ὁ ὄργανισμὸς μεταβάλῃ περιβάλλον μὲ πίεσιν διάφορον, θὰ ὑποστῆ βλάβην.

‘Ο ἀνθρωπός ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας τῆς γῆς δέχεται εἰς τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ σώματός του ἀτμοσφαιρικὴν πίεσιν 1012 γραμμαρίων κατὰ τετραγωνικὸν δάκτυλον. Ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας τῆς θαλασσῆς ἡ πίεσις αὐτὴ φθάνει τὰ 1033 γραμμάρια. ‘Αν δύμας ὁ ἀνθρωπός υψωθῇ πολὺ εἰς τὴν ἀτμόσφαιραν, ἢ πίεσις θὰ ἔλαττωθῇ, συγχρόνως δὲ θὰ μεταβληθοῦν καὶ αἱ ἀναλογίαι τῶν ἀποτελούντων τὸν ἄερα συστατικῶν. Εἰς τὸν ἀνθρωπὸν τότε θὰ ἐπέλθουν βλάβαι, ιδίως κυκλοφορικαί. ‘Ομοίως, ἀν οἱ ίχθυες, οἱ ὅποιοι ζοῦν εἰς μεγάλα βάθη θαλασσῶν καὶ δέχονται ἐπομένως μεγάλην πίεσιν, ἀνέλθουν εἰς τὴν ἐπιφάνειαν, θὰ ὑποστοῦν διάρρηξιν ἀγγείων καὶ θ' ἀποθάνουν.

ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑΙ ΕΙΣ ΕΡΕΘΙΣΜΟΥΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διάφοροι παρατηρήσεις ἀπέδειξαν, ὅτι πολλαὶ κινήσεις ὄργάνων ἢ ὄργανισμῶν ὀφείλονται εἰς ἐρεθισμούς ἐκ τοῦ περιβάλλοντος. Παράγοντες τοιούτων ἐρεθισμῶν εἶναι τὸ φῶς, ἡ βαρύτης, ἡ ύγρασία κτλ. Αἱ κινήσεις αὐταὶ σημειοῦνται συνήθως εἰς τὰ φυτὰ καὶ εἰς τὰ κατώτερα ζῷα καὶ ὀνομάζονται τροπισμοὶ ή τακτισμοί. Καὶ οἱ μὲν τροπισμοὶ εἶναι ἀπλαῖ ἐπιτόπιοι στροφικαὶ




κινήσεις, μὲ τὰς ὅποιας οἱ ἐν αὐξήσει ὄργανισμοί, καὶ μάλιστα οἱ φυτικοί, προσανατολίζονται ἀπλῶς πρὸς τὸ ἔρεθισμα, τὸ ὅποιον προκαλεῖ τὴν κίνησιν. Οἱ δὲ τακτισμοὶ εἰναι κινήσεις, αἱ ὅποιαι οὐδεμίαν σχέσιν ἔχουν μὲ τὴν αὔξησιν. Μὲ τοὺς τακτισμοὺς οἱ ὄργανισμοί, καὶ μάλιστα οἱ ζωϊκοί, δὲν προσανατολίζονται μόνον, ἀλλὰ κινοῦνται πρὸς τὸ ἔρεθισμα ἢ ἀπομακρύνονται ἀπὸ αὐτό. Ἐπομένως οἱ τακτισμοί, ἀλλὰ καὶ οἱ τροπισμοί, εἰναι ἢ θετικοὶ ἢ ἀρνητικοί. Οἱ τακτισμοὶ εἰς τὰ ζῷα δὲν εἰναι πάντοτε εύνοικοί διὰ τὴν ζωήν των.

Ἐάν σπέρμα τι τοποθετηθῇ εἰς δοχεῖον πλῆρες χώματος καὶ βλαστήσῃ, τὸ ριζίδιόν του θὰ λάβῃ κατακόρυφον διεύθυνσιν, ὁ δὲ βλαστός του θὰ λάβῃ διεύθυνσιν ἀντίθετον πρὸς τὴν ρίζαν. Ἐάν εἰς τὸ δοχεῖον δοθῇ θέσις ὄριζοντία, τὸ φυτὸν κατὰ τὴν περίοδον τῆς αὔξησεώς του θὰ λάβῃ καὶ πάλιν τὴν κατακόρυφον διεύ-



Εἰκὼν 30. Ἀρνητικὸς γεωτροπισμὸς βλαστοῦ.




Εἰκὼν 31. Ἀρνητικὸς γεωτροπισμὸς στελέχους Βαλσαμίνης.

θυνσιν. Ὁ τροπισμὸς αὐτὸς τοῦ φυτοῦ ρυθμίζεται ἀπὸ τὴν βαρύτητα καὶ διὰ τοῦτο λέγεται βαροτροπισμός. Ὁ βαροτροπισμὸς τῆς ρίζης λέγεται καὶ θετικὸς γεωτροπισμός, ἐνῷ ὁ τοῦ βλαστοῦ λέγεται ἀρνητικὸς γεωτροπισμός. Τὸν βαροτροπισμὸν τῶν φυτῶν δυνάμεθα νὰ παρακολουθήσωμεν εἰς τὰ περιαλλόβλαστα φυτὰ (εἶδη Φασιόλου κλπ.). Τούτων ὁ βλαστὸς εἰναι πολὺ λεπτὸς καὶ δὲν δύναται νὰ συνεχίσῃ μόνος τὴν

κατακόρυφον διεύθυνσίν του. Διὰ τοῦτο, ἐν ὅσῳ αὐξάνεται, ἀναζητεῖ στερεὸν ὑποστήριγμα, ἐπὶ τοῦ ὄποιού καὶ ἀναρριχᾶται.

‘Ο ἐκ τῆς ἐπιδράσεως τοῦ φωτὸς φωτοτροπισμὸς λέγεται εἰδικώτερον ἡ λιοτροπισμός, ὅταν ὀφείλεται εἰς τὴν ἐπίδρασιν τοῦ ἥλιακοῦ φωτός. Παράδειγμα ἥλιοτροπισμοῦ μᾶς παρέχει ‘Ηλίανθος ὁ Ἐτήσιος, τοῦ ὄποιού ὁ βλαστὸς κάμπτεται πρὸς τὸν ἥλιον, ἔνεκα μεγαλυτέρας αὔξήσεως τοῦ μὴ φωτιζομένου μέρους του. Κατὰ τὸν ἥλιοτροπισμὸν τὰ φυτὰ παρουσιάζουν μεγαλυτέραν εύαισθησίαν εἰς τὰς κυανᾶς καὶ τὰς ἰώδεις ἀκτίνας τοῦ



Εἰκὼν 32. Θετικὸς ἥλιοτροπισμός. (*Vicia Sativa*)


ἥλιου. Φωτοτροπισμὸς ἐπιστοποιήθη καὶ εἰς πολλοὺς Πολύποδας.

‘Απὸ ὑ δροτροπισμὸν αἱ ρίζαι τῶν φυτῶν φέρονται πρὸς τὸ μέρος τοῦ ἐδάφους, ὃπου ἡ ὑγρασία εἶναι περισσοτέρα, λ. χ. πρὸς τὰς ὅχθας ρυακίων, ποταμῶν κλπ. Ἀναφέρομεν ώς παράδειγμα τὰς ρίζας τοῦ Εύκαλυπτου.

‘Απὸ χημειοτροπισμὸν αἱ ρίζαι τῶν φυτῶν κάμπτονται οὔτως, ὡστε ν’ αὐξάνωνται πρὸς τὸ μέρος, ὃπου ὑπάρχουν μερικαὶ χημικαὶ οὐσίαι, ἡ ὀντιθέτως ν’ ἀπομακρύνωνται αὐτοῦ.


‘Απὸ ἀρνητικὸν φωτοτακτισμὸν φύλλα φωτιζόμενα ἐντόνως φαίνονται ὀλιγότερον πράσινα ἀπὸ τὰ μετρίως φωτιζόμενα, διότι εἰς ἑκείνα μετακινοῦνται οἱ κόκκοι τῆς χλωροφύλλης των.

Διά τὸν αὐτὸν λόγον πρὸ τοῦ φωτὸς τρέπονται εἰς φυγὴν καὶ οἱ Κόρεις, ως καὶ τὰ νυκτόβια ζῷα (Νυκτερίδες, Γλαῦκες). Ἀντιθέτως, ἀπὸ θετικὸν φωτοτακτισμὸν συναθροίζονται εἰς τὰ φωτιζόμενα μέρη αἱ Ἀμοιβάδες, αἱ Ψυχαὶ καὶ πολλὰ εἴδη Ιχθύων. Γνωστὸς ἄλλως τε



Εἰκὼν 33. Νεῦσις φύλλων τριφυλλίου.

είναι ὁ τρόπος ἀλιείας μὲ «πυροφάνι». Ἐπίστης τὰ πλήθη τῶν Φυκῶν, τὰ ὅποια δίδουν τὸ πράσινον χρῶμα εἰς τὰ στάσιμα ὕδατα,



Εἰκὼν 34. Μιμόζα ή Αισχυντηλή.

φέρονται περισσότερον πρὸς τὸ μέρος τοῦ ἔλους, τὸ ὅποιον φωτίζεται ἐντονώτερον.

Ἄπὸ θερμοτακτισμὸν πλασμώδιον Μυξομύκητος, ὃν τοποθετηθῆ ἐπὶ φύλλου ἀπορροφητικοῦ χάρτου, τοῦ ὅποιου τὸ

έν ακρον διεβράχη μὲ ίδωρ θερμοκρασίας 7 βαθμῶν, τὸ δὲ ἀλλο μὲ ίδωρ θερμοκρασίας 35 βαθμῶν, θὰ κινηθῇ πρὸς τὸ θερμότερον ἄκρον.

*Απὸ χιμειοτακτισμὸν Πρωτόζωα, τὸ ἔντομον Δροσόφιλον κλπ. φέρονται πρὸς ὥρισμένας χημικὰς ούσιας. Εἰς ἀνάλογον χημειοτακτισμὸν διείλεται καὶ ἡ κίνησις τῶν λευκῶν αἵμοσφαιρίων τοῦ ἀνθρώπου πρὸς τὰ Βακτηρίδια, τὰ δόποια προσβάλλουν τὸν ὀργανισμὸν του. *Άλλα δὲ ζῷα, ἀντιθέτως, ἀπομακρύνονται ἀπὸ τὰς χημικὰς ούσιας, ὡς δὲ Σής (Σκόρος) ἀπὸ τὴν ναφθαλίνην.

Μερικαὶ κινήσεις, κυρίως φυτῶν, δὲν ἔχουν κανένα προσανατολισμὸν πρὸς τὴν δύναμιν, ἡ δόποια τὰς προκαλεῖ. Αἱ κινήσεις αὐταὶ λέγονται νεύσεις καὶ ἔχουν ἀγνωστὸν τὸν μηχανισμόν. Νεύσεις π. χ. παρουσιάζει τὸ φυτὸν Μιμόζα ἡ Αἰσχυντηλή, τῆς δόποιας ὅλα τὰ φύλλα κλίνουν πρὸς τὸ ἔδαφος, μόλις σῶμά τι ἐγγίσῃ ἐν ἐξ αὐτῶν, ἡ μόλις νέφος τι διέλθῃ πρὸ τοῦ ἡλίου, ἡ μόλις ἐρεθιστική τις ὁσμὴ ἐπιδράσῃ ἐπ’ αὐτῆς. Εἰς τὰς νεύσεις ὑπάγονται καὶ αἱ κινήσεις τῶν ἀνθέων, τὰ δόποια ἀνοίγονται ἡ κλείονται τὴν ἡμέραν ἡ τὴν νύκτα. Ἐπίστης δὲ καὶ αἱ κινήσεις τῶν σαρκοφάγων φυτῶν, τὰ δόποια παγιδεύουν τὰ ἔντομα.

Εἰς τοὺς τελειοτέρους ζωϊκούς ὀργανισμοὺς τὰ ἐκ τοῦ περιβάλλοντος ἐρεθίσματα προκαλοῦν ἀντιδράσεις, ἐκδηλουμένας εἴτε διὰ κινήσεως, εἴτε δι’ ἐκκρίσεως, εἴτε, ὡς εἰδομεν, διὰ παραγωγῆς αἰσθημάτων.

ΕΝΟΤΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Πολλάκις συμβαίνει πολλοὶ ὀργανισμοὶ νὰ διαβιοῦν ταυτοχρόνως εἰς μίαν καὶ τὴν αὐτὴν περιοχὴν, εἰς ἐν δάσος λ. χ., ἢ εἰς ἐνα λειμῶνα, ἢ εἰς μίαν λίμνην. Οἱ ὀργανισμοὶ αὐτοί, ἀποτελοῦντες βιολογικὰς ἐνότητας, εύρισκονται εἰς ἀμοιβαίαν ἀλληλεξάρτησιν καὶ εἰς ἔξαρτησιν ἀπὸ τὸ περιβάλλον.

Καλεῖται βιοτικὴ κοινότης ἡ βιοκοινότης τὸ σύνολον τῶν φυτῶν καὶ τῶν ζώων, τὰ δόποια ζοῦν ἀρμονικῶς μεταξύ των ὑπὸ τὰς αὐτὰς ἔξωτερικὰς συνθήκας. *Άν εἰς τὸ σύνολον αὐτὸ συμβῇ ποτε νὰ μεταβληθοῦν αἱ συνθῆκαι τοῦ περιβάλλοντος, θὰ μεταβληθῇ καὶ ἡ ὑφισταμένη ἀριθμητικὴ σχέσις τῶν ἐμβίων


δντων του καὶ θ' ἄλλοιωθῇ ἡ σύνθεσις τῆς βιοτικῆς κοινότητος.

Ο βασιλεὺς Κάρολος τῆς Νεαπόλεως, ὅτε ἡθέλησε νὰ ἰδρύσῃ ἐπί τινος νήσου κῆπον Φασιανῶν, εἶχεν ἀπαγορεύσει τὴν ὑπαρξίν γολῶν ἐπ' αὐτῆς. Ἀλλὰ μετὰ μικρὸν διάστημα ἐπληθύνθησαν τόσον οἱ ποντικοί, ωστε ἐδημιουργήθη κίνδυνος ἀκόμη καὶ διὰ τὰ νήπια εἰς τὸ λίκνον τῶν. Ἡ ἔξαφάνισις τῆς γαλῆς ἐπέφερε τὸν πολλαπλασιαμὸν τῶν ποντικῶν.

Ἐξ ἄλλου εἰς τὰς νήσους Χαβάι, ἐν εἶδος φυτοῦ Λατάνας ἀνεπτύχθη ὑπὲρ τὸ δέον ἐπὶ ζημιά τῶν ἄλλων φυτῶν. Διὰ νὰ τὸ καταπολεμήσουν, εἰσήγαγον ἀπλῶς ἀπὸ τὸ Μεξικὸν τὸ ἔντομον Ἀγρομύζα, τὸν κυριώτερον ἔχθρόν του, τοῦ ὅποιου αἱ κάμπαι τρέφονται ἀπὸ τὰ σπέρματα τοῦ φυτοῦ τούτου. Κατ' αὐτὸν τὸν τρόπον ἡ μεγάλη ἔξαπλωσις τοῦ ὡς ἄνω φυτοῦ περιωρίσθη καὶ ὁ κίνδυνος ἀπεσοβήθη.

Ἐπίστης εἰς τὴν νῆσον Ἀγίαν Ἐλένην, ὅπου εἶχεν ἔξορισθῆ ὁ Μέγας Ναπολέων, ὅτε ἀνεκαλύφθη τῷ 1500 μ.Χ., ὑπῆρχον μεγάλα δάση. Τῷ 1513 οἱ Πορτογάλοι εἰσήγαγον τὰς πρώτας Αιγαίας. Μετὰ 75 ἔτη εἶχον αὔται πολλαπλασιασθῆ τόσον, ωστε ἡ νῆσος βαθμηδὸν ἀπεψιλώθη. Μὲ τὴν ἔξαφάνισιν τῶν δασῶν ἔξηφανίσθησαν καὶ πολλὰ ἔντομα ἔνδιαιτώμενα ἐντὸς αὐτῶν, ὡς καὶ πολλὰ πτηνά, τρεφόμενα κυρίως ἀπὸ αὐτὰ τὰ ἔντομα, καὶ ἄλλα ζῶα. Ἀντ' αὐτῶν ἀνεπτύχθησαν ἄλλα ζῶα, εἰσαχθέντα βραδύτερον.

Πολλάκις δύο ἑτεροειδεῖς δργανισμοὶ ζοῦν ὁ εἰς πλησίον τοῦ ἄλλου ἐκ τῶν ὅποιων μόνον ὁ εἰς ἐπωφελεῖται χωρὶς ὁ ἄλλος νὰ βλάπτεται. Ἡ βιολογικὴ αὕτη ἐνότης καλεῖται παραβίωσις. Ἀπαντᾶται εἰς τὰ ἀναρριχητικὰ φυτὰ τὰ ὅποια χρησιμοποιοῦν τὰ δέντρα ὡς στηρίγματα ἀλλὰ καὶ διὰ πηγὴν ὑγρασίας χωρὶς τὰ δέντρα νὰ βλάπτωνται. Ἀπαντᾶται ἐπίστης καὶ εἰς τὰ ζῶα ὡς π.χ. ἡ Ἐνδαμοιβάς coli ἡ ὅποια ζῆ παραβιωτικῶς εἰς τὸ παχὺ ἔντερον τοῦ ἀνθρώπου.



Εἰκὼν 35. Βερνάρδος ὁ Ἐρημίτης καὶ η Θαλασσία Ἀνεμώνη

Ύπάρχουν δύμας καὶ ἑτεροειδεῖς δργανισμοί, οἱ δόποιοι ζοῦν δ εἰς πλησίον τοῦ ἄλλου πρὸς κοινὴν ὡφέλειάν των. Ἡ βιολογική αὐτὴ ἐνότης καλεῖται σ υ μ β ῥ ω σ i s . Οἱ συμβιωταὶ δυνατὸν νὰ εἰναι μόνον φυτὰ ἢ μόνον ζῷα ἢ φυτὰ καὶ ζῷα μαζί. Παράδειγμα φυτῶν συμβιούντων ἔχομεν τὰ Ριζοβακτηρίδια, τὰ ὅποια ζοῦν εἰς τὰς ρίζας τῶν Ψυχανθῶν. Ἐπίσης τοὺς Λειχῆνας, οἱ δόποιοι ἀποτελοῦνται ἀπὸ ἐν Φύκος καὶ ἔνα Μύκητα. Παράδειγμα δὲ ζώων συμβιούντων ἔχομεν Βερνάρδον τὸν Ἐρημίτην καὶ τὴν Θαλασσίαν Ἀνεμώνην ἢ τὰ κατοικίδια ζῷα καὶ τὸν ἀνθρωπον. Τέλος παράδειγμα συμβιώσεως φυτῶν καὶ ζώων ἔχομεν πολλὰ Φύκη μετὰ διαφόρων εἰδῶν τῆς "Υδρας.

Εἰς δόμοιδῆς ζῷα ἢ ἀνάγκη τῆς φροντίδος διὰ τὰ νεογνά των δημιουργεῖ τὴν οἰκογένειαν, ἢ δὲ ἀνάγκη τῆς δύμαδικῆς ἀμύνης δημιουργεῖ τὴν ἀγέλην. Εἰς ἀποδημητικὰ δὲ πτηνὰ τὸ ἔνστικτον τῆς ἀποδημίας δημιουργεῖ εἰς ὡρισμένην ἐποχὴν τὰ στίφη.

ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ

Συνθῆκαι ἔξωτερικαὶ συναποτελοῦν τὸ περιβάλλον, ἐντὸς τοῦ ὅποιου ζοῦν οἱ διάφοροι δργανισμοί. Τὰς σχέσεις τῶν δργανισμῶν πρὸς τὸ περιβάλλον μελετᾶ ὡς Οἰκολογία. Ἀπὸ τὰς ἔξωτερικὰς αὐτὰς συνθήκας, αἱ δόποιαι ἀσκοῦν ἐπίδρασιν ἐπὶ τῶν δργανισμῶν, ἔξαρταται ἡ διαστήρησις τῆς ζωῆς των. Παράγοντες ἐπιδράσεως εἰναι τὸ φῶς, ἡ θερμότης, ἡ ύγρασία, ἡ τροφὴ καὶ ἡ πίεσις τῆς ἀτμοσφαίρας ἢ τοῦ ὑδατος. Εἰς τὰ φυτὰ καὶ εἰς τὰ κατώτερα ζῷα, διάφοροι ἐρεθισμοί, προερχόμενοι ἐκ τῆς βαρύτητος, τοῦ φωτός, τοῦ χημισμοῦ, τῆς ύγρασίας καὶ τῆς θερμότητος, προκαλοῦν τὴν γένεσιν τροπισμῶν καὶ τακτισμῶν. Πολλοὶ δργανισμοὶ διαβιοῦν πολλάκις μὲ ἀμοιβαίαν ἀλληλεξάρτησιν εἰς μίαν καὶ τὴν αὐτὴν περιοχήν. Σχηματίζουν τοιούτοτρόπως βιοκοινότητας ἢ ἄλλας ἐνότητας παραβιώσεως ἢ συμβιώσεως πρὸς κοινὴν ὡφέλειαν καὶ κοινὸν συμφέρον.


ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

- 1) Τί εἰναι Οἰκολογία;
- 2) Πότε αὔξανονται τὰ μεσογονάτια διαστήματα;
- 3) Ποῦ διείλεται τὸ μελάγχρωμα τοῦ δέρματος; Ποία ἡ σημασία του;

ΓΕΝΕΣΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΣ

ΓΕΝΕΣΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

‘Ως ήδη έγνωρίσαμεν, δύο είναι κυρίως αἱ μεγάλαι φυσιολογικαὶ λειτουργίαι τῶν ὄργανισμῶν, αἱ ὅποιαι διατηροῦν καὶ συνεχίζουν τὴν ὅλην ζωὴν ἐπὶ τῆς Γῆς. Ἡ πρώτη τούτων είναι ἡ θρέψις, ἡ ὅποια ἀποβλέπει εἰς τὴν εἰς ἑκαστὸν ὄργανισμὸν ἴσορροπίαν τῆς ἀνομοιώσεως πρὸς τὴν ἀφομοίωσιν. Ἡ δευτέρα είναι ἡ ἀναπαραγωγὴ, ἥτοι ἡ δημιουργία ἀπογόνων δόμοιῶν πρὸς τὰ ὑπάρχοντα ἀτομα, ἡ ὅποια ἀποβλέπει εἰς τὴν διαιώνισιν τῶν εἰδῶν. Είναι θαυμασία ἡ ποικιλία τῶν μέσων, τὰ ὅποια διαθέτει ἡ φύσις, τόσον εἰς τὸ φυτικόν, ὅσον καὶ εἰς τὸ ζωϊκὸν βασίλειον, διὰ νὰ ἔξασφαλίσῃ τὴν διαιώνισιν αὐτὴν τῶν εἰδῶν.



Εἰκὼν 36. "Αμεσος κυτταροτομία 'Αμοιβάδος.


‘Εχοντες ὑπ’ ὅψει τὴν ἀναπαραγωγὴν, δυνάμεθα νὰ εἴπωμεν, ὅτι ἑκαστος ὄργανισμὸς συνδέεται καὶ μὲ τὸ παρελθὸν καὶ μὲ τὸ μέλλον. Ἀποτελεῖ τρόπον τινὰ ἔνα κρίκον, ὁ ὅποιος ἀνήκει εἰς μίαν συνεχῆ κληρονομικὴν ἄλισιν. Σοφός τις δὲ ἔλεγεν: « Οἱ πρόγονοι δὲν ἀποθνήσκουν ἐντελῶς, ἀλλὰ φέρουν ἐντὸς ἑαυτῶν τὰς καταβολὰς τῶν νέων γενεῶν. Ἡ παλαιὰ φλόξ τῆς ζωῆς ἔξακολουθεῖ νὰ καίη καὶ περαιτέρω. Δὲν γίνεται νέα ζωὴ, ἀλλὰ συνέχεια αὔτης ».

‘Η ιδιότης τῶν ὄργανισμῶν νὰ παράγουν οὗτοι νέα ἀτομα, ἀπογόνους δόμοιους πρὸς αὐτούς, καλεῖται γένεσις ἡ πολλαπλασία ασιασμὸς τῶν ὄργανισμῶν. Καὶ διὰ μὲν τούς μονοκυττάρους ὄργανισμοὺς ἡ διαρρεΐσις τοῦ κυττάρου είναι καὶ ὁ συνή-

ὑπερ τρόπος πολλαπλασιασμοῦ τοῦ εἶδους. Ἡ Ἀμοιβᾶς λ. χ. αύξάνεται κατὰ τὰς διαστάσεις τῆς, δὸν ἐπιτρέπουν οἱ αἰώνιοι νόμοι. Ἐπειτα διαιρεῖται εἰς δύο θυγατρικάς, αἱ ὅποιαι ζοῦν τοῦ λοιποῦ αὐτοτελῶς. Ἀλλὰ διὰ τοὺς πολυκυττάρους δργανισμοὺς τὰ πράγματα διαφέρουν. Εἰς αὐτοὺς διακρίνομεν πολλαπλασιασμὸν ἀνευ γενῶν ἢ βλαστογονίας, καὶ πολλαπλασιασμὸν διὰ γενῶν ἢ ἐγγενῆ.

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΝΕΥ ΓΕΝΩΝ

Τρεῖς είναι οἱ τρόποι ἢ οἱ τύποι παραγωγῆς ἀπογόνων κατὰ τὸν ἀνευ γενῶν πολλαπλασιασμὸν τῶν δργανισμῶν: ὁ διὰ ποβλαστο-




Εἰκὼν 37. Πολλαπλασιασμὸς διὰ βλαστογονίας.


στήσεως ἢ βλαστογονίας, ὁ διὰ σποριογονίας καὶ ὁ διὰ διαιρέσεως ἢ σχιζογονίας.

α) Διὰ ἀποβλαστήσεως ἢ βλαστογονίας. Κατὰ ταύτην τμῆμα τοῦ μητρικοῦ δργανισμοῦ ἀποκόπτεται ἔξ αὐτοῦ καὶ παράγει νέον ὁμοιδές ἄτομον. Οὕτω, πολλὰ φυτὰ παράγουν

παραφυάδας, αἱ δποίαι ριζοβολοῦν καὶ σχηματίζουν νέα ἄτομα. Καὶ οἱ καλλιεργηταὶ δὲ παράγουν νέα ἄτομα διὰ μοσχευμάτων καὶ καταβολάδων. Ἀποκόπτουν δηλαδὴ κλάδους ἀπὸ πολλὰ δένδρα καὶ τοὺς φυτεύουν, αὐτοὶ δὲ μὲ τὴν ἐπίδρασιν ἔξωτερικῶν συνθηκῶν ριζοβολοῦν. Δι’ ἀποβλαστήσεως πολλαπλασιάζονται πολλὰ κατώτερα ζῷα: Κοιλεντερωτά, Σπόγγοι κλπ. Εἰς ἐν ἀπὸ τὰ κατώτερα



Εἰκὼν 38. Ἡ "Υδρα τῶν γλυκέων ὑδάτων, προσκεκολλημένη ἐπὶ στελέχους ὑδροβίου φυτοῦ. Κατὰ τὸ πλάγιον τοῦ σώματός της σχηματίζεται θυγατρικὴ "Υδρα.




Εἰκὼν 39. Πολλαπλασιασμὸς τοῦ πτεριδοφύτου Δρυοπτέριδος τῆς Ἀρρενοπτέρου διὰ σπορίων. A = τομὴ σωροῦ σπορίων. B = φύλλον μὲ νεαροὺς σωροὺς σπορίων. Γ = παλαιοὶ σωροὶ σπορίων.

ζῷα, τὴν "Υδραν τῶν γλυκέων ὑδάτων, ἡ δποία ζῇ προσκεκολλημένη ἐπὶ φύλλων ἢ στελέχῶν ὑδροβίων φυτῶν, σχηματίζεται κατὰ τὸ πλάγιον μέρος τοῦ σώματός της ἐν κοῖλον διόγκωμα. Τοῦτο ἀποκτᾷ στεφάνην ἀπὸ βραχίονας καὶ γίνεται ὅμοιον μὲ τὴν ἀρχικὴν "Υδραν. Καὶ ἐφ' ὅσον μὲν ὑπάρχει ἀρκετὴ τροφή, ἔκαστη νέα "Υδρα μένει προσκεκολλημένη εἰς τὸ μητρικὸν σῶμα, ὅλαι


δέ ομοῦ σχηματίζουν ἀποικίαν. Ἀλλως ἀποστᾶται ἑκάστη καὶ πε-
ριπλανᾶται ἐδῶ καὶ ἔκει, μέχρις ὅτου εύρη ὑποστήριγμα, διὰ νὰ
προσκολληθῇ καὶ νὰ ζῆσῃ ὡς νέα

‘Υδρα.

β) Διὰ σποριογόνιας.
Κατὰ ταύτην ὑπὸ τοῦ ὄργανι-
σμοῦ παράγονται σπόρια, ἣ-
τοι μονοκύτταρα σωματίδια, ἐκ
τῶν ὅποιων ἕκαστον παράγει
μόνον του νέον ἀπόγονον. Πολλὰ
φυτὰ παρουσιάζουν τοιαύτην
σποριογονίαν, ὡς εἰναι οἱ Μύκητες,
τὰ Βρυόφυτα, τὰ Πτεριδόφυτα.
‘Ο Εύρως, δὲ ὅποιος εἶναι Μύκης,
καλύπτων τὰ σακχαροῦχα διαλύ-
ματα κλπ., σχηματίζει εἰς τὰ ἄκρα
τῶν νημάτων του σπόρια, τὰ
ὅποια, μεταφερόμενα εἰς περιβάλ-
λον κατάλληλον, παράγουν νέον Εύρωτα. Ἀλλὰ καὶ κατώτεροι
ζωϊκοὶ ὄργανισμοί, ὡς εἶναι τὰ Σπορόζωα, τὰ ὅποια ζοῦν παρα-
σιτικῶς, πολλαπλασιά-
ζονται διὰ σπορίων.



Εἰκὼν 40. Εύρως.




Εἰκὼν 41. Στέντωρ διπλόμορφος πολλαπλασια-
ζόμενος διὰ διαιρέσεως.

τόν. ‘Ο τρόπος αὐτὸς εἶναι λίσιν διαδεδομένος, ὡς εἴδομεν, εἰς τὰ
κατώτατα μονοκύτταρα (Πρωτόφυτα καὶ Πρωτόζωα). Ἀπαντᾶται

γ) Διὰ διαιρέ-
σεως ἢ σχιζογο-
νίας. Κατὰ ταύτην
τὸ σῶμα τοῦ ὄργανι-
σμοῦ χωρίζεται εἰς δύο
ἢ περισσότερα τμήμα-
τα, ἐκ τῶν ὅποιων ἕ-
καστον δι’ ἀναγεννή-
σεως συμπληρώνει τὰ
ἐλλείποντα μέρη του,
εἴτε πρὸ τοῦ ἀποχω-
ρισμοῦ, εἴτε μετ’ αὐ-
τόν.

ὅμως καὶ εἰς πολυκυττάρους ὄργανισμούς, δῆπος εἶναι πολλὰ Φύκη, Μύκητες, τὰ Κοράλλια, αἱ Ἀκαλῆφαι, αἱ Θαλάσσιαι Ἀνεμῶναι, διὶς Ζωνοσκώληκες κλπ.

Εἰς καλλιέργειαν Ἐγχυματικῶν Πρωτοζῷων, δῆταν ἡ σχιζογονία



Εἰκὼν 42. Ἀστερίας ἀναγεννήθεις ἐξ
ένδει μόνον βραχίονος.

του κλπ. Ὁ μικρὸς σκώληξ Planaria, ἐὰν κοπῇ καὶ μέχρι 72 τέμαχίων, ἀναγεννᾶται, ἀπὸ ἕκαστον δὲ τεμάχιον παράγεται ἐν τέλειον ζωάριον.

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑ ΓΕΝΩΝ

‘Ο διὰ γενῶν ἡ ἐγγενὴς τολλαπλασιασμὸς τῶν ὄργανικῶν ὅντων εἶναι ὁ τρόπος γενέσεως, ὁ περισσότερον διαδεδομένας καὶ εἰς τὸ φυτικὸν καὶ εἰς τὸ ζωϊκὸν βασίλειον. ‘Ωρισμένα ἐκ τῶν προτέρων μεμονωμένα κύτταρα, τὰ λεγόμενα γεννητικὰ ἡ ἀναπαραγωγικά, χρησιμεύουν πρὸς παραγωγὴν τῶν ἀπο-

γόνων. Τὰ λοιπὰ κύτταρα τοῦ ὄργανισμοῦ, τὰ σωματικά, δὲν ἔχουν τὴν ἴδιότητα αὐτήν.


‘Ως εἴδομεν εἰς τὰ περὶ πολλαπλασιασμοῦ τοῦ κυττάρου, εἰς ἕκαστον κύτταρον ὁ ἀριθμὸς τῶν χρωματοσωματίων εἶναι σταθερὸς καὶ χαρακτηριστικὸς δι’ ἕκαστον εἶδος ὄργανισμῶν. ’Αλλὰ τοῦτο ἰσχύει μόνον διὰ τὰ σωματικὰ κύτταρα. Τὰ γεννητικὰ κύτταρα ἀπὸ οἰκονομίαν τῆς φύσεως καὶ μὲ θαυμασίας ἐξεργασίας, τὰς ὅποιας ἀπεκάλυψε τὸ μικροσκόπιον, ἔχουν ἀριθμὸν χρωματοσωματίων ἡλαττωμένον κατὰ τὸ ἥμισυ.

Μᾶς εἶναι γνωστὸν ἀπὸ τὴν Φυτολογίαν, ὅτι ὁ πολλαπλασιασμὸς τῶν ἀνωτέρων φυτῶν ὀφείλεται εἰς τὸ ὅτι οἱ κόκκοι τῆς γύρεως, οἱ ὅποιοι εἶναι τὰ ἄρρενα γεννητικὰ κύτταρα τοῦ φυτοῦ, ἐνοῦνται μὲ τὰς φορφαίρας τῶν φαρίων τῆς φοιθῆκτης, αἱ ὅποιαι εἶναι τὰ θηλεα γεννητικὰ κύτταρα. Διὰ τῆς συντήξεως τῶν δύο τούτων γεννητικῶν κυττάρων παράγεται νέον κύτταρον, τὸ ὅποιον θ' ἀποτελέσῃ τὴν ἀπαρχὴν τοῦ ἀπογόνου, τὸ πρῶτον κύτταρον τοῦ φυτικοῦ ὄργανισμοῦ.

Τὴν λειτουργίαν τῆς συντήξεως

τῶν δύο κυττάρων καλοῦμεν γονιμοποιήσεως ἐπιτυγχάνεται ὁ προορισμὸς τοῦ ἀνθους, ἥτοι ἡ μετατροπὴ τῆς φοιθῆκτης εἰς καρπὸν καὶ τῶν φαρίων εἰς σπέρματα. Τὰ σπέρματα διατηροῦν τὴν ζωὴν των εἰς λανθάνουσαν κατάστασιν. ’Εὰν δὲ εύρεθοῦν ὑπὸ καταλήκους συνθήκας ὑγρασίας καὶ θερμοκρασίας, βλαστάνουν καὶ δίδουν νέους ὄργανισμούς.


‘Ο διὰ γενῶν πολλαπλασιασμὸς τῶν ζῷων δύναται νὰ λεχθῇ, ὅτι ἀρχίζει ἀπὸ αὐτὰ τὰ Πρωτόζωα. Τελειοποιεῖται δὲ βαθμηδόν, ὃσον ἀνερχόμεθα εἰς τὴν ζῳολογικὴν κλίμακα. ’Ο πολλαπλασιασμὸς τῶν ζῷων γίνεται διὰ συγχωνεύσεως τῶν δύο πρωταρχικῶν γεν-



Εἰκὼν 43. Σχηματικὴ παράστασις ἀνθους τετμημένου.

νητικῶν ἑτεροφύλων κυττάρων, ἀρρενος καὶ θήλεος, εἰς ἐν νέον, τὸ δόπιον, ἔξεισισόμενον εἰς φόν, καλεῖται ζυγωτός, διότι ἔχει διττὴν τὴν προέλευσιν, κατὰ τὸ ήμισυ πατρικὴν καὶ κατὰ τὸ ἄλλο ήμισυ μητρικὴν. Ἡ γονιμοποίησις γίνεται ἢ ἔξω τοῦ σώματος τῶν γονέων, λ. χ. εἰς τὸ ὄνδρο διὰ τοὺς ἴχθυς, ἢ εἰς τὸ ἐσωτερικὸν τοῦ σώματος τοῦ θήλεος, ὡς εἰς τὰ θηλαστικά.

Τὸ μετὰ τὴν συγχώνευσιν σχηματισθὲν πρῶτον κύτταρον τέμνεται καὶ σχηματίζει δύο κύτταρα, τὰ δύο τέμνονται πάλιν καὶ σχηματίζουν τέσσαρα καὶ οὕτω καθεξῆς. Τὰ κύτταρα αὗτὰ κατ' ἀρ-



Εἰκὼν 44. Ὄδον δρνιθος.

χάς εἶναι ὅμοια, βαθμηδὸν ὅμως διαφοροποιοῦνται, σχηματίζουν δὲ οὕτω τοὺς διαφόρους ἴστοις καὶ τὰ ὄργανα τοῦ ὀργανισμοῦ.

Παρετηρήθησαν καὶ περιπτώσεις, καὶ εἰς τὰ ζῷα καὶ εἰς τὰ φυτά, κατὰ τὰς δόποιας ἀναπτύσσεται ἔμβρυον καὶ ἀπόγονος ἀπὸ μὴ γονιμοποιηθὲν φέριον. Τοῦτο καλεῖται παρθενογόνια. Λ. χ. παρετηρήθη, ὅτι μερικαὶ Ψυχαὶ θήλειαι, τῶν δόποιών ἡμποδίσθη ἡ γονιμοποίησις, ἐγένησαν φέρια, τὰ δόποια ἔξειλίχθησαν εἰς τέλεια ἔντομα. Τὸ αὐτὸν ἐπανελήφθη καὶ εἰς τὰς ἀπογόνους των ἐπὶ τρεῖς γενεάς. Αἱ Μέλισσαι γεννοῦν φέρια, ἀπὸ τὰ δόποια πρόερχονται βασίλισσαι, ἐργάτιδες καὶ κηφῆνες. Καὶ αἱ μὲν βασίλισσαι

καὶ αἱ ἑργάτιδες προέρχονται ἀπὸ ὡάρια γονιμοποιηθέντα, οἱ δὲ κηφῆνες ἀπὸ ὡάρια μὴ γονιμοποιηθέντα. Ἀν ἀπὸ τὰ ἄνθη τῆς Ἀφάκης ἀφαιρέσωμεν τὸ στίγμα τοῦ ὑπέρου, πρὶν ἀκόμη ὠριμάσουν οἱ κόκκοι τῆς γύρεως, τὸ ἄνθος καὶ πάλιν ἔξελίσσεται εἰς πλήρη καρπὸν μὲ σπέρματα.

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΣ

Εἴπομεν εἰς τὰ προηγούμενα, ὅτι οἱ διάφοροι δργανισμοὶ δημιουργοῦν ἀπὸ στοιχεῖα τοῦ σώματός των ἀπογόνους, ἥτοι ἄλλους δργανισμούς, δόμοίους πρὸς αὐτούς. Ἡ δόμοιότης τῶν ἀπογόνων πρὸς τοὺς προγόνους ὀφείλεται εἰς τὴν μεταβίβασιν τῶν προγονικῶν χαρακτήρων. Ἡ μεταβίβασις αὐτὴ τῶν χαρακτήρων τῶν προγόνων εἰς τοὺς ἀπογόνους καλεῖται κληρονομικότης. Ἡ κληρονομικότης ἔξασφαλίζει τὴν δργανικήν συνέχειαν μεταξὺ τῶν διαδοχικῶν γενεῶν.


Θεμελιωτὴς τῶν νόμων τῆς κληρονομικότητος θεωρεῖται ὁ Αὐστριακὸς Ἱερομόναχος Γρηγόριος Μένδελ (1822 - 1884). Οὗτος εἰς τὸν περιβόλον τῆς βασιλικῆς μονῆς τοῦ Brünn ἐπειραματίζετο μὲ πίστα (μπιζέλια) διαφόρων ποικιλῶν. Συνεκέντρων δὲ τὴν προσοχήν του εἰς τὸν τρόπον τῆς μεταβιβάσεως τοῦ μῆκους τῶν βλαστῶν, τοῦ χρώματος τῶν ἀνθέων, τοῦ σχήματος τῶν σπερμάτων κτλ. Τὰς παρατηρήσεις του ὁ Μένδελ διετύπωσε τῷ 1865 εἰς δημοσίευμα, τὸ ὅποιον ὅμως παρῆλθεν ἀπαρατήρητον. Μόλις δὲ τῷ 1900, ἀφοῦ ὁ Μένδελ εἶχε πλέον ἀποθάνει, οἱ βιολόγοι ἐλασθον γνῶσιν τοῦ ἔργου του, τὸ ὅποιον εἶχε τόσῳ μεγάλην σημασίαν. Ἐσυνέχισαν τὰ πειράματά του καὶ ἐπεβεβαίωσαν τὰς παρατηρήσεις του. Ἐκτοτε τὸ κῦρος τῶν νόμων τοῦ Μένδελ ἀνεγνωρίσθη παγκοσμίως, ὅχι μόνον διὰ τὰ φυτά, ἀλλὰ καὶ διὰ τὰ ζῷα καὶ τὸν ἄνθρωπον.

ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΜΕΝΔΕΛ

Διὰ νὰ κατανοήσωμεν τοὺς νόμους τοῦ Μένδελ, εἶναι ἀνάγκη νὰ μελετήσωμεν μερικὰς περιπτώσεις διασταυρώσεων ἀτόμων, φυτικῶν ἢ ζωϊκῶν, καὶ νὰ γνωρίσωμεν τὰ ἀποτελέσματά των. Ἄσ

έχετάσωμεν πρώτον ἄπομα, τὰ ὅποια διαφέρουν μεταξύ των κατά ένα μόνον χαρακτῆρα, λ.χ. κατά τὸ χρῶμα.


Ὑπάρχει ἐν διακοσμητικὸν φυτόν, τὸ ὅποιον φέρει τὸ ἐπιστημονικὸν ὄνομα *Mirabilis Jalapa*. Τὸ κοινόν του ὄνομα εἶναι «Δειλινόν» ἢ «Νυκτολούθουδον». Ἡς διασταύρωσωμεν δύο ποικίλιας αὐτοῦ τοῦ φυτοῦ, ἔξι ὃν ἡ μία νὰ φέρῃ ἄνθη ἐρυθρά, ἡ δὲ ἄλλη λευκά. Μεταφέρομεν κόκκους γύρεως ἀπὸ τοὺς ἀνθῆρας ἐνὸς λευκοῦ ἄνθους εἰς τὸν ὑπερον ἐνὸς ἐρυθροῦ. Καὶ τὰ σπέρματα, τὰ ὅποια θὰ προέλθουν ἀπὸ αὐτὴν τὴν διασταύρωσιν, φυτεύομεν ἐκ νέου. Θὰ παρατηρήσωμεν, ὅτι τὰ νέα φυτά, τὰ ὅποια θὰ παρα-



Εἰκ. 45 Ἐνδιάμεσος καὶ ἐναλλασσομένη μορφὴ αληρονομικότητος εἰς τὸ φυτόν *Mirabilis Jalapa*.


χθοῦν καὶ θ' ἀποτελέσουν τὴν πρώτην θυγατρικήν γενεάν, θὰ εἶναι νόθα, διότι θὰ δώσουν ἄνθη ροδόχροα, ητοι χρώματος λευκοῦ ἀναμείκτου μετ' ἐρυθροῦ. Εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν ἡ μορφὴ τῆς κληρονομικότητος καλεῖται ἐνδιάμεσος καὶ δεικνύει, ὅτι εἰς τοὺς ἀπογόνους μετεδόθησαν καὶ ἀνεμείχθησαν καὶ αἱ δύο ἴδιότητες τῶν γονέων.

Θὰ ὑποθέσῃ ἵσως κανείς, ὅτι εἰς τὰ ἄνθη αὐτὰ τῆς πρώτης γενεᾶς οἱ πατρικοὶ καὶ οἱ μητρικοὶ χαρακτῆρες ἔχουν ὄριστικὰ ἔξαφανισθῆ. 'Άλλ' ἀν ἐπαναλάβωμεν τὴν διασταύρωσιν μεταξύ τῶν



Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

ροδοχρώων ἀνθέων, θά παρατηρήσωμεν, ὅτι εἰς τὰ φυτὰ τῆς νέας γενεᾶς, τῆς δευτέρας θυγατρικῆς γενεᾶς, θά παραχθοῦν 25% ἄνθη λευκά, 25% ἄνθη ἐρυθρά καὶ 50% ἄνθη ροδόχροα, δηλαδὴ θά ἴδωμεν εἰς τὴν νέαν γενεάν, ὅτι οἱ προγονικοί χαρακτῆρες θά διαχωρίσθοῦν ἐν μέρει καὶ θά ἐπανεμφανισθοῦν. Εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν ἡ μορφὴ τῆς κληρονομικότητος καλεῖται ἐν αλλασσομένῃ. Τὸ ούσιδες είναι εἰς αὐτὴν ἡ μαθηματικὴ σχέσις, ἡ ὅποια ἐμφανίζεται μὲ τὸν ἀριθμὸν τῶν παραχθέν-



Εἰκ. 46. Μωσαϊκὴ μορφὴ κληρονομικότητος.

των ἀπογόνων καὶ ἡ ὅποια παρίσταται μὲ τὴν ἀναλογίαν: 1 (λευκὸν) : 2 (ροδόχροα) : 1 (ἐρυθρόν).

"Αν τώρα ἀπό τὰ φυτὰ τῆς δευτέρας γενεᾶς διασταυρώσωμεν μεταξύ των τὰ λευκά ἄνθη, εἰς ὅλας τὰς διαδοχικὰς γενεὰς θὰ παραχθοῦν ἀπόγονοι πάντοτε ἀμιγεῖς μὲ ἄνθη λευκά. Τὸ ἴδιον θὰ συμβῇ καὶ ἂν διασταυρώσωμεν μεταξύ των τὰ ἐρυθρά ἄνθη. Αἱ μετέπειτα γενεαί θὰ ἔχουν πάντοτε ἄνθη ἐρυθρά. "Αν ὅμως διασταυρώσωμεν τὰ ροδόχροα ἄνθη, ὅλαι αἱ μετέπειτα γενεαί


θὰ δίδουν συνεχῶς καὶ τὰς τρεῖς κατηγορίας ἀνθέων, τὰς ὅποιας εἴδομεν ἀνωτέρω, μὲ τὴν αὐτὴν πάντοτε ἀναλογίαν 1 : 2 : 1.

"Αν ἀφ' ἑτέρου διασταυρώσωμεν δύο καθαρόσαιμα Ἰνδικὰ χοιρίδια, ἐκ τῶν ὅποιών τὸ ἐν νὰ εἶναι λευκόν, τὸ δὲ ἄλλο μέλαν, θὰ προκύψουν νόθοι ἀπόγονοι τῆς πρώτης θυγατρικῆς γενεᾶς μέλανες οἱ ὅλοι, δηλαδὴ εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν θὰ ἔπικρατήσῃ τὸ μέλαν χρῶμα, χωρὶς νὰ ἔχαφανισθῇ τὸ λευκόν, τὸ ὅποιον ἀπλῶς θὰ καλυφθῇ ἀπὸ τὸ μέλαν.

Απόδειξις, ὅτι εἰς τὴν δευτέραν θυγατρικὴν γενεὰν θὰ ἴδωμεν καὶ μέλανας καὶ λευκούς ἀπογόνους.

"Αν διασταυρώσωμεν ἀλέκτορα λευκὸν μὲ δρυνθανόμελαν, οἱ νεοσσοὶ τῆς πρώτης θυγατρικῆς γενεᾶς θὰ ἔμφανισθοῦν ὅλοι μὲ πτέρωμα φέροντας καὶ τὰ δύο χρώματα; ἀλλὰ κεχωρισμένα, τὰ ὅποια θὰ δίδουν τὴν εἰκόνα μωσαϊκοῦ. Εἰς τοὺς νεοσσούς δηλαδὴ οὔτε θ' ἀναμειχθοῦν οἱ δύο χαρακτῆρες τῶν γεννητόρων, οὔτε θὰ ἐπικρατήσῃ ὁ εἰς ἐπὶ τοῦ ἄλλου. Εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν ἡ μορφὴ τῆς κληρονομικότητος καλεῖται μωσαϊκή.

Ἐάν συνεχίσωμεν τὴν διασταύρωσιν τῶν μελανολεύκων ἀπογόνων μεταξύ των, εἰς τὴν δευτέραν θυγατρικὴν γενεὰν



Εἰκ. 47. Διασταύρωσις ἐντόμων Δροσιφίλου, τὰ ὅποια διαφέρουν μεταξύ των κατὰ δύο χαρακτήρας.

θὰ ἴδωμεν ἀπογόνους 25% μὲ πτέρωμα λευκόν, 25% μὲ πτέρωμα μέλαν καὶ 50% μὲ πτέρωμα μελανόλευκον.

"Ας λάβωμεν τώρα καὶ ἐν παράδειγμα διασταυρώσεως ἀτόμων, τὰ ὅποια διαφέρουν μεταξύ των κατὰ δύο χαρακτῆρας. "Ας διασταυρώσωμεν π.χ. Δροσόφιλον μακρόπτερον καὶ φαιόχρονον μὲ ἄλλο βραχύτερον καὶ ἔβενόχρονον. Τὸ δίπτερον αὐτὸν ἔντομον ἀποτελεῖ τὸ καλύτερον πειραματόζωον διὰ τὰς κληρονομικὰς ἔρευνας.

"Ολα τὰ ἄτομα τῆς πρώτης γενεᾶς θά είναι ὅμοια, ἢτοι μακρόπτερα καὶ φαιόχροα. Διότι τὸ ζεῦγος τῶν χαρακτήρων « μακρόπτερον - φαιόχρουν » ἐπικρατεῖ τοῦ ἀλλού ζεύγους. 'Εάν κατόπιν διασταυρώσωμεν μεταξύ των ἄτομα τῆς πρώτης γενεᾶς, θά ἴδωμεν νὰ παραχθοῦν εἰς τὴν δευτέραν γενεάν, ὅχι μόνον ἄτομα μακρόπτερα καὶ φαιόχροα ἢ ἄτομα βραχύπτερα καὶ ἔβενόχροα, ἀλλὰ καὶ ἄτομα νέων συνδυασμῶν, ἢτοι μακρόπτερα καὶ ἔβενόχροα ἢ βραχύπτερα καὶ φαιόχροα. 'Εξ αὐτοῦ συμπεραίνομεν πόσον μεγάλη πρέπει νὰ είναι ἡ ποικιλία τῶν ἀπογόνων, ὅταν οἱ γεννήτορες διαφέρουν κατὰ πολλοὺς χαρακτῆρας. 'Εξ αὐτοῦ ἐπίστης ἔξηγείται καὶ διατί είναι δύσκολον νὰ εὑρεθοῦν δύο ἀνθρωποί ἐντελῶς ὅμοιοι μεταξύ των.

'Από τὰς περιπτώσεις διασταυρώσεως, τὰς ἑποίας περιεγράψαμεν ἀνωτέρω, προκύπτουν τὰ ἔξης συμπεράσματα, τὰ δόποια ἀποτελοῦν καὶ τούς περὶ κληρονομικότητος νόμους τοῦ Μένδελ.

1) Τὰ νόθα τῆς πρώτης θυγατρικῆς γενεᾶς είναι πάντοτε μεταξύ των ὅμοια. Τοῦτο καλεῖται νόμος τῆς ὅμοιορφίας.

2) Οἱ ἀρχικοὶ χαρακτῆρες, ἀν καὶ εὐρίσκονται συνηνωμένοι εἰς τὰ νόθα τῆς πρώτης γενεᾶς, ὅμως διατηροῦν τὴν ἀνεξαρτησίαν των. Τοῦτο καλεῖται νόμος τῆς αὐτοτελείας.

3) Χαρακτῆρες, οἱ δόποιοι τυχὸν ἀνεμίχθησαν εἰς τὴν πρώτην θυγατρικὴν γενεάν, διαχωρίζονται πάλιν εἰς τὰς ἐπομένας γενεάς. Τοῦτο καλεῖται νόμος τῆς διαζεύξεως ἢ τῆς διασπάσεως.

4) Πολλάκις εἰς χαρακτήρα κατὰ τὴν ἐκδήλωσίν του ἐπικρατεῖ ἀπέναντι ἀλλού χαρακτῆρος. Τοῦτο καλεῖται νόμος τῆς ἐπικρατήσεως.

Πᾶσα προσπάθεια τοῦ κτηνοτρόφου ἢ τοῦ καλλιεργητοῦ νὰ βελτιώσῃ μίαν ὥρισμένην φυλὴν ζώου ἢ φυτοῦ θὰ ἔχῃ καλύτερα καὶ ταχύτερα ἀποτελέσματα, ἀν οὕτος είναι γνώστης τῶν βασικῶν νόμων τῆς κληρονομικότητος.

ΕΞΗΓΗΣΙΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΟΣ

Διὰ ποίου ἀραγε μέσου καὶ κατὰ ποίον μυστηριώδη τρόπον γίνεται ἡ μεταβίβασις τῶν ἰδιοτήτων ἢ χαρακτήρων τῶν γονέων εἰς τοὺς ἀπογόνους; Τὸ ζήτημα τοῦτο ἀπησχόλησε πολὺ τὴν ἐπιστήμην.

‘Αν ἐπρόκειτο νὰ ἔξηγήσωμεν πῶς γίνεται ἡ μεταβίθασις αὐτὴ κατὰ τὸν βλαστητικὸν πολλαπλασιασμὸν τῶν ἐμβίων ὅντων, τὸ πρᾶγμα δὲν θὰ εἶχε μεγάλας δυσκολίας. Εἴδομεν, ὅτι οἱ ἀπόγονοι τῶν φυτῶν, τὰ ὅποια πολλαπλασιάζονται δι’ ἀποβλαστήσεως, δὲν εἰναι τίποτε ἄλλο, παρὰ τμῆματα, τὰ ὅποια ἀπλῶς ἀπεκόπησαν ἀπὸ τὰ παλαιὰ φυτὰ καὶ μετεφυτεύθησαν. ‘Ἐπομένως οἱ ἀπόγονοι φέρουν ὅλας τὰς ἰδιότητας, τὰς ὅποιας ἔφερον καὶ προηγουμένως, ὅτε ἀπετέλουν μέλη τῶν μητρικῶν φυτῶν.

‘Ἄλλὰ κατὰ τὸν πολλαπλασιασμὸν διὰ γενῶν τὸ πρᾶγμα δὲν εἴναι τόσῳ ἀπλοῦν. Οἱ χαρακτῆρες μεταβιβάζονται εἰς τοὺς ἀπογόνους μὲ δύο μόνον κύτταρα τῶν γονέων, ἐκ τῶν προτέρων ὥρισμένα, μὲ τὸν κόκκον λ.χ. τῆς γύρεως ἀφ’ ἐνὸς καὶ μὲ τὴν φόσφαιραν τῆς φοιθήκης ἀφ’ ἑτέρου, χωρὶς νὰ προστεθῇ πλέον εἰς αὐτοὺς κανὲν ἄλλο κύτταρον προερχόμενον εἴτε ἀπὸ τὸ σῶμα τῶν γονέων, εἴτε ἄλλοθεν. Πρέπει λοιπὸν νὰ δεχθῶμεν, ὅτι τὰ δύο αὐτὰ ἀναπαραγωγικὰ κύτταρα ἐμπερικλείουν στοιχεῖα ὅλων τῶν προγονικῶν ἰδιοτήτων καὶ ἐπομένως, ὅτι εἰς αὐτὰ μόνον πρέπει ν’ ἀναζητήσωμεν τοὺς φορεῖς τῶν ἰδιοτήτων τούτων.

Εἴδομεν, ὅτι κατὰ τὴν γονιμοποίησιν τὰ δύο γεννητικὰ κύτταρα, ἄρρεν καὶ θῆλυ, συγχωνεύονται. Οἱ δύο τότε πυρῆνες, εἰσχωροῦντες ὁ εἷς εἰς τὴν μᾶζαν τοῦ ἄλλου, σχηματίζουν τὸν ἑνιαῖον πυρῆνα τοῦ νέου κυττάρου, τὸ ὅποιον θ’ ἀποτελέσῃ τὴν ἀπαρχὴν τοῦ νέου ὄργανισμοῦ. Οἱ πυρῆνες τῶν γεννητικῶν κυττάρων ἔχουν, ὡς γνωστόν, χρωματοσωμάτια τὸ ἥμισυ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν χρωματοσωματίων τῶν σωματικῶν κυττάρων. ‘Ο ἑνιαῖος λοιπὸν πυρὴν μὲ τὴν συγχώνευσιν ἔξασφαλίζει χρωματοσωμάτια, ὅσα καὶ οἱ πυρῆνες τῶν σωματικῶν κυττάρων.

‘Ἐν παράδειγμα. Τὰ γεννητικὰ κύτταρα τοῦ Βατράχου ἔχουν 8 χρωματοσωμάτια, ἐνῷ τὰ σωματικὰ ἔχουν 16. Μὲ τὴν γονιμοποίησιν τὸ πρῶτον κύτταρον τοῦ νέου Βατράχου ἔξασφαλίζει 16 (8 + 8) χρωματοσωμάτια, ἐκ τῶν ὅποιων τὰ 8 εἰναι πατρικῆς, τὰ δὲ ἄλλα 8 μητρικῆς προελεύσεως. Τὸ τοιοῦτον είναι μία σοφὴ οἰκονομία τῆς Φύσεως. Διότι, ἀν τὰ γεννητικὰ κύτταρα εἶχον καὶ αὐτὰ ἀριθμὸν χρωματοσωματίων ἵσον μὲ τὰ ἄλλα κύτταρα τοῦ ὄργανισμοῦ, μὲ τὴν γονιμοποίησιν τὸ παραγόμενον πρῶτον κύτταρον τοῦ ἀπογόνου θὰ εἶχε διπλάσιον ἀριθμὸν χρωματοσωματίων ἀπὸ

τὸν ἀριθμὸν τῶν προγονικῶν κυττάρων. Τοιουτοτρόπως δὲ ὁ ἀριθμὸς τῶν χρωματοσωματίων δλονὲν θὰ ἐδιπλασιάζετο εἰς ἑκάστην γενεᾶν κυττάρων καὶ δὲν θὰ ἥτο σταθερὸς καὶ χαρακτηριστικὸς τοῦ εἶδους.

‘Ως ἀπεδείχθη ἀπὸ τὰ ἔκτεθέντα παραδείγματα διασταυρώσεως, εἰς τοὺς ἀπογόνους τῆς δευτέρας γενεᾶς ἀνευρίσκονται ίδιότητες τῶν πάππων. Εἴμεθα λοιπὸν ὑποχρεωμένοι νὰ δεχθῶμεν, ὅτι αὐταὶ μόνον διὰ τῶν χρωματοσωματίων εἰναι δυνατὸν νὰ μεταβιβάζωνται ἀπὸ τοὺς γονεῖς εἰς τὸ ὡδὸν καὶ ἐν συνεχείᾳ εἰς τοὺς ἀπογόνους τῶν κατόπιν γενεῶν. Αὐτὸς ἄλλως τε ἀπέδειξε καὶ ἡ πειραματικὴ ἔρευνα. ’Επὶ τῶν χρωματοσωματίων ἐδράζονται καταβολαί, ἀφαντάστως μικρὰ στοιχεῖα, τὰ δόποια καλοῦνται γόνοι ἢ γονύλλια (gen). ’Έκ τῶν γονυλλίων τούτων προέρχονται οἱ χαρακτήρες ἑκάστου ὀργανισμοῦ. Τοιαῦτα γονύλλια ὄμοια ὑπάρχουν καὶ εἰς τοὺς προγόνους καὶ εἰς τοὺς ἀπογόνους. ’Η θέσις δὲ τῶν γονυλλίων εἰναι ὠρισμένη καὶ πάντοτε ἢ ίδια. Μεταβολαὶ εἰς τὴν θέσιν των ἢ ἄλλαι ἀλλοιώσεις ἔχουν ὡς ἀποτέλεσμα τὴν μεταβολὴν ἢ τὴν ἔξαφάνισιν ὠρισμένων χαρακτήρων. ’Επὶ παραδείγματι, μὲ ἐπίδρασιν ἀκτίνων X εἰς τὰς ὡθήκας τοῦ ἐντόμου Δροσοφίλου προκαλεῖται κατὰ τὴν δευτέραν καὶ τὴν τρίτην αὔτοῦ γενεῶν ἀνώμαλος ἀνάπτυξις ἐνὸς τῶν ὀφθαλμῶν ἢ ἐνὸς τῶν ποδῶν.

Παραδέχονται σήμερον, ὅτι ἔκτὸς τῶν γονυλλίων τῶν χρωματοσωματίων κληρονομικὰς ίδιότητας ἔχουν καὶ τὰ χρωματοφόρα τοῦ πρωτοπλάσματος τῶν γεννητικῶν κυττάρων. Εἰς αὐτὸς ἀποδίδονται π.χ. αἱ περιπτώσεις, κατὰ τὰς δόποιας δὲ ἀπόγονος κληρονομεῖ ίδιότητας μόνον τῆς μητρός. Αἱ ίδιότητες αὗται μεταβιβάζονται κατὰ τρόπον ἀποκλείοντα τὴν συμμετοχὴν τοῦ πυρῆνος.

Πᾶν τέκνον λοιπὸν φέρει εἰς τὰ κύτταρά του τὰ κληρονομικὰ στοιχεῖα, τὰ δόποια παρέλαβεν ἀπὸ τοὺς γονεῖς του. Εἶναι δὲ τὰ στοιχεῖα αὐτὰ δύο εἰδῶν: πρωτεύοντα καὶ δευτερεύοντα. Καὶ τὰ μὲν πρῶτα κυριαρχοῦν καὶ δίδουν τὸν τύπον τῆς ἐμφανίσεως τοῦ ἀνθρώπου, τὰ δὲ δευτερεύοντα διατηροῦνται ἐντὸς τῶν χρωματοσωματίων εἰς λανθάνουσαν κατάστασιν καὶ ὡς τοιαῦτα μεταβιβάζονται μὲ τὰ γεννητικὰ κύτταρα εἰς τοὺς ἀπογόνους. Φανερώνονται δὲ μόνον, ὅταν εἰς κάποιον ἀπόγονον εὔρουν εὐκαιρίαν διὰ νὰ κυριαρχήσουν. Εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν δὲ ἀπόγονος αὐτὸς

θά εύρεθη νὰ ὁμοιάζῃ μᾶλλον μὲ τὸν παλαιὸν πρόγονόν του παρὰ μὲ τὸν γεννήτορά του. Ἡ ύπερπήδησις αὐτὴ τῶν ἴδιοτήτων τῶν προγόνων κατὰ μίαν ἢ περισσοτέρας γενεὰς καλεῖται προγονισμὸς ἢ προπατορισμὸς (*atavismus*).

ΠΟΙΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΝΤΑΙ

Οἱ χαρακτῆρες, οἱ ὅποιοι παρουσιάζονται εἰς τοὺς ὄργανισμούς, εἶναι δυνατὸν νὰ διακριθοῦν εἰς τρεῖς κατηγορίας :

α) Εἰς καὶ ηρονομικούς, εἰς ἐκείνους δηλαδή, οἱ ὅποιοι ὑπῆρχον εἰς τοὺς γεννήτορας ἐκ συνεχοῦς κληρονομίας ἀπὸ τοὺς προγόνους των. Οἱ χαρακτῆρες αὐτοὶ μεταβιβάζονται, ὡς εἶναι εύνότον, καὶ εἰς τοὺς ἀπογόνους. Τοιοῦτοι χαρακτῆρες εἰς τὸν ἀνθρωπὸν εἶναι π.χ. τὸ χρῶμα τῆς κόμης καὶ τῆς ἱριδοῦ τῶν ὀφθαλμῶν, τὸ σχῆμα τοῦ κρανίου καὶ τῆς ρινός, τὸ ἀνάστημα, ἢ ἴδιάζουσα χημικὴ σύστασις τοῦ αἷματος, ὥρισμέναι ἴδιοφυῖαι (μουσική, μαθηματική), ἢ μακροβιότης ἢ τὸ πρόωρον γῆρας κλπ. Ἐπίσης ὁ προγναθισμὸς τῶν μελῶν τῆς οἰκογενείας τῶν Ἀψβούργων ἢ τῶν μελῶν τῆς παλαιᾶς φλωρεντινῆς οἰκογενείας τῶν Μεδίκων καὶ μερικαὶ παθήσεις, ὅπως εἶναι ἢ αἵμορροιοφιλία καὶ ὁ δαλτωνισμός, αἱ ὅποιαι συνηθέστερον πλήττουν κατὰ τὴν μετάδοσιν τὰ ἄρρενα μέλη τῶν οἰκογενειῶν.

β) Εἰς συγγενεῖς ἢ συμφύτους, εἰς ἐκείνους δηλαδή, οἱ ὅποιοι παρουσιάζονται αἴφνιδίως εἰς τοὺς ἀπογόνους, χωρὶς νὰ ὑπῆρχον εἰς τοὺς προγόνους. Ὁφείλονται οἱ περισσότεροι τούτων εἰς αἵτια, τὰ ὅποια ἔδρασαν κατὰ τὴν ἐμβρυϊκὴν ζωὴν καὶ διετάραξαν τὸν ἐμβρυϊκὸν ὄργανισμόν. Οἱ χαρακτῆρες αὐτοὶ ἐκδηλώνονται ἢ ἀπὸ τῆς στιγμῆς τῆς γεννήσεως ἢ πολὺ μετ' αὐτήν, ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ δὲ κληροδοτοῦνται καὶ εἰς τοὺς ἀπογόνους. Εἰς τὸν ἀνθρωπὸν τοιοῦτοι χαρακτῆρες εἶναι π.χ. ἢ πολυδακτυλία, ἢ βραχυδακτυλία, ἢ συνδακτυλία κτλ. Εἰς τὸ Δροσόφιλον εἶναι ἢ ἀνώμαλος ἀνάπτυξις τῶν ὀφθαλμῶν ἢ τῶν ποδῶν τῶν ἀπογόνων του, κατόπιν ἐπιδράσεως μὲ ἀκτίνας Röntgeni ἐπὶ τῆς ὠσθήκης του. Εἰς μερικὰ δένδρα οἱ κλάδοι των ἀποτόμως κλίνουν πρὸς τὸ ἔδαφος. "Ἄν δὲ παραχθοῦν νέα ἄτομα ἀπὸ τοὺς κλάδους αὐτούς, θὰ λάβουν τὴν μορφήν, τὴν ὅποιαν ἔχει λ.χ. ἢ Ἰτέα.

γ) Εἰς ἐπικτήτους, εἰς ἐκείνους δηλαδὴ τοὺς χαρακτῆ-

ρας, οἱ ὅποῖοι ἀποκτῶνται διὰ διαφόρους λόγους μετὰ τὴν γένησιν τοῦ ὄργανισμοῦ καὶ κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ζωῆς του. Τὸ πρόβλημα, ἀν μεταβιβάζωνται ἢ δχι καὶ οἱ ἐπίκτητοι χαρακτῆρες εἰς τοὺς ἀπογόνους, ἀπησχόλησε μεγάλως τοὺς εἰδικοὺς ἐπιστήμονας. Οἱ μὲν ἀποκρούουν τὴν μεταβιβασιν, ἄλλοι δὲ τὴν παραδέχονται.

Πολλαὶ καὶ διάφοροι πειραματικαὶ ἔρευναι ἔγιναν διὰ τὸ ζῆτήμα τοῦτο. 'Ο Βάσιμαν ἀπέκοπτε τὴν οὐρὰν νεαρῶν Μυῶν καὶ αὐτὸ συνεχῶς εἰς σειρὰν 22 γενεῶν. 'Ἐν τούτοις οὐδεμίαν παρετήρησε μεταβολὴν εἰς τὸ μῆκος τῆς οὐρᾶς τῶν ἀπογόνων. Λαοὶ ἡμιάγριοι ἀπὸ νεαρᾶς ἥλικίας ἐκριζώνουν τοὺς τομεῖς ὁδόντας των ἢ διατρυποῦν τὴν ρίνα των, τὸ χεῖλος καὶ τὰ ὀτα, διὰ ν' ἀναρτήσουν κοσμήματα. Τοῦτο δὲ ἐπαναλαμβάνουν συνεχῶς μέχρι σήμερον. Καὶ ὅμως οὐδεμίᾳ παρετηρήθη μεταβολὴ εἰς τοὺς ἀπογόνους.

'Αντιθέτως, ἄλλοι ἔξέθρεψαν κάμπτας ἐντόμων μὲ τροφὴν διάφορον ἀπὸ τὴν συνήθη. Παρετήρησαν δὲ τότε, ὅτι τὰ τέλεια ἔντομα ἐπαρουσίασαν μεταβολὰς χαρακτήρων, αἱ ὅποιαι ἐνεφανίσθησαν καὶ εἰς τοὺς ἀπογόνους των, ἀν καὶ οὗτοι ἐτράφησαν μὲ τὴν συνήθη των τροφῆν. "Αλλοὶ ἔξέθεσαν διαρκῶς εἰς κίτρινὸν φῶς Σαλαμάνδραν, μὲ κηλίδας κιτρίνας. Παρετήρησαν δέ, ὅτι τὸ κίτρινὸν χρῶμα πηγήθη, ἐνῷ εἰς τὸ μέλαν περιβάλλον ηὔξήθη τὸ μέλαν χρῶμα. Οἱ χαρακτῆρες αὐτοὶ διετηρήθησαν ἐπί τι χρονικὸν διάστημα καὶ εἰς τοὺς ἀπογόνους.

'Αληθῶς εἰναι δύσκολον νὰ ταχθῇ κανεὶς μὲ τὴν μίαν ἢ μὲ τὴν ἄλλην ἀποψιν ζητήματος, τὸ ὅποιον ἐπὶ τοῦ παρόντος παραμένει ἄλυτον. Δύναται ὅμως νὰ δεχθῇ, ὅτι οἱ ἐπίκτητοι ἴδιότητες μεταβιβάζονται ἵσως ἐκ προσαρμογῆς, ὅταν μεταβάλλωνται αἱ ἔξωτερικαὶ συνθῆκαι τῆς ζωῆς καὶ ὅταν ταυτοχρόνως γίνηται μεταβολὴ εἰς τὰ γεννητικὰ κύτταρα εἰς μίαν εὐαίσθητον περίοδόν των.



Εἰκ. 48. 'Ανήρ τῆς φυλῆς Batonga, ὃ ὅποιος διὰ καλαισθητικοὺς λόγους ἔξήρεσε τοὺς ἔξι δύνα προσθίους διδόντας του, ἐμφανιζόμενος ὡς προγναθικός.

ΕΥΓΟΝΙΚΗ

Παλαιόθεν εἶχε παρατηρηθῆν, ότι οἱ σωματικῶς καὶ ψυχικῶς ὑγιεῖς γονεῖς ἀποκτοῦν τέκνα σωματικῶς καὶ ψυχικῶς ὑγιᾶ, οἱ δὲ ἐλαττωματικοὶ γονεῖς ἀποκτοῦν τέκνα σωματικῶς καὶ ψυχικῶς ἀνάπηρα. Δὲν εἶναι λοιπὸν ὅρθὸν οἱ ἄνθρωποι νὰ συνάπτουν γάμους, ὅταν δὲν εἶναι σωματικῶς καὶ ψυχικῶς ἀρτίοι, διὰ νὰ μὴ μεταδίδουν βαρείας παθήσεις καὶ ἀνωμαλίας εἰς τοὺς ἀθώους ἀπογόνους των.

Οἱ ἀρχαῖοι ἡμῶν πρόγονοι δὲν ἤθελον νὰ διαιωνίζηται ἡ σωματικὴ καὶ ἡ διανοητικὴ ἀναπτηρία. Μάλιστα οἱ Σπαρτιάται εἶχον τὴν συνήθειαν νὰ ἔγκαταλείπουν τὰ κακῶς πεπλασμένα βρέφη των εἰς τοὺς πρόποδας τοῦ Ταύγέτου. Οἱ πρόγονοί μας, ὁδηγούμενοι καὶ διαφωτιζόμενοι ἀπὸ τοὺς μεγάλους φιλοσόφους, τοὺς νομοθέτας καὶ τοὺς ἴστροντις τῆς ἐποχῆς των, κατώρθωσαν νὰ δημιουργήσουν τὸ τέλειον καὶ ἴδεωντες σωματικὸν κάλλος, τὸ ὅποιον οὐδεμία χώρα τῆς Γῆς ἐδημιούργησε, ὡς ὁμολογοῦν παλαιοί καὶ νεοί συγγραφεῖς.

Σήμερον οἱ πεπολιτισμένοι λαοὶ (‘Ηνωμ. Πολιτεῖαι, ‘Ελβετία, Δανία, Σουηδία κλπ.) ἐπιζητοῦν νὰ τελειοποιήσουν τὸ ἀνθρώπινον εἶδος μὲ τὴν ἐφαρμογὴν τῶν νόμων τῆς Βιολογίας καὶ ἴδιως τῶν νόμων τῆς κληρονομικότητος. Ἐξ αὐτοῦ δὲ ἔγενητη ὁ κλάδος τῆς Γενικῆς ‘Υγιεινῆς, ὁ καλούμενος Εὔγονικὴ ή Εὔγονια.

Διὰ τὸν σκοπὸν αὐτὸν λαμβάνουν ὑπὲρ τοῦ κοινοῦ κατάλληλα νομοθετικά μέτρα. Σχηματίζουν δὲ καὶ εὐγονικὰς ἐταιρείας, αἱ ὅποιαι μὲ τὴν ἐκλατίκευσιν τῶν βιολογικῶν καὶ τῶν ἡθικῶν ἀρχῶν ἐπιδιώκουν, ὅχι μόνον νὰ προστατεύσουν τὰς μελλούσας γενεὰς ἀπὸ τὴν κατάπτωσιν, ἀλλὰ καὶ νὰ βελτιώσουν αὐτάς.

ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ

Διὰ τὴν διαιώνισιν τῶν εἰδῶν οἱ ὄργανισμοὶ παράγουν ἀπογόνους, εἴτε διὰ διαιρέσεως τοῦ κυττάρου των οἱ μονοκύτταροι, εἴτε διὰ πολλαπλασιασμοῦ ἀνευ γενῶν (ἀποβλαστήσεως, σποριογονίας, σχιζογονίας) οἱ πολυκύτταροι, εἴτε διὰ πολλαπλασιασμοῦ διὰ γενῶν ἄλλοι, ἥτοι μὲ τὴν συνάντησιν δύο γεννητικῶν κυττάρων, τῶν ὅποιων ἡ λειτουργία τῆς συντήξεως καλεῖται γονιμοποίησις.

‘Η μεταβίβασις τῶν χαρακτήρων τῶν προγόνων εἰς τοὺς ἀπογόνους καλεῖται κληρονομικότης. Οἱ νόμοι τῆς κληρονομικότητος ἐτέθησαν ἀπὸ τὸν Μένδελ καὶ εἶναι: ὁ νόμος τῆς δύμοιομορφίας, ὁ νόμος τῆς αὐτοτελείας, ὁ νόμος τῆς διαζεύξεως καὶ ὁ νόμος τῆς ἐπικρατήσεως. Οἱ χαρακτῆρες τῶν γονέων μεταβιβάζονται εἰς τοὺς ἀπογόνους διὰ τῶν χρωματοσωματίων τοῦ πυρῆνος τῶν γεννητικῶν κυττάρων. ’Ἐκ τῶν χαρακτήρων, οἱ δόποιοι παρουσιάζονται εἰς τοὺς ὄργανισμούς, μεταβιβάζονται εἰς τοὺς ἀπογόνους κυρίως οἱ κληρονομικοί, πολλάκις δὲ καὶ οἱ συγγενεῖς. Διὰ τοὺς ἐπικτήτους ὅμως χαρακτῆρας ὑπάρχει ἀμφισβήτησις ὡς πρὸς τὴν μετάδοσίν των.

Μὲ τὴν ἐφαρμογὴν τῶν νόμων τῆς Βιολογίας καὶ ἴδιως τῶν νόμων τῆς κληρονομικότητος ἐπιζητοῦν σήμερον νὰ προστατεύσουν τὸ ἀνθρώπινον εἶδος ἀπὸ τὴν κατάπτωσιν. ‘Ο κλάδος τῆς Γενικῆς ‘Υγιεινῆς, ὁ δόποιος ἐπιδιώκει τὸν σκοπὸν αὐτόν, καλεῖται Εὔγονική.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

- 1) Ποῖοι εἶναι οἱ τρόποι τοῦ πολλαπλασιασμοῦ τῶν ὄργανισμῶν ;
- 2) Τί καλεῖται κληρονομικότης ; Τί προγονισμός ;
- 3) Ποῖοι εἶναι οἱ νόμοι τοῦ Μένδελ ;
- 4) Διὰ τίνος μέσου γίνεται ἡ μεταβίβασις τῶν ἴδιοτήτων τῶν γεννητόρων εἰς τοὺς ἀπογόνους ; Ποῖαι ἴδιότητες μεταβιβάζονται ;
- 5) Τί εἶναι Εὔγονική ; Ποῖος ὁ προορισμός της ;

Η ΕΞΕΛΙΞΙΣ
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Η ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΟΝΤΩΝ

Από τούς παλαιοτέρους χρόνους, άκόμη καὶ ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴν ἀρχαιότητα, ἀπασχολεῖ τὸ ἀνθρώπινον πνεῦμα ἡ ἀπορία, πῶς προῆλθεν εἰς τὴν Γῆν ἡ μεγάλη καὶ θαυμαστὴ ἐκείνη ποικιλία μορφῆς τῶν διαφόρων ὄργανικῶν ὅντων, τὰ ὅποια συναντῶμεν. Τὸ σπουδαῖον αὐτὸν ζήτημα ἀποτελεῖ ἵσως τὸ λεπτότερον καὶ τὸ δυσκολώτερον πρόβλημα τῆς Βιολογίας. Εἰς αὐτὸν πολλοὶ σοφοί προσεπάθησαν νὰ δῶσουν μίαν λύσιν μὲ διαφόρους θεωρίας, τὰς ὅποιας κατὰ καιρούς ἀνέπτυξαν.

Καὶ ἄλλοι μὲν (Λινναῖος, Κυβιέ) ὑπεστήριξαν, ὅτι τὸ ἀνώτατον "Ον, δημιουργός, ἐπλασεν ἐξ ἀρχῆς ὅλα τὰ εἴδη μὲ τὴν μορφὴν καὶ μὲ τὰ δργανα, μὲ τὰ ὅποια σήμερον παρουσιάζονται. "Αλλοι δὲ (Λαμάρκ, Σαίντ - Ιλαίρ, Ντάρβιν), ὅτι τὰ εἴδη αὐτὰ μὲ τὴν πάροδον τῶν αἰώνων μετέβαλον μορφήν, διὰ ν' ἀνταποκριθοῦν εἰς τὰς ἀνάγκας των. "Αλλοι δὲ τέλος, ὅτι ὅλα τὰ εἴδη, τὰ ὅποια ἐπλάσθησαν, ἐδημιουργήθησαν ἐξ ἀρχῆς ὅχι σταθερά, ἀλλὰ ίκανὰ νὰ ἔξελισσωνται καὶ νὰ μεταβάλλωνται. Οἱ πρῶτοι εἶναι οἱ ὀπαδοὶ τῆς θεωρίας τοῦ ἀμεταβλήτου ἡ τῆς σταθερότητος τῶν εἰδῶν. Οἱ δεύτεροι εἶναι οἱ ὀπαδοὶ τῆς θεωρίας τοῦ μεταμορφισμοῦ ἡ τῆς ἔξελιξεως τοῦ ὄργανικοῦ κόσμου. Καὶ οἱ τρίτοι προσπαθοῦν νὰ συμβιβάσουν τὰς θεωρίας τῶν δύο προηγουμένων παρατάξεων.

"Αν καὶ οὐδεμίᾳ ἀπὸ τὰς θεωρίας αὐτὰς δίδει λύσιν τοῦ προβλήματος ἀπολύτως ίκανοποιητικήν, ἐπικρατεστέρα ὅμως εἶναι ἡ θεωρία τῆς ἔξελιξεως, διότι στηρίζεται, ὅχι βέβαια εἰς ἀποδείξεις, ἀλλὰ εἰς ἀρκετός ἔνδειξεις περὶ τῆς ὄρθότητός της.

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΕΩΣ ΚΑΙ ΑΙ ΥΠΕΡ ΑΥΤΗΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

"Οταν λέγωμεν ἔξελιξιν (évolution), ἐννοοῦμεν, ὅτι ὅλα τὰ πράγματα εἰς τὴν φύσιν ὑφίστανται διαδοχικάς μεταβολάς. Ακόμη καὶ ὁ ἀνόργανος κόσμος μεταβάλλεται. Καὶ παράδειγμα ἔχο-


μεν αὐτὴν τὴν Γῆν, ἡ δόποία καὶ αὐτὴ ὑπέστη πολλὰς μεταβολάς,
ἔως ὅτου φθάσῃ εἰς τὴν σημερινὴν κατάστασιν.

‘Ως πρὸς τὸν ὄργανικὸν κόσμον, ἡ θεωρία τῆς ἔξελίξεως δέχεται,
ὅτι κατ’ ἀρχὰς παρήχθησαν κατώτεροι ἀτελεῖς ὄργανισμοί. ’Απὸ^{τούτους} δέ,
οἱ δόποιοι μετεβλήθησαν βαθμηδὸν μὲ τὴν πάροδον μα-
κροτάτου χρόνου, προέκυψαν οἱ ἀνώτεροι. “Εκαστος ὄργανισμὸς
εἶναι Πρωτεὺς ἀενάως μεταβαλλόμενος.


‘Η ἀνθρωπίνη γνῶσις δὲν κατέχει σήμερον ἀμέσους ἀποδείξεις
τῆς ἔξελίξεως τῶν εἰδῶν. Κατέχει ὅμως, ὅπως εἴπομεν, ἐνδείξεις τινάς,
τὰς δόποιας παρέχουν ἐμμέσως :

A) Η ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑ

‘Ο στερεός φλοιὸς τοῦ πλανήτου μᾶς ἀποτελεῖται ἀπὸ διαφόρους
στιβάδας, ἐκ τῶν δόποιων αἱ βαθύτεραι εἶναι καὶ αἱ παλαιότεραι.
Ἐντὸς τῶν διαφόρων τούτων στιβάδων εύρεθησαν κατὰ καιροὺς
τὰ ἀπολιθώματα διαφόρων ἐμβίων ὅν-
των, φυτῶν καὶ ζώων, τὰ δόποια ἔξησαν
εἰς χρονικὰς περιόδους τοῦ παρελθόντος,
ἀντιστοίχους μὲ τὸν χρόνον διαπλάσεως
ἐκάστης γηίνης στιβάδος. Αἱ χρονικαὶ
αὐταὶ περίοδοι, αἱ δόποιαι διήρκεσαν ἐκά-
στη ἑκατομμύρια ἑτῶν, ἐκλήθησαν γε-
ωλογικοὶ αἰῶνες, φέρουν δὲ
κατὰ σειρὰν τὰ ὄνόματα ἀρχέγο-
νος, πρωτογενής, δευτερο-
γενής, τριτογενής καὶ τεταρ-
τογενής αἰών. ’Απὸ ἀπόψεως ὄργα-
νισμῶν ὁ ἀρχέγονος αἰών καλεῖται καὶ
ἀζωϊκός, διότι στερεῖται ἀπολιθω-
μάτων καὶ θεωρεῖται ὡς ἐποχή, κατὰ
τὴν δόποιαν οὐδεμία ζωὴ ὑπῆρχεν ἐπὶ
τῆς Γῆς, ἡ ἀκριβέστερον ἡ ζωὴ ἦτο τόσον ἀπλὴ, ὥστε δὲν ἀφῆκε
κανὲν ἵχνος. ‘Ο πρωτογενής αἰών καλεῖται καὶ παλαιόζωϊ-
κός. Εἰς τὴν γηίνην στιβάδα τούτου ἀνευρέθησαν ἀπολιθώματα
ἀσπονδύλων, ἀλλὰ καὶ σπονδυλωτῶν καὶ μάλιστα ἰχθύων, βατρα-




Εἰκ. 49. Τριλοβίτης, ἀρθρω-
τὸν ζῷον τοῦ Παλαιοζωϊκοῦ
αἰῶνος.

ΑΙΩΝΕΣ	ΕΤΗ	ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΖΩΗΣ	
ΚΑΙΝΟΖΩΙΚΟΣ	1 έκτμ.	"Ανθρωπός Κατοικίδια ζώα	
	55 έκτμ.	'Ανωτερά θηλαστικά	
ΜΕΣΟΖΩΙΚΟΣ	190 - 120 έκτμ.	'Ανθοφόρα φυτά Θηλαστικά Κολοσσιαία έρπετά Πτηνά Τελειότατα έντομα	
	215 έκτμ.	Μεγάλα πτεριδοειδῆ Σπερματόφυτα 'Αμφίβια 'Έρπετα	
ΠΑΛΑΙΟΖΩΙΚΟΣ	300 - 250 έκτμ.	Πτεριδόφυτα 'Ιχθύες Πρώτα άμφιβια ''Έντομα	
	480 - 350 έκτμ.	Τριλοβίται Πρώτα άραχνοειδῆ ''Εμφάνιση σπονδυλωτῶν	
ΑΖΩΙΚΟΣ	550 έκτμ.	'Ασπόνδυλα	
	575 έκτμ.	Πρώιμα ιχνη σπόγγων κλπ.	
	600 έκτμ.	Χαώδης ζωή	

Συνοπτικός πίνακας της ιστορίας της ζωής.

χίων καὶ ἐρπετῶν. Ὁ δευτερογενῆς αἰώνιαν ἐκλήθη καὶ μεσοζωϊκός. Εἰς τὴν γηῖνην δὲ στιβάδα τούτου ἀνευρέθησαν λείψανα κολοσσιαίων ἐρπετῶν, πτηνῶν καὶ θηλαστικῶν. Τέλος ὁ τριτογενῆς όμοιος μὲ τὸν τεταρτογενῆ αἰώνιαν ἐκλήθησαν καὶ νοζωϊκός αἱών. Εἰς τὰς γηῖνας δὲ στιβάδας τούτου ἐνεφανίσθησαν λείψανα ὄργανισμῶν, όμοιῶν μὲ τοὺς σημερινούς, ἥτοι ἀπολιθώματα ἀνωτέρων θηλαστικῶν καὶ ἀνθρώπου. Δηλαδὴ ἀπὸ 60 περίπου ἑκατομμυρίων ἔτῶν, ἀφ' ὅτου ἥρχισεν ὁ τελευταῖος αἰών, ἡ ἐξέλιξις οὐδὲν νεώτερον ούσιῶδες ἐσημείωσεν εἰς τὸ ζωϊκὸν βασίλειον, ἀλλ' οὔτε καὶ εἰς τὸ φυτικόν. Ἐξαιρεσίς παρετηρήθη μόνον εἰς τὴν ἐξέλιξιν τοῦ ἀνθρώπου.

Απὸ τὴν ἐξέτασιν τῶν εύρεθντων ἀπολιθωμάτων, τὰ ὅποια ὑπολογίζονται εἰς 100 χιλιάδας εἰδῶν, προκύπτουν τὰ ἔξῆς : "Οτι, ὅσῳ ἀρχαιοτέρᾳ εἰναὶ ἡ γηῖνη στιβάς, ἀπὸ τὴν ὅποιαν προέρχονται οἱ παλαιοὶ ὄργανισμοί, τόσῳ ἀτελέστεροι παρουσιάζονται οἱ ὄργανισμοί αὐτοί. "Οτι οἱ μεταγενέστεροι ὄργανισμοί συνδέονται μὲ τοὺς ἀμέσως προγενεστέρους διὰ συγγενῶν μορφῶν. "Οτι μεταξὺ δύο ἢ περισσοτέρων ὑποδιαιρέσεων τοῦ ζωϊκοῦ ἢ τοῦ φυτικοῦ βασιλείου ὑπάρχουν διὰ τὴν πλήρη ἀλληλουχίαν καὶ ἐνδιάμεσοι μορφαί, ως εἶναι ἡ Ἡχθυόρνις, ὁ συνθετικὸς τύπος μὲ χαρακτηριστικὰ




Εἰκ. 50. Τὸ γιγαντιαῖον σαρκοβόρον παλαιογνοτολογικὸν ἐρπετόν Τυραννόσαυρος, ἔχον ύψος 15 μέτρων.

ἰχθύος καὶ πτηνοῦ, ἡ Ἀρχαιοπτέρυξ, μὲν χαρακτηριστικὰ ἐρπετοῦ καὶ πτηνοῦ κλπ. Καὶ ὅτι τέλος εἰς ἄτομα τῆς αὐτῆς σειρᾶς



Εἰκ. 51. Ἀρχαιοπτέρυξ ἡ λιθογραφικὴ τοῦ Μεσοζωϊκοῦ αἰδονος.


παρατηρεῖται ἀλλαχοῦ μὲν τελειοποίησις τῶν ὄργάνων, ἀλλαχοῦ δὲ ὁπισθοδρόμησις αὐτῶν. Σαφὲς παράδειγμα μᾶς παρέχουν τὰ εἰς τὴν



Εἰκ. 52. Ἀναπαράστασις τῆς Ἀρχαιοπτέρυγος.

Β. Ἀμερικήν εύρεθέντα ἀπολιθώματα "Ιππων, τὰ δόποια παρουσιάζουν σειρὰν μορφῶν μιᾶς βραδείας ύποπλαστικῆς μεταβολῆς τῶν δακτύλων τοῦ ζῷου τούτου. Οἱ 4 ἐκ τῶν 5 δακτύλων του βραχυ-

νόμενοι όλονέν, ἔξηφανίσθησαν. Ἀντιθέτως ὁ μέσος δάκτυλος, ἐπὶ




Εἰκ. 53. Ἐξέλιξις τοῦ σκελετοῦ τοῦ ποδὸς τοῦ "Ιππου".

τοῦ ὅποίου ὁ "Ιππος" ἐστηρίζετο, προσηρμόσθη μὲ τὸ ταχὺ βάδισμα τοῦ ἵππου. Παρ' ἡμῖν εὐρέθησαν παρόμοια εἰς Πικέρμι.

B) Η ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ



Ο βιολογικὸς αὐτὸς κλάδος παρακολουθεῖ τὴν βαθμιαίαν ἀνάπτυξιν τῶν ὄντων, ἀπὸ τὴν ἀρχικήν των κατάστασιν, μέχρις ὅτου λάβουν τὴν μορφὴν τοῦ τελείου ἀτόμου. Κατὰ τὴν ἀνάπτυξιν αὐτὴν ὁ ὄργανισμός, μὲ σειρὰν διαδοχικῶν μεταβολῶν, λαμβάνει πολλὰς

μορφάς, αἱ ὀποῖαι ὑπενθυμίζουν μορφάς κατωτέρων ὄργανισμῶν. Παρατηρεῖται ἔξι ἄλλου, ὅτι τὰ ἔμβρυα διαφόρων συγγενῶν ὄργανισμῶν, π.χ. ἀνθρώπου, πιθήκου, καὶ κονίκλου, δύμοιάζουν τόσῳ περισσότερον μεταξύ των, ὅσῳ μικροτέρα εἰναι ἡ ἡλικία των. Ἐμβρυα πτηνῶν καὶ θηλαστικῶν παρουσιάζουν μεγαλυτέραν μεταξύ των δύμοιότητα, παρὰ αὐτὰ ταῦτα τὰ τέλεια πτηνὰ πρὸς τὰ θηλαστικά.




Εἰκ. 54. Α = ἔμβρυα Ἰχθύος, Β = ἔμβρυα Ὁρνιθος,
Γ = ἔμβρυα Ἀνθρώπου.

Ἡ μορφὴ τοῦ φοῦ εἰς ὅλα τὰ ζῶα εἰναι δύμοια. Ἡ καρδία τοῦ ἀνθρώπου καὶ τῶν θηλαστικῶν ἐν γένει κατὰ τὴν ἔμβρυϊκὴν ζωὴν δύμοιάζει μὲ τὴν καρδίαν τῶν ιχθύων. Ἐχει δηλαδὴ ἐνα κόλπον καὶ μίαν κοιλίαν. Ὡς αἵτια τῆς δύμοιότητος τῶν μορφῶν εἰς τὰ ἔμβρυα, ἐνῷ οἱ ἐνήλικοι διαφέρουν μεταξύ των, προβάλλεται ἡ κοινὴ καταγωγὴ μὲ διάφορον ἔξελιξιν.



Τὸ σύνολον τῶν μορφῶν, τὰς ὅποιας λαμβάνει τὸ ἔμβρυον μέχρις ὅτου λάβῃ τὴν δριστικήν του μορφήν, καλεῖται δὲ τογονία.
Ἡ δοντογονία εἶναι σύντομος ἐπανάληψις τῆς φυλογονίας, ἡ



Εἰκ. 55. Σκελετὸς Νυκτερίδος.



ὅποια πάλιν εἶναι τὸ σύνολον τῶν διαδοχικῶν μορφῶν, τὰς ὅποιας ἔλασθον βαθμηδὸν οἱ διάφοροι ὀργανισμοὶ κατὰ τὸ μακρὸν χρονικὸν διάστημα τῆς διαπλάσεως τῆς Γῆς.

Γ) Η ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ

Τὰ ἄκρα ὅλων τῶν θηλαστικῶν εἶναι κατεσκευασμένα μὲν τὴν ἀρχικὴν βάσιν, ἔχουν δηλαδὴ ἐν ὁστοῦν εἰς τὸν βραχίονα καὶ δύο εἰς τὸ ἀντιθράχιον. "Ἄν τὰ συγκρίνωμεν ὅμως, θὰ παρατηρήσωμεν, ὅτι ἔχουν μεταξύ των διαφορὰς ἀναλόγους μὲν τὴν εἰδικὴν λειτουργίαν, τὴν ὅποιαν ἔκαστον ἐκτελεῖ. Τὰ ἄκρα τοῦ Ἀνθρώπου ἔγιναν κατάλληλα πρὸς ἐκτέλεσιν διαφόρων λεπτεπιλέπτων ἐργασιῶν,

τοῦ Πιθήκου είναι κατάλληλα πρὸς σύλληψιν, τῆς Νυκτερίδος πρὸς πτήσιν, τοῦ Ἀσπάλακος πρὸς ἀνόρυξιν, τῶν Κητῶν πρὸς νῆξιν κ.ο.κ. "Οσα δργανα ἔχουν τὴν ίδιαν προέλευσιν καὶ τὴν ίδιαν κατασκευὴν κατὰ βάσιν, ἀλλὰ ἔχουν προσαρμοσθῆ κατὰ διάφορον τρόπον καὶ ἐκτελοῦν λειτουργίας διαφόρους ὀνομάζονται ὁ μόλογ αδργανα.

Οἱ μύες, οἱ ὅποιοι κινοῦν τὸ πτερύγιον τοῦ ὥτος εἰς τὰ ζῷα, είναι ἄχρηστοι εἰς τὸν ἀνθρωπὸν. Διὰ τοῦτο είναι καὶ δλιγώτερον ἀνεπιτυγμένοι εἰς αὐτόν. Ὅπολογίζουν, ὅτι εἰς τὸν ἀνθρωπὸν εύρισκονται εἰς παρομοίαν παλινδρόμησιν ἡ πήρωσιν 90 περίπου δργανα. Μεταξὺ τούτων καταλέγονται αἱ τρίχες τοῦ σώ-




Εἰκ. 56. Ἡ μηνοειδής πτυχὴ εἰς δρθαλμὸν
Πτηνοῦ καὶ εἰς δρθαλμὸν Ἀνθρώπου.

ματος, οἱ οὐραῖοι σπόνδυλοι, οἱ ὅποιοι ὅμως εἰς σπανίας περιπτώσεις διατηροῦνται εἰς τὸ ἀρτιγέννητον βρέφος, ὁ σωφρονιστὴρ ὁδούς, ἡ σκωληκοειδής ἀπόφυσις, ἡ μηνοειδής πτυχὴ, ἡ ὅποια εἰς τὴν ἑσωτερικὴν γωνίαν τῶν δρθαλμῶν τῶν πτηνῶν ἡ τῶν ἐρπετῶν είναι τόσον ἀνεπιτυγμένη, κλπ. Ἡ ἀτροφία διαφόρων δργάνων, τὰ ὅποια οὐδεμίαν λειτουργίαν ἐκτελοῦν, ως είναι π.χ. ἡ ἀτροφία τῶν ὄπισθιών ἄκρων τῆς Φαλαίνης, δύναται νὰ ἐ-
-ηγηθῇ κατὰ δύο τρόπους, οἱ ὅποιοι συνηγοροῦν καὶ οἱ δύο ὑπὲρ τῆς θεωρίας τῆς ἔξελίξεως τῶν δντων. "Ἡ δτι δηλαδὴ τὰ δργανα αὐτὰ είναι λείψανα τελειοτέρων ἄλλοτε δργάνων, τὰ ὅποια ἔξυπηρέτησαν τοὺς προγόνους, τοῦ εἶδους, ἡ ὅτι είναι προκαταρκτικὰ σχέδια δργάνων, πρωρισμένα νὰ ἔξελιχθοῦν μελλοντικῶς, χάριν τῶν ἀπογόνων τοῦ εἶδους.

Εἰκ. 57. Παιδίον 10 ἐ-
-τῶν μὲ οὐράν, ἐκ τῆς δια-
-τηρήσεως τῶν οὐραίων
σπονδύλων.

Δ) Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

Γνωρίζομεν, ότι ή κατασκευή τοῦ σώματος τῶν δργανισμῶν γενικῶς ἀνταποκρίνεται πρὸς τὰς συνθῆκας τοῦ μέσου, τὸ διποῖον τούς περιβάλλει. Τοιαύτης προσαρμογῆς παραδείγματα καὶ ἐπομένως ἔνδειξεις ἔχειτε τῶν δργανικῶν ὅντων μᾶς παρέχει ή σύγκρισις τοῦ δργανικοῦ κόσμου περιοχῶν, αἱ διποῖαι διαφέρουν οὐσιωδῶς μεταξύ των. "Αν π.χ. τὰ ζωϊκά εἶδη, τὰ διποῖα ἀπὸ ἡπειρωτικᾶς περιοχᾶς ἀπωκίσθησαν καὶ ἀπεμονώθησαν εἰς νήσους κοραλλιογενεῖς (Βερμούδας) ἢ ήφαιστειογενεῖς (Χαβάη), συγκρίνωμεν πρὸς τὰ ἀρχικά των εἶδη, θὰ εὑρωμεν εἰς τὰ ἀποικισθέντα σημαντικά



Εἰκ. 58. Ποικιλίαι τοῦ πτηνοῦ Μικροσκελίδος τῆς Λευκόκεφάλου, διφειλόμεναι εἰς τὴν γεωγραφικὴν προέλευσίν των (Ίνδαι, Κεϋλάνη, Σινική, Φορμόδζα κλπ.)

μεταβολάς. Αἱ μεταβολαὶ μάλιστα αὐταὶ καταλήγουν πολλάκις εἰς δημιουργίαν νέων ἐντελῶς εἶδῶν. Ἀναλόγους μεταβολὰς εύρισκομεν καὶ εἰς τὰ ἔξημερωμένα κατοικίδια ζῷα (Περιστεράς κλπ.), ὡς καὶ εἰς τὰ καλλιεργημένα φυτά. Εἰς τὴν Νέαν Ζηλανδίαν εἶδός τι Ψιττακοῦ ἐτρέφετο μὲν ἐντομα, σκώληκας καὶ σπόρους. Ἀφ' ὅτου ὅμως εἰστήκη ἐκεῖ τὸ Πρόβατον, ὁ Ψιττακὸς ἥρχισε νὰ γίνηται ἀρπακτικὸς καὶ νὰ ἐπιτίθεται τελικῶς καὶ κατὰ τοῦ Προβάτου, εἰς τοῦ διποίου τὰ νῶτα ἥνοιγεν ὅπάς. Εἰς τὴν Μαδαγασκάρην οἱ μόνοι ὑπάρχουντες Πίθηκοι εἰναι οἱ Λεμούριοι. Φαίνεται, ὅτι ή νήσος είχεν ἀποστασθῆ ἀπὸ τὴν Ἀφρικανικὴν ἥπειρον, προτοῦ ἀκόμη ἐμφανισθοῦν οἱ πραγματικοὶ Πίθηκοι. "Αν ή νήσος παρέμενεν ἡνωμένη μὲ τὴν ἥπειρον, οἱ Λεμούριοι θὰ ἔχησαν ιζόντο ίσως ἔνεκα τοῦ μεγάλου ζωϊκοῦ ἀνταγωνισμοῦ. Τὸ φυτὸν Ἡλίανθος ὁ Βολβώδης (κοινῶς Βολβογύγγηλη), τὸ διποῖον εἰς τὴν πεδιάδα ἔχει ὑψηλὸν στέλεχος, ἀν καλλιεργηθῇ εἰς ύψηλὰ μέρη, ἀποκτᾷ βραχύτατα μεσογονάτια δια-

στήματα. Τὰ φύλλα του τότε λαμβάνουν ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας τοῦ ἔδαφους διάταξιν κυκλοτερῆ, εἰς σχῆμα ρόδακος. (βλέπε σελ. 38)

Ε) Η ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ

Διὰ νὰ διευκολύνῃ τὴν μελέτην τοῦ τεραστίου ἀριθμοῦ τῶν φυτῶν καὶ τῶν ζώων, ἡ Συστηματικὴ τὰ κατατάσσει εἰς διάφορα ἀθροίσματα μὲ κοινὰ γνωρίσματα, τὰ ὅποια ὑποδηλώνουν καὶ τὴν συγγένειάν των. Ἀπὸ τὰ διάφορα αὐτὰ ἀθροίσματα σχηματίζονται τὰ συστήματα, τὸ σύστημα τῶν φυτῶν καὶ τὸ σύστημα τῶν ζώων, τῶν ὅποιων βάσις εἰναι τὸ εἶδος. Μὲ τὴν φυσικὴν συγγένειαν τὰ συστήματα προσπαθοῦν νὰ παρουσιάσουν καὶ τὴν ἔξελιξιν τοῦ ὄργανικοῦ κόσμου.

ΠΩΣ ΕΓΙΝΕΝ Η ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΘΕΩΡΙΑΙ

"Αν στηριχθῶμεν εἰς τὰς ἐνδείξεις, τὰς ὅποιας ἀποκομίζομεν ἀπὸ τὴν Παλαιοντολογίαν, τὴν Ἐμβρυολογίαν, τὴν Συγκριτικὴν Ἀνατομικήν, τὴν Οἰκολογίαν καὶ τὴν Συστηματικήν, καὶ παραδεχθῶμεν ὄριστικῶς τὴν θεωρίαν τῆς ἔξελίξεως τῶν ὄντων, ὑπολείπεται νὰ γνωρίσωμεν πῶς ἔγινε αὐτὴ ἡ ἔξελιξις, τὴν ὅποιαν ἐδέχοντο καὶ οἱ ἀρχαῖοι "Ἐλληνες φιλόσοφοι" Ἀναξίμανδρος, Ἡράκλειτος, Ἐμπεδοκλῆς κλπ. Πολλαὶ εἰναι αἱ θεωρίαι, αἱ ὅποιαι ἀνεπτύχθησαν διὰ τὸ ζήτημα τοῦτο. Θὰ μημονεύσωμεν ἔξ αὐτῶν τὰς κυριωτέρας.

α) Θεωρία τοῦ Λαμάρκ (Λαμαρκισμός). Ὁ Γάλλος βιολόγος Ἰω. Λαμάρκ (1744 - 1829) ὀφείλει τὴν θεωρίαν του εἰς μελέτας ἐπὶ διαφόρων ἀντιπροσώπων τοῦ φυτικοῦ καὶ τοῦ ζωϊκοῦ βασιλείου. Τὴν ἐστήριξε δὲ εἰς τὰς ἔκτις δύο βάσεις: 1) Ἐντὸς ὥρισμένου περιβάλλοντος ὁ ὄργανισμὸς διὰ τὰς ἀνάγκας του δημιουργεῖ συνηθείας, αἱ ὅποιαι ἐπιβάλλουν συχνοτέραν καὶ ἐντατικωτέραν χρῆσιν ὄργάνων. Ἡ χρῆσις ἰσχυροποιεῖ καὶ ἔξελίσσει τὰ ὄργανα, ἐνῷ ἡ ἀχρησία τὰ καθιστᾶ ἀτροφικὰ καὶ βαθμηδὸν τὰ ἔξαφανίζει. 2) Πᾶσα μεταβολὴ τοῦ ὄργάνου διατηρεῖται καὶ μεταδίδεται κληρονομικῶς, ἐφ' ὅσον καὶ τὰ δύο φῦλα τοῦ εἴδους τὴν ἔχουν ὑποστῆ.

Κατὰ τὸν Λαμάρκ λοιπὸν ἡ ἀχρησία ἔξηφάνισε τοὺς ὄδόντας

εἰς τὸν Μυρμηκοφάγον καὶ εἰς τὰ πτηνά. Ἡ ἀνάγκη τῆς Καμηλοπαρδάλεως νὰ φθάνῃ τὰ ψυχλὰ δένδρα ἀνέπτυξεν ὑπερβολικὰ τὸ μῆκος τοῦ τραχήλου της. Ἐπειδὴ Πίθηκοί τινες ζοῦν ἐπὶ τῶν κλάδων τῶν δένδρων, ἀπέκτησαν συλληπτήριον ούραν καὶ πόδας μὲ ίδιότητας χειρῶν. Ἡ συνήθεια τῶν Ὀφεών νὰ διέρχωνται ὑπὸ τοὺς θάμνους καὶ ἀπὸ μέρη στενὰ κατέστησε τὸ σῶμά των λεπτὸν καὶ ἄπουν. Ἐπειδὴ τὸ πτηνὸν εύρεθη εἰς τὴν ἀνάγκην νὰ πετᾷ, ἀπέκτησε πτέρυγας.

Τὰς γνώμας τοῦ Λαμάρκ ἐπολέμησαν σφοδρῶς ἄλλοι ἐπιστήμονες, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ὁ Γ. Κυβιέ, ὁ ὁποῖος ὑπεστήριζε τὴν θεωρίαν τοῦ ἀμεταβλήτου τῶν εἰδῶν. Τὸ ἀδύνατον σημεῖον τῆς θεωρίας τοῦ Λαμάρκ είναι ἡ παραδοχὴ τοῦ δυνατοῦ τῆς κληροδοτήσεως ἐπικτήτων ίδιοτήτων. Ἄλλὰ περὶ τὸ τέλος τῆς 19ης ἑκατονταετηρίδος αἱ γνώμαι τοῦ Λαμάρκ ἀπέκτησαν νέους ὀπαδούς καὶ μάλιστα μεταξὺ τῶν παλαιοντολόγων, οἱ ὁποίοι πρεσβεύουν, ὅτι ὅχι μόνον ὁ δργανισμὸς ὡς σύνολον, ἀλλὰ καὶ ἕκαστον κύτταρον ἀντιδρᾶ σκοπίμως εἰς τὰς ἔξωτερικὰς ἐπιδράσεις (Νεολαμαρκισμός).

β) Θεωρία τοῦ Ντάρβιν (Δαρβινισμός). Ὁ "Αγγλος Κάρολος Ντάρβιν (1809 - 1882), εἰς μίαν ἔξερευνητικὴν ἀποστολὴν εἰς τὴν N. Ἀμερικὴν καὶ εἰς τὸν Εἰρηνικὸν Ὦκεανόν, ἔσχε τὴν εὐκαιρίαν νὰ παρατηρήσῃ πλῆθος ζῷων καὶ φυτῶν. Εἶδε τότε εἰς τὰ τροπικὰ δάση τὸν ἀέναον πόλεμον μεταξὺ τῶν ὄργανισμῶν διὰ τὸν σκοπὸν τῆς συντηρήσεώς των. Ζῶα ἐσπαράσσοντο μεταξύ των. Φυτὰ ἀνερριχῶντο ἐπὶ δένδρων πρὸς ἀναζήτησιν φωτὸς καὶ κατελάμβανον τὴν θέσιν τοῦ φυλλώματος. Ζῶα καὶ φυτὰ ἀνέπτυσσον ὡφελίμους χαρακτῆρας, ιδιάζοντα δηλαδὴ χρώματα ἢ σχήματα ξένων σωμάτων, διὰ νὰ δύνανται ν' ἀμύνωνται ἢ καὶ νὰ ἐπιτίθενται κατὰ τῶν ἔχθρῶν των. "Ανθρωποι ἐπάλαιον ἐναντίον τῆς φύ-



Εἰκ. 59. Ὁ Γάλλος βιολόγος
I. Λαμάρκ.

σεως. Και τὸν γενικὸν τοῦτον σκληρὸν ἀγῶνα δὲ Ντάρβιν ὠνόμασεν ἀγῶνα περὶ ὑπάρχεως.

Ἄν ήθελέ τις σκεφθῆ, διὰ ἀπὸ ἐν ζεῦγος Ἐλεφάντων εἰναι δυνατὸν νὰ παραχθοῦν μετὰ 750 ἔτη 19 ἑκατομμύρια ἀπογόνων διὰ τὸ Ἀρίγγη γενῆ 40 χιλιάδας ὡῶν καὶ τὸ "Οστρεον 1 ἑκατομμύριον, διὰ δὲ μύκης Λυκοπέρδων παράγει περὶ τὰ 7 δισεκατομμύρια σπόρια κλπ., θὰ ἔφθαινεν εἰς τὸ συμπέρασμα, διὰ οἱ διάφοροι ὄργανισμοὶ ἀναπαραγόμενοι θὰ ἐκάλυπτον ταχέως τὴν ἐπιφάνειαν τῆς Γῆς. Τοιοῦτον τι ὅμως δὲν συμβαίνει. Οἱ ἀριθμὸι τῶν ἀτόμων ἐκάστου

εἶδος παραμένει σχεδὸν σταθερὸς ἐπὶ τοῦ πλανήτου μας, διότι πλεῖστα ἐκ τῶν παραγομένων ἀτόμων καταστρέφονται κατὰ τὸν ἀγῶνα περὶ ὑπάρχεως.

Ο περὶ ὑπάρχεως ἀγώνα ἀποτελεῖ τὴν βάσιν τῆς θεωρίας τοῦ Ντάρβιν. Ἀπὸ τὸν ἀγῶνα τοῦτον φυσικῶς καὶ μηχανικῶς ἔξερχονται νικηταὶ καὶ ἐπιζοῦν τὰ δυντα, τὰ περισσότερον ἰκανὰ καὶ ἐπιτήδεια, ἐνῷ τὰ δλιγώτερον ἰκανὰ ὑποκύπτουν καὶ ἔξαφανίζονται. Τὰ ἴσχυρότερα ἐπιτυγχάνουν τοῦτο μὲ τὴν καλυτέραν των προσαρμογῆς, ἴσχυροποιοῦνται καὶ αὐξάνουν αἱ ἴδιότητες τοῦ ὄργανισμοῦ, αἱ προσφρότεραι διὰ τὸν ἀγῶνα, αἱ δοποῖαι καὶ ἐπικρατοῦν. Η ἐπικράτησις αὐτὴ τῶν καλυτέρων ἴδιοτήτων καλεῖται φυσικὴ ἐπιλογὴ. Κατὰ τὸν Ντάρβιν, η φύσις μιμεῖται αὐτομάτως τὸν κτηνοτρόφον ἢ τὸν γεωργόν, διὸ ποιοῖς διὰ τὴν ἀναπροσαρμογὴν ἐκλέγει ἀτομα προικισμένα μὲ τοὺς χαρακτῆρας, τοὺς δοποίους ἐπιθυμεῖ νὰ διατηρήσῃ (τεχνητὴ ἐπιλογὴ). Μὲ τὰς διαδοχικὰς ἐπιλογὰς μεταξὺ τῶν ἰκανωτέρων ἀτόμων προστίθενται συνεχῶς τελειότεροι χαρακτῆρες καὶ τὸ είδος βαθμιαίως μεταβάλλεται καὶ καθίσταται καλύτερον προστηρόμοσμένον. Τοιουτορόπτως τὰ ἔμβια δυντα ἔξελισσονται, κληροδοτοῦν τὰς μεταβολὰς εἰς τοὺς ἀπογόνους των καὶ παράγουν νέας ποικιλίας καὶ βαθμηδὸν νέα είδη.




60. Ο "Αγγλος φυσιοδι-
φης Κάρ. Ντάρβιν.

ποιοῦνται καὶ αὐξάνουν αἱ ἴδιότητες τοῦ ὄργανισμοῦ, αἱ προσφρότεραι διὰ τὸν ἀγῶνα, αἱ δοποῖαι καὶ ἐπικρατοῦν. Η ἐπικράτησις αὐτὴ τῶν καλυτέρων ἴδιοτήτων καλεῖται φυσικὴ ἐπιλογὴ. Κατὰ τὸν Ντάρβιν, η φύσις μιμεῖται αὐτομάτως τὸν κτηνοτρόφον ἢ τὸν γεωργόν, διὸ ποιοῖς διὰ τὴν ἀναπροσαρμογὴν ἐκλέγει ἀτομα προικισμένα μὲ τοὺς χαρακτῆρας, τοὺς δοποίους ἐπιθυμεῖ νὰ διατηρήσῃ (τεχνητὴ ἐπιλογὴ). Μὲ τὰς διαδοχικὰς ἐπιλογὰς μεταξὺ τῶν ἰκανωτέρων ἀτόμων προστίθενται συνεχῶς τελειότεροι χαρακτῆρες καὶ τὸ είδος βαθμιαίως μεταβάλλεται καὶ καθίσταται καλύτερον προστηρόμοσμένον. Τοιουτορόπτως τὰ ἔμβια δυντα ἔξελισσονται, κληροδοτοῦν τὰς μεταβολὰς εἰς τοὺς ἀπογόνους των καὶ παράγουν νέας ποικιλίας καὶ βαθμηδὸν νέα είδη.

‘Η θεωρία τοῦ Ντάρβιν ὑπὸ πολλῶν ἔγινε ἐνθουσιωδῶς δεκτή. Άλλὰ δὲν ἔλειψαν καὶ οἱ σφοδροὶ πολέμοι τῆς. Οὕτοι ὑπεστήριξαν, διτὶ ἡ ἐπιλογὴ δὲν δύναται νὰ παραγάγῃ νέα εἶδη, ὅλλα’ ἀπλῶς καὶ λυτέρους ἀντιπροσώπους εἰδῶν, τὰ ὅποια ὑπάρχουν ήδη.

Μεταξὺ τῆς θεωρίας τοῦ Ντάρβιν καὶ τῆς θεωρίας τοῦ Λαμάρκ ὑπάρχει διαφορὰ ὡς πρὸς τὴν ἐρμηνείαν τῶν αἰτίων, τὰ ὅποια προ-



Εἰκ. 61. Ο ἁχθός Τορπίλη. 1 = ἐπιφάνεια ραχιαία, 2 = ἐπιφάνεια κοιλια-
κή, 3 = θέσης ἡλεκτρικῶν ὅργάνων, διό τῶν ὅποιων ἀμύνεται.

καλοῦν τὴν ἔξελιξιν τῶν ὄντων. Π.χ. κατὰ τὸν Ντάρβιν, οἱ ὄφθαλ-
μοὶ τοῦ Ἀσπάλακος ἐσμικρύνθησαν βαθμηδὸν διότι διετηρήθη-
σαν τὰ ἄτομα τὰ ὅποια εἶχον τοὺς μικροτέρους ὄφθαλμούς, σύμ-
φωνα μὲ τὴν θεωρίαν τῆς φυσικῆς ἐπιλογῆς καὶ ἐδέχοντο τοὺς
όλιγωτέρους ἐρεθισμούς ἐντὸς τοῦ ἐδάφους. Ενῷ κατὰ τὸν Λαμάρκ,
ὁ Ἀσπάλακος ἔχειχάσει τὴν ὅρασιν, διότι εἰς τὸ σκότος ὑπὸ τὸ ἔδσ-
φος δὲν χρησιμοποιεῖ τοὺς ὄφθαλμούς.

γ) Θεωρία τοῦ Ντέ Βρίς (Μεταλλακτισμός). Ένωδό Λαμάρκ καὶ ὁ Ντάρβιν παρεδέχοντο διὰ τὴν ἔξελιξιν τῶν ὄντων τὰς μικρὰς συνεχεῖς μεταβολάς, ὁ 'Ολλανδὸς βοτανολόγος Οὔγ. Ντέ Βρίς (1848 - 1935) ἀπέδωκε τὸν σχηματισμὸν νέων εἰδῶν εἰς μεταβολὰς τῶν ὄργανισμῶν ἀποτόμους, αἱφνιδίας καὶ ἀσυνεχεῖς, τῶν ὅποιών τὴν περίοδον διαδέχεται μία περίοδος σταθερότητος. Εἰς τὴν θεωρίαν του αὐτήν κατέληξεν ὁ 'Ολλανδὸς βοτανολόγος




Εἰκ. 62. 'Ο Ολλανδὸς βοτανολόγος Οὔγ. Ντέ Βρίς.

μελετῶν τὸ φυτὸν «Οἰνόθηρα ἡ λαμαρκιανή». 'Αλλ' εἶγαι καὶ ιστορικῶς ἔξηκριβωμένον, ὅτι ἡ ἐρυθρόφυλλος 'Οξύα διὰ πρώτην φορὰν ἐνεφανίσθη αἱφνιδίως τῷ 1190 μ.Χ. εἰς τὴν περιοχὴν τοῦ καντονίου τῆς Ζυρίχης. Μάλιστα ἔνεκα τοῦ ἐρυθροῦ χρώματος τῶν φύλλων τῆς προεκάλεσεν αἰσθησιν εἰς τοὺς δεισιδαίμονας κατοίκους τῆς ἐποχῆς ἐκείνης. 'Επίσης αἱφνιδίως ἐπαρουσιάσθησαν τὰ ἄνευ σπερμάτων δαμάσκηνα, πορτοκάλλια καὶ σταφίδες, αἱ αἴγες χωρὶς κέρατα καὶ ἄλλα παρόμοια. 'Η θεωρία τῶν μεταλλάξεων ἔχειγείται μὲ τὴν θεωρίαν τῶν γονυλλίων. Δηλαδὴ χρωματοσωμάτιον τι τεμαχίζεται αἱφνιδίως μετὰ τῶν γονυλλίων του, τὰ ὅποια προσκολλῶνται

τότε εἰς ἄλλο χρωματοσωμάτιον. Αἱ μεταλλάξεις, τῶν ὅποιών ἡ ὑπαρξίς δὲν εἶναι πλέον δυνατὸν νὰ ἀμφισβητηθῇ, εἶναι ἡ εύνοϊκαὶ ἡ ἀδιάφοροι ἡ δυσμενεῖς δι' ἓνα ὄργανισμόν. Συνεπάγονται δὲ πιθανότητας τόσον διὰ τὴν ἔξαφάνισιν, ὅσον καὶ διὰ τὴν ἐπιβίωσίν του.

Κατὰ τὸν Ντέ Βρίς, ὑπάρχουν ποικιλίαι μικραί, αἱ ὅποιαι δὲν κληρονομοῦνται, καὶ ἄλλαι σημαντικώτεραι, αἱ ὅποιαι ἐμφανίζονται ἀποτόμως, χωρὶς τίποτε νὰ προάγγειλῃ τὴν ἔξαφάνισίν των, καὶ



αἱ δόποιαι κληρονομοῦνται. Ἡ ἐμφάνισις τῶν ποικιλιῶν αὐτῶν γίνεται συγχρόνως εἰς πολλὰ ἄτομα, τὰ δόποια ἀποκτοῦν τοιαύτην διαφορὰν ἀπὸ τὰ ἄλλα, ώστε νὰ χαρακτηρίζωνται ὡς νέον εἶδος συγγενές.

* * *

Καὶ αἱ τρεῖς θεωρίαι, τὰς δόποιας ἀνωτέρω ἐμνημονεύσαμεν, παρουσιάζουν κενά, τὰ δόποια μὲν ἀγωνίαν οἱ δόπαδοι ἑκάστης θεωρίας προσπαθοῦν νὰ συμπληρώσουν. Ἐλλ᾽ ἐνῷ αὐτοὶ ἀγωνίζονται νὰ ἔξηγήσουν τὴν ἔξελιξιν μὲ τὴν ἀνεύρεσιν τοῦ τί ἔγινεν εἰς τὸ παρελθόν, ἡ νεωτέρα Πειραματικὴ Βιολογία στρέφεται πρὸς τὸ μέλλον καὶ προσπαθεῖ ν' ἀνεύρῃ τὸν τρόπον παραγωγῆς νέων ποικιλιῶν καὶ νέων εἰδῶν. Καὶ κατώρθωσε μὲν νὰ ἐπιτύχῃ ἐν μέρει τοῦτο, πρέπει ὅμως νὰ παρέλθῃ μακρὸν χρονικὸν διάστημα, διὰ νὰ πιστοποιηθῇ κατὰ πόσον αἱ παραχθεῖσαι ποικιλίαι θὰ διατηρηθοῦν σταθεραὶ ἢ ὅχι.

Τὸ μεγαλειῶδες πρόβλημα περὶ τοῦ πῶς ἔγινεν ἡ ἔξελιξις τῶν ὄντων, δῆπος καὶ ἄλλα βιολογικὰ προβλήματα, δὲν ἔλυθη ἀκόμη. Εἴναι μάλιστα πιθανόν, ὅτι κατὰ βάθος θὰ μείνῃ μυστήριον ἄλυτον, εἰς τὸ δόποιον, δῆπος καὶ εἰς τὸ μυστήριον τῆς ζωῆς, οὐδέποτε θὰ ἐπιτραπῇ νὰ εἰσχωρήσῃ ὁ ἀνθρωπος.

ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ

Ἡ πολυμορφία τῶν ὄργανικῶν ὄντων προϊῆθεν ἀπὸ τὴν ἔξελιξιν τοῦ ὄργανικοῦ κόσμου. Ὄλα τὰ πράγματα εἰς τὴν Φύσιν ὑφίστανται διαδοχικάς μεταβολάς. Ἀπὸ τοὺς κατωτέρους δὲ ἀτελεῖς ὄργανισμοὺς προέκυψαν διὰ τοῦ χρόνου οἱ ἀνώτεροι. Εἰς τὴν κλίμακα τῶν γεωλογικῶν περιόδων μόνον ἔξελιξιν βλέπει τις. Ἐνδείξεις, διὰ νὰ δεχθῶμεν κατ' ἀρχὴν τὴν θεωρίαν τῆς ἔξελίξεως, μᾶς παρέχουν κυρίως ἡ Παλαιοντολογία, ἡ Ἐμβρυολογία, ἡ Συγκριτικὴ Ἀνατομική, ἡ Οἰκολογία καὶ ἡ Συστηματική.

Ἐλλὰ κατὰ ποιὸν τρόπον ἔγινεν ἡ ἔξελιξις; Κατὰ τὸν Λαμάρκ, τὰ ἔμβια ὄντα ἔξελίσσονται μὲν μικρὰς συνεχεῖς μεταβολὰς τῶν ὄργάνων των, προερχομένας ἀπὸ τὴν χρῆσιν ἢ τὴν ἀχρησίαν αὐτῶν καὶ μεταδιδομένας κληρονομικῶς. Κατὰ τὸν Ντάρβιν, ἡ ἔξελιξις ὁφεί-

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

‘Από ὅσα μᾶς ἔδιδαξεν ἡ Γενικὴ Βιολογία προκύπτει, ὅτι ὀλόκληρος ὁ ζῶν δργανικὸς κόσμος, φυτά, ζῷα, ἄνθρωποι, ἀποτελεῖ ἐν ἑνιαῖον σύνολον, τοῦ δποίου κοινὸν χαρακτηριστικὸν γνώρισμα εἶναι ἡ ζωή. Τὸ σύνολον τοῦτο διέπουν οἱ αὐτοὶ γενικοὶ βιολογικοὶ νόμοι.

‘Η ζωή, χωρὶς νὰ ἔρμηνευθῇ ὡς πρὸς τὰ βαθύτερα αἰτιά της καὶ ὡς πρὸς τὸν σκοπόν της ἐν τῇ Φύσει, ἐκδηλώνεται μὲ τὰς ποικίλας ἔξεργασίας, αἱ δποῖαι τελοῦνται ἐντὸς τῶν ἐμβίων ὅντων καὶ αἱ δποῖαι ὅλαι κατευθύνονται πρὸς κοινὸν ἀποτέλεσμα.

‘Η ζωὴ ἔξασφαλίζεται εἰς μὲν τὰ ἄτομα μὲ τὴν θρέψιν, εἰς δὲ τὸ σύνολον μὲ τὴν ἀναπαραγωγήν. Εἰς ἕκαστον ὀργανισμὸν παρέχονται τὰ μέσα διὰ τὴν ὅσον τὸ δυνατὸν ἀσφαλεστέραν συστήρησίν του. ‘Η δὲ κατασκεψὴ τῶν δργάνων του καὶ τῶν μελῶν του δύναται νὰ ὀνομασθῇ σκόπιμος καὶ τελεία.

‘Η περιοχὴ τῆς γνώσεως ἐπεκτείνεται συνεχῶς καὶ κατακτᾷ μεγάλους τομεῖς τοῦ ἀνεξερευνήτου χώρου. ‘Η γνῶσις τῶν βιολογικῶν νόμων εἶναι ἀναγκαία διὰ πάντα σκεπτόμενον ἄνθρωπον. Πᾶσα γνῶσις παρέχει χαράν καὶ καθιστᾷ τὸν βίον πληρέστερον καὶ πλουσιώτερον. Τὸ βιολογικὸν παράδειγμα τῶν κοινοβιοτήτων εἶναι ἔξοχως διδακτικὸν διὰ τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ πᾶσαν κοινωνίαν. ‘Ο Ντάρβιν ἀναφέρει, ὅτι πολλὰ πτηνὰ διατρέφουν μὲ ἔξαιρετικὴν στοργὴν τοὺς συντρόφους των, ὅταν γηράσουν ἢ τυφλωθοῦν. Πολλάκις μάλιστα υἱοθετοῦν μικρούς νεοσσούς ἐγκωταλειμμένους, ἀκόμη καὶ ὅταν οὗτοι ἀνήκουν εἰς διάφορον εἶδος.

Οἱ πολιτισμένοι λαοὶ προσπαθοῦν νὰ βελτιώσουν τὴν ζωὴν μὲ βάσιν τὰς βιολογικὰς μεθόδους. ‘Εδημιούργησαν τὴν Εύγονικὴν διὰ νὰ βελτιώσουν τοὺς ἀπογόνους τοῦ ἀνθρώπου. ‘Εστράφησαν πρὸς τὰς παραγωγικὰς ἐπιστήμας καὶ μετέτρεψαν αὐτὰς εἰς ἐφηρμοσμένας βιολογικάς. Εἰς τὴν Σουηδίαν ἐκαλλιεργεῖτο πρὸ ἐτῶν εἰδός τι σίτου μὲ μεγάλην ὀπόδοσιν, τὸ δποίον ὅμως ἥτο εύπαθές εἰς τὰ ὄψιμα ψύχη. Τούναντίον εἰς τὴν Ἀγγλίαν ἐκαλλιεργεῖτο ἔτερον εἰδός σίτου, μικροτέρας μὲν ἀποδόσεως, ἀνθεκτικὸν ὅμως εἰς τὰ ψύχη. ‘Η πειραματικὴ προσπάθεια πολλῶν ἐτῶν κατώρθωσε νὰ συνενώσῃ τὰς ἰδιότητας τοῦ ἐνὸς εἰδούς μὲ τὰς ἰδιότητας τοῦ ἄλλου εἰς μίαν καὶ τὴν αὐτὴν ποικιλίαν σίτου. ‘Η καλλιέργεια τῆς ποικιλίας αὐτῆς

εις τὴν Σουηδίαν ηύξησε τὴν παραγωγὴν τοῦ σίτου κατὰ 48 %. Εἰς τὴν Γερμανίαν ἐπίσης ἐπέτυχον τὴν παραγωγὴν πολλῶν ποικιλιῶν σίτου, αἱ ὁποῖαι ἀντικατέστησαν τὴν σίκαλιν. Παρήγαγον δὲ καὶ ποικιλίαν γεωμήλων, τὰ ὅποια δὲν προσβάλλονται ἀπὸ περονόσπορον ἢ ἄλλας ἀσθενείας. Εἰς τὰ κατοικίδια ζῶα παρήχθησαν ποικιλίαι, αἱ ὁποῖαι δεικνύουν ταχύτητα ἀναπτύξεως, αὔξησιν τῆς ποσότητος τοῦ γάλακτος, τοῦ ἔριου κτλ. Εἰς τὸν ὄρνιθολογικὸν κλάδον ἔχουν ἀναπτυχθῆ ἐδη ὄρνιθων, τὰ ὅποια γεννοῦν 200 ἢ περισσότερα ωρὰ τὸ ἔτος.

Ο διάσημος φυσιοδίφης Ο. Σμάιλ, ἔξαρων τὴν σημασίαν τῆς μελέτης τῆς Φύσεως, προσθέτει : « Ἐκεῖνος ὁ λαὸς μέλλει νὰ ταχθῇ καὶ νὰ βαδίσῃ πρὸ τῶν ἀλλων λαῶν, ὁ ὅποιος μὲ τὴν ὑψίστην ἡθικὴν ἐνέργειαν συνδέει καὶ τὴν βαθυτάτην γνῶσιν τῆς Φύσεως κατὰ τὰς ποικίλας μορφὰς τῆς ἐκδηλώσεως της, ἔχει δὲ τὴν ἰκανότητα, αὐτὴν τὴν γνῶσιν τῆς Φύσεως, νὰ τὴν ἐφαρμόζῃ εἰς τοὺς διαφόρους κλάδους τῆς ἀνθρωπίνης δράσεως ».

Εἰς τὴν Φύσιν, τὸ πλήθος τῶν μορφῶν εἶναι μεγαλύτερον ἀπὸ τὸ πλήθος τῶν ἀναγκῶν τῆς ζωῆς. Διότι ἡ Φύσις ἐργάζεται καὶ ὡς πραγματικὸς καλλιτέχνης, ὁ ὅποιος κάμνει σπατάλην ύλικοῦ, χάριν τῆς καλλιτεχνικῆς του δημιουργίας. Ὡς ἐκ τούτου ἡ μελέτη τῆς Φύσεως ἀναπτύσσει καὶ καλαισθητικὰς ἰκανότητας. Μὲ αὐτὴν παντοῦ βλέπομεν τὸ ὥρατὸν εἰς σχῆμα, εἰς χρῶμα, εἰς κίνησιν. Καὶ ὁ κόσμος ὀλόκληρος μᾶς ἀποκαλύπτεται ὡς ἐν θαυμάσιον ἀρμονικὸν σύνολον, ἔργον ἀπαράμιλλον τῆς θείας Δημιουργίας, ἡ ὅποια « πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησεν ».

Διατί τοῦτο; Μήτι παραπλεύτερον τοῦτο τοῦτο;

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΝ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΝ

(Οι άριθμοι παραπέμπουν εἰς τὰς σελίδας)

- Αγέλη, 54.
- Αγριόχοιρος, 47.
- Αγρομύζα, 53.
- Αγώνι περὶ ὑπάρξεως, 86.
- Αίμορροιοφιλία, 70.
- Αἴτε, 53.
- Αἰσθήματα, 17.
- Αἰσθήσις, 17.
- Αἰσθητήρια ὅργανα, 17.
- Αἰῶνες γεωλογικοί, 75, 76.
- Ακαλήφη, 37.
- Ακριψία, 36.
- Ακανθόχοιρος, 39.
- Αμετάβλητον εἶδων, 74.
- Αμιτωσία, 25.
- Αλμοιβάς, 27, 46, 51, 56, 57.
- Αναβολισμός, 15.
- Αναξίμανδρος, 84.
- Αναπταραγωγή, 16, 56.
- Αναπνοή, 12, 13, 36, 42.
- Ανατομική, 8, 11.
- Ανεμώνη θαλασσία, 54, 60.
- Ανθυκομία, 11.
- Ανθραξ, 44.
- Ανθρωπολογία, 10.
- Ανομοίωσις, 12.
- Ανόργανα σώματα, 5.
- Απέκρισις, 12.
- Αποβλάστησις, 57, 68.
- Αποδημία, 39.
- Αποικίαι, 28.
- Απολιθώματα, 10, 77, 78.
- Αραβόσιτος, 42.
- Αράχνη, 35.
- Αρίγγη, 48, 86.
- Αρκτος, 39, 40.
- Αρχαιοπτέρυξ, 78.
- Ασκαρίς, 46.
- Ασπάλαξ, 35, 82, 87.
- Αστερίας, 60.
- Αστήρ, 26, 27.
- Atavismus, 70
- Ατραχτος, 26.
- Αὔξησις, 15, 16.
- Αύτότροφα, 8.
- Αφάκη, 63.
- Αφετεροίωσις, 12.
- Αφομοίωσις, 15, 36.
- Βάισμαν Α., 71.
- Βακτηρίδια, 34, 36, 45, 52
- Βακτηριολογία, 10.
- Βαλσαμίνη, 49.
- Βαροτροπισμός, 49.
- Βασίλειον, 9.
- Βάτραχος, 46, 68.
- Βεγόνια, 32.
- Βερνάρδος, δ 'Ερημίτης, 53.
- Βιοκοινότης, 52.
- Βιολογία, 9, 10, 72, 74, 89, 91.
- Βλαστητική περίοδος, 18, 37.
- Βλαστητικός πολλαπλασιασμός, 57, 68
- Βλαστογονία, 57, 58.
- Βλεφαριδοφόρον, 28.
- Βοτανική, 10.
- Βραχυδακτυλία, 70.
- Βρύα, 33, 34.
- Γαλῆ, 53.
- Γενεά θυγατρική, 64

- Γένος, 9.
 Γεωγραφική ἐξάπλωσις, 38, 40, 48.
 Γεώμηλον, 21, 32, 36.
 Γεωτροπισμός, 49.
 Γῆρας, 17.
 Γλαῦξ, 51.
 Γονιμοποίησις, 61, 68.
 Γόνοι, 69.
 Γονύλλια, 69.
 Γῦρις, 64, 68.

 Δαλτωνισμός, 70.
 Δαρβινισμός, 85.
 Δειλινόν, 64.
 Δενδροκομία, 11.
 Διαιρέσις, 56, 59.
 Διαιώνισις εἴδους, 16, 56.
 Διάμεψις, 15.
 Διάμετρος κυττάρου, 22.
 Διάτομον, 7.
 Διεγερισμότης, 7, 17.
 Διοξείδιον άνθρακος, 12, 32, 47.
 Δίστομον, 46.
 Διφθερίτις, 44, 45.
 Διωναία, 8, 45.
 Δροσερά, 44, 45.
 Δροσόφιλον, 52, 66, 69, 70.
 Δρυόπτερις, 58.

 'Εγγενής πολλαπλασιασμός, 57, 60.
 'Εγκλείσματα, 23.
 'Εγχυματικά, 8, 28, 60.
 'Εδαφος, 38.
 'Εδριόλυχμος, 47.
 Εἶδος, 9.
 'Εκχρίματα, 23.
 'Ελάτη, 33, 38, 45.
 'Ελέφας, 86.
 'Εμβρυολογία, 79.
 'Εμπεδοκλῆς, 84.
 'Εναλλαγή ψήνες, 15.
 'Εναλλασσομένη μορφή, 65.
 'Ενδειξεις ἔξελιξεως, 75.

 'Ενδιάμεσος μορφή, 65.
 'Ενεργὸς κατάστασις, 18.
 'Εντομολογία, 10.
 'Ενυδρεῖον, 34.
 'Εξέλιξις, 74.
 'Επιλογή, 86.
 'Ερεθιστότης, 7, 17.
 'Ετερότροφα, 8.
 Εύγονική, 72, 91.
 Εύδορινη, 28.
 Εύκαλυπτος, 50.
 Εύφως, 59.
 'Εφήμερον, 19.
 'Εφηρομοσμέναι ἐπιστῆμαι, 10.

 Ζυγωτός, 62.
 Ζωή, 5, 7, 10, 13, 16, 17, 19, 28, 31.
 Ζωολογία, 10.
 Ζωοτεχνία, 11.

 'Ηλιανθος, 33, 38, 50.
 'Ηλιοτροπισμός, 50.
 'Ηράκλειτος, 84.

 Θαλλόφυτον, 28.
 Θάνατος, 15, 16, 18, 19, 20.
 Θερμοπληξία, 36.
 Θερμοτακτισμός, 51.
 Θερμότης, 35.
 Θρέψις, 16, 56.
 Θυγατρικά κύτταρα, 25.

 'Ιδιότητες, 69, 70.
 'Ιξός, 45.
 'Ιππος, 79.
 'Ιχθυολογία, 10.
 'Ιχθυόρνις, 77.
 'Ιχθύς, 80.

 Κάκτος, 36.
 Καμηλοπάρδαλις, 85.
 Καρκίνος, 60.

- Καταβολισμός, 12.
 Κεντρόσφαιρα, 23, 26.
 Κεντροσωμάτιον, 24.
 Κερατόφυλλον, 43.
 Κηπουρική, 11.
 Κήτη, 43.
 Κίνησις, 7, 17.
 Κισσός, 32.
 Κληρονομικότης, 56, 61, 73.
 Κοινότης βιοτική, 52.
 Κολεόπτερον, 23.
 Κοράλλια, 8, 60.
 Κόρις, 51.
 Κοχλίας, 43.
 Κριθή, 13.
 Κρότων, 46.
 Κύαμος, 45.
 Κυβιέ Γ., 74, 85.
 Κύτταρα ἀναπαραγωγικά, 60, 68.
 Κύτταρα γεννητικά, 28, 61, 68, 69.
 Κύτταρα θυγατρικά, 25, 26.
 Κύτταρα σωματικά, 61.
 Κύτταρα τροφικά, 28.
 Κυτταρική κατασκευή, 6.
 Κυτταρική μεμβράνη, 22, 23, 27.
 Κυτταρίνη, 7.
 Κύτταρον, 6, 21.
 Κυτταρόπλασμα, 23.
 Κυτταροτομία, 25.
 Κωνοφόρα, 36.
 Κώνωψ, 46.

 Λαγωός, 39.
 Λαμάρκ Ι., 74, 84.
 Λαμαρκισμός, 84.
 Λατάνα, 53.
 Λειτουργίαι ζωῆς, 16.
 Λειχήνες, 41.
 Λευκώματα, 6.
 Λέων, 40.
 Λινίνη, 24, 26.
 Λινναῖος Κ., 74.
 Λίπος, 15, 25.

 Λυκοπέρδων, 86.
 Μαστιγοφόρον, 28.
 Μελάγχρωμα, 35.
 Μελάμπυρον, 44, 45.
 Μέλισσα, 62.
 Μελισσοκομία, 11.
 Μεμβράνη πυρηνική, 24.
 Μένδελ, 63.
 Μεσογονάτιον, 32.
 Μεταβολισμός, 15.
 Μεταλλακτισμός, 88.
 Μεταλλάξεις, 88.
 Μεταμορφισμός, 74.
 Μεταμόσχευσις, 29.
 Μηνοειδής πυρχή, 82.
 Μητρικὸν κύτταρον, 25, 26.
 Μητρικὸν φυτόν, 68.
 Μικρόκοκκος, 44.
 Μικροσκελίς, 83.
 Μιμόζα, 8, 51.
 Mirabilis Jalapa, 64.
 Μίτωσις, 26.
 Μονοκύτταροι δργανισμοί, 27, 56.
 Μονοπύρηνα κύτταρα, 24.
 Μορφολογία, 8.
 Μυϊκαλ ίνες, 22.
 Μύκητες, 34, 60.
 Μυζομύκητες, 51.
 Μυρμηκοφάγος, 85.
 Μυριάποδα, 35.
 Μυριόφυλλον, 43.
 Mutations, 88.
 Μωσαΐκή μορφή, 65.

 Νάρκη, 18.
 Νεκροβίωσις, 19.
 Νεκροὶ δργανισμοί, 6.
 Νεκροφάνεια, 18.
 Νεολαμαρκισμός, 85.
 Νευρικὸν σύστημα, 17.
 Νεύσεις, 51.
 Νηπενθές, 45.

- Νόμος αυτοτελείας, 67.
 Νόμος διαζέύξεως ή διασπάσεως, 67.
 Νόμος έπικρατήσεως, 67.
 Νόμος κληρονομικότητος, 67.
 Νόμος διμοιουροφίας, 67.
 Ντάρβιν Ε., 74.
 Ντάρβιν Κ., 85, 91.
 Ντέ Βριτ Ούγ., 88, 90.
 Νυκτερίς, 39, 51, 81.
 Νυκτόβια ζώα, 51.

 Ξενιστής, 44.
 Ξηρόφυτα, 40.

 Οικογένεια, 9, 54.
 Οικολογία, 9, 35, 83.
 Οινόθηρο, 88.
 Ομοιόθερμα, 39.
 Ομόλογη όργανα, 82.
 Ομοταξία, 9.
 Οντα ἔμβια ή ἐνζωα, 5.
 Οντολογία, 81.
 Οξύα, 33, 38, 88.
 Οξυγόνον, 12, 13, 14, 42, 45.
 Οργανα, 5, 7.
 Οργανικά, 5.
 Οργανισμός, 5.
 Ορνις, 15, 80.
 Οροβόληγχη, 44.
 Οστρεον, 8, 86.
 Οφις, 85.

 Παγοπληξία, 36.
 Παλαιοντολογία, 8, 75.
 Παλινδρόμησις όργάνων, 82.
 Παμφάγα ζώα, 46, 47.
 Παραβίωσις, 53.
 Παραλλαγή χρωματική, 35.
 Παράπτωτα, 8, 34, 44, 46.
 Παρασιτολογία, 10.
 Παρθενογονία, 62.
 Πειραμα, 11.
 Περιβάλλον, 31, 36, 39.

 Περιστερά, 83.
 Πεύκη, 33, 38, 41.
 Πήρωσις όργάνων, 82.
 Πίεσις, 48.
 Πίθηκος, 40, 82, 83.
 Πικροδάφνη, 41.
 Πίσον, 16, 63.
 Πλασμώδιον, 46.
 Planaria, 60.
 Πλάτανος, 41.
 Ποικιλόθερμα ζώα, 39.
 Πολλαπλασιασμός κυττάρου, 25.
 Πολλαπλασιασμός όργανησμάν, 56.
 Πολυδακτυλία, 70.
 Πολυκύτταροι όργανησμοί, 18, 29, 57.
 Πολυμορφία ήργαν. όντων, 74.
 Πολύπους, 50.
 Πολυπύρηνα κύτταρα, 24.
 Ποντικός, 53.
 Πρέμουλα, 38.
 Πρόβατον, 83.
 Προγονισμός, 70.
 Προπατορισμός, 70.
 Προσαρμογή, 86.
 Πρωτεύς, 34.
 Πρώτιστα, 29.
 Πρωτόζωα, 18, 28, 29, 34.
 Πρωτόπλασμα, 22, 23, 24, 26, 27, 36.
 Πρωτόφυτα, 28.
 Πτέρις, 33, 59.
 Πτέρωμα, 34, 39.
 Πτήλωμα, 34.
 Πυρήν, 22, 24, 26.
 Πυρηνίσκος, 23.
 Πυρηνοστομία, 25.

 Ριζοβακτηρίδια, 51.
 Ριζόποδα, 29.
 Ρινόκερως, 40.

 Σαίντ - Ίλαϊρ Ε., 74.
 Σαλαμάνδρα, 71.
 Σαπρόφυτα, 45.

- Σαρδίνη, 48.
 Σαύρα, 60.
 Σαρκοφάγα ζῷα, 45, 46.
 Σαρκεφάγα φυτά, 45, 46.
 Σηροτροφία, 11.
 Σής, 52.
 Σιτία, 14.
 Σῖτος, 33, 92.
 Σκιατραφῆ, 33.
 Σκίουρος, 39.
 Σκότος, 32, 34.
 Σκώληξ, 42, 46.
 Σμάιλ "Ο., 92.
 Σπείραμα, 26.
 Σπέρμα, 16, 32, 36, 53, 61.
 Σπήλαια, 35.
 Σπόγγος, 8.
 Σπόρια, 36.
 Σποριογονία, 57.
 Σπορόζωα, 26.
 Σταγονόρροια, 41.
 Σταθερότης εἰδῶν, 74.
 Σταφυλόκοκκος, 44.
 Στέντωρ, 59.
 Στῖφος, 54.
 Στοιχεῖα δευτερεύοντα, 69.
 Στοιχεῖα πρωτεύοντα, 69.
 Στρεπτόκοκκος, 44.
 Στρουθοκάμηλος, 40.
 Συγκριτική Ἀνατομική, 81.
 Σύζευξις, 19.
 Συκῆ, 41.
 Συμβίωσις, 54.
 Συναισθήματα, 17.
 Συνδακτυλία, 70.
 Συνθῆκαι ζωῆς, 31.
 Συνομοταξία, 9.
 Συστηματική, 8, 9, 84.
 Σχιζογονία, 57, 59.

 Ταινία, 46.
 Τακτισμοί, 48.
 Τάξις, 9.
- Τάξις ανδος, 40.
 Τεχνητή έπιλογή, 86.
 Τορπίλη, 87.
 Τριλογία, 75.
 Τριφύλλιαν, 51.
 Τρίχωμα, 40, 41.
 Τροπισμοί, 48.
 Τροπόφυτα, 41.
 Τροφεύς, 44.
 Τροφή, 14, 43.
 Τυραννόσαυρος, 77.
 Τῦφος, 44, 45.

 Τγρασία, 40.
 Τγρόφυτα, 41.
 Τδρα, 54, 57, 58.
 Τδρόβια ζῷα, 42, 43.
 Τδρόβια φυτά, 42.
 Τδροτροπισμός, 50.
 Τγεριώδεις ἀκτῖνες, 34.
- Φακίραι, 18.
 Φάλαινα, 82.
 Φασιανός, 53.
 Φασίολος, 49.
 Φελλός, 21.
 Φιλόφωτα, 33.
 Φούξια, 32.
 Φύκη, 35, 51, 54, 60.
 Φυλλοβολία, 32.
 Φυλλοξήρα, 46, 47.
 Φυλογονία, 81.
 Φυματίσιας, 44, 45.
 Φυσική έπιλογή, 86.
 Φυσιολογία, 8, 9.
 Φυτολογία, 10.
 Φυτοφάγα, 46.
 Φυτόφθειρ, 46.
 Φῶς, 14, 24, 32, 33.
 Φωτοτροπισμός, 50.
 Φωτοτροπισμός, 50.

 Χαρακτήρες έπικτητοι, 70.

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Χαρακτήρες αληρονομικοί, 70. | Χρωματοφόρα, 23, 24, 69. |
| Χαρακτήρες συγγενεῖς ή σύμφυτοι, 70. | Χυμοτόπια, 23, 25. |
| Χειμερία διάπαυλα, 37. | Χυτίνη, 23. |
| Χειμερία νάρκη, 39. | |
| Χειμέριος θύπνος, 39. | Ψευδομονάς, 44. |
| Χημειοτακτισμός, 52. | Ψιτακός, 34, 83. |
| Χημειοτροπισμός, 50. | Ψύλλος, 46. |
| Χημική ένέργεια, 12. | Ψυχανθή, 54. |
| Χλαμυδομονάς, 29. | Ψυχή ή Κάλλιψος, 35. |
| Χλωροφύλλη, 8, 24, 32, 50. | Ψυχικαὶ ἐκδηλώσεις, 17. |
| Χοῖρος, 35, 47. | Ψώρα, 46. |
| Χολέρα, 36, 44. | |
| Χοῦκε P., 21. | |
| Χρώματα, 25, 37. | Ωόν, 15, 28, 42, 62 |
| Χρωματίνη, 23, 24, 26. | Ωόσφαιρα, 61, 72. |
| Χρωματοσωμάτια, 26, 27, 68, 69. | Ωριμότης, 17. |

Εικονογράφησις : OP. ΚΑΝΕΛΛΗ – Έξωφυλλο : ΕΛΕΝΗΣ Δ. ΖΗΚΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

	Σελίς
ΕΙΣΑΓΩΓΗ	5
'Οργανικά, άνδργανα και νεκρά φυσικά σώματα	5
Διακριτικά γνωρίσματα τῶν δργανικῶν και τῶν ἀνοργάνων σωμάτων	6
Διαφοραὶ μεταξὺ φυτῶν και ζώων	7
Τρόπος ἔξετάσεως τῶν δργανισμῶν	8
Βιολογία και βιολογικαὶ ἐπιστῆμαι	9
Περίληψις	11
Ἐρωτήσεις	11
ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ	12
Ζωὴ και λειτουργίαι αὐτῆς	12
Σπάδια και καταστάσεις τῆς ζωῆς	12
Θάνατος τῶν δργανισμῶν	18
Περίληψις	20
Ἐρωτήσεις	20
ΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟΝ, Ο ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΛΙΘΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ	21
Ἐννοια τοῦ κυττάρου	21
Τὰ μέρη τοῦ κυττάρου	22
Πολλαπλασιασμὸς τοῦ κυττάρου	25
Τὸ κύτταρον στοιχειώδης μονὰς τῆς ζωῆς	27
Περίληψις	29
Ἐρωτήσεις	30
ΣΥΝΘΗΚΑΙ ΕΞ ΩΝ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ Η ΖΩΗ	31
Ἐσωτερικαὶ και ἔξωτερικαὶ συνθῆκαι	31
Τὸ φῶς	32
Ἡ θερμότης	35
Ἡ ύγρασία	40
Ἡ τροφὴ	43
Ἡ πίεσις	48
Κινήσεις ὁφειλόμεναι εἰς ἐρεθισμοὺς ἐκ τοῦ περιβάλλοντος	48
Ἐνότης διαβιώσεως τῶν δργανισμῶν	52
Περίληψις	54
Ἐρωτήσεις	54
ΓΕΝΕΣΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΣ	56
Γένεσις τῶν δργανισμῶν	56

Πολλαπλασιασμὸς ἀνευ γενῶν	57
Πολλαπλασιασμὸς διὰ γενῶν	60
Κληρονομικότης	63
Οἱ νόμοι τοῦ Μένδελ.	63
Ἐξήγησις τοῦ μηχανισμοῦ τῆς κληρονομικότητος	67
Ποῖοι χαρακτῆρες κληρονομοῦνται	70
Εὐγονικὴ	72
Περίληψις	72
Ἐρωτήσεις	73
Η ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ	74
Ἡ πολυμορφία τῶν δργανικῶν ὅντων	74
Ἡ ἐνοια τῆς ἔξελιξεως καὶ αἱ ὑπὲρ αὐτῆς ἐνδείξεις	74
Πῶς ἔγινεν ἡ ἔξελιξις τῶν δργανισμῶν. Αἱ διάφοροι θεωρίαι.	84
Περίληψις	89
Ἐρωτήσεις	90
ΕΠΙΔΟΓΟΣ	91
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΝ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΝ	93
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ	99

ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΙ^ν, 1974 (IV) — ANTIT. 116.000 — ΣΥΜΒΑΣΙΣ: 2407/18-3-74
ΕΚΤΥΠΩΣΙΣ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ : Μ. ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ - A. E.



024000030039



Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής