


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

.Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ



Β. ΣΤΑΪΚΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ 1979

1965L

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Με απόφαση τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως τὰ διδακτικά βιβλία τοῦ Δημοτικοῦ, Γυμνασίου καὶ Λυκείου τυπώνονται ἀπὸ τὸν Ὄργανισμό Ἐκδόσεως Διδακτικῶν Βιβλίων καὶ μοιράζονται ΔΩΡΕΑΝ.

Ψηφιοποιήθηκε ἀπὸ τὸ Ἰνστιτούτο Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΥΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΪΚΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΑΘΗΝΑ 1979

*Τό βιβλίο μεταγλωττίστηκε από τό συγγραφέα σέ συνεργασία
μέ τούς Γ. Καρακόστα βοηθό τῆς Φυσικομαθηματικῆς Σχολῆς
τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων καί Β. Θεοδορακόπουλο Εἰση-
γητή τοῦ ΚΕΜΕ.*

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΟΛΑ

1. ΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ

1.1 Σύμβολα. Κάθε λέξη πού μεταχειριζόμαστε είναι τό *σύμβολο* μιᾶς έννοιᾶς. Τίς διάφορες μαθηματικές έννοιες τίς παριστάνουμε ὄχι μόνο μέ *λέξεις* ἀλλά καί μέ ἄλλα *σύμβολα* π.χ. μέ ἀπλά γράμματα ἢ μέ διάφορα γράφικά σήματα ἢ καί μέ συνδυασμούς τους. Π.χ. «ἡ εὐθεΐα AB», «ὁ ἀριθμός 5», « \vec{AB} », « $\alpha x + \beta = 0$ », « $\sqrt{\alpha}$ ».

1.2 Ἰσότητα. Δυό σύμβολα x καί y μποροῦν νά παριστάνουν τήν ἴδια έννοια ἢ καί έννοιες, πού θεωροῦνται ἀπό μιᾶ ὀρισμένη σκοπιά ταυτόσημες. Στήν περίπτωσι αὐτή γράφουμε $x = y$, χρησιμοποιώντας τό σύμβολο $=$ τῆς *ισότητας*. Ἡ ἄρνησι τού $x = y$ παριστάνεται μέ $x \neq y$ (τό σύμβολο \neq διαβάζεται «διάφορο τού»). Λ.χ.

$$5 = 5, \quad 5 = 2 + 3, \quad \eta\mu \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}, \quad \frac{2}{3} = \frac{20}{30}, \quad 3 \neq 4.$$

1.3 Σύνολα - Στοιχεΐα. Σέ μερικές περιπτώσεις μιᾶ έννοια μπορεΐ νά θεωρεΐται ὡς *σύνολο* ὀρισμένων καί διακεκριμένων ἄλλων έννοιῶν, τῶν *στοιχείων* του. Π.χ. μιᾶ εὐθεΐα μπορεΐ νά θεωρεΐται ὡς σύνολο τῶν σημείων τῆς, μιᾶ τάξι ὡς σύνολο τῶν μαθητῶν τῆς κ.ο.κ. Ἀλλά καί ἕνα σύνολο μπορεΐ νά εΐναι στοιχεΐο ἐνός ἄλλου συνόλου. Π.χ. μιᾶ εὐθεΐα μπορεΐ νά εΐναι στοιχεΐο μιᾶς πρισματικῆς ἐπιφάνειας, μιᾶ τάξι στοιχεΐο κάποιου σχολείου πού θεωρεΐται ὡς σύνολο τάξεων κτλ. Ἀξιοσημείωτα σύνολα ἀριθμῶν, μέ τά ὁποΐα ἔχουμε ἤδη ἀσχοληθεΐ, εΐναι τά σύνολα:

N	τῶν φυσικῶν ἀριθμῶν
N_0	τῶν ἀκεραίων τῆς ἀριθμητικῆς
Z	τῶν ἀκεραίων ἀριθμῶν (σχετικῶν ἀκεραίων)
Q	τῶν ρητῶν ἀριθμῶν
R	τῶν πραγματικῶν ἀριθμῶν
R^+	τῶν θετικῶν πραγματικῶν ἀριθμῶν
R_0^+	τῶν μή ἀρνητικῶν πραγματικῶν ἀριθμῶν
C	τῶν μιγαδικῶν ἀριθμῶν.

Τήν έκφραση «τό x είναι στοιχείο του E » γράφουμε $x \in E$ (ή $E \ni x$ και διαβάζουμε «άπό τό σύνολο E τό στοιχείο x ») χρησιμοποιώντας τό σύμβολο \in . Τήν άρνηση αὐτῆς θά συμβολίζουμε μέ $x \notin E$ (ή: $E \not\ni x$) καί γενικά τήν άρνηση τῆς έννοιας πού παριστάνει ένα σύμβολο θά τή σημειώνουμε διαγράφοντας τό σύμβολο αὐτό μέ μιά γραμμή.

Παρατήρηση. Ἐντί τοῦ ὅρου στοιχείο χρησιμοποιεῖται καί ὁ ὅρος σημεῖο πού εἶναι μάλιστα καί πιό κατάλληλος στήν περίπτωση τοῦ συνόλου R τῶν πραγματικῶν ἀριθμῶν καί τοῦ συνόλου C τῶν μιγαδικῶν ἀριθμῶν, ὅπου, ὅπως ξέρομε, τά στοιχεῖα τους παριστάνονται μέ τά σημεῖα μῖας εὐθείας ἢ ενός ἐπιπέδου ἀντίστοιχα.

1.4 Προτασιακός τύπος - Συνθήκη. Στά μαθηματικά χρησιμοποιοῦνται συχνά έκφράσεις ὅπως:

- « x εἶναι ἀκέραιος»
- « x εἶναι ἰσοσκελές τρίγωνο»
- « x διαιρεῖ τόν ἀριθμό 10»
- « $x \in E$ »,

οἱ ὁποῖες καί ἀποδίδουν ὀρισμένες ἰδιότητες στό x .

Μία έκφραση πού περιέχει ένα σύμβολο x , σάν τίς παραπάνω, χαρακτηρίζεται, ὅπως εἶναι γνωστό ἀπ' τά μαθήματα τῶν προηγουμένων τάξεων, μέ τόν ὅρο *προτασιακός τύπος* (άνοικτή πρόταση, ἢ συνθήκη) πού περιέχει ένα σύμβολο x . Ἐν σέ έναν προτασιακό τύπο $P(x)$ πού περιέχει ένα σύμβολο x , ἀντικαταστήσουμε τό σύμβολο x μέ ένα συγκεκριμένο στοιχείο α , ἢ ἄν, ὅπως λέμε, τό x λάβει ὡς τιμή τό α , τότε, ἀπ' τόν ὀρισμό, ὁ προτασιακός τύπος γίνεται πρόταση τήν ὁποία συμβολίζουμε μέ $P(\alpha)$. Π.χ.

- $P(x)$: Ὁ x εἶναι φυσικός ἀριθμός
- $P(2)$: Ὁ 2 εἶναι φυσικός ἀριθμός (ἀληθής)
- $P\left(\frac{3}{4}\right)$: Ὁ $\frac{3}{4}$ εἶναι φυσικός ἀριθμός (ψευδής).

Συνήθως σέ ένα προτασιακό τύπο $P(x)$ ὑποθέτουμε ὅτι τό x παίρνει ὡς τιμές τά στοιχεῖα ενός συγκεκριμένου συνόλου E , δηλαδή, ὅπως λέμε, τό x διατρέχει τό E . Τότε τό x ὀνομάζεται *μεταβλητή* καί ὁ $P(x)$ *προτασιακός τύπος* (άνοικτή πρόταση ἢ συνθήκη) στό E . Ἐτσι ἡ ἐξίσωση

$$x^2 - x + 2 = 0$$

πού εἶναι ένας προτασιακός τύπος, γράφεται μέ τήν προϋπόθεση ὅτι τό x εἶναι ἀριθμός. Εἶναι λοιπόν ἡ ἐξίσωση αὐτή μιά συνθήκη σέ ένα σύνολο ἀριθμῶν π.χ. τό R ἢ τό C .

Ἐν $P(x)$ εἶναι μιά συνθήκη στό E , τότε θά λέμε ὅτι *ένα στοιχείο α τοῦ E ἰκανοποιεῖ τή συνθήκη αὐτή*, ἢ *ἡ συνθήκη $P(x)$ ἰσχύει στό α* , τότε καί μόνο τότε, ἄν ἡ πρόταση $P(\alpha)$ εἶναι ἀληθής. Οἱ έκφράσεις:

«γιά κάθε $x \in E$ ἰσχύει $P(x)$ »

καί

«Υπάρχει $x \in E$ τέτοιο ώστε ή $P(x)$ νά ισχύει»
γράφονται αντίστοιχα:

$(\forall x \in E) P(x)$ ή $P(x) \forall x \in E$
καί

$$(\exists x \in E) P(x),$$

όπου τά σύμβολα \forall καί \exists διαβάζονται αντίστοιχα «γιά κάθε» καί «υπάρχει» καί ονομάζονται αντίστοιχα *καθολικός* καί *υπαρξιακός ποσοδείκτης*. Πολλές φορές στίς παραπάνω έκφράσεις τό σύνολο E παραλείπεται καί τότε γράφουμε αντίστοιχα

$$(\forall x) P(x) \text{ ή } P(x) \forall x$$

καί

$$(\exists x) P(x).$$

Επίσης, αν κάθε στοιχείο του E ικανοποιεί τή συνθήκη $P(x)$, δηλαδή, αν ισχύει $(\forall x \in E) P(x)$, τότε ή συνθήκη $P(x)$ ονομάζεται *ταυτότητα* στό E .
*Ετσι

«Ο x είναι φυσικός αριθμός» είναι ταυτότητα στό N .

« $(x + 1)^2 = x^2 + 2x + 1$ » είναι ταυτότητα σε κάθε σύνολο αριθμών

« $x^2 + 1 \geq 1$ » είναι ταυτότητα στό R .

*Αν $P(x)$ καί $Q(x)$ είναι συνθήκες στό σύνολο E , θά γράφουμε

$$P(x) \Rightarrow Q(x) \text{ γιά κάθε } x \in E$$

καί θά διαβάζουμε « $P(x)$ συνεπάγεται $Q(x)$ » ή «αν $P(x)$, τότε ισχύει $Q(x)$ », τότε καί μόνο τότε, αν κάθε στοιχείο του E , πού ικανοποιεί τήν $P(x)$, ικανοποιεί καί τήν $Q(x)$.

Οί συνθήκες $P(x)$ καί $Q(x)$ ονομάζονται *ισοδύναμες*, τότε καί μόνο τότε, αν ή μίς συνεπάγεται τήν άλλη. Θά γράφουμε τότε

$$P(x) \Leftrightarrow Q(x) \text{ γιά κάθε } x \in E$$

καί θά διαβάζουμε «ισχύει $P(x)$ τότε καί μόνο τότε, αν ή $Q(x)$ ισχύει».

*Αν θέλουμε νά δηλώσουμε ότι μιά ισοδυναμία υπάρχει έξ όρισμού, χρησιμοποιούμε τό σύμβολο $\Leftrightarrow_{\text{ορισ}}$. *Ετσι γιά τίς δυό συνθήκες $P(x)$ καί $Q(x)$ πού είναι ισοδύναμες έξ όρισμού γράφουμε:

$$P(x) \Leftrightarrow_{\text{ορισ}} Q(x) \text{ γιά κάθε } x \in E.$$

1.5 *Αλγεβρα συνόλων. Κατά τήν έπεξεργασία ενός μαθηματικού θέματος, γενικά, υπεισέρχονται άποκλειστικά τά στοιχεία ενός συνόλου Ω , τό όποιο ονομάζεται *βασικό σύνολο*. Π.χ. σε διάφορα προβλήματα τής άλγεβρας θεωρήσαμε ως βασικό σύνολο τό σύνολο R τών πραγματικών αριθμών, ενώ στήν έπεξεργασία όρισμένων γεωμετρικών προβλημάτων ως βασικό σύνολο Ω θεωρήσαμε τό σύνολο όλων τών επιπέδων σχημάτων.

*Εστω ότι A καί B είναι δυό σύνολα μέ στοιχεία άπ' τό βασικό σύνολο Ω . *Όπως είναι γνωστό, λέμε ότι τό σύνολο A είναι *υποσύνολο* του B καί συμ-

βολίζουμε τούτο μέ $A \subseteq B$, τότε καί μόνο τότε, άν ή συνθήκη $x \in A$ συνεπάγεται τήν $x \in B$. Για συντομία:

$$A \subseteq B \stackrel{\text{ορσ}}{\iff} (x \in A \Rightarrow x \in B \text{ για κάθε } x \in \Omega).$$

Επίσης ή *ισότητα* δυό συνόλων καί ή έννοια του *γνήσιου υποσυνόλου* (πού συμβολίζεται μέ \subset), όπως ξέρουμε, όρίζονται:

$$A = B \stackrel{\text{ορσ}}{\iff} A \subseteq B \text{ καί } B \subseteq A$$

$$A \subset B \stackrel{\text{ορσ}}{\iff} A \subseteq B \text{ καί } A \neq B.$$

Μιά συνθήκη $P(x)$ στό βασικό σύνολο Ω όρίζει τό σύνολο S όλων τών στοιχείων του Ω , πού τήν ίκανοποιούν. Αυτό παριστάνεται μέ $\{x \in \Omega : P(x)\}$, δηλαδή $S = \{x \in \Omega : P(x)\}$. Π.χ. άν $\Omega = \mathbb{R}$, ή συνθήκη $x^2 - 1 = 0$ όρίζει τό σύνολο $S = \{x \in \mathbb{R} : x^2 - 1 = 0\} = \{-1, 1\}$. Άλλα άξιοσημείωτα υποσύνολα του \mathbb{R} πού όρίζονται άπό συνθήκες είναι τά άκόλουθα, γνωστά ως διαστήματα του \mathbb{R} :

1. Άνοικτό διάστημα μέ άκρα α, β ($\alpha < \beta$):
 $(\alpha, \beta) = \{x \in \mathbb{R} : \alpha < x < \beta\}$
2. Κλειστό διάστημα μέ άκρα α, β ($\alpha < \beta$):
 $[\alpha, \beta] = \{x \in \mathbb{R} : \alpha \leq x \leq \beta\}$
3. Άνοικτό άριστερά, κλειστό δεξιά διάστημα μέ άκρα α, β ($\alpha < \beta$):
 $(\alpha, \beta] = \{x \in \mathbb{R} : \alpha < x \leq \beta\}$
4. Κλειστό άριστερά, άνοικτό δεξιά διάστημα μέ άκρα α, β ($\alpha < \beta$):
 $[\alpha, \beta) = \{x \in \mathbb{R} : \alpha \leq x < \beta\}$
5. Άπέραντο άριστερά, άνοικτό δεξιά διάστημα μέ άκρο β :
 $(-\infty, \beta) = \{x \in \mathbb{R} : x < \beta\}$
6. Άπέραντο άριστερά, κλειστό δεξιά διάστημα μέ άκρο β :
 $(-\infty, \beta] = \{x \in \mathbb{R} : x \leq \beta\}$
7. Άπέραντο δεξιά, άνοικτό άριστερά διάστημα μέ άκρο α :
 $(\alpha, +\infty) = \{x \in \mathbb{R} : \alpha < x\}$
8. Άπέραντο δεξιά, κλειστό άριστερά διάστημα μέ άκρο α :
 $[\alpha, +\infty) = \{x \in \mathbb{R} : \alpha \leq x\}$.

Επίσης παρατηρούμε ότι καί κάθε υποσύνολο S ενός βασικού συνόλου Ω μπορεί νά παρασταθεί, όπως παραπάνω, μέ μία συνθήκη, τή συνθήκη $x \in S$. Έτσι έχουμε $S = \{x \in \Omega : x \in S\}$.


Τό σύνολο όλων τών υποσυνόλων ενός βασικού συνόλου Ω συμβολίζεται μέ $\mathcal{P}(\Omega)$. Πάνω σ' αυτό όρίζονται, όπως γνωρίζουμε, σί πράξεις $\cup, \cap, -$ άπό τούς τύπους:

$$A \cup B = \{x \in \Omega : x \in A \text{ ή } x \in B\}$$


$$A \cap B = \{x \in \Omega : x \in A \text{ καί } x \in B\}$$

$$A - B = \{x \in \Omega : x \in A \text{ καί } x \notin B\}.$$


Μιά έποπτική έρμηνεία αυτών τών πράξεων μς δίνουν τά παρακάτω σχήματα:



Σχ. 1 $A \cup B$



Σχ. 2 $A \cap B$



Σχ. 3 $A - B$

Τό κενό σύνολο \emptyset είναι, όπως ξέρουμε, ή διαφορά $A - A$, όπου A είναι οποιοδήποτε υποσύνολο του Ω . Επίσης τό συμπλήρωμα A^c ενός συνόλου A , υποσυνόλου του βασικού συνόλου Ω , όπως ξέρουμε, όρίζεται, νά είναι ή διαφορά $\Omega - A$, δηλαδή

$$A^c = \Omega - A = \{x \in \Omega : x \notin A\}.$$

Μεταξύ τών πράξεων \cup , \cap , $-$ άλλθεύουν οί παρακάτω τύποι (ταυτότητες στο $\mathcal{P}(\Omega)$), πού μᾶς είναι γνωστοί άπ' τά μαθήματα τών προηγούμενων τάξεων:

$A \cup B = B \cup A$ $A \cup (B \cap \Gamma) = (A \cup B) \cap \Gamma$ $A \cup \emptyset = A$ $A \cup (A \cap B) = A$ $(A - B) \cup B = A \cup B$		$A \cap B = B \cap A$ $A \cap (B \cap \Gamma) = (A \cap B) \cap \Gamma$ $A \cap \Omega = A$ $A \cap (A \cup B) = A$ $(A - B) \cap B = \emptyset$
$A \cap (B \cup \Gamma) = (A \cap B) \cup (A \cap \Gamma).$		

1.6 Ζεύγος - Καρτεσιανό γινόμενο. Ένα στοιχείο α πού χαρακτηρίζεται ώς *πρώτο* και ένα στοιχείο β πού χαρακτηρίζεται ώς *δεύτερο* σχηματίζουν ένα νέο στοιχείο, τό όποιο γράφεται (α, β) και όνομάζεται (διατεταγμένο) ζεύγος. Τά στοιχεία α και β του ζεύγους όνομάζονται *πρώτη* και *δεύτερη*, αντίστοιχα *προβολή* του ζεύγους. Άν οί προβολές του ζεύγους είναι άριθμοί, όνομάζονται και συντεταγμένες του ζεύγους.

Άπ' τόν παραπάνω όρισμό του ζεύγους συμπεραίνουμε ότι δυό ζεύγη είναι *ίσα*, όταν όχι μόνο σχηματίζονται άπό τά ίδια στοιχεία, αλλά και όταν τά στοιχεία αυτά παρουσιάζονται μέ τήν ίδια διαδοχή, δηλαδή

$$(\alpha, \beta) = (\gamma, \delta) \Leftrightarrow \alpha = \gamma \text{ και } \beta = \delta.$$

Μέ όμοιο τρόπο όρίζεται και μία (διατεταγμένη) τριάδα $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ ή μία (διατεταγμένη) νιάδα $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$.

Παραδείγματα:

1. Ένα κλάσμα μέ άριθμητή α και παρονομαστή β μπορεί νά παρασταθεί ώς ζεύγος (α, β) .
2. Ένας μιγαδικός άριθμός $\alpha + \beta i$ μπορεί νά παρασταθεί ώς ζεύγος (α, β) .
3. Ένας άγώνας μεταξύ δύο όμάδων α και β μπορεί νά παρασταθεί ώς ζεύγος (α, β) ή (β, α) έφόσον διεξάγεται στήν έδρα τής α ή τής β όμάδας, αντίστοιχα.

Έστω A και B δυό σύνολα. Τό σύνολο τών ζευγών (α, β) μέ $\alpha \in A$ και $\beta \in B$

γράφεται $A \times B$ και ονομάζεται *καρτεσιανό γινόμενο* του A επί του B . Δηλαδή :

$$A \times B = \{(x,y) : x \in A \text{ και } y \in B\}.$$

Παρόμοια ορίζεται τό γινόμενο $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$ νά είναι τό σύνολο τών νιάδων $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ μέ $\alpha_k \in A_k$, γιά κάθε $k \in \{1, 2, \dots, n\}$ (ή, όπως και άλλιώς λέμε: γιά κάθε $k = 1, 2, \dots, n$). "Αν ένα τουλάχιστο από τά A_1, A_2, \dots, A_n είναι τό κενό σύνολο, τότε προκύπτει εύκολα ότι και τό καρτεσιανό γινόμενο $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$ είναι πάλι τό κενό σύνολο.

Γιά συντομία, τό $A \times A$ συμβολίζεται μέ A^2 , τό $A \times A \times A$ μέ A^3 κ.ο.κ.

Τό σύνολο Δ τών ζευγών (α, α) μέ $\alpha \in A$ ονομάζεται *διαγώνιος του* A^2 και είναι φανερό ότι $\Delta \subseteq A^2$.

Παραδείγματα ▶

1. $A = \{\alpha, \beta, \gamma\}$, $B = \{1, 2\}$

$$A \times B = \{(\alpha, 1), (\alpha, 2), (\beta, 1), (\beta, 2), (\gamma, 1), (\gamma, 2)\}$$

$$B \times A = \{(1, \alpha), (1, \beta), (1, \gamma), (2, \alpha), (2, \beta), (2, \gamma)\} \neq A \times B.$$

2. "Αν A είναι τό σύνολο τών ποδοσφαιρικών ομάδων πού παίρνουν μέρος σ' ένα πρωτάθλημα, τότε, τό σύνολο τών αγώνων του πρωταθλήματος είναι $A^2 - \Delta$, εφόσον σέ κάθε αγώνα συμμετέχουν διαφορετικές ομάδες και τό πρωτάθλημα γίνεται σέ δυό γύρους.

Παρατήρηση. Μιά έκφραση πού περιέχει δυό σύμβολα x και y μπορεί νά θεωρηθεί ότι περιέχει ένα σύμβολο, δηλαδή τό ζεύγος (x,y) . Π.χ. οι εκφράσεις:

« Τό κλάσμα $\frac{x}{y}$ είναι ανάγωγο »

« Ό x διαιρεί τόν y »

« $x^2 + 2y^2 = 2$ »

ονομάζονται *προτασιακοί τύποι* (άνοικτές προτάσεις ή συνθήκες) πού περιέχουν δυό σύμβολα x και y και συμβολίζονται μέ $P(x,y)$, $Q(x,y)$ κ.λ.π. Τέτοιοι προτασιακοί τύποι μπορούν νά θεωρηθούν ως προτασιακοί τύποι πού περιέχουν ένα σύμβολο, τό ζεύγος (x,y) .

*Ετσι, έκφράσεις σάν τίς

$$(\forall x, y) P(x, y) \text{ και } (\exists x, y) P(x, y)$$

έχουν αντίστοιχα τήν ίδια έννοια μέ τίς

$$(\forall (x, y)) P(x, y) \text{ και } (\exists (x, y)) P(x, y).$$

*Ανάλογα ορίζονται και προτασιακοί τύποι πού περιέχουν τρία ή και περισσότερα (πεπερασμένου πλήθους) σύμβολα.

2. ΣΧΕΣΕΙΣ (ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ) - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

2.1 Σχέση. Δυό στοιχεΐα πού ανήκουν στό ίδιο ή σέ διαφορετικά σύνολα μπορεί νά συνδέονται λογικά, δηλαδή νά συσχετίζονται. Π.χ. όταν λέμε «τό τρίγωνο $AB\Gamma$ έχει έμβαδόν 100 m^2 » συσχετίζουμε *ένα τρίγωνο μέ έναν αριθμό*, ή όταν λέμε «ο αριθμός 25 είναι τό τετράγωνο του αριθμού 5» συσχετίζουμε *δυό αριθμούς* κτλ. Παρακάτω ξεετάζουμε τέτοιες συσχετίσεις στοιχείων δυό συνόλων, τά όποια (σύνολα) δέν είναι απαραίτητο νά είναι διαφορετικά.


"Εστω A και B δυό μή κενά σύνολα και ένας συγκεκριμένος τρόπος (π.χ. ένας κανόνας ή μία διαδικασία) μέ τόν όποιο μπορεί τουλάχιστον ένα $x \in A$ νά

συσχετίζεται με ένα ή περισσότερα $y \in B$. Θά λέμε τότε ότι ορίζεται μία *σχέση* (*άντιστοιχία*) σ από τό A στό B και θά σημειώνουμε

xy ή $x \xrightarrow{\sigma} y$ γιά τά στοιχειά πού συσχετίζονται

ανάλογα μέ τό σ χρησιμοποιείται, αντίστοιχα, ό όρος *σχέση* ή *άντιστοιχία*

Τό παρακάτω σχήμα μός δίνει μία έποπτική έρμηνεία τής σχέσεως σ



Τό σύνολο A ονομάζεται *σύνολο άφετηρίας* τής σ . Τό σύνολο B ονομάζεται *σύνολο άφίξεως* τής σ , ενώ ή έκφραση xy ή $x \xrightarrow{\sigma} y$ (πού είναι ή συμβολική μορφή του τρόπου, μέ τόν όποιο καθορίζονται τά στοιχειά έκείνα πού συσχετίζονται) ονομάζεται *τύπος* τής σ . Η έκφραση xy διαβάζεται «τό x βρίσκεται στή σχέση σ μέ τό y », ενώ ή $x \xrightarrow{\sigma} y$ διαβάζεται «τό x άντιστοιχίζεται μέ τή σ στό y », ή «τό y είναι τό άντίστοιχο του x μέ τή σ ».

Όλα τά ζεύγη (x,y) γιά τά όποια ισχύει xy άποτελοϋν ένα σύνολο S_σ (ύποσύνολο του $A \times B$), τό όποιο ονομάζεται *γράφημα* (*graph*) τής σχέσεως σ . Είναι λοιπόν

$$S_\sigma = \{(x,y) \in A \times B : xy\} \neq \emptyset.$$

Όστε κάθε σχέση σ από τό A στό B έχει ένα γράφημα $S_\sigma \subseteq A \times B$. Άλλά και άντίστροφα: κάθε μή κενό σύνολο S , ύποσύνολο του $A \times B$ ορίζει μία σχέση σ_s μέ τύπο:

$$x\sigma_s y \Leftrightarrow (x,y) \in S$$

και ή όποια έχει γράφημα τό S , ήτοι $S_{\sigma_s} = S$.

Όλα τά στοιχειά $x \in A$, πού βρίσκονται στή σχέση σ μέ ένα (τουλάχιστο) $y \in B$, άποτελοϋν ένα σύνολο $\mathcal{D}(\sigma)$ τό όποιο ονομάζεται *πεδίο όρισμοϋ* (*domain*) τής σχέσεως σ . Είναι λοιπόν

$$\mathcal{D}(\sigma) = \{x \in A : \exists y \in B \text{ μέ } xy\} \subseteq A$$

Όλα τά στοιχειά $y \in B$ πού βρίσκονται στή σχέση σ μέ ένα (τουλάχιστο) $x \in A$ άποτελοϋν ένα σύνολο $\mathcal{R}(\sigma)$, τό όποιο ονομάζεται *πεδίο τιμών* (*range*) τής σχέσεως σ . Είναι λοιπόν

$$\mathcal{R}(\sigma) = \{y \in B : \exists x \in A \text{ μέ } xy\} \subseteq B.$$

Παραδείγματα:

$$1. A = B = \mathbb{R}, (\forall x, y) \text{ } x \text{ } \sigma\text{ } y \Leftrightarrow x^2 + 2y^2 = 1.$$

Για κάθε x, y στο \mathbb{R} , έχουμε

$$x \text{ } \sigma\text{ } y \Rightarrow x^2 + 2y^2 = 1 \Rightarrow 1 - x^2 = 2y^2 \geq 0 \Rightarrow x^2 \leq 1$$

πού σημαίνει ότι $\mathcal{D}(\sigma) \subseteq [-1, 1]$. 'Αλλά και $[-1, 1] \subseteq \mathcal{D}(\sigma)$, γιατί για κάθε $x \in [-1, 1]$, υπάρχει y με $x \text{ } \sigma\text{ } y$. Πραγματικά για $y = \sqrt{\frac{1-x^2}{2}}$, έχουμε

$$x^2 + 2y^2 = x^2 + 2 \frac{1-x^2}{2} = x^2 + (1-x^2) = 1.$$

"Αρα $\mathcal{D}(\sigma) = [-1, 1]$. Παρόμοια για κάθε x, y στο \mathbb{R} , έχουμε

$$x^2 + 2y^2 = 1 \Rightarrow 1 - 2y^2 = x^2 \geq 0 \Rightarrow y^2 \leq \frac{1}{2}$$

πού σημαίνει ότι $\mathcal{R}(\sigma) \subseteq \left[-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right]$. 'Αλλά και $\left[-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right] \subseteq \mathcal{R}(\sigma)$, γιατί για κάθε $y \in \left[-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right]$ υπάρχει x με $x \text{ } \sigma\text{ } y$. Πραγματικά για $x = \sqrt{1-2y^2}$, έχουμε $x^2 + 2y^2 = (1-2y^2) + 2y^2 = 1$.

"Αρα $\mathcal{R}(\sigma) = \left[-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right]$.

$$2. A = B = \mathbb{R}, (\forall x, y) \text{ } x \text{ } \sigma\text{ } y \Leftrightarrow (x^2 + 1)y^2 - x^2 = 0.$$

Πρώτα παρατηρούμε ότι για κάθε $x \in \mathbb{R}$, υπάρχει y με $x \text{ } \sigma\text{ } y$. Πραγματικά για $y = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}$, έχουμε

$$(x^2 + 1)y^2 - x^2 = (x^2 + 1) \frac{x^2}{x^2 + 1} - x^2 = x^2 - x^2 = 0.$$

"Αρα $\mathcal{D}(\sigma) = \mathbb{R}$. 'Επίσης για κάθε x, y στο \mathbb{R} έχουμε

$$(x^2 + 1)y^2 - x^2 = 0 \Leftrightarrow y^2 = \frac{x^2}{x^2 + 1} < 1$$

πού σημαίνει ότι $\mathcal{R}(\sigma) \subseteq (-1, 1)$. 'Αλλά και $(-1, 1) \subseteq \mathcal{R}(\sigma)$, γιατί για κάθε $y \in (-1, 1)$ υπάρχει x με $x \text{ } \sigma\text{ } y$. Πραγματικά για $x = \frac{y}{\sqrt{1-y^2}}$, έχουμε

$$(x^2 + 1)y^2 - x^2 = \left(\frac{y^2}{1-y^2} + 1\right) y^2 - \frac{y^2}{1-y^2} = \frac{1}{1-y^2} y^2 - \frac{y^2}{1-y^2} = 0.$$

"Αρα τό πεδίο τιμών είναι $\mathcal{R}(\sigma) = (-1, 1)$.

$$3. A = B = \mathbb{R}, (\forall x, y) \text{ } x \text{ } \sigma\text{ } y \Leftrightarrow (y^2 + 1)x^2 - 4y^2 = 0.$$

Για κάθε x, y στο \mathbb{R} έχουμε

$$(y^2 + 1)x^2 - 4y^2 = 0 \Rightarrow x^2 = \frac{4y^2}{y^2 + 1} < 4$$

πού σημαίνει ότι $\mathcal{D}(\sigma) \subseteq (-2, 2)$. 'Αλλά και $(-2, 2) \subseteq \mathcal{D}(\sigma)$, γιατί για οποιοδήποτε $x \in (-2, 2)$ υπάρχει y με $x \text{ } \sigma\text{ } y$. Πραγματικά για $y = \frac{x}{\sqrt{4-x^2}}$, έχουμε :

$$(y^2 + 1)x^2 - 4y^2 = \left(\frac{x^2}{4-x^2} + 1\right) x^2 - 4 \frac{x^2}{4-x^2} = \frac{4}{4-x^2} x^2 - 4 \frac{x^2}{4-x^2} = 0.$$

"Αρα τό πεδίο ορισμού τής σ είναι

$$\mathcal{D}(\sigma) = (-2, 2).$$

Επίσης παρατηρούμε ότι για κάθε $y \in \mathbb{R}$ υπάρχει x με xy . Πραγματικά για

$$x = \frac{2y}{\sqrt{y^2+1}}, \text{ έχουμε:}$$

$$(y^2 + 1)x^2 - 4y^2 = (y^2 + 1) \cdot \frac{4y^2}{y^2+1} - 4y^2 = 4y^2 - 4y^2 = 0$$

καί άρα

$$\mathcal{R}(\sigma) = \mathbb{R}.$$

4. $A = B = \mathbb{R}$, $(\forall x, y) \quad xy < x + y < 1$.

Πρώτα άπ' όλα παρατηρούμε ότι για κάθε $x \in \mathbb{R}$ υπάρχει y με xy . Πραγματικά για $y = -x$, έχουμε

$$x + y = x + (-x) = 0 < 1.$$

Άρα $\mathcal{D}(\sigma) = \mathbb{R}$. Επίσης για κάθε $y \in \mathbb{R}$ υπάρχει x με xy . Πραγματικά για $x = -y$ έχουμε

$$x + y = (-y) + y = 0 < 1$$

καί άρα $\mathcal{R}(\sigma) = \mathbb{R}$.


Επειδή $\mathcal{D}(\sigma) \subseteq A$ και $\mathcal{R}(\sigma) \subseteq B$ μεταχειριζόμαστε ειδικότερα τις εκφράσεις «σχέση του $A \dots$ » (άντι από τό), όταν θέλουμε να δηλώσουμε ότι $\mathcal{D}(\sigma) = A$ και «σχέση... πάνω στο B », όταν θέλουμε να δηλώσουμε ότι $\mathcal{R}(\sigma) = B$. Έτσι ή σχέση

του παραδείγματος 2 είναι του \mathbb{R} στό \mathbb{R}


του παραδείγματος 3 είναι από τό \mathbb{R} πάνω στό \mathbb{R}

του παραδείγματος 4 είναι του \mathbb{R} πάνω στό \mathbb{R}


Γεωμετρική (ή γραφική) παράσταση σχέσεως. Στην περίπτωση όπου τά σύνολα άφετηρίας και άφίξεως μιάς σχέσεως σ είναι ύποσύνολα του συνόλου \mathbb{R} τών πραγματικών άριθμών, τό γράφημα S_σ τής σχέσεως αύτης άποτελείται από ζεύγη πραγματικών άριθμών (x, y) , τά όποία, όπως ξέρουμε, παριστάνονται στό επίπεδο με σημεία P , όπως φαίνεται στό σχ. 5. Έτσι τό γράφημα S_σ παριστάνεται με ένα σημειοσύνολο του επιπέδου (βλ. σχ. 6) και ονομάζεται *γεωμετρική (ή γραφική) παράσταση* τής σχέσεως σ , ή και *διάγράμμα* τής σ .



Σχ. 5




σχέση σ από τό A στό B




Σχ. 7

σχέση σ του A στό B



Σχ. 8

σχέση σ από τό A πάνω στό B



Σχ. 9

σχέση σ του A πάνω στό B

Ἀντίστροφη σχέση. Ὡς θεωρήσουμε μιά σχέση σ ἀπό τό Α στο Β τῆς ὁποίας τό γράφημα εἶναι

$$S_{\sigma} = \{(x,y) \in A \times B : x\sigma y\} \neq \emptyset.$$

Μέ ἐναλλαγή τῆς διαδοχῆς τῶν στοιχείων τοῦ ζεύγους (x,y) ἔχουμε τό ἀκόλουθο ὑποσύνολο τοῦ καρτεσιανοῦ γινομένου $B \times A$.

$$S^* = \{(y,x) \in B \times A : (x,y) \in S_{\sigma}\}$$

πού εἶναι, βέβαια, σύνολο ἐπίσης μή κενό.

Ὅπως εἶδαμε παραπάνω, τό σύνολο S^* ὀρίζει μιά σχέση ἀπό τό Β στο Α μέ τύπο

$$y\sigma_s^*x \Leftrightarrow (y,x) \in S^*, \text{ γιά κάθε } x,y.$$

Ἐπειδή $(y,x) \in S^* \Leftrightarrow (x,y) \in S_{\sigma} \Leftrightarrow x\sigma y$, θά ἔχουμε καί

$$y\sigma_s^*x \Leftrightarrow x\sigma y, \text{ γιά κάθε } x,y.$$

Ἄν λοιπόν ἓνα σημεῖο x βρίσκεται στή σχέση σ μέ τό y , τότε τό y βρίσκεται στή σχέση σ_s^* πάλι μέ τό x . Ἡ σχέση σ_s^* ὀνομάζεται *ἀντίστροφη σχέση* τῆς σ καί συμβολίζεται μέ σ^{-1} . Ὡστε

$$x\sigma y \Leftrightarrow y\sigma^{-1}x, \text{ γιά κάθε } x,y.$$

Ἄρα ἡ σχέση σ^{-1} ἔχει πεδίο ὀρισμοῦ τό πεδίο τιμῶν τῆς σ καί πεδίο τιμῶν τό πεδίο ὀρισμοῦ τῆς σ , δηλαδή ἰσχύουν

$$\mathcal{D}(\sigma^{-1}) = \mathcal{R}(\sigma) \text{ καί } \mathcal{R}(\sigma^{-1}) = \mathcal{D}(\sigma).$$

Παρατηροῦμε τώρα ὅτι:

- 1) Ἄν σ εἶναι μιά σχέση ἀπό τό Α στο Β, τότε ἡ σ^{-1} εἶναι σχέση ἀπό τό Β στο Α.
- 2) Ἄν σ εἶναι μιά σχέση ἀπό τό Α πάνω στο Β, τότε ἡ σ^{-1} εἶναι σχέση τοῦ Β στο Α.
- 3) Ἄν σ εἶναι μιά σχέση τοῦ Α στο Β, τότε ἡ σ^{-1} εἶναι σχέση ἀπό τό Β πάνω στο Α.
- 4) Ἄν σ εἶναι μιά σχέση τοῦ Α πάνω στο Β, τότε ἡ σ^{-1} εἶναι σχέση τοῦ Β πάνω στο Α.

Παρατήρηση. Συχνά, ὅταν πρόκειται νά μελετηθεῖ μόνη τῆς ἡ σ^{-1} , ἀλλάζουμε τά x καί y μεταξύ τους, δηλαδή θεωροῦμε $x \in B$ καί $y \in A$, ὥστε τό x νά συμβολίζει πάντα ἓνα στοιχεῖο τοῦ συνόλου ἀφετηρίας. Ἐτσι γράφουμε $x\sigma^{-1}y$ (καί ἰσοδύναμα $y\sigma x$).

Παραδείγματα:

1. Ἡ ἀντίστροφη σχέση τῆς σχέσεως τοῦ παραπάνω παραδείγματος 1 δίδεται ἀπ' τόν τύπο

$$(\forall x,y) \quad x\sigma^{-1}y \Leftrightarrow y^2 + 2x^2 = 1.$$

2. Ἡ ἀντίστροφη σχέση τῆς σχέσεως τοῦ παραδείγματος 2 δίδεται ἀπ' τόν τύπο

$$(\forall x,y) \quad x\sigma^{-1}y \Leftrightarrow (y^2 + 1)x^2 - y^2 = 0.$$

3. Ἡ ἀντίστροφη σχέση τῆς σχέσεως τοῦ παραδείγματος 4 εἶναι ἡ ἴδια σχέση.

*Επειδή, από τον ορισμό της αντίστροφης σχέσεως, έχουμε ότι

$$(x,y) \in S_{\sigma} \Leftrightarrow (y,x) \in S_{\sigma^{-1}}$$

καί επειδή, όταν πρόκειται για γραφήματα στο R^2 , τά σημεία $P = (x,y)$ καί $P^* = (y,x)$ είναι συμμετρικά ως προς τήν πρώ-τη διχοτόμο d τής γωνίας τών άξόνων (βλ. σχ. 10), τά διαγράμματα τών σχέσεων σ καί σ^{-1} θά είναι επίσης *συμμετρικά* ως προς τήν d .

*Όπως είδαμε παραπάνω, για κάθε σχέση σ ισχύει

$$(\forall x,y) \quad x\sigma y \Leftrightarrow y\sigma^{-1}x$$

καί άρα για τήν αντίστροφη σχέση σ^{-1} τής σ θά ισχύει

$$(\forall x,y) \quad y\sigma^{-1}x \Leftrightarrow x(\sigma^{-1})^{-1}y,$$

όπου $(\sigma^{-1})^{-1}$ είναι ή αντίστροφη σχέση τής σ^{-1} . *Αρα ισχύει καί

$$(\forall x,y) \quad x\sigma y \Leftrightarrow x(\sigma^{-1})^{-1}y,$$

δηλαδή ή αντίστροφη τής αντίστροφης μιās σχέσεως σ είναι ή ίδια ή σ . Για συντομία γράφουμε

$$(\sigma^{-1})^{-1} = \sigma.$$

*Η ιδιότητα αυτή γεωμετρικά έρμηνεύεται με τή βοήθεια τής συμμετρίας ως προς τή διχοτόμο d (βλ. σχ. 10) τών διαγραμμάτων τών σχέσεων σ καί σ^{-1} .

2.2 Συνάρτηση. *Η έννοια τής συναρτήσεως είναι μιá άπ' τής πιό θεμελιώδεις μαθηματικές έννοιες. Αύτή τήν όρίζουμε σά μιá ειδική σχέση.

Μιά σχέση f από τό A στό B ονομάζεται *συνάρτηση* τότε καί μόνο τότε, άν κάθε $x \in \mathcal{D}(f)$ βρίσκεται στή σχέση f με ένα καί μόνο $y \in B$. Θά λέμε τότε ότι ή f είναι *συνάρτηση με πεδίο όρισμού* $\mathcal{D}(f) \subseteq A$ καί με *τιμές* στό B , ή ή f είναι *μονοσήμαντη αντίστοιχία* (ή *άπεικόνιση*) από τό A στό B καί θά γράφουμε


$$x \xrightarrow{f} y \text{ για τά στοιχεία πού συσχετίζονται.}$$

Τό y , πού είναι αντίστοιχο του x με τήν f , λέμε ότι είναι ή *τιμή* ή ή *εικόνα* τής f στό x καί συμβολίζεται με $f(x)$. Τότε γράφουμε

$$y = f(x), \text{ ή καί } y = f[x].$$

*Αρα ή έκφραση $y=f(x)$ είναι μιá άλλη μορφή του $x f y$ ή του $x \xrightarrow{f} y$, δηλαδή ό τύπος τής f . Τό x ονομάζεται *ανεξάρτητη μεταβλητή* τής f καί τό y *εξαρτημένη μεταβλητή* τής f .

*Αν $\mathcal{D}(f) = A$, τότε θά γράφουμε $f: A \rightarrow B$ καί θά λέμε ότι ή f είναι *συνάρτηση του A στό B* ή καί *άλλιως*, *συνάρτηση με πεδίο όρισμού τό A καί με τιμές στό B* .



Σχ. 10.


*Αν $\mathcal{D}(f) = A$ και $\mathcal{R}(f) = B$, τότε θα γράφουμε $f: A \xrightarrow{\text{πάνω}} B$ και θα λέμε ότι η f είναι συνάρτηση του A πάνω στο B .

*Αν $\mathcal{R}(f) \subseteq \mathbb{R}$, τότε λέμε ότι η f είναι *πραγματική συνάρτηση*. *Επίσης, αν και $\mathcal{D}(f) \subseteq \mathbb{R}$, τότε λέμε ότι αυτή είναι *πραγματική συνάρτηση μιᾶς πραγματικής μεταβλητής* (για τὸ διάγραμμα μιᾶς τέτοιας συναρτήσεως βλ. σχ. 11).


Π.χ. με τὸν τύπο $\mathbb{R} \ni x \xrightarrow{f} x^2$ ὀρίζεται μιᾶς πραγματική συνάρτηση μιᾶς πραγματικής μεταβλητής. Παρόμοια και με τὸν τύπο $x \xrightarrow{f} \sqrt{1-x^2}$ ὀρίζεται μιᾶς πραγματική συνάρτηση μιᾶς πραγματικής μεταβλητής με πεδίο ὀρισμοῦ τὸ διάστημα $[-1, 1]$. *Αντίθετα, παρατηροῦμε ὅτι ἀπὸ τὶς σχέσεις τῶν παραδειγμάτων τῆς προηγούμενης § 2.1 καμιά δὲν εἶναι συνάρτηση.

Γιὰ μιᾶς συνάρτηση f ἀπὸ τὸ A στοῦ B , τὸ σύνολο τῶν τιμῶν τῆς, δηλαδή τὸ πεδίο τιμῶν τῆς $\mathcal{R}(f)$ συμβολίζεται και με $f(A)$. *Ἔτσι ἔχουμε

$$f(A) = \{y \in B : \exists x \in A \text{ με } y = f(x)\}.$$



Σχ. 11 $x \xrightarrow{f} y$



Σχ. 12

Γενικότερα, ἂν $X \subseteq A$, τότε με $f(X)$ συμβολίζουμε τὸ σύνολο τῶν τιμῶν τῆς f στὰ διάφορα στοιχεῖα τοῦ X (βλ. σχ. 12), δηλαδή

$$f(X) = \{y \in B : \exists x \in X \text{ με } f(x) = y\}.$$

***Αντίστροφη συνάρτηση.** *Ἄς θεωρήσουμε μιᾶς συνάρτηση f ἀπὸ τὸ A στοῦ B . *Ἐπειδὴ ἡ f εἶναι σχέση ἀπὸ τὸ A στοῦ B , ὑπάρχει ἡ ἀντίστροφη σχέση f^{-1} ἀπὸ τὸ B στοῦ A και μάλιστα, ὅπως εἶδαμε και παραπάνω, ἰσχύουν

$$\mathcal{D}(f^{-1}) = \mathcal{R}(f) \text{ και } \mathcal{R}(f^{-1}) = \mathcal{D}(f).$$

*Αν ἡ σχέση f^{-1} εἶναι ἐπίσης συνάρτηση, τότε αὐτὴ ὀνομάζεται *ἀντίστροφη συνάρτηση* τῆς f . Σ' αὐτὴ τὴν περίπτωση, μάλιστα, τὸ x ἀπεικονίζεται με τὴν f μόνο στοῦ $f(x)$ και τὸ $f(x)$ με τὴν f^{-1} μόνο στοῦ x . *Ἔτσι ἔχουμε

$$(\forall x \in \mathcal{D}(f)) \quad f^{-1}[f(x)] = x$$

και ἀνάλογα

$$(\forall y \in \mathcal{R}(f)) \quad f[f^{-1}(y)] = y.$$

Τώρα παρατηροῦμε ὅτι ἂν $f(x_1) = f(x_2)$, τότε και $f^{-1}[f(x_1)] = f^{-1}[f(x_2)]$ δηλαδή $x_1 = x_2$. *Ἔτσι βλέπουμε ὅτι, ἂν και ἡ f^{-1} εἶναι μιᾶς συνάρτηση, τότε ἔχουμε

$$(\forall x_1, x_2 \text{ στο } \mathcal{D}(f)) \quad f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$$

ή ισοδύναμα

$$(\forall x_1, x_2 \text{ στο } \mathcal{D}(f)) \quad x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2).$$

Μιά συνάρτηση f από το A στο B που ικανοποιεί την παραπάνω συνθήκη ονομάζεται *άμφιμονοσήμαντη συνάρτηση* (ή *ένα προς ένα*). Τότε, βέβαια, και η f^{-1} είναι άμφιμονοσήμαντη συνάρτηση και ισχύει η ισοδυναμία


$$(\forall x, y) \quad y = f(x) \Leftrightarrow x = f^{-1}(y).$$



Σχ. 13


*Έτσι έχει αποδειχθεί το παρακάτω θεώρημα.

2.2.1 ΘΕΩΡΗΜΑ. *Η συνάρτηση f έχει αντίστροφη συνάρτηση, δηλαδή η σχέση f^{-1} είναι επίσης συνάρτηση, τότε και μόνον τότε, αν αυτή (δηλαδή η f) είναι άμφιμονοσήμαντη.



Σχ. 14

άμφιμονοσήμαντη συνάρτηση



Σχ. 15

αντίστροφη συνάρτηση

Σύνθεση συναρτήσεων. Θεωρούμε δυό συναρτήσεις f και g . Ο τύπος

$$y = g[f(x)]$$

έχει έννοια για εκείνα τα x και μόνο, για τα όποια ισχύει $x \in \mathcal{D}(f)$ και $f(x) \in \mathcal{D}(g)$.

*Έτσι, αν το σύνολο

$$\{x : x \in \mathcal{D}(f) \text{ και } f(x) \in \mathcal{D}(g)\}$$


είναι μη κενό, ο παραπάνω τύπος ορίζει μία συνάρτηση που ονομάζεται *σύνθεση των συναρτήσεων f και g* και συμβολίζεται με $g \circ f$. Είναι εύκολο νά δούμε ότι

$$\mathcal{D}(g \circ f) = \{x : x \in \mathcal{D}(f) \text{ και } f(x) \in \mathcal{D}(g)\} \subseteq \mathcal{D}(f)$$

και

$$\mathcal{R}(g \circ f) \subseteq \mathcal{R}(g)$$

Η σύνθεση $g \circ f$ είναι λοιπόν μία συνάρτηση από το $\mathcal{D}(f)$ στο $\mathcal{R}(g)$ και ερμηνεύεται εποπτικά στο παρακάτω σχήμα




Σχ. 16

Η πράξη της συνθέσεως συναρτήσεων είναι *προσεταιριστική*, δηλαδή ισχύει

$$f \circ (g \circ h) = (f \circ g) \circ h$$

όπως προκύπτει από το παρακάτω σχήμα.



Σχ. 17

Είναι εύκολο να δούμε ότι αν $f: A \rightarrow B$ και $g: B \rightarrow \Gamma$ τότε το σύνολο $\{x: x \in \mathcal{D}(f) \text{ και } f(x) \in \mathcal{D}(g)\} = A$ και άρα και η σύνθεση $g \circ f$ ορίζεται πάντοτε ως μία συνάρτηση του A στο Γ , δηλαδή

$$g \circ f: A \rightarrow \Gamma$$

Παραδείγματα:

1. Η σύνθεση τῶν συναρτήσεων f και g με

$$f(x) = 2x + 3 \quad \text{και} \quad g(x) = \eta\mu x$$

είναι η συνάρτηση που ορίζεται από τον τύπο

$$y = \eta\mu(2x + 3) \quad \eta \quad g \circ f(x) = \eta\mu(2x + 3).$$

Έδω έχουμε

$$\mathcal{D}(f) = \mathcal{D}(g) = \mathcal{D}(g \circ f) = \mathbb{R}$$

$$\mathcal{R}(f) = \mathbb{R}, \quad \mathcal{R}(g) = [-1, 1], \quad \mathcal{R}(g \circ f) = [-1, 1].$$

2. Η σύνθεση τῶν συναρτήσεων f και g με

$$f(x) = x^2 + 1 \quad \text{και} \quad g(x) = \sqrt{x}$$

είναι η συνάρτηση που ορίζεται από τον τύπο

$$y = \sqrt{x^2 + 1} \quad \eta \quad g \circ f(x) = \sqrt{x^2 + 1}.$$

Έδω έχουμε

$$\mathcal{D}(f) = \mathbb{R}, \quad \mathcal{D}(g) = [0, +\infty), \quad \mathcal{D}(g \circ f) = \mathbb{R}$$

$$\mathcal{R}(f) = \{1, +\infty\}, \quad \mathcal{R}(g) = [0, +\infty), \quad \mathcal{R}(g \circ f) = [1, +\infty).$$

3. Η σύνθεση των συναρτήσεων f και g με

$$f(x) = |x| \quad \text{και} \quad g(x) = \sqrt{x}$$

είναι η συνάρτηση που ορίζεται από τον τύπο

$$y = \sqrt{|x|} \quad \eta \quad g \circ f(x) = \sqrt{|x|}.$$

Έδω έχουμε

$$\mathcal{D}(f) = \mathbb{R}, \quad \mathcal{D}(g) = [0, +\infty), \quad \mathcal{D}(g \circ f) = \mathbb{R}$$

$$\mathcal{R}(f) = [0, +\infty), \quad \mathcal{R}(g) = [0, +\infty), \quad \mathcal{R}(g \circ f) = [0, +\infty).$$

2.3 Πράξεις. Θεωρούμε ένα μη κενό σύνολο E και μία συνάρτηση από τό E^2 στο E . Μιά τέτοια συνάρτηση ονομάζεται *πράξη μέσα στο* σύνολο E . Αν $*$ είναι μία *πράξη μέσα στο* σύνολο E , θά γράφουμε

$$x * y \text{ αντί του } *(x, y)$$

και θά τό ονομάζουμε *αποτέλεσμα* τής πράξεως $*$ πάνω στά x, y .

Ειδικότερα αν $E = \mathbb{R}$, τότε γνωρίζουμε ότι ή πρόσθεση $+$ και ό πολλαπλασιασμός, καθώς και ή αφαίρεση $-$ και ή διαίρεση: είναι πράξεις στο \mathbb{R} , ή, μέ άλλα λόγια, πράξεις πραγματικών αριθμών. Από αυτές ή πρόσθεση και ό πολλαπλασιασμός, είναι οι βασικότερες αφού οι άλλες δύο ορίζονται, όπως ξέ-
ρουμε, από τους τύπους

$$x - y = x + (-y) \quad \text{και} \quad x : y = x \cdot \frac{1}{y}, \quad y \neq 0.$$

Στίς περιπτώσεις αυτές τό αποτέλεσμα τής πράξεως $+$ πάνω στά x, y ονομά-
ζεται και *άθροισμα των* x, y και τής \cdot *γινόμενο των* x, y . Επίσης οι αριθμοί x, y ονομάζονται στήν πρώτη περίπτωση *προσθετέοι* και στή δεύτερη *παράγοντες*.
Γιά τίς δυό αυτές βασικές πράξεις ξέρουμε ότι ισχύουν οι έξης ιδιότητες:

$$x + (y + z) = (x + y) + z, \quad x(yz) = (xy)z \quad (\text{προσεταιριστική})$$

$$x + y = y + x, \quad xy = yx \quad (\text{άντιμεταθετική})$$

$$x + 0 = x = 0 + x, \quad x1 = x = 1x$$

$$x + (-x) = 0 = (-x) + x, \quad x \frac{1}{x} = 1 = \frac{1}{x} x, \quad x \neq 0$$

$$x(y + z) = xy + xz \quad (\text{έπιμεριστική})$$

Γενικότερα, αν x_1, x_2, \dots, x_n είναι πραγματικοί αριθμοί, τότε ορίζουμε

$$x_1 + x_2 + \dots + x_n = \begin{cases} x_1, & \text{αν } n = 1 \\ (x_1 + x_2 + \dots + x_{n-1}) + x_n, & \text{αν } n > 1 \end{cases}$$

και τό ονομάζουμε *γενικευμένο άθροισμα των* x_1, x_2, \dots, x_n και

$$x_1 x_2 \dots x_v = \begin{cases} x_1, & \text{αν } v = 1 \\ (x_1 x_2 \dots x_{v-1})x_v, & \text{αν } v > 1 \end{cases}$$

καί τό όνομάζουμε *γενικευμένο γινόμενο* τών x_1, x_2, \dots, x_v . Για συντομία τό γενικευμένο άθροισμα τών x_1, x_2, \dots, x_v παριστάνεται μέ $\sum_{k=1}^v x_k$ καί τό γενικευμένο γινόμενο $\prod_{k=1}^v x_k$, δηλαδή

$$\sum_{k=1}^v x_k = x_1 + x_2 + \dots + x_v \quad \text{καί} \quad \prod_{k=1}^v x_k = x_1 x_2 \dots x_v.$$

Τώρα παρατηρούμε ότι μία γενίκευση τής προσεταιριστικής ιδιότητας είναι

$$\sum_{k=1}^v x_k = \sum_{k=1}^{\rho} x_k + \sum_{k=\rho+1}^v x_k, \quad \prod_{k=1}^v x_k = \prod_{k=1}^{\rho} x_k \prod_{k=\rho+1}^v x_k$$

για κάθε $\rho = 1, 2, \dots, v-1$ ενώ μία γενίκευση τής έπιμεριστικής ιδιότητας είναι

$$\sum_{k=1}^v (\xi x_k + \eta y_k) = \xi \sum_{k=1}^v x_k + \eta \sum_{k=1}^v y_k$$

όπου ξ καί η είναι πραγματικοί άριθμοί.

Ειδικά τό

$$\underbrace{\alpha + \alpha + \dots + \alpha}_{v \text{ φορές}} \quad \text{γράφεται να}$$

καί όνομάζεται *νιστό πολλαπλάσιο* τού α , ενώ

$$\underbrace{\alpha \alpha \dots \alpha}_{v \text{ φορές}} \quad \text{γράφεται } \alpha^v$$

καί όνομάζεται *νιστή δύναμη* τού α . Τό v στην πρώτη περίπτωση όνομάζεται *πολλαπλασιαστής* τού α καί στή δεύτερη *έκθέτης* τού α .

Είναι εύκολο νά δούμε ότι ισχύουν οί ιδιότητες

$$\alpha^m \alpha^n = \alpha^{m+n}, \quad (\alpha^m)^n = \alpha^{mn} \quad \text{καί} \quad (\alpha\beta)^n = \alpha^n \beta^n.$$

Τέλος, παρατηρούμε ότι μία άλλη ιδιότητα πού ισχύει για τούς πραγματικούς άριθμούς είναι καί ή παρακάτω *άνισότητα* τού *Bernoulli* :

$$(1 + \alpha)^n \geq 1 + n\alpha \quad \forall n \in \mathbb{N}_0 \quad \text{καί} \quad \alpha > -1$$

όπου ή ισότητα ισχύει μόνο για $\alpha = 0$ ή $n = 0, n = 1$.

Για νά τήν άποδείξουμε θά στηριχθούμε πάνω σέ μία άποδεικτική μέθοδο πού όνομάζεται *έπαγωγική μέθοδος* καί πού έχει ως έξης:

Θεωρούμε έναν άκέραιο άριθμό μ καί έναν προτασιακό τύπο $P(x)$ στό σύνολο $\{x \in \mathbb{Z}; x \geq \mu\}$ πού περιέχει τό μ καί όλους τούς μεγαλύτερους άπ' αυτόν άκέραιους. *Αν ή πρόταση $P(\mu)$ είναι άληθής καί για κάθε άκέραιο $k \geq \mu$ ισχύει

$$P(k) \Rightarrow P(k+1)$$

τότε ή πρόταση $P(v)$ είναι άληθής για όποιοδήποτε άκέραιο $v \geq \mu$.

Παρατηρούμε τώρα ότι για $v = 0$, $v = 1$ ή $\alpha = 0$ ή ανισότητα του *Ber-noulli* ισχύει άφωδ

$$(1 + \alpha)^0 = 1 = 1 + 0\alpha, \quad (1 + \alpha)^1 = 1 + \alpha = 1 + 1\alpha$$

$$(1 + 0)^v = 1^v = 1 = 1 + v \cdot 0.$$

Απομένει ν' αποδείξουμε ότι

$$(1 + \alpha)^v > 1 + v\alpha \quad \forall v \geq 2 \quad \text{καί} \quad \alpha > -1 \quad \text{μέ} \quad \alpha \neq 0.$$

Θέτουμε

$$P(v) : (1 + \alpha)^v > 1 + v\alpha, \quad v \geq 2$$

καί εφαρμόζουμε τήν επαγωγική μέθοδο για $\mu = 2$. Έτσι έχουμε

$$(1 + \alpha)^2 = 1 + 2\alpha + \alpha^2 > 1 + 2\alpha$$

δηλαδή ή πρόταση $P(2)$ είναι αληθής.

Επίσης για κάθε $k \geq 2$ έχουμε

$$(1 + \alpha)^{k+1} = (1 + \alpha)^k (1 + \alpha) \geq (1 + k\alpha) (1 + \alpha) = 1 + (k+1)\alpha + k\alpha^2 > 1 + (k+1)\alpha$$

δηλαδή

$$(1 + \alpha)^{k+1} > 1 + (k+1)\alpha$$

καί επομένως ή πρόταση $P(v)$ είναι αληθής για κάθε άκεραίο $v \geq 2$.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1. Νά αποδειχθεί ότι στό $\mathcal{P}(\Omega)$ ισχύουν :

$$1) A \subseteq B \Leftrightarrow A \cup B = B \quad 2) A \subseteq B \Leftrightarrow A \cap B = A.$$

2. Νά αποδειχθεί ότι στό $\mathcal{P}(\Omega)$ ισχύουν :

$$1.) \Omega^c = \emptyset \quad 2) \emptyset^c = \Omega \quad 3) (A^c)^c = A \quad 4) A \cup A^c = \Omega \quad 5) A \cap A^c = \emptyset$$

3. Νά αποδειχθεί ότι στό $\mathcal{P}(\Omega)$ ισχύουν (τύποι του de Morgan) :

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c \quad \text{καί} \quad (A \cap B)^c = A^c \cup B^c$$

4. Νά βρεθεί τό πεδίο όρισμοδ καί τό πεδίο τιμδν τδν σχέσεων σ από τό \mathbb{R} στό \mathbb{R} πού όρίζονται από τδς τύπους :

$$1) y^2 = x \quad 2) y = x^4 \quad 3) y = x^2 + 1 \quad 4) 3x + 2y = 1$$

$$5) x^2 + y^4 = 1 \quad 6) x < y \quad 7) x^2 + y^2 \leq 1 \quad 8) x^2 < y < x^2 + 1.$$

5. Ποιές είναι οι αντίστροφες σχέσεις τδν σχέσεων τής προηγδμενης άσκησης 4 ;

6. Ποιές από τής σχέσεις τής άσκησης 4 είναι συναρτήσεις καί ποιές δέν είναι ;

7. Ποιές από τής συναρτήσεις τής άσκησης 4 έχουν αντίστροφες συναρτήσεις ;


8*. Μιά πράξη * μέσα σ' ένα σύνολο E όνομάζεται *όλική* άν $\mathcal{D}(\ast) = E^2$ καί *μερική* άν $\mathcal{D}(\ast) \subset E^2$. Ποιές από τής πράξεις +, -, ·, : στό σύνολο \mathbb{R} τδν πραγματικδν άριθμδν είναι όλικές καί ποιές μερικές ;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

1. ΜΟΝΟΤΟΝΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

1.1 Αύξουσες και φθίνουσες συναρτήσεις. Είναι εύκολο νά δοῦμε ὅτι ἡ συνάρτηση φ μέ $\varphi(x) = x^3$ διατηρεῖ τή φυσική διάταξη τῶν πραγματικῶν ἀριθμῶν, δηλαδή γιά κάθε x_1, x_2 ἰσχύει



Σχ. 18 $\varphi : y = x^3$

$$x_1 < x_2 \Rightarrow x_1^3 < x_2^3 \Rightarrow \varphi(x_1) < \varphi(x_2).$$

Γενικά μιά πραγματική συνάρτηση f μιᾶς πραγματικῆς μεταβλητῆς πού διατηρεῖ, ὅπως καί ἡ φ , τή φυσική διάταξη τῶν πραγματικῶν ἀριθμῶν ὀνομάζεται *γνησίως αύξουσα*. Ἀκριβέστερα, γιά μιά συνάρτηση $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ μέ $A \subseteq \mathbb{R}$ δίδουμε τόν παρακάτω ὄρισμό:


Ἡ συνάρτηση f ὀνομάζεται *γνησίως αύξουσα* τότε καί μόνο τότε, ἂν γιά κάθε x_1, x_2 στό A ἰσχύει

(1)

$$x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2).$$

Παρόμοια, ἡ συνάρτηση f ὀνομάζεται *γνησίως φθίνουσα* τότε καί μόνο τότε, ἂν γιά κάθε x_1, x_2 στό A ἰσχύει

$$(2) \quad x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2).$$



Σχ. 19 $\psi : y = -x$

Π.χ. ἡ συνάρτηση ψ μέ $\psi(x) = -x$ εἶναι γνησίως φθίνουσα συνάρτηση.

*Ἄν οἱ (1) καί (2) ἀντικατασταθοῦν ἀντίστοιχα ἀπό τίς

$$(1') \quad x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \leq f(x_2)$$

$$(2') \quad x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \geq f(x_2),$$

τότε λέμε στήν περίπτωση τῆς (1') ὅτι ἡ συνάρτηση f εἶναι *αὔξουσα* καί στήν περίπτωση τῆς (2') ὅτι ἡ f εἶναι *φθίνουσα*, δηλαδή:

Ἡ συνάρτηση f ὀνομάζεται *αὔξουσα* τότε καί μόνο τότε ἂν γιά κάθε x_1, x_2 στό A ἰσχύει

$$x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \leq f(x_2).$$

Ἡ συνάρτηση f ὀνομάζεται *φθίνουσα* τότε καί μόνο τότε, ἂν γιά κάθε x_1, x_2 στό A ἰσχύει

$$x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \geq f(x_2).$$

Ἐπίσης λέμε ὅτι μιὰ συνάρτηση f εἶναι *γνησίως μονότονη* τότε καί μόνο τότε, ἂν αὐτή εἶναι γνησίως αὐξουσα ἢ γνησίως φθίνουσα. Ἀντίστοιχα λέμε ὅτι ἡ f εἶναι *μονότονη*, ἂν αὐτή εἶναι αὐξουσα ἢ φθίνουσα. Γιά νά δηλώσουμε τό εἶδος τῆς μονοτονίας μιᾶς συναρτήσεως χρησιμοποιοῦμε τά παρακάτω σύμβολα:

$$\begin{array}{l} f \nearrow \quad \eta \quad f \nearrow \quad \Leftrightarrow f \text{ εἶναι γνησίως αὐξουσα} \\ f \searrow \quad \eta \quad f \searrow \quad \Leftrightarrow f \text{ εἶναι γνησίως φθίνουσα} \\ f \uparrow \quad \eta \quad f \nearrow \quad \Leftrightarrow f \text{ εἶναι αὐξουσα} \\ f \downarrow \quad \eta \quad f \searrow \quad \Leftrightarrow f \text{ εἶναι φθίνουσα.} \end{array}$$

*Ἄν ἡ συνάρτηση f εἶναι σταθερή, δηλαδή κάθε $x \in A$ ἀπεικονίζεται μέ τήν f στόν ἴδιο πάντοτε πραγματικό ἀριθμό, ἢ μέ ἄλλα λόγια, τό πεδίο τιμῶν $\mathfrak{R}(f)$ εἶναι ἓνα μονομελές σύνολο, τότε ἡ f εἶναι ταυτόχρονα αὐξουσα καί φθίνουσα. Ἀλλά καί ἀντίστροφα, ἂν ἡ f εἶναι ταυτόχρονα αὐξουσα καί φθίνουσα θά ἔχουμε γιά ὁποιαδήποτε x_1, x_2 στό A ($x_1 \neq x_2$) ὅτι $f(x_1) = f(x_2)$, δηλαδή ὅτι ἡ f εἶναι σταθερή συνάρτηση. Πραγματικά: γιά $x_1 < x_2$ ἔχουμε

$$f(x_1) \leq f(x_2) \text{ (γιατί } f \uparrow) \text{ καί } f(x_1) \geq f(x_2) \text{ (γιατί } f \downarrow)$$

δηλαδή $f(x_1) = f(x_2)$. Παρόμοια, γιά $x_2 < x_1$ ἔχουμε

$$f(x_2) \leq f(x_1) \text{ (γιατί } f \uparrow) \text{ καί } f(x_2) \geq f(x_1) \text{ (γιατί } f \downarrow)$$

δηλαδή πάλι $f(x_1) = f(x_2)$. Ὡστε ἀποδείξαμε ὅτι

1.1.1. Ἡ συνάρτηση $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ ($A \subseteq \mathbb{R}$) εἶναι σταθερή τότε καί μόνο τότε, ἂν ἡ f εἶναι ταυτόχρονα αὐξουσα καί φθίνουσα.

*Ἄς μελετήσουμε τώρα ὡς πρὸς τή μονοτονία τήν πραγματική συνάρτηση ω μέ $\omega(x) = \frac{1}{x}$, πού ἔχει πεδίο ὀρισμοῦ τό σύνολο $\mathbb{R} - \{0\}$.


*Ἄν δεχθοῦμε ὅτι ἡ συνάρτηση ω εἶναι φθίνουσα, δηλαδή ὅτι γιά κάθε x_1, x_2

$$x_1 < x_2 \Rightarrow \omega(x_1) \geq \omega(x_2),$$

τότε γιά $x_1 = -1$, $x_2 = 1$ καταλήγουμε στό ἄτοπο $-1 = \omega(-1) \geq \omega(1) = 1$.

Ἐπίσης, ἂν δεχθοῦμε ὅτι ἡ ω εἶναι αὐξουσα, δηλαδή ὅτι γιά κάθε x_1, x_2

$$x_1 < x_2 \Rightarrow \omega(x_1) \leq \omega(x_2),$$



Σχ. 20 $\omega: y = \frac{1}{x}$

τότε για $x_1 = 1, x_2 = 2$ καταλήγουμε στο άτοπο $1 = \omega(1) \leq \omega(2) = \frac{1}{2}$.

Ωστε η συνάρτηση ω δεν είναι μονότονη. Παρατηρούμε όμως ότι, αν περιορισθούμε για x_1, x_2 στο $(-\infty, 0)$, ισχύει

$$(3) \quad x_1 < x_2 \Rightarrow \omega(x_1) = \frac{1}{x_1} > \frac{1}{x_2} = \omega(x_2),$$

δηλαδή στο $(-\infty, 0)$ βλέπουμε ότι η συνθήκη να είναι ή ω γνησίως φθίνουσα πληροῦται. Στην περίπτωση αυτή λέμε ότι η συνάρτηση ω είναι γνησίως φθίνουσα στο $(-\infty, 0)$.

Παρόμοια και για x_1, x_2 στο $(0, +\infty)$ ισχύει ή (3) και ανάλογα λέμε ότι ή ω είναι γνησίως φθίνουσα στο $(0, +\infty)$.

Γενικά, αν για τή συνάρτηση f ισχύει ή (2) για κάθε x_1, x_2 στο B , (όπου B είναι ένα μή κενό ὑποσύνολο τοῦ πεδίου ὀρισμοῦ της A) τότε λέμε ότι ή f είναι γνησίως φθίνουσα στο B και συμβολίζουμε αυτό με $f \downarrow B$.

Ἀνάλογα λέμε ότι ή f είναι γνησίως αὔξουσα στο B , αν ή (1) ισχύει για κάθε x_1, x_2 στο B καθώς επίσης και ότι ή f είναι αὔξουσα στο B ή φθίνουσα στο B , αν ή (1') ή (2') ἀντίστοιχα ισχύει για κάθε x_1, x_2 στο B . Για να δηλώσουμε ἀντίστοιχα ότι ή f είναι γνησίως αὔξουσα στο B , αὔξουσα στο B και φθίνουσα στο B , χρησιμοποιοῦμε τούς συμβολισμούς $f \uparrow \uparrow B$, $f \uparrow B$ και $f \downarrow B$.


Π.χ. ή συνάρτηση ήμίτονο, πού ὅπως γνωρίζουμε παριστάνεται και με τό σύμβολο $\eta\mu$, είναι γνησίως αὔξουσα στο $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ και γνησίως φθίνουσα

στο $\left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right]$. Γενικότερα, αν κ είναι ἀκέραιος, ισχύει


$$\eta\mu \uparrow \left[2\kappa\pi - \frac{\pi}{2}, 2\kappa\pi + \frac{\pi}{2}\right] \text{ και } \eta\mu \downarrow \left[2\kappa\pi + \frac{\pi}{2}, (2\kappa + 1)\pi + \frac{\pi}{2}\right]$$

1.2 Ἡ μονοτονία και ή σύνθεση συναρτήσεων.

Ἡ πραγματική συνάρτηση σ με $\sigma(x) = \alpha x$, ὅπου α είναι ἕνας σταθερός πραγματικός ἀριθμός διάφορος τοῦ 0, είναι γνησίως μονότονη και μάλιστα αν $\alpha > 0$, είναι γνησίως αὔξουσα, ἀφοῦ για κάθε x_1, x_2 $x_1 < x_2 \Rightarrow \alpha x_1 < \alpha x_2 \Rightarrow \sigma(x_1) < \sigma(x_2)$ ἐνῶ αν $\alpha < 0$, είναι γνησίως φθίνουσα ἀφοῦ για κάθε x_1, x_2



$y = \alpha x, \alpha > 0$
Σχ. 21



$y = \alpha x, \alpha < 0$
Σχ. 22

$$x_1 < x_2 \Rightarrow \alpha x_1 > \alpha x_2 \Rightarrow \sigma(x_1) > \sigma(x_2).$$


Δηλαδή:

$$\alpha > 0 \Rightarrow \sigma \uparrow$$

$$\alpha < 0 \Rightarrow \sigma \downarrow$$

Γεωμετρικά η συνάρτηση σ παριστάνεται με μία ευθεία, όπως φαίνεται στα σχήματα 21 και 22.

*Ας θεωρήσουμε επίσης και την πραγματική συνάρτηση τ με $\tau(x) = x + \beta$, όπου β είναι σταθερός πραγματικός αριθμός. Η συνάρτηση τ είναι γνησίως αύξουσα, έπειδή για κάθε x_1, x_2



$$y = x + \beta \quad (\beta > 0)$$


Σχ. 23

$$x_1 < x_2 \Rightarrow x_1 + \beta < x_2 + \beta \Rightarrow \tau(x_1) < \tau(x_2).$$

Τό διάγραμμα της συναρτήσεως τ είναι η ευθεία του σχήματος 23 που διέρχεται από τα σημεία $(-\beta, 0)$ και $(0, \beta)$.


*Αν τώρα $\omega = \tau \circ \sigma$ είναι η σύνθεση των συναρτήσεων σ και τ , δηλαδή η συνάρτηση που ορίζεται από τον τύπο

$\omega(x) = \tau(\sigma(x)) = \alpha x + \beta$,
 όπου α, β πραγματικοί αριθμοί
 με $\alpha \neq 0$, τότε παρατηρούμε
 ότι ισχύουν :



$$\omega: y = \alpha x + \beta, \alpha > 0$$

Σχ. 24 ($\beta > 0$)



$$\omega: y = \alpha x + \beta, \alpha < 0$$

Σχ. 25 ($\beta > 0$)

$\alpha > 0 \Rightarrow \omega \uparrow$	$\alpha < 0 \Rightarrow \omega \downarrow$
--	--

έπειδή για κάθε x_1, x_2 και για $\alpha > 0$ έχουμε

$$x_1 < x_2 \Rightarrow \alpha x_1 + \beta < \alpha x_2 + \beta \Rightarrow \omega(x_1) < \omega(x_2),$$

ενώ για $\alpha < 0$

$$x_1 < x_2 \Rightarrow \alpha x_1 + \beta > \alpha x_2 + \beta \Rightarrow \omega(x_1) > \omega(x_2).$$

Τό διάγραμμα της συνθέσεως ω των συναρτήσεων σ και τ είναι η ευθεία των σχημάτων 24 και 25, που διέρχεται από τα σημεία $(-\frac{\beta}{\alpha}, 0)$ και $(0, \beta)$.

*Από όλα τα παραπάνω παίρνουμε τώρα ότι στην περίπτωση $\alpha > 0$, όπου οι σ και τ είναι γνησίως αύξουσες συναρτήσεις, ή σύνθεσή τους ω είναι γνησίως αύξουσα συνάρτηση, ενώ στην περίπτωση $\alpha < 0$, όπου ή σ είναι γνησίως φθίνουσα και ή τ γνησίως αύξουσα συνάρτηση, ή σύνθεσή τους ω είναι γνησίως φθίνουσα συνάρτηση.

Γενικά, αν $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow R$ είναι πραγματικές συναρτήσεις (A, B υποσύνολα του R), τότε ορίζεται, όπως ξέρουμε, ή σύνθεσή τους $g \circ f: A \rightarrow R$ και ισχύει τό παρακάτω θεώρημα.

1.2.1 ΘΕΩΡΗΜΑ. *Υποθέτουμε ότι οι συναρτήσεις f και g είναι γνησίως μονότονες. Τότε, αν και οι δύο είναι τοῦ ἴδιου εἴδους μονοτονίας, ή σύνθεσή τους $g \circ f$ είναι γνησίως αύξουσα συνάρτηση, ενώ αν είναι διαφορετικοῦ εἴδους μονοτο-

νίας, η σύνθεσή τους $g \circ f$ είναι γνησίως φθίνουσα συνάρτηση. Ακριβέστερα ισχύουν τὰ παρακάτω:

a) $\left. \begin{array}{l} f \uparrow \\ g \uparrow \end{array} \right\} \Rightarrow g \circ f \uparrow$	b) $\left. \begin{array}{l} f \downarrow \\ g \uparrow \end{array} \right\} \Rightarrow g \circ f \downarrow$
c) $\left. \begin{array}{l} f \uparrow \\ g \downarrow \end{array} \right\} \Rightarrow g \circ f \downarrow$	d) $\left. \begin{array}{l} f \downarrow \\ g \downarrow \end{array} \right\} \Rightarrow g \circ f \uparrow$

Απόδειξη. Έστω x_1, x_2 δύο οποιαδήποτε στοιχεία του A .

a) Αν $x_1 < x_2$, τότε επειδή $f \uparrow$ έχουμε $f(x_1) < f(x_2)$ και άρα, επειδή και $g \uparrow$, παίρνουμε $g[f(x_1)] < g[f(x_2)]$. Έτσι

$$x_1 < x_2 \Rightarrow g \circ f(x_1) < g \circ f(x_2)$$

πού σημαίνει ότι $g \circ f \uparrow$.

b) Αν $x_1 < x_2$, τότε επειδή $f \downarrow$ έχουμε $f(x_1) > f(x_2)$ και άρα, επειδή και $g \uparrow$ παίρνουμε $g[f(x_1)] > g[f(x_2)]$. Έτσι

$$x_1 < x_2 \Rightarrow g \circ f(x_1) > g \circ f(x_2)$$

πού σημαίνει ότι $g \circ f \downarrow$.

c) Αν $x_1 < x_2$, τότε επειδή $f \uparrow$ έχουμε $f(x_1) < f(x_2)$ και επειδή $g \downarrow$ $g[f(x_1)] > g[f(x_2)]$. Έτσι

$$x_1 < x_2 \Rightarrow g \circ f(x_1) > g \circ f(x_2)$$

πού σημαίνει ότι $g \circ f \downarrow$.

d) Αν $x_1 < x_2$, τότε επειδή $f \downarrow$ έχουμε $f(x_1) > f(x_2)$ και επειδή $g \downarrow$ ισχύει $g[f(x_1)] < g[f(x_2)]$. Έτσι

$$x_1 < x_2 \Rightarrow g \circ f(x_1) < g \circ f(x_2)$$

πού σημαίνει ότι $g \circ f \uparrow$.

1.2.2 Θα εφαρμόσουμε τώρα τό παραπάνω θεώρημα 1.2.1 για νά μελετήσουμε ως προς τή μονοτονία τήν πραγματική συνάρτηση w μέ

$$w(x) = \frac{\alpha x + \beta}{\gamma x + \delta}$$

όπου $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ είναι σταθεροί πραγματικοί αριθμοί μέ $\gamma \neq 0$. Πρώτα παρατηρούμε ότι τό πεδίο όρισμού τής w είναι τό σύνολο $\mathbb{R} - \left\{ -\frac{\delta}{\gamma} \right\}$ και άκόμη ότι ισχύει

$$w(x) = \frac{\alpha x + \beta}{\gamma \left(x + \frac{\delta}{\gamma} \right)} = \frac{\alpha \left(x + \frac{\delta}{\gamma} \right) - \frac{\alpha \delta}{\gamma} + \beta}{\gamma \left(x + \frac{\delta}{\gamma} \right)} = \frac{\alpha}{\gamma} - \frac{\alpha \delta - \beta \gamma}{\gamma^2 \left(x + \frac{\delta}{\gamma} \right)},$$

δηλαδή

$$(4) \quad y = w(x) = \frac{\alpha}{\gamma} + \frac{c}{x + \frac{\delta}{\gamma}}$$

όπου θέσαμε $c = -\frac{\alpha\delta - \beta\gamma}{\gamma^2} = -\frac{\begin{vmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{vmatrix}}{\gamma^2}$

Είναι φανερό από τον τύπο (4), ότι για $c = 0$ (δηλαδή $\begin{vmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{vmatrix} = 0$) ή w είναι σταθερή συνάρτηση, δηλαδή

$$\begin{vmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow w \text{ σταθερή}$$

Για $c \neq 0$ παρατηρούμε ότι η w είναι σύνθεση μερικῶν ἀπλῶν συναρτήσεων g_1, g_2, g_3, g_4 μέ

$$g_1(x) = x + \frac{\delta}{\gamma}, \quad g_2(x) = \frac{1}{x}, \quad g_3(x) = cx \quad \text{καί} \quad g_4(x) = \frac{\alpha}{\gamma} + x,$$

δηλαδή

$$w = g_4 \circ [g_3 \circ (g_2 \circ g_1)].$$

Ἀλλά οἱ συναρτήσεις g_4 καί g_3 εἶναι μόνотонες καί ἔτσι ἡ μονοτονία τῆς w ἐπηρεάζεται ἀπὸ τὴ μονοτονία τῆς $g_2 \circ g_1$. Ἐπειδὴ ἡ g_2 εἶναι μόνотонη στὰ διαστήματα $(-\infty, 0)$ καί $(0, +\infty)$ θὰ πρέπει νὰ ἐξετάσουμε τὴ μονοτονία τῆς $g_2 \circ g_1$ σ' ἐκεῖνα τὰ διαστήματα τοῦ \mathbb{R} , ὅπου ἡ g_1 παίρνει τιμές στὰ παραπάνω διαστήματα $(-\infty, 0)$ καί $(0, +\infty)$. Εἶναι φανερό ὅτι τὰ διαστήματα αὐτὰ εἶναι τὰ $(-\infty, -\frac{\delta}{\gamma})$ καί $(-\frac{\delta}{\gamma}, +\infty)$. Ἐτσι ἀπὸ τὸ θεώρημα 1.2.1 παίρνομε :

περίπτωση $c > 0$:

$$\left. \begin{array}{l} g_1 \uparrow \\ g_2 \downarrow (-\infty, 0) \end{array} \right\} \Rightarrow g_2 \circ g_1 \downarrow \left(-\infty, -\frac{\delta}{\gamma}\right)$$

$$\left. \begin{array}{l} g_2 \circ g_1 \downarrow \left(-\infty, -\frac{\delta}{\gamma}\right) \\ g_3 \uparrow \end{array} \right\} \Rightarrow g_3 \circ (g_2 \circ g_1) \downarrow \left(-\infty, -\frac{\delta}{\gamma}\right)$$

$$\left. \begin{array}{l} g_3 \circ (g_2 \circ g_1) \downarrow \left(-\infty, -\frac{\delta}{\gamma}\right) \\ g_4 \uparrow \end{array} \right\} \Rightarrow w \downarrow \left(-\infty, -\frac{\delta}{\gamma}\right)$$

περίπτωση $c < 0$:

$$\left. \begin{array}{l} g_1 \uparrow \\ g_2 \downarrow (-\infty, 0) \end{array} \right\} \Rightarrow g_2 \circ g_1 \downarrow \left(-\infty, -\frac{\delta}{\gamma}\right)$$

$$\left. \begin{array}{l} g_2 \circ g_1 \downarrow \left(-\infty, -\frac{\delta}{\gamma}\right) \\ g_3 \downarrow \end{array} \right\} \Rightarrow g_3 \circ (g_2 \circ g_1) \uparrow \left(-\infty, -\frac{\delta}{\gamma}\right)$$

$$g_3 \circ (g_2 \circ g_1) \uparrow \left(-\infty, -\frac{\delta}{\gamma} \right) \} \Rightarrow w \uparrow \left(-\infty, -\frac{\delta}{\gamma} \right)$$

$g_4 \uparrow$

*Ετσι βρήκαμε ότι:

$$\left| \frac{\alpha\beta}{\gamma\delta} \right| < 0 \Rightarrow w \downarrow \left(-\infty, -\frac{\delta}{\gamma} \right)$$

$$\left| \frac{\alpha\beta}{\gamma\delta} \right| > 0 \Rightarrow w \uparrow \left(-\infty, -\frac{\delta}{\gamma} \right)$$

Παρόμοια μπορούμε να βρούμε και ότι:

$$\left| \frac{\alpha\beta}{\gamma\delta} \right| < 0 \Rightarrow w \downarrow \left(-\frac{\delta}{\gamma}, +\infty \right)$$

$$\left| \frac{\alpha\beta}{\gamma\delta} \right| > 0 \Rightarrow w \uparrow \left(-\frac{\delta}{\gamma}, +\infty \right)$$

Τά παραπάνω συμπεράσματα σχετικά με τη μονοτονία μπορούν να προκύψουν και άμεσα από τους ορισμούς της μονοτονίας συναρτήσεως.


Διάγραμμα της συναρτήσεως w. *Αν θέσουμε

$$X = x + \frac{\delta}{\gamma}, \quad Y = y - \frac{\alpha}{\gamma},$$

τότε ο τύπος (4) δίνει


$$Y = \frac{c}{X}, \quad c = -\frac{\left| \frac{\alpha\beta}{\gamma\delta} \right|}{\gamma^2}.$$

Οι άξονες x,y μεταθέτονται παράλληλα στους X, Y με άρχη τό σημείο $C = \left(-\frac{\delta}{\gamma}, \frac{\alpha}{\gamma} \right)$. Το διάγραμμα της w δίδεται στα παρακάτω σχήματα:




$$y = \frac{\alpha x + \beta}{\gamma x + \delta}, \quad \left| \frac{\alpha\beta}{\gamma\delta} \right| < 0$$

Σχ. 26



$$y = \frac{\alpha x + \beta}{\gamma x + \delta}, \quad \left| \frac{\alpha\beta}{\gamma\delta} \right| > 0$$

Σχ. 27



$$y = \frac{\alpha x + \beta}{\gamma x + \delta}, \quad \left| \frac{\alpha\beta}{\gamma\delta} \right| = 0$$

Σχ. 28

Παραδείγματα :

$$1. \quad w(x) = \frac{2x + 8}{x + 3}$$


$$y = w(x) = 2 + \frac{2}{x+3}$$

$$C = (-3, 2)$$

Βοηθητικοί ύπολογισμοί

$$\frac{2x + 8}{x + 3} = \frac{2}{1} + \frac{c}{x + \frac{3}{1}}$$

$$x = 0: \quad \frac{8}{3} = 2 + \frac{c}{3} \Rightarrow 8 = 6 + c \Rightarrow c = 2$$



Σχ. 29 $w: y = \frac{2x+8}{x+3}$


$w \downarrow (-\infty, -3)$ και $w \downarrow (-3, +\infty)$.

2. $w(x) = \frac{5x+3}{2x+3}$
 $y = w(x) = \frac{5}{2} + \frac{-\frac{9}{4}}{x + \frac{3}{2}}$
 $C = \left(-\frac{3}{2}, \frac{5}{2}\right)$

Βοηθητικοί υπολογισμοί

$$\frac{5x+3}{2x+3} = \frac{5}{2} + \frac{c}{x + \frac{3}{2}}$$

$$x=0: \frac{3}{3} = \frac{5}{2} + \frac{c}{\frac{3}{2}} \Rightarrow 1 - \frac{5}{2} = \frac{2}{3}c \Rightarrow c = -\frac{9}{4}$$



Σχ. 30 $w: y = \frac{5x+3}{2x+3}$

$w \uparrow (-\infty, -\frac{3}{2})$ και $w \uparrow (-\frac{3}{2}, +\infty)$.

1.3. Η μονοτονία και η αντίστροφη συνάρτηση. Έστω $f: A \xrightarrow{\text{πάνω}} B$ (A, B υποσύνολα του \mathbb{R}) μία γνησίως μονότονη συνάρτηση του A πάνω στο B . Τότε αυτή είναι και άμφιμονοσήμαντη, δηλαδή για κάθε x_1, x_2 στο A ισχύουν

$$(5) \quad x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$$

Πραγματικά: μπορούμε να υποθέσουμε, χωρίς βλάβη της γενικότητας, ότι

$x_1 < x_2$ (στήν αντίθετη περίπτωση, δηλαδή $x_1 > x_2$ αλλάζουμε τό ρόλο τῶν x_1, x_2). Ἄλλά τότε θά ἰσχύει

$$f(x_1) < f(x_2), \text{ ἂν } f \uparrow \text{ ἢ } f(x_1) > f(x_2), \text{ ἂν } f \downarrow.$$

*Ἄρα πάντοτε ἰσχύει ἡ (5) καί ἔτσι ἡ f εἶναι ἀμφιμονοσήμαντη συνάρτηση τοῦ A πάνω στό B .

Σύμφωνα μέ τό θεώρημα 2.2.1 τοῦ κεφ. I ὑπάρχει καί ἡ ἀντίστροφη τῆς γνησίως μονότονης συναρτήσεως f . Ἀκριβέστερα ἰσχύει τό παρακάτω θεώρημα.

1.3.1. ΘΕΩΡΗΜΑ. Ἐάν $f: A \rightarrow B$ εἶναι μιά γνησίως μονότονη συνάρτηση τοῦ A ἐπὶ τοῦ B , τότε ὑπόκειται ἡ ἀντίστροφη συνάρτηση f^{-1} αὐτῆς καί μάλιστα ἰσχύουν.

$$f \uparrow \Rightarrow f^{-1} \uparrow$$

$$f \downarrow \Rightarrow f^{-1} \downarrow$$

Ἀπόδειξη. Ἡ ὑπαρξη τῆς ἀντίστροφης συναρτήσεως ἔχει ἀποδειχθεῖ παραπάνω. Γιά ν' ἀποδείξουμε καί τὰ ὑπόλοιπα συμπεράσματα τοῦ θεωρήματος διακρίνουμε τίς περιπτώσεις:

α) $f \uparrow$ καί $f^{-1} \uparrow$ ὄχι \uparrow . Ἐπειδή ἡ f^{-1} δέν εἶναι γνησίως αὐξουσα, ὑπάρχουν x_1, x_2 στό πεδίο ὀρισμοῦ τῆς B μέ

$$x_1 < x_2 \text{ καί } f^{-1}(x_1) \geq f^{-1}(x_2).$$

*Ἀλλά

$$\left. \begin{array}{l} f \uparrow \\ f^{-1}(x_1) \geq f^{-1}(x_2) \end{array} \right\} \Rightarrow f(f^{-1}(x_1)) \geq f(f^{-1}(x_2)) \Rightarrow x_1 \geq x_2,$$

πού εἶναι ἄτοπο, γιατί $x_1 < x_2$.

*Ὡστε ἀποδείξαμε ὅτι $f \uparrow \Rightarrow f^{-1} \uparrow$.

β) $f \downarrow$ καί f^{-1} ὄχι \downarrow . Παρόμοια, ὅπως καί στήν προηγούμενη περίπτωση, ἐπειδή ἡ f^{-1} δέν εἶναι γνησίως φθίνουσα ὑπάρχουν x_1, x_2 στό B μέ

$$x_1 < x_2 \text{ καί } f^{-1}(x_1) \leq f^{-1}(x_2).$$

*Ἀλλά

$$\left. \begin{array}{l} f \downarrow \\ f^{-1}(x_1) \leq f^{-1}(x_2) \end{array} \right\} \Rightarrow f(f^{-1}(x_1)) \geq f(f^{-1}(x_2)) \Rightarrow x_1 \geq x_2,$$

πού εἶναι ἐπίσης ἄτοπο.

*Ὡστε ἀποδείξαμε ὅτι $f \downarrow \Rightarrow f^{-1} \downarrow$.


Παραδείγματα:

1. Ἡ πραγματική συνάρτηση φ μέ $\varphi(x) = x^3$ (βλ. Σχ. 18) εἶναι, ὅπως γνωρίζουμε, γνησίως αὐξουσα, ἄρα καί ἡ ἀντίστροφη αὐτῆς συνάρτηση φ^{-1} τῆς ὁποίας ὁ τύπος εἶναι $y = \sqrt[3]{x}$, εἶναι ἐπίσης γνησίως αὐξουσα καί μάλιστα τό διάγραμμα αὐτῆς (βλ. Σχ. 31) εἶναι συμμετρικό, ὡς πρὸς τή διχοτόμο τῆς πρώτης γωνίας τῶν ἀξόνων, τοῦ διαγράμματος τῆς φ .

2. Γενικότερα, ἡ συνάρτηση f μέ $f(x) = x^{2v+1}$ (v φυσικός ἀριθμός) εἶναι γνησίως αὐξουσα, γιατί γιά ὁποιαδήποτε x_1, x_2


$$x_1 < x_2 \Rightarrow x_1^{2v+1} < x_2^{2v+1} \Rightarrow f(x_1) < f(x_2).$$

Παρόμοια καί ἡ ἀντίστροφη f^{-1} αὐτῆς, τῆς ὁποίας ὁ τύπος εἶναι $f^{-1}(x) = \sqrt[2v+1]{x}$, εἶναι ἐπίσης γνησίως αὐξουσα. Τά διαγράμματα τῶν συναρτήσεων f καί f^{-1} εἶναι βέβαια συμμετρικά ὡς πρὸς τή διχοτόμο τῆς πρώτης γωνίας τῶν ἀξόνων (βλ. Σχ. 32').



$$\varphi: y=x^3; \varphi^{-1}: y=\sqrt[3]{x}.$$

Σχ. 31



$$f: y=x^{2v+1}; f^{-1}: y=\sqrt[2v+1]{x}.$$

Σχ. 32

2. ΑΚΡΟΤΑΤΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΣ

2.1 Μέγιστο κι ελάχιστο συναρτήσεως. Για τή συνάρτηση φ μέ $\varphi(x) = 1-x^2$ παρατηρούμε ότι ισχύει

$$\varphi(x) = 1-x^2 \leq 1 = \varphi(0) \quad \forall x \in \mathbb{R},$$

δηλαδή οί τιμές τής φ ποτέ δέν ξεπερνούν τήν τιμή της στό 0, δηλαδή τόν αριθμό $\varphi(0)$. Στήν περίπτωση αυτή λέμε ότι ή φ παρουσιάζει μέγιστο στό σημείο 0, ένω τήν τιμή της $\varphi(0)$ τήν ονομάζουμε μέγιστη τιμή τής φ . Άκόμη παρατηρούμε ότι ή φ είναι γνησίως αύξουσα άριστερά άπό τό 0 και άκριβέστερα στό $(-\infty, 0]$, γιατί για κάθε x_1, x_2 ισχύει

$$x_1 < x_2 \leq 0 \Rightarrow 1-x_1^2 < 1-x_2^2 \Rightarrow \varphi(x_1) < \varphi(x_2),$$

και άκόμη ότι αυτή είναι γνησίως φθίνουσα δεξιά άπό τό 0, γιατί για κάθε x_1, x_2

$$0 \leq x_1 < x_2 \Rightarrow 1-x_1^2 > 1-x_2^2 \Rightarrow \varphi(x_1) > \varphi(x_2).$$


Τό διάγραμμα τής συναρτήσεως φ δίνεται στό σχ. 33.

Άνάλογα, για τή συνάρτηση ψ μέ $\psi(x) = (x-1)^2$ παρατηρούμε ότι

$$\psi(x) = (x-1)^2 \geq 0 = \psi(1) \quad \forall x \in \mathbb{R},$$


δηλαδή όλες οί τιμές τής συναρτήσεως ψ ξεπερνούν τήν τιμή της $\psi(1)$.

Στήν περίπτωση αυτή λέμε ότι ή συνάρτηση ψ παρουσιάζει ελάχιστο στό σημείο 1, ένω τήν



$$\Sigma\chi. 33 \quad \varphi: y = 1 - x^2$$

φ παρουσιάζει μέγιστο στό 0.



$$\Sigma\chi. 34 \quad \psi: y = (x-1)^2$$

ψ παρουσιάζει ελάχιστο στό 1

τιμή της $\psi(1)$ την ονομάζουμε ελάχιστη τιμή της. 'Ακόμη παρατηρούμε ότι ή ψ είναι γνησίως φθίνουσα στο $(-\infty, 1]$, δηλαδή άριστερά άπ' τό 1 και γνησίως αύξουσα στο $[1, +\infty)$ δηλαδή δεξιά άπό τό 1. Τό διάγραμμα τής συναρτήσεως ψ μάς τό δίνει τό σχ. 34.

Γενικά, γιά μιá συνάρτηση $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ ($A \subseteq \mathbb{R}$) λέμε ότι παρουσιάζει *μέγιστο* (ή *όλικό μέγιστο*) σ' ένα σημείο $x_0 \in A$, τότε και μόνο τότε, αν ισχύει

$$f(x) \leq f(x_0) \quad \forall x \in A.$$

Τήν τιμή $f(x_0)$ την ονομάζουμε, τότε, *μεγίστη τιμή* (ή *όλικό μέγιστο*) τής f .

Παρόμοια, λέμε ότι ή f παρουσιάζει *ελάχιστο* (ή *όλικό ελάχιστο*) σ' ένα σημείο $x_0 \in A$, τότε και μόνο τότε, αν ισχύει

$$f(x) \geq f(x_0) \quad \forall x \in A.$$

Τήν τιμή $f(x_0)$ την ονομάζουμε, τότε, *ελάχιστη τιμή* (ή *όλικό ελάχιστο*) τής f .

Εφαρμογές :

1. 'Η συνάρτηση f μέ $f(x) = \alpha x^2$ ($\alpha \in \mathbb{R} - \{0\}$). Διακρίνουμε τίς παρακάτω δύο περιπτώσεις:

περίπτωση $\alpha > 0$

'Η f παρουσιάζει *ελάχιστο* στο 0, επειδή

$$f(x) = \alpha x^2 \geq 0 = f(0) \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

$f \downarrow (-\infty, 0]$, επειδή γιά κάθε x_1, x_2

$$x_1 < x_2 \leq 0 \Rightarrow \alpha x_1^2 > \alpha x_2^2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)$$

$f \uparrow [0, +\infty)$, επειδή γιά κάθε x_1, x_2

$$0 \leq x_1 < x_2 \Rightarrow \alpha x_1^2 < \alpha x_2^2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$$

περίπτωση $\alpha < 0$

'Η f παρουσιάζει *μέγιστο* στο 0, επειδή


$$f(x) = \alpha x^2 \leq 0 = f(0) \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

$f \uparrow (-\infty, 0]$, επειδή γιά κάθε x_1, x_2


$$x_1 < x_2 \leq 0 \Rightarrow \alpha x_1^2 < \alpha x_2^2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$$

$f \downarrow [0, +\infty)$, επειδή γιά κάθε x_1, x_2

$$0 \leq x_1 < x_2 \Rightarrow \alpha x_1^2 > \alpha x_2^2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)$$



Σχ. 35 $f: y = \alpha x^2, \alpha > 0$



Σχ. 36 $f: y = \alpha x^2, \alpha < 0$

Παρατήρηση. 'Η παραπάνω συνάρτηση f δέν είναι άμφιμονοσήμαντη, επειδή γιά κάθε πραγματικό άριθμό x ισχύει


$$f(x) = \alpha x^2 = \alpha (-x)^2 = f(-x).$$

'Αντίθετα, οί συναρτήσεις $\varphi: [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ και $\psi: (-\infty, 0] \rightarrow \mathbb{R}$, πού όρίζονται άπό τόν ίδιο τύπο

$$y = \alpha x^2$$


είναι γνησίως μονότονες και έπομένως άμφιμονοσήμαντες συναρτήσεις. 'Αρα οί συναρτήσεις

αυτές έχουν αντίστροφες συναρτήσεις που παριστάνονται γεωμετρικά στα παρακάτω σχήματα.




$$\alpha > 0$$

Σχ. 37




$$\alpha > 0$$

Σχ. 38



$$\alpha < 0$$

Σχ. 39



$$\alpha < 0$$

Σχ. 40

2. Η τριώνυμη συνάρτηση δεύτερου βαθμού f με $f(x) = \alpha x^2 + \beta x + \gamma$, όπου α, β, γ είναι πραγματικοί αριθμοί και $\alpha \neq 0$.

Πρώτα παρατηρούμε ότι

$$y = \alpha x^2 + \beta x + \gamma = \alpha \left(x^2 + \frac{\beta}{\alpha} x \right) + \gamma = \alpha \left(x + \frac{\beta}{2\alpha} \right)^2 + \left(\gamma - \frac{\beta^2}{4\alpha} \right),$$

και επομένως, αν θέσουμε

$$X = x + \frac{\beta}{2\alpha} \text{ και } Y = y - \frac{4\alpha\gamma - \beta^2}{4\alpha},$$

θά έχουμε


$$Y = \alpha X^2,$$

καί οι άξονες x, y θά μεταφερθούν παράλληλα στους X, Y μέ άρχή τό σημείο


$$C = \left(-\frac{\beta}{2\alpha}, \frac{4\alpha\gamma - \beta^2}{4\alpha} \right) \quad (\text{βλ. παρακάτω σχ. 41 και 42}).$$

Τώρα, χρησιμοποιώντας τό προηγούμενο παράδειγμα, συμπεραίνουμε εύκολα ότι:

<p><i>περίπτωση $\alpha > 0$</i></p> <p>‘Η f παρουσιάζει ελάχιστο στό $-\frac{\beta}{2\alpha}$</p> <p>$f \downarrow \left(-\infty, -\frac{\beta}{2\alpha} \right]$ και $f \uparrow \left[-\frac{\beta}{2\alpha}, +\infty \right)$</p>	<p><i>περίπτωση $\alpha < 0$</i></p> <p>‘Η f παρουσιάζει μέγιστο στό $-\frac{\beta}{2\alpha}$</p> <p>$f \uparrow \left(-\infty, -\frac{\beta}{2\alpha} \right]$ και $f \downarrow \left[-\frac{\beta}{2\alpha}, +\infty \right)$</p>
---	--



Σχ. 41 $f: y = \alpha x^2 + \beta x + \gamma, \alpha > 0$



Σχ. 42 $f: y = \alpha x^2 + \beta x + \gamma, \alpha < 0$

3. ‘Η διτετραγωνη τριώνυμη συνάρτηση f μέ $f(x) = \alpha x^4 + \beta x^2 + \gamma$, όπου α, β, γ είναι πραγματικοί αριθμοί και $\alpha \neq 0$. ‘Η μελέτη τής διτετραγωνης τριώνυμης συναρτήσεως f βασίζεται στό γεγονός ότι αυτή είναι ή σύνθεση τής συναρτήσεως h μέ $h(x) = x^2$ και τής τριώνυμης συναρτήσεως g μέ $g(x) = \alpha x^2 + \beta x + \gamma$. Έχοντας ύπόψη μας τό γεγονός αυτό, δηλαδή τό ότι $f = g \circ h$, σε συνδυασμό μέ τό θεώρημα 1.2.1, μπορούμε νά μελετήσουμε τή μεταβολή τής f και νά χαράξουμε τό διάγραμμά της, όπως φαίνεται στα παρακάτω παραδείγματα:

Παράδειγμα 1. $f(x) = 2x^4 - 4x^2 - 1$
 $h(x) = x^2$
 $g(x) = 2x^2 - 4x - 1 = 2(x - 1)^2 - 3$

‘Από τά συμπεράσματα τών παραπάνω εφαρμογών 1 και 2, ή μεταβολή τών συναρτήσεων h και g δίδεται από τούς πίνακες:

x	0
$h(x)$	0

x	1
$g(x)$	-3

‘Επειδή $f(x) = g[h(x)]$ και ή g έχει διαφορετικό είδος μονοτονίας στά διαστήματα $(-\infty, 1]$ και $[1, +\infty)$, πρέπει νά μελετήσουμε τή συνάρτηση f , ως προς τή μονοτονία, σ’ εκείνα τά υποδιαστήματα τών $(-\infty, 0]$ και $[0, +\infty)$ όπου ή h πληροί μία από τίς συνθήκες

$$h(x) = x^2 \leq 1 \quad \text{και} \quad h(x) = x^2 \geq 1$$

δηλαδή στά διαστήματα $(-\infty, -1], [-1, 0], [0, 1]$ και $[1, +\infty)$.

(i) Στο διάστημα $(-\infty, -1]$, όπως φαίνεται από τον πρώτο πίνακα, η συνάρτηση h είναι γνησίως φθίνουσα, άρα

$$h(x) = x^2 \geq (-1)^2 = 1 \quad \forall x \in (-\infty, -1],$$

δηλαδή οι αντίστοιχες τιμές της h ανήκουν στο διάστημα $[1, +\infty)$, όπου, όπως προκύπτει από τον δεύτερο πίνακα, η g είναι γνησίως αύξουσα. Άρα, σύμφωνα με το θεώρημα 1.2.1 ή σύνθεση $f = g \circ h$, δηλαδή η συνάρτηση f , είναι *γνησίως φθίνουσα* στο $(-\infty, -1]$.

(ii) Στο διάστημα $[-1, 0]$, όπως φαίνεται από τον πρώτο πίνακα, η συνάρτηση h είναι γνησίως φθίνουσα, άρα

$$h(x) = x^2 \leq (-1)^2 = 1 \quad \forall x \in [-1, 0],$$

δηλαδή οι αντίστοιχες τιμές της h ανήκουν στο διάστημα $(-\infty, 1]$, όπου, όπως φαίνεται από το δεύτερο πίνακα, η g είναι επίσης γνησίως φθίνουσα. Άρα, σύμφωνα με το θεώρημα 1.2.1, ή σύνθεση $f = g \circ h$ είναι *γνησίως αύξουσα* στο $[-1, 0]$.

(iii) Παρόμοια, στο διάστημα $[0, 1]$, όπως φαίνεται από τον πρώτο πίνακα η συνάρτηση h είναι γνησίως αύξουσα, άρα

$$h(x) = x^2 \leq 1^2 = 1 \quad \forall x \in [0, 1],$$

δηλαδή οι αντίστοιχες τιμές της h ανήκουν στο διάστημα $(-\infty, 1]$, όπου η g είναι γνησίως φθίνουσα. Άρα η σύνθεση $f = g \circ h$ είναι *γνησίως φθίνουσα* στο $[0, 1]$.

(iv) Τέλος, στο διάστημα $[1, +\infty)$, η συνάρτηση h είναι γνησίως αύξουσα, άρα


$$h(x) = x^2 \geq 1^2 = 1 \quad \forall x \in [1, +\infty),$$

δηλαδή οι αντίστοιχες τιμές της h ανήκουν στο διάστημα $[1, +\infty)$, όπου, όπως φαίνεται από το δεύτερο πίνακα, η g είναι επίσης γνησίως αύξουσα. Άρα η σύνθεση $f = g \circ h$ είναι γνησίως αύξουσα στο $[1, +\infty)$.

Από τα παραπάνω προκύπτει τώρα ο εξής πίνακας μεταβολής της f .

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
$f(x)$	\searrow	-3	\nearrow	-1	\searrow
				-3	\nearrow

περίπτωση $ab < 0$



Σχ. 43 $f: y = 2x^4 - 4x^2 - 1$.

Παράδειγμα 2. $f(x) = 2x^4 + 4x^2 - 3$

$h(x) = x^2$

$g(x) = 2x^2 + 4x - 3 = 2(x+1)^2 - 5.$

Οί πίνακες μεταβολής τών συναρτήσεων h και g είναι :


x	0
h(x)	0

x	-1
g(x)	-5

*Από τούς παραπάνω πίνακες μεταβολής τών συναρτήσεων h και g βλέπουμε ότι και στα δύο διαστήματα $(-\infty, 0]$ και $[0, +\infty)$ η συνάρτηση h παίρνει τιμές στο $[0, +\infty)$, όπου η g είναι γνησίως αύξουσα. *Αρα εφαρμόζοντας τό θεώρημα 1.2.1 παίρνουμε τόν παρακάτω πίνακα μεταβολής τής διτετραγωνής τριώνυμης συναρτήσεως $f = g \circ h$.

x	0
f(x)	-3

περίπτωση $\alpha\beta \geq 0$



Σχ. 44 $f: y = 2x^4 + 4x^2 - 3.$

2.2 Τοπικά άκρότατα συναρτήσεως. Στο παράδειγμα 1 τής παραπάνω εφαρμογής 3 είδαμε ότι η διτετραγωνή τριώνυμη συνάρτηση f με $f(x) = 2x^4 - 4x^2 - 1$ (βλ. σχ. 43) παρουσιάζει τόσο στο σημείο -1 όσο και στο 1 (όλικό) έλάχιστο μέ έλάχιστη τιμή τό -3 . *Αντίθετα η συνάρτηση αυτή δέν παρουσιάζει (όλικό) μέγιστο. *Αν όμως περιορισθούμε στο άνοικτό διάστημα $(-1,1)$, τότε παρατηρούμε ότι ισχύει

$$f(x) \leq f(0) = -1 \quad \forall x \in (-1,1)$$

δηλαδή οί τιμές τής f στο διάστημα $(-1,1)$ δέν ξεπερνούν τήν τιμή της στο ση-

μείο 0. Στην περίπτωση αυτή λέμε ότι η συνάρτηση f παρουσιάζει στο σημείο 0 *τοπικό μέγιστο*.

Γενικά, λέμε ότι μία συνάρτηση $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ ($A \subseteq \mathbb{R}$) παρουσιάζει *τοπικό μέγιστο* σ' ένα σημείο $x_0 \in A$, τότε και μόνο τότε, αν υπάρχει ένα *ανοικτό* διάστημα (a, b) που περιέχει τό x_0 και περιέχεται στο πεδίο ορισμού A τής f , δηλαδή $x_0 \in (a, b) \subseteq A$, τέτοιο ώστε νά ισχύει

$$f(x) \leq f(x_0) \quad \forall \quad x \in (a, b).$$

Τήν τιμή $f(x_0)$ ονομάζουμε τότε *τοπικά μέγιστη τιμή* (ή *τοπικό μέγιστο*) τής f .

Παρόμοια, λέμε ότι η συνάρτηση f παρουσιάζει *τοπικό ελάχιστο* σ' ένα σημείο $x_0 \in A$, τότε και μόνο τότε, αν υπάρχει ένα *ανοικτό* διάστημα $(a, b) \subseteq A$ που νά περιέχει τό x_0 και τέτοιο ώστε νά ισχύει

$$f(x) \geq f(x_0) \quad \forall \quad x \in (a, b).$$

Τήν τιμή $f(x_0)$ τήν ονομάζουμε τότε *τοπικά ελάχιστη τιμή* (ή *τοπικό ελάχιστο*) τής f .

Όταν μία συνάρτηση f παρουσιάζει σ' ένα σημείο x_0 τοπικό μέγιστο ή τοπικό ελάχιστο, τότε λέμε ότι αυτή παρουσιάζει στο σημείο x_0 *τοπικό άκρότατο*. Λ.χ. ή διτετράγωνη τριώνυμη συνάρτηση f με $f(x) = 2x^4 - 4x^2 - 1$ (βλ. σχ. 43) παρουσιάζει στά σημεία $-1, 0, 1$ τοπικά άκρότατα. Άκριβέστερα αυτή παρουσιάζει στά σημεία $-1, 1$ (όλικό) ελάχιστο και στο σημείο 0 τοπικό μέγιστο.

3. ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

3.1 'Η μελέτη μιās πραγματικής συναρτήσεως μιās πραγματικής μεταβλητής άποτελείται από τήν τμηματική (κατά διαστήματα) μελέτη τής μονοτονίας της, τόν καθορισμό τών σημείων όπου αυτή παρουσιάζει τοπικά άκρότατα και τόν ύπολογισμό τών άκροτάτων τιμών της, δηλαδή τών τοπικών μεγίστων και τοπικών ελαχίστων τιμών της. Με τή βοήθεια τών παραπάνω στοιχείων, τά όποια προκύπτουν από τή μελέτη μιās συναρτήσεως, μπορούμε νά παραστήσουμε γεωμετρικά αυτή τή συνάρτηση, δηλαδή νά χαράξουμε τό διάγραμμα της. Στη χάραξη του διαγράμματος μιās συναρτήσεως διευκολυνόμαστε πολύ αν καθορίσουμε, πρώτα, όρισμένα σημεία του διαγράμματος που τά εκλέγουμε, αυθαίρετα και κατά τέτοιον τρόπο, ώστε αυτά νά χαρακτηρίζουν τό διάγραμμα, αν είναι δυνατό, σε όλη τήν έκτασή του.

3.2 'Η συνάρτηση f με $f(x) = \gamma \sqrt{\alpha^2 - x^2}$, όπου α, γ είναι πραγματικοί άριθμοί γαί $\alpha > 0$. Τό πεδίο ορισμού αυτής είναι τό κλειστό διάστημα $[-\alpha, \alpha]$. Άκόμη γαί $\gamma > 0$ ή συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα στο διάστημα $[-\alpha, 0]$, γιατί γαί όποιαδήποτε x_1, x_2 στο $[-\alpha, 0]$ ισχύει

$$x_1 < x_2 \Rightarrow x_1^2 > x_2^2 \Rightarrow \alpha^2 - x_1^2 < \alpha^2 - x_2^2 \Rightarrow \sqrt{\alpha^2 - x_1^2} < \sqrt{\alpha^2 - x_2^2} \Rightarrow f(x_1) = \gamma \sqrt{\alpha^2 - x_1^2} < \gamma \sqrt{\alpha^2 - x_2^2} = f(x_2),$$

ένω αυτή είναι γνησίως φθίνουσα στο διάστημα $[0, \alpha]$, γιατί για οποιαδήποτε x_1, x_2 στο $[0, \alpha]$ ισχύει

$$x_1 < x_2 \Rightarrow x_1^2 < x_2^2 \Rightarrow \alpha^2 - x_1^2 > \alpha^2 - x_2^2 \Rightarrow \sqrt{\alpha^2 - x_1^2} > \sqrt{\alpha^2 - x_2^2} \Rightarrow f(x_1) = \gamma \sqrt{\alpha^2 - x_1^2} > \gamma \sqrt{\alpha^2 - x_2^2} = f(x_2).$$

Παρόμοια, για $\gamma < 0$ έχουμε $f \downarrow [-\alpha, 0]$ και $f \uparrow [0, \alpha]$.

Έτσι, η μεταβολή της συναρτήσεως f δίδεται από τους πίνακες:

x	$-\alpha$	0	α
f(x)	0 ↗	$\gamma\alpha$	↘ 0


$\gamma > 0$

x	$-\alpha$	0	α
f(x)	0 ↘	$\gamma\alpha$	↗ 0


$\gamma < 0$

Από τους πίνακες αυτούς βλέπουμε ότι η συνάρτηση f παρουσιάζει στο σημείο 0 μέγιστο με μέγιστη τιμή $\gamma\alpha$ αν $\gamma > 0$ και ελάχιστο με ελάχιστη τιμή $\gamma\alpha$ αν $\gamma < 0$.

Τό διάγραμμα της συναρτήσεως f δίνεται στα παρακάτω σχήματα:



Σχ. 45 $f: y = \gamma\sqrt{\alpha^2 - x^2}, \gamma > 0$



Σχ. 46 $f: y = \gamma\sqrt{\alpha^2 - x^2}, \gamma < 0$


Για ακριβέστερη χάραξη του διαγράμματος μίας συναρτήσεως σχεδιάζουμε πρώτα όρισμένα σημεία του διαγράμματος, τα όποια το χαρακτηρίζουν σε όλη την έκτασή του. Έτσι π.χ. στην παραπάνω περίπτωση για $\alpha = 4$,

$\gamma = \frac{3}{4}$ χαράζουμε τό διάγραμμα της συναρτήσεως f με $f(x) = \frac{3}{4} \sqrt{16 - x^2}$ με τή βοήθεια του πίνακα μεταβολής της

x	-4	0	4
f(x)	0 ↗	3	↘ 0

καί του παρακάτω πίνακα πού δίνει τίς συντεταγμένες όρισμένων σημείων του διαγράμματος.

x	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
f(x)	0	$\frac{3\sqrt{7}}{4}$	$\frac{3\sqrt{3}}{2}$	$\frac{3\sqrt{15}}{4}$	3	$\frac{3\sqrt{15}}{4}$	$\frac{3\sqrt{3}}{2}$	$\frac{3\sqrt{7}}{4}$	0
Μέ προσέγγιση									
f(x)	0	1,98	2,60	2,90	3	2,90	2,60	1,98	0




Σχ. 47 $f: y = \frac{3}{4} \sqrt{16 - x^2}$.


Ειδικές περιπτώσεις:

3.2.1 $\gamma=1$, δηλαδή $f(x) = \sqrt{\alpha^2 - x^2}$. Στην περίπτωση αυτή έχουμε ως διάγραμμα της f τό πάνω ημικύκλιο που έχει κέντρο 0 και ακτίνα α . Πραγματικά: από τό πυθαγόρειο θεώρημα, κάθε σημείο $P = (x,y)$ του διαγράμματος της f επαληθεύει τή σχέση $OP^2 = x^2 + y^2 = x^2 + (\sqrt{\alpha^2 - x^2})^2 = x^2 + (\alpha^2 - x^2) = \alpha^2$, άρα ή απόσταση κάθε σημείου του διαγράμματος της f από τήν άρχή τών άξόνων είναι σταθερή και ίση μέ α . Ακόμη, κάθε σημείο $P = (x,y)$ του πάνω ημικυκλίου (άρα $y \geq 0$) είναι σημείο του διαγράμματος της f , άφου πάλι από τό πυθαγόρειο θεώρημα έχουμε


$$\alpha^2 = OP^2 = x^2 + y^2 \Rightarrow y^2 = \alpha^2 - x^2 \Rightarrow y = \sqrt{\alpha^2 - x^2} = f(x).$$



Σχ. 48 $f: y = \sqrt{\alpha^2 - x^2}$



Σχ. 49 $-f: y = -\sqrt{\alpha^2 - x^2}$



Σχ. 50 $x^2 + y^2 = \alpha^2$

Είναι φανερό ότι τό διάγραμμα της συναρτήσεως $-f$ είναι τό κάτω ημικύκλιο που έχει κέντρο τό 0 και ακτίνα α (βλ. σχ. 49). Άρα ό κύκλος μέ κέντρο 0 και ακτίνα α είναι ή ένωση τών διαγραμμάτων τών συναρτήσεων f και $-f$. Κάθε σημείο $P = (x,y)$ του κύκλου μέ κέντρο 0 και ακτίνα α επαληθεύει τή σχέση

$$(6) \quad x^2 + y^2 = \alpha^2$$

όπως, εύκολα, μπορεί νά προκύψει, από τό πυθαγόρειο θεώρημα. Άλλά και άντιστρόφως: κάθε σημείο $P = (x,y)$, που επαληθεύει τήν (6) βρίσκεται πάνω στον κύκλο μέ κέντρο 0 και ακτίνα α , όπως πάλι εύκολα προκύπτει από τό πυθαγόρειο θεώρημα.

Ώστε ή σχέση (6) χαρακτηρίζει τό σύνολο τών σημείων του έπιπέδου,

πού βρίσκονται πάνω στον κύκλο με κέντρο 0 και ακτίνα α , και ονομάζεται *εξίσωση του κύκλου αυτού*.


Γενικότερα η σχέση

$$(7) \quad (x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 = \alpha^2,$$

όπου x_0, y_0 είναι σταθεροί πραγματικοί αριθμοί, με την αντικατάσταση $X = x - x_0$ και $Y = y - y_0$, γράφεται και έτσι:

$$X^2 + Y^2 = \alpha^2$$

πού είναι η εξίσωση του κύκλου με κέντρο την αρχή $C = (x_0, y_0)$ των νέων αξόνων X, Y και ακτίνα α (βλ. σχ. 51). Η παραπάνω σχέση (7) ονομάζεται *εξίσωση του κύκλου με κέντρο $C = (x_0, y_0)$ και ακτίνα α* .




Σχ. 51 $(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 = \alpha^2$


3.2.2 $\gamma = \frac{\beta}{\alpha}$, δηλαδή $f(x) = \frac{\beta}{\alpha} \sqrt{\alpha^2 - x^2}$, όπου α και β είναι θετικοί αριθμοί. Στην περίπτωση αυτή ο πίνακας μεταβολής της f είναι

x	$-\alpha$	0	α
$f(x)$	0	β	0

Τά διαγράμματα της f και της $-f$ δίδονται στα παρακάτω σχήματα:



Σχ. 52 $f: y = \frac{\beta}{\alpha} \sqrt{\alpha^2 - x^2}$



Σχ. 53 $-f: y = -\frac{\beta}{\alpha} \sqrt{\alpha^2 - x^2}$

Τήν ένωση τών παραπάνω διαγραμμάτων τών συναρτήσεων f και $-f$ τήν ονομάζουμε *έλλειψη με κέντρο 0 και ημιάξονες α, β* .

Κάθε σημείο $P = (x, y)$ τής έλλείψεως αυτής επαληθεύει τή σχέση

$$(8) \quad \frac{x^2}{\alpha^2} + \frac{y^2}{\beta^2} = 1,$$

έπειδή, αν τό P ανήκει στό διάγραμμα τής f (πού ονομάζεται και *πάνω ημιέλλειψη με κέντρο 0 και ημιάξονες α, β*), έχουμε

$$y = \frac{\beta}{\alpha} \sqrt{\alpha^2 - x^2} \Rightarrow y^2 = \frac{\beta^2}{\alpha^2} (\alpha^2 - x^2) \Rightarrow (8),$$

καί ἄν τό P ἀνήκει στό διάγραμμα τῆς $-f$ (πού ὀνομάζεται καί *κάτω ἡμιέλλειψη μέ κέντρο 0 καί ἡμιάξονες α, β*), πάλι ἔχουμε

$$y = -\frac{\beta}{\alpha} \sqrt{\alpha^2 - x^2} \Rightarrow y^2 = \frac{\beta^2}{\alpha^2} (\alpha^2 - x^2) \Rightarrow (8).$$

Ἄλλά καί ἀντιστρόφως : ἄν γιά ἓνα σημεῖο $P=(x, y)$ ἡ (8) ἐπαληθεύεται, τότε τό P εἶναι σημεῖο τῆς ἑλλείψεως, γιατί

$$(8) \left. \begin{array}{l} y \geq 0 \end{array} \right\} \Rightarrow y = \frac{\beta}{\alpha} \sqrt{\alpha^2 - x^2} \Rightarrow$$

P ἀνήκει στό διάγραμμα τῆς $-f$

$$(8) \left. \begin{array}{l} y \leq 0 \end{array} \right\} \Rightarrow y = -\frac{\beta}{\alpha} \sqrt{\alpha^2 - x^2} \Rightarrow P \text{ ἀνήκει στό διάγραμμα τῆς } -f.$$

Ἡ σχέση (8) χαρακτηρίζει τά σημεῖα τῆς ἑλλείψεως μέ κέντρο 0 καί ἡμιάξονες α, β καί ὀνομάζεται *ἐξίσωση* τῆς ἑλλείψεως αὐτῆς.


3.3 Ἡ συνάρτηση f μέ $f(x) = \gamma \sqrt{x^2 - \alpha^2}$, ὅπου α, γ εἶναι πραγματικοί ἀριθμοί καί $\alpha > 0$. Τό πεδίο ὀρισμοῦ τῆς συναρτήσεως αὐτῆς εἶναι ἡ ἔνωση τῶν διαστημάτων $(-\infty, -\alpha]$ καί $[\alpha, +\infty)$. Ὅπως καί στήν προηγούμενη § 3.2 προκύπτει καί ἐδῶ ὅτι ὁ πίνακας μεταβολῆς τῆς συναρτήσεως f εἶναι:

x	$-\alpha$	α
f(x)	↘ 0	0 ↗


$\gamma > 0$

x	$-\alpha$	α
f(x)	↗ 0	0 ↘

$\gamma < 0$



Σχ. 55 $f: y = \gamma \sqrt{x^2 - \alpha^2}, \gamma > 0$




Σχ. 56 $f: y = \gamma \sqrt{x^2 - \alpha^2}, \gamma < 0$

Γιά τή χάραξη τῶν διαγραμμάτων τῶν παραπάνω σχημάτων 55 καί 56 διευκολύνουν καί οἱ εὐθείες μέ ἐξισώσεις $y = \gamma x$ καί $y = -\gamma x$, γιατί, π.χ. στήν περίπτωση $\gamma > 0$, ἔχουμε

$$f(x) = \gamma \sqrt{x^2 - \alpha^2} = \gamma |x| \sqrt{1 - \frac{\alpha^2}{x^2}} < \gamma |x|$$

$f(x) < -\gamma x \quad \forall x \in (-\infty, -\alpha]$
 $f(x) < \gamma x \quad \forall x \in [\alpha, +\infty)$

Ειδικά, τώρα, αν θεωρήσουμε τα διαγράμματα των συναρτήσεων, τα όποια απεικονίζονται στις τιμές $\gamma = \frac{\beta}{\alpha}$ και



$\gamma = -\frac{\beta}{\alpha}$, όπου, εκτός από τό α , και τό β είναι θετικός αριθμός, τότε η ένωση των διαγραμμάτων αυτών (βλ. σχ. 57) ονομάζεται *υπερβολή*.

‘Η σχέση

$$(9) \quad \frac{x^2}{\alpha^2} - \frac{y^2}{\beta^2} = 1,$$

όπως μπορεί να προκύψει εύκολα, αν εργαστούμε όπως και στην περίπτωση της έλλειψως, χαρακτηρίζει τα σημεία της υπερβολής και ονομάζεται *έξισωση της υπερβολής*.

Σχ. 57 $\frac{x^2}{\alpha^2} - \frac{y^2}{\beta^2} = 1$
υπερβολή.

Οι ευθείες με εξισώσεις $y = \frac{\beta}{\alpha} x$ και $y = -\frac{\beta}{\alpha} x$ που διευκολύνουν τή χάραξη της υπερβολής με εξίσωση τήν (9) ονομάζονται *ασύμπτωτες* της υπερβολής.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

9. α) Νά μελετηθούν ως προς τή μονοτονία οι συναρτήσεις που όρίζονται από τούς τύπους:

1) $f(x) = x^3 + 1$

2) $f(x) = -x^3 - 1$

3) $f(x) = x^2 + 1, x \geq 0$

4) $f(x) = \frac{1}{x^2 + 1}, x \geq 0$.

β) ‘Αν ή f είναι μιά μονότονη ή γνησίως μονότονη συνάρτηση, τί συμπεραίνετε γενικά για τή συνάρτηση $-f$ σχετικά με τή μονοτονία της; ‘Αν και αυτή, δηλαδή ή $-f$ είναι μονότονη, πώς συσχετίζεται τό είδος της μονοτονίας αυτής με τό είδος της μονοτονίας της f ;

γ) Νά εξετασθεί τό ίδιο έρώτημα, όπως και στό β), για τή συνάρτηση $\frac{1}{f}$, όπου έδω ύποθέτουμε, βέβαια, ότι $f(x) \neq 0$ για κάθε x στό πεδίο όρισμού της f .

10. Θεωρούμε δύο πραγματικές συναρτήσεις f και g με κοινό πεδίο όρισμού.

1) Νά αποδειχθεί ότι

α) αν $f \uparrow$ και $g \uparrow$, τότε $f + g \uparrow$ γ) αν $f \downarrow$ και $g \downarrow$, τότε $f + g \downarrow$

β) αν $f \uparrow$ και $g \downarrow$, τότε $f + g \uparrow$ δ) αν $f \downarrow$ και $g \uparrow$, τότε $f + g \downarrow$

ε) αν οι συναρτήσεις f και g είναι μονότονες αλλά με διαφορετικό είδος μονοτονίας, τί συμπεραίνετε για τή μονοτονία της $f + g$;

2) ‘Αν $f(x) > 0$ και $g(x) > 0$ για κάθε x , ν’ αποδείξετε ότι

α) αν $f \uparrow$ και $g \uparrow$, τότε $fg \uparrow$ γ) αν $f \downarrow$ και $g \downarrow$, τότε $fg \downarrow$

β) αν $f \uparrow$ και $g \downarrow$, τότε $fg \downarrow$ δ) αν $f \downarrow$ και $g \uparrow$, τότε $fg \uparrow$

ε) αν οι συναρτήσεις f και g είναι μονότονες αλλά με διαφορετικό είδος μονοτονίας, τί συμπεραίνετε για τη μονοτονία της fg ;

3) *Αν $f(x) > 0$ και $g(x) < 0$ για κάθε x , ν' αποδείξετε ότι

- α) αν $f \uparrow$ και $g \downarrow$, τότε $fg \downarrow$ δ) αν $f \downarrow$ και $g \uparrow$, τότε $fg \uparrow$
 β) αν $f \uparrow$ και $g \downarrow$, τότε $fg \downarrow$ ε) αν $f \downarrow$ και $g \uparrow$, τότε $fg \uparrow$
 γ) αν $f \uparrow$ και $g \downarrow$, τότε $fg \downarrow$ στ) αν $f \downarrow$ και $g \uparrow$, τότε $fg \uparrow$

ζ) αν οι συναρτήσεις f και g είναι μονότονες με τό ίδιο είδος μονοτονίας τί συμπεραίνετε για τη μονοτονία της fg ;

4) *Αν $f(x) < 0$ και $g(x) < 0$ για κάθε x , ν' αποδείξετε ότι

- α) αν $f \downarrow$ και $g \downarrow$, τότε $fg \uparrow$ γ) αν $f \uparrow$ και $g \downarrow$, τότε $fg \downarrow$
 β) αν $f \downarrow$ και $g \downarrow$, τότε $fg \uparrow$ δ) αν $f \uparrow$ και $g \downarrow$, τότε $fg \downarrow$
 ε) αν οι συναρτήσεις f και g είναι μονότονες αλλά με διαφορετικό είδος μονοτονίας, τί συμπεραίνετε για τη μονοτονία της fg ;

11. Νά μελετηθούν και νά παρασταθούν γεωμετρικά οι συναρτήσεις πού όρίζονται από τούς τύπους:

$$1) f(x) = \frac{3x+1}{2x+5} \quad 2) f(x) = \frac{1}{x+7} \quad 3) f(x) = \frac{x+2}{8x+1}$$

$$4) f(x) = \frac{x}{3x+2} \quad 5) f(x) = \frac{3x+2}{x} \quad 6) f(x) = \frac{7x+2}{5x+1}$$

12*. Νά μελετηθούν και νά παρασταθούν γεωμετρικά οι συναρτήσεις πού όρίζονται από τούς τύπους:

$$1) f(x) = 3x^2 + 2 \quad 2) f(x) = -4x^3 + 1 \quad 3) f(x) = 2x^4 - 1$$

$$4) f(x) = x^2 - 3x + 2 \quad 5) f(x) = -2x^2 + 3x + 5 \quad 6) f(x) = 3x^2 - 2x - 5$$

$$7) f(x) = x^4 + 2x^2 - 3 \quad 8) f(x) = -2x^4 + 3x^2 + 5$$

13. Νά χαραχθούν οι έλλείψεις με εξισώσεις:

$$1) \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1 \quad 2) x^2 + \frac{y^2}{4} = 1 \quad 3) \frac{x^2}{9} + y^2 = 1$$

$$4) \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1 \quad 5) x^2 + \frac{y^2}{4} = 4 \quad 6) \frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{12} = 3$$

14. Νά χαραχθούν οι ύπερβολές με εξισώσεις:

$$1) \frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1 \quad 2) x^2 - \frac{y^2}{9} = 1 \quad 3) \frac{x^2}{16} - y^2 = 1$$

$$4) \frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{8} = 8 \quad 5) x^2 - \frac{y^2}{9} = 4 \quad 6) \frac{x^2}{16} - y^2 = 4$$

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Ι Ε Σ

1. ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

1.1 Ἡ ἔννοια τῆς ἀκολουθίας. Ξέρουμε ἤδη (κεφ. I, § 2.2) τὴν ἔννοια τῆς συναρτήσεως (ἀπεικονίσεως) $f : A \rightarrow B$ μὲ πεδίο ὀρισμοῦ ἓνα σύνολο A καὶ μέ τιμές σ' ἓνα σύνολο B (A, B ὑποθέτουμε ὅτι εἶναι μὴ κενά). Ἐξ ἄλλου γιὰ τὰ στοιχεῖα x, y ποῦ συσχετίζονται μὲ τὴν f γράφουμε

$$A \ni x \mapsto y = f(x) \in B.$$

*Ἔτσι, γιὰ μιὰ συνάρτηση α μὲ πεδίο ὀρισμοῦ τὸ σύνολο N τῶν φυσικῶν ἀριθμῶν καὶ μέ τιμές στό B γράφουμε

$$\alpha : N \rightarrow B \text{ ἢ καὶ } N \ni v \mapsto \alpha(v) \in B.$$

Κάθε συνάρτηση, ὅπως ἡ παραπάνω α , ὀνομάζεται *μιὰ ἀκολουθία στοιχείων τοῦ συνόλου* B . Εἰδικά, ἂν $B \subseteq \mathbb{R}$ ἡ ἀκολουθία α ὀνομάζεται *ἀκολουθία πραγματικῶν ἀριθμῶν*.

*Ὡστε : *ἀκολουθία πραγματικῶν ἀριθμῶν εἶναι κάθε συνάρτηση μὲ πεδίο ὀρισμοῦ τὸ σύνολο N τῶν φυσικῶν ἀριθμῶν καὶ μέ τιμές στό σύνολο \mathbb{R} τῶν πραγματικῶν ἀριθμῶν, δηλαδή μιὰ ἀπεικόνιση τοῦ N στό \mathbb{R} .*

Στὴν περίπτωση μιᾶς ἀκολουθίας α συνηθίζουμε νὰ συμβολίζουμε τὴν τιμὴ τῆς $\alpha(v)$ μὲ α_v , γράφοντας τὸ φυσικὸ ἀριθμὸ v ὡς κάτω δείκτη τοῦ α . Τίς τιμές μιᾶς ἀκολουθίας α τίς ὀνομάζουμε ὄρους τῆς καὶ μπορούμε νὰ τοὺς καταχωρήσουμε σὲ ἓναν πίνακα μὲ τὸν ἑξῆς τρόπο:

1	2	3	...	v	...
α_1	α_2	α_3	...	α_v	...

Συνήθως ἡ πρώτη γραμμὴ τοῦ πίνακα παραλείπεται καὶ γράφονται μόνο οἱ ὄροι τῆς ἀκολουθίας, δηλαδή:

$$(1) \quad \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_v, \dots$$

Ὁ ὄρος α_1 ὀνομάζεται πρῶτος ὄρος τῆς ἀκολουθίας, ὁ α_2 δεῦτερος ὄρος καὶ γενικά ὁ α_v νιοστός ὄρος τῆς ἀκολουθίας.

*Ἐχει ἐπικρατήσει μιὰ ἀκολουθία α νὰ παριστάνεται μὲ τοὺς ὄρους τῆς ὅπως στὴν (1). Τότε λέμε «ἡ ἀκολουθία $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_v, \dots$ » ἢ καὶ ἀλλιῶς «ἡ

ἀκολουθία $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots$. Συντομώτερα ἡ ἀκολουθία (1) παριστάνεται καί ὡς ἐξῆς:

$$\alpha_n, n \in \mathbb{N} \quad \eta \quad \alpha_n, n = 1, 2, \dots$$

Παραδείγματα :

1. ἡ ἀκολουθία τῶν φυσικῶν ἀριθμῶν, δηλαδή ἡ ἀκολουθία

$$1, 2, 3, \dots, n, \dots$$

τῆς ὁποίας νιοστὸς ὅρος εἶναι ὁ ἀριθμὸς n , δηλαδή $\alpha_n = n$.

2. ἡ ἀκολουθία

$$1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{n}, \dots$$

τῆς ὁποίας ὁ νιοστὸς ὅρος εἶναι ὁ ἀριθμὸς $\frac{1}{n}$, δηλαδή $\alpha_n = \frac{1}{n}$.

3. ἡ ἀκολουθία

$$1, 4, 9, \dots, n^2, \dots$$


4. ἡ ἀκολουθία

$$-1, \frac{1}{2}, -\frac{1}{3}, \dots, (-1)^n \frac{1}{n}, \dots$$

1.1.1 Γεωμετρικὴ παράσταση ἀκολουθίας. Ἐάν $\alpha_n, n = 1, 2, \dots$ εἶναι μιὰ ἀκολουθία πραγματικῶν ἀριθμῶν, τότε τὸ διάγραμμά της S_α εἶναι τὸ σύνολο

$$\{(1, \alpha_1), (2, \alpha_2), \dots, (n, \alpha_n), \dots\}.$$


Ἡ γεωμετρικὴ παράσταση (τὸ διάγραμμα) αὐτοῦ τοῦ συνόλου ἢ, ὅπως καί ἄλλιῶς λέμε, τῆς ἀκολουθίας $\alpha_n, n = 1, 2, \dots$ ἀποτελεῖται ἀπὸ ἀπομονωμένα σημεῖα τοῦ ἐπιπέδου, ὅπως φαίνεται στὸ παρακάτω σχῆμα 58.



Σχ. 58

1.1.2 Φραγμένη ἀκολουθία. Γιά τὴν ἀκολουθία $\alpha_n = \frac{1}{n}, n = 1, 2, \dots$ παρατηροῦμε ὅτι ἰσχύει

$$0 \leq \alpha_n = \frac{1}{n} \leq 1 \quad \forall n \in \mathbb{N}$$



Σχ. 59

δηλαδή ὅλοι οἱ ὅροι τῆς ἀκολουθίας αὐτῆς βρίσκονται στὸ κλειστὸ διάστημα $[0, 1]$ καί τότε λέμε ὅτι ἡ ἀκολουθία αὐτὴ εἶναι *φραγμένη*.

☞ Γενικά: μιá áκολουθία πραγματικῶν ἀριθμῶν α_n , $n = 1, 2, \dots$ ὀνομάζεται φραγμένη, τότε καί μόνο τότε, ἂν ὑπάρχουν πραγματικοί ἀριθμοί γ καί δ τέτοιοι ὥστε νά ἰσχύει.

$$(2) \quad \gamma \leq \alpha_n \leq \delta \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Τότε οἱ ἀριθμοί γ καί δ ὀνομάζονται, ἀντίστοιχα, *κάτω* καί *ἄνω φράγμα* τῆς ἀκολουθίας α_n , $n = 1, 2, \dots$.

Ἄν τώρα θ εἶναι ἀριθμὸς μεγαλύτερος ἢ ἴσος ἀπ' τοὺς ἀριθμοὺς $|\gamma|$ καί $|\delta|$, τότε ἀπὸ τῆ (2) προκύπτει ὅτι:

$$\alpha_n \leq \delta \leq |\delta| < \theta \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

καί ἀκόμη

$$\alpha_n \geq \gamma \geq -|\gamma| \geq -\theta \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Ἄρα, ἰσχύει τότε

$$(3) \quad -\theta \leq \alpha_n \leq \theta \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

ἢ ἰσοδύναμα

$$(4) \quad |\alpha_n| \leq \theta \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Ἄλλὰ καί ἀντίστροφα, ἂν ἰσχύει ἡ (4), τότε ἡ ἀκολουθία α_n , $n = 1, 2, \dots$ εἶναι φραγμένη, ἀφοῦ ἡ (4) εἶναι ἰσοδύναμη μέ τὴν (3). Ἀποδείξαμε λοιπόν, ὅτι:

Μιá ἀκολουθία πραγματικῶν ἀριθμῶν α_n , $n = 1, 2, \dots$ εἶναι φραγμένη τότε καί μόνο τότε, ἂν ὑπάρχει πραγματικὸς ἀριθμὸς θ τέτοιος, ὥστε νά ἰσχύει

$$|\alpha_n| \leq \theta \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Στὴν περίπτωσι αὐτῆ ὁ ἀριθμὸς θ ὀνομάζεται *φράγμα* τῆς ἀκολουθίας α_n , $n = 1, 2, \dots$.

Φραγμένες ἀκολουθίες εἶναι, π.χ., οἱ $\frac{n \cdot \eta \mu \nu}{n+1}$, $n = 1, 2, \dots$ καί $\frac{2 \sigma \nu \nu}{\nu^3}$, $n = 1, 2, \dots$ γιατί ἰσχύουν

$$\left| \frac{n \eta \mu \nu}{n+1} \right| = \frac{n |\eta \mu \nu|}{n+1} \leq \frac{n}{n+1} \leq 1 \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

καί

$$\left| \frac{2 \sigma \nu \nu}{\nu^3} \right| = \frac{2 |\sigma \nu \nu|}{\nu^3} \leq \frac{2}{\nu^3} \leq 2 \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Ἀντίθετα, οἱ ἀκολουθίες ν^3 , $n = 1, 2, \dots$ καί $-\nu^2 + \nu$, $n = 1, 2, \dots$ δέν εἶναι φραγμένες, γιατί γιὰ κάθε πραγματικὸ ἀριθμὸ ἡ πρώτη ἔχει ὄρους μεγαλύτερους ἀπὸ αὐτὸν καί ἡ δεύτερη μικρότερους.

1.1.3 Μονότονη ἀκολουθία. Ἐφόσον ἡ ἀκολουθία εἶναι μιá εἰδική περίπτωσι συναρτήσεως, οἱ ἔννοιες *μονότονη* καί *γνησίως μονότονη ἀκολουθία* πραγματικῶν ἀριθμῶν εἶναι γνωστές, σύμφωνα μέ τοὺς ἀντίστοιχους ὁρισμοὺς πού δόθηκαν στὴν § 1.1 τοῦ κεφ. II, γιὰ πραγματικῆς συναρτήσεως μιᾶς πραγματικῆς μεταβλητῆς.

Ἀκριβέστερα μιá ἀκολουθία πραγματικῶν ἀριθμῶν α_n , $n = 1, 2, \dots$ εἶναι *αἰξουσα* τότε καί μόνο τότε, ἂν

$$v < \mu \Rightarrow \alpha_v \leq \alpha_\mu.$$

Παρόμοια, ή α_v , $v = 1, 2, \dots$ είναι φθίνουσα τότε και μόνο τότε, αν

$$v < \mu \Rightarrow \alpha_v \geq \alpha_\mu.$$

Επίσης, ή ακολουθία α_v , $v = 1, 2, \dots$ είναι γνησίως αύξουσα αν

$$v < \mu \Rightarrow \alpha_v < \alpha_\mu$$

και γνησίως φθίνουσα, αν

$$v < \mu \Rightarrow \alpha_v > \alpha_\mu.$$

Π.χ. ή ακολουθία v^2 , $v = 1, 2, \dots$ είναι γνησίως αύξουσα, γιατί

$$v < \mu \Rightarrow v^2 < \mu^2$$

ενώ ή ακολουθία $\frac{1}{v}$, $v = 1, 2, \dots$ είναι γνησίως φθίνουσα, γιατί

$$v < \mu \Rightarrow \frac{1}{v} > \frac{1}{\mu}.$$

Τώρα, είναι εύκολο νά διαπιστώσουμε ότι μιá ακολουθία α_v , $v = 1, 2, \dots$ είναι

αύξουσα, τότε και μόνο τότε, αν $\alpha_v \leq \alpha_{v+1} \quad \forall v \in \mathbf{N}$

φθίνουσα, τότε και μόνο τότε, αν $\alpha_v \geq \alpha_{v+1} \quad \forall v \in \mathbf{N}$

γνησίως αύξουσα, τότε και μόνο τότε, αν $\alpha_v < \alpha_{v+1} \quad \forall v \in \mathbf{N}$

γνησίως φθίνουσα, τότε και μόνο τότε, αν $\alpha_v > \alpha_{v+1} \quad \forall v \in \mathbf{N}$

1.2 Ή έννοια τής ύπακολουθίας. Αν α_v , $v = 1, 2, \dots$ είναι μιá ακολουθία και θεωρήσουμε τήν ακολουθία τών άρτίων φυσικῶν άριθμῶν $2v$, $v = 1, 2, \dots$, τότε μέ τή διαδοχική αντίστοιχίση

$$v \mapsto 2v \mapsto \alpha_{2v}$$

ορίζεται μιá νέα ακολουθία α_{2v} , $v = 1, 2, \dots$, δηλαδή ή ακολουθία

$$\alpha_2, \alpha_4, \alpha_6, \dots, \alpha_{2v}, \dots$$

πού άποτελείται άπό εκείνους τούς όρους τής α_v , $v = 1, 2, \dots$ πού έχουν δείκτη άρτιο. Ή νέα αυτή ακολουθία ονομάζεται *ύπακολουθία* τής α_v , $v = 1, 2, \dots$ και μάάλιστα *ύπακολουθία τών άρτιων δεικτῶν*.

Παρόμοια, ή ακολουθία

$$\alpha_1, \alpha_3, \alpha_5, \dots, \alpha_{2v-1}, \dots$$

μπορεί νά όρισθεϊ ώς ή *ύπακολουθία τών περιττῶν δεικτῶν* τής α_v , $v = 1, 2, \dots$

Λ.χ. αν $\alpha_v = (-1)^v \frac{1}{v}$, $v = 1, 2, \dots$, τότε ή ύπακολουθία τών άρτιων δεικτῶν είναι ή

$$\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{6}, \dots, \frac{1}{2v}, \dots$$

γμένες τῶν σημείων αὐτῶν, δηλαδή οἱ ὄροι $\alpha_3, \alpha_4, \alpha_5, \dots$ τῆς ἀκολουθίας μας, βρίσκονται στό ἀνοικτό διάστημα $(-\epsilon, \epsilon)$, δηλαδή

$$-\epsilon < \alpha_n < \epsilon \quad \forall n \geq n_0 = 3 \quad (\epsilon = 0,4)$$

ἡ ἰσοδύναμα

$$|\alpha_n| < \epsilon \quad \forall n \geq n_0 = 3.$$

Ἄν τώρα πάρουμε ἕναν ἄλλο θετικό ἀριθμό ϵ , π.χ. τόν $\epsilon = 0,16$ (μικρότερο τοῦ προηγούμενου) καί ἐπαναλάβουμε τά παραπάνω, τότε καταλήγουμε στό συμπέρασμα ὅτι τά σημεία P_1, P_2, P_3, P_4, P_5 καί P_6 βρίσκονται ἔξω ἀπό τήν ἀντίστοιχη ταινία, ἐνῶ τά σημεία P_7, P_8, P_9, \dots βρίσκονται μέσα σ' αὐτή. Μέ ἄλλα λόγια, οἱ τεταγμένες τῶν σημείων αὐτῶν, δηλαδή οἱ ὄροι $\alpha_7, \alpha_8, \alpha_9, \dots$ τῆς ἀκολουθίας μας, βρίσκονται στό ἀνοικτό διάστημα $(-\epsilon, \epsilon)$. Ἄρα ἰσχύει

$$-\epsilon < \alpha_n < \epsilon \quad \forall n \geq n_0 = 7 \quad (\epsilon = 0,16)$$

ἡ ἰσοδύναμα

$$|\alpha_n| < \epsilon \quad \forall n \geq n_0 = 7.$$

Στό ἴδιο συμπέρασμα καταλήγουμε καί ἂν πάρουμε ὡς ϵ ὅποιοδήποτε θετικό ἀριθμό, μόνο πού γιά κάθε ϵ ἀλλάζει ὁ δείκτης n_0 (παραπάνω εἶδαμε ὅτι γιά $\epsilon = 0,4$ ἔχουμε ὡς n_0 τό 3, ἐνῶ γιά $\epsilon = 0,16$, τό 7).

Τήν ἀκολουθία αὐτή, $\alpha_n, n = 1, 2, \dots$ μέ $\alpha_n = (-1)^n \frac{1}{n}$ πού ἱκανοποιεῖ τά παραπάνω, τή χαρακτηρίζουμε ὡς *μηδενική ἀκολουθία*.


Ἐναντίον, οἱ ἀκολουθίες $\beta_n = (-1)^n, n = 1, 2, \dots$ δηλαδή

$$-1, 1, -1, 1, \dots$$


καί $\gamma_n = \frac{1 - (-1)^n}{2}, n = 1, 2, \dots$ δηλαδή

$$0, 1, 0, 1, \dots$$

δέν πληροῦν τά παραπάνω (βλ. σχ. 61 καί 62) καί ἔτσι αὐτές δέν μποροῦν νά χαρακτηρισθοῦν ὡς μηδενικές.



Σχ. 61



Σχ. 62

Ἄπό τά παραπάνω ὀδηγοῦμαστε στό νά δώσουμε τόν ἑξῆς ὄρισμό:

Μιά ἀκολουθία πραγματικῶν ἀιθμῶν $\alpha_n, n = 1, 2, \dots$ ὀνομάζεται *μηδενική ἀκολουθία* καί αὐτό θά τό συμβολίζουμε μέ

$$\alpha_n \rightarrow 0 \quad \text{ἢ καί} \quad \lim \alpha_n = 0$$

τότε και μόνο τότε, αν για κάθε $\varepsilon > 0$ υπάρχει δείκτης $v_0 = v_0(\varepsilon)$ (που εξαρτάται από το ε) τέτοιος ώστε να ισχύει.

$$|\alpha_n| < \varepsilon \quad \forall \quad n \geq v_0.$$

Για συντομία:

$$\alpha_n \rightarrow 0 \iff \forall \varepsilon > 0, \exists v_0 = v_0(\varepsilon): |\alpha_n| < \varepsilon \quad \forall n \geq v_0$$

Παραδείγματα:

1. Η ακολουθία $\alpha_n = \frac{1}{n}$, $n = 1, 2, \dots$ είναι μηδενική, γιατί για κάθε θετικό αριθμό ε υπάρχει δείκτης $v_0 = v_0(\varepsilon)$, (έδω μπορεί να ληφθεί ένας φυσικός αριθμός μεγαλύτερος του $\frac{1}{\varepsilon}$), τέτοιος ώστε

$$n \geq v_0 \Rightarrow |\alpha_n| = \frac{1}{n} \leq \frac{1}{v_0},$$

και, από την έκλογή του v_0 ,

$$v_0 > \frac{1}{\varepsilon} \Rightarrow \frac{1}{v_0} < \varepsilon.$$

*Αρα ισχύει $|\alpha_n| < \varepsilon \quad \forall n \geq v_0$. *Ωστε αποδείξαμε ότι

$$\forall \varepsilon > 0, \exists v_0 = v_0(\varepsilon) \left(\text{άρκει να ληφθεί } v_0 > \frac{1}{\varepsilon} \right): |\alpha_n| < \varepsilon \quad \forall n \geq v_0$$

δηλαδή

$$\alpha_n = \frac{1}{n} \rightarrow 0.$$

2. Η ακολουθία $\alpha_n = \frac{1}{\sqrt[n]{n}}$, $n = 1, 2, \dots$ είναι μηδενική, γιατί για οποιοδήποτε θετικό αριθμό ε υπάρχει δείκτης $v_0 = v_0(\varepsilon)$, (έδω μπορεί να ληφθεί ένας φυσικός αριθμός μεγαλύτερος του $\frac{1}{\varepsilon^2}$), τέτοιος ώστε

$$n \geq v_0 \Rightarrow |\alpha_n| = \frac{1}{\sqrt[n]{n}} \leq \frac{1}{\sqrt{v_0}},$$

και, από την έκλογή του v_0 ,

$$v_0 > \frac{1}{\varepsilon^2} \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{v_0}} < \varepsilon.$$

*Αρα ισχύει $|\alpha_n| < \varepsilon \quad \forall n \geq v_0$.

*Αποδείξαμε, λοιπόν, ότι:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists v_0 = v_0(\varepsilon) \left(\text{άρκει να ληφθεί } v_0 > \frac{1}{\varepsilon^2} \right): |\alpha_n| < \varepsilon \quad \forall n \geq v_0,$$

δηλαδή

$$\alpha_n = \frac{1}{\sqrt[n]{n}} \rightarrow 0.$$

1.3.1 Ιδιότητες των μηδενικών ακολουθιών. Έδω αναφέρονται οι βα-

σικότερες ιδιότητες τῶν μηδενικῶν ἀκολουθιῶν πού μάθαμε στή προηγούμενη τάξη.

$$1. \quad \alpha_n \rightarrow 0 \Leftrightarrow |\alpha_n| \rightarrow 0$$

Ἀπό αὐτή βρίσκουμε εὐκόλα καί ὅτι

$$\alpha_n \rightarrow 0 \Leftrightarrow -\alpha_n \rightarrow 0.$$

$$2. \quad \alpha_n \rightarrow 0 \Rightarrow \alpha_{k_n} \rightarrow 0,$$

ὅπου α_{k_n} , $n = 1, 2, \dots$ εἶναι ὁποιαδήποτε ὑπακολουθία τῆς α_n , $n = 1, 2, \dots$. Αὐτό σημαίνει ὅτι *κάθε ὑπακολουθία μηδενικῆς ἀκολουθίας εἶναι ἐπίσης μηδενική ἀκολουθία.*

$$3. \quad \alpha_n \rightarrow 0 \Rightarrow \alpha_{n^2}, n = 1, 2, \dots \text{ εἶναι φραγμένη.}$$

Τό ἀντίστροφο, ὅμως, δέν ἰσχύει, ὅπως μπορεῖ νά ἀποδειχθεῖ μέ τό παράδειγμα $\alpha_n = (-1)^n$.

Πραγματικά· αὐτή εἶναι φραγμένη γιατί

$$|\alpha_n| = 1 \leq 1 \text{ γιά κάθε } n \in \mathbb{N}$$

ἀλλά δέν εἶναι μηδενική.

$$4. \quad \left. \begin{array}{l} \alpha_n \rightarrow 0 \\ \beta_n \rightarrow 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \alpha_n + \beta_n \rightarrow 0.$$

$$5. \quad \left. \begin{array}{l} \alpha_n \rightarrow 0 \\ \beta_n, n = 1, 2, \dots \text{ φραγμένη} \end{array} \right\} \Rightarrow \alpha_n \beta_n \rightarrow 0.$$

Αὐτή μέ τήν ιδιότητα 3 μᾶς δίνουν τήν

$$\left. \begin{array}{l} \alpha_n \rightarrow 0 \\ \beta_n \rightarrow 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \alpha_n \beta_n \rightarrow 0$$

$$6. \quad \left. \begin{array}{l} \xi \in \mathbb{R} \\ \alpha_n \rightarrow 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \xi \alpha_n \rightarrow 0.$$

Αὐτή μέ τήν ιδιότητα 4 δίνουν τήν

$$\left. \begin{array}{l} \xi \in \mathbb{R}, \alpha_n \rightarrow 0 \\ \eta \in \mathbb{R}, \beta_n \rightarrow 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \xi \alpha_n + \eta \beta_n \rightarrow 0$$

Εἰδικά γιά $\xi = 1$ καί $\eta = -1$, παίρνομε

$$\left. \begin{array}{l} \alpha_n \rightarrow 0 \\ \beta_n \rightarrow 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \alpha_n - \beta_n \rightarrow 0.$$

$$7. \quad \left. \begin{array}{l} |\alpha_n| \leq |\beta_n| \quad \forall n \in \mathbb{N} \\ \beta_n \rightarrow 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \alpha_n \rightarrow 0.$$

$$8. \quad \alpha_n \rightarrow 0 \Rightarrow \sqrt[k]{|\alpha_n|} \rightarrow 0, \quad k \text{ σταθερός φυσικός ἀριθμός.}$$

Εφαρμογές :

1. Η ακολουθία $\alpha_n = \frac{v}{v^2 + v + 2}$, $v = 1, 2, \dots$ είναι μηδενική. Πραγματικά.

$$|\alpha_n| = \frac{v}{v^2 + v + 2} \leq \frac{v}{v^2} = \frac{1}{v} \quad \forall v \in \mathbb{N}$$

και επειδή $\frac{1}{v} \rightarrow 0$ από την ιδιότητα 7 παίρνουμε ότι και $\frac{v}{v^2 + v + 2} \rightarrow 0$.

2. Η ακολουθία $\alpha_n = \sqrt{v^3 + 2} - \sqrt{v^3 + 1}$, $v = 1, 2, \dots$ είναι μηδενική. Πραγματικά:

$$|\alpha_n| = \sqrt{v^3 + 2} - \sqrt{v^3 + 1} = \frac{1}{\sqrt{v^3 + 2} + \sqrt{v^3 + 1}} < \frac{1}{\sqrt{v^3} + \sqrt{v^3}} = \frac{1}{2v\sqrt{v}} < \frac{1}{v} \quad \forall v \in \mathbb{N}$$

και επειδή $\frac{1}{v} \rightarrow 0$, σύμφωνα με την ιδιότητα 7, και η ακολουθία $\alpha_n = \sqrt{v^3 + 2} - \sqrt{v^3 + 1}$, $v = 1, 2, \dots$ είναι μηδενική.

3. Η ακολουθία $\alpha_n = \omega^n$, $v = 1, 2, \dots$ με ω σταθερό πραγματικό αριθμό και $|\omega| < 1$ είναι μηδενική. Πραγματικά.

*Αν $\omega = 0$, τότε $\alpha_n = 0 \quad \forall v \in \mathbb{N}$ και ή $\alpha_n = 0$, $v = 1, 2, \dots$ είναι μηδενική.

*Αν $\omega \neq 0$, έχουμε $0 < |\omega| < 1 \Rightarrow \frac{1}{|\omega|} > 1$. Άρα $\frac{1}{|\omega|} = 1 + \theta$, $\theta > 0$ και επομένως

$$(5) \quad |\alpha_n| = |\omega|^n = \frac{1}{(1 + \theta)^n} \quad \forall v \in \mathbb{N}$$

*Αλλά επειδή $1 + \theta > 0$, σύμφωνα με τη γνωστή ανισότητα του Bernoulli (§ 2.3 του κεφ. 1)

$$(1 + \theta)^n \geq 1 + n\theta$$

έχουμε

$$(1 + \theta)^n > n\theta \quad \forall v \in \mathbb{N}$$

και τότε η (5) γίνεται

$$|\alpha_n| < \frac{1}{n\theta} = \frac{1}{\theta} \cdot \frac{1}{n} \quad \forall v \in \mathbb{N}.$$

*Άρα, επειδή $\frac{1}{n} \rightarrow 0$, από τις ιδιότητες 6 και 7, συμπεραίνουμε ότι και η ακολουθία $\alpha_n = \omega^n$, $v = 1, 2, \dots$ ($0 < |\omega| < 1$) είναι μηδενική.

Π.χ. οι ακολουθίες $\frac{1}{2^n}$, $v = 1, 2, \dots$, $\frac{1}{3^n}$, $v = 1, 2, \dots$ και $\frac{1}{10^n}$, $v = 1, 2, \dots$ είναι όλες μηδενικές ακολουθίες.

1.4 Συγκλίνουσες ακολουθίες. Για την ακολουθία $\alpha_n = \frac{v+1}{v}$, $v = 1, 2, \dots$

παρατηρούμε ότι ισχύει $\alpha_n - 1 = \frac{1}{v}$, δηλαδή η ακολουθία $\alpha_n - 1$, $v = 1, 2, \dots$ είναι μηδενική ακολουθία. Αυτό το εκφράζουμε λέγοντας ότι η ακολουθία $\frac{v+1}{v}$, $v = 1, 2, \dots$ συγκλίνει προς τον αριθμό 1.

Γενικά, λέμε ότι «μια ακολουθία πραγματικών αριθμών α_n , $v = 1, 2, \dots$ συγκλίνει προς τον πραγματικό αριθμό l » ή και αλλιώς «τένει προς τον πραγμα-

τικό αριθμό l και αυτό το συμβολίζουμε με $\lim \alpha_n = l$ ή $\alpha_n \rightarrow l$, τότε και μόνο τότε, αν η ακολουθία $\alpha_n - l$, $n = 1, 2, \dots$ δηλαδή η ακολουθία

$$\alpha_1 - l, \alpha_2 - l, \dots, \alpha_n - l, \dots$$

είναι μηδενική. Για συντομία γράφουμε:

$$\lim \alpha_n = l \iff \alpha_n - l \rightarrow 0$$

Ο αριθμός l είναι μοναδικός και ονομάζεται όριο ή όριακή τιμή της ακολουθίας α_n , $n = 1, 2, \dots$

Τό μονοσήμαντο της όριακής τιμής είναι φανερό για τις σταθερές ακολουθίες, ενώ γενικά προκύπτει από την ιδιότητα

$$\left. \begin{aligned} \lim \alpha_n = l_1 \\ \lim \alpha_n = l_2 \end{aligned} \right\} \Rightarrow l_1 = l_2.$$

Πραγματικά: επειδή $\lim \alpha_n = l_1$ και $\lim \alpha_n = l_2$ θα έχουμε $\alpha_n - l_1 \rightarrow 0$ και $\alpha_n - l_2 \rightarrow 0$ και έτσι, από την ιδιότητα 6 των μηδενικών ακολουθιών $(\alpha_n - l_2) - (\alpha_n - l_1) = l_1 - l_2 \rightarrow 0$ που σημαίνει ότι $l_1 - l_2 = 0$, ή $l_1 = l_2$, αφού πρόκειται για σταθερή ακολουθία.

1.4.1. ΘΕΩΡΗΜΑ. *Αν α_n , $n = 1, 2, \dots$ είναι μία ακολουθία πραγματικών αριθμών, τότε οι παρακάτω προτάσεις είναι ισοδύναμες:

(i) $\lim \alpha_n = l$

(ii) Για κάθε $\epsilon > 0$ υπάρχει δείκτης $n_0 = n_0(\epsilon)$ (που εξαρτάται από το ϵ) τέτοιος, ώστε να ισχύει

$$|\alpha_n - l| < \epsilon \text{ για κάθε } n \geq n_0.$$

*Απόδειξη. (i) \Rightarrow (ii). Πραγματικά: $\lim \alpha_n = l \Rightarrow \lim (\alpha_n - l) = 0$ και έτσι από τον ορισμό της μηδενικής ακολουθίας παίρνουμε

$$\forall \epsilon > 0, \exists n_0 = n_0(\epsilon): |\alpha_n - l| < \epsilon \quad \forall n \geq n_0.$$

(ii) \Rightarrow (i). Πραγματικά: από τον ορισμό της μηδενικής ακολουθίας η πρόταση (ii) σημαίνει ότι η ακολουθία $\alpha_n - l$, $n = 1, 2, \dots$ είναι μηδενική και αυτό συνεπάγεται την (i).

Παρατήρηση. *Αν θεωρήσουμε την ακολουθία $\frac{n+1}{n}$, $n = 1, 2, \dots$, που όπως ξέρουμε συγκλίνει προς τον αριθμό 1, τότε παρατηρούμε ότι και η ακολουθία $\frac{n+11}{n+10}$, $n = 1, 2, \dots$ δηλαδή η ακολουθία

$$\frac{12}{11}, \frac{13}{12}, \frac{14}{13}, \dots$$

ή οποία προκύπτει από την $\frac{n+1}{n}$, $n = 1, 2, \dots$ με διαγραφή των δέκα πρώτων όρων της επίσης συγκλίνει και μάλιστα προς τον αριθμό, 1, γιατί

$$\left| \frac{n+11}{n+10} - 1 \right| = \frac{1}{n+10} < \frac{1}{n} \rightarrow 0.$$

Γενικά, από τον ορισμό της συγκλίνουσας ακολουθίας μπορούμε να συμπεράνουμε εύκολα ότι η ιδιότητα να είναι μία ακολουθία συγκλίνουσα διατηρείται και μετά από τη διαγραφή ενός πεπερασμένου πλήθους όρων της και μάλιστα η όριακή τιμή της παραμένει αμετάβλητη.

*Αν $\alpha_n, n = 1, 2, \dots$ είναι μία ακολουθία και M ένα άπειρο υποσύνολο του συνόλου \mathbf{N} των φυσικών αριθμών, για έναν πραγματικό αριθμό l θα γράψουμε

$$\lim_{n \in M} \alpha_n = l$$

τότε και μόνο τότε, αν

$$\forall \varepsilon > 0, \exists v_0 = v_0(\varepsilon): |\alpha_n - l| < \varepsilon \quad \forall n \in M \text{ με } n \geq v_0.$$

*Ετσι είναι φανερό ότι για οποιοδήποτε τέτοιο σύνολο M ισχύει

$$(6) \quad \lim_{n \in M} \alpha_n = l \Rightarrow \lim_{n \in \mathbf{N}} \alpha_n = l.$$

και ακόμη ότι

$$\lim_{n \in \mathbf{N}} \alpha_n = l \Leftrightarrow \lim_{n \in \mathbf{N}} \alpha_n = l.$$

*Επίσης, από την παραπάνω παρατήρηση, για οποιοδήποτε πεπερασμένο υποσύνολο T του συνόλου \mathbf{N} ισχύει

$$\lim_{n \in M} \alpha_n = l \Rightarrow \lim_{n \in M \cup T} \alpha_n = l \quad \text{και} \quad \lim_{n \in M - T} \alpha_n = l.$$

Τέλος, αν M, M είναι άπειρα σύνολα υποσύνολα του \mathbf{N} , τότε

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{n \in M} \alpha_n = l \\ \lim_{n \in \Lambda} \alpha_n = l \end{array} \right\} \Rightarrow \lim_{n \in M \cup \Lambda} \alpha_n = l.$$

Πραγματικά: αν ε είναι ένας θετικός αριθμός, τότε επειδή $\lim_{n \in M} \alpha_n = l$

$$\exists v_1 = v_1(\varepsilon): |\alpha_n - l| < \varepsilon \quad \forall n \in M \text{ με } n \geq v_1$$

και επειδή $\lim_{n \in \Lambda} \alpha_n = l$, πάλι

$$\exists v_2 = v_2(\varepsilon): |\alpha_n - l| < \varepsilon \quad \forall n \in \Lambda \text{ με } n \geq v_2$$

*Ετσι για $v_0 = \max\{v_1, v_2\}$ έχουμε

$$n \geq v_0 \text{ και } n \in M \cup \Lambda \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} n \geq v_1 \text{ και } n \in M \\ n \geq v_2 \text{ και } n \in \Lambda \end{array} \right\} \Rightarrow |\alpha_n - l| < \varepsilon$$

δηλαδή

$$\forall \varepsilon > 0, \exists v_0 = v_0(\varepsilon): |\alpha_n - l| < \varepsilon \quad \forall n \in M \cup \Lambda \text{ με } n \geq v_0$$

πού σημαίνει ότι $\lim_{n \in M \cup \Lambda} \alpha_n = l$.

$$\lim_{n \in M \cup \Lambda} \alpha_n = l$$

1.4.2 Ιδιότητες των συγκλινουσών ακολουθιών. Από τις ιδιότητες των μηδενικών ακολουθιών προκύπτουν άμεσα και οι παρακάτω ιδιότητες των συγκλινουσών ακολουθιών, πού είναι άλλωστε γνωστές και απ' τὰ μαθήματα προηγούμενων τάξεων.

$$1. \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = l \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} |\alpha_n| = |l|$$

$$2. \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = l \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_{k_n} = l$$

όπου $\alpha_{k_n}, n = 1, 2, \dots$ είναι μία υπακολουθία της $\alpha_n, n = 1, 2, \dots$, δηλαδή κάθε υπακολουθία συγκλίνουσας ακολουθίας είναι επίσης συγκλίνουσα ακολουθία με την ίδια όριακή τιμή.

3. $\lim \alpha_n = l \Rightarrow \alpha_n, n = 1, 2, \dots$ είναι φραγμένη.

Τό αντίστροφο δέν ισχύει, δηλαδή ύπάρχουν φραγμένες άκολουθίες που δέν είναι συγκλίνουσες (Λ.χ. ή $\alpha_n = (-1)^n + \frac{1}{n}, n = 1, 2, \dots$).

$$4. \left. \begin{array}{l} \lim \alpha_n = l_1 \\ \lim \beta_n = l_2 \end{array} \right\} \Rightarrow \lim (\alpha_n + \beta_n) = l_1 + l_2.$$

$$5. \left. \begin{array}{l} \lim \alpha_n = l_1 \\ \lim \beta_n = l_2 \end{array} \right\} \Rightarrow \lim (\alpha_n \beta_n) = l_1 l_2.$$

Αύτή συνεπάγεται τήν

$$\left. \begin{array}{l} \xi \in \mathbb{R} \\ \lim \alpha_n = l \end{array} \right\} \Rightarrow \lim (\xi \alpha_n) = \xi l.$$

ή όποία μαζί μέ τήν 4 συνεπάγεται τήν

$$\left. \begin{array}{l} \xi \in \mathbb{R}, \lim \alpha_n = l_1 \\ \eta \in \mathbb{R}, \lim \beta_n = l_2 \end{array} \right\} \Rightarrow \lim (\xi \alpha_n + \eta \beta_n) = \xi l_1 + \eta l_2.$$

Ειδικά, γιά $\xi = 1$ και $\eta = -1$, παίρνουμε

$$\left. \begin{array}{l} \lim \alpha_n = l_1 \\ \lim \beta_n = l_2 \end{array} \right\} \Rightarrow \lim (\alpha_n - \beta_n) = l_1 - l_2.$$

$$6. \left. \begin{array}{l} \lim \alpha_n = l \neq 0 \\ \alpha_n \neq 0 \forall n \in \mathbb{N} \end{array} \right\} \Rightarrow \lim \frac{1}{\alpha_n} = \frac{1}{l}.$$

Αύτή μαζί μέ τήν προηγούμενη ιδιότητα 5 συνεπάγονται και τήν

$$\left. \begin{array}{l} \lim \alpha_n = l_1 \neq 0 \\ \lim \beta_n = l_2 \\ \alpha_n \neq 0 \forall n \in \mathbb{N} \end{array} \right\} \Rightarrow \lim \frac{\beta_n}{\alpha_n} = \frac{l_2}{l_1}$$

$$7. \left. \begin{array}{l} \lim \alpha_n = l_1 \\ \lim \beta_n = l_2 \\ \alpha_n \leq \beta_n \forall n \in \mathbb{N} \end{array} \right\} \Rightarrow l_1 \leq l_2.$$

$$8. \left. \begin{array}{l} \lim \beta_n = l \\ \lim \gamma_n = l \\ \beta_n \leq \alpha_n \leq \gamma_n, \forall n \in \mathbb{N} \end{array} \right\} \Rightarrow \lim \alpha_n = l$$

9. $\lim \alpha_n = l \Rightarrow \lim \sqrt[k]{|\alpha_n|} = \sqrt[k]{|l|}$, k σταθερός φυσικός άριθμός.

Παρατήρηση. Οι παραπάνω ιδιότητες διατυπώνονται αντίστοιχα και μέ τό σύμβολο \lim στη θέση του \lim , όπου M είναι ένα άπέραντο ύποσύνολο του \mathbb{N} . Έτσι π.χ. ή άνω

τίστοιχη μέ τήν παραπάνω ιδιότητα 1 είναι ή

$$\lim_{n \in M} \alpha_n = l \Rightarrow \lim_{n \in M} |\alpha_n| = |l|$$

αντίστοιχη με την ιδιότητα 2 είναι ή (6), αντίστοιχη με την 3 είναι ή

$$\lim_{v \in M} \alpha_v = l \Rightarrow \exists \theta > 0 : |\alpha_v| \leq \theta \quad \forall v \in M$$

κ.ο.κ. όλες οι υπόλοιπες άπ' τις παραπάνω ιδιότητες ισχύουν ανάλογα αν αντικαταστήσουμε τό σύνολο \mathbf{N} με τό M .

Εφαρμογές :

1. $\lim \frac{v^2 + 3v + 5}{4v^2 + 1} = \frac{1}{4}$.

Πραγματικά:

$$\frac{v^2 + 3v + 5}{4v^2 + 1} = \frac{v^2 \left(1 + \frac{3}{v} + \frac{5}{v^2}\right)}{v^2 \left(4 + \frac{1}{v^2}\right)} = \frac{1 + \frac{3}{v} + \frac{5}{v^2}}{4 + \frac{1}{v^2}}$$

Οί άκολουθίες όμως $\frac{3}{v} = 3 \cdot \frac{1}{v}$, $v=1,2,\dots$, $\frac{5}{v^2} = \frac{1}{v} \cdot \frac{1}{v}$, $v=1,2,\dots$ καί

$\frac{5}{v^2} = 5 \cdot \frac{1}{v^2}$, $v=1,2,\dots$ είναι όλες μηδενικές άκολουθίες. *Αρα

$$\lim \left(1 + \frac{3}{v} + \frac{5}{v^2}\right) = 1 + 0 + 0 = 1 \text{ καί } \lim \left(4 + \frac{1}{v^2}\right) = 4 + 0 = 4.$$

*Έτσι, από την ιδιότητα 6 τών συγκλινουσών άκολουθιών έχομε

$$\lim \frac{v^2 + 3v + 5}{4v^2 + 1} = \lim \frac{1 + \frac{3}{v} + \frac{5}{v^2}}{4 + \frac{1}{v^2}} = \frac{1}{4}.$$

2. $\lim \sqrt[v]{\alpha} = 1$, όπου α είναι σταθερός θετικός αριθμός.

Διακρίνομε τις παρακάτω περιπτώσεις:

i) $\alpha = 1$. Είναι φανερό.

ii) $\alpha > 1$. Θέτομε $\delta_v = \sqrt[v]{\alpha} - 1$, $v=1,2,\dots$ καί τότε άρκει νά δείξομε ότι $\delta_v \rightarrow 0$.

Πραγματικά: έχομε $\sqrt[v]{\alpha} = 1 + \delta_v$, δηλαδή

$$(7) \quad \alpha = (1 + \delta_v)^v.$$

*Έπειδή $\delta_v > 0 \quad \forall v \in \mathbf{N}$, άπ' την άνισότητα του *Bernoulli*, θά έχομε καί $(1 + \delta_v)^v \geq 1 + v\delta_v$ καί έτσι ή (7) δίνει

$$\alpha \geq 1 + v\delta_v > v\delta_v.$$

*Αρα

$$0 < \delta_v < \frac{\alpha}{v} \rightarrow 0,$$

τό όποιο, σύμφωνα με την ιδιότητα 8 τών συγκλινουσών άκολουθιών, συνεπάγεται ότι $\delta_v \rightarrow 0$.

iii) $\alpha < 1$. Στην περίπτωση αυτή έχομε $\frac{1}{\alpha} > 1$ καί έτσι, σύμφωνα με την προη-

γούμενη περίπτωση, έχομε $\sqrt[v]{\frac{1}{\alpha}} \rightarrow 1$, δηλαδή $\frac{1}{\sqrt[v]{\alpha}} \rightarrow 1$, τό όποιο, μαζί με την ι-

διότητα 6 τών συγκλινουσών άκολουθιών, συνεπάγεται ότι $\sqrt[v]{\alpha} \rightarrow \frac{1}{1} = 1$.

3. Είναι εύκολο νά δοϋμε ότι ή άκολουθία $\alpha_v = (-1)^{3v} + \frac{1}{v}$, $v=1,2,\dots$ δέν είναι συγκλινουσα. Μποροϋμε όμως νά βροϋμε μία της ύπακολουθία α_{k_v} , $v=1,2,\dots$ καί μάλιστα

έκεινη μέ $k_n = 2n, n = 1, 2, \dots$ δηλαδή τήν $\alpha_{2n} = (-1)^{2n} + \frac{1}{2n}, n = 1, 2, \dots$, πού είναι ή ύπακολουθία τών άρτιων όρων, γιά τήν όποία παρατηρούμε ότι

$$\alpha_{2n} = (-1)^{2n} + \frac{1}{2n} = 1 + \frac{1}{2n} \rightarrow 1 + 0 = 1,$$

δηλαδή ότι συγκλίνει.

Έτσι βλέπουμε ότι ένώ μιά άκολουθία μπορεί νά μήν είναι συγκλίνουσα, μπορεί νά έχει μιά συγκλίνουσα ύπακολουθία της.

1.4.3 Η μονοτονία και ή σύγκλιση άκολουθίας — Ο αριθμός e. Άς θεωρήσουμε πρώτα τήν άκολουθία $\frac{v-1}{v}, v = 1, 2, \dots$, δηλαδή τήν

$$0, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \dots, \frac{v-1}{v}, \dots$$

και έπειτα τήν άκολουθία $v^2, v = 1, 2, \dots$, δηλαδή τήν άκολουθία

$$1, 4, 9, 16, \dots, v^2, \dots$$

Παρατηρούμε ότι και οι δύο είναι αύξουσες και μάλιστα γνησίως αύξουσες άκολουθίες. Άπ' αυτές όμως μόνο ή πρώτη, δηλαδή ή άκολουθία $\frac{v-1}{v}$,

$v = 1, 2, \dots$ είναι φραγμένη, άφοϋ $0 \leq \frac{v-1}{v} < 1 \forall v \in \mathbb{N}$. Άκόμη παρατηρούμε ότι ή άκολουθία αυτή συγκλίνει και μάλιστα $\lim_{v \rightarrow \infty} \frac{v-1}{v} = 1$, ένώ αντίθετα ή $v^2, v = 1, 2, \dots$ πού δέν είναι φραγμένη, δέ συγκλίνει πρός πραγματικό αριθμό.

Τό γεγονός ότι ή αύξουσα και φραγμένη άκολουθία $\frac{v-1}{v}, v = 1, 2, \dots$ συγκλίνει πρός πραγματικό αριθμό τό δεχόμαστε ότι ίσχύει γενικά γιά κάθε αύξουσα και φραγμένη άκολουθία. Άκριβέστερα δεχόμαστε τό ακόλουθο αξίωμα:

Άξίωμα. Άν $\alpha_n, n = 1, 2, \dots$ είναι μιά μονότονη και φραγμένη άκολουθία πραγματικών αριθμών, τότε αυτή συγκλίνει πρός κάποιον πραγματικό αριθμό.

Ο αριθμός e. Θεωρούμε τίς άκολουθίες $\alpha_n, n = 1, 2, \dots$ και $\beta_n, n = 1, 2, \dots$ όπω

$$\alpha_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \text{ και } \beta_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}$$

γιά τίς όποιες πρώτα θά άποδείξουμε ότι είναι γνησίως μονότονες και μάλιστα ή $\alpha_n, n = 1, 2, \dots$ (γνησίως) αύξουσα και ή $\beta_n, n = 1, 2, \dots$ (γνησίως) φθίνουσα.

Γιά τήν άκολουθία $\alpha_n, n = 1, 2, \dots$ έχουμε ότι

$$\begin{aligned} \frac{\alpha_{n+1}}{\alpha_n} &= \frac{\left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1}}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} = \left(\frac{1 + \frac{1}{n+1}}{1 + \frac{1}{n}}\right)^{n+1} \left(1 + \frac{1}{n}\right) = \frac{(n+2)^{n+1}}{(n+1)^2} \cdot \left(1 + \frac{1}{n}\right) = \\ &= \left(1 - \frac{1}{(n+1)^2}\right)^{n+1} \left(1 + \frac{1}{n}\right) > \left(1 - \frac{1}{(n+1)^2}\right) \left(1 + \frac{1}{n}\right) = 1 \end{aligned}$$

όπου χρησιμοποιήθηκε η ανισότητα του *Bernoulli*.

$$(1+\omega)^{v+1} > 1+(v+1)\omega, \text{ με } \omega = \frac{-1}{(v+1)^2}.$$

*Αρα

$$\alpha_v < \alpha_{v+1} \quad \forall v \in \mathbb{N}$$

πού σημαίνει ότι η ακολουθία $\alpha_v, v = 1, 2, \dots$ είναι γνησίως αύξουσα. *Επίσης έχουμε

$$\begin{aligned} \frac{\beta_v}{\beta_{v+1}} &= \frac{\left(1 + \frac{1}{v}\right)^{v+1}}{\left(1 + \frac{1}{v+1}\right)^{v+2}} = \left(1 + \frac{1}{v^2 + 2v}\right)^{v+1} \cdot \frac{v+1}{v+2} > \left(1 + (v+1) \cdot \frac{1}{v^2 + 2v}\right) \cdot \frac{v+1}{v+2} \\ &> \left(1 + \frac{v+1}{v^2 + 2v + 1}\right) \cdot \frac{v+1}{v+2} = 1 \end{aligned}$$

όπου χρησιμοποιήθηκε πάλι η ανισότητα του *Bernoulli*.

*Αρα

$$\beta_{v+1} < \beta_v \quad \forall v \in \mathbb{N}$$

*Υστερα άπ' αυτά είναι φανερό ότι για κάθε φυσικό αριθμό v ισχύει

$$2 = \alpha_1 \leq \alpha_v < \beta_v \leq \beta_1 = 4$$

καί επομένως, από τή μονοτονία τῶν ακολουθιῶν $\alpha_v, v = 1, 2, \dots$ καί $\beta_v, v = 1, 2, \dots$ καί τό παραπάνω ἄξίωμα, συμπεραίνουμε ὅτι καί οἱ δυὸ αὐτὲς ἀκολουθίες συγκλίνουν. *Αρα θά ισχύει καί $2 \leq \lim \alpha_v \leq \lim \beta_v \leq 4$.

*Αλλά έχουμε $\lim_{v \rightarrow \infty} \frac{\beta_v}{\alpha_v} = \lim_{v \rightarrow \infty} \frac{\beta_v}{\alpha_v} = \lim_{v \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{v}\right) = 1 + \lim_{v \rightarrow \infty} \frac{1}{v} = 1 + 0 = 1$ δηλαδή

$$\lim \alpha_v = \lim \beta_v.$$

Τήν κοινή ὀριακή τιμή τῶν ἀκολουθιῶν $\alpha_v, v = 1, 2, \dots$ καί $\beta_v, v = 1, 2, \dots$ τήν παριστάνουμε μέ e , δηλαδή

$$e = \lim_{v \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{v}\right)^v = \lim_{v \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{v}\right)^{v+1}.$$

*Εξ ἄλλου φαίνεται εὐκόλα ὅτι γιά κάθε φυσικό ἀριθμό v ισχύει

$$\left(1 + \frac{1}{v}\right)^v < e < \left(1 + \frac{1}{v}\right)^{v+1}.$$

*Ο ἀριθμός αὐτός e εἶναι ἕνας ἄρρητος ἀριθμός καί ἡ παραπάνω ἀνισότητα μᾶς ἐπιτρέπει νά τόν προσεγγίσουμε ὅσο θέλουμε. *Ἐτσι μιά προσέγγιση τοῦ ἀριθμοῦ αὐτοῦ μέ τρία δεκαδικά ψηφία εἶναι ἡ

$$e \simeq 2,718$$

ἡ ὁποία προκύπτει ἀπ' τήν παραπάνω ἀνισότητα γιά $v = 4837$. *Ἡ ἐκτίμηση τοῦ ἀριθμοῦ e μέ τή βοήθεια τῆς διπλῆς αὐτῆς ἀνισότητος εἶναι πρακτικά ἐπίπονη καί δέν προσφέρεται. Γι' αὐτό ἔχουν δοθεῖ ταχύτεροι τρόποι προσεγγίσεως τοῦ ἀριθμοῦ e . *Ἐτσι λ.χ. βρίσκεται ἡ προσέγγιση

$$e \simeq 2,71828182845904523536$$

μέ 20 δεκαδικά ψηφία.

2. ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ $+\infty$ ΚΑΙ $-\infty$. ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ

2.1. Τά σύμβολα $+\infty$ και $-\infty$. Μιά μη φραγμένη ακολουθία πραγματικών αριθμών α_n , $n = 1, 2, \dots$ δέ συγκλίνει προς πραγματικό αριθμό, γιατί αλλιώς, δηλαδή αν αυτή συνέκλινε προς πραγματικό αριθμό, τότε, σύμφωνα με την ιδιότητα 3 των συγκλινουσών ακολουθιών, θά ήταν φραγμένη, πράγμα άτοπο. Στην περίπτωση που η μη φραγμένη ακολουθία α_n , $n = 1, 2, \dots$ είναι και αύξουσα, όπως η n^2 , $n = 1, 2, \dots$ λέμε ότι αυτή «*απειρίζεται θετικά*» ή «*συγκλίνει προς τό $+\infty$* » ή ακόμη «*τείνει προς τό $+\infty$* » (τό σύμβολο $+\infty$ διαβάζεται «*σύν άπειρο*»).

Στην περίπτωση μιζς ακολουθίας α_n , $n = 1, 2, \dots$ που είναι αύξουσα και μη φραγμένη, δηλαδή που απειρίζεται θετικά, αν ϵ είναι ένας θετικός αριθμός, τότε υπάρχει δείκτης $n_0 = n_0(\epsilon)$ τέτοιος, ώστε να ισχύει

$$(7) \quad \alpha_{n_0} > \frac{1}{\epsilon}.$$

Πραγματικά: αν τούτο δέν ήταν σωστό, τότε θά είχαμε

$$\alpha_n \leq \frac{1}{\epsilon} \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

και έπειδή η α_n , $n = 1, 2, \dots$ είναι αύξουσα,

$$\alpha_1 \leq \alpha_n \leq \frac{1}{\epsilon} \quad \forall n \in \mathbb{N},$$

πράγμα που σημαίνει ότι η α_n , $n = 1, 2, \dots$ θά ήταν φραγμένη, άλλ' αυτό είναι άτοπο.

Τώρα, έπειδή η α_n , $n = 1, 2, \dots$ είναι αύξουσα, έχουμε

$$n \geq n_0 \Rightarrow \alpha_n \geq \alpha_{n_0}$$

και έτσι

$$n \geq n_0 \Rightarrow \alpha_n > \frac{1}{\epsilon}.$$

Ώστε αποδείχθηκε ότι για την αύξουσα και μη φραγμένη ακολουθία α_n , $n = 1, 2, \dots$ ισχύει ότι:

Για οποιοδήποτε θετικό αριθμό ϵ , δηλαδή για κάθε $\epsilon > 0$, υπάρχει δείκτης $n_0 = n_0(\epsilon)$ τέτοιος, ώστε να ισχύει

$$\alpha_n > \frac{1}{\epsilon} \quad \forall n \geq n_0.$$

Ώστερα από τά παραπάνω είναι πιά φυσικό να δώσουμε τον εξής γενικό όρισμό για τή σύγκλιση ακολουθίας πραγματικών αριθμών προς τό $+\infty$.

Θά λέμε ότι: η ακολουθία πραγματικών αριθμών α_n , $n = 1, 2, \dots$ «*απειρίζεται θετικά*» ή αλλιώς «*συγκλίνει προς τό $+\infty$* » ή ακόμη «*τείνει προς τό $+\infty$* » και αυτό θά τό συμβολίζουμε με $\lim \alpha_n = +\infty$ ή $\alpha_n \rightarrow +\infty$, τότε και μόνο τότε, αν για κάθε $\epsilon > 0$ υπάρχει δείκτης $n_0 = n_0(\epsilon)$ (που εξαρτάται από τό ϵ) τέτοιος, ώστε να ισχύει $\alpha_n > \frac{1}{\epsilon}$ για κάθε $n \geq n_0$. Για συντομία:

$$\lim \alpha_n = +\infty \Leftrightarrow \forall \epsilon > 0, \exists n_0 = n_0(\epsilon): \alpha_n > \frac{1}{\epsilon} \quad \forall n \geq n_0$$

Παραδείγματα:

1. Ἡ ἀκολουθία τῶν φυσικῶν ἀριθμῶν $v, v = 1, 2, \dots$ ἀπειρίζεται θετικά, δηλαδή $v \rightarrow +\infty$.

2. Ἡ ἀκολουθία $v^2 + 1, v = 1, 2, \dots$ δηλαδή ἡ ἀκολουθία $2, 5, 10, \dots, v^2 + 1, \dots$ ἀπειρίζεται θετικά. Πραγματικά: γιὰ ὁποιοδήποτε θετικό ἀριθμό $\varepsilon > 0$ ἀρκεῖ νά λάβουμε ὡς $v_0 = v_0(\varepsilon)$ ἕναν φυσικό ἀριθμό μεγαλύτερο ἀπό τό $\frac{1}{\varepsilon}$ καί τότε, ἀφοῦ $v^2 + 1 > v$, θά ἔχουμε

$$v^2 + 1 > v \geq v_0 > \frac{1}{\varepsilon} \quad \forall v \geq v_0.$$

Ὡστε: γιὰ κάθε $\varepsilon > 0$ ὑπάρχει δείκτης $v_0 = v_0(\varepsilon)$ (ἀρκεῖ νά λάβουμε ὡς τέτοιο δείκτη ἕνα φυσικό ἀριθμό μεγαλύτερο ἀπό τόν $\frac{1}{\varepsilon}$), τέτοιος ὥστε

$$v^2 + 1 > \frac{1}{\varepsilon} \quad \forall v \geq v_0,$$

δηλαδή $v^2 + 1 \rightarrow +\infty$.

Ἡ ἀκολουθία $-v^2, v = 1, 2, \dots$, δηλαδή ἡ ἀκολουθία $-1, -4, -9, \dots, -v^2, \dots$

εἶναι φθίνουσα καί μὴ φραγμένη. Ἀνάλογα πρὸς τὰ παραπάνω θά μπορούσαμε νά ποῦμε ὅτι αὐτή ἀπειρίζεται ἀρνητικά. Ἀξίζει νά παρατηρήσουμε ἐδῶ ὅτι ἡ ἀντίθετη ἀκολουθία, δηλαδή ἡ $-(-v^2) = v^2, v = 1, 2, \dots$ ἀπειρίζεται θετικά.

Γενικά θά λέμε ὅτι: ἡ ἀκολουθία πραγματικῶν ἀριθμῶν $\alpha_v, v = 1, 2, \dots$ «ἀπειρίζεται ἀρνητικά» ἢ ἀλλιῶς «συγκλίνει πρὸς τό $-\infty$ » ἢ ἀκόμη «τείνει πρὸς τό $-\infty$ » καί αὐτό θά τό συμβολίζουμε μὲ $\lim \alpha_v = -\infty$ ἢ $\alpha_v \rightarrow -\infty$ (τό σύμβολο $-\infty$ διαβάζεται «πλὴν ἀπειρο») τότε καί μόνο τότε, ἂν ἡ ἀντίθετη ἀκολουθία $-\alpha_v, v = 1, 2, \dots$ ἀπειρίζεται θετικά. Γιὰ συντομία:

$$\lim \alpha_v = -\infty \iff \lim (-\alpha_v) = +\infty$$

Ἰσχύουν τὰ παρακάτω θεωρήματα:

2.1.1. ΘΕΩΡΗΜΑ. Ἡ ἀκολουθία πραγματικῶν ἀριθμῶν $\alpha_v, v = 1, 2, \dots$ ἀπειρίζεται ἀρνητικά, τότε καί μόνο τότε, ἂν γιὰ κάθε $\varepsilon > 0$ ὑπάρχει δείκτης $v_0 = v_0(\varepsilon)$ (πού ἐξαρτᾶται ἀπὸ τό ε) τέτοιος, ὥστε νά ἰσχύει

$$\alpha_v < -\frac{1}{\varepsilon} \quad \forall v \geq v_0.$$

Ἀπόδειξη. $\lim \alpha_v = -\infty \iff \lim (-\alpha_v) = +\infty \iff (\forall \varepsilon > 0, \exists v_0 = v_0(\varepsilon): -\alpha_v > \frac{1}{\varepsilon} \quad \forall v \geq v_0) \iff (\forall \varepsilon > 0 \exists v_0 = v_0(\varepsilon): \alpha_v < -\frac{1}{\varepsilon} \quad \forall v \geq v_0)$.

2.1.2 ΘΕΩΡΗΜΑ. Θεωροῦμε δύο ἀκολουθίες $\alpha_v, v = 1, 2, \dots$ καί $\beta_v, v = 1, 2, \dots$ μὲ $\alpha_v \leq \beta_v$ γιὰ κάθε $v \in \mathbb{N}$. Τότε ἰσχύουν

$$\lim \alpha_v = +\infty \Rightarrow \lim \beta_v = +\infty$$

$$\text{καί} \quad \lim \beta_v = -\infty \Rightarrow \lim \alpha_v = -\infty$$

Ἀπόδειξη. Ἐπειδὴ $\lim \alpha_n = +\infty$, ἔχουμε

$$\forall \varepsilon > 0, \exists v_0 = v_0(\varepsilon): \alpha_n > \frac{1}{\varepsilon} \quad \forall n \geq v_0$$

καὶ αὐτὸ μαζί μέ τήν ἀνισότητα $\alpha_n \leq \beta_n \quad \forall n \in \mathbf{N}$ συνεπάγονται ὅτι

$$\forall \varepsilon > 0, \exists v_0 = v_0(\varepsilon): \beta_n > \frac{1}{\varepsilon} \quad \forall n \geq v_0$$

πού σημαίνει ὅτι

$$\lim \beta_n = +\infty.$$

Ὡστε ἀποδείξαμε ὅτι

$$\lim \alpha_n = +\infty \Rightarrow \lim \beta_n = +\infty.$$

Ἀπ' αὐτὸ προκύπτει καὶ ὅτι

$$\lim \beta_n = -\infty \Rightarrow \lim \alpha_n = -\infty$$

ἀφοῦ ἰσχύει $-\beta_n \leq -\alpha_n \quad \forall n \in \mathbf{N}$ καὶ ἐπομένως

$$\lim \beta_n = -\infty \Rightarrow \lim(-\beta_n) = +\infty \Rightarrow \lim(-\alpha_n) = +\infty \Rightarrow \lim \alpha_n = -\infty.$$

Ὅπως εἶδαμε παραπάνω στό παράδειγμα 2, ἡ ἀκολουθία $v^2 + 1$, $v = 1, 2, \dots$ ἀπειρίζεται θετικά. Αὐτὸ μπορούμε νά τό συμπεράνουμε ἀμέσως μέ τή βοήθεια τοῦ παραπάνω θεωρήματος, γιατί ἰσχύει $v < v^2 + 1$, $\forall v \in \mathbf{N}$ καὶ $\lim v = +\infty$. Παρόμοια, ἀπό τό παραπάνω θεώρημα προκύπτουν εὐκόλα καὶ ὅτι $\lim(v^2 - v + 1) = +\infty$, $\lim(-v^3) = -\infty$ καὶ $\lim(-v^2 + 2v - 2) = -\infty$.

2.1.3 *Τά σύμβολα $-\infty$, $+\infty$ καί ἡ διάταξη τῶν πραγματικῶν ἀριθμῶν.*

Ὅπως εἶναι γνωστό, γιά τίς συγκλίνουσες ἀκολουθίες πραγματικῶν ἀριθμῶν ἰσχύει (§ 1.4.2 ιδιότητα 7).

$$\left. \begin{array}{l} \lim \alpha_n = l_1, l_1 \in \mathbf{R} \\ \lim \beta_n = l_2, l_2 \in \mathbf{R} \\ \alpha_n \leq \beta_n \quad \forall n \in \mathbf{N} \end{array} \right\} \Rightarrow l_1 \leq l_2,$$

πράγμα πού παίζει σπουδαῖο ρόλο στήν τεχνική τῶν ἀποδείξεων πολλῶν θεωρημάτων τῆς μαθηματικῆς ἀναλύσεως. Γιά τό λόγο αὐτό θά ὀρίσουμε διάταξη στό σύνολο $\mathbf{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$ κατά τέτοιον τρόπο, ὥστε νά ἰσχύει τό παραπάνω καὶ στίς περιπτώσεις, ὅπου ἡ μία ἢ καί οἱ δύο ὀριακές τιμές l_1, l_2 εἶναι ἕνα ἀπό τά σύμβολα $-\infty$ καὶ $+\infty$. Πραγματικά, ἂν δεχθοῦμε αὐτό, θά ἔχουμε

$$\left. \begin{array}{l} \lim \alpha_n = l, l \in \mathbf{R} \\ \lim \beta_n = +\infty \\ \alpha_n \leq \beta_n \quad \forall n \in \mathbf{N} \end{array} \right\} \Rightarrow l \leq +\infty$$

καὶ ἐπειδὴ, ἀπό τόν ὀρισμό, τό $+\infty$ δέν εἶναι πραγματικός ἀριθμός θά πρέπει νά ὀρίσουμε

$$l < +\infty \quad \forall l \in \mathbf{R}$$

Παρόμοια, ὀδηγούμαστε καὶ στό νά ὀρίσουμε

$$-\infty < l \quad \forall l \in \mathbb{R}$$

καί

$$-\infty < +\infty$$

Τό σύνολο \mathbb{R} τῶν πραγματικῶν ἀριθμῶν, πού, ὅπως ξέρομε, τά στοιχεῖα του γεωμετρικά παριστάνονται μέ τά σημεῖα μιᾶς εὐθείας, ὀνομάζεται καί *εὐθεία τῶν πραγματικῶν ἀριθμῶν ἢ πραγματική εὐθεία*. Τό εὐρύτερο σύνολο $\mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$ πού θεωρεῖται ἐφοδιασμένο μέ τή διάταξη πού ὄρισαμε παραπάνω ὀνομάζεται *ἐπεκτεταμένη εὐθεία τῶν πραγματικῶν ἀριθμῶν ἢ ἐπεκτεταμένη πραγματική εὐθεία* καί παριστάνεται μέ \mathbb{R}^* , δηλαδή

$$\mathbb{R}^* = \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}.$$

2.2 Ἐπιτρεπές καί μὴ ἐπιτρεπές πράξεις μεταξύ τῶν συμβόλων $-\infty, +\infty$ καί τῶν πραγματικῶν ἀριθμῶν. Στό σύνολο \mathbb{R}^* μπορεῖ νά ὀρισθοῦν, ὡς μερικές πράξεις, ἡ πρόσθεση καί ὁ πολλαπλασιασμός (καθώς ἐπίσης καί ἡ ἀφαίρεση καί ἡ διαίρεση) κατά τέτοιο τρόπο, ὥστε νά μὴν ὀδηγοῦμαστε σέ ἀντιφάσεις στίς μέχρι τώρα γνωστές ιδιότητες τῶν ὀριακῶν τιμῶν. Οἱ πράξεις αὐτές ὀρίζονται ὡς ἐπεκτάσεις τῶν ἀντιστοίχων πράξεων στό \mathbb{R} . Πρῖν προχωρήσουμε στόν ὀρισμό τῶν πράξεων αὐτῶν θά ἀποδείξουμε τίς παρακάτω ιδιότητες:

$$1. \quad \left. \begin{array}{l} \lim \alpha_n = +\infty \\ \lim \beta_n = x, x \in \mathbb{R} \end{array} \right\} \Rightarrow \lim (\alpha_n + \beta_n) = +\infty.$$

Πρῶτα παρατηροῦμε ὅτι, ἀπό τήν ιδιότητα 3 τῆς § 1.4.2, ἡ ἀκολουθία β_n εἶναι φραγμένη, δηλαδή ὑπάρχει πραγματικός ἀριθμός θ τέτοιος ὥστε $|\beta_n| \leq \theta$ γιά κάθε $n \in \mathbb{N}$, δηλαδή

$$(8) \quad -\theta \leq \beta_n \leq \theta \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Ἐστω τώρα ἕνας (ὅποιοσδήποτε) θετικός ἀριθμός ε καί ἔστω $\varepsilon^ = \frac{\varepsilon}{1+\theta\varepsilon}$.

*Ἀρα τότε

$$\lim \alpha_n = +\infty \Rightarrow (\exists v_0 = v_0(\varepsilon^*): \alpha_n > \frac{1}{\varepsilon^*} \quad \forall n \geq v_0).$$

*Ἐπομένως, ἀπό τήν (8) θά ἔχουμε καί

$$\alpha_n + \beta_n > \frac{1}{\varepsilon^*} - \theta = \frac{1+\theta\varepsilon}{\varepsilon} - \theta = \frac{1}{\varepsilon} \quad \forall n \geq v_0.$$

*Ὡστε ἀποδείξαμε ὅτι

$$\forall \varepsilon > 0, \exists v_0 \text{ (πού ἐξαρτᾶται ἀπό τό } \varepsilon^*, \text{ ἄρα καί ἀπό τό } \varepsilon): \alpha_n + \beta_n > \frac{1}{\varepsilon}$$

$$\forall n \geq v_0, \text{ δηλαδή ὅτι } \lim (\alpha_n + \beta_n) = +\infty.$$

$$2. \quad \left. \begin{array}{l} \lim \alpha_n = -\infty \\ \lim \beta_n = x, x \in \mathbb{R} \end{array} \right\} \Rightarrow \lim (\alpha_n + \beta_n) = -\infty.$$

Παρατηροῦμε ὅτι, ἂν $\lim \alpha_n = -\infty$, τότε $\lim(-\alpha_n) = +\infty$ καί, ἂν $\lim \beta_n = x$,

$x \in \mathbb{R}$, τότε και $\lim(-\beta_n) = -x$, $-x \in \mathbb{R}$. Έτσι εφαρμόζουμε την ιδιότητα 1 και έχουμε

$$\left. \begin{array}{l} \lim \alpha_n = -\infty \\ \lim \beta_n = x, x \in \mathbb{R} \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \lim(-\alpha_n) = +\infty \\ \lim(-\beta_n) = -x, -x \in \mathbb{R} \end{array} \right\} \Rightarrow \\ \Rightarrow \lim(-(\alpha_n + \beta_n)) = \lim((-\alpha_n) + (-\beta_n)) = +\infty \Rightarrow \lim(\alpha_n + \beta_n) = -\infty.$$

$$3. \quad \left. \begin{array}{l} \lim \alpha_n = +\infty \\ \lim \beta_n = +\infty \end{array} \right\} \Rightarrow \lim(\alpha_n + \beta_n) = +\infty.$$

Πραγματικά: για έναν (όποιοδήποτε) $\varepsilon > 0$ θέτουμε $\varepsilon^* = 2\varepsilon$ και τότε, αφού $\lim \alpha_n = +\infty$, υπάρχει δείκτης $v_1 = v_1(\varepsilon^*)$ τέτοιος, ώστε $\alpha_n > \frac{1}{\varepsilon^*} \forall n \geq v_1$. Επίσης, αφού $\lim \beta_n = +\infty$, υπάρχει δείκτης $v_2 = v_2(\varepsilon^*)$ τέτοιος, ώστε $\beta_n > \frac{1}{\varepsilon^*} \forall n \geq v_2$. Έτσι, αν v_0 είναι ο μεγαλύτερος από τους δύο δείκτες v_1 και v_2 , για κάθε φυσικό αριθμό $n \geq v_0$ θα έχουμε τότε

$$\alpha_n + \beta_n > \frac{1}{\varepsilon^*} + \frac{1}{\varepsilon^*} = \frac{2}{\varepsilon^*} = \frac{1}{\varepsilon}$$

δηλαδή $\alpha_n + \beta_n > \frac{1}{\varepsilon} \forall n \geq v_0$ πράγμα που σημαίνει ότι $\lim(\alpha_n + \beta_n) = +\infty$

$$4. \quad \left. \begin{array}{l} \lim \alpha_n = -\infty \\ \lim \beta_n = -\infty \end{array} \right\} \Rightarrow \lim(\alpha_n + \beta_n) = -\infty$$

Με τη βοήθεια της ιδιότητας 3 παίρνουμε

$$\left. \begin{array}{l} \lim \alpha_n = -\infty \\ \lim \beta_n = -\infty \end{array} \right\} \Rightarrow \left. \begin{array}{l} \lim(-\alpha_n) = +\infty \\ \lim(-\beta_n) = +\infty \end{array} \right\} \Rightarrow \lim(-(\alpha_n + \beta_n)) = \lim((-\alpha_n) + (-\beta_n)) = +\infty \\ \Rightarrow \lim(\alpha_n + \beta_n) = -\infty$$

$$5. \quad \left. \begin{array}{l} \lim \alpha_n = +\infty \\ \lim \beta_n = x, x > 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \lim(\alpha_n \beta_n) = +\infty.$$

Για να το αποδείξουμε αυτό διακρίνουμε τις εξής δύο περιπτώσεις:

(i) περίπτωση $x = +\infty$. Τότε, για οποιοδήποτε $\varepsilon > 0$, θέτουμε $\varepsilon^* = \sqrt{\varepsilon}$ και άρα

$$\lim \alpha_n = +\infty \Rightarrow \exists v_1 = v_1(\varepsilon^*): \alpha_n > \frac{1}{\varepsilon^*} \forall n \geq v_1$$

$$\text{και} \quad \lim \beta_n = +\infty \Rightarrow \exists v_2 = v_2(\varepsilon^*): \beta_n > \frac{1}{\varepsilon^*} \forall n \geq v_2.$$

Έτσι για $v_0 = \max\{v_1, v_2\}$ (που εξαρτάται από το ε^* , άρα και από το ε), έχουμε

$$n \geq v_0 \Rightarrow \alpha_n > \frac{1}{\varepsilon^*} \text{ και } \beta_n > \frac{1}{\varepsilon^*} \Rightarrow \alpha_n \beta_n > \frac{1}{\varepsilon^*} \cdot \frac{1}{\varepsilon^*} = \frac{1}{\varepsilon}$$

δηλαδή

$$\forall \varepsilon > 0, \exists v_0 = v_0(\varepsilon): \alpha_v \beta_v > \frac{1}{\varepsilon} \quad \forall v \geq v_0$$

που σημαίνει ότι

$$\lim (\alpha_v \beta_v) = +\infty.$$

(ii) περίπτωση $x \in \mathbb{R}$. Τότε, για όποιοδήποτε $\varepsilon > 0$, θέτουμε $\varepsilon^* = \frac{x\varepsilon}{2}$.

Επειδή $\lim \alpha_v = +\infty$ και $\lim \beta_v = x$, $x > 0$ υπάρχει δείκτης v_0 (που εξαρτάται από τό ε^* , άρα και από τό ε) τέτοιος, ώστε

$$\alpha_v > \frac{1}{\varepsilon^*} \quad \forall v \geq v_0 \quad \text{και} \quad |\beta_v - x| < \frac{x}{2} \quad \forall v \geq v_0$$

δηλαδή

$$\alpha_v > \frac{1}{\varepsilon^*} \quad \text{και} \quad \beta_v > \frac{x}{2} \quad \forall v \geq v_0$$

Άρα, τότε, για κάθε $v \geq v_0$ έχουμε

$$\alpha_v \beta_v > \frac{1}{\varepsilon^*} \cdot \frac{x}{2} = \frac{1}{\varepsilon}.$$

Έτσι αποδείξαμε ότι

$$\forall \varepsilon > 0, \exists v_0 = v_0(\varepsilon): \alpha_v \beta_v > \frac{1}{\varepsilon} \quad \forall v \geq v_0$$

δηλαδή ότι

$$\lim (\alpha_v \beta_v) = +\infty.$$

$$6. \quad \left. \begin{array}{l} \lim \alpha_v = -\infty \\ \lim \beta_v = x, x > 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \lim \alpha_v \beta_v = -\infty$$

Με τή βοήθεια τής ιδιότητας 5 παίρνουμε

$$\left. \begin{array}{l} \lim \alpha_v = -\infty \\ \lim \beta_v = x, x > 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \lim (-\alpha_v) = +\infty \\ \lim \beta_v = x, x > 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \lim (-\alpha_v \beta_v) = \lim (-\alpha_v) \beta_v = +\infty \\ \Rightarrow \lim \alpha_v \beta_v = -\infty.$$

$$7. \quad \left. \begin{array}{l} \lim \alpha_v = +\infty \\ \lim \beta_v = x, x < 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \lim \alpha_v \beta_v = -\infty.$$

Με τή βοήθεια τής ιδιότητας 6 παίρνουμε

$$\left. \begin{array}{l} \lim \alpha_v = +\infty \\ \lim \beta_v = x, x < 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \lim (-\alpha_v) = -\infty \\ \lim (-\beta_v) = -x, -x > 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \lim \alpha_v \beta_v = \lim (-\alpha_v)(-\beta_v) = -\infty$$

$$8. \quad \left. \begin{array}{l} \lim \alpha_v = -\infty \\ \lim \beta_v = x, x > 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \lim \alpha_v \beta_v = +\infty.$$

Με τή βοήθεια τής ιδιότητας 5 παίρνουμε

$$\left. \begin{array}{l} \lim \alpha_v = -\infty \\ \lim \beta_v = x, x < 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \lim (-\alpha_v) = +\infty \\ \lim (-\beta_v) = -x, -x > 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \lim \alpha_v \beta_v = \lim (-\alpha_v)(-\beta_v) = +\infty$$

$$9. \quad \left. \begin{array}{l} \lim \alpha_v = x, x \in \mathbb{R} \\ \lim \beta_v = +\infty \\ \beta_v \neq 0 \quad \forall v \in \mathbb{N} \end{array} \right\} \Rightarrow \lim \frac{\alpha_v}{\beta_v} = 0.$$

Πραγματικά: παρατηρούμε ότι

$$\left. \begin{array}{l} \lim \beta_v = +\infty \\ \beta_v \neq 0 \quad \forall v \in \mathbb{N} \end{array} \right\} \Rightarrow (\forall \varepsilon > 0, \exists v_0 = v_0(\varepsilon): \beta_v > \frac{1}{\varepsilon} \quad \forall v \geq v_0) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow (\forall \varepsilon > 0, \exists v_0 = v_0(\varepsilon): \frac{1}{\beta_v} < \varepsilon \quad \forall v \geq v_0) \Rightarrow \lim \frac{1}{\beta_v} = 0.$$

Έτσι σύμφωνα με την ιδιότητα 5 της § 1.4.2 έχουμε:

$$\left. \begin{array}{l} \lim \alpha_v = x, x \in \mathbb{R} \\ \lim \beta_v = +\infty \\ \beta_v \neq 0 \quad \forall v \in \mathbb{N} \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \lim \alpha_v = x, x \in \mathbb{R} \\ \lim \frac{1}{\beta_v} = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \lim \frac{\alpha_v}{\beta_v} = \lim \alpha_v \cdot \frac{1}{\beta_v} = x \cdot 0 = 0.$$

10.

$$\left. \begin{array}{l} \lim \alpha_v = x, x \in \mathbb{R} \\ \lim \beta_v = -\infty \\ \beta_v \neq 0 \quad \forall v \in \mathbb{N} \end{array} \right\} \Rightarrow \lim \frac{\alpha_v}{\beta_v} = 0.$$

Πραγματικά από την ιδιότητα 9 έχουμε

$$\left. \begin{array}{l} \lim \alpha_v = x, x \in \mathbb{R} \\ \lim \beta_v = -\infty \\ \beta_v \neq 0 \quad \forall v \in \mathbb{N} \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \lim (-\alpha_v) = -x, -x \in \mathbb{R} \\ \lim (-\beta_v) = +\infty \\ -\beta_v \neq 0 \quad \forall v \in \mathbb{N} \end{array} \right\} \Rightarrow \lim \frac{\alpha_v}{\beta_v} = \lim \frac{-\alpha_v}{-\beta_v} = 0.$$

Με τη βοήθεια, τώρα, των παραπάνω ιδιοτήτων μπορούμε να όρισουμε και αντίστοιχες *επιτρεπές πράξεις* στο σύνολο \mathbb{R}^* . Συγκεκριμένα οι πράξεις αυτές, που προέρχονται από τις ιδιότητες που μόλις δείξαμε, παραθέτονται στον παρακάτω πίνακα:

Ιδιότητες

Επιτρεπές πράξεις

$\left. \begin{array}{l} \lim \alpha_v = +\infty \\ \lim \beta_v = x, x \in \mathbb{R} \end{array} \right\} \Rightarrow \lim (\alpha_v + \beta_v) = +\infty$	$+ \infty + x = x + (+\infty) = +\infty \quad \forall x \in \mathbb{R}$
$\left. \begin{array}{l} \lim \alpha_v = -\infty \\ \lim \beta_v = x, x \in \mathbb{R} \end{array} \right\} \Rightarrow \lim (\alpha_v + \beta_v) = -\infty$	$(-\infty) + x = x + (-\infty) = -\infty \quad \forall x \in \mathbb{R}$
$\left. \begin{array}{l} \lim \alpha_v = +\infty \\ \lim \beta_v = +\infty \end{array} \right\} \Rightarrow \lim (\alpha_v + \beta_v) = +\infty$	$+ \infty + (+\infty) = +\infty$
$\left. \begin{array}{l} \lim \alpha_v = -\infty \\ \lim \beta_v = -\infty \end{array} \right\} \Rightarrow \lim (\alpha_v + \beta_v) = -\infty$	$-\infty + (-\infty) = -\infty$
$\lim \alpha_v = -\infty \Rightarrow \lim (-\alpha_v) = +\infty$	$-(-\infty) = +\infty$
$\lim \alpha_v = +\infty \Rightarrow \lim (-\alpha_v) = -\infty$	$-(+\infty) = -\infty$
$\left. \begin{array}{l} \lim \alpha_v = +\infty \\ \lim \beta_v = x, x > 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \lim \alpha_v \beta_v = +\infty$	$(+\infty)x = x(+\infty) = +\infty \quad \forall x > 0,$ ἄρα $(+\infty)(+\infty) = +\infty$
$\left. \begin{array}{l} \lim \alpha_v = -\infty \\ \lim \beta_v = x, x > 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \lim \alpha_v \beta_v = -\infty$	$(-\infty)x = x(-\infty) = -\infty \quad \forall x > 0,$ ἄρα $(-\infty)(+\infty) = (+\infty)(-\infty) = -\infty$

$\left. \begin{array}{l} \lim \alpha_n = +\infty \\ \lim \beta_n = x, x < 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \lim \alpha_n \beta_n = -\infty$	$(+\infty)x = x(+\infty) = -\infty \quad \forall x < 0,$ $\text{Άρα } (+\infty)(-\infty) = (-\infty)(+\infty) = -\infty$
$\left. \begin{array}{l} \lim \alpha_n = -\infty \\ \lim \beta_n = x, x < 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \lim \alpha_n \beta_n = +\infty$	$(-\infty)x = x(-\infty) = +\infty \quad \forall x < 0,$ $\text{Άρα } (-\infty)(-\infty) = +\infty$
$\left. \begin{array}{l} \lim \alpha_n = x, x \in \mathbb{R} \\ \lim \beta_n = +\infty \\ \beta_n \neq 0 \quad \forall n \in \mathbb{N} \end{array} \right\} \Rightarrow \lim \frac{\alpha_n}{\beta_n} = 0$	$\frac{x}{+\infty} = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$
$\left. \begin{array}{l} \lim \alpha_n = x, x \in \mathbb{R} \\ \lim \beta_n = -\infty \\ \beta_n \neq 0 \quad \forall n \in \mathbb{N} \end{array} \right\} \Rightarrow \lim \frac{\alpha_n}{\beta_n} = 0$	$\frac{x}{-\infty} = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}.$

Από τις παραπάνω επιτρεπτές πράξεις προκύπτει άμεσα ότι και η πράξη $+\infty - (-\infty)$, δηλαδή ή $+\infty + (-(-\infty))$ είναι επιτρεπτή, γιατί $-(-\infty) = +\infty$ και έπομένως $+\infty - (-\infty) = +\infty + (+\infty) = +\infty$. Ωστε $+\infty - (-\infty) = +\infty$. Παρόμοια, προκύπτει και ότι $-\infty - (+\infty) = -\infty + (-(+\infty)) = -\infty + (-\infty) = -\infty$, δηλαδή $-\infty - (+\infty) = -\infty$.

Αντίθετα η πράξη $+\infty - (+\infty)$ δέν όρίζεται ως επιτρεπτή, γιατί αν $\lim \alpha_n = +\infty$ και $\lim \beta_n = +\infty$, τότε ή ακολουθία $\alpha_n - \beta_n$, $n = 1, 2, \dots$ δέ συγκλίνει πάντοτε πρός τό μηδέν ή άλλο μονοσημάντως όρισμένο αριθμό, ή ακόμη πρός ένα από τά σύμβολα $-\infty, +\infty$. Πραγματικά: άρκεί νά λάβουμε ως $\alpha_n = n^2 + n \rightarrow +\infty$ και $\beta_n = n^2 \rightarrow +\infty$ και τότε $\alpha_n - \beta_n = n \rightarrow +\infty$ και ως $\alpha_n = n^2 + \frac{1}{n} \rightarrow +\infty$ και $\beta_n = n^2 \rightarrow +\infty$ και τότε $\alpha_n - \beta_n = \frac{1}{n} \rightarrow 0$. Άνάλογα έργαζόμαστε γιά νά δούμε ότι και ή $-\infty + (+\infty)$ δέν είναι επιτρεπτή πράξη.

Επίσης ή πράξη $0(+\infty)$ δέν είναι επιτρεπτή, άφοϋ αν $\alpha_n = \frac{1}{n}$, $n = 1, 2, \dots$ και $\beta_n = n$, $n = 1, 2, \dots$, τότε

$$\lim \alpha_n = 0, \quad \lim \beta_n = +\infty \quad \text{και} \quad \lim \alpha_n \beta_n = \lim 1 = 1$$

ένϋ αν $\alpha_n = \frac{1}{n^2}$, $n = 1, 2, \dots$ και $\beta_n = n$, $n = 1, 2, \dots$, τότε

$$\lim \alpha_n = 0, \quad \lim \beta_n = +\infty \quad \text{και} \quad \lim \alpha_n \beta_n = \lim \frac{1}{n} = 0.$$

Ανάλογα προκύπτει και ότι οί πράξεις $0(-\infty)$, $(+\infty)0$ και $(-\infty)0$ δέν είναι επιτρεπτές.

Άκόμη ή πράξη $\frac{+\infty}{+\infty}$ δέν είναι επιτρεπτή, άφοϋ αν $\alpha_n = \beta_n = n$, $n = 1, 2, \dots$ τότε

$$\lim \alpha_n = +\infty, \quad \lim \beta_n = +\infty \quad \text{και} \quad \lim \frac{\alpha_n}{\beta_n} = \lim 1 = 1$$

ένω αν $\alpha_n = n$, $n = 1, 2, \dots$ και $\beta_n = n^2$, $n = 1, 2, \dots$, τότε

$$\lim \alpha_n = +\infty, \lim \beta_n = +\infty \quad \text{και} \quad \lim \frac{\alpha_n}{\beta_n} = \lim \frac{1}{n} = 0.$$

Παρόμοια προκύπτει ότι και οι πράξεις $\frac{-\infty}{-\infty}$, $\frac{+\infty}{-\infty}$, $\frac{-\infty}{+\infty}$, $\frac{+\infty}{0}$ και $\frac{-\infty}{0}$ δεν είναι έπιτρεπτές.

Η πράξη $\frac{0}{0}$, πάλι, δεν είναι έπιτρεπτή, γιατί αν $\alpha_n = \beta_n = \frac{1}{n}$, $n = 1, 2, \dots$ τότε

$$\lim \alpha_n = 0, \lim \beta_n = 0 \quad \text{και} \quad \lim \frac{\alpha_n}{\beta_n} = \lim 1 = 1$$

ένω αν $\alpha_n = \frac{1}{n}$, $n = 1, 2, \dots$ και $\beta_n = \frac{1}{n^2}$, $n = 1, 2, \dots$, τότε

$$\lim \alpha_n = 0, \lim \beta_n = 0 \quad \text{και} \quad \lim \frac{\alpha_n}{\beta_n} = \lim n = +\infty.$$

Τέλος και η πράξη $\frac{\alpha}{0}$, $\alpha \in \mathbb{R}$ δεν είναι έπιτρεπτή. Πραγματικά, για $\alpha = 0$ τό είδαμε παραπάνω, ένω για $\alpha \neq 0$ έχουμε ότι αν $\beta_n = \frac{1}{n}$, $n = 1, 2, \dots$, τότε

$$\lim \beta_n = 0 \quad \text{και} \quad \lim \frac{\alpha}{\beta_n} = \lim \alpha n = \alpha(+\infty)$$

ένω αν $\beta_n = -\frac{1}{n}$, $n = 1, 2, \dots$, τότε

$$\lim \beta_n = 0 \quad \text{και} \quad \lim \frac{\alpha}{\beta_n} = \lim \alpha(-n) = \alpha(-\infty).$$

Άλλά $\alpha(+\infty) \neq \alpha(-\infty)$ όταν $\alpha \neq 0$.

Έτσι διαπιστώσαμε τίς παρακάτω μή έπιτρεπτές πράξεις σε σχέση με τίς γνωστές ιδιότητες τών όριακων τιμών.

Μή έπιτρεπτές πράξεις

$$+\infty - (+\infty), -\infty + (+\infty), 0(+\infty), 0(-\infty), (+\infty)0, (-\infty)0, \\ \frac{+\infty}{+\infty}, \frac{-\infty}{-\infty}, \frac{+\infty}{-\infty}, \frac{-\infty}{+\infty}, \frac{+\infty}{0}, \frac{-\infty}{0}, \frac{0}{0} \quad \text{και} \quad \frac{\alpha}{0}, \alpha \in \mathbb{R}.$$

2.3. Γενική παρατήρηση. Η παράσταση $\frac{\mu+1}{\mu\nu}$, όπου μ και ν είναι φυσικοί αριθμοί, για μ σταθερό όρίζει μία ακολουθία τήν $\alpha_n = \frac{\mu+1}{\mu\nu}$, $n = 1, 2, \dots$ δηλαδή τήν

$$\frac{\mu+1}{\mu}, \frac{\mu+1}{2\mu}, \frac{\mu+1}{3\mu}, \dots, \frac{\mu+1}{\nu\mu}, \dots,$$

ή όποια συγκλίνει και μάλιστα $\lim \alpha_n = \lim \frac{\mu+1}{\mu\nu} = 0$.

“Αν όμως θεωρήσουμε τό v σταθερό, τότε ή παράσταση $\frac{\mu+1}{\mu v}$ όρίζει μιá άλλη áκολουθία, τήν $\beta_{\mu} = \frac{\mu+1}{\mu v}$, $\mu = 1, 2, \dots$, δηλαδή τήν

$$\frac{2}{v}, \frac{3}{2v}, \frac{4}{3v}, \dots, \frac{\mu+1}{\mu v}, \dots,$$

πού επίσης συγκλίνει καί μάλιστα $\lim \beta_{\mu} = \lim \frac{\mu+1}{\mu v} = \frac{1}{v}$.

Γιά νά διακρίνουμε ποιá από τίς áκολουθίες α_v , $v = 1, 2, \dots$ ή β_{μ} , $\mu = 1, 2, \dots$ θεωρούμε στό $\lim \frac{\mu+1}{\mu v}$, γράφουμε $\lim \frac{\mu+1}{\mu v}$ γιά τήν πρώτη περίπτωση, δηλαδή γιά τήν áκολουθία α_v , $v = 1, 2, \dots$ καί $\lim \frac{\mu+1}{\mu}$ γιά τήν περίπτωση τής áκολουθίας β_{μ} , $\mu = 1, 2, \dots$. “Ωστε έχουμε

$$\lim_v \frac{\mu+1}{\mu v} = 0 \quad \text{καί} \quad \lim_{\mu} \frac{\mu+1}{\mu v} = \frac{1}{v}.$$

Γράφουμε επίσης ισοδύναμα καί

$$\frac{\mu+1}{\mu v} \xrightarrow{v} 0, \quad \frac{\mu+1}{\mu v} \xrightarrow{\mu} \frac{1}{v}.$$

“Αντί γιά τά σύμβολα $\lim_{v \rightarrow \infty}$ ή \xrightarrow{v} χρησιμοποιοῦνται επίσης καί τά σύμβολα $\lim_{v \rightarrow \infty}$ ή $\xrightarrow{v \rightarrow \infty}$. “Επομένως μπορούμε νά γράφουμε ισοδύναμα

$$\lim_{v \rightarrow \infty} \frac{\mu+1}{\mu v} = 0, \quad \lim_{\mu \rightarrow \infty} \frac{\mu+1}{\mu v} = \frac{1}{v}$$

ή ακόμη

$$\frac{\mu+1}{\mu v} \xrightarrow{v \rightarrow \infty} 0, \quad \frac{\mu+1}{\mu v} \xrightarrow{\mu \rightarrow \infty} \frac{1}{v}.$$

Λ Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ

15. Ποιές από τίς áκολουθίες α_v , $v=1, 2, \dots$ πού όρίζονται από τούς παρακάτω τύπους είναι φραγμένες καί ποιές δέν είναι;

$$1) \alpha_v = \frac{v+100}{v+10}$$

$$2) \alpha_v = \frac{v^2+20}{v+100}$$

$$3) \alpha_v = \frac{v\mu 5v}{v^2+1}$$

$$4) \alpha_v = \frac{v^3+\eta\mu v}{v}$$

$$5) \alpha_v = \frac{v}{2v}$$

$$6) \alpha_v = \frac{v^2}{2v+\eta\mu^2 v}$$

16. Ποιές από τίς áκολουθίες τής προηγούμενης άσκήσεως είναι μονότονες καί ποιές δέν είναι; Γιά τίς μονότονες νά καθορισθεί καί τό είδος μονοτονίας.

17. Νά δώσετε τρεις διαφορετικές ύπακολουθίες γιά κάθε μιá από τής áκολουθίες τής άσκήσεως 15.

18. Ν' αποδείξετε ότι οι ακολουθίες α_n , $n=1, 2, \dots$ που δρίζονται από τούς παρακάτω τύπους είναι όλες μηδενικές :

$$1) \alpha_n = \frac{n}{n^3 + 5n + 2} \quad 2) \alpha_n = \sqrt{n+5} - \sqrt{n} \quad 3) \alpha_n = \frac{1 + \sqrt[n]{n}}{n^2}$$

$$4) \alpha_n = n (\sqrt[n]{n^3 + 2} - \sqrt[n]{\frac{n}{2}}) \quad 5) \alpha_n = \frac{\eta\mu n + \sigma\upsilon\nu 7n}{\sqrt[n]{n}} \quad 6) \alpha_n = n^{\frac{3}{2}} (\sqrt[n]{n^4 + 2} - n^{\frac{1}{2}}).$$

19. Νά υπολογίσετε τις όριακές τιμές τών ακολουθιών α_n , $n=1, 2, \dots$ που δρίζονται από τούς παρακάτω τύπους :

$$1) \alpha_n = \sqrt{1 + \frac{a}{n}}, \quad a \in \mathbb{R}^+ \quad 2) \alpha_n = \frac{1 + 2 + \dots + n}{n^2}$$

$$3) \alpha_n = \frac{n^3 - 3n + 2}{5n^3 + n + 4} \quad 4) \alpha_n = \sqrt{(n+a)(n+b)} - n, \quad \begin{matrix} a \in \mathbb{R}^+ \\ b \in \mathbb{R}^+ \end{matrix}$$

$$5) \alpha_n = n \left(1 - \sqrt{1 + \frac{a}{n}} \right), \quad a \in \mathbb{R}^+ \quad 6) \alpha_n = \frac{a^n}{n!}, \quad a \in \mathbb{R}^+$$

20. *Αν θεωρηθεί γνωστό ότι η ακολουθία $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}$, $n=1, 2, \dots$ είναι γνησίως φθίνουσα, νά αποδειχθεί ότι η ακολουθία $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$, $n=1, 2, \dots$ είναι γνησίως αύξουσα.

21. Νά υπολογίσετε τις όριακές τιμές τών ακολουθιών α_n , $n=1, 2, \dots$ που δρίζονται από τούς παρακάτω τύπους :

$$1) \alpha_n = \frac{n^3 + 7n}{n^3 + 2n + 5} \quad 2) \alpha_n = -2^n \frac{n^3 + 7}{(n+1)^3} \quad 3) \alpha_n = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}$$

22. Νά υπολογίσετε τις παρακάτω όριακές τιμές :

$$1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\mu n^3}{n^3 + 1} \quad 2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\mu n^3}{n^3 + 1} \quad 3) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\mu^3 n^3}{\mu n^3 + n^3 \mu^2}$$

$$4) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\mu^3 n^3}{\mu n^3 + n^3 \mu^3} \quad 5) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2\mu n}{\mu n + n^3} \quad 6) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2\mu^2 n}{\mu n + n^2}$$

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

1. ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΣ ΓΙΑ $x \rightarrow +\infty$

1.1 Στο προηγούμενο κεφάλαιο ασχοληθήκαμε με τη σύγκλιση ακολουθιών πραγματικών αριθμών που, όπως είδαμε, αποτελούν μία πολύ απλή περίπτωση πραγματικών συναρτήσεων. Στο κεφάλαιο τούτο θα επεκτείνουμε τις έννοιες της σύγκλισης και της όριακής τιμής για πραγματικές συναρτήσεις μίας πραγματικής μεταβλητής. Αυτό θα γίνει πρώτα για πραγματικές συναρτήσεις ορισμένες τουλάχιστον σε ένα άπειρο διάστημα της μορφής $(\alpha, +\infty)$, όπου α είναι σταθερός πραγματικός αριθμός, δηλαδή για συναρτήσεις f με $(\alpha, +\infty) \subseteq \mathcal{D}(f)$.

1.2 Μηδενικές συναρτήσεις για $x \rightarrow +\infty$. Όπως είναι γνωστό, ισχύουν $v \rightarrow +\infty$ και $\frac{1}{v} \rightarrow 0$ και μάλιστα η δεύτερη απ' αυτές είναι συνέπεια της πρώτης. Άλλωστε και γενικότερα για οποιαδήποτε ακολουθία $x_n, n = 1, 2, \dots$ με $x_n > 0 \forall n \in \mathbb{N}$ ισχύει

$$(1) \quad \lim x_n = +\infty \Rightarrow \frac{1}{x_n} \rightarrow 0$$

επειδή, από την $\lim x_n = +\infty$, έχουμε

$$\forall \varepsilon > 0, \exists v_0 = v_0(\varepsilon): x_n > \frac{1}{\varepsilon} \quad \forall n \geq v_0.$$

και αφού $x_n > 0 \forall n \in \mathbb{N}$

$$\forall \varepsilon > 0, \exists v_0 = v_0(\varepsilon): \left| \frac{1}{x_n} \right| = \frac{1}{x_n} < \varepsilon \quad \forall n \geq v_0, \text{ δηλαδή } \frac{1}{x_n} \rightarrow 0.$$

Την ιδιότητα (1) την εκφράζουμε λέγοντας ότι η συνάρτηση f με $f(x) = \frac{1}{x}, x \in (0, +\infty)$ είναι *μηδενική για $x \rightarrow +\infty$* (τό σύμβολο $x \rightarrow +\infty$ διαβάζεται « x τείνει προς τό $+\infty$ ») και γράφουμε $\frac{1}{x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$ ή $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$

Γενικά, αν f είναι μία συνάρτηση ορισμένη τουλάχιστον σ' ένα διάστημα της μορφής $(\alpha, +\infty)$, θα λέμε ότι *η συνάρτηση f είναι μηδενική για $x \rightarrow +\infty$* και αυτό θα τό συμβολίζουμε με $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$ ή $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, τότε και μόνο

τότε, αν για κάθε ακολουθία $x_n, n=1,2,\dots$ με $x_n \in (\alpha, +\infty) \forall n \in \mathbb{N}$ και $\lim x_n = +\infty$ ισχύει $f(x_n) \rightarrow 0$.

Δηλαδή

$$f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0 \iff \left\{ \begin{array}{l} \text{Για κάθε ακολουθία } x_n, n=1,2,\dots \text{ με } x_n \in (\alpha, +\infty) \forall n \in \mathbb{N} \\ \text{ισχύει} \quad \lim x_n = +\infty \Rightarrow \lim f(x_n) = 0 \end{array} \right.$$

Παραδείγματα:

1. Η συνάρτηση f με $f(x) = \frac{x+1}{x^2+3x}$, $x \in (0, +\infty)$ είναι μηδενική για $x \rightarrow +\infty$.

Πραγματικά: αν $x_n, n=1,2,\dots$ είναι μία οποιαδήποτε ακολουθία με θετικούς όρους, τέτοια ώστε $\lim x_n = +\infty$, τότε η αντίστοιχη ακολουθία τιμών $f(x_n) = \frac{x_n+1}{x_n^2+3x_n}$, $n=1,2,\dots$ είναι μηδενική, γιατί από την (1), έχουμε $\frac{1}{x_n} \rightarrow 0$, $\frac{3}{x_n} \rightarrow 0$ και $\frac{1}{x_n^2} \rightarrow 0$ και επομένως

$$f(x_n) = \frac{\frac{1}{x_n} + \frac{1}{x_n^2}}{1 + \frac{3}{x_n}} \rightarrow \frac{0+0}{1+0} = 0.$$

*Ωστε αποδείξαμε ότι για κάθε ακολουθία με θετικούς όρους $x_n, n=1,2,\dots$ και με $\lim x_n = +\infty$ ή αντίστοιχη ακολουθία τιμών της συναρτήσεως f , δηλαδή ή ακολουθία $f(x_n)$, $n=1,2,\dots$ είναι μηδενική.

2. Η συνάρτηση f με $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$, $x \in (0, +\infty)$ είναι μηδενική για $x \rightarrow +\infty$. Πραγματικά: αρκεί ν' αποδείξουμε ότι αν $x_n, n=1,2,\dots$ είναι μία οποιαδήποτε ακολουθία με θετικούς όρους και με $\lim x_n = +\infty$, ή ακολουθία των τιμών $f(x_n) = \frac{1}{\sqrt{x_n}}$, $n=1,2,\dots$ είναι μηδενική. Προς τούτο, θεωρούμε έναν οποιοδήποτε θετικό αριθμό ε : τότε από την $\lim x_n = +\infty$ θα έχουμε ότι για τό ε^2

$$\exists v_0 = v_0(\varepsilon^2) : x_n > \frac{1}{\varepsilon^2} \quad \forall n \geq v_0$$

και επειδή $x_n > 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}$, έχουμε

$$\frac{1}{x_n} < \varepsilon^2 \quad \forall n \geq v_0, \text{ δηλαδή } \frac{1}{\sqrt{x_n}} < \varepsilon \quad \forall n \geq v_0.$$

*Ωστε αποδείξαμε ότι για οποιοδήποτε θετικό αριθμό ε , δηλαδή για κάθε $\varepsilon > 0$ υπάρχει δείκτης v_0 (πού εξαρτάται από τό ε) τέτοιος, ώστε νά ισχύει

$$\frac{1}{\sqrt{x_n}} < \varepsilon \quad \forall n \geq v_0$$

δηλαδή ότι $\frac{1}{\sqrt{x_n}} \rightarrow 0$.

1.3 Συγκλίνουσες συναρτήσεις για $x \rightarrow +\infty$. Για τή συνάρτηση f με $f(x) = \frac{3x+1}{x}$ παρατηρούμε ότι $f(x)-3 = \frac{1}{x}$ και επομένως ή συνάρτηση $f-3$ είναι μηδενική για $x \rightarrow +\infty$. Άνάλογα προς τήν περίπτωση των ακολουθιών λέμε και έδω ότι ή συνάρτηση f συγκλίνει για $x \rightarrow +\infty$ προς τόν αριθμό 3.

Γενικά, λέμε ότι μία συνάρτηση f ορισμένη τουλάχιστο σ' ένα διάστημα της μορφής $(\alpha, +\infty)$ «συγκλίνει για $x \rightarrow +\infty$ προς τον αριθμό l ». ή αλλιώς «τείνει για $x \rightarrow +\infty$ προς τον αριθμό l » και τούτο το συμβολίζουμε με $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l$ ή $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} l$, τότε και μόνο τότε, αν η συνάρτηση $f-l$ είναι μηδενική για $x \rightarrow +\infty$. Γιά συντομία:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l \iff f(x) - l \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$$

Θά αποδείξουμε τώρα ότι για μία συνάρτηση f ορισμένη σ' ένα τουλάχιστο διάστημα της μορφής $(\alpha, +\infty)$ ισχύει τό εξής:

1.3.1 ΘΕΩΡΗΜΑ. Η συνάρτηση f συγκλίνει για $x \rightarrow +\infty$ προς τον αριθμό l τότε και μόνο τότε, αν για κάθε ακολουθία $x_n, n=1,2,\dots$ με $x_n \in (\alpha, +\infty) \forall n \in \mathbb{N}$ ισχύει

$$\lim x_n = +\infty \Rightarrow \lim f(x_n) = l.$$

Απόδειξη. Από τον ορισμό έχουμε ότι $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - l) = 0$.

Όμως, $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - l) = 0$ σημαίνει ότι για κάθε ακολουθία $x_n, n=1,2,\dots$ με όρους στό $(\alpha, +\infty)$ και τέτοια ώστε $\lim x_n = +\infty$, ισχύει $\lim (f(x_n) - l) = 0$, δηλαδή $\lim f(x_n) = l$.

Επειδή τό όριο μιās ακολουθίας είναι μοναδικό, από τό παραπάνω θεώρημα προκύπτει ότι ο αριθμός l είναι επίσης μονοσημάντως ορισμένος. Τόν αριθμό αυτό τον ονομάζουμε *όριο* ή *όριακή τιμή* της συναρτήσεως f για $x \rightarrow +\infty$.

Παραδείγματα :

1. Η συνάρτηση f με $f(x) = \frac{x^2 + 8x + 5}{5x^2 + 15x}$, $x \in (0, +\infty)$ συγκλίνει για $x \rightarrow +\infty$ προς τον αριθμό $\frac{1}{5}$. Πραγματικά:

$$f(x) - \frac{1}{5} = \frac{x^2 + 8x + 5}{5x^2 + 15x} - \frac{1}{5} = \frac{x + 1}{x^2 + 3x}.$$

Αλλά, όπως είδαμε στο παράδειγμα 1 της προηγούμενης § 1.2. Ισχύει $\frac{x + 1}{x^2 + 3x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$.

*Αρα $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + 8x + 5}{5x^2 + 15x} = \frac{1}{5}$.

2. Η συνάρτηση f με $f(x) = \frac{\sqrt{x} + \frac{3}{x}}{2\sqrt{x} + 5}$, $x \in (0, +\infty)$ συγκλίνει για $x \rightarrow +\infty$ προς τον αριθμό $\frac{1}{2}$. Πραγματικά: αν $x_n, n=1,2,\dots$ είναι οποιαδήποτε ακολουθία με θετικούς όρους

και με $\lim x_n = +\infty$, τότε η ακολουθία $f(x_n) = \frac{\sqrt{x_n} + \frac{3}{x_n}}{2\sqrt{x_n} + 5}$, $n=1, 2, \dots$ συγκλίνει προς τον αριθμό $\frac{1}{2}$, γιατί έχουμε

$$f(x_v) = \frac{\sqrt{x_v} + \frac{3}{x_v}}{2\sqrt{x_v} + 5} = \frac{1 + \frac{3}{x_v} \cdot \frac{1}{\sqrt{x_v}}}{2 + \frac{5}{\sqrt{x_v}}}$$

καί ακόμη $\frac{3}{x_v} \rightarrow 0, \frac{1}{\sqrt{x_v}} \rightarrow 0, \frac{5}{\sqrt{x_v}} \rightarrow 0$. Άρα

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \frac{1 + 0 \cdot 0}{2 + 0} = \frac{1}{2}$$

Ώστε αποδείξαμε ότι για κάθε ακολουθία με θετικούς όρους και με $\lim x_v = +\infty$, η αντίστοιχη ακολουθία τιμών της συναρτήσεως f , δηλαδή η ακολουθία $f(x_v)$, $v = 1, 2, \dots$ συγκλίνει προς τον αριθμό $\frac{1}{2}$. Άρα, από το παραπάνω θεώρημα 1.3.1, ισχύει

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x} + \frac{3}{x}}{2\sqrt{x} + 5} = \frac{1}{2}$$

1.3.2 Συναρτήσεις που άπειρίζονται θετικά ή αρνητικά για $x \rightarrow +\infty$.

Για τη συνάρτηση f με $f(x) = x^2$ παρατηρούμε ότι, αν x_v , $v = 1, 2, \dots$ είναι μία οποιαδήποτε ακολουθία πραγματικών αριθμών με $\lim x_v = +\infty$, τότε και η αντίστοιχη ακολουθία τιμών $f(x_v) = x_v^2$, $v = 1, 2, \dots$ άπειρίζεται θετικά, γιατί

$$f(x_v) = x_v^2 = x_v \cdot x_v \rightarrow (+\infty) (+\infty) = +\infty$$

Στήν περίπτωση αυτή λέμε ότι η συνάρτηση f με $f(x) = x^2$ άπειρίζεται θετικά για $x \rightarrow +\infty$.

Γενικά, λέμε ότι μία συνάρτηση f που είναι ορισμένη τουλάχιστο σ' ένα διάστημα της μορφής $(\alpha, +\infty)$ «άπειρίζεται θετικά για $x \rightarrow +\infty$ » ή αλλιώς «συγκλίνει για $x \rightarrow +\infty$ προς τό $+\infty$ » ή ακόμη «τείνει για $x \rightarrow +\infty$ προς τό $+\infty$ » και τούτο τό συμβολίζουμε με $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ ή $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$, τότε και μόνο τότε, αν για κάθε ακολουθία x_v , $v = 1, 2, \dots$ με $x_v \in (\alpha, +\infty)$ $\forall v \in \mathbb{N}$ έχουμε

$$\lim x_v = +\infty \Rightarrow \lim f(x_v) = +\infty$$

Ανάλογα προς την περίπτωση των ακολουθιών θά λέμε ότι η συνάρτηση f «άπειρίζεται αρνητικά για $x \rightarrow +\infty$ » ή αλλιώς «συγκλίνει για $x \rightarrow +\infty$ προς τό $-\infty$ » ή ακόμη «τείνει για $x \rightarrow +\infty$ προς τό $-\infty$ » και αυτό θά τό συμβολίζουμε με $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$ ή $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} -\infty$, τότε και μόνο τότε, αν ισχύει $\lim_{x \rightarrow +\infty} (-f(x)) = +\infty$. Για συντομία

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty \iff \lim_{\text{ορσ } x \rightarrow +\infty} (-f(x)) = +\infty$$

Π.χ. η συνάρτηση f με $f(x) = \frac{-x^2 + x}{3x + 1}$, $x \in (0, +\infty)$ άπειρίζεται αρνητικά για $x \rightarrow +\infty$. Πραγματικά:

$$-f(x) = \frac{x^2 - x}{3x + 1}, \quad x \in (0, +\infty)$$

καί για όποιαδήποτε ακολουθία $x_n, n=1,2,\dots$ με θετικούς όρους καί μέ $\lim x_n = +\infty$ ισχύει

$$-f(x_n) = \frac{x_n^2 - x_n}{3x_n + 1} = \frac{x_n - 1}{3 + \frac{1}{x_n}} \rightarrow \frac{+\infty - 1}{3 + 0} = +\infty,$$

Άρα $\lim_{x \rightarrow +\infty} (-f(x)) = +\infty$ καί έπομένως $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-x^2 + x}{3x + 1} = -\infty$.

Άπό τά παραπάνω προκύπτει τώρα εύκολα ότι τό θεώρημα 1.3.1 ισχύει καί στην περίπτωση, πού ή όριακή τιμή l είναι ένα άπό τά σύμβολα $+\infty, -\infty$. Πιο συγκεκριμένα ισχύει τό ακόλουθο θεώρημα:

1.3.3 ΘΕΩΡΗΜΑ. *Η συνάρτηση f συγκλίνει για $x \rightarrow +\infty$ προς τό l ($l \in \mathbb{R}^* = \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$) τότε καί μόνο τότε, άν για κάθε ακολουθία $x_n, n=1,2,\dots$ μέ $x_n \in (\alpha, +\infty) \forall n \in \mathbb{N}$ έχουμε:*

$$\lim x_n = +\infty \Rightarrow \lim f(x_n) = l.$$

Απόδειξη. Η περίπτωση πού $l \in \mathbb{R}$ προκύπτει άπό τό θεώρημα 1.3.1, ένώ ή περίπτωση $l = +\infty$ άπό τόν όρισμό τής συναρτήσεως πού άπειρίζεται θετικά για $x \rightarrow +\infty$. Η περίπτωση πού άπομένει είναι $l = -\infty$ καί προκύπτει κατά τόν ακόλουθο τρόπο:

Άπό τόν όρισμό έχουμε $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} (-f(x)) = +\infty$. Άλλά $\lim_{x \rightarrow +\infty} (-f(x)) = +\infty$ σημαίνει ότι για κάθε ακολουθία $x_n, n=1,2,\dots$ μέ $x_n \in (0, +\infty) \forall n \in \mathbb{N}$ τέτοια, ώστε $\lim x_n = +\infty$, ισχύει $\lim (-f(x_n)) = +\infty$ δηλαδή $\lim f(x_n) = -\infty$.

2. ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΣ ΓΙΑ $x \rightarrow -\infty$

2.1 *Ας θεωρήσουμε τή συνάρτηση f μέ $f(x) = \frac{x+1}{3x-2}, x \in (-\infty, 0)$ για τήν όποία παρατηρούμε ότι για όποιαδήποτε ακολουθία $x_n, n=1,2,\dots$ μέ $x_n < 0 \forall n \in \mathbb{N}$ καί $\lim x_n = -\infty$ ισχύει

$$f(x_n) = \frac{x_n + 1}{3x_n - 2} = \frac{1 + \frac{1}{x_n}}{3 - \frac{2}{x_n}} \rightarrow \frac{1 + 0}{3 - 0} = \frac{1}{3}.$$

Αυτό τό εκφράζουμε λέγοντας ότι ή συνάρτηση f μέ $f(x) = \frac{x+1}{3x-2}$, $x \in (-\infty, 0)$ συγκλίνει για $x \rightarrow -\infty$ προς τόν αριθμό $\frac{1}{3}$ καί τό γράφουμε

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x+1}{3x-2} = \frac{1}{3}$$

Γενικά, λέμε ότι μία συνάρτηση f που είναι ορισμένη τουλάχιστο σ' ένα διάστημα τής μορφής $(-\infty, \alpha)$, «συγκλίνει για $x \rightarrow -\infty$ προς τον αριθμό l » ή αλλιώς «τείνει για $x \rightarrow -\infty$ προς τον αριθμό l » και αυτό τό συμβολίζουμε με $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = l$ ή $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} l$, τότε και μόνο τότε, αν για κάθε ακολουθία $x_v, v = 1, 2, \dots$ με $x_v \in (-\infty, \alpha) \quad \forall v \in \mathbb{N}$ έχουμε

$$\lim x_v = -\infty \Rightarrow \lim f(x_v) = l.$$

Από τόν παραπάνω όρισμό προκύπτει ότι ό αριθμός l είναι μονοσημάντως όρισμένος. Τόν αριθμό αυτό τόν ονομάζουμε όριο ή όριακή τιμή τής f για $x \rightarrow -\infty$.

Η έννοια τής συναρτήσεως που άπειρίζεται θετικά ή άρνητικά για $x \rightarrow -\infty$, όρίζεται άνάλογα προς τήν περίπτωση $x \rightarrow +\infty$. Πιο συγκεκριμένα, αν f είναι μία συνάρτηση όρισμένη τουλάχιστο σ' ένα διάστημα τής μορφής $(-\infty, \alpha)$, τότε όρίζουμε:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty \iff \left\{ \begin{array}{l} \text{Γιά κάθε ακολουθία } x_v, v=1, 2, \dots \text{ με } x_v \in (-\infty, \alpha) \quad \forall v \in \mathbb{N} \\ \text{ίσχύει } \lim x_v = -\infty \Rightarrow \lim f(x_v) = +\infty \end{array} \right.$$

και

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty \iff \lim_{x \rightarrow -\infty} (-f(x)) = +\infty$$

Έτσι, άνάλογα προς τό θεώρημα 1.3.3, έχουμε και τό παρακάτω θεώρημα:

2.1.1 ΘΕΩΡΗΜΑ. Η συνάρτηση f συγκλίνει για $x \rightarrow -\infty$ προς τό $l, l \in \mathbb{R}^*$, τότε και μόνο τότε, αν για κάθε ακολουθία $x_v, v = 1, 2, \dots$ με $x_v \in (-\infty, \alpha) \quad \forall v \in \mathbb{N}$ έχουμε

$$\lim x_v = -\infty \Rightarrow \lim f(x_v) = l.$$

Παραδείγματα:

1. Η συνάρτηση f με $f(x) = \frac{3x^2 + 1}{x^2 + x}, x \in (-\infty, -1)$ συγκλίνει για $x \rightarrow -\infty$ προς τόν αριθμό 3. Πραγματικά: αν $x_v, v = 1, 2, \dots$ είναι μία όποιαδήποτε ακολουθία πραγματικών αριθμών με $x_v < -1 \quad \forall v \in \mathbb{N}$ και $\lim x_v = -\infty$, τότε

$$f(x_v) = \frac{3x_v^2 + 1}{x_v^2 + x_v} = \frac{3 + \frac{1}{x_v^2}}{1 + \frac{1}{x_v}} \rightarrow \frac{3 + 0}{1 + 0} = 3,$$

γιατί $\frac{1}{x_v} \rightarrow 0$ και $\frac{1}{x_v^2} = \frac{1}{x_v} \cdot \frac{1}{x_v} \rightarrow 0 \cdot 0 = 0$. Έσπε άποδείξαμε ότι

$$\lim x_v = -\infty \Rightarrow \lim \frac{3x_v^2 + 1}{x_v^2 + x_v} = 3,$$

δηλαδή ότι $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x^2 + 1}{x^2 + x} = 3$.

2. Η συνάρτηση f με $f(x) = \sqrt{x^2 - x}$, $x \in (-\infty, 0)$ απειρίζεται θετικά για $x \rightarrow -\infty$. Πραγματικά: αν x_v , $v = 1, 2, \dots$ είναι μία οποιαδήποτε ακολουθία με άρνητικούς όρους και με $\lim x_v = -\infty$, τότε

$$f(x_v) = \sqrt{x_v^2 - x_v} = \sqrt{x_v^2 \left(1 - \frac{1}{x_v}\right)} = |x_v| \sqrt{1 - \frac{1}{x_v}} = -x_v \sqrt{1 - \frac{1}{x_v}} \rightarrow$$
$$\rightarrow -(-\infty) \sqrt{1 - 0} = -(-\infty) \cdot 1 = +\infty,$$

δηλαδή

$$\lim x_v = -\infty \Rightarrow \lim \sqrt{x_v^2 - x_v} = +\infty.$$

και επομένως $\lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{x^2 - x} = +\infty$.

3. Η συνάρτηση f με $f(x) = x\sqrt{x^2 - x}$, $x \in (-\infty, 0)$ απειρίζεται αρνητικά για $x \rightarrow -\infty$. Πραγματικά: αν x_v , $v = 1, 2, \dots$ είναι μία οποιαδήποτε ακολουθία με άρνητικούς όρους και με $\lim x_v = -\infty$, τότε

$$f(x_v) = x_v \sqrt{x_v^2 - x_v} \rightarrow (-\infty) (+\infty) = -\infty,$$

δηλαδή

$$\lim x_v = -\infty \Rightarrow \lim x_v \sqrt{x_v^2 - x_v} = -\infty$$

και επομένως $\lim_{x \rightarrow -\infty} x\sqrt{x^2 - x} = -\infty$.

3. ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΣ ΓΙΑ $x \rightarrow x_0$

3.1 Σύγκλιση συναρτήσεως για $x \rightarrow x_0 + 0$. Για τή συνάρτηση g με $g(x) = x + \sqrt{x-1}$, $x \in (1, +\infty)$ παρατηρούμε ότι για οποιαδήποτε ακολουθία x_v , $v = 1, 2, \dots$ με $x_v > 1 \forall v \in \mathbb{N}$ και $\lim x_v = 1$, ισχύει

$$(2) \quad g(x_v) = x_v + \sqrt{x_v - 1} \rightarrow 1 + \sqrt{1-1} = 1.$$

Παρόμοια, για τή συνάρτηση h με $h(x) = \frac{1}{x-5}$, $x \in (5, +\infty)$ παρατηρούμε ότι για οποιαδήποτε ακολουθία x_v , $v = 1, 2, \dots$ με $x_v > 5 \forall v \in \mathbb{N}$ και $\lim x_v = 5$ ισχύει

$$(3) \quad h(x_v) = \frac{1}{x_v - 5} \rightarrow +\infty$$

γιατί, από τήν $x_v > 5 \forall v \in \mathbb{N}$ και τήν $\lim x_v = 5$ προκύπτει ότι, για κάθε $\varepsilon > 0$ υπάρχει δείκτης $v_0 = v_0(\varepsilon)$ τέτοιος ώστε να ισχύει $0 < x_v - 5 < \varepsilon \forall v \geq v_0$ και άρα

$$h(x_v) = \frac{1}{x_v - 5} > \frac{1}{\varepsilon} \quad \forall v \geq v_0$$

δηλαδή έχουμε ότι $\lim h(x_v) = +\infty$.

Τήν ιδιότητα (2) τήν εκφράζουμε λέγοντας ότι ή συνάρτηση g με $g(x) = x + \sqrt{x-1}$, $x \in (1, +\infty)$ συγκλίνει για $x \rightarrow 1 + 0$ προς τόν αριθμό 1 και

γράφουμε $\lim_{x \rightarrow 1+0} (x + \sqrt{x-1}) = 1$, ενώ την ιδιότητα (3) την εκφράζουμε λέγον-

τας ότι η συνάρτηση h με $h(x) = \frac{1}{x-5}$, $x \in (5, +\infty)$ απειρίζεται θετικά για $x \rightarrow 5 + 0$, ή συγκλίνει για $x \rightarrow 5 + 0$ προς τό $+\infty$ και γράφουμε

$$\lim_{x \rightarrow 5+0} \frac{1}{x-5} = +\infty.$$

Γενικά, αν f είναι μία συνάρτηση ορισμένη τουλάχιστο σ' ένα διάστημα της μορφής (x_0, β) , όπου $x_0 \in \mathbb{R}$, θα λέμε ότι αυτή *συγκλίνει για $x \rightarrow x_0 + 0$ προς τό l* ή *άλλιως ατείνει για $x \rightarrow x_0 + 0$ προς τό l* , όπου $l \in \mathbb{R}^*$ και αυτό θα τό συμβολίζουμε με $\lim_{x \rightarrow x_0+0} f(x) = l$ ή $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0+0} l$, τότε και μόνο τότε,

αν για κάθε ακολουθία x_n , $n = 1, 2, \dots$ με $x_n \in (x_0, \beta) \quad \forall n \in \mathbb{N}$ έχουμε

$$\lim x_n = x_0 \Rightarrow \lim f(x_n) = l.$$

Τό l , πού είναι βέβαια μονοσημάντως ορισμένο, τό ονομάζουμε *οριο* ή *οριακή τιμή* της συναρτήσεως f για $x \rightarrow x_0 + 0$.

*Αν $l = 0$, τότε η συνάρτηση f ονομάζεται *μηδενική για $x \rightarrow x_0 + 0$* . Επίσης στην περίπτωση, πού $l = -\infty$ λέμε και ότι η συνάρτηση f *απειρίζεται αρνητικά* για $x \rightarrow x_0 + 0$, ενώ στην περίπτωση, πού $l = +\infty$ λέμε ότι αυτή *απειρίζεται θετικά* για $x \rightarrow x_0 + 0$.

Παραδείγματα:

1. Η συνάρτηση f με $f(x) = (x-1)^2 + \sqrt{\frac{x}{x^2+1}}$, $x \in (0, +\infty)$ συγκλίνει για $x \rightarrow +0$ προς τόν αριθμό 1 ($+0$ γράφεται αντί του $0 + 0$). Πραγματικά: αν x_n , $n = 1, 2, \dots$ είναι μία οποιαδήποτε μηδενική ακολουθία με θετικούς όρους, έχουμε

$$f(x_n) = (x_n - 1)^2 + \sqrt{\frac{x_n}{x_n^2 + 1}} \rightarrow (0 - 1)^2 + \sqrt{\frac{0}{0^2 + 1}} = 1.$$

$$\text{*Αρα } \lim_{x \rightarrow +0} \left((x-1)^2 + \sqrt{\frac{x}{x^2+1}} \right) = 1.$$

2. Η συνάρτηση f με $f(x) = \frac{x}{1-x^2}$, $x \in (1, +\infty)$ απειρίζεται αρνητικά για $x \rightarrow 1 + 0$. Πραγματικά: αν x_n , $n = 1, 2, \dots$ είναι οποιαδήποτε ακολουθία με όρους μεγαλύτερους του 1 τέτοια, ώστε $\lim x_n = 1$, τότε έχουμε

$$1 - x_n^2 < 0 \quad \forall n \in \mathbb{N} \text{ και } \lim (1 - x_n^2) = 0$$

και άρα $\lim \frac{1}{1-x_n^2} = -\infty$. Έτσι

$$f(x_n) = \frac{x_n}{1-x_n^2} = x_n \cdot \frac{1}{1-x_n^2} \rightarrow 1 \cdot (-\infty) = -\infty$$

δηλαδή $\lim_{x \rightarrow 1+0} \frac{x}{1-x^2} = -\infty$.

3.2 Σύγκλιση συναρτήσεως για $x \rightarrow x_0 - 0$. Για τή συνάρτηση g με

$g(x)=x+\sqrt{1-x}$, $x \in (-\infty, 1)$, παρατηρούμε, όπως και στη (2), ότι για οποιαδήποτε ακολουθία x_n , $n=1, 2, \dots$ με $x_n < 1 \quad \forall n \in \mathbb{N}$ ισχύει

$$\lim x_n = 1 \Rightarrow g(x_n) = x_n + \sqrt{1-x_n} \rightarrow 1 + \sqrt{1-1} = 1.$$

Παρόμοια, για τη συνάρτηση h με $h(x) = \frac{1}{x-5}$, $x \in (-\infty, 5)$ παρατηρούμε ότι για οποιαδήποτε ακολουθία x_n , $n=1, 2, \dots$ με $x_n < 5 \quad \forall n \in \mathbb{N}$ ισχύει

$$\lim x_n = 5 \Rightarrow g(x_n) = \frac{1}{x_n-5} \rightarrow -\infty.$$

Πραγματικά: από το γεγονός ότι $\lim x_n = 5$ και $x_n < 5 \quad \forall n \in \mathbb{N}$ προκύπτει ότι για κάθε $\varepsilon > 0$ υπάρχει $n_0 = n_0(\varepsilon)$ τέτοιος ώστε να ισχύει $0 < 5 - x_n < \varepsilon \quad \forall n \geq n_0$. Άρα ισχύει και

$$\frac{1}{5-x_n} > \frac{1}{\varepsilon} \quad \forall n \geq n_0$$

δηλαδή $\lim \frac{1}{5-x_n} = +\infty$ και έτσι $\lim \frac{1}{x_n-5} = -\infty$.

Τά παραπάνω τά εκφράζουμε λέγοντας ότι η συνάρτηση g με $g(x)=x+\sqrt{1-x}$, $x \in (-\infty, 1)$ συγκλίνει για $x \rightarrow 1-0$ προς τον αριθμό 1 και γράφουμε

$\lim_{x \rightarrow 1-0} (x + \sqrt{1-x}) = 1$, και ότι η συνάρτηση h με $h(x) = \frac{1}{x-5}$, $x \in (-\infty, 5)$

άπειρίζεται αρνητικά για $x \rightarrow 5-0$ ή συγκλίνει για $x \rightarrow 5-0$ προς τό $-\infty$ και

γράφουμε $\lim_{x \rightarrow 5-0} \frac{1}{x-5} = -\infty$.

Γενικά, αν f είναι μία συνάρτηση ορισμένη τουλάχιστο σ' ένα διάστημα τῆς μορφῆς (α, x_0) , όπου $x_0 \in \mathbb{R}$, θά λέμε ότι αὐτή «συγκλίνει για $x \rightarrow x_0-0$ πρὸς τό l » ἢ ἀλλιῶς «τείνει για $x \rightarrow x_0-0$ πρὸς τό l », όπου $l \in \mathbb{R}^*$ καὶ αὐτό θά τό συμβολίζουμε μέ $\lim_{x \rightarrow x_0-0} f(x) = l$ ἢ $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0-0} l$, τότε καὶ μόνο τότε, ἂν για κάθε ακολουθία x_n , $n=1, 2, \dots$ με $x_n \in (\alpha, x_0) \quad \forall n \in \mathbb{N}$ ἔχουμε

$$\lim x_n = x_0 \Rightarrow \lim f(x_n) = l.$$

Τό l πού εἶναι, βέβαια, μονοσήμαντα ὀρισμένο, τό ὀνομάζουμε ὄριο ἢ ὀριακή τιμή τῆς συναρτήσεως f για $x \rightarrow x_0 + 0$.

*Αν $l = 0$, τότε ἡ συνάρτηση f ὀνομάζεται μηδενική για $x \rightarrow x_0-0$. Ἐπίσης στήν περίπτωση, πού $l = -\infty$ λέμε καὶ ὅτι ἡ συνάρτηση f ἀπειρίζεται ἀρνητικά για $x \rightarrow x_0-0$, ἐνῶ στήν περίπτωση, πού $l = +\infty$ λέμε ὅτι αὐτή ἀπειρίζεται θετικά για $x \rightarrow x_0-0$.

Παραδείγματα:

1. Ἡ συνάρτηση f με $f(x) = (x+2)^2 + \sqrt{\frac{x}{x^2-1}}$, $x \in (-1, 0)$ συγκλίνει για $x \rightarrow -0$ πρὸς τόν ἀριθμό 4 (-0 γράφεται ἀντί τοῦ $0-0$). Πραγματικά: ἂν x_n , $n=1, 2, \dots$ εἶναι ὅποιαδήποτε μηδενική ἀκολουθία με $x_n \in (-1, 0) \quad \forall n \in \mathbb{N}$, ἔχουμε

$$f(x_v) = (x_v + 2)^2 + \sqrt{\frac{-x_v}{1-x_v^2}} \rightarrow (0+2)^2 + \sqrt{\frac{0}{1-0^2}} = 4$$

καί ἄρα $\lim_{x \rightarrow -0} \left((x+2)^2 + \sqrt{\frac{x}{x^2-1}} \right) = 4.$

2. Ἡ συνάρτηση f μέ $f(x) = \frac{1}{x}$, $x \in (-\infty, 0)$ ἀπειρίζεται ἀρνητικά γιά $x \rightarrow -0$.

Πραγματικά: ἂν x_v , $v = 1, 2, \dots$ εἶναι ὁποιαδήποτε μηδενική ἀκολουθία μέ ἀρνητικούς ὄρους, τότε, γιά κάθε $\varepsilon > 0$ ὑπάρχει $v_0 = v_0(\varepsilon)$ τέτοιος, ὥστε νά ἰσχύει $0 < -x_v < \varepsilon \quad \forall v \geq v_0$. Τότε ὁμως

$$-\frac{1}{x_v} > \frac{1}{\varepsilon} \quad \forall v \in \mathbb{N}$$

δηλαδή $\lim \left(-\frac{1}{x_v} \right) = +\infty$ καί ἔτσι $\lim \frac{1}{x_v} = -\infty$. Ἄρα $\lim_{x \rightarrow -0} \frac{1}{x} = -\infty$.

3. Ἡ συνάρτηση f μέ $f(x) = \frac{x}{1-x^2}$, $x \in (-1, 1)$ ἀπειρίζεται θετικά γιά $x \rightarrow 1-0$.

Πραγματικά: ἂν x_v , $v = 1, 2, \dots$ εἶναι ὁποιαδήποτε ἀκολουθία μέ ὄρους στό διάστημα $(-1, 1)$ καί τέτοια ὥστε $\lim x_v = 1$, τότε ἔχουμε

$$1-x_v^2 > 0 \quad \forall v \in \mathbb{N} \text{ καί } \lim(1-x_v^2) = 0$$

ἀπ' ὅπου παίρουμε $\lim \frac{1}{1-x_v^2} = +\infty$. Ἔτσι

$$f(x_v) = \frac{x_v}{1-x_v^2} = x_v \frac{1}{1-x_v^2} \rightarrow 1(+\infty) = +\infty.$$

καί ἄρα $\lim_{x \rightarrow 1-0} \frac{x}{1-x^2} = +\infty$.

3.3 Σύγκλιση συναρτήσεως γιά $x \rightarrow x_0$. Ἄν θεωρήσουμε μιά συνάρτηση f ὀρισμένη τουλάχιστο σ' ἓνα σύνολο τῆς μορφῆς $(\alpha, x_0) \cup (x_0, \beta)$, τότε γι' αὐτή εἶναι δυνατό νά ὀριστεῖ ἡ ἔννοια τῆς συγκλίσεως τόσο γιά $x \rightarrow x_0 + 0$ ὅσο καί γιά $x \rightarrow x_0 - 0$.

Π.χ. γιά $f(x) = \frac{x}{|x|}$, $x \in (-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$, ἔχουμε

$$\lim_{x \rightarrow +0} \frac{x}{|x|} = \lim_{x \rightarrow +0} \frac{x}{x} = \lim_{x \rightarrow +0} 1 = 1$$

καί

$$\lim_{x \rightarrow -0} \frac{x}{|x|} = \lim_{x \rightarrow -0} \frac{x}{-x} = \lim_{x \rightarrow -0} (-1) = -1.$$

Ἀκόμη, γιά $f(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$, $x \in (-\infty, 1) \cup (1, +\infty)$ ἔχουμε

$$\lim_{x \rightarrow 1+0} \frac{x^2-1}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1+0} \frac{(x-1)(x+1)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1+0} (x+1) = 1+1 = 2$$

καί

$$\lim_{x \rightarrow 1-0} \frac{x^2-1}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1-0} \frac{(x-1)(x+1)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1-0} (x+1) = 1+1 = 2$$

Στήν τελευταία αυτή περίπτωση παρατηρούμε ότι

$$\lim_{x \rightarrow 1+0} \frac{x^2-1}{x-1} = 2 = \lim_{x \rightarrow 1-0} \frac{x^2-1}{x-1}$$

καί αυτό τό εκφράζουμε λέγοντας ότι ή συνάρτηση f μέ $f(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$, $x \in (-\infty, 1) \cup (1, +\infty)$ συγκλίνει γιά $x \rightarrow 1$ πρός τόν αριθμό 2.

Γενικά, αν f είναι μία συνάρτηση όρισμένη τουλάχιστο σ' ένα σύνολο τής μορφής $(\alpha, x_0) \cup (x_0, \beta)$ όπου $x_0 \in \mathbf{R}$, θά λέμε ότι αυτή «συγκλίνει γιά $x \rightarrow x_0$ πρός τό l » ή άλλίως «τείνει γιά $x \rightarrow x_0$ πρός τό l », όπου $l \in \mathbf{R}^*$ καί αυτό θά τό συμβολίζουμε μέ $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$ ή $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} l$ τότε καί μόνο τότε, αν

$$\lim_{x \rightarrow x_0+0} f(x) = l = \lim_{x \rightarrow x_0-0} f(x).$$

Όνομάζουμε τό l όριο ή όριακή τιμή τής συναρτήσεως f γιά $x \rightarrow x_0$.

Έπειδή οι όριακές τιμές τής f γιά $x \rightarrow x_0-0$ καί $x \rightarrow x_0+0$ είναι μοναδικές, άπό τά παραπάνω προκύπτει ότι καί ή όριακή τιμή τής f γιά $x \rightarrow x_0$ είναι επίσης μοναδική.

Αν $l = 0$, τότε ή συνάρτηση f ονομάζεται μηδενική γιά $x \rightarrow x_0$. Ακόμη στήν περίπτωση, πού $l = -\infty$ λέμε καί ότι ή συνάρτηση f απειρίζεται άρνητικά γιά $x \rightarrow x_0$, ένώ στήν περίπτωση, όπου $l = +\infty$ λέμε ότι αυτή απειρίζεται θετικά γιά $x \rightarrow x_0$.

Παραδείγματα:

1. Η συνάρτηση f μέ $f(x) = \frac{x^2-5x+6}{x-2}$, $x \in (-\infty, 2) \cup (2, +\infty)$ συγκλίνει γιά $x \rightarrow 2$ πρός τόν αριθμό -1. Πραγματικά:

$$\frac{x^2-5x+6}{x-2} = \frac{(x-2)(x-3)}{x-2} = x-3 \quad \forall x \in \mathbf{R} - \{2\}.$$

Αλλά τότε εύκολα προκύπτει ότι $\lim_{x \rightarrow 2+0} (x-3) = -1 = \lim_{x \rightarrow 2-0} (x-3)$, δηλαδή

$$\lim_{x \rightarrow 2+0} \frac{x^2-5x+6}{x-2} = -1 = \lim_{x \rightarrow 2-0} \frac{x^2-5x+6}{x-2}, \text{ καί άρα } \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2-5x+6}{x-2} = -1.$$

2. Η συνάρτηση f μέ $f(x) = \frac{1}{x^2}$, $x \in (-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ απειρίζεται θετικά γιά $x \rightarrow 0$. Πραγματικά: γιά κάθε μηδενική άκολουθία x_n , $n = 1, 2, \dots$ μέ θετικούς όρους, έχουμε

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x_n} = +\infty$$

καί άρα $\frac{1}{x_n^2} = \frac{1}{x_n} \cdot \frac{1}{x_n} \rightarrow (+\infty)(+\infty) = +\infty$, δηλαδή $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = +\infty$.

Έπίσης, γιά κάθε μηδενική άκολουθία x_n , $n = 1, 2, \dots$ μέ άρνητικούς όρους, έχουμε

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x_n} = -\infty$$

καί ἄρα $\frac{1}{x_v^2} = \frac{1}{x_v} \cdot \frac{1}{x_v} = (-\infty)(-\infty) = +\infty$, δηλαδή $\lim_{x \rightarrow -0} \frac{1}{x^2} = +\infty$.

*Ἐτσι ἀποδείξαμε ὅτι $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = +\infty$.

3. Ἡ συνάρτηση f μέ $f(x) = \frac{x-1}{x^2}$, $x \in (-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ ἀπειρίζεται ἀρνητικά γιά $x \rightarrow 0$. Πραγματικά: γιά κάθε μηδενική ἀκολουθία x_v , $v = 1, 2, \dots$ μέ θετικούς ὄρους, ἔχουμε

$$\frac{x_v - 1}{x_v^2} = \frac{1}{x_v} \left(1 - \frac{1}{x_v}\right) \rightarrow (+\infty)(1 - (+\infty)) = (+\infty)(-\infty) = -\infty$$

καί ἄρα $\lim_{x \rightarrow +0} \frac{x-1}{x^2} = -\infty$.

Ἐπίσης, γιά κάθε μηδενική ἀκολουθία x_v , $v = 1, 2, \dots$ μέ ἀρνητικούς ὄρους, ἔχουμε

$$\frac{x_v - 1}{x_v^2} = \frac{1}{x_v} \left(1 - \frac{1}{x_v}\right) \rightarrow (-\infty)(1 - (-\infty)) = (-\infty)(+\infty) = -\infty$$

καί ἄρα $\lim_{x \rightarrow -0} \frac{x-1}{x^2} = -\infty$.

*Ἐτσι ἀποδείξαμε ὅτι $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x-1}{x^2} = -\infty$.

Σχετικά μέ τή σύγκλιση γιά $x \rightarrow x_0$, $x_0 \in \mathbb{R}$ ἰσχύει τό παρακάτω βασικό θεώρημα, πού εἶναι ἀνάλογο μέ τό θεώρημα 1.3.3 πού ἀναφέρεται στή σύγκλιση γιά $x \rightarrow +\infty$.

3.3.1 ΘΕΩΡΗΜΑ. Θεωροῦμε μιά συνάρτηση f ὀρισμένη τουλάχιστο σέ ἕνα σύνολο τῆς μορφῆς $(\alpha, x_0) \cup (x_0, \beta)$, $x_0 \in \mathbb{R}$. Ἡ συνάρτηση f συγκλίνει γιά $x \rightarrow x_0$ πρὸς τό l ($l \in \mathbb{R}^*$), τότε καί μόνο τότε, ἂν γιά κάθε ἀκολουθία x_v , $v = 1, 2, \dots$ μέ $x_v \in (\alpha, x_0) \cup (x_0, \beta) \quad \forall v \in \mathbb{N}$ ἔχουμε.

$$\lim x_v = x_0 \Rightarrow \lim f(x_v) = l.$$

*Ἀπόδειξη. Α) Ὑποθέτουμε ὅτι $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$ καί θεωροῦμε μιά ὁποιαδήποτε ἀκολουθία x_v , $v = 1, 2, \dots$ μέ $x_v \in (\alpha, x_0) \cup (x_0, \beta) \quad \forall v \in \mathbb{N}$ καί $\lim x_v = x_0$. Διακρίνουμε, τώρα, τίς παρακάτω τρεῖς περιπτώσεις:

1. Ἰσχύει $x_v < x_0$ γιά ἕνα πεπερασμένο πλῆθος δεικτῶν. Στήν περίπτωση αὐτή, διαγράφοντας τοὺς ὄρους τῆς x_v , $v = 1, 2, \dots$ πού ικανοποιοῦν τή σχέση $x_v < x_0$ ἔχουμε μιά ἀκολουθία y_v , $v = 1, 2, \dots$ γιά τήν ὁποία, βέβαια, ἰσχύει $y_v \in (x_0, \beta) \quad \forall v \in \mathbb{N}$ καί ἀκόμη, σύμφωνα μέ τήν παρατήρηση τῆς § 1.4 τοῦ κεφ. III, ὅτι $\lim y_v = x_0$. Ἄρα, ἀφοῦ $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$, ἔχουμε $\lim_{x \rightarrow x_0} f(y_v) = l$, πού,

σύμφωνα πάλι μέ τήν ἴδια παρατήρηση, σημαίνει ὅτι $\lim f(x_v) = l$.

2. Ἰσχύει $x_v > x_0$ γιά ἕνα πεπερασμένο πλῆθος δεικτῶν. Ὅπως καί στήν πρώτη περίπτωση, ἔτσι καί ἐδῶ συμπεραίνουμε μέ ἀνάλογο τρόπο ὅτι $\lim f(x_v) = l$.

3. Δέν ἰσχύει καμιά ἀπ' τίς περιπτώσεις 1 καί 2. Τότε, διαγράφοντας

τούς όρους τής x_n , $n = 1, 2, \dots$ πού ίκανοποιούν τή σχέση $x_n < x_0$ έχουμε μιά ύπακολουθία x_{n_v} , $n = 1, 2, \dots$ τής x_n , $n = 1, 2, \dots$ γιά τήν όποία ίσχύει $x_{n_v} \in (x_0, \beta) \forall n \in \mathbb{N}$ καί άκόμη $\lim x_{n_v} = x_0$ (Ιδιότητα 2, § 1.4.2 τού κεφ. III). Άλλά άφοϋ $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$, έχουμε

$$(4) \quad \lim_{x \rightarrow x_0} f(x_{n_v}) = l.$$

Παρόμοια, διαγράφοντας τούς όρους τής x_n , $n = 1, 2, \dots$ πού ίκανοποιούν τή σχέση $x_n > x_0$ έχουμε μιά ύπακολουθία x_{m_v} , $n = 1, 2, \dots$ τής x_n , $n = 1, 2, \dots$ γιά τήν όποία ίσχύει $x_{m_v} \in (\alpha, x_0) \forall n \in \mathbb{N}$ καί $\lim x_{m_v} = x_0$. Άλλά, άφοϋ $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$, έχουμε

$$(5) \quad \lim_{x \rightarrow x_0} f(x_{m_v}) = l.$$

Παραπάνω διασπάσαμε τήν άκολουθία x_n , $n = 1, 2, \dots$ σέ δυό ύπακολουθίες τής, τίς x_{n_v} , $n = 1, 2, \dots$ καί x_{m_v} , $n = 1, 2, \dots$, γιά τίς όποίες ίσχύουν άντίστοιχα οί (4) καί (5). Από τίς σχέσεις αυτές προκύπτει ότι ίσχύει καί $\lim f(x_n) = l$. Πραγματικά: θέτοντας $\Lambda = \{\lambda_1, \lambda_2, \dots\}$ καί $M = \{\mu_1, \mu_2, \dots\}$ οί (4) καί (5) μποροϋν νά γραφοϋν άντίστοιχα

$$\lim_{n \in \Lambda} f(x_n) = l \quad \text{καί} \quad \lim_{n \in M} f(x_n) = l.$$

Άλλά, όπως είδαμε στήν παράγραφο 1.4 τού κεφ. III, ίσχύει

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{n \in \Lambda} f(x_n) = l \\ \lim_{n \in M} f(x_n) = l \end{array} \right\} \Rightarrow \lim_{n \in \Lambda \cup M = \mathbb{N}} f(x_n) = l \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l.$$

Όστε καί στίς τρεις παραπάνω περιπτώσεις άποδείξαμε ότι $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$.

B. Υποθέτουμε, τώρα, ότι γιά κάθε άκολουθία x_n , $n = 1, 2, \dots$ μέ $x_n \in (\alpha, x_0) \cup (x_0, \beta) \forall n \in \mathbb{N}$ ίσχύει

$$(6) \quad \lim x_n = x_0 \Rightarrow \lim f(x_n) = l.$$

Είμαι φανερό ότι αυτό ίσχύει καί γιά έκείνες τίς άκολουθίες x_n , $n = 1, 2, \dots$ γιά τίς όποίες $x_n \in (\alpha, x_0) \forall n \in \mathbb{N}$ πού σημαίνει ότι $\lim_{x \rightarrow x_0-0} f(x) = l$. Άκόμη

ή (6) ίσχύει καί γιά έκείνες τίς άκολουθίες x_n , $n = 1, 2, \dots$ μέ $x_n \in (x_0, \beta) \forall n \in \mathbb{N}$, πού σημαίνει ότι $\lim_{x \rightarrow x_0+0} f(x) = l$. Έτσι έχουμε $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$.

4. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΛΙΝΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

4.1 Έστω σε $\mathbb{R}^* = \mathbb{R} \cup \{-\infty, \infty\}$ καί f μιά συνάρτηση όρισμένη τουλάχιστο σ' ένα σύνολο $U(\sigma)$ πού έχει τή μορφή

$$(\alpha, \sigma) \cup (\sigma, \beta), \quad \text{άν } \sigma \in \mathbb{R}$$

$$(\alpha, +\infty), \quad \text{άν } \sigma = +\infty$$

$$(-\infty, \alpha), \quad \text{άν } \sigma = -\infty.$$

Παραπάνω έχουμε όρισει την έννοια του $\lim_{x \rightarrow \sigma} f(x) = l$ και μάλιστα σε όλες τις περιπτώσεις, όπου $l \in \mathbb{R}^*$. 'Ακόμη τό l τό ονομάσαμε *βιοιο ή όριοκή τιμή τής συναρτήσεως f γιά $x \rightarrow \sigma$* .

'Όπως είδαμε, ή σύγκλιση μιās συναρτήσεως γιά $x \rightarrow \sigma$ χαρακτηρίζεται πάντοτε από τις συγκλίνουσες πρός τό σ ακολουθίες και τοῦτο άλλοτε από τόν όρισμό (βλ. π.χ. § 1.2) και άλλοτε από θεωρήματα (βλ. π.χ. θεωρήματα 1.3.3 και 3.3.1). Γιά όλες όμως τις περιπτώσεις ισχύει, τό ακόλουθο θεωρήμα.

4.1.1 ΘΕΩΡΗΜΑ. *'Η συνάρτηση f συγκλίνει γιά $x \rightarrow \sigma$ πρός τό l , $l \in \mathbb{R}^*$, τότε και μόνο τότε, αν γιά κάθε ακολουθία $x_n, n = 1, 2, \dots$ με $x_n \in U(\sigma) \forall n \in \mathbb{N}$ ισχύει*

$$\lim x_n = \sigma \Rightarrow \lim f(x_n) = l.$$

'Απόδειξη. Γιά $\sigma = +\infty$, τό θεωρήμα αυτό συμπίπτει με τό θεωρήμα 1.3.3. Παρόμοια, και γιά $\sigma = -\infty$, τό θεωρήμα πάλι ισχύει (βλ. § 2.1). Τέλος γιά $\sigma \in \mathbb{R}$, τό θεωρήμα συμπίπτει με τό θεωρήμα 3.3.1.

Μέ τή βοήθεια του παραπάνω θεωρήματος αποδεικνύονται εύκολα και γιά τις συγκλίνουσες συναρτήσεις ιδιότητες ανάλογες με τις ιδιότητες των ακολουθιών. Πρίν όμως διατυπώσουμε τις ιδιότητες των συγκλινουσών συναρτήσεων θά όρίσουμε πρώτα την έννοια τής *φραγμένης συναρτήσεως*, ή όποία συνδέεται με την έννοια τής συγκλίσεως συναρτήσεως, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τις ακολουθίες (βλ. ιδιότητες 3 και 5 τής § 1.3.1, και ιδιότητα 3 τής § 1.4.2 του κεφ. III).

Μιά συνάρτηση f , ονομάζεται *φραγμένη στή γειτονιά του σ* , τότε και μόνο τότε, αν υπάρχει πραγματικός αριθμός θ και σύνολο τής μορφής $U(\sigma)$ τέτοιο, ώστε νά ισχύει

$$|f(x)| \leq \theta \quad \forall x \in U(\sigma).$$

Τό θ ονομάζεται τότε *φράγμα τής f πάνω στό $U(\sigma)$* .

Π.χ. ή συνάρτηση f με $f(x) = \frac{1}{x}$ είναι φραγμένη στή γειτονιά του $+\infty$ και του $-\infty$, γιατί ισχύει

$$\left| \frac{1}{x} \right| \leq 1 \quad \forall x \in (1, +\infty),$$

και

$$\left| \frac{1}{x} \right| \leq 1 \quad \forall x \in (-\infty, -1).$$

Παρόμοια, αυτή είναι φραγμένη και στή γειτονιά του 2, γιατί ισχύει

$$\left| \frac{1}{x} \right| \leq 1 \quad \forall x \in (1, 2) \cup (2, +\infty).$$

'Αντίθετα, αυτή δέν είναι φραγμένη στή γειτονιά του 0, γιατί αν υποθέσουμε ότι υπάρχει $\theta > 0$ και σύνολο τής μορφής $U(0)$ με

$$\left| \frac{1}{x} \right| \leq \theta \quad \forall x \in U(0)$$

τότε για κάθε $x \in \left[\left(-\frac{1}{\theta}, 0 \right) \cup \left(0, \frac{1}{\theta} \right) \right] \cap U(0)$ έχουμε $\left| \frac{1}{x} \right| > \theta$, πράγμα που είναι άτοπο.

4.1.2. *Με τή βοήθεια του θεωρήματος 4.1.1. προκύπτουν οι παρακάτω ιδιότητες των συγκλινοσών συναρτήσεων με την προϋπόθεση, βέβαια, ότι οι παράξεις που σημειώνονται στις όριακές τιμές είναι επιτορεπτές.*

Υποθέτουμε ότι f και g είναι συναρτήσεις ορισμένες τουλάχιστο πάνω σε ένα συγκεκριμένο σύνολο $U(\sigma)$, τής μορφής που καθορίστηκε παραπάνω.

$$1. \left. \begin{array}{l} f \text{ φραγμένη στή γειτονιά του } \sigma \\ g(x) \xrightarrow{x \rightarrow \sigma} 0 \end{array} \right\} \Rightarrow f(x)g(x) \xrightarrow{x \rightarrow \sigma} 0$$

Πραγματικά: θεωρούμε ένα φράγμα θ τής f πάνω στο $U(\sigma)$ και μία οποιαδήποτε ακολουθία $x_n, n = 1, 2, \dots$ με $\lim x_n = \sigma$. Άλλά τότε έχουμε ότι $x_n \in U(\sigma)$ για όλους τούς δείκτες n εκτός από ένα πεπερασμένο πλήθος και έτσι για τούς ίδιους δείκτες προκύπτει ότι $|f(x_n)| \leq \theta$. Άπ' αυτό προκύπτει άμέσως ότι ή ακολουθία $f(x_n), n = 1, 2, \dots$ είναι φραγμένη. Τώρα παρατηρούμε ότι ισχύει και $g(x_n) \rightarrow 0$, άφοϋ από τήν υπόθεση έχουμε ότι $g(x) \xrightarrow{x \rightarrow \sigma} 0$. Άρα σύμφωνα με τήν ιδιότητα 5, § 1.3.1 του κεφ. III, προκύπτει ότι και $f(x_n)g(x_n) \rightarrow 0$, δηλαδή $f(x)g(x) \xrightarrow{x \rightarrow \sigma} 0$.

$$2. \quad f(x) \xrightarrow{x \rightarrow \sigma} 0 \Leftrightarrow |f(x)| \xrightarrow{x \rightarrow \sigma} 0 \Leftrightarrow -f(x) \xrightarrow{x \rightarrow \sigma} 0.$$

Πραγματικά: αν $x_n, n = 1, 2, \dots$ είναι μία οποιαδήποτε ακολουθία με $\lim x_n = \sigma$, τότε σύμφωνα με τήν ιδιότητα 1, § 1.3.1 του κεφ. III, έχουμε

$$f(x_n) \rightarrow 0 \Leftrightarrow |f(x_n)| \rightarrow 0 \Leftrightarrow -f(x_n) \rightarrow 0$$

και άρα ισχύει ή 2.

$$3. \quad \left. \begin{array}{l} g(x) \xrightarrow{x \rightarrow \sigma} 0 \\ |f(x)| \leq |g(x)| \quad \forall x \in U(\sigma) \end{array} \right\} \Rightarrow f(x) \xrightarrow{x \rightarrow \sigma} 0.$$

Πραγματικά: αν $x_n, n = 1, 2, \dots$ είναι μία οποιαδήποτε ακολουθία με $\lim x_n = \sigma$, χωρίς βλάβη τής γενικότητας υποθέτουμε ότι $x_n \in U(\sigma) \quad \forall n \in \mathbb{N}$. Έτσι έχουμε $g(x_n) \rightarrow 0$ και $|f(x_n)| \leq |g(x_n)| \quad \forall n \in \mathbb{N}$ και άρα, σύμφωνα με τήν ιδιότητα 7, § 1.3.1 του κεφ. III, ισχύει και $f(x_n) \rightarrow 0$, που σημαίνει ότι $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow \sigma} 0$.

$$4. \quad \lim_{x \rightarrow \sigma} f(x) = l \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \sigma} |f(x)| = \begin{cases} |l|, & \text{αν } l \in \mathbb{R} \\ +\infty, & \text{αν } l = +\infty \text{ ή } -\infty. \end{cases}$$

Πραγματικά: αν $l \in \mathbb{R}$, τότε έχουμε $f(x) - l \xrightarrow{x \rightarrow \sigma} 0$. Άλλά ισχύει

$||f(x)| - |l|| \leq |f(x) - l| \quad \forall x \in U(\sigma)$ και άρα, από τήν παραπάνω ιδιότητα 3, προκύπτει ότι και $||f(x)| - |l|| \xrightarrow{x \rightarrow \sigma} 0$, δηλαδή $\lim_{x \rightarrow \sigma} |f(x)| = |l|$.

*Αν $l = +\infty$, $\eta = -\infty$, θεωρούμε μία οποιαδήποτε ακολουθία $x_n, n = 1, 2, \dots$ με $\lim x_n = \sigma$. 'Αλλά ισχύει $-|f(x_n)| \leq f(x_n) \leq |f(x_n)|$ και έτσι έχουμε

$$\lim(-|f(x_n)|) \leq \lim f(x_n) \leq \lim |f(x_n)|.$$

*Αρα, αν $l = +\infty$, τότε και $\lim |f(x_n)| = +\infty$, ενώ αν $\lim f(x_n) = -\infty$, τότε και $\lim(-|f(x_n)|) = -\infty$ και άρα $\lim |f(x_n)| = +\infty$. *Έτσι πάντοτε έχουμε $\lim |f(x_n)| = +\infty$ που σημαίνει ότι $\lim_{x \rightarrow \sigma} |f(x)| = +\infty$.

5. $\lim_{x \rightarrow \sigma} f(x) = l, l \in \mathbb{R} \Rightarrow f$ είναι φραγμένη στη γειτονιά του σ .

*Αν υποθεθεί ότι η f δεν είναι φραγμένη, έχουμε:

1) αν $\sigma \in \mathbb{R}$, τότε σε κάθε σύνολο της μορφής $(\sigma - \frac{1}{v}, \sigma) \cup (\sigma, \sigma + \frac{1}{v})$

υπάρχει x_n με $f(x_n) \geq v \quad \forall v \in \mathbb{N}$.

2) αν $\sigma = -\infty$, τότε σε κάθε σύνολο της μορφής $(-\infty, -v)$ υπάρχει x_n με $f(x_n) \geq v \quad \forall v \in \mathbb{N}$.

3) αν $\sigma = +\infty$, τότε σε κάθε σύνολο της μορφής $(v, +\infty)$ υπάρχει x_n με $f(x_n) \geq v \quad \forall v \in \mathbb{N}$.

Παρατηρούμε ότι και στις τρεις παραπάνω περιπτώσεις η ακολουθία που όριζεται είναι τέτοια ώστε

$$\lim x_n = \sigma \quad \text{και} \quad f(x_n) \geq v \quad \forall v \in \mathbb{N}$$

*Αρα $\lim f(x_n) = l$ και ακόμη $\lim f(x_n) \geq \lim v$, δηλαδή $l \geq +\infty$, πράγμα που είναι άτοπο.

$$6. \left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow \sigma} f(x) = l_1 \\ \lim_{x \rightarrow \sigma} g(x) = l_2 \end{array} \right\} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \sigma} (f(x) + g(x)) = l_1 + l_2$$

Πραγματικά: αν $x_n, n = 1, 2, \dots$ είναι μία οποιαδήποτε ακολουθία με $\lim x_n = \sigma$, τότε έχουμε και $\lim f(x_n) = l_1, \lim g(x_n) = l_2$ και έτσι, σύμφωνα με την ιδιότητα 4, § 1.4.2 του κεφ. III, προκύπτει

$$\lim [f(x_n) + g(x_n)] = l_1 + l_2$$

που σημαίνει ότι $\lim_{x \rightarrow \sigma} [f(x) + g(x)] = l_1 + l_2$.

$$7. \left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow \sigma} f(x) = l_1 \\ \lim_{x \rightarrow \sigma} g(x) = l_2 \end{array} \right\} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \sigma} f(x)g(x) = l_1 l_2.$$

Πραγματικά: αν $x_n, n = 1, 2, \dots$ είναι μία οποιαδήποτε ακολουθία με $\lim x_n = \sigma$, τότε έχουμε και $\lim f(x_n) = l_1, \lim g(x_n) = l_2$ και έτσι, σύμφωνα με την ιδιότητα 5, § 1.4.2 του κεφ. III, προκύπτει

$$\lim f(x_n) g(x_n) = l_1 l_2$$

που σημαίνει ότι $\lim_{x \rightarrow \sigma} f(x)g(x) = l_1 l_2$.

Αυτή μαζί με την προηγούμενη ιδιότητα 6 συνεπάγονται και την

$$\left. \begin{array}{l} \xi \in \mathbb{R}, \lim_{x \rightarrow \sigma} f(x) = l_1 \\ \eta \in \mathbb{R}, \lim_{x \rightarrow \sigma} g(x) = l_2 \end{array} \right\} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \sigma} (\xi f(x) + \eta g(x)) = \xi l_1 + \eta l_2.$$

Ειδικά, για $\xi = 1$ και $\eta = -1$, προκύπτει

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow \sigma} f(x) = l_1 \\ \lim_{x \rightarrow \sigma} g(x) = l_2 \end{array} \right\} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \sigma} (f(x) - g(x)) = l_1 - l_2.$$

$$8. \left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow \sigma} f(x) = l \neq 0 \\ f(x) \neq 0 \quad \forall x \in U(\sigma) \end{array} \right\} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \sigma} \frac{1}{f(x)} = \frac{1}{l}.$$

Πραγματικά: αν $x_v, v=1,2,\dots$ είναι μία οποιαδήποτε ακολουθία με $\lim x_v = \sigma$, τότε $\lim f(x_v) = l$. Χωρίς βλάβη της γενικότητας υποθέτουμε ότι $x_v \in U(\sigma)$ για κάθε $v \in \mathbb{N}$. Τότε όμως έχουμε $\lim f(x_v) = l$ και $f(x_v) \neq 0 \quad \forall v \in \mathbb{N}$ και έτσι από την ιδιότητα 6, § 1.4.2 του κεφ. III παίρνουμε

$$\lim \frac{1}{f(x_v)} = \frac{1}{l}$$

πού σημαίνει ότι και $\lim_{x \rightarrow \sigma} \frac{1}{f(x)} = \frac{1}{l}$.

Αυτή μαζί με την προηγούμενη ιδιότητα 7 συνεπάγονται και την

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow \sigma} f(x) = l_1 \neq 0 \\ \lim_{x \rightarrow \sigma} g(x) = l_2 \\ f(x) \neq 0 \quad \forall x \in U(\sigma) \end{array} \right\} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \sigma} \frac{g(x)}{f(x)} = \frac{l_2}{l_1}.$$

$$9. \left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow \sigma} f(x) = l_1 \\ \lim_{x \rightarrow \sigma} g(x) = l_2 \\ f(x) \leq g(x) \quad \forall x \in U(\sigma) \end{array} \right\} \Rightarrow l_1 \leq l_2.$$

Πραγματικά: αν $x_v, v=1,2,\dots$ είναι μία οποιαδήποτε ακολουθία με $\lim x_v = \sigma$ και $x_v \in U(\sigma) \quad \forall v \in \mathbb{N}$, θα πρέπει να αποδείξουμε την παρακάτω ιδιότητα

$$\left. \begin{array}{l} \lim f(x_v) = l_1 \\ \lim g(x_v) = l_2 \\ f(x_v) \leq g(x_v) \quad \forall v \in \mathbb{N} \end{array} \right\} \Rightarrow l_1 \leq l_2.$$

Αυτή όμως προκύπτει από τον ορισμό της διατάξεως στο σύνολο \mathbb{R}^* πού δόθηκε στην § 2.1.3 του κεφ. III.

$$10. \left. \begin{array}{l} f(x) \leq h(x) \leq g(x) \quad \forall x \in U(\sigma) \\ \lim_{x \rightarrow \sigma} f(x) = l, \quad \lim_{x \rightarrow \sigma} g(x) = l \end{array} \right\} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \sigma} h(x) = l.$$

Πραγματικά: αν $x_v, v=1,2,\dots$ είναι μία οποιαδήποτε ακολουθία με $\lim x_v = \sigma$

θά έχουμε $\lim f(x_v) = l$ και $\lim g(x_v) = l$. Χωρίς, όμως, βλάβη τής γενικότητας υποθέτουμε ότι $x_v \in U(\sigma) \forall v \in \mathbb{N}$ και άρα

$$f(x_v) \leq h(x_v) \leq g(x_v) \quad \forall v \in \mathbb{N}$$

Αυτό, σύμφωνα με τήν ιδιότητα 8, § 1.4.2 τού κεφ. III, μᾶς δίνει ότι και $\lim h(x_v) = l$ πού σημαίνει ότι $\lim h(x) = l$.

$$\text{II. } \lim_{x \rightarrow \sigma} f(x) = l \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \sigma} \sqrt[k]{|f(x)|} = \begin{cases} \sqrt[k]{|l|}, & \text{ἂν } l \in \mathbb{R} \\ +\infty, & \text{ἂν } l = +\infty \text{ ἢ } -\infty. \end{cases}$$

Πραγματικά: υποθέτουμε ότι $l \in \mathbb{R}$ και θεωροῦμε μια οποιαδήποτε ακολουθία $x_v, v = 1, 2, \dots$ με $\lim x_v = \sigma$. Τότε όμως $\lim f(x_v) = l$ και από τήν ιδιότητα 9, § 1.4.2 τού κεφ. III ἔχουμε

$$\lim \sqrt[k]{|f(x_v)|} = \sqrt[k]{|l|},$$

$$\text{πού σημαίνει ότι } \lim_{x \rightarrow \sigma} \sqrt[k]{|f(x)|} = \sqrt[k]{|l|}.$$

*Αν $l = +\infty$, ἢ $-\infty$, τότε, από τήν παραπάνω ιδιότητα 4 ἔχουμε και $\lim_{x \rightarrow \sigma} |f(x)| = +\infty$. *Άρα, γιά οποιαδήποτε ακολουθία $x_v, v = 1, 2, \dots$ με

$\lim x_v = \sigma$, ἔχουμε $\lim |f(x_v)| = +\infty$. *Ἔτσι γιά κάθε $\epsilon > 0$, θέτουμε $\epsilon^* = \epsilon^k$ και τότε ὑπάρχει δείκτης v_0 (πού ἐξαρτᾶται ἀπό τό ϵ^* , ἄρα και ἀπό τό ϵ) τέτοιος ὥστε

$$|f(x_v)| > \frac{1}{\epsilon^*} \quad \forall v \geq v_0$$

*Ἀλλά τότε ἔχουμε και

$$\sqrt[k]{|f(x_v)|} > \frac{1}{\sqrt[k]{\epsilon^*}} = \frac{1}{\sqrt[k]{\epsilon^k}} = \frac{1}{\epsilon} \quad \forall v \geq v_0$$

δηλαδή $\lim_{x \rightarrow \sigma} \sqrt[k]{|f(x_v)|} = +\infty$, πού σημαίνει ότι $\lim_{x \rightarrow \sigma} \sqrt[k]{|f(x)|} = +\infty$.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

23. Νά υπολογισθοῦν οἱ παρακάτω ὁριακές τιμές:

$$1) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^5 + 3} \quad 2) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\eta\mu x}{x} \quad 3) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\eta\mu 5x}{x^3 + 7}$$

$$4) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x\eta\mu x}{x^2 + 1} \quad 5) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + 1}{x - 1} \quad 6) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + 1}{x^2 - 1}$$

24. Νά υπολογισθοῦν οἱ παρακάτω ὁριακές τιμές:

$$1) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^4 + 3x^2 + 7}{x^4 - x^2 + 2} \quad 2) \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x(x+\alpha)} - x) \quad 3) \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{4x^2 + 5x + 2} - 2x)$$

$$4) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^5 + 7x}{3x^2 + 1} \quad 5) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x - x^3}{5x^2 + 1} \quad 6) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^8 - x^8}{x^4 + 8x^2 + 7}$$

$$7) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^4 - x^7}{x^6 + 7} \quad 8) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3 - x^2}{x^2 + 2} \quad 9) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x - x^5}{7x^2 + 2}$$

25. Νά υπολογισθούν οι παρακάτω όριακές τιμές:

1) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 \eta \mu x}{x^3 + 1}$ 2) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3 + 2x}{-x^3 + 8}$ 3) $\lim_{x \rightarrow -\infty} x (\sqrt{x^2 + 1} + x)$

26. Νά υπολογισθούν οι παρακάτω όριακές τιμές:

1) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 + 1}{2x + 4}$ 2) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3}{x + 7}$ 3) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^7}{x^4 + 2}$ 4) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x - x^3}{x^2 + 3x + 4}$

27. Νά υπολογισθούν οι παρακάτω όριακές τιμές:

1) $\lim_{x \rightarrow 1+0} \frac{x^2 - 2x + 4}{x - 1}$

2) $\lim_{x \rightarrow 1-0} \frac{x^2 - 2x + 4}{x - 1}$

3) $\lim_{x \rightarrow 2+0} \frac{|x - 2| + x^2 - 3x + 2}{x - 2}$

4) $\lim_{x \rightarrow 2-0} \frac{|x - 2| + x^2 - 3x + 2}{x - 2}$

5) $\lim_{x \rightarrow +0} \frac{x^2 + 2}{|x|x}$

6) $\lim_{x \rightarrow -0} \frac{x^2 + 2}{|x|x}$

28. Παρόμοια, νά υπολογισθούν οι όριακές τιμές:

1) $\lim_{x \rightarrow \sqrt{a}} \frac{x^4 - 4}{x^2 - 2}$

2) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 + 2x - 3}{x - 1}$

3) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 3x - 4}{2x^2 - 5x + 3}$

4) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^\lambda - 1}{x^\mu - 1}$

(λ, μ φυσικοί αριθμοί)

5) $\lim_{x \rightarrow \sqrt{a}} \frac{5x^3 - 3\sqrt{2}x^2 - 4x}{x^2 - 2}$

6) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 + 1}{x^2}$

7) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{3x^2 + 6x}{x^2 + 2x + 1}$

8) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - 1}{|x|}$

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

1. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΣ


1.1 "Όλες οι συναρτήσεις με τις οποίες ασχολούμαστε στο κεφάλαιο αυτό είναι πραγματικές μιās πραγματικής μεταβλητής.

Για τή συνάρτηση g με $g(x) = \begin{cases} \frac{x^2-1}{x-1}, & \text{αν } x \neq 1 \\ 0, & \text{αν } x = 1 \end{cases}$ παρατηρούμε ότι

$$\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2-1}{x-1} = 2 \neq 0 = g(1).$$


Αντίθετα, για τή συνάρτηση h με $h(x) = \begin{cases} \frac{x^2-1}{x-1}, & \text{αν } x \neq 1 \\ 2, & \text{αν } x = 1 \end{cases}$ παρατηρούμε ότι

$$\lim_{x \rightarrow 1} h(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2-1}{x-1} = 2 = h(1).$$



Σχ. 63

g είναι άσυνεχής στο 1



Σχ. 64



h είναι συνεχής στο 1

Στή δεύτερη περίπτωση λέμε ότι ή συνάρτηση h είναι συνεχής στο σημείο 1 (σχ. 64), ενώ στήν πρώτη περίπτωση λέμε ότι ή συνάρτηση g είναι άσυνεχής στο σημείο 1 (σχ. 63).

Επίσης για τίσ συναρτήσεις φ και ψ με

$$\varphi(x) = \begin{cases} |x|, & \text{αν } x \leq 0 \\ x+1, & \text{αν } x > 0 \end{cases} \quad \text{και} \quad \psi(x) = \begin{cases} x, & \text{αν } x \leq 0 \\ \frac{1}{x}, & \text{αν } x > 0 \end{cases}$$

παρατηρούμε ότι είναι άσυνεχες στο σημείο 0, όπως φαίνεται και στις παρακάτω γεωμετρικές παραστάσεις τους:



Γενικά, για μία συνάρτηση f με πεδίο ορισμού ένα διάστημα Δ λέμε ότι είναι *συνεχής στο σημείο* $x_0 \in \Delta$, τότε και μόνο τότε, αν

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

Παρατήρηση. Στόν παραπάνω όρισμό γράφοντας $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$, αν τό x_0 είναι τό άριστερό άκρο τοῦ διαστήματος Δ , έννοοῦμε τό $\lim_{x \rightarrow x_0+0} f(x)$, ένῶ αν τό x_0 είναι τό δεξιό άκρο, έννοοῦμε τό $\lim_{x \rightarrow x_0-0} f(x)$.

Αν ή συνάρτηση f είναι συνεχής σε κάθε σημείο τοῦ διαστήματος Δ , τότε λέμε ότι είναι *συνεχής στο* Δ , ή και, άπλά, *συνεχής*.

1.1.1 ΘΕΩΡΗΜΑ. Η συνάρτηση f είναι συνεχής στο σημείο $x_0 \in \Delta$ τότε και μόνο τότε, αν για κάθε ακολουθία $x_n, n = 1, 2, \dots$ με $x_n \in \Delta \forall n \in \mathbb{N}$ έχουμε

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(x_0).$$

Απόδειξη. Από τόν όρισμό, τό ότι ή f είναι συνεχής στο $x_0 \in \Delta$ σημαίνει ότι $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$. Έτσι, στην περίπτωση πού τό x_0 δέν είναι άκρο τοῦ

διαστήματος Δ , τό θεώρημα προκύπτει από τό θεώρημα 3.3.1 τοῦ κεφ. IV, ένῶ στην περίπτωση πού τό x_0 είναι άκρο τοῦ διαστήματος Δ τό θεώρημα προκύπτει από τούς όρισμούς πού δόθηκαν στην § 3.1 και § 3.2 τοῦ κεφ. IV.

Σημείωση. Θεωροῦμε μία συνάρτηση f όρισμένη σ' ένα διάστημα Δ , ή όποια είναι συνεχής σε ένα σημείο $x_0 \in \Delta$. Τότε για όποιαδήποτε ακολουθία $x_n, n = 1, 2, \dots$ με $x_n \in \Delta \forall n \in \mathbb{N}$ και για ένα άπέραντο σύνολο $M \subseteq \mathbb{N}$ με $\lim_{n \in M} x_n = x_0$

θέτοῦμε

$$y_n = \begin{cases} x_n, & \text{αν } n \in M \\ x_0, & \text{αν } n \notin M \end{cases}$$

και παρατηρούμε ότι

$$\lim_{v \in M} x_v = x_0 \Rightarrow \lim_{v \in M} y_v = x_0 \Rightarrow \lim_{v \in M} f(y_v) = f(x_0) \Rightarrow \lim_{v \in M} f(x_v) = f(x_0)$$

δηλαδή ότι

$$\lim_{v \in M} x_v = x_0 \Rightarrow \lim_{v \in M} f(x_v) = f(x_0).$$

Παραδείγματα:

1. Κάθε σταθερή συνάρτηση είναι συνεχής.

2. Η συνάρτηση f με $f(x) = x$ είναι συνεχής. Πραγματικά: για κάθε ακολουθία x_v , $v = 1, 2, \dots$ με $\lim x_v = x_0$ έχουμε

$$\lim f(x_v) = \lim x_v = x_0 = f(x_0).$$

*Αρα $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$ και τούτο για κάθε x_0 .

3. Η συνάρτηση f με $f(x) = \alpha x^k$ (k φυσικός αριθμός) είναι συνεχής. Πραγματικά: για κάθε ακολουθία x_v , $v = 1, 2, \dots$ με $\lim x_v = x_0$ έχουμε

$$\lim f(x_v) = \lim \alpha x_v^k = \lim \underbrace{\alpha x_v \cdot x_v \cdot \dots \cdot x_v}_k \text{ φορές} = \alpha \underbrace{x_0 \cdot x_0 \cdot \dots \cdot x_0}_k \text{ φορές} = \alpha x_0^k$$

όπου χρησιμοποιήσαμε διαδοχικά την ιδιότητα 5 της § 1.4.2 του κεφ. III. *Ετσι

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$ και τούτο για κάθε x_0 .

$x \rightarrow x_0$

4. Η συνάρτηση f με $f(x) = |x|$ είναι συνεχής. Πραγματικά: αν x_v , $v = 1, 2, \dots$ είναι μία ακολουθία με $\lim x_v = x_0$, τότε από την ιδιότητα 1, § 1.4.2 του κεφ. III έχουμε

$$\lim f(x_v) = \lim |x_v| = |x_0| = f(x_0).$$

*Αρα $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$ και τούτο για κάθε x_0 .

$x \rightarrow x_0$

5. Η συνάρτηση f με $f(x) = \sqrt[k]{x}$, $x \geq 0$ είναι συνεχής. Πραγματικά: αν x_v , $v = 1, 2, \dots$ είναι μία ακολουθία με $x_v \geq 0 \forall v \in \mathbb{N}$ και $\lim x_v = x_0$, όπου $x_0 \geq 0$, από την ιδιότητα 9, § 1.4.2 του κεφ. III, έχουμε

$$\lim f(x_v) = \lim \sqrt[k]{x_v} = \sqrt[k]{x_0} = f(x_0).$$

*Αρα $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$ και τούτο για κάθε x_0 .

$x \rightarrow x_0$

1.2 Ίδιότητες τών συνεχών συναρτήσεων. Στα παρακάτω θεωρήματα αναφέρονται μερικές βασικές ιδιότητες τών συνεχών συναρτήσεων.

1.2.1. ΘΕΩΡΗΜΑ. Έγυποθέτουμε ότι f και g είναι συναρτήσεις με πεδίο ορισμού ένα διάστημα Δ . Αν οι f και g είναι συνεχείς συναρτήσεις, τότε και τό άθροισμά τους $f+g$ και τό γινόμενό τους fg είναι συνεχείς συναρτήσεις. Αν ακόμη $g(x) \neq 0 \forall x \in \Delta$, τότε και τό πηλίκο τους $\frac{f}{g}$ είναι συνεχής συνάρτηση.

Απόδειξη. Έπειδή οι συναρτήσεις f και g είναι συνεχείς σ' ένα οποιοδήποτε σημείο x_0 του διαστήματος Δ , θά ισχύει

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0) \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = g(x_0).$$

*Έτσι και για μία οποιαδήποτε ακολουθία x_v , $v = 1, 2, \dots$ με $x_v \in \Delta \forall v \in \mathbb{N}$ και $\lim x_v = x_0$ θά ισχύει

$$(1) \quad \lim f(x_v) = f(x_0) \quad \text{καί} \quad \lim g(x_v) = g(x_0).$$

*Αρα

$$\lim [f(x_v) + g(x_v)] = f(x_0) + g(x_0) \quad \text{καί} \quad \lim f(x_v) g(x_v) = f(x_0) g(x_0)$$

δηλαδή αποδείξαμε ότι

$$\lim x_v = x_0 \Rightarrow$$

$$\lim (f + g)(x_v) = \lim [f(x_v) + g(x_v)] = f(x_0) + g(x_0) = (f + g)(x_0)$$

καί άκόμη

$$\lim x_v = x_0 \Rightarrow$$

$$\lim (f g)(x_v) = \lim f(x_v) g(x_v) = f(x_0) g(x_0) = (fg)(x_0).$$

*Έτσι, μέ τή βοήθεια του θεωρήματος 1.1.1, προκύπτει ότι οί συναρτήσεις $f + g$ καί fg είναι συνεχείς στό x_0 καί τοῦτο γιά κάθε $x_0 \in \Delta$.

*Αν τώρα υποθέσουμε ότι ισχύει καί $g(x) \neq 0 \quad \forall x \in \Delta$, τότε από τήν(1) καί από τό γεγονός ότι $g(x_v) \neq 0 \quad \forall v \in \mathbb{N}$ προκύπτει ότι

$$\lim \frac{f(x_v)}{g(x_v)} = \frac{f(x_0)}{g(x_0)},$$

δηλαδή

$$\lim x_v = x_0 \Rightarrow \left(\frac{f}{g}\right)(x_v) = \frac{f(x_v)}{g(x_v)} \rightarrow \frac{f(x_0)}{g(x_0)} = \left(\frac{f}{g}\right)(x_0).$$

*Αρα, μέ τή βοήθεια του θεωρήματος 1.1.1, προκύπτει ότι καί ή συνάρτηση $\frac{f}{g}$ είναι συνεχής στό x_0 καί τοῦτο γιά κάθε $x_0 \in \Delta$.

Έφαρμογή. Ὡς μιά άπλή έφαρμογή αὐτου τοῦ θεωρήματος προκύπτει ότι κάθε πολυωνυμική συνάρτηση είναι συνεχής, άφου είναι άθροισμα μονωνυμικών συναρτήσεων, πού, όπως είδαμε στό παράδειγμα 3, είναι συνεχείς συναρτήσεις. Ἀκόμα καί οί ρητές συναρτήσεις είναι συνεχείς, γιατί μιά ρητή συνάρτηση είναι πηλίκo πολυωνυμικών συναρτήσεων, δηλαδή συνεχών συναρτήσεων.

1.2.2 ΘΕΩΡΗΜΑ. Ὑποθέτουμε ότι $f: \Delta \rightarrow A$ καί $g: A \rightarrow \mathbb{R}$ είναι δύο συναρτήσεις, όπου A καί Δ είναι διαστήματα. Τότε, όπως ξέροουμε, ή σύνθεσή τους $h = g \circ f$ ορίζεται μέ τον τύπο $h(x) = g[f(x)]$, $x \in \Delta$ καί μάλιστα ισχύει

$$\left. \begin{array}{l} f \text{ συνεχής} \\ g \text{ συνεχής} \end{array} \right\} \Rightarrow g \circ f \text{ συνεχής}.$$

Απόδειξη. Ἐστω σημείο $x_0 \in \Delta$ καί x_v , $v = 1, 2, \dots$ μιά οποιαδήποτε ακολουθία μέ $x_v \in \Delta \quad \forall v \in \mathbb{N}$ καί $\lim x_v = x_0$. Τότε, έπειδή ή συνάρτηση f είναι συνεχής, έχουμε $\lim f(x_v) = f(x_0)$ καί άφου καί ή g είναι συνεχής θά έχουμε

$$\lim g[f(x_v)] = g[f(x_0)].$$

Ὡστε αποδείξαμε ότι αν f καί g είναι συνεχείς συναρτήσεις, τότε




$$\lim x_v = x_0 \Rightarrow \lim h(x_v) = h(x_0),$$

δηλαδή ότι ή σύνθεση $h = g \circ f$ των f καί g είναι συνεχής στό σημείο x_0 καί τοῦτο γιά κάθε $x_0 \in \Delta$.

Σημείωση. Η σύνθεση $h = g \circ f$ μπορεί να είναι συνεχής, χωρίς οι συναρτήσεις f και g να είναι συνεχείς. Έτσι γιά

$$f(x) = \begin{cases} x, & \text{αν } x < 0 \\ x+1, & \text{αν } x \geq 0 \end{cases} \quad \text{και} \quad g(x) = \begin{cases} x+1, & \text{αν } x < 0 \\ x, & \text{αν } x \geq 0 \end{cases}$$

έχουμε $h(x) = g[f(x)] = x + 1$, δηλαδή η σύνθεση $h = g \circ f$ των άσυνεχών συναρτήσεων f και g είναι συνεχής συνάρτηση.



Παραδείγματα:

1. Η συνάρτηση h με $h(x) = \sqrt{\alpha^2 - x^2}$ (α θετικός αριθμός) είναι συνεχής. Αυτό προκύπτει εύκολα από το παραπάνω θεώρημα 1.2.2, γιατί η συνάρτηση h μπορεί να θεωρηθεί ως σύνθεση δύο συναρτήσεων f και g με $f(x) = \alpha^2 - x^2$, $-\alpha \leq x \leq \alpha$ και $g(x) = \sqrt{x}$, $0 \leq x < +\infty$, που είναι συνεχείς.

2. Η συνάρτηση h με $h(x) = \sqrt[3]{\frac{x^3 + 1}{x^2 + 1}}$ είναι συνεχής. Πραγματικά: η συνάρτηση

η μπορεί να θεωρηθεί ως σύνθεση δύο συναρτήσεων f και g με $f(x) = \frac{x^3 + 1}{x^2 + 1}$ και $g(x) = \sqrt[3]{x}$ που είναι συνεχείς.

3. Η συνάρτηση h με $h(x) = x^p$, $x > 0$, όπου p ρητός, είναι συνεχής. Πραγματικά: αν $p = \frac{\lambda}{\kappa}$ όπου $\lambda \in \mathbb{Z}$ και $\kappa \in \mathbb{N}$, τότε η συνάρτηση h μπορεί να θεωρηθεί ως σύνθεση των συναρτήσεων f και g με $f(x) = x^\lambda$, $x > 0$ και $g(x) = \sqrt[\kappa]{x}$, $x > 0$ που είναι συνεχείς.

1.2.3 ΘΕΩΡΗΜΑ. Αν f είναι μιá συνάρτηση ορισμένη και συνεχής σ' ένα διάστημα Δ και για ένα σημείο $x_0 \in \Delta$ ισχύει $f(x_0) \neq 0$, τότε υπάρχει ανοικτό διάστημα (a, b) τέτοιο, ώστε να ισχύει

$$f(x) \neq 0 \quad \forall \quad x \in \Delta \cap (a, b)$$

και μάλιστα:

i) αν $f(x_0) > 0$, τότε και $f(x) > 0 \quad \forall \quad x \in \Delta \cap (a, b)$

ii) αν $f(x_0) < 0$, τότε και $f(x) < 0 \quad \forall \quad x \in \Delta \cap (a, b)$.

Απόδειξη. i) Αν υποθέσουμε ότι δεν ισχύει η i), τότε σε κάθε σύνολο της μορφής $\Delta \cap \left(x_0 - \frac{1}{v}, x_0 + \frac{1}{v}\right)$ μπορούμε να βρούμε ένα x_v με $f(x_v) \leq 0$. Για τήν ακολουθία x_v , $v = 1, 2, \dots$ έχουμε ότι

$$x_n \in \left(x_0 - \frac{1}{n}, x_0 + \frac{1}{n}\right) \text{ δηλαδή } |x_n - x_0| < \frac{1}{n}$$

για κάθε $n \in \mathbb{N}$. Άρα $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$ και, από τη συνέχεια της f και τη σχέση $f(x_n) \leq 0 \forall n \in \mathbb{N}$, παίρνουμε

$$f(x_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) \leq 0$$

πού είναι άτοπο.

ii) Αυτή προκύπτει έντελως ανάλογα με την i).

2. ΟΙ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

2.1 Η συνάρτηση ήμίτονο είναι συνεχής. Όπως είναι γνωστό από την τριγωνομετρία, για τις συναρτήσεις $\eta\mu$ και $\sigma\upsilon\nu$ (ή όπως αλλιώς παριστάνονται με τα διεθνή σύμβολα, \sin και \cos αντίστοιχα) ισχύουν οι παρακάτω τύποι:

$$\eta\mu x - \eta\mu x_0 = 2 \eta\mu \frac{x - x_0}{2} \sigma\upsilon\nu \frac{x + x_0}{2}$$

και

$$|\eta\mu t| \leq |t| \text{ και } |\sigma\upsilon\nu t| \leq 1 \quad \forall t \in \mathbb{R}.$$

Έπομένως θα έχουμε

$$(2) \quad |\eta\mu x - \eta\mu x_0| = 2 \left| \eta\mu \frac{x - x_0}{2} \right| \left| \sigma\upsilon\nu \frac{x + x_0}{2} \right| \leq 2 \frac{|x - x_0|}{2} \cdot 1 = |x - x_0|.$$

Αν τώρα $x_n, n = 1, 2, \dots$ είναι μία οποιαδήποτε ακολουθία πραγματικών αριθμών με $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$, όπου $x_0 \in \mathbb{R}$, τότε η (2) δίνει

$$|\eta\mu x_n - \eta\mu x_0| \leq |x_n - x_0| \rightarrow 0$$

δηλαδή $\lim_{n \rightarrow \infty} (\eta\mu x_n - \eta\mu x_0) = 0$, ή $\lim_{n \rightarrow \infty} \eta\mu x_n = \eta\mu x_0$.

Όστε αποδείξαμε ότι $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \eta\mu x_n = \eta\mu x_0$ και τούτο για κάθε x_0 και οποιαδήποτε ακολουθία $x_n, n = 1, 2, \dots$, δηλαδή η συνάρτηση $\eta\mu$ είναι συνεχής.

Ας μελετήσουμε τώρα τη συνάρτηση ήμίτονο. Από την τριγωνομετρία είναι γνωστό ότι είναι *περιοδική με περίοδο* 2π , δηλαδή ισχύει


$$\eta\mu(x + 2\pi) = \eta\mu x \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Άρκει λοιπόν να τη μελετήσουμε σ' ένα διάστημα με μήκος 2π , π.χ. στο διάστημα $[-\pi, \pi]$. Η μεταβολή της συνεχούς συναρτήσεως $\eta\mu$ στο διάστημα $[-\pi, \pi]$ περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα.

x	$-\pi$	$-\frac{\pi}{2}$	0	$\frac{\pi}{2}$	π
$\eta\mu x$	0 ↘	-1 ↗	0 ↗	1 ↘	0

Από τον πίνακα αυτό φαίνεται ότι στο σημείο $-\frac{\pi}{2}$ η συνάρτηση $\eta\mu$ παρουσιάζει ελάχιστο ίσο με -1 , ενώ στο σημείο $\frac{\pi}{2}$ παρουσιάζει μέγιστο ίσο με 1 .

Γενικά η συνάρτηση αυτή παρουσιάζει στά σημεία $2\kappa\pi - \frac{\pi}{2}$, $\kappa = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ ελάχιστο ίσο με -1 και στά σημεία $2\kappa\pi + \frac{\pi}{2}$, $\kappa = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ μέγιστο ίσο με 1 .



Σχ. 65 $y = \eta\mu x$.


2.2 Η συνάρτηση συνημίτονο είναι συνεχής. Όπως ξέρουμε από την τριγωνομετρία ισχύει

$$(3) \quad \sigma\upsilon\nu x = \eta\mu\left(\frac{\pi}{2} - x\right) \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

και επομένως η συνάρτηση συνημίτονο μπορεί να θεωρηθεί ως σύνθεση των συνεχών συναρτήσεων f με $f(x) = \frac{\pi}{2} - x$ και $\eta\mu$, και έτσι από το θεώρημα 1.2.2 προκύπτει ότι η συνάρτηση $\sigma\upsilon\nu$ είναι συνεχής.

Η συνάρτηση συνημίτονο είναι περιοδική με περίοδο 2π , όπως φαίνεται και από τον τύπο (3), απ' όπου προκύπτει και ο παρακάτω πίνακας μεταβολής της συναρτήσεως αυτής στο διάστημα $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right]$.

x	$-\frac{\pi}{2}$	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$
συνx	0 ↗	1 ↘	0 ↘	-1 ↗	0



Σχ. 66 $y = \sigma\upsilon\nu x$.

Η συνάρτηση συνημίτονο παρουσιάζει στο σημείο 0 μέγιστο ίσο με 1 , ενώ στο σημείο π παρουσιάζει ελάχιστο ίσο με -1 . Γενικά, στά σημεία $2\kappa\pi$, $\kappa = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ παρουσιάζει μέγιστο ίσο με 1 και στά σημεία $(2\kappa + 1)\pi$, $\kappa = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ παρουσιάζει ελάχιστο ίσο με -1 .

2.3 Η συνάρτηση εφαπτομένη είναι συνεχής. Η συνάρτηση $\epsilon\phi$ (ή και

tg ή tan) όπως ξέρουμε, ορίζεται, από τον τύπο $\epsilon\phi x = \frac{\eta\mu x}{\sigma\upsilon\nu x}$ και έχει πεδίο ορισμοῦ τό σύνολο τῶν πραγματικῶν ἀριθμῶν ἐκτός ἀπό τίς ρίζες τῆς συναρτήσεως συνημίτονο, δηλαδή τούς ἀριθμούς $k\pi + \frac{\pi}{2}$, $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$. Ἡ συνάρτηση $\epsilon\phi$ ὡς πηλίκο συνεχῶν συναρτήσεων εἶναι, σύμφωνα μέ τό θεώρημα 1.2.1, συνεχῆς σέ κάθε διάστημα τῆς μορφῆς $(k\pi + \frac{\pi}{2}, (k+1)\pi + \frac{\pi}{2})$, $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$.

Γιά τή συνάρτηση αὐτή ἰσχύει, ὅπως εἶναι γνωστό:

$$\epsilon\phi(x + \pi) = \epsilon\phi x \quad \forall x \neq k\pi + \frac{\pi}{2}, k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

καί ἐπομένως ἀρκεῖ νά τή μελετήσουμε στό διάστημα $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$.

Ἡ συνάρτηση $\epsilon\phi$ εἶναι γνησίως ἀύξουσα στό $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$. Πραγματικά ἀπό τίς σχέσεις ὅτι $\eta\mu \uparrow [0, \frac{\pi}{2})$ καί $\sigma\upsilon\nu \downarrow [0, \frac{\pi}{2})$ ἔχουμε

$$0 \leq x_1 < x_2 < \frac{\pi}{2} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} 0 \leq \eta\mu x_1 < \eta\mu x_2 \\ 0 < \sigma\upsilon\nu x_2 < \sigma\upsilon\nu x_1 \end{array} \right\} \Rightarrow \epsilon\phi x_1 < \epsilon\phi x_2,$$

δηλαδή ὅτι $\epsilon\phi \uparrow [0, \frac{\pi}{2})$. Ἀλλά ἡ $\epsilon\phi$ εἶναι περιττή συνάρτηση, δηλαδή ἰσχύει $\epsilon\phi x = -\epsilon\phi(-x)$ καί ἄρα ἔχουμε

$$-\frac{\pi}{2} < x_1 < x_2 \leq 0 \Rightarrow 0 \leq -x_2 < -x_1 < \frac{\pi}{2} \Rightarrow \epsilon\phi(-x_2) < \epsilon\phi(-x_1) \\ \Rightarrow \epsilon\phi x_1 < \epsilon\phi x_2 \quad \text{δηλαδή } \epsilon\phi \uparrow \left(-\frac{\pi}{2}, 0\right].$$

Ἐπίσης γιά τή συνάρτηση $\epsilon\phi$ ἰσχύουν

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \epsilon\phi x = +\infty \quad \text{καί} \quad \lim_{x \rightarrow -\frac{\pi}{2}^+} \epsilon\phi x = -\infty$$

Πραγματικά παρατηροῦμε ὅτι γιά ὅποιαδήποτε ἀκολουθία x_n , $n = 1, 2, \dots$, μέ $-\frac{\pi}{2} < x_n < \frac{\pi}{2}$ (ἄρα καί $\sigma\upsilon\nu x_n > 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}$)

$$\lim x_n = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \lim \sigma\upsilon\nu x_n = \sigma\upsilon\nu \frac{\pi}{2} = 0 \Rightarrow$$

$$(\forall \epsilon > 0, \exists v_0 = v_0(\epsilon): 0 < \sigma\upsilon\nu x_n < \epsilon \quad \forall n \geq v_0) \Rightarrow$$

$$(\forall \epsilon > 0, \exists v_0 = v_0(\epsilon): \frac{1}{\sigma\upsilon\nu x_n} > \frac{1}{\epsilon} \quad \forall n \geq v_0) \Rightarrow \lim \frac{1}{\sigma\upsilon\nu x_n} = +\infty$$

Ἔτσι ἰσχύει

$$\lim x_n = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \lim \eta\mu x_n = \eta\mu \frac{\pi}{2} = 1 \\ \lim \frac{1}{\sigma\upsilon\nu x_n} = +\infty \end{array} \right\} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2} - 0} \epsilon\phi x_v = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2} - 0} \eta\mu x_v \frac{1}{\sigma\upsilon\nu x_v} = 1 \cdot (+\infty) = +\infty, \text{ δηλαδή } \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2} - 0} \epsilon\phi x = +\infty.$$


Ἀποδείξαμε λοιπόν ὅτι $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2} - 0} \epsilon\phi x = +\infty$. Παρόμοια μποροῦμε νά ἀποδείξουμε

$$\text{καί ὅτι } \lim_{x \rightarrow -\frac{\pi}{2} + 0} \epsilon\phi x = -\infty.$$

Σημείωση. Ἀπό τήν περιοδικότητα τῆς συναρτήσεως $\epsilon\phi$ προκύπτει, τώρα, εὐκόλα ὅτι ἰσχύουν

$$\lim_{x \rightarrow \kappa\pi + \frac{\pi}{2} - 0} \epsilon\phi x = +\infty \quad \text{καί} \quad \lim_{x \rightarrow \kappa\pi - \frac{\pi}{2} + 0} \epsilon\phi x = -\infty$$

γιά κάθε ἀκέραιο ἀριθμό κ .



Σχ. 67 $y = \epsilon\phi x$.

2.4 Ἡ συνάρτηση συνεφαπτομένη εἶναι συνεχής.

Ἡ συνάρτηση $\sigma\phi$ (ἢ καί ἀλλιῶς ctg ἢ ctan) ὅπως ξέρομε, ὀρίζεται, ἀπό τόν τύπο $\sigma\phi x = \frac{\sigma\upsilon\nu x}{\eta\mu x}$ καί ἔχει πεδίο ὀρισμοῦ τό σύνολο τῶν πραγματικῶν ἀριθμῶν ἐκτός ἀπό τίς ρίζες τῆς συναρτήσεως $\eta\mu$, δηλαδή τούς ἀριθμούς $\kappa\pi$, $\kappa = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$. Ἡ συνάρτηση $\sigma\phi$ ὡς πηλίκο συνεχῶν συναρτήσεων εἶναι, σύμφωνα μέ τό θεώρημα 1.2.1, συνεχής σέ κάθε διάστημα τῆς μορφῆς $(\kappa\pi, (\kappa+1)\pi)$, $\kappa = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$. Γιά τή συνάρτηση αὐτή ὅπως ξέρομε, ἰσχύει,

$$\sigma\phi(x + \pi) = \sigma\phi x \quad \forall x \neq \kappa\pi, \kappa = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

καί ἔτσι ἀρκεῖ νά τή μελετήσουμε στό διάστημα $(0, \pi)$. Εἶναι ἀκόμη γνωστό ἀπό τήν τριγωνομετρία ὅτι ἰσχύει ὁ τύπος

$$\sigma\phi x = \epsilon\phi\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$$

ὁ ὁποῖος μᾶς βοηθᾷ στό νά μελετήσουμε τή $\sigma\phi$ χρησιμοποιώντας τά συμπεράσματα πού ἔχουμε γιά τήν $\epsilon\phi$. Ἔτσι π.χ. ἡ $\sigma\phi$, ὡς σύνθεση τῆς γνησίως

φθίνουσας συναρτήσεως f με $f(x) = \frac{\pi}{2} - x$, $x \in (0, \pi)$ και της γνησίως αύξουσας στο $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ συναρτήσεως $\varepsilon\phi$, είναι, σύμφωνα με το θεώρημα 1.2.1 του κεφ. II, γνησίως φθίνουσα στο $(0, \pi)$. 'Ακόμη παρατηρούμε ότι

$$\lim_{x \rightarrow +0} \sigma\phi x = +\infty \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow \pi-0} \sigma\phi x = -\infty$$

Πραγματικά: παρατηρούμε ότι για οποιαδήποτε ακολουθία x_v , $v = 1, 2, \dots$ με $0 < x_v < \pi \quad \forall v \in \mathbb{N}$ (άρα και $-\frac{\pi}{2} < \frac{\pi}{2} - x_v < \frac{\pi}{2} \quad \forall v \in \mathbb{N}$) έχουμε

$$x_v \rightarrow 0 \Rightarrow \lim \left(\frac{\pi}{2} - x_v \right) = \frac{\pi}{2}$$

και ακόμη

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}-0} \left(\frac{\pi}{2} - x_v \right) = \frac{\pi}{2} \\ \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}-0} \varepsilon\phi x = +\infty \end{array} \right\} \Rightarrow \lim \varepsilon\phi \left(\frac{\pi}{2} - x_v \right) = +\infty \Rightarrow \lim \sigma\phi x_v = +\infty.$$

'Ωστε ισχύει

$$x_v \rightarrow 0 \Rightarrow \lim \sigma\phi x_v = +\infty.$$


'Αποδείξαμε λοιπόν ότι $\lim_{x \rightarrow +0} \sigma\phi x = +\infty$. Παρόμοια μπορούμε να αποδείξουμε

και ότι $\lim_{x \rightarrow \pi-0} \sigma\phi x = -\infty$.

Σημείωση. 'Από την περιοδικότητα της συναρτήσεως $\sigma\phi$ προκύπτει, τώρα, εύκολα ότι ισχύουν

$$\lim_{x \rightarrow k\pi+0} \sigma\phi x = +\infty \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow k\pi-0} \sigma\phi x = -\infty$$

για κάθε άκεραιο αριθμό k .



3. Η ΕΚΘΕΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΛΟΓΑΡΙΘΜΙΚΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ

3.1 'Η έκθετική συνάρτηση. Όπως ξέρουμε, κάθε πραγματικός αριθμός x έχει μία δεκαδική παράσταση $x = \psi_0, \psi_1\psi_2 \dots \psi_n \dots$, όπου ψ_0 είναι άκεραιος αριθμός και $\psi_1, \psi_2, \dots, \psi_n, \dots$ είναι ψηφία, δηλαδή άκεραιοί αριθμοί με $0 \leq \psi_n \leq 9 \forall n \in \mathbb{N}$. 'Η ακολουθία $r_n = \psi_0, \psi_1 \psi_2 \dots \psi_n, n = 1, 2, \dots$ είναι μία αύξουσα ακολουθία ρητών αριθμών, που συγκλίνει προς τον πραγματικό αριθμό x .
 "Όπως, πάλι, ξέρουμε

$$(4) \quad \psi_0 \leq r_n \leq \psi_0 + 1 \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

"Αν θεωρήσουμε, τώρα, και ένα θετικό αριθμό $a > 1$, τότε, επειδή η έννοια τής δυνάμεως του με έκθέτη ένα ρητό αριθμό είναι γνωστή, ορίζεται η ακολουθία

$$a^{r_1}, a^{r_2}, \dots, a^{r_n}, \dots,$$

πού, μάλιστα, είναι αύξουσα και επιπλέον φραγμένη, γιατί από τήν (4) ισχύει

$$a^{\psi_0} \leq a^{r_n} \leq a^{\psi_0+1} \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

"Ετσι, σύμφωνα με τό αξίωμα τής § 1.4.3 τού Κεφ. III, η ακολουθία $a^{r_n}, n = 1, 2, \dots$ συγκλίνει προς πραγματικό αριθμό, τόν όποιο παριστάνουμε με a^x : δηλαδή ορίζουμε

$$a^x = \lim a^{r_n}.$$

Τήν παραπάνω έννοια τής δυνάμεως ενός αριθμού $a > 1$ με έκθέτη πραγματικό αριθμό επέκτεινουμε και για $0 < a \leq 1$ ορίζοντας, τά εξής :

$$\text{Γιά } a = 1: \quad 1^x = 1$$

$$\text{Γιά } 0 < a < 1: \quad a^x = 1 / \left(\frac{1}{a} \right)^x.$$

'Εκθετική (exponential) συνάρτηση με βάση τό θετικό αριθμό a ονομάζουμε, τώρα, τή συνάρτηση πού ορίζεται από τόν τύπο $y = a^x$. Αυτή τή συμβολίζουμε με \exp_a , δηλαδή $\exp_a(x) = a^x$. Τήν τιμή $\exp_a(x)$ γράφουμε άπλούστερα και $\exp_a x$. Ειδικά τήν έκθετική συνάρτηση με βάση τόν αριθμό e (§ 1.4.3, κεφ. III), δηλαδή τή συνάρτηση \exp_e , τή συμβολίζουμε άπλούστερα με \exp και τήν ονομάζουμε άπλά έκθετική συνάρτηση.

"Από τόν όρισμό τής έκθετικής συναρτήσεως \exp_a προκύπτει εύκολα ότι αυτή έχει πεδίο όρισμού τό σύνολο \mathbb{R} τών πραγματικών αριθμών και παίρνει τιμές στό σύνολο \mathbb{R}^+ τών θετικών αριθμών: δηλαδή ισχύει

$$a^x > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

'Η έκθετική συνάρτηση \exp_a έχει τίσ παρακάτω ιδιότητες:

1. 'Η συνάρτηση \exp_a είναι μονότονη και μάλιστα για $a > 1$ γνησίως αύξουσα, ενώ για $0 < a < 1$ γνησίως φθίνουσα.

Ἀπόδειξη. Για $a = 1$ ἡ συνάρτηση \exp_a συμπίπτει με τὴ σταθερὴ συνάρτηση 1, ἡ ὁποία, βέβαια, εἶναι μονότονη. Για $a \neq 1$ θεωροῦμε δυὸ ὁποιοσδήποτε πραγματικούς ἀριθμούς x, y με $x < y$. Ἔτσι ἀπὸ τὸν ὀρισμὸ τῆς \exp_a ἔχουμε

$$a^x = \lim a^{u_n} \quad \text{καὶ} \quad a^y = \lim a^{v_n}$$

ὅπου $u_n, v_n = 1, 2, \dots$ καὶ $u_n, v_n = 1, 2, \dots$ εἶναι ἀκολουθίες ρητῶν ἀριθμῶν με

$$\lim u_n = x \quad \text{καὶ} \quad \lim v_n = y.$$

Ἐκλέγουμε τώρα δυὸ ρητούς ἀριθμούς z, w με

$$x < z < w < y$$

καὶ τότε εὐκόλα προκύπτει ὅτι ὑπάρχει δείκτης n τέτοιος, ὥστε νὰ ἰσχύει

$$u_n < z < w < v_n \quad \forall n = n, n + 1, \dots$$

Ἄρα, ἐπειδὴ τὰ u_n, z, w, v_n εἶναι ρητοὶ ἀριθμοί, ὅπως ξέρομε, θὰ ἰσχύει

$$a^{u_n} < a^z < a^w < a^{v_n}, \quad \text{ἂν } a > 1$$

καὶ

$$a^{u_n} > a^z > a^w > a^{v_n}, \quad \text{ἂν } 0 < a < 1$$

γιά κάθε $n = n, n + 1, \dots$. Ὡστε γιά $a > 1$ ἔχουμε

$$a^x = \lim a^{u_n} \leq a^z < a^w \leq \lim a^{v_n} = a^y$$

καὶ γιά $0 < a < 1$

$$a^x = \lim a^{u_n} \geq a^z > a^w \geq \lim a^{v_n} = a^y.$$

2. Ἄν $z_n, v_n = 1, 2, \dots$ εἶναι ὁποιαδήποτε μηδενική ἀκολουθία, τότε

$$\lim a^{z_n} = 1.$$

Ἀπόδειξη. Ἀπὸ τὸν ὀρισμὸ γιά $0 < a < 1$ ἔχουμε

$$a^{z_n} = 1 / \left(\frac{1}{a} \right)^{z_n}, \quad \text{ὅπου } \frac{1}{a} > 1$$

πού σημαίνει ὅτι ἀρκεῖ ν' ἀποδειχθεῖ ἡ παραπάνω ιδιότητα στὴν περίπτωση ὅπου $a \geq 1$. Ὑποθέτουμε λοιπὸν ὅτι $a \geq 1$ καὶ θεωροῦμε ἕναν θετικὸ ἀριθμὸ $\varepsilon > 0$. Τότε, ἐπειδὴ $\lim \sqrt[k]{a} = 1$ (ἐφαρμογὴ 2 τῆς § 1.4, κεφ. III), ὑπάρχει φυσικὸς ἀριθμὸς k τέτοιος, ὥστε νὰ ἰσχύει

$$a^{\frac{1}{k}} - 1 = \sqrt[k]{a} - 1 < \varepsilon \quad \text{καὶ} \quad a^{-\frac{1}{k}} - 1 = \frac{1}{\sqrt[k]{a}} - 1 > -\varepsilon.$$

Ἀκόμη, ἐπειδὴ $\lim z_n = 0$, ὑπάρχει φυσικὸς ἀριθμὸς n τέτοιος, ὥστε γιά κάθε δείκτη n με $n > n$ νὰ ἰσχύει

$$-\frac{1}{k} < z_n < \frac{1}{k}$$

καὶ ἐπομένως, ἐπειδὴ ἡ συνάρτηση \exp_a εἶναι γνησίως αὐξουσα, ἔχουμε καὶ

$$a^{-\frac{1}{\kappa}} < a^{z\nu} < a^{\frac{1}{\kappa}}.$$

*Αρα για κάθε φυσικό αριθμό ν με $\nu > n$ ισχύει

$$-\varepsilon < a^{-\frac{1}{\kappa}} - 1 < a^{z\nu} - 1 < a^{\frac{1}{\kappa}} - 1 < \varepsilon$$

δηλαδή

$$|a^{z\nu} - 1| < \varepsilon$$

τό όποιο σημαίνει ότι $\lim a^{z\nu} = 1$.

3. Για κάθε πραγματικό αριθμό x και οποιαδήποτε ακολουθία ρητών αριθμών u_ν , $\nu = 1, 2, \dots$ με $\lim u_\nu = x$ ισχύει

$$a^x = \lim a^{u_\nu}.$$

*Απόδειξη. Στην περίπτωση όπου $a = 1$, ή ιδιότητα αυτή είναι φανερή. Για $a > 1$ θεωρούμε και την ακολουθία r_ν , $\nu = 1, 2, \dots$ του όρισμού τής δυνάμεως a^x . Βέβαια τά u_ν , r_ν είναι ρητοί αριθμοί και ισχύει

$$a^{u_\nu} = a^{u_\nu - r_\nu} \cdot a^{r_\nu}$$

όπου $\lim (u_\nu - r_\nu) = \lim u_\nu - \lim r_\nu = x - x = 0$. *Αρα, σύμφωνα με την προηγούμενη ιδιότητα 2, ισχύει

$$\lim a^{u_\nu - r_\nu} = 1$$

άπό όπου παίρνουμε

$$\lim a^{u_\nu} = (\lim a^{u_\nu - r_\nu}) (\lim a^{r_\nu}) = 1 a^x = a^x.$$

Τέλος για $0 < a < 1$, έχουμε $\frac{1}{a} > 1$ και επομένως

$$\lim a^{u_\nu} = \frac{1}{\lim \left(\frac{1}{a}\right)^{u_\nu}} = \frac{1}{\left(\frac{1}{a}\right)^x} = a^x.$$

4. Για όποιονδήποτε πραγματικούς αριθμούς x και y ισχύει

$$a^x \cdot a^y = a^{x+y}.$$

*Απόδειξη. Θεωρούμε δύο ακολουθίες ρητών αριθμών u_ν , $\nu = 1, 2, \dots$ και v_ν , $\nu = 1, 2, \dots$ με

$$\lim u_\nu = x \quad \text{και} \quad \lim v_\nu = y.$$

*Αλλά τότε έχουμε

$$a^{u_\nu} a^{v_\nu} = a^{u_\nu + v_\nu} \quad \forall \nu \in \mathbb{N}$$

και έτσι, άπό την προηγούμενη ιδιότητα 3, παίρνουμε

$$a^x a^y = (\lim a^{u_\nu}) (\lim a^{v_\nu}) = \lim (a^{u_\nu} a^{v_\nu}) = \lim a^{u_\nu + v_\nu} = a^{x+y}$$

έπειδή $\lim (u_\nu + v_\nu) = \lim u_\nu + \lim v_\nu = x + y$.

5. *Η συνάρτηση \exp_a είναι συνεχής.

Απόδειξη. Θεωρούμε έναν οποιοδήποτε πραγματικό αριθμό x_0 και οποιαδήποτε ακολουθία $x_n, n = 1, 2, \dots$ με $\lim x_n = x_0$. Σύμφωνα με την προηγούμενη ιδιότητα 4, έχουμε

$$a^{x_n} = a^{(x_n - x_0) + x_0} = a^{x_n - x_0} a^{x_0} \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

και έτσι, επειδή $\lim (x_n - x_0) = 0$, από την ιδιότητα 2 παίρνουμε

$$\lim a^{x_n} = (\lim a^{x_n - x_0}) a^{x_0} = 1 \cdot a^{x_0} = a^{x_0}$$

πού σημαίνει ότι η συνάρτηση \exp_a είναι συνεχής στο x_0 και τούτο ισχύει για κάθε σημείο x_0 .

6. Για οποιοσδήποτε πραγματικούς αριθμούς x και y ισχύει.

$$(a^x)^y = a^{xy}.$$

Απόδειξη. Θεωρούμε δύο ακολουθίες ρητών αριθμών $u_n, n = 1, 2, \dots$ και $v_n, n = 1, 2, \dots$ με

$$\lim u_n = x \quad \text{και} \quad \lim v_n = y.$$

*Αν r είναι ένας οποιοσδήποτε ρητός αριθμός, τότε θα έχουμε

$$(a^{u_n})^r = a^{u_n r} \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

και έτσι, από τη συνέχεια των συναρτήσεων \exp_a και $f(x) = x^r$, παίρνουμε

$$(a^x)^r = (\lim a^{u_n})^r = \lim (a^{u_n})^r = \lim a^{u_n r} = a^{\lim(u_n r)} = a^{xr}$$

δηλαδή

$$(a^x)^r = a^{xr}.$$

*Αρα ισχύει και

$$(a^x)^{u_n} = a^{x u_n} \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

και επομένως, χρησιμοποιώντας πάλι τη συνέχεια της \exp_a , τελικά, παίρνουμε

$$(a^x)^y = \lim (a^x)^{u_n} = \lim a^{x u_n} = a^{\lim(x u_n)} = a^{xy}.$$

7. *Αν $a > 1$, τότε ισχύει.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} a^x = +\infty \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = 0.$$

Απόδειξη. Θεωρούμε οποιαδήποτε ακολουθία $x_n, n = 1, 2, \dots$ με $\lim x_n = +\infty$ και ένα θετικό αριθμό ε . *Επειδή η ακολουθία $a^{x_n}, n = 1, 2, \dots$ δεν είναι φραγμένη, υπάρχει δείκτης k με

$$a^k > \frac{1}{\varepsilon}.$$

*Επίσης, από το ότι $\lim x_n = +\infty$, προκύπτει ότι υπάρχει δείκτης n τέτοιος, ώστε να ισχύει

$$x_n \geq k \quad \forall n = n, n + 1, \dots$$

*Έτσι, επειδή η συνάρτηση \exp_a είναι γνησίως αύξουσα, θα έχουμε και

$$a^{x_n} \geq a^k > \frac{1}{\varepsilon} \quad \forall n = n, n + 1, \dots$$

Έπειδή τό ε είναι οποιοσδήποτε θετικός αριθμός, θά ισχύει

$$\lim a^{x_v} = +\infty$$

καί ἄρα, ἐπειδή καί ἡ x_v , $v = 1, 2, \dots$ εἶναι μιά οποιαδήποτε ἀκολουθία μέ $\lim x_v = +\infty$, θά ισχύει καί

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} a^x = +\infty.$$

Γιά ν' ἀποδείξουμε τήν $\lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = 0$, θεωροῦμε μιά οποιαδήποτε ἀκολου-

θία x_v , $v = 1, 2, \dots$ μέ $\lim x_v = -\infty$. Τότε ἔχουμε

$$\lim x_v = -\infty \Rightarrow \lim (-x_v) = +\infty \Rightarrow \lim a^{-x_v} = +\infty$$

καί ἔτσι

$$\lim a^{x_v} = \lim \frac{1}{a^{-x_v}} = \frac{1}{\lim a^{-x_v}} = \frac{1}{+\infty} = 0.$$

Ὡστε γιά οποιαδήποτε ἀκολουθία x_v , $v = 1, 2, \dots$ μέ $\lim x_v = -\infty$ ισχύει $\lim a^{x_v} = 0$, πού σημαίνει ὅτι

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = 0.$$

8. Ἐάν $0 < a < 1$, τότε ισχύει

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} a^x = 0 \text{ καί } \lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = +\infty.$$

Ἀπόδειξη. Ἐχουμε $\frac{1}{a} > 1$ καί, ἐπειδή ἀπό τόν ὀρισμό

$$a^x = 1 / \left(\frac{1}{a} \right)^x$$

μέ τή βοήθεια τῆς παραπάνω ιδιότητας 7 ἔχουμε

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} a^x = \frac{1}{\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{a} \right)^x} = \frac{1}{+\infty} = 0.$$

Γιά ν' ἀποδείξουμε τήν $\lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = +\infty$, θεωροῦμε μιά οποιαδήποτε ἀκολουθία x_v , $v = 1, 2, \dots$ μέ $\lim x_v = -\infty$ καί ἕνα θετικό ἀριθμό ε . Ἐπειδή ἡ ἀκολουθία a^v , $v = 1, 2, \dots$ εἶναι μηδενική (ἐφαρμογή 3 τῆς §1.3, κεφ. III), ὑπάρχει δείκτης k μέ

$$a^k < \varepsilon.$$

Ἀκόμη, ἐπειδή $\lim x_v = -\infty$, ὑπάρχει δείκτης n τέτοιος, ὥστε νά ισχύει

$$x_v \leq -k \quad \forall v = n, n + 1, \dots$$

καί ἄρα, ἀφοῦ ἡ συνάρτηση \exp_a εἶναι (γνησίως) φθίνουσα,

$$a^{x_v} \geq a^{-k} = \frac{1}{a^k} > \frac{1}{\varepsilon} \quad \forall v = n, n + 1, \dots$$

Ἐπειδή τό ε εἶναι οποιοδήποτε, θά ισχύει

$$\lim a^{x_n} = +\infty$$

καί έτσι, έπειδή καί ή $x_n, n=1,2,\dots$ είναι όποιαδήποτε άκολουθία μέ $\lim x_n = -\infty$, θά έχουμε


$$\lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = +\infty.$$

Ή μελέτη τής συνεχούς συναρτήσεως \exp_a περιγράφεται, βασικά, στόν παρακάτω πίνακα καί ή γεωμετρική έρμηνεία της στά σχήματα 69, 70.


$a > 1$	$\exp_a \uparrow$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} a^x = +\infty$ καί $\lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = 0$
$a = 1$	\exp_a σταθερή ίση μέ 1
$0 < a < 1$	$\exp_a \downarrow$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} a^x = 0$ καί $\lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = +\infty$

Ειδικά, έπειδή $e > 1$, ή έκθετική συνάρτηση \exp είναι γνησίως αύξουσα συνάρτηση μέ


$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty \text{ καί } \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0 \quad (\text{σχ. 71}).$$



Σχ. 69 $y = a^x, a > 1$



Σχ. 70 $y = a^x, 0 < a < 1$



Σχ. 71 $y = e^x$

Ή από τά παραπάνω σχήματα καί τό συνοπτικό πίνακα τής συμπεριφορής τής συνεχούς συναρτήσεως \exp_a παραστατικά προκύπτει ότι τό πεδίο τιμών τής συναρτήσεως αύτης είναι όλόκληρο τό σύνολο \mathbb{R}^+ τών θετικών άριθμών, δηλαδή

$$\mathfrak{R}(\exp_a) = \mathbb{R}^+.$$

3.2 Ή λογαριθμική συνάρτηση. Όπως είδαμε παραπάνω, ή έκθετική συνάρτηση \exp_a για $a \neq 1$ είναι γνησίως μονότονη. Έπομένως (θεώρημα 1.3.1 του κεφ. II) ύπάρχει ή αντίστροφή της, πού όνομάζεται *λογάριθμος ως προς βάση τόν άριθμό a* καί συμβολίζεται μέ \log_a . Ή συνάρτηση \log_a έχει πεδίο όρισμοϋ τό πεδίο τιμών τής συναρτήσεως \exp_a , δηλαδή τό σύνολο \mathbb{R}^+ τών θετικών άριθμών, καί πεδίο τιμών τό πεδίο όρισμοϋ τής \exp_a , δηλαδή τό σύνολο \mathbb{R} τών πραγματικών άριθμών. Συγκεκριμένα ισχύει

$$\mathcal{D}(\log_a) = \mathbb{R}^+ \text{ καί } \mathfrak{R}(\log_a) = \mathbb{R}.$$

Τήν τιμή $\log_a(x)$ τή γράφουμε πιο άπλά και μέ $\log_a x$. Άπό τόν όρισμό τής λογαριθμικής συναρτήσεως προκύπτει άμέσως ότι


$$y = \log_a x \Leftrightarrow a^y = x.$$

Έπειδή $a^0 = 1$ και $a^1 = a$, έχουμε τίς έξής άξιοσημείωτες τιμές τής συναρτήσεως \log_a :


$$(5) \quad \log_a 1 = 0 \quad \text{και} \quad \log_a a = 1 \quad (a \neq 1).$$

Ειδικά ή συνάρτηση \log_e όνομάζεται *φυσικός λογάριθμος* και συμβολίζεται πιο άπλά μέ \log ή και \ln .

Ή συνάρτηση \log_a , ώς αντίστροφη γνησίως μονότονης συναρτήσεως, είναι επίσης γνησίως μονότονη και μάλιστα για $a > 1$ είναι *γνησίως αύξουσα*, ένώ για $0 < a < 1$ είναι *γνησίως φθίνουσα* (θεώρημα 1.3.1 του κεφ. II). Επίσης τό διάγραμμα τής συναρτήσεως \log_a είναι συμμετρικό του διαγράμματος τής \exp_a ώς προς τή διχοτόμο τής πρώτης γωνίας τών άξόνων. Ή γεωμετρική έρμηνεία τής λογαριθμικής συναρτήσεως παρέχεται στα παρακάτω σχήματα 72, 73 και 74 (όπου παριστάνεται ή \log).



Σχ. 72 $y = \log_a x$, $a > 1$



Σχ. 73 $y = \log_a x$, $0 < a < 1$



Σχ. 74 $y = \log x$

Άπό τά παραπάνω προκύπτει εύκολα και ό άκόλουθος συνοπτικός πίνακας βασικών ιδιοτήτων τής λογαριθμικής συναρτήσεως.

$a > 1$	$\log_a \uparrow$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \log_a x = +\infty$ και $\lim_{x \rightarrow +0} \log_a x = -\infty$
$0 < a < 1$	$\log_a \downarrow$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \log_a x = -\infty$ και $\lim_{x \rightarrow +0} \log_a x = +\infty$

Ειδικά, έπειδή $e > 1$, ό φυσικός λογάριθμος είναι γνησίως αύξουσα συνάρτηση μέ

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \log x = +\infty \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow +0} \log x = -\infty.$$

Άπό τόν όρισμό τής λογαριθμικής συναρτήσεως \log_a , ώς αντίστροφης τής \exp_a , προκύπτουν άμέσως και οι τύποι:

$$a^{\log_a x} = x \quad \text{και} \quad \log_a a^x = x$$

και ειδικά

$$e^{\log x} = x \quad \text{και} \quad \log e^x = x.$$

Επίσης η λογαριθμική συνάρτηση έχει τις παρακάτω ιδιότητες:

1. Γιά όποιουσδήποτε θετικούς αριθμούς x, y ισχύει.

$$\log_a xy = \log_a x + \log_a y.$$

Απόδειξη. Έχουμε

$$a^{\log_a xy} = xy = a^{\log_a x} a^{\log_a y} = a^{\log_a x + \log_a y}$$

Αλλά αφού $a \neq 1$, η έκθετική συνάρτηση \exp_a ως γνησίως μονότονη είναι και άμφιμονοσήμαντη συνάρτηση. Έτσι παίρνουμε

$$\log_a xy = \log_a x + \log_a y.$$

2. Γιά όποιουσδήποτε θετικούς αριθμούς x, y ισχύει

$$\log_a \frac{x}{y} = \log_a x - \log_a y.$$

Απόδειξη. Σύμφωνα με την προηγούμενη ιδιότητα έχουμε

$$\log_a x = \log_a \frac{x}{y} \cdot y = \log_a \frac{x}{y} + \log_a y$$

και άρα

$$\log_a \frac{x}{y} = \log_a x - \log_a y.$$

3. Γιά όποιουσδήποτε πραγματικούς αριθμούς x, y με $x > 0$ ισχύει

$$\log_a x^y = y \log_a x$$

Απόδειξη. Έχουμε

$$a^{\log_a x^y} = x^y = [a^{\log_a x}]^y = a^{y \log_a x}$$

και έτσι

$$\log_a x^y = y \log_a x.$$

4. Ισχύει ο τύπος

(6)

$$a^x = e^{x \log_a a}.$$

Απόδειξη. Έχουμε

$$a^x = (e^{\log_a a})^x = e^{x \log_a a}$$

5. Ισχύει ο τύπος

(7)

$$\log_a x = \frac{\log x}{\log a}.$$

Απόδειξη. Από την παραπάνω ιδιότητα 3 έχουμε.

$$\log x = \log a^{\log_a x} = (\log_a x) (\log a)$$

καί ἔτσι

$$\log_a x = \frac{\log x}{\log a}.$$

3.3 Ἀξιοσημείωτες ιδιότητες. Ἐδῶ θά συμπληρώσουμε τὰ συμπεράσματα τῶν προηγούμενων παραγράφων 3.1 καί 3.2 μέ τίς παρακάτω ἀξιοσημείωτες ιδιότητες τῶν συναρτήσεων \exp_a καί \log_a .

1. *Γιά κάθε πραγματικό ἀριθμό x ἰσχύει*

$$(8) \quad e^x \geq 1 + x$$

καί γενικότερα

$$a^x \geq 1 + x \log a \quad (a \neq 1).$$

Ἀπόδειξη. Ἐδῶ θά χρησιμοποιήσουμε τή γνωστή ἀνισότητα τοῦ *Bernoulli*

$$(1 + \omega)^v \geq 1 + v\omega$$

ὅπου v εἶναι μὴ ἀρνητικός ἀκέραιος καί $\omega > -1$.

Γιά v ἀποδείξουμε τόν τύπο (8), θεωροῦμε ἕναν ὁποιοδήποτε ρητό ἀριθμό u καί ἀκόμη δύο ἀκεραίους μ, ν μέ $u = \frac{\mu}{\nu}$, $\nu \in \mathbb{N}$. Ἔτσι διακρίνουμε τίς παρακάτω δύο περιπτώσεις:

(i) $u \geq 0$, δηλαδή $\mu \geq 0$. Θέτουμε

$$K = \left\{ \kappa : \frac{\kappa}{\nu} \in \mathbb{N} \right\}.$$

Τό K εἶναι ἕνα ἀπέραντο (μὴ πεπερασμένο) ὑποσύνολο τοῦ συνόλου \mathbb{N} τῶν φυσικῶν ἀριθμῶν καί μάλιστα γιά κάθε $\kappa \in K$ ἰσχύει

$$\kappa u = \kappa \frac{\mu}{\nu} = \frac{\kappa}{\nu} \mu \quad \text{δηλαδή} \quad \kappa u \in \mathbb{N}_0.$$

Ἄρα

$$\left(1 + \frac{1}{\kappa} \right)^{\kappa u} \geq 1 + (\kappa u) \frac{1}{\kappa} = 1 + u$$

καί ἐπειδὴ ἡ συνάρτηση f μέ $f(x) = x^u$ εἶναι συνεχής, παίρνουμε

$$\lim_{\kappa \in K} \left(1 + \frac{1}{\kappa} \right)^{\kappa u} = \lim_{\kappa \in K} \left[\left(1 + \frac{1}{\kappa} \right)^{\kappa} \right]^u = \left[\lim_{\kappa \in K} \left(1 + \frac{1}{\kappa} \right)^{\kappa} \right]^u = e^u$$

καί ἔτσι

$$e^u \geq 1 + u.$$

(ii) $u < 0$, δηλαδή $\mu < 0$. Θέτουμε

$$\Lambda = \left\{ \lambda : \lambda > 0 \text{ καί } \frac{\lambda+1}{\nu} \in \mathbb{N} \right\}$$

Τό Λ εἶναι ἕνα ἀπέραντο ὑποσύνολο τοῦ συνόλου \mathbb{N} τῶν φυσικῶν ἀριθμῶν καί μάλιστα γιά κάθε $\lambda \in \Lambda$ ἰσχύει

$$-(\lambda + 1)u = -(\lambda + 1) \frac{\mu}{\nu} = \frac{\lambda + 1}{\nu} (-\mu) \quad \text{δηλαδή} \quad -(\lambda + 1)u \in \mathbb{N}.$$

*Άρα

$$\begin{aligned} \left(1 + \frac{1}{\lambda}\right)^{\lambda u} &= \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{\lambda}\right)^{-\lambda u}} = \left(\frac{1}{1 + \frac{1}{\lambda}}\right)^{-\lambda u} = \left(\frac{\lambda}{\lambda + 1}\right)^{-\lambda u} = \left(1 - \frac{1}{\lambda + 1}\right)^{-\lambda u} \\ &\geq \left(1 - \frac{1}{\lambda + 1}\right)^{-(\lambda + 1)u} \geq 1 + [-(\lambda + 1)u] \left(-\frac{1}{\lambda + 1}\right) = 1 + u \end{aligned}$$

καί επειδή, όπως στην περίπτωση (i), έχουμε

$$\lim_{\lambda \in \mathbb{N}} \left(1 + \frac{1}{\lambda}\right)^{\lambda u} = e^u,$$

παίρνουμε

$$e^u \geq 1 + u.$$

*Ωστε αποδείξαμε ότι για οποιοδήποτε ρητό αριθμό u ισχύει

$$e^u \geq 1 + u$$

καί έτσι, αν για οποιοδήποτε πραγματικό αριθμό x θεωρήσουμε μία ακολουθία ρητών αριθμών u_n , $n = 1, 2, \dots$ με $\lim u_n = x$, τότε από τη συνέχεια της έκθετικής συναρτήσεως θά έχουμε

$$e^x = \lim e^{u_n} \geq \lim (1 + u_n) = 1 + \lim u_n = 1 + x \quad (\text{βλ. σχ. 71})$$

Τέλος, από τους τύπους (6) και (8) έχουμε

$$a^x = e^{x \log a} \geq 1 + x \log a.$$

2. Για κάθε θετικό αριθμό x ισχύει

$$(9) \quad \log x \leq x - 1$$

καί γενικότερα $\log_a x \leq \frac{x-1}{\log a}$, αν $a > 1$

καί $\log_a x \geq \frac{x-1}{\log a}$, αν $0 < a < 1$.

*Απόδειξη. Θετώντας $y = \log x$ έχουμε $e^y = x$. Άρα από τον τύπο (8), έχουμε

$$x = e^y \geq 1 + y = 1 + \log x$$

καί έτσι

$$\log x \leq x - 1 \quad (\text{βλ. καί σχ. 74})$$

Τέλος, από τον τύπο (7), παίρνουμε

$$\log_a x = \frac{\log x}{\log a} \leq \frac{x-1}{\log a}, \quad \text{αν } a > 1$$

άφοῦ $\log a > 0$ καί

$$\log_a x = \frac{\log x}{\log a} \geq \frac{x-1}{\log a}, \quad \forall 0 < a < 1$$

άφοῦ τότε $\log a < 0$.

3. Ἡ λογαριθμική συνάρτηση \log_a εἶναι συνεχής.

Ἀπόδειξη. Σύμφωνα μέ τόν τύπο (7) ἔχουμε

$$\log_a x = \frac{\log x}{\log a}$$

καί ἔτσι ἀρκεῖ ν' ἀποδείξουμε τή συνέχεια τοῦ φυσικοῦ λογαρίθμου \log . Γιά τό σκοπό αὐτό θεωροῦμε ἕναν ὁποιοδήποτε θετικό ἀριθμό x_0 καί μιᾶ ἀκολουθία θετικῶν ἀριθμῶν x_n , $n = 1, 2, \dots$ μέ $\lim x_n = x_0$. Ἀπό τίς ἰδιότητες 1 καί 2 τῆς προηγούμενης § 3.2 καί τοῦ τύπου (9), γιά κάθε φυσικό ἀριθμό n , ἔχουμε

$$\log x_n = \log \left(x_0 \frac{x_n}{x_0} \right) = \log x_0 + \log \frac{x_n}{x_0} \leq \log x_0 + \frac{x_n}{x_0} - 1$$

καί

$$\log x_n = \log \left(x_0 \frac{x_0}{x_n} \right) = \log x_0 - \log \frac{x_0}{x_n}$$

$$\geq \log x_0 - \left(\frac{x_0}{x_n} - 1 \right) = \log x_0 + 1 - \frac{x_0}{x_n}.$$

Ἄρα γιά κάθε φυσικό ἀριθμό n ἰσχύει

$$\log x_0 + 1 - \frac{x_0}{x_n} \leq \log x_n \leq \log x_0 + \frac{x_n}{x_0} - 1.$$

Ἀλλά

$$\lim \left(\log x_0 + 1 - \frac{x_0}{x_n} \right) = \log x_0 + 1 - \frac{x_0}{x_0} = \log x_0$$

καί

$$\lim \left(\log x_0 + \frac{x_n}{x_0} - 1 \right) = \log x_0 + \frac{x_0}{x_0} - 1 = \log x_0.$$

Ὡστε ἰσχύει καί

$$\lim \log x_n = \log x_0$$

τό ὁποῖο, ἐπειδή ἡ x_n , $n = 1, 2, \dots$ εἶναι ὁποιαδήποτε ἀκολουθία θετικῶν ἀριθμῶν μέ $\lim x_n = x_0$, σημαίνει ὅτι ὁ φυσικός λογάριθμος εἶναι συνεχής συνάρτηση στό x_0 γιά ὁποιοδήποτε θετικό ἀριθμό x_0 .

4. Ἰσχύει:

$$(10) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1.$$

Ἀπόδειξη. Πρῶτα θ' ἀποδείξουμε ὅτι ἰσχύει

$$1 \leq \frac{e^x - 1}{x} \leq e^x \quad \forall x \in (0, +\infty)$$

καί

$$e^x \leq \frac{e^x - 1}{x} \leq 1 \quad \forall x \in (-\infty, 0).$$

Πραγματικά: για $x \in (0, +\infty)$, από τον τύπο (9), έχουμε

$$e^x - 1 \geq (1+x) - 1 = x, \text{ οπότε } \frac{e^x - 1}{x} \geq 1$$

καί

$$\frac{e^x - 1}{e^x} = 1 - e^{-x} \leq 1 - [1 + (-x)] = x, \text{ οπότε } \frac{e^x - 1}{x} \leq e^x$$

Γιά $x \in (-\infty, 0)$, έχουμε $-x \in (0, +\infty)$ και έτσι παίρνουμε

$$1 \leq \frac{e^{-x} - 1}{-x} \leq e^{-x}, \text{ οπότε } e^x \leq e^x \frac{e^{-x} - 1}{-x} \leq 1.$$

Άλλά

$$e^x \frac{e^{-x} - 1}{-x} = \frac{1 - e^x}{-x} = \frac{e^x - 1}{x} \text{ και έπομένως } e^x \leq \frac{e^x - 1}{x} \leq 1.$$

Θά αποδείξουμε, τώρα, ότι $\lim_{x \rightarrow +0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$. Πραγματικά: θεωρούμε μία οποιαδήποτε ακολουθία $x_n, n = 1, 2, \dots$ με $x_n > 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}$ και $x_n \rightarrow 0$. Άλλά τότε, σύμφωνα με τα παραπάνω, ισχύει

$$1 \leq \frac{e^{x_n} - 1}{x_n} \leq e^{x_n} \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

καί έτσι

$$\lim_{x_n \rightarrow 0} \frac{e^{x_n} - 1}{x_n} = 1.$$

άφοϋ, από τή συνέχεια τής έκθετικής συναρτήσεως, έχουμε $\lim_{x_n \rightarrow 0} e^{x_n} = e^0 = 1$. Άποδείξαμε λοιπόν ότι

$$x_n \rightarrow 0 \Rightarrow \lim_{x_n} \frac{e^{x_n} - 1}{x_n} = 1$$

πού σημαίνει ότι $\lim_{x \rightarrow +0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$.

Παρόμοια ισχύει και $\lim_{x \rightarrow -0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$. Πραγματικά: θεωρούμε μία οποια-

δήποτε ακολουθία $x_n, n = 1, 2, \dots$ με $x_n < 0, \forall n \in \mathbb{N}$ και $x_n \rightarrow 0$. Άλλά τότε, σύμφωνα με τα παραπάνω, ισχύει

$$e^{x_n} \leq \frac{e^{x_n} - 1}{x_n} \leq 1 \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

καί έτσι

$$\lim_{x_v} \frac{e^{x_v} - 1}{x_v} = 1.$$

άφοῦ, ἀπό τή συνέχεια τῆς ἐκθετικῆς συναρτήσεως, ἔχουμε $\lim e^{x_v} = e^0 = 1$.
 Ἀποδείξαμε λοιπόν ὅτι

$$x_v \rightarrow 0 \Rightarrow \lim \frac{e^{x_v} - 1}{x_v} = 1$$

πού σημαίνει ὅτι $\lim_{x \rightarrow -0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$.

Ἔστω ἰσχύει

$$\lim_{x \rightarrow +0} \frac{e^x - 1}{x} = 1 = \lim_{x \rightarrow -0} \frac{e^x - 1}{x}$$

δηλαδή

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1.$$

5. Ἰσχύει

$$(11) \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\log x}{x-1} = 1.$$

Ἀπόδειξη. Πρῶτα θά ἀποδείξουμε ὅτι ἰσχύει

$$\frac{1}{x} \leq \frac{\log x}{x-1} \leq 1 \quad \forall x \in (1, +\infty)$$

καί

$$1 \leq \frac{\log x}{x-1} \leq \frac{1}{x} \quad \forall x \in (0, 1).$$

Πραγματικά: γιά $x \in (1, +\infty)$, σύμφωνα μέ τόν τύπο (9), ἔχουμε

$$\log x \leq x-1, \quad \text{ὅποτε} \quad \frac{\log x}{x-1} \leq 1$$

καί

$$\frac{\log x}{x-1} = \frac{-\log \frac{1}{x}}{x-1} \geq \frac{-\left(\frac{1}{x} - 1\right)}{x-1} = \frac{x-1}{x-1} = \frac{1}{x}.$$

Γιά $x \in (0, 1)$ ἔχουμε $\frac{1}{x} \in (1, +\infty)$ καί ἔτσι παίρνουμε

$$\frac{1}{\frac{1}{x}} \leq \frac{\log \frac{1}{x}}{\frac{1}{x} - 1} \leq 1, \quad \text{ἀπ' ὅπου} \quad 1 \leq \frac{1}{x} \frac{\log \frac{1}{x}}{\frac{1}{x} - 1} \leq \frac{1}{x}.$$

Ἀλλά

$$\frac{1}{x} \frac{\log \frac{1}{x}}{\frac{1}{x} - 1} = \frac{1}{x} \frac{-\log x}{\frac{1-x}{x}} = \frac{-\log x}{1-x} = \frac{\log x}{x-1}$$

καί ἔτσι

$$1 \leq \frac{\log x}{x-1} \leq \frac{1}{x}.$$

Θά ἀποδείξουμε, τώρα, ὅτι $\lim_{x \rightarrow 1+0} \frac{\log x}{x-1} = 1$. Πραγματικά· θεωροῦμε μιά ὁποιαδήποτε ἀκολουθία $x_n, n = 1, 2, \dots$ μέ $x_n > 1 \quad \forall n \in \mathbb{N}$ καί $\lim x_n = 1$. Ἀλλά τότε σύμφωνα μέ τά παραπάνω ἰσχύει

$$\frac{1}{x_n} \leq \frac{\log x_n}{x_n - 1} \leq 1 \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

καί ἔτσι

$$\lim \frac{\log x_n}{x_n - 1} = 1$$

ἀφοῦ $\lim \frac{1}{x_n} = \frac{1}{1} = 1$. Ἀποδείξαμε, λοιπόν, ὅτι

$$\lim x_n = 1 \Rightarrow \lim \frac{\log x_n}{x_n - 1} = 1$$

καί ἄρα $\lim_{x \rightarrow 1+0} \frac{\log x}{x-1} = 1$.

Παρόμοια ἰσχύει καί $\lim_{x \rightarrow 1-0} \frac{\log x}{x-1} = 1$. Πραγματικά· θεωροῦμε μιά ὁποια-

δήποτε ἀκολουθία $x_n, n = 1, 2, \dots$ μέ $0 < x_n < 1 \quad \forall n \in \mathbb{N}$ καί $\lim x_n = 1$. Ἀλλά τότε, σύμφωνα μέ τά παραπάνω, ἰσχύει

$$1 \leq \frac{\log x_n}{x_n - 1} \leq \frac{1}{x_n} \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

καί ἔτσι

$$\lim \frac{\log x_n}{x_n - 1} = 1$$

ἀφοῦ $\lim \frac{1}{x_n} = \frac{1}{1} = 1$. Ἀποδείξαμε, λοιπόν, ὅτι

$$\lim x_n = 1 \Rightarrow \lim \frac{\log x_n}{x_n - 1} = 1$$

καί ἄρα $\lim_{x \rightarrow 1-0} \frac{\log x}{x-1} = 1$.

*Ὡστε ἰσχύει

$$\lim_{x \rightarrow 1+0} \frac{\log x}{x-1} = 1 = \lim_{x \rightarrow 1-0} \frac{\log x}{x-1}$$

δηλαδή

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\log x}{x-1} = 1.$$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

29. Νά μελετηθούν ως προς τη συνέχεια οι συναρτήσεις που δρίζονται από τους παρακάτω τύπους και νά παρασταθούν γεωμετρικά οι τρεις πρώτες:

$$1) f(x) = \begin{cases} x, & \text{αν } x \in \left[0, \frac{1}{2}\right] \\ \frac{1}{2} + x, & \text{αν } x \in \left(\frac{1}{2}, 1\right] \end{cases}$$

$$2) f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & \text{αν } x \neq 0 \\ 0, & \text{αν } x = 0 \end{cases}$$

$$3) f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x^2}, & \text{αν } x \neq 0 \\ 0, & \text{αν } x = 0 \end{cases}$$

$$4) f(x) = \begin{cases} \eta\mu \frac{1}{x}, & \text{αν } x > 0 \\ x, & \text{αν } x \leq 0 \end{cases}$$

$$5) f(x) = \begin{cases} x^2 \eta\mu \frac{1}{x}, & \text{αν } x \neq 0 \\ 0, & \text{αν } x = 0 \end{cases}$$

$$6) f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} \eta\mu \frac{1}{x}, & \text{αν } x \neq 0 \\ 0, & \text{αν } x = 0 \end{cases}$$

30. Νά αποδειχθεί ότι οι συναρτήσεις που δρίζονται από τους παρακάτω τύπους είναι συνεχείς:

$$1) f(x) = \sin(x^2 + 3x)$$

$$2) f(x) = \sin \sqrt{1-x^2}$$

$$3) f(x) = \eta\mu(\sin 3x)$$

$$4) f(x) = \eta\mu \frac{x^2-1}{x^2+1}$$

$$5) f(x) = \frac{x^2+3x}{2+\eta\mu x^2}$$

$$6) f(x) = \sin(x^2 + \epsilon\phi 3x)$$

$$7) f(x) = 2^{\eta\mu x} (1 + \epsilon\phi x)$$

$$8) f(x) = \log(1 + x^2 \eta\mu^4 x)$$

$$9) f(x) = 3^{\epsilon\phi(x^2+1)}$$

31*. Νά μελετηθεί ως προς τη συνέχεια ή συνάρτηση f με

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} \eta\mu \frac{1}{x}, & \text{αν } x \neq 0 \text{ και } |x| \leq 1 \\ 0, & \text{αν } x = 0 \\ \eta\mu x, & \text{αν } |x| > 1 \end{cases}$$

32*. Νά μελετηθεί ως προς τη συνέχεια και νά παρασταθεί γεωμετρικά ή συνάρτηση f με

$$f(x) = \begin{cases} \log x, & \text{αν } x > 2 \\ x-2 + \log x, & \text{αν } 1 < x \leq 2 \\ 1-x, & \text{αν } x \leq 1 \end{cases}$$

Δ. Ζωσιμάκης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΣ

1. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΣ

1.1 Οί συναρτήσεις τις οποίες θά θεωροῦμε στό κεφάλαιο τοῦτο εἶναι ὅλες πραγματικές συναρτήσεις μιᾶς πραγματικῆς μεταβλητῆς. Ἡ ἔννοια τῆς παραγώγου μιᾶς συναρτήσεως εἶναι, ὅπως καί ἡ ἔννοια τῆς συνέχειας συναρτήσεως, ἄμεσα δεμένη μέ τήν ἔννοια τῆς συγκλίσεως.

*Ἐστω f μιᾶ συνάρτηση μέ πεδίο ὀρισμοῦ ἕνα διάστημα Δ καί ἔστω $x_0 \in \Delta$. Τότε μέ τόν τύπο

$$g_{x_0}(x) = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}, \quad x \in \Delta - \{x_0\}$$

ὀρίζεται μιᾶ συνάρτηση g_{x_0} , ἡ ὁποία ὀνομάζεται *πληξιο διαφορῶν τῆς f στό σημεῖο x_0* . *Ἄν ὑπάρχει τό $\lim_{x \rightarrow x_0} g_{x_0}(x)$, δηλαδή τό

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

καί τοῦτο εἶναι πραγματικός ἀριθμός, τότε λέμε ὅτι «ἡ συνάρτηση f παραγωγίζεται στό σημεῖο x_0 » ἢ ἀλλιῶς «*ὑπάρχει ἡ παράγωγος* (ἀκριβέστερα ἡ *πρώτη παράγωγος*) τῆς f στό σημεῖο x_0 ». Τήν ὀριακή αὐτή τιμή τήν ὀνομάζουμε τότε *παράγωγο* (ἀκριβέστερα *πρώτη παράγωγο*) τῆς f στό σημεῖο x_0 καί μάλιστα τήν συμβολίζουμε μέ

$$f'(x_0), \quad \text{ἢ} \quad (f(x))'_{x=x_0}, \quad \text{ἢ} \quad \left[\frac{df(x)}{dx} \right]_{x=x_0}$$

Γιά συντομία

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}.$$

Παρατηρήσεις. 1) *Ἄν τό x_0 εἶναι τό ἀριστερό ἄκρο τοῦ διαστήματος Δ , τότε στόν παραπάνω ὀρισμό ἔννοοῦμε τήν ὀριακή τιμή γιά $x \rightarrow x_0 + 0$, ἐνῶ ἂν τό x_0 εἶναι τό δεξιό ἄκρο τοῦ διαστήματος Δ , τήν ὀριακή τιμή τήν ἔννοοῦμε γιά $x \rightarrow x_0 - 0$.

2) Μπορεῖ νά ἀποδειχθεῖ ὅτι ἡ ὑπαρξη τῆς παραγώγου μιᾶς συναρτή-

σεως σ' ένα σημείο συνεπάγεται τή συνέχεια τῆς συναρτήσεως αὐτῆς στό σημείο τοῦτο (βλ. παρακάτω ιδιότητα 1.5.1).

Παραδείγματα:

1. Στήν περίπτωση σταθερῆς συναρτήσεως c , δηλαδή $f(x) = c$, ἔχουμε

$$(c)'_{x=x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{c - c}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} 0 = 0,$$

δηλαδή

$$(c)'_{x=x_0} = 0.$$

Ὁ τύπος αὐτός ἰσχύει γιά κάθε πραγματικό ἀριθμό x_0 καί μάλιστα γράφουμε

$$(c)' = 0.$$

2. Στήν περίπτωση ὅπου $f(x) = x$, ἔχουμε

$$(x)'_{x=x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{x - x_0}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} 1 = 1,$$

δηλαδή

$$(x)'_{x=x_0} = 1$$

Ὁ τύπος αὐτός ἰσχύει γιά κάθε πραγματικό ἀριθμό x_0 καί μάλιστα γράφουμε

$$(x)' = 1.$$

3. Στήν περίπτωση ὅπου $f(x) = x^2$, ἔχουμε

$$(x^2)'_{x=x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{x^2 - x_0^2}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} (x + x_0) = x_0 + x_0 = 2x_0,$$

δηλαδή

$$(x^2)'_{x=x_0} = 2x_0$$

καί μάλιστα ὁ τύπος αὐτός ἰσχύει γιά κάθε πραγματικό ἀριθμό x_0 . Τότε γράφουμε

$$(x^2)' = 2x$$

καί λέμε ὅτι ἡ συνάρτηση f μέ $f(x) = x^2$ παραγωγίζεται στό πεδίο ὁρισμοῦ τῆς καί μάλιστα, στήν περίπτωση αὐτή, τή συνάρτηση g μέ $g(x) = 2x$ τήν ὀνομάζουμε παράγωγο τῆς f .

Γενικά, ἂν γιά μιά συνάρτηση f μέ πεδίο ὁρισμοῦ ἕνα διάστημα Δ , ὑπάρχει ἡ (πρώτη) παράγωγός τῆς γιά κάθε $x \in \Delta$, τότε ὁ τύπος

$$y = f'(x)$$

ὀρίζει μιά συνάρτηση f' , πού ἔχει πεδίο ὁρισμοῦ ἐπίσης τό διάστημα Δ . Τήν συνάρτηση f' τήν ὀνομάζουμε *παράγωγο* (ἀκριβέστερα *πρώτη παράγωγο*) τῆς f στό Δ ἢ ἀπλά *πρώτη παράγωγο τῆς f* . Αὐτή τή συμβολίζουμε καί μέ $\frac{df}{dx}$. Στήν περίπτωση πού ὀρίζεται ἡ (πρώτη) παράγωγος f' τῆς συναρτήσεως f , λέμε ὅτι «*ἡ συνάρτηση f παραγωγίζεται στό Δ* » ἢ ἀπλά «*ἡ συνάρτηση f παραγωγίζεται*».

*Αν ἡ συνάρτηση f παραγωγίζεται, τότε μπορεῖ νά παραγωγίζεται καί ἡ συνάρτηση f' σ' ένα σημείο $x_0 \in \Delta$ καί στήν περίπτωση αὐτή, τήν παράγωγο $(f'(x))'_{x=x_0}$ τήν ὀνομάζουμε *δεύτερη παράγωγο τῆς f στό σημείο x_0* καί τή συμβολίζουμε μέ $f''(x_0)$ ἢ $(f'(x))''_{x=x_0}$ ἢ ἀκόμη καί $\left[\frac{d^2f(x)}{dx^2} \right]_{x=x_0}$. *Αν τώρα ὑ-

παράγει ή δεύτερη παράγωγος τής f σε κάθε σημείο $x \in \Delta$, τότε ο τύπος

$$y = f''(x)$$

ορίζει μία συνάρτηση f'' με πεδίο ορισμού επίσης τό διάστημα Δ , ή όποία ονομάζεται *δευτέρα παράγωγος τής f στό Δ* ή άπλά *δευτέρα παράγωγος τής f* . Αύτή τή συμβολίζουμε καί μέ $\frac{d^2f}{dx^2}$. Π.χ.

$$(x^2)''_{x=x_0} = (2x)'_{x=x_0} = 2,$$

γιατί

$$(2x)'_{x=x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{2x - 2x_0}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} 2 = 2.$$


Άρα ύπάρχει ή δεύτερη παράγωγος τής συναρτήσεως f μέ $f(x) = x^2$ καί αύτή είναι ή σταθερή συνάρτηση 2.

Ανάλογα όρίζουμε τήν τρίτη παράγωγο μιās συναρτήσεως f νά είναι ή παράγωγος τής δευτέρας παραγώγου της καί έπαγωγικά τή νιοστή παράγωγο $f^{(v)}$ τής f μέ τόν τύπο

$$f^{(v)} = (f^{(v-1)})', \quad v = 2, 3, \dots,$$

όπου μέ $f^{(v)}$ συμβολίζουμε τή μιοστή παράγωγο τής f . Άκόμα για τήν νιοστή παράγωγο $f^{(v)}$ χρησιμοποιείται καί τό σύμβολο $\frac{d^v f}{dx^v}$.

1.2 Γεωμετρική σημασία τής παραγώγου. Έστω ότι f είναι μία συνάρτηση μέ πεδίο ορισμού ένα διάστημα Δ καί $P_0 = (x_0, f(x_0))$ ένα σημείο τοῦ διαγράμματος τής συναρτήσεως αύτης. Αν θεωρήσουμε καί ένα άλλο σημείο $P_\eta = (x_0 + \eta, f(x_0 + \eta))$ τοῦ διαγράμματος καθώς καί τήν εὐθεία πού διέρχεται από τά σημεία P_0, P_η , (ή εὐθεία αύτή ονομάζεται *τέμνουσα τοῦ διαγράμματος στό P_0*), τότε ό συντελεστής κατευθύνσεώς της, δηλαδή ή έφαπτομένη τής γωνίας α_η , δίδεται από τόν τύπο



Σχ. 75

$$\epsilon\phi \alpha_\eta = \frac{QP_\eta}{P_0P_\eta} = \frac{f(x_0 + \eta) - f(x_0)}{\eta},$$

ένώ ή εξίσωση για τήν τέμνουσα είναι

$$(τ) \quad y - f(x_0) = \frac{f(x_0 + \eta) - f(x_0)}{\eta} (x - x_0).$$

Άν τώρα ύποθέσουμε ότι ύπάρχει τό $\lim_{\eta \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \eta) - f(x_0)}{\eta}$, δηλαδή ότι ύπάρ-

χει ή παράγωγος $f'(x_0)$ τής συναρτήσεως f στό σημείο x_0 , τότε όρίζεται ως όριακή εξίσωση τής (τ) για $\eta \rightarrow 0$ ή εξίσωση τής εὐθείας

$$(ε) \quad y - f(x_0) = f'(x_0) (x - x_0)$$

πού διέρχεται από τό σημείο $P_0=(x_0, f(x_0))$ καί ἔχει συντελεστή κατευθύνσεως τήν $f'(x_0)$, δηλαδή (βλ. σχ. 75)

$$\text{εφ } \alpha = f'(x_0).$$

Ὅριζουμε τήν εὐθεία αὐτή νά εἶναι ἡ *εφαπτομένη εὐθεία τοῦ διαγράμματος τῆς f στό σημείο P_0* .

1.3 Κινηματική σημασία τῆς παραγώγου. Ἔστω ὅτι ἡ θέση x ἑνός ὕλικου σημείου πού κινεῖται πάνω σέ μιὰ εὐθεία ἐκφράζεται ὡς μιὰ συνάρτηση τοῦ χρόνου t . Δηλαδή

$$x = f(t), \quad t \in \Delta = [t_0, t_1] \quad (\text{ἕνα χρονικό διάστημα}).$$

Τό πηλίκο διαφορῶν $\frac{f(t) - f(\tau)}{t - \tau}$ στή χρονική στιγμή $t \in [t_0, t_1]$ ἐκφράζει τή *μέση ταχύτητα τοῦ ὕλικου σημείου κατά τό χρονικό διάστημα μεταξύ τῶν στιγμῶν τ καί t* . Τήν ὀριακή τιμή τῆς μέσης αὐτῆς ταχύτητας γιά $t \rightarrow \tau$ τήν ὀρίζουμε ὡς τή (στιγμιαία) *ταχύτητα $u(\tau)$ τοῦ ὕλικου σημείου κατά τή χρονική στιγμή τ* , δηλαδή ὀρίζουμε

$$u(\tau) = \lim_{t \rightarrow \tau} \frac{f(t) - f(\tau)}{t - \tau} = f'(\tau).$$

Ἄν τώρα ἡ στιγμιαία ταχύτητα $u(t)$ ὀρίζεται γιά κάθε χρονική στιγμή $t \in [t_0, t_1]$, τότε τό πηλίκο διαφορῶν $\frac{u(t) - u(\tau)}{t - \tau}$ ἐκφράζει τή *μέση ἐπιτάχυνση τοῦ ὕλικου σημείου κατά τό χρονικό διάστημα μεταξύ τῶν στιγμῶν τ καί t* . Τήν ὀριακή αὐτή τιμή τῆς μέσης ἐπιταχύνσεως γιά $t \rightarrow \tau$ τήν ὀρίζουμε ὡς τή (στιγμιαία) *ἐπιτάχυνση $\gamma(\tau)$ κατά τή χρονική στιγμή τ* , δηλαδή

$$\gamma(\tau) = \lim_{t \rightarrow \tau} \frac{u(t) - u(\tau)}{t - \tau} = u'(\tau) = f''(\tau).$$

1.4* Διαφορικό συναρτήσεως. Ἔστω ὅτι f εἶναι μιὰ συνάρτηση πού παραγωγίζεται σ' ἕνα διάστημα Δ . Ἄν x_0 εἶναι ἕνα ὁποιοδήποτε σημείο τοῦ διαστήματος Δ , τότε μέ τόν τύπο $Y = f'(x_0) X$ ὀρίζεται μιὰ (γραμμική) συνάρτηση, ἡ ὁποία ὀνομάζεται *διαφορικό τῆς συναρτήσεως f στό σημείο x_0* καί συμβολίζεται μέ $df(x_0)$, δηλαδή

$$X \xrightarrow{df(x_0)} Y = f'(x_0) X.$$

Εἰδικά, ἂν θεωρήσουμε τήν ταυτοτική συνάρτηση, δηλαδή τή συνάρτηση t μέ $\tau(x) = x$, τότε τό διαφορικό $d\tau(x) = dx$ αὐτῆς τῆς συναρτήσεως στό σημείο x , ὀρίζεται, σύμφωνα μέ τά παραπάνω, ὡς ἡ συνάρτηση πού δίδεται ἀπό τόν τύπο $Y = \tau'(x)X = 1 \cdot X = X$, δηλαδή

$$X \xrightarrow{dx} Y = X$$

καί ἄρα ἡ συνάρτηση $f'(x_0)dx$ ἔχει τύπο $Y = f'(x_0)X$, δηλαδή συμπίπτει μέ τό διαφορικό $df(x_0)$. Ἄρα ἰσχύει ὁ τύπος

$$df(x_0) = f'(x_0) dx$$

ό οποίος και δικαιολογεί τό συμβολισμό $f'(x_0) = \frac{df(x_0)}{dx_0}$ τής παραγώγου σάν πηλίκο διαφορικών.

Ἡ γεωμετρική ἐρμηνεία τοῦ διαφορικοῦ $df(x_0)$ τής συναρτήσεως f στό x_0 , δίδεται στό διπλανό σχ. 75α, ὅπου ἡ ἀρχή τῶν ἀξόνων X, Y εἶναι τό σημεῖο $P_0 = (x_0, f(x_0))$.

Ὅπως εἶδαμε παραπάνω, σέ κάθε σημεῖο $x_0 \in \Delta$ ὀρίζεται τό διαφορικό $df(x_0)$ τής f στό x_0 δηλαδή ὀρίζεται μιά μονοσήμαντη ἀπεικόνιση μέ τύπο

$$\Delta \ni x \mapsto df(x),$$

ἡ ὁποία στό σημεῖο $x \in \Delta$ ἀπεικονίζει μιά συνάρτηση, τό διαφορικό $df(x)$ τής f στό σημεῖο x . Τήν ἀπεικόνιση αὐτή τήν ὀνομάζουμε *διαφορικό τής συναρτήσεως* f καί τή συμβολίζουμε μέ df , δηλαδή:

$$\Delta \ni x \xrightarrow{df} df(x).$$

1.5 Ἰδιότητες τῶν παραγῶγων. Θεωροῦμε δύο συναρτήσεις f καί g μέ κοινό πεδίο ὀρισμοῦ ἕνα διάστημα Δ . Τότε ἰσχύουν τά ἑξῆς:

1.5.1. *Ἄν ἡ συνάρτηση f παραγωγίζεται στό Δ , τότε αὐτή εἶναι συνεχῆς συνάρτηση.

*Ἀπόδειξη. Ἐστω x_0 ἕνα σημεῖο τοῦ Δ . Τότε ἔχουμε

$$f(x) - f(x_0) = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} (x - x_0) \quad \forall x \in \Delta - \{x_0\}$$

καί ἄρα

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) - f(x_0)) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \lim_{x \rightarrow x_0} (x - x_0) = f'(x_0) \cdot 0 = 0,$$


δηλαδή $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$, τό ὁποῖο σημαίνει ὅτι ἡ συνάρτηση f εἶναι συνεχῆς στό σημεῖο x_0 τοῦ διαστήματος Δ .

Παρατήρηση. Τό ἀντίστροφο τής ιδιότητος αὐτῆς δέν ἰσχύει, δηλαδή μιά συνάρτηση μπορεῖ νά εἶναι συνεχῆς, ἀλλά νά μήν παραγωγίζεται. Αὐτό μπορεῖ ν' ἀποδειχθεῖ μέ τό παράδειγμα τής συναρτήσεως f μέ $f(x) = |x|$, πού, ὅπως εἶδαμε στό παράδειγμα 4 τής § 1.1 τοῦ κεφ. V, εἶναι συνεχῆς. Αὐτή ὁμως δέν παραγωγίζεται στό σημεῖο 0, γιατί

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{|x| - |0|}{x - 0} = \frac{|x|}{x} = \begin{cases} 1, & \text{ἂν } x > 0 \\ -1, & \text{ἂν } x < 0 \end{cases}$$

καί ἄρα

$$\lim_{x \rightarrow +0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow -0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = -1.$$



Σχ. 75α.

Άρα δέν υπάρχει τό $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0}$, δηλαδή ή συνάρτηση f δέν παραγωγίζεται στό σημείο 0.

1.5.2. *Αν οί συναρτήσεις f καί g παραγωγίζονται στό Δ , τότε παραγωγίζονται καί οί συναρτήσεις $f+g$ καί $f-g$ καί μάλιστα ισχύουν*

$$(f + g)' = f' + g' \quad \text{καί} \quad (f - g)' = f' - g'.$$

Απόδειξη. Αν x_0 είναι ένα οποιοδήποτε σημείο του διαστήματος Δ , τότε έχουμε

$$\frac{(f(x) + g(x)) - (f(x_0) + g(x_0))}{x - x_0} = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} + \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0}$$

καί άρα

$$\begin{aligned} (f(x) + g(x))'_{x=x_0} &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{(f(x) + g(x)) - (f(x_0) + g(x_0))}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \\ &+ \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0} = f'(x_0) + g'(x_0), \end{aligned}$$

δηλαδή $(f(x) + g(x))'_{x=x_0} = f'(x_0) + g'(x_0)$ καί τούτο γιά κάθε $x_0 \in \Delta$, πράγμα τό όποίο σημαίνει ότι $(f + g)' = f' + g'$.

Παρόμοια μπορεί νά αποδειχθεί καί ό αντίστοιχος τύπος γιά τή διαφορά.

Ειδικά, αν g είναι ή σταθερή συνάρτηση c , τότε ισχύει

$$(f + c)' = f'.$$

1.5.3. *Αν οί συναρτήσεις f καί g παραγωγίζονται στό Δ , τότε παραγωγίζεται καί τό γινόμενο fg καί μάλιστα ισχύει.*

$$(fg)' = f'g + fg'.$$

Απόδειξη. Αν x_0 είναι οποιοδήποτε σημείο του διαστήματος Δ , τότε έχουμε

$$\begin{aligned} \frac{f(x)g(x) - f(x_0)g(x_0)}{x - x_0} &= \frac{[f(x)g(x) - f(x_0)g(x)] + [f(x_0)g(x) - f(x_0)g(x_0)]}{x - x_0} = \\ &= \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} g(x) + f(x_0) \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0}. \end{aligned}$$

Έπειδή όμως ή g παραγωγίζεται στό Δ , σύμφωνα μέ τήν 1.5.1, αυτή είναι συνεχής καί άρα $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = g(x_0)$. Έτσι παίρνουμε

$$\begin{aligned} (f(x)g(x))'_{x=x_0} &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) + f(x_0) \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0} = \\ &= f'(x_0)g(x_0) + f(x_0)g'(x_0) \end{aligned}$$

καί τούτο γιά κάθε $x_0 \in \Delta$, πράγμα πού σημαίνει ότι

$$(fg)' = f'g + fg'.$$

Ειδικά, αν g είναι ή σταθερή συνάρτηση c , τότε ισχύει

$$(cf)' = cf'.$$

1.5.4. "Αν οι συναρτήσεις f και g παραγωγίζονται στο Δ και ισχύει $g(x) \neq 0 \quad \forall x \in \Delta$, τότε παραγωγίζεται και το πηλίκο $\frac{f}{g}$ και μάλιστα ισχύει

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}.$$

Ειδικά, αν f είναι ή σταθερή συνάρτηση 1 , ισχύει

$$(1) \quad \left(\frac{1}{g}\right)' = -\frac{g'}{g^2}.$$

Απόδειξη. Θα αποδείξουμε πρώτα την (1). "Αν το x_0 είναι ένα οποιοδήποτε σημείο του διαστήματος Δ , έχουμε

$$\frac{\frac{1}{g(x)} - \frac{1}{g(x_0)}}{x - x_0} = -\frac{1}{g(x_0)} \frac{1}{g(x)} \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0}.$$

"Επειδή όμως ή g παραγωγίζεται στο Δ , σύμφωνα με την 1.5.1 αυτή είναι συνεχής και άρα $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = g(x_0)$. "Ετσι $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{g(x)} = \frac{1}{g(x_0)}$ και

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{g(x)}\right)'_{x \rightarrow x_0} &= -\frac{1}{g(x_0)} \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{g(x)} \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0} = -\frac{1}{g(x_0)} \frac{1}{g(x_0)} g'(x_0) = \\ &= -\frac{g'(x_0)}{g^2(x_0)}. \end{aligned}$$

Τούτο όμως ισχύει για κάθε $x_0 \in \Delta$ πού σημαίνει ότι ισχύει ή (1).

Τώρα, από την (1) και την 1.5.3 έχουμε

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \left(f \frac{1}{g}\right)' = f' \frac{1}{g} + f \left(\frac{1}{g}\right)' = f' \frac{1}{g} + f \left(-\frac{g'}{g^2}\right) = \frac{f'g - fg'}{g^2}.$$

1.6 Οι παράγωγοι μερικών στοιχειωδών συναρτήσεων.

1.6.1 $(x^v)' = vx^{v-1} \quad (v = 2, 3, \dots)$.

Για $v = 2$ έχουμε ήδη υπολογίσει ότι $(x^2)' = 2x = 2x^{2-1}$, δηλαδή ό τύπος ισχύει. "Η απόδειξη του τύπου αυτού στή γενική περίπτωση γίνεται με την έπαγωγική μέθοδο ως εξής:

"Εστω ότι ισχύει $(x^k)' = kx^{k-1}$, τότε, από την 1.5.3 θα ισχύει

$$(x^{k+1})' = (x \cdot x^k)' = (x)' x^k + x(x^k)' = 1 \cdot x^k + xkx^{k-1} = (k+1)x^k.$$

"Ωστε, με τό νά δεχθούμε ότι ό τύπος 1.6.1 ισχύει για τό φυσικό αριθμό $k(k \geq 2)$, δείξαμε ότι αυτός ισχύει και για τόν έπόμενο του φυσικό αριθμό $k+1$. "Άρα ό τύπος 1.6.1 ισχύει και για κάθε φυσικό αριθμό $v \geq 2$.

1.6.1' $\left(\frac{1}{x^v}\right)' = -\frac{v}{x^{v+1}}, \quad x \neq 0$ (v φυσικός αριθμός).

Για $v = 1$ ό τύπος αυτός ισχύει, γιατί από την (1) έχουμε

$$\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{(x)'}{x^2} = -\frac{1}{x^2} = -\frac{1}{x^{1+1}}.$$

Γιά $v \geq 2$, από την (1) και τον τύπο 1.6.1, έχουμε

$$\left(\frac{1}{x^v}\right)' = -\frac{(x^v)'}{(x^v)^2} = -\frac{vx^{v-1}}{x^{2v}} = -\frac{v}{x^{v+1}}.$$

1.6.2 $(\eta\mu x)' = \sigma\upsilon\nu x$.

Πρώτα θά αποδείξουμε τον τύπο $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\eta\mu y}{y} = 1$. Από την τριγωνομετρία είναι γνωστή η ανισότητα

$$\eta\mu y < y < \epsilon\phi y \quad \forall y \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$$

ή οποία γράφεται ισοδύναμα και ως εξής:

$$\sigma\upsilon\nu y < \frac{\eta\mu y}{y} < 1 \quad \forall y \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right).$$

Η τελευταία αυτή ανισότητα ισχύει και για $x \in \left(-\frac{\pi}{2}, 0\right)$, γιατί

$$y \in \left(-\frac{\pi}{2}, 0\right) \Rightarrow -y \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right) \Rightarrow \sigma\upsilon\nu(-y) < \frac{\eta\mu(-y)}{-y} < 1 \Rightarrow \sigma\upsilon\nu y < \frac{\eta\mu y}{y} < 1.$$

Ωστε αποδείξαμε ότι

$$(2) \quad \sigma\upsilon\nu y < \frac{\eta\mu y}{y} < 1 \quad \forall y \in \left(-\frac{\pi}{2}, 0\right) \cup \left(0, \frac{\pi}{2}\right).$$

Έπειδή τό συνημίτονο είναι συνεχής συνάρτηση, έχουμε $\lim_{y \rightarrow 0} \sigma\upsilon\nu y = \sigma\upsilon\nu 0 = 1$

και ο τύπος (2) δίνει $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\eta\mu y}{y} = 1$.

Γιά να αποδείξουμε τώρα τον τύπο 1.6.2 θεωρούμε έναν οποιοδήποτε πραγματικό αριθμό x_0 . τότε έχουμε

$$\frac{\eta\mu x - \eta\mu x_0}{x - x_0} = \frac{2\eta\mu \frac{x-x_0}{2} \sigma\upsilon\nu \frac{x+x_0}{2}}{x-x_0} = \frac{\eta\mu \frac{x-x_0}{2}}{\frac{x-x_0}{2}} \sigma\upsilon\nu \frac{x+x_0}{2}$$

και έπειδή, όπως παραπάνω δείξαμε, $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\eta\mu \frac{x-x_0}{2}}{\frac{x-x_0}{2}} = 1$ και (από τη συνέ-

χεια του συνημιτόνου) $\lim_{x \rightarrow x_0} \sigma\upsilon\nu \frac{x+x_0}{2} = \sigma\upsilon\nu \frac{x_0+x_0}{2} = \sigma\upsilon\nu x_0$, θά έχουμε

$$(\eta\mu x)'_{x=x_0} = 1 \cdot \sigma\upsilon\nu x_0 = \sigma\upsilon\nu x_0$$

και αυτό για κάθε πραγματικό αριθμό x_0 , που σημαίνει ότι $(\eta\mu x)' = \sigma\upsilon\nu x$.

1.6.3 $(\sigma\upsilon\nu x)' = -\eta\mu x$.

Ανάλογα με την προηγούμενη περίπτωση έχουμε

$$(\sigma\upsilon\nu x)'_{x=x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\sigma\upsilon\nu x - \sigma\upsilon\nu x_0}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{-2\eta\mu \frac{x-x_0}{2} \eta\mu \frac{x+x_0}{2}}{x-x_0} =$$

$$= - \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\eta \mu \frac{x - x_0}{2}}{\frac{x - x_0}{2}} \lim_{x \rightarrow x_0} \eta \mu \frac{x + x_0}{2} = -1 \cdot \eta \mu \frac{x_0 + x_0}{2} = -\eta \mu x_0.$$

1.6.4. $(\epsilon \phi x)' = \frac{1}{\sigma \nu^2 x} = 1 + \epsilon \phi^2 x$, $x \neq \kappa \pi + \frac{\pi}{2}$ ($\kappa = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$).

Ἡ ἀπόδειξη τοῦ τύπου αὐτοῦ γίνεται μέ ἐφαρμογή τῆς ιδιότητος 1.5.4

$$\begin{aligned} (\epsilon \phi x)' &= \left(\frac{\eta \mu x}{\sigma \nu x} \right)' = \frac{(\eta \mu x)' \sigma \nu x - \eta \mu x (\sigma \nu x)'}{\sigma \nu^2 x} = \frac{\sigma \nu x \sigma \nu x - \eta \mu x (-\eta \mu x)}{\sigma \nu^2 x} = \\ &= \frac{\sigma \nu^2 x + \eta \mu^2 x}{\sigma \nu^2 x} = \frac{1}{\sigma \nu^2 x}. \end{aligned}$$

1.6.5. $(\sigma \phi x)' = -\frac{1}{\eta \mu^2 x} = -(1 + \sigma \phi^2 x)$, $x \neq \kappa \pi$ ($\kappa = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$).

$$\begin{aligned} (\sigma \phi x)' &= \left(\frac{\sigma \nu x}{\eta \mu x} \right)' = \frac{(\sigma \nu x)' \eta \mu x - \sigma \nu x (\eta \mu x)'}{\eta \mu^2 x} = \frac{(-\eta \mu x) \eta \mu x - \sigma \nu x \sigma \nu x}{\eta \mu^2 x} = \\ &= -\frac{\eta \mu^2 x + \sigma \nu^2 x}{\eta \mu^2 x} = -\frac{1}{\eta \mu^2 x}. \end{aligned}$$

1.6.6. $(e^x)' = e^x$.

*Ἐχομε

$$\frac{e^x - e^{x_0}}{x - x_0} = \frac{e^{(x-x_0)+x_0} - e^{x_0}}{x - x_0} = e^{x_0} \frac{e^{x-x_0} - 1}{x - x_0},$$

καί ἐπομένως, ἐπειδή σύμφωνα μέ τόν τύπο (10) τῆς § 3.3 τοῦ κεφ. V ἰσχύει

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{e^{x-x_0} - 1}{x - x_0} = 1, \text{ θά ἔχομε καί}$$

$$(e^x)'_{x=x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{e^x - e^{x_0}}{x - x_0} = e^{x_0} \cdot 1 = e^{x_0}$$

καί αὐτό ἰσχύει γιά κάθε πραγματικό ἀριθμό x_0 , πού σημαίνει ὅτι $(e^x)' = e^x$.

1.6.7 $(\log x)' = \frac{1}{x}$, $x \in (0, +\infty)$.

*Ἐχομε

$$\frac{\log x - \log x_0}{x - x_0} = \frac{\log \frac{x}{x_0}}{x - x_0} = \frac{1}{x_0} \frac{\log \frac{x}{x_0}}{\frac{x}{x_0} - 1},$$

καί ἔτσι, ἐπειδή σύμφωνα μέ τόν τύπο (11) τῆς § 3.3 τοῦ κεφ. V ἰσχύει

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\log \frac{x}{x_0}}{\frac{x}{x_0} - 1} = 1, \text{ θά ἔχομε καί}$$

$$(\log x)'_{x=x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\log x - \log x_0}{x - x_0} = \frac{1}{x_0} \cdot 1 = \frac{1}{x_0}$$

καί αὐτό ἰσχύει γιά κάθε θετικό ἀριθμό x_0 , πού σημαίνει ὅτι $(\log x)' = \frac{1}{x}$

Επειδή, σύμφωνα με τον τύπο (7) της § 3.2 του κεφ. V ισχύει

$$\log_a x = \frac{\log x}{\log a} \quad (a \neq 1), \text{ θά έχουμε}$$

$$(\log_a x)' = \frac{1}{\log a} (\log x)' = \frac{1}{\log a} \cdot \frac{1}{x} = \frac{1}{x \log a}$$

Όστε ισχύει, γενικότερα, ο παρακάτω τύπος

$$1.6.7' \quad (\log_a x)' = \frac{1}{x \log a}, \quad x \in (0, +\infty) \quad (a \neq 1).$$

1.7 Παραγωγή συνθετης συναρτήσεως. Ο ύπολογισμός της παραγωγού μιās συναρτήσεως με τή βοήθεια του όρισμού της είναι γενικά κουραστικός και πολλές φορές πρακτικά άδύνατος. Οί ιδιότητες τών παραγώγων και οί τύποι πού δόθηκαν στις προηγούμενες παραγράφους 1.5 και 1.6 μπορούν νά εφαρμοσθούν κατάλληλα γιά τόν ύπολογισμό τών παραγώγων και άλλων στοιχειωδών συναρτήσεων, όπως π.χ.

$$(\log x + \epsilon \phi x)' = (\log x)' + (\epsilon \phi x)' = \frac{1}{x} + \frac{1}{\sigma \nu \nu^{2x}}, \quad x \in \mathbb{R}^+ \text{ και } x \neq \kappa \pi + \frac{\pi}{2}$$

$$(\kappa = 0, \pm 1, \pm 2, \dots).$$

Άλλά αυτό σέ πολλές περιπτώσεις στοιχειωδών συναρτήσεων δέν είναι δυνατό όπως π.χ. γιά τή συνάρτηση πού όρίζεται από τόν τύπο $y = \sigma \nu \nu (2x + 3)$, της όποιας όμως μπορούμε σχετικά εύκολα νά ύπολογίσομε τήν παράγωγο με άπ' ευθείας εφαρμογή του όρισμού, ως εξής :

$$\begin{aligned} (\sigma \nu \nu (2x + 3))'_{x=x_0} &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\sigma \nu \nu (2x + 3) - \sigma \nu \nu (2x_0 + 3)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{-2\eta \mu (x - x_0) \eta \mu (x + x_0 + 3)}{x - x_0} = \\ &= -2 \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\eta \mu (x - x_0)}{x - x_0} \lim_{x \rightarrow x_0} \eta \mu (x + x_0 + 3) = \\ &= -2 \cdot 1 \cdot \eta \mu (x_0 + x_0 + 3) = -2\eta \mu (2x_0 + 3) \end{aligned}$$

και αυτό ισχύει γιά κάθε πραγματικό άριθμό x_0 . Άρα

$$(\sigma \nu \nu (2x + 3))' = -2\eta \mu (2x + 3).$$

Η παραπάνω συνάρτηση, της όποιας ύπολογίσαμε τήν παράγωγο, μπορεί νά θεωρηθεϊ ως σύνθεση δυό συναρτήσεων, της συναρτήσεως f με $f(x) = 2x + 3$ και του σνημιτόνου, οί παράγωγοι τών όποιών ύπολογίζονται εύκολα με τή βοήθεια τών τύπων και ιδιοτήτων τών παραγράφων 1.5 και 1.6. Είναι λοιπόν φυσικό νά αναζητηθεϊ κάποια σχέση μεταξύ της παραγώγου της σύνθετης συναρτήσεως και τών παραγώγων τών συναρτήσεων, οί όποιες τήν συνθέτουν. Η σχέση αυτή δίδεται στο έπόμενο θεώρημα.

1.7.1 ΘΕΩΡΗΜΑ. Έστω ότι $f: \Delta \rightarrow A$ και $g: A \rightarrow \mathbb{R}$ είναι δυό συναρτήσεις, όπου A και Δ είναι διαστήματα, γιά τίς όποιες ύποθέτομε ότι παραγωγίζονται. Τότε ή σύνθεσή τους $h = g \circ f$ (ή όποία, όπως ξερούμε, όρίζεται από τόν τύπο $h(x) = g[f(x)]$, $x \in \Delta$) παραγωγίζεται επίσης και μάλιστα ισχύει

$$h'(x) = g'[f(x)]f'(x).$$

Απόδειξη. "Εστω $x_0 \in \Delta$. "Ας θεωρήσουμε μία οποιαδήποτε ακολουθία $x_n, n = 1, 2, \dots$ με $x_n \in \Delta - \{x_0\} \forall n \in \mathbb{N}$ και $x_n \rightarrow x_0$, για την οποία διακρίνουμε τις παρακάτω τρεις περιπτώσεις:

1. $f(x_n) = f(x_0)$ για ένα πεπερασμένο πλήθος δεικτών. Στην περίπτωση αυτή, με διαγραφή των όρων της $x_n, n = 1, 2, \dots$ που πληροῦν τή σχέση $f(x_n) = f(x_0)$ προκύπτει μία ακολουθία $y_n, n = 1, 2, \dots$ για την οποία ισχύει $y_n \rightarrow x_0$ (βλ. παρατήρηση της § 1.4 του κεφ. III) και

$$f(y_n) \neq f(x_0) \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Τότε θά έχουμε

$$\begin{aligned} \frac{h(y_n) - h(x_0)}{y_n - x_0} &= \frac{h(y_n) - h(x_0)}{f(y_n) - f(x_0)} \cdot \frac{f(y_n) - f(x_0)}{y_n - x_0} = \\ &= \frac{g[f(y_n)] - g[f(x_0)]}{f(y_n) - f(x_0)} \cdot \frac{f(y_n) - f(x_0)}{y_n - x_0}. \end{aligned}$$

Επειδή από την υπόθεση υπάρχουν οι παράγωγοι $g'(f(x_0))$ και $f'(x_0)$, εύκολα διαπιστώνεται ότι ισχύουν και

$$\lim \frac{g[f(y_n)] - g[f(x_0)]}{f(y_n) - f(x_0)} = g'[f(x_0)], \quad \lim \frac{f(y_n) - f(x_0)}{y_n - x_0} = f'(x_0).$$

Επομένως $\lim \frac{h(y_n) - h(x_0)}{y_n - x_0} = g'[f(x_0)]f'(x_0)$ και, από την παρατήρηση της § 1.4. του κεφ. III, ισχύει επίσης

$$(3) \quad \lim \frac{h(x_n) - h(x_0)}{x_n - x_0} = g'[f(x_0)]f'(x_0).$$

2. $f(x_n) \neq f(x_0)$ για ένα πεπερασμένο πλήθος δεικτών. Στην περίπτωση αυτή, με διαγραφή των όρων της $x_n, n = 1, 2, \dots$ που πληροῦν τή σχέση $f(x_n) \neq f(x_0)$ προκύπτει μία ακολουθία $y_n, n = 1, 2, \dots$ για την οποία ισχύει $y_n \rightarrow x_0$ και

$$f(y_n) = f(x_0) \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Τότε θά έχουμε

$$f'(x_0) = \lim \frac{f(y_n) - f(x_0)}{y_n - x_0} = \lim \frac{0}{y_n - x_0} = 0,$$

και επίσης

$$\lim \frac{h(y_n) - h(x_0)}{y_n - x_0} = \lim \frac{g[f(y_n)] - g[f(x_0)]}{y_n - x_0} = \lim \frac{g[f(x_0)] - g[f(x_0)]}{y_n - x_0} = 0$$

και επομένως, σύμφωνα με την παρατήρηση της § 1.4 του κεφ. III, ισχύει επίσης

$$\lim \frac{h(x_n) - h(x_0)}{x_n - x_0} = 0.$$

"Αρα και στην περίπτωση αυτή ισχύει ο τύπος (3), γιατί τότε διαπιστώνεται ότι $f'(x_0) = 0$.

3. Καμία από τις περιπτώσεις 1 ή 2 δεν ισχύει. Με διαγραφή των όρων της $x_n, n = 1, 2, \dots$ που πληροῦν τή σχέση $f(x_n) = f(x_0)$ προκύπτει μία υποακολουθία $x_{k_n}, n = 1, 2, \dots$ της $x_n, n = 1, 2, \dots$ για την οποία ισχύει $x_{k_n} \rightarrow x_0$ (ιδιότητα 2, § 1.4.2 του κεφ. III) και $f(x_{k_n}) \neq f(x_0) \quad \forall n \in \mathbb{N}$.

Γιά τήν ύπακολουθία αυτή, ακριβώς όπως και στην περίπτωση 1, προκύπτει ότι

$$(4) \quad \lim_{x_{\nu} \rightarrow x_0} \frac{h(x_{\nu}) - h(x_0)}{x_{\nu} - x_0} = g'[f(x_0)]f'(x_0).$$

Παρόμοια, μέ διαγραφή τών όρων τής x_{ν} , $\nu = 1, 2, \dots$ πού πληροῦν τή σχέση $f(x_{\nu}) \neq f(x_0)$, προκύπτει μιὰ ύπακολουθία $x_{\mu_{\nu}}$, $\nu = 1, 2, \dots$ τής x_{ν} , $\nu = 1, 2, \dots$, γιά τήν όποία ισχύει $x_{\mu_{\nu}} \rightarrow x_0$ καί $f(x_{\mu_{\nu}}) = f(x_0) \quad \forall \nu \in \mathbb{N}$. Γιά τήν ύπακολουθία αυτή ακριβώς, όπως και στην περίπτωση 2, προκύπτει ότι

$$(5) \quad \lim_{x_{\mu_{\nu}} \rightarrow x_0} \frac{h(x_{\mu_{\nu}}) - h(x_0)}{x_{\mu_{\nu}} - x_0} = g'[f(x_0)]f'(x_0).$$

Παραπάνω διασπάσαμε τήν ακολουθία x_{ν} , $\nu = 1, 2, \dots$ σέ δύο ύπακολουθίες τής x_{ν} , $\nu = 1, 2, \dots$ καί $x_{\mu_{\nu}}$, $\nu = 1, 2, \dots$ γιά τής όποιες ισχύουν οι (4) καί (5). Από τής σχέσεις αυτές αποδεικνύεται ότι ισχύει ό τύπος (3).

Ωστε καί στίς τρεις παραπάνω περιπτώσεις αποδείξαμε ότι ισχύει ό τύπος (3), δηλαδή ότι αν x_{ν} , $\nu = 1, 2, \dots$ είναι όποιαδήποτε ακολουθία μέ $x_{\nu} \in \Delta - \{x_0\} \quad \forall \nu \in \mathbb{N}$ τότε

$$\lim_{\nu \rightarrow \infty} x_{\nu} = x_0 \Rightarrow \lim_{x_{\nu} \rightarrow x_0} \frac{h(x_{\nu}) - h(x_0)}{x_{\nu} - x_0} = g'[f(x_0)]f'(x_0),$$

δηλαδή

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{h(x) - h(x_0)}{x - x_0} = g'[f(x_0)]f'(x_0) \quad \eta \quad h'(x_0) = g'[f(x_0)] \cdot f'(x_0)$$

καί αυτό ισχύει γιά όποιοδήποτε $x_0 \in \Delta$, πού σημαίνει ότι

$$h'(x) = g'[f(x)]f'(x) \quad \forall x \in \Delta.$$

Παρατήρηση. Στην τελευταία περίπτωση, όπου ισχύουν ταυτόχρονα οι τύποι (4) καί (5), έχουμε, όπως και στη δεύτερη περίπτωση, $f'(x_0) = 0$.

Εφαρμογές:

1. $(\sin(2x + 3))' = [-\eta\mu(2x + 3)](2x + 3)' = -\eta\mu(2x + 3) \cdot 2 = -2\eta\mu(2x + 3)$.

Στό αποτέλεσμα αυτό είχαμε καταλήξει καί προηγουμένως μέ απ' ευθείας εφαρμογή τού όρισμού τής παραγώγου.

2. $(a^x)' = a^x \log a$.

Σύμφωνα μέ τόν τύπο (8) τής § 3.3 τού κεφ. V έχουμε $a^x = e^{x \log a}$ καί έπομένως

$$(a^x)' = (e^{x \log a})' = e^{x \log a} (x \log a)' = e^{x \log a} \log a = a^x \log a.$$

3. $(x^a)' = ax^{a-1}$, $x \in (0, +\infty)$.

Παρόμοια, έχουμε $x^a = e^{a \log x}$ καί έπομένως

$$(x^a)' = (e^{a \log x})' = e^{a \log x} (a \log x)' = e^{a \log x} a (\log x)' = x^a a \frac{1}{x} = ax^{a-1}.$$

Ειδικά γιά $a = \frac{1}{2}$ παίρνουμε

$$\left(x^{-\frac{1}{2}}\right)' = \frac{1}{2} x^{-\frac{1}{2}-1} = \frac{1}{2} x^{-\frac{3}{2}}, \quad \eta \tau \omicron \iota \quad (\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}.$$

$$4. (\sqrt{x^2+1})' = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}.$$

$$\text{Πραγματικά: } (\sqrt{x^2+1})' = \frac{1}{2\sqrt{x^2+1}} (x^2+1)' = \frac{1}{2\sqrt{x^2+1}} 2x = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}.$$

Γενικότερα Ισχύει ο τύπος

$$(\sqrt{f(x)})' = \frac{f'(x)}{2\sqrt{f(x)}}$$

όπως εύκολα προκύπτει από το θεώρημα 1.7.1.

Πίνακας των παραγώγων των κυριωτέρων στοιχειωδών συναρτήσεων

$f(x)$	$f'(x)$	$f(x)$	$f'(x)$
x^v	vx^{v-1}	x^a	ax^{a-1}
e^x	e^x	a^x	$a^x \log a$
$\log x$	$\frac{1}{x}$	$\log_a x$	$\frac{1}{x \log a}$
$\eta \mu x$	$\sigma \nu \eta x$	$\sigma \nu \eta x$	$-\eta \mu x$
$\epsilon \phi x$	$\frac{1}{\sigma \nu \eta^2 x}$	$\sigma \phi x$	$-\frac{1}{\eta \mu^2 x}$

2. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΣ

2.1 Η έννοια της παραγώγου μās εξυπηρετεί σε μεγάλο βαθμό στή μελέτη μιās συναρτήσεως, όχι μόνο γιατί μπορούμε νά καταρτίσουμε ταχύτερα τον πίνακα μεταβολής της, αλλά και γιατί με τή βοήθεια της παραγώγου μπορούμε νά έχουμε πιό λεπτομερή στοιχεία γιά τή συμπεριφορά του διαγράμματος της συναρτήσεως σε όλη τήν έκτασή της. Τά θεωρήματα πού ακολουθούν έρμηνεύουν τό ρόλο της παραγώγου στή μελέτη συναρτήσεως.

2.1.1 ΘΕΩΡΗΜΑ. *Αν ή συνάρτηση f παραγωγίζεται σε ένα σημείο x_0 και παρουσιάζει τοπικό ακρότατο στό σημείο αυτό, τότε ισχύει $f'(x_0) = 0$.*

Απόδειξη. Ας υποθέσουμε ότι ή συνάρτηση f παρουσιάζει τοπικό μέγιστο στό σημείο x_0 (στήν περίπτωση τοπικού ελάχιστου εργαζόμαστε ανάλογα). Τότε θά υπάρξει ένα άνοικτό διάστημα (a,b) με $x_0 \in (a,b) \subseteq \mathcal{D}(f)$ τέτοιο, ώστε νά ισχύει

$$f(x) \leq f(x_0) \quad \forall x \in (a,b).$$

Έτσι

$$\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} \leq 0 \quad \forall x \in (x_0,b) \quad \text{και} \quad \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} \geq 0 \quad \forall x \in (a,x_0)$$


και άρα, έπειδή ή f παραγωγίζεται στό σημείο x_0 , θά έχουμε

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0+0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq 0 \text{ και } f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0-0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq 0,$$

δηλαδή $f'(x_0) = 0$.

Τό αντίστροφο του παραπάνω θεωρήματος δέν ισχύει. 'Η ισότητα $f'(x_0) = 0$ μπορεί νά ισχύει, χωρίς ή συνάρτηση f νά παρουσιάζει ένα τοπικό άκρότατο στό σημείο x_0 . Αυτό π.χ. συμβαίνει στην περίπτωση πού $f(x) = x^3$, $x_0 = 0$, άφοϋ, ένω $f'(0) = (3x^2)_{x=0} = 0$, για κάθε $x > 0$ έχουμε $f(-x) = -x^3 < 0 < x^3 = f(x)$. (βλ. και σχ. 18 κεφ. II).


Γεωμετρικά ή ύπαρξη ενός τοπικού άκροτάτου τής συναρτήσεως στό σημείο x_0 σημαίνει (στην περίπτωση πού ή συνάρτηση παραγωγίζεται στό x_0) ότι ή εφαπτομένη του διαγράμματος τής f στό σημείο $P_0 = (x_0, f(x_0))$ είναι παράλληλη προς τον άξονα τών x (βλ. σχ. 76).




Σχ. 76

2.1.2. ΘΕΩΡΗΜΑ (του Rolle). Έστω f μιά συνάρτηση μέ πεδίο όρισμοϋ ένα κλειστό διάστημα $[a, b]$, ή οποία είναι συνεχής και επιπλέον παραγωγίζεται στό άνοιχτό διάστημα (a, b) . Τότε, αν $f(a) = f(b)$, ύπάρχει $x_0 \in (a, b)$ τέτοιο, ώστε $f'(x_0) = 0$.

Τό θεώρημα αυτό έρμηνεύεται γεωμετρικά (βλ. σχ. 77α) ως εξής: αν



Σχ. 77α



Σχ. 77β

μιά καμπύλη (δηλαδή τό διάγραμμα μιάς συνεχούς συναρτήσεως), πού έχει εφαπτομένη σε κάθε σημείο της, τέμνεται από μιά ευθεία παράλληλη προς τον άξονα τών x σε δύο τουλάχιστο σημεία, τότε σε ένα τουλάχιστο σημείο ή εφαπτομένη τής καμπύλης αυτής είναι παράλληλη προς τον άξονα τών x . Ειδικά στην περίπτωση πού $f(a) = f(b) = 0$, ή γεωμετρική έρμηνεία του θεωρήματος αυτού δίδεται στό σχ. 77β.

Τό θεώρημα πού ακολουθεί άποτελεί μιά γενίκευση του θεωρήματος του Rolle και είναι γνωστό ως *θεώρημα τής μέσης τιμής του διαφορικού λογισμού* ή και ως *θεώρημα τών πεπερασμένων αζήσεων*.

2.1.3. ΘΕΩΡΗΜΑ. Έστω ότι f είναι μιά συνάρτηση μέ πεδίο όρισμοϋ ένα κλειστό διάστημα $[a, b]$, ή οποία είναι συνεχής και επιπλέον παραγωγίζεται στό άνοιχτό διάστημα (a, b) . Τότε ύπάρχει $x_0 \in (a, b)$ τέτοιο, ώστε

$$f'(x_0) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$$

Ἀπόδειξη. Τό θεώρημα αὐτό προκύπτει ἄμεσα ἀπό τό θεώρημα τοῦ Rolle ἄν ἐφαρμοσθεῖ γιά τή συνάρτηση g μέ

$$g(x) = f(a) - f(x) + (x-a) \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$$

Ἡ συνάρτηση g ἱκανοποιεῖ, πραγματικά, τίς ὑποθέσεις τοῦ θεωρήματος τοῦ Rolle, γιατί αὐτή εἶναι συνεχής, παραγωγίζεται στό (a, b) καί μάλιστα


$$g'(x) = -f'(x) + \frac{f(b)-f(a)}{b-a},$$

ἐνῶ, ἐπίσης, εἶναι $g(a) = 0 = g(b)$. Ἐπομένως ὑπάρχει $x_0 \in (a, b)$ τέτοιο, ὥστε νά ἰσχύει

$$g'(x_0) = -f'(x_0) + \frac{f(b)-f(a)}{b-a} = 0,$$

$$\text{δηλαδή } f'(x_0) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}.$$

Ἡ γεωμετρική σημασία τοῦ θεωρήματος αὐτοῦ (βλ. σχ. 78) εἶναι ἡ ἑξῆς: ἄν μιὰ καμπύλη ἔχει ἐφαπτομένη σέ κάθε σημείο της, τότε σέ ἕνα τουλάχιστο σημεῖο ἡ ἐφαπτομένη τῆς καμπύλης αὐτῆς εἶναι παράλληλη πρός τήν τέμνουσα εὐθεῖα πού διέρχεται ἀπό τά ἄκρα τῆς καμπύλης.



Σχ. 78

2.1.4. ΠΟΡΙΣΜΑ. Ἐάν μιὰ συνάρτηση f παραγωγίζεται σέ ἕνα διάστημα Δ καί μάλιστα γιά κάθε $x \in \Delta$ ἰσχύει $f'(x) = 0$, τότε ἡ συνάρτηση αὐτή παίρνει στό διάστημα Δ σταθερή τιμή.

Ἀπόδειξη. Ἐστω x^* ἕνα σταθερό σημεῖο τοῦ διαστήματος Δ καί x ἕνα ἄλλο ὁποιοδήποτε σημεῖο τοῦ διαστήματος αὐτοῦ. Σύμφωνα μέ τό θεώρημα τῆς μέσης τιμῆς τοῦ διαφορικοῦ λογισμοῦ ὑπάρχει σημεῖο x_0 τέτοιο, ὥστε νά ἰσχύει

$$\frac{f(x)-f(x^*)}{x-x^*} = f'(x_0) = 0, \quad \text{ἄρα } f(x) = f(x^*) \quad \forall x \in \Delta.$$

2.1.5. ΠΟΡΙΣΜΑ. Ἐάν οἱ συναρτήσεις f καί g παραγωγίζονται στό διάστημα Δ καί μάλιστα γιά κάθε $x \in \Delta$ ἰσχύει $f'(x) = g'(x)$, τότε οἱ συναρτήσεις f καί g διαφέρουν κατά μιὰ σταθερή συνάρτηση, δηλαδή γιά κάθε $x \in \Delta$ ἰσχύει $f(x) = g(x) + c$.

Ἀπόδειξη. Γιά τή συνάρτηση $h = f - g$ παρατηροῦμε ὅτι ἰσχύει

$$h'(x) = f'(x) - g'(x) = 0 \quad \forall x \in \Delta$$

καί ἐπομένως, σύμφωνα μέ τό πόρισμα 2.1.4, ἡ h παίρνει στό διάστημα Δ σταθερή τιμή, ἔστω c . Ἐρα $f(x) = g(x) + c \quad \forall x \in \Delta$.

2.1.6. ΘΕΩΡΗΜΑ. Αν η συνάρτηση f παραγωγίζεται στο διάστημα Δ , τότε ισχύουν τα παρακάτω

$f'(x) > 0 \quad \forall x \in \Delta \Rightarrow f \uparrow \Delta$	$f'(x) < 0 \quad \forall x \in \Delta \Rightarrow f \downarrow \Delta$
$f'(x) \geq 0 \quad \forall x \in \Delta \Rightarrow f \uparrow \Delta$	$f'(x) \leq 0 \quad \forall x \in \Delta \Rightarrow f \downarrow \Delta$

Απόδειξη. Ας είναι $f'(x) > 0$ για κάθε $x \in \Delta$. Τότε, αν x_1, x_2 είναι δύο οποιαδήποτε σημεία του διαστήματος Δ με $x_1 < x_2$, θά έχουμε, από το θεώρημα της μέσης τιμής: του διαφορικού λογισμού, ότι υπάρχει $x_0 \in (x_1, x_2) \subseteq \Delta$ τέτοιο, ώστε

$$f'(x_0) = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$$

Άρα $f(x_2) - f(x_1) = f'(x_0)(x_2 - x_1) > 0$, δηλαδή $f(x_1) < f(x_2)$, πού σημαίνει ότι η f είναι γνησίως αύξουσα στο Δ . Όστε αποδείξαμε ότι

$$f'(x) > 0 \quad \forall x \in \Delta \Rightarrow f \uparrow \Delta$$

Τά υπόλοιπα συμπεράσματα του θεωρήματος εξάγονται με ανάλογο τρόπο.

2.1.7. ΘΕΩΡΗΜΑ. Έστω f μιá συνάρτηση γιά τήν όποία υπάρχει ή δεύτερη παράγωγος στο διάστημα (a, b) πού είναι και συνεχής. Τότε, αν $x_0 \in (a, b)$ με $f'(x_0) = 0$, ισχύουν:

$$f''(x_0) < 0 \Rightarrow \text{ή } f \text{ παρουσιάζει τοπικό μέγιστο στο } x_0$$

$$f''(x_0) > 0 \Rightarrow \text{ή } f \text{ παρουσιάζει τοπικό ελάχιστο στο } x_0$$

Απόδειξη. Η συνέχεια της δεύτερης παραγώγου f'' και ή ανισότητα $f''(x_0) < 0$ συνεπάγονται από τό θεώρημα 1.2.3 του κεφ. V ότι υπάρχει διάστημα (a_1, b_1) με $x_0 \in (a_1, b_1) \subseteq (a, b)$ και $f''(x) < 0 \quad \forall x \in (a_1, b_1)$. Άρα από τό θεώρημα 2.1.6 παίρνουμε ότι $f \downarrow (a_1, b_1)$ και έπομένως

$$\left. \begin{array}{l} f'(x_0) = 0 \\ f' \downarrow (a_1, x_0) \end{array} \right\} \Rightarrow f'(x) \geq f'(x_0) = 0 \quad \forall x \in (a_1, x_0] \Rightarrow f \uparrow (a_1, x_0] \\ \Rightarrow f(x) \leq f(x_0) \quad \forall x \in (a_1, x_0]$$

Παρόμοια


$$\left. \begin{array}{l} f'(x_0) = 0 \\ f' \downarrow [x_0, b_1) \end{array} \right\} \Rightarrow f'(x) \leq f'(x_0) = 0 \quad \forall x \in [x_0, b_1) \Rightarrow f \downarrow [x_0, b_1) \\ \Rightarrow f(x_0) \geq f(x) \quad \forall x \in [x_0, b_1)$$

Όστε αποδείξαμε (βλ. σχ. 79) ότι ισχύει

$$f(x) \leq f(x_0) \quad \forall x \in (a_1, b_1),$$

δηλαδή ότι ή f παρουσιάζει τοπικό μέγιστο στο σημείο x_0 .

Αν $f''(x_0) > 0$, τότε μέ εφαρμογή του παραπάνω συμπεράσματος γιά τή συνάρτηση $-f$ (γιά τήν όποία ισχύει $(-f)'(x_0) = -f'(x_0) = 0$ και $(-f)''(x_0) = -f''(x_0) < 0$) προκύπτει ότι



Σχ. 79

αυτή (ή $-f$) παρουσιάζει τοπικό μέγιστο στο σημείο x_0 , πράγμα που σημαίνει ότι ή f παρουσιάζει τοπικό ελάχιστο στο x_0 .

Έφαρμογή. Για μία εφαρμογή τῶν παραπάνω, ὡς μελετήσουμε τώρα τή διτετραγωνη τριώνυμη συνάρτηση f με $f(x) = 2x^4 - 4x^2 - 1$, τήν ὁποία μελετήσαμε καί στήν § 2.1 (έφαρμογή 3, παράδ. 1) τοῦ κεφ. II (βλ. σχ. 43).

Πρῶτα ὑπολογίζουμε τήν πρώτη καί δεύτερη παράγωγο τῆς f . Ἐτσι ἔχουμε

$$f'(x) = (2x^4)' - (4x^2)' - 0 = 8x^3 - 8x = 8x(x^2 - 1)$$

$$f''(x) = (8x^3)' - (8x)' = 24x^2 - 8.$$

Οἱ ρίζες τῆς πρώτης παραγωγῆς f' εἶναι $-1, 0, 1$ γιά τίς ὁποῖες ἰσχύουν

$$f''(-1) = 24 - 8 = 16 > 0, \quad f''(0) = -8 < 0 \quad \text{καί} \quad f''(1) = 16 > 0$$

καί ἔπομένως, σύμφωνα μέ τό θεώρημα 2.1.7, ή f παρουσιάζει τοπικό ελάχιστο στά σημεία -1 καί 1 καί τοπικό μέγιστο στο σημείο 0 .

Ἐπίσης, εὐκόλα προκύπτουν καί τά παρακάτω:

$$f'(x) < 0 \quad \forall x \in (-\infty, -1) \quad \text{καί} \quad \forall x \in (0, 1)$$


$$f'(x) > 0 \quad \forall x \in (-1, 0) \quad \text{καί} \quad \forall x \in (1, +\infty),$$

τά ὁποῖα, ἀπό τό θεώρημα 2.1.6, συνεπάγονται τά ἑξῆς:

$$f \searrow (-\infty, -1), \quad f \nearrow (-1, 0), \quad f \searrow (0, 1) \quad \text{καί} \quad f \nearrow (1, +\infty),$$

δηλαδή τά συμπεράσματα τοῦ πίνακα μεταβολῆς τῆς f τῆς § 2.1 τοῦ κεφ. II.

2.2 Κυρτές καί κοίλες συναρτήσεις. Ἐστω f μία συνάρτηση μέ πεδίο ὀρισμοῦ ἕνα διάστημα Δ , ή ὁποία παραγωγίζεται στό Δ .



Σχ. 80

Τότε, ὅπως ξέρουμε, ὑπάρχει ή ἔφαπτομένη σέ κάθε σημείο τοῦ διαγράμματός της. Ἐς θεωρήσουμε τώρα τήν περίπτωση ὅπου τό διάγραμμα τῆς συναρτήσεως f βρίσκεται πάνω ἀπό τήν ἔφαπτομένη στό ὁποιοδήποτε σημείο του P_0 (βλ. σχ. 80).


Ἐπειδή, ὅπως εἶδαμε στήν § 1.2 αὐτοῦ τοῦ κεφαλαίου, ή ἐξίσωση τῆς ἔφαπτομένης τοῦ διαγράμματος τῆς f στό σημείο $P_0 = (x_0, f(x_0))$ εἶναι ή

$$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0),$$

τό διάγραμμα τῆς f βρίσκεται πάνω ἀπό τήν ἔφαπτομένη του στό σημείο P_0 , τότε καί μόνο τότε, ἂν ἰσχύει

$$f(x) - f(x_0) - f'(x_0)(x - x_0) > 0 \quad \forall x \in \Delta - \{x_0\}.$$

Στήν παραπάνω περίπτωση, ὅπου ή τελευταία σχέση ἰσχύει γιά ὁποιοδήποτε $x_0 \in \Delta$, λέμε ὅτι ή συνάρτηση f εἶναι *κυρτή* στό Δ , ή καί ἀπλά *κυρτή*.



Σχ. 81

Ἀνάλογα, ἂν δεχθοῦμε ὅτι τό διάγραμμα τῆς f βρίσκεται κάτω ἀπό τήν ἔφαπτομένη του σέ ἕνα σημείο του P_0 (βλ. σχ. 81), θά καταλήξουμε, παρόμοια, στό συμπε-

ρασμα ότι αυτό συμβαίνει, τότε και μόνο τότε, αν για οποιοδήποτε σημείο $x_0 \in \Delta$ ισχύει

$$f(x) - f(x_0) - f'(x_0)(x - x_0) < 0 \quad \forall x \in \Delta - \{x_0\}.$$

Στήν περίπτωση αυτή λέμε ότι η f είναι *κοίλη* στο Δ ή απλά *κοίλη*.

Ώστε


$$f \text{ κυρτή στο } \Delta \iff \underset{\text{ορισ}}{f(x) - f(y) - f'(y)(x-y)} > 0 \quad \forall x, y \text{ στο } \Delta \text{ με } x \neq y$$

$$f \text{ κοίλη στο } \Delta \iff \underset{\text{ορισ}}{f(x) - f(y) - f'(y)(x-y)} < 0 \quad \forall x, y \text{ στο } \Delta \text{ με } x \neq y$$


Παραδείγματα:

1. Η συνάρτηση f με $f(x) = x^2$ είναι κυρτή. Πραγματικά, έχουμε

$$f(x) - f(y) - f'(y)(x - y) = x^2 - y^2 - 2y(x - y) = x^2 - y^2 - 2xy + 2y^2 = x^2 - 2xy + y^2 = (x - y)^2 > 0 \quad \forall x \neq y \text{ (βλ. σχ. 82)}.$$



Σχ. 82 $y = x^2$



Σχ. 83 $y = -x^2 + 2x - 2$

2. Η συνάρτηση f με $f(x) = -x^2 + 2x - 2$ είναι κοίλη. Πραγματικά, έχουμε

$$f(x) - f(y) - f'(y)(x - y) = -x^2 + 2x - 2 - (-y^2 + 2y - 2) - (-2y + 2)(x - y) = -x^2 + 2x - 2 + y^2 - 2y + 2 + 2yx - 2x - 2y^2 + 2y = -x^2 + 2xy - y^2 = -(x - y)^2 < 0 \quad \forall x \neq y \text{ (βλ. σχ. 83)}.$$


3. Η συνάρτηση f με $f(x) = x^3$ είναι κοίλη στο $(-\infty, 0)$ και κυρτή στο $(0, +\infty)$. Πραγματικά, έχουμε

$$f(x) - f(y) - f'(y)(x - y) = x^3 - y^3 - 3y^2(x - y) = (x - y)(x^2 + xy + y^2) - 3y^2(x - y) = (x - y)(x^2 + xy - 2y^2) = (x - y)^2(x + 2y)$$

και επομένως

$$f(x) - f(y) - f'(y)(x - y) < 0 \quad \forall x, y \text{ στο } (-\infty, 0) \text{ με } x \neq y$$

$$\text{και} \quad f(x) - f(y) - f'(y)(x - y) > 0 \quad \forall x, y \text{ στο } (0, +\infty) \text{ με } x \neq y.$$




Σχ. 84 $y = x^3$


Στό τελευταίο από τα παραπάνω παραδείγματα παρατηρούμε ότι η συνάρτηση f με $f(x) = x^3$ είναι κοίλη αριστερά του 0 και κυρτή δεξιά του 0

(βλ. σχ. 84). Αυτό το έκφραζουμε λέγοντας ότι η συνάρτηση παρουσιάζει καμπή στο 0.

Γενικά, λέμε ότι μία συνάρτηση f που είναι παραγωγίσιμη σε ένα άνοικτο διάστημα (a,b) παρουσιάζει καμπή στο σημείο $x_0 \in (a,b)$ τότε και μόνο τότε, αν αυτή είναι κοίλη στο (a, x_0) και κυρτή στο (x_0, b) ή αν είναι κυρτή στο (a, x_0) και κοίλη στο (x_0, b) (βλ. σχ. 85 και 86). Το αντίστοιχο σημείο $P_0 = (x_0, f(x_0))$ του διαγράμματος της συναρτήσεως ονομάζεται τότε *σημείο καμπής* του διαγράμματος αυτού. Στην περίπτωση που το σημείο P_0 είναι σημείο καμπής, ή εφαιπτομένη του γραφήματος της f στο σημείο αυτό διαπερνά το γράφημα, όπως φαίνεται και στα σχήματα 85 και 86.



Σχ. 85



Σχ. 86

2.2.1. ΘΕΩΡΗΜΑ. "Εστω f μία συνάρτηση για την οποία υπάρχει η δεύτερη παράγωγος στο διάστημα (a,b) . Τότε ισχύουν:

$$f''(x) > 0 \quad \forall \quad x \in (a,b) \Rightarrow f \text{ κυρτή στο } (a,b)$$

$$f''(x) < 0 \quad \forall \quad x \in (a,b) \Rightarrow f \text{ κοίλη στο } (a,b).$$

*Απόδειξη. "Αν x, y είναι δυο οποιαδήποτε σημεία του διαστήματος (a,b) με $x \neq y$, τότε, σύμφωνα με το θεώρημα της μέσης τιμής του διαφορικού λογισμού υπάρχει σημείο x_0 μεταξύ των x και y τέτοιο, ώστε

$$f(x) - f(y) = f'(x_0)(x - y).$$

*Άρα ισχύει και

$$f(x) - f(y) - f'(y)(x - y) = [f'(x_0) - f'(y)](x - y),$$

τό οποίο, με εφαρμογή πάλι του θεωρήματος της μέσης τιμής του διαφορικού λογισμού για την f' , μας δίνει

$$(6) \quad f(x) - f(y) - f'(y)(x - y) = f''(y_0)(x_0 - y)(x - y),$$

όπου το y_0 βρίσκεται μεταξύ των x_0 και y . Έπειδή το x_0 βρίσκεται μεταξύ των x και y , ισχύει $(x_0 - y)(x - y) > 0$. Έπομένως η σχέση (6) στην πρώτη περίπτωση όπου $f''(x) > 0 \quad \forall \quad x \in (a,b)$, συνεπάγεται ότι

$$f(x) - f(y) - f'(y)(x - y) > 0$$

δηλαδή ότι η f είναι κυρτή στο (a,b) , ενώ στη δεύτερη περίπτωση όπου $f''(x) < 0 \quad \forall \quad x \in (a,b)$, συνεπάγεται ότι

$$f(x) - f(y) - f'(y)(x - y) < 0,$$

δηλαδή ότι η f είναι κοίλη στο (a,b) .

Εφαρμογές:

1. Η συνάρτηση f με $f(x) = \gamma \sqrt{\alpha^2 - x^2}$, $\alpha > 0$ είναι κοίλη για $\gamma > 0$ και κυρτή για $\gamma < 0$. Πραγματικά: Έχουμε

$$f'(x) = \gamma \frac{1}{2\sqrt{\alpha^2 - x^2}} (\alpha^2 - x^2)' = \gamma \frac{1}{2\sqrt{\alpha^2 - x^2}} (-2x) = -\gamma \frac{x}{\sqrt{\alpha^2 - x^2}}$$

και

$$f''(x) = -\gamma \frac{(x)' \sqrt{\alpha^2 - x^2} - x (\sqrt{\alpha^2 - x^2})'}{\alpha^2 - x^2} = -\gamma \frac{\sqrt{\alpha^2 - x^2} - x \frac{(-2x)}{2\sqrt{\alpha^2 - x^2}}}{\alpha^2 - x^2} =$$
$$= -\gamma \frac{\alpha^2}{(\alpha^2 - x^2) \sqrt{\alpha^2 - x^2}}$$

Επομένως για $\gamma > 0$, έχουμε

$$f''(x) < 0 \quad \forall x \in (-\alpha, \alpha), \text{ άρα } f \text{ κοίλη στο } (-\alpha, \alpha),$$

ενώ για $\gamma < 0$, έχουμε

$$f''(x) > 0 \quad \forall x \in (-\alpha, \alpha), \text{ άρα } f \text{ κυρτή στο } (-\alpha, \alpha)$$

(βλ. σχ. 45 και 46, § 3.2 του κεφ. II).

2. Η συνάρτηση f με $f(x) = \gamma \sqrt{x^2 - \alpha^2}$, $\alpha > 0$, για $\gamma > 0$ είναι κοίλη στα διαστήματα $(-\infty, -\alpha)$ και $(\alpha, +\infty)$, ενώ για $\gamma < 0$ είναι κυρτή στα $(-\infty, -\alpha)$ και $(\alpha, +\infty)$, (βλ. σχ. 55 και 56, § 3.3 του κεφ. II). Πραγματικά: Έχουμε

$$f'(x) = \gamma \frac{(x^2 - \alpha^2)'}{2\sqrt{x^2 - \alpha^2}} = \gamma \frac{2x}{2\sqrt{x^2 - \alpha^2}} = \gamma \frac{x}{\sqrt{x^2 - \alpha^2}}$$

και

$$f''(x) = \gamma \frac{(x)' \sqrt{x^2 - \alpha^2} - x (\sqrt{x^2 - \alpha^2})'}{x^2 - \alpha^2} = \gamma \frac{\sqrt{x^2 - \alpha^2} - x \frac{x}{\sqrt{x^2 - \alpha^2}}}{x^2 - \alpha^2} =$$
$$= -\gamma \frac{\alpha^2}{(x^2 - \alpha^2) \sqrt{x^2 - \alpha^2}}$$

Επομένως για $\gamma > 0$, έχουμε

$$f''(x) < 0 \quad \forall x \in (-\infty, -\alpha) \text{ και } \forall x \in (\alpha, +\infty)$$

και για $\gamma < 0$, έχουμε

$$f''(x) > 0 \quad \forall x \in (-\infty, -\alpha) \text{ και } \forall x \in (\alpha, +\infty)$$


2.3. Άσύμπτωτες. Άς θεωρήσουμε μία συνάρτηση f όρισμένη σ' ένα διάστημα της μορφής $(\alpha, +\infty)$. Μία ευθεία με εξίσωση $y = ax + \beta$ ονομάζεται *άσύμπτωτη του διαγράμματος της f* (βλ. σχ. 87), αν ισχύει

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - ax - \beta] = 0.$$

Από τή σχέση αυτή προκύπτουν οι τύποι:

$$\alpha = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} \text{ και } \beta = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - \alpha x].$$

Πραγματικά: ό τύπος $\beta = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - \alpha x]$




Σχ. 87

είναι φανερός, ενώ ο άλλος προκύπτει ως έξης:


$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{f(x)}{x} - \alpha \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x) - \alpha x}{x} = \frac{\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - \alpha x)}{\lim_{x \rightarrow +\infty} x} = \frac{\beta}{+\infty} = 0$$

δηλαδή $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \alpha$.

Από τὰ παραπάνω φαίνεται ότι ο άξονας τῶν x , δηλαδή ή εὐθεία μέ έξίσωση $y = 0$ ($\alpha = \beta = 0$), είναι ασύμπτωτη τοῦ διαγράμματος οποιασδήποτε μηδενικής συναρτήσεως γιά $x \rightarrow +\infty$. Π.χ. τούτο φαίνεται στά σχ. 88 καί 89 γιά τίς συναρτήσεις πού όρίζονται άπ' τούς τύπους $y = \frac{1}{x}$ καί $y = \frac{1}{x} \eta\mu x$, οι όποίες, όπως γνωρίζουμε, είναι μηδενικές γιά $x \rightarrow +\infty$.



Σχ. 88 $y = \frac{1}{x}$



Σχ. 89 $y = \frac{1}{x} \eta\mu x$

Παρόμοια, στην περίπτωση πού παίρνουμε τή συνάρτηση f όρισμένη σ' ένα διάστημα τής μορφής $(-\infty, \alpha)$, λέμε ότι ή εὐθεία μέ έξίσωση $y = \alpha x + \beta$ είναι ασύμπτωτη τοῦ διαγράμματος τής f , άν ισχύει

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - \alpha x - \beta] = 0.$$

Παρόμοια τότε, έχουμε

$$\beta = \beta + 0 = \beta + \lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - \alpha x - \beta] = \lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - \alpha x]$$

καί

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{f(x)}{x} - \alpha \right) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x) - \alpha x}{x} = \frac{\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - \alpha x)}{\lim_{x \rightarrow -\infty} x} = \frac{\beta}{-\infty} = 0$$

δηλαδή


$$\alpha = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} \text{ καί } \beta = \lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - \alpha x]$$

Είναι λοιπόν φανερό ότι ο άξονας τῶν x είναι ασύμπτωτη τοῦ διαγράμματος οποιασδήποτε μηδενικής συναρτήσεως γιά $x \rightarrow -\infty$. Αυτό, π.χ., φαίνεται στά


σχ. 88 και 89, όπου οι αντίστοιχες συναρτήσεις είναι μηδενικές για $x \rightarrow -\infty$.

Τέλος, αν για τη συνάρτηση f υποθέσουμε ότι είναι ορισμένη σ' ένα τουλάχιστο ανοικτό διάστημα (a,b) (a,b πραγματικοί αριθμοί), τότε λέμε ότι η ευθεία με εξίσωση $x = a$ είναι (κατακόρυφη) *άσύμπτωτη του διαγράμματος* της f , αν ισχύει $\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = +\infty$ ή $-\infty$ (βλ. σχ. 90 και 91), ενώ λέμε ότι η


ευθεία με εξίσωση $x = b$ είναι (κατακόρυφη) *άσύμπτωτη του διαγράμματος* της f αν ισχύει $\lim_{x \rightarrow b-0} f(x) = +\infty$ ή $-\infty$ (βλ. σχ. 93 και 94).




Σχ. 90



Σχ. 91



Σχ. 92



Σχ. 93

Π.χ. στο σχ. 88 ο άξονας των y είναι ευθεία άσύμπτωτη του διαγράμματος, ενώ, αντίθετα, στο σχ. 89 δεν συμβαίνει αυτό.

2.4 Έφαρμογές στη μελέτη συναρτήσεως. Τά συμπεράσματα που βγάλαμε παραπάνω μᾶς επιτρέπουν νά μελετήσουμε μιᾶ συνάρτηση μέ τή βοήθεια τῆς πρώτης καί δευτέρας παραγώγου τῆς ἐξετάζοντας μόνο τή μεταβολή τοῦ προσήμου τους. Ἔτσι, ὄχι μόνο μποροῦμε νά καθορίσουμε τοπικά (κατά διαστήματα) τό εἶδος τῆς μονοτονίας (ἀπό τό πρόσημο τῆς πρώτης παραγώγου, σύμφωνα μέ τό θεώρημα 2.1.6), ἀλλά καί τό ἄν ἡ συνάρτηση εἶναι κυρτή ἢ κοίλη (ἀπό τό πρόσημο τῆς δευτέρας παραγώγου, σύμφωνα μέ τό θεώρημα 2.2.1). Ἐπίσης ὁ καθορισμός τῶν σημείων, ὅπου ἡ συνάρτηση παρουσιάζει τοπικά ἀκρότατα ἢ καμπή, εἶναι εὐχερής, ἐνῶ ὁ καθορισμός τῶν ἀσυμπτῶτων διευκολύνει στή χάραξη τοῦ γραφήματός τῆς. Στά παραδείγματα που ἀκολουθοῦν γίνεται σαφής ἡ τεχνική τῆς μελέτης μιᾶς συναρτήσεως

2.4.1 Ἡ συνάρτηση f μέ $f(x) = \frac{1}{2} x^2 (x-3)$. Ἔχουμε


$$f(x) = \frac{1}{2} x^2 (x-3) \quad \text{ρίζες τῆς } f \quad : \quad 0, 3$$

$$f'(x) = \frac{3}{2} x (x-2) \quad \text{ρίζες τῆς } f' \quad : \quad 0, 2$$

$$f''(x) = 3(x-1) \quad \text{ρίζα τῆς } f'' \quad : \quad 1.$$

Σχηματίζουμε τόν παρακάτω πίνακα διατάσσοντας τίς ρίζες τῶν f , f' , f'' πάνω σ' ἕναν ἄξονα καί σημειώνουμε πάνω στό ἀντίστοιχα διαστήματα τό πρόσημο τῶν συναρτήσεων f' , f'' καί f . Τέλος, ἀπό τά στοιχεῖα αὐτά ἐξάγουμε, στήν τελευταία γραμμή τοῦ πίνακα, τά συμπεράσματά μας γιά τή μονοτονία τῆς f καί γιά τό ἄν αὐτή εἶναι κυρτή ἢ κοίλη. Ἀκόμη, σημειώνουμε καί τά σημεία,

όπου η συνάρτηση f παρουσιάζει καμπή (κ), τοπικό μέγιστο (τ.μ.) και τοπικό ελάχιστο (τ.ε). Κάτω άκριβώς από τον πίνακα αυτό χαράζουμε το διάγραμμα της συναρτήσεως (βλ. σχ. 94).



Σχ. 94 $y = \frac{1}{2} x^2(x-3)$

Στήν περίπτωση της παραπάνω συναρτήσεως, είναι εύκολο νά δοῦμε ότι δέν υπάρχουν ασύμπτωτες, γιατί $\lim_{x \rightarrow \pm \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm \infty} \frac{1}{2} x(x-3) = +\infty$.

2.4.2 Η συνάρτηση f με $f(x) = e^{-\frac{1}{x}}$. Έχουμε

$$f'(x) = \frac{e^{-\frac{1}{x}}}{x^2} \quad \text{και} \quad f''(x) = \frac{1-2x}{x^4} e^{-\frac{1}{x}}$$

Έπίσης

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{-\frac{1}{x}}}{x} = \frac{\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-\frac{1}{x}}}{\lim_{x \rightarrow +\infty} x} = \frac{1}{+\infty} = 0 \quad \text{και}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - 0 \cdot x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-\frac{1}{x}} = 1.$$


*Αρα η ευθεία με εξίσωση $y = 0x + 1 = 1$ είναι (οριζόντια) ασύμπτωτη (για $x \rightarrow -\infty$, βρίσκουμε πάλι την ίδια ασύμπτωτη).

Έπειδή η συνάρτηση f δέν είναι ορισμένη στο σημείο 0, η εύρεση τών οριακών τιμών $\lim_{x \rightarrow -0} f(x)$ και $\lim_{x \rightarrow +0} f(x)$ μās διευκολύνει στή χάραξη του διαγράμματος. Στήν προκειμένη περίπτωση υπολογίζεται ότι

$$\lim_{x \rightarrow -0} e^{-\frac{1}{x}} = +\infty \quad \text{καί} \quad \lim_{x \rightarrow +0} e^{-\frac{1}{x}} = 0$$

καί ἄρα ὁ ἄξονας τῶν y εἶναι (κατακόρυφη) ἀσύμπτωτη (βλ. σχ. 95).

$f'(x)$	$-\infty$	0	$\frac{1}{2}$	$+\infty$
$f''(x)$	+	+	0	-
$f(x)$	+	+	+	+
	↑ Κυρτή		↑ Κυρτή	
			↓ Κοίτη	



Σχ. 95 $y = e^{-\frac{1}{x}}$

2.4.3 Ἡ συνάρτηση f μέ $f(x) = x + \frac{1}{x}$. Ἔχουμε:

$$f'(x) = 1 - \frac{1}{x^2}, \quad \text{ρίζες τῆς } f' : -1, 1$$

$$f''(x) = \frac{2}{x^3}.$$

Ἐπίσης

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x^2}\right) = 1 \quad \text{καί} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - 1 \cdot x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0.$$

Ἄρα, ἡ εὐθεία μέ ἐξίσωση $y = 1 \cdot x + 0 = x$ εἶναι ἀσύμπτωτη (γιά $x \rightarrow -\infty$ βρίσκουμε πάλι τήν ἴδια ἀσύμπτωτη). Ἐπειδή ἡ συνάρτηση f δέν εἶναι ὀρισμένη στό 0, ὑπολογίζουμε τίς ὀριακές τιμές


$$\lim_{x \rightarrow -0} f(x) = \lim_{x \rightarrow -0} \left(x + \frac{1}{x}\right) = 0 + (-\infty) = -\infty$$

καί

$$\lim_{x \rightarrow +0} f(x) = \lim_{x \rightarrow +0} \left(x + \frac{1}{x}\right) = 0 + (+\infty) = +\infty.$$

Ἄρα καί ὁ ἄξονας τῶν y εἶναι (κατακόρυφη) ἀσύμπτωτη.

$f'(x)$	$-\infty$		-1	0	1	$+\infty$
$f''(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$		$-$	-2	$-$	$+2$	$+$



Σχ. 96 $y = x + \frac{1}{x}$

3. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΟΡΙΑΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕΣ ΜΟΡΦΕΣ

3.1 Άπροσδιόριστες μορφές του τύπου $\frac{0}{0}$. Για τη συνάρτηση h με

$h(x) = \frac{\log(1+x)}{e^x - 1}$ παρατηρούμε ότι ισχύει $\lim_{x \rightarrow 0} \log(1+x) = \log 1 = 0$ και

$\lim_{x \rightarrow 0} (e^x - 1) = e^0 - 1 = 0$ και έπομένως για να υπολογίσουμε την όριακή τιμή

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1+x)}{e^x - 1}$ δέν μπορούμε να εφαρμόσουμε τον τύπο

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow 0} f(x)}{\lim_{x \rightarrow 0} g(x)}$$

(ή πράξη $\frac{0}{0}$, όπως ξέρουμε, δέν είναι έπιτρεπτή). Όμως, μπορούμε να υπολογίσουμε την όριακή αυτή τιμή ως εξής:

$$\frac{\log(1+x)}{e^x - 1} = \frac{\log(1+x) - \log 1}{e^x - e^0} = \frac{\frac{\log(1+x) - \log 1}{x}}{\frac{e^x - e^0}{x}} \quad \forall x > -1 \text{ με } x \neq 0$$

και έπομένως

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1+x)}{e^x - 1} = \frac{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1+x) - \log 1}{x}}{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^0}{x}} = \frac{(\log(1+x))'_{x=0}}{(e^x)'_{x=0}} = \frac{1}{e^0} = 1.$$

*Οριακές τιμές όπως ή παραπάνω, δηλαδή όριακές τιμές τής μορφής:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)}, \text{ όπου } \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0 = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$$

ονομάζονται *άπροσδιόριστες μορφές του τύπου* $\frac{0}{0}$. Ακολουθώντας τήν ίδια τεχνική, όπως παραπάνω για τον ύπολογισμό τής όριακής τιμής $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1+x)}{e^x - 1}$ μπορούμε νά αποδείξουμε τό έξής θεώρημα:

3.1.1. ΘΕΩΡΗΜΑ. *Εστω ότι f και g είναι συναρτήσεις μέ κοινό πεδίο όρισμοῦ ένα σύνολο τής μορφής $(a, x_0]$ ή $[x_0, b)$ ή $(a, x_0] \cup [x_0, b) = (a, b)$ οι όποιες παραγωγίζονται στό σημείο x_0 και μάλιστα $g'(x_0) \neq 0$. Τότε, αν $f(x_0) = 0 = g(x_0)$, ισχύει

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(x_0)}{g'(x_0)}$$

*Απόδειξη. *Έχουμε

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x) - f(x_0)}{g(x) - g(x_0)} = \frac{\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}}{\frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0}} \quad x \neq x_0,$$

και άρα ισχύει και

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}}{\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0}} = \frac{f'(x_0)}{g'(x_0)}$$

Σημείωση. Παραπάνω, στήν περίπτωση πού τό κοινό πεδίο όρισμοῦ τῶν f και g είναι τής μορφής $(a, x_0]$, μέ τό σύμβολο $\lim_{x \rightarrow x_0}$ έννοούμε τό $\lim_{x \rightarrow x_0-0}$. Παρόμοια, στήν περίπτωση πού τό κοινό πεδίο όρισμοῦ τῶν f και g είναι τής μορφής $[x_0, b)$, μέ τό $\lim_{x \rightarrow x_0}$ έννοούμε τό $\lim_{x \rightarrow x_0+0}$.

***Εφαρμογές:**

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{1 - e^{-x}} = 1$. Παρατηρούμε ότι αυτό είναι μία άπροσδιόριστη μορφή του τύπου $\frac{0}{0}$. *Έχουμε $(x)' = 1$ και $(1 - e^{-x})' = 0 - e^{-x}(-x)' = -e^{-x}(-1) = e^{-x}$, και άρα από τό παραπάνω θεώρημα παίρνουμε

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{1 - e^{-x}} = \frac{(x)'_{x=0}}{(1 - e^{-x})'_{x=0}} = \frac{1}{e^{-0}} = \frac{1}{1} = 1.$$

2. $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{1 + \sin x}{x - \pi} = 0$. Παρατηρούμε ότι αυτό είναι μία άπροσδιόριστη μορφή του τύπου $\frac{0}{0}$. *Έχουμε $(1 + \sin x)' = 0 + (\sin x)' = \cos x$ και $(x - \pi)' = 1 - 0 = 1$. *Άρα, από τό

παραπάνω θεώρημα παίρνουμε

$$\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{1 + \sin x}{x - \pi} = \frac{(1 + \sin x)'_{x=\pi}}{(x - \pi)'_{x=\pi}} = \frac{-\eta\mu\pi}{1} = \frac{-0}{1} = 0.$$

Έκτός από τό θεώρημα 3.1.1, πού είναι γνωστό στή βιβλιογραφία ως κανόνας του *de l' Hospital*, ισχύει καί τό παρακάτω θεώρημα.

3.1.2. ΘΕΩΡΗΜΑ. "Εστω ότι f καί g είναι συναρτήσεις μέ κοινό πεδίο ορισμού ένα σύνολο τής μορφής (a, x_0) ή (x_0, b) ή $(a, x_0) \cup (x_0, b)$, οι οποίες παραγωγίζονται. Τότε, αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0 = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$, ισχύει

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = l \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = l.$$

Στό θεώρημα αυτό τό x_0 μπορεί νά είναι καί ένα από τά σύμβολα $+\infty$ ή $-\infty$ καί ἄρα, τότε, τό κοινό πεδίο ορισμού τῶν f καί g θά είναι τής μορφής $(a, +\infty)$ ή $(-\infty, b)$ ἀντίστοιχα, ἐνῶ ἡ τρίτη περίπτωση φυσικά ἀποκλείεται.

Ἐφαρμογές:

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{e^{-x} + x - 1} = 2$. Παρατηρούμε ότι αυτό είναι ἀπροσδιόριστη μορφή τοῦ τύπου $\frac{0}{0}$. Ἐχουμε $(x^2)' = 2x$, $(e^{-x} + x - 1)' = e^{-x}(-x)' + 1 - 0 = e^{-x}(-1) + 1 = 1 - e^{-x}$ καί παρατηρούμε ότι ἡ ὀριακή τιμή $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x^2)'}{(e^{-x} + x - 1)'} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{1 - e^{-x}} = 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{1 - e^{-x}}$ είναι ἐπίσης μιά ἀπροσδιόριστη μορφή τοῦ τύπου $\frac{0}{0}$. Αὐτή μάλιστα ὑπολογίσθηκε στήν παραπάνω ἐφαρμογή 1 καί ἄρα, ἀπό τό παραπάνω θεώρημα 3.1.2, ισχύει

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{e^{-x} + x - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x^2)'}{(e^{-x} + x - 1)'} = 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{1 - e^{-x}} = 2 \cdot 1 = 2.$$

2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \eta\mu x}{x^2} = 0$. Παρατηρούμε ότι αυτό είναι μιά ἀπροσδιόριστη μορφή τοῦ τύπου $\frac{0}{0}$. Ἐχουμε $(x - \eta\mu x)' = 1 - \sigma\upsilon\nu x$, $(x^2)' = 2x$ καί παρατηρούμε ότι ἡ ὀριακή τιμή

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x - \eta\mu x)'}{(x^2)'} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sigma\upsilon\nu x}{2x}$$

είναι ἐπίσης μιά ἀπροσδιόριστη μορφή τοῦ τύπου $\frac{0}{0}$. Αὐτή, ἀπό τό θεώρημα 3.3.1, ὑπολογίζεται ότι είναι ἴση μέ $\frac{(1 - \sigma\upsilon\nu x)'_{x=0}}{(2x)'_{x=0}} = \frac{\eta\mu 0}{2} = \frac{0}{2} = 0$,

δηλαδή ισχύει $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x - \eta\mu x)'}{(x^2)'} = 0$. Ἄρα, σύμφωνα μέ τό θεώρημα 3.1.2 παίρνουμε καί

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \eta\mu x}{x^2} = 0.$$

3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log \frac{x-1}{x}}{\frac{1}{x}} = -1$. Παρατηρούμε ότι ισχύει $\lim_{x \rightarrow +\infty} \log \frac{x-1}{x} = \log \left(\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x-1}{x} \right) =$

$= \log 1 = 0$ και επίσης $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$, δηλαδή ότι η όριακή τιμή $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log \frac{x-1}{x}}{\frac{1}{x}}$ είναι

μιά άπροσδιόριστη μορφή του τύπου $\frac{0}{0}$. Έπομένως, με τη βοήθεια του θεωρήματος 3.1.2 έχουμε

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log \frac{x-1}{x}}{\frac{1}{x}} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\left(\log \frac{x-1}{x}\right)'}{\left(\frac{1}{x}\right)'} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{x}{x-1} \left(\frac{x-1}{x}\right)'}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{x}{x-1} \cdot \frac{1}{x^2}}{-\frac{1}{x^2}} = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{1-x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\frac{1}{x} - 1} = \frac{1}{0-1} = -1. \end{aligned}$$

3.2 Άπροσδιόριστες μορφές του τύπου $\frac{+\infty}{+\infty}$. Όριακές τιμές της μορφής

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)}, \text{ όπου } \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$$

ονομάζονται *άπροσδιόριστες μορφές του τύπου $\frac{+\infty}{+\infty}$* . Τις άπροσδιόριστες μορφές του τύπου αυτού μπορούμε να τις υπολογίσουμε με τη βοήθεια του παρακάτω θεωρήματος, που είναι ανάλογο προς το θεώρημα 3.1.2.

3.2.1. ΘΕΩΡΗΜΑ. Έστω ότι f και g είναι συναρτήσεις με κοινό πεδίο ορισμού ένα σύνολο της μορφής (a, x_0) ή (x_0, b) ή $(a, x_0) \cup (x_0, b)$, και ότι παραγωγίζονται. Τότε αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty = \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$, ισχύει

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = l \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = l.$$

Στό θεώρημα αυτό μπορεί, επίσης, τό x_0 νά είναι ένα από τά σύμβολα $+\infty$ ή $-\infty$.

Εφαρμογές:

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log x}{x} = 0$. Παρατηρούμε ότι αυτό είναι μιά άπροσδιόριστη μορφή του τύπου $\frac{+\infty}{+\infty}$, γιατί $\lim_{x \rightarrow +\infty} \log x = +\infty = \lim_{x \rightarrow +\infty} x$. Άρα, από τό θεώρημα 3.2.1 έχουμε

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log x}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\log x)'}{(x)'} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{x}}{1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0.$$

2. $\lim_{x \rightarrow +0} \frac{e^{\frac{1}{x}}}{\log x} = -\infty$. Παρατηρούμε ότι $\lim_{x \rightarrow +0} \frac{e^{\frac{1}{x}}}{\log x} = -\lim_{x \rightarrow +0} \frac{e^{\frac{1}{x}}}{-\log x}$ και

ἀκόμη ὅτι ἡ ὁριακὴ τιμὴ $\lim_{x \rightarrow +0} \frac{e^{\frac{1}{x}}}{-\log x}$ εἶναι μιὰ ἀπροσδιόριστη μορφή τοῦ τύπου $\frac{+\infty}{+\infty}$

* Ἄρα ἔχουμε

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +0} \frac{e^{\frac{1}{x}}}{-\log x} &= \lim_{x \rightarrow +0} \frac{\left(e^{\frac{1}{x}}\right)'}{\left(-\log x\right)'} = \lim_{x \rightarrow +0} \frac{e^{\frac{1}{x}} \left(-\frac{1}{x^2}\right)}{-\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow +0} \frac{e^{\frac{1}{x}}}{x} = \\ &= \lim_{x \rightarrow +0} \frac{1}{x} \cdot \lim_{x \rightarrow +0} e^{\frac{1}{x}} = (+\infty)(+\infty) = +\infty \end{aligned}$$

καὶ ἐπομένως

$$\lim_{x \rightarrow +0} \frac{e^{\frac{1}{x}}}{\log x} = - \lim_{x \rightarrow +0} \frac{e^{\frac{1}{x}}}{-\log x} = -(+\infty) = -\infty.$$

3.3 Ἀπροσδιόριστες μορφές τῶν τύπων $+\infty - (+\infty)$ καὶ $0(+\infty)$.

3.3.1 Ἀπροσδιόριστες μορφές τοῦ τύπου $+\infty - (+\infty)$ εἶναι ὁριακὲς τιμὲς τῆς μορφῆς:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) - g(x)], \text{ ὅπου } \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x).$$

Οἱ ἀπροσδιόριστες μορφές τοῦ τύπου αὐτοῦ ἀνάγονται σὲ ἀπροσδιόριστες μορφές τοῦ τύπου $\frac{0}{0}$. Πραγματικά· ἂν $F = \frac{1}{f}$ καὶ $G = \frac{1}{g}$, τότε παρατηροῦμε ὅτι

$$\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) - g(x)] = \lim_{x \rightarrow x_0} \left[\frac{1}{F(x)} - \frac{1}{G(x)} \right] = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{G(x) - F(x)}{F(x)G(x)}$$

* Ἄρα, ἐπειδὴ

$$\lim_{x \rightarrow x_0} F(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{f(x)} = \frac{1}{+\infty} = 0 \text{ καὶ } \lim_{x \rightarrow x_0} G(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{g(x)} = \frac{1}{+\infty} = 0,$$

συμπεραίνουμε ὅτι ἡ ὁριακὴ τιμὴ $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{G(x) - F(x)}{F(x)G(x)}$ εἶναι μιὰ ἀπροσδιόριστη μορφή τοῦ τύπου $\frac{0}{0}$.

Παράδειγμα: $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\log(1+x^2)} - \frac{1}{x^2} \right) = \frac{1}{2}$. Πραγματικά·

* Ἄρα

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\log(1+x^2)} - \frac{1}{x^2} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - \log(1+x^2)}{x^2 \log(1+x^2)} \text{ καὶ ἡ τελευταία αὐτή}$$

ὁριακὴ τιμὴ εἶναι μιὰ ἀπροσδιόριστη μορφή τοῦ τύπου $\frac{0}{0}$, γιατί

$$\lim_{x \rightarrow 0} (x^2 - \log(1+x^2)) = 0 = \lim_{x \rightarrow 0} (x^2 \log(1+x^2)).$$

Ἄρα

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - \log(1+x^2)}{x^2 \log(1+x^2)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x^2 - \log(1+x^2))'}{(x^2 \log(1+x^2))'} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{\frac{2x}{1+x^2} x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{\frac{2x}{1+x^2} (x^2 + (1+x^2) \log(1+x^2))}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{x^2 + (1+x^2) \log(1+x^2)} \text{ (ἀπροσδιόριστη μορφή } \frac{0}{0} \text{)} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x^2)'}{(x^2 + (1+x^2) \log(1+x^2))'} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{2x(2 + \log(1+x^2))} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2 + \log(1+x^2)} =$$

$$= \frac{1}{2+0} = \frac{1}{2}.$$

3.3.2 Άπροσδιόριστες μορφές του τύπου $0(+\infty)$ είναι όριακές τιμές της μορφής:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) g(x), \text{ όπου } \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0 \text{ και } \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = +\infty.$$

Οι άπροσδιόριστες μορφές του τύπου αυτού ανάγονται σε άπροσδιόριστες μορφές του τύπου $\frac{0}{0}$ και μερικές φορές σ' εκείνες του τύπου $\frac{+\infty}{+\infty}$. Πραγματικά παρατηρούμε ότι

$$f(x) g(x) = \frac{f(x)}{1/g(x)} = \frac{g(x)}{1/f(x)}$$

όπου

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0 = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{1/f(x)} \text{ και } \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = +\infty = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{1/g(x)}$$

Παραδείγματα: 1. $\lim_{x \rightarrow +0} x \log x = 0$. Πραγματικά: $\lim_{x \rightarrow +0} x \log x = \lim_{x \rightarrow +0} \frac{\log x}{1/x} =$

$= \lim_{x \rightarrow +0} \frac{-\log x}{1/x}$, όπου η τελευταία όριακή τιμή είναι μία άπροσδιόριστη μορφή του τύπου

$$\frac{+\infty}{+\infty} \text{ και έπομένως } \lim_{x \rightarrow +0} \frac{-\log x}{1/x} = \lim_{x \rightarrow +0} \frac{(-\log x)'}{(1/x)'} = \lim_{x \rightarrow +0} \frac{-1/x}{-1/x^2} = \lim_{x \rightarrow +0} x = 0.$$

Άρα και $\lim_{x \rightarrow +0} x \log x = -\lim_{x \rightarrow +0} \frac{-\log x}{1/x} = -0 = 0$.

2. $\lim_{x \rightarrow +0} x \sigma\varphi x = 1$. Πραγματικά: $\lim_{x \rightarrow +0} x \sigma\varphi x = \lim_{x \rightarrow +0} \frac{x}{\varepsilon\varphi x}$, όπου η τελευταία όριακή τιμή είναι μία άπροσδιόριστη μορφή του τύπου $\frac{0}{0}$ και έπομένως

$$\lim_{x \rightarrow +0} \frac{x}{\varepsilon\varphi x} = \lim_{x \rightarrow +0} \frac{(x)'}{(\varepsilon\varphi x)'} = \lim_{x \rightarrow +0} \frac{1}{1 + \varepsilon\varphi^2 x} = \frac{1}{1} = 1. \text{ Άρα και } \lim_{x \rightarrow +0} x \sigma\varphi x = 1.$$

3.4 Άπροσδιόριστες μορφές των τύπων, 0^0 , $(+\infty)^0$ και $1^{+\infty}$.

3.4.1 Άπροσδιόριστες μορφές του τύπου 0^0 είναι όριακές τιμές της μορφής:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x)]^{g(x)}, \text{ όπου } \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0 = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x).$$

3.4.2 Άπροσδιόριστες μορφές του τύπου $(+\infty)^0$ είναι όριακές τιμές της μορφής:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x)]^{g(x)}, \text{ όπου } \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty \text{ και } \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0.$$

3.4.3 Άπροσδιόριστες μορφές του τύπου $1^{+\infty}$ είναι όριακές τιμές της μορφής:

$\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x)]^{g(x)}$, όπου $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 1$ και $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = +\infty$.

"Όλες οι παραπάνω άπροσδιόριστες μορφές ανάγονται σε άπροσδιόριστη μορφή του τύπου $0(+\infty)$. Πραγματικά, όπως ξέρουμε (βλ. τύπο (6), § 3.2 του κεφ. V), ισχύει

$$[f(x)]^{g(x)} = e^{g(x)\log f(x)}$$

και από τη συνέχεια της έκθετικής συναρτήσεως εφαρμόζεται ο τύπος

$$\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x)]^{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} e^{g(x)\log f(x)} = e^{\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)\log f(x)}$$

και επομένως αρκεί να υπολογίσουμε την όριακή τιμή $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) \log f(x)$, που σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις είναι (ή ανάγεται εύκολα σε) μία άπροσδιόριστη μορφή του τύπου $0(+\infty)$.

Παραδείγματα:

1. $\lim_{x \rightarrow +0} x^x = 1$. Παρατηρούμε ότι αυτό είναι μία άπροσδιόριστη μορφή του τύπου 0^0 . Έχουμε

$$\lim_{x \rightarrow +0} x^x = \lim_{x \rightarrow +0} e^{x \log x} = e^{\lim_{x \rightarrow +0} x \log x} = e^0 = 1,$$

γιατί, όπως υπολογίσαμε στην § 3.3.2, $\lim_{x \rightarrow +0} x \log x = 0$.

2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{\frac{1}{x}} = 1$. Παρατηρούμε ότι αυτό είναι μία άπροσδιόριστη μορφή του τύπου $(+\infty)^0$. Έχουμε

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{\frac{1}{x} \log x} = e^{\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log x}{x}} = e^0 = 1,$$

γιατί, όπως υπολογίσαμε στην § 3.2, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log x}{x} = 0$.

3. $\lim_{x \rightarrow +0} (\sin x)^{\frac{1}{x}} = 1$. Παρατηρούμε ότι αυτό είναι μία άπροσδιόριστη μορφή του τύπου $1^{+\infty}$. Έχουμε

$$\lim_{x \rightarrow +0} (\sin x)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow +0} e^{\frac{1}{x} \log \sin x} = e^{\lim_{x \rightarrow +0} \frac{1}{x} \log \sin x} = e^0 = 1,$$

γιατί

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +0} \frac{1}{x} \log \sin x &= \lim_{x \rightarrow +0} \frac{\log \sin x}{x} = \lim_{x \rightarrow +0} \frac{(\log \sin x)'}{(x)'} = \lim_{x \rightarrow +0} \frac{\frac{1}{\sin x} (\sin x)'}{1} = \\ &= -\lim_{x \rightarrow +0} \epsilon\phi x = -\epsilon\phi 0 = 0. \end{aligned}$$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

33. Νά υπολογισθούν οι (πρώτες) παράγωγοι τών συναρτήσεων που δρίζονται από τούς παρακάτω τύπους.

1) $f(x) = x^2 + 2x + 3$

2) $f(x) = x^2(x + 1)^3$

3) $f(x) = \frac{x^2}{(x + 1)^3}$

4) $f(x) = \frac{3x + 2}{x^2 + 1}$

5) $f(x) = \frac{x^2 + 2x + 5}{x^4 - 1}$

6) $f(x) = \sin x + \log x$

7) $f(x) = \frac{e^{\varphi x}}{x}$

8) $f(x) = x^2 e^{\varphi x} + \frac{1}{x}$

9) $f(x) = 3 \sin x + \frac{x}{x^2 + 1}$

34. Παρόμοια, νά υπολογισθούν οι παράγωγοι τών συναρτήσεων που δρίζονται από τούς παρακάτω τύπους:

1) $f(x) = \sqrt[n]{x-1}$

2) $f(x) = \frac{1}{\sqrt[n]{x+1}}$

3) $f(x) = \sqrt{x^4 + 3x^2 + 1}$

4) $f(x) = \sqrt{x+1} + \sqrt{x-1}$

5) $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x+1}} - \frac{1}{\sqrt{x-1}}$

6) $f(x) = \sqrt{\frac{x^2-1}{x^2+1}}$

7) $f(x) = \sin(3x + 2)$

8) $f(x) = \eta\mu(3x + 2)$

9) $f(x) = \frac{1}{\sin 3x}$

10) $f(x) = \frac{e^{\varphi^2 x} - 1}{e^{\varphi^2 x} + 1}$

11) $f(x) = 3\eta\mu^4 x + 2\sin^2 x + 1$

12) $f(x) = \sqrt{e^{\varphi^2 x} + 1}$

13) $f(x) = \frac{2\eta\mu x}{1 + \sin(2x + 3)}$

14) $f(x) = \log \eta\mu x + x^x$

15) $f(x) = (x^3 + x)^x + \log(x^2 + 1)$

16) $f(x) = (\eta\mu x)^{\log x}$

17) $f(x) = x^{x^2 + 1} + 2\sqrt{x}$

18) $f(x) = e^{\varphi x}$.

35. Νά βρεθούν τά τοπικά άκρότατα τών συναρτήσεων που δρίζονται από τούς παρακάτω τύπους.

1) $f(x) = \eta\mu(2x + 3)$ 2) $f(x) = x^4 - 2x^3 + 5$ 3) $f(x) = \eta\mu \frac{1}{x}$.

36*. Ν' άποδειχθεί ότι μεταξύ όλων τών ορθογωνίων με σταθερή περίμετρο, τό τετράγωνο είναι εκείνο που έχει τό μεγαλύτερο έμβαδό.

37*. Ν' άποδειχθεί ότι μεταξύ όλων τών τριγώνων με σταθερή περίμετρο καί σταθερή βάση, τό ίσοσκελές τρίγωνο είναι εκείνο που έχει τό μεγαλύτερο έμβαδό.

38*. Ν' άποδειχθεί ότι μεταξύ όλων τών τριγώνων με σταθερή περίμετρο, τό ίσόπλευρο τρίγωνο είναι εκείνο που έχει τό μεγαλύτερο έμβαδό.

39. Ν' άποδειχθεί ότι

$$f \text{ κυρτή στο } \Delta \Leftrightarrow -f \text{ κοίλη στο } \Delta$$

$$\text{καί} \quad f \text{ κοίλη στο } \Delta \Leftrightarrow -f \text{ κυρτή στο } \Delta.$$

40. Ν' άποδειχθεί ότι οι άσύμπτωτες τής ύπερβολής με έξίσωση $\frac{x^2}{\alpha^2} - \frac{y^2}{\beta^2} = 1$

(βλ. § 3.3 τού κεφ. II) είναι καί άσύμπτωτες τών συναρτήσεων f_1, f_2 που δρίζονται από τούς

τύπους $f_1(x) = \frac{\beta}{\alpha} \sqrt{x^2 - \alpha^2}$ καί $f_2(x) = -\frac{\beta}{\alpha} \sqrt{x^2 - \alpha^2}$.

41. Νά μελετηθούν και νά παρασταθούν γεωμετρικά οι συναρτήσεις που δρίζονται από τούς παρακάτω τύπους:

$$1) f(x) = 3x^4 - 2x^2 + 3$$

$$2) f(x) = x(x^2 - 4)$$

$$3) f(x) = 2x^4 + 3x^2 + 2$$

$$4) f(x) = x + \frac{1}{x^2}$$

42. Νά υπολογισθούν οι παρακάτω άπροσδιόριστες μορφές:

$$1) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^\alpha - 1}{x - 1}$$

$$2) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\log x}{x^2 - 1}$$

$$3) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\eta\mu\alpha x}{\eta\mu\beta x}$$

$$4) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\epsilon\phi\alpha x}{\epsilon\phi\beta x}$$

$$5) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x} - 2x}{x - \eta\mu x}$$

$$6) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \eta\mu x}{x^3}$$

43. Νά υπολογισθούν οι παρακάτω άπροσδιόριστες μορφές:

$$1) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x + \log x}$$

$$2) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^{-2x}}{x^2}$$

$$3) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\log(x-1)}{x^3 + x - 10}$$

$$4) \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\log(x^2 - 8)}{x^2 + x - 12}$$

44*. Νά υπολογισθούν οι παρακάτω άπροσδιόριστες μορφές:

$$1) \lim_{x \rightarrow +0} \sqrt{x} \log x \quad 2) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2} - 0} \left(\frac{\pi}{2} - x \right) \epsilon\phi x \quad 3) \lim_{x \rightarrow 1 + 0} \left(\frac{1}{\log x} - \frac{1}{x-1} \right)$$

45*. Νά υπολογισθούν οι παρακάτω άπροσδιόριστες μορφές:

$$1) \lim_{x \rightarrow +0} x^{\eta\mu x}$$

$$2) \lim_{x \rightarrow +\infty} (\log x)^{2^{-x}}$$

$$3) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x+1}{x} \right)^x$$

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Α

1. ΤΟ ΑΟΡΙΣΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ

1.1 Αρχική συνάρτηση και άοριστο ολοκλήρωμα. Έστω ότι f και F είναι συναρτήσεις με κοινό πεδίο ορισμού ένα διάστημα Δ . Θα λέμε ότι η F είναι μία *αρχική* (ή *παράγουσα*) συνάρτηση, ή αλλιώς *ένα άοριστο ολοκλήρωμα* της f στο Δ τότε και μόνο τότε, αν η F παραγωγίζεται και ισχύει

$$F'(x) = f(x) \quad \forall x \in \Delta.$$

Αν F είναι μία αρχική συνάρτηση της f στο Δ , τότε αυτό το συμβολίζουμε γράφοντας

$$\int f(x) dx = F(x), \quad x \in \Delta$$

(τὸ σύμβολο $\int f(x) dx$ διαβάζεται «όλοκλήρωμα $f(x) dx$ »).

Ωστε, λοιπόν

$$\int f(x) dx = F(x) \quad \forall x \in \Delta \iff F'(x) = f(x) \quad \forall x \in \Delta.$$

Π.χ. η συνάρτηση \sin έχει αρχική συνάρτηση την $\eta\mu$, γιατί, όπως είναι ήδη γνωστό, $(\eta\mu x)' = \sin x$. Άρα $\int \sin x dx = \eta\mu x$, καθώς επίσης και $\int \sin x dx = \eta\mu x + c$, όπου c σταθερός αριθμός, γιατί και η $\eta\mu + c$ είναι μία αρχική συνάρτηση της συναρτήσεως \sin , αφού $(c)' = 0$. Οι συναρτήσεις της μορφής $\eta\mu x + c$ είναι και οι μοναδικές αρχικές συναρτήσεις της \sin , γιατί ισχύει τὸ ακόλουθο θεώρημα.

1.1.1. ΘΕΩΡΗΜΑ. Αν F και G είναι δύο αρχικές συναρτήσεις της συναρτήσεως f στο Δ , τότε αυτές διαφέρουν κατά σταθερή συνάρτηση.

Ἀπόδειξη. Σύμφωνα πρὸς τὸν ὄρισμό της αρχικής συναρτήσεως έχουμε

$$F'(x) = f(x) \quad \forall x \in \Delta \quad \text{καὶ} \quad G'(x) = f(x) \quad \forall x \in \Delta.$$

Ἀρα $F'(x) = G'(x) \quad \forall x \in \Delta$ καὶ ἔτσι, ἀπὸ τὸ πόρισμα 2.1.5 τοῦ κεφ. VI, ισχύει $F = G + c$.

Παραδείγματα:

Μὲ ἐφαρμογὴ τῶν τύπων τῶν παραγῶγων παίρνουμε τοὺς παρακάτω τύπους:

1. $\int 0 dx = c$. Πραγματικά· τοῦτο ἐξ ὁρισμοῦ εἶναι ἰσοδύναμο μὲ τὸ $(c)' = 0$, πού, ὅπως γνωρίζουμε, ἰσχύει.

2. $\int dx = ax$. Πραγματικά: τούτο έξ' όρισμού είναι Ισοδύναμο μέ τό γνωστό τύπο $(ax)' = a$.

3. $\int x^v dx = \frac{x^{v+1}}{v+1}$ ($v = 1, 2, \dots$). Πραγματικά: $\left(\frac{x^{v+1}}{v+1}\right)' = \frac{(x^{v+1})'}{v+1} = \frac{(v+1)x^v}{v+1} = x^v$

Όστε άποδείξαμε ότι $\left(\frac{x^{v+1}}{v+1}\right)' = x^v$ πού έξ' όρισμού είναι Ισοδύναμο μέ $\int x^v dx = \frac{x^{v+1}}{v+1}$.

4. $\int \frac{dx}{x^v} = -\frac{1}{(v-1)x^{v-1}}$ ($v = 2, 3, \dots$). Πραγματικά: $\left(-\frac{1}{(v-1)x^{v-1}}\right)' = -\frac{1}{v-1} \left(\frac{1}{x^{v-1}}\right)' = -\frac{1}{v-1} \left(-\frac{(x^{v-1})'}{(x^{v-1})^2}\right) = \frac{(v-1)x^{v-2}}{(v-1)x^2(v-1)} = \frac{1}{x^2(v-1) - (v-2)} = \frac{1}{x^v}$.

5. $\int \frac{dx}{x} = \log x$ ($x > 0$). Πραγματικά: $(\log x)' = \frac{1}{x}$.

6. $\int x^a dx = \frac{x^{a+1}}{a+1}$ ($a \neq -1$). Πραγματικά:
 $\left(\frac{x^{a+1}}{a+1}\right)' = \frac{(x^{a+1})'}{a+1} = \frac{(a+1)x^a}{a+1} = x^a$.

7. $\int \sigma \cdot vx dx = \eta \mu x$ (τό άποδείξαμε παραπάνω).

8. $\int \eta \mu x dx = -\sigma \nu x$. Πραγματικά: $(-\sigma \nu x)' = -(-\eta \mu x) = \eta \mu x$.

9. $\int \frac{dx}{\sigma \nu \nu^2 x} = \epsilon \phi x$. Πραγματικά: $(\epsilon \phi x)' = \frac{1}{\sigma \nu \nu^2 x}$.

10. $\int \frac{dx}{\eta \mu^2 x} = -\sigma \phi x$. Πραγματικά: $(-\sigma \phi x)' = -\left(-\frac{1}{\eta \mu^2 x}\right) = \frac{1}{\eta \mu^2 x}$.

11. $\int e^x dx = e^x$. Πραγματικά: $(e^x)' = e^x$.

12. $\int a^x dx = \frac{a^x}{\log a}$ ($a \neq 1$). Πραγματικά: $\left(\frac{a^x}{\log a}\right)' = \frac{(a^x)'}{\log a} = \frac{a^x \log a}{\log a} = a^x$.

Πίνακας άόριστων όλοκληρωμάτων τών κυριότερων στοιχειωδών συναρτήσεων

$f(x)$	$\int f(x) dx$	$f(x)$	$\int f(x) dx$
x^v	$\frac{x^{v+1}}{v+1}$	$\frac{1}{x^v}$ ($v \geq 2$)	$-\frac{1}{(v-1)x^{v-1}}$
x^a ($a \neq -1$)	$\frac{x^{a+1}}{a+1}$	$\frac{1}{x}$ ($x > 0$)	$\log x$
$\eta \mu x$	$-\sigma \nu x$	$\sigma \nu x$	$\eta \mu x$
$\frac{1}{\eta \mu^2 x}$	$-\sigma \phi x$	$\frac{1}{\sigma \nu \nu^2 x}$	$\epsilon \phi x$
e^x	e^x	a^x	$\frac{a^x}{\log a}$

1.2 Γενικοί τύποι ολοκλήρωσεως. Υποθέτουμε, όπου χρειάζεται, ότι οι συναρτήσεις που θεωρούνται στην παράγραφο αυτή έχουν παράγωγο.

$$1.2.1 \int [f(x) + g(x)] dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx.$$

Πραγματικά: από τον ορισμό του άοριστου ολοκληρώματος έχουμε

$$(\int [f(x) + g(x)] dx)' = f(x) + g(x) = (\int f(x) dx)' + (\int g(x) dx)',$$

άπ' όπου προκύπτει ο παραπάνω τύπος.

Παράδειγμα :

$$\int (x + e^x) dx = \int x dx + \int e^x dx = \frac{x^{1+1}}{1+1} + e^x = \frac{x^2}{2} + e^x.$$

$$1.2.2 \int a f(x) dx = a \int f(x) dx.$$

Πραγματικά: $(\int a f(x) dx)' = a f(x) = a (\int f(x) dx)' = (a \int f(x) dx)'$.

Παραδείγματα :

$$1. \int a x^v dx = a \int x^v dx = a \frac{x^{v+1}}{v+1} = \frac{a}{v+1} x^{v+1}.$$

$$2. \text{(σέ συνδυασμό με τον τύπο 1.2.1)} \quad \int (a_0 + a_1 x + \dots + a_k x^k) dx = \int a_0 dx + \int a_1 x dx + \dots + \int a_k x^k dx = a_0 x + \frac{a_1}{2} x^2 + \dots + \frac{a_k}{k+1} x^{k+1}.$$

1.2.3. 'Ο τύπος ολοκλήρωσεως κατά παράγοντες:

$$\int f(x) g'(x) dx = f(x) g(x) - \int f'(x) g(x) dx.$$

Πραγματικά: $(\int f(x) g'(x) dx)' = f(x) g'(x) = [f(x) g'(x) + f'(x) g(x)] - f'(x) g(x) = (f(x) g(x))' - (\int f'(x) g(x) dx)'$.

Ειδικά για $g(x) = x$ έχουμε τον τύπο

$$1.2.3' \int f(x) dx = x f(x) - \int x f'(x) dx.$$

Παραδείγματα :

$$1. \int \log x dx = x \log x - \int x (\log x)' dx = x \log x - \int x \frac{1}{x} dx = x \log x - \int dx = x \log x - x = x(\log x - 1).$$

$$2. \int x \log x dx = \int \left(\frac{x^2}{2}\right)' \log x dx = \frac{x^2}{2} \log x - \int \frac{x^2}{2} (\log x)' dx = \frac{x^2}{2} \log x - \int \frac{x^2}{2} \frac{1}{x} dx = \frac{x^2}{2} \log x - \frac{1}{2} \int x dx = \frac{x^2}{2} \log x - \frac{1}{2} \frac{x^2}{2} = \frac{x^2}{4} (2 \log x - 1) = \frac{x^2}{4} (\log x^2 - 1), \text{ δηλαδή}$$

$$\int x \log x dx = \frac{x^2}{4} (\log x^2 - 1).$$

$$3. \int e^x \eta \mu x dx = \int (e^x)' \eta \mu x dx = e^x \eta \mu x - \int e^x (\eta \mu x)' dx = e^x \eta \mu x - \int e^x \sigma \nu \nu x dx = e^x \eta \mu x - \int (e^x)' \sigma \nu \nu x dx = e^x \eta \mu x - [e^x \sigma \nu \nu x - \int e^x (\sigma \nu \nu x)' dx] = e^x \eta \mu x - e^x \sigma \nu \nu x + \int e^x (-\eta \mu x) dx = e^x (\eta \mu x - \sigma \nu \nu x) - \int e^x \eta \mu x dx. \text{ *Ωστε αποδείξαμε ότι}$$

$$\int e^x \eta \mu x dx = e^x (\eta \mu x - \sigma \nu \nu x) - \int e^x \eta \mu x dx,$$

άπό όπου προκύπτει εύκολα ότι:

$$\int e^x \eta \mu x dx = e^x \frac{\eta \mu x - \sigma \nu \nu x}{2}$$

1.2.4. 'Ο τύπος ολοκλήρωσεως με αντικατάσταση:

$$\int g[f(x)] f'(x) dx = \int g(y) dy \Big|_{y=f(x)}$$

Όπου στο δεξιό μέλος του τύπου έννοούμε ότι ύστερα από τον ύπολογοισμό του $\int g(y)dy$ όφείλουμε νά άντικαταστήσουμε τό y μέ τό $f(x)$.

Γιά ν' άποδείξουμε τον τύπο αυτό, θέτουμε $F(y) = \int g(y)dy$ (άρα $F'(y) = g(y)$) και τότε άρκει νά δείξουμε ότι

$$F[f(x)] = \int g[f(x)]f'(x) dx.$$

Αυτό πραγματικά ίσχύει, γιατί σύμφωνα μέ τό θεώρημα 1.7.1 του κεφ. VI (παραγωγήιση σύνθετης συναρτήσεως) έχουμε

$$(F[f(x)])' = F'[f(x)]f'(x) = g[f(x)]f'(x).$$

Παραδείγματα :

$$1. \int \sin(ax + \beta)dx = \frac{1}{\alpha} \int \sin(ax + \beta) \cdot \alpha dx = \frac{1}{\alpha} \int \sin(ax + \beta) \cdot (ax + \beta)' dx = \\ = \frac{1}{\alpha} [\int \sin y dy]_{y=ax+\beta} = \frac{1}{\alpha} [\eta \mu y]_{y=ax+\beta} = \frac{1}{\alpha} \eta \mu(ax + \beta), (\alpha \neq 0).$$

2. $\int \frac{dx}{x} = \log |x|$ *Όπως ξέρουμε ίσχύει $\int \frac{dx}{x} = \log x, x \in (0, +\infty)$. Για $x \in (-\infty, 0)$ τό ολοκλήρωμα αυτό ύπολογίζεται ως εξής :

$$\int \frac{dx}{x} = \int \frac{1}{-x} (-1)dx = \int \frac{1}{-x} (-x)' dx = \left[\int \frac{1}{y} dy \right]_{y=-x} = [\log y]_{y=-x} = \\ = \log(-x), x \in (-\infty, 0).$$

Οι δύο τύποι ολοκληρώσεως

$$\int \frac{dx}{x} = \log x, x \in (0, +\infty) \text{ και } \int \frac{dx}{x} = \log(-x), x \in (-\infty, 0)$$

ένοποιούνται στον $\int \frac{dx}{x} = \log |x|$

$$3. \int \frac{x}{1+x^2} dx = \frac{1}{2} \int \frac{1}{1+x^2} (2x) dx = \frac{1}{2} \int \frac{1}{1+x^2} (1+x^2)' dx = \\ = \frac{1}{2} \left[\int \frac{1}{y} dy \right]_{y=1+x^2} = \frac{1}{2} [\log |y|]_{y=1+x^2} = \frac{1}{2} \log(1+x^2) = \log \sqrt{1+x^2}.$$

4. $\int \frac{dx}{(x-1)^2(x-2)}$ = $\frac{1}{x-1} + \log \left| \frac{x-2}{x-1} \right|$. Για νά ύπολογοίσουμε τό ολοκλήρωμα αυτό θέτουμε

$$\frac{1}{(x-1)^2(x-2)} = \frac{\alpha}{x-1} + \frac{\beta}{(x-1)^2} + \frac{\gamma}{x-2}$$

και ύπολογοίζουμε τά α, β, γ ως εξής:

Μέ πολλαπλασιασμό και των δύο μελών της επί $(x-1)^2(x-2)$ βρίσκουμε

$$1 = \alpha(x-1)(x-2) + \beta(x-2) + \gamma(x-1)^2$$

και μετά τίς πράξεις

$$1 = (\alpha + \gamma)x^2 + (-3\alpha + \beta - 2\gamma)x + (2\alpha - 2\beta + \gamma)$$

και αυτό ίσχύει για κάθε $x \in \mathbb{R}$, πράγμα πού σημαίνει ότι

$$(\alpha + \gamma = 0, \quad -3\alpha + \beta - 2\gamma = 0, \quad 2\alpha - 2\beta + \gamma = 1).$$

*Άπό τήν επίλυση του συστήματος αυτού βρίσκουμε ($\alpha = -1, \beta = -1, \gamma = 1$) και έπομένως ίσχύει

$$\frac{1}{(x-1)^2(x-2)} = -\frac{1}{x-1} - \frac{1}{(x-1)^2} + \frac{1}{x-2}.$$

*Άρα

$$\int \frac{dx}{(x-1)^2(x-2)} = -\int \frac{dx}{x-1} - \int \frac{dx}{(x-1)^2} + \int \frac{dx}{x-2}.$$

*Αλλά

$$\int \frac{dx}{x-1} = \int \frac{1}{x-1} (x-1)' dx = \left[\int \frac{dy}{y} \right]_{y=x-1} = \left[\log |y| \right]_{y=x-1} = \log |x-1|$$

$$\int \frac{dx}{(x-1)^2} = \int \frac{1}{(x-1)^2} (x-1)' dx = \left[\int \frac{dy}{y^2} \right]_{y=x-1} = \left[-\frac{1}{y} \right]_{y=x-1} = -\frac{1}{x-1}$$

$$\int \frac{dx}{x-2} = \int \frac{1}{x-2} (x-2)' dx = \left[\int \frac{dy}{y} \right]_{y=x-2} = \left[\log |y| \right]_{y=x-2} = \log |x-2|.$$

Θά έχουμε λοιπόν

$$\int \frac{dx}{(x-1)^2(x-2)} = -\log |x-1| + \frac{1}{x-1} + \log |x-2| = \frac{1}{x-1} + \log \left| \frac{x-2}{x-1} \right|$$

*Ο παραπάνω τύπος ισχύει σε καθένα από τα διαστήματα $(-\infty, 1)$, $(1, 2)$ και $(2, +\infty)$.

$$5. \int \frac{dx}{\sqrt{x+2}} = \int \frac{1}{\sqrt{x+2}} (x+2)' dx = \left[\int \frac{dy}{\sqrt{y}} \right]_{y=x+2} = \left[\int y^{-\frac{1}{2}} dy \right]_{y=x+2} =$$

$$= \left[\frac{y^{-\frac{1}{2}+1}}{-\frac{1}{2}+1} \right]_{y=x+2} = \left[2\sqrt{y} \right]_{y=x+2} = 2\sqrt{x+2}.$$

$$6. \int e^{\mu x} dx = \int \frac{\eta \mu x}{\sigma \nu \eta x} dx = -\int \frac{1}{\sigma \nu \eta x} (\sigma \nu \eta x)' dx = -\left[\int \frac{dy}{y} \right]_{y=\sigma \nu \eta x} =$$

$$= -\left[\log |y| \right]_{y=\sigma \nu \eta x} = -\log |\sigma \nu \eta x|.$$

$$7. \int \sigma \nu \eta^2 x dx = \int \frac{1 + \sigma \nu \eta 2x}{2} dx = \int \frac{1}{2} dx + \int \frac{\sigma \nu \eta 2x}{2} dx =$$

$$= \frac{1}{2} x + \frac{1}{2} \int \sigma \nu \eta 2x dx = \frac{1}{2} x + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} [\int \sigma \nu \eta y dy]_{y=2x} = \frac{1}{2} x + \frac{1}{4} [\eta \mu y]_{y=2x} =$$

$$= \frac{x}{2} + \frac{\eta \mu 2x}{4} = \frac{x + \eta \mu x \sigma \nu \eta}{2}.$$

$$8. \int e^{-x} dx = -\int e^{-x} (-1) dx = -\int e^{-x} (-x)' dx = -\left[\int e^y dy \right]_{y=-x} = -[e^y]_{y=-x} = -e^{-x}.$$

9. $\int e^{-x} x^v dx = -v! e^{-x} \left(1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^v}{v!} \right)$ ($v = 0, 1, 2, \dots$). Το όλο κλήρωμα αυτό το υπολογίζουμε με την αναγωγική μέθοδο, ως έξης:

Για $\kappa > 0$ έχουμε:

$$I_{\kappa}(x) = \int e^{-x} x^{\kappa} dx = -\int x^{\kappa} (e^{-x})' dx = -x^{\kappa} e^{-x} + \int e^{-x} (x^{\kappa})' dx = -x^{\kappa} e^{-x} + \kappa \int e^{-x} x^{\kappa-1} dx =$$

$$= -x^{\kappa} e^{-x} + \kappa I_{\kappa-1}(x),$$

δηλαδή

$$I_{\kappa}(x) = -x^{\kappa} e^{-x} + \kappa I_{\kappa-1}(x),$$

*Έτσι για $\kappa = 1, 2, \dots, v$ έχουμε

(σ_1)	$I_1(x) = -xe^{-x} + I_0(x)$	$\frac{1}{1!}$
(σ_2)	$I_2(x) = -x^2e^{-x} + 2I_1(x)$	$\frac{1}{2!}$
(σ_3)	$I_3(x) = -x^3e^{-x} + 3I_2(x)$	$\frac{1}{3!}$
\vdots	\dots	\vdots
(σ_κ)	$I_\kappa(x) = -x^\kappa e^{-x} + \kappa I_{\kappa-1}(x)$	$\frac{1}{\kappa!}$
\vdots	\dots	\vdots
(σ_ν)	$I_\nu(x) = -x^\nu e^{-x} + \nu I_{\nu-1}(x)$	$\frac{1}{\nu!}$

*Αν πολλαπλασιάσουμε και τὰ δύο μέλη τῶν παραπάνω σχέσεων μέ τόν ἀντίστοιχο ἀριθμό πού εἶναι γραμμένος δεξιά (π.χ. τῆς σχέσεως (σ_κ) ἐπί τόν $\frac{1}{\kappa!}$) καί προσθέσουμε ὕστερα κατὰ μέλη προκύπτει (ἀφοῦ γίνουν οἱ κατάλληλες ἀναγωγές) ὅτι

$$\frac{1}{\nu!} I_\nu(x) = I_0(x) - \frac{x}{1!} e^{-x} - \frac{x^2}{2!} e^{-x} - \dots - \frac{x^\nu}{\nu!} e^{-x}$$

*Ἐστί επειδή, ὅπως ὑπολογίσαμε στό προηγούμενο παράδειγμα, $I_0(x) = \int e^{-x} dx = -e^{-x}$ θά ἔχουμε

$$I_\nu(x) = \int e^{-x} x^\nu dx = -\nu! e^{-x} \left(1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^\nu}{\nu!} \right)$$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

46. Νά ὑπολογισθοῦν τὰ παρακάτω ἀόριστα ὀλοκληρώματα:

$$1) \int \frac{dx}{(x-2)(x+3)} \quad 2) \int \frac{x^2 - x + 4}{(x^2 - 1)(x+2)} dx \quad 3) \int \frac{x^3 + 2x^2 - 3x + 1}{(x-1)(x+3)} dx.$$

47. Νά ὑπολογισθοῦν τὰ παρακάτω ἀόριστα ὀλοκληρώματα:

$$1) \int \sqrt{2x+3} dx \quad 2) \int \frac{dx}{\sqrt{x+1} - \sqrt{x-1}} \quad 3) \int \frac{x}{\sqrt{3x+1}} dx.$$

48*. Νά ὑπολογισθοῦν τὰ παρακάτω ἀόριστα ὀλοκληρώματα:

$$1) \int \frac{x^3}{\sqrt{1+x^4}} dx \quad 2) \int \frac{3x+1}{\sqrt{3x^2+2x+1}} dx \quad 3) \int (2x-3)\sqrt{x^2-3x+2} dx$$

49. Νά ὑπολογισθοῦν τὰ παρακάτω ἀόριστα ὀλοκληρώματα:

$$1) \int \sin x dx \quad 2) \int e^{-5x} dx \quad 3) \int x e^{-5x} dx \\ 4) \int e^x \sin x dx \quad 5) \int \eta \mu^2 x dx \quad 6) \int \epsilon \varphi^2 x dx$$

50*. Νά ὑπολογισθοῦν τὰ παρακάτω ἀόριστα ὀλοκληρώματα:

$$1) \int \eta \mu k x \eta \mu n x dx \quad 2) \int \eta \mu k x \sigma \nu \nu x dx \quad 3) \int \sigma \nu \nu k x \sigma \nu \nu x dx,$$

ὅπου k, n φυσικοί ἀριθμοί.

(Νά χρησιμοποιηθοῦν ἀντίστοιχα οἱ τύποι:

$$\eta\mu\kappa\eta\mu\nu\chi = \frac{1}{2} [\sigma\upsilon\nu(\kappa - \nu)\chi - \sigma\upsilon\nu(\kappa + \nu)\chi],$$

$$\eta\mu\kappa\sigma\upsilon\nu\nu\chi = \frac{1}{2} [\eta\mu(\kappa + \nu)\chi + \eta\mu(\kappa - \nu)\chi],$$

$$\sigma\upsilon\nu\kappa\sigma\upsilon\nu\nu\chi = \frac{1}{2} [\sigma\upsilon\nu(\kappa + \nu)\chi + \sigma\upsilon\nu(\kappa - \nu)\chi].$$

51*. Νά υπολογισθοῦν τὰ παρακάτω ἄορίστα ὀλοκληρώματα:

$$1) \int (\sigma\upsilon\nu\chi + \eta\mu\chi) \sqrt{\sigma\upsilon\nu\chi - \eta\mu\chi} dx \quad 2) \int \frac{\eta\mu\chi}{(1 + \sigma\upsilon\nu\chi)^2} dx \quad 3) \int \frac{\chi\sigma\upsilon\nu\chi}{(\chi\eta\mu\chi + \sigma\upsilon\nu\chi)^2} dx$$

$$4) \int \frac{\chi\eta\mu\chi}{(1 + \sigma\upsilon\nu\chi)^2} dx \quad 5) \int \left(\frac{\chi}{\chi\eta\mu\chi + \sigma\upsilon\nu\chi} \right)^2 dx$$

52*. Νά βρεθοῦν ἀναγωγικοί τύποι γιὰ τὰ ὀλοκληρώματα:

$$1) \int \eta\mu^{\nu}\chi dx \quad 2) \int \sigma\upsilon\nu^{\nu}\chi dx \quad (\nu \text{ φυσικός ἀριθμός}).$$

Μέ τή βοήθεια αὐτῶν τῶν τύπων νά υπολογισθοῦν τὰ ὀλοκληρώματα $\int \eta\mu^{\nu}\chi dx$ καί $\int \sigma\upsilon\nu^{\nu}\chi dx$.

53*. Νά βρεθεῖ ἀναγωγικός τύπος γιὰ τὸ ὀλοκλήρωμα $\int \log^{\nu}\chi dx$ ($\nu = 0, 1, 2, \dots$) καί μέ τή βοήθειά του νά υπολογισθεῖ τὸ ὀλοκλήρωμα $\int \log^3\chi dx$.

2. ΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ

2.1 Ὅρισμός καί ιδιότητες. Ἐὰν θεωρήσουμε μιά συνάρτηση f ὀρισμένη σ' ἓνα διάστημα Δ , ἡ ὁποία εἶναι συνεχής καί, ὅπως ἔχει ἀποδειχθεῖ στή Μαθηματική Ἀνάλυση, ἔχει ἀρχική συνάρτηση στό Δ . Ἐὰν α, β εἶναι δύο ὁποιαδήποτε σημεία τοῦ Δ , τότε ἡ διαφορά

$$F(\beta) - F(\alpha),$$

ὅπου F εἶναι μιά ἀρχική συνάρτηση τῆς f , εἶναι ἀνεξάρτητη ἀπὸ τὴν ἐκλογή τῆς F . Πραγματικά· σύμφωνα μέ τὸ θεώρημα 1.1.1, ὁποιαδήποτε ἀρχική συνάρτηση G τῆς f διαφέρει ἀπὸ τὴν F κατὰ μιά σταθερή συνάρτηση, δηλαδή $G = F + c$. Ἐπομένως

$$G(\beta) - G(\alpha) = (F(\beta) + c) - (F(\alpha) + c) = F(\beta) - F(\alpha).$$

Τὴ διαφορά $F(\beta) - F(\alpha)$ τὴν ὀνομάζουμε *ὀρισμένο ὀλοκλήρωμα τῆς f ἀπὸ α μέχρι β* καί τὸ παριστάνουμε μέ $\int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx$, δηλαδή

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx = F(\beta) - F(\alpha)$$

(τὸ σύμβολο $\int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx$ διαβάζεται «ὀλοκλήρωμα $f(x) dx$ ἀπὸ α μέχρι β »).

Ἀπὸ τὸν παραπάνω ὀρισμὸ τοῦ ὀρισμένου ὀλοκληρώματος προκύπτουν αἰεσίως τὰ ἑξῆς:

$$\int_{\alpha}^{\alpha} f(x) dx = 0$$

καί

$$\int_{\beta}^{\alpha} f(x) dx = - \int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx.$$

Τή διαφορά $F(\beta) - F(\alpha)$ τήν παριστάνουμε συνήθως καί μέ $[F(x)]_a^\beta$, δηλαδή $[F(x)]_a^\beta = F(\beta) - F(\alpha)$. Έτσι

$$\int_a^\beta f(x)dx = [F(x)]_a^\beta = [f(x)]_a^\beta.$$

Παρατηρούμε ακόμη ότι τό ολοκλήρωμα $\int_a^\beta f(x)dx$ εξαρτᾶται τόσο ἀπό τή συνάρτηση f , ὅσο καί ἀπό τούς ἀριθμούς α, β , οἱ ὁποῖοι ὀνομάζονται *ἄκρα ὀλοκληρώσεως*. Ἀντίθετα τό ολοκλήρωμα $\int_a^\beta f(x)dx$ δέν εξαρτᾶται ἀπό τή μεταβλητή x , δηλαδή δέν ἀλλάζει ἂν ἀντικαταστήσουμε τή μεταβλητή x ἀπό μία ἄλλη. Έτσι ἰσχύει

$$\int_a^\beta f(x)dx = \int_a^\beta f(t)dt.$$

Παραδείγματα :

$$1. \int_a^\beta adx = a(\beta - \alpha).$$

Πραγματικά: $\int_a^\beta adx = [\int adx]_a^\beta = [ax]_a^\beta = a\beta - a\alpha = a(\beta - \alpha)$.

$$2. \int_0^1 xdx = \frac{1}{2}.$$

Πραγματικά: $\int_0^1 xdx = [\int xdx]_0^1 = \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^1 = \frac{1^2}{2} - \frac{0^2}{2} = \frac{1}{2}$.

$$3. \int_0^1 x^2dx = \frac{1}{3}.$$

Πραγματικά: $\int_0^1 x^2dx = [\int x^2dx]_0^1 = \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1^3}{3} - \frac{0^3}{3} = \frac{1}{3}$.

$$4. \int_0^{\pi/2} \eta\mu x dx = 1.$$

Πραγματικά: $\int_0^{\pi/2} \eta\mu x dx = [\int \eta\mu x dx]_0^{\pi/2} = [-\sigma\upsilon\upsilon x]_0^{\pi/2} = -\sigma\upsilon\upsilon \frac{\pi}{2} + \sigma\upsilon\upsilon 0 = -0 + 1 = 1$.

$$5. \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sigma\upsilon\upsilon^2 x dx = \frac{\pi}{2}.$$

Πραγματικά: ἀπό τό παράδειγμα 7 τῆς § 1.2.4 ἔχουμε:

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sigma\upsilon\upsilon^2 x dx = \left[\int \sigma\upsilon\upsilon^2 x dx \right]_{-\pi/2}^{\pi/2} = \left[\frac{x + \eta\mu x \sigma\upsilon\upsilon x}{2} \right]_{-\pi/2}^{\pi/2} = \frac{\frac{\pi}{2} + 0}{2} - \frac{-\frac{\pi}{2} + 0}{2} = \frac{\pi}{2}$$

$$6. \int_1^2 \log x dx = \log 4 - 1.$$

Πραγματικά: ἀπό τό παράδειγμα 1 τῆς § 1.2.3, ἔχουμε:

$$\int_1^2 \log x dx = \left[\int \log x dx \right]_1^2 = [x(\log x - 1)]_1^2 = 2(\log 2 - 1) - 1(\log 1 - 1) = \\ = 2 \log 2 - 2 + 1 = \log 4 - 1.$$

$$7. \int_0^1 \frac{x}{1+x^2} dx = \log \sqrt{2}.$$

Πραγματικά· από τό παράδειγμα 3 τής § 1.2.4 έχουμε :

$$\int_0^1 \frac{x}{1+x^2} dx = \left[\int \frac{x}{1+x^2} dx \right]_0^1 = \left[\log \sqrt{1+x^2} \right]_0^1 = \log \sqrt{1+1^2} - \log \sqrt{1+0^2} = \log \sqrt{2}.$$

2.1.1. Από τόν όρισμό τοῦ όρισμένον ολοκληρώματος προκύπτουν οί παρακάτω τύποι:

$$\int_a^\beta [f(x) + g(x)] dx = \int_a^\beta f(x) dx + \int_a^\beta g(x) dx \\ \int_a^\beta af(x) dx = a \int_a^\beta f(x) dx.$$

Πραγματικά· αν F και G είναι δυό άρχικές συναρτήσεις τῶν f και g αντίστοιχα, τότε έχουμε

$$\int_a^\beta [f(x) + g(x)] dx = \left[\int [f(x) + g(x)] dx \right]_a^\beta = \left[\int f(x) dx + \int g(x) dx \right]_a^\beta = \\ = [F(x) + G(x)]_a^\beta = F(\beta) - F(\alpha) + G(\beta) - G(\alpha) = \int_a^\beta f(x) dx + \int_a^\beta g(x) dx.$$

Ανάλογα προκύπτει και ό δεύτερος τύπος.

2.1.2. Αν α, β, γ είναι σημεία τοῦ διαστήματος Δ , τότε ισχύει ό τύπος

$$\int_a^\gamma f(x) dx + \int_\gamma^\beta f(x) dx = \int_a^\beta f(x) dx.$$

Πραγματικά· αν F είναι μιá άρχική συνάρτηση τής f, τότε έχουμε

$$[F(\gamma) - F(\alpha)] + [F(\beta) - F(\gamma)] = F(\beta) - F(\alpha)$$

δηλαδή τόν παραπάνω τύπο.

2.1.3. Ισχύει ό τύπος (τής μέσης τιμής τοῦ ολοκληρωτικοῦ λογιμοῦ)

$$\int_a^\beta f(x) dx = f(x_0)(\beta - \alpha),$$

όπου x_0 είναι ένα κατάλληλο σημείο τοῦ ανοικτοῦ διαστήματος (α, β) .

Πραγματικά· αν F είναι μιá άρχική συνάρτηση τής f (δηλαδή $F'(x) = f(x) \forall x \in \Delta$), τότε, από τό θεώρημα τής μέσης τιμής τοῦ διαφορικοῦ λογιμοῦ (θεώρημα 2.1.3 τοῦ κεφ. VI), υπάρχει $x_0 \in (\alpha, \beta)$ τέτοιο, ὥστε νά ισχύει

$$F(\beta) - F(\alpha) = F'(x_0)(\beta - \alpha) = f(x_0)(\beta - \alpha),$$

δηλαδή

$$\int_a^\beta f(x) dx = f(x_0)(\beta - \alpha).$$

Αν εφαρμόσουμε τον παραπάνω τύπο της μέσης τιμής έχουμε τα εξής:

$$\left. \begin{array}{l} \alpha < \beta \\ f(x) \geq 0 \quad \forall x \in [\alpha, \beta] \end{array} \right\} \Rightarrow \int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx \geq 0$$

$$\left. \begin{array}{l} \alpha < \beta \\ f(x) \geq g(x) \quad \forall x \in [\alpha, \beta] \end{array} \right\} \Rightarrow \int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx \geq \int_{\alpha}^{\beta} g(x) dx.$$

Πραγματικά: επειδή $f(x) \geq 0 \quad \forall x \in [\alpha, \beta]$ και για τό x_0 του τύπου της μέσης τιμής, θά έχουμε και $f(x_0) \geq 0$. Άρα:

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx = f(x_0) (\beta - \alpha) \geq 0(\beta - \alpha) = 0.$$

Επίσης, επειδή $f(x) \geq g(x) \quad \forall x \in [\alpha, \beta]$, έχουμε $f(x) - g(x) \geq 0 \quad \forall x \in [\alpha, \beta]$.

Άρα:

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx = \int_{\alpha}^{\beta} [f(x) - g(x)] dx + \int_{\alpha}^{\beta} g(x) dx \geq 0 + \int_{\alpha}^{\beta} g(x) dx = \int_{\alpha}^{\beta} g(x) dx.$$

2.1.4. Ισχύει επίσης και ο τύπος

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(\psi(x)) \psi'(x) dx = \int_{\psi(\alpha)}^{\psi(\beta)} f(y) dy.$$

Πραγματικά: αν F είναι μία αρχική συνάρτηση της f , τότε, σύμφωνα με τον τύπο της ολοκλήρωσης με αντικατάσταση, παίρνουμε

$$\begin{aligned} \int_{\alpha}^{\beta} f(\psi(x)) \psi'(x) dx &= \left[\int f(\psi(x)) \psi'(x) dx \right]_{\alpha}^{\beta} = \left[\int f(y) dy \right]_{y=\psi(\alpha)}^{y=\psi(\beta)} = \\ &= \left[F(y) \right]_{y=\psi(\alpha)}^{y=\psi(\beta)} = \left[F(\psi(x)) \right]_{\alpha}^{\beta} = F(\psi(\beta)) - F(\psi(\alpha)) = \int_{\psi(\alpha)}^{\psi(\beta)} f(y) dy. \end{aligned}$$

Εφαρμογή: $\int_{-1}^1 \sqrt{1-x^2} dx = \frac{\pi}{2},$

Πραγματικά: πρώτα παρατηρούμε ότι

$$\begin{aligned} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sin^2 x dx &= \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sin x \sin x dx = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sqrt{1-\eta\mu^2 x} (\eta\mu x)' dx = \\ &= \frac{\eta\mu(\frac{\pi}{2})}{\eta\mu(-\frac{\pi}{2})} \int_{-1}^1 \sqrt{1-y^2} dy = \int_{-1}^1 \sqrt{1-y^2} dy = \int_{-1}^1 \sqrt{1-x^2} dx. \end{aligned}$$

Έτσι, ανατρέχοντας στο παράδειγμα 5 της § 2.1, παίρνουμε

$$\int_{-1}^1 \sqrt{1-x^2} dx = \frac{\pi}{2}.$$

2.2 Τό όρισμένο ολοκλήρωμα ως έμβαδόν. Έστω f μία συνάρτηση όρισμένη και συνεχής στο κλειστό διάστημα $[\alpha, \beta]$ με $f(x) \geq 0 \quad \forall x \in [\alpha, \beta]$. Έστω, άκόμη, E τό χωρίο του έπιπέδου που όρίζεται άπό τό διάγραμμα της f , τόν άξονα τών x και τίς ευθείες μέ έξισώσεις $x = \alpha$ και $x = \beta$ (βλ. σχ. 97) δηλαδή

$$E = \text{διάγραμμα } \{(x, y) : \alpha \leq x \leq \beta, 0 \leq y \leq f(x)\}.$$

Άς θεωρήσουμε πρώτα τήν περίπτωση, που ή f είναι γραμμική συνάρτηση, δηλαδή $f(x) = \gamma x + \delta$. Τότε τό χωρίο E είναι ένα τραπέζιο (βλ. σχ. 98) μέ βάσεις (παράλληλες προς τόν άξονα τών y και) που έχουν μήκη $f(\alpha)$ και $f(\beta)$ και μέ ύψος που έχει μήκος $\beta - \alpha$. Έτσι ή τιμή (E) του έμβαδου του τραapeziου E είναι

$$\frac{f(\alpha) + f(\beta)}{2} (\beta - \alpha).$$

Έξ άλλου έχουμε

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx = \int_{\alpha}^{\beta} (\gamma x + \delta) dx = \left[\frac{1}{2} \gamma x^2 + \delta x \right]_{\alpha}^{\beta} =$$

$$= \frac{1}{2} \gamma \beta^2 + \delta \beta - \left(\frac{1}{2} \gamma \alpha^2 + \delta \alpha \right) =$$

$$= \frac{1}{2} \gamma (\beta^2 - \alpha^2) + \delta (\beta - \alpha) = \left(\frac{1}{2} \gamma (\beta + \alpha) + \delta \right) (\beta - \alpha) = \frac{\gamma \beta + \gamma \alpha + 2\delta}{2} (\beta - \alpha) =$$

$$= \frac{(\gamma \alpha + \delta) + (\gamma \beta + \delta)}{2} (\beta - \alpha) = \frac{f(\alpha) + f(\beta)}{2} (\beta - \alpha), \text{ δηλαδή}$$

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx = (E).$$

Ό τύπος αυτός ισχύει γενικότερα και στην περίπτωση όπου ή f είναι μία *πολυγωνική συνάρτηση*, δηλαδή μία συνάρτηση της οποίας τό διάγραμμα είναι μία πολυγωνική γραμμή π.χ. ή $A_1 A_2 A_3 A_4$ του σχ. 99. Τότε έχουμε

$$(E) = (\epsilon_1) + (\epsilon_2) + (\epsilon_3)$$

και


$$\int_{\alpha}^{\alpha_1} f(x) dx + \int_{\alpha_1}^{\alpha_2} f(x) dx + \int_{\alpha_2}^{\beta} f(x) dx = \int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx,$$

δηλαδή πάλι


$$\int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx = (E).$$

Ό τύπος αυτός ισχύει βέβαια και για πολυγωνικές γραμμές μέ όσεσδήποτε πλευρές.


Άς ξαναγυρίσουμε τώρα στην περίπτωση της οποιασδήποτε συναρτή-




Σχ. 97



Σχ. 98



Σχ. 99



Σχ. 100

σεως f . "Αν διαμερίσουμε τό κλειστό διάστημα $[\alpha, \beta]$ σέ n ἴσα μέρη ὀρίζεται μιά πολυγωνική συνάρτηση f_n πού προσεγγίζει τήν f , ὅπως φαίνεται στό σχ. 100 γιά $n=4$. "Αν ὀνομάσουμε E_n τό ἀντίστοιχο χωρίο τοῦ ἐπιπέδου πού ὀρίζει ἡ f_n (δηλαδή $E_n = \text{διάγραμμα } \{(x, y) : \alpha \leq x \leq \beta, 0 \leq y \leq f_n(x)\}$), τότε ὀνομάζουμε τιμή τοῦ ἔμβαδοῦ τοῦ χωρίου E τό $\lim(E_n)$ (ἄν, βέβαια, τοῦτο ὑπάρχει καί εἶναι πραγματικός ἀριθμός), δηλαδή

$$(E) = \lim(E_n) = \lim \int_a^\beta f_n(x) dx.$$

Στή μαθηματική ἀνάλυση ἀποδεικνύεται ὅτι, κάτω ἀπό τίς ὑποθέσεις αὐτές πού κάναμε, ἰσχύει

$$\lim \int_a^\beta f_n(x) dx = \int_a^\beta f(x) dx.$$

"Ὡστε καί στή γενική περίπτωση ἰσχύει

$$\int_a^\beta f(x) dx = (E).$$

Παρατήρηση. Ἡ παραπάνω μέθοδος στηρίζεται στήν ἰδέα τῆς προσεγγίσεως τοῦ ἔμβαδοῦ, πού περικλείει μιά καμπύλη, ἀπό τό ἔμβαδο πού περικλείει μιά ἐγγεγραμμένη σ' αὐτή πολυγωνική γραμμή. Ἡ ἰδέα αὐτή ὀφείλεται στόν Ἀρχιμήδη, ὁ ὁποῖος τήν ἐφάρμοσε γιά τόν ὑπολογισμό τῆς τιμῆς τοῦ ἔμβαδοῦ παραβολικοῦ χωρίου.

Παραδείγματα:

1. $f(x) = x^2$, $x \in [0, \alpha]$. Στήν περίπτωση αὐτή τό ἀντίστοιχο χωρίο E τοῦ ἐπιπέδου εἶναι ἐκεῖνο πού περιέχεται μεταξύ τοῦ διαγράμματος τῆς f , τοῦ ἄξονα τῶν x καί τῆς εὐθείας μέ ἐξίσωση $x = \alpha$ (βλ. σχ. 101). "Ἐχουμε


$$(E) = \int_0^\alpha x^2 dx = \left[\int_0^\alpha x^2 dx \right]_0^\alpha = \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^\alpha = \frac{\alpha^3}{3} - \frac{0^3}{3} = \frac{\alpha^3}{3}$$

2. $f(x) = \eta\mu x$, $x \in [0, \pi]$. Στήν περίπτωση αὐτή τό ἀντίστοιχο χωρίο E τοῦ ἐπιπέδου εἶναι αὐτό πού περικλείεται ἀπό τήν ἡμιτονοειδή καμπύλη καί τό διάστημα $[0, \pi]$ (βλ. σχ. 102). "Ἐχουμε


$$(E) = \int_0^\pi \eta\mu x dx = [-\sigma\upsilon\nu x]_0^\pi = -\sigma\upsilon\nu\pi + \sigma\upsilon\nu 0 = -(-1) + 1 = 2.$$

3. Ἐμβαδοῦ ἐσωτερικοῦ ἑνός κύκλου μέ ἀκτίνα α . "Ας θεωρήσουμε τό ἐπίπεδο χωρίο E πού περικλείεται ἀπό τό διάγραμμα τῆς f μέ $f(x) = \sqrt{\alpha^2 - x^2}$, $-\alpha \leq x \leq \alpha$ καί τόν ἄξονα τῶν x (βλ. σχ. 103). "Ἐχουμε


$$\begin{aligned} (E) &= \int_{-\alpha}^\alpha \sqrt{\alpha^2 - x^2} dx = \int_{-\alpha}^\alpha \alpha \sqrt{1 - \left(\frac{x}{\alpha}\right)^2} dx = \alpha^2 \int_{-\alpha}^\alpha \sqrt{1 - \left(\frac{x}{\alpha}\right)^2} \left(\frac{x}{\alpha}\right) dx = \\ &= \alpha^2 \int_{-\frac{\alpha}{\alpha}}^{\frac{\alpha}{\alpha}} \sqrt{1 - y^2} dy = \alpha^2 \int_{-1}^1 \sqrt{1 - x^2} dx \end{aligned}$$



Σχ. 101



Σχ. 102



Σχ. 103


καί επειδή, όπως υπολογίσθηκε στην § 2.1.4 (έφαρμογή) $\int_{-1}^1 \sqrt{1-x^2} dx = \frac{\pi}{2}$, θα έχουμε

$(E) = \frac{\pi a^2}{2}$. Επομένως η τιμή του έμβραδου του έσωτερικού κύκλου με άκτινα a θα είναι

$$2(E) = 2 \frac{\pi a^2}{2} = \pi a^2.$$

4. Έμβραδόν έσωτερικού μιās ελλείψεως. Άς θεωρήσουμε τήν έλλειψη με εξίσωση $\frac{x^2}{\alpha^2} + \frac{y^2}{\beta^2} = 1$, δηλαδή τήν έλλειψη με κέντρο 0 και ήμιάξονες α, β . Έστω E τό χωρίο του έπιπέδου που περικλείεται από τό διάγραμμα τής f με $f(x) = \frac{\beta}{\alpha} \sqrt{\alpha^2 - x^2}$, $-\alpha \leq x \leq \alpha$ και από τόν άξονα τών x (βλ. σχ. 104). Τότε έχουμε

$$\begin{aligned} (E) &= \int_{-\alpha}^{\alpha} \frac{\beta}{\alpha} \sqrt{\alpha^2 - x^2} dx = \beta \int_{-\alpha}^{\alpha} \sqrt{1 - \left(\frac{x}{\alpha}\right)^2} dx = \\ &= \alpha \beta \int_{-\alpha}^{\alpha} \sqrt{1 - \left(\frac{x}{\alpha}\right)^2} \left(\frac{1}{\alpha}\right) dx = \alpha \beta \int_{-1}^1 \sqrt{1 - y^2} dy = \\ &= \alpha \beta \int_{-1}^1 \sqrt{1 - x^2} dx \end{aligned}$$




Σχ. 104 $\frac{x^2}{\alpha^2} + \frac{y^2}{\beta^2} = 1$


καί επειδή, όπως υπολογίσθηκε στην § 2.1.4 (έφαρμογή), $\int_{-1}^1 \sqrt{1-x^2} dx = \frac{\pi}{2}$, θα έχουμε

$(E) = \frac{\pi \alpha \beta}{2}$. Επομένως η τιμή του έμβραδου του έσωτερικού τής έλλείψεως με κέντρο 0 και ήμιάξονες α, β είναι $\pi \alpha \beta$.


Άς θεωρήσουμε τώρα δύο συναρτήσεις f και g που είναι όρισμένες και συνεχείς στό $[\alpha, \beta]$ με $f(x) \geq g(x) \forall x \in [\alpha, \beta]$. Άν E παριστάνει τό χωρίο του έπιπέδου (βλ. σχ. 105), που περικλείεται από τά διαγράμματα τών συναρτήσεων f και g και τίς εύθειες με εξισώσεις $x = \alpha$ και $x = \beta$, τότε τό έμβραδό του χωρίου αυτού είναι ή διαφορά τών έμβραδών τών χωρίων E_f και E_g (βλ. σχ. 106 και 107). Ωστε έχουμε δηλαδή



Σχ. 105



Σχ. 106



Σχ. 107

δηλαδή


$$(E) = (E_f) - (E_g) = \int_a^{\beta} f(x)dx - \int_a^{\beta} g(x)dx,$$

$$(E) = \int_a^{\beta} [f(x) - g(x)] dx.$$


Παραδείγματα :

1. $f(x) = x$ και $g(x) = x^2$. Το έμβασό του χωρίου E του επιπέδου (βλ. σχ. 108) είναι

$$\begin{aligned} (E) &= \int_0^1 (x - x^2)dx = \left[\int (x - x^2)dx \right]_0^1 = \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1^2}{2} - \frac{1^3}{3} - \left(\frac{0^2}{2} - \frac{0^3}{3} \right) = \\ &= \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}. \end{aligned}$$



Σχ. 108



Σχ. 109

2. $f(x) = \sin x$ και $g(x) = \cos x$. Το έμβασό του χωρίου E που περικλείεται από τη συνημιτονοειδή καμπύλη, την ημιτονοειδή καμπύλη και τον άξονα των y (βλ. σχ. 109) είναι

$$\begin{aligned} (E) &= \int_0^{\pi/4} (\sin x - \cos x)dx = \left[\int (\sin x - \cos x)dx \right]_0^{\pi/4} = \left[-\cos x + \sin x \right]_0^{\pi/4} = \\ &= -\cos \frac{\pi}{4} + \sin \frac{\pi}{4} - (-\cos 0 + \sin 0) = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} - (-1 + 0) = \sqrt{2} - 1, \end{aligned}$$

δηλαδή

$$(E) = \sqrt{2} - 1.$$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

54. Ν' αποδειχθεί ότι

$$1) \int_{-\pi}^{\pi} \eta_{\mu\kappa} \eta_{\nu\kappa} dx = 0 = \int_{-\pi}^{\pi} \sigma_{\nu\kappa} \sigma_{\mu\kappa} dx \quad (\kappa, \nu \text{ φυσικοί, } \kappa \neq \nu)$$

$$2) \int_{-\pi}^{\pi} \eta_{\mu\kappa} \sigma_{\nu\kappa} dx = 0 \quad (\kappa, \nu \text{ φυσικοί})$$

$$3) \int_{-\pi}^{\pi} \eta_{\mu^2\kappa} dx = \pi = \int_{-\pi}^{\pi} \sigma_{\nu^2\kappa} dx \quad (\kappa \text{ φυσικός})$$

55*. Ν' αποδειχθεί ότι για κάθε φυσικό αριθμό ν ισχύουν :


$$1) \int_0^{\pi/2} \eta_{\mu^{2\nu}} x dx = \frac{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2\nu - 1)}{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot (2\nu)} \cdot \frac{\pi}{2} \quad 2) \int_0^{\pi/2} \eta_{\mu^{2\nu+1}} x dx = \frac{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot (2\nu)}{3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2\nu + 1)}$$

56*. Νά υπολογισθοῦν τὰ ὀρισμένα ὀλοκληρώματα:


$$1) \int_0^{\pi/2} \sigma_{\nu^{2\nu}} x dx \quad 2) \int_0^{\pi/2} \sigma_{\nu^{2\nu+1}} x dx,$$

ὅπου ν εἶναι φυσικός ἀριθμός


57. Νά υπολογισθεῖ ἡ τιμὴ τοῦ ἔμβαδοῦ τοῦ χωρίου E τοῦ ἐπιπέδου, ποῦ περικλείεται ἀπὸ τὴν ἑλλειψή μὲ ἐξίσωση $\frac{x^2}{\alpha^2} + \frac{y^2}{\beta^2} = 1$, τὸν κύκλο μὲ κέντρο O καὶ ἀκτίνα r ($r < \alpha$ καὶ $r < \beta$) καὶ τοὺς θετικούς ἡμίμαξονες (βλ. σχ. 110).



Σχ. 110



Σχ. 111



Σχ. 112

58. Νά υπολογισθεῖ ἡ τιμὴ τοῦ ἔμβαδοῦ τοῦ χωρίου E τοῦ ἐπιπέδου, ποῦ περικλείεται ἀπὸ τὰ διαγράμματα τῶν συναρτήσεων f καὶ g μὲ $f(x) = \sqrt[3]{x}$ καὶ $g(x) = x^2$, $0 \leq x \leq 1$ (βλ. σχ. 111).

59. Νά υπολογισθεῖ ἡ τιμὴ τοῦ ἔμβαδοῦ τοῦ χωρίου E τοῦ ἐπιπέδου ποῦ περικλείεται ἀπὸ τὸ διάγραμμα τῆς f μὲ $f(x) = x^{3/2}$ καὶ τὶς εὐθείες μὲ ἐξισώσεις $y = 1$, $x = 2$ (βλ. σχ. 112)



ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

25. Έστω $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ η συνάρτηση $f(x) = x^2 + 2x - 3$. Η f είναι αρνητική για $x \in (-3, 1)$ και θετική για $x \in (-\infty, -3) \cup (1, \infty)$. Η f είναι μηδενική για $x = -3$ και $x = 1$.

26. Έστω $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ η συνάρτηση $f(x) = x^2 - 4x + 4$. Η f είναι μηδενική για $x = 2$ και θετική για $x \in (-\infty, 2) \cup (2, \infty)$.

27. Έστω $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ η συνάρτηση $f(x) = x^2 + 1$. Η f είναι θετική για $x \in (-\infty, \infty)$.

28. Έστω $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ η συνάρτηση $f(x) = x^2 - 1$. Η f είναι αρνητική για $x \in (-1, 1)$ και θετική για $x \in (-\infty, -1) \cup (1, \infty)$.

29. Έστω $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ η συνάρτηση $f(x) = x^2 + 2x + 1$. Η f είναι μηδενική για $x = -1$ και θετική για $x \in (-\infty, -1) \cup (-1, \infty)$.

30. Έστω $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ η συνάρτηση $f(x) = x^2 - 2x + 1$. Η f είναι μηδενική για $x = 1$ και θετική για $x \in (-\infty, 1) \cup (1, \infty)$.



31. Έστω $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ η συνάρτηση $f(x) = x^2 + 2x - 3$. Η f είναι αρνητική για $x \in (-3, 1)$ και θετική για $x \in (-\infty, -3) \cup (1, \infty)$. Η f είναι μηδενική για $x = -3$ και $x = 1$.

32. Έστω $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ η συνάρτηση $f(x) = x^2 - 4x + 4$. Η f είναι μηδενική για $x = 2$ και θετική για $x \in (-\infty, 2) \cup (2, \infty)$.

33. Έστω $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ η συνάρτηση $f(x) = x^2 + 1$. Η f είναι θετική για $x \in (-\infty, \infty)$.

34. Έστω $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ η συνάρτηση $f(x) = x^2 - 1$. Η f είναι αρνητική για $x \in (-1, 1)$ και θετική για $x \in (-\infty, -1) \cup (1, \infty)$.

35. Έστω $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ η συνάρτηση $f(x) = x^2 + 2x + 1$. Η f είναι μηδενική για $x = -1$ και θετική για $x \in (-\infty, -1) \cup (-1, \infty)$.

36. Έστω $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ η συνάρτηση $f(x) = x^2 - 2x + 1$. Η f είναι μηδενική για $x = 1$ και θετική για $x \in (-\infty, 1) \cup (1, \infty)$.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΟΛΑ

1. Όρολογία - Συμβολισμοί	
1.1 Σύμβολα	Σελίδα 5
1.2 Ίσότητα	» 5
1.3 Σύνολα - Στοιχεία	» 5
1.4 Προτασιακός τύπος - Συνθήκη	» 6
1.5 Άλγεβρα συνόλων	» 7
1.6 Ζεύγος - Καρτεσιανό γινόμενο	» 9
2. Σχέσεις (Αντιστοιχίες) - Συναρτήσεις	
2.1 Σχέση	Σελίδα 10
2.2 Συνάρτηση	» 15
2.3 Πράξεις	» 19
Άσκήσεις	» 21

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

1. Μονότονες Συναρτήσεις	Σελίδα 22
1.1 Αύξουσες και φθίνουσες συναρτήσεις	» 22
1.2 Ή μονοτονία και ή σύνθεση συναρτήσεων	» 24
1.3 Ή μονοτονία και ή αντίστροφη συνάρτηση	» 29
2. Άκρότατα συναρτήσεως	» 31
2.1 Μέγιστο κι ελάχιστο συναρτήσεως	» 31
2.2 Τοπικά άκρότατα συναρτήσεως	» 36
3. Μελέτη συναρτήσεως και γεωμετρική της παράσταση	» 37
3.1 (Γενικά)	» 37
3.2 Ή συνάρτηση f με $f(x) = \gamma \sqrt{\alpha^2 - x^2}$, όπου α, γ είναι πραγματικοί άριθμοί και $\alpha > 0$	» 37
3.3 Ή συνάρτηση f με $f(x) = \gamma \sqrt{x^2 - \alpha^2}$, όπου α, γ είναι πραγματικοί άριθμοί και $\alpha > 0$	» 41
Άσκήσεις	» 42

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ

1. Άκολουθίες πραγματικών άριθμών.	Σελίδα 44
1.1 Ή έννοια τής άκολουθίας	» 44
1.2 Ή έννοια τής ύπακολουθίας	» 47
1.3 Μηδενικές άκολουθίες	» 48

1.4 Συγκλίνουσες ακολουθίες	Σελίδα	52
2. Τά σύμβολα $+\infty$ και $-\infty$. Έπιτρεπτές πράξεις	»	59
2.1 Τά σύμβολα $+\infty$ και $-\infty$	»	59
2.2 Έπιτρεπτές και μή έπιτρεπτές πράξεις μεταξύ τών συμβόλων $-\infty$, $+\infty$ καί τών πραγματικών αριθμών	»	62
2.3 Γενική παρατήρηση	»	67
*Ασκήσεις	»	68

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

1. Σύγκλιση συναρτήσεως γιά $x \rightarrow +\infty$	Σελίδα	70
1.1 (Γενικά)	»	70
1.2 Μηδενικές συναρτήσεις γιά $x \rightarrow +\infty$	»	70
1.3 Συγκλίνουσες συναρτήσεις γιά $x \rightarrow +\infty$	»	71
2. Σύγκλιση συναρτήσεως γιά $x \rightarrow -\infty$	»	74
3. Σύγκλιση συναρτήσεως γιά $x \rightarrow x_0$	»	76
3.1 Σύγκλιση συναρτήσεως γιά $x \rightarrow x_0 + 0$	»	76
3.2 Σύγκλιση συναρτήσεως γιά $x \rightarrow x_0 - 0$	»	77
3.3 Σύγκλιση συναρτήσεως γιά $x \rightarrow x_0$	»	79
4. Ίδιότητες τών συγκλινουσών συναρτήσεων	»	82
*Ασκήσεις	»	87

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

1. Έννοια τής συνεχούς συναρτήσεως	Σελίδα	89
1.1 (Όρισμός)	»	89
1.2 Ίδιότητες τών συνεχών συναρτήσεων	»	91
2. Οί τριγωνομετρικές συναρτήσεις	»	94
2.1 Έ συνάρτηση ήμίτονο είναι συνεχής	»	94
2.2 Έ συνάρτηση συνημίτονο είναι συνεχής	»	95
2.3 Έ συνάρτηση έφαπτομένη είναι συνεχής	»	95
2.4 Έ συνάρτηση συνεφαπτομένη είναι συνεχής	»	97
3. Έ έκθετική και ή λογαριθμική συνάρτηση	»	99
3.1 Έ έκθετική συνάρτηση	»	99
3.2 Έ λογαριθμική συνάρτηση	»	104
3.3 Άξιοσημείωτες ιδιότητες	»	107
*Ασκήσεις	»	113

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΣ

1. Έννοια τής παραγώγου συναρτήσεως	Σελίδα	114
1.1 (Όρισμός)	»	114
1.2 Γεωμετρική σημασία τής παραγώγου	»	116
1.3 Κινηματική σημασία τής παραγώγου	»	117
1.4* Διαφορικό συναρτήσεως	»	117
1.5 Ίδιότητες τών παραγώγων	»	118
1.6 Οί παράγωγοι μερικών στοιχειωδών συναρτήσεων	»	120
1.7 Παραγωγήσι σύνθετης συναρτήσεως	»	123

2. 'Ο ρόλος τής παραγώγου στή μελέτη συναρτήσεως	Σελίδα	126
2.1 (Βασικά θεωρήματα)	»	126
2.2 Κυρτές και κοίλες συναρτήσεις	»	130
2.3 'Ασύμπτωτες	»	133
2.4 'Εφαρμογές στή μελέτη συναρτήσεως	»	135
3. 'Ο ρόλος τής παραγώγου στόν υπολογισμό όριακῶν τιμῶν - 'Απροσδιόριστες μορφές	»	138
3.1 'Απροσδιόριστες μορφές τοῦ τύπου $\frac{0}{0}$	»	138
3.2 'Απροσδιόριστες μορφές τοῦ τύπου $\frac{+\infty}{+\infty}$	»	141
3.3 'Απροσδιόριστες μορφές τῶν τύπων $+\infty - (+\infty)$ καί $0(+\infty)$	»	142
3.4 'Απροσδιόριστες μορφές τῶν τύπων $0^0, (+\infty)^0$ καί $1^{+\infty}$	»	143
'Ασκήσεις	»	145

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ

1. Τό άόριστο όλοκλήρωμα	Σελίδα	147
1.1 'Αρχική συνάρτηση καί άόριστο όλοκλήρωμα	»	147
1.2 Γενικοί τύποι όλοκληρώσεως	»	149
'Ασκήσεις	»	152
2. Τό όρισμένο όλοκλήρωμα	»	153
2.1 'Ορισμός καί ιδιότητες	»	153
2.2 Τό όρισμένο όλοκλήρωμα ώς έμβαδόν	»	157
'Ασκήσεις	»	161

101	ΕΙΣΑΓΩΓΗ	101
102	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο	102
103	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο	103
104	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο	104
105	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο	105
106	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο	106
107	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο	107
108	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο	108
109	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο	109
110	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο	110
111	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10ο	111
112	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11ο	112
113	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12ο	113
114	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13ο	114
115	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14ο	115

116	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15ο	116
117	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16ο	117
118	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17ο	118
119	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18ο	119
120	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19ο	120
121	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20ο	121
122	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21ο	122
123	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22ο	123
124	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23ο	124
125	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24ο	125
126	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25ο	126
127	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26ο	127
128	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27ο	128
129	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 28ο	129
130	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29ο	130
131	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30ο	131

132	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 31ο	132
133	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 32ο	133
134	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 33ο	134
135	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 34ο	135
136	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35ο	136
137	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36ο	137
138	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 37ο	138
139	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 38ο	139
140	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 39ο	140
141	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40ο	141
142	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 41ο	142
143	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 42ο	143
144	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 43ο	144
145	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 44ο	145
146	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 45ο	146
147	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 46ο	147
148	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 47ο	148
149	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 48ο	149
150	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 49ο	150
151	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 50ο	151

152	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 51ο	152
153	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 52ο	153
154	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 53ο	154
155	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 54ο	155
156	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 55ο	156
157	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 56ο	157
158	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 57ο	158
159	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 58ο	159
160	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59ο	160
161	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 60ο	161
162	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61ο	162
163	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 62ο	163
164	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 63ο	164
165	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 64ο	165
166	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 65ο	166
167	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 66ο	167
168	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 67ο	168
169	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 68ο	169
170	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 69ο	170
171	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 70ο	171
172	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 71ο	172
173	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 72ο	173
174	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 73ο	174
175	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 74ο	175
176	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 75ο	176
177	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 76ο	177
178	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 77ο	178
179	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 78ο	179
180	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 79ο	180
181	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 80ο	181

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ (ΙΤΥΣΥΕ)



024000030045

ΕΚΔΟΣΗ Γ', 1979 (V) ΑΝΤΙΤΥΠΑ 67.000 – ΣΥΜΒΑΣΗ 3231/25-5-79

ΕΚΤΥΠΩΣΗ: ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΗ ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑ
ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ: ΚΑΤΣΙΑΒΡΙΑΣ Δ. Ο.Ε.

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

