

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

(ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΣ)

ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

Θ. ΒΑΒΑΛΕΤΣΚΟΥ — Γ. ΜΠΟΥΣΓΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ 1977

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

19717

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Με απόφαση τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως τὰ δι-
δακτικά βιβλία τοῦ Δημοτικοῦ, Γυμνασίου καὶ Λυ-
κείου τυπώνονται ἀπὸ τὸν Ὀργανισμό Ἐκδόσεων
Διδακτικῶν Βιβλίων καὶ μοιράζονται ΔΩΡΕΑΝ

Α ΧΙΤΛΕΡΙΑΔΟ

Με άδεια της Γαλλικής Κυβέρνησης, το
εθνικό βιβλίο του Δημοτικού Γυμνασίου και
και τα κείμενα από τον Οργανισμό Εκδόσεων
Διακρίσεων Βιβλίων και κομμάτια ΔΩΡΕΑΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΛΓΕΥΡΑ - ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ

Θ. ΒΑΒΑΛΕΤΣΚΟΥ — Γ. ΜΠΟΥΣΓΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ 1977

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ - ΤΡΙΤΟΜΕΤΡΙΑ

Θ. ΒΑΒΑΛΕΤΣΚΟΥ - Γ. ΜΠΟΥΣΣΟΥ

Τό βιβλίο γράφτηκε από τους :

Θ. Βαβαλέτσκο (Κεφάλαια IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV)
καί Γ. Μπούσσο (Κεφάλαια I, II, III καί XVI).

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ

1. ΠΡΟΤΑΣΗ

Οι άνθρωποι συνεννοούνται μεταξύ τους με προφορικό ή με γραπτό λόγο. Στή Γραμματική και στο Συντακτικό «ένας σύντομος λόγος με έντελώς άπλο περιεχόμενο» λέγεται **πρόταση**.

Στή Μαθηματική Λογική και γενικά στα Μαθηματικά θεωρούμε τις λεγόμενες **λογικές προτάσεις**, δηλαδή εκφράσεις με νόημα σύμφωνα με τήν έννοια που τούς δίνει τό συντακτικό, αλλά που τό περιεχόμενό τους νά μπορεί νά χαρακτηριστεί ή **μόνο ως άληθές** ή **μόνο ως ψευδές**. Έτσι, π.χ., ή πρόταση:

«ό αριθμός 4 είναι άρτιος» (1)

είναι μιά λογική πρόταση, έπειδή εκείνο, που εκφράζει, είναι άληθές.

Ή πρόταση:

«ό αριθμός 5 είναι άρνητικός» (2)

είναι μιά λογική πρόταση, έπειδή εκείνο, που εκφράζει, είναι ψευδές.

Οι παραπάνω προτάσεις (1) και (2) θεωρούνται ως **άπλές** προτάσεις, έπειδή δέν μπορούν νά χωρισθούν σέ δύο ή περισσότερες άλλες προτάσεις. Άντίθετα ή πρόταση:

«οί αριθμοί 2 και 11 είναι πρώτοι» (3)

ή όποια χαρακτηρίζεται ως **άληθής** (είναι δηλ. λογική πρόταση), χωρίζεται σέ δύο άλλες: «ό αριθμός 2 είναι πρώτος» και «ό αριθμός 11 είναι πρώτος». Γι' αυτό ή πρόταση (3) λέγεται **σύνθετη** πρόταση.

Σύμφωνα με τά παραπάνω στή Μαθηματική Λογική δεχόμαστε ότι:

i) Ύπάρχει ένα σύνολο άπλών λογικών προτάσεων. Τό σύνολο αυτό τό συμβολίζουμε μέ L.

ii) Κάθε πρόταση άπό τό L, άνάλογα μέ τό περιεχόμενό της, έπιδέχεται τόν έναν και μόνο τόν έναν χαρακτηρισμό: **άληθής** ή **ψευδής**.

Παραδείγματα προτάσεων του συνόλου L:

1. «Τό άθροισμα τῶν ἔσωτερικῶν γωνιῶν κάθε τριγώνου εἶναι ἴσο μέ μία εὐθεία γωνία» (ἀληθής).

2. « $4+2=7$ » (ψευδής).

Παραδείγματα προτάσεων, πού δέν ἀνήκουν στοῦ L:

1. «Τά Μαθηματικά εἶναι πράσινα» (παραλογισμός).

2. «Ἐνα τρίγωνο ἀποτελεῖται ἀπό τρεῖς γραμμές» (άσαφής).

3. « $x+10=0$ » (δέν μπορούμε ν' ἀποφανθοῦμε ἄν εἶναι ἀληθής ἢ ψευδής).

Ἐάν τὸ περιεχόμενο μιᾶς ἀπλῆς προτάσεως εἶναι ἀληθές, τότε λέμε ὅτι ἡ πρόταση ἔχει **λογική τιμή Α** ἢ **τιμή ἀλήθειας Α**.

Ἐάν τὸ περιεχόμενο μιᾶς ἀπλῆς προτάσεως εἶναι ψευδές, τότε λέμε ὅτι ἡ πρόταση ἔχει **λογική τιμή Ψ** ἢ **τιμή ἀλήθειας Ψ**.

Παραδείγματα :

1. Ἡ τιμή ἀλήθειας τῆς προτάσεως «ὁ 5 εἶναι ἀρνητικός ἀριθμός» εἶναι Ψ.

2. Ἡ τιμή ἀλήθειας τῆς προτάσεως «ὁ 3 εἶναι θετικός ἀριθμός» εἶναι Α.

Τίς προτάσεις τοῦ συνόλου L παρασταίνουμε συνήθως μέ τὰ γράμματα p, q, r κτλ. Γράφουμε π.χ.

p: «ὁ ἀριθμός 135 λήγει σέ 5».

q: «ὁ ἀριθμός 125 εἶναι διαιρετός διά 5».

2. ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ

Οἱ ἄνθρωποι συνεννοοῦνται μέ τούς συνανθρώπους τους μέ τή βοήθεια διάφορων σημάτων, π.χ. γραμμάτων, λέξεων, φράσεων, προτάσεων, σημείων στίξεως, διάφορων συμβατικῶν σημάτων (π.χ. ΙΚΑ, ΟΤΕ), εἰκόνων, διαγραμμάτων κτλ. Κάθε τέτοιο σῆμα (γραπτό ἢ προφορικό) τὸ ὀνομάζουμε **σύμβολο**. Ἐνα γράμμα, π.χ. τὸ x, εἶναι σύμβολο. Σύμβολα εἶναι ἐπίσης, π.χ. ἡ λέξη «πέντε», τὸ «+», ὁ ἀριθμός 15, τὸ ἐρωτηματικό κτλ.

Μπορεῖ ἕνα σύμβολο ν' ἀποτελεῖται ἀπό περισσότερα σήματα, καθένα ἀπό τὰ ὁποῖα εἶναι ἐπίσης σύμβολο. Π.χ. $x^2 + 5$, $\alpha^2 - \beta$. Συνήθως σέ τέτοιες περιπτώσεις τὸ σύμβολο τὸ ὀνομάζουμε **ἐκφραση**.

Μέσα στίς προτάσεις καί γενικότερα στίς ἐκφράσεις, στά Μαθηματικά ἰδίως, βρίσκουμε ὄρους ἢ σύμβολα, ὅπως π.χ. «ἄθροισμα», «τρίγωνο», «-8», «+12», «0» καί ἄλλα παρόμοια, πού ἔχουν μία **καθορισμένη καί μόνιμη σημασία στό θέμα, τὸ ὁποῖο ἐξετάζουμε**. Τέτοιοι ὄροι καί τέτοια σύμβολα ὀνομάζονται **σταθερές**. Μπορεῖ ὅμως σέ μία ἐκφραση νά ὑπάρχει σύμβολο, τὸ ὁποῖο δέν ἔχει μόνιμη καί καθορισμένη σημασία σ' αὐτή τήν ἐκφραση. Π.χ. στήν ἐκφραση «ὁ φυσικός ἀριθμός x εἶναι μικρότερος ἀπό τόν 5» τὸ σύμβολο x δέν ἔχει μόνιμη καί καθορισμένη σημασία. Δέν εἶναι δηλ. τὸ «x» ὄνομα ἑνός ὀρισμένου ἀριθμοῦ. Ἐπιπλέον εἶναι ὑποχρεωμένο νά σημαίνει ἕναν ὅποιοδήποτε φυσικό ἀριθμό. Ἐάν ὅμως στή θέση τοῦ x τοποθετήσουμε κάποιο φυσικό ἀριθμό, τότε θά προκύψει πρόταση (ἀληθής ἢ ψευδής). Τὸ ἴδιο συμβαίνει στήν ἐκφραση $2x = 4$

καί στήν έκφραση $x > y$. Σύμβολα, ὅπως τά x καί y τῶν προηγούμενων παραδειγμάτων ὀνομάζονται **μεταβλητές**.

3. ΠΡΟΤΑΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ (Ἡ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ)

Α) Ἐξετάσουμε πάλι τήν έκφραση:

«ὁ φυσικός ἀριθμός x εἶναι μικρότερος ἀπό τόν 5».

Ἡ έκφραση αὕτη δέν εἶναι πρόταση, ἀφοῦ δέν μπορούμε ν' ἀποφανθοῦμε ἂν εἶναι ἢ μόνο ἀληθής ἢ μόνο ψευδής.

Παρατηροῦμε ὅμως ὅτι ἡ έκφραση αὕτη γίνεται πρόταση, ἂν στή θέση τῆς μεταβλητῆς x τοποθετήσουμε ἕναν ὁποιοδήποτε φυσικό ἀριθμό. Ἄν π.χ. ἀντικαταστήσουμε τό x μέ τό 2, θά προκύψει ἡ πρόταση «ὁ φυσικός ἀριθμός 2 εἶναι μικρότερος ἀπό τόν 5», πού εἶναι ἀληθής. Ἄν ἀντικαταστήσουμε τό x μέ τόν 7, θά προκύψει πάλι πρόταση: «ὁ φυσικός ἀριθμός 7 εἶναι μικρότερος ἀπό τόν 5», ἡ ὁποία εἶναι ψευδής.

Ἄς ἐξετάσουμε ἀκόμα τήν έκφραση:

$$2x = 4$$

Ἡ έκφραση αὕτη γίνεται πρόταση, ἂν ἀντικαταστήσουμε τό x μέ ἕναν πραγματικό ἀριθμό, π.χ. τόν 3. Τότε γίνεται $2 \cdot 3 = 4$, γίνεται δηλ. πρόταση ψευδής. Ἡ ἴδια έκφραση γίνεται πρόταση ἀληθής, ἂν τή μεταβλητή x τήν ἀντικαταστήσουμε μέ τό 2.

Οἱ ἐκφράσεις «ὁ φυσικός ἀριθμός x εἶναι μικρότερος ἀπό τόν 5», $2x = 4$ κτλ. ὀνομάζονται **προτασιακοί τύποι ἢ ἀνοικτές προτάσεις**.

Γενικά: **Προτασιακός τύπος (ἢ ἀνοικτή πρόταση) μιᾶς μεταβλητῆς λέγεται κάθε έκφραση, πού περιέχει μιᾶ μόνο μεταβλητή καί μετατρέπεται σέ πρόταση, ὅταν ἡ μεταβλητή ἀντικατασταθεῖ ἀπό ἕνα ὁποιοδήποτε στοιχεῖο ἑνός καθορισμένου συνόλου.**

Τό στοιχεῖο, πού μπαίνει στή θέση τῆς μεταβλητῆς, γιά νά προκύψει πρόταση, λέγεται **τιμὴ** τῆς μεταβλητῆς. Τό σύνολο τῶν τιμῶν τῆς μεταβλητῆς λέγεται **σύνολο ἀναφορᾶς** τοῦ προτασιακοῦ τύπου καί συμβολίζεται συνήθως μέ U . Π.χ. στόν προτασιακό τύπο $2x > 3$ μπορούμε νά πάρουμε γιά σύνολο ἀναφορᾶς τό σύνολο \mathbb{R} , τῶν πραγματικῶν ἀριθμῶν. Τότε, ἂν ἡ τιμὴ τῆς μεταβλητῆς x εἶναι ἀριθμός μεγαλύτερος ἀπό τόν $1\frac{1}{2}$, θά προκύψει πρόταση ἀληθής, ἐνῶ ἂν εἶναι ἴσος ἢ μικρότερος ἀπό τόν $1\frac{1}{2}$, θά προκύψει πρόταση ψευδής.

Τό σύνολο τῶν τιμῶν τῆς μεταβλητῆς, γιά τίς ὁποῖες ἕνας προτασιακός τύπος γίνεται πρόταση ἀληθής, λέγεται **σύνολο ἀλήθειας** τοῦ προτασιακοῦ τύπου. Στόν προτασιακό τύπο, π.χ., $2x = 4$, ἂν θεωρήσουμε ὡς σύνολο ἀναφορᾶς τό \mathbb{R} , τῶν πραγματικῶν ἀριθμῶν, τότε τό σύνολο ἀλήθειας του εἶναι τό $\{2\}$.

Σημ. Εἶπαμε ὅτι συνήθως ἡ μεταβλητή x εἶναι στοιχεῖο ἑνός καθορισμένου συνόλου, ἔστω U , πού τό ὀνομάσαμε σύνολο ἀναφορᾶς. Στήν περίπτωση αὕτη ὁ προτασιακός τύπος λέγεται καί **συνθήκη** στό U καί λέμε ὅτι ἡ μεταβλητή x διατρέχει τό U .

Γιά συντομία τούς προτασιακούς τύπους με μία μεταβλητή, π.χ., x τούς συμβολίζουμε με $p(x)$, $q(x)$, $s(x)$ κτλ. και τά σύνολα αλήθειας τους με P , Q , S κτλ.

"Αν, π.χ., παραστήσουμε με $p(x)$ τόν προτασιακό τύπο $1 < x < 5$ και πάρουμε γιά σύνολο αναφοράς τό N , τότε ή πρόταση $p(2)$ είναι αληθής, ενώ ή $p(8)$ είναι ψευδής. Τό σύνολο αλήθειας του $p(x)$ είναι $P = \{2, 3, 4\}$.

'Επίσης στόν προτασιακό τύπο $q(x) : 4x = 20$ έχουμε ότι: $q(5) = 4 \cdot 5 = 20$, δηλ. αληθής πρόταση, ενώ $q(2) = 4 \cdot 2 = 8$, δηλ. ψευδής πρόταση. Σύνολο αλήθειας του είναι τό $Q = \{5\}$.

Β) "Ας θεωρήσουμε τώρα τήν έκφραση $x > y$.

"Αν αντικαταστήσουμε τό x με 6 και τό y με 4, προκύπτει ή πρόταση $6 > 4$, ή όποία είναι αληθής. "Αν βάλουμε $x = 3$ και $y = 6$ προκύπτει ή ψευδής πρόταση $3 > 6$.

'Η έκφραση $x > y$ λέγεται προτασιακός τύπος με δύο μεταβλητές. Παρατηρούμε έδω ότι υπάρχουν ζεύγη τιμών των μεταβλητών από τό σύνολο R , γιά τίς όποίες ό προτασιακός τύπος γίνεται αληθής πρόταση, και άλλα ζεύγη τιμών, γιά τίς όποίες γίνεται ψευδής πρόταση.

"Ας θεωρήσουμε ακόμα τήν έκφραση:

«ή πόλη x είναι πρωτεύουσα του κράτους y ».

"Αν αντί x βάλουμε «'Αθήναι» και αντί y «'Ελλάδα», προκύπτει πρόταση αληθής: «'Η πόλη 'Αθήναι είναι πρωτεύουσα του κράτους 'Ελλάδα». "Αν αντί x βάλουμε «Μιλάνο» και αντί y «'Ελλάδα», προκύπτει πρόταση ψευδής. Οί εκφράσεις $x > y$, «ή πόλη x είναι πρωτεύουσα του κράτους y », λέγονται **προτασιακοί τύποι** με δύο μεταβλητές.

Γενικά: Προτασιακός τύπος ή άνοικτή πρόταση με δύο μεταβλητές λέγεται **μία έκφραση**, πού περιέχει δύο μεταβλητές και πού μετατρέπεται σέ πρόταση, όταν οί μεταβλητές αντικατασταθούν από στοιχεία δύο καθορισμένων συνόλων. Τά σύνολα αναφοράς των μεταβλητών μπορεί και νά ταυτίζονται.

Στό α' παράδειγμά μας, $x > y$, και οί δύο μεταβλητές αναφέρονται στό σύνολο R , των πραγματικών αριθμών.

Στ β' παράδειγμα ή μεταβλητή x αναφέρεται στό σύνολο των πόλεων και ή μεταβλητή y στό σύνολο των κρατών του κόσμου.

Γιά συντομία συμβολίζουμε τούς προτασιακούς τύπους με δύο μεταβλητές, με τό $p(x, y)$, $q(x, y)$, $s(x, y)$ κτλ.

"Αν $p(x, y)$ συμβολίζει τόν προτασιακό τύπο του α' παραδείγματος, τότε $p(7, 5)$ είναι πρόταση αληθής, ενώ ή $p(5, 7)$ είναι πρόταση ψευδής.

'Επίσης αν $q(x, y)$: «ή πόλη x είναι πρωτεύουσα του κράτους y », τότε $q(\text{Λονδίνο}, \text{'Αγγλία})$ είναι αληθής πρόταση, ενώ $q(\text{Ρώμη}, \text{Βέλγιο})$ είναι ψευδής.

Παρατηρούμε ότι τό σύνολο αλήθειας ενός προτασιακού τύπου με δύο μεταβλητές είναι γενικά ένα σύνολο διατεταγμένων ζευγών.

1) Νά εξετάσετε πώς μπορούν νά ονομασθούν οι εκφράσεις: « - », «παραλληλόγραμμο», «όρθη γωνία», «17».

2) Νά εξετάσετε πώς μπορούν νά ονομασθούν οι εκφράσεις:

α) 'Ο 10 είναι αριθμός σύνθετος.

β) $2 = 4$.

γ) $5 = 3 + 2$.

δ) 'Ο Εύκλειδης ήταν φιλόλογος.

ε) 'Ο x είναι πρώτος αριθμός.

στ) $2x + 3 = 23$.

ζ) $x + y = 5$.

3) Γνωρίζουμε ότι υπάρχει μία μόνο τιμή του x για την οποία $2x = 6$. Σημαίνει αυτό ότι τό x είναι σταθερό στην έκφραση $2x = 6$;

4) Σταθερές, οι οποίες είναι ονόματα του ίδιου πράγματος, λέμε ότι έχουν την ίδια τιμή. Π.χ. «0» και « $2 - 2$ ». Νά γράψετε πέντε σταθερές, οι οποίες νά έχουν την τιμή 6.

5) 'Υπάρχουν άραγε προτασιακοί τύποι, οι οποίοι δέ γίνονται αληθείς προτάσεις για καμία τιμή της μεταβλητής τους; 'Εξετάστε τόν $\frac{x}{x} = 2$. Δώστε ένα δικό σας παράδειγμα (Πάρτε ως σύνολο αναφοράς της μεταβλητής τό \mathbb{N}).

6) 'Υπάρχουν προτασιακοί τύποι μιās μεταβλητής, οι οποίοι γίνονται αληθείς προτάσεις για όλες τίς τιμές της μεταβλητής τους. Προφανές παράδειγμα: $x + x = 2x$, όπου $x \in \mathbb{R}$.

Νά βρείτε ένα δικό σας παράδειγμα. Πώς ονομάζονται οι Ισότητες, όπως ή $x + x = 2x$;

7) Δίνεται ο προτασιακός τύπος $p(x)$: $2x = 10$ και σύνολο αναφοράς τό \mathbb{R} . Νά βρείτε τό σύνολο αλήθειας P του προτασιακού τύπου.

8) Δίνεται ο προτασιακός τύπος $x + y = 5$ και σύνολο αναφοράς τών μεταβλητών τό $\Sigma = \{1, 2, 3, 4, 5\}$. Νά βρείτε τό σύνολο αλήθειας του προτασιακού τύπου.

9) Δίνεται ο προτασιακός τύπος $q(x)$: $y = x + 1$, όπου x, y είναι στοιχεία του \mathbb{R} . Νά βρείτε δύο ζεύγη, για τά οποία $q(x, y)$ γίνεται πρόταση αληθής, και δύο για τά οποία γίνεται ψευδής.

10) Δίνεται ο προτασιακός τύπος $p(x)$: $x^2 - 25 = 0$.

Νά όρίσετε σύνολο αναφοράς του και τό αντίστοιχο σύνολο αλήθειας του.

11) Δίνεται ο προτασιακός τύπος «ή πόλη x βρίσκεται στό νομό y ». Σύνολα αναφοράς: της μεταβλητής x τό σύνολο τών πόλεων της 'Ελλάδας, της μεταβλητής y τό σύνολο τών νομών της 'Ελλάδας. Νά βρείτε τρία ζεύγη του συνόλου αλήθειας του προτασιακού τύπου.

4. ΠΟΣΟΔΕΙΚΤΕΣ

A) Γνωρίζουμε από την Άλγεβρα ότι

$$(x + 1)^2 = x^2 + 2x + 1, \text{ όπου } x \in \mathbb{R}$$

Γνωρίζουμε επίσης ότι ο προτασιακός αυτός τύπος μιās μεταβλητής γίνεται αληθής πρόταση για κάθε τιμή της μεταβλητής x , την οποία (τιμή) παίρνουμε από τό σύνολο \mathbb{R} , τών πραγματικών αριθμών. Μέ άλλα λόγια τό σύνολο αλήθειας του προτασιακού τύπου ταυτίζεται μέ τό σύνολο αναφοράς του.

Συμβολικά γράφουμε τότε:

$$\forall x(x \in \mathbb{R}) : (x + 1)^2 = x^2 + 2x + 1$$

και διαβάζουμε:

«Για κάθε x , τό όποιο άνήκει στό R , άληθεύει ότι

$$(x + 1)^2 = x^2 + 2x + 1.$$

Τό σύμβολο \forall διαβάζεται «για κάθε...» ή «για όλα τά...» και λέγεται **καθολικός ή γενικός ποσοδείκτης**.

Έπίσης $\forall x (x \in R) : x - x = 0$.

Μπορούμε λοιπόν, όταν έχουμε προτασιακούς τύπους, πού τό σύνολο άλήθειας τους ταυτίζεται μέ τό σύνολο άναφοράς τους, νά προτάσσουμε τό γενικό ποσοδείκτη.

B) Άς εξετάσουμε τώρα τόν προτασιακό τύπο:

$$p(x) : x + 3 = 8 \quad (x \in R)$$

Παρατηρούμε έδώ ότι $p(x)$ δέ γίνεται άληθής πρόταση για κάθε τιμή τής μεταβλητής, άπό τό R , άφοϋ, π.χ., $p(1) = 4$, δηλ. πρόταση ψευδής. Άλλά τό σύνολο άλήθειας του προτασιακού τύπου $x + 3 = 8$ δέν είναι τό κενό. Πραγματικά $p(5) = 8$, δηλ. άληθής πρόταση.

Γράφουμε συμβολικά στην περίπτωση αυτή:

$$\exists x (x \in R) : x + 3 = 8$$

και διαβάζουμε:

«Υπάρχει τουλάχιστο ένα x , τό όποιο άνήκει στό R , τέτοιο ώστε νά άληθεύει $x + 3 = 8$ ».

Τό σύμβολο \exists λέγεται **ύπαρξιακός ποσοδείκτης** και διαβάζεται «ύπάρχει τουλάχιστο ένα...» ή «για μερικά...».

Μπορούμε επίσης νά γράφουμε:

$$\alpha) \exists x (x \in R) : x + 1 > 5$$

$$\beta) \exists x (x \in R) : x = -x$$

γ) Άν T όνομάσουμε τό σύνολο τών τριγώνων, τότε:

$$\exists x (x \in T) : x \text{ ισόπλευρο}$$

Όστε: Όταν σ'έναν προτασιακό τύπο τό σύνολο άλήθειας του είναι γνήσιο ύποσύνολο του συνόλου άναφοράς, τότε μπορούμε νά προτάσσουμε τόν ύπαρξιακό ποσοδείκτη.

Γενικότερα πρέπει νά γνωρίζουμε τά εξής:

Συχνά, για νά διατυπώσουμε προτάσεις, οι όποιες χρησιμοποιούνται στά Μαθηματικά, κάνουμε χρήση τών ποσοδεικτών. Οι ποσοδείκτες προτάσσονται στους προτασιακούς τύπους και τότε αυτοί γίνονται προτάσεις ή μόνο άληθεις ή μόνο ψευδεις.

Έτσι, π.χ., ή πρόταση $\forall x (x \in U) : p(x)$ είναι μία λογική πρόταση, έπειδή παίρνει τιμή άλήθειας A άν, και μόνο άν, τό σύνολο άλήθειας της P ταυτίζεται μέ τό σύνολο άναφοράς U (όπότε τό $P^c = \emptyset$) και τιμή άλήθειας ψ , άν, και μόνο άν, τό P είναι γνήσιο ύποσύνολο του U (όπότε τό $P^c \neq \emptyset$).

Έπίσης ή πρόταση $\exists x (x \in U) : p(x)$ είναι μία λογική πρόταση, έπειδή έχει τιμή άλήθειας A , άν, και μόνο άν, τό σύνολο άλήθειας της P δέν είναι τό κενό, και τιμή άλήθειας ψ , άν, και μόνο άν, τό σύνολο P είναι τό \emptyset (όπότε $P^c = U$).

Παραδείγματα :

1. *Αν $p(x) : x + 1 > 3$ και $U = \mathbb{N}$, τότε
 - α) $\forall x (x \in \mathbb{N}) : x + 1 > 3$ λαμβάνει τιμή αλήθειας Ψ , αφού $P = \{3, 4, 5, 6, \dots\} \subset U$.
 - β) $\exists x (x \in \mathbb{N}) : x + 1 > 3$ λαμβάνει τιμή αλήθειας A , αφού $P = \{3, 4, 5, 6, \dots\} \neq \emptyset$.
2. *Αν $p(x) : x^2 + 1 < 0$ και $U = \mathbb{R}$, τότε:
 - α) $\forall x (x \in \mathbb{R}) : x^2 + 1 < 0$ λαμβάνει τιμή αλήθειας ψ , αφού $P = \emptyset$.
 - β) $\exists x (x \in \mathbb{R}) : x^2 + 1 < 0$ λαμβάνει τιμή αλήθειας ψ , αφού $P = \emptyset$.
3. *Αν $p(x) : x^2 + 2x + 1 = (x + 1)^2$, τότε
 - α) $\forall x (x \in \mathbb{R}) : x^2 + 2x + 1 = (x + 1)^2$ έχει τιμή αλήθειας A , αφού $P = \mathbb{R}$.
 - β) $\exists x (x \in \mathbb{R}) : x^2 + 2x + 1 = (x + 1)^2$ έχει τιμή αλήθειας A , αφού $P \neq \emptyset$.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

12) Νά εξετάσετε αν είναι αληθές ή ψευδές ότι:

- | | |
|---|--|
| α) $\forall x (x \in \mathbb{N}) : \frac{x}{x} = 1,$ | β) $\forall x (x \in \mathbb{R}) : (x + 1)^2 = x^2 + 1,$ |
| γ) $\exists x (x \in \mathbb{R}) : x = x + 2,$ | δ) $\exists x (x \in \mathbb{R}) : x^2 \neq 0,$ |
| ε) $\exists x (x \in \mathbb{R}) : (x + 1)^2 = x^2 + 2x + 1,$ | στ) $\forall x (x \in \mathbb{R}) : x = -x.$ |

13) Νά χρησιμοποιήσετε κατάλληλο ποσοδείκτη στους παρακάτω προτασιακούς τύπους:

- | | |
|--------------------|-----------------|
| α) $x \neq x + 1,$ | β) $x^2 = x,$ |
| γ) $ x = x,$ | δ) $x - 1 < 2.$ |

όπου σύνολο αναφοράς της μεταβλητής είναι τό \mathbb{R} .

5. ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Στήν καθημερινή συζήτηση και στά Μαθηματικά δέ χρησιμοποιούμε μόνο άπλές προτάσεις. Συνήθως τίς άπλές προτάσεις τίς συνδέουμε μεταξύ τους μέ διάφορα συνδετικά, π.χ. «καί», «εΐτε», «ή», «όχι», «έάν... , τότε...» κτλ. και σχηματίζουμε μ' αυτόν τόν τρόπο νέες προτάσεις. Αυτές τίς προτάσεις τίς ονομάζουμε **σύνθετες προτάσεις**.

6. Η ΣΥΖΕΥΞΗ ΔΥΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ό άπλούστερος τρόπος συνδέσεως δύο προτάσεων είναι ή σύζευξη, στήν όποία έκφωνούμε ή γράφουμε τή μιά μετά τήν άλλη μέ ένα **καί** μεταξύ τους. Π.χ. από τίς άπλές προτάσεις: «Ό Γιάννης είναι μαθητής», «ό Κώστας είναι κηπουρός» προκύπτει μέ τή σύζευξή τους ή σύνθετη πρόταση:

«ό Γιάννης είναι μαθητής και ό Κώστας είναι κηπουρός».

Ό σύζευξη δύο προτάσεων άποτελεί πρόταση και έπομένως θά είναι ή μόνο αληθής ή μόνο ψευδής.

Δεχόμαστε ότι η σύζευξη είναι αληθής, μόνο όταν και οι δύο άπλές προτάσεις είναι συγχρόνως αληθείς, αλλιώς η σύζευξη είναι ψευδής.

‘Η σύζευξη, π.χ., «ο Σωκράτης ήταν αστρονόμος και $2 + 3 = 5$ είναι ψευδής, ενώ η σύζευξη « $2 + 3 = 5$ και $2 > 0$ » είναι αληθής.

‘Η σύζευξη δύο προτάσεων p και q συμβολίζεται: $p \wedge q$.

Τό σύμβολο \wedge διαβάζεται «καί» και λέγεται **σύμβολο της συζεύξεως**.

Προσέξτε: τό σύμβολο \wedge χρησιμοποιείται μόνο για να συνδέει προτάσεις. Δέν επιτρέπεται, π.χ., να γράψουμε « $3 \wedge 2$ » ή «ο Κώστας \wedge η ‘Ελένη».

7. ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

A) Στή Μαθηματική λογική ή μέθοδος πού χρησιμοποιείται περισσότερο για τήν εύρεση τών (λογικών) τιμών τών σύνθετων προτάσεων είναι εκείνη, κατά τήν όποια αναγράφουμε σε μορφή πίνακα όλες τīs δυνατότητες αληθοῦς ή ψευδοῦς τών άπλών προτάσεων και τής σύνθετης προτάσεως πού προκύπτει άπ’ αυτές. Ένας τέτοιος πίνακας λέγεται συνήθως **πίνακας (λογικῶν) τιμών ή πίνακας αλήθειας**.

‘Από έναν πίνακα αλήθειας μπορούμε να διαπιστώσουμε μέ ένα βλέμμα άν μία σύνθετη πρόταση είναι αληθής ή ψευδής, όταν γνωρίζουμε, ότι οι προτάσεις, πού τήν άποτελούν, είναι αληθείς ή ψευδείς.

Παρακάτω βλέπετε τόν πίνακα αλήθειας για τήν πράξη * τής συζεύξεως δύο προτάσεων p και q . Στήν πρώτη γραμμή τού πίνακα βλέπουμε ότι ή σύζευξη $p \wedge q$ είναι αληθής, μόνο όταν και οι δύο άπλές προτάσεις p, q είναι συγχρόνως αληθείς. Σ’ όλες τīs άλλες περιπτώσεις ή σύζευξη $p \wedge q$ είναι ψευδής. Αυτό τό δεχθήκαμε ως αληθές, επειδή συμφωνεί και μέ τήν ένόρασή μας.

B) Μέ τρόπο άνάλογο πρὸς τή σύζευξη δύο προτάσεων μπορούμε να ξεετάσουμε τή σύζευξη δύο άνοικτῶν προτάσεων, $p(x)$ και $q(x)$, τήν όποία θά συμβολίζουμε μέ $p(x) \wedge q(x)$.

*Ας πάρουμε ένα παράδειγμα:

*Εστω ότι $p(x)$ είναι: $x^2 - 5x + 6 = 0$ και $q(x) : x - 2 = 0$.

Τότε $p(x) \wedge q(x)$ είναι:

$$(x^2 - 5x + 6 = 0) \wedge (x - 2 = 0), U = R.$$

*Όταν $x = 5$, ή παραπάνω σύζευξη μετατρέπεται στήν έξης σύνθετη πρόταση:

$$(5^2 - 5 \cdot 5 + 6 = 0) \wedge (5 - 2 = 0)$$

ή όποία είναι ψευδής, επειδή καθεμία άπό τīs άπλές προτάσεις πού τήν άποτελούν είναι ψευδής.

*Αν στήν παραπάνω σύζευξη $p(x) \wedge q(x)$ θέσουμε $x = 2$, τότε προκύπτει ή πρόταση:

(*) Οι διάφοροι τρόποι μέ τούς όποιους συνδέονται οι άπλές προτάσεις για να σχηματισθούν σύνθετες προτάσεις άποτελούν τīs **λογικές πράξεις** (§ 5), όπως τīs λέμε.

$$(2^2 - 5 \cdot 2 + 6 = 0) \wedge (2 - 2 = 0)$$

ή όποία είναι άληθής, έπειδή καθεμία άπό τίς άπλές προτάσεις πού τήν άποτελοϋν είναι άληθής.

Άπ' αυτό τό παράδειγμα γίνεται φανερό ότι τό σύνολο άλήθειας τής τής συζεύξεως δύο άνοικτών προτάσεων $p(x), q(x)$, τό όποίο συμβολίζουμε $\{x \mid p(x) \wedge q(x)\}$, άποτελείται άπό έκείνα τά στοιχεία $x \in U$ (τοϋ συνόλου άναφοράς), τά όποία άνήκουν συγχρόνως στό σύνολο P [σύνολο άλήθειας τής $p(x)$] και στό σύνολο Q [σύνολο άλήθειας τής $q(x)$], δηλ. άπό τά στοιχεία πού άνήκουν στην τομή $P \cap Q$.

Ώστε: $\{x \mid p(x) \wedge q(x)\} = P \cap Q.$

Πραγματικά στό προηγούμενο παράδειγμα έχουμε:

$$\{x \mid x^2 - 5x + 6 = 0 \wedge x - 2 = 0\} = \{2, 3\} \cap \{2\} = \{2\}$$

8. ΔΙΑΖΕΥΞΗ ΔΥΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

A) Όταν παραθέσουμε δύο προτάσεις στη συνέχεια μέ τό συνδετικό «ή» ή τό «είτε» μεταξύ τους, λέμε ότι σχηματίσαμε **τή διάζευξη** τών δύο αυτών προτάσεων.

Προσέξτε π.χ. τίς παρακάτω τρεις σύνθετες προτάσεις.

1) Η Έθνική Τράπεζα προσλαμβάνει άπολυτηριούχους τοϋ Γυμνασίου, πού γνωρίζουν Γαλλικά είτε Άγγλικά.

2) Θα άριστεύσω στά Μαθηματικά είτε στά Φυσικά.

3) Θα πάω στον κινηματογράφο ή θα μείνω στό σπίτι.

Στήν πρώτη πρόταση είναι φανερό ότι ή Τράπεζα δέν άποκλείεται νά προσλάβει άπολυτηριούχο τοϋ Γυμνασίου, ό όποιος νά γνωρίζει Γαλλικά και Άγγλικά. Επίσης στη δεύτερη πρόταση ό μαθητής δέν άποκλείει ότι ένδέχεται νά άριστεύσει και στά Μαθηματικά και στά Φυσικά.

Στήν τρίτη πρόταση είναι φανερό ότι αυτός, πού μιλάει θα κάνει ένα άπό τά δύο: ή θα πάει στον κινηματογράφο ή θα μείνει στό σπίτι. Έπομένως, όταν λέμε «p ή q», θα έννοοϋμε ή μόνο p είναι άληθής ή μόνο q είναι άληθής.

Στήν πρώτη και δεύτερη περίπτωση ή **μία τουλάχιστο και ένδεχομένου** **οι δύο προτάσεις είναι άληθείς**. Λέμε τότε ότι έχουμε **έγκλειστική διάζευξη** ή, άπλώς, **διάζευξη** και κάνουμε χρήση τοϋ «είτε» ως συνδετικού. Σύμβολο τής έγκλειστικής διαζεύξεως είναι τό \vee τό όποίο διαβάζεται «είτε».

Στήν περίπτωση τοϋ τρίτου παραδείγματος τό συνδετικό «ή» χρησιμοποιείται μέ τήν έννοια ότι ή **μία μόνο** **άπό τίς προτάσεις είναι άληθής** και ή **άλλη είναι ψευδής**. Στήν περίπτωση αυτή λέμε ότι ή διάζευξη είναι **άποκλειστική**. Σύμβολο τής άποκλειστικής διαζεύξεως είναι τό \vee , τό όποίο διαβάζεται ή.

Σημ. Στήν καθημερινή όμιλία χρησιμοποιοϋμε, βέβαια, τή λέξη ή μέ διπλή σημασία. Άλλοτε, όταν λέμε «p ή q», έννοοϋμε ότι **μία, και μόνο μία**, άπό τίς προτάσεις είναι άληθής και άλλοτε ότι **μία τουλάχιστο** πρόταση είναι άληθής και πιθανώς νά είναι και οι δύο.

Στά Μαθηματικά όμως δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τό «ή» με διπλή σημασία. Πρέπει να γνωρίζουμε ακριβώς τις έννοούμε, όταν λέμε « p ή q ».

Παραδείγματα (έγκλειστικής) διαζεύξεως: $p \vee q$ (p είτε q)

1) $\delta \frac{3}{4}$ είναι ρητός είτε $\delta -2$ είναι θετικός.

2) $\delta 4$ είναι διαιρέτης του 5 είτε $\delta 3$ είναι φυσικός.

3) $\delta 4$ είναι διαιρέτης του 8 είτε $\delta -3$ είναι αρνητικός.

Οι παραπάνω διαζεύξεις είναι αληθείς προτάσεις.

4) 'Η διάζευξη: « $\delta 3$ είναι αρνητικός είτε $\delta \frac{1}{2}$ είναι άκέραιος» είναι ψευδής, επειδή και οι δύο άπλές προτάσεις πού την αποτελούν είναι ψευδείς.

Πίνακας (λογικών) τιμών της (έγκλειστικής) διαζεύξεως: $p \vee q$

p	q	$p \vee q$
A	A	A
A	Ψ	A
Ψ	A	A
Ψ	Ψ	Ψ

Δηλαδή η διάζευξη $p \vee q$ είναι ψευδής, μόνο όταν και οι δύο άπλές προτάσεις της είναι ψευδείς. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις είναι αληθείς.

Παραδείγματα άποκλειστικής διαζεύξεως: $p \vee\vee q$ (p ή q)

1) $\delta -3$ είναι φυσικός ή $\delta \frac{1}{2}$ είναι θετικός,

2) $\delta \frac{3}{4}$ είναι άκέραιος ή $\delta -3$ είναι αρνητικός,

3) $\delta 2$ είναι διαιρέτης του 5 ή $\delta -2$ είναι θετικός,

4) $\delta 5$ είναι φυσικός ή $\delta -5$ είναι αρνητικός.

Οι δύο πρώτες άποκλειστικές διαζεύξεις είναι αληθείς, ενώ οι δύο τελευταίες είναι ψευδείς.

Πίνακας (λογικών) τιμών της (άποκλειστικής) διαζεύξεως: $p \vee\vee q$

p	q	$p \vee\vee q$
A	A	Ψ
A	Ψ	A
Ψ	A	A
Ψ	Ψ	Ψ

Δηλαδή η διάζευξη $p \vee\vee q$ είναι αληθείς τότε, και μόνο τότε, όταν ή μία μόνο από τις άπλές προτάσεις της είναι αληθείς.

B) Μέ τρόπο ανάλογο προς τή διάζευξη δύο προτάσεων μπορούμε να εξετάσουμε τή διάζευξη δύο άνοικτων προτάσεων $p(x)$, $q(x)$, τήν όποία θά συμβολίζουμε $p(x) \vee q(x)$.

"Ας πάρουμε ένα παράδειγμα:

"Εστω ότι $p(x)$ είναι: $x^2 - 5x + 6 = 0$ και $q(x) : x + 5 = 0$. Τότε $p(x) \vee q(x)$ είναι:

$$(x^2 - 5x + 6 = 0) \vee (x + 5 = 0), \quad U = \mathbb{R}.$$

Όταν $x = 5$, η παραπάνω διάζευξη μετατρέπεται στην έξης σύνθετη πρόταση:

$$(5^2 - 5 \cdot 5 + 6 = 0) \vee (5 + 5 = 0)$$

ή όποια είναι ψευδής, έπειδή καθεμιά από τις άπλές προτάσεις πού τήν άποτελοϋν είναι ψευδής.

Άν $x = -5$, η παραπάνω διάζευξη άνοικτών προτάσεων γίνεται:

$$[(-5)^2 - 5 \cdot (-5) + 6 = 0] \vee (-5 + 5 = 0),$$

ή όποια είναι άληθής, έπειδή η δεύτερη πρόταση είναι άληθής. Έπίσης, αν $x = 3$, τότε η διάζευξη γίνεται:

$$(3^2 - 5 \cdot 3 + 6 = 0) \vee (3 + 5 = 0)$$

ή όποια είναι άληθής, έπειδή η πρώτη από τις άπλές προτάσεις της είναι άληθής.

Καταλήγουμε λοιπόν στο έξης συμπέρασμα: τά στοιχεΐα του συνόλου άλήθειας τής σύνθετης άνοικτής προτάσεως $p(x) \vee q(x)$ είναι έκείνα τά στοιχεΐα του συνόλου άναφορής, τά όποια ανήκουν στο σύνολο άλήθειας P τής $p(x)$ ή στο σύνολο άλήθειας Q τής $q(x)$ ή ανήκουν και στά δύο σύνολα P και Q . Μέ άλλες λέξεις τό σύνολο άλήθειας τής $p(x) \vee q(x)$ είναι τό $P \cup Q$.

Συμβολικά διατυπώνουμε τό συμπέρασμα αυτό ως έξης:

$$\{x \mid p(x) \vee q(x)\} = P \cup Q.$$

Γ) Κατ' άναλογία προς τήν άποκλειστική διάζευξη δύο προτάσεων μπορούμε νά ξεετάσουμε τήν άποκλειστική διάζευξη δύο προτασιακών τύπων $p(x)$, $q(x)$, τήν όποια θά συμβολίζουμε μέ $p(x) \underline{\vee} p(x)$.

Είναι φανερό ότι τό σύνολο άλήθειας τής $p(x) \underline{\vee} q(x)$ άποτελείται από έκείνα τά στοιχεΐα του συνόλου άναφορής, τά όποια κάνουν τήν $p(x)$ άληθή και τήν $q(x)$ ψευδή πρόταση, και έκείνα τά στοιχεΐα του συνόλου άναφορής, τά όποια κάνουν τήν $p(x)$ ψευδή και τήν $q(x)$ άληθή, δηλ. είναι τό σύνολο $P \cup Q - P \cap Q$, πού ταυτίζεται μέ τό σύνολο $(P - Q) \cup (Q - P)$.

Συμβολικά τό συμπέρασμα διατυπώνεται ως έξης:

$$\{x \mid p(x) \underline{\vee} q(x)\} = P \cup Q - P \cap Q \text{ ή } (P - Q) \cup (Q - P)$$

Παράδειγμα :

*Έστω ότι ζητείται τό $\{x \mid x^2 - 5x + 6 = 0 \vee x^2 - 6x + 8 = 0\}$, όπου σύνολο άναφορής είναι τό R .

*Έχουμε $P = \{2, 3\}$, $Q = \{2, 4\}$. Έπομένως: $P \cup Q = \{2, 3, 4\}$ και $P \cap Q = \{2\}$. Όστε: $P \cup Q - P \cap Q = \{3, 4\}$ και

$$\{x \mid x^2 - 5x + 6 = 0 \vee x^2 - 6x + 8 = 0\} = \{3, 4\}.$$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ (*)

- 14) Νά δείξετε ότι οι συζεύξεις $p \wedge q$ και $q \wedge p$ έχουν τις ίδιες τιμές άλήθειας.
- 15) Νά δείξετε ότι οι διαζεύξεις $p \vee q$ και $q \vee p$ έχουν τις ίδιες τιμές άλήθειας.
- 16) Νά διατυπώσετε μέ λόγια τή σύζευξη και τή διάζευξη των έξης προτάσεων:

(*) Άπό τις προτεινόμενες άσκήσεις στο Κεφάλαιο I θά δίνονται όσες, κατά τήν κρίση του καθηγητή πού διδάσκει, άπαιτούνται για τήν έμπέδωση κάθε ένότητας.

- α) 'Ο Γιώργος είναι αγρότης. 'Η 'Αγγελική είναι οικοκυρά.
 β) Οι ευθείες αυτές είναι παράλληλες. Οι ευθείες αυτές τέμνονται.

17) Νά σχηματίσετε τή σύζευξη και διάζευξη τῶν παρακάτω προτάσεων. Ἐπειτα νά ἀποφανθεῖτε γιά τό ἀληθές ἢ ψευδές τῶν σύνθετων προτάσεων, πού θά προκύψουν.

- α) 'Ο Σεπτέμβριος ἔχει 30 ἡμέρες. 'Η ἑβδομάδα ἔχει 8 μέρες.
 β) Τό 3 εἶναι μικρότερο τοῦ 4. Τό 4 εἶναι μικρότερο τοῦ 3.
 γ) $5 + 1 = 6$, $21 = 3 \cdot 7$.
 δ) $5 + 1 = 5$, $8 + 1 = 10$.

18) Νά σχηματίσετε τή σύζευξη καί διάζευξη τῶν παρακάτω ἀνοικτῶν προτάσεων. Νά βρεῖτε κατόπιν τά σύνολα ἀλήθειας τῶν σύνθετων ἀνοικτῶν προτάσεων, πού θά προκύψουν. (Σύνολο ἀναφορᾶς τό \mathbb{R}).

- α) $x + 2 = 0$, $x^2 - 4 = 0$
 β) $x^2 = 0$, $x = 2$
 γ) $x^2 - 8x + 12 = 0$, $x^2 - 5x + 6 = 0$
 δ) $x > 3$, $x > 5$
 ε) $x - 8 = 0$, $x > 5$
 στ) $x^2 - 4 = (x + 2)(x - 2)$, $x^2 - 1 = (x + 1)(x - 1)$.

Στήν ἀσκηση γ) νά βρεῖτε καί τό σύνολο ἀλήθειας τῆς ἀποκλειστικῆς διαζεύξεως.

19) *Αν α , β εἶναι πραγματικοί ἀριθμοί, τότε ἡ πρόταση $\alpha \cdot \beta = 0$ διατυπώνεται μέ μιά διάζευξη. Ποιά εἶναι αὐτή ἡ διάζευξη;

20) *Αν α καί β εἶναι πραγματικοί ἀριθμοί, τότε ἡ πρόταση $\alpha^2 + \beta^2 = 0$ διατυπώνεται μέ μιά σύζευξη. Ποιά εἶναι αὐτή ἡ σύζευξη;

9. ἈΡΝΗΣΗ

A) 'Η ἄρνηση διαφέρει ἀπό τίς προηγούμενες πράξεις τῆς διαζεύξεως καί συζεύξεως κατά τό ὅτι εἶναι **μονομελής** πράξη. *Αν p εἶναι μιά πρόταση, ἡ ἄρνηση τῆς p εἶναι μιά νέα (σύνθετη) πρόταση, πού ἔχει ἀντίθετη τιμή ἀλήθειας. *Αν, π.χ., ἡ p εἶναι ἀληθής, ἡ ἄρνηση τῆς p εἶναι ψευδής, καί ἄν ἡ p εἶναι ψευδής, ἡ ἄρνηση τῆς p εἶναι ἀληθής.

'Η ἄρνηση μιᾶς προτάσεως p συμβολίζεται μέ $\sim p$ καί διαβάζεται: ὄχι p .

Παραδείγματα :

1ο) p : ὁ 5 εἶναι φυσικός ἀριθμός.

$\sim p$: ὄχι ὁ 5 εἶναι φυσικός ἀριθμός = ὁ 5 δέν εἶναι φυσικός ἀριθμός.

2ο) p : ὁ 2 εἶναι ἀρνητικός ἀριθμός.

$\sim p$: ὄχι ὁ 2 εἶναι ἀρνητικός ἀριθμός = ὁ 2 δέν εἶναι ἀρνητικός ἀριθμός.

3ο) p : $2 + 3 = 5$

$\sim p$: $2 + 3 \neq 5$

4ο) Τό ἄθροισμα τῶν ἀπόλυτων τιμῶν τῶν ἐσωτερικῶν γωνιῶν ἐνός τριγώνου εἶναι 180° .

$\sim p$: τό ἄθροισμα τῶν ἀπόλυτων τιμῶν τῶν ἐσωτερικῶν γωνιῶν ἐνός τριγώνου δέν εἶναι 180° .

Πίνακας ἀλήθειας τῆς ἀρνήσεως $\sim p$

p	$\sim p$
A	Ψ
Ψ	A

Σημ. Φραστικῶς οἱ ἀρνήσεις τῶν ἀπλῶν προτάσεων σχηματίζονται συνήθως μέ τήν παρεμβολή ἑνός ὄχι (ἤ δέν) στήν κατάλληλη θέση.

Παραδείγματα :

- 1ο) p : ὁ 8 εἶναι τέλειο τετράγωνο.
~ p : ὁ 8 δέν εἶναι τέλειο τετράγωνο.
2ο) p : κάθε τετράγωνο εἶναι ὀρθογώνιο.
~ p : κάθε τετράγωνο δέν εἶναι ὀρθογώνιο.

Τό πίο συνηθισμένο σφάλμα πού γίνεται κατά τό σχηματισμό τῆς ἀρνήσεως μιᾶς προτάσεως ὅπως, π. χ., ἡ «Ὅλοι οἱ μαθητές αὐτῆς τῆς τάξεως ἀγαποῦν τή Γεωμετρία», εἶναι νά πούμε «κανεῖς μαθητής σ' αὐτή τήν τάξη δέν ἀγαπᾷ τή Γεωμετρία». Οἱ παραπάνω προτάσεις βέβαια δέ συμφωνοῦν, ἀλλά δέν εἶναι ἡ μιά ἀρνηση τῆς ἄλλης, ἐπειδή μπορεῖ νά εἶναι καί οἱ δύο ψευδεῖς. Γι' αὐτό εἶναι προτιμότερο σέ τέτοιες περιπτώσεις νά σχηματίζουμε τήν ἀρνηση λεκτικῶς μέ τό: ὄχι. Στό παραπάνω παράδειγμα λοιπόν θά πούμε: ὄχι ὅλοι οἱ μαθητές αὐτῆς τῆς τάξεως ἀγαποῦν τή Γεωμετρία.

B) Ἄν $p(x)$ εἶναι μιά ἀνοικτή πρόταση, τότε ἡ ἀρνησή της συμβολίζεται μέ $\sim p(x)$.

Ἄν ἀπό τήν ἀντικατάσταση τοῦ x μέ ἕνα στοιχεῖο τοῦ συνόλου ἀναφορᾶς U στήν $p(x)$ προκύπτει πρόταση ἀληθῆς, ἀπό τήν ἀντικατάσταση τοῦ x μέ τό ἴδιο στοιχεῖο στήν $\sim p(x)$ προκύπτει πρόταση ψευδῆς. Ἄν ἀπό τήν ἀντικατάσταση τοῦ x στήν $p(x)$ μέ ἕνα στοιχεῖο τοῦ συνόλου ἀναφορᾶς προκύπτει πρόταση ψευδῆς, ἀπό τήν ἀντικατάσταση τοῦ x στήν $\sim p(x)$ μέ τό ἴδιο στοιχεῖο προκύπτει πρόταση ἀληθῆς. Ὡστε τό σύνολο ἀλήθειας τῆς $\sim p(x)$ ἀποτελεῖται ἀπό ἐκεῖνα τά στοιχεῖα τοῦ U , τά ὁποῖα δέν ἀνήκουν στό σύνολο ἀλήθειας P , τῆς $p(x)$, ἐπομένως θά ἀνήκουν στό συμπληρωματικό τοῦ P ὡς πρὸς U , δηλ. τό P^c .

Συμβολικά διατυπώνουμε τά παραπάνω ὡς ἑξῆς:

$$\{x \mid \sim p(x)\} = P^c$$

Ἐστω γιά παράδειγμα ἡ ἀνοικτή πρόταση $p(x)$: $x^2 - 4 = 0$ καί σύνολο ἀναφορᾶς τό R . Τό σύνολο ἀλήθειας τῆς $p(x)$ εἶναι τό $P = \{2, -2\}$. Τό συμπληρωματικό τοῦ P ὡς πρὸς R εἶναι τό $P^c = \{x \mid x \neq 2 \wedge x \neq -2\}$. Ὡστε:

$$\{x \mid \sim p(x)\} = \{x \mid x \neq -2 \text{ καί } x \neq 2\}.$$

10. Η ΑΡΝΗΣΗ ΜΙΑΣ ΣΥΖΕΥΞΕΩΣ

Ἐστω ὅτι θέλουμε νά σχηματίσουμε τήν ἀρνηση τῆς συζεύξεως:

«ὁ A εἶναι γιατρός καί ὁ B εἶναι δάσκαλος».

Ὅπως μάθαμε (§ 7), γιά νά πούμε ὅτι ἡ σύνθετη αὐτή πρόταση εἶναι ψευδῆς, πρέπει ἡ μία τουλάχιστο ἀπό τίς ἀπλές προτάσεις νά εἶναι ψευδῆς.

Θά πούμε λοιπόν:

«Ὁ A δέν εἶναι γιατρός εἴτε ὁ B δέν εἶναι δάσκαλος».

Ἄς πάρουμε ἕνα ἄλλο παράδειγμα:

«Θά κερδίσουμε στον αγώνα τῆς πετόσφαιρας μέ τήν ομάδα τοῦ Γυμνασίου Α καί θά κερδίσουμε στον αγώνα μέ τήν ομάδα τοῦ Γυμνασίου Β».

Γιά νά σχηματίσουμε τήν ἄρνηση αὐτῆς τῆς συζεύξεως εἶναι φανερό ὅτι πρέπει νά ποῦμε: «Δέ θά κερδίσουμε στον αγώνα πετόσφαιρας μέ τήν ομάδα τοῦ Γυμνασίου Α εἴτε δέ θά κερδίσουμε στον αγώνα μέ τήν ομάδα τοῦ Γυμνασίου Β».

Νά καί ἕνα τρίτο παράδειγμα ἀπό τά Μαθηματικά: "Ἄν α καί β εἶναι πραγματικοί ἀριθμοί, τότε ἡ πρόταση $\alpha^2 + \beta^2 = 0$ διατυπώνεται μέ τή σύζευξη $\alpha = 0 \wedge \beta = 0$. Ἡ ἄρνηση τῆς $\alpha^2 + \beta^2 = 0$ εἶναι $\alpha^2 + \beta^2 \neq 0$ καί διατυπώνεται μέ τή διάζευξη $\alpha \neq 0 \vee \beta \neq 0$. Δηλαδή:

$$\sim(\alpha = 0 \wedge \beta = 0) \text{ εἶναι } (\alpha \neq 0 \vee \beta \neq 0)$$

Εἶναι λοιπόν φανερό ὅτι ἡ ἄρνηση τῆς $p \wedge q$ εἶναι $\sim p \vee \sim q$. Τό πράγμα γίνεται σαφέστερο ἀπό τόν ἐπόμενο πίνακα ἀλήθειας:

p	q	$\sim p$	$\sim q$	$p \wedge q$	$\sim(p \wedge q)$	$\sim p \vee \sim q$
A	A	Ψ	Ψ	A	Ψ	Ψ
A	Ψ	Ψ	A	Ψ	A	A
Ψ	A	A	Ψ	Ψ	A	A
Ψ	Ψ	A	A	Ψ	A	A

Ἀπό τίς δύο τελευταῖες στήλες τοῦ πίνακα φαίνεται ὅτι ἡ ἄρνηση τῆς $p \wedge q$ καί ἡ διάζευξη $\sim p \vee \sim q$ ἔχουν τίς ἴδιες τιμές ἀλήθειας. Ἐπίσης σαφέστερα φαίνεται ἀπό τίς στήλες 5η καί 7η ὅτι, ὅταν ἡ $p \wedge q$ εἶναι ἀληθής, ἡ $(\sim p \vee \sim q)$ εἶναι ψευδής, καί ὅταν ἡ $p \wedge q$ εἶναι ψευδής, ἡ $\sim p \vee \sim q$ εἶναι ἀληθής. Ἐπομένως ἡ μιά εἶναι ἄρνηση τῆς ἄλλης.

Συμπέρασμα: $\sim(p \wedge q)$ εἶναι: $\sim p \vee \sim q$.

11. Η ἈΡΝΗΣΗ ΜΙΑΣ ΔΙΑΖΕΥΞΕΩΣ

Ἄς πάρουμε τίς προτάσεις:

p: ὁ Α εἶναι γιατρός,

q: ὁ Β εἶναι δάσκαλος.

Ἡ διάζευξή τους εἶναι:

$p \vee q$: ὁ Α εἶναι γιατρός εἴτε ὁ Β εἶναι δάσκαλος.

Εἶναι εὐκόλο νά ἐνοήσουμε ὅτι ἡ ἄρνηση τῆς $p \vee q$ εἶναι: ὁ Α δέν εἶναι γιατρός καί ὁ Β δέν εἶναι δάσκαλος.

Ὡστε $\sim(p \vee q)$ εἶναι: $\sim p \wedge \sim q$.

Νά ἕνα παράδειγμα ἀπό τά Μαθηματικά:

Ἄν α καί β εἶναι πραγματικοί ἀριθμοί, τότε ἡ πρόταση $\alpha \cdot \beta = 0$ διατυπώνεται μέ τή διάζευξη: $\alpha = 0 \vee \beta = 0$. Ἡ ἄρνηση τῆς $\alpha \cdot \beta = 0$ εἶναι $\alpha \cdot \beta \neq 0$ καί διατυπώνεται μέ τή σύζευξη $\alpha \neq 0 \wedge \beta \neq 0$. Δηλαδή:

$$\sim(\alpha = 0 \vee \beta = 0) \text{ εἶναι } (\alpha \neq 0 \wedge \beta \neq 0)$$

Ἰσχύει λοιπόν ὅτι: $\sim(p \vee q)$ εἶναι $\sim p \wedge \sim q$.

Τό ἴδιο βρισκόμε, πέρα ἀπό κάθε ἀμφιβολία, ἂν σχηματίσουμε ἕναν πίνακα ἀλήθειας γιά τίς $p \vee q$ καί $\sim p \wedge \sim q$.

p	q	$\sim p$	$\sim q$	$p \vee q$	$\sim(p \vee q)$	$\sim p \wedge \sim q$
A	A	Ψ	Ψ	A	Ψ	Ψ
A	Ψ	Ψ	A	A	Ψ	Ψ
Ψ	A	A	Ψ	A	Ψ	Ψ
Ψ	Ψ	A	A	Ψ	A	A

Ἀπό τῆς δύο τελευταῖες στῆλης τοῦ πίνακα φαίνεται ὅτι ἡ ἄρνηση τῆς $p \vee q$ καί σύζευξη $\sim p \wedge \sim q$ ἔχουν τῆς ἴδιες τιμές ἀλήθειας. Σαφέστερα βλέπουμε ἀπό τῆς στῆλης 5η καί 7η ὅτι, ὅταν ἡ $p \vee q$ εἶναι ἀληθής, ἡ $\sim p \wedge \sim q$ εἶναι ψευδής, καί ὅταν ἡ $p \vee q$ εἶναι ψευδής, ἡ $\sim p \wedge \sim q$ εἶναι ἀληθής. Ἐπομένως ἡ μιά εἶναι ἄρνηση τῆς ἄλλης.

Συμπέρασμα: $\sim(p \vee q)$ εἶναι: $\sim p \wedge \sim q$.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

- 21) Νά διατυπώσετε τῆς ἀρνήσεις τῶν ἐξῆς προτάσεων:
- Ἡ Ἄλγεβρα εἶναι ἐνδιαφέρουσα.
 - Ὅλοι οἱ μαθητές τῆς τάξεως ἀγαποῦν τήν Ἄλγεβρα.
 - Κάθε τρίγωνο ἔχει τέσσερις πλευρές.
 - $5 + 2 = 7$
 - ὁ 7 εἶναι πρῶτος ἀριθμός.
 - $3 + 1 = 5$
 - ὁ 4 δέν εἶναι τέλειο τετράγωνο.
 - Μερικοί ἀριθμοί δέν εἶναι ἀρνητικοί.
- 22) Νά ὑπολογίσετε τό $P_c = \{x \mid \sim p(x)\}$ γιά τῆς ἐξῆς ἀνοικτές προτάσεις $p(x)$, ὅπου σύνολο ἀναφορᾶς τῆς μεταβλητῆς x εἶναι τό R :
- $x = 2$
 - $x = -2$
 - $x + 7 = 15$
 - $x^2 = 9$
 - $x^2 + 1 = 0$
 - $x^2 \geq 16$.
- 23) Νά σχηματίσετε τῆς ἀρνήσεις τῶν παρακάτω σύνθετων προτάσεων:
- Σήμερα εἶναι Τετάρτη καί ὁ καιρός εἶναι βροχερός.
 - $x = 2$ καί $y = 5$
 - $2 \cdot 3 = 6$ καί $3 + 2 = 5$
 - Τό τρίγωνο $AB\Gamma$ εἶναι ἰσοσκελές καί τό ABE εἶναι ἰσόπλευρο τρίγωνο.
 - Θά μείνω στό σπίτι ἢ θά πάω στόν κινηματογράφο (*).
 - $2 + 3 = 6$ εἴτε $3 + 4 = 5$
 - $5 \cdot 7 = 35$ εἴτε $4 \cdot 5 = 20$

12. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Στήν καθημερινή ζωή, ὅταν θέλουμε νά πείσουμε ἕνα πρόσωπο ὅτι κάτι, γιά τό ὁποῖο συζητοῦμε, εἶναι ἀληθές, συνήθως λέμε: «**Αὐτό** εἶναι ἀληθές, ἐπειδή **ἐκεῖνο** εἶναι ἀληθές». Γιά νά εἶναι πειστική μιά τέτοια πρόταση, πρέπει οἱ συζητητές νά συμφωνοῦν ὅτι τό **ἐκεῖνο** εἶναι ἀληθές καί ὅτι **αὐτό** εἶναι ἀναγκαῖα συνέπεια **ἐκείνου**. Μέ ἄλλες λέξεις πρέπει νά ὑπάρχει συμφωνία ὡς πρός τῆς πληροφορίες, μέ τῆς ὁποῖες ἀρχίζουμε, καί ὡς πρός τό πῶς ἐξάγουμε συμπεράσματα ἀπό αὐτές τῆς πληροφορίες. **Ἡ λογική ἀσχολεῖται μέ τή μελέτη τῶν κανόνων γιά σχηματισμό ὀρθῶν προτάσεων.** Ἡ ἀπόδειξη, καθῶς λέγεται,

(*) Μέ πίνακα ἀλήθειας θά δείξουμε προηγουμένως ὅτι ἡ ἄρνηση τῆς $p \vee q$ εἶναι $(\sim p \vee q) \wedge (p \vee \sim q)$.

συνίσταται στό σχηματισμό προτάσεων του τύπου: "Αν αυτό είναι άληθές, τότε καί έκεινο πρέπει νά είναι άληθές. Π.χ. «άν βρέξει, τότε ό κήπος μου θά ποτιστεί». 'Ο καθένας θά συμφωνήσει μ' αυτή τήν πρόταση, έπειδή όλοι από πείρα ξέρουμε ότι μέ τή βροχή ό κήπος θά ποτιστεί.

Νά δύο άλλα παραδείγματα από τήν "Άλγεβρα:

1) "Αν $3x = 5$, τότε $x = \frac{5}{3}$.

2) "Αν $\alpha = 4$ καί $\beta = 2$, τότε $\alpha^2 + 2\beta = 20$.

"Όλες οι μαθηματικές άποδείξεις χρησιμοποιούν προτάσεις αυτού του τύπου.

Συντομότερα διατυπώνουμε τίς προτάσεις αυτές λέγοντας «ρ συνεπάγεται q», ή συμβολικά: $p \Rightarrow q$.

Π.χ. $3x = 5 \Rightarrow x = \frac{5}{3}$

$(\alpha = 4 \text{ καί } \beta = 2) \Rightarrow \alpha^2 + 2\beta = 20$

Μιά σύνθετη πρόταση τής μορφής $p \Rightarrow q$ λέγεται, όπως μās είναι γνωστό, **συνεπαγωγή**. 'Η έργασία μέ άληθείς προτάσεις του τύπου $p \Rightarrow q$ λέγεται **παραγωγικός συλλογισμός**, ή, άπλά, **συλλογισμός**. 'Η πρόταση p λέγεται **ύπόθεση** καί ή πρόταση q λέγεται **συμπέρασμα**. Καί λέμε ότι $p \Rightarrow q$ είναι ένα **θεώρημα**.

"Όταν ή πρόταση p είναι άληθής, ή πρόταση q μπορεί νά είναι άληθής ή ψευδής. 'Επίσης όταν ή πρόταση p είναι ψευδής, ή πρόταση q μπορεί νά είναι άληθής ή ψευδής.

Πρέπει λοιπόν νά γνωρίζουμε τίς τιμές άλήθειας μās συνεπαγωγής, όταν είναι γνωστές οι τιμές άλήθειας των άπλών προτάσεων, από τίς όποιες άποτελείται.

Μολονότι ή μέθοδος, που άκολουθείται γιά τό σκοπό αυτό είναι συνέπεια μās παραδοχής, ώστόσο αυτή στηρίζεται στίς ένορατικές βάσεις του όρθου συλλογισμού. Θά εξετάσουμε παρακάτω όλες τίς δυνατές περιπτώσεις.

13. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΠΑΓΩΓΗΣ

1) "Αν μιά άληθής ύπόθεση p όδηγει σέ ένα άληθές συμπέρασμα q, πιστεύουμε ότι κάναμε όρθό συλλογισμό καί θεωρούμε τή συνεπαγωγή άληθή.

2) "Αν μιά άληθής ύπόθεση p όδηγει σέ ένα ψευδές συμπέρασμα, τότε είναι βέβαιο ότι έχουμε κάνει λάθος στό συλλογισμό καί θεωρούμε τή συνεπαγωγή ψευδή.

3) "Αν ή ύπόθεση p είναι ψευδής, τότε ένας όρθός συλλογισμός μπορεί νά μās όδηγήσει σέ άληθές συμπέρασμα καί συμφωνούμε νά όνομάζουμε άληθή αυτή τή συνεπαγωγή.

4) "Αν ή ύπόθεση είναι ψευδής, τότε ένας όρθός συλλογισμός μπορεί έξίσου νά μās όδηγήσει σέ ψευδές συμπέρασμα καί τότε συμφωνούμε νά όνομάζουμε τή συνεπαγωγή αυτή άληθή.

"Όλα αυτά τά συγκεντρώνουμε στον παρακάτω πίνακα άλήθειας:

Πίνακας αλήθειας της συνεπαγωγής: $p \Rightarrow q$

p	q	$p \Rightarrow q$
A	A	A
A	Ψ	Ψ
Ψ	A	A
Ψ	Ψ	A

Όπως φαίνεται στον πίνακα, η συνεπαγωγή $p \Rightarrow q$ είναι ψευδής, τότε και μόνο, όταν η πρώτη πρόταση είναι αληθής και η δεύτερη ψευδής. Σ' όλες τις άλλες περιπτώσεις είναι αληθής.

Παραδείγματα εφαρμογής του πίνακα:

- 1) $2 \in \mathbb{N} \Rightarrow \frac{1}{2} \in \mathbb{Q}$, αληθής,
- 2) $3 > 0 \Rightarrow \frac{1}{2} \in \mathbb{N}$, ψευδής,
- 3) $\sqrt{2} \in \mathbb{N} \Rightarrow \frac{2}{3} \in \mathbb{Q}$, αληθής,
- 4) $\frac{1}{2} \in \mathbb{N} \Rightarrow \sqrt{2} \in \mathbb{Q}$, αληθής.

Έστω η αληθής συνεπαγωγή $p \Rightarrow q$, όπου η p είναι αληθής. 'Η συνεπαγωγή αυτή διαβάζεται και με άλλους τρόπους. 'Αναφέρουμε μερικούς απ' αυτούς:

- 1) αν p , τότε q ,
- 2) p είναι ικανή συνθήκη για q ,
- 3) q είναι αναγκαία συνθήκη για p ,
- 4) για q αρκεί p .

14. ΣΥΝΕΠΑΓΩΓΗ ΔΥΟ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Έστω ότι έχουμε τη συνεπαγωγή $p(x) \Rightarrow q(x)$.

Σύνολο αναφοράς τό U , σύνολο αλήθειας της $p(x)$ τό P , σύνολο αλήθειας της $q(x)$, τό Q . Θέλουμε νά προσδιορίσουμε τό σύνολο αλήθειας της συνεπαγωγής $p(x) \Rightarrow q(x)$.

Παρατηρώντας τόν πίνακα αλήθειας της συνεπαγωγής βλέπουμε ότι μπορούμε νά καταστήσουμε τη συνεπαγωγή $p(x) \Rightarrow q(x)$ αληθή,

αν καταστήσουμε: $\begin{cases} \text{τήν } p(x) \text{ αληθή και τήν } q(x) \text{ αληθή,} \\ \text{τήν } p(x) \text{ ψευδή και τήν } q(x) \text{ αληθή,} \\ \text{τήν } p(x) \text{ ψευδή και τήν } q(x) \text{ ψευδή.} \end{cases}$

'Από αυτά έπεται ότι:

$$\{x \mid p(x) \Rightarrow q(x)\} = P^c \cup Q (*)$$

Παραδείγματα :

1) Νά βρεθεί τό σύνολο αλήθειας της συνεπαγωγής, $x^2 = 1 \Rightarrow x = 1$ (σύνολο αναφοράς τό \mathbb{R}).

(*) 'Αποδεικνύεται ότι όλες οι περιπτώσεις καλύπτονται από αυτό τόν τύπο.

Βρίσκουμε πρώτα ότι $P = \{1, -1\}$, άρα $P^c = \{x \mid x \neq 1 \text{ είτε } -1\}$.
 Βρίσκουμε έπειτα ότι $Q = \{1\}$. Έπομένως $P^c \cup Q = \{x \mid x \neq -1\}$.

2) Νά βρεθεί τό σύνολο αλήθειας τής συνεπαγωγής: $x = 1 \Rightarrow x^2 = 1$.
 Έχουμε $P = \{1\}$, άρα $P^c = \{x \mid x \neq 1\}$. $Q = \{1, -1\}$. Έπομένως $P^c \cup Q =$
 $=$ τό σύνολο άναφορής R .

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

24) Νά βρείτε ποιές άπό τίς παρακάτω συνεπαγωγές είναι αλήθεις και ποιές ψευδεις:

α) $3 = 4 \Rightarrow 3 + 1 = 4$

β) $2 > 0 \Rightarrow 6 = 2 \cdot 3$

γ) $5 = 2 + 3 \Rightarrow 2 > 8$

δ) $2 = 5 + 6 \Rightarrow 8 > 10$

ε) $3 = 2 \Rightarrow 2 > 5$.

25) Νά σχηματίσετε τόν πίνακα αλήθειας τών:

α) $p \Rightarrow \sim q$

β) $\sim p \Rightarrow q$

γ) $\sim p \Rightarrow \sim q$

26) Νά σχηματίσετε τόν πίνακα αλήθειας τών:

$p \Rightarrow q$ και $\sim p \vee q$

Τί παρατηρείτε;

27) Για νά είναι $x = -2$, είναι άναγκαία συνθήκη ή $x^2 = 4$. Νά τό διατυπώσετε αυτό συμβολικά μέ μία συνεπαγωγή.

28) Νά σχηματίσετε τόν πίνακα αλήθειας τής:

$p \Rightarrow (p \vee q)$

29) Νά σχηματίσετε δύο συνεπαγωγές άπό κάθε ζεύγος άπό τίς έξής προτάσεις και νά βρείτε τίς τιμές αλήθειας τους:

α) $3 + 4 = 7$, $5 + 3 = 8$

β) $5 + 1 = 6$, $3 + 2 = 6$

γ) $6 - 3 = 2$, $4^2 = 25$

δ) $0 = 1$, $2 \cdot 5 = 10$.

30) Στίς παρακάτω συνεπαγωγές άνοικτών προτάσεων νά βρείτε τά σύνολα αλήθειας τους:

(Τό σύνολο άναφορής U είναι τό R).

α) *Αν $x^2 = 4$, τότε $x = 2$ είτε -2 .

β) *Αν $x = 4$, τότε $x^2 = 16$.

γ) *Αν $x^2 = 25$, τότε $x = -5$.

δ) *Αν $x = 3$, τότε $x \neq 5$.

ε) *Αν $x^2 \geq 0$, τότε $x^2 < 0$.

στ) *Αν $x^2 - 5x + 6 = 0$, τότε $x = 3$ είτε 2 .

31) « $\alpha = 3$, $\beta = 2$ ». Είναι ή πρόταση αυτή ικανή ή άναγκαία συνθήκη, για νά έχουμε $\alpha + \beta = 5$;

32) Έστω ένα σύνολο 3 προτάσεων: p , q , r , για τίς όποίες σχηματίζουμε έναν πίνακα τιμών αλήθειας. Πόσες γραμμές θά περιέχει ό πίνακας; Πόσες, άν οι προτάσεις είναι v ;

33) Έστω p ή πρόταση «βρέχει» και q ή πρόταση «κάνει κρύο». Νά άποδώσετε μέ λόγια τίς προτάσεις:

$p \wedge q$, $p \wedge \sim q$, $\sim p \wedge \sim q$, $p \vee \sim q$, $\sim(p \wedge q)$, $p \Rightarrow q$

$p \Rightarrow \sim q$, $\sim p \Rightarrow q$, $q \Rightarrow p$, $\sim p \Rightarrow \sim q$.

15. Η ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΜΙΑΣ ΣΥΝΕΠΑΓΩΓΗΣ

A) Έστω ή συνεπαγωγή:

«άν ένας αριθμός λήγει σέ 0 ή 5, τότε είναι διαιρετός διά 5», τήν όποία σημειώνουμε $p \Rightarrow q$.

Θεωρούμε τώρα τή συνεπαγωγή:

«αν ένας αριθμός είναι διαιρετός διά 5, τότε λήγει σε 0 ή 5».

Τή συνεπαγωγή αυτή θά τή σημειώσουμε με $q \Rightarrow p$, επειδή υπόθεση στή δεύτερη αυτή συνεπαγωγή είναι τό συμπέρασμα τής πρώτης και τό συμπέρασμα τής δεύτερης συνεπαγωγής είναι υπόθεση τής πρώτης.

Οι συνεπαγωγές $p \Rightarrow q$ και $q \Rightarrow p$ λέγονται **αντίστροφες** ή μιá τής άλλης.

Παρατηρούμε ότι οι $p \Rightarrow q$ και $q \Rightarrow p$ τοῦ παραπάνω παραδείγματος είναι και οι δύο αληθείς. Δέ συμβαίνει όμως αυτό πάντοτε. Ἡ αντίστροφη μιᾶς αληθοῦς συνεπαγωγής ἐνδέχεται νά είναι ψευδής. Π.χ. $p \Rightarrow q$: αν δύο γωνίες είναι ὀρθές, τότε είναι ἴσες (ἀληθής), ἐνῶ $q \Rightarrow p$: αν δύο γωνίες είναι ἴσες, τότε είναι ὀρθές (ψευδής ἐγγενεί).

Β) Ἐστω ἡ ἀληθής συνεπαγωγή:

$p \Rightarrow q$: αν ένας αριθμός λήγει σε 0 ή 5, τότε είναι διαιρετός διά 5. Ἡ συνεπαγωγή $\sim p \Rightarrow \sim q$ λέγεται **ἀντίθετη** τής $p \Rightarrow q$.

Στό παράδειγμά μας μέ λόγια θά πούμε:

$\sim p \Rightarrow \sim q$: αν ένας αριθμός δέ λήγει σε 0 ή 5, τότε δέν είναι διαιρετός διά 5, ἡ ὁποία είναι ἀληθής πρόταση. Δέ συμβαίνει όμως πάντοτε ἡ ἀντίθετη μιᾶς αληθοῦς συνεπαγωγής νά είναι ἐπίσης ἀληθής. Νά ἕνα παράδειγμα:

$p \Rightarrow q$: αν δύο γωνίες είναι ὀρθές, τότε είναι ἴσες (ἀληθής).

$\sim p \Rightarrow \sim q$: αν δύο γωνίες δέν είναι ὀρθές, τότε δέν είναι ἴσες (ψευδής).

16. Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑ ΔΥΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Α) Δυό προτάσεις p και q λέμε ότι είναι **ισοδύναμες** μεταξύ τους, αν ἡ σύζευξη $(p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow p)$ είναι ἀληθής. Συμβολίζουμε τό γεγονός αυτό μέ $p \Leftrightarrow q$ και διαβάζουμε: p **ισοδυναμεῖ** (λογικά) μέ q . Ἐτσι, π.χ., οι προτάσεις p : ένας αριθμός λήγει σε 0 ή 5 και q : ένας αριθμός είναι διαιρετός διά 5, είναι **ισοδύναμες**, επειδή ἰσχύει $p \Rightarrow q$ και $q \Rightarrow p$. Γράφουμε λοιπόν $p \Leftrightarrow q$.

Γιά νά σχηματίσουμε τόν πίνακα ἀλήθειας τής **ισοδυναμίας**, ἀρκεί νά σχηματίσουμε τόν πίνακα ἀλήθειας τής συζεύξεως $(p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow p)$. Ἐχουμε:

p	q	$p \Rightarrow q$	$q \Rightarrow p$	$(p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow p)$
A	A	A	A	A
A	Ψ	Ψ	A	Ψ
Ψ	A	A	Ψ	Ψ
Ψ	Ψ	A	A	A

Δηλαδή ἔχουμε τόν παρακάτω πίνακα τιμῶν ἀλήθειας τής **ισοδυναμίας**:

p	q	$p \Leftrightarrow q$
A	A	A
A	Ψ	Ψ
Ψ	A	Ψ
Ψ	Ψ	A

Ώστε : η **ισοδυναμία δύο προτάσεων είναι αληθής, μόνον όταν και οι δύο προτάσεις είναι αληθείς ή ψευδείς ταυτόχρονα.**

Μέ άλλες λέξεις δύο προτάσεις p και q λέμε ότι είναι **ισοδύναμες**, όταν έχουν τις ίδιες τιμές αλήθειας συγχρόνως.

Παραδείγματα εφαρμογής του πίνακα:

- 1) δ 5 είναι άκεραιος \Leftrightarrow δ -3 είναι άρνητικός (άληθής),
- 2) δ $\frac{5}{6}$ είναι άκεραιος \Leftrightarrow δ $\sqrt{3}$ είναι φυσικός (άληθής),
- 3) δ 2 είναι φυσικός \Leftrightarrow δ $\frac{1}{3}$ είναι άκεραιος (ψευδής),
- 4) δ $\frac{1}{2}$ είναι άρρητος \Leftrightarrow δ $\sqrt{3}$ είναι άρρητος (ψευδής),
- 5) η **εὐθεία $\epsilon//\epsilon'$** \Leftrightarrow η **εὐθεία $\epsilon'//\epsilon$** (άληθής),
- 6) τό τρίγωνο **ΑΒΓ** είναι **ισόπλευρο** \Leftrightarrow τό τρίγωνο **ΑΒΓ** είναι **ισογώνιο**.

Β) Ἡ **ισοδυναμία $p \Leftrightarrow q$** διατυπώνεται λεκτικά και με άλλους τρόπους.

Προσέξτε τις δύο προτάσεις « p ἂν q » και « p μόνο ἂν q ». Ἡ « p ἂν q » σημαίνει $q \Rightarrow p$ και ἡ « p μόνο ἂν q » σημαίνει $p \Rightarrow q$. Ἐπομένως ἂν και οι δύο αυτές προτάσεις είναι αληθείς, ἡ σύζευξή τους θά είναι αληθής. Ώστε:

« p ἂν και μόνο ἂν q » σημαίνει $p \Rightarrow q$ και $q \Rightarrow p$, δηλαδή $p \Leftrightarrow q$.

Ώστε, ἀντί νά λέμε « p ισοδυναμεῖ μέ q », μπορούμε νά λέμε « p ἂν, και μόνο ἂν q ».

Παράδειγμα: Θεωρούμε τις ἑξῆς δύο προτάσεις:

p : δύο εὐθεῖες ἑνός ἐπιπέδου δέν τέμνονται,

q : οι εὐθεῖες αυτές είναι παράλληλες.

$p \Rightarrow q$: ἂν δύο εὐθεῖες ἑνός ἐπιπέδου δέν τέμνονται, τότε είναι παράλληλες (άληθής).

$q \Rightarrow p$: ἂν δύο εὐθεῖες ἑνός ἐπιπέδου είναι παράλληλες, τότε δέν τέμνονται (άληθής).

Μπορούμε λοιπόν νά ποῦμε:

«Δύο εὐθεῖες ἑνός ἐπιπέδου είναι παράλληλες ἂν, και μόνο ἂν, δέν τέμνονται».

Τήν **ισοδυναμία** δύο προτάσεων τή διατυπώνουμε και μέ άλλο τρόπο.

Ἄν πάρουμε τό ἴδιο παράδειγμα, μπορούμε νά ποῦμε: «**ἀναγκαῖα και ἱκανή συνθήκη**, γιά νά είναι παράλληλες δύο εὐθεῖες ἑνός ἐπιπέδου, είναι νά μήν τέμνονται».

Ἐνας άλλος τρόπος διατυπώσεως τῆς **ισοδυναμίας** τῶν δύο προηγούμενων προτάσεων p και q είναι: «Γιά νά είναι παράλληλες δύο εὐθεῖες ἑνός ἐπιπέδου, **πρέπει και ἀρκεί** νά μήν τέμνονται».

Ἄς πάρουμε ἕνα άλλο παράδειγμα:

Ἐπενθυμίζουμε τά δύο θεωρήματα:

ΘΕΩΡΗΜΑ 1. Ἄν τό τετράπλευρο **ΑΒΓΔ** είναι παραλληλόγραμμο, τότε οι διαγώνιοί του **ΑΓ** και **ΒΔ** διχοτομοῦνται.

ΘΕΩΡΗΜΑ 2. "Αν οι διαγώνιοι ΑΓ και ΒΔ ενός κυρτού τετραπλεύρου ΑΒΓΔ διχοτομούνται, τότε τό τετράπλευρο αυτό είναι παραλληλόγραμμο.

"Ας ονομάσουμε p τήν πρόταση: «ΑΒΓΔ είναι παραλληλόγραμμο», και q τήν πρόταση «ΑΓ και ΒΔ διχοτομούνται».

Τό θεώρημα 1 εκφράζεται μέ τή συνεπαγωγή: $p \Rightarrow q$.

Τό θεώρημα 2 εκφράζεται μέ τήν $q \Rightarrow p$.

Καί τά δύο θεωρήματα μαζί εκφράζονται μέ τήν Ισοδυναμία $p \Leftrightarrow q$.

Καθεμιά από τίς προτάσεις p και q είναι **ικανή συνθήκη** γιά τήν άλλη και επίσης καθεμιά είναι **άναγκαία συνθήκη** γιά τήν άλλη.

Μπορούμε λοιπόν νά πούμε:

«Γιά νά είναι παραλληλόγραμμο ένα τετράπλευρο **άναγκαία και ικανή συνθήκη** είναι νά διχοτομούνται οί διαγώνιοί του». "Η άκόμα:

«Γιά νά είναι παραλληλόγραμμο ένα τετράπλευρο **πρέπει και άρκει** οί διαγώνιοί του νά διχοτομούνται».

"Επίσης, όπως είδαμε παραπάνω, μπορούμε νά πούμε:

«Ένα τετράπλευρο είναι παραλληλόγραμμο **άν, και μόνο άν**, οί διαγώνιοί του διχοτομούνται».

"Από τόν όρισμό τής Ισοδυναμίας ένοοούμε ότι Ισχύουν οί έξής Ιδιότητες:

α) $p \Leftrightarrow p$

β) $(p \Leftrightarrow q) \Leftrightarrow (q \Leftrightarrow p)$

γ) $(p \Leftrightarrow q \wedge q \Leftrightarrow r) \Rightarrow (p \Leftrightarrow r)$.

17. ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

"Όπως και στή συνεπαγωγή, έτσι και στήν Ισοδυναμία μπορούμε νά επέκτεινουμε τήν έννοια και γιά άνοικτές προτάσεις. "Ας ζητήσουμε λοιπόν τό σύνολο άλήθειας τής $p(x) \Leftrightarrow q(x)$.

"Αν θέσουμε στήν $p(x) \Leftrightarrow q(x)$, όπου x ένα στοιχείο του συνόλου άναφοράς U , τό όποιο άνήκει στήν τομή $P \cap Q$, λαμβάνουμε μιά άληθή σύνθετη πρόταση, επειδή και τά δύο μέλη τής Ισοδυναμίας είναι τώρα άληθεις προτάσεις. "Αν στήν $p(x) \Leftrightarrow q(x)$, θέσουμε όπου x ένα στοιχείο, τό όποιο άνήκει στήν $P^c \cap Q^c$, λαμβάνουμε πάλι μιά άληθή σύνθετη πρόταση, επειδή τώρα και τά δύο μέλη τής Ισοδυναμίας είναι ψευδεις προτάσεις. "Αν αντί γιά τό x θέσουμε όποιοδήποτε άλλο στοιχείο του U , προκύπτει ψευδής σύνθετη πρόταση, επειδή τό ένα μέλος τής Ισοδυναμίας θά είναι άληθής πρόταση και τό άλλο ψευδής. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι:

$$\{x \mid p(x) \Leftrightarrow q(x)\} = (P \cap Q) \cup (P^c \cap Q^c)$$

Παράδειγμα :

Ζητείται τό σύνολο άλήθειας τής $(x^2 = 4) \Leftrightarrow (x = 2)$. "Εχουμε ότι $p(x) : x^2 = 4$ και $q(x) : x = 2$. "Επομένως $P = \{2, -2\}$ και $Q = \{2\}$. "Αρα θά είναι $P^c = \{x \mid x \neq 2 \text{ είτε } -2\}$ και $Q^c = \{x \mid x \neq 2\}$.

Συνεπώς $P \cap Q = \{2\}$ και $P^c \cap Q^c = \{x \mid x \neq 2 \text{ είτε } -2\}$. Τελικά λοιπόν έχουμε:

$$\{x \mid p(x)\} \Leftrightarrow \{q(x)\} = (P \cap Q) \cup (P^c \cap Q^c) = \{x \mid x \neq -2\}$$

Σημ. 1. Το σύνολο αλήθειας της $(x^2 = 4) \Leftrightarrow (x = 2)$ είναι φανερό ότι είναι το $\{x \mid x \neq -2\}$, επειδή το -2 είναι η μόνη τιμή του x (από το σύνολο αναφοράς R), για την οποία δέ λαμβάνουν τις ίδιες τιμές αλήθειας και τα δύο μέλη της Ισοδυναμίας.

Σημ. 2. Οι προτάσεις

$$p \vee q, p \wedge q, p \Rightarrow q, p \Leftrightarrow q, \sim p$$

λέγονται **σύνθετες προτάσεις πρώτης βαθμίδας**, για κάθε ζεύγος άπλων προτάσεων p και q από το L .

Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ

34) Νά διατυπώσετε τις αντίστροφες των παρακάτω συνεπαγωγών και νά άποφανθείτε αν αυτές είναι αληθείς ή ψευδείς.

α) "Αν κάποιος γεννήθηκε στην Πάτρα, τότε έχει ελληνική Ιθαγένεια.

β) "Αν $x - y = 3$, τότε $x > y$.

γ) "Αν δύο όρθογώνια έχουν Ισες βάσεις και Ισα ύψη, τότε έχουν Ισα έμβαδά.

δ) "Αν $x^2 = 25$, τότε $x = 5$ είτε $x = -5$.

ε) "Αν ένα σημείο βρίσκεται στη μεσοκάθετο ενός εύθύγραμμου τμήματος, τότε απέχει εξίσου από τα άκρα του τμήματος.

στ) "Αν $2 + 4 = 5$, τότε $4 + 6 = 8$.

35) Νά άποφανθείτε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι Ισοδύναμες μεταξύ τους:

α) $p : 2x = 10 \ (x \in R)$,

$q : x = 5$.

β) $p : \text{Τό τρίγωνο } AB\Gamma \text{ είναι Ισόπλευρο,}$

$q : \text{Τό τρίγωνο } AB\Gamma \text{ είναι Ισογώνιο.}$

γ) $p : x > y \ (x, y \in R)$,

$q : y < x$.

δ) $p : \text{ή εύθεια } \epsilon \text{ είναι παράλληλη προς την } \epsilon',$

$q : \text{ή εύθεια } \epsilon' \text{ είναι παράλληλη προς την } \epsilon$.

ε) $p : x = 4 \text{ είτε } x = -4,$

$q : x^2 = 16$.

36) Νά διατυπώσετε προτάσεις Ισοδύναμες προς τις παρακάτω:

α) Οι εύθειες ϵ και ϵ' του επιπέδου (Π) δέν τέμνονται.

β) Τό σημείο M ανήκει στην εύθεια ϵ και στην εύθεια ϵ' .

γ) Τά σημεία A και B είναι στο Ιδιο ήμιεπίπεδο ως προς την εύθεια ϵ .

δ) Τό παραλληλόγραμμο $AB\Gamma\Delta$ έχει τις διαγωνίους του $ΑΓ$ και $ΒΔ$ Ισες.

ε) Τό σημείο M βρίσκεται στη διχοτόμο της γωνίας θ .

στ) $x^2 = 1$.

ζ) $x = 2$ και $y = -2$.

37) Νά βρείτε τό σύνολο αλήθειας σε καθεμία από τις παρακάτω Ισοδυναμίες άνοικτών προτάσεων (σύνολο αναφοράς της μεταβλητής τό R).

α) $(x = 1) \Leftrightarrow (x = -1)$

β) $(x^2 = 0) \Leftrightarrow (x = 0)$

γ) $(3x = 6) \Leftrightarrow (x = 2)$

δ) $(x \neq 1) \Leftrightarrow (x^2 \neq 1)$

ε) $(x = 5) \Leftrightarrow (x \neq 5)$

στ) $(3x = 6) \Leftrightarrow (3x + 2 = 8)$.

18. Η ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟΑΝΤΙΘΕΤΗ ΜΙΑΣ ΣΥΝΕΠΑΓΩΓΗΣ

Α) Στά προηγούμενα, από τή συνεπαγωγή $p \Rightarrow q$ σχηματίσαμε τήν αντίστροφή της $q \Rightarrow p$ και τήν αντίθετή της $\sim p \Rightarrow \sim q$. Μιά άλλη συνεπαγωγή, που σχετίζεται με τήν $p \Rightarrow q$, είναι ή $\sim q \Rightarrow \sim p$, ή όποία λέγεται **αντιστροφοαντίθετη** τής $p \Rightarrow q$.

Παραδείγματα :

1ο) $p \Rightarrow q$: $x = 3 \Rightarrow x^2 = 9$

$\sim q \Rightarrow \sim p$: $x^2 \neq 9 \Rightarrow x \neq 3$

2ο) $p \Rightarrow q$: **αν δύο εύθειες ενός επιπέδου τέμνονται, τότε οί εύθειες αυτές δέν είναι παράλληλες.**

$\sim q \Rightarrow \sim p$: **αν δύο εύθειες ενός επιπέδου είναι παράλληλες, τότε δέν τέμνονται.**

3ο) $p \Rightarrow q$: **αν πάρω βαθμό 17 στά Μαθηματικά, τότε θά έχω 16 στό ένδεικτικό μου (έννοείται: μέ τήν τωρινή βαθμολογία στά άλλα μαθήματα).**

$\sim q \Rightarrow \sim p$: **αν δέν έχω 16 στό ένδεικτικό μου, τότε δέ θά έχω πάρει 17 στά Μαθηματικά.**

4ο) $p \Rightarrow q$: **αν $ΑΓ = ΒΔ$, τότε τό παραλληλόγραμμο $ΑΒΓΔ$ είναι όρθογώνιο.**

$\sim q \Rightarrow \sim p$: **αν τό παραλληλόγραμμο $ΑΒΓΔ$ δέν είναι όρθογώνιο, τότε $ΑΓ \neq ΒΔ$.**

Β) 'Η πιό σημαντική ιδιότητα τής αντιστροφοαντίθετης μιās συνεπαγωγής είναι ότι είναι **ισοδύναμη** (έχει τίς ίδιες τιμές αλήθειας) μέ τήν αρχική συνεπαγωγή. Δηλαδή:

$$(p \Rightarrow q) \Leftrightarrow (\sim q \Rightarrow \sim p)$$

*Ας κατασκευάσουμε τόν πίνακα αλήθειας γιά τίς $p \Rightarrow q$ και $\sim q \Rightarrow \sim p$:

p	q	$\sim p$	$\sim q$	$p \Rightarrow q$	$\sim q \Rightarrow \sim p$
A	A	Ψ	Ψ	A	A
A	Ψ	Ψ	A	Ψ	Ψ
Ψ	A	A	Ψ	A	A
Ψ	Ψ	A	A	A	A

'Από τίς στήλες 5η και 6η του πίνακα βλέπουμε ότι οί σύνθετες προτάσεις:

$$p \Rightarrow q \text{ και } \sim q \Rightarrow \sim p$$

έχουν τίς ίδιες τιμές αλήθειας, είναι λοιπόν **ισοδύναμες** προτάσεις. 'Η ιδιότητα αυτή μās επιτρέπει προκειμένου νά αποδείξουμε ώς αληθή μιιά συνεπαγωγή, νά αποδείξουμε αντί γι' αυτή τήν αντιστροφοαντίθετή της.

*Έτσι, π.χ., στό σύνολο τών παραλληλογράμμων ισχύει ή πρόταση: «**αν τό παραλληλόγραμμο $ΑΒΓΔ$ έχει ίσες τίς διαγωνίους του, τότε έχει τίς γωνίες του όρθές**». 'Η πρόταση αυτή είναι **ισοδύναμη** μέ τήν πρόταση: «**αν τό παραλληλόγραμμο $ΑΒΓΔ$ δέν έχει όρθές τίς γωνίες του, τότε δέν έχει τίς διαγωνίους του ίσες**».

Νά ένα άλλο παράδειγμα:

Γιά ν' αποδείξουμε στή Γεωμετρία ότι: «ό γεωμετρικός τόπος (τό σύνολο) τῶν σημείων τοῦ επιπέδου, τά ὁποῖα ἀπέχουν ἐξίσου ἀπό τά ἄκρα ἑνός εὐθύγραμμου τμήματος AB, εἶναι ἡ μεσοκάθετος τοῦ τμήματος AB», ἀποδεικνύουμε.

α) *Ἄν ἕνα σημεῖο M ἀπέχει ἐξίσου ἀπό τά A καί B, τότε ἀνήκει στή μεσοκάθετο, καί β) *Ἄν τό M ἀνήκει στή μεσοκάθετο τοῦ AB, τότε ἀπέχει ἐξίσου ἀπό τά A καί B.

Μποροῦμε ὅμως νά ἐργασθοῦμε ὡς ἐξῆς: Νά ἀποδείξουμε τήν α) καί κατόπιν ἀντί γιά τή β) νά ἀποδείξουμε τήν ἀντιστροφoαντίθετη τῆς β), ὅτι δηλ. ἂν τό M δέν ἀπέχει ἐξίσου ἀπό τά A καί B, τότε δέν ἀνήκει στή μεσοκάθετο.

Γ) Μιά ἄλλη ἰδιότητα τῆς $p \Rightarrow q$ εἶναι ὅτι εἶναι ἰσοδύναμη μέ τήν $\sim p \vee q$.
Δηλ. $(p \Rightarrow q) \Leftrightarrow (\sim p \vee q)$

Πραγματικά ἂν κάνουμε τόν πίνακα ἀλήθειας,

p	q	$\sim p$	$p \Rightarrow q$	$\sim p \vee q$
A	A	Ψ	A	A
A	Ψ	Ψ	Ψ	Ψ
Ψ	A	A	A	A
Ψ	Ψ	A	A	A

βλέπουμε ἀπό τίς στῆλες 4η καί 5η ὅτι $p \Rightarrow q$ καί $\sim p \vee q$ ἔχουν τίς ἴδιες τιμές ἀλήθειας, δηλ. εἶναι ἰσοδύναμες προτάσεις καί μποροῦμε, ὅταν χρειασθεῖ, νά ἀντικαταστήσουμε τή μιά μέ τήν ἄλλη.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

38) Νά διατυπώσετε τίς ἀντιστροφoαντίθετες τῶν παρακάτω συνεπαγωγῶν:

α) *Ἄν τηρεῖς τίς διατάξεις τοῦ κώδικα ὁδικῆς κυκλοφορίας, τότε δέ θά πάρεις κλήση ἀπό τόν τροχόνμο.

β) *Ἄν στόν *Ἄρη δέν ὑπάρχει ἀτμόσφαιρα μέ ὄξυγόνο, τότε δέν ὑπάρχει ζωή ἐκεῖ.

γ) *Ἄν τό σημεῖο M ἀνήκει στήν εὐθεῖα ε, τότε δέν ἀνήκει στήν ε'.

δ) *Ἄν μπορέσεις νά διατρέξεις τρία χιλιόμετρα σέ 1 λεπτό, τότε θά φάω τό καπέλλο μου.

ε) *Ἄν $2x = 10$, τότε $x = 5$.

στ) *Ἄν ἕνα σημεῖο M ἀνήκει στή διχοτόμο μιᾶς γωνίας θ, τότε τό M ἀπέχει ἐξίσου ἀπό τίς πλευρές τῆς γωνίας.

39) Νά ἀποδείξετε μέ τήν κατασκευή ἑνός πίνακα ἀλήθειας ὅτι ἡ ἄρνηση τῆς $p \Rightarrow q$ εἶναι $p \wedge \sim q$.

40) Καρρασκευάζοντας ἕναν πίνακα τιμῶν ἀλήθειας νά ἀποδείξετε ὅτι ἡ συνεπαγωγή εἶναι μεταβατική. Δηλ. $[(p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow r)] \Rightarrow (p \Rightarrow r)$.

41) *Ἄν $p : \varepsilon_1$ εἶναι κάθετη πρὸς τήν ε_3

$q : \varepsilon_2$ εἶναι κάθετη πρὸς τήν ε_3

$r : \varepsilon_1$ εἶναι παράλληλη πρὸς τήν ε_2 ,

νά γράψετε μέ συμβολική μορφή τίς ἐξῆς προτάσεις:

α) ἂν ε_1 εἶναι κάθετη πρὸς ε_3 καί ε_2 κάθετη πρὸς τήν ε_3 , τότε ἡ ε_1 εἶναι παράλληλη πρὸς τήν ε_2 .

β) Αν ϵ_1 είναι κάθετη προς τήν ϵ_3 και ϵ_2 δέν είναι κάθετη προς τήν ϵ_3 , τότε ή ϵ_1 δέν είναι παράλληλη προς τήν ϵ_2 .

42) Νά δείξετε ότι οι προτάσεις $p \Rightarrow (q \vee r)$ και $(p \Rightarrow q) \vee (p \Rightarrow r)$ είναι Ισοδύναμες, έχουν δηλαδή τις ίδιες τιμές αλήθειας.

43) Νά αποδείξετε μέ κατασκευή πίνακα αλήθειας ότι ή άρνηση τής $p \Leftrightarrow q$ είναι $\sim p \Leftrightarrow q$ ή $p \Leftrightarrow \sim q$.

*Έπειτα νά συμπληρώσετε τόν έξης πίνακα:

	τύπος	άρνηση
Σύζευξη	$p \wedge q$	$\sim p \vee \sim q$
Διάζευξη	$p \vee q$	—
Συνεπαγωγή	$p \Rightarrow q$	$p \wedge \sim q$
Ίσοδυναμία	$p \Leftrightarrow q$	—

19. ΘΕΩΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

A) Στήν § 12 είπαμε ότι Λογική είναι ή μελέτη τών κανόνων για κατασκευή όρθών συλλογισμών.

Ο μεγάλος Έλληνας φιλόσοφος Άριστοτέλης ύπήρξε ό πρώτος διδάσκαλος και θεμελιωτής τής Λογικής. Η λογική, τήν όποία συνέγραψε, δέν έχει σχεδόν προαχθεί μέχρι σήμερα και στην πραγματικότητα όλα σχεδόν, όσα μελετάμε σήμερα, ανήκουν σε ό,τι ονομάζουμε «Λογική του Άριστοτέλη», ή όποία έχει ηλικία πάνω από 2000 χρόνια. Η μαθηματικοποίηση τής Λογικής είναι βέβαια έργο τών μεταγενέστερων και ιδίως του Georges Boole (1815 - 1864) και άλλων θεωρητικών τής Λογικής.

Στά Μαθηματικά, ιδίως στή Γεωμετρία, ή έργασία μας συνίσταται στην άποδειξη θεωρημάτων, δηλαδή προτάσεων. Για νά αποδείξουμε ένα θεώρημα, πρέπει νά δείξουμε ότι αυτό έπακολουθει λογικά από τις ύποθέσεις μας. Για νά τό κάνουμε αυτό, χρησιμοποιούμε τις άρχές τής λογικής, δηλαδή λογικούς κανόνες.

*Αν, π.χ., γνωρίζουμε ότι ή πρόταση $p \Rightarrow q$ είναι αληθής και ότι ή p είναι αληθής, τότε μπορούμε νά συμπεράνουμε ότι q είναι αληθής. Δηλαδή, μέ σύμβολα:

$$[(p \Rightarrow q) \wedge p] \Rightarrow q$$

Πραγματικά αν σχηματίσουμε πίνακα αλήθειας,

p	q	$p \Rightarrow q$	$(p \Rightarrow q) \wedge p$	$[(p \Rightarrow q) \wedge p] \Rightarrow q$
A	A	A	A	A
A	Ψ	Ψ	Ψ	A
Ψ	A	A	Ψ	A
Ψ	Ψ	A	Ψ	A

βλέπουμε ότι ή σύνθετη πρόταση $[(p \Rightarrow q) \wedge p] \Rightarrow q$ είναι πάντοτε αληθής, άνεξάρτητα από τις τιμές αλήθειας, τις όποιες λαμβάνουν οι προτάσεις, που τήν άποτελούν. Μιά τέτοια πρόταση λέγεται **ταυτολογία** και μέ τις ταυτολογίες θά ασχοληθούμε ειδικότερα στα έπόμενα μαθήματα.

Ἡ σύνθετη πρόταση $[(p \Rightarrow q) \wedge p] \Rightarrow q$, είναι πάντοτε, ὅπως εἴπαμε, ἕνας ὀρθὸς συλλογισμὸς. Μερικοὶ γράφουν τὸ συλλογισμὸ αὐτὸ ὡς ἑξῆς:

$$\left. \begin{array}{l} p \Rightarrow q \text{ (ἀληθής)} \\ p \text{ (ἀληθής)} \end{array} \right\} \text{(ὑπόθεση τοῦ συλλογισμοῦ)}$$

ἄρα q (συμπέρασμα τοῦ συλλογισμοῦ)

Θὰ δώσουμε τώρα παράδειγμα ἐφαρμογῆς τοῦ λογικοῦ κανόνα:

$$[(p \Rightarrow q) \wedge p] \Rightarrow q.$$

Παράδειγμα :

Ἐλάβαμε μιὰ πρόσκληση γιὰ τὶς γυμναστικές ἐπιδείξεις τοῦ Γυμνασίου Α, ἡ ὁποία ἔγραφε: «ἂν βρέχει τὴν ἡμέρα τῶν ἐπιδείξεων, ἡ γιορτὴ θὰ γίνεῖ στοῦ κλειστοῦ γυμναστήριου» ($p \Rightarrow q$). Σήμερα εἶναι ἡ μέρα τῆς γιορτῆς καὶ βρέχει (p εἶναι ἀληθής). Ἀφοῦ λοιπὸν οἱ προτάσεις $p \Rightarrow q$ καὶ p εἶναι καὶ οἱ δύο ἀληθεῖς, γνωρίζουμε ὅτι q εἶναι ἀληθής, δηλ. ἡ γιορτὴ θὰ γίνεῖ στοῦ κλειστοῦ γυμναστήριου. Μποροῦμε τώρα νὰ ποῦμε ὅτι ἀποδείξαμε τὸ θεώρημα: «Ἡ γιορτὴ τῶν γυμναστικῶν ἐπιδείξεων θὰ γίνεῖ στοῦ κλειστοῦ Γυμναστήριου».

Β) Μιὰ ἄλλη τεχνικὴ πού χρησιμοποιεῖται στὶς ἀποδείξεις εἶναι ἡ ἑξῆς:

*Ἄν γνωρίζουμε ὅτι $p \Rightarrow q$ εἶναι ἀληθής καὶ ἂν γνωρίζουμε ὅτι q εἶναι ψευδής, τότε μποροῦμε νὰ συμπεράνουμε ὅτι p εἶναι ψευδής. Συμβολικά:

$$[(p \Rightarrow q) \wedge \sim q] \Rightarrow \sim p$$

Πραγματικά, ἂν κατασκευάσουμε πῖνακα ἀλήθειας,

p	q	$\sim p$	$\sim q$	$p \Rightarrow q$	$(p \Rightarrow q) \wedge \sim q$	$[(p \Rightarrow q) \wedge \sim q] \Rightarrow \sim p$
A	A	Ψ	Ψ	A	Ψ	A
A	Ψ	Ψ	A	Ψ	Ψ	A
Ψ	A	A	Ψ	A	Ψ	A
Ψ	Ψ	A	A	A	A	A

βλέπουμε ὅτι ἡ σύνθετη πρόταση $[(p \Rightarrow q) \wedge \sim q] \Rightarrow \sim p$ εἶναι πάντοτε ἀληθής, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὶς τιμές ἀλήθειας, πού παίρνουν οἱ προτάσεις ἀπὸ τὶς ὁποῖες ἀποτελεῖται. Εἶναι δηλαδή ταυτολογία καὶ μποροῦμε νὰ τὴ χρησιμοποιοῦμε ὡς λογικὸ κανόνα.

Νὰ ἕνα παράδειγμα ἐφαρμογῆς αὐτοῦ τοῦ κανόνα:

Παράδειγμα :

Ἡ μαθητὴς Γεωργίου λέει ὅτι ὁ -5 εἶναι ρίζα τῆς ἐξισώσεως $x^2 - 5x + 6 = 0$. Ἄν -5 εἶναι ρίζα τῆς ἐξισώσεως $x^2 - 5x + 6 = 0$, τότε $(-5)^2 - 5 \cdot (-5) + 6 = 0$ ($p \Rightarrow q$). Ἀλλὰ $(-5)^2 - 5 \cdot (-5) + 6 = 25 + 25 + 6 \neq 0$ (q ψευδής). Ἄλλ' ἀφοῦ τώρα γνωρίζουμε ὅτι $p \Rightarrow q$ εἶναι ἀληθής καὶ ὅτι q ψευδής, εἴμαστε βέβαιοι ὅτι p εἶναι ψευδής καὶ ὁ Γεωργίου ἔκαμε λάθος. Ἡ -5 δὲν εἶναι ρίζα τῆς ἐξισώσεως $x^2 - 5x + 6 = 0$.

Στὸ παράδειγμα αὐτὸ μποροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι ἀποδείξαμε τὸ θεώρημα: «ὁ -5 δὲν εἶναι ρίζα τῆς ἐξισώσεως $x^2 - 5x + 6 = 0$ ».

Αυτή η απόδειξη μπορεί να γραφτεί ως εξής:

Προτάσεις	Δικαιολογίες
1) -5 είναι ρίζα της $x^2 - 5x + 6 = 0$ $\Rightarrow [(-5)^2 - 5 \cdot (-5) + 6 = 0]$	1) Όρισμός ρίζας μιᾶς εξισώσεως.
2) $(-5)^2 - 5 \cdot (-5) + 6 \neq 0$	2) Αριθμητική.
3) -5 δέν είναι ρίζα της $x^2 - 5x + 6 = 0$	3) Προτάσεις 1 και 2 και κανόνες της λογικής.

Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ

Σέ καθεμιά από τίς παρακάτω άσκήσεις 44 - 52 (*) δίνονται όρισμένες προτάσεις, τίς όποίες όνομάζουμε άληθεις, και διατυπώνεται ένα θεώρημα. Σέ μερικές περιπτώσεις τό θεώρημα μπορεί νά είναι ψευδές και σέ άλλες νά μή δίνονται άρκετές πληροφορίες, γιά νά άποφανθοῦμε άν τό θεώρημα είναι άληθές ή ψευδές. Ζητείται νά διατυπώσετε τίς άποδείξεις (οί δεδομένες άληθεις προτάσεις λέγονται: ύποθέσεις).

44) **Υπόθεση.** Ό θεός Κώστας θά μάς συνοδεύσει στό θέατρο. άν ή μητέρα τό έπιτρέψει. **Η** μητέρα τό έπέτρεψε.

Θεώρημα. Ό θεός Κώστας θά μάς συνοδεύσει στό θέατρο.

45) **Υπόθεση.** **Αν** δέν ύπάρχει όξυγόνο στή Σελήνη, τότε δέν ύπάρχει ζωή εκεί. **Αποδείχθηκε** τελειωτικά ότι δέν ύπάρχει όξυγόνο στή Σελήνη.

Θεώρημα. Δέν ύπάρχει ζωή στή Σελήνη.

46) **Υπόθεση** $x + y = 20$, $x - y = 4$.

Θεώρημα. $x \neq 1$.

47) **Υπόθεση** $2x - 3y = 7$, $x + 2y = 3$.

Θεώρημα. $3x - y = 10$.

48) **Υπόθεση.** Τό γινόμενο δύο θετικών άριθμών είναι θετικός. Ό άριθμός α είναι θετικός. Τό γινόμενο $\alpha \cdot \beta$ δέν είναι θετικός.

Θεώρημα. Ό άριθμός β είναι άρνητικός.

49) **Υπόθεση.** **Αν** $\alpha \in \mathbb{Z}$, τότε $1 \cdot \alpha = \alpha$. **Αν** $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{Z}$, τότε $\beta \cdot \alpha + \gamma \cdot \alpha = (\beta + \gamma) \cdot \alpha$, $1 + 1 = 2$.

Θεώρημα. Για κάθε $\alpha \in \mathbb{Z}$, ισχύει $\alpha + \alpha = 2\alpha$.

50) **Υπόθεση.** $6 + (-6) = 0$, $8 = 2 + 6$. Για κάθε τριάδα άριθμών α, β, γ , από τό \mathbb{Z} , ισχύει ότι $(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma)$. **Επίσης** γιά κάθε $x \in \mathbb{Z}$ ισχύει ότι $x + 0 = x$.

Θεώρημα. $8 + (-6) = 2$.

51) Νά κατασκευάσετε έναν πίνακα άλήθειας γιά τή σύνθετη πρόταση $(p \wedge q) \vee r$.

52) Ποιά είναι ή άρνηση της $\sim p$, δηλαδή μέ ποιά πρόταση Ισοδυναμεί ή $\sim(\sim p)$;

53) **Αν** α, β είναι πραγματικοί άριθμοί, νά δείξετε ότι $\alpha = \beta \Rightarrow \alpha + \gamma = \beta + \gamma$.

54) Νά άποδείξετε τό θεώρημα:

$$\text{άν } x = 5, \text{ τότε } 3x + 6 = 21$$

55) Νά άποδείξετε τό αντίστροφο του θεωρήματος της άσκήσεως 54.

56) **Αν** $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, $\alpha \neq 0$ και $\alpha(3\beta - 8) = \alpha$, τί μπορείτε νά συμπεράνετε;

57) **Αν** $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, $\beta \neq 4$ και $(3\alpha + 12)(2\beta - 8) = 0$, τί μπορείτε νά συμπεράνετε;

20. ΤΑΥΤΟΛΟΓΙΑ

Μιά σύνθετη πρόταση, ή όποία άποτελείται από άλλες προτάσεις p , q , r κτλ., σέ πεπερασμένο πλήθος, πού συνδέονται μέ τά σύμβολα \wedge , \vee , $\underline{\vee}$, \Rightarrow ,

(*) **Από** τίς άσκήσεις αυτές νά δοθοῦν στους μαθητές, όσες κατά τήν κρίση του καθηγητή πού διδάσκει απαιτούνται γιά τήν έμπέδωση της έννοιας «άπόδειξη».

\Leftrightarrow, \sim , θά ονομάζεται **λογικός τύπος**. Οι p, q, r κ.τ.λ., οι όποιες μπορεί να πάρουν τιμές A ή Ψ , λέγονται **μεταβλητές** του λογικού τύπου.

Οι τύποι, πού συναντήσαμε στα προηγούμενα: $p \wedge q, p \vee q, p \Rightarrow q, \sim p, p \Leftrightarrow q$, ονομάζονται **άπλοι τύποι**. Σύμφωνα μ' αυτούς τούς όρισμούς ή έκφραση $\sim p \wedge \sim q$ είναι ένας λογικός τύπος, όπως επίσης και οι εκφράσεις $[(p \Rightarrow q) \wedge p] \Rightarrow q$ και $[(p \Rightarrow q) \wedge \sim q] \Rightarrow \sim p$, τς όποιες συναντήσαμε στα προηγούμενα.

'Από όσα έκθέσαμε στα προηγούμενα εννοούμε ότι, για να βρούμε τς τιμές αλήθειας ενός λογικού τύπου, θά σχηματίσουμε έναν πίνακα, πού οι πρώτες στήλες του θά έχουν έπικεφαλίδες τς άπλές προτάσεις p, q, r κ.τ.λ., από τς όποιες αποτελείται ό τύπος. "Αν οι άπλές προτάσεις είναι δύο, τότε οι γραμμές του πίνακα θά είναι $2^2 = 4$. "Αν οι άπλές προτάσεις είναι τρεις, τότε οι γραμμές του πίνακα θά είναι $2^3 = 8$. "Αν οι προτάσεις είναι τέσσερες, οι γραμμές θά είναι $2^4 = 16$ κ.ο.κ. "Έπειτα θά σχηματίσουμε παραπλεύρως στήλες μέ έπικεφαλίδες τούς άπλούς τύπους, στους όποιους αναλύεται ό λογικός τύπος πού έξετάζουμε. Στην τελευταία στήλη έπικεφαλίδα θά είναι ό σύνθετος τύπος πού έξετάζουμε. "Αν στην τελευταία στήλη οι τιμές είναι σ' όλες τς γραμμές της A , τότε αυτός ό τύπος είναι αληθής, για όλες τς τιμές τών άπλών του προτάσεων και λέγεται **ταυτολογία**. "Ωστε: **ταυτολογία** λέγεται κάθε λογικός τύπος, πού αληθεύει για κάθε τιμή (άληθή ή ψευδή) τών άπλών προτάσεών του. (*)

Δύο σπουδαίες ταυτολογίες συναντήσαμε στα προηγούμενα και είδαμε ότι στα Μαθηματικά γίνεται μεγάλη χρήση τους. Είναι οι ταυτολογίες:

- 1) $[(p \Rightarrow q) \wedge p] \Rightarrow q$
- 2) $[(p \Rightarrow q) \wedge \sim q] \Rightarrow \sim p$

Δίνουμε μερικά άκόμα παραδείγματα ταυτολογιών:

- 1) 'Η συνεπαγωγή $p \Rightarrow p$ είναι ταυτολογία.

p	$p \Rightarrow p$
A	A
Ψ	A

- 2) 'Η Ισοδυναμία $\sim(\sim p) \Leftrightarrow p$ είναι ταυτολογία.

p	$\sim p$	$\sim(\sim p)$	$\sim(\sim p) \Leftrightarrow p$
A	Ψ	A	A
Ψ	A	Ψ	A

(*) 'Ορισμένες ταυτολογίες ονομάζονται **άρχές ή νόμοι**. Οι νόμοι τής Λογικής του 'Αριστοτέλη είναι οι έξης τέσσερις:

- α) 'Ο νόμος τής ταυτότητας: $p \Rightarrow p$
- β) 'Ο νόμος τής διπλής άρνήσεως: $p \Leftrightarrow \sim(\sim p)$
- γ) 'Ο νόμος τής άποκλείσεως του τρίτου: $p \vee \sim p$
- δ) 'Ο νόμος τής αντίφάσεως: $\sim(p \wedge \sim p)$ (§ 21).

3) 'Η σύνθετη πρόταση $(p \Rightarrow q) \Leftrightarrow (\sim p \vee q)$ είναι ταυτολογία:

p	q	$\sim p$	$p \Rightarrow q$	$\sim p \vee q$	$(p \Rightarrow q) \Leftrightarrow (\sim p \vee q)$
A	A	Ψ	A	A	A
A	Ψ	Ψ	Ψ	Ψ	A
Ψ	A	A	A	A	A
Ψ	Ψ	A	A	A	A

4) 'Η σύνθετη πρόταση $(p \Leftrightarrow q) \Leftrightarrow [(\sim p \vee q) \wedge (p \vee \sim q)]$ είναι ταυτολογία:

p	q	$\sim p$	$\sim q$	$\sim p \vee q$	$p \vee \sim q$	$p \Leftrightarrow q$	$(\sim p \vee q) \wedge (p \vee \sim q)$	$(p \Leftrightarrow q) \Leftrightarrow [(\sim p \vee q) \wedge (p \vee \sim q)]$
A	A	Ψ	Ψ	A	A	A	A	A
A	Ψ	Ψ	A	Ψ	A	Ψ	Ψ	A
Ψ	A	A	Ψ	A	Ψ	Ψ	Ψ	A
Ψ	Ψ	A	A	A	A	A	A	A

5) 'Η σύνθετη πρόταση $(p \underline{\vee} q) \Leftrightarrow (\sim p \wedge q) \vee (p \wedge \sim q)$ είναι ταυτολογία:

p	q	$\sim p$	$\sim q$	$\sim p \wedge q$	$p \wedge \sim q$	$p \underline{\vee} q$	$(\sim p \wedge q) \vee (p \wedge \sim q)$	$(p \underline{\vee} q) \Leftrightarrow [(\sim p \wedge q) \vee (p \wedge \sim q)]$
A	A	Ψ	Ψ	Ψ	Ψ	Ψ	Ψ	A
A	Ψ	Ψ	A	Ψ	A	A	A	A
Ψ	A	A	Ψ	A	Ψ	A	A	A
Ψ	Ψ	A	A	Ψ	Ψ	Ψ	Ψ	A

'Από τούς πίνακες τῶν τριῶν τελευταίων παραδειγμάτων βλέπουμε ὅτι:

- 1) $p \Rightarrow q$ είναι ἰσοδύναμη πρὸς τὴν $\sim p \vee q$
- 2) $p \Leftrightarrow q$ είναι ἰσοδύναμη πρὸς τὴν $(\sim p \vee q) \wedge (p \vee \sim q)$
- 3) $p \underline{\vee} q$ είναι ἰσοδύναμη πρὸς τὴν $(\sim p \wedge q) \vee (p \wedge \sim q)$

Συμπεραίνουμε λοιπὸν ὅτι μὲ τὶς πράξεις τῆς ἀρνήσεως, τῆς συζεύξεως καὶ διαζεύξεως μπορούμε νὰ ἐκφράσουμε τὶς ἄλλες πράξεις τῆς συνεπαγωγῆς (\Rightarrow), τῆς ἰσοδυναμίας (\Leftrightarrow) καὶ τῆς ἀποκλειστικῆς διαζεύξεως ($\underline{\vee}$) καὶ ἐπομένως ὁποιοσδήποτε λογικὸς τύπος μπορεῖ νὰ διατυπωθεῖ μὲ χρῆση τῶν τριῶν μόνο συμβόλων: \wedge , \vee καὶ \sim .

21. ΑΝΤΙΦΑΣΗ

Μία σύνθετη πρόταση λέγεται ἀντίφαση, ἂν, καὶ μόνο ἂν, εἶναι ψευδὴς γιὰ ὁποιαδήποτε τιμὴ (A ἢ Ψ) τῶν ἀπλῶν προτάσεών της.

Κλασικὸ παράδειγμα ἀντιφάσεως εἶναι ἡ σύνθετη πρόταση $p \wedge \sim p$.

p	$\sim p$	$p \wedge \sim p$
A	Ψ	Ψ
Ψ	A	Ψ

'Απὸ τὸν παρακάτω πίνακα βλέπουμε ὅτι ἡ ἀρνηση μιᾶς ταυτολογίας ἀποτελεῖ ἀντίφαση, καὶ ἡ ἀρνηση μιᾶς ἀντιφάσεως ἀποτελεῖ ταυτολογία.

p	$\sim p$	$p \vee \sim p$	$p \wedge \sim p$	$\sim(p \vee \sim p)$	$\sim(p \wedge \sim p)$
A	Ψ	A	Ψ	Ψ	A
Ψ	A	A	Ψ	Ψ	A

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

58) Νά αποδείξετε, χρησιμοποιώντας πίνακες αλήθειας, ότι οι παρακάτω τύποι αποτελούν ταυτολογίες:

α) $[\sim(p \wedge q)] \Leftrightarrow (\sim p \vee \sim q)$

β) $[\sim(p \vee q)] \Leftrightarrow (\sim p \wedge \sim q)$

γ) $[\sim(p \Rightarrow q)] \Leftrightarrow (p \wedge \sim q)$

59) Όμοιο ζήτημα για τους τύπους:

α) $[\sim(p \Leftrightarrow q)] \Leftrightarrow (\sim p \Leftrightarrow q)$

β) $[\sim(p \Leftrightarrow q)] \Leftrightarrow (p \Leftrightarrow \sim q)$

60) Νά αποδείξετε επίσης ότι αποτελούν ταυτολογίες οι παρακάτω τύποι:

α) $(p \wedge q) \Rightarrow q$

β) $[\sim p \wedge (p \vee q)] \Rightarrow q$

γ) $p \Rightarrow (p \vee q)$

61) Όμοιο ζήτημα για τους τύπους:

α) $p \vee (q \vee r) \Leftrightarrow (p \vee q) \vee r$

β) $p \wedge (q \wedge r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \wedge r$

62) Επίσης:

α) $p \wedge (q \vee r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$

β) $p \vee (q \wedge r) \Leftrightarrow (p \vee q) \wedge (p \vee r)$

γ) $[(p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow r)] \Rightarrow (p \Rightarrow r)$.

63) Νά αποδείξετε ότι, αν α είναι μία αληθής πρόταση, τότε $(p \wedge \alpha) \Leftrightarrow p$.

64) Νά αποδείξετε ότι, αν ψ είναι μία ψευδής πρόταση, τότε $(p \vee \psi) \Leftrightarrow p$.

65) Νά αποδείξετε ότι $(p \vee p) \Leftrightarrow p$ και $(p \wedge p) \Leftrightarrow p$.

22. ΤΥΠΟΙ ΑΛΗΘΕΙΣ ΚΑΤΑ ΣΥΓΚΥΡΙΑ (Ή ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ)

"Ένας λογικός τύπος, πού δέν είναι ούτε ταυτολογία ούτε αντίφαση, άλλ' ό όποιος για μερικές τιμές τών μεταβλητών του (άπλών προτάσεων του) δίνει άληθές αποτέλεσμα και για άλλες ψευδές, λέγεται **τύπος αληθής κατά συγκυρία** (ή **σχετικός τύπος**).

Παράδειγμα. Ό τύπος $\sim p \vee q$ είναι αληθής κατά συγκυρία.

p	q	$\sim p$	$\sim p \vee q$
Α	Α	Ψ	Α
Α	Ψ	Ψ	Ψ
Ψ	Α	Α	Α
Ψ	Ψ	Α	Α

Οί πίνακες αλήθειας αποτελούν έναν άσφαλή τρόπο, για νά διαπιστώνουμε αν ένας τύπος είναι ταυτολογία ή αντίφαση ή αληθής κατά συγκυρία.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

66) Ένας μαθητής έκανε τόν εξής συλλογισμό:

$p \Rightarrow q$	(άληθής)
q	(άληθής)
—	—
άρα p	(άληθής)

Νά εξετάσετε αν αυτός ό συλλογισμός είναι πάντοτε άληθής. (Θά κάμετε πίνακα αλήθειας για $[(p \Rightarrow q) \wedge q] \Rightarrow p$.

67) Νά δώσετε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα από την Αριθμητική, από το οποίο νά φαίνεται ότι ο συλλογισμός της άσκησης 66 είναι αληθής κατά συγκυρία (π.χ. $p : 1 = 3, q : 2 = 2$).

68) Ένας μαθητής έκανε τον έξης συλλογισμό:

"Αν $x = 0$ και $y = z$, τότε $y > 1$.

"Αλλά $y > 1$. "Αρα $y \neq z$.

Νά ελέγξετε το συλλογισμό αυτό.

(Νά παραστήσετε μέ $p : x = 0, q : y = z, r : y > 1$ κτλ.)

69) Νά ελέγξετε τους έξης συλλογισμούς:

α) $[(p \Rightarrow \sim q) \wedge \sim q] \Rightarrow \sim p$.

β) $x < 5 \Rightarrow x \neq y, x \neq y \wedge x < 5$.

"Αρα $x < 5 \wedge x = y$

γ) $x = 2 \vee x < 2, x = 3x \neq 2, x = 3 \Rightarrow x < 2$.

"Αρα $x \neq 3$

δ) $x = y, y \neq 1, (x = y \wedge y \neq 1)$. "Αρα $y \neq 1$.

70) Νά δείξετε ότι:

α) ό τύπος $[\sim(p \wedge q)] \Leftrightarrow (p \Rightarrow \sim q)$ είναι μιά ταυτολογία.

β) ό τύπος $(p \wedge q) \wedge \sim q$ άποτελεί αντίφαση.

γ) ό τύπος $[(p \vee q) \wedge p] \Rightarrow \sim q$ είναι σχετικός τύπος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΣΥΝΟΛΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ

23. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ. ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ.

Μάθαμε στο Γυμνάσιο ότι τή λέξη **σύνολο** τή χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε ν' αναφερθούμε σε αντικείμενα όρισμένα καί σαφώς ξεχωρισμένα, πού τά θεωρούμε ως μιά όλότητα.

Έτσι, π.χ., μιλούμε γιά τό σύνολο τών μαθητών μιās τάξεώς μας, τό σύνολο τών άγροτών τής χώρας μας, τό σύνολο τών φυσικών άριθμών, τό σύνολο τών σημείων ενός επιπέδου, τό σύνολο τών σημείων ενός ευθύγραμμου τμήματος, τό σύνολο τών διανυσμάτων του επιπέδου κ.τ.λ.

Τά αντικείμενα πού συναποτελοῦν ένα σύνολο λέγονται **στοιχεία** του συνόλου.

Όνομάζουμε τά σύνολα γενικώς μέ κεφαλαία γράμματα του άλφαβήτου μας καί τά στοιχεία τους μέ μικρά.

Όταν ένα στοιχείο x ανήκει σ' ένα σύνολο A , γράφουμε συμβολικά $x \in A$.

Όταν ένα στοιχείο x δέν ανήκει στό σύνολο A , γράφουμε $x \notin A$.

Γιά ένα σύνολο A καί ένα στοιχείο x αληθεύει ή $x \in A$ ή $x \notin A$.

Η έννοια του συνόλου είναι συνδεμένη μέ τήν έννοια τής βασικής Ισότητας, ή όποία συμβολίζεται μέ « = » καί μέ βάση αυτή θεωρούμε ότι τά στοιχεία του συνόλου ξεχωρίζουν τό ένα από τό άλλο. Λέμε ότι δύο στοιχεία α καί β είναι **ίσα** καί γράφουμε $\alpha = \beta$, αν, καί μόνο αν, τά α καί β είναι όνόματα του ίδιου στοιχείου. Έτσι, π.χ., στό σύνολο Q είναι $2 = \frac{10}{5}$.

Όταν δέν είναι $\alpha = \beta$, τότε λέμε ότι α είναι διαφορετικό από τό β καί γράφουμε συμβολικά $\alpha \neq \beta$. Γιά δύο όποιαδήποτε στοιχεία x καί y θά ισχύει:
$$\text{ή } x = y \quad \text{ή } x \neq y.$$

Όπως μās είναι γνωστό, ένα σύνολο συμβολίζεται:

- 1) μέ άναγραφή τών στοιχείων του μέσα σε άγκιστρο,
- 2) μέ περιγραφή μιās χαρακτηριστικής ιδιότητας τών στοιχείων του μέ τή βοήθεια μεταβλητής καί άγκίστρου.

$$\text{Π.χ. } N = \{ 1, 2, 3, \dots \}$$

$$Z = \{ x \mid \text{κράκεριος τῆς "Αλγεβρας} \}$$

Γιά εύκολία στή διατύπωση γενικῶν προτάσεων εἰσάγεται στά μαθηματικά ἓνα σύνολο, πού λέγεται **κενό σύνολο** καί συμβολίζεται μέ \emptyset . Στό σύνολο αὐτό δέν ἀνήκει κανένα στοιχεῖο.

24. ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΕΝΟΣ ΣΥΝΟΛΟΥ

Λέμε ὅτι ἓνα σύνολο A εἶναι **ὑποσύνολο** ἑνός συνόλου B , καί συμβολίζουμε $A \subseteq B$, ἂν, καί μόνο ἂν, κάθε στοιχεῖο τοῦ A εἶναι καί στοιχεῖο τοῦ B . Συμβολικά ὁ ὀρισμός αὐτός διατυπώνεται ὡς ἑξῆς:

$$(A \subseteq B) \Leftrightarrow (\forall x : x \in A \Rightarrow x \in B).$$

*Ἐτσι, π.χ., τό σύνολο N , τῶν φυσικῶν ἀριθμῶν, εἶναι ὑποσύνολο τοῦ συνόλου R , τῶν πραγματικῶν ἀριθμῶν: $N \subseteq R$.

Δεχόμεστε ὅτι τό κενό σύνολο \emptyset εἶναι ὑποσύνολο ὁποιουδήποτε ἄλλου συνόλου, δηλ. $\emptyset \subseteq A$, γιά κάθε σύνολο A . Τό κενό σύνολο ἔχει ὑποσύνολο μόνο τόν ἑαυτό του, δηλ. $\emptyset \subseteq \emptyset$.

*Ἰσχύουν οἱ ἑξῆς ιδιότητες:

- 1) $A \subseteq A$ (ἀνακλαστική ἢ αὐτοπαθής).
- 2) $(A \subseteq B \wedge B \subseteq \Gamma) \Rightarrow A \subseteq \Gamma$ (μεταβατική).

*Ἐνα σύνολο A λέγεται **γνήσιο ὑποσύνολο** ἑνός ἄλλου συνόλου B , ἂν, καί μόνο ἂν, τό A εἶναι ὑποσύνολο τοῦ B καί ὑπάρχει στοιχεῖο $x \in B$ μέ $x \notin A$. Συμβολικά γράφουμε τότε $A \subset B$. Δηλαδή:

$$(A \subset B) \Leftrightarrow (\forall x : x \in A \Rightarrow x \in B) \wedge (\exists \psi \in B : \psi \notin A)$$

*Ἄν ἓνα σύνολο A δέν εἶναι ὑποσύνολο συνόλου B θά γράφουμε: $A \not\subseteq B$.

*Ἡ ἔννοια **γνήσιο ὑποσύνολο** ἔχει μόνο τή μεταβατική ιδιότητα:

$$(A \subset B \wedge B \subset \Gamma) \Rightarrow A \subset \Gamma.$$

Τό σύνολο B , τοῦ ὁποίου θεωροῦμε διάφορα ὑποσύνολα A, Δ, E κ.τ.λ., λέγεται **σύνολο ἀναφορᾶς** ἢ **ὑπερσύνολο** τῶν A, Δ, E κ.τ.λ.

25. ἴΣΑ ΣΥΝΟΛΑ

Δύο σύνολα A καί B λέμε ὅτι εἶναι **ἴσα**, καί συμβολίζουμε $A = B$, ἂν, καί μόνο ἂν, κάθε στοιχεῖο τοῦ A εἶναι καί στοιχεῖο τοῦ B καί ἀντιστρόφως, κάθε στοιχεῖο τοῦ B εἶναι καί στοιχεῖο τοῦ A . Δηλαδή, συμβολικά:

$$(A = B) \Leftrightarrow (\forall x : x \in A \Rightarrow x \in B) \wedge (\forall \psi : \psi \in B \Rightarrow \psi \in A)$$

*Ἐτσι, π.χ., ἂν $A = \{ 1, 2, 3 \}$ καί $B = \left\{ \frac{5}{5}, 3, 2 \right\}$ τότε ἔχουμε $A = B$.

*Ἄν δύο σύνολα A καί B δέν εἶναι ἴσα, τότε λέμε ὅτι τό A εἶναι **διαφορετικό** ἀπό τό B καί συμβολίζουμε $A \neq B$.

*Ἰσχύουν οἱ ἑξῆς ιδιότητες τῆς ἰσότητος τῶν συνόλων:

- 1) $A = A$ (ἀνακλαστική ἢ αὐτοπαθής).
- 2) $A = B \Rightarrow B = A$ (συμμετρική).
- 3) $(A = B \wedge B = \Gamma) \Rightarrow A = \Gamma$ (μεταβατική).

Ίσχύει επίσης η εξής ιδιότητα:

$$(A \subseteq B \wedge B \subseteq A) \Rightarrow (A = B) \text{ (άντισυμμετρική).}$$

Πραγματικά:

$$\left. \begin{aligned} (A \subseteq B) &\Leftrightarrow (\forall x : x \in A \Rightarrow x \in B) \\ (B \subseteq A) &\Leftrightarrow (\forall x : x \in B \Rightarrow x \in A) \end{aligned} \right\} \Rightarrow A = B$$

26. ΔΥΝΑΜΟΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟΥ

"Όταν έχουμε ένα σύνολο U και θεωρήσουμε όλα τα υποσύνολά του ως αντικείμενα, δηλ. ως στοιχεία ενός νέου συνόλου, τότε ορίζεται ένα νέο σύνολο, πού λέγεται **δυναμοσύνολο** του U . Το **δυναμοσύνολο** αυτό συμβολίζεται με $\mathcal{P}(U)$ και σ' αυτό ανήκουν και τό κενό σύνολο και τό ίδιο τό U .

"Όπως μάθαμε σέ προηγούμενες τάξεις, κάθε σύνολο διαφορετικό από τό κενό έχει τό λιγότερο δύο υποσύνολα: τό κενό σύνολο και τόν έαυτό του. "Ένα σύνολο μέ δύο στοιχεία έχει $2^2=4$ υποσύνολα. "Ένα σύνολο μέ τρία στοιχεία έχει $2^3=8$ υποσύνολα, ένα μέ πέντε στοιχεία έχει 2^5 υποσύνολα και γενικά ένα σύνολο μέ n στοιχεία έχει 2^n υποσύνολα. "Έτσι, π.χ., αν $A = \{1, 2, 3\}$, τότε $\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}$. Παρατηρούμε ότι τό σύνολο A μέ τρία στοιχεία έχει $2^3=8$ υποσύνολα.

27. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ VENN

Σέ πολλές περιπτώσεις διακυκολυνόμαστε στή μελέτη ενός ζητήματος, πού αναφέρεται σέ σύνολα, αν χρησιμοποιήσουμε γραφικές παραστάσεις τους, δηλ. τά γνωστά μας από τίς προηγούμενες τάξεις διαγράμματα του Venn. Ύπενθυμίζουμε ότι σ' ένα διάγραμμα του Venn τά στοιχεία του συνόλου παρασταίνονται μέ σημεία άνεξάρτητα από τή φύση τους.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

71) "Αν $A = \{\alpha, \beta, \gamma, \delta, \epsilon\}$, νά έλέγξετε αν είναι άληθεις και ποιές από τίς ακόλουθες προτάσεις:

$$\beta \in A, \epsilon \notin A, \zeta \in A, \theta \in A, \gamma \in A$$

72) Νά δώσετε μέ άναγραφή των στοιχείων τους τά σύνολα:

$$\alpha) \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 - 5x + 6 = 0\}, \quad \beta) \{x \in \mathbb{N} \mid x < 2\}.$$

73) Νά βρείτε χαρακτηριστική ιδιότητα για τήν περιγραφή των εξής συνόλων:

$$\alpha) \{0, 3, 6, 9, \dots\}$$

$$\beta) \{1, 4, 9, \dots\}$$

$$\gamma) \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$$

74) Νά άναγράψετε δύο σύνολα πού τά στοιχεία τους νά είναι σύνολα.

75) "Αν $A \subseteq B$ και $A \neq B$, τί συμπεραίνετε για τό σύνολο A ;

76) Νά καθορίσετε μέ άναγραφή των στοιχείων του τό σύνολο $\{x \in \mathbb{R} \mid x^2 + 1 = 0\}$.

77) Νά άποδείξετε ότι $(A \subseteq B \wedge B \subseteq \Gamma) \Rightarrow A \subseteq \Gamma$.

78) σχηματίστε τό δυναμοσύνολο του $\{\emptyset, \alpha, \beta\}$

79) Νά άποδείξετε ότι, αν $A \subseteq \emptyset$, τότε $A = \emptyset$.

80) Ποιό είναι τό δυναμοσύνολο του κενού συνόλου;

81) Νά εξετάσετε αν τό κενό σύνολο είναι γνήσιο υποσύνολο ενός όποιοδήποτε συνόλου A .

82) Νά αναγράψετε τό σύνολο λύσεων τής εξίσώσεως
 $(x + 1)(2x + 1)(x^2 - 2)(x^2 + 1) = 0$,

α) όταν σύνολο αναφοράς είναι τό R ,

β) όταν σύνολο αναφοράς είναι τό Q ,

γ) όταν σύνολο αναφοράς είναι τό N .

28. ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΝΟΛΩΝ

*Ας θεωρήσουμε ένα σύνολο αναφοράς U μή κενό και τελείως όρισμένο και τά υποσύνολά του άς τά συμβολίσουμε μέ $A, B, \Gamma, \dots, X, \Psi, \dots$

*Όπως ξέρουμε δύο υποσύνολα του U , έστω τά A, B , λέγονται ίσα, άν, και μόνο άν, γιά κάθε $x \in A \Rightarrow x \in B$ και γιά κάθε $y \in B \Rightarrow y \in A$. 'Η έννοια τής ισότητας αυτής μπορεί νά θεωρηθεί ώς βασική ισότητα στό σύνολο όλων τών υποσυνόλων του U , πού όπως είναι γνωστό, τό συμβολίζουμε μέ $\mathcal{P}(U)$. Μέ βάση τήν ισότητα αυτή τά υποσύνολα του U ξεχωρίζουν τό ένα από τό άλλο. Στο σύνολο αυτό, τών υποσυνόλων του U , όρίζονται πράξεις ώς έξής:

A) Ένωση συνόλων

*Ός ένωση δύο συνόλων A και B , ή όποία συμβολίζεται μέ $A \cup B$, όρίζει-ται τό σύνολο όλων τών στοιχείων, πού άνήκουν στό A είτε στό B .

Συμβολικά γράφουμε:

$$A \cup B = \{x \in U \mid x \in A \vee x \in B\}$$

*Αν τά σύνολα A και B όρίζονται μέ χαρακτηριστική ιδιότητα τών στοιχείων τους, δηλ. άν, π.χ., είναι:

$$A = \{x \in U \mid p(x)\} \quad \text{και} \quad B = \{x \in U \mid q(x)\},$$

τότε έχουμε, όπως γνωρίζουμε από τή Λογική, ότι:

$$A \cup B = \{x \in U \mid p(x) \vee q(x)\}$$

*'Η γραφική παράσταση τής ένώσεως δύο συνόλων A και B φαίνεται στό παραπλεύρως διάγραμμα. Είναι τό σκιασμένο μέρος του σχήματος.

*'Ισχύουν οι έξής ιδιότητες:

1) $A \cup B = B \cup A$ (άντιμεταθετική).

Πραγματικά: $A \cup B = \{x \in U \mid x \in A \vee x \in B\}$
 $x \in B\} = \{x \in U \mid x \in B \vee x \in A\}$ (έπειδή $p \vee q \Leftrightarrow q \vee p$) $= B \cup A$.

2) $(A \cup B) \cup \Gamma = A \cup (B \cup \Gamma)$ (προσεταριστική).


Πραγματικά:

$$(A \cup B) \cup \Gamma = \{x \in U \mid x \in (A \cup B) \vee x \in \Gamma\}$$

$$= \{x \in U \mid x \in A \vee x \in B \vee x \in \Gamma\}$$

$$= \{x \in U \mid x \in A \vee x \in (B \cup \Gamma)\}, \text{ έπειδή } (p \vee q) \vee r \Leftrightarrow p \vee (q \vee r)$$

$$= A \cup (B \cup \Gamma).$$



Σχ. 28.1

Ἐπειδὴ ἰσχύει ἡ ἰδιότητα (2), συμφωνοῦμε νὰ γράφουμε:

$$(A \cup B) \cup \Gamma = A \cup (B \cup \Gamma) = A \cup B \cup \Gamma$$

Ἡ πράξη \cup ἐπεκτείνεται γιὰ περισσότερα σύνολα:

$$A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup \dots \cup A_n = \bigcup_{k=1}^n A_k = \{x \in U \mid x \in A_1 \vee x \in A_2 \vee \dots \vee x \in A_n\}.$$

Β) Τομή συνόλων

Ὡς τομή δύο συνόλων A καὶ B ὀρίζεται τὸ σύνολο τῶν στοιχείων, ποὺ ἀνήκουν στὸ A καὶ στὸ B συγχρόνως καὶ συμβολίζεται μὲ $A \cap B$.

Συμβολικὰ γράφουμε τὸν ὀρισμὸ ὡς ἑξῆς:


$$A \cap B = \{x \in U \mid x \in A \wedge x \in B\}.$$

Ἄν τὰ σύνολα A καὶ B δίνονται μὲ χαρακτηριστικὴ ἰδιότητα τῶν στοιχείων τους, π.χ., ἂν εἶναι:

$$A = \{x \in U \mid p(x)\} \quad \text{καὶ} \quad B = \{x \in U \mid q(x)\},$$

τότε θὰ ἔχουμε:

$$A \cap B = \{x \in U \mid p(x) \wedge q(x)\}$$



Σχ. 28.2

Ἡ γραφικὴ παράσταση τῆς τομῆς δύο συνόλων A καὶ B φαίνεται στὸ παραπλευρῶς διάγραμμα. Εἶναι τὸ σκιασμένο μέρος τοῦ σχήματος.

Ἰσχύουν οἱ ἑξῆς ἰδιότητες:

$$1) A \cap B = B \cap A \quad (\text{ἀντιμεταθετική}).$$

Πραγματικά:

$$A \cap B = \{x \in U \mid x \in A \wedge x \in B\} = \{x \in U \mid x \in B \wedge x \in A\}, \quad (\text{ἐπειδὴ } p \wedge q \Leftrightarrow q \wedge p) = B \cap A$$

$$2) (A \cap B) \cap \Gamma = A \cap (B \cap \Gamma) \quad (\text{προσεταιριστική}).$$

Πραγματικά:

$$\begin{aligned} (A \cap B) \cap \Gamma &= \{x \in U \mid x \in (A \cap B) \wedge x \in \Gamma\} \\ &= \{x \in U \mid x \in A \wedge x \in B \wedge x \in \Gamma\} \\ &= \{x \in U \mid x \in A \wedge x \in (B \cap \Gamma)\}, \quad \text{ἐπειδὴ } (p \wedge q) \wedge r \Leftrightarrow p \wedge (q \wedge r) \\ &= A \cap (B \cap \Gamma). \end{aligned}$$

Ἐπειδὴ ἰσχύει ἡ ἰδιότητα 2), συμφωνοῦμε νὰ γράφουμε:

$$(A \cap B) \cap \Gamma = A \cap (B \cap \Gamma) = A \cap B \cap \Gamma$$

Ἡ πράξη \cap ἐπεκτείνεται γιὰ περισσότερα σύνολα:

$$A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap \dots \cap A_n = \bigcap_{k=1}^n A_k = \{x \in U \mid x \in A_1 \wedge x \in A_2 \wedge \dots \wedge x \in A_n\}$$

Τέλος, ὑπεθυμίζουμε ὅτι, ἂν $A \cap B = \emptyset$, τότε τὰ σύνολα A, B λέγονται ξένα μεταξύ τους. Ἐπομένως ἂν $A \cap B \neq \emptyset$, τότε $[\exists x : x \in A \wedge x \in B]$ καὶ ἀντιστρόφως, ἂν $[\exists x : x \in A \wedge x \in B]$, τότε $A \cap B \neq \emptyset$ ἢ καὶ $A \cap B \neq \emptyset \Leftrightarrow [\exists x : x \in A \wedge x \in B]$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

83) Ἄν $A = \{1, 2, 3, 5\}$ καὶ $B = \{-1, 3, 7\}$, νὰ σχηματίσετε τὰ σύνολα $A \cup B$, $A \cap B$.

84) "Αν $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 0\}$, $B = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 < x < 8\}$ και $\Gamma = \{x \in \mathbb{R} \mid 2 < x < 6\}$ νά συμβολίσετε με χρήση μεταβλητής τά σύνολα $A \cap B$, $A \cup B$, $A \cap \Gamma$, $A \cup \Gamma$, $B \cup \Gamma$, $B \cap \Gamma$, $A \cap B \cap \Gamma$, $A \cup B \cup \Gamma$.

85) Νά αποδείξετε ότι:
α) $A \cup A = A$ β) $A \cup \emptyset = A$

86) Νά αποδείξετε ότι:
α) $A \cap A = A$ β) $A \cap \emptyset = \emptyset$

87) Νά αποδείξετε ότι:
α) $A \cap B \subseteq A$ β) $A \cap B \subseteq B$

88) Νά αποδείξετε ότι:
α) $A \subseteq A \cup B$ β) $B \subseteq A \cup B$

89) Νά αποδείξετε ότι $(A \cup B = \emptyset) \Rightarrow (A = \emptyset \wedge B = \emptyset)$

90) "Ομοίως ότι, αν $A \subseteq B$, τότε: α) $B = A \cup B$ β) $A = A \cap B$

91) Νά αποδείξετε ότι $(A \cap B) \cap \Gamma \subseteq A \cap (B \cap \Gamma)$ και επίσης ότι $A \cap (B \cap \Gamma) \subseteq (A \cap B) \cap \Gamma$. Τί συμπεραίνετε από αυτά;

92) Νά αποδείξετε ότι:
α) $A \cap (B \cup \Gamma) = (A \cap B) \cup (A \cap \Gamma)$
β) $A \cup (B \cap \Gamma) = (A \cup B) \cap (A \cup \Gamma)$ (έπιμεριστικές Ιδιότητες)

Νά δείξετε και με διάγραμμα του Venn ότι αυτές οι ιδιότητες αληθεύουν.

Γ) Διαφορά συνόλων

"Ως διαφορά συνόλου B από σύνολο A , πού συμβολίζεται με $A - B$, ορίζεται τό σύνολο τών στοιχείων του A , τά όποια δέν άνήκουν στό B . "Αν τά A και B είναι ξένα, τότε δεχόμαστε ότι $A - B = A$. Τέλος, αν $A = B$, τότε $A - B = A - A = \emptyset$.


Συμβολικά ό όρισμός αυτός γράφεται ως έξής:

$$A - B = \{x \in U \mid x \in A \wedge x \notin B\}$$

"Η γραφική παράσταση τής διαφοράς $A - B$ φαίνεται στό παραπλεύρωσ διάγραμμα. Είναι τό σκιασμένο μέρος του σχήματος.

"Από τό ίδιο σχήμα βλέπουμε άμέσως ότι:

$$(A - B) \cup B = A \cup B.$$



Σχ. 28.3

Α) Συμπλήρωμα συνόλου

"Ονομάζουμε συμπλήρωμα του συνόλου A ως πρós τό U , και τό συμβολίζουμε με A^c είτε με $\bar{C}A$, τό σύνολο $U - A$, δηλ. τό σύνολο τών στοιχείων του U , τά όποια δέν άνήκουν στό A .

Συμβολικά ό όρισμός αυτός γράφεται:

$$A^c = \{x \in U \mid x \notin A\}$$

Είναι φανερό από τούς παραπάνω όρισμούς ότι:

1) $A \cap A^c = \emptyset$, 2) $A \cup A^c = U$ και 3) $(A^c)^c = A$

"Επίσης ότι $\underbrace{C(U - A)}_U = \emptyset$ και $\underbrace{C(\emptyset)}_U = U$

"Ακόμα από τό σχήμα 28.3 έχουμε ότι:

$$A - B = A \cap B^c$$

Ίσχύουν οι έξης ιδιότητες, οι όποιες λέγονται νόμοι του De Morgan:

$$1) (A \cap B)^c = A^c \cup B^c$$

$$2) (A \cup B)^c = A^c \cap B^c$$

Ή αποδείχνουμε έδω την ισότητα 2):

$$\begin{aligned} & \text{Γιά κάθε } x \in U, x \in (A \cup B)^c \Rightarrow x \notin (A \cup B) \Rightarrow \sim(x \in A \vee x \in B) * \Rightarrow \\ \Rightarrow & x \notin A \wedge x \notin B \Rightarrow x \in A^c \wedge x \in B^c \Rightarrow x \in (A^c \cap B^c). \end{aligned}$$

$$*\text{Ωστε: } (A \cup B)^c \subseteq (A^c \cap B^c) \quad (\alpha)$$

Ή αντιστρόφως:

$$\begin{aligned} & \text{Γιά κάθε } x \in U, x \in (A^c \cap B^c) \Rightarrow (x \in A^c \wedge x \in B^c) \Rightarrow \sim(x \in A \vee x \in B) \Rightarrow \\ & (x \notin A \wedge x \notin B) \Rightarrow x \notin (A \cup B) \Rightarrow x \in (A \cup B)^c \end{aligned}$$

$$*\text{Ωστε είναι: } (A^c \cap B^c) \subseteq (A \cup B)^c \quad (\beta)$$

Ή από τις (α) και (β) έπεται η παραπάνω ισότητα (2).

Μέ όμοιο τρόπο αποδείχεται η (1).

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

93) Νά αποδείξετε ότι:

$$(A = B^c) \Leftrightarrow (A^c = B)$$

94) Νά αποδείξετε ότι τά σύνολα A και $B - A$ είναι ξένα μεταξύ τους.

95) Νά αποδείξετε ότι $A - \emptyset = A$.

96) Νά αποδείξετε και μέ συλλογισμό ότι

$$(A - B) \cup B = A \cup B$$

(Θά αντικαταστήσετε τό $A - B$ μέ τό ίσο του $A \cap B^c$ και θά εφαρμόσετε την έπιμεριστική ιδιότητα τής ένώσεως ως πρός την τομή).

97) Νά άπλοποιήσετε τις έξης παραστάσεις:

$$\alpha) B \cap (A \cup A^c)$$

$$\beta) A \cup (\Gamma \cup \Gamma^c)$$

$$\gamma) (B \cap \Gamma) \cup (B \cap \Gamma^c)$$

$$\delta) (A \cap B) \cup (A \cap B^c) \cup (A^c \cap B)$$

29. ΚΑΡΤΕΣΙΑΝΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΟΥ A ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟ B

Ή έννοια του διατεταγμένου ζεύγους μās είναι γνωστή από τις προηγούμενες τάξεις: "Ένα ζεύγος στοιχείων λέγεται διατεταγμένο ζεύγος, άν, και μόνο άν, έχει όρισθεί ποιό στοιχείο είναι πρώτο και ποιό δεύτερο. "Έτσι, π.χ., άν για τά στοιχεία α, β όρίσουμε ως πρώτο τό α και ως δεύτερο τό β έχουμε καθορίσει τή διάταξη στό ζεύγος. Αυτό τό συμβολίζουμε μέ τό (α, β) . Ένω, άν όρίσουμε ως πρώτο τό β και ως δεύτερο τό α , θά γράψουμε (β, α) .

Σ' ένα διατεταγμένο ζεύγος (α, β) τό α λέγεται: τό πρώτο μέλος του ζεύγους και τό β : τό δεύτερο μέλος του ζεύγους.

Ή από τόν παραπάνω όρισμό του διατεταγμένου ζεύγους έπεται ότι $(\alpha, \beta) \neq (\beta, \alpha)$. Είναι όμως δυνατό νά έχουμε ζεύγος μέ τό ίδιο πρώτο και δεύτερο μέλος, όπως, π.χ., τά (α, α) , (β, β) , (γ, γ) κ.τ.λ.

Δύο διατεταγμένα ζεύγη (α, β) και (α', β') όρίζονται ως ίσα, άν, και μόνο

(*) έπειδή: $\sim(p \vee q) \Leftrightarrow \sim p \wedge \sim q$.

άν, είναι $\alpha = \alpha'$ και $\beta = \beta'$.

Άν A και B είναι δύο μή κενά σύνολα, τό σύνολο τών διατεταγμένων ζευγών (α, β) μέ $\alpha \in A$ και $\beta \in B$, λέγεται: καρτεσιανό γινόμενο τοῦ συνόλου A ἐπί τό σύνολο B και συμβολίζεται μέ $A \times B$.

Συμβολικά ὁ ὀρισμός αὐτός γράφεται:

$$A \times B = \{ (\alpha, \beta) \mid \alpha \in A \wedge \beta \in B \}$$

Άν $A = \emptyset$ ἢ $B = \emptyset$, τότε $A \times B = \emptyset$ ἀπό ὀρισμό. Είναι δηλ. $A \times \emptyset = \emptyset$ και $\emptyset \times B = \emptyset$.

Άν $A = B$, τότε $A \times A = A^2 = \{ (\alpha, \beta) \mid \alpha \in A \wedge \beta \in A \}$

Παραδείγματα: 1ο) Άν $A = \{ 1, 2 \}$ και $B = \{ \alpha, \beta \}$, τότε

$$A \times B = \{ (1, \alpha), (1, \beta), (2, \alpha), (2, \beta) \}, \text{ ἐνῶ}$$

$$B \times A = \{ (\alpha, 1), (\alpha, 2), (\beta, 1), (\beta, 2) \}. \text{ Ὡστε: } A \times B \neq B \times A$$

2ο) Άν $A = N = \{ 1, 2, 3, \dots \}$, τότε:

$$N \times N = N^2 = \left\{ \begin{array}{l} (1, 1), (1, 2), (1, 3), \dots \\ (2, 1), (2, 2), (2, 3), \dots \\ (3, 1), (3, 2), (3, 3), \dots \\ \vdots \\ \vdots \\ \vdots \end{array} \right\}$$

Υπενθυμίζουμε τά ἑξῆς:

1) Ἡ ἀντιμεταθετική ιδιότητα δέν ἰσχύει στό καρτεσιανό γινόμενο δύο συνόλων. Δηλ. είναι $A \times B \neq B \times A$ ἐκτός ἂν είναι $A = B$ ἢ ὁ ἕνας παράγοντας είναι τό κενό σύνολο.

2) Άν τό σύνολο A ἔχει μ στοιχεῖα και τό B ἔχει ν στοιχεῖα, τότε τό $A \times B$ ἔχει $\mu \cdot \nu$ (τό πλήθος) στοιχεῖα. Άν τό A ἢ τό B ἔχει ἄπειρο πλήθος στοιχείων, τότε τό καρτεσιανό γινόμενο $A \times B$ ἔχει ἐπίσης ἄπειρο πλήθος στοιχείων.

3) Μποροῦμε νά παραστήσουμε ἕνα καρτεσιανό γινόμενο μέ πίνακα διπλῆς εἰσόδου, ὅπως μάθαμε στή Γ' τάξη τοῦ Γυμνασίου.

5) Άν θεωρήσουμε τά μέλη ἑνός διατεταγμένου ζεύγους ὡς συντεταγμένες σημείου στό ἐπίπεδο δύο ἀξόνων $x'O'x$, $y'O'y$, τότε κάθε διατεταγμένο ζεύγος παρασταίνει ἕνα σημείο σ' αὐτό τό ἐπίπεδο. Ἐπομένως ἕνα καρτεσιανό γινόμενο μέ δύο παράγοντες, π.χ. τό $A \times B$, θά παρασταίνει τότε ἕνα σύνολο σημείων στό ἐπίπεδο αὐτό. Ἐχουμε τότε τή γεωμετρική (ἢ γραφική) παράσταση τοῦ καρτεσιανοῦ γινομένου.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

98) Άν τά διατεταγμένα ζεύγη $(x + y, 1)$ και $(5, x - y)$ είναι ἴσα, νά βρεῖτε τά x και y .

99) Άν $A = \{ 1, 2, 3 \}$ και $B = \{ 0, 1, -2 \}$, νά σχηματίσετε τό $A \times B$. Ἐπειτα νά κάνετε τή γεωμετρική του παράσταση.

100) Νά ἀποδείξετε ὅτι:

α) $A \times (B \cap \Gamma) = (A \times B) \cap (A \times \Gamma)$


β) Άν $A \subseteq B$, τότε $A \times A \subseteq B \times B$.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ

30. ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΚΑΙ ΠΛΑΓΙΟΓΩΝΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

A) Σ' ένα επίπεδο (E) χαράζουμε δύο τεμνόμενους άξονες $x'Ox$ και $y'Oy$, που έχουν κοινή άρχή τό σημείο O τής τομής τους, και μοναδιαία διανύσματα $\vec{O\theta} = \vec{i}$ και $\vec{O\eta} = \vec{j}$ αντίστοιχως (σχ. 30.1 και 30.2).



Σχ. 30.1



Σχ. 30.2

Οι δύο αυτοί άξονες αποτελούν ένα σύστημα αναφοράς ή, όπως συνήθως λέμε, ένα σύστημα άξόνων στο επίπεδο (E).

Έστω τώρα ένα σημείο M του επιπέδου (E). Από τό M φέρνουμε εύθειες παράλληλες στους άξονες. Ορίζονται έτσι ένα σημείο Π στον άξονα $x'Ox$ και ένα σημείο P στον άξονα $y'Oy$. Ορίζονται επίσης τά διανύσματα \vec{OM} , \vec{OPi} , \vec{OPeta} .

Τό διάνυσμα \vec{OM} λέγεται **διανυσματική άκτίνα** του σημείου M.

» » \vec{OPi} » **τετμημένη προβολή** του \vec{OM} .

» » \vec{OPeta} » **τεταγμένη προβολή** του \vec{OM} .

Ή άλγεβρ. τιμή \vec{OPi} , του \vec{OPi} , λέγεται **τετμημένη** του σημείου M.

» » » \vec{OPeta} , » \vec{OPeta} , » **τεταγμένη** του σημείου M.


Ή τετμημένη ενός σημείου M συμβολίζεται μέ x_M και ή τεταγμένη του μέ y_M . Οι άριθμοί x_M , y_M λέγονται **συντεταγμένες** του σημείου M.

Παρατηρούμε τώρα ότι: 1) με τόν τρόπο, τόν όποιο είδαμε προηγουμένως, σέ κάθε σημείο M τού έπιπέδου άντιστοιχεί ένα, και μόνο ένα, διατεταγμένο ζεύγος πραγματικών άριθμών μέ πρώτο μέλος του τήν τετμημένη x_M , τού M , και δεύτερο μέλος του τήν τεταγμένη y_M , τού M , δηλαδή τό διατεταγμένο ζεύγος (x_M, y_M) . 2) Άντιστρόφως: σέ κάθε διατεταγμένο ζεύγος πραγματικών άριθμών (x, y) άντιστοιχεί ένα και μόνο σημείο τού έπιπέδου, τό $M(x, y)$, τό όποιο όρίζεται, άν πάρουμε πάνω στους $x'x$ και $y'y$ διανύσματα \vec{OP} και $\vec{OP'}$ τέτοια, ώστε $\vec{OP} = x$ και $\vec{OP'} = y$, και φέρουμε άπό τό Π παράλληλη πρός τόν άξονα $y'y$ και άπό τό P παράλληλη πρός τόν $x'x$. 'Η τομή αύτών τών δύο εύθειών όρίζει τό M .

Υπάρχει λοιπόν άμφιμονοσήμαντη άντιστοιχία μεταξύ τού συνόλου $R \times R$ και τού συνόλου τών σημείων τού έπιπέδου (E).

Γιά νά έκφράσουμε ότι ένα σημείο M έχει τετμημένη x και τεταγμένη y , γράφουμε $M = (x, y)$ ή $M(x, y)$.

Οί δύο άξονες σχηματίζουν τέσσερις γωνίες, οί όποιες λέγονται **πρώτη, δεύτερη, τρίτη και τέταρτη γωνία τών άξόνων**, όπως σημειώνονται μέ τή σειρά I, II, III, IV στό σχ. 30.3.



Σχ. 30.3

Κάθε σημείο έσωτερικό τής γωνίας I έχει συντεταγμένες θετικές.

Κάθε σημείο έσωτερικό τής γωνίας III έχει συντεταγμένες άρνητικές.

Κάθε σημείο έσωτερικό τής γωνίας II έχει τετμημένη άρνητική και τεταγμένη θετική.

Κάθε σημείο έσωτερικό τής γωνίας IV έχει τετμημένη θετική και τεταγμένη άρνητική.

'Ο άξονας $x'Ox$ λέγεται **άξονας τών x ή άξονας τών τετμημένων** και ό $y'Oy$ λέγεται **άξονας τών y ή άξονας τών τεταγμένων**. 'Η τομή τών άξόνων O λέγεται **άρχή** τών άξόνων. 'Η άρχή O έχει και τής δύο τής συντεταγμένες μηδέν, δηλ. $O(0, 0)$.

Οί άξονες λέγονται **όρθογώνιοι άξονες** συντεταγμένων, όταν είναι κάθετοι μεταξύ τους, άλλιώς λέγονται **πλαγιογώνιοι** (σχ. 30.1).

'Όταν οί άξονες είναι όρθογώνιοι και έπιπλέον τά μοναδιαία διανύσματα $\vec{O\theta}$ και $\vec{O\eta}$ έχουν ίσα μήκη, τότε λέμε ότι έχουμε ένα **όρθοκανονικό** σύστημα άξόνων.

'Ετσι μέ τής συντεταγμένες καθορίζεται ή θέση ενός σημείου στό έπίπεδο.


31. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΕΦΑΡ. ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

'Εστω (σχ. 31.1) ένα προσανατολισμένο έπίπεδο (E) έφοδιασμένο μέ τό σύστημα όρθογώνιων άξόνων xOy και έφαρμοστό διάνυσμα \vec{AB} πάνω στό (E). Φέρνουμε άπό τά A, B τής παράλληλες πρός τούς άξονες. 'Ορίζουμε έτσι τά έφαρμοστά διανύσματα $\vec{A_1B_1}$ πάνω στόν άξονα $x'Ox$ και $\vec{A_2B_2}$ πάνω στόν


άξονα $y'Oy$. Τό $\vec{A_1B_1}$ ονομάζεται: **τετμημένη προβολή** του \vec{AB} και τό $\vec{A_2B_2}$ **τεταγμένη προβολή** του \vec{AB} .

*Αν ό φορέας του \vec{AB} (τό όποίο ύποτίθεται όχι μηδενικό) είναι παράλληλος πρós τόν άξονα Oy , τότε ή τετμημένη προβολή του \vec{AB} είναι τό μηδενικό έφαρμοστό διάνυσμα $\vec{A_1A_1}$ (Σχ. 31.3).


*Αν ό φορέας του \vec{AB} είναι παράλληλος πρós τόν άξονα Ox , τότε ή τεταγμένη προβολή του \vec{AB} είναι τό μηδενικό έφαρμοστό διάνυσμα $\vec{A_2A_2}$ (Σχ. 31.4).




Σχ. 31.1




Σχ. 31.2



Σχ. 31.3



Σχ. 31.4



Σχ. 31.5

*Αν τό \vec{AB} είναι μηδενικό διάνυσμα, π.χ. τό \vec{AA} , τότε και οι δύο προβολές του είναι μηδενικά διανύσματα (Σχ. 31.5).

*Έστω τώρα ότι είναι: $A = (x_A, y_A)$, δηλ. ή τετμημένη του σημείου A είναι x_A και ή τεταγμένη του είναι y_A . *Έστω επίσης ότι είναι $B = (x_B, y_B)$ 'Ο άριθμός $x_B - x_A$ (τετμημένη του πέρατος μείον τετμημένη της άρχής του \vec{AB}) ονομάζεται: ή **τετμημένη του \vec{AB}** και συγχρόνως: ή **άλγ. τιμή του $\vec{A_1B_1}$** πάνω στόν άξονα $x'Ox$, και συμβολίζεται με $\vec{A_1B_1}$ (Σχ. 31.1).

'Ο άριθμός $y_B - y_A$ (τεταγμένη του πέρατος μείον τεταγμένη της άρχής του διανύσματος) ονομάζεται: ή **τεταγμένη του \vec{AB}** και συγχρόνως: ή **άλγ. τιμή του $\vec{A_2B_2}$** πάνω στόν άξονα $y'Oy$, και συμβολίζεται με $\vec{A_2B_2}$.

*Έτσι, π.χ., στό Σχ. 31.2 ή τετμημένη προβολή του \vec{AB} είναι τό $\vec{A_1B_1}$. 'Η τετμημένη του \vec{AB} είναι $1 - 4 = -3 =$ άλγ. τιμή του $\vec{A_1B_1}$ πάνω στόν $x'Ox$.

Ἡ τεταγμένη προβολή τοῦ \vec{AB} εἶναι τό $\vec{A_2B_2}$. Ἡ τεταγμένη τοῦ \vec{AB} εἶναι $2 - 4 = -2 = \text{άλγ. τιμὴ τοῦ } \vec{A_2B_2}$ πάνω στόν $y'Ox$.

Ἐπίσης ἡ τετμημένη προβολή τοῦ \vec{BA} εἶναι τό $\vec{B_1A_1}$, ἡ τετμημένη τοῦ \vec{BA} εἶναι $4 - 1 = 3 = \text{άλγ. τιμὴ τοῦ } \vec{B_1A_1}$ πάνω στόν $x'Ox$.

Ἡ τεταγμένη προβολή τοῦ \vec{BA} εἶναι τό $\vec{B_2A_2}$, ἡ τεταγμένη τοῦ \vec{BA} εἶναι $4 - 2 = 2 = \text{άλγ. τιμὴ τοῦ } \vec{B_2A_2}$ πάνω στόν $y'Oy$.

Ἐπίσης εἶναι (Σχ. 31.2):

ἡ τετμημένη προβολή τοῦ \vec{AA} τό $\vec{A_1A_1}$, ἡ τετμημένη τοῦ \vec{AA} : $4 - 4 = 0$,

ἡ τεταγμένη προβολή τοῦ \vec{AA} τό $\vec{A_2A_2}$, ἡ τεταγμένη \vec{AA} : $4 - 4 = 0$.

Ἡ τετμημένη καὶ τεταγμένη ἑνός διανύσματος λέγονται **συντεταγμένες** τοῦ διανύσματος. Γιά νά συμβολίσουμε ὅτι ἕνα διάνυσμα \vec{AB} ἔχει τετμημένη α καὶ τεταγμένη β , γράφουμε $\vec{AB}(\alpha, \beta)$ ἢ $\vec{AB} = (\alpha, \beta)$.

Ἀπό τὰ παραπάνω ἐννοοῦμε ὅτι ἡ θέση ἑνός ἐφαρμοστοῦ διανύσματος καθορίζεται, ἂν γνωρίζουμε τίς συντεταγμένες τῶν ἄκρων του ἢ τίς συντεταγμένες τοῦ διανύσματος καὶ τίς συντεταγμένες ἑνός ἄκρου του (ἀρχῆς ἢ πέρατος). Οἱ τύποι, πού χρησιμοποιοῦμε, εἶναι οἱ $\alpha = x_B - x_A$, $\beta = y_B - y_A$.

32. ἸΣΑ (Ἡ ἸΣΟΔΥΝΑΜΑ) ΕΦΑΡΜΟΣΤΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ. ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

A) Ἐνα ἐφαρμοστό διάνυσμα \vec{AB} λέγεται **ἴσο** ἢ **ἰσοδύναμο** μέ ἄλλο $\vec{\Gamma\Delta}$, ἂν, καὶ μόνο ἂν, οἱ συντεταγμένες τοῦ \vec{AB} εἶναι ἴσες ἀντιστοίχως μέ τίς ὁμώνυμες τους συντεταγμένες τοῦ $\vec{\Gamma\Delta}$.

Γράφουμε τότε συμβολικά: $\vec{AB} = \vec{\Gamma\Delta}$.

Ἐτσι, π. χ., στό Σχ.

32.1 ἡ τετμημένη τοῦ

\vec{AB} εἶναι $-5 - (-2) = -3$

ἡ τεταγμένη τοῦ \vec{AB} εἶναι


$6 - 2 = 4$,

ἡ τετμημένη τοῦ $\vec{\Gamma\Delta}$ εἶναι

$2 - 5 = -3$,

ἡ τεταγμένη τοῦ $\vec{\Gamma\Delta}$ εἶναι

$7 - 3 = 4$.



Σχ. 32.1

Ἐπομένως σύμφωνα μέ τόν ὄρισμό, πού δώσαμε, εἶναι $\vec{AB} = \vec{\Gamma\Delta}$.

Γενικά, ἂν $\vec{AB}(\alpha, \beta)$ καὶ $\vec{\Gamma\Delta}(\alpha', \beta')$, γιά νά ἐκφράσουμε ὅτι $\vec{AB} = \vec{\Gamma\Delta}$, μποροῦμε νά γράφουμε συμβολικά $(\alpha, \beta) = (\alpha', \beta')$. Μ' αὐτό θά ἐννοοῦμε ὅτι $\alpha = \alpha'$ καὶ $\beta = \beta'$.

Ἡ ἔννοια ἰσότητος ἐφαρμοστῶν διανυσμάτων, πού ὀρίσαμε ἐδῶ, ἔχει τίς γνωστές ιδιότητες:

- α) Ἀνακλαστική : $\vec{AB} = \vec{AB}$
 β) Συμμετρική : $\vec{AB} = \vec{\Gamma\Delta} \Rightarrow \vec{\Gamma\Delta} = \vec{AB}$
 γ) Μεταβατική : $\left. \begin{array}{l} \vec{AB} = \vec{\Gamma\Delta} \\ \vec{\Gamma\Delta} = \vec{ΚΛ} \end{array} \right\} \Rightarrow \vec{AB} = \vec{ΚΛ}$

Παρατηρήσεις: 1) Εἶναι φανερό ὅτι, ἂν ἔχουμε ἓνα ἐφαρμοστό διάνυσμα, π.χ. τὸ \vec{AB} , ὑπάρχουν ἀπειράριθμα ἐφαρμοστά διανύσματα, πού τὸ καθένα εἶναι ἴσο μέ τὸ \vec{AB} . Εἶναι τὰ διανύσματα πού ἔχουν τίς συντεταγμένες τους ἴσες μέ τίς ὁμώνυμες συντεταγμένες τοῦ \vec{AB} .

2) Ἡ παραπάνω δεύτερη ιδιότητα τῆς ἔννοιας τῆς ἰσότητος μᾶς ἐπιτρέπει νά λέμε ὅτι: $\vec{AB}, \vec{\Gamma\Delta}$ εἶναι ἴσα μεταξύ τους.

3) Ἄν $\vec{AB}, \vec{\Gamma\Delta}$ εἶναι ἴσα (μεταξύ τους) καί ὄχι μηδενικά, τότε ἔχουν τήν ἴδια διεύθυνση (οἱ φορεῖς τους εἶναι παράλληλοι) καί τήν ἴδια φορά (εἶναι ὁμόρροπα). (Ἐπειδή τρίγ. $ABH =$ τρίγ. $\Gamma\Delta\Theta$ καί $\vec{AH}, \vec{\Gamma\Theta}$ παράλληλα καί ὁμόρροπα, ὅπως ἐπίσης καί τὰ \vec{HB} καί $\vec{\Theta\Delta}$ κ.τ.λ.)

4) Κάθε μηδενικό ἐφαρμοστό διάνυσμα εἶναι ἴσο μέ κάθε ἄλλο μηδενικό ἐφαρμοστό διάνυσμα (γιατί;).

Β) Ἐνα ἐφαρμοστό διάνυσμα \vec{AB} (Σχ. 32.1) λέγεται «ἀντίθετο» ἄλλου $\vec{E\Z}$, ἂν, καί μόνο ἂν, οἱ συντεταγμένες τοῦ \vec{AB} εἶναι ἀντίθετες ἀντιστοίχως πρὸς τίς ὁμώνυμες συντεταγμένες τοῦ $\vec{E\Z}$.

Γράφουμε τότε $\vec{AB} = -\vec{E\Z}$. Στό Σχ. 32.1 ἔχουμε, π.χ., γιά τὰ ἐφαρμοστά διανύσματα \vec{AB} καί $\vec{E\Z}$:

$$\text{τετμημένη τοῦ } \vec{AB} = -5 - (-2) = -3$$

$$\text{τετμημένη τοῦ } \vec{E\Z} = 4 - 1 = 3,$$

$$\text{τεταγμένη τοῦ } \vec{AB} = 6 - 2 = 4,$$

$$\text{τεταγμένη τοῦ } \vec{E\Z} = 2 - 6 = -4.$$

Ὡστε τὸ \vec{AB} εἶναι ἓνα διάνυσμα ἀντίθετο τοῦ $\vec{E\Z}$, δηλ. $\vec{AB} = -\vec{E\Z}$. Εἶναι φανερό ὅτι κάθε διάνυσμα ἴσο μέ τὸ \vec{AB} εἶναι ἀντίθετο πρὸς τὸ $\vec{E\Z}$ καί πρὸς κάθε ἴσο του. Προφανῶς ἀντίθετο τοῦ διανύσματος \vec{AB} εἶναι καί τὸ \vec{BA} , δηλ. $\vec{AB} = -\vec{BA}$.

Παρατηρήσεις: 1) Ἄν εἶναι \vec{AB} ἀντίθετο τοῦ $\vec{\Gamma\Delta}$, τότε θά εἶναι καί τὸ $\vec{\Gamma\Delta}$

αντίθετο του \vec{AB} (γιατί;). Γι' αυτό επιτρέπεται νά λέμε: τὰ \vec{AB} , $\vec{\Gamma\Delta}$ είναι αντίθετα (μεταξύ τους).

2) *Αν \vec{AB} , $\vec{\Gamma\Delta}$ είναι αντίθετα (μεταξύ τους), τότε έχουν τήν ίδια διεύθυνση (οί φορείς τους είναι παράλληλοι) και αντίθετες φορές.

3) Κάθε μηδενικό εφαρμοστό διάνυσμα είναι αντίθετο προς κάθε άλλο μηδενικό διάνυσμα (γιατί;)

33. ΜΗΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ (ΟΡΘΟΚΑΝΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΟΝΩΝ)

*Εστω ένα εφαρμοστό διάνυσμα \vec{AB} . Ονομάζεται **μήκος** του \vec{AB} είτε **απόλυτη τιμή** του \vec{AB} , και συμβολίζεται με $|\vec{AB}|$, τό μήκος του εϋθύγραμμου τμήματος με άκρα τὰ A, B. *Ετσι, π.χ., για τό μηδενικό διάνυσμα \vec{AA} έχουμε: μήκος του $\vec{AA} = |\vec{AA}| =$ μήκος του εϋθύγρ. τμήματος $AA = 0$. Γενικά: τό μήκος κάθε μή μηδενικού εφαρμοστού διανύσματος είναι ένας απόλυτος πραγματικός αριθμός.

*Ας πάρουμε σύστημα ὀρθογώνιων ἄξωνων xOy (Σχ. 33.1) και μοναδιαία διανύσματα τὰ $\vec{O\Theta} \equiv \vec{i}$, $\vec{O\Omega} \equiv \vec{j}$ με $|\vec{O\Theta}| = |\vec{O\Omega}|$. *Ας υποθέσουμε ὅτι εἶναι: $A = (x_A, y_A)$, $B = (x_B, y_B)$ και ὅτι α) τό \vec{AB} δέν εἶναι μηδενικό και β) τό \vec{AB} δέν εἶναι παράλληλο πρὸς ἕναν ἀπὸ τοὺς ἄξονες.

Τότε ὀρίζεται ἕνα τρίγωνο AKB , ὀρθογώνιο στό K, ὅπως φαίνεται στό σχ. 33.1 και με ἐφαρμογή τοῦ πυθαγόρειου θεωρήματος βρίσκουμε ὅτι τό μήκος τοῦ \vec{AB} δίνεται ἀπὸ τόν τύπο:


$$|\vec{AB}| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2} \quad (33, \alpha)$$

Εἶναι εϋκόλο νά ἐξηγήσουμε ὅτι ὁ τύπος αὐτός ἰσχύει και ὅταν τό \vec{AB} εἶναι μηδενικό διάνυσμα ἢ εἶναι παράλληλο πρὸς ἕναν ἀπὸ τοὺς ἄξονες (πῶς;). *Ὡστε ἰσχύει γενικά ὅτι: $|\vec{AB}| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2} = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2}$. Δηλαδή:

Τό μήκος εφαρμοστού διανύσματος εἶναι ἴσο με τήν τετραγ. ρίζα τοῦ ἀθροίσματος τῶν τετραγώνων τῶν συντεταγμένων του.


*Επομένως: *Αν δύο ὁποιαδήποτε εφαρμοστά διανύσματα εἶναι ἴσα μεταξύ τους, τότε θά ἔχουν τό ἴδιο μήκος (γιατί;). *Αρα **κάθε δύο μή μηδενικά ἴσα εφαρμοστά διανύσματα ἔχουν τό ἴδιο μήκος, τήν ἴδια διεύθυνση και τήν ἴδια φορά.** *Επίσης τό ἴδιο μήκος και τήν ἴδια διεύθυνση ἔχουν και κάθε δύο μή μηδενικά αντίθετα μεταξύ τους εφαρμοστά διανύσματα.

Τό σύνολο ὄλων τῶν εφαρμοστών διανυσμάτων τοῦ ἐπιπέδου (μαζί και



Σχ. 33.1

μέ τα μηδενικά έφαρμοστά διανύσματα του) θά τό συμβολίζουμε, όπου μās χρειασθεί, στά επόμενα μέ 2).



Σχ. 33.2

Παράδειγμα 1ο. Σ' ένα επίπεδο (E) (σχ. 33.2) έφοδιασμένο μέ άξονες συντεταγμένων xOy δίνονται τά σημεία A(2, -8) και B(-3,4).

Νά βρείτε α) τίς συντεταγμένες του διανύσματος \vec{AB} , β) τίς συντεταγμένες ενός διανύσματος αντίθετου του \vec{AB} και γ) τό μήκος του \vec{AB} (δηλ. τήν απόσταση μεταξύ των σημείων A και B).

Απάντηση: α) τετμημένη του $\vec{AB} = x_B - x_A = -3 - 2 = -5$, τεταγμένη του $\vec{AB} = y_B - y_A = 4 - (-8) = 5 + 8 = 12$.

β) Ένα διάνυσμα αντίθετο του \vec{AB} θά έχει συντεταγμένες αντίθετες των συντεταγμένων του \vec{AB} , δηλ. θά έχει τετμημένη: 5 και τεταγμένη -12.

γ) Σύμφωνα μέ τόν τύπο (33, α) είναι:

$$|\vec{AB}| = \sqrt{(-5)^2 + 12^2} = \sqrt{25 + 144} = \sqrt{169} = 13 \text{ μονάδες.}$$

Παράδειγμα 2ο. Σ' ένα επίπεδο έφοδιασμένο μέ άξονες συντεταγμένων xOy δίνονται τά σημεία A(2, 3), B(2, 5).


Νά βρείτε α) τίς συντεταγμένες του διανύσματος \vec{AB} και β) τό μήκος του (σχ. 33.3).

Απάντηση: Τετμημένη του $\vec{AB} = x_B - x_A = 2 - 2 = 0$, τεταγμένη του $\vec{AB} = y_B - y_A = 5 - 3 = 2$. Μήκος του $\vec{AB} = |\vec{AB}| = \sqrt{0^2 + 2^2} = \sqrt{4} = 2$ μονάδες.

Παράδειγμα 3ο. Ένα διάνυσμα \vec{AB} έχει τετμημένη 3, τεταγμένη 0 και άρχή



Σχ. 33.4



Σχ. 33.3

τό σημείο A(2, 3). Νά βρείτε τίς συντεταγμένες του πέρατός του B (σχ. 33.4).

Απάντηση: Έστω B = (x_B, y_B), τότε: x_B - 2 = 3 ⇔ x_B = 3 + 2 = 5 και y_B - 3 = 0 ⇔ y_B = 3. Άρα B = (5, 3).

101) Νά βρείτε τις συντεταγμένες του διανύσματος \vec{AB} και τό μήκος του, αν σ' ένα σύστημα ὀρθογώνιων ἀξόνων τοῦ ἐπιπέδου εἶναι $A = (-2, -3)$ καί $B = (2, 1)$.

102) Νά δείξετε ὅτι τό τρίγωνο, πού ἔχει κορυφές τά σημεῖα $A = (-2, 8)$, $B = (-1, 1)$ καί $\Gamma = (3, 3)$ εἶναι ἰσοσκελές. (Νά συγκρίνετε τά μήκη τῶν \vec{AB} , $\vec{A\Gamma}$, $\vec{B\Gamma}$.)

103) Σ' ἕνα ἐπίπεδο ἐφοδιασμένο μέ ὀρθοκανονικό σύστημα ἀξόνων τρία σημεῖα, A, B, Γ ἔχουν ἀντιστοίχως συντεταγμένες $(3, 1)$, $(3, 5)$, $(-1, 1)$. Νά βρείτε τίς συντεταγμένες ἐνός σημείου Δ τοῦ ἐπιπέδου, ἀν γνωρίζετε ὅτι $\vec{AB} = \vec{\Gamma\Delta}$. (Λύση: θά πρέπει νά ἔχουμε: $x_B - x_A = x_\Delta - x_\Gamma$ καί $y_B - y_A = y_\Delta - y_\Gamma$ καί νά λύσουμε τίς δύο ἐξισώσεις μέ ἀγνώστους τό x_Δ καί y_Δ .)

104) Ἐνα ἐφαρμοστό διάνυσμα \vec{AB} ἔχει τετμημένη 3 καί τεταγμένη 4 καί πέρασ τό σημεῖο $B(4, 2)$. Νά βρείτε τίς συντεταγμένες τῆς ἀρχῆς του A καί τό μήκος τοῦ διανύσματος.

34. ΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΔΙΑΝΥΣΜΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Ἐστω ἕνα διάνυσμα \vec{AB} τοῦ \mathcal{D} , δηλ. ἕνα ἐφαρμοστό διάνυσμα τοῦ ἐπιπέδου. (Τό \vec{AB} δέν ἀποκλείεται νά εἶναι ἕνα μηδενικό ἐφαρμοστό διάνυσμα.) Γνωρίζουμε ὅτι ὑπάρχουν ἀπειράριθμα διανύσματα ἴσα (ἰσοδύναμα) πρὸς τό \vec{AB} .


Τό σύνολο ὅλων τῶν ἐφαρμοστῶν διανυσμάτων τοῦ ἐπιπέδου, πού εἶναι ἴσα μέ τό \vec{AB} , ὀνομάζεται: «**ἕνα ἐλεύθερο διάνυσμα**» τοῦ ἐπιπέδου καί τό \vec{AB} (καθὼς καί κάθε ἴσο μέ τό \vec{AB} ἐφαρμοστό διάνυσμα ἀπὸ τό \mathcal{D}) ὀνομάζεται: **ἕνας ἀντιπρόσωπος** τοῦ ἐλεύθερου διανύσματος.

Ὅπως ἀπὸ τό ἐφαρμοστό διάνυσμα \vec{AB} ὄρισαμε ἕνα ἐλεύθερο διάνυσμα, ἔτσι μπορούμε νά ὀρίσουμε ἀπὸ κάθε ἐφαρμοστό διάνυσμα τοῦ \mathcal{D} ἀνά ἕνα ἐλεύθερο διάνυσμα τοῦ ἐπιπέδου. Ἄν γίνει αὐτό, τότε τό \mathcal{D} θά ἔχει διαμεριθεῖ σέ κλάσεις (ὑποσύνολα) ξένες μεταξύ τους ἀνά δύο, καθεμιά ἀπὸ τίς ὁποῖες εἶναι (ἀπὸ ὀρισμό) **ἕνα ἐλεύθερο διάνυσμα**.

Ἐνα ὁποιοδήποτε ἐφαρμοστό διάνυσμα ἀπὸ τό \mathcal{D} εἶναι ἕνας ἀντιπρόσωπος κάποιου ἐλεύθερου διανύσματος τοῦ ἐπιπέδου. Συνήθως ὡς ἀντιπρόσωπο ἐνός ἐλεύθερου διανύσματος τοῦ ἐπιπέδου xOy (σχ. 34.1) παίρνουμε τό ἐφαρμοστό διάνυσμα τοῦ \mathcal{D} , πού ἔχει ὡς ἀρχή του τό O .

Ἐνα ἐλεύθερο διάνυσμα τοῦ ἐπιπέδου εἶναι καί τό μηδενικό ἐλεύθερο διάνυσμα, δηλ. τό σύνολο ὅλων τῶν μηδενικῶν ἐφαρμοστῶν διανυσμάτων τοῦ ἐπιπέδου. Αὐτό θά τό συμβολίζουμε μέ $\vec{0}$.

Κάθε ἐλεύθερο διάνυσμα θά συμβολίζεται μέ ἕναν ὁποιοδήποτε ἀντιπρόσωπό του εἴτε μέ τόν ἀντιπρόσωπό του μέ ἀρχή τό O εἴτε μέ ἕνα μικρό γράμμα τοῦ ἀλφαβῆτου μαζί μέ ἕνα μικρό βέλος ἀποπάνω. Ἐτσι μπορούμε νά μιλάμε γιά τό ἐλεύθερο διάνυσμα \vec{OA} ἢ $\vec{\Gamma\Delta}$, γιά τό ἐλεύθερο διάνυσμα $\vec{\beta}$ κ.τ.λ. (σχ.



Σχ. 34.1

34.1). Για να δηλώσουμε ότι ένα εφαρμοστό διάνυσμα \vec{AB} είναι αντιπρόσωπος του ελεύθερου διανύσματος \vec{u} γράφουμε $\vec{u} = \vec{AB}$.

Το σύνολο όλων των ελεύθερων διανυσμάτων του επιπέδου θα το συμβολίζουμε με \mathcal{D}_0 .


35. ΜΗΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ

Μήκος ενός διανύσματος από \mathcal{D}_0 , δηλ. ενός ελεύθερου διανύσματος, έστω $\vec{\alpha}$, λέγεται το μήκος ενός αντιπροσώπου του και συμβολίζεται με $|\vec{\alpha}|$.

Έτσι, για το μηδενικό ελεύθερο διάνυσμα $\vec{0}$, έχουμε:

$$|\vec{0}| = |\vec{OO}| = 0$$

36. ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ



Σχ. 36.1

Έστω $\vec{\alpha} \in \mathcal{D}_0$. Ονομάζεται: τετμημένη του $\vec{\alpha}$ ή τετμημένη ενός οποιουδήποτε αντιπροσώπου του και τεταγμένη του $\vec{\alpha}$ ή τεταγμένη του ίδιου ή οποιουδήποτε άλλου αντιπροσώπου του.

Έτσι, π.χ., για το $\vec{0}$ είναι: τετμημένη του τό 0 και τεταγμένη του τό 0. Επίσης για το ελεύθερο διάνυσμα $\vec{\alpha}$, που αντιπροσωπεύεται από το \vec{AB} (σχ. 36.1), είναι: τετμημένη του ό 4 και τεταγμένη του ό 3. Συμβολικά γράφουμε $\vec{\alpha} = (4, 3)$ ή $\vec{\alpha} (4, 3)$. Είναι φανερό ότι, αν δοθούν οι συντεταγμένες ενός ελεύθερου διανύσματος, μπορούμε να ορίσουμε γραφικώς έναν αντιπρόσωπό του στο επίπεδο xOy (πώς;).

37. Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΟ \mathcal{D}_0

Έστω ότι $\vec{\alpha} \in \mathcal{D}_0$ και $\vec{\beta} \in \mathcal{D}_0$. Θα λέμε ότι: το $\vec{\alpha}$ είναι ίσο με τό $\vec{\beta}$ και θα γράφουμε: $\vec{\alpha} = \vec{\beta}$, αν, και μόνο αν, υπάρχει κάποιος αντιπρόσωπος του $\vec{\alpha}$ ίσος με κάποιο αντιπρόσωπο του $\vec{\beta}$.

Έστω $\vec{\alpha} = \vec{\beta}$: τότε (και μόνο τότε) είναι:

τετμημένη του $\vec{\alpha} =$ τετμημένη του $\vec{\beta}$ και τεταγμένη του $\vec{\alpha} =$ τεταγμένη του $\vec{\beta}$.

Είναι φανερό ότι και για την έννοια ισότητας που όρισαμε εδώ ισχύουν οι τρεις γνωστές ιδιότητες της ισότητας διανυσμάτων, δηλ. ή ανακλαστική, ή συμμετρική και ή μεταβατική.

38. ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΣΤΟ \mathcal{D}_0


Έστω $\vec{\alpha} \in \mathcal{D}_0$ και \vec{OA} αντιπρόσωπός του (σχ. 38.1). Έστω \vec{OA}' ένα αντίθετο του \vec{OA} εφαρμοστό διάνυσμα. Τό $\vec{OA}' = -\vec{OA}$ είναι αντιπρόσωπος ενός

ελεύθερου διανύσματος, έστω $\vec{\alpha}$. Αυτό το ελεύθερο διάνυσμα $\vec{\alpha}$ λέγεται αντίθετο του $\vec{\alpha}$ και συμβολίζεται με $-\vec{\alpha}$.

Είναι φανερό από τούς όρισμούς, πού δώσαμε, ότι:

1) Για κάθε $\vec{\alpha} \in \mathcal{D}_0$ υπάρχει ένα μόνο αντίθετό του διάνυσμα του \mathcal{D}_0 .

2) "Αν $\vec{\alpha}$ είναι το αντίθετο του $\vec{\alpha}$, τότε και το $\vec{\alpha}$ είναι το αντίθετο του $-\vec{\alpha}$ και 3) οί συντεταγμένες του $\vec{\alpha}$ είναι αντίθετες τών ομώνυμων συντεταγμένων του $-\vec{\alpha}$.




Σχ. 38 1

39. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ \mathcal{D}_0 , ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

A) *Ας πάρουμε τά εφαρμοστά διανύσματα \vec{AB} και \vec{BF} , τά όποία βλέπετε στό σχ. 39.1. Όπως γνωρίζουμε από όσα μάθαμε στή Γ' τάξη του Γυμνασίου, τό διάνυσμα \vec{AF} είναι τό άθροισμα τών εφαρμοστών διαδοχικών διανυσμάτων \vec{AB} και \vec{BF} . Συμβολικά γράφουμε $\vec{AB} + \vec{BF} = \vec{AF}$.

Παρατηρούμε τώρα ότι οί συντεταγμένες του άθροίσματος \vec{AF} είναι ίσες αντίστοίχως μέ τό άθροισμα τών ομώνυμων συντεταγμένων τών προσθετών διανυσμάτων. Πραγματικά είναι:

- τετμημένη του $\vec{AB} = 3$,
- τεταγμένη του $\vec{AB} = 2$,
- τετμημένη του $\vec{BF} = 1$,
- τεταγμένη του $\vec{BF} = 2$
- τετμημένη του $\vec{AF} = 4 = 3 + 1$,
- τεταγμένη του $\vec{AF} = 4 = 2 + 2$



Σχ. 39.1

B) *Έστω τώρα ότι $\alpha \in \mathcal{D}_0$ και $\beta \in \mathcal{D}_0$ και \vec{AB}, \vec{BF} (σχ. 39.1) αντίστοίχως αντιπρόσωποι τους, οί όποιοί είναι διαδοχικά διανύσματα. Όρίζουμε τό άθροισμα $\vec{AB} + \vec{BF}$, δηλ. τό \vec{AF} . Αυτό, τό \vec{AF} , είναι ένας αντιπρόσωπος κάποιου ελεύθερου διανύσματος, έστω γ . Τό γ ονομάζεται **άθροισμα α σύν β** και συμβολίζεται με $\vec{\alpha} + \vec{\beta}$, δηλ. $\vec{\alpha} + \vec{\beta} = \vec{\gamma}$. Είναι προφανές ότι τό $\vec{\gamma}$ έχει ως τετμημένη τό άθροισμα τής τετμημένης του $\vec{\alpha}$ σύν τήν τετμημένη του $\vec{\beta}$ και τεταγμένη τό άθροισμα τής τεταγμένης του $\vec{\alpha}$ σύν τήν τεταγμένη του $\vec{\beta}$.

Έτσι, π.χ., αν $\vec{u}(\alpha, \beta)$ και $\vec{v}(\gamma, \delta)$, τότε το $(\vec{u} + \vec{v})$ θα έχει συντεταγμένες $(\alpha + \gamma, \beta + \delta)$ και μπορούμε να κατασκευάσουμε έναν αντιπρόσωπο του διανύσματος $(\vec{u} + \vec{v})$, άφου γνωρίζουμε τις συντεταγμένες του.

Ύστερ' από τα παραπάνω **ορίζουμε** ως άθροισμα δύο ελεύθερων διανυσμάτων $\vec{u}(\alpha_1, \beta_1)$ και $\vec{v}(\alpha_2, \beta_2)$ και το συμβολίζουμε με $\vec{u} + \vec{v}$, το ελεύθερο διάνυσμα z , το οποίο έχει τεμημένη $\alpha_1 + \alpha_2$ και τεταγμένη $\beta_1 + \beta_2$.

Συνήθως γράφουμε $(\alpha_1, \beta_1) + (\alpha_2, \beta_2) = (\alpha_1 + \alpha_2, \beta_1 + \beta_2)$.

Η πράξη με την οποία βρίσκουμε το z από τα \vec{u} και \vec{v} , λέγεται **πρόσθεση** ή σύνθεση μέσα στο σύνολο \mathcal{D}_0 .

Αν το ένα από τα προσθετέα διανύσματα είναι το μηδενικό ελεύθερο διάνυσμα, τότε θα έχουμε $\vec{u} + \vec{0} = \vec{u}$, επειδή το $\vec{0}$ έχει τεμημένη 0 και τεταγμένη 0 και επομένως είναι $(\alpha_1, \beta_1) + (0, 0) = (\alpha_1 + 0, \beta_1 + 0) = (\alpha_1, \beta_1)$.

Δηλαδή το μηδενικό ελεύθερο διάνυσμα είναι το **ουδέτερο** στοιχείο στην πρόσθεση μέσα στο σύνολο \mathcal{D}_0 .

Αν $\vec{\alpha}, \vec{\beta}, \vec{\gamma}$ είναι τρία ελεύθερα διανύσματα του επιπέδου (E), τότε ορίζουμε ως άθροισμα $\vec{\alpha}$ σύν $\vec{\beta}$ σύν $\vec{\gamma}$, και το συμβολίζουμε $\vec{\alpha} + \vec{\beta} + \vec{\gamma}$, το άθροισμα $(\vec{\alpha} + \vec{\beta}) + \vec{\gamma}$.

Αναλόγως ορίζεται το άθροισμα με τέσσερα, πέντε κ.τ.λ. προσθετέα διανύσματα.

Είναι εύκολο να δικαιολογήσουμε ότι η πρόσθεση που ορίσαμε στο \mathcal{D}_0 έχει τις ιδιότητες: αντιμεταθετική, προσεταιριστική και της διαγραφής. Δηλ.

- 1) $\vec{\alpha} + \vec{\beta} = \vec{\beta} + \vec{\alpha}$
- 2) $(\vec{\alpha} + \vec{\beta}) + \vec{\gamma} = \vec{\alpha} + (\vec{\beta} + \vec{\gamma})$
- 3) $\vec{\alpha} = \vec{\beta} \Leftrightarrow \vec{\alpha} + \vec{\gamma} = \vec{\beta} + \vec{\gamma}$

Τό ότι ισχύουν αυτές οι ιδιότητες είναι φανερό από τον ορισμό της ισότητας δύο ελεύθερων διανυσμάτων.

Πραγματικά ως υποθέσουμε ότι τα διανύσματα $\vec{\alpha}$ και $\vec{\beta}$ έχουν συντεταγμένες αντίστοιχως τους πραγματικούς αριθμούς α_1, β_1 και α_2, β_2 . Τότε το άθροισμα $\vec{\alpha} + \vec{\beta}$ είναι το διάνυσμα με συντεταγμένες $(\alpha_1 + \alpha_2, \beta_1 + \beta_2)$. Τό άθροισμα $\vec{\beta} + \vec{\alpha}$ είναι το ελεύθερο διάνυσμα με συντεταγμένες $(\alpha_2 + \alpha_1, \beta_2 + \beta_1)$. Άλλ' επειδή $\alpha_1 + \alpha_2 = \alpha_2 + \alpha_1$ και $\beta_1 + \beta_2 = \beta_2 + \beta_1$, συμπεραίνουμε ότι $\vec{\alpha} + \vec{\beta} = \vec{\beta} + \vec{\alpha}$.

Η απόδειξη των ιδιοτήτων 2) και 3) είναι πολύ εύκολη.

Γ) Αφαίρεση στο \mathcal{D}_0 . Γνωρίζουμε από την Γ' τάξη του Γυμνασίου ότι, αν $\vec{\alpha}$ και $\vec{\beta}$ είναι δύο ελεύθερα διανύσματα του επιπέδου και $\vec{\beta}$ είναι το ελεύθερο διάνυσμα τό αντίθετο του $\vec{\beta}$, τότε ορίζεται ως **διαφορά** $\vec{\alpha}$ **πλὴν** $\vec{\beta}$, και συμβο-

λίζεται με $\vec{\alpha} - \vec{\beta}$, τό ελεύθερο διάνυσμα $\vec{\alpha} + \vec{\beta}$, δηλ. τό $\vec{\alpha} + (-\vec{\beta})$. Έτσι γιά νά βρούμε τή διαφορά $\vec{\alpha} - \vec{\beta}$, άρκει νά προσθέσουμε στό $\vec{\alpha}$ τό αντίθετο διάνυσμα τοῦ $\vec{\beta}$.

Ἡ πράξη γιά τήν εὔρεση τῆς διαφοράς $\vec{\alpha} - \vec{\beta}$ λέγεται **ἀφαίρεση** στό \mathcal{D}_0 .

Ἐπειδή τά αντίθετα διανύσματα ἔχουν αντίθετες τῖς ὁμώνυμες συντεταγμένες τους καί ἐπειδή, ὅπως εἶδαμε, ἡ διαφορά $\vec{\alpha} - \vec{\beta}$ εἶναι ἴση μέ $\vec{\alpha} + (-\vec{\beta})$, γι' αὐτό, ἄν εἶναι $\vec{\alpha}(\alpha_1, \beta_1)$ καί $\vec{\beta}(\alpha_2, \beta_2)$, τότε εἶναι $-\vec{\beta}(-\alpha_2, -\beta_2)$ καί ἐπομένως τό διάνυσμα $\vec{\alpha} - \vec{\beta} = \vec{\alpha} + (-\vec{\beta})$ ἔχει συντεταγμένες $\alpha_1 - \alpha_2, \beta_1 - \beta_2$. Συμβολικά γράφουμε $(\alpha_1, \beta_1) - (\alpha_2, \beta_2) = (\alpha_1 - \alpha_2, \beta_1 - \beta_2)$.

Ἐπομένως, ὅταν δοθοῦν δύο διανύσματα $\vec{\alpha}(\alpha_1, \beta_1)$ καί $\vec{\beta}(\alpha_2, \beta_2)$, **ὀρίζουμε** ὡς διαφορά τους τό διάνυσμα, ἔστω $\vec{\gamma}$, ποῦ ἔχει συντεταγμένες $\alpha_1 - \alpha_2, \beta_1 - \beta_2$, δηλ. τό $\vec{\gamma}(\alpha_1 - \alpha_2, \beta_1 - \beta_2)$. Εἶναι φανερό ὅτι ἰσχύει ἡ ἰσοδυναμία:

$$\vec{\alpha} - \vec{\beta} = \vec{\gamma} \Leftrightarrow \vec{\beta} + \vec{\gamma} = \vec{\alpha}$$

Ἐπίσης ἰσχύει ἡ ἰδιότητα:

$$\vec{\alpha} - \vec{\beta} = (\vec{\alpha} + \vec{\gamma}) - (\vec{\beta} + \vec{\gamma})$$


ΑΣΚΗΣΕΙΣ

105) Ἄν $\vec{u}(2, -5)$ καί $\vec{v}(3, 1)$ εἶναι δύο ελεύθερα διανύσματα, νά ὀρίσετε μέ τῖς συντεταγμένες του τό ελεύθερο διάνυσμα $\vec{u} + \vec{v}$ καί νά σχεδιάσετε στό ἐπίπεδο xOy ἕναν ἀντιπρόσωπό του.

106) Ἄν $\vec{u}(3, 1)$ καί $\vec{v}(2, 5)$ νά βρεῖτε τῖς συντεταγμένες τοῦ $\vec{u} + \vec{v}$ καί τό μήκος του. Ἐπειτα νά βρεῖτε μέ τῖς συντεταγμένες τῆς τῆ διαφορά $\vec{u} - \vec{v}$ καί νά ὑπολογίσετε τό μήκος τοῦ διανύσματος $\vec{u} - \vec{v}$.

107) Τό διάνυσμα $\vec{\alpha}(-3, 8)$ εἶναι τό ἄθροισμα τοῦ διανύσματος $\vec{\beta}(-1, -2)$ καί ἑνός ἄλλου ἄγνωστου διανύσματος. Νά βρεῖτε τό τελευταῖο αὐτό διάνυσμα.

108) Στό σχ. 39.2 βλέπετε δύο ἐφαρμοστά διανύσματα \vec{AB} καί $\vec{\Gamma\Delta}$, τά ὁποῖα εἶναι ἀντιπρόσωποι δύο ελεύθερων διανυσμάτων $\vec{\alpha}$ καί $\vec{\beta}$. Ζητεῖται νά βρεῖτε ἀπό τό σχῆμα τῖς



Σχ. 39.2

συντεταγμένες τῶν διανυσμάτων $\vec{\alpha}$ καί $\vec{\beta}$. Ἐπειτα νά βρεῖτε τό διάνυσμα τό ἴσο μέ $\vec{\alpha} + \vec{\beta}$ μέ δύο τρόπους. (Ὁ ἕνας τρόπος θά εἶναι μέ τῖς συντεταγμένες.) Νά βρεῖτε ὁμοίως τό διάνυσμα τό ἴσο μέ $\vec{\alpha} - \vec{\beta}$.

40. ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ

Α) Σέ άλλη τάξη μάθαμε ότι: αν \vec{u} είναι ένα μή μηδενικό διάνυσμα του επιπέδου και $\rho \neq 0$ πραγματικός αριθμός, τότε ως $\rho \cdot \vec{u}$ ορίζεται διάνυσμα \vec{v} , τό όποιο έχει τήν ίδια διεύθυνση μέ τό \vec{u} , φορά τήν ίδια, αν $\rho > 0$, ή τήν αντίθετη, αν $\rho < 0$, και μήκος ίσο μέ $|\rho| \cdot |\vec{u}|$.

Γράφουμε: $\vec{v} = \rho \vec{u}$. Ή ίδια ισότητα γράφεται ισοδύναμα και έτσι: $\frac{\vec{v}}{\vec{u}} = \rho$ και τότε ό ρ λέγεται λόγος του \vec{v} προς τό \vec{u} .

Έστω τώρα έλεύθερο διάνυσμα \vec{u} μέ αντίπρόσωπό του τό \vec{AB} και έστω ότι $\vec{v} = \rho \vec{u} = \vec{AE}$ (σχ. 40.1 και 40.2).

Παρατηρούμε ότι: αν τό διάνυσμα \vec{AB} έχει τετμημένη X και τεταγμένη Y και τό $\vec{AE} = \rho \cdot \vec{AB}$ (στό σχ. 40.1 τό $\rho = 2$, στό σχ. 40.2 είναι $\rho = -3$) έχει συντεταγμένες X' και Y' αντίστοιχως, τότε από τό γνωστό μας θεώρημα των προβολών θά έχουμε:


$$\frac{\vec{AE}}{\vec{AB}} = \frac{X'}{X} = \frac{Y'}{Y} = \rho$$

άπό τίς όποίες έχουμε $X' = \rho X$ και $Y' = \rho Y$.


Γι' αυτό μπορούμε νά ορίσουμε ως $\rho \vec{u}$ τό διάνυσμα πού έχει συντεταγμένες ρX , ρY . Ωστε: $\rho \cdot (X, Y) = (\rho X, \rho Y)$.

Παρατηρούμε επίσης ότι ισχύει:

$$|\vec{AE}| = \sqrt{(\rho X)^2 + (\rho Y)^2} = |\rho| \cdot \sqrt{X^2 + Y^2} = |\rho| \cdot |\vec{AB}| = |\rho| \cdot |\vec{u}|$$




Σχ. 40.1



Σχ. 40.2

Ἡ πράξη, με τὴν ὁποία βρίσκουμε τὸ $\vec{v} = \vec{\rho} \vec{u}$ ἀπὸ τὸν $\vec{\rho}$ καὶ τὸ \vec{u} , λέγε-



ται **πολλαπλασιασμός** τοῦ \vec{u} ἐπὶ τὸν ρ .

B) Εὐκόλα ἀποδείχνονται οἱ ἰδιότητες:

1) $(-2) \cdot (3\vec{AB}) = -6\vec{AB} = (-2 \cdot 3)\vec{AB} = \vec{EZ}$
(Σχ. 40.3) καὶ γενικά:

$\lambda(\rho\vec{u}) = (\lambda \cdot \rho) \vec{u}$, ὅπου λ, ρ πραγματικοὶ ἀριθμοὶ (προσεταιριστικὴ ἰδιότητα).

2) $(\lambda + \mu) \cdot \vec{u} = \lambda\vec{u} + \mu\vec{u}$,

ὅπου $\lambda \in \mathbb{R}, \mu \in \mathbb{R}$ καὶ \vec{u} ἕνα ὁποιοδήποτε ἐλεύθερο διάνυσμα τοῦ ἐπιπέδου (ἐπιμεριστικὴ ἰδιότητα).

3) $\rho(\vec{u} + \vec{v}) = \rho\vec{u} + \rho\vec{v}$, ὅπου ρ ἕνας πραγματικὸς ἀριθμὸς καὶ \vec{u}, \vec{v} ἐλεύθερα διανύσματα (ἐπιμεριστικὴ ἰδιότητα).

Γενικά, με βάση τοὺς ὁρισμοὺς πού δώσαμε, ἡ ἰδιότητα 3) ἐξηγεῖται ὡς ἑξῆς:

Ἔστω: τετμημένη τοῦ $\vec{u} = \alpha$, τεταγμένη τοῦ $\vec{u} = \beta$

» » $\vec{v} = \alpha'$, » » $\vec{v} = \beta'$

Τότε εἶναι:

τετμημένη τοῦ $\vec{u} + \vec{v} = \alpha + \alpha'$

τεταγμένη τοῦ $\vec{u} + \vec{v} = \beta + \beta'$

Ἄρα τετμημένη τοῦ $\rho \cdot (\vec{u} + \vec{v}) = \rho(\alpha + \alpha') = \rho\alpha + \rho\alpha'$ καὶ

τεταγμένη τοῦ $\rho \cdot (\vec{u} + \vec{v}) = \rho(\beta + \beta') = \rho\beta + \rho\beta'$

Ἄς βροῦμε τώρα τὶς συντεταγμένες τοῦ $\rho \cdot \vec{u} + \rho \cdot \vec{v}$. Θὰ εἶναι:

τετμημένη τοῦ $\rho \cdot \vec{u} + \rho \cdot \vec{v} = \rho\alpha + \rho\alpha'$

τεταγμένη τοῦ $\rho \cdot \vec{u} + \rho \cdot \vec{v} = \rho\beta + \rho\beta'$

Ἐπειδὴ λοιπὸν τὰ διανύσματα $\rho(\vec{u} + \vec{v})$ καὶ $\rho\vec{u} + \rho\vec{v}$ ἔχουν ἴσες τὶς δὴμιονυμες συντεταγμένες τοὺς (§ 32, A) εἶναι ἴσα. Δηλ.


$$\rho(\vec{u} + \vec{v}) = \rho\vec{u} + \rho\vec{v}$$

Ἡ ἐξήγηση τῶν ἰδιοτήτων 1 καὶ 2 ἀφήνεται ὡς ἄσκηση γιὰ τοὺς μαθητὲς.

Ἐφαρμογή. Δίνονται τὰ σημεῖα $A(x_1, y_1)$ καὶ $B(x_2, y_2)$ διαφορετικὰ ($B \equiv A$) μεταξύ τους καὶ ζητεῖται νὰ βρεθῆ πάνω στὴν εὐθεία AB ἕνα σημεῖο Γ

τέτοιο, ὥστε $\frac{\vec{A\Gamma}}{\vec{\Gamma B}} = \lambda$, ὅπου $\lambda \in \mathbb{R}$.

*Ας ονομάσουμε x και y τις συντεταγμένες του σημείου Γ (σχ. 40.4). Θέλουμε νά ισχύει $\frac{\vec{A\Gamma}}{\vec{\Gamma B}} = \lambda$, πού ισοδύναμα γράφεται $\vec{A\Gamma} = \lambda \vec{\Gamma B}$. Θα είναι λοιπόν διαδοχικά:



Σχ. 40.4

Προφανώς πρέπει νά είναι $\lambda \neq -1$. Πράγματι αποκλείεται νά είναι $\lambda = -1$, επειδή τότε θα ήταν

$\vec{A\Gamma} = (-1) \cdot \vec{\Gamma B} \Leftrightarrow \vec{A\Gamma} = -\vec{\Gamma B} \Leftrightarrow \vec{A\Gamma} = \vec{B\Gamma}$, πού σημαίνει ότι $A \equiv B$ (τό A ταυτίζεται μέ τό B), πράγμα άδύνατο, επειδή ύποθέσαμε ότι τά A και B είναι δύο διαφορετικά σημεία του επιπέδου. Όταν $\lambda = 1$, οί τύποι (40, α) δίνουν τίς συντεταγμένες του μέσου του διανύσματος \vec{AB} : $x = \frac{x_1 + x_2}{2}$, $y = \frac{y_1 + y_2}{2}$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

109) Αν $\vec{\Gamma\Delta} = 0 \cdot \vec{AB}$, τί συμπεραίνετε για τό $\vec{\Gamma\Delta}$;

110) Αν $\vec{\Gamma\Delta} = \rho \cdot \vec{AA}$, τί συμπεραίνετε για τό $\vec{\Gamma\Delta}$;

111) Δίνεται τό διάνυσμα \vec{AB} του σχ. 36.1 και ζητείται νά κατασκευασθούν διανύσματα ίσα μέ τά:

α) $3\vec{AB}$, β) $\frac{1}{2}\vec{AB}$, γ) $-2\vec{AB}$, δ) $\frac{5}{4}\vec{AB}$

(Νά έργασθείτε μέ δύο τρόπους. Ό ένας τρόπος θά είναι μέ συντεταγμένες.)

41. ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΗ ΚΑΘΕΤΟΤΗΤΑΣ ΔΥΟ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΩΝ. ΒΑΣΕΙΣ.

Α) *Έπειτα από όσα μάθαμε στά προηγούμενα (§ § 30, 31, 39, 40) μπορούμε νά εκφράσουμε ένα διάνυσμα μέ τά μοναδιαία διανύσματα \vec{i} , \vec{j} και τίς συντεταγμένες του.

Πραγματικά έχουμε (σχ. 30.1 και 30.2):

$$\vec{OM} = \vec{OP} + \vec{PM}$$

*Άλλ' επειδή $\vec{OP} = \vec{OP} \cdot \vec{i}$ και $\vec{PM} = \vec{OP} = \vec{OP} \cdot \vec{j}$, ή παραπάνω διανυσματική ισότητα γίνεται:

$$\vec{OM} = \vec{OP} \cdot \vec{i} + \vec{OP} \cdot \vec{j}$$

ή, αν ονομάσουμε X τήν τετμημένη και Y τήν τεταγμένη του διανύσματος \vec{OM} , τότε:

$$\vec{OM} = X \vec{i} + Y \vec{j}$$

Όμοίως για τό διάνυσμα \vec{AB} του σχήματος 33.1, αν ονομάσουμε $x_B - x_A = X$ και $y_B - y_A = Y$, θά είναι:

$$\vec{AB} = \vec{AK} + \vec{KB} = \vec{A_1B_1} + \vec{A_2B_2}, \text{ δηλ. } \vec{AB} = X \vec{i} + Y \vec{j}$$

Β) Έστω ότι έχουμε στό επίπεδο δύο διανύσματα $\vec{V}(X, Y)$ και $\vec{V}'(X', Y')$, για τά όποια ισχύει $\vec{V}' = k\vec{V}$. Γνωρίζουμε (§ 40) ότι τά διανύσματα αυτά έχουν τήν ίδια διεύθυνση (είναι παράλληλα). Έπειδή $\vec{V}' = k\vec{V}$, δηλ. $(X', Y') = (kX, kY)$, θά έχουμε (§ 37):

$$X' = kX \quad \text{και} \quad Y' = kY$$

έπομένως θά είναι:

$$\frac{X'}{X} = \frac{Y'}{Y}$$

Άντιστρόφως, αν ισχύει $\frac{X'}{X} = \frac{Y'}{Y}$ και ονομάσουμε k τήν τιμή τών λόγων, θά είναι:

$$\frac{X'}{X} = \frac{Y'}{Y} = k \Rightarrow X' = kX \quad \text{και} \quad Y' = kY$$

και έπομένως:

$$\vec{V}' = X' \vec{i} + Y' \vec{j} = kX \vec{i} + kY \vec{j} = k(X \vec{i} + Y \vec{j}) = k\vec{V},$$

δηλ. τά διανύσματα \vec{V}' και \vec{V} έχουν τήν ίδια διεύθυνση.

Ωστε: **άναγκαία και ικανή συνθήκη, για νά είναι παράλληλα δύο διανύσματα του επιπέδου, είναι οί όμώνυμες συντεταγμένες τους νά είναι άνάλογες.**

Συμβολικά:

$$\vec{V} \parallel \vec{V}' \Leftrightarrow \frac{X'}{X} = \frac{Y'}{Y}$$

Παρατήρηση :

Άποδείξαμε και ότι:

$$\vec{V}' = k\vec{V} \Leftrightarrow X' = kX, Y' = kY$$

Στήν ειδική περίπτωση, πού τά διανύσματα είναι ίσα, όταν δηλ. $k = 1$, τότε:

$$\vec{V}' = \vec{V} \Leftrightarrow X' = X, Y' = Y.$$

Δηλαδή: **για νά είναι ίσα δύο διανύσματα, πρέπει και άρκει οί όμώνυμες συντεταγμένες τους νά είναι ίσες** (βλέπε και § 37).

Γ) Έστω όρθοκανονικό σύστημα άναφοράς xOy και δύο διανύσματα $\vec{u}(\alpha_1, \beta_1)$ και $\vec{v}(\alpha_2, \beta_2)$. Ζητούμε νά βρούμε τήν ικανή και άναγκαία συνθήκη, για νά είναι τά διανύσματα αυτά κάθετα μεταξύ τους (σχ. 41.1). Άν \vec{OM} και \vec{OM}' είναι άντιστοίχως οί άντιπρόσωποι τών \vec{u} και \vec{v} μέ άρχή τό O , πρέπει


καί ἀρκεῖ τό τρίγωνο OMM' νά εἶναι ὀρθογώνιο στό O . Πρέπει καί ἀρκεῖ λοιπόν νά ἔχουμε:

$$|\vec{OM}|^2 + |\vec{OM}'|^2 = |\vec{MM}'|^2.$$

Ἄλλὰ (§ 33) $|\vec{OM}|^2 = \alpha_1^2 + \beta_1^2$, $|\vec{OM}'|^2 = \alpha_2^2 + \beta_2^2$ καί $|\vec{MM}'|^2 = (\alpha_2 - \alpha_1)^2 + (\beta_2 - \beta_1)^2$ καί ἐπομένως θά ἔχουμε:

$\alpha_1^2 + \beta_1^2 + \alpha_2^2 + \beta_2^2 = (\alpha_2 - \alpha_1)^2 + (\beta_2 - \beta_1)^2$ καί μετά τήν ἐκτέλεση τῶν πράξεων καί τίς ἀναγωγές:

$$\alpha_1\alpha_2 + \beta_1\beta_2 = 0$$



Σχ. 41.1

Ὡστε, σέ ὀρθοκανονικό σύστημα συντεταγμένων, γιά νά εἶναι κάθετα δύο διανύσματα \vec{u} καί \vec{v} , πρέπει καί ἀρκεῖ τό ἄθροισμα τῶν γινομένων τῶν ὁμῶνυμων συντεταγμένων τους νά εἶναι ἴσο μέ μηδέν.

Συμβολικά γράφουμε: $\vec{u}(\alpha_1, \beta_1) \perp \vec{v}(\alpha_2, \beta_2) \Leftrightarrow \alpha_1\alpha_2 + \beta_1\beta_2 = 0$.

Ἡ παράσταση $\alpha_1\alpha_2 + \beta_1\beta_2$ λέγεται **ἑσωτερικό γινόμενο** τῶν διανυσμάτων $\vec{u}(\alpha_1, \beta_1)$ καί $\vec{v}(\alpha_2, \beta_2)$, συμβολίζεται μέ $\vec{u} \cdot \vec{v}$ καί διαβάζεται: \vec{u} ἐπί ἑσωτερικό \vec{v} . Εἶναι λοιπόν $\vec{u} \cdot \vec{v} = \alpha_1\alpha_2 + \beta_1\beta_2$ καί ἡ συνθήκη καθετότητας τῶν διανυσμάτων \vec{u} καί \vec{v} μπορεῖ νά γραφεῖ ὡς ἑξῆς:

$$\vec{u} \perp \vec{v} \Leftrightarrow \vec{u} \cdot \vec{v} = 0.$$

Παράδειγμα: Νά ἐξετασθεῖ ἡ σχετική θέση μεταξύ τῶν διανυσμάτων:

α) $\vec{u}(9, -7)$ καί $\vec{v}(3, -\frac{7}{3})$

β) $\vec{u}(2, -3)$ καί $\vec{v}(4, \frac{8}{3})$

γ) $\vec{u}(-2, -3)$ καί $\vec{v}(-4, -2)$

Ἀπάντηση: α) Ἐπειδή $\frac{9}{3} = \frac{-7}{-\frac{7}{3}}$, εἶναι $\vec{u} \parallel \vec{v}$.

β) Ἐπειδή $\vec{u} \cdot \vec{v} = 2 \cdot 4 + (-3) \cdot \frac{8}{3} = 0$, εἶναι $\vec{u} \perp \vec{v}$.

γ) Ἐπειδή $\frac{-2}{-4} \neq \frac{-3}{-2}$ καί $\vec{u} \cdot \vec{v} = (-2) \cdot (-4) + (-3) \cdot (-2) \neq 0$

τά \vec{u} καί \vec{v} οὔτε παράλληλα εἶναι οὔτε κάθετα.

Άσκηση. Νά ἐξετάσετε ποιά ἀπό τά παρακάτω ζεύγη διανυσμάτων εἶναι: α) παράλληλα, β) κάθετα καί γ) οὔτε παράλληλα οὔτε κάθετα (ὀρθοκανονικό σύστημα ἀξόνων).

1) $\vec{u}(2, 3)$ καί $\vec{v}(4, 6)$,

2) $\vec{u}(2, -3)$ καί $\vec{v}(-1, \frac{3}{2})$

$$3) \vec{u}(2, -3) \text{ και } \vec{v}(12, 8),$$

$$4) \vec{u}(\alpha, 0) \text{ και } \vec{v}(0, \beta),$$


$$5) \vec{u}(3, 4) \text{ και } \vec{v}(5, -6),$$

$$6) \vec{u}(1, -2) \text{ και } \vec{v}(-4, -2).$$

Δ) 'Ονομάζουμε **γραμμικό συνδυασμό** δύο μή μηδενικών διανυσμάτων \vec{u} και \vec{v} , ένα διάνυσμα \vec{z} τής μορφής $\vec{z} = \lambda\vec{u} + \mu\vec{v}$, όπου $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ και $\vec{u}, \vec{v}, \vec{z}$ διανύσματα του επιπέδου με τά \vec{u}, \vec{v} , μή παράλληλα μεταξύ τους.

'Αν δοθούν δύο μή μηδενικά και μή παράλληλα διανύσματα, π.χ. τά \vec{u} και \vec{v} , τότε κάθε διάνυσμα του επιπέδου, π.χ. τό \vec{z} , είναι δυνατό νά τό εκφράσουμε ώς γραμμικό συνδυασμό τών δύο αυτών δοσμένων διανυσμάτων:

'Από ένα σημείο A του επιπέδου παίρνουμε τό \vec{AB} ώς αντιπρόσωπο του \vec{u} , τό \vec{AG} ώς αντιπρόσωπο του \vec{v} και τό \vec{AD} ώς αντιπρόσωπο του \vec{z} . 'Από τό σημείο Δ φέρνουμε παράλληλες πρὸς τούς φορείς τών \vec{AB} και \vec{AG} . Τότε σχηματίζεται τό παραλληλόγραμμο $AEDH$, όπως φαίνεται στά σχήματα 41.2.



Σχ. 41.2

Προφανώς τά \vec{AB} και \vec{AE} είναι συγγραμμικά διανύσματα και επομένως υπάρχει κάποιος $\lambda \in \mathbb{R}$, ώστε νά είναι $\vec{AE} = \lambda\vec{AB}$, δηλ. $\vec{AE} = \lambda\vec{u}$.

'Επίσης ισχύει $\vec{AH} = \mu\vec{AG}$, δηλ. $\vec{AH} = \mu\vec{v}$, όπου $\mu \in \mathbb{R}$.

'Από τό παραλληλόγραμμο $AEDH$ έχουμε τώρα:

$$\vec{AD} = \vec{AE} + \vec{AH}, \text{ δηλ. } \vec{z} = \lambda\vec{u} + \mu\vec{v}.$$

Κάθε ζεύγος διανυσμάτων όπως τά \vec{u} και \vec{v} , πού μέ γραμμικό συνδυασμό τους μπορούμε νά εκφράσουμε ένα οποιοδήποτε διάνυσμα του επιπέδου, λέγεται **βάση**.

'Επομένως κάθε ζεύγος μή μηδενικών και μή παράλληλων διανυσμάτων του επιπέδου είναι μία βάση.

'Ετσι, π.χ., τά διανύσματα \vec{i}, \vec{j} , όπου $\vec{i}(1, 0)$ και $\vec{j}(0, 1)$, μέ κοινή αρχή τό O τής τομής τών αξόνων, αποτελούν βάση (σχ. 30.2). Πραγματικά: $\vec{OM} = X\vec{i} + Y\vec{j}$ (§ 41, A).

'Αντί νά λέμε ότι εκφράσαμε ένα διάνυσμα, π.χ. \vec{z} , ώς γραμμικό συν-

δυασμό, π.χ. τῶν \vec{i} καὶ \vec{j} , συνηθίζεται νὰ λέμε ὅτι ἀναλύσαμε τὸ διάνυσμα \vec{z} σὲ δύο διανύσματα κατὰ τὶς διευθύνσεις τῶν \vec{i} καὶ \vec{j} .

Θὰ δείξουμε τώρα ὅτι ἡ ἀνάλυση $\vec{z} = \lambda \vec{u} + \mu \vec{v}$ εἶναι **μοναδική**: Ἔστω ὅτι εἶναι $\vec{z} = \lambda \vec{u} + \mu \vec{v}$ καὶ $\vec{z} = \tau \vec{u} + \rho \vec{v}$, ὅπου $\lambda, \mu, \tau, \rho \in \mathbb{R}$. Τότε θὰ ἔχουμε διαδοχικά: $\lambda \vec{u} + \mu \vec{v} = \tau \vec{u} + \rho \vec{v} \Rightarrow \lambda \vec{u} - \tau \vec{u} = \rho \vec{v} - \mu \vec{v} \Rightarrow (\lambda - \tau) \vec{u} = (\rho - \mu) \vec{v} \Rightarrow$ (ἂν $\lambda \neq \tau$) $\vec{u} = \frac{\rho - \mu}{\lambda - \tau} \vec{v} \Rightarrow \vec{u} = k \vec{v}$ (θέσαμε $\frac{\rho - \mu}{\lambda - \tau} = k$), πού σημαίνει ὅτι $\vec{u} \parallel \vec{v}$, πράγμα πού εἶναι ἀντίθετο μὲ τὴν ὑπόθεση ὅτι τὰ \vec{u} καὶ \vec{v} δέν εἶναι παράλληλα. Ὡστε δέν εἶναι $\lambda \neq \tau$, ἀλλὰ $\lambda = \tau$ καὶ ἀπὸ τὴν ἰσότητα $(\lambda - \tau) \vec{u} = (\rho - \mu) \vec{v}$ βρίσκουμε ὅτι τότε καὶ $\mu = \rho$. Ἡ ἀνάλυση λοιπὸν εἶναι μία καὶ μόνη.

Στὴ βᾶση $\{\vec{i}, \vec{O}, \vec{j}\}$, ὅπου $\vec{i}(1, 0)$ καὶ $\vec{j}(0, 1)$, ὅπως εἶδαμε προηγουμένως, κάθε διάνυσμα \vec{z} τοῦ ἐπιπέδου, ἀναλύεται κατὰ ἓνα μόνον τρόπο σὲ ἄθροισμα δύο διανυσμάτων κατὰ τὶς διευθύνσεις τῶν \vec{i} καὶ \vec{j} , π.χ. $\vec{z} = X \vec{i} + Y \vec{j}$, ὅπου X καὶ Y εἶναι οἱ συντεταγμένες τοῦ \vec{z} . Ἔτσι ἐννοοῦμε ὅτι κάθε διάνυσμα τοῦ ἐπιπέδου τῶν ἀξόνων $x'Ox, y'Oy$ **χαρακτηρίζεται** ἀπὸ τὶς συντεταγμένες του.

Γιὰ νὰ δοῦμε πῶς προσδιορίζονται οἱ πραγματικοὶ ἀριθμοὶ λ καὶ μ στὸν τύπο $\vec{z} = \lambda \vec{u} + \mu \vec{v}$, ἄς πάρουμε ἓνα παράδειγμα: Ἔστω ὅτι θέλουμε νὰ ἐκφράσουμε τὸ διάνυσμα $\vec{z}(-4, -5)$ ὡς γραμμικὸ συνδυασμὸ τῶν $\vec{u}(6, -3)$ καὶ $\vec{v}(-3, -2)$. Πρῶτα παρατηροῦμε ὅτι $\frac{6}{-3} \neq \frac{-3}{-2}$ καὶ ἐπομένως τὰ \vec{u} καὶ \vec{v} δέν εἶναι παράλληλα.

Θὰ ἔχουμε λοιπὸν διαδοχικά: $\vec{z} = \lambda \vec{u} + \mu \vec{v} \Leftrightarrow$

$$(-4, -5) = \lambda(6, -3) + \mu(-3, -2) \Leftrightarrow$$

$$(-4, -5) = (6\lambda, -3\lambda) + (-3\mu, -2\mu) \Leftrightarrow$$

$$(-4, -5) = (6\lambda - 3\mu, -3\lambda - 2\mu) \Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} 6\lambda - 3\mu = -4 \\ -3\lambda - 2\mu = -5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 6\lambda - 3\mu = -4 \\ -6\lambda - 4\mu = -10 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -7\mu = -14 \\ 6\lambda - 3\mu = -4 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} \mu = 2 \\ 6\lambda - 6 = -4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \mu = 2 \\ \lambda = \frac{1}{3} \end{cases}$$

$$\text{Ἔτσι } \vec{z} = 2\vec{u} + \frac{1}{3}\vec{v}$$

Ἀσκηση. Νὰ ἐκφρασθεῖ τὸ διάνυσμα $\vec{z}(8, 8)$ ὡς γραμμικὸς συνδυασμὸς τῶν $\vec{u}(2, -5)$ καὶ $\vec{v}(-3, 4)$.

42. ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΟΥ CHASLES (ΣΑΛ)

*Αν $A(x_A, y_A)$, $B(x_B, y_B)$, $\Gamma(x_\Gamma, y_\Gamma)$, $\Delta(x_\Delta, y_\Delta)$ είναι τυχόντα σημεία επίπεδου xOy , θά έχουμε:

$\vec{AB}(x_B - x_A, y_B - y_A)$, $\vec{B\Gamma}(x_\Gamma - x_B, y_\Gamma - y_B)$, $\vec{\Gamma\Delta}(x_\Delta - x_\Gamma, y_\Delta - y_\Gamma)$ και $\vec{\Delta A}(x_A - x_\Delta, y_A - y_\Delta)$. Τό άθροισμα $\vec{AB} + \vec{B\Gamma} + \vec{\Gamma\Delta} + \vec{\Delta A}$ θά έχει τετμημένη $x_B - x_A + x_\Gamma - x_B + x_\Delta - x_\Gamma + x_A - x_\Delta = 0$ και τεταγμένη $y_B - y_A + y_\Gamma - y_B + y_\Delta - y_\Gamma + y_A - y_\Delta = 0$, είναι δηλ. μηδενικό διάνυσμα. 'Ισχύει λοιπόν ή εξής ισότητα:

$$\vec{AB} + \vec{B\Gamma} + \vec{\Gamma\Delta} + \vec{\Delta A} = \vec{0_A}$$

ή όποία λέγεται **διανυσματική ισότητα του Chasles**.

43. ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

*Έστω $A(x_A, y_A)$ ένα όρισμένο σημείο και $\vec{u}(\alpha, \beta)$ ένα έλεύθερο διάνυσμα του έπιπέδου xOy (σχ. 43.1).

Θεωρούμε τό σύνολο των σημείων $M(x, y)$ του έπιπέδου, για τά όποία είναι $\vec{AM} = \lambda \cdot \vec{u}$, όπου $\lambda \in \mathbb{R}$. Τό σύνολο των σημείων αυτών λέγεται: **εϋθεία** (ϵ). 'Η εϋθεία αυτή όρίσθηκε από τό σημείο A και τό έλεύθερο διάνυσμα \vec{u} .

*Αν στά μέλη της εξίσωσης

$$\vec{AM} = \lambda \vec{u} \quad (\lambda \in \mathbb{R})$$

προσθέσουμε τό ίδιο διάνυσμα \vec{OA} θά έχουμε:


$$\vec{OA} + \vec{AM} = \lambda \vec{u} + \vec{OA}$$

δηλαδή $\vec{OM} = \lambda \vec{u} + \vec{OA}$ ($\lambda \in \mathbb{R}$) (43, α)

'Η εξίσωση $\vec{AM} = \lambda \vec{u}$ ($\lambda \in \mathbb{R}$) καθώς και ή $\vec{OM} = \lambda \vec{u} + \vec{OA}$ ($\lambda \in \mathbb{R}$) εκφράζουν ή καθεμία τήν αναγκαία και ίκανή συνθήκη για νά ανήκει τό σημείο M στην εϋθεία (ϵ). 'Ο πραγματικός αριθμός λ είναι ή **παράμετρος** αυτών των εξισώσεων.

'Από τόν παραπάνω όρισμό της εϋθείας (ϵ) έννοούμε ότι ή (ϵ) όρίζεται μονότροπα από τό σημείο A και τό διάνυσμα \vec{u} .

Δύο σημεία A και B (διαφορετικά μεταξύ τους) όρίζουν μία, και μόνο μία, εϋθεία. Πραγματικά μπορούμε νά πάρουμε τήν εϋθεία, ή όποία όρίζεται από τό A και τό $\vec{u} = \vec{AB}$. 'Η εξίσωση της εϋθείας θά είναι:



Σχ. 43.1

$$\vec{AM} = \lambda \vec{AB} \quad (\lambda \in \mathbb{R})$$

$$\vec{OM} = \lambda \vec{AB} + \vec{OA} \quad (\lambda \in \mathbb{R})$$

για $\lambda = 0$ έχουμε $M \equiv A$, για $\lambda = 1$ έχουμε $M \equiv B$.

Παράδειγμα. Δίνονται σημείο $A(2, 5)$ και διάνυσμα $\vec{u}(-2, 3)$ στο επίπεδο xOy και ζητείται η διανυσματική εξίσωση της ευθείας, η οποία περνάει από το A και είναι παράλληλη προς το \vec{u} .

Απάντηση. Σύμφωνα προς την (43, α), αν $M(x, y)$ είναι ένα οποιοδήποτε σημείο της ευθείας που ζητούμε, τότε θα είναι $\vec{OM}(x, y)$, και θα έχουμε:

$$(x, y) = \lambda \cdot (-2, 3) + (2, 5),$$

ή οποία είναι η διανυσματική εξίσωση που ζητούσαμε.

Απ' αυτή βρίσκουμε διαδοχικά:

$$(x, y) = (-2\lambda, 3\lambda) + (2, 5) \Rightarrow$$

$$(x, y) = (-2\lambda + 2, 3\lambda + 5) \Rightarrow$$

$$\left. \begin{array}{l} x = -2\lambda + 2 \\ y = 3\lambda + 5 \end{array} \right\} \Rightarrow \left. \begin{array}{l} \frac{x-2}{-2} = \lambda \\ \frac{y-5}{3} = \lambda \end{array} \right\} \Rightarrow$$

$$\frac{x-2}{-2} = \frac{y-5}{3} \Rightarrow$$

$3x - 6 = -2y + 10 \Rightarrow 3x + 2y - 16 = 0$, η οποία είναι η αναλυτική εξίσωση της ευθείας, όπως την ονομάζουμε.

44. ΔΙΕΥΘΥΝΟΝ ΔΙΑΝΥΣΜΑ ΕΥΘΕΙΑΣ

Τό διάνυσμα $\vec{u}(\alpha, \beta)$ λέγεται **διευθύνον διάνυσμα** της ευθείας (ϵ).

Τά διανύσματα $\vec{u}' = t \vec{u}$ ($t \in \mathbb{R}$) είναι επίσης διευθύνοντα διανύσματα της (ϵ), επειδή η εξίσωση της (ϵ) μπορεί να γραφτεί:

$$\vec{AM} = \frac{\lambda}{t} \cdot t \vec{u}$$

$$\text{ή } \vec{AM} = \frac{\lambda}{t} \vec{u}' \quad (\lambda \in \mathbb{R}, t \in \mathbb{R} \text{ και } t \neq 0)$$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

112) Δίνεται τό ελεύθερο διάνυσμα $\vec{u}(-3, 5)$ και ζητείται νά όρίσετε μέ τίς συντεταγμένες του τό διάνυσμα $-2\vec{u}$. Έπειτα νά λάβετε σύστημα όρθοκανονικών άξόνων και νά σχεδιάσετε έναν αντίπρόσωπο του $-2\vec{u}$.

113) Νά εξετάσετε αν είναι παράλληλα ή όχι τά διανύσματα $\vec{u}(3, 4)$ και $\vec{v}\left(\frac{3}{2}, 2\right)$

114) Θεωρούμε τὰ διανύσματα \vec{AB} και $\vec{\Gamma\Delta}$:
 $A(-3, 2), \quad B(1, 3), \quad \Gamma(1, 2), \quad \Delta(5, 3)$

Νά εξετάσετε αν τὰ παραπάνω διανύσματα είναι παράλληλα και αν έχουν τήν ίδια φορά.

115) Δίνεται τό ελεύθερο διάνυσμα $\vec{u}(2, 1)$ και τό σημείο $A(2, -1)$. Νά καθορίσετε τήν εύθεια, ή όποία περνάει από τό A και έχει διευθύνον διάνυσμα τό \vec{u} .

116) Δίνεται τό ελεύθερο διάνυσμα $\vec{u}(-1, 2)$ και τὰ σημεία $A(2, 2)$ και $M(x, y)$. Ζητείται νά εκφράσετε ότι τὰ διανύσματα \vec{AM} και \vec{u} είναι παράλληλα.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΝΤΕΡΝΗΤ

Η ανάλυση της ιστορίας του διαδικτύου είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Η ιστορία του διαδικτύου ξεκινάει από τον 1960, όταν οι επιστήμονες δημιούργησαν το ARPANET, το πρώτο δίκτυο υπολογιστών. Το 1989, ο Τιμ Μπέρνερς-Λι δημιούργησε το World Wide Web, το οποίο επέτρεψε στους χρήστες να μοιράζονται πληροφορίες και να επικοινωνούν εύκολα. Σήμερα, το διαδίκτυο έχει γίνει ένα σημαντικό μέρος της ζωής μας, χρησιμοποιούμενο για εργασία, μάθηση, κοινωνική επικοινωνία και ψυχαγωγία.

Πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για να αγοράσουν προϊόντα ή υπηρεσίες. Αυτό γίνεται μέσω των διαδικτυακών καταστημάτων, που έχουν γίνει πολύ δημοφιλή λόγω της ευκολίας και της άνεσης που προσφέρουν.

Το διαδίκτυο έχει επίσης επηρεάσει τον τρόπο που μαθαίνουμε. Οι διαδικτυακές πλατφόρμες παρέχουν πόρους για αυτομάθηση και μαθήματα σε διάφορα επίπεδα. Αυτό επιτρέπει στους μαθητές να προχωρήσουν στο δικό τους ρυθμό και να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες 24 ώρες το 24ωρο.

Επιπλέον, το διαδίκτυο έχει επηρεάσει τον τρόπο που επικοινωνούμε. Οι κοινωνικά μέσα έχουν γίνει πολύ δημοφιλή, επιτρέποντας στους ανθρώπους να μοιράζονται στιγμές της ζωής τους και να επικοινωνούν εύκολα με φίλους και συγγενείς. Αυτό έχει αλλάξει τον τρόπο που βλέπουμε την κοινωνία και τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΛΥΩΝΥΜΩΝ ΣΕ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

Η ανάλυση πολυωνύμου σε γινόμενο παραγόντων είναι ένα από τα σπουδαιότερα κεφάλαια της Άλγεβρας, γιατί σε πολλά άλγεβρικά θέματα, όπως θα δούμε, χρειάζεται να τεθούν τα πολυώνυμα σε μορφή γινομένου παραγόντων. Π.χ. στην επίλυση εξισώσεων ο μετασχηματισμός των πολυωνύμων σε γινόμενο παραγόντων, αν είναι δυνατός, δέν είναι πάντοτε εύκολος, ούτε μπορεί να γίνει με τρισεμένους κανόνες. Πρέπει λοιπόν να ασχοληθούμε, όσο γίνεται περισσότερο, με τό θέμα αυτό.

46. Είναι γνωστή από την προηγούμενη τάξη η ανάλυση σε γινόμενο παραγόντων των παρακάτω παραστάσεων, γι' αυτό και τις επαναλαμβάνουμε σύντομα:

1. Παραστάσεις, πού οι όροι τους έχουν κοινό παράγοντα.

Πολύωνυμο = (κοινός παράγοντας) (πηλίκο πολυωνύμου διέ. κοινού παρ. άγοντα)

Παράδειγματα : α) $4x^3y - 10x^2y^2 + 12xy^3 - 8y^4x = 2xy \cdot (2x^2 - 5xy + 6y^2 - 4y^3)$,
β) $45y^{v+1}x - 25y^{v+2}x^2 + 15y^{v+3}x^3 = 5y^{v+1}x (9 - 5yx + 3y^2x^2)$,
γ) $15x(\beta - 3)^3 - 3\alpha^2(\beta - 3)^2 + 6\alpha^3(\beta - 3) = 3\alpha(\beta - 3) [5(\beta - 3)^2 - \alpha(\beta - 3) + 2\alpha^2]$.

2. Παραστάσεις, πού μπορούν να χωριστούν σε ομάδες.

Παραδείγματα : α) $\alpha^2\mu + \beta v^2 + v^2\alpha^2 + \beta\mu = (\alpha^2\mu + \beta\mu) + (\alpha^2v^2 + \beta v^2) = \mu(\alpha^2 + \beta) + v^2(\alpha^2 + \beta) = (\alpha^2 + \beta) \cdot (\mu + v^2)$
β) $\alpha x^v + \alpha y^u - \alpha\beta x^v - \alpha\beta y^u + \beta x^v + \beta y^u = (\alpha x^v + \alpha y^u) - (\alpha\beta x^v + \alpha\beta y^u) + (\beta x^v + \beta y^u) = \alpha(x^v + y^u) - \alpha\beta(x^v + y^u) + \beta(x^v + y^u) = (x^v + y^u)(\alpha - \alpha\beta + \beta)$.

Χωρίστε την ίδια παράσταση σε δύο ομάδες και έπειτα αναλύστε την σε γινόμενο παραγόντων.

$$\gamma) xy(\alpha^2 + \beta^2) + \alpha\beta(x^2 + y^2) = \alpha^2xy + \beta^2xy + \alpha\beta x^2 + \alpha\beta y^2 = (\alpha^2xy + \alpha\beta x^2) + (\beta^2xy + \alpha\beta y^2) = \alpha x(\alpha y + \beta x) + \beta y(\beta x + \alpha y) = (\alpha y + \beta x) \cdot (\alpha x + \beta y).$$

3. Παραστάσεις με μορφή $A^2 - B^2$ (A και B άλγεβρ. παραστάσεις).

$$A^2 - B^2 = (A + B) \cdot (A - B)$$

Παραδείγματα : α) $25x^2 - 81y^4 = (5x)^2 - (9y^2)^2 = (5x - 9y^2)(5x + 9y^2)$

$$\beta) \mu^{16} - \nu^8 = (\mu^8 + \nu^4) \cdot (\mu^8 - \nu^4) = (\mu^8 + \nu^4) \cdot (\mu^4 + \nu^2) \cdot (\mu^4 - \nu^2) = (\mu^8 + \nu^4) \cdot (\mu^4 + \nu^2) \cdot (\mu^2 + \nu) \cdot (\mu^2 - \nu).$$

$$\gamma) \alpha^{2\nu} - \beta^{2\mu} = (\alpha^\nu)^2 - (\beta^\mu)^2 = (\alpha^\nu + \beta^\mu) \cdot (\alpha^\nu - \beta^\mu), \quad (\nu, \mu \in \mathbb{N})$$

$$\delta) (8x - 3y^2)^2 - (5y^2 + 2x)^2 = (8x - 3y^2 + 5y^2 + 2x) \cdot (8x - 3y^2 - 5y^2 - 2x) = (2y^2 + 10x)(6x - 8y^2) = 4(y^2 + 5x) \cdot (3x - 4y^2).$$

4. Παραστάσεις με μορφή $A^2 + 2AB + B^2$ (A, B παραστάσεις).

$$A^2 \pm 2AB + B^2 = (A \pm B)^2$$

Παραδείγματα : α) $9x^2 \pm 12x + 4 = (3x)^2 \pm 2 \cdot 3x \cdot 2 + 2^2 = (3x \pm 2)^2$

$$\beta) 16y^2 + 49x^2y^4 - 56xy^3 = (4y)^2 + (7xy^2)^2 - 2 \cdot 4y \cdot 7xy^2 = (4y - 7xy^2)^2$$

$$\gamma) \alpha^{2\nu} \pm 2\alpha^\nu\beta^\mu + \beta^{2\mu} = (\alpha^\nu)^2 \pm 2\alpha^\nu\beta^\mu + (\beta^\mu)^2 = (\alpha^\nu \pm \beta^\mu)^2$$

$$\delta) (x^2 + y^2)^2 + 4x^2y^2 + 4(x^2 + y^2)xy = [(x^2 + y^2) + 2xy]^2 = [(x + y)^2]^2 = (x + y)^4.$$

5. Παραστάσεις με μορφή $\varphi(x) = x^2 + px + q$ ($p, q, x \in \mathbb{R}$)

$$\Delta = p^2 - 4q: \text{ "Av} \left\{ \begin{array}{l} \Delta = 0 \text{ τότε } \varphi(x) = x^2 + px + q = \left(x + \frac{p}{2}\right)^2 \\ \Delta > 0 \text{ τότε } \varphi(x) = x^2 + px + q = \left(x + \frac{p}{2}\right)^2 - \left(\frac{\sqrt{\Delta}}{2}\right)^2 = \left(x + \frac{p + \sqrt{\Delta}}{2}\right) \cdot \left(x + \frac{p - \sqrt{\Delta}}{2}\right) \\ \Delta < 0 \text{ τότε } \varphi(x) = x^2 + px + q = \left(x + \frac{p}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{-\Delta}}{2}\right)^2. \end{array} \right.$$

Στήν περίπτωση που είναι $\Delta < 0$, παρατηρούμε ότι η παράσταση $\varphi(x) \equiv x^2 + px + q$ δε μετασχηματίζεται στο σύνολο \mathbb{R} σε γινόμενο πρωτοβάθμιων παραγόντων, αλλά σε άθροισμα δύο τετραγώνων. Πολύ σύντομα θα μάθουμε τρόπο μετασχηματισμού ενός πολυωνύμου σε γινόμενο παραγόντων με τη βοήθεια άλλου συστήματος αριθμών.

Παραδείγματα : α) $\varphi(x) = x^2 + 8x + 16.$

$$\Delta = 8^2 - 4 \cdot 16 = 0.$$

•Ωστε έχουμε: $\varphi(x) = x^2 + 8x + 16 = \left(x + \frac{8}{2}\right)^2 = (x + 4)^2$

β) $\varphi(x) = x^2 + 2x - 15$. $\Delta = 2^2 - 4(-15) = 4 + 60 = 64 > 0$.

•Ωστε: $\varphi(x) = x^2 + 2x - 15 = \left(x + \frac{2}{2}\right)^2 - \left(\frac{\sqrt{64}}{2}\right)^2 = \left(x + \frac{2+8}{2}\right)\left(x + \frac{2-8}{2}\right) =$
 $= (x + 5) \cdot (x - 3)$.

γ) $\varphi(x) = x^2 - 4x + 1$. $\Delta = (-4)^2 - 4 \cdot 1 = 16 - 4 = 12 > 0$.

•Ετσι έχουμε: $\varphi(x) = x^2 - 4x + 1 = \left(x + \frac{-4 + \sqrt{12}}{2}\right) \cdot \left(x + \frac{-4 - \sqrt{12}}{2}\right) =$
 $= \left(x + \frac{-4 + 2\sqrt{3}}{2}\right) \cdot \left(x + \frac{-4 - 2\sqrt{3}}{2}\right) = (x - 2 + \sqrt{3})(x - 2 - \sqrt{3})$

δ) $\varphi(x) = x^2 - 3x + 13$. $\Delta = (-3)^2 - 4 \cdot 13 = 9 - 52 = -43 < 0$

•Ωστε έχουμε: $\varphi(x) = x^2 - 3x + 13 = \left(x + \frac{-3}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{-43}}{2}\right)^2 =$
 $= \left(x - \frac{3}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{43}}{2}\right)^2$ άθροισμα δύο τετραγώνων

6. Παραστάσεις με μορφή $\varphi(x) = ax^2 + \beta x + \gamma$, ($a \neq 0$, $\beta, \gamma \in \mathbb{R}$).

$$\Delta = \beta^2 - 4\alpha\gamma: \text{•Αν} \begin{cases} \Delta = 0 \text{ τότε } \varphi(x) = ax^2 + \beta x + \gamma = \alpha \left(x^2 + \frac{\beta}{\alpha}x + \frac{\gamma}{\alpha}\right) = \\ = \alpha(x^2 + px + q) = \alpha \left(x + \frac{\beta}{2\alpha}\right)^2, \text{ όπου } p = \frac{\beta}{\alpha}, q = \frac{\gamma}{\alpha} \\ \Delta > 0 \text{ τότε } \varphi(x) = ax^2 + \beta x + \gamma = \alpha \left(x + \frac{\beta + \sqrt{\Delta}}{2\alpha}\right) \cdot \left(x + \frac{\beta - \sqrt{\Delta}}{2\alpha}\right) \\ \Delta < 0 \text{ τότε } \varphi(x) = ax^2 + \beta x + \gamma = \alpha \left[\left(x + \frac{\beta}{2\alpha}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{-\Delta}}{2\alpha}\right)^2\right] \end{cases}$$

Καί εδώ όταν $\Delta < 0$, μετασχηματίζεται σε άθροισμα δύο τετραγώνων και όχι σε γινόμενο δύο παραγόντων στο σύνολο \mathbb{R} .

Παραδείγματα: α) $\varphi(x) = 9x^2 + 6x + 1$. $\Delta = 6^2 - 4 \cdot 9 \cdot 1 = 36 - 36 = 0$

•Ετσι έχουμε: $\varphi(x) = 9x^2 + 6x + 1 = 9\left(x + \frac{6}{2 \cdot 9}\right)^2 = 9\left(x + \frac{1}{3}\right)^2 = (3x + 1)^2$

β) $\varphi(x) = 2x^2 - x - 1$. $\Delta = (-1)^2 - 4 \cdot 2 \cdot (-1) = (1 + 8) = 9 > 0$.

•Ωστε: $\varphi(x) = 2x^2 - x - 1 = 2\left(x + \frac{-1 + \sqrt{9}}{2 \cdot 2}\right)\left(x + \frac{-1 - \sqrt{9}}{2 \cdot 2}\right) =$
 $= 2\left(x + \frac{1}{2}\right)(x - 1) = (2x + 1)(x - 1)$

γ) $\varphi(x) = 3x^2 - x + 2$. $\Delta = (-1)^2 - 4 \cdot 3 \cdot 2 = 1 - 24 = -23 < 0$

•Ωστε :

$$\varphi(x) = 3x^2 - x + 2 = 3 \left[\left(x + \frac{-1}{6}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{-(-23)}}{6}\right)^2 \right] = 3 \left[\left(x - \frac{1}{6}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{23}}{6}\right)^2 \right]$$

δ) $\varphi(x) = 25x^2 - 20x + 1$. $\Delta = 20^2 - 4 \cdot 25 = 400 - 100 = 300 > 0$.

•Ωστε:

$$\varphi(x) = 25x^2 - 20x + 1 = 25 \left(x + \frac{-20 + \sqrt{300}}{50} \right) \left(x + \frac{-20 - \sqrt{300}}{50} \right) =$$

$$= 25 \left(x + \frac{-2 + \sqrt{3}}{5} \right) \left(x + \frac{-2 - \sqrt{3}}{5} \right) = (5x - 2 + \sqrt{3})(5x - 2 - \sqrt{3})$$

Δίνουμε τώρα και άλλες περιπτώσεις μετασχηματισμού πολυωνύμων σε γινόμενο παραγόντων πολύ χρήσιμες, που δέ διδάχθηκαν στην προηγούμενη τάξη.

7. Παραστάσεις που μπορούν να γραφούν σαν διαφορά τετραγώνων παραστάσεων.

α) Συνδυασμός τῶν περιπτώσεων 3 και 4:

$$A^2 + 2AB + B^2 - \Gamma^2 = (A + B)^2 - \Gamma^2 = (A + B + \Gamma)(A + B - \Gamma)$$

$$A^2 + 2AB + B^2 - \Gamma^2 + 2\Gamma\Delta - \Delta^2 = (A^2 + 2AB + B^2) - (\Gamma^2 - 2\Gamma\Delta + \Delta^2) =$$

$$= (A + B)^2 - (\Gamma - \Delta)^2 = (A + B + \Gamma - \Delta)(A + B - \Gamma + \Delta),$$

όπου A, B, Γ, Δ αλγεβρικές παραστάσεις.

β) Παραστάσεις με μορφή $x^{2^v} + x^{2^{v-1}}y^{2^{v-1}} + y^{2^v}$, $v \in \mathbb{N}$ και $v \geq 2$

$$x^{2^v} + x^{2^{v-1}}y^{2^{v-1}} + y^{2^v} = x^{2^v} + 2x^{2^{v-1}}y^{2^{v-1}} + y^{2^v} - x^{2^{v-1}}y^{2^{v-1}} =$$

$$= (x^{2^{v-1}} + y^{2^{v-1}})^2 - (x^{2^{v-2}}y^{2^{v-2}})^2 = (x^{2^{v-1}} + y^{2^{v-1}} + x^{2^{v-2}}y^{2^{v-2}}) \cdot (x^{2^{v-1}} + y^{2^{v-1}} - x^{2^{v-2}}y^{2^{v-2}}).$$

γ) Παραστάσεις με μορφή $x^{2^v} + 4y^{2^v}$, $v \in \mathbb{N}$ και $v \geq 2$

$$x^{2^v} + 4y^{2^v} = (x^{2^{v-1}})^2 + (2y^{2^{v-1}})^2 + 4x^{2^{v-1}}y^{2^{v-1}} - 4x^{2^{v-1}}y^{2^{v-1}} =$$

$$= (x^{2^{v-1}} + 2y^{2^{v-1}})^2 - (2x^{2^{v-2}}y^{2^{v-2}})^2 =$$

$$= (x^{2^{v-1}} + 2y^{2^{v-1}} + 2x^{2^{v-2}}y^{2^{v-2}}) \cdot (x^{2^{v-1}} + 2y^{2^{v-1}} - 2x^{2^{v-2}}y^{2^{v-2}}).$$

Στις περιπτώσεις β και γ προσπαθούμε να συμπληρώσουμε την παράσταση με προσθαφαίρεση του ίδιου μονωνύμου, ώστε αυτή να γίνει διαφορά δύο τετραγώνων.

Παραδείγματα: α) $9x^2 + 6yx + y^2 - \omega^2 = (3x + y)^2 - \omega^2 =$
 $= (3x + y + \omega)(3x + y - \omega)$

β) $36\alpha^2 + 12\alpha\beta + \beta^2 - \gamma^2 - 4\gamma\delta - 4\delta^2 = (36\alpha^2 + 12\alpha\beta + \beta^2) - (\gamma^2 + 4\gamma\delta + 4\delta^2) =$
 $= (6\alpha + \beta)^2 - (\gamma + 2\delta)^2 = (6\alpha + \beta + \gamma + 2\delta)(6\alpha + \beta - \gamma - 2\delta)$

γ) $x^4 + x^2y^2 + y^4 = x^4 + 2x^2y^2 + y^4 - x^2y^2 = (x^2 + y^2)^2 - (xy)^2 =$
 $= (x^2 + y^2 + xy)(x^2 + y^2 - xy)$

δ) $x^8 + x^4\psi^4 + \psi^8 = x^8 + 2x^4\omega^4 + \psi^8 - x^4\psi^4 = (x^4 + \psi^4)^2 - (x^2\psi^2)^2 =$
 $= (x^4 + \psi^4 + x^2\psi^2) \cdot (x^4 + \psi^4 - x^2\psi^2) =$
 $= (x^2 + \psi^2 + x\psi)(x^2 + \psi^2 - x\psi)(x^4 + \psi^4 - x^2\psi^2)$

ε) $x^4 + 4\psi^4 = (x^2)^2 + (2\psi^2)^2 + 4x^2\psi^2 - 4x^2\psi^2 = (x^2 + 2\psi^2)^2 - (2x\psi)^2 =$
 $= (x^2 + 2\psi^2 + 2x\psi)(x^2 + 2\psi^2 - 2x\psi).$

8. Παραστάσεις, που ένας ή περισσότεροι όροι τους πρέπει να αναλυθούν σε άθροισμα άλλων.

Πολλές φορές σε μία παράσταση χρειάζεται να αναλυθεί ένας ή περισσότεροι όροι σε αλγεβρικό άθροισμα άλλων και έπειτα να την αναλύσουμε σε γι-

νόμοιο παραγόντων. Τοῦτο χρειάζεται συχνά, όταν τό πλῆθος τῶν ὄρων τῆς παραστάσεως εἶναι περιττό καί θέλουμε νά τό κάνουμε ἄρτιο.

Ἡ μέθοδος αὐτή χρησιμοποιεῖται σέ πολλές περιπτώσεις.

Παραδείγματα : α) Νά ἀναλυθεῖ σέ γινόμενο παραγόντων ἡ παράσταση:

$$A = x^2\psi + x^2\omega + \psi^2x + \psi^2\omega + \omega^2x + \omega^2\psi + 2x\psi\omega$$

$$\begin{aligned} \text{Ἔχουμε: } A &= x^2\psi + x^2\omega + \psi^2x + \psi^2\omega + \omega^2x + \omega^2\psi + x\psi\omega + x\psi\omega = \\ &= (x^2\psi + x^2\omega) + (\psi^2x + x\psi\omega) + (\psi^2\omega + \omega^2\psi) + (\omega^2x + x\psi\omega) = \\ &= x^2(\psi + \omega) + x\psi(\psi + \omega) + \omega\psi(\psi + \omega) + \omega x(\omega + \psi) = \\ &= (\psi + \omega)(x^2 + x\psi + \omega\psi + \omega x) = (\psi + \omega)[x(x + \psi) + \omega(x + \psi)] = \\ &= (\psi + \omega)(x + \psi)(x + \omega). \end{aligned}$$

β) Νά γίνει γινόμενο ἡ παράσταση $\varphi(x) = x^3 - 3x + 2$

$$\begin{aligned} \text{Ἔχουμε: } \varphi(x) &= x^3 - 3x + 2 = x^3 - x - 2x + 2 = x(x^2 - 1) - 2(x - 1) = \\ &= x(x + 1)(x - 1) - 2(x - 1) = (x - 1)(x^2 + x - 2) = \\ &= (x - 1)(x^2 + 2x - x - 2) = (x - 1)[(x + 2)x - (x + 2)] = \\ &= (x - 1)^2(x + 2). \end{aligned}$$

9. Παραστάσεις μέ μορφή $x^v \pm \psi^v$, $v \in \mathbb{N}$.

Τίς παραστάσεις αὐτές τίς ἀναλύουμε σέ γινόμενο παραγόντων σύμφωνα μέ τή θεωρία τῶν ἀξιοσημείωτων πηλίκων καί τῆς ταυτότητας τῆς τέλειαις διαιρέσεως.

α) Οἱ παραστάσεις μέ μορφή $\alpha^3 \pm \beta^3$, ἄν διαιρεθοῦν μέ $\alpha \pm \beta$ ἀντίστοιχα, δίνουν ὑπόλοιπο 0 καί πηλίκο $\alpha^2 \mp \alpha\beta + \beta^2$.

Ἔστω ἔχουμε:

$$\alpha^3 \pm \beta^3 = (\alpha \pm \beta) \cdot (\alpha^2 \mp \alpha\beta + \beta^2).$$

β) Οἱ παραστάσεις μέ μορφή $x^v - \psi^v$, ὅπου $v \in \mathbb{N}$, όταν διαιρεθοῦν μέ $x - \psi$, δίνουν ὑπόλοιπο 0 καί πηλίκο $x^{v-1} + x^{v-2}\psi + x^{v-3}\psi^2 + \dots + x\psi^{v-2} + \psi^{v-1}$

Ἔστω:

$$x^v - \psi^v = (x - \psi) \cdot (x^{v-1} + x^{v-2}\psi + \dots + x\psi^{v-2} + \psi^{v-1})$$

Ἄν εἶναι $v = 2k$, $k \in \mathbb{N}$, τότε θά ἔχουμε:

$$x^v - \psi^v = x^{2k} - \psi^{2k} = (x^k + \psi^k) \cdot (x^k - \psi^k)$$

Παραδείγματα : 1) $\alpha^4 - \beta^4 = (\alpha^2 + \beta^2)(\alpha^2 - \beta^2) = (\alpha^2 + \beta^2)(\alpha + \beta)(\alpha - \beta)$

$$\text{ἢ } \alpha^4 - \beta^4 = (\alpha - \beta)(\alpha^3 + \alpha^2\beta + \alpha\beta^2 + \beta^3) = (\alpha - \beta)(\alpha + \beta)(\alpha^2 + \beta^2)$$

$$2) \alpha^5 - \beta^5 = (\alpha - \beta)(\alpha^4 + \alpha^3\beta + \alpha^2\beta^2 + \alpha\beta^3 + \beta^4)$$

$$3) \alpha^6 - \beta^6 = (\alpha^3 + \beta^3)(\alpha^3 - \beta^3) = (\alpha + \beta)(\alpha^2 - \alpha\beta + \beta^2)(\alpha - \beta)(\alpha^2 + \alpha\beta + \beta^2)$$

$$\text{ἢ } \alpha^6 - \beta^6 = (\alpha^2)^3 - (\beta^2)^3 = (\alpha^2 - \beta^2)(\alpha^4 + \alpha^2\beta^2 + \beta^4) =$$

$$= (\alpha + \beta)(\alpha - \beta)(\alpha^2 + \alpha\beta + \beta^2)(\alpha^2 - \alpha\beta + \beta^2) \text{ (βλ. περίπτ. 7 β')} \quad \text{ἢ } \alpha^6 - \beta^6 = (\alpha - \beta)(\alpha^5 + \alpha^4\beta + \alpha^3\beta^2 + \alpha^2\beta^3 + \alpha\beta^4 + \beta^5) = (\alpha - \beta)[\alpha^4(\alpha + \beta) +$$

$$+ \alpha^2\beta^2(\alpha + \beta) + \beta^4(\alpha + \beta)] = (\alpha - \beta)(\alpha + \beta)(\alpha^4 + \alpha^2\beta^2 + \beta^4) \text{ κλπ.}$$

γ) Για τις παραστάσεις με μορφή $x^ν + ψ^ν$ διακρίνουμε δύο περιπτώσεις:

1) *Αν $ν = 2k + 1$ (περιττός), τότε το διωνύμιο διαιρείται με $x + ψ$,
 όπου έχουμε:

$$\forall \nu = 2k + 1, k \in \mathbb{N}: \boxed{x^\nu + \psi^\nu = (x + \psi)(x^{\nu-1} - x^{\nu-2}\psi + x^{\nu-3}\psi^2 - \dots - x^{\nu-2}\psi + \psi^{\nu-1})}$$

2) *Αν $ν = 2k$ (άρτιος), τότε το διωνύμιο, όταν διαιρεθεί με $x + ψ$ ή με $x - ψ$, δίνει υπόλοιπο $2ψ^ν$ και έτσι δεν μπορούμε να το αναλύσουμε σε γινόμενο παραγόντων, σύμφωνα με τη θεωρία των αξιολογημένων πηλίκων.

Σε μερικές όμως περιπτώσεις, όπου ο $ν$ είναι άρτιο πολλαπλάσιο περιττού αριθμού, μπορούμε να εργαστούμε ως εξής:

$$(6 = 2 \cdot 3) \quad x^6 + \psi^6 = (x^2)^3 + (\psi^2)^3 = (x^2 + \psi^2)(x^4 - x^2\psi^2 + \psi^4)$$

$$(12 = 4 \cdot 3) \quad x^{12} + \psi^{12} = (x^4)^3 + (\psi^4)^3 = (x^4 + \psi^4)(x^8 - x^4\psi^4 + \psi^8)$$

$$(10 = 2 \cdot 5) \quad x^{10} + \psi^{10} = (x^2)^5 + (\psi^2)^5 = (x^2 + \psi^2)(x^8 - x^6\psi^2 + x^4\psi^4 - x^2\psi^6 + \psi^8)$$

Παραδείγματα :

$$1) \alpha^5 + \beta^5 = (\alpha + \beta)(\alpha^4 - \alpha^3\beta + \alpha^2\beta^2 - \alpha\beta^3 + \beta^4)$$

$$2) \alpha^7 + \beta^7 = (\alpha + \beta)(\alpha^6 - \alpha^5\beta + \alpha^4\beta^2 - \alpha^3\beta^3 + \alpha^2\beta^4 - \alpha\beta^5 + \beta^6)$$

$$3) \alpha^{15} + \beta^{15} = (\alpha^3)^5 + (\beta^3)^5 = (\alpha^3 + \beta^3)(\alpha^{12} - \alpha^9\beta^3 + \alpha^6\beta^6 - \alpha^3\beta^9 + \beta^{12}) = (\alpha + \beta)(\alpha^2 - \alpha\beta + \beta^2)(\alpha^{12} - \alpha^9\beta^3 + \alpha^6\beta^6 - \alpha^3\beta^9 + \beta^{12})$$

10. Παραστάσεις : Τέλειο τετράγωνο ή κύβος πολυωνύμου.

α) *Όταν ένα πολυώνυμο περιέχει τα τετράγωνα μερικών μονωνύμων και τα διπλάσια γινόμενά τους ανά δύο με όλους τους δυνατούς τρόπους με τό κατάλληλο σημείο, τότε το πολυώνυμο είναι τέλειο τετράγωνο, οπότε αναλύεται σε γινόμενο δύο ίσων παραγόντων. Μερική περίπτωση είναι η περίπτωση 4, που εξετάστηκε.

Παραδείγματα : 1) $\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 + 2\alpha\beta + 2\beta\gamma + 2\alpha\gamma = (\alpha + \beta + \gamma)^2 = (\alpha + \beta + \gamma)(\alpha + \beta + \gamma)$

2) $x^2 + 4\psi^2 + 9\omega^2 + 4x\psi - 6x\omega - 12\omega\psi = x^2 + (2\psi)^2 + (3\omega)^2 + 2 \cdot 2x\psi - 2x \cdot 3\omega - 2 \cdot 2\psi \cdot 3\omega = (x + 2\psi - 3\omega)^2 = (x + 2\psi - 3\omega)(x + 2\psi - 3\omega)$

β) *Αν τό πολυώνυμο έχει τή μορφή $A^3 \pm 3A^2B + 3AB^2 \pm B^3$, τότε είναι ο κύβος του διωνύμου $A \pm B$, οπότε αναλύεται σε γινόμενο τριών ίσων παραγόντων.

*Έτσι: $A^3 \pm 3A^2B + 3AB^2 \pm B^3 = (A \pm B)^3 = (A \pm B)(A \pm B)(A \pm B)$

Παραδείγματα :

1) $27x^3 + 27x^2\psi + 9x\psi^2 + \psi^3 = (3x)^3 + 3 \cdot (3x)^2\psi + 3 \cdot (3x)\psi^2 + \psi^3 = (3x + \psi)^3 = (3x + \psi)(3x + \psi)(3x + \psi)$

2) $8x^6\alpha^3 - 36x^5\alpha^2 + 54x^4\alpha - 27x^3 = (2x^2\alpha)^3 - 3 \cdot (2x^2\alpha)^2(3x) + 3(2x^2\alpha)(3x)^2 - (3x)^3 = (2x^2\alpha - 3x)^3 = (2x^2\alpha - 3x)(2x^2\alpha - 3x)(2x^2\alpha - 3x)$

11. Παραστάσεις: Πολυώνυμα βαθμού άνωτερου από τόν πρώτο.

Γνωρίζουμε ότι, αν άκέραιο πολυώνυμο $\varphi(x)$ βαθμού ≥ 1 μηδενίζεται για $x = \alpha$ ή $x = \frac{\beta}{\alpha}$, όπου $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, τότε διαιρείται μέ $x - \alpha$ ή $\alpha x - \beta$ και άντιστρόφως.

Σύμφωνα μέ τήν ιδιότητα αυτή αναλύουμε πολυώνυμα βαθμού άνωτερου από τόν πρώτο σε γινόμενο παραγόντων, ως εξής:

Παραδείγματα: 1) Νά αναλυθεί σε γινόμενο τό πολυώνυμο

$$\varphi(x) = x^4 + x^3 - x^2 + x - 2$$

Βρίσκουμε τούς διαιρέτες του γνωστού όρου -2 . Αυτοί είναι: $\pm 1, \pm 2$. Παρατηρούμε ότι για $x = 1$ έχουμε $\varphi(1) = 1^4 + 1^3 - 1^2 + 1 - 2 = 0$. "Ωστε τό $\varphi(x)$ διαιρείται μέ $x - 1$ και δίνει πηλίκο $\Pi_1(x) = x^3 + 2x^2 + x + 2$, όποτε θα έχουμε:

$$\varphi(x) = (x - 1) \cdot (x^3 + 2x^2 + x + 2) \quad (1)$$

Επίσης για $x = -2$ έχουμε: $\Pi_1(-2) = 0$. "Ωστε τό $\Pi_1(x)$ διαιρείται μέ $x + 2$ και δίνει πηλίκο $\Pi_2(x) = x^2 + 1$, όποτε $\Pi_1(x) = (x + 2) \cdot (x^2 + 1)$. "Ετσι ή (1) γράφεται:

$$\varphi(x) = (x - 1) \cdot (x + 2) \cdot (x^2 + 1)$$

2) Νά αναλυθεί σε γινόμενο τό $\varphi(x) = 2x^3 + 3x^2 + 8x + 12$. Οί διαιρέτες του 12 είναι: $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4, \pm 6, \pm 12$. Οί διαιρέτες του συντελεστή του όρου $2x^3$ είναι: $\pm 1, \pm 2$. Σχηματίζουμε όλα τά κλάσματα, πού έχουν άρι-

θμητή διαιρέτη του 12 και παρονομαστή διαιρέτη του 2. Αυτά είναι: $\pm \frac{1}{2}$,

$$\pm \frac{3}{2}. \text{ Τό κλάσμα } -\frac{3}{2} \text{ δίνει } \varphi\left(-\frac{3}{2}\right) = 2\left(-\frac{3}{2}\right)^3 + 3\left(-\frac{3}{2}\right)^2 + 8\left(-\frac{3}{2}\right) + 12 = 0.$$

"Ωστε τό $\varphi(x)$ διαιρείται μέ $2x + 3$ και δίνει πηλίκο $\Pi(x) = x^2 + 4$, όποτε έχουμε:

$$\varphi(x) = (2x + 3)(x^2 + 4).$$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

117. Νά τραπούν σε γινόμενο παραγόντων οι παραστάσεις:

- | | | |
|--|--|--------------------------------------|
| 1) $x^\mu \psi^\mu + x^{\mu-1} \psi^{\mu+1} - x^{\mu+1} \psi^{\mu-1}$, $\mu \in \mathbb{N}$, | 2) $\alpha x^2 + \beta x^2 + \alpha + \beta + \alpha x + \beta x$, | |
| 3) $x^2 \psi^3 (\alpha^3 + \beta^3) + \alpha \beta (x^4 + \psi^4)$, | 4) $(\mu^2 x + \nu^2 \psi)^2 + (\nu^2 x - \mu^2 \psi)^2$, | |
| 5) $144x^2 \psi^2 - 121\alpha^2 \beta^2$, | 6) $x^2 - (\alpha - \beta)^2$, | 7) $(\alpha x + \beta \psi)^2 - 1$, |
| 8) $(x^2 + x\psi + \psi^2)^2 - (x^2 - x\psi + \psi^2)^2$, | 9) $64x^2 \psi^4 - 160x^2 \psi^2 + 100x^2$, | |
| 10) $169x^2 y^2 z^2 - 286xy^2 z^2 + 121y^2 z^2$, | 11) $4y^2 \omega^2 \beta^2 + 361x^2 y^2 \omega^2 \alpha^2 \pm 76\alpha \beta x y^2 \omega^2$ | |
| 12) $\alpha^2 - \beta^2 - 2\beta \gamma - \gamma^2$, | 13) $\alpha^2 - 2\alpha\beta + \beta^2 - 4\gamma^2 + 12\gamma\delta - 9\delta^2$ | |

118) Νά μετασχηματισθούν σε γινόμενο πρωτοβάθμιων παραγόντων τά ακόλουθα πολυώνυμα:

- | | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|--|
| 1) $x^2 + 4x - 21$, | 2) $x^2 \pm 7\alpha x + 12\alpha^2$, | 3) $\omega^2 - (\nu - 2)x - 2\nu$ |
| 4) $2\omega^2 + 4\omega - 70$, | 5) $5x^2 - 4x + 1$, | 6) $9x^2 - 6\alpha x + \alpha^2 - \beta^2$ |

119) Νά αναλυθούν σε γινόμενο παραγόντων οι παραστάσεις:

- | | |
|--|---|
| 1) $9\alpha^2 \beta^2 - 36\alpha\beta + 36 - 25\alpha^2$, | 2) $x^4 - 16\omega^4 + 9y^4 - 6x^2 y^2$ |
| 3) $2(x^2 y - 3\omega) - 9 + x^2 y^2 - \omega^2 + x^2$, | 4) $4\alpha^4 + 16\alpha^2 \beta^2 + 25\beta^4$ |

- 5) $36x^4y^4 + 49a^4 - 100a^2x^2y^2$, 6) $9x^3 + 1 - 15x^4$, 7) $64a^4x^8 + y^4$,
 8) $\lambda^{4\nu} + 4\nu\lambda^{\nu}$, ($\nu, \lambda \in \mathbb{N}$), 9) $\alpha x^2 - (\alpha + 1)x + 1$, 10) $\mu x^2 + (\mu - 5\nu)x - 5\nu$
 11) $x^4 + x^3 - 3x^2 - 5x - 2$ (ύπόδ. $-5x = -3x - 2x$),
 12) $x^3 + x^2 - 2$ (ύπόδ. $x^2 = 2x^2 - x^2$)
 13) $64a^3 \pm 27\beta^3$, $\alpha^3\beta^3 \pm \gamma^3$, $(\alpha + \beta)^3 \pm (\alpha - \beta)^3$, $(\alpha - \beta)^3 - \beta^3$
 14) $\alpha^4x^8 - y^8$, $x^8 \pm 64\alpha^4y^8$, $\alpha^{13} \pm 1$, $\alpha^6 \pm \beta^3$
 15) $32x^6 \pm 1$, $x^7 \pm y^7$, $x^9 \pm y^9$, $243a^6 \pm \beta^3$
 16) $81x^2 + y^2 + 4\omega^2 + 18xy - 36x\omega - 4y\omega$
 17) $9a^2x^4 + y^2\beta^4 + 1 - 6a\beta^2x^2y - 6ax^2 + 2\beta^2y$
 18) $8x^3 + 1 + 12x^2 + 6x$, 19) $\alpha^3x^3 - 6a^2x^2y + 12\alpha xy^2 - 8y^3$
 20) $27x^3y^3 - 8a^3 - 54\alpha x^2y^2 + 36\alpha^2xy$
 21) $x^4 - 7x^3 + 9x^2 + 7x - 10$, 22) $3x^3 + x^2 - 6x + 8$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΣ

120) Νά τραποῦν σέ γινόμενο παραγόντων οι παραστάσεις:

- 1) $\alpha^{16} - \beta^{16}$, 2) $x^{4\mu} - y^{4\nu}$, ($\mu, \nu \in \mathbb{N}$), 3) $x^2y^{4\nu+5} - y^5x^{4\mu+3}$, ($\mu, \nu \in \mathbb{N}$),
 4) $\beta\gamma^2 + \alpha^2\gamma + \alpha\beta^2 - \alpha^2\beta - \beta^2\gamma - \alpha\gamma^2$, 5) $(x - \alpha)^2 + 12\alpha^2(x - \alpha) + 36\alpha^4$
 6) $x^2 - \psi^2 - \omega^2 + 2\psi\omega + x + \psi - \omega$, 7) $(x + \psi)^3 - 1 - (x + \psi + 1)x\psi$
 8) $\alpha^2\beta^{2\nu} + 2\alpha^{\mu+1}\beta^{\nu+1} + \alpha^{\mu}\beta^2$, ($\nu, \mu \in \mathbb{N}$)
 9) $16\alpha^{2\mu-2}\beta^{8\nu} - 24\alpha\beta^2 + 9\alpha^{4-2\mu}\beta^{4-8\nu}$, ($\mu, \nu \in \mathbb{N}$)
 10) $\alpha^{2\nu} + \beta^{2\mu} \pm 2\alpha^{\nu}\beta^{\mu} - \gamma^{2\lambda}$, ($\mu, \nu, \lambda \in \mathbb{N}$)
 11) $x^{4\nu} + 4x^{2\nu}\psi^{2\mu} + 4\psi^{4\mu} - \alpha^2\beta^2 + 2\alpha\beta - 1$, ($\mu, \nu \in \mathbb{N}$)
 12) $x^{4\nu} + x^{2\nu}y^{2\mu} + y^{4\mu}$, ($\mu, \nu \in \mathbb{N}$), 13) $\alpha^4x^4y^4\mu + 64\beta^4$, ($\mu, \nu \in \mathbb{N}$)
 14) $\alpha^6 - \beta^3$, 15) $\alpha^9 - 27\alpha^6 - \alpha^3 + 17$, 16) $x^6 - (\alpha^3 - 1)x^3 - \alpha^3$
 17) $x^{3\nu} + y^{3\mu} + 3x^{\nu}y^{\mu}(x^{\nu} + y^{\mu})$, ($\mu, \nu \in \mathbb{N}$)
 18) $125x^{3\nu+3} - 75x^{2\nu+2} + 15x^{\nu+1} - 1$, 19) $\frac{x^3}{27} - \frac{x^2}{3} + x - 1$.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ

47. ΟΡΙΣΜΟΣ. Ταυτότητα λέγεται ή ισότητα μεταξύ δύο άλγεβρικών παραστάσεων, ή όποια είναι αληθής για όλες τις τιμές των γραμμάτων, πού περιέχουν οι παραστάσεις αυτές·

Τά δύο μέλη τής ταυτότητας λέγονται **ισοδύναμες άλγεβρικές παραστάσεις**.

Σέ μία τέτοια ισότητα (ταυτότητα) τό σύμβολο (=) τό αντικαθιστούμε, χωρίς αυτό νά είναι άπαραίτητο, μέ τό σύμβολο (\equiv) πού τό διαβάζουμε: «έκ ταυτότητος ίσον μέ».

*Έτσι γράφουμε: $\varphi(x, \psi, \omega, \dots) \equiv f(x, \psi, \omega, \dots)$.

*Αν ή ισότητα αυτή ισχύει μόνο για όρισμένες τιμές τών x, ψ, ω, \dots καί δέν ισχύει για κάθε τιμή αύτών τών μεταβλητών, τότε δέν είναι ταυτότητα.

*Η χρησιμότητα τών ταυτοτήτων είναι πολύ μεγάλη. Μέ τις ταυτότητες διευκολύνεται πολύ ό άλγεβρικός λογισμός· δηλαδή ό μετασχηματισμός τών παραστάσεων σε άπλούστερες, περισσότερο εύχρηστες.

48. ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΜΙΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Γιά νά έπαληθεύσουμε μία ταυτότητα, κάνουμε διαδοχικούς κατάλληλους μετασχηματισμούς στό ένα μέλος τής, για νά καταλήξουμε στό άλλο. Κατάλληλοι μετασχηματισμοί είναι: 1) Έκτέλεση τών πράξεων, 2) αντικατάσταση παραστάσεων μέ άλλες ισοδύναμες, 3) ανάλυση όρων σε άθροισμα άλλων, 4) πρόσθεση καί άφαίρεση γνωστών ταυτοτήτων κατά μέλη, 5) προσθαφαίρεση όρων ή παραστάσεων κλπ.

Πολλές φορές ύποθέτουμε τήν ταυτότητα αληθή καί, άφου κάνουμε όρισμένες άπλοποιήσεις, καταλήγουμε σε ισότητα αληθή. *Έπειτα ακολουθοῦμε αντίστροφους μετασχηματισμούς, για νά καταλήξουμε στήν ταυτότητα, πού θέλουμε νά άποδείξουμε. Καλύτερα όμως είναι νά τό άποφεύγουμε αυτό, γιατί χρειάζεται μεγάλη προσοχή στή χρησιμοποίηση τών μετασχηματισμών, πού πρέπει νά είναι όλοι άντιστρεπτοί.

*Αν έχουμε νά έπαληθεύσουμε ταυτότητα μέ περιορισμούς, ακολουθοῦμε

τήν ίδια διαδικασία, με τη διαφορά ότι κατά τήν εκτέλεση τών πράξεων πρέπει να έχουμε πάντοτε υπόψη μας τους περιορισμούς.

Σ' αυτό τό κεφάλαιο θα γνωρίσουμε ταυτότητες, έκτός από τίς γνωστές τής προηγούμενης τάξεως, και άλλες, πού πρέπει να άπομνημονευθοῦν.

49. ΑΞΙΟΜΝΗΜΟΝΕΥΤΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ

A) Γνωστές από τήν προηγούμενη τάξη.

$$(\alpha \pm \beta)^2 \equiv \alpha^2 \pm 2\alpha\beta + \beta^2 \Leftrightarrow \alpha^2 + \beta^2 \equiv (\alpha \pm \beta)^2 \mp 2\alpha\beta$$

$$(\alpha + \beta)(\alpha - \beta) \equiv \alpha^2 - \beta^2 \Leftrightarrow \alpha^2 - \beta^2 \equiv (\alpha + \beta)(\alpha - \beta)$$

$$(\alpha \pm \beta)^3 \equiv \alpha^3 \pm 3\alpha^2\beta + 3\alpha\beta^2 \pm \beta^3 \equiv \alpha^3 \pm \beta^3 \pm 3\alpha\beta(\alpha \pm \beta) \Leftrightarrow$$

$$\alpha^3 + \beta^3 \equiv (\alpha + \beta)^3 - 3\alpha\beta(\alpha + \beta) \equiv (\alpha + \beta)(\alpha^2 - \alpha\beta + \beta^2)$$

$$\alpha^3 - \beta^3 \equiv (\alpha - \beta)^3 + 3\alpha\beta(\alpha - \beta) \equiv (\alpha - \beta)(\alpha^2 + \alpha\beta + \beta^2)$$

$$(\alpha + \beta + \gamma)^2 \equiv \alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 + 2\alpha\beta + 2\beta\gamma + 2\gamma\alpha \Leftrightarrow$$

$$\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 \equiv (\alpha + \beta + \gamma)^2 - 2(\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha)$$

$$(x + \alpha)(x + \beta) \equiv x^2 + (\alpha + \beta)x + \alpha\beta$$

$$(x + \alpha)(x + \beta)(x + \gamma) \equiv x^3 + (\alpha + \beta + \gamma)x^2 + (\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha)x + \alpha\beta\gamma$$

$$(x - \alpha)(x - \beta)(x - \gamma) \equiv x^3 - (\alpha + \beta + \gamma)x^2 + (\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha)x - \alpha\beta\gamma$$

Ταυτότητα τής διαιρέσεως

$$\Delta(x) \equiv \delta(x) \cdot \Pi(x) + U(x) \Leftrightarrow \frac{\Delta(x)}{\delta(x)} \equiv \Pi(x) + \frac{U(x)}{\delta(x)} \quad \delta(x) \neq 0,$$

όπου $\Delta(x)$, $\delta(x)$, $\Pi(x)$, $U(x)$ άντιστοιχώς διαιρετέος, διαιρέτης, πηλίκο και υπόλοιπο τής διαιρέσεως.

B) Άλλες άξιοσημείωτες ταυτότητες.

1) Τό τετράγωνο πολυωνόμου

Νά βρεθεί τό άνάπτυγμα του $(\alpha + \beta + \gamma + \delta)^2$

$$\text{Έχουμε: } (\alpha + \beta + \gamma + \delta)^2 \equiv (\alpha + \beta + \gamma + \delta)(\alpha + \beta + \gamma + \delta)$$

$$\equiv \alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 + \delta^2 + 2\alpha\beta + 2\alpha\gamma + 2\alpha\delta + 2\beta\gamma + 2\beta\delta + 2\gamma\delta$$

$$\equiv \alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 + \delta^2 + 2(\alpha\beta + \alpha\gamma + \alpha\delta + \beta\gamma + \beta\delta + \gamma\delta)$$

$$\text{Γενικά } (\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n)^2 \equiv (\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n)(\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n) \equiv$$

$$\equiv \alpha_1(\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n) + \alpha_2(\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n) + \dots + \alpha_n(\alpha_1 + \alpha_2 + \dots$$

$$+ \alpha_n) \equiv \alpha_1^2 + \alpha_2^2 + \dots + \alpha_n^2 + 2(\alpha_1\alpha_2 + \alpha_1\alpha_3 + \dots + \alpha_1\alpha_n) + 2(\alpha_2\alpha_3 +$$

$$+ \alpha_2\alpha_4 + \dots + \alpha_2\alpha_n) \dots + 2\alpha_{n-1}\alpha_n \equiv \alpha_1^2 + \alpha_2^2 + \dots + \alpha_n^2 + 2(\alpha_1\alpha_2 +$$

$$\dots + \alpha_1\alpha_n + \alpha_2\alpha_3 + \dots + \alpha_2\alpha_n + \dots + \alpha_{n-1}\alpha_n)$$

$$\text{Έτσι: } \forall \alpha, i = 1, 2, 3, \dots, n : (\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n)^2 \equiv \sum \alpha_i^2 + 2\sum \alpha_i\alpha_j$$

$$i \neq j, j = 2, 3, \dots, n$$

Δηλαδή: Τό τετράγωνο πολυωνόμου με n όρους ίσοῦται με τό άθροισμα τών τετραγώνων τών όρων του αύξημένο κατά τό διπλάσιο του άλγεβρικού

άθροισματος τῶν γινομένων τῶν ὀρῶν του, πού τούς παίρνομε ἀνά δύο μέ ὄλους τούς δυνατούς τρόπους.

Παραδείγματα :

$$\alpha) (\alpha + \beta - \gamma - \delta)^2 \equiv \alpha^2 + \beta^2 + (-\gamma)^2 + (-\delta)^2 + 2\alpha\beta + 2\alpha(-\gamma) + 2\alpha(-\delta) + 2\beta(-\gamma) + 2\beta(-\delta) + 2(-\gamma)(-\delta) \equiv \alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 + \delta^2 + 2(\alpha\beta - \alpha\gamma - \alpha\delta - \beta\gamma - \beta\delta + \gamma\delta)$$

$$\beta) (\alpha x^3 + \beta x^2 + \gamma x + \delta)^2 \equiv \alpha^2 x^6 + \beta^2 x^4 + \gamma^2 x^2 + \delta^2 + 2(\alpha\beta x^5 + \alpha\gamma x^4 + \alpha\delta x^3 + \beta\gamma x^3 + \beta\delta x^2 + \gamma\delta x).$$

2) Ὁ κύβος τριωνύμου

Νά βρεθεῖ τό ἀνάπτυγμα τοῦ $(\alpha + \beta + \gamma)^3$.

$$\text{Ἔχομε: } (\alpha + \beta + \gamma)^3 \equiv (\alpha + \beta + \gamma)^2 (\alpha + \beta + \gamma)$$

$$\equiv (\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 + 2\alpha\beta + 2\beta\gamma + 2\gamma\alpha) (\alpha + \beta + \gamma)$$

$$\equiv \alpha^3 + \beta^3 + \gamma^3 + 3\alpha^2\gamma + 3\alpha^2\beta + 3\beta^2\alpha + 3\beta^2\gamma + 3\gamma^2\alpha + 3\gamma^2\beta + 6\alpha\beta\gamma$$

$$\equiv \alpha^3 + \beta^3 + \gamma^3 + 3(\alpha^2\gamma + \alpha^2\beta + \beta^2\alpha + \beta^2\gamma + \gamma^2\alpha + \gamma^2\beta + 2\alpha\beta\gamma)$$

$$(\beta\lambda. \text{ περ. } 8\alpha \text{ ἀναλύσεως}) \equiv \alpha^3 + \beta^3 + \gamma^3 + 3(\alpha + \beta)(\beta + \gamma)(\gamma + \alpha)$$

Δηλαδή: Ὁ κύβος τριωνύμου ἰσοῦται μέ τό ἄθροισμα τῶν κύβων τῶν ὀρων του ἀύξημένο κατά τό 3πλάσιο τοῦ γινομένου τῶν ἀλγεβρικών ἀθροισμάτων τῶν ὀρων του πού τούς παίρνομε ἀνά δύο μέ ὄλους τούς δυνατούς τρόπους.

Παραδείγματα: Νά βρεθοῦν τ' ἀναπτύγματα:

$$\alpha) (1 + x + x^2)^3 \equiv 1^3 + x^3 + x^6 + 3(1 + x)(x + x^2)(1 + x^2) \equiv 1 + x^3 + x^6 + 3x + 3x^2 + 3x^2 + 3x^4 + 3x^4 + 3x^5 + 6x^3 \equiv x^6 + 3x^5 + 6x^4 + 7x^3 + 6x^2 + 3x + 1$$

$$\beta) (2x - 3\psi + 5)^3 \equiv 8x^3 - 27\psi^3 + 125 + 3(2x - 3\psi)(2x + 5)(5 - 3\psi) \equiv 8x^3 - 27\psi^3 + 125 - 36x^2\psi + 60x^2 + 54x\psi^2 + 135\psi^2 + 150x - 225\psi$$

3) Νά ἀποδειχθεῖ ἡ ἀλήθεια τῆς ταυτότητας

$$\alpha^3 + \beta^3 + \gamma^3 - 3\alpha\beta\gamma \equiv (\alpha + \beta + \gamma)(\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 - \alpha\beta - \beta\gamma - \gamma\alpha)$$

$$\text{Ἔχομε: } \alpha^3 + \beta^3 + \gamma^3 - 3\alpha\beta\gamma \equiv (\alpha + \beta)^3 - 3\alpha\beta(\alpha + \beta) + \gamma^3 - 3\alpha\beta\gamma \equiv$$

$$\equiv (\alpha + \beta)^3 + \gamma^3 - 3\alpha\beta(\alpha + \beta + \gamma) \equiv$$

$$\equiv (\alpha + \beta + \gamma)[(\alpha + \beta)^3 - (\alpha + \beta)\gamma + \gamma^3] - 3\alpha\beta(\alpha + \beta + \gamma) \equiv$$

$$\equiv (\alpha + \beta + \gamma)(\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 - \alpha\beta - \beta\gamma - \gamma\alpha)$$

$$\text{Ἐπειδή ὁμοῦς } \alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 - \alpha\beta - \beta\gamma - \gamma\alpha \equiv \frac{1}{2}(2\alpha^2 + 2\beta^2 + 2\gamma^2 - 2\alpha\beta - 2\beta\gamma - 2\gamma\alpha) \equiv \frac{1}{2}[(\alpha - \beta)^2 + (\beta - \gamma)^2 + (\gamma - \alpha)^2],$$

θά ἔχομε

$$\alpha^3 + \beta^3 + \gamma^3 - 3\alpha\beta\gamma = \frac{1}{2}(\alpha + \beta + \gamma)[(\alpha - \beta)^2 + (\beta - \gamma)^2 + (\gamma - \alpha)^2].$$

Παραδείγματα: α) Νά αναλυθεί σε γινόμενο παραγόντων ή παράσταση
 $\alpha^3 + 8\beta^3 + 27\gamma^3 - 18\alpha\beta\gamma$.

Λύση: Έχουμε $\alpha^3 + (2\beta)^3 + (3\gamma)^3 - 3 \cdot \alpha \cdot 2\beta \cdot 3\gamma \equiv (\alpha + 2\beta + 3\gamma)(\alpha^2 + 4\beta^2 + 9\gamma^2 - 2\alpha\beta - 6\beta\gamma - 3\alpha\gamma)$.

β) Νά αποδειχθεί ότι $1 - \alpha^3 + (\alpha + 1)^3 + 3\alpha(\alpha + 1) \equiv 2(3\alpha^2 + 3\alpha + 1)$

Λύση: Έχουμε $1 - \alpha^3 + (\alpha + 1)^3 + 3\alpha(\alpha + 1) \equiv 1^3 + (-\alpha)^3 + (\alpha + 1)^3 - 3 \cdot 1 \cdot (-\alpha) \cdot (\alpha + 1) \equiv (1 - \alpha + \alpha + 1)[1 + \alpha^2 + (\alpha + 1)^2 - 1 \cdot (-\alpha) - 1 \cdot (\alpha + 1) - (-\alpha)(\alpha + 1)] \equiv 2(1 + \alpha^2 + \alpha^2 + 1 + 2\alpha + \alpha - \alpha - 1 + \alpha^2 + \alpha) \equiv 2(3\alpha^2 + 3\alpha + 1)$.

4) Ταυτότητες του Lagrange

α) Νά αποδειχθεί ότι: $(\alpha_1^2 + \alpha_2^2)(\beta_1^2 + \beta_2^2) - (\alpha_1\beta_1 + \alpha_2\beta_2)^2 \equiv (\alpha_1\beta_2 - \alpha_2\beta_1)^2$.

Λύση: Έχουμε: $(\alpha_1^2 + \alpha_2^2)(\beta_1^2 + \beta_2^2) - (\alpha_1\beta_1 + \alpha_2\beta_2)^2 \equiv \alpha_1^2\beta_1^2 + \alpha_1^2\beta_2^2 + \alpha_2^2\beta_1^2 + \alpha_2^2\beta_2^2 - \alpha_1^2\beta_1^2 - 2\alpha_1\alpha_2\beta_1\beta_2 - \alpha_2^2\beta_2^2 \equiv \alpha_1^2\beta_2^2 + \alpha_2^2\beta_1^2 - 2\alpha_1\alpha_2\beta_1\beta_2 \equiv (\alpha_1\beta_2 - \alpha_2\beta_1)^2 \equiv \left| \begin{array}{c} \alpha_1\beta_1 \\ \alpha_2\beta_2 \end{array} \right|^2$. Το σύμβολο $\left| \begin{array}{c} \alpha_1\beta_1 \\ \alpha_2\beta_2 \end{array} \right|$, γνωστό από την προηγούμενη τάξη, λέγεται ορίζουσα δεύτερης τάξεως.

β) Νά αποδειχθεί ότι:

$$(\alpha_1^2 + \alpha_2^2 + \alpha_3^2)(\beta_1^2 + \beta_2^2 + \beta_3^2) - (\alpha_1\beta_1 + \alpha_2\beta_2 + \alpha_3\beta_3)^2 \equiv \left| \begin{array}{c} \alpha_1\beta_1 \\ \alpha_2\beta_2 \end{array} \right|^2 + \left| \begin{array}{c} \alpha_1\beta_1 \\ \alpha_3\beta_3 \end{array} \right|^2 + \left| \begin{array}{c} \alpha_2\beta_2 \\ \alpha_3\beta_3 \end{array} \right|^2$$

Η απόδειξη νά γίνει από τους μαθητές.

Σημείωση. Για νά σχηματίσουμε τις ορίζουσες του β' μέλους παίρνουμε τις τριάδες $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ και $(\beta_1, \beta_2, \beta_3)$ σε δύο στήλες, όπως δείχνει ο πίνακας.

γ) Στην περίπτωση που έχουμε τις νιάδες των αριθμών $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_n)$ και $(\beta_1, \beta_2, \beta_3, \dots, \beta_n)$ ή προηγούμενη ταυτότητα με τη βοήθεια του πίνακα γίνεται:

$$(\alpha_1^2 + \alpha_2^2 + \dots + \alpha_n^2)(\beta_1^2 + \beta_2^2 + \dots + \beta_n^2) - (\alpha_1\beta_1 + \alpha_2\beta_2 + \dots + \alpha_n\beta_n)^2 \equiv \left| \begin{array}{c} \alpha_1\beta_1 \\ \alpha_2\beta_2 \\ \alpha_3\beta_3 \\ \dots \\ \alpha_n\beta_n \end{array} \right|^2 + \left| \begin{array}{c} \alpha_1\beta_1 \\ \alpha_3\beta_3 \\ \dots \\ \alpha_n\beta_n \end{array} \right|^2 + \dots + \left| \begin{array}{c} \alpha_{n-1}\beta_{n-1} \\ \alpha_n\beta_n \end{array} \right|^2$$

Η ταυτότητα αυτή λέγεται ταυτότητα Lagrange και η χρησιμότητά της στον άλγεβρικό λογισμό είναι μεγάλη. Οι μαθητές μπορούν νά κάνουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με τον τρόπο σχηματισμού της.

Παραδείγματα: α) Νά αποδειχθεί ότι $(\alpha^2 + 1)(x^2 + 1) - (\alpha x + 1)^2 = (\alpha - x)^2$

Λύση: Έχουμε: $(\alpha^2 + 1)(x^2 + 1) - (\alpha x + 1)^2 = \left| \begin{array}{c} \alpha \ x \\ 1 \ 1 \end{array} \right|^2 = (\alpha - x)^2$

β) Νά αποδειχθεί ότι: $(\alpha^2 + 1)(x^2 + \psi^2 + 1) - (\alpha x + 1)^2 = \alpha^2 \psi^2 + (\alpha - x)^2 + \psi^2$
Λύση: Έχουμε: $(\alpha^2 + 1)(x^2 + \psi^2 + 1) - (\alpha x + 1)^2 = (\alpha^2 + 0^2 + 1^2)$.

$$\therefore (x^2 + \psi^2 + 1) - (\alpha x + 0\psi + 1)^2 = \left| \begin{array}{c} \alpha \ 0 \\ x \ \psi \end{array} \right|^2 + \left| \begin{array}{c} \alpha \ 1 \\ x \ 1 \end{array} \right|^2 + \left| \begin{array}{c} 0 \ 1 \\ \psi \ 1 \end{array} \right|^2 =$$

$$= (\alpha\psi - 0x)^2 + (\alpha - x)^2 + (01 - \psi \cdot 1)^2 = \alpha^2 \psi^2 + (\alpha - x)^2 + \psi^2.$$

Σημ. Τούς όρους που λείπουν τούς συμπληρώνουμε με μηδενικούς.

5) Ταυτότητα του Newton - Διώνυμο του Newton

α) Στις γνωστές από την προηγούμενη τάξη ταυτότητες συμπεριλάβαμε και τις ακόλουθες:

$$(x \pm \alpha_1)(x \pm \alpha_2) \equiv x^2 \pm (\alpha_1 + \alpha_2)x + \alpha_1\alpha_2$$

$$(x \pm \alpha_1)(x \pm \alpha_2)(x \pm \alpha_3) \equiv x^3 \pm (\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3)x^2 + (\alpha_1\alpha_2 + \alpha_2\alpha_3 + \alpha_3\alpha_1)x \pm \alpha_1\alpha_2\alpha_3$$

Επίσης εύκολα μπορούμε να επαληθεύσουμε ότι:

$$(x \pm \alpha_1)(x \pm \alpha_2)(x \pm \alpha_3)(x \pm \alpha_4) \equiv x^4 \pm (\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4)x^3 + (\alpha_1\alpha_2 + \alpha_1\alpha_3 + \alpha_1\alpha_4 + \alpha_2\alpha_3 + \alpha_2\alpha_4 + \alpha_3\alpha_4)x^2 \pm (\alpha_1\alpha_2\alpha_3 + \alpha_1\alpha_2\alpha_4 + \alpha_1\alpha_3\alpha_4 + \alpha_2\alpha_3\alpha_4)x + \alpha_1\alpha_2\alpha_3\alpha_4$$

*Αν συνεχίσουμε έτσι, μπορούμε να πάρουμε τη γενική έκφραση της ταυτότητας του Newton, που η πλήρης απόδειξή της θά γίνει σε ανώτερη τάξη.

$$\text{"Έτσι: } (x \pm \alpha_1)(x \pm \alpha_2)(x \pm \alpha_3) \dots (x \pm \alpha_n) \equiv x^n \pm (\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n)x^{n-1} + (\alpha_1\alpha_2 + \alpha_1\alpha_3 + \dots + \alpha_1\alpha_n + \alpha_2\alpha_3 + \dots + \alpha_2\alpha_n + \dots + \alpha_{n-1}\alpha_n)x^{n-2} \pm (\alpha_1\alpha_2\alpha_3 + \dots + \alpha_1\alpha_2\alpha_n + \alpha_1\alpha_3\alpha_4 + \dots + \alpha_1\alpha_3\alpha_n + \dots + \alpha_1\alpha_{n-1}\alpha_n + \alpha_2\alpha_3\alpha_4 + \dots + \alpha_{n-2}\alpha_{n-1}\alpha_n)x^{n-3} + \dots + (-1)^{n-1}(\alpha_1\alpha_2\alpha_3 \dots \alpha_{n-1} + \dots)x + (-1)^n \alpha_1\alpha_2\alpha_3 \dots \alpha_n$$

*Αν θέσουμε Σ_1 τό άθροισμα τών $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ και $\Sigma_2, \Sigma_3, \dots, \Sigma_k$ τό άθροισμα τών γινομένων τών $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, όταν τούς πάρουμε ανά δύο, ανά τρεις, ..., ανά k αντιστοίχως με όλους τούς δυνατούς τρόπους, τότε θά έχουμε :

$$(x \pm \alpha_1)(x \pm \alpha_2) \dots (x \pm \alpha_n) \equiv x^n \pm \Sigma_1 x^{n-1} + \Sigma_2 x^{n-2} \pm \dots + (-1)^{n-1} \Sigma_{n-1} x + (-1)^n \Sigma_n$$

β) *Αν στις προηγούμενες ταυτότητες έχουμε $\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_n \neq 0$,

$$\text{τότε: } (x \pm \alpha)^2 \equiv x^2 \pm 2\alpha x + \alpha^2$$

$$(x \pm \alpha)^3 \equiv x^3 \pm 3x^2\alpha + 3x\alpha^2 \pm \alpha^3$$

$$(x \pm \alpha)^4 \equiv x^4 \pm 4x^3\alpha + 6x^2\alpha^2 \pm 4x\alpha^3 + \alpha^4$$

$$(x \pm \alpha)^5 \equiv x^5 \pm 5x^4\alpha + 10x^3\alpha^2 \pm 10x^2\alpha^3 + 5x\alpha^4 \pm \alpha^5 \quad \text{κ.λ.π.}$$

Η γενική έκφραση του άναπτύγματος του διωνύμου $(x \pm \alpha)^n$, $n \in \mathbb{N}$, που λέγεται διώνυμο του Newton, θά δοθεί σε ανώτερη τάξη.

*Εδώ περιοριζόμαστε στις ακόλουθες παρατηρήσεις για τό σχηματισμό του άναπτύγματος.

Παρατηρήσεις :

α) Τό άνάπτυγμα είναι όμογενές πολυώνυμο, ως προς x και α , βαθμού n , με πλήθος όρων ίσο με $n + 1$.

β) Οί έκθέτες του x είναι κατά μέγεθος ελαττούμενο και του α κατά μέγεθος

αύξανόμενο. Δηλαδή τό ανάπτυγμα είναι «διατεταγμένο» κατά τίς κατιούσες δυνάμεις του x καί τίς άνιούσες του α .

γ) Όλοι οί όροι του άναπτύγματος; $(x + \alpha)^9$ έχουν πρόσημο θετικό, ενώ του $(x - \alpha)^9$ έναλλάξ θετικό καί άρνητικό.

δ) Κάθε συντελεστής ενός όρου του άναπτύγματος προκύπτει, άν πολλαπλασιάσουμε τό συντελεστή καί τόν έκθέτη του x του προηγούμενου όρου καί διαιρέσουμε τό γινόμενο μέ τόν άριθμό που φανερώνει τήν τάξη του προηγούμενου όρου. Οί συντελεστές, που άπέχουν έξίσου από τούς άκραίους όρους, είναι ίσοι.

Παράδειγμα: Νά βρεθεί τό ανάπτυγμα του $(x + \alpha)^9$.

Έχουμε: $(x + \alpha)^9 = x^9 + 9x^8\alpha + 36x^7\alpha^2 + 84x^6\alpha^3 + 126x^5\alpha^4 + 126x^4\alpha^5 + 84x^3\alpha^6 + 36x^2\alpha^7 + 9x\alpha^8 + \alpha^9$

Παρατηρούμε ότι τό ανάπτυγμα του $(x + \alpha)^9$

α) είναι όμογενές πολώνυμο 9ου βαθμού ως προς x καί α ,

β) έχει πλήθος όρων $9 + 1 = 10$,

γ) είναι «διατεταγμένο» κατά τίς κατιούσες δυνάμεις; του x καί τίς άνιούσες του α , καί

δ) ό συντελεστής, π.χ., του 5ου όρου είναι $(84 \cdot 6) : 4 = 126$.

50. ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ (Περιορισμοί στούς όποίους υπόκεινται τά γράμματα)

I. $\forall \alpha, \beta, \gamma : \alpha + \beta + \gamma = 0 \vee \alpha = \beta = \gamma \Leftrightarrow \alpha^3 + \beta^3 + \gamma^3 = 3\alpha\beta\gamma$

Άπόδειξη: Άν $\alpha + \beta + \gamma = 0$, τότε από τήν ταυτότητα

$\alpha^3 + \beta^3 + \gamma^3 - 3\alpha\beta\gamma \equiv (\alpha + \beta + \gamma)(\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 - \alpha\beta - \beta\gamma - \gamma\alpha)$ τράβνουμε

$\alpha^3 + \beta^3 + \gamma^3 - 3\alpha\beta\gamma \equiv 0 \Leftrightarrow \alpha^3 + \beta^3 + \gamma^3 = 3\alpha\beta\gamma$

Άν δέ $\alpha = \beta = \gamma$, τότε $\alpha^3 + \beta^3 + \gamma^3 = \alpha^3 + \alpha^3 + \alpha^3 = 3\alpha^3 = 3\alpha\alpha\alpha = 3\alpha\beta\gamma$

Άντίστροφα. Άν $\alpha^3 + \beta^3 + \gamma^3 = 3\alpha\beta\gamma$ $\alpha^3 + \beta^3 + \gamma^3 - 3\alpha\beta\gamma = 0 \Leftrightarrow$

$1/2(\alpha + \beta + \gamma)[(\alpha - \beta)^2 + (\beta - \gamma)^2 + (\gamma - \alpha)^2] = 0$ (βλ. ταυτότητα 3).

Άπό αυτή έχουμε: $\alpha + \beta + \gamma = 0 \vee (\alpha - \beta)^2 + (\beta - \gamma)^2 + (\gamma - \alpha)^2 = 0$.

Κάθε όρος τής παραστάσεως $(\alpha - \beta)^2 + (\beta - \gamma)^2 + (\gamma - \alpha)^2$ είναι μη άρνητικός. Όστε, άν $(\alpha - \beta)^2 + (\beta - \gamma)^2 + (\gamma - \alpha)^2 = 0 \Rightarrow (\alpha - \beta)^2 = 0, (\beta - \gamma)^2 = 0, (\gamma - \alpha)^2 = 0 \Rightarrow \alpha - \beta = 0, \beta - \gamma = 0, \gamma - \alpha = 0 \Rightarrow \alpha = \beta = \gamma$.

Άν έχουμε $\alpha + \beta + \gamma = 0 \wedge (\alpha - \beta)^2 + (\beta - \gamma)^2 + (\gamma - \alpha)^2 = 0$, τότε $\alpha = \beta = \gamma = 0$

Όστε:

$$\forall \alpha, \beta, \gamma : \alpha + \beta + \gamma = 0 \vee \alpha = \beta = \gamma \Leftrightarrow \alpha^3 + \beta^3 + \gamma^3 = 3\alpha\beta\gamma$$

Η χρησιμότητα τής ταυτότητας αυτής φαίνεται από τά παραδείγματα που άκολουθούν.

Παράδειγμα: α) Νά αναλυθεί σε γινόμενο η παράσταση

$$(3\alpha - \beta)^3 + (3\beta - \gamma)^3 + (3\gamma - \alpha)^3, \text{ έιν είναι } \alpha + \beta + \gamma = 0.$$

Λύση: Έπειδή $(3\alpha - \beta) + (3\beta - \gamma) + (3\gamma - \alpha) = 2(\alpha + \beta + \gamma) = 2 \cdot 0 = 0$, έπεται ότι $(3\alpha - \beta)^3 + (3\beta - \gamma)^3 + (3\gamma - \alpha)^3 = 3(3\alpha - \beta)(3\beta - \gamma)(3\gamma - \alpha)$

β) *Αν $\alpha + \beta + \gamma = 2\tau$ νά γίνει γινόμενο ή παράσταση

$$(2\tau - 3\alpha)^3 + (2\tau - 3\beta)^3 + (2\tau - 3\gamma)^3.$$

Λύση: * Επειδή $(2\tau - 3\alpha) + (2\tau - 3\beta) + (2\tau - 3\gamma) = 6\tau - 3(\alpha + \beta + \gamma) = 6\tau - 3 \cdot 2\tau = 6\tau - 6\tau = 0$, έπεται ότι

$$(2\tau - 3\alpha)^3 + (2\tau - 3\beta)^3 + (2\tau - 3\gamma)^3 = 3(2\tau - 3\alpha)(2\tau - 3\beta)(2\tau - 3\gamma).$$

II. $\forall \alpha, \beta, \gamma : \alpha + \beta + \gamma = 0 \vee \alpha = 0 \vee \beta = 0 \vee \gamma = 0 \Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow (\alpha\beta + \beta\gamma + \alpha\gamma)^2 = \alpha^2\beta^2 + \beta^2\gamma^2 + \gamma^2\alpha^2$$

Οι μαθητές άφοϋ χρησιμοποιήσουν τήν ταυτότητα

$$(\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha)^2 \equiv \alpha^2\beta^2 + \beta^2\gamma^2 + \gamma^2\alpha^2 + 2\alpha\beta\gamma(\alpha + \beta + \gamma),$$

νά κάνουν τήν άπόδειξη.

III. $\forall \alpha, \beta, \gamma : \alpha + \beta + \gamma = 0 \vee \alpha + \beta = \gamma \vee \beta + \gamma = \alpha \vee \gamma + \alpha = \beta \Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow \alpha^4 + \beta^4 + \gamma^4 = 2(\alpha^2\beta^2 + \beta^2\gamma^2 + \alpha^2\gamma^2).$$

Οι μαθητές άφοϋ έπαληθεύσουν τήν ταυτότητα τοϋ de Moivre

$$\alpha^4 + \beta^4 + \gamma^4 - 2\alpha^2\beta^2 - 2\beta^2\gamma^2 - 2\gamma^2\alpha^2 \equiv (\alpha + \beta + \gamma) \cdot (\alpha - \beta + \gamma) (\alpha + \beta - \gamma) (\alpha - \beta - \gamma),$$

νά κάνουν τήν άπόδειξη.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

121) Νά άποδειχθεί ή άλήθεια τών παρακάτω ταυτοτήτων:

1) $\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right)^2 - \left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right)^2 \equiv \alpha\beta$

2) $\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 - (\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha) \equiv \frac{1}{2} [(\alpha - \beta)^2 + (\beta - \gamma)^2 + (\gamma - \alpha)^2]$

3) $(\mu + \nu)^2 - (\mu - \nu)^2 + (\mu + \nu)(\mu - \nu) \equiv \mu(2\nu + \mu) + \nu(2\mu - \nu)$

4) $(\alpha + \beta)^3 - (\alpha - \beta)^3 \equiv 2\beta(\beta^2 + 3\alpha^2)$

5) $(\alpha - x)(\beta + x)(\gamma - x) \equiv (x - \alpha)(x - \beta)(x - \gamma)$

122). Νά βρεθοϋν τ' άναπτύγματα:

1) $(4x^3 - 3x^2 - 2x + 1)^2$, 2) $\left(\frac{x^2}{2} - \frac{x}{3} + 2\right)^2$

3) $(\alpha x + \beta y + \gamma z + 1)^2$,

4) $(\alpha^3 - \alpha^2x + \alpha x^2 - x^3)^2$

123) Νά γίνουν οι πράξεις: $(2x + 3\psi - \omega)^2 - (x - 3\psi + 2\omega)^2 - (x - 3\psi - 2\omega)^2$

124) Νά βρεθοϋν τ' άναπτύγματα:

1) $(\alpha^2 - \alpha x + x^2)^3$,

2) $(\alpha^{2\nu} + \alpha^\nu + 1)^3$

125) Νά βρεθεί τό έξαγόμενο:

$$(x + \psi + \omega)^3 - (x - \psi + \omega)^3 - (x + \psi - \omega)^3 - (\psi + \omega - x)^3$$

126) Νά αναλυθεί σε γινόμενο παραγόντων: $8x^3 - 27\psi^3 - 64\omega^3 - 72x\psi\omega$.

127) Νά άποδειχθεί ότι:

$$(\alpha - \beta)^3 - \alpha^3 + (\alpha + \beta)^3 + 3\alpha(\alpha - \beta)(\alpha + \beta) \equiv \alpha(4\alpha^2 + 3\beta^2)$$

128) Νά έπαληθευθοϋν οι παρακάτω ταυτότητες μέ τή βοήθεια τής ταυτότητας Lagrange:

1) $(\alpha^2 + x^2 + \psi^2)(x^2 + \alpha^2 + 1) - (2\alpha x + \psi)^2 \equiv (\alpha^2 - x^2)^2 + (\alpha - x\psi)^2 + (x - \alpha\psi)^2$

2) $(x^2 + \psi^2 + z^2)^2 - (x\psi + \psi z + xz)^2 \equiv (x^2 - \psi z)^2 + (\psi^2 - xz)^2 + (z^2 - x\psi)^2$

3) $(\alpha^2 + \beta^2)(x^2 + \psi^2 + \omega^2 + 1) - (\alpha x + \beta\omega)^2 \equiv \alpha^2\psi^2 + \beta^2\psi^2 + \alpha^2 + \beta^2 + (\alpha\omega - \beta x)^2$

129) Νά βρεθοϋν τά άκόλουθα άναπτύγματα:

$$(2x \pm \psi)^4, \quad (x \pm 3)^6, \quad (\alpha x^2 + 1)^6, \quad (\alpha\beta\gamma + 2x)^7, \quad (\alpha^2 - x^2)^7$$

130) Νά έκτελεσθοϋν οι πράξεις: 1) $(x - \psi)^6 + (x + \psi)^6 - (x^3 + \psi^3)(x^3 - \psi^3)$

2) $(2x^2 - 1)^4 - (3x + 2)^8$, 3) $3(x - 3\psi)^4 - 5(x^2 - 5\psi^2)^2$.

131) Νά αποδειχθεί ή άλήθεια τών ταυτοτήτων:

- 1) $(\alpha + \beta)^3 - \alpha^3 - \beta^3 \equiv 3\alpha\beta(\alpha + \beta)$
 $(\alpha + \beta)^5 - \alpha^5 - \beta^5 \equiv 5\alpha\beta(\alpha + \beta)(\alpha^2 + \alpha\beta + \beta^2)$ Ταυτότητες του Cauchy
 $(\alpha + \beta)^7 - \alpha^7 - \beta^7 \equiv 7\alpha\beta(\alpha + \beta)(\alpha^2 + \alpha\beta + \beta^2)^2$
 2) $(x + \psi)^4 + x^4 + \psi^4 \equiv 2(x^2 + x\psi + \psi^2)^2$
 3) $(2x + \beta)^5 - 32x^5 - \beta^5 \equiv 10\beta x(2x + \beta)(4x^2 + 2x\beta + \beta^2)$
 4) $(3\alpha - 2\beta)^5 - 243\alpha^5 + 32\beta^5 \equiv 30\alpha\beta(2\beta - 3\alpha)(9\alpha^2 - 6\alpha\beta + 4\beta^2)$

132) Νά αποδειχθεί ή ταυτότητα του De Moivre

$$\alpha^4 + \beta^4 + \gamma^4 - 2\alpha^2\beta^2 - 2\beta^2\gamma^2 - 2\alpha^2\gamma^2 \equiv (\alpha + \beta + \gamma)(\alpha + \beta - \gamma)(\alpha - \beta + \gamma)(\alpha - \beta - \gamma)$$

133) *Αν $\alpha + \beta + \gamma = 0$ νά γίνει γινόμενο ή παράσταση

$$(\alpha + \beta)^3 + (\beta + \gamma)^3 + (\gamma + \alpha)^3$$

134) Νά αναλυθεί σε γινόμενο ή παρ. $(\alpha - \beta)^3 + (\beta - \gamma)^3 + (\gamma - \alpha)^3$

135) *Αν $\alpha + \beta + \gamma = \kappa + \lambda + \mu$ νά αναλυθεί σε γινόμενο ή παράσταση
 $(\alpha - \kappa)^3 + (\beta - \lambda)^3 + (\gamma - \mu)^3$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΣ

136) *Αν $\alpha = 7x + 3\psi + 6\omega$, $\beta = 6x + 2\psi + 6\omega$, $\gamma = 3x + 3\psi + 2\omega$ και $x^2 = \psi^2 + \omega^2$, νά αποδειχθεί ότι $\alpha^2 = \beta^2 + \gamma^2$.

137) Νά βρεθούν τά άναπτύγματα τών:

1) $(\alpha' + \beta' + \gamma')^2 - (\alpha' - \beta' - \gamma')^2 + (-\alpha' + \beta' + \gamma')^2$

2) $(\alpha x' + \beta \psi')^2 + (\alpha x' - \beta \psi')^2 + 1)^2 - (\alpha \psi' - \beta x')^2$

138) Νά αποδειχθεί ότι $(\alpha + \beta + \gamma + \delta)^3 - 3(\alpha\delta + \beta\delta + \gamma\delta)(\alpha + \beta + \gamma + \delta) - \delta^3 \equiv (\alpha + \beta + \gamma)^3$

139) Νά βρεθεί τό έξαγόμενο τής παραστάσεως

$$(\alpha - \beta + \gamma)^3 - \alpha^3 + \beta^3 - \gamma^3 \text{ με μορφή γινομένου}$$

140) Νά αποδειχθεί ότι είναι: $\alpha^6 + \alpha^3 + 1 - 3\alpha^4 \equiv (\alpha - 1)(\alpha^3 + \alpha + 1) \cdot (\alpha^5 + \alpha^4 - \alpha^2 - 1) \equiv (\alpha^3 + \alpha + 1)(\alpha - 1)^2(\alpha^4 + 2\alpha^3 + 2\alpha^2 + \alpha + 1)$

141) Νά αποδειχθεί ότι ή άλγ. παράσταση $(x^2 + \psi^2 + \omega^2)(\alpha^2 + x^2) - (\alpha x + x\psi)^2$ είναι μή άρνητική (δηλ. παίρνει $\forall \alpha, x, \psi, \omega \in \mathbb{R}$ μόνο θετικές ή μηδενικές τιμές).

142) *Αν $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2 \in \mathbb{R} \wedge \beta_1 \cdot \beta_2 \neq 0$ και $(\alpha_1^2 + \alpha_2^2)(\beta_1^2 + \beta_2^2) = (\alpha_1\beta_1 + \alpha_2\beta_2)^2$,

νά αποδειχθεί ότι $\frac{\alpha_1}{\beta_1} = \frac{\alpha_2}{\beta_2}$

143) *Αν $\alpha_i, \beta_i \in \mathbb{R}$, $i = 1, 2, 3, \dots, n$, νά αποδειχθεί ότι:

$$(\alpha_1^2 + \alpha_2^2 + \dots + \alpha_n^2)(\beta_1^2 + \beta_2^2 + \dots + \beta_n^2) \geq (\alpha_1\beta_1 + \alpha_2\beta_2 + \dots + \alpha_n\beta_n)^2$$

(Αυτή λέγεται άνισότητα του Schwarz). Με ποιές συνθήκες είναι μόνο ισότητα;

144) Νά επαληθευθούν οι ταυτότητες

α) $(x + \psi)^3 + (\psi + \omega)^3 + (\omega + x)^3 - 3(x + \psi)(\psi + \omega)(\omega + x) \equiv 2(x^3 + \psi^3 + \omega^3 - 3x\psi\omega)$

β) $(x^2 - \psi\omega)^3 + (\psi^2 - \omega x)^3 + (\omega^2 - x\psi)^3 - 3(x^2 - \psi\omega)(\psi^2 - \omega x)(\omega^2 - x\psi) \equiv (x^3 + \psi^3 + \omega^3 - 3x\psi\omega)^2$

145) *Αν $\alpha + \beta + \gamma = 0$, νά αναλυθεί σε γινόμενο ή παράσταση

$$A = (\alpha\kappa + \beta\lambda)^3 + (\beta\kappa + \gamma\lambda)^3 + (\gamma\kappa + \alpha\lambda)^3$$

ΡΗΤΑ ΑΛΓΕΒΡΙΚΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ

51. Τήν έννοια τοῦ ἀλγεβρικοῦ κλάσματος καί τίς πράξεις τῶν ἀλγεβρικών κλασμάτων τά μάθαμε στήν προηγούμενη τάξη, γι' αὐτό θά τά ἐπαναλάβουμε ἐδῶ μόνο περιληπτικά.

Κάθε συνάρτηση $\psi = \frac{A}{B} \in R$, ὅπου A καί B ἀκέραια πολυώνυμα μιᾶς ἢ περισσότερων μεταβλητῶν καί $B \neq 0$, λέγεται **ρητό ἀλγεβρικό κλάσμα**.

Ἐνα ρητό ἀλγεβρ. κλάσμα εἶναι ἡ ἀπλοῦστερη μορφή μιᾶς ρητῆς κλασματικῆς παραστάσεως. Ὁ παρονομαστής τοῦ κλάσματος μπορεῖ νά εἶναι σταθερά, ὁπότε τό κλάσμα εἶναι ἀκέραιο πολυώνυμο. Ἄρα ἕνα ἀκέραιο πολυώνυμο μπορεῖ νά θεωρηθεῖ ρητό ἀλγεβρικό κλάσμα.

Οἱ συναρτήσεις $\frac{4x\psi}{x+\psi}$, $\frac{x^2+1}{x^2-1}$, $\frac{x^2+2x\psi+\psi^2}{x^2+x\psi}$, $\frac{x^3+\psi^3+\omega^3-3x\psi\omega}{x^2+\psi^2+\omega^2}$ εἶναι ρητά ἀλγεβρικά κλάσματα.

Γιά νά ἔχει έννοια ἡ συνάρτηση $\psi = \frac{A}{B}$, πρέπει $B \neq 0$. Ἄρα εἶναι ὀρισμένη στό σύνολο R , ἀπό τό ὁποῖο ἐξαιροῦνται οἱ τιμές, πού μηδενίζουν τόν παρονομαστή.

Π.χ. τό σύνολο ὀρισμοῦ τῆς συναρτ. $f(x) = \frac{\varphi_1(x)}{\varphi_2(x)}$, ὅπου $\varphi_1(x)$, $\varphi_2(x)$ ἀκέραια πολυώνυμα, εἶναι τό σύνολο $\Sigma = R - \{x/x \in R \text{ καί } \varphi_2(x) = 0\}$.

Συμβολίζουμε: $f | x \in \Sigma \rightarrow f(x) = \frac{\varphi_1(x)}{\varphi_2(x)} \in R$.

Ἐπίσης τό σύνολο ὀρισμοῦ τῆς συναρτήσεως $f(x, y) = \frac{\varphi_1(x, y)}{\varphi_2(x, y)}$, $x, y \in R$ καί $\varphi_1(x, y)$, $\varphi_2(x, y)$ ἀκέραια πολυώνυμα, εἶναι τό σύνολο $\Sigma = R^2 - \{(x, y) | (x, y) \in R^2 \text{ καί } \varphi_2(x, y) = 0\}$.

Συμβολίζουμε: $f | (x, y) \in \Sigma \rightarrow f(x, y) = \frac{\varphi_1(x, y)}{\varphi_2(x, y)} \in R$.

Σημείωση: $R^2 = R \times R$ (Καρτεσιανό γινόμενο)

Λ = καί (σύμβολο λογικῆς συζεύξεως)

Παραδείγματα: α) τῆς συναρτήσεως $(x, y = \frac{x^2 - 5x + 6}{x^2 - 4})$, $x \in \mathbb{R}$, σύνολο ὀρισμοῦ εἶναι τὸ σύνολο $\Sigma = \mathbb{R} - \{2, -2\}$.

β) τῆς συναρτήσεως $(x, y = \frac{\alpha x + \beta}{\gamma x + \delta})$, $\alpha, \beta, \gamma, \delta, x \in \mathbb{R} \wedge \gamma \neq 0$ σύνολο ὀρισμοῦ εἶναι τὸ σύνολο

$$\Sigma = \mathbb{R} - \{x/x \in \mathbb{R} \wedge \gamma x + \delta = 0\} = \mathbb{R} - \left\{ -\frac{\delta}{\gamma} \right\}$$

52. ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ ΑΛΓΕΒΡΙΚΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ

$$y = \frac{\varphi_1}{\varphi_2}, \varphi_1, \varphi_2 \text{ ἄκερ. πολυώνυμα.}$$

α) Τὸ κλάσμα αὐτὸ δὲν ἔχει ἕννοια πραγματικοῦ ἀριθμοῦ,

ὅταν $\varphi_1 \in \mathbb{R} \wedge \varphi_1 \neq 0 \wedge \varphi_2 = 0$, γιατί $\varphi_2 \cdot y = 0 \cdot y = 0 \neq \varphi_1$

β) *Αν $\varphi_1 = 0 \wedge \varphi_2 \neq 0$ τὸ κλάσμα $y = 0$ γιὰ κάθε ἄκεραιο πολυώνυμο $\varphi_2 \neq 0$

γ) *Αν $\varphi_1 = 0 \wedge \varphi_2 = 0$ τὸ κλάσμα y εἶναι ἀπροσδιόριστο ἢ ἄοριστο.

53. ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΡΗΤΩΝ ΑΛΓΕΒΡΙΚΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ

Ὁρισμός. Δύο ἢ περισσότερα ἄκεραια πολυώνυμα ὀνομάζονται πρῶτα μεταξύ τους, ἂν ὁ Μ.Κ.Δ. τους εἶναι μία σταθερά $C \neq 0$. *Αρα τὰ πηλίκια τῆς διαιρέσεως ἄκεραίων πολυωνύμων μὲ τὸ Μ.Κ.Δ. τους εἶναι ἄκεραια πολυώνυμα πρῶτα μεταξύ τους καὶ ἀντιστρόφως.

*Ἀπλοποίηση ρητοῦ κλάσματος

*Αν πολ/σουμε τοὺς ὄρους ἑνὸς ρητοῦ κλάσματος $\psi = \frac{\varphi_1(x)}{\varphi_2(x)}$ μὲ τὸ ἴδιο ἄκεραιο πολυώνυμο $\varphi(x)$, παίρουμε ἕνα ρητὸ κλάσμα $\frac{\varphi_1 \cdot \varphi}{\varphi_2 \cdot \varphi}$ ἰσοδύναμο μὲ τὸ $\frac{\varphi_1}{\varphi_2}$, $\forall x \in \Sigma = \mathbb{R} - \{x/x \in \mathbb{R} \wedge \varphi = 0 \wedge \varphi_2 = 0\}$

*Αντιστρόφως τὸ κλάσμα $\frac{\varphi_1 \varphi}{\varphi_2 \varphi}$ εἶναι ἰσοδύναμο μὲ τὸ $\frac{\varphi_1}{\varphi_2}$, $\forall x \in \Sigma$, ὁπότε λέμε ὅτι τὸ κλάσμα $\frac{\varphi_1 \varphi}{\varphi_2 \varphi}$ ἀπλοποιήθηκε στό $\frac{\varphi_1}{\varphi_2}$

*Ἡ ἀπλοποίηση λοιπὸν εἶναι δυνατὴ, ἂν οἱ ὄροι τοῦ ρητοῦ κλάσματος ἔχουν κοινὸ παράγοντα ἀλγεβρική παράσταση. *Απὸ τὰ παραπάνω ἔπεται ὅτι, γιὰ νὰ ἀπλοποιήσουμε ἕνα ρητὸ ἀλγεβρ. κλάσμα, ἀναλύουμε τοὺς ὄρους του σὲ γινόμενο παραγόντων καὶ τοὺς διαιροῦμε μὲ τοὺς κοινούς παράγοντές τους, ὅταν τοὺς ὑποθέσουμε διάφορους τοῦ μηδενός. *Αν ἡ διαίρεση γίνῃ μὲ τὸ Μ.Κ.Δ. τῶν ὄρων του, τότε προκύπτει κλάσμα ἰσοδύναμο μὲ τὸ ἀρχικὸ καὶ μὲ ὄρους πρῶτους μεταξύ τους.

Παραδείγματα: α) Νὰ ἀπλοποιηθεῖ τὸ κλάσμα $A = \frac{x^3 - \psi^3}{x^2 - \psi^2}$, $x, \psi \in \mathbb{R}$

$$\text{Λύση: } * \text{Έχουμε } A = \frac{x^3 - \psi^3}{x^2 - \psi^2} = \frac{(x - \psi)(x^2 + x\psi + \psi^2)}{(x + \psi)(x - \psi)}$$

Αν $x - \psi \neq 0$ διαιρούμε τους όρους του A με $x - \psi$ και έχουμε $B = \frac{x^2 + x\psi + \psi^2}{x + \psi}$
 Τά κλάσματα A και B είναι Ισοδύναμα για κάθε $(x, \psi) \in \mathbb{R}^2$, εκτός από τα ζεύγη (x, ψ) που μηδενίζουν την παράσταση $x - \psi$.

Σημ. 1) Τά κλάσματα A και B με $x + \psi = 0$ δέν έχουν έννοια. 2) 'Ο παράγοντας $x - \psi$ λέγεται παράγοντας άπροσδιοριστίας του κλάσματος.

β) Νά άπλοποιηθεί τό ρητό κλάσμα $A = \frac{x^2 - 2x - 3}{x^2 - 5x + 6}$, $x \in \mathbb{R}$.

Λύση: Έχουμε $A = \frac{x^2 - 2x - 3}{x^2 - 5x + 6} = \frac{(x+1)(x-3)}{(x-3)(x-2)} = \frac{x+1}{x-2}$, $x - 3 \neq 0$.

Τό κλάσμα δέν έχει έννοια μέ $x = 2$. 'Ο παράγοντας $x - 3$ είναι ό παράγοντας άπροσδιοριστίας του κλάσματος.

Πράξεις ρητών άλγ. κλασμάτων.

Οί πράξεις πρόσθεση, άφαιρέση, πολ/σμός και διαίρεση μέ ρητά άλγεβρικά κλάσματα γίνονται όπως και μέ τά γνωστά μέχρι τώρα κλάσματα. Έτσι έχουμε:

$\forall x \in \Sigma = \mathbb{R} - \{x/x \in \mathbb{R} \wedge \varphi = 0\}$,

$$\frac{p_1}{\varphi} \pm \frac{p_2}{\varphi} = \frac{p_1 \pm p_2}{\varphi}$$

$\forall x \in \Sigma = \mathbb{R} - \{x/x \in \mathbb{R} \wedge \varphi_1 = 0 \wedge \varphi_2 = 0\}$

$$\frac{p_1}{\varphi_1} \pm \frac{p_2}{\varphi_2} = \frac{p_1\varphi_2 \pm p_2\varphi_1}{\varphi_1\varphi_2}$$

$\forall x \in \Sigma = \mathbb{R} - \{x/x \in \mathbb{R} \wedge \varphi_1 = 0 \wedge \varphi_2 = 0\}$

$$\frac{p_1}{\varphi_1} \cdot \frac{p_2}{\varphi_2} = \frac{p_1 p_2}{\varphi_1 \varphi_2}$$

$\forall x \in \Sigma = \mathbb{R} - \{x/x \in \mathbb{R} \wedge \varphi_1 = 0 \wedge \varphi_2 = 0 \wedge p_2 = 0\}$

$$\frac{p_1}{\varphi_1} : \frac{p_2}{\varphi_2} = \frac{p_1 \varphi_2}{\varphi_1 p_2}$$

Σημ.: Όλα τά πολυώνυμα είναι άκέρ. πολυώνυμα του x .

Παραδείγματα: α) Νά γίνει ρητό κλάσμα ή παράσταση:

$$A = \frac{2x-1}{2x} + \frac{2x}{1-2x} - \frac{1}{2x(1-2x)}, \quad x \in \mathbb{R}$$

Λύση: Τό κλάσμα $\frac{2x-1}{2x}$ έχει έννοια όταν $x \neq 0$, τό $\frac{2x}{1-2x}$ όταν $x \neq \frac{1}{2}$ και τό $\frac{1}{2x(1-2x)}$ όταν $x \neq 0$ και $x \neq \frac{1}{2}$. Άρα για νά κάνουμε τίς πράξεις πρέπει νά ύποθέσουμε $x \neq 0$ και $x \neq \frac{1}{2}$. Τό Ε.Κ.Π. τών παρονομαστών είναι $2x(1-2x)$. Μετά τήν άναγωγή τών κλασμάτων στόν ίδιο παρονομαστή έχουμε:

$$A = \frac{(2x-1)(1-2x) + 2x \cdot 2x - 1}{2x(1-2x)} = \frac{4x-2}{2x(1-2x)} = \frac{-2(1-2x)}{2x(1-2x)} = -\frac{1}{x}$$

β) Νά άπλοποιηθεί ή παράσταση

$$A = \frac{x+2}{x-2} \cdot \frac{x^2-4}{4x}, \quad (x \neq 2, x \neq 0)$$

$$\text{Λύση: } A = \frac{(x+2)(x^2-4)}{(x-2)4x} = \frac{(x+2)(x+2)(x-2)}{(x-2)4x} = \frac{(x+2)^2}{4x}$$

γ) Νά γίνουν οι πράξεις

$$A = \frac{x^4-1}{x^2-2x+1} : \frac{x^2+x}{x-1}, \quad (x \neq 1, x \neq -1, x \neq 0)$$

$$\begin{aligned} \text{Λύση: } A &= \frac{x^4-1}{x^2-2x+1} : \frac{x^2+x}{x-1} = \frac{x^4-1}{(x-1)^2} \cdot \frac{x-1}{x^2+x} = \frac{(x^2+1)(x^2-1)(x-1)}{(x-1)^2(x+1)x} = \\ &= \frac{(x^2+1)(x+1)(x-1)^2}{(x-1)^2(x+1)x} = \frac{x^2+1}{x} \end{aligned}$$

54. ΣΥΝΘΕΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ

Ένα ρητό άλγεβρικό κλάσμα, αν περιέχει σε έναν τουλάχιστο από τους όρους του ρητό κλάσμα, λέγεται **σύνθετο κλάσμα**. Αντίθετα, εκείνα, που έχουν όρους άκεραίες ρητές παραστάσεις λέγονται **άπλά κλάσματα**. Ένα σύνθετο κλάσμα τρέπεται σε ισοδύναμο άπλό, αν πρώτα μετατρέψουμε τους όρους του σε ρητά κλάσματα και έπειτα διαιρέσουμε τά κλάσματα αυτά.

Παραδείγματα :

α) Νά τραπεῖ σε άπλό τό σύνθετο κλάσμα $A = \frac{\frac{x+\psi}{x-\psi} + 1}{\frac{x+\psi}{x-\psi} - 1}$

Λύση: Ό αριθμητής: $\frac{x+\psi}{x-\psi} + 1 = \frac{x+\psi}{x-\psi} + \frac{x-\psi}{x-\psi} = \frac{2x}{x-\psi}, \quad (x \neq \psi)$

Ό παρονομαστής: $\frac{x+\psi}{x-\psi} - 1 = \frac{x+\psi}{x-\psi} - \frac{x-\psi}{x-\psi} = \frac{2\psi}{x-\psi}, \quad (x \neq \psi)$

Τό σύνθετο κλάσμα: $A = \frac{\frac{2x}{x-\psi}}{\frac{2\psi}{x-\psi}} = \frac{2x}{x-\psi} : \frac{2\psi}{x-\psi} = \frac{x}{\psi}, \quad (x \neq \psi, \psi \neq 0)$

β) Νά τραπεῖ σε άπλό τό σύνθετο κλάσμα $A = \frac{4x^2+2x}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{x}}}, \quad x \neq 0$

Λύση: Αρχίζοντας από τόν παρονομαστή έχουμε: $1 + \frac{1}{x} = \frac{x+1}{x}$

καί άρα τό κλάσμα $\frac{1}{1 + \frac{1}{x}} = \frac{1}{\frac{x+1}{x}} = \frac{x}{x+1}$, όποτε ό παρονομαστής του συν-

θετου γίνεται $1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{x}} = 1 + \frac{x}{x+1} = \frac{x+1+x}{x+1} = \frac{2x+1}{x+1}$

Όστε: $A = \frac{4x^2+2x}{\frac{2x+1}{x+1}} = \frac{2x(2x+1)(x+1)}{2x+1} = 2x(x+1), \quad (x \neq -\frac{1}{2})$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

146) Νά ἀπλοποιηθοῦν τὰ ἀκόλουθα ρητὰ κλάσματα:

$$\begin{aligned}
 & 1) \frac{39\beta^2\gamma\delta^4}{65\beta\gamma^3\delta^2}, \quad 2) \frac{165\mu^3\nu^2x^\nu}{132\mu^4\nu^2x^{\nu-1}}, \quad 3) \frac{147x^{\nu+2}y^\nu}{49x^{\nu+1}y^{\nu-1}}, \quad 4) \frac{1-x^2}{(1+\alpha x)^2 - (\alpha+x)^2} \\
 & 5) \frac{10\alpha^2 - 7\alpha^3 + 10 - 7\alpha}{\alpha^2 - 2\alpha^3 + 1 - 2\alpha}, \quad 6) \frac{x^2 - (\alpha - \beta)x - \alpha\beta}{x^3 + \beta x^2 + \alpha x + \alpha\beta}, \quad 7) \frac{15x^3 + 35x^2 + 3x + 7}{27x^4 + 63x^3 - 12x^2 - 28x}, \\
 & 8) \frac{(\alpha + \beta)^5 - \alpha^5 - \beta^5}{(\alpha + \beta)^3 - \alpha^3 - \beta^3}, \quad 9) \frac{xy(\alpha^2 + \beta^2) + \alpha\beta(x^2 + y^2)}{xy(\alpha^2 - \beta^2) + \alpha\beta(x^2 - y^2)}, \quad 10) \frac{x^4 - \alpha^2x^2 - 5x^3 + 5\alpha^2x}{(x - \alpha)^2(x - 5)}, \\
 & 11) \frac{(x^2 - 2y\omega - \omega^2 - y^2)(\alpha + \beta - \gamma)}{(x + y + \omega)(\alpha^2 - \beta^2 + \gamma^2 - 2\alpha\gamma)}
 \end{aligned}$$

147) Νά μετατραπεί καθεμιά ἀπὸ τὶς παρακάτω παραστάσεις σὲ ρητὸ ἀλγεβρικό κλάσμα.

$$\begin{aligned}
 & 1) \frac{5}{(x-1)^2} - \frac{3}{x-1} + \frac{4}{(x+2)^2} + \frac{3}{x+2}, \quad 2) \frac{\alpha}{(x-\beta)(x-\gamma)} + \frac{\beta}{(x-\gamma)(x-\alpha)} + \\
 & \quad + \frac{\gamma}{(x-\alpha)(x-\beta)}, \quad 3) \frac{\alpha + \beta}{(\nu-\lambda)(\nu-\mu)} + \frac{\beta + \gamma}{(\lambda-\mu)(\lambda-\nu)} + \frac{\gamma + \alpha}{(\mu-\lambda)(\mu-\nu)}, \\
 & 4) \frac{x^3 - y^3}{x^4 - y^4} - \frac{x-y}{x^2 - y^2} - \frac{x+y}{2(x^2 + y^2)}, \quad 5) \frac{1}{(\alpha-\beta)(\alpha-\gamma)(x-\alpha)} + \frac{1}{(\beta-\gamma)(\beta-\alpha)(x-\beta)} + \\
 & \quad + \frac{1}{(\gamma-\alpha)(\gamma-\beta)(x-\gamma)}, \quad 6) \frac{\alpha^2 - \beta\gamma}{(\alpha - \beta)(\alpha - \gamma)} + \frac{\beta^2 + \alpha\gamma}{(\beta + \gamma)(\beta - \alpha)} + \frac{\gamma^2 + \alpha\beta}{(\gamma - \alpha)(\gamma + \beta)}, \\
 & 7) \frac{x^4 - \alpha^2x^2 - 5x^3 + 5\alpha^2x}{(x - \alpha)^2(x - 5)} - \frac{x^3 - \alpha^2x}{x^2 + 2\alpha x + \alpha^2} - \frac{4\alpha^3x - 4\alpha^4}{x^3 - \alpha^2x - \alpha x^2 + \alpha^3}, \quad 8) \frac{8\gamma^4 - 27\gamma\delta^3}{4\gamma^2 - 9\delta^2} \cdot \\
 & \quad \cdot \frac{2(2\gamma + 3\delta)}{4\gamma^2 + 6\gamma\delta + 9\delta^2}, \quad 9) \frac{11x - 2\psi}{6x - \psi} : \frac{121x^2 - 4\psi^2}{36x^2 - \psi^2}, \quad 10) \frac{x^2 - 25}{x + 2} : \frac{x^2 - 9x + 20}{x^2 - 4}, \\
 & 11) \frac{\alpha^2 - x^2}{\alpha + \beta} \cdot \frac{\alpha^2 - \beta^2}{\alpha x + x^2} \cdot \left(\alpha + \frac{\alpha x}{\alpha - x} \right), \quad 12) \frac{\mu^2 - \nu\nu + \nu^2}{\mu^3 - 3\mu\nu(\mu - \nu) - \nu^3} \cdot \frac{\mu^2 - \nu^2}{\mu^3 + \nu^3}, \\
 & 13) \left(\frac{x^2}{\psi^3} + \frac{1}{x} \right) : \left(\frac{x}{\psi^2} - \frac{1}{\psi} + \frac{1}{x} \right), \quad 14) \left(\frac{x^2 - 6x + 8}{x^2 - 4x + 3} \cdot \frac{x^2 - 5x + 6}{x^2 - 2x + 8} \right) : \frac{(x-2)^2}{x-1}, \\
 & 15) \left(\frac{\alpha^3 - \beta^3}{\alpha - \beta} - \frac{\alpha^2 + \beta^2}{\alpha + \beta} \right) : \frac{4\alpha\beta}{\alpha^2 - \beta^2}
 \end{aligned}$$

148) Νά τραπεί σὲ ἀπλό καθεμιά ἀπὸ τὰ ἀκόλουθα σύνθετα κλάσματα.

$$\begin{aligned}
 & 1) \frac{\alpha + \frac{\beta - \alpha}{1 + \alpha\beta}}{1 - \alpha \frac{\beta - \alpha}{1 + \alpha\beta}}, \quad 2) \frac{\frac{\alpha^3 + \beta^3}{\alpha^2 - \beta^2}}{\frac{\alpha^2 - \alpha\beta + \beta^2}{\alpha - \beta}}, \quad 3) \frac{\frac{2\alpha\beta}{\alpha + \beta} + \frac{2\alpha^2\beta}{\alpha + \beta} + \beta}{\frac{2\alpha\beta}{\alpha + \beta} - \frac{2\alpha^2\beta}{\alpha + \beta} - \beta}, \\
 & 4) \frac{\left(1 - \frac{3\alpha + \beta}{\alpha - \beta}\right) \cdot \left(1 - \frac{2\alpha + \beta}{\alpha + 2\beta}\right)}{1 + \frac{3\beta^2}{\alpha^2 - 4\beta^2}}, \quad 5) \frac{\left(\alpha - \frac{\alpha^2 + \alpha\beta}{\alpha - \beta}\right) \cdot \left(\alpha - \frac{2\alpha^2 + \alpha\beta}{\alpha + \beta}\right)}{\alpha\beta + \frac{\alpha\beta^3}{\alpha^2 - \beta^2}}, \\
 & 6) \frac{\frac{\alpha^3 - \beta^3}{\alpha^2 - \beta^2} + \frac{2\beta^2}{1 + \frac{\alpha + \beta}{\alpha + \beta}}}{1 + \frac{\alpha + \beta}{\alpha + \beta}}
 \end{aligned}$$

149) Νά τραπεϊ σέ άπλό κλάσμα καθιεμιά άπό τίς παραστάσεις

$$1) \frac{\frac{2\psi\omega}{\psi + \omega} - \psi}{\frac{1}{\omega} + \frac{1}{\psi - 2\omega}} + \frac{\frac{2\psi\omega}{\psi + \omega} - \omega}{\frac{1}{\psi} + \frac{1}{\omega - 2\psi}}, \quad 2) \frac{\frac{x^3 - \psi^3}{x^2 + \psi^2} \cdot \frac{x^3 - \psi^3}{x^3 + \psi^3} \cdot \left(\frac{1}{x^2} + \frac{1}{\psi^2}\right)}{\frac{(x + \psi)^2 - x\psi}{(x - \psi)^2 + x\psi} \cdot \left(\frac{1}{\psi} - \frac{1}{x}\right)^2}$$

$$3) \frac{\frac{x}{\psi} + \frac{\psi}{x} - 1}{\frac{x^2}{\psi^2} + \frac{x}{\psi} + 1} \cdot \frac{1 + \frac{\psi}{x}}{x - \psi} : \frac{1 + \frac{\psi^3}{x^3}}{\frac{x^2}{\psi} - \frac{\psi^2}{x}}$$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΣ

150) Νά άπλοποιηθούν τά κλάσματα:

$$1) \frac{x^6 + 2x^3y^3 + y^6}{x^6 - y^6}, \quad 2) \frac{\alpha^3\beta^3 + \beta^3\gamma^3 + \gamma^3\alpha^3 - 3\alpha^2\beta^2\gamma^2}{\alpha^2\beta^2 + \beta^2\gamma^2 + \gamma^2\alpha^2 - \alpha^2\beta\gamma - \alpha\beta^2\gamma - \alpha\beta\gamma^2},$$

$$3) \frac{(\alpha - \beta)^3 + (\beta - \gamma)^3 + (\gamma - \alpha)^3}{(\alpha - \beta)(\beta - \gamma)(\gamma - \alpha)}.$$

151) Νά άπλοποιηθεί ή παράσταση

$$\frac{(x + y)^3 - \omega^3}{x + y - \omega} + \frac{(y + \omega)^3 - x^3}{y + \omega - x} + \frac{(x + \omega)^3 - y^3}{x + \omega - y}$$

152) *Αν $\alpha + \beta + \gamma = 0$, νά άποδειχθεί ότι:

$$2\alpha^2 + \beta\gamma + 2\beta^2 + \alpha\gamma + 2\gamma^2 + \alpha\beta = 1.$$

153) *Αν $\alpha + \beta + \gamma = 0$, νά άποδειχθεί ότι:

$$\frac{\alpha^2 - \beta^2 - 2\beta\gamma}{\alpha + \beta} + \frac{\beta^2 - \gamma^2 - 2\alpha\gamma}{\beta + \gamma} + \frac{\gamma^2 - \alpha^2 - 2\alpha\beta}{\alpha + \gamma} = 0$$

154) Νά άπλοποιηθούν οι παραστάσεις:

$$1) \frac{x^2 - (\mu + \nu)x + \mu\nu}{x^2 - (\mu + \kappa)x + \mu\kappa} \cdot \frac{x^2 - \kappa^2}{x^2 - \nu^2}, \quad 2) \frac{\alpha^3 - \beta^3}{\alpha^2 + \beta^2} \cdot \frac{\alpha + \beta}{\alpha - \beta} : \left(\frac{\alpha^2 + \alpha\beta + \beta^2}{\alpha^2 - \alpha\beta + \beta^2}\right)^2,$$

$$3) \left(\frac{x^2 - 1}{x^4 - 2x^3 + x^2} : \frac{x^2 + 2x + 1}{x^3 - 1}\right) : \left(\frac{x + 1}{x^2} - x\right)$$

$$155) *Αν $x = \frac{\beta^2 + \gamma^2 - \alpha^2}{2\beta\gamma}$ καί $y = \frac{\alpha^2 - \beta^2 - \gamma^2 + 2\beta\gamma}{(\alpha + \beta + \gamma)(\beta + \gamma - \alpha)}$$$

νά άποδειχθεί ότι ή παράσταση $\frac{x + y}{1 - xy}$ είναι ανεξάρτητη άπό τά α, β, γ .

$$156) Νά άποδειχθεί ότι τό σύνθετο κλάσμα $1 + \frac{\frac{x - \alpha}{1 + \alpha x} - \frac{x - \beta}{1 + \beta x}}{(x - \alpha)(x - \beta)}$$$

είναι ανεξάρτητο άπό τό x .

157) "Αν $\frac{x}{y+\omega} = \alpha$, $\frac{y}{\omega+x} = \beta$, $\frac{\omega}{x+y} = \gamma$ νά δειχθεί :

$$\frac{1}{\alpha\beta\gamma} - \left(\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} + \frac{1}{\gamma} \right) = 2.$$

158) "Αν $n \in \mathbb{N}$, νά αποδειχθεί ότι τό κλάσμα $A = \frac{\alpha^{3n} - 1}{\alpha^3 + \alpha + 1}$ είναι άκέραιο πο-
λυώνυμο του α .

159) Νά άπλοποιηθεί τό κλάσμα $A = \frac{(x^2 - x\psi + \psi^2)^3 + (x^2 + x\psi + \psi^2)^3}{2(x^2 + \psi^2)}$

160) "Επίσης τό κλάσμα $A = \frac{\alpha^3 + \beta^3 + \gamma^3 + 3(\alpha + \beta)(\beta + \gamma)(\gamma + \alpha)}{\alpha + \beta + \gamma}$

161) "Επίσης τό κλάσμα $A = \frac{(x + \psi)^5 - x^5 - \psi^5}{(x^2 + x\psi + \psi^2)5x^2\psi^2}$

162) "Αν $\alpha + \beta + \gamma = 0 \vee \alpha = \beta = \gamma$, νά βρεθεί ή τιμή του κλάσματος $\frac{\alpha^3 + \beta^3 + \gamma^3}{\alpha\beta\gamma}$

163) "Αν $\alpha + \beta + \gamma = 0$, νά βρεθεί ή τιμή του $A = \frac{\alpha^4 + \beta^4 + \gamma^4}{\alpha^2\beta^2 + \alpha^2\gamma^2 + \beta^2\gamma^2}$

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ α' ΒΑΘΜΟΥ (Γραμμικά) (Συμπλήρωση)

55. Από τό Γυμνάσιο μάς είναι γνωστά τά ακόλουθα:

1. Ο όρισμός καί οί ιδιότητες τών συστημάτων.
2. Οί βασικές μέθοδοι επίλυσεως γραμμικοῦ συστήματος δύο εξισώσεων α' βαθμοῦ μέ δύο άγνωστούς καί ή διερεύνησή του.
3. Η μέθοδος επίλυσεως γραμμικοῦ συστήματος μέ περισσότερες από δύο εξισώσεις καί ισάριθμους άγνωστούς.

Στά έπόμενα, άφοῦ δοθεῖ ή λύση τοῦ γραμμικοῦ συστήματος μέ τή βοήθεια τών όριζουσών, θά συμπληρωθεῖ ή διερεύνησή του καί θά μελετηθοῦν όρισμένες ειδικές περιπτώσεις γραμμικῶν συστημάτων.

56. ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΖΟΥΣΩΝ - ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΟΥ GRAMER

α) Επίλυση συστήματος α' βαθμοῦ μέ δύο άγνωστούς.

Στή Γ' τάξη δόθηκε ό όρισμός τῆς όρίζουσας β' τάξεως.

$$\text{*Έτσι: } \forall \alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2 \in \mathbb{R}: \Delta = \begin{vmatrix} \alpha_1 & \beta_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 \end{vmatrix} = \alpha_1\beta_2 - \alpha_2\beta_1$$

*Άς θεωρήσουμε τό σύστημα:

$$\Sigma: \begin{cases} \alpha_1 x + \beta_1 \psi = \gamma_1 \\ \alpha_2 x + \beta_2 \psi = \gamma_2 \end{cases} \text{ ὅπου } \alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2, \gamma_1, \gamma_2, x, \psi \in \mathbb{R} \wedge |\alpha_1| + |\beta_1| > 0 \wedge |\alpha_2| + |\beta_2| > 0$$

Γνωρίζουμε ότι, αν $\alpha_1\beta_2 - \alpha_2\beta_1 \neq 0$, η λύση του συστήματος Σ είναι:

$$(x, \psi) = \left(\frac{\gamma_1\beta_2 - \gamma_2\beta_1}{\alpha_1\beta_2 - \alpha_2\beta_1}, \frac{\alpha_1\gamma_2 - \alpha_2\gamma_1}{\alpha_1\beta_2 - \alpha_2\beta_1} \right)$$

πού με τη βοήθεια των οριζουσών γράφεται ως εξής :

$$(x, \psi) = \left(\frac{\begin{vmatrix} \gamma_1 & \beta_1 \\ \gamma_2 & \beta_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} \alpha_1 & \beta_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 \end{vmatrix}}, \frac{\begin{vmatrix} \alpha_1 & \gamma_1 \\ \alpha_2 & \gamma_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} \alpha_1 & \beta_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 \end{vmatrix}} \right) = \left(\frac{\Delta_x}{\Delta}, \frac{\Delta_\psi}{\Delta} \right)$$

$$\text{όπου } \Delta = \begin{vmatrix} \alpha_1 & \beta_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 \end{vmatrix}, \Delta_x = \begin{vmatrix} \gamma_1 & \beta_1 \\ \gamma_2 & \beta_2 \end{vmatrix}, \Delta_\psi = \begin{vmatrix} \alpha_1 & \gamma_1 \\ \alpha_2 & \gamma_2 \end{vmatrix}$$

Είναι λοιπόν
$$\boxed{x = \frac{\Delta_x}{\Delta}, \psi = \frac{\Delta_\psi}{\Delta}} \quad (1)$$

$$\text{όπότε } \frac{x}{\Delta_x} = \frac{1}{\Delta}, \frac{\psi}{\Delta_\psi} = \frac{1}{\Delta} \text{ και άρα } \frac{x}{\Delta_x} = \frac{\psi}{\Delta_\psi} = \frac{1}{\Delta}$$

Οί τύποι (1) (τύποι του Cramer) φανερώνουν ότι κάθε άγνωστος είναι πηλίκο δύο οριζουσών με παρονομαστή (κοινό) τήν ορίζουσα Δ των συντελεστών των άγνωστων και αριθμητή που προκύπτει, αν στην ορίζουσα του παρονομαστή αντικαταστήσουμε τη στήλη των συντελεστών του υπολογιζόμενου άγνωστου με τη στήλη των γνωστών όρων, που πρέπει να βρίσκονται όπωσδήποτε στο δεύτερο μέλος των εξισώσεων του συστήματος.

Η τυποποιημένη αυτή μέθοδος επίλυσης συστήματος γραμμικού με δύο άγνωστους ονομάζεται κανόνας του Cramer.

Παραδείγματα : 1. Νά επιλυθεί τό σύστημα:
$$\begin{cases} 3x + 2\psi = 12 \\ 5x - 3\psi = 1 \end{cases}, (x, y) \in \mathbb{R}^2$$

Λύση : Σύμφωνα με τον κανόνα του Cramer έχουμε:

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 12 & 2 \\ 1 & -3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 5 & -3 \end{vmatrix}}, \quad \psi = \frac{\begin{vmatrix} 3 & 12 \\ 5 & 1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 5 & -3 \end{vmatrix}}$$

$$\text{ή } x = \frac{-36 - 2}{-9 - 10} = \frac{38}{19} = 2, \quad \psi = \frac{3 - 60}{-9 - 10} = \frac{57}{19} = 3$$

2. Νά επιλυθεί τό σύστημα:
$$\begin{cases} x + \alpha^2\psi = 2 \\ x + \psi = 2\alpha \end{cases}, \text{ όπου } \alpha, x, \psi \in \mathbb{R}$$

Λύση : Έχουμε :

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 2 & \alpha^2 \\ 2\alpha & 1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & \alpha^2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix}} = \frac{2-2\alpha^3}{1-\alpha^3} = \frac{2(1-\alpha)(\alpha^2+\alpha+1)}{(1-\alpha)(1+\alpha)} = \frac{2(\alpha^2+\alpha+1)}{1+\alpha} = , (\alpha \neq \pm 1),$$

$$\psi = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2\alpha \end{vmatrix}}{1-\alpha^2} = \frac{2\alpha-2}{1-\alpha^2} = \frac{2(\alpha-1)}{(1+\alpha)(1-\alpha)} = -\frac{2}{1+\alpha}$$

Η διερεύνηση του συστήματος Σ : $\begin{cases} \alpha_1 x + \beta_1 \psi = \gamma_1 \\ \alpha_2 x + \beta_2 \psi = \gamma_2 \end{cases}$ συνοψίζεται στον ακόλουθο πίνακα:

Διερεύνηση του συστήματος Σ : $\alpha_1 x + \beta_1 \psi = \gamma_1 \wedge \alpha_2 x + \beta_2 \psi = \gamma_2$

όπου $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2, \gamma_1, \gamma_2 \in \mathbb{R}$

$$\text{καί } \Delta = \begin{vmatrix} \alpha_1 & \beta_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 \end{vmatrix}, \quad \Delta_x = \begin{vmatrix} \gamma_1 & \beta_1 \\ \gamma_2 & \beta_2 \end{vmatrix}, \quad \Delta_\psi = \begin{vmatrix} \alpha_1 & \gamma_1 \\ \alpha_2 & \gamma_2 \end{vmatrix}$$

Αν $\Delta \neq 0$, τότε το σύστημα Σ έχει μία μόνο λύση,

$$\text{τήν : } (x, \psi) = \left(\frac{\Delta_x}{\Delta}, \frac{\Delta_\psi}{\Delta} \right)$$

$\Delta_x \neq 0$ ή $\Delta_\psi \neq 0$, τότε το σύστημα Σ δεν έχει καμιά λύση

Αν $\Delta = 0$ και

$\Delta_x = 0$

ή

$\Delta_\psi = 0$

Τότε το σύστημα Σ :

α) Έχει άπειρες σε πλήθος λύσεις, αν τὰ $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2$ δέν είναι όλα μηδέν.

(Ανάγεται σε μιά εξίσ. με δυο άγνωστους)

β) Είναι αδύνατο, αν $\alpha_1 = \alpha_2 = \beta_1 = \beta_2 = 0$

καί $\gamma_1 \neq 0$ ή $\gamma_2 \neq 0$

γ) Είναι ταυτοτικό ως προς x και ψ ,

αν $\alpha_1 = \alpha_2 = \beta_1 = \beta_2 = \gamma_1 = \gamma_2 = 0$

β) Επίλυση συστήματος α' βαθμού με τρεις άγνωστους.

Ορίζουσες τρίτης τάξεως.

Τό σύμβολο $\begin{vmatrix} \alpha_1 & \beta_1 & \gamma_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 & \gamma_2 \\ \alpha_3 & \beta_3 & \gamma_3 \end{vmatrix}$ πού αποτελείται από 9 στοιχεία σε τρεις γραμμές και τρεις στήλες λέγεται ορίζουσα τρίτης τάξεως και ορίζουμε :

$$\Delta = \begin{vmatrix} \alpha_1 & \beta_1 & \gamma_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 & \gamma_2 \\ \alpha_3 & \beta_3 & \gamma_3 \end{vmatrix} = \alpha_1 \begin{vmatrix} \beta_2 & \gamma_2 \\ \beta_3 & \gamma_3 \end{vmatrix} - \alpha_2 \begin{vmatrix} \beta_1 & \gamma_1 \\ \beta_3 & \gamma_3 \end{vmatrix} + \alpha_3 \begin{vmatrix} \beta_1 & \gamma_1 \\ \beta_2 & \gamma_2 \end{vmatrix}$$

Τό β' μέλος τῆς ἰσότητος λέγεται **ανάπτυγμα ἢ τιμὴ τῆς Δ** καὶ οἱ ὀρίζουσες

$$+ \begin{vmatrix} \beta_2 & \gamma_2 \\ \beta_3 & \gamma_3 \end{vmatrix}, - \begin{vmatrix} \beta_1 & \gamma_1 \\ \beta_3 & \gamma_3 \end{vmatrix}, + \begin{vmatrix} \beta_1 & \gamma_1 \\ \beta_2 & \gamma_2 \end{vmatrix}$$

λέγονται **ἐλάσσονες ὀρίζουσες τῆς Δ** ὡς πρὸς τὰ στοιχεῖα τῆς α' στήλης.

Δηλαδή, τὸ ἀνάπτυγμα τῆς Δ προκύπτει, ἂν πολ/σουμε τὰ στοιχεῖα μιᾶς γραμμῆς ἢ στήλης ἀντιστοιχῶς τὸ καθένα μὲ τὴν ἐλάσσονα ὀρίζουσα, ἢ ὅποια προκύπτει ἂν διαγράψουμε τὴ γραμμὴ καὶ τὴ στήλη τοῦ στοιχείου αὐτοῦ.

Τὸ ἀνάπτυγμα αὐτὸ βρίσκεται πρὸ εὐκολα μὲ τὸν κανόνα τοῦ **Sarrus**. Σύμφωνα καὶ μὲ αὐτὸ τὸν κανόνα ἐπαναλαμβάνουμε κάτω ἀπὸ τὴν τρίτη γραμμὴ τῆς δύο πρῶτες γραμμῆς ἢ δεξιὰ τῆς τρίτης στήλης τῆς δύο πρῶτες στήλης καὶ ἔτσι προκύπτουν, ἀντίστοιχα, δύο πίνακες. Ὁ ἕνας (I) μὲ πέντε γραμμῆς καὶ τρεῖς στήλης καὶ ὁ ἄλλος (II) μὲ τρεῖς γραμμῆς καὶ πέντε στήλης. Δηλαδή:

	+	$\alpha_1 \beta_1 \gamma_1$	-		+	+	+	
Πίνακας I	+	$\alpha_2 \beta_2 \gamma_2$	-	Πίνακας II	α_1	β_1	γ_1	$\alpha_1 \beta_1$
	+	$\alpha_3 \beta_3 \gamma_3$	-		α_2	β_2	γ_2	$\alpha_2 \beta_2$
		$\alpha_1 \beta_1 \gamma_1$			α_3	β_3	γ_3	$\alpha_3 \beta_3$
		$\alpha_2 \beta_2 \gamma_2$			-	-	-	

Ἐπειτα σχηματίζουμε τὰ τρία γινόμενα διαγώνια ἀπὸ πάνω ἀριστερά πρὸς τὰ κάτω δεξιὰ μὲ πρόσημο τὸ (+) καὶ τὰ ἄλλα τρία γινόμενα ἐπίσης διαγώνια ἀπὸ κάτω ἀριστερά πρὸς τὰ πάνω δεξιὰ μὲ πρόσημο τὸ (-).

Ἐτσι ἔχουμε:
$$\Delta = \begin{vmatrix} \alpha_1 & \beta_1 & \gamma_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 & \gamma_2 \\ \alpha_3 & \beta_3 & \gamma_3 \end{vmatrix} = \alpha_1 \beta_2 \gamma_3 + \alpha_2 \beta_3 \gamma_1 + \alpha_3 \beta_1 \gamma_2 - \alpha_3 \beta_2 \gamma_1 - \alpha_1 \beta_3 \gamma_2 - \alpha_2 \beta_1 \gamma_3$$

Ἰδιότητες τῶν ὀρίζουσῶν.

1. Τὸ ἀνάπτυγμα ὀρίζουσας δὲ μεταβάλλεται, ἂν οἱ γραμμῆς γίνουιν στή-
λες καὶ οἱ στήλες γραμμῆς.

2. Τὸ ἀνάπτυγμα ὀρίζουσας ἀλλάζει πρόσημο, ἂν ἀντιμεταθέσουμε δύο
γραμμῆς ἢ δύο στήλες.

3. Ἄν σὲ μιὰ ὀρίζουσα δύο γραμμῆς ἢ δύο στήλες εἶναι οἱ ἴδιες, τότε αὐτὴ
ἰσοῦται μὲ μηδέν.

4. Ἄν σὲ μιὰ ὀρίζουσα τὰ στοιχεῖα μιᾶς γραμμῆς ἢ στήλης πολλαπλασια-
σθοῦν ἐπὶ $\lambda \in \mathbb{R}$, τότε καὶ τὸ ἀνάπτυγμά τῆς πολλαπλασιάζεται ἐπὶ λ .

5. Τὸ ἀνάπτυγμα μιᾶς ὀρίζουσας δὲ μεταβάλλεται, ἂν στὰ στοιχεῖα μιᾶς
στήλης προσθέσουμε τὰ στοιχεῖα μιᾶς ἄλλης στήλης, ἀφοῦ τὰ πολ/σουμε ἐπὶ

$\lambda \neq 0$. Τήν απόδειξη τῶν ιδιοτήτων αὐτῶν καθώς καί τήν ἀναζήτηση καί διατύπωση καί ἄλλων ιδιοτήτων τήν ἀφήνουμε στους μαθητές γιά ἀσκηση.

Παραδείγματα: Νά βρεθῆ ἡ τιμὴ τῶν ὀριζουσῶν:

$$\alpha) \Delta_1 = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 1 & 1 \end{vmatrix} \quad \beta) \Delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & \alpha & -2 \\ \alpha & -1 & 3 \\ 2 & 1 & -\alpha \end{vmatrix} \quad \gamma) \Delta_3 = \begin{vmatrix} 1 & \alpha & \alpha^2 \\ 1 & \beta & \beta^2 \\ 1 & \gamma & \gamma^2 \end{vmatrix}$$

Λύση:

$$\alpha) \begin{vmatrix} 1 & 3 & 5 & 1 & 3 \\ 2 & 4 & 6 & 2 & 4 \\ 3 & 1 & 1 & 3 & 1 \end{vmatrix} : \Delta_1 = 4 + 54 + 10 - 60 - 6 - 6 = -4$$

$$\beta) \begin{vmatrix} 1 & \alpha - 2 & 1 & \alpha \\ \alpha - 1 & 3 & \alpha - 1 & \\ 2 & 1 - \alpha & 2 & 1 \end{vmatrix} : \Delta_2 = \alpha + 6\alpha - 2\alpha - 4 - 3 + \alpha^3 = \alpha^3 + 5\alpha - 7$$

$$\gamma) \begin{vmatrix} 1 & \alpha & \alpha^2 & 1 & \alpha \\ 1 & \beta & \beta^2 & 1 & \beta \\ 1 & \gamma & \gamma^2 & 1 & \gamma \end{vmatrix} : \Delta_3 = \alpha\beta^2 + \beta\gamma^2 + \alpha^2\gamma - \alpha^2\beta - \beta^2\gamma - \alpha\gamma^2 = (\alpha - \beta)(\beta - \gamma)(\gamma - \alpha)$$

Λύση καί διερεύνηση τοῦ συστήματος Σ :

$$\begin{cases} \alpha_1 x + \beta_1 \psi + \gamma_1 \omega = \delta_1 \\ \alpha_2 x + \beta_2 \psi + \gamma_2 \omega = \delta_2 \quad (1) \\ \alpha_3 x + \beta_3 \psi + \gamma_3 \omega = \delta_3 \end{cases}$$

Λύση: Λαμβάνουμε τίς ἐλάχιστες ὀρίζουσες ἀπὸ τήν ὀρίζουσα τῶν συντελεστῶν τῶν ἀγνώστων τοῦ συστήματος (1)

$$A_1 = \begin{vmatrix} \beta_2 & \gamma_2 \\ \beta_3 & \gamma_3 \end{vmatrix}, \quad A_2 = - \begin{vmatrix} \beta_1 & \gamma_1 \\ \beta_3 & \gamma_3 \end{vmatrix}, \quad A_3 = \begin{vmatrix} \beta_1 & \gamma_1 \\ \beta_2 & \gamma_2 \end{vmatrix}$$

καί σχηματίζουμε τό γραμμικό συνδυασμό.

$$\begin{aligned} & A_1(\alpha_1 x + \beta_1 \psi + \gamma_1 \omega) + A_2(\alpha_2 x + \beta_2 \psi + \gamma_2 \omega) + A_3(\alpha_3 x + \beta_3 \psi + \gamma_3 \omega) = \\ & = A_1 \delta_1 + A_2 \delta_2 + A_3 \delta_3 \Leftrightarrow (\alpha_1 A_1 + \alpha_2 A_2 + \alpha_3 A_3)x + (\beta_1 A_1 + \beta_2 A_2 + \beta_3 A_3)\psi + \\ & + (\gamma_1 A_1 + \gamma_2 A_2 + \gamma_3 A_3)\omega = A_1 \delta_1 + A_2 \delta_2 + A_3 \delta_3. \text{ Ἀλλά εἶναι: } \beta_1 A_1 + \beta_2 A_2 + \\ & + \beta_3 A_3 = \beta_1(\beta_2 \gamma_3 - \beta_3 \gamma_2) - \beta_2(\beta_1 \gamma_3 - \beta_3 \gamma_1) + \beta_3(\beta_1 \gamma_2 - \beta_2 \gamma_1) = 0 \end{aligned}$$

Ἐπίσης εἶναι: $\gamma_1 A_1 + \gamma_2 A_2 + \gamma_3 A_3 = \gamma_1(\beta_2 \gamma_3 - \beta_3 \gamma_2) - \gamma_2(\beta_1 \gamma_3 - \beta_3 \gamma_1) + \gamma_3(\beta_1 \gamma_2 - \beta_2 \gamma_1) = 0$. Ἄρα $(\alpha_1 A_1 + \alpha_2 A_2 + \alpha_3 A_3)x = \delta_1 A_1 + \delta_2 A_2 + \delta_3 A_3$

$$\eta \begin{vmatrix} \alpha_1 & \beta_1 & \gamma_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 & \gamma_2 \\ \alpha_3 & \beta_3 & \gamma_3 \end{vmatrix} \cdot x = \begin{vmatrix} \delta_1 & \beta_1 & \gamma_1 \\ \delta_2 & \beta_2 & \gamma_2 \\ \delta_3 & \beta_3 & \gamma_3 \end{vmatrix} \quad \eta \quad \Delta \cdot x = \Delta_x \quad (2)$$

Μέ ανάλογο τρόπο λαμβάνουμε:

$$\begin{vmatrix} \alpha_1 & \beta_1 & \gamma_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 & \gamma_2 \\ \alpha_3 & \beta_3 & \gamma_3 \end{vmatrix} \cdot \psi = \begin{vmatrix} \alpha_1 & \delta_1 & \gamma_1 \\ \alpha_2 & \delta_2 & \gamma_2 \\ \alpha_3 & \delta_3 & \gamma_3 \end{vmatrix} \quad \text{ή} \quad \Delta \cdot \psi = \Delta_\psi \quad (3)$$

$$\begin{vmatrix} \alpha_1 & \beta_1 & \gamma_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 & \gamma_2 \\ \alpha_3 & \beta_3 & \gamma_3 \end{vmatrix} \cdot \omega = \begin{vmatrix} \alpha_1 & \beta_1 & \delta_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 & \delta_2 \\ \alpha_3 & \beta_3 & \delta_3 \end{vmatrix} \quad \text{ή} \quad \Delta \cdot \omega = \Delta_\omega \quad (4)$$

Διακρίνουμε τīs ἐξῆς περιπτώσεις:

α) *Αν εἶναι $\Delta \neq 0$, τότε ἀπό τīs (2), (3), (4) προκύπτει ὅτι τὸ σύστημα Σ

$$\text{θὰ ἔχει μία λύση τήν} \quad x = \frac{\Delta_x}{\Delta}, \quad \psi = \frac{\Delta_\psi}{\Delta}, \quad \omega = \frac{\Delta_\omega}{\Delta} \quad (5)$$

Παρατηροῦμε καί ἐδῶ, ὅτι γιὰ τήν ἐπίλυση τοῦ συστήματος Σ μπορεῖ νά ἐφαρμοσθεῖ ὁ κανόνας Cramer.

β) *Αν εἶναι $\Delta = 0$ καί ἕνας, τὸ λιγότερο, ἀπὸ τοὺς $\Delta_x, \Delta_\psi, \Delta_\omega$ εἶναι διάφορος τοῦ μηδενός, τότε ἀπό τīs (2), (3), (4) συμπεραίνουμε ὅτι τὸ σύστημα (1) εἶναι ἀδύνατο.

γ) *Αν εἶναι $\Delta = \Delta_x = \Delta_\psi = \Delta_\omega = 0$, τότε τὸ σύστημα ἔχει ἄπειρες σέ πλῆθος λύσεις. Εἶναι ἀόριστο.

δ) *Αν $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \gamma_1 = \gamma_2 = \gamma_3 = \delta_1 = \delta_2 = \delta_3 = 0$, τότε τὸ σύστημα εἶναι ταυτοτικό (x, ψ, ω αὐθαίρετοι).

Παρατηρήσεις: 1) Στὴν πρώτη περίπτωση, ἀν εἶναι $\delta_1 = \delta_2 = \delta_3 = 0$ (σύστημα ὁμογενές), ὁπότε $\Delta_x = \Delta_\psi = \Delta_\omega = 0$, τὸ σύστημα (1) θὰ ἔχει μία μόνο λύση, τὴ μηδενική.

2) *Αν $\Delta_x, \Delta_\psi, \Delta_\omega, \Delta$ εἶναι ὄλα διάφορα τοῦ μηδενός, τότε ἀπὸ τοὺς (5) λαμβάνουμε:

$$\frac{x}{\Delta_x} = \frac{1}{\Delta}, \quad \frac{\psi}{\Delta_\psi} = \frac{1}{\Delta}, \quad \frac{\omega}{\Delta_\omega} = \frac{1}{\Delta} \quad \text{καὶ ἐπομένως} \quad \frac{x}{\Delta_x} = \frac{\psi}{\Delta_\psi} = \frac{\omega}{\Delta_\omega} = \frac{1}{\Delta}$$

Σημείωση: Διάφορες ἄλλες ὑποπεριπτώσεις νά ἀναζητηθοῦν καί νά ἐξεταστοῦν ἀπὸ τοὺς μαθητές.

Παραδείγματα: 1) Νά ἐπιλυθεῖ τὸ σύστημα:

$$x, \psi, z \in \mathbb{R}$$

$$\begin{cases} 2x + \psi - z = 1 \\ -x + 2\psi + z = 6 \\ x + \psi + 2z = 9 \end{cases}$$

Λύση: Σύμφωνα με τον κανόνα του Cramer λαμβάνουμε:

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 6 & 2 & 1 \\ 9 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 \\ -1 & 6 & 1 \\ 1 & 9 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix}} = 1, \quad \psi = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 \\ -1 & 6 & 1 \\ 1 & 9 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 \\ -1 & 6 & 1 \\ 1 & 9 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix}} = 2, \quad z = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & 6 \\ 1 & 1 & 9 \\ 2 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 \\ -1 & 6 & 1 \\ 1 & 9 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix}} = 3$$

*Έτσι έχουμε τη λύση: $(x, \psi, z) = (1, 2, 3)$

2) Νά επιλυθεί τό σύστημα: $x + 3\psi + \alpha z = -4\alpha \wedge -x + \alpha\psi + \alpha z = -2\alpha^2 \wedge 2x + \psi - z = -1, \quad x, \psi, z, \alpha \in \mathbb{R}.$

Λύση: Μέ τον κανόνα του Cramer λαμβάνουμε:

$$x = \frac{\begin{vmatrix} -4\alpha & 3 & \alpha \\ -2\alpha^2 & \alpha & \alpha \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & \alpha \\ -1 & \alpha & \alpha \\ 2 & 1 & -1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & -4\alpha & \alpha \\ -1 & -2\alpha^2 & \alpha \\ 2 & -1 & -1 \\ 1 & 3 & \alpha \\ -1 & \alpha & \alpha \\ 2 & 1 & -1 \end{vmatrix}} = \alpha, \quad \psi = \frac{\begin{vmatrix} 1 & -4\alpha & \alpha \\ -1 & -2\alpha^2 & \alpha \\ 2 & -1 & -1 \\ 1 & 3 & \alpha \\ -1 & \alpha & \alpha \\ 2 & 1 & -1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & -4\alpha & \alpha \\ -1 & -2\alpha^2 & \alpha \\ 2 & -1 & -1 \\ 1 & 3 & \alpha \\ -1 & \alpha & \alpha \\ 2 & 1 & -1 \end{vmatrix}} = -2\alpha, \quad z = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 3 & -4\alpha \\ -1 & \alpha & -2\alpha^2 \\ 2 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & \alpha \\ -1 & \alpha & \alpha \\ 2 & 1 & -1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & -4\alpha & \alpha \\ -1 & -2\alpha^2 & \alpha \\ 2 & -1 & -1 \\ 1 & 3 & \alpha \\ -1 & \alpha & \alpha \\ 2 & 1 & -1 \end{vmatrix}} = 1$$

*Έτσι έχουμε τη λύση: $(x, \psi, z) = (\alpha, -2\alpha, 1).$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

'Ομάδα α' :

164) Νά επιλυθούν με τον κανόνα του Cramer τά συστήματα:

1) $9(2x - 3) - 10(\psi + 3) = 19,$

2) $\frac{x}{4} - \frac{\psi}{3} = 1$

$6(4x - 9) - 25(\psi + 4) = -6$

$\frac{x}{6} + \frac{\psi}{2} = 5$

3) $x + \alpha^2\psi = 2$
 $x + \psi = 2\alpha$

4) $kx + (k + 2)\psi = 2$
 $x + k\psi = 1$

165) Μέ ποιές τιμές τῶν λ καί μ τό σύστημα $\begin{cases} (\lambda + 1)x + 2\mu\psi = 2 \\ (3 - \lambda)x + (3\mu - 1)\psi = -3 \end{cases}$

όπου $x, \psi, \lambda, \mu \in \mathbb{R}$, έχει άπειρες λύσεις.

166) Μέ ποιές καί τίς αυτές τιμές τῶν λ καί μ τά δύο συστήματα

$\Sigma_1: \begin{cases} \mu x + \lambda\psi = 1 \\ 2x - \psi = 3 \end{cases}$ καί $\Sigma_2: \begin{cases} -\mu x + (\lambda + 1)\psi = 2 \\ x + 2\psi = 5 \end{cases}$ είναι αδύνατα;

167) Νά εύρεθεί ή τιμή τῶν όριζουσῶν :

1) $\begin{vmatrix} 1 & 3 & 6 \\ 1 & 4 & 10 \\ 1 & 5 & 15 \end{vmatrix}$ 2) $\begin{vmatrix} 5 & 3 & 1 \\ 10 & 6 & 1 \\ 15 & 9 & 1 \end{vmatrix}$ 3) $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \alpha & \beta & \gamma \\ \alpha^2 & \beta^2 & \gamma^2 \end{vmatrix}$

168) Νά επιλυθούν με τόν κανόνα Cramer τά συστήματα :

$$1) \begin{cases} x + \psi - 2z = -15 \\ x - \psi + z = 10 \\ -2x + \psi + z = 15 \end{cases} \quad 2) \begin{cases} 3x - \psi + 3z = 1 \\ -x + 2\psi - z = -7 \\ \frac{x}{2} + \frac{\psi}{4} + \frac{z}{3} = -\frac{5}{3} \end{cases}$$

‘Ο μ ά δ α β’ :

169) Νά επιλυθούν με τόν κανόνα Cramer τά συστήματα:

$$1) \begin{cases} x + \mu\psi = 1 \\ (\mu + 1)x - \psi = 2 \end{cases} \quad 2) \begin{cases} (\alpha - \beta)x + (\alpha + \beta)\psi = 2(\alpha^2 + \beta^2) \\ (\alpha + \beta)x + (\alpha - \beta)\psi = 2(\alpha^2 + 2\alpha\beta - \beta^2) \end{cases}$$

170) Νά επιλυθεί τό σύστημα $\Sigma: \begin{cases} \alpha_1 x + \beta_1 \psi = \gamma_1 \\ \alpha_2 x + \beta_2 \psi = \gamma_2 \end{cases}$ $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2, \gamma_1, \gamma_2 \in \mathbb{R}$

- 1) αν $\gamma_1 = \gamma_2 = 0 \wedge \alpha_1 \beta_2 - \beta_1 \alpha_2 \neq 0$
- 2) αν $\alpha_1 \neq 0 \vee \beta_1 \neq 0 \wedge \alpha_2 = \beta_2 = 0 \wedge \gamma_2 \neq 0$
- 3) αν $\beta_1 = \beta_2 = 0 \wedge \alpha_1 \gamma_2 - \alpha_2 \gamma_1 \neq 0$
- 4) αν $\alpha_1 = \beta_1 = 0 \wedge \gamma_1 \neq 0 \wedge (\alpha_2 \neq 0 \vee \beta_2 \neq 0)$
- 5) αν $\alpha_1 = \alpha_2 = \beta_1 = \beta_2 = 0 \wedge (\gamma_1 \neq 0 \vee \gamma_2 \neq 0)$
- 6) αν $\alpha_2 = \beta_2 = \gamma_2 = 0$
- 7) αν $\alpha_2 = \beta_2 = \gamma_2 = 0 \wedge (\alpha_1 \neq 0 \vee \beta_1 \neq 0)$

171) Νά εύρεθεί ή τιμή τών οριζουσών:

$$1) \begin{vmatrix} \beta + \gamma & \alpha & \alpha \\ \beta & \gamma + \alpha & \beta \\ \gamma & \gamma & \alpha + \beta \end{vmatrix} \quad 2) \begin{vmatrix} \alpha - \beta & \beta - \gamma & \gamma - \alpha \\ \beta - \gamma & \gamma - \alpha & \alpha - \beta \\ \gamma - \alpha & \alpha - \beta & \beta - \gamma \end{vmatrix}$$

172) Νά άποδειχθούν οι ταυτότητες : $\forall \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$

$$1) \begin{vmatrix} 1 + \alpha^2 & \alpha\beta & \alpha\gamma \\ \alpha\beta & 1 + \beta^2 & \beta\gamma \\ \alpha\gamma & \beta\gamma & 1 + \gamma^2 \end{vmatrix} \equiv \alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 + 1 \quad 2) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2\beta & \beta - \gamma - \alpha & 2\beta \\ 2\gamma & 2\gamma & \gamma - \alpha - \beta \end{vmatrix} \equiv (\alpha + \beta + \gamma)^2$$

173) Νά επιλυθούν με τόν κανόνα Cramer τά συστήματα :

$$1) \begin{cases} x + \psi + z = 1 \\ \alpha x + \beta\psi + \gamma z = \delta \\ \alpha^2 x + \beta^2 \psi + \gamma^2 z = \delta^2 \end{cases} \quad 2) \begin{cases} \alpha x + \psi + \omega = 1 \\ x + \alpha\psi + \omega = \alpha \\ x + \psi + \alpha\omega = \alpha^2 \end{cases}$$

57. ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α΄ ΘΑΒΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ (τεχνάσματα)

‘Η επίλυση όρισμένων συστημάτων α΄ βαθμοϋ ειδικής μορφής γίνεται με ειδικές μεθόδους (τεχνάσματα) πιό σύντομα και άπλούστερα από τίς γνωστές μεθόδους επίλυσεως.

‘Αναφέρουμε παρακάτω μερικές ειδικές μεθόδους επίλυσεως συστημάτων, οι όποϊες παρουσιάζονται πιό συχνά.

α) Η μέθοδος της προσθέσεως των εξισώσεων κατά μέλη.

Με τή μέθοδο αυτή επιλύονται συστήματα με μορφή:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_{v-1} = \alpha_1 \\ x_2 + x_3 + x_4 + \dots + x_v = \alpha_2 \\ x_3 + x_4 + x_5 + \dots + x_1 = \alpha_3 \\ \dots \\ x_v + x_1 + x_2 + \dots + x_{v-2} = \alpha_v \end{cases} \quad (1) \quad \begin{matrix} \text{όπου } x_1, x_2, \dots, x_v \text{ άγνωστοι} \\ v \in \mathbb{N} \text{ και } v \geq 3 \end{matrix}$$

"Αν προσθεσουμε κατά μέλη τις εξισώσεις του συστήματος λαμβάνουμε:

$$\begin{aligned} (v-1)(x_1 + x_2 + \dots + x_v) &= \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_v \Rightarrow \\ \Rightarrow x_1 + x_2 + \dots + x_v &= \frac{\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_v}{v-1} \end{aligned} \quad (2)$$

"Επειτα συνδυάζουμε κάθε εξίσωση του συστήματος (1) με τή (2), οπότε λαμβάνουμε αντίστοιχως:

$$\begin{aligned} \alpha_1 + x_v &= \frac{\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_v}{v-1} \Leftrightarrow x_v = \frac{\alpha_2 + \alpha_3 + \dots + \alpha_v - (v-2)\alpha_1}{v-1} \\ x_1 + \alpha_2 &= \frac{\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_v}{v-1} \Leftrightarrow x_1 = \frac{\alpha_1 - (v-2)\alpha_2 + \alpha_3 + \dots + \alpha_v}{v-1} \\ \dots & \dots \\ x_{v-1} + \alpha_2 &= \frac{\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_v}{v-1} \Leftrightarrow x_{v-1} = \frac{\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_{v-1} - (v-2)\alpha_v}{v-1} \end{aligned}$$

Παράδειγμα: Νά επιλυθεί τό σύστημα:

$$x + \psi + z = 1, \quad \psi + z + \omega = 3, \quad z + \omega + x = 2, \quad \omega + x + \psi = 6$$

"Επίλυση: "Αν προσθέσουμε κατά μέλη τις εξισώσεις του συστήματος έχουμε $3(x + \psi + z + \omega) = 12 \Leftrightarrow x + \psi + z + \omega = 4$ (3)

"Αφαιρούμε κατά μέλη κάθε εξίσωση του συστήματος από τήν (3), οπότε έχουμε αντίστοιχως:

$$\omega = 3, \quad x = 1, \quad \psi = 2, \quad z = -2$$

β) Η μέθοδος της χρησιμοποίησης βοηθητικών άγνωστων.

Με τή μέθοδο αυτή επιλύονται τά παρακάτω συστήματα:

1. Νά επιλυθεί τό σύστημα:

$$\begin{aligned} &\text{όπου } x_1, x_2, \dots, x_v \text{ άγνωστοι} \\ &\alpha_v, \beta_v, \gamma_v \neq 0 \\ &v \in \mathbb{N} \text{ και } v \geq 3 \end{aligned} \quad (1) \quad \begin{cases} \alpha_1 x_1 + \beta_1(x_2 + x_3 + \dots + x_v) = \gamma_1 \\ \alpha_2 x_2 + \beta_2(x_3 + \dots + x_v + x_1) = \gamma_2 \\ \dots \\ \alpha_v x_v + \beta_v(x_1 + x_2 + \dots + x_{v-1}) = \gamma_v \end{cases}$$

"Επίλυση:

"Αν θέσουμε όπου $x_1 + x_2 + \dots + x_v = K$, τότε κάθε εξίσωση του συστήματος (1) γράφεται, αντίστοιχως:

$$\begin{aligned} \alpha_1 x_1 + \beta_1(K - x_1) &= \gamma_1 \\ \alpha_2 x_2 + \beta_2(K - x_2) &= \gamma_2 \\ \dots \\ \alpha_v x_v + \beta_v(K - x_v) &= \gamma_v \end{aligned} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} x_1 = (\gamma_1 - \beta_1 K) / (\alpha_1 - \beta_1) \\ x_2 = (\gamma_2 - \beta_2 K) / (\alpha_2 - \beta_2) \\ \dots \\ x_v = (\gamma_v - \beta_v K) / (\alpha_v - \beta_v) \end{cases} \quad \left. \begin{matrix} \text{"Όπου} \\ \alpha_1 \neq \beta_1 \\ \alpha_2 \neq \beta_2 \\ \dots \\ \alpha_v \neq \beta_v \end{matrix} \right\} \quad (2)$$

Προσθέτουμε τις (2) κατά μέλη, όποτε λαμβάνουμε :

$$x_1 + x_2 + \dots + x_n = \frac{\gamma_1 - \beta_1 K}{\alpha_1 - \beta_1} + \frac{\gamma_2 - \beta_2 K}{\alpha_2 - \beta_2} + \dots + \frac{\gamma_n - \beta_n K}{\alpha_n - \beta_n} = K \quad (3)$$

Η εξίσωση (3) είναι πρωτοβάθμια ως προς K, όποτε η λύση της είναι:

$$K = \left(\frac{\gamma_1}{\alpha_1 - \beta_1} + \frac{\gamma_2}{\alpha_2 - \beta_2} + \dots + \frac{\gamma_n}{\alpha_n - \beta_n} \right) / \left(1 + \frac{\beta_1}{\alpha_1 - \beta_1} + \dots + \frac{\beta_n}{\alpha_n - \beta_n} \right)$$

Έστω $K = C$. Τήν τιμή $K = C$ θέτουμε στις εξισώσεις (2) και έχουμε τις τιμές τών x_1, x_2, \dots, x_n .

Παράδειγμα : Νά επιλυθεί τό σύστημα:

$$3x + 2(\psi + z) = 8, \quad 4\psi + 3(z + x) = 6, \quad z - 4(x + \psi) = 8$$

Επίλυση : Θέτουμε όπου $x + \psi + z = K$, όποτε οι εξισώσεις του συστήματος γράφονται: $3x + 2(K - x) = 8, \quad 4\psi + 3(K - \psi) = 6, \quad z - 4(K - z) = 8, \Leftrightarrow$
 $x = 8 - 2K, \quad \psi = 6 - 3K, \quad z = (8 + 4K) / 5$. Προσθέτουμε κατά μέλη, όποτε
 $x + \psi + z = \frac{78 - 21K}{5}$ και άρα $K = \frac{78 - 21K}{5}, \quad K = 3$.

Τέλος μέ αντικατάσταση της τιμής $K = 3$ έχουμε:

$$x = 8 - 2 \cdot 3 = 2, \quad \psi = 6 - 3 \cdot 3 = -3, \quad z = (8 + 4 \cdot 3) : 5 = 4$$

2. Νά επιλυθεί τό σύστημα :

$$\begin{array}{l} x_1, x_2, \dots, x_n \text{ άγνωστοι} \\ \alpha_v, \gamma_v, \delta_v, \varepsilon \neq 0 \\ v \in \mathbb{N} \text{ και } v \geq 2 \end{array} \quad \left| \quad \begin{array}{l} \frac{\alpha_1 x_1 + \beta_1}{\gamma_1} = \frac{\alpha_2 x_2 + \beta_2}{\gamma_2} = \dots = \frac{\alpha_n x_n + \beta_n}{\gamma_n} \\ \delta_1 x_1 + \delta_2 x_2 + \dots + \delta_n x_n = \varepsilon \end{array} \right. \quad (1)$$

Επίλυση :

1ος τρόπος. Μέ τή βοήθεια του θεωρήματος τών ίσων λόγων έχουμε:

$$\frac{\alpha_1 x_1 + \beta_1}{\gamma_1} = \frac{\alpha_2 x_2 + \beta_2}{\gamma_2} = \dots = \frac{\alpha_n x_n + \beta_n}{\gamma_n} = \frac{x_1 + \frac{\beta_1}{\alpha_1}}{\frac{\gamma_1}{\alpha_1}} = \frac{x_2 + \frac{\beta_2}{\alpha_2}}{\frac{\gamma_2}{\alpha_2}} = \dots = \frac{x_n + \frac{\beta_n}{\alpha_n}}{\frac{\gamma_n}{\alpha_n}} =$$

$$= \frac{\delta_1 x_1 + \frac{\delta_1 \beta_1}{\alpha_1}}{\frac{\delta_1 \gamma_1}{\alpha_1}} = \frac{\delta_2 x_2 + \frac{\delta_2 \beta_2}{\alpha_2}}{\frac{\delta_2 \gamma_2}{\alpha_2}} = \dots = \frac{\delta_n x_n + \frac{\delta_n \beta_n}{\alpha_n}}{\frac{\delta_n \gamma_n}{\alpha_n}} =$$

$$\frac{\delta_1 x_1 + \delta_2 x_2 + \dots + \delta_n x_n + \frac{\delta_1 \beta_1}{\alpha_1} + \frac{\delta_2 \beta_2}{\alpha_2} + \dots + \frac{\delta_n \beta_n}{\alpha_n}}{\frac{\delta_1 \gamma_1}{\alpha_1} + \frac{\delta_2 \gamma_2}{\alpha_2} + \dots + \frac{\delta_n \gamma_n}{\alpha_n}} = \frac{\varepsilon + \frac{\delta_1 \beta_1}{\alpha_1} + \frac{\delta_2 \beta_2}{\alpha_2} + \dots + \frac{\delta_n \beta_n}{\alpha_n}}{\frac{\delta_1 \gamma_1}{\alpha_1} + \frac{\delta_2 \gamma_2}{\alpha_2} + \dots + \frac{\delta_n \gamma_n}{\alpha_n}} = K,$$

όπου $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \neq 0$ και $\frac{\delta_1 \gamma_1}{\alpha_1} + \frac{\delta_2 \gamma_2}{\alpha_2} + \dots + \frac{\delta_n \gamma_n}{\alpha_n} \neq 0$. Άρα $\frac{\alpha_1 x_1 + \beta_1}{\gamma_1} = K,$

$\frac{\alpha_2 x_2 + \beta_2}{\gamma_2} = K, \dots, \frac{\alpha_n x_n + \beta_n}{\gamma_n} = K$, όποτε έχουμε τις τιμές τών x_1, x_2, \dots, x_n .

2ος τρόπος. *Αν κάθε λόγος έχει τιμή K , τότε θά έχουμε :

$$\frac{\alpha_1 x_1 + \beta_1}{\gamma_1} = K, \frac{\alpha_2 x_2 + \beta_2}{\gamma_2} = K, \dots, \frac{\alpha_v x_v + \beta_v}{\gamma_v} = K \Leftrightarrow x_1 = \frac{K\gamma_1 - \beta_1}{\alpha_1}, x_2 = \frac{K\gamma_2 - \beta_2}{\alpha_2}, \dots,$$

$$x_v = \frac{K\gamma_v - \beta_v}{\alpha_v} \quad (2). \text{ Τίς τιμές (2) αντικαθιστούμε στη δεύτερη εξίσωση του συστή-$$

$$\text{ματος, \u03f4\u03c0\u03c4\u03b5 \u03b4}_1 \frac{K\gamma_1 - \beta_1}{\alpha_1} + \delta_2 \frac{K\gamma_2 - \beta_2}{\alpha_2} + \dots + \delta_v \frac{K\gamma_v - \beta_v}{\alpha_v} = \varepsilon.$$

Α\u03c5\u03c4\u03b7 \u03b5\u03b9\u03bd\u03b1 \u03c0\u03c1\u03c9\u03c4\u03b1\u03b2\u03b1\u03b8\u03bc\u03b9\u03b1 \u03c9\u03c3 \u03c0\u03c1\u03cc\u03c3 K \u03ba\u03b1\u03b9 \u03b7 \u03bb\u03c5\u03c4\u03b7 \u03c4\u03b7\u03c3 \u03b5\u03b9\u03bd\u03b1 :

$$K = \left(\varepsilon + \frac{\beta_1 \delta_1}{\alpha_1} + \frac{\beta_2 \delta_2}{\alpha_2} + \dots + \frac{\beta_v \delta_v}{\alpha_v} \right) / \left(\frac{\delta_1 \gamma_1}{\alpha_1} + \frac{\delta_2 \gamma_2}{\alpha_2} + \dots + \frac{\delta_v \gamma_v}{\alpha_v} \right) = C.$$

Τ\u03b7\u03bd \u03c4\u03b9\u03bc\u03b7 $K = C$ \u03b8\u03b5\u03c4\u03bf\u03c5\u03bc\u03b5 \u03c3\u03c4\u03b9\u03c3 \u03b5\u03be\u03b9\u03c3\u03c9\u03c3\u03b5\u03b9\u03c3 (2), \u03f4\u03c0\u03c4\u03b5 \u03b5\u03be\u03c7\u03bf\u03bc\u03b5 \u03c4\u03b9\u03c3 \u03c4\u03b9\u03bc\u03ad\u03c3 \u03c4\u03c9\u03bd \u03b1\u03b3\u03bd\u03c9\u03c3\u03c4\u03c9\u03bd x_1, x_2, \dots, x_v .

Π\u03c1\u03ac\u03b4\u03b5\u03b9\u03b3\u03bc\u03b1. \u039d\u03ac \u03b5\u03c0\u03b9\u03bb\u03c5\u03b8\u03b5\u03b9 \u03c4\u03c4 \u03c3\u03c5\u03c3\u03c4\u03b7\u03bc\u03b1 :

$$\left| \begin{array}{l} \frac{x}{3} = \frac{\psi+1}{9} = \frac{\omega-2}{5} \\ x - \psi + 3\omega = -2 \end{array} \right.$$

*\u0395\u03c0\u03b9\u03bb\u03c5\u03c3\u03b7 : *Α\u03c3 \u03b9\u03c0\u03b8\u03b5\u03c3\u03bf\u03bc\u03b5 \u03f4\u03c4 \mathbf{K} \u03b7 \u03c4\u03b9\u03bc\u03b7 \u03c4\u03c9\u03bd \u03b9\u03c3\u03c9\u03bd \u03bb\u03cc\u03b3\u03c9\u03bd. \u039c\u03cc\u03c4\u03b5 \u03b8\u03ac \u03b5\u03be\u03c7\u03bf\u03bc\u03b5 $x=3K, \psi=9K-1, \omega=5K+2$. \u039c\u03c4\u03c3 \u03c4\u03b9\u03bc\u03ad\u03c3 \u03b1\u03c5\u03c4\u03b5\u03c3 \u03b8\u03b5\u03c4\u03bf\u03c5\u03bc\u03b5 \u03c3\u03c4\u03b7\u03bd \u03b5\u03be\u03b9\u03c3. $x-\psi+3\omega=-2$, \u03f4\u03c0\u03c4\u03b5\u03c4\u03b5: $3K-(9K-1)+3(5K+2)=-2 \Leftrightarrow K=-1$. \u039c\u03b5\u03bb\u03cc\u03c3, \u03bc\u03b5 \u03b1\u03bd\u03c4\u03b9\u03ba\u03c4\u03b1\u03c3\u03c4\u03b1\u03c3\u03b7 \u03c4\u03b7\u03c3 \u03c4\u03b9\u03bc\u03b7\u03c3 $K=-1$ \u03b5\u03be\u03c7\u03bf\u03bc\u03b5 $x=-3, \psi=-10, \omega=-3$.

3. \u039d\u03ac \u03b5\u03c0\u03b9\u03bb\u03c5\u03b8\u03b5\u03b9 \u03c4\u03c4 \u03c3\u03c5\u03c3\u03c4\u03b7\u03bc\u03b1 :

$$x_1, x_2, \dots, x_v \text{ \u03b1\u03b3\u03bd\u03c9\u03c3\u03c4\u03c9\u03b9 \neq 0} \quad (1)$$

$$v \in \mathbb{N} \text{ \u03ba\u03b1\u03b9 } v \geq 3$$

$$\left| \begin{array}{l} \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \dots + \frac{1}{x_{v-1}} = \alpha_1 \\ \frac{1}{x_2} + \frac{1}{x_3} + \dots + \frac{1}{x_v} = \alpha_2 \\ \dots \dots \dots \\ \frac{1}{x_v} + \frac{1}{x_1} + \dots + \frac{1}{x_{v-2}} = \alpha_v \end{array} \right.$$

*\u0395\u03c0\u03b9\u03bb\u03c5\u03c3\u03b7 : *Α\u03bd \u03b8\u03b5\u03c4\u03bf\u03c5\u03bc\u03b5 \u03f4\u03c4\u03c9\u03bd $\frac{1}{x_1} = x'_1, \frac{1}{x_2} = x'_2, \frac{1}{x_3} = x'_3, \dots, \frac{1}{x_v} = x'_v$ \u03c3\u03c4\u03c4 \u03c3\u03c5\u03c3\u03c4\u03b7\u03bc\u03b1 \u03b5\u03be\u03c7\u03bf\u03bc\u03b5:

$$\left. \begin{array}{l} x'_1 + x'_2 + \dots + x'_{v-1} = \alpha_1 \\ x'_2 + x'_3 + \dots + x'_v = \alpha_2 \\ \dots \dots \dots \\ x'_v + x'_1 + \dots + x'_{v-2} = \alpha_v \end{array} \right\} (2) \text{ \u039c\u03c4 \u03c3\u03c5\u03c3\u03c4\u03b7\u03bc\u03b1 (2) \u03b5\u03c0\u03b9\u03bb\u03c5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03bc\u03b5 \u03c4\u03b7 \u03bc\u03b5\u03b8\u03cc\u03b4\u03bf}$$

\u03c4\u03b7\u03c3 \u03c0\u03c1\u03c9\u03c3\u03b8\u03b5\u03c3\u03b5\u03c9\u03c3 \u03c4\u03c9\u03bd \u03b5\u03be\u03b9\u03c3\u03c9\u03c3\u03b5\u03c9\u03bd \u03ba\u03c4\u03b1 \u03bc\u03b5\u03bb\u03b7, \u03f4\u03c0\u03c4\u03b5 \u03bc\u03b5 \u03b1\u03bd\u03c4\u03b9\u03c3\u03c4\u03c1\u03c9\u03c6\u03b7 \u03c4\u03c9\u03bd \u03c4\u03b9\u03bc\u03c9\u03bd x'_1, x'_2, \dots, x'_v \u03b5\u03be\u03c7\u03bf\u03bc\u03b5 \u03c4\u03b9\u03c3 \u03c4\u03b9\u03bc\u03ad\u03c3 x_1, x_2, \dots, x_v

\u039c\u03c1\u03b1\u03b4\u03b5\u03b9\u03b3\u03bc\u03b1 : 1) \u039d\u03ac \u03b5\u03c0\u03b9\u03bb\u03c5\u03b8\u03b5\u03b9 \u03c4\u03c4 \u03c3\u03c5\u03c3\u03c4\u03b7\u03bc\u03b1 :

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{\psi} = \frac{5}{6}, \frac{1}{\psi} + \frac{1}{\omega} = \frac{7}{12}, \frac{1}{\omega} + \frac{1}{x} = \frac{3}{4}$$

Έπίλυση: Πρέπει να είναι $x\psi\omega \neq 0$.

Θέτουμε $\frac{1}{x} = x'$, $\frac{1}{\psi} = \psi'$, $\frac{1}{\omega} = \omega'$, οπότε λαμβάνουμε:

$$\left. \begin{array}{l} x' + \psi' = \frac{5}{6} \\ \psi' + \omega' = \frac{7}{12} \\ \omega' + x' = \frac{3}{4} \end{array} \right\} (1) \quad \begin{array}{l} \text{Μέ πρόσθεση κατά μέλη τῶν (1) ἔχουμε:} \\ 2(x' + \psi' + \omega') = \frac{13}{6}, \Leftrightarrow x' + \psi' + \omega' = \frac{13}{12} \end{array} \quad (2)$$

Ἀφαιροῦμε ἀπὸ τὴν ἐξίσωση (2) καθεμιὰ ἀπὸ τὶς ἐξισώσεις (1) κατὰ μέλη, ὁπότε ἔχουμε ἀντιστοιχῶς: $\omega' = \frac{1}{4}$, $x' = \frac{1}{2}$, $\psi' = \frac{1}{3}$ καὶ ἄρα
 $x = 2$, $\psi = 3$, $\omega = 4$.

2) Νὰ ἐπιλυθεῖ τὸ σύστημα: $\frac{x\psi}{ax+\beta\psi} = \gamma$, $\frac{\psi\omega}{\gamma\psi+\alpha\omega} = \beta$, $\frac{\omega x}{\beta\omega+\gamma x} = \alpha$.

Έπίλυση: Ὑποθέτουμε $\alpha\beta\gamma \neq 0$ καὶ $x\psi\omega \neq 0$, ὁπότε τὸ σύστημα γράφεται:

$$\left. \begin{array}{l} \frac{ax+\beta\psi}{x\psi} = \frac{1}{\gamma} \\ \frac{\gamma\psi+\alpha\omega}{\psi\omega} = \frac{1}{\beta} \\ \frac{\beta\omega+\gamma x}{\omega x} = \frac{1}{\alpha} \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left. \begin{array}{l} \frac{\alpha}{\psi} + \frac{\beta}{x} = \frac{1}{\gamma} \\ \frac{\gamma}{\omega} + \frac{\alpha}{\psi} = \frac{1}{\beta} \\ \frac{\beta}{x} + \frac{\gamma}{\omega} = \frac{1}{\alpha} \end{array} \right\} \quad \begin{array}{l} \text{Θέτουμε ὅπου } \frac{1}{x} = x', \frac{1}{\psi} = \psi', \frac{1}{\omega} = \omega' \\ \text{ὁπότε λαμβάνουμε:} \\ \alpha\psi' + \beta x' = 1/\gamma \\ \gamma\omega' + \alpha\psi' = 1/\beta \\ \beta x' + \gamma\omega' = 1/\alpha \end{array} \quad (1)$$

Μέ πρόσθεση τῶν (1) κατὰ μέλη λαμβάνουμε:

$$2(\alpha\psi' + \beta x' + \gamma\omega') = \frac{\alpha\beta + \beta\gamma + \alpha\gamma}{\alpha\beta\gamma} \Leftrightarrow \alpha\psi' + \beta x' + \gamma\omega' = \frac{\alpha\beta + \beta\gamma + \alpha\gamma}{2\alpha\beta\gamma}$$

Ἀφαιροῦμε ἀπὸ αὐτὴ καθεμιὰ ἀπὸ τὶς ἐξισώσεις (1) κατὰ μέλη καὶ ἔχουμε:

$$\gamma\omega' = \frac{\alpha\gamma + \beta\gamma - \alpha\beta}{2\alpha\beta\gamma}, \quad \beta x' = \frac{\alpha\beta + \beta\gamma - \alpha\gamma}{2\alpha\beta\gamma}, \quad \alpha\psi' = \frac{\alpha\gamma + \alpha\beta - \beta\gamma}{2\alpha\beta\gamma} \Leftrightarrow$$

$$\omega' = (\alpha\gamma + \beta\gamma - \alpha\beta) : 2\alpha\beta\gamma^2, \quad x' = (\alpha\beta + \beta\gamma - \alpha\gamma) : 2\alpha\beta^2\gamma, \quad \psi' = (\alpha\gamma + \alpha\beta - \beta\gamma) : 2\alpha^2\beta\gamma \quad \text{καὶ ἄρα } \omega = \frac{2\alpha\beta\gamma^2}{\alpha\gamma + \beta\gamma - \alpha\beta}, \quad x = \frac{2\alpha\beta^2\gamma}{\alpha\beta + \beta\gamma - \alpha\gamma}, \quad \psi = \frac{2\alpha^2\beta\gamma}{\alpha\gamma + \alpha\beta - \beta\gamma}$$

Σημείωση. Τὸ θέμα τῆς ἐπιλύσεως συστημάτων μέ ειδικές μεθόδους δέν ἐξαντλεῖται ἐδῶ. Ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ εἶδος τοῦ συστήματος καὶ ἀπὸ τὴ δεξιότεχνία καὶ εὐχέρεια τοῦ μελετητῆ.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Όμάδα α'

174) Νά επιλυθούν τὰ ακόλουθα συστήματα:

$$\begin{array}{l}
 1) \left\{ \begin{array}{l} x + \psi = -1 \\ \psi + \omega = -19 \\ \omega + x = 2 \end{array} \right. \quad 2) \left\{ \begin{array}{l} x + \psi + \omega = 4 \\ \psi + \omega + z = -2 \\ \omega + z + x = 1 \\ z + x + \psi = -3 \end{array} \right. \quad 3) \left\{ \begin{array}{l} 3x + \psi + \omega = 2 \\ x + 3\psi + \omega = 6 \\ x + \psi + 3\omega = -8 \end{array} \right. \\
 4) \left\{ \begin{array}{l} \alpha x + \psi + \omega = 1 \\ x + \alpha\psi + \omega = \alpha \\ x + \psi + \alpha\omega = \alpha^2 \end{array} \right. \quad 5) \left\{ \begin{array}{l} x + \psi - \omega = \alpha \\ \psi + \omega - x = \beta \\ \omega + x - \psi = \gamma \end{array} \right. \quad 6) \left\{ \begin{array}{l} \mu x + \nu\psi + z = 1 \\ x + \mu\nu\psi + z = 1 \\ x + \nu\psi + \mu z = 1 \end{array} \right.
 \end{array}$$

175) Νά επιλυθούν τὰ ακόλουθα συστήματα:

$$\begin{array}{l}
 1) \left\{ \begin{array}{l} x + 3(\psi + \omega + z) = 15 \\ 6\psi + 5(x + \omega + z) = 36 \\ 3\omega + (x + \psi + z) = 11 \\ 5z + 2(x + \psi + \omega) = 17 \end{array} \right. \quad 2) \left\{ \begin{array}{l} \alpha x + \beta(\psi + z + \omega) = \gamma \\ \alpha\psi + \beta_1(x + z + \omega) = \gamma_1 \\ \alpha z + \beta_2(x + \psi + \omega) = \gamma_2 \\ \alpha\omega + \beta_3(x + \psi + z) = \gamma_3 \end{array} \right. \\
 3) \left\{ \begin{array}{l} \frac{x}{5} = \frac{\psi}{6} = \frac{\omega}{15} \\ 2x + \psi - \omega = 2 \end{array} \right. \quad 4) \left\{ \begin{array}{l} \frac{x + \alpha}{\mu} = \frac{\psi + \beta}{\nu} = \frac{\omega + \gamma}{\lambda} \\ x + \psi + \omega = \kappa \end{array} \right. \quad 5) \left\{ \begin{array}{l} \alpha x = \beta\psi = \gamma\omega \\ \frac{1}{x} + \frac{1}{\psi} + \frac{1}{\omega} = \frac{1}{\delta} \end{array} \right. \\
 6) \left\{ \begin{array}{l} \frac{1}{x} + \frac{1}{\psi} + \frac{1}{\omega} = 1 \\ \frac{1}{\psi} + \frac{1}{\omega} + \frac{1}{z} = \frac{1}{3} \\ \frac{1}{\omega} + \frac{1}{z} + \frac{1}{x} = \frac{5}{6} \\ \frac{1}{z} + \frac{1}{x} + \frac{1}{\psi} = \frac{11}{6} \end{array} \right. \quad 7) \left\{ \begin{array}{l} \frac{x\psi\omega}{x\psi + x\omega - \psi\omega} = \alpha \\ \frac{x\psi\omega}{\psi\omega + \psi x - \omega x} = \beta \\ \frac{x\psi\omega}{\omega x + \omega\psi - x\psi} = \gamma \end{array} \right. \quad 8) \left\{ \begin{array}{l} x\psi\omega = \alpha(\psi\omega - \omega x - x\psi) \\ x\psi\omega = \beta(\omega x - \psi\omega - x\psi) \\ x\psi\omega = \gamma(x\psi - \psi\omega - \omega x) \end{array} \right.
 \end{array}$$

Όμάδα β'

176) Νά επιλυθούν τὰ ακόλουθα συστήματα:

$$\begin{array}{l}
 1) \left\{ \begin{array}{l} x + \psi = 3 \\ \psi + \omega = 5 \\ \omega + \phi = 7 \\ \phi + z = 9 \\ z + x = 6 \end{array} \right. \quad 2) \left\{ \begin{array}{l} vx + \psi + z + \omega = v^3 \\ x + \nu\psi + z + \omega = v^2 \\ x + \psi + \nu z + \omega = v \\ x + \psi + z + \nu\omega = 1 \end{array} \right. \quad 3) \left\{ \begin{array}{l} 2(x + z) + \omega = -5 \\ x + 2(\psi + \omega) = 6 \\ 2(\psi + \omega) + z = 0 \\ 2(z + x) + \psi = -1 \end{array} \right.
 \end{array}$$

58. ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΕΣ

Ἔστω τὸ σύστημα τριῶν ἐξισώσεων μὲ δύο ἀγνώστους.

$$\Sigma: \left\{ \begin{array}{l} x - 2\psi = -4 \\ 3x + \psi = 9 \\ x + 5\psi = 17 \end{array} \right. \quad x, \psi \in \mathbb{R}$$

“Αν επιλύσουμε τό σύστημα τῶν δύο πρώτων ἐξισώσεων, βρίσκουμε ὅτι

$$(x, y) = (2, 3)$$

Παρατηροῦμε ὅτι ἡ λύση $(x, \psi) = (2, 3)$ εἶναι λύση καί τῆς τρίτης ἐξισ. $x + 5\psi = 17$. Δηλαδή οἱ ἐξισώσεις τοῦ συστήματος Σ ἔχουν κοινή λύση.

Τίς ἐξισώσεις αὐτές τίς λέμε **συμβιβαστές** καί τό σύστημα **συμβιβαστό**.

Γενικά, ὅταν τό πλήθος μ τῶν ἐξισώσεων εἶναι μεγαλύτερο ἀπό τό πλήθος ν τῶν ἀγνώστων, τότε ἐκλέγουμε ν ἐξισώσεις, τίς ἀπλούστερες, καί ἐπιλύουμε τό σύστημα αὐτῶν τῶν ν ἐξισώσεων, ἂν βέβαια ἔχει λύση. “Αν ἡ λύση του εἶναι λύση καί τῶν ὑπόλοιπων ἐξισώσεων, τότε οἱ μ ἐξισώσεις εἶναι **συμβιβαστές** καί τό σύστημά τους **συμβιβαστό**, ἂν ὄχι, τότε οἱ ἐξισώσεις εἶναι **ἀσυμβιβαστές** καί τό σύστημα **ἀδύνατο**.

Παραδείγματα : 1) Νά βρεθεῖ σχέση μεταξύ τῶν $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2 \in \mathbb{R}$ τῶν ἐξισώσεων $\alpha_1 x + \beta_1 = 0$ καί $\alpha_2 x + \beta_2 = 0$, ὅπου $\alpha_1, \alpha_2 \neq 0$, ὥστε οἱ ἐξισώσεις αὐτές νά εἶναι συμβιβαστές

Λύση : Ἔχουμε τίς λύσεις: $\{x/x \in \mathbb{R} \wedge \alpha_1 x + \beta_1 = 0\} = \left\{-\frac{\beta_1}{\alpha_1}\right\}$
 $\{x/x \in \mathbb{R} \wedge \alpha_2 x + \beta_2 = 0\} = \left\{-\frac{\beta_2}{\alpha_2}\right\}$

Πρέπει νά εἶναι:

$$-\frac{\beta_1}{\alpha_1} = -\frac{\beta_2}{\alpha_2} \Leftrightarrow \frac{\alpha_1}{\alpha_2} = \frac{\beta_1}{\beta_2} \Leftrightarrow \begin{vmatrix} \alpha_1 & \beta_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 \end{vmatrix} = 0,$$

Αὐτή εἶναι ἡ σχέση πού ζητοῦμε. Τό ἀντίστροφο εἶναι φανερό.

2) Νά βρεθεῖ σχέση μεταξύ τῶν συντελεστῶν $\alpha_{1,2,3}, \beta_{1,2,3}, \gamma_{1,2,3} \in \mathbb{R}$ τῶν ἐξισώσεων $\alpha_1 x + \beta_1 \psi = \gamma_1$ (1), $\alpha_2 x + \beta_2 \psi = \gamma_2$ (2), $\alpha_3 x + \beta_3 \psi = \gamma_3$ (3), ὅπου $|\alpha_1| + |\beta_1| > 0$, $|\alpha_2| + |\beta_2| > 0$, $|\alpha_3| + |\beta_3| > 0$, ὥστε οἱ ἐξισώσεις αὐτές νά εἶναι συμβιβαστές.

Λύση : Ἡ κοινή λύση τῶν (1) καί (2) εἶναι $x = \frac{\gamma_1 \beta_2 - \gamma_2 \beta_1}{\alpha_1 \beta_2 - \alpha_2 \beta_1} = \frac{\Delta_x}{\Delta}$

$\psi = \frac{\alpha_1 \gamma_2 - \alpha_2 \gamma_1}{\alpha_1 \beta_2 - \alpha_2 \beta_1} = \frac{\Delta_\psi}{\Delta}$, ὅπου $\alpha_1 \beta_2 - \alpha_2 \beta_1 \neq 0$. Αὐτή ἡ λύση πρέπει νά εἶναι λύση καί τῆς (3).

Δηλαδή: $\alpha_3 \cdot \frac{\Delta_x}{\Delta} + \beta_3 \cdot \frac{\Delta_\psi}{\Delta} = \gamma_3 \Leftrightarrow \alpha_3 \Delta_x + \beta_3 \Delta_\psi = \gamma_3 \Delta \Leftrightarrow \begin{vmatrix} \alpha_1 & \beta_1 & \gamma_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 & \gamma_2 \\ \alpha_3 & \beta_3 & \gamma_3 \end{vmatrix} = 0.$

Αὐτή εἶναι ἡ σχέση πού ζητοῦμε.

✱ 59. ΑΠΑΛΕΙΦΟΥΣΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Στά παραπάνω δύο παραδείγματα συμβιβαστῶν ἐξισώσεων οἱ σχέσεις πού βρήκαμε εἶναι τό ἐξαγόμενο τῆς ἀπαλοιφῆς τῶν ἀγνώστων μεταξύ τῶν ἐξισώσεων αὐτῶν. Οἱ σχέσεις αὐτές λέγονται **ἀπαλειφούσες**.

Ἡ ἀπαλείφουσα ἑνὸς συστήματος εἶναι ἡ ἰκανὴ καὶ ἀναγκαία συνθήκη, γιὰ νὰ εἶναι τὸ σύστημα συμβιβαστό.

Παραδείγματα: 1) Νὰ βρεθεῖ ἡ ἀπαλείφουσα τοῦ συστήματος $x + \psi = 3$, $2x - 3\psi = -14$, $\lambda x + \mu\psi = \nu$, $\lambda, \mu, \nu, x, \psi \in \mathbf{R}$.

Λύση: Κατὰ τὸ παράδειγμα (2) τῆς προηγούμενης παραγράφου ἔχουμε:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 2 & -3 & -14 \\ \lambda & \mu & \nu \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow \lambda + \nu = 4\mu$$

Ἡ σχέση $\lambda + \nu = 4\mu$ εἶναι ἡ ἀπαλείφουσα τοῦ συστήματος.

2) Μὲ ποιά τιμὴ τοῦ $\lambda \in \mathbf{R}$ τὸ σύστημα εἶναι συμβιβαστό $2\lambda x + \psi = \lambda$, $x + \psi = 3$, $\chi - 2\psi = 2$ στὸ \mathbf{R} .

Λύση: Γιὰ νὰ εἶναι συμβιβαστό τὸ σύστημα πρέπει ἡ ὀρίζουσά της νὰ εἶναι 0.

$$\text{Δηλαδή: } \begin{vmatrix} 2\lambda & 1 & \lambda \\ 1 & 1 & 3 \\ 1 & -2 & 2 \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow 2\lambda(2+6) - (2+2\lambda) + (3-\lambda) = 0 \Leftrightarrow \lambda = -\frac{1}{13}$$

Ἔτσι, γιὰ $\lambda = -\frac{1}{13}$ τὸ σύστημα εἶναι συμβιβαστό.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

‘Ο μ ἄ δ α α’

177) Νὰ ἐξεταστεῖ ἂν οἱ ἐξισώσεις στὰ ἀκόλουθα συστήματα εἶναι συμβιβαστές ἢ ὄχι.

$$1) x - 5\psi = 0 \quad 2) 2x - \frac{\psi}{\beta} = 2\alpha - 1$$

$$x = \psi + 4 \quad 2\alpha x + \beta\psi = \beta^2 + 2\alpha^2$$

$$3x - 7\psi = 8 \quad \frac{x}{\alpha} + \frac{2\psi}{\beta} = 3$$

178) Ποιά σχέση συνδέει τὰ α, β γιὰ νὰ εἶναι τὰ ἀκόλουθα συστήματα συμβιβαστά;

$$1) \alpha x = \beta - 1, \quad \beta x = 2\alpha + 1,$$

$$2) \beta x + \alpha\psi = 13, \quad \psi + 2x = 2, \quad 2\beta x + 3\beta\psi = 1$$

179) Ἄν οἱ τρεῖς ἐξισώσεις: $\alpha x + \beta\psi = 1$, $\alpha\psi + \beta x = \alpha\beta$, $x + \psi = \alpha + \beta$ εἶναι συμβιβαστές νὰ ἀποδειχθεῖ ὅτι $(\alpha + \beta)^2 = \alpha\beta + 1$.

‘Ο μ ἄ δ α β’

180) Νὰ προσδιοριστεῖ ἡ τιμὴ τοῦ $\mu \in \mathbf{R}$, γιὰ νὰ εἶναι τὸ σύστημα τῶν ἐξισώσεων $(\mu - 7)x = 5$ καὶ $(3\mu - 1)x = -1$ συμβιβαστό. Ἐπεὶτα νὰ λυθεῖ τὸ σύστημα.

$$181) \text{ Νὰ βρεθεῖ ἡ ἀπαλείφουσα τοῦ συστήματος } \begin{vmatrix} (\alpha^2 - \beta^2)x + \alpha^3 + \beta^3 = 0 \\ x + \alpha + \beta = 0 \end{vmatrix}$$

182) Νά βρεθεί ή άπαλείφουσα τών συστημάτων:

$$\begin{aligned} 1) \quad x + \lambda\psi &= -\lambda^3 \\ x + \mu\psi &= -\mu^3 \\ x + \nu\psi &= -\nu^3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2) \quad ax + \gamma\psi + \beta &= 0 \\ \gamma x + \beta\psi + \alpha &= 0 \\ \beta x + \alpha\psi + \gamma &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3) \quad ax + \beta\psi &= \gamma \\ \alpha^2 x + \beta^2 \psi &= \gamma^2 \\ \alpha^3 x + \beta^3 \psi &= \gamma^3 \end{aligned}$$

60. ΟΜΟΓΕΝΗ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Όρισμός: Μία γραμμική εξίσωση καλείται *όμογενής*, αν ο γνωστός όρος αυτής είναι μηδενικός π. χ. Οι εξισώσεις $ax + \beta\psi = 0$, $ax + \beta\psi + \gamma\omega = 0$, $\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \alpha_3 x_3 + \dots + \alpha_n x_n = 0$, όπου x_i μεταβλητές, είναι γραμμικές όμογενείς.

Συνεπώς ένα σύστημα γραμμικών όμογενών εξισώσεων είναι *όμογενές γραμμικό σύστημα*.

$$\begin{array}{l} \text{Τά συστήματα:} \\ \alpha_1 x + \beta_1 \psi = 0 \\ \alpha_2 x + \beta_2 \psi = 0 \end{array} \quad \left| \begin{array}{l} \alpha_1 x + \beta_1 \psi + \gamma_1 \omega = 0 \\ \alpha_2 x + \beta_2 \psi + \gamma_2 \omega = 0 \\ \alpha_3 x + \beta_3 \psi + \gamma_3 \omega = 0 \end{array} \right. \quad \left| \begin{array}{l} \alpha_1 x + \beta_1 \psi + \gamma_1 z = 0 \\ \alpha_2 x + \beta_2 \psi + \gamma_2 z = 0 \end{array} \right.$$

είναι γραμμικά όμογενή συστήματα.

Σημείωση. Ένας τό λιγότερο από τούς συντελεστές πρέπει νά είναι μή μηδενικός. Φανερή λύση ενός όμογενοῦς συστήματος είναι ή μηδενική (όλοι οι άγνωστοι 0). Άρα τό σύστημα έχει πάντοτε μία λύση. Γεννάται τό έρώτημα, αν έκτός από τή μηδενική λύση έχει καί άλλες λύσεις.

Θέτουμε λοιπόν ως σκοπό τήν αναζήτηση τών μή μηδενικών λύσεων τών όμογενών γραμμικών συστημάτων.

61. ΙΚΑΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΟΜΟΓΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΕΙΡΕΣ ΣΕ ΠΛΗΘΟΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΗ ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ

$$\text{I. Έστω τό σύστημα } \Sigma_1 : \left| \begin{array}{l} \alpha_1 x + \beta_1 \psi = 0 \\ \alpha_2 x + \beta_2 \psi = 0, \end{array} \right| \alpha_{1,2}, \beta_{1,2}, x, \psi \in \mathbb{R}$$

Είδαμε ότι, αν $\left| \begin{array}{l} \alpha_1 \beta_1 \\ \alpha_2 \beta_2 \end{array} \right| \neq 0$, τότε τό σύστημα έχει μία καί μόνο λύση καί έδω

τή μηδενική (0, 0). Αν $\left| \begin{array}{l} \alpha_1 \beta_1 \\ \alpha_2 \beta_2 \end{array} \right| = 0$, τότε τό σύστημα είναι άόριστο, δηλαδή

έχει άπειρες σέ πλήθος λύσεις, γιατί αποκλείεται νά είναι άδύνατο, έφόσον έχει μία λύση, τήν (0, 0). Τίς άπειρες σέ πλήθος λύσεις βρίσκουμε από μία εξίσωση του Σ_1 , όταν ό ένας άγνωστος έκλεγεί αυθαίρετα.

Άντιστροφή. Αν τό Σ_1 έχει έκτός από τή λύση (0, 0) καί τήν (x_1, ψ_1) ,

τότε ή όρίζουσα τών συντελεστών δέν μπορεί νά είναι $\neq 0$. Άρα θά είναι $\left| \begin{array}{l} \alpha_1 \beta_1 \\ \alpha_2 \beta_2 \end{array} \right| = 0$

Ωστε η αναγκαία και ικανή συνθήκη, για να έχει το σύστημα Σ_1 εκτός από τη λύση $(0, 0)$ και άλλες άπειρες σε πλήθος λύσεις, είναι η ορίζουσα των συντελεστών των άγνωστων να είναι 0.

$$\Delta\eta\lambda\alpha\delta\eta \begin{vmatrix} \alpha_1 & \beta_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 \end{vmatrix} = \alpha_1\beta_2 - \alpha_2\beta_1 = 0 \Leftrightarrow \frac{\alpha_1}{\alpha_2} = \frac{\beta_1}{\beta_2}$$

II. Έστω το σύστημα Σ_2 :

$$\begin{cases} \alpha_1 x + \beta_1 \psi + \gamma_1 \omega = 0 \\ \alpha_2 x + \beta_2 \psi + \gamma_2 \omega = 0 \end{cases}$$

όμογενές γραμμικό δύο εξισώσεων με τρεις άγνωστους. Το σύστημα Σ_2 έχει άπειρες σε πλήθος λύσεις. Φανερή λύση του είναι η $(x, \psi, \omega) = (0, 0, 0)$.

Υποθέτουμε $x\psi\omega \neq 0$, τότε το σύστημα Σ_2 μπορεί να γραφεί

$$\left. \begin{cases} \alpha_1 \frac{x}{\omega} + \beta_1 \frac{\psi}{\omega} = -\gamma_1 \\ \alpha_2 \frac{x}{\omega} + \beta_2 \frac{\psi}{\omega} = -\gamma_2 \end{cases} \right\} \text{ Αν λύσουμε ως προς } \frac{x}{\omega} \text{ και } \frac{\psi}{\omega} \text{ λαμβάνουμε :}$$

$$\left. \begin{aligned} \frac{x}{\omega} &= \frac{\begin{vmatrix} -\gamma_1 & \beta_1 \\ -\gamma_2 & \beta_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} \alpha_1 & \beta_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 \end{vmatrix}} = \frac{\begin{vmatrix} \beta_1 & \gamma_1 \\ \beta_2 & \gamma_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} \alpha_1 & \beta_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 \end{vmatrix}} \Leftrightarrow \frac{x}{\omega} = \frac{\begin{vmatrix} \beta_1 & \gamma_1 \\ \beta_2 & \gamma_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} \alpha_1 & \beta_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 \end{vmatrix}} \\ \frac{\psi}{\omega} &= \frac{\begin{vmatrix} \alpha_1 & -\gamma_1 \\ \alpha_2 & -\gamma_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} \alpha_1 & \beta_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 \end{vmatrix}} = \frac{\begin{vmatrix} \gamma_1 & \alpha_1 \\ \gamma_2 & \alpha_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} \alpha_1 & \beta_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 \end{vmatrix}} \Leftrightarrow \frac{\psi}{\omega} = \frac{\begin{vmatrix} \gamma_1 & \alpha_1 \\ \gamma_2 & \alpha_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} \alpha_1 & \beta_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 \end{vmatrix}} \end{aligned} \right\} \Leftrightarrow \frac{x}{\omega} = \frac{\psi}{\omega} = \frac{\omega}{\omega}$$

Οι λόγοι αυτοί έχουν έννοια, όταν οι ορίζουσες των παρονομαστών είναι διάφορες του μηδενός.

Αντιστρόφως: Άν

$$\frac{x}{\omega} = \frac{\psi}{\omega} = \frac{\omega}{\omega} = \lambda, \lambda \in \mathbb{R} \text{ και}$$

$$\begin{vmatrix} \beta_1 & \gamma_1 \\ \beta_2 & \gamma_2 \end{vmatrix} \neq 0, \begin{vmatrix} \gamma_1 & \alpha_1 \\ \gamma_2 & \alpha_2 \end{vmatrix} \neq 0, \begin{vmatrix} \alpha_1 & \beta_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 \end{vmatrix} \neq 0, \text{ τότε οι τιμές}$$

$$x = \lambda \begin{vmatrix} \beta_1 & \gamma_1 \\ \beta_2 & \gamma_2 \end{vmatrix}, \psi = \lambda \begin{vmatrix} \gamma_1 & \alpha_1 \\ \gamma_2 & \alpha_2 \end{vmatrix}, \omega = \lambda \begin{vmatrix} \alpha_1 & \beta_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 \end{vmatrix}$$

είναι λύσεις του συστήματος Σ_2 . Τούτο διαπιστώνεται εύκολα, αν αντικαταστήσουμε τις τιμές αυτές στις εξισώσεις του Σ_2 .

Ωστε, αν $\alpha_1\beta_2 - \alpha_2\beta_1 \neq 0$, $\beta_1\gamma_2 - \beta_2\gamma_1 \neq 0$, $\gamma_1\alpha_2 - \gamma_2\alpha_1 \neq 0$, το σύστημα Σ_2 έχει άπειρες σε πλήθος λύσεις που δίνονται από τους τύπους:

$$x = \lambda \begin{vmatrix} \beta_1 & \gamma_1 \\ \beta_2 & \gamma_2 \end{vmatrix}, \quad \psi = \lambda \begin{vmatrix} \gamma_1 & \alpha_1 \\ \gamma_2 & \alpha_2 \end{vmatrix}, \quad \omega = \lambda \begin{vmatrix} \alpha_1 & \beta_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 \end{vmatrix}, \quad \delta\text{που } \lambda \in \mathbb{R}$$

Αν $\lambda = 0$, τότε η λύση είναι ή $(x, \psi, \omega) = (0, 0, 0)$.

III. Έστω το σύστημα Σ_3 :

$$\begin{cases} \alpha_1 x + \beta_1 \psi + \gamma_1 \omega = 0 & (1) \\ \alpha_2 x + \beta_2 \psi + \gamma_2 \omega = 0 & (2) \\ \alpha_3 x + \beta_3 \psi + \gamma_3 \omega = 0 & (3) \end{cases}$$

Φανερή λύση του συστήματος Σ_3 είναι $(x, \psi, \omega) = (0, 0, 0)$.

Από τις (1) και (2) λαμβάνουμε: $x = \lambda \begin{vmatrix} \beta_1 & \gamma_1 \\ \beta_2 & \gamma_2 \end{vmatrix}, \quad \psi = \lambda \begin{vmatrix} \gamma_1 & \alpha_1 \\ \gamma_2 & \alpha_2 \end{vmatrix}, \quad \omega = \lambda \begin{vmatrix} \alpha_1 & \beta_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 \end{vmatrix} \quad (4)$,

οπότε ή (3) γίνεται:

$$\lambda[\alpha_3(\beta_1\gamma_2 - \beta_2\gamma_1) + \beta_3(\gamma_1\alpha_2 - \alpha_1\gamma_2) + \gamma_3(\alpha_1\beta_2 - \beta_1\alpha_2)] = 0,$$

πού γράφεται και έτσι: $\lambda \cdot \begin{vmatrix} \alpha_1 & \beta_1 & \gamma_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 & \gamma_2 \\ \alpha_3 & \beta_3 & \gamma_3 \end{vmatrix} = 0$ ή $\lambda \cdot \Delta = 0$

Αν $\Delta \neq 0$, τότε $\lambda = 0$, οπότε $x = 0$, $\psi = 0$, $\omega = 0$.

Αν $\Delta = 0$, τότε για $\lambda \in \mathbb{R}$ από τις (4) θα έχουμε άπειρες σε πλήθος λύσεις, γιατί ο λ εκλέγεται αυθαίρετα.

Αντιστρόφως: Αν μιιά λύση του συστήματος Σ_3 είναι ή $(x_1, \psi_1, \omega_1) \neq (0, 0, 0)$, τότε $\lambda \neq 0$, οπότε από την $\lambda \cdot \Delta = 0$ προκύπτει $\Delta = 0$.

Ωστε ή αναγκαία και ικανή συνθήκη, για να έχει το σύστημα Σ_3 εκτός από τή λύση $(0, 0, 0)$ και άλλες άπειρες σε πλήθος λύσεις, είναι ή ορίζουσα των συντελεστών των άγνωστων να είναι 0 και οι ελάσσονες ορίζουσές της κατά τά στοιχεία μιιά γραμμής να είναι $\neq 0$.

Δηλαδή: $\begin{vmatrix} \alpha_1 & \beta_1 & \gamma_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 & \gamma_2 \\ \alpha_3 & \beta_3 & \gamma_3 \end{vmatrix} = 0$ μέ $\begin{vmatrix} \beta_1 & \gamma_1 \\ \beta_2 & \gamma_2 \end{vmatrix} \neq 0$, $\begin{vmatrix} \gamma_1 & \alpha_1 \\ \gamma_2 & \alpha_2 \end{vmatrix} \neq 0$, $\begin{vmatrix} \alpha_1 & \beta_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 \end{vmatrix} \neq 0$

Παραδείγματα:

1) Μέ ποιιά τιμή του $\lambda \in \mathbb{R}$ το σύστημα
$$\begin{cases} 3x + 2\lambda\psi = 0 \\ 4x - (\lambda + 1)\psi = 0 \end{cases}$$

έχει και άλλες λύσεις εκτός από τή μηδενική;

Λύση: Πρέπει να έχουμε
$$\begin{vmatrix} 3 & 2\lambda \\ 4 & -(\lambda + 1) \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow \lambda = -\frac{3}{11}$$

$$\text{Πράγματι: γιατί τότε } \left. \begin{aligned} 3x + 2\left(-\frac{3}{11}\right)\psi &= 0 \\ 4x - \left(-\frac{3}{11} + 1\right)\psi &= 0 \end{aligned} \right\} \Leftrightarrow \left. \begin{aligned} 33x - 6\psi &= 0 \\ 44x - 8\psi &= 0 \end{aligned} \right\} \Leftrightarrow \left. \begin{aligned} 11x - 2\psi &= 0 \\ 11x - 2\psi &= 0 \end{aligned} \right\}$$

καί ἄρα τό σύνολο τῶν λύσεων τῆς πρώτης ἐξισώσεως ἰσοῦται μέ τό σύνολο τῶν λύσεων τῆς δευτέρας.

2) Νά βρεθεῖ ἡ ἀναγκαῖα καί ἰκανή συνθήκη μεταξύ τῶν α, β, γ , ὥστε

$$\text{τό σύστημα } \Sigma: \left\{ \begin{aligned} \alpha x + \psi + \omega &= 0 \\ x + \beta\psi + \omega &= 0 \\ x + \psi + \gamma\omega &= 0 \end{aligned} \right. \text{ νά ἔχει καί ἄλλες λύσεις ἐκτός ἀπό τή μη-} \\ \text{δενική } (x, \psi, \omega) = (0, 0, 0)$$

Λύση :

$$\text{Πρέπει νά ἔχουμε: } \begin{vmatrix} \alpha & 1 & 1 \\ 1 & \beta & 1 \\ 1 & 1 & \gamma \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow \alpha + \beta + \gamma - \alpha\beta\gamma = 2.$$

Ἄυτή εἶναι ἡ συνθήκη πού ζητοῦμε.

3) Νά ἐπιλυθεῖ τό σύστημα $6x - \psi - \omega = 0$, $3x + 4\psi - 2\omega = 0$

Λύση : Φανερό εἶναι ἡ λύση $(x, \psi, \omega) = (0, 0, 0)$. Γιά νά βροῦμε τίς ἄλλες λύσεις, ἐφόσον ἔχουμε:

$$\begin{vmatrix} 6 & -1 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 24 + 3 \neq 0, \quad \begin{vmatrix} -1 & -1 \\ 4 & -2 \end{vmatrix} = 2 + 4 \neq 0, \quad \begin{vmatrix} -1 & 6 \\ -2 & 3 \end{vmatrix} = -3 + 12 \neq 0,$$

$$\text{λαμβάνουμε } x = \lambda \begin{vmatrix} -1 & -1 \\ 4 & -2 \end{vmatrix} = 6\lambda, \quad \psi = \lambda \begin{vmatrix} -1 & 6 \\ -2 & 3 \end{vmatrix} = 9\lambda, \quad \omega = \lambda \begin{vmatrix} 6 & -1 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 27\lambda$$

Ἔστω οἱ λύσεις εἶναι:

$$(x, \psi, \omega) = (6\lambda, 9\lambda, 27\lambda), \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}$$

π.χ. γιά $\lambda = -1$ λαμβάνουμε $(x, \psi, \omega) = (-6, -9, -27)$.

Ἄυτή εἶναι μία λύση τοῦ συστήματος.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

183) Μέ ποιά τιμή τοῦ $\lambda \in \mathbb{R}$ τό σύστημα $\begin{cases} 5x + (2\lambda - 1)\psi = 0, \\ -2x + (6\lambda + 1)\psi = 0 \end{cases}$ ἔχει ἀπείρες σέ πλῆθος λύσεις;

184) Ἄν τό σύστημα $\alpha x + \beta\psi = 0$, $\beta^2 x + \alpha^2\psi = 0$ ἔχει καί ἄλλες λύσεις ἐκτός ἀπό τή μηδενική, ποιά εἶναι ἡ σχέση τῶν α καί β ;

185) Ποιά ἀπό τά ἀκόλουθα συστήματα ἔχουν μιά μόνο λύση καί ποιά ἀπείρες σέ πλῆθος λύσεις;

$$1) \begin{cases} x + \psi - \omega = 0 \\ 2x - \psi + 4\omega = 0 \\ x - 3\psi + \omega = 0 \end{cases}$$

$$2) \begin{cases} -5x + 4\psi + 3\omega = 0 \\ x - 2\psi + \omega = 0 \\ -10x + 8\psi + 6\omega = 0 \end{cases}$$

186) Νά επιλυθούν τὰ συστήματα
(χρησιμοποιήστε τις δύο όμογενεις
έξισώσεις)

$$1) \begin{cases} x + 2\psi - z = 0 \\ 2x - \psi + 3z = 0 \\ x + \psi + z = 2 \end{cases} \quad \begin{cases} \alpha x + \beta \psi + \gamma \omega = 0 \\ \alpha^2 x + \beta^2 \psi + \gamma^2 \omega = 0 \\ x + \psi + \omega = \frac{1}{\alpha\beta\gamma} \end{cases}$$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΣ

187) Μέ ποιές τιμές των x και ψ οι όριζουσες

$$\begin{vmatrix} x & 1 & 1 \\ 4 & 2 & 5 \\ 4 + \psi & 3 & 5 \end{vmatrix} \text{ και } \begin{vmatrix} -1 & 1 & 2x \\ 2 & 4 & 1 \\ 3 & -1 & 1 - \psi \end{vmatrix} \text{ λαμβάνουν συγχρόνως την τιμή } 0;$$

188) Νά επιλυθούν και νά διερευνηθούν τὰ ακόλουθα συστήματα:

$$1) \begin{cases} x + (3\lambda - 1)\psi = 0 \\ x + 2\psi = \lambda - 4 \end{cases} \quad 2) \begin{cases} \frac{1}{x} + \frac{1}{\psi} = \alpha \\ \frac{1}{x} - \frac{1}{\psi} = \beta \end{cases} \quad 3) \begin{cases} \alpha^3 + \alpha x + \psi = 0 \\ \beta^3 + \beta x + \psi = 0 \end{cases}$$

189) Νά αποδειχθούν οι ταυτότητες:

$$1) \begin{vmatrix} 1 & \lambda & -\lambda^3 \\ 1 & \mu & -\mu^3 \\ 1 & \nu & -\nu^3 \end{vmatrix} = (\lambda - \mu)(\nu - \mu)(\nu - \lambda)(\nu + \lambda + \mu) \quad 2) \begin{vmatrix} x - x & 0 \\ 0 & x^2 - 1 \\ 1 & x & x + 1 \end{vmatrix} = \frac{x^5 - x}{x - 1} \quad (x \neq 1)$$

$$3) \begin{vmatrix} \alpha\gamma & \alpha\beta & \beta\gamma \\ 1 & 1 & 1 \\ \beta & \gamma & \alpha \end{vmatrix} = (\alpha - \beta)(\beta - \gamma)(\gamma - \alpha) \quad 4) \begin{vmatrix} \beta^2 + \gamma^2 & \alpha\beta & \alpha\gamma \\ \alpha\beta & \alpha^2 + \gamma^2 & \beta\gamma \\ \alpha\gamma & \beta\gamma & \alpha^2 + \beta^2 \end{vmatrix} = 4\alpha^2\beta^2\gamma^2$$

190) Νά επιλυθούν με τον κανόνα του Cramer τὰ συστήματα:

$$1) \begin{cases} \alpha x + \beta \psi + z = 1 \\ x + \alpha\beta\psi + z = \beta \\ x + \beta\psi + \alpha z = 1 \end{cases} \quad 2) \begin{cases} x + \psi + z = 0 \\ \alpha x + \beta\psi + \gamma z = 0 \\ \beta\gamma x + \alpha\gamma\psi + \alpha\beta z = 1 \end{cases} \quad 3) \begin{cases} x + \alpha\psi + z = 2\alpha \\ x + \psi + \alpha z = 0 \\ (\alpha + 1)x + \alpha\psi + z = \alpha \end{cases}$$

191) Νά επιλυθεί και διερευνηθεί τό σύστημα, γιά $\lambda \in \mathbb{R}$

$$1) \begin{cases} x + \psi + \lambda\omega = 1 \\ x + \lambda\psi + \omega = \lambda \\ x - \psi + \omega = 3 \end{cases}$$

192) Ποιά ή σχέση μεταξύ των συντελεστών α και β , ώστε οι εξισώσεις $\beta x + 2\alpha\psi = \alpha\beta$, $\alpha x - \beta\psi = \alpha\beta$, $x + \psi = 2\alpha - \beta$ νά επαληθεύονται μέ τις ίδιες τιμές των $x, \psi \in \mathbb{R}$;

193) Νά προσδιορισθεί ή τιμή του $\mu \in \mathbb{R}$, ώστε τό σύστημα

$$x + (\mu + 1)\psi = 10, \quad 2x - (4\mu + 1)\psi = 5, \quad x - \psi = 6$$

νά έχει μία μόνο λύση στό \mathbb{R} .

194) Νά βρεθεί ή άναγκαία και ίκανή συνθήκη μεταξύ των α, β, γ , ώστε τό σύστημα νά έχει και άλλες λύσεις εκτός από τή φανερή.

$$\begin{cases} \alpha x + \beta \psi + \gamma \omega = 0 \\ \beta x + \gamma \psi + \alpha \omega = 0 \\ x + \psi + \omega = 0 \end{cases}$$

195) Νά βρεθεί ή άναγκαία και Ικανή συνθήκη μεταξύ τών α, β, γ, ώστε τό σύστημα νά έχει και άλλες λύσεις έκτός άπό τή μηδενική.

$$\begin{cases} \alpha^2x + \beta^2\psi + \gamma^2\omega = 0 \\ \alpha x + \beta\psi + \gamma\omega = 0 \\ x + \psi + \omega = 0 \end{cases}$$

196) Νά άποδειχθεί ότι τό σύστημα είναι συμβιβαστό $\forall \alpha \in \mathbb{R}$ έκτός $\alpha = 1$ και $\alpha = -1$

$$\begin{cases} \alpha x + \psi + \omega = \alpha \\ \alpha x + \alpha\psi + \omega = 1 \\ x + \alpha\psi + \alpha\omega = 1 \\ x + \psi + \alpha\omega = \alpha \end{cases}$$

197) Νά έπιλυθεί και διερευνηθεί τό σύστημα (οι δύο πρώτες εξισώσεις άποτελούνόμογενές σύστημα δύο εξισώσεων μέ τρεις άγνωστους)

$$\begin{cases} \frac{x}{\beta+\gamma} + \frac{\psi}{\gamma-\alpha} - \frac{z}{\alpha-\beta} = 0 \\ \frac{x}{\beta-\gamma} - \frac{\psi}{\gamma-\alpha} + \frac{z}{\alpha+\beta} = 0 \\ \frac{x}{\beta+\gamma} + \frac{\psi}{\gamma-\alpha} + \frac{z}{\alpha+\beta} = 2\alpha \end{cases}$$

ΑΣΥΜΜΕΤΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ—ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

(Συμπλήρωση αὐτῶν πού διδάχθηκαν στήν Γ' τάξη Γυμνασίου)

A'. ΑΣΥΜΜΕΤΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

62. Στό Γυμνάσιο μάθαμε ὅτι στό σύνολο τῶν ρητῶν ἀριθμῶν ὑπάρχει ἀδυναμία λύσεως τῆς ἐξισώσεως $x^2 - 2 = 0$, ἢ γενικά τῆς $x^2 = \theta$, ὅπου $\theta > 0$ καί μὴ τετράγωνος ἀριθμός, γιατί δέν ὑπάρχει ρητός, πού τό τετράγωνό του νά εἶναι ἀντιστοίχως 2, ἢ θ . Ἔτσι δημιουργήθηκε ἡ ἀνάγκη νά κατασκευασθεῖ ἕνα νέο σύνολο ἀριθμῶν, πού ὀνομάστηκαν **ἄρρητοι ἢ ἀσύμμετροι**. Οἱ νέοι αὐτοί ἀριθμοί κατασκευάστηκαν ἔτσι, ὥστε νά θεραπεύονται οἱ ἀδυναμίες τῶν ρητῶν ἀριθμῶν. Π.χ. νά γίνεται δυνατή ἡ λύση τῶν παραπάνω ἐξισώσεων. Γνωρίσαμε στή Γ' τάξη τοῦ Γυμνασίου τίς ἀκόλουθες ἔννοιες:

Ὁρισμός. Ἀπό τόν ἀριθμό $a \in N_0$ καί τήν ἀπέραντη (χωρίς τέλος) ἀκολουθία ψηφίων (μονοψήφιων ἀκεραίων) $\psi_1, \psi_2, \dots, \psi_n, \dots$, ὅπου $n \in N$, σχηματίζουμε τήν ἀπέραντη ἀκολουθία:

$$(1) \quad a, \psi_1, a, \psi_1\psi_2, a, \psi_1\psi_2\psi_3, \dots, a, \psi_1\psi_2 \dots \psi_n \dots$$

Τήν ἀκολουθία αὐτή συμβολίζουμε: $a, \psi_1\psi_2\psi_3 \dots \psi_n \dots$. Τό σύμβολο αὐτό εἶναι μιὰ ἀπειροσφύα δεκαδική παράσταση καί τήν ὀνομάζουμε **ἄρρητο ἢ ἀσύμμετρο ἀριθμό**, ἄν δέν εἶναι περιοδική (ρητός ἀριθμός), δηλαδή ἄν μετά τήν ὑποδιαστολή ἢ μετά ἀπό κάποιο ψ καί πέρα, δέν ἐμφανίζεται «τμήμα ψηφίων» πού νά ἐπαναλαμβάνεται διαρκῶς χωρίς νά ἐμφανίζονται ἄλλα ψηφία.

Κάθε ὄρος τῆς ἀκολουθίας (1) εἶναι ἕνας ρητός **προσεγγιστικός ἀντιπρόσωπος** τοῦ $a, \psi_1\psi_2\psi_3 \dots \psi_n \dots$.

Σχετικός ἄρρητος ἀριθμός λέγεται κάθε ἄρρητος, πού προσημαίνεται μέ τό (+) ἢ τό (-).

Π.χ. οἱ ὄροι τῶν ἀκολουθιῶν:

$$(\alpha) \quad 1 \quad 1,4 \quad 1,41 \quad 1,414 \quad 1,4142 \dots$$

$$(\beta) \quad 2 \quad 1,5 \quad 1,42 \quad 1,415 \quad 1,4143 \dots$$

εἶναι ρητοί προσεγγιστικοί ἀντιπρόσωποι τοῦ ἄρρητου 1,4142... μέ ἔλλει-

ψη ή με υπεροχή αντιστοίχως και εκφράζουν τιμές της $\sqrt{2}$ με προσέγγιση 1 0,1 0,01 0,001 0,0001...

Έτσι έχουμε $1 < 1,4 < 1,41 < 1,414 < \dots < \sqrt{2} < \dots < 1,415 < 1,42 < 1,5 < 2$

όποτε λέμε ότι οι ακολουθίες (α) και (β) διαχωρίζονται από τον ασύμμετρο αριθμό $\sqrt{2}$, που για τό λόγο αυτό αντιπροσωπεύει τον ασύμμετρο 1,4142... Μά ανάλογο τρόπο μπορούμε να κατασκευάσουμε και άλλους άρρητους αριθμούς με μορφή $\sqrt{\theta}$, όπου $\theta > 0$ και μή τετράγωνος.

Οι πράξεις πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός, διαίρεση και οι έννοιες της ισότητας και ανισότητας με ασύμμετρους αριθμούς ορίζονται όπως και με τους ρητούς και έχουν τις ίδιες θεμελιώδεις ιδιότητες, που έχουν και οι πράξεις με ρητούς. Επίσης και η έννοια της δυνάμεως άρρητου αριθμού ορίζεται όπως και στους ρητούς.

Οι πράξεις αυτές με ασύμμετρους αριθμούς στη στοιχειώδη Άλγεβρα γίνονται με προσέγγιση. Δηλαδή αντί για ασύμμετρους αριθμούς παίρνουμε προσεγγιστικούς αντιπροσώπους αυτών των αριθμών (ρητούς) με οποιαδήποτε προσέγγιση θέλουμε. Έτσι ο ύπολογισμός αριθμητικών παραστάσεων με ασύμμετρους αριθμούς γίνεται με κάθε επιθυμητή προσέγγιση, ή οποία αυξάνει με τό πλήθος των δεκαδικών ψηφίων των ρητών αντιπροσώπων. Π.χ. για τον ύπολογισμό του άθροίσματος $\sqrt{3} + \sqrt{2}$, παίρνουμε με προσέγγιση 0,01 τούς ρητούς αντιπροσώπους, όποτε έχουμε $1,73 + 1,41 = 3,14$. Ό 3,14 είναι ό προσεγγιστικός ρητός αντιπρόσωπος του αριθμού $\sqrt{3} + \sqrt{2}$.

Τό άθροισμα, τό γινόμενο, τό πηλίκο και ή διαφορά άρρητων αριθμών μπορεί να είναι ρητός αριθμός.

Π.χ. $\sqrt{3} \cdot \sqrt{12} = \sqrt{36} = 6$. Επίσης $\sqrt{18} : \sqrt{2} = \sqrt{18:2} = \sqrt{9} = 3$.

Σχετικά με τις πράξεις με ασύμμετρους αριθμούς συμπεραίνουμε από τά παραπάνω, ότι μπορούμε να κάνουμε πράξεις με τή βοήθεια των ιδιοτήτων των πράξεων χωρίς να μᾶς ενδιαφέρει αν οι αριθμοί είναι ρητοί ή άρρητοι.

63. Παρακάτω εξετάζουμε μερικές χρήσιμες προτάσεις:

1. "Αν α άρρητος και ρ_1, ρ_2 ρητοί, τότε ισχύει :

$$\alpha \cdot \rho_1 = \rho_2 \Leftrightarrow \rho_1 = \rho_2 = 0$$

Απόδειξη: "Αν $\rho_1 \neq 0$, τότε $\alpha \cdot \rho_1 = \rho_2 \Leftrightarrow \alpha = \frac{\rho_2}{\rho_1}$

Αυτό είναι άτοπο, γιατί ό αριθμός $\frac{\rho_2}{\rho_1}$ είναι ρητός. Άρα $\rho_1 = 0$, όποτε και $\rho_2 = 0$.

Τό αντίστροφο είναι φανερό.

2. Άν α άρρητος και ρ ρητός, τότε οι αριθμοί α + ρ και α · ρ, με ρ ≠ 0, είναι άρρητοι.

Άπόδειξη: Άν υποθέσουμε ότι είναι ρητοί, τότε:

$$\alpha + \rho = \rho' = \text{ρητός} \Leftrightarrow \alpha = \rho' - \rho = \text{ρητός} \cdot \text{άτοπο.}$$

$$\alpha\rho = \rho'' = \text{ρητός} \Leftrightarrow \alpha = \frac{\rho''}{\rho} = \text{ρητός} \cdot \text{άτοπο.}$$

3. Άν α άρρητος και ρ ρητός, τότε ισχύει:

$$\alpha + \rho = 0 \Leftrightarrow \alpha = \rho = 0$$

Άπόδειξη: Άν ρ ≠ 0, έχουμε: α + ρ = 0 ⇔ α = -ρ. Αυτό είναι άτοπο, γιατί ό -ρ είναι ρητός. Άρα ρ = 0, όποτε και α = 0. Τό αντίστροφο είναι φανερό.

4. Άν θ ∈ Ν και δέν είναι δύναμη με έκθέτη πολλαπλάσιο του ν ∈ Ν, τότε ό αριθμός $\sqrt[n]{\theta}$ είναι άρρητος.

Άπόδειξη: Τό σύμβολο $\sqrt[n]{\theta}$, γνωστό από την Γ' τάξη, όρίζεται από την ίσοδυναμία: $x = \sqrt[n]{\theta} \Leftrightarrow x^n = \theta$ (∀ θ > 0).

Έστω ότι $\sqrt[n]{\theta} = \kappa \in \mathbb{Z}^+$ και ότι $\kappa = \kappa_1^{\lambda_1} \cdot \kappa_2^{\lambda_2} \dots \kappa_\mu^{\lambda_\mu}$, όπου κ₁, κ₂, ..., κ_μ και λ₁, λ₂, ..., λ_μ φυσικοί αριθμοί, τότε: θ = κ^ν = κ₁^{νλ₁} · κ₂^{νλ₂} · ... · κ_μ^{νλ_μ}. Τοῦτο είναι άτοπο, γιατί ό θ δέν είναι δύναμη με έκθέτη πολλαπλάσιο του ν.

Επίσης, αν είναι $\sqrt[n]{\theta} = \frac{\kappa}{\lambda}$, όπου κ, λ ∈ Ζ⁺ και πρώτοι μεταξύ τους, τότε: $\theta = \left(\frac{\kappa}{\lambda}\right)^n = \frac{\kappa^n}{\lambda^n}$. Αυτό είναι άτοπο, γιατί οι κ^ν, λ^ν είναι πρώτοι μεταξύ τους.

Όστε ό $\sqrt[n]{\theta}$ είναι άρρητος.

5. Κάθε άκέραιη δύναμη της παραστάσεως α ± β $\sqrt{\gamma}$, όπου α, β, γ ρητοί και $\sqrt{\gamma}$ άρρητος, είναι παράσταση με μορφή κ ± λ $\sqrt{\gamma}$, όπου κ, λ ρητοί.

Άπόδειξη: α) (α ± β $\sqrt{\gamma}$)² = α² + β²γ ± 2αβ $\sqrt{\gamma}$ = κ₁ ± λ₁ $\sqrt{\gamma}$

$$\text{όπου } \alpha^2 + \beta^2\gamma = \kappa_1 \text{ και } 2\alpha\beta = \lambda_1$$

β) (α ± β $\sqrt{\gamma}$)³ = α³ ± 3α²β $\sqrt{\gamma}$ + 3αβ²γ ± β³γ $\sqrt{\gamma}$ =

$$= (\alpha^3 + 3\alpha\beta^2\gamma) \pm (3\alpha^2\beta + \beta^3\gamma) \sqrt{\gamma} = \kappa_2 \pm \lambda_2 \sqrt{\gamma}$$

$$\text{όπου } \alpha^3 + 3\alpha\beta^2\gamma = \kappa_2 \text{ και } 3\alpha^2\beta + \beta^3\gamma = \lambda_2$$

6. Άν α, β, γ, δ ρητοί και $\sqrt{\beta}$, $\sqrt{\delta}$ άρρητοι, τότε για νά είναι α + $\sqrt{\beta}$ = γ + $\sqrt{\delta}$ πρέπει και άρκει νά είναι α = γ και β = δ.

Απόδειξη: "Αν $\alpha = \gamma$, τότε $\sqrt{\beta} = \sqrt{\delta} \Rightarrow \beta = \delta$. Έξάλλου έχουμε:
 $\alpha + \sqrt{\beta} = \gamma + \sqrt{\delta} \Leftrightarrow \alpha - \gamma + \sqrt{\beta} = \sqrt{\delta}$, και με ύψωση στο τετράγωνο
 έχουμε: $(\alpha - \gamma)^2 + \beta + 2(\alpha - \gamma)\sqrt{\beta} = \delta \Rightarrow 2(\alpha - \gamma)\sqrt{\beta} = \delta - \beta - (\alpha - \gamma)^2$.
 "Αν $\alpha \neq \gamma$, τότε $\sqrt{\beta} = \frac{\delta - \beta - (\alpha - \gamma)^2}{2(\alpha - \gamma)}$ = ρητός· είναι άτοπο γιατί $\sqrt{\beta}$ άρρητος.
 "Αρα $\alpha = \gamma$, όπότε και $\beta = \delta$. Τό αντίστροφο είναι φανερό.

Παράδειγμα: Νά βρεθούν οι τιμές των σύμμετρων λ και μ , ώστε η παράσταση $(\lambda + \mu)\sqrt{5} + 2\lambda - \mu$ νά ίσούται μέ $\sqrt{5} + 1$.

Λύση: "Έχουμε $(\lambda + \mu)\sqrt{5} + 2\lambda - \mu = \sqrt{5} + 1 \Leftrightarrow (\lambda + \mu - 1)\sqrt{5} = 1 + \mu - 2\lambda$, όπότε κατά τήν πρόταση 1, θά πρέπει $\lambda + \mu - 1 = 0$ και $1 + \mu - 2\lambda = 0$. "Αρα έχουμε τή λύση $(\lambda, \mu) = \left(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}\right)$.

Ιστορική σημείωση:

Τήν ύπαρξη ασύμμετρων αριθμών διαπίστωσαν πρώτοι οι Πυθαγόρειοι και ό Εϋδοξος συνέβαλε πολύ στή μελέτη τους. Νεώτεροι θεωρητικοί, όπως οι Weierstrass (1815 - 1897), Meray (1835 - 1911), Cantor (1843 - 1918), Dedekind (1831 - 1916) ανέλυσαν περισσότερο τήν έννοια των ασύμμετρων αριθμών μέ τīs περίφημες «τομές Dedekind».

B. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

64. Όπως είναι γνωστό, τέσσερα είναι τά κύρια στάδια τής εξέλιξης του συστήματος των αριθμών. Τό πρώτο είναι ή δημιουργία των απόλυτων άκεραίων ή φυσικών αριθμών (N), τό δεύτερο είναι ή επέκτασή τους στό σύστημα των σχετικών άκεραίων (Z), τό τρίτο ή εισαγωγή των ρητών κλασμάτων πού δημιούργησε τό σύστημα των ρητών ή σύμμετρων αριθμών (Q). Τέλος ή έννοια του άρρητου ή ασύμμετρου αριθμού όδηγήσε στήν ιδέα επέκτασεως του συστήματος των ρητών σε ένα σύστημα, πού νά περιέχει τό σύνολο των ρητών και τό σύνολο των άρρητων αριθμών. Τό σύστημα τουτο ονομάσθηκε σύστημα των πραγματικών αριθμών. Άργότερα, σε άλλη τάξη, θά μάθουμε και μιá άλλη επέκταση σε ένα ευρύτερο σύστημα αριθμών.

Όστε, τό σύνολο των ρητών και άρρητων αριθμών τής "Αλγεβρας λέγεται σύνολο των πραγματικών αριθμών (Real) και συμβολίζεται μέ τό R.

Τά σύνολα Q των ρητών και A των άρρητων είναι ξένα μεταξύ τους, γιατί κανένας ρητός αριθμός δέν είναι άρρητος, και αντίστροφως. Δηλαδή τά σύνολα Q και A διαμερίζουν τό σύνολο R.

"Ετσι έχουμε: $Q \cap A = \emptyset$, $Q \cup A = R$, $Q \subset R$, $A \subset R$.

"Επίσης έχουμε: $N_0 \subset Z \subset Q \subset R$, $N_0 \cap A = \emptyset$, $Z \cap A = \emptyset$, όπου N_0 τό σύνολο των φυσικών αριθμών μέ τό 0.

Κάθε πραγματικός αριθμός, ἀφοῦ εἶναι ἢ ρητός ἢ ἄρρητος, συμβολίζεται μέ τόν ἀριθμό α , $\psi_1\psi_2\psi_3\dots\psi_n\dots$, πού εἶναι τό ὄριο τῆς ἀκολουθίας:

$$\alpha = \alpha, \psi_1 \quad \alpha, \psi_1\psi_2 \quad \alpha, \psi_1\psi_2\psi_3 \quad \dots \quad \alpha, \psi_1\psi_2\dots\psi_n \quad \dots,$$

ὅπου $\alpha \in \mathbb{N}_0$ καί $\psi_1, \psi_2, \psi_3, \dots, \psi_n$ μονοψήφιοι ἀκέραιοι.

Τό δεκαδικό ἀνάπτυγμα τοῦ πραγματικοῦ ἀριθμοῦ $\alpha, \psi_1\psi_2\dots\psi_n\dots$ εἶναι ἢ περιοδικό, ὅποτε ὁ ἀριθμός εἶναι ρητός, ἢ μή περιοδικό, ὅποτε ὁ ἀριθμός εἶναι ἄρρητος. Ὑπενθυμίζουμε ὅτι ὅλοι οἱ ρητοί ἀριθμοί συμβολίζονται μέ ἀπειροψήφιο περιοδικό δεκαδικό ἀριθμό.

65. Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΟ \mathbb{R}

Δύο πραγματικοί ἀριθμοί $\alpha, x_1x_2\dots x_n\dots$ καί $\beta, \psi_1\psi_2\dots\psi_n\dots$ ὀρίζονται ἴσοι, τότε καί μόνο τότε, ἂν εἶναι:

$$\alpha = \beta, x_1 = \psi_1, x_2 = \psi_2, \dots, x_n = \psi_n, \dots$$

Εὐκόλα ἀποδεικνύεται ὅτι ἰσχύουν οἱ ἰδιότητες τῆς ἰσότητος καί ὅτι ἡ σχέση τῆς ἰσότητος εἶναι σχέση ἰσοδυναμίας.

66. ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΤΟ \mathbb{R}

Εἶδαμε ὅτι οἱ πράξεις στό σύνολο A τῶν ἄρρητων ἀριθμῶν ὀρίζονται ὅπως καί στό σύνολο Q τῶν ρητῶν καί οἱ ἰδιότητες παραμένουν ἀναλλοίωτες· οἱ πράξεις στό \mathbb{R} γίνονται μέ προσέγγιση. Ἐάν σέ δύο ἀριθμούς $\alpha, x_1x_2\dots x_n\dots$ καί $\beta, \psi_1\psi_2\dots\psi_n\dots$ τοῦ συνόλου \mathbb{R} εἶναι $\alpha = \beta$, $x_1 = \psi_1$, $x_2 = \psi_2$, \dots , $x_{n-1} = \psi_{n-1}$, $x_n > \psi_n$, \dots , τότε οἱ ἀριθμοί εἶναι ἀνισοί μέ μεγαλύτερο τόν πρῶτο.

Ἡ σύγκριση μεταξύ πραγματικῶν ἀριθμῶν γίτεται στίς ἐφορμογές μέ βάση τήν προσεγγιστική ἐκπροσώπηση τῶν ἀσύμμετρων. Ἐτσι, $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$ ἀπό τίς σχέσεις $\alpha > \beta$, $\alpha = \beta$, $\alpha < \beta$ μία μόνο μπορεῖ νά εἶναι ἀληθής.

Ἐπίσης $\forall \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ ἰσχύει: $\alpha \leq \beta \wedge \beta < \gamma \Rightarrow \alpha < \gamma$

67. Η ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ \mathbb{R}

Θεωροῦμε τό γνωστό ἀπό τήν προηγούμενη τάξη ἄξονα $(x'Ox, \vec{\theta})$, ὅπου $\vec{\theta} = \vec{OA}$ τό μοναδιαῖο διάνυσμα.



Ἐάν M εἶναι σημεῖο τοῦ ἄξονα τούτου, τότε ὁ λόγος $\frac{\vec{OM}}{\vec{OA}}$, πού εἶναι ἴσος μέ

τό λόγο τῶν ἀλγεβρικών τιμῶν τῶν διανυσμάτων (δηλαδή $\frac{\vec{OM}}{\vec{OA}} = \frac{\overline{OM}}{1} = \overline{OM}$)

εἶναι ἓνας πραγματικός ἀριθμός ρητός ἢ ἄρρητος καί μόνο ἓνας. *Ἐτσι σέ κάθε σημεῖο M τοῦ ἄξονα ἀντιστοιχεῖ ἓνας καί μόνο ἓνας πραγμ. ἀριθμός.

Καί ἀντιστρόφως, σέ κάθε πραγμ. ἀριθμό ἀντιστοιχεῖ ἓνα καί μόνο ἓνα σημεῖο M τοῦ ἄξονα, πού εἶναι τό πέρας τοῦ διανύσματος \vec{OM} καί πού ὁ λόγος $\frac{\vec{OM}}{\vec{OA}} = \overline{OM} = \overline{OM}$ ἰσοῦται μέ τόν ἀριθμό αὐτό.

*Ἄρα μεταξύ τοῦ συνόλου R καί τοῦ συνόλου τῶν σημείων τοῦ ἄξονα x'Ox ὑπάρχει ἀμφιμονοσήμαντη ἀντιστοιχία, γι' αὐτό ὁ ἄξονας x'Ox λέγεται ἄξονας τῶν **πραγματικῶν ἀριθμῶν** καί εἶναι ἡ γεωμετρική εἰκόνα τοῦ συνόλου R.

68. ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΙΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ

Στό Γυμνάσιο εἶδαμε ὅτι **ἀπόλυτη τιμή** ἑνός ρητοῦ ἀριθμοῦ λέγεται ὁ ἀριθμός πού προκύπτει ἀπό αὐτόν, ὅταν παραλειφθεῖ τό πρόσημό του. Δηλαδή ἡ ἀπόλυτη τιμή τοῦ $\frac{+4}{5}$ εἶναι ὁ $\frac{4}{5}$ καί τοῦ $\frac{-4}{5}$ εἶναι πάλι ὁ $\frac{4}{5}$.

$$\text{Συμβολίζεται } \left| \frac{+4}{5} \right| = \frac{4}{5} \text{ καί } \left| \frac{-4}{5} \right| = \frac{4}{5}$$

καί διαβάζεται : «ἀπόλυτη τιμή τοῦ $\frac{+4}{5}$ ἢ τοῦ $\frac{-4}{5}$ ».*

Τώρα μποροῦμε νά δώσουμε τόν ἐξῆς ὄρισμό:

Ἀπόλυτη τιμή ἑνός πραγμ. ἀριθμοῦ (ἢ μιᾶς πραγματικῆς παραστάσεως) a λέγεται ὁ ἴδιος ὁ ἀριθμός a ἂν εἶναι θετικός ἢ μηδέν, καί ὁ ἀντίθετός του $-a$ ἂν εἶναι ἀρνητικός.

*Ἐτσι ἔχουμε :

$$\begin{array}{l} \forall \alpha \in \mathbb{R}^+ \Leftrightarrow |\alpha| = \alpha > 0 \\ \forall \alpha \in \mathbb{R}^- \Leftrightarrow |\alpha| = -\alpha > \alpha \end{array}$$

Δηλαδή ἡ παράσταση $|\alpha|$ εἶναι ἓνας **μη ἀρνητικός ἀριθμός**.

69. ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΤΩΝ ΤΙΜΩΝ

1. *Ἄν $\alpha \in \mathbb{R}$, τότε $|\alpha| = |-\alpha|$.

* Τό σύμβολο $|\cdot|$ καί ἡ ὀνομασία του ὀφείλονται στό Γερμανό μαθηματικό Weierstrass (1815 - 1897).

Απόδειξη. "Αν $\alpha \in \mathbb{R}^+$ τότε $-\alpha \in \mathbb{R}^-$. "Αρα θά έχουμε $|\alpha| = \alpha$ και $|- \alpha| = -(-\alpha) = \alpha$. "Οπότε $|\alpha| = |-\alpha|$

"Αν $\alpha \in \mathbb{R}^-$ τότε $-\alpha \in \mathbb{R}^+$. "Αρα θά έχουμε $|\alpha| = -\alpha$ και $|- \alpha| = -\alpha$. "Οπότε $|\alpha| = |-\alpha|$

"Αν $\alpha = 0$, τότε $-\alpha = 0$, όπότε $|\alpha| = |-\alpha|$

"Ωστε :

$$\forall \alpha \in \mathbb{R} : |\alpha| = |-\alpha|$$

2. "Αν $\alpha \in \mathbb{R}$, τότε είναι $-|\alpha| \leq \alpha \leq |\alpha|$.

Απόδειξη: "Αν $\alpha \in \mathbb{R}_0^+$ τότε $|\alpha| = \alpha$ και επειδή $|\alpha| \geq -|\alpha|$, θά έχουμε $-|\alpha| \leq \alpha = |\alpha|$ (1). "Αν $\alpha \in \mathbb{R}^-$ τότε $|\alpha| = -\alpha$ ή $-\alpha = |\alpha|$, θά έχουμε $-\alpha = |\alpha| \leq |\alpha|$ (2). Οί σχέσεις (1) και (2) δίνουν $-|\alpha| \leq \alpha \leq |\alpha|$

"Ωστε:

$$\forall \alpha \in \mathbb{R} : -|\alpha| \leq \alpha \leq |\alpha|$$

3. "Αν $\alpha \in \mathbb{R}$ και $v \in \mathbb{N}$, τότε είναι $|\alpha|^{2v} = \alpha^{2v}$

Απόδειξη. "Αν $\alpha \in \mathbb{R}_0^+$ τότε $|\alpha| = \alpha$ και άρα $|\alpha|^{2v} = \alpha^{2v}$.

"Αν $\alpha \in \mathbb{R}^-$ τότε $|\alpha| = -\alpha$ και άρα $|\alpha|^{2v} = (-\alpha)^{2v} = \alpha^{2v}$.

"Ωστε:

$$\forall \alpha \in \mathbb{R}, v \in \mathbb{N} : |\alpha|^{2v} = \alpha^{2v}$$

4. "Αν $\alpha \in \mathbb{R}_0^+$ και $v \in \mathbb{N}$, τότε είναι $|\alpha|^{2v+1} = \alpha^{2v+1}$

Απόδειξη: "Αν $\alpha \in \mathbb{R}_0^+$ τότε $|\alpha| = \alpha$ και άρα $|\alpha|^{2v+1} = \alpha^{2v+1}$

"Ωστε:

$$\forall \alpha \in \mathbb{R}_0^+, v \in \mathbb{N} : |\alpha|^{2v+1} = \alpha^{2v+1}$$

5. "Αν $\alpha, x \in \mathbb{R}$ και $|x| \leq \alpha$, τότε $-\alpha \leq x \leq \alpha$ και αντίστροφως:

Απόδειξη. "Αν $x \in \mathbb{R}_0^+$ τότε $|x| = x$ και επειδή $|x| \leq \alpha$, έπεται $x \leq \alpha$ και άρα $-\alpha \leq x \leq \alpha$, γιατί $|x| \leq \alpha \Rightarrow \alpha \geq 0$. "Αν $x \in \mathbb{R}^-$ τότε $|x| = -x$ και επειδή $|x| \leq \alpha$, έπεται $-x \leq \alpha$ ή $x \geq -\alpha$ και άρα $-\alpha \leq x \leq \alpha$, γιατί $\alpha \geq 0$.

Αντιστρόφως: "Αν $x \in \mathbb{R}_0^+$ τότε $|x| = x$ και επειδή $-\alpha \leq x \leq \alpha$, έπεται $|x| \leq \alpha$. "Αν $x \in \mathbb{R}^-$ τότε $|x| = -x$ ή $-|x| = x$ και επειδή $-\alpha \leq x \leq \alpha$, έπεται $-\alpha \leq -|x|$ ή $\alpha \geq |x|$ ή $|x| \leq \alpha$

"Ωστε:

$$\forall \alpha, x \in \mathbb{R} : |x| \leq \alpha \Leftrightarrow -\alpha \leq x \leq \alpha$$

Σημ. "Εκτός από τις βασικές αυτές ιδιότητες σέ άλλη τάξη θά μάθουμε και άλλες πολύ χρήσιμες.

Παραδείγματα : α) *Αν $x \in \mathbb{R}$, τότε $|x - 7| \leq 3 \Leftrightarrow 4 \leq x \leq 10$

Πράγματι: $|x - 7| \leq 3 \Leftrightarrow -3 \leq x - 7 \leq 3 \Leftrightarrow 4 \leq x \leq 10$

β) *Αν είναι $6 < x < 10$, νά βρεθεί τό σύνολο τιμών τῆς παραστάσεως $A = -|x - 1| - 2|x - 11|$.

Λύση : *Από τήν $6 < x < 10$ ἔχουμε $5 < x - 1 < 9$, ὁπότε $|x - 1| = x - 1$, ἐπίσης $-5 < x - 11 < -1$, ὁπότε $|x - 11| = -(x - 11) = 11 - x$.

*Αρα $A = -(x - 1) - 2(11 - x) = x - 21$ ἢ $A + 21 = x$
ὁπότε $6 < A + 21 < 10$ ἢ $-15 < A < -11$.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

‘Ομάδα α’

198) Νά ἀποδειχθεῖ ὅτι οἱ ἀριθμοί $3 + \sqrt[3]{3}$, $\sqrt[3]{5}$, $\sqrt[4]{3}$, $\sqrt[5]{3}$ εἶναι ἀσύμμετροι καί ὁ $3 + \sqrt[5]{5}$ νά κατασκευασθεῖ μέ προσέγγιση 0,01.

199) *Αν α ἄρρητος καί ρ ρητός, νά ἀποδειχθεῖ ὅτι οἱ ἀριθμοί $\frac{1}{\alpha}$, $\frac{\alpha}{\rho}$, $\frac{\rho}{\alpha}$ εἶναι ἄρρητοι.

200) Νά ἀποδειχθεῖ μέ παραδείγματα ὅτι τό ἄθροισμα, τό γινόμενο καί τό πηλίκο δύο ἄρρητων, μπορεῖ νά εἶναι ρητός ἀριθμός.

201) *Αν $(\alpha, \beta, \gamma) \in \mathbb{Q}$ καί $\alpha + \beta \sqrt{2} = \gamma \sqrt{3}$, τότε $\alpha = \beta = \gamma = 0$.

202) Νά βρεθοῦν οἱ τιμές τῶν σύμμετρων λ καί μ, ἂν ὁ ἀριθμός $(\lambda - \mu) \sqrt{2} - (2\mu - 1)$ εἶναι ἴσος μέ τόν $\sqrt{2}$.

203) Στόν ἀξονα τῶν πράγματικῶν ἀριθμῶν Χ’ΟΧ νά βρεθοῦν σημεῖα, πού νά ἔχουν γεωμετρικές εἰκόνες τοῦς ἀριθμούς $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, $\sqrt{5}$, ... (χρησιμοποίηστε τό πυθαγόρειο θεώρημα).

204) Νά ἀποδειχθεῖ ὅτι: $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$ θά ἔχουμε $|\alpha - \beta| = |\beta - \alpha|$

205) *Αν $|x - 10| < 5$, τότε $5 < x < 15$ καί ἀντιστρόφως.

206) Νά ἀπλοποιηθεῖ τό κλάσμα $(|x| + 8x^2) / (8|x| + 1)$

207) *Αν $x = \sqrt{2} + 1$, νά βρεθεῖ ἡ τιμή τῆς παραστάσεως:

$$A = -2|2x - 1| - 3|\sqrt{2} - x| - 7|3x - (\sqrt{2} + 3)| - 3|x|$$

‘Ομάδα β’

208) *Αν x ἀσύμμετρος καί α, β, γ, δ σύμμετροι, μέ ποιά συνθήκη ἡ παράσταση $\frac{\alpha x + \beta}{\gamma x + \delta}$ εἶναι ἀριθμός σύμμετρος:

209) *Αν $\alpha \in \mathbb{R}$, νά ἀποδειχθεῖ ὅτι δέν εἶναι ποτέ $-|\alpha| < \alpha < |\alpha|$

210) Νά ἀποδειχθεῖ ὅτι: $\forall \alpha \in \mathbb{R}^-$ καί $n \in \mathbb{N}$ θά ἔχουμε $|\alpha|^{2n+1} = -\alpha^{2n+1}$

211) *Αν $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ καί $|\alpha| + |\beta| < 0$, τί συμπεραίνετε γιά τοῦς α, β;

212) Νά ἀποδειχθεῖ ἡ ἰσοδυναμία: $|x - \alpha| < \theta \Leftrightarrow \begin{cases} \theta > 0 \\ \alpha - \theta < x < \alpha + \theta \end{cases}$

213) *Αν $x \in \mathbb{R}^+$, νά ἀποδειχθεῖ ὅτι ἀπό τή σχέση $|x| > \alpha > 0$ ἔπεται ἡ $0 < \alpha < x < +\infty$ καί ἂν $x \in \mathbb{R}^-$ ἢ $-\infty < x < -\alpha < 0$

214) "Αν $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, νά αποδειχθεί ότι $\alpha^2 + \beta^2 > 2|\alpha| \cdot |\beta|$

215) Νά βρεθεί ή τιμή τής παραστάσεως:

$$7|\alpha - \beta| - 3|\beta - \alpha| + 2|\alpha + \beta| - |2\alpha - \beta|, \text{ ἄν } \alpha > \beta > 0$$

216) "Αν $-5 < x < 12$, νά βρεθεί τό σύνολο τιμών τής παραστάσεως

$$A = -3|x - 6| + |x + 13| - 2|2x - 11| - |12 - x|$$

ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΒΛΘΜΟΥ

70. ΟΡΙΣΜΟΙ

Στήν προηγούμενη τάξη είδαμε ότι τό σύνολο τών λύσεων μιᾶς γραμμικῆς ἔξισώσεως $ax + \beta\psi = \gamma$, ὅπου $a, \beta \in \mathbb{Q}$, εἶναι ὑποσύνολο τοῦ συνόλου $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$, μέ ἄπειρα στοιχεῖα τῆς μορφῆς $\left(x, \psi = \frac{\gamma - ax}{\beta}\right)$.

Πολλές φορές ὁμως μᾶς ἐνδιαφέρουν μόνο οἱ ἀκέραιες λύσεις τῆς ἔξισώσεως $ax + \beta\psi = \gamma$, δηλαδή οἱ λύσεις τῆς μορφῆς $(x, \psi) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$.

Τούς συντελεστῆς $a, \beta, \gamma \in \mathbb{Q}$ μπορούμε πάντοτε νά τούς θεωροῦμε ἀκέραιους. Γιατί;

Ἔργο τῆς ἀπροσδιόριστης ἀναλύσεως **α'** βαθμοῦ, καθώς λέγεται, εἶναι ἡ ἔρευνα γιά τήν ὑπαρξη καί ἡ εὕρεση τών ἀκέραιων λύσεων μιᾶς ἔξισώσεως **α'** βαθμοῦ μέ ἀκέραιους συντελεστῆς καί ἀγνώστους (μεταβλητές) ὁσοῦσδήποτε μέ πλῆθος πεπερασμένο ἢ καί συστήματος **α'** βαθμοῦ μέ πλῆθος ἔξισώσεων μικρότερο ἀπό τό πλῆθος τών ἀγνώντων.

71.* ΑΚΕΡΑΙΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΞΙΣ. $ax + \beta\psi = \gamma$, ὅπου $a, \beta, \gamma \in \mathbb{Z}$.

α) Προτάσεις γιά τήν ἀναζήτηση ἀκέραιων λύσεων τῆς $ax + \beta\psi = \gamma$ (1)

1. Ἐν οἱ a, β, γ ἔχουν Μ.Κ.Α. $\delta \neq 1$, τότε ἡ ἔξισωση (1) εἶναι ἰσοδύναμη τῆς

$$\text{ἔξισ. } \frac{a}{\delta} x + \frac{\beta}{\delta} \psi = \frac{\gamma}{\delta}$$

Ἄποδειξη: Ἡ πρόταση εἶναι φανερή, γιατί διαιροῦμε τά μέλη τῆς (1) μέ τό δ . Ἔτσι μπορούμε νά ὑποθέτουμε πάντοτε τούς a, β, γ πρώτους μεταξύ τους.

(*) Ὁ Ἕλληνας Μαθηματικός Διόφαντος ὁ Ἀλεξανδρεὺς (360 μ.Χ.) ἔρευνῆσε καί βρῆκε τίς ἀκέραιες λύσεις τέτοιων ἔξισώσεων μέχρι 4ου βαθμοῦ, γι' αὐτό καί ὀνομάζονται **διοφαντικές ἔξισώσεις** καί ἡ ἀπροσδιόριστη ἀνάλυση **διοφαντικῆ ἀνάλυσης**.

2. "Αν α, β, γ είναι πρώτοι μεταξύ τους και α, β έχουν κοινό διαιρέτη $\delta \neq 1$, ή εξίσωση (1) δέν έχει άκεραiah λύση.

"Απόδειξη: 'Ο δ δέ διαιρεί τόν γ , διαιρεί όμως τούς όρους αx και βy και άρα τό άθροισμα $\alpha x + \beta y$, γιατί $x, y \in Z$. 'Επομένως, άν $x, y \in Z$, τά μέλη τής εξίσ. (1), ποτέ δέ γίνονται ίσα και επομένως ή εξίσωση είναι αδύνατη. Δηλαδή δέν έχει άκεραiah λύση.

3. "Αν α, β πρώτοι μεταξύ τους, ή εξίσωση (1) έχει άκεραiah λύση.

"Απόδειξη: Μπορούμε πάντοτε νά υποθέτουμε $\alpha > 0$. 'Η εξίσωση (1) γράφεται: $x = \frac{\gamma - \beta y}{\alpha}$ (2).

"Αν στήν (2) αντί για τό y θέσουμε τίς διαδοχικές άκεραιες τιμές $0, 1, 2, 3, \dots, \alpha - 1$ (πλήθους α), παίρνουμε τίς λύσεις:

$$(3) \left(\frac{\gamma}{\alpha}, 0 \right), \left(\frac{\gamma - \beta}{\alpha}, 1 \right), \left(\frac{\gamma - 2\beta}{\alpha}, 2 \right), \dots, \left(\frac{\gamma - \beta(\alpha - 1)}{\alpha}, \alpha - 1 \right)$$

"Εστω τώρα $\pi_0, \pi_1, \pi_2, \dots, \pi_{\alpha-1}$ τά άκεραiah πηλίκα και $u_0, u_1, u_2, \dots, u_{\alpha-1}$ άντιστοιχως, τά μή άρνητικά υπόλοιπα τών διαιρέσεων

$$\frac{\gamma}{\alpha}, \frac{\gamma - \beta}{\alpha}, \dots, \frac{\gamma - \beta(\alpha - 1)}{\alpha} \quad (4).$$

"Αν υπάρχουν άρνητικά υπόλοιπα, τά κάνουμε θετικά, όταν αύξήσουμε τήν άπόλυτη τιμή του πηλίκου κατά μία μονάδα. Π.χ. ή διαίρεση $\frac{-17}{5}$ έχει πηλίκο -3 και υπόλοιπο -2 . Παίρνουμε ως πηλίκο τό -4 , όποτε τό υπόλοιπο είναι $+3$.

Τά υπόλοιπα αυτά, α στό πλήθος, είναι μικρότερα άπό τόν α και διαφορετικά μεταξύ τους. Γιατί άν είναι $u_k = u_\lambda$, ($k < \lambda < \alpha$), τότε θά έχουμε:

$$\left. \begin{aligned} \gamma - \beta \cdot k &= \alpha \pi_k + u_k \\ \gamma - \beta \cdot \lambda &= \alpha \pi_\lambda + u_\lambda \end{aligned} \right\} \Rightarrow \beta(\lambda - k) = \alpha(\pi_k - \pi_\lambda) \Rightarrow \frac{\beta(\lambda - k)}{\alpha} = \pi_k - \pi_\lambda = \text{άκεραιος.}$$

Τούτο όμως είναι άτοπο, γιατί α, β πρώτοι μεταξύ τους και $0 < \lambda - k < \alpha$. Δηλαδή ό α δέ διαιρεί τόν β ούτε τόν $\lambda - k$.

"Ωστε όλα τά υπόλοιπα είναι διαφορετικά μεταξύ τους και επειδή είναι σέ πλήθος α και μικρότερα άπό τόν α , ένα άπό αυτά πρέπει νά είναι 0. Τότε όμως ένας άπό τούς ρητούς άριθμούς (4) είναι άριθμός άκεραιος και άρα μία άπό τίς λύσεις (3) είναι άκεραiah λύση τής εξισώσεως (1).

4. "Αν ή εξίσωση $\alpha x + \beta y = \gamma$ (1), μέ $\alpha, \beta, \gamma \in Z$, έχει μία άκεραiah λύση, τήν (x_0, y_0) , θά έχει και άλλες άπειρες σέ πλήθος λύσεις τής μορφής $(x_0 - \beta \cdot \lambda, y_0 + \alpha \cdot \lambda)$ και μόνο αυτές, όπου $\lambda \in Z$.

"Απόδειξη: "Αν α, β πρώτοι μεταξύ τους, κατά τήν πρόταση (3), ή εξίσωση (1) έχει μία άκεραiah λύση, έστω τήν (x_0, y_0) . 'Υποθέτουμε ότι έχει και άλλη άκεραiah λύση, τήν (x_k, y_k) .

Τότε θα έχουμε :

$$\left. \begin{array}{l} \alpha x_0 + \beta \psi_0 = \gamma \\ \alpha x_k + \beta \psi_k = \gamma \end{array} \right\} \Rightarrow \alpha(x_k - x_0) + \beta(\psi_k - \psi_0) = 0 \Rightarrow x_k - x_0 = -\frac{\beta}{\alpha}(\psi_k - \psi_0).$$

Ἡ ἰσότητα αὐτή εἶναι ἀληθής, μόνο ἂν ὁ α διαιρεῖ τὴν $\psi_k - \psi_0$ ὅπου $k \in \mathbb{Z}$.

Ἐστω $\frac{\psi_k - \psi_0}{\alpha} = \lambda \in \mathbb{Z}$, τότε $\psi_k = \psi_0 + \alpha\lambda$, $x_k = x_0 - \beta\lambda$.

Ἀντιστρόφως : Κάθε ζεύγος τῆς μορφῆς $(x_0 - \beta\lambda, \psi_0 + \alpha\lambda)$ εἶναι λύση ἀκέραιη τῆς (1).

Πράγματι :

$$\alpha(x_0 - \beta\lambda) + \beta(\psi_0 + \alpha\lambda) = \alpha x_0 - \alpha\beta\lambda + \beta\psi_0 + \alpha\beta\lambda = \alpha x_0 + \beta\psi_0 = \gamma.$$

Ὡστε, ἂν ἡ ἐξίσωση (1) ἔχει μίαν ἀκέραιη λύση, τὴν (x_0, ψ_0) , τότε θὰ ἔχει καὶ ἄλλες ἄπειρες σὲ πλῆθος ἀκέραιες λύσεις, πού λαμβάνονται ἀπὸ τοὺς τύπους :

$$(5) \quad \boxed{\begin{array}{l} x = x_0 - \beta\lambda \quad \eta \quad x = x_0 + \beta\lambda \\ \psi = \psi_0 + \alpha\lambda \quad \psi = \psi_0 - \alpha\lambda, \end{array} \quad \text{ὅπου } \lambda \in \mathbb{Z}}$$

β) Πῶς θὰ βροῦμε μίαν ἀκέραιη λύση τῆς ἐξισώσεως $\alpha x + \beta \psi = \gamma$ (1)

Γιὰ νὰ ἐφαρμόσουμε τοὺς τύπους (5), πρέπει νὰ βροῦμε μόνο μίαν ἀπὸ τίς ἀκέραιες λύσεις τῆς (1), τὴν (x_0, ψ_0) . Γιὰ τὸ σκοπὸ αὐτὸ λύνουμε τὴν ἐξίσωση (1) ὡς πρὸς τὸν ἄγνωστο ἐκεῖνο, πού ἔχει τὸ μικρότερο συντελεστή.

Π.χ., ἂν $\alpha < \beta$, τότε $x = \frac{\gamma - \beta\psi}{\alpha}$. Ἐπειτα, κατὰ τὴν πρόταση (3), θέτουμε ὅπου $\psi = 0, 1, 2, \dots, \alpha - 1$, ὥσπου νὰ βροῦμε x ἀκέραιο.

Ἄν οἱ συντελεστὲς α καὶ β εἶναι μεγάλοι ἀριθμοί, ὁ προηγούμενος τρόπος εἶναι ἐπίπονος, γιὰ τοῦτο ἐργαζόμεσθε ὡς ἑξῆς: Λύνουμε τὴν ἐξίσωση ὡς πρὸς τὸν ἄγνωστο ἐκεῖνο, πού ἔχει τὸ μικρότερο συντελεστή. Π.χ., ἂν $\alpha < \beta$, τότε:

$$x = \frac{\gamma - \beta\psi}{\alpha} = \frac{\gamma}{\alpha} - \frac{\beta}{\alpha}\psi = \pi_1 + \frac{v_1}{\alpha} - \left(\pi_2 + \frac{v_2}{\alpha}\right)\psi = \pi_1 - \pi_2\psi + \frac{v_1 - v_2\psi}{\alpha},$$

ὅπου π_1, π_2 πηλικά καὶ v_1, v_2 ὑπόλοιπα τῶν διαιρέσεων $\gamma:\alpha$ καὶ $\beta:\alpha$. Γιὰ νὰ εἶναι ὁ x ἀκέραιος πρέπει τὸ κλάσμα $\frac{v_1 - v_2\psi}{\alpha}$ νὰ εἶναι ἀκέραιος ἀριθμὸς ω .

$$\text{Δηλαδή } \frac{v_1 - v_2\psi}{\alpha} = \omega \Leftrightarrow \alpha\omega + v_2\psi = v_1.$$

Αὐτὴ ἔχει ἀκέραιες λύσεις, γιατί οἱ α καὶ v_2 εἶναι πρῶτοι μεταξὺ τους. (Ὁ Μ.Κ.Δ. δύο ἀριθμῶν δὲ μεταβάλλεται, ἂν ἀντικαταστήσουμε τὸ μεγαλύτερο ἀριθμὸ μὲ τὸ ὑπόλοιπο τῆς διαιρέσεώς του διὰ τοῦ ἄλλου.) Ἐπειδὴ $v_2 < \alpha$,

γι' αυτό ή εξίσωση $\alpha\omega + \nu_2\psi = \nu_1$ είναι πιό άπλη από την $\alpha x + \beta\psi = \gamma$, όποτε βρίσκουμε μιά άκέραιη λύση της, την (ψ_0, ω_0) . Έτσι ή εξίσωση :

$$x = \pi_1 - \pi_2\psi + \frac{\nu_1 - \nu_2\psi}{\alpha} \text{ γράφεται : } x_0 = \pi_1 - \pi_2\psi_0 + \omega_0.$$

Τό (x_0, ψ_0) είναι μιά άκέραιη λύση τής εξισώσεως (1).

Σημ. "Αν και ή εξίσωση $\alpha\omega + \nu_2\psi = \nu_1$ έχει τούς συντελεστές α και ν_2 μεγάλους, τότε συνεχίζουμε ώσπου νά βρούμε μικρούς συντελεστές.

Παραδείγματα : 1) Νά βρεθοῦν οί άκέραιες λύσεις τής εξισώσεως $3x + 5\psi = 11$.

Έπίλυση : "Έχουμε $x = \frac{11 - 5\psi}{3}$. Θέτουμε $\psi = 0, 1, 2$. Μέ $\psi = 0$ έχουμε

$$x = \frac{11}{3}, \text{ ένω μέ } \psi = 1 \text{ έχουμε } x = \frac{11 - 5}{3} = 2. \text{ Τό ζεύγος λοιπόν } (2, 1) \text{ είναι}$$

μιά άκέραιη λύση τής εξισώσεως. "Αν εφαρμόσουμε τούς τύπους (5) μέ $(x_0, \psi_0) = (2, 1)$, έχουμε τό σύνολο τών λύσεων τής $3x + 5\psi = 11$.

$$\text{Δηλαδή: } \left. \begin{array}{l} x = 2 - 5\kappa \quad \eta \quad x = 2 + 5\kappa \\ \psi = 1 + 3\kappa \quad \psi = 1 - 3\kappa \end{array} \right\} \text{ όπου } \kappa \in \mathbb{Z}$$

Σημείωση. Γιά νά βρούμε τίς θετικές μόνο άκέραιες λύσεις, βρίσκουμε τίς τιμές του κ , μέ τίς όποιες συναληθεύουν οί ανισώσεις $2 - 5\kappa > 0$ και $1 + 3\kappa > 0$.

"Έτσι έχουμε: $-\frac{1}{3} < \kappa < \frac{2}{5} \Rightarrow \kappa = 0$. "Άρα μέ $\kappa = 0$ έχουμε $(x, \psi) = (2, 1)$.

2) Νά αναλυθεί τό κλάσμα $\frac{176}{221}$ σέ άθροισμα ή διαφορά δύο άλλων ρητών κλασμάτων μέ παρονομαστές 13 και 17.

Έπίλυση. "Αν τά κλάσματα πού ζητούμε είναι $\frac{x}{13}$ και $\frac{\psi}{17}$, τότε θά έχουμε

$$\frac{x}{13} + \frac{\psi}{17} = \frac{176}{221} \Leftrightarrow 17x + 13\psi = 176. \quad (1)$$

Βρίσκουμε τίς άκέραιες λύσεις τής εξισώσεως (1).

$$\text{"Έχουμε } \psi = \frac{176 - 17x}{13} = \frac{176}{13} - \frac{17}{13}x = 13 - x + \frac{7 - 4x}{13} = 13 - x + \omega.$$

Τής εξισώσεως $\omega = \frac{7 - 4x}{13}$ ή $13\omega + 4x = 7$ ή $x = \frac{7 - 13\omega}{4}$ μιά άκέραιη λύση είναι $(x, \omega) = (-8, 3)$ και έπομένως $\psi = 13 - (-8) + 3 = 24$.

"Έτσι, μιά άκέραιη λύση τής (1) είναι ή $(x_0, \psi_0) = (-8, 24)$ και τό σύνολο τών λύσεων της δίνεται από τούς τύπους:

$$\left. \begin{array}{l} x = -8 - 13\kappa \quad \eta \quad x = -8 + 13\kappa \\ \psi = 24 + 17\kappa \quad \psi = 24 - 17\kappa \end{array} \right\} \text{ όπου } \kappa \in \mathbb{Z}$$

$$\text{Μέ } \kappa = 0 \text{ έχουμε } (x_0, \psi_0) = (-8, 24) \text{ και άρα } -\frac{8}{13} + \frac{24}{17} = \frac{176}{221}$$

$$\text{» } \kappa = 1 \text{ » } (x_1, \psi_1) = (-21, 41) \text{ » » } -\frac{21}{13} + \frac{41}{17} = \frac{176}{221}$$

72. ΑΚΕΡΑΙΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Α' ΒΑΘΜΟΥ ΔΥΟ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥΣ

$$\text{*Εστω τό σύστημα } \begin{cases} (1) & \alpha_1 x + \beta_1 \psi + \gamma_1 \omega = \delta_1 \\ (2) & \alpha_2 x + \beta_2 \psi + \gamma_2 \omega = \delta_2 \end{cases} \left. \begin{array}{l} \alpha_1, \beta_1, \gamma_1, \delta_1 \in \mathbb{Z} \\ \alpha_2, \beta_2, \gamma_2, \delta_2 \in \mathbb{Z} \end{array} \right\}$$

Τούς συντελεστές $\alpha_1, \beta_1, \gamma_1, \delta_1$ καθώς και τούς $\alpha_2, \beta_2, \gamma_2, \delta_2$ μπορούμε νά τούς υποθέσουμε πρώτους μεταξύ τους, γιατί άν δέν είναι, διαιρούμε τά μέλη τών (1) και (2) μέ τό Μ.Κ.Δ. τους.

Πρώτα παρατηρούμε ότι τό σύστημα δέν έχει άκέραιη λύση άν $\alpha_1, \beta_1, \gamma_1, \delta_1$ είναι πρώτοι μεταξύ τους και $\alpha_1, \beta_1, \gamma_1$ έχουν Μ.Κ.Δ. $\delta' \neq 1$. Επίσης άν $\alpha_2, \beta_2, \gamma_2, \delta_2$ είναι πρώτοι μεταξύ τους και $\alpha_2, \beta_2, \gamma_2$ έχουν Μ.Κ.Δ. $\delta'' \neq 1$ (πρόταση § 72/2).

*Υποθέτουμε, λοιπόν, ότι $\alpha_1, \beta_1, \gamma_1$ και $\alpha_2, \beta_2, \gamma_2$ είναι πρώτοι μεταξύ τους και άπαλείφουμε τόν έναν άγνωστο μεταξύ τών εξισώσεων (1) και (2), έστω τόν ω .

*Έτσι έχουμε: $(\alpha_1 \gamma_2 - \alpha_2 \gamma_1)x + (\beta_1 \gamma_2 - \beta_2 \gamma_1)\psi = \delta_1 \gamma_2 - \delta_2 \gamma_1$ (3). *Αν ή (3) έχει άκέραιες λύσεις, τότε τό σύνολο τών λύσεων αυτών θά δίνεται από τούς τύπους :

$$\left. \begin{array}{l} x = x_0 - (\beta_1 \gamma_2 - \beta_2 \gamma_1)\kappa \\ \psi = \psi_0 + (\alpha_1 \gamma_2 - \alpha_2 \gamma_1)\kappa \end{array} \right\} \quad (4)$$

Τίς τιμές (4) τών x και ψ θέτουμε σέ μιά από τίς εξισώσεις του συστήματος, έστω στήν (1), όποτε λαμβάνουμε μετά τίς πράξεις

$$\kappa \gamma_1 (\alpha_1 \beta_2 - \alpha_2 \beta_1) + \gamma_1 \omega = \delta_1 - \alpha_1 x - \beta_1 \psi \quad (5)$$

*Αν ή (5) έχει άκέραιες λύσεις, τότε τό σύνολο τών λύσεων της θά δίνεται από τούς τύπους :

$$\left. \begin{array}{l} \kappa = \kappa_0 - \gamma_1 \lambda \\ \omega = \omega_0 + \gamma_1 (\alpha_1 \beta_2 - \alpha_2 \beta_1) \lambda \end{array} \right\} \lambda \in \mathbb{Z} \quad (6)$$

Τήν τιμή του κ θέτουμε στους τύπους (4), όποτε λαμβάνουμε:

$$\boxed{\begin{array}{l} x = x_0 - (\beta_1 \gamma_2 - \beta_2 \gamma_1) (\kappa_0 - \gamma_1 \lambda) \\ \psi = \psi_0 + (\alpha_1 \gamma_2 - \alpha_2 \gamma_1) (\kappa_0 - \gamma_1 \lambda) \\ \omega = \omega_0 + \gamma_1 (\alpha_1 \beta_2 - \alpha_2 \beta_1) \lambda \end{array}}$$

Οι τύποι αυτοί δίνουν τις άκεράιες λύσεις του συστήματος.

Σημείωση: Κατά την απαλοιφή του ενός άγνωστου μεταξύ των εξισώσεων (1) και (2), προτιμούμε τον άγνωστο εκείνο, που οι συντελεστές του είναι πρώτοι μεταξύ τους. Γιατί;

Παράδειγμα: Νά βρεθούν οι άκεράιες λύσεις του συστήματος:

$$(1) \quad 4x + 3\psi + \omega = 4 \quad \text{και} \quad 5x - 6\psi - 3\omega = 7 \quad (2)$$

Έπιλυση: Απαλείφουμε τον άγνωστο ω , όποτε λαμβάνουμε:
 $16x + 3\psi = 22$ (3). Βρίσκουμε τις άκεράιες λύσεις της (3).

Έχουμε: $\psi = \frac{22-16x}{3}$. Μιά άκεράια λύση της είναι $(x_0, \psi_0) = (1, 2)$ και τό σύνολο των λύσεων δίνεται από τούς τύπους:

$$\left. \begin{aligned} x &= 1 - 3\kappa \\ \psi &= 2 + 16\kappa \end{aligned} \right\} (4), \quad \text{όπου } \kappa \in \mathbb{Z}.$$

Η εξίσωση (1) μέ τούς (4) γίνεται:

$$4(1 - 3\kappa) + 3(2 + 16\kappa) + \omega = 5 \Leftrightarrow 36\kappa + \omega = -5 \quad \eta \quad \omega = -5 - 36\kappa.$$

Μιά άκεράια λύση της εξισώσεως αυτής είναι $(\kappa_0, \omega_0) = (0, -5)$ και τό σύνολο των λύσεών της δίνεται από τούς τύπους:

$$\left. \begin{aligned} \kappa &= 0 - \lambda \\ \omega &= -5 + 36\lambda \end{aligned} \right\} (5), \quad \text{όπου } \lambda \in \mathbb{Z}.$$

Τήν τιμή $\kappa = -\lambda$ θέτουμε στους τύπους (4), όποτε λαμβάνουμε τούς τύπους:

$$\left. \begin{aligned} x &= 1 + 3\lambda \\ \psi &= 2 - 16\lambda \\ \omega &= -5 + 36\lambda \end{aligned} \right\} (6).$$

Γιά $\lambda \in \mathbb{Z}$ δίνουν τις άκεράιες λύσεις του συστήματος.

Μέ $\lambda = 0$ έχουμε $(x_0, \psi_0, \omega_0) = (1, 2, -5)$

» $\lambda = 1$ » $(x_1, \psi_1, \omega_1) = (4, -14, 31)$ κ.ο.κ.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

217) Νά βρεθούν οι άκεράιες λύσεις των εξισώσεων:

- | | | |
|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1) $3x + 5\psi = -12,$ | 2) $-x + 4\psi = 1,$ | 3) $7x - 9\psi = -28,$ |
| 4) $13x + 21\psi = 91,$ | 5) $53x + 29\psi = 108,$ | 6) $40x + 51\psi = 121$ |

218) Νά βρεθούν οι άκεράιες και θετικές τιμές του x , που κάνουν άκεράιες και θετικές τις ακόλουθες παραστάσεις:

$$1) \quad \frac{7x-15}{3}, \quad 2) \quad \frac{133-2x}{3}, \quad 3) \quad \frac{1053-31x}{14}$$

219) Νά αναλυθεί τό κλάσμα $\frac{1}{15}$ σέ άθροισμα δύο ρητών κλασμάτων, μέ παρονομαστές 3 καί 5 άντιστοιχώς.

220) Ένα χαρτονόμισμα τών 50 δρχ. μέ πόσους τρόπους μπορεί νά άλλαχθει μέ κέρματα τών 2 καί 5 δραχμών;

221) Νά βρεθει αριθμός, πού άν διαιρεθει μέ 5 νά δίνει υπόλοιπο 3, καί άν διαιρεθει μέ 7, νά δίνει υπόλοιπο 2.

222) Νά βρεθει διψήφιος αριθμός τέτοιος, ώστε τό ένα τρίτο τής διαφοράς του ψηφίου τών δεκάδων άπό τόν αριθμό, νά ίσούται μέ τό διπλάσιο του ψηφίου τών μονάδων, όταν αύξηθει κατά 5.

223) Νά βρεθοῦν οι άκέραιες λύσεις τών συστημάτων:

$$\begin{array}{l} 1) \left| \begin{array}{l} x + 2\psi - \omega = -4 \\ 3x - 4\psi + 2\omega = 17 \end{array} \right. \quad 2) \left| \begin{array}{l} 7x + 5\psi + 6\omega = 18 \\ 4x + 2\psi + 3\omega = 9 \end{array} \right. \quad 3) \left| \begin{array}{l} 6x - 4\psi + 3z = 30 \\ 3x + 6\psi - 2z = 25 \end{array} \right. \\ 4) \left| \begin{array}{l} 3x + 6\psi - 5\omega = 11 \\ -x + 7\psi - 2\omega = -16 \end{array} \right. \quad 5) \left| \begin{array}{l} 7x - 5\psi = 4 \\ 11x + 13\omega = 103 \end{array} \right. \end{array}$$

224) Νά βρεθει τριψήφιος αριθμός, πού τά ψηφία του νά έχουν άθροισμα 7, καί άν αλλάξουν θέση τά ψηφία εκατοντάδων καί μονάδων του, τότε ό αριθμός δέν αλλάζει.

225) Νά βρεθοῦν δύο άκέραιοι καί θετικοί αριθμοί, πού νά έχουν άθροισμα 100, καί τό υπόλοιπο τής διαιρέσεως του ενός διά του 7 νά είναι 1, ενώ του άλλου διά του 9 νά είναι 7.

226) Τρεις κτηνοτρόφοι έχουν μαζί 111 ζώα. Ό αριθμός τών ζώων του α' κτηνοτρόφου είναι διαιρετός διά 2, του β' διαιρετός διά 5 καί του γ' διά 7. Πόσα ζώα έχει κάθε κτηνοτρόφος, άν τό τριπλάσιο τών ζώων του α', τό διπλάσιο τών ζώων του β' καί τό πενταπλάσιο τών ζώων του γ' έχουν άθροισμα 400;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ X

ΠΕΡΙ ΡΙΖΩΝ

τῶν πραγματικῶν ἀριθμῶν ἢ παραστάσεων

73. Στό Γυμνάσιο εἶδαμε ὅτι κάθε ἀριθμός $\alpha \in \mathbb{R}_0^+$ εἶναι τετράγωνο ἄλλου πραγματικοῦ ἀριθμοῦ x , πού ὀνομάσθηκε τετραγωνική ρίζα (ἢ ρίζα β' τάξεως) τοῦ α , καί ἐξετάσαμε τίς ιδιότητες καί τίς πράξεις αὐτῶν τῶν ριζῶν.

Τώρα θά γενικεύσουμε τήν ἔννοια τῆς ρίζας τῶν πραγματικῶν ἀριθμῶν.

Ὁρισμός. Ἐστω ἀριθμός $\alpha \in \mathbb{R}$ καί $n \in \mathbb{N}$ καί $n > 1$. Ἄν ὑπάρχει ἄλλος ἀριθμός $x \in \mathbb{R}$, πού ὅταν ὑψωθεί στή νουστή δύναμη νά γίνεται ἴσος μέ τόν α , τότε λέμε ὅτι ὁ x εἶναι μιά νουστή ρίζα τοῦ α (ἢ ρίζα νουστής τάξεως τοῦ α).

Δηλαδή, ἂν $n = 2$, ὁ x εἶναι μιά τετραγωνική ρίζα τοῦ α ,
ἂν $n = 3$, ὁ x εἶναι τρίτη (κυβική) ρίζα τοῦ α .

Π.χ. τοῦ ἀριθμοῦ 25 μιά τετραγωνική ρίζα εἶναι ὁ $+5$, γιατί $(+5)^2 = 25$
τοῦ ἀριθμοῦ 25 μιά τετραγωνική ρίζα εἶναι ὁ -5 , γιατί $(-5)^2 = 25$
τοῦ ἀριθμοῦ 8 μιά τρίτη ρίζα (κυβική) εἶναι ὁ $+2$, γιατί $(+2)^3 = 8$
τοῦ ἀριθμοῦ -27 μιά κυβική ρίζα εἶναι ὁ -3 , γιατί $(-3)^3 = -27$
τοῦ ἀριθμοῦ -9 δέν ὑπάρχει τετραγωνική πραγματική ρίζα ἢ ρίζα ἄρτιας τάξεως, γιατί δέν ὑπάρχει πραγματικός ἀριθμός, πού ὅταν ὑψωθεί σέ ἄρτια δύναμη, γίνεται ἴσος μέ τόν -9 .

Ἐδῶ παρατηροῦμε ὅτι ἕνας πραγμ. ἀριθμός μπορεῖ νά ἔχει περισσότερες ἀπό μιά πραγματικές ρίζες, ὅπως ἐπίσης μπορεῖ νά μήν ἔχει πραγματική ρίζα ἄρτιας τάξεως.

Γενικά διακρίνουμε τίς ἀκόλουθες περιπτώσεις :

1) Ἄν $\alpha > 0$ καί $n \in \mathbb{N}$, τότε ἀποδεικνύεται ὅτι ὑπάρχει ἕνας καί μόνο ἕνας θετικός ἀριθμός x τέτοιος, ὥστε: $x^n = \alpha$. (Ἡ ἀπόδειξη σέ ἄλλη τάξη).
Ἄς δοῦμε ἂν ὑπάρχει ἀρνητικός ἀριθμός x τέτοιος, ὥστε: $x^n = \alpha$.

*Αν $n=2k+1$, όπου $k \in \mathbb{N}$, και $x < 0$, τότε $x^n < 0$, οπότε $x^n \neq \alpha$, γιατί $\alpha > 0$. Δηλαδή δεν υπάρχει ο x . *Αν $n=2k$, όπου $k \in \mathbb{N}$, τότε αν $x_0 > 0$ είναι η μοναδική θετική ρίζα της εξίσ. $x^n = \alpha$, δηλαδή $x_0^n = \alpha$, θα είναι ρίζα της εξίσ. $x^n = \alpha$ και ο αριθμός $-x_0 < 0$, διότι $(-x_0)^n = x_0^n = \alpha$.

2) *Αν $\alpha < 0$ και $n = 2k + 1$, όπου $k \in \mathbb{N}$, τότε υπάρχει ένας και μόνο ένας άρνητικός αριθμός x τέτοιος, ώστε: $x^n = \alpha < 0$.

*Αν $n = 2k$, τότε δεν υπάρχει πραγμ. αριθμός x , γιατί $x^n > 0$, οπότε $x^n \neq \alpha$.

*Από τὰ παραπάνω συμπεραίνουμε ότι:

Κάθε αριθμός $\alpha \in \mathbb{R}$ έχει: 1) μία και μόνο μία πραγμ. ρίζα x περιττής τάξεως ($n = 2k + 1$) θετική ή άρνητική, αν ο α είναι θετικός ή άρνητικός αντίστοιχως, πού λέγεται πρωτεύουσα νιοστή ρίζα του α , 2) δύο πραγματικές ρίζες x και $-x$ άρτιας τάξεως ($n = 2k$), αν ο $\alpha > 0$, από τις οποίες η θετική λέγεται πρωτεύουσα νιοστή ρίζα του α και 3) καμιά πραγματική ρίζα άρτιας τάξεως, αν $\alpha < 0$.

Τὴν πρωτεύουσα νιοστή ρίζα του α συμβολίζουμε $\sqrt[n]{\alpha}$. Τό σύμβολο $\sqrt[n]{\alpha}$ καλείται ριζικό, ὁ n δείκτης τῆς ρίζας καί τό α ὑπόρριζο. *Αν $n = 2$, τότε γράφουμε $\sqrt{\alpha}$, πού εκφράζει τὴν πρωτεύουσα τετραγωνική ρίζα του α .

Τὰ παραπάνω δικαιολογοῦν τὴ λογικὴ ἰσοδυναμία

$$x = \sqrt[n]{\alpha} \Leftrightarrow x^n = \alpha$$

καί συνέπεια αὐτῆς τῆς ἰσοδυναμίας εἶναι: $(\sqrt[n]{\alpha})^n = \alpha$.

*Ὡστε, τό σύμβολο $\sqrt[n]{\alpha}$ ἔχει τῆς ἀκόλουθες ἰδιότητες:

1) *Αν $\alpha > 0$ καί $n \in \mathbb{N}$, τότε $\sqrt[n]{\alpha} > 0$, ρητός ἢ ἄρρητος.

2) *Αν $\alpha < 0$ καί $n = 2k + 1$, $k \in \mathbb{N}$, τότε $\sqrt[n]{\alpha} < 0$, ρητός ἢ ἄρρητος.

3) *Αν $\alpha < 0$ καί $n = 2k$, τότε τό σύμβολο $\sqrt[n]{\alpha}$ δέν ἔχει ἔννοια πραγματικοῦ ἀριθμοῦ.

4) *Αν $\alpha \in \mathbb{R}$ καί $n = 2k$, ἀπό τὰ παραπάνω συνάγεται ὅτι $\sqrt[n]{\alpha^n} = |\alpha|$ καί ἂν $n = 2k + 1$, τότε $\sqrt[n]{\alpha^n} = \alpha = (\sqrt[n]{\alpha})^n$.

5) Σέ κάθε περίπτωση ὀρίζουμε: $\sqrt[n]{0} = 0$.

Παράδειγματα: Νά βρεθοῦν οἱ πρωτεύουσες ρίζες τῶν ἀριθμῶν:

$$\sqrt[3]{27}, \sqrt[3]{-27}, \sqrt[4]{16}, \sqrt[4]{-16}, \sqrt[5]{3}.$$

Λύση: Ἡ πρωτεύουσα κυβική ρίζα του 27 εἶναι ὁ ἀριθμός 3, γιατί

$$\sqrt[3]{27} = \sqrt[3]{3^3} = 3. \text{ Ἐπίσης ἔχουμε } \sqrt[3]{-27} = \sqrt[3]{(-3)^3} = -3.$$

Επίσης $\sqrt[4]{16} = \sqrt[4]{2^4}$ ή $\sqrt[4]{(-2)^4} = |2| = 2$.

Η $\sqrt[4]{-16}$ δέν έχει έννοια πραγματικού αριθμού.

Η πρωτεύουσα πέμπτη ρίζα του 3 είναι $\sqrt[5]{3} > 0$, άρρητος αριθμός.

74. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΡΙΖΩΝ

Βοηθητική πρόταση (Λήμμα). "Αν οί μυστές δυνάμεις δύο θετικών αριθμών είναι ίσοι αριθμοί, τότε και οί αριθμοί θά είναι ίσοι.

Απόδειξη : "Αν $\alpha, \beta \in \mathbb{R}^+$ και $\alpha^\mu = \beta^\mu$, όπου $\mu \in \mathbb{N}$, τότε είναι $\alpha^\mu - \beta^\mu = (\alpha - \beta)(\alpha^{\mu-1} + \alpha^{\mu-2}\beta + \dots + \beta^{\mu-1}) = 0$, όποτε $\alpha - \beta = 0$ ή $\alpha = \beta$, γιατί ό παράγοντας $\alpha^{\mu-1} + \alpha^{\mu-2}\beta + \dots + \beta^{\mu-1}$ είναι θετικός, έπειδή είναι άθροισμα θετικών προσθετέων.

Ιδιότητα 1η. "Αν $\alpha > 0$ και $n=2k+1$, ($k \in \mathbb{N}$), τότε $\sqrt[n]{-\alpha} = -\sqrt[n]{\alpha}$.

Τά μέλη τής Ισοτήτας αυτής είναι άρνητικά. "Αν όμως γραφεί $-\sqrt[n]{-\alpha} = \sqrt[n]{\alpha}$ γίνονται θετικά. "Υψώνουμε τά μέλη της στή νυοστή δύναμη και έχουμε:

$$(-\sqrt[n]{-\alpha})^n = -(\sqrt[n]{-\alpha})^n = -(-\alpha) = \alpha \quad \text{και} \quad (\sqrt[n]{\alpha})^n = \alpha,$$

άρα $-\sqrt[n]{-\alpha} = \sqrt[n]{\alpha}$ ή $\sqrt[n]{-\alpha} = -\sqrt[n]{\alpha}$.

Η ιδιότητα αυτή μάς επιτρέπει νά υποθέτουμε τά ύπόρριζα θετικά, γιατί σύμφωνα μέ αυτή τό πρόσημο (-) βγαίνει έξω από τό ριζικό γιά ριζικά περιττής τάξεως.

Στίς ακόλουθες ιδιότητες τά ύπόρριζα τά υποθέτουμε θετικά.

Ιδιότητα 2η. Οί ρίζες τής ίδιας τάξεως πολλαπλασιάζονται ή διαιρούνται, άν πολλαπλασιασθούν ή διαιρεθούν άντιστοιχως οί ύπόρριζες ποσότητες τους και τό έξαγόμενο τεθεί ώς ύπόρριζο ριζικού τής ίδιας τάξεως.

Απόδειξη : "Αν $\sqrt[n]{\alpha}$ και $\sqrt[n]{\beta}$, όπου $\alpha, \beta \in \mathbb{R}^+$, είναι πρωτεύουσες ρίζες, τότε $\sqrt[n]{\alpha} > 0$ και $\sqrt[n]{\beta} > 0$. Θα άποδείξουμε ότι είναι:

$$\sqrt[n]{\alpha} \cdot \sqrt[n]{\beta} = \sqrt[n]{\alpha\beta} \quad (1) \quad \text{και} \quad \sqrt[n]{\alpha} : \sqrt[n]{\beta} = \sqrt[n]{\alpha : \beta} \quad (2)$$

"Υψώνουμε τά μέλη τών Ισοτήτων στή νυοστή δύναμη. "Εχουμε:

$$1) (\sqrt[n]{\alpha} \cdot \sqrt[n]{\beta})^n = (\sqrt[n]{\alpha})^n \cdot (\sqrt[n]{\beta})^n = \alpha \cdot \beta \quad \text{και} \quad (\sqrt[n]{\alpha\beta})^n = \alpha\beta,$$

Άρα κατά τη βοηθητική πρόταση έχουμε $\sqrt[n]{\alpha} \cdot \sqrt[n]{\beta} = \sqrt[n]{\alpha\beta}$

$$2) \left(\frac{\sqrt[n]{\alpha}}{\sqrt[n]{\beta}} \right)^n = \left(\frac{\sqrt[n]{\alpha}}{\sqrt[n]{\beta}} \right)^n = \frac{\alpha}{\beta} \text{ και } (\sqrt[n]{\alpha} : \beta)^n = \alpha : \beta = \frac{\alpha}{\beta}$$

Άρα κατά τη βοηθητική πρόταση έχουμε $\sqrt[n]{\alpha} : \sqrt[n]{\beta} = \sqrt[n]{\alpha} : \beta$

Παρατήρηση: Οι Ισότητες (1) και (2) γράφονται και έτσι:

$$\sqrt[n]{\alpha\beta} = \sqrt[n]{\alpha} \cdot \sqrt[n]{\beta} \text{ και } \sqrt[n]{\alpha} : \beta = \sqrt[n]{\alpha} : \sqrt[n]{\beta}$$

Ιδιότητα 3η. Ένας θετικός παράγοντας ή διαιρέτης ριζικού μπορεί να τεθεί μέσα στο ριζικό, σάν παράγοντας ή διαιρέτης του υπόρριζου, αφού ύψωθεί σε δύναμη ίση με τό δείκτη του ριζικού, και αντίστροφα.

Απόδειξη: *Αν $\alpha > 0$ και $\sqrt[n]{\beta}$ πρωτεύουσα νουστή ρίζα του $\beta > 0$,

τότε θά αποδείξουμε ότι: $\alpha\sqrt[n]{\beta} = \sqrt[n]{\alpha^n\beta}$ (1) και $\frac{\sqrt[n]{\beta}}{\alpha} = \sqrt[n]{\frac{\beta}{\alpha^n}}$ (2)

*Έχουμε: 1) $\alpha\sqrt[n]{\beta} = \sqrt[n]{\alpha^n} \cdot \sqrt[n]{\beta} = \sqrt[n]{\alpha^n \cdot \beta}$

$$2) \frac{\sqrt[n]{\beta}}{\alpha} = \frac{\sqrt[n]{\beta}}{\sqrt[n]{\alpha^n}} = \sqrt[n]{\frac{\beta}{\alpha^n}}, \text{ γιατί } \alpha = \sqrt[n]{\alpha^n}$$

Οι Ισότητες (1) και (2) Ισχύουν και αντίστροφα. Γιατί;

Ιδιότητα 4η. Για να βγάλουμε τή ρίζα άλλης ρίζας αριθμού $a \in \mathbb{R}^+$, άρκει να βγάλουμε τή ρίζα του αριθμού a με δείκτη τό γινόμενο των δεικτών.

Απόδειξη. Θά αποδείξουμε ότι: $\sqrt[n]{\sqrt[m]{\alpha}} = \sqrt[nm]{\alpha}$ (1)

Υψώνουμε τά μέλη τής Ισότητας στή δύναμη mn .

$$\text{*Έχουμε: } \left(\sqrt[n]{\sqrt[m]{\alpha}} \right)^{mn} = \left[\left(\sqrt[n]{\sqrt[m]{\alpha}} \right)^n \right]^m = \left(\sqrt[m]{\alpha} \right)^m = \alpha \text{ και } \left(\sqrt[nm]{\alpha} \right)^{mn} = \alpha$$

Ωστε, κατά τή βοηθητική πρόταση, τά μέλη τής (1) είναι ίσα.

Ιδιότητα 5η. Μιά ρίζα ύψώνεται σε δύναμη, όταν ύψωθεί στή δύναμη αυτή τό υπόρριζο και τό έξαγόμενο τεθεί ως υπόρριζο ριζικού τής ίδιας τάξεως.

Απόδειξη: Θα αποδείξουμε ότι : $(\sqrt[\nu]{\alpha})^\mu = \sqrt[\nu]{\alpha^\mu}$

Έχουμε : $(\sqrt[\nu]{\alpha})^\mu = \underbrace{\sqrt[\nu]{\alpha} \cdot \sqrt[\nu]{\alpha} \cdot \sqrt[\nu]{\alpha} \dots \sqrt[\nu]{\alpha}}_{\mu} = \sqrt[\nu]{\alpha \cdot \alpha \cdot \alpha \dots \alpha} = \sqrt[\nu]{\alpha^\mu}$

Οί μαθητές νά κάνουν τήν απόδειξη καί μέ άλλο τρόπο.

Ιδιότητα 6η. "Αν τό δείκτη μιᾶς ρίζας καί τόν ἐκθέτη τοῦ ὑπόρριζοῦ τῆς τοῦς πολλαπλασιάσουμε ἢ διαιρέσουμε (ἂν διαιροῦνται) μέ τόν ἴδιο φυσικό ἀριθμό, ἡ ἀριθμητική τιμή τῆς ρίζας δέ μεταβάλλεται.

Απόδειξη: Θα αποδείξουμε ότι: $\sqrt[\nu]{\alpha^\mu} = \sqrt[\nu\rho]{\alpha^{\mu\rho}}$ (1) καί $\sqrt[\nu]{\alpha^\mu} = \sqrt[\nu\rho]{\alpha^{\mu:\rho}}$ (2), ὅπου $\rho \in \mathbb{N}$ καί διαιρέτης τῶν ν καί μ .

Έχουμε μετά ἀπό ὕψωση τῶν μελῶν τῆς (1) στή δύναμη $\nu\rho$,

$$1) (\sqrt[\nu]{\alpha^\mu})^{\nu\rho} = [(\sqrt[\nu]{\alpha^\mu})^\nu]^\rho = (\alpha^\mu)^\rho = \alpha^{\mu\rho} \text{ καί } (\sqrt[\nu\rho]{\alpha^{\mu\rho}})^{\nu\rho} = \alpha^{\mu\rho}$$

$$2) \text{Θέτουμε } \nu : \rho = \kappa \in \mathbb{N}, \text{ ὁπότε } \nu = \kappa\rho. \text{ Ἡ (2) γράφεται } \sqrt[\nu]{\alpha^\mu} = \sqrt[\kappa\rho]{\alpha^{\mu:\rho}}$$

Υψώνουμε τά μέλη τῆς στή δύναμη $\rho\kappa$.

$$\text{Έχουμε } (\sqrt[\nu]{\alpha^\mu})^{\kappa\rho} = \alpha^\mu \text{ καί } (\sqrt[\kappa\rho]{\alpha^{\mu:\rho}})^{\kappa\rho} = [(\sqrt[\kappa]{\alpha^{\mu:\rho}})^\kappa]^\rho = (\alpha^{\mu:\rho})^\rho = \alpha^\mu$$

Ὡστε, κατά τή βοθητική πρόταση, τά μέλη τῶν ἰσοτήτων (1) καί (2) εἶναι ἴσα.

Ἀξιοσημείωτη παρατήρηση: Ἡ ἐξέταση τῶν παραπάνω ἰδιοτήτων ἔγινε μέ τήν ὑπόθεση ὅτι τά ὑπόριζα εἶναι θετικά. Ἄν ὁμως δέ γνωρίζουμε τό σημεῖο τῶν ὑπόριζων, τότε χρειάζεται ἰδιαίτερη προσοχή στήν ἐφαρμογή τῶν ἰδιοτήτων αὐτῶν, ὅπως φαίνεται στά ἀκόλουθα παραδείγματα.

Παραδείγματα : 1) Δέν μπορούμε νά γράψουμε $\sqrt{\alpha}\sqrt{\beta} = \sqrt{\alpha\beta}$, ἂν $\alpha > 0$ καί $\beta < 0$ ἢ ἂν $\alpha < 0$ καί $\beta < 0$, οὔτε $\sqrt{\alpha}/\sqrt{\beta} = \sqrt{\alpha/\beta}$.

Ἐνῶ, ἂν $\alpha < 0$ καί $\beta < 0$, μπορούμε νά γράψουμε $\sqrt{\alpha\beta} = \sqrt{-\alpha} \cdot \sqrt{-\beta}$ καί $\sqrt{\frac{\alpha}{\beta}} = \sqrt{-\alpha}/\sqrt{-\beta}$, γιατί $-\alpha > 0$ καί $-\beta > 0$.

2) Δέν μπορούμε νά γράψουμε $\sqrt[3]{\sqrt{\alpha}} = \sqrt[6]{\alpha}$ ἂν $\alpha < 0$.

3) Δέν μπορούμε νά γράψουμε $\alpha\sqrt{\beta} = \sqrt{\alpha^2\beta}$ ἂν $\alpha < 0$, $\beta > 0$.

Τό σωστό εἶναι $\alpha\sqrt{\beta} = -|\alpha|\sqrt{\beta} = -\sqrt{\alpha^2\beta}$.

4) Δέν μπορούμε νά γράψουμε $\sqrt[3]{\alpha^5} = \sqrt[6]{\alpha^{10}}$ ἂν $\alpha < 0$, γιατί τά μέλη τῆς ἰσότητος εἶναι ἑτερόσημα καί συνεπῶς διαφορετικά.

Τό σωστό εἶναι $\sqrt[3]{\alpha^5} = \sqrt[3]{-(-\alpha^5)} = -\sqrt[3]{(-\alpha)^5} = -\sqrt[6]{(-\alpha)^{10}} = -\sqrt[6]{\alpha^{10}}$

5) Δέν μπορούμε νά γράψουμε $\sqrt[6]{\alpha^2} = \sqrt[3]{\alpha}$ άν $\alpha < 0$, γιατί οί άριθμοί $\sqrt[6]{\alpha^2}$ καί $\sqrt[3]{\alpha}$ είναι έτερόσημοι. Τό σωστό είναι: $\sqrt[6]{\alpha^2} = \sqrt[6]{(-\alpha)^2} = \sqrt[3]{-\alpha} > 0$.

75. ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕ ΑΡΡΗΤΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Λέγεται **άρρητη παράσταση** κάθε αριθμητική ή έγγράμματη παράσταση, πού περιέχει τουλάχιστον ένα ριζικό.

Οί παραστάσεις $\alpha + \beta\sqrt{2}$, $\frac{\alpha}{3 + \sqrt{\beta}}$, $\sqrt{x + \psi}$ είναι άρρητες.

1) Πρόσθεση καί άφαίρεση.

Όρισμός. Τά ριζικά πού έχουν τόν ίδιο δείκτη καί τό ίδιο ύπόρριζο όνομάζονται **όμοια** καί ό παράγοντας πού βρίσκεται μπροστά άπό κάθε ριζικό λέγεται **συντελεστής** του ριζικού.

Γιά νά βρούμε τό άλγεβρικό άθροισμα άρρητων μονωνύμων, όμοιων ώς πρós τό ριζικό πού περιέχουν, σχηματίζουμε ένα άρρητο μονώνυμο όμοιο μέ αυτά καί μέ συντελεστή το άλγ. άθροισμα τών συντελεστών τών μονωνύμων.

Παραδείγματα: α) Τό άθροισμα τών μονωνύμων $-3\sqrt[3]{\alpha^2\beta}$, $\sqrt[3]{\alpha^2\beta}$, $\frac{1}{2}\sqrt[3]{\alpha^2\beta}$, $-2\sqrt[3]{\alpha^2\beta}$ ίσοῦται μέ $(-3 + 1 + \frac{1}{2} - 2)\sqrt[3]{\alpha^2\beta} = -\frac{7}{2}\sqrt[3]{\alpha^2\beta}$

β) Νά βρεθεί τό άθροισμα $\sqrt[3]{3\alpha^4x} - 2\sqrt[3]{3\alpha x} + \sqrt[3]{24\alpha^4x}$

Έχουμε $\sqrt[3]{3\alpha^4x} - 2\sqrt[3]{3\alpha x} + \sqrt[3]{24\alpha^4x} = \alpha\sqrt[3]{3\alpha x} - 2\sqrt[3]{3\alpha x} + 2\alpha\sqrt[3]{3\alpha x} = (\alpha - 2 + 2\alpha)\sqrt[3]{3\alpha x} = (3\alpha - 2)\sqrt[3]{3\alpha x}$

2) Πολλαπλασιασμός καί διαίρεση ριζικών μέ διαφορετικό δείκτη.

Ριζικά μέ διαφορετικούς δείκτες τρέπονται σέ ίσοδύναμα ριζικά του ίδιου δείκτη, άν δείκτης καί έκθέτης του ύπορρίζου στό καθένα άπό αυτά πολ/σθούν μέ τό πηλίκο πού δίνει ή διαίρεση του Ε.Κ.Π. τών δεικτών μέ τό δείκτη του ριζικού. Έπειτα γιά νά βρούμε τό γινόμενο καί τό πηλίκο τών ριζικών εφαρμόζουμε τό γνωστό κανόνα.

Παραδείγματα: α) $3\sqrt[3]{\alpha^2\gamma} \cdot \sqrt[3]{\alpha\gamma} \cdot \sqrt[3]{\gamma^4} = 3\sqrt[3]{(\alpha^2\gamma)(\alpha\gamma)\gamma^4} = 3\sqrt[3]{\alpha^3\gamma^6} = 3\alpha\gamma^2$

β) Νά βρεθεί τό γινόμενο $A = \sqrt{\alpha} \cdot \sqrt[3]{\beta} \cdot \sqrt[4]{\gamma}$.

ΕΚΠ δεικτών τό 12.

$$\text{Έχουμε: } A = \sqrt{\alpha^6} \cdot \sqrt[3]{\beta^4} \cdot \sqrt[4]{\gamma^3} = \sqrt{\alpha^6 \beta^4 \gamma^3}$$

γ) Τό πηλίκο: $\frac{\sqrt[μ]{\alpha}}{\sqrt[ν]{\beta}} = \frac{\sqrt[μν]{\alpha^ν}}{\sqrt[μν]{\beta^μ}} = \sqrt[μν]{\frac{\alpha^ν}{\beta^μ}}$ ($\alpha, \beta \in \mathbb{R}^+$)

δ) Νά γίνουν οί πράξεις $\left(\sqrt{\frac{x\psi^2}{\alpha^3}} + \sqrt{\frac{x^2}{\psi}} \right) \cdot (\sqrt{x\alpha} + \sqrt{\psi^3})$

Έχουμε :

$$\begin{aligned} A &= \sqrt{\frac{x\psi^2}{\alpha^3}} \cdot \alpha x + \sqrt{\frac{x\psi^2}{\alpha^3}} \cdot \psi^3 + \sqrt{\frac{x^2}{\psi}} \cdot \alpha x + \sqrt{\frac{x^2}{\psi}} \cdot \psi^3 = \sqrt{\frac{x^2\psi^2}{\alpha^2}} + \sqrt{\frac{x\psi^5}{\alpha^3}} + \sqrt{\frac{\alpha x^3}{\psi}} + \\ &+ \sqrt{x^2\psi^3} = \frac{x\psi}{\alpha} + \frac{\psi^2}{\alpha} \sqrt{\frac{x\psi}{\alpha}} + x \sqrt{\frac{x\alpha}{\psi}} + x\psi \end{aligned}$$

3) Άπλοποίηση ἄρρητων παραστάσεων.

Μέ τή βοήθεια τῶν ἰδιοτήτων τῶν ριζῶν εἶναι δυνατό πολλές φορές ριζικά ἢ ἄρρητες παραστάσεις νά ἀπλουστευθοῦν ἢ, ὅπως λέμε, νά ἀπλοποιηθοῦν.

$$\text{Παραδείγματα : } \alpha) \sqrt[3]{\frac{1}{3} x} \sqrt{\frac{x}{3}} = \sqrt[3]{\frac{x^2}{9}} \cdot \frac{x}{3} = \sqrt[3]{\frac{x^3}{27}} = \sqrt{\left(\frac{x}{3}\right)^3} = \sqrt{\frac{x}{3}}$$

$$\beta) \sqrt[6]{\alpha^2} \cdot \sqrt[3]{\alpha^2} \cdot \sqrt{\alpha^5} = \sqrt{\alpha^2} \cdot \sqrt{\alpha^2} \cdot \sqrt{\alpha^5} = \sqrt{\alpha^9} = \sqrt{\alpha^3} \quad (\alpha > 0)$$

76. ΤΡΟΠΗ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΡΗΤΟ ΠΑΡΟΝΟΜΑΣΤΗ ΣΕ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΜΕ ΡΗΤΟ ΠΑΡΟΝΟΜΑΣΤΗ

Πολλές φορές εἶναι σκόπιμο νά τρέπουμε κλάσματα μέ ἄρρητο παρονομαστή σέ ἰσοδύναμα μέ ρητό παρονομαστή, γιατί ἔτσι διευκολύνονται οί πράξεις.

Πιό συνηθισμένες μορφές τέτοιων κλασμάτων εἶναι οί ἀκόλουθες:

1. Κλάσματα μέ μορφή $A = \frac{\alpha}{\sqrt[ν]{\beta^μ}}$, $\beta > 0$, $\nu, \mu \in \mathbb{N}$ καί $\nu > \mu$

Πολλαπλασιάζουμε τούς ὄρους τοῦ κλάσματος μέ $\sqrt[ν]{\beta^{\nu-\mu}}$

$$\text{Έτσι: } A = \frac{\alpha \sqrt[ν]{\beta^{\nu-\mu}}}{\sqrt[ν]{\beta^μ} \cdot \sqrt[ν]{\beta^{\nu-\mu}}} = \frac{\alpha \sqrt[ν]{\beta^{\nu-\mu}}}{\sqrt[ν]{\beta^{\mu+\nu-\mu}}} = \frac{\alpha \sqrt[ν]{\beta^{\nu-\mu}}}{\sqrt[ν]{\beta^{\nu}}} = \frac{\alpha \sqrt[ν]{\beta^{\nu-\mu}}}{\beta}$$

$$\text{π.χ.} \quad \frac{3}{\sqrt{5}} = \frac{3 \sqrt{5^3}}{\sqrt{5} \cdot \sqrt{5^2}} = \frac{3 \sqrt{25}}{\sqrt{3^3}} = \frac{3 \sqrt{25}}{5}$$

2. Κλάσματα με μορφή $A = \frac{\alpha}{\beta \pm \sqrt{\gamma}}$ ή $B = \frac{\alpha}{\sqrt{\beta} \pm \sqrt{\gamma}}$, $\beta, \gamma \in \mathbb{R}^+$

Όρισμός. Άρρητες παραστάσεις, που διαφέρουν μόνο ως προς τό πρόσημο ενός ριζικού, ονομάζονται **συζυγείς**.

α) Τό κλάσμα A τρέπεται σέ Ισοδύναμο μέ ρητό παρονομαστή, αν οι όροι του πολ/σθοῦν μέ τή συζυγή παράσταση τοῦ παρονομαστή του, που είναι άντιστοίχως, $\beta \mp \sqrt{\gamma}$.

$$\text{Έτσι:} \quad A_1 = \frac{\alpha}{\beta + \sqrt{\gamma}} = \frac{\alpha(\beta - \sqrt{\gamma})}{(\beta + \sqrt{\gamma})(\beta - \sqrt{\gamma})} = \frac{\alpha(\beta - \sqrt{\gamma})}{\beta^2 - \gamma}$$

$$\text{καί} \quad A_2 = \frac{\alpha}{\beta - \sqrt{\gamma}} = \frac{\alpha(\beta + \sqrt{\gamma})}{(\beta - \sqrt{\gamma})(\beta + \sqrt{\gamma})} = \frac{\alpha(\beta + \sqrt{\gamma})}{\beta^2 - \gamma}$$

β) Πολ/ζουμε τούς όρους τοῦ κλάσματος B μέ τή συζυγή παράσταση τοῦ παρονομαστή του, που είναι $\sqrt{\beta} \mp \sqrt{\gamma}$

$$\text{Έτσι:} \quad B_1 = \frac{\alpha}{\sqrt{\beta} + \sqrt{\gamma}} = \frac{\alpha(\sqrt{\beta} - \sqrt{\gamma})}{(\sqrt{\beta} + \sqrt{\gamma})(\sqrt{\beta} - \sqrt{\gamma})} = \frac{\alpha(\sqrt{\beta} - \sqrt{\gamma})}{\beta - \gamma}$$

$$\text{Έπίσης} \quad B_2 = \frac{\alpha}{\sqrt{\beta} - \sqrt{\gamma}} = \frac{\alpha(\sqrt{\beta} + \sqrt{\gamma})}{\beta - \gamma}$$

$$\text{π.χ.} \quad \frac{1}{2 - \sqrt{3}} = \frac{2 + \sqrt{3}}{2^2 - 3} = 2 + \sqrt{3}, \quad \frac{1}{\sqrt{2} - \sqrt{3}} = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{3}}{2 - 3} = -(\sqrt{2} + \sqrt{3})$$

3. Κλάσματα με μορφή $A = \frac{\alpha}{\sqrt{\beta \pm \sqrt{\gamma} \pm \sqrt{\delta}}}$, $\beta, \gamma, \delta \in \mathbb{R}^+$

Γιά νά τρέψουμε ένα άπό αυτά σέ Ισοδύναμο μέ ρητό παρονομαστή, πολλαπλασιάζουμε τούς όρους του μέ μιά συζυγή παράσταση τοῦ παρονομαστή του.

$$\begin{aligned} \text{Έτσι:} \quad A &= \frac{\alpha}{\sqrt{\beta + \sqrt{\gamma} - \sqrt{\delta}}} = \frac{\alpha(\sqrt{\beta} + \sqrt{\gamma} + \sqrt{\delta})}{(\sqrt{\beta + \sqrt{\gamma} - \sqrt{\delta}})(\sqrt{\beta} + \sqrt{\gamma} + \sqrt{\delta})} = \\ &= \frac{\alpha(\sqrt{\beta} + \sqrt{\gamma} + \sqrt{\delta})}{(\sqrt{\beta} + \sqrt{\gamma})^2 - \delta} = \frac{\alpha(\sqrt{\beta} + \sqrt{\gamma} + \sqrt{\delta})}{(\beta + \gamma - \delta) + 2\sqrt{\beta\gamma}} \end{aligned}$$

Αυτό έχει τή μορφή 2 καί τρέπεται σέ Ισοδύναμο μέ ρητό παρονομαστή, όπως καί προηγουμένως.

$$\begin{aligned} \text{Π.Χ. } \frac{A}{\sqrt{2}-\sqrt{3}+\sqrt{5}} &= \frac{A(\sqrt{2}-\sqrt{3}-\sqrt{5})}{(\sqrt{2}-\sqrt{3}+\sqrt{5})(\sqrt{2}-\sqrt{3}-\sqrt{5})} = \frac{A(\sqrt{2}-\sqrt{3}-\sqrt{5})}{(\sqrt{2}-\sqrt{3})^2-5} = \\ &= \frac{A(\sqrt{2}-\sqrt{3}-\sqrt{5})}{2+3-5-2\sqrt{6}} = \frac{A(\sqrt{2}-\sqrt{3}-\sqrt{5})}{-2\sqrt{6}} = \frac{A(\sqrt{2}-\sqrt{3}-\sqrt{5})\sqrt{6}}{-12} \text{ κλπ.} \end{aligned}$$

Γενικά: Κλάσματα με μορφή:

$$\frac{A}{\sqrt{\alpha_1} \pm \sqrt{\alpha_2} \pm \sqrt{\alpha_3} \pm \dots \pm \sqrt{\alpha_n}}$$

τρέπονται σε ίσοδύναμα με ρητό παρονομαστή, αν συνέχεια πολλαπλασιάσουμε με μία συζυγή παράσταση του κάθε φορά παρονομαστή, ώσπου ο παρονομαστής να γίνει ρητός.

4. Κλάσματα με μορφή $A = \frac{K}{\sqrt{\alpha} + \sqrt{\beta}}$, $B = \frac{\Lambda}{\sqrt{\alpha} - \sqrt{\beta}}$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}^+$

1) Για τό κλάσμα A διακρίνουμε δύο περιπτώσεις:

α) *Αν $v = 2\kappa + 1$, $\kappa \in \mathbb{N}$, τότε τό κλάσμα A γράφεται:

$$\begin{aligned} A &= \frac{K}{\sqrt{\alpha} + \sqrt{\beta}} = \frac{K}{\alpha + \beta} \cdot \frac{\alpha + \beta}{\sqrt{\alpha} + \sqrt{\beta}} = \frac{K}{\alpha + \beta} \frac{(\sqrt{\alpha})^v + (\sqrt{\beta})^v}{\sqrt{\alpha} + \sqrt{\beta}} = \\ &= \frac{K}{\alpha + \beta} \cdot (\sqrt{\alpha^{v-1}} - \sqrt{\alpha^{v-2}\beta} + \sqrt{\alpha^{v-3}\beta^2} - \dots + \sqrt{\beta^{v-1}}) \end{aligned}$$

β) *Αν $v = 2\kappa$, $\kappa \in \mathbb{N}$, τότε επίσης έχουμε:

$$\begin{aligned} A &= \frac{K}{\sqrt{\alpha} + \sqrt{\beta}} = \frac{K}{\alpha - \beta} \cdot \frac{\alpha - \beta}{\sqrt{\alpha} + \sqrt{\beta}} = \frac{K}{\alpha - \beta} \frac{(\sqrt{\alpha})^v - (\sqrt{\beta})^v}{\sqrt{\alpha} + \sqrt{\beta}} = \\ &= \frac{K}{\alpha - \beta} \cdot (\sqrt{\alpha^{v-1}} - \sqrt{\alpha^{v-2}\beta} + \sqrt{\alpha^{v-3}\beta^2} - \dots - \sqrt{\beta^{v-1}}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Π.Χ. } \frac{1}{\sqrt[3]{2} + \sqrt[3]{3}} &= \frac{1}{2+3} \cdot \frac{2+3}{\sqrt[3]{2} + \sqrt[3]{3}} = \frac{1}{5} \cdot \frac{(\sqrt[3]{2})^3 + (\sqrt[3]{3})^3}{\sqrt[3]{2} + \sqrt[3]{3}} = \\ &= \frac{1}{5} (\sqrt[3]{4} - \sqrt[3]{6} + \sqrt[3]{9}) \end{aligned}$$

2) Τό κλάσμα B γράφεται:

$$B = \frac{\Lambda}{\sqrt{\alpha} - \sqrt{\beta}} = \frac{\Lambda}{\alpha - \beta} \cdot \frac{\alpha - \beta}{\sqrt{\alpha} - \sqrt{\beta}} = \frac{\Lambda}{\alpha - \beta} \frac{(\sqrt{\alpha})^v - (\sqrt{\beta})^v}{\sqrt{\alpha} - \sqrt{\beta}} =$$

$$= \frac{\Lambda}{\alpha - \beta} \cdot (\sqrt[\nu]{\alpha^{\nu-1}} + \sqrt[\nu]{\alpha^{\nu-2}\beta} + \dots + \sqrt[\nu]{\beta^{\nu-1}})$$

$$\begin{aligned} \text{π.χ.} \quad \frac{1}{\sqrt[4]{2} - \sqrt[4]{3}} &= \frac{1}{2-3} \cdot \frac{2-3}{\sqrt[4]{2} - \sqrt[4]{3}} = -1 \cdot \frac{(\sqrt[4]{2})^4 - (\sqrt[4]{3})^4}{\sqrt[4]{2} - \sqrt[4]{3}} = \\ &= -(\sqrt[4]{8} + \sqrt[4]{12} + \sqrt[4]{18} + \sqrt[4]{27}) \end{aligned}$$

Σημείωση: *Αν τό κλάσμα έχει τή μορφή $\Gamma = \frac{M}{\sqrt[\nu]{\alpha} \pm \sqrt[\mu]{\beta}}$, όπου $\alpha, \beta \in \mathbb{R}^+$ και

$\nu, \mu \in \mathbb{N}$ τότε τρέπουμε τόν παρονομαστή σέ άλλο παρονομαστή μέ ριζικά τοῦ ἴδιου δείκτη καί ἔπειτα προχωροῦμε ὅπως προσηγουμένως.

$$\text{Π.χ.} \quad \frac{1}{\sqrt[3]{2} + \sqrt[3]{3}} = \frac{1}{\sqrt[6]{4} + \sqrt[6]{27}} = \frac{1}{4-27} \cdot \frac{4-27}{\sqrt[6]{4} + \sqrt[6]{27}} = -\frac{1}{23} \cdot$$

$$\frac{(\sqrt[6]{4})^6 - (\sqrt[6]{27})^6}{\sqrt[6]{4} + \sqrt[6]{27}} = -\frac{1}{23} (\sqrt[6]{4^5} - \sqrt[6]{4^4 \cdot 27} + \sqrt[6]{4^3 \cdot 27^2} - \sqrt[6]{4^2 \cdot 27^3} + \sqrt[6]{4 \cdot 27^4} - \sqrt[6]{27^5})$$

77. ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕ ΡΗΤΟ ΕΚΘΕΤΗ

Είδαμε ὅτι σύμφωνα μέ τήν 6η ιδιότητα τῶν ριζῶν μπορούμε νά διαιρέσουμε τό δείκτη τοῦ ριζικοῦ καί τόν ἐκθέτη τοῦ ὑπορρίζου του μέ τόν ἴδιο φυσικό ἀριθμό.

*Ἐτσι, ἄν $\alpha > 0$, $\mu, \nu \in \mathbb{N}$ καί $\mu = \nu\kappa$, ὅπου $\kappa \in \mathbb{N}$, τότε γιά τήν πρωτεύουσα ρίζα $\sqrt[\nu]{\alpha^\mu}$ θά ἔχουμε:

$$\sqrt[\nu]{\alpha^\mu} = \sqrt[\nu]{\alpha^{\nu\kappa}} = (\sqrt[\nu]{\alpha^\kappa})^\nu = \alpha^\kappa = \alpha^{\frac{\mu}{\nu}}$$

Δηλαδή βλέπουμε, ὅτι τό σύμβολο $\alpha^{\frac{\mu}{\nu}}$ ἔχει τήν ἑννοια τοῦ συμβόλου $\sqrt[\nu]{\alpha^\mu}$, ὅταν βέβαια τό $\frac{\mu}{\nu}$ εἶναι φυσικός. *Ἄν ὁμως τό $\frac{\mu}{\nu}$ δέν εἶναι φυσικός, τότε τό σύμβολο $\alpha^{\frac{\mu}{\nu}}$ δέν ἔχει καμιά ἔννοια, σύμφωνα μέ τόν ὀρισμό τῆς δυνάμεως. Σκόπιμο εἶναι νά γενικεύσουμε τήν ἔννοια τοῦ συμβόλου $\alpha^{\frac{\mu}{\nu}}$ καί γιά τήν περίπτωση, πού τό $\frac{\mu}{\nu}$ δέν εἶναι φυσικός, ἀλλά γενικά ρητός.

Θά ὀνομάζουμε τό σύμβολο $\alpha^{\frac{\mu}{\nu}}$ δύναμη τοῦ α μέ εἰσθέτη τόν ρητό $\frac{\mu}{\nu}$ καί,

θά ορίζουμε να είναι η νιοστή πρωτεύουσα ρίζα της μιοστής δυνάμεως του a , δηλαδή ή $\sqrt[\nu]{a^\mu}$, αν $\frac{\mu}{\nu} > 0$ και $a > 0$ και ή αντίστροφή της $\frac{1}{\sqrt[\nu]{a^\mu}}$, αν $\frac{\mu}{\nu} < 0$ και $a > 0$.

*Έτσι γράφουμε $a^{\frac{\mu}{\nu}} = \sqrt[\nu]{a^\mu}$ και $a^{-\frac{\mu}{\nu}} = \frac{1}{a^{\frac{\mu}{\nu}}} = \frac{1}{\sqrt[\nu]{a^\mu}}$ όπου $\mu, \nu \in \mathbb{N}$ και $a > 0$.

Π.χ. $a^{\frac{4}{3}} = \sqrt[3]{a^4}$, $a^{1.2} = a^{\frac{12}{10}} = a^{\frac{6}{5}} = \sqrt[5]{a^6}$, $a^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{a}}$

Σημείωση. Πρέπει να αποφεύγουμε να εφαρμόζουμε το συμβολισμό $a^{\frac{\mu}{\nu}}$ όταν $a < 0$, γιατί μπορεί να μην έχει έννοια.

Π.χ. $(-8)^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{-8} = -2$, αλλά $(-8)^{\frac{2}{6}} = \sqrt[6]{(-8)^2} = \sqrt[6]{8^2} = \sqrt[3]{8} = +2$.

Είναι φανερό ότι $(-8)^{\frac{1}{3}} \neq (-8)^{\frac{2}{6}}$

*Ωστε, με βάση τους ορισμούς που θέσαμε, **κάθε ρίζα μπορεί να γραφεί σε δύναμη με εκθέτη ρητό.**

Οι νέες αυτές δυνάμεις με εκθέτη ρητό υπακούουν στις ιδιότητες των δυνάμεων με εκθέτες σχετικούς άκεραιοις.

78. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΜΕ ΡΗΤΟΥΣ ΕΚΘΕΤΕΣ.

1) Τό γινόμενο δυνάμεων του ίδιου αριθμού $a > 0$:

*Έχουμε:

$$a^{\frac{\mu}{\nu}} \cdot a^{\frac{\kappa}{\lambda}} = \sqrt[\nu]{a^\mu} \cdot \sqrt[\lambda]{a^\kappa} = \sqrt[\nu\lambda]{a^{\mu\lambda}} \cdot \sqrt[\lambda\nu]{a^{\kappa\nu}} = \sqrt[\nu\lambda]{a^{\mu\lambda + \kappa\nu}} = a^{\frac{\mu\lambda + \kappa\nu}{\nu\lambda}} = a^{\frac{\mu}{\nu} + \frac{\kappa}{\lambda}}$$

2) *Υψωση δυνάμεως σε δύναμη:

*Έχουμε:

$$\left(a^{\frac{\mu}{\nu}}\right)^{\frac{\kappa}{\lambda}} = \sqrt[\lambda]{\left(a^{\frac{\mu}{\nu}}\right)^\kappa} = \sqrt[\lambda]{\left(\sqrt[\nu]{a^\mu}\right)^\kappa} = \sqrt[\lambda\nu]{a^{\mu\kappa}} = \sqrt[\lambda\nu]{a^{\mu\kappa}} = a^{\frac{\mu\kappa}{\lambda\nu}} = a^{\frac{\mu}{\nu} \cdot \frac{\kappa}{\lambda}}$$

3) *Υψωση γινομένου σε δύναμη:

*Έχουμε:

$$(a \cdot \beta \cdot \gamma)^{\frac{\mu}{\nu}} = \sqrt[\nu]{(a \cdot \beta \cdot \gamma)^\mu} = \sqrt[\nu]{a^\mu \cdot \beta^\mu \cdot \gamma^\mu} = \sqrt[\nu]{a^\mu} \cdot \sqrt[\nu]{\beta^\mu} \cdot \sqrt[\nu]{\gamma^\mu} = a^{\frac{\mu}{\nu}} \cdot \beta^{\frac{\mu}{\nu}} \cdot \gamma^{\frac{\mu}{\nu}}$$

4) Τό ηλίκο δύο δυνάμεων του $a > 0$:

*Έχουμε:

$$a^{\frac{\mu}{\nu}} : a^{\frac{\kappa}{\lambda}} = \sqrt[\nu]{a^\mu} : \sqrt[\lambda]{a^\kappa} = \sqrt[\nu\lambda]{a^{\mu\lambda}} : \sqrt[\lambda\nu]{a^{\kappa\nu}} = \sqrt[\nu\lambda]{a^{\mu\lambda - \kappa\nu}} = a^{\frac{\mu\lambda - \kappa\nu}{\nu\lambda}} = a^{\frac{\mu}{\nu} - \frac{\kappa}{\lambda}} \left(\frac{\mu}{\nu} > \frac{\kappa}{\lambda}\right)$$

5) Ύψωση κλάσματος σε δύναμη :

Έχουμε :

$$\left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^{\frac{\mu}{\nu}} = \sqrt[\nu]{\left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^{\mu}} = \sqrt[\nu]{\frac{\alpha^{\mu}}{\beta^{\mu}}} = \frac{\sqrt[\nu]{\alpha^{\mu}}}{\sqrt[\nu]{\beta^{\mu}}} = \frac{\alpha^{\frac{\mu}{\nu}}}{\beta^{\frac{\mu}{\nu}}}$$

Για όλες τις περιπτώσεις είναι $\alpha, \beta \in \mathbb{R}^+$ και $\mu, \nu, \kappa, \lambda \in \mathbb{N}$.

Σημείωση. Έπειδή $\alpha^{-\frac{\mu}{\nu}} = \frac{1}{\alpha^{\frac{\mu}{\nu}}}$ έπεται ότι οι παραπάνω ιδιότητες ισχύουν και για δυνάμεις με έκθετες ρητούς άρνητικούς

Οι μαθητές μπορούν να διατυπώσουν τους κανόνες τών ιδιοτήτων τών δυνάμεων με έκθετες ρητούς αριθμούς.

Παρατήρηση : Από τά παραπάνω γίνεται φανερό ότι ο λογισμός με ριζικά είναι τριό εύκολος, όταν αντικαταστήσουμε τά ριζικά αυτά με δυνάμεις πού νά έχουν έκθετες ρητούς.

Έφαρμογή :

$$\left(\sqrt[3]{\alpha^2} \cdot \sqrt[5]{\alpha^3} \cdot \sqrt{\alpha}\right) : \sqrt[6]{\alpha^9} = \left(\alpha^{\frac{2}{3}} \cdot \alpha^{\frac{3}{5}} \cdot \alpha^{\frac{1}{2}}\right) : \alpha^{\frac{9}{6}} = \alpha^{\frac{53}{30}} : \alpha^{\frac{9}{6}} = \alpha^{\frac{4}{15}} = \sqrt[15]{\alpha^4}$$

Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ

Ο μ ά δ α α'

227) Νά βρεθούν οι πρωτεύουσες ρίζες τών αριθμών :

$$\sqrt[3]{8}, \sqrt[3]{-27}, \sqrt[4]{81}, \sqrt[5]{32}, \sqrt[5]{-243}, \sqrt[4]{\frac{1}{16}}, \sqrt[3]{-\frac{1}{27}}, \sqrt[5]{\frac{1}{243}}, \sqrt[4]{0,0256}$$

228) Νά βρεθούν όλες οι πραγματικές ρίζες τέταρτης τάξεως τών αριθμών :

$$16, -16, 49^2, -10^2, 81, 0,0081$$

229) Νά απλοποιηθούν οι ακόλουθες παραστάσεις :

$$\sqrt[4]{25}, \sqrt[4]{49}, \sqrt[5]{9^{10}}, \sqrt[10]{32}, \sqrt[9]{-512}, \sqrt[15]{-243}, \sqrt[3]{-27\alpha^6\beta^3}, \sqrt[10]{-\alpha^2\beta^6\gamma^{10}}, \sqrt[18]{64\alpha^{12}\psi^{80}}$$

230) Νά βγούν έξω από κάθε ρίζα οι κατάλληλοι παράγοντες :

$$\sqrt[3]{40}, \sqrt[3]{-24}, \sqrt[5]{320}, \sqrt[5]{-96}, \sqrt[4]{0,1250}, \sqrt[3]{54x^3\psi^4}, \sqrt[4]{32x^2\psi^5}, \sqrt{x^{v+1}}, \sqrt{x^{v+1}\psi^{v+2}}, \sqrt[3]{16x^{2v}\psi^{4v}}$$

231) Οι παράγοντες έξω από τις ρίζες νά εισαχθούν στα ύπορριζα.

$$\sqrt[3]{2}, -2\sqrt[3]{-7}, \alpha\sqrt[4]{3\alpha}, \alpha^2\beta\sqrt[4]{-\alpha\beta}, -2\alpha\beta^2\gamma^3\sqrt[5]{-\alpha\beta\gamma}, (\alpha + \beta)\sqrt{\alpha-\beta}, \frac{3x^2\psi}{\omega}\sqrt[3]{\frac{\omega^2}{9x^2\psi^2}}$$

$$\frac{\alpha + \beta}{\alpha - \beta} \sqrt{\frac{\alpha - \beta}{\alpha + \beta}}$$

232) Νά βρεθούν τὰ ἀκόλουθα γινόμενα καὶ ἰτηλίκια:

$$1) 5\sqrt[3]{18} \cdot 3\sqrt[3]{8}, \quad 2) \sqrt[3]{6} \cdot \sqrt[3]{30} \cdot \sqrt[3]{150}, \quad 3) \sqrt[4]{24} \cdot \sqrt[4]{48} \cdot \sqrt[4]{48}$$

$$4) \sqrt[3]{75\alpha\beta\gamma} \cdot 2\sqrt[3]{6\alpha^2\beta\gamma^2} \cdot \sqrt[3]{60\alpha^2\beta\gamma^2}, \quad 5) \sqrt{\alpha} \cdot \sqrt[5]{\alpha^2} \cdot \sqrt[10]{\alpha^4}, \quad 6) 5\sqrt[4]{18} : \sqrt[4]{8}$$

233) Νά βρεθούν τὰ ἀλγεβρικά ἀθροίσματα:

$$1) \sqrt[3]{54} - \sqrt[3]{16} + \sqrt[3]{12} - \sqrt[3]{3}, \quad 2) 4\sqrt[3]{24} + \sqrt[3]{-3} + \sqrt[11]{-81}, \quad 3) \sqrt[6]{16} - \sqrt[4]{4} + \sqrt[3]{-4},$$

$$4) 9\sqrt[3]{2\alpha^2x} - 3\sqrt[3]{16\alpha^2x} + \sqrt[3]{2x}$$

234) Νά ἐκτελεσθοῦν οἱ ἀκόλουθες πράξεις:

$$1) (\sqrt[3]{81} + 2\sqrt[3]{24} - 4\sqrt[3]{375}) \cdot \sqrt[3]{-3}, \quad 2) (x\sqrt{x} - \psi\sqrt{\psi}) : (\sqrt{x} - \sqrt{\psi})$$

235) Τὰ παρακάτω κλάσματα νά: τραποῦν σέ ἰσοδύναμα μέ ρητὸ παρονομαστή.

$$1) \frac{\alpha}{\beta\sqrt{\alpha}}, \quad \frac{\alpha^2}{\sqrt{\alpha}}, \quad \frac{\mu\nu}{\sqrt{\mu^2\nu^2}}, \quad \frac{x+\beta}{\sqrt{x+\beta}}, \quad 2) \frac{\alpha}{1+\sqrt{\alpha}}, \quad \frac{7}{\sqrt{x}+\sqrt{\psi}}, \quad \frac{\alpha+\sqrt{\beta}}{\alpha-\sqrt{\beta}}$$

236) Νά ἐκτελεσθοῦν οἱ ἀκόλουθες πράξεις:

$$1) \left(2^{\frac{1}{2}} + 3^{\frac{1}{2}}\right) \cdot \left(2^{\frac{1}{2}} - 3^{\frac{1}{2}}\right), \quad 2) \left(2^{\frac{1}{2}} + 3^{\frac{1}{2}}\right)^2, \quad 3) \left(2^{\frac{1}{2}} + 3^{\frac{1}{2}} - 1\right)^2,$$

$$4) \left(\gamma^3\right)^{\frac{2}{3}} \cdot \left(\gamma^{-\frac{1}{2}}\right)^{\frac{4}{3}} \cdot \sqrt[4]{\gamma^{\frac{4}{5}}}, \quad 5) \left(\alpha^{\frac{1}{2}} - \beta^{\frac{1}{2}}\right) \left(\alpha^{-\frac{1}{2}} + \beta^{-\frac{1}{2}}\right)$$

‘Ομάδα β’

237) Νά βρεθούν τὰ ἀκόλουθα γινόμενα καὶ πηλίκια:

$$1) \sqrt[5]{x^2\omega^{-2}} \cdot \sqrt[5]{\psi^{-3}\omega^2} \cdot \sqrt[5]{x^{-2}\psi^3}, \quad 2) 3\sqrt[4]{\alpha} \cdot 7\sqrt[6]{\gamma^5\beta} \cdot \sqrt[12]{\alpha^2\beta^{10}},$$

$$3) 4\sqrt[3]{-12} : 2\sqrt[2]{2}, \quad 4) (\sqrt[3]{\alpha^2\beta^4} \cdot \sqrt[3]{\beta^2}) : \sqrt[3]{\alpha^2\beta^{12}}$$

238) Νά ἀπλοποιηθοῦν οἱ ἀκόλουθες παραστάσεις:

$$\sqrt[5]{\sqrt[3]{-\alpha^5}}, \quad \sqrt[4]{\frac{3}{\sqrt[3]{3}}}, \quad \left(\sqrt[7]{-\alpha\sqrt[3]{3\alpha}}\right)^{14}, \quad \left(\sqrt[3]{\sqrt[7]{-8\alpha^3}}\right)^7, \quad \sqrt[5]{\frac{\alpha}{\sqrt[5]{\alpha}}}$$

$$\sqrt{2\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt[3]{2}}, \quad \sqrt{\frac{\alpha}{\beta} \sqrt[3]{\frac{\beta^2}{\alpha^2}} \sqrt[4]{\frac{\beta^2}{x^2}}}, \quad \sqrt[3]{x^2 \sqrt{\frac{2\beta}{3\alpha}}} \cdot \sqrt[3]{4\beta^2 \sqrt{\frac{3\alpha}{2\beta}}}$$

239) Νά βρεθούν τὰ ἀλγεβρικά ἀθροίσματα:

$$1) \sqrt[4]{50} - \sqrt[4]{324} - \sqrt[4]{2916} + \sqrt[4]{256}, \quad 2) \sqrt{4\alpha^2 + 4} - 5\sqrt{1 + \alpha^4} + \sqrt{x^2 + \alpha^2x^2} + \sqrt{9\alpha^2 + 9},$$

$$3) 5\sqrt{\frac{\alpha^2 + \alpha^2}{x^2 - x^2}} - \frac{1}{x} \sqrt{\frac{4\alpha^2 + 4\alpha^2}{x-1}} - \frac{3\alpha}{x} \sqrt{\frac{\alpha-x}{x-1}}$$

240) Νά εκτελεσθούν οι ακόλουθες πράξεις:

$$1) (x - \alpha + \sqrt{\beta + \alpha^2})(x - \alpha - \sqrt{\beta + \alpha^2}), \quad 2) (\sqrt[3]{\alpha} + \sqrt[3]{\beta})(\sqrt[3]{\alpha^2} - \sqrt[3]{\alpha\beta} + \sqrt[3]{\beta^2}),$$

$$3) (\sqrt[3]{x} - \sqrt[3]{\psi})(x + \psi + \sqrt[3]{x\psi^2} + \sqrt[3]{x^2\psi}), \quad 4) (\sqrt[4]{x^3} - \sqrt[4]{\psi^3}) : (\sqrt{x} + \sqrt{x\psi} + \sqrt{\psi}),$$

$$5) (3\alpha\sqrt{\alpha} + \alpha + \sqrt{\alpha} - 2) : (3\sqrt{\alpha} - 2)$$

241) Τά παρακάτω κλάσματα νά τραπεούν σέ Ισοδύναμα μέ ρητό παρονομαστή.

$$1) \frac{\sqrt{x+\psi} + \sqrt{x-\psi}}{\sqrt{x+\psi} - \sqrt{x-\psi}}, \quad \frac{\sqrt{x} - \sqrt{\psi}}{1 - \sqrt{x} + \sqrt{\psi}}, \quad \frac{\alpha - \beta}{\alpha + \beta + 2\sqrt{\alpha\beta}}, \quad \frac{\sqrt{2} - \sqrt{3} - \sqrt{5} + \sqrt{6}}{\sqrt{5} + \sqrt{6} - \sqrt{3} - \sqrt{2}},$$

$$2) \frac{5}{\sqrt[3]{2} + \sqrt[3]{3}}, \quad \frac{5}{1 - \sqrt[3]{2}}, \quad \frac{1}{\sqrt[4]{3} - \sqrt[4]{2}}, \quad \frac{11}{\sqrt[3]{4} - \sqrt[3]{3}}$$

242) Νά εκτελεσθούν οι ακόλουθες πράξεις:

$$1) \frac{x + \sqrt{x^2 - 1}}{x - \sqrt{x^2 - 1}} - \frac{x - \sqrt{x^2 - 1}}{x + \sqrt{x^2 - 1}}, \quad 2) \frac{\sqrt{2x+\psi} + \sqrt{2x-\psi}}{\sqrt{2x+\psi} - \sqrt{2x-\psi}} + \frac{\sqrt{2x+\psi} - \sqrt{2x-\psi}}{\sqrt{2x+\psi} + \sqrt{2x-\psi}},$$

$$3) \frac{\sqrt{1+\alpha^2}}{\sqrt{1-\alpha^2}} + \frac{\sqrt{1-\alpha^2}}{\sqrt{1+\alpha^2}} - \frac{2}{\sqrt{1-\alpha^4}}, \quad 4) \frac{1}{\sqrt[3]{\alpha^2} + \sqrt[3]{\alpha} + 1} + \frac{1}{\sqrt[3]{\alpha^2} - \sqrt[3]{\alpha} + 1}$$

243) Νά εκτελεσθούν οι ακόλουθες πράξεις:

$$1) \left(\alpha^{-\frac{2}{3}} + \alpha^{-\frac{1}{3}}\beta + \beta^{-\frac{2}{3}}\right) \cdot \left(\alpha^{-\frac{1}{3}} - \beta^{-\frac{1}{3}}\right), \quad 2) \left(\frac{1}{\alpha} - \frac{1}{\beta}\right) : \left(\alpha^{-\frac{1}{3}} - \beta^{-\frac{1}{3}}\right)$$

244) Νά άπλοποιηθούν οι παραστάσεις:

$$1) \frac{\alpha - \beta}{\alpha^4 + \alpha^2\beta^4} \cdot \frac{\alpha^{\frac{1}{2}}\beta^{\frac{1}{4}} + \alpha^{\frac{1}{4}}\beta^{\frac{1}{2}}}{\alpha^{\frac{1}{2}} + \beta^{\frac{1}{2}}}, \quad 2) \frac{\alpha^{\frac{1}{2}} - 2\alpha^{\frac{1}{4}} + 1}{\alpha^{\frac{1}{4}} - 2\alpha^{\frac{1}{8}} + 1}$$

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙ

ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ⁽¹⁾

79. ΑΝΑΓΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΩΝ.

Στό Γυμνάσιο είδαμε ότι τό τριώνυμο

$$\varphi(x) = \alpha x^2 + \beta x + \gamma = \alpha \left[\left(x + \frac{\beta}{2\alpha} \right)^2 - \frac{\Delta}{4\alpha^2} \right]$$

μέ $\Delta = \beta^2 - 4\alpha\gamma < 0$ δέν μπορεί να μετασχηματιστεί σέ διαφορά δύο τετραγώνων, γιατί ό όρος $\frac{\Delta}{4\alpha^2}$ δέν είναι τετράγωνο πραγματικού αριθμού, αφού είναι άρνητικός.

Έπίσης γιά όρισμένες εξισώσεις, όπως οι $x^2 + 1 = 0$, $x^2 + 4 = 0$, ή λύση είναι άδύνατη στό \mathbb{R} .

Γενικά ή ισότητα $x^{2v} = \beta$, $\forall x \in \mathbb{R}$, $\beta \in \mathbb{R}^-$, $v \in \mathbb{N}_0$, είναι άδύνατη, γιατί δέν υπάρχει πραγματικός αριθμός x , πού ή άρτια δύναμή του νά είναι άρνητικός αριθμός.

Άκόμα είδαμε ότι $\forall \alpha \in \mathbb{R}^-$, $v \in \mathbb{N}$ τό σύμβολο $\sqrt[v]{\alpha}$ δέν έχει έννοια πραγματικού αριθμού.

Τά παραπάνω άλγεβρικά θέματα καί άλλα παρόμοιά τους έμεναν άλυτα, ώσπου ή προσπάθεια τών μαθηματικών νά δώσουν λύση σ' αυτά όδηγήσε στην έπίνοηση ενός νέου συστήματος αριθμών μέ τούς όποιους μπορούμε νά τά λύσουμε. Έτσι έπινοήθηκε ένα νέο σύστημα αριθμών, πού όνομάστηκε **σύστημα φανταστικών αριθμών**.

Ένα τέτοιο σύστημα αριθμών, γιά νά γίνει δεκτό. πρέπει νά ύπακούει στους γνωστούς μέχρι τώρα νόμους, πού ισχύουν γιά τούς πραγματικούς αριθμούς. Δεχόμαστε ότι τό νέο σύστημα τών **φανταστικών αριθμών** ύπακούει στους νόμους αούτους.

(1) Τή θεωρία τών μιγαδικών αριθμών θεμελίωσαν οι D' Alembert, Euler, Gauss.

80. ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ - ΟΡΙΣΜΟΙ.

Κάθε σύστημα αριθμών έχει μία μονάδα.

Για τό σύστημα τών φανταστικών αριθμών συμβολίζουμε τή μονάδα μέ τό γράμμα (i) (άρχικό τής γαλλικής λέξεως imagineure), τήν ονομάζουμε φανταστική μονάδα καί όρίζουμε νά έχει τήν ιδιότητα: Τό τετράγωνό της καθώς καί τό τετράγωνο του αντίθετου της (-i) νά ίσούται μέ τήν άρνητική πραγματική μονάδα.

Έτσι όρίζουμε:

$$i^2 = -1, (-i)^2 = -1 \quad (1)$$

Μέ τίς Ισότητες (1) ή λύση τής έξισ. $x^2 + 1 = 0$ είναι δυνατή στους φανταστικούς αριθμούς, γιατί:

$$x^2 + 1 = 0 \Leftrightarrow x^2 = -1 \Leftrightarrow x^2 = (\pm i)^2 \Rightarrow x = \pm i$$

Έπιπλέον οι Ισότητες (1) φανερώνουν ότι:

$$\sqrt{-1} = \pm i \quad *$$

Φανταστικός αριθμός λέγεται κάθε αριθμός, πού γίνεται μέ τήν επανάληψη τής φανταστικής μονάδας i, ή καί τής αντίθετης -i, καί τών μερών της.

Έτσι, οι αριθμοί $2i, -3i, \frac{1}{2}i, -\frac{3}{5}i, 0,25i$ είναι φανταστικοί.

Η γενική μορφή ενός φανταστικού αριθμού είναι: βi , όπου $\beta \neq 0$ καί $\beta \in \mathbb{R}$.

Μέ βάση τούς όρισμούς πού θέσαμε ή τετραγωνική ρίζα κάθε άρνητικού αριθμού είναι αριθμός φανταστικός.

$$\text{Πράγματι: } \forall \alpha \in \mathbb{R}^-: \sqrt{\alpha} = \sqrt{-1} \cdot \sqrt{|\alpha|} \wedge \sqrt{-1} = \pm i \Rightarrow \sqrt{\alpha} = \pm i \sqrt{|\alpha|}$$

Από τίς δύο τετραγωνικές ρίζες του άρνητικού αριθμού α συμφωνούμε μέ τό σύμβολο $\sqrt{\alpha}$ νά συμβολίζουμε τήν $i\sqrt{|\alpha|}$, τήν όποία ονομάζουμε πρωτεύουσα τετραγωνική ρίζα του α .

$$\text{Π.χ. } \sqrt{-16} \cdot \sqrt{-9} = i\sqrt{16} \cdot i\sqrt{9} = i^2\sqrt{16 \cdot 9} = (-1) \cdot 12 = -12$$

$$\text{Όχι σωστή πράξη: } \sqrt{-16} \cdot \sqrt{-9} = \sqrt{(-16) \cdot (-9)} = \sqrt{144} = 12$$

Οι άκέραιες δυνάμεις τής φανταστικής μονάδας.

$$\begin{aligned} \text{Έχουμε: } & \left. \begin{aligned} 1) \quad i^0 &= 1 \\ i^1 &= i \\ i^2 &= -1, (-i)^2 = -1 \\ i^3 &= i^2 \cdot i = (-1)i = -i \\ i^4 &= i^2 \cdot i^2 = (-1) \cdot (-1) = 1 \\ i^5 &= i^4 \cdot i = 1i = i \end{aligned} \right\} \text{ από τόν όρισμό} \end{aligned}$$

(*) Τό συμβολισμό αυτό χρησιμοποίησε πρώτος ό Gauss, αλλά ό Euler (1777) τόν καθιέρωσε.

2) Γενικά:

$$\forall v \in \mathbb{N}: \begin{cases} i^{4v} = (i^4)^v = 1^v = 1 \\ i^{4v+1} = i^{4v} \cdot i = 1 \cdot i = i \\ i^{4v+2} = i^{4v} i^2 = 1 (-1) = -1 \\ i^{4v+3} = i^{4v} i^3 = 1 (-i) = -i \\ i^{-v} = \frac{1}{i^v} \text{ (Δυνατές τιμές: } 1, i, -1, -i) \end{cases}$$

Ἡ δύναμη i^k , μέ $k \in \mathbb{N}$ καί $k > 4$, γράφεται $i^{4\pi+u}$, ὅπου π καί u τό πηλίκο καί τό ὑπόλοιπο τῆς διαιρέσεως $k : 4$. Οἱ δυνατές τιμές τοῦ u εἶναι: 0, 1, 2, 3. Ἄρα ἔχουμε: $i^k = i^{4\pi+u} = i^{4\pi} \cdot i^u = 1 \cdot i^u = i^u$

Π.χ. $i^{66} = i^{4 \cdot 16 + 2} = i^2 = -1$.

Παρατηρήσεις :

1) Οἱ δυνατές τιμές τῶν δυνάμεων τοῦ i εἶναι $i, -1, -i, 1$ καί ἐναλλάσσονται περιοδικά.

2) Οἱ ἄρτιες δυνάμεις τῆς i εἶναι οἱ πραγματικοί ἀριθμοί $+1, -1$.

3) Οἱ περιττές δυνάμεις τῆς i εἶναι οἱ φανταστικοί ἀριθμοί $i, -i$.

Παραδείγματα : 1) Νά ἀποδειχθεῖ ὅτι $i^7 + i^8 + i^9 + i^{10} = 0$

Λύση : $i^7 + i^8 + i^9 + i^{10} = i^7(1 + i + i^2 + i^3) = i^7(1 + i - 1 - i) = i^7 \cdot 0 = 0$.

2) Νά βρεθεῖ ἡ τιμή τῆς παραστάσεως $A = i^{2v} + \frac{1}{i^3} + 2i^4 + 3i^2$

Λύση : $A = (i^2)^v + \frac{1}{-i} + 2 \cdot 1 + 3(-1) = (-1)^v + i + 2 - 3 = (-1)^v - 1 + i$.

Ἔτσι : $\forall v = 2k, k \in \mathbb{N}_0 : A = 1 - 1 + i = i$

$\forall v = 2k + 1 : A = -1 - 1 + i = -2 + i$

3) Νά βρεθοῦν οἱ δυνατές τιμές τῆς παραστ.: $A = i^0 + i^1 + i^2 + i^3 + \dots + i^v$

Λύση : α) Ἄν $v = 4k$, ὅπου $k \in \mathbb{N}$ ἔχουμε: $A_1 = 1 + i - 1 - i + \dots + 1 = 1$

β) Ἄν $v = 4k + 1$ ἔχουμε: $A_2 = 1 + i - 1 - i + \dots + 1 + i = 1 + i$

γ) Ἄν $v = 4k + 2$ ἔχουμε: $A_3 = 1 + i - 1 - i + \dots + 1 + i - 1 = i$

δ) Ἄν $v = 4k + 3$ ἔχουμε: $A_4 = 1 + i - 1 - i + \dots + 1 + i - 1 - i = 0$

81. ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ (COMPLEXES) - ΟΡΙΣΜΟΙ *

Ἄν $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, θά ὀνομάζουμε μιγαδικό ἀριθμό τό ἀλγεβρικό ἄθροισμα μέ μορφή $\alpha + \beta i$, ὅπου ὁ α ἀποτελεῖ τό πραγματικό μέρος καί βi τό φανταστικό μέρος του.

Ἐπειδή μέ $\beta = 0$ εἶναι $\alpha = \alpha + 0i$ καί μέ $\alpha = 0 \wedge \beta \neq 0$ εἶναι $\beta i = 0 + \beta i$, ἔπεται ὅτι κάθε ἀριθμός πραγματικός ἢ φανταστικός μπορεῖ νά τεθεῖ σέ μορφή μιγαδικοῦ ἀριθμοῦ.

(*) Εἶναι ἀδύνατο, ὅπως ἀπέδειξε ὁ Weterstrass, νά γίνει σύστημα πιά γενικό ἀπό τό μιγαδικό, στό ὅποιο νά ἰσχύουν ὅλοι οἱ νόμοι τῶν τεσσάρων πράξεων.

Άρα τό σύστημα τών μιγαδικών ἀριθμῶν περιέχει τά συστήματα τών πραγματικῶν καί τών φανταστικῶν ἀριθμῶν.

Ἐτσι ἄν εἶναι: I τό σύνολο τών φανταστικῶν ἀριθμῶν βi , R τό σύνολο τών πραγματικῶν ἀριθμῶν α καί C τό σύνολο τών μιγαδικῶν ἀριθμῶν $\alpha + \beta i$, τότε ἔχουμε:

$$R \subset C, I \subset C, R \cap I = \emptyset, (R \cup I) \subset C$$

Στό μιγαδικό ἀριθμό $Z = \alpha + \beta i$ παρατηροῦμε ὅτι μεταξύ τών πραγματικῶν ἀριθμῶν α καί β ὑπάρχει μιά διμελής σχέση. Ἐπομένως μποροῦμε νά θεωρήσουμε ὅτι τά α καί β ἀποτελοῦν διατεταγμένο ζεῦγος (α, β) καί ἔτσι νά συμβολίσουμε τό μιγαδικό ἀριθμό μέ διατεταγμένο ζεῦγος πού νά ἔχει πρῶτο στοιχεῖο τό πραγματικό μέρος καί δεύτερο τό φανταστικό μέρος.

Ἐτσι ἔχουμε: $Z = \alpha + \beta i = (\alpha, \beta), \forall \alpha, \beta \in R$

Ἄμεση συνέπεια τοῦ νέου συμβολισμοῦ εἶναι ὅτι:

1) Κάθε πραγματικός ἀριθμός εἶναι τῆς μορφῆς $(\alpha, 0)$, $\alpha \in R$.

2) Κάθε φανταστικός ἀριθμός εἶναι τῆς μορφῆς $(0, \beta)$, $\beta \in R$.

Γιά νά ξεχωρίσουμε τοὺς μιγαδικούς ἀριθμούς τῆς μορφῆς (α, β) μέ $\beta \neq 0$ ἀπό τοὺς μιγαδικούς τῆς μορφῆς (α, β) $\forall \alpha, \beta \in R$, συμφωνοῦμε τοὺς πρώτους νά τοὺς λέμε **καθαροὺς μιγ. ἀριθμούς**.

82. ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕ ΜΙΓΑΔΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ.

Ὁρισμοί: Τοῦ μιγαδικοῦ ἀριθμοῦ $Z = \alpha + \beta i = (\alpha, \beta)$, $\forall \alpha, \beta \in R$ ὀνομάζουμε:

1) **συζυγή** τό μιγ. ἀριθμό $\bar{Z} = \alpha - \beta i = (\alpha, -\beta)$,

2) **ἀντισυζυγή** τό μιγ. ἀριθμό $Z_1 = -\alpha + \beta i = (-\alpha, \beta)$,

3) **ἀντίθετο** τό μιγ. ἀριθμό $-Z = -\alpha - \beta i = (-\alpha, -\beta)$,

4) **μέτρο ἢ ἀπόλυτη τιμή** τό μὴ ἀρνητικό ἀριθμό $+\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}$

καί συμβολίζουμε:

$$\rho = |Z| = |(\alpha, \beta)| = |\alpha + \beta i| = +\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}$$

Οἱ πράξεις μέ μιγαδικούς ἀριθμούς γίνονται ὅπως καί μέ τά διώνυμα $\alpha + \beta x$ καί $\gamma + \delta x$, ἄν ὅπου x εἶναι ἡ φανταστική μονάδα, γιατί δεχθήκαμε ὅτι ἰσχύουν οἱ ὡς τώρα γνωστοί νόμοι τών πραγματικῶν ἀριθμῶν.

Οἱ μιγαδικοί ἀριθμοὶ μηδενικός καί μοναδιαῖος.

Ὁ μιγαδικός ἀριθμός $0 + 0i = (0, 0)$ λέγεται **μηδενικός** καί συμφωνοῦμε νά ταυτίζεται μέ τό 0 τών πραγματικῶν ἀριθμῶν.

Ο μιγαδικός αριθμός $1 + 0i = (1, 0)$ λέγεται **μοναδιαίος** και συμφωνούμε να ταυτίζεται με τον πραγματικό 1.

Ίσότητα μιγαδικών αριθμών.

Δύο μιγαδικοί αριθμοί $Z_1 = \alpha_1 + \beta_1 i$ και $Z_2 = \alpha_2 + \beta_2 i$ είναι ίσοι, όταν και μόνο όταν είναι $\alpha_1 = \alpha_2$ και $\beta_1 = \beta_2$.

Δηλαδή: $\alpha_1 + \beta_1 i = \alpha_2 + \beta_2 i \Leftrightarrow \alpha_1 = \alpha_2 \wedge \beta_1 = \beta_2$

Σημείωση: Η σχέση τής ισότητας μιγαδικών αριθμών είναι **σχέση ισοδυναμίας**, γιατί ισχύουν οι ιδιότητες:

- 1) **αυτοπαθής:** δηλαδή $\alpha + \beta i = \alpha + \beta i$,
- 2) **συμμετρική:** δηλαδή $\alpha + \beta i = \gamma + \delta i \Leftrightarrow \gamma + \delta i = \alpha + \beta i$,
- 3) **μεταβατική:** δηλαδή $\left. \begin{array}{l} \alpha + \beta i = \gamma + \delta i \\ \gamma + \delta i = \epsilon + \zeta i \end{array} \right\} \Rightarrow \alpha + \beta i = \epsilon + \zeta i$

Πράξεις με μιγαδικούς αριθμούς.

1) Πρόσθεση - αφαίρεση.

Άθροισμα δύο μιγαδ. αριθμών $Z_1 = \alpha_1 + \beta_1 i = (\alpha_1, \beta_1)$ και $Z_2 = \alpha_2 + \beta_2 i = (\alpha_2, \beta_2)$ λέγεται ο μιγαδ. αριθμός $Z_1 + Z_2 = (\alpha_1 + \alpha_2) + (\beta_1 + \beta_2)i = (\alpha_1 + \alpha_2, \beta_1 + \beta_2)$.

Διαφορά δύο μιγαδ. αριθμών $Z_1 = \alpha_1 + \beta_1 i = (\alpha_1, \beta_1)$ μείον $Z_2 = \alpha_2 + \beta_2 i = (\alpha_2, \beta_2)$ λέγεται ο μιγαδ. αριθμός $Z_1 - Z_2 = (\alpha_1 - \alpha_2) + (\beta_1 - \beta_2)i$, πού, όταν προστεθεί στον Z_2 , δίνει άθροισμα τόν Z_1 .

Τό άθροισμα περισσότερων από δύο μιγ. αριθμών ανάγεται στο άθροισμα δύο μιγαδ. αριθμών.

Δηλαδή ισχύει :

$$(\alpha_1 + \beta_1 i) + (\alpha_2 + \beta_2 i) + \dots + (\alpha_n + \beta_n i) = (\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n) + (\beta_1 + \beta_2 + \dots + \beta_n) i$$

2) Πολλαπλασιασμός - διαίρεση.

Γινόμενο δύο μιγαδ. αριθμών $Z_1 = \alpha_1 + \beta_1 i = (\alpha_1, \beta_1)$ και $Z_2 = \alpha_2 + \beta_2 i = (\alpha_2, \beta_2)$ λέγεται ο μιγ. αριθμός $Z_1 \cdot Z_2 = (\alpha_1 \alpha_2 - \beta_1 \beta_2) + (\alpha_1 \beta_2 + \alpha_2 \beta_1) i$.

Τό γινόμενο περισσότερων από δύο μιγ. αριθμών, βρίσκεται αν πολ/σουμε τούς δύο πρώτους, τό έξαγόμενο τό πολ/σουμε με τόν τρίτο κ.ο.κ., ώσπου νά τελειώσουν όλοι οι παράγοντες του γινομένου.

Αντίστροφος του αριθμού $Z = \alpha + \beta i \neq 0$ λέγεται ο αριθμός Z^{-1} και είναι τέτοιος, ώστε $Z \cdot Z^{-1} = 1 + 0i$. Ο Z^{-1} υπάρχει και είναι ένας και μόνο ένας,

$$\delta \ Z^{-1} = (\alpha + \beta i)^{-1} = \frac{\alpha}{\alpha^2 + \beta^2} + \frac{-\beta}{\alpha^2 + \beta^2} i$$

Πράγματι, αν $Z = \alpha + \beta i$ και $Z^{-1} = x + \psi i$, τότε πρέπει
 $(\alpha + \beta i) \cdot (x + \psi i) = 1 = 1 + 0i \Rightarrow (\alpha x - \beta \psi) + (\alpha \psi + \beta x)i = 1 + 0i \Leftrightarrow$

$$\left. \begin{array}{l} \alpha x - \beta \psi = 1 \\ \alpha \psi + \beta x = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{array}{l} x = \frac{\alpha}{\alpha^2 + \beta^2} \\ \psi = \frac{-\beta}{\alpha^2 + \beta^2} \end{array}$$

Πηλίκο δύο μιγαδ. αριθμών $Z_1 = \alpha_1 + \beta_1 i$ διά $Z_2 = \alpha_2 + \beta_2 i$ λέγεται ο μιγαδ. αριθμός $Z_1 : Z_2$, πού, όταν πολ/σθει με τον Z_2 , δίνει γινόμενο τον Z_1 . Όπου $Z_2 \neq 0$. Τό πηλίκο αυτό υπάρχει και είναι ένα και μόνο ένα.

Πράγματι, αν $Z = x + \psi i$ είναι τό πηλίκο $Z_1 : Z_2$, τότε πρέπει:

$$(\alpha_2 + \beta_2 i) \cdot (x + \psi i) = \alpha_1 + \beta_1 i \Leftrightarrow (\alpha_2 x - \beta_2 \psi) + (\alpha_2 \psi + \beta_2 x)i = \alpha_1 + \beta_1 i \Rightarrow$$

$$\left. \begin{array}{l} \alpha_2 x - \beta_2 \psi = \alpha_1 \\ \alpha_2 \psi + \beta_2 x = \beta_1 \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{array}{l} x = \frac{\alpha_1 \alpha_2 + \beta_1 \beta_2}{\alpha_2^2 + \beta_2^2} \\ \psi = \frac{\alpha_2 \beta_1 - \alpha_1 \beta_2}{\alpha_2^2 + \beta_2^2} \end{array}$$

Έτσι έχουμε : $Z_1 : Z_2 = x + \psi i = \frac{\alpha_1 \alpha_2 + \beta_1 \beta_2}{\alpha_2^2 + \beta_2^2} + \frac{\alpha_2 \beta_1 - \alpha_1 \beta_2}{\alpha_2^2 + \beta_2^2} i$

Γιά να βρούμε τό πηλίκο δύο μιγαδων $Z_1 = \alpha_1 + \beta_1 i$ και $Z_2 = \alpha_2 + \beta_2 i \neq (0,0)$ εργαζόμαστε και ώς εξής :

$$Z_1 : Z_2 = Z \cdot Z_2^{-1} = (\alpha_1 + \beta_1 i) \cdot (\alpha_2 + \beta_2 i)^{-1} =$$

$$= (\alpha_1 + \beta_1 i) \cdot \left(\frac{\alpha_2}{\alpha_2^2 + \beta_2^2} + \frac{-\beta_2}{\alpha_2^2 + \beta_2^2} i \right) = \frac{\alpha_1 \alpha_2 + \beta_1 \beta_2}{\alpha_2^2 + \beta_2^2} + \frac{\alpha_2 \beta_1 - \alpha_1 \beta_2}{\alpha_2^2 + \beta_2^2} i$$

Επίσης ή πράξη τής διαιρέσεως γίνεται άμέσως, αν πολ/σουμε τούς όρους του κλάσματος με τό συζυγή μιγαδικό του παρονομαστή.

Δηλαδή :

$$Z_1 : Z_2 = \frac{Z_1}{Z_2} = \frac{\alpha_1 + \beta_1 i}{\alpha_2 + \beta_2 i} = \frac{(\alpha_1 + \beta_1 i)(\alpha_2 - \beta_2 i)}{(\alpha_2 + \beta_2 i)(\alpha_2 - \beta_2 i)} = \frac{\alpha_1 \alpha_2 + \beta_1 \beta_2}{\alpha_2^2 + \beta_2^2} + \frac{\alpha_2 \beta_1 - \alpha_1 \beta_2}{\alpha_2^2 + \beta_2^2} i$$

3) Η ύψωση μιγαδικού αριθμού σε δύναμη.

Έχουμε: $Z^2 = (\alpha + \beta i)^2 = \alpha^2 + 2\alpha\beta i + \beta^2 i^2 = (\alpha^2 - \beta^2) + 2\alpha\beta i$

$$Z^3 = (\alpha + \beta i)^3 = \alpha^3 + 3\alpha^2\beta i + 3\alpha\beta^2 i^2 + \beta^3 i^3 =$$

$$= (\alpha^3 - 3\alpha\beta^2) - (\beta^3 - 3\alpha^2\beta)i$$

4) Οι νόμοι των πράξεων.

Με βάση τούς όρισμούς πού θέσαμε οί μαθητές μπορούν νά άποδείξουν ότι για τίς πράξεις με μιγαδικούς αριθμούς ισχύουν οί τρεις θεμελιώδεις νόμοι : αντι-μεταθέσεως, προσεταιριστικός, έπιμεριστικός.

83. ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ.

1) Οι μιγαδικοί αριθμοί $\alpha + \beta i$, $\alpha - \beta i$, $-\alpha + \beta i$, $-\alpha - \beta i$ έχουν τό ίδιο μέτρο.

$$\text{Έτσι: } |\alpha + \beta i| = |\alpha - \beta i| = |-\alpha + \beta i| = |-\alpha - \beta i| = +\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}.$$

2) Οι πραγματικοί μιγαδικοί αριθμοί $(\alpha, 0) = \alpha = \alpha + 0i$ έχουν μέτρο τόν $|\alpha|$. Δηλαδή: $|(\alpha, 0)| = |\alpha + 0i| = \sqrt{\alpha^2} = |\alpha|$

3) Οι φανταστικοί αριθμοί $(0, \alpha) = \alpha i = 0 + \alpha i$ έχουν μέτρο $|\alpha|$.
Δηλαδή: $|(0, \alpha)| = |0 + \alpha i| = +\sqrt{\alpha^2} = |\alpha|$

4) Τό τετράγωνο του μέτρου ενός μιγαδ. αριθμού $Z = (\alpha, \beta) = \alpha + \beta i$ είναι ίσο μέ τό γινόμενο του αριθμού αυτού επί τό συζυγή του.

Δηλαδή :

$$\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R} : |Z|^2 = Z \cdot \bar{Z} \Rightarrow (\sqrt{\alpha^2 + \beta^2})^2 = (\alpha + \beta i) \cdot (\alpha - \beta i) = \alpha^2 + \beta^2$$

5) Τό μέτρο του γινομένου δύο μιγαδ. αριθμών $Z_1 = (\alpha_1 + \beta_1 i)$ και $Z_2 = (\alpha_2 + \beta_2 i)$ Ισοῦται μέ τό γινόμενο τών μέτρων τους.

Δηλαδή :

$$\begin{aligned} |Z_1 \cdot Z_2| &= |(\alpha_1 + \beta_1 i) \cdot (\alpha_2 + \beta_2 i)| = \sqrt{(\alpha_1 \alpha_2 - \beta_1 \beta_2)^2 + (\alpha_1 \beta_2 + \alpha_2 \beta_1)^2} = \\ &= \sqrt{(\alpha_1^2 + \beta_1^2) \cdot (\alpha_2^2 + \beta_2^2)} = \sqrt{\alpha_1^2 + \beta_1^2} \cdot \sqrt{\alpha_2^2 + \beta_2^2} = |Z_1| \cdot |Z_2| \end{aligned}$$

Γενικά έχουμε: $|Z_1 \cdot Z_2 \dots Z_n| = |Z_1| \cdot |Z_2| \dots |Z_n|$

Οί μαθητές νά αποδείξουν τήν ιδιότητα αυτή γιά τρεις καί τέσσερις αριθμούς.

6) Τό μέτρο του αντίστροφου Z^{-1} του μιγαδ. αριθμού $Z = \alpha + \beta i$ Ισοῦται μέ τό αντίστροφο του μέτρου του Z , ($Z \neq 0$).

Δηλαδή :

$$\begin{aligned} |Z^{-1}| &= |(\alpha + \beta i)^{-1}| = \left| \frac{\alpha}{\alpha^2 + \beta^2} - \frac{\beta}{\alpha^2 + \beta^2} i \right| = \sqrt{\frac{\alpha^2}{(\alpha^2 + \beta^2)^2} + \frac{\beta^2}{(\alpha^2 + \beta^2)^2}} = \\ &= \sqrt{\frac{\alpha^2 + \beta^2}{(\alpha^2 + \beta^2)^2}} = \sqrt{\frac{1}{\alpha^2 + \beta^2}} = \frac{1}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}} = \frac{1}{|Z|} \end{aligned}$$

7) Τό μέτρο του πηλίκου δύο μιγαδ. αριθμών Z_1 και $Z_2 \neq 0$ Ισοῦται μέ τό πηλίκο τών μέτρων τους.

Δηλαδή :

$$\left| \frac{Z_1}{Z_2} \right| = |Z_1 \cdot Z_2^{-1}| = |Z_1| \cdot |Z_2^{-1}| = |Z_1| \cdot \frac{1}{|Z_2|} = \frac{|Z_1|}{|Z_2|}$$

8) Τό μέτρο του πηλίκου δύο συζυγών μιγαδικών αριθμών είναι ή πραγματική μονάδα.

Πράγματι :

$$\left| \frac{Z}{\bar{Z}} \right| = \frac{|Z|}{|\bar{Z}|} = 1, \text{ γιατί } |Z| = |\bar{Z}|$$

9) Τό μέτρο ενός μιγαδικού αριθμού $Z = \alpha + \beta i$ είναι μηδέν, όταν $\alpha = 0$ και $\beta = 0$.

Πράγματι έχουμε :

$$|\alpha + \beta i| = 0 \Rightarrow \sqrt{\alpha^2 + \beta^2} = 0 \Rightarrow \alpha^2 + \beta^2 = 0 \Rightarrow \alpha = 0 \text{ και } \beta = 0.$$

Αντιστρόφως :

$$Z = \alpha + \beta i = 0 + 0i \Leftrightarrow |Z| = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2} = 0.$$

10) Η ιδιότητα $\forall Z \in \mathbb{R} \Rightarrow |Z|^2 = Z^2$ δεν ισχύει, όταν είναι $Z \in (\mathbb{C} - \mathbb{R})$.

Πράγματι, αν :

$$Z = \alpha + \beta i (\beta \neq 0), \text{ τότε } |\alpha + \beta i|^2 = (\sqrt{\alpha^2 + \beta^2})^2 = \alpha^2 + \beta^2.$$

Είναι όμως $(\alpha + \beta i)^2 = \alpha^2 - \beta^2 + 2\alpha\beta i$.

Άρα τό $|\alpha + \beta i|^2$ δεν ισούται μέ τό $(\alpha + \beta i)^2$.

Σημαντική σημείωση. Μερικές ιδιότητες τών απόλυτων τιμών τών πραγματικών αριθμών δεν ισχύουν γιά τούς καθαρούς μιγαδικούς αριθμούς (ιδιότητα 10).

84. ΓΡΑΦΙΚΗ (ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ) ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΙΓΑΔ. ΑΡΙΘΜΩΝ.

Γνωρίζουμε ότι τά διατεταγμένα ζεύγη (x, ψ) του συνόλου του καρτεσιανού γινομένου \mathbb{R}^2 απεικονίζονται άμφιμονοσήμαντα στά σημεία του επιπέδου μέ τή βοήθεια τών όρθογωνίων άξόνων (καρτεσιανό επίπεδο).

Οί μιγαδικοί αριθμοί, σάν διατεταγμένα ζεύγη πραγματικών, μπορούν κι αύτοί νά παρασταθούν μέ τά σημεία του επιπέδου τών όρθογ. άξόνων.

Πράγματι ό μιγαδικός αριθμός $(\alpha, \beta) = \alpha + \beta i$, όπου $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, απεικονίζεται σέ ένα μόνο σημείο $M(\alpha, \beta)$ του επιπέδου, πού έχει τετμημένη α και τεταγμένη β . Αντιστρόφως τό σημείο $M(\alpha, \beta)$ μέ συντεταγμένες (α, β) αντιστοιχεί σέ έναν και μόνο όρισμένο μιγαδικό αριθμό $(\alpha, \beta) = \alpha + \beta i$.


Δηλαδή :

Αρχέτυπο	Εικόνα
$\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R} : (\alpha, \beta) = \alpha + \beta i$	$\leftrightarrow M(\alpha, \beta)$

Έτσι ύπάρχει άμφιμονοσήμαντη άντιστοιχία μεταξύ τών μιγαδικών αριθμών του συνόλου $\mathbb{C} = \{(x, \psi) / (x, \psi) \text{ μιγαδικός αριθμός}\}$ και τών σημείων

του επιπέδου. Στο επίπεδο αυτό οι άξονες των τετμημένων και τεταγμένων ονομάζονται αντίστοιχως άξονας των πραγματικών και άξονας των φανταστικών. Το επίπεδο λέγεται **μιαδικό** ή **πολικό επίπεδο** ή του Argand (σχ. 84.1).

Επίσης μπορούμε να έχουμε μία άμφιμονοσήμαντη αντιστοιχία μεταξύ των μιγαδ. αριθμών (α, β) και των διανυσματικών ακτίνων \vec{OM} του επιπέδου.



Έτσι:

$$\psi(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2: (\alpha, \beta) = (\alpha + \beta i) \leftrightarrow \vec{OM}.$$

Επειδή $|\vec{OM}| = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2}$ και $|\alpha + \beta i| = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2}$, τό μήκος του διανύσματος \vec{OM} είναι τό μέτρο του μιγ. αριθμού $\alpha + \beta i$. Η προσημασμένη γωνία $\theta = (\widehat{OX}, \widehat{OM})$ λέγεται **δρισμα** του $\alpha + \beta i$.

$$\text{Είναι } \text{συν}\theta = \frac{\alpha}{(\overline{OM})} = \frac{\alpha}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}} \text{ και } \eta\mu\theta = \frac{\beta}{(\overline{OM})} = \frac{\beta}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}}$$

Έτσι, $\psi(\alpha, \beta) \in \mathbb{C}: \alpha + \beta i = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2} \left(\frac{\alpha}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}} + i \frac{\beta}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}} \right) = \rho(\text{συν}\theta + i\eta\mu\theta)$,

όπου ρ τό μέτρο και θ τό δρισμα.

Τό μέτρο ρ και τό δρισμα θ ενός μιγ. αριθμού $\alpha + \beta i$, μέ εικόνα τό σημείο $M(\alpha, \beta)$ λέγονται **πολικές συντεταγμένες** του σημείου M .

Όποτε, κάθε μιγαδικός αριθμός μπορεί να γραφεί με τίς μορφές $\alpha + \beta i$ και $\rho(\text{συν}\theta + i\eta\mu\theta)$. Η πρώτη λέγεται **καρτεσιανή μορφή** και η δεύτερη **τριγωνομετρική μορφή**.

Παράδειγμα: Να γραφεί με τριγωνομετρική μορφή ό $Z = 1 + i\sqrt{3}$.

Έχουμε:


$$|Z| = \sqrt{1 + 3} = 2, \text{ συν}\theta = \frac{1}{2} \text{ και } \eta\mu\theta = \frac{\sqrt{3}}{2}, \text{ όποτε } \rho=2 \text{ και } \theta = 60^\circ.$$

Άρα μπορούμε να γράψουμε:

$$Z = 1 + i\sqrt{3} = 2(\text{συν } 60^\circ + i\eta\mu 60^\circ)$$

85. ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΔΥΟ ΜΙΓΑΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ.

1) Πρόσθεση. *Αν $Z_1 = \alpha_1 + \beta_1 i$ και $Z_2 = \alpha_2 + \beta_2 i$ και οι εικόνες τους




Σχ. 85.1

τά διανύσματα \vec{OM}_1 και \vec{OM}_2 αντίστοιχως, τότε τό άθροισμα $Z_1 + Z_2 = Z$ έχει εικόνα τό άθροισμα $\vec{OM}_1 + \vec{OM}_2 = \vec{OM}$. Γνωρίζουμε ότι τό διάνυσμα \vec{OM} έχει άρχή τό σημείο O και πέρασ τό άλλο άκρο τής διαγωνίου του παραλληλογράμμου OM_1MM_2 (κανόνας του παραλληλογράμμου).

*Η άπόδειξη μπορεί νά γίνει

άπό τούς μαθητές εύκολα, άρκεί νά παρατηρήσουν ότι $\alpha_1 + \alpha_2 = \alpha$ και $\beta_1 + \beta_2 = \beta$. (Σχήμα 85.1)

2) *Αφαίρεση. *Αν οι εικόνες τών μιγαδικών $Z_1 = \alpha_1 + \beta_1 i$ και $Z_2 = \alpha_2 + \beta_2 i$ είναι τά διανύσματα \vec{OM}_1 και \vec{OM}_2 αντίστοιχως, τότε ή εικόνα τής διαφοράς



Σχ. 85.2

$Z_1 - Z_2 = Z$ είναι τό διάνυσμα \vec{OM} (Σχήμα 85.2). Γιατί $Z = Z_1 - Z_2 = Z_1 + (-Z_2)$

*Η εικόνα του $-Z_2$ είναι τό διάνυσμα \vec{OM}'_2 , συμμετρικό του \vec{OM}_2 ως πρós τό O.

*Έτσι: $\vec{OM}_1 - \vec{OM}_2 = \vec{OM}_1 + \vec{M}_2\vec{O} = \vec{OM}_1 + \vec{OM}'_2 = \vec{OM}$.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

*Ομάδα α'

Οί φανταστικοί αριθμοί

245) Νά άποδειχθεί ότι

$$i^{4n} = i^{-4} = -1, \quad i^{4n+2} = -i^{4n} = \frac{1}{i^2}, \quad \frac{1}{i^{4n+1}} = i^{4n+3} = -i, \quad i^{4n+1} : i^{4n-1} = -1, \quad \text{όπου } n, \mu \in \mathbb{N}_0$$

246) Νά γίνουν οι πράξεις

$$-5i^3(-i^7), \quad i \cdot i^2 \cdot i^3 \cdot i^4, \quad -5i^2 + i \cdot (2i - i^4), \quad \frac{1}{i} + \frac{1}{i^2} + \frac{1}{i^3} + \frac{1}{i^4}$$

247) Νά αποδειχθεί ότι $\forall v \in \mathbb{N}_0$ έχουμε $i^v + i^{v+1} + i^{v+2} + i^{v+3} = 0$

248) Οι αριθμοί $\kappa, \lambda, \mu, v \in \mathbb{N}$, αν διαιρεθούν διά 4, αφήνουν τό ίδιο υπόλοιπο.

Νά αποδειχθεί ότι α) $i^\kappa = i^\lambda \cdot i^\mu = i^\nu = i^v$, β) $i^{\kappa+\lambda+\mu+v} = 1$

249) Νά βρεθούν οι τετραγωνικές ρίζες τών αριθμών $-25, -36, -23, -27$.

Οι μιγαδικοί αριθμοί

250) Νά άναχθοϋν οι παρακάτω παραστάσεις στη μορφή $\alpha + \beta i$:

α) $-2i(-1 + i) - (-3 + 2i)$, β) $(5 + 3i) \cdot (5 - 3i) \cdot i^2$, γ) $(1 + i)^2$,

δ) $(2 + 1)^2 + (2 - i)^2$, ε) $(\alpha + \beta i)^2 + (\alpha - \beta i)^2$, ζ) $\frac{\alpha + i}{1 - \alpha i}$

251) Νά αποδειχθεί ή άλήθεια τών ισοτήτων:

α) $(-2 + 7i) \cdot (-2 - 7i) = 53$, β) $(-7 + i) \cdot (7 + i) = -50$

γ) $(2 + 3i) \cdot (3 + 2i) = 13i$, δ) $(x - \alpha + \beta i) \cdot (x - \alpha - \beta i) = (x - \alpha)^2 + \beta^2$

ε) $\frac{\alpha + \beta i}{\beta - \alpha i} = i$

252) Γιά ποιές πραγματικές τιμές τών x, ψ ισχύει ή ισότητα;

$$(1 - 2i)x + (3 + 5i)\psi = 1 + 3i$$

253) *Αν $z_1 = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$, $z_2 = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$, νά αποδειχθεί ότι:

α) $z_1 = z_2^2$, β) $z_2 = z_1^2$ και γ) $z_1^3 = z_2^3 = 1$

254) Ποιό είναι τό μέτρο τών αριθμών $-i, 1 + i, 1 + i\sqrt{3}, 2 + \sqrt{3} + i$,

$$\frac{1 + 2i}{1 - 2i}, \quad \frac{1 + \alpha i}{1 - \alpha i}, \quad \frac{3 + 2i}{i} - (1 + i), \quad \frac{(3 + 4i) \cdot (-1 + 2i)}{(-1 - i) \cdot (3 - i)}, \quad \frac{i \cdot (2 - \sqrt{3} + i)^2}{(-1 + i)^3}$$

255) Νά βρεθούν οι εικόνες τών αριθμών:

$$1 + i, \quad 1 - 2i, \quad -3 + i, \quad -2 - \frac{1}{2}i, \quad (1 - 2i)^{-1}, \quad (1 + i)^2, \quad 1, \quad -1, \quad -i, \quad \frac{1}{i}, \quad -\frac{1}{i}$$

*Ομάδα $\alpha \beta'$

Οι φανταστικοί αριθμοί

256) Ποιές τιμές μπορεί νά πάρει ή παράσταση

$$A = 1^0 - i^1 + i^2 - \dots (-1)^{i^v}, \quad \delta\text{που } v \in \mathbb{N}^0$$

257) *Αν $A = i^0 + i^1 + i^2 + \dots + i^v$, $B = i^0 - i^1 + i^2 - \dots (-1)^{i^v}$, $v \in \mathbb{N}$, ποιές τιμές μπορεί νά πάρει ή παράσταση $A + B$;

258) Νά συγκριθοϋν οι τιμές τών παραστάσεων:

$$A = i^\lambda + i^{\lambda+1} + i^{\lambda+2} + i^{\lambda+3}, \quad B = \frac{1}{i^\lambda} + \frac{1}{i^{\lambda+1}} + \frac{1}{i^{\lambda+2}} + \frac{1}{i^{\lambda+3}}, \quad \lambda \in \mathbb{N}$$

Οι μιγαδικοί αριθμοί

259) Νά άναχθοϋν οι παρακάτω παραστάσεις στη μορφή $\alpha + \beta i$:

$$\begin{aligned} \alpha) & (1 + 2i)^4 - (1 - 2i)^4, & \beta) & \frac{(1 + 2i)^3 - (1 - i)^3}{(3 + 2i)^3 - (2 + i)^3}, \\ \gamma) & \frac{\alpha + \beta i}{\gamma + \delta i} + \frac{\alpha - \beta i}{\gamma - \delta i}, & \delta) & \frac{\sqrt{3} + i}{\sqrt{3} - i} + \frac{\sqrt{3} - i}{\sqrt{3} + i} \end{aligned}$$

260) Νά άποδειχθεί ή άλήθεια των ίσοτήτων:

$$\alpha) (1 - i)^4 = -4, \quad \beta) \frac{3}{6 - 5i} = \frac{18}{61} + \frac{15}{61}i, \quad \gamma) \frac{\alpha + \beta v - (\alpha v - \beta)i}{1 - vi} = \alpha + \beta i,$$

$$\iota) \frac{\alpha + \beta i}{\alpha - \beta i} + \frac{\alpha - \beta i}{\alpha + \beta i} = \frac{2(\alpha^2 - \beta^2)}{\alpha^2 + \beta^2}, \quad \kappa) (1 + i)^3 (1 + i^3) = 4i$$

261) *Αν $z_1 = (2 + i)$, $z_2 = (1 - 2i)$, νά ύπολογισθεί ό μιγαδικός αριθμός $z = z_1 + z_2 + z_1 z_2 + \frac{z_1}{z_2} + (z_1 - z_2)^2$.

262) *Αν $z = \alpha + \beta i$ καί $\bar{z} = \alpha - \beta i$, νά άποδειχθοϋν οι σχέσεις:

$$\begin{aligned} z_1 \pm z_2 &= \bar{z}_1 \pm \bar{z}_2, & z_1 z_2 &= \bar{z}_1 \cdot \bar{z}_2, & \overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)} &= \frac{\bar{z}_1}{\bar{z}_2} \quad (z_2 \neq 0), \\ \overline{(-z)} &= -\bar{z}, & \overline{\left(\frac{1}{z}\right)} &= \frac{1}{\bar{z}} \quad (z \neq 0) \end{aligned}$$

263) Μέ ποιά συνθήκη των $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2 \in \mathbb{R}$ τό άθροισμα ή ή διαφορά των $z_1 = \alpha_1 + \beta_1 i$, $z_2 = \alpha_2 + \beta_2 i$ είναι αριθμός α) πραγματικός καί β) φανταστικός καθαρός;

Τό μέτρο των μιγαδικών αριθμών

264) *Αν $z_1, z_2 \in (\mathbb{C} - \mathbb{R})$, νά άποδειχθεί ότι $|z_1 z_2|^2 = |z_1|^2 \cdot |z_2|^2$ (έφαρμόστε τον τύπο $|z|^2 = z \bar{z}$).

265) Νά άποδειχθεί ότι $|z_1 + \bar{z}_2| = |\bar{z}_1 + z_2|$, $z_1, z_2 \in (\mathbb{C} - \mathbb{R})$

266) *Αν οι $z_1 = \alpha_1 + \beta_1 i$, $z_2 = \alpha_2 + \beta_2 i$ έπαληθεϋουν τή σχέση $z_1 \bar{z}_1 + z_2 \bar{z}_2 = |z_1 + z_2|^2$ δείξτε ότι $\alpha_1 \alpha_2 + \beta_1 \beta_2 = 0$.

267) *Αν $\alpha + \beta i = 0 \Leftrightarrow |\alpha + \beta i| = 0$.

Γραφική παράσταση των μιγαδικών αριθμών

268) Νά παραστήσετε γραφικά τους μιγαδικούς αριθμούς $\alpha + \beta i$, $\alpha - \beta i$, $-\alpha + \beta i$, $-\alpha - \beta i$ ($\alpha, \beta \in \mathbb{R}^+$). Τί παρατηρείτε;

269) Νά βρεθοϋν οι πολικές συντεταγμένες του αριθμού $\sqrt{3} + i$ καί νά γραφεί μέ τριγωνομετρική μορφή.

270) Οι πολικές συντεταγμένες ένος μιγαδ. αριθμού είναι $\rho = 5$ καί $\theta = 45^\circ$. Ποιός είναι ό αριθμός αυτός;

271) Νά παρασταθεί γραφικά τό άθροισμα τριών καί έπειτα τεσσάρων μιγαδικών αριθμών.

272) Νά παραστήσετε γεωμετρικά τό άθροισμα των αριθμών:

$$1) z_1 = -2i, z_2 = -3 + 2i \text{ καί } 2) z_1 = 3i, z_2 = -2 + 0i, z_3 = 1 + i$$

273) *Αν $z_1 = 2 - 3i$, $z_2 = +1 + 2i$, ποιές είναι οι εικόνες στό μιγαδικό έπίπεδο των διαφορών $z_1 - z_2$ καί $z_2 - z_1$. Τί παρατηρείτε;

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΣ

274) *Αν $z_1, z_2 \in (\mathbb{C} - \mathbb{R})$, νά βρεθεί σχέση μεταξύ των $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2 \in \mathbb{R}$, όπου $z_1 = \alpha_1 + \beta_1 i, z_2 = \alpha_2 + \beta_2 i$, γιά νά έχουμε: α) $z_1 z_2 \in \mathbb{R}$. β) $z_1 z_2 \in i$ (\mathbb{R} σύνολο πραγματικών, i σύνολο φανταστικών).

275) Μέ ποιά συνθήκη των πραγματικών $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2$ τό πηλίκο $\frac{\alpha_1 + \beta_1 i}{\alpha_2 + \beta_2 i}$ είναι: α) πραγματικός αριθμός, καί β) φανταστικός;

276) *Αν $z_1 z_2 \in (\mathbb{C} - \mathbb{R})$ καί $z_1 = -\bar{z}_2$, νά αποδειχθεί ότι τό άθροισμα $z_1 + z_2$ είναι καθαρός φανταστικός αριθμός καί τό γινόμενο $z_1 z_2 \in \mathbb{R}$.

277) *Αν $z_1 = \alpha_1 + \beta_1 i, z_2 = \alpha_2 + \beta_2 i$, μέ ποιά συνθήκη των $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2$ θά είναι α) $(z_1 \cdot z_2) = 0$ καί β) $|z_1 - z_2| = |z_1 + z_2|$;

278) *Αν $z_1 = \alpha_1 + \beta_1 i, z_2 = \alpha_2 + \beta_2 i$ καί $|z_1|^2 + |z_2|^2 = |z_2 - z_1|^2$, νά αποδειχθεί ότι $\alpha_1 \alpha_2 + \beta_1 \beta_2 = 0$.

279) *Αν $z_1, z_2 \in (\mathbb{C} - \mathbb{R})$, νά αποδειχθεί ότι

$$2(|z_1|^2 + |z_2|^2) = |z_1 + z_2|^2 + |z_1 - z_2|^2$$

280) *Αν $z = \alpha + \beta i$ καί $\bar{z} = \alpha - \beta i$, νά αποδειχθεί ότι ό z είναι ή πραγματικός ή φανταστικός, άν ισχύει ή σχέση $z^2 = \bar{z}^2$.

281) *Αν $z = \alpha + \beta i$ καί $\bar{z} = \alpha - \beta i$, νά αποδειχθεί ότι οι παραστάσεις

$$\frac{2z}{1+z\bar{z}}, \frac{2\bar{z}}{1+z\bar{z}}$$

είναι μιγαδικοί συζυγείς αριθμοί.

282) *Αν $z = \alpha + \beta i, \alpha, \beta \in \mathbb{R}$ καί $|2z - 1| = |z - 2|$, νά αποδειχθεί ότι $\alpha^2 + \beta^2 = 1$.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XII

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ Β' ΒΑΘΜΟΥ

86. ΟΡΙΣΜΟΙ, ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ (περιληπτική υπόμνηση).

ΟΡΙΣΜΟΙ: Κάθε ισότητα μεταξύ δύο αλγεβρικών παραστάσεων, που είναι αληθής για ορισμένες τιμές των γραμμάτων (άγνωστων) των παραστάσεων αυτών, λέγεται *έξισωση*.

*Αν η ισότητα είναι αληθής για κάθε τιμή των γραμμάτων της (άγνωστων), τότε η εξίσωση λέγεται *ταυτότητα*. Π. χ. η εξίσωση $4x^2 + 1 - 4x = (2x - 1)^2$ είναι αληθής για κάθε $x \in \mathbb{R}$, γι' αυτό είναι ταυτότητα.

Η εργασία που κάνουμε, για να βρούμε σε μία εξίσωση όλες τις τιμές των γραμμάτων, δηλαδή των άγνωστων, με τις οποίες η εξίσωση είναι αληθής, λέγεται *επίλυση της εξισώσεως*.

Οι τιμές, που βρίσκουμε με την επίλυση μιάς εξισώσεως, λέγονται *λύσεις ή ρίζες* της εξισώσεως.

Δύο ή περισσότερες εξισώσεις, αν έχουν τις ίδιες ακριβώς λύσεις (όχι κοινές λύσεις), λέγονται *ισοδύναμες*.

Ιδιότητες: 1) Η εξίσωση $f(x) = \varphi(x)$ είναι ισοδύναμη με την εξίσωση $f(x) + \sigma(x) = \varphi(x) + \sigma(x)$, αν στο σύνολο που αναφερόμαστε η συνάρτηση $\sigma(x)$ έχει νόημα. Έτσι: $f(x) = \varphi(x) \Leftrightarrow f(x) + \sigma(x) = \varphi(x) + \sigma(x)$.

2) Η εξίσωση $f(x) = \varphi(x)$ είναι ισοδύναμη με την εξίσωση $\lambda f(x) = \lambda \varphi(x)$, όπου $\lambda \in \mathbb{R}$, $\lambda \neq 0$ και ανεξάρτητο από τον x .

Έτσι συμβολίζουμε: $\lambda \in \mathbb{R}$, $\lambda \neq 0 : f(x) = \varphi(x) \Leftrightarrow \lambda f(x) = \lambda \varphi(x)$.

3) Η εξίσωση $f(x) = \varphi(x)$ δεν είναι γενικά ισοδύναμη με την εξίσωση $f(x) \cdot \sigma(x) = \varphi(x) \cdot \sigma(x)$, όπου $\sigma(x)$ συνάρτηση του x .

Πράγματι, γιατί $f(x) \cdot \sigma(x) = \varphi(x) \cdot \sigma(x) \Leftrightarrow \sigma(x)[f(x) - \varphi(x)] = 0$, οπότε έχουμε $\sigma(x) = 0 \vee f(x) = \varphi(x)$.

4) Αν $\varphi(x) = 0$ και $\varphi(x) = \varphi_1(x) \cdot \varphi_2(x) \dots \varphi_n(x)$, τότε το σύνολο των λύσεων της $\varphi(x) = 0$ ισούται με την ένωση των συνόλων των λύσεων των

έξισώσεων $\varphi_1(x) = 0, \varphi_2(x) = 0, \dots, \varphi_n(x) = 0$. Πράγματι, γιατί, για να άλη-
θεύει ή $\varphi(x) = 0$, πρέπει και άρκει ένα τουλάχιστον άπό τά $\varphi_1(x), \varphi_2(x), \dots, \varphi_n(x)$
νά είναι ίσο μέ μηδέν. Άρα οί ρίζες τών έξισώσεων $\varphi_1(x) = 0, \varphi_2(x) = 0, \dots,$
 $\varphi_n(x) = 0$ είναι και ρίζες τής έξισώσεως $\varphi(x) = 0$.

5) 'Η έξίσωση $f(x) = \varphi(x)$ δέν είναι γενικά ίσοδύναμη μέ τήν έξίσωση
 $[\varphi(x)]^2 = [f(x)]^2$.

Γιατί: $[\varphi(x)]^2 - [f(x)]^2 = 0 \Leftrightarrow [\varphi(x) + f(x)][\varphi(x) - f(x)] = 0$, όπότε είναι
 $\varphi(x) = -f(x) \vee \varphi(x) = f(x)$.

Άπό τήν περιληπτική αύτή υπόμνηση, χωρίς άπόδειξη, τών ιδιοτήτων
των έξισώσεων συμπεραίνουμε ότι κατά τήν επίλυση τών έξισώσεων πρέπει
νά έχουμε σοβαρά υπόψη αυτές τίς ιδιότητες για να μήν κάνουμε σφάλματα.

87. ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΕΞΙΣ. Β' ΒΑΘΜΟΥ. (1)

'Ορισμός. Λέγεται έξίσωση β' βαθμού ώς πρός x κάθε έξίσωση τής μορφής
 $ax^2 + bx + \gamma = 0$, όπου $a \neq 0$ και a, β, γ πραγματικοί ή και μιγαδικοί.

'Εδω θά θεωρούνται οί a, β, γ , πού λέγονται συντελεστές, πραγματικοί
άριθμοί ή άλγεβρικές παραστάσεις άνεξάρτητες άπό τόν x . 'Ετσι για τίς άκό-
λουθες έξισώσεις β' βαθμού οί συντελεστές έχουν τίς άκόλουθες τιμές:

$3x^2 - 2x = 0$	$\alpha = 3,$	$\beta = -2,$	$\gamma = 0$
$-5x^2 + 7 = 0$	$\alpha = -5,$	$\beta = 0,$	$\gamma = 7$
$-\frac{1}{2}x^2 = 0$	$\alpha = -\frac{1}{2}$	$\beta = 0,$	$\gamma = 0$
$x^2 - 3x + 1 = 0$	$\alpha = 1,$	$\beta = -3,$	$\gamma = 1$
$ax^2 - (\alpha + 1)x - 3\alpha = 0$	$\alpha' = \alpha,$	$\beta' = -(\alpha + 1),$	$\gamma' = -3\alpha$
$(\lambda - 1)x^2 - 4\lambda + (\lambda^2 - 9) = 0$	$\alpha = \lambda - 1,$	$\beta = -4\lambda,$	$\gamma = \lambda^2 - 9$

Οί τρεις πρώτες έξισώσεις δέν περιέχουν όλους τούς όρους του τριωνύμου
 $ax^2 + bx + \gamma$, γι' αυτό λέγονται έλλιπείς. Οί άλλες τρεις είναι πλήρεις
μορφές.

'Ετσι, άν $\beta = \gamma = 0$ λαμβάνουμε

$\alpha x^2 = 0$	} έλλιπείς μορφές
$\alpha x^2 + \gamma = 0$	
$\alpha x^2 + \beta x = 0$	
$\alpha x^2 + \beta x + \gamma = 0$	

Τής έξισώσεως $\varphi(x) = ax^2 + bx + \gamma = 0$, ($a \neq 0, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$), θά όνομάζουμε
λύση ή ρίζα τήν τιμή $x = x_0 \in \mathbb{C}$, άν έχουμε $\varphi(x_0) = ax_0^2 + \beta x_0 + \gamma = 0$.
($\mathbb{C} = \{x/x \text{ μιγαδικός άριθμ.}\}$)*.

(1) Τίς έξισώσεις β' βαθμού μέ έναν άγνωστο πραγματεύθηκε πρώτος ό 'Ελληνας μα-
θηματικός Διόφαντος (3ος αι. μ. Χ.).

(*) Τό σύνολο \mathbb{C} τών μιγαδικών άριθμών περιέχει τό σύνολο τών πραγματικών άριθ-
μών (κεφάλαιο περί μιγαδικών).

Όπως θα δούμε παρακάτω, τό σύνολο τών λύσεων (ριζών) τής δευτεροβάθμιας εξίσωσης είναι διμελές.

Αν λοιπόν x_1 και x_2 είναι οι ρίζες τής $f(x) = ax^2 + bx + \gamma = 0$ στό σύνολο C , τότε οι $f(x_1) = ax_1^2 + bx_1 + \gamma = 0$ και $f(x_2) = ax_2^2 + bx_2 + \gamma = 0$ είναι αληθείς ισότητες.

Συμβολίζουμε:

$$\left. \begin{array}{l} \alpha \neq 0, \beta, \gamma \in \mathbb{R} \\ f(x_1) = 0, f(x_2) = 0 \end{array} \right\} : \Sigma = \{x/x \in C \wedge f(x) = ax^2 + bx + \gamma = 0\} = \{x_1, x_2\}$$

Επίλυση τής εξίσ. β' βαθμού.

1) Η έλλιπής μορφή $ax^2 = 0$, $a \neq 0$.

Επειδή $a \neq 0$, έχουμε $ax^2 = 0 \Rightarrow x^2 = 0$ ή $x \cdot x = 0$, όπότε $x_1 = x_2 = 0$.

2) Η έλλιπής μορφή $ax^2 + \gamma = 0$, $a \neq 0$, $\gamma \neq 0$.

Έχουμε: $ax^2 + \gamma = 0 \Leftrightarrow x^2 + \gamma/a = 0$, όπότε:

α) *Αν $\frac{\gamma}{a} < 0$, δηλαδή οι a και γ είναι έτερόσημοι, τότε $-\frac{\gamma}{a} > 0$ και ή εξίσωση γράφεται:

$$x^2 - \left(-\frac{\gamma}{a}\right) = 0 \Leftrightarrow x^2 - \left(\sqrt{-\frac{\gamma}{a}}\right)^2 = 0 \Leftrightarrow \left(x + \sqrt{-\frac{\gamma}{a}}\right) \left(x - \sqrt{-\frac{\gamma}{a}}\right) = 0.$$

Αυτή είναι Ισοδύναμη μέ τό ζευγος

$$x + \sqrt{-\frac{\gamma}{a}} = 0, x - \sqrt{-\frac{\gamma}{a}} = 0, \text{ όπότε } x_1 = -\sqrt{-\frac{\gamma}{a}}, x_2 = +\sqrt{-\frac{\gamma}{a}}$$

β) *Αν $\frac{\gamma}{a} > 0$, δηλαδή οι a και γ είναι όμόσημοι, τότε ή εξίσωση $x^2 + \frac{\gamma}{a} = 0$ δέν έχει λύση στό \mathbb{R} , γιατί $x^2 + \frac{\gamma}{a} > 0 \forall x \in \mathbb{R}$, έχει όμως λύση στό σύνολο τών φανταστικών \mathbb{I} .

Έτσι λαμβάνουμε τίς λύσεις:

$$x_1 = -\sqrt{-\frac{\gamma}{a}} = -i\sqrt{\frac{\gamma}{a}}, x_2 = +\sqrt{-\frac{\gamma}{a}} = i\sqrt{\frac{\gamma}{a}}$$

3) Η έλλιπής μορφή $ax^2 + bx = 0$, $a \neq 0$, $\beta \neq 0$.

Έχουμε: $ax^2 + bx = 0 \Leftrightarrow x(ax + \beta) = 0$.

Αυτή είναι Ισοδύναμη μέ τό ζευγος τών εξίσ. $x = 0$, $ax + \beta = 0$,

όπότε λαμβάνουμε $x_1 = 0$, $x_2 = -\frac{\beta}{a}$

4) Η πλήρης μορφή $f(x) = ax^2 + bx + \gamma = 0$, $a \neq 0$, $\beta \neq 0$, $\gamma \neq 0$.

Σύμφωνα με τις ιδιότητες Ισοδυναμίας τῶν ἐξισώσεων λαμβάνουμε διαδοχικά:

$$f(x) = \alpha x^2 + \beta x + \gamma = 0 \quad (\text{πολ/ζουμε ἐπὶ } 4\alpha)$$

$$\Leftrightarrow 4\alpha^2 x^2 + 4\alpha\beta x + 4\alpha\gamma = 0 \quad (\text{προσθέτουμε τὸ } \beta^2)$$

$$\Leftrightarrow 4\alpha^2 x^2 + 4\alpha\beta x + \beta^2 - \beta^2 + 4\alpha\gamma = 0$$

$$\Leftrightarrow (2\alpha x + \beta)^2 - (\beta^2 - 4\alpha\gamma) = 0 \quad (\text{θέτουμε ὅπου } \beta^2 - 4\alpha\gamma = \Delta)$$

$$\eta \quad (2\alpha x + \beta)^2 - \Delta = 0$$

$$\eta \quad (2\alpha x + \beta)^2 - (\sqrt{\Delta})^2 = 0.$$

Αὐτὴ εἶναι ἰσοδύναμη μὲ τὸ ζεῦγος τῶν ἐξισώσεων

$$2\alpha x + \beta + (\sqrt{\Delta}) = 0, \quad 2\alpha x + \beta - \sqrt{\Delta} = 0,$$

ὁπότε λαμβάνουμε

$$x_1 = \frac{-\beta + \sqrt{\Delta}}{2\alpha}, \quad x_2 = \frac{-\beta - \sqrt{\Delta}}{2\alpha}$$

*Ὡστε ἡ ἐξίσωση $f(x) = \alpha x^2 + \beta x + \gamma = 0$ ἔχει ρίζες πού δίνονται ἀπὸ τὸν τύπο

$$\boxed{x = \frac{-\beta \pm \sqrt{\Delta}}{2\alpha} = \frac{-\beta \pm \sqrt{\beta^2 - 4\alpha\gamma}}{2\alpha}} \quad (1)$$

*Ἡ παράσταση $\Delta = \beta^2 - 4\alpha\gamma$ εἶναι πραγματικὴ καὶ λέγεται **διακρίνουσα τῆς ἐξίσωσης**.

Σχετικὰ μὲ τὸ σημεῖο τῆς διακρίνουσας $\Delta = \beta^2 - 4\alpha\gamma \in \mathbf{R}$ παρατηροῦμε ὅτι:

α) *Ἄν $\Delta > 0$, τότε οἱ ρίζες x_1, x_2 , πού δίνει ὁ τύπος (1), εἶναι πραγματικές καὶ ἄνισες.

β) *Ἄν $\Delta = 0$, τότε οἱ ρίζες x_1, x_2 εἶναι πραγματικές καὶ ἴσες, ὁπότε λέμε ὅτι ἡ ἐξίσωση ἔχει μιά διπλὴ ρίζα $x = -\frac{\beta}{2\alpha}$.

γ) *Ἄν $\Delta < 0$, τότε ἡ ἐξίσωση $\alpha x^2 + \beta x + \gamma = 0$ ἢ ἡ ἰσοδύναμὴ τῆς $(2\alpha x + \beta)^2 = \Delta$ δὲν ἔχει λύση στό σύνολο \mathbf{R} , γιατί $\forall x \in \mathbf{R} \Rightarrow (2\alpha x + \beta)^2 > \Delta$, ἔχει ὅμως λύση στό σύνολο τῶν μιγαδικῶν τῆς μορφῆς (α, β) μὲ $\beta \neq 0$ καὶ λέμε ὅτι οἱ ρίζες x_1, x_2 εἶναι καθαρές μιγαδικές.

Εἰδικὴ περίπτωση. Ὁ τύπος (1) μπορεῖ νά ἀπλουστευθεῖ, ἂν ὁ συντελεστής β τοῦ x εἶναι πολλαπλάσιο τοῦ 2.

*Ἐτσι, ἂν $\beta = 2\beta'$, τότε $\Delta = (2\beta')^2 - 4\alpha\gamma = 4\beta'^2 - 4\alpha\gamma = 4(\beta'^2 - \alpha\gamma)$,

$$\text{ὁπότε } x = \frac{-\beta \pm \sqrt{\Delta}}{2\alpha} = \frac{-2\beta' \pm 2\sqrt{\beta'^2 - \alpha\gamma}}{2\alpha} = \frac{-\beta' \pm \sqrt{\beta'^2 - \alpha\gamma}}{\alpha}$$

*Ἄν $\beta^2 - 4\alpha\gamma \geq 0 \Leftrightarrow 4(\beta'^2 - \alpha\gamma) \geq 0 \Leftrightarrow \beta'^2 - \alpha\gamma \geq 0$

*Ἐπίσης ἂν $\beta^2 - 4\alpha\gamma < 0 \Leftrightarrow 4(\beta'^2 - \alpha\gamma) < 0 \Leftrightarrow \beta'^2 - \alpha\gamma < 0$

Σημείωση. Μὲ τὸν τύπο (1) μποροῦν νά ἐπιλυθοῦν καὶ οἱ ἔλλειπτες μορφές τῶν ἐξισώσεων $\beta' \beta''$.

Παραδείγματα: 1) Νά επιλυθούν οι εξισώσεις:

α) $9x^2 - 16 = 0$, β) $4x^2 + 3x = 0$, γ) $6x^2 - 5 = 0$, δ) $5x^2 + 3 = 0$

Επίλυση. α) Έχουμε $9x^2 - 16 = 0 \Leftrightarrow (3x + 4)(3x - 4) = 0$ Ισοδύναμη μέ

τό ζεύγος $\begin{cases} 3x + 4 = 0 \\ 3x - 4 = 0, \text{ \acute{o}\pi\omicron\tau\epsilon:} \end{cases} \begin{cases} x_1 = -\frac{4}{3} \\ x_2 = \frac{4}{3} \end{cases}$

Έτσι: $\Sigma = \{x/x \in \mathbb{R} \wedge 9x^2 - 16 = 0\} = \left\{-\frac{4}{3}, \frac{4}{3}\right\}$.

β) Έχουμε $4x^2 + 3x = 0 \Leftrightarrow x(4x + 3) = 0$ Ισοδύναμη μέ τό ζεύγος τών

εξισώσεων $\begin{cases} x = 0 \\ 4x + 3 = 0 \end{cases}$, \acute{o}\pi\omicron\tau\epsilon: $\begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = -\frac{3}{4} \end{cases}$

Έτσι: $\Sigma = \{x/x \in \mathbb{R} \wedge 4x^2 + 3x = 0\} = \left\{0, -\frac{3}{4}\right\}$.

γ) Έχουμε $6x^2 - 5 = 0 \Leftrightarrow (x\sqrt{6})^2 - (\sqrt{5})^2 = 0 \Leftrightarrow (x\sqrt{6} + \sqrt{5})(x\sqrt{6} - \sqrt{5}) = 0$ Ισοδύναμη μέ τό ζεύγος τών εξισώσεων $x\sqrt{6} + \sqrt{5} = 0$, $x\sqrt{6} - \sqrt{5} = 0$, \acute{o}\pi\omicron\tau\epsilon \acute{\epsilon}\chi\omicron\mu\epsilon \tau\acute{\iota}\varsigma \lambda\acute{\upsilon}\sigma\epsilon\iota\varsigma $x_1 = -\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{6}} = -\frac{\sqrt{30}}{6}$, $x_2 = \frac{\sqrt{5}}{6} = \frac{\sqrt{30}}{6}$

Ωστε: $\Sigma = \{x/x \in \mathbb{R} \wedge 6x^2 - 5 = 0\} = \left\{-\frac{\sqrt{30}}{6}, \frac{\sqrt{30}}{6}\right\}$.

δ) Έχουμε $5x^2 + 3 = 0 \Leftrightarrow (x\sqrt{5})^2 - (\sqrt{-3})^2 = 0 \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow (x\sqrt{5} + \sqrt{-3}) \cdot (x\sqrt{5} - \sqrt{-3}) = 0$ Ισοδύναμη μέ τό ζεύγος τών εξισ.
 $x\sqrt{5} + \sqrt{-3} = 0$, $x\sqrt{5} - \sqrt{-3} = 0$, \acute{\alpha}\rho\alpha $x_1 = -i\sqrt{3}/\sqrt{5}$, $x_2 = i\sqrt{3}/\sqrt{5}$.

Ωστε: $\Sigma = \{x/x \in \mathbb{I} \wedge 5x^2 + 3 = 0\} = \{-i\sqrt{3}/\sqrt{5}, i\sqrt{3}/\sqrt{5}\}$.

2) Νά επιλυθούν οι εξισώσεις

α) $x^2 + 2x - 3 = 0$, β) $x^2 - 6x + 13 = 0$, γ) $3x^2 - 5x + 1 = 0$.

Επίλυση: α) Έπειδή είναι $\alpha = 1$, $\beta = 2$, $\gamma = -3$,

\acute{\alpha}\rho\alpha $\Delta = 2^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-3) = 4 + 12 = 16$.

Μέ τόν τύπο (1) \acute{\epsilon}\chi\omicron\mu\epsilon:

$x = \frac{-2 \pm \sqrt{16}}{2 \cdot 1} = \frac{-2 \pm 4}{2}$, \acute{o}\pi\omicron\tau\epsilon: $x_1 = \frac{-2+4}{2} = 1$, $x_2 = \frac{-2-4}{2} = -3$

Έτσι: $\Sigma = \{x/x \in \mathbb{R} \wedge x^2 + 2x - 3 = 0\} = \{1, -3\}$.

β) Έπειδή είναι $\alpha = 1$, $\beta = -6$, $\gamma = 13$

\acute{\alpha}\rho\alpha $\Delta = (-6)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 13 = 36 - 52 = -16$.

Μέ τόν τύπο (1) \acute{\epsilon}\chi\omicron\mu\epsilon:

$x = \frac{6 \pm \sqrt{-16}}{2 \cdot 1} = \frac{6 \pm 4i}{2}$, \acute{o}\pi\omicron\tau\epsilon: $x_1 = 3 + 2i$, $x_2 = 3 - 2i$

*Ετσι: $\Sigma = \{x/x \in \mathbb{C} \wedge x^2 - 6x + 13 = 0\} = \{3 + 2i, 3 - 2i\}$.

γ) *Επειδή $\alpha = 3, \beta = -5, \gamma = 1$

άρα $\Delta = (-5)^2 - 4 \cdot 3 \cdot 1 = 25 - 12 = 13$.

Μέ τον τύπο (1) έχουμε:

$$x = \frac{5 \pm \sqrt{13}}{2 \cdot 3} = \frac{5 \pm \sqrt{13}}{6}, \text{ όποτε: } x_1 = \frac{5 + \sqrt{13}}{6}, x_2 = \frac{5 - \sqrt{13}}{6}$$

*Ετσι: $\Sigma = \{x | x \in \mathbb{R} \wedge 3x^2 - 5x + 1 = 0\} = \left\{ \frac{5 + \sqrt{13}}{6}, \frac{5 - \sqrt{13}}{6} \right\}$.

3) *Αν $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, νά επιλυθεί ή εξίσωση:

$$x^2 + 2\beta x - (\alpha^2 + 2\alpha\beta) = 0$$

*Επίλυση: *Επειδή ό συντελεστής του x είναι πολλαπλάσιο του 2, άν εφαρμόσουμε τον τύπο $x = \frac{-\beta' \pm \sqrt{\beta'^2 - \alpha\gamma}}{\alpha}$, παίρνουμε

$$x = \frac{-\beta \pm \sqrt{\beta^2 + \alpha^2 + 2\alpha\beta}}{1} = \frac{-\beta \pm \sqrt{(\alpha + \beta)^2}}{1} = \frac{-\beta \pm |\alpha + \beta|}{1} = -\beta \pm |\alpha + \beta|,$$

όποτε: $x_1 = -\beta + \alpha + \beta = \alpha, x_2 = -\beta - \alpha - \beta = -(\alpha + 2\beta)$

*Ετσι: $\Sigma = \{x | x \in \mathbb{R} \wedge x^2 + 2\beta x - (\alpha^2 + 2\alpha\beta) = 0 \wedge \alpha, \beta \in \mathbb{R}\} = \{\alpha, -(\alpha + 2\beta)\}$.

4) Νά επιλυθεί ή εξίσωση $\frac{1}{x-4} + \frac{8}{x-1} = \frac{15}{x+9}$.

*Επίλυση: Τά κλάσματα έχουν έννοια, όταν $x \neq 4, x \neq 1, x \neq -9$. Κάνουμε τίς πράξεις καί έχουμε: $: 2x^2 - 41x + 119 = 0$.

Μέ τον τύπο (1) έχουμε τίς λύσεις

$$x_1 = \frac{41 + 27}{4} = 17, x_2 = \frac{41 - 27}{4} = \frac{7}{2}$$

5) Νά επιλυθεί ή εξίσωση $\frac{2x^2 - 5x + 2}{x-2} = 0$.

*Επίλυση:

Τό κλάσμα μέ $x = 2$ είναι άόριστο, γιατί οί όροι του μηδενίζονται. Δηλαδή ό παρονομαστής $x - 2$ είναι παράγοντας άπροσδιοριστίας του κλάσματος. *Αν ύποθέσουμε $x \neq 2$, παίρνουμε μετά τήν έκτέλεση τής διαιρέσεως $(2x^2 - 5x + 2) : (x - 2) = (2x - 1)$. *Αρα $2x - 1 = 0$, όποτε $x = +\frac{1}{2}$, πού είναι λύση τής εξισώσεως.

88. ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΡΙΖΩΝ ΤΗΣ ΕΞΙΣ. $ax^2 + \beta x + \gamma = 0, \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$.

Τό είδος τών ριζών τής εξισώσ. $f(x) = ax^2 + \beta x + \gamma = 0$ εξαρτάται άπό τή διακρίνουσα $\Delta = \beta^2 - 4\alpha\gamma \in \mathbb{R}$.

*Έτσι διακρίνουμε τής περιπτώσεις:

1) *Αν $\Delta > 0$, τότε $\sqrt{\Delta} \in \mathbb{R}$, οπότε $x = \frac{-\beta \pm \sqrt{\Delta}}{2\alpha} \in \mathbb{R}$.

Δηλαδή οι ρίζες x_1, x_2 είναι **πραγματικές και άνισες**.

Καί αν είναι $\Delta = \kappa^2$ και $\alpha, \beta, \gamma, \kappa \in \mathbb{Q}$, τότε οι ρίζες x_1, x_2 είναι ρητές. Δηλαδή $x_1, x_2 \in \mathbb{Q}$. *Αν $\Delta \neq \kappa^2$ οι ρίζες είναι άρρητες (άσύμμετρες) συζυγείς. Δηλαδή, όταν η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει ρίζα τόν άσύμμετρο $x_1 = A + \sqrt{B}$, $B \neq \mu^2$, θά έχει ρίζα καί τήν $x_2 = A - \sqrt{B}$ (παραδ. 2γ').

2) *Αν $\Delta = 0$, τότε $\sqrt{\Delta} = 0$, οπότε $x = \frac{-\beta}{2\alpha} \in \mathbb{R}$.

Δηλαδή οι ρίζες $x_1 = x_2 = -\frac{\beta}{2\alpha}$ είναι **πραγματικές και ίσες**.

3) *Αν $\Delta < 0$, τότε $\sqrt{\Delta} \in i$, οπότε $x = \frac{-\beta \pm i\sqrt{-\Delta}}{2\alpha} \in (\mathbb{C} - \mathbb{R})$.

Δηλαδή $x_1 = \frac{-\beta}{2\alpha} + i\frac{\sqrt{-\Delta}}{2\alpha}$, $x_2 = \frac{-\beta}{2\alpha} - i\frac{\sqrt{-\Delta}}{2\alpha}$ **καθαρές μιγαδικές συζυγείς**.

*Εδῶ ισχύουν καί οι αντίστροφες προτάσεις.

Οί μαθητές μπορούν εύκολα νά κάνουν τήν απόδειξη.

Παρακάτω δίνουμε συνοπτικά τά προηγούμενα συμπεράσματα:

Πίνακας I

Είδος τῶν ριζῶν τῆς ἐξίσ. $\alpha x^2 + \beta x + \gamma = 0$, $\alpha \neq 0$, $\beta, \gamma \in \mathbb{R}$	
$\Delta = \beta^2 - 4\alpha\gamma > 0$	Δύο ρίζες πραγματικές και άνισες: $x_2 < x_1$
$\Delta = \beta^2 - 4\alpha\gamma = 0$	Δύο ρίζες πραγματικές και ίσες: $x_1 = x_2 = -\frac{\beta}{2\alpha}$
$\Delta = \beta^2 - 4\alpha\gamma < 0$	Δύο ρίζες καθαρές μιγαδικές συζυγείς.

Πίνακας II

Είδος τῶν ριζῶν τῆς ἐξίσ. $\alpha x^2 + \beta x + \gamma = 0$, $\alpha \neq 0$, $\beta, \gamma \in \mathbb{Q}$		
$\Delta > 0$	$\frac{\Delta}{\kappa} \in \mathbb{Q}$	Δύο ρίζες πραγματικές, άνισες καί σύμμετρες.
	$\Delta \neq \kappa^2$	Δύο ρίζες πραγματικές, άνισες καί άσύμμετρες.
$\Delta = 0$		Δύο ρίζες πραγματικές, ίσες καί σύμμετρες.
$\Delta < 0$		Δύο ρίζες καθαρές μιγαδικές συζυγείς.

Σημαντική παρατήρηση. *Αν οι συντελεστές α καί γ είναι έτερόσημοι, τότε ή εξίσ. $\alpha x^2 + \beta x + \gamma = 0$ έχει δύο ρίζες πραγματικές άνισες.

Γιατί τότε: $\alpha\gamma < 0 \Leftrightarrow -4\alpha\gamma > 0 \Leftrightarrow \beta^2 - 4\alpha\gamma > 0$ ή $\Delta > 0$.

89. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΡΙΖΩΝ ΤΗΣ $ax^2 + \beta x + \gamma = 0$.

*Έχουμε $\Delta \geq 0$ και $x_1 = \frac{-\beta + \sqrt{\Delta}}{2\alpha}$, $x_2 = \frac{-\beta - \sqrt{\Delta}}{2\alpha}$.

Σχηματίζουμε τή διαφορά $x_1 - x_2$:

$$x_1 - x_2 = \frac{-\beta + \sqrt{\Delta}}{2\alpha} - \frac{-\beta - \sqrt{\Delta}}{2\alpha} = \frac{\sqrt{\Delta}}{\alpha}.$$

Τό σημείο τής διαφορᾶς $x_1 - x_2$ ἐξαρτᾶται ἀπό τό πρόσημο τοῦ α , γιατί $\Delta \geq 0 \Leftrightarrow \sqrt{\Delta} \geq 0$.

*Ἐτσι: *Ἄν $\alpha > 0$, τότε $x_1 - x_2 \geq 0 \Leftrightarrow x_1 \geq x_2$

*Ἄν $\alpha < 0$, τότε $x_1 - x_2 \leq 0 \Leftrightarrow x_1 \leq x_2$

Σημαντική σημείωση. Σκόπιμο εἶναι νά ἔχουμε στίς δύο περιπτώσεις μία μόνο διάταξη τῶν πραγματικῶν ριζῶν x_1, x_2 . Γι' αὐτό συμφωνοῦμε στά ἐπόμενα νά χρησιμοποιοῦμε τή διάταξη $x_2 \leq x_1$, ὁπότε,

ἂν $\alpha > 0$, τότε $x_1 = \frac{-\beta + \sqrt{\Delta}}{2\alpha}$ καί $x_2 = \frac{-\beta - \sqrt{\Delta}}{2\alpha}$, καί

ἂν $\alpha < 0$, τότε $x_1 = \frac{\beta - \sqrt{\Delta}}{2\alpha}$ καί $x_2 = \frac{-\beta + \sqrt{\Delta}}{2\alpha}$.

90. ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΡΙΖΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙΩΝΥΜΟΥ $f(x) = ax^2 + \beta x + \gamma$, $\alpha \neq 0$.

Λέγονται ρίζες τοῦ τριωνύμου $f(x)$ οἱ τιμές τοῦ x , πού μηδενίζουν τό τριώνυμο. *Ἀρα οἱ ρίζες τοῦ τριωνύμου $f(x)$ εἶναι καί ρίζες τῆς ἐξίσωσως $f(x) = ax^2 + \beta x + \gamma = 0$. *Ἐτσι τά συμπεράσματα, πού βγῆκαν ἀπό τήν ἐξέταση τοῦ είδους τῶν ριζῶν τῆς $ax^2 + \beta x + \gamma = 0$, μποροῦν νά χρησιμοποιηθοῦν καί γιά τό τριώνυμο $f(x) = ax^2 + \beta x + \gamma$. (Βλ. πίνακες I καί II).

Παραδείγματα. 1) Νά προσδιορισθεῖ τό είδος τῶν ριζῶν τῶν ἐξισώσεων

α) $x^2 - 5x + 4 = 0$, β) $x^2 + 2x + 1 = 0$, γ) $5x^2 + 13x + 9 = 0$

Λύση: α) *Έχουμε: $\Delta = (-5)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 4 = 25 - 16 = 9 = 3^2 > 0$.

Δηλαδή ἡ διακρίνουσα Δ τῆς ἐξίσωσως εἶναι τέλειο τετράγωνο πραγματικοῦ ἀριθμοῦ καί ἐπομένως ἡ ἐξίσωση ἔχει δύο ρίζες πραγματικές, σύμμετρες καί ἄνισες.

β) *Έχουμε $\Delta = 2^2 - 4 \cdot 1 \cdot 1 = 4 - 4 = 0$.

*Ἀρα ἔχει δύο ρίζες ἴσες πραγματικές: $x_1 = x_2 = -\frac{2}{2 \cdot 1} = -1$.

γ) *Έχουμε $\Delta = 13^2 - 4 \cdot 5 \cdot 9 = 169 - 180 = -11 < 0$.

*Ἀρα ἔχει δύο ρίζες καθαρές μιγαδικές συζυγεῖς.

2) Νά προσδιορισθεί τό είδος τών ριζών τών εξισώσεων.

α) $x^2 - (\alpha + \beta)x + \alpha\beta = 0$, $\beta) x^2 - 2\alpha x + \alpha^2 + \beta^2$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

Λύση: α) Είναι: $\Delta = (\alpha + \beta)^2 - 4\alpha\beta = (\alpha - \beta)^2 \geq 0$.

"Αρα έχει δύο ρίζες πραγματικές σύμμετρες ως προς α, β άνισες ή ίσες, άν θά έχουμε $\alpha \neq \beta$ ή $\alpha = \beta$ άντιστοιχώως.

β) Είναι: $\Delta = 4\alpha^2 - 4(\alpha^2 + \beta^2) = -4\beta^2 = -(2\beta)^2 < 0$.

"Αρα έχει δύο ρίζες καθαρές μιγαδικές συζυγείς, άν $\beta \neq 0$.

3) Νά προσδιορισθοϋν οί τιμές τοϋ $\lambda \in \mathbb{R}$, γιά νά έχει ή εξίσωση ρίζες α) ίσες, β) πραγματικές άνισες καί γ) καθαρές μιγαδικές συζυγείς

$$f(x) = 3x^2 + 2x - (3\lambda + 1) = 0.$$

Λύση: α) "Εχουμε $\Delta = 2^2 + 4 \cdot 3 \cdot (3\lambda + 1) = 0 \Leftrightarrow 9\lambda + 4 = 0 \Leftrightarrow \lambda = -\frac{4}{9}$.

"Ωστε μέ $\lambda = -\frac{4}{9}$ ή $f(x) = 0$ έχει μιά ρίζα διπλή.

Αϋτή είναι $x_1 = x_2 = -\frac{2}{2 \cdot 3} = -\frac{1}{3}$.

β) "Εχουμε $\Delta = 2^2 + 4 \cdot 3 \cdot (3\lambda + 1) > 0 \Leftrightarrow 9\lambda + 4 > 0 \Leftrightarrow \lambda > -\frac{4}{9}$

"Ωστε μέ $\lambda > -4/9$ ή $f(x) = 0$ έχει δύο ρίζες πραγμ. άνισες.

γ) "Εχουμε $\Delta = 2^2 + 4 \cdot 3 \cdot (3\lambda + 1) < 0 \Leftrightarrow \lambda < -\frac{4}{9}$

"Ωστε μέ $\lambda < -\frac{4}{9}$ έχει δύο ρίζες καθαρές μιγαδικές συζυγείς.

Συνοπτικός πίνακας

Τιμές τοϋ λ	$-\infty$	$-\frac{4}{9}$	$+\infty$
Σημείο τής Δ	-	0	+
Είδος ριζών τής $f(x) = 0$	Δύο καθαρές μιγαδικές συζυγείς		Δύο πραγματικές άνισες

Όμάδα α'

283) Νά επιλυθούν οι ακόλουθες εξισώσεις:

- 1) $6x^2 + 5x = 0$, $-55x^2 + 75x = 0$
- 2) $2x^2 - 18 = 0$, $7x^2 + 1 = 0$, $121x^2 - 196 = 0$
- 3) $x^2 - 2x - 80 = 0$, $x^2 - 9x + 14 = 0$, $x^2 + 25x + 156 = 0$
- 4) $4x^2 + 7x - 2 = 0$, $2x^2 - 2x - 2 = 0$, $5x^2 - 7x + 1 = 0$
- 5) $2x^2 + 2x + 5 = 0$, $9x^2 - 6x + 4 = 0$
- 6) $5x^2 + \sqrt{3}x - 1 = 0$, $(1 - \sqrt{2})x^2 - 2(1 + \sqrt{2})x + 3\sqrt{2} + 1 = 0$
- 7) $(x + 1)^2 - (x - 1)(x + 2) = -2x(x - 3)$,

$$(x + 2)\left(x - \frac{1}{2}\right) - (3x - 1)\left(x + \frac{2}{3}\right) = 1 - 2x$$

284) Νά επιλυθούν οι ακόλουθες εξισώσεις:

- 1) $(4x - 1)^2 + 3(4x - 1) = 0$,
- 2) $(4x + 1)^2 + 3(16x^2 - 1) = 0$,
- 3) $(3x + 2)(5x - 1) + (3x + 7)(1 - 5x) = (1 - 5x)(2 + 15x)$

285) Νά επιλυθούν οι ακόλουθες εξισώσεις:

- 1) $15x^2 + 26\mu x + 7\mu^2 = 0$
- 2) $x^2 - (\alpha^2 - \beta^2)x - \alpha^2\beta^2 = 0$, $x^2 - 2(\alpha^2 + \beta^2)x + (\alpha^2 - \beta^2)^2 = 0$

286) Νά προσδιορισθεί τό είδος τών ριζών τών εξισώσεων χωρίς νά βρεθούν οι ρίζες.

- 1) $x^2 - 11x + 28 = 0$, $x^2 - 24x + 143 = 0$, $x^2 - 16x + 64 = 0$
- 2) $x^2 - 17x + 11 = 0$, $3x^2 + 7x + 5 = 0$, $8x^2 - 4x + 5 = 0$

287) Μέ ποιές τιμές του λ ή εξίσωση $x^2 - 2(\lambda + 2)x + 2\lambda^2 - 17 = 0$ έχει μιá ρίζα διπλή; *Αν $x_1 = 11$, νά υπολογισθεί ή x_2 .

288) Μέ ποιές τιμές του v ή εξίσωση $(v + 3)x^2 - (2v + 1)x + v + 2 = 0$ έχει:
α) ρίζες ίσες, β) πραγματικές άνισες, γ) καθαρές μιγαδικές συζυγείς.

289) *Αν ή εξίσωση $x^2 + \alpha x + \beta = 0$ έχει ρίζα τόν άριθμό $2 + 3i$, νά προσδιορισθούν τά α καί β .

Όμάδα β'

290) Νά επιλυθούν οι ακόλουθες εξισώσεις:

- 1) $\frac{3x + 1}{3 - x} - \frac{3 - x}{x + 1} - \frac{5}{3} = 0$, $\frac{25}{12} - \frac{2x + 1}{x - 3} = \frac{x - 3}{2x + 1}$
- 2) $\frac{1}{x - 8} + \frac{1}{x - 6} + \frac{1}{x + 6} + \frac{1}{x + 8} = 0$ 3) $\frac{x + 1}{x - 1} + \frac{x + 2}{x - 2} + \frac{x + 3}{x - 3} = 3$

291) Νά επιλυθούν οι ακόλουθες εξισώσεις:

- 1) $4x^2 - 4\alpha x + (\alpha^2 - \beta^2) = 0$, $kx^2 + (\lambda + \mu)x - k + \lambda + \mu = 0$
- 2) $\frac{x + \alpha}{x - \alpha} + \frac{x + \beta}{x - \beta} + \frac{x + \gamma}{x - \gamma} = 3$, $\frac{\alpha + \beta}{x + \beta} + \frac{\alpha + \gamma}{x + \gamma} = 2 \cdot \frac{\alpha + \beta + \gamma}{x + \beta + \gamma}$

292) *Αν $\alpha, \beta \in \mathbb{Q}$, προσδιορίστε τό είδος τών ριζών τών έξισώσεων:

1) $3\alpha x^2 + (3\alpha - \beta)x - \beta = 0$

2) $x^2 - 2\alpha x + \alpha^2 - \beta = 0, \quad 4\alpha^2 x^2 + 4\alpha x + \beta^2 + 1 = 0$

293) *Αν ή έξισ. $\alpha x^2 + 2\beta x + \gamma = 0$ έχει ρίζες $x_1 \neq x_2 \in \mathbb{R}$, νά άποδειχθεί ότι ισχύει τό ίδιο καί γιά τήν έξισ. $x^2 + 2(\alpha + \beta + \gamma) \cdot x + 2\beta(\alpha + \gamma) + 3\alpha\gamma = 0$.

294) Νά άποδειχθεί ότι τό είδος τών ριζών τών έξισώσεων $f_1(x) = \alpha x^2 + 2\beta x + \gamma = 0$ καί $f_2(x) = \alpha x^2 + 2\beta kx + k^2\gamma = 0$ είναι τό ίδιο καί γιά τίς δυό.

295) *Αν οί ρίζες τής έξισ. $x^2 + 2\beta x + \gamma = 0$ είναι καθαρές μιγαδικές συζυγείς, νά άποδειχθεί ότι καί οί ρίζες τής $x^2 + 2x + \gamma + 2\beta(x + 1) + 1 = 0$ είναι έπίσης καθαρές μιγαδικές συζυγείς.

296) *Αν $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{Q}$, νά άποδειχθεί ότι οί ρίζες τής έξισώσεως $(\alpha + 2\beta - \gamma)x^2 - 2\alpha x + \alpha + \gamma - 2\beta = 0$ είναι ρητές έκφράσεις τών α, β, γ .

297) Νά προσδιορισθεί τό είδος τών ριζών τής παραστάσεως

$$(\alpha_1 x + \beta_1)^2 + (\alpha_2 x + \beta_2)^2, \text{ αν } \alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2 \in \mathbb{R} \wedge \frac{\alpha_1}{\alpha_2} \neq \frac{\beta_1}{\beta_2}. \text{ Τι συμβαίνει, αν } \frac{\alpha_1}{\alpha_2} = \frac{\beta_1}{\beta_2};$$

91. ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΡΙΖΩΝ ΤΗΣ $f(x) = \alpha x^2 + \beta x + \gamma = 0$ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑ $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$.

***Ορισμός.** Μιά παράσταση $\varphi(x_1, x_2)$, πού περιέχει τίς ρίζες x_1, x_2 τής έξισώσεως του β' βαθμού $\alpha x^2 + \beta x + \gamma = 0$, λέγεται **συμμετρική** ώς πρós τίς ρίζες x_1, x_2 , αν δέ μεταβάλλεται μέ έναλλαγή τών x_1, x_2 .
Δηλαδή: $\varphi(x_1, x_2) = \varphi(x_2, x_1)$.

*Έτσι οί παραστάσεις:

$$x_1 + x_2, x_1 \cdot x_2, x_1^3 + x_2^3, \frac{1}{x_1^2} + \frac{1}{x_2^2}, (2x_1 + 3)(2x_2 + 3) + 5x_1 x_2$$

είναι συμμετρικές παραστάσεις τών ριζών x_1, x_2 .

Οί συμμετρικές παραστάσεις τών ριζών x_1, x_2 τής $\alpha x^2 + \beta x + \gamma = 0$ μπορούν, όπως θά δοϋμε, νά έκφραστοϋν μέ τά $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$, χωρίς νά λυθεί ή έξίσωση.

***Άθροισμα, γινόμενο καί άπόλυτη τιμή διαφοράς τών ριζών x_1, x_2 τής $f(x) \equiv \alpha x^2 + \beta x + \gamma = 0, \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$.**

*Από τίς έκφράσεις τών ριζών τής $f(x) = 0$

$$x_1 = \frac{-\beta + \sqrt{\Delta}}{2\alpha}, \quad x_2 = \frac{-\beta - \sqrt{\Delta}}{2\alpha}$$

$$\text{παίρνουμε: } x_1 + x_2 = \frac{-\beta + \sqrt{\Delta}}{2\alpha} + \frac{-\beta - \sqrt{\Delta}}{2\alpha} = -\frac{\beta}{\alpha}$$

$$x_1 \cdot x_2 = \left(\frac{-\beta + \sqrt{\Delta}}{2\alpha}\right) \cdot \left(\frac{-\beta - \sqrt{\Delta}}{2\alpha}\right) = \frac{(-\beta)^2 - (\sqrt{\Delta})^2}{4\alpha^2} = \frac{\gamma}{\alpha}$$

$$x_1 - x_2 = \frac{-\beta + \sqrt{\Delta}}{2\alpha} - \frac{-\beta - \sqrt{\Delta}}{2\alpha} = \frac{2\sqrt{\Delta}}{2\alpha} = \frac{\sqrt{\Delta}}{\alpha}$$

Έτσι έχουμε:

Θεμελιώδεις σχέσεις συντελεστών και ριζών
 x_1, x_2 της $ax^2 + bx + \gamma = 0$

$$S_1 = x_1 + x_2 = -\frac{\beta}{\alpha}, P_1 = x_1 x_2 = \frac{\gamma}{\alpha}$$

$$x_1 - x_2 = \frac{\sqrt{\Delta}}{\alpha}, |x_1 - x_2| = \frac{\sqrt{|\Delta|}}{|\alpha|}$$

Παρατήρηση: Το άθροισμα S_1 και το γινόμενο P_1 των ριζών x_1, x_2 της $f(x)=0$ είναι πάντοτε αριθμός πραγματικός.

Αντίστροφα: Αν x_1, x_2 είναι δύο αριθμοί που επαληθεύουν τις σχέσεις $x_1 + x_2 = -\frac{\beta}{\alpha}$ και $x_1 \cdot x_2 = \frac{\gamma}{\alpha}$, αυτοί θα είναι ρίζες της εξίσωσης $ax^2 + bx + \gamma = 0$.

Πράγματι, από την $ax^2 + bx + \gamma = 0 \Leftrightarrow x^2 + \frac{\beta}{\alpha}x + \frac{\gamma}{\alpha} = 0$ και τις $x_1 + x_2 = -\frac{\beta}{\alpha}, x_1 \cdot x_2 = \frac{\gamma}{\alpha}$ παίρνουμε:

$$x^2 - (x_1 + x_2)x + x_1 x_2 = 0 \Leftrightarrow (x - x_1)(x - x_2) = 0.$$

Αυτή είναι ισοδύναμη με το ζεύγος $x - x_1 = 0, x - x_2 = 0$, οπότε:
 $x = x_1, x = x_2$.

Άπό τά παραπάνω συμπεραίνουμε ότι:

Οί αριθμοί x_1, x_2 για να είναι ρίζες της εξίσω. $ax^2 + bx + \gamma = 0$, πρέπει και άρκει να επαληθεύουν τις σχέσεις $x_1 + x_2 = -\frac{\beta}{\alpha}$ και $x_1 x_2 = \frac{\gamma}{\alpha}$

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

1. Άπό τό γινόμενο και τό άθροισμα δύο αριθμών να σχηματισθεί εξίσωση β' βαθμού, που να έχει ρίζες τούς αριθμούς αυτούς.

Άν $ax^2 + bx + \gamma = 0$ είναι ή εξίσωση που ζητούμε και x_1, x_2 οι ρίζες της, τότε $x_1 + x_2 = -\frac{\beta}{\alpha}$ και $x_1 \cdot x_2 = \frac{\gamma}{\alpha}$

$$\left. \begin{array}{l} \text{Έπειδή όμως: } x_1 + x_2 = S \text{ γνωστός αριθμός} \\ x_1 \cdot x_2 = P \quad \quad \quad \text{»} \quad \quad \quad \text{»} \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{array}{l} -\frac{\beta}{\alpha} = S \\ \frac{\gamma}{\alpha} = P \end{array}$$

Άρα έχουμε:

$$ax^2 + bx + \gamma = 0 \Leftrightarrow x^2 + \frac{\beta}{\alpha}x + \frac{\gamma}{\alpha} = 0 \quad \text{ή} \quad \boxed{x^2 - Sx + P = 0}$$

Ωστε για τό σχηματισμό μιās εξίσώσεως β' βαθμού από τό άθροισμα S και τό γινόμενο P τών ριζών της, πρέπει νά έχουμε υπόψη τόν τύπο $x^2 - Sx + P = 0$.

Σημαντική παρατήρηση: Για νά βρούμε τούς αριθμούς x_1, x_2 όταν γνωρίζουμε τό άθροισμα και τό γινόμενο τους, άρκει νά λύσουμε τήν εξίσωση

$$x^2 - Sx + P = 0.$$

Παράδειγμα. Νά βρεθοῦν δύο αριθμοί, πού έχουν άθροισμα 9 και γινόμενο 14.

Λύση: Άν x_1, x_2 είναι οί αριθμοί αυτοί, τότε είναι $x_1 + x_2 = 9, x_1x_2 = 14$, και ή εξίσωση, πού έχει αυτούς ώς ρίζες, είναι $x^2 - 9x + 14 = 0$. Οί ρίζες της είναι $x = \frac{9 \pm \sqrt{81-56}}{2}$ ή $x_1 = 7, x_2 = 2$.

2. Νά σχηματισθεί μιá εξίσωση β' βαθμού, όταν δίνονται οί ρίζες της.

Λύση: Άν $x_1 = \alpha, x_2 = \beta$ είναι οί ρίζες τής εξίσώσεως πού ζητούμε, τότε έχουμε:

$$\left. \begin{array}{l} x_1 + x_2 = \alpha + \beta \\ x_1 \cdot x_2 = \alpha\beta \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \alpha + \beta = S \\ \alpha\beta = P \end{array} \right., \text{ όπότε από τόν τύπο } x^2 - Sx + P = 0 \text{ παίρνουμε } x^2 - (\alpha + \beta)x + \alpha\beta = 0.$$

Παράδειγμα: Νά σχηματισθεί μιá εξίσωση β' βαθμού μέ ρίζες τούς αριθμούς $\frac{1}{2}, 4$.

Λύση: Έχουμε $x_1 + x_2 = \frac{1}{2} + 4 = \frac{9}{2}, x_1x_2 = \frac{1}{2} \cdot 4 = 2$.

Άρα ή εξίσωση είναι:

$$x^2 - \frac{9}{2}x + 2 = 0 \Leftrightarrow 2x^2 - 9x + 4 = 0.$$

92. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΟΜΟΙΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΩΝ ΡΙΖΩΝ
 x_1, x_2 τής $ax^2 + bx + \gamma = 0, a, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$.

1. Υπολογισμός του $S_2 = x_1^2 + x_2^2$ και $S_3 = x_1^3 + x_2^3$

Έχουμε $S_2 = x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2 = \left(-\frac{\beta}{\alpha}\right)^2 - 2 \cdot \frac{\gamma}{\alpha} = \frac{\beta^2 - 2\alpha\gamma}{\alpha^2}$

Επίσης $S_3 = x_1^3 + x_2^3 = (x_1 + x_2)^3 - 3x_1x_2(x_1 + x_2) = \left(-\frac{\beta}{\alpha}\right)^3 - 3 \cdot \frac{\gamma}{\alpha} \cdot \left(-\frac{\beta}{\alpha}\right) = \frac{-\beta^3 + 3\alpha\beta\gamma}{\alpha^3}$

Έτσι: $S_2 = x_1^2 + x_2^2 = \frac{\beta^2 - 2\alpha\gamma}{\alpha^2}, S_3 = x_1^3 + x_2^3 = \frac{-\beta^3 + 3\alpha\beta\gamma}{\alpha^3}$

2. Υπολογισμός του $S_n = x_1^n + x_2^n, n \in \mathbb{N}$.

Έπειδή x_1, x_2 είναι ρίζες τής $ax^2 + bx + \gamma = 0$,

Άρα:
$$\begin{array}{l} \alpha x_1^2 + \beta x_1 + \gamma = 0 \\ \alpha x_2^2 + \beta x_2 + \gamma = 0 \end{array} \quad \left| \begin{array}{l} \text{Πολλαπλασιάζουμε τὰ μέλη τῆς πρώτης ἐπί} \\ x_1^{v-2} \text{ καὶ τὰ μέλη τῆς δευτέρας ἐπί } x_2^{v-2}, \end{array} \right.$$

ὁπότε:
$$\begin{array}{l} \alpha x_1^v + \beta x_1^{v-1} + \gamma x_1^{v-2} = 0 \\ \alpha x_2^v + \beta x_2^{v-1} + \gamma x_2^{v-2} = 0 \end{array} \quad \left| \begin{array}{l} \text{προσθέτουμε κατὰ μέλη καὶ} \end{array} \right.$$

ἔχουμε:
$$\begin{array}{l} \alpha(x_1^v + x_2^v) + \beta(x_1^{v-1} + x_2^{v-1}) + \gamma(x_1^{v-2} + x_2^{v-2}) = 0 \\ \text{ἢ } \alpha S_v + \beta S_{v-1} + \gamma S_{v-2} = 0 \end{array}$$

Ἔτσι :

$$S_v = -\frac{\beta}{\alpha} S_{v-1} - \frac{\gamma}{\alpha} S_{v-2} = S_1 S_{v-1} - P_1 S_{v-2}.$$

Με τόν τύπο αὐτό μπορούμε νά βροῦμε τό $S_v = x_1^v + x_2^v$, ὅταν γνωρίζουμε τὰ ἀθροίσματα $S_{v-1} = x_1^{v-1} + x_2^{v-1}$, $S_{v-2} = x_1^{v-2} + x_2^{v-2}$

Παράδειγμα : Νά βρεθεῖ τό ἀθροίσμα τῶν τέταρτων δυνάμεων τῶν ριζῶν τῆς ἐξισώσεως $x^2 - 3x + 2 = 0$.

Εἶναι : $S_4 = S_1 S_3 - P_1 S_2$.

Ἐπειδὴ $S_1 = 3$, $P_1 = 2$,

ἔχουμε $S_2 = \frac{(-3)^2 - 2 \cdot 1 \cdot 2}{1^2} = 9 - 4 = 5$ καὶ $S_3 = \frac{-(-3)^3 + 3 \cdot 1 \cdot (-3) \cdot 2}{1^3} = 27 - 18 = 9$

Ἄρα $S_4 = 3 \cdot 9 - 2 \cdot 5 = 27 - 10 = 17$.

Παρατήρηση : Ὁ ὑπολογισμός τοῦ ἀθροίσματος $\frac{1}{x_1^v} + \frac{1}{x_2^v}$, $v \in \mathbb{N}$,

ἀνάγεται στήν προηγούμενη περίπτωση.

Ἔτσι : $\frac{1}{x_1^v} + \frac{1}{x_2^v} = \frac{x_1^v + x_2^v}{x_1^v \cdot x_2^v} = \frac{S_v}{P_1^v}$

3. Ὑπολογισμός ρητῆς συμμετρικῆς παραστάσεως $\varphi(x_1, x_2)$ τῶν ριζῶν x_1, x_2 τῆς $ax^2 + bx + \gamma = 0$,

Μιά ρητὴ συμμετρικὴ παράσταση τῶν ριζῶν $\varphi(x_1, x_2)$ μπορούμε πάντοτε νά τὴν ἐκφράσουμε μέ τό ἀθροίσμα $x_1 + x_2 = S$ καὶ τό γινόμενο $x_1 x_2 = P$ καὶ ἐπομένως μέ τοὺς συντελεστῆς $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$. Καί αὐτό, γιατί ἡ παράσταση θά ἔχει ὄρους τῆς μορφῆς $Ax_1 x_2, Bx_1^2 x_2^2, \dots, \Sigma x_1^v x_2^v$, πού ἐκφράζονται μέ τό $P = x_1 x_2$ καὶ διωνυμικὲς παραστάσεις τῆς μορφῆς $\Gamma x_1^k x_2^k + \Gamma x_1^{\lambda} x_2^{\lambda} = \Gamma x_1^{\lambda} x_2^{\lambda} (x_1^{k-\lambda} + x_2^{k-\lambda})$ πού ἐκφράζονται μέ τό P καὶ τό S . Ἄν ὑπάρχει στήν παράσταση ὄρος τῆς μορφῆς Γx_1^v , θά ὑπάρχει καὶ ὁ ἀντίστοιχός του Γx_2^v , ὁπότε πάλι θά ἔχουμε $\Gamma x_1^v + \Gamma x_2^v = \Gamma(x_1^v + x_2^v) = \Gamma S_v$.

Ἔτσι κάθε ρητὴ συμμετρικὴ παράσταση τῶν ριζῶν x_1, x_2 τῆς $ax^2 + bx + \gamma = 0$ εἶναι ρητὴ ἔκφραση τῶν $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$.

Παράδειγμα : Νά υπολογισθεί ή τιμή τής παραστάσεως :

$\varphi(\rho_1, \rho_2) = \rho_1^2 + \rho_2^2 + (\rho_1 - \rho_2)^2 + 3\rho_1^2\rho_2 + 3\rho_1\rho_2^2$, άν ρ_1, ρ_2 , είναι ρίζες τής εξισώσεως $x^2 + ax + \beta = 0$, χωρίς νά λυθεί ή εξίσωση.

Λύση : 'Η $\varphi(\rho_1, \rho_2)$ είναι συμμετρική ώς πρός τίς ρίζες ρ_1, ρ_2 .

$$\begin{aligned} \text{Έχουμε: } \varphi(\rho_1, \rho_2) &= \rho_1^2 + \rho_2^2 + \rho_1^2 + \rho_2^2 - 2\rho_1\rho_2 + 3\rho_1\rho_2(\rho_1 + \rho_2) = \\ &= 2(\rho_1^2 + \rho_2^2) - 2\rho_1\rho_2 + 3\rho_1\rho_2(\rho_1 + \rho_2) = \\ &= 2(\rho_1 + \rho_2)^2 - 6\rho_1\rho_2 + 3\rho_1\rho_2(\rho_1 + \rho_2) = \\ &= 2(-\alpha)^2 - 6\beta + 3\beta(-\alpha) = 2\alpha^2 - 3\alpha\beta - 6\beta \end{aligned}$$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

'Ο μ á δ α α'

298) Νά υπολογισθεί τό S και P τών ριζών τών εξισώσεων χωρίς νά λυθούν οι εξισώσεις.

$$\begin{aligned} 1) \quad x^2 - 12x - 7 = 0, & \quad x^2 + x\sqrt{3} + \sqrt{5} = 0 \\ 2) \quad -x^2 + 3x - 1 = 0, & \quad x^2\sqrt{2} + x\sqrt{3} - 4\sqrt{2} = 0 \\ 3) \quad (\alpha + \beta)x^2 - (\alpha^2 - \beta^2)x + \alpha^2 + \beta^2 = 0, & \quad \alpha\beta\gamma x^2 + (\alpha^2\beta - \alpha\beta^2)x - \alpha^2\beta^2\gamma = 0 \end{aligned}$$

299) 'Από τό άθροισμα S και τό γινόμενο P δύο άριθμών νά βρεθούν οι άριθμοί στis άκόλουθες περιπτώσεις :

$$\begin{aligned} 1) \quad S &= 15 & 2) \quad S &= -19 & 3) \quad S &= 2\alpha \\ P &= 14 & P &= 84 & P &= \alpha^2 - \beta^2 \end{aligned}$$

300) Νά σχηματισθεί εξίσωση β' βαθμού μέ ρίζες :

$$\begin{aligned} 1) \quad 7 \text{ και } -5, & \quad 2) \quad -10 \text{ και } -\frac{1}{2}, & \quad 3) \quad 5 + \sqrt{3} \text{ και } 5 - \sqrt{3} \\ 4) \quad -2 + 3i \text{ και } -2 - 3i, & \quad 5) \quad \alpha + \beta \text{ και } \alpha - \beta, & \quad 6) \quad \frac{\alpha + \beta}{\alpha} \text{ και } \frac{\alpha + \beta}{\beta} \end{aligned}$$

301) Νά υπολογισθεί ή μιά ρίζα τής εξισώσεως $ax^2 + bx + \gamma = 0$, όταν γνωρίζουμε τήν άλλη ρίζα της.

302) Νά υπολογισθεί ή τιμή του λ, ώστε τό τριώνυμο $x^2 - 5\lambda x + \lambda^2$ νά έχει ρίζα τόν άριθμό $\frac{1}{2}$.

303) 'Αν x_1, x_2 είναι οι ρίζες τής $x^2 - (m + 1)x + m = 0$, νά βρεθεί

- 1) μέ ποιά τιμή του m έχει ρίζες αντίθετες,
- 2) μέ ποιά τιμή του m ισχύει ή σχέση $3x_1 + 2x_2 = 7$,
- 3) μέ ποιά τιμή του m έχει ρίζες αντίστροφες.

304) 'Αν x_1, x_2 είναι οι ρίζες τής εξισώσεως $3x^2 - 2x + 6 = 0$, νά υπολογισθούν οι τιμές τών παραστάσεων :

$$\begin{aligned} 1) \quad \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2}, & \quad \frac{1}{x_1^2} + \frac{1}{x_2^2}, & \quad x_1^{-3} + x_2^{-3} \\ 2) \quad (x_1 - x_2)^2, & \quad \frac{2}{x_1 + 3} + \frac{2}{x_2 + 3}, & \quad (3x_1 - 2)(3x_2 - 2), & \quad \frac{x_1}{x_2^2} + \frac{x_2}{x_1^2} \end{aligned}$$

305) Μέ ποιές τιμές του λ $\in \mathbb{R}$ τό άθροισμα τών τετραγώνων τών ριζών τής εξισ. $2\lambda x(x - 1) - x(x - 2) + 3\lambda = 0$ Ισοϋται μέ 4;

‘Ο μ ά δ α β’

306) Νά βρεθεί ή ίκανή και άναγκαία συνθήκη μεταξύ τών α, β, γ τής $ax^3 + bx + \gamma = 0$, ώστε οι ρίζες αύτής x_1, x_2 νά έπαληθεύουν τή σχέση $kx_1 + \lambda x_2 = \mu$.

307) Νά σχηματισθεί έξίσωση β’ βαθμού μέ ρίζες 1) τά αντίστροφα τών ριζών, 2) τά αντίστροφα τών τετραγώνων και 3) τούς κύβους τών ριζών τής έξισώσεως $x^2 - ax + \beta = 0$.

308) *Αν ρ_1, ρ_2 είναι οι ρίζες τής έξισώσεως $x^2 - 3x + \kappa = 0$, νά ύπολογισθεί ή τιμή τοϋ κ, ώστε: $5\rho_1^3\rho_2 - 4\rho_1^2\rho_2 = 2\kappa + 3 + 4\rho_1\rho_2^2 - 5\rho_1\rho_2^3$.

309) Μέ ποιές τιμές τών μ και ν οι ρίζες ρ_1, ρ_2 τής έξισ. $2x^2 + \mu x - 3\nu = 0$ έπαληθεύουν τίς σχέσεις $3\rho_1 + 3\rho_2 = 2\rho_1\rho_2$ και $1 - \rho_1\rho_2 = 5(\rho_1 + \rho_2 - 2)$;

310) *Αν x_1, x_2 είναι οι ρίζες τής έξισώσεως $ax^2 + bx + \gamma = 0$, νά ύπολογισθούν οι παραστάσεις: $(ax_1 + \beta)^{-2} + (ax_2 + \beta)^{-2}$, $(ax_1 + \beta)^{-3} + (ax_2 + \beta)^{-3}$

311) Νά λυθεί τό σύστημα :

όπου ρ_1, ρ_2 ρίζες τής $x^2 - 3x + 1 = 0$

$$\begin{cases} -3\rho_1\rho_2x + 5(\rho_1 + \rho_2)\psi = 4(\rho_1 + \rho_2) \\ (\rho_1 + \rho_2)x + \rho_1\rho_2\psi = 7\rho_1\rho_2 \end{cases}$$

312) Νά κατασκευασθεί έξίσωση β’ βαθμού, πού οι ρίζες της x_1, x_2 νά έπαληθεύου τίς σχέσεις $x_1x_2 - 3(x_1 + x_2) = -5$ και $x_1x_2 - \mu(x_1 + x_2) = -1$ και έπειτα νά προσδιορισθεί ό μ, ώστε νά έχει ή έξίσωση ρίζες ίσες.

93. ΣΗΜΕΙΟ ΤΩΝ ΡΙΖΩΝ ΤΟΥ $\Phi(x) = ax^2 + bx + \gamma$, α, β, γ ∈ R, α ≠ 0.

Είδαμε ότι τό είδος τών ριζών τοϋ τριωνύμου $\varphi(x)$ έξαρτάται από τί διακρίνουσα $\Delta = \beta^2 - 4\alpha\gamma$ και ότι αυτές μπορεί νά είναι πραγματικές άνισες ($\Delta > 0$), πραγματικές ίσες ($\Delta = 0$) και καθαρές μιγαδικές συζυγείς ($\Delta < 0$)

Τώρα θά ξεετάσουμε τό σημείο τών ριζών στήν περίπτωση πού οι ρίζες είναι πραγματικές, γιατί τούς μιγαδικούς άριθμούς δέν τούς διακρίνουμε sé θετικούς και άρνητικούς.

Τό σημείο τών ριζών τοϋ $\varphi(x)$ έξαρτάται από τό γινόμενο τους $P = \frac{\gamma}{\alpha}$ και τό άθροισμά τους $S = -\frac{\beta}{\alpha}$.

Διακρίνουμε τίς έξής περιπτώσεις :

1. $\Delta > 0$. Οι ρίζες είναι πραγματικές άνισες.

α) $P = \frac{\gamma}{\alpha} > 0$. Οι ρίζες είναι όμόσημες, όπότε, άν έχουμε:

1) $S = -\frac{\beta}{\alpha} > 0$, τότε είναι θετικές ($x_1, x_2 \in R^+$),

2) $S = -\frac{\beta}{\alpha} < 0$, τότε είναι άρνητικές ($x_1, x_2 \in R^-$)

*Η περίπτωση $S = -\frac{\beta}{\alpha} = 0 \rightarrow \beta = 0$ μέ $\frac{\gamma}{\alpha} > 0$ και $\Delta > 0$ είναι άδύνατη.

β) $P = \frac{\gamma}{\alpha} < 0$. Οι ρίζες είναι έτερόσημες, όπότε άν έχουμε:

1) $S = -\frac{\beta}{\alpha} > 0$ άπόλυτα μεγαλύτερη είναι ή θετική

($x_1 \in R^+, x_2 \in R^-,$ ή $x_2 < 0 < x_1$ και $|x_2| < |x_1|$),

2) $S = -\frac{\beta}{\alpha} < 0$ άπόλυτα μεγαλύτερη είναι ή άρνητική

($x_1 \in R^+, x_2 \in R^-$ ή $x_2 < 0 < x_1$ και $|x_1| < |x_2|$),

3) $S = -\frac{\beta}{\alpha} = 0$ οι ρίζες είναι αντίθετες ($x_2 < 0 < x_1$ και $|x_1| = |x_2|$)

γ) $P = \frac{\gamma}{\alpha} = 0$. Η μιά ρίζα είναι 0 και η άλλη διάφορη του μηδενός (ἀποκλείεται $x_1 = x_2 = 0$, γιατί $\Delta > 0$), ὁπότε, ἄν ἔχουμε:

1) $S = -\frac{\beta}{\alpha} > 0$ ἢ $x_2 = 0$ καὶ ἢ $x_1 > 0$ ($x_1 = -\frac{\beta}{\alpha}$),

2) $S = -\frac{\beta}{\alpha} < 0$ ἢ $x_1 = 0$ καὶ ἢ $x_2 < 0$ ($x_2 = -\frac{\beta}{\alpha}$),

II. $\Delta = 0$. Οἱ ρίζες εἶναι πραγματικές ἴσες ($x_1 = x_2 = -\frac{\beta}{2\alpha}$)

καὶ ἄρα $P = \frac{\gamma}{\alpha} \geq 0$, ὁπότε ἄν ἔχουμε:

α) $P = \frac{\gamma}{\alpha} > 0$ καὶ $S = -\frac{\beta}{\alpha} > 0$ οἱ ρίζες εἶναι θετικές ($x_1 = x_2 \in \mathbb{R}^+$),

β) $P = \frac{\gamma}{\alpha} > 0$ καὶ $S = -\frac{\beta}{\alpha} < 0$ οἱ ρίζες εἶναι ἀρνητικές ($x_1 = x_2 \in \mathbb{R}^-$)

γ) $P = \frac{\gamma}{\alpha} = 0$ οἱ ρίζες εἶναι 0 ($x_1 = x_2 = 0$).

III. $\Delta < 0$. Οἱ ρίζες εἶναι καθαρὲς μιγαδικές συζυγεῖς ($|x_1| = |x_2|$).

Τὰ παραπάνω συνοψίζονται στὸν ἀκόλουθο πίνακα:

Σημεῖο ριζῶν τοῦ $\varphi(x) \equiv ax^2 + \beta x + \gamma$, $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$, $\alpha \neq 0$			
Δ	P	S	Εἶδος ριζῶν καὶ σημεῖο τους
+	+	+	$x_1 \in \mathbb{R}^+, x_2 \in \mathbb{R}^+ \Leftrightarrow 0 < x_2 < x_1$
		-	$x_1 \in \mathbb{R}^-, x_2 \in \mathbb{R}^- \Leftrightarrow x_2 < x_1 < 0$
		0	περίπτωση ἀδύνατη
	-	+	$x_1 \in \mathbb{R}^+, x_2 \in \mathbb{R}^- \Leftrightarrow x_2 < 0 < x_1$ καὶ $ x_2 < x_1 $
		-	$x_1 \in \mathbb{R}^+, x_2 \in \mathbb{R}^- \Leftrightarrow x_2 < 0 < x_1$ καὶ $ x_1 < x_2 $
		0	$x_1 \in \mathbb{R}^+, x_2 \in \mathbb{R}^- \wedge x_1 = -x_2 \Rightarrow x_1 = x_2 $
	0	+	$x_1 \in \mathbb{R}^+, x_2 = 0$ ($x_1 = -\frac{\beta}{\alpha}$)
		-	$x_1 = 0, x_2 \in \mathbb{R}^-$ ($x_2 = -\frac{\beta}{\alpha}$)
		0	περίπτωση ἀδύνατη, γιατί $\Delta \neq 0$
0	+	+	$x_1 = x_2 = -\frac{\beta}{2\alpha} \in \mathbb{R}^+$
		-	$x_1 = x_2 = -\frac{\beta}{2\alpha} \in \mathbb{R}^-$
	0	0	$x_1 = x_2 = 0$
-			$x_1 \in (\mathbb{C} - \mathbb{R}), x_2 \in (\mathbb{C} - \mathbb{R})$ καὶ $x_1 = \bar{x}_2 \Rightarrow x_1 = x_2 $

Παραδείγματα : α) Νά βρεθεί τό σημείο τῶν ριζῶν τῶν ἐξισώσεων:

1) $x^2 - 2x - 5 = 0$, 2) $x^2 + 5x + 4 = 0$, 3) $3x^2 - x + 1 = 0$

Λύσεις : 1) *Έχουμε :

$$\Delta = (-2)^2 - 4 \cdot (-5) = 24 > 0, \quad P = -\frac{5}{1} < 0 \quad \text{καί} \quad S = -\frac{-2}{1} = 2 > 0.$$

*Άρα $x_1 \in \mathbb{R}^+$, $x_2 \in \mathbb{R}^-$ καί $|x_2| < |x_1|$.

2) *Έχουμε :

$$\Delta = 5^2 - 4 \cdot 4 = 9 > 0, \quad P = 4 > 0 \quad \text{καί} \quad S = -5 < 0.$$

*Άρα $x_1 \in \mathbb{R}^-, x_2 \in \mathbb{R}^- \Leftrightarrow x_2 < x_1 < 0$.

3) *Έχουμε $\Delta = (-1)^2 - 4 \cdot 3 \cdot 1 = -11 < 0$.

*Άρα $x_1 \in (\mathbb{C} - \mathbb{R}), x_2 \in (\mathbb{C} - \mathbb{R})$ καί $x_1 = \bar{x}_2 \Rightarrow |x_1| = |x_2|$.

β) Μέ ποιές τιμές τοῦ λ οἱ ρίζες x_1, x_2 τῆς ἐξίσ. $x^2 - 8x + \lambda = 0$ εἶναι ἑτερόσημες μέ ἀπόλυτα μεγαλύτερη τή θετική:

Λύση : Πρέπει νά ἰσχύουν οἱ συνθήκες $P < 0$ καί $S > 0$

(Δέν παίρνομε $\Delta > 0$, γιατί $P < 0 \Rightarrow \Delta > 0$).

*Άρα $P = \lambda < 0$ καί $S = -(-8) = 8 > 0$.

*Ὡστε : μέ $\lambda < 0$ ἔχουμε $x_1 \in \mathbb{R}^+, x_2 \in \mathbb{R}^-$ καί $|x_2| < |x_1|$

γ) Νά διερευνηθεῖ ἡ ἐξίσωση $3x^2 - 6x + 5(2\mu - 1) = 0$, $\mu \in \mathbb{R}$.

Λύση : Ἐξετάζουμε τίς ποσότητες Δ, P, S :

$$\Delta = 36 - 60(2\mu - 1) = 12(3 - 10\mu + 5) = 24(4 - 5\mu)$$

Τό σημείο τῆς Δ εἶναι:

μ	$-\infty$	$4/5$	$+\infty$
Δ	+	○	-

$P = \frac{5(2\mu - 1)}{3} = \frac{5}{3}(2\mu - 1)$

Τό σημείο τοῦ P εἶναι:

μ	$-\infty$	$1/2$	$+\infty$
P	-	○	+

$$S = -\frac{-6}{3} = 2 > 0.$$

*Ἐπειτα συμπληρώνουμε τόν πίνακα:

μ	Δ	P	S	Εἶδος ριζῶν τῆς $3x^2 - 6x + 5(2\mu - 1) = 0$
$-\infty$	+	-	+	$x_1 \in \mathbb{R}^+, x_2 \in \mathbb{R}^-$ καί $ x_2 < x_1 $
$\frac{1}{2}$	-	○	-	$x_1, x_2 \in \mathbb{R}^+, x_2 = 0, x_1 = 2$
	+	+	+	$x_1 \in \mathbb{R}^+, x_2 \in \mathbb{R}^+$
$\frac{4}{5}$	-	○	-	$x_1 = x_2 = +1$
$+\infty$	-	+	+	$x_1 \in (\mathbb{C} - \mathbb{R}), x_2 \in (\mathbb{C} - \mathbb{R})$ καί $x_1 = \bar{x}_2 \Rightarrow x_1 = x_2 $

‘Ο μ ά δ α α’

313) Νά βρεθεί τό σημείο τών ριζών τών παρακάτω εξισώσεων:

$$\begin{array}{ll} 1) & x^2 - 6x + 9 = 0, & 7x^2 + 14x - 1 = 0 \\ 2) & 4x^2 - 4x + 1 = 0, & -3x^2 - 9x + 2 = 0 \end{array}$$

314) Νά βρεθοῦν οί τιμές τοῦ $\lambda \in \mathbb{R}$ γιά νά εἶναι οί ρίζες τῆς ἐξίσ. $3x^2 - 2x + 3(\lambda - 7) = 0$:
1) θετικές, 2) ἑτερόσημες μέ ἀπόλυτα μεγαλύτερη τῆ θετική, 3) μιᾶ διπλή θετική, 4) καθαρές μιγαδικές.

‘Ο μ ά δ α β’

315) Νά διερευνηθεῖ γιά πραγματικές τιμές τοῦ λ καθεμίᾶ ἀπό τίς ἀκόλουθες ἐξισώσεις καί νά γίνει πινακογράφηση τών συμπερασμάτων τῆς διερεύνησεως.

$$1) \quad x^2 - 4x - 3(2 - 5\lambda) = 0, \quad 2) \quad -2x^2 + 5x - 7(1 - \lambda) = 0$$

316) Νά βρεθεῖ τό εἶδος καί τό σημείο τών ριζών τῆς ἐξισώσεως $2x(x - \alpha) = \alpha^2$, ὅταν α πραγματικός καί $\alpha \neq 0$.

94. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ $f(x) = ax^2 + bx + \gamma$, $a, b, \gamma \in \mathbb{R}$ καί $a \neq 0$ ΣΕ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ x ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ.

*Αν x_1, x_2 εἶναι οί ρίζες τοῦ τριωνύμου $f(x) \equiv ax^2 + bx + \gamma$, τότε ἔχουμε:
 $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$ καί $x_1 \cdot x_2 = \frac{\gamma}{a}$.

*Ἐτσι τό τριώνυμο γράφεται :

$$\begin{aligned} f(x) &\equiv ax^2 + bx + \gamma \equiv a \left(x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{\gamma}{a} \right) \equiv a[x^2 - (x_1 + x_2)x + x_1x_2] \equiv \\ &\equiv a[x^2 - x_1x - x_2x + x_1x_2] \equiv a[x(x - x_1) - x_2(x - x_1)] \equiv \\ &\equiv a(x - x_1)(x - x_2) \end{aligned}$$

*Ὡστε: Γιά νά μετασχηματίσουμε τό τριώνυμο $f(x) = ax^2 + bx + \gamma$ σέ γινόμενο πρωτοβάθμιων παραγόντων ὡς πρός x , βρίσκουμε τίς ρίζες του καί ἔπειτα σχηματίζουμε τό γινόμενο $a(x - x_1)(x - x_2)$.

Παράδειγμα: Νά τραποῦν σέ γινόμενο παραγόντων τά τριώνυμα

$$1) \quad x^2 - 7x + 10, \quad 2) \quad 3x^2 + x - 2, \quad 3) \quad x^2 - 4x + 5$$

Λύσεις: 1) Οἱ ρίζες τοῦ τριωνύμου εἶναι $x_1 = 5, x_2 = 2$

*Ἀρα ἔχουμε: $x^2 - 7x + 10 = (x - 5)(x - 2)$

2) Οἱ ρίζες τοῦ τριωνύμου εἶναι $x_1 = \frac{2}{3}, x_2 = -1$.

*Ἀρα ἔχουμε: $3x^2 + x - 2 = 3\left(x - \frac{2}{3}\right)(x + 1) = (3x - 2)(x + 1)$

3) Οἱ ρίζες τοῦ τριωνύμου εἶναι $x_1 = 2 + i, x_2 = 2 - i$. *Ἀρα ἔχουμε:
 $x^2 - 4x + 5 = (x - (2 + i))(x - (2 - i)) = (x - 2 - i)(x - 2 + i)$

Δηλαδή η ανάλυση του τριωνύμου $x^2 - 4x + 5$ με ρίζες καθαρές μιγαδικές δέν είναι δυνατή (βλ. 5η περίπτωση αναλύσεως) στο σύνολο τών πραγματικών, είναι όμως δυνατή στο σύνολο τών μιγαδικών.

95. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΞΙΣΩΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΤΗΣ.

Αν είναι γνωστές οι ρίζες x_1, x_2 τής δευτεροβάθμιας εξίσωσης, μπορούμε να σχηματίσουμε τήν εξίσωση κάνοντας χρήση του μετασχηματισμού

$$\alpha x^2 + \beta x + \gamma \equiv \alpha(x - x_1)(x - x_2).$$

Παράδειγμα: Νά σχηματισθεί εξίσωση β' βαθμού με ρίζες τούς αριθμούς $\alpha) 3, -2, \beta) 2 \pm \sqrt{3}, \gamma) -3 \pm 2i$.

Λύση: $\alpha)$ Έχουμε $\alpha(x - 3)(x + 2) = \alpha(x^2 - x - 6) = 0 \Leftrightarrow x^2 - x - 6 = 0$.

$\beta)$ Έχουμε $\alpha[x - (2 + \sqrt{3})][x - (2 - \sqrt{3})] = \alpha[(x - 2)^2 - 3] = 0 \Leftrightarrow (x - 2)^2 - 3 = 0 \Leftrightarrow x^2 - 4x + 1 = 0$.

$\gamma)$ Έχουμε $\alpha[x - (-3 + 2i)][x - (-3 - 2i)] = \alpha[(x + 3)^2 - (2i)^2] = 0 \Leftrightarrow (x + 3)^2 + 4 = 0 \Leftrightarrow x^2 + 6x + 13 = 0$.

Σημείωση: Ο παράγοντας α του γινομένου μπορεί να παραλείπεται ή και να είναι οποιοσδήποτε πραγματικός αριθμός.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

317) Νά τραπούν σε γινόμενο πρωτοβάθμιων παραγόντων του x τά τριώνυμα:

- | | | |
|---|-------------------------------|--|
| 1) $x^2 + 7x - 8,$ | $x^2 - 11x - 26$ | |
| 2) $2x^2 + 11x + 5$ | $x^2 + x\psi - 72\psi^2,$ | $v^2x^2 - 6vx - 91$ |
| 3) $x^2 - 2\alpha x + (\alpha^2 - \beta^2)$ | $x^2 - 2\mu x + \mu^2 - \nu,$ | $x^2 - 2\alpha x - 3\alpha^2 - 4\beta(\beta - 2\alpha).$ |

318) Νά σχηματισθεί εξίσωση β' βαθμού με ρίζες:

- | | | |
|---------------------------------------|--------------------------|--|
| 1) $-\frac{3}{4}$ και $-\frac{1}{2},$ | 2) $5 \pm 2\sqrt{3},$ | 3) $\frac{1}{2} \pm \frac{3i}{2},$ |
| 4) $\alpha \pm \sqrt{2\beta},$ | 5) $\lambda \pm 3\mu i,$ | 6) $\alpha^2 + \beta^2$ και $\alpha - \beta$ |

319) Νά άπλοποιηθούν τά κλάσματα:

- | | |
|--|--|
| 1) $\frac{x^2 - 15x}{x^2 - 14x - 15},$ | $\frac{3x^2 + 19x - 14}{6x^2 - x - 2}$ |
| 2) $\frac{3x^2 - 7x\psi + 2\psi^2}{6x^2 - 5x\psi + \psi^2},$ | $\frac{x^2 - x(2\alpha + 3\beta + 1) + (2\alpha + 3\beta)}{2x^2 - x(4\alpha + 6\beta + 1) + (2\alpha + 3\beta)}$ |

96. ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ $f(x) = \alpha x^2 + \beta x + \gamma$ ΣΤΟ \mathbb{R} .

Αν x_1, x_2 οι ρίζες του τριωνύμου $f(x) \equiv \alpha x^2 + \beta x + \gamma$, τότε

$$x_1 = \frac{-\beta + \sqrt{\Delta}}{2\alpha}, \quad x_2 = \frac{-\beta - \sqrt{\Delta}}{2\alpha}$$

Καί τό τριώνυμο γράφεται:

$$f(x) \equiv \alpha x^2 + \beta x + \gamma \equiv \alpha(x - x_1)(x - x_2) \equiv \alpha \left(x - \frac{-\beta + \sqrt{\Delta}}{2\alpha} \right) \left(x - \frac{-\beta - \sqrt{\Delta}}{2\alpha} \right) \equiv \alpha \left[\left(x + \frac{\beta}{2\alpha} \right)^2 - \left(\frac{\sqrt{\Delta}}{2\alpha} \right)^2 \right]$$

Διακρίνουμε τώρα τίς περιπτώσεις:

$$1) \text{ *Αν } \Delta > 0, \text{ τότε } f(x) \equiv \alpha \left[\left(x + \frac{\beta}{2\alpha} \right)^2 - \left(\frac{\sqrt{\Delta}}{2\alpha} \right)^2 \right]$$

*Όστε τό τριώνυμο $f(x) \forall x \in \mathbb{R}$ μετασχηματίζεται σέ διαφορά δύο τετραγώνων πραγματικῶν παραστάσεων ἐπί τό $\alpha \neq 0$.

$$2) \text{ *Αν } \Delta = 0, \text{ τότε } f(x) \equiv \alpha x^2 + \beta x + \gamma \equiv \alpha \left(x + \frac{\beta}{2\alpha} \right)^2.$$

*Όστε τό $f(x) \forall x \in \mathbb{R}$ μετασχηματίζεται σέ τέλειο τετράγωνο πραγματικῆς παραστάσεως ἐπί τό $\alpha \neq 0$.

$$3) \text{ *Αν } \Delta < 0, \text{ τότε } f(x) \equiv \alpha x^2 + \beta x + \gamma \equiv \alpha \left[\left(x + \frac{\beta}{2\alpha} \right)^2 - \left(\frac{i\sqrt{-\Delta}}{2\alpha} \right)^2 \right] \equiv \alpha \left[\left(x + \frac{\beta}{2\alpha} \right)^2 + \left(\frac{\sqrt{-\Delta}}{2\alpha} \right)^2 \right]$$

*Όστε τό $f(x) \forall x \in \mathbb{R}$ μετασχηματίζεται σέ ἄθροισμα δύο τετραγώνων πραγματικῶν παραστάσεων ἐπί τό $\alpha \neq 0$.

Σημείωση: Αὐτές οἱ μορφές εἶναι πολύ χρήσιμες γιά τά ἐπόμενα κεφάλαια.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

320) Νά βρεθοῦν οἱ τιμές τοῦ $\lambda \in \mathbb{R}$, ὥστε νά εἶναι τά τριώνυμα α) τέλεια τετράγωνα, β) ἴσα μέ τή διαφορά δύο τετραγώνων πραγματικῶν παραστάσεων, γ) ἴσα μέ τό ἄθροισμα δύο τετραγώνων πραγματικῶν παραστάσεων:

$$1) 5(2\lambda - 1)x^2 + x - 1,$$

$$2) -7x^2 + 5x - 3(2 - 3\lambda)$$

321) Νά βρεθεῖ ποιά ἀπό τά παρακάτω τριώνυμα μετασχηματίζονται σέ διαφορά καί ποιά σέ ἄθροισμα δύο τετραγώνων πραγματικῶν παραστάσεων:

$$1) 4x^2 + 20\alpha x + 21\alpha^2,$$

$$2) \alpha\beta x^2 - (\alpha^2 + \beta^2)x + \alpha\beta$$

$$3) \alpha^2 x^2 - 2\alpha^2 x + \alpha^4 + 1,$$

$$4) 9\alpha^4 x^2 - 8\alpha^2 \beta(3x - 2\beta) + 16\beta^2$$

97. ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ $\varphi(x) \equiv \alpha x^2 + \beta x + \gamma$, $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$, $\alpha \neq 0$ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΟΥ x .

*Έστω ἡ συνάρτηση $[x, \varphi(x) \equiv x^2 - 5x + 6] \in \mathbb{R}^2$. Αὐτή εἶναι ὀρισμένη στό σύνολο τῶν πραγματικῶν ἀριθμῶν. *Ας βροῦμε μερικές τιμές της, π.χ. τούς:

$$\varphi(-4), \varphi(2), \varphi\left(-\frac{5}{2}\right), \varphi(3), \varphi(10).$$

*Έτσι ἔχουμε:

$$\varphi: x = -4 \rightarrow \varphi(-4) = 42 > 0 \quad \varphi: x = \frac{5}{2} \rightarrow \varphi\left(\frac{5}{2}\right) = -\frac{1}{4} < 0$$

$$\varphi: x = 2 \rightarrow \varphi(2) = 0$$

$$\varphi: x = 3 \rightarrow \varphi(3) = 0.$$

Παρατηρούμε ότι οι τιμές της άλλοτε είναι θετικές, άλλοτε αρνητικές και μόνο με $x_1 = 2$ και $x_2 = 3$ (οι ρίζες της $\varphi(x) = x^2 - 5x + 6 = 0$) είναι ίσες με 0.


Πολλές φορές στά επόμενα μαθήματα θά βρεθούμε στην ανάγκη νά γνωρίζουμε τό σημείο της αριθμητικής τιμής του τριωνύμου $\varphi(x) \equiv \alpha x^2 + \beta x + \gamma$ ($\alpha \neq 0$), γιά τήν τιμή $x = \xi \in \mathbb{R}$, χωρίς νά βρούμε τήν τιμή $\varphi(\xi) \in \mathbb{R}$.

Είδαμε ότι τό τριώνυμο $\varphi(x) \equiv \alpha x^2 + \beta x + \gamma$ μετασχηματίζεται στή μορφή $\varphi(x) \equiv \alpha x^2 + \beta x + \gamma \equiv \alpha \left\{ \left(x + \frac{\beta}{2\alpha} \right)^2 - \frac{\Delta}{4\alpha^2} \right\}$. Τό σημείο της τιμής του $\varphi(\xi)$, μέ $x = \xi$ εξαρτάται από τή Δ και τόν αριθμό α .

Έτσι διακρίνουμε τίς περιπτώσεις:

1) *Αν $\Delta > 0$, τότε $x_1 \neq x_2 \in \mathbb{R}$ και έστω $x_2 < x_1$.

Οί ρίζες x_1, x_2 διαμερίζουν τό σύνολο \mathbb{R} σέ τρία διαστήματα, όπως φαίνεται στή γεωμετρική παράσταση.



*Ας θεωρήσουμε μία τιμή $x = \xi \in \mathbb{R}$. Γιά τήν τιμή αυτή διακρίνουμε τίς περιπτώσεις:

α) *Αν $\xi < x_2 < x_1$ τότε $\xi - x_1 < 0$ και $\xi - x_2 < 0$,
 όπότε $(\xi - x_1)(\xi - x_2) > 0$.

*Από τό $\varphi(x) \equiv \alpha x^2 + \beta x + \gamma \equiv \alpha(x - x_1)(x - x_2)$ παίρνουμε
 $\varphi(\xi) = \alpha\xi^2 + \beta\xi + \gamma = \alpha(\xi - x_1)(\xi - x_2) = \alpha \cdot$ (θετικός αριθμός).

*Αρα ή τιμή $\varphi(\xi)$ έχει τό σημείο του α .

*Ωστε $\alpha\varphi(\xi) > 0$.

β) *Αν $x_2 < \xi < x_1$, τότε $\xi - x_1 < 0$ και $\xi - x_2 > 0$,
 όπότε $(\xi - x_1)(\xi - x_2) < 0$

και άρα

$\varphi(\xi) = \alpha\xi^2 + \beta\xi + \gamma = \alpha(\xi - x_1)(\xi - x_2) = \alpha \cdot$ (άρνητικός αριθμός).

*Αρα ή τιμή $\varphi(\xi)$ έχει τό σημείο του $-\alpha$.

*Ωστε, $\alpha\varphi(\xi) < 0$.

γ) *Αν $x_2 < x_1 < \xi$, τότε $\xi - x_1 > 0$ και $\xi - x_2 > 0$,
 όπότε $(\xi - x_1)(\xi - x_2) > 0$ και $\varphi(\xi) = \alpha(\xi - x_1)(\xi - x_2) = \alpha \cdot$ (θετικός αριθμός)

*Αρα ή τιμή $\varphi(\xi)$ έχει τό σημείο του α .

*Ωστε, $\alpha\varphi(\xi) > 0$.

2) *Αν $\Delta = 0$, τότε $x_1 = x_2 = -\frac{\beta}{2\alpha} \in \mathbb{R}$ και τό τριώνυμο μετασχηματίζεται σέ $\varphi(x) \equiv \alpha x^2 + \beta x + \gamma \equiv \alpha \cdot \left(x + \frac{\beta}{2\alpha} \right)^2$,

όπότε, αν $x = \xi \neq -\frac{\beta}{2\alpha}$, έχουμε $\varphi(\xi) = \alpha \cdot \left(\xi + \frac{\beta}{2\alpha} \right)^2 = \alpha \cdot$ (θετικός αριθμός.)

*Αρα ή τιμή $\varphi(\xi)$ για κάθε $\xi \neq -\frac{\beta}{2\alpha}$ έχει τό σημείο του α .

3) *Αν $\Delta < 0$, τότε $x_1, x_2 \in (C - R)$ και τό τριώνυμο μετασχηματίζεται σε $\varphi(x) \equiv \alpha x^2 + \beta x + \gamma \equiv \alpha \left\{ \left(x + \frac{\beta}{2\alpha} \right)^2 + \left(\frac{\sqrt{-\Delta}}{2\alpha} \right)^2 \right\}$

όποτε έχουμε $\varphi(\xi) = \alpha \left\{ \left(\xi + \frac{\beta}{2\alpha} \right)^2 + \left(\frac{\sqrt{-\Delta}}{2\alpha} \right)^2 \right\} = \alpha \cdot (\text{θετικός αριθμός})$.

*Αρα ή τιμή $\varphi(\xi)$ για κάθε $\xi \in R$ έχει τό σημείο του α .

Τά παραπάνω συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα:

$$\varphi(x) \equiv \alpha x^2 + \beta x + \gamma$$

Σημείο τής Δ	Ρίζες του $\varphi(x)$	Σημείο του $\varphi(x)$ (για $x = \xi \in R$)	
$\Delta > 0$	$x_1, x_2 \in R$ $x_2 < x_1$	$x < x_2 < x_1$ ή $x_2 < x_1 < x$	σημείο του α $\alpha\varphi(\xi) > 0$
		$x_2 < x < x_1$	σημείο του $-\alpha$ $\alpha\varphi(\xi) < 0$
$\Delta = 0$	$x_1 = x_2 = -\frac{\beta}{2\alpha} \in R$	$\forall x \neq -\frac{\beta}{2\alpha}$	σημείο του α $\alpha\varphi(\xi) > 0$
$\Delta < 0$	$x_1, x_2 \in (C - R)$	$\forall x \in R$	σημείο του α $\alpha\varphi(\xi) > 0$

*Ωστε: Τό τριώνυμο $\varphi(x)$ παίρνει τιμή όμοσημη του α

α) για $x < x_2 < x_1$ ή $x_2 < x_1 < x$, αν $x_1, x_2 \in R$, β) για $\forall x \neq -\frac{\beta}{2\alpha} \in R$ αν

$x_1 = x_2 = -\frac{\beta}{2\alpha}$ και γ) για $\forall x \in R$, αν $x_1, x_2 \in (C - R)$,

και τιμή όμοσημη του $-\alpha$ για $x_2 < x < x_1$ αν $x_1, x_2 \in R$.

Παραδείγματα : Νά βρεθούν οι πραγματικές τιμές του x , ώστε τά τριώνυμα νά έχουν τιμές θετικές ή άρνητικές:

1) $x^2 - 6x + 8$, 2) $x^2 - 6x + 9$ 3) $3x^2 - x + 1$

Λύση :

1) *Επειδή $\Delta = 36 - 32 = 4 > 0$ και $x_1 = 4$, $x_2 = 2$, έπεται ό ακόλουθος πίνακας

Τιμές του x	$-\infty$	2	4	$+\infty$
σημείο του τριωνύμου	+	○	○	+

2) *Επειδή $\Delta = 36 - 36 = 0$ και $x_1 = x_2 = 3$, έπεται ότι τό τριώνυμο $\forall x \neq 3$ γίνεται θετικό. Ποτέ δέ γίνεται άρνητικό.

3) *Επειδή $\Delta = 1 - 12 = -11 < 0$, έπεται ότι τό τριώνυμο $\forall x \in R$ γίνεται θετικό. Ποτέ δέ γίνεται άρνητικό.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Όμαδα α'

322) Μέ ποιές τιμές του $x \in \mathbb{R}$ τά τριώνυμα γίνονται θετικά ή άρνητικά;

- 1) $3x^2 - x - 4$, 2) $4x^2 - 20x + 25$, 3) $x^2 + x + 1$
 4) $-x^2 + x - 1$ 5) $-2x^2 + 16x - 40$, 6) $-3x^2 + 2x - 5$

323) Νά αποδειχθεί ότι τó τριώνυμο $\varphi(x) \equiv 5x^2 + \mu x + 2\mu^2$ ($\mu \in \mathbb{R}$) είναι θετικό $\forall x \in \mathbb{R}$.

Όμαδα β'

324) Νά αποδειχθεί ότι, άν τó $\varphi(x) \equiv ax^2 + \beta x + \gamma$ γίνεται δμόσημο του $\alpha 1) \forall x \in \mathbb{R}$, τότε έχει ρίζες καθαρές μιγαδικές συζυγείς, 2) $\forall x \neq -\frac{\beta}{2\alpha} \in \mathbb{R}$, τότε $x_1 = x_2 = -\frac{\beta}{2\alpha} \in \mathbb{R}$.

325) Νά αποδειχθεί ότι τó τριώνυμο $\varphi(x) \equiv ax^2 + \beta x + \gamma$ έχει ρίζες πραγματικές άνισης, άν υπάρχει άριθμός $\xi \in \mathbb{R}$ τέτοιος, ώστε νά είναι $\varphi(\xi) < 0$.

326) Νά αποδειχθεί ότι ή έξίσωση $x^2 - 2\lambda x + (\lambda - 1) = 0$ έχει ρίζες πραγματικές $\forall \lambda \in \mathbb{R}$.

$\Delta = (-2\lambda)^2 - 4(1)(\lambda - 1)$	$= 4\lambda^2 - 4\lambda + 4$	$= 4(\lambda^2 - \lambda + 1)$	$\Delta \geq 0$
--	-------------------------------	--------------------------------	-----------------

Παρατήρηση: Το τριώνυμο $\varphi(x)$ καθαρά τριώνυμο τó Δ είναι άρνητικό ή ίσο με 0 ή θετικό. Άρα $\Delta \geq 0$ και τó τριώνυμο έχει δύο πραγματικές ή ίσο με 0 ή δύο μιγαδικές συζυγείς ρίζες. Άρα $\Delta \geq 0$ και τó τριώνυμο έχει δύο πραγματικές ή ίσο με 0 ή δύο μιγαδικές συζυγείς ρίζες.

Άρα: $\Delta = 4(\lambda^2 - \lambda + 1) = 4(\lambda^2 - \lambda + \frac{1}{4} + \frac{3}{4}) = 4(\lambda - \frac{1}{2})^2 + 3 > 0$

Άρα: $\Delta = 4(\lambda^2 - \lambda + 1) = 4(\lambda^2 - \lambda + \frac{1}{4} + \frac{3}{4}) = 4(\lambda - \frac{1}{2})^2 + 3 > 0$

Τύπος τó x	συνολικό σύνολο λύσεων
$\lambda < \frac{1}{2}$	$x_1 = \lambda - \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{\Delta}}{2}, x_2 = \lambda - \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{\Delta}}{2}$
$\lambda = \frac{1}{2}$	$x_1 = x_2 = \lambda - \frac{1}{2} = 0$
$\lambda > \frac{1}{2}$	$x_1 = \lambda - \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{\Delta}}{2}, x_2 = \lambda - \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{\Delta}}{2}$

2) Έπειρά $\Delta = 36 - 36 = 0$ και $x_1 = x_2 = 3$ έπεται ότι τó τριώνυμο $\forall x \in \mathbb{R}$ γίνεται άρνητικό. Άρα $\Delta = 36 - 36 = 0$ και $x_1 = x_2 = 3$ έπεται ότι τó τριώνυμο $\forall x \in \mathbb{R}$ γίνεται άρνητικό. Άρα $\Delta = 36 - 36 = 0$ και $x_1 = x_2 = 3$ έπεται ότι τó τριώνυμο $\forall x \in \mathbb{R}$ γίνεται άρνητικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XIII

ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ Β' ΒΑΘΜΟΥ ΜΕ ΕΝΑΝ ΑΓΝΩΣΤΟ

98. ΟΡΙΣΜΟΙ - ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ (περιληπτική υπόμνηση).

Όρισμοί: Ονομάζεται *άνισωση με έναν άγνωστο*, τόν x , κάθε σχέση τής μορφής $\varphi(x) > f(x)$ ή $f(x) < \varphi(x)$, που είναι αληθής με ειδικές τιμές του άγνωστου x , όπου $\varphi(x), f(x)$ πραγματικές συναρτήσεις τής μεταβλητής x , με τό ίδιο πεδίο ορισμού. "Αν είναι αληθής για κάθε τιμή του συνόλου αναφοράς της, τότε λέγεται *μόνιμη άνισωση*.

Έπίλυση άνισώσεως σε ένα σύνολο S λέγεται ή αναζήτηση του συνόλου τών τιμών του άγνωστου x στο σύνολο S , οι όποιες επαληθεύουν τήν άνισωση. Οι τιμές αυτές του x λέγονται *λύσεις* τής άνισώσεως.

Δύο ή περισσότερες άνισώσεις λέγονται *ισοδύναμες* σε ένα σύνολο S , εάν και μόνο εάν, έχουν τό ίδιο σύνολο λύσεων στο S .

Ίδιότητες: 1) Η άνισωση $\varphi(x) > f(x)$ είναι Ισοδύναμη με τήν άνισωση $\varphi(x) + \tau(x) > f(x) + \tau(x)$, όταν ή συνάρτηση $\tau(x)$ είναι ορισμένη στο σύνολο αναφοράς S .

2) Η άνισωση $\varphi(x) > f(x)$ είναι Ισοδύναμη με τήν $\varphi(x) - f(x) > 0$

3) Η άνισωση $\varphi(x) > 0$, στο S , είναι Ισοδύναμη με τήν άνισωση $\varphi(x) \cdot \sigma(x) > 0$, αν ή άνισωση $\sigma(x) > 0$, στο S , είναι *μόνιμη*.

4) "Αν οι άνισώσεις, στο S , $\varphi(x) > 0$ και $f(x) > 0$ είναι Ισοδύναμες, τότε και ή $\varphi(x) + f(x) > 0$ είναι Ισοδύναμη με αυτές.

"Από τή σύντομη αυτή υπόμνηση, χωρίς απόδειξη, τών Ιδιοτήτων τών άνισώσεων συμπεραίνουμε ότι κατά τήν επίλυση τών άνισώσεων πρέπει να προσέχουμε στην εφαρμογή αυτών τών Ιδιοτήτων, για να μήν κάνουμε σφάλματα.

99. ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΑΝΙΣΩΣΕΩΣ.

Όρισμός: Λέγεται *άνισωση β' βαθμού με έναν άγνωστο*, τόν x , κάθε άνισωση τής μορφής $\varphi(x) \equiv ax^2 + bx + \gamma > 0$ ή < 0 με $a \neq 0$, $a, \beta, \gamma, \gamma \in \mathbf{R}$. (Οι a, β, γ μπορεί να είναι και πραγμ. παραστάσεις ανεξάρτητες από τόν x).

Τό τριώνυμο $ax^2 + bx + \gamma$ είναι ορισμένο στο \mathbb{R} . Για την επίλυση της $ax^2 + bx + \gamma > 0$ ή < 0 , στο σύνολο \mathbb{R} , πρέπει να έχουμε υπόψη μας τα συμπεράσματα από την εξέταση του σημείου της άριθμ. τιμής του τριωνύμου $ax^2 + bx + \gamma$ για πραγμ. τιμές του x .

Επίλυση της άνισ. $\varphi(x) = ax^2 + bx + \gamma > 0$ ή < 0 , ($a \neq 0$).

Γνωρίζουμε ότι τό σημείο της άριθμ. τιμής του $\varphi(x)$ εξαρτάται από τη διακρίνουσα Δ και τόν a .

Έτσι μπορούμε εύκολα να δικαιολογήσουμε τή συμπλήρωση του παρακάτω πίνακα.

Δ	a	Σύνολο λύσεων της $ax^2 + bx + \gamma > 0$	Σύνολο λύσεων της $ax^2 + bx + \gamma < 0$
+	+	$x_1, x_2 \in \mathbb{R}, x_2 < x_1$ $\{x \in \mathbb{R} \mid -\infty < x < x_2, x_1 < x < +\infty\}$	$x_1, x_2 \in \mathbb{R}, x_2 < x_1$ $\{x \in \mathbb{R} \mid x_2 < x < x_1\}$
	-	$x_1, x_2 \in \mathbb{R}, x_2 < x_1$ $\{x \in \mathbb{R} \mid x_2 < x < x_1\}$	$x_1, x_2 \in \mathbb{R}, x_2 < x_1$ $\{x \in \mathbb{R} \mid -\infty < x < x_2, x_1 < x < +\infty\}$
0	+	$\{x \in \mathbb{R} \mid x \neq -\frac{\beta}{2\alpha}\}$	$() = \emptyset$
	-	$() = \emptyset$	$\{x \in \mathbb{R} \mid x \neq -\frac{\beta}{2\alpha}\}$
-	+	$\{x \mid x \in \mathbb{R}\}$	$() = \emptyset$
	-	$() = \emptyset$	$\{x \mid x \in \mathbb{R}\}$

Σημείωση. Τά σύμβολα $-\infty$ και $+\infty$ δέν αντιπροσωπεύουν ορισμένους πραγματικούς άριθμούς.

Παραδείγματα : Νά επίλυθοῦν στό \mathbb{R} οί άνισώσεις:

1) $3x^2 - x - 2 > 0$, 2) $-3x^2 + x + 4 > 0$, 3) $x^2 + 6x + 9 < 0$, 4) $x^2 + x + 1 > 0$

Επίλυση : 1) $\alpha = 3 > 0$, $\Delta = 1 + 24 = 25 > 0$, $x_1 = 1$, $x_2 = -\frac{2}{3}$.

Ή άνίσωση άληθεύει μέ $x > 1$ και μέ $x < -\frac{2}{3}$

Άρα τό σύνολο λύσεων είναι: $\{x \in \mathbb{R} \mid -\infty < x < -\frac{2}{3}, 1 < x < +\infty\}$

2) $\alpha = -3$, $\Delta = 1 - 4(-3)4 = 49 > 0$, $x_1 = \frac{4}{3}$, $x_2 = -1$.

Ή άνίσωση άληθεύει μέ $-1 < x < \frac{4}{3}$

Σύνολο λύσεων: $\{x \in \mathbb{R} \mid -1 < x < \frac{4}{3}\}$

$$3) \alpha = 1 > 0, \Delta = 36 - 16 = 0, x_1 = x_2 = -3.$$

Ἡ ἀνίσωση δὲν ἔχει λύση στό σύνολο \mathbb{R} .

$$\text{Σύνολο λύσεων: } \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 + 6x + 9 < 0\} = \emptyset$$

$$4) \alpha = 1 > 0, \Delta = 1 - 4 = -3 < 0, x_1 x_2 \in (\mathbb{C} - \mathbb{R})$$

Ἡ ἀνίσωση εἶναι ἀληθής γιά κάθε πραγμ. τιμή τοῦ x . Εἶναι μιά μόνιμη ἀνίσωση. Σύνολο λύσεων: $\{x \mid x \in \mathbb{R}\}$.

100. ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ ΒΑΘΜΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ.

Μιά ἀνίσωση βαθμοῦ ἀνώτερου ἀπό β' ὡς πρός x γιά νά ἐπιλυθεῖ, πρέπει νά πάρει τή μορφή $\varphi_1(x) \cdot \varphi_2(x) \dots \varphi_n(x) > 0$ ἢ < 0 , ὅπου $\varphi_1(x), \varphi_2(x), \dots, \varphi_n(x)$ ἀκέραια πολυώνυμα τοῦ x πρώτου ἢ δευτέρου βαθμοῦ μέ τό ἴδιο πεδίο ὀρισμοῦ.

Οἱ παράγοντες β' βαθμοῦ, ἂν ἔχουν ρίζες πραγματικές, μποροῦν νά ἀναλυθοῦν σέ γινόμενο δύο πρωτοβάθμιων παραγόντων, ἂν ὁμως ἔχουν ρίζες καθαρές μιγαδικές συζυγεῖς, παραλείπονται, γιατί εἶναι μόνιμα θετικοί, (γιατί πάντοτε μποροῦμε νά ὑποθέσουμε τόν α θετικό). Ἄρα ἡ ἀνίσωση πάντοτε μπορεῖ νά πάρει τή μορφή $(x - \rho_1)(x - \rho_2) \dots (x - \rho_n) > 0$ ἢ < 0 ($n \in \mathbb{N}$). Ἡ ἐπίλυση τῆς ἀνισώσεως αὐτῆς εἶναι γνωστή ἀπό τήν προηγούμενη τάξη.

Παράδειγμα: Νά ἐπιλυθεῖ στό \mathbb{R} ἡ ἀνίσωση:

$$f(x) \equiv (x - 3)(x^2 - x + 2)(-2x^2 + 7x - 3)(-x^2 + 5x) < 0$$

Ἐπίλυση: Ἐξετάζουμε τούς δευτεροβάθμιους παράγοντες.

Ἔτσι ἔχουμε γιά τό:

$$x^2 + 1, \quad \Delta = -4 < 0 \quad \text{ὅπότε} \quad x^2 + 1 > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

$$x^2 - x + 2, \quad \Delta = -7 < 0 \quad \text{ὅπότε} \quad x^2 - x + 2 > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

$$-2x^2 + 7x - 3, \quad \Delta = 25 > 0 \quad \text{ὅπότε} \quad -2x^2 + 7x - 3 = -2(x - 3)\left(x - \frac{1}{2}\right)$$

$$-x^2 + 5x, \quad \Delta = 25 > 0 \quad \text{ὅπότε} \quad -x^2 + 5x = -x(x - 5)$$

Ἄρα ἡ ἀνίσωση εἶναι ἰσοδύναμη μέ τήν ἀνίσωση:

$$(x - 3)(-2)(x - 3)\left(x - \frac{1}{2}\right)(-x)(x - 5) < 0$$

καί αὐτή ἰσοδύναμη μέ τήν

$$(x - 3)^2 \left(x - \frac{1}{2}\right)(x - 5)x < 0.$$

Ὁ παράγοντας $(x - 3)^2$ εἶναι μὴ ἀρνητικός $\forall x \in \mathbb{R}$,

ἄρα γιά $x \neq 3$, ἡ ἀνίσωση εἶναι ἰσοδύναμη μέ τήν

$$\left(x - \frac{1}{2}\right)(x - 5)x < 0.$$

Οι ρίζες του πρώτου μέλους της είναι $0, \frac{1}{2}, 5$.

Έτσι έχουμε :

x	$-\infty$	0	$\frac{1}{2}$	3	5	$+\infty$	
Σημείο του $(x - \frac{1}{2})(x - 5)x$	-	0	+	0	-	0	+
Σημείο του $(x - 3)^2(x - \frac{1}{2})(x - 5)x$	-	0	+	0	-	0	+

Άρα το σύνολο λύσεων της $f(x) < 0$ είναι :

$$\{x \in \mathbb{R} \mid -\infty < x < 0, \frac{1}{2} < x < 5, x \neq 3\}$$

101. ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ.

Μιά ανίσωση λέγεται κλασματική, αν μπορεί να πάρει τη μορφή

$\frac{\varphi_1(x)}{\varphi_2(x)} > 0$ ή < 0 . Όπου $\varphi_1(x), \varphi_2(x)$ πραγματικές ρητές συναρτήσεις του x με πεδίο ορισμού το πεδίο ορισμού του ρητού άλγεβρικού κλάσματος $\frac{\varphi_1(x)}{\varphi_2(x)}$

Έπειδή το πηλίκο δύο αριθμών είναι όμοσημο του γινομένου τους, ισχύουν οι ισοδυναμίες:

$$\left. \begin{aligned} \frac{\varphi_1(x)}{\varphi_2(x)} > 0 &\Leftrightarrow \varphi_1(x) \cdot \varphi_2(x) > 0 \text{ (στό S)} \\ \frac{\varphi_1(x)}{\varphi_2(x)} < 0 &\Leftrightarrow \varphi_1(x) \cdot \varphi_2(x) < 0 \text{ (στό S)} \end{aligned} \right\} \text{ S το σύνολο ορισμού του } \frac{\varphi_1(x)}{\varphi_2(x)}$$

Άρα η επίλυση της ανίσωσης $\frac{\varphi_1(x)}{\varphi_2(x)} > 0$ ή < 0 ανάγεται στην επίλυση ανίσωσης της μορφής $\varphi_1(x) \cdot \varphi_2(x) > 0$ ή < 0 .

Παράδειγμα : Νά επιλυθεί στο R, η ανίσωση:

$$\frac{3}{x-2} + \frac{3}{x-1} < \frac{5}{x+3}$$

Έπίλυση : Έχουμε : $\frac{3}{x-2} + \frac{3}{x-1} - \frac{5}{x+3} < 0 \Leftrightarrow \frac{x^2 + 24x - 37}{(x-2)(x-1)(x+3)} < 0$

Το πεδίο ορισμού είναι $S = \mathbb{R} - \{2, 1, -3\}$

Επιλύουμε την ισοδύναμη της $(x^2 + 24x - 37)(x - 2)(x - 1)(x + 3) < 0$ όπως προηγουμένως, οπότε λαμβάνουμε το σύνολο λύσεων:

$$\{x \in \mathbb{R} \mid -\infty < x < -12 - \sqrt{181}, -3 < x < 1, -12 + \sqrt{181} < x < 2\}$$

102. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΙΣΩΣΕΩΝ Β' ΒΑΘΜΟΥ.

Αν δύο ή περισσότερες ανισώσεις, με τον ίδιο άγνωστο, είναι αληθείς με τις ίδιες τιμές του άγνωστου, στο σύνολο S , τότε λέμε ότι αποτελούν **σύστημα ανισώσεων**.

Επίλυση του συστήματος ανισώσεων ονομάζουμε την αναζήτηση των κοινών λύσεων των ανισώσεων του. Το σύνολο των κοινών αυτών λύσεων είναι η τομή των συνόλων των λύσεων των ανισώσεων και βρίσκεται με το γνωστό πίνακα, που καθορίζει τα κοινά διαστήματα λύσεων των ανισώσεων.

Παράδειγμα: Νά επιλυθεί, στο R , τό σύστημα των ανισώσεων:


$$1) 3x > 6, \quad 2) x^2 - 6x + 5 < 0, \quad 3) x^3 - 9x^2 + 14x \leq 0$$

Επίλυση. Τό σύνολο λύσεων τής πρώτης είναι: $\Sigma_1 = \{x \in R \mid x > 2\}$. Τό σύνολο λύσεων τής δεύτερης είναι: $\Sigma_2 = \{x \in R \mid 1 < x < 5\}$. Η τρίτη γράφεται $x(x-7)(x-2) \leq 0$, και είναι αληθής για $-\infty < x \leq 0$ και $2 < x < 7$.

x	$-\infty$	0	2	7	$+\infty$
$x^3 - 9x^2 + 14x$	$-$	0	$+$	0	$+$

Τό σύνολο λύσεων τής τρίτης: $\Sigma_3 = \{x \in R \mid -\infty < x \leq 0, 2 \leq x \leq 7\}$

Τό σύνολο του συστήματος δίνεται από την παρακάτω παράσταση



Σύνολο λύσεων του συστήματος είναι:

$$\Sigma = \Sigma_1 \cap \Sigma_2 \cap \Sigma_3 = \{x \in R \mid 2 < x < 5\}$$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Όμάδα α'

327) Νά επιλυθούν στο R , οι ακόλουθες ανισώσεις:

- | | | |
|----------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1) $x^2 - 2x + 3 > 0,$ | 3) $x^2 - 13x + 10 < 0,$ | - $x^2 + 2x + 3 > 0$ |
| 2) $-6x^2 + 11x - 4 < 0,$ | 3) $16x^2 - 8x + 1 > 0,$ | $x^2 + \sqrt{3}x - 1 < 0$ |
| 3) $(x^2 - 9x + 14)(x - 4) < 0,$ | $x^3 + 1 > x^2 + x,$ | $x^4 - 1 > x^3 - x$ |
| 4) $\frac{x^2 - 4}{x + 1} > 0,$ | $\frac{x^2}{x + 1} > 2,$ | |

$$5) \frac{2}{3x+1} > \frac{1}{x+1} - \frac{1}{x-1}$$

328) Νά επιλυθούν, στο σύνολο \mathbb{R} , τὰ συστήματα:

$$1) \begin{cases} 4x^2 - 4x - 3 < 0 \\ -x^2 + 2x > 0, \end{cases}$$

$$2) \left\{ -1 < \frac{2x-1}{(x+1)(x-2)} < 1 \right.$$

329) Μέ ποιές τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$ ή έξισ. $(\lambda-1)x^2 - 2(\lambda-3)x - \lambda + 3 = 0$ έχει ρίζες α) πραγματικές και β) καθαρές μιγαδικές συζυγείς;

'Ομάδα α β'

330) Νά επιλυθούν, στο \mathbb{R} , οι άνισώσεις:

$$1) (x^2 - 2x + 1)(3x^2 + 1)(2x - 1) > 0, \quad (2x^2 - 5x - 7)(x^2 - 1)(3x^2 + 7) < 0$$

$$4) \frac{x^2(x+2)(x-3)^3}{(x+4)^2(x-5)^3} < 0, \quad \frac{3x^3 - 7x^2 + 4x}{x^3 - 6x^2 + 12x - 8} > 0$$

331) Νά επιλυθούν, στο σύνολο \mathbb{R} , τὰ συστήματα:

$$1) \begin{cases} x^2 - 7x + 12 > 0 \\ -3x^2 + 16x - 5 < 0 \\ -x^2 + 2x + 48 > 0 \end{cases}$$

$$2) \begin{cases} x^3 - 5x^2 + 6x \leq 0 \\ -x^2 + 2x + 3 > 0 \\ 2x^3 - 5x - 7 > 0 \end{cases}$$

332) Μέ ποιές πραγματικές τιμές του μ τὸ τριώνυμο $\varphi(x) = (\mu-2)x^2 - 2(\mu+3)x + 2\mu - 18$ έχει ρίζες α) θετικές και β) άρνητικές;

103. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΑΓΜ. ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ ΤΡΙΩΝΥΜΟΥ $\varphi(x) \equiv ax^2 + \beta x + \gamma$.

"Αν x_1, x_2 είναι οι πραγμ. ρίζες, όπου $x_2 \leq x_1$, και ξ πραγματικός άριθμός, τότε οι τρεις πραγματικοί άριθμοί x_1, x_2, ξ μπορούν νά παρουσιάσουν τίς έξής σχέσεις διατάξεως:

$$\xi < x_2 \leq x_1, \quad x_2 \leq x_1 < \xi, \quad x_2 < \xi < x_1,$$

πού λέγονται θέσεις του ξ σέ σχέση μέ τίς ρίζες του $\varphi(x)$.

Καθεμιά άπό τίς θέσεις αυτές του ξ χαρακτηρίζεται άπό όρισμένες συνθήκες μεταξύ του ξ και τών συντελεστών α, β, γ .

1) "Αν $\xi < x_2 \leq x_1$, τότε ισχύει $\alpha\varphi(\xi) > 0$ (§ 97).

"Επίσης έχουμε $\xi < x_2 \leq x_1 \Leftrightarrow \xi < x_2$ και $\xi < x_1$ όπότε $2\xi < x_1 + x_2$ ή $\xi < \frac{x_1 + x_2}{2}$ ή $\xi < -\frac{\beta}{2\alpha}$ ή $\xi + \frac{\beta}{2\alpha} < 0$. "Αρα οι συνθήκες είναι: $\Delta \geq 0$, $\alpha\varphi(\xi) > 0$ και $\xi + \frac{\beta}{2\alpha} < 0$.

"Αντιστρόφως. "Εστω $\Delta \geq 0$, $\alpha\varphi(\xi) > 0$ και $\xi + \frac{\beta}{2\alpha} < 0$. "Από τή $\Delta \geq 0$ έπεται $x_2 \leq x_1 \in \mathbb{R}$. "Από τήν $\alpha\varphi(\xi) > 0$ έπεται ότι ό ξ δέν μπορεί νά βρísκεται μεταξύ τών ριζών. Τέλος, άπό τήν $\xi + \frac{\beta}{2\alpha} < 0$ έπεται ότι ό ξ είναι μικρότερος και άπό τή μικρότερη ρίζα x_2 , γιατί, άν $x_2 \leq x_1 < \xi$, τότε $x_1 < \xi$ και $x_2 < \xi$ όπότε $x_1 + x_2 < 2\xi$ ή $\frac{x_1 + x_2}{2} < \xi$ ή $\xi + \frac{\beta}{2\alpha} > 0$. Αυτό είναι άτοπο.

2) "Αν $x_2 \leq x_1 < \xi$, τότε έχουμε πάλι $\alpha\varphi(\xi) > 0$ και, έπειδή άπό τήν $x_2 \leq x_1 < \xi$, έπεται $\xi + \frac{\beta}{2\alpha} > 0$,

Άρα οι συνθήκες είναι $\Delta \geq 0$, $\alpha\varphi(\xi) > 0$, και $\xi + \frac{\beta}{2\alpha} > 0$.

Αντιστρόφως. Αν $\Delta \geq 0$, $\alpha\varphi(\xi) > 0$ και $\xi + \frac{\beta}{2\alpha} > 0$, τότε έχουμε ρίζες πραγματικές ($x_2 \leq x_1$), ό ξ δέν μπορεί νά είναι μεταξύ τών ριζών και άρα βρίσκεται έξω από τίς ρίζες και είναι μεγαλύτερος και από τή μεγαλύτερη x_1 , γιατί, αν $\xi < x_2 \leq x_1$, τότε θά έχουμε $\xi + \frac{\beta}{2\alpha} < 0$. Αυτό είναι άτοπο.

3) Αν $x_2 < \xi < x_1$, τότε έχουμε $\alpha\varphi(\xi) < 0$ (§ 97).

Αντιστρόφως. Αν $\alpha\varphi(\xi) < 0$, τότε έχουμε ρίζες πραγματικές, και $x_2 < \xi < x_1$, γιατί, αν $\Delta \leq 0$, είναι $\alpha\varphi(\xi) > 0$. Και, αν ό ξ ήταν έξω από τίς ρίζες, θά είχαμε $\alpha\varphi(\xi) > 0$. Αυτό είναι άτοπο.

Από τά παραπάνω συμπεραίνουμε ότι:

Οί **ικανές και αναγκαίες συνθήκες**, ώστε ό $\xi \in \mathbb{R}$ νά είναι 1) μικρότερος τών $x_2 \leq x_1$, είναι $\Delta \geq 0$, $\alpha\varphi(\xi) > 0$, $\xi + \frac{\beta}{2\alpha} < 0$ και 2) μεγαλύτερος τών $x_2 \leq x_1$, είναι $\Delta \geq 0$, $\alpha\varphi(\xi) > 0$, $\xi + \frac{\beta}{2\alpha} > 0$.

Η ικανή και αναγκαία συνθήκη, ώστε ό $\xi \in \mathbb{R}$ νά βρίσκεται μεταξύ τών $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$, είναι $\alpha\varphi(\xi) < 0$.

Παρατήρηση: Τή συνθήκη $\alpha\varphi(\xi) < 0$ τή χρησιμοποιούμε πολλές φορές ώς κριτήριο πραγματικότητας τών ριζών του $\varphi(x)$.

Τά παραπάνω, όπως και μερικότερες περιπτώσεις, συνοψίζονται στον πίνακα.

$\varphi(x) \equiv ax^2 + bx + \gamma, \quad x_2 \leq x_1$			
Δ	$\alpha\varphi(\xi)$	$\xi + \frac{\beta}{2\alpha}$	Θέση του ξ σε σχέση με τίς x_2, x_1
+	+	+	$x_2 < x_1 < \xi$
		-	$\xi < x_2 < x_1$
	-	+	$x_2 < \frac{x_1+x_2}{2} < \xi < x_1$
		-	$x_2 < \xi < \frac{x_1+x_2}{2} < x_1$
		0	$x_2 < \xi = \frac{x_1+x_2}{2} < x_1$
		0	$x_2 < x_1 = \xi$
0	+	-	$\xi = x_2 < x_1$
		0	$x_1 = x_2 < \xi$
	0	0	$\xi < x_1 = x_2$
			$x_1 = x_2 = \xi$

Παραδείγματα : α) Ποιά είναι η θέση των αριθμών $-3, 0, 9, 10$ σε σχέση με τις ρίζες της εξίσωσης $\varphi(x) \equiv x^2 - 8x - 8 = 0$;

Λύση : Έχουμε $\Delta = 64 + 36 = 100 > 0$, $x_2 < x_1$ και $\alpha = 1$. Έπειδή $\alpha\varphi(-3) = 9 + 24 - 9 = 24 > 0$ και $-3 + \frac{\beta}{2\alpha} = -3 - 4 = -7 < 0$, έπεται ότι

$$-3 < x_2 < x_1.$$

Έπίσης: $\alpha\varphi(0) = -9 < 0$, άρα $x_2 < 0 < x_1$ και $\alpha\varphi(9) = 81 - 72 - 9 = 0$ άρα $x_2 < x_1 = 9$ ή $x_2 < x_1 = 9 < 10$

Έτσι έχουμε τη διάταξη: $-3 < x_2 < 0 < x_1 = 9 < 10$

β) Μέ ποιές τιμές του λ οι ρίζες του $\varphi(x) \equiv 4x^2 - x + 2(\lambda - 1)$ είναι μικρότερες από τη μονάδα;

Λύση : Πρέπει να έχουμε $x_2 \leq x_1 < 1$.

Όπότε άρκει να είναι $\Delta \geq 0$, $\alpha\varphi(1) > 0$, $1 + \frac{\beta}{2\alpha} > 0$.

Έτσι έχουμε: $\Delta = 1 - 32(\lambda - 1) \geq 0 \Leftrightarrow \lambda \leq \frac{33}{32}$,

$\alpha\varphi(1) = 4(4 - 1 + 2\lambda - 2) = 4(1 + 2\lambda) > 0 \Leftrightarrow \lambda > -\frac{1}{2}$,

$1 + \frac{\beta}{2\alpha} = 1 + \frac{-1}{8} = 1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8} > 0$ ($\forall \lambda \in \mathbb{R}$).

Οί $\lambda \leq \frac{33}{32}$, $\lambda > -\frac{1}{2}$ συναληθεύουν για $-\frac{1}{2} < \lambda \leq \frac{33}{32}$.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Ό μ α δ α β'

333) Νά βρεθεί η θέση των αριθμών $-2, -1, 0, \frac{1}{2}, 2$ σε σχέση με τις ρίζες των τριωνύμων $\varphi_1(x) \equiv 3x^2 - x - 4$, $\varphi_2(x) \equiv 4x^2 + 4x - 3$.

334) Μέ ποιές τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$ οι ρίζες x_1, x_2 του τριωνύμου $\varphi(x) \equiv -7x^2 + 2x - (3\lambda - 2)$ βρίσκονται μεταξύ των αριθμών $-1, 1$.

335) Νά αποδειχθεί ότι οι παρακάτω εξισώσεις έχουν ρίζες πραγματικές και άνισες, χωρίς τη χρήση της διακρίνουσας:

$$1) (x-5)(x-3) - 5 = 0, \quad 2) (x-\alpha)(x-\beta) = \kappa^2 \quad (\alpha, \beta, \kappa \neq 0 \in \mathbb{R})$$

336) Αν x_1, x_2 είναι οι πραγματικές ρίζες του τριωνύμου $\varphi(x) \equiv \alpha x^2 + \beta x + \gamma$ και $0 < \gamma < \beta < \alpha$, νά αποδειχθεί, ότι οι ρίζες x_1, x_2 βρίσκονται μεταξύ των αριθμών -1 και 1 .

337) Ποιά είναι η διάταξη του αριθμού 2 και των ριζών του τριωνύμου $\varphi(x) \equiv 2x^2 - 3x + 5(1 - 2\lambda)$ κατά τις διάφορες τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$.

338) Αν $\xi_1, \xi_2 \in \mathbb{R}$ και $\varphi(x) \equiv \alpha x^2 + \beta x + \gamma$, νά αποδειχθεί ότι τό $\varphi(x)$ έχει ρίζες πραγματικές και άνισες, αν είναι $\varphi(\xi_1) \cdot \varphi(\xi_2) < 0$, πού ή μιά βρίσκεται μεταξύ των $\xi_1 < \xi_2$. Έπειτα, σύμφωνα με την πρόταση αυτή, νά αποδειχθεί ότι οι ρίζες της εξίσωσης $\varphi(x) \equiv (x-2)(x+3) + (x+2)(x-3) - (2-x)(3-x) = 0$ είναι πραγματικές άνισες και ή μιά ρίζα βρίσκεται μεταξύ 2 και 3 .

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΑΝΙΣΩΣΕΩΝ Β' ΒΑΘΜΟΥ

104. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ Β' ΒΑΘΜΟΥ.

Είδαμε στα προηγούμενα ότι οι συντελεστές α, β, γ του τριωνύμου $\varphi(x) \equiv \alpha x^2 + \beta x + \gamma$ πολλές φορές είναι συναρτήσεις ενός γράμματος $\lambda \in \mathbb{R}$, πού χωρίς νά δίνεται αριθμητικά θεωρείται γνωστή ποσότητα ανεξάρτητη από τον x , και από τις διάφορες τιμές πού παίρνει εξαρτώνται οι ρίζες και τό σημείο του τριωνύμου.

Τό γράμμα λ λέγεται **παράμετρος** και οι εξισώσεις ή άνισώσεις, πού τό περιέχουν, λέγονται **παραμετρικές**.

Γιά νά διερυνήσουμε μία εξίσωση β' βαθμού παραμετρική κατά τις διάφορες τιμές τής παραμέτρου λ , πρέπει νά έχουμε ύπόψη τό γνωστό πίνακα (§ 93), πού εξετάζει το είδος και τό σημείο τών ριζών της.

Παράδειγμα: Νά διερυνηθεί ή εξίσωση. $\varphi(x) \equiv (2\lambda - 1)x^2 - 2(\lambda - 2)x + 3\lambda = 0$, όταν $\lambda \in \mathbb{R}$.

Λύση: Έξετάζουμε τό σημείο τών $\Delta(\lambda)$, $P(\lambda)$ και $S(\lambda)$ κατά τις διάφορες τιμές του λ .

*Έτσι έχουμε:

$$\Delta(\lambda) = 4(\lambda - 2)^2 - 12\lambda(2\lambda - 1) = -4(5\lambda^2 + \lambda - 4) = -20(\lambda + 1)\left(\lambda - \frac{4}{5}\right)$$

Τό σημείο τής $\Delta(\lambda)$ δίνεται από τό γραφικό πίνακα :

λ	$-\infty$	-1	$\frac{4}{5}$	$+\infty$
$\Delta(\lambda)$	-	o	+	-

$P(\lambda) = \frac{3\lambda}{2\lambda - 1}$. Τό κλάσμα $\frac{3\lambda}{2\lambda - 1}$ είναι όμόσημο του $3\lambda(2\lambda - 1)$, πού τό σημείο του δίνεται άπότε ό γραφικό πίνακα:

λ	$-\infty$	o	$\frac{1}{2}$	$+\infty$
$3\lambda(2\lambda - 1)$	+	o	-	+
$P(\lambda)$	+	o	-	+

$S(\lambda) = \frac{2(\lambda - 2)}{2\lambda - 1}$. Τό κλάσμα $\frac{2(\lambda - 2)}{2\lambda - 1}$ είναι όμόσημο του $2(\lambda - 2)(2\lambda - 1)$, πού τό σημείο του δίνεται άπό τό γραφικό πίνακα:

λ	$-\infty$	$\frac{1}{2}$	2	$+\infty$
$2(\lambda - 2)(2\lambda - 1)$	+	o	-	+
$S(\lambda)$	+	-	o	+

Τά παραπάνω βοηθούν στη συμπλήρωση του πίνακα διερευνήσεως:

Διερεύνηση της εξίσωσης $\varphi(x) \equiv (2\lambda - 1)x^2 - 2(\lambda - 2)x + 3\lambda = 0$				
λ	$\Delta(\lambda)$	$P(\lambda)$	$S(\lambda)$	Είδος ριζών και σημεία τους
$-\infty$	-	+	+	$x_1, x_2 \in (\mathbb{C} - \mathbb{R})$ και $x_1 = \bar{x}_2 \Rightarrow x_1 = x_2 $
-1	0			$x_1 = x_2 = -\frac{\beta}{2\alpha} = 1$
	+	+	+	$x_1 \in \mathbb{R}^+, x_2 \in \mathbb{R}^+ \Leftrightarrow 0 < x_2 < x_1$
0	0			$x_1 \in \mathbb{R}^+, x_2 = 0 \left(x_1 = -\frac{\beta}{\alpha} = 4 \right)$
	+	-	+	$x_1 \in \mathbb{R}^+, x_2 \in \mathbb{R}^- \Leftrightarrow x_2 < 0 < x_1$ και $ x_2 < x_1 $
$\frac{1}{2}$				'Εξίσωση πρωτοβάθμια
	+	+	-	$x_1 \in \mathbb{R}^-, x_2 \in \mathbb{R}^- \Leftrightarrow x_2 < x_1 < 0$
$\frac{4}{5}$	0			$x_1 = x_2 = -\frac{\beta}{2\alpha} = -2$
	-	+	-	$x_1, x_2 \in (\mathbb{C} - \mathbb{R})$ και $x_1 = \bar{x}_2 \Rightarrow x_1 = x_2 $
2			0	$x_1 \in \mathbb{I}, x_2 \in \mathbb{I}$ και $x_1 = -x_2$
	-	+	+	$x_1, x_2 \in (\mathbb{C} - \mathbb{R})$ και $x_1 = \bar{x}_2 \Rightarrow x_1 = x_2 $
$+\infty$				

Σημ. C σύνολο μιγαδικών, I σύνολο καθαρών φανταστικών.

105. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΝΙΣΩΣΕΩΝ Β' ΒΑΘΜΟΥ

Για να διερευνήσουμε μία άνισωση β' βαθμού παραμετρική, δηλ. να βρούμε τα σύνολα λύσεων της κατά τις διάφορες τιμές της παραμέτρου λ , πρέπει να έχουμε υπόψη τό γνωστό πίνακα (§ 99).

Παράδειγμα: Να διερευνηθεί ή άνισωση

$$\varphi(x) \equiv (3\lambda - 2)x^2 - (\lambda - 1)x + 2(\lambda - 1) < 0, \text{ όταν } \lambda \in \mathbb{R}.$$

Λύση: Ξεετάζουμε τό σημείο τών $\Delta(\lambda)$ και $\alpha(\lambda)$ κατά τις διάφορες τιμές του λ . Έτσι έχουμε:

$$\Delta(\lambda) = (\lambda - 1)^2 - 8(\lambda - 1)(3\lambda - 2) = (\lambda - 1)(-23\lambda + 15)$$

Τό σημείο της $\Delta(\lambda)$ δίνεται από τον πίνακα :

λ	$-\infty$	$\frac{15}{23}$	1	$+\infty$
$\Delta(\lambda)$	-	0	+	0
				-

$\alpha(\lambda) = 3\lambda - 2$. Έχει σημείο θετικό για $\lambda > \frac{2}{3}$, αρνητικό για $\lambda < \frac{2}{3}$ και μηδενίζεται για $\lambda = \frac{2}{3}$. Τα παραπάνω βοηθούν στη σύνταξη του πίνακα :

Διερεύνηση τής άνισ. $\varphi(x) \equiv (3\lambda - 2)x^2 - (\lambda - 1)x + 2(\lambda - 1) < 0$			
λ	$\Delta(\lambda)$	$\alpha(\lambda)$	Σύνολο λύσεων τής $\varphi(x) < 0$
$-\infty$	-	-	$\{ x/x \in \mathbb{R} \}$
$\frac{15}{23}$	0	-	$\left\{ x \in \mathbb{R}/x \neq -\frac{\beta}{2\alpha} = 4 \right\}$
	+	-	$x_2 < x_1, \{ x \in \mathbb{R}/-\infty < x < x_2, x_1 < x < +\infty \}$
$\frac{2}{3}$		0	άνισηση πρωτοβάθμια, $\{ x \in \mathbb{R}/-\infty < x < 2 \}$
	+	+	$x_2 < x_1, \{ x \in \mathbb{R}/x_2 < x < x_1 \}$
1	0		$\{ \} = \emptyset$
	-	+	$\{ \} = \emptyset$
$+\infty$			

Σημείωση. Τα x_1, x_2 είναι εκφράσεις του λ και μεταβάλλονται μαζί με τό λ .

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

339) Νά διερευνηθούν οι ακόλουθες εξισώσεις και άνισησεις, όταν $\lambda \in \mathbb{R}$:

1) $(2\lambda - 3)x^2 + 2(6\lambda - 5)x + 18\lambda + 25 = 0$

2) $(\lambda - 5)x^2 - 4\lambda x + \lambda - 2 = 0,$ 3) $(\lambda + 1)x^2 - 3\lambda x + 4\lambda > 0$

4) $x^2 + 2(2\lambda - 1)x + 3\lambda^2 - 5 > 0,$ 5) $(\lambda + 2)x^2 + 12x + 10 - 6\lambda \leq 0$

340) Νά άποδειχθεί ότι τό κλάσμα $\frac{x^2 - 5x + 6}{x - 2}$ παίρνει κάθε πραγματική τιμή, όταν $\mathbb{R} \in x$.

341) Άν x πραγματικός αριθμός, νά άποδειχθεί ότι τό κλάσμα $(x^2 + 2x - 11)/(2(x - 3))$ δέν μπορεί νά πάρει τιμές του διαστήματος (2, 6).

ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΔΥΟ Β'ΒΑΘΜΙΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ, ΩΣΤΕ ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥΣ ΝΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΟΥΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

106. Δίνονται δύο εξισώσεις $\varphi_1(x) \equiv a_1x^2 + \beta_1x + \gamma_1 = 0$ και $\varphi_2(x) \equiv a_2x^2 + \beta_2x + \gamma_2 = 0$ ($a_1 \neq 0, a_2 \neq 0$) με πραγματικούς συντελεστές και ρίζες αντίστοιχα (x_1, x_2) και (ρ_1, ρ_2) . Ζητούνται οι σχέσεις μεταξύ των συντελεστών των εξισώσεων, ώστε νά έχουν ρίζες :

1. Άνάλογες με λόγο λ .

Έχουμε: $\frac{x_1}{\rho_1} = \frac{x_2}{\rho_2} = \lambda \Leftrightarrow x_1 = \lambda\rho_1$ και $x_2 = \lambda\rho_2 \Rightarrow x_1 + x_2 = \lambda(\rho_1 + \rho_2)$

καί $x_1 x_2 = \rho_1 \rho_2 \lambda^2$ ή $-\frac{\beta_1}{\alpha_1} = \lambda \left(-\frac{\beta_2}{\alpha_2}\right)$ καί $\frac{\gamma_1}{\alpha_1} = \frac{\gamma_2}{\alpha_2} \lambda^2$ ή

$$\frac{\alpha_1}{\alpha_2} = \frac{\beta_1}{\lambda \beta_2} \quad \text{καί} \quad \frac{\alpha_1}{\alpha_2} = \frac{\gamma_1}{\gamma_2 \lambda^2} \Rightarrow \quad \boxed{\frac{\alpha_1}{\alpha_2} = \frac{\beta_1}{\beta_2 \lambda} = \frac{\gamma_1}{\gamma_2 \lambda^2}} \quad (1)$$

***Αντιστρόφως.** *Αν ισχύει ή συνθήκη (1), τότε οί εξισώσεις έχουν ρίζες ανάλογες μέ λόγο λ. Πράγματι, αν θέσουμε τούς λόγους (1) ίσον μέ κ, έχουμε:

$$\alpha_1 = \kappa \alpha_2, \beta_1 = \kappa \beta_2 \lambda, \gamma_1 = \kappa \gamma_2 \lambda^2, \text{ όπότε ή εξίσωση } \varphi_1(x) = 0 \text{ γίνεται}$$

$$\varphi_1(x) \equiv \kappa \alpha_2 x^2 + \kappa \beta_2 \lambda x + \kappa \gamma_2 \lambda^2 = 0 \Leftrightarrow \alpha_2 x^2 + \beta_2 \lambda x + \gamma_2 \lambda^2 = 0.$$

$$\text{Αυτή έχει ρίζες } x_1 = \lambda \frac{-\beta_2 + \sqrt{\beta_2^2 - 4\alpha_2 \gamma_2}}{2\alpha_2} \quad \text{ή} \quad x_1 = \lambda \rho_1 \Rightarrow \frac{x_1}{\rho_1} = \lambda$$

$$x_2 = \lambda \frac{-\beta_2 - \sqrt{\beta_2^2 - 4\alpha_2 \gamma_2}}{2\alpha_2} \quad \text{ή} \quad x_2 = \lambda \rho_2 \Rightarrow \frac{x_2}{\rho_2} = \lambda.$$

$$\text{*Αρα } \frac{x_1}{\rho_1} = \frac{x_2}{\rho_2} = \lambda.$$

*Ωστε ή συνθήκη (1) είναι ίκανή καί άναγκαία.

2. *Αντίθετες. *Έχουμε: $x_1 = -\rho_1$ καί $x_2 = -\rho_2 \Leftrightarrow$

$$\left. \begin{array}{l} x_1 + x_2 = -(\rho_1 + \rho_2) \\ x_1 x_2 = \rho_1 \rho_2 \end{array} \right\} \text{ ή } \left. \begin{array}{l} -\frac{\beta_1}{\alpha_1} = -\left(-\frac{\beta_2}{\alpha_2}\right) \\ \frac{\gamma_1}{\alpha_1} = \frac{\gamma_2}{\alpha_2} \end{array} \right\} \Rightarrow \boxed{\frac{\alpha_1}{\alpha_2} = -\frac{\beta_1}{\beta_2} = \frac{\gamma_1}{\gamma_2}} \quad (2)$$

***Αντιστρόφως.** *Αν ισχύει ή συνθήκη (2), τότε οί εξισώσεις έχουν ρίζες αντίθετες. Πράγματι, αν θέσουμε τούς λόγους (2) ίσον μέ κ, έχουμε:

$$\alpha_1 = \kappa \alpha_2, \beta_1 = -\kappa \beta_2, \gamma_1 = \kappa \gamma_2,$$

$$\text{όπότε } \varphi_1(x) \equiv \kappa \alpha_2 x^2 - \kappa \beta_2 x + \kappa \gamma_2 = 0 \Leftrightarrow \alpha_2 x^2 - \beta_2 x + \gamma_2 = 0.$$

$$\text{Αυτή έχει ρίζες } x_1 = \frac{\beta_2 + \sqrt{\beta_2^2 - 4\alpha_2 \gamma_2}}{2\alpha_2}, x_2 = \frac{\beta_2 - \sqrt{\beta_2^2 - 4\alpha_2 \gamma_2}}{2\alpha_2}$$

Αυτές οί ρίζες είναι αντίθετες πρός τίς ρίζες ρ_1, ρ_2 τής εξίσ. $\varphi_2(x) \equiv \alpha_2 x^2 + \beta_2 x + \gamma_2 = 0$.

*Ωστε ή συνθήκη (2) είναι ίκανή καί άναγκαία.

*Η πρόταση αυτή μπορεί νά θεωρηθεί σάν πόρισμα τής περιπτώσεως πού οί ρίζες είναι ανάλογες μέ λόγο $\lambda = -1$.

3. *Αντίστροφες. *Έχουμε: $x_1 = \frac{1}{\rho_1}$ καί $x_2 = \frac{1}{\rho_2} \Rightarrow$

$$\left. \begin{array}{l} x_1 + x_2 = \frac{1}{\rho_1} + \frac{1}{\rho_2} \\ x_1 x_2 = \frac{1}{\rho_1 \rho_2} \end{array} \right\} \text{ ή } \left. \begin{array}{l} x_1 + x_2 = \frac{\rho_1 + \rho_2}{\rho_1 \rho_2} \\ x_1 x_2 = \frac{1}{\rho_1 \rho_2} \end{array} \right\} \text{ ή } \left. \begin{array}{l} -\frac{\beta_1}{\alpha_1} = -\frac{\beta_2}{\gamma_2} \\ \frac{\gamma_1}{\alpha_1} = \frac{\alpha_2}{\gamma_2} \end{array} \right\} \text{ ή } \left. \begin{array}{l} \frac{\alpha_1}{\gamma_2} = \frac{\beta_1}{\beta_2} \\ \frac{\gamma_1}{\alpha_1} = \frac{\gamma_1}{\alpha_2} \end{array} \right\} \Rightarrow$$

$$\boxed{\frac{\alpha_1}{\gamma_2} = \frac{\beta_1}{\beta_2} = \frac{\gamma_1}{\alpha_2}}$$

(3). *Η σχέση (3) είναι αυτή πού ζητούμε.

Ἀντιστροφή. Ἄν ἰσχύει ἡ συνθήκη (3), τότε οἱ ἐξισώσεις ἔχουν ρίζες ἀντίστροφες. Πράγματι, ἂν θέσουμε τοὺς λόγους (3) ἴσον μὲ κ, ἔχουμε:

$$\alpha_1 = \kappa \gamma_2, \beta_1 = \kappa \beta_2, \gamma_1 = \kappa \alpha_2,$$

ὁπότε $\varphi_1(x) \equiv \kappa \gamma_2 x^2 + \kappa \beta_2 x + \kappa \alpha_2 = 0 \Leftrightarrow \gamma_2 x^2 + \beta_2 x + \alpha_2 = 0$.

$$\text{Αὕτῃ ἔχει ρίζες } x_1 = \frac{-\beta_2 + \sqrt{\beta_2^2 - 4\alpha_2\gamma_2}}{2\gamma_2}, x_2 = \frac{-\beta_2 - \sqrt{\beta_2^2 - 4\alpha_2\gamma_2}}{2\gamma_2}$$

$$\text{Οἱ ρίζες τῆς } \varphi_2(x) = 0 \text{ εἶναι } \rho_1 = \frac{-\beta_2 - \sqrt{\beta_2^2 - 4\alpha_2\gamma_2}}{2\alpha_2}, \rho_2 = \frac{-\beta_2 + \sqrt{\beta_2^2 - 4\alpha_2\gamma_2}}{2\alpha_2}$$

Ἔτσι ἔχουμε

$$x_1 \rho_1 = \frac{\beta_2^2 - (\beta_2^2 - 4\alpha_2\gamma_2)}{4\alpha_2\gamma_2} = 1 \Rightarrow x_1 = \frac{1}{\rho_1}. \text{ Ἐπίσης } x_2 = \frac{1}{\rho_2}.$$

Ἄρα: Οἱ ἰκανές καὶ ἀναγκαῖες συνθήκες, ὥστε οἱ ἐξισώσεις $\varphi_1(x) = 0$ καὶ $\varphi_2(x) = 0$, νὰ ἔχουν ρίζες 1) ἀνάλογες μὲ λόγο λ, 2) ἀντίθετες, καὶ 3) ἀντίστροφες, εἶναι ἀντίστοιχα οἱ (1), (2), (3).

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

342) Μὲ ποιές τιμές τῶν λ καὶ μ οἱ ἐξισώσεις $\varphi_1(x) \equiv (\lambda + 2)x^2 - (\mu + 1)x - 3 = 0$ καὶ $\varphi_2(x) \equiv (\mu - 1)x^2 + 4\lambda x + 2 = 0$ ἔχουν ρίζες α) ἀνάλογες μὲ λόγο 2, β) ἀντίθετες καὶ γ) ἀντίστροφες;

343) Νὰ σχηματισθεῖ ἐξίσωση β' βαθμοῦ μὲ ρίζες τὰ τετράγωνα τῶν ριζῶν τῆς $x^2 + \lambda x + \mu = 0$. Ἐπειτα νὰ βρεθοῦν οἱ πραγματικές τιμές τῶν λ καὶ μ, ὥστε οἱ δύο ἐξισώσεις νὰ ἔχουν ρίζες α) ἀνάλογες μὲ λόγο 2, β) ἀντίθετες καὶ γ) ἀντίστροφες.

344) Νὰ σχηματισθεῖ ἐξίσωση μὲ ρίζες $x_1 + \frac{1}{x_1}$ καὶ $x_2 + \frac{1}{x_2}$, ὅπου x_1, x_2 ρίζες τῆς $ax^2 + \beta x + \gamma = 0$. Ἐπειτα νὰ βρεθεῖ ἡ συνθήκη, ὥστε οἱ δύο ἐξισώσεις νὰ ἔχουν ρίζες ἀνάλογες μὲ λόγο κ.

107. ΑΠΑΛΕΪΦΟΥΣΑ ΔΥΟ ΤΡΙΩΝΥΜΩΝ Β' ΒΑΘΜΟΥ.

Ἄν δοθοῦν δύο τριώνυμα $\varphi_1(x) \equiv \alpha_1 x^2 + \beta_1 x + \gamma_1$ καὶ $\varphi_2(x) \equiv \alpha_2 x^2 + \beta_2 x + \gamma_2$ μὲ πραγματικούς συντελεστές, ὅπου $\alpha_1 \neq 0, \alpha_2 \neq 0$, καὶ ρίζες ἀντίστοιχα (x_1, x_2) καὶ (ρ_1, ρ_2) , τότε θὰ ὀνομάζουμε τὴν πραγματικὴ παράσταση

$$R = (\alpha_1 \gamma_2 - \alpha_2 \gamma_1)^2 - (\alpha_1 \beta_2 - \alpha_2 \beta_1) (\beta_1 \gamma_2 - \beta_2 \gamma_1)$$

ἀπαλείφουσα τῶν δύο τριωνύμων.

Ἡ ἐξέταση τῶν ἰδιοτήτων τῆς ἀπαλείφουσας R δύο τριωνύμων β' βαθμοῦ βοηθᾷ στὴν ἐπίλυση πολλῶν σπουδαίων προβλημάτων.

α) Μορφές τῆς ἀπαλείφουσας R

Ἄν δοθοῦν τὰ παραπάνω τριώνυμα, ἡ ἀπαλείφουσα μπορεῖ νὰ πάρει τίς ἀκόλουθες μορφές:

$$1\eta) R = \alpha_1^2 \varphi_2(x_1) \varphi_2(x_2) = \alpha_2^2 \varphi_1(\rho_1) \varphi_1(\rho_2)$$

Πράγματι. Σχηματίζουμε τό γινόμενο

$$\begin{aligned} \varphi_2(x_1) \varphi_2(x_2) &= (\alpha_2 x_1^2 + \beta_2 x_1 + \gamma_2) (\alpha_2 x_2^2 + \beta_2 x_2 + \gamma_2) = \\ &= \alpha_2^2 x_1^2 x_2^2 + \alpha_2 \beta_2 x_1 x_2 (x_1 + x_2) + \alpha_2 \gamma_2 (x_1^2 + x_2^2) + \beta_2^2 x_1 x_2 + \\ &+ \beta_2 \gamma_2 (x_1 + x_2) + \gamma_2^2 = \\ &= \frac{1}{\alpha_1^2} [(\alpha_1 \gamma_2 - \alpha_2 \gamma_1)^2 - (\alpha_1 \beta_2 - \alpha_2 \beta_1) (\beta_1 \gamma_2 - \beta_2 \gamma_1)] = \frac{1}{\alpha_1^2} \cdot R \end{aligned}$$

*Αρα $R = \alpha_1^2 \varphi_2(x_1) \varphi_2(x_2)$, επίσης $R = \alpha_2^2 \varphi_1(\rho_1) \varphi_1(\rho_2)$

2α $R = \alpha_1^2 \alpha_2^2 (x_1 - \rho_1) (x_2 - \rho_1) (x_1 - \rho_2) (x_2 - \rho_2)$

3η $R = \frac{1}{4} [(2\alpha_1 \gamma_2 + 2\alpha_2 \gamma_1 - \beta_1 \beta_2)^2 - \Delta_1 \Delta_2]$

δπου $\Delta_1 = \beta_1^2 - 4\alpha_1 \gamma_1$, $\Delta_2 = \beta_2^2 - 4\alpha_2 \gamma_2$

Οί μαθητές μπορούν εύκολα νά επαληθεύσουν τίς μορφές τῆς R 2η καί 3η.

β) Ἰδιότητες τῆς ἀπαλείφουσας R

1. Ἄν ἡ ἀπαλείφουσα $R = 0$, τότε ἀπό τήν $R = \alpha_2^2 \varphi_1(\rho_1) \varphi_1(\rho_2)$ ἔχουμε $\alpha_2^2 \varphi_1(\rho_1) \varphi_1(\rho_2) = 0 \Leftrightarrow \varphi_1(\rho_1) = 0 \vee \varphi_1(\rho_2) = 0$, ὁπότε, ἂν $\varphi_1(\rho_1) = 0$ καί ἐπειδή $\varphi_2(\rho_1) = 0$ [ρ_1 εἶναι ρίζα τοῦ $\varphi_2(x)$], ἔπεται ὅτι ἡ ρ_1 εἶναι κοινή ρίζα τῶν $\varphi_1(x)$ καί $\varphi_2(x)$. Ἄν $\varphi_1(\rho_2) = 0$ καί $\varphi_1(\rho_2) = 0$, τότε τά $\varphi_1(x)$ καί $\varphi_2(x)$ ἔχουν καί τίς δύο ρίζες κοινές. Στήν περίπτωση αὐτή θά ἔχουμε:

$$\frac{\alpha_1}{\alpha_2} = \frac{\beta_1}{\beta_2} = \frac{\gamma_1}{\gamma_2}, \text{ γιατί } x_1 + x_2 = \rho_1 + \rho_2 \text{ καί } x_1 x_2 = \rho_1 \rho_2 \Rightarrow -\frac{\beta_1}{\alpha_1} = -\frac{\beta_2}{\alpha_2} \text{ καί } \frac{\gamma_1}{\alpha_1} = \frac{\gamma_2}{\alpha_2} \Rightarrow \frac{\alpha_1}{\alpha_2} = \frac{\beta_1}{\beta_2} = \frac{\gamma_1}{\gamma_2}$$

*Ἀντίστροφα. Ἄν τά τριώνυμα ἔχουν κοινή ἢ κοινές ρίζες, τότε εἶναι φανερό ὅτι $R = 0$.

Ἔστω: Ἡ ἰκανή καί ἀναγκαία συνθήκη, γιά νά ἔχουν τά τριώνυμα $\varphi_1(x)$ καί $\varphi_2(x)$ μία τό λιγότερο κοινή ρίζα, εἶναι νά ἰσοῦται ἡ ἀπαλείφουσα τους μέ 0.

2. Ἄν ἡ ἀπαλείφουσα $R = 0$ καί $\alpha_1 \beta_2 - \alpha_2 \beta_1 \neq 0$, τότε εἶδαμε ὅτι τά τριώνυμα $\varphi_1(x)$ καί $\varphi_2(x)$ ἔχουν μία τό λιγότερο κοινή ρίζα, δέν μποροῦν ὁμως νά ἔχουν καί τίς δύο ρίζες κοινές, γιατί τότε θά ἦταν $\frac{\alpha_1}{\alpha_2} = \frac{\beta_1}{\beta_2} = \frac{\gamma_1}{\gamma_2} \Rightarrow \alpha_1 \beta_2 - \alpha_2 \beta_1 = 0$. Αὐτό εἶναι ἄτοπο, γιατί εἶναι $\alpha_1 \beta_2 - \alpha_2 \beta_1 \neq 0$.

*Ἀντίστροφα. Ἄν τά τριώνυμα ἔχουν μία μόνο κοινή ρίζα, τήν x_0 , τότε :

$$\left. \begin{aligned} \alpha_1 x_0^2 + \beta_1 x_0 + \gamma_1 = 0 \\ \alpha_2 x_0^2 + \beta_2 x_0 + \gamma_2 = 0 \end{aligned} \right\} \Leftrightarrow x_0^2 = \frac{\beta_1 \gamma_2 - \gamma_1 \beta_2}{\alpha_1 \beta_2 - \alpha_2 \beta_1} \text{ καί } x_0 = \frac{\gamma_1 \alpha_2 - \alpha_1 \gamma_2}{\alpha_1 \beta_2 - \alpha_2 \beta_1}$$

ὁπότε ἔχουμε $\frac{\beta_1 \gamma_2 - \gamma_1 \beta_2}{\alpha_1 \beta_2 - \alpha_2 \beta_1} = \left(\frac{\gamma_1 \alpha_2 - \alpha_1 \gamma_2}{\alpha_1 \beta_2 - \alpha_2 \beta_1} \right)^2$ καί $\alpha_1 \beta_2 - \alpha_2 \beta_1 \neq 0$ καί συνεπῶς

$(\gamma_1 \alpha_2 - \alpha_1 \gamma_2)^2 - (\alpha_1 \beta_2 - \alpha_2 \beta_1) (\beta_1 \gamma_2 - \gamma_1 \beta_2) = 0$ καί $\alpha_1 \beta_2 - \alpha_2 \beta_1 \neq 0$. Ἡ κοινή αὐτή ρίζα x_0 εἶναι πραγματική, γιατί, ἂν ἦταν μιγαδική τῆς μορφῆς $\kappa + \lambda i$,

τότε τὰ τριώνυμα θά είχαν κοινή ρίζα και τή συζυγή $\kappa - \lambda$ και συνεπώς θά είχαν δύο κοινές ρίζες, άλλ' αυτό είναι άτοπο.

Ώστε : 'Η ίκανή και άναγκαία συνθήκη για να έχουν τὰ τριώνυμα $\varphi_1(x)$ και $\varphi_2(x)$ μιά και μόνη πραγματική κοινή ρίζα, τήν $x_0 = \frac{\gamma_1\alpha_2 - \alpha_1\gamma_2}{\alpha_1\beta_2 - \alpha_2\beta_1}$, είναι ή άπαλείφουσά τους $R = 0$ και $\alpha_1\beta_2 - \alpha_2\beta_1 \neq 0$.

Σημείωση. Άλλες ιδιότητες τής άπαλείφουσας R , πολύ χρήσιμες, θά εξετασθούν σε άλλη τάξη.

Παράδειγμα : Μέ ποιές τιμές του λ οι εξισώσεις

$\varphi_1(x) \equiv 2x^2 - x - 3 = 0$ και $\varphi_2(x) \equiv x^2 - (2\lambda - 3)x + 4\lambda = 0$ έχουν μιά και μόνη πραγματική κοινή ρίζα; Νά βρεθεί ή ρίζα αυτή.

Λύση : Πρέπει $R = 0$ και $\alpha_1\beta_2 - \alpha_2\beta_1 \neq 0$

Έχουμε: $\alpha_1\beta_2 - \alpha_2\beta_1 = -2(2\lambda - 3) - 1(-1) = -4\lambda + 7 \neq 0 \Leftrightarrow \lambda \neq \frac{7}{4}$

$$\beta_1\gamma_2 - \beta_2\gamma_1 = -1 \cdot 4\lambda + (2\lambda - 3)(-3) = -10\lambda + 9$$

$$\alpha_1\gamma_2 - \alpha_2\gamma_1 = 2 \cdot 4\lambda - 1 \cdot (-3) = 8\lambda + 3$$

Άρα $R = (8\lambda + 3)^2 - (-4\lambda + 7)(-10\lambda + 9) = 0 \Leftrightarrow 12\lambda^2 + 77\lambda - 27 = 0$, όπότε

$$\lambda_1 = \frac{1}{3}, \lambda_2 = -\frac{27}{4}$$

Ή κοινή ρίζα μέ $\lambda_1 = \frac{1}{3}$ είναι $x_0 = \frac{-(8\lambda + 3)}{-4\lambda + 7} = -1$

και μέ $\lambda_2 = -\frac{27}{4}$ είναι: $x_0 = \frac{3}{2}$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

345) Ποιά είναι ή συνθήκη μεταξύ τών α και β , ώστε τὰ τριώνυμα $\varphi_1(x) \equiv \alpha x^2 + x + \beta$ και $\varphi_2(x) \equiv x^2 + \alpha x + \beta$ να έχουν μιά μόνο κοινή ρίζα; Νά βρεθεί αυτή.

346) Άν οι εξισώσεις $x^2 + px + \kappa = 0$ και $x^2 + kx + \lambda = 0$ έχουν μιά μόνο κοινή ρίζα, νά άποδειχθεί ότι: $(\kappa - \lambda)^2 = (\rho\lambda - \kappa^2)(\kappa - \rho)$.

347) Μέ ποιές τιμές τών μ και ν τὰ τριώνυμα $\varphi_1(x) = \mu x^2 - (\mu - 1)x - 5$ και $(\nu - 2)x^2 - 3\nu x + 1$ έχουν τής ίδιες ρίζες;

348) Άν x_0 είναι ή κοινή ρίζα τών δύο τριωνύμων $\varphi_1(x) \equiv \alpha_1 x^2 + \beta_1 x + \gamma_1$ και $\varphi_2(x) \equiv \alpha_2 x^2 + \beta_2 x + \gamma_2$ και R ή άπαλείφουσά τους, νά άποδειχθεί ότι:

$$R = \frac{(\alpha_1\beta_2 - \alpha_2\beta_1)^2}{\alpha_1} \cdot \varphi_1(x_0) = \frac{(\alpha_1\beta_2 - \alpha_2\beta_1)^2}{\alpha_2} \cdot \varphi_2(x_0)$$

349) Νά άποδειχθεί ότι τὰ τριώνυμα $\varphi_1(x) \equiv \lambda x^2 - (\lambda\mu + 1)x + \mu$ και $\varphi_2(x) \equiv \lambda\mu x^2 + (\lambda^2 - \mu)x - \lambda = 0$ έχουν κοινή ρίζα και νά βρεθεί αυτή.

350) Νά άποδειχθεί ότι οι εξισώσεις $x^2 + \alpha x - 3 = 0$ και $x^2 - 2\alpha x + 3 = 0$ δέν μπορεί να έχουν και τής δύο ρίζες κοινές. Νά βρεθούν οι τιμές του α , ώστε αυτές να έχουν κοινή ρίζα.

ΤΟ ΤΡΙΩΝΥΜΟ $\varphi(x) \equiv ax^2 + \beta x + \gamma$ ΩΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ x ΣΤΟ \mathbb{R}

**108. 1) ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΣΤΟ \mathbb{R}
(μέ απλό τρόπο δοσμένες)**

1) Μεταβλητές πού τείνουν στό 0 ή ∞ ή σέ σταθερό άριθμό $a \in \mathbb{R}$.

Μιά μεταβλητή x του συνόλου \mathbb{R} λέμε: α) ότι τείνει στό 0, καί συμβολίζουμε $x \rightarrow 0$, όταν μπορεί νά γίνει καί νά μείνει άπολύτως μικρότερη άπό κάθε άριθμό $\varepsilon > 0$, όσο θέλουμε μικρό, β) ότι τείνει στό ∞ (άπειρο θετικό ή άρνητικό), καί συμβολίζουμε $x \rightarrow \infty$, όταν μπορεί νά γίνει καί νά μείνει άπολύτως μεγαλύτερη άπό κάθε άριθμό $M > 0$, όσο θέλουμε μεγάλο καί γ) ότι τείνει στό σταθερό άριθμό $a \in \mathbb{R}$, καί συμβολίζουμε $x \rightarrow a$, όταν μπορεί ή διαφορά $x - a$ νά γίνει καί νά μείνει άπολύτως μικρότερη άπό κάθε άριθμό $\varepsilon > 0$, όσο θέλουμε μικρό.

2) Μεταβολές μιās συναρτήσεως στό \mathbb{R} .

Έστω μιá συνάρτηση $\psi = \varphi(x)$, μέ σύνολο όρισμοϋ τό $\Sigma \subseteq \mathbb{R}$, καί x_1, x_2 δύο όποιοσδήποτε άνισες τιμές τής μεταβλητής x του συνόλου Σ (ή ύποσυνόλου του). Θά λέμε ότι ή συνάρτηση $\psi = \varphi(x)$ είναι:

α) γνησίως αύξουσα στό Σ , όταν $x_1 < x_2 \Leftrightarrow \varphi(x_1) < \varphi(x_2)$,

β) γνησίως φθίνουσα στό Σ , όταν: $x_1 < x_2 \Leftrightarrow \varphi(x_1) > \varphi(x_2)$,

γ) σταθερή στό Σ , όταν $x_1 < x_2 \Leftrightarrow \varphi(x_1) = \varphi(x_2)$.

Είναι φανερό, ότι τή φορά μεταβολής τής συναρτήσεως $\psi = \varphi(x)$ τήν καθορίζει τό σημείο του λόγου $\frac{\varphi(x_1) - \varphi(x_2)}{x_1 - x_2} = k$. Άν δηλαδή ό λόγος k είναι θετικός, ή συνάρτηση είναι γνησίως αύξουσα, άν ό k είναι άρνητικός, ή συνάρτηση είναι γνησίως φθίνουσα, καί άν $k = 0$, ή συνάρτηση είναι σταθερή.

Σημείωση. Άν στήν (α) περίπτωση είναι:

$x_1 < x_2 \Rightarrow \varphi(x_1) \leq \varphi(x_2)$, τότε ή $\varphi(x)$ λέγεται **αύξουσα**.

Έπίσης, άν στή (β) περίπτωση είναι:

$x_1 < x_2 \Rightarrow \varphi(x_1) \geq \varphi(x_2)$, τότε ή $\varphi(x)$ λέγεται **φθίνουσα**.

Άν στό σύνολο Σ (ή σέ κάποιο ύποσύνολο του Σ) ή συνάρτηση $\psi = \varphi(x)$ είναι γνησίως αύξουσα ή γνησίως φθίνουσα, λέγεται **γνησίως μονότονη**. Άν ή συνάρτηση είναι αύξουσα ή φθίνουσα λέγεται **μονότονη**.

3) Η έννοια τής συνέχειας μιās συναρτήσεως στό \mathbb{R} .

Η λέξη **συνέχεια** χρησιμοποιείται πολύ συχνά στόν καθημερινό λόγο καί σημαίνει ότι κάτι συμβαίνει ή ύπάρχει έξακολουθητικά καί χωρίς διακοπή. Η μαθηματοποίηση της όμως (καί άπ' αυτή ή λέξη άσυνέχεια) έγινε χωρίς νά δένεται στενά μέ τήν οϋσία της. Τό ίδιο, άλλωστε, έγινε καί μέ τίς λέξεις **σύνολο** καί **συνάρτηση**. Τό περιεχόμενο των λέξεων **συνέχεια** - **άσυνέχεια**, στό μαθηματικά, δίνεται σέ συνδυασμό μέ τήν έννοια τής συναρτήσεως καί των μεταβολών της στό \mathbb{R} .

Όρισμοί: 1) 'Η συνάρτηση $\psi = \varphi(x)$, όρισμένη σ' ένα σύνολο $\Sigma \subseteq \mathbb{R}$, λέγεται **συνεχής** σημείο $x_0 \in \Sigma$, όταν τείνει στην τιμή $\varphi(x_0)$, καθώς ή μεταβλητή x τείνει στην τιμή x_0 .

$$\left. \begin{array}{l} \text{Δηλαδή: } x \rightarrow x_0 \\ x_0 \in \Sigma \end{array} \right\} \Rightarrow \varphi(x) \rightarrow \varphi(x_0)$$

2) "Αν ή συνάρτηση $\psi = \varphi(x)$ είναι συνεχής σέ κάθε σημείο $x_0 \in \Sigma$, τότε λέμε ότι ή $\varphi(x)$ είναι **συνεχής στό σύνολο Σ** ή πλιό άπλά ή $\varphi(x)$ είναι **συνεχής**.

3) Μιά συνάρτηση $\psi = \varphi(x)$, όρισμένη σ' ένα σύνολο $\Sigma \subseteq \mathbb{R}$, λέγεται **άσυνεχής** σέ κάποιο σημείο $x_0 \in \Sigma$, τότε, και μόνο τότε, όταν δέν είναι συνεχής στό x_0 .

Ιδιότητες. Παρακάτω δίνονται μερικές βασικές ιδιότητες τών συνεχών συναρτήσεων, χωρίς άπόδειξη. "Εστω $\psi = \varphi(x)$ και $\psi = f(x)$ συναρτήσεις μέ κοινό πεδίο όρισμού ένα διάστημα $\Sigma \subseteq \mathbb{R}$. "Αν οι συναρτήσεις φ και f είναι συνεχείς στό Σ , τότε: 1) τό άθροισμα $\varphi + f$ και τό γινόμενο $\varphi \cdot f$ είναι συναρτήσεις συνεχείς στό Σ και 2) τό πηλίκο $\frac{\varphi}{f}$, όπου $f(x) \neq 0 \forall x \in \Sigma$, είναι συνάρτηση συνεχής στό Σ .

109. II) Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ $\varphi(x) = ax^2 + bx + \gamma$ ΣΤΟ \mathbb{R} .

A) 'Η συνάρτηση $\varphi(x)$ είναι συνεχής στό \mathbb{R} .

Τό πεδίο όρισμού τής $\varphi(x)$ είναι τό σύνολο \mathbb{R} . "Εστω $x_0 \in \mathbb{R}$ μία τιμή τής μεταβλητής x και $\varphi(x_0) = ax_0^2 + bx_0 + \gamma$ ή άντίστοιχη τιμή τής συναρτήσεως. Παίρνουμε και τήν τιμή $x_0 + \epsilon$, όπου $\epsilon > 0$ και όσο θέλουμε μικρός. Τότε ή άντίστοιχη τιμή τής συναρτήσεως είναι:

$$\varphi(x_0 + \epsilon) = a(x_0 + \epsilon)^2 + b(x_0 + \epsilon) + \gamma$$

Σχηματίζουμε τή διαφορά

$$\begin{aligned} \varphi(x_0 + \epsilon) - \varphi(x_0) &= a(x_0 + \epsilon)^2 + b(x_0 + \epsilon) + \gamma - (ax_0^2 + bx_0 + \gamma) = \\ &= 2ax_0\epsilon + a\epsilon^2 + b\epsilon \end{aligned}$$

Κάθε όρος του β' μέλους έχει άπόλυτη τιμή όσο θέλουμε μικρή, γιατί ε είναι άριθμός όσο θέλουμε μικρός. "Αρα ή διαφορά $\varphi(x_0 + \epsilon) - \varphi(x_0)$ μπορεί νά γίνει και νά μείνει άπολύτως μικρότερη άπό κάθε άριθμό $\epsilon' > 0$ όσο θέλουμε μικρό, όπότε: $\varphi(x_0 + \epsilon) \rightarrow \varphi(x_0)$. Και έπειδή $x_0 + \epsilon \rightarrow x_0$, γιατί $\epsilon > 0$ και όσο θέλουμε μικρός, έπεται ότι ή συνάρτηση $\psi = \varphi(x)$ είναι συνεχής στην τιμή x_0 . 'Η τιμή x_0 είναι όποιαδήποτε άπό τό σύνολο \mathbb{R} και έπομένως ή συνάρτηση $\psi = \varphi(x)$ είναι συνεχής στό \mathbb{R} .

B) Μεταβολές τής $\varphi(x) = ax^2 + bx + \gamma$ στό \mathbb{R}

"Εστω $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ ($x_1 < x_2$) δύο τιμές τής μεταβλητής x και $\varphi(x_1), \varphi(x_2)$ οι άντίστοιχες τιμές τής συναρτήσεως. Σχηματίζουμε τό λόγο $k = \frac{\varphi(x_1) - \varphi(x_2)}{x_1 - x_2} =$

$$= \frac{ax_1^2 + bx_1 + \gamma - ax_2^2 - bx_2 - \gamma}{x_1 - x_2} = \frac{a(x_1^2 - x_2^2) + b(x_1 - x_2)}{x_1 - x_2} = a(x_1 + x_2) + b =$$

$$= a \left(x_1 + x_2 + \frac{\beta}{\alpha} \right).$$

Ἡ τιμὴ $-\frac{\beta}{2\alpha}$ διαμερίζει τὸ σύνολο \mathbb{R} στὰ ὑποσύνολα $(-\infty, -\frac{\beta}{2\alpha}]$
καὶ $[-\frac{\beta}{2\alpha}, +\infty)$.

Ἐλέγχοντας τὸ σημεῖο τοῦ λόγου k διακρίνουμε τὶς περιπτώσεις:

α) Ἄν $x \in (-\infty, -\frac{\beta}{2\alpha}]$, δηλαδή $x_1 < x_2 \leq -\frac{\beta}{2\alpha}$, τότε

$$\left. \begin{array}{l} x_1 < -\frac{\beta}{2\alpha} \\ x_2 \leq -\frac{\beta}{2\alpha} \end{array} \right\} \Rightarrow x_1 + x_2 < -\frac{\beta}{\alpha} \Rightarrow x_1 + x_2 + \frac{\beta}{\alpha} < 0, \quad \text{ὅπότε}$$

μέ $\alpha > 0$ ἔχουμε $k < 0$ καὶ ἄρα ἡ $\varphi(x)$ εἶναι **γνησίως φθίνουσα**
καὶ μέ $\alpha < 0$ ἔχουμε $k > 0$ καὶ ἄρα ἡ $\varphi(x)$ εἶναι **γνησίως αὐξουσα**.

β) Ἄν $x \in [-\frac{\beta}{2\alpha}, +\infty)$, δηλαδή $-\frac{\beta}{2\alpha} \leq x_1 < x_2$, τότε

$$\left. \begin{array}{l} x_1 \geq -\frac{\beta}{2\alpha} \\ x_2 > -\frac{\beta}{2\alpha} \end{array} \right\} \Rightarrow x_1 + x_2 > -\frac{\beta}{\alpha} \Rightarrow x_1 + x_2 + \frac{\beta}{\alpha} > 0, \quad \text{ὅπότε}$$

μέ $\alpha > 0$ ἔχουμε $k > 0$ καὶ ἄρα ἡ $\varphi(x)$ εἶναι **γνησίως αὐξουσα**
καὶ μέ $\alpha < 0$ ἔχουμε $k < 0$ καὶ ἄρα ἡ $\varphi(x)$ εἶναι **γνησίως φθίνουσα**.

Ὡστε ἡ συνάρτηση $\varphi(x)$ μέ πεδίο ὀρισμοῦ τὸ σύνολο \mathbb{R} : 1) ἂν $\alpha > 0$, εἶναι γνησίως φθίνουσα στὸ διάστημα $(-\infty, -\frac{\beta}{2\alpha}]$ καὶ γνησίως αὐξουσα στὸ διάστημα $[-\frac{\beta}{2\alpha}, +\infty)$. Δηλαδή ἀλλάζει φορά μεταβολῆς καὶ ἐπειδὴ ἀπὸ φθίνουσα γίνεται αὐξουσα, διέρχεται ἀπὸ μιὰ ἐλάχιστη τιμὴ πού λέγεται **ἐλάχιστο (minimum) τῆς συναρτήσεως** καὶ 2) ἂν $\alpha < 0$, εἶναι γνησίως αὐξουσα στὸ διάστημα $(-\infty, -\frac{\beta}{2\alpha}]$ καὶ γνησίως φθίνουσα στὸ διάστημα $[-\frac{\beta}{2\alpha}, +\infty)$. Δηλαδή ἀλλάζει φορά μεταβολῆς καὶ, ἐπειδὴ ἀπὸ αὐξουσα γίνεται φθίνουσα, διέρχεται ἀπὸ μιὰ μέγιστη τιμὴ πού λέγεται **μέγιστο (maximum) τῆς συναρτήσεως**.

Γ) **Μέγιστο ἢ ἐλάχιστο τῆς $\varphi(x) = ax^2 + bx + \gamma$ στὸ \mathbb{R} .**

Τὸ μέγιστο ἢ τὸ ἐλάχιστο τῆς συναρτήσεως $\varphi(x)$ εἶναι ἡ ἀριθμητικὴ τιμὴ $\varphi(-\frac{\beta}{2\alpha}) = \alpha(-\frac{\beta}{2\alpha})^2 + \beta(-\frac{\beta}{2\alpha}) + \gamma = \frac{4\alpha\gamma - \beta^2}{4\alpha}$.

Δηλαδή: 1) ἂν $\alpha > 0$, ἡ τιμὴ $\varphi(-\frac{\beta}{2\alpha}) = \frac{4\alpha\gamma - \beta^2}{4\alpha}$ εἶναι τὸ ἐλάχιστο τῆς $\varphi(x)$ καὶ

2) ἂν $\alpha < 0$, ἡ τιμὴ $\varphi(-\frac{\beta}{2\alpha}) = \frac{4\alpha\gamma - \beta^2}{4\alpha}$ εἶναι τὸ μέγιστο τῆς $\varphi(x)$.

Σημείωση: Τὴν ἐξέταση τῆς μεταβολῆς τῆς $\varphi(x) \equiv ax^2 + bx + \gamma$ μπορούμε νά τὴν κάνουμε καὶ ἀπὸ τὴ μορφή $\varphi(x) \equiv \alpha \left[\left(x + \frac{\beta}{2\alpha} \right)^2 + \frac{4\alpha\gamma - \beta^2}{4\alpha^2} \right]$.

Έτσι έχουμε:

1) *Αν $\alpha > 0$, τότε, όταν $x \rightarrow \pm \infty \Rightarrow \left(x + \frac{\beta}{2\alpha}\right)^2 \rightarrow +\infty \Rightarrow \left(x + \frac{\beta}{2\alpha}\right)^2 + \frac{4\alpha\gamma - \beta^2}{4\alpha^2} \rightarrow +\infty \Rightarrow \alpha \left[\left(x + \frac{\beta}{2\alpha}\right)^2 + \frac{4\alpha\gamma - \beta^2}{4\alpha^2} \right] \rightarrow +\infty$. Έπειδή η συνάρτηση είναι συνεχής, όταν ο x αυξάνει από $-\infty$ μέχρι $-\frac{\beta}{2\alpha}$ το $\left(x + \frac{\beta}{2\alpha}\right)^2$ ελαττώνεται συνεχώς από τό $+\infty$ (μέ θετικές τιμές) και για $x = -\frac{\beta}{2\alpha}$ γίνεται 0, όποτε $\varphi\left(-\frac{\beta}{2\alpha}\right) = \frac{4\alpha\gamma - \beta^2}{4\alpha}$. Έπειτα, όταν ο x αυξάνει από $-\frac{\beta}{2\alpha}$ μέχρι $+\infty$, τό $\left(x + \frac{\beta}{2\alpha}\right)^2$ αυξάνει συνεχώς από τό 0 (μέ θετικές τιμές) και τείνει στο $+\infty$, όποτε και η τιμή τής $\varphi(x)$ αυξάνει συνεχώς από τήν τιμή $\varphi\left(-\frac{\beta}{2\alpha}\right) = \frac{4\alpha\gamma - \beta^2}{4\alpha}$ τείνοντας στο $+\infty$.

2) *Αν $\alpha < 0$, άποδεικνύουμε όμοίως ότι, όταν ο x αυξάνει από $-\infty$ μέχρι $-\frac{\beta}{2\alpha}$, η τιμή τής $\varphi(x)$ αυξάνει συνεχώς από $-\infty$ μέχρι τήν τιμή $\frac{4\alpha\gamma - \beta^2}{4\alpha}$ και όταν ο x αυξάνει από $-\frac{\beta}{2\alpha}$ μέχρι $+\infty$, η τιμή τής $\varphi(x)$ ελαττώνεται συνεχώς από τήν τιμή $\frac{4\alpha\gamma - \beta^2}{4\alpha}$ τείνοντας στο $-\infty$.

Τά παραπάνω συνοφίζονται στόν ακόλουθο πίνακα:

Πίνακας μεταβολής του τριωνύμου $\varphi(x) \equiv \alpha x^2 + \beta x + \gamma$

	x	$-\infty$ ↗	$-\frac{\beta}{2\alpha}$ ↗	$+\infty$
$\alpha > 0$	$\varphi(x)$	$+\infty$ ↘	$\frac{4\alpha\gamma - \beta^2}{4\alpha}$ ελάχιστο ↗	$+\infty$
$\alpha < 0$	$\varphi(x)$	$-\infty$ ↗	$\frac{4\alpha\gamma - \beta^2}{4\alpha}$ μέγιστο ↘	$-\infty$

Παραδείγματα: α) Τό τριώνυμο $\varphi(x) \equiv 3x^2 - 2x + 3$ έχει ένα ελάχιστο για $x = -\frac{\beta}{2\alpha} = -\frac{-2}{2 \cdot 3} = \frac{1}{3}$, γιατί $\alpha = 3 > 0$, πού είναι

$$\varphi\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{4\alpha\gamma - \beta^2}{4\alpha} = \frac{4 \cdot 3 \cdot 3 - (-2)^2}{4 \cdot 3} = \frac{8}{3}$$

β) Τό τριώνυμο $f(x) \equiv -x^2 - 2x + 2$ έχει ένα μέγιστο για

$$x = -\frac{\beta}{2\alpha} = -\frac{-2}{2(-1)} = -1, \text{ γιατί } \alpha = -1 < 0.$$

Αυτό είναι $\varphi(-1) = 3$.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

351) Νά βρεθεί τό μέγιστο ή έλάχιστο τών συναρτήσεων:

1) $\varphi_1(x) \equiv 3x^2 - 2x + 4$, $\varphi_2(x) \equiv x^2 - 7x - 1$, $\varphi_3(x) \equiv x^2 - 7x$, $\varphi_4(x) \equiv 5x^2 - 4$

2) $\sigma_1(x) \equiv -x^2 - 3x + 1$, $\sigma_2(x) \equiv 2 - (x-1)^2$, $\sigma_3(x) \equiv -\frac{1}{2}x - \frac{3}{4}(x+2)^2$

352) Νά βρεθεί ή τιμή τοῦ λ , ὥστε τό τριώνυμο $\varphi(x) \equiv (\lambda - 1)x^2 - \lambda x + \lambda$ νά ἔχει μέγιστο τόν ἀριθμό -1 .

353) Νά βρεθεί ή σχέση μεταξύ τῶν α καί β , ὥστε τό τριώνυμο $\varphi(x) \equiv -x^2 + (\alpha + \beta)x - (\alpha - \beta)$ νά ἔχει μέγιστο τόν ἀριθμό $\alpha + \beta$.

354) Μέ ποιά τιμή τοῦ x τό γινόμενο $(2\alpha - x)(2\beta + x)$ γίνεται μέγιστο καί ποιά εἶναι τό μέγιστο αὐτό ($\alpha, \beta \in \mathbb{R}$).

ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

$$\psi = \alpha x + \beta \quad \text{καί} \quad \psi = \alpha x^2 + \beta x + \gamma$$

110. Ὅρισμός: Γραφική παράσταση ή γεωμετρική ή παραστατική καμπύλη μιᾶς συναρτήσεως $\psi = \varphi(x)$ λέγεται ή γραμμή, πού τά σημεῖα της ἔχουν τετμημένες τίς τιμές τοῦ συνόλου ὁρισμοῦ τῆς $\varphi(x)$ καί τεταγμένες τίς ἀντίστοιχες τιμές τοῦ συνόλου τιμῶν τῆς συναρτήσεως.

1. Γραφική παράσταση τῆς συναρτήσεως $\psi = \alpha x + \beta$, ὅταν $(x, \psi) \in \mathbb{R}^2$.

Ἄν x_1 καί x_2 εἶναι δύο αὐθαίρετες τιμές τοῦ x , τότε οἱ ἀντίστοιχες τιμές τῆς συναρτήσεως εἶναι $\psi_1 = \alpha x_1 + \beta$ καί $\psi_2 = \alpha x_2 + \beta$. Κατασκευάζουμε τά σημεῖα $A(x_1, \psi_1)$ καί $B(x_2, \psi_2)$, στό ὀρθογώνιο σύστημα ἀξόνων $x'Ox$, $\psi'O\psi$. Ἄς θεωρήσουμε καί ἕνα τρίτο σημεῖο

$$M(x_0, \psi_0 = \alpha x_0 + \beta).$$

Ἀπό τίς $\psi_0 = \alpha x_0 + \beta$

$$\psi_1 = \alpha x_1 + \beta$$

$$\psi_2 = \alpha x_2 + \beta$$


μέ ἀφαίρεση κατά μέλη ἔχουμε:

$$\left. \begin{aligned} \psi_0 - \psi_1 &= \alpha(x_0 - x_1) \\ \psi_0 - \psi_2 &= \alpha(x_0 - x_2) \end{aligned} \right\} \Leftrightarrow \frac{\psi_0 - \psi_1}{x_0 - x_1} = \frac{\psi_0 - \psi_2}{x_0 - x_2} = \alpha$$

Οἱ ὅροι τῆς ἀναλογίας αὐτῆς εἶναι οἱ συντεταγμένες τῶν διανυσμάτων $\vec{MA}(x_0 - x_1, \psi_0 - \psi_1)$ καί $\vec{MB}(x_0 - x_2, \psi_0 - \psi_2)$ καί οἱ λόγοι $\frac{\psi_0 - \psi_1}{x_0 - x_1}, \frac{\psi_0 - \psi_2}{x_0 - x_2}$ εἶναι οἱ συντελεστές διεθυνσεῶς τους ἀντιστοίχως.

Ἄρα τά διανύσματα ἔχουν συντελεστές διεθυνσεῶς ἴσους καί ἐπομένως εἶναι συγγραμμικά. Δηλαδή τό $M(x_0, \psi_0)$ εἶναι σημεῖο τῆς εὐθείας AB καί ἐπειδή πάρθηκε τυχαῖα, ἔπεται ὅτι κάθε σημεῖο τῆς εὐθείας AB εἶναι σημεῖο τῆς γραφικῆς παραστάσεως τῆς συναρτήσεως $\psi = \alpha x + \beta$.

Ὡστε ή γραφική παράσταση τῆς $\psi = \alpha x + \beta$ εἶναι εὐθεῖα γραμμή μέ συν-



Σχ. 110.1

τελεστή διευθύνσεως τῆς συντελεστή διευθύνσεως τῶν διανυσμάτων \vec{MA} , \vec{MB} , πού εἶναι ὁ α , γι' αὐτό καί λέγεται ἡ $\psi = \alpha x + \beta$ γραμμική συνάρτηση.

Ἡ συνάρτηση μέ $x = 0$ δίνει $\psi = \beta$ καί μέ $\psi = 0$ δίνει $x = -\frac{\beta}{\alpha}$ ὁπότε τά σημεῖα $\Gamma(0, \beta)$ καί $\Delta(-\frac{\beta}{\alpha}, 0)$ εἶναι τά σημεῖα τομῆς τῆς εὐθείας $\psi = \alpha x + \beta$ μέ τούς ἄξονες $\psi'O\psi$ καί $x'Ox$ ἀντιστοίχως. Ἡ τεταγμένη β τοῦ σημείου Γ καί ἡ τεταγμένη $-\frac{\beta}{\alpha}$ τοῦ Δ λέγονται, ἀντιστοίχως, **τεταγμένη ἐπί τήν ἀρχή** καί **τεταγμένη ἐπί τήν ἀρχή** καί **συντεταγμένες ἐπί τήν ἀρχή**, ὅταν τίς θεωροῦμε μαζί.


Ἡ γραφική παράσταση τῆς συναρτ. $\psi = \alpha x + \beta$ μέ $\beta = 0$, δηλαδή τῆς συναρτήσεως $\psi = \alpha x$, εἶναι εὐθεῖα πού διέρχεται ἀπό τήν ἀρχή ὁ τῶν ἄξόνων, γιατί μέ $x = 0$ εἶναι καί $\psi = 0$.

Ἡ γραφική παράσταση τῆς συναρτ. $\psi = \alpha x + \beta$, ὅταν $\alpha = 0$, δηλαδή τῆς σταθερῆς συναρτ. $\psi = \beta$, εἶναι εὐθεῖα παράλληλη πρὸς τόν ἄξονα $x'Ox$, γιατί γιά κάθε $x \in \mathbb{R}$ ἡ τιμή τῆς ψ εἶναι πάντοτε β .

Κατασκευή τῆς εὐθείας $\psi = \alpha x + \beta$

Μιά εὐθεῖα ὀρίζεται μέ δύο μόνο σημεῖα. Τά χαρακτηριστικότερα γιά τήν κατασκευή τῆς εὐθείας $\psi = \alpha x + \beta$ εἶναι τά σημεῖα τῆς τομῆς τῆς μέ τούς ἄξονες. Ἀρκεῖ λοιπόν νά βροῦμε τίς συντεταγμένες ἐπί τήν ἀρχή. Ἔτσι τά σημεῖα $A(-\frac{\beta}{\alpha}, 0)$ καί $B(0, \beta)$ ἀρκοῦν γιά νά ὀρίσουν τήν εὐθεῖα AB , πού εἶναι ἡ γραφική παράσταση τῆς συναρτήσεως $\psi = \alpha x + \beta$.


Σημ. Ἄν ἡ εὐθεῖα διέρχεται ἀπό τήν ἀρχή τῶν ἄξόνων ($\psi = \alpha x$), τότε γιά τήν κατασκευή τῆς ἀρκεῖ ἕνα μόνο σημεῖο.



Σχ. 110.2

2. Γραφική παράσταση τῆς συναρτ. $\psi = \alpha x^2 + \beta x + \gamma$

Γιά νά παραστήσουμε γραφικά τή συνάρτηση $\psi = \alpha x^2 + \beta x + \gamma | \mathbb{R}$ στό ὀρθογώνιο σύστημα τῶν ἄξόνων $x'O\psi$, $\psi'O\psi$, πρέπει νά ἔχουμε ὑπόψη μας τόν πίνακα μεταβολῆς τοῦ τριωνύμου $\varphi(x) \equiv \alpha x^2 + \beta x + \gamma$. Ἔτσι διακρίνομε δύο περιπτώσεις:



Σχ. 110.3

α) Ἐστω $\alpha > 0$. Ἡ συνάρτηση γιά $x = -\frac{\beta}{2\alpha}$ παίρνει τήν ἐλάχιστη τιμή τῆς

$$\psi = \frac{4\alpha\gamma - \beta^2}{4\alpha} = \frac{-\Delta}{4\alpha}$$

Ὄταν $-\infty < x < -\frac{\beta}{2\alpha}$, ἔχει πεδίο τιμῶν τό $(-\infty, \frac{-\Delta}{4\alpha})$ καί ὅταν $-\frac{\beta}{2\alpha} < x < +\infty$,

ἔχει πεδίο τιμῶν τό $(\frac{-\Delta}{4\alpha}, +\infty)$


Κατασκευάζουμε λοιπόν τό σημείο $A \left(-\frac{\beta}{2\alpha}, -\frac{\Delta}{4\alpha} \right)$. Έπειτα παίρνουμε δύο τιμές $x_1 = -\frac{\beta}{2\alpha} + \xi$ και $x_2 = -\frac{\beta}{2\alpha} - \xi$ συμμετρικές ως προς τήν τιμή $-\frac{\beta}{2\alpha}$ και τίς αντίστοιχες τιμές ψ_1 και ψ_2 τής συναρτήσεως. Εύκολα αποδεικνύουμε ότι $\psi_1 = \psi_2$. Άρα τά σημεία $B(x_1, \psi_1)$ και $\Gamma(x_2, \psi_2)$ είναι συμμετρικά ως προς τήν εϋθεία AT , πού λέγεται άξονας συμμετρίας τής γραμμής $\psi = \varphi(x)$, και συνεπώς ή γραφική παράσταση τής συναρτ. $\psi = ax^2 + bx + \gamma$ άποτελείται από δύο τμήματα $\Delta\Gamma Z A$ και $AHBE$ συμμετρικά ως προς τόν άξονα συμμετρίας AT . Για τήν κατασκευή λοιπόν μέ προσέγγιση τής γραμμής $\psi = ax^2 + bx + \gamma$ άρκει νά βρούμε όσο μπορούμε περισσότερα σημεία συμμετρικά ως προς τόν άξονα συμμετρίας, γιατί ή γραμμή είναι καμπύλη και κανένα τμήμα της δέν είναι εϋθύγραμμο. Τοϋτο συνάγεται από τό ότι ή εϋθεία $\psi = Ax + B$ τέμνει τή γραμμή $\psi = ax^2 + bx + \gamma$ σέ δύο τό πολύ σημεία, γιατί τό σύστημα πού άποτελοϋν έχει τό πολύ δύο λύσεις.

Τήν καμπύλη αυτή τήν ονομάζουμε **παραβολή**, τό σημείο A **κορυφή** της και τόν άξονα AT **άξονα τής παραβολής**.

Παρατηρήσεις: 1) Τά χαρακτηριστικότερα σημεία τής καμπύλης $\psi = ax^2 + bx + \gamma$ είναι: ή κορυφή της $A \left(-\frac{\beta}{2\alpha}, -\frac{\Delta}{4\alpha} \right)$ τά σημεία τομής τής παραβολής μέ τόν άξονα τών x $Z(\rho_2, 0)$ και $H(\rho_1, 0)$, όπου ρ_1, ρ_2 ρίζες τοϋ τριωνύμου, και τό σημείο τομής τής παραβολής μέ τόν άξονα τών ψ $\Delta(0, \gamma)$ και τό συμμετρικό του $E \left(-\frac{\beta}{\alpha}, \gamma \right)$. 2) Τό σημείο $A \left(-\frac{\beta}{2\alpha}, -\frac{\Delta}{4\alpha} \right)$ σέ σχέση μέ τόν άξονα $x'Ox$ βρίσκεται ή κάτω από τόν άξονα, ή πάνω στον άξονα, ή πάνω από τόν άξονα αυτό, αν είναι $\Delta > 0$, ή $\Delta = 0$, ή $\Delta < 0$ αντίστοίχως. Πράγματι, γιατί τότε θά είναι αντίστοίχως:

$$\psi = -\frac{\Delta}{4\alpha} < 0, \psi = -\frac{\Delta}{4\alpha} = 0, \psi = -\frac{\Delta}{4\alpha} > 0.$$

Αυτό δείχεται μέ τά παρακάτω σχήματα.



Σχ. 110.4

β) Έστω $a < 0$. Τή γραφική παράσταση τῆς συναρτήσεως $\psi = ax^2 + bx + \gamma$ μπορούμε νά τήν κατασκευάσουμε μέ τόν ἴδιο τρόπο.

Ἡ ἔργασία αὐτή νά γίνει ἀπό τοὺς μαθητές.

Παράδειγμα: Νά γίνει ἡ γραφική παράσταση τῆς $\psi = x^2 - 5x + 6$.

Κατασκευή: Ἐπειδή $a = 1 > 0$, ἡ συνάρτηση ἔχει ἐλάχιστο. Βρίσκουμε τίς συντεταγμένες τῶν χαρακτηριστικῶν σημείων τῆς καμπύλης.


Κορυφή: $A\left(\frac{5}{2}, -\frac{1}{4}\right)$.

Σημεῖα τομῆς μέ τόν x' Ο x : $\Gamma(2, 0)$ καί $B(3, 0)$.

Σημεῖο τομῆς μέ τόν ψ' Ο ψ : $\Delta(0, 6)$ καί τό συμμετρικό του $E(5, 6)$.

Δύο ἄλλα συμμετρικά σημεῖα: $Z(1, 2)$ καί $H(4, 2)$.

Μά τά σημεῖα αὐτά μπορούμε νά κατασκευάσουμε τήν καμπύλη μέ προσέγγιση. Τήν κατασκευή αὐτή δείχνει τό σχῆμα (110.5).



Σχ. 110.5

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

355) Νά γίνει ἡ γραφική παράσταση τῶν συναρτήσεων:

$$\psi = \frac{2}{3}x - 2, \quad \psi = -2 - \frac{1}{2}x, \quad x = \pm \psi, \quad \psi = ax + 2, \quad \psi = \pm x + \beta$$

356) Μέ ποιές τιμές τῶν λ καί μ οἱ εὐθεῖες $\psi = (\lambda - 1)x + 2\mu$ καί $\psi = -(2 + \lambda)x + 5$ τέμνονται στό σημεῖο $M\left(\frac{3}{7}, \frac{20}{7}\right)$;

357) Νά γίνει ἡ γραφική παράσταση τῶν εὐθειῶν $\psi = 2x + 1$, $\psi = -x + 3$, $\psi = x + \frac{5}{3}$. Τί παρατηρεῖτε; Δικαιολογήστε τήν παρατήρησή σας.

358) Νά γίνει ἡ γραφική παράσταση τῶν συναρτήσεων:

$$\begin{aligned} \psi &= -\frac{x^2}{3} + 2x - 2, & \psi &= -\frac{x^2}{2} + 4, & \psi &= x^2 + x + 1 \\ \psi &= 2x^2 + x, & \psi &= x^2 - x - 6, & \psi &= -x^2 + x - 2 \end{aligned}$$

359) Γιά ποιά τιμή τοῦ α τό μέγιστο τῆς συναρτήσεως $\psi = -\frac{x^2}{3} + 2x - 2\alpha$ εἶναι ὁ ἀριθμός 1; Ἐπειτα νά παραστήσετε γραφικά τή συνάρτηση.

360) Νά ἐπιλυθοῦν γραφικά τά συστήματα καί νά βρεθοῦν οἱ ἀριθμητικές λύσεις τους:

$$\begin{cases} \psi = -2x - 1 \\ \psi = x^2 - 2x - 5, \end{cases} \quad \begin{cases} \psi = x^2 - x + 1 \\ \psi = x^2 + x \end{cases}$$

361) Νά κατασκευασθοῦν οἱ γραφικές παραστάσεις τῶν συναρτήσεων $\psi = -x^2 + 2x + 3$ καί $\psi = \frac{x^2}{2} - 4\left(x - \frac{3}{4}\right)$. Ἐπειτα νά βρεθοῦν οἱ ἀκέραιες τιμές τοῦ α , ὥστε ἡ εὐθεῖα $\psi = \alpha$ νά τέμνει τίς καμπύλες.

362) Νά επιλυθούν οι εξισώσεις:

- 1) $(\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2)x^2 + 2(\alpha + \beta + \gamma)x + 3 = 0,$ $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$
- 2) $\frac{(\alpha-x)^3 - (\beta-x)^3}{(x-\alpha)^2 + (\beta-x)^2} = \alpha - \beta,$ $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$
- 3) $(\kappa-x)^3 + (x-\lambda)^3 = (\kappa-\lambda)^3$ $\kappa, \lambda \in \mathbb{R}$
- 4) $(x-\alpha + 2\beta)^3 - (x-2\alpha + \beta)^3 = (\alpha + \beta)^3,$ $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$
- 5) $\frac{(x-\alpha)(x-\gamma)}{(\beta-\alpha)(\beta-\gamma)} - \frac{(x-\beta)(x-\gamma)}{(\alpha-\beta)(\gamma-\alpha)} = 1$ $\alpha \neq \beta \neq \gamma \in \mathbb{R}$

363) *Αν $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ και η εξίσωση $f(x) = \alpha x^2 + \beta x + \gamma = 0$ έχει ρίζα τό μιγαδικό $\mu + \nu i$, νά αποδειχθεί ότι η άλλη ρίζα τής $f(x) = 0$ είναι ο μιγαδικός $\mu - \nu i$.

364) Νά βρεθεί τό είδος τών ριζών τής εξισώσεως, $3x^2 - 2(\alpha + \beta + \gamma)x + \alpha\beta + \beta\gamma + \alpha\gamma = 0$ $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$.

365) *Αν η εξίσωση $f(x) = x^2 + \alpha x + \beta = 0$ έχει ρίζες πραγματικές και άνισες, νά αποδειχθεί ότι τό ίδιο συμβαίνει και για τίς ρίζες τής $f(x) + \lambda(2x + \alpha) = 0 \forall \lambda \in \mathbb{R}$.

366) Νά προσδιορισθεί τό είδος τών ριζών τής εξισώσεως $\beta^2 x^2 + (\gamma^2 + \beta^2 - \alpha^2)x + \gamma^2 = 0$, άν α, β, γ είναι μήκη τών πλευρών τυχαίου τριγώνου.

367) *Αν x_1, x_2 είναι ρίζες τής $x^2 + \alpha x + \beta = 0$ νά σχηματισθεί εξίσωση β' βαθμού, μέ ρίζες τίς x_1^2, x_2^2 και έπειτα νά βρεθεί σχέση μεταξύ τών α και β , ώστε η νέα εξίσωση νά έχει διπλή ρίζα.

368) *Αν x_1, x_2 είναι ρίζες του τριωνύμου $f(x) = \alpha x^2 + \beta x + \gamma$ και $\frac{S}{2} = \frac{x_1 + x_2}{2}$ νά αποδειχθεί ότι $f\left(\frac{S}{2} + k\right) = f\left(\frac{S}{2} - k\right)$, όπου k τυχαίος πραγματικός άριθμός.

369) Νά προσδιορισθούν οι k και λ , ώστε οι ρίζες τής εξισώσεως $x^2 + kx + \lambda = 0$ νά είναι οι άριθμοί k και λ .

370) *Αν x_1, x_2 είναι ρίζες τής εξίσ. $\alpha_1 x^2 + \beta_1 x + \gamma_1 + \lambda(\alpha_2 x^2 + \beta_2 x + \gamma_2) = 0$, νά αποδειχθεί ότι υπάρχει σχέση μεταξύ τών ριζών x_1, x_2 ανεξάρτητη από τό λ και νά βρεθεί η τιμή του λ , ώστε η εξίσωση νά έχει διπλή ρίζα.

371) Δίνεται η εξίσωση $\alpha x^2 + \beta x + \gamma = 0$, μέ ρίζες x_1, x_2 . Νά σχηματισθεί εξίσωση μέ ρίζες $x_1 + \lambda, x_2 + \lambda$ και έπειτα νά προσδιορισθεί ό λ , ώστε αυτή η εξίσωση νά πάρει τίς μορφές 1) $Ax^2 + \Gamma = 0$ και 2) $Ax^2 + Bx = 0$.

372) Νά όρισθούν τά κ και λ ώστε, άν x_1, x_2 είναι οι ρίζες τής εξίσ. $x^2 + \kappa x + \lambda = 0$, τότε οι άριθμοί $x_1 + 1, x_2 + 1$ νά είναι οι ρίζες τής εξίσ. $x^2 - \kappa^2 x + \kappa \lambda = 0$.

373) *Αν $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{Q}$ και η εξίσωση $f(x) = \alpha x^2 + \beta x + \gamma = 0$ έχει ρίζα τόν άσύμμετρο $\kappa + \sqrt{\lambda}$, νά αποδειχθεί ότι η άλλη ρίζα τής $f(x) = 0$ είναι ό άσύμμετρος $\kappa - \sqrt{\lambda}$, όπου $\kappa, \lambda \in \mathbb{Q}$ και λ μή τέλειο τετράγωνο ρητού.

374) *Αν οι ρίζες τών εξισώσεων $x^2 + 2\alpha x + \beta = 0$ και $x^2 + 2Ax + B = 0$ είναι άντίστοιχα (x_1, x_2) και $(x_1 + \kappa, x_2 + \kappa)$, νά δειχθεί ότι: $A^2 - B = \alpha^2 - \beta$.

375) Νά βρεθεί η ίκανή και άναγκαία συνθήκη μεταξύ τών $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$, ώστε τό τριώνυμο $\varphi(x) = \alpha^2 x^2 + (\alpha^2 + \gamma^2 - \beta^2)x + \gamma^2$ νά είναι τέλειο τετράγωνο.

376) Νά αποδειχθεί ότι η παράσταση $(\alpha + \beta)^3 x^2 + 2(\alpha^2 + \beta^2)x + (\alpha - \beta)^2$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ και $\alpha \neq 0, \beta \neq 0$ μπορεί νά μετασχηματισθεί σε διαφορά δύο τετραγώνων πραγματικών παραστάσεων και έπειτα νά αναλυθεί σε γινόμενο παραγόντων.

377) Νά βρεθούν οι τιμές του μ , με τις όποιες η παράσταση $x^3 + (\mu\psi + 2)x + (2\psi + 3)(\psi - 1)$ μπορεί ν' αναλυθεί σε γινόμενο δύο ρητών πραγματικών παραγόντων πρωτοβαθμίων ως προς x και ψ .

378) Νά βρεθεί η Ικανή και αναγκαία συνθήκη, ώστε η παράσταση $(\alpha x + \beta)^2 + (\gamma x + \delta)^2$ νά είναι τέλειο τετράγωνο. Έπειτα νά αποδειχθεί ότι, αν οι παραστάσεις $(\alpha_1 x + \beta_1)^2 + (\alpha_2 x + \beta_2)^2$ και $(\alpha_3 x + \beta_3)^2 + (\alpha_4 x + \beta_4)^2$ είναι τέλεια τετράγωνα, τότε και η παράσταση $(\alpha_1 x + \beta_1)^2 + (\alpha_3 x + \beta_3)^2$ είναι τέλειο τετράγωνο. Τούς αριθμούς $\alpha_{1,2,3,4}, \beta_{1,2,3,4}, \alpha, \beta, \gamma, \delta$ τούς υποθέτουμε πραγματικούς.

379) Νά αποδειχθεί ότι τό $f(x) \equiv 2x^2 - \lambda(10x - 7) - 1$ έχει ρίζες πραγματικές άνισες $\forall \lambda \in \mathbb{R}$.

380) Νά δειχθεί ότι η έξίσωση $\varphi(x) \equiv (x - \alpha_1)(x - \alpha_2) + (x - \alpha_2)(x - \alpha_3) + (x - \alpha_3)(x - \alpha_1) = 0$ έχει ρίζες πραγματικές άνισες, αν $\alpha_1 < \alpha_2 < \alpha_3$.

381) Τό ίδιο γιά τήν $\frac{\alpha_1 + \alpha_2}{x - \alpha_3} + \frac{\alpha_2 + \alpha_3}{x - \alpha_1} + \frac{\alpha_3 + \alpha_1}{x - \alpha_2} = 0$, αν $\alpha_1^2 < \alpha_2^2 < \alpha_3^2$.

382) Νά σχηματισθεί έξίσωση β' βαθμού μέ διπλή ρίζα τήν κοινή ρίζα τών δύο τριωμόνων $x^3 - \alpha x + \beta$ και $x^3 - 8x + \alpha$.

383) Μέ ποιά συνθήκη τά τριώνυμα $x^2 + \alpha x \psi + \beta \psi^2$ και $x^2 + \gamma x \psi + \delta \psi^2$ έχουν έναν κοινό παράγοντα πρώτου βαθμού;

384) Νά αποδειχθεί ότι η Δ τής έξισ. $\alpha_1 x^2 + \beta_1 x + \gamma_1 + \lambda(\alpha_2 x^2 + \beta_2 x + \gamma_2) = 0$ είναι τέλειο τετράγωνο, αν οι έξισ. $\alpha_1 x^2 + \beta_1 x + \gamma = 0$ και $\alpha_2 x^2 + \beta_2 x + \gamma_2 = 0$ έχουν μία κοινή ρίζα.

385) Νά έπιλυθούν στό \mathbb{R} οι άνισώσεις:

$$1) \quad x^3 - (3\alpha + \beta)x + 2\alpha(\alpha + \beta) < 0,$$

$$2) \quad \frac{(x + \alpha)^2}{(x + \beta)^2} < \frac{\alpha^2 + x^2}{\beta^2 + x^2}, \quad \text{αν } \alpha > \beta > 0.$$

386) Μέ ποιές τιμές του λ η παράσταση $(\lambda - 2)x^2 + 4x + \lambda + 1$ διατρεί όμόσημες τιμές γιά κάθε πραγματική τιμή του x ;

387) Νά βρεθεί τό σύνολο όρισμού τής πραγματικής συναρτήσεως $\psi = 5\sqrt{x^2 - 4x + 3} - 2\sqrt{-x^2 + 6x + 8}$.

388) Νά βρεθεί μέ ποιές τιμές του $x \in \mathbb{R}$ άληθεύει η άνίσωση $x^2 - 2\alpha x + (\beta + \gamma)^2 > 0$, αν α, β, γ είναι μήκη πλευρών τριώνου;

389) Τό τριώνυμο $\varphi(x) \equiv \alpha x^2 + \beta x + \gamma$ γιά $x = 5$ έχει δάχιστο τόν -3 και η μιá του ρίζα είναι ό αριθμός 2. Νά βρείτε τά α, β, γ .

390) Νά βρεθεί η Ικανή και αναγκαία συνθήκη, ώστε οι εύθειες $\psi = \alpha_1 x + \beta_1$, $\psi = \alpha_2 x + \beta_2$, $\psi = \alpha_3 x + \beta_3$ νά διέρχονται άπό τό ίδιο σημείο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XIV

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ Β' ΒΑΘΜΟΥ

ΔΙΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

111. **Όρισμός.** Ονομάζεται διτετράγωνη εξίσωση, με έναν άγνωστο, κάθε εξίσωση 4ου βαθμού, που έχει μόνο άρτιες δυνάμεις του άγνωστου.

Δηλαδή είναι της μορφής $ax^4 + \beta x^2 + \gamma = 0$, όπου $a \neq 0$, $\beta, \gamma \in \mathbb{R}$.
Τό πρώτο μέλος της $\varphi(x) \equiv ax^4 + \beta x^2 + \gamma$ λέγεται **διτετράγωνο τριώνυμο**.

112. ΕΠΙΛΥΣΗ.

Η επίλυση της εξίσ. $ax^4 + \beta x^2 + \gamma = 0$ γίνεται με τό μετασχηματισμό $x^2 = \psi$, όποτε προκύπτει ή εξίσωση $a\psi^2 + \beta\psi + \gamma = 0$, που λέγεται **επιλύουσα** της διτετράγωνης εξισώσεως.

Η επιλύουσα εξίσωση έχει γενικά δύο λύσεις ψ_1 και ψ_2 πραγματικές ή καθαρές μιγαδικές συζυγείς, όποτε, αν επανέλθουμε στό μετασχηματισμό $x^2 = \psi$, παίρνουμε $x^2 = \psi_1$ και $x^2 = \psi_2$. Έπειδή κάθε αριθμός πραγματικός ή μιγαδικός έχει δύο μόνο τετραγωνικές ρίζες αντίθετες, γι' αυτό από τίς εξισώσεις $x^2 = \psi_1$, $x^2 = \psi_2$ παίρνουμε $x = \pm \sqrt{\psi_1}$, $x = \pm \sqrt{\psi_2}$.

Έτσι έχουμε τίς λύσεις της διτετράγωνης εξισώσεως:

$$x_1 = \sqrt{\psi_1}, x_2 = -\sqrt{\psi_1}, x_3 = \sqrt{\psi_2}, x_4 = -\sqrt{\psi_2}.$$

Δηλαδή: **Οί ρίζες της διτετράγωνης εξισώσεως είναι οί τετραγωνικές ρίζες τών ριζών της επιλύουσας και είναι ανά δύο αντίθετες.**

Είδος τών ριζών της εξίσ. $ax^4 + \beta x^2 + \gamma = 0$, $a, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$

Τό είδος τών ριζών της διτετράγωνης εξισώσεως εξαρτάται από τό είδος και τό σημείο τών ριζών της επιλύουσάς της.

Έτσι αν χρησιμοποιήσουμε τά συμπεράσματα του πίνακα της (§ 93), μπορούμε νά συμπληρώσουμε τόν πίνακα διερευνήσεως της διτετράγωνης εξισώσεως ώς εξής:

Διερεύνηση τής εξίσ. $\alpha x^4 + \beta x^2 + \gamma = 0$, $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$, $\alpha \neq 0$

Δ	P	S	Ρίζες επιλύουσας	Είδος ριζών διτετράγωνης
+	+	+	$\psi_1, \psi_2 \in \mathbb{R}^+$	$x_1, x_2, x_3, x_4 \in \mathbb{R}$, $x_1 = -x_2$, $x_3 = -x_4$
		-	$\psi_1, \psi_2 \in \mathbb{R}^-$	$x_1, x_2, x_3, x_4 \in \mathbb{I}$
	-	+	$\psi_1 \in \mathbb{R}^+$, $\psi_2 \in \mathbb{R}^-$	$x_1, x_2 \in \mathbb{R}$, $x_3, x_4 \in \mathbb{I}$
		-	$\psi_1 \in \mathbb{R}^+$, $\psi_2 \in \mathbb{R}^-$	$x_1, x_2 \in \mathbb{R}$, $x_3, x_4 \in \mathbb{I}$
		0	$\psi_1 \in \mathbb{R}^+$, $\psi_2 \in \mathbb{R}^-$, $\psi_1 = -\psi_2$	$x_1, x_2 \in \mathbb{R}$, $x_3, x_4 \in \mathbb{I}$
	0	+	$\psi_1 \in \mathbb{R}^+$, $\psi_2 = 0$	$x_1, x_2, x_3 = x_4 = 0 \in \mathbb{R}$
-		$\psi_2 \in \mathbb{R}^-$, $\psi_1 = 0$	$x_3, x_4 \in \mathbb{I}$, $x_1 = x_2 = 0$	
0	+	+	$\psi_1 = \psi_2 \in \mathbb{R}^+$	$x_1 = x_3 \in \mathbb{R}$, $x_2 = x_4 \in \mathbb{R}$
		-	$\psi_1 = \psi_2 \in \mathbb{R}^-$	$x_1 = x_3 \in \mathbb{I}$, $x_2 = x_4 \in \mathbb{I}$
	0	$\psi_1 = \psi_2 = 0$	$x_1 = x_2 = x_3 = x_4 = 0$	
-			$\psi_1, \psi_2 \in (\mathbb{C} - \mathbb{R})$	$x_1, x_2, x_3, x_4 \in (\mathbb{C} - \mathbb{R})$

Σημ. Ι σύνολο τών φανταστικών, C σύνολο τών μιγαδικών.

113. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ ΤΡΙΩΝΥΜΟΥ $\varphi(x) = \alpha x^4 + \beta x^2 + \gamma$, $\alpha \neq 0$.

Ἐὰν ψ_1, ψ_2 εἶναι οἱ ρίζες τῆς ἐπιλύουσας $\alpha\psi^2 + \beta\psi + \gamma$, τότε $\alpha\psi^2 + \beta\psi + \gamma \equiv \alpha(\psi - \psi_1)(\psi - \psi_2)$. Καί ἀπό τὴν $x^2 = \psi \Leftrightarrow \psi = x^2$ προκύπτει: $\alpha x^4 + \beta x^2 + \gamma \equiv \alpha(x^2 - \psi_1)(x^2 - \psi_2) \equiv \alpha(x + \sqrt{\psi_1})(x - \sqrt{\psi_1})(x + \sqrt{\psi_2})(x - \sqrt{\psi_2}) \equiv \alpha(x - x_1)(x - x_2)(x - x_3)(x - x_4)$.

Ἀπὸ τὸ μετασχηματισμὸ αὐτὸ ἔπεται ὅτι μποροῦμε νὰ βροῦμε τὸ διτετράγωνο τριώνυμο, ὅταν γνωρίζουμε τὶς ρίζες του.

Ἐπίσης μποροῦμε νὰ πάρουμε ἄλλες μορφές τοῦ διτετράγωνου τριωνύμου, οἱ ὁποῖες ξεφεύζουν στὶς ἀσκήσεις.

Παραδείγματα : 1) Νὰ ἐπιλυθεῖ ἡ ἐξίσωση $36x^4 + 11x^2 - 5 = 0$.

Ἐπίλυση : Ὁ μετασχηματισμὸς $x^2 = \psi$ δίνει τὴν ἐπιλύουσα $36\psi^2 + 11\psi - 5 = 0$. Αὐτὴ ἔχει ρίζες $\psi_1 = \frac{1}{4}$, $\psi_2 = -\frac{5}{9}$.

Οἱ ρίζες τῆς διτετράγωνης βρίσκονται ἀπὸ τὶς ἐξισώσεις: $x^2 = \frac{1}{4}$ ὁπότε $x_1 = \frac{1}{2}$, $x_2 = -\frac{1}{2}$ καὶ $x^2 = -\frac{5}{9}$, ὁπότε $x_3 = i\frac{\sqrt{5}}{3}$, $x_4 = -i\frac{\sqrt{5}}{3}$.

2) Νά βρεθεί τό είδος τῶν ριζῶν τῆς ἔξισ. $2x^4 - 5x^2 - 3 = 0$.

Λύση: Ἔχουμε γιά $x^2 = \psi$ τήν ἐπιλύουσα $2\psi^2 - 5\psi - 3 = 0$, πού δίνει:

$$\Delta = 25 + 24 = 49 > 0, P = -\frac{3}{2} < 0, S = \frac{5}{2} > 0$$

Ἄρα ἡ ἐπιλύουσα ἔχει ρίζες πραγματικές, ἑτερόσημες μέ ἀπόλυτα μεγαλύτερη τή θετική. Καί συνεπῶς ἡ διτετράγωνη ἔχει (ἀπό τή θετική) δύο ρίζες πραγματικές ἀντίθετες καί (ἀπό τήν ἀρνητική) δύο ρίζες φανταστικές ἀντίθετες.

3) Νά μετασχηματισθεῖ σέ γινόμενο παραγόντων τό τριώνυμο

$$\varphi(x) \equiv x^4 - \alpha x^2(\alpha - 1) - \alpha^3, \alpha > 0$$

Λύση: Παίρουμε τήν ἐπιλύουσα $\psi^2 - \alpha\psi(\alpha - 1) - \alpha^3$, πού ἔχει ρίζες $\psi_1 = \alpha^2, \psi_2 = -\alpha$.

Ἄρα οἱ ρίζες τοῦ $\varphi(x)$ εἶναι: $x^2 = \alpha^2$, ὁπότε $x_1 = \alpha, x_2 = -\alpha$

καί $x^2 = -\alpha$, ὁπότε $x_3 = i\sqrt{-\alpha}, x_4 = -i\sqrt{-\alpha}$.

Ἄρα ἔχουμε:

$$\begin{aligned}\varphi(x) &\equiv x^4 - \alpha x^2(\alpha - 1) - \alpha^3 \equiv (x - \alpha)(x + \alpha)(x - i\sqrt{-\alpha})(x + i\sqrt{-\alpha}) \\ &\equiv (x - \alpha)(x + \alpha)(x^2 + \alpha)\end{aligned}$$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Ἄ μ ά δ α α'

391) Νά ἐπιλυθοῦν οἱ ἔξισώσεις:

1) $x^4 + 12x^2 - 64 = 0$,

$9x^4 - 5x^2 - 4 = 0$

2) $\frac{1}{x} + \frac{x}{x^2 + 2} = \frac{x}{2}$,

$\frac{2(x^2 + 2)}{5} = \frac{(x^2 - 1)(x^2 - 2) + 6}{x^2 + 1}$

392) Νά βρεθεῖ τό είδος τῶν ριζῶν τῶν ἔξισώσεων:

1) $2x^4 - 5x^2 - 7 = 0$,

2) $11x^4 + 13x^2 + 2 = 0$,

3) $2x^4 + 19x^2 + 9 = 0$

393) Νά ἀναλυθοῦν σέ γινόμενο παραγόντων τά τριώνυμα:

1) $\varphi_1(x) \equiv x^4 + 13x^2 - 48$,

2) $\varphi_2(x) \equiv 36x^4 - 13x^2 + 1$,

3) $\varphi_3(x) \equiv \alpha^2\beta^2\gamma^2x^4 + x^2(\alpha^2 - \beta^2\gamma^2) - 1$

394) Νά σχηματισθεῖ διτετράγωνη ἔξισωση μέ ρίζες

1) $\pm 3, \pm \frac{1}{2}$,

2) $\pm \sqrt{3}, \pm i$,

3) $\pm \frac{i}{2}, \pm 2i\sqrt{2}$,

4) $\pm \frac{\alpha}{2}, \pm \frac{\alpha + \beta}{2}$

Ἄ μ ά δ α β'

395) Νά ἐπιλυθοῦν οἱ ἔξισώσεις:

$x^2(\alpha x^2 - 1) = \alpha\beta^2(\alpha x^2 - 1)$,

$\frac{x^4 + 1}{x^2 - 1} = \frac{\alpha}{\beta}(x^2 - 1)$

396) Νά διερευνηθοῦν οἱ ἔξισώσεις:

1) $(\lambda - 1)x^4 - 4x^2 + \lambda + 2 = 0$,

2) $(\mu + 1)x^4 - 2(\mu - 1)x^2 + 3(\mu - 1) = 0$

397) Νά ἀποδειχθεῖ ὅτι τό τριώνυμο $\varphi(x) \equiv \alpha x^4 + \beta x^2 + \gamma$, $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$, μετασχηματίζεται σέ γινόμενο δύο δευτεροβάθμιων παραγόντων τοῦ x .

398) Ἄν $\frac{\gamma}{\alpha} < 0$, νά ἀποδειχθεῖ ὅτι τό τριώνυμο $\varphi(x) \equiv \alpha x^4 + \beta x^2 + \gamma$ μετασχηματίζεται σέ γινόμενο δύο πρωτοβάθμιων παραγόντων καί ἑνός δευτεροβάθμιου παράγοντα ὡς πρὸς x .

114. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΠΛΩΝ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΕ ΑΠΛΑ.

Οι παραστάσεις της μορφής $\pm \sqrt{A \pm \sqrt{B}}$, όπου $A, B \in \mathbb{Q}^+$, B μη τέλειο τετράγωνο ρητού και $A > \sqrt{B} \Rightarrow A^2 - B > 0$, λέγονται διπλά τετραγωνικά ριζικά. Τά A και B μπορεί να είναι και ρητές παραστάσεις.

Τέτοιες παραστάσεις συναντούμε στις λύσεις της διτετράγωνης εξίσωσης, όταν η διακρίνουσα $\Delta = \beta^2 - 4\alpha\gamma$ της επίλυσάς της δέν είναι τέλειο τετράγωνο ρητής παραστάσεως τών συντελεστών α, β, γ , αν τούς υποθέσουμε ρητούς. Πράγματι, στις λύσεις της διτετράγωνης εξίσωσης

$$x_{1,2} = \pm \sqrt{\frac{-\beta + \sqrt{\Delta}}{2\alpha}}, \quad x_{3,4} = \pm \sqrt{\frac{-\beta - \sqrt{\Delta}}{2\alpha}}, \quad \text{αν θέσουμε } -\frac{\beta}{2\alpha} = A \text{ και } \frac{2}{4\alpha^2} = B,$$

έχουμε $x_{1,2,3,4} = \pm \sqrt{A \pm \sqrt{B}}$.

Οι δυσκολίες που δημιουργούν τά διπλά ριζικά, εξαλείφονται σε όρισμένες περιπτώσεις με τό μετασχηματισμό τών ριζικών σε απλά.

Έτσι, ζητούμε δύο ρητούς θετικούς αριθμούς x και ψ τέτοιους ώστε: $\sqrt{A \pm \sqrt{B}} = \sqrt{x} \pm \sqrt{\psi}$, από τούς οποίους ένας τουλάχιστον να είναι μη τέλειο τετράγωνο ρητού.

Γιά τόν ύπολογισμό τών x και ψ εργαζόμαστε ως εξής:

Από τήν $\sqrt{A + \sqrt{B}} = \sqrt{x} + \sqrt{\psi}$, με ύψωση στο τετράγωνο, $A + \sqrt{B} = x + \psi + 2\sqrt{x\psi}$.

Επειδή \sqrt{B} και $\sqrt{x\psi}$ άρρητοι και A και $x + \psi$ ρητοί, έπεται (§ 63):

$$\left. \begin{aligned} A &= x + \psi \\ \sqrt{B} &= 2\sqrt{x\psi} \end{aligned} \right\} \Rightarrow A - \sqrt{B} = x + \psi - 2\sqrt{x\psi} \Rightarrow A - \sqrt{B} = (\sqrt{x} - \sqrt{\psi})^2 \Rightarrow \\ \Rightarrow \sqrt{A - \sqrt{B}} = |\sqrt{x} - \sqrt{\psi}|$$

Όστε έχουμε γιά τίς δύο περιπτώσεις $x + \psi = A$, $\sqrt{B} = 2\sqrt{x\psi}$,

$$\eta \quad x + \psi = A, \quad 4x\psi = B \quad \eta \quad x + \psi = A, \quad x\psi = \frac{B}{4}$$

Σχηματίζουμε τήν εξίσωση $\omega^2 - A\omega + \frac{B}{4} = 0$ με ρίζες τούς αριθμούς x και ψ .

Οι λύσεις αúτης τής εξίσώσεως είναι:

$$x = \frac{A + \sqrt{A^2 - B}}{2}, \quad \psi = \frac{A - \sqrt{A^2 - B}}{2}$$

Γιά να είναι οί x και ψ ρητοί, πρέπει $A^2 - B = \Gamma^2$, ($\Gamma \in \mathbb{Q}$),

$$\text{άρα } x = \frac{A + |\Gamma|}{2}, \quad \psi = \frac{A - |\Gamma|}{2}$$

Αντιστρόφως. Αν $x, \psi \in \mathbb{Q}^+$ και $x = \frac{A + |\Gamma|}{2}$, $\psi = \frac{A - |\Gamma|}{2}$, τότε :

$$(\sqrt{x} \pm \sqrt{\psi})^2 = x + \psi \pm 2\sqrt{x\psi} = \frac{A + |\Gamma|}{2} + \frac{A - |\Gamma|}{2} \pm 2\sqrt{\frac{A^2 - \Gamma^2}{4}} = A \pm \sqrt{B}.$$

Άρα $|\sqrt{x} \pm \sqrt{\psi}| = \sqrt{A \pm \sqrt{B}}$

Ώστε: Για να υπάρχουν ρητοί θετικοί αριθμοί x και ψ , με τον ένα τουλάχιστο μή τέλειο τετράγωνο ρητού, και τέτοιοι, ώστε $\sqrt{A \pm \sqrt{B}} = \sqrt{x} \pm \sqrt{\psi}$ πρέπει και άρκει να είναι $A, B \in \mathbb{Q}^+$, $A^2 - B = \Gamma^2$, ($\Gamma \in \mathbb{Q}$).

Ο μετασχηματισμός τότε του διπλού ριζικού μπορεί να γίνει σύμφωνα με τον τύπο:

$$\pm \sqrt{A \pm \sqrt{B}} = \pm \left(\sqrt{\frac{A + |\Gamma|}{2}} \pm \sqrt{\frac{A - |\Gamma|}{2}} \right)$$

Παραδείγματα: Να μετασχηματισθεί καθένα από τὰ διπλά ριζικά σε άπλά:

$$\sqrt{3+2\sqrt{2}}, \quad \sqrt{2\alpha+2\sqrt{\alpha^2-\beta^2}}.$$

Λύση: α) Έπειδή: $\sqrt{3+2\sqrt{2}} = \sqrt{3+\sqrt{8}}$ και $3^2 - 8 = 1 = 1^2$, έχουμε:

$$\sqrt{3+2\sqrt{2}} = \sqrt{\frac{3+1}{2}} + \sqrt{\frac{3-1}{2}} = \sqrt{2} + \sqrt{1} = \sqrt{2} + 1$$

β) Έχουμε $\sqrt{2\alpha+2\sqrt{\alpha^2-\beta^2}} = \sqrt{2\alpha+\sqrt{4(\alpha^2-\beta^2)}}$ και έπειδή $A = 2\alpha$, $B = 4(\alpha^2 - \beta^2)$, έπεται $A^2 - B = 4\alpha^2 - 4(\alpha^2 - \beta^2) = 4\beta^2 = \Gamma^2$.

Άρα $\sqrt{2\alpha+2\sqrt{\alpha^2-\beta^2}} = \sqrt{\frac{2\alpha+2\beta}{2}} + \sqrt{\frac{2\alpha-2\beta}{2}} = \sqrt{\alpha+\beta} + \sqrt{\alpha-\beta}$.

Υποθέσαμε $\alpha \geq \beta > 0$.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Ομάδα α'

399) Να μετασχηματισθουν σε άπλά ριζικά οι παραστάσεις:

$$1) \sqrt{7+\sqrt{13}}, \quad \sqrt{8-\sqrt{15}}, \quad \sqrt{9+4\sqrt{5}}, \quad \sqrt{14-2\sqrt{13}},$$

$$2) \sqrt{11-2\sqrt{30}} + \sqrt{7-2\sqrt{10}}, \quad \sqrt{3+8\sqrt{7+4\sqrt{3}}} + \sqrt{3+8\sqrt{7-4\sqrt{3}}}$$

Ομάδα β'

400) Να μετασχηματισθουν σε άπλά ριζικά οι παραστάσεις:

$$1) \sqrt{\alpha+2\sqrt{\alpha-1}}, \quad \sqrt{\alpha^2+3-2\alpha\sqrt{3}}, \quad \sqrt{\alpha+\beta-\gamma-2\sqrt{(\beta-\gamma)\alpha}}$$

401) Να βρεθεί η τιμή του λ , ώστε η παράσταση, $\psi = \sqrt{x+4} + \lambda\sqrt{x-4}$ να μπορεί να τραπεεί σε άπλά ριζικά.

402) Να αποδειχθεί ότι η παράσταση $\psi = \sqrt{x+3\sqrt{2x-9}} - \sqrt{x-3\sqrt{2x-9}}$ Ισοϋται με $\sqrt{2(2x-9)}$, αν $4,5 < x < 9$ και είναι ανεξάρτητη από τό x , αν $x > 9$.

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ (1)

§ 115. **Όρισμός.** "Όταν μιιά εξίσωση $\varphi(x) = 0$ με ρίζα τόν αριθμό $\rho \neq \pm 1$, έχει ρίζα καί τόν αριθμό $\frac{1}{\rho}$, ὅπου $\rho \neq 0$, τότε λέγεται **ἀντίστροφη**.

Σύμφωνα μέ τόν ὄρισμό αὐτό, μιιά ἀντίστροφη εξίσωση δέ μεταβάλλεται, ἂν ἀντί γιά x τεθεῖ τό $\frac{1}{x}$, ($x \neq 0$).

Π.χ. ἡ εξίσωση $\alpha x^3 + \beta x^2 + \beta x + \alpha = 0$ εἶναι ἀντίστροφη 3ου βαθμοῦ, γιατί ἂν ἀντί γιά x τεθεῖ σ' αὐτή $\frac{1}{x}$, βρίσκουμε:

$\alpha \cdot \frac{1}{x^3} + \beta \cdot \frac{1}{x^2} + \beta \cdot \frac{1}{x} + \alpha = 0 \Leftrightarrow \alpha + \beta x + \beta x^2 + \alpha x^3 = 0$, πού εἶναι ἡ ἴδια μέ τήν $\alpha x^3 + \beta x^2 + \beta x + \alpha = 0$.

Ἐποδεικνύεται ὅτι:

Ἀναγκαῖα καί ἰκανή συνθήκη, γιά νά εἶναι μιιά εξίσωση $\varphi(x) = 0$ ἀντίστροφη, εἶναι οἱ συντελεστές τῶν ὄρων, πού ἀπέχουν ἐξίσου ἀπό τοὺς ἀκραίους ὄρους, νά εἶναι ἴσοι ἢ ἀντίθετοι.

Εἰδικότερα, ἂν ἡ ἀντίστροφη εξίσωση εἶναι πλήρης ἄρτιου βαθμοῦ, ὁπότε δέν ἔχει ρίζες τοὺς ἀριθμούς ± 1 , τότε οἱ συντελεστές τῶν ὄρων, πού ἀπέχουν ἐξίσου ἀπό τοὺς ἀκραίους ὄρους, εἶναι ἴσοι.

Σύμφωνα μέ τά παραπάνω οἱ ἀντίστροφες ἐξισώσεις β' μέχρι καί ε' βαθμοῦ εἶναι:

$\alpha x^2 + \beta x + \alpha = 0$	$\alpha x^3 + \beta x^2 + \beta x + \alpha = 0$
$\alpha x^4 + \beta x^3 + \gamma x^2 + \beta x + \alpha = 0$	$\alpha x^3 + \beta x^2 - \beta x - \alpha = 0$
$\alpha x^4 + \beta x^3 + \beta x + \alpha = 0$	$\alpha x^5 + \beta x^4 + \gamma x^3 + \gamma x^2 + \beta x + \alpha = 0$
$\alpha x^4 + \beta x^3 - \beta x - \alpha = 0$	$\alpha x^5 + \beta x^4 + \gamma x^3 - \gamma x^2 - \beta x - \alpha = 0$

Ἡ λύση τῶν ἀντίστροφων ἐξισώσεων 3ου, 4ου καί 5ου βαθμοῦ μπορεῖ γενικά νά ἀναχθεῖ στή λύση δευτεροβάθμιας ἐξισώσεως.

116. ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ.

1. Ἐπίλυση ἀντίστροφων ἐξισώσεων 3ου καί 4ου βαθμοῦ χωρίς τό μεσαῖο ὄρο.

Τό πρῶτο μέλος τῶν ἐξισώσεων αὐτῶν μετασχηματίζεται εὐκόλα σέ γινόμενο παραγόντων.

α) Ἡ ἀντίστροφη $\alpha x^3 + \beta x^2 + \beta x + \alpha = 0$ ($\alpha, \beta \in \mathbf{R}$)

Ἐχουμε: $\alpha x^3 + \beta x^2 + \beta x + \alpha = 0 \Leftrightarrow \alpha(x^3 + 1) + \beta x(x + 1) = 0 \Leftrightarrow (x + 1)[\alpha x^2 + (\beta - \alpha)x + \alpha] = 0$. Αὐτή εἶναι ἰσοδύναμη μέ τό ζεῦγος τῶν ἐξισ. $x + 1 = 0$ καί $\alpha x^2 + (\beta - \alpha)x + \alpha = 0$, ὁπότε ἔχουμε $x = -1$ καί ἄλλες δύο ρίζες ἀντίστροφες ἀπό τήν ἀντίστροφη ἐξίσωση $\alpha x^2 + (\beta - \alpha)x + \alpha = 0$.

(1) Ἡ ἔννοια τῆς ἀντίστροφης ἐξισώσεως ὀφείλεται στόν De Moivre (1667-1754).

β) Ἡ ἀντίστροφη $ax^3 + \beta x^2 - \beta x - a = 0$ ($a, \beta \in \mathbb{R}$).

Μέ ἀνάλογο τρόπο ἔχουμε $(x - 1)[ax^2 + (\alpha + \beta)x + \alpha] = 0$, ὁπότε παίρνομε $x = 1$ καί ἄλλες δύο ρίζες ἀντίστροφες ἀπὸ τὴ δευτεροβάθμια.

γ) Ἡ ἀντίστροφη $ax^4 + \beta x^3 - \beta x - a = 0$ ($a, \beta \in \mathbb{R}$).

Ἔχουμε: $ax^4 + \beta x^3 - \beta x - a = 0 \Leftrightarrow a(x^4 - 1) + \beta x(x^2 - 1) = 0 \Leftrightarrow \Leftrightarrow (x^2 - 1)[ax^2 + \beta x + \alpha] = 0$. Αὐτὴ ἰσοδυναμεῖ μὲ τὸ ζεῦγος τῶν ἐξισ. $x^2 - 1 = 0$ καί $ax^2 + \beta x + \alpha = 0$, ὁπότε ἔχουμε $x = \pm 1$ καί δύο ἄλλες ρίζες ἀντίστροφες.

Σημ. Ἡ ἀντίστροφη $ax^4 + \beta x^3 + \beta x + \alpha = 0$ ἐπιλύεται, ὅπως ἡ πλήρης 4ου βαθμοῦ $ax^4 + \beta x^3 + \gamma x^2 + \beta x + \alpha = 0$ παρακάτω.

2. Ἐπίλυση ἀντίστροφων ἐξισ. 4ου καὶ 5ου βαθμοῦ.

α) Ἡ ἀντίστροφη $ax^4 + \beta x^3 + \gamma x^2 + \beta x + \alpha = 0$ ($\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$).

Διαιροῦμε τὰ δύο μέλη μὲ x^2 , ($x \neq 0$), ὁπότε ἔχουμε $ax^2 + \beta x + \gamma + \frac{\beta}{x} + \frac{\alpha}{x^2} = 0 \Leftrightarrow \alpha \left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) + \beta \left(x + \frac{1}{x}\right) + \gamma = 0$. Ἐκτελοῦμε τὸ μετασχηματισμὸ $x + \frac{1}{x} = \omega$, ὁπότε $x^2 + \frac{1}{x^2} = \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - 2x \cdot \frac{1}{x} = \omega^2 - 2$. Ἔτσι ἔχουμε $\alpha(\omega^2 - 2) + \beta\omega + \gamma = 0 \Leftrightarrow \alpha\omega^2 + \beta\omega + \gamma - 2\alpha = 0$. Αὐτὴ λέγεται ἐπιλύουσα τῆς ἀντίστροφης ἐξισώσεως καὶ ἔχει γενικά δύο ρίζες ω_1, ω_2 . Ἄν ἐπανέλθουμε στὸ μετασχηματισμὸ $x + \frac{1}{x} = \omega$, παίρνομε τὶς ἐξισώσεις: $x + \frac{1}{x} = \omega_1$ καὶ $x + \frac{1}{x} = \omega_2$ ἢ $x^2 - \omega_1 x + 1 = 0$ καὶ $x^2 - \omega_2 x + 1 = 0$, ποὺ δίνουν ἀπὸ δύο ρίζες ἢ καθεμίᾳ, καὶ συνεπῶς ἡ ἀντίστροφη 4ου βαθμοῦ ἔχει γενικά 4 ρίζες.

Τὸ εἶδος τῶν 4 αὐτῶν ριζῶν ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ εἶδος τῶν ριζῶν ω_1, ω_2 τῆς ἐπιλύουσας καὶ ἀπὸ τὶς διακρίνουσες $\Delta_1 = \omega_1^2 - 4$ καὶ $\Delta_2 = \omega_2^2 - 4$ τῶν ἐξισώσεων $x^2 - \omega_1 x + 1 = 0$ καὶ $x^2 - \omega_2 x + 1 = 0$ ἀντίστοιχα.

Παράδειγμα: Νά ἐπιλυθεῖ ἡ ἐξίσωση $6x^4 - 35x^3 + 62x^2 - 35x + 6 = 0$.

Ἐπίλυση: Διαιροῦμε διὰ x^2 καὶ λαμβάνομε διαδοχικά:

$$6x^4 - 35x^3 + 62x^2 - 35x + 6 = 0 \Leftrightarrow 6 \left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) - 35 \left(x + \frac{1}{x}\right) + 62 = 0.$$

Αὐτὴ γιὰ $x + \frac{1}{x} = \omega \Rightarrow x^2 + \frac{1}{x^2} = \omega^2 - 2$ γίνεται: $6\omega^2 - 35\omega + 50 = 0$, ὁπότε

$$\omega_1 = \frac{10}{3} \text{ καὶ } \omega_2 = \frac{5}{2}$$

Έτσι έχουμε τις εξισώσεις :

$$\begin{cases} 3x^2 - 10x + 3 = 0 \text{ και άρα } x_1 = 3 \text{ και } x_2 = \frac{1}{3} \\ 2x^2 - 5x + 2 = 0 \text{ και άρα } x_3 = 2 \text{ και } x_4 = \frac{1}{2} \end{cases}$$

β) 'Η αντίστροφη $\alpha x^5 + \beta x^4 + \gamma x^3 + \gamma x^2 + \beta x + \alpha = 0$ ($\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$).

Έχουμε: $\alpha x^5 + \beta x^4 + \gamma x^3 + \gamma x^2 + \beta x + \alpha = 0 \Leftrightarrow$
 $\alpha(x^5 + 1) + \beta x(x^3 + 1) + \gamma x^2(x + 1) = 0 \Leftrightarrow$
 $(x + 1) [\alpha(x^4 - x^3 + x^2 - x + 1) + \beta x(x^2 - x + 1) + \gamma x^2] = 0.$

Αυτή είναι ισοδύναμη με το ζεύγος

$$x + 1 = 0, \quad \alpha x^4 + (\beta - \alpha)x^3 + (\alpha - \beta + \gamma)x^2 + (\beta - \alpha)x + \alpha = 0.$$

'Η πρώτη δίνει $x = -1$. 'Η δεύτερη είναι αντίστροφη 4ου βαθμού και επιλύεται κατά τά γνωστά.

γ) 'Η αντίστροφη $\alpha x^5 + \beta x^4 + \gamma x^3 - \gamma x^2 - \beta x - \alpha = 0$ ($\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$).

Μά ανάλογο τρόπο έχουμε το ζεύγος τών εξισώσεων:

$$\begin{cases} x - 1 = 0 \\ \alpha x^4 + (\alpha + \beta)x^3 + (\alpha + \beta + \gamma)x^2 + (\alpha + \beta)x + \alpha = 0. \end{cases}$$

Αυτή πάλι είναι αντίστροφη 4ου βαθμού.

Γενικές παρατηρήσεις: 1) Οί αντίστροφες εξισώσεις βαθμού ανώτερου από 5ο δέν μπορούν γενικά νά επιλυθούν με άναγωγή σέ δευτεροβάθμιες εξισώσεις.

2) 'Ο μετασχηματισμός $x + \frac{1}{x} = \omega$ ύποβιβάζει γενικά τό βαθμό μιās αντίστροφης εξισώσεως άρτιου βαθμού στό μισό του βαθμού της.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

'Ο μ ά δ α α'

403) Νά επιλυθούν οι εξισώσεις:

$$\begin{array}{ll} 1) & 3x^3 + 13x^2 + 13x + 3 = 0, & x^3 - \frac{37}{12}x^2 + \frac{37}{12}x - 1 = 0 \\ 2) & x^4 - 6x^3 + 6x - 1 = 0, & x^4 + x^3 - 4x^2 + x + 1 = 0 \\ 3) & 2x^4 - 5x^3 + 7x^2 - 5x + 2 = 0, & \\ 4) & x^5 - 4x^4 + 3x^3 + 3x^2 - 4x + 1 = 0, & 2x^5 - 3x^4 - 5x^3 + 5x^2 + 3x - 2 = 0 \end{array}$$

'Ο μ ά δ α β'

404) Νά επιλυθούν οι εξισώσεις:

$$\frac{x^2 + 1}{x^2} = \frac{1}{(x-1)^2}, \quad \frac{(1+x)^4}{1+x^4} = 2, \quad \frac{(x^2 - x + 1)^2}{x^4 - x^3 + x^2 - x + 1} = \frac{9}{13}$$

405) Νά επιλυθούν οι εξισώσεις (μή αντίστροφες):

$$\begin{array}{ll} 1) & 6x^4 + 25x^3 + 12x^2 - 25x + 6 = 0, & 2) & x^6 + 2x^4 + 2x^2 + 1 = 0 \\ 3) & 5x^4 - 16x^3 + 2x^2 + 16x + 5 = 0, & 4) & x^4 + 2x^3 + 3x^2 + 4x + 4 = 0 \end{array}$$

406) Νά επιλυθεί και νά διερευνηθεί ή $x^3 + \lambda x^2 + \lambda x + 1 = 0$ ($\lambda \in \mathbb{R}$).

ΔΙΩΝΥΜΕΣ ΚΑΙ ΤΡΙΩΝΥΜΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

117. ΔΙΩΝΥΜΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ.

Όρισμός. Λέγεται διώνυμη εξίσωση με άγνωστο τον x , κάθε εξίσωση της μορφής $Ax^κ + Bx^λ = 0$, όπου A και B πραγματικοί αριθμοί ή πραγματικές παραστάσεις ανεξάρτητες από τον x και $κ, λ \in \mathbb{N}$.

Οι εξισώσεις: $x^3 + 8 = 0, x^4 - 81 = 0, 27x^4 - 64x = 0,$
 $2x^3 - 3x^2 = 0$ είναι διώνυμες.

Έπίλυση της εξίσ. $Ax^κ + Bx^λ = 0$ ($A \neq 0$ και $κ > λ \in \mathbb{N}$).

*Έχουμε: $Ax^κ + Bx^λ = 0 \Leftrightarrow Ax^λ \left(x^{κ-λ} + \frac{B}{A} \right) = 0 \Leftrightarrow x^λ \left(x^{κ-λ} + \frac{B}{A} \right) = 0.$

Αυτή είναι ισοδύναμη με τό ζευγος των εξισώσεων $x^λ = 0, x^{κ-λ} + \frac{B}{A} = 0.$

*Από την πρώτη $x^λ = 0$ έχουμε $λ$ ρίζες ίσες με 0 , ($x_1 = x_2 = \dots = x_λ = 0$). Δηλαδή τό 0 είναι ρίζα βαθμού πολλαπλότητας $λ$.

*Η δεύτερη εξίσωση, αν θέσουμε $κ - λ = ν \in \mathbb{N}$ και $-\frac{B}{A} = α$, γράφεται: $x^ν = α$. Διακρίνουμε τις περιπτώσεις:

α) *Αν $ν$ άρτιος, τότε έχει δύο ρίζες πραγματικές αντίθετες όταν $α > 0$ και καμιά πραγματική όταν $α < 0$.

β) *Αν $ν$ περιττός, τότε έχει πάντοτε μία μόνη πραγματική ρίζα, που είναι θετική όταν $α > 0$, και αρνητική όταν $α < 0$.

Οι υπόλοιπες ρίζες είναι καθαρές μιγαδικές, που την αναζητήσή τους θα εξετάσουμε σε άλλη τάξη. *Εμείς μπορούμε να βρούμε τις καθαρές μιγαδικές ρίζες, όταν ο $ν$ πάρει μικρές τιμές.

Παραδείγματα: Νά επίλυθούν οι εξισώσεις:

1) $x^3 + 1 = 0,$ 2) $x^4 + 16 = 0,$ 3) $x^6 - 1 = 0,$ 4) $x^5 - 5x^2 = 0.$

***Έπίλυση:** 1) *Έχουμε: $x^3 + 1 = 0 \Leftrightarrow (x + 1)(x^2 - x + 1) = 0.$

Αυτή είναι ισοδύναμη με τό ζευγος $x + 1 = 0$ και $x^2 - x + 1 = 0,$

όπότε έχουμε $x_1 = -1$ και $x_2 = \frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2}, x_3 = \frac{1}{2} - i \frac{\sqrt{3}}{2}$

2) *Έχουμε: $x^4 + 16 = 0 \Leftrightarrow x^4 + 16 + 8x^2 - 8x^2 = 0 \Leftrightarrow$

$(x^2 + 4)^2 - (2\sqrt{2}x)^2 = 0 \Leftrightarrow (x^2 + 2\sqrt{2}x + 4)(x^2 - 2\sqrt{2}x + 4) = 0.$

Αυτή είναι ισοδύναμη με τό ζευγος $x^2 + 2\sqrt{2}x + 4 = 0$

και $x^2 - 2\sqrt{2}x + 4 = 0,$

όπότε έχουμε τις ρίζες $x_1, x_2, x_3, x_4.$

3) Τήν εξίσωση $x^6 - 1 = 0$ μπορούμε νά τήν επιλύσουμε, αν επιλύσουμε μία από τίς Ισοδύναμες τής:

α) $(x^3 + 1)(x^3 - 1) = 0$. Αύτή δίνει: $x^3 + 1 = 0$, $x^3 - 1 = 0$

β) $(x^2 - 1)(x^4 + x^2 + 1) = 0$. Αύτή δίνει: $x^2 - 1 = 0$, $x^4 + x^2 + 1 = 0$

γ) $(x - 1)(x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1) = 0$. Αύτή δίνει τίς εξισώσεις $x - 1 = 0$, $x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1 = 0$ (άντίστροφη).

4) Έχουμε: $x^5 - 5x^2 = 0 \Leftrightarrow x^2(x^3 - 5) = 0$. Αύτή είναι Ισοδύναμη μέ τό ζεῦγος $x^2 = 0$ καί $x^3 - 5 = 0$. Από τήν $x^2 = 0$ ἔχουμε $x_1 = x_2 = 0$. Ἡ δεύτερη

γράφεται $x^3 - (\sqrt[3]{5})^3 = 0 \Leftrightarrow (x - \sqrt[3]{5})(x^2 + \sqrt[3]{5}x + \sqrt[3]{25}) = 0$. Αύτή Ισοδυναμεί μέ τό ζεῦγος τῶν εξισώσ. $x - \sqrt[3]{5} = 0$, $x^2 + \sqrt[3]{5}x + \sqrt[3]{25} = 0$,

ὅποτε ἔχουμε $x_1 = \sqrt[3]{5}$, $x_2 = \frac{\sqrt[3]{5}}{2}(-1 + i\sqrt{3})$, $x_3 = \frac{\sqrt[3]{5}}{2}(-1 - i\sqrt{3})$.

118. ΤΡΙΩΝΥΜΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ.

Όρισμός: Λέγεται τριώνυμη εξίσωση, μέ ἕναν ἄγνωστο, κάθε εξίσωση τῆς μορφῆς $Ax^k + Bx^l + \Gamma x^m = 0$, ὅπου A, B, Γ πραγματικοί ἀριθμοί ἢ πραγματικές παραστάσεις ἀνεξάρτητες ἀπό τόν ἄγνωστο x καί $k, l, m \in \mathbb{N}$.

Ἐδῶ μᾶς ἐνδιαφέρει μόνο ἡ περίπτωση πού ἔχουμε $k - l = l - m$, μέ $k > l > m$, γιατί τότε ἡ επίλυση τῆς $Ax^k + Bx^l + \Gamma x^m = 0$ ἀνάγεται στήν επίλυση τῆς εξισώσεως $Ax^{2v} + Bx^v + \Gamma = 0$, $v \in \mathbb{N}$.

Ἐπίλυση: Ἐάν $k - l = l - m = v \Rightarrow l = m + v, k = m + 2v$, ὅποτε: $Ax^{m+2v} + Bx^{m+v} + \Gamma x^m = 0 \Leftrightarrow x^m(Ax^{2v} + Bx^v + \Gamma) = 0$. Αύτή είναι Ισοδύναμη μέ τό ζεῦγος $x^m = 0$, $Ax^{2v} + Bx^v + \Gamma = 0$. Ἡ $x^m = 0$ δίνει $x_1 = x_2 = \dots = x_m = 0$. Δηλαδή ἔχει τό μηδέν ρίζα βαθμοῦ πολλαπλότητας m .

Στήν $Ax^{2v} + Bx^v + \Gamma = 0$, ἂν ἐκτελέσουμε τό μετασχηματισμό $x^v = \psi$, παίρουμε $A\psi^2 + B\psi + \Gamma = 0$. Αύτή λέγεται ἐπιλύουσα τῆς εξισώσεως καί ἔχει γενικά δύο λύσεις ψ_1 καί ψ_2 . Ἐάν ἐπανέλθουμε στό μετασχηματισμό $x^v = \psi$, παίρουμε τίς διωνυμες εξισώσεις $x^v = \psi_1$ καί $x^v = \psi_2$.

Τό εἶδος τῶν ριζῶν τῆς εξισώσ. $Ax^{2v} + Bx^v + \Gamma = 0$ ἐξαρτᾶται ἀπό τό εἶδος τῶν ριζῶν τῆς ἐπιλύουσάς τής.

Παράδειγμα: Νά ἐπιλυθεῖ ἡ εξίσωση $x^{10} - 26x^7 - 27x^4 = 0$.

Ἐπίλυση: Ἐχουμε $10 - 7 = 7 - 4$, ἄρα ἡ εξίσωση γράφεται: $x^4(x^6 - 26x^3 - 27) = 0$. Αύτή είναι Ισοδύναμη μέ τό ζεῦγος τῶν $x^4 = 0$, ($x_1 = x_2 = x_3 = x_4 = 0$), $x^6 - 26x^3 - 27 = 0$ καί γιά $x^3 = \psi$ δίνει τήν ἐπιλύουσα $\psi^2 - 26\psi - 27 = 0$. πού οἱ ρίζες τής είναι $\psi_1 = 27$, $\psi_2 = -1$.

Συνεπῶς ἔχουμε γιὰ ἐπίλυση τὶς διώνυμες ἐξισώσεις:

$$x^3 = 27 \Leftrightarrow (x-3)(x^2+3x+9) = 0. \text{ Ρίζες } x_5 = 3, x_{6,7} = -\frac{3}{2} \pm \frac{3i\sqrt{3}}{2}$$

$$x^3 = -1 \Leftrightarrow (x+1)(x^2-x+1) = 0. \text{ Ρίζες } x_8 = -1, x_{9,10} = \frac{1}{2} \pm \frac{i\sqrt{3}}{2}$$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

‘Ο μ α δ α α’

407) Νά ἐπιλυθοῦν οἱ ἐξισώσεις:

1) $x^3 - 8 = 0,$	8x ³ + 27 = 0,	64x ⁶ - x ² = 0,	x ⁵ - 81x - 0
2) $x^6 - 32 = 0,$	x ⁸ - 256 = 0,	x ⁶ ± 729 = 0,	x ¹² - 1 = 0
3) $x^{10} ± 1 = 0,$	x ⁸ ± 1 = 0,	3x ⁷ - 2x ⁴ = 0,	x ⁹ - x ⁵ + x ⁴ - 1 = 0

‘Ο μ α δ α β’

408) Νά ἐπιλυθοῦν οἱ ἐξισώσεις:

1) $x^6 - 5x^3 - 24 = 0,$	x ⁸ - 80x ⁴ - 81 = 0,	x ¹⁰ + 31x ⁵ - 32 = 0
2) $x^{12} - 33x^7 + 32x^2 = 0,$	(x-1) ⁶ - 9(x-1) ³ + 8 = 0,	2x ³ + $\frac{3}{x^3} = 5$

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΜΕ ΡΙΖΙΚΑ (ἄρρητες ἐξισώσεις)

119. Ἐξίσωση μὲ ριζικά ἢ ἄρρητη ἐξίσωση, μὲ ἓνα ἄγνωστο, λέγεται κάθῃ ἐξίσωση πού τὸ ἓνα τουλάχιστο μέλος τῆς εἶναι ἄρρητη ἀλγεβρική παράσταση τοῦ ἀγνώστου.

Ἡ ἐπίλυση μιᾶς ἄρρητης ἐξισώσεως γίνεται στό σύνολο ὀρισμοῦ τῶν ἄρρητων παραστάσεων τῆς. Ὡς σύνολο ὀρισμοῦ θά θεωρεῖται ἐκεῖνο πού κάνει πραγματικές τὶς παραστάσεις τῆς ἐξισώσεως. Αὐτό εἶναι γενικά ὑποσύνολο τοῦ συνόλου R.

Κατά τήν ἐπίλυση μιᾶς ἄρρητης ἐξισώσεως ἐπιδιώκουμε τήν ἀναγωγή τῆς σέ ρητή ἐξίσωση, ἢ ὅποια δέν εἶναι γενικά ἰσοδύναμη μὲ τήν ἄρρητη ἐξίσωση. Γιὰ τὸ σκοπὸ αὐτό πρέπει νά ἔχουμε ὑπόψη μας τὶς παρακάτω προτάσεις:

1) Ἄν τὰ μέλη μιᾶς ἐξισ. $\varphi(x) = f(x)$ τὰ ὑψώσουμε σέ ἄρτια δύναμη, ἢ ἐξίσωση πού προκύπτει ἔχει ρίζες τὶς πραγματικές ρίζες τῆς ἀρχικῆς καὶ τὶς πραγματικές ρίζες τῆς $\varphi(x) = -f(x)$.

2) Ἄν τὰ μέλη μιᾶς ἐξισ. $\varphi(x) = f(x)$ τὰ ὑψώσουμε σέ περιττὴ δύναμη, ἢ ἐξίσωση πού προκύπτει ἔχει ρίζες μόνο τὶς πραγματικές ρίζες τῆς ἀρχικῆς. Δηλαδή εἶναι ἰσοδύναμη μὲ τήν ἀρχική στό R.

Οἱ προτάσεις αὐτὲς μιᾶς ὑποχρεώνουν, ὅταν βροῦμε τὶς ρίζες τῆς ρητῆς ἐξισώσεως (στήν ὅποια καταλήγουμε μετὰ ἀπὸ διαδοχικές ὑψώσεις σέ δύναμη

για την εξάλειψη των ριζικών), να ελέγχουμε αν οι ρίζες ικανοποιούν τους περιορισμούς που θέσαμε. Οι περιορισμοί, που απαραίτητα πρέπει να θέτουμε, εξασφαλίζουν δόσημα και πραγματικά μέλη στην εξίσωση.

120. ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΡΙΖΙΚΑ.

α) Τῆς μορφῆς $\sqrt{\varphi(x)} = f(x)$ στό \mathbb{R} , ὅπου $\varphi(x), f(x) \in \mathbb{Q}$.

Πρέπει νά εἶναι $\varphi(x) \geq 0 \Rightarrow \sqrt{\varphi(x)} \geq 0$, ὁπότε καί $f(x) \geq 0$. Ὅταν ὑψώσουμε στό τετράγωνο τά μέλη τῆς εξισώσεως, παίρνουμε $\varphi(x) = [f(x)]^2$. Αὐτή εἶναι ἰσοδύναμη μέ τό ζεῦγος τῶν ἐξισ. $\sqrt{\varphi(x)} = f(x)$ καί $\sqrt{\varphi(x)} = -f(x)$. Εἶναι φανερό ὅτι οἱ λύσεις τῆς $\sqrt{\varphi(x)} = -f(x)$ δέν εἶναι λύσεις τῆς $\sqrt{\varphi(x)} = f(x)$.

Ἄπό τά παραπάνω συμπεραίνουμε ὅτι ἡ εξίσωση $\sqrt{\varphi(x)} = f(x)$ καί τό σύστημα τῶν $\varphi(x) \geq 0, f(x) \geq 0, \varphi(x) = [f(x)]^2$ ἔχουν τίς ἴδιες λύσεις.

Παράδειγμα: Νά ἐπιλυθεῖ ἡ ἐξισ. $2x - 3 = \sqrt{x^2 - 2x + 6}$ στό \mathbb{R} .

$$\text{Ἐπίλυση: Ἔχουμε: } 2x - 3 = \sqrt{x^2 - 2x + 6} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - 2x + 6 \geq 0 \\ 2x - 3 \geq 0 \\ (2x - 3)^2 = x^2 - 2x + 6 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x \in \mathbb{R} \text{ (γιατί;)} \\ x \geq \frac{3}{2} \\ 3x^2 - 10x + 3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq \frac{3}{2} \\ x_1 = 3, x_2 = \frac{1}{3} \end{cases} \Leftrightarrow x = 3$$

Ἄρα ἡ $x = 3$ εἶναι ρίζα τῆς εξισώσεως.

Σημείωση: Τήν εξίσωση μποροῦμε νά τήν λύσουμε καί ὡς ἐξῆς:

$$2x - 3 = \sqrt{x^2 - 2x + 6} \Rightarrow (2x - 3)^2 = x^2 - 2x + 6 \Rightarrow 3x^2 - 10x + 3 = 0, \text{ ὁπότε } x_1 = 3 \text{ καί } x_2 = \frac{1}{3}$$

Ἡ τιμή $x_1 = 3$ ἐπαληθεύει τήν εξίσωση, γιατί $2 \cdot 3 - 3 = \sqrt{3^2 - 2 \cdot 3 + 6} \Leftrightarrow 3 = \sqrt{9}$,

ὁπότε εἶναι ρίζα τῆς εξισώσεως, ἐνῶ ἡ τιμή $x_2 = \frac{1}{3}$ δέν ἐπαληθεύει τήν ἐξι-

$$\text{σωση, γιατί } 2 \cdot \frac{1}{3} - 3 = \sqrt{\left(\frac{1}{3}\right)^2 - 2 \cdot \frac{1}{3} + 6} \Rightarrow -\frac{7}{3} = \sqrt{\frac{49}{9}} \Rightarrow -\frac{7}{3} = \frac{7}{3}$$

ὁπότε ἀπορρίπτεται.

β) Τῆς μορφῆς (1) $\sqrt{f(x)} + \sqrt{\varphi(x)} = \sigma(x)$ στό \mathbb{R} , ὅπου $f(x), \varphi(x)$ καί $\sigma(x)$ ρητές συναρτήσεις τοῦ x .

Πρέπει νά εἶναι $f(x) \geq 0, \varphi(x) \geq 0, \sigma(x) \geq 0$.

Ἄν ὑψώσουμε τά μέλη στό τετράγωνο, παίρνουμε.

$$f(x) + \varphi(x) + 2\sqrt{f(x) \cdot \varphi(x)} = [\sigma(x)]^2 \Leftrightarrow 2\sqrt{f(x) \cdot \varphi(x)} = [\sigma(x)]^2 - f(x) - \varphi(x).$$

Επίσης πρέπει $[\sigma(x)]^2 - f(x) - \varphi(x) \geq 0$.

Υψώνουμε πάλι στο τετράγωνο, οπότε παίρνουμε:

$$4f(x) \cdot \varphi(x) = [[\sigma(x)]^2 - f(x) - \varphi(x)]^2 \quad (2)$$

Έτσι συμπεραίνουμε ότι η εξίσωση (1) είναι Ισοδύναμη με τό σύστημα:

$$\begin{cases} f(x) \geq 0, \varphi(x) \geq 0, \sigma(x) \geq 0 \\ [\sigma(x)]^2 - f(x) - \varphi(x) \geq 0 \\ 4f(x) \cdot \varphi(x) = [[\sigma(x)]^2 - f(x) - \varphi(x)]^2 \end{cases}$$

Τό σύστημα αυτό είναι Ισοδύναμο με τό σύστημα:

$$\begin{cases} \sigma(x) \geq 0, [\sigma(x)]^2 - f(x) - \varphi(x) \geq 0 \\ 4f(x) \cdot \varphi(x) = [[\sigma(x)]^2 - f(x) - \varphi(x)]^2 \end{cases}$$

Γιατί : 'Από τήν

$$4f \cdot \varphi = (\sigma^2 - f - \varphi)^2 \Leftrightarrow 4f \cdot \varphi = \sigma^4 - 2 \cdot \sigma^2(f + \varphi) + (f + \varphi)^2 \Leftrightarrow \sigma^4 + (f - \varphi)^2 = 2 \cdot \sigma^2(f + \varphi),$$

οπότε πρέπει $f + \varphi \geq 0$. Επίσης από τήν (2) προκύπτει $f \cdot \varphi \geq 0$.

Άρα πρέπει $f \geq 0$ και $\varphi \geq 0$.

Παράδειγμα : Νά επιλυθεί στό \mathbb{R} ή εξίσ. $\sqrt{x-8} + \sqrt{x-5} = 3$.

Επίλυση :

$$\text{Έχουμε : } \sqrt{x-8} + \sqrt{x-5} = 3 \Leftrightarrow \begin{cases} x-8 > 0 \\ x-5 > 0 \\ x-8 + x-5 + 2\sqrt{(x-8)(x-5)} = 9 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x > 8 \\ \sqrt{(x-8)(x-5)} = 11-x \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > 8 \\ x < 11 \\ (x-8) \cdot (x-5) = (11-x)^2 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 8 < x < 11 \\ x = 9 \end{cases} \Leftrightarrow x = 9$$

Άρα ή $x = 9$ είναι λύση τής εξισώσεως (1).

γ) Τής μορφής (1) $\sqrt{f(x)} + \sqrt{\varphi(x)} = \sqrt{\sigma(x)}$ στό \mathbb{R} , όπου $f(x), \varphi(x), \sigma(x) \in \mathbb{Q}$.

Πρέπει $f \geq 0, \varphi \geq 0, \sigma \geq 0$. Έτσι ή εξίσωση (1) είναι Ισοδύναμη με τό σύστημα:

$$\begin{cases} f \geq 0, \varphi \geq 0, \sigma \geq 0 \\ f + \varphi + 2\sqrt{f \cdot \varphi} = \sigma \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} f \geq 0, \varphi \geq 0, \sigma \geq 0 \\ 2\sqrt{f \cdot \varphi} = \sigma - (f + \varphi) \end{cases} \quad (2)$$

Επίσης πρέπει $\sigma - (f + \varphi) \geq 0$

Άρα τό σύστημα (2) και συνεπώς ή εξίσωση (1) είναι Ισοδύναμη με τό σύστημα:

$$\begin{cases} f \geq 0, \varphi \geq 0, \sigma \geq 0, \sigma - (f + \varphi) \geq 0 \\ 4f \cdot \varphi = [\sigma - (f + \varphi)]^2 \end{cases} \quad (\Sigma_1)$$

Άξιόλογη σημείωση : *Αν υποθέσουμε $f < 0, \varphi < 0, \sigma < 0$, τότε $-f > 0, -\varphi > 0, -\sigma > 0$, οπότε η εξίσωση (1) γράφεται:

$$i\sqrt{-f(x)} + i\sqrt{-\varphi(x)} = i\sqrt{-\sigma(x)} \Leftrightarrow \sqrt{-f(x)} + \sqrt{-\varphi(x)} = \sqrt{-\sigma(x)} \quad (3)$$

Η εξίσωση(3) είναι ισοδύναμη με τό σύστημα :

$$\left| \begin{array}{l} f < 0, \varphi < 0, \sigma < 0 \\ -f - \varphi + 2\sqrt{f\varphi} = -\sigma \end{array} \right. \Leftrightarrow \left| \begin{array}{l} f < 0, \varphi < 0, \sigma < 0 \\ 2\sqrt{f\varphi} = f + \varphi - \sigma \end{array} \right. \Leftrightarrow \left| \begin{array}{l} f < 0, \varphi < 0, \sigma < 0 \\ f + \varphi - \sigma > 0 \\ 4f\varphi = [(f + \varphi) - \sigma]^2 \end{array} \right. \quad (\Sigma_2)$$

*Από τὰ παραπάνω συμπεραίνουμε ότι η εξίσωση (1) έχει στο σύνολο \mathbb{R} τις λύσεις του συστήματος (Σ_1) και τις λύσεις του συστήματος (Σ_2) και μόνο αυτές, γιατί άλλες περιπτώσεις για τις ρητές παραστάσεις $f(x), \varphi(x), \sigma(x)$ είναι αδύνατες.

Παράδειγμα : Νά επιλυθεί στο \mathbb{R} η εξίσ. $\sqrt{x-8} + \sqrt{x-5} = \sqrt{3x-21}$.

Έπιλυση : Οι λύσεις παρέχονται από τὰ παρακάτω συστήματα.

*Έχουμε :

$$(\Sigma_1) \left| \begin{array}{l} x \geq 8, x \geq 5, x \geq 7 \\ x - 8 + x - 5 + 2\sqrt{(x-8)(x-5)} = 3x - 21 \end{array} \right. \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \left| \begin{array}{l} x \geq 8 \\ 2\sqrt{(x-8)(x-5)} = x - 8 \end{array} \right. \Leftrightarrow \left| \begin{array}{l} x \geq 8 \\ 4(x-8)(x-5) = (x-8)^2 \end{array} \right. \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \left| \begin{array}{l} x \geq 8 \\ x_1 = 8, x_2 = 4 \end{array} \right. \Leftrightarrow x = 8$$

$$(\Sigma_2) \left| \begin{array}{l} x < 8, x < 5, x < 7 \\ 4(x-8)(x-5) = (x-8)^2 \end{array} \right. \Leftrightarrow \left| \begin{array}{l} x < 5 \\ x_1 = 8, x_2 = 4 \end{array} \right. \Leftrightarrow x = 4$$

*Ωστε οι λύσεις τής εξίσωσης είναι:

$$x = 8 \quad \text{καί} \quad x = 4.$$

δ) Περίπτωση γενική.

*Αν η εξίσωση έχει περισσότερα από δύο τετραγωνικά ριζικά, τότε, με βάση τούς περιορισμούς που θά θέτουμε κάθε φορά, και με αλληπάλληλες ύψώσεις στο τετράγωνο, παίρνουμε ρητή εξίσωση που θά περιέχει όλες τις λύσεις τής αρχικής και άλλες ακόμη, ίσως, που δέ θά έπαληθεύουν τήν αρχική.

121. ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΜΕ ΡΙΖΙΚΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΤΑΞΕΩΝ

Οι εξισώσεις με ριζικά 3ης τάξεως και πάνω παρουσιάζουν μεγάλη ποιικιλία στις μορφές. Γι' αυτό δέν υπάρχει ένιαίος τρόπος επίλυσεως. Συνήθως ακολουθείται ή μέθοδος νά ύψώνουμε τὰ μέλη τής άρρητης εξισώσεως σε κατάλληλη δύναμη, για νά προκύψει εξίσωση με λιγότερα ριζικά.

Παραδείγματα :

α) Νά επιλυθεί στο \mathbb{R} η εξίσ. $\sqrt[3]{x^3 + 9x^2} = 3 + x$ (1).

Έπίλυση: Ύψωνουμε τά μέλη τής (1) στον κύβο, οπότε:

$$x^3 + 9x^2 = (3 + x)^3 \Leftrightarrow x = -1.$$

Ωστε η λύση $x = -1$ είναι ρίζα τής εξισώσεως (1).

β) Νά επιλυθεί στο \mathbb{R} η εξίσ. $\sqrt[4]{8x^2 - 1} = 2x$ (2).

Έπίλυση: Έχουμε:

$$\sqrt[4]{8x^2 - 1} = 2x \Leftrightarrow \begin{cases} 8x^2 - 1 \geq 0, x \geq 0 \\ 8x^2 - 1 = (2x)^4 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x \geq \frac{1}{\sqrt{8}} \\ 16x^4 - 8x^2 + 1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq \frac{1}{\sqrt{8}} \\ x_1 = x_3 = \frac{1}{2}, x_2 = x_4 = -\frac{1}{2} \end{cases} \Leftrightarrow x = \frac{1}{2}$$

γ) Νά επιλυθεί η εξίσωση $\sqrt[3]{A} + \sqrt[3]{B} + \sqrt[3]{\Gamma} = 0$, όπου A, B, Γ ρητές συναρτήσεις του άγνωστου.

Έπίλυση: Στο κεφάλαιο για τις ταυτότητες μάθαμε ότι:

$$\forall \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}: \alpha + \beta + \gamma = 0 \vee \alpha = \beta = \gamma \Leftrightarrow \alpha^3 + \beta^3 + \gamma^3 = 3\alpha\beta\gamma$$

Άρα από την εξίσωση έπεται η

$$\left(\sqrt[3]{A}\right)^3 + \left(\sqrt[3]{B}\right)^3 + \left(\sqrt[3]{\Gamma}\right)^3 = 3\sqrt[3]{A\Gamma B} \Leftrightarrow A + B + \Gamma = 3\sqrt[3]{A\Gamma B}$$

καί με ύψωση στον κύβο ή $(A + B + \Gamma)^3 = 27A\Gamma B$. Άρα έχουμε :

$$\text{Άν } x \in \mathbb{R}: \sqrt[3]{A} + \sqrt[3]{B} + \sqrt[3]{\Gamma} = 0 \Rightarrow (A + B + \Gamma)^3 = 27A\Gamma B$$

Έτσι η εξίσωση $\sqrt[3]{x-2} + \sqrt[3]{x-3} + \sqrt[3]{x-4} = 0$ είναι ισοδύναμη με την $(x-2 + x-3 + x-4)^3 = 27(x-2)(x-3)(x-4) \Leftrightarrow (3x-9)^3 = 27(x^3 - 9x^2 + 26x - 24) \Leftrightarrow (x-3)^3 = x^3 - 9x^2 + 26x - 24 \Leftrightarrow x = 3$, που είναι λύση τής εξισώσεως.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

‘Ομάδα α’

409) Νά επιλυθούν στο \mathbb{R} οι εξισώσεις:

1) $5\sqrt{x-3} = \sqrt{x+9}, \quad \sqrt{x} + \sqrt{x+32} = 16$

2) $2x = 3 + \sqrt{x^2 - 2x + 6}, \quad \sqrt{2 + \sqrt{x-5}} = \sqrt{13-x}$,

3) $\sqrt{5(x+2)} - \sqrt{x+1} = \sqrt{x+6}, \quad \sqrt{x+1} + \sqrt{x-4} = \sqrt{2x+9}$

$$4) \sqrt{x-15} - \sqrt{x-10} = \sqrt{x+6} - \sqrt{x+17}, \quad (x+3)\sqrt{x+2} = (x+2)\sqrt{x+5}$$

$$5) \frac{4-\sqrt{x}}{2} = \frac{\sqrt{4x+20}}{4+\sqrt{x}}, \quad \frac{\sqrt{x}-3}{\sqrt{x}+3} = \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-2}, \quad 2\sqrt{x} - \frac{x-8}{\sqrt{x}} = 6$$

‘Ομάδα β’

410) Νά επιλυθούν στο \mathbb{R} οι εξισώσεις:

$$1) \sqrt[3]{x+49} - \sqrt[3]{x-49} = 2, \quad \sqrt[3]{x+3} + \sqrt[3]{4-x} = 1$$

$$2) \sqrt[3]{x+2} + \sqrt[3]{2x+2} + \sqrt[3]{3x+2} = 0, \quad \sqrt[3]{5x} - \sqrt[3]{x+1} - \sqrt[3]{x-1} = 0$$

$$3) \sqrt[3]{\frac{x+2}{x-3}} + \sqrt[3]{\frac{x-3}{x+2}} = \frac{5}{2}, \quad \left(\frac{10x-1}{10x+1}\right)\sqrt[3]{\frac{2x+1}{1-2x}} = 1, \quad 4\sqrt[3]{x} - \frac{20}{\sqrt[3]{x}} = 11.$$

$$411) \text{Νά επιλυθεί στο } \mathbb{R} \text{ ή εξίσωση } \sqrt{\alpha + \sqrt{x}} + \sqrt{\alpha - \sqrt{x}} = \sqrt{x}$$

ΑΠΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΘΜΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ

122. Όρισμός. *Αν μιιά τουλάχιστον από τις εξισώσεις ενός συστήματος δύο ή περισσότερων εξισώσεων είναι δεύτερου βαθμού και πάνω, τότε τό σύστημα λέγεται σύστημα μέ βαθμό ανώτερο από τόν πρώτο.

Αυτά τά συστήματα παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία στις μορφές, γι’ αυτό δέν υπάρχει ένιαίος τρόπος επίλυσεως. Έδω αναφέρονται μερικές απλές μορφές πού παρουσιάζονται συχνά, και στις όποίες ανάγονται δυσκολότερες μορφές συστημάτων.

Γιά τήν επίλυση ενός τέτοιου συστήματος χρησιμοποιούμε, έκτός από τούς γνωστούς τρόπους επίλυσεως γραμμικοῦ συστήματος, και άλλους ειδικούς τρόπους (τεχνάσματα), πού δέν υπάγονται σέ όρισμένους κανόνες, μέ σκοπό τήν αναζήτηση πιό απλών εξισώσεων.

123. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΥΟ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΜΕ ΔΥΟ ΑΓΝΩΣΤΟΥΣ.

$$a) \text{ Τῆς μορφῆς } ax + by = \gamma, \quad Ax^2 + Bx + \Gamma\psi^2 + \Delta x + E\psi + Z = 0.$$

‘Η επίλυσή του είναι εύκολη. Μέ τή μέθοδο τῆς αντικαταστάσεως καταλήγουμε σέ δευτεροβάθμια εξίσωση. Έτσι τό σύστημα γράφεται:

$$\begin{cases} x = \frac{\gamma - \beta\psi}{\alpha} \\ A\left(\frac{\gamma - \beta\psi}{\alpha}\right)^2 + B\psi \cdot \frac{\gamma - \beta\psi}{\alpha} + \Gamma\psi^2 + \Delta \cdot \frac{\gamma - \beta\psi}{\alpha} + E\psi + Z = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\gamma - \beta\psi}{\alpha} \\ (A\beta^2 - \alpha B\beta + \beta^2\Gamma)\psi^2 + (\alpha B\gamma - 2A\beta\gamma - \alpha\beta\Delta + \alpha^2 E)\psi + (A\gamma^2 + \alpha\gamma\Delta + \alpha^2 Z) = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\gamma - \beta\psi}{\alpha} \\ K\psi^2 + \Lambda\psi + M = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\gamma - \beta\psi}{\alpha} \\ \psi_1 = \rho_1, \psi_2 = \rho_2 \text{ (ρίζες)}, \end{cases}$$

όπου K, Λ, M οι συντελεστές της δευτεροβάθμιας εξίσωσης. Οι λύσεις του συστήματος είναι γενικά δύο, οι:

$$(x_1, \psi_1) = \left(\frac{\gamma - \beta\rho_1}{\alpha}, \rho_1 \right) \text{ και } (x_2, \psi_2) = \left(\frac{\gamma - \beta\rho_2}{\alpha}, \rho_2 \right)$$

Παραδείγματα : 1) Νά επιλυθεί τό σύστημα:

$$ax + \beta\psi = \gamma, \quad x\psi = \delta \quad (\alpha, \beta, \gamma, \delta \in \mathbb{R}).$$

Επίλυση :

$$\text{*Εχουμε: } \begin{cases} \alpha x + \beta\psi = \gamma \\ x\psi = \delta \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\gamma - \beta\psi}{\alpha} \\ \psi \cdot \frac{\gamma - \beta\psi}{\alpha} = \delta \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\gamma - \beta\psi}{\alpha} \\ \beta\psi^2 - \gamma\psi + \alpha\delta = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\gamma - \beta\psi}{\alpha} \\ \psi_1 = \rho_1, \psi_2 = \rho_2, \end{cases} \text{ , όποτε οι λύσεις είναι:}$$

$$(x_1, \psi_1) = \left(\frac{\gamma - \beta\rho_1}{\alpha}, \rho_1 \right) \text{ και } (x_2, \psi_2) = \left(\frac{\gamma - \beta\rho_2}{\alpha}, \rho_2 \right)$$

2) Νά επιλυθεί τό σύστημα $x + \psi = \alpha, \quad x^2 + \psi^2 = \beta^2$.

Επίλυση : 1ος τρόπος. *Εχουμε

$$\begin{cases} x + \psi = \alpha \\ x^2 + \psi^2 = \beta^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \alpha - \psi \\ (\alpha - \psi)^2 + \psi^2 = \beta^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \alpha - \psi \\ 2\psi^2 - 2\alpha\psi + \alpha^2 - \beta^2 = 0. \end{cases}$$

Αυτό επιλύεται όπως πριν.

2ος τρόπος :

$$\begin{cases} x + \psi = \alpha \\ x^2 + \psi^2 = \beta^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x + \psi = \alpha \\ (x + \psi)^2 - 2x\psi = \beta^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x + \psi = \alpha \\ \alpha^2 - 2x\psi = \beta^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x + \psi = \alpha \\ x\psi = \frac{\alpha^2 - \beta^2}{2} \end{cases}$$

Αυτό είναι της μορφής του παραδ. (1).

$$3) \text{ Νά επιλυθεί τό σύστημα } \begin{cases} 3x^2 - 4x\psi + \psi^2 - 2x + \psi + 1 = 0 \\ x + 3\psi = 7 \end{cases}$$

Επίλυση : *Εχουμε:

$$\begin{cases} 3(7 - 3\psi)^2 - 4(7 - 3\psi)\psi + \psi^2 - 2(7 - 3\psi) + \psi + 1 = 0 \\ x = 7 - 3\psi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 40\psi^2 - 147\psi + 134 = 0 \\ x = 7 - 3\psi \end{cases}$$

Αυτό είναι ισοδύναμο μέ τό ζεύγος τών λύσεων

$$\begin{cases} \psi = 2 \\ x = 1 \end{cases} \text{ και } \begin{cases} \psi = 67/40 \\ x = 79/40 \end{cases}$$

$$\beta) \text{ Τῆς μορφῆς } \begin{cases} \alpha_1 x^2 + \beta_1 x\psi + \gamma_1 \psi^2 + \delta_1 x + \varepsilon_1 \psi + \zeta_1 = 0 \\ \alpha_2 x^2 + \beta_2 x\psi + \gamma_2 \psi^2 + \delta_2 x + \varepsilon_2 \psi + \zeta_2 = 0 \end{cases}$$

Ἡ ἐπίλυση τοῦ συστήματος αὐτοῦ ἐξαρτᾶται γενικά ἀπὸ τὴν ἐπίλυση μιᾶς ἐξισώσεως βαθμοῦ ἀνώτερου ἀπὸ δεύτερο, πού δέν μπορούμε πάντοτε νά τὴν ἐπιτύχουμε. Σέ εἰδικές ὁμως περιπτώσεις μπορούμε νά ἐπιλύσουμε τὸ σύστημα, ὅπως φαίνεται ἀπὸ τὰ παρακάτω παραδείγματα:

$$\text{Παράδειγματα: 1) Νά ἐπιλυθεῖ τὸ σύστημα: } \begin{cases} x^2 + 4\psi^2 = 52 \\ x\psi = 12 \end{cases}$$

Ἐπίλυση: Ἔχουμε:

$$\begin{cases} x^2 + 4\psi^2 = 52 \\ x\psi = 12 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + (2\psi)^2 = 52 \\ 4x\psi = 48 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (x + 2\psi)^2 = 100 \\ x\psi = 12 \end{cases} \begin{cases} x + 2\psi = \pm 10 \\ x\psi = 12 \end{cases}$$

Αὐτὸ εἶναι ἰσοδύναμο μέ τὸ ζεῦγος τῶν συστημάτων

$$\begin{cases} x + 2\psi = 10 \\ x\psi = 12 \end{cases} (1), \begin{cases} x + 2\psi = -10 \\ x\psi = 12 \end{cases} (2).$$

Οἱ λύσεις τοῦ συστήματος (1) εἶναι $(x, \psi) = (4, 3)$ ἢ $(x, \psi) = (6, 2)$ καὶ τοῦ συστήματος (2) εἶναι $(x, \psi) = (-4, -3)$ ἢ $(x, \psi) = (-6, -2)$

*Ἄρα οἱ λύσεις τοῦ συστήματος εἶναι:

$$\begin{array}{c|c|c|c|c|c} x & -4 & 4 & -6 & 6 & \\ \psi & -3 & 3 & -2 & 2 & \end{array}$$

$$2) \text{ Νά ἐπιλυθεῖ τὸ σύστημα: } \begin{cases} 3x^2 + 3\psi^2 - 11x - 7\psi + 10 = 0 \\ x^2 + \psi^2 - 4x - 3\psi + 5 = 0 \end{cases}$$

Ἐπίλυση: Ἔχουμε:

$$\begin{cases} 3x^2 + 3\psi^2 - 11x - 7\psi + 10 = 0 \\ x^2 + \psi^2 - 4x - 3\psi + 5 = 0 \end{cases} \begin{array}{c} -1 \\ 3 \end{array} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x^2 + 3\psi^2 - 11x - 7\psi + 10 = 0 \\ -3x^2 - 3\psi^2 + 12x + 9\psi - 15 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x + 2\psi - 5 = 0 \\ x^2 + \psi^2 - 4x - 3\psi + 5 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 5 - 2\psi \\ (5 - 2\psi)^2 + \psi^2 - 4(5 - 2\psi) - 3\psi + 5 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 5 - 2\psi \\ 5\psi^2 - 15\psi + 10 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 5 - 2\psi \\ \psi^2 - 3\psi + 2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 5 - 2\psi \\ \psi = 2 \end{cases} \text{ καὶ } \begin{cases} x = 5 - 2\psi \\ \psi = 1 \end{cases}$$

ὁπότε ἔχουμε τὶς λύσεις $(x, \psi) = (1, 2)$ καὶ $(x, \psi) = (3, 1)$

$$\gamma) \text{ Τῆς μορφῆς } \begin{cases} \alpha_1 x^2 + \beta_1 x\psi + \gamma_1 \psi^2 = \delta_1 & (\delta_1 \neq 0) \\ \alpha_2 x^2 + \beta_2 x\psi + \gamma_2 \psi^2 = \delta_2 & (\delta_2 \neq 0) \end{cases}$$

Τὰ πρῶτα μέλη τῶν ἐξισώσεων τοῦ συστήματος εἶναι πολυώνυμα ὁμογενῆ β' βαθμοῦ καὶ τὰ δεύτερα μέλη εἶναι σταθεροὶ ἀριθμοὶ διάφοροι τοῦ μηδενός. Αὐτὰ ὀνομάζονται **ὁμογενῆ συστήματα**.

Γιὰ τὴν ἐπίλυσή τους ἐκτελοῦμε τὸ μετασχηματισμὸ $x = \lambda\psi$ ($\psi \neq 0$).

*Έτσι έχουμε:

$$\begin{cases} \alpha_1 \lambda^2 \psi^2 + \beta_1 \lambda \psi^2 + \gamma_1 \psi^2 = \delta_1 \\ \alpha_2 \lambda^2 \psi^2 + \beta_2 \lambda \psi^2 + \gamma_2 \psi^2 = \delta_2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \psi^2(\alpha_1 \lambda^2 + \beta_1 \lambda + \gamma_1) = \delta_1 \\ \psi^2(\alpha_2 \lambda^2 + \beta_2 \lambda + \gamma_2) = \delta_2 \end{cases}$$

Διαιρούμε τις εξισώσεις κατά μέλη, οπότε έχουμε:

$$\frac{\alpha_1 \lambda^2 + \beta_1 \lambda + \gamma_1}{\alpha_2 \lambda^2 + \beta_2 \lambda + \gamma_2} = \frac{\delta_1}{\delta_2} \Leftrightarrow (\alpha_1 \delta_2 - \alpha_2 \delta_1) \lambda^2 + (\beta_1 \delta_2 - \beta_2 \delta_1) \lambda + (\gamma_1 \delta_2 - \gamma_2 \delta_1) = 0$$

Αυτή δίνει $\lambda = \lambda_1 \vee \lambda = \lambda_2$. *Αν επανέλθουμε στο μετασχηματισμό, έχουμε για επίλυση τὰ συστήματα:

$$\begin{cases} x = \lambda_1 \psi \\ \alpha_1 x^2 + \beta_1 x \psi + \gamma_1 \psi^2 = \delta_1 \end{cases} \quad \begin{cases} x = \lambda_2 \psi \\ \alpha_1 x^2 + \beta_1 x \psi + \gamma_1 \psi^2 = \delta_1, \end{cases}$$

πού ή επίλυσή τους είναι γνωστή.

Παράδειγμα: Νά επιλυθεί τό σύστημα
$$\begin{cases} x^2 - 3x\psi + 2\psi^2 = 2 \\ 2x^2 + x\psi - \psi^2 = 20 \end{cases}$$

Θέτουμε $x = \lambda \psi$ καί έχουμε:

$$\begin{cases} \lambda^2 \psi^2 - 3\lambda \psi^2 + 2\psi^2 = 2 \\ 2\lambda^2 \psi^2 + \lambda \psi^2 - \psi^2 = 20 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \psi^2(\lambda^2 - 3\lambda + 2) = 2 \\ \psi^2(2\lambda^2 + \lambda - 1) = 20 \end{cases}$$

Διαιρούμε τις εξισώσεις κατά μέλη, οπότε έχουμε

$$\frac{\lambda^2 - 3\lambda + 2}{2\lambda^2 + \lambda - 1} = \frac{1}{10} \Leftrightarrow 8\lambda^2 - 31\lambda + 21 = 0. \quad \text{*Άρα } \lambda_1 = 3, \lambda^2 = \frac{7}{8}$$

*Έτσι έχουμε για επίλυση τὰ συστήματα:

$$\begin{cases} x = 3\psi \\ x^2 - 3x\psi + 2\psi^2 = 2 \end{cases} \quad (1), \quad \begin{cases} x = \frac{7}{8} \psi \\ x^2 - 3x\psi + 2\psi^2 = 2 \end{cases} \quad (2)$$

Οί λύσεις του συστήματος (1) είναι $(x, \psi) = (3, 1)$, $(x, \psi) = (-3, -1)$ καί του συστήματος (2) είναι

$$(x, \psi) = \left(\frac{7\sqrt{2}}{3}, \frac{8\sqrt{2}}{3} \right), (x, \psi) = \left(-\frac{7\sqrt{2}}{3}, -\frac{8\sqrt{2}}{3} \right)$$

δ) Συστήματα συμμετρικά.

*Ένα σύστημα λέγεται συμμετρικό ως προς τούς άγνώστους του, όταν όλες οι εξισώσεις του είναι συμμετρικές ως προς τούς άγνώστους.

Π. χ. είναι συμμετρικά τὰ συστήματα

$$\begin{cases} x + \psi = \alpha \\ x\psi = \beta \end{cases} \quad \begin{cases} x^2 + \psi^2 = \alpha \\ x\psi = \beta \end{cases} \quad \begin{cases} x^2 + \psi^2 + x + \psi = \alpha \\ x + \psi + x\psi = \beta \end{cases}$$

Γιά τήν επίλυση αυτών των συστημάτων δέν υπάρχει ένιαίος τρόπος.

*Επειδή οι εξισώσεις είναι συμμετρικές ως προς τούς αγνώστους, μπορούν να εκφραστούν με τό άθροισμα $x + y$ και τό γινόμενο xy . *Αρα, αν θέσουμε όπου $x + y = \varphi$ και $xy = \omega$, τό συμμετρικό σύστημα γίνεται πιό άπλό ως προς τούς αγνώστους φ, ω . *Έτσι, όταν βροῦμε τίς τιμές τῶν φ και ω , αναγόμαστε στην επίλυση συστήματος τῆς μορφῆς $x + y = \varphi, xy = \omega$.

Παράδειγμα: 1) Νά ἐπιλυθεῖ τό σύστημα
$$\begin{cases} x^2 + \psi^2 + x + \psi = \alpha \\ x + \psi + x\psi = \beta \end{cases}$$

*Επίλυση: Θέτουμε όπου $x + \psi = \varphi$ και $x\psi = \omega$,
 ὁπότε τό σύστημα (1) γράφεται:
$$\begin{cases} \varphi^2 - 2\omega + \varphi = \alpha \\ \varphi + \omega = \beta \end{cases}$$

Αυτό ἐπιλύεται ὅπως τά συστήματα τῆς μορφῆς (α) και δίνει τίς λύσεις

$$\begin{aligned} \varphi = \kappa_1 & \quad \text{και} \quad \varphi = \kappa_2 \\ \omega = \lambda_1 & \quad \quad \quad \omega = \lambda_2 \end{aligned}$$

*Αρα προκύπτουν γιά ἐπίλυση τά συστήματα

$$\begin{aligned} x + \psi = \kappa_1 & \quad \text{και} \quad x + \psi = \kappa_2 \\ x\psi = \lambda_1 & \quad \quad \quad x\psi = \lambda_2, \end{aligned}$$

πού ἡ λύση τους εἶναι γνωστή.

124. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΔΥΟ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ.

α) *Όταν ἡ μία μόνο ἐξίσωση εἶναι δευτεροβάθμια και ὅλες οἱ ἄλλες πρωτοβάθμιες.

Στήν περίπτωση αὐτή ἐπιλύουμε τό σύστημα τῶν πρωτοβάθμιων ἐξισώσεων, αν πάρουμε ἕναν αγνωστο ὡς γνωστό και ἔπειτα ἀντικαταστήσουμε στή δευτεροβάθμια ἐξίσωση, τήν ὁποία ἐπιλύουμε.

Παράδειγμα: Νά ἐπιλυθεῖ τό σύστημα
$$\Sigma: \begin{cases} 2x^2 + \psi^2 - 4x\omega - 2\psi\omega + 3x - 4\psi - 13 = 0 \\ 5x - \psi - \omega = 2 \\ 7x - 3\psi + \omega = -6 \end{cases}$$

*Επίλυση: Θεωροῦμε τῶν ω ὡς γνωστό και ἐπιλύουμε τό σύστημα τῆς δεύτερης και τρίτης ἐξισώσεως. *Έτσι ἔχουμε τή λύση $(x, \psi) = \left(\frac{3+\omega}{2}, \frac{11+3\omega}{\omega}\right)$.

Τίς τιμές τῶν x και ψ τίς ἀντικαθιστοῦμε στήν πρώτη ἐξίσωση και ἔχουμε:

$$2\left(\frac{3+\omega}{2}\right)^2 + \left(\frac{11+3\omega}{\omega}\right)^2 - 4 \cdot \frac{3+\omega}{2} \omega - 2 \cdot \frac{11+3\omega}{\omega} \omega + 3 \cdot \frac{3+\omega}{2} - 4 \cdot \frac{11+3\omega}{\omega} - 13 = 0$$

$$\Leftrightarrow 9\omega^2 + 8\omega - 17 = 0, \text{ ὁπότε } \omega_1 = 1, \omega_2 = -\frac{17}{9}$$

Συνεπώς: Για $\omega = 1$ έχουμε $(x, \psi) = (2, 7)$ και

$$\text{Για } \omega = -\frac{17}{9} \text{ έχουμε } (x, \psi) = \left(\frac{5}{9}, \frac{8}{3}\right).$$

Άρα οι λύσεις του συστήματος Σ είναι:
$$\begin{cases} (x, \psi, \omega) = (2, 7, 1) \\ (x, \psi, \omega) = \left(\frac{5}{9}, \frac{8}{3}, -\frac{17}{9}\right) \end{cases}$$

β) Όταν περισσότερες από μία εξισώσεις είναι δευτεροβάθμιες (ή και όλες) και οι άλλες πρωτοβάθμιες.

Στή περίπτωση αυτή δεν υπάρχει έναίσιος τρόπος επίλυσης.

Παραδείγματα 1) Νά λυθεί τό σύστημα:
$$\begin{cases} x + \psi + \omega = \alpha & (1) \\ x^2 + \psi^2 + \omega^2 = \beta^2 & (2) \\ x\psi = \gamma^2 & (3) \end{cases}$$

Λύση: Τό σύστημα γράφεται:

$$\begin{cases} x + \psi = \alpha - \omega \\ (x + \psi)^2 - 2x\psi + \omega^2 = \beta^2 \\ x\psi = \gamma^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x + \psi = \alpha - \omega \\ (\alpha - \omega)^2 - 2\gamma^2 + \omega^2 = \beta^2 \\ x\psi = \gamma^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x + \psi = \alpha - \omega \\ 2\omega^2 - 2\alpha\omega + (\alpha^2 - \beta^2 - 2\gamma^2) = 0 \\ x\psi = \gamma^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x + \psi = \alpha - \omega \\ \omega_1 = \rho_1, \omega_2 = \rho_2 \\ x\psi = \gamma^2 \end{cases}$$

Άρα προκύπτουν γιά επίλυση τά συστήματα:

$$(\Sigma_1) \begin{cases} x + \psi = \alpha - \rho_1 \\ x\psi = \gamma^2 \\ \omega = \rho_1 \end{cases} \text{ και } (\Sigma_2) \begin{cases} x + \psi = \alpha - \rho_2 \\ x\psi = \gamma^2 \\ \omega = \rho_2 \end{cases}$$

Τά (Σ_1) και (Σ_2) επίλύονται κατά τά γνωστά.

2) Νά λυθεί τό σύστημα
$$\begin{cases} (1) & x(x + \psi + \omega) + \psi\omega = \alpha^2 \\ \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}^+ & (2) & \psi(x + \psi + \omega) + \omega x = \beta^2 \\ & (3) & \omega(x + \psi + \omega) + x\psi = \gamma^2 \end{cases}$$

Λύση: Τό σύστημα γράφεται:

$$(x + \psi)(x + \omega) = \alpha^2, (\psi + \omega)(\psi + x) = \beta^2, (\omega + x)(\omega + \psi) = \gamma^2 \quad (4).$$

Πολ/ζουμε κατά μέλη και έχουμε

$$(x + \psi)^2 (\omega + \psi)^2 (\omega + x)^2 = \alpha^2 \beta^2 \gamma^2 \Rightarrow (x + \psi)(\omega + \psi)(\omega + x) = \pm \alpha\beta\gamma.$$

Διαιρούμε τήν εξίσωση αυτή διαδοχικά μέ τίς (4) και έχουμε:

$$x + \psi = \pm \frac{\alpha\beta}{\gamma}, \quad \omega + \psi = \pm \frac{\beta\gamma}{\alpha}, \quad \omega + x = \pm \frac{\alpha\gamma}{\beta}.$$

*Έτσι έχουμε για επίλυση τὰ συστήματα:

$$(\Sigma_1) \begin{cases} x + \psi = \frac{\alpha\beta}{\gamma} \\ \psi + \omega = \frac{\beta\gamma}{\alpha} \\ \omega + x = \frac{\alpha\gamma}{\beta} \end{cases} \quad \text{καί } \Sigma_2 \begin{cases} x + \psi = -\frac{\alpha\beta}{\gamma} \\ \psi + \omega = -\frac{\beta\gamma}{\alpha} \\ \omega + x = -\frac{\alpha\gamma}{\beta} \end{cases}$$

*Επίλυση του (Σ_1) . Προσθέτουμε κατά μέλη, τότε έχουμε

$$x + \psi + \omega = \frac{\alpha^2\beta^2 + \beta^2\gamma^2 + \alpha^2\gamma^2}{2\alpha\beta\gamma}$$

*Αφαιρούμε από τήν εξίσωση αυτή (κατά μέλη) κάθε εξίσωση του Σ_1 και έχουμε τίς λύσεις :

$$\omega = \frac{\beta^2\gamma^2 + \alpha^2\gamma^2 - \alpha^2\beta^2}{2\alpha\beta\gamma}, \quad \psi = \frac{\alpha^2\beta^2 + \beta^2\gamma^2 - \alpha^2\gamma^2}{2\alpha\beta\gamma}, \quad x = \frac{\alpha^2\beta^2 + \alpha^2\gamma^2 - \beta^2\gamma^2}{2\alpha\beta\gamma}$$

Μέ ὄμοιο τρόπο ἐπιλύεται τό Σ_2 .

Σημείωση. Τά παραδείγματα πού ἐξετάσαμε παρέχουν μόνο μία ἀπλή ἰδέα τῶν ἐιδικῶν μεθόδων πού χρησιμοποιοῦνται γιά τήν ἐπίλυση συστημάτων ἀνώτερου ἀπό τόν πρῶτο βαθμό καί συνεπῶς οἱ μαθητές πρέπει νά ἐξασκηθοῦν πολύ σέ μεγάλο ἀριθμό ἀσκήσεων, γιά νά μπορέσουν νά ἀποκτήσουν κάποια εὐχέρεια.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

‘Ο μ ἄ δ α α’

412) Νά ἐπιλυθοῦν τὰ ἀκόλουθα συστήματα:

- | | |
|--|---|
| 1) $\begin{cases} x + \psi = 2 \\ 4x\psi = 3 \end{cases}$ | 2) $\begin{cases} x^2 + 2x\psi - \psi^2 + 4x - 6\psi + 7 = 0 \\ 2x + \psi = 4 \end{cases}$ |
| 3) $\begin{cases} x/5 + \psi/5 = 1 \\ 7x^2 + 5x\psi - 3\psi^2 - 2x - 27 = 0 \end{cases}$ | 4) $\begin{cases} x^2 + \psi^2 = 157 \\ x\psi = 66 \end{cases}$ |
| 6) $\begin{cases} x^2 + \psi^2 + x + \psi = 62 \\ (x - \psi)(x + \psi + 1) = 50 \end{cases}$ | 5) $\begin{cases} x^2 - x\psi = 14 \\ x\psi - \psi^2 = 10 \end{cases}$ |
| 8) $\begin{cases} (x + \psi)^2 - 3(x + \psi) = 10 \\ 9x^2 - 5x - 7\psi = 25 \end{cases}$ | 7) $\begin{cases} 3x^2 + 3\psi^2 - 11x - 7\psi + 10 = 0 \\ x^2 + \psi^2 - 4x - 3\psi + 5 = 0 \end{cases}$ |
| 10) $\begin{cases} x^2 + x\psi - \psi^2 = -4 \\ (8x - \psi)(x + 2\psi) = -36 \end{cases}$ | 9) $\begin{cases} x^2 + 2x\psi - \psi^2 = 1 \\ 3x^2 - 3x\psi + 5\psi^2 = 17 \end{cases}$ |

‘Ο μ ἄ δ α β’

413) Νά ἐπιλυθοῦν τὰ ἀκόλουθα συστήματα:

- | | |
|---|--|
| 1) $\begin{cases} x + \psi - 2\omega = 6 \\ 2x - \psi = -1 \\ 2x^2 + x\psi + \omega^2 - 4\omega = 10 \end{cases}$ | 2) $\begin{cases} x + \psi + \omega = 6 \\ x^2 + \psi^2 = 2\omega^2 - 13 \\ x\psi = 2 \end{cases}$ |
| 3) $\begin{cases} x^2 + z^2 = 46 + \psi^2 \\ x + \psi - z = 14 \\ x^2 = 9 \end{cases}$ | 4) $\begin{cases} x^2 + \psi^2 + \omega^2 = 84 \\ x + \psi + \omega = 14 \\ x\omega = \psi^2 \end{cases}$ |
| 6) $\begin{cases} x(x + \psi + \omega) = \alpha^2 \\ \psi(x + \psi + \omega) = \beta^2 \\ \omega(x + \psi + \omega) = \gamma^2 \end{cases}$ | 5) $\begin{cases} x(x + \psi + \omega) + \psi\omega = 21 \\ \psi(x + \psi + \omega) + \omega x = 18 \\ \omega(x + \psi + \omega) + x\psi = 42 \end{cases}$ |
| 7) $\begin{cases} x(\psi + \omega) = \alpha^2 \\ \psi(x + \omega) = \beta^2 \\ \omega(x + \psi) = \gamma^2 \end{cases}$ | |

414) Νά επιλυθούν τὰ ακόλουθα συστήματα:

$$\begin{array}{l}
 1) \left\{ \begin{array}{l} \sqrt{x} + \sqrt{\psi} = 11 \\ x + \psi = 65 \end{array} \right. \qquad 2) \left\{ \begin{array}{l} x^3 + \psi^3 = 19 \\ x + \psi = 1 \end{array} \right. \\
 3) \left\{ \begin{array}{l} x^3 - \psi^3 = 37 \\ x^2 + x\psi + \psi^2 = 37 \end{array} \right. \qquad 4) \left\{ \begin{array}{l} x + \psi - 2\sqrt{x\psi} = \sqrt{x} - \sqrt{\psi} \\ \sqrt{x} + \sqrt{\psi} = 5 \end{array} \right. \qquad 5) \left\{ \begin{array}{l} x\psi = \alpha^2 \\ \psi\omega = \beta^2 \\ \omega x = \gamma^2 \end{array} \right. \\
 6) \left\{ \begin{array}{l} x\psi z = 6 \quad z\omega x = 12 \\ \psi z\omega = 8 \quad \omega x\psi = 24 \end{array} \right. \qquad 7) \left\{ \begin{array}{l} (x + \psi)(x^3 + \psi^3) = 432 \\ x^3 + \psi^3 = 20 \end{array} \right.
 \end{array}$$

**ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΛΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΒΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΟΥ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΒΑΘΜΟ**

125. Όπως μάθαμε στό Γυμνάσιο, γιά νά λύσουμε ένα πρόβλημα έργαζόμαστε ώς εξής:

- α) Έκλέγουμε τόν άγνωστο ή τούς άγνώστους τοῦ προβλήματος.
- β) Καταστρώνουμε τήν εξίσωση ή τίς εξισώσεις τοῦ προβλήματος.
- γ) Θέτουμε στούς άγνώστους περιορισμούς, πού πηγάζουν από τή φύση τοῦ προβλήματος.
- δ) Έπιλύουμε τήν εξίσωση ή τό σύστημα τῶν εξισώσεων.
- ε) Έκτελοῦμε τή διερεύνηση τοῦ προβλήματος.

Στά ἐπόμενα θά ἀσχοληθοῦμε μέ προβλήματα πού ή λύση τους ἀπαιτεῖ τή χρήση εξισώσεων ή συστημάτων βαθμοῦ ἀνώτερου ἀπό τό πρώτο βαθμό.

126. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΛΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ Β' ΒΑΘΜΟΥ.

α) **Πρόβλημα:** Νά βρεθεῖ ένας ἀκέραιος ἀριθμός, πού τό τετράγωνό του ἄν αὐξηθεῖ κατά τό 5/πλάσιό του ὁ ἀριθμός αὐτός γίνεται 50.

Λύση: Ἄν x εἶναι ὁ ἀριθμός, τότε τό τετράγωνό του εἶναι x^2 καί τό 5/πλάσιο τοῦ ἀριθμοῦ $5x$.

Ἔτσι ἔχουμε τήν εξίσωση $x^2 + 5x = 50$.

Περιορισμός: Ὁ x πρέπει νά εἶναι ἀκέραιος ($x \in \mathbb{Z}$).

Ἐπίλυση τῆς $x^2 + 5x - 50 = 0$. Ἔχουμε $x_1 = 5$, $x_2 = -10$.

Διερεύνηση: Οἱ τιμές $x_1 = 5$, $x_2 = -10$ ὑπακούουν στό περιορισμό καί συνεπῶς τό πρόβλημα ἔχει δύο λύσεις.

β) **Πρόβλημα:** Νά μερισθεῖ ὁ ἀριθμός 15 σέ δύο μέρη τέτοια, ὥστε τό τετράγωνο τοῦ πρώτου ἄν ἐλαττωθεῖ κατά 41 νά γίνει ἴσο μέ τό 5/πλάσιο τοῦ τετραγώνου τοῦ ἄλλου.

Λύση: Ἄν x εἶναι τό ένα μέρος, τό ἄλλο θά εἶναι $15 - x$.

Ἐπομένως ἔχουμε τήν εξίσωση $x^2 - 41 = 5(15 - x)^2$.

Περιορισμός: Πρέπει νά εἶναι $0 < x < 15$.

Επίλυση τῆς $x^2 - 41 = 5(15 - x)^2$.

Ἡ ἰσοδύναμή της εἶναι $4x^2 - 150x + 1166 = 0$, ἄρα $x_1 = \frac{53}{2}$, $x_2 = 11$.

Διερεύνηση: Ἡ ρίζα $x_1 = \frac{53}{2}$ ἀπορρίπτεται, γιατί $\frac{53}{2} > 15$. Τά μέρη λοιπόν πού ζητοῦμε εἶναι 11 καί 4.

γ) **Πρόβλημα:** Ἐνας ἔμπορος πωλεῖ ἐλιές πρὸς 22 δραχ. τὸ χιλιόγραμμα καὶ κερδίζει στὶς 100 τὸ μισό τοῦ κόστους κάθε χιλιόγραμμου. Πόσο κοστίζει τὸ χιλιόγραμμα;

Λύση: Ἄν τὸ χιλιόγραμμα κοστίζει x δραχ., θά κερδίζει $\frac{x}{2}\%$ καὶ συνεπῶς ἀπὸ x δραχ. θά κερδίζει $\frac{x}{2} \cdot \frac{x}{100} = \frac{x^2}{200}$.

Συνεπῶς, ἔχουμε τὴν ἐξίσωση $x + \frac{x^2}{200} = 22$.

Περιορισμός: Πρέπει νά εἶναι $0 < x < 22$.

Επίλυση: $x + \frac{x^2}{200} = 22 \Leftrightarrow x^2 + 200x - 4400 = 0$.

Ἄρα ἔχουμε $x_1 = 20$, $x_2 = -220$.

Διερεύνηση: Ἡ $x_2 = -220$ ἀπορρίπτεται.

Ὡστε τὸ χιλιόγραμμα κοστίζει 20 δραχ.

δ) **Πρόβλημα:** Ἄν οἱ πλευρές ἑνὸς τετραγώνου αὐξηθοῦν κατὰ μ μονάδες μήκους, τὸ ἐμβαδὸν του θά γίνῃ $\mu - 3$ φορές μεγαλύτερο. Νά βρεθῇ τὸ μήκος τῆς πλευρᾶς τοῦ τετραγώνου.

Λύση: Ἄν τὸ μήκος τῆς πλευρᾶς τοῦ τετραγώνου εἶναι x , τότε ἡ πλευρὰ τοῦ νέου τετραγώνου θά εἶναι $x + \mu$ μονάδες μήκους καὶ τὰ ἐμβαδὰ τους ἀντιστοίχως x^2 καὶ $(x + \mu)^2$. Ἐπομένως ἔχουμε τὴν ἐξίσωση $(x + \mu)^2 = (\mu - 3)x^2$.

Περιορισμός: Πρέπει $x > 0$ καὶ $x + \mu > 0$.

Επίλυση: $(x + \mu)^2 = (\mu - 3)x^2 \rightarrow (4 - \mu)x^2 + 2x\mu + \mu^2 = 0$.

Αὐτὴ δίνει δύο ρίζες:

$$x_1 = \frac{-\mu + \sqrt{\mu^2(\mu-3)}}{4-\mu}, \quad x_2 = \frac{-\mu - \sqrt{\mu^2(\mu-3)}}{4-\mu}$$

Διερεύνηση: Τὸ εἶδος τῶν ριζῶν καὶ τὸ σημεῖο τους, ὅπως ξέρουμε, ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ σημεῖο τῶν Δ, P, S .

Σχηματίζοντας τὸν πίνακα διερευνησεως διαπιστώνουμε ὅτι γιὰ $\mu > 4$ ἔχουμε λύση στὸ πρόβλημα.

Ἔτσι γιὰ $\mu = 7$ ἔχουμε $x_1 = -\frac{7}{3}$, πού ἀπορρίπτεται, καὶ $x_2 = 7$, πού εἶναι δεκτὴ.

127. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΛΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΑΘΜΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ.

α) **Πρόβλημα** : Τά ψηφία ενός διψήφιου αριθμού έχουν γινόμενο 35. *Αν γίνει αντιμετάθεση τών ψηφίων, προκύπτει αριθμός μεγαλύτερος από τό γινόμενο τών ψηφίων κατά 40. Ποιός είναι ο αριθμός;

Λύση : *Αν ο αριθμός έχει ψηφία δεκάδων ψ και μονάδων x , τότε θά έχουμε: $x\psi = 35$ και $10\psi + x = x\psi + 40$.

Περιορισμός: Πρέπει νά είναι $0 < x < 10$, $0 < \psi < 10$ και $x, \psi \in \mathbb{Z}$.

$$\text{*Επίλυση: } \begin{cases} x\psi = 35 \\ x + 10\psi = 75 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (75 - 10\psi)\psi = 35 \\ x = 75 - 10\psi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2\psi^2 - 15\psi + 7 = 0 \\ x = 75 - 10\psi \end{cases}$$

Αυτό είναι ίσοδύναμο μέ τό ζευγος τών συστημάτων

$$\begin{cases} \psi = 7 \\ x = 75 - 10\psi \end{cases} \quad \begin{cases} \psi = \frac{1}{2} \\ x = 75 - 10\psi \end{cases}$$

*Αρα έχουμε τίς λύσεις $(x, \psi) = (5, 7)$, $(x, \psi) = (70, \frac{1}{2})$

Διερεύνηση: Τό ζευγος $(x, \psi) = (70, \frac{1}{2})$ απορρίπτεται.

*Ωστε ο αριθμός είναι ο 57.

β) **Πρόβλημα** : *Η περίμετρος ὀρθογ. τριγώνου είναι 60 cm και τό ὕψος στήν ὑποτείνουσα 12 cm. Ποιά είναι τά μήκη τών πλευρῶν του;

Λύση : *Αν x, ψ, z είναι τά μήκη τών κάθετων πλευρῶν και τῆς ὑποτείνουσας, τότε θά είναι $x^2 + \psi^2 = z^2$ και $x + \psi + z = 60$.

$$\text{Τό ἔμβαδόν τοῦ τριγώνου είναι } E = \frac{x\psi}{2} = \frac{12z}{2} \Rightarrow x\psi = 12z.$$

Τό σύστημα λοιπόν είναι :

$$x^2 + \psi^2 = z^2, \quad x + \psi + z = 60, \quad x\psi = 12z$$

Περιορισμός: Πρέπει $x > 0$, $\psi > 0$, $z > 0$ και μικρότεροι ἀπό τόν 60. *Όταν ἐπιλύσουμε τό σύστημα, ἔχουμε $x = 20$, $\psi = 15$, $z = 25$.

γ) **Πρόβλημα** : Δύο ἐργάτες τελειώνουν ἕνα ἔργο σέ λ ὥρες. *Ο πρῶτος μόνος του τό κάνει σέ α ὥρες λιγότερο ἀπό τό δεύτερο. Σέ πόσες ὥρες ὁ καθένας τελειώνει μόνος του τό ἔργο; (*Όπου $\alpha, \lambda \in \mathbb{R}^+$).

Λύση : *Αν ὁ α' χρειάζεται x ὥρες και ὁ β' ψ ὥρες, τότε θά είναι $x + \alpha = \psi$.

*Ο πρῶτος σέ 1 ὥρα κάνει τό $\frac{1}{x}$ ἀπό τό ἔργο, ὁ β' τό $\frac{1}{\psi}$ και οἱ δυο μαζί τό $\frac{1}{\psi} + \frac{1}{x}$. Σέ λ ὥρες κάνουν ὅλο τό ἔργο.

Ωστε θα έχουμε: $\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{\psi}\right) \lambda = 1$.

Περιορισμός: Πρέπει να είναι: $x > 0, \psi > 0, x > \lambda, \psi > \lambda$.

Επίλυση:
$$\begin{cases} \psi = \alpha + x \\ \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{\psi}\right) \lambda = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \psi = \alpha + x \\ \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{\alpha+x}\right) \lambda = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \psi = \alpha + x \\ x^2 - (2\lambda - \alpha)x - \alpha\lambda = 0 \end{cases}$$

Αυτό δίνει :

$$(x, \psi) = \left(\frac{2\lambda - \alpha + \sqrt{4\lambda^2 + \alpha^2}}{2}, \frac{2\lambda + \alpha + \sqrt{4\lambda^2 + \alpha^2}}{2} \right) \text{ που είναι δεκτή.}$$

Η άλλη λύση απορρίπτεται, επειδή $x < 0, \psi < 0$, όπως φαίνεται από το γινόμενο των ριζών $x_1 x_2 = -\alpha\lambda < 0$.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Ο μ α δ α α'

415) Αν το τετράγωνο της ηλικίας ενός παιδιού ελαττωθεί κατά τό διπλάσιό της, τότε γίνεται ίσο με τό διπλάσιο της ηλικίας. Νά βρεθεί ή ηλικία του παιδιού.

416) Νά βρεθεί άκέραιος αριθμός, που άν διαιρεθεί με 25 γίνεται ίσος με τόν αντίστροφο του πηλίκου.

417) Νά βρεθεί αριθμός, που άν αύξηθεί κατά τό 7/πλάσιο της τετραγωνικής ρίζας του γίνεται 44.

418) Νά βρεθούν δύο άκέραιοι διαδοχικοί περιττοί αριθμοί τέτοιοι, ώστε τό άθροισμα των τετραγώνων τους νά είναι 74.

419) Ένας πουλάει τό εμπόρευμά του 39 δραχ. και κερδίζει τόσο στις εκατό, όσο τό άγόρασε. Πόσο τό άγόρασε;

420) Ένας πατέρας είναι 40 χρόνων και ό γιός του 3 χρόνων. Μετά από πόσα χρόνια ή ηλικία του πατέρα θα είναι κατά 5 χρόνια μικρότερη από τό τετράγωνο της ηλικίας του γιού;

421) Μία ποσότητα από 630 κιλά τρόφιμα έπρεπε νά διανεμηθεί σε όρισμένες φτωχές οικογένειες. Έπειδή 15 από τίς οικογένειες δέν πήγαν στη διανομή, καθεμιά από τίς υπόλοιπες πήρε 1 κιλό τρόφιμα περισσότερο. Πόσες ήταν οι οικογένειες;

422) Οι πλευρές ενός τριγώνου είναι 3 cm, 6 cm, 8 cm. Κατά ποιο τμήμα πρέπει νά αύξηθούν οι πλευρές ώστε νά μπορεί νά κατασκευασθεί από αυτές όρθογώνιο τρίγωνο;

Ο μ α δ α β'

423) Νά βρεθεί διψήφιος αριθμός τέτοιος, ώστε τό ψηφίο των δεκάδων νά είναι κατά 1 μεγαλύτερο από τό διπλάσιο του ψηφίου των μονάδων. Ό αριθμός, άν διαιρεθεί με τό γινόμενο των ψηφίων του, δίνει πηλίκο 3 και υπόλοιπο 10.

424) Ένα κεφάλαιο από 27.000 δραχ, χωρίστηκε σε δύο μέρη και τοκίστηκε με 6%/ο. Τό α' μέρος τοκίστηκε 5 μήνες περισσότερο από τό β' μέρος και έδωσε τόκο 1500 δραχ. Τό β' έδωσε τόκο 900 δραχ. Νά βρεθούν τά δύο μέρη του κεφαλαίου.

425) Νά βρεθούν οι διαστάσεις όρθογωνίου, που έχει διαγώνιο 20 cm και έμβαδό 192 cm².

426) Δύο ποδηλάτες αναχωρούν μαζί από έναν τόπο, για να διανύσουν απόσταση 90 km. Το μισό της ταχύτητας του πρώτου και το ένα τρίτο της ταχύτητας του β' έχουν άθροισμα 16 km. Νά βρεθούν οι ταχύτητες, αν ο α' τερμάτισε μισή ώρα νωρίτερα από το β'.

427) Τρεις αριθμοί είναι ανάλογοι με τους αριθμούς 2, 3, 4. Το τετράγωνο του μεγαλύτερου είναι μεγαλύτερο από το διπλάσιο γινόμενο των άλλων κατά 36. Νά βρεθούν οι αριθμοί αυτοί.

428) Ο αριθμός 3 και τρεις άλλοι βρίσκονται σε αναλογία, που οι ηγούμενοι της έχουν άθροισμα 9, οι επόμενοι 12 και το άθροισμα των τετραγώνων όλων των δρών είναι 125. Ποιά είναι η αναλογία;

429) Νά υπολογισθούν οι πλευρές ενός όρθου. τριγώνου, αν οι κάθετες πλευρές του διαφέρουν κατά 5 m και η ύποτείνουσα με τό ύψος σ' αυτή δίνει άθροισμα 37 m.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΣ

430) Νά επιλυθεί η εξίσωση $x^4 - 2(\alpha + \beta)x^2 + (\alpha - \beta)^2 = 0$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, και νά εκφραστούν οι ρίζες της με τη μορφή απλών ριζικών.

431) Για ποιές τιμές των α και β η εξίσωση $(\alpha + \beta)x^4 + (2\alpha - \beta - 10)x^3 + 2x^2 - (\alpha - \beta - 7)x + 6 - \alpha = 0$ είναι διτετράγωνη και για ποιές δευτεροβάθμια; Και στις δυο περιπτώσεις νά βρεθεί το είδος των ριζών.

432) Μέ ποιά συνθήκη τό τριώνυμο $\varphi(x) \equiv \alpha x^2 + \beta x + \gamma$, $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{Q}$ έχει ρίζες της μορφής $\sqrt{\lambda} \pm \sqrt{\mu}$, όπου $\lambda, \mu \in \mathbb{Q}^+$.

433) Νά μετασχηματισθούν σε άπλά ριζικά οι ακόλουθες παραστάσεις:

$$1) \sqrt{x^2 + 1} + \sqrt{x^4 + x^2 + 1} \quad (x \in \mathbb{R}), \quad 2) \sqrt{\frac{5x}{\psi} + \frac{2x}{z}} \sqrt{\frac{5x}{\psi} - \frac{x^2}{z^2}}$$

434) Νά αποδειχθεί ότι η παράσταση ψ , $\alpha, \beta \in \mathbb{R}^+$

$$A = \sqrt{\alpha + 2\beta} \sqrt{\alpha - \beta^2} + \sqrt{\alpha - 2\beta} \sqrt{\alpha - \beta^2} \text{ Ισοῦται με } 2\beta, \text{ αν } \beta^2 \leq \alpha \leq 2\beta^2$$

και με $2\sqrt{\alpha - \beta^2}$, αν $\alpha > 2\beta^2$.

435) Νά επιλυθούν οι ακόλουθες εξισώσεις:

$$1) x^3 + \frac{1}{x^3} = 6 \left(x + \frac{1}{x} \right), \quad 2) x^3 + x^2 + x^2 + kx + k^2 = 0 \quad (k \in \mathbb{R})$$

436) Νά βρεθούν οι συνθήκες με τίς όποιες η επιλύουσα της εξίσ. $x^6 + \alpha x^5 + \beta x^4 + \gamma x^3 + \beta x^2 + \alpha x + 1 = 0$ είναι αντίστροφη εξίσωση.

$$437) \text{ Νά επιλυθεί η εξίσωση } \left(x + \frac{1}{x} \right)^6 - 9 \left(x + \frac{1}{x} \right)^3 + 8 = 0$$

438) Νά επιλυθούν στό \mathbb{R} οι ακόλουθες εξισώσεις

$$1) 5x\sqrt{x} - 3\sqrt{x^3} = 296, \quad 2) \sqrt[3]{x+1} - \sqrt[3]{x-1} = \sqrt[6]{x^2-1}$$

439) Νά επιλυθεί και νά διερευνηθεί η εξίσ. $\sqrt{x^2 - 4x} = x - \lambda$ για πραγματικές τιμές του λ και x .

440) Νά επιλυθούν τά ακόλουθα συστήματα:

$$1) \begin{cases} x^2 + \psi^2 + \omega^2 = 21\alpha^2 \\ \psi\omega + \omega x - x\psi = 6\alpha^2 \\ 3x + \psi - 2\omega = 3\alpha \end{cases} \quad 2) \begin{cases} z^2 + x^2 = 1 \\ \psi^2 + \omega^2 = 1 \\ x\psi + z\omega = 0 \\ (2x + \psi)(2z + \omega) = 2 \end{cases}$$

441) Νά βρεθεί η απαλείφουσα του συστήματος.

$$x^2 + \psi^2 + \omega^2 = \alpha^2, \quad x\psi = \beta^2, \quad \psi\omega = \gamma^2, \quad \omega x = \delta^2$$

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XV

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Βασικές έννοιες διδάχτηκαν στην Γ' τάξη Γυμν.)

128. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ.

Η στατιστική στην εποχή μας, με την έντελώς ιδιαίτερη σπουδαιότητα που απέκτησε για την ανθρωπότητα, αναπτύχθηκε σε μία έκτεταμένη επιστήμη με πολλούς κλάδους.

Στό Γυμνάσιο μάθαμε όρισμένες βασικές έννοιες της στατιστικής, τους τρόπους συγκεντρώσεως και έπεξεργασίας των στατιστικών στοιχείων και παρουσιάσεώς τους με τους αριθμητικούς πίνακες και τὰ διαγράμματα.

Παρακάτω επαναλαμβάνουμε αυτούς τους τρόπους, έπειδή έχουν ιδιαίτερη σημασία.

129. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΠΙΝΑΚΕΣ.

Τὰ στατιστικά στοιχεία, που προκύπτουν από τή διαλογή και έπεξεργασία, παρουσιάζονται έτσι, ώστε να είναι εύκολη ή μελέτη τους και ή συναγωγή συμπερασμάτων. Η παρουσίαση αυτή γίνεται συνήθως με δύο τρόπους:

- Μέ μορφή αριθμητικού πίνακα.
- Μέ μορφή γραφικού διαγράμματος.

I. Αριθμητικοί πίνακες

Αυτοί μπορούν να έχουν τή μορφή ενός κειμένου, στό όποιο να δίνονται οι πληροφορίες με κάθε λεπτομέρεια. Συνήθως όμως είναι **συγκεντρωτικοί**, άπλοοί στην άνάγνωση και στην σύγκριση των στοιχείων μεταξύ τους.

Συχνότητα - πίνακας συχνότητας

Υποθέτουμε ότι οι τιμές μιās μεταβλητής x σε μιάν στατιστική έρευνα από N παρατηρήσεις είναι: x_1, x_2, \dots, x_μ και ότι από αυτές τής τιμές, οι v_1 είναι ίσες με τήν τιμή x_1 , οι v_2 ίσες με x_2, \dots , οι v_μ ίσες με x_μ .

Έτσι σχηματίζουμε τόν πίνακα :

x_1	x_2	x_3	...	x_μ
v_1	v_2	v_3	...	v_μ

ΠΙΝΑΚΑΣ I

Καθένας από τούς αριθμούς v_1, v_2, \dots, v_μ λέγεται **απόλυτη συχνότητα** (ή, απλά, **συχνότητα**) τής αντίστοιχης τιμής x και συμβολίζεται μέ τό γράμμα f . Είναι φανερό ότι $v_1 + v_2 + \dots + v_\mu = N$. Ο N είναι τό πλήθος τών στοιχείων τού «πληθυσμού» (συνόλου παρατηρήσεων), και λέγεται **όλική συχνότητα** και συμβολίζεται και μέ Σf .

Οί λόγοι $\frac{v_1}{N}, \frac{v_2}{N}, \dots, \frac{v_\mu}{N}$ λέγονται **σχετικές συχνότητες** τών x_1, x_2, \dots, x_μ αντίστοιχως, και τό γινόμενό τους επί 100 έκφράζει τήν **εκατοστιαία (%) σχετική συχνότητα**. Τά άθροίσματα $\Sigma_1 = v_1, \Sigma_2 = v_1 + v_2, \Sigma_3 = v_1 + v_2 + v_3, \dots, \Sigma_\mu = v_1 + v_2 + \dots + v_\mu$ ή τά άθροίσματα $\Sigma_1 = f_1, \Sigma_2 = f_1 + f_2, \dots, \Sigma_\mu = f_1 + f_2 + \dots + f_\mu$ καλοῦνται **άθροιστικές συχνότητες**.

Τό άθροισμα όλων τών σχετικῶν συχνότητων μιᾶς στατιστικῆς έρευνας **ισοῦται μέ τή μονάδα**.

$$\text{Πράγματι έχουμε: } \frac{v_1}{N} + \frac{v_2}{N} + \dots + \frac{v_\mu}{N} = 1 \text{ ή } \frac{f_1}{\Sigma f} + \frac{f_2}{\Sigma f} + \dots + \frac{f_\mu}{\Sigma f} = 1$$

Ο πίνακας (1), πού μπορεί νά γραφεί και σέ δύο στῆλες, άποτελεῖ τόν πίνακα **συχνότητων** ή τήν **κατανομή συχνότητων**.

Παραδείγματα συγκεντρωτικῶν αριθμητικῶν πινάκων.

1) Σ' ένα Γυμνάσιο κατά τό σχολ. έτος 1973-74 γράφτηκαν 764 μαθητές, πού τά στοιχεῖα τους καταγράφηκαν σ' ένα βιβλίο, τό μαθητολόγιο. Τό βιβλίο αυτό άποτελεῖ ένα γενικό πίνακα λεπτομερή, χωρίς ταξινόμηση, από όπου μπορούμε νά έχουμε στατιστικές πληροφορίες σχετικές μέ τόν «πληθυσμό» τών μαθητῶν τού σχολείου. Η συμπλήρωση τού παρακάτω συγκεντρωτικῶ πινάκα έγινε μέ βάση τήν ποιοτική ιδιότητα: «τάξη έγγραφῆς».

Κατανομή τών μαθητῶν τού γυμνασίου κατά τάξεις				
Τάξεις έγγραφῆς	Αριθμός μαθητῶν Απόλυτη συχνότητα f	Αθροιστική συχνότητα	Εκατοστιαία σχετική συχνότητα $\frac{f}{\Sigma f}$	Αθροιστική εκατοστιαία σχετική συχνότητα
Α'	$f_1 = 245$	$\Sigma_1 = 245$	32,1	32
Β'	$f_2 = 160$	$\Sigma_2 = 405$	21	53
Γ'	$f_3 = 134$	$\Sigma_3 = 539$	17,5	70,5
Δ'	$f_4 = 90$	$\Sigma_4 = 629$	11,8	82,3
Ε'	$f_5 = 70$	$\Sigma_5 = 699$	9,1	91,5
ΣΤ'	$f_6 = 65$	$\Sigma_6 = 764$	8,5	100
	$\Sigma f = 764$		100,0	

Ἡ συμπλήρωση τῆς β' στήλης εἶναι φανερή. Ἡ τρίτη στήλη «ἄθροιστική συχνότητα» συμπληρώθηκε ὡς ἑξῆς: Γιά κάθε τάξη ἀντιστοιχίζεται τὸ ἄθροισμα τῆς ἀπόλυτης συχνότητας τῆς τάξεως καὶ ὄλων τῶν προηγούμενων τῆς. Ἡ συμπλήρωση τῆς δ' στήλης ἔγινε μέ βάση τόν τύπο $100 \cdot f / \Sigma f$ καί ἡ συμπλήρωση τῆς ε' στήλης ἔγινε ὅπως καί τῆς γ' στήλης ἀπό τή δ' στήλη.

Ὁ πίνακας αὐτός εἶναι ἀπλός, καί τὰ συμπεράσματα ἀπό τή μελέτη του εἶναι φανερά.

2) Σέ μιά ἔρευνα γιά τὸ ὕψος τῶν 764 μαθητῶν τοῦ παραπάνω γυμνασίου καταγράφηκαν σέ πρόχειρες καταστάσεις τὰ ὕψη τῶν μαθητῶν, τὰ ὁποῖα παρουσίασαν τιμές μεταξύ 135 cm καί 185 cm.

Ἡ ποσοτική ἰδιότητα «ὕψος μαθητοῦ» εἶναι μιά μεταβλητή μέ τιμές στό διάστημα [135 cm, 185 cm]. Τό εὖρος τῆς μεταβλητῆς αὐτῆς, δηλαδή ἡ διαφορά τῶν δύο ἄκραιων τιμῶν, εἶναι $185 \text{ cm} - 135 \text{ cm} = 50 \text{ cm}$. Τό σύνολο τῶν τιμῶν αὐτῆς τῆς μεταβλητῆς χωρίζεται σέ 5 τάξεις (ὁμάδες) πού ἔχουν τὸ ἴδιο εὖρος $\frac{50}{5} = 10 \text{ cm}$. Ἡ ἐργασία αὐτή λέγεται **ὁμαδοποίηση τῶν παρατηρήσεων**.

Ὁ παρακάτω συγκεντρωτικός πίνακας ἔγινε μέ βάση τήν ποσοτική ἰδιότητα «ὕψος μαθητοῦ».

Κατανομή 764 μαθητῶν τοῦ γυμνασίου κατά ὕψη

Τάξεις ὕψους	Μέση τιμή	Ἀριθμός μαθητῶν Ἀπόλ. συχνότητα f	Ἀθροιστική συχνότητα	Σχετική συχνότητα $\frac{e}{n}$	Ἀθροιστική σχετική συχνότητα
1η 135-145	140	94	94	12,3	12,3
2η 145-155	150	176	270	23	35,3
3η 155-165	160	278	548	36,4	71,7
4η 165-175	170	180	728	23,6	95,3
5η 175-185	180	36	764	4,7	100
		$\Sigma f = 764$		100,0	

Στήν α' στήλη οἱ τάξεις εἶναι διαστήματα τῆς μεταβλητῆς x τοῦ ὕψους κλειστά ἀριστερά καί ἀνοικτά δεξιά, ἔκτος ἀπό τήν 5η τάξη, πού εἶναι διάστημα κλειστό δεξιά καί ἀριστερά.

Τό ἡμιάθροισμα τῶν ἀκαραιῶν τιμῶν κάθε τάξεως λέγεται **μέση τιμή** τῆς τάξεως καί μέ τίς μέσες τιμές συμπληρώνεται ἡ β' στήλη.

Ἡ συμπλήρωση τῶν ὑπόλοιπων στηλῶν ἔγινε ὅπως καί προηγούμενος.

Καί ὁ πίνακας αὐτός εἶναι ἀπλός καί ἡ ἀνάγνωσή του εὐκόλη. Π.χ. ἀπό τήν γ' στήλη φαίνεται, ὅτι 36 μαθητές ἔχουν μέσο ὕψος 180 cm, ἐνῶ ἀπό τήν δ' στήλη φαίνεται, ὅτι 548 μαθητές ἔχουν ἀνάστημα κάτω ἀπό 165 cm. Ἀπό τήν ε' στήλη συμπεραίνουμε ὅτι τὸ 12,3% τῶν μαθητῶν ἔχουν ἀνάστημα κάτω ἀπό 145 cm, ἐνῶ ἀπό τήν τελευταία στήλη ὅτι τὸ 71,7% ἔχει ὕψος κάτω ἀπό 165 cm.

Σημείωση: Σε κάθε πίνακα πρέπει να υπάρχει στο πάνω μέρος ένας τίτλος ίσως και ένας υπότιτλος. 'Ακόμα δέν αποκλείεται να γραφούν και υποσημειώσεις. 'Όλα αυτά έχουν σκοπό να πληροφορούν σύντομα και με σαφήνεια τί περιέχει ό πίνακας, με ποιά κατάταξη συντάχθηκε και σε ποιά χρονική περίοδο ή και σε ποιά τόπο αναφέρεται.

II. Διαγράμματα (Γραφικοί πίνακες)

'Η παρουσίαση τών στατιστικών στοιχείων με συγκεντρωτικούς αριθμητικούς πίνακες παρουσιάζει μερικές δυσκολίες στην έρμηνεία και χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια για να γίνει κατανοητή ή άκριβής σημασία τους από τούς περισσότερους άνθρώπους.


'Εντελώς όμως διαφορετική είναι ή έντύπωση πού δοκιμάζουμε, όταν τά στατιστικά στοιχεία παρουσιάζονται με μορφή γεωμετρικού σχήματος, γραφικής παραστάσεως ή, όπως λέγεται, **διαγράμματος**. 'Η έντύπωση αυτή είναι ζωηρότερη και διαρκεί περισσότερο.

Οι γραφικές παραστάσεις ή διαγράμματα είναι οι εικόνες τών αριθμών και παρέχουν άμέσως και συνοπτικά διάφορες χρήσιμες πληροφορίες. Παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία και χρησιμοποιούνται πολύ στη Στατιστική.

Θά αναφέρουμε έδω τίς δύο κυριότερες κατηγορίες: (α) τίς γραμμικές παραστάσεις ή γραμμικά διαγράμματα και (β) γραφικές παραστάσεις με έπιφάνειες.

1) Πολύγωνο συχνότητας.


'Όταν ή μεταβλητή x σε μία στατιστική έρευνα είναι συνεχής, τότε τά ζεύγη (x, f) , όταν άπεικονισθούν στο σύστημα τών όρθογ. άξόνων xOy , δίνουν συνεχή τεθλασμένη γραμμή, πού λέγεται **πολύγωνο συχνότητας**. Στο σχήμα ή γραμμική παράσταση δίνει ή γεωμετρική εικόνα τής παρακάτω κατανομής 68 εργατών ενός έργοστασίου κατά βάρη.



Σχ. 129.1

Κατανομή 68 εργατών κατά βάρη σε kg					
Τάξεις	Μέση τιμή	f	$100f/\Sigma f$	'Αθροιστική συχνότητα	'Αθρ. σχετική συχνότητα %
55-65	60	3	4,4	3	4,4
65-75	70	11	16,2	14	20,6
75-85	80	24	35,3	38	55,9
85-95	90	15	22,1	53	78
95-105	100	13	19,1	66	97,1
105-115	110	0	0,0	66	97,1
115-125	120	2	2,9	68	100
		$\Sigma f = 68$	100		


Πολλές φορές στη στατιστική είναι χρήσιμη ή γραφική παράσταση της άθροιστικής συχνότητας, όποτε το πολύγωνο πού παίρνουμε λέγεται **πολύγωνο άθροιστικής συχνότητας**. Στο σχήμα ή γραμμική παράσταση είναι το πολύγωνο άθροιστικής συχνότητας της κατανομής των 68 έργατων κατά βάρη. Άν από τό σημείο Α φέρουμε $AB \perp O\psi$ και έπειτα $B\Gamma \perp O\chi$, συμπεραίνουμε ότι 35 έργατες έχουν βάρος λιγότερο από 78 kg (τό 78 είναι ή τετμημένη του Γ).



Σχ. 129.2

2) Ίστόγραμμα συχνότητας

Τό Ιστόγραμμα συχνότητας είναι ό συνηθέστερος τρόπος παρουσιάσεως στατιστικών στοιχείων. Για τήν κατασκευή του κατασκευάζουμε όρθογώνια μέ βάσεις τά ίσα τμήματα του άξονα $O\chi$, στα όποια αντίστοιχεί τό εύρος κάθε τάξεως της όμαδοποιημένης κατανομής, και μέ ύψη τίς αντίστοιχες συχνότητες αυτής της κατανομής.




Σχ. 129.3

γραμμή είναι τό πολύγωνο συχνότητας.

3) Τό ραβδόγραμμα.

Αυτό αποτελείται από μία σειρά όρθογωνίων, πού οι βάσεις τους είναι ίσες και στηρίζονται στον ίδιο άξονα (ή τον $O\chi$ ή τον $O\psi$). Τά μήκη τους είναι ανάλογα προς τίς αντίστοιχες τιμές πού παριστάνουν. Στα δύο σχήματα δίνουμε δύο ραβδογράμματα. Τό πρώτο αναφέρεται στην παραγωγή των κυριότερων κτηνοτροφικών προϊόντων της Έλλάδας κατά τό 1964 και τό δευτε-

ρο στις εξαγωγές των βιομηχανικών προϊόντων της χώρας μας κατά τη τετραετία 1964-1967. Το β' ραβδόγραμμα λέγεται και **χρονοδιάγραμμα**.



Κτηνοτροφικά προϊόντα έτους 1964

Σχ. 129.4



Εξαγωγές Βιομηχ προϊόντων

Σχ. 129.5

4) Τό κυκλικό διάγραμμα,

Αυτό είναι κύκλος με αθάιρητη άκτίνα διαμερισμένος σε κυκλικούς τομείς, που έχουν έμβαδά ανάλογα προς τις αντίστοιχες τιμές της μεταβλητής και τόξα με μέτρα ανάλογα προς τις ίδιες αντίστοιχες τιμές της μεταβλητής. Έδω δίνουμε ένα τέτοιο διάγραμμα που απεικονίζει τη χρηματοδότηση διάφορων κλάδων της οικονομικής ζωής της χώρας μας τον Αύγουστο 1968. Το 1% αντι-

Χρηματοδότηση 5 κλάδων σε έκατομ. δραχμές (Αύγουστος 1968)			
Κλάδοι	Ποσό	%	Μοίρες
1. Τουρισμός Ξενοδοχεία	3.900	19,5	70° 10'
2. Ήλεκτρική ένέργεια	3.300	16,5	59° 24'
3. Μεταφορές έπικοινωνίες	5.000	25	90°
4. Έργα κοινής ώφέλειας	6.600	33	118° 50'
5. Άλλοι σκοποί	1.200	6	21° 36'
*Άθροισμα	20.000	100	360°

στοιχίζεται σε τόξο $\frac{360^\circ}{100} = 3,6^\circ = 3^\circ 36'$, επομένως τὰ 16,5% σε τόξο $3,6^\circ \times 16,5 = 59^\circ 24'$.

Εκτός από τις παραπάνω γραφικές παραστάσεις των στατιστικών στοιχείων υπάρχουν ακόμα τὰ **χαρτογράμματα**, πού είναι γεωγραφικοί χάρτες με ποικιλία χρωμάτων. Επίσης υπάρχουν τὰ **ειδογράμματα** ή **ειδογραφήματα** πού είναι πίνακες σχεδίων και εικόνων προσώπων ή πραγμάτων και τὰ όποια χρησιμοποιούνται με ποικίλες μορφές στις διαφημίσεις.



Σχ. 129.6

130. ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ.

Στά προηγούμενα είδαμε τρόπους παρουσιάσεως των στατιστικών στοιχείων με αριθμητικούς πίνακες και γραφικές παραστάσεις. Η φάση αυτή της παρουσιάσεως αποτελεί έναν ουσιώδη τομέα της περιγραφικής στατιστικής, γιατί μās απαλλάσσει από τον κόπο νά παρατηρούμε μεγάλο πλήθος αριθμών.

Γεννᾶται όμως τό ἑρώτημα: Μήπως ή περιγραφή μιᾶς σειράς στατιστικών στοιχείων μπορεί νά γίνει με λίγες μόνο χαρακτηριστικές τιμές, πού νά δείχνουν τήν τάση τοῦ φαινομένου πού ἐξετάζουμε και νά τις διατηρούμε πίο εύκολα στή μνήμη μας; Π.χ., ή ἐντύπωση, πού δημιουργείται από τήν ἐξέταση τοῦ πίνακα βαθμολογίας ἑνός μαθητῆ σέ κάθε μάθημα ξεχωριστά, είναι βέβαια ἀσφαλῆς, όμως είναι κατά πολύ ἀπλούστερη, πίο σαφῆς και διαρκεί στή μνήμη μας, ἄν δοῦμε τό γενικό βαθμό ἐπιδόσεως, δηλαδή τό μέσο ὄρο, ὅπως λέμε.

Στή στατιστική συνήθως ἀναζητοῦμε μερικές χαρακτηριστικές τιμές, οι ὁποῖες ν' ἀντικαθιστοῦν ἕνα σύνολο ἀριθμῶν πού συγκεντρώνονται γύρω ἀπό αὐτές και οι ὁποῖες νά δίνουν μιᾶ ἱκανοποιητική ἰδέα γιά τό σύνολο τῶν ἀριθμῶν πού ἐξετάζουμε.

Οἱ χαρακτηριστικές αὐτές τιμές λέγονται **κεντρικές τιμές** ή **μέσοι** και διακρίνονται συνήθως σέ **μέσους κεντρικῆς τάσεως** και σέ **μέσους θέσεως**. Οἱ μέσοι κεντρικῆς τάσεως είναι ὁ **ἀριθμητικός**, ὁ **γεωμετρικός** και ὁ **ἀρμονικός μέσος** και οι μέσοι θέσεως είναι: ή **διάμεσος** και ή **ἐπικρατούσα τιμή**. Ἀπό τοῦς πρώτους θά γίνει ή ἐξέταση μόνο τοῦ ἀριθμητικοῦ μέσου.

I. Ἀριθμητικός μέσος (ή μέση τιμή)

α) Ἀριθμητικός μέσος σέ ἀταξινόμητα στοιχεῖα.

Ἄν x_1, x_2, \dots, x_N είναι οι τιμές τῶν στοιχείων, τότε τό πηλίκο τοῦ ἀθροίσματος ὄλων τῶν τιμῶν με τό πλήθος τους N δίνει τόν ἀριθμητικό μέσο, πού συμβολίζεται με τό \bar{x} .

$$\text{Δηλαδή: } \bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_N}{N} \quad \text{ή} \quad \bar{x} = \frac{\sum x}{N} \quad (1)$$

β) 'Αριθμητικός μέσος σε ταξινομημένα στοιχεία.

"Αν είναι x_1, x_2, \dots, x_N οι τιμές τῶν στοιχείων καὶ ταξινομηθῶν σὲ πίνακα κατανομῆς συχνότητων, τότε ὁ ἀριθμητικός μέσος \bar{x} θά εἶναι:

x_1	x_2	\dots	x_μ
f_1	f_2	\dots	f_μ

(1)

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_N}{N} = \frac{f_1 x_1 + f_2 x_2 + \dots + f_\mu x_\mu}{\Sigma f} = \frac{\Sigma f x}{\Sigma f} \quad (1)$$

Παράδειγμα: 1) Νά βρεθῆ ὁ ἀριθμητικός μέσος τοῦ ἀναστήματος 12 μαθητῶν. Τά ἀναστήματά τους ἀταξινόμητα εἶναι:

151, 152, 152, 156, 156, 156, 162, 162, 162, 162, 168, 168 cm

Μέσο ἀνάστημα:

$$\bar{x} = \frac{151+152+152+156+156+156+162+162+162+162+168+168}{12} = \frac{1907}{12} = 158,9 \text{ cm}$$

Ὁ πίνακας κατανομῆς συχνότητων εἶναι :
καί συνεπῶς κατὰ τόν τύπο (2)

151	152	156	162	168
1	2	3	4	2

$$\text{ἔχουμε : } \bar{x} = \frac{1 \cdot 151 + 2 \cdot 152 + 3 \cdot 156 + 4 \cdot 162 + 2 \cdot 168}{12} = 158,9 \text{ cm}$$

2) Νά βρεθῆ τό μέσο βάρος τῶν 68 ἐργατῶν ἀπό τόν πίνακα κατανομῆς συχνότητων τοῦ παραδείγματος τῆς σελ. 232.

Ὁ ὑπολογισμός ἐδῶ τοῦ ἀριθμητικοῦ μέσου γίνεται μέ προσέγγιση, γιατί θεωροῦμε ὡς τιμές τῆς x τίς μέσες τιμές τῆς β' στήλης.

"Ἐτσι ἔχουμε:

$$\bar{x} = \frac{3 \cdot 60 + 11 \cdot 70 + 24 \cdot 80 + 15 \cdot 90 + 13 \cdot 100 + 0 \cdot 110 + 2 \cdot 120}{68} = 84,7$$

"Ἄρα τό μέσο βάρος τῶν 68 ἐργατῶν εἶναι 84,7 Kg.

'Ιδιότητες τοῦ ἀριθμητικοῦ μέσου

1) "Ἐστω $x_1, x_2, \dots, x_\mu, \dots, x_N$ οἱ τιμές τῶν στοιχείων καί \bar{x} ὁ ἀριθμ. μέσος τους. "Αν ὀνομάσουμε τή διαφορά $x_\mu - \bar{x}$ ἀπόκλιση τῆς τυχαίας τιμῆς x_μ ἀπό τό μέσο \bar{x} , τότε τό ἄθροισμα τῶν ἀποκλίσεων τοῦ συνόλου τῶν στοιχείων ἀπό τό \bar{x} εἶναι μηδέν.

$$\text{Πράγματι, } (x_1 - \bar{x}) + (x_2 - \bar{x}) + \dots + (x_N - \bar{x}) = x_1 + x_2 + \dots + x_N - N\bar{x} = N\bar{x} - N\bar{x} = 0.$$

2) Ὁ μέσος \bar{x} ἰσοῦται μέ τό ἄθροισμα τῶν γινομένων τῶν τιμῶν x_1, x_2, \dots, x_μ ἐπί τίς σχετικές συχνότητες αὐτῶν.

Σημείωση. Ἀπό τίς τιμές x_1, x_2, \dots, x_N , οἱ f_1 εἶναι ἴσες μέ x_1 , οἱ f_2 ἴσες μέ x_2, \dots , οἱ f_μ ἴσες μέ x_μ καί συνεπῶς ἔχουμε $x_1 + x_2 + \dots + x_N = f_1 x_1 + f_2 x_2 + \dots + f_\mu x_\mu$.

Πράγματι, από τον τύπο (2) έχουμε:

$$\bar{x} = \frac{f_1}{\Sigma f} x_1 + \frac{f_2}{\Sigma f} x_2 + \dots + \frac{f_\mu}{\Sigma f} \cdot x_\mu = F_1 x_1 + F_2 x_2 + \dots + F_\mu x_\mu = \Sigma F x, \text{ όπου } F_1, F_2, \dots, F_\mu \text{ είναι οι σχετικές συχνότητες.}$$

II. Διάμεσος (x_s)

*Αν x_1, x_2, \dots, x_N είναι οι N τιμές, τις οποίες παρατηρήσαμε και τις γράφουμε κατά τάξη μεγέθους που αυξάνει, τότε, αν υπάρχει μεσαίος όρος της σειράς, αυτός είναι η **διάμεσος** των αριθμών x_1, x_2, \dots, x_N . *Αν όμως δεν υπάρχει μεσαίος όρος, τότε παίρνουμε ως **διάμεσο** το ήμισυαροισμα των δύο μεσαίων όρων.

Καί στις δύο περιπτώσεις η διάμεσος είναι αριθμός, που χωρίζει το σύνολο των τιμών x_1, x_2, \dots, x_N σε δύο τάξεις με τον ίδιο πληθάριθμο. *Ο τύπος $\frac{N+1}{2}$ δίνει την τάξη της διαμέσου στη σειρά των αριθμών.

Π.χ. η διάμεσος των αριθμών 3, 10, 13, 19, 20, 30, 32 είναι ο αριθμός 19, που κατέχει την τάξη $\frac{7+1}{2} = 4$ ος. *Ενώ των αριθμών 12, 15, 15, 15, 19, 40, 40, 41 η διάμεσος είναι αριθμός $\frac{15+19}{2} = 17$. Καί επειδή είναι $\frac{8+1}{2} = 4,5$, άρα κατέχει την 5η τάξη και συνεπώς βρίσκεται μεταξύ των αριθμών 15 και 19.

*Ο ύπολογισμός της διαμέσου σε παρατηρήσεις που έχουν ομαδοποιηθεί παρουσιάζει δυσκολίες και ίσως στην τιμή που βρίσκουμε παρατηρηθεί κάποια άοριστία, επειδή δε γνωρίζουμε τις τιμές της μεταβλητής με ακρίβεια. *Έτσι, για τον ύπολογισμό της διαμέσου των τιμών του πίνακα κατανομής των 68 έργων της σελ. 232 σκεπτόμαστε ως εξής:

*Έχουμε $N = 68$ και $\frac{N+1}{2} = \frac{68+1}{2} = 34,5$. *Άρα η διάμεσος βρίσκεται μεταξύ της 34ης και 35ης τιμής και συνεπώς ανήκει στην τάξη 75-85, όπως φαίνεται από τη στήλη «άθροιστική συχνότητα».

Πρίν από τη διάμεσο υπάρχουν 34 τιμές, από τις οποίες οι 14 ανήκουν στην τάξη 55 - 75 και οι υπόλοιπες 20 ανήκουν στην τάξη 75 - 85.

*Ωστε η τάξη 75 - 85, με εύρος 10 μονάδων, περιλαμβάνει στις 24 τιμές της τη **διάμεσο** και 20 τιμές πριν από αυτή. Καί επειδή 24 τιμές καλύπτουν εύρος 10 μονάδων, οι 20 τιμές θα καλύπτουν εύρος $10 \cdot \frac{20}{24}$ μονάδων.

*Έπομένως η **διάμεσος** με προσέγγιση είναι:

$$x_s = 75 + 10 \cdot \frac{20}{24} = 75 + 8,3 = 83,3 \text{ kg.}$$

Σημείωση :

*Ο αριθμ. μέσος στο παράδειγμά μας ύπολογίστηκε προηγουμένως και βρέθηκε ότι είναι $\bar{x} = 84,7$. *Η τιμή αυτή λίγο διαφέρει από τη διάμεσο $x_s = 83,3$.

Γενικά, αν x_λ είναι η αρχική τιμή της τάξεως, στην οποία ανήκει η διάμεσος x_δ , Σf ή ολική συχνότητα, f_δ ή συχνότητα της τάξεως στην οποία ανήκει η x_δ , F ή άθροιστική συχνότητα όλων των τάξεων πριν από την τάξη της x_δ και ϵ το εύρος της τάξεως της x_δ , τότε, αν σκεφθούμε κατά τον ίδιο τρόπο, βρίσκουμε τον τύπο:

$$x_\delta = x_\lambda + \epsilon \frac{\frac{1}{2} \Sigma f - F}{f_\delta}$$

Γραφικός προσδιορισμός της διαμέσου

Αυτός είναι εύκολος, αλλά δέν παρέχει μεγάλη ακρίβεια.

Κατασκευάζουμε το πολύγωνο άθροιστικής συχνότητας και φέρνουμε κάθετη ευθεία στον άξονα Oy στο σημείο, πού χωρίζει την ολική συχνότητα σε δύο ίσοπληθεις ομάδες. Από το σημείο πού η ευθεία αυτή τέμνει το πολύγωνο φέρνουμε κάθετη ευθεία στον άξονα Ox και όρίζουμε ένα σημείο, πού η τετμημένη του είναι η τιμή της διαμέσου.

Η κατασκευή πού περιγράψαμε φαίνεται στο πολύγωνο άθροιστικής συχνότητας της σελ. 233, στο όποιο η διάμεσος δίνεται από την τετμημένη του σημείου Γ .

III. Έπικρατούσα τιμή (X_e)

Ο μέσος αυτός είναι η τιμή της μεταβλητής, πού παρουσιάζεται πίο συχνά, δηλαδή άντιστοιχεί στην **μέγιστη συχνότητα** και συνεπώς έχει έννοια, όταν τά στοιχεία εμφανίζονται σε κατανομή συχνοτήτων. Π.χ. "Αν από τούς έργατες ενός έργοστασίου αυτοί πού παίρνουν ήμερομίσθιο 200 δραχ. είναι οί πολυαριθμότεροι, τότε λέμε ότι τό έπικρατέστερο ήμερομίσθιο (**έπικρατούσα τιμή**) στο έργοστάσιο είναι 200 δραχ.

Ο προσδιορισμός μέ ακρίβεια της **έπικρατούσας τιμής** x_e προϋποθέτει τή γνώση όλων των στοιχείων της κατανομής και έπομένως, είναι δύσκολος όταν τά στοιχεία αυτά είναι πολυπληθή και άκανόνιστα.

Στήν κανονική κατανομή συχνοτήτων ο προσδιορισμός της **έπικρατούσας τιμής** μέ προσέγγιση στηρίζεται στον έμπειρικό τύπο:

$$x_e - x_\delta = 2(x_\delta - \bar{x})$$

Σημείωση: Μετά από παρατηρήσεις βγήκε τό συμπέρασμα ότι, αν ή κατανομή συχνοτήτων είναι κάπως κανονική, ή διάμεσος x_δ περιέχεται μεταξύ της έπικρατούσας τιμής x_e και του αριθμητικού μέσου \bar{x} . "Αν ή κατανομή είναι συμμετρική (ιστόγραμμα συχνότητας συμμετρικό), τότε είναι $x_e = x_\delta = \bar{x}$.

Γραφικά μπορούμε νά προσδιορίσουμε τήν έπικρατούσα τιμή από τό ιστόγραμμα συχνότητας ως έξης: Συνδέουμε μέ ευθύγραμμα τμήματα τίς πάνω κορυφές του όρθογωνίου της μεγαλύτερης συχνότητας μέ τίς κορυφές των δύο δεξιά και άριστερά όρθογωνίων και από τό σημείο τομής των τμημάτων αυτών

φέρουμε κάθετο στον άξονα Ox , η οποία ορίζει την επικρατούσα τιμή. Π.χ. Στο ιστόγραμμα της σελ. 233 η επικρατούσα τιμή είναι η τετμημένη του σημείου Α.

*Αν εφαρμόσουμε τον τύπο της επικρατούσας τιμής στην κατανομή των 68 έργων της σελ. 232 παίρνουμε:

$$x_e - 83,3 = 2(83,3 - 84,7) \Rightarrow 80,5 \text{ kg.}$$

IV. Παρατηρήσεις για τις κεντρικές τιμές

Ο **ἀριθμητικός μέσος** υπολογίζεται εύκολα και έχει καθορισμένη τιμή. Έπειδή όμως επηρεάζεται από τις άκραιοι τιμές, μπορεί να είναι, με προσέγγιση, η αντιπροσωπευτική κεντρική τιμή. Πάντως είναι ο πιο εύχρηστος, ο πιο κατανοητός και ο πιο γνωστός μέσος στη στατιστική πράξη.

Η **διάμεσος** υπολογίζεται σχετικά εύκολα και η τιμή της επηρεάζεται μόνο από το πλήθος των δεδομένων τιμών (δεν επηρεάζεται από τις άκραιοι τιμές), γι' αυτό είναι περισσότερο κεντρική τιμή και συνεπώς μάς πληροφορεί πληρέστερα από τον αριθμητικό μέσο.

Η **ἐπικρατούσα τιμή**, τέλος, υπολογίζεται μόνο με προσέγγιση σχετικά εύκολα. Η αναζήτηση της αληθοῦς τιμής είναι δύσκολη και δεν επηρεάζεται από τις άκραιοι τιμές.

Τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των κεντρικών τιμών εμφανίζονται ανάλογα με την περίπτωση και συνεπώς στις στατιστικές εφαρμογές ή προτίμησή τους γίνεται ανάλογα πάλι με την περίπτωση.

131. ΔΙΑΣΠΟΡΑ — ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ — ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ.

Είδαμε στά προηγούμενα ότι οι τρεις κεντρικές τιμές (ἀριθμητ. μέσος, διάμεσος, επικρατούσα τιμή) παρέχουν πολλές φορές μόνο ενδείξεις για την τάση των στοιχείων μιᾶς κατανομής. Είναι εὐνόητο λοιπόν ότι είναι ἀνεπαρκείς να περιγράψουν με ἀκρίβεια τή φυσιογνωμία τῆς κατανομῆς.

Π.χ. Σέ ἕναν ἔρανο οἱ 12 ὑπάλληλοι μιᾶς ὑπηρεσίας πρόσφεραν τά ἐξῆς ποσά: 10, 15, 15, 20, 20, 20, 20, 25, 30, 30, 45, 50 (1). Οἱ κεντρικές τιμές τῆς σειρᾶς αὐτῆς εἶναι: $\bar{x} = 25$, $x_g = 20$, $x_e = 20$. *Αν ἀπό τούς ἴδιους ὑπαλλήλους ἡ σειρά τῶν εἰσφορῶν ἦταν

$$5, 10, 10, 10, 20, 20, 20, 20, 30, 35, 100 \quad (2)$$

τότε οἱ κεντρικές τιμές πάλι εἶναι: $\bar{x} = 25$, $x_g = 20$, $x_e = 20$. Οἱ σειρές (1) καί (2) μολονότι ἔχουν τίς ἴδιες κεντρικές τιμές, ὁμως διαφέρουν μεταξύ τους πάρα πολύ. Στή σειρά (1) οἱ τιμές **διασπείρονται** ἀπό 10 μέχρι 50 καί τό εὖρος τῆς κατανομῆς εἶναι $50 - 10 = 40$, ἐνώ στή (2) ἀπό 5 μέχρι 100 μέ εὖρος $100 - 5 = 95$, γι' αὐτό λέμε ότι ἡ κατανομή τῆς σειρᾶς (2) ἔχει μεγαλύτερη **διασπείρα** ἀπό τήν κεντρική τιμή.

Ἡ στατιστική ἔρευνα λοιπόν εἶναι ὑποχρεωμένη να ἐξετάσει καί ἄλλες τιμές τῆς μεταβολῆς τῶν στατιστικῶν στοιχείων.

Τή συγκέντρωση ή απομάκρυνση των στατιστικών στοιχείων γύρω από μία κεντρική τιμή ονομάζουμε **διασπορά**.

Τό εύρος της κατανομής δέν είναι κατάλληλο γιά τήν περιγραφή της διασποράς των στοιχείων, γιατί εξαρτάται μόνο από τίς άκραιοίς τιμές. Θα μπορούσαμε νά υπολογίσουμε τή διασπορά αναζητώντας τό μέσο όρο των άποκλίσεων των τιμών από τό μέσο τους \bar{x} , αλλά τό άθροισμα των άποκλίσεων αυτών είναι μηδέν (σελ. 236, 1η ιδιότητα του άριθμ. μέσου). Τά τετράγωνα όμως των άποκλίσεων, δηλαδή τά $(x_i - \bar{x})^2$, είναι θετικοί άριθμοί και συνεπώς ο άριθμητικός μέσος τους $\frac{\sum(x_i - \bar{x})^2}{N}$ είναι διάφορος του μηδενός. Τήν ποσότητα αυτή τή συμβολίζουμε μέ τό σ^2 και τήν ονομάζουμε **μέση τετραγωνική άπόκλιση** ή **διακύμανση της κατανομής** και τή θετική τετραγωνική ρίζα της σ τυπική άπόκλιση.

*Ωστε έχουμε :
 $\lambda = 1, 2, \dots, N$

$$\sigma^2 = \frac{\sum(x_i - \bar{x})^2}{N} \quad (1) \quad \text{και} \quad \sigma = \sqrt{\frac{\sum(x_i - \bar{x})^2}{N}} \quad (2)$$

*Αν αναπτύξουμε τό άθροισμα $\sum(x_i - \bar{x})^2$, παίρνουμε:

$$\begin{aligned} \sum(x_i - \bar{x})^2 &= (x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \dots + (x_N - \bar{x})^2 = \\ &= (x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_N^2) - 2\bar{x}(x_1 + x_2 + \dots + x_N) + (N\bar{x}^2) = \\ &= (x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_N^2) - 2\bar{x} \cdot N\bar{x} + N\bar{x}^2 = \sum x_i^2 - N\bar{x}^2. \end{aligned}$$

*Αρα οί τύποι
 (1) και (2) γράφονται:

$$\sigma^2 = \frac{\sum x_i^2}{N} - \bar{x}^2 \quad (1') \quad \text{και} \quad \sigma = \sqrt{\frac{\sum x_i^2}{N} - \bar{x}^2} \quad (2')$$

Παραδείγματα : 1) Οί διακυμάνσεις στό παράδειγμα του έράνου των 12 ύπαλλήλων είναι στίς δύο περιπτώσεις:

$$\sigma_1^2 = \frac{1}{12} [(10-25)^2 + (15-25)^2 + \dots + (50-25)^2] = \frac{1}{12} (15^2 + 10^2 + \dots + 25^2) = \frac{400}{3}$$

$$\sigma_2^2 = \frac{1}{12} [(5-25)^2 + (10-25)^2 + \dots + (100-25)^2] = \frac{1}{12} (20^2 + 15^2 + \dots + 75^2) = \frac{3475}{6}$$

Και οί τυπικές άποκλίσεις είναι :

$$\sigma_1 = \sqrt{\frac{400}{3}} = \frac{20\sqrt{3}}{3}, \quad \sigma_2 = \sqrt{\frac{3475}{6}}$$

2) Νά υπολογισθεί ή διακύμανση των άριθμών 6, 8, 11, 12.

*Έχουμε $\bar{x} = \frac{37}{4} = 9,25$. *Αν χρησιμοποιήσουμε τόν τύπο (1), έχουμε:

$$\sigma^2 = \frac{1}{4} [(6-9,25)^2 + \dots + (12-9,25)^2] = \frac{1}{4} (3,25^2 + 1,25^2 + 1,75^2 + 2,75^2) \approx 5,7$$

*Αν χρησιμοποιήσουμε τον τύπο (1'), έχουμε:

$$\sigma^2 = \frac{1}{4} (6^2 + 8^2 + 11^2 + 12^2) - \left(\frac{37}{4}\right)^2 = \frac{1}{4} (36 + 64 + 121 + 144) - \frac{1369}{16} \approx 5,7.$$

Ο τύπος (1') εδώ μάς απαλλάσσει από πολύπλοκους πολλαπλασιασμούς.

*Αν οι τιμές της μεταβλητής έχουν ταξινομηθεί σε έναν πίνακα κατανομής

x_1	x_2	\dots	x_k	$f_1 + f_2 + \dots + f_k = N = \Sigma f_i$
f_1	f_2	\dots	f_k	

τότε τα τετράγωνα των αποκλίσεων, όταν πολλαπλασιασθούν με τις αντίστοιχες συχνότητες, δίνουν μέση τετραγωνική απόκλιση $\sigma^2 = \frac{\Sigma f_i (x_i - \bar{x})^2}{\Sigma f_i}$ (3) και

$$\text{τυπική απόκλιση } \sigma = \sqrt{\frac{\Sigma f_i (x_i - \bar{x})^2}{\Sigma f_i}} \quad (4)$$

Καί αν σκεφθούμε όπως και προηγουμένως, τότε οι τύποι (3) και (4) γράφονται:

$$\sigma^2 = \frac{\Sigma f_i x_i^2}{\Sigma f_i} - \bar{x}^2 \quad (3') \quad \text{καί} \quad \sigma = \sqrt{\frac{\Sigma f_i x_i^2}{\Sigma f_i} - \bar{x}^2} \quad (4')$$

Στήν περίπτωση της ομαδοποιημένης κατανομής οι αποκλίσεις υπολογίζονται με τις μέσες τιμές των τάξεων.

Σημείωση. Η τυπική απόκλιση σ είναι τό μέτρο της διασποράς και εκφράζεται με τις άρχικες μονάδες μετρήσεως των στοιχείων.

Παραδείγμα. Νά υπολογισθεί ή τυπική απόκλιση της ομαδοποιημένης κατανομής των 68 έργων, πού αναφέρονται στή σελίδα 232.

Σχηματίζουμε τον πίνακα: 'Αριθμητικός μέσος $\bar{x} = 84,7$ kg

Μέση τιμή	f_i	x_i^2	$f_i x_i^2$	$x_i - \bar{x}$	$(x_i - \bar{x})^2$	$f_i (x_i - \bar{x})^2$
60	3	3600	10800	-24,7	610,09	1830,27
70	11	4900	53900	-14,7	216,09	2376,99
80	24	6400	153600	- 4,7	22,09	530,16
90	15	8100	121500	5,3	28,09	421,35
100	13	10000	130000	15,3	234,09	3043,17
110	0	12100	—	25,3	640,09	—
120	2	14400	28800	35,3	1246,09	2492,18
*Άθροισμα	68		498600			10694,12


*Αρα, σύμφωνα με τον τύπο (4') $\sigma = \sqrt{\frac{498600}{68} - 84,7^2} \approx 12,6 \text{ kg}$
 έχουμε :

καί σύμφωνα με τον τύπο (4) $\sigma = \sqrt{\frac{10694,12}{68}} \approx 12,6 \text{ kg}$
 έχουμε :

Σημασία της τυπικής απόκλισεως

Η γνώση της μέσης τιμής \bar{x} και της τυπικής απόκλισεως σ συμβάλλει πάρα πολύ στο να προσδιορισθεί η μορφή της κατανομής συχνοτήτων κατά τρόπο ικανοποιητικό, στην περίπτωση που τα στοιχεία **διασπείρονται** κανονικά και συμμετρικά γύρω από το μέσο \bar{x} . Όταν η τυπική απόκλιση είναι μικρή, τα στοιχεία τείνουν να **συσσωρευθούν** γύρω από το μέσο, και όταν είναι μεγάλη, τείνουν να **διασπαρουν**. Οι στατιστικές μελέτες δείχνουν ότι σε μία κανονική και συμμετρική κατανομή τα διαστήματα δεξιά και άριστερά του μέσου \bar{x} , σε απόσταση ίση με σ , 2σ , 3σ , περιλαμβάνουν αντίστοιχα τα 68%, 95%, 99,7% περίπου της όλικης συχνότητας των στοιχείων.

Ο παρακάτω πίνακας δίνει συνοπτικά τη διασπορά των τιμών της μεταβλητής δεξιά και άριστερά της μέσης τιμής \bar{x} σε εκατοστιαία ποσοστά της όλικης συχνότητας. Ο σκοπός του πίνακα είναι να θέσει κατώτερα όρια ασφάλειας και να βοηθήσει έτσι στη διαπίστωση λαθών, που ίσως έγιναν στους υπολογισμούς.



Σχ. 131.1

Στό προηγούμενο παράδειγμα βρήκαμε $\sigma = 12,6 \text{ kg}$ και $\bar{x} = 84,7 \text{ kg}$. *Αρα στο διάστημα από $\bar{x} - \sigma = 84,7 - 12,6 = 72,1$ έως $\bar{x} + \sigma = 84,7 + 12,6 = 97,3$ διαπιστώνουμε, μετά από εξέταση του πολυγώνου άθροιστικής συχνότητας, ότι ανήκουν οι 46 από τις 68 τιμές, δηλαδή το 67,6%. Πράγματι, η τιμή 72,1 αντιστοιχεί περίπου στην άθροιστική συχνότητα 19 και η τιμή 97,3 αντιστοιχεί στο 65 και συνεπώς $65 - 19 = 46$.

*Επίσης, στο διάστημα από $\bar{x} - 2\sigma = 84,7 - 2 \cdot 12,6 = 59,5$ έως $\bar{x} + 2\sigma = 109,9$ ανήκουν 63 από τις 68 τιμές, δηλαδή το 92,6%. Πράγματι, η τιμή 59,5 αντιστοιχεί περίπου στην άθροιστική συχνότητα 3 και η τιμή 109,9 στην 66 και συνεπώς $66 - 3 = 63$.

Τό διάγραμμα τής διασποράς


Είδαμε ότι κάθε κατανομή συχνοτήτων μπορεί να παρασταθεί γραφικά με ένα ιστόγραμμα ή πολύγωνο συχνότητας. Η εικόνα αυτή είναι τυπική για τον πληθυσμό που εξετάζουμε. Αν όμως υποθέσουμε ότι ο πληθυσμός μεταβάλλεται συνεχώς και ταυτόχρονα το εύρος των τάξεων μικραίνει, τότε το ιστόγραμμα ή το πολύγωνο θα ταυτισθεί όριακά με μία καμπύλη (τό διάγραμμα διασποράς), που καθορίζεται από το μέσο \bar{x} και την τυπική απόκλιση σ . Ο μέσος \bar{x} αποτελεί το μέτρο θέσεως στον άξονα Ox και η τυπική απόκλιση σ το μέτρο διασποράς. Αν η τιμή σ είναι μικρή, τότε η καμπύλη παρουσιάζει κυρτότητα, και αν είναι μεγάλη, τότε η καμπύλη είναι άπλωμένη.

Παρακάτω δίνουμε το διάγραμμα διασποράς τής κατανομής των 68 έργων από το ιστόγραμμα συχνότητας τής σελ. 233.

Έχουμε $\bar{x} = 84,7$ και $\sigma = 12,6$. Στο διάστημα $(\bar{x} - \sigma, \bar{x} + \sigma)$ ανήκουν 46 από τις 68 τιμές, δηλαδή το 67,6%. Στο διάστημα $(\bar{x} - 2\sigma, \bar{x} + 2\sigma)$ ανήκουν 63 από τις 68 τιμές, δηλαδή το 92,6%. Η διασπορά λοιπόν δεν είναι μεγάλη.

Δύο ή και περισσότεροι πληθυσμοί μπορούν:


- 1 να έχουν τον ίδιο μέσο και να διαφέρουν ως προς τη διασπορά,
- 2 να έχουν την ίδια διασπορά και διαφορετικό μέσο, και
- 3 να διαφέρουν ως προς τη διασπορά και το μέσο.



Σχ. 131.2

Τα ακόλουθα διαγράμματα διασποράς αναφέρονται στις περιπτώσεις αυτές.


Ο πίνακας του σχ. 131.1 δίνει τη διασπορά σε εκατοστιαία ποσοστά,



Σχ. 131.3

όταν η κατανομή συχνοτήτων είναι κανονική και συμμετρική ως προς το μέσο \bar{x} .

Με το ακόλουθο στικτό διάγραμμα δίνουμε την εικόνα μιας κανονικής και συμμετρικής κατανομής συχνοτήτων ως προς το μέσο \bar{x} .



Σχ. 131.4

132. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΣ






Η σύγκριση τών στατιστικῶν στοιχείων δύο ἢ περισσότερων φαινομένων ἀποτελεῖ τὴν τελικὴ φάση μιᾶς στατιστικῆς ἔρευνας. Σκοπὸς αὐτῆς τῆς συγκρίσεως εἶναι ἡ εὕρεση κάποιου νόμου πού νά καθορίζει τίς σχέσεις αὐτῶν τῶν φαινομένων. Μὲ τὴ σύγκριση τῶν στατιστικῶν στοιχείων μπορεῖ ὁ ἔρευνητὴς νά βρεῖ τίς ὁμοιότητες ἢ τίς διαφορὲς πού χαρακτηρίζουν δύο ἢ περισσότερα φαινόμενα καὶ νά ἀνακαλύψει, ἔτσι, τοὺς δεσμούς ἢ τίς σχέσεις ἐξαρτήσεώς τους.

Μιά τέτοια σύγκριση παρουσιάζει δυσκολίες, γιατί ἡ σχέση ἀλληλοεξαρτήσεως τῶν διαφόρων φαινομένων (φυσικῶν ἢ οἰκονομικῶν) εἶναι πολυσύνθετη, ἰδίως ὅταν πρόκειται γιὰ φαινόμενα οἰκονομικά.

Οἱ Φυσικὲς ἐπιστῆμες, τὰ μαθηματικά, ἡ ἀστρονομία, ἡ βιολογία μᾶς παρέχουν πάρα πολλὰ παραδείγματα συγκρίσεως διαφόρων ποσῶν καὶ μᾶς δίνουν τίς σχέσεις ἀλληλοεξαρτήσεώς τους μὲ τύπους (νόμους) σταθεροὺς καὶ ἀναλλοίωτους.

Ὅταν ὁμως πρόκειται γιὰ οἰκονομικά φαινόμενα, οἱ σχέσεις ἀλληλοεξαρτήσεώς τους δέν μποροῦν πάντοτε νά δοθοῦν μὲ τύπους, γιατί τὰ στοιχεῖα τῶν φαινομένων αὐτῶν εἶναι τίς περισσότερες φορές ἑτερογενή. Ὅμως γιὰ τὴν πορεία τῶν φαινομένων αὐτῶν ἡ στατιστικὴ παρέχει ἱκανοποιητικὲς ἐνδείξεις.

Συχνά συμβαίνει οἱ μεταβολές σὲ μιὰ μεταβλητὴ x νά συνοδεύονται ἀπὸ παράλληλες μεταβολές σὲ μιὰ ἄλλη μεταβλητὴ y καὶ νά ὑπάρχει μεταξύ τους κάποια σχέση. Οἱ μεταβλητὲς αὐτὲς λέμε ὅτι εἶναι **συσχετισμένες**. Π.χ. τὸ ὕψος καὶ τὸ βᾶρος ἀνθρώπων, τὸ ὕψος καὶ ἡ ἡλικία ἀνθρώπων, ἡ θερμοκρασία καὶ ἡ διαστολὴ μετᾶλλον κλπ.



Όταν δύο μεταβλητές x και ψ μεταβάλλονται παράλληλα έτσι, ώστε σε μεγάλες ή μικρές τιμές της x να αντιστοιχούν (όσο γίνεται) μεγάλες ή μικρές τιμές της ψ αντιστοίχως, χωρίς όμως να υπάρχει υποχρεωτικά και κάποια μαθηματική σχέση (νόμος) μεταξύ τους, τότε λέμε ότι υπάρχει **θετική συσχέτιση** των μεταβλητών x και ψ . Όταν όμως σε μεγάλες τιμές της x αντιστοιχούν μικρές τιμές της ψ και αντιστρόφως, λέμε ότι υπάρχει **αρνητική συσχέτιση** των μεταβλητών x και ψ . Π.χ. τό ύψος και τό βάρος ανθρώπων βρίσκονται σε **θετικό συσχετισμό**. Ο αριθμός των φυτών ανά μονάδα επιφάνειας και ή απόδοση κάθε φυτού βρίσκονται σε **αρνητικό συσχετισμό**.

Τέλος, όταν οι τιμές της μιᾶς μεταβλητῆς δέ φαίνονται να επηρεάζουν τίς τιμές της ἄλλης μεταβλητῆς, τότε λέγονται **ἀσυσχετίστες**. Π.χ. τό ύψος τῶν ἀνθρώπων καί τό ἐτήσιο εἰσόδημά τους.

Ἡ γραφική παράσταση βοηθεῖ στήν προσπάθεια νά βροῦμε μιά σχέση ἐξαρτήσεως μεταξύ δύο φαινομένων. Ἔτσι, ἄς ὑποθέσουμε ὅτι ἔχουμε τό σύνολο $\Sigma = \{ (x_1, \psi_1), (x_2, \psi_2), \dots, (x_\lambda, \psi_\lambda), \dots, (x_N, \psi_N) \}$, πού τά στοιχεῖα του παριστάνουν τίς ἀντίστοιχες τιμές δύο μεταβλητῶν x καί ψ .

Κατασκευάζουμε τίς εἰκόνες τῶν στοιχείων τοῦ Σ στό ἐπίπεδο τῶν ὀρθογ. ἀξόνων $xO\psi$. Τότε εἶναι δυνατό νά πάρουμε τά παραπάνω στικτά διαγράμματα, τά ὅποια εἶναι ἱκανά νά καταδείξουν ἂν ὑπάρχει ἢ ὄχι κάποια σχέση ἐξαρτήσεως (θετική ἢ ἀρνητική) μεταξύ τῶν δύο μεταβλητῶν x καί ψ .

Σημείωση. Ἐκτός ἀπό τά στικτά διαγράμματα γίνεται χρήση καί τῶν γραμμικῶν διαγραμμάτων (καμπύλων) στό ἴδιο ἐπίπεδο ὀρθογ. ἀξόνων, ὥστε νά μπορεῖ νά φαίνεται ἂν ὑπάρχει συσχέτιση ἢ ὄχι μεταξύ τῶν δύο μεταβλητῶν.

Τά παραπάνω διαγράμματα εἶναι βέβαια ἀναγκαῖα σάν προπαρασκευαστική ἐργασία, δέν εἶναι ὁμως καί ἐπαρκή. Γιά νά ἐπιτύχουμε πιό σαφεῖς ἐνδείξεις καί νά ἐρμηνεύσουμε τίς ὁμοιότητες ἢ διαφορές, ἂν ὑπάρχουν, μεταξύ δύο φαινομένων, εἶναι ἀνάγκη νά κάνουμε καί ἀριθμητικές συγκρίσεις.

Ἀποδείχτηκε ὅτι:

Ἄν \bar{x} καί $\bar{\psi}$ εἶναι ἀντιστοίχως οἱ μέσοι τῶν τιμῶν τῶν μεταβλητῶν x καί ψ τοῦ πίνακα:
$$\begin{cases} x_1, x_2, \dots, x_\lambda, \dots, x_N \\ \psi_1, \psi_2, \dots, \psi_\lambda, \dots, \psi_N \end{cases}$$
 τότε ἕνα πρῶτο κριτήριον, γιά νά δοῦμε ἂν εἶναι **συσχετισμένες** ἢ ὄχι οἱ μεταβλητές x καί ψ , μᾶς παρέχει τό ἄθροισμα:

$$(x_1 - \bar{x})(\psi_1 - \bar{\psi}) + (x_2 - \bar{x})(\psi_2 - \bar{\psi}) + \dots + (x_N - \bar{x})(\psi_N - \bar{\psi}) \quad (1)$$

Τό ἄθροισμα (1) ἂν εἶναι θετικό, φανερώνει ὅτι ἡ συσχέτιση εἶναι θετική, γιὰτί τότε τά περισσότερα γινόμενα $(x_\lambda - \bar{x})(\psi_\lambda - \bar{\psi})$ εἶναι θετικά, πράγμα πού σημαίνει ὅτι τά περισσότερα ζεύγη $(x_\lambda, \psi_\lambda)$ δίνουν ὁμόσημες ἀποκλίσεις ἀπό τούς μέσους \bar{x} καί $\bar{\psi}$.

*Αν τó άθροισμα (1) είναι άρνητικό, φανερώνει ότι ή συσχέτιση είναι άρνητική. *Αν, τέλος, είναι κοντά στό μηδέν, τότε δείχνει ότι οι μεταβλητές x και ψ είναι άσυσχέτιστες.

‘Ο βαθμός τής συσχέτισεως μεταξύ δύο μεταβλητών μετρίεται μέ τό συντελεστή συσχέτισεως r.

‘Ο συντελεστής συσχέτισεως r βρίσκειται άν διαιρέσουμε τό μέσο όρο τών γινομένων του άθροίσματος (1) μέ τό γινόμενο τών τυπικών άποκλίσεων σ_x και σ_y τών μεταβλητών x και ψ.

$$\text{Δηλαδή έχουμε: } r = \frac{\frac{1}{N} \sum (x_i - \bar{x}) (\psi_i - \bar{\psi})}{\sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{N}} \sqrt{\frac{\sum (\psi_i - \bar{\psi})^2}{N}}} = \frac{\sum (x_i - \bar{x}) (\psi_i - \bar{\psi})}{\sqrt{\sum (x_i - \bar{x})^2} \cdot \sqrt{\sum (\psi_i - \bar{\psi})^2}} \quad (2)$$

‘Ο συντελεστής r είναι ανεξάρτητος από τίς μονάδες μετρήσεως και (άποδεικνύεται ότι) περιέχεται μεταξύ -1 και +1. Δηλαδή $-1 \leq r \leq +1$.

*Αν είναι $r > 0$, τότε ή συσχέτιση είναι θετική και όσο ό r πλησιάζει πρός τό +1 γίνεται πιό ισχυρή. *Αν είναι $r < 0$, τότε ή συσχέτιση είναι άρνητική και όσο πλησιάζει πρός τό -1 γίνεται πιό ισχυρή. *Όταν ό r είναι κοντά στό 0, τότε ή συσχέτιση είναι πολύ άσθενής ή και άνύπαρκτη. Τέλος, άν $r = +1$, τότε έχουμε συσχέτιση θετική τέλεια και άν $r = -1$, τότε έχουμε συσχέτιση άρνητική τέλεια. Δηλαδή μεταξύ τών μεταβλητών x και ψ ύπάρχει μαθηματική γραμμική σχέση τής μορφής $\psi = ax + \beta$.

Τό συντελεστή συσχέτισεως r τόν χρησιμοποιούμε για νά εξακριβώσουμε τό δεσμό εξαρτήσεως, πού ύπάρχει μεταξύ δύο φαινομένων, σέ πάρα πολλές περιπτώσεις, ιδιαίτερα στή μετεωρολογία, βιολογία, ιατρική, στή γεωργική έρευνα και στήν οικονομία.

Στήν πράξη όμως πρέπει ό έρευνητής νά προχωρεί μέ πολλή προσοχή, γιατί πολλές φορές βρίσκουμε ισχυρό συντελεστή συσχέτισεως για φαινόμενα, τά όποια στή λογική φαίνεται ότι δέν έχουν κανένα δεσμό εξαρτήσεως. Τό σωστό είναι πρώτα νά εξετάζουμε τό πρόβλημα λογικά και έπειτα νά βρίσκουμε και νά διερευνούμε τό άποτέλεσμα.

‘Ο διάσημος στατιστικολόγος Tschuprow αναφέρει ότι σέ μιá στατιστική έρευνα για τό μέγεθος τών ζημιών από πυρκαϊές σέ συσχετισμό μέ τήν παρουσία ή όχι τών πυροσβεστικών άντλιών, ό συντελεστής συσχέτισεως απέδειξε ότι οι πιό βαριές ζημιές συμπίπτει νά γίνονται όπου παρουσιάζονται άντλίες. Πρέπει λοιπόν νά καταστρέψουμε τίς άντλίες (!).

Παράδειγμα: Οι βαθμοί 12 μαθητών στα έλληνικά, μαθηματικά, φυσική είναι:

Έλληνικά	x	1	2	4	5	6	7	10	12	13	15	16	19	9,2 = \bar{x}
Μαθηματικά	ψ	2	10	4	12	12	16	16	18	18	16	18	19	13,4 = $\bar{\psi}$
Φυσική	z	1	9	4	10	16	12	14	16	14	16	18	18	12,3 = \bar{z}

Νά υπολογιστεί ὁ συντελεστής συσχέτισως τῶν ἐπιδόσεων τῶν μαθητῶν στὰ:
1) ἑλληνικά καί μαθηματικά, 2) μαθηματικά καί φυσική.

Βρίσκουμε τίς ἀποκλίσεις καί ἐφαρμόζουμε τόν τύπο 2.

Ἔχουμε:	$x_{\lambda} - \bar{x}$	- 8,2	-7,2	-5,2	-4,2	-3,2	-2,2	0,8	2,8	3,8	5,8	6,8	9,8
	$\psi_{\lambda} - \bar{\psi}$	-11,4	-3,4	-9,4	-1,4	-1,4	2,6	2,6	4,6	4,6	2,6	4,6	5,6
	$z_{\lambda} - \bar{z}$	-11,3	-3,3	-8,3	-2,3	3,7	-0,3	1,7	3,7	1,7	3,7	5,8	5,8

$$\Sigma(x_{\lambda} - \bar{x})(\psi - \bar{\psi}) = (-8,2)(-11,4) + (-7,2)(-3,4) + \dots + (9,8)(5,6) = 305,16$$

$$\Sigma(\psi_{\lambda} - \bar{\psi})(z - \bar{z}) = (-11,4)(-11,3) + (-3,4)(-3,3) + \dots + (5,6)(5,8) = 313,36$$

$$\Sigma(x_{\lambda} - \bar{x})^2 = (-8,2)^2 + (-7,2)^2 + \dots + (6,8)^2 + (9,8)^2 = 377,68$$

$$\Sigma(\psi_{\lambda} - \bar{\psi})^2 = (-11,4)^2 + (-3,4)^2 + \dots + (4,6)^2 + (5,6)^2 = 348,92$$

$$\Sigma(z_{\lambda} - \bar{z})^2 = (-11,3)^2 + (-3,3)^2 + \dots + (5,8)^2 + (5,8)^2 = 326,98$$

$$\text{* Ἄρα ἔχουμε : 1) } r_1 = \frac{305,16}{\sqrt{377,68 \cdot 348,92}} = \frac{305,16}{363,01} \approx 0,84$$

$$2) r_2 = \frac{313,36}{\sqrt{348,92 \cdot 326,98}} = \frac{313,36}{337,77} \approx 0,93$$

Ἀπό τούς συντελεστῆς συσχέτισως πού βρήκαμε συμπεραίνουμε:

- 1) ὅτι καί οἱ δύο συσχέτισεις εἶναι θετικές καί πολύ ἰσχυρές,
- 2) ὅτι ἡ συσχέτιση τῶν ἐπιδόσεων τῶν μαθητῶν στὰ μαθηματικά - φυσική εἶναι ἰσχυρότερη ἀπό τή συσχέτιση στὰ ἑλληνικά - μαθηματικά.

Οἱ μαθητές μποροῦν νά κατασκευάσουν τό μικρό διάγραμμα καί στίς δύο συσχέτισεις.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

442) Ἀπό τίς παρακάτω ἰδιότητες ποιές εἶναι ποιοτικές καί ποιές ποσοτικές; Ἐπίσης ἀπό τίς μεταβλητές ποιές εἶναι συνεχεῖς καί ποιές ἀσυνεχεῖς; Ἀνάστημα - ἡλικία - ἐπάγγελμα - εἰσόδημα - θρησκεία - γλώσσα - οἰκογενειακή κατάσταση - ἀριθμός ἀγάμων - γεωργικός κλῆρος - θερμοκρασία τοῦ ἀέρα - θεραπευτήρια κατὰ γεωγρ. διαμερίσματα - βάρος - ἐξαγωγή σταφίδας σέ τόνους - ἀπουσίες μαθητῶν.

443) Σέ ἕνα πρόχειρο διαγωνισμό οἱ 42 τῆς τάξεώς μας πήραν τούς ἀκόλουθους βαθμούς:

12, 8, 15, 17, 10, 11, 6, 10, 12, 14, 11, 19, 16, 12
16, 10, 20, 7, 12, 11, 10, 13, 15, 9, 17, 18, 14, 2
13, 17, 18, 10, 14, 6, 11, 12, 14, 10, 13, 15, 13, 12

Νά σχηματισθεῖ πίνακας κατανομῆς συχνοτήτων μέ στήλες ἀπόλυτης, σχετικῆς καί ἀθροιστικῆς συχνότητας.

444) Τό ἔτος 1965 οἱ μετανάστες ἀπό τήν Ἑλλάδα ἔφθασαν τίς 117 χιλιάδες περίπου, ἀπό τούς ὁποίους 65 χιλ. ἄνδρες καί 52 χιλ. γυναῖκες ἡλικίας ἀπό 0 - 75 ἐτῶν, ὅπως δείχνει ὁ ἀκόλουθος πίνακας (Πηγή: Στατιστική Ἐπετηρίδα, 1966):

Ήλικια	0-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	Σύνολο
Άνδρες	1,8	1,6	1,3	5,3	10,2	17	11,9	8,6	3,8	1,5	0,9	0,5	0,3	0,2	0,1	65
Γυναίκες	1,8	1,6	1,4	8	11	10,3	7,1	4,7	2	1	1,1	0,8	0,6	0,4	0,2	52

Νά σχηματισθεί πίνακας κατανομής με στήλες όπως στην προηγούμενη άσκηση.

445) Οι αφίξεις στην Ελλάδα περιηγητών από το εξωτερικό τα έτη 1959-1965 είναι οι ακόλουθες (Στατιστική Έπιτετριδα, 1966):

Έτος	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	
Αφίξεις	340,0	399,4	494,2	597,9	741,2	757,5	976,1	Σέ χιλιάδες

Νά σχηματισθεί πίνακας κατανομής με στήλες όπως στην προηγ. άσκηση.

446) Νά κατασκευασθεί τό πολύγωνο συχνότητας των ασκήσεων 443, 444 και 445 καθώς και τό πολύγωνο άθροιστικής συχνότητας.

447) Νά κατασκευασθεί τό Ιστόγραμμα συχνότητας και άθροιστικής συχνότητας των ασκήσεων 443 και 444.

448) Νά κατασκευασθεί ραβδόγραμμα για τά στοιχεία τής άσκ. 445.

449) Τά γενικά έξοδα μιās επιχείρησης είναι:

Μισθοί δραχμές 300.000, ένοίκια δραχ. 200.000, ασφάλειες και φόροι δραχ. 100.000, διαφήμιση 150.000, διάφορα δραχ. 50.000. Νά κατασκευασθεί κυκλικό διάγραμμα αυτής τής κατανομής.

450) Τό έτος 1966 ή έκταση τής Ελλάδας παρουσίασε τήν έξις κατανομή: Γεωργική έκταση 30%, Δασική έκταση 20,3%, Έκταση βοσκής 38,2%, Οικοδομημένη έκταση 3,5%, άμμόδης έκταση 4,8%, έκταση πού καλύπτεται από νερά 3,2%. Νά κατασκευασθεί κυκλικό διάγραμμα αυτής τής κατανομής.

451) Νά εύρεθεί ό άριθμ. μέσος και ή διάμεσος στά δεδομένα των ασκήσεων 443, 444 και 445.

452) Νά βρεθεί ή έπικρατούσα τιμή στά δεδομένα τής άσκησης 444 ξεχωριστά για τούς άνδρες και γυναίκες και έπειτα για τό σύνολο των μεταναστών.

453) Τό προσωπικό μιās επιχείρησης κατανέμεται άνάλογα με τά έτη ύπηρεσίας ως έξης:

Έτη ύπηρεσίας	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45
Άριθμός υπαλλήλων	108	70	39	20	11	5	5	3	2

Νά γίνει ό πίνακας κατανομής συχνότητας άπόλυτης, σχετικής και άθροιστικής και άν βρεθούν οι κεντρικές τιμές \bar{x} , x_0 , x_n .

454) Ό άριθμ. μέσος των άριθμών $x_1, x_2, \dots, x_n, n \in \mathbb{N}$, είναι \bar{x} .

Νά βρεθεί ό άριθμ. μέσος των άριθμών α) $x_1 + k, x_2 + k, \dots, x_n + k$, β) $x_1 - k, x_2 - k, \dots, x_n - k$, γ) kx_1, kx_2, \dots, kx_n , δ) $\frac{x_1}{k}, \frac{x_2}{k}, \dots, \frac{x_n}{k}, k \neq 0$, και ε) $kx_1 + \lambda, kx_2 + \lambda, \dots, kx_n + \lambda$.

455) Δίνονται τά εξής βάρη σε kg: 3, 6, 6, 12, 9, 12, 10, 9, 12, 14, 17. Νά υπολογισθεί ο αριθμ. μέσος και η τυπική απόκλιση.

456) Τά ημερομίσθια 500 εργατῶν ἑνὸς ἐργοστασίου κατανέμονται ὡς ἐξῆς:

Τάξεις ημερομισθ.	..-55	55-65	65-75	75-85	85-95	95-105	105-...
Ἀριθμὸς εργατῶν	40	190	120	70	50	20	10

Νά βρεθεῖ ὁ ἀριθμ. μέσος, ἡ τυπικὴ ἀπόκλιση καὶ ὁ ἀριθμὸς τῶν εργατῶν, πού ἔχουν ημερομίσθιο α) ἀπὸ $\bar{x} - \sigma$ ἕως $\bar{x} + \sigma$ καὶ β) ἀπὸ $\bar{x} - 2\sigma$ ἕως $\bar{x} + 2\sigma$. Νά γίνει καὶ τὸ διάγραμμα διασπορᾶς.

457) Τά ἀναστήματα καὶ τά βάρη 346 ἀτόμων κατανέμονται ὡς ἐξῆς:

Βάρος σε kg	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95-100
Ἀριθμὸς ἀτόμων	2	3	12	38	88	70	55	39	26	13

Ἀνάστημα cm	150-155	155-160	160-165	165-170	170-175	175-180	180-185	185-190
Ἀριθμὸς ἀτόμων	1	2	9	48	131	102	40	13

Νά βρεθοῦν οἱ μέσοι, οἱ διακυμάνσεις, οἱ τυπικὲς ἀποκλίσεις σὲ κάθε σειρά καὶ νά ἐξετασθεῖ σὲ ποιά σειρά εἶναι μεγαλύτερη ἡ διασπορά.

458) Δύο τυχαῖες μεταβλητὲς ἐμφανίσθηκαν σὲ ζεύγη ἀντίστοιχων τιμῶν ὡς ἐξῆς:

x	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ψ	4	5	10	12	5	5	4	5	4	3

Νά υπολογισθεῖ ὁ συντελεστὴς συσχέτισεως καὶ νά γίνει τὸ στικτὸ διάγραμμα τῶν παραπάνω 10 ζευγῶν.

459) Τά κεφάλαια πού χρησιμοποιήθηκαν ἀπὸ μιὰ ἐταιρεία γιὰ 10 διαδοχικὰ ἔτη καὶ τὰ ἀντίστοιχα κέρδη δίνονται στὸν παρακάτω πίνακα:

Κεφάλαιο σὲ ἑκατομ. δρχ.	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Κέρδος σὲ ἑκατομ. δρχ.	2	4	8	5	10	15	14	20	22	30

Νά βρεθεῖ ὁ συντελεστὴς συσχέτισεως καὶ νά γίνει τὸ στικτὸ διάγραμμα.


ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧVI

ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ

133. ΤΟ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟ ΤΟΣΟ ΚΥΚΛΟΥ ΚΑΙ Η ΓΩΝΙΑ. ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ.

Σ' έναν κύκλο μέ κέντρο O (Σχ. 133.1) ἄς θεωρήσουμε δύο σημεῖα A καί B . Τά σημεῖα A καί B χωρίζουν τήν περιφέρεια σέ δύο τόξα, τό \widehat{AMB} καί τό $\widehat{BM'A}$. Οἱ ἡμιευθεῖες $O\alpha$ καί $O\beta$ ὀρίζουν δύο ἐπίκεντρες γωνίες, τίς $\sphericalangle (O\alpha, O\beta)$ καί $\sphericalangle (O\beta, O\alpha)$. Ἡ $\sphericalangle (O\alpha, O\beta)$ ἀντιστοιχεῖ στό τόξο \widehat{AMB} καί ἡ $\sphericalangle (O\beta, O\alpha)$ στό τόξο $\widehat{BM'A}$. Ἄν φανταστοῦμε ὅτι τό ἐπίπεδο τοῦ κύκλου στρέφεται γύρω ἀπό τό O κατὰ τή θετική φορά περιστροφῆς, ὅταν τό σημεῖο A στήν κίνησή του διαγράφει τό τόξο \widehat{AMB} , ἡ ἀκτίνα $O\alpha$, πάνω στήν ὁποία εἶναι τό σημεῖο A , θά διαγράφει τό ἐσωτερικό τῆς ἀντίστοιχης ἐπίκεντρης γωνίας $(O\alpha, O\beta)$.



Σχ. 133.1

Ἡ ἀπόλυτη τιμή ἑνός τόξου (ἢ μιᾶς γωνίας) εἶναι ὁ λόγος τοῦ τόξου (ἢ τῆς γωνίας) πρὸς τή μονάδα τῶν τόξων (ἢ τῶν γωνιῶν).

Ἡ γεωμετρία διδάσκει ὅτι λόγος δύο τόξων τῆς ἴδιας ἀκτίνας εἶναι ἴσος μέ τό λόγο τῶν ἀντίστοιχων ἐπίκεντρων γωνιῶν καί ἐπομένως: Ἐνα τόξο ἔχει τήν ἴδια ἀπόλυτη τιμή μέ τήν ἀντίστοιχὴ του ἐπίκεντρη γωνία, ἂν βέβαια ὡς μονάδα μετρήσεως τῶν τόξων παίρνουμε τό τόξο, πού ἀντιστοιχεῖ στή μονάδα τῶν γωνιῶν.

Συνέπεια αὐτοῦ εἶναι ὅτι τά τόξα πού ἀνήκουν σέ κύκλους μέ διαφορετικές ἀκτίνας ἔχουν τήν ἴδια ἀπόλυτη τιμή ἢ, ὅπως ἀλλιῶς λέμε, ἐκφράζονται μέ τόν ἴδιο ἀπόλυτο ἀριθμό, ὅταν ἀντιστοιχοῦν στήν ἴδια ἢ σέ ἴσες ἐπίκεντρες γωνίες.

Τό μέγεθος ἑνός τόξου ἐκφράζεται μέ δύο τρόπους:

1) μέ τό μήκος του, ὅταν εἶναι γνωστή ἡ ἀκτίνα του, καί

2) με τήν απόλυτη τιμή του, (μέ τή βοήθεια μιᾶς ὀρισμένης μονάδας τόξων), ἡ ὁποία απόλυτη τιμή δέν ἐξαρτᾶται ἀπό τήν ἀκτίνα τοῦ κύκλου.

Βασική μονάδα μετρήσεως τῶν γωνιῶν εἶναι ἡ ὀρθή γωνία. Ἡ ἀντίστοιχη μονάδα τόξων εἶναι τό $\frac{1}{4}$ τοῦ κύκλου. Ἡ ὀρθή γωνία ὑποδιαιρεῖται σέ 90 ἴσες γωνίες, ἡ καθεμίᾳ ἀπό τίς ὁποῖες λέγεται **μία μοίρα**, συμβολικά 1° . Ἡ γωνία μιᾶς μοίρας ὑποδιαιρεῖται σέ 60 ἴσες γωνίες καθεμίᾳ ἀπό τίς ὁποῖες λέγεται **ἕνα λεπτό**, συμβολικά $1'$. Ἡ γωνία τοῦ $1'$ ὑποδιαιρεῖται σέ 60 ἴσα μέρη, πού τό καθένα λέγεται **ἕνα δεύτερο λεπτό**, συμβολικά $1''$.

*Αντίστοιχα: τό $\frac{1}{4}$ τοῦ κύκλου ὑποδιαιρεῖται σέ 90 ἴσα τόξα, πού τό καθένα λέγεται μία μοίρα κύκλου καί συμβολίζεται ὁμοίως 1° . Τό τόξο μιᾶς μοίρας ὑποδιαιρεῖται σέ 60 ἴσα μέρη, πού τό καθένα λέγεται ἕνα λεπτό ($1'$) κύκλου κ.τ.λ.

Ἡ θεωρητική μονάδα τόξων ἡ γωνιῶν εἶναι τό ἀκτίνιο (rad). Τό ἀκτίνιο εἶναι τόξο, πού τό μήκος του εἶναι ἴσο μέ τό μήκος τῆς ἀκτίνας τοῦ κύκλου στόν ὁποῖο ἀνήκει. Ἐπίσης γωνία ἐνός ἀκτινίου λέγεται ἡ ἀντίστοιχη ἐπίκεντρο γωνία τοῦ τόξου ἐνός ἀκτινίου (Σχ. 132.2).

Ἡ απόλυτη τιμή ἐπομένως ἐνός τόξου σέ ἀκτίνια εἶναι ὁ λόγος τοῦ μήκους αὐτοῦ τοῦ τόξου πρὸς τήν ἀκτίνα. Τό μήκος s ἐνός τόξου κύκλου μέ ἀκτίνα ρ συνδέεται μέ τήν απόλυτη τιμή α τοῦ τόξου αὐτοῦ σέ ἀκτίνια μέ τήν ἰσότητα :



Σχ. 132.2

$$\alpha = \frac{s}{\rho} \Leftrightarrow s = \alpha \rho$$

*Αν ὡς μονάδα μετρήσεως τοῦ μήκους πάρουμε τήν ἀκτίνα ρ , τότε τό μήκος τοῦ τόξου ἐκφράζεται μέ τόν ἴδιο ἀριθμό, μέ τόν ὁποῖο ἐκφράζεται καί ἡ απόλυτη τιμή τοῦ τόξου αὐτοῦ σέ ἀκτίνια.

Ἐπομένως ἡ απόλυτη τιμή ὁλόκληρου τοῦ κύκλου σέ ἀκτίνια εἶναι $\frac{2\pi\rho}{\rho} = 2\pi$. Ὁ ἀριθμός αὐτός 2π ἐκφράζει ἐπίσης τό μήκος κύκλου, πού ἔχει ἀκτίνα ἴση μέ τή μονάδα. Ἡ απόλυτη τιμή τοῦ ἡμίκυκλου εἶναι π καί τοῦ $\frac{1}{4}$ τοῦ κύκλου εἶναι $\frac{\pi}{2}$.

*Αναφέρουμε ἐδῶ καί μία μονάδα, τήν ὁποία χρησιμοποιοῦν στίς στρατιωτικές ἐφαρμογές, τό mil *, πού εἶναι ἴσο μέ τό $\frac{1}{6400}$ τοῦ κύκλου. Τό mil μέ μεγάλη προσέγγιση εἶναι ἴσο μέ $\frac{1}{1000}$ rad.

*Αν μέ τά α καί μ παραστήσουμε τίς απόλυτες τιμές τοῦ ἴδιου τόξου μέ

(*) «χιλιοστό» κατὰ τήν ἑλληνική στρατιωτική ὀρολογία.

μονάδες αντίστοιχως τό ακτίνιο καί τή μοίρα, αν τό τόξο αυτό δέν είναι μεγαλύτερο από τόν κύκλο, θά Ισχύει ή Ισότητα:

$$\frac{\alpha}{\pi} = \frac{\mu}{180} \quad (133, \alpha)$$


Πραγματικά δύο τόξα ενός κύκλου ως μετρηθούν διαδοχικά μέ μονάδες τό ακτίνιο καί τή μοίρα. "Ας είναι α καί μ οι απόλυτες τιμές του πρώτου τόξου σέ ακτίνια καί μοίρες καί α' καί μ' του δεύτερου τόξου αντίστοιχως σέ ακτίνια καί μοίρες. "Η γεωμετρία διδάσκει ότι ο λόγος δύο τόξων δέν εξαρτάται από τή μονάδα μετρήσεως τους καί ότι Ισχύει: $\frac{\alpha}{\alpha'} = \frac{\mu}{\mu'}$.

"Αν ως δεύτερο τόξο πάρουμε τόν ήμικυκλο, τότε ή Ισότητα $\frac{\alpha}{\alpha'} = \frac{\mu}{\mu'}$ γίνεται $\frac{\alpha}{\pi} = \frac{\mu}{180}$.

"Η Ισότητα λοιπόν (133, α) μās επιτρέπει νά βρίσκουμε τήν απόλυτη τιμή ενός τόξου στή μιά από τίς μονάδες, όταν γνωρίζουμε τήν απόλυτη τιμή του στήν άλλη.

134. ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΕΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΕΝΟ ΤΟΞΟ.

"Αν ένα κινητό σημείο αναχωρήσει από ένα σημείο Α ενός κύκλου (Σχ. 134), μπορεί νά τόν διαγράψει, αν κινηθεί πάνω σ' αυτόν, κατά δύο φ ο ρ έ ς. "Από τίς φορές αυτές ή αντίθετη πρός τή φορά τής κινήσεως τών δεικτών του ρολογιού όρίζεται ως **θετική φορά** καί εκείνη, πού συμφωνεί μέ τή φορά τής κινήσεως τών δεικτών του ρολογιού, ως **άρνητική φορά**. "Όταν σ' έναν κύκλο έχει όρισθεί ή θετική, επομένως καί ή άρνητική φορά, ο κύκλος λέγεται **προσανατολισμένος**. Τή θετική φορά τή συμβολίζουμε στό σχήμα μέ ένα βέλος, πού συνοδεύεται μέ τό σύμβολο +.



Σχ. 134

"Αν τώρα πάνω σ' έναν προσανατολισμένο κύκλο έχουμε δύο σημεία Α καί Β, τότε στόν κύκλο αυτό όρίζονται τέσσερα τόξα προσανατολισμένα, πού τό μήκος του καθενός είναι μικρότερο από του κύκλου, επειδή ένα τόξο \widehat{AB} είναι δυνατό νά διαγραφεί από κινητό σημείο είτε από τό Α πρός τό Β είτε από τό Β πρός τό Α. "Ορίζονται λοιπόν δύο τόξα ΑΒ: ένα λεγόμενο **θετικό τόξο ΑΒ**, πού συμβολίζεται μέ \widehat{AB}^+ , καί ένα **άρνητικό τόξο ΑΒ**, πού συμβολίζεται μέ \widehat{AB}^- , επειδή τό ένα έχει τή θετική φορά του προσανατολισμένου κύκλου καί τό άλλο τή άρνητική. Γενικά ένα προσανατολισμένο τόξο συμβολίζεται μέ \widehat{AB} .

"Ορίζονται επίσης δύο τόξα ΒΑ, τό ένα θετικό \widehat{BA}^+ καί τό άλλο άρνητικό \widehat{BA}^- . Για νά μή γίνεται σύγχυση, μπορούμε νά διατηρήσουμε τό όνομα **γεωμετρικό τόξο ΑΒ**, συμβολικά \widehat{AB} , για τό μικρότερο θετικό τόξο \widehat{AB}^+ .

Τοῦ προσανατολισμένου τόξου \widehat{AB} τό σημεῖο A λέγεται: **ἡ ἀρχή** τοῦ \widehat{AB} καί τό B : **τό πέρασ** τοῦ \widehat{AB} .

Τά τόξα, πού ὄρισάμε μέ τόν παραπάνω, τρόπο εἶναι μερικές περιπτώσεις γενικότερων προσανατολισμένων τόξων, πού τό μήκος τους μπορεῖ νά εἶναι μεγαλύτερο ἀπό τό μήκος τοῦ κύκλου.

Πραγματικά, ἂν φαντασθοῦμε ἕνα κινητό σημεῖο πάνω στόν κύκλο (Σχ. 134), αὐτό μπορεῖ ξεκινώντας ἀπό τό A νά ἐκτελέσει μιᾶ ἢ περισσότερες περιστροφές διατρέχοντας τόν κύκλο καί νά σταματήσῃ στό B . Τό κινητό αὐτό σημεῖο μπορεῖ μάλιστα νά κινηθεῖ κατά τή θετική ἢ τήν ἀρνητική φορά πάνω στόν κύκλο.

Τά τόξα, πού ὀρίζονται ἔτσι, λέγονται **τριγωνομετρικά τόξα**, καί συμβολίζονται ἐπίσης μέ τό σύμβολο \widehat{AB} .

Γιά νά εἶναι ὁμως ἕνα τριγωνομετρικό τόξο τέλεια ὀρισμένο, πρέπει νά γνωρίζουμε: 1) τήν ἀρχή του, 2) τό πέρασ του, 3) τή φορά του, καί 4) τόν ἀριθμό τῶν ὀλόκληρων περιστροφῶν, πού τό κινητό σημεῖο διέγραψε, ὥσπου νά σταματήσῃ στό πέρασ τοῦ τόξου. Ὡστε:

Τριγωνομετρικό τόξο \widehat{AB} λέγονται ὅλα τά τόξα, τά ὁποῖα διαγράφονται ἀπό κινητό σημεῖο, τό ὁποῖο ἀναχωρεῖ ἀπό τό A καί, ἀφοῦ κινηθεῖ πάντοτε κατά τήν ἴδια φορά, θετική ἢ ἀρνητική, σταματᾷ στό B , προτοῦ διατρέξῃ ὀλόκληρο τόν κύκλο, ἢ ἀφοῦ διατρέξῃ προηγουμένως ἕναν ἀκέραιο ἀριθμό κύκλων.

Ἔτσι ἐννοοῦμε ὅτι ὑπάρχουν ἀπειράριθμα τριγωνομετρικά τόξα, πού ἔχουν τήν ἴδια ἀρχή καί τό ἴδιο πέρασ, θετικά καί ἀρνητικά.

135. ΑΛΓΕΒΡΙΚΗ ΤΙΜΗ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΤΟΞΟΥ.

Ἐνα τριγωνομετρικό τόξο, ὅπως ἕνα γεωμετρικό τόξο, μπορεῖ νά μετρηθεῖ μέ μιᾶ ἀπό τίς μονάδες τόξων. Ὁ ἀριθμός, πού θά προκύψει μ' αὐτό τόν τρόπο, εἶναι ἡ ἀπόλυτη τιμή, ἡ ὁποία χαρακτηρίζει τό μέγεθος, ἀλλά ὄχι καί τή φορά τοῦ τόξου. Ἄν τώρα στήν ἀπόλυτη τιμή προτάξουμε τό $+$, ἂν τό τόξο εἶναι θετικό, ἢ τό $-$, ἂν εἶναι ἀρνητικό, ἔχουμε τή λεγόμενη **ἀλγεβρική τιμή** τοῦ προσανατολισμένου τόξου.

Δύο προσανατολισμένα τόξα τοῦ ἴδιου κύκλου ἢ ἴσων κύκλων εἶναι ἴσα, ὅταν ἔχουν τήν ἴδια ἀλγεβρική τιμή. Εἶναι **ἀντίθετα**, ἂν οἱ ἀλγεβρικές τιμές τους εἶναι ἀριθμοί ἀντίθετοι.


Τό προσανατολισμένο τόξο, τό ὁποῖο ἔχει ἀρχή καί πέρασ πού ταυτίζονται πρῖν γίνῃ περιστροφή, εἶναι ἕνα συμβατικό τόξο, πού λέγεται **μηδενικό τόξο**. Ἀλγεβρική τιμή του εἶναι ὁ ἀριθμός 0.

Ἀπό τά παραπάνω γίνεται φανερό ὅτι τό προσανατολισμένο τόξο μπορεῖ νά θεωρηθεῖ ὡς μιᾶ μεταβλητή, πού μπορεῖ νά πάρῃ ὅλες τίς πραγματικές τιμές, δηλ. πού διατρέχει τό σύνολο \mathbf{R} , ἂν θεωρήσουμε τήν ἀλγεβρική τιμή κάθε τόξου ὡς ἕνα ἄλλο σύμβολο γιά τό τόξο.

136. ΤΟΞΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟ ΠΕΡΑΣ.

*Εστω προσανατολισμένος κύκλος με κέντρο O (Σχ. 136), A η αρχή τῶν τόξων καὶ M ἓνα σημεῖο τοῦ κύκλου. *Εστω τ ἡ ἀλγεβρική τιμὴ τοῦ πρώτου μὴ ἀρνητικοῦ τόξου \widehat{AM} . *Αν c εἶναι ἡ ἀλγεβρική τιμὴ τοῦ θετικοῦ κύκλου (ἡ ἀπόλυτη τιμὴ τῶν τόξων βρίσκεται πάντοτε στὴν ἴδια μονάδα: σὲ μοῖρες ἢ σὲ ἀκτίνα), τότε τὸ δεύτερο θετικό τόξο \widehat{AM} θά ἔχει ἀλγεβρική τιμὴ $c + \tau$, τὸ τρίτο $2c + \tau$, τὸ τέταρτο $3c + \tau$ καὶ γενικά ἡ ἀλγεβρική τιμὴ τοῦ τυχόντος θετικοῦ τόξου \widehat{AM} , θά δίνεται ἀπὸ τὸν τύπο $kc + \tau$, ὅπου k εἶναι θετικός ἀκέραιος ἢ 0 .

*Ἡ ἀλγεβρική τιμὴ τοῦ πρώτου ἀρνητικοῦ τόξου \widehat{AM} θά εἶναι $-c + \tau$, τοῦ δευτέρου ἀρνητικοῦ τόξου \widehat{AM} θά εἶναι $-2c + \tau$, τοῦ τρίτου $-3c + \tau$, τοῦ τέταρτου $-4c + \tau$ καὶ γενικά ἡ ἀλγεβρική τιμὴ τοῦ τυχόντος ἀρνητικοῦ τόξου \widehat{AM} θά δίνεται ἀπὸ τὸν τύπο $kc + \tau$, ὅπου k κάποιος ἀρνητικός ἀκέραιος.



Σχ. 136

*Αν λοιπὸν μὲ x παραστήσουμε τὴν ἀλγεβρική τιμὴ τοῦ τυχόντος τόξου \widehat{AM} (θετικοῦ ἢ ἀρνητικοῦ), αὐτὴ θά δίνεται ἀπὸ τὸν τύπο:

$$x = kc + \tau, \quad k \in \mathbb{Z}$$

*Αν ἔχουμε πᾶρει ὡς μονάδα τὸ ἀκτίνιο, ὁ τύπος γίνεται:

$$x = 2k\pi + \tau, \quad k \in \mathbb{Z} \quad (\alpha)$$

*Αν ἔχουμε πᾶρει ὡς μονάδα τὴ μοῖρα, ὁ τύπος γίνεται:

$$x^\circ = 360^\circ k + \tau^\circ, \quad k \in \mathbb{Z} \quad (\alpha')$$

***Ἀντιστρόφως** κάθε τόξο μὲ ἀρχὴ τὸ σημεῖο A καὶ ἀλγεβρική τιμὴ $x = kc + \tau$, $k \in \mathbb{Z}$, ἔχει πέρασ τὸ σημεῖο M . Γιά νά τὸ ἀποδείξουμε αὐτό, ἀρκεῖ ν' ἀντιστρέψουμε τὴν προηγούμενη πορεία, θεωρώντας τίς περιπτώσεις $k = 0$, $k > 0$, $k < 0$.

*Ἡ ἰσότητα (α) , καθὼς καὶ ἡ (α') , δὲ μεταβάλλεται, ἂν ἀντὶ τῆς τ πάρουμε τὴν ἀλγεβρική τιμὴ ἑνὸς ὁποιουδήποτε ἄλλου ἀλλὰ ὀρισμένου τόξου \widehat{AM} . Πραγματικά, ἂν στὸν παραπάνω τύπο (α) ἀντικαταστήσουμε τὸ k μὲ κάποιον ἀριθμὸ τοῦ συνόλου \mathbb{Z} , π.χ. τὸν k_1 , θά βροῦμε τὴν ἀλγεβρική τιμὴ τ_1

ένος από τὰ τόξα \widehat{AM} . Θά είναι λοιπόν:

$$x = 2k\pi + \tau$$

$$\tau_1 = 2k_1\pi + \tau$$

καί άπ' αυτές μέ άφαίρεση κατά μέλη:

$$x - \tau_1 = 2(k - k_1)\pi, \text{ δηλ. } x = 2\lambda\pi + \tau_1$$

όπου $\lambda \in \mathbb{Z}$ καί τ_1 είναι ή άλγεβρική τιμή ένός όποιουδήποτε άλλα όρισμένου τόξου \widehat{AM} .

Ό τύπος λοιπόν (α) μάς δίνει τήν άλγεβρική τιμή του τυχόντος προσανατολισμένου τόξου \widehat{AM} , όταν γνωρίζουμε τήν άλγεβρική τιμή ένός όποιουδήποτε άλλα όρισμένου τόξου \widehat{AM} .

Ό ίδιος τύπος (α) γράφεται:

$$x - \tau = 2k\pi \text{ ή } x^\circ - \tau^\circ = 360^\circ k, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Δηλαδή: Δύο τριγωνομετρικά τόξα, πού έχουν τήν ίδια άρχή καί τό ίδιο πέρας, διαφέρουν κατά άκέραιο άριθμό κύκλων.

Άντιστρόφως: άς θεωρήσουμε ένα τόξο \widehat{AM} μέ άλγεβρική τιμή

$$\tau_1 = 2k\pi + \tau$$

καί ένα άλλο τόξο μέ τήν ίδια άρχή A καί άλγεβρική τιμή τ_2 πού διαφέρει άπό τήν τ_1 , κατά άκέραιο πολλαπλάσιο τής άλγεβρικής τιμής όλόκληρου κύκλου, έστω κατά $k_2 2\pi$. Τότε, σύμφωνα μέ όσα είπαμε παραπάνω, θά είναι:

$$\tau_2 = \tau_1 + k_2 2\pi = 2k\pi + \tau + 2k_2\pi = 2(k + k_2)\pi + \tau$$

καί έπειδή $k_1 \in \mathbb{Z}$, $k \in \mathbb{Z}$, θά είναι καί $(k_1 + k) \in \mathbb{Z}$ καί έπομένως

$$\tau_2 = 2\lambda\pi + \tau, \quad \lambda \in \mathbb{Z}$$

Άπό τήν τελευταία αυτή ισότητα συνάγουμε ότι τό τόξο μέ άλγεβρική τιμή τ_2 θά έχει πέρας τό σημείο M .


Όποτε: **Άναγκαία καί ίκανή συνθήκη για νά έχουν καί κοινό πέρας δύο προσανατολισμένα τόξα του ίδιου κύκλου, πού έχουν κοινή άρχή, είναι οι άλγεβρικές τιμές τους νά διαφέρουν κατά $2k\pi$ ($360^\circ k$), όπου $k \in \mathbb{Z}$.**

137. ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΕΝΗ ΓΩΝΙΑ. ΑΛΓΕΒΡΙΚΗ ΤΙΜΗ ΤΗΣ.

Ό έννοια τής προσανατολισμένης γωνίας καί τής άλγεβρικής τιμής της μάς είναι γνωστή άπό τό Γυμνάσιο.

Ό άντιστοιχία, πού ύπάρχει μεταξύ τόξου καί έπίκεντρης γωνίας του, μάς επιτρέπει νά συνδέσουμε τήν έννοια του προσανατολισμένου τόξου μέ τήν έννοια τής προσανατολισμένης γωνίας (Σχ. 137).

Πραγματικά, όταν τό κινητό σημείο άναχωρεί από τό Α καί διαγράφει τό τόξο \widehat{AB} , τότε ή ήμιευθεία $O\alpha$ διαγράφει τό έσωτερικό τής προσανατολισμένης γωνίας $(O\alpha, O\beta)$, τήν όποία συμβολίζουμε μέ $\zeta (O\alpha, O\beta)$, άν είναι θετική ή μέ $\zeta (O\alpha, O\beta)$, άν είναι άρνητική. Ή τελική πλευρά $O\beta$ τής προσανατολισμένης γωνίας, πρίν πάρει τήν τελική θέση της $O\beta$, μπορεί νά έκτελέσει μιά ή περισσότερες περιστροφές γύρω από τό O καί νά διαγράψει έτσι έναν άκέραιο άριθμό θετικών ή άρνητικών πλήρων γωνιών. Ύπάρχουν έπομένως άπειράριθμες προσανατολισμένες γωνίες, πού έχουν τήν ίδια άρχική καί τήν ίδια τελική πλευρά. Καθεμιά από τίς γωνίες αυτές λέγεται: **τριγωνομετρική γωνία**. Έπομένως ύπάρχει μιά άμφιμονοσήμαντη άντιστοιχία μεταξύ των τόξων \widehat{AB} καί των προσανατολισμένων γωνιών $(O\alpha, O\beta)$.



Σχ. 137

Ή μικρότερη θετική γωνία $\zeta (O\alpha, O\beta)$, ή όποία άντιστοιχεί στό τόξο \widehat{AB}^+ , μπορεί νά όνομασθεί **γεωμετρική γωνία**: αυτή συμβολίζεται $\zeta (O\alpha, O\beta)$.

Ή άλγεβρική τιμή x μιās τριγωνομετρικής γωνίας μέ άρχική πλευρά $O\alpha$ καί τελική πλευρά $O\beta$ δίνεται προφανώς από τον τύπο: $x^\circ = 360^\circ k + \tau^\circ$ ή $x = 2k\pi + \tau$, όπου $k \in \mathbb{Z}$ καί τ είναι ή άλγεβρική τιμή σε μοίρες ή άκτίνια μιās όποιασδήποτε από τίς γωνίες αυτές, αλλά όρισμένης.

Μπορούμε τώρα νά διατυπώσουμε τήν έξής πρόταση:

Ή αναγκαία καί ίκανή συνθήκη, για δύο τριγωνομετρικές γωνίες, πού έχουν κοινή άρχική πλευρά, για νά έχουν καί κοινή τελική πλευρά, είναι οι άλγεβρικές τιμές τους νά διαφέρουν κατά $2k\pi$ ($360^\circ k$), όπου $k \in \mathbb{Z}$.

Μπορούμε έπομένως νά μεταβαίνουμε άδιάφορα από τά τόξα στις αντίστοιχες γωνίες καί άντιστρόφως καί νά εφαρμόζουμε σε καθένα από τά μεγέθη αυτά τίς μετρικές ιδιότητες του άλλου, έπειδή ένα προσανατολισμένο τόξο καί ή αντίστοιχη προσανατολισμένη γωνία έχουν πάντοτε τήν ίδια φορά.

Δύο τριγωνομετρικές γωνίες λέγονται ίσες, όταν οι άλγεβρικές τιμές τους είναι άριθμοί ίσοι.

Δύο τριγωνομετρικές γωνίες λέγονται αντίθετες, όταν οι άλγεβρικές τιμές τους είναι άριθμοί αντίθετοι.

138. ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΥΟ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΞΩΝ.

Ή άθροισμα προσανατολισμένων τόξων ενός κύκλου όνομάζουμε τό προσανατολισμένο τόξο, τό όποιο έχει ως άλγεβρική τιμή τό άθροισμα των άλγεβρικών τιμών των δοσμένων τόξων.

Ή από τον όρισμό αυτό γίνεται φανερό ότι για τό άθροισμα των προσανατολισμένων τόξων ισχύουν οι έξής ιδιότητες:

1) Μπορούμε σ' ένα άθροισμα προσανατολισμένων τόξων νά αλλάξουμε τή σειρά των προσθετέων.

2) Μπορούμε νά αντικαταστήσουμε όσουσδήποτε προσθετέους μέ Έναν, τό άθροισμά τους.

Γιά νά βρούμε τό άθροισμα προσανατολισμένων τόξων \widehat{AB} , $\widehat{\Gamma\Delta}$, $\widehat{\Delta\Xi}$, ... ένός κύκλου, τά κάνουμε διαδοχικά. Παίρνουμε, π.χ., από τό σημείο Β ένα τόξο \widehat{BZ} άλγεβρικής τιμής ίσης μέ τήν άλγ. τιμή τοῦ $\widehat{\Gamma\Delta}$ καί από τό σημείο Ζ ένα τόξο $\widehat{Z\Theta}$ άλγεβρικής τιμής ίσης μέ τήν άλγ. τιμή τοῦ $\widehat{\Delta\Xi}$ κ.ο.κ. Τό τόξο, πού έχει άρχή τήν άρχή τοῦ πρώτου Α καί πέρας τό πέρας τοῦ τελευταίου, θά έχει άλγεβρική τιμή ίση μέ τό άθροισμα τῶν άλγεβρικών τιμῶν τῶν δοσμένων τόξων, δηλ. θά εἶναι τό άθροισμά τους.

*Έτσι, π.χ., αν Α, Β, Γ (Σχ. 134) εἶναι τρία σημεία σέ κύκλο προσανατολισμένο καί θεωρήσουμε τά τόξα \widehat{AB} καί $\widehat{B\Gamma}$, τότε τό άθροισμά τους εἶναι τό τόξο $\widehat{A\Gamma}$. *Αν α εἶναι ἡ απόλυτη τιμή τοῦ γεωμετρικοῦ τόξου \widehat{AB} , β ἡ απόλυτη τιμή τοῦ γεωμετρικοῦ τόξου $\widehat{B\Gamma}$, τότε θά έχουμε:


άλγ. τιμή τοῦ $\widehat{AB} = \alpha + 2\kappa\pi$, άλγ. τιμή τοῦ $\widehat{B\Gamma} = \beta + 2\kappa'\pi$, ἐπομένως ἡ άλγεβρική τιμή τοῦ άθροίσματος $\widehat{A\Gamma} = \alpha + \beta + 2\lambda\pi$, ὅπου $\lambda \in \mathbb{Z}$.

Τά παραπάνω ἐπεκτείνονται εὐκόλα καί στίς προσανατολισμένες γωνίες.

139. ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΕΝΗ ΓΩΝΙΑ ΣΕ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΘΕΣΗ.

Λέμε ὅτι μιά προσανατολισμένη γωνία βρίσκεται σέ κανονική θέση ὡς πρὸς ένα σύστημα ὀρθογώνιων ἀξόνων $x'Ox$, $y'Oy$, αν ἡ κορυφή τῆς γωνίας βρίσκεται στήν άρχή Ο τῶν ἀξόνων καί ἡ άρχική πλευρά της ταυτίζεται μέ τό θετικό ἡμιάξονα Ox , ὅταν ἡ γωνία τοποθετηθεῖ πάνω στό ἐπίπεδο τῶν ἀξόνων.

Γιά νά τοποθετήσουμε, π.χ., γωνία 240° σέ κανονική θέση φανταζόμαστε ὅτι ἡ ἡμιευθεία Ox στρέφεται κατά τή θετική φορά κατά 240° (Σχ. 139), ὁπότε ὀρίζεται ἡ τελική πλευρά τῆς γωνίας. *Έτσι ἡ γωνία β έχει άλγεβρική τιμή 240° . Αυτό τό συμβολίζουμε γράφοντας $\beta = 240^\circ$. *Επίσης στό ἴδιο σχῆμα εἶναι $\alpha = -60^\circ$ καί $\theta = 30^\circ$.



Σχ. 139

*Αν μέ κέντρο τήν άρχή τῶν ἀξόνων καί άκτίνα τή μονάδα τοῦ μήκους γράψουμε κύκλο (Σχ. 139), τότε σέ καθεμιά από τίς προσανατολισμένες γωνίες, π.χ. θ , β , α ἀντιστοιχεῖ ένα προσανατολισμένο τόξο, τό ὁποῖο, ὅπως ξέρουμε, έχει τήν ἴδια άλγεβρική τιμή μέ τήν ἀντίστοιχῆ του γωνία. Γι' αὐτό μπορούμε ἀδιάφορα νά μιλάμε γιά γωνία α ἢ γιά τόξο \widehat{AP} , τό ὁποῖο ὀνομάζουμε ἐπίσης τόξο α. *Επίσης έχουμε τή γωνία θ ἢ τό τόξο θ ($\equiv \widehat{AP}^+$).

*Ο παραπάνω κύκλος, πού γράφεται μέ κέντρο τήν άρχή τῶν ἀξόνων καί άκτίνα τή μονάδα, λέγεται **τριγωνομετρικός κύκλος**. Τό σημείο Α (1, 0) λέ-

γεται **ἀρχή τῶν τόξων** τοῦ τριγωνομετρικοῦ κύκλου. Εἶναι τό σημεῖο, στό ὁποῖο ὁ τριγωνομετρικός κύκλος τέμνει τόν ἡμιάξονα Ox . Τό \vec{OA} εἶναι ἐπομέ-
ως τό μοναδιαῖο διάνυσμα τοῦ ἄξονα $x'Ox$ καί κάθε ἄλλου παράλληλου μ' αὐτόν.
Ὁ ἴδιος ἄξονας $x'Ox$ τέμνει τόν τριγωνομετρικό κύκλο καί στό σημεῖο $A'(-1, 0)$.
Ὁ ἄλλος ἄξονας $y'Oy$ τέμνει τόν τριγωνομετρικό κύκλο στά σημεῖα $B(0, 1)$
καί $B'(0, -1)$. Τό διάνυσμα \vec{OB} εἶναι τό μοναδιαῖο διάνυσμα τοῦ ἄξονα $y'Oy$
καί κάθε ἄλλου παράλληλου μ' αὐτόν.

Ἡ ἀκτίνα τοῦ τριγωνομετρικοῦ κύκλου, ἡ ὁποία καταλήγει στό πέρασ
ἐνός τόξου τοῦ κύκλου, λέγεται **τελική ἀκτίνα** τοῦ τόξου.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

460) Νά τρέψετε ἓνα ἀκτίνιο σέ μοῖρες.

461) Νά τρέψετε μία μοίρα σέ ἀκτίνα.

462) Νά τρέψετε 45° σέ ἀκτίνα.

463) Νά τρέψετε $\frac{\pi}{16}$ ἀκτίνα σέ μοῖρες.

464) Μέ τή βοήθεια μοιρογνωμόνιου νά κατασκευάσετε σέ κανονική θέση γωνίες, πού
νά ἔχουν ἀλγεβρικές τιμές:

α) 75° β) 125° γ) 210° δ) -150° ε) 330°
στ) -330° ζ) 385° η) -370° θ) 930° ι) -955°

465) Νά ἀναφέρετε πέντε γωνίες, οἱ ὁποῖες σέ κανονική θέση ἔχουν τήν ἴδια τελική
πλευρά μέ τή $\theta = 100^\circ$.

466) Οἱ γωνίες $\theta = 125^\circ$ καί $\varphi = -955^\circ$ σέ κανονική θέση ἔχουν τήν ἴδια τελική πλευρά.
Νά ἐξηγήσετε τό γιατί.

467) Νά ἐξετάσετε ἂν οἱ γωνίες $\kappa = 930^\circ$ καί $\lambda = -870^\circ$ ἔχουν, σέ κανονική θέση, τήν
ἴδια τελική πλευρά.

140. ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΓΩΝΙΩΝ.

Ἐστω θ μιὰ μεταβλητή, ἡ ὁποία παίρνει τιμές ἀπό τό σύνολο Γ , ὄλων
τῶν τριγωνομετρικῶν γωνιῶν. Τά στοιχεῖα λοιπόν τοῦ συνόλου Γ εἶναι γω-
νίες, ὄχι ἀριθμοί.


Γιά κάθε γωνία θ τοῦ συνόλου Γ φανταζόμαστε ὅτι τοποθετεῖται σέ κα-
νονική θέση ὡς πρὸς ἓνα ὀρθοκανονικό σύστημα ἀξόνων (Σχ. 140.1).

Ἐστω $P(x, \psi)$ ἓνα σημεῖο τῆς τελικῆς πλευρᾶς τῆς γωνίας θ διαφορετικό
ἀπὸ τήν ἀρχή O .

1) Ὀνομάζουμε **ἡμίτονο** τῆς γωνίας θ , συμβολικά $\eta\mu\theta$, τό λόγο τῆς τε-
ταγμένης τοῦ σημείου P πρὸς τό μήκος ρ τῆς διανυσματικῆς ἀκτίνας \vec{OP} .
Ὡστε εἶναι:

$$\eta\mu\theta = \frac{\psi}{\rho}$$

Ἄς πάρουμε κάποιον ἄλλο σημεῖο $P'(x', \psi')$ τῆς τελικῆς πλευρᾶς τῆς γω-



Σχ. 140.1

νίας θ , διαφορετικό από την άρχη. Σύμφωνα με τον όρισμό που δώσαμε, θά είναι $\eta\mu\theta = \frac{\Psi'}{\rho}$, όπου ρ' τό μήκος τής διανυσματικής ακτίνας του σημείου P' .

Παρατηρούμε όμως ότι $\vec{OP}' = \lambda\vec{OP}$ και επομένως θά έχουμε $x' = \lambda x$ και $\psi' = \lambda \psi$, από τίς όποιες έχουμε ότι $\frac{x}{x'} = \frac{\psi}{\psi'} = \frac{\sqrt{x^2 + \psi^2}}{\sqrt{x'^2 + \psi'^2}} = \frac{\rho}{\rho'}$. Ωστε $\frac{\psi}{\rho} = \frac{\psi'}{\rho'}$, $\frac{x}{\rho} = \frac{x'}{\rho'}$, $\frac{\psi}{x} = \frac{\psi'}{x'}$ κτλ.

Παρατηρούμε λοιπόν ότι ισχύει $\frac{\psi}{\rho} = \frac{\psi'}{\rho'}$. Αυτό σημαίνει ότι ή τιμή του λόγου $\frac{\psi}{\rho}$ δέν εξαρτάται από τή θέση του σημείου P πάνω στην τελική πλευρά τής γωνίας, αλλά μόνο από τή θέση αυτής τής ίδιας τής τελικής πλευράς, δηλαδή από τό μέγεθος τής γωνίας θ .

Ωστε: σέ κάθε γωνία θ ($\theta \in \Gamma$) αντιστοιχεί ένας και μόνο πραγματικός αριθμός: ή τιμή του λόγου $\frac{\psi}{\rho}$.

Όρίζεται λοιπόν έδω μιά συνάρτηση μέ πεδίο όρισμού τό σύνολο Γ όλων τών γωνιών, και πεδίο τιμών ένα σύνολο πραγματικών αριθμών, ή συνάρτηση $\theta \rightarrow \eta\mu\theta$.

2) Όνομάζουμε **συνημίτονο** τής γωνίας θ , συμβολικά $\sigma\upsilon\eta\theta$, τό λόγο τής τετμημένης ενός σημείου P τής τελικής πλευράς τής γωνίας πρός τό μήκος ρ , τής διανυσματικής ακτίνας του P . Ωστε είναι:

$$\sigma\upsilon\eta\theta = \frac{x}{\rho}.$$

Άς πάρουμε κάποιο άλλο σημείο P' (x', ψ') πάνω στην τελική πλευρά τής γωνίας θ , διαφορετικό από την άρχη. Σύμφωνα με τον όρισμό, που δώσαμε, είναι $\sigma\upsilon\eta\theta = \frac{x'}{\rho'}$. Παρατηρούμε όμως πάλι ότι ισχύει $\frac{x}{\rho} = \frac{x'}{\rho'}$, που σημαί-

νει ότι ή τιμή του λόγου $\frac{x}{\rho}$ δέν εξαρτάται από τή θέση του σημείου Ρ πάνω στην τελική πλευρά, αλλά από τή θέση αυτής τής ίδιας τής τελικής πλευράς, δηλαδή από τό μέγεθος τής γωνίας θ.

Ώστε: σέ κάθε τιμή τής μεταβλητῆς θ (θ ∈ Γ) ἀντιστοιχεί ένας καί μόνο πραγματικός ἀριθμός: ή τιμή του λόγου $\frac{x}{\rho}$.

Ώρίζεται λοιπόν μιά συνάρτηση μέ πεδίο ὀρισμοῦ τό σύνολο Γ, ὄλων τῶν γωνιῶν, καί πεδίο τιμῶν ένα σύνολο πραγματικῶν ἀριθμῶν, ή συνάρτηση θ → συν θ.

3) Ὀνομάζουμε **ἐφαπτομένη** μιᾶς γωνίας θ (θ ∈ Γ), συμβολικά εφ θ, τό λόγο τής τεταγμένης ενός σημείου Ρ τής τελικής πλευράς τής γωνίας πρὸς τήν τετμημένη αὐτοῦ του σημείου. Ώστε εἶναι:

$$\text{εφ } \theta = \frac{\Psi}{x} \quad x \neq 0.$$

Ἄν πάρουμε κάποιο ἄλλο σημείο Ρ' (x', ψ') πάνω στην τελική πλευρά τής γωνίας θ, διαφορετικό ἀπό τήν ἀρχή, θά εἶναι σύμφωνα μέ τόν ὀρισμό, πού δώσαμε, εφ θ = $\frac{\Psi'}{x'}$. Ἄλλά, ὅπως εἶδαμε παραπάνω, ἰσχύει $\frac{\Psi}{x} = \frac{\Psi'}{x'}$ πού σημαίνει ὅτι ή ἐφαπτομένη μιᾶς γωνίας, δέν εξαρτάται ἀπό τή θέση του Ρ πάνω στην τελική πλευρά τής γωνίας, αλλά ἀπό τή θέση αὐτῆς τής ίδιας τής τελικής πλευράς, δηλαδή ἀπό τό μέγεθος τής γωνίας θ.

Σημ. Ὄταν x = 0, ὁ λόγος ψ/x δέν ἔχει ἔννοια πραγματικοῦ ἀριθμοῦ καί ἔπομένως δέν ὀρίζεται τότε ἐφαπτομένη τής γωνίας θ. Αὐτό συμβαίνει, π.χ., γιά τίς γωνίες, πού ἔχουν ἀλγεβρική τιμή 90°, -90°, 270°, -270°, 450° κτλ., ὅπως θά δοῦμε παρακάτω.

Ώστε: σέ κάθε τιμή τής μεταβλητῆς θ ἀντιστοιχεί ένας καί μόνο πραγματικός ἀριθμός, ή τιμή του λόγου $\frac{\Psi}{x}$.

Ώρίζεται λοιπόν καί ἐδῶ μιά συνάρτηση μέ πεδίο ὀρισμοῦ τό σύνολο Γ, ὄλων τῶν γωνιῶν, καί πεδίο τιμῶν ένα σύνολο πραγματικῶν ἀριθμῶν, ή συνάρτηση θ → εφ θ.

4) Ὀνομάζουμε **συνεφαπτομένη** μιᾶς γωνίας θ (θ ∈ Γ), συμβολικά σφ θ, τό λόγο τής τετμημένης ενός σημείου Ρ, τής τελικής πλευράς τής γωνίας, πρὸς τήν τεταγμένη αὐτοῦ του σημείου. Ώστε εἶναι:

$$\text{σφ } \theta = \frac{x}{\Psi} \quad \Psi \neq 0.$$

Σημείωση. Παρατηροῦμε καί πάλι ὅτι δέν ὀρίζεται συνεφαπτομένη γιά γωνίες, πού τά σημεία τής τελικής πλευράς τους ἔχουν τεταγμένη 0. Τέτοιες γωνίες εἶναι, π.χ., ὄσες ἔχουν ἀλγεβρική τιμή: 0°, 180°, -180°, 360° κτλ., ὅπως θά δοῦμε παρακάτω.

Εὔκολα βλέπουμε καί ἐδῶ ὅτι ή συνεφαπτομένη μιᾶς γωνίας δέν εξαρτάται ἀπό τή θέση του σημείου Ρ πάνω στην τελική πλευρά τής γωνίας, αλλά ἀπό τό μέγεθος τής γωνίας.

Ώστε: σέ κάθε τιμή τής μεταβλητῆς θ (θ ∈ Γ) ἀντιστοιχεί ένας πραγμα-

τικός αριθμός, ή τιμή του λόγου $\frac{x}{\psi}$, και ορίζεται έτσι μια συνάρτηση με πεδίο ορισμού της τό σύνολο Γ , και πεδίο των τιμών της ένα σύνολο πραγματικών αριθμών, ή συνάρτηση $\theta \rightarrow \sigma\theta$.

5) 'Ονομάζουμε **τέμνουσα** μιᾶς γωνίας θ ($\theta \in \Gamma$), συμβολικά $\tau\epsilon\mu\theta$, τό λόγο του μήκους ρ τῆς διανυσματικῆς ἀκτίνας ἑνός σημείου $P(x, \psi)$ τῆς τελικῆς πλευρᾶς τῆς γωνίας θ , πρὸς τὴν τετμημένη αὐτοῦ τοῦ σημείου.

Δηλ. εἶναι: $\tau\epsilon\mu\theta = \frac{\rho}{x}, x \neq 0$.

Παρατηροῦμε καί ἐδῶ ὅτι δέν ορίζεται τέμνουσα γιὰ γωνίες, πού τὰ σημεία τῆς τελικῆς πλευρᾶς τους ἔχουν τετμημένη 0. Τέτοιες γωνίες εἶναι, π.χ., οἱ γωνίες πού ἔχουν ἀλγεβρική τιμή $90^\circ, -90^\circ, 270^\circ, -270^\circ$, κ.τ.λ., ὅπως θά δοῦμε στὰ ἐπόμενα.

Καί πάλι ἀποδεικνύεται εὐκολά ὅτι ἡ τέμνουσα μιᾶς γωνίας θ δέ μεταβάλλεται, ἂν πάροουμε ἄλλο, διαφορετικό ἀπό τὴν ἀρχή, σημείο πάνω στήν τελική πλευρά τῆς γωνίας. Ὡστε: σέ κάθε τιμή τῆς μεταβλητῆς θ ($\theta \in \Gamma$) ἀντιστοιχεῖ ἕνας πραγματικός ἀριθμός, ἡ τιμή τοῦ λόγου ρ/x , καί ορίζεται ἔτσι μιᾶ συνάρτηση με πεδίο ορισμοῦ τό σύνολο Γ , ὅλων τῶν γωνιῶν, καί πεδίο τῶν τιμῶν της ἕνα σύνολο πραγματικῶν ἀριθμῶν, ἡ συνάρτηση $\theta \rightarrow \tau\epsilon\mu\theta$.

6) 'Ονομάζουμε **συντέμνουσα** μιᾶς γωνίας θ ($\theta \in \Gamma$), συμβολικά $\sigma\tau\epsilon\mu\theta$, τό λόγο τοῦ μήκους ρ τῆς διανυσματικῆς ἀκτίνας ἑνός σημείου $P(x, \psi)$, τῆς τελικῆς πλευρᾶς τῆς γωνίας θ , πρὸς τὴν τεταγμένη τοῦ σημείου P . Δηλ. εἶναι:


$$\sigma\tau\epsilon\mu\theta = \frac{\rho}{\psi} \quad \psi \neq 0.$$

Κάνουμε καί γιὰ τό λόγο ρ/ψ ἀνάλογες παρατηρήσεις μεῖς ἐκεῖνες, πού κάναμε γιὰ τούς λόγους, πού ὄρισάμε παραπάνω.

Ὅρίζεται καί πάλι μιᾶ συνάρτηση με πεδίο ορισμοῦ τό σύνολο Γ , ὅλων τῶν γωνιῶν, καί πεδίο τῶν τιμῶν της ἕνα σύνολο πραγματικῶν ἀριθμῶν, ἡ συνάρτηση $\theta \rightarrow \sigma\tau\epsilon\mu\theta$.

Ἀνακεφαλαιώνοντας τούς ὁρισμούς, πού δώσαμε παραπάνω, ἔχουμε ὅτι γιὰ μιᾶ ὁποιαδήποτε τριγωνομετρική γωνία θ σέ κανονική θέση ὡς πρὸς ἕνα σύστημα ὀρθοκανονικῶν καί γιὰ $P(x, \psi)$ ἕνα ὁποιοδήποτε σημείο πάνω στήν τελική πλευρά τῆς γωνίας, τοῦ ὁποίου τό μήκος τῆς διανυσματικῆς ἀκτίνας \vec{OP} εἶναι ρ , ἔχουμε (Σχ. 140.2).

$$\left. \begin{aligned} \eta\mu\theta &= \frac{\psi}{\rho} \\ \sigma\upsilon\eta\theta &= \frac{x}{\rho} \\ \epsilon\phi\theta &= \frac{\psi}{x} \\ \sigma\phi\theta &= \frac{x}{\psi} \\ \tau\epsilon\mu\theta &= \frac{\rho}{x} \\ \sigma\tau\epsilon\mu\theta &= \frac{\rho}{\psi} \end{aligned} \right\} (\tau)$$



Σχ. 140.2


Οι έξι συναρτήσεις που όρισαμε παραπάνω, $\theta \rightarrow \eta\mu\theta$, $\theta \rightarrow \sigma\upsilon\nu\theta$, $\theta \rightarrow \epsilon\varphi\theta$, $\theta \rightarrow \sigma\varphi\theta$, $\theta \rightarrow \tau\epsilon\mu\theta$, $\theta \rightarrow \sigma\tau\epsilon\mu\theta$, λέγονται **τριγωνομετρικές συναρτήσεις** τής γωνίας θ .

Γιά μιá δεδομένη τριγωνομετρική γωνία όρίζονται μέ τόν τρόπο, που έκθέσαμε παραπάνω, οι έξι όρισμένοι λόγοι (τ), οι όποιοι λέγονται **τριγωνομετρικοί άριθμοί** τής δεδομένης γωνίας.

Είναι φανερό ότι **τριγωνομετρικές γωνίες σε κανονική θέση, που έχουν κοινή τελική πλευρά, έχουν ίσους τούς όμώνυμους τριγωνομετρικούς άριθμούς** των. Έτσι, π.χ., επειδή οι γωνίες μέ άλγεβρικές τιμές 30° και -330° έχουν τήν ίδια τελική πλευρά, θα έχουν τούς ίδιους όμώνυμους τριγωνομετρικούς άριθμούς.

Παράδειγμα: Νά βρεθοῦν οι τριγωνομετρικοί άριθμοί μιás γωνίας θ , αν ή τελική της πλευρά, σε κανονική θέση, περνάει από τό σημείο $P(3, -4)$.

Λύση: Μιά τέτοια γωνία θ βλέπете στο παραπλεύρωσ σχήμα. Από τό όρθογώνιο τρίγωνο OPP έχουμε $\rho^2 = x^2 + \psi^2 \Leftrightarrow \rho = \sqrt{x^2 + \psi^2}$.



Σχ. 140.3

Έπομένως $\rho = \sqrt{3^2 + (-4)^2} = \sqrt{25} = 5$.

Τότε, σύμφωνα μέ τούς όρισμούς (τ), είναι:

$$\eta\mu\theta = \frac{\psi}{\rho} = -\frac{4}{5}$$

$$\sigma\upsilon\nu\theta = \frac{x}{\rho} = \frac{3}{5}$$

$$\epsilon\varphi\theta = \frac{\psi}{x} = -\frac{4}{3}$$

$$\sigma\varphi\theta = \frac{x}{\psi} = -\frac{3}{4}$$

$$\tau\epsilon\mu\theta = \frac{\rho}{x} = \frac{5}{3}$$

$$\sigma\tau\epsilon\mu\theta = \frac{\rho}{\psi} = -\frac{5}{4}$$

Παρατήρηση 1η. Από τούς όρισμούς (τ) βλέπουμε άμέσως ότι ισχύουν οι έξης ισότητες, που είναι ταυτότητες (επειδή είναι άληθείς προτάσεις για κάθε τιμή τής γωνίας θ , για τήν όποία όρίζονται οι συναρτήσεις στά δύο μέλη κάθε ισότητας):

$$\eta\mu\theta = \frac{1}{\sigma\tau\epsilon\mu\theta} \Leftrightarrow \sigma\tau\epsilon\mu\theta = \frac{1}{\eta\mu\theta}$$

$$\sigma\upsilon\nu\theta = \frac{1}{\tau\epsilon\mu\theta} \Leftrightarrow \tau\epsilon\mu\theta = \frac{1}{\sigma\upsilon\nu\theta}$$

$$\epsilon\varphi\theta = \frac{1}{\sigma\varphi\theta} \Leftrightarrow \sigma\varphi\theta = \frac{1}{\epsilon\varphi\theta}$$

Παρατήρηση 2η. Από τους παραπάνω ορισμούς (τ) βλέπουμε επίσης ότι εύκολα βρίσκουμε τὰ πρόσημα τῶν τριγωνομετρικῶν ἀριθμῶν μιᾶς γωνίας, ὅταν γνωρίζουμε σέ ποιά γωνία τῶν ἀξόνων βρίσκεται ἡ τελική πλευρά τῆς δοσμένης γωνίας.

α) $\eta\theta = \frac{\psi}{\rho}$. Ἐπειδὴ ψ εἶναι θετικός ἀριθμός στήν I καί II καί ἀρνητικός στήν III καί IV γωνία τῶν ἀξόνων καί τό ρ πάντοτε θετικός ἀριθμός, γι' αὐτό τό $\eta\theta$ εἶναι θετικό γιά γωνίες μέ τελική πλευρά στήν I καί II γωνία τῶν ἀξόνων καί ἀρνητικό γιά γωνίες μέ τελική πλευρά στήν III καί IV γωνία τῶν ἀξόνων.

β) $\sigma\theta = \frac{x}{\rho}$. Ἐπειδὴ x εἶναι θετικός στήν I καί IV γωνία τῶν ἀξόνων καί ἀρνητικός στήν II καί III, γι' αὐτό τό $\sigma\theta$ εἶναι θετικό γιά γωνίες μέ τελική πλευρά στήν I καί IV γωνία τῶν ἀξόνων καί ἀρνητικό γιά τίς γωνίες μέ τελική πλευρά στή II καί III γωνία τῶν ἀξόνων.

γ) $\epsilon\theta = \frac{\psi}{x}$. Ἐπειδὴ x καί ψ ἔχουν τὰ ἴδια πρόσημα στήν I καί III γωνία τῶν ἀξόνων καί ἀντίθετα πρόσημα στή II καί IV γωνία τῶν ἀξόνων, γι' αὐτό ἡ $\epsilon\theta$ εἶναι θετική γιά γωνίες μέ τελική πλευρά στήν I καί III γωνία τῶν ἀξόνων καί ἀρνητική γιά γωνίες μέ τελική πλευρά στή II καί IV γωνία τῶν ἀξόνων.

Ἐνάλογες παρατηρήσεις μπορούμε νά κάνουμε καί γιά τούς ἄλλους τριγωνομετρικούς ἀριθμούς τῆς γωνίας θ .

Παρατήρηση 3η. Ἀπό τούς τύπους (τ) ἔχουμε $x = \rho \sigma\theta$, $\psi = \rho \eta\theta$. Οἱ τύποι αὐτοί συνδέουν τίς συντεταγμένες ἑνός ὁποιουδήποτε σημείου P τοῦ ἐπιπέδου (ὀρθοκανονικό σύστημα) μέ τό μήκος ρ τῆς διανυσματικῆς ἀκτίνας \vec{OP} , τοῦ σημείου P, καί μέ τήν ἀλγεβρική τιμή τῆς γωνίας θ , πού σχηματίζει ἡ \vec{OP} μέ τόν ἀξονα Ox (σχ. 140.2). Ὁ πρῶτος τύπος $x = \rho \sigma\theta$ λέει ὅτι: ἡ ἀλγεβρική τιμή τῆς προβολῆς ἑνός διανύσματος σ' ἔναν ἀξονα εἶναι ἴση μέ τό μήκος τοῦ διανύσματος ἐπὶ τό συνημίτονο τῆς γωνίας, τήν ὁποία σχηματίζει τό διάνυσμα μέ τόν ἀξονα.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

468) Νά βρεῖτε τούς τριγωνομετρικούς ἀριθμούς τῆς μικρότερης θετικῆς γωνίας θ σέ κανονική θέση, ἂν P εἶναι σημεῖο τῆς τελικῆς πλευρᾶς τῆς γωνίας θ καί οἱ συντεταγμένες τοῦ P εἶναι: α) P (3, 4), β) P(-5, 12), γ) P(-1, -3).

469) Σέ ποιά γωνία τῶν ἀξόνων βρίσκεται ἡ τελική πλευρά μιᾶς γωνίας θ , πού εἶναι σέ κανονική θέση, ἂν:

- $\eta\theta$ καί $\sigma\theta$ εἶναι καί τὰ δύο ἀρνητικά,
- $\eta\theta$ καί $\epsilon\theta$ εἶναι καί τὰ δύο θετικά,
- $\eta\theta$ εἶναι θετικό καί $\tau\epsilon\theta$ εἶναι ἀρνητική,
- $\tau\epsilon\theta$ εἶναι ἀρνητική καί $\epsilon\theta$ εἶναι ἀρνητική,
- $\epsilon\theta$ εἶναι θετική καί $\tau\epsilon\theta$ εἶναι ἀρνητική,
- $\eta\theta$ εἶναι θετικό καί $\sigma\theta$ εἶναι ἀρνητικό.

470) Σέ ποιά γωνία τών άξόνων βρίσκεται ή τελική πλευρά γωνίας θ , σέ κανονική θέση, άν:

- α) $\eta\mu\theta > 0$ β) $\sigma\upsilon\eta\theta < 0$ γ) $\epsilon\phi\theta < 0$ δ) $\tau\epsilon\mu\theta > 0$

471) *Αν ξέρουμε ότι $\eta\mu\theta = \frac{8}{17}$ και ότι ή τελική πλευρά τής θ , σέ κανονική θέση βρίσκεται στήν I γωνία τών άξόνων, νά βρεθοῦν τά $\sigma\upsilon\eta\theta$ και $\epsilon\phi\theta$.

472) *Αν $\sigma\upsilon\eta\theta = \frac{5}{6}$, νά βρεῖτε τά $\eta\mu\theta$ και $\epsilon\phi\theta$.

473) *Αν $\epsilon\phi\theta = -\frac{3}{4}$, νά βρεῖτε τά $\eta\mu\theta$ και $\sigma\upsilon\eta\theta$.

(*Υπόδειξη: έπειδή $\epsilon\phi\theta = \frac{\psi}{x}$ είναι άρνητική, ή θ είναι γωνία μέ τελική πλευρά στή II γωνία τών άξόνων, άν πάρουμε $x = -4$, $\psi = 3$, ή γωνία μέ τελική πλευρά στήν IV γωνία τών άξόνων, άν πάρουμε $x = 4$, $\psi = -3$. Καί στίς δύο περιπτώσεις $\rho = \sqrt{4^2 + (-3)^2} = \sqrt{25} = 5$).

474) Νά βρεῖτε τό $\eta\mu\theta$, άν δοθεῖ ότι $\sigma\upsilon\eta\theta = -\frac{4}{5}$ και ότι $\epsilon\phi\theta > 0$.

475) Νά βρεῖτε τούς τριγωνομετρικούς αριθμούς μιᾶς γωνίας θ , γιά τήν όποία γνωρίζουμε ότι $\eta\mu\theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$ και $\sigma\upsilon\eta\theta = \frac{1}{2}$.

476) Σέ ποιά γωνία τών άξόνων βρίσκονται οί τελικές πλευρές και ποιά είναι τά πρόσημα τοῦ ήμίτονου, τοῦ συνημίτονου και τής εφαπτομένης καθεμιᾶς από τίς γωνίες μέ άλγεβρική τιμή:

- α) 125° β) 75° γ) -320° δ) 210° ε) 460° στ) -250° ζ) -1000°

477) Νά βρεῖτε τούς τριγωνομετρικούς αριθμούς γωνίας θ , άν γνωρίζετε ότι:

- α) $\eta\mu\theta = \frac{7}{25}$ β) $\epsilon\phi\theta = \frac{3}{5}$ και $180^\circ < \theta < 270^\circ$.

141. ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΩΝ ΓΩΝΙΩΝ $0^\circ, 90^\circ, 180^\circ, 270^\circ, 360^\circ$.

A) Πρώτα-πρώτα συμφωνοῦμε τό έξής: θά γράφουμε, π.χ., $\eta\mu 18^\circ$ και θά έννοοῦμε τό ήμίτονο γωνίας, ή όποία έχει άλγεβρική τιμή 18° . Έπίσης στους συμβολισμούς $\eta\mu \theta$, $\sigma\upsilon\eta \theta$, $\epsilon\phi \theta$ κτλ. τό θ θά τό έννοοῦμε ώς άλγεβρική τιμή γωνίας. Τό κάνουμε αυτό, έπειδή ή τριγωνομετρική γωνία προσδιορίζεται μέ ακρίβεια, όταν γνωρίζουμε τήν άλγεβρική τιμή τής.

*Έπειτα από τή συμφωνία αυτή ή θ μπορεί νά θεωρηθεῖ ότι είναι μία μεταβλητή, πού μπορεί νά διατρέχει τό σύνολο \mathbb{R} , τών πραγματικών αριθμών, οί όποιοί είναι άλγεβρικές τιμές γωνιών, πού έχουν μετρηθεῖ μέ μονάδα τή μοῖρα.

B) Θά ζητήσουμε τώρα νά βροῦμε τούς τριγωνομετρικούς αριθμούς τών γωνιών $0^\circ, 90^\circ, 180^\circ, 270^\circ, 360^\circ$.

*Έστω P ένα σημείο (όχι ή άρχή) στήν τελική πλευρά τής γωνίας θ :

α) Όταν $\theta = 0^\circ$, τότε $x = \rho$, $\psi = 0$ και επομένως:

$$\eta\mu 0^\circ = \frac{\psi}{\rho} = \frac{0}{\rho} = 0,$$


$$\sigma\upsilon\nu 0^\circ = \frac{x}{\rho} = \frac{\rho}{\rho} = 1,$$

$$\epsilon\varphi 0^\circ = \frac{\psi}{x} = \frac{0}{\rho} = 0,$$

$$\sigma\varphi 0^\circ = \frac{x}{\psi} = \frac{\rho}{0} \text{ (δέν όρίζεται)*}$$

$$\tau\epsilon\mu 0^\circ = \frac{\rho}{x} = \frac{\rho}{\rho} = 1,$$

$$\sigma\tau\epsilon\mu 0^\circ = \frac{\rho}{\psi} = \frac{\rho}{0} \text{ (δέν όρίζεται)}$$



Σχ. 141.1

β) Όταν $\theta = 90^\circ$, τότε $x = 0$, $\psi = \rho$ και επομένως:

$$\eta\mu 90^\circ = \frac{\psi}{\rho} = \frac{\rho}{\rho} = 1,$$


$$\sigma\upsilon\nu 90^\circ = \frac{x}{\rho} = \frac{0}{\rho} = 0,$$

$$\epsilon\varphi 90^\circ = \frac{\psi}{x} = \frac{\rho}{0} \text{ (δέν όρίζεται),}$$

$$\sigma\varphi 90^\circ = \frac{x}{\psi} = \frac{0}{\rho} = 0,$$

$$\tau\epsilon\mu 90^\circ = \frac{\rho}{x} = \frac{\rho}{0} \text{ (δέν όρίζεται),}$$

$$\sigma\tau\epsilon\mu 90^\circ = \frac{\rho}{\psi} = \frac{\rho}{\rho} = 1,$$



Σχ. 141.2

γ) Όταν $\theta = 180^\circ$, τότε $x = -\rho$, $\psi = 0$ και επομένως:

$$\eta\mu 180^\circ = \frac{\psi}{\rho} = \frac{0}{\rho} = 0,$$


$$\sigma\upsilon\nu 180^\circ = \frac{x}{\rho} = \frac{-\rho}{\rho} = -1,$$

$$\epsilon\varphi 180^\circ = \frac{\psi}{x} = \frac{0}{-\rho} = 0,$$

$$\sigma\varphi 180^\circ = \frac{x}{\psi} = \frac{-\rho}{0} \text{ (δέν όρίζεται),}$$

$$\tau\epsilon\mu 180^\circ = \frac{\rho}{x} = \frac{\rho}{-\rho} = -1.$$

$$\sigma\tau\epsilon\mu 180^\circ = \frac{\rho}{\psi} = \frac{\rho}{0} \text{ (δέν όρίζεται),}$$



Σχ. 141.3

(*) δηλ. δέν έχει έννοια πραγματικού άριθμού.

δ) Όταν $\theta = 270^\circ$, τότε $x = 0$, $\psi = -\rho$ και επομένως:

$$\eta\mu 270^\circ = \frac{\psi}{\rho} = \frac{-\rho}{\rho} = -1,$$


$$\sigma\upsilon\nu 270^\circ = \frac{x}{\rho} = \frac{0}{\rho} = 0,$$

$$\sigma\phi 270^\circ = \frac{\psi}{x} = \frac{-\rho}{0} \text{ (δέν ορίζεται),}$$

$$\sigma\tau\epsilon\mu 270^\circ = \frac{x}{\psi} = \frac{0}{-\rho} = 0,$$

$$\tau\epsilon\mu 270^\circ = \frac{\rho}{x} = \frac{\rho}{0} \text{ (δέν ορίζεται),}$$

$$\sigma\tau\epsilon\mu 270^\circ = \frac{\rho}{\psi} = \frac{\rho}{-\rho} = -1.$$




Σχ. 141.4

ε) Όταν $\theta = 360^\circ$, τότε η τελική πλευρά της θ ταυτίζεται με τον άξονα Ox και οι τριγωνομετρικοί αριθμοί της γωνίας 360° είναι ίσοι με τους ομώνυμους τριγωνομετρικούς αριθμούς της γωνίας 0° .

142. ΟΙ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΩΝ ΓΩΝΙΩΝ $45^\circ, 60^\circ, 30^\circ$.

α) Όπως μάθαμε στο Γυμνάσιο, είναι:

$$\eta\mu 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad \sigma\upsilon\nu 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad \sigma\phi 45^\circ = 1.$$



Σχ. 142.1

Εύκολα βρίσκουμε ότι είναι:


$$\tau\epsilon\mu 45^\circ = \frac{\rho}{x} = \frac{\sqrt{2}}{1} = \sqrt{2}$$

$$\sigma\tau\epsilon\mu 45^\circ = \frac{\rho}{\psi} = \frac{\sqrt{2}}{1} = \sqrt{2}$$

$$\sigma\phi 45^\circ = \frac{x}{\psi} = \frac{1}{1} = 1$$

β) Μάθαμε στο Γυμνάσιο ότι:

$$\eta\mu 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \sigma\upsilon\nu 60^\circ = \frac{1}{2}, \quad \sigma\phi 60^\circ = \sqrt{3}$$



Σχ. 142.2

Εύκολα βρίσκουμε τώρα ότι:


$$\sigma\phi 60^\circ = \frac{x}{\psi} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3},$$

$$\tau\epsilon\mu 60^\circ = \frac{\rho}{x} = \frac{2}{1} = 2,$$

$$\sigma\tau\epsilon\mu 60^\circ = \frac{\rho}{\psi} = \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}.$$

γ) Ξέρουμε από τό Γυμνάσιο ότι:

$$\sigma\upsilon\nu 30^\circ = \frac{1}{2}, \quad \eta\mu 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \sigma\phi 30^\circ = \sqrt{3} = \frac{\sqrt{3}}{1}$$



Σχ. 142.3

Εύκολα βρίσκουμε ότι :

$$\sigma\phi 30^\circ = \frac{x}{\psi} = \frac{\sqrt{3}}{1} = \sqrt{3}$$


$$\tau\epsilon\mu 30^\circ = \frac{\rho}{x} = \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

$$\sigma\tau\epsilon\mu 30^\circ = \frac{\rho}{\psi} = \frac{2}{1} = 2$$

143. ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ.

*Έστω θ μιá γωνία σέ κανονική θέση (Σχ. 143).

Μέ κέντρο τήν άρχή και άκτίνα τή μονάδα χαράζουμε κύκλο, τό γνωστό



Σχ. 143

μας (§ 139) τριγωνομετρικό κύκλο, πού κόβει τό θετικό ήμιάξονα Ox στό σημείο $A(1, 0)$, τό θετικό ήμιάξονα Oy στό $B(0, 1)$ και τήν τελική πλευρά τής γωνίας θ στό P .

Φέρνουμε τή PP κάθετη στόν άξονα Ox και τίς εφαπτόμενες στά σημεία A και B , πού κόβουν τήν τελική πλευρά τής θ ή τήν προέκτασή της κατά τήν αντίθετη φορά, στά T και Σ αντίστοιχως.

*Όπως είναι εύκολο νά παρατηρήσουμε στά παραπάνω σχήματα 143, τά όρθογώνια τρίγωνα OPP , OAT και $OB\Sigma$ είναι όμοια μεταξύ τους άνά δύο.

*Αν στόν άξονα OP όρίσουμε ώς μοναδιαίο τό διάνυσμα \vec{OP} θά έχουμε:

$$\eta\mu\theta = \frac{\overline{PP}}{\overline{OP}} = \overline{PP}$$

$$\sigma\phi\theta = \frac{\overline{OP}}{\overline{PP}} = \frac{\overline{B\Sigma}}{\overline{OB}} = \overline{B\Sigma}$$

$$\sigma\upsilon\eta\theta = \frac{\overline{OP}}{\overline{OP}} = \overline{OP}$$

$$\tau\epsilon\mu\theta = \frac{\overline{OP}}{\overline{OP}} = \frac{\overline{OT}}{\overline{OA}} = \overline{OT}$$

$$\epsilon\phi\theta = \frac{\overline{PP}}{\overline{OP}} = \frac{\overline{AT}}{\overline{OA}} = \overline{AT}$$

$$\sigma\tau\epsilon\mu\theta = \frac{\overline{OP}}{\overline{PP}} = \frac{\overline{OS}}{\overline{OB}} = \overline{OS}$$

Τά διανύσματα \vec{PP} , \vec{OP} , \vec{AT} , \vec{BS} , \vec{OT} , \vec{OS} είναι αντίστοιχως οι γεωμετρικές παραστάσεις τών συναρτήσεων ημ θ, συν θ, σφ θ, τεμ θ, στεμ θ, τής γωνίας θ (του τόξου θ) και οι άλγεβρικές τιμές τών διανυσμάτων είναι οι τιμές τών αντίστοιχων τριγωνομετρικών συναρτήσεων τής θ. Για τά \vec{OS} και \vec{OT} παρατηρούμε ότι ή φορά τους είναι θετική, όταν αυτή συμφωνεί μέ τή φορά τής τελικής πλευράς τής γωνίας, άλλιώς ή φορά τους είναι άρνητική.

Άπό τά παραπάνω έννοούμε ότι μπορούμε, όταν αυτό μās έξυπηρετεί, ως ένα σημείο τής τελικής πλευράς τής τριγωνομετρικής γωνίας νά παίρνουμε έκείνο τό σημείο, στό όποιο ό τριγωνομετρικός κύκλος κόβει τήν τελική πλευρά. Τότε έπειδή $\rho = 1$, θά είναι (Σχ. 143):

1) ήμίτονο του τόξου θ ($\widehat{AP} \equiv \theta$) = \vec{PP} , δηλαδή ή τεταγμένη του πέρατος P του τόξου θ. Ό άξονας Oy τών τεταγμένων λέγεται **άξονας τών ήμιτόνων** του τριγωνομετρικού κύκλου.

2) συνημίτονο του τόξου θ = \vec{OP} , δηλαδή ή τετμημένη του πέρατος P του τόξου θ. Ό άξονας Ox τών τετμημένων λέγεται **άξονας τών συνημιτόνων**.

3) έφαπτομένη του τόξου θ = \vec{AT} , δηλαδή ή άλγεβρική τιμή του διανύσματος \vec{AT} , τό όποιο όρίζεται πάνω στην έφαπτομένη στην άρχή A τών τόξων από τό A και τό σημείο T, στό όποιο ή προέκταση τής τελικής άκτίνας του τόξου θ τέμνει στό A τήν έφαπτομένη του τριγωνομετρικού κύκλου. Ό άξονας AT μέ μοναδιαίο διάνυσμα τό \vec{OB} , λέγεται **άξονας τών έφαπτομένων**.

4) συνεφαπτομένη του τόξου θ = \vec{BS} , δηλαδή ή άλγεβρική τιμή του διανύσματος \vec{BS} , τό όποιο όρίζεται, πάνω στην έφαπτομένη στό B (0, 1) από τό B και τό σημείο S, στό όποιο ή προέκταση τής τελικής άκτίνας του τόξου θ τέμνει τήν έφαπτομένη B στό B του τριγωνομετρικού κύκλου. Ό άξονας BS μέ μοναδιαίο διάνυσμα τό \vec{OA} λέγεται **άξονας τών συνεφαπτομένων**.

Άνάλογα όρίζεται ή τέμνουσα και ή συντέμνουσα του τόξου θ*.

144. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ.

Άς ύποθέσουμε ότι τό σημείο P (Σχ. 143) άναχωρεί από τό A και κινείται κατά τή θετική φορά διαγράφοντας τόν τριγωνομετρικό κύκλο. Τότε είναι φανερό ότι ή γωνία θ (τό τόξο $\theta \equiv \widehat{AP}$) μεταβάλλεται συνεχώς από 0° ως 360°.

Είναι επίσης φανερό ότι έχουμε για τίς τριγωνομετρικές συναρτήσεις τόν παρακάτω πίνακα, πού δείχνει τίς μεταβολές τών τιμών τους, για τίς αντίστοιχες μεταβολές τών τιμών τής μεταβλητής θ.

(Στόν πίνακα τό ↗ = αύξάνει και τό ↘ = έλαττώνεται).

(*) Οι όρισμοί νά δοθούν από τούς μαθητές μέ τή βοήθεια του καθηγητή.

Πίνακας μεταβολών των τριγωνομετρικών συναρτήσεων

θ αυξάνει από	0 ως $\frac{\pi}{2}$ (0° ως 90°)	$\frac{\pi}{2}$ ως π (90° ως 180°)	π ως $\frac{3\pi}{2}$ (180° ως 270°)	$\frac{3\pi}{2}$ ως 2π (270° ως 360°)
$\eta\mu\theta$	\nearrow από 0 ως 1	\searrow από 1 ως 0	\searrow από 0 ως -1	\nearrow από -1 ως 0
$\sigma\upsilon\nu\theta$	\searrow από 1 ως 0	\searrow από 0 ως -1	\nearrow από -1 ως 0	\nearrow από 0 ως 1
$\epsilon\varphi\theta$	\nearrow από 0 άπειρο- ρίστα παίρνουν- τας όσοδηήποτε μεγάλες θετικές τιμές, όσο τό θ πλησιάζει τίς 90° (0 ως + ∞)	\nearrow από άρνητικές τιμές όσοδηήποτε μεγάλες κατ' ά- πόλυτη τιμή ως τό 0. (- ∞ ως 0)	\nearrow από 0 άπειρο- ρίστα παίρνουν- τας όσοδηήποτε μεγάλες θετικές τιμές, όσο πλη- σιάζει τό θ τίς 270° (0 ως + ∞)	\nearrow από άρνητικές τιμές όσοδηήποτε μεγάλες κατ' ά- πόλυτη τιμή ως τό 0. (- ∞ ως 0)
$\sigma\varphi\theta$	\searrow από θετικές τιμές όσοδηήποτε μεγάλες ως 0 (+ ∞ ως 0)	\searrow από 0 άπειρο- ρίστα παίρνουν- τας άρνητικές τι- μές κατ' άπόλυ- τη τιμή όσοδηή- ποτε μεγάλες όσο τό θ πλη- σιάζει τίς 180° (0 ως - ∞)	\searrow από θετικές τιμές όσοδηήποτε μεγάλες ως 0. (+ ∞ ως 0)	\searrow από 0 άπειρο- ρίστα παίρνουν- τας τιμές άρνη- τικές κατ' άπό- λυτη τιμή όσο- δηήποτε μεγάλες όσο τό θ πλη- σιάζει τίς 360° (0 ως - ∞)
$\tau\epsilon\mu\theta$ (*)	\nearrow από 1 άπει- ρορίστα παίρ- νοντας τιμές όσο- δηήποτε μεγάλες, όσο τό θ πλησιά- ζει τίς 90° (1 ως + ∞)	\nearrow από άρνητικές τιμές όσοδηήποτε μεγάλες κατ' ά- πόλυτη τιμή ως -1 (- ∞ ως -1)	\searrow από -1 άπειρο- ρίστα παίρνουν- τας άρνητικές τι- μές κατ' άπόλυ- τη τιμή όσοδηή- ποτε μεγάλες, ο- σο τό θ πλησιά- ζει τίς 270° (-1 ως - ∞)	\searrow από θετικές τιμές όσοδηήποτε μεγάλες ως 1. (+ ∞ ως 1)
$\sigma\tau\epsilon\mu\theta$	\searrow από μεγάλες θετικές τιμές ως 1 (+ ∞ ως 1)	\nearrow από 1 ως θε- τικές τιμές όσο- δηήποτε μεγάλες (1 ως + ∞)	\nearrow από άρνητικές τιμές μεγάλες κατ' άπόλυτη τι- μή ως -1. (- ∞ ως -1)	\searrow από -1 άπειρο- ρίστα. (-1 ως - ∞)

Σημ. Στην § 141 μάθαμε για ποιές τιμές τής θ δέν όρίζονται οι συναρτήσεις $\theta \rightarrow \epsilon\varphi\theta$, $\theta \rightarrow \sigma\varphi\theta$, $\theta \rightarrow \tau\epsilon\mu\theta$ και $\theta \rightarrow \sigma\tau\epsilon\mu\theta$.

(*) 'Η μεταβολή τής $\tau\epsilon\mu\theta$ και $\sigma\tau\epsilon\mu\theta$ μπορεί νά διδαχθεί ή νά παραλειφθεί κατά τήν κρίση τοῦ καθηγητῆ πού διδάσκει.

145. ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ.

Α) Θεωρήσαμε ως τώρα τις τριγωνομετρικές συναρτήσεις, ως συναρτήσεις της μεταβλητής θ , η οποία παίρνει τιμές από το σύνολο Γ , όλων των τριγωνομετρικών γωνιών. Είδαμε ακόμα ότι μπορούμε να πάρουμε, αντί για τις γωνίες θ , τις αλγεβρικές τους τιμές σε μοίρες, όποτε η μεταβλητή θ διατρέχει το σύνολο \mathbf{R} , των πραγματικών αριθμών. *Αν οι γωνίες του συνόλου Γ μετρηθούν με μονάδα τό ακτίνα, τότε μπορούμε να θεωρούμε την τιμή μιας γωνίας x σε ακτίνα ως ένα άλλο σύμβολο για τή γωνία και να αναφερόμαστε στή μεταβλητή x όπως σε μία μεταβλητή, πού διατρέχει τό \mathbf{R} .

Τότε σε κάθε τιμή της μεταβλητής $x \in \mathbf{R}$, αντιστοιχεί από μία τιμή για καθεμία από τις τριγωνομετρικές συναρτήσεις πού άνήκει σ' ένα σύνολο πραγματικών αριθμών, όταν, έννοείται, η συνάρτηση όρίζεται για τήν τιμή αυτή της μεταβλητής x . Στήν περίπτωση αυτή οι συναρτήσεις πού όρισαμε πίο πάνω, λέγονται: **πραγματικές τριγωνομετρικές συναρτήσεις**. *Έτσι οι συναρτήσεις, οι όποιες όρίζονται από τις $\psi = \eta\mu x$, $\psi = \sigma\upsilon\upsilon x$, $\psi = \epsilon\phi x$, $\psi = \sigma\phi x$ κτλ., στίς όποιες η μεταβλητή x νοείται ότι διατρέχει τό σύνολο \mathbf{R} και η ψ όρισμένα σύνολα πραγματικών αριθμών, είναι τριγωνομετρικές συναρτήσεις των πραγματικών αριθμών.

Κάθε τριγωνομετρική συνάρτηση έχει ως πεδίο όρισμοϋ της τό σύνολο \mathbf{R} , των πραγματικών αριθμών, εκτός από τις τιμές, οι όποιες φαίνονται στόν παρακάτω πίνακα *

συνάρτηση	Πεδίο όρισμοϋ	Πεδίο τιμών
$\psi = \eta\mu x$	\mathbf{R}	$\{\psi \in \mathbf{R} \mid -1 \leq \psi \leq 1\}$
$\psi = \sigma\upsilon\upsilon x$	\mathbf{R}	$\{\psi \in \mathbf{R} \mid -1 \leq \psi \leq 1\}$
$\psi = \epsilon\phi x$	$\mathbf{R} - \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \right\}, k \in \mathbf{Z}$	\mathbf{R}
$\psi = \sigma\phi x$	$\mathbf{R} - \{k\pi\}, k \in \mathbf{Z}$	\mathbf{R}
$\psi = \tau\epsilon\mu x$	$\mathbf{R} - \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \right\}, k \in \mathbf{Z}$	$\{\psi \in \mathbf{R} \mid \psi \leq -1\}, \{\psi \in \mathbf{R} \mid \psi \geq 1\}$
$\psi = \sigma\tau\epsilon\mu x$	$\mathbf{R} - \{k\pi\}, k \in \mathbf{Z}$	$\{\psi \in \mathbf{R} \mid \psi \leq -1\}, \{\psi \in \mathbf{R} \mid \psi \geq 1\}$

Β) Οι τιμές των τριγωνομετρικών συναρτήσεων των πραγματικών αριθμών δίνονται σε πίνακες. Οι τιμές αυτές βρίσκονται με μεθόδους, τις όποιες χρησιμοποιούν τά άνωτερα μαθηματικά. (Βλέπε πίνακες στίς τελευταίες σελίδες του βιβλίου).


Προκειμένου να κατασκευάσουμε τή γραφική παράσταση, π.χ., των τριγωνομετρικών συναρτήσεων $\psi = \eta\mu x$, $\psi = \sigma\upsilon\upsilon x$, $\psi = \epsilon\phi x$, δίνουμε στή μεταβλητή x τιμές από 0 ως 2π και βρίσκουμε τις αντίστοιχες τιμές της μεταβλητής ψ από τούς πίνακες. Κάθε ζεύγος αντίστοιχων τιμών άπεικονίζεται με ένα σημείο του επιπέδου, στό όποιο έχουμε πάρει ένα σύστημα άξόνων όρθο-

(*) Δέν είναι άπαραίτητο οι μαθητές να άπομνημονεύσουν τόν πίνακα. Μπορούν να τόν συμβουλευόνται κάθε φορά πού τόν χρειάζονται.

κανονικό. Έτσι, π.χ., βρίσκουμε για τις πύ άνω συναρτήσεις τις αντίστοιχες τιμές, οι όποιες φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:



x	$\psi = \eta \mu x$	$\psi = \sigma \nu x$	$\psi = \epsilon \phi x$
0	0	1	0
$\frac{\pi}{6} \approx 0,52$	0,50	0,87	0,58
$\frac{\pi}{4} \approx 0,79$	0,71	0,71	1
$\frac{\pi}{3} \approx 1,05$	0,87	0,50	1,73
$\frac{\pi}{2} \approx 1,57$	1	0	δέν όρίζεται (*)
$\frac{2\pi}{3} \approx 2,09$	0,87	-0,50	-1,73
$\frac{3\pi}{4} \approx 2,36$	0,71	-0,71	-1
$\frac{5\pi}{6} \approx 2,62$	0,50	-0,87	-0,58
$\pi \approx 3,14$	0	-1	0
$\frac{7\pi}{6} \approx 3,66$	-0,50	-0,87	0,58
$\frac{5\pi}{4} \approx 3,92$	-0,71	-0,71	1
$\frac{4\pi}{3} \approx 4,19$	-0,87	-0,50	1,73
$\frac{3\pi}{2} \approx 4,71$	-1	0	δέν όρίζεται
$\frac{5\pi}{3} \approx 5,23$	-0,87	0,50	-1,73
$\frac{7\pi}{4} \approx 5,49$	-0,71	0,71	-1
$\frac{11\pi}{6} \approx 5,76$	-0,5	0,87	-0,58
$2\pi \approx 6,28$	0	1	0

Βρίσκουμε τά αντίστοιχα ση-
μεία στό επίπεδο $xO\psi$ και τά
ένώνουμε μέ μία όμαλή καμπύλη.
Προκύπτουν τότε οι παρακάτω
γραφικές παραστάσεις, από τις
όποιες ή πρώτη λέγεται ήμιτο-
νοειδής καμπύλη και ή δεύτερη
σνημιτονοειδής καμπύλη.



Σχ. 145

(*) δηλ. δέν έχει έννοια πραγματικού αριθμού.



Σχ. 145

146. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ. ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ.

Έστω f μία συνάρτηση μιᾶς μεταβλητῆς x με πεδίο ὀρισμοῦ ἕνα σύνολο Σ , πραγματικῶν ἀριθμῶν, καὶ ἔστω ὅτι ὑπάρχει ἕνας πραγματικὸς ἀριθμὸς p , διάφορος ἀπὸ τὸ 0, τέτοιος, ὥστε νὰ ἰσχύει:

$$f(x + p) = f(x) \quad (\alpha)$$

γιά κάθε τιμὴ τῆς μεταβλητῆς, γιὰ τὴν ὁποία ἡ f ὀρίζεται. Λέμε στὴν περίπτωση αὐτὴ ὅτι ὁ p εἶναι **μιὰ περίοδος** τῆς συναρτήσεως f καὶ ἡ f λέγεται **περιοδική** συνάρτηση. Σύμφωνα με αὐτὰ θὰ εἶναι:

$$f[(x + p) + p] = f(x + p) = f(x)$$

δηλ. $f(x + 2p) = f(x)$, πού σημαίνει ὅτι $2p$ εἶναι ἐπίσης μιὰ περίοδος τῆς f . Ἐπίσης $3p, 4p, \dots, kp$, ὅπου $k \in \mathbb{N}$, εἶναι περίοδος τῆς f . Ἐάν ἡ f εἶναι περιοδική, ὁ μικρότερος θετικὸς ἀριθμὸς p , ὁ ὁποῖος εἶναι περίοδος τῆς f , λέγεται: **πρωτεύουσα περίοδος** τῆς f .

Ἐάν θέσουμε στὴν πρῶτὴν ἰσότητα (α) ὅπου x τὸ $x - p$, θὰ ἔχουμε $f[(x - p) + p] = f(x - p)$. Δηλαδή:

$$\forall x \in \Sigma: f(x) = f(x - p)$$

ὥστε καὶ ὁ $-p$ εἶναι μιὰ περίοδος τῆς f καὶ ἐπομένως καὶ ὁ $-2p, -3p, \dots$

Γενικά λοιπὸν μιὰ συνάρτηση f θὰ λέγεται **περιοδική**, ἂν γιὰ κάθε τιμὴ τῆς μεταβλητῆς ἀπὸ τὸ πεδίο ὀρισμοῦ τῆς, ἰσχύει:

$f(x) = f(x + kp)$, όπου $k \in \mathbb{Z} - \{0\}$ και p είναι σταθερός ορισμένος πραγματικός αριθμός.

‘Η ελάχιστη θετική τιμή του kp λέγεται: η πρωτεύουσα περίοδος της συναρτήσεως f .

‘Ετσι, π.χ., επειδή οι γωνίες θ και $\theta + 2\pi \cdot k$ έχουν την ίδια τελική πλευρά, θά ισχύουν οι ισότητες:

$$\eta\mu x = \eta\mu(x + 2k\pi), \quad \sigma\upsilon\nu x = \sigma\upsilon\nu(x + 2k\pi)$$

γιά κάθε τιμή της γωνίας x . ‘Επομένως οι συναρτήσεις $\psi = \eta\mu x$, $\psi = \sigma\upsilon\nu x$ είναι περιοδικές. Καί, επειδή γιά $k = 1$ ή παράμετρος $2k\pi$ παίρνει την ελάχιστη θετική τιμή, γι’ αυτό οι συναρτήσεις αυτές έχουν πρωτεύουσα περίοδο τό 2π . ‘Η συνάρτηση $\psi = \epsilon\phi x$ έχει ως περίοδο τό 2π , επειδή $\epsilon\phi(x + 2\pi) = \epsilon\phi x$, αλλά όχι ως πρωτεύουσα περίοδο, όπως θά δοῦμε στά ἐπόμενα.

‘Η κατασκευή της γραφικής παραστάσεως μιᾶς περιοδικῆς συναρτήσεως, όπως ή $\psi = \eta\mu x$, γίνεται εύκολότερη, επειδή ἀρκεί νά κατασκευάσουμε ένα τμήμα της. Πράγματικά, επειδή $\eta\mu x = \eta\mu(x + 2\pi) = \eta\mu(x + 4\pi)$ κ.τ.λ., οι τιμές της συναρτήσεως πού ἀντιστοιχοῦν στίς τιμές της x ἀπό 0 ως 2π συμπίπτουν μέ ἐκείνες, πού ἀντιστοιχοῦν στίς τιμές της x ἀπό 2π ως 4π , ἀπό 4π ως 6π κ.τ.λ. ή στίς τιμές της x ἀπό -2π ως 0, -4π ως -2π κ.τ.λ. ‘Αν κατασκευάσουμε λοιπόν ένα τμήμα της γραφικής παραστάσεως της $\psi = \eta\mu x$, π.χ. τό τμήμα, πού ἀντιστοιχεί στίς τιμές της x ἀπό 0 ως 2π , ἀρκεί ἔπειτα μία παράλληλη μετάθεση πρὸς τόν ἄξονα Ox κατά διάνυσμα ἀλγεβρικής τιμῆς 2π ή -2π , γιά νά ἔχουμε τό ἀμέσως ἐπόμενο ή τό ἀμέσως προηγούμενο τμήμα της παραστατικής καμπύλης, πού ἀντιστοιχεί στίς τιμές της x ἀπό 2π ως 4π ή ἀπό -2π ως 0.

‘Η συνάρτηση $\psi = \epsilon\phi x$ έχει πρωτεύουσα περίοδο τό π , όπως θά δοῦμε στά ἐπόμενα.

147. ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΓΩΝΙΑΣ (ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΤΟΞΟΥ).

Μάθαμε στά προηγούμενα (§ 140, παρατήρηση 1η) ὅτι μεταξύ τῶν τριγωνομετρικῶν ἀριθμῶν της ίδιας γωνίας θ ισχύουν οι ταυτότητες:


$$\tau\epsilon\theta\mu = \frac{1}{\sigma\upsilon\nu\theta}, \quad \sigma\tau\epsilon\mu\theta = \frac{1}{\eta\mu\theta}, \quad \sigma\phi\theta = \frac{1}{\epsilon\phi\theta} \quad (\alpha)$$

‘Εστω τώρα μία γωνία θ , σέ κανονική θέση, καί $P(x, \psi)$ τό σημείο στό ὁποῖο ή τελική πλευρά της τέμνει τόν τριγωνομετρικό κύκλο κέντρου O (Σχ. 147). Τότε θά είναι (§ 143):

$$\sigma\upsilon\nu\theta = \overline{OP} = x \quad \text{καί} \quad \eta\mu\theta = \overline{PP'} = y$$

(*) ‘Εννοοῦμε γωνία μέ ἀλγεβρική τιμή θ , της ὁποίας ή ἀπόλυτη τιμή έχει βρεθεί σέ ἀκτίνα.

*Αν υποθέσουμε ότι $x \neq 0$, δηλ. $\theta \neq \kappa\pi + \frac{\pi}{2}$, $\kappa \in \mathbb{Z}$ θά έχουμε:



Σχ. 147

$$\epsilon\phi\theta = \frac{y}{x} = \frac{\eta\mu\theta}{\sigma\upsilon\upsilon\theta}, \quad \text{δηλ.}$$

$$\boxed{\epsilon\phi\theta = \frac{\eta\mu\theta}{\sigma\upsilon\upsilon\theta}} \quad (\beta)$$

*Αν $y \neq 0$, δηλ. $\theta \neq \kappa\pi$, $\kappa \in \mathbb{Z}$, έχουμε:

$$\sigma\phi\theta = \frac{x}{y} = \frac{\sigma\upsilon\upsilon\theta}{\sigma\iota\mu\theta}, \quad \text{δηλ.}$$

$$\boxed{\sigma\phi\theta = \frac{\sigma\upsilon\upsilon\theta}{\sigma\iota\mu\theta}} \quad (\gamma)$$

Εξάλλου, από το όρθογώνιο τρίγωνο OPR, έχουμε:

$$x^2 + y^2 = OP^2 = 1,$$

δηλ.

$$\boxed{\sigma\upsilon\upsilon^2\theta + \eta\mu^2\theta = 1} \quad (\delta)$$

Διαιρώντας τά μέλη τῆς (δ) μέ $\sigma\upsilon\upsilon^2\theta$ (υποθέτουμε $\sigma\upsilon\upsilon\theta \neq 0$, δηλ.

$\theta \neq \kappa\pi + \frac{\pi}{2}$, $\kappa \in \mathbb{Z}$) βρίσκουμε:

$$\boxed{1 + \epsilon\phi^2\theta = \tau\epsilon\mu^2\theta} \quad (\epsilon)$$

Διαιρώντας τά μέλη τῆς (δ) μέ $\eta\mu^2\theta$ ($\eta\mu\theta \neq 0$, ἄρα $\theta \neq \kappa\pi$, $\kappa \in \mathbb{Z}$) βρίσκουμε:

$$\boxed{1 + \sigma\phi^2\theta = \sigma\tau\epsilon\mu^2\theta} \quad (\zeta)$$

Οἱ ταυτότητες (α), (β), (γ), (δ), (ε), (ζ) εἶναι οἱ θεμελιώδεις ταυτότητες μεταξύ τῶν τριγωνομετρικῶν ἀριθμῶν τῆς ἴδιας γωνίας (τοῦ ἴδιου τόξου).

148. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

1) Νά ἐκφρασθεῖ ἡ καθεμία ἀπό τίς τριγωνομετρικές συναρτήσεις τῆς γωνίας θ μέ τό $\eta\mu\theta$.

Λύση: Ἀπό τόν τύπο $\sigma\upsilon\upsilon^2\theta + \eta\mu^2\theta = 1$ έχουμε:

$$\sigma\upsilon\upsilon^2\theta = 1 - \eta\mu^2\theta \Rightarrow |\sigma\upsilon\upsilon\theta| = \sqrt{1 - \eta\mu^2\theta}$$

$$\text{ἄρα } \sigma\upsilon\upsilon\theta = \sqrt{1 - \eta\mu^2\theta} \quad \text{καί} \quad \sigma\upsilon\upsilon\theta = -\sqrt{1 - \eta\mu^2\theta}$$

Συμβολικά αυτούς τους δύο τύπους τους γράφουμε:

$$\begin{aligned} \text{συν } \theta &= \pm \sqrt{1 - \eta\mu^2 \theta}, \\ \epsilon\varphi \theta &= \frac{\eta\mu \theta}{\text{συν } \theta} = \frac{\eta\mu \theta}{\pm \sqrt{1 - \eta\mu^2 \theta}}, \quad \sigma\varphi \theta = \frac{1}{\epsilon\varphi \theta} = \frac{\pm \sqrt{1 - \eta\mu^2 \theta}}{\eta\mu \theta}, \\ \text{τεμ } \theta &= \frac{1}{\text{συν } \theta} = \frac{1}{\pm \sqrt{1 - \eta\mu^2 \theta}}, \quad \sigma\text{τεμ } \theta = \frac{1}{\eta\mu \theta}, \end{aligned}$$

Τό πρόσημο της τετραγ. ρίζας καθορίζεται, αν γνωρίζουμε σέ ποιά γωνία τών άξόνων βρίσκεται ή τελική πλευρά τής γωνίας θ . *Ετσι, π.χ., αν βρίσκεται στή δεύτερη γωνία τών άξόνων, θά πάροουμε, π.χ., γιά νά βροϋμε τό $\text{συν } \theta$, τόν τύπο $\text{συν } \theta = -\sqrt{1 - \eta\mu^2 \theta}$, έπειδή μιá τέτοια γωνία έχει ώς συνημίτονο άρνητικό άριθμό.

2) Νά έκφραστοϋν οί τριγωνομετρικές συναρτήσεις τής γωνίας θ μέ τήν $\epsilon\varphi \theta$.

Λύση : Ό τύπος (ζ) τής προηγούμενης § 147 δίνει:

$$\text{τεμ}^2 \theta = 1 + \epsilon\varphi^2 \theta \Leftrightarrow \frac{1}{\text{συν}^2 \theta} = 1 + \epsilon\varphi^2 \theta \Leftrightarrow$$

$$\text{συν}^2 \theta = \frac{1}{1 + \epsilon\varphi^2 \theta} \Leftrightarrow \boxed{\text{συν}^2 \theta = \frac{1}{\pm \sqrt{1 + \epsilon\varphi^2 \theta}}} \quad (\alpha)$$

*Από τόν τύπο $\frac{\eta\mu \theta}{\text{συν } \theta} = \epsilon\varphi \theta$ βρίσκουμε:

$$\frac{\eta\mu \theta}{\text{συν } \theta} = \epsilon\varphi \theta \Leftrightarrow \eta\mu \theta = \text{συν } \theta \epsilon\varphi \theta \Leftrightarrow$$

$$\eta\mu \theta = \frac{1}{\pm \sqrt{1 + \epsilon\varphi^2 \theta}} \epsilon\varphi \theta \Leftrightarrow \boxed{\eta\mu \theta = \frac{\epsilon\varphi \theta}{\pm \sqrt{1 + \epsilon\varphi^2 \theta}}} \quad (\beta)$$

$$\text{Τέλος, είναι } \sigma\varphi \theta = \frac{1}{\epsilon\varphi \theta} \text{ καί } \sigma\text{τεμ} \theta = \frac{1}{\eta\mu \theta} = \frac{\pm \sqrt{1 + \epsilon\varphi^2 \theta}}{\epsilon\varphi \theta}$$

Καί έδω τό πρόσημο τής τετραγ. ρίζας καθορίζεται, όταν γνωρίζουμε σέ ποιά γωνία τών άξόνων βρίσκεται ή τελική πλευρά τής γωνίας θ .

3) Χρησιμοποιώντας τίς θεμελιώδεις ταυτότητες μπορούμε νά βροϋμε τίς τιμές τών άλλων τριγωνομετρικών συναρτήσεων, όταν δοθεί ή τιμή μιáς άπ' αυτές:

*Εστω, π.χ., ότι είναι $\eta\mu \theta = \frac{3}{5}$ καί $-360^\circ < \theta < -270^\circ$.

*Από τόν τύπο $\text{συν}^2 \theta + \eta\mu^2 \theta = 1$ βρίσκουμε $\text{συν}^2 \theta = 1 - \eta\mu^2 \theta$, άρα

$$\text{συν } \theta = \pm \sqrt{1 - \eta\mu^2 \theta} = \pm \sqrt{1 - \frac{9}{25}} = \pm \sqrt{\frac{16}{25}} = \pm \frac{4}{5}. \text{ *Έπειδή ή τελική}$$

πλευρά τής γωνίας θ βρίσκεται στήν I γωνία τών άξόνων, θά πάροουμε τό πρόσημο +, γιατί μιá τέτοια γωνία έχει συνημίτονο θετικό. *Έπίσης

$$\text{βρίσκουμε ότι: } \varepsilon\phi\theta = \frac{\eta\mu\theta}{\sigma\upsilon\nu\theta} = \frac{\frac{3}{5}}{\frac{4}{5}} = \frac{3}{4}, \quad \sigma\phi\theta = \frac{4}{3}, \quad \tau\epsilon\mu\theta = \frac{5}{4}, \quad \sigma\tau\epsilon\mu\theta = \frac{5}{3}$$

Ὡς δεύτερο παράδειγμα ἔστω $\varepsilon\phi\theta = -\frac{5}{12}$. Ἐπειδὴ ἢ $\varepsilon\phi\theta$ εἶναι ἀρνητικὴ, ἢ θ θὰ εἶναι γωνία μὲ τελικὴ πλευρὰ ἢ στὴν II ἢ IV γωνία τῶν ἀξόνων.

Βρίσκουμε :

$$\sigma\phi\theta = \frac{1}{\varepsilon\phi\theta} = -\frac{12}{5},$$

$$\sigma\upsilon\nu\theta = \frac{1}{\pm\sqrt{1+\varepsilon\phi^2\theta}} = \frac{1}{\pm\sqrt{1+\frac{25}{144}}} = \frac{1}{\pm\sqrt{\frac{169}{144}}} = \pm\frac{12}{13}$$

$$\tau\epsilon\mu\theta = \frac{1}{\sigma\upsilon\nu\theta} = \pm\frac{13}{12}$$

$$\eta\mu\theta = \frac{\varepsilon\phi\theta}{\pm\sqrt{1+\varepsilon\phi^2\theta}} = \frac{-\frac{5}{12}}{\pm\frac{13}{12}} = \pm\frac{5}{13}$$

$$\sigma\tau\epsilon\mu\theta = \frac{1}{\eta\mu\theta} = \pm\frac{13}{5}$$

Ἄν ἢ θ ἔχει τελικὴ πλευρὰ
στὴν II γωνία τῶν ἀξόνων.

$$\varepsilon\phi\theta = -\frac{5}{12}$$

$$\sigma\phi\theta = -\frac{12}{5}$$

$$\tau\epsilon\mu\theta = -\frac{13}{12}$$

$$\sigma\upsilon\nu\theta = -\frac{12}{13}$$

$$\sigma\tau\epsilon\mu\theta = \frac{13}{5}$$

$$\eta\mu\theta = \frac{5}{13}$$

Ἄν ἢ θ ἔχει τελικὴ πλευρὰ
στὴν IV γωνία τῶν ἀξόνων

$$\varepsilon\phi\theta = -\frac{5}{12}$$

$$\sigma\phi\theta = -\frac{12}{5}$$

$$\tau\epsilon\mu\theta = \frac{13}{12}$$

$$\sigma\upsilon\nu\theta = \frac{12}{13}$$

$$\sigma\tau\epsilon\mu\theta = \frac{13}{5}$$

$$\eta\mu\theta = -\frac{5}{13}$$

4) Μὲ βάση τίς θεμελιώδεις τριγωνομετρικὲς ταυτότητες μποροῦμε νὰ ἀποδείξουμε ἄλλες τριγωνομετρικὲς ταυτότητες.

Παράδειγμα 1ο: Νὰ ἀποδειχθεῖ ὅτι:

$$\eta\mu^3\theta + \eta\mu\theta\sigma\upsilon\nu^2\theta = \eta\mu\theta$$

Λύση: $\eta\mu^3\theta + \eta\mu\theta\sigma\upsilon\nu^2\theta = \eta\mu\theta(\eta\mu^2\theta + \sigma\upsilon\nu^2\theta) = \eta\mu\theta \cdot 1 = \eta\mu\theta$

Παράδειγμα 2ο: Νὰ ἀποδειχθεῖ ὅτι:

$$\varepsilon\phi x + \sigma\phi x = \frac{\sigma\tau\epsilon\mu x}{\sigma\upsilon\nu x}$$

$$\begin{aligned} \text{Λύση: } \epsilon\phi x + \sigma\phi x &= \frac{\eta\mu x}{\sigma\upsilon\nu x} + \frac{\sigma\upsilon\nu x}{\eta\mu x} = \frac{\eta\mu^2x + \sigma\upsilon\nu^2x}{\sigma\upsilon\nu x \eta\mu x} = \frac{1}{\sigma\upsilon\nu x \eta\mu x} = \\ &= \frac{1}{\sigma\upsilon\nu x} \cdot \frac{1}{\eta\mu x} = \frac{1}{\sigma\upsilon\nu x} \text{ οστε } \mu x = \frac{\sigma\tau\epsilon\mu x}{\sigma\upsilon\nu x} \end{aligned}$$

Παράδειγμα 3ο: Νά αποδειχθεί ότι

$$\frac{1 + \sigma\upsilon\nu x}{\eta\mu x} = \frac{\eta\mu x}{1 - \sigma\upsilon\nu x}$$

Λύση: Πρώτα πρέπει: $\eta\mu x \neq 0$ και $1 - \sigma\upsilon\nu x \neq 0$. Τότε έχουμε:

$$\frac{1 + \sigma\upsilon\nu x}{\eta\mu x} = \frac{(1 + \sigma\upsilon\nu x)(1 - \sigma\upsilon\nu x)}{\eta\mu x (1 - \sigma\upsilon\nu x)} = \frac{1 - \sigma\upsilon\nu^2x}{\eta\mu x (1 - \sigma\upsilon\nu x)} = \frac{\eta\mu^2x}{\eta\mu x (1 - \sigma\upsilon\nu x)} = \frac{\eta\mu x}{1 - \sigma\upsilon\nu x}$$

Παράδειγμα 4ο: Νά αποδειχθεί ότι:

$$2 \sigma\tau\epsilon\mu x = \frac{\eta\mu x}{1 + \sigma\upsilon\nu x} + \frac{1 + \sigma\upsilon\nu x}{\eta\mu x} \quad (\eta\mu x \neq 0, \sigma\upsilon\nu x \neq -1)$$

$$\begin{aligned} \text{Λύση: } \frac{\eta\mu x}{1 + \sigma\upsilon\nu x} + \frac{1 + \sigma\upsilon\nu x}{\eta\mu x} &= \frac{\eta\mu^2x + (1 + \sigma\upsilon\nu x)^2}{\eta\mu x (1 + \sigma\upsilon\nu x)} = \\ &= \frac{\eta\mu^2x + 1 + 2\sigma\upsilon\nu x + \sigma\upsilon\nu^2x}{\eta\mu x (1 + \sigma\upsilon\nu x)} = \frac{(\eta\mu^2x + \sigma\upsilon\nu^2x) + 1 + 2\sigma\upsilon\nu x}{\eta\mu x (1 + \sigma\upsilon\nu x)} = \\ &= \frac{1 + 1 + 2\sigma\upsilon\nu x}{\eta\mu x (1 + \sigma\upsilon\nu x)} = \frac{2 + 2\sigma\upsilon\nu x}{\eta\mu x (1 + \sigma\upsilon\nu x)} = \frac{2(1 + \sigma\upsilon\nu x)}{\eta\mu x (1 + \sigma\upsilon\nu x)} = \\ &= \frac{2}{\eta\mu x} = 2 \cdot \frac{1}{\eta\mu x} = 2\sigma\tau\epsilon\mu x. \end{aligned}$$

Από τα παραπάνω παραδείγματα γίνεται φανερό ότι, για να αποδείξουμε πώς μία ισότητα, που περιέχει τριγωνομετρικές συναρτήσεις, είναι ταυτότητα, πρέπει και αρκεί να πάρουμε τό ένα μέλος της (τό πρώτο ή τό δεύτερο) και μέ κατάλληλους μετασχηματισμούς να καταλήξουμε στο άλλο μέλος. Σε σπάνιες περιπτώσεις μετασχηματίζουμε και τά δύο μέλη, για να μπορέσουμε να δοῦμε αν πρόκειται για ταυτότητα.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

478) *Αν $\eta\mu\theta = \frac{2}{3}$ και $0^\circ < \theta < 90^\circ$, νά βρείτε τούς άλλους τριγωνομετρικούς αριθμούς τῆς θ .

479) *Αν $\sigma\upsilon\nu\theta = -\frac{5}{6}$ και $90^\circ < \theta < 180^\circ$, νά βρείτε τούς άλλους τριγωνομετρικούς αριθμούς τῆς γωνίας θ .

480) *Αν $\epsilon\phi\theta = -\frac{5}{4}$ και $90^\circ < \theta < 180^\circ$, νά βρείτε τούς άλλους τριγωνομετρικούς αριθμούς τῆς γωνίας θ .

481) *Αν $\epsilon\phi\theta = -\frac{4}{3}$ και $270^\circ < \theta < 360^\circ$, νά βρείτε τήν αριθμητική τιμή τοῦ κλάσματος $\frac{\eta\mu\theta + \sigma\upsilon\nu\theta - \epsilon\phi\theta}{\tau\epsilon\mu\theta + \sigma\tau\epsilon\mu\theta - \sigma\phi\theta}$

482) Νά αποδειχθεί ότι:

α) $\eta\mu\theta \sigma\phi\theta \tau\epsilon\mu\theta = 1$

β) $\tau\epsilon\mu\theta - \tau\epsilon\mu\theta \eta\mu^2\theta = \sigma\upsilon\nu\theta$

483) Νά αποδειχθεί ότι:

$$\alpha) \eta\mu^2\theta (1 + \sigma\varphi^2\theta) = 1$$

$$\beta) \eta\mu^2\theta \tau\epsilon\mu^2\theta - \tau\epsilon\mu^2\theta = -1$$

484) Νά αποδειχθεί ότι:

$$(\eta\mu\theta + \sigma\upsilon\nu\theta)^2 + (\eta\mu\theta - \sigma\upsilon\nu\theta)^2 = 2$$

485) Νά αποδειχθεί ότι:

$$\epsilon\varphi^2\theta \sigma\upsilon\nu^2\theta + \sigma\varphi^2\theta \eta\mu^2\theta = 1$$

486) Νά αποδειχθεί ότι:

$$\epsilon\varphi\theta + \frac{\sigma\upsilon\nu\theta}{1 + \eta\mu\theta} = \tau\epsilon\mu\theta$$

487) 'Επίσης ότι:

$$\alpha) \frac{1 - \eta\mu\theta}{\sigma\upsilon\nu\theta} = \frac{\sigma\upsilon\nu\theta}{1 + \eta\mu\theta}$$

$$\beta) \eta\mu^4\theta - \sigma\upsilon\nu^4\theta = 2\eta\mu^2\theta - 1.$$

488) Νά αποδειχθεί ότι:

$$\frac{\epsilon\varphi\theta - \eta\mu\chi}{\eta\mu^2\chi} = \frac{\tau\epsilon\mu\chi}{1 + \sigma\upsilon\nu\chi}$$

489) Νά αποδειχθεί ότι:

$$\frac{\sigma\upsilon\nu\chi \sigma\varphi\chi - \eta\mu\chi \epsilon\varphi\chi}{\sigma\tau\epsilon\mu\chi - \tau\epsilon\mu\chi} = 1 + \eta\mu\chi \sigma\upsilon\nu\chi$$

490) Νά αποδειχθεί ότι:

$$\frac{\eta\mu\chi - \sigma\upsilon\nu\chi}{\epsilon\varphi\chi \sigma\tau\epsilon\mu\chi - \tau\epsilon\mu\chi \sigma\varphi\chi} = \eta\mu\chi \sigma\upsilon\nu\chi$$

491) Νά αποδειχθεί ότι:

$$\alpha) \frac{1 - \epsilon\varphi^2\chi}{1 + \epsilon\varphi^2\chi} = 1 - 2\eta\mu^2\chi$$

$$\beta) 1 - \frac{\sigma\upsilon\nu^2\chi}{1 + \eta\mu\chi} = \eta\mu\chi$$

492) Νά αποδειχθεί ότι:

$$\frac{1}{\sigma\tau\epsilon\mu\chi - \sigma\varphi\chi} - \frac{1}{\sigma\tau\epsilon\mu\chi + \sigma\varphi\chi} = \frac{2}{\epsilon\varphi\chi}$$

493) Νά αποδειχθεί ότι:

$$\eta\mu^2\alpha(1 + \sigma\varphi^2\alpha) + \sigma\upsilon\nu^2\alpha(1 + \epsilon\varphi^2\alpha) = 2$$

494) Νά αποδειχθεί ότι:

$$(\tau\epsilon\mu\alpha + \epsilon\varphi\alpha - 1)(\tau\epsilon\mu\alpha - \epsilon\varphi\alpha + 1) = 2\epsilon\varphi\alpha$$

495) Νά αποδειχθεί ότι:

$$(1 - \eta\mu\alpha + \sigma\upsilon\nu\alpha)^2 = 2(1 - \eta\mu\alpha)(1 + \sigma\upsilon\nu\alpha)$$

496) Νά αποδειχθεί ότι:

$$\frac{\epsilon\varphi\alpha + \sigma\varphi\beta}{\sigma\varphi\alpha + \epsilon\varphi\beta} = \frac{\epsilon\varphi\alpha}{\epsilon\varphi\beta}$$

497) Νά αποδειχθεί ότι:

$$\eta\mu^2\alpha \sigma\upsilon\nu^2\beta - \sigma\upsilon\nu^2\alpha \eta\mu^2\beta = \eta\mu^2\alpha - \eta\mu^2\beta.$$

498) Νά αποδειχθεί ότι:

$$(\eta\mu\alpha \sigma\upsilon\nu\beta + \sigma\upsilon\nu\alpha \eta\mu\beta)^2 + (\sigma\upsilon\nu\alpha \sigma\upsilon\nu\beta - \eta\mu\alpha \eta\mu\beta)^2 =$$

499) Νά αποδειχθεί ότι η παράσταση:

$$\eta\mu^6\alpha + \sigma\upsilon\nu^6\alpha - \frac{2}{3}(\eta\mu^4\alpha + \sigma\upsilon\nu^4\alpha)$$

έχει μιά σταθερή τιμή ανεξάρτητη από τό α .

500) Νά αποδειχθεί ότι η παράσταση

$$\eta\mu^8\alpha + \sigma\upsilon\nu^8\alpha - 2(1 - \eta\mu^2\alpha \sigma\upsilon\nu^2\alpha)^2$$

έχει μιά σταθερή τιμή ανεξάρτητη από τό α .

501) Νά αποδειχθεί ότι η παράσταση

$$\eta\mu^4\alpha(3 - 2\eta\mu^2\alpha) + \sigma\upsilon\nu^4\alpha(3 - 2\sigma\upsilon\nu^2\alpha)$$

έχει τιμή σταθερή ανεξάρτητη από τό α .

502) Νά αποδειχθεί ότι:

$$2\sigma\upsilon\nu^6x - 2\eta\mu^6x + 3\eta\mu^6x - 5\sigma\upsilon\nu^6x + 3\sigma\upsilon\nu^4x = \eta\mu^2x$$

503) Νά αποδειχθεί ότι η παράσταση

$$\eta\mu^6x + 3\eta\mu^2x \sigma\upsilon\nu^2x + \sigma\upsilon\nu^6x$$

έχει τιμή σταθερή ανεξάρτητη από τό x .

ΑΝΑΓΩΓΗ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΟΞΕΙΩΝ ΓΩΝΙΩΝ

149. ΓΩΝΙΕΣ ΜΕ ΚΟΙΝΗ ΤΕΛΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ

Μάθαμε στην § 140 ότι γωνίες με κοινή τελική πλευρά έχουν τούς ίδιους τριγωνομετρικούς αριθμούς και στην § 137 ότι, όταν δύο γωνίες (έννοείται πάντοτε: σέ κανονική θέση) διαφέρουν κατά $2\kappa\pi$ ($360^\circ\kappa$), τότε έχουν κοινή τελική πλευρά.

Έπομένως έχουμε τις εξής ταυτότητες, όπου $\kappa \in \mathbb{Z}$.

$$\eta\mu(\theta^\circ + 360^\circ\kappa) = \eta\mu\theta^\circ$$

$$\sigma\phi(\theta^\circ + 360^\circ\kappa) = \sigma\phi\theta^\circ$$

$$\sigma\upsilon\nu(\theta^\circ + 360^\circ\kappa) = \sigma\upsilon\nu\theta^\circ$$

$$\tau\epsilon\mu(\theta^\circ + 360^\circ\kappa) = \tau\epsilon\mu\theta^\circ$$

$$\epsilon\phi(\theta^\circ + 360^\circ\kappa) = \epsilon\phi\theta^\circ$$

$$\sigma\tau\epsilon\mu(\theta^\circ + 360^\circ\kappa) = \sigma\tau\epsilon\mu\theta^\circ$$

Έτσι, π.χ., είναι:

$$\eta\mu 410^\circ = \eta\mu(50^\circ + 360^\circ) = \eta\mu 50^\circ$$


$$\sigma\upsilon\nu 870^\circ = \sigma\upsilon\nu(150^\circ + 2 \cdot 360^\circ) = \sigma\upsilon\nu 150^\circ$$

$$\epsilon\phi(-1000^\circ) = \epsilon\phi(80^\circ - 3 \cdot 360^\circ) = \epsilon\phi 80^\circ$$

150. ΓΩΝΙΕΣ ΑΝΤΙΘΕΤΕΣ (ΤΟΣΑ ΑΝΤΙΘΕΤΑ)

Έστω ότι έχουμε σέ κανονική θέση τις αντίθετες γωνίες θ και $-\theta$ και $P(x, \psi)$, $P'(x', \psi')$ είναι αντίστοιχως τά σημεία στά όποια ό τριγωνομετρικός κύκλος τέμνει τις τελικές πλευρές τους. Έπειδή τό τρίγωνο OPP' είναι ίσοσκελές και ή Ox είναι διχοτόμος τής γωνίας τής κορυφής του θά είναι συγχρόνως ύψος και διάμέσός του.

*Αρα θα είναι $x' = x$ και $\psi' = -\psi$ (Σχ. 150).



Σχ. 150

*Επομένως θα έχουμε:

$$\eta\mu(-\theta) = \psi' = -\psi = -\eta\mu\theta$$

$$\sigma\upsilon\nu(-\theta) = x' = x = \sigma\upsilon\nu\theta$$

$$\epsilon\varphi(-\theta) = \frac{\eta\mu(-\theta)}{\sigma\upsilon\nu(-\theta)} = \frac{-\eta\mu\theta}{\sigma\upsilon\nu\theta} = -\epsilon\varphi\theta$$

$$\sigma\varphi(-\theta) = \frac{\sigma\upsilon\nu(-\theta)}{\eta\mu(-\theta)} = \frac{\sigma\upsilon\nu\theta}{-\eta\mu\theta} = -\sigma\varphi\theta$$

$$\tau\epsilon\mu(-\theta) = \frac{1}{\sigma\upsilon\nu(-\theta)} = \frac{1}{\sigma\upsilon\nu\theta} = \tau\epsilon\mu\theta$$

$$\sigma\tau\epsilon\mu(-\theta) = \frac{1}{\eta\mu(-\theta)} = \frac{1}{-\eta\mu\theta} = -\sigma\tau\epsilon\mu\theta$$

*Ωστε: αν δύο γωνίες είναι αντίθετες, τότε έχουν τό ίδιο συνημίτονο και την ίδια τέμνουσα, αλλά αντίθετους όλους τους άλλους όμώνυμους τριγωνομετρικούς τους αριθμούς.

*Έτσι, π.χ.,

$$\eta\mu(-20^\circ) = -\eta\mu 20^\circ$$


$$\sigma\upsilon\nu(-20^\circ) = \sigma\upsilon\nu 20^\circ$$

$$\epsilon\varphi(-20^\circ) = -\epsilon\varphi 20^\circ \text{ κ.τ.λ., κ.τ.λ.}$$

$$\sigma\upsilon\nu(-30^\circ) = \sigma\upsilon\nu 30^\circ = \sqrt{\frac{3}{2}}$$

151. ΓΩΝΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΜΙΑ ΓΩΝΙΑ ΠΛΗΡΗ (ΤΟΣΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΜΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ).

Έστω ότι έχουμε σε κανονική θέση δύο γωνίες θ και $360^\circ - \theta$. Γνωρίζουμε (§ 137) ότι οι γωνίες $-\theta$ και $360^\circ - \theta$ έχουν κοινή τελική πλευρά και έπομένως έχουν τούς ίδιους τριγωνομετρικούς αριθμούς. Έπομένως θα έχουμε:



Σχ. 151

$$\left. \begin{aligned} \eta\mu (360^\circ - \theta) &= \eta\mu (-\theta) = -\eta\mu \theta \\ \sigma\upsilon\nu (360^\circ - \theta) &= \sigma\upsilon\nu (-\theta) = \sigma\upsilon\nu \theta \\ \epsilon\varphi (360^\circ - \theta) &= \epsilon\varphi (-\theta) = -\epsilon\varphi \theta \\ \sigma\varphi (360^\circ - \theta) &= \sigma\varphi (-\theta) = -\sigma\varphi \theta \\ \tau\epsilon\mu (360^\circ - \theta) &= \tau\epsilon\mu (-\theta) = \tau\epsilon\mu \theta \\ \sigma\tau\epsilon\mu (360^\circ - \theta) &= \sigma\tau\epsilon\mu (-\theta) = -\sigma\tau\epsilon\mu \theta \end{aligned} \right\} (151, \alpha)$$

Ώστε: αν δύο γωνίες έχουν άθροισμα μία πλήρη γωνία (360°), τότε έχουν τό ίδιο συνημίτονο και τήν ίδια τέμνουσα, αλλά αντίθετους δλους τούς άλλους ομώνυμους τριγωνομετρικούς αριθμούς τους.


Έτσι, π.χ., είναι:

$$\begin{aligned} \eta\mu 330^\circ &= -\eta\mu 30^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \epsilon\varphi 300^\circ &= -\epsilon\varphi 60^\circ = -\sqrt{3} \\ \sigma\upsilon\nu 315^\circ &= \sigma\upsilon\nu 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2} \quad \text{κ.τ.λ.} \end{aligned}$$

152. ΓΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ (ΤΟΣΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΜΙΑ ΗΜΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ).

Έστω ότι έχουμε σε κανονική θέση τις παραπληρωματικές γωνίες θ και $180^\circ - \theta$, και $P(x, \psi)$, $P'(x', \psi')$ είναι αντίστοιχως τά σημεία στα όποια ό τριγωνομετρικός κύκλος τέμνει τις τελικές πλευρές τους. (Γιά νά σχεδιάσουμε τήν $180^\circ - \theta$ κατασκευάζουμε τήν $-\theta$ και προεκτείνουμε έπειτα τήν τελική της πλευρά κατ' αντίθετη φορά, δηλ. στρέφουμε τήν τελική πλευρά της κατά 180°). Έστω άκόμη ότι Π και Π' είναι οι όρθές προβολές αντίστοιχως τών σημείων P και P' στόν άξονα Ox. Τότε, από τά ίσα όρθογώνια τρίγωνα OΠP και OΠ'P' έχουμε:

$$x' = \overline{OΠ'} = -\overline{OΠ} = -x \quad \text{και} \quad \psi' = \overline{Π'P'} = \overline{ΠP} = \psi \quad (\text{Σχ. 152})$$



Σχ. 152

*Άρα θα έχουμε:

$$\eta\mu(180^\circ - \theta) = \psi' = \psi = \eta\mu \theta$$

$$\sigma\upsilon\upsilon(180^\circ - \theta) = x' = -x = -\sigma\upsilon\upsilon \theta$$

$$\epsilon\varphi(180^\circ - \theta) = \frac{\eta\mu(180^\circ - \theta)}{\sigma\upsilon\upsilon(180^\circ - \theta)} = \frac{\eta\mu\theta}{-\sigma\upsilon\upsilon\theta} = -\epsilon\varphi \theta$$

$$\sigma\varphi(180^\circ - \theta) = \frac{\sigma\upsilon\upsilon(180^\circ - \theta)}{\eta\mu(180^\circ - \theta)} = \frac{-\sigma\upsilon\upsilon\theta}{\eta\mu\theta} = -\sigma\varphi \theta$$

$$\tau\epsilon\mu(180^\circ - \theta) = \frac{1}{\sigma\upsilon\upsilon(180^\circ - \theta)} = \frac{1}{-\sigma\upsilon\upsilon\theta} = -\tau\epsilon\mu \theta$$

$$\sigma\tau\epsilon\mu(180^\circ - \theta) = \frac{1}{\eta\mu(180^\circ - \theta)} = \frac{1}{\eta\mu\theta} = \sigma\tau\epsilon\mu \theta$$

Ώστε: "Αν δύο γωνίες είναι παραπληρωματικές, τότε έχουν τό ίδιο ημίτονο και τήν ίδια συντέμνουσα, αλλά αντίθετους τούς άλλους όμώνυμους τριγωνομετρικούς αριθμούς τους.


"Έτσι, π.χ., επειδή $150^\circ + 30^\circ = 180^\circ$ θα είναι:

$$\eta\mu 150^\circ = \eta\mu 30^\circ = \frac{1}{2}$$

$$\sigma\upsilon\upsilon 150^\circ = -\sigma\upsilon\upsilon 30^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2} \quad \text{κ.τ.λ.}$$

153. ΓΩΝΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ (ΤΟΞΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΝΑ ΤΕΤΑΡΤΗΜΟΡΙΟ).

Έστω ότι έχουμε σέ κανονική θέση τής συμπληρωματικές γωνίες θ και $90^\circ - \theta$ και $P(x, \psi)$, $P'(x', \psi')$ είναι αντιστοίχως τά σημεία στά όποία ό τριγωνομετρικός κύκλος τέμνει τής τελικές πλευρές τους. (Γιά νά σχεδιάσουμε τήν $90^\circ - \theta$, κατασκευάζουμε τήν $-\theta$ και στρέφουμε έπειτα τήν τελική πλευρά τής κατά 90°). Έστω άκόμη ότι Π και Π' είναι οί όρθές προβολές άντιστοίχως τών σημείων P και P' στόν άξονα τών τετμημένων.



Σχ. 153

Τότε άπό τά ίσα όρθογώνια τρίγωνα $ΟΠΡ$ και $ΟΠ'Ρ'$ έχουμε:

$$x' = \overline{ΟΠ'} = \overline{ΠΡ} = \psi \quad \text{και} \quad \psi' = \overline{Π'Ρ'} = \overline{ΟΡ} = x \quad (\Sigma\chi. 153)$$

Άρα : $\eta\mu(90^\circ - \theta) = \psi' = x = \sigma\upsilon\upsilon\theta$

$\sigma\upsilon\upsilon(90^\circ - \theta) = x' = \psi = \eta\mu\theta$

$$\epsilon\varphi(90^\circ - \theta) = \frac{\eta\mu(90^\circ - \theta)}{\sigma\upsilon\upsilon(90^\circ - \theta)} = \frac{\sigma\upsilon\upsilon\theta}{\eta\mu\theta} = \sigma\varphi\theta$$

$$\sigma\varphi(90^\circ - \theta) = \frac{\sigma\upsilon\upsilon(90^\circ - \theta)}{\eta\mu(90^\circ - \theta)} = \frac{\eta\mu\theta}{\sigma\upsilon\upsilon\theta} = \epsilon\varphi\theta$$

$$\tau\epsilon\mu(90^\circ - \theta) = \frac{1}{\sigma\upsilon\upsilon(90^\circ - \theta)} = \frac{1}{\eta\mu\theta} = \sigma\tau\epsilon\mu\theta$$

$$\sigma\tau\epsilon\mu(90^\circ - \theta) = \frac{1}{\eta\mu(90^\circ - \theta)} = \frac{1}{\sigma\upsilon\upsilon\theta} = \tau\epsilon\mu\theta$$

Ωστε : άν δύο γωνίες είναι συμπληρωματικές, τότε τό ήμίτονο τής καθεμιάς άπ' αυτές είναι ίσο μέ τό συνημίτονο τής άλλης, ή εφαπτομένη μέ τή συνεφαπτομένη και ή τέμνουσα μέ τή συντέμνουσα.

Έτσι, π.χ., έπειδή $20^\circ + 70^\circ = 90^\circ$, θά έχουμε:

$\eta\mu 70^\circ = \sigma\upsilon\upsilon 20^\circ$ $\sigma\upsilon\upsilon 70^\circ = \eta\mu 20^\circ$ $\epsilon\varphi 70^\circ = \sigma\varphi 20^\circ$ κ.τ.λ.

154. ΓΩΝΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΚΑΤΑ ΜΙΑ ΟΡΘΗ (ΤΟΞΑ ΠΟΥ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ)

Ἔστω ὅτι ἔχουμε σὲ κανονικὴ θέση τὶς γωνίες θ καὶ $90^\circ + \theta$. Θέλουμε νὰ δοῦμε πῶς σχετίζονται οἱ τριγωνομετρικοὶ τοὺς ἀριθμοί. Ἐπειδὴ $(90 + \theta) + (90 - \theta) = 180^\circ$, γι' αὐτὸ θά ἔχουμε (§ 152 καὶ § 153):

$$\left. \begin{array}{l} \eta\mu (90^\circ + \theta) = \eta\mu (90^\circ - \theta) = \sigma\upsilon\nu \theta \\ \sigma\upsilon\nu (90^\circ + \theta) = -\sigma\upsilon\nu (90^\circ - \theta) = -\eta\mu \theta \\ \epsilon\varphi (90^\circ + \theta) = -\epsilon\varphi (90^\circ - \theta) = -\sigma\varphi \theta \\ \sigma\varphi (90^\circ + \theta) = -\sigma\varphi (90^\circ - \theta) = -\epsilon\varphi \theta \\ \tau\epsilon\mu (90^\circ + \theta) = -\tau\epsilon\mu (90^\circ - \theta) = -\sigma\tau\epsilon\mu \theta \\ \sigma\tau\epsilon\mu (90^\circ + \theta) = \sigma\tau\epsilon\mu (90^\circ - \theta) = \tau\epsilon\mu \theta \end{array} \right\} (154, \alpha)$$

Ἔτσι, π.χ., ἐπειδὴ $110^\circ = 90^\circ + 20^\circ$, γι' αὐτὸ θά εἶναι:

$$\begin{array}{l} \eta\mu 110^\circ = \sigma\upsilon\nu 20^\circ \\ \sigma\upsilon\nu 110^\circ = -\eta\mu 20^\circ \\ \epsilon\varphi 110^\circ = -\sigma\varphi 20^\circ \quad \text{κ.τ.λ.} \end{array}$$

155. ΓΩΝΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΚΑΤΑ ΕΥΘΕΙΑ ΓΩΝΙΑ (ΤΟΞΑ ΠΟΥ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΚΑΤΑ ΗΜΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ).

Ἔστω ὅτι ἔχουμε τὶς γωνίες θ καὶ $180^\circ + \theta$, οἱ ὁποῖες διαφέρουν κατὰ 180° . Ἐπειδὴ $180^\circ + \theta = 90^\circ + (90^\circ + \theta)$, γι' αὐτὸ θά ἔχουμε:

$$\begin{array}{l} \eta\mu (180^\circ + \theta) = \eta\mu [90^\circ + (90^\circ + \theta)] = \sigma\upsilon\nu(90^\circ + \theta) = -\eta\mu \theta \\ \sigma\upsilon\nu (180^\circ + \theta) = \sigma\upsilon\nu [90^\circ + (90^\circ + \theta)] = -\eta\mu (90^\circ + \theta) = -\sigma\upsilon\nu \theta \\ \epsilon\varphi (180^\circ + \theta) = \epsilon\varphi [90^\circ + (90^\circ + \theta)] = -\sigma\varphi (90^\circ + \theta) = \epsilon\varphi \theta \\ \sigma\varphi (180^\circ + \theta) = \sigma\varphi [90^\circ + (90^\circ + \theta)] = -\epsilon\varphi (90^\circ + \theta) = \sigma\varphi \theta \\ \tau\epsilon\mu (180^\circ + \theta) = \tau\epsilon\mu [90^\circ + (90^\circ + \theta)] = -\sigma\tau\epsilon\mu(90^\circ + \theta) = -\tau\epsilon\mu \theta \\ \sigma\tau\epsilon\mu (180^\circ + \theta) = \sigma\tau\epsilon\mu [90^\circ + (90^\circ + \theta)] = \tau\epsilon\mu (90^\circ + \theta) = -\sigma\tau\epsilon\mu \theta \end{array}$$

Μποροῦμε νὰ ἐργασθοῦμε καὶ ὡς ἑξῆς: ἐπειδὴ $(180^\circ + \theta) + (180^\circ - \theta) = 360^\circ$, γι' αὐτὸ (§ 151) θά εἶναι:

$$\begin{array}{l} \eta\mu (180^\circ + \theta) = -\eta\mu (180^\circ - \theta) = -\eta\mu \theta \\ \sigma\upsilon\nu (180^\circ + \theta) = \sigma\upsilon\nu (180^\circ - \theta) = -\sigma\upsilon\nu \theta \\ \epsilon\varphi (180^\circ + \theta) = -\epsilon\varphi (180^\circ - \theta) = \epsilon\varphi \theta \\ \sigma\varphi (180^\circ + \theta) = -\sigma\varphi (180^\circ - \theta) = \sigma\varphi \theta \\ \tau\epsilon\mu (180^\circ + \theta) = \tau\epsilon\mu (180^\circ - \theta) = -\tau\epsilon\mu \theta \\ \sigma\tau\epsilon\mu (180^\circ + \theta) = -\sigma\tau\epsilon\mu (180^\circ - \theta) = -\sigma\tau\epsilon\mu \theta \end{array}$$

Ἦστε: ἂν δύο γωνίες διαφέρουν κατὰ 180° , τότε ἔχουν τὴν ἴδια ἐφαπτομένη καὶ τὴν ἴδια συνεφαπτομένη, ἀλλὰ ἀντίθετους τοὺς ἄλλους ὁμώνυμους τριγωνομετρικοὺς ἀριθμοὺς τοὺς.

Έτσι, π.χ., επειδή $225^\circ = 180^\circ + 45^\circ$, γι' αυτό θά είναι:

$$\eta\mu 225^\circ = -\eta\mu 45^\circ = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\epsilon\varphi 225^\circ = \epsilon\varphi 45^\circ = 1$$

$$\sigma\upsilon\nu 225^\circ = -\sigma\upsilon\nu 45^\circ = -\frac{\sqrt{2}}{2} \text{ κ.τ.λ.}$$

Σημείωση. Παρατηρούμε ότι $\epsilon\varphi(\pi + \theta) = \epsilon\varphi \theta$ και $\sigma\varphi(\pi + \theta) = \sigma\varphi \theta$. Έπίσης $\epsilon\varphi(2\pi + \theta) = \epsilon\varphi \theta$ και $\sigma\varphi(2\pi + \theta) = \sigma\varphi \theta$, όπως γνωρίζουμε. Άκόμα είναι $\epsilon\varphi(3\pi + \theta) = \epsilon\varphi[2\pi + (\pi + \theta)] = \epsilon\varphi(\pi + \theta) = \epsilon\varphi \theta$ κτλ. Δηλ. οι συναρτήσεις $\psi = \epsilon\varphi x'$ και $\psi = \sigma\varphi x$ έχουν περίοδο τόν π .

156. ΑΝΑΓΩΓΗ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΙΑΣ ΓΩΝΙΑΣ (ΕΝΟΣ ΤΟΞΟΥ) ΣΕ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑΣ (ΜΗ ΑΡΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΞΟΥ) ΜΙΚΡΟΤΕΡΗΣ ΤΩΝ 45°.

Έφαρμόζοντας τούς τύπους, που μάθαμε στις παραγράφους 149 ως 155, μπορούμε να αναγάγουμε την εύρεση ενός τριγωνομετρικού αριθμού μιάς γωνίας θ (θετικής ή αρνητικής) στην εύρεση τριγωνομετρικού αριθμού μιάς γωνίας μη αρνητικής και μικρότερης από 45° .

Έστω, π.χ., ότι ζητείται η $\epsilon\varphi(-1250^\circ)$. Πρώτα-πρώτα έχουμε ότι: $\epsilon\varphi(-1250^\circ) = -\epsilon\varphi 1250^\circ$ (§ 150).

Διαιρούμε τώρα τόν 1250 με 360 και βρίσκουμε πηλίκο 3 και υπόλοιπο 170, άρα είναι $1250^\circ = 170^\circ + 3 \cdot 360^\circ$. Έχουμε επομένως:

$$\epsilon\varphi(-1250^\circ) = -\epsilon\varphi 1250^\circ = -\epsilon\varphi(170^\circ + 3 \cdot 360^\circ)$$

$$= -\epsilon\varphi 170^\circ \quad (\S 149)$$

$$= \epsilon\varphi 10^\circ \quad (\S 152)$$

Όμοιος βρίσκουμε ότι:

$$\eta\mu(-1385^\circ) = -\eta\mu 1385^\circ \quad (\S 150)$$

$$= -\eta\mu(305^\circ + 3 \cdot 360^\circ)$$

$$= -\eta\mu 305^\circ \quad (\S 149)$$

$$= \eta\mu 55^\circ \quad (\S 151)$$

$$= \sigma\upsilon\nu 35^\circ \quad (\S 153)$$

Γενικά μπορούμε να ακολουθούμε τόν εξής κανόνα: Αναγάμαστε πρώτα σέ γωνία θετική και μικρότερη από 360° . Έπειτα, αν η γωνία αυτή είναι μεγαλύτερη από 270° , τή συνδυάζουμε με τήν 360° . Αν είναι μεταξύ 180° και 270° , βρίσκουμε πόσο διαφέρει από 180° και τή συνδυάζουμε με τή διαφορά αυτή. Αν είναι μεγαλύτερη από 90° και μικρότερη από 180° , τή συνδυάζουμε με τήν παραπληρωματική της και, τέλος, αν είναι μεγαλύτερη από 45° και μικρότερη από 90° , τή συνδυάζουμε με τή συμπληρωματική της.

Παραδείγματα :

$$\eta\mu 290^\circ = -\eta\mu 70^\circ = -\sigma\upsilon\nu 20^\circ$$

$$\sigma\upsilon\nu 260^\circ = -\sigma\upsilon\nu 80^\circ = -\eta\mu 10^\circ$$

$$\epsilon\phi 140^\circ = -\epsilon\phi 40^\circ$$

$$\sigma\phi 85^\circ = \epsilon\phi 5^\circ.$$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

504) Νά αναχθούν σέ τριγωνομετρικούς αριθμούς μὴ ἀρνητικῆς γωνίας μικρότερης ἀπὸ 45° οἱ ἐξῆς τριγωνομετρικοὶ ἀριθμοί:

$$\begin{array}{llll} \alpha) \eta\mu 135^\circ & \beta) \sigma\upsilon\nu 315^\circ & \gamma) \epsilon\phi 200^\circ & \delta) \sigma\phi 400^\circ \quad \epsilon) \tau\epsilon\mu 325^\circ \\ \sigma\tau) \sigma\upsilon\nu(-760^\circ) & \zeta) \epsilon\phi(-1385^\circ) & \eta) \eta\mu 2880^\circ & \theta) \sigma\tau\epsilon\mu 825^\circ \quad \iota) \sigma\tau\epsilon\mu 610^\circ \end{array}$$

505) Νά βρεῖτε τίς τιμές (ἀκριβῶς) τῶν τριγωνομετρικῶν συναρτήσεων: $\eta\mu$, $\sigma\upsilon\nu$, $\epsilon\phi$, $\sigma\phi$ τῶν γωνιῶν:

$$\alpha) 150^\circ \quad \beta) 225^\circ \quad \gamma) -330^\circ \quad \delta) -120^\circ \quad \epsilon) -210^\circ \quad \sigma\tau) -315^\circ$$

506) Νά ἐκφραστοῦν οἱ παρακάτω τριγωνομετρικοὶ ἀριθμοὶ μὲ τριγωνομετρικοὺς ἀριθμοὺς τῆς γωνίας θ .

$$\begin{array}{lll} \alpha) \sigma\upsilon\nu(\theta - 90^\circ), & \beta) \epsilon\phi(270^\circ - \theta), & \gamma) \sigma\upsilon\nu(\theta + 540^\circ) \\ \delta) \eta\mu(\theta - 270^\circ) & \epsilon) \eta\mu(\theta - 180^\circ) & \sigma\tau) \sigma\upsilon\nu(270^\circ + \theta) \\ \zeta) \eta\mu(\theta - 720^\circ) & \eta) \epsilon\phi(-540^\circ + \theta) & \theta) \sigma\upsilon\nu(\theta - 180^\circ) \end{array}$$

507) Ἐάν $\epsilon\phi 25^\circ = \alpha$, νά βρεθεῖ ἡ τιμὴ τῶν κλασμάτων:

$$\alpha) \frac{\epsilon\phi 155^\circ - \epsilon\phi 115^\circ}{1 + \epsilon\phi 155^\circ \epsilon\phi 115^\circ} \quad \beta) \frac{\epsilon\phi 205^\circ - \epsilon\phi 115^\circ}{\epsilon\phi 245^\circ + \epsilon\phi 335^\circ}$$

508) Ἐάν $A + B + \Gamma = 180^\circ$, νά δεῖχθεῖ ὅτι $\eta\mu(B + \Gamma) = \eta\mu A$ καὶ $\sigma\upsilon\nu \frac{B + \Gamma}{2} = \eta\mu \frac{A}{2}$.

509) Ἐάν θ εἶναι γωνία μὲ τὴν τελικὴ τῆς πλευρᾶ στὴ δευτέρη γωνία τῶν ἄξόνων (δηλ. $90^\circ < \theta < 180^\circ$) γιὰ τὴν ὁποία εἶναι: $\epsilon\phi \theta = -2/3$, νά ἀποδειχθεῖ ὅτι τότε:

$$\alpha) \frac{\eta\mu(90^\circ - \theta) - \sigma\upsilon\nu(180^\circ - \theta)}{\epsilon\phi(270^\circ + \theta) + \sigma\phi(360^\circ - \theta)} = -\frac{2}{\sqrt{13}} \quad \text{καὶ}$$

$$\beta) \frac{\epsilon\phi(90^\circ + \theta) + \sigma\upsilon\nu(180^\circ + \theta)}{\eta\mu(270^\circ - \theta) - \sigma\phi(-\theta)} = \frac{2 + \sqrt{13}}{2 - \sqrt{13}}$$

510) Νά ἀποδειχθεῖ ὅτι:

$$\alpha) \sigma\upsilon\nu 0^\circ \eta\mu^2 270^\circ - 2 \sigma\upsilon\nu 180^\circ \epsilon\phi 45^\circ = 3$$

$$\beta) 3 \eta\mu 0^\circ \tau\epsilon\mu 180^\circ + 2 \sigma\tau\epsilon\mu 90^\circ - \sigma\upsilon\nu 360^\circ = 1$$

$$\gamma) 2 \tau\epsilon\mu\pi \sigma\upsilon\nu 0 + 3 \eta\mu^3 \frac{3\pi}{2} - \sigma\tau\epsilon\mu \frac{\pi}{2} = -6$$

$$\delta) \epsilon\phi\pi \sigma\upsilon\nu \frac{3\pi}{2} + \tau\epsilon\mu 2\pi - \sigma\tau\epsilon\mu \frac{3\pi}{2} = 2$$

511) Νά ἀπλοποιηθοῦν τὰ ἐξῆς κλάσματα:

$$\alpha) \frac{\sigma\upsilon\nu(90^\circ + \alpha) \tau\epsilon\mu(-\alpha) \epsilon\phi(180^\circ - \alpha)}{\tau\epsilon\mu(360^\circ + \alpha) \eta\mu(180^\circ + \alpha) \sigma\phi(270^\circ - \alpha)}$$

$$\beta) \frac{\eta\mu(180^\circ - \alpha) \sigma\phi(270^\circ - \alpha) \sigma\upsilon\nu(\alpha - 360^\circ)}{\epsilon\phi(180^\circ + \alpha) \epsilon\phi(90^\circ + \alpha) \sigma\upsilon\nu(270^\circ + \alpha)}$$

512) Νά άπλοποιηθοῦν τά κλάσματα:


$$\alpha) \frac{\sigma\upsilon\upsilon\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) \tau\epsilon\mu(-\alpha) \epsilon\phi(\pi - \alpha)}{\tau\epsilon\mu(2\pi + \alpha)\eta\mu(\pi + \alpha)\sigma\phi\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right)}$$

$$\beta) \frac{\eta\mu\left(\frac{3\pi}{2} - \alpha\right) \epsilon\phi(\pi - \beta)}{\epsilon\phi(\pi - \beta)\sigma\upsilon\upsilon(\pi - \alpha)} + \frac{\sigma\phi\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) \eta\mu\left(\gamma - \frac{\pi}{2}\right)}{\sigma\upsilon\upsilon(\pi - \gamma) \epsilon\phi(-\alpha)}$$

$$\gamma) \frac{\epsilon\phi(\pi - \theta) \sigma\phi(\pi + \theta) \epsilon\phi(-\theta) \epsilon\phi\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)}{\epsilon\phi(\pi + \theta)\sigma\phi(\pi - \theta)\sigma\phi\epsilon\phi(2\pi - \theta)}$$

157. ΝΟΜΟΣ ΤΩΝ ΗΜΙΤΩΝΩΝ.

A) Στό Γυμνάσιο μάθαμε πώς σχετίζονται μεταξύ τους τά κύρια στοιχεία ενός όρθογωνίου τριγώνου. Ύπενθυμίζουμε έδω τούς σχετικούς τύπους:



Σχ. 157.1



$$\left. \begin{aligned} \beta &= \alpha \eta\mu B = \alpha \sigma\upsilon\upsilon \Gamma \\ \gamma &= \alpha \eta\mu \Gamma = \alpha \sigma\upsilon\upsilon B \end{aligned} \right\}$$

$$\left. \begin{aligned} \beta &= \gamma \epsilon\phi B = \gamma \sigma\phi \Gamma \\ \gamma &= \beta \epsilon\phi \Gamma = \beta \sigma\phi B \end{aligned} \right\}$$

$$\alpha^2 = \beta^2 + \gamma^2$$

B) Θά ζητήσουμε τώρα νά βροῦμε τύπους πού νά συνδέουν τά στοιχεία ενός όποιοῦδήποτε μή όρθογωνίου τριγώνου.

Έστω ABΓ ένα μή όρθογώνιο τρίγωνο (Σχ. 157.2).



Σχ. 157.2

Στό σχ. 157.2 (α) έχουμε ένα όξυγώνιο τρίγωνο. Στό σχ. 157.2 (β) έχουμε ένα άμβλυγώνιο τρίγωνο. Φέρνουμε τή ΓΔ κάθετη στην AB καί όνομάζουμε (ΓΔ) = λ. Από τό όρθογώνιο τρίγωνο ΑΓΔ καί γιά τά δύο τά σχήματα έχουμε $\lambda = \beta \eta\mu A$ (1)

Από τό όρθογώνιο τρίγωνο ΓΔB του σχ. (α) έχουμε $\lambda = \alpha \eta\mu B$ (2)

Από τό όρθογώνιο τρίγωνο ΓΒΔ του σχ. (β) έχουμε: $\lambda = \alpha \eta\mu \phi = \alpha \eta\mu B$

(επειδή $B + \varphi = 180^\circ$), δηλ. έχουμε πάλι τή (2). Έπομένως από τής (1) και (2) έχουμε:

$$\left. \begin{array}{l} \lambda = \beta \eta\mu A \\ \lambda = \alpha \eta\mu B \end{array} \right\} \Rightarrow \beta \eta\mu A = \alpha \eta\mu B \Rightarrow \frac{\alpha}{\eta\mu A} = \frac{\beta}{\eta\mu B} \quad (3)$$

Φερνουμε τώρα τήν κάθετη από τό Β στήν ΑΓ και θέτουμε $(BE) = \mu$. Καί γιά τά δύο τά σχήματα έχουμε:

$$\mu = \alpha \eta\mu \Gamma \quad \text{καί} \quad \mu = \gamma \eta\mu A.$$

Έπομένως έχουμε :

$$\left. \begin{array}{l} \mu = \alpha \eta\mu \Gamma \\ \mu = \gamma \eta\mu A \end{array} \right\} \Rightarrow \alpha \eta\mu \Gamma = \gamma \eta\mu A \Rightarrow \frac{\alpha}{\eta\mu A} = \frac{\gamma}{\eta\mu \Gamma} \quad (4)$$

Άπό τής (3) και (4) συμπεραίνουμε ότι:

$$\boxed{\frac{\alpha}{\eta\mu A} = \frac{\beta}{\eta\mu B} = \frac{\gamma}{\eta\mu \Gamma}} \quad (157, \alpha)$$

Ώστε: σέ κάθε τρίγωνο τά μήκη τών πλευρῶν εἶναι ἀνάλογα πρὸς τά ἡμίτονα τῶν ἀπέναντι γωνιῶν.

Οἱ ἀναλογίες (157, α) ἀποτελοῦν τό λεγόμενο νόμο τῶν ἡμιτόνων.

Γ) Ἐστω Ο τό κέντρο τοῦ κύκλου τοῦ περιγεγραμμένου στό τρίγωνο ΑΒΓ, R ἡ ἀκτίνα τοῦ κύκλου καί Μ τό μέσο τῆς πλευρᾶς ΑΒ (Σχ. 157.3).

Τό τρίγωνο ΑΟΜ εἶναι ὀρθογώνιο καί ἡ γωνία στό Ο τοῦ τριγώνου ΑΟΜ εἶναι ἴση μέ τή γωνία Γ τοῦ τριγώνου ΑΒΓ.

Ἐχουμε λοιπόν ἀπό τό ὀρθογώνιο τρίγωνο ΑΟΜ:


$$AM = \frac{\gamma}{2} = R \eta\mu \hat{O} = R \eta\mu \Gamma$$

$$\text{ἀπό τήν } \frac{\gamma}{2} = R \eta\mu \Gamma \text{ ἔχουμε } \frac{\gamma}{\eta\mu \Gamma} = 2R$$

$$\text{καί μέ κυκλική τροπή: } \frac{\alpha}{\eta\mu A} = 2R, \quad \frac{\beta}{\eta\mu B} = 2R$$

$$\text{Ώστε: } \frac{\alpha}{\eta\mu A} = \frac{\beta}{\eta\mu B} = \frac{\gamma}{\eta\mu \Gamma} = 2R$$

Ξαναβρίσκουμε δηλαδή τό νόμο τῶν ἡμιτόνων.




Σχ. 157.3

158. ΝΟΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΗΜΙΤΟΝΩΝ.

Ἐὰν πάρουμε πάλι ἓνα μὴ ὀρθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ (Σχ. 158). Ἀπὸ τὸ ὀρθογώνιο τρίγωνο ΑΓΔ καὶ γιὰ τὰ δύο τὰ σχήματα ἔχουμε:

$$\beta^2 = \lambda^2 + (\Delta\Delta)^2 \quad (1)$$



Σχ. 158

Ἀπὸ τὸ ὀρθογώνιο τρίγωνο ΒΓΔ τοῦ σχ. (α) ἔχουμε:

$$\lambda = \alpha \eta\mu B \quad \text{καὶ} \quad (\Delta B) = \alpha \sigma\upsilon\nu B.$$

Ἐπομένως εἶναι:

$$(\Delta\Delta) = (AB) - (\Delta B) = \gamma - \alpha \sigma\upsilon\nu B$$

καὶ ἡ (1) γίνεταί:

$$\begin{aligned} \beta^2 &= \lambda^2 + (\Delta\Delta)^2 = \alpha^2 \eta\mu^2 B + \gamma^2 - 2\gamma\alpha \sigma\upsilon\nu B + \alpha^2 \sigma\upsilon\nu^2 B = \\ &= \alpha^2(\eta\mu^2 B + \sigma\upsilon\nu^2 B) + \gamma^2 - 2\gamma\alpha \sigma\upsilon\nu B = \\ &= \alpha^2 + \gamma^2 - 2\gamma\alpha \sigma\upsilon\nu B. \end{aligned}$$

Ἀπὸ τὸ τρίγωνο ΒΓΔ τοῦ σχ. (β) ἔχουμε:

$$\lambda = \alpha \eta\mu \varphi = \alpha \eta\mu B \quad (\text{ἐπειδὴ } B + \varphi = 180^\circ) \quad \text{καὶ} \quad (B\Delta) = \alpha \sigma\upsilon\nu \varphi = -\alpha \sigma\upsilon\nu B$$

Ἐπομένως εἶναι:

$$(\Delta\Delta) = (AB) + (B\Delta) = \gamma - \alpha \sigma\upsilon\nu B$$

καὶ ἡ (1) γίνεταί καὶ γιὰ τὸ τρίγωνο αὐτό:

$$\beta^2 = \alpha^2 + \gamma^2 - 2\gamma\alpha \sigma\upsilon\nu B$$

Ἄν ἐργασθοῦμε μὲ ὁμοιο τρόπο φέρνοντας τὶς κάθετες ἀπὸ τὶς κορυφές Γ καὶ Α στὶς ἀντίστοιχες πλευρές, βρῖσκουμε ἀκόμα δύο ὁμοιοὺς τύπους:

$$\alpha^2 = \beta^2 + \gamma^2 - 2\beta\gamma \sigma\upsilon\nu A$$

$$\gamma^2 = \alpha^2 + \beta^2 - 2\alpha\beta \sigma\upsilon\nu \Gamma$$

Ὡστε ἔχουμε τοὺς τύπους:

$$\alpha^2 = \beta^2 + \gamma^2 - 2\beta\gamma \sigma\upsilon\nu A$$

$$\beta^2 = \gamma^2 + \alpha^2 - 2\gamma\alpha \sigma\upsilon\nu B$$

$$\gamma^2 = \alpha^2 + \beta^2 - 2\alpha\beta \sigma\upsilon\nu \Gamma$$

(158, α)

Οι τύποι * (158, α) αποτελούν τό λεγόμενο νόμο τών συνημιτόνων, ό όποιοσ μέ λόγια διατυπώνεται ώσ εξής:

Τό τετράγωνο του μήκουσ μιās πλευρās τριγώνου είναι ίσο μέ τό άθροισμα τών τετραγώνων τών μηκόν τών δύο άλλων πλευρών μείον τό διπλάσιο γινόμενο τών μηκόν τών πλευρών αυτών επί τό συνημίτονο τής γωνίας, πού οι πλευρές αυτές σχηματίζουν.

159. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.

1) Σ' ένα τρίγωνο ΑΒΓ είναι $\gamma = 25$ cm, $A = 35^\circ$ και $B = 68^\circ$. Ζητείται νά βρεθοῦν τά α, β, Γ.

Λύση: 'Επειδή $A + B + \Gamma = 180^\circ$, θά είναι $\Gamma = 180^\circ - (A + B) = 77^\circ$. 'Από τό νόμο τών ημιτόνων έχουμε:

$$\frac{\alpha}{\eta\mu A} = \frac{\gamma}{\eta\mu \Gamma} \Rightarrow \alpha = \frac{\gamma \eta\mu A}{\eta\mu \Gamma} = \frac{25 \cdot \eta\mu 35^\circ}{\eta\mu 77^\circ} = \frac{25 \cdot 0,574}{0,974} \approx 15 \text{ cm}$$

'Από τό νόμο τών ημιτόνων έχουμε επίσης:

$$\frac{\beta}{\eta\mu B} = \frac{\gamma}{\eta\mu \Gamma} \Rightarrow \beta = \frac{\gamma \eta\mu B}{\eta\mu \Gamma} = \frac{25 \cdot \eta\mu 68^\circ}{\eta\mu 77^\circ} = \frac{25 \cdot 0,927}{0,974} \approx 24 \text{ cm}$$

2) Σ' ένα τρίγωνο ΑΒΓ είναι $\alpha = 132$ m, $\beta = 124$ m, $\Gamma = 28^\circ 40'$. Ζητείται νά βρεθοῦν ή πλευρά γ και οι γωνίες Α και Β.

Λύση: 'Από τό νόμο τών συνημιτόνων έχουμε:

$$\gamma^2 = \alpha^2 + \beta^2 - 2\alpha\beta \text{ συν } \Gamma = 132^2 + 124^2 - 2 \cdot 132 \cdot 124 \text{ συν } 28^\circ 40' = 15714,$$

άρα $\gamma = \sqrt{15714} \approx 125$ m

Γιά τήν Α:

$$\frac{\alpha}{\eta\mu A} = \frac{\gamma}{\eta\mu \Gamma} \Rightarrow \eta\mu A = \frac{\alpha \eta\mu \Gamma}{\gamma} = \frac{132 \eta\mu 28^\circ 40'}{125} = \frac{132 \cdot 0,480}{125} = 0,507$$

και από τούς πίνακες τών φυσικών τριγωνομετρικών αριθμών βρίσκουμε $A = 30^\circ 30'$.

*'Αν έργασθοῦμε μέ όμοιο τρόπο βρίσκουμε, από τήν

$$\eta\mu B = \frac{\beta \eta\mu \Gamma}{\gamma}, \text{ ότι } B = 120^\circ 40'.$$

Μπορούμε, βέβαια, νά υπολογίσουμε τή Β από τόν τύπο $A + B + \Gamma = 180^\circ$.

Στή Γ' τάξη θά μάθουμε νά υπολογίζομε, τά στοιχεία ενός όποιουδήποτε τριγώνου, όταν ξέρομε αρκετά γι' αυτό τό σκοπό στοιχεία του και θά δοῦμε πότε και πώς γίνεται ή έργασία αυτή, πού τήν όνομάζομε επίλυση του τριγώνου.

(*) Οι τύποι προκύπτουν ό ένας από τόν άλλο μέ κυκλική τροπή τών α, β, γ και Α, Β, Γ.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

513) Τριγώνου ΑΒΓ είναι $\alpha = 384 \text{ mm}$, $\beta = 593 \text{ mm}$, $\gamma = 276 \text{ mm}$. Ζητείται νά υπολογισθούν οι γωνίες του.

514) Σ' ένα τρίγωνο ΑΒΓ είναι $\beta = 300 \text{ mm}$, $A = 36^\circ$, $B = 65^\circ$. Ζητείται νά υπολογισθούν οι πλευρές α και γ .

515) Νά αποδειχθεί ότι σε κάθε τρίγωνο ΑΒΓ ισχύει:

$$\beta^2 - \gamma^2 = \alpha(\beta \text{ συν } \Gamma - \gamma \text{ συν } B)$$

516) Νά αποδειχθεί ότι σε κάθε τρίγωνο ΑΒΓ ισχύει:

$$\alpha = \beta \text{ συν } \Gamma + \gamma \text{ συν } B \quad (\text{νόμος τών προβολών})$$

(Νά βρείτε μέ κυκλική τροπή τών γραμμάτων τις άλλες ταυτότητες γιά τις β και γ).

517) Νά αποδειχθεί ότι σε κάθε τρίγωνο ΑΒΓ ισχύει:

$$\frac{\epsilon\phi A}{\epsilon\phi B} = \frac{\gamma^2 + \alpha^2 - \beta^2}{\gamma^2 + \beta^2 - \alpha^2}$$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ

518) *Αν τεμ $\alpha = -\frac{13}{5}$, νά βρεθούν τά συν α , ημ α , $\epsilon\phi \alpha$, όπου τό τόξο α τό ύποθετόν θετικό καί μικρότερο άπό 180° .

519) Νά αποδειχθεί ότι: $\sigma\phi^2 \alpha - \text{συν}^2 \alpha = \sigma\phi^2 \alpha \text{ συν}^2 \alpha$.

520) Νά αποδειχθεί ότι $2\eta\mu^4 \alpha - 2\eta\mu^2 \alpha = \text{συν}^4 \alpha + \eta\mu^4 \alpha - 1$.

521) Νά αποδειχθεί ότι γιά κάθε γωνία θ , γιά τήν όποία είναι $\text{συν } \theta \neq 0$, ισχύει ότι $(3 \text{ συν} \theta + \text{τεμ } \theta)^2 \geq 12$.

522) Νά εξετάσετε άν ή συνάρτηση, πού όρίζεται άπό τήν $\psi = \eta\mu 2x$, είναι περιοδική.

*Όμοιο ζήτημα καί γιά τή συνάρτηση, πού όρίζεται άπό τήν $\psi = \epsilon\phi \frac{x}{4}$.

523) Νά αποδειχθεί ότι, άν οι γωνίες Β καί Γ ένός τριγώνου ΑΒΓ ίκανοποιούν τή συνθήκη $\frac{\eta\mu^2 B}{\eta\mu^2 \Gamma} = \frac{\epsilon\phi B}{\epsilon\phi \Gamma}$, τότε τό τρίγωνο είναι όρθογώνιο ή ίσοσκελές.

524) Νά αποδειχθεί ότι ισχύει:

$$\epsilon\phi^2 \alpha + \epsilon\phi^2 \beta + \epsilon\phi^2 \gamma \geq \epsilon\phi \alpha \epsilon\phi \beta + \epsilon\phi \alpha \epsilon\phi \gamma + \epsilon\phi \beta \epsilon\phi \gamma.$$

525) Νά έπιλυθεί ή εξίσωση:

$$\left(\text{συν}x + \frac{1}{2}\right) \left(\eta\mu x - \frac{1}{2}\right) \cdot \left(\epsilon\phi x - \sqrt{3}\right) = 0$$

Table with 14 columns: Σχολείο, Τμήμα, Α.Α, ΔΑ, ΕΑ, ΣΤΑ, ΣΤΒ, ΣΤΓ, ΣΤΔ, ΣΤΕ, ΣΤΖ, ΣΤΗ, ΣΤΘ, ΣΤΙ, ΣΤΙΙ, ΣΤΙΙΙ. The table contains numerous rows of numerical data representing student counts for various schools and classes.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

Ήμιτονα ὀξειῶν γωνιῶν.

Μοίρες							Μοίρες						
	0'	10'	20'	30'	40'	50'		0'	10'	20'	30'	40'	50'
0	0,000	0,003	0,006	0,009	0,012	0,015	45	0,707	0,709	0,711	0,713	0,715	0,717
1	0,017	0,020	0,023	0,026	0,029	0,032	46	0,719	0,721	0,723	0,725	0,727	0,729
2	0,035	0,038	0,041	0,044	0,047	0,049	47	0,731	0,733	0,735	0,737	0,739	0,741
3	0,052	0,055	0,058	0,061	0,064	0,067	48	0,743	0,745	0,747	0,749	0,751	0,753
4	0,070	0,073	0,076	0,078	0,081	0,084	49	0,755	0,757	0,759	0,760	0,762	0,764
5	0,087	0,090	0,093	0,096	0,099	0,102	50	0,766	0,768	0,770	0,772	0,773	0,775
6	0,105	0,107	0,110	0,113	0,116	0,119	51	0,777	0,779	0,781	0,783	0,784	0,786
7	0,122	0,125	0,128	0,131	0,133	0,136	52	0,788	0,790	0,792	0,793	0,795	0,797
8	0,139	0,142	0,145	0,148	0,151	0,154	53	0,799	0,800	0,802	0,804	0,806	0,807
9	0,156	0,159	0,162	0,165	0,168	0,171	54	0,809	0,811	0,812	0,814	0,816	0,817
10	0,174	0,177	0,179	0,182	0,185	0,188	55	0,819	0,821	0,822	0,824	0,826	0,827
11	0,191	0,194	0,197	0,199	0,202	0,205	56	0,829	0,831	0,832	0,834	0,835	0,837
12	0,208	0,211	0,214	0,216	0,219	0,222	57	0,839	0,840	0,842	0,843	0,845	0,847
13	0,225	0,228	0,231	0,233	0,236	0,239	58	0,848	0,850	0,851	0,853	0,854	0,856
14	0,242	0,245	0,248	0,250	0,253	0,256	59	0,857	0,859	0,860	0,862	0,863	0,865
15	0,259	0,262	0,264	0,267	0,270	0,273	60	0,866	0,867	0,869	0,870	0,872	0,873
16	0,276	0,278	0,281	0,284	0,287	0,290	61	0,875	0,876	0,877	0,879	0,880	0,882
17	0,292	0,295	0,298	0,301	0,303	0,306	62	0,883	0,884	0,886	0,887	0,888	0,890
18	0,309	0,312	0,315	0,317	0,320	0,323	63	0,891	0,892	0,894	0,895	0,896	0,898
19	0,326	0,328	0,331	0,334	0,337	0,339	64	0,899	0,900	0,901	0,903	0,904	0,905
20	0,342	0,345	0,347	0,350	0,353	0,356	65	0,906	0,908	0,909	0,910	0,911	0,912
21	0,358	0,361	0,364	0,367	0,369	0,372	66	0,914	0,915	0,916	0,917	0,918	0,919
22	0,375	0,377	0,380	0,383	0,385	0,388	67	0,921	0,922	0,923	0,924	0,925	0,926
23	0,391	0,393	0,396	0,399	0,401	0,404	68	0,927	0,928	0,929	0,930	0,931	0,933
24	0,407	0,409	0,412	0,415	0,417	0,420	69	0,934	0,935	0,936	0,937	0,938	0,939
25	0,423	0,425	0,428	0,431	0,433	0,436	70	0,940	0,941	0,942	0,943	0,944	0,945
26	0,438	0,441	0,444	0,446	0,449	0,451	71	0,946	0,946	0,947	0,948	0,949	0,950
27	0,454	0,457	0,459	0,462	0,464	0,467	72	0,951	0,952	0,953	0,954	0,955	0,955
28	0,469	0,472	0,475	0,477	0,480	0,482	73	0,956	0,957	0,958	0,959	0,960	0,960
29	0,485	0,487	0,490	0,492	0,495	0,497	74	0,961	0,962	0,963	0,964	0,964	0,965
30	0,500	0,503	0,505	0,508	0,510	0,513	75	0,966	0,967	0,967	0,968	0,969	0,970
31	0,515	0,518	0,520	0,523	0,525	0,527	76	0,970	0,971	0,972	0,972	0,973	0,974
32	0,530	0,532	0,535	0,537	0,540	0,542	77	0,974	0,975	0,976	0,976	0,977	0,978
33	0,545	0,547	0,550	0,552	0,554	0,557	78	0,978	0,979	0,979	0,980	0,981	0,981
34	0,559	0,562	0,564	0,566	0,569	0,571	79	0,982	0,982	0,988	0,983	0,984	0,984
35	0,574	0,576	0,578	0,581	0,583	0,585	80	0,985	0,985	0,986	0,986	0,987	0,987
36	0,588	0,590	0,592	0,595	0,597	0,599	81	0,988	0,988	0,989	0,989	0,989	0,990
37	0,602	0,604	0,606	0,609	0,611	0,613	82	0,990	0,991	0,991	0,991	0,992	0,992
38	0,616	0,618	0,620	0,623	0,625	0,627	83	0,993	0,993	0,993	0,994	0,994	0,994
39	0,629	0,632	0,634	0,636	0,638	0,641	84	0,995	0,995	0,995	0,995	0,996	0,996
40	0,643	0,645	0,647	0,649	0,652	0,654	85	0,996	0,996	0,997	0,997	0,997	0,997
41	0,656	0,658	0,660	0,663	0,665	0,667	86	0,998	0,998	0,998	0,998	0,998	0,998
42	0,669	0,671	0,673	0,676	0,678	0,680	87	0,999	0,999	0,999	0,999	0,999	0,999
43	0,682	0,684	0,686	0,688	0,690	0,693	88	0,999	0,999	1,000	1,000	1,000	1,000
44	0,695	0,697	0,699	0,701	0,703	0,705	89	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Συνημίτονα όξειών γωνιών.

Μοίρες							Μοίρες						
	0'	10'	20'	30'	40'	50'		0'	10'	20'	30'	40'	50'
0	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	45	0,707	0,705	0,703	0,701	0,699	0,697
1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,999	46	0,695	0,693	0,690	0,688	0,686	0,684
2	0,999	0,999	0,999	0,999	0,999	0,999	47	0,682	0,680	0,678	0,676	0,673	0,671
3	0,999	0,998	0,998	0,998	0,998	0,998	48	0,669	0,667	0,665	0,663	0,660	0,658
4	0,998	0,997	0,997	0,997	0,997	0,996	49	0,656	0,654	0,652	0,649	0,647	0,645
5	0,996	0,996	0,996	0,995	0,995	0,995	50	0,643	0,641	0,638	0,636	0,634	0,632
6	0,995	0,994	0,994	0,994	0,993	0,993	51	0,629	0,627	0,625	0,623	0,620	0,618
7	0,993	0,992	0,992	0,991	0,991	0,991	52	0,616	0,613	0,611	0,609	0,606	0,604
8	0,990	0,990	0,989	0,989	0,989	0,988	53	0,602	0,599	0,597	0,595	0,592	0,590
9	0,988	0,987	0,987	0,986	0,986	0,985	54	0,588	0,585	0,583	0,581	0,578	0,576
10	0,985	0,984	0,984	0,983	0,983	0,982	55	0,574	0,571	0,569	0,566	0,564	0,562
11	0,982	0,981	0,981	0,980	0,979	0,979	56	0,559	0,557	0,554	0,552	0,550	0,547
12	0,978	0,978	0,977	0,976	0,976	0,975	57	0,545	0,542	0,540	0,537	0,535	0,532
13	0,974	0,974	0,973	0,972	0,972	0,971	58	0,530	0,527	0,525	0,523	0,520	0,518
14	0,970	0,970	0,969	0,968	0,967	0,967	59	0,515	0,513	0,510	0,508	0,505	0,503
15	0,966	0,965	0,964	0,964	0,963	0,962	60	0,500	0,497	0,495	0,492	0,490	0,487
16	0,961	0,960	0,960	0,959	0,958	0,957	61	0,485	0,482	0,480	0,477	0,475	0,472
17	0,956	0,955	0,955	0,954	0,953	0,952	62	0,469	0,467	0,464	0,462	0,459	0,457
18	0,951	0,950	0,949	0,948	0,947	0,946	63	0,454	0,451	0,449	0,446	0,444	0,441
19	0,946	0,945	0,944	0,943	0,942	0,941	64	0,438	0,436	0,433	0,431	0,428	0,425
20	0,940	0,939	0,938	0,937	0,936	0,935	65	0,423	0,420	0,417	0,415	0,412	0,409
21	0,934	0,933	0,931	0,930	0,929	0,928	66	0,407	0,404	0,401	0,399	0,396	0,393
22	0,927	0,926	0,925	0,924	0,923	0,922	67	0,391	0,388	0,385	0,383	0,380	0,377
23	0,921	0,919	0,918	0,917	0,916	0,915	68	0,375	0,372	0,369	0,367	0,364	0,361
24	0,914	0,912	0,911	0,910	0,909	0,908	69	0,358	0,356	0,353	0,350	0,347	0,345
25	0,906	0,905	0,904	0,903	0,901	0,900	70	0,342	0,339	0,337	0,334	0,331	0,329
26	0,899	0,898	0,896	0,895	0,894	0,892	71	0,326	0,323	0,320	0,317	0,315	0,312
27	0,891	0,890	0,888	0,887	0,886	0,884	72	0,309	0,306	0,303	0,301	0,298	0,295
28	0,883	0,882	0,880	0,879	0,877	0,876	73	0,292	0,290	0,287	0,284	0,281	0,278
29	0,875	0,873	0,872	0,870	0,869	0,867	74	0,276	0,273	0,270	0,267	0,264	0,262
30	0,866	0,865	0,863	0,862	0,860	0,859	75	0,259	0,256	0,253	0,250	0,248	0,245
31	0,857	0,856	0,854	0,853	0,851	0,850	76	0,242	0,239	0,236	0,233	0,231	0,228
32	0,848	0,847	0,845	0,843	0,842	0,840	77	0,225	0,222	0,219	0,216	0,214	0,211
33	0,839	0,837	0,835	0,834	0,832	0,831	78	0,208	0,205	0,202	0,199	0,197	0,194
34	0,829	0,827	0,826	0,824	0,822	0,821	79	0,191	0,188	0,185	0,182	0,179	0,177
35	0,819	0,817	0,816	0,814	0,812	0,811	80	0,174	0,171	0,168	0,165	0,162	0,159
36	0,809	0,807	0,806	0,804	0,802	0,800	81	0,156	0,154	0,151	0,148	0,145	0,142
37	0,799	0,797	0,795	0,793	0,792	0,790	82	0,139	0,136	0,133	0,131	0,128	0,125
38	0,788	0,786	0,784	0,783	0,781	0,779	83	0,122	0,119	0,116	0,113	0,110	0,107
39	0,777	0,775	0,773	0,772	0,770	0,768	84	0,105	0,102	0,099	0,096	0,093	0,090
40	0,766	0,764	0,762	0,760	0,759	0,757	85	0,087	0,084	0,081	0,078	0,076	0,073
41	0,755	0,753	0,751	0,749	0,747	0,745	86	0,070	0,067	0,064	0,061	0,058	0,055
42	0,743	0,741	0,739	0,737	0,735	0,733	87	0,052	0,049	0,047	0,044	0,041	0,038
43	0,731	0,729	0,727	0,725	0,723	0,721	88	0,035	0,032	0,029	0,026	0,023	0,020
44	0,719	0,717	0,715	0,713	0,711	0,709	89	0,017	0,015	0,012	0,009	0,006	0,003

Έφαπτόμενες όξειών γωνιών.

Μοίρες							Μοίρες						
	0'	10'	20'	30'	40'	50'		0'	10'	20'	30'	40'	50'
0	0,000	0,003	0,006	0,009	0,012	0,015	45	1,000	1,006	1,012	1,018	1,024	1,030
1	0,017	0,020	0,023	0,026	0,029	0,032	46	1,036	1,042	1,048	1,054	1,060	1,066
2	0,035	0,038	0,041	0,044	0,047	0,049	47	1,072	1,079	1,085	1,091	1,098	1,104
3	0,052	0,055	0,058	0,061	0,064	0,067	48	1,111	1,117	1,124	1,130	1,137	1,144
4	0,070	0,073	0,076	0,079	0,082	0,085	49	1,150	1,157	1,164	1,171	1,178	1,185
5	0,087	0,090	0,093	0,096	0,099	0,102	50	1,192	1,199	1,206	1,213	1,220	1,228
6	0,105	0,108	0,111	0,114	0,117	0,120	51	1,235	1,242	1,250	1,257	1,265	1,272
7	0,123	0,126	0,129	0,132	0,135	0,138	52	1,280	1,288	1,295	1,303	1,311	1,319
8	0,141	0,144	0,146	0,149	0,152	0,155	53	1,327	1,335	1,343	1,351	1,360	1,368
9	0,158	0,161	0,164	0,167	0,170	0,173	54	1,376	1,385	1,393	1,402	1,411	1,419
10	0,176	0,179	0,182	0,185	0,188	0,191	55	1,428	1,437	1,446	1,455	1,464	1,473
11	0,194	0,197	0,200	0,203	0,206	0,210	56	1,483	1,492	1,501	1,511	1,520	1,530
12	0,213	0,216	0,219	0,222	0,225	0,228	57	1,540	1,550	1,560	1,570	1,580	1,590
13	0,231	0,234	0,237	0,240	0,243	0,246	58	1,600	1,611	1,621	1,632	1,643	1,653
14	0,249	0,252	0,256	0,259	0,262	0,265	59	1,664	1,675	1,686	1,698	1,709	1,720
15	0,268	0,271	0,274	0,277	0,280	0,284	60	1,732	1,744	1,756	1,767	1,780	1,792
16	0,287	0,290	0,293	0,296	0,299	0,303	61	1,804	1,816	1,829	1,842	1,855	1,868
17	0,306	0,309	0,312	0,315	0,318	0,322	62	1,881	1,894	1,907	1,921	1,935	1,949
18	0,325	0,328	0,331	0,335	0,338	0,341	63	1,963	1,977	1,991	2,006	2,020	2,035
19	0,344	0,348	0,351	0,354	0,357	0,361	64	2,050	2,066	2,081	2,097	2,112	2,128
20	0,364	0,367	0,371	0,374	0,377	0,381	65	2,145	2,161	2,177	2,194	2,211	2,229
21	0,384	0,387	0,391	0,394	0,397	0,401	66	2,246	2,264	2,282	2,300	2,318	2,337
22	0,404	0,407	0,411	0,414	0,418	0,421	67	2,356	2,375	2,394	2,414	2,434	2,455
23	0,424	0,428	0,431	0,435	0,438	0,442	68	2,475	2,496	2,517	2,539	2,560	2,583
24	0,445	0,449	0,452	0,456	0,459	0,463	69	2,605	2,628	2,651	2,675	2,699	2,723
25	0,466	0,470	0,473	0,477	0,481	0,484	70	2,747	2,773	2,798	2,824	2,850	2,877
26	0,488	0,491	0,495	0,499	0,502	0,506	71	2,904	2,932	2,960	2,989	3,018	3,047
27	0,510	0,513	0,517	0,521	0,524	0,528	72	3,078	3,108	3,140	3,172	3,204	3,237
28	0,532	0,535	0,539	0,543	0,547	0,551	73	3,271	3,305	3,340	3,376	3,412	3,450
29	0,554	0,558	0,562	0,566	0,570	0,573	74	3,487	3,526	3,566	3,606	3,647	3,689
30	0,577	0,581	0,585	0,589	0,593	0,597	75	3,732	3,776	3,821	3,867	3,914	3,962
31	0,601	0,605	0,609	0,613	0,617	0,621	76	4,011	4,061	4,113	4,165	4,219	4,275
32	0,625	0,629	0,633	0,637	0,641	0,645	77	4,331	4,390	4,449	4,511	4,574	4,638
33	0,649	0,654	0,658	0,662	0,666	0,670	78	4,705	4,773	4,843	4,915	4,989	5,066
34	0,675	0,679	0,683	0,687	0,692	0,696	79	5,145	5,226	5,309	5,396	5,485	5,576
35	0,700	0,705	0,709	0,713	0,718	0,722	80	5,671	5,769	5,871	5,976	6,084	6,197
36	0,727	0,731	0,735	0,740	0,744	0,749	81	6,314	6,435	6,561	6,691	6,827	6,968
37	0,754	0,758	0,763	0,767	0,772	0,777	82	7,115	7,269	7,429	7,596	7,770	7,953
38	0,781	0,786	0,791	0,795	0,800	0,805	83	8,144	8,345	8,556	8,777	9,010	9,255
39	0,810	0,815	0,819	0,824	0,829	0,834	84	9,514	9,788	10,08	10,39	10,71	11,06
40	0,839	0,844	0,849	0,854	0,859	0,864	85	11,43	11,83	12,25	12,71	13,20	13,73
41	0,869	0,874	0,880	0,885	0,890	0,895	86	14,30	14,92	15,60	16,35	17,17	18,07
42	0,900	0,906	0,911	0,916	0,922	0,927	87	19,08	20,21	21,47	22,90	24,54	26,43
43	0,933	0,938	0,943	0,949	0,955	0,960	88	28,64	31,24	34,37	38,19	42,96	49,10
44	0,966	0,971	0,977	0,983	0,988	0,994	89	57,29	68,75	85,94	114,6	171,9	248,8

Τριγωνομετρικές συναρτήσεις

Γωνία εις :		ημ	συν	εφ	σφ
άκτινια	μοίρας				
0,00	0,0	0,00	1,00	0,00	*
0,09	5,0	0,087	0,996	0,087	11,4
0,10	5,7	0,10	0,995	0,10	10,0
0,17	10,0	0,17	0,98	0,18	5,7
0,20	11,5	0,20	0,98	0,20	4,9
0,26	15,0	0,26	0,97	0,27	3,7
0,30	17,2	0,30	0,96	0,31	3,2
0,35	20,0	0,34	0,94	0,36	2,7
0,40	22,9	0,39	0,92	0,42	2,4
0,44	25,0	0,42	0,91	0,47	2,1
0,50	28,6	0,48	0,88	0,55	1,8
0,52 (π 6)	30,0	0,50	0,87	0,58	1,7
0,60	34,4	0,56	0,83	0,68	1,5
0,61	35,0	0,57	0,82	0,70	1,4
0,70	40,1	0,64	0,76	0,84	1,2
0,78 (π 4)	45,0	0,71	0,71	1,00	1,00
0,80	45,8	0,72	0,70	1,0	0,97
0,87	50,0	0,77	0,64	1,2	0,84
0,90	51,6	0,78	0,62	1,3	0,79
0,96	55,0	0,82	0,57	1,4	0,70
1,00	57,3	0,84	0,54	1,6	0,64
1,08 (π 3)	60,0	0,87	0,50	1,7	0,58
1,10	63,0	0,89	0,45	2,0	0,51
1,13	65,0	0,91	0,42	2,1	0,47
1,20	68,7	0,93	0,36	2,6	0,39
1,22	70,0	0,94	0,34	2,8	0,37
1,30	74,5	0,96	0,27	3,6	0,28
1,40	80,2	0,985	0,17	5,8	0,17
1,48	85,0	0,996	0,09	11,4	0,09
1,50	85,9	0,998	0,07	14,1	0,07
1,57 (π/2)	90,0	1,00	0,00	*	0,00

* δέν όρίζεται

Κρατικά Παιδείας - Δείκτης Γραμματισμού

Χώρα	Ν	Μ	Δ	Σ	Α	Β	Γ	Δ	Σ
Διασ. Γραμματισμός - Εκπαιδευόμενοι									
1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
11	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
12	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
13	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
14	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
16	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
17	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
19	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
20	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
21	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
22	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
23	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
24	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
25	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
26	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
27	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
28	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
29	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
30	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
31	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
32	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
33	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
34	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
35	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
36	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
37	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
38	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
39	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
40	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
41	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
42	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
43	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
44	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ

	Σελίδα
Πρόταση — Σταθερά και μεταβλητή — Προτασιακός τύπος — 'Ασκήσεις (1 - 11) .	5 - 9
Ποσοδείκτες — 'Ασκήσεις (12 - 13)	9 - 11
Σύνθετες προτάσεις — Σύζευξη δύο προτάσεων — Πίνακες αλήθειας — Διάζευξη δύο προτάσεων — 'Ασκήσεις (14 - 20)	11 - 16
'Αρνηση — "Αρνηση μιᾶς συζεύξεως — 'Η ἄρνηση μιᾶς διαζεύξεως — 'Ασκήσεις (21 - 23)	16 - 19
Τί είναι απόδειξη — Πίνακας αλήθειας τῆς συνεπαγωγῆς — Συνεπαγωγή δύο ἀνοικτῶν προτάσεων — 'Ασκήσεις (24 - 33)	19 - 22
'Η ἀντίστροφη καὶ ἡ ἀντίθετη μιᾶς συνεπαγωγῆς — 'Η ἰσοδυναμία δύο προτά- σεων — 'Ισοδυναμία ἀνοικτῶν προτάσεων — 'Ασκήσεις (34 - 37)	22 - 26
'Η ἀντιστροφoαντίθετη μιᾶς συνεπαγωγῆς — 'Ασκήσεις (38 - 43)	27 - 29
Θεωρήματα καὶ ἀποδείξεις — 'Ασκήσεις (44 - 57)	29 - 31
Ταυτολογία — 'Αντίφαση — 'Ασκήσεις (58 - 65)	31 - 34
Τύποι ἀληθείς κατὰ συγκυρία — 'Ασκήσεις (66 - 70)	34 - 35

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΣΥΝΟΛΑ

'Η ἔννοια τοῦ συνόλου. Συμβολισμοί — 'Υποσύνολο — 'Ισα σύνολα — Δυναμοσύνολο συνόλου — Διαγράμματα τοῦ Venn — 'Ασκήσεις (71 - 82)	36 - 39
Πράξεις μεταξύ συνόλων ('Ενωση, τομή, διαφορά, συμπλήρωμα) — 'Ασκήσεις (83 - 97)	39 - 42
Καρτεσιανό γινόμενο συνόλου A ἐπὶ σύνολο B — 'Ασκήσεις (98 - 100)	42 - 43

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ

'Ορθογώνιο καὶ πλαγιογώνιο σύστημα ἀναφορᾶς — Καθορισμός τῆς θέσεως ἑφαρ. διανύσματος στό ἐπίπεδο — 'Ισα ἑφαρμοστά διανύσματα. 'Αντίθετα δια- νύσματα — Μῆκος ἑφαρμοστοῦ διανύσματος — 'Ασκήσεις (101 - 107)	44 - 51
--	---------

Τό ελεύθερο διάνυσμα στο επίπεδο — Μήκος ελεύθερου διανύσματος — Συντεταγμένες ελεύθερου διανύσματος — Η Ισότητα στο \mathcal{D}_0 — Αντίθετα διανύσματα στο \mathcal{D}_0 — Πράξεις στο σύνολο \mathcal{D}_0 , των ελεύθερων διανυσμάτων — Άσκήσεις (105 - 108)	Σελίδα 51 - 55
Γινόμενο διανύσματος με πραγμ. αριθμό — Άσκήσεις (109 - 111)	56 - 58
Συνθήκη παραλληλίας και συνθήκη καθετότητας. Βάσεις δύο διανυσμάτων — Διανυσματική Ισότητα του Chasles — Διανυσματική εξίσωση ευθείας — Διευθύνον διάνυσμα ευθείας — Άσκήσεις (112 - 116)	58 - 65

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΛΥΩΝΥΜΩΝ ΣΕ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

Όρισμός — Ανάλυση, παραστάσεων σε γινόμενο — Άσκήσεις (117 - 120)	66 - 73
---	---------

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ

Όρισμός ταυτότητας — Επαλήθευση μιᾶς ταυτότητας — Άξιοσημείωτες ταυτότητες — Ταυτότητες με συνθήκες — Άσκήσεις (121 - 145)	74 - 81
--	---------

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΡΗΤΑ ΑΛΓΕΒΡΙΚΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ

Έννοια αλγεβρικού κλάσματος — Ειδικές μορφές του ἄλγ. κλάσματος $\psi = \varphi_1/\varphi_2$ — Λογισμός τῶν ρητῶν ἄλγ. κλασμάτων — Σύνθετα κλάσματα — Άσκήσεις (146 - 163)	82 - 88
--	---------

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ α' ΒΑΘΜΟΥ

Όρισμοί και ιδιότητες — Μέθοδοι επίλυσεως — Μέθοδος τῶν ὀριζουσῶν — Κανόνας τοῦ Cramer — Άσκήσεις (164 - 173)	89 - 96
Ἐπίλυση συστημάτων α' βαθμοῦ ειδικῆς μορφῆς με ειδικές μεθόδους — Άσκήσεις (174 - 176)	96 - 101
Ἐξισώσεις συμβιβαστές — Απαλείφουσα συστήματος — Άσκήσεις (177 - 182) ..	101 - 104
Ὁμογενῆ γραμμικά συστήματα — Ἰκανές και ἀναγκαίαι συνθήκες γιά νά ἔχει τό ὁμογενές γραμμικό σύστημα ἀπειρες σε πλῆθος λύσεις — Άσκήσεις (183 - 197)	104 - 109

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΑΣΥΜΜΕΤΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ – ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

*Ασύμμετροι αριθμοί – Χρήσιμες προτάσεις – Πραγματικοί αριθμοί – *Η Ισότητα στο \mathbb{R} – Πράξεις και διάταξη στο \mathbb{R} – *Η γεωμετρική εικόνα του συνόλου \mathbb{R} – *Απόλυτη τιμή πραγμ. αριθμού – Βασικές Ιδιότητες τών απόλυτων τιμών – *Ασκήσεις (198 - 216)	Σελίδα 110 - 118
---	---------------------

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX

ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ α' ΒΑΘΜΟΥ

*Ορισμοί – *Ακέραιες λύσεις τής $ax + by = \gamma$ – *Ακέραιες λύσεις συστήματος α' βαθμού δύο εξισώσεων με τρεις αγνώστους – *Ασκήσεις (217 - 226)	119 - 125
--	-----------

ΚΕΦΑΛΑΙΟ X

ΠΕΡΙ ΡΙΖΩΝ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

*Ορισμοί – *Ιδιότητες τών ριζών – Πράξεις με άρρητες παραστάσεις – Τροπή κλάσματος με άρρητο παρονομαστή σε Ισοδύναμο με ρητό παρονομαστή – Δυνάμεις με ρητό εκθέτη – *Ιδιότητες τών δυνάμεων με ρητούς εκθέτες – *Ασκήσεις (227 - 244)	126 - 139
---	-----------

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XI

ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

*Ανάγκη εισαγωγής νέου συστήματος αριθμών – Φανταστικοί αριθμοί. *Ιρισμοί – Μιγαδικοί αριθμοί. *Ορισμοί – Πράξεις με μιγαδικούς αριθμούς – *Ορισμένες βασικές Ιδιότητες του μέτρου – Γραφική παράσταση μιγαδ. αριθμών – Γραφική παράσταση του άθροίσματος και τής διαφοράς δύο μιγαδικών αριθμών – *Ασκήσεις (245 - 282)	140 - 152
--	-----------

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XII

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ β' ΒΑΘΜΟΥ

*Ορισμοί, Ιδιότητες – *Ορισμός και επίλυση εξισώσεως β' βαθμού – Είδος τών ριζών τής εξίσ. $ax^2 + bx + \gamma = 0$ – Σύγκριση τών πραγμ. ριζών τής εξίσ. $ax^2 + bx + \gamma = 0$ – Είδος τών ριζών του $f(x) = ax^2 + bx + \gamma$ – *Ασκήσεις (283 - 297)	153 - 163
Συμμετρικές παραστάσεις τών ριζών τής $ax^2 + bx + \gamma = 0$ και εκφράσεις τους με τά $a, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ – Εφαρμογές – *Υπολογισμός του άθροίσματος τών όμοιων δυνάμεων τών ριζών τής $ax^2 + bx + \gamma = 0$ – *Ασκήσεις (298 - 312)	163 - 168
Σημείο τών ριζών του $ax^2 + bx + \gamma$ – *Ασκήσεις (313 - 316)	168 - 171
Μετασχηματισμός του $ax^2 + bx + \gamma$ σε γινόμενο πρωτοβάθμιων ως προς x παγόντων – Σχηματισμός τής δευτεροβάθμιας εξισώσεως από τις ρίζες τής – *Ασκήσεις (317 - 319)	171 - 172
Ειδικές μορφές του $ax^2 + bx + \gamma$ στο \mathbb{R} – *Ασκήσεις (320 - 321)	172 - 173
Σημείο τής αριθμ. τιμής του $ax^2 + bx + \gamma$ για τίς διάφορες προγματικές τιμές του x – *Ασκήσεις (322-326)	173 - 176

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XIII

ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ Β' ΒΑΘΜΟΥ ΜΕ ΕΝΑΝ ΑΓΝΩΣΤΟ

	Σελίδα
'Ορισμοί —'Ορισμός και επίλυση δευτεροβάθμιας ανίσωσης —'Ανισώσεις βαθμού άνωτερου από τό δεύτερο — Κλασματικές ανίσώσεις — Συστήματα ανισώ- σεων β' βαθμού —'Ασκήσεις (327 - 332)	177 - 182
Θέσεις πραγμ. αριθμού σέ σχέση μέ τίς πραγμ. ρίζες του $ax^2 + bx + \gamma$ —'Ασκή- σεις (333 - 338)	182 - 184
Διερεύνηση παραμετρικών εξισώσεων β' βαθμού — Διερεύνηση παραμετρικών άνισώσεων β' βαθμού —'Ασκήσεις (339 - 341)	185 - 187
Σχέσεις συντελεστών δύο δευτεροβάθμιων εξισώσεων, ώστε οι ρίζες τους νά έπα- ληθεύουν όρισμένες συνθήκες —'Ασκήσεις (342 - 344)	187 - 189
'Απαλείφουσα δύο τριωνύμων β' βαθμού —'Ασκήσεις (345 - 350)	189 - 191
Τό τριώνυμο $ax^2 + bx + \gamma$ ως συνάρτηση του x στό \mathbf{R} — Βασικές έννοιες τών συναρτήσεων μιās μεταβλητής στό \mathbf{R} —'Η συνάρτηση $\varphi(x) = ax^2 +$ $+ bx + \gamma$ στό \mathbf{R} (μεταβολές της) —'Ασκήσεις (351 - 354)	192 - 196
Γραφική παράσταση τών συναρτήσεων $y = ax + \beta$ και $y = ax^2 + bx + \gamma$ — 'Ασκήσεις (355 - 361)	196 - 199
'Ασκήσεως επαναλήψεως γιά τά κεφ. XII και XIII (362 - 390)	200 - 201

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XIV

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ Β' ΒΑΘΜΟΥ

Διτετράγωνες εξισώσεις (όρισμός, επίλυση) — Μετασχηματισμός σέ γινόμενο πα- ραγόντων του διτετράγωνου τριωνύμου $\varphi(x) = ax^4 + bx^3 + \gamma$ —'Ασκή- σεις (391 - 398)	202 - 204
Μετασχηματισμός διπλών ριζικών σέ άπλά —'Ασκήσεις (399 - 402)	205 - 206
'Αντίστροφες εξισώσεις (όρισμός, επίλυση) —'Ασκήσεις (403 - 406)	207 - 209
Διώνυμες εξισώσεις — Τριώνυμες εξισώσεις —'Ασκήσεις (407 - 408)	210 - 212
'Εξισώσεις μέ ριζικά —'Εξισώσεις μέ τετραγωνικά ριζικά —'Εξισώσεις μέ ριζικά μεγαλυτέρων τάσεων —'Ασκήσεις (409 - 411)	212 - 217
'Απλά συστήματα μέ βαθμό άνωτερο από τόν πρώτο — Συστήματα δύο εξισώ- σεων μέ δύο άγνωστούς — Συστήματα μέ περισσότερες από δύο εξισώ- σεις —'Ασκήσεις (412 - 414)	217 - 224
Προβλήματα που λύνονται μέ τή βοήθεια εξισώσεων β' βαθμού και συστημάτων άνωτερου από τόν α' βαθμό —'Ασκήσεις (415 - 429)	224 - 228
'Ασκήσεις επαναλήψεως γιά τό κεφ. XIV (430 - 441)	228

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XV

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Σκοπός τής Στατιστικής — Παρουσίαση στατιστικών στοιχείων — Πίνακες — Κεν- τρικές τιμές — Διασπορά — Τυπική απόκλιση — Διάγραμμα διασποράς — 'Η έννοια τής συσχέτισεως —'Ασκήσεις (442 - 459)	229 - 250
---	-----------

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XVI

ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ

Τό γεωμετρικό τόξο κύκλου καί ἡ γωνία. Μονάδες μετρήσεως — Προσανατολισμέ- νος κύκλος καί προσανατολισμένο τόξο — Ἀλγεβρική τιμὴ τριγωνομε- τρικοῦ τόξου — Τόξα πού ἔχουν κοινὴ ἀρχὴ καί κοινὸ πέρασ — Προσανα- τολισμένη γωνία. Ἀλγεβρική τιμὴ τῆς — Ἀθροισμα δύο ἢ περισσότερων προσανατολισμένων τόξων — Προσανατολισμένη γωνία σέ κανονικὴ θέση — Ἀσκήσεις (460 - 467)	σελίδα 251 - 259
Τριγωνομετρικὲς συναρτήσεις γωνιῶν — Ἀσκήσεις (468 - 477)	259 - 265
Τριγωνομετρικοὶ ἀριθμοὶ τῶν γωνιῶν 0° , 90° , 180° , 270° , 360° — Οἱ τριγωνομε- τρικοὶ ἀριθμοὶ τῶν γωνιῶν 45° , 60° , 30° —	265 - 268
Γεωμετρικὴ παράσταση τῶν τριγ/κῶν συναρτήσεων — Μεταβολὴ τῶν τριγ/κῶν συναρτήσεων — Γραφικὴ παράσταση τῶν τριγ/κῶν συναρτήσεων — Πε- ριοδικότητα τῶν τριγ/κῶν συναρτήσεων. Σημασία τῆς περιόδου	274 - 280
Θεμελιώδεις ταυτότητες τῶν τριγ/κῶν συναρτήσεων — Ἐφαρμογές — Ἀσκήσεις (478 - 503)	280 - 281
Ἀναγωγὴ σέ συναρτήσεις θετικῶν ὀξειῶν γωνιῶν — Γωνίες μὲ κοινὴ τελικὴ πλευ- ρά — Γωνίες ἀντίθετες	282 - 284
Γωνίες μὲ ἄθροισμα μιὰ πλήρη γωνία — Γωνίες παραπληρωματικὲς — Γωνίες συμπληρωματικὲς	285 - 286
Γωνίες μὲ διαφορά μιὰ ὀρθή γωνία — Γωνίες πού ἔχουν διαφορά μιὰ εὐθεία γωνία	287 - 288
Ἀναγωγὴ τριγ/κοῦ ἀριθμοῦ γωνίας σέ τριγ/κὸ ἀριθμὸ μὴ ἀρνητικῆς γωνίας μι- κρότερης τῶν 45° — Ἀσκήσεις (504 - 512)	288 - 292
Νόμος τῶν ἡμιτόνων — Νόμος τῶν συνημιτόνων — Ἐφαρμογές — Ἀσκήσεις (513 - 525)	293 - 297
Πίνακες τῶν φυσικῶν τριγ/κῶν ἀριθμῶν	

Το τρίγωνο ABC είναι ορθογώνιο στο B. Να βρεθεί το μήκος της υψομεινίδας BH, αν AB = 3 cm, BC = 4 cm.

Λύση: Επειδή το τρίγωνο ABC είναι ορθογώνιο στο B, έχουμε $AC^2 = AB^2 + BC^2$. Άρα $AC^2 = 3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25$, οπότε $AC = 5$ cm.

Επίσης, το τρίγωνο ABC είναι ομοίωμα με το τρίγωνο BHC (από το κριτήριο των ορθογώνιων τριγώνων). Άρα $\frac{BH}{BC} = \frac{AB}{AC}$, δηλαδή $\frac{BH}{4} = \frac{3}{5}$. Άρα $BH = \frac{12}{5} = 2,4$ cm.

Επίσης, το τρίγωνο ABC είναι ομοίωμα με το τρίγωνο ABH (από το κριτήριο των ορθογώνιων τριγώνων). Άρα $\frac{BH}{AB} = \frac{BC}{AC}$, δηλαδή $\frac{BH}{3} = \frac{4}{5}$. Άρα $BH = \frac{12}{5} = 2,4$ cm.

Άρα, το μήκος της υψομεινίδας BH είναι $2,4$ cm.



024000029775

ΕΚΔΟΣΗ Θ', 1977 (X) — ΑΝΤΙΤΥΠΗ 98.000 — ΣΥΜΒΑΣΗ: 2883/13-7-77

ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ :
«ΑΤΛΑΝΤΙΣ - Μ. ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ» Α.Ε.

