

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Δ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

(ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΣ)

ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

Θ. ΒΑΒΑΛΕΤΣΚΟΥ — Γ. ΜΠΟΥΣΓΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΑΘΗΝΑΙ 1975

49726

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΗΜΕΥΜΑΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ

ΙΩΒΕΤΙΚΗΣ ΛΑΤΕΡΙΤΙΟΥ ΝΟΣΟΥ

ΤΟΜΟΣ ΠΡΑΤΟΣ

Ε. ΙΑΝΝΑΚΕΠΟΥ - Β. ΑΠΟΥΖΙΔΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΛΩΡΕΑΝ

ΑΓΙΤΑΜΗΘΑΝ

ΖΩΦΕΑΝ

ΜΟΣΧΑΝΙΚΗΝ ΜΕ ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΗΝΕΣ ΜΟΣΧΗΟΥ

Α Ζ Ι Τ Α Μ Η Θ Α Μ
Υ Ο Κ Α Η Μ Υ Τ Δ
Ι Ο Σ Τ Κ Α Λ Σ Υ Τ Υ Β Υ Τ Ω Ω
Ζ Ο Τ Ο Π Ζ Ο Μ Ο Τ

Υ Ο Σ Τ Κ Α Η Μ Υ Τ Δ — Υ Ο Σ Τ Κ Α Β Α Ζ . Θ

Ι Ο Ρ Α Ν Ι Ζ Ε Β Υ Τ Υ Β Υ Τ Ω Ω Ζ Ε Κ Α Ζ Τ Κ Α Δ Α Ζ Ε Β Υ Ι Ζ Ι

* Η συγγραφή τοῦ παρόντος τόμου ἐγένετο ὡς ἔξῆς :
ὑπὸ Θ. Βαβαλέτσκου : Κεφάλαια IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV.
ὑπὸ Γ. Μπούσγου : Κεφάλαια I, II, III καὶ XVI.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ

1. ΠΡΟΤΑΣΙΣ.

«Η μεταξύ τῶν ἀνθρώπων συνεννόησις γίνεται μὲν προφορικὸν ἡ γραπτὸν λόγον. Εἰς τὴν Γραμματικὴν καὶ τὸ Συντακτικὸν «λόγος συντομώτατος μὲν ἐντελῆς ἀπλοῦν περιεχόμενον» λέγεται πρότασις.

Εἰς τὴν Μαθηματικὴν Λογικὴν καὶ τὰ Μαθηματικά ἐν γένει θεωροῦμεν τὰς λεγομένας λογικὰς προτάσεις, ἷτοι προτάσεις δι’ ἑκάστην τῶν ὅποιων δυνάμεθα κατὰ ἓνα ἀκριβῶς τρόπον νὰ ἀποφανθῶμεν ὅτι, ἐκεῖνο τὸ ὅποιον αὗτη ἔκφράζει, εἴναι ἀληθὲς ἡ ψευδές ἀποκλείοντες ἄλλην περίπτωσιν. Οὕτω, π.χ., ἡ πρότασις :

«ὁ ἀριθμὸς 4 εἶναι ἄρτιος» (1)

εἴναι μία λογική πρότασις, διότι ἐκεῖνο τὸ ὅποιον αὗτη ἔκφράζει εἴναι ἀληθές.

«Ἡ πρότασις :

«ὁ ἀριθμὸς 5 εἶναι ἀρνητικός» (2)

εἴναι μία λογική πρότασις, διότι ἐκεῖνο τὸ ὅποιον αὗτη ἔκφράζει εἴναι ψευδές.

Αἱ ἀνωτέρω προτάσεις (1) καὶ (2) θεωροῦνται ως ἀπλαῖ προτάσεις, καθόσον δὲν δύνανται νὰ χωρισθοῦν εἰς δύο ἡ περισσοτέρας ἄλλας προτάσεις. Τούναντίον ἡ πρότασις :

«Οἱ ἀριθμοὶ 2 καὶ 11 εἶναι πρῶτοι», (3)

ἡ δύοις χαρακτηρίζεται ως ἀληθής (εἴναι δηλ. λογική πρότασις), χωρίζεται εἰς δύο ἄλλας, ἷτοι :

«ὁ ἀριθμὸς 2 εἶναι πρῶτος» καὶ «ὁ ἀριθμὸς 11 εἶναι πρῶτος».

Δι’ αὐτὸν ἡ πρότασις (3) λέγεται σύνθετος πρότασις.

Κατὰ τὰ ἀνωτέρω εἰς τὴν Μαθηματικὴν Λογικὴν δεχόμεθα ὅτι :

1) ὑπάρχει ἔν σύνολον ἀπλῶν λογικῶν προτάσεων (τὸ σύνολον τοῦτο συμβολίζομεν μὲν L).

2) εἰς ἑκάστην πρότασιν ἐκ τοῦ L δυνάμεθα νὰ ἀντιστοιχίσωμεν ἀναλόγως τοῦ περιεχομένου της ἔνα καὶ μόνον ἔνα ἐκ τῶν χαρακτηρισμῶν : ἀληθής ἡ ψευδής.

Παραδείγματα προτάσεων τοῦ συνόλου L :

1. «Τὸ ἄθροισμα τῶν ἐσωτερικῶν γωνιῶν παντὸς τριγώνου εἶναι ἵσον πρὸς μίαν εὐθεῖαν - γωνίαν» (ἀληθής).

2. « $4 + 2 = 7$ » (ψευδής)

Παραδείγματα προτάσεων, αἱ ὅποιαι δὲν ἀνήκουν εἰς τὸ L :

1. «τὰ Μαθηματικά εἶναι πράσινα» (παραλογισμός)

2. «ἐν τρίγωνον ἀποτελεῖται ἐκ τριῶν γραμμῶν» (ἀσαφής)

3. « $x + 10 = 0$ » (δὲν δυνάμεθα νὰ ἀποφανθῶμεν ἂν εἶναι ἀληθής ή ψευδής).

“Οταν τὸ περιεχόμενον μιᾶς προτάσεως εἶναι ἀληθές, τότε λέγομεν ὅτι ἡ πρότασις ἔχει λογικὴν τιμὴν A η τιμὴν ἀληθείας A .

“Οταν τὸ περιεχόμενον μιᾶς προτάσεως εἶναι ψευδές, τότε λέγομεν ὅτι ἡ πρότασις ἔχει λογικὴν τιμὴν Ψ η τιμὴν ἀληθείας Ψ .

Παραδείγματα :

1. ‘Η τιμὴ ἀληθείας τῆς προτάσεως «ὅ 5 εἶναι ἀρνητικὸς ἀριθμός» εἶναι Ψ .

2. ‘Η τιμὴ ἀληθείας τῆς προτάσεως «ὅ 3 εἶναι θετικὸς ἀριθμός» εἶναι A .

Τὰς προτάσεις τοῦ συνόλου L παριστάνομεν συνήθως μὲ τὰ γράμματα p, q, r κτλ. Γράφομεν, π.χ.,

p : «ὅ ἀριθμὸς 135 λήγει εἰς 5».

q : «ὅ ἀριθμὸς 125 εἶναι διαιρετὸς διὰ 5.

2. ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ.

‘Η διὰ τῆς γραφῆς συνεννόησις γίνεται μὲ τὴν βοήθειαν διαφόρων σημάτων, π.χ. γραμμάτων, λέξεων, φράσεων, προτάσεων, σημείων στίξεως, διαφόρων συμβατικῶν σημάτων (π.χ. IKA), εἰκόνων, διαγραμμάτων κ.ο.κ. Τὰ τοιαῦτα σήματα ὀνομάζομεν **σύμβολα**.

“Ἐν γράμμα, π.χ. τὸ x , εἶναι σύμβολον. Σύμβολα ἐπίστης εἶναι, π.χ., η λέξης «πέντε», τὸ «+», ο ἀριθμὸς 15, τὸ ἔρωτηματικὸν κ.τ.λ.

“Ἐν σύμβολον εἶναι δυνατὸν νὰ ἀποτελῇται ἀπὸ περισσότερα σήματα, καθὲν ἀπὸ τὰ ὅποια εἶναι ἐπίσης σύμβολον. Π.χ. $x + 5, \alpha^2 - \alpha\beta$. Συνήθως εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτήν τὸ σύμβολον τὸ ὀνομάζομεν **ἔκφρασιν**.

Μέσα εἰς τὰς προτάσεις καὶ γενικώτερον εἰς τὰς ἔκφρασεις, ίδιως εἰς τὰ Μαθηματικά, εύρισκομεν ὅρους η σύμβολα, ὅπως π.χ. «ἄθροισμα», «τρίγωνον», «-8», «+ 12», «0» καὶ ἄλλα παρόμοια, τὰ ὅποια ἔχουν μίαν καθωρισμένην καὶ μόνιμον σημασίαν εἰς τὸ θέμα, τὸ ὅποιον ἔξετάζομεν. Τὰ τοιαῦτα σύμβολα ὀνομάζονται **σταθεραί**.

“Ημπορεῖ ὅμως εἰς μίαν ἔκφρασιν νὰ ὑπάρχῃ σύμβολον, τὸ ὅποιον δὲν ἔχει μόνιμον καὶ καθωρισμένην σημασίαν εἰς τὴν ἔκφρασιν αὐτήν. Π.χ. εἰς τὴν ἔκφρασιν «ὅ x εἶναι μικρότερος τοῦ 5» τὸ σύμβολον x δὲν ἔχει μόνιμον καὶ καθωρισμένην σημασίαν. Δὲν εἶναι δηλ. τὸ x ὀνοματα ἐνὸς ὀρισμένου ἀριθμοῦ. Ἐὰν ὅμως εἰς τὴν θέσιν τοῦ x τεθῇ ἔνας ὅποιοσδήποτε φυσικὸς ἀριθμὸς η ἔνας πραγματικὸς ἀριθμός, τότε προκύπτει πρότασις (ἀληθής η ψευδής). Τὸ ίδιον συμβαίνει εἰς

τὴν ἔκφρασιν $2x = 4$. Όμοίως εἰς τὴν ἔκφρασιν $x > \psi$. Τὰ τοιαῦτα σύμβολα δύνομάζομεν μεταβλητάς.

3. ΠΡΟΤΑΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ (Η ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΤΑΣΙΣ).

A) "Ας ἔξετάσωμεν πάλιν τὴν ἔκφρασιν :

"οὐχ εἶναι μικρότερος τοῦ 5"

"Η ἔκφρασις αὗτη δὲν εἶναι πρότασις, διότι δὲν δυνάμεθα ν' ἀποφανθῶμεν ἂν εἴναι ἡ μόνον ἀληθής ἡ μόνον ψευδής.

Παρατηροῦμεν ὅμως ὅτι αὕτη γίνεται πρότασις, ἂν εἰς τὴν θέσιν τῆς μεταβλητῆς x τοποθετήσωμεν ἕνα οἰουδήποτε πραγματικὸν ἀριθμόν. "Αν, π.χ., ἀντικαταστήσωμεν τὸ x διὰ τοῦ 2, θὰ προκύψῃ ἡ πρότασις «οὐχ εἶναι μικρότερος τοῦ 5», ἡ ὁποία εἶναι ἀληθής πρότασις. "Αν ἀντικαταστήσωμεν τὸ x διὰ τοῦ 7, θὰ προκύψῃ πάλιν πρότασις «οὐχ εἶναι μικρότερος τοῦ 5», ἡ ὁποία ὅμως εἴναι ψευδής.

"Ας ἔξετάσωμεν ἀκόμη τὴν ἔκφρασιν :

$$2x = 4$$

"Η ἔκφρασις αὗτῇ ἡμπορεῖ νὰ ἀποβῇ πρότασις, ἂν τὸ x ἀντικατασταθῇ μὲν ἕνα πραγματικὸν ἀριθμόν, π.χ. τὸν 3, ὅποτε γίνεται $2 \cdot 3 = 4$, ἡ ὁποία εἶναι πρότασις ψευδής. "Η ίδια ἔκφρασις γίνεται ἀληθής πρότασις, ἂν ἡ μεταβλητὴ x ἀντικατασταθῇ διὰ τοῦ 2.

Αἱ ἔκφρασεις «οὐχ εἶναι μικρότερος τοῦ 5», « $2x = 4$ », κ.τ.λ. δύνομάζονται προτασιακοὶ τύποι ἡ ἀνοικταὶ προτάσεις.

Γενικῶς : Προτασιακὸς τύπος (ἡ ἀνοικτὴ πρότασις) μιᾶς μεταβλητῆς λέγεται κάθε ἔκφρασις, ἡ ὁποία περιέχει μίαν μόνον μεταβλητὴν καὶ ἡ ὁποία μετατρέπεται εἰς πρότασιν, διανοούμενη μεταβλητὴ ἀντικατασταθῆ ἀπὸ τυχὸν στοιχείον ἐνὸς καθωρισμένου συνόλου.

Τὸ στοιχεῖον, τὸ ὁποῖον ἀντικαθιστᾶ τὴν μεταβλητήν, διὰ νὰ προκύψῃ πρότασις, λέγεται τιμὴ τῆς μεταβλητῆς. Τὸ σύνολον τῶν τιμῶν τῆς μεταβλητῆς λέγεται σύνολον ἀναφορᾶς τῆς μεταβλητῆς τοῦ προτασιακοῦ τύπου. Τοῦτο συμβολίζεται συνήθως μὲν U . Π.χ. εἰς τὸν προτασιακὸν τύπον $2x > 3$, ἡμποροῦμεν νὰ λάβωμεν ὡς σύνολον ἀναφορᾶς U τὸ σύνολον τῶν πραγματικῶν ἀριθμῶν τότε, ἡ τιμὴ τῆς μεταβλητῆς x εἶναι ἀριθμὸς μεγαλύτερος τοῦ $1\frac{1}{2}$, θὰ προκύψῃ πρότασις ἀληθής, ἡ εἶναι ἵσος μὲν $1\frac{1}{2}$ ἡ μικρότερος τοῦ $1\frac{1}{2}$ θὰ προκύψῃ πρότασις ψευδής.

Τὸ σύνολον τῶν τιμῶν τῆς μεταβλητῆς, διὰ τὰς ὁποίας ἔνας προτασιακὸς τύπος γίνεται ἀληθής πρότασις, λέγεται σύνολον ἀληθείας τοῦ προτασιακοῦ τύπου. Εἰς τὸν προτασιακὸν τύπον, π.χ., $2x = 4$, ἡ τιμὴ τῆς μεταβλητῆς τότε τὸ σύνολον ἀναφορᾶς τὸ σύνολον R , τῶν πραγματικῶν ἀριθμῶν, διὰ τὰς τιμὰς της ἀληθείας του εἶναι { 2 }.

Σημ. Είπομεν ότι συνήθως ή μεταβλητή x είναι στοιχείον ένός καθωρισμένου συνόλου, έστω U , τό διοτοίν ώνομάσαμεν σύνολον άναφορᾶς. Εις τὴν περίπτωσιν ταύτην ὁ προτασιακὸς τύπος λέγεται καὶ συνθήκη εἰς τὸ U καὶ λέγομεν ότι ή μεταβλητὴ x διατρέχει τὸ U .

Χάριν συντομίας τοὺς προτασιακοὺς τύπους μὲ μίαν μεταβλητήν, π.χ. x , τοὺς παριστάνομεν μὲ $p(x)$, $q(x)$, $s(x)$ κ.ο.κ. καὶ τὰ σύνολα ἀληθείας των ἀντιστοίχων μὲ P , Q , S κ.ο.κ.

"Αν π.χ. παραστήσωμεν μὲ $p(x)$ τὸν προτασιακὸν τύπον : $1 < x < 5$ καὶ λάβωμεν ὡς σύνολον άναφορᾶς τὸ N , τότε ή πρότασις $p(2)$ είναι ἀληθής, ἐνῶ ή $p(8)$ είναι ψευδής. Τὸ σύνολον ἀληθείας τοῦ $p(x)$ είναι $P = \{2, 3, 4\}$.

'Επίστης εἰς τὸν προτασιακὸν τύπον $q(x) : 4x = 20$ ἔχομεν ότι $q(5) = 4 \cdot 5 = 20$, δηλ. ἀληθής πρότασις, ἐνῶ $q(2) = 4 \cdot 2 = 8$, δηλ. ψευδής πρότασις. Σύνολον δὲ ἀληθείας του είναι τὸ σύνολον $Q = \{5\}$.

B) "Ας θεωρήσωμεν τώρα τὴν ἔκφρασιν $x > \psi$.

"Αν ἀντικαταστήσωμεν τὸ x μὲ 6 καὶ τὸ ψ μὲ 4 προκύπτει ή πρότασις $6 > 4$, ή ὅποια είναι ἀληθής. "Αν θέσωμεν $x = 3$ καὶ $\psi = 5$ προκύπτει ή ψευδής πρότασις $3 > 5$.

'Η ἔκφρασις $x > \psi$ λέγεται προτασιακὸς τύπος μὲ δύο μεταβλητάς.

Παρατηροῦμεν ἐδῶ ότι ὑπάρχουν ζεύγη τιμῶν τῶν μεταβλητῶν (ἀπὸ τὸ σύνολον R), διὰ τὰς ὅποιας ὁ προτασιακὸς τύπος γίνεται ἀληθής πρότασις καὶ ἄλλα ζεύγη τιμῶν, διὰ τὰς ὅποιας γίνεται ψευδής πρότασις.

"Ας θεωρήσωμεν ἀκόμη τὴν ἔκφρασιν

«ἡ πόλις x είναι πρωτεύουσα τοῦ κράτους ψ ».

"Αν ἀντὶ x θέσωμεν «'Αθῆναι» καὶ ἀντὶ ψ «'Ελλάς», προκύπτει ἀληθής πρότασις: «Ἡ πόλις Ἀθῆναι είναι πρωτεύουσα τοῦ κράτους 'Ελλάς». "Αν ἀντὶ x θέσωμεν «Μιλάνον» καὶ ἀντὶ ψ «'Ελλάς» προκύπτει πρότασις ψευδής. Αἱ ἔκφράσεις $x > \psi$, «ἡ πόλις x είναι πρωτεύουσα τοῦ κράτους ψ », λέγονται προτασιακοὶ τύποι δύο μεταβλητῶν.

Γενικῶς : Προτασιακὸς τύπος ή ἀνοικτὴ πρότασις δύο μεταβλητῶν λέγεται μία ἔκφρασις, ή ὅποια περιέχει δύο μεταβλητὰς καὶ ή ὅποια μετατρέπεται εἰς πρότασιν, ὅταν αἱ μεταβληταὶ ἀντικατασταθοῦν ἀπὸ στοιχεία δύο ὁριζομένων συνόλων. Τὰ σύνολα ἀναφορᾶς τῶν μεταβλητῶν ἡμπορεῖ καὶ νὰ ταυτίζωνται.

Εἰς τὸ πρῶτον παράδειγμά μας, $x > \psi$, καὶ αἱ δύο μεταβληταὶ ἀναφέροται εἰς τὸ σύνολον R , τῶν πραγματικῶν ἀριθμῶν.

Εἰς τὸ β' παράδειγμα ή μεταβλητὴ x ἀναφέρεται εἰς τὸ σύνολον τῶν πόλεων καὶ ή ψ εἰς τὸ σύνολον τῶν κρατῶν τοῦ κόσμου.

Χάριν συντομίας συμβολίζομεν τοὺς προτασιακοὺς τύπους μὲ δύο μεταβλητὰς διὰ τῶν $p(x, \psi)$, $q(x, \psi)$ $s(x, \psi)$ κ.ο.κ.

"Αν $p(x, \psi)$ συμβολίζῃ τὸν προτασιακὸν τύπον τοῦ πρώτου παραδείγματός μας, δηλ. ἂν $p(x, \psi) : x > \psi$, τότε $p(7, 5)$ είναι ἀληθής πρότασις, ἐνῶ $p(5, 7)$ είναι πρότασις ψευδής.

'Επίστης ἂν $q(x, \psi)$: «ἡ πόλις x είναι πρωτεύουσα τοῦ κράτους ψ », τό-

τε q (Λουδίνιον, 'Αγγλία) είναι άληθής πρότασις, ένω q (Ρώμη, Βέλγιον) είναι ψευδής.

Παρατηρούμεν ὅτι τὸ σύνολον ἀληθείας προτασιακοῦ τύπου p (x, ψ) δύο μεταβητῶν είναι, ἐν γένει, ἐν σύνολον διατεταγμένων ζευγῶν.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1) Νὰ ἔξετάσετε πῶς ἡμποροῦν νὰ ὀνομασθοῦν αἱ κατωτέρω ἑκφράσεις: «—», «παραληπλόγραμμον», «ὁρθὴ γωνία», «17».

2) Νὰ ἔξετάσετε πῶς ἡμποροῦν νὰ ὀνομασθοῦν αἱ ἑκφράσεις :

α) 'Ο 10 είναι ἀριθμὸς σύνθετος.

β) $2 = 4 \quad \gamma \quad 5 = 3 + 2$

δ) 'Ο Εὐκλείδης ἦτο φιλόλογος.

ε) 'Ο x είναι πρῶτος ἀριθμός.

στ) $2x + 3 = 23 \quad \zeta) x + \psi = 5$

3) Γνωρίζομεν ὅτι ὑπάρχει μία μόνον τιμὴ τοῦ x διὰ τὴν ὅποιαν $2x = 6$. Σημαίνει τοῦτο ὅτι τὸ x είναι σταθερὸν εἰς τὴν ἑκφρασιν $2x = 6$;

4) Σταθεραὶ, αἱ ὅποιαι είναι ὀνόματα τοῦ αὐτοῦ πράγματος, λέγομεν ὅτι ἔχουν τὴν αὐτὴν τιμὴν. Π.χ. «0» καὶ «2 — 2». Νὰ γράψετε πέντε σταθεράς, αἱ ὅποιαι νὰ ἔχουν τὴν τιμὴν 6.

5) 'Υπάρχουν ἀραγε προτασιακοὶ τύποι, οἱ ὅποιοι δὲν γίνονται ἀληθεῖς προτάσεις

διὰ καμμίαν τιμὴν τῆς μεταβλητῆς των ; 'Εξετάσατε τὸν $\frac{x}{x} = 2$. Δώσατε ἑναὶ ιδικόν σας παράδειγμα. (Λάβετε ὡς σύνολον ἀναφορᾶς τῆς μεταβλητῆς τὸ N).

6) 'Υπάρχουν προτασιακοὶ τύποι μιᾶς μεταβλητῆς, οἱ ὅποιοι γίνονται ἀληθεῖς προτάσεις δι' ὅλας τὰς τιμὰς τῆς μεταβλητῆς των. Προφανὲς παράδειγμα : $x + x = 2x$, ὅπου $x \in R$.

Νὰ εὔρετε ἑναὶ ιδικόν σας παράδειγμα. Πῶς ὀνομάζονται αἱ ισότητες, ὅπως ἡ $x + x = 2x$;

7) Δίδεται ὁ προτασιακὸς τύπος p (x) : $2x = 10$ καὶ σύνολον ἀναφορᾶς τὸ R. Νὰ εὔρετε τὸ σύνολον ἀληθείας P τοῦ προτασιακοῦ τύπου.

8) Δίδεται ὁ προτασιακὸς τύπος $x + \psi = 5$ καὶ σύνολον ἀναφορᾶς τῶν μεταβλητῶν τὸ $\Sigma = \{1, 2, 3, 4, 5\}$. Νὰ εὔρετε τὸ σύνολον ἀληθείας τοῦ προτασιακοῦ τύπου.

9) Δίδεται ὁ προτασιακὸς τύπος q (x) : $\psi = x + 1$, ὅπου x, ψ είναι στοιχεῖα τοῦ R. Νὰ εὔρετε δύο ζεύγη διὰ τὰ ὅποια q (x, ψ) γίνεται ἀληθής πρότασις καὶ δύο διὰ τὰ ὅποια γίνεται ψευδής.

10) Δίδεται ὁ προτασιακὸς τύπος p (x) : $x^2 - 25 = 0$.

Νὰ δρίστετε σύνολον ἀναφορᾶς του καὶ τὸ ἀντίστοιχον σύνολον ἀληθείας του.

11) Δίδεται ὁ προτασιακὸς τύπος «ἡ πόλις x εὑρίσκεται εἰς τὸν νομὸν ψ»). Σύνολα ἀναφορᾶς : τῆς μεταβλητῆς x τὸ σύνολον τῶν πόλεων τῆς 'Ελλάδος, τῆς μεταβλητῆς ψ τὸ σύνολον τῶν νομῶν τῆς 'Ελλάδος. Νὰ εὔρετε τρία ζεύγη τοῦ συνόλου ἀληθείας τοῦ προτασιακοῦ τύπου.

4. ΠΟΣΟΔΕΙΚΤΑΙ.

A) Γνωρίζομεν ἀπὸ τὴν "Αλγεβραν ὅτι

$$(x + 1)^2 = x^2 + 2x + 1, \text{ ὅπου } x \in R$$

Γνωρίζομεν ἐπίστης ὅτι ὁ προτασιακὸς οὗτος τύπος μιᾶς μεταβλητῆς γίνεται ἀληθής πρότασις διὰ τὸ σύνολον R, τῶν πραγματικῶν ἀριθμῶν. Μὲ δὲλλους λόγους τὸ σύνολον ἀληθείας τοῦ προτασιακοῦ τύπου ταυτίζεται μὲ τὸ σύνολον ἀναφορᾶς του.

Συμβολικῶς γράφομεν τότε :

$$\forall x (x \in R) : (x + 1)^2 = x^2 + 2x + 1$$

καὶ διαβάζομεν :

«Διὰ κάθε x , τὸ ὅποιον x ἀνήκει εἰς τὸ R , ἀληθεύει ὅτι
 $(x + 1)^2 = x^2 + 2x + 1$.

Τὸ σύμβολον \forall διαβάζεται «διὰ κάθε...» ἢ «δι᾽ ὅλα τά...» καὶ λέγεται καθολικὸς ἢ γενικὸς ποσοδείκτης.

'Επίσης $\forall x (x \in R) : x - x = 0$

'Ημποροῦμεν λοιπόν, ὅταν ἔχωμεν προτασιακούς τύπους, τῶν ὅποιων τὸ σύνολον ἀληθείας ταυτίζεται μὲ τὸ σύνολον ἀναφορᾶς, νὰ προτάσσωμεν τὸν γενικὸν ποσοδείκτην.

B) "Ας ἔξετάσωμεν τώρα τὸν προτασιακὸν τύπον

$$p(x) : x + 3 = 8 \quad (x \in R)$$

Παρατηροῦμεν ἐδῶ ὅτι $p(x)$ δὲν γίνεται ἀληθῆς πρότασις διὰ κάθε τιμὴν τῆς μεταβλητῆς, ἀπὸ τὸ R , διότι, π.χ., $p(1) = 4$, δηλ. πρότασις ψευδῆς. Άλλὰ τὸ σύνολον ἀληθείας τοῦ προτασιακοῦ τύπου $x + 3 = 8$ δὲν εἶναι τὸ κενόν. Πράγματι : $p(5) = 8$, δηλ. ἀληθῆς πρότασις.

Γράφομεν συμβολικῶς εἰς τὴν περίπτωσιν ταύτην :

$$\exists x (x \in R) : x + 3 = 8$$

καὶ διαβάζομεν :

«Υπάρχει τουλάχιστον ἕν x , τὸ ὅποιον x ἀνήκει εἰς τὸ R , τοιοῦτον ὥστε νὰ ἀληθεύῃ $x + 3 = 8$.

Τὸ σύμβολον \exists λέγεται ὑπαρξιακὸς ποσοδείκτης καὶ διαβάζεται «ύπάρχει τουλάχιστον ἔν...» ἢ «διὰ μερικά...»

'Ημποροῦμεν ὁμοίως νὰ γράψωμεν :

a) $\exists x (x \in R) : x + 1 > 5$

β) $\exists x (x \in R) : x = -x$

γ) "Αν T δονομάσσωμεν τὸ σύνολον τῶν τριγώνων, τότε

$$\exists x (x \in T) : x \text{ ἰσόπλευρον}$$

"Ωστε : «Οταν εἰς ἕνα προτασιακὸν τύπον τὸ σύνολον ἀληθείας του εἶναι γνήσιον ὑποσύνολον τοῦ συνόλου ἀναφορᾶς, τότε δυνάμεθα νὰ προτάσσωμεν τὸν ὑπαρξιακὸν ποσοδείκτην.

Γενικώτερον πρέπει νὰ γνωρίζωμεν τὰ ἔξῆς :

Πολλάκις διὰ νὰ διατυπώσωμεν προτάσεις, αἱ ὅποιαι χρησιμοποιοῦνται εἰς τὰ Μαθηματικά, κάμνομεν χρῆσιν τῶν ποσοδεικτῶν. Οἱ ποσοδείκται προτάσσονται προτασιακῶν τύπων, ὅπότε οὗτοι καθίστανται προτάσεις ἢ μόνον ἀληθεῖς ἢ μόνον ψευδεῖς.

Οὕτω, π.χ., ἡ πρότασις $\forall x (x \in U) : p(x)$ εἶναι μία λογικὴ πρότασις, καθόσον αὐτῇ λαμβάνει τιμὴν ἀληθείας Α ἔαν, καὶ μόνον ἔαν, τὸ σύνολον ἀληθείας της P ταύτιζεται μὲ τὸ σύνολον ἀναφορᾶς U (ὅπότε $T_P = \emptyset$) καὶ τιμὴν ἀληθείας ψ , ἔαν, καὶ μόνον ἔαν, τὸ P εἶναι γνήσιον ὑποσύνολον τοῦ U (ὅπότε $T_P \neq \emptyset$).

Έπισης ή πρότασις $\exists x (x \in U) : p(x)$ είναι μία λογική πρότασις, καθόσον αυτή έχει τιμήν διληθείας Α, έσαν, και μόνον έάν, τὸ σύνολον διληθείας της Ρ δὲν είναι τὸ κενόν, και τιμήν διληθείας Ψ, έσαν, και μόνον έάν, τὸ σύνολον Ρ είναι τὸ Ø (όπότε τὸ Ρc = U).

Παραδείγματα :

1. "Αν $p(x) : x + 1 > 3$ και $U = N$, τότε
 - α) $\forall x (x \in N) : x + 1 > 3$ λαμβάνει τιμήν διληθείας Ψ, διότι $P = \{3, 4, 5, 6, \dots\} \subset U$.
 - β) $\exists x (x \in N) : x + 1 > 3$ λαμβάνει τιμήν διληθείας Α, διότι $P = \{3, 4, 5, 6, \dots\} \neq \emptyset$
2. "Αν $p(x) : x^2 + 1 < 0$ και $U = R$, τότε
 - α) $\forall x (x \in R) : x^2 + 1 < 0$ λαμβάνει τιμήν διληθείας ψ, διότι $P = \emptyset$.
 - β) $\exists x (x \in R) : x^2 + 1 < 0$ λαμβάνει τιμήν διληθείας ψ, διότι $P = \emptyset$.
3. "Αν $p(x) : x^2 + 2x + 1 = (x + 1)^2$, τότε
 - α) $\forall x (x \in R) : x^2 + 2x + 1 = (x + 1)^2$ έχει τιμήν διληθείας Α, διότι $P = R$
 - β) $\exists x (x \in R) : x^2 + 2x + 1 = (x + 1)^2$ έχει τιμήν διληθείας Α, διότι $P \neq \emptyset$.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

12) Νὰ έξετάσετε ἂν είναι διληθὲς ἢ ψευδὲς ὅτι :

- α) $\forall x (x \in N) : \frac{x}{x} = 1$ β) $\forall x (x \in R) : (x + 1)^2 = x^2 + 1$
 - γ) $\exists x (x \in R) : x = x + 2$, δ) $\exists x (x \in R) : x^2 \neq 0$
 - ε) $\exists x (x \in R) : (x + 1)^2 = x^2 + 2x + 1$ στ) $\forall x (x \in R) : x = -x$
- 13) Νὰ χρησιμοποιήσετε κατάλληλον ποσοδείκτην εἰς τοὺς κάτωθι προτασιακούς τύπους :
- | | |
|-------------------|----------------|
| α) $x \neq x + 1$ | β) $x^2 = x$ |
| γ) $ x = x$ | δ) $x - 1 < 2$ |

διπού σύνολον ἀναφορᾶς τῆς μεταβλητῆς είναι τὸ R.

5. ΣΥΝΘΕΤΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ.

Εἰς τὴν καθημερινὴν συζήτησιν και εἰς τὰ Μαθηματικὰ δὲν χρησιμοποιοῦμεν μόνον ἀπλᾶς προτάσεις. Συνήθως τὰς ἀπλᾶς προτάσεις συνδέομεν μεταξύ των μὲ διάφορα συνδετικά, π.χ. «καί», «εἴτε», «ή», «δχι», «έάν...», τότε...» κ.τ.λ. και σχηματίζομεν κατ' αὐτὸν τὸν τρόπον νέας προτάσεις. Τὰς τοιαύτας προτάσεις ὀνομάζομεν συνθέτους προτάσεις.

6. Η ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΔΥΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ.

"Ο ἀπλούστερος τρόπος συνδέσεως δύο προτάσεων είναι ἡ σύνζευξις, κατὰ τὴν ὅποιαν ἐκφωνοῦμεν ἢ γράφομεν αὐτὰς μαζύ, μὲ ἔνα και μεταξύ των. Π.χ. ἀπὸ τὰς ἀπλᾶς προτάσεις : «Ο Ἰωάννης είναι μαθητής», «ὁ Κώστας είναι κηπουρός» προκύπτει μὲ τὴν σύζευξίν των ἢ σύνθετος πρότασις :

«ό ιωάννης είναι μαθητής καὶ ὁ Κώστας είναι κηπουρός».

«Η σύζευξις δύο προτάσεων ἀποτελεῖ πρότασιν καὶ ἐπομένως θὰ είναι ἡ μόνον ἀληθής ἡ μόνον ψευδής.

Δεχόμεθα ὅτι ἡ σύζευξις είναι ἀληθής μόνον ὅταν καὶ αἱ δύο συνιστῶσαι προτάσεις είναι συγχρόνως ἀληθεῖς, ἄλλως ἡ σύζευξις είναι ψευδής.

«Η σύζευξις π.χ., «ὅ Σωκράτης ἡτο ἀστρονόμος καὶ $2 + 3 = 5$, είναι ψευδής, ἐνῷ ἡ σύζευξις $\langle 2 + 3 = 5 \text{ καὶ } 2 > 0 \rangle$ είναι ἀληθής.

«Η σύζευξις δύο προτάσεων p καὶ q συμβολίζεται : $p \wedge q$.

Τὸ σύμβολον \wedge διαβάζεται «καί» καὶ λέγεται σύμβολον τῆς συζεύξεως.

Προσέξτε : τὸ σύμβολον \wedge χρησιμοποιεῖται μόνον διὰ νὰ συνδέῃ προτάσεις. Δὲν ἐπιτρέπεται π.χ. νὰ γράψωμεν $\langle 3 \wedge 2 \rangle$ ἢ «ὅ Κώστας \wedge ἡ 'Ελένη».

7. ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ.

A) Εἰς τὴν Μαθηματικὴν Λογικὴν ἡ περισσότερον χρησιμοποιουμένη μέθοδος πρὸς εὕρεσιν τῶν (λογικῶν) τιμῶν τῶν συνθέτων προτάσεων είναι ἑκίνη, κατὰ τὴν ὅποιαν ἀναγράφομεν ὅλας τὰς δυνατότητας ἀληθοῦς ἡ ψευδοῦς τῶν συνιστῶσῶν προτάσεων καὶ τῆς προκυπτούσης ἐξ αὐτῶν συνθέτου προτάσεως ὑπὸ μορφὴν πίνακος. Ο τοιοῦτος πίναξ λέγεται συνήθως πίναξ (λογικῶν) τιμῶν ἢ πίναξ ἀληθείας.

Ἄπὸ ἔνα πίνακα ἀληθείας ἡμποροῦμεν νὰ διαπιστώσωμεν μὲ ἐν βλέμμα, ἐὰν μία σύνθετος πρότασις είναι ἀληθής ἡ ψευδής, ὅταν γνωρίζωμεν, ὅτι αἱ προτάσεις, ποὺ τὴν ἀποτελοῦν, είναι ἀληθεῖς ἢ ψευδεῖς.

Κατωτέρω βλέπετε τὸν πίνακα ἀληθείας διὰ τὴν πρᾶξιν τῆς συζεύξεως δύο προτάσεων p καὶ q . Εἰς τὴν πρώτην γραμμὴν τοῦ πίνακος βλέπομεν ὅτι ἡ σύζευξις $p \wedge q$ είναι ἀληθής μόνον ὅταν καὶ αἱ δύο συνιστῶσαι προτάσεις p , q είναι συγχρόνως ἀληθεῖς. Εἰς ὅλας τὰς ἄλλας περιπτώσεις ἡ σύζευξις $p \wedge q$ είναι ψευδής. Τοῦτο ἐδέχθημεν ὡς ἀληθές, διότι συμφωνεῖ καὶ μὲ τὴν ἐνόρασίν μας.

B) Κατ' ἀναλογίαν πρὸς τὴν σύζευξιν δύο προτάσεων ἡμποροῦμεν νὰ ἔξετάσωμεν τὴν σύζευξιν δύο ἀνοικτῶν προτάσεων, $p(x)$ καὶ $q(x)$, τὴν ὅποιαν θὰ συμβολίζωμεν μὲ $p(x) \wedge q(x)$.

p	q	$p \wedge q$
A	A	A
A	Ψ	Ψ
Ψ	A	Ψ
Ψ	Ψ	Ψ

Ἄς λάβωμεν ἐν παράδειγμα :

«Ἐστω ὅτι $p(x)$ είναι : $x^2 - 5x + 6 = 0$ καὶ $q(x) : x - 2 = 0$.

Τότε $p(x) \wedge q(x)$ είναι :

$$(x^2 - 5x + 6 = 0) \wedge (x - 2 = 0), U = R.$$

«Οταν $x = 5$ ἡ ἀνωτέρω σύζευξις μετατρέπεται εἰς τὴν ἔξῆς σύνθετον πρότασιν :

$$(5^2 - 5 \cdot 5 + 6 = 0) \wedge (5 + 3 = 0)$$

ἡ ὅποια είναι ψευδής, διότι κάθε μία ἀπὸ τὰς συνιστῶσας προτάσεις είναι ψευδής.

«Ἐὰν εἰς τὴν ἀνωτέρω σύζευξιν $p(x) \wedge q(x)$ θέσωμεν $x = 2$ τότε προκύπτει ἡ πρότασις :

$$(2^2 - 5 \cdot 2 + 6 = 0) \wedge (2 - 2 = 0)$$

ή όποια είναι άληθης, διότι κάθε μία άπό τάς συνιστώσας προτάσεις είναι άληθης.

'Από τὸ ἀνωτέρω παράδειγμα γίνεται φανερὸν ὅτι τὸ σύνολον ἀληθείας τῆς συζεύξεως δύο ἀνοικτῶν προτάσεων $p(x), q(x)$, τὸ δόποιον συμβολίζομεν $\{x \mid p(x) \wedge q(x)\}$, ἀποτελεῖται ἀπό ἑκεῖνα τὰ στοιχεῖα $x \in U$ (τοῦ συνόλου ἀναφορᾶς), τὰ δόποια ἀνήκουν συγχρόνως εἰς τὸ σύνολον P (σύνολον ἀληθείας τῆς $p(x)$) καὶ εἰς τὸ σύνολον Q : (σύνολον ἀληθείας τῆς $q(x)$), δηλ. ἀπὸ τὰ στοιχεῖα, τὰ δόποια ἀνήκουν εἰς τὴν τομὴν $P \cap Q$.

"Ωστε : $\{x \mid p(x) \wedge q(x)\} = P \cap Q$.

Πράγματι εἰς τὸ προηγούμενον παράδειγμα ἔχομεν :

$$\{x \mid x^2 - 5x + 6 = 0 \wedge x - 2 = 0\} = \{2,3\} \cap \{2\} = \{2\}$$

8. ΔΙΑΖΕΥΞΙΣ ΔΥΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ.

A) "Οταν παραθέσωμεν δύο προτάσεις ἐν συνεχείᾳ μὲ τὸ συνδετικὸν « \wedge » ἢ τὸ « $\epsilon\tau\pi\epsilon$ » μεταξύ των, λέγομεν ὅτι ἐσχηματίσαμεν τὴν διάζευξιν τῶν δύο τούτων προτάσεων.

Προσέξατε π.χ. τὰς κατωτέρω τρεῖς συνθέτους προτάσεις.

1) 'Η Ἐθνικὴ Τράπεζα προσλαμβάνει ἀπολυτηριούχους τοῦ Γυμνασίου, οἱ δόποιοι γνωρίζουν Γαλλικὰ εἴτε Ἀγγλικά.

2) Θά ἀριστεύσω εἰς τὰ Μαθηματικά εἴτε εἰς τὰ Φυσικά.

3) Θά ὑπάγω εἰς τὸν κινηματογράφον ἢ θὰ μείνω εἰς τὸ σπίτι.

Εἰς τὴν πρώτην πρότασιν είναι φανερὸν ὅτι ἡ Τράπεζα δὲν ἀποκλείεται νὰ προσλάβῃ ἀπολυτηριούχον τοῦ Γυμνασίου ὁ δόποιος νὰ γνωρίζῃ Γαλλικά καὶ Ἀγγλικά. Ἐπίσης εἰς τὴν δευτέραν πρότασιν ὁ ὄμιλῶν δὲν ἀποκλείει ὅτι ἐνδέχεται νὰ ἀριστεύσῃ καὶ εἰς τὰ Μαθηματικὰ καὶ εἰς τὰ Φυσικά.

Εἰς τὴν τρίτην πρότασιν είναι φανερὸν ὅτι ὁ ὄμιλῶν θὰ πράξῃ ἐν ἐκ τῶν δύο : ἢ θὰ ὑπάγῃ εἰς τὸν κινηματογράφον ἢ θὰ μείνῃ εἰς τὸ σπίτι. Κατὰ ταῦτα ὅταν λέγωμεν « $p \wedge q$ » θὰ ἐννοοῦμεν ἢ μόνον p είναι άληθης ἢ μόνον q είναι άληθης.

Εἰς τὴν πρώτην καὶ δευτέραν περίπτωσιν ἡ μία τουλάχιστον καὶ ἐνδεχομένως αἱ δύο προτάσεις είναι ἀληθεῖς. Λέγομεν τότε ὅτι ἔχομεν ἐγκλειστικὴν διάζευξιν \wedge , ἀπλῶς, διάζευξιν καὶ κάμνομεν χρῆσιν τοῦ « $\epsilon\tau\pi\epsilon$ » ὡς συνδετικοῦ. Σύμβολον τῆς ἐγκλειστικῆς διαζεύξεως είναι τὸ \wedge , τὸ δόποιον διαβάζεται « $\epsilon\tau\pi\epsilon$ ».

Εἰς τὴν περίπτωσιν τοῦ τρίτου ἀνωτέρω παραδείγματος τὸ συνδετικὸν « \wedge » χρησιμοποιεῖται μὲ τὴν ἐννοιαν ὅτι ἡ μία μὲν ἡ διττὴ σημασίαν. "Άλλοτε, δταν λέγωμεν « $p \wedge q$ », ἐννοοῦμεν ὅτι μία καὶ μόνον μία ἀπὸ τὰς προτάσεις είναι άληθης καὶ ἀλλοτε ὅτι μία τουλάχιστον πρότασις είναι άληθης καὶ πιθανὸν νὰ είναι καὶ αἱ δύο.

Σημ. Εἰς τὴν καθημερινὴν ὄμιλίαν χρησιμοποιοῦμεν, βεβαίως, τὴν λέξιν \wedge μὲ διττὴν σημασίαν. "Άλλοτε, δταν λέγωμεν « $p \wedge q$ », ἐννοοῦμεν ὅτι μία καὶ μόνον μία ἀπὸ τὰς προτάσεις είναι άληθης καὶ ἀλλοτε ὅτι μία τουλάχιστον πρότασις είναι άληθης καὶ πιθανὸν νὰ είναι καὶ αἱ δύο.

Εις τὰ Μαθηματικά δύμως δὲν δυνάμεθα νὰ χρησιμοποιήσωμεν τὸ « \neg » μὲ διττὴν σημασίαν. Πρέπει νὰ γνωρίζωμεν ἐπακριβῶς τὶ ἐννοοῦμεν δταν λέγωμεν « $p \neg q$ »

Παραδείγματα (ἐγκλειστικῆς) διαζεύξεως : $p \vee q$ (p εἴτε q)

1) $\delta \frac{3}{4}$ εἶναι ρητὸς εἴτε $\delta -2$ εἶναι θετικός.

2) $\delta 4$ εἶναι διαιρέτης τοῦ 5 εἴτε $\delta 3$ εἶναι φυσικός.

3) $\delta 4$ εἶναι διαιρέτης τοῦ 8 εἴτε $\delta -3$ εἶναι ἀρνητικός.

Αἱ ἀνωτέρω διαζεύξεις εἶναι ἀληθεῖς προτάσεις.

4) 'Η διάζευξις : « $\delta 3$ εἶναι ἀρνητικός εἴτε $\delta \frac{1}{2}$ εἶναι ἀκέραιος» εἶναι ψευδῆς, διότι ἀμφότεραι αἱ συνιστῶσαι προτάσεις εἶναι ψευδεῖς.

Πίναξ (λογικῶν) τιμῶν τῆς (ἐγκλειστικῆς) διαζεύξεως : $p \vee q$

p	q	$p \vee q$	Δηλαδὴ ή διάζευξις $p \vee q$ εἶναι ψευδῆς μόνον δταν καὶ αἱ δύο συνιστῶσαι προτάσεις εἶναι ψευδεῖς. Εἰς δλας τὰς ἄλλας περιπτώσεις εἶναι ἀληθής.
A	A	A	
A	Ψ	A	
Ψ	A	A	
Ψ	Ψ	Ψ	

Παραδείγματα ἀποκλειστικῆς διαζεύξεως : $p \underline{\vee} q$ ($p \neg q$)

1) $\delta -3$ εἶναι φυσικός $\neg \delta \frac{1}{2}$ εἶναι θετικός

2) $\delta \frac{3}{4}$ εἶναι ἀκέραιος $\neg \delta -3$ εἶναι ἀρνητικός

3) $\delta 2$ εἶναι διαιρέτης τοῦ 5 $\neg \delta -2$ εἶναι θετικός

4) $\delta 5$ εἶναι φυσικός $\neg \delta -5$ εἶναι ἀρνητικός.

Αἱ δύο πρῶται ἀποκλειστικαὶ διαζεύξεις εἶναι ἀληθεῖς, ἐνῷ αἱ δύο τελευταῖαι εἶναι ψευδεῖς.

Πίναξ (λογικῶν) τιμῶν τῆς (ἀποκλειστικῆς) διαζεύξεως : $p \underline{\vee} q$

p	q	$p \underline{\vee} q$	Δηλαδὴ ή διάζευξις $p \underline{\vee} q$ εἶναι ἀληθής τότε καὶ μόνον τότε, δταν ή μία μόνον ἀπὸ τὰς συνιστώσας προτάσεις εἶναι ἀληθής.
A	A	Ψ	
A	Ψ	A	
Ψ	A	A	
Ψ	Ψ	Ψ	

B) Κατ' ἀναλογίαν πρὸς τὴν διάζευξιν δύο προτάσεων ἡμποροῦμεν νὰ ἔξετάσωμεν τὴν διάζευξιν δύο ἀνοικτῶν προτάσεων $p(x)$, $q(x)$, τὴν ὅποιαν θὰ συμβολίζωμεν $p(x) \vee q(x)$.

"Ας λάβωμεν ἐν παράδειγμα :

"Εστω δτι $p(x)$ εἶναι : $x^2 - 5x + 6 = 0$ καὶ $q(x) : x + 5 = 0$. Τότε $p(x) \vee q(x)$ εἶναι :

$$(x^2 - 5x + 6 = 0) \vee (x + 5 = 0), \quad U = R$$

*Όταν $x = 5$, ή άνωτέρω διάλευξης μετατρέπεται εις τήν έξης σύνθετον πρότασιν :

$$(5^2 - 5 \cdot 5 + 6 = 0) \vee (5 + 5 = 0)$$

ή όποια είναι ψευδής, διότι κάθε μία άπό τάς συνιστώσας προτάσεις είναι ψευδής.

*Εάν $x = -5$, ή άνωτέρω διάλευξης άνοικτῶν προτάσεων γίνεται :

$$((-5)^2 - 5 \cdot (-5) + 6 = 0) \vee (-5 + 5 = 0)$$

ή όποια είναι ἀληθής, διότι ή δευτέρα πρότασις είναι ἀληθής. Επίσης, όταν $x = 3$, τότε ή διάλευξης γίνεται :

$$(3^2 - 5 \cdot 3 + 6 = 0) \vee (3 + 5 = 0)$$

ή όποια είναι ἀληθής, διότι ή πρώτη άπό τάς συνιστώσας προτάσεις είναι ἀληθής.

Καταλήγομεν λοιπόν εις τὸ έξης συμπέρασμα : τὰ στοιχεῖα τοῦ συνόλου ἀληθείας τῆς συνθέτου άνοικτῆς προτάσεως $p(x) \vee q(x)$ είναι ἑκεῖνα τὰ στοιχεῖα τοῦ συνόλου ἀναφορᾶς, τὰ όποια ἀνήκουν εἰς τὸ σύνολον ἀληθείας P τῆς $p(x)$ ή εἰς τὸ σύνολον ἀληθείας Q τῆς $q(x)$ ή ἀνήκουν καὶ εἰς τὰ δύο σύνολα P καὶ Q . Μὲ ἄλλας λέξεις τὸ σύνολον ἀληθείας τῆς $p(x) \vee q(x)$ είναι τὸ $P \cup Q$.

Συμβολικῶς διατυπώνομεν τὸ συμπέρασμα τοῦτο ως έξης :

$$\{x \mid p(x) \vee q(x)\} = P \cup Q.$$

Γ) Κατ' ἀναλογίαν πρὸς τὴν ἀποκλειστικὴν διάλευξην δύο προτάσεων δυνάμεθα νὰ ἔχετασωμεν τὴν ἀποκλειστικὴν διάλευξην δύο προτασιακῶν τύπων $p(x)$, $q(x)$, τὴν όποιαν θὰ συμβολίζωμεν μὲ $p(x) \underline{\vee} q(x)$.

Είναι φανερὸν ὅτι τὸ σύνολον ἀληθείας $p(x) \underline{\vee} q(x)$ ἀποτελεῖται ἀπὸ ἑκεῖνα τὰ στοιχεῖα τοῦ συνόλου ἀναφορᾶς, τὰ όποια καθιστοῦν τὴν $p(x)$ ἀληθῆ καὶ τὴν $q(x)$ ψευδῆ πρότασιν καὶ ἑκεῖνα τὰ στοιχεῖα τοῦ συνόλου ἀναφορᾶς, τὰ όποια καθιστοῦν τὴν $p(x)$ ψευδῆ καὶ τὴν $q(x)$ ἀληθῆ, δηλ. είναι τὸ σύνολον $P \cup Q - P \cap Q$ ή, ὅπερ τὸ αὐτό, τὸ σύνολον $(P - Q) \cup (Q - P)$. Συμβολικῶς τὸ συμπέρασμα διατυπώνεται ως έξης :

$$\{x \mid p(x) \underline{\vee} q(x)\} = P \cup Q - P \cap Q \text{ ή } (P - Q) \cup (Q - P)$$

Παράδειγμα :

*Έστω ὅτι ζητεῖται τὸ $\{x \mid x^2 - 5x + 6 = 0 \underline{\vee} x^2 - 6x + 8 = 0\}$, ὅπου σύνολον ἀναφορᾶς είναι τὸ R .

*Έχομεν $P = \{2, 3\}$, $Q = \{2, 4\}$. Επομένως: $P \cup Q = \{2, 3, 4\}$ καὶ $P \cap Q = \{2\}$. Ωστε : $P \cup Q - P \cap Q = \{3, 4\}$ καὶ $\{x \mid x^2 - 5x + 6 = 0 \underline{\vee} x^2 - 6x + 8 = 0\} = \{3, 4\}$.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ (*)

14) Νὰ δείξετε ὅτι αἱ συζεύξεις $p \wedge q$ καὶ $q \wedge p$ ἔχουν τὰς αὐτὰς τιμὰς ἀληθείας.

15) Νὰ δείξετε ὅτι αἱ διαξεύξεις $p \vee q$ καὶ $q \vee p$ ἔχουν τὰς αὐτὰς τιμὰς ἀληθείας.

16) Νὰ διατυπώσετε λεκτικῶς τὴν σύζευξην καὶ τὴν διάλευξην τῶν κάτωθι προτάσεων.

α) 'Ο Γεώργιος είναι ἀγρότης. 'Η 'Αγγελική είναι οικούρα.

β) Αἱ εύθειαι αὔται είναι παράληλοι. Αἱ εύθειαι αὔται τέμνονται.

(*) *Απὸ τὰς προτεινομένας ἀσκήσεις εἰς τὸ Κεφάλαιον I θὰ δίδωνται ὅσαι κατὰ τὴν κρίσιν τοῦ διδάσκοντος ἀπαιτοῦνται. Βιὰ τὴν ἐμπέδωσιν ἐκάστης ἐνότητος.

17) Νά σχηματίσετε τήν σύζευξιν καὶ διάξευξιν τῶν κατωτέρω προτάσεων. Ἐπειτα νὰ ἀποφασθῆτε περὶ τῆς ἀληθείας ἢ μὴ τῶν συνθέτων προτάσεων, ποὺ θὰ προκύψουν.

α) Ὁ Σεπτέμβριος ἔχει 30 ἡμέρας. Ἡ ἑβδομάδας ἔχει 8 ἡμέρας.

β) Τὸ 3 εἶναι μικρότερον τοῦ 4. Τὸ 4 εἶναι μικρότερον τοῦ 3.

γ) $5 + 1 = 6$. $21 = 3 \cdot 7$

δ) $5 + 1 = 5$. $8 + 1 = 10$

18) Νά σχηματίσετε τήν σύζευξιν καὶ διάξευξιν τῶν κατωτέρω ἀνοικτῶν προτάσεων.

Νὰ εὔρετε ἀκολούθως τὰ σύνολα ἀληθείας τῶν συνθέτων ἀνοικτῶν προτάσεων, ποὺ θὰ προκύψουν. (Σύνολον ἀναφορᾶς τὸ R).

α) $x + 2 = 0$, $x^2 - 4 = 0$

β) $x^2 = 0$, $x = 2$

γ) $x^2 - 8x + 12 = 0$, $x^2 - 5x + 6 = 0$

δ) $x > 3$, $x > 5$

ε) $x - 8 = 0$, $x > 5$

στ) $x^2 - 4 = (x + 2)(x - 2)$, $x^2 - 1 = (x + 1)(x - 1)$

Εἰς τὴν ἀσκησιν γ) νὰ εὔρετε καὶ τὸ σύνολον ἀληθείας τῆς ἀποκλειστικῆς διαζεύξεως.

19) Ἐάν α, β εἶναι πραγματικοὶ ἀριθμοί, τότε ἡ πρότασις $\alpha \cdot \beta = 0$. διατυπώνεται μὲ μίαν διάζευξιν. Ποία εἶναι αὐτὴ ἡ διάζευξις;

20) Ἐάν α καὶ β εἶναι πραγματικοὶ ἀριθμοί, τότε ἡ πρότασις $\alpha^2 + \beta^2 = 0$, διατυπώνεται μὲ μίαν σύζευξιν. Ποία εἶναι αὐτὴ ἡ σύζευξις;

9. ΑΡΝΗΣΙΣ.

A) Ἡ ἄρνησις διαφέρει ἀπὸ τὰς προηγουμένας πράξεις τῆς διαζεύξεως καὶ συζεύξεως κατὰ τὸ ὅτι εἶναι μονομελῆς πρᾶξις. Ἐάν p εἶναι μία πρότασις, ἡ ἄρνησις τῆς p εἶναι μία νέα (σύνθετος) πρότασις, ἡ ὁποία ἔχει ἀντίθετον τιμῆν ἀληθείας. Ἐάν, π.χ., ἡ p εἶναι ἀληθής. ἡ ἄρνησις τῆς p εἶναι ψευδής καὶ ἐάν ἡ p εἶναι ψευδής ἡ ἄρνησις τῆς p εἶναι ἀληθής.

Ἡ ἄρνησις μιᾶς προτάσεως p συμβολίζεται μὲ ~ p καὶ διαβάζεται : ὅχι p.

Παραδείγματα :

1ον, p : ὁ 5 εἶναι φυσικὸς ἀριθμός.

~ p : ὅχι ὁ 5 εἶναι φυσικὸς ἀριθμός = ὁ 5 δὲν εἶναι φυσικὸς ἀριθμός.

2ον. p : ὁ 2 εἶναι ἀρνητικὸς ἀριθμός.

~ p : ὅχι ὁ 2 εἶναι ἀρνητικὸς ἀριθμός = ὁ 2 δὲν εἶναι ἀρνητικὸς ἀριθμός.

3ον. p : $2 + 3 = 5$

~ p : $2 + 3 \neq 5$

4ον. Τὸ ἀθροισμα τῶν ἀπολύτων τιμῶν τῶν ἐσωτερικῶν γωνιῶν ἐνὸς τριγώνου εἶναι 180° .

~ p : τὸ ἀθροισμα τῶν ἀπολύτων τιμῶν τῶν ἐσωτερικῶν γωνιῶν ἐνὸς τριγώνου δὲν εἶναι 180° .

Πίναξ ἀληθείας τῆς ἀρνήσεως ~ p

p	~p
A	Ψ
Ψ	A

Σημ. Φραστικῶς αἱ ἀρνήσεις τῶν ἀπλῶν προτάσεων σχηματίζονται συνήθως διὰ τῆς παρεμβολῆς ἐνὸς ὅχι (ἢ δὲν) εἰς τὴν κατάλληλον θέσιν.

Παραδείγματα :

1ον. p : δὲν εἶναι τέλειον τετράγωνον.

~ p : δὲν εἶναι τέλειον τετράγωνον.

2ον. p : Κάθε τετράγωνον εἶναι δρθιογώνιον.

~ p : Κάθε τετράγωνον δὲν εἶναι δρθιογώνιον.

Τὸ συνηθέστερον σφάλμα, τὸ δόποιον γίνεται κατὰ τὸν σχηματισμὸν τῆς ἀρνήσεως μιᾶς προτάσεως ὅπως, π.χ., ἡ «Ολοὶ οἱ μαθηταὶ αὐτῆς τῆς τάξεως ἀγαποῦν τὴν Γεωμετρίαν», εἶναι νὰ εἴπωμεν «κανεὶς μαθητὴς εἰς αὐτὴν τὴν τάξιν δὲν ἀγαπᾷ τὴν Γεωμετρίαν». Αἱ ἀνωτέρω προτάσεις βεβαίως δὲν συμφωνοῦν, ἀλλὰ δὲν εἶναι ἡ μία ἀρνητικής τῆς ἀλληλης, διότι ἐνδέχεται νὰ εἶναι καὶ αἱ δύο ψευδεῖς. Διὰ τοῦτο εἶναι προτιμότερον εἰς τὰς τοιαύτας περιπτώσεις νὰ σχηματίζωμεν τὴν ἀρνητικῶν λεκτικῶν μὲ τὸ : ὅχι. Εἰς τὸ ἀνωτέρω παράδειγμα λοιπὸν θὰ εἴπωμεν : ὅχι ὅλοι οἱ μαθηταὶ αὐτῆς τῆς τάξεως ἀγαποῦν τὴν Γεωμετρίαν.

B) Ἐὰν p (x) εἶναι μία ἀνοικτή πρότασις, τότε ἡ ἀρνητική αὐτῆς συμβολίζεται μὲ ~ p (x).

Ἐὰν ἔκ τῆς ἀντικαταστάσεως τοῦ x δι’ ἐνὸς στοιχείου τοῦ συνόλου ἀναφορᾶς U εἰς τὴν p (x) προκύπτη πρότασις ἀληθής, διὰ τῆς ἀντικαταστάσεως τοῦ x διὰ τοῦ αὐτοῦ στοιχείου εἰς τὴν ~ p(x) προκύπτει πρότασις ψευδής. Ἐὰν ἔκ τῆς ἀντικαταστάσεως τοῦ x εἰς p (x) δι’ ἐνὸς στοιχείου τοῦ συνόλου ἀναφορᾶς προκύπτη πρότασις ψευδής, διὰ τῆς ἀντικαταστάσεως τοῦ x εἰς τὴν ~ p(x) διὰ τοῦ αὐτοῦ στοιχείου προκύπτει πρότασις ἀληθής. "Ωστε τὸ σύνολον ἀληθείας τῆς ~ p(x) ἀποτελεῖται ἐξ ἑκείνων τῶν στοιχείων τοῦ U, τὰ δόποια δὲν ἀνήκουν εἰς τὸ σύνολον ἀληθείας P, τῆς p(x), ἐπομένως θὰ ἀνήκουν εἰς τὸ συμπληρωματικὸν τοῦ P ὡς πρὸς U, δηλ. τὸ P^c.

Συμβολικῶς διατυπώνομεν τὰ ἀνωτέρω ὡς ἔξῆς :

$$\{ x | \sim p(x) \} = P^c$$

"Εστω ὡς παράδειγμα ἡ ἀνοικτή πρότασις p(x) : x² - 4 = 0 καὶ σύνολον ἀναφορᾶς τὸ R. Τὸ σύνολον ἀληθείας τῆς p (x) εἶναι τὸ P = { 2, -2 }. Τὸ συμπληρωματικὸν τοῦ P ὡς πρὸς R εἶναι τὸ P^c = { x | x ≠ 2 ∧ x ≠ -2 }. "Ωστε: $\{ x | \sim p(x) \} = \{ x | x \neq -2 \text{ καὶ } x \neq 2 \}$.

10. Η ΑΡΝΗΣΙΣ ΜΙΑΣ ΣΥΖΕΥΞΕΩΣ.

"Εστω ὅτι θέλομεν νὰ σχηματίσωμεν τὴν ἀρνητικήν τῆς συζεύξεως :

« δὲν A εἶναι ιστρὸς καὶ δὲν B εἶναι διδάσκαλος ».

"Οπως ἐμάθομεν (§ 7), διὰ νὰ εἴπωμεν ὅτι ἡ πρότασις αὕτη εἶναι ψευδής, πρέπει ἡ μία τουλάχιστον ἀπὸ τὰς συνιστώσας προτάσεις νὰ εἶναι ψευδής.

Θὰ εἴπωμεν λοιπόν :

«'Ο A δὲν εἶναι ιστρὸς εἴτε δὲν εἶναι διδάσκαλος ».

"Ας λάβωμεν ἐν διλογίῳ παράδειγμα :

«Θά κερδίσωμεν εἰς τὸν ἀγῶνα τοῦ βόλευ μὲ τὴν δμάδα τοῦ Γυμνασίου Α καὶ θὰ κερδίσωμεν εἰς τὸν ἀγῶνα μὲ τὴν δμάδα τοῦ Γυμνασίου Β».

Διὰ νὰ σχηματίσωμεν τὴν ἄρνησιν τῆς ἀνωτέρω συζεύξεως εἰναι φανερὸν ὅτι πρέπει νὰ εἴπωμεν : «Δὲν θὰ κερδίσωμεν εἰς τὸν ἀγῶνα βόλευ μὲ τὴν δμάδα τοῦ Γυμνασίου Α εἴτε δέν θὰ κερδίσωμεν εἰς τὸν ἀγῶνα μὲ τὴν δμάδα τοῦ Γυμνασίου Β».

Ίδού ἐν τρίτον παράδειγμα ἀπὸ τὰ Μαθηματικά : 'Εὰν α καὶ β εἰναι πραγματικοὶ ἀριθμοί, τότε ή πρότασις $\alpha^2 + \beta^2 = 0$ διατυπώνεται μὲ τὴν σύζευξιν $\alpha = 0 \wedge \beta = 0$. Ἡ ἄρνησις τῆς $\alpha^2 + \beta^2 = 0$ εἰναι $\alpha^2 + \beta^2 \neq 0$ καὶ διατυπώνεται μὲ τὴν διάζευξιν $\alpha \neq 0 \vee \beta \neq 0$. Δηλαδή :

$\sim (\alpha = 0 \wedge \beta = 0)$ εἰναι $(\alpha \neq 0 \vee \beta \neq 0)$

Εἰναι λοιπὸν φανερὸν ὅτι ή ἄρνησις $p \wedge q$ εἰναι $\sim p \vee \sim q$. Τὸ πρᾶγμα καθίσταται σαφέστερον ἀπὸ τὸν κατωτέρω πίνακα ἀληθείας.

p	q	$\sim p$	$\sim q$	$p \wedge q$	$\sim (p \wedge q)$	$\sim p \vee \sim q$
A	A	Ψ	Ψ	A	Ψ	Ψ
A	Ψ	Ψ	A	Ψ	A	A
Ψ	A	A	Ψ	Ψ	A	A
Ψ	Ψ	A	A	Ψ	A	A

Ἄπὸ τὰς δύο τελευταίας στήλας τοῦ πίνακος φαίνεται ὅτι ή ἄρνησις τῆς $p \wedge q$ καὶ ή διάζευξις $\sim p \vee \sim q$ ἔχουν τὰς αὐτὰς τιμὰς ἀληθείας. Ἐπίσης σαφέστερον φαίνεται ἀπὸ τὰς στήλας 5ην καὶ 7ην ὅτι, ὅταν ή $p \wedge q$ εἰναι ἀληθής, ή $(\sim p \vee \sim q)$ εἰναι ψευδής καὶ ὅταν ή $p \wedge q$ εἰναι ψευδής, ή $\sim p \vee \sim q$ εἰναι ἀληθής. Ἐπομένως ή μία εἰναι ἄρνησις τῆς ἄλλης.

Συμπέρασμα : $\sim (p \wedge q)$ εἰναι : $\sim p \vee \sim q$

11. Η ΑΡΝΗΣΙΣ ΜΙΑΣ ΔΙΑΖΕΥΞΕΩΣ.

"Ἄσ λάβωμεν τὰς προτάσεις :

p : δ Α εἰναι ιατρός,

q : δ Β εἰναι διδάσκαλος.

Ἡ διάζευξις αὐτῶν εἰναι :

$p \vee q$: δ Α εἰναι ιατρὸς εἴτε δ Β εἰναι διδάσκαλος

Εἰναι εὐκολὸν νὰ ἐννοήσωμεν ὅτι ή ἄρνησις τῆς $p \vee q$ εἰναι : δ Α δὲν εἰναι ιατρὸς καὶ δ Β δὲν εἰναι διδάσκαλος.

"Ωστε $\sim (p \vee q)$ εἰναι : $\sim p \wedge \sim q$

Ίδού ἐν παράδειγμα ἀπὸ τὰ Μαθηματικά :

'Εὰν α καὶ β εἰναι πραγματικοὶ ἀριθμοί, τότε ή πρότασις $\alpha \cdot \beta = 0$ διατυπώνεται μὲ τὴν διάζευξιν : $\alpha = 0 \vee \beta = 0$. Ἡ ἄρνησις τῆς $\alpha \cdot \beta = 0$ εἰναι $\alpha \cdot \beta \neq 0$ καὶ διατυπώνεται μὲ τὴν σύζευξιν $\alpha \neq 0$ καὶ $\beta \neq 0$. Δηλαδή :

$\sim (\alpha = 0 \vee \beta = 0)$ εἰναι $(\alpha \neq 0 \wedge \beta \neq 0)$

Ίσχύει λοιπὸν ὅτι : $\sim (p \vee q)$ εἰναι $\sim p \wedge \sim q$.

Τὸ αὐτὸν εύρισκομεν, πέραν πάσης ἀμφιβολίας, ἐὰν σχηματίσωμεν ἕνα πίνακα ἀληθείας διὰ τὰς $p \vee q$ καὶ $\sim p \wedge \sim q$.

p	q	$\sim p$	$\sim q$	$p \vee q$	$\sim(p \vee q)$	$\sim p \wedge \sim q$
A	A	Ψ	Ψ	A	Ψ	Ψ
A	Ψ	Ψ	A	A	Ψ	Ψ
Ψ	A	A	Ψ	A	Ψ	Ψ
Ψ	Ψ	A	A	Ψ	A	A

’Από τὰς δύο τελευταίας στήλας τοῦ πίνακος φαίνεται ὅτι ἡ ἄρνησις τῆς πΥq καὶ σύζευξις ~ pΛ ~ q ἔχουν τὰς αὐτὰς τιμάς ἀληθείας. Σαφέστερον βλέπομεν ἀπὸ τὰς στήλας 5ην καὶ 7ην ὅτι, ὅταν ἡ pΥq είναι ἀληθής ἡ ~ pΛ~q είναι ψευδής καὶ ὅταν ἡ pΥq είναι ψευδής ἡ ~ pΛ~q είναι ἀληθής. ’Επομένως ἡ μία είναι ἄρνησις τῆς ἄλλης.

Συμπέρασμα : $\sim(p \vee q)$ είναι : $\sim p \wedge \sim q$.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

- 21) Νὰ διατυπώσετε τὰς ἀρνήσεις τῶν κάτωθι προτάσεων :

α) Ἡ Ἀλγεβρα εἶναι ἐνδιαφέρουσα.

β) "Ολοι οι μαθηται της τάξεως ἀγαποῦν τὴν Ἀλγεβραν.

γ) Πάν τρίγωνον ἔχει τέσσαρας πλευράς.

δ) $5 + 2 = 7$ ε) δ 7 είναι πρώτος δριθμός.

Δ) ο 4 δὲν είχατε τέλειου τετράγωνον.

τ) Μερικοί σύνθημοι δὲν είχαν συγκριτικούς.

- 22) Ηά ύπολογίσετε τό $P^c = \{x | \sim p(x)\}$ διά τάς κάτωθι άνοικτάς προτάσεις $p(x)$, δημοσίου σύνολον άναφορᾶς τῆς μεταβλητῆς x είναι τό R .

α) $x = 2$ β) $x = -2$

$$\gamma) x + 7 = 15$$

$$\delta) x^2 = 9$$

$$\text{e) } x^2 + 1 = 0$$

$$\sigma\tau) \ x^2 \geqslant$$

Νὰ συηματίσω

κάτωθι;

- g) Σήμερον είναι Τετάρτη και ό καιρός είναι

B) $x = 2$ και $y = 5$

$$x) 2 \cdot 3 = 6 \text{ vrai } 3 +$$

δ) Τὸ τοίχων ΑΒΓ εἰσει

ε) Το τριγωνόν ABC έιναι ισοσκελές καὶ τὸ ABE έιναι ισοπλευρὸν τριγωνὸν.

π) $2 + 3 = 6$ είτε $3 + 4 = 5$

$$0.5 \cdot 7 = 35$$

FINAL ACHIEVEMENT

12. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΗΟΔΕΙΞΙΣ.

Εις την καθημερινήν ζωήν, σταν θέλωμεν νά πείσωμεν ἐν πρόσωπον ὅτι κάτι, διά τὸ ὄποιον συζητοῦμεν, εἰναι ἀληθές, συνήθως λέγομεν : «Ἄντὸ εἰναι ἀληθές, διότι ἔκεινο εἰναι ἀληθές». Διά νά εἰναι πειστική μία τοιαύτη πρότασις, πρέπει οἱ συζητοῦντες νά συμφωνοῦν ὅτι τὸ ἔκεινο εἰναι ἀληθές καὶ ὅτι αὐτὸ εἰναι ἀναγκαία συνέπεια ἔκεινου. Μὲ ἄλλας λέξεις πρέπει νά ὑπάρχῃ συμφωνία ως πρὸς τὰς πληροφορίας, μὲ τὰς ὄποιας ἀρχίζομεν, καὶ ώς πρὸς τὸ πῶς ἔξαγομεν συμπέρασμα ἀπὸ αὐτὰς τὰς πληροφορίας. «Ἡ λογικὴ ἀσχολεῖται μὲ τὴν μελέτην τῶν κανόνων πρὸς σχηματισμὸν δρθῶν προτάσεων.» Ἡ λεγομένη ἀπόδειξις συνίσταται εἰς τὸν σχηματισμὸν προτάσεων τοῦ τύπου: «Ἐάν αὐτὸ εἰναι ἀληθές, τότε καὶ ἔκεινο πρέπει νά εἰναι ἀληθές. Π.χ. «ἐάν βρέεται, τότε ὁ κῆπος μου θα

(*) Με πίνακα αλγηθείας θα δείξωμεν προηγουμένως ότι η δρυησις τής $p \vee q$ είναι ($\sim p \vee q$) \wedge ($p \vee \sim q$).

ποτισθῆ». 'Ο καθεὶς θὰ συμφωνήσῃ μὲ αὐτὴν τὴν πρότασιν, διότι ὅλοι ἐκ πελ-
ρας γνωρίζομεν ὅτι μὲ τὴν βροχὴν ὁ κῆπος θὰ ποτισθῆ.

'Ιδού δύο ἄλλα παραδείγματα ἐκ τῆς Ἀλγέβρας :

1) "Αν $3x = 5$, τότε $x = \frac{5}{3}$

2) "Αν $\alpha = 4$ καὶ $\beta = 2$, τότε $\alpha^2 + 2\beta = 20$

"Ολαι αἱ μαθηματικαὶ ἀποδείξεις χρησιμοποιοῦν προτάσεις τοῦ ἀνωτέρω
τύπου.

Συντομώτερον διατυπώνομεν τὰς προτάσεις ταύτας λέγοντες «*p* συν-
επάγεται *q*», ἢ συμβολικῶς : $p \Rightarrow q$.

Π.χ. $3x = 5 \Rightarrow x = \frac{5}{3}$

($\alpha = 4$ καὶ $\beta = 2$) $\Rightarrow \alpha^2 + 2\beta = 20$

Μία σύνθετος πρότασις τῆς μορφῆς : $p \Rightarrow q$ λέγεται, ὡς γνωστόν, **συνεπαγωγὴ**. 'Η ἔργασία μὲ ἀληθεῖς προτάσεις τοῦ τύπου : $p \Rightarrow q$ λέγεται **παραγωγικὸς συλλογισμός**. ἢ, ἀπλῶς, **συλλογισμός**. 'Η πρότασις p λέγεται **ύποθεσις** καὶ ἡ πρότασις q λέγεται **συμπέρασμα**. Λέγομεν δὲ ὅτι $p \Rightarrow q$ εἶναι ἐν θεώ-
ρημα.

"Οταν ἡ πρότασις p εἶναι ἀληθής, ἡ πρότασις q ἡμπορεῖ νὰ εἶναι ἀληθής
ἢ ψευδής. 'Ἐπισης ὅταν ἡ πρότασις p εἶναι ψευδής, ἡ πρότασις q ἡμπορεῖ νὰ
εἶναι ἀληθής ἢ ψευδής.

Πρέπει λοιπὸν νὰ γνωρίζωμεν τὰς τιμὰς ἀληθείας μιᾶς συνεπαγωγῆς, ὅταν
εἶναι γνωσταὶ αἱ τιμαὶ ἀληθείας τῶν ἀπλῶν προτάσεων, ἐκ τῶν ὅποιων αὗτη
συνίσταται.

Καίτοι ἡ πρὸς τὸν σκοπὸν αὐτὸν ἀκολουθουμένη μέθοδος εἶναι συνέπεια
μιᾶς παραδοχῆς, ἐν τούτοις αὕτη στηρίζεται ἐπὶ τῶν ἐνορατικῶν βάσεων τοῦ
ὅρθιοῦ συλλογισμοῦ. Θὰ ἔξετάσωμεν κατωτέρω ὅλας τὰς δυνατὰς περιπτώσεις.

13. ΠΙΝΑΞ ΤΙΜΩΝ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΠΑΓΩΓΗΣ.

1) 'Εὰν μία ἀληθής ύποθεσις p ὁδηγῇ εἰς ἐν ἀληθεῖς συμπέρασμα q , πι-
στεύομεν ὅτι ἐκάμομεν ὁρθὸν συλλογισμὸν καὶ θεωροῦμεν τὴν συνεπαγωγὴν
ἀληθῆ.

2) 'Εὰν μία ἀληθής ύποθεσις p ὁδηγῇ εἰς ἐν ψευδὲς συμπέρασμα, τότε
εἶναι βέβαιον ὅτι ἔχομεν κάμει λάθος εἰς τὸν συλλογισμὸν καὶ θεωροῦμεν τὴν
συνεπαγωγὴν ψευδῆ.

3) 'Εὰν ἡ ύποθεσις p εἶναι ψευδής, τότε ὁρθὸς συλλογισμὸς ἡμπορεῖ νὰ
μᾶς ὁδηγήσῃ εἰς ἀληθεῖς συμπέρασμα καὶ συμφωνοῦμεν νὰ ὀνομάζωμεν
ἀυτὴν τὴν συνεπαγωγὴν.

4) 'Εὰν ἡ ύποθεσις εἶναι ψευδής, τότε ὁρθὸς συλλογισμὸς ἡμπορεῖ ἐξ
ἴσου νὰ μᾶς ὁδηγήσῃ εἰς ψευδὲς συμπέρασμα καὶ τότε συμφωνοῦμεν νὰ ὀνο-
μάζωμεν τὴν συνεπαγωγὴν αὐτὴν ἀληθῆ.

Τὰ ἀνωτέρω συγκεντρώνομεν εἰς τὸν κατωτέρω πίνακα ἀληθείας :

Πίναξ άληθείας τής συνεπαγωγῆς: $p \Rightarrow q$

p	q	$p \Rightarrow q$
A	A	A
A	Ψ	Ψ
Ψ	A	A
Ψ	Ψ	A

"Οπως φαίνεται εις τὸν πίνακα, ἡ συνεπαγωγὴ $p \Rightarrow q$ εἶναι ψευδῆς τότε καὶ μόνον, ὅταν ἡ πρώτη πρότασις εἶναι ἀληθῆς καὶ ἡ δευτέρα ψευδῆς. Εἰς ὅλας τὰς ἄλλας περιπτώσεις εἶναι ἀληθῆς.

Παραδείγματα ἐφαρμογῆς τοῦ πίνακος :

- 1) $2 \in \mathbb{N} \Rightarrow \frac{1}{2} \in \mathbb{Q}$, ἀληθῆς
- 2) $3 > 0 \Rightarrow \frac{1}{2} \in \mathbb{N}$, ψευδῆς
- 3) $\sqrt{2} \in \mathbb{N} \Rightarrow \frac{2}{3} \in \mathbb{Q}$, ἀληθῆς
- 4) $\frac{1}{2} \in \mathbb{N} \Rightarrow \sqrt{2} \in \mathbb{Q}$, ἀληθῆς

"Εστω ἡ ἀληθῆς συνεπαγωγὴ $p \Rightarrow q$, ὅπου ἡ p εἶναι ἀληθῆς. Ἡ συνεπαγωγὴ αὐτῇ διαβάζεται καὶ μὲ ἄλλους τρόπους. Ἰδοὺ μερικοὶ ἔξι αὐτῶν :

- 1) ἔὰν p , τότε q
- 2) p εἶναι ἵκανη συνθήκη διὰ q
- 3) q εἶναι ἀναγκαία συνθήκη διὰ p
- 4) ἴνα q ἀρκεῖ p

14. ΣΥΝΕΠΑΓΩΓΗ ΔΥΟ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ.

"Εστω ὅτι ἔχομεν τὴν συνεπαγωγὴν $p(x) \Rightarrow q(x)$.

Σύνολον ἀναφορᾶς τὸ U , σύνολον ἀληθείας τῆς $p(x)$ τὸ P , σύνολον ἀληθείας τῆς $q(x)$, τὸ Q . Θέλομεν νὰ προσδιορίσωμεν τὸ σύνολον ἀληθείας τῆς συνεπαγωγῆς $p(x) \Rightarrow q(x)$.

Παρατηροῦντες τὸν πίνακα ἀληθείας τῆς συνεπαγωγῆς, βλέπομεν ὅτι ἡμποροῦμεν νὰ καταστήσωμεν τὴν συνεπαγωγὴν $p(x) \Rightarrow q(x)$ ἀληθῆ,

ἄν καταστήσωμεν: $\begin{cases} \text{τὴν } p(x) \text{ ἀληθῆ καὶ τὴν } q(x) \text{ ἀληθῆ,} \\ \text{τὴν } p(x) \text{ ψευδῆ καὶ τὴν } q(x) \text{ ἀληθῆ,} \\ \text{τὴν } p(x) \text{ ψευδῆ καὶ τὴν } q(x) \text{ ψευδῆ.} \end{cases}$

'Ἐκ τούτων ἔπειται ὅτι :

$$\{ x \mid p(x) \Rightarrow q(x) \} = P^c \cup Q (*)$$

Παραδείγματα :

1) Νὰ εύρεθῇ τὸ σύνολον ἀληθείας τῆς συνεπαγωγῆς, $x^2 = 1 \Rightarrow x = 1$. (σύνολον ἀναφορᾶς τὸ R).

Εύρισκομεν πρῶτον ὅτι $P = \{ 1, -1 \}$, ἀρα $P^c = \{ x \mid x \neq 1 \text{ εἴτε } -1 \}$.

(*) 'Αποδεικνύεται ὅτι ὅλαι αἱ περιπτώσεις καλύπτονται ἀπὸ τὸν τύπον τοῦτον.

Εύρισκομεν ἔπειτα ὅτι $Q = \{1\}$. Έπομένως $P^c \cup Q = \{x \mid x \neq -1\}$.

2) Νὰ εύρεθῇ τὸ σύνολον ἀληθείας τῆς συνεπαγωγῆς : $x = 1 \Rightarrow x^2 = 1$.
Έχομεν $P = \{1\}$, ἄρα $P^c = \{x \mid x \neq 1\}$. $Q = \{1, -1\}$. Έπομένως $P^c \cup Q =$ τὸ σύνολον ἀναφορᾶς R .

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

24) Νὰ εὕρετε ποῖαι ἀπὸ τὰς κάτωθι συνεπαγωγὰς εἰναι ἀληθεῖς καὶ ποῖαι ψευδεῖς.

- α) $3 = 4 \Rightarrow 3 + 1 = 4$
- β) $2 > 0 \Rightarrow 6 = 2 \cdot 3$
- γ) $5 = 2 + 3 \Rightarrow 2 > 8$
- δ) $2 = 5 + 6 \Rightarrow 8 > 10$
- ε) $3 = 2 \Rightarrow 2 > 5$

25) Νὰ σχηματίσετε τὸν πίνακα ἀληθείας τῶν :

- α) $p \Rightarrow \sim q$
- β) $\sim p \Rightarrow q$
- γ) $\sim p \Rightarrow \sim q$

26) Νὰ σχηματίσετε τὸν πίνακα ἀληθείας τῶν

$$p \Rightarrow q \text{ καὶ } \sim p \vee q$$

Τί παρατηρεῖτε;

27) Διὰ νὰ εἰναι $x = -2$ εἰναι ἀναγκαία συνθήκη ἢ $x^2 = 4$. Διατυπώσατε τοῦτο συμβολικῶς μὲν μίαν συνεπαγωγήν.

28) Νὰ σχηματίσετε τὸν πίνακα ἀληθείας τῆς :

$$p \Rightarrow (p \vee q)$$

29) Νὰ σχηματίσετε δύο συνεπαγωγὰς ἀπὸ κάθε ζεῦγος ἐκ τῶν κάτωθι προτάσεων καὶ νὰ εὕρετε τὰς τιμὰς ἀληθείας των.

- α) $3 + 4 = 7, 5 + 3 = 8$
- β) $5 + 1 = 6, 3 + 2 = 6$
- γ) $6 - 3 = 2, 4^2 = 25$
- δ) $0 = 1, 2 \cdot 5 = 10$

30) Εἰς τὰς κάτωθι συνεπαγωγὰς ἀνοικτῶν προτάσεων νὰ εὕρετε τὰ σύνολα ἀληθείας των.

(Τὸ σύνολον ἀναφορᾶς U εἰναι τὸ R).

- α) 'Εάν $x^2 = 4$, τότε $x = 2$ εἴτε -2
- β) 'Εάν $x = 4$, τότε $x^2 = 16$
- γ) 'Εάν $x^2 = 25$, τότε $x = -5$
- δ) 'Εάν $x = 3$, τότε $x \neq 5$
- ε) 'Εάν $x^2 \geq 0$, τότε $x^2 < 0$
- στ) 'Εάν $x^2 - 5x + 6 = 0$, τότε $x = 3$ εἴτε 2

31) « $\alpha = 3, \beta = 2$ ». Εἰναι ἡ πρότασις αὗτη ἱκανὴ ἢ ἀναγκαία συνθήκη διὰ νὰ ἔχωμεν $\alpha + \beta = 5$;

32) "Εστω ἐν σύνολον 3 προτάσεων : p, q, r , διὰ τὰς ὅποιας σχηματίζομεν ἔνα πίνακα τιμῶν ἀληθείας. Πόσας γραμμὰς θὰ περιέχῃ ὁ πίνακας ; Πόσας ἔαν αἱ διδόμεναι προτάσεις εἰναι ν ;

33) "Εστω p ἡ πρότασις «βρέχει» καὶ q ἡ πρότασις «κάμνει κρύο». Νὰ ἀποδύσετε λεκτικῶς τὰς προτάσεις :

$$\begin{aligned} p \wedge q, \quad p \wedge \sim q, \quad \sim p \wedge \sim q, \quad p \vee \sim q, \quad \sim (p \wedge q), \quad p \Rightarrow q \\ p \Rightarrow \sim q, \quad \sim p \Rightarrow q, \quad q \Rightarrow p, \quad \sim p \Rightarrow \sim q \end{aligned}$$

15. Η ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΘΕΤΟΣ ΜΙΑΣ ΣΥΝΕΠΑΓΩΓΗΣ.

A) "Εστω ἡ συνεπαγωγή :

« ἀν ἔνας ἀριθμὸς λήγῃ εἰς 0 ἢ 5, τότε εἰναι διαιρετὸς διὰ 5», τὴν ὅποιαν στημειώνομεν $p \Rightarrow q$.

Θεωροῦμεν τώρα τήν συνεπαγωγήν :

«ἄν ἔνας ἀριθμὸς εἶναι διαιρετὸς διὰ 5, τότε λήγει εἰς 0 ή 5». Τήν συνεπαγωγήν αὐτὴν θὰ τήν σημειώσωμεν μὲ $q \Rightarrow p$, διότι ὑπόθεσις εἰς τήν δευτέραν αὐτὴν συνεπαγωγήν είναι τὸ συμπέρασμα τῆς πρώτης καὶ τὸ συμπέρασμα τῆς δευτέρας συνεπαγωγῆς είναι ὑπόθεσις τῆς πρώτης.

Αἱ συνεπαγωγαὶ $p \Rightarrow q$ καὶ $q \Rightarrow p$ λέγονται ἀντίστροφοι ἢ μία τῆς ἄλλης.

Παρατηροῦμεν ὅτι αἱ $p \Rightarrow q$ καὶ $q \Rightarrow p$ τοῦ ἀνωτέρω παραδείγματος είναι καὶ αἱ δύο ἀληθεῖς. Δὲν συμβαίνει ὅμως αὐτὸν πάντοτε. Ἡ ἀντίστροφος μιᾶς ἀληθοῦς συνεπαγωγῆς ἐνδέχεται νὰ εἶναι ψευδής. Π.χ. $p \Rightarrow q$: ἔὰν δύο γωνίαι είναι ὀρθαί, τότε εἶναι ἵσαι (ἀληθής), ἐνῷ $q \Rightarrow p$: ἔὰν δύο γωνίαι είναι ἵσαι, τότε εἶναι ὀρθαί (ψευδής ἐν γένει).

B) "Εστω ἡ ἀληθής συνεπαγωγή :

$p \Rightarrow q$: ἔὰν ἔνας ἀριθμὸς λήγῃ εἰς 0 ή 5, τότε εἶναι διαιρετὸς διὰ 5. Ἡ συνεπαγωγὴ $\sim p \Rightarrow \sim q$ λέγεται ἀντίθετος τῆς $p \Rightarrow q$.

Εἰς τὸ παραδειγμάτων μας λεκτικῶς θὰ εἴπωμεν :

$\sim p \Rightarrow \sim q$: 'Ἐὰν ἔνας ἀριθμὸς δὲν λήγῃ εἰς 0 ή 5, τότε δὲν εἶναι διαιρετὸς διὰ 5, ἡ δόποια είναι ἀληθής πρότασις. Δὲν συμβαίνει ὅμως πάντοτε ἡ ἀντίθετος μιᾶς ἀληθοῦς συνεπαγωγῆς νὰ εἶναι ἐπίσης ἀληθής. Ἰδού ἐν παράδειγμα :

$p \Rightarrow q$: ἔὰν δύο γωνίαι είναι ὀρθαί, τότε εἶναι ἵσαι (ἀληθής).

$\sim p \Rightarrow \sim q$: ἔὰν δύο γωνίαι δὲν εἶναι ὀρθαί, τότε δὲν εἶναι ἵσαι (ψευδής).

16. Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑ ΔΥΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ.

A) Δύο προτάσεις p καὶ q λέγομεν ὅτι εἶναι **Ισοδύναμοι** μεταξύ των, ἔὰν ἡ σύζευξις ($p \Rightarrow q$) Λ ($q \Rightarrow p$) εἶναι ἀληθής. Συμβολίζομεν τὸ γεγονός αὐτὸν μὲ $p \Leftrightarrow q$ καὶ διαβάζομεν : p ισοδυναμεῖ (λογικῶς) μὲ q . Οὕτω, π.χ., αἱ προτάσεις p : ἔνας ἀριθμὸς λήγει εἰς 0 ή 5 καὶ q : ἔνας ἀριθμὸς είναι διαιρετὸς διὰ 5, είναι ισοδύναμοι, διότι ισχύει $p \Rightarrow q$ καὶ $q \Rightarrow p$. Γράφομεν λοιπὸν $p \Leftrightarrow q$.

Διὰ νὰ σχηματίσωμεν τὸν πίνακα ἀληθείας τῆς ισοδυναμίας, ἀρκεῖ νὰ σχηματίσωμεν τὸν πίνακα ἀληθείας τῆς συζεύξεως ($p \Rightarrow q$) Λ ($q \Rightarrow p$). "Έχομεν :

p	q	$p \Rightarrow q$	$q \Rightarrow p$	$(p \Rightarrow q) \Lambda (q \Rightarrow p)$
A	A	A	A	A
A	Ψ	Ψ	A	Ψ
Ψ	A	A	Ψ	Ψ
Ψ	Ψ	A	A	A

Δηλαδὴ ἔχομεν τὸν κάτωθι πίνακα τιμῶν ἀληθείας τῆς ισοδυναμίας :

p	q	$p \Leftrightarrow q$
A	A	A
A	Ψ	Ψ
Ψ	A	Ψ
Ψ	Ψ	A

Ήτοι ή ίσοδυναμία δύο προτάσεων είναι άληθής μόνον όταν και αἱ δύο προτάσεις είναι άληθεῖς η ψευδεῖς ταυτοχρόνως.

Μὲ ἄλλας λέξεις δύο προτάσεις p καὶ q λέγομεν ότι είναι ίσοδύναμοι, όταν ἔχουν τὰς αὐτάς τιμάς άληθείας συγχρόνως.

Παραδείγματα ἐφαρμογῆς τοῦ πίνακος :

- 1) $\delta 5$ είναι ἀκέραιος $\Leftrightarrow \delta -3$ είναι ἀρνητικός (άληθής)
- 2) $\delta \frac{5}{6}$ είναι ἀκέραιος $\Leftrightarrow \delta \sqrt{3}$ είναι φυσικός (άληθής)
- 3) $\delta 2$ είναι φυσικός $\Leftrightarrow \delta \frac{1}{3}$ είναι ἀκέραιος (ψευδής)
- 4) $\delta \frac{1}{2}$ είναι ἄρρητος $\Leftrightarrow \delta \sqrt{3}$ είναι ἄρρητος (ψευδής).
- 5) ή εύθεια $\epsilon // \epsilon'$ \Leftrightarrow ή εύθεια $\epsilon' // \epsilon$ (άληθής)
- 6) τὸ τρίγωνον ABG είναι ίσοπλευρον \Leftrightarrow τὸ τρίγωνον ABG είναι ίσογώνιον.

B) 'Η ίσοδυναμία $p \Leftrightarrow q$ διατυπώνεται λεκτικῶς καὶ μὲ ἄλλους τρόπους.

Προσέξατε τὰς δύο προτάσεις « p ἔαν q » καὶ « p μόνον ἔαν q ». 'Η « p ἔαν q » σημαίνει $q \Rightarrow p$ καὶ ή « p μόνον ἔαν q » σημαίνει $p \Rightarrow q$. 'Επομένως ἔαν καὶ αἱ δύο αὐταὶ προτάσεις είναι άληθεῖς, ή σύζευξίς των θὰ είναι άληθής. "Ωστε : « p ἔαν καὶ μόνον ἔαν q » σημαίνει $p \Rightarrow q$ καὶ $q \Rightarrow p$, δηλαδὴ $p \Leftrightarrow q$.

"Ωστε ἀντὶ νὰ λέγωμεν « p ίσοδυναμεῖ μὲ q », ήμποροῦμεν νὰ λέγωμεν « p ἔαν καὶ μόνον ἔαν q ».

Παράδειγμα : Θεωροῦμεν τὰς έξης δύο προτάσεις :

p : Δύο εύθειαι ἐνὸς ἐπιπέδου δὲν τέμνονται,
 q : αἱ εύθειαι αὐταὶ είναι παράλληλοι.

$p \Rightarrow q$: 'Εὰν δύο εύθειαι ἐνὸς ἐπιπέδου δὲν τέμνωνται, τότε είναι παράλληλοι (άληθής).

$q \Rightarrow p$: 'Εὰν δύο εύθειαι ἐνὸς ἐπιπέδου είναι παράλληλοι, τότε δὲν τέμνονται (άληθής).

'Ημποροῦμεν λοιπὸν νὰ εἴπωμεν :

«Δύο εύθειαι ἐνὸς ἐπιπέδου είναι παράλληλοι ἔαν, καὶ μόνον ἔαν, δὲν τέμνωνται».

Τὴν ίσοδυναμίαν δύο προτάσεων τὴν διατυπώνομεν καὶ μὲ ἄλλον τρόπον.

"Αν λάβωμεν πάλιν τὸ ἀνωτέρω παράδειγμα ήμποροῦμεν νὰ εἴπωμεν : «ἀναγκαία καὶ ίκανή συνθήκη διὰ νὰ είναι παράλληλοι δύο εύθειαι ἐνὸς ἐπιπέδου είναι νὰ μὴ τέμνωνται».

"Ενας ἄλλος τρόπος διατυπώσεως τῆς ίσοδυναμίας τῶν ἀνωτέρω δύο προτάσεων p καὶ q είναι : «Διὰ νὰ είναι παράλληλοι δύο εύθειαι ἐνὸς ἐπιπέδου, πρέπει καὶ ἀρκεῖ νὰ μὴ τέμνωνται».

"Ας λάβωμεν ἐν ἄλλο παράδειγμα :

"Υπενθυμίζομεν τὰ δύο θεωρήματα.

ΘΕΩΡΗΜΑ 1. 'Εὰν τὸ τετράπλευρον $ABGD$ είναι παραλληλόγραμμον, τότε αἱ διαγώνιοι του AG καὶ BD διχοτομοῦνται.

ΘΕΩΡΗΜΑ 2. 'Εάν αἱ διαγώνιοι ΑΓ καὶ ΒΔ ἐνὸς κυρτοῦ τετραπλεύρου ΑΒΓΔ διχοτομοῦνται, τότε τὸ τετράπλευρον τοῦτο εἶναι παραλληλόγραμμον.

"Ἄσ δύνομάσωμεν ρ τὴν πρότασιν : «ΑΒΓΔ εἶναι παραλληλόγραμμον», καὶ q τὸν πρότασιν «ΑΓ καὶ ΒΔ διχοτομοῦνται».

Τὸ θεώρημα 1 ἔκφράζεται διὰ τῆς συνεπαγωγῆς : $p \Rightarrow q$

Τὸ θεώρημα 2 ἔκφραζεται διὰ τῆς $q \Rightarrow p$.

Καὶ τὰ δύο θεωρήματα μαζὶ ἔκφραζονται διὰ τῆς ἴσοδυναμίας $p \Leftrightarrow q$.

Κάθε μία ἀπὸ τὰς προτάσεις ρ καὶ q εἶναι **ίκανὴ συνθήκη** διὰ τὴν ἄλλην καὶ ἐπίστης κάθε μία εἶναι **ἀναγκαῖα συνθήκη** διὰ τὴν ἄλλην.

*Ημποροῦμεν λοιπὸν νὰ εἴπωμεν :

«"Ινα ἐν τετράπλευρον εἶναι παραλληλόγραμμον ἀναγκαῖα καὶ ίκανὴ συνθήκη εἶναι αἱ διαγώνιοι του νὰ διχοτομοῦνται». "Η ἀκόμη :

«"Ινα ἐν τετράπλευρον εἶναι παραλληλόγραμμον **πρέπει καὶ ἀρκεῖ** αἱ διαγώνιοι του νὰ διχοτομοῦνται».

*Ἐπίστης, ὅπως εἴδομεν ἀνωτέρω, ἡμποροῦμεν νὰ εἴπωμεν :

«"Ἐν τετράπλευρον εἶναι παραλληλόγραμμον **ἐάν, καὶ μόνον** ἐάν, αἱ διαγώνιοι του διχοτομοῦνται».

*Ἀπὸ τὸν ὄρισμὸν τῆς ἴσοδυναμίας ἐννοοῦμεν ὅτι ἴσχουν αἱ ἔξῆς ιδιότητες :

α) $p \Leftrightarrow p$

β) $(p \Leftrightarrow q) \Leftrightarrow (q \Leftrightarrow p)$

γ) $(p \Leftrightarrow q \wedge q \Leftrightarrow r) \Rightarrow (p \Leftrightarrow r)$

17. ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ.

"Οπως καὶ εἰς τὴν συνεπαγωγήν, οὕτω καὶ εἰς τὴν ἴσοδυναμίαν ἡμποροῦμεν νὰ ἐπεκτείνωμεν τὴν ἔννοιαν καὶ διὰ ἀνοικτὰς προτάσεις. "Ἄσ ζητήσωμεν λοιπὸν τὸ σύνολον ἀληθείας τῆς $p(x) \Leftrightarrow q(x)$.

'Εάν θέσωμεν εἰς τὴν $p(x) \Leftrightarrow q(x)$, ὅπου x ἔνα στοιχεῖον τοῦ συνόλου ἀναφορᾶς U, τὸ δποιὸν ἀνήκει εἰς τὴν τομὴν $P \cap Q$, λαμβάνομεν μίαν ἀληθῆ σύνθετον πρότασιν, ἐπειδὴ καὶ τὰ δύο μέλη τῆς ἴσοδυναμίας εἶναι τώρα ἀληθεῖς προτάσεις. 'Εάν εἰς τὴν $p(x) \Leftrightarrow q(x)$, θέσωμεν ὅπου x ἔνα στοιχεῖον, τὸ δποιὸν ἀνήκει εἰς τὴν $P^c \cap Q^c$, λαμβάνομεν πάλιν μίαν ἀληθῆ σύνθετον πρότασιν, διότι τώρα καὶ τὰ δύο μέλη τῆς ἴσοδυναμίας εἶναι ψευδεῖς προτάσεις. 'Εάν ἀντὶ τοῦ x θέσωμεν δποιονδήποτε ἄλλο στοιχεῖον τοῦ U, προκύπτει ψευδῆς σύνθετος πρότασις, διότι τὸ ἔνα μέλος τῆς ἴσοδυναμίας θὰ εἶναι ἀληθῆς πρότασις καὶ τὸ ἄλλο ψευδῆς. Συμπεραίνομεν λοιπὸν ὅτι :

$$\{ x \mid p(x) \Leftrightarrow q(x) \} = (P \cap Q) \cup (P^c \cap Q^c)$$

Παράδειγμα.

Ζητεῖται τὸ σύνολον ἀληθείας τῆς $(x^2 = 4) \Leftrightarrow (x = 2)$. "Έχομεν ὅτι $p(x) : x^2 = 4$ καὶ $q(x) : x = 2$. 'Ἐπομένως $P = \{ 2, -2 \}$ καὶ $Q = \{ 2 \}$. "Ἄρα θὰ εἶναι $P^c = \{ x \mid x \neq 2 \text{ εἴτε } -2 \}$ καὶ $Q^c = \{ x \mid x \neq 2 \}$.

Συνεπώς $P \cap Q = \{2\}$ και $P^c \cap Q^c = \{x | x \neq 2 \text{ είτε } -2\}$ Τελικώς λοιπόν έχομεν :

$$\{x | p(x) \Leftrightarrow q(x)\} = (P \cap Q) \cup (P^c \cap Q^c) = \{x | x \neq -2\}$$

Σημ. 1. Τὸ σύνολον ἀληθείας τῆς ($x^2 = 4 \Leftrightarrow (x = 2)$) εἶναι ἀμέσως φανερὸν ὅτι εἶναι τὸ { $x | x \neq -2$ }, διότι τὸ -2 εἶναι ἡ μόνη τιμὴ τοῦ x (ἀπὸ τὸ σύνολον ἀναφορᾶς R), διὸ τὴν ὁποίαν δὲν λαμβάνουν τὰς αὐτὰς τιμὰς ἀληθείας καὶ τὰ δύο μέλη τῆς Ισοδυναμίας.

Σημ. 2. Αἱ προτάσεις

$$p \vee q, p \wedge q, p \Rightarrow q, p \Leftrightarrow q, \sim p$$

λέγονται σύνθετοι προτάσεις πρώτης βαθμίδος, διὰ κάθε ζεῦγος ἀπλῶν προτάσεων p καὶ q ἐκ τοῦ L .

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

34) Νὰ διατυπώσετε τὰς ἀντιστρόφους τῶν κάτωθι συνεπαγωγῶν καὶ νὰ ἀποφανθῆτε ἂν αὗται εἶναι ἀληθεῖς ἢ ψευδεῖς.

α) 'Εάν κάποιος ἔγεννήθη εἰς τὰς Πάτρας, τότε ἔχει 'Ελληνικήν Ιθαγένειαν.

β) 'Εάν $x - \psi = 3$, τότε $x > \psi$

γ) 'Εάν δύο ὄρθογώνια ἔχουν ίσας βάσεις καὶ ίσα ύψη, τότε ἔχουν ίσα ἐμβαδά.

δ) 'Εάν $x^2 = 25$, τότε $x = 5$ εἴτε $x = -5$.

ε) 'Εάν ἐν σημείον κεῖται ἐπὶ τῆς μεσοκαθέτου ἐνὸς εύθυγράμμου τμήματος, τότε ἀπέχει ἐξ ίσου ἀπὸ τὰ ἄκρα τοῦ τμήματος.

στ) 'Εάν $2 + 4 = 5$, τότε $4 + 6 = 8$

35) Νὰ ἀποφανθῆτε, ἂν αἱ κατωτέρω προτάσεις εἶναι Ισοδύναμοι μεταξύ των :

α) $p : 2x = 10 (x \in R)$

q : $x = 5$

β) $p : \text{Τὸ τρίγωνον } A B G \text{ εἶναι ισόπλευρον}$

q : $\text{Τὸ τρίγωνον } A B G \text{ εἶναι ισογώνιον}$

γ) $p : x > \psi (x, \psi \in R)$

q : $\psi < x$

δ) $p : \text{ἡ εύθεια } e \text{ εἶναι παράλληλος πρὸς τὴν } e'$

q : $\text{ἡ εύθεια } e' \text{ εἶναι παράλληλος πρὸς τὴν } e$

ε) $p : x = 4 \text{ εἴτε } x = -4$

q : $x^2 = 16$

36) Νὰ διατυπώσετε προτάσεις Ισοδυνάμους πρὸς τὰς κάτωθι ἀναγραφομένας :

α) Αἱ εύθειαι e καὶ e' τοῦ ἐπιπέδου (P) δὲν τέμνονται.

β) Τὸ σημείον M ἀνήκει εἰς τὴν εύθειαν e καὶ εἰς τὴν εύθειαν e' .

γ) Τὰ σημεῖα A καὶ B κείνται εἰς τὸ αὐτὸν ἡμιεπίπεδον ὡς πρὸς τὴν εύθειαν e .

δ) Τὸ παραλληλόγραμμον $A B \Gamma \Delta$ ἔχει τὰς διαγωνίους τοῦ $A \Gamma$ καὶ $B \Delta$ ίσας.

ε) Τὸ σημείον M κείται ἐπὶ τῆς διχοτόμου τῆς γωνίας θ .

στ) $x^2 = 1$.

ζ) $x = 2$ καὶ $\psi = -2$.

37) Νὰ εύρετε τὸ σύνολον ἀληθείας εἰς κάθε μίαν ἀπὸ τὰς κάτωθι Ισοδυναμίας ἀνοικτῶν προτάσεων (σύνολον ἀναφορᾶς τῆς μεταβλητῆς τὸ R).

α) $(x = 1) \Leftrightarrow (x = -1)$

β) $(x^2 = 0) \Leftrightarrow (x = 0)$

γ) $(3x = 6) \Leftrightarrow (x = 2)$

δ) $(x \neq 1) \Leftrightarrow (x^2 \neq 1)$

ε) $(x = 5) \Leftrightarrow (x \neq 5)$

στ) $(3x = 6) \Leftrightarrow (3x + 2 = 8)$

18. Η ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟΑΝΤΙΘΕΤΟΣ ΜΙΑΣ ΣΥΝΕΠΑΓΩΓΗΣ.

A) Εις τὰ προηγούμενα ἀπὸ τὴν συνεπαγωγὴν $p \Rightarrow q$ ἐσχηματίσαμεν τὴν ἀντίστροφόν της $q \Rightarrow p$ καὶ τὴν ἀντίθετόν της $\sim p \Rightarrow \sim q$. Μία ἄλλη συνεπαγωγὴ σχετίζομένη μὲ τὴν $p \Rightarrow q$ είναι ἡ $\sim q \Rightarrow \sim p$, ἡ ὅποια λέγεται ἀντίστροφοαντίθετος τῆς $p \Rightarrow q$.

Παραδείγματα :

$$1\text{ov. } p \Rightarrow q : x = 3 \Rightarrow x^2 = 9$$

$$\sim q \Rightarrow \sim p : x^2 \neq 9 \Rightarrow x \neq 3$$

2ov. $p \Rightarrow q$: 'Εὰν δύο εύθειαι ἔνδος ἐπιπέδου τέμνωνται, τότε αἱ εύθειαι δὲν είναι παραλληλοι. $\sim q \Rightarrow \sim p$: 'Εὰν δύο εύθειαι ἔνδος ἐπιπέδου είναι παραλληλοι, τότε δὲν τέμνονται.

3ov. $p \Rightarrow q$: 'Εὰν πάρω βαθμὸν 17 εἰς τὰ Μαθηματικά, τότε θὰ ἔχω 16 εἰς τὸ ἐνδεικτικόν μου (ἐννοεῖται : μὲ τὴν ὑπάρχουσαν βαθμολογίαν εἰς τὰ ἄλλα μαθήματα). $\sim q \Rightarrow \sim p$: 'Εὰν δὲν ἔχω 16 εἰς τὸ ἐνδεικτικόν μου, τότε δὲν θὰ ἔχω πάρει 17 εἰς τὰ Μαθηματικά.

4ov. $p \Rightarrow q$: 'Εὰν $A\Gamma = B\Delta$, τότε τὸ παραλληλόγραμμον $A\bar{B}\Gamma\Delta$ είναι ὁρθογώνιον.

$\sim q \Rightarrow \sim p$: 'Εὰν τὸ παραλληλόγραμμον $A\bar{B}\Gamma\Delta$ δὲν είναι ὁρθογώνιον, τότε $A\Gamma \neq B\Delta$.

B) 'Η πλέον ἐνδιαφέρουσα ιδιότης τῆς ἀντίστροφοαντίθετου μιᾶς συνεπαγωγῆς είναι ὅτι είναι ίσοδύναμος (ἔχει τὰς αὐτὰς τιμάς ἀληθείας) μὲ τὴν δοθεῖσαν συνεπαγωγήν. Δηλαδή :

$$(p \Rightarrow q) \Leftrightarrow (\sim q \Rightarrow \sim p)$$

"Ας κατασκευάσωμεν τὸν πίνακα ἀληθείας διὰ τὰς $p \Rightarrow q$ καὶ $\sim q \Rightarrow \sim p$:

p	q	$\sim p$	$\sim q$	$p \Rightarrow q$	$\sim q \Rightarrow \sim p$
A	A	Ψ	Ψ	A	A
A	Ψ	Ψ	A	Ψ	Ψ
Ψ	A	A	Ψ	A	A
Ψ	Ψ	A	A	A	A

'Απὸ τὰς στήλας 5ην καὶ 6ην τοῦ πίνακος βλέπομεν ὅτι αἱ σύνθετοι προτάσεις :

$$p \Rightarrow q \text{ καὶ } \sim q \Rightarrow \sim p$$

ἔχουν τὰς αὐτὰς τιμάς ἀληθείας, είναι λοιπὸν ίσοδύναμοι προτάσεις. 'Η ιδιότης αὐτῆς μᾶς ἐπιτρέπει προκειμένου νὰ ἀποδείξωμεν μίαν συνεπαγωγήν, νὰ ἀποδείξωμεν ἀντ' αὐτῆς τὴν ἀντίστροφοαντίθετόν της.

Οὕτω, π.χ., εἰς τὸ σύνολον τῶν παραλληλογράμμων ίσχύει ἡ πρότασις : «ἄν τὸ παραλληλόγραμμον $A\bar{B}\Gamma\Delta$ ἔχει ίσας τὰς διαγωνίους του, τότε ἔχει τὰς γωνίας του ὁρθάς». 'Η πρότασις αὗτη είναι ίσοδύναμος πρὸς τὴν πρότασιν : «'Εὰν τὸ παραλληλόγραμμον $A\bar{B}\Gamma\Delta$ δὲν ἔχει ὁρθὰς τὰς γωνίας του, τότε δὲν ἔχει τὰς διαγωνίους του ίσας».

Ίδον ἐν ἄλλῳ παράδειγμα :

Διὰ ν' ἀποδείξωμεν εἰς τὴν Γεωμετρίαν ὅτι : «ὁ γεωμετρικὸς τόπος (τὸ σύνολον) τῶν σημείων τοῦ ἐπιπέδου, τὰ ὅποια ἀπέχουν ἔξι ἵσου ἀπὸ τὰ ἄκρα ἐνὸς εὐθυγράμμου τμήματος AB, εἴναι ἡ μεσοκάθετος τοῦ τμήματος AB», ἀποδεικύομεν α) Ἐὰν τυχὸν σημεῖον M ἀπέχει ἕσσον ἀπὸ τὰ A καὶ B, τότε ἀνήκει εἰς τὴν μεσοκάθετον. καὶ β) Ἐὰν τὸ M ἀντίκη εἰς τὴν μεσοκάθετον τοῦ AB τότε ἀπέχει ἔξι ἵσου ἀπὸ τὰ A καὶ B.

Δυνάμεθα ὅμως νὰ ἐργασθῶμεν ως ἔξῆς : Νὰ ἀποδείξωμεν τὴν α) καὶ τὸπιν ἀντὶ τῆς β) νὰ ἀποδείξωμεν τὴν ἀντιστροφαντίθετον τῆς β), ὅτι δηλ. ἔὰν τὸ M δὲν ἀπέχῃ ἕσσον ἀπὸ τὰ A καὶ B, τότε δὲν ἀνήκει εἰς τὴν μεσοκάθετον.

Γ) Μία ἄλλη ἰδιότης τῆς $p \Rightarrow q$ εἴναι ὅτι εἴναι ισοδύναμος πρὸς τὴν $\sim p \vee q$.

Δηλ. ($p \Rightarrow q \Leftrightarrow (\sim p \vee q)$)

Πράγματι, ἀν κάμωμεν τὸν πίνακα ἀληθείας,

p	q	$\sim p$	$p \Rightarrow q$	$\sim p \vee q$
A	A	Ψ	A	A
A	Ψ	Ψ	Ψ	Ψ
Ψ	A	A	A	A
Ψ	Ψ	A	A	A

βλέπομεν ἀπὸ τὰς στήλας 4ην καὶ 5ην ὅτι $p \Rightarrow q$ καὶ $\sim p \vee q$ ἔχουν τὰς αὐτὰς τιμὰς ἀληθείας, δηλ. εἴναι ισοδύναμοι προτάσεις καὶ ἡμποροῦμεν, ὅταν χρειασθῇ, νὰ ἀντικαταστήσωμεν τὴν μίαν διὰ τῆς ἄλλης.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

38) Νὰ διατυπώσετε τὰς ἀντιστροφαντίθετους τῶν κάτωθι συνεπαγωγῶν.

α) Ἐὰν τηρῇς τὰς διατάξεις τοῦ κώδικος δικιῆς κυκλοφορίας, τότε δὲν θὰ λάβῃς κλῆσιν ἀπὸ τὸν τροχονόμον.

β) Ἐὰν εἰς τὸν "Ἀρην δὲν ὑπάρχῃ ἀτμόσφαιρα μὲ δέυγόνον, τότε δὲν ὑπάρχει ζωὴ ἔκει.

γ) Ἐὰν τὸ σημεῖον M ἀντίκη εἰς τὴν εὐθείαν ε, τότε δὲν ἀντίκη εἰς τὴν ε'.

δ) Ἐὰν ἡμπορέσῃς νὰ διατρέξῃς τρία χιλιόμετρα εἰς 1 λεπτόν, τότε θὰ φάγω τὸ καπέλλον μου.

ε) Ἐὰν $2x = 10$, τότε $x = 5$.

στ) Ἐὰν ἐν σημεῖον M κεῖται ἐπὶ τῆς διχοτόμου μιᾶς γωνίας θ, τότε τὸ M ἀπέχει ἔξι ἵσου ἀπὸ τὰς πλευρὰς τῆς γωνίας.

39) Νὰ ἀποδείξετε μὲ τὴν κατασκευὴν ἐνὸς πίνακος ἀληθείας ὅτι ἡ ἀρνησις τῆς $p \Rightarrow q$ είναι $p \wedge \sim q$.

40) Κατασκευάζοντες πίνακα τιμῶν ἀληθείας νὰ ἀποδείξετε ὅτι ἡ συνεπαγωγὴ είναι μεταβατική. Δηλ. $[(p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow r)] \Rightarrow (p \Rightarrow r)$.

41) "Αν $p : \epsilon_1$ είναι κάθετος ἐπὶ τὴν ϵ_3

$q : \epsilon_2$ είναι κάθετος ἐπὶ τὴν ϵ_3

$r : \epsilon_1$ είναι παράλληλος πρὸς τὴν ϵ_3

νὰ γράψετε ὑπὸ συμβολικὴν μορφὴν τὰς ἔξῆς προτάσεις :

α) ὅν ϵ_1 είναι κάθετος πρὸς ϵ_3 καὶ ϵ_2 κάθετος πρὸς τὴν ϵ_3 , τότε ἡ ϵ_1 είναι παράληλος πρὸς τὴν ϵ_2 .

β) ἂν ϵ_1 είναι κάθετος πρός τὴν ϵ_3 καὶ ϵ_2 δέν είναι κάθετος πρός τὴν ϵ_3 , τότε ἡ ϵ_1 δὲν είναι παράλληλος πρός τὴν ϵ_2 .

42) Νὰ δείξετε ότι προτάσεις $p \Rightarrow (q \vee r)$ καὶ $(p \Rightarrow q) \vee (p \Rightarrow r)$ είναι ίσοδύναμοι, ἔχουν δηλαδὴ τὰς αὐτάς τιμὰς ἀληθείας.

43) Νὰ διποδείξετε μὲν κατασκευὴν πίνακος ἀληθείας ότι ἡ ἀρνησις τῆς $p \Leftrightarrow q$ είναι ~ $p \Leftrightarrow q$ ἢ $p \Leftrightarrow \sim q$.

Ἐπειτα νὰ συμπληρώσετε τὸν κάτωθι πίνακα :

	Τύπος	Ἀρνησις
Σύζευξις	$p \wedge q$	$\sim p \vee \sim q$
Διάζευξις	$p \vee q$	—
Συνεπαγωγὴ	$p \Rightarrow q$	$p \wedge \sim q$
Ίσοδυναμία	$p \Leftrightarrow q$	—

19. ΘΕΩΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ.

Α) Εἰς τὴν § 12 εἴπομεν ότι Λογική είναι ἡ μελέτη τῶν κανόνων πρὸς κατασκευὴν ὄρθων συλλογισμῶν.

‘Ο μέγας Ἐλλην φιλόσοφος Ἀριστοτέλης ὑπῆρξεν ὁ πρῶτος μέγας διδάσκαλος καὶ θεμελιωτὴς τῆς Λογικῆς. Ἡ Λογικὴ τὴν δόποιαν συνέγραψε δὲν ἔχει σχεδὸν προαχθῆ μέχρι σήμερον καὶ εἰς τὴν πραγματικότητα ὅλα σχεδὸν, ὅσα μελετῶμεν σήμερον, ἀνήκουν εἰς ὅ, τι ὀνομάζομεν «Λογικὴν τοῦ Ἀριστοτέλους», ἡ δόποια ἔχει ἡλικίαν ὅνων τῶν 2000 ἑτῶν. Ἡ μαθηματικοποίησις τῆς Λογικῆς είναι, βεβαίως, ἔργον τῶν μεταγενεστέρων καὶ ἴδιως τοῦ Georges Boole (1815–1864) καὶ ἄλλων θεωρητικῶν τῆς Λογικῆς.

Εἰς τὰ Μαθηματικά, ἴδιως εἰς τὴν Γεωμετρίαν, ἡ ἐργασία μας συνίσταται εἰς τὴν ἀπόδειξιν θεωρημάτων, δηλαδὴ προτάσεων. Διὰ νὰ ἀποδείξωμεν ἐν θεώρημα πρέπει νὰ δείξωμεν ότι τοῦτο ἐπακολουθεῖ λογικῶς ἀπὸ τὰς ὑποθέσεις μας. Διὰ νὰ τὸ κάμωμεν αὐτὸ χρησιμοποιοῦμεν τὰς ἀρχὰς τῆς λογικῆς, δηλαδὴ λογικούς κανόνας.

Ἐάν, π.χ., γνωρίζωμεν ότι ἡ πρότασις $p \Rightarrow q$ είναι ἀληθής καὶ ότι ἡ p είναι ἀληθής, τότε δυνάμεθα νὰ συμπεράνωμεν ότι q είναι ἀληθής. Δηλαδὴ μὲ σύμβολα :

$$[(p \Rightarrow q) \wedge p] \Rightarrow q$$

Πράγματι, ἂν σχηματίσωμεν πίνακα ἀληθείας,

p	q	$p \Rightarrow q$	$(p \Rightarrow q) \wedge p$	$[(p \Rightarrow q) \wedge p] \Rightarrow q$
A	A	A	A	A
A	Ψ	Ψ	Ψ	A
Ψ	A	A	Ψ	A
Ψ	Ψ	A	Ψ	A

βλέπομεν ότι ἡ σύνθετος πρότασις $[(p \Rightarrow q) \wedge p] \Rightarrow q$ είναι πάντοτε ἀληθής, ἀνεξαρτήτως τῶν τιμῶν ἀληθείας, τὰς δόποιας λαμβάνουν αἱ συνιστῶσαι αὐτὴν προτάσεις. Μία τοιαύτη πρότασις λέγεται ταυτολογία καὶ μὲ τὰς ταυτολογίας, θὰ ἀσχοληθῶμεν κατωτέρω εἰδικώτερον.

‘Η σύνθετος πρότασις $[(p \Rightarrow q) \wedge p] \Rightarrow q$, είναι πάντοτε, ώς είπομεν, ένας δρθός συλλογισμός. ’Ενίστε γράφομεν αύτὸν ώς έξῆς :

$$\left. \begin{array}{l} p \Rightarrow q \text{ (άληθής)} \\ p \quad \text{ (άληθής)} \end{array} \right\} \quad (\text{ύπόθεσις τοῦ συλλογισμοῦ})$$

$\ddot{\alpha}\rho\alpha \quad q \quad (\text{συμπέρασμα τοῦ συλλογισμοῦ})$

Θὰ δώσωμεν τώρα παράδειγμα ἐφαρμογῆς τοῦ λογικοῦ κανόνος :

$$[(p \Rightarrow q) \wedge p] \Rightarrow q.$$

Παράδειγμα :

’Ελάβομεν μίαν πρόσκλησιν διὰ τὰς γυμναστικὰς ἐπιδείξεις τοῦ Γυμνασίου Α, ἡ ὅποια ἔγραφεν «ἄν βρέχῃ κατὰ τὴν ἡμέραν τῶν ἐπιδείξεων, ἡ ἔορτὴ θὰ γίνη εἰς τὸ κλειστὸν γυμναστήριον» ($p \Rightarrow q$). Σήμερον είναι ἡ ἡμέρα τῆς ἔορτῆς καὶ βρέχει (p είναι ἀληθής). ’Εφ’ ὅσον λοιπὸν αἱ προτάσεις $p \Rightarrow q$ καὶ p είναι καὶ αἱ δύο ἀληθεῖς, γνωρίζωμεν ὅτι q είναι ἀληθής, δηλ. ἡ ἔορτὴ θὰ γίνη εἰς τὸ κλειστὸν γυμναστήριον. ’Ημποροῦμεν τώρα νὰ εἴπωμεν ὅτι ἀπεδείξαμεν τὸ θεώρημα: «’Η ἔορτὴ τῶν γυμναστικῶν ἐπιδείξεων θὰ γίνη εἰς τὸ κλειστὸν Γυμναστήριον».

B) Μία ἄλλη τεχνικὴ χρησιμοποιουμένη εἰς τὰς ἀποδείξεις είναι ἡ έξῆς :

’Εὰν γνωρίζωμεν ὅτι $p \Rightarrow q$ είναι ἀληθής καὶ ἔὰν γνωρίζωμεν ὅτι q είναι ψευδής, τότε ἡμποροῦμεν νὰ συμπεράνωμεν ὅτι p είναι ψευδής. Συμβολικῶς : $[(p \Rightarrow q) \wedge \sim q] \Rightarrow \sim p$

Πράγματι, ἂν κατασκευάσωμεν πίνακα ἀληθείας,

p	q	$\sim p$	$\sim q$	$p \Rightarrow q$	$(p \Rightarrow q) \wedge \sim q$	$[(p \Rightarrow q) \wedge \sim q] \Rightarrow \sim p$
A	A	Ψ	Ψ	A	Ψ	A
A	Ψ	Ψ	A	Ψ	Ψ	A
Ψ	A	A	Ψ	A	Ψ	A
Ψ	Ψ	A	A	A	A	A

βλέπομεν ὅτι ἡ σύνθετος πρότασις $[(p \Rightarrow q) \wedge \sim q] \Rightarrow \sim p$ είναι πάντοτε ἀληθής, ἀνεξαρτήτως τῶν τιμῶν ἀληθείας, τὰς ὅποιας λαμβάνουν αἱ συνιστῶσαι αὐτὴν προτάσεις. Είναι δηλαδὴ ταυτολογία καὶ ἡμποροῦμεν νὰ τὴν χρησιμοποιοῦμεν ώς λογικὸν κανόνα.

’Ιδού ἔν παράδειγμα ἐφαρμογῆς τοῦ κανόνος τούτου :

Παράδειγμα :

’Ο μαθητής Γεωργίου λέγει ὅτι $\delta - 5$ είναι ρίζα τῆς ἔξισώσεως $x^2 - 5x + 6 = 0$. ’Εὰν -5 είναι ρίζα τῆς ἔξισώσεως $x^2 - 5x + 6 = 0$, τότε $(-5)^2 - 5 \cdot (-5) + 6 = 0$ ($p \Rightarrow q$). ’Αλλὰ $(-5)^2 - 5 \cdot (-5) + 6 = 25 + 25 + 6 \neq 0$ (q ψευδής). ’Εφ’ ὅσον τώρα γνωρίζομεν ὅτι $p \Rightarrow q$ είναι ἀληθής καὶ ὅτι q ψευδής, εἴμεθα βέβαιοι ὅτι p είναι ψευδής καὶ δὲ δ Γεωργίου ἔκαμε λάθος. ’Ο -5 δὲν είναι ρίζα τῆς ἔξισώσεως $x^2 - 5x + 6 = 0$.

Εἰς τὸ παράδειγμα αὐτὸν ἡμποροῦμεν νὰ εἴπωμεν ὅτι ἀπεδείξαμεν τὸ θεώρημα : « $\delta - 5$ δὲν είναι ρίζα τῆς ἔξισώσεως $x^2 - 5x + 6 = 0$ ».

’Η ώς ἀνω ἀπόδειξις ἡμπορεῖ νὰ γραφῇ ώς έξῆς :

Προτάσεις	Δικαιολογία
1) -5 είναι ρίζα της $x^2 - 5x + 6 = 0$ $\Rightarrow ((-5)^2 - 5 \cdot (-5) + 6 = 0)$	1) Όρισμός ρίζης μιᾶς έξισώσεως.
2) $(-5)^2 - 5 \cdot (-5) + 6 \neq 0$	2) Αριθμητική.
3) -5 δὲν είναι ρίζα της $x^2 - 5x + 6 = 0$	3) Προτάσεις 1 καὶ 2 καὶ κανόνες τῆς λογικῆς.

AΣΚΗΣΕΙΣ

Εἰς κάθε μίαν ἀπὸ τὰς κατωτέρως ἀσκήσεις 44–52 (*) δίδονται ώρισμέναι προτάσεις τὰς δόποιάς ὀνομάζουμεν ἀληθεῖς καὶ διατυπώνεται ἐν θεώρημα. Εἰς μερικάς περιπτώσεις τὸ θεώρημα δύναται νὰ είναι ψευδές καὶ εἰς ἄλλας νὰ μὴ δίδωνται ἀρκεταὶ πληροφορίαι διὰ νὰ ἀποφανθῶμεν διὸ τὸ θεώρημα είναι ἀληθὲς ή ψευδές. Ζητεῖται νὰ διατυπώσετε τὰς ἀποδείξεις. (αἱ διδόμεναι ἀληθεῖς προτάσεις λέγονται : ὑποθέσεις).

44) **Υπόθεσις.** 'Ο θεῖος Κώστας θὰ μᾶς συνοδεύσῃ εἰς τὸ θέατρον, ἐὰν ἡ μητέρα τὸ ἐπιτρέψῃ. 'Η μητέρα τὸ ἐπέτρεψε.

Θεώρημα. 'Ο θεῖος Κώστας θὰ μᾶς συνοδεύσῃ εἰς τὸ θέατρον.

45) **Υπόθεσις.** 'Ἐὰν δὲν ὑπάρχῃ ὅργον εἰς τὴν Σελήνην, τότε δὲν ὑπάρχει ζωὴ ἔκει. Δοκιμαὶ ἔχουν δεῖτε τελειωτικῶς διὰ δὲν ὑπάρχει ὅργον ἐπὶ τῆς Σελήνης.

Θεώρημα. Δὲν ὑπάρχει ζωὴ ἐπὶ τῆς Σελήνης.

46) **Υπόθεσις** $x + \psi = 20$, $x - \psi = 4$

Θεώρημα. $x \neq 1$

47) **Υπόθεσις** $2x - 3\psi = 7$, $x + 2\psi = 3$

Θεώρημα. $3x - \psi = 10$

48) **Υπόθεσις.** Τὸ γινόμενον δύο θετικῶν ἀριθμῶν είναι θετικός. 'Ο ἀριθμὸς α είναι θετικός. Τὸ γινόμενον $\alpha \cdot \beta$ δὲν είναι θετικός.

Θεώρημα. 'Ο ἀριθμὸς β είναι ἀρνητικός.

49) **Υπόθεσις.** 'Ἐὰν $\alpha \in Z$, τότε $1 \cdot \alpha = \alpha$. 'Ἐὰν $\alpha, \beta, \gamma \in Z$, τότε $\beta \cdot \alpha + \gamma \cdot \alpha = (\beta + \gamma) \cdot \alpha$, $1 + 1 = 2$.

Θεώρημα. Διὰ κάθε $\alpha \in Z$, ισχύει $\alpha + \alpha = 2\alpha$

50) **Υπόθεσις.** $6 + (-6) = 0,8 = 2 + 6$. Διὰ κάθε τριάδα ἀριθμῶν α, β, γ , ἐκ τοῦ Z , ισχύει διὰ $(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma)$. 'Επίσης διὰ κάθε $x \in Z$ ισχύει διὰ $x + 0 = x$.

Θεώρημα. $8 + (-6) = 2$.

51) Νὰ κατασκευάσετε ἕνα πίνακα ἀληθείας διὰ τὴν σύνθετον πρότασιν (p Λ q) v r.

52) Ποία είναι ἡ ἀρνητικής τῆς ~ p, δηλαδὴ μὲ ποίαν πρότασιν ισοδυναμεῖ ἡ ~ (~ p) ;

53) 'Ἐὰν $\alpha, \beta \in R$, $\alpha \neq 0$ καὶ $\alpha(3\beta - 8) = \alpha$, τί ἡμπορεύετε νὰ συμπεράνετε ;

54) 'Ἐὰν $\alpha, \beta \in R$, $\beta \neq 4$ καὶ $(3\alpha + 12)(2\beta - 8) = 0$, τί ἡμπορεύετε νὰ συμπεράνετε ;

'Ἐὰν $x = 5$, τότε $3x + 6 = 21$

55) Νὰ ἀποδείξετε τὸ ἀντίστροφον τοῦ ἀνωτέρω θεωρήματος τῆς ἀσκήσεως 54.

56) 'Ἐὰν $\alpha, \beta \in R$, $\alpha \neq 0$ καὶ $\alpha(3\beta - 8) = \alpha$, τί ἡμπορεύετε νὰ συμπεράνετε ;

57) 'Ἐὰν $\alpha, \beta \in R$, $\beta \neq 4$ καὶ $(3\alpha + 12)(2\beta - 8) = 0$, τί ἡμπορεύετε νὰ συμπεράνετε ;

20. ΤΑΥΤΟΛΟΓΙΑ.

Μία σύνθετος πρότασις, ἡ δόποια μορφώνεται ἀπὸ ἄλλας προτάσεις p, q, r κ.τ.λ. πεπερασμένου πλήθους, συνδεομένας μὲ τὰ σύμβολα Λ , V , \underline{V} , \Rightarrow ,

(*) 'Εκ τῶν ἀσκήσεων τούτων θὰ δοθοῦν εἰς τοὺς μαθητάς, δσαι κατὰ τὴν κρίσιν τοῦ διάσκοντος ἀπαιτοῦνται διὰ τὴν ἐμπέδωσιν τῆς ἐννοίας «ἀπόδειξις».

\Leftrightarrow , \sim , θὰ δύναμέται λογικὸς τύπος Αί p , q , r , κ.τ.λ., αἱ δόποιαι δύνανται νὰ λάβουν τιμὰς Α ἢ Ψ , λέγονται μεταβληταὶ τοῦ λογικοῦ τύπου.

Οἱ τύποι, τοὺς δόποιους συνηντήσαμεν εἰς τὰ προηγούμενα : $p \wedge q$, $p \vee q$, $p \Rightarrow q$, $\sim p$, $p \Leftrightarrow q$, δύναμέζονται ἀπλοῖ τύποι. Συμφώνως πρὸς τοὺς ἀνωτέρω δρισμοὺς ἡ ἔκφρασις $\sim p \wedge \sim q$ εἶναι ἔνας λογικὸς τύπος, δῆπος ἐπίστης καὶ αἱ ἔκφράσεις $[(p \Rightarrow q) \wedge p] \Rightarrow q$ καὶ $[(p \Rightarrow q) \wedge \sim q] \Rightarrow \sim p$, τὰς δόποιας συνηντήσαμεν εἰς τὰ προηγούμενα.

*Απὸ δοσα ἔξεθέσαμεν εἰς τὰ προηγούμενα ἔννοοῦμεν ὅτι διὰ νὰ εὔρωμεν τὰς τιμὰς ἀληθείας ἐνὸς λογικοῦ τύπου, θὰ σχηματίσωμεν ἔνα πίνακα, τοῦ δόποιου αἱ πρῶται στῆλαι θὰ ἔχουν ἐπικεφαλίδας τὰς ἀπλᾶς προτάσεις p , q , r , κ.τ.λ., ἀπὸ τὰς δόποιας ἀποτελεῖται ὁ τύπος. *Ἐὰν αἱ ἀπλαῖ προτάσεις εἶναι δύο, τότε αἱ γραμμαὶ τοῦ πίνακος θὰ εἶναι $2^2 = 4$. *Ἀν αἱ ἀπλαῖ προτάσεις εἶναι τρεῖς, τότε αἱ γραμμαὶ τοῦ πίνακος θὰ εἶναι $2^3 = 8$. *Ἀν αἱ προτάσεις εἶναι τέσσαρες, αἱ γραμμαὶ θὰ εἶναι $2^4 = 16$ κ.ο.κ. *Ἐπειτα θὰ σχηματίσωμεν ἐν συνεχείᾳ στήλας μὲν ἐπικεφαλίδας τοὺς ἀπλοὺς τύπους, εἰς τοὺς δόποιους ἀναλύεται ὁ δοθεὶς λογικὸς τύπος. Εἰς τὴν τελευταίαν στήλην ἐπικεφαλὶς θὰ εἶναι ὁ δοθεὶς σύνθετος τύπος. *Ἐὰν εἰς τὴν τελευταίαν στήλην αἱ τιμαὶ εἶναι εἰς δῆλας τὰς γραμμὰς τῆς A , τότε ὁ δοθεὶς τύπος εἶναι ἀληθής, δι' ὅλας τὰς τιμὰς τῶν συνθετικῶν του προτάσεων καὶ λέγεται ταυτολογία. *Ωστε : ταυτολογία λέγεται πᾶς λογικὸς τύπος, ὁ δόποιος ἀληθεύει διὰ κάθε τιμῆν (ἀληθῆ ἢ ψευδῆ) τῶν ἀπλῶν προτάσεών του.

Δύο σπουδαίας ταυτολογίας συνηντήσαμεν εἰς τὰ προηγούμενα καὶ εἴδομεν ὅτι εἰς τὰ Μαθηματικὰ γίνεται μεγάλη χρῆσις αὐτῶν. Εἶναι αἱ ταυτολογίαι :

- 1) $[(p \Rightarrow q) \wedge p] \Rightarrow q$
- 2) $[(p \Rightarrow q) \wedge \sim q] \Rightarrow \sim p$

Δίδομεν μερικὰ ἀκόμη παραδείγματα ταυτολογιῶν :

- 1) *Η συνεπαγωγὴ $p \Rightarrow p$ εἶναι ταυτολογία.

p	$p \Rightarrow p$	
A	A	A
Ψ	A	A

- 2) *Η ισοδυναμία $\sim(\sim p) \Leftrightarrow p$ εἶναι ταυτολογία.

p	$\sim p$	$\sim(\sim p)$	$\sim(\sim p) \Leftrightarrow p$
A	Ψ	A	A
Ψ	A	Ψ	A

- 3) *Η σύνθετος πρότασις $(p \Rightarrow q) \Leftrightarrow (\sim p \vee q)$ εἶναι ταυτολογία :

p	q	$\sim p$	$p \Rightarrow q$	$\sim p \vee q$	$(p \Rightarrow q) \Leftrightarrow (\sim p \vee q)$
A	A	Ψ	A	A	A
A	Ψ	Ψ	Ψ	Ψ	A
Ψ	A	A	A	A	A
Ψ	Ψ	A	A	A	A

4) Ή σύνθετος πρότασις $(p \Leftrightarrow q) \Leftrightarrow [(\sim p \vee q) \wedge (p \vee \sim q)]$ είναι ταυτολογία :

p	q	$\sim p$	$\sim q$	$\sim p \vee q$	$p \vee \sim q$	$p \Leftrightarrow q$	$(\sim p \vee q) \wedge (p \vee \sim q)$	$(p \Leftrightarrow q) \Leftrightarrow [(\sim p \vee q) \wedge (p \vee \sim q)]$
A	A	Ψ	Ψ	A	A	A	A	A
A	Ψ	Ψ	A	Ψ	A	Ψ	Ψ	A
Ψ	A	A	Ψ	A	Ψ	Ψ	Ψ	A
Ψ	Ψ	A	A	A	A	A	A	A

5) Ή σύνθετος πρότασις $(p \vee q) \Leftrightarrow (\sim p \wedge q) \vee (p \wedge \sim q)$ είναι ταυτολογία :

p	q	$\sim p$	$\sim q$	$\sim p \wedge q$	$p \wedge \sim q$	$p \vee q$	$(\sim p \wedge q) \vee (p \wedge \sim q)$	$(p \vee q) \Leftrightarrow [(\sim p \wedge q) \vee (p \wedge \sim q)]$
A	A	Ψ	Ψ	Ψ	Ψ	Ψ	Ψ	A
A	Ψ	Ψ	A	Ψ	A	A	A	A
Ψ	A	A	Ψ	A	Ψ	A	A	A
Ψ	Ψ	A	A	Ψ	Ψ	Ψ	Ψ	A

Από τους πίνακας των τριών τελευταίων παραδειγμάτων έπειται ότι :

- 1) $p \Rightarrow q$ είναι ίσοδύναμος πρός τήν $\sim p \vee q$
- 2) $p \Leftrightarrow q$ είναι ίσοδύναμος πρός τήν $(\sim p \vee q) \wedge (p \vee \sim q)$
- 3) $p \vee q$ είναι ίσοδύναμος πρός τήν $(\sim p \wedge q) \vee (p \wedge \sim q)$

Έκ τούτων έπειται ότι διά των πράξεων της άρνησεως, της συζεύξεως και διαζεύξεως δυνάμεθα νὰ έκφραστομεν τάς άλλας πράξεις της συνεπαγωγῆς (\Rightarrow), της ίσοδυναμίας (\Leftrightarrow) και της άποκλειστικῆς διαζεύξεως (\vee) καὶ έπομένως δόπιοςδήποτε λογικὸς τύπος δύναται νὰ διατυπωθῇ διά των τριών συμβόλων : \wedge , \vee καὶ \sim .

21. ΑΝΤΙΦΑΣΙΣ.

Μία σύνθετος πρότασις λέγεται άντιφασις, ἐὰν καὶ μόνον ἐάν, είναι ψευδής δι' όποιανδήποτε τιμὴν (A ή Ψ) τῶν συνιστωσῶν προτάσεών της.

Κλασσικὸν παράδειγμα άντιφάσεως είναι ἡ σύνθετος πρότασις $p \wedge \sim p$.

p	$\sim p$	$p \wedge \sim p$
A	Ψ	Ψ
Ψ	A	Ψ

Απὸ τὸν κατωτέρω πίνακα βλέπομεν ότι ἡ ἀρνησις μιᾶς ταυτολογίας ἀποτελεῖ άντιφασιν καὶ ἡ ἀρνησις μιᾶς άντιφάσεως ταυτολογίαν.

p	$\sim p$	$p \vee \sim p$	$p \wedge \sim p$	$\sim(p \vee \sim p)$	$\sim(p \wedge \sim p)$
A	Ψ	A	Ψ	Ψ	A
Ψ	A	A	Ψ	Ψ	A

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

58) Νὰ ἀποδείξετε χρησιμοποιοῦντες πίνακας ἀληθείας ότι οἱ κάτωθι τύποι ἀποτελοῦν ταυτολογίας :

- α) $[(\sim p \wedge q)] \Leftrightarrow (\sim p \vee \sim q)$
- β) $[(\sim p \vee q)] \Leftrightarrow (\sim p \wedge \sim q)$
- γ) $[\sim(p \Rightarrow q)] \Leftrightarrow (p \wedge \sim q)$

- 59) Όμοιον ζήτημα διά τούς τύπους :
- $[\sim (p \Leftrightarrow q)] \Leftrightarrow (\sim p \Leftrightarrow q)$
 - $[\sim (p \Leftrightarrow q)] \Leftrightarrow (p \Leftrightarrow \sim q)$
- 60) Νὰ ἀποδείξετε δύοις διά προτελούν ταυτολογίας οι κάτωθι τύποι :
- $(p \wedge q) \Rightarrow q$
 - $[\sim p \wedge (p \vee q)] \Rightarrow q$
 - $p \Rightarrow (p \vee q)$
- 61) Όμοιον ζήτημα διά τούς τύπους :
- $p \vee (q \vee r) \Leftrightarrow (p \vee q) \vee r$
 - $p \wedge (q \wedge r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \wedge r$
- 62) Όμοιώς :
- $p \wedge (q \vee r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$
 - $p \vee (q \wedge r) \Leftrightarrow (p \vee q) \wedge (p \vee r)$
 - $[(p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow r)] \Rightarrow (p \Rightarrow r)$.
- 63) Νὰ ἀποδείξετε διά, ὅτι, ἐάν α είναι μία ἀληθής πρότασις, τότε $(p \wedge \alpha) \Leftrightarrow p$.
- 64) Νὰ ἀποδείξετε διά, ψ είναι μία ψευδής πρότασις, τότε $(p \vee \psi) \Leftrightarrow p$.
- 65) Νὰ ἀποδείξετε διά, $(p \vee p) \Leftrightarrow p$ καὶ $(p \wedge p) \Leftrightarrow p$.

22. ΤΥΠΟΙ ΑΛΗΘΕΙΣ ΚΑΤΑ ΣΥΓΚΥΡΙΑΝ.

"Ἐνας λογικὸς τύπος, ὁ ὅποιος δὲν είναι οὔτε ταυτολογία οὔτε ἀντίφασις, ἀλλ' ὁ ὅποιος διά μερικὰς τιμὰς τῶν μεταβλητῶν του (ἀπλῶν προτάσεών του) δίδει ἀληθὲς ἀποτέλεσμα καὶ δι' ἄλλας ψευδές, λέγεται τύπος ἀληθῆς κατὰ συγκυρίαν (ἢ σχετικὸς τύπος).

Παράδειγμα. 'Ο τύπος $\sim p \vee q$ είναι ἀληθής κατὰ συγκυρίαν.

p	q	$\sim p$	$\sim p \vee q$
A	A	Ψ	A
A	Ψ	Ψ	Ψ
Ψ	A	A	A
Ψ	Ψ	A	A

Οἱ πίνακες ἀληθείας ἀποτελούν ἔνα ἀσφαλῆ τρόπον διά νὰ διαπιστώνω-
μεν ἂν ἐνας τύπος είναι ταυτολογία ἢ ἀντίφασις ἢ ἀληθῆς κατὰ συγκυρίαν.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

- 66) "Ἐνας μαθητής ἔκαμε τὸν ἔξῆς συλλογισμόν :

$$\begin{array}{c} p \Rightarrow q \quad (\text{ἀληθής}) \\ q \quad (\text{ἀληθής}) \\ \hline \text{ἄρα } p \quad (\text{ἀληθής}) \end{array}$$

Νὰ ἔξετάσετε ἂν είναι ὁ συλλογισμὸς αὐτὸς πάντοτε ἀληθής. (Θὰ κάμετε πίνακα ἀλη-
θείας διά $[(p \Rightarrow q) \wedge q] \Rightarrow p$.

67) Νὰ δώσετε ἔνα συγκεκριμένον παράδειγμα ἀπὸ τὴν 'Ἀριθμητικήν, ἀπὸ τὸ ὅποιον
νὰ φαίνεται διά ὁ συλλογισμὸς τῆς ἀσκῆσεως 66 είναι ἀληθῆς κατὰ συγκυρίαν (π.χ. $p : 1 = 3$,
 $q : 2 = 2$).

- 68) "Ἐνας μαθητής ἔκαμε τὸν ἔξῆς συλλογισμόν :

'Ἐάν $x = 0$ καὶ $\psi = z$, τότε $\psi > 1$.

*Αλλά $\psi \Rightarrow 1$. *Άρα $\psi \neq z$.

Νά έλεγχετε τὸν συλλογισμὸν τοῦτον.

(Παραστήσατε μὲρ : $x = 0$, $q : \psi = z$, $r : \psi > 1$ κτλ.).

69) *Έλεγχατε τοὺς κάτωθι συλλογισμούς :

α) $[(p \Rightarrow \sim q) \wedge \sim q] \Rightarrow \sim p$.

β) $x \times 5 \Rightarrow x \neq \psi$, $x \neq \psi \wedge x \times 5$.

*Άρα $x \nless 5 \wedge x = \psi$

γ) $x = 2 \vee x < 2$, $x = 3 \neq 2$, $x = 3 \Rightarrow x \nless 2$.

*Άρα $x \neq 3$

δ) $x = \psi\psi \neq 1$, $(x = \psi \wedge \psi \neq 1)$. *Άρα $\psi \neq 1$.

70) Δείξατε ότι :

α) δ τύπος $[\sim(p \wedge q)] \Leftrightarrow (p \Rightarrow \sim q)$ είναι μία ταυτολογία.

β) δ τύπος $(p \wedge q) \wedge \sim q$ ἀποτελεῖ ἀντίφασιν.

γ) δ τύπος $[(p \vee q) \wedge p] \Rightarrow \sim q$ είναι σχετικός τύπος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΙ

ΣΥΝΟΛΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ

23. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ. ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ.

Έμάθομεν είς τὰς προηγουμένας τάξεις ὅτι τὴν λέξιν **σύνολον** χρησιμοποιοῦμεν ὅταν θέλωμεν ν' ἀναφερθῶμεν εἰς ἀντικείμενα ὡρισμένα καὶ σαφῶς διακεκριμένα, τὰ δόποια θεωροῦμεν ὡς μίαν δλότητα.

Οὕτω, π.χ., δύλιοῦμεν περὶ τοῦ συνόλου τῶν μαθητῶν τῆς τάξεώς μας, τοῦ συνόλου τῶν ἀγροτῶν τῆς χώρας μας, τοῦ συνόλου τῶν φυσικῶν ἀριθμῶν, τοῦ συνόλου τῶν σημείων ἐνὸς ἐπιπέδου, τοῦ συνόλου τῶν σημείων ἐνὸς εὐθυγράμμου τμήματος, τοῦ συνόλου τῶν διανυσμάτων τοῦ ἐπιπέδου κ.τ.λ.

Τὰ ἀντικείμενα, τὰ δόποια συναποτελοῦν ἐν σύνολον, λέγονται **στοιχεῖα** τοῦ συνόλου.

Όνομάζομεν τὰ σύνολα γενικῶς μὲ κεφαλαίᾳ γράμματα τοῦ ἀλφαβήτου μας, τὰ δὲ στοιχεῖα μὲ μικρά.

"Οταν ἔν στοιχείον x ἀνήκη εἰς ἔν σύνολον A γράφομεν συμβολικῶς x ∈ A.

"Οταν ἔν στοιχείον x δὲν ἀνήκη εἰς τὸ σύνολον A γράφομεν x ∉ A.

Δι' ἔν σύνολον A καὶ ἔν στοιχείον x ἀληθεύει ᷂ x ∈ A ᷂ x ∉ A.

Η ἔννοια τοῦ συνόλου εἶναι συνδεδεμένη μὲ τὴν ἔννοιαν τῆς βασικῆς ισότητος, ἡ δόποια συμβολίζεται μὲ « = » καὶ βάσει αὐτῆς θεωροῦμεν τὰ στοιχεῖα τοῦ συνόλου ὡς διακεκριμένα μεταξύ των. Δύο στοιχεῖα α καὶ β λέγομεν ὅτι εἶναι **ἴσα** καὶ γράφομεν $\alpha = \beta$, ἐάν, καὶ μόνον ἐάν, τὰ α καὶ β εἶναι ὄνόματα τοῦ αὐτοῦ στοιχείου. Οὕτω, π.χ., εἰς τὸ σύνολον Q εἶναι $2 = \frac{10}{5}$.

Ἐὰν δὲν εἶναι $\alpha = \beta$, τότε λέγομεν ὅτι α εἶναι **διάφορον** τοῦ β καὶ γράφομεν συμβολικῶς $\alpha \neq \beta$. Διὰ δύο τυχόντα στοιχεῖα x καὶ ψ θὰ ίσχύει :

ἢ $x = \psi$ ἢ $x \neq \psi$.

"Οπως μᾶς εἶναι γνωστόν, ἔν σύνολον συμβολίζεται :

- 1) μὲ ἀναγραφήν τῶν στοιχείων του ἐντὸς ἀγκίστρου.
- 2) μὲ περιγραφήν χαρακτηριστικῆς ιδιότητος τῶν στοιχείων του τῇ βοηθείᾳ μεταβλητῆς καὶ ἀγκίστρου.

Π.χ. $N = \{1, 2, 3, \dots\}$

$Z = \{x | x \text{ άκέραιος τῆς } 'Αλγέβρας\}$

Πρὸς εύκολιάν κατὰ τὴν διατύπωσιν γενικῶν προτάσεων εἰσάγεται εἰς τὰ Μαθηματικὰ ἐν σύνολον, τὸ δόποιον λέγεται **κενὸν σύνολον**, συμβολιζόμενον μὲν \emptyset . Εἰς τὸ σύνολον τοῦτο οὐδὲν στοιχεῖον ἀνήκει.

24. ΥΠΟΣΥΝΟΛΟΝ ΣΥΝΟΛΟΥ.

Λέγομεν ὅτι ἐν σύνολον A εἶναι **ύποσύνολον** ἐνὸς σύνολου B , καὶ συμβολίζομεν $A \subseteq B$, ἐὰν καὶ μόνον ἔαν, κάθε στοιχεῖον τοῦ A εἶναι καὶ στοιχεῖον τοῦ B . Συμβολικῶς δὲ δρισμὸς αὐτὸς διατυπώνεται ὡς ἔξῆς :

$$(A \subseteq B) \Leftrightarrow (\forall x : x \in A \Rightarrow x \in B).$$

Οὔτω, π.χ., τὸ σύνολον N , τῶν φυσικῶν ἀριθμῶν, εἶναι ύποσύνολον τοῦ συνόλου R , τῶν πραγματικῶν ἀριθμῶν : $N \subseteq R$.

Δεχόμεθα ὅτι τὸ κενὸν σύνολον \emptyset εἶναι ύποσύνολον δόποιου δήποτε ἄλλου συνόλου, δηλ. $\emptyset \subseteq A$, διὰ κάθε σύνολου A . Τὸ κενὸν σύνολον ἔχει ύποσύνολον μόνον τὸν ἑαυτόν του, δηλ. $\emptyset \subseteq \emptyset$.

Ίσχύουν αἱ κάτωθι ἰδιότητες :

- 1) $A \subseteq A$ (ἀνακλαστική ἢ αὐτοπαθής).
- 2) $(A \subseteq B \wedge B \subseteq \Gamma) \Rightarrow A \subseteq \Gamma$ (μεταβατική)

Ἐν σύνολον A λέγεται **γνήσιον** ύποσύνολον ἄλλου συνόλου B , ἔαν, καὶ μόνον ἔαν, τὸ A εἶναι ύποσύνολον τοῦ B καὶ ὑπάρχῃ στοιχεῖον $x \in B$ μὲν $x \notin A$. Συμβολικῶς γράφομεν τότε : $A \subset B$. Δηλαδή :

$$(A \subset B) \Leftrightarrow (\forall x : x \in A \Rightarrow x \in B) \wedge (\exists \psi \in B : \psi \notin A)$$

Ἐάν ἐν σύνολον A δὲν εἶναι ύποσύνολον συνόλου B θὰ γράφωμεν : $A \not\subset B$.

Ἡ ἔννοια γνήσιον ύποσύνολον ἔχει μόνον τὴν μεταβατικὴν ἰδιότητα : $(A \subset B \wedge B \subset \Gamma) \Rightarrow A \subset \Gamma$

Τὸ σύνολον B , τοῦ δόποιού θεωροῦμεν διάφορα ύποσύνολα A, Δ, E κ.τ.λ. λέγεται **σύνολον ἀναφορᾶς** ἢ **ύπερσύνολον** τῶν A, Δ, E κ.τ.λ.

25. ΙΣΑ ΣΥΝΟΛΑ.

Δύο σύνολα A καὶ B λέγομεν ὅτι εἶναι **ἴσα**, καὶ συμβολίζομεν $A = B$, ἔαν, καὶ μόνον ἔαν, κάθε στοιχεῖον τοῦ A εἶναι καὶ στοιχεῖον τοῦ B καὶ ἀντιστρόφως, κάθε στοιχεῖον τοῦ B εἶναι καὶ στοιχεῖον τοῦ A . Δηλαδή, συμβολικῶς : $(A = B) \Leftrightarrow (\forall x : x \in A \Rightarrow x \in B) \wedge (\forall \psi : \psi \in B \Rightarrow \psi \in A)$

Οὔτω, π.χ., ἐὰν $A = \{1, 2, 3\}$ καὶ $B = \{\frac{5}{5}, 3, 2\}$, τότε ἔχομεν $A = B$.

Ἐάν δύο σύνολα A καὶ B δὲν εἶναι **ἴσα**, τότε λέγομεν ὅτι τὸ A εἶναι **διάφορον** τοῦ B καὶ συμβολίζομεν $A \neq B$.

Ίσχύουν αἱ ἔξῆς ἰδιότητες τῆς ισότητος τῶν συνόλων :

- 1) $A = A$ (ἀνακλαστική ἢ αὐτοπαθής).
- 2) $A = B \Rightarrow B = A$ (συμμετρική).
- 3) $(A = B \wedge B = \Gamma) \Rightarrow A = \Gamma$ (μεταβατική).

Ίσχυει έπίσης ή έξης ίδιότης :

$$(A \subseteq B \wedge B \subseteq A) \Rightarrow (A = B) \quad (\text{άντισυμμετρική})$$

Πράγματι :

$$\begin{aligned} (A \subseteq B) &\Leftrightarrow (\forall x : x \in A \Rightarrow x \in B) \\ (B \subseteq A) &\Leftrightarrow (\forall x : x \in B \Rightarrow x \in A) \end{aligned} \quad \left\{ \Rightarrow A = B \right.$$

26. ΔΥΝΑΜΟΣΥΝΟΛΟΝ ΣΥΝΟΛΟΥ.

"Όταν έχωμεν ἐν σύνολον U και θεωρήσωμεν όλα τὰ ὑποσύνολα αὐτοῦ ὡς ἀντικείμενα, δῆλος ὡς στοιχεῖα ἐνὸς νέου συνόλου, τότε δρίζεται ἔνα νέον σύνολον, τὸ ὅποιον λέγεται δυναμοσύνολον τοῦ U . Τούτο συμβολίζεται μὲν $\mathcal{P}(U)$, ἀνήκουν δὲ εἰς αὐτὸν καὶ τὸ κενὸν σύνολον καὶ τὸ ἴδιον τὸ U .

"Οπως ἐμάθομεν εἰς προηγουμένας τάξεις, κάθε σύνολον διάφορον τοῦ κενοῦ ἔχει τὸ δλιγώτερον δύο ὑποσύνολα : τὸ κενὸν σύνολον καὶ τὸν ἑαυτόν του. "Ἐν σύνολον μὲν δύο στοιχεῖα ἔχει $2^2 = 4$ ὑποσύνολα. "Ἐν σύνολον μὲ τρία στοιχεῖα ἔχει $2^3 = 8$ ὑποσύνολα, ἐν μὲ πέντε στοιχεῖα ἔχει 2^5 ὑποσύνολα καὶ γενικῶς ἐν σύνολον μὲ n στοιχεῖα ἔχει 2^n ὑποσύνολα. Ούτω, π.χ., ἐάν $A = \{1, 2, 3\}$, τότε $\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}$, παρατηροῦμεν δὲ ὅτι τὸ A ἔχει $2^3 = 8$ ὑποσύνολα.

27. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ VENN.

Εἰς πολλὰς περιπτώσεις διευκολυνόμεθα εἰς τὴν μελέτην ἐνὸς ζητήματος ἀναφερομένου εἰς σύνολα, ἐάν χρησιμοποιήσωμεν γραφικάς παραστάσεις αὐτῶν, τὰ γνωστά μας ἀπὸ τὰς προηγουμένας τάξεις διαγράμματα τοῦ Venn. "Υπενθυμίζομεν ὅτι εἰς ἐν διάγραμμά τοῦ Venn τὰ στοιχεῖα τοῦ συνόλου παριστάνονται διὰ σημείων ἀνεξαρτήτως τῆς φύσεως αὐτῶν.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

71) Εάν $A = \{\alpha, \beta, \gamma, \delta, \epsilon\}$, νὰ ἐλέγχετε ἢν είναι ἀληθεῖς καὶ ποῖαι ἀπὸ τὰς κάτωθι προτάσεις :

$$\beta \in A, \epsilon \notin A, \zeta \in A, 8 \in A, \gamma \in A$$

72) Νὰ δώσετε μὲ ἀναγραφήν τῶν στοιχείων των τὰ σύνολα

$$\alpha) \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 - 5x + 6 = 0\} \quad \beta) \{x \in \mathbb{N} \mid x < 2\}$$

73) Νὰ εὑρετε χαρακτηριστικήν ίδιότητα διὰ τὴν περιγραφήν τῶν κάτωθι συνόλων :

$$\alpha) \{0, 3, 6, 9, \dots\}$$

$$\beta) \{1, 4, 9, \dots\}$$

$$\gamma) \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$$

74) Νὰ ἀναγράψετε δύο σύνολα, τῶν ὅποιων τὰ στοιχεῖα νὰ είναι σύνολα.

75) "Αν $A \subseteq B$ καὶ $A \neq B$ τί συμπεραίνετε διὰ τὸ σύνολον A ;

76) Νὰ καθορίσετε μὲ ἀναγραφήν τῶν στοιχείων του τὸ σύνολον $\{x \in \mathbb{R} \mid x^2 + 1 = 0\}$

77) Νὰ ἀποδείξετε ὅτι $(A \subset B \wedge B \subseteq \Gamma) \Rightarrow A \subset \Gamma$

78) Νὰ σχηματίσετε τὸ δυναμοσύνολον τοῦ $\{\emptyset, \alpha, \beta\}$

79) Νὰ ἀποδείξετε, διὰ, ἐάν $A \subseteq \emptyset$, τότε $A = \emptyset$

80) Ποιον είναι τὸ δυναμοσύνολον τοῦ κενοῦ συνόλου ;

81) Νὰ ἔξετάσετε ἂν τὸ κενὸν σύνολον εἶναι γνήσιον ὑποσύνολον τοῦ τυχόντος συνόλου A.

82) Νὰ ἀναγράψετε τὸ σύνολον λύσεων τῆς ἔξισώσεως

$$(x+1)(2x+1)(x^2-2)(x^2+1)=0$$

α) ὅταν σύνολον ἀναφορᾶς εἶναι τὸ R

β) ὅταν σύνολον ἀναφορᾶς εἶναι τὸ Q

γ) ὅταν σύνολον ἀναφορᾶς εἶναι τὸ N.

28. ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΝΟΛΩΝ.

"Ἄσθεωρήσωμεν ἐν σύνολον ἀναφορᾶς U μὴ κενὸν καὶ τελείως ὡρισμένον, τοῦ δποίου τὰ ὑποσύνολα ἃς συμβολίσωμεν μὲ A, B, Γ, ..., X, Ψ, ...

"Οπως γνωρίζομεν δύο ὑποσύνολα τοῦ U, ἔστωσαν τὰ A, B, λέγονται ἵσα, ἔάν καὶ μόνον ἔάν, διὰ κάθε $x \in A \Rightarrow x \in B$ καὶ διὰ κάθε $y \in B \Rightarrow y \in A$. Ἡ ἔννοια τῆς ἰσότητος αὐτῆς δύναται νὰ θεωρηθῇ ὡς βασική ἰσότης εἰς τὸ σύνολον ὅλων τῶν ὑποσυνόλων τοῦ U, τὸ δποίον, ὡς γνωστὸν συμβολίζομεν μὲ $\mathcal{P}(U)$. Βάσει τῆς ἰσότητος αὐτῆς τὰ ὑποσύνολα τοῦ U θεωροῦνται διακεκριμένα μεταξύ των. Εἰς τὸ σύνολον τοῦτο, τῶν ὑποσυνόλων τοῦ U, δρίζονται πράξεις ὡς ἔξῆς :

A) Ἐνωσις συνόλων.

"Ως ἔνωσις δύο συνόλων A καὶ B, ἡ δποία συμβολίζεται μὲ $A \cup B$, δρίζεται τὸ σύνολον δλων τῶν στοιχείων, τὰ δποία ἀνήκουν εἰς τὸ A εἴτε εἰς τὸ B.

Συμβολικῶς γράφομεν :

$$A \cup B = \{ x \in U \mid x \in A \vee x \in B \}$$

"Αν τὰ σύνολα A καὶ B δρίζονται διὰ χαρακτηριστικῆς ἴδιότητος τῶν στοιχείων των, δηλ. ἀν, π.χ., εἶναι

$A = \{ x \in U \mid p(x) \}$ καὶ $B = \{ x \in U \mid q(x) \}$, τότε ἔχομεν, ὅπως γνωρίζομεν ἀπὸ τὴν Λογικήν, ὅτι :

$$A \cup B = \{ x \in U \mid p(x) \vee q(x) \}$$

"Η γραφική παράστασις τῆς ἔνώσεως δύο συνόλων A καὶ B φαίνεται εἰς τὸ παραπλεύρως διάγραμμα. Εἶναι τὸ ἐσκιασμένον μέρος τοῦ σχήματος.

Ίσχύουν αἱ ἔξῆς ἴδιότητες :

$$1) A \cup B = B \cup A \quad (\text{ἀντιμεταθετική})$$

Πράγματι, $A \cup B = \{ x \in U \mid x \in A \vee x \in B \} = \{ x \in U \mid x \in B \vee x \in A \}$ (διότι $p \vee q \Leftrightarrow q \vee p$) = $= B \cup A$

$$2) (A \cup B) \cup \Gamma = A \cup (B \cup \Gamma) \quad (\text{προσεταιριστική})$$


Πράγματι,

$$(A \cup B) \cup \Gamma = \{ x \in U \mid x \in (A \cup B) \vee x \in \Gamma \}$$

$$= \{ x \in U \mid x \in A \vee x \in B \vee x \in \Gamma \}$$

$$= \{ x \in U \mid x \in A \vee x \in (B \cup \Gamma) \}, \text{ διότι } (p \vee q) \vee r \Leftrightarrow p \vee (q \vee r)$$

$$= A \cup (B \cup \Gamma)$$



Σχ. 28.1

Λόγω της ισχύος της ίδιοτητος 2) συμφωνοῦμεν νὰ γράφωμεν :
 $(A \cup B) \cup G = A \cup (B \cup G) = A \cup B \cup G$

‘Η πρᾶξις υπέκειται διὰ περισσότερα σύνολα :

$$A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup \dots \cup A_v = \bigcup_{k=1}^v A_k = \{ x \in U \mid x \in A_1 \vee x \in A_2 \vee \dots \vee x \in A_v \}.$$

B) Τομή συνόλων.

‘Ως τομή δύο συνόλων A καὶ B δρίζεται τὸ σύνολον τῶν στοιχείων, τὰ δόπτοια ἀνήκουν εἰς τὸ A καὶ εἰς τὸ B συγχρόνως, συμβολίζεται δὲ μὲ $A \cap B$.

Συμβολικῶς γράφομεν τὸν δόρισμὸν ὡς ἔξῆς :

$$A \cap B = \{ x \in U \mid x \in A \wedge x \in B \}$$

‘Αν τὰ σύνολα A καὶ B δίδονται διὰ χαρακτηριστικῆς ίδιοτητος τῶν στοιχείων των, π.χ.. ἂν εἴναι :

$$A = \{ x \in U \mid p(x) \} \text{ καὶ } B = \{ x \in U \mid q(x) \},$$

τότε θὰ ἔχωμεν :

$$A \cap B = \{ x \in U \mid p(x) \wedge q(x) \}$$

‘Η γραφικὴ παράστασις τῆς τομῆς δύο συνόλων A καὶ B φαίνεται εἰς τὸ παραπλεύρως διάγραμμα. Είναι τὸ ἐσκιασμένον μέρος τοῦ σχήματος.

‘Ισχύουν αἱ ἔξῆς ίδιοτητες :

$$1) A \cap B = B \cap A \text{ (ἀντιμεταθετική)}$$

Πράγματι :

$$A \cap B = \{ x \in U \mid x \in A \wedge x \in B \}$$

Σχ. 28.2

$$= \{ x \in U \mid x \in B \wedge x \in A \}, \text{ διότι } p \wedge q \Leftrightarrow q \wedge p \\ = B \cap A$$

$$2) (A \cap B) \cap G = A \cap (B \cap G) \text{ (προσεταιριστική)}$$

Πράγματι,

$$(A \cap B) \cap G = \{ x \in U \mid x \in (A \cap B) \wedge x \in G \}$$

$$= \{ x \in U \mid x \in A \wedge x \in B \wedge x \in G \}$$

$$= \{ x \in U \mid x \in A \wedge x \in (B \cap G) \}, \text{ διότι } (p \wedge q) \wedge r \Leftrightarrow p \wedge (q \wedge r) \\ = A \cap (B \cap G)$$

Λόγω της ισχύος της ίδιοτητος 2) συμφωνοῦμεν νὰ γράφωμεν :

$$(A \cap B) \cap G = A \cap (B \cap G) = A \cap B \cap G$$

‘Η πρᾶξις \cap ἐπέκειται διὰ περισσότερα σύνολα :

$$A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap \dots \cap A_v = \bigcap_{k=1}^v A_k = \{ x \in U \mid x \in A_1 \wedge x \in A_2 \wedge \dots \wedge x \in A_v \}$$

Τέλος ὑπενθυμίζομεν ὅτι, ἂν $A \cap B = \emptyset$, τότε τὰ σύνολα A , B λέγονται ἔνενα μεταξύ των. Κατὰ ταῦτα ‘Εὰν $A \cap B \neq \emptyset$ τότε $[\exists x : x \in A \wedge x \in B]$ καὶ ἀντιστρόφως, ἔὰν $[\exists x : x \in B \wedge x \in A]$ τότε $A \cap B \neq \emptyset$ ἢ καὶ $A \cap B \neq \emptyset \Leftrightarrow [\exists x : x \in A \wedge x \in B]$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

83) ‘Εὰν $A = \{ 1, 2, 3, 5 \}$ καὶ $B = \{ -1, 3, 7 \}$ νὰ σχηματίσετε τὰ σύνολα $A \cup B$, $A \cap B$

84) "Αν $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 0\}$, $B = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 < x < 8\}$ και $\Gamma = \{x \in \mathbb{R} \mid 2 < x < 6\}$ νά συμβολίσετε μὲ χρήσιν μεταβλητῆς τὰ σύνολα $A \cap B$, $A \cup B$, $A \cap \Gamma$, $A \cup \Gamma$, $B \cup \Gamma$, $A \cap B \cap \Gamma$, $A \cup B \cup \Gamma$.

85) Νά άποδείξετε ότι :

$$\alpha) A \cup A = A \quad \beta) A \cup \emptyset = A$$

86) Νά άποδείξετε ότι :

$$\alpha) A \cap A = A \quad \beta) A \cap \emptyset = \emptyset$$

87) Νά άποδείξετε ότι :

$$\alpha) A \cap B \subseteq A \quad \beta) A \cap B \subseteq B$$

88) Νά άποδείξετε ότι :

$$\alpha) A \subseteq A \cup B \quad \beta) B \subseteq A \cup B$$

89) Νά άποδείξετε ότι $(A \cup B = \emptyset) \Rightarrow (A = \emptyset \wedge B = \emptyset)$

90) 'Ομοίως ότι, έὰν $A \subseteq B$, τότε : α) $B = A \cup B$ β) $A = A \cap B$

91) Νά άποδείξετε ότι $(A \cap B) \cap \Gamma \subseteq A \cap (B \cap \Gamma)$ και ἐπίσης ότι $A \cap (B \cap \Gamma) \subseteq (A \cap B) \cap \Gamma$. Τί συνάγομεν έξι αὐτῶν ;

92) Νά άποδείξετε ότι :

$$\alpha) A \cap (B \cup \Gamma) = (A \cap B) \cup (A \cap \Gamma) \quad \beta) A \cup (B \cap \Gamma) = (A \cup B) \cap (A \cup \Gamma) \quad \left\{ \text{(ἐπιμεριστικαὶ ιδιότητες)} \right.$$

$$\beta) A \cup (B \cap \Gamma) = (A \cup B) \cap (A \cup \Gamma)$$

Νά δείξετε καὶ μὲ διάγραμμα τοῦ Venn ότι αἱ ἀνωτέρω ιδιότητες ἀληθεύουν.

Γ) Διαφορὰ συνόλων.

'Ως διαφορὰ συνόλου B ἀπὸ τὸ σύνολον A , συμβολίζομένη μὲ $A - B$, δρίζεται τὸ σύνολον τῶν στοιχείων τοῦ A , τὰ δόποια δὲν ἀνήκουν εἰς τὸ B . 'Εὰν τὰ A καὶ B εἶναι ξένα, τότε δεχόμεθα ότι $A - B = A$. Τέλος, έὰν $A = B$, τότε $A - B = A - A = \emptyset$.


Συμβολικῶς δὲ δρισμὸς οὗτος γράφεται ὡς ἔξῆς :

$$A - B = \{x \in U \mid x \in A \wedge x \notin B\}$$

'Η γραφικὴ παράστασις τῆς διαφορᾶς $A - B$ φαίνεται εἰς τὸ παραπλεύρως διάγραμμα. Εἶναι τὸ ἐσκιασμένον μέρος τοῦ σχήματος.

'Εκ τοῦ αὐτοῦ σχήματος βλέπομεν ἀμέσως ότι :

$$(A - B) \cup B = A \cup B$$



Δ) Συμπλήρωμα συνόλου.

'Ονομάζομεν συμπλήρωμα τοῦ συνόλου A ὡς πρὸς τὸ U , και τὸ συμβολίζομεν μὲ A^c εἴτε μὲ C_A ,

Σχ. 28.3

τὸ σύνολον $U - A$, δηλ. τὸ σύνολον τῶν στοιχείων τοῦ U , τὰ δόποια δὲν ἀνήκουν εἰς τὸ A .

Συμβολικῶς δὲ δρισμὸς οὗτος γράφεται :

$$A^c = \{x \in U \mid x \notin A\}$$

Εἶναι φανερὸν ἐκ τῶν ἀνωτέρω δρισμῶν ότι :

$$1) A \cap A^c = \emptyset, \quad 2) A \cup A^c = U \quad \text{καὶ} \quad 3) (A^c)^c = A$$

'Ἐπίσης ότι $C_U = \emptyset$ καὶ $C_{\emptyset} = U$

Τέλος ἐκ τοῦ ἀνωτέρω σχήματος ἔχομεν ότι :

$$A - B = A \cap B^c$$

'Ισχύουν αἱ ἔξῆς ίδιότητες, αἱ δποῖαι λέγονται νόμοι τοῦ De Morgan :

$$1) (A \cap B)^c = A^c \cup B^c$$

$$2) (A \cup B)^c = A^c \cap B^c$$

'Αποδεικνύομεν ἐδῶ τὴν ίσότητα 2) :

Διὰ κάθε $x \in U$, $x \in (A \cup B)^c \Rightarrow x \notin (A \cup B) \Rightarrow \sim(x \in A \vee x \in B)$ (*) $\Rightarrow x \notin A \wedge x \notin B \Rightarrow x \in A^c \wedge x \in B^c \Rightarrow x \in (A^c \cap B^c)$.

$$\text{"Ωστε : } (A \cup B)^c \subseteq (A^c \cap B^c) \quad (\alpha)$$

'Αντιστρόφως :

Διὰ κάθε $x \in U$, $x \in (A^c \cap B^c) \Rightarrow (x \in A^c \wedge x \in B^c) \Rightarrow \sim(x \in A \vee x \in B) \Rightarrow (x \notin A \wedge x \notin B) \Rightarrow x \notin (A \cup B) \Rightarrow x \in (A \cup B)^c$

$$\text{"Ωστε εἰναι } (A^c \cap B^c) \subseteq (A \cup B)^c \quad (\beta)$$

'Εκ τῶν (α) καὶ (β) ἐπεται ἡ ἀνωτέρω ίσότης (2).

Μὲ δομοιον τρόπον ἀποδεικνύεται ἡ (1).

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

93) Νὰ ἀποδείξετε ὅτι :

$$(A = B^c) \Leftrightarrow (A^c = B)$$

94) Νὰ ἀποδείξετε ὅτι τὰ σύνολα A καὶ $B - A$ εἰναι ξένα μεταξύ των.

95) Νὰ ἀποδείξετε ὅτι $A - \emptyset = A$

96) Νὰ ἀποδείξετε καὶ μὲ συλλογισμὸν ὅτι

$$(A - B) \cup B = A \cup B$$

(Θὰ ἀντικαταστήσετε τὸ $A - B$ μὲ τὸ ίσον του $A \cap B^c$ καὶ θὰ ἐφαρμόσετε τὴν ἐπιμεριστικὴν ίδιότητα τῆς ἑνώσεως ώς πρὸς τὴν τομήν).

97) Νὰ ἀπλοποιήσετε τὰς κάτωθι παραστάσεις :

$$\alpha) B \cap (A \cup A^c)$$

$$\beta) A \cup (Γ \cup Γ^c)$$

$$\gamma) (B \cap Γ) \cup (B \cap Γ^c)$$

$$\delta) (A \cap B) \cup (A \cap B^c) \cup (A^c \cap B)$$

29. ΚΑΡΤΕΣΙΑΝΟΝ ΓΙΝΟΜΕΝΟΝ ΣΥΝΟΛΟΥ Α ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΝ Β.

'Η ξένοια τοῦ διατεταγμένου ζεύγους μᾶς εἰναι γνωστὴ ἀπὸ τὰς προηγουμένας τάξεις : "Ἐν ζεύγος στοιχείων λέγεται διατεταγμένον ζεύγος, ἔαν, καὶ μόνον ἔαν, ἔχῃ ὄρισθη ποιὸν στοιχεῖον εἰναι πρῶτον καὶ ποιὸν δεύτερον. Οὔτω, π.χ., ἔαν διὰ τὰ στοιχεῖα α , β ὄρισωμεν ώς πρῶτον τὸ α καὶ ώς δεύτερον τὸ β ἔχομεν καθορίσει τὴν διάταξιν εἰς τὸ ζεύγος, τοῦτο δὲ συμβολίζομεν διὰ τοῦ (α, β), ἔνῳ ἀν ὄρισωμεν ώς πρῶτον τὸ β καὶ ώς δεύτερον τὸ α θὰ γράψωμεν (β, α).

Εἰς ἐν διατεταγμένον ζεύγος (α, β) τὸ α λέγεται : τὸ πρῶτον μέλος τοῦ ζεύγους καὶ τὸ β : τὸ δεύτερον μέλος τοῦ ζεύγους.

'Απὸ τὸν ἀνωτέρω ὄρισμὸν τοῦ διατεταγμένου ζεύγους ἐπεται ὅτι (α, β) \neq (β, α). Εἰναι ὅμως δυνατὸν νὰ ἔχωμεν ζεύγος μὲ τὸ αὐτὸ πρῶτον καὶ δεύτερον μέλος, ὅπως, π.χ., τὰ (α, α), (β, β), (γ, γ). κ.τ.λ.

Δύο διατεταγμένα ζεύγη (α, β) καὶ (α', β') ὄριζονται ώς ίσα, ἔαν μόνον ἔαν, εἰναι $\alpha = \alpha'$ καὶ $\beta' = \beta'$.

(*) Διότι : $\sim(p \vee q) \Leftrightarrow \sim p \wedge \sim q$

Έάν A και B είναι δύο μη κενά σύνολα, τόσυνολον τῶν διατεταγμένων ζευγών (α, β) μὲ α ∈ A και β ∈ B, λέγεται: καρτεσιανὸν γινόμενον τοῦ συνόλου A ἐπὶ τὸ σύνολον B και συμβολίζεται μὲ $A \times B$.

Συμβολικῶς δ ἀνωτέρω δρισμὸς γράφεται :

$$AXB = \{ (\alpha, \beta) \mid \alpha \in A \wedge \beta \in B \}$$

"Αν $A = \emptyset$ η $B = \emptyset$, τότε $A \times B = \emptyset$ ἐξ δρισμοῦ. Είναι δηλ. $A \times \emptyset = \emptyset$ και $\emptyset \times B = \emptyset$

'Εάν $A = B$, τότε $A \times A = A^2 = \{ (\alpha, \beta) \mid \alpha \in A \wedge \beta \in A \}$

Παραδείγματα: 1ον) 'Εάν $A = \{ 1, 2 \}$ και $B = \{ \alpha, \beta \}$, τότε $A \times B = \{ (1, \alpha), (1, \beta), (2, \alpha), (2, \beta) \}$ ἐνῷ $B \times A = \{ (\alpha, 1), (\alpha, 2), (\beta, 1), (\beta, 2) \}$. "Ωστε: $A \times B \neq B \times A$

2) 'Εάν $A = N = \{ 1, 2, 3, \dots \}$, τότε

$$N \times N = N^2 = \left\{ \begin{array}{l} (1, 1), (1, 2), (1, 3), \dots \\ (2, 1), (2, 2), (2, 3), \dots \\ (3, 1), (3, 2), (3, 3), \dots \\ \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \dots \\ \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \dots \\ \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \dots \end{array} \right\}$$

"Υπενθυμίζομεν τὰ κάτωθι :

1) 'Η ἀντιμεταθετικὴ ιδιότης δὲν ἴσχυει εἰς τὸ καρτεσιανὸν γινόμενον δύο συνόλων. Δηλ. είναι $A \times B \neq B \times A$ ἐκτὸς ἔαν είναι $A = B$ η δ εἰς τῶν παραγόντων είναι τὸ κενὸν σύνολον.

2) 'Εάν τὸ σύνολον A ἔχῃ μ τὸ πλῆθος στοιχεῖα και τὸ B ἔχῃ ν στοιχεῖα, τότε τὸ A × B ἔχει μ · ν τὸ πλῆθος στοιχεῖα. 'Εάν τὸ A η τὸ B ἔχῃ ἄπειρον πλῆθος στοιχείων, τότε τὸ καρτεσιανὸν γινόμενον A × B ἔχει ἐπίσης ἄπειρον πλῆθος στοιχείων.

3) Δυνάμεθα νὰ παραστήσωμεν ἐν καρτεσιανὸν γινόμενον μὲ πίνακα διπλῆς εἰσόδου, ὅπως ἐμάθομεν εἰς τὴν γ' τάξιν.

5) 'Εάν θεωρήσωμεν τὰ μέλη ἑνὸς διατεταγμένου ζεύγους ως συντεταγμένας σημείου εἰς τὸ ἐπίπεδον δύο ἀξόνων x'0x, ψ'0ψ, τότε κάθε διατεταγμένον ζεύγος παριστάνει ἐν σημεῖον εἰς τὸ ἐπίπεδον αὐτό. 'Επομένως ἐν καρτεσιανὸν γινόμενον μὲ δύο παράγοντας, π.χ. τὸ A × B, θὰ παριστάνη τότε ἐν σύνολον σημείων εἰς τὸ ἐπίπεδον αὐτό. "Εχομεν τότε τὴν λεγομένην γεωμετρικὴν (η γραφικὴν) παράστασιν τοῦ καρτεσιανοῦ γινομένου.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

98) 'Εάν τὰ διατεταγμένα ζεύγη $(x + \psi, 1)$ και $(5, x - \psi)$ είναι ίσα, νὰ εὕρετε τὰ x και ψ.

99) 'Εάν $A = \{ 1, 2, 3 \}$ και $B = \{ 0, 1, -2 \}$, νὰ σχηματίσετε τὸ A × B. "Επειτα νὰ κάμετε γεωμετρικὴν παράστασιν αὐτοῦ.

100) Νὰ ἀποδείξετε δτι :

$$\alpha) A \times (B \cap \Gamma) = (A \times B) \cap (A \times \Gamma)$$


$$\beta) " \text{Αν } A \subseteq B, \text{ τότε } A \times A \subseteq B \times B.$$

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ III


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ

30. ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΝ ΚΑΙ ΠΛΑΓΙΟΓΩΝΙΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ.

A) Εις ἐν ἐπίπεδον (E) χαράσσομεν δύο τεμνομένους ἄξονας x' Ox και y' Oy , ἔχοντας κοινὴν ἀρχὴν τὸ σημεῖον O τῆς τομῆς των καὶ μοναδιαῖα διανύσματα $\vec{O\theta} = \vec{i}$ καὶ $\vec{O\eta} = \vec{j}$ ἀντιστοίχως (σχ. 30-1 καὶ 30,-2).



Σχ. 30.1



Σχ. 30.2

Οἱ δύο αὐτοὶ ἄξονες ἀποτελοῦν ἐν σύστημα ἄξόνων ἐπὶ τοῦ ἐπιπέδου (E).

Ἐστω τώρα τυχὸν σημεῖον M τοῦ ἐπιπέδου (E). Ἀπὸ τὸ M φέρομεν τὰς παραλλήλους τῶν ἄξόνων. Ὁρίζονται οὕτως ἐν σημεῖον P ἐπὶ τοῦ ἄξονος x' Ox καὶ ἐν σημεῖον R ἐπὶ τοῦ ἄξονος y' Oy . Ὁρίζονται ἐπίσης τὰ διανύσματα \vec{OM} , \vec{OP} , \vec{OR} .

Τὸ διάνυσμα \vec{OM} λέγεται διανυσματικὴ ἀκτὶς τοῦ σημείου M .

» » \vec{OP} » τετμημένη προβολὴ τοῦ \vec{OM} .

» » \vec{OR} » τεταγμένη προβολὴ τοῦ \vec{OM} .

Ἡ ἀλγεβρ. τιμὴ \vec{OP} , τοῦ \vec{OP} , λέγεται τετμημένη τοῦ σημείου M .

» » » \vec{OP} , » \vec{OP} , λέγεται τεταγμένη τοῦ σημείου M .


Ἡ τετμημένη ἐνὸς σημείου M συμβολίζεται μὲ xm καὶ ἡ τεταγμένη του μὲ ym δύνομάζονται δὲ ἀμφότεραι συντεταγμέναι τοῦ σημείου M .

Παρατηροῦμεν τώρα ότι : 1) μὲ τὸν τρόπον, τὸν ὅποιον εἴδομεν προηγουμένως, εἰς κάθε σημεῖον M τοῦ ἐπιπέδου ἀντιστοιχεῖ ἐν, καὶ μόνον ἐν, διατεταγμένον ζεῦγος πραγματικῶν ἀριθμῶν μὲ πρῶτον μέλος του τὴν τετμημένην x_M , τοῦ M , καὶ δεύτερον μέλος του τὴν τεταγμένην ψ_M , τοῦ M , δηλαδὴ τὸ διατεταγμένον ζεῦγος (x_M, ψ_M). 2) Ἀντιστρόφως εἰς κάθε διατεταγμένον ζεῦγος πραγματικῶν ἀριθμῶν (x, ψ) ἀντιστοιχεῖ ἐν καὶ μόνον σημεῖον τοῦ ἐπιπέδου, τὸ $M(x, \psi)$, τὸ ὅποιον ὁρίζεται, ἂν λάβωμεν ἐπὶ τῶν $x'x$ καὶ $\psi'\psi$ διανύσματα \overrightarrow{OP} καὶ \overrightarrow{OP} τοιαῦτα, ὥστε $\overrightarrow{OP} = x$ καὶ $\overrightarrow{OP} = \psi$ καὶ φέρωμεν ἐκ τοῦ P παράλληλον πρὸς τὸν ἄξονα ψ' καὶ ἐκ τοῦ P παράλληλον πρὸς τὸν x' . Ἡ τομὴ τῶν δύο τούτων εὐθείῶν ὁρίζει τὸ M .

*Υπάρχει λοιπὸν ἀμφιμονοσήμαντος ἀντιστοιχία μεταξὺ τοῦ συνόλου $R \times R$ καὶ τοῦ συνόλου τῶν σημείων τοῦ ἐπιπέδου (E).

Διὰ νὰ ἑκφράσωμεν ότι ἐν σημεῖον M ἔχει τετμημένην x καὶ τεταγμένην ψ γράφομεν $M = (x, \psi)$ ἢ $M(x, \psi)$.

Οἱ δύο ἄξονες σχηματίζουν τέσσαρας γωνίας, αἱ ὅποιαι λέγονται πρώτη, δευτέρα, τρίτη καὶ τετάρτη γωνία τῶν ἄξόνων, ὅπως σημειώνονται κατὰ σειράν I, II, III, IV εἰς τὸ σχ. 30 - 3.



Σχ. 30.3

Κάθε σημεῖον ἐσωτερικὸν τῆς γωνίας I ἔχει συντεταγμένας θετικάς.

Κάθε σημεῖον ἐσωτερικὸν τῆς γωνίας III ἔχει συντεταγμένας ἀρνητικάς.

Κάθε σημεῖον ἐσωτερικὸν τῆς γωνίας II ἔχει τετμημένην ἀρνητικὴν καὶ τεταγμένην θετικήν. Κάθε σημεῖον ἐσωτερικὸν τῆς γωνίας IV ἔχει τετμημένην θετικὴν καὶ τεταγμένην ἀρνητικήν.

*Ο ἄξων x' ὁρίζεται ἄξων τῶν x ἢ ἄξων τῶν τετμημένων καὶ ὁ ψ' ὡψὲ λέγεται ἄξων τῶν ψ ἢ ἄξων τῶν τεταγμένων. Ἡ τομὴ τῶν ἄξόνων O λέγεται ἀρχὴ τῶν ἄξόνων. *Η ἀρχὴ O ἔχει ἀμφοτέρας τὰς συντεταγμένας μηδέν, δηλ. $O(0,0)$.

Οἱ ἄξονες λέγονται ὀρθογώνιοι ἄξονες συντεταγμένων, ὅταν εἰναι κάθετοι μεταξύ των, ἄλλως λέγονται πλαισιογώνιοι (σχ. 30 - 1).

*Οταν οἱ ἄξονες εἰναι ὀρθογώνιοι καὶ ἐπὶ πλέον τὰ μοναδιαῖα διανύσματα $\overrightarrow{O\theta}$ καὶ \overrightarrow{OH} ἔχουν ἵσα μήκη, τότε λέγομεν ότι ἔχομεν ἐν ὀρθοκανονικὸν σύστημα ἄξόνων.


Οὕτω διὰ τῶν συντεταγμένων καθορίζεται ἡ θέσις ἐνὸς σημείου εἰς τὸ ἐπίπεδον.

31. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΕΦΑΡ. ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟΝ.


*Εστω (σχ. 31 - 1) προσανατολισμένον ἐπίπεδον (E) ἐφωδιασμένον μὲ τὸ σύστημα ὀρθογώνιων ἄξόνων $x\psi$ καὶ ἐφαρμοστὸν διάνυσμα \overrightarrow{AB} ἐπάνω εἰς τὸ (E). Φέρομεν ἀπὸ τὰ A, B τὰς παραλλήλους πρὸς τοὺς ἄξονας. *Ορίζομεν οὕτω τὰ ἐφαρμοστὰ διανύσματα $\overrightarrow{A_1B_1}$ ἐπάνω εἰς τὸν ἄξονα x' καὶ $\overrightarrow{A_2B_2}$ ἐπάνω εἰς τὸν ἄξονα ψ' . Τὸ $\overrightarrow{A_1B_1}$ ὀνομάζεται : τετμημένη προβολὴ τοῦ \overrightarrow{AB} , τὸ δὲ $\overrightarrow{A_2B_2}$ τεταγμένη προβολὴ τοῦ \overrightarrow{AB} .

"Αν ό φορεύς, τοῦ \overrightarrow{AB} (τὸ ὅποιον ὑποτίθεται ὅχι μηδενικόν) εἴναι παράλληλος πρὸς τὸν ἄξονα Οψ, τότε ἡ τετμημένη προβολὴ τοῦ \overrightarrow{AB} είναι τὸ μηδενικὸν ἐφαρμοστὸν διάνυσμα $\overrightarrow{A_1A_1}$ (Σχ. 31 - 3).


"Αν ό φορεύς τοῦ \overrightarrow{AB} είναι παράλληλος πρὸς τὸν ἄξονα Οχ, τότε ἡ τεταγμένη προβολὴ τοῦ \overrightarrow{AB} είναι τὸ μηδενικὸν ἐφαρμοστὸν διάνυσμα $\overrightarrow{A_2A_2}$ (Σχ. 31 - 4).




Σχ. 31.1




Σχ. 31.2



Σχ. 31.3



Σχ. 31.4



Σχ. 31.5

"Αν τὸ \overrightarrow{AB} είναι μηδενικὸν διάνυσμα, π.χ. τὸ \overrightarrow{AA} , τότε καὶ αἱ δύο προβολαὶ του είναι μηδενικὰ διανύσματα (Σχ. 31 - 5).

"Εστω τώρα ὅτι είναι: $A = (x_A, \psi_A)$, δηλ. ἡ τετμημένη τοῦ σημείου A είναι x_A καὶ ἡ τεταγμένη του είναι ψ_A . "Εστω ἐπίσης ὅτι είναι $B = (x_B, \psi_B)$. 'Ο ἀριθμὸς $x_B - x_A$ (τετμημένη τοῦ πέρατος μεῖον τετμημένη τῆς ἀρχῆς τοῦ \overrightarrow{AB}) ὀνομάζεται: ἡ τετμημένη τοῦ \overrightarrow{AB} καὶ συγχρόνως: ἡ ἀλγ. τιμὴ τοῦ $\overrightarrow{A_1B_1}$ ἐπὶ τοῦ ἄξονος $x' \text{O}x$, καὶ συμβολίζεται μὲν $\overrightarrow{A_1B_1}$ (Σχ. 31 - 1).

'Ο ἀριθμὸς $\psi_B - \psi_A$ (τεταγμένη τοῦ πέρατος μεῖον τεταγμένη τῆς ἀρχῆς τοῦ διανύσματος) ὀνομάζεται: ἡ τεταγμένη τοῦ \overrightarrow{AB} καὶ συγχρόνως: ἡ ἀλγ. τιμὴ τοῦ $\overrightarrow{A_2B_2}$ ἐπὶ τοῦ ἄξονος $y' \text{O}y$, συμβολίζεται δὲ μὲν $\overrightarrow{A_2B_2}$.

Οὔτως εἰς τὸ Σχ. 31 - 2 ἡ τετμημένη προβολὴ τοῦ \overrightarrow{AB} είναι τὸ $\overrightarrow{A_1B_1}$. 'Η τετμημένη τοῦ \overrightarrow{AB} είναι $1 - 4 = -3 =$ ἀλγ. τιμὴ τοῦ $\overrightarrow{A_1B_1}$ ἐπὶ τοῦ $x' \text{O}x$. 'Η τεταγμένη προβολὴ τοῦ \overrightarrow{AB} είναι τὸ $\overrightarrow{A_2B_2}$. 'Η τεταγμένη τοῦ \overrightarrow{AB} είναι

$2 - 4 = -2 = \text{ἀλγ. τιμὴ τοῦ } \vec{A_2B_2}$ ἐπὶ τοῦ ψ'Ο ψ.

*Ἐπίστης ἡ τετμημένη προβολὴ τοῦ \vec{BA} εἰναι τὸ $\vec{B_1A_1}$, ἡ τετμημένη τοῦ \vec{BA} εἰναι $4 - 1 = 3 = \text{ἀλγ. τιμὴ τοῦ } \vec{B_1A_1}$ ἐπὶ τοῦ χ'Οψ.

*Ἡ τεταγμένη προβολὴ τοῦ \vec{BA} εἰναι τὸ $\vec{B_2A_2}$, ἡ τεταγμένη τοῦ \vec{BA} εἰναι $4 - 2 = 2 = \text{ἀλγ. τιμὴ τοῦ } \vec{B_2A_2}$ ἐπὶ τοῦ ψ'Οψ.

*Ἐπίστης εἰναι (Σχ. 31 - 2) :

ἡ τετμημένη προβολὴ τοῦ \vec{AA} τὸ $\vec{A_1A_1}$, ἡ τετμημένη τοῦ $\vec{AA} : 4 - 4 = 0$

ἡ τεταγμένη προβολὴ τοῦ \vec{AA} τὸ $\vec{A_2A_2}$, ἡ τεταγμένη $\vec{AA} : 4 - 4 = 0$

*Ἡ τετμημένη καὶ τεταγμένη ἐνὸς διανύσματος λέγονται συντεταγμέναι τοῦ διανύσματος. Διὰ νὰ συμβολίσωμεν ὅτι ἐν διάνυσμα \vec{AB} ἔχει τετμημένη α καὶ τεταγμένην β γράφομεν $\vec{AB}(\alpha, \beta)$ η $\vec{AB} = (\alpha, \beta)$.

*Ἀπὸ τὰ ἀνωτέρω ἐννοοῦμεν ὅτι ἡ θέσις ἐνὸς ἐφαρμοστοῦ διανύσματος καθορίζεται, ἐὰν γνωρίζωμεν τὰς συντεταγμένας τῶν ἄκρων του ἢ τὰς συντεταγμένας τοῦ διανύσματος καὶ τὰς συντεταγμένας ἐνὸς ἄκρου του (ἀρχῆς ἢ πέρατος).

32. ΙΣΑ (Ἡ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ) ΕΦΑΡΜΟΣΤΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ. ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ.

A) "Ἐν ἐφαρμοστὸν διάνυσμα \vec{AB} λέγεται ἵσον ἢ ισοδύναμον πρὸς ἄλλο \vec{GD} , ἐάν, καὶ μόνον ἐάν, αἱ συντεταγμέναι τοῦ \vec{AB} εἰναι ἵσαι ἀντιστοίχως πρὸς τὰς δύμωνύμους των συντεταγμένας τοῦ \vec{GD} .

Γράφομεν τότε συμ-

βολικῶς : $\vec{AB} = \vec{GD}$

Οὔτω, π.χ., εἰς τὸ Σχ 32 - 1 ἡ τετμημένη τοῦ \vec{AE} εἰναι $-5 - (-2) = -3$


ἡ μένη τοῦ \vec{AB} εἰναι $6 - = 4$

ἡ τετμημένη τοῦ $\vec{GD} = 2 - 5 = -3$

ἡ τεταγμένη τοῦ $\vec{GD} = 7 - 3 = 4$

"Ωστε, κατὰ τὸν δοθέντα δρισμόν, εἰναι

$\vec{AB} = \vec{GD}$.



Σχ. 32.1

Γενικῶς, ἐὰν $\vec{AB}(\alpha, \beta)$ καὶ $\vec{GD}(\alpha', \beta')$, διὰ νὰ ἐκφράσωμεν ὅτι $\vec{AB} = \vec{GD}$ δυνάμεθα νὰ γράφωμεν συμβολικῶς $(\alpha, \beta) = (\alpha', \beta')$. Δι' αὐτοῦ ἐννοοῦμεν ὅτι $\alpha = \alpha'$ καὶ $\beta = \beta'$.

“Η όρισθείσα έδω έννοια ισότητος έφαρμοστῶν διανυσμάτων έχει τὰς γνωστὰς ίδιότητας :

α) Ανακλαστικήν : $\vec{AB} = \vec{BA}$

β) Συμμετρικήν : $\vec{AB} = \vec{DA} \Rightarrow \vec{GD} = \vec{AB}$

γ) Τὴν μεταβατικήν: $\vec{AB} = \vec{GD} \quad \left| \begin{array}{l} \\ \vec{GD} = \vec{KL} \end{array} \right. \Rightarrow \vec{AB} = \vec{KL}$

Παρατηρήσεις : 1) Είναι φανερὸν ὅτι, ἂν ἔχωμεν ἐν έφαρμοστὸν διάνυσμα, π.χ. τὸ \vec{AB} , ύπάρχουν ἀπειράριθμα έφαρμοστὰ διανύσματα, καθὲν ἀπὸ τὰ ὅποια είναι ἵσον πρὸς τὸ \vec{AB} . Είναι τὰ διανύσματα τὰ ἔχοντα τὰς συντεταγμένας των ἴσας πρὸς τὰς ὁμωνύμους συντεταγμένας τοῦ \vec{AB} .

2) Λόγω τῆς ἀνωτέρω 2ας ίδιότητος τῆς ἔννοιας ισότητος ἡμποροῦμεν νὰ λέγωμεν ὅτι : \vec{AB}, \vec{GD} είναι ἵσα μεταξύ των.

3) "Αν \vec{AB}, \vec{GD} είναι ἵσα (μεταξύ των) καὶ ὅχι μηδενικά, τότε ἔχουν τὴν ίδιαν διεύθυνσιν (οἱ φορεῖς των είναι παράλληλοι) καὶ τὴν ίδιαν φορὰν (είναι διμόρροπα). (Διότι τριγ. $ABH = \text{τριγ. } \Gamma\Delta\Theta$ καὶ $\vec{AH}, \vec{\Theta}$ παράλληλα καὶ διμόρροπα ὅπως ἐπίστης καὶ τὰ \vec{HB} καὶ $\vec{\Delta D}$ κ.τ.λ.).

4) Κάθε μηδενικὸν έφαρμοστὸν διάνυσμα είναι ἵσον πρὸς κάθε ἄλλο μηδενικὸν έφαρμοστὸν διάνυσμα (διατί ;).

B). "Εν έφαρμοστὸν διάνυσμα \vec{AB} (Σχ. 32- 1) λέγεται «ἀντίθετον» ἄλλου \vec{EZ} , ἐάν, καὶ μόνον ἔαν, αἱ συντεταγμέναι τοῦ \vec{AB} είναι ἀντίθετοι ἀντιστοίχως πρὸς τὰς ὁμωνύμους συντεταγμένας τοῦ \vec{EZ} .

Γράφομεν τότε $\vec{AB} = -\vec{EZ}$. Εἰς τὸ Σχ. 32 - 1 ἔχομεν, π.χ., διὰ τὰ έφαρμοστὰ διανύσματα \vec{AB} καὶ \vec{EZ} :

$$\text{τετμημένη τοῦ } \vec{AB} = -5 - (-2) = -3$$

$$\text{τετμημένη τοῦ } \vec{EZ} = 4 - 1 = 3,$$

$$\text{τεταγμένη τοῦ } \vec{AB} = 6 - 2 = 4$$

$$\text{τεταγμένη τοῦ } \vec{EZ} = 2 - 6 = -4.$$

"Ωστε τὸ \vec{AB} είναι ἐν διάνυσμα ἀντίθετον τοῦ \vec{EZ} , δηλ. $\vec{AB} = -\vec{EZ}$. Είναι δὲ φανερὸν ὅτικάθε διάνυσμα ἵσον μὲ τὸ \vec{AB} είναι ἀντίθετον πρὸς τὸ \vec{EZ} καὶ πρὸς κάθε ἵσον του. Προφανῶς ἀντίθετον τοῦ διανύσματος \vec{AB} είναι καὶ τὸ \vec{BA} , δηλ. $\vec{AB} = -\vec{BA}$.

Παρατηρήσεις : 1) "Αν είναι \vec{AB} ἀντίθετον τοῦ \vec{GD} , τότε θὰ είναι καὶ τὸ

$\vec{\Delta}$ ἀντίθετον τοῦ \vec{AB} (ἰδιατί ;). Διὰ τοῦτο ἐπιτρέπεται νὰ λέγωμεν: τὰ \vec{AB} , $\vec{\Delta}$ εἰναι ἀντίθετα (μεταξύ των).

2) "Αν \vec{AB} , $\vec{\Delta}$ εἰναι ἀντίθετα (μεταξύ των), τότε ἔχουν τὴν ίδιαν διεύθυνσιν (οἱ φορεῖς των εἰναι παράλληλοι) καὶ ἀντιθέτους φοράς.

3) Κάθε μηδενικὸν ἐφαρμοστὸν διάνυσμα εἰναι ἀντίθετον πρὸς κάθε ἄλλο μηδενικὸν διάνυσμα (διατί ;)

33. ΜΗΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ.

"Εστω τυχὸν ἐφαρμοστὸν διάνυσμα \vec{AB} . Ονομάζεται μῆκος τοῦ \vec{AB} εἴτε ἀπόλυτος τιμὴ τοῦ \vec{AB} , καὶ συμβολίζεται μὲ $|AB|$, τὸ μῆκος τοῦ εύθυγράμμου τμήματος μὲ ἄκρα, τὰ A, B. Οὕτω, π.χ., διὰ τὸ μηδενικὸν διάνυσμα \vec{AA} ἔχομεν : μῆκος τοῦ $\vec{AA} = |AA| =$ μῆκος τοῦ εύθυγρ. τμήματος $AA = 0$. Γενικῶς : τὸ μῆκος κάθε μὴ μηδενικοῦ ἐφαρμοστοῦ διανύσματος εἰναι ἔνας ἀπόλυτος πραγματικὸς ἀριθμός.

"Ας λάβωμεν σύστημα ὁρθογωνίων ἀξόνων xOy (Σχ. 33 - 1) καὶ μοναδιαῖα διανύσματα τὰ $\vec{O\theta} \equiv \vec{i}$, $\vec{OH} \equiv \vec{j}$ μὲ $|\vec{O\theta}| = |\vec{OH}|$. "Ας ύποθέσωμεν δὲ ὅτι εἰναι : $A = (x_A, \psi_A)$, $B = (x_B, \psi_B)$ καὶ ὅτι α) τὸ \vec{AB} δὲν εἰναι μηδενικὸν καὶ β) τὸ \vec{AB} δὲν εἰναι παράλληλον πρὸς ἔνα ἐκ τῶν ἀξόνων.

Τότε δρίζεται ἐν τρίγωνον AKB, δρθογώνιον εἰς τὸ K, ὅπως φαίνεται εἰς τὸ Σχ. 33 - 1, μὲ ἐφαρμογὴν δὲ τοῦ Πιθαγορείου θεωρήματος εύρισκομεν ὅτι τὸ μῆκος τοῦ \vec{AB} δίδεται ἀπὸ τὸν τύπον :


$$|\vec{AB}| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (\psi_B - \psi_A)^2} \quad (33,\alpha)$$

Εἶναι εὐκολὸν νὰ ἔξηγήσωμεν ὅτι δὲ τύπος αὐτὸς ἴσχυει καὶ ὅταν τὸ \vec{AB} εἰναι μηδενικὸν διάνυσμα ἢ εἰναι παράλληλον πρὸς ἔνα ἐκ τῶν ἀξόνων (πῶς;). "Ωστε ἴσχυει γενικῶς ὅτι :

Τὸ μῆκος ἐφαρμοστοῦ διανύσματος εἶναι ἵσον μὲ τὴν τετραγ. ρίζαν τοῦ ἀθροίσματος τῶν τετραγώνων τῶν συντεταγμένων του.


"Επομένως : "Αν δύο τυχόντα ἐφαρμοστὰ διανύσματα εἰναι ἵσα μεταξύ των, τότε θὰ ἔχουν τὸ αὐτὸ μῆκος (διατί ;). "Αρα κάθε δύο δχι μηδενικὰ ἵσα ἐφαρμοστὰ διανύσματα ἔχουν τὸ αὐτὸ μῆκος, τὴν αὐτὴν διεύθυνσιν καὶ καὶ τὴν αὐτὴν φοράν. "Επίσης τὸ αὐτὸ μῆκος καὶ τὴν αὐτὴν διεύθυνσιν ἔχουν καὶ κάθε δύο δχι μηδενικὰ ἀντίθετα μεταξύ των ἐφαρμοστὰ διανύσματα.

Τὸ σύνολον ὅλων τῶν ἐφαρμοστῶν διανυσμάτων τοῦ ἐπιπέδου (μαζὶ



Σχ. 33.1

καὶ μὲ τὰ μηδενικὰ ἐφαρμοστὰ διανύσματα αὐτοῦ) θὰ τὸ συμβολίζωμεν, ὅπου εἰς τὰ ἐπόμενα μᾶς χρειασθῇ, μὲ \mathcal{D} .



Σχ. 33.2

Παράδειγμα 1ον. Εἰς ἐπίπεδον (E) (Σχ. 33 - 2) ἐφωδιασμένον μὲ ἀξονας συντεταγμένων xOy , δίδονται τὰ σημεῖα $A(2, -8)$ καὶ $B(-3, 4)$.

Νὰ εὕρετε α) τὰς συντεταγμένας τοῦ διανύσματος \vec{AB} . β) τὰς συντεταγμένας ἐνὸς διανύσματος ἀντιθέτου τοῦ \vec{AB} καὶ γ) τὸ μῆκος τοῦ \vec{AB} (δηλ. τὴν ἀπόστασιν μεταξὺ τῶν σημείων A καὶ B).

***Απάντησις:** α) τετμημένη τοῦ $\vec{AB} = x_B - x_A = -3 - 2 = -5$ τεταγμένη τοῦ $\vec{AB} = \psi_B - \psi_A = -4 - (-8) = 4 + 8 = 12$.

β) "Ἐν διάνυσμα ἀντιθέτον τοῦ \vec{AB} θὰ ἔχῃ συντεταγμένας ἀντιθέτους τῶν συντεταγμένων τοῦ \vec{AB} , δηλ. θὰ ἔχῃ τετμημένην: 5 καὶ τεταγμένην -12.

γ) Συμφώνως πρὸς τὸν τύπον (33, α) εἶναι


$$|\vec{AB}| = \sqrt{(-5)^2 + 12^2} = \sqrt{25 + 144} = \sqrt{169} = 13 \text{ μονάδες.}$$

Παράδειγμα 2ον. Εἰς ἐπίπεδον ἐφωδιασμένον μὲ ἀξονας συντεταγμένων xOy δίδονται τὰ σημεῖα $A(2, 3)$, $B(2, 5)$.


Νὰ εὕρετε α) τὰς συντεταγμένας τοῦ διανύσματος \vec{AB} καὶ β) τὸ μῆκος του (Σχ. 33 - 3).

***Απάντησις:** τετμημένη τοῦ $\vec{AB} = x_B - x_A = 2 - 2 = 0$, τεταγμένη τοῦ $\vec{AB} = \psi_B - \psi_A = 5 - 3 = 2$. Μῆκος τοῦ $\vec{AB} = |\vec{AB}| = \sqrt{0^2 + 2^2} = \sqrt{4} = 2$ μονάδες.

Παράδειγμα 3ον. "Ἐν διάνυσμα \vec{AB} ἔχει τετμημένην 3 καὶ τεταγμένην 0,



Σχ. 33.3



Σχ. 33.4

ἀρχὴν δὲ τὸ σημεῖον $A(2, 3)$. Νὰ εὕρετε τὰς συντεταγμένας τοῦ πέρατος του B (Σχ. 33 - 4).

***Απάντησις:** "Εστω $B = (x_B, \psi_B)$. τότε: $x_B - 2 = 3 \Leftrightarrow x_B = 3 + 2 = 5$ καὶ $\psi_B - 3 = 0 \Leftrightarrow \psi_B = 3$. *Αρα $B = (5, 3)$.

101) Νὰ εύρετε τὰς συντεταγμένας τοῦ διανύσματος \vec{AB} καὶ τὸ μῆκος του, ἐὰν εἰς ἐν σύστημα δρθιογωνίων δέδοντας τοῦ ἐπιπέδου εἶναι $A = (-2, -3)$ καὶ $B = (2, 1)$.

102) Νὰ δείξετε ὅτι τὸ τρίγωνον, που ἔχει κορυφάς τὰ σημεῖα $A = (-2, 8)$, $B = (-1, 1)$ καὶ $C = (3, 3)$ εἶναι ίσοσκελές. (Νὰ συγκρίνετε τὰ μήκη τῶν \vec{AB} , \vec{AC} , \vec{BC}).

103) Εἰς ἐνα ἐπίπεδον ἐφαρμισμένον μὲ δρθιοκανονικὸν σύστημα δέδοντας τρία σημεῖα, A , B , C ἔχουν ἀντιστοίχως συντεταγμένας $(3, 1)$, $(3, 5)$, $(-1, 1)$. Νὰ εύρετε τὰς συντεταγμένας ἐνὸς σημείου D τοῦ ἐπιπέδου, ἐὰν γνωρίζετε ὅτι $\vec{AB} = \vec{CD}$. (Λύσις: θὰ πρέπει νὰ ἔχωμεν: $x_B - x_A = x_D - x_C$ καὶ $y_B - y_A = y_D - y_C$ καὶ $\psi_B - \psi_A = \psi_D - \psi_C$ καὶ νὰ λύσωμεν τὰς δύο ἑξισώσεις μὲ ἀγνώστους τὸ x_D καὶ y_D).

104) "Ἐν ἐφαρμοστὸν διάνυσμα \vec{AB} ἔχει τετμημένην 3 καὶ τεταγμένην 4, πέρας δὲ τὸ σημεῖον B $(4, 2)$. Νὰ εύρετε τὰς συντεταγμένας τῆς ἀρχῆς του A καὶ τὸ μῆκος τοῦ διανύσματος.

34. ΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΔΙΑΝΥΣΜΑ ΕΙΣ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟΝ.

"Ἔστω ἐν διάνυσμα \vec{AB} τοῦ \mathcal{D} , δηλ. ἐν ἐφαρμοστὸν διάνυσμα τοῦ ἐπιπέδου. (Τὸ \vec{AB} δὲν ἀποκλείεται νὰ εἶναι ἐν μηδενικὸν ἐφαρμοστὸν διάνυσμα). Γνωρίζομεν ὅτι ὑπάρχουν ἀπειράριθμα διανύσματα ἵσα (ἰσοδύναμα) πρὸς τὸ \vec{AB} .


Τὸ σύνολον ὅλων τῶν ἵσων πρὸς τὸ \vec{AB} ἐφαρμοστῶν διανυσμάτων τοῦ ἐπιπέδου δύνομάζεται: «ἐν ἐλεύθερον διάνυσμα» τοῦ ἐπιπέδου καὶ τὸ \vec{AB} (καθὼς καὶ κάθε ἵσον τοῦ \vec{AB} ἐφαρμοστὸν διάνυσμα ἀπὸ τὸ \mathcal{D}) δύνομάζεται: εἰς ἀντί-πρόσωπος τοῦ ἐλεύθερου διανύσματος.

"Οπως ἀπὸ τὸ ἐφαρμοστὸν διάνυσμα \vec{AB} ώρίσαμεν ἐν ἐλεύθερον διάνυσμα, οὕτως ἡμποροῦμεν νὰ δρίσωμεν ἀπὸ κάθε ἐφαρμοστὸν διάνυσμα τοῦ \mathcal{D} ἀνὰ ἐν ἐλεύθερον διάνυσμα τοῦ \mathcal{D} ἀνὰ ἐν ἐλεύθερον διάνυσμα τοῦ ἐπιπέδου. "Αν γίνη τοῦτο, τότε τὸ \mathcal{D} θὰ ἔχῃ διαμερισθῇ εἰς κλάσεις (ὑποσύνολα) ξένας μεταξύ των ἀνὰ δύο, καθεμία ἀπὸ τὰς δύοις εἶναι (ἔξι δρισμοῦ) ἐν ἐλεύθερον διάνυσμα.

"Ἐν οιονδήποτε ἐφαρμοστὸν διάνυσμα ἀπὸ τὸ \mathcal{D} εἶναι εἰς ἀντιπρόσωπος κάποιου ἐλεύθερου διανύσματος τοῦ ἐπιπέδου. Συνήθως ως ἀντιπρόσωπον ἐνὸς ἐλεύθερου διανύσματος τοῦ ἐπιπέδου ουχ (Σχ. 34-1) λαμβάνομεν τὸ ἐφαρμοστὸν διάνυσμα τοῦ \mathcal{D} , ποὺ ἔχει ως ἀρχὴν του τὸ Ο.

"Ἐν ἐλεύθερον διάνυσμα τοῦ ἐπιπέδου εἶναι καὶ τὸ μηδενικὸν ἐλεύθερον διάνυσμα, δηλ. τὸ σύνολον ὅλων τῶν μηδενικῶν ἐφαρμοστῶν διανυσμάτων τοῦ ἐπιπέδου. Τοῦτο θὰ τὸ συμβολίζομεν μὲ \vec{O} .

Κάθε ἐλεύθερον διάνυσμα θὰ συμβολίζεται δι' ἐνὸς τυχόντος ἀντιπροσώπου του εἴτε διὰ τοῦ ἀντιπροσώπου του μὲ ἀρχὴν τὸ Ο εἴτε μὲ ἐν μικρὸν γράμμα τοῦ ἀλφαριθμοῦ μαζὶ μὲ ἐν μικρὸν βέλος ύπεράνω. Οὕτω δυνάμεθα νὰ δημι-



Σχ. 34.1

λῶμεν διὰ τὸ ἐλεύθερον διάνυσμα \vec{OA} ή \vec{GD} , διὰ τὸ ἐλεύθερον διάνυσμα $\vec{\beta}$ κ.τ.λ. (Σχ. 34 - 1).

Τὸ σύνολον ὅλων τῶν ἐλευθέρων διανυσμάτων τοῦ ἐπιπέδου θὰ τὸ συμβολίζωμεν μὲ \mathcal{D}_0 .


35. ΜΗΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ.

Μῆκος ἐνὸς διανύσματος ἀπὸ \mathcal{D}_0 , δηλ. ἐνὸς ἐλευθέρου διανύσματος, ἔστω α , λέγεται τὸ μῆκος ἐνὸς ἀντιπροσώπου του καὶ συμβολίζεται μὲ $|\vec{\alpha}|$.

Οὕτω, διὰ τὸ μηδενικὸν ἐλεύθερον διάνυσμα \vec{O} , ἔχομεν :

$$|\vec{\alpha}| = |\vec{O}\vec{\alpha}| = 0$$

36. ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ.



Σχ. 36.1

"Εστω $\alpha \in \mathcal{D}_0$. Όνομάζεται : τετμημένη τοῦ α ἡ τετμημένη ἐνὸς ὅποιοιουδήποτε ἀντιπροσώπου του καὶ τεταγμένη τοῦ $\vec{\alpha}$ ἡ τεταγμένη τοῦ αὐτοῦ ἢ οίουδήποτε ἄλλου ἀντιπροσώπου του.

Οὕτω, π.χ., διὰ τὸ \vec{O} εἰναι : τετμημένη του τὸ 0 καὶ τεταγμένη του τὸ 0. Ἐπίστης διὰ τὸ ἐλεύθερον διάνυσμα $\vec{\alpha}$, ποὺ ἀντιπροσωπεύεται ἀπὸ τὸ \vec{AB} (Σχ. 36 - 1), εἰναι: τετμημένη του ὁ 4 καὶ τεταγμένη του ὁ 3. Συμβολικῶς γράφομεν $\vec{\alpha} = (4, 3)$ Εἰναι φανερὸν ὅτι, ἐὰν δοθοῦν αἱ συντεταγμέναι ἐνὸς ἐλευθέρου διανύσματος ἡμποροῦμεν, νὰ ὀρίσωμεν γραφικῶς ἓνα ἀντιπρόσωπόν του εἰς τὸ ἐπίπεδον xOy (πῶς ;).

37. Η ΙΣΟΤΗΣ ΕΙΣ ΤΟ \mathcal{D}_0 .

"Εστωσαν ὅτι $\vec{\alpha} \in \mathcal{D}_0$ καὶ $\vec{\beta} \in \mathcal{D}_0$. Θὰ λέγωμεν ὅτι : τὸ $\vec{\alpha}$ εἰναι ισον πρὸς τὸ $\vec{\beta}$ καὶ θὰ γράφωμεν : $\vec{\alpha} = \vec{\beta}$, ἐάν, καὶ μόνον ἐάν, ὑπάρχῃ κάποιος ἀντιπρόσωπος τοῦ $\vec{\alpha}$ ἵσος μὲ κάποιον ἀντιπρόσωπον τοῦ $\vec{\beta}$.

"Εστω $\vec{\alpha} = \vec{\beta}$: τότε (καὶ μόνον τότε) εἰναι : τετμημένη τοῦ $\vec{\alpha}$ = τετμημένη τοῦ $\vec{\beta}$ καὶ τεταγμένη τοῦ $\vec{\alpha}$ = τεταγμένη τοῦ $\vec{\beta}$.

Εἰναι φανερὸν ὅτι καὶ διὰ τὴν ὀρισθεῖσαν ἐδῶ ἔννοιαν ισότητος ισχύουν αἱ τρεῖς γνωσταὶ ίδιότητες τῆς ισότητος διανυσμάτων. δηλ. ἡ ἀνακλαστική, ἡ συμμετρική καὶ ἡ μεταβατική.

38. ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΤΟ \mathcal{D}_0 .


"Εστω $\vec{\alpha} \in \mathcal{D}_0$ καὶ \vec{OA} ἀντιπρόσωπός του (Σχ. 38 - 1). "Εστω \vec{OA}' ἐν ἀντίθετον τοῦ \vec{OA} ἐφαρμοστὸν διάνυσμα. Τὸ $\vec{OA}' = -\vec{OA}$ εἰναι ἀντιπρόσωπος

ένδος έλευθέρου διανύσματος, εστω $\vec{\alpha}$. Αύτό το έλευθερον διάνυσμα $\vec{\alpha}$ λέγεται άντιθετον τοῦ α καὶ συμβολίζεται μὲ - $\vec{\alpha}$.

Είναι φανερὸν ἀπὸ τοὺς ὄρισμούς, ποὺ ἐδώσαμεν, ὅτι :

1) Διὰ κάθε $\vec{\alpha} \in \mathcal{D}_0$ ὑπάρχει ἐν μόνον άντιθετόν του διάνυσμα τοῦ $\vec{\alpha}$.

2) ἂν $\vec{\alpha}$ είναι τὸ άντιθετον τοῦ $\vec{\alpha}$, τότε καὶ τὸ $\vec{\alpha}$ είναι τὸ άντιθετον τοῦ $\vec{\alpha}$ καὶ 3) αἱ συντεταγμέναι τοῦ $\vec{\alpha}$ είναι άντιθετοι τῶν διανύσματων συντεταγμένων τοῦ $\vec{\alpha}$.



Σχ. 38.1

39. ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟΝ \mathcal{D}_0 , ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ.

A). "Ἄσ λάβωμεν τὰ ἐφαρμοστὰ διανύσματα \vec{AB} καὶ \vec{BG} , τὰ ὅποια βλέπετε εἰς τὸ σχ. 39 - 1. "Οπως γνωρίζομεν, ἀπὸ ὃσα ἐμάθομεν εἰς τὴν γ' τάξιν, τὸ διάνυσμα \vec{AG} είναι τὸ ἄθροισμα τῶν ἐφαρμοστῶν διαδοχικῶν διανύσματων \vec{AB} καὶ \vec{BG} . Συμβολικῶς γράφομεν $\vec{AB} + \vec{BG} = \vec{AG}$.

Παρατηροῦμεν τώρα ὅτι αἱ συντεταγμέναι τοῦ ἄθροισματος \vec{AG} είναι οἱ άντιστοίχως μὲ τὸ ἄθροισμα τῶν διανύσματων συντεταγμένων τῶν προσθετέων διανύσματων. Πράγματι είναι :

$$\text{τετμημένη τοῦ } \vec{AB} = 3,$$

$$\text{τεταγμένη τοῦ } \vec{AB} = 2.$$

$$\text{τετμημένη τοῦ } \vec{BG} = 1,$$

$$\text{τεταγμένη τοῦ } \vec{BG} = 2$$


$$\text{τετμημένη τοῦ } \vec{AG} = 4 = 3 + 1,$$

$$\text{τεταγμένη τοῦ } \vec{AG} = 4 = 2 + 2$$

B) Εστωσαν τώρα $\vec{\alpha} \in \mathcal{D}_0$ καὶ $\vec{\beta} \in \mathcal{D}_0$

καὶ \vec{AB} , \vec{BG} (Σχ. 39 - 1) άντιστοίχως

άντιπρόσωποί των, οἱ ὅποιοι είναι διαδοχικὰ διανύσματα. Όριζομεν τὸ ἄθροισμα $\vec{AB} + \vec{BG}$, δηλ. τὸ \vec{AG} . Αύτό, τὸ \vec{AG} είναι ἔνας άντιπρόσωπος κάποιου έλευθέρου διανύσματος, εστω γ . Τὸ γ ὀνομάζεται **ἄθροισμα** $\vec{\alpha}$ σὺν $\vec{\beta}$ καὶ συμβολίζεται μὲ $\vec{\alpha} + \vec{\beta}$, δηλ. $\vec{\alpha} + \vec{\beta} = \gamma$. Είναι προφανὲς ὅτι τὸ γ ἔχει ως τετμημένην τὸ ἄθροισμα τῆς τετμημένης τοῦ $\vec{\alpha}$ σὺν τὴν τετμημένην τοῦ $\vec{\beta}$ καὶ τεταγμένην τὸ ἄθροισμα τῆς τεταγμένης τοῦ $\vec{\alpha}$ σὺν τὴν τεταγμένην τοῦ $\vec{\beta}$.



Σχ. 39.1

Ούτω, π.χ., έάν \vec{u} (α, β) και \vec{v} (γ, δ), τότε τὸ $(\vec{u} + \vec{v})$ θὰ ἔχῃ συντεταγμένας $(\alpha + \gamma, \beta + \delta)$ και δυνάμεθα νὰ κατασκευάσωμεν ἐνα ἀντιπρόσωπον τοῦ διανύσματος $(\vec{u} + \vec{v})$, ἀφοῦ γνωρίζομεν τὰς συντεταγμένας του.

Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω ὁρίζομεν ως ἄθροισμα δύο ἐλευθέρων διανυσμάτων \vec{u} (α_1, β_1) και \vec{v} (α_2, β_2) και τὸ συμβολίζομεν μὲ $\vec{u} + \vec{v}$, τὸ ἐλεύθερον διάνυσμα w , τὸ ὅποιον ἔχει τετμημένην $\alpha_1 + \alpha_2$ και τεταγμένην $\beta_1 + \beta_2$. Συνήθως γράφομεν $(\alpha_1, \beta_1) + (\alpha_2, \beta_2) = (\alpha_1 + \alpha_2, \beta_1 + \beta_2)$. Ἡ πρᾶξις μὲ τὴν ὅποιαν εύρισκομεν τὸ w , ἐκ τῶν u και v , λέγεται πρόσθεσις ἢ σύνθεσις μέσα εἰς τὸ σύνολον \mathcal{D}_0 .

Ἐάν τὸ ἐν ἐκ τῶν προσθετέων διανυσμάτων εἴναι τὸ μηδενικὸν ἐλεύθερον διάνυσμα, τότε θὰ ἔχωμεν $\vec{u} + \vec{0} = \vec{u}$, διότι τὸ $\vec{0}$ ἔχει τετμημένην 0 και τεταγμένην 0 και ἐπομένως εἴναι $(\alpha_1, \beta_1) + (0, 0) = (\alpha_1 + 0, \beta_1 + 0) = (\alpha_1, \beta_1)$

Δηλαδὴ τὸ μηδενικὸν ἐλεύθερον διάνυσμα εἴναι τὸ οὐδέτερον στοιχεῖον εἰς τὴν πρόσθεσιν ἐν \mathcal{D}_0 .

Ἄν $\vec{\alpha}, \vec{\beta}, \vec{\gamma}$ εἴναι τρία ἐλεύθερα διανύσματα τοῦ ἐπιπέδου (E), τότε ὁρίζομεν ως ἄθροισμα $\vec{\alpha}$ σὺν $\vec{\beta}$ σὺν $\vec{\gamma}$, και τὸ συμβολίζομεν $\vec{\alpha} + \vec{\beta} + \vec{\gamma}$, τὸ ἄθροισμα $(\vec{\alpha} + \vec{\beta}) + \vec{\gamma}$.

Ἀναλόγως ὁρίζεται τὸ ἄθροισμα μὲ τέσσαρα πέντε κτλ. προσθετέα διανύσματα.

Είναι εὔκολον νὰ δικαιολογήσωμεν ὅτι ἡ ὁρισθεῖσα πρόσθεσις ἐν \mathcal{D}_0 ἔχει τὰς ίδιοτητας : ἀντιμεταθετικήν, προσεταιριστικήν και τῆς διαγραφῆς. Ἡτοι:

$$1) \vec{\alpha} + \vec{\beta} = \vec{\beta} + \vec{\alpha}$$

$$2) (\vec{\alpha} + \vec{\beta}) + \vec{\gamma} = \vec{\alpha} + (\vec{\beta} + \vec{\gamma})$$

$$3) \vec{\alpha} = \vec{\beta} \Leftrightarrow \vec{\alpha} + \vec{\gamma} = \vec{\beta} + \vec{\gamma}$$

Ἡ ἴσχυς τῶν ἀνωτέρω ίδιοτήτων είναι φανερὰ ἀπὸ τὸν δοθέντα ὁρισμὸν τῆς ίσοτήτος δύο ἐλευθέρων διανυσμάτων.

Πράγματι, ἂς ὑποθέσωμεν ὅτι τὰ διανύσματα $\vec{\alpha}$ και $\vec{\beta}$ ἔχουν συντεταγμένας ἀντιστοίχως τοὺς πραγματικοὺς ἀριθμοὺς α_1, β_1 και α_2, β_2 . Τότε τὸ ἄθροισμα $\vec{\alpha} + \vec{\beta}$ είναι τὸ διάνυσμα μὲ συντεταγμένας $(\alpha_1 + \alpha_2, \beta_1 + \beta_2)$. Τὸ ἄθροισμα $\vec{\beta} + \vec{\alpha}$ είναι τὸ ἐλεύθερον διάνυσμα μὲ συντεταγμένας $(\alpha_2 + \alpha_1, \beta_2 + \beta_1)$. Ἀλλ' ἐπειδὴ $\alpha_1 + \alpha_2 = \alpha_2 + \alpha_1$ και $\beta_1 + \beta_2 = \beta_2 + \beta_1$, συμπεραίνομεν ὅτι $\vec{\alpha} + \vec{\beta} = \vec{\beta} + \vec{\alpha}$.

Ἡ ἀπόδειξις τῆς ἴσχυος τῶν ίδιοτήτων 2) και 3) είναι εὔκολωτάτη.

Γ) Ἀφαίρεσις ἐν \mathcal{D}_0 Γνωρίζομεν ἀπὸ τὴν Γ' τάξιν ὅτι ἀν $\vec{\alpha}$ και $\vec{\beta}$ είναι δύο ἐλεύθερα διανύσματα ἐπὶ ἐπιπέδου και $\vec{\beta}'$ είναι τὸ ἐλεύθερον διάνυσμα τὸ ἀντιθετον τοῦ $\vec{\beta}$ τότε ὁρίζεται ως διαφορὰ $\vec{\alpha}$ πλὴν $\vec{\beta}$, και συμβολίζεται μὲ $\vec{\alpha} - \vec{\beta}$, τὸ ἐλεύθερον διάνυσμα $\vec{\alpha} + \vec{\beta}'$, δηλ. τὸ $\vec{\alpha} + (-\vec{\beta})$. Οὕτω διὰ νὰ εὔρωμεν τὴν δια-

φοράν $\vec{\alpha} - \vec{\beta}$, άρκει νὰ προσθέσωμεν εἰς τὸ $\vec{\alpha}$ τὸ $\vec{\alpha}$ ἀντίθετον διάνυσμα τοῦ $\vec{\beta}$.

‘Η πρᾶξις τῆς εὐρέσεως τῆς διαφορᾶς $\vec{\alpha} - \vec{\beta}$ λέγεται **ἀφαίρεσις** ἐν \mathcal{D}_0 .

Ἐπειδὴ τὰ ἀντίθετα διανύσματα ἔχουν ἀντιθέτους τὰς ὁμωνύμους συντεταγμένας τῶν καὶ ἐπειδή, ὡς εἴδομεν, ἡ διαφορὰ $\vec{\alpha} - \vec{\beta}$ ισοῦται μὲ $\vec{\alpha} + (-\vec{\beta})$, διὰ τοῦτο, ἂν εἰναι $\vec{\alpha}$ (α_1, β_1) καὶ $\vec{\beta}$ (α_2, β_2), τότε εἰναι $-\vec{\beta}$ ($-\alpha_2, -\beta_2$) καὶ ἐπομένως τὸ διάνυσμα $\vec{\alpha} - \vec{\beta} = \vec{\alpha} + (-\vec{\beta})$ ἔχει συντεταγμένας $\alpha_1 - \alpha_2, \beta_1 - \beta_2$. Συμβολικῶς γράφομεν $(\alpha_1, \beta_1) - (\alpha_2, \beta_2) = (\alpha_1 - \alpha_2, \beta_1 - \beta_2)$.

Δοθέντων ἐπομένως δύο διανύσματων $\vec{\alpha}$ (α_1, β_1) καὶ $\vec{\beta}$ (α_2, β_2) ὁρίζομεν ὡς διαφορὰν τῶν τὰ διάνυσμα, ἔστω $\vec{\gamma}$, τὸ ἔχον συντεταγμένας $\alpha_1 - \alpha_2, \beta_1 - \beta_2$, δηλ. τὸ $\vec{\gamma}$ ($\alpha_1 - \alpha_2, \beta_1 - \beta_2$). Εἶναι φανερὸν ὅτι ισχύει ἡ ισοδυναμία :

$$\vec{\alpha} - \vec{\beta} = \vec{\gamma} \Leftrightarrow \vec{\beta} + \vec{\gamma} = \vec{\alpha}$$

Ἐπίσης ισχύει ἡ ιδιότης :

$$\vec{\alpha} - \vec{\beta} = (\vec{\alpha} + \vec{\gamma}) - (\vec{\beta} + \vec{\gamma})$$


AΣΚΗΣΕΙΣ

105) Έάν \vec{u} ($2, -5$) καὶ \vec{v} ($3, 1$) εἰναι δύο ἐλεύθερα διανύσματα, νὰ ὀρίσετε, μὲ τὰς συντεταγμένας του, τὸ ἐλεύθερον διάνυσμα $\vec{u} + \vec{v}$ καὶ νὰ σχεδιάσετε εἰς τὸ ἐπίπεδον x ο ψευδὸν ἀντιπρόσωπόν του.

106) Έάν \vec{u} ($3, 1$) καὶ \vec{v} ($2, 5$) νὰ εὐρετε τὰς συντεταγμένας τοῦ $\vec{u} + \vec{v}$ καὶ τὸ μῆκος του. Ἐπειτα νὰ εὕρετε μὲ τὰς συντεταγμένας τῆς τὴν διαφορὰν $\vec{u} - \vec{v}$ καὶ νὰ ὑπολογίσετε τὸ μῆκος τοῦ διανύσματος $\vec{u} - \vec{v}$.

107) Τὸ διάνυσμα $\vec{\alpha}$ ($-3, 8$) εἰναι τὸ ἀθροισμα τοῦ διανύσματος $\vec{\beta}$ ($-1, -2$) καὶ ἐνὸς ὀλλού ἀγνώστου διανύσματος. Νὰ εὕρετε τὸ τελευταῖον αὐτὸ διάνυσμα.

108) Εἰς τὸ σχ. 39-2 βλέπετε δύο ἐφαρμοστὰ διανύσματα \vec{AB} καὶ \vec{GD} , τὰ ὁποῖα εἰναι ἀντιπρόσωποι δύο ἐλεύθερων διανύσματων $\vec{\alpha}$ καὶ $\vec{\beta}$. Ζητεῖται νὰ εὕρετε ἀπὸ τὸ σχῆμα τὰς συντεταγμένας τῶν διανύσματων $\vec{\alpha}$ καὶ $\vec{\beta}$. Ἐπειτα νὰ εὕρετε τὸ διάνυσμα τὸ ίσον μὲ $\vec{\alpha} + \vec{\beta}$ κατὰ δύο τρόπους. (ὁ ἔνας τρόπος θὰ εἰναι μὲ τὰς συντεταγμένας). Νὰ εὕρετε ὁμοίως τὸ διάνυσμα τὸ ίσον μὲ $\vec{\alpha} - \vec{\beta}$.



Σχ. 39.2

40. ΓΙΝΟΜΕΝΟΝ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΝ ΑΡΙΘΜΟΝ.

A) Εἰς τὴν Γ' τάξιν ἐμάθομεν ὅτι : ἐάν \vec{AB} εἰναι τυχὸν ὅχι μηδενικὸν διάνυσμα τοῦ ἐπιπέδου καὶ $\rho \neq 0$ πραγματικὸς ἀριθμός, τότε ὡς $\rho \cdot \vec{AB}$ ὁρίζεται διάνυσμα \vec{GD} , τὸ ὁποῖον ἔχει τὴν ίδιαν διεύθυνσιν μὲ τὸ \vec{AB} , φορὰν τὴν ίδιαν ἀν $\rho > 0$, ἀντίθετον δέ, ἂν $\rho < 0$ καὶ μῆκος ίσον μὲ $|\rho| \cdot |\vec{AB}|$.

"Ηδη παρατηροῦμεν ότι : αν τὸ διάνυσμα \vec{AB} ἔχῃ τετμημένην X καὶ τεταγμένην Y καὶ τὸ $\vec{AE} = \rho \cdot \vec{AB}$ (εἰς τὸ σχ. 40 - 1 τὸ $\rho = 2$, εἰς τὸ σχ. 40 - 2 εἰναι $\rho = -3$) ἔχῃ συντεταγμένας X' καὶ Y' ἀντιστοίχως, τότε λόγω τῶν ὁμοίων τριγώνων AKB καὶ AΛΕ θὰ ἔχωμεν :


$$\frac{\vec{AE}}{\vec{AB}} = \frac{X'}{X} = \frac{Y'}{Y} = \rho$$

"Εκ τούτων ἐπεται ότι $X' = \rho X$ καὶ $Y' = \rho Y$


Διὰ τοῦτο δυνάμεθα νὰ ὀρίσωμεν ως $\rho \vec{AB}$ τὸ διάνυσμα τὸ ἔχον συντεταγμένας ρX , ρY . "Ητοι : $\rho \cdot (X, Y) = (\rho X, \rho Y)$

Παρατηροῦμεν ἐπίσης ότι ισχύει :

$$|\vec{AE}| = \sqrt{(\rho X)^2 + (\rho Y)^2} = |\rho| \cdot \sqrt{X^2 + Y^2} = |\rho| \cdot |\vec{AB}|$$



Σχ. 40.1



Σχ. 40.2

"Η πρᾶξις, μὲ τὴν ὅποιαν εύρισκομεν τὸ $\vec{GD} = \rho \vec{AB}$ ἀπὸ τὸν ρ καὶ τὸ \vec{AB} , ὀνομάσθη πολλαπλασιασμός τοῦ \vec{AB} ἐπὶ τὸν ρ .


B) "Υπενθυμίζομεν ότι ισχύουν αἱ ἰδιότητες :

$$1) (-2) \cdot (3\vec{AB}) = -6\vec{AB} =$$

$(-2 \cdot 3)\vec{AB} = \vec{EZ}$ (Σχ. 40 - 3) καὶ γενικῶς : $\lambda (\rho \vec{AB}) = (\lambda \cdot \rho) \vec{AB}$, ὅπου λ, ρ πραγματικοὶ ἀριθμοί.

$$2) \rho (\vec{AB} + \vec{BG}) = \rho \vec{AB} + \rho \vec{BG},$$

ὅπου ρ τυχών πραγματικὸς ἀριθμὸς καὶ \vec{AB}, \vec{BG} διαδοχικὰ ἐφαρμοστὰ διανύσματα εἴτε ἐλεύθερα διανύσματα.



Σχ. 40.3

Γενικῶς, μὲν βάσιν τούς δοθέντας όρισμούς, ἡ ίδιότης 2) ἔξηγεῖται ως ἔξῆς.

Ἐστω : τετμημένη τοῦ $\vec{AB} = \alpha$, τεταγμένη τοῦ $\vec{AB} = \beta$

$$\gg \quad \gg \quad \vec{B}\Gamma = \alpha', \quad \gg \quad \gg \quad \vec{B}\Gamma = \beta'$$

Τότε είναι :

$$\text{τετμημένη τοῦ } \vec{AB} + \vec{B}\Gamma = \alpha + \alpha'$$

$$\text{τεταγμένη } \gg \quad \vec{AB} + \vec{B}\Gamma = \beta + \beta'$$

$$\text{Άρα τετμημένη τοῦ } \rho \cdot (\vec{AB} + \vec{B}\Gamma) = \rho(\alpha + \alpha') = \rho\alpha + \rho\alpha' \text{ καὶ}$$

$$\text{τεταγμένη τοῦ } \rho \cdot (\vec{AB} + \vec{B}\Gamma) = \rho(\beta + \beta') = \rho\beta + \rho\beta'$$

Ἄσ εὕρωμεν τώρα τὰς συντεταγμένας τοῦ $\rho \cdot \vec{AB} + \rho \cdot \vec{B}\Gamma$. Θά είναι

$$\text{τετμημένη τοῦ } \rho \cdot \vec{AB} + \rho \cdot \vec{B}\Gamma = \rho\alpha + \rho\alpha'$$

$$\text{τεταγμένη τοῦ } \rho \cdot \vec{AB} + \rho \cdot \vec{B}\Gamma = \rho\beta + \rho\beta'$$

Ἐπειδὴ λοιπὸν τὰ διανύσματα $\rho(\vec{AB} + \vec{B}\Gamma)$ καὶ $\rho\vec{AB} + \rho\vec{B}\Gamma$ ἔχουν τὰς δύμωνύμους των συντεταγμένας συνάγομεν (§ 32, A) ὅτι είναι ταῦτα. Δηλ.

$$\rho(\vec{AB} + \vec{B}\Gamma) = \rho\vec{AB} + \rho\vec{B}\Gamma$$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

109) Ἀν $\vec{GD} = 0 \cdot \vec{AB}$, τί συμπεραίνετε διὰ τὸ \vec{GD} ;

110) Ἀν $\vec{GD} = \rho \cdot \vec{AA}$, τί συμπεραίνετε διὰ τὸ \vec{GD} ;

111) Δίδεται τὸ διάνυσμα \vec{AB} τοῦ σχ. 36 - 1 καὶ ζητεῖται νὰ κατασκευασθοῦν διανύσματα ταῦτα πρὸς τὰ :

$$\alpha) 3 \vec{AB}, \quad \beta) \frac{1}{2} \vec{AB}, \quad \gamma) -2 \vec{AB}, \quad \delta) \frac{5}{4} \vec{AB}$$

(Νὰ ἐργασθῆτε μὲν δύο τρόπους. Ο ἕνας τρόπος θὰ είναι μὲν συντεταγμένας).

41. ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΙΑΣ ΔΥΟ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΩΝ.

A) Ἐξ ὅσων ἐμάθομεν εἰς τὰ προηγούμενα (§ 30, § 31, § 39, § 40) συνάγομεν ὅτι δυνάμεθα νὰ ἐκφράσωμεν ἐν διάνυσμα διὰ τῶν μοναδιαίων διανυσμάτων i , j καὶ τῶν συντεταγμένων του.

Πράγματι, ἔχομεν (Σχ. 30 - 1 καὶ 30 - 2) :

$$\vec{OM} = \vec{OP} + \vec{PM}$$

Ἄλλ' ἐπειδὴ $\vec{OP} = \vec{OP} \cdot i$ καὶ $\vec{PM} = \vec{OP} = \vec{OP} \cdot j$, ἡ ἀνωτέρω διανυσματικὴ ισότητα γίνεται :

$$\vec{OM} = \vec{OP} \cdot i + \vec{OP} \cdot j$$

ἢ, ἃν διομάσωμεν X τὴν τετμημένην καὶ Y τὴν τεταγμένην τοῦ διανύσματος \vec{OM} , τότε

$$\vec{OM} = X \vec{i} + Y \vec{j}$$

Όμοίως διὰ τὸ διάνυσμα \vec{AB} τοῦ σχήματος 33–1, ἂν ὀνομάσωμεν $x_B - x_A = X$ καὶ $y_B - y_A = Y$, θὰ εἴναι :

$$\vec{AB} = \vec{AK} + \vec{KB} = \vec{A_1B_1} + \vec{A_2B_2}, \text{ ἔτοι } \vec{AB} = X \vec{i} + Y \vec{j}$$

B) Ἐστωσαν εἰς τὸ ἐπίπεδον δύο διανύσματα $\vec{V}(X, Y)$ καὶ $\vec{V}'(X', Y')$, διὰ τὰ ὅποια ἴσχύει $\vec{V}' = k\vec{V}$. Γνωρίζομεν (§ 40) ὅτι τὰ διανύσματα αὐτὰ ἔχουν τὴν ίδιαν διεύθυνσιν (εἴναι παράλληλα). Ἐπειδὴ $\vec{V}' = k\vec{V}$, δηλ. $(X', Y') = (kX, kY)$, θὰ ἔχωμεν (§ 37) :

$$X' = kX \text{ καὶ } Y' = kY$$

ἔπομένως θὰ εἴναι :

$$\frac{X'}{X} = \frac{Y'}{Y}$$

Ἄντιστρόφως, ἂν ἴσχύῃ $\frac{X'}{X} = \frac{Y'}{Y}$ καὶ ὀνομάσωμεν k τὴν τιμὴν τῶν λόγων, θὰ εἴναι :

$$\frac{X'}{X} = \frac{Y'}{Y} = k \Rightarrow X' = kX \text{ καὶ } Y' = kY$$

καὶ ἔπομένως :

$\vec{V}' = X'\vec{i} + Y'\vec{j} = kX\vec{i} + kY\vec{j} = k(X\vec{i} + Y\vec{j}) = k\vec{V}$, δηλ. τὰ διανύσματα \vec{V}' καὶ \vec{V} ἔχουν τὴν αὐτὴν διεύθυνσιν.

Ωστε: ἀναγκαία καὶ ἵκανη συνθήκη, ἵνα δύο διανύσματα τοῦ ἐπιπέδου είναι παράλληλα, είναι αἱ ὁμώνυμοι συντεταγμέναι αὐτῶν νὰ είναι ἀνάλογοι.

Συμβολικῶς :

$$\boxed{\vec{V} \parallel \vec{V}' \Leftrightarrow \frac{X'}{X} = \frac{Y'}{Y}}$$

42. ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΣ ΤΟΥ CHASLES. (ΣΑΛ).

Ἐάν $A(x_A, \psi_A)$, $B(x_B, \psi_B)$, $\Gamma(x_\Gamma, \psi_\Gamma)$, $\Delta(x_\Delta, \psi_\Delta)$ είναι τυχόντα σημεῖα τοῦ ἐπιπέδου $\chi\Omega\psi$, θὰ ἔχωμεν :

$\vec{AB}(x_B - x_A, \psi_B - \psi_A)$, $\vec{B\Gamma}(x_\Gamma - x_B, \psi_\Gamma - \psi_B)$, $\vec{\Gamma\Delta}(x_\Delta - x_\Gamma, \psi_\Delta - \psi_\Gamma)$ καὶ $\vec{\Delta A}(x_A - x_\Delta, \psi_A - \psi_\Delta)$. Τὸ ἄθροισμα $\vec{AB} + \vec{B\Gamma} + \vec{\Gamma\Delta} + \vec{\Delta A}$ θὰ ἔχῃ τετμημένην $x_B - x_A + x_\Gamma - x_B + x_\Delta - x_\Gamma + x_A - x_\Delta = 0$ καὶ τετσγμένην $\psi_B - \psi_A + \psi_\Gamma - \psi_B + \psi_\Delta - \psi_\Gamma + \psi_A - \psi_\Delta = 0$, είναι δηλ. μηδενικὸν διάνυσμα. Ἱσχύει λοιπὸν ἡ ἔξῆς ισότης :

$$\vec{AB} + \vec{B\Gamma} + \vec{\Gamma\Delta} + \vec{\Delta A} = \vec{OA},$$

ἡ ὅποια λέγεται διανυσματικὴ ισότης τοῦ Chasles.

43. ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΙΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟΝ.

Ἐστω $A(x_A, \psi_A)$ τυχὸν σημεῖον καὶ ἐν ἑλεύθερον διάνυσμα $\vec{u}(\alpha, \beta)$ τοῦ ἐπιπέδου $\chi\Omega\psi$ σχ. 43–1.

Θεωροῦμεν τὸ σύνολον τῶν σημείων $M(x, \psi)$ τοῦ ἐπιπέδου, διὰ τὰ ὅποια εἰναι $\vec{AM} = \lambda \cdot \vec{u}$, ὅπου $\lambda \in \mathbb{R}$. Τὸ σύνολον τῶν σημείων τούτων λέγεται : εὐθεῖα (ε). Ἡ εὐθεῖα αὕτη ὡρίσθη ἀπὸ τὸ σημεῖον A καὶ τὸ ἐλεύθερον διάνυσμα \vec{u} .

Ἐὰν εἰς ἀμφοτέρα τὰ μέλη τῆς ἔξισώσεως

$$\vec{AM} = \lambda \vec{u} \quad (\lambda \in \mathbb{R})$$

προσθέσωμεν τὸ αὐτὸν διάνυσμα \vec{OA} θὰ ἔχωμεν :

$$\vec{OA} + \vec{AM} = \lambda \vec{u} + \vec{OA}$$

$$\text{δηλαδὴ } \vec{OM} = \lambda \vec{u} + \vec{OA}$$

($\lambda \in \mathbb{R}$) (43, α)

Ἡ ἔξισωσις, $\vec{AM} = \lambda \vec{u}$ ($\lambda \in \mathbb{R}$) καθὼς καὶ ἡ $\vec{OM} = \lambda \vec{u} + \vec{OA}$ ($\lambda \in \mathbb{R}$) ἐκφράζουν ἡ κάθε μία τὴν ἀναγκαίαν καὶ ἰκανήν συνθήκην ἵνα τὸ σημεῖον M ἀνήκῃ εἰς τὴν εὐθεῖαν (ε). Ὁ πραγματικὸς ὀριθμὸς λ εἰναι ἡ παράμετρος τῶν ἀνωτέρω ἔξισώσεων.

Ἀπὸ τὸν ἀνωτέρω ὀρισμὸν τῆς εὐθείας (ε) ἐπεται ὅτι ἡ (ε) ὁρίζεται μονοτρόπως ἐκ τοῦ σημείου A καὶ τοῦ διανύσματος \vec{u} .

Δύο σημεῖα A καὶ B (διάφορα μεταξύ των) ὁρίζουν μίαν καὶ μόνον μίαν εὐθεῖαν. Πράγματι, δυνάμεθα νὰ λάβωμεν τὴν εὐθεῖαν, ἡ ὅποια ὁρίζεται ἀπὸ τὸ A καὶ τὸ $\vec{u} = \vec{AB}$. Ἡ ἔξισωσις τῆς εὐθείας θὰ εἰναι :

$$\vec{AM} = \lambda \vec{AB} \quad (\lambda \in \mathbb{R})$$

$$\text{ἢ } \vec{OM} = \lambda \vec{AB} + \vec{OA} \quad (\lambda \in \mathbb{R})$$

διὰ $\lambda = 0$ ἔχομεν $M \equiv A$ διὰ $\lambda = 1$ ἔχομεν $M \equiv B$.

Παράδειγμα. Δίδονται σημεῖον $A(2,5)$ καὶ διάνυσμα $\vec{u}(-2,3)$ εἰς τὸ ἐπίπεδον xOy καὶ ζητεῖται ἡ διανυσματικὴ ἔξισωσις τῆς εὐθείας, ἡ ὅποια διέρχεται διὰ τοῦ A καὶ εἰναι παράλληλος πρὸς τὸ \vec{u} .


Ἀπάντησις. Συμφώνως πρὸς τὴν (43,α), ἂν $M(x, \psi)$ εἰναι τυχὸν σημεῖον τῆς ζητουμένης εὐθείας, ὅπότε θὰ εἰναι $\vec{OM}(x, \psi)$, θὰ ἔχωμεν :

$(x, \psi) = \lambda \cdot (-2,3) + (2,5)$ ἡ ὅποια εἰναι ἡ ζητουμένη διανυσματικὴ ἔξισωσις.

Ἐκ ταύτης εύρισκομεν διαδοχικῶς :

$$(x, \psi) = (-2\lambda, 3\lambda) + (2, 5) \Rightarrow$$

$$(x, \psi) = (-2\lambda + 2, 3\lambda + 5) \Rightarrow$$



Σχ. 43.1

$$\begin{array}{l} x = -2\lambda + 2 \\ \psi = 3\lambda + 5 \end{array} \quad \left\{ \begin{array}{l} \frac{x-2}{-2} = \lambda \\ \frac{\psi-5}{3} = \lambda \end{array} \right\} \Rightarrow$$

$$\frac{x-2}{-2} = \frac{\psi-5}{3} \Rightarrow$$

$3x - 6 = -2\psi + 10 \Rightarrow 3x + 2\psi - 16 = 0$, ή δοποία είναι ή λεγομένη άναλυτική έξισωσις της εύθειας.

44. ΔΙΕΥΘΥΝΟΝ ΔΙΑΝΥΣΜΑ ΕΥΘΕΙΑΣ.

Τὸ διάνυσμα $\vec{u}(\alpha, \beta)$ λέγεται διευθύνον διάνυσμα τῆς εύθειας (ϵ).

Τὰ διανύσματα $\vec{u}' = tu$ ($t \in \mathbb{R}$) είναι ἐπίσης διευθύνοντα διανύσματα τῆς (ϵ), διότι ή έξισωσις τῆς (ϵ) ήμπορεῖ νὰ γραφῇ :

$$\vec{AM} = \frac{\lambda}{t} \cdot \vec{tu}$$

$$\text{ἢ } \vec{AM} = \frac{\lambda}{t} \vec{u}' \quad (\lambda \in \mathbb{R}, t \in \mathbb{R} \text{ καὶ } t \neq 0)$$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

112) Δίδεται τὸ ἔλευθερον διάνυσμα $\vec{u}(-3, 5)$ καὶ ζητεῖται νὰ δρίσετε διὰ τῶν συντεταγμένων του τὸ διάνυσμα $-2\vec{u}$. Ἐπειτα νὰ λάβετε σύστημα ὀρθοκανονικῶν ἀξόνων καὶ νὰ σχεδιάσετε ἓνα ἀντιπρόσωπον τοῦ $-2\vec{u}$.

113) Νὰ ξετάσετε ἂν είναι παράλληλα η̄ ὅχι τὰ διανύσματα $\vec{u}(3, 4)$ καὶ $\vec{v}\left(\frac{3}{2}, 2\right)$

114) Θεωροῦμεν τὰ διανύσματα \vec{AB} καὶ \vec{CD} :

$$A(-3, 2), \quad B(1, 3), \quad C(1, 2), \quad D(5, 3)$$

Νὰ ξετάσετε ἂν τὰ ἀνωτέρω διανύσματα είναι παράλληλα καὶ ἂν είναι τῆς αὐτῆς φορᾶς.

115) Δίδεται τὸ ἔλευθερον διάνυσμα $\vec{u}(2, 1)$ καὶ τὸ σημεῖον $A(2, -1)$. Νὰ καθορίσετε τὴν εύθειαν, η̄ δοποία διέρχεται διὰ τοῦ A καὶ ἔχει διευθύνον διάνυσμα τὸ \vec{u} .

116) Δίδεται τὸ ἔλευθερον διάνυσμα $\vec{u}(-1, 2)$ καὶ τὰ σημεῖα $A(2, 2)$ καὶ $M(x, y)$. Ζητεῖται νὰ έκφράσετε ὅτι τὰ διανύσματα \vec{AM} καὶ \vec{u} είναι παράλληλα.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙV

ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΠΟΛΥΩΝΥΜΩΝ ΕΙΣ ΓΙΝΟΜΕΝΟΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

45. ΟΡΙΣΜΟΣ. Άναλυσις πολυωνύμου είς γινόμενον παραγόντων καλεῖται ό μετασχηματισμὸς αὐτοῦ εἰς γινόμενον παραγόντων.

Ή άναλυσις πολυωνύμου είς γινόμενον παραγόντων είναι ἐν ἐκ τῶν σπουδαιοτέρων κεφαλαίων τῆς Ἀλγέβρας, διότι είς πλεῖστα ἀλγεβρικὰ θέματα, ώς θά ἴδωμεν, ἀπαιτεῖται, ὅπως τὰ πολυώνυμα τεθοῦν ὑπὸ μορφὴν γινομένου παραγόντων. Π.χ. εἰς τὴν ἐπίλυσιν ἔξισώσεων.

Ο μετασχηματισμὸς τῶν πολυωνύμων είς γινόμενον παραγόντων, ἐὰν είναι δυνατός, δὲν είναι πάντοτε εὔκολος, οὔτε δύναται νὰ γίνῃ δι' ὠρισμένων κανόνων. Σκόπιμον είναι λοιπὸν ν' ἀσχοληθῶμεν, ὅσον τὸ δυνατὸν περισσότερον μὲ τὸ θέμα τοῦτο.

46. Είναι γνωστὴ ἐκ τῆς προηγουμένης τάξεως ἡ άναλυσις εἰς γινόμενον παραγόντων τῶν κάτωθι παραστάσεων, δι' ὅ καὶ ἐπαναλαμβάνονται συντόμως :

1. Παραστάσεις, τῶν ὁποίων οἱ ὅροι ἔχουν κοινὸν παράγοντα.

$$\text{Πολυώνυμον} = (\text{κοινὸς παράγων}) \cdot (\text{πηλίκον πολυωνύμου διὰ κοινοῦ παράγοντος})$$

Παραδείγματα : α) $4x^3\psi - 10x^2\psi^2 + 12x\psi^3 - 8\psi^4x = 2x\psi \cdot (2x^2 - 5x\psi + 6\psi^2 - 4\psi^3)$, β) $45\psi^{v+1}x - 25\psi^{v+2}x^2 + 15\psi^{v+3}x^3 = 5\psi^{v+1}x (9 - 5\psi x + 3\psi^2 x^2)$
γ) $15\alpha(\beta - 3)^3 - 3\alpha^2(\beta - 3)^2 + 6\alpha^3(\beta - 3) = 3\alpha(\beta - 3)[5(\beta - 3)^2 - \alpha(\beta - 3) + 2\alpha^2]$

2. Παραστάσεις χωριζόμεναι εἰς διάδας

Παραδείγματα : α) $\alpha^2\mu + \beta\nu^2 + \alpha^2\nu^2 + \beta\mu = (\alpha^2\mu + \beta\mu) + (\alpha^2\nu^2 + \beta\nu^2) = \mu(\alpha^2 + \beta) + \nu^2(\alpha^2 + \beta) = (\alpha^2 + \beta) \cdot (\mu + \nu^2)$
β) $\alpha x^v + \alpha \psi^u - \alpha \beta x^v - \alpha \beta \psi^u + \beta x^v + \beta \psi^u = (\alpha x^v + \alpha \psi^u) - (\alpha \beta x^v + \alpha \beta \psi^u) +$

$+ (\beta x^v + \beta \psi^u) = \alpha (x^v + \psi^u) - \alpha \beta (x^v + \psi^u) + \beta (x^v + \psi^u) = (x^v + \psi^u) (\alpha - \alpha \beta + \beta)$.
 Τήν ιδίαν παράστασιν χωρίσατε εις δύο διάλογους και άκολουθως άναλύσατε εις γινόμενον παραγόντων

$$\gamma) \quad x\psi(\alpha^2 + \beta^2) + \alpha\beta(x^2 + \psi^2) = \alpha^2 x\psi + \beta^2 x\psi + \alpha\beta x^2 + \alpha\beta \psi^2 = (\alpha^2 x\psi + \alpha\beta x^2) + (\beta^2 x\psi + \alpha\beta \psi^2) = \alpha x(\alpha\psi + \beta x) + \beta\psi(\beta x + \alpha\psi) = (\alpha\psi + \beta x) \cdot (\alpha x + \beta\psi).$$

3. Παραστάσεις της μορφής $A^2 - B^2$ (Α και Β άλγεβρ. παραστάσεις)

$$A^2 - B^2 = (A + B) \cdot (A - B)$$

Παραδείγματα : α) $25x^2 - 81\psi^4 = (5x)^2 - (9\psi^2)^2 = (5x - 9\psi^2)(5x + 9\psi^2)$
 β) $\mu^{16} - v^8 = (\mu^8 + v^4) \cdot (\mu^8 - v^4) = (\mu^8 + v^4) \cdot (\mu^4 + v^2) \cdot (\mu^4 - v^2) =$
 $= (\mu^8 + v^4) \cdot (\mu^4 + v^2) \cdot (\mu^2 + v) \cdot (\mu^2 - v)$.
 γ) $\alpha^{2v} - \beta^{2\mu} = (\alpha^v)^2 - (\beta^\mu)^2 = (\alpha^v + \beta^\mu) \cdot (\alpha^v - \beta^\mu), \quad (v, \mu \in \mathbb{N})$
 δ) $(8x - 3\psi^2)^2 - (5\psi^2 + 2x)^2 = (8x - 3\psi^2 + 5\psi^2 + 2x) \cdot (8x - 3\psi^2 - 5\psi^2 - 2x) =$
 $= (2\psi^2 + 10x)(6x - 8\psi^2) = 4(\psi^2 + 5x)(3x - 4\psi^2)$

4. Παραστάσεις της μορφής $A^2 \pm 2AB + B^2$ (Α,Β παραστάσεις).

$$A^2 \pm 2AB + B^2 = (A \pm B)^2$$

Παραδείγματα : α) $9x^2 \pm 12x + 4 = (3x)^2 \pm 2 \cdot 3x \cdot 2 + 2^2 = (3x \pm 2)^2$
 β) $16\psi^2 + 49x^2\psi^4 - 56x\psi^3 = (4\psi)^2 + (7x\psi^2)^2 - 2 \cdot 4\psi \cdot 7x\psi^2 = (4\psi - 7x\psi^2)^2$
 γ) $\alpha^{2v} \pm 2\alpha^v\beta^\mu + \beta^{2\mu} = (\alpha^v)^2 \pm 2\alpha^v\beta^\mu + (\beta^\mu)^2 = (\alpha^v \pm \beta^\mu)^2$
 δ) $(x^2 + \psi^2)^2 + 4x^2\psi^2 + 4(x^2 + \psi^2)x\psi = [(x^2 + \psi^2) + 2x\psi]^2 = [(x + \psi)^2]^2 =$
 $= (x + \psi)^4$

5. Παραστάσεις της μορφής $\phi(x) = x^2 + px + q$ ($p, q, x \in \mathbb{R}$)

$$\Delta = p^2 - 4q$$

$$\left| \begin{array}{l} \Delta = 0 \Leftrightarrow \phi(x) = x^2 + px + q = \left(x + \frac{p}{2} \right)^2 \\ \Delta > 0 \Leftrightarrow \phi(x) = x^2 + px + q = \left(x + \frac{p}{2} \right)^2 - \left(\frac{\sqrt{\Delta}}{2} \right)^2 = \\ = \left(x + \frac{p + \sqrt{\Delta}}{2} \right) \cdot \left(x + \frac{p - \sqrt{\Delta}}{2} \right) \\ \Delta < 0 \Leftrightarrow \phi(x) = x^2 + px + q = \left(x + \frac{p}{2} \right)^2 + \left(\frac{\sqrt{-\Delta}}{2} \right)^2. \end{array} \right.$$

Είς τήν περίπτωσιν, καθ' ἥν $\Delta < 0$, παρατηροῦμεν ὅτι ή παράστασις $\phi(x) \equiv x^2 + px + q$ δὲν μετασχηματίζεται εἰς τὸ σύνολον \mathbb{R} εἰς γινόμενον πρωτοβαθμίων παραγόντων, ἀλλὰ εἰς ἄθροισμα δύο τετραγώνων. Λίαν συντόμως θὰ μάθωμεν τρόπον μετασχηματισμοῦ εἰς γινόμενον παραγόντων τῇ βοηθείᾳ ἄλλου συστήματος ἀριθμῶν.

Παραδείγματα : α) $\phi(x) = x^2 + 8x + 16 \cdot \Delta = 8^2 - 4 \cdot 16 = 0$

"Ωστε ἔχομεν : $\phi(x) = x^2 + 8x + 16 = \left(x + \frac{8}{2} \right)^2 = (x + 4)^2$

β) $\phi(x) = x^2 + 2x - 15. \Delta = 2^2 - 4(-15) = 4 + 60 = 64 > 0$

$$\text{Ούτω : } \varphi(x) = x^2 + 2x - 15 = \left(x + \frac{2}{2}\right)^2 - \left(\frac{\sqrt{64}}{2}\right)^2 = \left(x + \frac{2+8}{2}\right)\left(x + \frac{2-8}{2}\right) = \\ = (x + 5) \cdot (x - 3)$$

$$\gamma) \varphi(x) = x^2 - 4x + 1. \Delta = (-4)^2 - 4 \cdot 1 = 16 - 4 = 12 > 0$$

$$\text{Ούτως έχομεν : } \varphi(x) = x^2 - 4x + 1 = \left(x + \frac{-4+\sqrt{12}}{2}\right) \cdot \left(x + \frac{-4-\sqrt{12}}{2}\right) = \\ = \left(x + \frac{-4+2\sqrt{3}}{2}\right) \cdot \left(x + \frac{-4-2\sqrt{3}}{2}\right) = (x - 2 + \sqrt{3}) \cdot (x - 2 - \sqrt{3})$$

$$\delta) \varphi(x) = x^2 - 3x + 13. \Delta = (-3)^2 - 4 \cdot 13 = 9 - 52 = -43 < 0$$

$$\text{"Ωστε, έχομεν : } \varphi(x) = x^2 - 3x + 13 = \left(x + \frac{-3}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{-(-43)}}{2}\right)^2 = \\ = \left(x - \frac{3}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{43}}{2}\right)^2 \text{ αθροισμα δύο τετραγώνων.}$$

6. Παραστάσεως της μορφής $\varphi(x) = ax^2 + bx + c$, ($a \neq 0, b, c \in \mathbb{R}$)

$$\left| \begin{array}{l} \Delta = 0 \Leftrightarrow \varphi(x) = ax^2 + bx + c = a \left(x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a}\right) = \\ = a(x^2 + px + q) = a \left(x + \frac{p}{2a}\right)^2, \text{ όπου } p = \frac{b}{a}, q = \frac{c}{a} \\ \Delta > 0 \Leftrightarrow \varphi(x) = ax^2 + bx + c = a \left(x + \frac{b+\sqrt{\Delta}}{2a}\right) \cdot \left(x + \frac{b-\sqrt{\Delta}}{2a}\right) \\ \Delta < 0 \Leftrightarrow \varphi(x) = ax^2 + bx + c = a \left[\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{-\Delta}}{2a}\right)^2\right] \end{array} \right.$$

Και ένταῦθα ὅταν $\Delta < 0$, μετασχηματίζεται εἰς αθροισμα δύο τετραγώνων και σχι εἰς γινόμενον δύο παραγόντων εἰς τὸ σύνολον \mathbb{R} .

Παραδείγματα : α) $\varphi(x) = 9x^2 + 6x + 1. \Delta = 6^2 - 4 \cdot 9 \cdot 1 = 36 - 36 = 0$

$$\text{Ούτως έχομεν : } \varphi(x) = 9x^2 + 6x + 1 = 9 \left(x + \frac{6}{2 \cdot 9}\right)^2 = 9 \left(x + \frac{1}{3}\right)^2 = (3x + 1)^2$$

$$\beta) \varphi(x) = 2x^2 - x - 1. \Delta = (-1)^2 - 4 \cdot 2 \cdot (-1) = (1 + 8) = 9 > 0.$$

$$\text{"Ωστε : } \varphi(x) = 2x^2 - x - 1 = 2 \left(x + \frac{-1+\sqrt{9}}{2 \cdot 2}\right) \left(x + \frac{-1-\sqrt{9}}{2 \cdot 2}\right) =$$

$$= 2 \left(x + \frac{1}{2}\right) (x - 1) = (2x + 1) (x - 1)$$

$$\gamma) \varphi(x) = 3x^2 - x + 2. \Delta = (-1)^2 - 4 \cdot 3 \cdot 2 = 1 - 24 = -23 < 0$$

$$\text{"Ωστε : } \varphi(x) = 3x^2 - x + 2 = 3 \left[\left(x + \frac{-1}{6}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{-(-23)}}{6}\right)^2\right] = 3 \left[\left(x - \frac{1}{6}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{23}}{6}\right)^2\right].$$

$$\delta) \varphi(x) = 25x^2 - 20x + 1. \Delta = 20^2 - 4 \cdot 25 = 400 - 100 = 300 > 0$$

$$\text{Ούτω : } \varphi(x) = 25x^2 - 20x + 1 = 25 \left(x + \frac{-20+\sqrt{300}}{50}\right) \left(x + \frac{-20-\sqrt{300}}{50}\right) =$$

$$= 25 \left(x + \frac{-2+\sqrt{3}}{5}\right) \left(x + \frac{-2-\sqrt{3}}{5}\right) = (5x - 2 + \sqrt{3})(5x - 2 - \sqrt{3})$$

Ίδού τώρα ξλλαί περιπτώσεις μετασχηματισμοῦ πολυωνύμων εἰς γινόμενα παραγόντων λίαν χρήσιμοι :

7. Παραστάσεις δυνάμεναι νά γραφοῦν ώς διαφορὰ τετραγώνων παραστάσεων.

α) Συνδυασμὸς τῶν περιπτώσεων 3 καὶ 4

$$A^2 + 2AB + B^2 - \Gamma^2 = (A + B)^2 - \Gamma^2 = (A + B + \Gamma)(A + B - \Gamma)$$

$$A^2 + 2AB + B^2 - \Gamma^2 + 2\Gamma\Delta - \Delta^2 = (A^2 + 2AB + B^2) - (\Gamma^2 - 2\Gamma\Delta + \Delta^2) = \\ = (A + B)^2 - (\Gamma - \Delta)^2 = (A + B + \Gamma - \Delta)(A + B - \Gamma + \Delta)$$

ὅπου A, B, Γ, Δ ἀλγεβρικαὶ παραστάσεις.

β) Παραστάσεις τῆς μορφῆς $x^{2v} + x^{2v-1}\psi^{2v-1} + \psi^{2v}$, $v \in \mathbb{N}$ καὶ $v \geq 2$

$$x^{2v} + x^{2v-1}\psi^{2v-1} + \psi^{2v} = x^{2v} + 2x^{2v-1}\psi^{2v-1} + \psi^{2v} - x^{2v-1}\psi^{2v-1} = \\ = (x^{2v-1} + \psi^{2v-1})^2 - (x^{2v-2}\psi^{2v-2})^2 = (x^{2v-1} + \psi^{2v-1} + x^{2v-2}\psi^{2v-2}) \cdot (x^{2v-1} + \psi^{2v-1} - x^{2v-2}\psi^{2v-2})$$

γ) Παραστάσεις τῆς μορφῆς $x^{2v} + 4\psi^{2v}$, $v \in \mathbb{N}$ καὶ $v \geq 2$

$$x^{2v} + 4\psi^{2v} = (x^{2v-1})^2 + (2\psi^{2v-1})^2 + 4x^{2v-1}\psi^{2v-1} - 4x^{2v-1}\psi^{2v-1} = \\ = (x^{2v-1} + 2\psi^{2v-1})^2 - (2x^{2v-2}\psi^{2v-2})^2 = \\ = (x^{2v-1} + 2\psi^{2v-1} + 2x^{2v-2}\psi^{2v-2}) \cdot (x^{2v-1} + 2\psi^{2v-1} - 2x^{2v-2}\psi^{2v-2})$$

Εἰς τὰς περιπτώσεις β καὶ γ ἐπιδιώκομεν τὴν συμπλήρωσιν τῆς παραστάσεως διὰ προσθαφαιρέσεως τοῦ αὐτοῦ μονωνύμου, ἵνα αὕτη καταστῇ διαφορὰ δύο τετραγώνων.

Παραδείγματα : α) $9x^2 + 6\psi x + \psi^2 - \omega^2 = (3x + \psi)^2 - \omega^2 = \\ = (3x + \psi + \omega)(3x + \psi - \omega)$

$$\beta) 36\alpha^2 + 12\alpha\beta + \beta^2 - \gamma^2 - 4\gamma\delta - 4\delta^2 = (36\alpha^2 + 12\alpha\beta + \beta^2) - (\gamma^2 + 4\gamma\delta + \\ + 4\delta^2) = (6\alpha + \beta)^2 - (\gamma + 2\delta)^2 = (6\alpha + \beta + \gamma + 2\delta)(6\alpha + \beta - \gamma - 2\delta)$$

$$\gamma) x^4 + x^2\psi^2 + \psi^4 = x^4 + 2x^2\psi^2 + \psi^4 - x^2\psi^2 = (x^2 + \psi^2)^2 - (x\psi)^2 = \\ = (x^2 + \psi^2 + x\psi)(x^2 + \psi^2 - x\psi)$$

$$\delta) x^8 + x^4\psi^4 + \psi^8 = x^8 + 2x^4\psi^4 + \psi^8 - x^4\psi^4 = (x^4 + \psi^4)^2 - (x^2\psi^2)^2 = \\ = (x^4 + \psi^4 + x^2\psi^2) \cdot (x^4 + \psi^4 - x^2\psi^2) = \\ = (x^2 + \psi^2 + x\psi)(x^2 + \psi^2 - x\psi)(x^4 + \psi^4 - x^2\psi^2)$$

$$\epsilon) x^4 + 4\psi^4 = (x^2)^2 + (2\psi^2)^2 + 4x^2\psi^2 - 4x^2\psi^2 = (x^2 + 2\psi^2)^2 - (2x\psi)^2 = \\ = (x^2 + 2\psi^2 + 2x\psi)(x^2 + 2\psi^2 - 2x\psi)$$

8. Ἀνάλυσις ἔνδος ἡ περισσοτέρων ὅρων εἰς ἄθροισμα ἄλλων.

Πολλάκις παρίσταται ἀνάγκη ἀναλύσεως ἔνδος ἡ περισσοτέρων ὅρων εἰς ἀλγεβρικὸν ὄθροισμα ἄλλων, προκειμένου νά ἐπιτύχωμεν τὴν ἀνάλυσιν εἰς γινόμενον παραγόντων μιᾶς παραστάσεως. Συνήθως τοῦτο ἀπαιτεῖται, ὅταν τὸ πλήθος τῶν ὅρων τῆς παραστάσεως εἶναι περιττὸν καὶ ἐπιθυμοῦμεν νά τὸ καταστήσωμεν ἀρτιον.

Ἡ μέθοδος αὕτη χρησιμοποιεῖται εἰς πολλὰς περιπτώσεις.

Παραδείγματα : α) Νά ἀναλυθῇ εἰς γινόμενον παραγόντων ἡ παράστασις $A = x^2\psi + x^2\omega + \psi^2x + \psi^2\omega + \omega^2x + \omega^2\psi + 2x\psi\omega$

"Ἐχομεν : $A = x^2\psi + x^2\omega + \psi^2x + \psi^2\omega + \omega^2x + \omega^2\psi + x\psi\omega + x\psi\omega =$

$$\begin{aligned}
 &= (x^2\psi + x^2\omega) + (\psi^2x + x\psi\omega) + (\psi^2\omega + \omega^2\psi) + (\omega^2x + x\psi\omega) = \\
 &= x^2(\psi + \omega) + x\psi(\psi + \omega) + \omega\psi(\psi + \omega) + \omega x(\omega + \psi) = \\
 &= (\psi + \omega)(x^2 + x\psi + \omega\psi + \omega x) = (\psi + \omega)[x(x + \psi) + \omega(x + \psi)] = \\
 &= (\psi + \omega)(x + \psi)(x + \omega)
 \end{aligned}$$

β) Νὰ γίνη γινόμενον ἡ παράστασις $\phi(x) = x^3 - 3x + 2$

$$\begin{aligned}
 \text{"Εχομεν : } \phi(x) &= x^3 - 3x + 2 = x^3 - x - 2x + 2 = x(x^2 - 1) - 2(x - 1) = \\
 &= x(x + 1)(x - 1) - 2(x - 1) = (x - 1)(x^2 + x - 2) = \\
 &= (x - 1)(x^2 + 2x - x - 2) = (x - 1)[(x + 2)x - (x + 2)] = \\
 &= (x - 1)^2(x + 2)
 \end{aligned}$$

9. Παραστάσεις τῆς μορφῆς $x^v \pm \psi^v$, $v \in \mathbb{N}$.

Τάς παραστάσεις αύτάς ἀναλύομεν ἐπὶ τῇ βάσει τῆς θεωρίας τῶν ἀξιοσημειώτων πηλίκων καὶ τῆς ταυτότητος τῆς τελείας διαιρέσεως.

α) Αἱ παραστάσεις τῆς μορφῆς $\alpha^3 \pm \beta^3$ διαιρούμεναι διὰ $\alpha \pm \beta$ δίδουν ὑπόλοιπον 0 καὶ πηλίκον $\alpha^2 \mp \alpha\beta + \beta^2$. Ἐπομένως ἀναλύονται ὡς ἔξῆς :

$$\alpha^3 \pm \beta^3 = (\alpha \pm \beta) \cdot (\alpha^2 \mp \alpha\beta + \beta^2)$$

β) Αἱ παραστάσεις τῆς μορφῆς $x^v - \psi^v$ ὅπου $v \in \mathbb{N}$, διαιρούμεναι διὰ $x - \psi$ δίδουν ὑπόλοιπον 0 καὶ πηλίκον $x^{v-1} + x^{v-2}\psi + x^{v-3}\psi^2 + \dots + x\psi^{v-2} + \psi^{v-1}$.

"Αρα ἔχομεν $x^v - \psi^v = (x - \psi)(x^{v-1} + x^{v-2}\psi + x^{v-3}\psi^2 + \dots + x\psi^{v-2} + \psi^{v-1})$
 "Αν εἰναι $v = 2k$, $k \in \mathbb{N}$, τότε δυνάμεθα νὰ ἀναλύσωμεν καὶ ὡς ἀκολούθως
 $x^v - \psi^v = x^{2k} - \psi^{2k} = (x^k + \psi^k)(x^k - \psi^k)$

Παραδείγματα : 1) $\alpha^4 - \beta^4 = (\alpha^2 + \beta^2)(\alpha^2 - \beta^2) = (\alpha^2 + \beta^2)(\alpha + \beta)(\alpha - \beta)$
 ἢ $\alpha^4 - \beta^4 = (\alpha - \beta)(\alpha^3 + \alpha^2\beta + \alpha\beta^2 + \beta^3) = (\alpha - \beta)(\alpha + \beta)(\alpha^2 + \beta^2)$
 2) $\alpha^5 - \beta^5 = (\alpha - \beta)(\alpha^4 + \alpha^3\beta + \alpha^2\beta^2 + \alpha\beta^3 + \beta^4)$
 3) $\alpha^6 - \beta^6 = (\alpha^3 + \beta^3)(\alpha^3 - \beta^3) = (\alpha + \beta)(\alpha^2 - \alpha\beta + \beta^2)(\alpha - \beta)(\alpha^2 + \alpha\beta + \beta^2)$
 ἢ $\alpha^6 - \beta^6 = (\alpha^2)^3 - (\beta^2)^3 = (\alpha^2 - \beta^2)(\alpha^4 + \alpha^2\beta^2 + \beta^4) =$
 $= (\alpha + \beta)(\alpha - \beta)(\alpha^2 + \alpha\beta + \beta^2)(\alpha^2 - \alpha\beta + \beta^2)$ (βλ. περίπτ. 7 β') ἢ
 $\alpha^6 - \beta^6 = (\alpha - \beta)(\alpha^5 + \alpha^4\beta + \alpha^3\beta^2 + \alpha^2\beta^3 + \alpha\beta^4 + \beta^5) = (\alpha - \beta)[\alpha^4(\alpha +) +$
 $+ \alpha^2\beta^2(\alpha + \beta) + \beta^4(\alpha + \beta)] = (\alpha - \beta)(\alpha + \beta)(\alpha^4 + \alpha^2\beta^2 + \beta^4)$ κλπ.

γ) Διὰ τάς παραστάσεις τῆς μορφῆς $x^v + \psi^v$ διακρίνομεν δύο περιπτώσεις : 1) Εάν $v = 2k + 1$ (περιττός), τότε τὸ διώνυμον διαιρεῖται διὰ $x + \psi$ καὶ κατ' ἀκολουθίαν :

$$\forall v = 2k + 1 \quad \boxed{x^v + \psi^v = (x + \psi)(x^{v-1} - x^{v-2}\psi + x^{v-3}\psi^2 - \dots - x\psi^{v-2} + \psi^{v-1})}$$

2) Εάν $v = 2k$ (άρτιος), τότε τὸ διώνυμον διαιρούμενον διὰ $x + \psi$ ἢ διὰ $x - \psi$ δίδει ὑπόλοιπον $2\psi^v$ καὶ συνεπῶς δὲν δυνάμεθα νὰ ἀναλύσωμεν αὐτὸν εἰς γινόμενον παραγόντων ἐπὶ τῇ βάσει τῆς θεωρίας τῶν ἀξιοσημειώτων πηλίκων.

Εἴς τινας ὅμως περιπτώσεις, κατὰ τὰς ὅποιας δὲν εἰναι ἄρτιον πολλαπλάσιον περιττοῦ ἀριθμοῦ, δυνάμεθα νὰ ἀναλύσωμεν ὡς ἀκολούθως :

$$(6 = 2 \cdot 3) \quad x^6 + \psi^6 = (x^2)^3 + (\psi^2)^3 = (x^2 + \psi^2)(x^4 - x^2\psi^2 + \psi^4)$$

$$(12 = 4 \cdot 3) \quad x^{12} + \psi^{12} = (x^4)^3 + (\psi^4)^3 = (x^4 + \psi^4)(x^8 - x^4\psi^4 + \psi^8)$$

$$(10 = 2 \cdot 5) \quad x^{10} + \psi^{10} = (x^2)^5 + (\psi^2)^5 = (x^2 + \psi^2)(x^8 - x^6\psi^2 + x^4\psi^4 - x^2\psi^6 + \psi^8)$$

Παραδείγματα :

$$1) \alpha^5 + \beta^5 = (\alpha + \beta)(\alpha^4 - \alpha^3\beta + \alpha^2\beta^2 - \alpha\beta^3 + \beta^4)$$

$$2) \alpha^7 + \beta^7 = (\alpha + \beta)(\alpha^6 - \alpha^5\beta + \alpha^4\beta^2 - \alpha^3\beta^3 + \alpha^2\beta^4 - \alpha\beta^5 + \beta^6)$$

$$3) \alpha^{15} + \beta^{15} = (\alpha^3)^5 + (\beta^3)^5 = (\alpha^3 + \beta^3)(\alpha^{12} - \alpha^9\beta^3 + \alpha^6\beta^6 - \alpha^3\beta^9 + \beta^{12}) = \\ = (\alpha + \beta)(\alpha^2 - \alpha\beta + \beta^2)(\alpha^{12} - \alpha^9\beta^3 + \alpha^6\beta^6 - \alpha^3\beta^9 + \beta^{12})$$

10. Παραστάσεις : Τέλειον τετράγωνον ή κύβος πολυωνύμου.

α) "Όταν ἔν πολυώνυμον περιέχῃ τὰ τετράγωνα μερικῶν μονωνύμων καὶ τὰ διπλάσια γινόμενα αὐτῶν ἀνὰ δύο καθ' ὅλους τούς δυνατούς τρόπους μὲ τὸ κατάλληλον σημεῖον, τότε είναι τέλειον τετράγωνον καὶ συνεπῶς ἀναλύεται εἰς γινόμενον δύο ἵσων παραγόντων. Μερική περίπτωσις είναι ἡ περίπτωσις ὑπὸ ἀριθ. 4.

Παραδείγματα : 1) $\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 + 2\alpha\beta + 2\beta\gamma + 2\alpha\gamma = (\alpha + \beta + \gamma)^2 = (\alpha + \beta + \gamma)(\alpha + \beta + \gamma)$

$$2) x^2 + 4\psi^2 + 9\omega^2 + 4x\psi - 6x\omega - 12\omega\psi = x^2 + (2\psi)^2 + (3\omega)^2 + 2 \cdot 2x\psi - 2x \cdot 3\omega - 2 \cdot 2\psi \cdot 3\omega = (x + 2\psi - 3\omega)^2 = (x + 2\psi - 3\omega)(x + 2\psi - 3\omega).$$

β) Εάν τὸ πολυώνυμον είναι τῆς μορφῆς $A^3 \pm 3A^2B + 3AB^2 \pm B^3$, τότε είναι ὁ κύβος τοῦ διωνύμου $A \pm B$ καὶ συνεπῶς ἀναλύεται εἰς γινόμενον τριῶν ἵσων παραγόντων.

$$\text{Οὕτω : } A^3 \pm 3A^2B + 3AB^2 \pm B^3 = (A \pm B)^3 = (A \pm B)(A \pm B)(A \pm B)$$

Παραδείγματα :

$$1) 27x^3 + 27x^2\psi + 9x\psi^2 + \psi^3 = (3x)^3 + 3 \cdot (3x)^2\psi + 3 \cdot (3x)\psi^2 + \psi^3 = \\ = (3x + \psi)^3 = (3x + \psi)(3x + \psi)(3x + \psi)$$

$$2) 8x^6\alpha^3 - 36x^5\alpha^2 + 54x^4\alpha - 27x^3 = (2x^2\alpha)^3 - 3 \cdot (2x^2\alpha)^2(3x) + 3(2x^2\alpha)(3x)^2 - (3x)^3 = (2x^2\alpha - 3x)^3 = (2x^2\alpha - 3x)(2x^2\alpha - 3x)(2x^2\alpha - 3x)$$

11. Παραστάσεις : Πολυώνυμα βαθμοῦ ἀνωτέρου τοῦ πρώτου.

Ως γνωστόν, ἂν ἀκέραιον πολυώνυμον $\phi(x)$ βαθμοῦ ≥ 1 μηδενίζεται διὰ $x = \alpha$ η $x = \frac{\beta}{\alpha}$, ὅπου $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, τότε διαιρεῖται διὰ $x - \alpha$ η $\alpha x - \beta$ καὶ ἀντιστρόφως.

Ἐπὶ τῇ βάσει τῆς ιδιότητος αὐτῆς ἀναλύομεν, ἐφ' ὅσον τοῦτο είναι κατορθωτόν, πολυώνυμα ἀνωτέρου τοῦ α^m βαθμοῦ εἰς γινόμενα παραγόντων, ώς εἰς τὰ ἀκόλουθα παραδείγματα :

Παραδείγματα : 1) Νὰ ἀναλυθῇ εἰς γινόμενον τὸ πολυώνυμον

$$\phi(x) = x^4 + x^3 - x^2 + x - 2$$

Εύρισκομεν τοὺς διαιρέτας τοῦ γνωστοῦ ὅρου -2 . Οὕτοι είναι : $\pm 1, \pm 2$.

Παρατηροῦμεν ὅτι, διὰ $x = 1$ ἔχομεν $\phi(1) = 1^4 + 1^3 - 1^2 + 1 - 2 = 0$. Ἀρα τὸ $\phi(x)$ διαιρεῖται διὰ $x - 1$ καὶ δίδει πηγίκον $\Pi_1(x) = x^3 + 2x^2 + x + 2$

Ἐπομένως θὰ ἔχωμεν : $\phi(x) = (x - 1)(x^3 + 2x^2 + x + 2)$ (1)

Όμοιώς, διά $x = -2$ έχουμε : $\Pi_1(-2) = (-2)^3 + 2(-2)^2 + (-2) + 2 = 0$
 "Αρα τό $\Pi_1(x)$ διαιρεῖται διά $x + 2$ καὶ δίδει πηλίκον $\Pi_2(x) = x^2 + 1$, όπότε
 $\Pi_1(x) = (x + 2) \cdot (x^2 + 1)$ καὶ ἀκολούθως ἡ (1) γράφεται:
 $\phi(x) = (x - 1)(x + 2)(x^2 + 1)$.

2) Νὰ ἀναλυθῇ εἰς γινόμενον τὸ $\phi(x) = 2x^3 + 3x^2 + 8x + 12$.

Εύρισκομεν τοὺς διαιρέτας τοῦ γνωστοῦ ὄρου 12 καὶ τοῦ συντελεστοῦ τοῦ μεγιστοβαθμίου ὄρου 2. Οὗτοι εἰναι οἱ ἔξης: τοῦ 12 οἱ $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4, \pm 6, \pm 12$, τοῦ 2 οἱ $\pm 1, \pm 2$. Ἀκολούθως σχηματίζομεν ὅλα τὰ κλάσματα, τὰ ὅποια ἔχουν ἀριθμητὰς τοὺς διαιρέτας τοῦ 12 καὶ παρανομαστὰς τοὺς διαιρέτας τοῦ 2.

Ταῦτα εἰναι: $\pm \frac{1}{2}, \pm \frac{3}{2}$. Ἐκ τῶν κλασμάτων αὐτῶν τὸ κλάσμα $-\frac{3}{2}$ μηδενίζει τὸ πολυώνυμον $\phi(x)$, διότι $\phi\left(-\frac{3}{2}\right) = 2\left(-\frac{3}{2}\right)^3 + 3\left(-\frac{3}{2}\right)^2 + 8\left(-\frac{3}{2}\right) + 12 = 0$. Ἀρα τὸ $\phi(x)$ διαιρεῖται διά $2x + 3$ καὶ δίδει πηλίκον $\Pi(x) = x^2 + 4$, όπότε $\phi(x) = (2x + 3)(x^2 + 4)$.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

117) Νὰ τραποῦν εἰς γινόμενον παραγόντων αἱ παραστάσεις :

- 1) $x^\mu \psi^\mu + x^{\mu-1} \psi^{\mu+1} - x^{\mu+1} \psi^{\mu-1}$, $\mu \in \mathbb{N}$,
- 2) $\alpha x^2 + \beta x^2 + \alpha + \beta + \alpha x + \beta x$,
- 3) $x^2 \psi^2 (\alpha^2 + \beta^2) + \alpha \beta (x^4 + \psi^4)$,
- 4) $(\mu^2 x + v^2 \psi)^2 + (v^2 x - \mu^2 \psi)^2$,
- 5) $144x^2 \psi^2 - 121\alpha^2 \beta^2$,
- 6) $x^2 - (\alpha - \beta)^2$,
- 7) $(\alpha x + \beta \psi)^2 - 1$,
- 8) $(x^2 + x\psi + \psi^2)^2 - (x^2 - x\psi + \psi^2)^2$,
- 9) $64x^2 \psi^4 - 160x^2 \psi^2 + 100x^2$,
- 10) $169x^2 \psi^2 z^2 - 286x \psi^2 z^2 + 121\psi^2 z^2$,
- 11) $4\psi^2 \omega^2 \beta^2 + 361x^2 \psi^2 \omega^2 \alpha^2 \pm 76\alpha \beta x \psi^2 \omega^2$
- 12) $\alpha^2 - \beta^2 - 2\beta y - y^2$,
- 13) $\alpha^2 - 2\alpha \beta + \beta^2 - 4y^2 + 12\gamma \delta - 98^2$

118) Νὰ μετασχηματισθοῦν εἰς γινόμενον πρωτοβαθμίων παραγόντων τὰ ἀκόλουθα, πολυώνυμα :

- 1) $x^2 + 4x - 21$,
- 2) $x^2 \pm 7ax + 12a^2$,
- 3) $\omega^2 - (v - 2)\omega - 2v$
- 4) $2\omega^2 + 4\omega - 70$,
- 5) $5x^2 - 4x + 1$,
- 6) $9x^2 - 6ax + \alpha^2 - \beta^2$
- 119) Νὰ ἀναλυθοῦν εἰς γινόμενον παραγόντων αἱ πραστάσεις :
- 1) $9\alpha^2 \beta^2 - 36\alpha \beta + 36 - 25\alpha^2$,
- 2) $x^4 - 16\omega^4 + 9\psi^4 - 6x^2 \psi^2$
- 3) $2(x^2 \psi - 3\omega) - 9 + x^2 \psi^2 - \omega^2 + x^4$,
- 4) $4\alpha^4 + 16\alpha^2 \beta^2 + 25\beta^4$
- 5) $36x^4 \psi^4 + 49\alpha^4 - 100\alpha^2 x^2 \psi^2$,
- 6) $9x^8 + 1 - 15x^4$,
- 7) $64\alpha^4 x^8 + \psi^4$,
- 8) $\lambda^{4v} + 4v^2 \lambda$, ($v, \lambda \in \mathbb{N}$),
- 9) $\alpha x^2 - (\alpha + 1)x + 1$,
- 10) $\mu x^2 + (\mu - 5v)x - 5v$
- 11) $x^4 + x^3 - 3x^2 - 5x - 2$ (ὑπόδ. $-5x = -3x - 2x$),
- 12) $x^3 + x^2 - 2$ (ὑπόδ. $x^2 = 2x^2 - x^3$)
- 13) $64\alpha^3 \pm 27\beta^3$,
- $\alpha^3 \beta^3 \pm \gamma^3$,
- $(\alpha + \beta)^3 \pm (\alpha - \beta)^3$,
- $(\alpha - \beta)^3 - \beta^3$
- 14) $\alpha^4 x^8 - \psi^8$,
- $x^8 \pm 64\alpha^6 \psi^6$,
- $\alpha^{12} \pm 1$,
- $\alpha^6 \pm \beta^3$
- 15) $32x^5 \pm 1$,
- $x^7 \pm \psi^7$,
- $x^8 \pm \psi^8$,
- $243\alpha^5 \pm \beta^5$
- 16) $81x^2 + \psi^2 + 4\omega^2 + 18x\psi - 36x\omega - 4\psi\omega$
- 17) $9\alpha^2 x^4 + \psi^2 \beta^4 + 1 - 6\alpha \beta^2 x^2 \psi - 6\alpha x^2 + 2\beta^2 \psi$
- 18) $8x^3 + 1 + 12x^2 + 6x$,
- 19) $\alpha^3 x^3 - 6\alpha^2 x^2 \psi + 12\alpha x \psi^2 - 8\psi^3$
- 20) $27x^3 \psi^3 - 8\alpha^3 - 54\alpha x^2 \psi^2 + 36\alpha^2 x \psi$
- 21) $x^4 - 7x^3 + 9x^2 + 7x - 10$,
- 22) $3x^3 + x^2 - 6x + 8$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΣ

120) Νά τραποῦν εἰς γινόμενον παραγόντων αἱ παραστάσεις :

- 1) $\alpha^{16} - \beta^{16}$, 2) $x^4\mu - \psi^{4v}$, ($\mu, v \in \mathbb{N}$), 3) $x^3\psi^{4v+5} - \psi^5x^{4\mu+3}$, ($\mu, v \in \mathbb{N}$),
- 4) $\beta\gamma^2 + \alpha^2\gamma + \alpha\beta^2 - \alpha^2\beta - \beta^2\gamma - \alpha\gamma^2$, 5) $(x-\alpha)^2 + 12\alpha^2(x-\alpha) + 36\alpha^4$
- 6) $x^2 - \psi^2 - \omega^2 + 2\psi\omega + x + \psi - \omega$, 7) $(x+\psi)^2 - 1 - (x+\psi+1)x\psi$
- 8) $\alpha^2\beta^{2v} + 2\alpha\mu + 1\beta^{v+1} + \alpha^{2\mu}\beta^2$, ($v, \mu \in \mathbb{N}$)
- 9) $16\alpha^{3\mu} - 2\beta^{8v} - 24\alpha\beta^2 + 9\alpha^{4-2\mu}\beta^{4-8v}$, ($\mu, v \in \mathbb{N}$)
- 10) $\alpha^{2v} + \beta^{2\mu} \pm 2\alpha v \beta\mu - \gamma^{2\lambda}$, ($\mu, v, \lambda \in \mathbb{N}$)
- 11) $x^{4v} + 4x^{2v}\psi^{2\mu} + 4\psi^{4\mu} - \alpha^2\beta^2 + 2\alpha\beta - 1$, ($\mu, v \in \mathbb{N}$)
- 12) $x^{4v} + x^{2v}\psi^{2\mu} + \psi^{4\mu}$, ($\mu, v \in \mathbb{N}$), 13) $\alpha^4x^{4v}\psi^{4\mu} + 64\beta^4$, ($\mu, v \in \mathbb{N}$)
- 14) $\alpha^8 - \beta^9$, 15) $\alpha^9 - 27\alpha^6 - \alpha^3 + 27$, 16) $x^6 - (\alpha^3 - 1)x^3 - \alpha^3$
- 17) $x^{3v} + \psi^{3\mu} + 3x^v\psi^\mu (x^v + \psi^\mu)$, ($\mu, v \in \mathbb{N}$)
- 18) $125x^{3v+3} - 75x^{2v+2} + 15x^{v+1} - 1$, 19) $\frac{x^3}{27} - \frac{x^2}{3} + x - 1$

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Τ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ

47. ΟΡΙΣΜΟΣ. Ταυτότης καλεῖται ή ἰσότης μεταξὺ δύο ἀλγεβρικῶν παραστάσεων, ή όποια είναι ἀληθής διὰ πάσας τὰς τιμᾶς τῶν γραμμάτων ἐκ τῶν δοιών ἐξ αριθμητῶν.

Τὰ δύο μέλη τῆς ταυτότητος εἶναι ἰσοδύναμοι ἀλγεβρικαὶ παραστάσεις.

Εἰς μίαν τοιαύτην ἰσότητα τὸ σύμβολον (=) ἀντικαθίσταται συνήθως, χωρὶς τοῦτο νὰ εἶναι ἀπολύτως ἀπαραίτητον, μὲ τὸ σύμβολον (≡) καὶ τὸ δόπιον διαβάζεται : «ἐκ ταυτότητος ἵσον μὲ». "Ητοι γράφομεν φ(x, ψ, ω, ...) ≡ f(x, y, ω, ...).

'Εὰν ή ἰσότης αὕτη ἰσχύῃ μόνον δι' ὥρισμένας τιμὰς τῶν x, ψ, ω, ... καὶ δὲν ἰσχύῃ διὰ καθε τιμὴν τῶν μεταβλητῶν αὐτῶν, τότε δὲν εἶναι ταυτότης.

'Η χρησιμότης τῶν ταυτοτήτων εἶναι πολὺ μεγάλη. Δι' αὐτῶν διευκολύνεται πολὺ δ ἀλγεβρικὸς λογισμός· ἦτοι διασχηματισμὸς τῶν παραστάσεων εἰς ἀπλουστέρας περισσότερον ἐπωφελεῖς διὰ τὰ ἀλγεβρικὰ θέματα.

48. ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΙΣ (ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ) ΜΙΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ.

'Η ἔργασία ἐπαληθεύσεως μιᾶς ταυτότητος συνίσταται εἰς διαδοχικούς καταλλήλους μετασχηματισμούς, τοὺς ὅποιους θὰ ἐκτελέσωμεν εἰς τὸ ἐν μέλος διὰ καταλήξωμεν εἰς τὸ ἄλλο. Καταλληλοὶ δὲ μετασχηματισμοὶ εἴναι : 1) ἐκτέλεσις τῶν πράξεων, 2) ἀντικατάστασις παραστάσεων μὲ τὰς ἐκ ταυτότητος ἵσας αὐτῶν, 3) ἀνάλυσις ὅρων εἰς ἄθροισμα ἄλλων, 4) πρόσθεσις καὶ ἀφαίρεσις ταυτοτήτων γνωστῶν κατὰ μέλη, 5) προσθαφαίρεσις ὅρων ή παραστάσεων κ.λ.π.

Πολλάκις ὑποθέτομεν τὴν ταυτότητα ἀληθῆ καὶ ἀφοῦ ἐπιφέρομεν ὥρισμένας ἀπλοποιήσεις, καταλήγομεν εἰς ἰσότητα ἐκ τῶν προτέρων ἀληθῆ. "Ἐπειτα, ἀκολουθοῦντες ἀντιστρόφους μετασχηματισμούς, καταλήγομεν εἰς τὴν ἀποδεικτέαν ταυτότητα. Καλὸν θὰ εἶναι ὅμως τοῦτο νὰ ἀποφεύγεται, διότι ἀλλως ἀπαιτεῖται προσοχὴ εἰς τὴν χρησιμοποίησιν τῶν μετασχηματισμῶν, οἱ δόποιοι δέοντες νὰ εἶναι ὅλοι ἀντιστρεπτοί.

'Εὰν ἔχωμεν πρὸς ἐπαλήθευσιν ταυτότητα ὑπὸ περιορισμούς, ἀκολουθοῦ-

μεν τὴν αὐτὴν διαδικασίαν, μὲ τὴν διαφορὰν ὅτι κατὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν πράξεων πρέπει νὰ ἔχωμεν πάντοτε ὑπ' ὅψιν μας τοὺς περιορισμούς.

Εἰς τὸ παρὸν κεφάλαιον θὰ γνωρίσωμεν ταυτότητας, ἐκτὸς τῶν ἥδη γνωστῶν ἐκ τῆς προηγουμένης τάξεως, καὶ ἄλλας τὰς ὅποιας οἱ μαθηταὶ δέον νὰ ἀπομνημονεύσουν.

49. ΑΞΙΟΜΗΜΟΝΕΥΤΟΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ.

A) Γνωσταὶ ἐκ τῆς προηγουμένης τάξεως

$$\begin{aligned} (\alpha \pm \beta)^2 &\equiv \alpha^2 \pm 2\alpha\beta + \beta^2 \Leftrightarrow \alpha^2 + \beta^2 \equiv (\alpha \pm \beta)^2 \mp 2\alpha\beta \\ (\alpha + \beta)(\alpha - \beta) &\equiv \alpha^2 - \beta^2 \Leftrightarrow \alpha^2 - \beta^2 \equiv (\alpha + \beta)(\alpha - \beta) \\ (\alpha \pm \beta)^3 &\equiv \alpha^3 \pm 3\alpha^2\beta + 3\alpha\beta^2 \pm \beta^3 \equiv \alpha^3 \pm \beta^3 \pm 3\alpha\beta(\alpha \pm \beta) \Leftrightarrow \\ &\quad \alpha^3 + \beta^3 \equiv (\alpha + \beta)^3 - 3\alpha\beta(\alpha + \beta) \equiv (\alpha + \beta)(\alpha^2 - \alpha\beta + \beta^2) \\ &\quad \alpha^3 - \beta^3 \equiv (\alpha - \beta)^3 + 3\alpha\beta(\alpha - \beta) \equiv (\alpha - \beta)(\alpha^2 + \alpha\beta + \beta^2) \\ (\alpha + \beta + \gamma)^2 &\equiv \alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 + 2\alpha\beta + 2\beta\gamma + 2\gamma\alpha \Leftrightarrow \\ &\quad \alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 \equiv (\alpha + \beta + \gamma)^2 - 2(\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha) \\ (x + \alpha)(x + \beta) &\equiv x^2 + (\alpha + \beta)x + \alpha\beta \\ (x + \alpha)(x + \beta)(x + \gamma) &\equiv x^3 + (\alpha + \beta + \gamma)x^2 + (\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha)x + \alpha\beta\gamma \\ (x - \alpha)(x - \beta)(x - \gamma) &\equiv x^3 - (\alpha + \beta + \gamma)x^2 + (\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha)x - \alpha\beta\gamma \end{aligned}$$

Ταυτότης τῆς διαιρέσεως

$$\Delta(x) \equiv \delta(x) \cdot \Pi(x) + U(x) \Leftrightarrow \frac{\Delta(x)}{\delta(x)} \equiv \Pi(x) + \frac{U(x)}{\delta(x)} \quad \delta(x) \neq 0,$$

ὅπου $\Delta(x)$, $\delta(x)$, $\Pi(x)$, $U(x)$ ἀντιστοίχως διαιρέτεος, διαιρέτης, πηλίκον καὶ ὑπόλοιπον τῆς διαιρέσεως.

B) Ἀλλαι ἀξιοσημείωτοι ταυτότητες.

1) Τὸ τετράγωνον πολυωνύμου

Νὰ εὐρεθῇ τὸ ἀνάπτυγμα τοῦ $(\alpha + \beta + \gamma + \delta)^2$

$$\begin{aligned} \text{Έχομεν : } (\alpha + \beta + \gamma + \delta)^2 &\equiv (\alpha + \beta + \gamma + \delta)(\alpha + \beta + \gamma + \delta) \\ &\equiv \alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 + \delta^2 + 2\alpha\beta + 2\alpha\gamma + 2\alpha\delta + 2\beta\gamma + 2\beta\delta + 2\gamma\delta \\ &\equiv \alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 + \delta^2 + 2(\alpha\beta + \alpha\gamma + \alpha\delta + \beta\gamma + \beta\delta + \gamma\delta) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Γενικῶς } (\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_v)^2 &\equiv (\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_v)(\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_v) \equiv \\ &\equiv \alpha_1(\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_v) + \alpha_2(\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_v) + \dots + \alpha_v(\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_v) \equiv \\ &\equiv \alpha_1^2 + \alpha_2^2 + \dots + \alpha_v^2 + 2(\alpha_1\alpha_2 + \alpha_1\alpha_3 + \dots + \alpha_1\alpha_v) + 2(\alpha_2\alpha_3 + \dots + \alpha_2\alpha_4 + \dots + \alpha_2\alpha_v) + \dots + 2\alpha_{v-1}\alpha_v \equiv \alpha_1^2 + \alpha_2^2 + \dots + \alpha_v^2 + 2(\alpha_1\alpha_2 + \dots + \alpha_1\alpha_v + \alpha_2\alpha_3 + \dots + \alpha_2\alpha_v + \dots + \alpha_{v-1}\alpha_v) \end{aligned}$$

$$\boxed{\text{Ούτω : } \forall \alpha, i = 1, 2, 3, \dots, v : \forall \alpha, i = 1, 2, 3, \dots, v : (\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_v)^2 \equiv \sum \alpha_i^2 + 2 \sum \alpha_i \alpha_j}$$

”Ητοι : Τὸ τετράγωνον πολυωνύμου μὲν ὁ σρος ἰσοῦται μὲ τὸ ἀθροίσμα τῶν τετραγώνων τῶν ὅρων του, ηὔξημένον κατὰ τὸ διπλάσιον τοῦ ὀλγ. ἀθροίσματος τῶν γινομένων τῶν ὅρων του λαμβανομένων ἀνὰ δύο, καθ' ὅλους τοὺς δυνατοὺς τρόπους.

Παραδείγματα :

- $(\alpha + \beta - \gamma - \delta)^2 \equiv \alpha^2 + \beta^2 + (-\gamma)^2 + (-\delta)^2 + 2\alpha\beta + 2\alpha(-\gamma) + 2\alpha(-\delta) + 2\beta(-\gamma) + 2\beta(-\delta) + 2(-\gamma)(-\delta) \equiv \alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 + \delta^2 + 2(\alpha\beta - \alpha\gamma - \alpha\delta - \beta\gamma - \beta\delta + \gamma\delta)$
- $(\alpha x^3 + \beta x^2 + \gamma x + \delta)^2 \equiv \alpha^2 x^6 + \beta^2 x^4 + \gamma^2 x^2 + \delta^2 + 2(\alpha\beta x^5 + \alpha\gamma x^4 + \alpha\delta x^3 + \beta\gamma x^3 + \beta\delta x^2 + \gamma\delta x)$.

2) Ό κύβος τριωνύμου

Νὰ εύρεθῇ τὸ ἀνάπτυγμα τοῦ $(\alpha + \beta + \gamma)^3$.

*Έχομεν : $(\alpha + \beta + \gamma)^3 \equiv (\alpha + \beta + \gamma)^2(\alpha + \beta + \gamma)$
 $\equiv (\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 + 2\alpha\beta + 2\beta\gamma + 2\gamma\alpha)(\alpha + \beta + \gamma)$
 $\equiv \alpha^3 + \beta^3 + \gamma^3 + 3\alpha^2\gamma + 3\alpha^2\beta + 3\beta^2\alpha + 3\beta^2\gamma + 3\gamma^2\alpha + 3\gamma^2\beta + 6\alpha\beta\gamma$
 $\equiv \alpha^3 + \beta^3 + \gamma^3 + 3(\alpha^2\gamma + \alpha^2\beta + \beta^2\alpha + \beta^2\gamma + \gamma^2\alpha + \gamma^2\beta + 2\alpha\beta\gamma)$

(βλ. περ. 8α ἀναλύσεως) $\equiv \alpha^3 + \beta^3 + \gamma^3 + 3(\alpha + \beta)(\beta + \gamma)(\gamma + \alpha)$

Ούτω : 'Ο κύβος τριωνύμου ισούται μὲ τὸ ἀθροισμα τῶν κύβων τῶν ὅρων του, ηὔημένον κατὰ τὸ 3πλάσιον τοῦ γινομένου τῶν ἀλγεβρ. ἀθροισμάτων τῶν ὅρων του λαμβανομένων ἀνὰ δύο, καθ' ὅλους τοὺς δυνατοὺς τρόπους.

Παραδείγματα : Νὰ εύρεθοῦν τὸ ἀναπτύγματα :

- $(1 + x + x^2)^3 \equiv 1^3 + x^3 + x^6 + 3(1 + x)(x + x^2)(1 + x^2) \equiv 1 + x^3 + x^6 + 3x + 3x^2 + 3x^2 + 3x^4 + 3x^4 + 3x^5 + 6x^3 \equiv x^6 + 3x^5 + 6x^4 + 7x^3 + 6x^2 + 3x + 1$
- $(2x - 3\psi + 5)^3 \equiv 8x^3 - 27\psi^3 + 125 + 3(2x - 3\psi)(2x + 5)(5 - 3\psi) \equiv 8x^3 - 27\psi^3 + 125 - 36x^2\psi + 60x^2 + 54x\psi^2 + 135\psi^2 + 150x - 225\psi$

3) Νὰ ἀποδειχθῇ ἡ ἀλήθεια τῆς ταυτότητος

$$\alpha^3 + \beta^3 + \gamma^3 - 3\alpha\beta\gamma \equiv (\alpha + \beta + \gamma)(\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 - \alpha\beta - \beta\gamma - \gamma\alpha)$$

*Έχομεν $\alpha^3 + \beta^3 + \gamma^3 - 3\alpha\beta\gamma \equiv (\alpha + \beta)^3 - 3\alpha\beta(\alpha + \beta) + \gamma^3 - 3\alpha\beta\gamma \equiv$
 $\equiv (\alpha + \beta)^3 + \gamma^3 - 3\alpha\beta(\alpha + \beta + \gamma) \equiv$
 $\equiv (\alpha + \beta + \gamma)[(\alpha + \beta)^2 - (\alpha + \beta)\gamma + \gamma^2] - 3\alpha\beta(\alpha + \beta + \gamma) \equiv$
 $\equiv (\alpha + \beta + \gamma)(\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 - \alpha\beta - \beta\gamma - \gamma\alpha)$

*Επειδὴ δὲ $\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 - \alpha\beta - \beta\gamma - \gamma\alpha \equiv \frac{1}{2}(2\alpha^2 + 2\beta^2 + 2\gamma^2 - 2\alpha\beta - 2\beta\gamma - 2\gamma\alpha) \equiv \frac{1}{2}[(\alpha - \beta)^2 + (\beta - \gamma)^2 + (\gamma - \alpha)^2]$

ἄρα έχομεν $\alpha^3 + \beta^3 + \gamma^3 - 3\alpha\beta\gamma = \frac{1}{2}(\alpha + \beta + \gamma)[(\alpha - \beta)^2 + (\beta - \gamma)^2 + (\gamma - \alpha)^2]$

Παραδείγματα : α) Νὰ ἀναλυθῇ εἰς γινόμενον παραγόντων ἡ παράστασις $\alpha^3 + 8\beta^3 + 27\gamma^3 - 18\alpha\beta\gamma$.

Λύσις : *Έχομεν $\alpha^3 + (2\beta)^3 + (3\gamma)^3 - 3 \cdot \alpha \cdot 2\beta \cdot 3\gamma \equiv (\alpha + 2\beta + 3\gamma)(\alpha^2 + 4\beta^2 + 9\gamma^2 - 2\alpha\beta - 6\beta\gamma - 9\alpha\gamma)$

β) Νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι $1 - \alpha^3 + (\alpha + 1)^3 + 3\alpha/(\alpha + 1) \equiv 2(3\alpha^2 + 3\alpha + 1)$

Λύσις: "Έχομεν $1 - \alpha^3 + (\alpha + 1)^3 + 3\alpha(\alpha + 1) \equiv 1^3 + (-\alpha)^3 + (\alpha + 1)^3 - 3 \cdot 1 \cdot (-\alpha)(\alpha + 1) \equiv (1 - \alpha + \alpha + 1)[1 + \alpha^2 + (\alpha + 1)^2 - 1 \cdot (-\alpha) - 1 \cdot (\alpha + 1) - (-\alpha)(\alpha + 1)] \equiv 2(1 + \alpha^2 + \alpha^2 + 1 + 2\alpha + \alpha - \alpha - 1 + \alpha^2 + \alpha) \equiv 2(3\alpha^2 + 3\alpha + 1)$

4) Ταυτότητες του Lagrange

α) Νά αποδειχθῆ ὅτι: $(\alpha_1^2 + \alpha_2^2)(\beta_1^2 + \beta_2^2) - (\alpha_1\beta_1 + \alpha_2\beta_2)^2 \equiv (\alpha_1\beta_2 - \alpha_2\beta_1)^2$

Λύσις: "Έχομεν: $(\alpha_1^2 + \alpha_2^2)(\beta_1^2 + \beta_2^2) - (\alpha_1\beta_1 + \beta_2\alpha_2)^2 \equiv \alpha_1^2\beta_1^2 + \alpha_2^2\beta_2^2 + \alpha_1^2\beta_2^2 + \alpha_2^2\beta_1^2 - \alpha_1^2\beta_1^2 - 2\alpha_1\alpha_2\beta_1\beta_2 - \alpha_2^2\beta_2^2 \equiv \alpha_1^2\beta_2^2 + \alpha_2^2\beta_1^2 -$

$$- 2\alpha_1\alpha_2\beta_1\beta_2 \equiv (\alpha_1\beta_2 - \alpha_2\beta_1)^2 \equiv \begin{vmatrix} \alpha_1 & \beta_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 \end{vmatrix}^2.$$

Τὸ σύμβολον $\begin{vmatrix} \alpha_1 & \beta_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 \end{vmatrix}$ καλούμενον δριζόουσα βασικάς τάξεως ἔγνωρίσαμεν εἰς τὴν προηγουμένην τάξιν.

β) Νά αποδειχθῆ ὅτι:

$$(\alpha_1^2 + \alpha_2^2 + \alpha_3^2)(\beta_1^2 + \beta_2^2 + \beta_3^2) - (\alpha_1\beta_1 + \alpha_2\beta_2 + \alpha_3\beta_3)^2 \equiv \begin{vmatrix} \alpha_1 & \beta_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 \\ \alpha_3 & \beta_3 \end{vmatrix}^2 + \begin{vmatrix} \alpha_1 & \beta_1 \\ \alpha_3 & \beta_3 \end{vmatrix}^2 + \begin{vmatrix} \alpha_2 & \beta_2 \\ \alpha_3 & \beta_3 \end{vmatrix}^2$$

Η απόδειξης νὰ γίνη ύποτε τῶν μαθητῶν

Σημ. Διὰ τὸν σχηματισμὸν τῶν δριζούσῶν τοῦ β' μέλους θεωροῦμεν τὰς τριάδας τῶν ἀριθμῶν $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ καὶ $(\beta_1, \beta_2, \beta_3)$ εἰς δύο στήλας ὡς διάφορα:

α_1	β_1
α_2	β_2
α_3	β_3

γ) Γενικῶς θεωροῦμεν τὰς νιάδας τῶν ἀριθμῶν $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_v)$ καὶ $(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_v)$ καὶ τὰς δριζούσας βασικάς τάξεως, αἱ ὁποῖαι προκύπτουν ἐκ τοῦ πίνακος τῶν δύο στηλῶν. Οὕτως ἔχομεν:

α_1	β_1
α_2	β_2
\vdots	\vdots
α_v	β_v

$$(\alpha_1^2 + \alpha_2^2 + \dots + \alpha_v^2)(\beta_1^2 + \beta_2^2 + \dots + \beta_v^2) - (\alpha_1\beta_1 + \alpha_2\beta_2 + \dots + \alpha_v\beta_v)^2 \equiv \begin{vmatrix} \alpha_1 & \beta_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 \\ \vdots & \vdots \\ \alpha_v & \beta_v \end{vmatrix}^2 + \begin{vmatrix} \alpha_1 & \beta_1 \\ \alpha_3 & \beta_3 \\ \vdots & \vdots \\ \alpha_v & \beta_v \end{vmatrix}^2 + \dots + \begin{vmatrix} \alpha_1 & \beta_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 \\ \vdots & \vdots \\ \alpha_{v-1} & \beta_{v-1} \end{vmatrix}^2 + \dots + \begin{vmatrix} \alpha_{v-1} & \beta_{v-1} \\ \alpha_v & \beta_v \end{vmatrix}^2$$

Η ταυτότης αὐτὴ λέγεται ταυτότης τοῦ Lagrange, ἡ δὲ χρησιμότης της εἰς τὸν ἀλγεβρικὸν λογισμὸν εἶναι μεγάλη. Οἱ μαθηταὶ δύνανται νὰ κάνουν τὰς παρατηρήσεις των, ὡς πρὸς τὸν τρόπον σχηματισμοῦ αὐτῆς.

Παραδείγματα: α) Ν' αποδειχθῆ ὅτι $(\alpha^2 + 1)(x^2 + 1) - (\alpha x + 1)^2 = (\alpha - x)^2$

Λύσις: "Έχομεν: $(\alpha^2 + 1^2)(x^2 + 1^2) - (\alpha x + 1)^2 = \begin{vmatrix} \alpha & x \\ 1 & 1 \end{vmatrix}^2 = (\alpha - x)^2$

β) Ν' αποδειχθῆ ὅτι: $(\alpha^2 + 1)(x^2 + y^2 + 1) - (\alpha x + 1)^2 = \alpha^2 y^2 + (\alpha - x)^2 + y^2$

Λύσις : "Έχομεν : $(\alpha^2 + 1)(x^2 + \psi^2 + 1) - (\alpha x + 1)^2 = (\alpha^2 + 0^2 + 1^2) \cdot$

$$\cdot (x^2 + \psi^2 + 1) - (\alpha x + 0\psi + 1)^2 = \begin{vmatrix} \alpha & 0 \\ x & \psi \end{vmatrix}^2 + \begin{vmatrix} \alpha & 1 \\ x & 1 \end{vmatrix}^2 + \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ \psi & 1 \end{vmatrix}^2 =$$

$$= (\alpha\psi - 0x)^2 + (\alpha - x)^2 + (01 - \psi \cdot 1)^2 = \alpha^2\psi^2 + (\alpha - x)^2 + \psi^2$$

Σημ. Τούς έλλειποντας τυχόν όρους συμπληρώνομεν μὲν μηδενικούς.

5) Ταυτότης τοῦ Newton — Διώνυμον τοῦ Newton

α) Εἰς τὰς γνωστάς ἐκ τῆς προηγουμένης τάξεως ταυτότητας συμπεριέλήφθησαν καὶ αἱ ἀκόλουθοι :

$$(x \pm \alpha_1)(x \pm \alpha_2) \equiv x^2 \pm (\alpha_1 + \alpha_2)x + \alpha_1\alpha_2$$

$$(x \pm \alpha_1)(x \pm \alpha_2)(x \pm \alpha_3) \equiv x^3 \pm (\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3)x^2 + (\alpha_1\alpha_2 + \alpha_2\alpha_3 + \alpha_3\alpha_1)x \pm \pm \alpha_1\alpha_2\alpha_3$$

Ἐπίσης εὐκόλως δυνάμεθα νὰ ἐπαληθεύσωμεν ὅτι :

$$(x \pm \alpha_1)(x \pm \alpha_2)(x \pm \alpha_3)(x \pm \alpha_4) \equiv x^4 \pm (\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4)x^3 + (\alpha_1\alpha_2 + + \alpha_1\alpha_3 + \alpha_1\alpha_4 + \alpha_2\alpha_3 + \alpha_2\alpha_4 + \alpha_3\alpha_4)x^2 \pm (\alpha_1\alpha_2\alpha_3 + \alpha_1\alpha_2\alpha_4 + \alpha_1\alpha_3\alpha_4 + \alpha_2\alpha_3\alpha_4)x + + \alpha_1\alpha_2\alpha_3\alpha_4$$

Συνεχίζοντες οὕτω, δυνάμεθα νὰ λάβωμεν τὴν γενικὴν ἔκφρασιν τῆς ταυτότητος τοῦ Newton, τῆς δποίας ἡ πλήρης ἀπόδειψις θὰ γίνη εἰς ἀνωτέραν τάξιν. Οὕτω : $(x \pm \alpha_1)(x \pm \alpha_2)(x \pm \alpha_3) \dots (x \pm \alpha_v) \equiv x^v \pm (\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_v)x^{v-1} + + (\alpha_1\alpha_2 + \alpha_1\alpha_3 + \dots + \alpha_1\alpha_v + \alpha_2\alpha_3 + \dots + \alpha_2\alpha_v + \dots + \alpha_{v-1}\alpha_v)x^{v-2} \pm (\alpha_1\alpha_2\alpha_3 + + \dots + \alpha_1\alpha_2\alpha_v + \alpha_1\alpha_3\alpha_4 + \dots + \alpha_1\alpha_3\alpha_v + \dots + \alpha_1\alpha_{v-1}\alpha_v + \alpha_2\alpha_3\alpha_4 + \dots + + \alpha_{v-2}\alpha_{v-1}\alpha_v)x^{v-3} + \dots + (-1)^{v-1}(\alpha_1\alpha_2\alpha_3 \dots \alpha_{v-1} + \dots) x + (-1)^v \alpha_1\alpha_2\alpha_3 \dots \alpha_v$

Ἐὰν δὲ χάριν συντομίας θέσωμεν

Σ_1 τὸ ἄθροισμα τῶν $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_v$ καὶ

$\Sigma_2, \Sigma_3, \dots, \Sigma_k$ τὸ ἄθροισμα τῶν γινομένων τῶν $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_v$, λαμβανομένων ἀντιστοίχως ἀνὰ δύο, ἀνὰ τρεῖς, ..., ἀνὰ καθ' ὅλους τούς δυνατούς τρόπους, τότε θὰ ἔχωμεν :

$$(x \pm \alpha_1)(x \pm \alpha_2) \dots (x \pm \alpha_v) \equiv x^v \pm \Sigma_1 x^{v-1} + \Sigma_2 x^{v-2} \pm \dots + (-1)^{v-1} \Sigma_{v-1} x + (-1)^v \Sigma_v$$

β) Ἐὰν εἰς τὰς προηγουμένας ταυτότητας ἔχωμεν $\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_v \neq 0$ τότε : $(x \pm \alpha)^2 \equiv x^2 \pm 2\alpha x + \alpha^2$

$$(x \pm \alpha)^3 \equiv x^3 \pm 3x^2\alpha + 3x\alpha^2 \pm \alpha^3$$

$$(x \pm \alpha)^4 \equiv x^4 \pm 4x^3\alpha + 6x^2\alpha^2 \pm 4x\alpha^3 + \alpha^4$$

$$(x \pm \alpha)^5 \equiv x^5 \pm 5x^4\alpha + 10x^3\alpha^2 \pm 10x^2\alpha^3 + 5x\alpha^4 \pm \alpha^5 \text{ κ.λ.π.}$$

Ἡ γενικὴ ἔκφρασις τοῦ ἀνάπτυγματος τοῦ διωνύμου $(x \pm \alpha)^v$, $v \in \mathbb{N}$, τὸ δποίον καλεῖται διώνυμον τοῦ Newton, θὰ δοθῇ εἰς ἀνωτέραν τάξιν. Ἐνταῦθα περιοριζόμεθα εἰς τὰς ἀκολούθους παρατηρήσεις διὰ τὸν σχηματισμὸν τοῦ ἀνάπτυγματος.

Παρατηρήσεις :

α) Τὸ ἀνάπτυγμα εἶναι ὁμογενὲς πολυώνυμον, ὡς πρὸς τὰ x καὶ α , βαθμοῦ

ἴσου πρὸς τὸν βαθμὸν τοῦ διωνύμου, ἔχον πλῆθος ὅρων ἵσον πρὸς τὸν βαθμόν του ηὔημένον κατὰ 1.

β) Οἱ ἑκέται τοῦ χ βαίνουν ἐλαττούμενοι, ἐνῷ τοῦ α αὔξανόμενοι

γ) τοῦ ἀναπτύγματος $(x + \alpha)^n$ ἀπαντεῖς οἱ ὅροι ἔχουν πρόστημον θετικὸν ἐνῷ τοῦ $(x - \alpha)^n$ ἐναλλάξ θετικὸν καὶ ἀρνητικόν.

δ) "Εκαστος συντελεστὴς προκύπτει, ἀν λάβωμεν τὸ γινόμενον τοῦ συντελεστοῦ ἐπὶ τὸν ἑκέτην τοῦ χ τοῦ προηγουμένου ὅρου καὶ διαιρέσωμεν διὰ τοῦ ἀριθμοῦ τοῦ δηλοῦντος τὴν τάξιν τοῦ προηγουμένου ὅρου. Οἱ Ἰσάκις ἀπέχοντες ἀπὸ τοὺς ἄκρους ὅρους συντελεσταὶ εἰναι ἴσοι.

Παραδείγμα: Νὰ εὐρεθῇ τὸ ἀνάπτυγμα τοῦ $(x + \alpha)^9$.

$$\text{Έχομεν : } (x + \alpha)^9 = x^9 + 9x^8\alpha + 36x^7\alpha^2 + 84x^6\alpha^3 + 126x^5\alpha^4 + 126x^4\alpha^5 + 84x^3\alpha^6 + 36x^2\alpha^7 + 9x\alpha^8 + \alpha^9$$

Παρατηροῦμεν ὅτι : α) τὸ ἀνάπτυγμα εἰναι ὁμογενὲς 9ου βαθμοῦ ὡς πρὸς x,α.

β) Τὸ πλῆθος τῶν ὅρων εἰναι 10

γ) Εἰναι διατεταγμένον κατὰ τὰς ἀνιούσας δυνάμεις τοῦ α καὶ κατὰ τὰς κατιούσας τοῦ χ

δ) 'Ο συντελεστὴς π.χ. 126 λαμβάνεται ἐκ τοῦ $\frac{84 \cdot 6}{4} = 126$

50. ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΑΣ (Περιορισμοὶ εἰς οὓς ὑπόκεινται τὰ γράμματα)

$$1) \quad \forall \alpha, \beta, \gamma : \alpha + \beta + \gamma = 0 \vee \alpha = \beta = \gamma \Leftrightarrow \alpha^3 + \beta^3 + \gamma^3 = 3\alpha\beta\gamma$$

Ἀπόδειξις : 'Εὰν $\alpha + \beta + \gamma = 0$, τότε ἐκ τῆς ταυτότητος

$$\alpha^3 + \beta^3 + \gamma^3 - 3\alpha\beta\gamma \equiv (\alpha + \beta + \gamma)(\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 - \alpha\beta - \beta\gamma - \gamma\alpha) \text{ λαμβάνομεν } \alpha^3 + \beta^3 + \gamma^3 - 3\alpha\beta\gamma \equiv 0 \Leftrightarrow \alpha^3 + \beta^3 + \gamma^3 = 3\alpha\beta\gamma.$$

$$'Εὰν δέ $\alpha = \beta = \gamma$, τότε $\alpha^3 + \beta^3 + \gamma^3 = \alpha^3 + \alpha^3 + \alpha^3 = 3\alpha^3 = 3\alpha\alpha\alpha = 3\alpha\beta\gamma$$$

Ἀντιστρόφως : 'Εὰν $\alpha^3 + \beta^3 + \gamma^3 = 3\alpha\beta\gamma \Leftrightarrow \alpha^3 + \beta^3 + \gamma^3 - 3\alpha\beta\gamma = 0 \Leftrightarrow$

$$1/2(\alpha + \beta + \gamma)[(\alpha - \beta)^2 + (\beta - \gamma)^2 + (\gamma - \alpha)^2] = 0 \text{ (βλ. ταυτότητα 3)}$$

$$'Εκ ταύτης ἔπειται $\alpha + \beta + \gamma = 0 \vee (\alpha - \beta)^2 + (\beta - \gamma)^2 + (\gamma - \alpha)^2 = 0$$$

"Εκαστος τῶν ὅρων τῆς παραστάσεως $(\alpha - \beta)^2 + (\beta - \gamma)^2 + (\gamma - \alpha)^2$ εἰναι μὴ ἀρνητικός. Συνεπῶς, ἂν $(\alpha - \beta)^2 + (\beta - \gamma)^2 + (\gamma - \alpha)^2 = 0 \Rightarrow (\alpha - \beta)^2 = 0, (\beta - \gamma)^2 = 0, (\gamma - \alpha)^2 = 0 \Rightarrow \alpha - \beta = 0, \beta - \gamma = 0, \gamma - \alpha = 0 \Rightarrow \alpha = \beta = \gamma$

Δυνατὸν νὰ ἔχωμεν $\alpha + \beta + \gamma = 0 \wedge (\alpha - \beta)^2 + (\beta - \gamma)^2 + (\gamma - \alpha)^2 = 0$ ὁπότε $\alpha = \beta = \gamma = 0$

"Ωστε : $\boxed{\forall \alpha, \beta, \gamma : \alpha + \beta + \gamma = 0 \vee \alpha = \beta = \gamma \Leftrightarrow \alpha^3 + \beta^3 + \gamma^3 = 3\alpha\beta\gamma}$

'Η χρησιμότης τῆς ταυτότητος αὐτῆς φαίνεται ἐκ τῶν παραδειγμάτων πού ἀκολουθοῦν.

Παραδείγματα : α) Νὰ ἀναλυθῇ εἰς γινόμενον ἡ παράστασις $(3\alpha - \beta)^3 + (3\beta - \gamma)^3 + (3\gamma - \alpha)^3$, ἀν εἰναι $\alpha + \beta + \gamma = 0$.

Λύσις : 'Επειδὴ $(3\alpha - \beta) + (3\beta - \gamma) + (3\gamma - \alpha) = 2(\alpha + \beta + \gamma) = 2 \cdot 0 = 0$, ἔπειται ὅτι $(3\alpha - \beta)^3 + (3\beta - \gamma)^3 + (3\gamma - \alpha)^3 = 3(3\alpha - \beta)(3\beta - \gamma)(3\gamma - \alpha)$

$$\beta) \text{ Εάν } \alpha + \beta + \gamma = 2\tau \text{ νά γίνη γινόμενον ή παράστασις } (2\tau - 3\alpha)^3 + (2\tau - 3\beta)^3 + (2\tau - 3\gamma)^3$$

Λύσις: Επειδή $(2\tau - 3\alpha) + (2\tau - 3\beta) + (2\tau - 3\gamma) = 6\tau - 3(\alpha + \beta + \gamma) = 6\tau - 3 \cdot 2\tau = 6\tau - 6\tau = 0$, έπειται ότι $(2\tau - 3\alpha)^3 + (2\tau - 3\beta)^3 + (2\tau - 3\gamma)^3 = 3(2\tau - 3\alpha)(2\tau - 3\beta)(2\tau - 3\gamma)$

$$2) \forall \alpha, \beta, \gamma : \alpha + \beta + \gamma = 0 \vee \alpha = 0 \vee \beta = 0 \vee \gamma = 0 \Leftrightarrow (\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha)^2 = \alpha^2\beta^2 + \beta^2\gamma^2 + \gamma^2\alpha^2$$

Οι μαθηταί, χρησιμοποιούντες τήν ταυτότητα

$$(\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha)^2 \equiv \alpha^2\beta^2 + \beta^2\gamma^2 + \gamma^2\alpha^2 + 2\alpha\beta\gamma(\alpha + \beta + \gamma), \text{ νά κάμουν τήν άποδειξιν.}$$

$$3) \forall \alpha, \beta, \gamma : \alpha + \beta + \gamma = 0 \vee \alpha + \beta = \gamma \vee \beta + \gamma = \alpha \vee \gamma + \alpha = \beta \Leftrightarrow \alpha^4 + \beta^4 + \gamma^4 = 2(\alpha^2\beta^2 + \beta^2\gamma^2 + \gamma^2\alpha^2)$$

Οι μαθηταί, άφού έπαληθεύσουν τήν ταυτότητα τοῦ de Moivre $\alpha^4 + \beta^4 + \gamma^4 - 2\alpha^2\beta^2 - 2\beta^2\gamma^2 - 2\gamma^2\alpha^2 \equiv (\alpha + \beta + \gamma) \cdot (\alpha - \beta + \gamma) \cdot (\alpha + \beta - \gamma) \cdot (\alpha - \beta - \gamma)$, δύνανται νά κάμουν τήν άποδειξιν.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

121) Νά άποδειχθῇ ή άλήθεια τῶν κάτωθι ταυτοτήτων :

$$1) \left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right)^2 - \left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right)^2 \equiv \alpha\beta$$

$$2) \alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 - (\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha) \equiv \frac{1}{2}[(\alpha - \beta)^2 + (\beta - \gamma)^2 + (\gamma - \alpha)^2]$$

$$3) (\mu + v)^2 - (\mu - v)^2 + (\mu + v)(\mu - v) = \mu(2v + \mu) + v(2\mu - v)$$

$$4) (\alpha + \beta)^3 - (\alpha - \beta)^3 \equiv 2\beta(\beta^2 + 3\alpha^2)$$

$$5) (\alpha - x)(\beta + x)(\gamma - x) \equiv (x - \alpha)(x + \beta)(x - \gamma)$$

122) Νά εύρεθοῦν τ' ἀναπτύγματα :

$$1) (4x^3 - 3x^2 - 2x + 1)^2, \quad 2) \left(\frac{x^2}{2} - \frac{x}{3} + 2\right)^2$$

$$3) (\alpha x + \beta y + \gamma z + 1)^2, \quad 4) (\alpha^3 - \alpha^2 x + \alpha x^2 - x^3)^2$$

123) Νά γίνουν αἱ πράξεις : $(2x + 3y - \omega)^2 - (x - 3y + 2\omega)^2 - (x - 3y - 2\omega)^2$

124) Νά εύρεθοῦν τ' ἀναπτύγματα :

$$1) (\alpha^2 - \alpha x + x^2)^3, \quad 2) (\alpha^{2y} + \alpha^y + 1)^3$$

125) Νά εύρεθῇ τὸ ἔξεγόμενον τῶν πράξεων :

$$(x + \psi + \omega)^3 - (x - \psi + \omega)^3 - (x + \psi - \omega)^3 - (\psi + \omega - x)^3$$

126) Νά ἀναλυθῇ εἰς γινόμενον παραγόντων : $8x^3 - 27\psi^3 - 64\omega^3 - 72x\psi\omega$

127) Νά άποδειχθῇ ότι :

~~$$(\alpha - \beta)^3 - \alpha^3 + (\alpha + \beta)^3 + 3\alpha(\alpha - \beta)(\alpha + \beta) \equiv \alpha(4\alpha^2 + 3\beta^2)$$~~

128) Νά έπαληθευθοῦν αἱ κάτωθι ταυτότητες μὲ τὴν βοήθειαν τῆς ταυτότητος Lagrange :

$$1) (\alpha^2 + x^2 + \psi^2)(x^2 + \alpha^2 + 1) - (2\alpha x + \psi)^2 \equiv (\alpha^2 - x^2)^2 + (\alpha - x\psi)^2 + (x - \alpha\psi)^2$$

$$2) (x^2 + \psi^2 + z^2)^2 - (\chi\psi + \psi z + xz)^2 \equiv (x^2 - \psi z)^2 + (\psi^2 - xz)^2 + (z^2 - x\psi)^2$$

$$3) (\alpha^2 + \beta^2)(x^2 + \psi^2 + \omega^2 + 1) - (\alpha x + \beta\omega)^2 \equiv \alpha^2\psi^2 + \beta^2\psi^2 + \alpha^2 + \beta^2 + (\alpha\omega - \beta x)^2$$

129) Νά εύρεθοῦν τὰ ἀκόλουθα ἀναπτύγματα :

~~$$(2x \pm \psi)^4, \quad (x \pm 3)^6, \quad (\alpha x^2 + 1)^5, \quad (\alpha\beta\gamma + 2x)^7, \quad (\alpha^2 - x^2)^7$$~~

130) Νά ἔκτελεσθοῦν αἱ πράξεις : 1) $(x - \psi)^6 + (x + \psi)^6 - (x^3 + \psi^3)(x^3 - \psi^3)$

$$2) (2x^2 - 1)^4 - (3x + 2)^8, \quad 3) 3(x - 3\psi)^4 - 5(x^2 - 5\psi^2)^2$$

131) Νά δποδειχθή ή άλγθεια τῶν ταυτοτήτων :

$$\begin{aligned} 1) & (\alpha + \beta)^3 - \alpha^3 - \beta^3 \equiv 3\alpha\beta(\alpha + \beta) \\ & (\alpha + \beta)^5 - \alpha^5 - \beta^5 \equiv 5\alpha\beta(\alpha + \beta)(\alpha^2 + \alpha\beta + \beta^2) \\ & (\alpha + \beta)^7 - \alpha^7 - \beta^7 \equiv 7\alpha\beta(\alpha + \beta)(\alpha^2 + \alpha\beta + \beta^2)^2 \end{aligned} \quad \left. \right\} \text{Ταυτότητες τοῦ Gauchy}$$

$$2) (x + \psi)^4 + x^4 + \psi^4 \equiv 2(x^2 + x\psi + \psi^2)^2$$

$$3) (2x + \beta)^5 - 32x^5 - \beta^5 \equiv 10\beta x(2x + \beta)(4x^2 + 2x\beta + \beta^2)$$

$$4) (3\alpha - 2\beta)^5 - 243\alpha^5 + 32\beta^5 \equiv 30\alpha\beta(2\beta - 3\alpha)(9\alpha^2 - 6\alpha\beta + 4\beta^2)$$

132) Νά δποδειχθή ή ταυτότητης τοῦ De Moivre

$$\alpha^4 + \beta^4 + \gamma^4 - 2\alpha^2\beta^2 - 2\beta^2\gamma^2 - 2\alpha^2\gamma^2 \equiv$$

$$\equiv (\alpha + \beta + \gamma)(\alpha + \beta - \gamma)(\alpha - \beta + \gamma)(\alpha - \beta - \gamma)$$

133) Εάν $\alpha + \beta + \gamma = 0$ νά γίνη γινόμενον ή παράστασις

$$(\alpha + \beta)^3 + (\beta + \gamma)^3 + (\gamma + \alpha)^3$$

134) Νά άναλυθή εἰς γινόμενον ή παρ. $(\alpha - \beta)^3 + (\beta - \gamma)^3 + (\gamma - \alpha)^3$

135) Εάν $\alpha + \beta + \gamma = \kappa + \lambda + \mu$ νά άναλυθή εἰς γινόμενον ή παράστασις
 $(\alpha - \kappa)^3 + (\beta - \lambda)^3 + (\gamma - \mu)^3$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΣ

136) Εάν $\alpha = 7x + 3\psi + 6\omega$, $\beta = 6x + 2\psi + 6\omega$, $\gamma = 3x + 3\psi + 2\omega$ και
 $x^2 = \psi^2 + \omega^2$, νά δποδειχθή ότι $\alpha^2 = \beta^2 + \gamma^2$

137) Νά εύρεθοῦν τὰ άναπτύγματα τῶν :

$$1) (\alpha^v + \beta^v + \gamma^v)^2 - (\alpha^v - \beta^v - \gamma^v)^2 + (-\alpha^v + \beta^v + \gamma^v)^2$$

$$2) (\alpha x^v + \beta \psi^v)^2 + (\alpha x^v - \beta \psi^v + 1)^2 - (\alpha \psi^v - \beta x^v)^2$$

138) Νά δποδειχθή ότι $(\alpha + \beta + \gamma + \delta)^3 - 3(\alpha\delta + \beta\delta + \gamma\delta)(\alpha + \beta + \gamma + \delta) - \delta^3 \equiv (\alpha + \beta + \gamma)^3$

139) Νά εύρεθή τὸ ἔξαγόμενον τῆς παραστάσεως

$$(\alpha - \beta + \gamma)^3 - \alpha^3 + \beta^3 - \gamma^3 \quad \text{ύπὸ μορφὴν γινομένου}$$

140) Νά δποδειχθή ότι είναι : $\alpha^9 + \alpha^3 + 1 - 3\alpha^4 \equiv (\alpha - 1)(\alpha^3 + \alpha + 1)$
 $(\alpha^5 + \alpha^4 - \alpha^2 - 1) \equiv (\alpha^3 + \alpha + 1)(\alpha - 1)^2(\alpha^4 + 2\alpha^3 + 2\alpha^2 + \alpha + 1)$

141) Νά δποδειχθή ότι ή άλγ. παράστασις $(x^2 + \psi^2 + \omega^2)(\alpha^2 + x^2) - (\alpha x + x\psi)^2$ είναι μή άρνητική (δηλ. λαμβάνει όλα $x, \psi, \omega \in \mathbb{R}$ μόνον θετικάς ή μηδενικάς τιμάς).

142) Εάν $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2 \in \mathbb{R}$ $\wedge \beta_1 \cdot \beta_2 \neq 0$ και $(\alpha_1^2 + \alpha_2^2)(\beta_1^2 + \beta_2^2) = (\alpha_1\beta_1 + \alpha_2\beta_2)^2$
νά δποδειχθή ότι $\frac{\alpha_1}{\beta_1} = \frac{\alpha_2}{\beta_2}$

143) Εάν $\alpha_i, \beta_i \in \mathbb{R}$, $i = 1, 2, 3, \dots, n$, νά δποδειχθή ότι :

$$(\alpha_1^2 + \alpha_2^2 + \dots + \alpha_n^2)(\beta_1^2 + \beta_2^2 + \dots + \beta_n^2) \geq (\alpha_1\beta_1 + \alpha_2\beta_2 + \dots + \alpha_n\beta_n)^2$$

(Αύτη καλεῖται άνισότης τοῦ Schwarz). Υπὸ ποίας συνθήκας είναι μόνον ίσότητα;

144) Νά έπαληθευθοῦν αἱ ταυτότητες

$$\alpha) (x + \psi)^3 + (\psi + \omega)^3 + (\omega + x)^3 - 3(x + \psi)(\psi + \omega)(\omega + x) \equiv 2(x^3 + \psi^3 + \omega^3 - 3x\psi\omega)$$

$$\beta) (x^2 - \psi\omega)^3 + (\psi^2 - \omega x)^3 + (\omega^2 - x\psi)^3 - 3(x^2 - \psi\omega)(\psi^2 - \omega x)(\omega^2 - x\psi) \equiv \\ \equiv (x^3 + \psi^3 + \omega^3 - 3x\psi\omega)^3$$

145) Εάν $\alpha + \beta + \gamma = 0$ νά άναλυθή εἰς γινόμενον ή παράστασις

$$A = (\alpha\kappa + \beta\lambda)^3 + (\beta\kappa + \gamma\lambda)^3 + (\gamma\kappa + \alpha\lambda)^3$$

. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VI

ΡΗΤΑ ΑΛΓΕΒΡΙΚΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ

51. Τὴν ἔννοιαν τοῦ ἀλγεβρικοῦ κλάσματος καὶ τὰς πράξεις ἐπ' αὐτῶν ἔγνω-
ρίσαμεν εἰς τὴν προηγουμένην τάξιν, δι' ὃ καὶ ἐκθέτομεν τὰς ἔννοιάς ταύτας μόνον
περιληπτικῶς.

Πᾶσα συνάρτησις $\psi = \frac{A}{B} \in R$, ὅπου A καὶ B ἀκέραια πολυώνυμα μιᾶς ἢ
περισσοτέρων μεταβλητῶν καὶ $B \neq 0$, λέγεται **ρητὸν ἀλγεβρικὸν κλάσμα**.

"Ἐν ρητὸν ἀλγεβρικὸν κλάσμα εἶναι ἡ ἀπλουστέρα μορφὴ μιᾶς ρητῆς
κλασματικῆς παραστάσεως. 'Ο παρονομαστής B τοῦ ρητοῦ ὀλγ. κλάσματος
δυνατὸν νὰ εἴναι σταθερό, διπότε τὸ κλάσμα εἶναι ἀκέραιον πολυώνυμον. Συ-
νεπῶς ἐν ἀκέραιον πολυώνυμον δύναται νὰ θεωρηθῇ ρητὸν ἀλγεβρικὸν κλάσμα.

Αἱ συναρτήσεις $\frac{4x\psi}{x+\psi}, \frac{x^2+1}{x^2-1}, \frac{x^2+2x\psi+\psi^2}{x^2+x\psi}, \frac{x^3+\psi^3+\omega^3-3x\psi\omega}{x^2+\psi^2+\omega^2}$ εἶναι ρητὰ
ἀλγεβρικὰ κλάσματα.

Διὰ νὰ ἔχῃ ἔννοιαν ἡ συνάρτησις $\psi = \frac{A}{B}$ πρέπει $B \neq 0$. Κατ' ἀκολου-
θίαν εἶναι ὡρισμένη εἰς τὸ σύνολον R, ἀπὸ τὸ ὅποιον ἔξαιροῦνται αἱ τιμαί, αἱ
ὅποιαι μηδενίζουν τὸν παρονομαστήν. Οὕτω τὸ πεδίον ὀρισμοῦ τῆς συναρτή-
σεως $f(x) = \frac{\varphi_1(x)}{\varphi_2(x)}$, $x \in R$ καὶ $\varphi_1(x), \varphi_2(x)$ ἀκέραια πολυώνυμα, εἶναι τὸ σύνολον

$$\Sigma = R - \{ x/x \in R \wedge \varphi_2(x) = 0 \}$$

Συμβολίζομεν δέ : $f : x \in \Sigma \rightarrow f(x) = \frac{\varphi_1(x)}{\varphi_2(x)} \in R$

'Επίσης τὸ πεδίον ὀρισμοῦ τῆς συναρτήσεως $f(x, \psi) = \frac{\varphi_1(x, \psi)}{\varphi_2(x, \psi)}$, $x, \psi \in R$ καὶ
 $\varphi_1(x, \psi), \varphi_2(x, \psi)$ ἀκέραια πολυώνυμα, εἶναι τὸ σύνολον

$$\Sigma = R^2 - \{ (x, \psi) \mid (x, \psi) \in R^2 \wedge \varphi_2(x, \psi) = 0 \}$$

Συμβολίζομεν δέ : $f : (x, \psi) \in \Sigma \rightarrow f(x, \psi) = \frac{\varphi_1(x, \psi)}{\varphi_2(x, \psi)} \in R$

Σημείωσις $R^2 = R \times R$ (Καρτεσιανὸν γινόμενον)

$\Lambda =$ καὶ (σύμβολον λογικῆς συζεύξεως)

Παραδείγματα : α) τῆς συναρτήσεως $(x, \psi = \frac{x^2 - 5x + 6}{x^2 - 4})$, $x \in R$, πεδίον
ὅρισμοῦ εἶναι τὸ σύνολον $\Sigma = R - \{ 2, -2 \}$

β) τῆς συναρτήσεως $(x, \psi = \frac{\alpha x + \beta}{\gamma x + \delta})$, $\alpha, \beta, \gamma, \delta, x \in \mathbb{R} \wedge \gamma \neq 0$ πεδίον δρι-
σμοῦ είναι

$$\text{τὸ σύνολον } \Sigma = \mathbb{R} - \{ x / x \in \mathbb{R} \wedge \gamma x + \delta = 0 \} = \mathbb{R} - \left\{ -\frac{\delta}{\gamma} \right\}$$

52. ΕΙΔΙΚΑΙ ΜΟΡΦΑΙ ΤΟΥ ΑΛΓΕΒΡΙΚΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ $\psi = \frac{\varphi_1}{\varphi_2}$, φ_1, φ_2 ἀκέρ. πο-
λυώνυμα.

α) Τὸ κλάσμα τοῦτο δὲν ἔχει ἔννοιαν πραγματικοῦ ἀριθμοῦ, ὅταν $\varphi_1 \in \mathbb{R} \wedge \varphi_1 \neq 0 \wedge \varphi_2 = 0$, διότι $\varphi_2 \cdot \psi = 0 \cdot \psi = 0 \neq \varphi_1$

β) Ἐὰν $\varphi_1 = 0 \wedge \varphi_2 \neq 0 \Leftrightarrow \forall \varphi_2 \neq 0 \in \mathbb{R} : \psi = 0$

γ) Ἐὰν $\varphi_1 = 0 \wedge \varphi_2 = 0$ τὸ κλάσμα ψ είναι ἀπροσδιόριστον ἢ ἀόριστον.

Εἰς ἄλλην τάξιν θὰ δειχθῇ ὅτι τὸ κλάσμα τοῦτο δύναται εἰς περιπτώσεις
τινὰς νὰ ἔχῃ μίαν καὶ μόνον τιμήν.

53. ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΡΗΤΩΝ ΑΛΓΕΒΡΙΚΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ.

ΟΡΙΣΜΟΣ. Δύο ἢ περισσότερα ἀκέραια πολυώνυμα ὀνομάζονται πρῶτα
πρὸς ἄλληλα, ἐὰν ὁ M.K.D. αὐτῶν είναι μία σταθερά $C \neq 0$. Συνεπῶς τὰ πηλί-
κα ἀκέραιών πολυωνύμων διὰ τοῦ M.K.D. αὐτῶν είναι ἀκέραια πολυώνυμα πρῶ-
τα πρὸς ἄλληλα καὶ ἀντιστρόφως.

‘Απλοποίησις ρητοῦ κλάσματος

Ἐὰν πολ/σωμεν τοὺς ὄρους ἐνὸς ρητοῦ κλάσματος $\psi = \frac{\varphi_1(x)}{\varphi_2(x)}$ ἐπὶ τὸ αὐ-
τὸ ἀκέραιον πολυώνυμον $\varphi(x)$, λαμβάνομεν ἐν ρητὸν κλάσμα $\frac{\varphi_1 \cdot \varphi}{\varphi_2 \cdot \varphi}$ ἵσοδύναμον
τοῦ $\frac{\varphi_1}{\varphi_2} \forall x \in \Sigma = \mathbb{R} - \{ x / x \in \mathbb{R} \wedge \varphi = 0 \wedge \varphi_2 = 0 \}$

‘Αντιστρόφως, τὸ κλάσμα $\frac{\varphi_1 \varphi}{\varphi_2 \varphi}$ είναι ἵσοδύναμον τοῦ $\frac{\varphi_1}{\varphi_2} \forall x \in \Sigma$, ὅπότε λέ-
γομεν, ὅτι τὸ κλάσμα $\frac{\varphi_1 \varphi}{\varphi_2 \varphi}$ ἔχει ἀπλοποιηθῆ εἰς τὸ $\frac{\varphi_1}{\varphi_2}$. ‘Η ἀπλοποίησις λοιπὸν εί-
ναι δυνατή, ἐφ’ ὅσον τοῦ ρητοῦ κλάσματος οἱ ὄροι ἔχουν κοινὸν παράγοντα
ἀλγ. παράστασιν. ‘Εκ τῶν ἀνωτέρω συνάγομεν ὅτι, διὰ νὰ ἀπλοποιήσωμεν
ἐν ρητὸν ἀλγ. κλάσμα, ἀναλύομεν τοὺς ὄρους του εἰς γινόμενον παραγόντων
καὶ διαιροῦμεν ἀμφοτέρους διὰ τῶν κοινῶν των παραγόντων, ὑποθέτοντες
τούτους δαφόρους τοῦ μηδενός. ‘Ἐὰν ἡ διαιρεσις γίνη διὰ τοῦ M.K.D. τῶν
ὅρων του, τότε λαμβάνεται κλάσμα ἵσοδύναμον μὲ τὸ ἀρχικὸν ἔχον ὄρους
πρώτους πρὸς ἄλλήλους.

Παραδείγματα: α) Νὰ ἀπλοποιηθῇ τὸ κλάσμα $A = \frac{x^3 - \psi^3}{x^2 - \psi^2}$, $x, \psi \in \mathbb{R}$

$$\text{Λύσις: } " \text{Εχομεν } A = \frac{x^3 - \psi^3}{x^2 - \psi^2} = \frac{(x - \psi)(x^2 + x\psi + \psi^2)}{(x + \psi)(x - \psi)}$$

‘Υποθέτοντες $x - \psi \neq 0$ διαιροῦμεν τοὺς ὄρους τοῦ A διὰ $x - \psi$ καὶ ἔχο-
μεν $B = \frac{x^2 + x\psi + \psi^2}{x + \psi}$. Τὸ κλάσματα A καὶ B είναι ἵσοδύναμα διὰ κάθε $(x, \psi) \in \mathbb{R}^2$

έκτος τῶν ζευγῶν ἔκεινων, τὰ δόποια μηδενίζουν τὴν παράστασιν $x - \psi$.

Σημ. 1) Τὰ κλάσματα A καὶ B διὰ $x + \psi = 0$ δὲν ἔχουν ἔννοιαν.

2) Ὁ παράγων $x - \psi$, καλεῖται παράγων τῆς ἀπροσδιοριστίας τοῦ κλάσματος.

β) Νὰ ἀπλοποιηθῇ τὸ ρητὸν κλάσμα $A = \frac{x^2 - 2x - 3}{x^2 - 5x + 6}$, $x \in \mathbb{R}$

$$\text{Λύσις: } \text{Έχομεν } A = \frac{x^2 - 2x - 3}{x^2 - 5x + 6} = \frac{(x+1)(x-3)}{(x-3)(x-2)} = \frac{x+1}{x-2}, \quad x-3 \neq 0.$$

Τὸ κλάσμα δὲν ἔχει ἔννοιαν διὰ $x = 2$. Ὁ παράγων $x-3$ εἴναι δὲ παράγων ἀπροσδιοριστίας τοῦ κλάσματος.

Πράξεις ρητῶν ἀλγ. κλασμάτων.

Αἱ πράξεις πρόσθεσις, ἀφάρεσις, πολ/σμός καὶ διαίρεσις ἐπὶ τῶν ρητῶν ἀλγεβρικῶν κλασμάτων γίνονται ὅπως καὶ ἐπὶ τῶν γνωστῶν μέχρι τοῦδε κλασμάτων. Οὕτω ἔχομεν :

$$\forall x \in \Sigma = \mathbb{R} - \{ x/x \in \mathbb{R} \wedge \phi = 0 \} \Leftrightarrow \frac{p_1}{\phi} \pm \frac{p_2}{\phi} = \frac{p_1 \pm p_2}{\phi}$$

$$\forall x \in \Sigma = \mathbb{R} - \{ x/x \in \mathbb{R} \wedge \phi_1 = 0 \wedge \phi_2 = 0 \} \Leftrightarrow \frac{p_1}{\phi_1} \pm \frac{p_2}{\phi_2} = \frac{p_1 \phi_2 \pm p_2 \phi_1}{\phi_1 \phi_2}$$

$$\forall x \in \Sigma = \mathbb{R} - \{ x / x \in \mathbb{R} \wedge \phi_1 = 0 \wedge \phi_2 = 0 \} \Leftrightarrow \frac{p_1}{\phi_1} \cdot \frac{p_2}{\phi_2} = \frac{p_1 p_2}{\phi_1 \phi_2}$$

$$\forall x \in \Sigma = \mathbb{R} - \{ x/x \in \mathbb{R} \wedge \phi_1 = 0 \wedge \phi_2 = 0 \wedge p_2 = 0 \} \Leftrightarrow \frac{p_1}{\phi_1} : \frac{p_2}{\phi_2} = \frac{p_1}{\phi_1} \cdot \frac{p_2}{\phi_2}$$

Σημ. Ἀπαντα τὰ πολυώνυμα ἐλήφθησαν ὡς ἀκέρ. πολυώνυμα τοῦ x

Παραδείγματα : α) Νὰ γίνῃ ρητὸν κλάσμα ἡ παράστασις

$$A = \frac{2x-1}{2x} + \frac{2x}{1-2x} - \frac{1}{2x(1-2x)}, \quad x \in \mathbb{R}$$

$$\text{Λύσις: } \text{τὸ κλάσμα } \frac{2x-1}{2x} \text{ ἔχει ἔννοιαν ὅταν } x \neq 0, \text{ τὸ } \frac{2x}{1-2x} \text{ ὅταν } x \neq \frac{1}{2}$$

καὶ τὸ $\frac{1}{2x(1-2x)}$ ὅταν $x \neq 0$ καὶ $x \neq \frac{1}{2}$, ἀρα διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν πράξεων πρέπει νὰ ὑποθέσωμεν $x \neq 0$ καὶ $x \neq \frac{1}{2}$. Τὸ Ε.Κ.Π. τῶν παρανομαστῶν εἶναι $2x(1-2x)$. Μετὰ τὴν ἀναγωγὴν τῶν κλασμάτων εἰς τὸν αὐτὸν παρονομαστὴν λαμβάνομεν :

$$A = \frac{(2x-1)(1-2x) + 2x \cdot 2x - 1}{2x(1-2x)} = \frac{4x-2}{2x(1-2x)} = \frac{-2(1-2x)}{2x(1-2x)} = -\frac{1}{x}$$

β) Νὰ ἀπλοποιηθῇ ἡ παράστασις

$$A = \frac{x+2}{x-2} \cdot \frac{x^2-4}{4x}, \quad (x \neq 2, x \neq 0)$$

$$\text{Λύσις: } A = \frac{(x+2)(x^2-4)}{(x-2)4x} = \frac{(x+2)(x+2)(x-2)}{(x-2)4x} = \frac{(x+2)^2}{4x}$$

γ) Νὰ γίνουν αἱ πράξεις

$$A = \frac{x^4-1}{x^2-2x+1} : \frac{x^2+x}{x-1}, \quad (x \neq 1, x \neq -1, x \neq 0)$$

$$\text{Λύσις: } A = \frac{x^4-1}{x^2-2x+1} : \frac{x^2+x}{x-1} = \frac{x^4-1}{(x-1)^2} \cdot \frac{x-1}{x^2+x} = \frac{(x^2+1)(x^2-1)(x-1)}{(x-1)^2 x (x+1)} = \\ = \frac{(x^2+1)(x+1)(x-1)^2}{(x-1)^2 (x+1)x} = \frac{x^2+1}{x}$$

54. ΣΥΝΘΕΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ.

Τό ρητὸν ἀλγεβρικὸν κλάσμα, ἐὰν περιέχῃ εἰς τὴν ἀλγεβρικὴν παράστασιν ἐνὸς τουλάχιστον ἑκατὸν δρῶν του, ρητὸν κλάσμα, λέγεται σύνθετον κλάσμα, ἐν ἀντιθέσει πρὸς ἑκεῖνα, τὰ δόποια ἔχουν δροῦσας ἀκεραίας ρητὰς ἀλγ. παραστάσεις καὶ τὰ δόποια καλοῦνται ἀπλᾶ.

"Ἐν σύνθετον κλάσμα τρέπεται εἰς ἀπλοῦν, ὅφοῦ προτιγουμένως μετατρέψωμεν τοὺς δροῦς του εἰς ρητὰ ἀλγ. κλάσματα καὶ ἀκολούθως διαιρέσωμεν αὐτὰ ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ δρισμοῦ

$$\frac{A}{B} = A : B, \quad (B \neq 0)$$

Παραδείγματα :

α) Νὰ τραπῆῃ εἰς ἀπλοῦν τὸ σύνθετον κλάσμα $A = \frac{\frac{x+\psi}{x-\psi} + 1}{\frac{x+\psi}{x-\psi} - 1}$

Λύσις : 'Ο ἀριθμητής : $\frac{x+\psi}{x-\psi} + 1 = \frac{x+\psi}{x-\psi} + \frac{x-\psi}{x-\psi} = \frac{2x}{x-\psi}, \quad (x \neq \psi)$

'Ο παρανομαστής : $\frac{x+\psi}{x-\psi} - 1 = \frac{x+\psi}{x-\psi} - \frac{x-\psi}{x-\psi} = \frac{2\psi}{x-\psi}, \quad (x \neq \psi)$

Τὸ σύνθετον κλάσμα : $A = \frac{\frac{x-\psi}{2\psi}}{\frac{2x}{x-\psi}} = \frac{2x}{x-\psi} : \frac{2\psi}{x-\psi} = \frac{x}{\psi}, \quad (x \neq \psi, \psi \neq 0)$

β) Νὰ τραπῆῃ εἰς ἀπλοῦν τὸ σύνθετον κλάσμα $A = \frac{\frac{4x^2+2x}{1}}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{x}}}, \quad x \neq 0$

Λύσις : Λαμβάνομεν διαδοχικῶς :

'Η παράστασις τοῦ παρονομαστοῦ $1 + \frac{1}{x} = \frac{x+1}{x}$,

καὶ συνεπῶς τὸ κλάσμα $\frac{1}{1 + \frac{1}{x}} = \frac{1}{\frac{x+1}{x}} = \frac{x}{x+1}$

'Ο παρονομαστής τοῦ συνθέτου $1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{x}} = 1 + \frac{x}{x+1} = \frac{x+1+x}{x+1} = \frac{2x+1}{x+1}$

Συνεπῶς $A = \frac{\frac{4x^2+2x}{2x+1}}{\frac{x+1}{x+1}} = \frac{2x(2x+1)(x+1)}{2x+1} = 2x(x+1), \quad (x \neq -\frac{1}{2})$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

146) Νὰ ἀπλοποιηθοῦν τὰ ἀκόλουθα ρητὰ κλάσματα

1) $\frac{39\beta^2y\delta^4}{65\beta^2y^2\delta^2}, \quad 2) \frac{165\mu^3v^2\chi v}{132\mu^4v^2\chi v - 1}, \quad 3) \frac{147\chi v + 2yv}{49\chi v + 1yv - 1}, \quad 4) \frac{1 - x^2}{(1 + \alpha x)^2 - (\alpha + x)^2},$

5) $\frac{10\alpha^2 - 7\alpha^3 + 10 - 7\alpha}{\alpha^2 - 2\alpha^3 + 1 - 2\alpha}, \quad 6) \frac{x^2 - (\alpha - \beta)x - \alpha\beta}{x^3 + \beta x^2 + \alpha x + \alpha\beta}, \quad 7) \frac{15x^3 + 35x^2 + 3x + 7}{27x^4 + 63x^3 - 12x^2 - 28x},$

$$8) \frac{(\alpha + \beta)^5 - \alpha^5 - \beta^5}{(\alpha + \beta)^3 - \alpha^3 - \beta^3}, \quad 9) \frac{xy(\alpha^2 + \beta^2) + \alpha\beta(x^2 + y^2)}{xy(\alpha^2 - \beta^2) + \alpha\beta(x^2 - y^2)}, \quad 10) \frac{x^4 - \alpha^2x^2 - 5x^3 + 5\alpha^2x}{(x - \alpha)^2(x - 5)},$$

$$11) \frac{(x^2 - 2yw - \omega^2 - y^2)(\alpha + \beta - \gamma)}{(x + y + \omega)(\alpha^2 - \beta^2 + \gamma^2 - 2\alpha\gamma)}$$

147. Νὰ μετατραπῆ ἑκάστη τῶν κάτωθι παραστάσεων εἰς ρητὸν ἀλγεβρικὸν κλάσμα.

$$1) \frac{5}{(x - 1)^2} - \frac{3}{x - 1} + \frac{4}{(x + 2)^2} + \frac{3}{x + 2}, \quad 2) \frac{\alpha}{(x - \beta)(x - \gamma)} + \frac{\beta}{(x - \gamma)(x - \alpha)} + \frac{\gamma}{(x - \alpha)(x - \beta)},$$

$$+ \frac{\alpha + \beta}{(v - \lambda)(v - \mu)} + \frac{\beta + \gamma}{(\lambda - \mu)(\lambda - v)} + \frac{\gamma + \alpha}{(\mu - \lambda)(\mu - v)},$$

$$4) \frac{x^3 - y^3}{x^4 - y^4} - \frac{x - y}{x^2 - y^2} - \frac{x + y}{2(x^2 + y^2)}, \quad 5) \frac{1}{(\alpha - \beta)(\alpha - \gamma)(x - \alpha)} + \frac{1}{(\beta - \gamma)(\beta - \alpha)(x - \beta)} +$$

$$+ \frac{1}{(\gamma - \alpha)(\gamma - \beta)(x - \gamma)}, \quad 6) \frac{\alpha^2 - \beta\gamma}{(\alpha - \beta)(\alpha - \gamma)} + \frac{\beta^2 + \alpha\gamma}{(\beta + \gamma)(\beta - \alpha)} + \frac{\gamma^2 + \alpha\beta}{(\gamma - \alpha)(\gamma + \beta)},$$

$$7) \frac{x^4 - \alpha^2x^2 - 5x^3 + 5\alpha^2x}{(x - \alpha)^2(x - 5)} - \frac{x^3 - \alpha^2x}{x^2 + 2\alpha x + \alpha^2} - \frac{4\alpha^3x - 4\alpha^4}{x^3 - \alpha^2x - \alpha x^2 + \alpha^3}, \quad 8) \frac{8\gamma^4 - 27\gamma\delta^3}{4\gamma^2 - 9\delta^2},$$

$$\cdot \frac{2(2\gamma + 3\delta)}{4\gamma^2 + 6\gamma\delta + 9\delta^2}, \quad 9) \frac{11x - 2\psi}{6x - \psi} : \frac{121x^2 - 4\psi^2}{36x^2 - \psi^2}, \quad 10) \frac{x^2 - 25}{x + 2} : \frac{x^2 - 9x + 20}{x^2 - 4},$$

$$11) \frac{\alpha^2 - x^2}{\alpha + \beta} \cdot \frac{\alpha^2 - \beta^2}{\alpha x + x^2} \cdot \left(\alpha + \frac{\alpha x}{\alpha - x}\right), \quad 12) \frac{\mu^2 - \mu\nu + \nu^2}{\mu^3 - 3\mu\nu(\mu - \nu) - \nu^3} \cdot \frac{\mu^2 - \nu^2}{\mu^3 + \nu^3},$$

$$13) \left(\frac{x^2}{\psi^3} + \frac{1}{x}\right) : \left(\frac{x}{\psi^2} - \frac{1}{\psi} + \frac{1}{x}\right), \quad 14) \left(\frac{x^2 - 6x + 8}{x^2 - 4x + 3} \cdot \frac{x^2 - 5x + 6}{x^2 - 2x + 8}\right) : \frac{(x - 2)^2}{x - 1},$$

$$15) \left(\frac{\alpha^3 - \beta^3}{\alpha - \beta} - \frac{\alpha^2 + \beta^2}{\alpha + \beta}\right) : \frac{4\alpha\beta}{\alpha^2 - \beta^2}$$

148) Νὰ τραπῆ εἰς ἀπλοῦν ἑκαστὸν τῶν ἀκολούθων συνθέτων κλασμάτων.

$$1) \frac{\alpha + \frac{\beta - \alpha}{1 + \alpha\beta}}{1 - \alpha \frac{\beta - \alpha}{1 + \alpha\beta}}, \quad 2) \frac{\frac{\alpha^3 + \beta^3}{\alpha^2 - \beta^2}}{\frac{\alpha^2 - \alpha\beta + \beta^2}{\alpha - \beta}}, \quad 3) \frac{\frac{2\alpha\beta}{\alpha + \beta} + \frac{2\alpha^2\beta}{\alpha + \beta} + \beta}{\frac{2\alpha\beta}{\alpha + \beta} - \frac{2\alpha^2\beta}{\alpha + \beta} - \beta},$$

$$4) \frac{\left(1 - \frac{3\alpha + \beta}{\alpha - \beta}\right) \cdot \left(1 - \frac{2\alpha + \beta}{\alpha + 2\beta}\right)}{1 + \frac{3\beta^2}{\alpha^2 - 4\beta^2}}, \quad 5) \frac{\left(\alpha - \frac{\alpha^2 + \alpha\beta}{\alpha - \beta}\right) \cdot \left(\alpha - \frac{2\alpha^2 + \alpha\beta}{\alpha + \beta}\right)}{\alpha\beta + \frac{\alpha\beta^3}{\alpha^2 - \beta^2}},$$

$$6) \frac{\alpha^3 - \beta^3}{\alpha^2 - \beta^2 + \frac{2\beta^2}{1 + \frac{\alpha + \beta}{\alpha - \beta}}}$$

149) Νὰ τραπῆ εἰς ἀπλοῦν κλάσμα ἑκάστη τῶν παραστάσεων

$$1) \frac{\frac{2\psi\omega}{\psi + \omega} - \psi}{\frac{1}{\omega} + \frac{1}{\psi - 2\omega}} + \frac{\frac{2\psi\omega}{\psi + \omega} - \omega}{\frac{1}{\psi} + \frac{1}{\omega - 2\psi}}, \quad 2) \frac{\frac{x^3 - \psi^3}{x^2 + \psi^2} \cdot \frac{x^2 - \psi^2}{x^3 + \psi^3} \cdot \left(\frac{1}{x^2} + \frac{1}{\psi^2}\right)}{\frac{(x + \psi)^2 - x\psi}{(x - \psi)^2 + x\psi} \cdot \left(\frac{1}{\psi} - \frac{1}{x}\right)^2}$$

$$3) \frac{\frac{x}{\psi} + \frac{\psi}{x} - 1}{\frac{x^2}{\psi^2} + \frac{x}{\psi} + 1} \cdot \frac{1 + \frac{\psi}{x}}{x - \psi} : \frac{1 + \frac{\psi^3}{x^3}}{\frac{x^2}{\psi} - \frac{\psi^2}{x}}$$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΣ

150 Νά διπλοποιηθοῦν τὰ κλάσματα :

$$1) \frac{x^6 + 2x^3y^3 + y^6}{x^6 - y^6}, \quad 2) \frac{\alpha^3\beta^3 + \beta^3\gamma^3 + \gamma^3\alpha^3 - 3\alpha^2\beta^2\gamma^2}{\alpha^2\beta^2 + \beta^2\gamma^2 + \gamma^2\alpha^2 - \alpha^2\beta\gamma - \alpha\beta^2\gamma - \alpha\beta\gamma^2},$$

$$3) \frac{(\alpha - \beta)^3 + (\beta - \gamma)^3 + (\gamma - \alpha)^3}{(\alpha - \beta)(\beta - \gamma)(\gamma - \alpha)}$$

151) Νά διπλοποιηθῇ ἡ παράστασις

$$\frac{(x+y)^3 - \omega^3}{x+y-\omega} + \frac{(y+\omega)^3 - x^3}{y+\omega-x} + \frac{(x+\omega)^3 - y^3}{x+\omega-y}$$

152) Εάν $\alpha + \beta + \gamma = 0$, νά διποδειχθῇ ὅτι :

$$\frac{\alpha^2}{2\alpha^2 + \beta\gamma} + \frac{\beta^2}{2\beta^2 + \alpha\gamma} + \frac{\gamma^2}{2\gamma^2 + \alpha\beta} = 1$$

153) Εάν $\alpha + \beta + \gamma = 0$, νά διποδειχθῇ ὅτι :

$$\frac{\alpha^2 - \beta^2 - 2\beta\gamma}{\alpha + \beta} + \frac{\beta^2 - \gamma^2 - 2\alpha\gamma}{\beta + \gamma} + \frac{\gamma^2 - \alpha^2 - 2\alpha\beta}{\alpha + \gamma} = 0$$

154) Νά διπλοποιηθοῦν αἱ παραστάσεις :

$$1) \frac{x^2 - (\mu + \nu)x + \mu\nu}{x^2 - (\mu + \kappa)x + \mu\kappa} \cdot \frac{x^2 - \kappa^2}{x^2 - \nu^2}, \quad 2) \frac{\alpha^3 - \beta^3}{\alpha^3 + \beta^3} \cdot \frac{\alpha + \beta}{\alpha - \beta} : \left(\frac{\alpha^2 + \alpha\beta + \beta^2}{\alpha^2 - \alpha\beta + \beta^2} \right)^2,$$

$$3) \left(\frac{x^2 - 1}{x^4 - 2x^3 + x^2} : \frac{x^3 + 2x + 1}{x^3 - 1} \right) : \frac{(x+1)^2 - x}{x^2}$$

$$155) \text{ Εάν } x = \frac{\beta^2 + \gamma^2 - \alpha^2}{2\beta\gamma} \text{ καὶ } y = \frac{\alpha^2 - \beta^2 - \gamma^2 + 2\beta\gamma}{(\alpha + \beta + \gamma)(\beta + \gamma - \alpha)} \text{ νά διποδειχθῇ, ὅτι}$$

ἡ παράστασις $\frac{x+y}{1-xy}$ είναι ἀνεξάρτητος τῶν α, β, γ .

$$156) \text{ Νά διποδειχθῇ ὅτι τὸ σύνθετον κλάσμα } \frac{\frac{x-\alpha}{1+\alpha x} - \frac{x-\beta}{1+\beta x}}{1 + \frac{(x-\alpha)(x-\beta)}{(1+\alpha x)(1+\beta x)}} \text{ είναι ἀνεξάρτητον τοῦ } x.$$

$$157) \text{ Εάν } \frac{x}{y+\omega} = \alpha, \quad \frac{y}{\omega+x} = \beta, \quad \frac{\omega}{x+y} = \gamma \text{ νά δειχθῇ :}$$

$$\frac{1}{\alpha\beta\gamma} - \left(\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} + \frac{1}{\gamma} \right) = 2$$

$$158) \text{ Εάν } v \in \mathbb{N}, \text{ νά διποδειχθῇ ὅτι τὸ κλάσμα } A = \frac{\alpha^{3v} - 1}{\alpha^3 + \alpha + 1} \text{ είναι ἀκέραιον πολυώνυμον τοῦ } \alpha.$$

$$159) \text{ Νά διπλοποιηθῇ τὸ κλάσμα } A = \frac{(x^2 - x\psi + \psi^2)^3 + (x^2 + x\psi + \psi^2)^3}{2(x^2 + \psi^2)}$$

$$160) \text{ Όμοιώς τὸ κλάσμα } A = \frac{\alpha^3 + \beta^3 + \gamma^3 + 3(\alpha + \beta)(\beta + \gamma)(\gamma + \alpha)}{\alpha + \beta + \gamma}$$

$$161) \text{ Όμοιώς τὸ κλάσμα } A = \frac{(x + \psi)^5 - x^5 - \psi^5}{(x^2 + x\psi + \psi^2)^5 x^2 \psi^2}$$

$$162) \text{ Εάν } \alpha + \beta + \gamma = 0 \text{ } \forall \alpha = \beta = \gamma \text{ νά εύρεθῇ ἡ τιμὴ τοῦ κλάσματος } \frac{(\alpha^3 + \beta^3 + \gamma^3)}{\alpha\beta\gamma}$$

$$163) \text{ Εάν } \alpha + \beta + \gamma = 0 \text{ νά εύρεθῇ ἡ τιμὴ τοῦ } A = \frac{\alpha^4 + \beta^4 + \gamma^4}{\alpha^2\beta^2 + \alpha^2\gamma^2 + \beta^2\gamma^2}$$

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VII

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ α' ΒΑΘΜΟΥ (Γραμμικά)

(Συμπλήρωσις)

55. Έκ τοῦ κεφαλαίου τούτου ἔγνωρίσαμεν εἰς τὴν Γ' τάξιν τ' ἀκόλουθα :

1. Ὁρισμοὶ καὶ ἴδιότητες συστημάτων.
2. Συστήματα ἰσοδύναμα
3. Μέθοδοι ἐπιλύσεως γραμμικοῦ συστήματος δύο ἔξισ. α' βαθμοῦ μὲ δύο ἄγνώστους.
4. Διερεύνησις τοῦ ἐν λόγῳ συστήματος.
5. Γραφική ἐπίλυσις τοῦ ἴδιου συστήματος.
6. Ἐπίλυσις γραμμικοῦ συστήματος μὲ περισσοτέρους τῶν δύο ἄγνώστους.
7. Προβλήματα ἐπιλυόμενα τῇ βοηθείᾳ συστήματος γραμμικοῦ.

*Ηδη θὰ ἔξετάσωμεν ἄλλας μεθόδους ἐπιλύσεως γραμμικοῦ συστήματος πλέον συντόμους.

56. ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΖΟΥΣΩΝ — ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ GRAMER.

α) Ἐπίλυσις συστήματος α' βαθμοῦ μὲ δύο ἄγνώστους

Εἰς τὴν Γ' τάξιν ἐδόθη δ ὁρισμὸς τῆς ὁριζούσης β' τάξεως.

$$\text{Οὕτω : } \forall \alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2 \in \mathbf{R} : \Delta = \begin{vmatrix} \alpha_1 & \beta_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 \end{vmatrix} = \alpha_1 \beta_2 - \alpha_2 \beta_1$$

*Ἄσ θεωρήσωμεν τὸ σύστημα :

$$\sum : \begin{cases} \alpha_1 x + \beta_1 \psi = \gamma_1, \\ \alpha_2 x + \beta_2 \psi = \gamma_2 \end{cases} \quad \text{ὅπου} \quad \alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2, \gamma_1, \gamma_2, x, \psi \in \mathbf{R} \wedge |\alpha_1| + |\beta_1| > 0 \wedge |\alpha_2| + |\beta_2| > 0$$

Γνωρίζομεν δτι :

$$\begin{aligned} \sum : \alpha_1 \beta_2 - \alpha_2 \beta_1 \neq 0 \iff & \left\{ (x, \psi) \mid (x, \psi) \in \mathbf{R}^2 \wedge \begin{array}{l} \alpha_1 x + \beta_1 \psi = \gamma_1 \\ \alpha_2 x + \beta_2 \psi = \gamma_2 \end{array} \right\} = \\ = & \left\{ \left(\frac{\gamma_1 \beta_2 - \gamma_2 \beta_1}{\alpha_1 \beta_2 - \alpha_2 \beta_1}, \frac{\alpha_1 \gamma_2 - \alpha_2 \gamma_1}{\alpha_1 \beta_2 - \alpha_2 \beta_1} \right) \right\} \\ & x \qquad \psi \end{aligned}$$

Έπομένως δυνάμεθα νὰ γράψωμεν :

$$\Sigma : \left| \begin{array}{cc} \alpha_1 & \beta_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 \end{array} \right| \neq 0 \iff \{(x, \psi) \mid (x, \psi) \in \mathbb{R}^2 \wedge \Sigma\} = \left\{ \left(\left| \begin{array}{cc} \gamma_1 & \beta_1 \\ \gamma_2 & \beta_2 \end{array} \right|, \frac{\alpha_1 \gamma_1}{\alpha_2 \beta_2}, \frac{\alpha_2 \gamma_2}{\alpha_1 \beta_1} \right) \right\} =$$

$$= \left\{ \left(\frac{\Delta_x}{\Delta}, \frac{\Delta_y}{\Delta} \right) \right\}, \text{ ὅπου } \Delta = \left| \begin{array}{cc} \alpha_1 & \beta_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 \end{array} \right|, \Delta_x = \left| \begin{array}{cc} \gamma_1 & \beta_1 \\ \gamma_2 & \beta_2 \end{array} \right|, \Delta_y = \left| \begin{array}{cc} \alpha_1 & \gamma_1 \\ \alpha_2 & \gamma_2 \end{array} \right|$$

"Ωστε ἡ λύσις τοῦ Σ εἰναι : $(x, y) = \left(\frac{\Delta_x}{\Delta}, \frac{\Delta_y}{\Delta} \right) \iff x = \frac{\Delta_x}{\Delta}, y = \frac{\Delta_y}{\Delta}$ (1)

Ἐξ ὧν $\frac{x}{\Delta_x} = \frac{1}{\Delta}, \frac{\psi}{\Delta_y} = \frac{1}{\Delta}$ καὶ ἀρα $\frac{x}{\Delta_x} = \frac{\psi}{\Delta_y} = \frac{1}{\Delta}$

Οἱ τύποι (1) (τύποι τοῦ Gramer) δεικνύουν, ὅτι ἔκαστος ἀγνώστος εἶναι πηλίκον δύο ὁρίζουσῶν μὲ παρονομαστὴν κοινὸν τὴν ὁρίζουσαν Δ τῶν συντελεστῶν τῶν ἀγνώστων καὶ ἀριθμητήν, ὃ ὅποιος προκύπτει, ἀν εἰς τὴν ὁρίζουσαν τοῦ παρονομαστοῦ ἀντικαταστήσωμεν τὴν στήλην τῶν συντελεστῶν τοῦ ὑπολογιζομένου ἀγνώστου διὰ τῆς στήλης τῶν γνωστῶν ὅρων, εύρισκομένων ἀπαραιτήτως εἰς τὸ δεύτερον μέλος τῶν ἔξισώσεων τοῦ συστήματος.

Ἡ τυποποιημένη αὕτη μέθοδος ἐπιλύσεως συστήματος γραμμικοῦ μὲ δύο ἀγνώστους καλεῖται ~~κανὼν τοῦ Gramer~~.

Παραδείγματα : 1ον Νὰ ἐπιλυθῇ τὸ σύστημα $\sum : \begin{cases} 3x + 2\psi = 12 \\ 5x - 3\psi = 1 \end{cases} \quad (x, \psi \in \mathbb{R})$

Λύσις : Συμφώνως πρὸς τὸν κανόνα τοῦ

Gramer λαμβάνομεν : $x = \frac{\begin{vmatrix} 12 & 2 \\ 1 & -3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 5 & -3 \end{vmatrix}}, \psi = \frac{\begin{vmatrix} 3 & 12 \\ 5 & 1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 5 & -3 \end{vmatrix}} \Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow x = \frac{-36 - 2}{-9 - 10} = \frac{38}{19} = 2, \psi = \frac{3 - 60}{-9 - 10} = \frac{57}{19} = 3$$

Οὕτω : $\Sigma : \{(x, \psi) / (x, \psi) \in \mathbb{R}^2 \wedge \Sigma\} = \{(2, 3)\}.$

2ον : Νὰ ἐπιλυθῇ τὸ σύστημα $\sum : \begin{cases} x + \alpha^2 \psi = 2 \\ x + \psi = 2\alpha \end{cases}, \text{ ὅπου } \alpha, x, \psi \in \mathbb{R}$

Λύσις : Όμοιώς λαμβάνομεν :

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 2 & \alpha^2 \\ 1 & \alpha^2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 1 \end{vmatrix}} = \frac{2 - 2\alpha^3}{1 - \alpha^2} = \frac{2(1 - \alpha)(\alpha^2 + \alpha + 1)}{(1 - \alpha)(1 + \alpha)} = \frac{2(\alpha^2 + \alpha + 1)}{1 + \alpha}, (\alpha \neq \pm 1),$$

$$\psi = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2\alpha \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 - \alpha^2 \end{vmatrix}} = \frac{2\alpha - 2}{1 - \alpha^2} = \frac{2(\alpha - 1)}{(1 + \alpha)(1 - \alpha)} = -\frac{2}{1 + \alpha}$$

Οὕτω ἔχομεν : $\Sigma : \{(x, \psi) / (x, \psi) \in \mathbb{R}^2 \wedge \Sigma \wedge \alpha \neq \pm 1\} =$

$$= \left\{ \left(\frac{2(\alpha^2 + \alpha + 1)}{1 + \alpha}, -\frac{2}{1 + \alpha} \right) \right\}$$

Η μελετηθείσα διερεύνησις τοῦ συστήματος Σ : $\alpha_1x + \beta_1\psi = \gamma_1 \wedge \alpha_2x + \beta_2\psi = \gamma_2$, ὅπου $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2, \gamma_1, \gamma_2, x, \psi \in \mathbb{R}$, δύναται νὰ συνοψισθῇ ὡς ἀκολούθως:

Διερεύνησις τοῦ συστήματος Σ : $\alpha_1x + \beta_1\psi = \gamma_1 \wedge \alpha_2x + \beta_2\psi = \gamma_2$

ὅπου $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2, \gamma_1, \gamma_2, x, \psi \in \mathbb{R}$

$\begin{vmatrix} \alpha_1 & \beta_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 \end{vmatrix} \neq 0$	$\Leftrightarrow \begin{aligned} x &= \frac{\Delta x}{\Delta} \\ \psi &= \frac{\Delta \psi}{\Delta} \end{aligned}$	<p>Τὸ σύστημα ἔχει μίαν καὶ μόνην μίαν λύσιν.</p>
$\begin{vmatrix} \alpha_1 & \beta_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 \end{vmatrix} = 0$	$\begin{vmatrix} \gamma_1 \beta_1 \\ \gamma_2 \beta_2 \\ \alpha_1 \gamma_1 \\ \alpha_2 \gamma_2 \end{vmatrix} \neq 0$	<p>{ $(x, \psi) (x, \psi) \in \mathbb{R}^2 \wedge \Sigma$ } = \emptyset Τὸ σύστημα εἶναι ἀδύνατον.</p>
$\begin{vmatrix} \alpha_1 & \beta_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 \end{vmatrix} = 0$	$\begin{vmatrix} \gamma_1 \beta_1 \\ \gamma_2 \beta_2 \end{vmatrix} = 0$	<p>$\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2$ ὅχι ἀπαντά μηδὲν $\{ (x, \psi) (x, \psi) \in \mathbb{R}^2 \wedge \Sigma \} = \{ (x, \psi) (x, \psi) \in \mathbb{R}^2 \wedge \Lambda \alpha_1 x + \beta_1 \psi = \gamma_1 \}$ Τὸ σύστημα ἔχει ἀπείρους τὸ πλῆθος λύσεις ("Ενας ἄγνωστος αὐθαίρετος")</p>
$\begin{vmatrix} \alpha_1 & \beta_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 \end{vmatrix} = 0$	$\begin{vmatrix} \alpha_1 \gamma_1 \\ \alpha_2 \gamma_2 \end{vmatrix} = 0$	<p>$\alpha_1 = \alpha_2 = \beta_1 = \beta_2 = \gamma_1 = \gamma_2 = 0$ $\{ (x, \psi) (x, \psi) \in \mathbb{R}^2 \wedge \Sigma \} = \mathbb{R}^2$ Τὸ σύστημα εἶναι ταυτοτικὸν (x καὶ ψ αὐθαίρετοι)</p>

Σημείωσις: Διάφοροι ἄλλαι ὑποπειρπτώσεις δίδονται ὡς ἀσκήσεις.

β) Ἐπίλυσις συστήματος α' βαθμοῦ μὲ τρεῖς ἀγνώστους.

Ορίζουσαι τρίτης τάξεως.

Τὸ σύμβολον $\begin{vmatrix} \alpha_1 & \beta_1 & \gamma_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 & \gamma_2 \\ \alpha_3 & \beta_3 & \gamma_3 \end{vmatrix}$ ἀποτελούμενον ἔξ 9 στοιχείων εἰς τρεῖς γραμμὰς καὶ τρεῖς στήλας ὀνομάζομεν ὁρίζουσαν τρίτης τάξεως καὶ ὁρίζομεν:

$$\Delta = \begin{vmatrix} \alpha_1 & \beta_1 & \gamma_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 & \gamma_2 \\ \alpha_3 & \beta_3 & \gamma_3 \end{vmatrix} = \alpha_1 \begin{vmatrix} \beta_2 & \gamma_2 \\ \beta_3 & \gamma_3 \end{vmatrix} - \alpha_2 \begin{vmatrix} \beta_1 & \gamma_1 \\ \beta_3 & \gamma_3 \end{vmatrix} + \alpha_3 \begin{vmatrix} \beta_1 & \gamma_1 \\ \beta_2 & \gamma_2 \end{vmatrix}$$

τὸ β' μέλος ταύτης ὀνομάζεται ἀνάπτυγμα ἢ τιμὴ τῆς Δ , αἱ δὲ ὁρίζουσαι αὐτοῦ μετά τοῦ προσήμου ἐλάσσονες τῆς Δ .

Τὸ ἀνάπτυγμα τῆς Δ προκύπτει, ἂν πολλαπλασιάσωμεν τὰ στοιχεῖα μιᾶς γραμμῆς ἢ στήλης ἀντιστοίχως ἕκαστον ἐπὶ τὴν ἐλάσσονα ὁρίζουσαν, ἢ ὅποια λαμβάνεται διὰ τῆς διαγραφῆς τῆς γραμμῆς καὶ τῆς στήλης, εἰς ἣν ἀνή-

κει τὸ ἐν λόγῳ στοιχείον. Πρὸ δὲ ἔκάστου τῶν γινομένων τούτων θέτομεν τὸ σημεῖον τὸ ἀντιστοιχοῦν ἐκ τοῦ πίνακος

$$\left| \begin{array}{ccc} \alpha_1 & \beta_1 & \gamma_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 & \gamma_2 \\ \alpha_3 & \beta_3 & \gamma_3 \end{array} \right| \longleftrightarrow \left| \begin{array}{ccc} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{array} \right|$$

Τὸ ἀνάπτυγμα τοῦτο εύρισκεται εὐκολώτερον μὲ τὸν κανόνα τοῦ **Sarrus**. Κατ' αὐτὸν ἐπαναλαμβάνομεν κάτω τῆς τρίτης γραμμῆς τὰς δύο πρώτας γραμμὰς ἢ δεξιὰ τῆς τρίτης στήλης τὰς δύο πρώτας στήλας καὶ οὕτω προκύπτει ἀντιστοίχως πίνακε πέντε γραμμῶν καὶ τριῶν στηλῶν. ἢ τριῶν γραμμῶν καὶ πέντε στηλῶν ὡς ἀκολούθως :

$$\text{Πίνακε I} \quad \left| \begin{array}{ccc|c} + & \alpha_1 & \beta_1 & \gamma_1 \\ + & \alpha_2 & \beta_2 & \gamma_2 \\ + & \alpha_3 & \beta_3 & \gamma_3 \\ \hline \alpha_1 & \beta_1 & \gamma_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 & \gamma_2 \end{array} \right| \quad \text{Πίνακε II}$$

$$\left| \begin{array}{ccccc} + & + & + & & \\ \cancel{\alpha_1} & \cancel{\beta_1} & \cancel{\gamma_1} & \alpha_1 & \beta_1 \\ \cancel{\alpha_2} & \cancel{\beta_2} & \cancel{\gamma_2} & \alpha_2 & \beta_2 \\ \cancel{\alpha_3} & \cancel{\beta_3} & \cancel{\gamma_3} & \alpha_3 & \beta_3 \\ \hline - & - & - & & \end{array} \right|$$

Ἐν συνεχείᾳ λαμβάνομεν τὰ τρία γινόμενα διαγωνίως, ἐξ ἀριστερῶν ἀνω πρὸς τὰ δεξιὰ κάτω, μὲ τὸ πρόσημον (+) καὶ τὰ ἄλλα τρία γινόμενα πάλιν διαγωνίως, ἐξ ἀριστερῶν κάτω πρὸς τὰ δεξιὰ ἀνω, μὲ τὸ πρόσημον (-).

Οὕτω εύρισκωμεν : $\Delta = \left| \begin{array}{ccc} \alpha_1 & \beta_1 & \gamma_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 & \gamma_2 \\ \alpha_3 & \beta_3 & \gamma_3 \end{array} \right| = \alpha_1\beta_2\gamma_3 + \alpha_2\beta_3\gamma_1 + \alpha_3\beta_1\gamma_2 - \alpha_3\beta_2\gamma_1 - \alpha_1\beta_3\gamma_2 - \alpha_2\beta_1\gamma_3$

Ίδιότητες τῶν όριζουσαν.

1. Τὸ ἀνάπτυγμα όριζούσης δὲν μεταβάλλεται, ἐὰν αἱ γραμμαὶ γίνουν στῆλαι καὶ αἱ στῆλαι γραμμαί.

2. Τὸ ἀνάπτυγμα όριζούσης ἀλλάσσει πρόσημον, ἢν ἀντιμεταθέσωμεν δύο γραμμὰς ἢ δύο στήλας

3. Ἐὰν εἰς μίαν όριζουσαν δύο γραμμαὶ ἢ δύο στῆλαι εἶναι αἱ αὐταί, τότε αὗτη ἰσοῦται μὲ μηδέν.

4. Ἐὰν όριζούσης τὰ στοιχεῖα μιᾶς γραμμῆς ἢ στήλης πολλαπλασιασθοῦν ἐπὶ λ ∈ ℝ, τότε καὶ τὸ ἀνάπτυγμα αὐτῆς πολλαπλασιάζεται ἐπὶ λ.

5. Τὸ ἀνάπτυγμα όριζούσης δὲν μεταβάλλεται, ἐὰν εἰς τὰ στοιχεῖα μιᾶς στήλης προσθέσωμεν τὰ στοιχεῖα μιᾶς ἄλλης στήλης πολ/σθέντα ἐπὶ λ ≠ 0.

Τὴν ἀπόδειξιν τῶν ιδιοτήτων τούτων ἀφήνομεν εἰς τοὺς μαθητὰς ὡς ἀσκησιν, ὡς καὶ τὴν διατύπωσιν κι' ἀλλων τυχόν ιδιοτήτων.

Παραδείγματα: Νὰ εὐρεθῇ ἡ τιμὴ τῶν κάτωθι όριζουσαν :

$$\alpha) \quad \Delta_1 = \left| \begin{array}{ccc} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 1 & 1 \end{array} \right| \quad \beta) \quad \Delta_2 = \left| \begin{array}{ccc} 1 & \alpha & -2 \\ \alpha & -1 & 3 \\ 2 & 1 & -\alpha \end{array} \right| \quad \gamma) \quad \Delta_3 = \left| \begin{array}{ccc} 1 & \alpha & \alpha^2 \\ 1 & \beta & \beta^2 \\ 1 & \gamma & \gamma^2 \end{array} \right|$$

Λύσις:

$$\alpha) \begin{vmatrix} 1 & 3 & 5 & 1 & 3 \\ 2 & 4 & 6 & 2 & 4 \\ 3 & 1 & 1 & 3 & 1 \end{vmatrix} : \Delta_1 = 4 + 54 + 10 - 60 - 6 - 6 = -4$$

$$\beta) \begin{vmatrix} 1 & \alpha & -2 & 1 & \alpha \\ \alpha & -1 & 3 & \alpha & -1 \\ 2 & 1 & -\alpha & 2 & 1 \end{vmatrix} : \Delta_2 = \alpha + 6\alpha - 2\alpha - 4 - 3 + \alpha^3 = \alpha^3 + 5\alpha - 7$$

$$\gamma) \begin{vmatrix} 1 & \alpha & \alpha^2 & 1 & \alpha \\ 1 & \beta & \beta^2 & 1 & \beta \\ 1 & \gamma & \gamma^2 & 1 & \gamma \end{vmatrix} : \Delta_3 = \alpha\beta^2 + \beta\gamma^2 + \alpha^2\gamma - \alpha^2\beta - \beta^2\gamma - \alpha\gamma^2 = (\alpha - \beta)(\beta - \gamma)(\gamma - \alpha)$$

— "Εστω τώρα πρός λύσιν τὸ σύστημα $\sum :$

$$\begin{array}{l} \alpha_1 x + \beta_1 \psi + \gamma_1 \omega = \delta_1 \\ \alpha_2 x + \beta_2 \psi + \gamma_2 \omega = \delta_2 \\ \alpha_3 x + \beta_3 \psi + \gamma_3 \omega = \delta_3 \end{array} \quad (1)$$

Λύσις: Λαμβάνομεν τὰς ἐλάσσονας δριζούσας τῆς δριζούσης τῶν συντελεστῶν τῶν ἀγνώστων τοῦ συστήματος (1)

$$A_1 = \begin{vmatrix} \beta_2 & \gamma_2 \\ \beta_3 & \gamma_3 \end{vmatrix}, \quad -A_2 = \begin{vmatrix} \beta_1 & \gamma_1 \\ \beta_3 & \gamma_3 \end{vmatrix}, \quad A_3 = \begin{vmatrix} \beta_1 & \gamma_1 \\ \beta_2 & \gamma_2 \end{vmatrix}$$

καὶ σχηματίζομεν τὸν γραμμικὸν συνδυασμὸν

$$A_1(\alpha_1 x + \beta_1 \psi + \gamma_1 \omega) + A_2(\alpha_2 x + \beta_2 \psi + \gamma_2 \omega) + A_3(\alpha_3 x + \beta_3 \psi + \gamma_3 \omega) = A_1\delta_1 + A_2\delta_2 + A_3\delta_3 \Leftrightarrow (\alpha_1 A_1 + \alpha_2 A_2 + \alpha_3 A_3)x + (\beta_1 A_1 + \beta_2 A_2 + \beta_3 A_3)\psi + (\gamma_1 A_1 + \gamma_2 A_2 + \gamma_3 A_3)\omega = A_1\delta_1 + A_2\delta_2 + A_3\delta_3 \quad \text{Αλλὰ εἴναι: } \beta_1 A_1 + \beta_2 A_2 + \beta_3 A_3 = \beta_1(\beta_2 \gamma_3 - \beta_3 \gamma_2) - \beta_2(\beta_1 \gamma_3 - \beta_3 \gamma_1) + \beta_3(\beta_1 \gamma_2 - \beta_2 \gamma_1) = 0$$

$$\text{"Επίστης εἴναι: } \gamma_1 A_1 + \gamma_2 A_2 + \gamma_3 A_3 = \gamma_1(\beta_2 \gamma_3 - \beta_3 \gamma_2) - \gamma_2(\beta_1 \gamma_3 - \beta_3 \gamma_1) + \gamma_3(\beta_1 \gamma_2 - \beta_2 \gamma_1) = 0 \quad \text{Άρα } (\alpha_1 A_1 + \alpha_2 A_2 + \alpha_3 A_3)x = \delta_1 A_1 + \delta_2 A_2 + \delta_3 A_3$$

$$\text{η } \begin{vmatrix} \alpha_1 & \beta_1 & \gamma_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 & \gamma_2 \\ \alpha_3 & \beta_3 & \gamma_3 \end{vmatrix} \cdot x = \begin{vmatrix} \delta_1 & \beta_1 & \gamma_1 \\ \delta_2 & \beta_2 & \gamma_2 \\ \delta_3 & \beta_3 & \gamma_3 \end{vmatrix} \quad \text{η } \Delta \cdot x = \Delta_x \quad (2)$$

Ἐργαζόμενοι κατ' ἀνάλογον τρόπον λαμβάνομεν

$$\begin{vmatrix} \alpha_1 & \beta_1 & \gamma_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 & \gamma_2 \\ \alpha_3 & \beta_3 & \gamma_3 \end{vmatrix} \cdot \psi = \begin{vmatrix} \alpha_1 & \delta_1 & \gamma_1 \\ \alpha_2 & \delta_2 & \gamma_2 \\ \alpha_3 & \delta_3 & \gamma_3 \end{vmatrix} \quad \text{η } \Delta \cdot \psi = \Delta_y \quad (3)$$

$$\begin{vmatrix} \alpha_1 & \beta_1 & \gamma_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 & \gamma_2 \\ \alpha_3 & \beta_3 & \gamma_3 \end{vmatrix} \cdot \omega = \begin{vmatrix} \alpha_1 & \beta_1 & \delta_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 & \delta_2 \\ \alpha_3 & \beta_3 & \delta_3 \end{vmatrix} \quad \text{η } \Delta \cdot \omega = \Delta_\omega \quad (4)$$

Έάν είναι $\Delta \neq 0$, τότε έκ τῶν (2), (3), (4) ἔχομεν :

$$x = \frac{\Delta_x}{\Delta}, \quad \psi = \frac{\Delta_\psi}{\Delta}, \quad \omega = \frac{\Delta_\omega}{\Delta} \quad (5)$$

"Ηδη παρατηροῦμεν, ότι καὶ διὰ τὴν ἐπίλυσιν τοῦ συστήματος α' βαθμοῦ μὲ τρεῖς ἀγνώστους δύναται νὰ ἐφαρμοσθῇ ὁ κανὼν Gramer.

Διευρεύνησις τοῦ συστήματος (1)

Διακρίνομεν τέσσαρας περιπτώσεις :

1) Έάν είναι $\Delta \neq 0$, τότε αἱ δρίζουσαι A_1, A_2, A_3 δὲν είναι δλαὶ μηδέν.

"Εστω $A_1 = \begin{vmatrix} \beta_2 & \gamma_2 \\ \beta_3 & \gamma_3 \end{vmatrix} \neq 0$. Τότε τὸ σύστημα (1) είναι ἰσοδύναμον πρὸς τὸ σύστημα :

$$\begin{aligned} A_1(\alpha_1 x + \beta_1 \psi + \gamma_1 \omega) + A_2(\alpha_2 x + \beta_2 \psi + \gamma_2 \omega) + A_3(\alpha_3 x + \beta_3 \psi + \gamma_3 \omega) &= \delta_1 A_1 + \\ &+ \delta_2 A_2 + \delta_3 A_3 \\ &\beta_2 \psi + \gamma_2 \omega = \delta_2 - \alpha_2 x \\ &\beta_3 \psi + \gamma_3 \omega = \delta_3 - \alpha_3 x \end{aligned} \quad (6)$$

Αἱ ἔξισώσεις $\beta_2 \psi + \gamma_2 \omega = \delta_2 - \alpha_2 x$ καὶ $\beta_3 \psi + \gamma_3 \omega = \delta_3 - \alpha_3 x$ ἀποτελοῦν

σύστημα ἔχον μίαν μόνον λύσιν, διότι ὑπετέθη $\begin{vmatrix} \beta_2 & \gamma_2 \\ \beta_3 & \gamma_3 \end{vmatrix} \neq 0$. "Αρα τὸ σύστημα

(6) ἔχει μίαν μόνον λύσιν καὶ συνεπῶς καὶ τὸ ἰσοδύναμον αὐτοῦ (1) ἔχει μίαν μόνον λύσιν, ἥτις λαμβάνεται ἐκ τῶν τύπων (5):

2) Έάν είναι $\Delta = 0$ καὶ εἰς τουλάχιστον τῶν $\Delta_x, \Delta_\psi, \Delta_\omega$ είναι διάφορος τοῦ μηδενὸς, τότε ἐκ τῶν (2), (3), (4) καθίσταται προφανὲς ὅτι τὸ σύστημα (1) είναι ἀδύνατον.

3) Έάν είναι $\Delta = \Delta_x = \Delta_\psi = \Delta_\omega = 0$, τότε τὸ σύστημα ἔχει ἀπείρους τὸ πλῆθος λύσεις, ἥτοι είναι ἀδρίστον.

4) Έάν $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \gamma_1 = \gamma_2 = \gamma_3 = \delta_1 = \delta_2 = \delta_3 = 0$, τότε τὸ σύστημα είναι ταυτοτικὸν (x, ψ, ω αὐθαίρετοι)

Παρατήρησις 1) Κατὰ τὴν πρώτην περίπτωσιν, ἔάν είναι $\delta_1 = \delta_2 = \delta_3 = 0$ καὶ συνεπῶς $\Delta_x = \Delta_\psi = \Delta_\omega = 0$, τὸ σύστημα (1) ἔχει μίαν μόνον λύσιν τὴν μηδενικὴν, τὸ δὲ σύστημα καλεῖται ὁμογενές.

2) Έάν $\Delta, \Delta_x, \Delta_\psi, \Delta_\omega$ είναι ὅλα διάφορα τοῦ μηδενὸς τότε ἐκ τῶν (5) λαμβάνομεν :

$$\frac{x}{\Delta_x} = \frac{1}{\Delta}, \quad \frac{\psi}{\Delta_\psi} = \frac{1}{\Delta}, \quad \frac{\omega}{\Delta_\omega} = \frac{1}{\Delta} \Leftrightarrow \frac{x}{\Delta_x} = \frac{\psi}{\Delta_\psi} = \frac{\omega}{\Delta_\omega} = \frac{1}{\Delta}$$

Παραδείγματα: 1) Νὰ ἐπιλυθῇ τὸ σύστημα : $\sum : \begin{cases} 2x + \psi - z = 1 \\ -x + 2\psi + z = 6 \\ x + \psi + 2z = 9 \end{cases}$

Λύσις : Συμφώνως πρὸς τὸν κανόνα τοῦ Gramer λαμβάνομεν :

$$x = \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 6 & 2 & 1 \\ 9 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 1, \quad \psi = \begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 \\ -1 & 6 & 1 \\ 1 & 9 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 2, \quad z = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & 6 \\ 1 & 1 & 9 \\ 2 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 3$$

Ούτω εχομεν τήν λύσιν $(x, \psi, z) = (1, 2, 3)$

2) Νὰ ἐπιλυθῇ τὸ στύστημα : $\Sigma : x + 3\psi + \alpha z = -4\alpha \wedge -x + \alpha\psi + \alpha z = -2\alpha^2 \wedge 2x + \psi - z = -1, \quad x, \psi, z, \alpha \in \mathbb{R}$

Λύσις : Διὰ τοῦ κανόνος τοῦ Gramer λαμβάνομεν :

$$x = \begin{vmatrix} -4\alpha & 3 & \alpha \\ -2\alpha^2 & \alpha & \alpha \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & \alpha \\ -1 & \alpha & \alpha \\ 2 & 1 & -1 \end{vmatrix} = \alpha, \quad \psi = \begin{vmatrix} 1 & -4\alpha & \alpha \\ -1 & -2\alpha^2 & \alpha \\ 2 & -1 & -1 \\ 1 & 3 & \alpha \\ -1 & \alpha & \alpha \\ 2 & 1 & -1 \end{vmatrix} = -2\alpha, \quad z = \begin{vmatrix} 1 & 3 & -4\alpha \\ -1 & \alpha & -2\alpha^2 \\ 2 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & \alpha \\ -1 & \alpha & \alpha \\ 2 & 1 & -1 \end{vmatrix} = 1$$

Ούτω εχομεν τήν λύσιν $(x, \psi, z) = (\alpha, -2\alpha, 1)$.

AΣΚΗΣΕΙΣ

α' 'Ο μάξ :

164) Νὰ ἐπιλυθοῦν διὰ τοῦ κανόνος τοῦ Cramer τὰ συστήματα :

$$1) 9(2x - 3) - 10(\psi + 3) = 19 \quad 2) \frac{x}{4} - \frac{\psi}{3} = 1$$

$$6(4x - 9) - 25(\psi + 4) = -6 \quad \frac{x}{6} + \frac{\psi}{2} = 5$$

$$3) x + \alpha^2\psi = 2 \quad 4) kx + (k+2)\psi = 2 \quad 5) x + \mu\psi = 1 \\ x + \psi = 2\alpha \quad x + k\psi = 1 \quad (\mu + 1)x - \psi = 2$$

$$6) (\alpha - \beta)x + (\alpha + \beta)\psi = 2(\alpha^2 + \beta^2) \\ (\alpha + \beta)x + (\alpha - \beta)\psi = 2(\alpha^2 + 2\alpha\beta - \beta^2)$$

β' 'Ο μάξ :

165) Νὰ ἐπιλυθῇ τὸ σύστημα $\sum : \begin{cases} \alpha_1x + \beta_1\psi = \gamma_1 \\ \alpha_2x + \beta_2\psi = \gamma_2 \end{cases} \quad \alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2, \gamma_1, \gamma_2, \in \mathbb{R}$

$$1) \text{ἄν } \gamma_1 = \gamma_2 = 0 \wedge \alpha_1\beta_2 - \beta_1\alpha_2 \neq 0$$

$$2) \text{ἄν } \alpha_1 \neq 0 \vee \beta_1 \neq 0 \wedge \alpha_2 = \beta_2 = 0 \wedge \gamma_2 \neq 0$$

$$3) \text{ἄν } \beta_1 = \beta_2 = 0 \wedge \alpha_1\gamma_2 - \alpha_2\gamma_1 \neq 0$$

$$4) \text{ἄν } \alpha_1 = \beta_1 = 0 \wedge \gamma_1 \neq 0 \wedge (\alpha_2 \neq 0 \vee \beta_2 \neq 0)$$

$$5) \text{ἄν } \alpha_1 = \alpha_2 = \beta_1 = \beta_2 = 0 \wedge (\gamma_1 \neq 0 \vee \gamma_2 \neq 0)$$

$$6) \text{ἄν } \alpha_2 = \beta_2 = \gamma_2 = 0$$

$$7) \text{ἄν } \alpha_2 = \beta_2 = \gamma_2 = 0 \wedge (\alpha_1 \neq 0 \vee \beta_1 \neq 0)$$

166) Διὰ ποίας τιμάς τῶν λ καὶ μ τὸ σύστημα $\sum : \begin{cases} (\lambda + 1)x + 2\mu\psi = 2 \\ (3 - \lambda)x + (3\mu - 1)\psi = -3 \end{cases}$

ὅπου $x, \psi, \lambda, \mu \in \mathbb{R}$, ᾔχει ἀπείρους τὸ πλῆθος λύσεις ;

167) Διάτα ποίας καὶ τὰς αὐτάς τιμάς τῶν λ καὶ μ ἀμφότερα τὰ συστήματα
 $\Sigma_1 : \begin{cases} \mu x + \lambda \psi = 1 \\ 2x - \psi = 3 \end{cases}$ καὶ $\Sigma_2 : \begin{cases} -\mu x + (\lambda + 1) \psi = 2 \\ x + 2\psi = 5 \end{cases}$ εἰναι ἀδύνατα;

γ' 'Ο μάξ:

168) Νὰ εύρεθῇ ἡ τιμὴ ἑκάστης τῶν ὁρίζουσῶν :

$$1) \begin{vmatrix} 1 & 3 & 6 \\ 1 & 4 & 10 \\ 1 & 5 & 15 \end{vmatrix} \quad 2) \begin{vmatrix} 5 & 3 & 1 \\ 10 & 6 & 1 \\ 15 & 9 & 1 \end{vmatrix} \quad 3) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \alpha & \beta & \beta \\ \alpha^2 & \beta^2 & \gamma^2 \end{vmatrix} \quad 4) \begin{vmatrix} \beta+\gamma & \alpha & \alpha \\ \beta & \gamma+\alpha & \beta \\ \gamma & \gamma & \alpha+\beta \end{vmatrix}$$



$$5) \begin{vmatrix} \alpha-\beta & \beta-\gamma & \gamma-\alpha \\ \beta-\gamma & \gamma-\alpha & \alpha-\beta \\ \gamma-\alpha & \alpha-\beta & \beta-\gamma \end{vmatrix}$$

169) Ν' ἀποδειχθοῦν αἱ κάτωθι ταυτότητες : $\forall \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$

$$1) \begin{vmatrix} 1+\alpha^2 & \alpha\beta & \alpha\gamma \\ \alpha\beta & 1+\beta^2 & \beta\gamma \\ \alpha\gamma & \beta\gamma & 1+\gamma^2 \end{vmatrix} \equiv \alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 + 1 \quad 2) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2\beta & \beta - \gamma - \alpha & 2\beta \\ 2\gamma & 2\gamma & \gamma - \alpha - \beta \end{vmatrix} \equiv$$

$$\equiv (\alpha + \beta + \gamma)^2$$

δ' 'Ο μάξ:

170) Νὰ ἐπιλυθοῦν διὰ τοῦ κανόνος Cramer τὰ συστήματα :



$$1) \begin{vmatrix} x + \psi - 2z = -15 \\ x - \psi + z = 10 \\ -2x + \psi + z = 15 \end{vmatrix} \quad 2) \begin{vmatrix} 3x - \psi + 3z = 1 \\ -x + 2\psi - z = -7 \\ \frac{x}{2} + \frac{\psi}{4} + \frac{z}{3} = -3 \end{vmatrix}$$

$$3) \begin{vmatrix} x + \psi + z = 1 \\ \alpha x + \beta \psi + \gamma z = \delta \\ \alpha^2 x + \beta^2 \psi + \gamma^2 z = \delta^2 \end{vmatrix} \quad 4) \begin{vmatrix} \alpha x + \psi + \omega = 1 \\ x + \alpha \psi + \omega = \alpha \\ x + \psi + \alpha \omega = \alpha^2 \end{vmatrix}$$

57. ΕΠΙΛΥΣΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α' ΒΑΘΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΔΙ' ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ.

'Η ἐπίλυσις ὠρισμένων συστημάτων α' βαθμοῦ εἰδικῆς μορφῆς ἐπιτυγχάνεται δι' εἰδικῶν μεθόδων (τεχνασμάτων) πολὺ συντομωτέρων καὶ ἀπλουστέρων τῶν γνωστῶν μεθόδων ἐπιλύσεως.

'Αναφέρομεν κατωτέρω εἰδικὰς τινὰς μεθόδους ἐπιλύσεως συστημάτων, ἐκ τῶν συνήθως παρουσιαζομένων.

a) 'Η μέθοδος τῆς προσθέσεως τῶν ἔξισώσεων κατὰ μέλη.

Διὰ τῆς μεθόδου ταύτης ἐπιλύονται συστήματα τῆς μορφῆς :

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_{v-1} &= \alpha_1 \\ x_2 + x_3 + x_4 + \dots + x_v &= \alpha_2 \\ x_3 + x_4 + x_5 + \dots + x_1 &= \alpha_3 \\ \dots &\dots \\ x_v + x_1 + x_2 + \dots + x_{v-2} &= \alpha_v \end{aligned}$$

(1)

ὅπου x_1, x_2, \dots, x_v ἄγνωστοι
 $v \in \mathbb{N}$ καὶ $v > 3$

"Αν προσθέσωμεν κατά μέλη τάς έξισώσεις τοῦ συστήματος λαμβάνομεν :

$$(v-1)(x_1 + x_2 + \dots + x_v) = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_v \Rightarrow$$

$$\Rightarrow x_1 + x_2 + \dots + x_v = \frac{\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_v}{v-1} \quad (2)$$

*Ακολούθως συνδυάζομεν έκάστην έξισωσιν τοῦ συστήματος (1) μὲ τὴν (2), δόποτε λαμβάνομεν ἀντιστοίχως :

$$\alpha_1 + x_v = \frac{\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_v}{v-1}, \text{ ἐξ ἣς } x_v = \frac{\alpha_2 + \alpha_3 + \dots + \alpha_v - (v-2)\alpha_1}{v-1}$$

$$x_1 + \alpha_2 = \frac{\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_v}{v-1}, \text{ ἐξ ἣς } x_1 = \frac{\alpha_3 - (v-2)\alpha_2 + \alpha_3 + \dots + \alpha_v}{v-1}$$

κ. ο. κ.

$$x_{v-1} + \alpha_v = \frac{\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_v}{v-1}, \text{ ἐξ ἣς } x_{v-1} = \frac{\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_{v-1} - (v-2)\alpha_v}{v-1}$$

Παράδειγμα : Νὰ ἐπιλυθῇ τὸ σύστημα :

$$x + \psi + z = 1, \psi + z + \omega = 3, z + \omega + x = 2, \omega + x + \psi = 6$$

***Επίλυσις :** Διὰ προσθέσεως κατὰ μέλη τῶν έξισώσεων τοῦ συστήματος ἔχομεν $3(x + \psi + z + \omega) = 12$, ἐξ ἣς $x + \psi + z + \omega = 4$ (3)

*Αφαιροῦμεν κατὰ μέλη έκάστην έξισωσιν τοῦ συστήματος ἀπὸ τὴν (3), δόποτε ἔχομεν ἀντιστοίχως :

$$\omega = 3, x = 1, \psi = 2, z = -2$$

β) Ή μέθοδος τῆς χρησιμοποιήσεως βιοθητικῶν ἀγνώστων.

Διὰ τῆς μεθόδου ταύτης ἐπιλύονται τὰ κάτωθι συστήματα :

1. Νὰ ἐπιλυθῇ τὸ σύστημα :

$$\text{ὅπου } x_1, x_2, \dots, x_v \text{ ἀγνώστοι} \quad (1)$$

$$\alpha_v, \beta_v, \gamma_v \neq 0$$

$$v \in \mathbb{N} \text{ καὶ } v \geqslant 3$$

$$\left| \begin{array}{l} \alpha_1 x_1 + \beta_1 (x_2 + x_3 + \dots + x_v) = \gamma_1 \\ \alpha_2 x_2 + \beta_2 (x_3 + \dots + x_v + x_1) = \gamma_2 \\ \dots \dots \dots \dots \dots \dots \\ \alpha_v x_v + \beta_v (x_1 + x_2 + \dots + x_{v-1}) = \gamma_v \end{array} \right.$$

***Επίλυσις :**

*Αν θέσωμεν ὅπου $x_1 + x_2 + \dots + x_v = K$, τότε έκάστη τῶν έξισώσεων τοῦ συστήματος (1) ἀντιστοίχως γράφεται :

$$\left. \begin{array}{l} \alpha_1 x_1 + \beta_1 (K - x_1) = \gamma_1 \\ \alpha_2 x_2 + \beta_2 (K - x_2) = \gamma_2 \\ \dots \dots \dots \\ \alpha_v x_v + \beta_v (K - x_v) = \gamma_v \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left. \begin{array}{l} x_1 = (\gamma_1 - \beta_1 K) / (\alpha_1 - \beta_1) \\ x_2 = (\gamma_2 - \beta_2 K) / (\alpha_2 - \beta_2) \\ \dots \dots \dots \\ x_v = (\gamma_v - \beta_v K) / (\alpha_v - \beta_v) \end{array} \right\} \quad (2)$$

"Οπου
 $\alpha_1 \neq \beta_1$
 $\alpha_2 \neq \beta_2$
 \dots
 $\alpha_v \neq \beta_v$

Προσθέτομεν τὰς (2) κατὰ μέλη, δόποτε λαμβάνομεν :

$$x_1 + x_2 + \dots + x_v = \frac{\gamma_1 - \beta_1 K}{\alpha_1 - \beta_1} + \frac{\gamma_2 - \beta_2 K}{\alpha_2 - \beta_2} + \dots + \frac{\gamma_v - \beta_v K}{\alpha_v - \beta_v} = K \quad (3)$$

*Η έξισωσις (3) εἶναι πρωτοβάθμιος ὡς πρὸς K , ἡ ὁποία λυομένη δίδει :

$$K = \left(\frac{\gamma_1}{\alpha_1 - \beta_1} + \frac{\gamma_2}{\alpha_2 - \beta_2} + \dots + \frac{\gamma_v}{\alpha_v - \beta_v} \right) / \left(1 + \frac{\beta_1}{\alpha_1 - \beta_1} + \frac{\beta_2}{\alpha_2 - \beta_2} + \dots + \frac{\beta_v}{\alpha_v - \beta_v} \right)$$

ὅπερ, ἔστω $K=C$. Τὴν τιμὴν $K=C$ θέτομεν εἰς τὰς ἔξισώσεις (2) καὶ ἔχομεν τὰς τιμὰς τῶν x_1, x_2, \dots, x_v

Παράδειγμα: Νὰ ἐπιλυθῇ τὸ σύστημα :

$$3x + 2(\psi + z) = 8, \quad 4\psi + 3(z + x) = 6, \quad z - 4(x + \psi) = 8$$

*Επίλυσις: Θέτομεν ὅπου $x + \psi + z = K$, διπότε αἱ ἔξισώσεις τοῦ συστήματος γράφονται : $3x + 2(K - x) = 8, 4\psi + 3(K - \psi) = 6, z - 4(K - z) = 8$, ἐξ ὧν $x = 8 - 2K, \psi = 6 - 3K, z = (8 + 4K)/5$. Προσθέτομεν κατὰ μέλη, διπότε $x + \psi + z = \frac{78 - 21K}{5}$ καὶ ἄρα $K = \frac{78 - 21K}{5}, K = 3$. τέλος δι' ἀντικαταστάσεως τῆς τιμῆς $K = 3$ ἔχομεν :

$$x = 8 - 2 \cdot 3 = 2, \quad \psi = 6 - 3 \cdot 3 = -3, \quad z = (8 + 4 \cdot 3)/5 = 4$$

2. Νὰ ἐπιλυθῇ τὸ σύστημα :

x_1, x_2, \dots, x_v ἀγνωστοί

$$\alpha_v, \gamma_v, \delta_v, \epsilon \neq 0$$

$$v \in \mathbb{N} \text{ καὶ } v \geq 2$$

$$\left| \begin{array}{l} \frac{\alpha_1 x_1 + \beta_1}{\gamma_1} = \frac{\alpha_2 x_2 + \beta_2}{\gamma_2} = \dots = \frac{\alpha_v x_v + \beta_v}{\gamma_v} \\ \delta_1 x_1 + \delta_2 x_2 + \dots + \delta_v x_v = \epsilon \end{array} \right. \quad (1)$$

*Επίλυσις.

1ος τρόπος. Τῇ βοηθείᾳ τοῦ θεωρήματος τῶν ἴσων λόγων ἔχομεν :

$$\begin{aligned} \frac{\alpha_1 x_1 + \beta_1}{\gamma_1} &= \frac{\alpha_2 x_2 + \beta_2}{\gamma_2} = \dots = \frac{\alpha_v x_v + \beta_v}{\gamma_v} = \frac{x_1 + \frac{\beta_1}{\alpha_1}}{\frac{\gamma_1}{\alpha_1}} = \frac{x_2 + \frac{\beta_2}{\alpha_2}}{\frac{\gamma_2}{\alpha_2}} = \dots = \frac{x_v + \frac{\beta_v}{\alpha_v}}{\frac{\gamma_v}{\alpha_v}} = \\ &= \frac{\delta_1 x_1 + \frac{\delta_1 \beta_1}{\alpha_1}}{\frac{\delta_1 \gamma_1}{\alpha_1}} = \frac{\delta_2 x_2 + \frac{\delta_2 \beta_2}{\alpha_2}}{\frac{\delta_2 \gamma_2}{\alpha_2}} = \dots = \frac{\delta_v x_v + \frac{\delta_v \beta_v}{\alpha_v}}{\frac{\delta_v \gamma_v}{\alpha_v}} = \\ \frac{\delta_1 x_1 + \delta_2 x_2 + \dots + \delta_v x_v + \frac{\delta_1 \beta_1}{\alpha_1} + \frac{\delta_2 \beta_2}{\alpha_2} + \dots + \frac{\delta_v \beta_v}{\alpha_v}}{\frac{\delta_1 \gamma_1}{\alpha_1} + \frac{\delta_2 \gamma_2}{\alpha_2} + \dots + \frac{\delta_v \gamma_v}{\alpha_v}} &= \frac{\epsilon + \frac{\delta_1 \beta_1}{\alpha_1} + \frac{\delta_2 \beta_2}{\alpha_2} + \dots + \frac{\delta_v \beta_v}{\alpha_v}}{\frac{\delta_1 \gamma_1}{\alpha_1} + \frac{\delta_2 \gamma_2}{\alpha_2} + \dots + \frac{\delta_v \gamma_v}{\alpha_v}} = K, \end{aligned}$$

ὅπου $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_v \neq 0$ καὶ $\frac{\delta_1 \gamma_1}{\alpha_1} + \frac{\delta_2 \gamma_2}{\alpha_2} + \dots + \frac{\delta_v \gamma_v}{\alpha_v} \neq 0$. Ἀρα $\frac{\alpha_1 x_1 + \beta_1}{\gamma_1} = K$,

$$\frac{\alpha_2 x_2 + \beta_2}{\gamma_2} = K, \dots, \frac{\alpha_v x_v + \beta_v}{\gamma_v} = K, \text{ ἐξ ὧν ἔχομεν τὰς τιμὰς τῶν ἀγνώστων } x_1, x_2, \dots, x_v$$

2ος τρόπος. Εὰν ἔκαστος τῶν ἴσων λόγων ἔχῃ τιμὴν K , τότε θὰ ἔχωμεν :

$$\begin{aligned} \frac{\alpha_1 x_1 + \beta_1}{\gamma_1} &= K, \quad \frac{\alpha_2 x_2 + \beta_2}{\gamma_2} = K, \dots, \quad \frac{\alpha_v x_v + \beta_v}{\gamma_v} = K, \text{ ἐξ ὧν } x_1 = \frac{K \gamma_1 - \beta_1}{\alpha_1}, \quad x_2 = \\ &= \frac{K \gamma_2 - \beta_2}{\alpha_2}, \dots, \quad x_v = \frac{K \gamma_v - \beta_v}{\alpha_v} (2). \quad \text{Tὰς τιμὰς (2) ἀντικαθιστῶμεν εἰς τὴν δευτέραν ἔξισωσιν τοῦ συστήματος, ὅπερ } \delta_1 \frac{K \gamma_1 - \beta_1}{\alpha_1} + \delta_2 \frac{K \gamma_2 - \beta_2}{\alpha_2} + \dots + \delta_v \frac{K \gamma_v - \beta_v}{\alpha_v} = \\ &= \epsilon. \quad \text{Αὕτη εἶναι πρωτοβάθμιος ὡς πρὸς } K, \text{ ἡ διπότια λυομένη δίδει :} \end{aligned}$$

$$K = \left(\epsilon + \frac{\beta_1 \delta_1}{\alpha_1} + \frac{\beta_2 \delta_2}{\alpha_2} + \dots + \frac{\beta_v \delta_v}{\alpha_v} \right) / \left(\frac{\delta_1 \gamma_1}{\alpha_1} + \frac{\delta_2 \gamma_2}{\alpha_2} + \dots + \frac{\delta_v \gamma_v}{\alpha_v} \right) = C$$

Τὴν τιμὴν $K = C$ θέτομεν εἰς τὰς ἔξισώσεις (2), ὅπότε ἔχομεν τὰς τιμὰς τῶν ἀγνώστων x_1, x_2, \dots, x_v

Παράδειγμα Νὰ ἐπιλυθῇ τὸ σύστημα :
$$\begin{cases} \frac{x}{3} = \frac{\psi + 1}{9} = \frac{\omega - 2}{5} \\ x - \psi + 3\omega = -2 \end{cases}$$

*Ἐπίλυσις : "Εστω K ἡ τιμὴ ἑκάστου τῶν ἵσων λόγων. Τότε ἔχομεν $x = 3K$, $\psi = 9K - 1$, $\omega = 5K + 2$ τὰς τιμὰς αὐτὰς θέτομεν εἰς τὴν ἔξισ. $x - \psi + 3\omega = -2$ δύτε : $3K - (9K - 1) + 3(5K + 2) = -2$, ἐξ ἣς $K = -1$. Τέλος δι' ἀντικαταστάσεως τῆς τιμῆς $K = -1$ ἔχομεν $x = -3$, $\psi = -10$, $\omega = -3$

3. Νὰ ἐπιλυθῇ τὸ σύστημα :
$$\begin{cases} x_1, x_2, \dots, x_v \text{ ἄγνωστοι } \neq 0 \\ v \in \mathbb{N} \text{ καὶ } v \geq 3 \end{cases} \quad (1)$$

$$\left| \begin{array}{l} \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \dots + \frac{1}{x_{v-1}} = \alpha_1 \\ \frac{1}{x_2} + \frac{1}{x_3} + \dots + \frac{1}{x_v} = \alpha_2 \\ \vdots \\ \frac{1}{x_v} + \frac{1}{x_1} + \dots + \frac{1}{x_{v-2}} = \alpha_v \end{array} \right.$$

*Ἐπίλυσις : Θέτοντες ὅπου $\frac{1}{x_1} = x'_1$, $\frac{1}{x_2} = x'_2$, $\frac{1}{x_3} = x'_3, \dots, \frac{1}{x_v} = x'_v$ εἰς τὸ σύστημα, ἔχομεν :

$$\begin{aligned} x'_1 + x'_2 + \dots + x'_{v-1} &= \alpha_1 \\ x'_2 + x'_3 + \dots + x'_v &= \alpha_2 \\ \dots \\ x'_v + x'_1 + \dots + x'_{v-2} &= \alpha_v \end{aligned}$$

Τὸ σύστημα (2) ἐπιλύεται διὰ τῆς μεθόδου τῆς προσθέσεως τῶν ἔξισώσεων κατὰ μέλη, ὅπότε δι' ἀντιστροφῆς τῶν τιμῶν

x'_1, x'_2, \dots, x'_v ἔχομεν τὰς τιμὰς x_1, x_2, \dots, x_v

Παραδείγματα : 1) Νὰ ἐπιλυθῇ τὸ σύστημα :

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{\psi} = \frac{5}{6}, \frac{1}{\psi} + \frac{1}{\omega} = \frac{7}{12}, \frac{1}{\omega} + \frac{1}{x} = \frac{3}{4}$$

*Ἐπίλυσις : Πρέπει νὰ εἶναι $x\psi\omega \neq 0$

Θέτομεν $\frac{1}{x} = x'$, $\frac{1}{\psi} = \psi'$, $\frac{1}{\omega} = \omega'$, διπότε λαμβάνομεν :

$$\begin{cases} x' + \psi' = \frac{5}{6} \\ \psi' + \omega' = \frac{7}{12} \\ \omega' + x' = \frac{3}{4} \end{cases} \quad (1)$$

Διὰ προσθέσεως κατὰ μέλη τῶν (1) ἔχομεν :

$$2(x' + \psi' + \omega') = \frac{13}{6}, \text{ ἐξ ἣς } x' + \psi' + \omega' = \frac{13}{12} \quad (2)$$

*Ἀφαιροῦμεν κατὰ μέλη, ἑκάστην ἔξισωσιν ἐκ τῶν (1) ἀπὸ τὴν ἔξισωσιν (2), διπότε ἔχομεν ἀντιστοίχως : $\omega' = \frac{1}{4}$, $x' = \frac{1}{2}$, $\psi' = \frac{1}{3}$, καὶ ἀκολούθως $x = 2$, $\psi = 3$, $\omega = 4$.

2) Νὰ ἐπιλυθῇ τὸ σύστημα : $\frac{x\psi}{\alpha x + \beta\psi} = \gamma, \frac{\psi\omega}{\gamma\psi + \alpha\omega} = \beta, \frac{\omega x}{\beta\omega + \gamma x} = \alpha$

*Ἐπίλυσις : "Υποθέτομεν $\alpha\beta\gamma \neq 0$ καὶ $x\psi\omega \neq 0$, διπότε τὸ σύστημα γράφεται :

$$\left. \begin{array}{l} \frac{\alpha x + \beta \psi}{x\psi} = \frac{1}{\gamma} \\ \frac{\gamma \psi + \alpha \omega}{\psi \omega} = \frac{1}{\beta} \\ \frac{\beta \omega + \gamma x}{\omega x} = \frac{1}{\alpha} \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left. \begin{array}{l} \frac{\alpha}{\psi} + \frac{\beta}{x} = \frac{1}{\gamma} \\ \frac{\gamma}{\omega} + \frac{\alpha}{\psi} = \frac{1}{\beta} \\ \frac{\beta}{x} + \frac{\gamma}{\omega} = \frac{1}{\alpha} \end{array} \right\} \quad \begin{array}{l} \text{Θέτομεν όπου } \frac{1}{x} = x', \frac{1}{\psi} = \psi', \frac{1}{\omega} = \omega' \\ \text{όπότε λαμβάνομεν:} \\ \alpha \psi' + \beta x' = 1/\gamma \\ \gamma \omega' + \alpha \psi' = 1/\beta \\ \beta x' + \gamma \omega' = 1/\alpha \end{array} \quad (1)$$

Διὰ προσθέσεως τῶν (1) κατὰ μέλη λαμβάνομεν :

$$2(\alpha \psi' + \beta x' + \gamma \omega') = \frac{\alpha \beta + \beta \gamma + \alpha \gamma}{\alpha \beta \gamma}, \text{ έξι } \alpha \psi' + \beta x' + \gamma \omega' = \frac{\alpha \beta + \beta \gamma + \alpha \gamma}{2 \alpha \beta \gamma}$$

Αφαιροῦμεν ἀπὸ αὐτὴν ἑκάστην ἔξισωσιν ἐκ τῶν (1) κατὰ μέλη, ὅτε ἔχομεν :

$$\gamma \omega' = \frac{\alpha \gamma + \beta \gamma - \alpha \beta}{2 \alpha \beta \gamma}, \quad \beta x' = \frac{\alpha \beta + \beta \gamma - \alpha \gamma}{2 \alpha \beta \gamma}, \quad \alpha \psi' = \frac{\alpha \gamma + \alpha \beta - \beta \gamma}{2 \alpha \beta \gamma}, \quad \text{ξεὶ ὅν}$$

$$\omega' = (\alpha \gamma + \beta \gamma - \alpha \beta) : 2 \alpha \beta \gamma^2, \quad x' = (\alpha \beta + \beta \gamma - \alpha \gamma) : 2 \alpha \beta^2 \gamma, \quad \psi' = (\alpha \gamma + \alpha \beta - \beta \gamma) : 2 \alpha^2 \beta \gamma \quad \text{καὶ ἀκολούθως } \omega = \frac{2 \alpha \beta^2 \gamma^2}{\alpha \gamma + \beta \gamma - \alpha \beta}, \quad x = \frac{2 \alpha \beta^2 \gamma}{\alpha \beta + \beta \gamma - \alpha \gamma},$$

$$\psi = \frac{2 \alpha^2 \beta \gamma}{\alpha \gamma + \alpha \beta - \beta \gamma}$$

Σημείωσις. Τὸ θέμα τῆς ἐπιλύσεως συστημάτων δι³ εἰδικῶν μεθόδων οὐδόλως ἔξαντλεῖται ἐνταῦθα. Εξαρτάται δὲ ἀπὸ τὸ εἶδος τοῦ συστήματος καὶ ἀπὸ τὴν δεξιοτεχνίαν καὶ εὐχερειαν τοῦ ἀσχολουμένου μὲν αὐτά.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

171) Νὰ ἐπιλυθοῦν τὰ ἀκόλουθα συστήματα :

$$\begin{array}{lll} 1) \left| \begin{array}{l} x + \psi = -1 \\ \psi + \omega = -19 \\ \omega + x = 2 \end{array} \right. & 2) \left| \begin{array}{l} x + \psi + \omega = 4 \\ \psi + \omega + z = -2 \\ \omega + z + x = 1 \\ z + x + \psi = -3 \end{array} \right. & 3) \left| \begin{array}{l} 3x + \psi + \omega = 2 \\ x + 3\psi + \omega = 6 \\ x + \psi + 3\omega = -8 \end{array} \right. \\ 4) \left| \begin{array}{l} \alpha x + \psi + \omega = 1 \\ x + \alpha \psi + \omega = \alpha \\ x + \psi + \alpha \omega = \alpha^2 \end{array} \right. & 5) \left| \begin{array}{l} x + \psi - \omega = \alpha \\ \psi + \omega - x = \beta \\ \omega + x - \psi = \gamma \end{array} \right. & 6) \left| \begin{array}{l} \mu x + \nu \psi + z = 1 \\ x + \mu \psi + z = 1 \\ x + \nu \psi + \mu z = 1 \end{array} \right. \end{array}$$

172) Νὰ ἐπιλυθοῦν τὰ ἀκόλουθα συστήματα :

$$\begin{array}{lll} 1) \left| \begin{array}{l} x + 3(\psi + \omega + z) = 15 \\ 6\psi + 5(x + \omega + z) = 36 \\ 3\omega + (x + \psi + z) = 11 \\ 5z + 2(x + \psi + \omega) = 17 \end{array} \right. & 2) \left| \begin{array}{l} \alpha x + \beta(\psi + z + \omega) = \gamma \\ \alpha \psi + \beta_1(x + z + \omega) = \gamma_1 \\ \alpha z + \beta_2(x + \psi + \omega) = \gamma_2 \\ \alpha \omega + \beta_3(x + \psi + z) = \gamma_3 \end{array} \right. & 3) \left| \begin{array}{l} \frac{x}{5} = \frac{\psi}{6} = \frac{\omega}{15} \\ 2x + \psi - \omega = 2 \end{array} \right. \quad 4) \left| \begin{array}{l} \frac{x + \alpha}{\mu} = \frac{\psi + \beta}{\nu} = \frac{\omega + \gamma}{\lambda} \\ x + \psi + \omega = \kappa \end{array} \right. \quad 5) \left| \begin{array}{l} \alpha x = \beta \psi = \gamma \omega \\ \frac{1}{x} + \frac{1}{\psi} + \frac{1}{\omega} = \frac{1}{\delta} \end{array} \right. \\ 6) \left| \begin{array}{l} \frac{1}{x} + \frac{1}{\psi} + \frac{1}{\omega} = 1 \\ \frac{1}{\psi} + \frac{1}{\omega} + \frac{1}{z} = \frac{1}{3} \\ \frac{1}{\omega} + \frac{1}{z} + \frac{1}{x} = \frac{5}{6} \\ \frac{1}{z} + \frac{1}{x} + \frac{1}{\psi} = \frac{11}{6} \end{array} \right. & 7) \left| \begin{array}{l} \frac{x \psi \omega}{x \psi + x \omega - \psi \omega} = \alpha \\ \frac{x \psi \omega}{\psi \omega + \psi x - \omega x} = \beta \\ \frac{x \psi \omega}{\omega x + \omega \psi - x \psi} = \gamma \end{array} \right. & \end{array}$$

$$8) \begin{cases} x\psi\omega = \alpha(\psi\omega - \omega x - x\psi) \\ x\psi\omega = \beta(\omega x - \psi\omega - x\psi) \\ x\psi\omega = \gamma(x\psi - \psi\omega - \omega x) \end{cases}$$

173) Νὰ ἐπιλυθοῦν τὰ ἀκόλουθα συστήματα :

$$1) \begin{cases} x + \psi = 3 \\ \psi + \omega = 5 \\ \omega + \varphi = 7 \\ \varphi + z = 9 \\ z + x = 6 \end{cases}$$

$$2) \begin{cases} vx + \psi + z + \omega = v^3 \\ x + v\psi + z + \omega = v^2 \\ x + \psi + vz + \omega = v \\ x + \psi + z + v\omega = 1 \end{cases}$$

$$3) \begin{cases} 2(x + z) + \omega = -5 \\ x + 2(\psi + \omega) = 6 \\ 2(\psi + \omega) + z = 0 \\ 2(z + x) + \psi = -1 \end{cases}$$

58. ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑΙ.

*Εστω πρὸς ἐπίλυσιν τὸ σύστημα $\sum:$ $x - 2\psi = -4$
 $x, \psi \in \mathbb{R}$
 $x + 5\psi = 17$

*Ἐπιλύοντες τὸ σύστημα τῶν δύο πρώτων ἔξισώσεων εὑρίσκομεν :

$$\left\{ (x, \psi) / (x, \psi) \in \mathbb{R}^2 \wedge \begin{array}{l} x - 2\psi = -4 \\ 3x + \psi = 9 \end{array} \right\} = \{(2, 3)\}$$

Παρατηροῦμεν ὅτι ἡ εὐρεθεῖσα λύσις $(x, \psi) = (2, 3)$ εἶναι λύσις καὶ τῆς τρίτης ἔξισ. $x + 5\psi = 17$. *Ητοι αἱ ἔξισώσεις τοῦ συστήματος Σ ἔχουν κοινὴν λύσιν.

Τὰς ἔξισώσεις ταύτας καλοῦμεν **συμβιβαστὰς** καὶ τὸ σύστημα τὸ ὅποιον ἀποτελοῦν **συμβιβαστόν**.

*Ἐν γένει, ὅταν τὸ πλήθος μ τῶν ἔξισώσεων εἶναι μεγαλύτερον τοῦ πλήθους ν τῶν ἀγνώστων, τότε ἐκλέγομεν ν ἔξισώσεις, τὰς ἀπλουστέρας, καὶ λύομεν τὸ σύστημα τὸ ὅποιον ἀποτελοῦν, ἐφ' ὅσον ἔχῃ τοῦτο λύσιν. *Η λύσις τούτου ἔὰν εἶναι λύσις καὶ τῶν ὑπολοίπων ἔξισώσεων, τότε αἱ μ ἔξισώσεις εἶναι **συμβιβασταὶ** καὶ τὸ σύστημα αὐτῶν **συμβιβαστόν**, ἔὰν ὅχι, τότε αἱ ἔξισώσεις εἶναι **ἀσυμβιβαστοί** καὶ τὸ σύστημα **ἀδύνατον**.

Παραδείγματα : 1) Νὰ εὐρεθῇ σχέσις μεταξὺ τῶν $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2 \in \mathbb{R}$ τῶν ἔξισώσεων $\alpha_1x_1 + \beta_1 = 0$ καὶ $\alpha_2x_1 + \beta_2 = 0$, ὅπου $\alpha_1, \alpha_2 \neq 0$, ἵνα αὗται εἶναι συμβιβασταί.

Λύσις : *Ἐχομεν τὰς λύσεις : $\{x / x \in \mathbb{R} \wedge \alpha_1x + \beta_1 = 0\} = \left\{-\frac{\beta_1}{\alpha_1}\right\}$

$$\{x / x \in \mathbb{R} \wedge \alpha_2x + \beta_2 = 0\} = \left\{-\frac{\beta_2}{\alpha_2}\right\}$$

Δέον νὰ εἶναι :

$$-\frac{\beta_1}{\alpha_1} = -\frac{\beta_2}{\alpha_2} \iff \frac{\alpha_1}{\alpha_2} = \frac{\beta_1}{\beta_2} \iff \left| \begin{array}{cc} \alpha_1 & \beta_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 \end{array} \right| = 0,$$

ἥτις εἶναι ἡ ζητουμένη σχέσις. Τὸ ἀντίστροφον προφανές.

2) Νὰ εὐρεθῇ σχέσις μεταξὺ τῶν συντελεστῶν $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_{1,2,3}, \gamma_{1,2,3} \in \mathbb{R}$ τῶν ἔξισώσεων $\alpha_1x + \beta_1\psi = \gamma_1$ (1), $\alpha_2x + \beta_2\psi = \gamma_2$ (2), $\alpha_3x + \beta_3\psi = \gamma_3$ (3), ὅπου $|\alpha_1| + |\beta_1| > 0, |\alpha_2| + |\beta_2| > 0, |\alpha_3| + |\beta_3| > 0$, ἵνα αὗται εἶναι συμβιβασταί.

Λύσις: Ή κοινη λύσις των (1) και (2) είναι $x = \frac{\gamma_1\beta_2 - \gamma_2\beta_1}{\alpha_1\beta_2 - \alpha_2\beta_1} = \frac{\Delta_x}{\Delta}$
 $\psi = \frac{\alpha_1\gamma_2 - \alpha_2\gamma_1}{\alpha_1\beta_2 - \alpha_2\beta_1} = \frac{\Delta_y}{\Delta}$, όπου $\alpha_1\beta_2 - \alpha_2\beta_1 \neq 0$. Αυτή ή λύσις δέον να είναι λύσις και της (3).

$$\text{Ήτοι: } \alpha_3 \cdot \frac{\Delta_x}{\Delta} + \beta_3 \cdot \frac{\Delta_y}{\Delta} = \gamma_3 \iff \alpha_3\Delta_x + \beta_3\Delta_y = \gamma_3\Delta \iff \begin{vmatrix} \alpha_1 & \beta_1 & \gamma_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 & \gamma_2 \\ \alpha_3 & \beta_3 & \gamma_3 \end{vmatrix} = 0.$$

Αυτή είναι ή ζητουμένη σχέσις, (*)

59. ΑΠΑΛΕΙΦΟΥΣΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΣΥΝΑΡΜΟΖΟΥΣΑ).

Εις τὰ ἀνωτέρω δύο παραδείγματα συμβιβαστῶν ἔξισώσεων αἱ εὐρεθεῖσαι σχέσεις είναι τὸ ἔξαγόμενον τῆς ἀπαλοιφῆς τῶν ἀγνώστων μεταξὺ τῶν ἔξισώσεων τούτων, δι' ὃ καὶ καλεῖται ἀπαλείφουσα τοῦ συστήματος τῶν ἔξισώσεων.

Ἡ ἀπαλείφουσα ἐνὸς συστήματος είναι ἡ ἴκανη καὶ ἀναγκαῖα συνθήκη, ἵνα τὸ σύστημα είναι συμβιβαστόν.

Παραδείγματα: 1) Νὰ εύρεθῇ ἡ ἀπαλείφουσα τοῦ συστήματος $x+\psi=3$, $2x-3\psi=-14$, $\lambda x+\mu\psi=\nu$, $\lambda, \mu, \nu, x, \psi \in \mathbb{R}$

Λύσις: Κατὰ τὸ παράδειγμα (2) τῆς προηγουμένης παραγράφου ἔχομεν:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 2 & -3 & -14 \\ \lambda & \mu & \nu \end{vmatrix} = 0 \iff \lambda + \nu = 4\mu$$

Ἡ σχέσις $\lambda + \nu = 4\mu$ είναι ἡ ἀπαλείφουσα τοῦ συστήματος.

2) Διὰ ποίαν τιμὴν τοῦ $\lambda \in \mathbb{R}$ τὸ σύστημα είναι συμβιβαστὸν $2\lambda x + \psi = \lambda$, $x + \psi = 3$, $x - 2\psi = 2$ ἐν \mathbb{R}

Λύσις: "Ινα τὸ σύστημα είναι συμβιβαστὸν πρέπει ἡ ἀπαλείφουσα αὐτοῦ νὰ είναι 0.

Ήτοι: $\begin{vmatrix} 2\lambda & 1 & \lambda \\ 1 & 1 & 3 \\ 1 & -2 & 2 \end{vmatrix} = 0 \iff 2\lambda(2+6) - (2+2\lambda) + (3-\lambda) = 0 \iff$

$$\iff \lambda = -\frac{1}{13}. \text{ "Ωστε, διὰ } \lambda = -\frac{1}{13} \text{ τὸ δοθὲν σύστημα είναι συμβιβαστόν. }$$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

α' Ο μάς :

174) Νὰ ἔρετασθῇ ἂν αἱ ἔξισώσεις εἰς τὰ κάτωθι συστήματα είναι συμβιβασταὶ ἡ ὅχι;

$$1) x - 5\psi = 0 \quad 2) 2x - \frac{\psi}{\beta} = 2\alpha - 1$$

$$x = \psi + 4 \quad 2\alpha + \beta\psi = \beta^2 + 2\alpha^2$$

$$3x - 7\psi = 8 \quad \frac{x}{\alpha} + \frac{2\psi}{\beta} = 3$$

(*) ητις ίνα είναι και ίκανη πρέπει

96 $\alpha_1\beta_2 - \alpha_2\beta_1 \neq 0 \vee \alpha_2\beta_3 - \alpha_3\beta_2 \neq 0 \vee \alpha_1\beta_3 - \alpha_3\beta_1 \neq 0$.

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

175) Ποία σχέσις συνδέει τά α, β ένα τά άκολουθα συστήματα είναι συμβιβαστά.

1) $\alpha x = \beta - 1, \quad \beta x = 2\alpha + 1$

2) $\beta x + \alpha\psi = 13, \quad \psi + 2x = 2, \quad 2\beta x + 3\beta\psi = 1$

176) "Αν αι τρεῖς έξισώσεις : $\alpha x + \beta\psi = 1, \alpha\psi + \beta x = \alpha\beta, x + \psi = \alpha + \beta$ είναι συμβιβασταί, ν' απόδειχθῇ ότι $(\alpha + \beta)^2 = \alpha\beta + 1$

β' Ο μάς :

177) Νά προσδιορισθῇ ή τιμή τοῦ $\mu \in \mathbb{R}$, ίνα τὸ σύστημα τῶν έξισώσεων $(\mu - 7)x = 5$ καὶ $(3\mu - 1)x = -1$ είναι συμβιβαστόν. "Ακολούθως νὰ λυθῇ τὸ σύστημα.

178) Νά εύρεθῇ ή ἀπαλείφουσα τοῦ συστήματος $\left| \begin{array}{l} (\alpha^2 - \beta^2)x + \alpha^3 + \beta^3 = 0 \\ x + \alpha + \beta = 0 \end{array} \right.$

179) Νά εύρεθῇ ή ἀπαλείφουσα ἑκάστου τῶν άκολουθῶν συστημάτων :

1) $x + \lambda\psi = -\lambda^3 \quad 2) \alpha x + \gamma\psi + \beta = 0 \quad 3) \alpha x + \beta\psi = \gamma$

$x + \mu\psi = -\mu^3 \quad \gamma x + \beta\psi + \alpha = 0 \quad \alpha^2 x + \beta^2 \psi = \gamma^2$

$x + \nu\psi = -\nu^3 \quad \beta x + \alpha\psi + \gamma = 0 \quad \alpha^3 x + \beta^3 \psi = \gamma^3$

60. ΟΜΟΓΕΝΗ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ.

Όρισμός: Μία γραμμικὴ έξισώσεις καλεῖται δμογενῆς, ἐὰν ὁ γνωστὸς δρος αὐτῆς είναι μηδενικός π.χ. Αἱ έξισώσεις $\alpha x + \beta\psi = 0, \alpha x + \beta\psi + \gamma\omega = 0$ $\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \alpha_3 x_3 + \dots + \alpha_v x_v = 0$, ὅπου x_i μεταβλητάι, είναι γραμμικαὶ δμογενεῖς.

Κατὰ συνέπειαν ἐν σύστημα γραμμικῶν δμογενῶν έξισώσεων είναι ὁ μογενὲς γραμμικὸν σύστημα.

Τὰ συστήματα : $\left| \begin{array}{l} \alpha_1 x + \beta_1 \psi + \gamma_1 \omega = 0 \\ \alpha_1 x + \beta_1 \psi = 0 \quad \alpha_1 x + \beta_1 \psi + \gamma_1 z = 0 \\ \alpha_2 x + \beta_2 \psi = 0 \quad \alpha_2 x + \beta_2 \psi + \gamma_2 \omega = 0 \\ \alpha_2 x + \beta_2 \psi = 0 \quad \alpha_2 x + \beta_2 \psi + \gamma_2 z = 0 \end{array} \right.$

είναι γραμμικὰ δμογενῆ συστήματα.

Σημ. "Ενας τουλάχιστον ἐκ τῶν συντελεστῶν δέον νὰ είναι μὴ μηδενικός. Προφανής λύσις ἔνδος δμογενοῦς γραμμικοῦ συστήματος είναι ή μηδενικὴ (ὅλοι οἱ ἀγνωστοι 0). συνεπῶς ἔχει πάντοτε μίαν λύσιν. Γενινᾶται ἐνταῦθα τὸ ἔρωτημα, ἃν ἐκτὸς τῆς μηδενικῆς ἔχῃ κι' ἄλλην λύσιν η ἄλλας λύσεις.

Σκοπὸς τῆς μελέτης τῶν δμογενῶν γραμμικῶν συστημάτων είναι ή ἀναζήτησις τῶν μὴ μηδενικῶν λύσεων αὐτῶν.

61. ΙΚΑΝΑΙ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑΙ ΣΥΝΩΗΚΑΙ, ΙΝΑ ΤΟ ΟΜΟΓΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΧΕΙ ΑΠΕΙΡΟΥΣ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΗ ΜΗΔΕΝΙΚΑΣ.

I. "Εστω τὸ σύστημα Σ_1 : $\left| \begin{array}{l} \alpha_1 x + \beta_1 \psi = 0 \\ \alpha_2 x + \beta_2 \psi = 0, \quad \alpha_{1,2}, \beta_{1,2}, x, \psi \in \mathbb{R} \end{array} \right.$

Εἴδομεν, ότι ἂν $\left| \begin{array}{cc} \alpha_1 & \beta_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 \end{array} \right| \neq 0$ τότε τὸ σύστημα ἔχει μίαν καὶ μόνον λύσιν καὶ ἐνταῦθα τὴν μηδενικὴν $(0, 0)$, ητις είναι προφανής. "Αν $\left| \begin{array}{cc} \alpha_1 & \beta_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 \end{array} \right| = 0$, τότε τὸ σύστημα είναι ἀόριστον, ἔχον ἀπείρους τὸ πλῆθος λύσεις, ἀποκλειομένης τῆς περιπτώσεως τοῦ ἀδυνάτου, ἐφ' ὅσον ἔχῃ μίαν λύσιν $(0, 0)$.

Τάς άπειρους τό πλήθος λύσεις εύρισκομεν προφανῶς ἐκ μιᾶς ἔξισώσεως τοῦ Σ_1 , ὅταν δὲ εἰς ἄγνωστος ἐκλεγῇ αὐθαιρέτως.

Αντιστρόφως. Ἐάν τὸ σύστημα Σ_1 ἔχῃ ἐκτὸς τῆς λύσεως $(0,0)$ καὶ τὴν λύσιν (x_1, y_1) , τότε ἡ δρίζουσα τῶν συντελεστῶν δὲν δύναται νὰ εἶναι διάφορος τοῦ 0 . Ἀρα θὰ εἶναι $\begin{vmatrix} \alpha_1 & \beta_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 \end{vmatrix} = 0$.

Ωστε ἡ ἀναγκαῖα καὶ ἰκανὴ συνθήκη, ἵνα τὸ σύστημα Σ_1 ἔχῃ ἐκτὸς τῆς λύσεως $(0,0)$ καὶ ἄλλας ἀπειρους τὸ πλήθος λύσεις, εἶναι ἡ δρίζουσα τῶν συντελεστῶν τῶν ἀγνώστων νὰ εἶναι 0 .

$$\text{Ητοι } \begin{vmatrix} \alpha_1 & \beta_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 \end{vmatrix} = \alpha_1\beta_2 - \alpha_2\beta_1 = 0 \Leftrightarrow \frac{\alpha_1}{\alpha_2} = \frac{\beta_1}{\beta_2}$$

$$\text{II. } \text{Ἐστω τὸ σύστημα } \sum_2 : \begin{cases} \alpha_1 x + \beta_1 \psi + \gamma_1 \omega = 0 \\ \alpha_2 x + \beta_2 \psi + \gamma_2 \omega = 0 \end{cases}$$

δόμογενὲς γραμμικὸν δύο ἔξισώσεων μὲ τρεῖς ἀγνώστους. Προφανῆς λύσις τούτου εἶναι $(x, \psi, \omega) = (0, 0, 0)$

Ὑποθέτομεν $x\psi \neq 0$, τότε τὸ σύστημα Σ_2 δύναται νὰ γραφῇ

$$\left. \begin{array}{l} \alpha_1 \frac{x}{\omega} + \beta_1 \frac{\psi}{\omega} = -\gamma_1 \\ \alpha_2 \frac{x}{\omega} + \beta_2 \frac{\psi}{\omega} = -\gamma_2 \end{array} \right\} \text{Λύοντες ὡς πρὸς } \frac{x}{\omega} \text{ καὶ } \frac{\psi}{\omega} \text{ λαμβάνομεν}$$

$$\left. \begin{array}{l} \frac{x}{\omega} = \frac{-\gamma_1 \beta_1}{\alpha_1 \beta_1} = \frac{\beta_1 \gamma_1}{\alpha_1 \beta_1} \\ \frac{\psi}{\omega} = \frac{-\gamma_2 \beta_2}{\alpha_2 \beta_2} = \frac{\beta_2 \gamma_2}{\alpha_2 \beta_2} \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left. \begin{array}{l} \frac{x}{\beta_1 \gamma_1} = \frac{\omega}{\alpha_1 \beta_1} \\ \frac{\psi}{\beta_2 \gamma_2} = \frac{\omega}{\alpha_2 \beta_2} \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left. \begin{array}{l} \frac{x}{\beta_1 \gamma_1} = \frac{\psi}{\gamma_1 \alpha_1} = \frac{\omega}{\alpha_1 \beta_1} \\ \frac{\psi}{\beta_2 \gamma_2} = \frac{\omega}{\gamma_2 \alpha_2} = \frac{\omega}{\alpha_2 \beta_2} \end{array} \right\}$$

Οἱ λόγοι οὗτοι ἔχουν ἔννοιαν ὅταν αἱ δρίζουσαι τῶν παρονομαστῶν εἶναι διάφοροι τοῦ μηδενός.

Αντιστρόφως. Εάν $\frac{x}{\beta_1 \gamma_1} = \frac{\psi}{\gamma_1 \alpha_1} = \frac{\omega}{\alpha_1 \beta_1} = \lambda$, $\lambda \in \mathbb{R}$ καὶ

$$\left| \begin{array}{cc} \beta_1 & \gamma_1 \\ \beta_2 & \gamma_2 \end{array} \right| \neq 0, \left| \begin{array}{cc} \gamma_1 & \alpha_1 \\ \gamma_2 & \alpha_2 \end{array} \right| \neq 0, \left| \begin{array}{cc} \alpha_1 & \beta_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 \end{array} \right| \neq 0, \text{ τότε αἱ τιμαὶ}$$

$$x = \lambda \left| \begin{array}{cc} \beta_1 & \gamma_1 \\ \beta_2 & \gamma_2 \end{array} \right|, \psi = \lambda \left| \begin{array}{cc} \gamma_1 & \alpha_1 \\ \gamma_2 & \alpha_2 \end{array} \right|, \omega = \lambda \left| \begin{array}{cc} \alpha_1 & \beta_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 \end{array} \right| \text{ εἶναι λύσεις}$$

τοῦ συστήματος Σ_2 . Τοῦτο διεπιστοῦται εὐκόλως ἀν ἀντικαταστήσωμεν τὰς τιμὰς ταύτας εἰς τὰς ἔξισώσεις τοῦ Σ_2 .

"Ωστε ή άναγκαία καὶ ίκανή συνθήκη, ίνα τὸ σύστημα Σ_2 , ἐκτὸς τῆς λύσεως $(0, 0, 0)$, ἔχῃ καὶ ἄλλας ἀπειρούς τὸ πλῆθος λύσεις, εἰναι $a_1\beta_2 - a_2\beta_1 \neq 0$, $\beta_1\gamma_2 - \beta_2\gamma_1 \neq 0$, $\gamma_1a_2 - \gamma_2a_1 \neq 0$.

$$\text{III. } " \text{Εστω τὸ σύστημα } \Sigma_3 : \begin{cases} \alpha_1x + \beta_1\psi + \gamma_1\omega = 0 & (1) \\ \alpha_2x + \beta_2\psi + \gamma_2\omega = 0 & (2) \\ \alpha_3x + \beta_3\psi + \gamma_3\omega = 0 & (3) \end{cases}$$

Προσφανής λύσης τοῦ συστήματος Σ_3 εἰναι ἡ $(x, \psi, \omega) = (0, 0, 0)$

"Εκ τῶν (1) καὶ (2) λαμβάνομεν : $x = \lambda \begin{vmatrix} \beta_1 & \gamma_1 \\ \beta_2 & \gamma_2 \end{vmatrix}$, $\psi = \lambda \begin{vmatrix} \gamma_1 & \alpha_1 \\ \gamma_2 & \alpha_2 \end{vmatrix}$, $\omega = \lambda \begin{vmatrix} \alpha_1 & \beta_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 \end{vmatrix}$ (4),

όπότε ἡ (3) γίνεται : $\lambda [\alpha_3(\beta_1\gamma_2 - \beta_2\gamma_1) + \beta_3(\gamma_1\alpha_2 - \alpha_1\gamma_2) + \gamma_3$

$$(\alpha_1\beta_2 - \beta_1\alpha_2)] = 0, \text{ ήτις γράφεται καὶ οὕτω : } \lambda \cdot \begin{vmatrix} \alpha_1 & \beta_1 & \gamma_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 & \gamma_2 \\ \alpha_3 & \beta_3 & \gamma_3 \end{vmatrix} = 0 \text{ ή } \lambda \cdot \Delta = 0$$

"Ἐὰν $\Delta \neq 0$ τότε $\lambda = 0$ καὶ συνεπῶς $x = 0, \psi = 0, \omega = 0$

"Ἐὰν $\Delta = 0$, τότε διὰ $\lambda \in \mathbb{R}$ ἐκ τῶν (4) θὰ ἔχωμεν ἀπειρούς τὸ πλῆθος λύσεις, καθ' ὅσον ὁ λ ἔκλεγεται αὐθαιρέτως.

"Αντιστρόφωσ : "Ἐὰν μία λύσης τοῦ συστήματος Σ_3 εἰναι ἡ $(x_1, \psi_1, \omega_1) \neq (0, 0, 0)$, τότε $\lambda \neq 0$ καὶ συνεπῶς ἐκ τῆς $\lambda \cdot \Delta = 0$ προκύπτει $\Delta = 0$.

"Ωστε, καὶ ἐδῶ ή άναγκαία καὶ ίκανή συνθήκη, ίνα τὸ σύστημα Σ_3 ἐκτὸς τῆς λύσεως $(0, 0, 0)$ ἔχῃ καὶ ἄλλας ἀπειρούς τὸ πλῆθος λύσεις, εἰναι ή όριζουσα τῶν συντελεστῶν τῶν ἀγνώστων νὰ εἰναι 0, (*)

$$" \text{Ητοι : } \begin{vmatrix} \alpha_1 & \beta_1 & \gamma_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 & \gamma_2 \\ \alpha_3 & \beta_3 & \gamma_3 \end{vmatrix} = 0$$

Παραδείγματα :

$$1) \text{ Διὰ ποίαν τιμὴν τοῦ } \lambda \in \mathbb{R} \text{ τὸ σύστημα } \begin{cases} 3x + 2\lambda\psi = 0 \\ 4x - (\lambda+1)\psi = 0 \end{cases} \text{ ἔχει καὶ ἄλλας λύσεις ἐκτὸς τῆς μηδενικῆς ;}$$

$$\text{Λύσις : } \text{Δέον νὰ ἔχωμεν } \begin{vmatrix} 3 & 2\lambda \\ 4 & -(\lambda+1) \end{vmatrix} = 0 \iff \lambda = -\frac{3}{11}$$

$$\text{Πράγματι διότι τότε } \begin{cases} 3x + 2\left(-\frac{3}{11}\right)\psi = 0 \\ 4x - \left(-\frac{3}{11} + 1\right)\psi = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} 33x - 6\psi = 0 \\ 44x - 8\psi = 0 \end{cases} \iff$$

$11x - 2\psi = 0 \}$ καὶ ἐπομένως τὸ σύνολον τῶν λύσεων τῆς πρώτης
 $11x - 2\psi = 0 \}$ ἔξισώσεως ισοῦται μὲ τὸ τοιοῦτον τῆς δευτέρας.

(*) καὶ αἱ ἐλάσσονες όριζουσαι αὐτῆς κατὰ τὰ στοιχεῖα μιᾶς γραμμῆς νὰ εἰναι $\neq 0$.

2) Νὰ εύρεθη ἡ ἀναγκαία καὶ ίκανή συνθήκη μεταξύ τῶν α, β, γ ἵνα
τὸ σύστημα $\sum :$

$$\begin{cases} \alpha + \psi + \omega = 0 \\ x + \beta\psi + \omega = 0 \\ x + \psi + \gamma\omega = 0 \end{cases}$$

ἔχῃ καὶ ἄλλας λύσεις ἐκτὸς

τῆς μηδενικῆς $(x, \psi, \omega) = (0, 0, 0)$

Ἄνσις: Δέον νὰ
ἔχωμεν:

$$\begin{vmatrix} \alpha & 1 & 1 \\ 1 & \beta & 1 \\ 1 & 1 & \gamma \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow \alpha + \beta + \gamma - \alpha\beta\gamma = 2, \text{ ἵτις}$$

εἶναι ἡ ζητουμένη συνθήκη.

3). Νὰ ἐπιλυθῇ τὸ σύστημα $6x - \psi - \omega = 0, 3x + 4\psi - 2\omega = 0$

Ἄνσις: Προφανής εἶναι ἡ λύση $(x, \psi, \omega) = (0, 0, 0)$ Διὰ τὴν εὕρεσιν τῶν ἄλλων λύσεων, ἐφ' ὅσον ᔁχωμεν:

$$\begin{vmatrix} 6 & -1 & -1 \\ 3 & 4 & -2 \end{vmatrix} = 24 + 3 \neq 0, \quad \begin{vmatrix} -1 & -1 \\ 4 & -2 \end{vmatrix} = 2 + 4 \neq 0, \quad \begin{vmatrix} -1 & 6 \\ -2 & 3 \end{vmatrix} = -3 + 12 \neq 0,$$

λαμβάνομεν $x = \lambda \begin{vmatrix} -1 & -1 \\ 4 & -2 \end{vmatrix} = 6\lambda, \quad \psi = \lambda \begin{vmatrix} -1 & 6 \\ -2 & 3 \end{vmatrix} = 9\lambda, \quad \omega = \lambda \begin{vmatrix} 6 & -1 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 27\lambda$

Οὗτοι αἱ λύσεις εἶναι:

$$(x, \psi, \omega) = (6\lambda, 9\lambda, 27\lambda), \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}$$

π.χ. διὰ $\lambda = -1$ λαμβάνομεν $(x, \psi, \omega) = (-6, -9, -27)$, ἵτις εἶναι λύσης τοῦ συστήματος.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

180) Διὰ ποίαν τιμὴν τοῦ $\lambda \in \mathbb{R}$ τὸ σύστημα

$$\begin{cases} 5x + (2\lambda - 1)\psi = 0, \\ -2x + (6\lambda + 1)\psi = 0 \end{cases}$$

ἔχει ἀπείρους τὸ πλήθος λύσεις;

181) Ἐὰν τὸ σύστημα $\alpha x + \beta\psi = 0, \beta^2x + \alpha^2\psi = 0$ ᔁχει καὶ ἄλλας λύσεις ἐκτὸς τῆς μηδενικῆς, ποίᾳ ἡ σχέσις τῶν α καὶ β .

182) Ποῖα ἐκ τῶν ἀκόλουθων συστημάτων ᔁχουν μίαν μόνον λύσιν καὶ ποῖα ἀπείρους τὸ πλήθος λύσεις;

$$\begin{array}{ll} 1) \quad x + \psi - \omega = 0 & 2) \quad -5x + 4\psi + 3\omega = 0 \\ 2x - \psi + 4\omega = 0 & x - 2\psi + \omega = 0 \\ x - 3\psi + \omega = 0 & -10x + 8\psi + 6\omega = 0 \end{array}$$

183) Νὰ ἐπιλυθοῦν τὰ συστήματα

(χρησιμοποιήσατε τὰς δύο ὁμογενεῖς

$$1) \quad \begin{cases} x + 2\psi - z = 0 \\ 2x - \psi + 3z = 0 \\ x + \psi + z = 2 \end{cases} \quad 2) \quad \begin{cases} \alpha x + \beta\psi + \gamma\omega = 0 \\ \alpha^2x + \beta^2\psi + \gamma^2\omega = 0 \\ x + \psi + \omega = \frac{1}{\alpha\beta\gamma} \end{cases}$$

ἴξισώσεις)

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΣ

184) Διὰ ποίας καὶ τὰς αὐτὰς τιμὰς τῶν x καὶ ψ αἱ δρίζουσαι

$$\begin{vmatrix} x & 1 & 1 \\ 4 & 2 & 5 \\ 4 + \psi & 3 & 5 \end{vmatrix} \quad \text{καὶ} \quad \begin{vmatrix} -1 & 1 & 2x \\ 2 & 4 & 1 \\ 3 - 1 & 1 - \psi \end{vmatrix} \quad \text{λαμβάνουν ἀμφότεραι τὴν τιμὴν } 0.$$

185) Νὰ ἐπιλυθοῦν καὶ διερευνηθοῦν τὰ ἀκόλουθα συστήματα:

$$\begin{array}{lll} 1) \quad x + (3\lambda - 1)\psi = 0 & 2) \quad \frac{1}{x} + \frac{1}{\psi} = \alpha & 3) \quad \alpha^2 + \alpha\lambda + \psi = 0 \\ x + 2\psi = \lambda - 4 & \frac{1}{x} - \frac{1}{\psi} = \beta & \beta^2 + \beta x + \psi = 0 \end{array}$$

186) Ν' ἀποδειχθοῦν αἱ κάτωθι ταυτότητες.

$$1) \begin{vmatrix} 1 & \lambda & -\lambda^3 \\ 1 & \mu & -\mu^3 \\ 1 & \nu & -\nu^3 \end{vmatrix} = (\lambda-\mu)(\nu-\mu)(\nu-\lambda)(\nu+\lambda+\mu) \quad 2) \begin{vmatrix} x & -x & 0 \\ 0 & x^2 & -1 \\ 1 & x & x+1 \end{vmatrix} = \frac{x^5-x}{x-1} \quad (x \neq 1)$$

$$3) \begin{vmatrix} \alpha\gamma & \alpha\beta & \beta\gamma \\ 1 & 1 & 1 \\ \beta & \gamma & \alpha \end{vmatrix} = (\alpha-\beta)(\beta-\gamma)(\gamma-\alpha) \quad 4) \begin{vmatrix} \beta^2+\gamma^2 & \alpha\beta & \alpha\gamma \\ \alpha\beta & \alpha^2+\gamma^2 & \beta\gamma \\ \alpha\gamma & \beta\gamma & \alpha^2+\beta^2 \end{vmatrix} = 4\alpha^2\beta^2\gamma^2$$

187) Νὰ ἐπιλυθοῦν διὰ τοῦ κανόνος τοῦ Cramer τὰ συστήματα :

$$\begin{array}{lll} 1) \alpha x + \beta y + z = 1 & 2) x + \psi + z = 0 & 3) x + \alpha\psi + z = 2\alpha \\ x + \alpha\beta y + z = \beta & \alpha x + \beta y + \gamma z = 0 & x + \psi + \alpha z = 0 \\ x + \beta\psi + \alpha z = 1 & \beta y x + \alpha\gamma\psi + \alpha\beta z = 1 & (\alpha + 1)x + \alpha\psi + z = \alpha \end{array}$$

188) Νὰ ἐπιλυθῇ καὶ διερευνηθῇ τὸ σύστημα, διὰ $\lambda \in \mathbb{R}$

$$1) x + \psi + \lambda\omega = 1 \quad x + \lambda\psi + \omega = \lambda \quad x - \psi + \omega = 3$$

189) Ποία ἡ σχέσις μεταξὺ τῶν συντελεστῶν α καὶ β , ἵνα αἱ ἔξισώσεις $\beta x + 2\alpha\psi = \alpha\beta$, $\alpha x - \beta\psi = \alpha\beta$, $x + \psi = 2\alpha - \beta$ ἐπαληθεύωνται μὲ τὰς αὐτὰς τιμὰς τῶν $x, \psi \in \mathbb{R}$;

190) Νὰ προσδιορισθῇ ἡ τιμὴ τοῦ $\mu \in \mathbb{R}$, ἵνα τὸ σύστημα $x + (\mu + 1)\psi = 10$, $2x - (4\mu + 1)\psi = 5$, $x - \psi = 6$ ἔχει μίαν μόνον λύσιν ἐν \mathbb{R} .

191) Νὰ εύρεθῇ ἡ ἀναγκαία καὶ ίκανὴ συνθήκη μεταξύ τῶν

$$\alpha, \beta, \gamma \quad \text{ἵνα τὸ σύστημα} \quad \begin{vmatrix} \alpha x + \beta\psi + \gamma\omega = 0 \\ \beta x + \gamma\psi + \alpha\omega = 0 \\ x + \psi + \omega = 0 \end{vmatrix}$$

ἔχῃ καὶ ἄλλας λύσεις ἑκτὸς τῆς προφανοῦς

$$192) \quad \begin{array}{l} \text{Νὰ εύρεθῇ ἡ ἀναγκαία καὶ ίκανὴ} \\ \text{συνθήκη μεταξύ τῶν } \alpha, \beta, \gamma \text{ ἵνα τὸ σύστημα} \\ \text{ἔχῃ καὶ ἄλλας λύσεις ἑκτὸς τῆς μηδενικῆς} \end{array} \quad \begin{vmatrix} \alpha^2 x + \beta^2 \psi + \gamma^2 \omega = 0 \\ \alpha x + \beta\psi + \gamma\omega = 0 \\ x + \psi + \omega = 0 \end{vmatrix}$$

$$193) \quad \begin{array}{l} \text{Νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι τὸ σύστημα εἶναι} \\ \text{συμβιβαστὸν διὰ πάσας τὰς τιμὰς τοῦ } \alpha \in \mathbb{R} \\ \text{ἕκτος } \alpha = 1 \text{ καὶ } \alpha = -1 \end{array} \quad \begin{vmatrix} \alpha x + \psi + \omega = \alpha \\ \alpha x + \alpha\psi + \omega = 1 \\ x + \alpha\psi + \alpha\omega = 1 \\ x + \psi + \alpha\omega = \alpha \end{vmatrix}$$

$$\begin{array}{l} 194) \quad \text{Νὰ ἐπιλυθῇ καὶ διερευνηθῇ τὸ σύστημα} \\ (\text{Αἱ δύο πρώται } \epsilon\text{-ξεισώσεις ἀποτελοῦν δόμογενὲς} \\ \text{σύστημα δύο } \epsilon\text{-ξεισώσεων μὲ τρεῖς ἀγνώστους}) \end{array} \quad \begin{array}{l} \frac{x}{\beta + \gamma} + \frac{\psi}{\gamma - \alpha} - \frac{z}{\alpha - \beta} = 0 \\ \frac{x}{\beta - \gamma} - \frac{\psi}{\gamma - \alpha} + \frac{z}{\alpha + \beta} = 0 \\ \frac{x}{\beta + \gamma} + \frac{\psi}{\gamma - \alpha} + \frac{z}{\alpha + \beta} = 2\alpha \end{array}$$

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VIII

ΑΣΥΜΜΕΤΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ — ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

(Συμπλήρωσις τῶν διδαχθέντων εἰς τὴν Γ' τάξιν)

A'. ΑΣΥΜΜΕΤΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

62. Εἰς τὴν Γ' τάξιν εἴδομεν, ὅτι κατὰ τὴν σπουδὴν τῶν ρητῶν σχετικῶν ἀριθμῶν διεπιστώθη ἡ ἀδυναμία ρητῆς λύσεως τῆς ἔξισώσεως $x^2 - 2 = 0$, ἢ τῆς $x^2 - 3 = 0$, ἢ ἐν γένει τῆς $x^2 = \theta$, ὅπου $\theta > 0$ καὶ μὴ τετράγωνος ἀριθμὸς, διότι δὲν ὑπάρχει ρητός, τοῦ ὅποιού τὸ τετράγωνον νὰ είναι ἀντιστοίχως 2, ἢ 3, ἢ θ. Ὡς ἐκ τούτου, προέκυψεν ἡ ἀνάγκη ἐπεκτάσεως τοῦ συνόλου τῶν ρητῶν ἀριθμῶν μὲ τὴν δημιουργίαν νέων ἀριθμῶν, δνομασθέντων ἄρρητων ἢ ἀσυμμέτρων καὶ οἱ ὅποιοι κατεσκεύασθησαν κατὰ τρόπον θεραπεύοντα τὰς ἀδυναμίας τῶν ρητῶν ἀριθμῶν. Δηλαδὴ νὰ καθίσταται δυνατὴ ἡ λύσις τῶν ἄνω ἔξισώσεων.

Ἡ θεμελίωσις τοῦ νέου συστήματος τῶν ἄρρητων ἀριθμῶν ἔγινε κατὰ τρόπον πληροῦντα τὰς διδακτικὰς ἀνάγκας. Οὕτως, ἐγνωρίσαμεν τὰς ἀκολούθους ἐννοίας :

‘Ορισμός. Ἐκ τοῦ ἀριθμοῦ $\alpha \in N_0$, καὶ τῆς ἀπεράντου (ἄνευ τέλους) ἀκολουθίας ψηφίων (μονοψηφίων ἀκεραίων) $\psi_1, \psi_2, \dots, \psi_v, \dots$ σχηματίζομεν τὴν ἀπέραντον ἀκολουθίαν ἀριθμῶν.

(1) $\alpha \alpha, \psi_1 \alpha, \psi_1 \psi_2 \alpha, \psi_1 \psi_2 \psi_3 \dots \alpha, \psi_1 \psi_2 \dots \psi_v \dots$
τὴν ὅποιαν συμβολίζομεν $\alpha, \psi_1 \psi_2 \psi_3 \dots \psi_v \dots$

Τὸ σύμβολον τοῦτο, τὸ ὅποιον είναι μία ἀπειροψήφιος δεκαδικὴ παράστασις, δινομάζομεν ἄρρητον ἢ ἀσύμμετρον ἀριθμόν, ἂν δὲν παριστάνῃ δεκαδικὸν περιοδικὸν ἀριθμὸν (δηλ. ρητόν), ἢ τοι ἂν, μετὰ τὴν ὑποδιαστολὴν εἴτε μετὰ ἀπό ἐν ψ καὶ τέραν, δὲν ἐμφανίζεται «τμῆμα ψηφίων» ἐπαναλαμβανόμενον διαρκῶς χωρὶς τὴν ἐμφάνισιν ἄλλων ψηφίων.

Πᾶς ὄρος τῆς ἀκολουθίας (1) είναι ἔνας ρητὸς προσεγγιστικὸς ἀντιπρόσωπος τοῦ ἄρρητου ἀριθμοῦ $\alpha, \psi_1 \psi_2 \psi_3 \dots \psi_v \dots$

Σχετικὸς ἄρρητος ἀριθμός καλεῖται πᾶς ἄρρητος φέρων πρὸ αὐτοῦ τὸ (+) ἢ τὸ (-).

π.χ. Οι όροι τῶν ἀκολουθῶν :

$$(\alpha) \quad 1 \quad 1,4 \quad 1,41 \quad 1,414 \quad 1,4142\dots$$

$$(\beta) \quad 2 \quad 1,5 \quad 1,42 \quad 1,415 \quad 1,4143\dots$$

είναι ρητοὶ προσεγγιστικοὶ ἀντιπρόσωποι τοῦ ἀρρήτου $1,4142\dots$ κατ' Ἑλλειψιν ἢ καθ' ὑπεροχὴν ἀντιστοίχως καὶ ἐκφράζουν τιμὰς τῆς $\sqrt{2}$ κατὰ προσέγγισιν $0,1\ 0,01\ 0,001\ 0,0001\dots$

Οὕτω ἔχομεν $1 < 1,4 < 1,41 < 1,414 < \dots < \sqrt{2} < \dots < 1,415 < 1,42 < 1,5 < 2$, δόποτε λέγομεν ὅτι αἱ ἀκολουθίαι (α) καὶ (β) διαχωρίζονται ἀπὸ τὸν ἀσύμμετρον ἀριθμὸν $\sqrt{2}$, ὁ ὄποιος διὰ τὸν λόγον αὐτὸν ἀντιπροσωπεύει τὸν ἀσύμμετρον $1,4142\dots$, τὸν ὄποιον καθορίζουν αἱ ἀκολουθίαι. Μὲ ἀνάλογον τρόπον δυνάμεθα νὰ κατασκευάσωμεν καὶ ἄλλους ἀρρήτους ἀριθμοὺς τῆς μορφῆς $\sqrt{\theta}$, ὅπου $\theta > 0$ καὶ μὴ τετράγωνος.

Αἱ πράξεις ἐπὶ τῶν ἀσυμμέτρων ἀριθμῶν, πρόσθεσις, ἀφαίρεσις πολ/σμός, διαίρεσις καὶ αἱ ἔννοιαι τῆς ισότητος καὶ ἀνισότητος δρίζονται ώς καὶ ἐπὶ τῶν ρητῶν (συμμέτρων), καὶ ἔχουν τὰς αὐτὰς θεμελιώδεις ἰδιότητας, τὰς ὄποιας ἔχουν αἱ πράξεις ἐπὶ τῶν ρητῶν. Ὁμοίως δρίζεται ἡ ἔννοια τῆς δυνάμεως ἀρρήτου ἀριθμοῦ.

Αἱ πράξεις αὐταὶ ἐπὶ τῶν ἀσυμμέτρων ἀριθμῶν εἰς τὴν στοιχειώδη "Ἀλγεβραὶ γίνονται προσεγγιστικῶς. Θεωροῦμεν ἀντὶ τῶν ἀσυμμέτρων ἀριθμῶν, προσεγγιστικούς ἀντιπροσώπους αὐτῶν (ρητοὺς συνεπῶς) μὲ δόποιανδήποτε προσέγγισιν θέλωμεν. Οὕτως ὁ ὑπολογισμὸς ἀριθμητικῶν παραστάσεων μὲ ἀσυμμέτρους ἀριθμοὺς γίνεται μὲ πᾶσαν ἐπιθυμητὴν προσέγγισιν, ἡ ὄποια αὐξάνει μὲ τὸ πλῆθος τῶν δεκαδικῶν ψηφίων τῶν ρητῶν ἀντιπροσώπων τῶν. Π.χ. διὰ νὰ δρίσωμεν τὸ ἄθροισμα $\sqrt{3} + \sqrt{2}$ καὶ ὑπολογίσωμεν αὐτό, λαμβάνομεν μὲ προσέγγισιν $0,01$ τοὺς ρητοὺς ἀντιπροσώπους καὶ σχηματίζομεν τὸ ἄθροισμα $1,73 + 1,41 = 3,14$. ὁ $3,14$ είναι ὁ προσεγγιστικὸς ρητὸς ἀντιπρόσωπος τοῦ ἀσυμμέτρου ἀριθμοῦ $\sqrt{3} + \sqrt{2}$.

Τὸ ἄθροισμα, γινόμενον, διαφορὰ καὶ πηλίκον ἀρρήτων ἀριθμῶν δυνατὸν νὰ είναι ρητὸς ἀριθμός π.χ. $\sqrt{3} \cdot \sqrt{12} = \sqrt{36} = 6$. Ὁμοίως $\sqrt{18} : \sqrt{2} = \sqrt{18/2} = \sqrt{9} = 3$.

'Ἐπὶ τῇ βάσει τῶν λεχθέντων, σχετικῶς μὲ τὰς πράξεις ἐπὶ τῶν ἀσυμμέτρων, συνάγεται τὸ συμπτέρασμα ὅτι δυνάμεθα νὰ ἐκτελῶμεν πράξεις ἐφαρμόζοντες τὰς ἰδιότητας αὐτῶν, ἀδιαφοροῦντες διὰ τὸ εἶδος τῶν ἀριθμῶν, εἴτε πρόκειται περὶ ρητῶν, εἴτε πρόκειται περὶ ἀρρήτων.

63. "Ηδη θὰ ἔετάσωμεν μερικὰς χρησίμους προτάσεις :

1. 'Εὰν a ἀρρητὸς καὶ p_1, p_2 ρητοὶ τότε, ἐὰν είναι $a \cdot p_1 = p_2$, θὰ είναι $p_1 = p_2 = 0$.

'Απόδειξις. 'Εὰν ὑποθέσωμεν $p_1 \neq 0$, τότε $a \cdot p_1 = p_2 \Leftrightarrow a = \frac{p_2}{p_1}$, ὅπερ ἀτοπον, διότι ὁ ἀριθμὸς $\frac{p_2}{p_1}$ είναι ρητός. "Αρα ὁ p_1 δὲν δύναται νὰ είναι διάφορος τοῦ μηδενὸς καὶ συνεπῶς $p_1 = 0$, ἀλλὰ τότε καὶ $p_2 = a \cdot 0 = 0$

2. Έὰν α ἄρρητος καὶ ρ ρητός, τότε ὁ ἀριθμὸς $\alpha + \rho$ καὶ ὁ ἀριθμὸς $\alpha \cdot \rho$ ($\rho \neq 0$) εἶναι ἄρρητοι.

*Ἀπόδειξις: 'Εὰν ὑποθέσωμεν ὅτι εἶναι ρητοί τότε

$$\alpha + \rho = \rho' = \text{ρητὸς} \Leftrightarrow \alpha = \rho' - \rho = \text{ρητός}, \text{ ὅπερ ἀτοπον}$$

$$\alpha \rho = \rho'' = \text{ρητὸς} \Leftrightarrow \alpha = \frac{\rho''}{\rho} \text{ ρητὸς } (\rho \neq 0), \text{ ὅπερ ἀτοπον.}$$

3. Έὰν $\theta \in \mathbb{N}$ καὶ δὲν εἶναι δύναμις μὲν ἐκθέτην διαιρετὸν διὰ v , τότε ὁ ἀριθμὸς $\sqrt[\theta]{v}$ εἶναι ἄρρητος.

*Ἀπόδειξις: 'Υπενθυμίζομεν ὅτι τὸ σύμβολον $\sqrt[\theta]{v}$ τῆς νιοστῆς ρίζης τοῦ ἀριθμοῦ θ ἔγνωρίσαμεν εἰς τὴν Γ' τάξιν καὶ ὅτι: $x = \sqrt[\theta]{v} \Leftrightarrow x^\theta = v$ (διὰ πᾶν $\theta > 0$).

'Εὰν ὑποθέσωμεν, ὅτι $\sqrt[\theta]{v} = k$ ($k \in \mathbb{Z}^+$) καὶ ὅτι ὁ $k = k_1^{\lambda_1} \cdot k_2^{\lambda_2} \cdots k_\mu^{\lambda_\mu}$, ὅπου $k_{1,2}, \dots, \mu$ καὶ $\lambda_{1,2}, \dots, \mu$ φυσικοί, τότε: $\theta = k^\theta = k_1^{\nu \lambda_1} \cdot k_2^{\nu \lambda_2} \cdots k_\mu^{\nu \lambda_\mu}$, ὅπερ ἀτοπον.

'Εὰν ὑποθέσωμεν, ὅτι $\sqrt[\theta]{v} = \frac{k}{\lambda}$, ὅπου $k, \lambda \in \mathbb{Z}^+$ πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους, τότε $\theta = \left(\frac{k}{\lambda}\right)^\theta = \frac{k^\theta}{\lambda^\theta}$, ὅπερ ἀτοπον, διότι οἱ ἀριθμοὶ k^θ , λ^θ εἶναι πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους. "Ωστε ὁ $\sqrt[\theta]{v}$ εἶναι ἄρρητος.

4. Πᾶσα ἀκεραία δύναμις τῆς παραστάσεως $\alpha \pm \beta\sqrt{\gamma}$, ὅπου α, β, γ ρητοὶ καὶ $\sqrt{\gamma}$ ἄρρητος εἶναι παράστασις τῆς μορφῆς $\kappa \pm \lambda\sqrt{\gamma}$, ὅπου κ, λ ρητοί.

*Ἀπόδειξις: α) $(\alpha \pm \beta\sqrt{\gamma})^2 = \alpha^2 + \beta^2\gamma \pm 2\alpha\beta\sqrt{\gamma} = \kappa_1 \pm \lambda_1\sqrt{\gamma}$
ὅπου $\alpha^2 + \beta^2\gamma = \kappa_1$ καὶ $2\alpha\beta = \lambda_1$

$$\begin{aligned} \text{β)} \quad (\alpha \pm \beta\sqrt{\gamma})^3 &= \alpha^3 \pm 3\alpha^2\beta\sqrt{\gamma} + 3\alpha\beta^2\gamma \pm \beta^3\gamma\sqrt{\gamma} = \\ &= (\alpha^3 + 3\alpha^2\beta) \pm (3\alpha^2\beta + \beta^3\gamma)\sqrt{\gamma} = \kappa_2 \pm \lambda_2\sqrt{\gamma} \end{aligned}$$

ὅπου $\alpha^3 + 3\alpha^2\beta = \kappa_2$ καὶ $3\alpha^2\beta + \beta^3\gamma = \lambda_2$

5. Έὰν $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ ρητοὶ καὶ $\sqrt{\beta}, \sqrt{\delta}$ ἄρρητοι, τότε διὰ νὰ εἶναι $\alpha + \sqrt{\beta} = \gamma + \sqrt{\delta}$ πρέπει καὶ ἀρκεῖ νὰ εἶναι $\alpha = \gamma$ καὶ $\beta = \delta$.

*Ἀπόδειξις: 'Εὰν $\alpha = \gamma$, τότε $\sqrt{\beta} = \sqrt{\delta}$, ἐξ οὗ $\beta = \delta$ 'Εε ἀλλου ἔχομεν: $\alpha + \sqrt{\beta} = \gamma + \sqrt{\delta} \Leftrightarrow \alpha - \gamma + \sqrt{\beta} = \sqrt{\delta}$, ἐξ ἣς δι' ὑψώσεως εἰς τὸ τετράγωνον ἔχομεν $(\alpha - \gamma)^2 + \beta + 2(\alpha - \gamma)\sqrt{\beta} = \delta \Rightarrow 2(\alpha - \gamma)\sqrt{\beta} = \delta - \beta - (\alpha - \gamma)^2$. 'Εὰν $\alpha \neq \gamma$ τότε $\sqrt{\beta} = \frac{\delta - \beta - (\alpha - \gamma)^2}{2(\alpha - \gamma)} = \text{ρητός}$, ὅπερ ἀτοπον καθ' ὅσον $\sqrt{\beta}$ ἄρρητος.

Κατ' ἀνάγκην λοιπὸν $\alpha = \gamma$ καὶ συνεπῶς καὶ $\beta = \delta$. Τοῦτο δὲ εἶναι ἀρκετόν, ὡς εἶναι προφανές.

Παράδειγμα: Νὰ εὐρεθοῦν αἱ τιμαὶ τῶν συμμέτρων λ καὶ μ , ἵνα ἡ παράστασις $(\lambda + \mu)\sqrt{5} + 2\lambda - \mu$ ισοῦται πρὸς $\sqrt{5} + 1$.

Λύσις: "Έχομεν $(\lambda + \mu)\sqrt{5} + 2\lambda - \mu = \sqrt{5} + 1 \Leftrightarrow (\lambda + \mu - 1)\sqrt{5} = 1 + \mu - 2\lambda$, ὅπερ κατὰ τὴν πρότασιν 1, θὰ πρέπει $\lambda + \mu - 1 = 0$ καὶ $1 + \mu - 2\lambda = 0$, ἐξ οὗ ἔχομεν τὴν λύσιν $(\lambda, \mu) = \left(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}\right)$.

Ιστορική σημείωσις :

Τὴν ὑπαρξίν ἀσυμμέτρων ἀριθμῶν διεπίστωσαν πρῶτοι οἱ Πυθαγόρειοι, ἀκολούθως ὁ Εὔδοιος συνέβαλεν πραγματικῶς εἰς τὴν ἔννοιαν τῶν ἀσυμμέτρων, νεώτεροι δὲ θεωρητικοί, ως οἱ Weirstrass (1815–1897), Meray (1835 – 1911) Cantor (1843 – 1918), Dedekind (1831 – 1916), εἰσεχώρησαν πλέον βαθύτερον ἐπὶ τῆς ἔννοιας τῶν ἀσυμμέτρων διὰ τῶν περιφήμων «τομῶν Dedekind».

Β. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

64. Ὡς γνωστόν, τέσσαρα είναι τὰ κύρια στάδια τῆς ἔξελίζεως τοῦ συστήματος τῶν σχετικῶν ἀριθμῶν. Τὸ πρῶτον είναι ἡ ἔννοια τῶν ἀπολύτων ἀκεραίων ἢ φυσικῶν ἀριθμῶν. Ἡ κοιλούθησεν ἡ ἀπέκτασις εἰς τὸ σύστημα τῶν σχετικῶν ἀκεραίων. Ἐν συνεχείᾳ ἡ εἰσαγωγὴ τῶν ρητῶν κλασμάτων ἐδημιούργησε τὸ σύστημα τῶν ρητῶν ἢ συμμέτρων ἀριθμῶν. Τέλος, ἡ ἔννοια τοῦ ἀρρήτου ἢ ἀσυμμέτρου ἀριθμοῦ ὡδήγησεν εἰς τὴν ἰδέαν ἀπεκτάσεως τοῦ συστήματος τῶν ρητῶν εἰς ἓν σύστημα, τὸ δποῖον νὰ περιέχῃ τὸ σύνολον τῶν ρητῶν καὶ τὸ σύνολον τῶν ἀρρήτων ἀριθμῶν. Τὸ σύστημα τοῦτο καλεῖται σύστημα τῶν πραγματικῶν ἀριθμῶν. Βραδύτερον θὰ μάθωμεν καὶ μίαν ἄλλην ἀπέκτασιν πρὸς ἓν εὐρύτερον σύστημα ἀριθμῶν.

“Ωστε, τὸ σύνολον τῶν ρητῶν καὶ τῶν ἀρρήτων ἀριθμῶν, τῆς Ἀλγέβρας, καλεῖται σύνολον τῶν πραγματικῶν ἀριθμῶν (Real) καὶ παρίσταται διὰ τοῦ R

Ἐπειδὴ οὐδεὶς ρητὸς ἀριθμὸς είναι ἄρρητος καὶ ἀντιστρόφως, ἐπειταὶ ὅτι τὰ δύο σύνολα τῆς Ἀλγέβρας, Q τὸ σύνολον τῶν σχετικῶν ρητῶν καὶ A τὸ σύνολον τῶν σχετικῶν ἀρρήτων, είναι ξένα πρὸς ἄλληλα καὶ διαμερίζουν τὸ σύνολον R.

Οὕτως ἔχομεν : $Q \cap A = \emptyset$, $Q \cup A = R$, $Q \subset R$, $A \subset R$.

Ἐὰν δὲ N₀ είναι τὸ σύνολον τῶν φυσικῶν καὶ τοῦ μηδενὸς καὶ Z είναι τὸ σύνολον τῶν σχετικῶν ἀκεραίων, τότε :

$$N_0 \subset Z \subset Q \subset R, \quad N_0 \cap A = \emptyset, \quad Z \cap A = \emptyset.$$

Πᾶς πραγματικὸς ἀριθμός, ἐφ' ὅσον είναι ἡ ρητός ἡ ἄρρητος ἀριθμός, συμβολίζεται διὰ τοῦ α, ψ₁ψ₂ψ₃...ψ_v..., δ ὅποιος παριστᾶ τὴν ἀκολουθίαν α, α₁, ψ₁ α, ψ₁ψ₂...α, ψ₁ψ₂...ψ_v..., δπου αεN₀ καὶ ψ₁, ψ₂, ψ₃...ψ_v... ἀπέραντος ἀκολουθίας μονοψηφίων ἀκεραίων. Τὸ δεκαδικὸν ἀνάπτυγμα τοῦ πραγματικοῦ ἀριθμοῦ είναι ἡ περιοδικόν, δπότε δ ἀριθμὸς είναι ρητός, ἡ μὴ περιοδικὸν δπότε δ ἀριθμὸς είναι ἄρρητος. ‘Υπενθυμίζομεν ὅτι πάντες οἱ ρητοὶ ἀριθμοὶ συμβολίζονται δι' ἀπειροψηφίου περιοδικοῦ δεκαδικοῦ ἀριθμοῦ.

65. Η ΙΣΟΤΗΣ ΕΙΣ ΤΟ R.

Δύο πραγματικοὶ δόμστημοι ἀριθμοὶ α, x₁ x₂ x₃...x_v... καὶ β, ψ₁ψ₂ψ₃...ψ_v... δρίζονται ἵστοι, ἐὰν καὶ μόνον ἔάν, είναι α = β, x₁ = ψ₁, x₂ = ψ₂,..., x_v = ψ_v,... Εύκόλως δὲ ἀποδεικνύεται ἡ ισχὺς τῶν ιδιοτήτων τῆς ισότητος, ἡ δποία συνιστᾶ σχέσιν ισοδυναμίας.

66. ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΕΙΣ ΤΟ R.


Είδομεν ότι αἱ πράξεις όριζονται ώς καὶ ἐπὶ τῶν ρητῶν καὶ αἱ ιδιότητες παραμένουν ἀναλλοίωτοι, γίνονται δὲ εἰς τὴν στοιχειώδη Ἀλγεβραν προσεγγιστικῶς.

Ἐις τοὺς ἀνωτέρω ἴσους πραγματικοὺς ἀριθμούς, (§ 65), ἂν συμβῇ νὰ εἴναι $\alpha = \beta$, $x_1 = \psi_1$, $x_2 = \psi_2$, ... $x_{v-1} = \psi_{v-1}$ καὶ $x_v > \psi_v$, τότε οἱ ἀριθμοὶ εἴναι ἀνισοί μὲν μεγαλύτερον τὸν πρῶτον.

Ἡ σύγκρισις μεταξὺ πραγματικῶν ἀριθμῶν γίνεται εἰς τὰς ἑφαρμογὰς μὲ βάσιν τὴν προσεγγιστικὴν ἔκπροσώπησιν τῶν ἀσυμμέτρων. Οὔτω, $\forall \alpha, \beta \in R$ μία μόνον πληροῦται ἐκ τῶν σχέσεων : $\alpha > \beta$, $\alpha = \beta$, $\alpha < \beta$

*Ἐπίσης ἂν $\alpha, \beta, \gamma \in R$ καὶ $\alpha \leq \beta$ καὶ $\beta < \gamma$, τότε θὰ εἴναι καὶ $\alpha < \gamma$.

67. Η ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΕΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ R.

‘Ως γνωστόν, ἡ εὐθεῖα $x'x$,  τὸ σημεῖον O καὶ τὸ μοναδιαῖον $\vec{\theta}$ διάνυσμα $\overrightarrow{OA} = \vec{\theta}$, ἀποτελοῦν ἔναν ἄξονα, τὸν ἄξονα ($x'0x, \vec{\theta}$). ‘Αν θεωρήσωμεν σημεῖον M ἐπὶ τοῦ ἄξονος τούτου καὶ λάβωμεν τὸν λόγον $\frac{\overrightarrow{OM}}{\overrightarrow{OA}}$, τότε ὁ λόγος οὗτος ίσοῦται πρὸς τὸν λόγον τῶν μέτρων τῶν διανυσμάτων, ὁ ὅποιος εἴναι ἔνας πραγματικὸς ἀριθμὸς ρητὸς ἡ ἀρρητος καὶ μόνον ἔνας. Οὔτως εἰς κάθε σημεῖον M τοῦ ἄξονος ἀντιστοιχεῖ εἰς καὶ μόνον πραγματικὸς ἀριθμός, ὃστις εἴναι ὁ λόγος τῶν μέτρων τῶν διανυσμάτων \overrightarrow{OM} καὶ \overrightarrow{OA} .

‘Αντιστρόφως, εἰς πάντα πραγματικὸν ἀριθμὸν ἀντιστοιχεῖ ἔν καὶ μόνον σημεῖον M τοῦ ἄξονος, τὸ ὅποιον εἴναι πέρας τοῦ διανύσματος \overrightarrow{OM} καὶ τοῦ ὅποιού ὁ λόγος πρὸς τὸ διάνυσμα \overrightarrow{OA} ίσοῦται πρὸς τὸν ἀριθμὸν αὐτόν. *Ἐπομένως, μεταξὺ τοῦ συνόλου R καὶ τοῦ συνόλου τῶν σημείων τοῦ ἄξονος $x'0x$, ὑπάρχει ἀντιστοιχία ἀμφιμονοσήμαντος, διὰ τοῦτο δ ἄξων $x'0x$ καλεῖται ἄξων τῶν πραγματικῶν καὶ εἴναι ἡ γεωμετρικὴ εἰκὼν τοῦ συνόλου R.

68. ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΤΙΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ

‘Ως γνωστόν, ἡ ἔνωσις τοῦ συνόλου τῶν θετικῶν ἀριθμῶν τῆς ἀριθμητικῆς μετὰ τοῦ μηδενὸς καὶ τοῦ συνόλου τῶν ἀντιθέτων τῶν ἀποτελεῖ τὸ σύνολον τῶν σχετικῶν ἀριθμῶν (πραγματικῶν).

‘Ορισμός. Είναι γνωστὸν ἐκ προηγουμένης τάξεως, ὅτι ἀπόλυτος τιμὴ (ἢ μέτρον) ἐνὸς πραγματικοῦ ἀριθμοῦ καλεῖται ὁ ἀριθμὸς τῆς Ἀριθμητικῆς, ὁ προκύπτων ἀπὸ αὐτού, ὅταν παραλειφθῇ τὸ πρόσημόν του.

Οὔτως ἡ ἀπόλυτος τιμὴ τοῦ + 4 εἴναι ὁ 4, ἢ δὲ ἀπόλυτος τιμὴ τοῦ -4

είναι πάλιν ό 4, συμβολίζεται δὲ ώς έξης: $|+4|=4$ καὶ $| -4| = 4$ καὶ διαβάζεται «άπόλυτος τιμή του +4 ή του -4».*

*Επειδή πάντες οἱ θετικοὶ ἀριθμοὶ ταυτίζονται μὲ τοὺς ἀριθμοὺς τῆς ἀριθμητικῆς κατὰ σύμβασιν, ἔπειται ὅτι ἔχομεν $4=+4$ καὶ συνεπῶς $|+4|=+4$ καὶ $| -4| = +4 = -(-4)$.

*Ωστε δυνάμεθα νὰ εἰπωμεν αὐστηρότερον ὅτι: *Απόλυτος τιμὴ ἐνὸς πραγματικοῦ ἀριθμοῦ (ἢ μιᾶς πραγματικῆς παραστάσεως) α καλεῖται αὐτὸς οὗτος ὁ ἀριθμὸς α , ἐὰν είναι θετικὸς ἢ μηδὲν, ὁ ἀντίθετός του δέ — α , ἂν ὁ ἀριθμὸς είναι ἀρνητικός.

Συμφώνως πρὸς τὸν
ἀνωτέρω δρισμὸν θὰ ἔχωμεν

$$\begin{aligned} \forall \alpha \in \mathbb{R}_0^+ &\Rightarrow |\alpha| = \alpha \\ . \forall \alpha \in \mathbb{R}^- &\Rightarrow |\alpha| = -\alpha (-\alpha > 0) \end{aligned}$$

Κατὰ τὰ ἀνωτέρω ἡ παράστασις $|\alpha|$ οὐδέποτε γίνεται ἀρνητικὴ καὶ συνεπῶς είναι ἐνας μὴ ἀρνητικὸς ἀριθμὸς.

69. ΒΑΣΙΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΤΩΝ ΤΙΜΩΝ.

1. *Ἐὰν $\alpha \in \mathbb{R}$, τότε $|\alpha| = |-\alpha|$.

*Απόδειξις: *Ἐὰν $\alpha \in \mathbb{R}^+$ $\Rightarrow -\alpha \in \mathbb{R}^-$ καὶ συνεπῶς θὰ ἔχωμεν $|\alpha| = \alpha$ καὶ $|-\alpha| = -(-\alpha) = \alpha$. *Θεν $|\alpha| = |-\alpha|$

*Ἐὰν $\alpha \in \mathbb{R}^-$ $\Rightarrow -\alpha \in \mathbb{R}^+$ καὶ συνεπῶς θὰ ἔχωμεν $|\alpha| = -\alpha$ καὶ $|-\alpha| = -\alpha$. *Θεν $|\alpha| = |-\alpha|$

*Ἐὰν $\alpha = 0$, τότε $-\alpha = 0$ καὶ προφανῶς $|\alpha| = |-\alpha|$

$$\text{“Ωστε : } \forall \alpha \in \mathbb{R} \Rightarrow |\alpha| = |-\alpha|$$

2. *Ἐὰν $\alpha \in \mathbb{R}$, τότε είναι $-|\alpha| \leq \alpha \leq |\alpha|$.

*Απόδειξις: *Ἐὰν $\alpha \in \mathbb{R}_0^+ \Rightarrow |\alpha| = \alpha$ καὶ ἐπειδὴ $|\alpha| \geq -|\alpha|$, ἔπειται ὅτι $-|\alpha| \leq \alpha = |\alpha|$ (1). *Ἐὰν δέ $\alpha \in \mathbb{R}^- \Rightarrow |\alpha| = -\alpha$ ἢ $-|\alpha| = \alpha$, ὅπότε $-|\alpha| = \alpha \leq |\alpha|$ (2). Αἱ σχέσεις (1) καὶ (2) δίδουν $-|\alpha| \leq \alpha \leq |\alpha|$

$$\text{“Ωστε : } \forall \alpha \in \mathbb{R} \Rightarrow -|\alpha| \leq \alpha \leq |\alpha|$$

3. *Ἐὰν $\alpha \in \mathbb{R}$ καὶ $v \in \mathbb{N}$, τότε είναι $|\alpha|^{2v} = \alpha^{2v}$

*Απόδειξις: *Ἐὰν $\alpha \in \mathbb{R}_0^+ \Rightarrow |\alpha| = \alpha$ καὶ ἄρα $|\alpha|^{2v} = \alpha^{2v}$. *Ἐὰν $\alpha \in \mathbb{R}^- \Rightarrow |\alpha| = -\alpha$ καὶ ἄρα $|\alpha|^{2v} = (-\alpha)^{2v} = \alpha^{2v}$

$$\text{“Ωστε : } \forall \alpha \in \mathbb{R}, v \in \mathbb{N} \Rightarrow |\alpha|^{2v} = \alpha^{2v}$$

4. *Ἐὰν $\alpha \in \mathbb{R}_0^+$ καὶ $v \in \mathbb{N}$, τότε είναι $|\alpha|^{2v+1} = \alpha^{2v+1}$

*Απόδειξις: *Ἐὰν $\alpha \in \mathbb{R}_0^+ \Rightarrow |\alpha| = \alpha$ καὶ ἄρα $|\alpha|^{2v+1} = \alpha^{2v+1}$

$$\text{“Ωστε : } \forall \alpha \in \mathbb{R}_0^+, v \in \mathbb{N} \Rightarrow |\alpha|^{2v+1} = \alpha^{2v+1}$$

(*). Τὸ σύμβολον $|$ καὶ ἡ ὀνομασία αὐτοῦ, δρείλονται εἰς τὸν Γερμανὸν μαθηματικὸν Weirstrass (1815 – 1897).

5. Έάν $\alpha, x \in \mathbb{R}$ και $|x| \leq \alpha$, τότε $-\alpha \leq x \leq \alpha$ και άντιστρόφως.

*Απόδειξις: Έάν $x \in \mathbb{R}_0^+ \Rightarrow |x| = x$ και έπειδή $|x| \leq \alpha$, έπειται $x \leq \alpha$ και $\alpha - \alpha \leq x \leq \alpha$, διότι $|x| \leq \alpha \Rightarrow \alpha \geq 0$. Έάν δέ $x \in \mathbb{R}^- \Rightarrow |x| = -x$ και έπειδή $|x| \leq \alpha$, έπειται $-x \leq \alpha \Rightarrow x \geq -\alpha$ και $\alpha - \alpha \leq x \leq \alpha$, διότι $\alpha \geq 0$.

*Άντιστρόφως: Έάν $x \in \mathbb{R}_0^+ \Rightarrow |x| = x$ και έπειδή $-\alpha \leq x \leq \alpha$, έπειται $|x| \leq \alpha$. Έάν $x \in \mathbb{R}^- \Rightarrow |x| = -x \Rightarrow -|x| = x$ και έπειδή $-\alpha \leq x \leq \alpha$, έπειται $-\alpha \leq -|x| \Rightarrow \alpha \geq |x| \Rightarrow |x| \leq \alpha$

"Ωστε : $\forall \alpha, x \in \mathbb{R} : |x| \leq \alpha \Leftrightarrow -\alpha \leq x \leq \alpha$

Σημ. Έκτος τῶν βασικῶν τούτων ίδιοτήτων είς άλλην τάξιν θὰ μάθωμεν καὶ ἄλλας λίαν χρησίμους.

Παραδείγματα: α) Έάν $x \in \mathbb{R}$ τότε, $|x - 7| \leq 3 \Leftrightarrow 4 \leq x \leq 10$

Πράγματι: $|x - 7| \leq 3 \Leftrightarrow -3 \leq x - 7 \leq 3 \Leftrightarrow 4 \leq x \leq 10$

β) Έάν είναι $6 < x < 10$ νὰ εύρεθῇ τὸ σύνολον τιμῶν τῆς παραστάσεως $A = -|x - 1| - 2|x - 11|$.

Λύσις: Έκ τῆς $6 < x < 10$ ἔχομεν $5 < x - 1 < 9$, ὅπερ $|x - 1| = x - 1$, ἐπίσης $-5 < x - 11 < -1$, ὅπερ $|x - 11| = -(x - 11) = 11 - x$

*Αρα $A = -(x - 1) - 2(11 - x) = x - 21 \Rightarrow A + 21 = x \Rightarrow 6 < A + 21 < 10 \Rightarrow -15 < A < -11$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

195) Νὰ άποδειχθῇ ὅτι οἱ ἀριθμοὶ $3 + \sqrt{3}, \sqrt[3]{5}, \sqrt[4]{3}, \sqrt[5]{3}$ είναι ἀσύμμετροι, δὲ $3 + \sqrt{5}$ νὰ κατασκευασθῇ μὲ προσέγγισιν 0,01.

196) Έάν α ἀρρητος καὶ ρ ρητός, νὰ άποδειχθῇ ὅτι οἱ ἀριθμοὶ $\frac{1}{\alpha}, \frac{\alpha}{\rho}, \frac{\rho}{\alpha}$ είναι ἀρρητοι.

197) Νὰ άποδειχθῇ διὰ παραδειγμάτων, ὅτι τὸ ἀθροισμα, τὸ γινόμενον καὶ τὸ πηλίκον δύο ἀρρήτων, δύναται νὰ είναι ρητὸς ἀριθμός.

198) *Αν $(\alpha, \beta, \gamma) \in \mathbb{Q}$ καὶ $\alpha + \beta \sqrt{2} = \gamma \sqrt{3}$, τότε $\alpha = \beta = \gamma = 0$.

199) Νὰ εύρεθοῦν αἱ τιμαὶ τῶν συμμέτρων λ καὶ μ , σὺν ὁ ἀριθμὸς $(\lambda - \mu) \sqrt{2} - (2\mu - 1)$ είναι ἴσος πρὸς τὸν $\sqrt{2}$.

200) *Αν x ἀσύμμετρος καὶ $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ σύμμετροι, ὑπὸ ποίαν συνθήκην ἡ παράστασις $\frac{\alpha x + \beta}{\gamma x + \delta}$ είναι ἀριθμὸς σύμμετρος;

201) Επὶ τοῦ ἀξονος τῶν πραγματικῶν ἀριθμῶν $X'OX$ νὰ εύρεθοῦν σημεῖα, ἔχοντα γεωμετρικὰς εἰκόνας τοὺς ἀριθμοὺς $\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{5}, \dots$ (διὰ χρησιμοποιήσεως τοῦ πυθαγορείου θεωρήματος).

202) Νὰ άποδειχθῇ ὅτι: $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R} \Rightarrow |\alpha - \beta| = |\beta - \alpha|$

203) Έάν $\alpha \in \mathbb{R}$, νὰ άποδειχθῇ ὅτι οὐδέποτε είναι $|\alpha| < \alpha < |\alpha|$

204) Νὰ άποδειχθῇ ὅτι: $\forall \alpha \in \mathbb{R} - \text{καὶ } n \in \mathbb{N} \Rightarrow |\alpha|^{2n+1} = -\alpha^{2n+1}$

205) Έάν $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ καὶ $|\alpha| + |\beta| > 0$, τί συμπεραίνετε διὰ τοὺς α, β ;

206) Έάν $|x - 10| \leq 5$, τότε $5 \leq x \leq 15$ καὶ άντιστρόφως.

- 207) Νά αποδειχθῇ ή ισοδυναμία : $|x - \alpha| \leq \theta \iff \begin{cases} \theta > 0 \\ \alpha - \theta \leq x \leq \alpha + \theta \end{cases}$

208) *Έάν $x \in \mathbb{R}^+$, νά αποδειχθῇ ότι έκ της σχέσεως $|x| > \alpha \geq 0$ ξπεται ή $0 \leq \alpha < x < +\infty$, έάν δέ $x \in \mathbb{R}^-$ ή $-\infty < x < -\alpha \leq 0$

209) Νά απλοποιηθῇ τό κλάσμα $(|x| + 8x^2) / (8|x| + 1)$

210) *Έάν $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, νά αποδειχθῇ ότι $\alpha^2 + \beta^2 \geq 2|\alpha| \cdot |\beta|$

211) *Έάν $x = \sqrt{2} + 1$, νά εύρεθῃ ή τιμή της παραστάσεως :

$$A = -2|2x - 1| - 3|\sqrt{2} - x| - 7|3x - (\sqrt{2} + 3)| - 3|x|$$

212) Νά εύρεθῃ ή τιμή της παραστάσεως :

$$7|\alpha - \beta| - 3|\beta - \alpha| + 2|\alpha + \beta| - |2\alpha - \beta|, \text{ ñv } \alpha > \beta > 0$$

213) *Έάν $-5 < x < 12$, νά εύρεθῃ τό σύνολον τιμῶν της παραστάσεως

$$A = -3|x - 6| + |x + 13| - 2|2x - 11| - |12 - x|$$

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΧ

ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ

70. ΟΡΙΣΜΟΙ

Είς τὴν προηγουμένην τάξιν εἴδομεν ὅτι τὸ σύνολον τῶν λύσεων μιᾶς γραμμικῆς ἔξισώσεως $\alpha x + \beta \psi = \gamma$, ὅπου $\alpha, \beta \in \mathbf{Q}$, είναι ὑποσύνολον τοῦ συνόλου RxR , ἔχον ἀπειρα στοιχεῖα τῆς μορφῆς $(x, \psi) = \frac{\gamma - \alpha x}{\beta}$.

Πολλάκις ὅμως ἐνδιαφερόμεθα μόνον διὰ τὰς ἀκεραίας λύσεις τῆς ἔξισώσεως $\alpha x + \beta \psi = \gamma$, ἢτοι τὰς λύσεις τῆς μορφῆς $(x, \psi) \in ZxZ$.

Τοὺς συντελεστὰς α, β, γ είναι δυνατόν πάντοτε νὰ θεωρῶμεν ἀκεραίους. Ἐργον τῆς καλουμένης ἀπροσδιορίστου ἀναλύσεως α' βαθμοῦ είναι ἡ ἔρευνα τῆς ὑπάρχεως καὶ ἡ ἀναζήτησις τῶν ἀκεραίων λύσεων μιᾶς ἔξισώσεως α' βαθμοῦ μὲ ἀκεραίους συντελεστὰς καὶ μεταβλητὰς (ἀγνώστους) δσασδήποτε πεπερασμένου πλήθους ἢ καὶ συστήματος α' βαθμοῦ μὲ πλήθος ἔξισώσεων μικρότερον τοῦ τῶν ἀγνώστων.

71* ΕΥΡΕΣΙΣ ΤΩΝ ΑΚΕΡΑΙΩΝ ΑΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΞΙΣ. $\alpha x + \beta \psi = \gamma$ (1), ὅπου $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbf{Z}$

I) Ἡ εύρεσις τῶν ἀκεραίων λύσεων στηρίζεται εἰς τὰς ἀκολούθους προτάσεις.

1. Ἐὰν οἱ α, β, γ ἔχουν M.K.Δ. $\delta \neq 1$, τότε ἡ ἔξισωσις $\frac{\alpha}{\delta} x + \frac{\beta}{\delta} \psi = \frac{\gamma}{\delta}$ είναι ισοδύναμος τῆς ἔξισώσεως (1).

Ἀπόδειξις: Ἡ πρότασις είναι προφανής καθ' ὅσον διαιροῦμεν ἀμφότερα τὰ μέλη τῆς (1) διὰ δ , μᾶς ἐπιτρέπει δὲ, νὰ ὑποθέτωμεν πάντοτε τοὺς συντελεστὰς α, β, γ πρώτους πρὸς ἀλλήλους.

2. Ἐὰν α, β, γ είναι πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους καὶ α, β ἔχουν κοινὸν τινὰ διαιρέτην $\delta \neq 1$, ἡ ἔξισωσις (1) οὐδεμίαν ἀκεραίαν λύσιν ἔχει.

Ἀπόδειξις: Ο δ προφανῶς δὲν διαιρεῖ τὸν γ , διαιρεῖ ὅμως τοὺς ὅρους α καὶ $\beta \psi$ καὶ συνεπῶς τὸ ἀθροισμα αὐτῶν, οἷοι δήποτε κι' ἂν είναι οἱ ἀκέραιοι x

(*) Ο "Ἐλλην Μαθηματικὸς Διόφαντος ὁ Ἀλεξανδρεὺς (360μ.Χ.) ἥρεύνησε καὶ εὗρεν τὰς ἀκεραίας λύσεις τοιούτων ἔξισώσεων ἔως 4ου βαθμοῦ, διὰ τοῦτο καὶ καλοῦνται Διοφαντικαὶ ἔξισώσεις, ἡ δὲ ἀπροσδιόριστος ἀνάλυσις Διοφαντικὴ ἀνάλυσις.

καὶ ψ. Ἐπομένως, ὅν $x \in Z$, τότε τὰ μέλη τῆς ἔξισώσεως (1) ούδεποτε γίνονται ἵσα καὶ συνεπῶς ἡ ἔξισώσις εἶναι ἀδύνατος. Ἡτοι οὐδεμίαν λύσιν ἔχει.

3. Εὰν α, β πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους, ἡ ἔξισώσις (1) ἔχει ἀκέραιαν λύσιν.

Απόδειξις: Δυνάμεθα πάντοτε νὰ ὑποθέτωμεν $\alpha > 0$.

Η ἔξισώσις (1) γράφεται: $x = \frac{\gamma - \beta\psi}{\alpha}$ (2).

Αἱ διαδοχικαὶ ἀκέραιαι τιμαὶ $0, 1, 2, 3, \dots, \alpha - 1$ (πλήθους α) τιθέμεναι ἀντὶ τοῦ ψ εἰς τὴν (2), δίδουν τὰς ἀκολούθους λύσεις:

$$(3) \left(\frac{\gamma}{\alpha}, 0 \right), \left(\frac{\gamma - \beta}{\alpha}, 1 \right), \left(\frac{\gamma - 2\beta}{\alpha}, 2 \right), \dots, \left(\frac{\gamma - \beta(\alpha - 1)}{\alpha}, \alpha - 1 \right)$$

θεωροῦμεν τοὺς ρητοὺς ἀριθμούς:

$$(4) \frac{\gamma}{\alpha}, \frac{\gamma - \beta}{\alpha}, \frac{\gamma - 2\beta}{\alpha}, \dots, \frac{\gamma - \beta(\alpha - 1)}{\alpha} \text{ καὶ ἔστω τὰ ἀκέραια πηλίκα } \pi_0, \pi_1,$$

$\pi_2, \dots, \pi_{\alpha-1}$ καὶ τὰ μὴ ἀρνητικὰ ὑπόλοιπα $u_0, u_1, u_2, \dots, u_{\alpha-1}$ ἀντιστοίχως τῶν διαιρέσεων γ: $\alpha, (\gamma - \beta): \alpha, \dots, [\gamma - \beta(\alpha - 1)]: \alpha$. Ἐὰν ὑπάρχουν ἀρνητικὰ ὑπόλοιπα τὰ καθιστῶμεν θετικὰ δι' αὐξήσεως ἀπολύτως κατὰ μονάδα τὰ ἀντιστοιχα πηλίκα. Π.χ. τῆς διαιρέσεως $\frac{17}{5}$ τὸ πηλίκον εἶναι -3 καὶ τὸ ὑπόλοιπον -2 , ὅπότε λαμβανομεν ὡς πηλίκον τὸ -4 καὶ συνεπῶς ὑπόλοιπον $+3$, διότι $-17 = 5(-4) + 3$. Τὰ ὑπόλοιπα ταῦτα, α εἰς πλήθος, εἶναι μικρότερα τοῦ α καὶ διάφορα μεταξύ των. Διότι ἂν δύο τυχόντα u_κ, u_λ ($\kappa < \lambda < \alpha$) εἶναι ἵσα, ἥτοι ἂν $u_\kappa = u_\lambda$, τότε θὰ ἔχωμεν:

$$\begin{aligned} \gamma - \beta\kappa &= \alpha\pi_\kappa + u_\kappa \\ \gamma - \beta\lambda &= \alpha\pi_\lambda + u_\lambda \end{aligned} \Rightarrow \beta(\lambda - \kappa) = \alpha(\pi_\kappa - \pi_\lambda) \Rightarrow \frac{\beta(\lambda - \kappa)}{\alpha} = \pi_\kappa - \pi_\lambda = \text{ἀκέραιος.}$$

Ἐπειδὴ δὲ α, β πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους, ἄρα δ ἡ πρέπη νὰ διαιρῇ τὸν $\lambda - \kappa$, βάσει γνωστῆς ἴδιότητος, ὅπερ ἄποτον, διότι $0 < \lambda - \kappa < \alpha$. "Ωστε, ὅλα τὰ ὑπόλοιπα εἶναι διάφορα μεταξύ των, εἰς πλήθος α καὶ ἔκαστον μικρότερον τοῦ α. "Αρα ἐν τῶν ὑπολοίπων τούτων εἶναι μηδὲν καὶ κατὰ συνέπειαν εἰς τῶν ρητῶν ἀριθμῶν (4) εἶναι ἀριθμὸς ἀκέραιος, ἥτοι μία τῶν λύσεων (3) εἶναι ἀκέραια λύσις τῆς ἔξισώσεως (1).

4. Εὰν ἡ ἔξισώσις $\alpha\kappa + \beta\psi = \gamma$ (1) ἔχῃ μίαν ἀκέραιαν λύσιν, τὴν (x_0, ψ_0) , θὰ ἔχῃ καὶ ἄλλας ἀπείρους τὸ πλήθος τῆς μορφῆς $(x_0 - \beta\kappa, \psi_0 + \alpha\kappa)$ καὶ μόνον αὐτάς.

Απόδειξις: Κατὰ τὴν πρότασιν (3), ἐὰν α, β πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους, τότε ἡ ἔξισ. (1) ἔχει μίαν ἀκέραιαν λύσιν, ἔστω τὴν (x_0, ψ_0) . Ἐσ ὑποθέσωμεν ὅτι ἔχει καὶ τὴν ἀκέραιαν λύσιν (x_1, ψ_1) . Θὰ ἔχωμεν τότε: $\alpha x_0 + \beta\psi_0 = \gamma$ καὶ $\alpha x_1 + \beta\psi_1 = \gamma$. Ἀφαιροῦντες τὰς ἰσότητας κατὰ μέλη ἔχομεν: $\alpha(x_1 - x_0) + \beta(\psi_1 - \psi_0) = 0 \Rightarrow x_1 - x_0 = -\frac{\beta}{\alpha}(\psi_1 - \psi_0)$. Τὸ α' μέλος ταύτης εἶναι ἀκέραιος ἀριθμός,

Έφ' ούσον έδειχθημεν τήν υπαρξίν καὶ τῆς ἀλλης λύσεως (x_1, ψ_1) , διαφόρου τῆς (x_0, ψ_0) . Ἐάν πρέπει νὰ είναι ἀκέραιος ἀριθμὸς καὶ τὸ β' μέλος $-\frac{\beta}{\alpha}$ ($\psi_1 - \psi_0$). Ἐπειδὴ δὲ α, β πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους, πρέπει ὁ α νὰ διαιρῇ τὸν ἄλλον παράγοντα $\psi_1 - \psi_0$. Ἐάν $\kappa \in \mathbb{Z}$ είναι τὸ πηλίκον $\frac{\psi_1 - \psi_0}{\alpha}$, ἥτοι ἂν $\frac{\psi_1 - \psi_0}{\alpha} = \kappa$, τότε $\psi_1 = \psi_0 + \alpha\kappa$ καὶ $x_1 = x_0 - \beta\kappa$.

Ἐκ τῶν ισοτήτων τούτων καθίσταται φανερόν, ὅτι πᾶσα ἀκέραιά λύσις $(x, \psi) = (x_1, \psi_1)$, δίδεται ἀπὸ αὐτάς, ὅταν ὁ κ λάβῃ μίαν ἀκέραιαν τιμήν. Ἐπομένως ύπάρχουν ἄπειρα τὸ πλῆθος ἀκέραιατ λύσεις.

*Ἀντιστρόφως. Κάθε λύσις τῆς μορφῆς $(x, \psi) = (x_0 - \beta\kappa, \psi_0 + \alpha\kappa)$ είναι λύσις ἀκέραιά τῆς ἔξισώσεως (1).

Πράγματι ἔχομεν : $\alpha(x_0 - \beta\kappa) + \beta(\psi_0 + \alpha\kappa) = \alpha x_0 - \alpha\beta\kappa + \beta\psi_0 + \alpha\beta\kappa = \alpha x_0 + \beta\psi_0 = \gamma$, διότι $\alpha x_0 + \beta\psi_0 = \gamma$

"Ωστε, ἐάν ἡ ἔξισωσις (1) ἔχῃ μίαν ἀκέραιαν λύσιν τὴν (x_0, ψ_0) , τότε θὰ ἔχῃ καὶ ἄλλας ἄπειρους τὸ πλῆθος λύσεις, αἱ δόποιαὶ δίδονται ἀπὸ τοὺς τύπους.

(5)

$$\begin{array}{ll} x = x_0 - \beta\kappa & x = x_0 + \beta\kappa, \\ \psi = \psi_0 + \alpha\kappa & \psi = \psi_0 - \alpha\kappa, \end{array} \quad \text{διότι } \kappa \in \mathbb{Z}$$

II) Εὑρεσις μιᾶς ἀκέραιας λύσεως τῆς ἔξισώσεως $\alpha x + \beta\psi = \gamma$

Διὰ νὰ ἐφαρμόσωμεν τοὺς τύπους (5) πρέπει νὰ εὔρωμεν μόνον μίαν ἀπὸ τὰς ἀκέραιας λύσεις τῆς ἔξισης $\alpha x + \beta\psi = \gamma$.

Πρὸς τοῦτο, λύομεν τὴν ἔξισωσιν ὡς πρὸς τὸν ἀγνωστὸν ἐκεῖνον, ποὺ ἔχει τὸν μικρότερον συντελεστήν, π.χ. ἐάν α μικρὸς τότε : $x = \frac{\gamma - \beta\psi}{\alpha}$, καὶ ἀκολούθως κατὰ τὴν πρότασιν (3) θέτομεν ὅπου $\psi = 0, 1, 2, \dots, \alpha - 1$ μέχρις ὅτου εὔρωμεν x ἀκέραιον.

Ἐάν οἱ συντελεσταὶ α καὶ β είναι μεγάλοι ἀριθμοί, ἡ προτιγουμένη μέθοδος είναι ἐπίπονος διὰ τοῦτο ἐργαζόμεθα ὡς ἔεῖς : Λύομεν τὴν ἔξισωσιν ὡς πρὸς τὸν ἀγνωστὸν ἐκεῖνον, ποὺ ἔχει τὸν μικρότερον συντελεστὴν π.χ. τὸν α . Τότε ἔχομεν $x = \frac{\gamma - \beta\psi}{\alpha} = \frac{\gamma}{\alpha} - \frac{\beta}{\alpha}\psi = \pi_1 + \frac{u_1}{\alpha} - \left(\pi_2 + \frac{u_2}{\alpha} \right)\psi = \pi_1 - \pi_2\psi + \frac{u_1 - u_2\psi}{\alpha}$ ὅπου π_1, π_2 πηλίκα καὶ u_1, u_2 ὑπόλοιπα τῶν διαιρέσεων γ : α καὶ β : α . Διὰ νὰ είναι συνεπῶς δ x ἀκέραιος πρέπει τὸ κλάσμα $\frac{u_1 - u_2\psi}{\alpha}$ νὰ είναι ἀκέραιος ἀριθμὸς ω . Ἡτοι $\frac{u_1 - u_2\psi}{\alpha} = \omega \Leftrightarrow \alpha\omega + u_2\psi = u_1$

Αὕτη ἔχει ἀκέραιας λύσεις διότι οἱ α καὶ u_2 είναι πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους. (Ο Μ.Κ.Δ. δύο ἀριθμῶν δὲν μεταβάλλεται ἐάν ἀντικαταστήσωμεν τὸν μεγαλύτερον ἀριθμὸν διὰ τοῦ ὑπολοίπου τῆς διαιρέσεως του διὰ τοῦ ἑτέρου).

Οὕτως ἀναγόμεθα εἰς τὴν εὑρεσιν ἀκέραιας λύσεως τῆς ἔξισώσεως $\alpha\omega + u_2\psi = u_1$, ἥτις είναι ἀπλουστέρα, διότι $u_2 < \alpha$.

Συνεχίζοντες ώς προηγουμένως, καταλήγομεν εἰς έξισώσιν μὲν μικρούς συντελεστάς, όπότε ἔργαζόμεθα μὲν τὴν πρώτην μέθοδον,

Παραδείγματα : 1) Νὰ εύρεθοῦν αἱ ἀκέραιαι λύσεις τῆς ἔξισώσεως $3x + 5\psi = 11$.

*Επίλυσις : *Έχομεν $x = \frac{11-5\psi}{3}$. Θέτομεν $\psi = 0, 1, 2$. Διὰ $\psi = 0$ ἔχομεν $x = \frac{11}{3}$, ἐνῶ διὰ $\psi = 1$ ἔχομεν $x = \frac{11-5}{3} = 2$. Τὸ ζεῦγος λοιπὸν $(2, 1)$ εἶναι μία ἀκέραια λύσης τῆς ἔξισώσεως. *Εφαρμόζοντες τοὺς τύπους (5) διὰ $(x_0, \psi_0) = (2, 1)$ ἔχομεν τὸ σύνολον τῶν λύσεων τῆς $3x + 5\psi = 11$.

Οὕτω : $x = 2 - 5\kappa$ $x = 2 + 5\kappa$ $\left. \begin{array}{l} \psi = 1 + 3\kappa \\ \psi = 1 - 3\kappa \end{array} \right\}$ ὅπου $\kappa \in \mathbb{Z}$

Σημείωσις. Διὰ τὴν εὔρεσιν τῶν θετικῶν μόνον ἀκέραιών λύσεων εύρισκομεν τὰς τιμὰς τοῦ κ , διὰ τὰς ὁποίας συναληθεύουν αἱ ἀνισώσεις $2 - 5\kappa > 0$ καὶ $1 + 3\kappa > 0$. *Ητοι $-\frac{1}{3} < \kappa < \frac{2}{5}$ καὶ συνεπῶς $\kappa = 0$. *Ἄρα διὰ $\kappa = 0$ ἔχομεν $(x, \psi) = (2, 1)$, ἣτις εἶναι ἡ μοναδικὴ ἀκέραια θετικὴ λύσης.

2) Νὰ ἀναλύθῃ τὸ κλάσμα $176 / 221$ εἰς ἄθροισμα ἢ διαφορὰν δύο ἄλλων ρητῶν κλασμάτων, ἔχόντων παρονομαστὰς 13 καὶ 17.

*Επίλυσις. *Εὰν τὰ ζητούμενα κλάσματα εἶναι $\frac{x}{13}$ καὶ $\frac{\psi}{17}$, τότε θὰ ἔχωμεν $\frac{x}{13} + \frac{\psi}{17} = \frac{176}{221} \Leftrightarrow 17x + 13\psi = 176$ (1).

Εύρισκομεν τὰς ἀκέραιας λύσεις τῆς ἔξισώσεως (1).

*Έχομεν $\psi = \frac{176 - 17x}{13} = \frac{176}{13} - \frac{17}{13}x = 13 - x + \frac{7 - 4x}{13} = 13 - x + \omega$

Τῆς ἔξισώσεως $\omega = \frac{7 - 4x}{13}$ ἢ $13\omega + 4x = 7$ ἢ $x = \frac{7 - 13\omega}{4}$ μία ἀκέραια λύσης εἶναι $(x, \omega) = (-8, 3)$

καὶ ἔπομένως $\psi = 13 - (-8) + 3 = 24$

Οὕτω, μία ἀκέραια λύσης τῆς (1) εἶναι ἡ $(x_0, \psi_0) = (-8, 24)$, τὸ σύνολον δὲ τῶν λύσεων αὐτῆς δίδεται ἀπὸ τοὺς τύπους

$x = -8 - 13\kappa$ $x = -8 + 13\kappa$ $\left. \begin{array}{l} \psi = 24 + 17\kappa \\ \psi = 24 - 17\kappa \end{array} \right\}$, ὅπου $\kappa \in \mathbb{Z}$

Διὰ $\kappa = 0$ ἔχομεν $(x_0, \psi_0) = (-8, 24)$ καὶ ἄρα $-\frac{8}{13} + \frac{24}{17} = \frac{176}{221}$

» $\kappa = 1$ » $(x_1, \psi_1) = (-21, 41)$ » $-\frac{21}{13} + \frac{41}{17} = \frac{176}{221}$

72. ΕΥΡΕΣΙΣ ΤΩΝ ΑΚΕΡΑΙΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Α' ΒΑΘΜΟΥ ΑΥΤΟΥ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥΣ.

*Εστω τὸ σύστημα (1) $\left| \begin{array}{l} \alpha_1 x + \beta_1 \psi + \gamma_1 \omega = \delta_1 \\ \alpha_2 x + \beta_2 \psi + \gamma_2 \omega = \delta_2 \end{array} \right\} \alpha_1, \beta_1, \gamma_1, \delta_1 \in \mathbb{Z}$

$\left(2\right) \left| \begin{array}{l} \alpha_2 x + \beta_2 \psi + \gamma_2 \omega = \delta_2 \end{array} \right\} \alpha_2, \beta_2, \gamma_2, \delta_2 \in \mathbb{Z}$

Τοὺς συντελεστὰς $\alpha_1, \beta_1, \gamma_1, \delta_1$ ὡς καὶ τοὺς $\alpha_2, \beta_2, \gamma_2, \delta_2$ δυνάμεθα νὰ ὑποθέσω-

μεν πρώτους μεταξύ των, διότι όν δὲν εἶναι, διαιροῦμεν τὰ μέλη τῶν (1) καὶ (2) διὰ τοῦ Μ.Κ.Δ. αὐτῶν ἀντιστοίχως.

Πρῶτον παρατηροῦμεν ὅτι τὸ σύστημα οὐδεμίαν ἀκέρασιν λύσιν ἔχει, ἐάν $\alpha_1, \beta_1, \gamma_1, \delta_1$ εἶναι πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους καὶ $\alpha_1, \beta_1, \gamma_1$ ἔχουν Μ.Κ.Δ. $\delta_1 \neq 1$ (πρότασις § 71/2). Τὸ αὐτὸ συμβαίνει, ἐάν $\alpha_2, \beta_2, \gamma_2, \delta_2$ εἶναι πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους καὶ $\alpha_2, \beta_2, \gamma_2$ ἔχουν Μ.Κ.Δ. $\delta_2 \neq 1$.

Ὑποθέτομεν λοιπὸν ὅτι $\alpha_1, \beta_1, \gamma_1$ καὶ $\alpha_2, \beta_2, \gamma_2$ εἶναι ἀριθμοὶ πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους καὶ ἀπαλείφομεν τὸν ἓνα ἄγνωστον μεταξύ τῶν ἔξισώσεων (1) καὶ (2) ἔστω τὸν ω .

Οὕτως ἔχομεν : $(\alpha_1\gamma_2 - \alpha_2\gamma_1)x + (\beta_1\gamma_2 - \beta_2\gamma_1)\psi = \delta_1\gamma_2 - \delta_2\gamma_1$ (3). Ἐάν ἡ (3) ἔχῃ ἀκέρασις λύσεις, τότε τὸ σύνολον τῶν λύσεων αὐτῶν θὰ δίδεται ὑπὸ τῶν τύπων $x = x_0 - (\beta_1\gamma_2 - \beta_2\gamma_1)\kappa$ } (4)

$$\psi = \psi_0 + (\alpha_1\gamma_2 - \alpha_2\gamma_1)\kappa$$

Τὰς τιμὰς (4) τῶν x καὶ ψ θέτομεν εἰς μίαν τῶν ἔξισώσεων τοῦ συστήματος, ἔστω εἰς τὴν (1), ὅπότε λαμβάνομεν μετὰ τὰς πράξεις $\kappa\gamma_1(\alpha_1\beta_2 - \alpha_2\beta_1) + \gamma_1\omega = \delta_1 - \alpha_1x_0 - \beta_1\psi_0$ (5)

Ἐάν ἡ (5) ἔχῃ ἀκέρασις λύσεις, τότε τὸ σύνολον λύσεων αὐτῆς θὰ δίδεται ὑπὸ τῶν τύπων $\kappa = \kappa_0 - \gamma_1\lambda$ } , $\lambda \in \mathbb{Z}$, (6)

$$\omega = \omega_0 + \gamma_1(\alpha_1\beta_2 - \alpha_2\beta_1)\lambda$$

Τὴν τιμὴν τοῦ κ ἐκ τῶν (6) θέτομεν εἰς τοὺς τύπους (4), ὅπότε λαμβάνομεν :

$x = x_0 - (\beta_1\gamma_2 - \beta_2\gamma_1)(\kappa_0 - \gamma_1\lambda)$
$\psi = \psi_0 + (\alpha_1\gamma_2 - \alpha_2\gamma_1)(\kappa_0 - \gamma_1\lambda)$
$\omega = \omega_0 + \gamma_1(\alpha_1\beta_2 - \alpha_2\beta_1)\lambda$

Οἱ τύποι οὗτοι δίδουν τὰς ἀκέρασις λύσεις τοῦ συστήματος.

Σημείωσις: Κατὰ τὴν ἀπαλοιφὴν τοῦ ἑνὸς ἄγνωστον μεταξύ τῶν ἔξισώσεων (1) καὶ (2), προτιμοῦμεν τὸν ἄγνωστον ἐκεῖνον, τοῦ ὃποίου οἱ συντελεσταὶ εἶναι πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους. Διατί ;

Παράδειγμα: Νὰ εύρεθοῦν αἱ ἀκέρασιαι λύσεις τοῦ συστήματος

$$1) 4x + 3\psi + \omega = 5 \text{ καὶ } 4x - 6\psi - 3\omega = 7 \quad (2)$$

Ἐπίλυσις: Ἀπαλείφομεν τὸν ἄγνωστον ω , ὅπότε λαμβάνομεν : $16x + 3\psi = 22$ (3). Εύρισκομεν τὰς ἀκέρασις λύσεις τῆς (3).

Οὕτω : $\psi = \frac{22 - 16x}{3}$. Μία ἀκέρασι λύσις αὐτῆς εἶναι $(x_0, \psi_0) = (1, 2)$, τὸ δὲ σύνολον τῶν λύσεων δίδεται ὑπὸ τῶν τύπων

$x = 1 - 3\kappa$ } (4), ὅπου $\kappa \in \mathbb{Z}$. Ἡ ἔξισωσις (1) διὰ τῶν (4) γίνεται $4(1 - 3\kappa) + 3(2 + 16\kappa) + \omega = 5 \Leftrightarrow 36\kappa + \omega = -5$ ή $\omega = -5 - 36\kappa$, τῆς δόποιας μία ἀκέ-

ραία λύσις είναι $(\kappa_0, \omega_0) = (0, -5)$, τό δὲ σύνολον τῶν λύσεων αὐτῆς δίδεται ύπὸ τῶν τύπων

$$\left. \begin{array}{l} \kappa = 0 - \lambda \\ \omega = -5 + 36\lambda \end{array} \right\} (5), \text{ ὅπου } \lambda \in \mathbb{Z}. \text{ Τήν τιμὴν } \kappa = -\lambda \text{ θέτομεν εἰς τοὺς τύπους} \\ (4), \text{ δηπότε λαμβάνομεν τοὺς τύπους}$$

$$\left. \begin{array}{l} x = 1 + 3\lambda \\ \psi = 2 - 16\lambda \\ \omega = -5 + 36\lambda \end{array} \right\} (6), \text{ οἱ δηποῖοι διὰ } \lambda \in \mathbb{Z} \text{ δίδουν τὰς ἀκεραίας λύσεις τοῦ} \\ \text{συστήματος.}$$

$$\Delta i \lambda = 0 \text{ ἔχομεν } (x_0, \psi_0, \omega_0) = (1, 2, -5) \\ \gg \lambda = 1 \gg (x_1, \psi_1, \omega_1) = (4, -14, 31) \text{ κ.ο.κ.}$$

AΣΚΗΣΕΙΣ

214) Νὰ εύρεθοῦν αἱ ἀκέραιαι λύσεις τῶν ἀκολούθων ἑξισώσεων :

$$\begin{array}{lll} 1) 3x + 5\psi = -12, & 2) -x + 4\psi = 1, & 3) 7x - 9\psi = -28, \\ 4) 13x + 21\psi = 91, & 5) 53x + 29\psi = 108, & 6) 40x + 51\psi = 121 \end{array}$$

215) Νὰ εύρεθοῦν αἱ ἀκέραιαι καὶ θετικαὶ τιμαὶ τοῦ x, αἱ δηποῖαι καθιστοῦν ἀκεραίας καὶ θετικὰς τὰς ἀκολούθους παραστάσεις :

$$1) \frac{7x - 15}{3}, \quad 2) \frac{133 - 2x}{3}, \quad 3) \frac{1053 - 31x}{14}$$

216) Νὰ ἀναλυθῇ τὸ κλάσμα $\frac{1}{15}$ εἰς ἀθροισμα δύο ρητῶν κλασμάτων, ἔχόντων παρονομαστὰς ἀντιστοίχως 3 καὶ 5.

217) "Ἐν χαρτονόμισμα τῶν 50 δραχ. κατὰ πόσους τρόπους δύναται νὰ ἀλλαχθῇ μὲ κέρματα τῶν 2 καὶ 5 δραχμῶν ;

218) Νὰ εύρεθῇ ἀριθμός, ὁ δηποῖος διαιρούμενος διὰ 5 δίδει ὑπόλοιπον 3 καὶ διαιρούμενος διὰ 7 δίδει ὑπόλοιπον 2.

219) Νὰ εύρεθῇ διψήφιος ἀριθμὸς τοιοῦτος, ὥστε τὸ τρίτον τῆς διαφορᾶς τοῦ ψηφίου τῶν δεκάδων ἀπὸ τοῦ ἀριθμοῦ, νὰ ισοῦται μὲ τὸ διπλάσιον τοῦ ψηφίου τῶν μονάδων αὐξῆθεν κατὰ 5.

220) Νὰ εύρεθοῦν αἱ ἀκέραιαι λύσεις τῶν ἀκολούθων συστημάτων :

$$\begin{array}{lll} 1) \begin{cases} x + 2\psi - \omega = -4 \\ 3x - 4\psi + 2\omega = 17 \end{cases} & 2) \begin{cases} 7x + 5\psi + 6\omega = 18 \\ 4x + 2\psi + 3\omega = 9 \end{cases} & 3) \begin{cases} 6x - 4\psi + 3z = 30 \\ 3x + 6\psi - 2z = 25 \end{cases} \\ 4) \begin{cases} 3x + 6\psi - 5\omega = 11 \\ -x + 7\psi - 2\omega = -16 \end{cases} & 5) \begin{cases} 7x - 5\psi = 4 \\ 11x + 13\omega = 103 \end{cases} & \end{array}$$

221) Νὰ εύρεθῇ τριψήφιος ἀριθμός, τοῦ δηποίου τὰ ψηφία ἔχουν ἀθροισμα 7 καὶ ὁ δηποῖος δὲν ἀλλάσσει, ἀν τὰ ψηφία αὐτοῦ ἐκατοντάδων καὶ μονάδων ἐναλλαγοῦν.

222) Νὰ εύρεθοῦν δύο ἀκέραιοι καὶ θετικοὶ ἀριθμοὶ, ἔχοντες ἀθροισμα 100, τὸ δὲ ὑπόλοιπον τῆς διαιρέσεως τοῦ ἐνδὸς διὰ τοῦ 7 εἶναι 1, ἐνῶ τοῦ ἀλλού διὰ τοῦ 9 εἶναι 7.

223) Τρεῖς κτηνοτρόφοι ἔχουν δμοῦ 111 ζῶα. 'Ο ἀριθμὸς τῶν ζῶων τοῦ α' κτηνοτρόφου είναι διαιρετὸς διὰ 2, τοῦ β' διαιρετὸς διὰ 5 καὶ τοῦ γ' διὰ 7. Τὸ τριπλάσιον δὲ τῶν ζῶων τοῦ α' κτηνοτρόφου, τὸ διπλάσιον τοῦ β' καὶ τὸ πενταπλάσιον τοῦ γ' ἔχουν ἀθροισμα 400. Πόσα ζῶα εἶχεν ἕκαστος ;

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Χ

ΠΕΡΙ ΡΙΖΩΝ

ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ "Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ

73. Εἰς τὴν Γ' τάξιν εἰδομεν, ὅτι πᾶς πραγματικὸς ἀριθμὸς α εἶναι τετράγωνον ἄλλου πραγματικοῦ ἀριθμοῦ x , ὅστις ἐκλήθη τετραγωνικὴ ρίζα (ἢ ρίζα βασ τάξεως) τοῦ α. Ἐξετάσαμεν δὲ τὰς ιδιότητας καὶ τὰς πράξεις τῶν ριζικῶν βασ τάξεως.

"Ηδη θὰ γενικεύσωμεν τὴν ἔννοιαν τῆς ρίζης τῶν πραγματικῶν ἀριθμῶν.

Όρισμός. Ἐὰν $\alpha \in \mathbb{R}$ καὶ $n \in \mathbb{N}$ καὶ μεγαλύτερος τῆς μονάδος, τότε, ἐὰν ὑπάρχῃ ἔτερος ἀριθμὸς $x \in \mathbb{R}$, ὅστις ὑψούμενος εἰς τὴν νυοστὴν δύναμιν γίνεται ἵσος πρὸς τὸν α, θὰ λέγωμεν ὅτι ὁ x εἶναι μία νυόστη ρίζα (ἢ ρίζα νυοστῆς τάξεως) τοῦ α.

Οὕτω, ἐὰν $n = 2$, ὁ x εἶναι μία τετραγωνικὴ ρίζα τοῦ α,

ἐὰν $n = 3$, ὁ x εἶναι μία τρίτη (κυβική) ρίζα τοῦ α.

Π.χ. τοῦ ἀριθμοῦ 25 μία τετραγωνικὴ ρίζα εἶναι ὁ + 5, διότι $(+ 5)^2 = 25$
 τοῦ ἀριθμοῦ 25 μία τετραγωνικὴ ρίζα εἶναι ὁ - 5, διότι $(- 5)^2 = 25$
 τοῦ ἀριθμοῦ 8 μία τρίτη ρίζα (κυβική) εἶναι ὁ + 2, διότι $(+ 2)^3 = 8$
 τοῦ ἀριθμοῦ - 27 μία κυβικὴ ρίζα εἶναι ὁ - 3, διότι $(- 3)^3 = - 27$
 τοῦ ἀριθμοῦ - 9 οὐδεμία τετραγωνικὴ πραγματικὴ ρίζα ὑπάρχει
 ἢ ἄλλη ρίζα ἀρτίας τάξεως, διότι οὐδεὶς πραγματικὸς ἀριθμὸς ὑψούμενος εἰς ἀρτίαν δύναμιν γίνεται ἵσος πρὸς τὸν - 9.

"Ἐνταῦθα παρατηροῦμεν, ὅτι ἔνας πραγματικὸς ἀριθμὸς δύναται νὰ ἔχῃ περισσοτέρας τῆς μιᾶς πραγματικὰς ρίζας, ὅπως ἐπίστης εἶναι δυνατὸν νὰ μὴν ἔχῃ πραγματικὴν ρίζαν ἀρτίας τάξεως.

Γενικῶς δέ, διακρίνομεν τὰς ἔξῆς περιπτώσεις :

1) Ἐὰν $\alpha > 0$ καὶ $n \in \mathbb{N}$, τότε ἀπόδεικνύεται ὅτι ὑπάρχει εἰς καὶ μόνον εἰς θετικὸς ἀριθμὸς x τοιοῦτος, ὥστε : $x^n = \alpha$. Ἡ ἀπόδειξις τῆς προτάσεως αὐτῆς δύναται νὰ γίνη εἰς ἄλλην τάξιν. Ἀς εἰδώμεν ἂν ὑπάρχῃ ἀρνητικὸς ἀριθμὸς x καὶ τοιοῦτος, ὥστε : $x^n = \alpha$. Ἐὰν $n = 2k + 1$, ὅπου $k \in \mathbb{N}$, τότε οὐδεὶς ἀρνητικὸς ἀριθμὸς x ὑπάρχει ἱκανοποιῶν τὴν $x^n = \alpha > 0$

2) Ἐὰν δέ, $n = 2k$, ὅπου $k \in \mathbb{N}$ τότε, ἐὰν $x_0 > 0$ εἶναι ἡ μοναδικὴ θετικὴ ρίζα τῆς

ξέισ. $x^v = \alpha$, ήτοι $x_0^v = \alpha$, θὰ είναι ρίζα τής $x^v = \alpha$ καὶ ὁ ἀριθμὸς $-x_0 < 0$, διότι $(-x_0)^v = x_0^v = \alpha$.

2) 'Εάν $\alpha < 0$ καὶ $v = 2k + 1$, ὅπου $k \in \mathbb{N}$, τότε ὑπάρχει εἰς καὶ μόνον εἰς πραγματικὸς ἀρνητικὸς ἀριθμὸς x ίκανοποιῶν τὴν ξέισωσιν $x^v = \alpha < 0$. 'Εάν δὲ $v = 2k$, τότε οὐδεὶς πραγματικὸς ἀριθμὸς x ὑπάρχει ίκανοποιῶν τὴν $x^v = \alpha < 0$. 'Εκ τῶν ἀνωτέρω συμπεραίνομεν ὅτι :

Πᾶς πραγματικὸς ἀριθμὸς α ἔχει 1) μίαν μόνην πραγματικὴν νυοστὴν ρίζαν x περιττῆς τάξεως ($v = 2k + 1$) θετικὴν ἢ ἀρνητικὴν, καθ' ὅσον ὁ α εἰναι θετικὸς ἢ ἀρνητικὸς ἀντιστοίχως, ἥτις καλεῖται πρωτεύουσα νυοστὴ ρίζα τοῦ α , 2) δύο πραγματικὰς νυοστὰς ρίζας ἀντιθέτους ἀρτίας τάξεως ($v = 2k$), ἂν $\alpha > 0$, ἐκ τῶν ὃποιων ἡ θετικὴ καλεῖται πρωτεύουσα νυοστὴ ρίζα τοῦ α καὶ 3) οὐδεμίαν πραγματικὴν νυοστὴν ρίζαν ἀρτίας τάξεως, ἂν $\alpha < 0$.

Τὴν πρωτεύουσαν νυοστὴν ρίζαν τοῦ α συμβολίζομεν $\sqrt[v]{\alpha}$. Τὸ σύμβολον $\sqrt[-]$ καλεῖται ριζικὸν, ὁ v δείκτης τῆς ρίζης καὶ τὸ α ὑπόρριζον. 'Εάν $v = 2$ τότε γράφομεν $\sqrt[2]{\alpha}$, ἥτις ἐκφράζει τὴν πρωτεύουσαν τετραγωνικὴν ρίζαν τοῦ α .

Πάντα τὰ ἀνωτέρω δικαιολογοῦν τὴν λογικὴν ίσοδυναμίαν

$$x = \sqrt[v]{\alpha} \Leftrightarrow x^v = \alpha$$

ἄμεσος δὲ συνέπεια αὐτῆς είναι $(\sqrt[v]{\alpha})^v = \alpha$.

"Ωστε, συνοψίζοντες, τὸ σύμβολον $\sqrt[v]{\alpha}$ ἔχει τὰς ξένης ίδιότητας :

- 1) 'Εάν $\alpha > 0$ καὶ $v \in \mathbb{N}$, τότε $\sqrt[v]{\alpha} > 0$, ρητὸς ἢ ἄρρητος.
- 2) 'Εάν $\alpha < 0$ καὶ $v = 2k + 1$, $k \in \mathbb{N}$, τότε $\sqrt[v]{\alpha} < 0$, ρητὸς ἢ ἄρρητος.
- 3) 'Εάν $\alpha < 0$ καὶ $v = 2k$, τότε τὸ σύμβολον $\sqrt[v]{\alpha}$ δὲν ἔχει ἔννοιαν πραγματικοῦ ἀριθμοῦ.
- 4) 'Εάν $\alpha \in \mathbb{R}$ καὶ $v = 2k$, ἐκ τῶν ἀνωτέρω συνάγεται ὅτι $\sqrt[v]{\alpha^v} = |\alpha|$, ἐὰν δὲ $v = 2k + 1$, τότε $\sqrt[v]{\alpha^v} = \alpha = (\sqrt[v]{\alpha})^v$.
- 5) Εἰς πᾶσαν περίπτωσιν δρίζομεν : $\sqrt[3]{0} = 0$

Παραδείγματα : Νὰ εύρεθοιον ἀἱ πρωτεύουσαι ρίζαι τῶν ἀριθμῶν :

$$\sqrt[3]{27}, \sqrt[3]{-27}, \sqrt[4]{16}, \sqrt[4]{-16}, \sqrt[5]{3}.$$

Αύσις : 'Η πρωτεύουσα κυβικὴ ρίζα τοῦ 27 είναι ὁ ἀριθμὸς 3, διότι $\sqrt[3]{27} = \sqrt[3]{3^3} = 3$. 'Ομοίως ἔχομεν $\sqrt[3]{-27} = \sqrt[3]{(-3)^3} = -3$.

'Επίσης $\sqrt[4]{16} = \sqrt[4]{2^4}$ ἢ $\sqrt[4]{(-2)^4} = |2| = 2$

'Η $\sqrt[4]{-16}$ δὲν ἔχει ἔννοιαν πραγματικοῦ ἀριθμοῦ.

• Ή πρωτεύουσα πέμπτη ρίζα του 3 είναι $\sqrt[5]{3} > 0$ άρρητος.

74. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΡΙΖΩΝ.

Διὰ τὴν ἔξετασιν τῶν ἰδιοτήτων τῶν ριζῶν χρειαζόμενα τὴν πρότασιν : **Λῆμμα (Βοηθητικὴ πρότασις).** Ἐάν δύο θετικῶν ἀριθμῶν αἱ μυοσταὶ δυνάμεις εἰναι ἵσοι ἀριθμοί, τότε καὶ οἱ ἀριθμοὶ εἰναι ἵσοι.

Ἀπόδειξις : Ἐάν $\alpha, \beta \in \mathbb{R}^+$ καὶ $\alpha^\mu = \beta^\mu$, ὅπου $\mu \in \mathbb{N}$, τότε ἐκ τῆς $\alpha^\mu - \beta^\mu = (\alpha - \beta)(\alpha^{\mu-1} + \alpha^{\mu-2}\beta + \dots + \beta^{\mu-1}) = 0$ προκύπτει $\alpha - \beta = 0$ ἢ $\alpha = \beta$, διότι ὁ παράγων $\alpha^{\mu-1} + \alpha^{\mu-2}\beta + \dots + \beta^{\mu-1}$ είναι θετικός, ὡς ἄθροισμα θετικῶν προσθετών.

Ίδιότης 1η Ἐάν $\alpha > 0$ καὶ $v = 2k + 1$, ($k \in \mathbb{N}$), τότε $\sqrt[v]{-\alpha} = -\sqrt[\bar{v}]{\alpha}$.

Τὰ μέλη τῆς ισότητος αὐτῆς είναι προφανῶς ἀρνητικά. Ἀν δημοσίευσι $-\sqrt[v]{-\alpha} = \sqrt[\bar{v}]{\alpha}$ γίνονται θετικά. Υψώνομεν τὰ μέλη της εἰς τὴν νυοστήν δύναμιν, ὅτε ἔχομεν: $(-\sqrt[v]{-\alpha})^v = -(\sqrt[\bar{v}]{\alpha})^v = -(-\alpha) = \alpha$ καὶ $(\sqrt[\bar{v}]{\alpha})^v = \alpha$,

ἄρα $-\sqrt[v]{-\alpha} = \sqrt[\bar{v}]{\alpha}$ ἢ $\sqrt[\bar{v}]{-\alpha} = -\sqrt[\bar{v}]{\alpha}$

Ἡ ιδιότης αὐτῇ μᾶς ἐπιτρέπει νὰ ἔξετάσωμεν τὰς ἀκολούθους ιδιότητας τῶν ριζῶν ὑποθέτοντες τὰ ὑπόρριζα θετικά, διότι βάσει αὐτῆς, τὸ πρόστημον πλὴν ἔξερχεται, διὰ ριζικὰ περιττῆς τάξεως, ἐκτὸς τοῦ ριζικοῦ.

Ίδιότης 2α Ρίζαι τῆς αὐτῆς τάξεως πολλαπλασιάζονται ἢ διαιροῦνται, ἐάν πολλαπλασιασθοῦν ἢ διαιρεθοῦν αἱ ὑπόρριζαι ποσότητες αὐτῶν καὶ τὸ ἔξαγόμενον τεθῇ ὡς ὑπόρριζον ριζικοῦ τῆς αὐτῆς τάξεως.

Έσον $\sqrt[\bar{v}]{\alpha}$ καὶ $\sqrt[\bar{v}]{\beta}$, ὅπου $\alpha, \beta \in \mathbb{R}^+$, είναι πρωτεύουσαι ρίζαι, τότε $\sqrt[\bar{v}]{\alpha} > 0$ καὶ $\sqrt[\bar{v}]{\beta} > 0$. Θὰ ἀποδείξωμεν ὅτι είναι :

$$\sqrt[\bar{v}]{\alpha} \cdot \sqrt[\bar{v}]{\beta} = \sqrt[\bar{v}]{\alpha\beta} \quad (1) \text{ καὶ } \sqrt[\bar{v}]{\alpha} : \sqrt[\bar{v}]{\beta} = \sqrt[\bar{v}]{\alpha : \beta} \quad (2)$$

Ὑψοῦμεν τὰ μέλη τῶν ισοτήτων διαδοχικῶν εἰς τὴν νυοστήν δύναμιν.

Έχομεν : 1) $(\sqrt[\bar{v}]{\alpha} \cdot \sqrt[\bar{v}]{\beta})^v = (\sqrt[\bar{v}]{\alpha})^v \cdot (\sqrt[\bar{v}]{\beta})^v = \alpha \cdot \beta$ καὶ $(\sqrt[\bar{v}]{\alpha\beta})^v = \alpha\beta$, ἄρα κατὰ τὴν βοηθητικὴν πρότασιν ἔχομεν $\sqrt[\bar{v}]{\alpha} \cdot \sqrt[\bar{v}]{\beta} = \sqrt[\bar{v}]{\alpha\beta}$

$$2) \left(\frac{\sqrt[\bar{v}]{\alpha}}{\sqrt[\bar{v}]{\beta}} \right)^v = \frac{(\sqrt[\bar{v}]{\alpha})^v}{(\sqrt[\bar{v}]{\beta})^v} = \frac{\alpha}{\beta} \text{ καὶ } (\sqrt[\bar{v}]{\alpha : \beta})^v = \alpha : \beta = \frac{\alpha}{\beta}$$

ἄρα κατὰ τὴν βοηθητικὴν πρότασιν ἔχομεν $\sqrt[\bar{v}]{\alpha : \beta} = \sqrt[\bar{v}]{\alpha \cdot \beta}$

Παρατήρησις : Αἱ ισότητες (1) καὶ (2) γράφονται καὶ οὕτω :

$$\sqrt[\bar{v}]{\alpha\beta} = \sqrt[\bar{v}]{\alpha} \cdot \sqrt[\bar{v}]{\beta} \text{ καὶ } \sqrt[\bar{v}]{\alpha : \beta} = \sqrt[\bar{v}]{\alpha} : \sqrt[\bar{v}]{\beta}$$

*Ιδιότης 3η Θετικός παράγων ή διαιρέτης ρίζικού δύναται να είσαι χθη̄ ύπο το ριζικόν, ώς παράγων ή διαιρέτης του ύπορριζου, ἀν ύψωθη εἰς τὴν δύναμιν του δείκτου του ριζικού καὶ ἀντιστρόφως.

*Απόδειξις : Εάν $\alpha > 0$ καὶ $\sqrt[\nu]{\beta}$ πρωτεύουσα υποστή ρίζα τοῦ $\beta > 0$, τότε θὰ ἀποδείξωμεν ὅτι : $\alpha \sqrt[\nu]{\beta} = \sqrt[\nu]{\alpha^\nu \beta}$ (1) καὶ $\frac{\sqrt[\nu]{\beta}}{\alpha} = \sqrt[\nu]{\frac{\beta}{\alpha^\nu}}$ (2)

*Έχομεν : 1) $\alpha \sqrt[\nu]{\beta} = \sqrt[\nu]{\alpha^\nu} \cdot \sqrt[\nu]{\beta} = \sqrt[\nu]{\alpha^\nu \cdot \beta}$

$$2) \frac{\sqrt[\nu]{\beta}}{\alpha} = \frac{\sqrt[\nu]{\beta}}{\sqrt[\nu]{\alpha^\nu}} = \sqrt[\nu]{\frac{\beta}{\alpha^\nu}}, \quad \text{διότι } \alpha = \sqrt[\nu]{\alpha^\nu}$$

Αἱ ισότητες (1) καὶ (2) ισχύουν προφανῶς καὶ ἀντιστρόφως.

*Ιδιότης 4η. Ρίζα ἄλλης ρίζης ἀριθμοῦ τινὸς ισοῦται μὲν ρίζαν του αὐτοῦ ἀριθμοῦ, έχουσαν δείκτην τὸ γινόμενον τῶν δεικτῶν.

*Απόδειξις : Θὰ ἀποδείξωμεν ὅτι : $\sqrt[\nu]{\sqrt[\mu]{\alpha}} = \sqrt[\nu\mu]{\alpha}$ (1)

*Ψυοῦμεν τὰ μέλη τῆς ισότητας εἰς τὴν δύναμιν μν.

*Έχομεν : $\left(\sqrt[\nu]{\sqrt[\mu]{\alpha}}\right)^{\nu\mu} = \left[\left(\sqrt[\nu]{\sqrt[\mu]{\alpha}}\right)^\nu\right]^\mu = \left(\sqrt[\nu]{\alpha}\right)^\mu = \alpha$ καὶ $\left(\sqrt[\nu\mu]{\alpha}\right)^{\nu\mu} = \alpha$

Ωστε κατὰ τὴν βοηθητικὴν πρότασιν τὰ μέλη τῆς (1) εἰναι ἵσα.

*Ιδιότης 5η Ρίζα ύψουται εἰς δύναμιν, ἂν ύψωθη εἰς τὴν δύναμιν αὐτὴν τὸ ύπορριζον καὶ τοῦ ἔξαγομένου ἔξαχθη ἡ ρίζα τῆς αὐτῆς τάξεως.

*Απόδειξις. Θὰ ἀποδείξωμεν ὅτι : $\left(\sqrt[\nu]{\alpha}\right)^\mu = \sqrt[\nu]{\alpha^\mu}$

*Έχομεν : $\left(\sqrt[\nu]{\alpha}\right)^\mu = \underbrace{\sqrt[\nu]{\alpha} \cdot \sqrt[\nu]{\alpha} \cdot \sqrt[\nu]{\alpha} \dots \sqrt[\nu]{\alpha}}_{\mu} = \sqrt[\nu]{\alpha \cdot \alpha \cdot \alpha \dots \alpha} = \sqrt[\nu]{\alpha^\mu}$

Οἱ μαθηταὶ νὰ κάνουν τὴν ἀπόδειξιν καὶ μὲ ἄλλον τρόπον.

*Ιδιότης 6η Έάν δείκτην ρίζης καὶ ἐκθέτην του ύπορριζού αὐτῆς πολ/σωμεν ἡ διαιρέσωμεν (ἄν διαιροῦνται) μὲ τὸν αὐτὸν φυσικὸν ἀριθμόν, ἡ ἀριθμητικὴ τιμὴ τῆς ρίζης δὲν μεταβάλλεται.

*Απόδειξις : Θὰ ἀποδείξωμεν ὅτι : $\sqrt[\nu]{\alpha^\mu} = \sqrt[\nu\mu]{\alpha}$ (1) καὶ $\sqrt[\nu]{\alpha^\mu} = \sqrt[\nu\mu:\rho]{\alpha}$ (2), ὅπου $\rho \in \mathbb{N}$ καὶ διαιρέτης τῶν ν καὶ μ .

*Έχομεν, κατόπιν ύψωσεως τῶν μελῶν τῆς (1) εἰς τὴν δύναμιν $\nu\rho$,

$$1) \left(\sqrt[\nu]{\alpha^\mu}\right)^{\nu\rho} = \left[\left(\sqrt[\nu]{\alpha^\mu}\right)^\nu\right]^\rho = (\alpha^\mu)^\rho = \alpha^{\mu\rho} \quad \text{καὶ} \quad \left(\sqrt[\nu\mu\rho]{\alpha}\right)^{\nu\rho} = \alpha^{\mu\rho}$$

2) Θέτομεν $\nu : \rho = k \in \mathbb{N}$, ὅπότε $\nu = kp$, ἡ δὲ (2) γράφεται $\sqrt[\nu]{\alpha^\mu} = \sqrt[kp]{\alpha^{\mu:\rho}}$. Υψοῦμεν τὰ μέλη της εἰς τὴν δύναμιν ρk

$$\text{Έχομεν} \quad \left(\sqrt[\nu\mu\rho]{\alpha}\right)^{kp} = \alpha^{\mu\rho} \quad \text{καὶ} \quad \left(\sqrt[kp]{\alpha^{\mu:\rho}}\right)^{kp} = \left[\left(\sqrt[k]{\alpha^{\mu:\rho}}\right)^k\right]^\rho = (\alpha^{\mu:\rho})^\rho = \alpha^{\mu\rho}$$

"Ωστε κατά τὴν βοηθητικὴν πρότασιν τὰ μέλη τῶν ἴσοτήτων (1) καὶ (2) ισοῦνται.

Αξιοσημείωτος παρατήρησις: Τὰς ἀνωτέρω ιδιότητας ἔξετάσαμεν, ὑπόθετοντες θετικὰ τὰ ὑπόρριζα. Ἐάν δύμως τὰ ὑπόρριζα εἰναι σχετικοὶ ἀριθμοὶ ἀπαιτεῖται ιδιαιτέρα προσοχὴ κατὰ τὴν ἐφαρμογὴν τῶν ιδιοτήτων τούτων, ὡς φαίνεται εἰς τὰ κάτωθι παραδείγματα.

Παραδείγματα: 1) Δὲν δυνάμεθα νὰ γράψωμεν $\sqrt{\alpha} \sqrt{\beta} = \sqrt{\alpha\beta}$, ἐάν $\alpha > 0$ καὶ $\beta < 0$ ή ἐάν $\alpha < 0$ καὶ $\beta < 0$, οὔτε $\sqrt{\alpha} / \sqrt{\beta} = \sqrt{\alpha/\beta}$. Ἐνῶ ἐάν $\alpha < 0$ καὶ $\beta < 0$, δυνάμεθα νὰ γράψωμεν $\sqrt{\alpha\beta} = \sqrt{-\alpha} \cdot \sqrt{-\beta}$ καὶ $\sqrt{\frac{\alpha}{\beta}} = \sqrt{-\alpha}/\sqrt{-\beta}$, διότι $-\alpha > 0$ καὶ $-\beta > 0$.

$$2) \text{Δὲν δυνάμεθα νὰ γράψωμεν } \sqrt{\sqrt[3]{\alpha}} = \sqrt[6]{\alpha} \text{ ἀν } \alpha < 0.$$

$$3) \text{Δὲν δυνάμεθα νὰ γράψωμεν } \alpha\sqrt{\beta} = \sqrt{\alpha^2\beta} \text{ ἐάν } \alpha < 0, \beta > 0, \text{ τὸ δρθὸν εἰναι } \alpha\sqrt{\beta} = -|\alpha| \sqrt{\beta} = -\sqrt{\alpha^2\beta}.$$

$$4) \text{Δὲν δυνάμεθα νὰ γράψωμεν } \sqrt[3]{\alpha^5} = \sqrt[6]{\alpha^{10}} \text{ ἐάν } \alpha < 0, \text{ διότι τὰ μέλη τῆς ισότητος εἰναι ἐτερόσημα καὶ συνεπῶς διάφορα. Τὸ δρθὸν εἰναι } \sqrt[3]{\alpha^5} = \sqrt[3]{-(\alpha^5)} = -\sqrt[3]{(-\alpha)^5} = -\sqrt[6]{(-\alpha)^{10}} = -\sqrt[6]{\alpha^{10}}.$$

$$5) \text{Δὲν δυνάμεθα νὰ γράψωμεν } \sqrt[6]{\alpha^2} = \sqrt[3]{\alpha} \text{ ἐάν } \alpha < 0, \text{ διότι οἱ ἀριθμοὶ } \sqrt[3]{\alpha^2} \text{ καὶ } \sqrt[6]{\alpha} \text{ εἰναι ἐτερόσημοι. Τὸ δρθὸν εἰναι : } \sqrt[6]{\alpha^2} = \sqrt[6]{(-\alpha)^2} = \sqrt[3]{-\alpha} > 0.$$

75. ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕ ΑΡΡΗΤΟΥΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ.

Καλεῖται ἄρρητος παράστασις, κάθε ἀριθμητικὴ ἢ ἐγγράμματος παράστασις περιέχουσα ἐν τουλάχιστον ριζικόν.

Αἱ παραστάσεις $\alpha + \beta \sqrt{2}, \frac{\alpha}{3 + \sqrt{\beta}}, \sqrt{x + \psi}$ εἰναι ἄρρητοι.

1) Πρόσθεσις καὶ ἀφάρεσις.

ΟΡΙΣΜΟΣ. Ριζικὰ ἔχοντα τὸν αὐτὸν δείκτην καὶ τὸ αὐτὸν ὑπόρριζον δύναζονται **δημοια.** Συντελεστὴς δὲ ριζικοῦ καλεῖται ὁ πρὸ αὐτοῦ εύρισκόμενος παράγων.

Διὰ νὰ εὕρωμεν τὸ ἀλγεβρικὸν ἄθροισμα ἀρρήτων μονωνύμων, δύμοίων ὡς πρὸς τὸ ριζικὸν ποὺ περιέχουν, σχηματίζομεν ἐν ἄρρητον μονώνυμον δημοιον ὡς πρὸς τὸ ριζικόν, πρὸς τὰ δοθέντα μὲ συντελεστὴν τὸ ἀλγεβρικὸν ἄθροισμα τῶν συντελεστῶν τῶν ριζικῶν τῶν δοθέντων μονωνύμων.

Παραδείγματα: α) Τὸ ἄθροισμα τῶν μονωνύμων $-3\sqrt[3]{\alpha^2\beta}, \sqrt[3]{\alpha^2\beta}, \frac{1}{2}\sqrt[3]{\alpha^2\beta}, -2\sqrt[3]{\alpha^2\beta}$ ισοῦται μὲ $(-3 + 1 + \frac{1}{2} - 2)\sqrt[3]{\alpha^2\beta} = -\frac{7}{2}\sqrt[3]{\alpha^2\beta}$

$$\beta) \text{ Νὰ εύρεθῇ τὸ ἄθροισμα } \sqrt[3]{3\alpha^4x} - 2\sqrt[3]{3\alpha x} + \sqrt[3]{24\alpha^4x}$$

"Εχομεν $\sqrt[3]{3\alpha^4x} - 2\sqrt[3]{3\alpha x} + \sqrt[3]{24\alpha^4x} = \alpha \sqrt[3]{3\alpha x} - 2\sqrt[3]{3\alpha x} + 2\alpha \sqrt[3]{3\alpha x} = (\alpha - 2 + 2\alpha) \sqrt[3]{3\alpha x} = (3\alpha - 2) \sqrt[3]{3\alpha x}.$

2) Πολλαπλασιασμός καὶ διαίρεσις

Ο πολ/σμὸς καὶ ἡ διαίρεσις ἀρρήτων παραστάσεων γίνεται ὅπως καὶ εἰς τὰς ρητὰς ἀλγεβρικὰς παραστάσεις. Συνεπῶς πρέπει τὰ ριζικὰ τῶν παραστάσεων νὰ εἰναι ἡ νὰ γίνουν τοῦ αὐτοῦ δείκτου. Ριζικὰ δὲ διαφόρων δεικτῶν τρέπονται εἰς ριζικὰ τοῦ αὐτοῦ δείκτου, ἐὰν δείκτης καὶ ἑκθέτης ὑπορρίζου ἔκαστου ἔξι αὐτῶν πολλαπλασιασθῇ ἐπὶ τὸ πηλίκον τῆς διαιρέσεως τοῦ Ε.Κ.Π. τῶν δεικτῶν διὰ τοῦ δείκτου τοῦ ριζικοῦ.

Παραδείγματα : α) $3\sqrt[3]{\alpha^2\gamma} \cdot \sqrt[3]{\alpha\gamma} \cdot \sqrt[3]{\gamma^4} = 3\sqrt[3]{(\alpha^2\gamma)(\alpha\gamma)\gamma^4} = 3\sqrt[3]{\alpha^3\gamma^6} = 3\alpha\gamma^2$

β) Νὰ εύρεθῇ τὸ γινόμενον $A = \sqrt[3]{\alpha} \cdot \sqrt[4]{\beta} \cdot \sqrt[4]{\gamma}$.
ΕΚΠ δεικτῶν τὸ 12. Οὕτω : $A = \sqrt[12]{\alpha^6} \cdot \sqrt[12]{\beta^4} \cdot \sqrt[12]{\gamma^3} = \sqrt[12]{\alpha^6\beta^4\gamma^3}$

γ) Τὸ πηλίκον : $\frac{\sqrt[\mu]{\alpha}}{\sqrt[\nu]{\beta}} = \frac{\sqrt[\mu\nu]{\alpha^\nu}}{\sqrt[\mu\nu]{\beta^\mu}} = \sqrt[\mu\nu]{\frac{\alpha^\nu}{\beta^\mu}} \quad (\alpha, \beta \in \mathbb{R}^+)$

δ) Νὰ ἐκτελεσθοῦν αἱ πράξεις $(\sqrt{\frac{x\psi^2}{\alpha^3}} + \sqrt{\frac{x^2}{\psi}}) \cdot (\sqrt{x\alpha} + \sqrt{\psi^3})$. "Εχομεν:
 $A = \sqrt{\frac{x\psi^2}{\alpha^3} \cdot \alpha x} + \sqrt{\frac{x\psi^2}{\alpha^3} \cdot \psi^3} + \sqrt{\frac{x^2}{\psi} \cdot \alpha x} + \sqrt{\frac{x^2}{\psi} \cdot \psi^3} = \sqrt{\frac{x^2\psi^2}{\alpha^2}} + \sqrt{\frac{x\psi^5}{\alpha^3}} + \sqrt{\frac{\alpha x^3}{\psi}} + \sqrt{\frac{x^2\psi^2}{\alpha^3}} = \frac{x\psi}{\alpha} + \frac{\psi^2}{\alpha} \sqrt{\frac{x\psi}{\alpha}} + x \sqrt{\frac{x\alpha}{\psi}} + x\psi$

3. Απλοποίησις.

Διὰ τῆς ἐφαρμογῆς τῶν ιδιοτήτων τῶν ριζῶν, εἰναι δυνατόν πολλάκις ριζικὰ ἡ ἄρρητοι παραστάσεις νὰ ἀπλουστευθοῦν ἢ, ὅπως λέγομεν, νὰ ἀπλοποιηθοῦν.

Παραδείγματα : α) $\sqrt[3]{\frac{1}{3} x \sqrt{\frac{x}{3}}} = \sqrt[3]{\sqrt{\frac{x^2}{9} \cdot \frac{x}{3}}} = \sqrt[3]{\sqrt{\frac{x^3}{27}}} = \sqrt[6]{\left(\frac{x}{3}\right)^3} = \sqrt[6]{\frac{x}{3}}$
 β) $\sqrt[4]{\frac{6}{\sqrt{\alpha^2}}} \cdot \sqrt[3]{\frac{3}{\sqrt{\alpha^2}}} \cdot \sqrt[12]{\alpha^5} = \sqrt[4]{\alpha^2} \cdot \sqrt[12]{\alpha^2} \cdot \sqrt[12]{\alpha^5} = \sqrt[4]{\alpha^9} = \sqrt[4]{\alpha^3} \quad (\alpha > 0)$

76. ΤΡΟΠΗ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΡΗΤΟΝ ΠΑΡΟΝΟΜΑΣΤΗΝ ΕΙΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΝ ΜΕ ΡΗΤΟΝ ΠΑΡΟΝΟΜΑΣΤΗΝ.

Σκόπτιμον εἰναι νὰ μετατρέπωμεν, ἐφ' ὅσον τοῦτο εἰναι δυνατόν, κλάσματα μὲ ἄρρητον παρονομαστὴν εἰς ισοδύναμα μὲ ρητὸν παρονομαστὴν, διότι οὕτω διευκολύνονται πολὺ αἱ πράξεις.

Συνηθέστεραι μορφαὶ τοιούτων κλασμάτων εἰναι αἱ ἀκόλουθοι :

$$1. \text{ Κλάσματα τῆς μορφῆς } A = \frac{\alpha}{\sqrt[n]{\beta^n - \mu}}, \quad \beta > 0, n, \mu \in \mathbb{N} \text{ καὶ } n > \mu$$

Πολλαπλασιάζομεν τοὺς ὄρους τοῦ κλάσματος ἐπὶ $\sqrt[n]{\beta^n - \mu}$

$$\text{Οὔτω : } A = \frac{\alpha \sqrt[n]{\beta^n - \mu}}{\sqrt[n]{\beta} \cdot \sqrt[n]{\beta^n - \mu}} = \frac{\alpha \sqrt[n]{\beta^n - \mu}}{\sqrt[n]{\beta^n} \cdot \sqrt[n]{\beta^n - \mu}} = \frac{\alpha \sqrt[n]{\beta^n - \mu}}{\sqrt[n]{\beta^n}} = \frac{\alpha \sqrt[n]{\beta^n - \mu}}{\beta}$$

$$\text{π.χ. } \frac{3}{\sqrt[3]{5}} = \frac{3 \sqrt[3]{5^2}}{\sqrt[3]{5} \cdot \sqrt[3]{5^2}} = \frac{3 \sqrt[3]{25}}{\sqrt[3]{25}} = \frac{3 \sqrt[3]{25}}{5}$$

$$2. \text{ Κλάσματα τῆς μορφῆς } A = \frac{\alpha}{\beta \pm \sqrt[\gamma]{\gamma}} \quad \text{ἢ } B = \frac{\alpha}{\sqrt[\gamma]{\beta} \pm \sqrt[\gamma]{\gamma}}, \quad \beta, \gamma \in \mathbb{R}^+$$

Όρισμός. Ἀρρητοὶ παραστάσεις ἀρτίας τάξεως διαφέρουσαι μόνον ως πρὸς τὸ πρόστημα ἔνδιοι ριζικοῦ, δύνομάζονται συγγεῖς.

α) τὸ κλάσμα A τρέπεται εἰς ίσοδύναμον μὲρητὸν παρονομαστήν, ἐὰν οἱ ὄροι πολ/σθοῦν ἐπὶ τὴν συζυγὴ παράστασιν τοῦ παρονομαστοῦ του, ἢτις εἰναι ἀντιστοίχως $\beta \mp \sqrt[\gamma]{\gamma}$

$$\text{Οὔτω : } A_1 = \frac{\alpha}{\beta + \sqrt[\gamma]{\gamma}} = \frac{\alpha(\beta - \sqrt[\gamma]{\gamma})}{(\beta + \sqrt[\gamma]{\gamma})(\beta - \sqrt[\gamma]{\gamma})} = \frac{\alpha(\beta - \sqrt[\gamma]{\gamma})}{\beta^2 - \gamma}$$

$$\text{καὶ } A_2 = \frac{\alpha}{\beta - \sqrt[\gamma]{\gamma}} = \frac{\alpha(\beta + \sqrt[\gamma]{\gamma})}{(\beta - \sqrt[\gamma]{\gamma})(\beta + \sqrt[\gamma]{\gamma})} = \frac{\alpha(\beta + \sqrt[\gamma]{\gamma})}{\beta^2 - \gamma}$$

β) Πολ/ζομεν τοὺς ὄρους τοῦ κλάσματος B ἐπὶ τὴν συζυγὴ παράστασιν τοῦ παρονομαστοῦ του, ἢτις εἰναι $\sqrt[\gamma]{\beta} \mp \sqrt[\gamma]{\gamma}$

$$\text{Οὔτω : } B_1 = \frac{\alpha}{\sqrt[\gamma]{\beta} + \sqrt[\gamma]{\gamma}} = \frac{\alpha(\sqrt[\gamma]{\beta} - \sqrt[\gamma]{\gamma})}{(\sqrt[\gamma]{\beta} + \sqrt[\gamma]{\gamma})(\sqrt[\gamma]{\beta} - \sqrt[\gamma]{\gamma})} = \frac{\alpha(\sqrt[\gamma]{\beta} - \sqrt[\gamma]{\gamma})}{\beta - \gamma}$$

$$\text{Ἐπίσης } B_2 = \frac{\alpha}{\sqrt[\gamma]{\beta} - \sqrt[\gamma]{\gamma}} = \frac{\alpha(\sqrt[\gamma]{\beta} + \sqrt[\gamma]{\gamma})}{\beta - \gamma}$$

$$\text{π.χ. } \frac{1}{2 - \sqrt{3}} = \frac{2 + \sqrt{3}}{2^2 - 3} = 2 + \sqrt{3}, \quad \frac{1}{\sqrt{2} - \sqrt{3}} = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{3}}{2 - 3} = -(\sqrt{2} + \sqrt{3})$$

$$3. \text{ Κλάσματα τῆς μορφῆς } A = \frac{\alpha}{\sqrt[\beta]{\pm \sqrt[\gamma]{\gamma} \pm \sqrt[\delta]{\delta}}}, \quad \beta, \gamma, \delta \in \mathbb{R}^+.$$

Προκειμένου νὰ τρέψωμεν ἐν ἔξι αὐτῶν εἰς ίσοδύναμον μὲρητὸν παρονομαστήν, πολ/ζομεν τοὺς ὄρους του ἐπὶ μίαν συζυγὴ παράστασιν τοῦ παρονομαστοῦ του.

$$\text{Οὔτω : } A = \frac{\alpha}{\sqrt[\beta]{\pm \sqrt[\gamma]{\gamma} - \sqrt[\delta]{\delta}}} = \frac{\alpha(\sqrt[\beta]{\pm \sqrt[\gamma]{\gamma} + \sqrt[\delta]{\delta}})}{(\sqrt[\beta]{\pm \sqrt[\gamma]{\gamma} - \sqrt[\delta]{\delta}})(\sqrt[\beta]{\pm \sqrt[\gamma]{\gamma} + \sqrt[\delta]{\delta}})} =$$

$$= \frac{\alpha(\sqrt[\beta]{\pm \sqrt[\gamma]{\gamma} + \sqrt[\delta]{\delta}})}{(\sqrt[\beta]{\pm \sqrt[\gamma]{\gamma}})^2 - \delta} = \frac{\alpha(\sqrt[\beta]{\pm \sqrt[\gamma]{\gamma} + \sqrt[\delta]{\delta}})}{(\beta + \gamma - \delta) + 2\sqrt[\beta]{\gamma\delta}}, \quad \text{τὸ δόποιον εἰναι τῆς μορφῆς 2 καὶ}$$

τρέπεται εἰς ίσοδύναμον μὲρητὸν παρονομαστήν ως προηγουμένως.

$$\text{Π.χ. } \frac{A}{\sqrt{2}-\sqrt{3}+\sqrt{5}} = \frac{A(\sqrt{2}-\sqrt{3}-\sqrt{5})}{(\sqrt{2}-\sqrt{3}+\sqrt{5})(\sqrt{2}-\sqrt{3}-\sqrt{5})} = \frac{A(\sqrt{2}-\sqrt{3}-\sqrt{5})}{(\sqrt{2}-\sqrt{3})^2 - 5} =$$

$$= \frac{A(\sqrt{2}-\sqrt{3}-\sqrt{5})}{2+3-5-2\sqrt{6}} = \frac{A(\sqrt{2}-\sqrt{3}-\sqrt{5})}{-2\sqrt{6}} = \frac{A(\sqrt{2}-\sqrt{3}-\sqrt{5})\sqrt{6}}{-12} \text{ κ.λ.π.}$$

Γενικῶς: Κλάσματα τῆς μορφῆς $\frac{\Lambda}{\sqrt{\alpha_1} \pm \sqrt{\alpha_2} \pm \sqrt{\alpha_3} \pm \dots \pm \sqrt{\alpha_v}}$ τρέπονται εἰς ισοδύναμα μὲρη τὸν παρονομαστήν, ἐάν συνεχῶς πολλάζωμεν ἐπὶ μίαν συγχρήματα παράστασιν τοῦ ἑκάστοτε παρονομαστοῦ, μέχρις ὅτου ὁ παρονομαστής γίνῃ ρητός.

4. Κλάσματα τῆς μορφῆς $A = \frac{\kappa}{\sqrt{\alpha} + \sqrt{\beta}}, B = \frac{\lambda}{\sqrt{\alpha} - \sqrt{\beta}}, \alpha, \beta \in \mathbb{R}^+$

1) Διὰ τὸ κλάσμα A διακρίνομεν δύο περιπτώσεις :

α) Ἐὰν $v = 2k+1$, $k \in \mathbb{N}$, τότε τὸ κλάσμα A γράφεται :

$$A = \frac{\kappa}{\sqrt{\alpha} + \sqrt{\beta}} = \frac{\kappa}{\alpha + \beta} \cdot \frac{\alpha + \beta}{\sqrt{\alpha} + \sqrt{\beta}} = \frac{\kappa}{\alpha + \beta} \cdot \frac{(\sqrt{\alpha})^v + (\sqrt{\beta})^v}{\sqrt{\alpha} + \sqrt{\beta}} =$$

$$= \frac{\kappa}{\alpha + \beta} \cdot \left(\sqrt{\alpha^{v-1}} - \sqrt{\alpha^{v-2}}\beta + \sqrt{\alpha^{v-3}}\beta^2 - \dots + \sqrt{\beta^{v-1}} \right)$$

β) Ἐὰν $v = 2k$, $k \in \mathbb{N}$, τότε δύοις ἔχομεν :

$$A = \frac{\kappa}{\sqrt{\alpha} + \sqrt{\beta}} = \frac{\kappa}{\alpha - \beta} \cdot \frac{\alpha - \beta}{\sqrt{\alpha} + \sqrt{\beta}} = \frac{\kappa}{\alpha - \beta} \cdot \frac{(\sqrt{\alpha})^v - (\sqrt{\beta})^v}{\sqrt{\alpha} + \sqrt{\beta}} =$$

$$= \frac{\kappa}{\alpha - \beta} \cdot \left(\sqrt{\alpha^{v-1}} - \sqrt{\alpha^{v-2}}\beta + \sqrt{\alpha^{v-3}}\beta^2 - \dots - \sqrt{\beta^{v-1}} \right)$$

$$\text{Π.χ. } \frac{1}{\sqrt{2} + \sqrt{3}} = \frac{1}{2+3} \cdot \frac{2+3}{\sqrt{2} + \sqrt{3}} = \frac{1}{5} \cdot \frac{(\sqrt{2})^3 + (\sqrt{3})^3}{\sqrt{2} + \sqrt{3}} =$$

$$= \frac{1}{5} \cdot \left(\sqrt[3]{4} - \sqrt[3]{6} + \sqrt[3]{9} \right)$$

2) Τὸ κλάσμα B γράφεται :

$$B = \frac{\lambda}{\sqrt{\alpha} - \sqrt{\beta}} = \frac{\lambda}{\alpha - \beta} \cdot \frac{\alpha - \beta}{\sqrt{\alpha} - \sqrt{\beta}} = \frac{\lambda}{\alpha - \beta} \cdot \frac{(\sqrt{\alpha})^v - (\sqrt{\beta})^v}{\sqrt{\alpha} - \sqrt{\beta}} =$$

$$= \frac{\lambda}{\alpha - \beta} \cdot \left(\sqrt{\alpha^{v-1}} + \sqrt{\alpha^{v-2}}\beta + \dots + \sqrt{\beta^{v-1}} \right)$$

$$\text{Π.χ. } \frac{1}{\sqrt{2} - \sqrt{3}} = \frac{1}{2-3} \cdot \frac{2-3}{\sqrt{2} - \sqrt{3}} = -1 \cdot \frac{(\sqrt{2})^4 - (\sqrt{3})^4}{\sqrt{2} - \sqrt{3}} =$$

$$= -\left(\sqrt[4]{8} - \sqrt[4]{12} + \sqrt[4]{18} + \sqrt[4]{27} \right)$$

Σημείωσις. Ἐὰν τὸ κλάσμα εἴναι τῆς μορφῆς $\Gamma = \frac{M}{\sqrt{\alpha} \pm \sqrt{\beta}}$, ὅπου $\alpha, \beta \in \mathbb{R}^+$ καὶ

$v, \mu \in \mathbb{N}$, τότε πρώτον καθιστῶμεν τὸν παρανομαστὴν ἔχοντα ριζικὰ τοῦ αὐτοῦ δείκτου καὶ ἐπειτα προχωροῦμεν ὡς ἄνω.

$$\text{Π.χ. } \frac{1}{\sqrt[3]{\sqrt{2} + \sqrt{3}}} = \frac{1}{\sqrt[6]{4} + \sqrt[6]{27}} = \frac{1}{4 - 27} \cdot \frac{4 - 27}{\sqrt[6]{4} + \sqrt[6]{27}} =$$

$$= -\frac{1}{23} \cdot \frac{\left(\sqrt[6]{4}\right)^6 - \left(\sqrt[6]{27}\right)^6}{\sqrt[6]{4} + \sqrt[6]{27}} = -\frac{1}{23} \left(\sqrt[6]{4^6} - \sqrt[6]{4^4 \cdot 27} + \sqrt[6]{4^3 \cdot 27^2} - \sqrt[6]{4^2 \cdot 27^3} + \sqrt[6]{4 \cdot 27^4} - \sqrt[6]{27^5} \right)$$

77. ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕ ΡΗΤΟΝ ΕΚΘΕΤΗΝ.

Εἴδομεν ὅτι, κατά τὴν 6ην ιδιότητα τῶν ριζῶν, δυνάμεθα νὰ διαιρέσωμεν δείκτην ριζικοῦ καὶ ἐκθέτην τοῦ ὑπορρίζου του διὰ τοῦ αὐτοῦ φυσικοῦ ἀριθμοῦ.

Οὕτω, ἐὰν $\alpha > 0$, $\mu, v \in \mathbb{N}$ καὶ $\mu = nv$, ὅπου $n \in \mathbb{N}$, τότε διὰ τὴν πρωτεύουσαν ρίζαν $\sqrt[n]{\alpha^v}$ θὰ ἔχωμεν :

$\sqrt[n]{\alpha^v} = \sqrt[n]{\alpha^{\mu v}} = (\sqrt[n]{\alpha^\mu})^v = \alpha^{\frac{\mu}{n} v} = \alpha^{\frac{\mu}{v}}$. Δηλαδὴ βλέπομεν ὅτι τὸ σύμβολον $\alpha^{\frac{\mu}{v}}$ ἔχει τὴν ἔννοιαν τοῦ συμβόλου $\sqrt[n]{\alpha^\mu}$, ἐφ' ὅσον βεβαίως τὸ $\frac{\mu}{v}$ εἶναι φυσικός. Ἐὰν δῆλος τὸ $\frac{\mu}{v}$ δὲν εἶναι φυσικὸς τότε τὸ σύμβολον $\alpha^{\frac{\mu}{v}}$ δὲν ἔχει καμμίαν ἔννοιαν, συμφώνως πρὸς τὸν ὀρισμὸν τῆς δυνάμεως. Σκόπιμον εἶναι, ὅπως γενικεύσωμεν τὴν ἔννοιαν τοῦ συμβόλου $\alpha^{\frac{\mu}{v}}$ καὶ διὰ τὴν περίπτωσιν, καθ' ἥν τὸ $\frac{\mu}{v}$ δὲν εἶναι φυσικός, ἀλλὰ ἐν γένει ρητός.

Θὰ καλοῦμεν τὸ σύμβολον $\alpha^{\frac{\mu}{v}}$ δύναμιν τοῦ α μὲν ἐκθέτην ρητόν, καὶ ὁρίζομεν νὰ παριστᾶ τὴν νυοστὴν πρωτεύουσαν ρίζαν τῆς μυοστῆς δυνάμεως τοῦ α , ἢτοι τὴν $\sqrt[n]{\alpha^\mu}$, ἂν $\frac{\mu}{v} > 0$ καὶ $\alpha > 0$ καὶ τὴν ἀντίστροφον αὐτῆς $\frac{1}{\sqrt[n]{\alpha^\mu}}$, ἂν $\frac{\mu}{v} < 0$ καὶ

$\alpha > 0$

Θὰ γράψωμεν $\alpha^{\frac{\mu}{v}} = \sqrt[n]{\alpha^\mu}$ καὶ $\alpha^{-\frac{\mu}{v}} = \frac{1}{\sqrt[n]{\alpha^\mu}} = \frac{1}{\sqrt[n]{\alpha^{\frac{\mu}{v}}}}$, ὅπου $\mu, v \in \mathbb{N}$ καὶ $\alpha > 0$.

$$\text{Π. χ. } \alpha^{\frac{4}{3}} = \sqrt[3]{\alpha^4}, \alpha^{1,2} = \alpha^{\frac{12}{10}} = \alpha^{\frac{6}{5}} = \sqrt[5]{\alpha^6}, \alpha^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{\alpha}}$$

Σημείωσις Πρέπει νὰ ἀποφεύγωμεν νὰ ἐφαρμόζωμεν τὸν συμβολισμὸν $\alpha^{\frac{\mu}{v}}$ ὅταν $\alpha < 0$, διότι πιθανὸν νὰ στερῆται ἔννοιας.

$$\text{Π.χ. } (-8)^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{-8} = -2, \text{ ἀλλὰ } (-8)^{\frac{6}{2}} = \sqrt[2]{(-8)^6} = \sqrt[6]{8^2} = \sqrt[3]{8} = +2$$

$$\text{Προφανῶς } (-8)^{\frac{1}{3}} \neq (-8)^{\frac{2}{6}}$$

*Ωστε, βάσει τῶν τεθέντων ὀρισμῶν, πᾶσα ρίζα δύναται νὰ γραφῇ ὡς δύναμις μὲν ἐκθέτην ρητόν.

Αἱ νέαι αύται δυνάμεις μὲ ρητὸν ἐκθέτην ὑπακούουν εἰς τὰς ιδιότητας τῶν δυνάμεων μὲ ἐκθέτας σχετικοὺς ἀκεραίους.

78. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

1) Τὸ γινόμενον δυνάμεων τοῦ αὐτοῦ ἀριθμοῦ $\alpha > 0$:

$$\text{Έχομεν : } \alpha^{\frac{\mu}{v}} \cdot \alpha^{\frac{\kappa}{\lambda}} = \sqrt[v]{\alpha^\mu} \cdot \sqrt[\lambda]{\alpha^\kappa} = \sqrt[v\lambda]{\alpha^{\mu\lambda}} \cdot \sqrt[v\lambda]{\alpha^{\kappa v}} = \sqrt[v\lambda]{\alpha^{\mu\lambda+\kappa v}} = \\ = \alpha^{\frac{\mu\lambda+\kappa v}{v\lambda}} = \alpha^{\frac{\mu}{v}} + \frac{\kappa}{\lambda}$$

2) "Υψωσις δυνάμεως εἰς δύναμιν :

$$\text{Έχομεν } \left(\alpha^{\frac{\mu}{v}}\right)^{\frac{\kappa}{\lambda}} = \sqrt[\lambda]{\left(\alpha^{\frac{\mu}{v}}\right)^{\kappa}} = \sqrt[\lambda]{\left(\sqrt[v]{\alpha^\mu}\right)^{\kappa}} = \sqrt[\lambda]{\sqrt[v]{\alpha^{\mu\kappa}}} = \sqrt[\lambda v]{\alpha^{\mu\kappa}} = \\ = \alpha^{\frac{\mu\kappa}{\lambda v}} = \alpha^{\frac{\mu}{v}} \cdot \frac{\kappa}{\lambda}$$

3) "Υψωσις γινομένου εἰς δύναμιν :

$$\text{Έχομεν : } (\alpha \cdot \beta \cdot \gamma)^{\frac{\mu}{v}} = \sqrt[v]{(\alpha \cdot \beta \cdot \gamma)^\mu} = \sqrt[v]{\alpha^\mu \cdot \beta^\mu \cdot \gamma^\mu} = \\ = \sqrt[v]{\alpha^\mu} \cdot \sqrt[v]{\beta^\mu} \cdot \sqrt[v]{\gamma^\mu} = \alpha^{\frac{\mu}{v}} \cdot \beta^{\frac{\mu}{v}} \cdot \gamma^{\frac{\mu}{v}}$$

4) Τὸ πηλίκον δόνο δυνάμεων τοῦ $\alpha > 0$:

$$\text{Έχομεν : } \alpha^{\frac{\mu}{v}} : \alpha^{\frac{\kappa}{\lambda}} = \sqrt[v]{\alpha^\mu} : \sqrt[\lambda]{\alpha^\kappa} = \sqrt[v\lambda]{\alpha^{\mu\lambda}} : \sqrt[v\lambda]{\alpha^{\kappa v}} = \sqrt[v\lambda]{\alpha^{\mu\lambda-\kappa v}} = \\ = \sqrt[v\lambda]{\alpha^{\mu\lambda-\kappa v}} = \alpha^{\frac{\mu\lambda-\kappa v}{v\lambda}} = \alpha^{\frac{\mu}{v}} - \frac{\kappa}{\lambda} \quad \left(\frac{\mu}{v} > \frac{\kappa}{\lambda} \right)$$

5) "Υψωσις κλάσματος εἰς δύναμιν :

$$\text{Έχομεν : } \left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^{\frac{\mu}{v}} = \sqrt[v]{\left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^\mu} = \sqrt[v]{\frac{\alpha^\mu}{\beta^\mu}} = \frac{\sqrt[v]{\alpha^\mu}}{\sqrt[v]{\beta^\mu}} = \frac{\alpha^{\frac{\mu}{v}}}{\beta^{\frac{\mu}{v}}}$$

Δι' ὅλας τὰς περιπτώσεις ὑπετέθη $\alpha, \beta \in \mathbb{R}^+$ καὶ $\mu, v, \kappa, \lambda \in \mathbb{N}$

Σημείωσις. Ἐπειδὴ $\alpha^{-\frac{\mu}{v}} = \frac{1}{\alpha^{\frac{\mu}{v}}}$, ἐπεταὶ ὅτι αἱ ἀνωτέρω ιδιότητες ισχύουν καὶ διὰ

δυνάμεις μὲ ἐκθέτας ρητούς ἀρνητικούς.

Οἱ μαθηταὶ δύνανται νὰ διατυπώσουν τοὺς κανόνας τῶν ιδιοτήτων τῶν δυνάμεων μὲ ἐκθέτας ρητούς ἀριθμούς.

Παρατήρησις : Ἐκ τῶν ἀνωτέρω συνάγεται ὅτι, ὁ λογισμὸς μὲ ριζικὰ καθίσταται πολὺ εὔκολος, ὅταν ταῦτα ἀντικατασταθοῦν μὲ δυνάμεις μὲ ἐκθέτας ρητούς.

$$\text{Έφαρμογή : } \left(\sqrt[3]{\alpha^2} \cdot \sqrt[5]{\alpha^3} \cdot \sqrt{\alpha}\right) : \sqrt[6]{\alpha^9} = \left(\alpha^{\frac{2}{3}} \cdot \alpha^{\frac{3}{5}} \cdot \alpha^{\frac{1}{2}}\right) : \alpha^{\frac{9}{6}} = \\ = \alpha^{\frac{53}{30}} : \alpha^{\frac{9}{6}} = \alpha^{\frac{4}{15}} = \sqrt[15]{\alpha^4}$$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

224) Νὰ εύρεθοῦν αἱ πρωτεύουσαι ρίζαι τῶν ἀριθμῶν :

$$\sqrt[3]{\frac{3}{8}}, \sqrt[3]{\frac{3}{-27}}, \sqrt[4]{\frac{4}{81}}, \sqrt[5]{\frac{5}{32}}, \sqrt[5]{\frac{5}{-243}}, \sqrt[3]{\frac{1}{16}}, \sqrt[5]{\frac{-1}{27}}, \sqrt[5]{\frac{1}{243}}, \sqrt[3]{0,0256}$$

225) Νὰ εύρεθοῦν δλαι αἱ πραγματικαὶ ρίζαι τετάρτης τάξεως τῶν ἀριθμῶν :

$$16, -16, 49^{\frac{1}{2}}, -10^{\frac{1}{2}}, 81, 0,0081$$

226) Νὰ ἀπλοποιηθοῦν αἱ ἀκόλουθοι παραστάσεις :

$$\sqrt[4]{\frac{4}{25}}, \sqrt[6]{\frac{6}{49}}, \sqrt[5]{\frac{5}{9^{10}}}, \sqrt[10]{\frac{10}{32}}, \sqrt[9]{\frac{9}{-512}}, \sqrt[15]{\frac{15}{-243}}, \sqrt[3]{\frac{3}{-27\alpha^6\beta^3}}, \sqrt[10]{\frac{10}{-\alpha^2\beta^6\gamma^{10}}}, \sqrt[18]{\frac{18}{64\alpha^{12}\psi^{30}}}$$

227) Νὰ ἔσαχθοῦν ἑκτὸς τῆς ρίζης οἱ κατάλληλοι παράγοντες :

$$\sqrt[3]{\frac{3}{40}}, \sqrt[3]{\frac{3}{-24}}, \sqrt[5]{\frac{5}{320}}, \sqrt[5]{\frac{5}{-96}}, \sqrt[4]{\frac{4}{0,1250}}, \sqrt[3]{\frac{3}{54x^3\psi^4}}, \sqrt[4]{\frac{4}{32x^8\psi\omega^5}}, \sqrt[x]{\frac{x}{x^{v+1}}}, \sqrt[v]{\frac{v}{x^{v+1}\psi^{v+2}}}, \sqrt[16]{\frac{16}{x^2\psi}}$$

228) Οἱ ἑκτὸς τῶν ριζῶν παράγοντες νὰ εἰσαχθοῦν ἐντὸς αὐτῆς.

$$\frac{3}{3\sqrt{2}}, \frac{3}{-2\sqrt{-7}}, \alpha\sqrt{3\alpha}, \alpha^2\beta\sqrt{-\alpha\beta}, -2\alpha\beta^2\gamma^3\sqrt{-\alpha\beta\gamma}, (\alpha + \beta)\sqrt{\alpha - \beta}, \frac{3x^2\psi}{\omega}\sqrt{\frac{\omega^2}{9x^2\psi^2}},$$

$$\frac{\alpha + \beta}{\alpha - \beta}\sqrt{\frac{\alpha - \beta}{\alpha + \beta}}.$$

229) Νὰ εύρεθοῦν τὰ ἀκόλουθα γινόμενα καὶ πηλίκα :

$$1) 5\sqrt[3]{18} \cdot 3\sqrt[3]{8}, \quad 2) \sqrt[3]{6} \cdot \sqrt[3]{30} \cdot \sqrt[3]{150}, \quad 3) \sqrt[4]{24} \cdot \sqrt[4]{48} \cdot \sqrt[4]{48}$$

$$4) \sqrt[3]{75\alpha\beta\gamma} \cdot 2\sqrt[3]{6\alpha^2\beta\gamma^2} \cdot \sqrt[3]{60\alpha^3\beta\gamma^3}, \quad 5) \sqrt[x]{x^2\omega^{v-2}} \cdot \sqrt[v]{\psi^{v-3}\omega^3} \cdot \sqrt[v]{x^{v-3}\psi^3}$$

$$6) \sqrt[5]{\alpha} \cdot \sqrt[10]{\alpha^3} \cdot \sqrt[4]{\alpha^4}, \quad 7) 3\sqrt[4]{\alpha} \cdot 7\sqrt[6]{\alpha^5\beta} \cdot \sqrt[12]{\alpha^3\beta^{10}}, \quad 8) 5\sqrt[4]{18} : \sqrt[4]{8},$$

$$9) 4\sqrt[3]{-12} : 2\sqrt[2]{2}, \quad 10) \left(\sqrt[3]{\alpha^6\beta^4} \cdot \alpha\sqrt{\beta^3} \right) : \sqrt{\alpha^2\beta^{12}}$$

230) Νὰ ἀπλοποιηθοῦν αἱ ἀκόλουθοι παραστάσεις :

$$\sqrt[5]{\frac{3}{1-\alpha^5}}, \sqrt[3]{\frac{3}{\frac{4}{V_3}}}, \left(\sqrt[7]{\frac{\alpha}{-\alpha V_{3\alpha}}} \right)^{14}, \left(\sqrt[3]{\frac{7}{1-8\alpha^3}} \right)^7, \sqrt[\nu-1]{\frac{\alpha}{\frac{\nu}{V\alpha}}},$$

$$\sqrt[3]{2\sqrt[2]{\sqrt[2]{\sqrt[2]{2}}}}, \sqrt[3]{\frac{\alpha}{\beta}\sqrt{\frac{\beta^2}{\alpha^3}\sqrt{\frac{\beta^3}{\alpha^3}}}}, \sqrt[3]{9\alpha^2}\sqrt[3]{\frac{2\beta}{3\alpha}} \cdot \sqrt[3]{4\beta^2}\sqrt[3]{\frac{3\alpha}{2\beta}}$$

231) Νὰ εύρεθοῦν τὰ ἀλγεβρικὰ ἀθροίσματα :

$$1) \sqrt[3]{54} - \sqrt[3]{16} + \sqrt[3]{12} - \sqrt[3]{3}, \quad 2) 4\sqrt[3]{24} + \sqrt[3]{-3} + \sqrt[3]{-81}, \quad 3) \sqrt[6]{16} - \sqrt[4]{4} + \sqrt[3]{-4},$$

$$4) \sqrt[4]{50} - \sqrt[4]{324} - \sqrt[6]{2916} + \sqrt[8]{256}, \quad 5) 9\sqrt[3]{2\alpha^6x} - 3\sqrt[3]{16\alpha^8x} + \sqrt[3]{2x}$$

$$6) \sqrt{4\alpha^2+4} - 5\sqrt{1+\alpha^2} + \sqrt{x^2+\alpha^2x^2} + \sqrt{9\alpha^2+9}$$

$$7) 5\sqrt{\frac{\alpha^3+\alpha^2}{x^3-x^2}} - \frac{1}{x}\sqrt{\frac{4\alpha^2+4\alpha^3}{x-1}} - \frac{3\alpha}{x}\sqrt{\frac{\alpha+1}{x-1}}$$

232) Νὰ ἐκτελεσθοῦν αἱ ἀκόλουθοι πράξεις :

$$1) (\sqrt[3]{81} + 2\sqrt[3]{24} - 4\sqrt[3]{75}) \cdot \sqrt[3]{-3}, \quad 2) (x - \alpha + \sqrt{\beta + \alpha^2})(x - \alpha - \sqrt{\beta + \alpha^2})$$

- 3) $(\sqrt[3]{\alpha} + \sqrt[3]{\beta})(\sqrt[3]{\alpha^2} - \sqrt[3]{\alpha\beta} + \sqrt[3]{\beta^2})$, 4) $(\sqrt[3]{x} - \sqrt[3]{\psi})(x + \psi + \sqrt[3]{x\psi^2} + \sqrt[3]{x^2\psi})$
 5) $(x\sqrt[4]{x} - \psi\sqrt[4]{\psi}):(\sqrt[4]{x} - \sqrt[4]{\psi})$, 6) $(\sqrt[4]{x^3} - \sqrt[4]{\psi^3}):(\sqrt[4]{x} + \sqrt[4]{x\psi} + \sqrt[4]{\psi})$
 7) $(3\alpha\sqrt[3]{\alpha} + \alpha + \sqrt[3]{\alpha} - 2) : (3\sqrt[3]{\alpha} - 2)$

233) Τὰ κάτωθι κλάσματα νὰ τραπποῦν εἰς ίσοδύναμα μὲρη της παρανομαστήν.

$$1) \frac{\alpha}{\beta\sqrt[3]{\alpha}}, \frac{\alpha^3}{\sqrt[3]{\alpha}}, \frac{\mu\nu}{\sqrt[3]{\mu^2\nu^2}}, \frac{\alpha+\beta}{\sqrt[3]{\alpha+\beta}}, 2) \frac{\alpha}{1+\sqrt[3]{\alpha}}, \frac{7}{\sqrt[3]{x} + \sqrt[3]{\psi}}, \frac{\alpha+\sqrt[3]{\beta}}{\alpha-\sqrt[3]{\beta}},$$

$$\frac{\sqrt[3]{\psi} + \sqrt[3]{x}}{x + \sqrt[3]{\psi}}, 3) \frac{\sqrt[3]{x+\psi} + \sqrt[3]{x-\psi}}{\sqrt[3]{x+\psi} - \sqrt[3]{x-\psi}}, \frac{\sqrt[3]{x}-\sqrt[3]{\psi}}{1-\sqrt[3]{x}+\sqrt[3]{\psi}}, \frac{\alpha-\beta}{\alpha+\beta+2\sqrt[3]{\alpha\beta}},$$

$$\frac{\sqrt[3]{2}-\sqrt[3]{3}}{\sqrt[3]{5}+\sqrt[3]{6}}, \frac{-\sqrt[3]{5}+\sqrt[3]{6}}{-\sqrt[3]{3}-\sqrt[3]{2}}, 4) \frac{5}{\sqrt[3]{2}+\sqrt[3]{3}}, \frac{5}{1-\sqrt[3]{2}}, \frac{1}{\sqrt[3]{3}-\sqrt[3]{2}}, \frac{11}{\sqrt[3]{4}-\sqrt[3]{3}}$$

234) Νὰ έκτελεσθοῦν αἱ ἀκόλουθοι πράξεις :

$$1) \frac{x+\sqrt{x^2-1}}{x-\sqrt{x^2-1}} - \frac{x-\sqrt{x^2-1}}{x+\sqrt{x^2-1}}, 2) \frac{\sqrt{2x+\psi}+\sqrt{2x-\psi}}{\sqrt{2x+\psi}-\sqrt{2x-\psi}} + \frac{\sqrt{2x+\psi}-\sqrt{2x-\psi}}{\sqrt{2x+\psi}+\sqrt{2x-\psi}} \\ 3) \frac{\sqrt{1+\alpha^2}}{\sqrt{1-\alpha^2}} + \frac{\sqrt{1-\alpha^2}}{\sqrt{1+\alpha^2}} - \frac{2}{\sqrt{1-\alpha^4}}, 4) \frac{1}{\sqrt[3]{\alpha^2}+\sqrt[3]{\alpha}+1} + \frac{1}{\sqrt[3]{\alpha^2}-\sqrt[3]{\alpha}+1}$$

235) Νὰ έκτελεσθοῦν αἱ ἀκόλουθοι πράξεις :

$$1) \left(\frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2}\right) \cdot \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2}\right), 2) \left(\frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2}\right)^2, 3) \left(\frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} - 1\right)^2, 4) \left(\gamma^3\right)^{\frac{2}{3}}.$$

$$\left(\gamma^{-\frac{1}{2}}\right)^{\frac{4}{5}} \cdot \sqrt[5]{\frac{4}{\gamma^5}}, 5) \left(\frac{1}{\alpha^2} - \frac{1}{\beta^2}\right) \left(\alpha - \frac{1}{2} + \beta - \frac{1}{2}\right), 6) \left(\alpha - \frac{2}{3} + \alpha^{-\frac{1}{3}}\beta - \frac{1}{3} + \beta - \frac{2}{3}\right) \cdot \left(\alpha^{-\frac{1}{3}} - \beta - \frac{1}{3}\right)$$

$$7) \left(\frac{1}{\alpha} - \frac{1}{\beta}\right) : \left(\alpha - \frac{1}{3} - \beta - \frac{1}{3}\right)$$

236) Νὰ ἀπλοποιηθοῦν αἱ παραστάσεις :

$$1) \frac{\alpha-\beta}{\frac{3}{\alpha^4} + \frac{1}{\alpha^2} \frac{1}{\beta^4}} \cdot \frac{\frac{1}{\alpha^2} \frac{1}{\beta^4} + \frac{1}{\alpha^4} \frac{1}{\beta^2}}{\frac{1}{\alpha^2} + \frac{1}{\beta^2}}, 2) \frac{\frac{1}{\alpha^2} - 2\frac{1}{\alpha_4} + 1}{\frac{1}{\alpha^4} - 2\frac{1}{\alpha_8} + 1}$$

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΧΙ

ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ*

79. ΑΝΑΓΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΩΝ.

Εις τὸ κεφάλαιον «ἀνάλυσις ἀκεραίων ἀλγ. παραστάσεων εἰς γινόμενον παραγόντων» (περίπτωσις 6η) εἴδομεν, ὅτι τὸ τριώνυμον $\phi(x) \equiv ax^2 + bx + c = \alpha \left[\left(x + \frac{b}{2\alpha} \right)^2 - \frac{\Delta}{4\alpha^2} \right]$ διὰ $\Delta < 0$ δὲν δύναται νὰ μετασχηματισθῇ εἰς διαφορὰν δύο τετραγώνων, διότι ὁ ὄρος $\frac{\Delta}{4\alpha^2}$ δὲν εἶναι τετράγωνον πραγματικοῦ ἀριθμοῦ ὡς ἀρνητικός.

³Ἐπίσης δι' ὧρισμένας ἔξισώσεις, ὡς αἱ $x^2 + 1 = 0$, $x^2 + 4 = 0$ ἢ λύσις εἶναι ἀδύνατος ἐν R .

Γενικῶς δὲ ἡ ἴσοτης $x^{2v} = \beta$, $\forall x \in R \wedge \beta \in R - \Lambda v \in N_0$, εἶναι ἀδύνατος, διότι οὐδεὶς πραγματικὸς ἀριθμὸς ὑπάρχει x , τοῦ ὅποιου ἡ ἀρτία δύναμις νὰ εἶναι ἀρνητικὸς ἀριθμός.

³Ἀκόμη εἴδομεν ὅτι $\forall \alpha \in R - \Lambda v \in N$ τὸ σύμβολον $\sqrt[2v]{\alpha}$ δὲν ἔχει ἔννοιαν πραγματικοῦ ἀριθμοῦ.

Τὰ ἀνωτέρω ἀλγεβρικὰ θέματα καὶ ἄλλα συναφῆ αὐτῶν ἔμενον ἀλυτά μέχρις ὅτου ἡ ἐπιθυμία τῶν Μαθηματικῶν, ὅπως δώσουν λύσιν εἰς τοιαῦτα θέματα, ὡδήγησεν εἰς τὴν ἐπινόησιν ἐνὸς νέου συστήματος ἀριθμῶν, ἐπιτρέποντος τὴν ἐπιθυμητὴν λύσιν.

Οὕτως εἰσήχθη ἐν νέον σύστημα ἀριθμῶν, τὸ ὅποιον ὡνομάσθη σύστημα φανταστικῶν ἀριθμῶν.

Ἐν τοιοῦτον σύστημα ἀριθμῶν διὰ νὰ γίνῃ δεκτόν, πρέπει νὰ ὑπακούῃ εἰς τοὺς γνωστοὺς μέχρι τοῦδε νόμους, οἱ ὅποιοι ἰσχύουν διὰ τοὺς πραγματικοὺς ἀριθμούς. Δεχόμεθα διὰ τὸ νέον σύστημα τῶν φανταστικῶν ἀριθμῶν, ὅτι ὑπακούει εἰς τοὺς νόμους αὐτούς.

80. ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ — ΟΡΙΣΜΟΙ.

Πᾶν σύστημα ἀριθμῶν ἔχει μίαν μονάδα. Τοῦ συστήματος τῶν φανταστι-

(*) Τὴν θεωρίαν τῶν μιγαδικῶν ἀριθμῶν ἐθεμελίωσαν οἱ : D' Alembert, Euler, Gauss.

κῶν ἀριθμῶν τὴν μονάδα παριστῶμεν μὲ τὸ γράμμα i , ἀρχικὸν τῆς Γαλλικῆς λέξεως *imagine*ire, καὶ ὁνομάζομεν αὐτὴν φανταστικὴν μονάδα. Ἡ φανταστικὴ μονάς i , δρίζομεν ὅπως ἔχει τὴν ιδιότητα, τὸ τετράγωνον τῆς ώς καὶ τὸ τετράγωνον τοῦ ἀντιθέτου αὐτῆς — i νὰ ισοῦται πρὸς τὴν ἀρνητικὴν μονάδα. Ἐξ ὁρισμοῦ λοιπὸν ἔχομεν :

$$i^2 = -1, \quad (-i)^2 = -1 \quad (1)$$

Αἱ ἰσότητες (1) καθιστοῦν δυνατὴν τὴν λύσιν τῆς ἔξιστος $x^2 + 1 = 0$, εἰς τοὺς φανταστικούς ἀριθμούς, διότι :

$$x^2 + 1 = 0 \Leftrightarrow x^2 = -1 \Leftrightarrow x^2 = (\pm i)^2 \Rightarrow x = \pm i$$

*Ἐπὶ πλέον αἱ ἰσότητες (1) δηλοῦν ὅτι : $\sqrt{-1} = \pm i$ * (2)

Φανταστικὸς ἀριθμὸς καλεῖται πᾶς ἀριθμὸς, ὃ ὅποιος γίνεται διὰ τῆς ἐπαναλήψεως τῆς φανταστικῆς μονάδος i , ἢ καὶ τῆς ἀντιθέτου $-i$, καὶ τῶν μερῶν αὐτῆς.

Οὔτως οἱ ἀριθμοὶ $2i, -3i, \frac{1}{2}i, -\frac{3}{5}i, 0,25i$ εἰναι φανταστικοί. Ἡ γενικὴ μορφὴ ἑνὸς φανταστικοῦ ἀριθμοῦ εἰναι : βi , ὅπου $\beta \neq 0 \in \mathbb{R}$.

*Ἐπὶ τῇ βάσει τῶν τεθέντων δρισμῶν, ἡ τετραγωνικὴ ρίζα παντὸς ἀρνητικοῦ ἀριθμοῦ εἰναι ἀριθμὸς φανταστικός.

Πράγματι: $\forall \alpha \in \mathbb{R}^- : \sqrt{\alpha} = \sqrt{-1} \cdot \sqrt{|\alpha|} \wedge \sqrt{-1} = \pm i \Rightarrow \sqrt{\alpha} = \pm i \sqrt{|\alpha|}$

*Ἐκ τῶν δύο τετραγωνικῶν ρίζῶν τοῦ ἀρνητικοῦ ἀριθμοῦ α συμφωνοῦμεν διὰ τοῦ συμβόλου $\sqrt{\alpha}$, νὰ παριστάνωμεν τὴν $i \sqrt{|\alpha|}$, τὴν ὅποιαν καλοῦμεν πρωτεύουσαν τετραγωνικὴν ρίζαν τοῦ α .

Π.χ. $\sqrt{-16} \cdot \sqrt{-9} = i \sqrt{16} \cdot i \sqrt{9} = i^2 \sqrt{16 \cdot 9} = (-1) \cdot 12 = -12$

Μὴ ὄρθη πρᾶξις : $\sqrt{-16} \cdot \sqrt{-9} = \sqrt{(-16) \cdot (-9)} = \sqrt{144} = 12$

Αἱ ἀκέραιαι δυνάμεις τῆς φανταστικῆς μονάδος.

*Ἐχομεν : 1) $i^0 = 1$
 $i^1 = i$
 $i^2 = -1, \quad (-i)^2 = -1$
 $i^3 = i^2 \cdot i = (-1)i = -i$
 $i^4 = i^2 \cdot i^2 = (-1) \cdot (-1) = 1$
 $i^5 = i^4 i = 1i = i$

2) Γενικῶς :

$$\begin{aligned} i^{4v} &= (i^4)^v = 1^v = 1 \\ i^{4v+1} &= i^{4v} \cdot i = 1 \cdot i = i \\ i^{4v+2} &= i^{4v} i^2 = 1 (-1) = -1 \\ i^{4v+3} &= i^{4v} i^3 = 1 (-i) = -i \\ i^{-v} &= \frac{1}{i^v} \quad (\Deltaυναταὶ τιμαὶ : 1, i, -1, -i) \end{aligned}$$

(*) Τὸν συμβολισμὸν τοῦτον ἔχρησμοποίησε τὸ πρῶτον ὁ Gauss, ἀλλὰ ὁ Euler (1777) τὸν εἰσήγαγεν ὁριστικῶς.

Παρατηρήσεις :

1) Αἱ δυναταὶ τιμαὶ τῶν δυνάμεων τοῦ i εἰναι $i, -1, -i, 1$ καὶ ἐναλλάσσονται περιοδικῶς.

2) Αἱ ἄρτιαι δυνάμεις τῆς i εἰναι οἱ πραγματικοὶ ἀριθμοὶ $+1, -1$.

3) Αἱ περιτταὶ δυνάμεις τῆς i εἰναι οἱ φανταστικοὶ ἀριθμοὶ $i, -i$.

Παραδείγματα : 1) Νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι $i^7 + i^8 + i^9 + i^{10} = 0$

$$\text{Λύσις : } i^7 + i^8 + i^9 + i^{10} = i^7(1 + i + i^2 + i^3) = i^7(1 + i - 1 - i) = i^7 \cdot 0 = 0$$

2) Νὰ εύρεθῃ ἡ τιμὴ τῆς παραστάσεως $A = i^{2v} + \frac{1}{i^3} + 2i^4 + 3i^2$

$$\text{Λύσις : } A = (i^2)^v + \frac{1}{-i} + 2 \cdot 1 + 3(-1) = (-1)^v + i + 2 - 3 = (-1)^v - 1 + i$$

"Οπερ $\forall v = 2k, k \in \mathbb{N}_0 : A = 1 - 1 + i = i$

$$\forall v = 2k + 1 : A = -1 - 1 + i = -2 + i$$

3) Νὰ εύρεθοῦν αἱ δυναταὶ τιμαὶ τῆς παραστ. : $A = i^0 + i^1 + i^2 + i^3 + \dots + i^v$

$$\text{Λύσις : } \alpha) \text{ 'Εὰν } v = 4k, \text{ δῆπου } \kappa \in \mathbb{N} \text{ ἔχομεν : } A_1 = 1 + i - 1 - i + \dots + 1 = 1$$

$$\beta) \text{ 'Εὰν } v = 4k + 1 \text{ ἔχομεν : } A_2 = 1 + i - 1 - i + \dots + 1 + i = 1 + i$$

$$\gamma) \text{ 'Εὰν } v = 4k + 2 \text{ ἔχομεν : } A_3 = 1 + i - 1 - i + \dots + 1 + i - 1 = i$$

$$\delta) \text{ 'Εὰν } v = 4k + 3 \text{ ἔχομεν : } A_4 = 1 + i - 1 - i + \dots + 1 + i - 1 - i = 0$$

81. ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ (COMPLEXES) — ΟΡΙΣΜΟΙ *

'Εὰν $a, b \in \mathbb{R}$, θὰ δονομάζωμεν μιγαδικὸν ἀριθμὸν τὸ ἀλγεβρικὸν ἔθροισμα τῆς μορφῆς $a + bi$, δῆπου ὁ a ἀποτελεῖ τὸ πραγματικὸν μέρος, ὁ δὲ bi τὸ φανταστικὸν μέρος αὐτοῦ.

'Επειδὴ διὰ $\beta = 0$ εἰναι $\alpha = \alpha + 0i$ καὶ διὰ $\alpha = 0$ $\Lambda \beta \neq 0$ εἰναι $\beta i = 0 + bi$, ἔπειται ὅτι πᾶς ἀριθμὸς πραγματικὸς εἴτε φανταστικὸς δύναται νὰ τεθῇ ὑπὸ τὴν μορφὴν μιγαδικοῦ ἀριθμοῦ.

'Επομένως τὸ σύστημα τῶν μιγαδικῶν ἀριθμῶν περιέχει τὰ συστήματα τῶν πραγματικῶν καὶ τῶν φανταστικῶν ἀριθμῶν.

"Αν συνεπῶς εἰναι : I τὸ σύνολον τῶν φανταστικῶν ἀριθμῶν bi , R τὸ σύνολον τῶν πραγματικῶν ἀριθμῶν a καὶ C τὸ σύνολον τῶν μιγαδικῶν ἀριθμῶν $a + bi$ τότε ἔχομεν :

$$R \subset C, I \subset C, R \cap I = \emptyset, (R \cup I) \subset C$$

Εἰς τὸν μιγαδικὸν ἀριθμὸν $Z = a + bi$ παραστηροῦμεν, ὅτι μεταξὺ τῶν πραγματικῶν ἀριθμῶν a καὶ b ὑφίσταται μία διμελῆς σχέσις. 'Επομένως δυνάμεθα νὰ θεωρήσωμεν ὅτι τὰ a καὶ b ἀποτελοῦν διατεταγμένον ζεῦγος (α, β) καὶ συνεπῶς νὰ συμβολίσωμεν τὸν μιγαδικὸν ἀριθμὸν ὑπὸ μορφὴν διατεταγμένου ζεύγους μὲν πρῶτον στοιχεῖον τὸ πραγματικὸν μέρος καὶ δεύτερον τὸ φανταστικὸν μέρος αὐτοῦ.

(*) Έίναι ἀδύνατον ως ἀπέδειξεν ὁ Weierstrass, νὰ ὑπάρξῃ σύστημα γενικώτερον τοῦ μιγαδικοῦ, εἰς τὸ ὅποιον νὰ ισχύουν ὅλοι οἱ νόμοι τῶν τεσσάρων πράξεων.

Ούτω έχομεν :

$$Z = \alpha + \beta i = (\alpha, \beta), \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$$

"Αμεσος συνέπεια ταῦ νέου συμβολισμοῦ είναι ότι :

- 1) Πᾶς πραγματικὸς ἀριθμὸς είναι τῆς μορφῆς $(\alpha, 0)$, $\alpha \in \mathbb{R}$
- 2) Πᾶς φανταστικὸς ἀριθμὸς είναι τῆς μορφῆς $(0, \beta)$, $\beta \in \mathbb{R}$

Πρὸς διαχωρισμὸν τῶν μιγαδικῶν ἀριθμῶν τῆς μορφῆς (α, β) μὲν $\beta \neq 0$ ἀπὸ τοὺς μιγαδικούς τῆς μορφῆς (α, β) $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$, συμφωνοῦμεν τοὺς πρώτους νὰ τοὺς καλοῦμεν καθαροὺς μιγ. ἀριθμοὺς.

82. ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΜΙΓΑΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ.

***Ορισμοί:** 1) Καλοῦμεν συζυγὴ τοῦ μιγαδικοῦ ἀριθμοῦ $Z = (\alpha, \beta) = \alpha + \beta i$, τὸν μιγαδικὸν ἀριθμὸν $\bar{Z} = (\alpha, -\beta) = \alpha - \beta i$. ἀντισυζυγὴ δὲ τὸν μιγ. ἀριθμὸν $Z_1 = (-\alpha, \beta) = -\alpha + \beta i$

2) τοὺς μιγαδ. ἀριθμούς $Z = (\alpha, \beta) = \alpha + \beta i$ καὶ $-Z = (-\alpha, -\beta) = -\alpha - \beta i$ καλοῦμεν ἀντιθέτους.

3) Μέτρον ἡ ἀπόλυτος τιμὴ τοῦ $Z = (\alpha, \beta) = \alpha + \beta i$ καλεῖται ό μὴ ἀρνητικὸς ἀριθμὸς $\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}$ καὶ συμβολίζεται :

$$\rho = |Z| = |(\alpha, \beta)| = |\alpha + \beta i| = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2}$$

Αἱ πράξεις ἔπι τῶν μιγαδικῶν ἀριθμῶν γίνονται ὅπως καὶ ἔπι τῶν διωνύμων $\alpha + \beta x$ καὶ $\gamma + \delta x$, ὅπου ό x είναι ἡ φανταστικὴ μονάς i , καθότι ἐδέχθημεν ἵσχυοντας τοὺς μέχρι τοῦδε γνωστοὺς νόμους ἔπι τῶν πραγματικῶν ἀριθμῶν.

***Ιδιότητες τινὲς τῶν πράξεων.**

a) Οἱ μιγαδικοὶ ἀριθμοί, μηδενικός, μοναδιαῖος.

1) Ο μηδενικὸς μιγαδικὸς ἀριθμὸς ὑπάρχει καὶ είναι ἔνας καὶ μόνος ό $0 = 0 + 0i = (0, 0)$.

Πράγματι : "Εστω ότι είναι $\alpha + \beta i = 0$, ὅπότε $\alpha = -\beta i \Rightarrow \alpha^2 = (-\beta i)^2 \Leftrightarrow \alpha^2 = \beta^2 i^2 \Leftrightarrow \alpha^2 = -\beta^2 \Leftrightarrow \alpha^2 + \beta^2 = 0$.

Τὸ α' μέλος $\alpha^2 + \beta^2$ είναι μὴ ἀρνητικὴ ποσότης καὶ ἐπειδὴ ἴσοῦται μὲν μηδέν, ἔπειται ότι $\alpha = 0$ καὶ $\beta = 0$.

"Ωστε, ἐὰν $\alpha + \beta i = 0 \Leftrightarrow \alpha = 0$ καὶ $\beta = 0$

2) Ο μοναδιαῖος μιγαδικὸς ἀριθμὸς ὑπάρχει καὶ είναι ἔνας καὶ μόνος ό $1 = 1 + 0i = (1, 0)$

Πράγματι : "Εστω ότι είναι $\alpha + \beta i = 1$, ὅπότε $(\alpha - 1) + \beta i = 0$. Υπάρξει $\alpha - 1 = 0$ καὶ $\beta = 0$ ἢ $\alpha = 1$ καὶ $\beta = 0$ καὶ συνεπῶς $\alpha + \beta i = 1 + 0i = 1$

b) Οἱ ισοι μιγαδικοὶ ἀριθμοί

*Η ίκανὴ καὶ ἀναγκαία συνθήκη, ἵνα δόνο μιγαδικοὶ ἀριθμοὶ είναι ισοι, είναι νὰ ἔχουν τὰ πραγματικὰ μέρη ισα καὶ τοὺς συντελεστὰς τοῦ ι ισους. "Ητοι : $\alpha + \beta i = \gamma + \delta i \Leftrightarrow \alpha = \gamma \wedge \beta = \delta$

Πράγματι, ἐὰν $\alpha = \gamma$ καὶ $\beta = \delta$, τότε $\alpha + \beta i = \gamma + \delta i$. Εὰν δὲ είναι $\alpha + \beta i =$

$= \gamma + \delta i$, τότε $(\alpha - \gamma) + (\beta - \delta)i = 0$ και συνεπώς $\alpha - \gamma = 0$ και $\beta - \delta = 0$, δηλαδή $\alpha = \gamma$ και $\beta = \delta$

Σημείωσις: Ή σχέσις ισότητος μιγαδικῶν ἀριθμῶν είναι :

- 1) αὐτοπαθής: ήτοι $\overline{(\alpha, \beta)} = (\alpha, \beta)$
- 2) συμμετρική: ήτοι $\overline{(\alpha, \beta)} = (\gamma, \delta) \Leftrightarrow (\gamma, \delta) = (\alpha, \beta)$
- 3) μεταβατική: ήτοι $\overline{(\alpha, \beta)} = (\gamma, \delta) \quad \left. \begin{array}{l} (\alpha, \beta) = (\gamma, \delta) \\ (\gamma, \delta) = (\epsilon, \zeta) \end{array} \right\} \Rightarrow (\alpha, \beta) = (\epsilon, \zeta)$

Μία τοιαύτη σχέσις καλεῖται σχέσις ισοδυναμίας.

Αἱ πράξεις τῆς προσθέσεως, πολλαπλασιασμοῦ καὶ διαιρέσεως.

Έχομεν : $\forall \alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2 \in \mathbb{R} : (\alpha_1 + \beta_1 i) + (\alpha_2 + \beta_2 i) = (\alpha_1 + \alpha_2) + (\beta_1 + \beta_2) i$
 $\forall \alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2 \in \mathbb{R} : (\alpha_1 + \beta_1 i) \cdot (\alpha_2 + \beta_2 i) = (\alpha_1 \alpha_2 - \beta_1 \beta_2) + (\alpha_1 \beta_2 + \alpha_2 \beta_1) i$

Ή ἀφαίρεσις $(\alpha_1 + \beta_1 i) - (\alpha_2 + \beta_2 i)$ ἀνάγεται εἰς τὴν πρόσθεσιν.

Οὔτως, έχομεν $(\alpha_1 + \beta_1 i) - (\alpha_2 + \beta_2 i) = (\alpha_1 + \beta_1 i) + (-\alpha_2 - \beta_2 i) =$
 $= (\alpha_1 - \alpha_2) + (\beta_1 - \beta_2) i$

Τὸ ἄθροισμα καὶ τὸ γινόμενον δύο συζυγῶν μιγαδικῶν ἀριθμῶν είναι ἀριθμὸς πραγματικός.

Πράγματι, $Z + \bar{Z} = (\alpha + \beta i) + (\alpha - \beta i) = 2\alpha$

$$Z \cdot \bar{Z} = (\alpha + \beta i) \cdot (\alpha - \beta i) = \alpha^2 - (\beta i)^2 = \alpha^2 + \beta^2$$

Ο μιγαδικὸς ἀντίστροφος τοῦ ἀριθμοῦ $Z = \alpha + \beta i \neq (0,0)$ ὑπάρχει καὶ είνα
 ἔνας καὶ μόνος, δὲ $Z^{-1} = (\alpha + \beta i)^{-1} = \frac{\alpha}{\alpha^2 + \beta^2} + \frac{-\beta}{\alpha^2 + \beta^2} i$

Πράγματι, εἰὰν $Z = \alpha + \beta i$ καὶ $Z^{-1} = x + \psi i$, τότε πρέπει $(\alpha + \beta i) \cdot (x + \psi i) = 1 = 1 + 0i \Rightarrow (\alpha x - \beta \psi) + (\alpha \psi + \beta x) i = 1 + 0i \Leftrightarrow$

$$\left. \begin{array}{l} \alpha x - \beta \psi = 1 \\ \alpha \psi + \beta x = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{aligned} x &= \frac{\alpha}{\alpha^2 + \beta^2} \\ \psi &= \frac{-\beta}{\alpha^2 + \beta^2} \end{aligned}$$

Καλοῦμεν πηλίκον δύο μιγαδικῶν ἀριθμῶν $Z_1 = \alpha_1 + \beta_1 i$, $Z_2 = \alpha_2 + \beta_2 i$,
 ὅπου $Z_2 \neq 0$, τὸν μιγαδικὸν ἀριθμὸν $x + \psi i$ τοιοῦτον ὥστε :

$$(\alpha_2 + \beta_2 i) \cdot (x + \psi i) = \alpha_1 + \beta_1 i \Rightarrow (\alpha_2 x - \beta_2 \psi) + (\alpha_2 \psi + \beta_2 x) i = \alpha_1 + \beta_1 i \Leftrightarrow$$

$$\left. \begin{array}{l} \alpha_2 x - \beta_2 \psi = \alpha_1 \\ \alpha_2 \psi + \beta_2 x = \beta_1 \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{aligned} x &= \frac{\alpha_1 \alpha_2 + \beta_1 \beta_2}{\alpha_2^2 + \beta_2^2} \\ \psi &= \frac{\alpha_2 \beta_1 - \alpha_1 \beta_2}{\alpha_2^2 + \beta_2^2} \end{aligned}$$

$$\text{Ήτοι } \overline{(\alpha_1 + \beta_1 i)} = Z_1 : Z_2 = x + \psi i = \frac{\alpha_1 \alpha_2 + \beta_1 \beta_2}{\alpha_2^2 + \beta_2^2} + \frac{\alpha_2 \beta_1 - \alpha_1 \beta_2}{\alpha_2^2 + \beta_2^2} i$$

Διὰ τὴν εὐρεσιν τοῦ πηλίκου δύο μιγαδῶν $Z_1 = \alpha_1 + \beta_1 i$ καὶ $Z_2 = \alpha_2 + \beta_2 i \neq (0,0)$ ἐργαζόμεθα καὶ ὡς ἔξῆς :

$$Z_1 : Z_2 = Z \cdot Z_2^{-1} = (\alpha_1 + \beta_1 i) \cdot (\alpha_2 + \beta_2 i)^{-1} =$$

$$= (\alpha_1 + \beta_1 i) \cdot \left(\frac{\alpha_2}{\alpha_2^2 + \beta_2^2} + \frac{-\beta_2}{\alpha_2^2 + \beta_2^2} i \right) = \frac{\alpha_1 \alpha_2 + \beta_1 \beta_2}{\alpha_2^2 + \beta_2^2} + \frac{\alpha_2 \beta_1 - \alpha_1 \beta_2}{\alpha_2^2 + \beta_2^2} i$$

*Επίσης ή πρᾶξις τῆς διαιρέσεως γίνεται ὀμέσως, ἐν πολύσωμεν τοὺς ὄρους τοῦ κλάσματος ἐπὶ τὸν συζυγῆ μιγαδικὸν τοῦ παρονομαστοῦ.

$$*\text{Ητοι: } Z_1 : Z_2 = \frac{Z_1}{Z_2} = \frac{\alpha_1 + \beta_1 i}{\alpha_2 + \beta_2 i} = \frac{(\alpha_1 + \beta_1 i) \cdot (\alpha_2 - \beta_2 i)}{(\alpha_2 + \beta_2 i) \cdot (\alpha_2 - \beta_2 i)} = \frac{\alpha_1 \alpha_2 + \beta_1 \beta_2}{\alpha_2^2 + \beta_2^2} + \frac{\alpha_2 \beta_1 - \alpha_1 \beta_2}{\alpha_2^2 + \beta_2^2} i$$

*Η ύψωσις μιγαδικοῦ ἀριθμοῦ εἰς δύναμιν.

$$\begin{aligned} * \text{Έχομεν: } Z^2 &= (\alpha + \beta i)^2 = \alpha^2 + 2\alpha\beta i + \beta^2 i^2 = (\alpha^2 - \beta^2) + 2\alpha\beta i \\ Z^3 &= (\alpha + \beta i)^3 = \alpha^3 + 3\alpha^2 \beta i + 3\alpha\beta^2 i^2 + \beta^3 i^3 = \\ &= (\alpha^3 - 3\alpha\beta^2) - (\beta^3 - 3\alpha^2\beta) i \end{aligned}$$

83. ΩΡΙΣΜΕΝΑΙ ΒΑΣΙΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ.

1) Οἱ μιγαδικοὶ ἀριθμοὶ $\alpha + \beta i$, $\alpha - \beta i$, $-\alpha + \beta i$, $-\alpha - \beta i$ ἔχουν τὸ αὐτὸ μέτρον.

$$\text{Οὕτω: } |\alpha + \beta i| = |\alpha - \beta i| = |-\alpha + \beta i| = |-\alpha - \beta i| = +\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}$$

2) Οἱ πραγματικοὶ μιγαδικοὶ ἀριθμοὶ $(\alpha, 0) = \alpha = \alpha + 0i$ ἔχουν μέτρον τὸν $|\alpha|$. *Ητοι: $|(\alpha, 0)| = |\alpha + 0i| = \sqrt{\alpha^2} = |\alpha|$

3) Οἱ φανταστικοὶ ἀριθμοὶ $(0, \alpha) = \alpha i = 0 + \alpha i$ ἔχουν μέτρον $|\alpha|$.

$$*\text{Ητοι: } |(0, \alpha)| = |0 + \alpha i| = +\sqrt{\alpha^2} = |\alpha|$$

4) Τὸ τετράγωνον τοῦ μέτρου ἐνὸς μιγαδ. ἀριθμοῦ $Z = (\alpha, \beta) = \alpha + \beta i$ εἶναι ἵσον μὲ τὸ γινόμενον αὐτοῦ ἐπὶ τὸν συζυγῆ του.

$$*\text{Ητοι: } \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}: |Z|^2 = Z \cdot \overline{Z} \Rightarrow (\sqrt{\alpha^2 + \beta^2})^2 = (\alpha + \beta i) \cdot (\alpha - \beta i) = \alpha^2 + \beta^2$$

5) Τὸ μέτρον τοῦ γινομένου δύο μιγαδ. ἀριθμῶν $Z_1 = (\alpha_1 + \beta_1 i)$ καὶ $Z_2 = (\alpha_2 + \beta_2 i)$ ἴσοῦται μὲ τὸ γινόμενον τῶν μέτρων αὐτῶν.

$$*\text{Ητοι: } |Z_1 \cdot Z_2| = |(\alpha_1 + \beta_1 i) \cdot (\alpha_2 + \beta_2 i)| = \sqrt{(\alpha_1 \alpha_2 - \beta_1 \beta_2)^2 + (\alpha_1 \beta_2 + \alpha_2 \beta_1)^2} = \\ = \sqrt{(\alpha_1^2 + \beta_1^2) \cdot (\alpha_2^2 + \beta_2^2)} = \sqrt{\alpha_1^2 + \beta_1^2} \cdot \sqrt{\alpha_2^2 + \beta_2^2} = |Z_1| \cdot |Z_2|$$

$$\text{Γενικῶς ἔχομεν: } |Z_1 \cdot Z_2 \dots Z_v| = |Z_1| \cdot |Z_2| \dots |Z_v|$$

Οἱ μαθηταὶ νὰ ἀποδείξουν τὴν ιδιότητα ταύτην διὰ τρεῖς καὶ τέσσαρας ἀριθμούς.

6) Τὸ μέτρον τοῦ ἀντιστρόφου Z^{-1} τοῦ μιγαδ. ἀριθμοῦ $Z = \alpha + \beta i$ ἴσοῦται μὲ τὸ ἀντίστροφον τοῦ μέτρου τοῦ $Z \cdot (Z \neq 0)$

$$*\text{Ητοι: } |Z^{-1}| = |(\alpha + \beta i)^{-1}| = \left| \frac{\alpha}{\alpha^2 + \beta^2} - \frac{\beta}{\alpha^2 + \beta^2} i \right| = \sqrt{\frac{\alpha^2}{(\alpha^2 + \beta^2)^2} + \frac{\beta^2}{(\alpha^2 + \beta^2)^2}} = \\ = \sqrt{\frac{\alpha^2 + \beta^2}{(\alpha^2 + \beta^2)^2}} = \sqrt{\frac{1}{\alpha^2 + \beta^2}} = \frac{1}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}} = \frac{1}{|Z|}$$

7) Τὸ μέτρον τοῦ πηλίκου δύο μιγαδ. ἀριθμῶν Z_1 καὶ $Z_2 \neq 0$ ἴσοῦται μὲ τὸ πηλίκον τῶν μέτρων αὐτῶν.

$$*\text{Ητοι: } \left| \frac{Z_1}{Z_2} \right| = |Z_1 \cdot Z_2^{-1}| = |Z_1| \cdot |Z_2^{-1}| = |Z_1| \cdot \frac{1}{|Z_2|} = \frac{|Z_1|}{|Z_2|}$$

8) Τὸ μέτρον τοῦ πηλίκου δύο συζυγῶν μιγαδικῶν ἀριθμῶν εἶναι ἡ πραγματική μονάς (1)

$$\text{Πράγματι: } \left| \frac{Z}{\bar{Z}} \right| = \left| \frac{Z}{\overline{Z}} \right| = 1, \text{ διότι} |Z| = |\bar{Z}|$$

9) Τὸ μέτρον ἐνὸς μιγαδικοῦ ἀριθμοῦ $Z = \alpha + \beta i$ εἶναι μηδέν, ὅταν $\alpha = 0$ καὶ $\beta = 0$.

Πράγματι: ἔχομεν $|\alpha + \beta i| = 0 \Rightarrow \sqrt{\alpha^2 + \beta^2} = 0 \Rightarrow \alpha^2 + \beta^2 = 0 \Rightarrow \alpha = 0$ καὶ $\beta = 0$. Ἀντιστρόφως: $Z = \alpha + \beta i = 0 + 0i \Leftrightarrow |Z| = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2} = 0$.

10) Ἡ ἴδιότης $\forall Z \in \mathbb{R} \Rightarrow |Z|^2 = Z^2$ δὲν ἴσχύει, ὅταν εἶναι $Z \in (\mathbb{C} - \mathbb{R})$.

Πράγματι: ἂν $Z = \alpha + \beta i$ ($\beta \neq 0$), τότε $|\alpha + \beta i|^2 = (\sqrt{\alpha^2 + \beta^2})^2 = \alpha^2 + \beta^2$. Ἐξ ἄλλου ἔχομεν $(\alpha + \beta i)^2 = \alpha^2 - \beta^2 + 2\alpha\beta i$.

Ἐπομένως τὸ $|\alpha + \beta i|^2$ δὲν ἴσοῦται πρὸς τὸ $(\alpha + \beta i)^2$.

Σημαντικὴ σημείωσις. Ἰδιότητες τινὲς τῶν ἀπολύτων τιμῶν τῶν πραγματικῶν ἀριθμῶν δὲν ἴσχυουν διὰ τοὺς καθαροὺς μιγαδικούς ἀριθμοὺς (ἴδιότης 10 τῆς ἀνω παραγράφου).

84. ΓΡΑΦΙΚΗ (ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ) ΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ ΜΙΓΑΔ. ΑΡΙΘΜΩΝ


Γνωρίζομεν, ὅτι τὰ διατεταγμένα ζεύγη (x, y) τοῦ συνόλου τοῦ Καρτεσιανοῦ γινομένου \mathbb{R}^2 ἀπεικονίζονται ἀμφιμονοσήμαντως εἰς τὰ σημεῖα τοῦ ἐπιπέδου τῶν ὀρθογωνίων ἀξόνων (Καρτεσιανὸν ἐπίπεδον).

Οἱ μιγαδικοὶ ἀριθμοὶ, ὡς διατεταγμένα ζεύγη πραγματικῶν, δύνανται συνεπῶς νὰ παρασταθοῦν ἀπὸ τὰ σημεῖα τοῦ ἐπιπέδου τῶν ὀρθογ. ἀξόνων.

Πράγματι, ὁ μιγαδικὸς ἀριθμὸς $(\alpha, \beta) = \alpha + \beta i$, ὅπου $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, ἀπεικονίζεται εἰς ἕν μόνον σημεῖον $M(\alpha, \beta)$ τοῦ ἐπιπέδου, τὸ ὅποιον ἔχει τετμημένην α καὶ τεταγμένην β καὶ ἀντιστρόφως, τὸ σημεῖον $M(\alpha, \beta)$ μὲ συντεταγμένας (α, β) ἀντιστοιχεῖ πρὸς ἓνα καὶ μόνον ὠρισμένον μιγαδικὸν ἀριθμὸν $(\alpha, \beta) = \alpha + \beta i$

"Ητοι.	'Αρχέτυπον	Εἰκὼν
	$\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R} : (\alpha, \beta) = \alpha + \beta i \longleftrightarrow M(\alpha, \beta)$	

Οὕτως ὑπάρχει ἀμφιμονοσήμαντος ἀντιστοιχία μεταξὺ τῶν μιγαδικῶν ἀριθμῶν τοῦ συνόλου $C = \{(x, y) / (x, y) \text{ μιγαδικὸς ἀριθμὸς}\}$ καὶ τῶν σημείων τοῦ ἐπιπέδου. Ἐπὶ τοῦ ἐπιπέδου τούτου ὁ ἄξων τῶν τετμημένων καὶ τεταγμένων ὀνομάζονται ἀντιστοιχίως ἄξων τῶν πραγματικῶν καὶ ἄξων τῶν φανταστικῶν, τὸ δὲ ἐπίπεδον μιγαδικὸν ἡ πολικὸν ἐπίπεδον ἡ διάγραμμα τοῦ Argand (σχ. 84.1).



Ἐπίστης δυνάμεθα νὰ ἔχωμεν μίαν ἀμφιμονοσήμαντον ἀντιστοιχίαν μεταξὺ τῶν μιγαδ. ἀριθμῶν (α, β) καὶ τῶν διανυσματικῶν ἀκτίνων \vec{OM} ὡς πρὸς τὸ σημεῖον τοῦ ἐπιπέδου. Τοῦτο διαπιστοῦται ὁμοίως.

Ούτω :

$$\forall (\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2 : (\alpha, \beta) = (\alpha + \beta i) \longleftrightarrow \overrightarrow{OM}, \text{ όπου } M(\alpha, \beta)$$

*Επειδή $|\overrightarrow{OM}| = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2}$ και $|\alpha + \beta i| = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2}$, ορα τό μῆκος τοῦ διανύσματος \overrightarrow{OM} παριστά τὸ μέτρον τοῦ μιγ. ἀριθμοῦ $\alpha + \beta i$. Η προσημασμένη γωνία $\theta = (\overrightarrow{OX}, \overrightarrow{OM})$ καλεῖται ὅρισμα τοῦ $\alpha + \beta i$.

$$\text{Είναι } \delta \text{ε συνθ} = \frac{\alpha}{|\overrightarrow{OM}|} = \frac{\alpha}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}} \text{ και } \eta \text{μθ} = \frac{\beta}{|\overrightarrow{OM}|} = \frac{\beta}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}}$$

$$\text{Ούτω, } \forall (\alpha, \beta) \in C: \alpha + \beta i = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2} \left(\frac{\alpha}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}} + i \frac{\beta}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}} \right) = \\ = \rho (\sin \theta + i \eta \theta), \text{ όπου } \rho \text{ τὸ μέτρον καὶ } \theta \text{ τὸ ὅρισμα.}$$

Τὸ μέτρον ρ καὶ τὸ ὅρισμα θ ἔνδει μιγ. ἀριθμοῦ $\alpha + \beta i$, ἔχοντος εἰκόνα τὸ σημεῖον $M(\alpha, \beta)$ καλοῦνται πολικὰ συντεταγμέναι τοῦ σημείου M .

*Ωστε, πᾶς μιγαδικὸς ἀριθμὸς δύναται νὰ γραφῇ ὑπὸ τὰς μορφὰς $\alpha + \beta i$ καὶ $\rho (\sin \theta + i \eta \theta)$. Η πρώτη καλεῖται **Καρτεσιανὴ μορφὴ** καὶ ἡ δευτέρα **τριγωνομετρικὴ μορφὴ**


Παράδειγμα: Νὰ τεθῇ ὑπὸ τριγωνομετρικὴν μορφὴν $\delta Z = 1 + i\sqrt{3}$

*Έχομεν $|Z| = \sqrt{1+3} = 2$, συνθ $= \frac{1}{2}$ καὶ ημθ $= \frac{\sqrt{3}}{2}$, ορα $\rho = 2$ καὶ $\theta = 60^\circ$. Επομένως δυνάμεθα νὰ γράψωμεν :

$$Z = 1 + i\sqrt{3} = 2 (\sin 60^\circ + i \eta 60^\circ)$$

85. ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΔΥΟ ΜΙΓΑΔΙΚΩΝ.

1) **Πρόσθεσις.** Εάν $Z_1 = \alpha_1 + \beta_1 i$ καὶ $Z_2 = \alpha_2 + \beta_2 i$ καὶ αἱ εἰκόνες αὐτῶν τὰ διανύσματα \overrightarrow{OM}_1 καὶ \overrightarrow{OM}_2 ἀντιστοίχως, τότε τὸ ἄθροισμα $Z_1 + Z_2 = Z$ ἔχει ὡς εἰκόνα τὸ ἄθροισμα $\overrightarrow{OM}_1 + \overrightarrow{OM}_2 = \overrightarrow{OM}$. Ως γνωστόν, τὸ διάνυσμα \overrightarrow{OM} ἔχει ἀρχὴν τὸ σημεῖον O καὶ πέρας τὸ ἄλλο ἄκρον τῆς διαγωνίου τοῦ παραλ/γράμμου OM_1MM_2 (κανὼν τοῦ παραλ/γράμμου).




Σχ. 85.1

*Η ἀπόδειξις δύναται νὰ γίνη ὑπὸ τῶν μαθητῶν εὐκόλως ἀρκεῖ νὰ παρατηρήσουν ὅτι $\alpha_1 + \alpha_2 = \alpha$ καὶ $\beta_1 + \beta_2 = \beta$. (Σχῆμα 85.1)

2) **Αφαίρεσις.** Εάν αἱ εἰκόνες τῶν μιγαδικῶν $Z_1 = \alpha_1 + \beta_1 i$ καὶ $Z_2 = \alpha_2 + \beta_2 i$ είναι τὰ διανύσματα \overrightarrow{OM}_1 καὶ \overrightarrow{OM}_2 ἀντιστοίχως, τότε ἡ εἰκὼν τῆς διαφορᾶς $Z_1 -$

$-Z_2 = Z$ είναι τό διάνυσμα \overrightarrow{OM} ($\Sigma\chi\tilde{\eta}\mu\alpha$ 85.2). Διότι $Z = Z_1 - Z_2 = Z_1 + (-Z_2)$.



Η είκων τού $-Z_2$ είναι τό διάνυσμα \overrightarrow{OM}'_2 , συμμετρικόν τού \overrightarrow{OM}_2 ώς πρὸς τό Ο.
Οὕτω : $\overrightarrow{OM}_1 - \overrightarrow{OM}_2 = \overrightarrow{OM}_1 + \overrightarrow{M}_2 O = \overrightarrow{OM}_1 + \overrightarrow{OM}'_2 = \overrightarrow{OM}$.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Οι φανταστικοί ἀριθμοί.

$$237) \text{ Νὰ ἀποδειχθῇ, ὅτι } i^{4^2} = i^{-14} = -1, \quad i^{4v+2} = -i^{4v} = \frac{1}{i^2},$$

$$\frac{1}{i^{4v+1}} = i^{4v+3} = -i, \quad i^{4\mu+1} : i^{4v-1} = -1, \quad \text{ὅπου } v, \mu \in \mathbb{N}_0.$$

$$238) \text{ Νὰ ἐκτελεσθοῦν οἱ πράξεις } -5i^3 (-i^7), \quad i \cdot i^2 \cdot i^3 \cdot i^4, \\ -5i^2 + i \cdot (2i - i^4), \quad \frac{1}{i} + \frac{1}{i^2} + \frac{1}{i^3} + \frac{1}{i^4}$$

$$239) \text{ Ν' ἀποδειχθῇ ὅτι } \forall v \in \mathbb{N}_0 \text{ ἔχομεν } i^v + i^{v+1} + i^{v+2} + i^{v+3} = 0$$

240) Ποίας τιμάς δύναται νὰ λάβῃ ἡ παράστασις

$$A = 1^0 - i^1 + i^2 - \dots - (-1)^vi^v, \quad \text{ὅπου } v \in \mathbb{N}_0$$

$$241) \text{ Ἐὰν } A = i^0 + i^1 + i^2 + \dots + i^v, \quad B = i^0 - i^1 + i^2 - \dots - (-1)^vi^v, \quad v \in \mathbb{N}, \\ \text{ποίας τιμάς δύναται νὰ λάβῃ ἡ παράστασις } A + B ;$$

242) Νὰ συγκριθοῦν αἱ τιμαὶ τῶν κάτωθι παραστάσεων :

$$A = i\lambda + i\lambda^{+1} + i\lambda^{+2} + i\lambda^{+3}, \quad B = \frac{1}{i\lambda} + \frac{1}{i\lambda^{+1}} + \frac{1}{i\lambda^{+2}} + \frac{1}{i\lambda^{+3}}, \quad \lambda \in \mathbb{N}$$

$$243) \text{ Ἐὰν οἱ ἀριθμοὶ } \kappa, \lambda, \mu, v \in \mathbb{N} \text{ διαιρούμενοι διὰ 4 ἀφήνουν τό αὐτὸν ὑπόλοιπον } v' \text{ ἀποδειχθῇ ὅτι: } \alpha) i^\kappa = i^\lambda = i^\mu = i^v, \quad \beta) i^{\kappa+1+\lambda+\mu+v} = 1$$

$$244) \text{ Νὰ εύρεθοῦν αἱ τετραγωνικαὶ ρίζαι τῶν ἀριθμῶν, } -25, -36, -23, -27.$$

Οι μιγαδικοί ἀριθμοί.

245) Νὰ ἀναχθοῦν αἱ κάτωθι παραστάσεις εἰς τὴν μορφὴν $\alpha + \beta i$:

$$\alpha) -2i(-1+i) - (-3+2i), \quad \beta) (5+3i) \cdot (5-3i) \cdot i^2, \quad \gamma) (1+i)^3,$$

$$\delta) (2+i)^3 + (2-i)^3, \quad \epsilon) (1+2i)^4 - (1-2i)^4, \quad \zeta) \frac{(1+2i)^2 - (1-i)^2}{(3+2i)^3 - (2+i)^2},$$

$$\eta) (\alpha + \beta i)^2 + (\alpha - \beta i)^2, \quad \theta) \frac{\alpha + \beta i}{\gamma + \delta i} + \frac{\alpha - \beta i}{\gamma - \delta i}, \quad \iota) \frac{\alpha + i}{1 - \alpha i}, \quad \kappa) \frac{\sqrt{3} + i}{\sqrt{3} - i} + \frac{\sqrt{3} - i}{\sqrt{3} + i}$$

246) Ν' άποδειχθῇ ἡ ἀλήθεια τῶν κάτωθι ισοτίτων :

$$\alpha) (1-i)^4 = -4, \quad \beta) (-2+7i) \cdot (-2-7i) = 53, \quad \gamma) (-7+i) \cdot (7+i) = -50$$

$$\delta) (2+3i) \cdot (3+2i) = 13i, \quad \epsilon) (x-\alpha+\beta i) \cdot (x-\alpha-\beta i) = (x-\alpha)^2 + \beta^2$$

$$\zeta) \frac{3}{6-5i} = \frac{18}{61} + \frac{15}{61}i, \quad \eta) \frac{\alpha+\beta i}{\beta-\alpha i} = i, \quad \theta) \frac{\alpha+\beta v - (\alpha v - \beta)i}{1-vi} = \alpha + \beta i$$

$$\iota) \frac{\alpha+\beta i}{\alpha-\beta i} + \frac{\alpha-\beta i}{\alpha+\beta i} = \frac{2(\alpha^2 - \beta^2)}{\alpha^2 + \beta^2}, \quad \kappa) (1+i)^3 (1+i^3) = 4i$$

247) Διά ποίας πραγματικάς τιμάς τῶν x, ψ ισχύει ἡ ισότης

$$(1-2i)x + (3+5i)\psi = 1+3i$$

248) Εὰν $z_1 = (2+i)$, $z_2 = (1-2i)$, νὰ ύπολογισθῇ ὁ μιγαδικὸς ἀριθμὸς

$$z = z_1 + z_2 + z_1 z_2 + \frac{z_1}{z_2} + (z_1 - z_2)^2.$$

$$249) \text{ Εὰν } z_1 = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i, \quad z_2 = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i \quad \nu' \text{ άποδειχθῇ ὅτι :}$$

$$\alpha) z_1 = z_2^2, \quad \beta) z_2 = z_1^2 \text{ καὶ } \gamma) z_1^3 = z_2^3 = 1$$

250) Εὰν $z = \alpha + \beta i$ καὶ $\bar{z} = \alpha - \beta i$, ν' άποδειχθοῦν αἱ σχέσεις :

$$\begin{aligned} z_1 \pm z_2 &= \overline{z_1} \pm \overline{z_2}, & \overline{z_1 z_2} &= \overline{z_1} \cdot \overline{z_2}, & \overline{\left(\frac{z_1}{z_2} \right)} &= \frac{\overline{z_1}}{\overline{z_2}} \quad (z_2 \neq 0), \\ (-z) &= -\overline{z}, & \overline{\left(\frac{1}{z} \right)} &= \frac{1}{\overline{z}} \quad (z \neq 0) \end{aligned}$$

251) Υπὸ ποίαν συνθήκην τῶν $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2 \in \mathbb{R}$ τὸ ἄθροισμα ἡ ἡ διαφορὰ τῶν $z_1 = \alpha_1 + \beta_1 i$, $z_2 = \alpha_2 + \beta_2 i$ εἰναι ἀριθμὸς α) πραγματικὸς καὶ β) φανταστικὸς καθαρός ;

Τὸ μέτρον τῶν μιγαδικῶν ἀριθμῶν.

$$252) \text{ Ποιὸν τὸ μέτρον τῶν ἀριθμῶν } -i, \quad 1+i, \quad 1+i\sqrt{3}, \quad 2+\sqrt{3}+i, \quad \frac{1+2i}{1-2i}, \\ \frac{1+\alpha i}{1-\alpha i}, \quad \frac{3+2i}{i} - (1+i), \quad \frac{(3+4i) \cdot (-1+2i)}{(-1-i) \cdot (3-i)}, \quad \frac{i \cdot (2-\sqrt{3}+i)^2}{(-1+i)^3}$$

253) Εὰν $z_1, z_2 \in (\mathbb{C} - \mathbb{R})$ νὰ άποδειχθῇ ὅτι $|z_1 z_2|^2 = |z_1|^2 \cdot |z_2|^2$ (ἐφαρμόσατε τὸν τύπον $|z|^2 = z \bar{z}$)

$$254) \text{ Ν' άποδειχθῇ ὅτι } |z_1 + \bar{z}_2| = |\bar{z}_1 + z_2| \quad z_1, z_2 \in (\mathbb{C} - \mathbb{R})$$

255) Εὰν οἱ $z_1 = \alpha_1 + \beta_1 i$, $z_2 = \alpha_2 + \beta_2 i$ πληροῦν τὴν σχέσιν $\overline{z_1 z_1} + \overline{z_2 z_2} = |z_1 + z_2|^2$, δεῖξατε ὅτι $\alpha_1 \alpha_2 + \beta_1 \beta_2 = 0$

$$256) \text{ Εὰν } \alpha + \beta i = 0 \Leftrightarrow |\alpha + \beta i| = 0$$

Γραφικὴ παράστασις τῶν μιγαδικῶν ἀριθμῶν.

$$257) \text{ Νὰ εύρεθοῦν αἱ εἰκόνες τῶν ἀριθμῶν } 1+i, 1-2i, -3+i, -2-\frac{1}{2}i, \\ (1-2i)^{-1}, (1+i)^2, 1, -1, i, -i, \frac{1}{i}, -\frac{1}{i}$$

258) Παραστήσατε γραφικῶς τοὺς μιγαδικοὺς ἀριθμοὺς $\alpha + \beta i$, $\alpha - \beta i$, $-\alpha + \beta i$, $-\alpha - \beta i$ ($\alpha, \beta \in \mathbb{R}^+$). Τί παρατηρεῖτε;

259) Νὰ εύρεθοῦν αἱ πολικαὶ συντεταγμέναι τοῦ ἀριθμοῦ $\sqrt{3}+i$ καὶ νὰ τεθῇ ὑπὸ τριγωνομετρικὴν μορφήν.

260) Αἱ πολικαὶ συντεταγμέναι ἐνὸς μιγάδος εἰναι $\rho = 5$ καὶ $\theta = 45^\circ$. Ποῖος ὁ ἀριθμὸς οὗτος;

261) Νὰ παρασταθῇ γραφικῶς τὸ ἄθροισμα τριῶν καὶ ἀκολούθως τεσσάρων μιγαδικῶν ἀριθμῶν.

262) Παραστήσατε γεωμετρικῶς τὸ ἄθροισμα τῶν ἀριθμῶν :

$$1) z_1 = -2i, z_2 = -3 + 2i \text{ καὶ } 2) z_1 = 3i, z_2 = -2 + 0i, z_3 = 1 + i$$

263) Ἐάν $z_1 = 2 - 3i, z_2 = +1 + 2i$, ποῖαι αἱ εἰκόνες εἰς τὸ μιγαδικὸν ἐπίπεδον τῶν διαφορῶν $z_1 - z_2$ καὶ $z_2 - z_1$. Τί παρατηρεῖτε;

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΣ

264) Ἐάν $z_1, z_2 \in (C - R)$, νὰ εύρεθῇ σχέσις μεταξὺ τῶν $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2 \in R$, ὅπου $z_1 = \alpha_1 + \beta_1 i, z_2 = \alpha_1 + \beta_2 i$, ἵνα ἔχωμεν : α) $z_1 z_2 \in R$. β) $z_1 z_2 \in I$ (R σύνολον πραγματικῶν, I σύνολον φανταστικῶν).

265) Ὑπὸ ποίαν συνθήκην τῶν πραγματικῶν $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2$ τὸ πηλίκον $\frac{\alpha_1 + \beta_1 i}{\alpha_2 + \beta_2 i}$ εἴναι α) πραγματικὸς ἀριθμὸς καὶ β) φανταστικός.

266) Ἐάν $z_1 z_2 \in (C - R)$ καὶ $z_1 = -\bar{z}_2$, ν' ἀποδειχθῇ ὅτι τὸ ἄθροισμα $z_1 + z_2$ εἴναι καθαρὸς φανταστικὸς ἀριθμὸς καὶ τὸ γινόμενον $z_1 z_2 \in R$

267) Ἐάν $z_1 = \alpha_1 + \beta_1 i, z_2 = \alpha_2 + \beta_2 i$, ύπὸ ποίαν συνθήκην τῶν $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2$ θὰ εἴναι α) $(z_1 \cdot z_2) = 0$ καὶ β) $|z_1 - z_2| = |z_1 + z_2|$;

268) Ἐάν $z_1 = \alpha_1 + \beta_1 i, z_2 = \alpha_2 + \beta_2 i$ καὶ $|z_1|^2 + |z_2|^2 = |z_2 - z_1|^2$ νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι $\alpha_1 \alpha_2 + \beta_1 \beta_2 = 0$

269) Ἐάν $z_1, z_2 \in (C - R)$ ν' ἀποδειχθῇ ὅτι $2(|z_1|^2 + |z_2|^2) = |z_1 + z_2|^2 + |z_1 - z_2|^2$.

270) Ἐάν αἱ πολικαὶ συντεταγμέναι τοῦ ἀριθμοῦ $z = \alpha + \beta i$ εἴναι ρ, θ , ποῖαι αἱ πολικαὶ συντεταγμέναι τοῦ ἀριθμοῦ $z^{-1} = (\alpha + \beta i)^{-1}$;

271) Ὑπὸ ποίαν συνθήκην τῶν $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2 \in R$ αἱ εἰκόνες εἰς τὸ πολικὸν ἐπίπεδον τῶν $z_1 = \alpha_1 + \beta_1 i, z_2 = \alpha_2 + \beta_2 i$, κείνται ἐπ' εὐθείας διερχομένης διὰ τῆς ἀρχῆς 0 τῶν ἀξόνων :

272) Ἐάν $z = \alpha + \beta i$ καὶ $\bar{z} = \alpha - \beta i$, τοῦ δὲ μιγαδικοῦ $z_1 = x + \psi i$ τὸ μέτρον $|z_1| = 1$ νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι $\left| \frac{z - z_1}{1 - \bar{z} z_1} \right| = 1$, $(\bar{z} z_1 \neq 1)$.

273) Παραστήσατε γεωμετρικῶς τοὺς ἀριθμοὺς $\frac{z + \bar{z}}{2}, \frac{z - \bar{z}}{2i}$ ὅπου z μιγαδικὸς ἀριθμὸς καὶ \bar{z} ὁ συζυγής αὐτοῦ.

274) Ἐάν $z = \alpha + \beta i$ καὶ $\bar{z} = \alpha - \beta i$, νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι ὁ z εἴναι ἡ πραγματικὸς ἡ φανταστικὸς ἀντίσχυρη ἡ σχέσις $z^2 = \bar{z}^2$.

275) Ἐάν $|z_1 + z_2| = |z_1 - z_2|$, ὅπου $z_1, z_2 \in (C - R)$, ν' ἀποδειχθῇ ὅτι : α) $z_1 \bar{z}_2 + z_2 \bar{z}_1 = 0$, (\bar{z}_1, \bar{z}_2 συζυγεῖς τῶν z_1, z_2 ἀντιστοιχῶς) καὶ β) $|z_1 + \bar{z}_2| = |\bar{z}_1 + z_2|$. Ἐπιστησης ν' ἀποδειχθῇ, ὅτι ὅντε $|z_1 + \bar{z}_2| = |\bar{z}_1 - z_2|$ τότε $z_1 z_2 + \bar{z}_1 \bar{z}_2 = 0$.

276) Ἐάν $z = \alpha + \beta i$ καὶ $\bar{z} = \alpha - \beta i$, ν' ἀποδειχθῇ, ὅτι αἱ παραστάσεις $\frac{2z}{1+zz}$, $\frac{2\bar{z}}{1+z\bar{z}}$ είναι μιγαδικοὶ συζυγεῖς ἀριθμοί.

277) Ἐάν $z = \alpha + \beta i$, $\alpha, \beta \in R$, καὶ $|2z - 1| = |z - 2|$ ν' ἀποδειχθῇ ὅτι $\alpha^2 + \beta^2 = 1$.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ XII

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΒΟΥ ΒΑΘΜΟΥ

86. ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ (περιληπτική ύπομνησις).

ΟΡΙΣΜΟΙ : Πᾶσα ισότης μεταξὺ δύο ἀλγεβρικῶν παραστάσεων, ή ὅποια εἰναι ἀληθῆς δὲ ὡρισμένας τιμὰς τῶν γραμμάτων (ἀγνώστων) τῶν παραστάσεων τούτων, καλεῖται ἔξισωσις.

Ἐνταῦθα δὲν ἀποκλείεται ἡ περίπτωσις, καθ' ᾧ ίσότης νὰ εἰναι ἀληθῆς διὰ πάσας τὰς τιμὰς τῶν γραμμάτων, ὅπότε ἡ ἔξισωσις καλεῖται ταυτότης. Π.χ. ἡ ἔξισωσις $4x^2 + 1 - 4x = (2x - 1)^2$ εἰναι ἀληθῆς διὰ πᾶν $x \in \mathbb{R}$.

Ἡ εὑρεσις ὅλων τῶν τιμῶν τῶν γραμμάτων, τὰ ὅποια καλοῦνται ἄγνωστοι τῆς ἔξισωσεως διὰ τὰς ὅποιας εἰναι αὐτη ἀληθῆς καλεῖται ἐπίλυσις τῆς ἔξισωσεως. Αἱ οὕτω δὲ εύρισκόμεναι τιμαὶ καλοῦνται λύσεις ἢ ρίζαι τῆς ἔξισωσεως.

Δύο ἡ περισσότεραι ἔξισώσεις, αἱ ὅποιαι ἔχουν τὰς αὐτὰς ἀκριβῶς λύσεις (ὅχι κοινὰς λύσεις), καλοῦνται ισοδύναμοι.

Ίδιότητες : 1) Ἡ ἔξισωσις $f(x) = \phi(x)$ εἰναι ισοδύναμος πρὸς τὴν ἔξισωσιν $f(x) + \sigma(x) = \phi(x) + \sigma(x)$, ἐφ' ὅσον εἰς τὸ σύνολον εἰς τὸ ὅποιον ἀναφερόμεθα, ἡ συνάρτησις $\sigma(x)$ ἔχῃ νόημα. Οὕτω : $f(x) = \phi(x) \Leftrightarrow f(x) + \sigma(x) = \phi(x) + \sigma(x)$

2) Ἡ ἔξισωσις $f(x) = \phi(x)$ εἰναι ισοδύναμος πρὸς τὴν ἔξισωσιν $\lambda f(x) = \lambda \phi(x)$, ὅπου $\lambda \in \mathbb{R}$, $\lambda \neq 0$ καὶ ἀνεξάρτητον τοῦ x .

Οὕτω συμβολίζομεν : $\lambda \in \mathbb{R}, \lambda \neq 0 : f(x) = \phi(x) \Leftrightarrow \lambda f(x) = \lambda \phi(x)$.

3) Ἡ ἔξισωσις $f(x) = \phi(x)$ δὲν εἰναι ἐν γένει ισοδύναμος πρὸς τὴν ἔξισωσιν $f(x) \cdot \sigma(x) = \phi(x) \cdot \sigma(x)$, ὅπου $\sigma(x)$ συνάρτησις τοῦ x .

Πράγματι, διότι $f(x) \cdot \sigma(x) = \phi(x) \cdot \sigma(x) \Leftrightarrow \sigma(x) [f(x) - \phi(x)] = 0$, εἴ τις ἔχομεν $\sigma(x) = 0 \vee f(x) = \phi(x)$.

4) Ἀν $\phi(x) = 0$ καὶ $\phi(x) = \phi_1(x) \cdot \phi_2(x) \cdots \phi_v(x)$, τότε τὸ σύνολον τῶν λύσεων τῆς $\phi(x) = 0$ ισοῦται μὲ τὴν ἔνωσιν τῶν συνόλων τῶν λύσεων τῶν ἔξισώσεων $\phi_1(x) = 0, \phi_2(x) = 0, \dots, \phi_v(x) = 0$. Πράγματι, διότι διὰ νὰ ἀληθεύῃ ἡ $\phi(x) = 0$ πρέπει καὶ ἀρκεῖ εἰς τουλάχιστον ἐκ τῶν $\phi_1(x), \phi_2(x), \dots, \phi_v(x)$

νὰ εἶναι ἵσος μὲ μηδέν. Ἐπομένως αἱ ρίζαι τῶν ἔξισώσεων $\varphi_1(x) = 0$, $\varphi_2(x) = 0, \dots \varphi_v(x) = 0$ εἶναι καὶ ρίζαι τῆς ἔξισώσεως $\varphi(x) = 0$.

5) Ἡ ἔξισώσις $f(x) = \varphi(x)$ δὲν εἶναι ἐν γένει ἰσοδύναμος πρὸς τὴν ἔξισώσιν $[\varphi(x)]^2 = [f(x)]^2$.

Διότι : $[\varphi(x)]^2 - [f(x)]^2 = 0 \Leftrightarrow (\varphi(x) + f(x))(\varphi(x) - f(x)) = 0$, ἡτίς δίδει $\varphi(x) = -f(x)$ ή $\varphi(x) = f(x)$

Ἐκ τῆς περιληπτικῆς ταύτης ὑπομνήσεως, ἀνευ ἀποδείξεως, τῶν ἰδιοτήτων τῶν ἔξισώσεων συμπεραίνουμε, ὅτι κατά τὴν λύσιν τῶν ἔξισώσεων δέον νὰ λαμβάνωμε σοβαρῶς ὑπὸ δψιν αὐτάς, διὰ νὰ μὴν ὑποπίπτωμεν εἰς σφάλματα.

87. ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΙΣ ΕΞΙΣ. Β' ΒΑΘΜΟΥ⁽¹⁾

Ορισμός. Καλεῖται ἔξισώσις β' βαθμοῦ ώς πρὸς x , πᾶσα ἔξισώσις τῆς μορφῆς $\alpha x^2 + \beta x + \gamma = 0$ μὲ $\alpha \neq 0$ καὶ α, β, γ πραγματικοὶ ἢ καὶ μιγαδικοί. Ἐνταῦθα θὰ θεωροῦνται οἱ α, β, γ οἱ ὄποιοι καλοῦνται συντελεσταί, πραγματικοὶ ἀριθμοὶ ἢ καὶ ἀλγεβρικοὶ παραστάσεις μὴ περιέχουσαι τὸν ἄγνωστον x .

Οὕτω διὰ τὰς ἀκολούθους ἔξισώσεις β' βαθμοῦ οἱ συντελεσταί ἔχουν ἀντιστοίχως τὰς παρακειμένας τιμάς :

$$\begin{array}{lll} 3x^2 - 2x = 0 & \alpha = 3, & \beta = -2, & \gamma = 0 \\ -5x^2 + 7 = 0 & \alpha = -5, & \beta = 0, & \gamma = 7 \\ -\frac{1}{2}x^2 = 0 & \alpha = -\frac{1}{2}, & \beta = 0, & \gamma = 0 \\ x^2 - 3x + 1 = 0 & \alpha = 1, & \beta = -3, & \gamma = 1 \\ \alpha x^2 - (\alpha + 1)x - 3\alpha = 0 & \alpha' = \alpha, & \beta' = -(\alpha + 1), & \gamma' = -3\alpha \\ (\lambda - 1)x^2 - 4\lambda x + (\lambda^2 - 9) = 0 & \alpha = \lambda - 1, & \beta = -4\lambda, & \gamma = \lambda^2 - 9 \end{array}$$

Αἱ τρεῖς πρῶται ἔξισώσεις δὲν περιέχουν ὅλους τοὺς ὄρους τοῦ τριωνύμου $\alpha x^2 + \beta x + \gamma$, διὰ τοῦτο καλοῦνται ἐ λ λ ι π ε ι ζ. Αἱ ἄλλαι τρεῖς εἶναι π λ ή-ρ ε ι ζ μορφαί.

Ἐν γένει, ἐὰν $\beta = \gamma = 0$ λαμβάνομεν $\alpha x^2 = 0$
 » $\beta = 0 \wedge \gamma \neq 0$ » $\alpha x^2 + \gamma = 0$ } ἐλλιπεῖς μορφαί
 » $\beta \neq 0 \wedge \gamma = 0$ » $\alpha x^2 + \beta x = 0$
 » $\beta \neq 0 \wedge \gamma \neq 0$ » $\alpha x^2 + \beta x + \gamma = 0$ πλήρης μορφὴ

Τῆς ἔξισώσεως $\varphi(x) = \alpha x^2 + \beta x + \gamma = 0$, $(\alpha \neq 0, \beta, \gamma) \in \mathbb{R}$, θὰ καλοῦμεν λύσιν ἢ ρίζαν τὴν τιμὴν $x = x_0 \in \mathbb{C}$, ἐὰν ἔχωμεν $\varphi(x_0) = \alpha x_0^2 + \beta x_0 + \gamma = 0$. ($C^* = \{x / x \text{ μιγαδικός ἀριθμός}\}$ *).

"Οπως θὰ ἴδωμεν κατωτέρω, τὸ σύνολον τῶν λύσεων (ρίζῶν) τῆς β'/θμίου ἔξισώσεως εἶναι διμελές.

"Ἐὰν λοιπὸν x_1 καὶ x_2 εἶναι αἱ ρίζαι τῆς $f(x) = \alpha x^2 + \beta x + \gamma = 0$ εἰς τὸ σύνολον C , τότε αἱ $f(x_1) = \alpha x_1^2 + \beta x_1 + \gamma = 0$ καὶ $f(x_2) = \alpha x_2^2 + \beta x_2 + \gamma = 0$ εἶναι ἀληθεῖς ισότητες.

(1) Τὰς ἔξισώσεις β' βαθμοῦ μὲ ἔναν ἄγνωστον ἐπραγματεύθη τὸ πρῶτον ὁ "Ελλην: Μαθηματικός Διόφαντος".

(*) Τὸ σύνολον C τῶν μιγαδικῶν ἀριθμῶν περιέχει τὸ σύνολον τῶν πραγματικῶν ἀριθμῶν (κεφάλαιον περὶ Μιγαδικῶν).

Συμβολίζομεν :

$$\left. \begin{array}{l} \alpha \neq 0, \beta, \gamma \in \mathbb{R} \\ f(x_1) = 0, f(x_2) = 0 \end{array} \right\} \Leftrightarrow \Sigma = \{x/x \in \mathbb{C} \wedge f(x) = \alpha x^2 + \beta x + \gamma = 0\} = \{x_1, x_2\}$$

*Επίλυσις της έξισ. β' βαθμού.

1) 'Η έλλιπής μορφή $\alpha x^2 = 0, \alpha \neq 0$.

'Επειδή $\alpha \neq 0$, έκ της $\alpha x^2 = 0 \Leftrightarrow x^2 = 0 \wedge x \cdot x = 0$, έξ ού $x_1 = x_2 = 0$

2) 'Η έλλιπής μορφή $\alpha x^2 + \gamma = 0, \alpha \neq 0, \gamma \neq 0$.

*Έχομεν : $\alpha x^2 + \gamma = 0 \Leftrightarrow x^2 + \gamma/\alpha = 0$, δηπότε

α) 'Εάν $\frac{\gamma}{\alpha} < 0$, δηλαδή οι α και γ είναι έτερόσημοι, τότε $-\frac{\gamma}{\alpha} > 0$ και ή έξισωσις γράφεται :

$$x^2 - \left(-\frac{\gamma}{\alpha}\right) = 0 \Leftrightarrow x^2 - \left(\sqrt{-\frac{\gamma}{\alpha}}\right)^2 = 0 \Leftrightarrow \left(x + \sqrt{-\frac{\gamma}{\alpha}}\right) \left(x - \sqrt{-\frac{\gamma}{\alpha}}\right) = 0,$$

ήτις είναι ίσοδύναμος πρὸς τὸ ζεῦγος $x + \sqrt{-\frac{\gamma}{\alpha}} = 0, x - \sqrt{-\frac{\gamma}{\alpha}} = 0$, έξ ού

$$x_1 = -\sqrt{-\frac{\gamma}{\alpha}}, x_2 = +\sqrt{-\frac{\gamma}{\alpha}}$$

β) 'Εάν $\frac{\gamma}{\alpha} > 0$, δηλαδή οι α και γ είναι όμόσημοι, τότε ή έξισωσις $x^2 + \frac{\gamma}{\alpha} = 0$ δὲν έχει λύσιν ἐν \mathbb{R} διότι $x^2 + \frac{\gamma}{\alpha} > 0 \forall x \in \mathbb{R}$, έχει όμως λύσιν εἰς τὸ σύνολον τῶν φανταστικῶν I. Οὕτω λαμβάνομεν τὰς λύσεις :

$$x_1 = -\sqrt{-\frac{\gamma}{\alpha}} = -i\sqrt{\frac{\gamma}{\alpha}}, x_2 = +\sqrt{-\frac{\gamma}{\alpha}} = i\sqrt{\frac{\gamma}{\alpha}}$$

3) 'Η έλλιπής μορφή $\alpha x^2 + \beta x = 0, \alpha \neq 0, \beta \neq 0$.

*Έχομεν : $\alpha x^2 + \beta x = 0 \Leftrightarrow x(\alpha x + \beta) = 0$, ήτις είναι ίσοδύναμος πρὸς τὸ ζεῦγος τῶν έξισ. $x = 0, \alpha x + \beta = 0$, έξ ού λαμβάνομεν $x_1 = 0, x_2 = -\frac{\beta}{\alpha}$

4) 'Η πλήρης μορφή $f(x) = \alpha x^2 + \beta x + \gamma = 0, \alpha \neq 0, \beta \neq 0, \gamma \neq 0$

*Έχοντες ύπ' θέσην τὰς ιδιότητας ίσοδυναμίας τῶν έξισώσεων λαμβάνομεν διαδοχικῶς :

$$f(x) = \alpha x^2 + \beta x + \gamma = 0 \quad (\text{πολ/ζομεν έπι 4α})$$

$$\Leftrightarrow 4\alpha^2 x^2 + 4\alpha\beta x + 4\alpha\gamma = 0 \quad (\text{προσθέτομεν τὸν } \beta^2)$$

$$\Leftrightarrow 4\alpha^2 x^2 + 4\alpha\beta x + \beta^2 - \beta^2 + 4\alpha\gamma = 0$$

$$\Leftrightarrow (2\alpha x + \beta)^2 - (\beta^2 - 4\alpha\gamma) = 0 \quad (\text{θέτομεν } \beta^2 - 4\alpha\gamma = \Delta)$$

$$\text{ή } (2\alpha x + \beta)^2 - \Delta = 0$$

ή $(2\alpha x + \beta)^2 - (\sqrt{\Delta})^2 = 0$, ήτις είναι ίσοδύναμος πρὸς τὸ ζεῦγος τῶν έξισώσεων $2\alpha x + \beta + \sqrt{\Delta} = 0, 2\alpha x + \beta - \sqrt{\Delta} = 0$, έξ ού λαμβάνομεν

$$x_1 = \frac{-\beta + \sqrt{\Delta}}{2\alpha}, x_2 = \frac{-\beta - \sqrt{\Delta}}{2\alpha}$$

"Ωστε ή έξισωσις $f(x) = \alpha x^2 + \beta x + \gamma = 0$ έχει ρίζας, αἱ όποιαι δίδονται ἀπὸ τὸν τύπον

$$x = \frac{-\beta \pm \sqrt{\Delta}}{2\alpha} = \frac{-\beta \pm \sqrt{\beta^2 - 4\alpha\gamma}}{2\alpha} \quad (1)$$

‘Η παράστασις $\Delta = \beta^2 - 4\alpha\gamma \in \mathbb{R}$ καλείται διακρίνουσα της έξισώσεως,

Σημ. Αἱ ἔξετασθεῖσαι ἐλλιπεῖς μορφαὶ εἰναι δυνατὸν νὰ ἐπιλυθοῦν διὰ τοῦ ἀνωτέρῳ γενικοῦ τύπου.

‘Η διακρίνουσα εἰναι δυνατὸν νὰ παρουσιασθῇ ὑπὸ τὰς ἔξῆς περιπτώσεις :

α) ’Εὰν $\Delta > 0$, τότε αἱ ρίζαι x_1, x_2 αἱ διδόμεναι ἀπὸ τὸν τύπον (1) εἰναι πραγματικαὶ καὶ ἀνισοί.

β) ’Εὰν $\Delta = 0$, τότε αἱ ρίζαι x_1, x_2 εἰναι πραγματικαὶ καὶ ἴσαι, ὅπότε λέγομεν, ὅτι ἡ ἔξισώσις ἔχει μίαν διπλὴν ρίζαν $x = -\frac{\beta}{2\alpha}$

γ) ’Εὰν $\Delta < 0$, τότε ἡ ἔξισώσις $\alpha x^2 + \beta x + \gamma = 0$ ἡ ἡ ἰσοδύναμὸς της $(2\alpha x + \beta)^2 = \Delta$ δὲν ἔχει λύσιν εἰς τὸ σύνολον \mathbb{R} , διότι $\forall x \in \mathbb{R} \Rightarrow (2\alpha x + \beta)^2 > \Delta$, ἔχει δύμως λύσιν εἰς τὸ σύνολον τῶν μιγαδικῶν της μορφῆς (α, β) μὲ $\beta \neq 0$, αἱ δὲ ρίζαι x_1, x_2 λέγομεν ὅτι εἰναι καθαραὶ μιγαδικαὶ.

Εἰδικὴ περίπτωσις ‘Ο τύπος (1) δύναται ν’ ἀπλουστευθῆ, ἐὰν ὁ συντελεστὴς β τοῦ x εἰναι πολλαπλάσιον τοῦ 2

Οὔτω, ἐὰν $\beta = 2\beta'$, τότε $\Delta = (2\beta')^2 - 4\alpha\gamma = 4\beta'^2 - 4\alpha\gamma = 4(\beta'^2 - \alpha\gamma)$

$$\text{Συνεπῶς } x = -\frac{\beta \pm \sqrt{\Delta}}{2\alpha} = -\frac{2\beta' \pm 2\sqrt{\beta'^2 - \alpha\gamma}}{2\alpha} = -\frac{\beta' \pm \sqrt{\beta'^2 - \alpha\gamma}}{\alpha}$$

’Εὰν δὲ $\beta^2 - 4\alpha\gamma \geq 0 \Leftrightarrow 4(\beta'^2 - \alpha\gamma) \geq 0 \Leftrightarrow \beta'^2 - \alpha\gamma \geq 0$

‘Ομοίως ἐὰν $\beta^2 - 4\alpha\gamma < 0 \Leftrightarrow 4(\beta'^2 - \alpha\gamma) < 0 \Leftrightarrow \beta'^2 - \alpha\gamma < 0$

Παραδείγματα : 1) Να ἐπιλυθοῦν αἱ ἔξισώσεις.

α) $9x^2 - 16 = 0$, β) $4x^2 + 3x = 0$, γ) $6x^2 - 5 = 0$, δ) $5x^2 + 3 = 0$

‘Επίλυσις α) ’Εχομεν $9x^2 - 16 = 0 \Leftrightarrow (3x + 4)(3x - 4) = 0$ ἰσοδύναμος πρὸς τὸ ζεῦγος

$$\begin{cases} 3x + 4 = 0 \\ 3x - 4 = 0, \end{cases} \text{ ἐξ οὗ : } \begin{cases} x_1 = -\frac{4}{3} \\ x_2 = \frac{4}{3} \end{cases}$$

$$\text{Οὔτω : } \Sigma = \{ x / x \in \mathbb{R} \wedge 9x^2 - 16 = 0 \} = \left\{ -\frac{4}{3}, \frac{4}{3} \right\}$$

β) ’Εχομεν $4x^2 + 3x = 0 \Leftrightarrow x(4x + 3) = 0$ ἰσοδύναμος πρὸς τὸ ζεῦγος τῶν ἔξισώσεων

$$\begin{cases} x = 0 \\ 4x + 3 = 0, \end{cases} \text{ ἐξ οὗ : } \begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = -\frac{3}{4} \end{cases}$$

$$\text{Οὔτω : } \Sigma = \{ x / x \in \mathbb{R} \wedge 4x^2 + 3x = 0 \} = \left\{ 0, -\frac{3}{4} \right\}$$

γ) ’Εχομεν $6x^2 - 5 = 0 \Leftrightarrow (x\sqrt{6})^2 - (\sqrt{5})^2 = 0 \Leftrightarrow (x\sqrt{6} + \sqrt{5})(x\sqrt{6} - \sqrt{5}) = 0$ ἰσοδύναμος πρὸς τὸ ζεῦγος τῶν ἔξισώσεων $x\sqrt{6} + \sqrt{5} = 0$, $x\sqrt{6} - \sqrt{5} = 0$, ἐξ οὐ λαμβάνομεν τὰς λύσεις $x_1 = -\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{6}} = -\frac{\sqrt{30}}{6}$, $x_2 = \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{30}}{6}$

$$\text{Ωστε : } \Sigma = \{ x / x \in \mathbb{R} \wedge 6x^2 - 5 = 0 \} = \left\{ -\frac{\sqrt{30}}{6}, \frac{\sqrt{30}}{6} \right\}$$

$$\delta) ’Εχομεν $5x^2 + 3 = 0 \Leftrightarrow (x\sqrt{5})^2 - (\sqrt{-3})^2 = 0 \Leftrightarrow$$$

$$\Leftrightarrow (x\sqrt{5} + \sqrt{-3}) \cdot (x\sqrt{5} - \sqrt{-3}) = 0 \text{ Ισοδύναμος πρὸς τὸ ζεῦγος τῶν ἔξισ.}$$

$$x\sqrt{5} + \sqrt{-3} = 0, x\sqrt{5} - \sqrt{-3} = 0, \text{ εἰς οὐ } x_1 = -i\sqrt{3}/\sqrt{5}, x_2 = i\sqrt{3}/\sqrt{5}$$

"Ωστε : $\Sigma = \{ x / x \in \mathbb{I} \wedge 5x^2 + 3 = 0 \} = \{ -i\sqrt{3}/\sqrt{5}, i\sqrt{3}/\sqrt{5} \}$

2) Νὰ ἐπιλυθοῦν αἱ ἔξισώσεις

$$\alpha) x^2 + 2x - 3 = 0, \quad \beta) x^2 - 6x + 13 = 0, \quad \gamma) 3x^2 - 5x + 1 = 0$$

*Ἐπίλυσις. α) Ἐπειδὴ εἴναι $\alpha = 1, \beta = 2, \gamma = -3$

ἄρα $\Delta = 2^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-3) = 4 + 12 = 16$. Διὰ τοῦ τύπου (1) ἔχομεν :

$$x = \frac{-2 \pm \sqrt{16}}{2 \cdot 1} = \frac{-2 \pm 4}{2}, \text{ εἰς οῦ : } x_1 = \frac{-2 + 4}{2} = 1, x_2 = \frac{-2 - 4}{2} = -3$$

$$\text{Οὕτω : } \Sigma = \{ x / x \in \mathbb{R} \wedge x^2 + 2x - 3 = 0 \} = \{ 1, -3 \}$$

$$\beta) Ἐπειδὴ εἴναι $\alpha = 1, \beta = -6, \gamma = 13$$$

ἄρα $\Delta = (-6)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 13 = 36 - 52 = -16$. Διὰ τοῦ τύπου (1) ἔχομεν :

$$x = \frac{6 \pm \sqrt{-16}}{2 \cdot 1} = \frac{6 \pm 4i}{2}, \text{ εἰς οῦ : } x_1 = 3 + 2i, x_2 = 3 - 2i$$

$$\text{Οὕτω : } \Sigma = \{ x / x \in \mathbb{C} \wedge x^2 - 6x + 13 = 0 \} = \{ 3 + 2i, 3 - 2i \}$$

$$\gamma) Ἐπειδὴ $\alpha = 3, \beta = -5, \gamma = 1$$$

ἄρα $\Delta = (-5)^2 - 4 \cdot 3 \cdot 1 = 25 - 12 = 13$. Διὰ τοῦ τύπου (1) ἔχομεν :

$$x = \frac{5 \pm \sqrt{13}}{2 \cdot 3} = \frac{5 \pm \sqrt{13}}{6}, \text{ εἰς οῦ : } x_1 = \frac{5 + \sqrt{13}}{6}, x_2 = \frac{5 - \sqrt{13}}{6}$$

$$\text{Οὕτω : } \Sigma = \{ x | x \in \mathbb{R} \wedge 3x^2 - 5x + 1 = 0 \} = \left\{ \frac{5 + \sqrt{13}}{6}, \frac{5 - \sqrt{13}}{6} \right\}$$

3) Ἐὰν $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, νὰ ἐπιλυθῇ ἡ ἔξισωσις :

$$x^2 + 2\beta x - (\alpha^2 + 2\alpha\beta) = 0$$

*Ἐπίλυσις : Ἐπειδὴ δὲ συντελεστὴς τοῦ x εἴναι πολλαπλάσιον τοῦ 2, ἐφαρμόζοντες τὸν τύπον $x = \frac{-\beta' \pm \sqrt{\beta'^2 - 4\gamma}}{\alpha}$, λαμβάνομεν :

$$x = \frac{-\beta \pm \sqrt{\beta^2 + \alpha^2 + 2\alpha\beta}}{1} = \frac{-\beta \pm \sqrt{(\alpha + \beta)^2}}{1} = \frac{-\beta \pm |\alpha + \beta|}{1} = -\beta \pm |\alpha + \beta|,$$

$$\text{εἰς οῦ : } x_1 = -\beta + \alpha + \beta = \alpha, \quad x_2 = -\beta - \alpha - \beta = -(\alpha + 2\beta)$$

$$\text{Οὕτω : } \Sigma = \{ x | x \in \mathbb{R} \wedge x^2 + 2\beta x - (\alpha^2 + 2\alpha\beta) = 0 \wedge \alpha, \beta \in \mathbb{R} \} = \{ \alpha, -(\alpha + 2\beta) \}$$

$$4) \text{ Νὰ ἐπιλυθῇ ἡ ἔξισωσις } \frac{1}{x-4} + \frac{8}{x-1} = \frac{15}{x+9}$$

*Ἐπίλυσις. τὰ κλάσματα ἔχουν ἔννοιαν, ὅταν $x \neq 4, x \neq 1, x \neq -9$. Ἐκτελοῦμεν τὰς σημειουμένας πράξεις καὶ διατάσσοντες, λαμβάνομεν $2x^2 - 41x + 119 = 0$. Διὰ τοῦ τύπου λαμβάνομεν τὰς λύσεις $x_1 = \frac{41 + 27}{4} = 17, x_2 = \frac{41 - 27}{4} = \frac{7}{2}$, αἱ δόποιαὶ ἐπαληθεύουν τὴν ἔξισωσιν.

$$5) \text{ Νὰ ἐπιλυθῇ ἡ ἔξισωσις } \frac{2x^2 - 5x + 2}{x-2} = 0.$$

Έπιλυσης.

Τότε κλάσμα διά $x = 2$ είναι δάριοστον, διότι οι όροι αύτοῦ μηδενίζονται.
 "Ητοι, όταν παρονομαστής $x - 2$ είναι ό πάραγων δάπροσδιοριστίας τοῦ κλάσματος. Υποθέτοντες $x \neq 2$ λαμβάνομεν μετά τὴν ἐκτέλεσιν τῆς διαιρέσεως $(2x^2 - 5x + 2) : (x - 2) = (2x - 1)$. Άρα $2x - 1 = 0$, εἴ τοι $x = +\frac{1}{2}$, ητοι είναι λύσης τῆς διοθείσης ἔξισώσεως.

88. ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΡΙΖΩΝ ΤΗΣ ΕΞΙΣ. $\alpha x^2 + \beta x + \gamma = 0$, $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$.

Τότε είδος τῶν ριζῶν τῆς ἔξισωσ. $f(x) = \alpha x^2 + \beta x + \gamma = 0$ ἔξαρταται ἀπό τὴν διακρίνουσαν $\Delta = \beta^2 - 4\alpha\gamma \in \mathbb{R}$

Οὕτω διακρίνομεν τὰς ἔξης περιπτώσεις :

$$1) \text{ Εάν } \Delta > 0, \text{ τότε } \sqrt{\Delta} \in \mathbb{R} \text{ καὶ συνεπῶς } x = \frac{-\beta \pm \sqrt{\Delta}}{2\alpha} \in \mathbb{R}$$

"Ητοι αἱ ρίζαι x_1, x_2 είναι πραγματικαὶ καὶ ἄνισοι.

"Εάν δὲ είναι $\Delta = k^2$ καὶ $\alpha, \beta, \gamma, k \in \mathbb{Q}$ τότε αἱ ρίζαι x_1, x_2 ἐκφράζονται ρητῶς. "Ητοι $x_1, x_2 \in \mathbb{Q}$. "Άλλως αἱ ρίζαι είναι ἄρρητοι (ἀσύμμετροι) συζυγεῖς. Δηλαδὴ ὅταν ἡ ἔξισωσις $f(x) = 0$ ἔχει ως ρίζαν τὸν ἀσύμμετρον $x_1 = A + \sqrt{B}$, $B \neq m^2$ θὰ ἔχῃ καὶ τὴν ρίζαν $x^2 = A - \sqrt{B}$ (παραδ. 2γ')

$$2) \text{ Εάν } \Delta = 0, \text{ τότε } \sqrt{\Delta} = 0 \text{ καὶ συνεπῶς } x = \frac{-\beta}{2\alpha} \in \mathbb{R}.$$

"Ητοι αἱ ρίζαι $x_1 = x_2 = -\frac{\beta}{2\alpha}$ είναι πραγματικαὶ καὶ ἴσαι.

$$3) \text{ Εάν } \Delta < 0, \text{ τότε } \sqrt{\Delta} \in \mathbb{C} \text{ καὶ συνεπῶς } x = \frac{-\beta \pm i\sqrt{-\Delta}}{2\alpha} \in (\mathbb{C} - \mathbb{R}).$$

"Ητοι $x_1 = \frac{-\beta}{2\alpha} + \frac{i\sqrt{-\Delta}}{2\alpha}, x_2 = \frac{-\beta}{2\alpha} - i\frac{\sqrt{-\Delta}}{2\alpha}$ καθαραὶ μιγαδικαὶ συζυγεῖς.

Τῶν προτάσεων τούτων ἴσχύουν καὶ αἱ ἀντίστροφοι.

Οἱ μαθηταὶ δύνανται εὐκόλως νὰ κάμουν τὴν ἀπόδειξιν.

Κατωτέρω δίδομεν συνοπτικῶς τὰ ἀνωτέρω συμπεράσματα εἰς δύο πίνακας.

Πίναξ I

Είδος τῶν ριζῶν τῆς ἔξισ. $\alpha x^2 + \beta x + \gamma = 0, \alpha \neq 0, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$	
$\Delta = \beta^2 - 4\alpha\gamma > 0$	Δύο ρίζαι πραγματικαὶ καὶ ἄνισοι : $x_2 < x_1$
$\Delta = \beta^2 - 4\alpha\gamma = 0$	Δύο ρίζαι πραγματικαὶ καὶ ἴσαι : $x_1 = x_2 = -\frac{\beta}{2\alpha}$
$\Delta = \beta^2 - 4\alpha\gamma < 0$	Δύο ρίζαι καθαραὶ μιγαδικαὶ συζυγεῖς.

Πίναξ II

Είδος τῶν ριζῶν τῆς ἔξισ. $\alpha x^2 + \beta x + \gamma = 0, \alpha \neq 0, \beta, \gamma \in \mathbb{Q}$	
$\Delta > 0$	$\Delta = k^2, k \in \mathbb{Q}$ Δύο ρίζαι πραγματικαὶ ἄνισοι καὶ σύμμετροι. $\Delta \neq k^2$ Δύο ρίζαι πραγματικαὶ ἄνισοι καὶ ἀσύμμετροι.
$\Delta = 0$	Δύο ρίζαι πραγματικαὶ ἴσαι καὶ σύμμετροι.
$\Delta < 0$	Δύο ρίζαι καθαραὶ μιγαδικαὶ συζυγεῖς.

Σημαντική παρατήρησις. Εάν οί συντελεσταί α και γ είναι έτερόσημοι τότε ή έξισ. $\alpha x^2 + \beta x + \gamma = 0$ έχει δύο ρίζας πραγματικάς άνίσους. Διότι τότε: $\alpha < 0 \Leftrightarrow -4\alpha > 0 \Leftrightarrow \beta^2 - 4\alpha\gamma > 0 \text{ ή } \Delta > 0$.

89. ΣΥΓΚΡΙΣΙΣ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΡΙΖΩΝ ΤΗΣ $\alpha x^2 + \beta x + \gamma = 0$

*Έχομεν $\Delta \geq 0$ και $x_1 = \frac{-\beta + \sqrt{\Delta}}{2\alpha}$, $x_2 = \frac{-\beta - \sqrt{\Delta}}{2\alpha}$

Σχηματίζομεν τήν διαφοράν $x_1 - x_2$:

$$x_1 - x_2 = \frac{-\beta + \sqrt{\Delta}}{2\alpha} - \frac{-\beta - \sqrt{\Delta}}{2\alpha} = \frac{\sqrt{\Delta}}{\alpha}$$

Τὸ σημεῖον τῆς διαφορᾶς $x_1 - x_2$ ἔξαρτᾶται ἀπὸ τὸ πρόσημον τοῦ α, διότι $\Delta \geq 0 \Leftrightarrow \sqrt{\Delta} \geq 0$.

Οὕτω: *Εάν $\alpha > 0$, τότε $x_1 - x_2 \geq 0 \Leftrightarrow x_1 \geq x_2$

*Εάν $\alpha < 0$, τότε $x_1 - x_2 \leq 0 \Leftrightarrow x_1 \leq x_2$

Σημαντική σημείωσις. Σκόπιμον είναι νὰ ἔχωμεν εἰς ἀμφοτέρας τὰς περιπτώσεις ἑνιαίαν διάταξιν τῶν πραγματικῶν ρίζῶν x_1, x_2 . Διὰ τοῦτο συμφωνοῦμεν εἰς τὰ ἐπόμενα νὰ χρησιμοποιῶμεν τήν διάταξιν $x_2 \leq x_1$, ὅπότε ἂν $\alpha > 0$ τότε $x_1 = \frac{-\beta + \sqrt{\Delta}}{2\alpha}$ και $x_2 = \frac{-\beta - \sqrt{\Delta}}{2\alpha}$, ἂν δὲ $\alpha < 0$ τότε $x_1 = \frac{-\beta - \sqrt{\Delta}}{2\alpha}$ και $x_2 = \frac{-\beta + \sqrt{\Delta}}{2\alpha}$.

90. ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΡΙΖΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙΩΝΥΜΟΥ $f(x) = ax^2 + \beta x + \gamma$, $a \neq 0$

Καλούνται ρίζαι τοῦ τριωνύμου $f(x)$ αἱ τιμαὶ τοῦ x αἱ ὀποῖαι τὸ μηδενίζουν. Συνεπῶς αἱ ρίζαι τοῦ τριωνύμου $f(x)$ είναι αἱ αὐταὶ μὲ τὰς ρίζας τῆς ἔξισώσεως $\alpha x^2 + \beta x + \gamma = 0$ και κατὰ συνέπειαν τὰ συμπεράσματα, τὰ συναχθέντα ἐκ τῆς ἔξετάσεως τοῦ εἰδους τῶν ρίζῶν αὐτῆς, δύνανται νὰ χρησιμοποιηθοῦν και ἐνταῦθα (πίνακες I και II).

Παραδείγματα. 1) Νὰ προσδιορισθῇ τὸ εἰδος τῶν ριζῶν τῶν ἀκολούθων ἔξισώσεων: α) $x^2 - 5x + 4 = 0$, β) $x^2 + 2x + 1 = 0$, γ) $5x^2 + 13x + 9 = 0$

Λύσις α) *Έχομεν: $\Delta = (-5)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 4 = 25 - 16 = 9 = 3^2 > 0$

*Ητοι, ή διακρίνουσα Δ τῆς ἔξισώσεως είναι τέλειον τετράγωνον πραγματικοῦ ἀριθμοῦ και ἄρα ή ἔξισωσις ἔχει δύο ρίζας πραγματικάς συμμέτρους και άνίσους. β) *Έχομεν $\Delta = 2^2 - 4 \cdot 1 \cdot 1 = 4 - 4 = 0$

*Ἄρα ἔχει δύο ρίζας ἵσας πραγματικάς: $x_1 = x_2 = -\frac{2}{2 \cdot 1} = -1$

γ) *Έχομεν $\Delta = 13^2 - 4 \cdot 5 \cdot 9 = 169 - 180 = -11 < 0$

*Ἄρα ἔχει δύο ρίζας καθαράς μιγαδικάς συζυγεῖς.

2) Νὰ προσδιορισθῇ τὸ εἰδος τῶν ριζῶν τῶν ἔξισώσεων.

α) $x^2 - (\alpha + \beta)x + \alpha\beta = 0$, β) $x^2 - 2\alpha x + \alpha^2 + \beta^2$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$

Λύσις: α) Είναι: $\Delta = (\alpha + \beta)^2 - 4\alpha\beta = (\alpha - \beta)^2 \geq 0$

"Αρα έχει δύο ρίζας πραγματικάς συμμέτρους ώς πρὸς α , β άνίσους ή ίσας, ἐφ' ὅσον θὰ έχωμεν $\alpha \neq \beta$ ή $\alpha = \beta$ ἀντιστοίχως.

$$\beta) \text{ Είναι : } \Delta = 4\alpha^2 - 4(\alpha^2 + \beta^2) = -4\beta^2 = -(2\beta)^2 < 0$$

"Αρα έχει δύο ρίζας καθαράς μιγαδικάς συζυγεῖς, ἐὰν $\beta \neq 0$.

3) Νὰ προσδιορισθοῦν αἱ τιμαὶ τοῦ $\lambda \in \mathbb{R}$, διὰ τὰς ὁποίας η ἔξισωσις ἔχει ρίζας
a) ίσας, β) πραγματικάς ἀνίσους καὶ γ) καθαράς μιγαδικάς συζυγεῖς. $f(x) = 3x^2 + 2x - (3\lambda + 1) = 0$

Λύσις: α) "Εχομεν $\Delta = 2^2 + 4 \cdot 3 \cdot (3\lambda + 1) = 0 \Leftrightarrow 9\lambda + 4 = 0 \Leftrightarrow \lambda = -\frac{4}{9}$. "Ωστε διὰ $\lambda = -\frac{4}{9}$ η $f(x) = 0$ έχει μίαν ρίζαν διπλήν. Αὕτη είναι $x_1 = x_2 = -\frac{2}{2 \cdot 3} = -\frac{1}{3}$

$$\beta) "Εχομεν \Delta = 2^2 + 4 \cdot 3(3\lambda + 1) > 0 \Leftrightarrow 9\lambda + 4 > 0 \Leftrightarrow \lambda > -\frac{4}{9}.$$

"Ωστε διὰ $\lambda > -\frac{4}{9}$ η $f(x) = 0$ έχει δύο ρίζας πραγμ. ἀνίσους.

$$\gamma) "Εχομεν \Delta = 2^2 + 4 \cdot 3(3\lambda + 1) < 0 \Leftrightarrow \lambda < -\frac{4}{9}$$

"Ωστε διὰ $\lambda < -\frac{4}{9}$ η $f(x) = 0$ έχει δύο ρίζας καθαράς μιγαδικάς συζυγεῖς.

Συνοπτικός πίναξ

Τιμαὶ τοῦ λ	$-\infty$	$-\frac{4}{9}$	$+\infty$
Πρόσημον τῆς Δ	-	0	+
Εἶδος ριζῶν τῆς $f(x) = 0$	Δύο καθαραὶ μιγαδικαὶ συζυγεῖς	$-\frac{1}{3}$	Δύο πραγματικαὶ ἀνίσοι

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

'Ο μὰς α :

278) Νὰ ἐπιλυθοῦν αἱ ἀκόλουθοι ἔξισώσεις :

$$1) 6x^2 + 5x = 0, \quad -55x^2 + 75x = 0$$

$$2) 2x^2 - 18 = 0, \quad 7x^2 + 1 = 0, \quad 121x^2 - 196 = 0$$

$$3) x^2 - 2x - 80 = 0, \quad x^2 - 9x + 14 = 0, \quad x^2 + 25x + 156 = 0$$

$$4) \cancel{4x^2 + 7x - 2 = 0}, \quad 2x^2 - 2x - 2 = 0, \quad \cancel{5x^2 - 7x + 1 = 0}$$

$$5) \cancel{2x^2 + 2x + 5 = 0}, \quad 9x^2 - 6x + 4 = 0,$$

$$6) 5x^2 + \sqrt{3}x - 1 = 0, \quad (1 - \sqrt{2})x^2 - 2(1 + \sqrt{2})x + 3\sqrt{2} + 1 = 0$$

$$7) (x+1)^2 - (x-1)(x+2) = -2x(x-3), \quad (x+2)\left(x - \frac{1}{2}\right) - (3x-1)\left(x + \frac{2}{3}\right) = 1-2x$$

$$8) \frac{3x+1}{3-x} - \frac{3-x}{x+1} - \frac{5}{3} = 0, \quad \frac{25}{12} - \frac{2x+1}{x-3} = \frac{x-3}{2x+1}$$

$$9) \frac{1}{x-8} + \frac{1}{x-6} + \frac{1}{x+6} + \frac{1}{x+8} = 0$$

$$10) \frac{x+1}{x-1} + \frac{x+2}{x-2} + \frac{x+3}{x-3} = 3,$$

Ό μάξ β' :

279) Νὰ ἐπιλυθοῦν αἱ ἀκόλουθοι ἔξισώσεις :

$$1) (4x - 1)^2 + 3(4x - 1) = 0$$

$$2) (4x + 1)^2 + 3(16x^2 - 1) = 0,$$

$$3) (3x + 2)(5x - 1) + (3x + 7)(1 - 5x) = (1 - 5x)(2 + 15x)$$

280) Νὰ ἐπιλυθοῦν αἱ ἀκόλουθοι ἔξισώσεις :

$$1) 15x^2 + 26\mu x + 7\mu^2 = 0$$

$$2) x^2 - (\alpha^2 - \beta^2)x - \alpha^2\beta^2 = 0, \quad |$$

$$3) 4x^2 - 4\alpha x + (\alpha^2 - \beta^2) = 0,$$

$$4) \frac{x+\alpha}{x-\alpha} + \frac{x+\beta}{x-\beta} + \frac{x+\gamma}{x-\gamma} = 3, \quad \frac{\alpha+\beta}{x+\beta} + \frac{\alpha+\gamma}{x+\gamma} = 2 \cdot \frac{\alpha+\beta+\gamma}{x+\beta+\gamma}$$

Ό μάξ γ' :

281) Νὰ προσδιορισθῇ τὸ εἶδος τῶν ριζῶν τῶν ἔξισώσεων χωρὶς νὰ εὐρεθοῦν αὗται :

$$1) x^2 - 11x + 28 = 0, \quad x^2 - 24x + 143 = 0, \quad x^2 - 16x + 64 = 0$$

$$2) x^2 - 17x + 11 = 0, \quad 3x^2 + 7x + 5 = 0, \quad 8x^2 - 4x + 5 = 0$$

282) Ἐάν $\alpha, \beta \in \mathbb{Q}$ προσδιορίσατε τὸ εἶδος τῶν ριζῶν τῶν ἔξισώσεων :

$$1) 3\alpha x^2 + (3\alpha - \beta)x - \beta = 0$$

$$2) x^2 - 2\alpha x + \alpha^2 - \beta = 0$$

$$4\alpha^2 x^2 + 4\alpha x + \beta^2 + 1 = 0$$

283) Διὰ ποίας τιμὰς τοῦ λὴ ἔξισωσις $x^2 - 2(\lambda + 2)x + 2\lambda^2 - 17 = 0$ ἔχει μίαν ρίζαν διπλήν ; Ἐάν $x_1 = 11$, νὰ ύπολογισθῇ ἡ x_2 .

284) Διὰ ποίας τιμὰς τοῦ νὴ ἔξισωσις $(v + 3)x^2 - (2v + 1)x + v + 2 = 0$ ἔχει

α) ρίζαν ίσας, β) πραγματικάς ἀνίσους, γ) καθαράς μιγαδικάς συζυγεῖς.

285) Ἐάν η ἔξισωσις $x^2 + \alpha x + \beta = 0$ ἔχῃ ὡς ρίζαν τὸν ἀριθμὸν $2 + 3i$, νὰ προσδιορισθοῦν τὰ α καὶ β.

286) Ἐάν η ἔξισ. $\alpha x^2 + 2\beta x + \gamma = 0$ ἔχῃ ρίζας $x_1 \neq x_2 \in \mathbb{R}$, νὰ ἀποδειχθῇ τὸ αὐτὸ δτι ισχύει καὶ διὰ τὴν ἔξισ. $x^2 + 2(\alpha + \beta + \gamma)x + 2\beta(\alpha + \gamma) + 3\alpha\gamma = 0$.

287) Νὰ ἀποδειχθῇ δτι τὸ εἶδος τῶν ριζῶν τῶν ἔξισώσεων $f_1(x) = \alpha x^2 + 2\beta x + \gamma = 0$ καὶ $f_2(x) = \alpha x^2 + 2\beta x + \kappa^2\gamma = 0$ εἶναι τὸ αὐτὸ δι' ἀμφοτέρας.

288) Ἐάν αἱ ρίζαι τῆς ἔξισ. $x^2 + 2\beta x + \gamma = 0$ εἶναι καθαραὶ μιγαδικαὶ συζυγεῖς, νὰ ἀποδειχθῇ δτι καὶ αἱ ρίζαι τῆς $x^2 + 2x + \gamma + 2\beta(x + 1) + 1 = 0$ εἶναι ἐπίσης καθαραὶ μιγαδικαὶ συζυγεῖς.

289) Ἐάν $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{Q}$ νὰ ἀποδειχθῇ δτι αἱ ρίζαι τῆς ἔξισώσεως $(\alpha + 2\beta - \gamma)x^2 - 2\alpha x + \alpha + \gamma - 2\beta = 0$ εἶναι ρηταὶ ἑκφράσεις τῶν α, β, γ .

290) Νὰ προσδιορισθῇ τὸ εἶδος τῶν ριζῶν τῆς παραστάσεως

$(\alpha_1 x + \beta_1)^2 + (\alpha_2 x + \beta_2)^2$, ἐάν $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2 \in \mathbb{R}$ $\wedge \frac{\alpha_1}{\alpha_2} \neq \frac{\beta_1}{\beta_2}$. Τί συμβαίνει ἐν $\frac{\alpha_1}{\alpha_2} = \frac{\beta_1}{\beta_2}$;

91. ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΡΙΖΩΝ ΤΗΣ $f(x) \equiv ax^2 + bx + \gamma = 0$
ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΩΝ $a, b, \gamma \in \mathbb{R}$

Όρισμός. Μία παράστασις $\phi(x_1, x_2)$, περιέχουσα τὰς ρίζας x_1, x_2 τῆς ἔξι-
σώσεως τοῦ β' βαθμοῦ $ax^2 + bx + \gamma = 0$, καλεῖται συμμετρική ὡς πρὸς τὰς ρί-
ζας x_1, x_2 , ἐὰν δὲν μεταβάλλεται δι' ἐναλλαγῆς τῶν x_1, x_2 . Ἡτοι : $\phi(x_1, x_2) =$
 $= \phi(x_2, x_1)$.

Οὔτως αἱ παραστάσεις :

$$x_1 + x_2, x_1 \cdot x_2, x_1^3 + x_2^3, \frac{1}{x_1^2} + \frac{1}{x_2^2}, (2x_1 + 3)(2x_2 + 3) + 5x_1 x_2
εἰναι συμμετρικαὶ παραστάσεις τῶν ριζῶν $x_1, x_2$$$

Αἱ συμμετρικαὶ παραστάσεις τῶν ριζῶν x_1, x_2 τῆς $ax^2 + bx + \gamma = 0$ δύ-
νανται, ὡς θὰ ἴδωμεν, νὰ ἐκφρασθοῦν συναρτήσει τῶν $a, b, \gamma \in \mathbb{R}$, χωρὶς νὰ λυθῇ
ἡ ἔξισωσης.

Άθροισμα, γινόμενον καὶ ἀπόλυτον διαφορᾶς τῶν ριζῶν x_1, x_2 τῆς $f(x) \equiv$
 $\equiv ax^2 + bx + \gamma = 0$, $a, b, \gamma \in \mathbb{R}$.

Ἐκ τῶν ἐκφράσεων τῶν ριζῶν τῆς $f(x) = 0$.

$$x_1 = \frac{-\beta + \sqrt{\Delta}}{2\alpha}, x_2 = \frac{-\beta - \sqrt{\Delta}}{2\alpha}$$

$$\text{λαμβάνομεν : } x_1 + x_2 = \frac{-\beta + \sqrt{\Delta}}{2\alpha} + \frac{-\beta - \sqrt{\Delta}}{2\alpha} = -\frac{\beta}{\alpha}$$

$$x_1 \cdot x_2 = \left(\frac{-\beta + \sqrt{\Delta}}{2\alpha} \right) \left(\frac{-\beta - \sqrt{\Delta}}{2\alpha} \right) = \frac{(-\beta)^2 - (\sqrt{\Delta})^2}{4\alpha^2} = \frac{\gamma}{\alpha}$$

$$x_1 - x_2 = \frac{-\beta + \sqrt{\Delta}}{2\alpha} - \frac{-\beta - \sqrt{\Delta}}{2\alpha} = \frac{2\sqrt{\Delta}}{2\alpha} = \frac{\sqrt{\Delta}}{\alpha}$$

Οὔτως ἔχομεν :

Θεμελιώδεις σχέσεις συντελεστῶν καὶ ριζῶν
 x_1, x_2 τῆς $ax^2 + bx + \gamma = 0$

$$S_1 = x_1 + x_2 = -\frac{\beta}{\alpha}, P_1 = x_1 x_2 = \frac{\gamma}{\alpha}$$

$$x_1 - x_2 = \frac{\sqrt{\Delta}}{\alpha}, |x_1 - x_2| = \frac{\sqrt{|\Delta|}}{|\alpha|}$$

Παρατήρησις. Τὸ ἄθροισμα S_1 καὶ τὸ γινόμενον P_1 τῶν ριζῶν x_1, x_2 τῆς $f(x) = 0$ εἰναι πάντοτε ἀριθμὸς πραγματικός.

Αντιστρόφως. Ἐάν x_1, x_2 εἰναι δύο ἀριθμοὶ πληροῦντες τὰς σχέσεις $x_1 + x_2 = -\frac{\beta}{\alpha}$ καὶ $x_1 \cdot x_2 = \frac{\gamma}{\alpha}$, οὔτοι θὰ εἰναι ρίζαι τῆς ἔξισώσεως $ax^2 + bx + \gamma = 0$.

Πράγματι ἐκ τῆς $ax^2 + bx + \gamma = 0 \Leftrightarrow x^2 + \frac{\beta}{\alpha}x + \frac{\gamma}{\alpha} = 0$ καὶ τῶν
 $x_1 + x_2 = -\frac{\beta}{\alpha}, x_1 \cdot x_2 = \frac{\gamma}{\alpha}$ λαμβάνομεν :

$$x^2 - (x_1 + x_2)x + x_1 x_2 = 0 \Leftrightarrow (x - x_1)(x - x_2) = 0,$$

ἥτις εἰναι ἰσοδύναμος πρὸς τὸ ζεῦγος $x - x_1 = 0, x - x_2 = 0$, ἐξ οὗ : $x = x_1, x = x_2$

Έκ τῶν ἀνωτέρω συνάγεται ἡ πρότασις :

Οἱ ἀριθμοὶ x_1, x_2 , ἵνα είναι ρίζαι τῆς ἔξισης $ax^2 + bx + \gamma = 0$, πρέπει καὶ ἀρκεῖ νὰ πληροῦν τὰς σχέσεις $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$ καὶ $x_1 \cdot x_2 = \frac{\gamma}{a}$

Ἐφαρμογαὶ

1. Έκ τοῦ γινομένου καὶ τοῦ ἀθροίσματος δύο ἀριθμῶν, νὰ σχηματισθῇ ἔξισωσις β' βαθμοῦ, ἔχουσα ρίζας τοὺς ἀριθμοὺς αὐτούς.

Έάν $ax^2 + bx + \gamma = 0$ εἴναι ἡ ζητουμένη ἔξισωσις καὶ x_1, x_2 αἱ ρίζαι αὐτῆς, τότε $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$ καὶ $x_1 \cdot x_2 = \frac{\gamma}{a}$

$$\left. \begin{array}{l} \text{'Επειδὴ ὅμως : } x_1 + x_2 = S \text{ δοθεῖσι ἀριθμὸς} \\ x_1 \cdot x_2 = P \quad \gg \quad \gg \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{cases} -\frac{b}{a} = S \\ \frac{\gamma}{a} = P \end{cases}$$

Ἄρα ἔχομεν :

$$ax^2 + bx + \gamma = 0 \Leftrightarrow x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{\gamma}{a} = 0 \quad \text{ἢ} \quad x^2 - Sx + P = 0$$

Ωστε, διὰ τὸν σχηματισμὸν μιᾶς ἔξισώσεως β' βαθμοῦ ἐκ τοῦ ἀθροίσματος S καὶ τοῦ γινομένου P τῶν ριζῶν αὐτῆς, δέον νὰ ἔχωμεν ὑπὸ ὅψιν τὸν τύπον $x^2 - Sx + P = 0$

Σημαντικὴ παρατήρησις. Διὰ τὴν εὔρεσιν τῶν ἀριθμῶν x_1, x_2 , τῶν ὁποίων δίδονται τὸ ἀθροισμα καὶ τὸ γινόμενον, ἀρκεῖ νὰ λύσωμεν τὴν ἔξισωσιν $x^2 - Sx + P = 0$.

Παράδειγμα. Νὰ εύρεθοῦν δύο ἀριθμοὶ ἔχοντες ἀθροισμα 9 καὶ γινόμενον 14.

Λύσις: Έάν x_1, x_2 είναι οἱ ζητούμενοι ἀριθμοί, τότε είναι $x_1 + x_2 = 9$, $x_1 \cdot x_2 = 14$, ἢ δὲ ἔξισωσις ἡ ἔχουσα αὐτούς ὡς ρίζας είναι $x^2 - 9x + 14 = 0$. Έκ τῆς ἐπιλύσεως αὐτῆς λαμβάνομεν $x = \frac{9 \pm \sqrt{81 - 56}}{2}$ ἢ $x_1 = 7, x_2 = 2$

2. Νὰ σχηματισθῇ ἔξισωσις β' βαθμοῦ, διὰ τὸν δίδωνται αἱ ρίζαι αὐτῆς.

Λύσις: Έάν $x_1 = \alpha, x_2 = \beta$ είναι αἱ δοθεῖσαι ρίζαι τῆς ζητουμένης ἔξισωσεως, τότε ἔχομεν διαδοχικῶς

$$\left. \begin{array}{l} x_1 + x_2 = \alpha + \beta \\ x_1 \cdot x_2 = \alpha\beta \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \alpha + \beta = S \\ \alpha\beta = P \end{array} \right., \text{όπότε ἐκ τοῦ τύπου } x^2 - Sx + P = 0 \\ \text{λαμβάνομεν } x^2 - (\alpha + \beta)x + \alpha\beta = 0$$

Παράδειγμα: Νὰ σχηματισθῇ ἔξισωσις β' βαθμοῦ, ἔχουσα ρίζας τοὺς ἀριθμοὺς $\frac{1}{2}, 4$.

$$\text{Λύσις: } \text{"Έχομεν } x_1 + x_2 = \frac{1}{2} + 4 = \frac{9}{2}, \quad x_1 \cdot x_2 = \frac{1}{2} \cdot 4 = 2$$

Ἄρα ἡ ἔξισωσις είναι :

$$x^2 - \frac{9}{2}x + 2 = 0 \Leftrightarrow 2x^2 - 9x + 4 = 0$$

92. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΟΜΟΙΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΩΝ ΡΙΖΩΝ x_1, x_2 τῆς $ax^2 + bx + \gamma = 0$, $a, b, \gamma \in \mathbb{R}$.

1. Ύπολογισμός του $S_2 = x_1^2 + x_2^2$ και $S_3 = x_1^3 + x_2^3$

$$\text{Έχομεν } S_2 = x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2 = \left(-\frac{\beta}{\alpha}\right)^2 - 2 \cdot \frac{\gamma}{\alpha} = \frac{\beta^2 - 2\alpha\gamma}{\alpha^2}$$

$$\text{Όμοιως } S_3 = x_1^3 + x_2^3 = (x_1 + x_2)^3 - 3x_1 x_2 (x_1 + x_2) = \left(-\frac{\beta}{\alpha}\right)^3 - 3 \cdot \frac{\gamma}{\alpha} \cdot \left(-\frac{\beta}{\alpha}\right) = \frac{-\beta^3 + 3\alpha\beta\gamma}{\alpha^3}$$

Ούτω :	$x_1^2 + x_2^2 = \frac{\beta^2 - 2\alpha\gamma}{\alpha^2}, \quad x_1^3 + x_2^3 = \frac{-\beta^3 + 3\alpha\beta\gamma}{\alpha^3}$
--------	--

2. Ύπολογισμός του $S_v = x_1^v + x_2^v$, $v \in \mathbb{N}$.

$$\text{Έπειδή } x_1, x_2 \text{ είναι ρίζαι της } \alpha x^2 + \beta x + \gamma = 0,$$

$$\text{όρα : } \alpha x_1^2 + \beta x_1 + \gamma = 0 \quad \text{Πολλαπλασιάζομεν τάκα μέλη της πρώτης έπι } \\ \alpha x_2^2 + \beta x_2 + \gamma = 0 \quad \text{τα } x_1^{v-2} \text{ και τάκα μέλη της δευτέρας έπι } x_2^{v-2},$$

$$\text{όποτε : } \alpha x_1^v + \beta x_1^{v-1} + \gamma x_1^{v-2} = 0 \quad \text{, προσθέτοντες δὲ κατά μέλη} \\ \alpha x_2^v + \beta x_2^{v-1} + \gamma x_2^{v-2} = 0$$

λαμβάνομεν :

$$\alpha(x_1^v + x_2^v) + \beta(x_1^{v-1} + x_2^{v-1}) + \gamma(x_1^{v-2} + x_2^{v-2}) = 0 \\ \text{ή } \alpha S_v + \beta S_{v-1} + \gamma S_{v-2} = 0$$

Ούτω :	$S_v = -\frac{\beta}{\alpha} S_{v-1} - \frac{\gamma}{\alpha} S_{v-2} = S_1 S_{v-1} - P_1 S_{v-2}$
--------	---

Διὰ τοῦ τύπου τούτου δυνάμεθα νὰ εὕρωμεν τὸ $S_v = x_1^v + x_2^v$, ὅταν γνωρίζωμεν τὰ ἀθροίσματα $S_{v-1} = x_1^{v-1} + x_2^{v-1}$, $S_{v-2} = x_1^{v-2} + x_2^{v-2}$

Παράδειγμα : Νὰ εύρεθῇ τὸ ἀθροίσμα τῶν τετάρτων δυνάμεων τῶν ριζῶν τῆς ἔξισώσεως $x^2 - 3x + 2 = 0$.

$$\text{Έχομεν : } S_4 = S_1 S_3 - P_1 S_2. \quad \text{Έπειδὴ } S_1 = 3, P_1 = 2, \quad \text{Έχομεν} \\ S_2 = \frac{-(-3)^2 - 2 \cdot 1 \cdot 2}{1^2} = 9 - 4 = 5 \quad \text{καὶ } S_3 = \frac{-(-3)^3 + 3 \cdot 1 \cdot (-3) \cdot 2}{1^3} = 27 - 18 = 9.$$

$$\text{Άρα } S_4 = 3 \cdot 9 - 2 \cdot 5 = 27 - 10 = 17$$

Παρατήρησις : Ό οὐ πολογισμός του ἀθροίσματος $\frac{1}{x_1^v} + \frac{1}{x_2^v}$, $v \in \mathbb{N}$, ἀνάγεται εἰς τὴν προηγουμένην περίπτωσιν.

$$\text{Ούτω : } \frac{1}{x_1^v} + \frac{1}{x_2^v} = \frac{x_1^v + x_2^v}{x_1^v x_2^v} = \frac{S_v}{P_1 v}$$

3. Ύπολογισμὸς οίασδήποτε ρητῆς συμμετρικῆς παραστάσεως $\phi(x_1, x_2)$ τῶν ριζῶν x_1, x_2 τῆς $\alpha x^2 + \beta x + \gamma = 0$

Εἰς μίαν ρητὴν συμμετρικὴν παράστασιν τῶν ριζῶν $\phi(x_1, x_2)$ είναι πάντοτε δυνατὴ ἡ ἕκφρασις αὐτῆς συναρτήσει τοῦ ἀθροίσματος $x_1 + x_2$ καὶ τοῦ γινομένου $x_1 x_2$ καὶ συνεπῶς συναρτήσει τῶν συντελεστῶν $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$, διότι δ τυχῶν

όρος αύτῆς ή θά είναι τῆς μορφής Ax_1x_2 , $Bx_1^2x_2^2$, ..., $\Sigma x_1^v x_2^v$, όπότε θά έκφραζεται διά τοῦ x_1x_2 , ή θά είναι τῆς μορφής $Tx_1^kx_2^{\lambda}$, όπότε μέ τὸν ἀντίστοιχὸν του $Tx_1^{\lambda}x_2^k$ θὰ δίδουν διώνυμον τῆς μορφής $T_1x_1^kx_2^{\lambda} + Tx_1^{\lambda}x_2^k = Tx_1^{\lambda}x_2^{\lambda}(x_1^{k-\lambda} + x_2^{k-\lambda}) = TP^{\lambda}S_{k-\lambda}$, $k > \lambda$.

'Εάν, τέλος, ὑπάρχη όρος τῆς μορφής Gx_1^v , θά ὑπάρχῃ καὶ ὁ ἀντίστοιχός του Gx_2^v , όπότε πάλιν θὰ ἔχωμεν $Gx_1^v + Gx_2^v = \Gamma(x_1^v + x_2^v) = GS_v$.

"Ωστε, πᾶσα ρητὴ παράστασις συμμετρικὴ τῶν ριζῶν x_1, x_2 τῆς $ax^2 + bx + \gamma = 0$ έκφραζεται ρητῶς συναρτήσει τῶν $a, b, \gamma \in \mathbb{R}$.

Παράδειγμα : Νὰ ὑπολογισθῇ ἡ τιμὴ τῆς παραστάσεως.

$\varphi(p_1, p_2) = p_1^2 + p_2^2 + (p_1 - p_2)^2 + 3p_1^2p_2 + 3p_1p_2^2$, ἐάν p_1, p_2 , είναι ρίζαι τῆς ἔξισώσεως $x^2 + ax + \beta = 0$, χωρὶς νὰ λυθῇ αὐτῇ.

Λύσις : 'Η $\varphi(p_1, p_2)$ είναι συμμετρικὴ ὡς πρὸς τὰς ρίζας p_1, p_2 .

"Έχομεν : $\varphi(p_1, p_2) = p_1^2 + p_2^2 + p_1^2 + p_2^2 - 2p_1p_2 + 3p_1p_2(p_1 + p_2) =$

$$= 2(p_1^2 + p_2^2) - 2p_1p_2 + 3p_1p_2(p_1 + p_2) =$$

$$= 2(p_1 + p_2)^2 - 6p_1p_2 + 3p_1p_2(p_1 + p_2) =$$

$$= 2(-\alpha)^2 - 6\beta + 3\beta(-\alpha) = 2\alpha^2 - 3\alpha\beta - 6\beta$$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

'Ομας α':

291) Νὰ ὑπολογισθῇ τὸ S καὶ P τῶν ριζῶν ἔκάστης τῶν κάτωθι ἔξισώσεων χωρὶς νὰ λυθοῦν αὐταὶ :

$$1) x^2 - 12x - 7 = 0, \quad x^2 + x\sqrt{3} + \sqrt{5} = 0$$

$$2) -x^2 + 3x - 1 = 0, \quad x^2\sqrt{2} + x\sqrt{3} - 4\sqrt{2} = 0$$

$$3) (\alpha + \beta)x^2 - (\alpha^2 - \beta^2)x + \alpha^3 + \beta^3 = 0, \quad \alpha\beta\gamma^2x^2 + (\alpha^2\beta - \alpha\beta^2)x - \alpha^2\beta^2\gamma = 0$$

292) 'Εκ τοῦ ἀθροίσματος S καὶ τοῦ γινομένου P δύο ἀριθμῶν νὰ εύρεθοῦν οὗτοι εἰς τὰς ἀκολούθους περιπτώσεις :

$$\begin{array}{lll} 1) S = 15 & 2) S = -19 & 3) S = 2\alpha \\ P = 14, & P = 84 & P = \alpha^2 - \beta^2 \end{array}$$

293) Νὰ σχηματισθῇ ἔξισωσις β' βαθμοῦ, ἔχουσα ρίζας :

$$1) 7 \text{ καὶ } -5, \quad 2) -10 \text{ καὶ } -\frac{1}{2}, \quad 3) 5 + \sqrt{3} \text{ καὶ } 5 - \sqrt{3}$$

$$4) -2 + 3i \text{ καὶ } -2 - 3i, \quad 5) \alpha + \beta \text{ καὶ } \alpha - \beta, \quad 6) \frac{\alpha + \beta}{\alpha} \text{ καὶ } \frac{\alpha + \beta}{\beta}$$

294) Νὰ ὑπολογισθῇ ἡ μία ρίζα τῆς ἔξισώσεως $\alpha x^2 + \beta x + \gamma = 0$, δταν γνωρίζωμεν τὴν ἄλλην ρίζαν αὐτῆς.

295) Νὰ ὑπολογισθῇ ἡ τιμὴ τοῦ λ , ἵνα τὸ τριώνυμον $x^2 - 5\lambda x + \lambda^2$ ἔχῃ ρίζαν τὸν ἀριθμὸν $\frac{1}{2}$.

296) 'Εάν x_1, x_2 είναι αἱ ρίζαι τῆς $x^2 - (m+1)x + m = 0$, νὰ εύρεθῇ

1) διὰ ποίαν τιμὴν τοῦ m ἔχει ρίζας ἀντιθέτους,

2) διὰ ποίαν τιμὴν τοῦ m πληρούται ἡ σχέσις $3x_1 + 2x_2 = 7$

3) διὰ ποίαν τιμὴν τοῦ m ἔχει ρίζας ἀντιστρόφους.

297) Νὰ εύρεθῇ ἡ λικαὴ καὶ ἀναγκαῖα συνθήκη μεταξὺ τῶν α, β, γ τῆς $\alpha x^2 + \beta x + \gamma = 0$, ἵνα αἱ ρίζαι αὐτῆς x_1, x_2 πληροῦν τὴν σχέσιν $\kappa x_1 + \lambda x_2 = \mu$.

'Ο μάς β' :

298) Έάν x_1, x_2 είναι αι ρίζαι της έξισώσεως $3x^2 - 2x + 6 = 0$, να ύπολογισθούν αι τιμαι τῶν παραστάσεων :

1) $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2}$, $\frac{1}{x_1^2} + \frac{1}{x_2^2}$, $x_1^{-3} + x_2^{-3}$

2) $(x_1 - x_2)^2$, $\frac{2}{x_1 + 3} + \frac{2}{x_2 + 3}$, $(3x_1 - 2)(3x_2 - 2)$, $\frac{x_1}{x_2^2} + \frac{x_2}{x_1^2}$

299) Να σχηματισθῇ έξισώσις β' βαθμοῦ έχουσα ρίζας 1) τὰ ἀντίστροφα τῶν ριζῶν, 2) τὰ ἀντίστροφα τῶν τετραγώνων τῶν ριζῶν καὶ 3) τούς κύβους τῶν ριζῶν τῆς έξισώσεως $x^2 - ax + b = 0$

300) Έάν p_1, p_2 είναι αι ρίζαι της έξισώσεως $x^2 - 3x + k = 0$, να ύπολογισθῇ ἡ τιμὴ τοῦ k , ίνα : $5p_1^3p_2 - 4p_1^2p_2 = 2k + 3 + 4p_1p_2^2 - 5p_1p_2^3$.

301) Διὰ ποίας τιμᾶς τοῦ $\lambda \in \mathbb{R}$ τὸ ἀθροισμα τῶν τετραγώνων τῶν ριζῶν τῆς έξισ. $2\lambda x(x-1) - x(x-2) + 3\lambda = 0$ ίσοῦται πρὸς 4;

302) Διὰ ποίας τιμᾶς τῶν μ καὶ ν αι ρίζαι p_1, p_2 τῆς έξισ. $2x^2 + \mu x - 3\nu = 0$ πληροῦν τὰς σχέσεις $3p_1 + 3p_2 = 2p_1p_2$ καὶ $1 - p_1p_2 = 5(p_1 + p_2 - 2)$

303) Έάν x_1, x_2 είναι αι ρίζαι της έξισώσεως $ax^2 + bx + c = 0$ νά ύπολογισθούν αι παραστάσεις :

$$(\alpha x_1 + \beta)^{-2} + (\alpha x_2 + \beta)^{-2}, \quad (\alpha x_1 + \beta)^{-3} + (\alpha x_2 + \beta)^{-3}$$

304) Να λυθῇ τὸ σύστημα : $| -3p_1p_2x + 5(p_1 + p_2)\psi = 4(p_1 + p_2)$ ὅπου p_1, p_2 ρίζαι τῆς $x^2 - 3x + 1 = 0$ $| (p_1 + p_2)x + p_1p_2\psi = 7p_1p_2$

305) Να κατασκευασθῇ έξισώσις β' βαθμοῦ, τῆς ὀποίας αι ρίζαι x_1, x_2 πληροῦν τὰς σχέσεις $x_1x_2 - 3(x_1 + x_2) = -5$ καὶ $x_1x_2 - \mu(x_1 + x_2) = -1$ καὶ ἀκολούθως νά προσδιοριθῇ ὁ μ , ίνα ἡ κατασκευασθεῖσα έξισώσις ἔχῃ ρίζας ίσας.

93. ΠΡΟΣΗΜΟΝ ΤΩΝ ΡΙΖΩΝ ΤΟΥ $\Phi(x) \equiv ax^2 + bx + c$, $a, b, c \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$.

Εἰδομεν ὅτι τὸ εἶδος τῶν ριζῶν τοῦ τριωνύμου $\phi(x)$ έξαρτάται ἀπὸ τὴν διακρίνουσαν $\Delta = b^2 - 4ac$ καὶ ὅτι ἀῦται δύνανται νά είναι πραγματικά ἄνισοι ($\Delta > 0$), πραγματικαὶ ίσαι ($\Delta = 0$) καὶ καθαραὶ μιγαδικαὶ συζυγεῖς ($\Delta < 0$).

"Ηδη θὰ έξετάσωμεν τὸ πρόσημον τῶν ριζῶν εἰς τὴν περίπτωσιν, καθ' ἦν ἔχουμεν ρίζας πραγματικάς, διότι τούς μιγαδικούς ἀριθμούς δὲν διεκρίναμεν εἰς θετικούς καὶ ἀρνητικούς.

Τὸ πρόσημον τῶν ριζῶν τοῦ $\phi(x)$ έξαρτάται ἀπὸ τὸ γινόμενον $P = \frac{c}{a}$ καὶ τὸ ἀθροισμα $S = -\frac{b}{a}$ αὐτῶν.

Διακρίνομεν τὰς έξης περιπτώσεις :

I. $\Delta > 0$. Αἱ ρίζαι είναι πραγματικαὶ ἄνισοι.

α) $P = \frac{c}{a} > 0$. Αἱ ρίζαι είναι δύμοσημοι, ὅπότε έὰν έχωμεν

1) $S = -\frac{b}{a} > 0$ ἀμφότεραι είναι θετικαὶ ($x_1, x_2 \in \mathbb{R}^+$),

2) $S = -\frac{b}{a} < 0$ ἀμφότεραι είναι ἀρνητικαὶ ($x_1, x_2 \in \mathbb{R}^-$)

Ἡ περίπτωσις $S = -\frac{b}{a} = 0 \Rightarrow b = 0$ μὲ $\frac{c}{a} > 0$ καὶ $\Delta > 0$ είναι ἀδύνατος.

β) $P = \frac{c}{a} < 0$. Αἱ ρίζαι είναι ἔτερόσημοι, ὅπότε έὰν έχωμεν

1) $S = -\frac{b}{a} > 0$ ἀπολύτως μεγαλυτέρα είναι ἡ θετικὴ ($x_1 \in \mathbb{R}^+, x_2 \in \mathbb{R}^-$,

ἢ $x_2 < 0 < x_1$ καὶ $|x_2| < |x_1|$),

2) $S = -\frac{\beta}{\alpha} < 0$ ἀπολύτως μεγαλυτέρα είναι ή ἀρνητική ($x_1 \in \mathbb{R}^+, x_2 \in \mathbb{R}^-$ ή $x_2 < 0 < x_1$ καὶ $|x_1| < |x_2|$),

3) $S = -\frac{\beta}{\alpha} = 0$ αἱ ρίζαι είναι ἀντίθετοι ($x_2 < 0 < x_1$ καὶ $|x_1| = |x_2|$)

γ) $P = \frac{\gamma}{\alpha} = 0$. Ἡ μία ρίζα είναι 0 καὶ η ἄλλη διάφορος τοῦ μηδενὸς (ἀποκλείεται $x_1 = x_2 = 0$, διότι $\Delta > 0$), ὅπότε ἐάν ἔχωμεν

1) $S = -\frac{\beta}{\alpha} > 0$ ή $x_2 = 0$ καὶ $x_1 > 0$ ($x_1 = -\frac{\beta}{\alpha}$),

2) $S = -\frac{\beta}{\alpha} < 0$ ή $x_1 = 0$ καὶ $x_2 < 0$ ($x_2 = -\frac{\beta}{\alpha}$),

II. $\Delta = 0$. Αἱ ρίζαι είναι πραγματικαὶ ἵσαι ($x_1 = x_2 = -\frac{\beta}{2\alpha}$) καὶ συνεπῶς

$P = \frac{\gamma}{\alpha} \geq 0$, ὅπότε ἐάν ἔχωμεν

α) $P = \frac{\gamma}{\alpha} > 0$ καὶ $S = -\frac{\beta}{\alpha} > 0$ ἀμφότεραι είναι θετικαὶ ($x_1 = x_2 \in \mathbb{R}^+$),

β) $P = \frac{\gamma}{\alpha} > 0$ καὶ $S = -\frac{\beta}{\alpha} < 0$ ἀμφότεραι είναι ἀρνητικαὶ ($x_1 = x_2 \in \mathbb{R}^-$)

γ) $P = \frac{\gamma}{\alpha} = 0$ ἀμφότεραι είναι 0 ($x_1 = x_2 = 0$).

III. $\Delta < 0$. Αἱ ρίζαι είναι καθαραὶ μιγαδικαὶ συζυγεῖς ($|x_1| = |x_2|$).

Τὰ ἀνωτέρω συνοψίζονται εἰς τὸν ἀκόλουθον πίνακα :

Πρόσημον ρίζῶν τοῦ $\phi(x) \equiv ax^2 + bx + \gamma$, $a, b, \gamma \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$

Δ	P	S	Είδος ρίζῶν καὶ πρόσημον αὐτῶν
+	+	+	$x_1 \in \mathbb{R}^+, x_2 \in \mathbb{R}^+ \Leftrightarrow 0 < x_2 < x_1$
		-	$x_1 \in \mathbb{R}^-, x_2 \in \mathbb{R}^- \Leftrightarrow x_2 < x_1 < 0$
		0	περίπτωσις ἀδύνατος
	-	+	$x_1 \in \mathbb{R}^+, x_2 \in \mathbb{R}^- \Leftrightarrow x_2 < 0 < x_1$ καὶ $ x_2 < x_1 $
		-	$x_1 \in \mathbb{R}^+, x_2 \in \mathbb{R}^- \Leftrightarrow x_2 < 0 < x_1$ καὶ $ x_1 < x_2 $
		0	$x_1 \in \mathbb{R}^+, x_2 \in \mathbb{R}^- \wedge x_1 = -x_2 \Rightarrow x_1 = x_2 $
	0	+	$x_1 \in \mathbb{R}^+, x_2 = 0 \quad (x_1 = -\frac{\beta}{\alpha})$
		-	$x_1 = 0, x_2 \in \mathbb{R}^- \quad (x_2 = -\frac{\beta}{\alpha})$
		0	περίπτωσις ἀδύνατος, διότι $\Delta \neq 0$
0	+	+	$x_1 = x_2 = -\frac{\beta}{2\alpha} \in \mathbb{R}^+$
		-	$x_1 = x_2 = -\frac{\beta}{2\alpha} \in \mathbb{R}^-$
	0	0	$x_1 = x_2 = 0$
-			$x_1 \in (C - R), x_2 \in (C - R)$ καὶ $x_1 = \bar{x}_2 \Rightarrow x_1 = x_2 $

Παραδείγματα : α) Νά εύρεθη τό πρόσημον τῶν ριζῶν τῶν ἔξισώσεων.

$$1) x^2 - 2x - 5 = 0, \quad 2) x^2 + 5x + 4 = 0, \quad 3) 3x^2 - x + 1 = 0$$

$$\text{Λύσεις : } 1) \text{ "Εχομεν } \Delta = (-2)^2 - 4 \cdot (-5) = 24 > 0, \quad P = -\frac{5}{1} < 0 \text{ και}$$

$$S = -\frac{-2}{1} = 2 > 0. \text{ "Αρα } x_1 \in R^+, \quad x_2 \in R^- \text{ και } |x_2| < |x_1|.$$

$$2) \text{ "Εχομεν } \Delta = 5^2 - 4 \cdot 4 = 9 > 0, \quad P = 4 > 0 \text{ και } S = -5 < 0. \text{ "Αρα } x_1 \in R^-, \quad x_2 \in R^- \iff x_2 < x_1 < 0.$$

$$3) \text{ "Εχομεν } \Delta = (-1)^2 - 4 \cdot 3 \cdot 1 = -11 < 0$$

$$\text{ "Αρα } x_1 \in (C - R), \quad x_2 \in (C - R) \text{ και } x_1 = \bar{x}_2 \Rightarrow |x_1| = |x_2|.$$

β) Διά ποίας τιμάς τοῦ λ αἱ ριζαι x_1, x_2 τῆς ἔξισης $x^2 - 8x + \lambda = 0$ εἰναι ἑτερόσημοι μὲν ἀπολύτως μεγαλυτέραν τὴν θετικήν ;

Λύσις. Πρέπει νὰ πληροῦνται αἱ συνθῆκαι $P < 0$ και $S > 0$ (Δ ὲν λαμβάνομεν $\Delta > 0$, διότι δ αν $P < 0 \Rightarrow \Delta > 0$)

$$\text{ "Αρα } P = \lambda < 0 \text{ και } S = -(-8) = 8 > 0 \text{ "Ωστε :}$$

$$\text{ Διὰ } \lambda < 0 \text{ ἔχομεν } x_1 \in R^+, \quad x_2 \in R^- \text{ και } |x_2| < |x_1|$$

$$\gamma) \text{ Νά διερευνηθῇ ἡ ἔξισωσις } 3x^2 - 6x + 5(2\mu - 1) = 0, \quad \mu \in R$$

Λύσις. Εξετάζομεν τὰς ποσότητας Δ, P, S :

$$\Delta = 36 - 60(2\mu - 1) = 12(3 - 10\mu + 5) = 24(4 - 5\mu)$$

Τὸ σημεῖον τῆς Δ εἰναι :

	μ	$-\infty$	$4/5$	$+\infty$
	Δ	+	o	-

$$P = \frac{5(2\mu - 1)}{3} = \frac{5}{3}(2\mu - 1) \quad \begin{array}{c|ccccc} \mu & -\infty & 4/5 & +\infty \\ \hline P & - & o & + \end{array}$$

Τὸ σημεῖον τοῦ P εἰναι :

$$S = -\frac{-6}{3} = 2 > 0 \text{ 'Ακολούθως συντάσσομεν τὸν πίνακα :}$$

μ	Δ	P	S	$Eίδος$ ριζῶν τῆς $3x^2 - 6x + 5(2\mu - 1) = 0$
$-\infty$	+	-	+	$x_1 \in R^+, \quad x_2 \in R^- \text{ και } x_2 < x_1 $
$\frac{1}{2}$	o	-	-	$x_1 \in R^+, \quad x_2 = 0, \quad x_1 = 2$
$\frac{4}{5}$	+	+	+	$x_1 \in R^+, \quad x_2 \in R^+$
$+\infty$	-	o	-	$x_1 = x_2 = +1$
				$x_1 \in (C - R), \quad x_2 \in (C - R) \text{ και } x_1 = \bar{x}_2 \Rightarrow x_1 = x_2 $

AΣΚΗΣΕΙΣ

306) Νά εύρεθη τό πρόσημον τῶν ριζῶν τῶν κάτωθι ἔξισώσεων :

$$1) x^2 - 6x + 9 = 0, \quad 7x^2 + 14x - 1 = 0$$

$$2) 4x^2 - 4x + 1 = 0, \quad -3x^2 - 9x + 2 = 0$$

307) Νὰ εύρεθοῦν αἱ τιμαὶ τοῦ $\lambda \in \mathbb{R}$ διὰ τὰς ὁποῖας αἱ ρίζαι τῆς ἔξιος $3x^3 - 2x + 3 (\lambda - 7) = 0$ εἰναι : 1) ἀμφότεραι θετικαί, 2) ἑτερόσημοι μὲν ἀπολύτως μεγαλυτέραν τὴν θετικήν, 3) μίαν διπλῆν θετικήν, 4) καθαραὶ μιγαδικαὶ κατὰ μέτρον ἴσαι.

308) Νὰ διερευνηθῇ διὰ πραγματικάς τιμᾶς τοῦ λ ἐκάστη τῶν ἀκολούθων ἔξισώσεων καὶ νὰ γίνῃ πινακογράφησις τῶν συμπερασμάτων τῆς διερευνήσεως.

$$1) x^2 - 4x - 3 (2 - 5\lambda) = 0, \quad 2) -2x^2 + 5x - 7 (1 - \lambda) = 0$$

309) Νὰ εύρετε τὸ εἶδος καὶ τὸ πρόσημον τῶν ρίζῶν τῆς ἔξισώσεως $2x(x - \alpha) = \alpha^2$, δτῶν α πραγματικός καὶ $\alpha \neq 0$

94. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ $f(x) \equiv ax^2 + bx + \gamma$, $a, b, \gamma \in \mathbb{R}$ καὶ $a \neq 0$ ΕΙΣ ΓΙΝΟΜΕΝΟΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ x ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ.

*Ἐάν x_1, x_2 εἰναι αἱ ρίζαι τοῦ τριωνύμου $f(x) \equiv ax^2 + bx + \gamma$, τότε ἔχομεν : $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$ καὶ $x_1 \cdot x_2 = \frac{\gamma}{a}$.

*Ἐξ ἄλλου τὸ τριώνυμον γράφεται :

$$\begin{aligned} f(x) &\equiv ax^2 + bx + \gamma \equiv a \left(x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{\gamma}{a} \right) \equiv a [x^2 - (x_1 + x_2)x + x_1 x_2] \equiv \\ &\equiv a [x^2 - x_1 x - x_2 x + x_1 x_2] \equiv a [x(x - x_1) - x_2(x - x_1)] \equiv \\ &\equiv a(x - x_1)(x - x_2) \end{aligned}$$

*Ωστε, Διὰ νὰ μετασχηματίσωμεν τὸ τριώνυμον $f(x) \equiv ax^2 + bx + \gamma$ εἰς γινόμενον $a'(x - x_1)(x - x_2)$.

Παράδειγμα: Νὰ τραποῦν εἰς γινόμενον παραγόντων τὰ τριώνυμα

$$1) x^2 - 7x + 10, \quad 2) 3x^2 + x - 2, \quad 3) x^2 - 4x + 5$$

Λύσεις : 1) Αἱ ρίζαι τοῦ τριωνύμου εἰναι $x_1 = 5, x_2 = 2$

$$\text{Άρα } \text{ἔχομεν : } x^2 - 7x + 10 = (x - 5)(x - 2)$$

$$2) \text{Αἱ ρίζαι τοῦ τριωνύμου εἰναι } x_1 = \frac{2}{3}, x_2 = -1$$

$$\text{Άρα } \text{ἔχομεν : } 3x^2 + x - 2 = 3 \left(x - \frac{2}{3} \right) (x + 1) = (3x - 2)(x + 1)$$

$$3) \text{Αἱ ρίζαι τοῦ τριωνύμου εἰναι } x_1 = 2 + i, x_2 = 2 - i. \text{ Άρα } \text{ἔχομεν : } x^2 - 4x + 5 = (x - (2 + i))(x - (2 - i)) = (x - 2 - i)(x - 2 + i)$$

*Ητοι ἡ ἀνάλυσις τοῦ τριωνύμου $x^2 - 4x + 5$ μὲν ρίζας καθαρὰς μιγαδικάς δὲν εἰναι δυνατὴ μὲν (βλ. 5η περίπ. ἀναλύσεως) εἰς τὸ σύνολον τῶν πραγματικῶν, εἰναι δῆμως δυνατὴ εἰς τὸ σύνολον τῶν μιγαδικῶν.

95. ΕΥΡΕΣΙΣ ΤΗΣ Β' / ΘΜΙΟΥ ΕΞΙΣΩΣΕΩΣ ΕΚ ΤΩΝ ΡΙΖΩΝ ΑΥΤΗΣ.

*Ἐάν δοθοῦν αἱ ρίζαι x_1, x_2 τῆς β' / θμίου ἔξισώσεως, δυνάμεθα χρησιμοποιοῦντες τὸν μετασχηματισμὸν $ax^2 + bx + \gamma \equiv a(x - x_1)(x - x_2)$ νὰ εὕρωμεν τὴν ἔξισωσιν ταύτην.

Παράδειγμα : Νὰ σχηματισθῇ ἔξισωσις β' βαθμοῦ, ἔχουσα ὡς ρίζας τοὺς ἀριθμοὺς $\alpha) 3, -2, \beta) 2 \pm \sqrt{3}, \gamma) -3 \pm 2i$

Λύσις : α) έχομεν $\alpha(x-3)(x+2)=\alpha(x^2-x-6)=0 \Leftrightarrow x^2-x-6=0$
 β) "Έχομεν $\alpha[x-(2+\sqrt{3})]\cdot[x-(2-\sqrt{3})]=\alpha[(x-2)^2-3]=0 \Leftrightarrow (x-2)^2-3=0 \Leftrightarrow x^2-4x+1=0$
 γ) "Έχομεν $\alpha[x-(-3+2i)][x-(-3-2i)]=\alpha[(x+3)^2-(2i)^2]=0 \Leftrightarrow (x+3)^2+4=0 \Leftrightarrow x^2+6x+13=0$

Σημείωσις. Ο παράγων α του γινομένου δύναται να παραλείπεται ή κατ' είναι οισθήποτε πραγματικός άριθμός.

AΣΚΗΣΕΙΣ

310) Να τραποῦν εις γινόμενον α'/β βαθμίων παραγόντων τοῦ x τὰ ἀκόλουθα τριώνυμα β' βαθμοῦ :

$$\begin{array}{lll} 1) x^2 + 7x - 8, & x^2 - 11x - 26 \\ 2) 2x^2 + 11x + 5 & x^2 + x\psi - 72\psi^2, & v^2x^2 - 6vx - 91 \\ 3) x^2 - 2\alpha x + (\alpha^2 - \beta^2) & x^2 - 2\mu x + \mu^2 - v, & x^2 - 2\alpha x - 3\alpha^2 - 4\beta (\beta - 2\alpha). \end{array}$$

311) Να σχηματισθῇ ἑξίσωσις β' βαθμοῦ, ἔχουσα ρίζας :

$$\begin{array}{l} 1) -\frac{3}{4} \text{ καὶ } -\frac{1}{2}, \quad 2) 5 \pm 2\sqrt{3}, \quad 3) \frac{1}{2} \pm \frac{3i}{2} \\ 4) \alpha \pm \sqrt{2\beta}, \quad 5) \lambda \pm 3i, \quad 6) \alpha^2 + \beta^2 \text{ καὶ } \alpha - \beta \end{array}$$

312) Να ἀπλοποιηθοῦν τὰ κλάσματα :

$$\begin{array}{l} 1) \frac{x^2 - 15x}{x^2 - 14x - 15}, \quad \frac{3x^2 + 19x - 14}{6x^2 - x - 2} \\ 2) \frac{3x^2 - 7x\psi + 2\psi^2}{6x^2 - 5x\psi + \psi^2}, \quad \frac{x^2 - x(2\alpha + 3\beta + 1) + (2\alpha + 3\beta)}{2x^2 - x(4\alpha + 6\beta + 1) + (2\alpha + 3\beta)} \end{array}$$



96. ΆΛΛΑΙ ΕΙΔΙΚΑΙ ΜΟΡΦΑΙ ΤΟΥ $f(x) \equiv \alpha x^2 + \beta x + \gamma$ ἐν \mathbb{R}

'Εὰν x_1, x_2 αἱ ρίζαι τοῦ τριώνυμου $f(x) \equiv \alpha x^2 + \beta x + \gamma$, τότε
 $x_1 = \frac{-\beta + \sqrt{\Delta}}{2\alpha}$, $x_2 = \frac{-\beta - \sqrt{\Delta}}{2\alpha}$.

Τὸ δὲ τριώνυμον γράφεται :

$$f(x) \equiv \alpha x^2 + \beta x + \gamma \equiv \alpha(x - x_1)(x - x_2) \equiv \alpha \left(x - \frac{-\beta + \sqrt{\Delta}}{2\alpha} \right) \left(x - \frac{-\beta - \sqrt{\Delta}}{2\alpha} \right) \equiv \alpha \left[\left(x + \frac{\beta}{2\alpha} \right)^2 - \left(\frac{\sqrt{\Delta}}{2\alpha} \right)^2 \right]$$

Διακρίνομεν τῶρα τὰς περιπτώσεις :

$$1) 'Εὰν $\Delta > 0$, τότε $f(x) \equiv \alpha \left[\left(x + \frac{\beta}{2\alpha} \right)^2 - \left(\frac{\sqrt{\Delta}}{2\alpha} \right)^2 \right]$.$$

ἢτοι τὸ τριώνυμον $f(x) \forall x \in \mathbb{R}$ μετασχηματίζεται εἰς διαφορὰν δύο τετραγώνων πραγματικῶν παραστάσεων ἐπὶ τὸ $\alpha \neq 0$.

$$2) 'Εὰν $\Delta = 0$, τότε $f(x) \equiv \alpha x^2 + \beta x + \gamma \equiv \alpha \left(x + \frac{\beta}{2\alpha} \right)^2$.$$

ἢτοι τὸ $f(x) \forall x \in \mathbb{R}$ μετασχηματίζεται εἰς τέλειον τετράγωνον πραγμάτικῆς παραστάσεως ἐπὶ τὸ $\alpha \neq 0$.

$$3) 'Εὰν $\Delta < 0$, τότε $f(x) \equiv \alpha x^2 + \beta x + \gamma \equiv \alpha \left[\left(x + \frac{\beta}{2\alpha} \right)^2 - \left(\frac{i\sqrt{-\Delta}}{2\alpha} \right)^2 \right] \equiv$$$

$$\equiv \alpha \left[\left(x + \frac{\beta}{2\alpha} \right)^2 + \left(\frac{\sqrt{-\Delta}}{2\alpha} \right)^2 \right].$$

ήτοι τὸ $f(x) \forall x \in \mathbb{R}$ μετασχηματίζεται εἰς ἀθροισμα δύο τετραγώνων πραγματικῶν παραστάσεων ἐπὶ τὸ $\alpha \neq 0$.

Σημείωσις. Αἱ ἀνωτέρω μορφαὶ εἰναι λίαν χρήσιμοι διὰ τὰ ἐπόμενα κεφάλαια.

Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ

313) Νὰ εύρεθοῦν αἱ τιμαὶ τοῦ $\lambda \in \mathbb{R}$ διὰ τὰς ὁποῖας τὰ ἀκόλουθα τριώνυμα εἰναι α)

τέλεια τετράγωνα, β) ἵσα πρὸς τὴν διαφορὰν δύο τετραγώνων πραγματικῶν παραστάσεων,

γ) ἵσα πρὸς τὸ ἀθροισμα δύο τετραγώνων πραγματικῶν παραστάσεων :

$$1) 5(2\lambda - 1)x^2 + x - 1, \quad 2) -7x^2 + 5x - 3(2 - 3\lambda)$$

314) Νὰ εύρεθῃ ποια ἔκ τῶν ἀκολούθων τριώνυμων μετασχηματίζονται εἰς διαφορὰν καὶ ποια εἰς ἀθροισμα δύο τετραγώνων πραγματικῶν παραστάσεων :

$$1) 4x^2 + 20\alpha x + 21\alpha^2, \quad 2) \alpha\beta x^2 - (\alpha^2 + \beta^2)x + \alpha\beta$$

$$3) \alpha^2 x^2 - 2\alpha^3 x + \alpha^4 + 1, \quad 4) 9\alpha^4 x^2 - 8\alpha^3 \beta (3x - 2\beta) + 16\beta^2$$

97. ΠΡΟΣΗΜΟΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ $\phi(x) \equiv ax^2 + bx + \gamma$, $a, b, \gamma \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$ ΔΙΑ ΤΑΣ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑΣ ΤΙΜΑΣ ΤΟΥ x .

"Εστω ἡ συνάρτησις $(x, \phi(x) \equiv x^2 - 5x + 6) \in \mathbb{R}^2$. Αὕτη εἰναι τελείως ώρισμένη εἰς τὸ σύνολον τῶν πραγματικῶν ἀριθμῶν. "Ας εὔρωμεν μερικὰς τιμὰς αὐτῆς π.χ. τούς : $\phi(-4), \phi(2), \phi\left(\frac{5}{2}\right), \phi(3), \phi(10)$. Οὕτω ἔχομεν :

$$\phi : x = -4 \rightarrow \phi(-4) = 42 > 0 \quad \phi : x = \frac{5}{2} \rightarrow \phi\left(\frac{5}{2}\right) = -\frac{1}{4} < 0$$

$$\phi : x = 2 \rightarrow \phi(2) = 0 \quad \phi : x = 3 \rightarrow \phi(3) = 0$$

Παρατηροῦμεν ὅτι αἱ τιμαὶ αὐτῆς ἄλλοτε εἰναι θετικαί, ἄλλοτε ἀρνητικαί καὶ μόνον διὰ $x_1 = 2$ καὶ $x_2 = 3$ (αἱ ρίζαι τῆς $\phi(x) = x^2 - 5x + 6 = 0$) εἰναι ἵσαι πρὸς 0.


Πολλάκις εἰς τὰ ἐπόμενα μαθήματα θὰ εύρεθῶμεν εἰς τὴν ἀνάγκην νὰ γνωρίζωμεν τὸ πρόσημον τῆς ἀριθμητικῆς τιμῆς τοῦ τριώνυμου $\phi(x) \equiv ax^2 + bx + \gamma$ ($a \neq 0$), διὰ τυχοῦσαν τιμὴν $x = \xi \in \mathbb{R}$, ἀνευ εύρεσεως τῆς τιμῆς $\phi(\xi) \in \mathbb{R}$.

Εἶδομεν ὅτι τὸ τριώνυμον $\phi(x) \equiv ax^2 + bx + \gamma$ μετασχηματίζεται εἰς τὴν μορφὴν $\phi(x) \equiv ax^2 + bx + \gamma \equiv a \left[\left(x + \frac{\beta}{2\alpha} \right)^2 - \frac{\Delta}{4\alpha^2} \right]$. Τὸ πρόσημον τῆς τυχοῦσης τιμῆς αὐτοῦ $\phi(\xi)$, διὰ $x = \xi$ προφανῶς ἔξαρταται ἐκ τῆς Δ καὶ τοῦ ἀριθμοῦ a .

Οὕτω διακρίνομεν τὰς περιπτώσεις :

1) Ἐάν $\Delta > 0$, τότε $x_1 \neq x_2 \in \mathbb{R}$ καὶ ἔστω $x_2 < x_1$

Αἱ ρίζαι x_1, x_2 διαμερίζουν τὸ σύνολον \mathbb{R} εἰς τρία διαστήματα ώς φαίνεται εἰς τὴν γεωμετρικὴν παράστασιν.



"Ας θεωρήσωμεν μίαν τιμὴν $x = \xi \in \mathbb{R}$. Διὰ τὴν τιμὴν αὐτὴν διακρίνομεν τὰς ἔξις περιπτώσεις :

α) Έάν $\xi < x_2 < x_1 \Leftrightarrow \xi - x_1 < 0$ και $\xi - x_2 < 0 \Rightarrow (\xi - x_1)(\xi - x_2) > 0$ Εξ αλλου έκ τοῦ φ(x) $\equiv \alpha x^2 + \beta x + \gamma \equiv \alpha(x - x_1)(x - x_2)$ λαμβάνομεν φ(ξ) = $\alpha \xi^2 + \beta \xi + \gamma = \alpha(\xi - x_1)(\xi - x_2) = \alpha \cdot (\text{θετικός άριθμ.})$

Άρα ή τιμή φ(ξ) έχει τό πρόστημον τοῦ α. Ήτοι $\alpha \cdot \phi(\xi) > 0$

β) Έάν $x_2 < \xi < x_1 \Leftrightarrow \xi - x_1 < 0$ και $\xi - x_2 > 0 \Rightarrow (\xi - x_1)(\xi - x_2) < 0$ και συνεπώς

$\phi(\xi) = \alpha \xi^2 + \beta \xi + \gamma = \alpha(\xi - x_1)(\xi - x_2) = \alpha \cdot (\text{άρνητικός άριθμός}).$

Άρα ή τιμή φ(ξ) έχει τό πρόστημον τοῦ -α. Ήτοι $\alpha \cdot \phi(\xi) < 0$

γ) Έάν $x_2 < x_1 < \xi \Leftrightarrow \xi - x_1 > 0$ και $\xi - x_2 > 0 \Rightarrow (\xi - x_1)(\xi - x_2) > 0$ και $\phi(\xi) = \alpha(\xi - x_1)(\xi - x_2) = \alpha \cdot (\text{θετικός άριθμός})$

Άρα ή τιμή φ(ξ) έχει τό πρόστημον τοῦ α. Ήτοι $\alpha \cdot \phi(\xi) > 0$

2) Έάν $\Delta = 0$, τότε $x_1 = x_2 = -\frac{\beta}{2\alpha} \in \mathbb{R}$ και τό τριώνυμον μετασχηματίζεται εἰς $\phi(x) \equiv \alpha x^2 + \beta x + \gamma \equiv \alpha \cdot (x + \frac{\beta}{2\alpha})^2$, δηλαδή $x = \xi \neq -\frac{\beta}{2\alpha}$ λαμβάνομεν $\phi(\xi) = \alpha \cdot (\xi + \frac{\beta}{2\alpha})^2 = \alpha \cdot (\text{θετικός άριθμ.})$

Άρα ή τιμή φ(ξ) διὰ πᾶν $\xi \neq -\frac{\beta}{2\alpha}$ έχει τό πρόστημον τοῦ α.

3) Έάν $\Delta < 0$, τότε $x_1, x_2 \in (\mathbb{C} - \mathbb{R})$ και τό τριώνυμον μετασχηματίζεται εἰς $\phi(x) \equiv \alpha x^2 + \beta x + \gamma \equiv \alpha \left[\left(x + \frac{\beta}{2\alpha} \right)^2 + \left(\frac{\sqrt{-\Delta}}{2\alpha} \right)^2 \right]$, δηλαδή λαμβάνομεν $\phi(\xi) = \alpha \left[\left(\xi + \frac{\beta}{2\alpha} \right)^2 + \left(\frac{\sqrt{-\Delta}}{2\alpha} \right)^2 \right] = \alpha \cdot (\text{θετικός άριθμός}).$

Άρα ή τιμή φ(ξ) διὰ πᾶν $\xi \in \mathbb{R}$ έχει τό πρόστημον τοῦ α.

Τά άνωτέρω συνοψίζονται ως άκολουθως :

$$\phi(x) \equiv \alpha x^2 + \beta x + \gamma$$

Πρόστημον τῆς Δ	Ρίζαι τοῦ φ(x)	Πρόστημον τοῦ φ(x) (διὰ $x = \xi \in \mathbb{R}$)
$\Delta > 0$	$x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ $x_2 < x_1$	$x < x_2 < x_1$ ή $x_2 < x_1 < x$
		$x_2 < x < x_1$
$\Delta = 0$	$x_1 = x_2 = -\frac{\beta}{2\alpha} \in \mathbb{R}$	$\forall x \neq -\frac{\beta}{2\alpha}$
$\Delta < 0$	$x_1, x_2 \in (\mathbb{C} - \mathbb{R})$	$\forall x \in \mathbb{R}$

Ωστε: Τό τριώνυμον φ(x) λαμβάνει τιμὴν όμόστημον τοῦ α.

α) διὰ $x < x_2 < x_1$ ή $x_2 < x_1 < x$, έὰν $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$, β) διὰ $\forall x \neq -\frac{\beta}{2\alpha} \in \mathbb{R}$ έὰν $x_1 = x_2 = -\frac{\beta}{2\alpha}$ και γ) διὰ $\forall x \in \mathbb{R}$, έὰν $x_1, x_2 \in (\mathbb{C} - \mathbb{R})$, λαμβάνει δὲ τιμὴν όμόστημον τοῦ -α γιὰ $x_2 < x < x_1$ έὰν $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$.

Παραδείγματα : Νὰ εύρεθοῦν αἱ πραγματικαὶ τιμαὶ τοῦ x, διὰ τὰς διόποιας τὰ άκόλουθα τριώνυμα έχουν τιμὰς θετικὰς ή άρνητικάς :

$$1) x^2 - 6x + 8, \quad 2) x^2 - 6x + 9 \quad 3) 3x^2 - x + 1$$

Λύσις :

1) Επειδή $\Delta = 36 - 32 = 4 > 0$ καὶ $x_1 = 4, x_2 = 2$, ἔπειται δὲ ἀκόλουθος

πίναξ	Τιμαὶ τοῦ x	$-\infty$	2	4	$+\infty$
	πρόσημον τοῦ τριωνύμου	+	○	-	○

2) Επειδὴ $\Delta = 36 - 36 = 0$ καὶ $x_1 = x_2 = 3$, ἔπειται δὲ τὸ τριώνυμον $\forall x \neq 3$ καθίσταται θετικόν. Οὐδέποτε γίνεται ἀρνητικόν.

3) Επειδὴ $\Delta = 1 - 12 = -11 < 0$, ἔπειται δὲ τὸ τριώνυμον $\forall x \in \mathbb{R}$ καθίσταται θετικόν. Οὐδέποτε γίνεται ἀρνητικόν.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

315) Διὰ ποίας τιμάς τοῦ $x \in \mathbb{R}$ τὰ ἀκόλουθα τριώνυμα γίνονται θετικά ἢ ἀρνητικά ;

$$1) 3x^2 - x - 4, \quad 2) 4x^2 - 20x + 25, \quad 3) x^2 + x + 1$$

$$4) -x^2 + x - 1 \quad 5) -2x^2 + 16x - 40, \quad 6) -3x^2 + 2x - 5$$

316) Νὰ ἀποδειχθῇ δὲ τὸ τριώνυμον $\phi(x) \equiv 5x^2 + mx + 2m^2$ ($m \in \mathbb{R}$) εἶναι θετικὸν $\forall x \in \mathbb{R}$.

317) Νὰ ἀποδειχθῇ δὲ, ὅτι, ἐὰν τὸ $\phi(x) \equiv ax^2 + bx + c$ καθίσταται δύοσημον τοῦ α

$$1) \forall x \in \mathbb{R}, \text{ τότε } \exists x \text{ καθαρὰς μιγαδικάς συζυγεῖς, } 2) \forall x \neq -\frac{\beta}{2\alpha} \in \mathbb{R}, \text{ τότε } x_1 = x_2 = -\frac{\beta}{2\alpha} \in \mathbb{R}.$$

318) Νὰ ἀποδειχθῇ δὲ τὸ τριώνυμον $\phi(x) \equiv ax^2 + bx + c$ $\exists x$ καθαρὰς πραγματικάς ἀνίσους, ἐὰν ὑπάρχῃ ἀριθμὸς $\xi \in \mathbb{R}$ τοιοῦτος, ὥστε νὰ εἴναι $\alpha(\xi) < 0$

319) Νὰ ἀποδειχθῇ δὲ ὅτι $\forall \lambda \in \mathbb{R}$ $\exists x$ καθαρὰς πραγματικάς $x^2 - 2\lambda x + (\lambda - 1) = 0$ $\exists x$ καθαρὰς πραγματικάς $\forall \lambda \in \mathbb{R}$.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ XIII

ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ Β' ΒΑΘΜΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΕΝΑΝ ΑΓΝΩΣΤΟΝ

98. ΟΡΙΣΜΟΙ — ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ (περιληπτική ύπομνησις)

Ορισμοί: Καλεῖται ἀνίσωσις ως πρὸς $\varphi(x) > f(x)$ ή $f(x) < \varphi(x)$, ή δύοια είναι ἀληθῆς δι' εἰδικὰς τιμὰς τοῦ ἀγνώστου x , ὅπου $\varphi(x), f(x)$ πραγματικά συναρτήσεις τῆς μεταβλητῆς x , ἔχουσαι τὸ αὐτὸ πεδίον δισμοῦ. Ἐάν είναι ἀληθῆς δια πάσας τὰς τιμὰς τοῦ συνόλου ἀναφορᾶς αὐτῆς, τότε καλεῖται μόνιμος ἀνίσωσις.

Ἐπίλυσις ἀνίσωσεως, ἐν συνόλῳ S , καλεῖται ἡ εὕρεσις τοῦ συνόλου τῶν τιμῶν τοῦ ἀγνώστου x ἐν τῷ S , αἱ δύοια τὴν καθιστοῦν ἀληθῆ (ἐπαληθεύουν).

Αἱ εύρισκόμεναι διὰ τῆς ἐπιλύσεως τιμαὶ τοῦ x καλοῦνται λύσεις τῆς ἀνίσωσεως.

Δύο η περισσότεραι ἀνίσωσεις, ἐν συνόλῳ S , καλοῦνται ισοδύναμοι, ἐὰν καὶ μόνον ἔάν ἔχουν τὸ αὐτὸ σύνολον λύσεων.

Ιδιότητες: 1) 'Η ἀνίσωσις $\varphi(x) > f(x)$ είναι ισοδύναμος πρὸς τὴν ἀνίσωσιν $\varphi(x) + \tau(x) > f(x) + \tau(x)$, ἐφ' ὅσον η συνάρτησις $\tau(x)$ είναι ώρισμένη εἰς τὸ σύνολον ἀναφορᾶς S .

2) 'Η ἀνίσωσις $\varphi(x) > f(x)$ είναι ισοδύναμος πρὸς τὴν $\varphi(x) - f(x) > 0$.

3) 'Η ἀνίσωσις $\varphi(x) > 0$, ἐν S , είναι ισοδύναμος τῆς ἀνίσωσεως $\varphi(x) \cdot \sigma(x) > 0$, ἢν η ἀνίσωσις $\sigma(x) > 0$, ἐν S , είναι μόνιμος.

4) 'Ἐάν αἱ ἀνίσωσεις, ἐν S , $\varphi(x) > 0$ καὶ $f(x) > 0$ είναι ισοδύναμοι, τότε καὶ η $\varphi(x) + f(x) > 0$ είναι ισοδύναμος πρὸς αὐτάς.

'Ἐκ τῆς περιληπτικῆς ταύτης ὑπομνήσεως, ἄνευ ἀποδείξεως, τῶν ιδιοτήτων τῶν ἀνίσωσεων συμπεραίνομεν, ὅτι κατὰ τὴν λύσιν τῶν ἀνίσωσεων δέον νὰ λαμβάνωμεν σοβαρῶς ύπ' ὅψιν αὐτάς ως ἐπίσης καὶ τὰς γνωστάς ιδιότητας τῶν ἀνισοτήτων, διὰ νὰ μὴν ὑποπίπτωμεν εἰς σφάλματα.

$$x = \frac{-1 \pm \sqrt{1^2 + 4}}{6} = \frac{1 \pm 5}{6} = \boxed{\begin{array}{l} 1 \\ 3 \end{array}}$$

99. ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΙΣ Β' ΘΜΙΟΥ ΑΝΙΣΩΣΕΩΣ

Όρισμός. Καλείται άνισωσης β' βαθμοῦ, ώς πρός άγνωστον τὸν x , πᾶσα άνισωσης τῆς μορφής $\varphi(x) \equiv ax^2 + bx + c > 0$ ή < 0 μὲν $a \neq 0$, $a, b, c \in \mathbb{R}$. (οἱ a, b, c δύνανται νὰ εἰναι καὶ πραγματικαὶ παραστάσεις μὴ περιέχουσαι τὸν ἄγνωστον x).

Τὸ α' μέλος τῆς άνισώσεως εἰναι τὸ τριώνυμον β' βαθμοῦ, τὸ όποιον εἴδομεν ὅτι εἰναι τελείως ώρισμένον εἰς τὸ σύνολον \mathbb{R} . Οὔτω διὰ τὴν ἐπίλυσιν τῆς άνισώσεως $ax^2 + bx + c > 0$ ή < 0 ἐν τῷ συνόλῳ \mathbb{R} , λαμβάνομεν ύπ' ὅψιν τὰ συμπεράσματα τῆς ἔξετάσεως τοῦ προσήμου τῆς ἀριθμ. τιμῆς τοῦ τριωνύμου $\varphi(x)$ διὰ πραγματικὰς τιμὰς τοῦ x .

Ἐπίλυσις τῆς άνισώσεως $\varphi(x) \equiv ax^2 + bx + c > 0$ ή < 0 , ($a \neq 0$).

Ως γνωστόν, τὸ πρόσημον τῆς ἀριθμ. τιμῆς τοῦ $\varphi(x)$ ἔξαρταται ἐκ τῆς διακρινούστης Δ καὶ τοῦ ἀριθμοῦ $a \neq 0$. Οὔτω δυνάμεθα εύκόλως νὰ δικαιολογήσωμεν τὴν συμπλήρωσιν τοῦ κάτωθι πίνακος.

Δ	a	Σύνολον λύσεων τῆς $ax^2 + bx + c > 0$	Σύνολον λύσεων τῆς $ax^2 + bx + c < 0$
+	+	$x_1, x_2 \in \mathbb{R}, x_2 < x_1$ $\{ x \in \mathbb{R} \mid -\infty < x < x_2, x_1 < x < +\infty \}$	$x_1, x_2 \in \mathbb{R}, x_2 < x_1$ $\{ x \in \mathbb{R} \mid x_2 < x < x_1 \}$
	-	$x_1, x_2 \in \mathbb{R}, x_2 < x_1$ $\{ x \in \mathbb{R} \mid x_2 < x < x_1 \}$	$x_1, x_2 \in \mathbb{R}, x_2 < x_1$ $\{ x \in \mathbb{R} \mid -\infty < x < x_2, x_1 < x < +\infty \}$
0	+	$\left\{ x \in \mathbb{R} \mid x \neq -\frac{b}{2a} \right\}$	$\{ \} = \emptyset$
	-	$\{ \} = \emptyset$	$\left\{ x \in \mathbb{R} \mid x \neq -\frac{b}{2a} \right\}$
-	+	$\{ x \mid x \in \mathbb{R} \}$	$\{ \} = \emptyset$
	-	$\{ \} = \emptyset$	$\{ x \mid x \in \mathbb{R} \}$

Σημείωσις. Τὰ σύμβολα $-\infty$ καὶ $+\infty$ δὲν άντιπροσωπεύουν ώρισμένους πραγματικούς ἀριθμούς.

Παραδείγματα : Νὰ ἐπιλυθοῦν ἐν \mathbb{R} , αἱ ἀκόλουθοι άνισώσεις :

1) $3x^2 - x - 2 > 0$, 2) $-3x^2 + x + 4 > 0$, 3) $x^2 + 6x + 9 < 0$, 4) $x^2 + x + 1 > 0$

'Επίλυσις: 1) $a = 3 > 0$, $\Delta = 1 + 24 = 25 > 0$, $x_1 = 1$, $x_2 = -\frac{2}{3}$.

Η άνισωσης πληροῦται διὰ $x > 1$ καὶ διὰ $x < -\frac{2}{3}$.

"Αρα τὸ σύνολον λύσεων εἰναι : $\{ x \in \mathbb{R} \mid -\infty < x < -\frac{2}{3}, 1 < x < +\infty \}$

2) $a = -3$, $\Delta = 1 - 4(-3)4 = 49 > 0$, $x_1 = -\frac{4}{3}$, $x_2 = -1$

‘Η άνίσωσις άληθεύει διὰ $-1 < x < \frac{4}{3}$

Σύνολον λύσεων : { $x \in \mathbb{R} \mid -1 < x < \frac{4}{3}\}$ }

3) $\alpha = 1 > 0$, $\Delta = 36 - 36 = 0$, $x_1 = x_2 = -3$

‘Η άνίσωσις δὲν έχει λύσιν εἰς τὸ σύνολον \mathbb{R} .

Σύνολον λύσεων : { $x \in \mathbb{R} \mid x^2 + 6x + 9 < 0\} = \emptyset$

4) $\alpha = 1 > 0$, $\Delta = 1 - 4 = -3 < 0$, $x_1, x_2 \in (\mathbb{C} - \mathbb{R})$

‘Η άνίσωσις εἶναι ἀληθής διὰ πάσας τὰς πραγμ. τιμὰς τοῦ x . Εἶναι μία μόνιμος άνίσωσις. Σύνολον λύσεων : { $x \mid x \in \mathbb{R}\}$.

100. ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ ΒΑΘΜΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ

Μία άνίσωσις βαθμοῦ ἀνωτέρου τοῦ δευτέρου ως πρὸς x διὰ νὰ ἐπιλυθῇ, δέον νὰ λάβῃ τὴν μορφὴν $\varphi_1(x) \cdot \varphi_2(x) \dots \varphi_v(x) > 0$ ή < 0 , ὅπου $\varphi_1(x), \varphi_2(x), \dots \varphi_v(x)$ ἀκέραια πολυώνυμα τοῦ x πρώτου ή δευτέρου βαθμοῦ, ἔχοντα τὸ αὐτὸ πεδίον δρισμοῦ.

Οἱ παράγοντες β' βαθμοῦ, ἐὰν ἔχουν ρίζας προσγματικάς, δύνανται νὰ ἀναλυθοῦν εἰς γινόμενον δύο πρωτοβαθμίων παραγόντων, ἐὰν ἔχουν ρίζας καθαρὰς μιγαδικάς συζυγεῖς, δύνανται νὰ παραλειφθοῦν ως μονίμως θετικοί, (διότι πάντοτε δυνάμεθα νὰ ὑποθέτωμεν τὸν α θετικόν). Συνεπῶς ή ἀνωτέρω άνίσωσις πάντοτε εἶναι δυνατὸν να λάβῃ τὴν μορφὴν $(x - p_1)(x - p_2) \dots (x - p_\mu) > 0$ ή < 0 ($\mu \in \mathbb{N}$). ‘Η ἐπίλυσις τῆς άνισώσεως αὐτῆς εἶναι γνωστὴ ἐκ τῆς προηγουμένης τάξεως.

Παράδειγμα : Νὰ ἐπιλυθῇ ἐν \mathbb{R} , ή άνίσωσις :

$$f(x) \equiv (x - 3)(x^2 + 1)(x^2 - x + 2)(-2x^2 + 7x - 3)(-x^2 + 5x) < 0$$

***Ἐπίλυσις :** Ἐξετάζομεν τοὺς δευτεροβαθμίους παράγοντας.

Οὕτως ἔχομεν : $x^2 + 1, \Delta = -4 < 0 \Rightarrow x^2 + 1 > 0 \forall x \in \mathbb{R}$

$$x^2 - x + 2, \Delta = -7 < 0 \Rightarrow x^2 - x + 2 > 0 \forall x \in \mathbb{R}$$

$$-2x^2 + 7x - 3, \Delta = 25 > 0 \Rightarrow -2x^2 + 7x - 3 = -2(x - 3)\left(x - \frac{1}{2}\right) \\ -x^2 + 5x, \Delta = 25 > 0 \Rightarrow -x^2 + 5x = -x(x - 5)$$

***Ἄρα** ή άνίσωσις εἶναι ίσοδύναμος πρὸς τὴν άνίσωσιν :

$$(x - 3)(-2)(x - 3)\left(x - \frac{1}{2}\right)(-x)(x - 5) < 0, \text{ ήτις εἶναι ίσοδύναμος πρὸς}$$

τὴν $(x - 3)^2\left(x - \frac{1}{2}\right)(x - 5)x < 0$. ‘Ο παράγων $(x - 3)^2$ εἶναι μὴ ἀρνητικὸς $\forall x \in \mathbb{R}$, ἐπομένως διὰ $x \neq 3$, ή άνίσωσις εἶναι ίσοδύναμος πρὸς τὴν

$$\left(x - \frac{1}{2}\right)(x - 5)x < 0.$$

Αἱ ρίζαι τοῦ πρώτου μέλους αὐτῆς εἶναι $0, \frac{1}{2}, 5$, Οὕτως ἔχομεν :

x	-∞	0	$\frac{1}{2}$	3	5	+∞
Πρόσημον τοῦ $\left(x - \frac{1}{2} \right) (x - 5)$ x	-	0	+	0	-	0
Πρόσημον τοῦ $(x - 3)^2 \left(x - \frac{1}{2} \right) (x - 5)$ x	-	0	+	0	-	0

*Αρα τὸ σύνολον λύσεων τῆς $f(x) < 0$ εἶναι: $\{x \in \mathbb{R} \mid -\infty < x < 0, \frac{1}{2} < x < 5, x \neq 3\}$

101. ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΑΙ ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ

Mία ἀνίσωσις καλεῖται κλασματική, ἐὰν δύναται νὰ λάβῃ τὴν μορφήν,

$\frac{\varphi_1(x)}{\varphi_2(x)} > 0 \text{ ή } < 0.$ "Οπου $\varphi_1(x), \varphi_2(x)$ πραγματικαὶ ρηταὶ συναρτήσεις τοῦ x, ἔχουσαι πεδίον ὁρισμοῦ τὸ πεδίον ὁρισμοῦ τοῦ ρητοῦ ἀλγεβρικοῦ κλάσματος $\frac{\varphi_1(x)}{\varphi_2(x)}$

*Ἐπειδὴ τὸ πηλίκον δύο ἀριθμῶν εἶναι ὅμοστημον τοῦ γινομένου αὐτῶν, ἔπονται αἱ ἀκόλουθοι ἴσοδυναμίαι :

$$\frac{\varphi_1(x)}{\varphi_2(x)} > 0 (\text{ἐν } S) \Leftrightarrow \varphi_1(x) \cdot \varphi_2(x) > 0 (\text{ἐν } S)$$

$$\frac{\varphi_1(x)}{\varphi_2(x)} < 0 (\text{ἐν } S) \Leftrightarrow \varphi_1(x) \cdot \varphi_2(x) < 0 (\text{ἐν } S)$$

S τὸ σύνολον ὁρισμοῦ τοῦ $\frac{\varphi_1(x)}{\varphi_2(x)}$

*Αρα ἡ ἐπίλυσις τῆς ἀνισώσεως $\frac{\varphi_1(x)}{\varphi_2(x)} > 0 \text{ ή } < 0$ ἀνάγεται εἰς τὴν ἐπίλυσιν ἀνισώσεως τῆς μορφῆς $\varphi_1(x) \cdot \varphi_2(x) > 0 \text{ ή } < 0$

Παράδειγμα: Νὰ ἐπιλύσῃ, ἐν R, ἡ ἀνίσωσις :

$$\frac{3}{x-2} + \frac{3}{x-1} < \frac{5}{x+3}$$

$$\text{'Ἐπίλυσις: '} \text{Έχομεν } \frac{3}{x-2} + \frac{3}{x-1} - \frac{5}{x+3} < 0 \Leftrightarrow \frac{x^2 + 24x - 37}{(x-2)(x-1)(x+3)} < 0$$

Τὸ πεδίον ὁρισμοῦ εἶναι $S = R - \{2, 1, -3\}$

*Ἐπιλύσιμεν τὴν ἴσοδύναμον αὐτῆς $(x^2 + 24x - 37)(x-2)(x-1)(x+3) < 0$, ὡς προηγουμένως, ὅποτε λαμβάνομεν τὸ σύνολον λύσεων :

$$\{x \in S \mid -\infty < x < -12 - \sqrt{181}, -3 < x < 1, -12 + \sqrt{181} < x < 2\}$$

102. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΙΣΩΣΕΩΝ Β' ΒΑΘΜΟΥ.

*Ἐὰν δύο η περισσότεραι ἀνισώσεις, ὡς πρὸς τὸν αὐτὸν ἀγνωστον, εἶναι ἀληθεῖς διὰ τὰς αὐτὰς τιμὰς τοῦ ἀγνώστου x, ἐν συνόλῳ S, τότε λέγομεν ὅτι ἀποτελοῦν σύστημα ἀνισώσεων.

*Ἐπίλυσιν τοῦ συστήματος ἀνισώσεων καλοῦμεν τὴν εὕρεσιν τῶν κοινῶν λύσεων τῶν ἀνισώσεων αὐτοῦ. Τὸ σύνολον τῶν κοινῶν τούτων λύσεων εἶναι ἡ τομὴ τῶν συνόλων λύσεων τῶν ἀνισώσεων, εύρισκεται δὲ διὰ τοῦ γνωστοῦ πίνακος, ὃστις καθορίζει τὰ κοινὰ διαστήματα λύσεων τῶν ἀνισώσεων.

Παράδειγμα: Νὰ ἐπιλύσῃ, ἐν R, τὸ σύστημα τῶν ἀνισώσεων :

$$1) 3x > 6, \quad 2) x^2 - 6x + 5 < 0, \quad 3) x^3 - 9x^2 + 14x < 0$$

***Επίλυσης:** Τὸ σύνολον λύσεων τῆς πρώτης εἶναι : $\Sigma_1 = \{ x \in \mathbb{R} \mid x > 2 \}$
 Τὸ σύνολον λύσεων τῆς δευτέρας εἶναι : $\Sigma_2 = \{ x \in \mathbb{R} \mid 1 < x < 5 \}$. Ἡ τρίτη γράφεται $x(x - 7)(x - 2) \leq 0$, ἥτις εἶναι ἀληθής διὰ $-\infty < x < 0$ καὶ $2 < x < 7$.

x	- ∞	0	2	7	+ ∞
$x^3 - 9x^2 + 14x$	-	0	+	0	-

Τὸ σύνολον λύσεων τῆς τρίτης : $\Sigma_3 = \{ x \in \mathbb{R} \mid -\infty < x \leq 0, 2 \leq x \leq 7 \}$
 Τὸ σύνολον λύσεων τοῦ συστήματος λαμβάνεται ἐκ τοῦ ἀκολούθου πίνακος.

x	$3x - 6$	$x^2 - 6x + 5$	$x^3 - 9x^2 + 14x$	Λύσεις συστήματος
- ∞	-	+	-	
0	-	+	0	
1	-	+	+	
2	0	0	+	
5	+	-	-	$2 < x < 5$
7	+	+	-	
+ ∞	+	+	+	

Σύνολον λύσεων τοῦ συστήματος εἶναι :

$$\Sigma = \Sigma_1 \cap \Sigma_2 \cap \Sigma_3 = \{ x \in \mathbb{R} \mid 2 < x < 5 \}$$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

320) Νὰ ἐπιλυθοῦν, ἐν \mathbb{R} , αἱ ἀκόλουθοι ἀνισώσεις:

- 1) $x^2 - 2x + 3 > 0$, $3x^2 - 13x + 10 < 0$, $-x^2 + 2x + 3 > 0$
- 2) $-6x^2 + 11x - 4 < 0$, $16x^2 - 8x + 1 > 0$, $x^2 + \sqrt{3}x - 1 < 0$
- 3) $(x^2 - 9x + 14)(x - 4) < 0$, $x^3 + 1 > x^2 + x$, $x^4 - 1 > x^3 - x$
- 4) $(x^2 - 2x + 1)(3x^2 + 1)(2x - 1) > 0$, $(2x^2 - 5x - 7)(x^2 - 1)(3x^2 + 7) < 0$

$$5) \frac{x^2 - 4}{x + 1} > 0, \quad \frac{x^2}{x + 1} > 2$$

$$6) \frac{2}{3x + 1} > \frac{1}{x + 1} - \frac{1}{x - 1}$$

$$7) \frac{x^2(x + 2)(x - 3)^3}{(x + 4)^2(x - 5)^2} \leq 0, \quad \frac{3x^3 - 7x^2 + 4x}{x^3 - 6x^2 + 12x - 8} \geq 0$$

321) Νὰ ἐπιλυθοῦν, ἐν συνόλῳ \mathbb{R} , τὰ ἀκόλουθα συστήματα :

- 1) $\begin{cases} 4x^2 - 4x - 3 < 0 \\ -x^2 + 2x > 0 \end{cases}$
- 2) $\begin{cases} 2x - 1 \\ -1 < \frac{2x - 1}{(x + 1)(x - 2)} < 1 \end{cases}$

$$3) \begin{cases} x^2 - 7x + 12 > 0 \\ -3x^2 + 16x - 5 < 0 \\ -x^2 + 2x + 48 > 0 \end{cases} \quad 4) \begin{cases} x^3 - 5x^2 + 6x \leq 0 \\ -x^2 + 2x + 3 > 0 \\ 2x^2 - 5x - 7 > 0 \end{cases}$$

322) Διὰ ποίας τιμάς τοῦ $\lambda \in \mathbb{R}$ η ἔξισ. $(\lambda - 1)x^2 - 2(\lambda - 3)x - \lambda + 3 = 0$ ἔχει ρίζας α) πραγματικάς καὶ β) καθαράς μιγαδικάς συζυγεῖς.

323) Διὰ ποίας πραγματικάς τιμάς τοῦ μ τὸ τριώνυμον $\phi(x) = (\mu - 2)x^2 - 2(\mu + 3)x + 2\mu - 18$ ἔχει ρίζας α) θετικάς καὶ β) ἀρνητικάς.

103. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΠΡΑΓΜ. ΡΙΖΑΣ ΤΟΥ ΤΡΙΩΝΥΜΟΥ $\phi(x) \equiv ax^2 + bx + c$

*Ἐὰν x_1, x_2 εἶναι αἱ ρίζαι (πραγματικαὶ), ὅπου $x_2 \leq x_1$, καὶ δοθῆ πραγματικὸς ἀριθμὸς ξ , τότε οἱ τρεῖς πραγματικοὶ ἀριθμοὶ x_1, x_2, ξ δύνανται νὰ παρουσιάσουν τὰς ἔξῆς σχέσεις διατάξεως :

$$\xi < x_2 \leq x_1 \quad x_2 < x_1 < \xi, \quad x_2 < \xi < x_1, \\ \text{καλούμενας } \theta\epsilon\sigma\epsilon\iota\varsigma \text{ τοῦ } \xi \text{ ως πρὸς τὰς ρίζας.}$$

*Ἐκάστη τῶν θέσεων τούτων τοῦ ξ χαρακτηρίζεται ἀπὸ ὥρισμένας συνθήκας μεταξὺ τοῦ ξ καὶ τῶν συντελεστῶν a, b, c .

1) *Ἐὰν $\xi < x_2 \leq x_1$, τότε ως γνωστὸν $a\phi(\xi) > 0$ (§ 97)

*Ἐπίσης ἔχομεν $\xi < x_2 \leq x_1 \iff \xi < x_2$ καὶ $\xi < x_1 \Rightarrow 2\xi < x_1 + x_2$ ή $\xi < \frac{x_1 + x_2}{2}$ ή $\xi < -\frac{b}{2a}$ ή $\xi + \frac{b}{2a} < 0$. *Ἄρα αἱ συνθῆκαι εἶναι $\Delta \geq 0, a\phi(\xi) > 0$ καὶ $\xi + \frac{b}{2a} < 0$

*Ἀντιστρόφως. *Ἐστω $\Delta \geq 0, a\phi(\xi) > 0$ καὶ $\xi + \frac{b}{2a} < 0$. *Ἐκ τῆς $\Delta \geq 0$ ἐπεται $x_2 \leq x_1 \in \mathbb{R}$. *Ἐκ τῆς δευτέρας $a\phi(\xi) > 0$ ἐπέται ὅτι $\delta \xi$ δὲν δύναται νὰ κεῖται μεταξὺ τῶν ριζῶν. Τέλος ἐκ τῆς τρίτης $\xi + \frac{b}{2a} < 0$ ἐπέται ὅτι $\delta \xi$ εἶναι μικρότερος καὶ τῆς μικροτέρας ρίζης x_2 , διότι ἂν ἦτο $x_2 \leq x_1 < \xi$, τότε $x_1 < \xi$ καὶ $x_2 < \xi \Rightarrow x_1 + x_2 < 2\xi \Rightarrow \frac{x_1 + x_2}{2} < \xi \Rightarrow \xi + \frac{b}{2a} > 0$.

2) *Ἐὰν $x_2 \leq x_1 < \xi$, τότε ἔχομεν πάλιν $a\phi(\xi) > 0$ καὶ ἐπειδὴ ἐκ τῆς $x_2 \leq x_1 < \xi$ ἐπεται $\xi + \frac{b}{2a} > 0$, ἄρα αἱ συνθῆκαι εἶναι $\Delta \geq 0, a\phi(\xi) > 0$, καὶ $\xi + \frac{b}{2a} > 0$.

*Ἀντιστρόφως. *Ἐὰν $\Delta \geq 0, a\phi(\xi) > 0$ καὶ $\xi + \frac{b}{2a} > 0$, τότε ἔχομεν ρίζας πραγματικὰς ($x_2 \leq x_1$), δὲν δύναται νὰ κεῖται μεταξὺ τῶν ριζῶν καὶ συνεπῶς, ως κείμενος ἐκτὸς τῶν ριζῶν, εἶναι μεγαλύτερος καὶ τῆς μεγαλυτέρας x_1 , διότι ἄλλως θὰ ἔχωμεν $\xi + \frac{b}{2a} < 0$.

3) *Ἐὰν $x_2 < \xi < x_1$, τότε ως γνωστὸν $a\phi(\xi) < 0$ (§ 97)

*Ἀντιστρόφως. *Ἐὰν $a\phi(\xi) < 0$, τότε ἀφ' ἐνὸς ἔχομεν ρίζας πραγματικάς, ἀφ' ἐτέρου $x_2 < \xi < x_1$, διότι ἂν $\Delta \leq 0$ εἶναι $a\phi(\xi) > 0$. *Ἐὰν δὲ $\delta \xi$ ἔκειτο ἐκτὸς τῶν ριζῶν θὰ εἴχομεν $a\phi(\xi) > 0$.

Έκ τῶν ἀνωτέρω συνάζομεν ὅτι :

Αἱ ίκαναι καὶ ἀναγκαῖαι συνθῆκαι, ἵνα ὁ $\xi \in \mathbb{R}$ είναι 1) μικρότερος τῶν $x_2 < x_1$, είναι $\Delta \geq 0$, $\alpha\varphi(\xi) > 0$, $\xi + \frac{\beta}{2\alpha} < 0$ καὶ 2) μεγαλύτερος τῶν $x_2 < x_1$, είναι $\Delta \geq 0$, $\alpha\varphi(\xi) > 0$, $\xi + \frac{\beta}{2\alpha} > 0$.

Ἡ ίκανὴ καὶ ἀναγκαῖα συνθήκη, ἵνα ὁ $\xi \in \mathbb{R}$ εὑρίσκεται μεταξὺ τῶν $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$, είναι $\alpha\varphi(\xi) < 0$.

Παρατήρησις. Τὴν συνθήκην $\alpha\varphi(\xi) < 0$ χρησιμοποιοῦμεν πολλάκις ὡς κριτήριον πραγματικότητος τῶν ριζῶν τοῦ $\varphi(x)$.

Τὰ ἀνωτέρω, ὡς καὶ μερικώτεραι περιπτώσεις, συνοψίζονται ὡς ἔξῆς :

$\varphi(x) \equiv \alpha x^2 + \beta x + \gamma, \quad x_2 \leq x_1$			
Δ	$\alpha\varphi(\xi)$	$\xi + \frac{\beta}{2\alpha}$	Θέσις τοῦ ξ ὡς πρὸς x_1, x_2
+	+	+	$x_2 < x_1 < \xi$
		-	$\xi < x_2 < x_1$
	-	+	$x_2 < \frac{x_1 + x_2}{2} < \xi < x_1$
+	-	-	$x_2 < \xi < \frac{x_1 + x_2}{2} < x_1$
		0	$x_2 < \xi = \frac{x_1 + x_2}{2} < x_1$
	0	+	$x_2 < x_1 = \xi$
0	+	+	$x_1 = x_2 < \xi$
		-	$\xi < x_1 = x_2$
	0	0	$x_1 = x_2 = \xi$

Παραδείγματα : α) Ποία ἡ θέσις τῶν ἀριθμῶν $-3, 0, 9, 10$ ὡς πρὸς τὰς ρίζας τῆς ἔξισώσεως $\varphi(x) \equiv x^2 - 8x - 9 = 0$;

Λύσις: Εχομεν $\Delta = 64 + 36 = 100 > 0$, $x_2 < x_1$ καὶ $\alpha = 1$. Επειδὴ $\alpha\varphi(-3) = 9 + 24 - 9 = 24 > 0$ καὶ $-3 + \frac{\beta}{2\alpha} = -3 - 4 = -7 < 0$, ἐπεταί ὅτι $-3 < x_2 < x_1$.

Ομοίως $\alpha\varphi(0) = -9 < 0$ ἄρα $x_2 < 0 < x_1$

$\alpha\varphi(9) = 81 - 72 - 9 = 0 \Rightarrow x_2 < x_1 = 9 \Rightarrow x_2 < x_1 = 9 < 10$

Ολαι δύο διατάσσονται : $-3 < x_2 < 0 < x_1 = 9 < 10$

β) Διὰ ποίας τιμᾶς τοῦ λ αἱ ρίζαι τοῦ $\varphi(x) \equiv 4x^2 - x + 2(\lambda - 1)$ είναι μικρότεραι τῆς μονάδος :

Λύσις: Πρέπει νὰ ἔχωμεν $x_2 \leq x_1 < 1$

Πρὸς τοῦτο ἀρκεῖ νὰ είναι $\Delta \geq 0$, $\alpha\varphi(1) > 0$, $1 + \frac{\beta}{2\alpha} > 0$.

Ούτως έχομεν : $\Delta = 1 - 32(\lambda - 1) \geq 0 \Leftrightarrow \lambda \leq \frac{33}{32}$,

$\alpha\varphi(1) = 4(4 - 1 + 2\lambda - 2) = 4(1 + 2\lambda) > 0 \Leftrightarrow \lambda > -\frac{1}{2}$,

$1 + \frac{\beta}{2\alpha} = 1 + \frac{-1}{8} = 1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8} > 0$ ($\forall \lambda \in \mathbb{R}$).

Αι $\lambda \leq \frac{33}{32}$, $\lambda > -\frac{1}{2}$ συναληθεύουν διὰ $-\frac{1}{2} < \lambda \leq \frac{33}{32}$.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

324) Νά εύρεθη ή θέσις τῶν ἀριθμῶν $-2, -1, 0, \frac{1}{2}, 2$ ώς στού τῶν τριωνύμων $\varphi_1(x) \equiv 3x^2 - x - 4$, $\varphi_2(x) \equiv 4x^3 + 4x^2 - 4x - 3$ ρίζας έκαστου τῶν τριωνύμων.

325) Διὰ ποιάς τιμάς τοῦ $\lambda \in \mathbb{R}$ αἱ ρίζαι x_1, x_2 τῶν τριωνύμου $\varphi(x) \equiv -3\lambda x^2 - (3\lambda - 2)$ περιέχονται μεταξύ -1 καὶ 1 .

326) Νά ἀποδειχθῇ ὅτι αἱ κάτωθι ἔξισώσεις χωρὶς τὴν χρῆσιν τῆς διακρινούστης :

$$1) (x - 5)(x - 3) - 5 = 0, \quad 2) (x - \alpha)(x - \beta) = 0 \quad (\alpha, \beta \neq 0 \in \mathbb{R})$$

327) Εάν x_1, x_2 εἰναι αἱ πραγματικαὶ ρίζαι τῶν τριωνύμων $\varphi(x) \equiv ax^2 + bx + c$ καὶ $0 < c < b < a$, νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι αἱ ρίζαι x_1, x_2 περιέχονται μεταξύ -1 καὶ 1 .

328) Νά εύρεθη ή θέσις τοῦ ἀριθμοῦ 2 πρὸς τὰς ρίζας τοῦ τριωνύμου $\varphi(x) \equiv 2x^2 - 3x + 5$ ($1 - 2\lambda$) κατὰ τὰς διαφόρους τιμάς τοῦ λ .

329) Εάν $\xi_1, \xi_2 \in \mathbb{R}$ καὶ $\varphi(x) \equiv ax^2 + bx + c$, νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι τὸ $\varphi(x)$ ἔχει^o ρίζας πραγματικάς καὶ ἀνίσους ἐάν εἰναι $\varphi(\xi_1) \cdot \varphi(\xi_2) < 0$, μία τῶν ὁποίων περιέχεται μεταξύ $\xi_1 < \xi_2$. Ακολούθως ἐπὶ τῇ βάσει τῆς προτάσεως ταύτης, νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι αἱ ρίζαι τῆς ἔξισώσεως $\varphi(x) \equiv (x - 2)(x + 3) + (x + 2)(x - 3) - (2 - x)(3 - x) = 0$ εἰναι πραγματικαὶ ἀνίσοι καὶ ἡ μία τῶν ὁποίων περιέχεται μεταξύ 2 καὶ 3 .

ΕΦΑΡΜΟΓΑΙ ΤΩΝ ΑΝΙΣΩΣΕΩΝ β' ΒΑΘΜΟΥ

104. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΙΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ β' ΒΑΘΜΟΥ.

Εἴδομεν εἰς τὰ προηγούμενα, ὅτι οἱ συντελεσταὶ α, β, γ τοῦ τριωνύμου $\varphi(x) \equiv \alpha x^2 + \beta x + \gamma$ πολλάκις εἰναι συναρτήσεις ἐνὸς γράμματος $\lambda \in \mathbb{R}$, τὸ δόποιον, χωρὶς νὰ δίδεται ἀριθμητικῶς, θεωρεῖται ως γνωστὴ ποσότης ἀνεξάρτητος τοῦ x καὶ ἀπὸ τὰς διαφόρους τιμάς τοῦ δόποιον ἔξαρτῶνται αἱ ρίζαι καὶ τὸ σημείον τοῦ τριωνύμου.

Τὸ γράμμα λ καλεῖται παράμετρος, αἱ δὲ ἔξισώσεις ἡ ἀνισώσεις περιέχουσαι αὐτὸν παραμετρικαί.

Διὰ νὰ διερευνήσωμεν μίαν ἔξισωσιν β' βαθμοῦ παραμετρικήν κατὰ τὰς διαφόρους τιμάς τῆς παραμέτρου λ , δέον νὰ ἔχωμεν ὑπὸ δψιν τὸν γνωστὸν πίνακα (§ 93), δ δόποιος ἔξετάζει τὸ εἶδος καὶ τὸ πρόσημον τῶν ριζῶν αὐτῆς.

Παράδειγμα : Νά διερευνήθῃ ἡ ἔξισωσ. $\varphi(x) \equiv (2\lambda - 1)x^2 - 2(\lambda - 2)x + 3\lambda = 0$, ὅταν $\lambda \in \mathbb{R}$.

Λύσις : Εξετάζομεν τὸ σημείον τῶν $\Delta(\lambda), P(\lambda)$ καὶ $S(\lambda)$ κατὰ τὰς διαφόρους τιμάς τοῦ λ . Ούτως έχομεν :

$$\Delta(\lambda) = 4(\lambda - 2)^2 - 12\lambda(2\lambda - 1) = -4(5\lambda^2 + \lambda - 4) = -20(\lambda + 1)\left(\lambda - \frac{4}{5}\right)$$

Τὸ σημεῖον τῆς $\Delta(\lambda)$ δίδεται ἀπὸ τὸν γραφικὸν πίνακα :

λ	$-\infty$	-1	$\frac{4}{5}$	$+\infty$
$\Delta(\lambda)$	-	o	+	-

$P(\lambda) = \frac{3\lambda}{2\lambda-1}$. Τὸ κλάσμα $\frac{3\lambda}{2\lambda-1}$ εἶναι ὁμόσημον τοῦ $3\lambda(2\lambda-1)$, τοῦ ὁποίου τὸ σημεῖον δίδεται ἀπὸ τὸν γραφικὸν πίνακα :

λ	-8	o	$\frac{1}{2}$	$+\infty$
$3\lambda(2\lambda-1)$	+	o	-	o
$P(\lambda)$	+	o	-	+

$S(\lambda) = \frac{2(\lambda-2)}{2\lambda-1}$. Τὸ κλάσμα $\frac{2(\lambda-2)}{2\lambda-1}$ εἶναι ὁμόσημον τοῦ $2(\lambda-2)(2\lambda-1)$, τοῦ ὁποίου τὸ σημεῖον δίδεται ἀπὸ τὸν γραφικὸν πίνακα :

λ	$-\infty$	$\frac{1}{2}$	2	$+\infty$
$2(\lambda-2)(2\lambda-1)$	+	o	-	o
$S(\lambda)$	+		-	o

Τὰ ἀνωτέρω βοηθοῦν εἰς τὸν ἀκόλουθον πίνακα διερευνήσεως :

Διερεύνησις τῆς ἔξισώσεως $\phi(x) \equiv (2\lambda-1)x^2 - 2(\lambda-2)x + 3\lambda = 0$				Eίδος ριζῶν καὶ πρόσημον αὐτῶν
λ	$\Delta(\lambda)$	$P(\lambda)$	$S(\lambda)$	
$-\infty$	-	+	+	$x_1, x_2 \in (C-R) \text{ καὶ } x_1 = \bar{x}_2 \Rightarrow x_1 = x_2 $
-1	0	—	—	$x_1 = x_2 = -\frac{\beta}{2\alpha} = 1$
0	+	+	+	$x_1 \in R^+, x_2 \in R^+ \Leftrightarrow 0 < x_1 < x_2$
0	—	0	—	$x_1 \in R^+, x_2 = 0 \quad (x_1 = -\frac{\beta}{\alpha} = 4)$
$\frac{1}{2}$	+	—	+	$x_1 \in R^+, x_2 \in R^- \Leftrightarrow x_2 < 0 < x_1 \text{ καὶ } x_2 < x_1 $
$\frac{4}{5}$	—	—	—	Ἐξίσωσις πρωτοβάθμιος
$\frac{4}{5}$	0	—	—	$x_1 \in R^-, x_2 \in R^- \Leftrightarrow x_2 < x_1 < 0$
$\frac{5}{2}$	—	—	—	$x_1 = x_2 = -\frac{\beta}{2\alpha} = -2$
2	—	+	—	$x_1, x_2 \in (C-R) \text{ καὶ } x_1 = \bar{x}_2 \Rightarrow x_1 = x_2 $
2	—	—	0	$x_1 \in I, x_2 \in I \text{ καὶ } x_1 = -x_2$
$+\infty$	—	+	+	$x_1, x_2 \in (C-R) \text{ καὶ } x_1 = \bar{x}_2 \Rightarrow x_1 = x_2 $

Σημ. C σύνολον μιγαδικῶν, I σύνολον καθαρῶν φανταστικῶν.

105. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΙΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΝΙΣΩΣΕΩΝ Β' ΒΑΘΜΟΥ.

Διὰ νὰ διερευνήσωμεν μίαν ἀνίσωσιν β' βαθμοῦ παραμετρικήν, δηλ. νὰ εὕρωμεν τὰ σύνολα λύσεων αὐτῆς κατὰ τὰς διαφόρους τιμὰς τῆς παραμέτρου λ , δέοντας νὰ ἔχωμεν ὑπ' ὅψιν τὸν γνωστὸν πίνακα (§ 99).

Παράδειγμα: Νὰ διερευνηθῇ ἡ ἀνίσωσις
 $\phi(x) \equiv (3\lambda-2)x^2 - (\lambda-1)x + 2(\lambda-1) < 0$, ὅταν $\lambda \in R$.

Λύσις: Εξετάζομεν τὸ σημεῖον τῶν $\Delta(\lambda)$ καὶ $\alpha(\lambda)$ κατὰ τὰς διαφόρους τι-
μὰς τοῦ λ . Οὕτως ἔχομεν :

$$\Delta(\lambda) = (\lambda - 1)^2 - 8(\lambda - 1)(3\lambda - 2) = (\lambda - 1)(-23\lambda + 15) \quad \begin{array}{c|ccccc} \lambda & -\infty & \frac{15}{23} & 1 & +\infty \\ \hline \Delta(\lambda) & - & 0 & + & - \end{array}$$

Τὸ σημεῖον τῆς $\Delta(\lambda)$ δίδεται ἀπὸ τὸν πίνακα :

$$\alpha(\lambda) = 3\lambda - 2, \text{ ὅπερ ἔχει σημεῖον θετικὸν διὰ } \lambda > \frac{2}{3} \text{ καὶ ἀρνητικὸν διὰ } \lambda < \frac{2}{3}$$

Μηδενίζεται δὲ διὰ $\lambda = \frac{2}{3}$. Τὰ ἀνωτέρω βοηθοῦν εἰς τὴν σύνταξιν τοῦ ἀκολού-
θου πίνακος :

Διερεύνησις τῆς ἀνισ. $\phi(x) \equiv (3\lambda - 2)x^2 - (\lambda - 1)x + 2(\lambda - 1) < 0$			
λ	$\Delta(\lambda)$	$\alpha(\lambda)$	Σύνολον λύσεων τῆς $\phi(x) < 0$
$-\infty$	-	-	$\{x / x \in \mathbb{R}\}$
$\frac{15}{23}$	0	-	$\left\{x \in \mathbb{R} / x \neq -\frac{\beta}{2\alpha} = 4\right\}$
$\frac{2}{3}$	+	-	$x_2 < x_1, \{x \in \mathbb{R} / -\infty < x < x_2, x_1 < x < +\infty\}$
$\frac{2}{3}$	0	-	ἀνίσωσις α'/βάθμιος, $\{x \in \mathbb{R} / -\infty < x < 2\}$
$\frac{2}{3}$	+	+	$x_2 < x_1, \{x \in \mathbb{R} / x_2 < x < x_1\}$
1	0	-	$\{\} = \emptyset$
$+\infty$	-	+	$\{\} = \emptyset$

Σημείωσις. Τὰ x_1, x_2 είναι ἑκφράσεις τοῦ λ καὶ μεταβάλλονται μετὰ τοῦ λ .

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

330) Νὰ διερευνηθοῦν αἱ ἀκόλουθοι ἔξισώσεις καὶ ἀνισώσεις, ὅταν $\lambda \in \mathbb{R}$:

$$1) (2\lambda - 3)x^2 + 2(6\lambda - 5)x + 18\lambda + 25 = 0$$

$$2) (\lambda - 5)x^2 - 4\lambda x + \lambda - 2 = 0, \quad 3) (\lambda + 1)x^2 - 3\lambda x + 4\lambda > 0$$

$$4) x^2 + 2(2\lambda - 1)x + 3\lambda^2 - 5 > 0, \quad 5) (\lambda + 2)x^2 + 12x + 10 - 6\lambda \leqslant 0$$

331) Νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι τὸ κλάσμα $\frac{x^2 - 5x + 6}{x - 2}$ λαμβάνει πᾶσαν πραγματικὴν τιμήν,
ὅταν $x \in \mathbb{R}$.

332) 'Εὰν x πραγματικὸς ἀριθμός, νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι τὸ κλάσμα $(x^2 + 2x - 11)/2(x - 3)$ δὲν δύναται νὰ λάβῃ τιμὰς τοῦ διαστήματος $[2, 6]$

ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΔΥΟ Β' / ΒΑΘΜΙΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΙΝΑ ΑΙ ΡΙΖΑΙ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΥΝ ΩΡΙΣΜΕΝΑΣ ΣΥΝΘΗΚΑΣ

106. Δίδονται δύο ἔξισώσεις $\varphi_1(x) \equiv a_1x^2 + \beta_1x + \gamma_1 = 0$ καὶ $\varphi_2(x) \equiv a_2x^2 + \beta_2x + \gamma_2 = 0$ ($a_1 \neq 0, a_2 \neq 0$) μὲν πραγματικοὺς συντελεστὰς καὶ ρίζας ἀντιστοίχως

(x_1, x_2) και (ρ_1, ρ_2) . Ζητούνται αἱ σχέσεις μεταξὺ τῶν συντελεστῶν των, ἵνα αὗται ἔχουν ρίζας:

1. Ἀναλόγους μὲ λόγον λ .

$$\begin{aligned} \text{Έχομεν : } & \frac{x_1}{\rho_1} = \frac{x_2}{\rho_2} = \lambda \Leftrightarrow x_1 = \lambda \rho_1 \text{ καὶ } x_2 = \lambda \rho_2 \Rightarrow x_1 + x_2 = \lambda(\rho_1 + \rho_2) \text{ καὶ} \\ x_1 x_2 &= \rho_1 \rho_2 \lambda^2 \text{ ή } -\frac{\beta_1}{\alpha_1} = \lambda \left(-\frac{\beta_2}{\alpha_2} \right) \text{ καὶ } \frac{\gamma_1}{\alpha_1} = \frac{\gamma_2}{\alpha_2} \lambda^2 \text{ ή } \frac{\alpha_1}{\alpha_2} = \frac{\beta_1}{\lambda \beta_2} \text{ καὶ } \frac{\alpha_1}{\alpha_2} = \frac{\gamma_1}{\gamma_2 \lambda^2} \Rightarrow \\ & \Rightarrow \boxed{\frac{\alpha_1}{\alpha_2} = \frac{\beta_1}{\beta_2 \lambda} = \frac{\gamma_1}{\gamma_2 \lambda^2}} \quad (1) \end{aligned}$$

Ἀντιστρόφως. Ἐὰν ὑφίσταται ἡ συνθήκη (1), τότε αἱ ἔξισώσεις ἔχουν ρίζας ἀναλόγους μὲ λόγον λ . Πράγματι, θέτοντες τοὺς λόγους (1) ἵσον μὲ κ λαμβάνομεν :

$$\alpha_1 = \kappa \alpha_2, \beta_1 = \kappa \beta_2 \lambda, \gamma_1 = \kappa \gamma_2 \lambda^2, \text{ διπότε } \text{ἡ } \text{ἔξισωσης } \varphi_1(x) = 0 \text{ γίνεται } \varphi_1(x) \equiv \kappa \alpha_2 x^2 + \kappa \beta_2 \lambda x + \kappa \gamma_2 \lambda^2 = 0 \Leftrightarrow \alpha_2 x^2 + \beta_2 \lambda x + \gamma_2 \lambda^2 = 0.$$

$$\begin{aligned} \text{Αὕτη } \text{ἔχει } \text{ρίζας } x_1 &= \lambda \frac{-\beta_2 + \sqrt{\beta_2^2 - 4\alpha_2 \gamma_2}}{2\alpha_2} \text{ ή } x_1 = \lambda \rho_1 \Rightarrow \frac{x_1}{\rho_1} = \lambda \\ x_2 &= \lambda \frac{-\beta_2 - \sqrt{\beta_2^2 - 4\alpha_2 \gamma_2}}{2\alpha_2} \text{ ή } x_2 = \lambda \rho_2 \Rightarrow \frac{x_2}{\rho_2} = \lambda, \end{aligned}$$

ὅπερ $\frac{x_1}{\rho_1} = \frac{x_2}{\rho_2} = \lambda$. Ὡστε ἡ συνθήκη (1) εἶναι ἰκανὴ καὶ ἀναγκαία.

2. Ἀντιθέτους.

$$\begin{aligned} \text{Έχομεν : } x_1 &= -\rho_1 \text{ καὶ } x_2 = -\rho_2 \Rightarrow \\ x_1 + x_2 &= -(\rho_1 + \rho_2) \quad \left| \begin{array}{l} -\frac{\beta_1}{\alpha_1} = -\left(-\frac{\beta_2}{\alpha_2}\right) \\ \frac{\gamma_1}{\alpha_1} = \frac{\gamma_2}{\alpha_2} \end{array} \right. \Rightarrow \boxed{\frac{\alpha_1}{\alpha_2} = -\frac{\beta_1}{\beta_2} = \frac{\gamma_1}{\gamma_2}} \quad (2) \\ x_1 x_2 &= \rho_1 \rho_2 \end{aligned}$$

Ἀντιστρόφως. Ἐὰν ὑφίσταται ἡ συνθήκη (2), τότε αἱ ἔξισώσεις ἔχουν ρίζας ἀντιθέτους. Πράγματι, θέτοντες τοὺς λόγους (2) ἵσον μὲ κ, λαμβάνομεν : $\alpha_1 = \kappa \alpha_2, \beta_1 = -\kappa \beta_2, \gamma_1 = \kappa \gamma_2$, διπότε $\varphi_1(x) \equiv \kappa \alpha_2 x^2 - \kappa \beta_2 x + \kappa \gamma_2 = 0 \Leftrightarrow \alpha_2 x^2 - \beta_2 x + \gamma_2 = 0$, ἥτις ᔁρίζει $x_1 = \frac{\beta_2 + \sqrt{\beta_2^2 - 4\alpha_2 \gamma_2}}{2\alpha_2}, x_2 = \frac{\beta_2 - \sqrt{\beta_2^2 - 4\alpha_2 \gamma_2}}{2\alpha_2}$.

Αὕται εἶναι ἀντιθέτοι τῶν ρίζῶν ρ_1, ρ_2 τῆς ἔξισης $\varphi_2(x) \equiv \alpha_2 x^2 + \beta_2 x + \gamma_2 = 0$.

“Ωστε ἡ συνθήκη (2) εἶναι ἰκανὴ καὶ ἀναγκαία.

Τὸ ἀνωτέρω δύναται νὰ θεωρηθῇ ὡς πόρισμα τῆς περιπτώσεως καθ' ἥν αἱ ρίζαι εἶναι ἀνάλογοι μὲ λόγον $\lambda = -1$.

3. Ἀντιστρόφους.

$$\begin{aligned} \text{Έχομεν : } x_1 &= \frac{1}{\rho_1} \text{ καὶ } x_2 = \frac{1}{\rho_2} \Rightarrow \\ x_1 + x_2 &= \frac{1}{\rho_1} + \frac{1}{\rho_2} \quad \left| \begin{array}{l} x_1 + x_2 = \frac{\rho_1 + \rho_2}{\rho_1 \rho_2} \\ x_1 x_2 = \frac{1}{\rho_1 \rho_2} \end{array} \right. \quad \left| \begin{array}{l} -\frac{\beta_1}{\alpha_1} = -\frac{\beta_2}{\gamma_2} \\ \frac{\gamma_1}{\alpha_1} = \frac{\alpha_2}{\gamma_2} \end{array} \right. \quad \left| \begin{array}{l} \frac{\alpha_1}{\gamma_2} = \frac{\beta_1}{\beta_2} \\ \frac{\alpha_1}{\gamma_2} = \frac{\gamma_1}{\alpha_2} \end{array} \right. \Rightarrow \\ \boxed{\frac{\alpha_1}{\gamma_2} = \frac{\beta_1}{\beta_2} = \frac{\gamma_1}{\alpha_2}} \quad (3). \end{aligned}$$

Ἀντιστρόφως. Ἐὰν ὑφίσταται ἡ συνθήκη (3), τότε αἱ ἔξισώσεις ἔχουν ρίζας ἀντιστρόφους. Πράγματι, θέτοντες τοὺς λόγους (3) ἵσον μὲ κ, λαμβάνομεν :

$$\alpha_1 = \kappa\gamma_2, \quad \beta_1 = \kappa\beta_2, \quad \gamma_1 = \kappa\alpha_2, \quad \text{όπότε } \varphi_1(x) \equiv \kappa\gamma_2x^2 + \kappa\beta_2x + \kappa\alpha_2 = 0 \Leftrightarrow \gamma_2x^2 + \beta_2x + \alpha_2 = 0, \quad \text{ήτις } \exists \text{ ρίζας } x_1 = \frac{-\beta_2 + \sqrt{\beta_2^2 - 4\alpha_2\gamma_2}}{2\gamma_2}, \quad x_2 = \frac{-\beta_2 - \sqrt{\beta_2^2 - 4\alpha_2\gamma_2}}{2\gamma_2}.$$

Αίριζαι δέ της $\varphi_2(x) = 0$ είναι $\rho_1 = \frac{-\beta_2 - \sqrt{\beta_2^2 - 4\alpha_2\gamma_2}}{2\alpha_2}, \quad \rho_2 = \frac{-\beta_2 + \sqrt{\beta_2^2 - 4\alpha_2\gamma_2}}{2\alpha_2}$

Έξ αυτῶν \exists $x_1 \rho_1 = \frac{\beta_2^2 - (\beta_2^2 - 4\alpha_2\gamma_2)}{4\alpha_2\gamma_2} = 1 \Rightarrow x_1 = \frac{1}{\rho_1}$. Όμοιως δέ $x_2 = \frac{1}{\rho_2}$.

"Ωστε: Αίρικαν και ἀναγκαῖαι συνθῆκαι, ίνα αἱ ἔξισώσεις $\varphi_1(x) = 0$ καὶ $\varphi_2(x) = 0$, ἔχουν ρίζας 1) ἀναλόγους μὲ λόγον λ, 2) ἀντιθέτους καὶ 3) ἀντιστρόφους, είναι ἀντιστοίχως αἱ (1), (2), (3).

AΣΚΗΣΕΙΣ

333) Διὰ ποίας τιμᾶς τῶν λ καὶ μ αἱ ἔξισώσεις $\varphi_1(x) \equiv (\lambda + 2)x^2 - (\mu + 1)x - 3 = 0$ καὶ $\varphi_2(x) \equiv (\mu - 1)x^2 + 4\lambda x + 2 = 0$ ἔχουν ρίζας α) ἀναλόγους μὲ λόγον 2, β) ἀντιθέτους καὶ γ) ἀντιστρόφους.

334) Νὰ σχηματισθῇ ἔξισωσις β' βαθμοῦ, ἔχουσα ρίζας τὰ τετράγωνα τῶν ριζῶν τῆς $x^2 + \lambda x + \mu = 0$. Ακολούθως νὰ εὐρεθοῦν αἱ πραγματικαὶ τιμαὶ τῶν λ καὶ μ διὰ τὰς ὅποιας αἱ δύο ἔξισώσεις ἔχουν ρίζας α) ἀναλόγους μὲ λόγον 2, β) ἀντιθέτους καὶ γ) ἀντιστρόφους.

335) Νὰ σχηματισθῇ ἔξισωσις ἔχουσα ρίζας $x_1 + \frac{1}{x_1}$ καὶ $x_2 + \frac{1}{x_2}$, ὅπου x_1, x_2 ρίζαι τῆς $\alpha x^2 + \beta x + \gamma = 0$. Ακολούθως νὰ εὐρεθῇ ἡ συνθήκη, ίνα αἱ δύο ἔξισώσεις ἔχουν ρίζας ἀναλόγους μὲ λόγον κ.

107. ΑΠΑΛΕΙΦΟΥΣΑ ΔΥΟ ΤΡΙΩΝΥΜΩΝ Β' ΒΑΘΜΟΥ.

"Ἐὰν δοθοῦν δύο τριώνυμα $\varphi_1(x) \equiv \alpha_1x^2 + \beta_1x + \gamma_1$ καὶ $\varphi_2(x) \equiv \alpha_2x^2 + \beta_2x + \gamma_2$ μὲ πραγματικοὺς συντελεστάς, ὅπου $\alpha_1 \neq 0, \alpha_2 \neq 0$, καὶ ρίζας ἀντιστοίχως (x_1, x_2) καὶ (ρ_1, ρ_2), τότε θὰ καλοῦμεν τὴν πραγματικὴν παράστασιν

$$R = (\alpha_1\gamma_2 - \alpha_2\gamma_1)^2 - (\alpha_1\beta_2 - \alpha_2\beta_1)(\beta_1\gamma_2 - \beta_2\gamma_1)$$

ἀπαλείφουσα τῶν δύο τριωνύμων.

"Η ἔέτασις τῶν ιδιοτήτων τῆς ἀπαλειφούστης R δύο τριωνύμων β' βαθμοῦ βοηθεῖ εἰς τὴν ἐπίλυσιν πολλῶν σπουδαίων προβλημάτων.

a) Μορφαὶ τῆς ἀπαλειφούστης R

Δοθέντων τῶν ἀνωτέρω τριωνύμων, ἡ ἀπαλείφουσα δύναται νὰ λάβῃ τὰς ἀκολούθους μορφάς :

$$1\eta \quad R = \alpha_1^2 \varphi_2(x_1)\varphi_2(x_2) = \alpha_2^2 \varphi_1(\rho_1)\varphi_1(\rho_2)$$

Πράγματι. Σχηματίζομεν τὸ γινόμενον

$$\begin{aligned} \varphi_2(x_1)\varphi_2(x_2) &= (\alpha_2x_1^2 + \beta_2x_1 + \gamma_2)(\alpha_2x_2^2 + \beta_2x_2 + \gamma_2) = \\ &= \alpha_2^2x_1^2x_2^2 + \alpha_2\beta_2x_1x_2(x_1 + x_2) + \alpha_2\gamma_2(x_1^2 + x_2^2) + \beta_2^2x_1x_2 + \\ &\quad + \beta_2\gamma_2(x_1 + x_2) + \gamma_2^2 = \\ &= \frac{1}{\alpha_1^2} [(\alpha_1\gamma_2 - \alpha_2\gamma_1)^2 - (\alpha_1\beta_2 - \alpha_2\beta_1)(\beta_1\gamma_2 - \beta_2\gamma_1)] = \frac{1}{\alpha_1^2} \cdot R \end{aligned}$$

"Ἄρα R = $\alpha_1^2 \varphi_2(x_1)\varphi_2(x_2)$, ὅμοιως δέ R = $\alpha_2^2 \varphi_1(\rho_1)\varphi_1(\rho_2)$

$$2\alpha \quad R = \alpha_1^2 \alpha_2^2 (x_1 - \rho_1)(x_2 - \rho_1)(x_1 - \rho_2)(x_2 - \rho_2)$$

3η

$$R = \frac{1}{4} [(2\alpha_1\gamma_2 + 2\alpha_2\gamma_1 - \beta_1\beta_2)^2 - \Delta_1\Delta_2],$$

$$\text{όπου } \Delta_1 = \beta_1^2 - 4\alpha_1\gamma_1, \Delta_2 = \beta_2^2 - 4\alpha_2\gamma_2$$

Οι μαθηταί δύνανται εύκολως νὰ έπαληθεύσουν τὰς μορφάς τῆς R 2α καὶ 3η.

β) Ιδιότητες τῆς ἀπαλειφούσης R

1. 'Εάν ή ἀπαλειφουσα $R = 0$, τότε ἐκ τῆς $R = \alpha_2^2\phi_1(\rho_1)\phi_1(\rho_2)$ $\epsilonχομεν$ $\alpha_2^2\phi_1(\rho_1)\phi_1(\rho_2) = 0 \Leftrightarrow \phi_1(\rho_1) = 0 \vee \phi_1(\rho_2) = 0$, δόποτε ἐάν $\phi_1(\rho_1) = 0$ καὶ ἔπειδη $\phi_2(\rho_1) = 0$ (ρ_1 εἶναι ρίζα τοῦ $\phi_2(x)$), ἔπειται ὅτι ή ρ_1 εἶναι κοινὴ ρίζα τῶν $\phi_1(x)$ καὶ $\phi_2(x)$. 'Εάν δὲ $\phi_1(\rho_1) = 0$ καὶ $\phi_1(\rho_2) = 0$, τότε τὰ $\phi_1(x)$ καὶ $\phi_2(x)$ $\epsilonχουν$ ἀμφοτέρας τὰς ρίζας κοινάς. Εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτήν θὰ $\epsilonχωμεν$:

$$\frac{\alpha_1}{\alpha_2} = \frac{\beta_1}{\beta_2} = \frac{\gamma_1}{\gamma_2}, \text{ διότι } x_1 + x_2 = \rho_1 + \rho_2 \text{ καὶ } x_1 x_2 = \rho_1 \rho_2 \Rightarrow -\frac{\beta_1}{\alpha_1} = -\frac{\beta_2}{\alpha_2} \text{ καὶ}$$

$$\frac{\gamma_1}{\alpha_1} = \frac{\gamma_2}{\alpha_2} \Rightarrow \frac{\alpha_1}{\alpha_2} = \frac{\beta_1}{\beta_2} = \frac{\gamma_1}{\gamma_2}$$

'Αντιστρόφως. 'Εάν τὰ τριώνυμα $\epsilonχουν$ κοινὴν ή κοινάς ρίζας, τότε προφανῶς $R = 0$.

"Ωστε : 'Η ίκανὴ καὶ ἀναγκαία συνθήκη, ἵνα τὰ τριώνυμα $\phi_1(x)$ καὶ $\phi_2(x)$ $\epsilonχουν$ μίαν τουλάχιστον κοινὴν ρίζαν, είναι ή ἀπαλειφουσα αὐτῶν νὰ ισοῦται πρὸς 0.

2. 'Εάν ή ἀπαλειφουσα $R = 0$ καὶ $\alpha_1\beta_2 - \alpha_2\beta_1 \neq 0$, τότε εῖδομεν ὅτι τὰ τριώνυμα $\phi_1(x)$ καὶ $\phi_2(x)$ $\epsilonχουν$ μίαν τουλάχιστον κοινὴν ρίζαν, δὲν δύνανται ὅμως νὰ $\epsilonχουν$ ἀμφοτέρας τὰς ρίζας κοινάς, διότι τότε θὰ $\frac{\alpha_1}{\alpha_2} = \frac{\beta_1}{\beta_2} = \frac{\gamma_1}{\gamma_2} \Rightarrow \alpha_1\beta_2 - \alpha_2\beta_1 = 0$, τὸ δόποιον εἶναι ἄτοπον, διότι ύπετέθει $\alpha_1\beta_2 - \alpha_2\beta_1 \neq 0$.

'Αντιστρόφως. 'Εάν τὰ τριώνυμα $\epsilonχουν$ μίαν μόνον κοινὴν ρίζαν τὴν x_0 , τότε : $\begin{cases} \alpha_1x_0^2 + \beta_1x_0 + \gamma_1 = 0 \\ \alpha_2x_0^2 + \beta_2x_0 + \gamma_2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow x_0^2 = \frac{\beta_1\gamma_2 - \gamma_1\beta_2}{\alpha_1\beta_2 - \alpha_2\beta_1} \text{ καὶ } x_0 = \frac{\gamma_1\alpha_2 - \alpha_1\gamma_2}{\alpha_1\beta_2 - \alpha_2\beta_1}$,

ἕξ ὡν λαμβάνομεν $\frac{\beta_1\gamma_2 - \gamma_1\beta_2}{\alpha_1\beta_2 - \alpha_2\beta_1} = (\frac{\gamma_1\alpha_2 - \alpha_1\gamma_2}{\alpha_1\beta_2 - \alpha_2\beta_1})^2$ καὶ $\alpha_1\beta_2 - \alpha_2\beta_1 \neq 0$ καὶ ἄρα $(\gamma_1\alpha_2 - \alpha_1\gamma_2)^2 - (\alpha_1\beta_2 - \alpha_2\beta_1)(\beta_1\gamma_2 - \gamma_1\beta_2) = 0$ καὶ $\alpha_1\beta_2 - \alpha_2\beta_1 \neq 0$. 'Η κοινὴ αὔτη ρίζα x_0 εἶναι πραγματική, διότι ἀν τὸ ητο μιγαδικὴ τῆς μορφῆς $\kappa + \lambda i$, τότε τὰ τριώνυμα θὰ εἶχον κοινὴν ρίζαν καὶ τὴν συζυγὴ $\kappa - \lambda i$ καὶ συνεπῶς θὰ εἶχον δύο κοινάς ρίζας, ὅπερ ἄτοπον.

"Ωστε : 'Η ίκανὴ καὶ ἀναγκαία συνθήκη, ἵνα τὰ τριώνυμα $\phi_1(x)$ καὶ $\phi_2(x)$ $\epsilonχουν$ μίαν καὶ μόνην πραγματικὴν κοινὴν ρίζαν, τὴν $x_0 = \frac{\gamma_1\alpha_2 - \alpha_1\gamma_2}{\alpha_1\beta_2 - \alpha_2\beta_1}$, είναι ή ἀπαλειφουσα αὐτῶν $R = 0$ καὶ $\alpha_1\beta_2 - \alpha_2\beta_1 \neq 0$.

Σημείωσις. "Άλλαι ιδιότητες τῆς ἀπαλειφούσης R , λίαν ἀξιόλογοι, θὰ $\epsilonξετασθοῦν$ εἰς ἄλλην τάξιν.

Παράδειγμα : Διὰ ποίας τιμάς τοῦ λ αἱ ἔξισώσεις $\phi_1(x) \equiv 2x^2 - x - 3 = 0$ καὶ $\phi_2 = x^2 - (2\lambda - 3)x + 4\lambda = 0$ $\epsilonχουν$ μίαν καὶ μόνην πραγματικὴν κοινὴν ρίζαν καὶ νὰ εύρεθῇ αὕτη.

Λύσις : Πρέπει $R = 0$ και $\alpha_1\beta_2 - \alpha_2\beta_1 \neq 0$

"Εχομεν : $\alpha_1\beta_2 - \alpha_2\beta_1 = -2(2\lambda - 3) - 1(-1) = -4\lambda + 7 \neq 0 \Leftrightarrow \lambda \neq \frac{7}{4}$

$$\beta_1\gamma_2 - \beta_2\gamma_1 = -1 \cdot 4\lambda + (2\lambda - 3)(-3) = -10\lambda + 9$$

$$\alpha_1\gamma_2 - \alpha_2\gamma_1 = 2 \cdot 4\lambda - 1 \cdot (-3) = 8\lambda + 3$$

"Αρα $R = (8\lambda + 3)^2 - (-4\lambda + 7)(-10\lambda + 9) = 0 \Leftrightarrow 12\lambda^2 + 77\lambda - 27 = 0$, εξ
ής $\lambda_1 = \frac{1}{3}$, $\lambda_2 = -\frac{27}{4}$

Η κοινή ρίζα διάλ λ₁ = $\frac{1}{3}$ είναι $x_0 = \frac{-8\lambda + 3}{-4\lambda + 7} = -1$

και διάλ λ₂ = $-\frac{27}{4}$ είναι: $x_0 = \frac{3}{2}$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

336) Ποιά ή συνθήκη μεταξύ των α και β, ίνα τά τριώνυμα $\phi_1(x) \equiv \alpha x^2 + x + \beta$ και $\phi_2(x) \equiv x^2 + \alpha x + \beta$ έχουν μίαν μόνη κοινή ρίζαν, ήτις νά εύρεθη.

337) "Αν αι έξισώσεις $x^2 + px + k = 0$ και $x^2 + kx + \lambda = 0$ έχουν μίαν μόνη κοινή ρίζαν, νά άποδειχθή ότι: $(k - \lambda)^2 = (\rho\lambda - k^2)(k - \rho)$.

338) Διάλ ποιάς τιμάς των μ και ν τά τριώνυμα $\phi_1(x) = \mu x^2 - (\mu - 1)x - 5$ και $\phi_2(x) \equiv (v - 2)x^2 - 3vx + 1$ έχουν τάς αντάς ρίζας;

339) Εάν x_0 είναι ή κοινή ρίζα των δύο τριώνυμων $\phi_1(x) \equiv \alpha_1 x^2 + \beta_1 x + \gamma_1$ και $\phi_2(x) \equiv \alpha_2 x^2 + \beta_2 x + \gamma_2$ και R ή άπαλείφουσά των, νά άποδειχθή

$$\text{ότι: } R = \frac{(\alpha_1\beta_2 - \alpha_2\beta_1)^2}{\alpha_1} \cdot \phi_1(x_0) = \frac{(\alpha_1\beta_2 - \alpha_2\beta_1)^2}{\alpha_2} \cdot \phi_2(x_0)$$

340) Νά άποδειχθή ότι τά τριώνυμα $\phi_1(x) \equiv \lambda x^2 - (\lambda\mu + 1)x + \mu$ και $\phi_2(x) \equiv \lambda\mu x^2 + (\lambda^2 - \mu)x - \lambda = 0$ έχουν κοινή ρίζαν, ήτις νά εύρεθη.

341) Νά άποδειχθή ότι αι έξισώσεις $x^2 + \alpha x - 3 = 0$ και $x^2 - 2ax + 3 = 0$ δέν δύνανται νά έχουν άμφοτέρας τάς ρίζας κοινάς. Εύρατε δέ τάς τιμάς του α, ίνα ακύρωτας μίαν κοινή ρίζαν.

ΤΟ ΤΡΙΩΝΥΜΟΝ $\phi(x) \equiv \alpha x^2 + \beta x + \gamma$ ως ΣΥΝΕΧΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΣ ΤΟΥ X

108. I) ΒΑΣΙΚΑΙ ΕΝΝΟΙΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΑΝΤΗΣ

1) Μεταβληταί τείνουσαι πρός τό 0, ∞ και πρός σταθερόν $a \in \mathbb{R}$

Μία μεταβλητή τού συνόλου των πραγματικών άριθμών λέγομεν : α) ότι τείνει πρός τό 0, και συμβολίζομεν $x \rightarrow 0$, όταν μεταβαλομένη δύναται νά γίνη και νά μείνη κατ' άπόλυτον τιμήν μικρότερα παντός άριθμού $\epsilon > 0$, δοσονδήποτε μικροῦ κατά βούλησιν,

β) ότι τείνει πρός τό ∞ (θετικὸν ή άρνητικόν), και συμβολίζομεν $x \rightarrow \infty$, όταν μεταβαλομένη δύναται νά γίνη και νά μείνη κατ' άπόλυτον τιμήν μεγαλυτέρα παντός άριθμού $M > 0$, δοσονδήποτε μεγάλου,

γ) ότι τείνει πρός τόν σταθερόν άριθμόν α, και συμβολίζομεν $x \rightarrow \alpha$, όταν μεταβαλομένη δύναται ή διαφορά $x - \alpha$ νά γίνη και νά μείνη κατ' άπόλυτον τιμήν μικροτέρα παντός άριθμού $\epsilon > 0$, δοσονδήποτε μικροῦ κατά βούλησιν.

2) Μεταβολαι μιᾶς συναρτήσεως

Μία συνάρτησις $\psi = \phi(x)$, έχουσα σύνολον δρισμοῦ τό $\Sigma \subseteq \mathbb{R}$, λέγεται :

α) αντίστοιχα είς τὸ Σ, ὅταν εἰς δύο οίασδήποτε ἀνίσους τιμάς τῆς μεταβλητῆς x , $x_1, x_2 \in \Sigma$ ἀντίστοιχοῦ δύος ἀνίσους τιμάς της συναρτήσεως.

"Ητοι, ἂν $x_1 < x_2 \Leftrightarrow \phi(x_1) < \phi(x_2)$,

β) φθίνουσα είς τὸ Σ, ὅταν εἰς τὰς ἐν λόγῳ τιμάς $x_1, x_2 \in \Sigma$ ἀντίστοιχοῦ ἀνομοίως αἱ ἀνίσους τιμάς της συναρτήσεως. "Ητοι, ἂν $x_1 < x_2 \Leftrightarrow \phi(x_1) > \phi(x_2)$ καὶ γ) σταθερὰ είς τὸ Σ, ὅταν εἰς τὰς δύο ἀνίσους τιμάς $x_1, x_2 \in \Sigma$ ἀντίστοιχοῦ τιμάς της συναρτήσεως. "Ητοι, ἂν $x_1 < x_2 \Leftrightarrow \phi(x_1) = \phi(x_2)$.

Τὴν φοράν μεταβολῆς τῆς ἀνω συναρτήσεως $\psi = \phi(x)$ καθορίζει προφανῶς τὸ σημεῖον τοῦ λόγου $\frac{\phi(x_1) - \phi(x_2)}{x_1 - x_2}$, δέ όποιος ἂν εἴναι θετικός ἢ συνάρτησις εἴναι αντίστοιχα, ἂν ἀρνητικός φθίνουσα καὶ ἂν ίσοῦται μὲν 0 ἢ συνάρτησις εἴναι σταθερά.

Η ἔννοια τῆς συνεχείας μιᾶς συναρτήσεως.

Μία συνάρτησις $\psi = \phi(x)$, ὡρισμένη εἰς ἐν σύνολον $\Sigma \subseteq R$, λέγεται συνεχής διά τινα τιμὴν $x_0 \in \Sigma$, ἐάν, τοῦ x τείνοντος πρὸς τὸ x_0 , ἡ συνάρτησις τείνει πρὸς τὴν τιμὴν $\phi(x_0)$.

"Εάν δέ ἡ $\psi = \phi(x)$ εἴναι συνεχής διά κάθε τιμὴν $x_0 \in \Sigma$, τότε λέγεται συνεχής είς τὸ σύνολον Σ .

109. II) Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΣ $\phi(x) \equiv ax^2 + bx + \gamma$ EINAI ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΙΣ TO R.

"Εστω $x_0 \in R$ μία τιμὴ τῆς μεταβλητῆς x καὶ $\phi(x_0) = ax_0^2 + bx_0 + \gamma$ ἡ ἀντίστοιχος τιμὴ τῆς συναρτήσεως. "Εάν λάβωμεν καὶ τὴν τιμὴν $x_0 + \epsilon$, ὅπου $\epsilon > 0$ καὶ ὅσον θέλομεν μικρὰ ποσότης, τότε ἡ ἀντίστοιχος τιμὴ τῆς συναρτήσεως θὰ εἴναι $\phi(x_0 + \epsilon) = a(x_0 + \epsilon)^2 + b(x_0 + \epsilon) + \gamma$. Σχηματίζομεν τὴν διαφοράν $\phi(x_0 + \epsilon) - \phi(x_0) = a(x_0 + \epsilon)^2 + b(x_0 + \epsilon) + \gamma - (ax_0^2 + bx_0 + \gamma) = 2ax_0\epsilon + a\epsilon^2 + b\epsilon$.

"Επειδὴ εἰς ἀριθμὸς δύονδήποτε μικρός, κάθε ὄρος τοῦ βου μέλους ἔχει ἀπόλυτον τιμὴν ὃσον θέλομεν μικρὰν καὶ συνεπῶς ἡ διαφορὰ $\phi(x_0 + \epsilon) - \phi(x_0)$ δύναται νὰ γίνη καὶ νὰ μείνῃ κατ' ἀπόλυτον τιμὴν μικροτέρα παντὸς ἀριθμοῦ $\epsilon' > 0$, δύονδήποτε μικροῦ κατὰ βούλησιν. "Αρα $\phi(x_0 + \epsilon) \rightarrow \phi(x_0)$. "Επειδὴ δέ, $x_0 + \epsilon \rightarrow x_0$, διότι $\epsilon > 0$ δύονδήποτε μικρός, ἔπειται ὅτι ἡ συνάρτησις $\psi = \phi(x)$ εἴναι συνεχής διά τὴν τιμὴν $x = x_0$. "Η τιμὴ ὅμως x_0 είναι τυχοῦσα καὶ συνεπῶς ἡ συνάρτησις $\psi = \phi(x)$ είναι συνεχής διά κάθε τιμὴν $x \in R$ καὶ ἄρα συνεχής είς τὸ σύνολον τῶν πραγματικῶν R .

2) Μεταβολὴ τῆς συναρτήσεως $\phi(x) \equiv ax^2 + bx + \gamma$, δταν $x \in R$

"Εστω $x_1, x_2 \in R$ ($x_1 < x_2$) δύο τιμαὶ τῆς μεταβλητῆς x καὶ $\phi(x_1), \phi(x_2)$ αἱ ἀντίστοιχοι τιμαὶ τῆς συναρτήσεως. Σχηματίζομεν τὸν λόγον $\frac{\phi(x_1) - \phi(x_2)}{x_1 - x_2} = \frac{ax_1^2 + bx_1 + \gamma - ax_2^2 - bx_2 - \gamma}{x_1 - x_2} = \frac{a(x_1^2 - x_2^2) + b(x_1 - x_2)}{x_1 - x_2} = a(x_1 + x_2) + b = a(x_1 + x_2 + \frac{\beta}{\alpha})$.

Διὰ τὸν ἔλεγχον τοῦ σημείου αὐτοῦ διακρίνομεν τὰς περιπτώσεις :

α) Εάν $\alpha > 0$ καὶ λάβομεν $x_1 < x_2 \leq -\frac{\beta}{2\alpha}$, τότε ἔχομεν $x_1 < -\frac{\beta}{2\alpha}$ καὶ $x_2 \leq -\frac{\beta}{2\alpha} \Rightarrow$
 $\Rightarrow x_1 + x_2 < -\frac{\beta}{\alpha} \Rightarrow x_1 + x_2 + \frac{\beta}{\alpha} < 0 \Rightarrow \alpha(x_1 + x_2 + \frac{\beta}{\alpha}) < 0 \Rightarrow \frac{\phi(x_1) - \phi(x_2)}{x_1 - x_2} <$
 < 0 καὶ συνεπῶς ἡ συνάρτησις $\phi(x) = \alpha x^2 + \beta x + \gamma$ εἶναι φθίνουσα.

Ομοίως δυνάμεθα νὰ ἀποδείξωμεν, ὅτι ἂν $\alpha > 0$ καὶ $-\frac{\beta}{2\alpha} \leq x_1 < x_2$, τότε ἡ $\phi(x)$ εἶναι αὔξουσα.

"Ωστε, ἡ συνάρτησις διὰ $\alpha > 0$ εἰς τὸ διάστημα $-\infty < x \leq -\frac{\beta}{2\alpha}$ εἶναι φθίνουσα καὶ εἰς τὸ διάστημα $-\frac{\beta}{2\alpha} \leq x < +\infty$ αὔξουσα. Δηλαδὴ ἀλλάσσει φορὰν μεταβολῆς καὶ ἐπειδὴ ἀπὸ φθίνουσα γίνεται αὔξουσα, διέρχεται διὰ μιᾶς ἐλαχίστης τιμῆς καλουμένης ἐλάχιστον (minimum) τῆς συναρτήσεως.

β) Εάν $\alpha < 0$, ἀποδεικνύομεν ως προηγουμένως, ὅτι ἡ συνάρτησις εἰς τὸ διάστημα $-\infty < x \leq -\frac{\beta}{2\alpha}$ εἶναι αὔξουσα καὶ εἰς τὸ διάστημα $-\frac{\beta}{2\alpha} \leq x < +\infty$ φθίνουσα. Ήτοι πάλιν ἀλλάσσει φορὰν μεταβολῆς καὶ ἐπειδὴ ἀπὸ αὔξουσα γίνεται φθίνουσα, διέρχεται διὰ μιᾶς μεγίστης τιμῆς, καλουμένης μέγιστον (maximum) τῆς $\phi(x)$.

3) Μέγιστον ἡ ἐλάχιστον τοῦ τριωνύμου $\phi(x) = \alpha x^2 + \beta x + \gamma$

Εἴδομεν προηγουμένως ὅτι τὸ τριώνυμον, ἂν $\alpha > 0$, εἰς τὸ σύνολον δρισμοῦ του (R) λαμβάνει τιμὰς διερχομένας δι' ἐνὸς ἐλαχίστου, τὸ δόποιον εἶναι :

$$\phi\left(-\frac{\beta}{2\alpha}\right) = \alpha\left(-\frac{\beta}{2\alpha}\right)^2 + \beta\left(-\frac{\beta}{2\alpha}\right) + \gamma = \frac{4\alpha\gamma - \beta^2}{4\alpha} \text{ καὶ } \text{ἄν } \alpha < 0, \text{ εἰς τὸ σύνολον } R \text{ λαμβάνει τιμὰς διερχομένας δι' ἐνὸς μεγίστου, τὸ δόποιον εἶναι: } \phi\left(-\frac{\beta}{2\alpha}\right) = \frac{4\alpha\gamma - \beta^2}{4\alpha}.$$

Τὴν ἔξετασιν τῆς μεταβολῆς τοῦ τριωνύμου $\phi(x) \equiv \alpha x^2 + \beta x + \gamma$ δυνάμεθα νὰ κάμωμεν καὶ ἀπὸ τὴν μορφὴν τοῦ τριωνύμου $\phi(x) \equiv \alpha \left[\left(x + \frac{\beta}{2\alpha} \right)^2 + \frac{4\alpha\gamma - \beta^2}{4\alpha^2} \right]$. Οὕτω διακρίνομεν τὰ ἔντονα :

α) Εάν $\alpha > 0$, τότε ὅταν $x \rightarrow \pm \infty$, τὸ $\left(x + \frac{\beta}{2\alpha} \right)^2 \rightarrow +\infty$ καὶ τὸ $\left(x + \frac{\beta}{2\alpha} \right)^2 + \frac{4\alpha\gamma - \beta^2}{4\alpha^2} \rightarrow +\infty$. Ἀρα $\phi(x) \rightarrow +\infty$ διὰ $x \rightarrow \pm \infty$. Ἐν συνεχείᾳ, τοῦ x αὔξανομένου ἀπὸ $-\infty$ ἔως τοῦ $-\frac{\beta}{2\alpha}$, τὸ $\left(x + \frac{\beta}{2\alpha} \right)^2$ λαμβάνει τιμὰς θετικὰς μὲν ἀλλὰ ἐλαττουμένας συνεχῶς, διὰ x δὲ ἵσον πρὸς $-\frac{\beta}{2\alpha}$, τὸ $\left(x + \frac{\beta}{2\alpha} \right)^2 = 0$ καὶ συνεπῶς $\phi\left(-\frac{\beta}{2\alpha}\right) = \alpha \left[0 + \frac{4\alpha\gamma - \beta^2}{4\alpha^2} \right] = \frac{4\alpha\gamma - \beta^2}{4\alpha}$. Ἀκολούθως, τοῦ x αὔξανομένου ἀπὸ $-\frac{\beta}{2\alpha}$ ἔως τοῦ $+\infty$, τὸ $\left(x + \frac{\beta}{2\alpha} \right)^2$ αὔξανεται συνεχῶς ἀπὸ τοῦ 0 τεῖνον εἰς τὸ $+\infty$ καὶ ἡ τιμὴ τῆς $\phi(x)$ αὔξανεται συνεχῶς ἀπὸ τῆς τιμῆς $\phi\left(-\frac{\beta}{2\alpha}\right) = \frac{4\alpha\gamma - \beta^2}{4\alpha}$ τείνουσα εἰς τὸ $+\infty$.

β) Εάν $\alpha < 0$, άποδεικνύομεν όμοίως, ότι, τοῦ x αύξανομένου άπό $-\infty$ έως τοῦ $-\frac{\beta}{2\alpha}$, ή τιμή τῆς συναρτήσεως αύξανεται συνεχῶς άπό $-\infty$ έως τῆς τιμῆς $\frac{4\alpha\gamma - \beta^2}{4\alpha}$ καί, τοῦ x αύξανομένου άπό $-\frac{\beta}{2\alpha}$ έως τοῦ $+\infty$, ή τιμή τῆς συναρτήσεως έλαττοῦται συνεχῶς άπό τῆς τιμῆς $\frac{4\alpha\gamma - \beta^2}{4\alpha}$ τείνουσα εἰς τὸ $-\infty$.

Τὰ ἀνωτέρω συνοψίζονται εἰς τὸν ἀκόλουθον πίνακα :

Πίναξ μεταβολῆς τοῦ τριωνύμου $\phi(x) \equiv \alpha x^2 + \beta x + \gamma$

	x	$-\infty$	\nearrow	$-\frac{\beta}{2\alpha}$	\nearrow	$+\infty$
$\alpha > 0$	$\phi(x)$	$+\infty$	\searrow	$(4\alpha\gamma - \beta^2)/4\alpha$ έλάχιστον	\nearrow	$+\infty$
$\alpha < 0$	$\phi(x)$	$-\infty$	\nearrow	$(4\alpha\gamma - \beta^2)/4\alpha$ μέγιστον	\searrow	$-\infty$

Παραδείγματα : α) Τὸ τριώνυμον $\phi(x) \equiv 3x^2 - 2x + 3$ έχει ἔνα έλάχιστον διὰ $x = -\frac{\beta}{2\alpha} = -\frac{-2}{2 \cdot 3} = \frac{1}{3}$, διότι $\alpha = 3 > 0$, τὸ δόποιον εἶναι $\phi\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{4\alpha\gamma - \beta^2}{4\alpha} = \frac{4 \cdot 3 \cdot 3 - (-2)^2}{4 \cdot 3} = \frac{8}{3}$

β) Τὸ τριώνυμον $f(x) \equiv -x^2 - 2x + 2$ έχει ἔνα μέγιστον διὰ $x = -\frac{\beta}{2\alpha} = -\frac{-2}{2(-1)} = -1$, διότι $\alpha = -1 < 0$. Τοῦτο εἶναι $\phi_{(-1)} = 3$.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

342) Νὰ εύρεθῇ τὸ μέγιστον ή έλάχιστον τῶν κάτω συναρτήσεων :

$$1) \quad \phi_1(x) \equiv 3x^2 - 2x + 4, \quad \phi_2(x) \equiv x^2 - 7x - 1, \quad \phi_3(x) \equiv x^2 - 7x, \quad \phi_4(x) \equiv 5x^2 - 4 \\ 2) \quad \sigma_1(x) \equiv -x^2 - 3x + 1, \quad \sigma_2(x) \equiv 3 - (x - 1)^2, \quad \sigma_3(x) \equiv -\frac{1}{2}x - \frac{3}{4}(x + 2)^2$$

343) Νὰ εύρεθῇ ή τιμὴ τοῦ λ , ἵνα τὸ τριώνυμον $\phi(x) \equiv (\lambda - 1)x^2 - \lambda x + \lambda$ έχῃ μέγιστον τὸν ἀριθμὸν -1 .

344) Νὰ εύρεθῇ ή μεταξὺ τῶν α καὶ β σχέσις, ἵνα τὸ τριώνυμον $\phi(x) \equiv -x^2 + (\alpha + \beta)x - (\alpha - \beta)$ έχῃ μέγιστον τὸν ἀριθμὸν $\alpha + \beta$.

345) Διὰ ποίαν τιμὴν τοῦ x τὸ γινόμενον $(2\alpha - x)(2\beta + x)$ γίνεται μέγιστον καὶ ποῖον τὸ μέγιστον τοῦτον ($\alpha, \beta \in \mathbb{R}$).

ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

$$\psi = ax + \beta \quad \text{καὶ} \quad \psi = ax^2 + \beta x + \gamma$$

110. Ορισμός. Γραφικὴ παράστασις ή γεωμετρικὴ ή παραστατικὴ καμπύλη μᾶς συναρτήσεως $\psi = \phi(x)$ καλεῖται ή γραμμή, τῆς δόποίας τὰ σημεῖα έχοντα τετμημένας τὰς τιμὰς τοῦ συνόλου δρισμοῦ αὐτῆς καὶ τεταγμένας τὰς ἀντιστοίχους τιμὰς τοῦ συνόλου τιμῶν τῆς συναρτήσεως.

1. Γραφική παράστασις τῆς συναρτήσεως $\psi = \alpha x + \beta$, ὅταν $(x, \psi) \in \mathbb{R}^2$


Ἐάν x_1 καὶ x_2 εἰναι δύο αὐθαίρετοι τιμαι τοῦ x , τότε οἱ ἀντίστοιχοι τιμαι τῆς συναρτήσεως εἰναι $\psi_1 = \alpha x_1 + \beta$ καὶ $\psi_2 = \alpha x_2 + \beta$. Κατασκευάζομεν τὰ σημεῖα $A(x_1, \psi_1)$ καὶ $B(x_2, \psi_2)$, ἀναφερόμενοι εἰς τὸ ὄρθογώνιον σύστημα ἀξόνων x' O x , ψ' O ψ . Ἐάς θεωρήσωμεν καὶ ἐν τρίτον σημεῖον $M(x_0, \psi_0 = \alpha x_0 + \beta)$.

Ἐκ τῶν $\psi_0 = \alpha x_0 + \beta$

$$\psi_1 = \alpha x_1 + \beta$$

$$\psi_2 = \alpha x_2 + \beta$$

δι' ἀφαιρέσεως κατὰ μέλη ἔχομεν :



Σχ. 110.1

$$\begin{aligned} \psi_0 - \psi_1 &= \alpha(x_0 - x_1) \\ \psi_0 - \psi_2 &= \alpha(x_0 - x_2) \end{aligned} \Rightarrow \frac{\psi_0 - \psi_1}{\psi_0 - \psi_2} = \frac{x_0 - x_1}{x_0 - x_2} \Leftrightarrow \frac{\psi_0 - \psi_1}{x_0 - x_1} = \frac{\psi_0 - \psi_2}{x_0 - x_2} = \alpha$$

Οἱ ὅροι τῆς ἀναλογίας αὐτῆς εἰναι οἱ συντεταγμέναι τῶν διανυσμάτων \overrightarrow{MA} ($x_0 - x_1$, $\psi_0 - \psi_1$) καὶ \overrightarrow{MB} ($x_0 - x_2$, $\psi_0 - \psi_2$) οἱ δὲ λόγοι $\frac{\psi_0 - \psi_1}{x_0 - x_1}$, $\frac{\psi_0 - \psi_2}{x_0 - x_2}$ εἰναι οἱ συντελεσταὶ διευθύνσεως ἀντιστοίχως αὐτῶν.

"Ἄρα τὰ διανύσματα ἔχουν συντελεστὰς διευθύνσεως ἵσους καὶ συνεπῶς εἰναι συγγραμμικά. "Ητοι τὸ σημεῖον $M(x_0, \psi_0)$ κεῖται ἐπὶ τῆς εὐθείας AB , ἐπειδὴ δὲ ἐλήφθη τυχόν, ἔπειται ὅτι πᾶν σημεῖον τῆς εὐθείας AB εἰναι σημεῖον τῆς γραφικῆς παραστάσεως τῆς συναρτήσεως $\psi = \alpha x + \beta$.

"Ωστε, ἡ γραφικὴ παράστασις τῆς $\psi = \alpha x + \beta$ εἰναι εὐθεῖα γραμμὴ μὲ συντελεστὴν διευθύνσεως, τὸν συντελεστὴν διευθύνσεως τῶν διανυσμάτων \overrightarrow{MA} , \overrightarrow{MB} , ὁ ὥποιος εἰναι α , διὰ τοῦτο καὶ καλεῖται ἡ $\psi = \alpha x + \beta$ γραμμικὴ συνάρτησις.

"Ἡ συνάρτησις διὰ $x = 0$ δίδει $\psi = \beta$ καὶ διὰ $\psi = 0$ δίδει $x = -\frac{\beta}{\alpha}$, τὰ δὲ σημεῖα $\Gamma(0, \beta)$ καὶ $\Delta\left(-\frac{\beta}{\alpha}, 0\right)$ εἰναι τὰ σημεῖα τομῆς τῆς εὐθείας $\psi = \alpha x + \beta$ μὲ τοὺς ἀξονας ψ' O ψ καὶ x' O x ἀντιστοίχως. "Ἡ τεταγμένη β τοῦ σημείου Γ καὶ ἡ τετμημένη $-\frac{\beta}{\alpha}$ τοῦ Δ καλοῦνται ἀντιστοίχως τεταγμένη ἐπὶ τὴν ἀρχὴν καὶ τετμημένη ἐπὶ τὴν ἀρχήν, ἀμφότεραι δὲ συντεταγμέναι ἐπὶ τὴν ἀρχήν.


"Ἡ γραφικὴ παράστασις τῆς συναρτ. $\psi = \alpha x + \beta$ διὰ $\beta = 0$, ἡτοι τῆς συναρτήσεως $\psi = \alpha x$, εἰναι εὐθεῖα διερχομένη διὰ τῆς ἀρχῆς 0 τῶν ἀξόνων, διότι διὰ $x = 0$ εἰναι καὶ $\psi = 0$.

"Ἡ γραφικὴ παράστασις τῆς συναρτ. $\psi = \alpha x + \beta$, ὅταν $\alpha = 0$, ἡτοι τῆς σταθερᾶς συναρτ. $\psi = \beta$, εἰναι εὐθεῖα παράλληλος πρὸς τὸν ἀξονα x' O x , διότι διὰ πᾶν x εἰναι ή τιμὴ τῆς ψ πάντοτε β .

Κατασκευὴ τῆς εὐθείας $\psi = \alpha x + \beta$

Μία εὐθεῖα δρίζεται διὰ δύο μόνον σημείων. Τὰ χαρακτηριστικώτερα προφανῶς,

διὰ τὴν κατασκευὴν τῆς εὐθείας $\psi = \alpha x + \beta$, εἶναι τὰ σημεῖα τοῦτης μὲ τοὺς ἀξόνας. Ἀρκεῖ λοιπὸν νὰ εὔρωμεν τὰς συντεταγμένας ἐπὶ τὴν ἀρχήν. Οὕτω, τὰ σημεῖα $A\left(-\frac{\beta}{\alpha}, 0\right)$ καὶ $B(0, \beta)$ ἀρκοῦν διὰ νὰ δρίσουν τὴν εὐθεῖαν AB , ἥτις εἶναι ἡ γραφικὴ παράστασις τῆς συναρτήσης $\psi = \alpha x + \beta$.




Σημ. Ἐὰν ἡ εὐθεία διέρχεται διὰ τὴν ἀρχῆς τῶν ἀξόνων ($\psi = \alpha x$), τότε διὰ τὴν κατασκευὴν της, ἀρκεῖ ἐν μόνον σημεῖον.

Σχ. 110.2

2. Γραφικὴ παράστασις τῆς συναρτ. $\psi = ax^2 + bx + \gamma$

Ἐχοντες ὑπὸ δψιν τὸν πίνακα μεταβολῆς τοῦ τριωνύμου $\phi(x) \equiv ax^2 + bx + \gamma$, δυνάμεθα νὰ παραστήσωμεν γραφικῶς τὴν συνάρτησιν $\psi = ax^2 + bx + \gamma$, ἀναφερόμενοι εἰς τὸ δρθιογώνιον σύστημα ἀξόνων $x'0x$, $\psi'0\psi$. Οὕτω διακρίνομεν δύο περιπτώσεις :



Σχ. 110.3

a) Ἐὰν $a > 0$. Ἡ συνάρτησις διὰ $x = -\frac{\beta}{2\alpha}$ λαμβάνει τὴν ἔλαχίστην της τιμὴν $\psi = \frac{4\alpha\gamma - \beta^2}{4\alpha} = -\frac{\Delta}{4\alpha}$, ὅταν δὲ $-\infty < x < -\frac{\beta}{2\alpha}$ ἔχει πεδίον τιμῶν τὸ $(-\infty, -\frac{\Delta}{4\alpha})$ καὶ ὅταν $-\frac{\beta}{2\alpha} < x < +\infty$ ἔχει πεδίον τιμῶν τὸ $(-\frac{\Delta}{4\alpha}, +\infty)$.

Κατασκευάζομεν λοιπὸν τὸ σημεῖον $A\left(-\frac{\beta}{2\alpha}, -\frac{\Delta}{4\alpha}\right)$. Ἀκολούθως λαμβάνομεν δύο


τιμὰς $x_1 = -\frac{\beta}{2\alpha} + \xi$ καὶ $x_2 = -\frac{\beta}{2\alpha} - \xi$ συμμετρικὰς ὡς πρὸς τὴν τιμὴν $-\frac{\beta}{2\alpha}$ καὶ τὰς ἀντιστοίχους τιμὰς ψ_1 καὶ ψ_2 τῆς συναρτήσεως. Εὐκόλως ἀποδεικνύομεν ὅτι $\psi_1 = \psi_2$. Ἀρα τὰ σημεῖα $B(x_1, \psi_1)$ καὶ $\Gamma(x_2, \psi_2)$ εἶναι συμμετρικὰ ὡς πρὸς τὴν εὐθεῖαν AT , ἥτις καλεῖται ἄξων συμμετρίας τῆς γραμμῆς $\psi = \phi(x)$, καὶ συνεπῶς ἡ γραφικὴ παράστασις τῆς συναρ. $\psi = ax^2 + bx + \gamma$ ἀποτελεῖται ἀπὸ δύο τμήματα $\Delta\GammaZA$ καὶ $AH\Gamma E$ συμμετρικὰ ὡς πρὸς τὸν ἄξονα συμμετρίας AT . Διὰ τὴν κατασκευὴν λοιπὸν κατὰ προσέγγισιν τῆς γραμμῆς $\psi = ax^2 + bx + \gamma$ δέον νὰ εὔρωμεν δύο τὸ δυνατὸν περισσότερα σημεῖα συμμετρικὰ ὡς πρὸς τὸν ἄξονα συμμετρίας, διότι εἶναι ἡ γραμμὴ καμπύλη καὶ οὐδὲν τμῆμα αὐτῆς εἶναι εὐθύγραμμον. Τοῦτο συνάγεται ἐκ τοῦ ὅτι, ἡ εὐθεία $\psi = Ax + B$ τέμνει τὴν γραμμὴν $\psi = ax^2 + bx + \gamma$ εἰς δύο τὸ πολὺ σημεῖα, διότι τὸ σύστημα ποὺ ἀποτελοῦν ἔχει τὸ πολὺ δύο λύσεις.

Τὴν καμπύλην ταύτην καλοῦμεν παραβολήν, τὸ σημεῖον Α κορυφὴν αὐτῆς καὶ τὸν ἄξονα ΑΤ ἄξονα τῆς παραβολῆς.

Παρατηρήσεις 1) Τὰ χαρακτηριστικά της καμπύλης $\psi = \alpha x^2 + \beta x + \gamma$ είναι : ἡ κορυφὴ αὐτῆς $A\left(-\frac{\beta}{2\alpha}, -\frac{\Delta}{4\alpha}\right)$, τὰ σημεῖα τομῆς τῆς παραβολῆς μὲ τὸν ἄξονα τῶν x $Z(\rho_2, 0)$ καὶ $H(\rho_1, 0)$, ὅπου ρ_1, ρ_2 ρίζαι τοῦ τριωνύμου, καὶ τὸ σημεῖον τομῆς τῆς παραβολῆς μὲ τὸν ἄξονα τῶν $\psi = \Delta(0, \gamma)$ καὶ τὸ συμμετρικὸν αὐτοῦ $E\left(-\frac{\beta}{\alpha}, \gamma\right)$. 2) Τὸ σημεῖον $A\left(-\frac{\beta}{2\alpha}, -\frac{\Delta}{4\alpha}\right)$ κεῖται, ἐν σχέσει πρὸς τὸν ἄξονα $x'0x$, κάτωθεν, ἢ ἐπί, ἢ ἀνωθεν αὐτοῦ, καθ' ὅσον είναι $\Delta > 0$, ἢ $\Delta = 0$, ἢ $\Delta < 0$. Πράγματι, διότι τότε ἀντιστοίχως θὰ είναι :

$$\psi = -\frac{\Delta}{4\alpha} < 0, \quad \psi = -\frac{\Delta}{4\alpha} = 0, \quad \psi = -\frac{\Delta}{4\alpha} > 0$$

Τοῦτο δεικνύεται εἰς τὰ ἀκόλουθα σχήματα.



Σχ. 110.4

β) Εὰν $a < 0$. Τὴν γραφικὴν παράστασιν τῆς συναρτήσεως $\psi = \alpha x^2 + \beta x + \gamma$ δυνάμεθα νὰ κατασκευάσωμεν σκεπτόμενοι δόμοιώς.


Τὴν ἔργασίαν ταύτην ἀφήνομεν διὰ τοὺς μαθητάς.

Παράδειγμα: Νὰ γίνῃ ἡ γραφικὴ παράστασις τῆς $\psi = x^2 - 5x + 6$

Κατασκευή: Ἐπειδὴ $\alpha = 1 > 0$, ἡ συνάρτησις ἔχει ἐλάχιστον. Εύρισκομεν τὰς συντεταγμένας τῶν χαρακτηριστικῶν σημείων τῆς καμπύλης. Κορυφὴ : $A\left(\frac{5}{2}, -\frac{1}{4}\right)$. Σημεῖα τομῆς μὲ τὸν $x'0x$:

$G(2,0)$ καὶ $B(3,0)$. Σημεῖον τομῆς μὲ τὸν $\psi'0\psi$: $\Delta(0, 6)$ καὶ τὸ συμμετρικὸν αὐτοῦ $E(5, 6)$.

Δύο ἔτερα συμμετρικὰ σημεῖα : $Z(1, 2)$ καὶ $H(4, 2)$. Μὲ τὰ σημεῖα αὐτὰ δυνάμεθα νὰ κατασκευάσωμεν τὴν καμπύλην κατὰ πρασέγγισιν. Τὴν κατασκευὴν ταύτην δεικνύει τὸ σχῆμα.



Σχ. 110.5

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

346) Νὰ γίνη ἡ γραφική παράστασις τῶν κάτωθι συναρτήσεων :

$$\psi = \frac{2}{3}x - 2, \quad \psi = -2 - \frac{1}{2}x, \quad x = \pm \psi, \quad \psi = \alpha x + 2, \quad \psi = \pm x + \beta$$

347) Διὰ ποίας τιμᾶς τῶν λ καὶ μαὶ εὐθεῖαι $\psi = (\lambda-1)x+2\mu$ καὶ $\psi = -(2+\lambda)x+5$ τέμνονται εἰς τὸ σημεῖον $M\left(\frac{3}{7}, \frac{20}{7}\right)$;

348) Νὰ γίνη ἡ γραφική παράστασις τῶν εύθειῶν $\psi = 2x+1$, $\psi = -x+3$, $\psi = x + \frac{5}{3}$. Τί παρατηρεῖτε; Δικαιολογήσατε τὴν παρατήρησίν σας.

349) Νὰ γίνη ἡ γραφική παράστασις τῶν κάτωθι συναρτήσεων :

$$\begin{aligned} \psi &= -\frac{x^2}{3} + 2x - 2, & \psi &= -\frac{x^2}{2} + 4, & \psi &= x^2 + x + 1 \\ \psi &= 2x^2 + x, & \psi &= x^2 - x - 6, & \psi &= -x^2 + x - 2 \end{aligned}$$

350) Διὰ ποίαν τιμὴν τοῦ α τὸ μέγιστον τῆς συναρ. $\psi = -\frac{x^2}{3} + 2x - 2\alpha$ εἶναι δάριθμός 1; Ἀκολούθως παραστήσατε αὐτὴν γραφικῶς.

351) Νὰ ἐπιλυθοῦν γραφικῶς τὰ συστήματα καὶ νὰ εὑρεθοῦν αἱ ἀριθμητικαὶ λύσεις των :

$$\begin{cases} \psi = -2x - 1 \\ \psi = x^2 - 2x - 5, \end{cases} \quad \begin{cases} \psi = x^2 - x + 1 \\ \psi = x^2 + x \end{cases}$$

352) Νὰ κατασκευασθοῦν αἱ γραφικαὶ παραστάσεις τῶν συναρτήσεων $\psi = -x^2 + 2x + 3$ καὶ $\psi = \frac{x^2}{2} - 4\left(x - \frac{3}{4}\right)$. Ἀκολούθως νὰ εὑρεθοῦν αἱ ἀκέραιαι τιμαὶ τοῦ α , ἵνα ἡ εὐθεῖα $\psi = \alpha$ τέμνῃ ἀμφοτέρας τὰς καμπύλας.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΣ

353) Νὰ ἐπιλυθοῦν αἱ ἀκόλουθοι ἔξισώσεις :

- 1) $(\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2)x^2 + 2(\alpha + \beta + \gamma)x + 3 = 0, \quad \alpha, \beta, \gamma \in R$
- 2) $\frac{(\alpha - x)^3 - (\beta - x)^3}{(x - \alpha)^2 + (\beta - x)^2} = \alpha - \beta, \quad \alpha, \beta \in R$
- 3) $(\kappa - x)^3 + (x - \lambda)^3 = (\kappa - \lambda)^3, \quad \kappa, \lambda \in R$
- 4) $(x - \alpha + 2\beta)^3 - (x - 2\alpha + \beta)^3 = (\alpha + \beta)^3, \quad \alpha, \beta \in R$
- 5) $\frac{(x - \alpha)(x - \gamma)}{(\beta - \alpha)(\beta - \gamma)} - \frac{(x - \beta)(x - \gamma)}{(\alpha - \beta)(\gamma - \alpha)} = 1 \quad \alpha \neq \beta \neq \gamma \in R$

354) Ἐάν $\alpha, \beta, \gamma \in R$, ἡ δὲ ἔξισωσις $f(x) = \alpha x^2 + \beta x + \gamma = 0$ ἔχει ρίζαν τὸν μιγαδικὸν $\mu + vi$, νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι ἡ ἄλλη ρίζα τῆς $f(x) = 0$ εἶναι δὲ μιγαδικὸς $\mu - vi$.

355) Νὰ εύρεθῇ τὸ εἶδος τῶν ριζῶν τῆς ἔξισώσεως, $\alpha, \beta, \gamma \in R$, $3x^2 - 2(\alpha + \beta + \gamma)x + \alpha\beta + \beta\gamma + \alpha\gamma = 0$.

356) Ἐάν ἡ ἔξισωσις $f(x) = x^2 + \alpha x + \beta = 0$ ἔχῃ ρίζας πραγματικὰς καὶ ἀνίσους, νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι τὸ αὐτὸν συμβαίνει καὶ διὰ τὰς ρίζας τῆς $f(x) + \lambda(2x + \alpha) = 0 \forall \lambda \in R$

357) Νὰ προσδιορισθῇ τὸ εἶδος τῶν ριζῶν τῆς ἔξισώσεως $\beta^2x^2 + (\gamma^2 + \beta^2 - \alpha^2)x + \gamma^2 = 0$, ἀν α, β, γ παριστοῦν μήκη τῶν πλευρῶν τυχόντος τριγώνου.

358) Ἐάν x_1, x_2 εἶναι ρίζαι τῆς $x^2 + \alpha x + \beta = 0$ νὰ σχηματισθῇ ἔξισωσις $\beta' \beta \alpha \beta' \beta \alpha$ ἔχουσα ρίζας τὰς x_1^2, x_2^2 καὶ ἀκολούθως νὰ εύρεθῇ σχέσις μεταξὺ τῶν α καὶ β , ἵνα ἡ νέα ἔξισωσις ἔχῃ διπλῆν ρίζαν.

359) Ἐάν x_1, x_2 εἶναι ρίζαι τοῦ τριωνύμου $f(x) = \alpha x^2 + \beta x + \gamma$ καὶ $\frac{S}{2} = \frac{x_1 + x_2}{2}$

νά άποδειχθῇ ὅτι $f\left(\frac{S}{2} + k\right) = f\left(\frac{S}{2} - k\right)$, σπου κ τυχών πραγματικός άριθμός.

360) Νά προσδιορισθοῦν οι κ καὶ λ, ἵνα αἱ ρίζαι τῆς ἔξισεως $x^2 + kx + \lambda = 0$ εἶναι οἱ άριθμοὶ κ καὶ λ.

361) Ἐὰν x_1, x_2 εἶναι ρίζαι τῆς ἔξισεως $\alpha_1 x^2 + \beta_1 x + \gamma_1 + \lambda (\alpha_2 x^2 + \beta_2 x + \gamma_2) = 0$, νὰ άποδειχθῇ ὅτι ὑπάρχει σχέσις μεταξύ τῶν ρίζων x_1, x_2 ἀνεξάρτητος τοῦ λ καὶ νὰ εὔρεθῇ ἡ τιμὴ τοῦ λ, διὰ τὴν δόποιαν ἡ ἔξισωσις ἔχει διπλῆν ρίζαν.

362) Δίδεται ἡ ἔξισωσις $\alpha x^2 + \beta x + \gamma = 0$, ἔχουσα ρίζας x_1, x_2 . Νά σχηματισθῇ ἔξισωσις, ἔχουσα ρίζας $x_1 + \lambda, x_2 + \lambda$ καὶ ἀκολούθως νὰ προσδιορισθῇ ὁ λ, ἵνα αὐτή εἶναι τῆς μορφῆς 1) $Ax^2 + \Gamma = 0$ καὶ 2) $Ax^2 + Bx = 0$.

363) Νά ὀρισθοῦν τὰ κ καὶ λ ὥστε, ἂν x_1, x_2 εἶναι αἱ ρίζαι τῆς ἔξισεως $x^2 + kx + \lambda = 0$, τότε οἱ άριθμοὶ $x_1 + 1, x_2 + 1$ νὰ εἶναι αἱ ρίζαι τῆς ἔξισεως $x^2 - k^2 x + k\lambda = 0$.

364) Ἐὰν $\alpha, \beta, \gamma \in Q$, ἡ δὲ ἔξισωσις $f(x) = \alpha x^2 + \beta x + \gamma = 0$ ἔχει ρίζαν τὸν ἀσύμμετρον $\kappa + \sqrt{-\lambda}$, νὰ άποδειχθῇ ὅτι ἡ ἄλλη ρίζα τῆς $f(x) = 0$ εἶναι ὁ ἀσύμμετρος $\kappa - \sqrt{-\lambda}$. Ἔνθα $\kappa, \lambda \in Q$ καὶ λ μὴ τέλειον τετράγωνον ρητοῦ.

365) Ἐὰν τῶν ἔξισωσεων $x^2 + 2ax + \beta = 0$ καὶ $x^2 + 2Ax + B = 0$ αἱ ρίζαι εἶναι ἀντιστοίχως (x_1, x_2) καὶ $(x_1 + k, x_2 + k)$, νὰ δειχθῇ ὅτι: $A^2 - B = \alpha^2 - \beta$.

366) Ἐὰν αἱ ρίζαι x_1, x_2 τῆς ἔξισεως $\alpha x^2 + \beta x + \gamma = 0$ εἶναι ἀνάλογοι τῶν άριθμῶν $\mu, v \in N$ καὶ $x_1, x_2 \in R^+$, νὰ άποδειχθῇ ὅτι $\sqrt{\frac{\mu}{v}} + \sqrt{\frac{v}{\mu}} + \sqrt{\frac{\beta}{\alpha}} = 0$.

367) Νά εύρεθῇ ἡ ικανὴ καὶ ἀναγκαία συνθήκη μεταξύ τῶν $\alpha, \beta, \gamma \in R$, ἵνα τὸ τριώνυμον $\phi(x) = \alpha^2 x^2 + (\alpha^2 + \gamma^2 - \beta^2) x + \gamma^2$ εἶναι τέλειον τετράγωνον.

368) Νά άποδειχθῇ ὅτι ἡ παράστασις $(\alpha + \beta)^2 x^2 + 2(\alpha^2 + \beta^2) x + (\alpha - \beta)^2$, $\alpha, \beta \in R$ καὶ $\alpha \neq 0, \beta \neq 0$ δύναται νὰ μετασχηματισθῇ εἰς διαφορὰν δύο τετραγώνων πραγματικῶν παραστάσεων καὶ ἀκολούθως νὰ ἀναλυθῇ εἰς γινόμενον παραγόντων.

369) Νά εύρεθοῦν αἱ τιμαὶ τοῦ μ , διὰ τὰς δόποιας ἡ παράστασις $x^2 + (\mu \psi + 2) x + (2\psi + 3)(\psi - 1)$ δύναται ν' ἀναλυθῇ εἰς γινόμενον δύο ρητῶν πραγματικῶν παραγόντων $\alpha'/\theta\mu\omega\lambda$ ὡς πρὸς x καὶ ψ .

370) Νά εύρεθῇ ἡ ικανὴ καὶ ἀναγκαία συνθήκη, ἵνα ἡ παράστασις $(\alpha x + \beta)^2 + (yx + \delta)^2$ εἶναι τέλειον τετράγωνον. Ἐν συνεχείᾳ νὰ άποδειχθῇ ὅτι, ἐὰν αἱ παραστάσεις $(\alpha_1 x + \beta_1)^2 + (\alpha_2 x + \beta_2)^2$ καὶ $(\alpha_3 x + \beta_3)^2 + (\alpha_4 x + \beta_4)^2$ εἶναι τέλεια τετράγωνα, τότε καὶ ἡ παράστασις $(\alpha_1 x + \beta_1)^2 + (\alpha_3 x + \beta_3)^2$ εἶναι τέλειον τετράγωνον. Οἱ άριθμοὶ $\alpha_{1, 2, 3, 4}, \beta_{1, 2, 3, 4}, \alpha, \beta, \gamma, \delta$ ὑποτίθενται πραγματικοί.

371) Νά άποδειχθῇ ὅτι τὸ $f(x) \equiv 2x^2 - \lambda(10x - 7) - 1$ ἔχει ρίζας πραγματικάς ἀνίσους $\forall \lambda \in R$.

372) Νά δειχθῇ ὅτι ἡ ἔξισωσις $\phi(x) \equiv (x - \alpha_1)(x - \alpha_2) + (x - \alpha_2)(x - \alpha_3) + (x - \alpha_3)(x - \alpha_1) = 0$ ἔχει ρίζας πραγματικάς ἀνίσους, ἀν $\alpha_1 < \alpha_2 < \alpha_3$.

$$373) \text{Ομοίως διὰ τὴν } \frac{\alpha_1 + \alpha_2}{x - \alpha_3} + \frac{\alpha_2 + \alpha_3}{x - \alpha_1} + \frac{\alpha_3 + \alpha_1}{x - \alpha_2} = 0, \text{ ἀν } \alpha_1^2 < \alpha_2^2 < \alpha_3^2.$$

374) Νά σχηματισθῇ ἔξισωσις β' βαθμοῦ ἔχουσα διπλῆν ρίζαν τὴν κοινὴν ρίζαν τῶν δύο τριώνυμων $x^2 - \alpha x + \beta$ καὶ $x^2 - 8x + \alpha$.

375) Ὑπὸ ποίαν συνθήκην τὰ τριώνυμα $x^2 + \alpha x + \beta \psi^2$ καὶ $x^2 + \gamma x \psi + \delta \psi^2$ ἔχουν ἕνα κοινὸν παράγοντα πρώτου βαθμοῦ;

376) Νά άποδειχθῇ ὅτι ἡ Δ τῆς ἔξισεως $\alpha_1 x^2 + \beta_1 x + \gamma_1 + \lambda (\alpha_2 x^2 + \beta_2 x + \gamma_2) = 0$ εἶναι τέλειον τετράγωνον, ἀν αἱ ἔξισεως $\alpha_1 x^2 + \beta_1 x + \gamma = 0$ καὶ $\alpha_2 x^2 + \beta_2 x + \gamma_2 = 0$ ἔχουν μίαν κοινὴν ρίζαν.

377) Νά ἐπιλυθοῦν ἐν R αἱ ἀκόλουθοι ἀνισώσεις :

$$1) x^2 - (3\alpha + \beta)x + 2\alpha(\alpha + \beta) < 0,$$

$$2) \frac{(x + \alpha)^2}{(x + \beta)^2} < \frac{\alpha^2 + x^2}{\beta^2 + x^2}, \text{ ἀν } \alpha > \beta > 0.$$

378) Διὰ ποίας τιμάς τοῦ λ ή παράστασις $(\lambda - 2)x^3 + 4x + \lambda + 1$ διατηρεῖ όμοσήμους τιμάς διὰ πᾶσαν πραγματικήν τιμὴν τοῦ x ;

379) Νὰ εύρεθῇ τὸ σύνολον δρισμοῦ τῆς πραγματικῆς συναρτήσεως

$$\psi = 5\sqrt{x^2 - 4x + 3} - 2\sqrt{-x^2 + 6x + 8}$$

380) Νὰ εύρεθῃ διὰ ποίας τιμάς τοῦ $x \in \mathbb{R}$ ἀληθεύει ή ἀνίσωσις $x^2 - 2ax + (\beta + \gamma)^2 > 0$, ἀν a, β, γ παριστοῦν μήκη πλευρῶν τριγώνου;

381) Τὸ τριώνυμον $\varphi(x) \equiv ax^2 + bx + \gamma$ διὰ $x = 5$ ἔχει ἐλάχιστόν τὸν -3 , ή μία του δὲ ρίζα είναι ὁ ἀριθμὸς 2 . Εὕρατε τὰ a, b, γ .

382) Νὰ εύρεθῃ ή ίκανὴ καὶ ἀναγκαῖα συνθήκη, ἵνα αἱ εὐθεῖαι $\psi = \alpha_1x + \beta_1$, $\psi = \alpha_2x + \beta_2$, $\psi = \alpha_3x + \beta_3$ διέρχονται διὰ τοῦ αὐτοῦ σημείου.

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΑΝΑΓΟΜΕΝΑΙ ΕΙΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ Β' ΒΑΘΜΟΥ

ΔΙΤΕΤΡΑΓΩΝΟΙ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

111. Όρισμός. Καλείται διτετράγωνος ἔξισωσις ώς πρός ἓνα ἄγνωστον, πᾶσα ἔξισωσις 4ου βαθμοῦ, περιέχοντα μόνον ἀρτίας δυνάμεις τοῦ ἀγνώστου.

"Ητοι τῆς μορφῆς $\alpha x^4 + \beta x^2 + \gamma = 0$, $\alpha \neq 0$, $\beta, \gamma \in \mathbb{R}$ ή καὶ πραγματικαὶ παραστάσεις μὴ περιέχουσαι τὸν x .

Τὸ πρῶτον μέλος αὐτῆς $\phi(x) \equiv \alpha x^4 + \beta x^2 + \gamma$ καλεῖται διτετράγωνον τριώνυμον.

112. ΕΠΙΛΥΣΙΣ.

"Ἐπίλυσις αὐτῆς ἐπιτυγχάνεται διὰ τοῦ μετασχηματισμοῦ $x^2 = \psi$, ὅπότε λαμβάνομεν τὴν ἔξισωσιν $\alpha\psi^2 + \beta\psi + \gamma = 0$, ἦτις καλεῖται ἐπιλύουσα τῆς διτετραγώνου ἔξισώσεως.

"Η ἐπιλύουσα ἔχει ἐν γένει δύο λύσεις ψ_1 καὶ ψ_2 πραγματικὰς η̄ καθαρὰς μιγαδικὰς συζυγεῖς, ὅπότε ἐπανερχόμενοι εἰς τὸν μετασχηματισμὸν $x^2 = \psi$ ἔχομεν $x^2 = \psi_1$ καὶ $x^2 = \psi_2$. Λαμβανομένου δὲ ὑπὸ δψιν, ὅτι πᾶς ἀριθμὸς πραγματικὸς η̄ μιγαδικός, ἔχει δύο μόνον τετραγωνικὰς ρίζας ἀντιθέτους (§ 73), εὐρίσκομεν ἐκ τῶν $x^2 = \psi_1$ καὶ $x^2 = \psi_2$ τὰς λύσεις τῆς διτετραγώνου ἔξισώσεως $x = \pm\sqrt{\psi_1}$, $x = \pm\sqrt{\psi_2}$, ἐξ ὧν ἔχομεν $x_1 = +\sqrt{\psi_1}$, $x_2 = -\sqrt{\psi_1}$, $x_3 = +\sqrt{\psi_2}$, $x_4 = -\sqrt{\psi_2}$.

"Ωστε : Αἱ τετραγωνικαὶ ρίζαι τῶν ριζῶν τῆς ἐπιλυούσης εἶναι ρίζαι τῆς διτετραγώνου ἔξισώσεως, ἀνὰ δύο ἀντιθετοῖ.

Εἰδος τῶν ριζῶν τῆς ἔξισ. $\alpha x^4 + \beta x^2 + \gamma = 0$, $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$

Τὸ εἰδος τῶν ριζῶν τῆς διτετραγώνου ἔξισώσεως ἔξαρταται ἐκ τοῦ εἰδους καὶ τοῦ προσήμου τῶν ριζῶν τῆς ἐπιλυούσης αὐτῆς.

Οὕτως, ἔχοντες ὑπὸ δψιν τὰ συμπεράσματα τοῦ πίνακος τῆς (§ 93), δυνάμεθα νὰ συμπληρώσωμεν τὸν ἀκόλουθον πίνακα διερευνήσεως τῆς διτετραγώνου ἔξισώσεως :

Διερεύνησης τῆς έξισ. $\alpha x^4 + \beta x^2 + \gamma = 0$, $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$, $\alpha \neq 0$

Δ	P	S	Ρίζαι έπιλυσης	Είδος ριζῶν διτετραγώνων
+	+	+	$\psi_1, \psi_2 \in \mathbb{R}^+$	$x_1, x_2, x_3, x_4 \in \mathbb{R}, x_1 = -x_2, x_3 = -x_4$
		-	$\psi_1, \psi_2 \in \mathbb{R}^-$	$x_1, x_2, x_3, x_4 \in \mathbb{I}$
	-	+	$\psi_1 \in \mathbb{R}^+, \psi_2 \in \mathbb{R}^-$	$x_1, x_2 \in \mathbb{R}, x_3, x_4 \in \mathbb{I}$
		-	$\psi_1 \in \mathbb{R}^-, \psi_2 \in \mathbb{R}^+$	$x_1, x_2 \in \mathbb{R}, x_3, x_4 \in \mathbb{I}$
	0	0	$\psi_1 \in \mathbb{R}^+, \psi_2 \in \mathbb{R}^-, \psi_1 = -\psi_2$	$x_1, x_2 \in \mathbb{R}, x_3, x_4 \in \mathbb{I}$
		+	$\psi_1 \in \mathbb{R}^+, \psi_2 = 0$	$x_1, x_2, x_3 = x_4 = 0 \in \mathbb{R}$
0	+	-	$\psi_2 \in \mathbb{R}^-, \psi_1 = 0$	$x_3, x_4 \in \mathbb{I}, x_1 = x_2 = 0$
		+	$\psi_1 = \psi_2 \in \mathbb{R}^+$	$x_1 = x_3 \in \mathbb{R}, x_2 = x_4 \in \mathbb{R}$
	-	-	$\psi_1 = \psi_2 \in \mathbb{R}^-$	$x_1 = x_3 \in \mathbb{I}, x_2 = x_4 \in \mathbb{I}$
		0	$\psi_1 = \psi_2 = 0$	$x_1 = x_2 = x_3 = x_4 = 0$
	-		$\psi_1, \psi_2 \in (\mathbb{C} - \mathbb{R})$	$x_1, x_2, x_3, x_4 \in (\mathbb{C} - \mathbb{R})$

Σημ. Ι σύνολον τῶν φανταστικῶν, C σύνολον τῶν μιγαδικῶν.

113. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΙΣ ΓΙΝΟΜΕΝΟΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ ΤΡΙΩΝΥΜΟΥ $\phi(x) \equiv \alpha x^4 + \beta x^2 + \gamma$, $\alpha \neq 0$.

Έάν ψ_1, ψ_2 είναι αἱ ρίζαι τῆς έπιλυσης $\alpha\psi^2 + \beta\psi + \gamma$, τότε $\alpha\psi^2 + \beta\psi + \gamma \equiv \alpha(\psi - \psi_1)(\psi - \psi_2)$. Ἐκ δὲ τῆς $x^2 = \psi \Leftrightarrow \psi = x^2$ προκύπτει : $\alpha x^4 + \beta x^2 + \gamma \equiv \alpha(x^2 - \psi_1)(x^2 - \psi_2) \equiv \alpha(x + \sqrt{\psi_1})(x - \sqrt{\psi_1})(x + \sqrt{\psi_2})(x - \sqrt{\psi_2}) \equiv \alpha(x - x_1)(x - x_2)(x - x_3)(x - x_4)$

Ἐκ τοῦ μετασχηματισμοῦ τούτου ἔπειται, ὅτι δυνάμεθα νὰ εὕρωμεν τὸ διτετράγωνον τριώνυμον, δταν γνωρίζωμεν τὰς ρίζας του.

Ἐπίσης δυνάμεθα νὰ λάβωμεν ἄλλας μορφὰς τοῦ διτετραγώνου τριώνυμου, τὰς δποίας δίδομεν ὡς ἀσκήσεις.

Παραδείγματα : 1) Νὰ έπιλυθῇ ἡ έξισωσις $36x^4 + 11x^2 - 5 = 0$

***Επίλυσης :** Ο μετασχηματισμὸς $x^2 = \psi$ δίδει τὴν έπιλύσουσαν $36\psi^2 + 11\psi - 5 = 0$, ἦτις ἔχει ρίζας $\psi_1 = \frac{1}{4}$, $\psi_2 = -\frac{5}{9}$

Αἱ ρίζαι τῆς διτετραγώνου εύρισκονται ἐκ τῶν ἔξισώσεων $x^2 = \frac{1}{4}$, ἢντος $x_1 = \frac{1}{2}$, $x_2 = -\frac{1}{2}$ καὶ $x^2 = -\frac{5}{9}$, ἢντος $x_3 = i\frac{\sqrt{5}}{3}$, $x_4 = -i\frac{\sqrt{5}}{3}$

2) Νὰ εὕρεθῇ τὸ είδος τῶν ριζῶν τῆς έξισ. $2x^4 - 5x^2 - 3 = 0$

Λύσις : "Ἐχομεν διὰ $x^2 = \psi$ τὴν έπιλύσουσαν $2\psi^2 - 5\psi - 3 = 0$, ἦτις δίδει :

$$\Delta = 25 + 24 = 49 > 0, P = -\frac{3}{2} < 0, S = \frac{5}{2} > 0$$

"Ἄρα ἡ έπιλύσουσα ἔχει ρίζας πραγματικάς, ἔτεροςήμους μὲ ἀπολύτως μεγαλυ-

τεραν τὴν θετικήν. Καὶ συνεπῶς ἡ διτετράγωνος ἔχει (έκ τῆς θετικῆς) δύο ρίζας πραγματικὰς ἀντιθέτους καὶ (έκ τῆς ἀρνητικῆς) δύο ρίζας φανταστικὰς ἀντιθέτους.

3) Νὰ μετασχηματισθῇ εἰς γινόμενον παραγόντων τὸ τριώνυμον

$$\phi(x) \equiv x^4 - \alpha x^2 (\alpha - 1) - \alpha^3, \quad \alpha > 0$$

Λύσις: Λαμβάνομεν τὴν ἐπιλύουσαν $\psi^2 - \alpha\psi(\alpha - 1) - \alpha^3$, ἥτις ἔχει ρίζας $\psi_1 = \alpha^2$, $\psi_2 = -\alpha$. Συνεπῶς αἱ ρίζαι τοῦ $\phi(x)$ εἰναι : $x^2 = \alpha^2$, ἐξ ἣς $x_1 = \alpha$, $x_2 = -\alpha$ καὶ $x_3 = i\sqrt{\alpha}$, $x_4 = -i\sqrt{\alpha}$

$$\begin{aligned} \text{"Ἄρα ἔχομεν } \phi(x) \equiv x^4 - \alpha x^2 (\alpha - 1) - \alpha^3 &\equiv (x - \alpha)(x + \alpha)(x - i\sqrt{\alpha})(x + i\sqrt{\alpha}) \\ &\equiv (x - \alpha)(x + \alpha)(x^2 + \alpha) \end{aligned}$$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

383) Νὰ ἐπιλυθοῦν αἱ ἀκόλουθοι ἔξισώσεις :

$$1) x^4 + 12x^2 - 64 = 0, \quad 9x^4 - 5x^2 - 4 = 0$$

$$2) \frac{1}{x} + \frac{x}{x^2 + 2} = \frac{x}{2}, \quad \frac{2(x^2 + 2)}{5} = \frac{(x^2 - 1)(x^2 - 2) + 6}{x^2 + 1}$$

$$3) x^2(\alpha x^2 - 1) = \alpha \beta^2 (\alpha x^2 - 1), \quad \frac{x^4 + 1}{x^2 - 1} = \frac{\alpha}{\beta} (x^2 - 1)$$

384) Νὰ εύρεθῃ τὸ εἶδος τῶν ριζῶν ἑκάστης τῶν ἔξισώσεων :

$$1) 2x^4 - 5x^2 - 7 = 0, \quad 2) 11x^4 + 13x^2 + 2 = 0, \quad 3) 2x^4 + 19x^2 + 9 = 0$$

385) Νὰ ἀναλυθοῦν εἰς γινόμενον παραγόντων τὰ τριώνυμα :

$$1) \phi_1(x) \equiv x^4 + 13x^2 - 48, \quad 2) \phi_2(x) \equiv 36x^4 - 13x^2 + 1, \quad 3) \phi_3(x) \equiv \alpha^2 \beta^2 \gamma^2 x^4 + x^2(\alpha^2 - \beta^2 \gamma^2) - 1$$

386) Νὰ σχηματισθῇ διτετράγωνος ἔξισωσις, ἔχουσα ρίζας

$$1) \pm 3, \pm \frac{1}{2}, \quad 2) \pm \sqrt{3}, \pm i, \quad 3) \pm \frac{i}{2}, \pm 2i\sqrt{2}, \quad 4) \pm \frac{\alpha}{2}, \pm \frac{\alpha + \beta}{2}$$

387) Νὰ διερευνηθοῦν αἱ ἀκόλουθοι ἔξισώσεις :

$$1) (\lambda - 1)x^4 - 4x^2 + \lambda + 2 = 0, \quad 2) (\mu + 1)x^4 - 2(\mu - 1)x^2 + 3(\mu - 1) = 0$$

388) Νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι τὸ τριώνυμον $\phi(x) \equiv \alpha x^4 + \beta x^2 + \gamma$, $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$, μετασχηματίζεται εἰς γινόμενον δύο δευτεροβαθμίων παραγόντων τοῦ x .

389) Ἐάν $\frac{\gamma}{\alpha} < 0$, νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι τὸ τριώνυμον $\phi(x) \equiv \alpha x^4 + \beta x^2 + \gamma$ μετασχηματίζεται εἰς γινόμενον δύο πρωτοβαθμίων παραγόντων καὶ ἐνὸς β'/β αθμίου παράγοντος ὡς πρὸς x .

114. ΜΕΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΠΛΩΝ ΤΙΝΩΝ ΡΙΖΙΚΩΝ ΕΙΣ ΑΠΛΑ

Αἱ παραστάσεις τῆς μορφῆς $\pm \sqrt{A \pm \sqrt{B}}$, ὅπου $A, B \in \mathbb{Q}^+$, B μὴ τέλειον τετράγωνον ρητοῦ καὶ $A > \sqrt{B} \Rightarrow A^2 - B > 0$, καλοῦνται διπλᾶ τετραγωνικὰ ριζικά. Τὰ A καὶ B δύναται νὰ εἰναι καὶ ρηταὶ παραστάσεις.

Τοιαῦται παραστάσεις ἀπαντῶνται εἰς τὰς λύσεις τῆς διτετραγώνου ἔξισώσεως, ὅταν ἡ διακρίνουσα $\Delta = \beta^2 - 4\alpha\gamma$ τῆς ἐπιλύουσης αὐτῆς δὲν εἰναι τέλειον τετράγωνον ρητῆς παραστάσεως τῶν συντελεστῶν α, β, γ ὑποτιθεμένων ρητῶν. Πράγματι εἰς τὰς λύσεις τῆς διτετραγώνου ἔξισώσεως

$$x_{1,2} = \pm \sqrt{\frac{-\beta + \sqrt{\Delta}}{2\alpha}}, \quad x_{3,4} = \pm \sqrt{\frac{-\beta - \sqrt{\Delta}}{2\alpha}}, \quad \text{έπειτα } \frac{\beta}{2\alpha} = A \text{ και } \frac{\Delta}{4\alpha^2} = B,$$

Έχουμε $x_1, x_2, x_3, x_4 = \pm \sqrt{A \pm \sqrt{B}}$.

Αἱ δυσκολίαι, τὰς ὅποιας δημιουργοῦν τὰ διπλᾶ ριζικά, αἴρονται εἰς ὥρισμένας περιπτώσεις διὸ τοῦ μετασχηματισμοῦ αὐτῶν εἰς ἀπλᾶ.

Πρὸς τούτοις, ζητοῦμεν δύο ρητοὺς θετικοὺς ἀριθμοὺς x καὶ ψ τοιούτους, ὅστε : $\sqrt{A \pm \sqrt{B}} = \sqrt{x} \pm \sqrt{\psi}$, ἐκ τῶν ὅποιων ὁ εἰς τουλάχιστον νὰ εἴναι μὴ τέλειον τετράγωνον ρητοῦ.

Τὸ διπλοῦν σημεῖον δικαιολογεῖται ὡς ἔξῆς :

Ἐχομεν ἐκ τῆς $\sqrt{A + \sqrt{B}} = \sqrt{x} + \sqrt{\psi}$, δι' ὑψώσεως εἰς τὸ τετράγωνον, $A + \sqrt{B} = x + \psi + 2\sqrt{x\psi}$. Ἐπειδὴ \sqrt{B} καὶ $\sqrt{x\psi}$ ἀρρητοὶ καὶ A καὶ $x + \psi$ ρητοί, ἔπειται (§ 63)

$$\begin{cases} A = x + \psi \\ \sqrt{B} = 2\sqrt{x\psi} \end{cases} \Rightarrow A - \sqrt{B} = x + \psi - 2\sqrt{x\psi} \Rightarrow A - \sqrt{B} = (\sqrt{x} - \sqrt{\psi})^2 \\ \Rightarrow \sqrt{A - \sqrt{B}} = |\sqrt{x} - \sqrt{\psi}|$$

"Ωστε ἔχομεν δι' ἀμφοτέρας τὰς περιπτώσεις $x + \psi = A$, $\sqrt{B} = 2\sqrt{x\psi}$, ἢ $x + \psi = A$, $4x\psi = B$ ἢ $x + \psi = A$, $x\psi = \frac{B}{4}$, αἱ ὅποιαι σχηματίζουν τὴν ἔξισωσιν $\omega^2 - A\omega + \frac{B}{4} = 0$ μὲν ρίζας τοὺς ἀριθμοὺς x καὶ ψ . Αἱ ρίζαι αὐτῆς τῆς ἔξισώσεως εἴναι :

$$x = \frac{A + \sqrt{A^2 - B}}{2}, \quad \psi = \frac{A - \sqrt{A^2 - B}}{2}. \quad \text{Διὰ νὰ εἴναι δὲ οἱ } x \text{ καὶ } \psi \text{ ρητοί, πρέ-$$

$$\text{πει } A^2 - B = \Gamma^2, \quad (\Gamma \in Q), \quad \text{όθεν } x = \frac{A + |\Gamma|}{2}, \quad \psi = \frac{A - |\Gamma|}{2}$$

*Αντιστρόφως. *Εὰν $x, \psi \in Q^+$ καὶ $x = \frac{A + |\Gamma|}{2}, \quad \psi = \frac{A - |\Gamma|}{2}$, τότε :

$$(\sqrt{x} \pm \sqrt{\psi})^2 = x + \psi \pm 2\sqrt{x\psi} = \frac{A + |\Gamma|}{2} + \frac{A - |\Gamma|}{2} \pm 2\sqrt{\frac{A^2 - \Gamma^2}{4}} = \\ = A \pm \sqrt{B}.$$

$$*\text{Οθεν } |\sqrt{x} \pm \sqrt{\psi}| = \sqrt{A \pm \sqrt{B}}$$

*Αρα: Διὰ νὰ ὑπάρχουν ρητοὶ θετικοὶ ἀριθμοὶ x καὶ ψ , μὲν ἔνα τουλάχιστον μὴ τέλειον τετράγωνον ρητοῦ, τοιοῦτοι, ὕστε $\sqrt{A \pm \sqrt{B}} = \sqrt{x} \pm \sqrt{\psi}$, πρέπει καὶ ἀρκεῖ νὰ είναι $A, B \in Q^+, A^2 - B = \Gamma^2, (\Gamma \in Q)$.

*Ο μετασχηματισμὸς τότε τοῦ διπλοῦ ριζικοῦ είναι δυνατὸς καὶ γίνεται βάσει τοῦ τύπου

$$\pm \sqrt{A \pm \sqrt{B}} = \pm \left(\sqrt{\frac{A + |\Gamma|}{2}} \pm \sqrt{\frac{A - |\Gamma|}{2}} \right)$$

Παραδείγματα: Νὰ μετασχηματισθῇ ἔκαστον τῶν ἀκολούθων διπλῶν ριζικῶν εἰς ἀπλᾶ : $\sqrt{3 + 2\sqrt{2}}$, $\sqrt{2\alpha + 2\sqrt{\alpha^2 - \beta^2}}$.

Λύσις: α) *Ἐπειδὴ $\sqrt{3 + 2\sqrt{2}} = \sqrt{3 + \sqrt{8}}$ καὶ $3^2 - 8 = 1 = 1^2$, έχομεν $\sqrt{3 + 2\sqrt{2}} = \sqrt{\frac{3+1}{2}} + \sqrt{\frac{3-1}{2}} = \sqrt{2} + \sqrt{1} = \sqrt{2} + 1$

β) Έχομεν $\sqrt{2\alpha} + 2\sqrt{\alpha^2 - \beta^2} + \sqrt{2\alpha} + \sqrt{4(\alpha^2 - \beta^2)}$ και έπειδή $A = 2\alpha$, $B = 4(\alpha^2 - \beta^2)$, έπειται $A^2 - B = 4\alpha^2 - 4(\alpha^2 - \beta^2) = 4\beta^2 = \Gamma^2$. Οθεν $\sqrt{2\alpha} + 2\sqrt{\alpha^2 - \beta^2} = \sqrt{\frac{2\alpha + 2\beta}{2}} + \sqrt{\frac{2\alpha - 2\beta}{2}} = \sqrt{\alpha + \beta} + \sqrt{\alpha - \beta}$. Υπεθέσαμεν $\alpha \geq \beta > 0$.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

390) Νά μετασχηματισθούν εις άπλα ριζικά αι δικόλουθοι παραστάσεις :

$$\begin{aligned} 1) \sqrt{7+\sqrt{13}}, \quad \sqrt{8-\sqrt{15}}, \quad \sqrt{9+4\sqrt{5}}, \quad \sqrt{14-2\sqrt{13}}, \\ 2) \sqrt{\alpha+2\sqrt{\alpha-1}}, \quad \sqrt{\alpha^2+3-2\alpha\sqrt{3}}, \quad \sqrt{\alpha+\beta-\gamma-2\sqrt{(\beta-\gamma)\alpha}} \\ 3) \sqrt{11-2\sqrt{30}} + \sqrt{7-2\sqrt{10}}, \quad \sqrt{3+8\sqrt{7+4\sqrt{3}}} + \\ + \sqrt{3+8\sqrt{7-4\sqrt{3}}} \end{aligned}$$

391) Νά εύρεθη ή τιμή του λ, ίνα ή παράστασις, $\forall x > 4$, $\psi = \sqrt{x+\lambda\sqrt{x-4}}$ δύναται νά τραπεί εις άπλα ριζικά.

392) Νά άποδειχθῇ ότι ή παράστασις $\psi = \sqrt{x+3\sqrt{2x-9}} - \sqrt{x-3\sqrt{2x-9}}$ ίσοῦται μὲν $\sqrt{2(2x-9)}$, αν $4,5 \leq x \leq 9$ και είναι άνεξάρτητος του x, αν $x > 9$.

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟΙ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ *

115. Όρισμός. Έξισωσις τις $\varphi(x) = 0$ καλεῖται άντιστροφος, δταν, έχουσα ώς ριζαν τὸν άριθμὸν $\varrho \neq \pm 1$, έχῃ ώς τοιαύτην και τὸν άριθμὸν $\frac{1}{\varrho}$ ($\varrho \neq 0$).

Βάσει τοῦ τεθέντος άρισμοῦ, μία άντιστροφος έξισωσις δὲν μεταβάλλεται, έαν άντι τοῦ x τεθῇ τὸ $\frac{1}{x}$, ($x \neq 0$).

Π.χ. ή έξισωσις $\alpha x^3 + \beta x^2 + \beta x + \alpha = 0$ είναι άντιστροφος 3ου βαθμοῦ, διότι αν άντι τοῦ x τεθῇ εις αύτὴν $\frac{1}{x}$ εύρισκομεν:

$$\alpha \cdot \frac{1}{x^3} + \beta \cdot \frac{1}{x^2} + \beta \cdot \frac{1}{x} + \alpha = 0 \Leftrightarrow \alpha + \beta x + \beta x^2 + \alpha x^3 = 0, \text{ ήτις είναι ή αύτὴ μὲν τὴν } \alpha x^3 + \beta x^2 + \beta x + \alpha = 0.$$

Άποδεικνύεται ότι : 'Αναγκαία και ίκανη συνθήκη, ίνα ή έξισωσις $\varphi(x) = 0$ είναι άντιστροφος, είναι οι συντελεσταὶ τῶν ὅρων αὐτῆς, οι ίσάκις τῶν ἄκρων ἀπέχοντες, νὰ είναι ίσοι ή άντιθετοι.

Εἰδικώτερον, έαν ή άντιστροφος στερῆται τῶν ριζῶν ± 1 , είναι άρτίου βαθμοῦ και οι συντελεσταὶ τῶν ὅρων αὐτῆς, οι ίσάκις τῶν ἄκρων ἀπέχοντες, είναι ίσοι.

Συμφώνως πρὸς τὰ άνωτέρω αι άντιστροφοι έξισώσεις β' έως και ε' βαθμοῦ είναι :

(*) Η έννοια τῆς άντιστροφου έξισώσεως διείλεται εἰς τὸν De Moivre (1667-1754).

$$\begin{array}{ll} \alpha x^2 + \beta x + \alpha = 0 & \alpha x^3 + \beta x^2 + \beta x + \alpha = 0 \\ \alpha x^4 + \beta x^3 + \gamma x^2 + \beta x + \alpha = 0 & \alpha x^3 + \beta x^2 - \beta x - \alpha = 0 \\ \alpha x^4 + \beta x^3 + \beta x + \alpha = 0 & \alpha x^5 + \beta x^4 + \gamma x^3 + \gamma x^2 + \beta x + \alpha = 0 \\ \alpha x^4 + \beta x^3 - \beta x - \alpha = 0 & \alpha x^5 + \beta x^4 + \gamma x^3 - \gamma x^2 - \beta x - \alpha = 0 \end{array}$$

‘Η λύσις τῶν ἀντιστρόφων ἔξισώσεων 3ου, 4ου καὶ 5ου βαθμοῦ δύναται ἐν γένει νὰ ἀναχθῇ εἰς τὴν λύσιν δευτεροβαθμίου ἔξισώσεως

116. ΕΠΙΛΥΣΙΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ

1. Ἐπίλυσις ἀντιστρόφων ἔξισώσεων 3ου καὶ 4ου βαθμοῦ μὲν ἐλλείποντα τὸν μεσαίον ὄρον.

Τὸ πρῶτον μέλος τῶν ἔξισώσεων αὐτῶν μετασχηματίζεται εὐκόλως εἰς γινόμενον παραγόντων.

α) Ἡ ἀντιστροφος $\alpha x^3 + \beta x^2 + \beta x + \alpha = 0$ ($\alpha, \beta \in \mathbb{R}$)

Έχομεν : $\alpha x^3 + \beta x^2 + \beta x + \alpha = 0 \Leftrightarrow \alpha(x^3 + 1) + \beta x(x + 1) = 0 \Leftrightarrow$
 $\Leftrightarrow (x + 1)[\alpha x^2 + (\beta - \alpha)x + \alpha] = 0$, ἵτις εἶναι ἴσοδύναμος πρὸς τὸ ζεῦγος τῶν ἔξισ. $x + 1 = 0$ καὶ $\alpha x^2 + (\beta - \alpha)x + \alpha = 0$, ἐξ οὗ ἔχομεν $x = -1$ καὶ ἄλλας δύο ρίζας ἀντιστρόφους ἐκ τῆς ἀντιστρόφου ἔξισώσεως $\alpha x^2 + (\beta - \alpha)x + \alpha = 0$

β) Ἡ ἀντιστροφος $\alpha x^3 + \beta x^2 - \beta x - \alpha = 0$ ($\alpha, \beta \in \mathbb{R}$)

Κατ’ ἀνάλογον τρόπον ἔχομεν $(x - 1)[\alpha x^2 + (\alpha + \beta)x + \alpha] = 0$, ἵτις δίδει : $x = 1$ καὶ ἄλλας δύο ρίζας ἀντιστρόφους.

γ) Ἡ ἀντιστροφος $\alpha x^4 + \beta x^3 - \beta x - \alpha = 0$ ($\alpha, \beta \in \mathbb{R}$)

Έχομεν : $\alpha x^4 + \beta x^3 - \beta x - \alpha = 0 \Leftrightarrow \alpha(x^4 - 1) + \beta x(x^2 - 1) = 0 \Leftrightarrow$
 $\Leftrightarrow (x^2 - 1)[\alpha x^2 + \beta x + \alpha] = 0$, ἵτις ἴσοδυναμεῖ πρὸς τὸ ζεῦγος τῶν ἔξισ. $x^2 - 1 = 0$ καὶ $\alpha x^2 + \beta x + \alpha = 0$, ἐξ οὗ ἔχομεν $x = \pm 1$ καὶ δύο ἄλλας ρίζας ἀντιστρόφους.

Σημ. Ἡ ἀντιστροφος $\alpha x^4 + \beta x^3 + \beta x + \alpha = 0$ λύεται, ὅπως ἡ πλήρης 4ου βαθμοῦ $\alpha x^4 + \beta x^3 + \gamma x^2 + \beta x + \alpha = 0$ κατωτέρω.

2. Ἐπίλυσις ἀντιστρόφων ἔξισ. 4ου καὶ 5ου βαθμοῦ.

α) Ἡ ἀντιστροφος $\alpha x^4 + \beta x^3 + \gamma x^2 + \beta x + \alpha = 0$ ($\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$)

Διαιροῦμεν ἀμφότερα τὰ μέλη διὰ x^2 , ($x \neq 0$), ὅπότε ἔχομεν $\alpha x^4 + \beta x^3 + \gamma x^2 + \beta x + \alpha = 0 \Leftrightarrow \alpha x^2 + \beta x + \gamma + \frac{\beta}{x} + \frac{\alpha}{x^2} = 0 \Leftrightarrow \alpha \left(x^2 + \frac{1}{x^2} \right) + \beta \left(x + \frac{1}{x} \right) + \gamma = 0$. Ἐκτελοῦμεν τὸν μετασχηματισμὸν $x + \frac{1}{x} = \omega$, ὅτε $x^2 + \frac{1}{x^2} = \left(x + \frac{1}{x} \right)^2 - 2x \cdot \frac{1}{x} = \omega^2 - 2$, καὶ δι’ ἀντικαταστάσεως λαμβάνομεν $\alpha(\omega^2 - 2) + \beta\omega + \gamma = 0 \Leftrightarrow \alpha\omega^2 + \beta\omega + \gamma - 2\alpha = 0$, ἵτις καλεῖται ἐπιλύουσα τῆς διθείσης ἔξισώσεως καὶ ἔχει ἐν γένει δύο ρίζας ω_1, ω_2 . Ἐπανερχόμενοι εἰς τὸν μετασχηματισμὸν $x + \frac{1}{x} = \omega$, λαμβάνομεν τὰς ἔξισώσεις : $x + \frac{1}{x} = \omega_1$ καὶ $x + \frac{1}{x} = \omega_2$ ἢ $x^2 - \omega_1 x + 1 = 0$ καὶ $x^2 - \omega_2 x + 1 = 0$, αἱ ὅποιαι δίδουν ἐν γένει ἀνὰ δύο ρίζας, καὶ συνεπῶς ἡ ἀντιστροφος 4ου βαθμοῦ ἔχει ἐν γένει 4 ρίζας.

Τό είδος τῶν 4 τούτων ριζῶν ἔξαρτάται ἐκ τοῦ εἰδους τῶν ριζῶν ω_1 , ω_2 τῆς ἐπιλυσούσης καὶ ἀκολούθως ἐκ τῆς διακρινούσης $\Delta_1 = \omega_1^2 - 4$ καὶ $\Delta_2 = \omega_2^2 - 4$ τῶν ἔξισώσεων $x^2 - \omega_1 x + 1 = 0$ καὶ $x^2 - \omega_2 x + 1 = 0$ ἀντιστοίχως.

Παράδειγμα: Νὰ ἐπιλυθῇ ἡ ἔξισώσης $6x^4 - 35x^3 + 62x^2 - 35x + 6 = 0$ Ἐπίλυσις: Διαιροῦμεν διὰ x^2 καὶ λαμβάνομεν διαδοχικῶς: $6x^4 - 35x^3 + 62x^2 - 35x + 6 = 0 \Leftrightarrow 6\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) - 35\left(x + \frac{1}{x}\right) + 62 = 0$, ἥτις διὰ $x + \frac{1}{x} = \omega$ $\Rightarrow x^2 + \frac{1}{x^2} = \omega^2 - 2$ γίνεται: $6\omega^2 - 35\omega + 50 = 0$, ἐξ ἣς ἔχομεν $\omega_1 = \frac{10}{3}$ καὶ $\omega_2 = \frac{5}{2}$. Οὕτως ἔχομεν τὰς ἔξισώσεις:

$$3x^2 - 10x + 3 = 0, \text{ ἐξ } \text{ἥς } \text{ἔχομεν } x_1 = 3 \text{ καὶ } x_2 = \frac{1}{3}$$

$$2x^2 - 5x + 2 = 0, \text{ ἐξ } \text{ἥς } \text{ἔχομεν } x_3 = 2 \text{ καὶ } x_4 = \frac{1}{2}$$

β) Ή ἀντίστροφος $\alpha x^5 + \beta x^4 + \gamma x^3 + \gamma x^2 + \beta x + \alpha = 0$ ($\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$)

Ἐχομεν: $\alpha x^5 + \beta x^4 + \gamma x^3 + \gamma x^2 + \beta x + \alpha = 0$

$$\alpha(x^5 + 1) + \beta x(x^3 + 1) + \gamma x^2(x + 1) = 0 \Leftrightarrow$$

$(x + 1)[\alpha(x^4 - x^3 + x^2 - x + 1) + \beta x(x^2 - x + 1) + \gamma x^2] = 0$, ἥτις εἶναι ἴσοδύναμος πρὸς τὸ ζεῦγος $x + 1 = 0$, $\alpha x^4 + (\beta - \alpha)x^3 + (\alpha - \beta + \gamma)x^2 + (\beta - \alpha)x + \alpha = 0$. Ή πρώτη δίδει $x = -1$. Ή δεύτερη εἶναι ἀντίστροφος 4ου βαθμοῦ καὶ ἐπιλύεται ὡς προηγουμένως.

γ) Ή ἀντίστροφος $\alpha x^5 + \beta x^4 + \gamma x^3 - \gamma x^2 - \beta x - \alpha = 0$ ($\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$)

Κατ' ἀνάλογον τρόπον ἔχομεν τὸ ζεῦγος τῶν ἔξισώσεων:

$$x - 1 = 0, \text{ ἐξ } \text{ἥς } x = 1 \text{ καὶ}$$

$\alpha x^4 + (\alpha + \beta)x^3 + (\alpha + \beta + \gamma)x^2 + (\alpha + \beta)x + \alpha = 0$, ἥτις πάλιν εἶναι ἀντίστροφος 4ου βαθμοῦ.

Γενικαὶ παρατηρήσεις. 1) Αἱ ἀντίστροφοι ἔξισώσεις ἀνωτέρου τοῦ 5ου βαθμοῦ δὲν δύνανται ἐν γένει νὰ ἐπιλυθοῦν δι' ἀναγωγῆς των εἰς δευτεροβαθμίους ἔξισώσεις.

2) Ό μετασχηματισμὸς $x + \frac{1}{x} = \omega$ ὑποβιβάζει ἐν γένει τὸν βαθμὸν μιᾶς ἀντιστρόφου ἔξισώσεως ἀρτίου βαθμοῦ εἰς τὸ ἥμισυ.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

393) Νὰ ἐπιλυθοῦν αἱ ἀκόλουθοι ἔξισώσεις :

$$1) 3x^3 + 13x^2 + 13x + 3 = 0, \quad x^3 - \frac{37}{12}x^2 + \frac{37}{12}x - 1 = 0$$

$$2) x^4 - 6x^3 + 6x - 1 = 0, \quad x^4 + x^3 - 4x^2 + x + 1 = 0$$

$$3) 2x^4 - 5x^3 + 7x^2 - 5x + 2 = 0,$$

$$4) x^6 - 4x^4 + 3x^3 + 3x^2 - 4x + 1 = 0, \quad 2x^5 - 3x^4 - 5x^3 + 5x^2 + 3x - 2 = 0$$

$$5) \frac{x^2 + 1}{x^2} = \frac{1}{(x - 1)^2}, \quad \frac{(1 + x)^4}{1 + x^4} = 2, \quad \frac{(x^2 - x + 1)^2}{x^4 - x^3 + x^2 - x + 1} = \frac{9}{13}$$

394) Νὰ ἐπιλυθοῦν αἱ ἀκόλουθοι ἔξισώσεις (μὴ ἀντίστροφοι):

$$1) 6x^4 + 25x^3 + 12x^2 - 25x + 6 = 0, \quad 2) x^6 + 2x^4 + 2x^2 + 1 = 0$$

$$3) 5x^4 - 16x^3 + 2x^2 + 16x + 5 = 0, \quad 4) x^4 + 2x^3 + 3x^2 + 4x + 4 = 0$$

$$395) \text{Νὰ ἐπιλυθῇ καὶ διερευνθῇ } \eta \text{ } x^3 + \lambda x^2 + \lambda x + 1 = 0 \text{ (λ} \in \mathbb{R}\text{).}$$

ΔΙΩΝΥΜΟΙ ΚΑΙ ΤΡΙΩΝΥΜΟΙ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

117. ΔΙΩΝΥΜΟΙ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ.

Όρισμός. Καλείται διώνυμος έξισωσης, ώστε πρός άγνωστον τὸν x , πᾶσα έξισωσης τῆς μορφής $Ax^k + Bx^\lambda = 0$, όπου A καὶ B πραγματικοὶ ἀριθμοὶ ἢ πραγματικαὶ παραστάσεις μὴ περιέχονται τὸν ἀγνωστον καὶ $k, \lambda \in N$.

$$\text{Αἱ ἔξισώσεις : } x^3 + 8 = 0, \quad x^4 - 81 = 0, \quad 27x^4 - 64x = 0, \\ 2x^3 - 3x^2 = 0 \text{ εἰναι διώνυμοι.}$$

Ἐπίλυσις τῆς ἔξισης $Ax^k + Bx^\lambda = 0$ ($A \neq 0$ καὶ $k > \lambda \in N$).

$$\text{Ἐχομεν: } Ax^k + Bx^\lambda = 0 \Leftrightarrow Ax^\lambda \left(x^{k-\lambda} + \frac{B}{A} \right) = 0 \Leftrightarrow x^\lambda \left(x^{k-\lambda} + \frac{B}{A} \right) = 0,$$

ἥτις εἰναι ἰσοδύναμος πρὸς τὸ ζεῦγος τῶν ἔξισώσεων $x^\lambda = 0, x^{k-\lambda} + \frac{B}{A} = 0$.

Ἐκ τῆς πρώτης $x^\lambda = 0$ ἔχομεν λ ρίζας ἵσας πρὸς 0, ($x_1 = x_2 = \dots = x_\lambda = 0$). Εἰναι δηλαδὴ τὸ 0 ρίζα λ βαθμοῦ πολλαπλότητος.

Ἡ δευτέρα ἔξισωσης, ἐὰν θέσωμεν $k - \lambda = v \in N$ καὶ $-\frac{B}{A} = \alpha$, γράφεται : $x^v = \alpha$.

Διακρίνομεν τὰς ἔξης περιπτώσεις :

α) Ἐάν ν ἄρτιος, τότε ἔχει δύο ρίζας πραγματικὰς ἀντιθέτους, ὅταν $\alpha > 0$ καὶ οὐδεμίαν πραγματικήν, ὅταν $\alpha < 0$

β) Ἐάν ν περιττός, τότε ἔχει πάντοτε μίαν μόνην πραγματικήν ρίζαν, θετικήν μὲν ὅταν $\alpha > 0$, ἀρνητικήν δὲ ὅταν $\alpha < 0$

Αἱ ὑπόλοιποι ρίζαι εἰναι καθαραὶ μιγαδικαί, τὴν εὔρεσιν τῶν ὅποιων θὰ ἔξετάσωμεν εἰς ἄλλην τάξιν. Ἐν τούτοις καὶ ἡμεῖς δυνάμεθα νὰ εὔρωμεν τὰς καθαρὰς μιγαδικὰς ρίζας, ὅταν δ ν λάβῃ μικρὰς τιμάς.

Παραδείγματα: Νὰ ἐπιλυθοῦν αἱ ἔξισώσεις :

$$1) \quad x^3 + 1 = 0, \quad 2) \quad x^4 + 16 = 0, \quad 3) \quad x^6 - 1 = 0, \quad 4) \quad x^5 - 5x^2 = 0$$

Ἐπίλυσις : 1) **Ἐχομεν :** $x^3 + 1 = 0 \Leftrightarrow (x + 1)(x^2 - x + 1) = 0$, ἥτις εἶναι ἰσοδύναμος πρὸς τὸ ζεῦγος $x+1=0$ καὶ $x^2 - x + 1 = 0$, ἔξ οὐ ἔχομεν $x_1 = -1$ καὶ $x_2 = \frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2}, x_3 = \frac{1}{2} - i \frac{\sqrt{3}}{2}$

2) **Ἐχομεν :** $x^4 + 16 = 0 \Leftrightarrow x^4 + 16 + 8x^2 - 8x^2 = 0 \Leftrightarrow (x^2 + 4)^2 - (2\sqrt{2}x)^2 = 0 \Leftrightarrow (x^2 + 2\sqrt{2}x + 4)(x^2 - 2\sqrt{2}x + 4) = 0$, ἥτις εἶναι ἰσοδύναμος πρὸς τὸ ζεῦγος $x^2 + 2\sqrt{2}x + 4 = 0$ καὶ $x^2 - 2\sqrt{2}x + 4 = 0$, ἔξ οὐ ἔχομεν τὰς ρίζας x_1, x_2, x_3, x_4 .

3) Τὴν ἔξισωσιν $x^6 - 1 = 0$ δυνάμεθα νὰ ἐπιλύσωμεν, ἐπιλύοντες μίαν ἐκ τῶν ἰσοδυνάμων τῆς :

$$\alpha) \quad (x^3 + 1)(x^3 - 1) = 0, \quad \text{ἥτις δίδει : } x^3 + 1 = 0, \quad x^3 - 1 = 0$$

$$\beta) \quad (x^2 - 1)(x^4 + x^2 + 1) = 0, \quad \text{ἥτις δίδει : } x^2 - 1 = 0, \quad x^4 + x^2 + 1 = 0$$

$$\gamma) \quad (x - 1)(x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1) = 0, \quad \text{ἥτις δίδει τὰς ἔξισώσεις } x - 1 = 0, \\ x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1 = 0 \text{ (ἀντίστροφος)}$$

$$4) \quad \text{Ἐχομεν : } x^5 - 5x^2 = 0 \Leftrightarrow x^2(x^3 - 5) = 0, \quad \text{ἥτις εἶναι ἰσοδύναμος πρὸς τὸ ζεῦγος } x^2 = 0 \text{ καὶ } x^3 - 5 = 0. \quad \text{Ἐκ τῆς } x^2 = 0 \text{ ἔχομεν } x_1 = x_2 = 0. \quad \text{Ἡ δευτέρα γράψεις : }$$

φεται $x^3 - (\sqrt[3]{5})^3 = 0 \Leftrightarrow (x - \sqrt[3]{5})(x^2 + \sqrt[3]{5}x + \sqrt[3]{25}) = 0$, ήτις ίσοδυναμεί πρός τὸ ζεῦγος τῶν ἔξισώσ. $x - \sqrt[3]{5} = 0$, $x^2 + \sqrt[3]{5}x + \sqrt[3]{25} = 0$, ἐξ οὗ ἔχομεν $x_1 = \sqrt[3]{5}$, $x_2 = \frac{\sqrt[3]{5}}{2}(-1 + i\sqrt{3})$, $x_3 = \frac{\sqrt[3]{5}}{2}(-1 - i\sqrt{3})$

118. ΤΡΙΩΝΥΜΟΙ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ. Καλεῖται τριώνυμος ἔξισωσις, ώς πρός ἓνα ἄγνωστον, πᾶσα ἔξισωσις τῆς μορφῆς $Ax^k + Bx^\lambda + \Gamma x^\mu = 0$, ὅπου A, B, Γ πραγματικοὶ ἀριθμοὶ ή πραγματικαὶ παραστάσεις μὴ περιέχονται τὸν ἄγνωστον καὶ $\kappa, \lambda, \mu \in N$.

Ἐνταῦθα ἐνδιαφέρει μόνον ἡ περίπτωσις, καθ' ἣν ἔχομεν $\kappa - \lambda = \lambda - \mu$, ὅταν εἴναι $\kappa > \lambda > \mu$, διότι τότε ἡ ἐπίλυσίς τῆς $Ax^k + Bx^\lambda + \Gamma x^\mu = 0$ ἀνάγεται εἰς τὴν ἐπίλυσιν τῆς ἔξισώσεως $Ax^{2v} + Bx^v + \Gamma = 0$, $v \in N$.

Ἐπίλυσις: Ἐὰν $\kappa - \lambda = \lambda - \mu = v \Rightarrow \lambda = \mu + v$, $\kappa = \mu + 2v$, δόπτε: $Ax^{\mu+2v} + Bx^{\mu+v} + \Gamma x^\mu = 0 \Leftrightarrow x^\mu(Ax^{2v} + Bx^v + \Gamma) = 0$, ἡτις εἴναι ίσοδύναμος πρός τὸ ζεῦγος $x^\mu = 0$, $Ax^{2v} + Bx^v + \Gamma = 0$. Ἡ $x^\mu = 0$ δίδει $x_1 = x_2 = \dots = x_\mu = 0$ ἥτοι ἔχει τὸ μηδὲν ρίζαν μυοστοῦ βαθμοῦ πολλαπλότητος.

Εἰς τὴν $Ax^{2v} + Bx^v + \Gamma = 0$, ἔὰν ἑκτελέσωμεν τὸν μετασχηματισμὸν $x^v = \psi$, λαμβάνομεν $A\psi^2 + B\psi + \Gamma = 0$, ἡτις καλεῖται ἐπιλύσυσα τῆς ἔξισώσεως καὶ ἔχει ἐν γένει δύο λύσεις ψ_1 καὶ ψ_2 . Ἐπανερχόμενοι εἰς τὸν μετασχηματισμὸν $x^v = \psi$, λαμβάνομεν τὰς διωνύμους ἔξισώσεις $x^v = \psi_1$ καὶ $x^v = \psi_2$.

Τὸ εἶδος τῶν ριζῶν τῆς τριωνύμου $Ax^{2v} + Bx^v + \Gamma = 0$ ἔξαρταται ἐκ τοῦ εἶδους τῶν ριζῶν τῆς ἐπιλυούσης αὐτῆς.

Παράδειγμα: Νὰ ἐπιλυθῇ ἡ ἔξισωσις $x^{10} - 26x^7 - 27x^4 = 0$

Ἐπίλυσις: Ἐχομεν $10 - 7 = 7 - 4$, ἄρα ἡ ἔξισωσις γράφεται: $x^4(x^6 - 26x^3 - 27) = 0$, ἡτις εἴναι ίσοδύναμος πρός τὸ ζεῦγος τῶν $x^4 = 0$, $(x_1 = x_2 = x_3 = x_4 = 0)$ καὶ $x^6 - 26x^3 - 27 = 0$, ἡτις διὰ $x^3 = \psi$ δίδει τὴν ἐπιλύσυσα $\psi^2 - 26\psi - 27 = 0$, τῆς δόποιας αἱ ρίζαι εἴναι $\psi_1 = 27$, $\psi_2 = -1$. Συνεπῶς ἔχομεν πρός ἐπίλυσιν τὰς διωνύμους ἔξισώσεις :

$$x^3 = 27 \Leftrightarrow (x - 3)(x^2 + 3x + 9) = 0. \text{ Ρίζαι } x_5 = 3, x_{6,7} = -\frac{3}{2} \pm \frac{3i\sqrt{3}}{2}$$

$$x^3 = -1 \Leftrightarrow (x + 1)(x^2 - x + 1) = 0. \text{ Ρίζαι } x_8 = -1, x_{9,10} = \frac{1}{2} \pm \frac{i\sqrt{3}}{2}$$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

396) Νὰ ἐπιλυθοῦν αἱ ἀκόλουθοι ἔξισώσεις :

$$1) x^3 - 8 = 0, \quad 8x^3 + 27 = 0, \quad 64x^6 - x^3 = 0, \quad x^5 - 81x = 0$$

$$2) x^5 - 32 = 0, \quad x^8 - 256 = 0, \quad x^6 \pm 729 = 0, \quad x^{12} - 1 = 0$$

$$3) x^{10} \pm 1 = 0, \quad x^8 \pm 1 = 0, \quad 3x^7 - 2x^4 = 0, \quad x^9 - x^6 + x^4 - 1 = 0$$

397) Νὰ ἐπιλυθοῦν αἱ ἀκόλουθοι ἔξισώσεις :

$$1) x^6 - 5x^3 - 24 = 0, \quad x^8 - 80x^4 - 81 = 0, \quad x^{10} + 31x^5 - 32 = 0$$

$$2) x^{12} - 33x^7 + 32x^2 = 0, \quad (x - 1)^6 - 9(x - 1)^3 + 8 = 0, \quad 2x^3 + \frac{3}{x^3} = 5$$

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΜΕ ΡΙΖΙΚΑ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΤΑΞΕΩΣ

119. ΟΡΙΣΜΟΣ. Καλείται έξισωσης μὲν ριζικὰ ή ἀρρητος έξισωσης, ώς πρὸς ἓνα ἄγνωστον, πᾶσα έξισωσης τῆς δόποιας τὸ ἐν τονάλχιστον μέλος εἶναι ἀρρητος ἀλγεβρικὴ παραστασις ώς πρὸς τὸν ἄγνωστον. Αἱ λύσεις μιᾶς ἀρρήτου έξισωσεως δέον νὰ ἀνήκουν εἰς τὸ πεδίον δρισμοῦ ὅλων τῶν ἀρρήτων παραστάσεων τῆς έξισώσεως. Εἰς τὰ ἐπόμενα ώς πεδίον δρισμοῦ θὰ λαμβάνεται ἐκεῖνο, τὸ δόποιον θὰ καθιστᾶ πραγματικὰς τὰς παραστάσεις τῆς έξισώσεως ἥτοι, ή ἐπίλυσης τῶν ἀρρήτων έξισώσεων θὰ γίνεται ἐν τῷ συνόλῳ R .

Κατὰ τὴν ἐπίλυσιν μιᾶς ἀρρήτου έξισωσεως ἐπιδιώκομεν τὴν ἀναγωγὴν αὐτῆς εἰς ρητὴν έξισωσιν, ἥτις δὲν εἶναι ἐν γένει ἰσοδύναμος τῆς ἀρρήτου έξισώσεως. Πρὸς τοῦτο, δέον νὰ ἔχωμεν ὑπὸ όψει τὰς ἀκολούθους προτάσεις :

1) Ἐὰν τὰ μέλη μιᾶς έξισώσεως $\varphi_1(x) = \varphi_2(x)$ ὑψώσωμεν εἰς ἀρτίαν δύναμιν, ή προκύπτουσα έξισωσης ἔχει ρίζας τὰς πραγματικὰς ρίζας τῆς ἀρχικῆς καὶ τὰς πραγματικὰς ρίζας $\varphi_1(x) = -\varphi_2(x)$.

2) Ἐὰν τὰ μέλη μιᾶς έξισώσεως $\varphi_1(x) = \varphi_2(x)$ ὑψώσωμεν εἰς περιττὴν δύναμιν, ή προκύπτουσα έξισωσης ἔχει πραγματικὰς ρίζας μόνον τὰς πραγματικὰς ρίζας τῆς ἀρχικῆς.

Αἱ προτάσεις αὐταὶ μᾶς ὑποχρεώνουν, ὅπως, μετὰ τὴν εὔρεσιν τῶν ριζῶν τῆς έξισώσεως, εἰς ἣν ἀγόμεθα κατόπιν διαδοχικῶν ὑψώσεων δι' ἔξαλειψιν τῶν ριζικῶν, γίνεται ἐπαλήθευσις ἦ, ὅπερ καὶ τὸ μεθοδικώτερον, γίνεται ἔλεγχος, ἐὰν αἱ ρίζαι ίκανοποιοῦν τοὺς τεθέντας περιορισμούς, οἱ δόποιοι έξασφαλίζουν τὸ δόμσημον τῶν μελῶν τῆς έξισώσεως καὶ καθιστοῦν τὰς παραστάσεις αὐτῆς πραγματικάς.

120. ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΜΕ ΡΙΖΙΚΑ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΤΑΞΕΩΣ

a) Τῆς μορφῆς (1) $\sqrt{A(x)} = B(x)$, ἐν R , ($A(x), B(x) \in Q$).

Πρέπει νὰ εἶναι $A(x) \geq 0 \Rightarrow \sqrt{A(x)} \geq 0$. Ἀρα διὰ νὰ ὑπάρχῃ λύσις, πρέπει $B(x) \geq 0$, δόποτε δι' ὑψώσεως εἰς τὸ τετράγωνον τῶν μελῶν λαμβάνομεν (2) $A(x) = [B(x)]^2 \Leftrightarrow [B(x)]^2 - (\sqrt{A(x)})^2 = 0$, ἥτις εἶναι ἰσοδύναμος πρὸς τὸ ζεῦγος $B(x) = \sqrt{A(x)}$ καὶ $B(x) = -\sqrt{A(x)}$. Ἀρα διὰ νὰ ἐπιλύσωμεν τὴν (1) ἀρκεῖ νὰ ἐπιλύσωμεν τὴν (2) καὶ ἐκ τῶν λύσεων νὰ ἀποκλεισθοῦν ἐκεῖναι, αἱ δόποιαι δὲν ίκανοποιοῦν τὸν περιορισμὸν $B(x) \geq 0$. Προφανῶς ἀποκλείονται αἱ λύσεις $B(x) = -\sqrt{A(x)}$, διότι καθιστοῦν τὸ $B(x) \leq 0$. Ἐκ τῶν ἀνωτέρω συνάγομεν ὅτι η έξισωσης (1) καὶ τὸ σύστημα $B(x) \geq 0$, $A(x) = [B(x)]^2$ ἔχουν τὰς αὐτὰς λύσεις.

Παράδειγμα. Νὰ ἐπιλυθῇ ἐν R η έξισωσης $2x - 3 = \sqrt{x^2 - 2x + 6}$

Ἐπίλυση. Τὸ ὑπόρριζον, ως ἔχον ρίζας καθαράς μιγαδικάς είναι μονίμως θετικόν. Πρέπει νὰ ἔχωμεν λοιπὸν $2x - 3 > 0 \Leftrightarrow x > \frac{3}{2}$ (περιορισμός). Ὅψοῦντες τὰ μέλη τῆς έξισης. εἰς τὸ τετράγωνον λαμβάνομεν:

$(2x - 3)^2 = x^2 - 2x + 6 \Leftrightarrow 3x^2 - 10x + 3 = 0$, έξι ουχί $x_1 = 3$, $x_2 = \frac{1}{3}$. Η λύσης $x^2 = \frac{1}{3}$ αποκλείεται, ώς μή πληρούσα τὸν περιορισμόν.

β) Τῆς μορφῆς (1) $\sqrt{A(x)} + \sqrt{B(x)} = \Gamma(x)$, ἐν R .

Αἱ A , B , Γ ρηταὶ συναρτήσεις τοῦ x .

Πρέπει νὰ εἰναι $A \geq 0$, $B \geq 0$, $\Gamma \geq 0$. Υψοῦντες εἰς τὸ τετράγωνον λαμβάνομεν: $A + B + 2\sqrt{AB} = \Gamma^2 \Leftrightarrow 2\sqrt{AB} = \Gamma^2 - A - B$ (2). ἀκολούθως πρέπει $\Gamma^2 - A - B \geq 0$ καὶ δι' ὑψώσεως ἐκ νέου τῶν μελῶν τῆς (2) εἰς τὸ τετράγωνον λαμβάνομεν τὴν ρητὴν ἔξισωσιν $4AB = (\Gamma^2 - A - B)^2$ (3). Ἐκ τῶν πραγματικῶν λύσεων τῆς 3 ὅσαι πληροῦν τοὺς περιορισμοὺς $A \geq 0$, $B \geq 0$, $\Gamma \geq 0$, $\Gamma^2 - A - B \geq 0$, εἰναι λύσεις τῆς (1).

Αἱ σχέσεις $A \geq 0$ καὶ $B \geq 0$ εἰναι ἀληθεῖς ἐφ' ὅσον εἰναι ἀληθεῖς αἱ ἄλλαι.

Πράγματι, ἡ (3) γράφεται: $4AB = \Gamma^4 - 2\Gamma^2(A + B) + (A + B)^2 \Leftrightarrow \Gamma^4 + (A - B)^2 = 2\Gamma^2(A + B)$. Τὸ α' μέλος τῆς ισότητος αὐτῆς εἰναι μὴ ἀρνητικόν. Ἐρα καὶ τὸ β' μέλος πρέπει νὰ εἰναι μὴ ἀρνητικόν. Ήτοι $2\Gamma^2(A + B) \geq 0$, έξι $A + B \geq 0$. Ἐπειδὴ δέ, ἐκ τῆς (3) ἔπειτα ὅτι $AB \geq 0$, ἀρα $A \geq 0$ καὶ $B \geq 0$.

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω συνάγομεν ὅτι ἡ ἔξισωσις (1) καὶ τὸ σύστημα

$$\begin{array}{l} \Gamma \geq 0 \\ \Gamma^2 - A - B \geq 0 \\ 4AB = (\Gamma^2 - A - B)^2 \end{array} \quad \left| \begin{array}{l} \text{ἔχουν τὰς αὐτὰς λύσεις} \end{array} \right.$$

Παράδειγμα: Νὰ ἐπιλυθῇ ἐν R ἡ ἔξιστος $\sqrt{x-8} + \sqrt{x-5} = 3$.

*Επίλυσις: Πρέπει $x-8 > 0$, $x-5 > 0$, έξι ὃν $x > 8$, $x > 5$. Υψοῦντες εἰς τὸ τετράγωνον λαμβάνομεν: $x-8 + x-5 + 2\sqrt{(x-8)(x-5)} = 9 \Leftrightarrow \sqrt{(x-8)(x-5)} = 11-x$, ἀκολούθως πρέπει $11-x \geq 0 \Leftrightarrow x \leq 11$ καὶ δι' ὑψώσεως ἐκ νέου εἰς τὸ τετράγωνον λαμβάνομεν τὴν ρητὴν ἔξισωσιν $(x-8)(x-5) = (11-x)^2 \Leftrightarrow 9x = 81$ ἢ $x = 9$. Οἱ περιορισμοὶ συναληθεύουν διὰ $8 < x \leq 11$. Ἐρα ἡ λύσις $x = 9$ εἰναι λύσις τῆς διθείσης ἔξισώσεως.

γ) Τῆς μορφῆς (1) $\sqrt{A(x)} + \sqrt{B(x)} = \sqrt{\Gamma(x)}$, ἐν R ($A, B, \Gamma \in Q$).

Διὰ τὰς ρητὰς συναρτήσεις τοῦ x , $A(x)$, $B(x)$ καὶ $\Gamma(x)$ διακρίνομεν τὰς ἔξιστος περιπτώσεις:

1) Εάν $A \geq 0$, $B \geq 0$, $\Gamma \geq 0$, τότε δι' ὑψώσεως εἰς τὸ τετράγωνον ἡ (1) γράφεται $A + B + 2\sqrt{AB} = \Gamma \Leftrightarrow 2\sqrt{AB} = \Gamma - (A + B)$. Ἀκολούθως ἔὰν $\Gamma - (A + B) \geq 0$, τότε ὑψοῦντες ἐκ νέου εἰς τὸ τετράγωνον, ἔχομεν τὴν ρητὴν ἔξισωσιν $4AB = [\Gamma - (A + B)]^2$ (2).

Ἐκ τῶν πραγματικῶν λύσεων τῆς (2), ὅσαι πληροῦν τοὺς περιορισμοὺς $A \geq 0$, $B \geq 0$, $\Gamma \geq 0$ καὶ $\Gamma - (A + B) \geq 0$, εἰναι λύσεις τῆς ἔξιστος (1).

*Ἐρα αἱ λύσεις τοῦ συστήματος εἰναι καὶ λύσεις τῆς (1) $\sum_1 : \begin{cases} A \geq 0, B \geq 0, \Gamma \geq 0 \\ \Gamma - (A + B) \geq 0 \\ 4AB = [\Gamma - (A + B)]^2 \end{cases}$

2) Εάν $A < 0$, $B < 0$, $\Gamma < 0$, τότε $-A > 0$, $-B > 0$, $-\Gamma > 0$, ἡ δὲ ἔξισωσις (1)

$$\text{γράφεται } i\sqrt{-A(x)} + i\sqrt{-B(x)} = i\sqrt{-\Gamma(x)} \Leftrightarrow \sqrt{-A} + \sqrt{-B} = \sqrt{-\Gamma} \quad (3).$$

‘Ψυοῦντες τὰ μέλη τῆς (3) εἰς τὸ τετράγωνον ἔχομεν $-A - B + 2\sqrt{AB} = -\Gamma$ $\Leftrightarrow 2\sqrt{AB} = A + B - \Gamma$. Ἀκολούθως ἐὰν $A + B - \Gamma > 0$, τότε ύψοῦντες ἐκ νέου εἰς τὸ τετράγωνον, ἔχομεν τὴν ρητὴν ἔξισωσιν $4AB = (A + B - \Gamma)^2$ ή $4AB = [\Gamma - (A + B)]^2$ (4).

Ἐκ τῶν πραγματικῶν λύσεων τῆς (4), δύσαι πληροῦν τοὺς περιορισμούς $A < 0$, $B < 0$, $\Gamma < 0$ καὶ $A + B - \Gamma > 0$, εἶναι λύσεις τῆς ἔξισης (1).

$$\text{Άρα αἱ λύσεις τοῦ συστήματος} \quad \sum_2 : \begin{cases} A < 0, B < 0, \Gamma < 0 \\ A + B - \Gamma > 0 \\ 4AB = [\Gamma - (A + B)]^2 \end{cases}$$

εἶναι καὶ λύσεις τῆς ἔξισης (1).

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω συνάζεται ὅτι ἡ ἔξισωσις (1) ἔχει ἐν R τὰς λύσεις τοῦ συστήματος Σ_1 καὶ τὰς λύσεις τοῦ συστήματος Σ_2 καὶ μόνον αὐτάς, διότι ἄλλαι περιπτώσεις διὰ τὰ A , B , Γ εἶναι ἀδύνατοι.

Παράδειγμα: Νὰ ἐπιλυθῇ ἐν R ἡ ἔξισωσις $\sqrt{x-8} + \sqrt{x-5} = \sqrt{3x-21}$

Ἐπίλυσις: Συμφώνως πρὸς τὰ ἀνωτέρω αἱ λύσεις τῆς διοθείσης ἔξισώσεως παρέχονται ἀπὸ τὸ σύστημα

$$\begin{cases} x-8 \geq 0, x-5 \geq 0, 3x-21 \geq 0, 3x-21-(x-8+x-5) \geq 0 \\ 4(x-8)(x-5) = [3x-21-(x-8+x-5)]^2 \end{cases} \quad (1)$$

$$\text{καὶ ἀπὸ τὸ} \quad \begin{cases} x-8 < 0, x-5 < 0, 3x-21 < 0, x-8+x-5-(3x-21) > 0 \\ 4(x-8)(x-5) = [3x-21-(x-8+x-5)]^2 \end{cases} \quad (2)$$

σύστημα

Ἐπίλυσις τοῦ συστήματος (1):

Ἐχομεν $x \geq 8$, $x \geq 5$, $x \geq 7$, $x \geq 8$

Ἡ ἔξισωσις τοῦ συστήματος μετά τὴν ἐκτέλεσιν τῶν πράξεων γίνεται: $x^2 - 12x + 32 = 0$, ἐξ ἣς $x_1 = 8$ καὶ $x_2 = 4$

Αἱ λύσεις τοῦ συστήματος λαμβάνονται ἐκ τοῦ ἀκολούθου πίνακος

x	$x-8$	$x-5$	$3x-21$	$3x-21-(x-8+x-5)$	$x^2-12x+32$	Λύσεις τοῦ συστήματος
$-\infty$	—	—	—	—	+	
4	—	—	—	—	0	
5	—	0	—	—	—	
7	—	+	—	—	—	
8	0	+	+	0	0	$x = 8$
$+\infty$	+	+	+	+	+	

Ἐπίλυσις τοῦ συστήματος (2):

Ἐπειδὴ $x-8+x-5-(3x-21) > 0 \Leftrightarrow 3x-21-(x-8+x-5) < 0$, αἱ

ἄλλαι δὲ ἀνισότητες καὶ ἡ ἔξισωσις εἶναι αἱ αὐταί, δυνάμεθα ἐκ τοῦ ἀνωτέρω πίνακος νὰ λάβωμεν τὰς λύσεις τοῦ συστήματος (2). Οὕτω αἱ λύσεις τοῦ συστήματος (2) εἶναι : $x = 4$

Ἐπομένως αἱ λύσεις τῆς διθείστης ἔξισώσεως εἶναι $x_1 = 8$, $x_2 = 4$ καὶ μόνον αὐταί.

δ) Περίπτωσις γενικὴ

Ἐάν ἡ ἔξισωσις ἔχῃ περισσότερα τῶν δύο ριζικῶν βασικῶν, τότε ἐπὶ τῇ βάσει περιορισμῶν, δι’ ἀλλεπαλλήλων ὑψώσεων εἰς τὸ τετράγωνον, λαμβάνομεν ρητὴν ἔξισωσιν, ἡ ὅποια θὰ περιέχῃ ὅλας τὰς λύσεις τῆς ἀρχικῆς καὶ ἄλλας ἀκόμη, ἐνδεχομένως, αἱ ὅποιαι δέον νὰ ἀποκλεισθοῦν, ὡς μὴ πληροῦσαι τοὺς περιορισμούς.

121. ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΜΕ ΡΙΖΙΚΑ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Βας ΤΑΞΕΩΣ

Αἱ ἔξισώσεις μὲν ριζικά ἀνωτέρας τῆς βασικῆς τάξεως παρουσιάζουν ποικιλίαν μορφῶν. Δὲν ὑπάρχει δὲ ἔνιαῖς τρόπος ἐπιλύσεως. Συνήθως ἀκολουθεῖται ἡ μέθοδος τῆς ὑψώσεως τῶν μελῶν τῆς ἀρρήτου ἔξισώσεως εἰς κατάλληλον δύναμιν, ὥστε ἡ προκύπτουσα ἔξισωσις νὰ περιέχῃ δλιγώτερα ριζικά.

Παραδείγματα : α) Νὰ ἐπιλυθῇ ἐν R ἡ ἔξιση. $\sqrt[3]{x^3 + 9x^2} = 3 + x$

Ἐπίλυσις: ‘Ψυοῦντες εἰς τὸν κύβον τὰ μέλη τῆς διθείστης ἔξισώσεως λαμβάνομεν: $x^3 + 9x^2 = (3 + x)^3 \Leftrightarrow x^3 + 9x^2 = 27 + 27x + 9x^2 + x^3 \Leftrightarrow x = -1$, ήτις εἶναι λύσις τῆς διθείστης ἔξισώσεως.

β) Νὰ ἐπιλυθῇ ἐν R ἡ ἔξισωσις $\sqrt[4]{8x^2 - 1} = 2x$.

Ἐπίλυσις: ‘Ψυοῦντες εἰς τὴν τετάρτην δύναμιν τὰ μέλη τῆς ἔξισώσεως λαμβάνομεν: $8x^2 - 1 = 16x^4 \Leftrightarrow 16x^4 - 8x^2 + 1 = 0$, ήτις ἔχει ρίζας $x_1 = x_3 = \frac{1}{2}$, $x_2 = x_4 = -\frac{1}{2}$. Ἐπειδὴ δὲ πρέπει $2x \geq 0 \Leftrightarrow x \geq 0$, ἀρα ἡ λύσις $x = -\frac{1}{2}$ δέον νὰ ἀποκλεισθῇ.

γ) Νὰ ἐπιλυθῇ ἡ ἔξισωσις $\sqrt[3]{A} + \sqrt[3]{B} + \sqrt[3]{\Gamma} = 0$, ὅπου A, B, Γ ρηταὶ συναρτήσεις τοῦ ἀγνώστου x .

Ἐπίλυσις: Εἰς τὸ κεφάλαιον «ταυτότητες» ἐμάθομεν ὅτι :

∀ $\alpha, \beta, \gamma \in R$: $\alpha + \beta + \gamma = 0 \Leftrightarrow \alpha = \beta = \gamma \Leftrightarrow \alpha^3 + \beta^3 + \gamma^3 = 3\alpha\beta\gamma$

Ἄρα ἐκ τῆς διθείστης ἐπεταί η $(\sqrt[3]{A})^3 + (\sqrt[3]{B})^3 + (\sqrt[3]{\Gamma})^3 = 3\sqrt[3]{AB\Gamma} \Leftrightarrow A + B + \Gamma = 3\sqrt[3]{AB\Gamma}$ καὶ δι’ ὑψώσεως εἰς τὸν κύβον η $(A + B + \Gamma)^3 = 27AB\Gamma$.

Ἄρα ἔχομεν :

Ἐάν $x \in R$: $\sqrt[3]{A} + \sqrt[3]{B} + \sqrt[3]{\Gamma} = 0 \Leftrightarrow (A + B + \Gamma)^3 = 27AB\Gamma$

Οὕτως ἡ ἔξισωσις ἐν R $\sqrt[3]{x-2} + \sqrt[3]{x-3} + \sqrt[3]{x-4} = 0$ εἶναι ίσοδύναμος τῆς

$(x-2+x-3+x-4)^3 = 27(x-2)(x-3)(x-4) \Leftrightarrow (3x-9)^3 = 27(x^3 - 9x^2 + 26x - 24) \Leftrightarrow (x-3)^3 = x^3 - 9x^2 + 26x - 24 \Leftrightarrow x = 3$, ήτις είναι λύσις της δοθείσης έξισώσεως.

AΣΚΗΣΕΙΣ

398) Να έπιλυθούν ἐν R αι ἀκόλουθοι έξισώσεις :

$$\begin{aligned} 1) 5\sqrt{x-3} &= \sqrt{x+9}, \quad \sqrt{x} + \sqrt{x+32} = 16 \\ 2) 2x &= 3 + \sqrt{x^2 - 2x + 6}, \quad \sqrt{2 + \sqrt{x-5}} = \sqrt{13-x}, \\ 3) \sqrt{5(x+2)} - \sqrt{x+1} &= \sqrt{x+6}, \quad \sqrt{x+1} + \sqrt{x-4} = \sqrt{2x+9} \\ 4) \sqrt{x-15} - \sqrt{x-10} &= \sqrt{x+6} - \sqrt{x+17}, \quad (x+3)\sqrt{x+2} = (x+2)\sqrt{x+5} \\ 5) \frac{4-\sqrt{x}}{2} &= \frac{\sqrt{4x+20}}{4+\sqrt{x}}, \quad \frac{\sqrt{x}-3}{\sqrt{x}+3} = \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-2}, \quad 2\sqrt{x} - \frac{x-8}{\sqrt{x}} = 6 \end{aligned}$$

399) Να έπιλυθούν ἐν R αι ἀκόλουθοι έξισώσεις :

$$\begin{aligned} 1) \sqrt[3]{x+49} - \sqrt[3]{x-49} &= 2, \quad \sqrt[3]{x+3} + \sqrt[3]{4-x} = 1 \\ 2) \sqrt[3]{x+2} + \sqrt[3]{2x+2} + \sqrt[3]{3x+2} &= 0, \quad \sqrt[3]{5x} - \sqrt[3]{x+1} - \sqrt[3]{x-1} = 0 \\ 3) \sqrt[3]{\frac{x+2}{x-3}} + \sqrt[3]{\frac{x-3}{x+2}} &= \frac{5}{2}, \quad \left(\frac{10x-1}{10x+1}\right) \sqrt[3]{\frac{2x+1}{1-2x}} = 1, \quad 4\sqrt[3]{x} - \frac{20}{\sqrt[3]{x}} = 11 \end{aligned}$$

400) Να έπιλυθῇ ἐν R ή έξισωσις

$$\sqrt{\alpha + \sqrt{x}} + \sqrt{\alpha - \sqrt{x}} = \sqrt{x}$$

ΑΠΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΑΘΜΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ

122. ΟΡΙΣΜΟΣ. Καλεῖται ἀνωτέρου τοῦ πρώτου βαθμοῦ ἐν σύστημα δύο ή περισσοτέρων έξισώσεων, ἐὰν μία τουλάχιστον τῶν έξισώσεων αὐτοῦ είναι βαθμοῦ ἀνωτέρου τοῦ πρώτου. Ταῦτα παρουσιάζουν μεγάλην ποικιλίαν μορφῶν καὶ ὡς ἐκ τούτου δὲν ὑπάρχει ένιαίος τρόπος ἔπιλυσεώς των.

Ἐνταῦθα ἀναφέρονται μερικαὶ ἀπλαῖ μορφαὶ συστημάτων, τὰ δόποια συχνὰ παρουσιάζονται καὶ εἰς τὴν ἔπιλυσιν τῶν δόποιών ἀνάγονται δυσκολώτεραι μορφαὶ συστημάτων.

Διὰ τὴν ἔπιλυσιν, ἐνὸς τοιούτου συστήματος χρησιμοποιοῦμεν ἐκτὸς τῶν μεθόδων ἔπιλύσεως γραμμικοῦ συστήματος καὶ ἄλλους εἰδικοὺς τρόπους (τεχνάσματα), μή ὑπαγομένους εἰς ὡρισμένους κανόνας, ἔπιδιώκοντες οὕτω τὴν εύρεσιν ἀπλουστέρων έξισώσεων.

123. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΥΟ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΜΕ ΔΥΟ ΑΓΝΩΣΤΟΥΣ.

$$a) \text{τῆς μορφῆς } ax + \beta\psi = \gamma, \quad Ax^2 + Bx\psi + \Gamma\psi^2 + \Delta x + E\psi + Z = 0$$

Ἡ ἔπιλυσις αὐτοῦ είναι εὔκολος, διότι ἐκ τῆς πρώτης λαμβάνομεν $x = \frac{\gamma - \beta\psi}{\alpha}$, δόποτε δι' ἀντικαταστάσεως εἰς τὴν δευτέραν ἀναγόμεθα εἰς δευτεροβάθμιον έξισωσιν ὡς πρὸς ψ (*).

(*). Τὸ σύστημα τοῦτο καλεῖται σύστημα βου βαθμοῦ, διότι ἔχει ἐν γένει δύο λύσεις

Παραδείγματα : 1) Νὰ ἐπιλυθῇ τὸ σύστημα $x + \psi = \alpha$, $x\psi = \beta$

$$\text{Ἐπίλυσις : } \begin{cases} x + \psi = \alpha \\ x\psi = \beta \end{cases} \iff \begin{cases} x = \alpha - \psi \\ (\alpha - \psi)\psi = \beta \end{cases} \iff \begin{cases} x = \alpha - \psi \\ \psi^2 - \alpha\psi + \beta = 0 \end{cases}$$

τὸ δποῖον εἶναι ἰσοδύναμον πρὸς τὸ ζεῦγος τῶν συστημάτων.

$$\begin{cases} x = \alpha - \psi \\ \psi = \rho_1 \end{cases}, \quad \begin{cases} x = \alpha - \psi \\ \psi = \rho_2 \end{cases}, \quad \text{ἐξ οὗ} \quad \begin{cases} x = \alpha - \rho_1 \\ \psi = \rho_1 \end{cases}, \quad \begin{cases} x = \alpha - \rho_2 \\ \psi = \rho_2 \end{cases}$$

ὅπου ρ_1, ρ_2 ρίζαι τῆς ἔξισ. $\psi^2 - \alpha\psi + \beta = 0$

2) Νὰ ἐπιλυθῇ τὸ σύστημα $x + \psi = \alpha$, $x^2 + \psi^2 = \beta^2$

$$\text{Ἐπίλυσις : 1ος τρόπος. } \text{Ἐχομεν} \begin{cases} x + \psi = \alpha \\ x^2 + \psi^2 = \beta^2 \end{cases} \iff \begin{cases} x = \alpha - \psi \\ (\alpha - \psi)^2 + \psi^2 = \beta^2 \end{cases} \iff$$

$$\iff \begin{cases} x = \alpha - \psi \\ 2\psi^2 - 2\alpha\psi + \alpha^2 - \beta^2 = 0 \end{cases}, \quad \text{τὸ δποῖον ἐπιλύεται ὡς προηγουμένως}$$

$$2ος τρόπος \begin{cases} x + \psi = \alpha \\ x^2 + \psi^2 = \beta^2 \end{cases} \iff \begin{cases} x + \psi = \alpha \\ (x + \psi)^2 - 2x\psi = \beta^2 \end{cases} \iff \begin{cases} x + \psi = \alpha \\ \alpha^2 - 2x\psi = \beta^2 \end{cases} \iff$$

$$\iff \begin{cases} x + \psi = \alpha \\ x\psi = \frac{\alpha^2 - \beta^2}{2} \end{cases}, \quad \text{τὸ δποῖον εἶναι τῆς μορφῆς τοῦ παραδ. (1).}$$

$$3) \text{Νὰ ἐπιλυθῇ τὸ σύστημα } \begin{cases} 3x^2 - 4x\psi + \psi^2 - 2x + \psi + 1 = 0 \\ x + 3\psi = 7 \end{cases}$$

Ἐπίλυσις : Ἐχομεν :

$$\begin{cases} 3(7 - 3\psi)^2 - 4(7 - 3\psi)\psi + \psi^2 - 2(7 - 3\psi) + \psi + 1 = 0 \\ x = 7 - 3\psi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 40\psi^2 - 147\psi + 134 = 0 \\ x = 7 - 3\psi \end{cases}$$

τὸ δποῖον εἶναι ἰσοδύναμον

$$\text{πρὸς τὸ ζεῦγος τῶν συστημάτων } \begin{cases} \psi = 2 \\ x = 1 \end{cases} \quad \text{καὶ} \quad \begin{cases} \psi = 67/40 \\ x = 79/40 \end{cases}$$

$$\beta) \text{ τῆς μορφῆς } \begin{cases} \alpha_1 x^2 + \beta_1 x\psi + \gamma_1 \psi^2 + \delta_1 x + \epsilon_1 \psi + \zeta_1 = 0 \\ \alpha_2 x^2 + \beta_2 x\psi + \gamma_2 \psi^2 + \delta_2 x + \epsilon_2 \psi + \zeta_2 = 0 \end{cases}$$

Ἡ ἐπίλυσις τοῦ συστήματος αὐτοῦ ἔξαρτᾶται ἐν γένει ἀπὸ τὴν ἐπίλυσιν μιᾶς ἔξισώσεως ἀνωτέρου τοῦ βου βαθμοῦ, τὴν δποίαν δὲν δυνάμεθα πάντοτε νὰ ἐπιτύχωμεν. Εἰς εἰδικάς δύμας περιπτώσεις δυνάμεθα νὰ ἐπιλύσωμεν τὸ σύστημα, ὡς τοῦτο καθίσταται φανερὸν ἐκ τῶν κάτωθι παραδειγμάτων :

Παραδείγματα : 1) Νὰ ἐπιλυθῇ τὸ σύστημα : $\begin{cases} x^2 + 4\psi^2 = 52 \\ x\psi = 12 \end{cases}$

Ἐπίλυσις :

$$\text{Ἐχομεν } \begin{cases} x^2 + 4\psi^2 = 52 \\ x\psi = 12 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + (2\psi)^2 = 52 \\ 4x\psi = 48 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (x + 2\psi)^2 = 100 \\ x\psi = 12 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x + 2\psi = \pm 10 \\ x\psi = 12 \end{cases}, \quad \text{τὸ δποῖον εἶναι ἰσοδύναμον πρὸς τὸ ζεῦγος τῶν}$$

$$\text{συστημάτων } \begin{cases} x + 2\psi = 10 \\ x\psi = 12 \end{cases} (1), \quad \begin{cases} x + 2\psi = -10 \\ x\psi = 12 \end{cases} (2). \quad \text{Αἱ λύσεις τοῦ}$$

συστήματος (1) είναι $(x, \psi) = (4, 3)$ ή $(x, \psi) = (6, 2)$ και τού συστήματος (2) είναι $(x, \psi) = (-4, -3)$ ή $(x, \psi) = (-6, -2)$

*Άρα αἱ λύσεις τοῦ δοθέντος συστήματος είναι: $\begin{array}{c|ccccc} x & | & -4 & | & 4 & | & -6 & | & 6 \\ \psi & | & -3 & | & 3 & | & -2 & | & 2 \end{array}$

2) Νὰ ἐπιλυθῇ τὸ σύστημα $\begin{cases} 3x^2 + 3\psi^2 - 11x - 7\psi + 10 = 0 \\ x^2 + \psi^2 - 4x - 3\psi + 5 = 0 \end{cases}$

*Ἐπίλυσις: *Ἐχομεν:

$$\begin{cases} 3x^2 + 3\psi^2 - 11x - 7\psi + 10 = 0 \\ x^2 + \psi^2 - 4x - 3\psi + 5 = 0 \end{cases} \left| \begin{array}{c} 1 \\ -3 \end{array} \right. \Leftrightarrow \begin{cases} 3x^2 + 3\psi^2 - 11x - 7\psi + 10 = 0 \\ -3x^2 - 3\psi^2 + 12x + 9\psi - 15 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x + 2\psi - 5 = 0 \\ x^2 + \psi^2 - 4x - 3\psi + 5 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 5 - 2\psi \\ (5 - 2\psi)^2 + \psi^2 - 4(5 - 2\psi) - 3\psi + 5 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 5 - 2\psi \\ 5\psi^2 - 15\psi + 10 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 5 - 2\psi \\ \psi^2 - 3\psi + 2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 5 - 2\psi \\ \psi = 2 \end{cases} \text{ καὶ } \begin{cases} x = 5 - 2\psi \\ \psi = 1 \end{cases}$$

Ἐξῶν ἔχομεν τὰς λύσεις $(x, \psi) = (1, 2)$ καὶ $(x, \psi) = (3, 1)$

γ) τῆς μορφῆς $\begin{cases} \alpha_1 x^2 + \beta_1 x\psi + \gamma_1 \psi^2 = \delta_1 & (\delta_1 \neq 0) \\ \alpha_2 x^2 + \beta_2 x\psi + \gamma_2 \psi^2 = \delta_2 & (\delta_2 \neq 0) \end{cases}$

Τὰ πρῶτα μέλη τῶν ἔξισώσεων τοῦ συστήματος είναι πολυώνυμα ὁμογενῆ βου βαθμοῦ, τὰ δὲ δεύτερα μέλη σταθεροὶ ἀριθμοὶ διάφοροι τοῦ μηδενός. Ταῦτα καλοῦνται ὁμογενῆ συστήματα.

Διὰ τὴν ἐπίλυσιν αὐτῶν ἔκτελούμεν τὸν μετασχηματισμὸν $x = \lambda\psi$ ($\psi \neq 0$). Οὕτω λαμβάνομεν :

$$\begin{cases} \alpha_1 \lambda^2 \psi^2 + \beta_1 \lambda \psi^2 + \gamma_1 \psi^2 = \delta_1 \\ \alpha_2 \lambda^2 \psi^2 + \beta_2 \lambda \psi^2 + \gamma_2 \psi^2 = \delta_2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \psi^2 (\alpha_1 \lambda^2 + \beta_1 \lambda + \gamma_1) = \delta_1 \\ \psi^2 (\alpha_2 \lambda^2 + \beta_2 \lambda + \gamma_2) = \delta_2 \end{cases},$$

ἀκολούθως διαιροῦμεν τὰς ἔξισώσεις κατὰ μέλη, ὅτε ἔχομεν

$$\frac{\alpha_1 \lambda^2 + \beta_1 \lambda + \gamma_1}{\alpha_2 \lambda^2 + \beta_2 \lambda + \gamma_2} = \frac{\delta_1}{\delta_2} \Leftrightarrow (\alpha_1 \delta_2 - \alpha_2 \delta_1) \lambda^2 + (\beta_1 \delta_2 - \beta_2 \delta_1) \lambda + (\gamma_1 \delta_2 - \gamma_2 \delta_1) = 0,$$

ἥτις δίδει $\lambda = \lambda_1$ ή $\lambda = \lambda_2$. Ἐπανερχόμενοι εἰς τὸν μετασχηματισμόν, ἔχομεν πρὸς ἐπίλυσιν τὰ συστήματα :

$$\begin{cases} x = \lambda_1 \psi \\ \alpha_1 x^2 + \beta_1 x\psi + \gamma_1 \psi^2 = \delta_1 \end{cases}, \quad \begin{cases} x = \lambda_2 \psi \\ \alpha_1 x^2 + \beta_1 x\psi + \gamma_1 \psi^2 = \delta_1 \end{cases}, \text{ τῶν ὅποιων ἡ ἐπίλυσις είναι γνωστή.}$$

Παράδειγμα: Νὰ ἐπιλυθῇ τὸ σύστημα $\begin{cases} x^2 - 3x\psi + 2\psi^2 = 2 \\ 2x^2 + x\psi - \psi^2 = 20 \end{cases}$

Θέτομεν $x = \lambda\psi$ καὶ ἔχομεν :

$$\begin{cases} \lambda^2 \psi^2 - 3\lambda \psi^2 + 2\psi^2 = 2 \\ 2\lambda^2 \psi^2 + \lambda \psi^2 - \psi^2 = 20 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \psi^2 (\lambda^2 - 3\lambda + 2) = 2 \\ \psi^2 (2\lambda^2 + \lambda - 1) = 20 \end{cases}, \text{ ἀκολούθως}$$

$$\text{διαιρούμεν τάς έξισώσεις κατά μέλη, ότε } \frac{\lambda^2 - 3\lambda + 2}{2\lambda^2 + \lambda - 1} = \frac{1}{10} \Leftrightarrow 8\lambda^2 - 31\lambda + 21 = 0, \text{ έξι } \lambda_1 = 3, \lambda_2 = \frac{7}{8}.$$

Ούτως έχομεν πρός έπιλυσιν τὰ συστήματα:

$$\left\{ \begin{array}{l} \{ x = 3\psi \\ \{ x^2 - 3x\psi + 2\psi^2 = 2 \end{array} \right. \quad (1), \quad \left\{ \begin{array}{l} x = \frac{7}{8}\psi \\ x^2 - 3x\psi + 2\psi^2 = 2 \end{array} \right. \quad (2)$$

Αἱ λύσεις τοῦ συστήματος (1) εἰναι $(x, \psi) = (3, 1), (x, \psi) = (-3, -1)$ καὶ τοῦ συστήματος (2) εἰναι $(x, \psi) = \left(\frac{7\sqrt{2}}{3}, \frac{8\sqrt{2}}{3}\right), (x, \psi) = \left(-\frac{7\sqrt{2}}{3}, -\frac{8\sqrt{2}}{3}\right)$

δ) Συστήματα συμμετρικά.

Ἐν σύστημα καλεῖται συμμετρικόν, ως πρὸς τοὺς ἀγνώστους του, ὅταν ὅλαι αἱ ἔξισώσεις αὐτοῦ εἰναι συμμετρικαὶ ως πρὸς τοὺς ἀγνώστους.

π.χ. τὰ συστήματα $\left| \begin{array}{l} x + \psi = \alpha \\ x\psi = \beta \end{array} \right| \left| \begin{array}{l} x^2 + \psi^2 = \alpha \\ x\psi = \beta \end{array} \right| \left| \begin{array}{l} x^2 + \psi^2 + x + \psi = \alpha \\ x + \psi + x\psi = \beta \end{array} \right.$

Διὰ τὴν ἐπίλυσιν αὐτῶν δὲν ὑπάρχει ἔνιαῖος τρόπος.

Συνήθως χρησιμοποιοῦμεν βιοθητικοὺς ἀγνώστους, ως φαίνεται εἰς τὸ κάτωθι παράδειγμα.

Παράδειγμα : 1) Νὰ ἐπιλυθῇ τὸ σύστημα $\left| \begin{array}{l} x^2 + \psi^2 + x + \psi = \alpha \\ x + \psi + x\psi = \beta \end{array} \right.$

Ἐπίλυσις : Θέτομεν δῆπον $x + \psi = \varphi$ καὶ $x\psi = \omega$, διόποτε τὸ σύστημα (1) γράφεται $\varphi^2 - 2\omega + \varphi = \alpha$
 $\varphi + \omega = \beta$

Τοῦτο ἐπιλύεται ως τὰ συστήματα τῆς μορφῆς (α) καὶ δίδει τὰς λύσεις $\varphi = \kappa_1$ καὶ $\varphi = \kappa_2$. ^{x + \psi = \kappa_1} Άρα προκύπτουν πρὸς ἐπίλυσιν τὰ συστήματα ^{x\psi = \lambda_1}
 $\omega = \lambda_1$ καὶ $\omega = \lambda_2$.

καὶ $x + \psi = \kappa_2$, τῶν δῆποιων ἡ λύσις εἰναι γνωστή.
 $x\psi = \lambda_2$

124. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ.

a) Ὅταν ἡ μία μόνον ἔξισωσις εἰναι δευτεροβάθμιος καὶ ὅλαι αἱ ἄλλαι πρωτοβάθμιοι.

Εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν ἐπιλύομεν τὸ σύστημα τῶν πρωτοβάθμιων ἔξισώσεων, θεωροῦντες ἔνα τῶν ἀγνώστων ως γνωστὸν καὶ ὀκολούθως ἀντικαθιστῶμεν εἰς τὴν δευτεροβάθμιον ἔξισωσιν, τὴν δῆποιαν ἐπιλύομεν.

Παράδειγμα : Νὰ ἐπιλυθῇ τὸ σύστημα $\Sigma : \left\{ \begin{array}{l} 2x^2 + \psi^2 - 4x\omega - 2\psi\omega + 3x - 4\psi - 13 = 0 \\ 5x - \psi - \omega = 2 \\ 7x - 3\psi + \omega = -6 \end{array} \right.$

Ἐπίλυσις : Θεωροῦντες τὸν ω ως γνωστὸν ἐπιλύομεν τὸ σύστημα τῆς δευτέρας καὶ τρίτης ἔξισώσεως. Ούτως έχομεν τὴν λύσιν $(x, \psi) = \left(\frac{3+\omega}{2}, \frac{11+3\omega}{2}\right)$. Τὰς τιμὰς τῶν x καὶ ψ ἀντικαθιστῶμεν εἰς τὴν πρώτην ἔξισωσιν καὶ έχομεν

$$2 \left(\frac{3+\omega}{2} \right)^2 + \left(\frac{11+3\omega}{2} \right)^2 - 4 \cdot \frac{3+\omega}{2} \cdot \omega - 2 \cdot \frac{11+3\omega}{2} \cdot \omega + 3 \cdot \frac{3+\omega}{2} - 4 \cdot \frac{11+3\omega}{2} - 13 = 0 \Leftrightarrow 9\omega^2 + 8\omega - 17 = 0, \text{ εξ } \omega_1 = 1, \omega_2 = -\frac{17}{9}.$$

*Επομένως : διά ω = 1 έχομεν (x, ψ) = (2, 7) και

$$\text{διά } \omega = -\frac{17}{9} \text{ έχομεν } (x, \psi) = \left(\frac{5}{9}, \frac{8}{3} \right).$$

$$*\text{Αρα αἱ λύσεις τοῦ συστήματος } \Sigma \text{ εἰναι : } \begin{cases} (x, \psi, \omega) = (2, 7, 1) \\ (x, \psi, \omega) = \left(\frac{5}{9}, \frac{8}{3}, -\frac{17}{9} \right) \end{cases}$$

β) "Οταν περισσότεραι τῆς μιᾶς ἔξισώσεις ειναι δευτεροβάθμιοι (ἢ καὶ ὅλαι) καὶ αἱ ἄλλαι πρωτοβάθμιοι.

Εις τὴν περίπτωσιν αὐτὴν δὲν ὑπάρχει ἐνιαῖος τρόπος ἐπιλύσεως.

Παραδείγματα : 1) Να λυθῇ τὸ σύστημα : $\begin{cases} x + \psi + \omega = \alpha & (1) \\ x^2 + \psi^2 + \omega^2 = \beta^2 & (2) \\ x\psi = \gamma^2 & (3) \end{cases}$

Λύσις : Ἡ (1) γράφεται

$x + \psi = \alpha - \omega$. "Ψυοῦμεν τὰ μέλη της εἰς τὸ τετράγωνον καὶ λαμβάνοντες ὑπὸ σκψιν τὰς (2) καὶ (3) έχομεν διαδοχικῶς $x^2 + \psi^2 + 2x\psi = \alpha^2 + \omega^2 - 2\alpha\omega$, $\beta^2 - \omega^2 + 2\gamma^2 = \alpha^2 + \omega^2 - 2\alpha\omega \Leftrightarrow 2\omega^2 - 2\alpha\omega + \alpha^2 - \beta^2 - 2\gamma^2 = 0$, τῆς δποίας αἱ ρίζαι έστω ω_1 καὶ ω_2 . Οὕτως, αἱ ἔξισώσεις (1) καὶ (3) δίδουν τὰ συστήματα :

$$\begin{cases} x + \psi = \alpha - \omega_1 \\ x\psi = \gamma^2 \\ \omega = \omega_1 \end{cases}, \quad \begin{cases} x + \psi = \alpha - \omega_2 \\ x\psi = \gamma^2 \\ \omega = \omega_2 \end{cases}$$

τὰ δποία λυόμενα μᾶς δίδουν τὰς λύσεις τοῦ ἀρχικοῦ.

2) Να λυθῇ τὸ σύστημα $\begin{cases} (1) \\ \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}^+ \\ (2) \\ (3) \end{cases} \quad \begin{cases} x(x + \psi + \omega) + \psi\omega = \alpha^2 \\ \psi(x + \psi + \omega) + \omega x = \beta^2 \\ \omega(x + \psi + \omega) + x\psi = \gamma^2 \end{cases}$

Λύσις : τὸ σύστημα γράφεται :

$$(x + \psi)(x + \omega) = \alpha^2, (\psi + \omega)(\psi + x) = \beta^2, (\omega + x)(\omega + \psi) = \gamma^2 \quad (4)$$

Πολ/ζομεν κατὰ μέλη καὶ έχομεν $(x + \psi)^2(\omega + \psi)^2(\omega + x)^2 = \alpha^2\beta^2\gamma^2 \Rightarrow (x + \psi)(\omega + \psi)(\omega + x) = \pm \alpha\beta\gamma$. Διαιροῦμεν τὴν ἔξισωσιν αὐτὴν διαδοχικῶς διὰ τῶν (4) καὶ έχομεν: $x + \psi = \pm \frac{\alpha\beta}{\gamma}$, $\psi + \omega = \pm \frac{\beta\gamma}{\alpha}$, $\omega + x = \pm \frac{\alpha\gamma}{\beta}$

Οὕτως έχομεν πρὸς ἐπίλυσιν τὰ συστήματα :

$$(5) \quad \{ x + \psi = \alpha\beta/\gamma, \psi + \omega = \beta\gamma/\alpha, \omega + x = \alpha\gamma/\beta \}$$

$$(6) \quad \{ x + \psi = -\alpha\beta/\gamma, \psi + \omega = -\beta\gamma/\alpha, \omega + x = -\alpha\gamma/\beta \}$$

Σημείωσις. Τὰ ἔξιτασθέντα ἀνωτέρω παραδείγματα παρέχουν μόνον μίαν δπλήν ίδεαν τῶν εἰδικῶν μεθόδων, αἱ δποίαι χρησμοποιοῦνται διὰ τὴν ἐπίλυσιν συστημάτων ἀνωτέρου τοῦ πρώτου βαθμοῦ καὶ κατ' ἀκολουθίαν οἱ μαθηταὶ πρέπει νὰ κάμουν μακράν ἔξασκησιν εἰς μεγάλον ἀριθμὸν ἀσκήσεων, διὰ νὰ δυνηθοῦν νὰ ἀποκτήσουν κάποιαν εὐχέρειαν.

Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ

Όμιλος α'

401) Νὰ ἐπιλυθοῦν τὰ ἀκόλουθα συστήματα :

$$1) \begin{cases} x + \psi = 2 \\ 4x\psi = 3 \end{cases} \quad 2) \begin{cases} x^2 + 2x\psi - \psi^2 + 4x - 6\psi + 7 = 0, \\ 2x + \psi = 4 \end{cases}$$

$$3) \begin{cases} x/5 + \psi/5 = 1 \\ 7x^2 + 5x\psi - 3\psi^2 - 2x - 27 = 0 \end{cases} \quad 4) \begin{cases} x^2 + \psi^2 = 157 \\ x\psi = 66 \end{cases} \quad 5) \begin{cases} x^2 - x\psi = 14 \\ x\psi - \psi^2 = 10 \end{cases}$$

$$6) \begin{cases} x^2 + \psi^2 + x + \psi = 62 \\ (x - \psi)(x + \psi + 1) = 50 \end{cases} \quad 7) \begin{cases} 3x^2 + 3\psi^2 - 11x - 7\psi + 10 = 0 \\ x^2 + \psi^2 - 4x - 3\psi + 5 = 0 \end{cases}$$

$$8) \begin{cases} (x + \psi)^2 - 3(x + \psi) = 10 \\ 9x^2 - 5x - 7\psi = 25 \end{cases} \quad 9) \begin{cases} x^2 + 2x\psi - \psi^2 = 1 \\ 3x^2 - 3x\psi + 5\psi^2 = 17 \end{cases}$$

$$10) \begin{cases} x^2 + x\psi - \psi^2 = -4 \\ (8x - \psi)(x + 2\psi) = -36 \end{cases}$$

Όμιλος β'

402) Νὰ ἐπιλυθοῦν τὰ ἀκόλουθα συστήματα :

$$1) \begin{cases} x + \psi - 2\omega = 6 \\ 2x - \psi = -1 \\ 2x^2 + x\psi + \omega^2 - 4\omega = 10 \end{cases} \quad 2) \begin{cases} x + \psi + \omega = 6 \\ x^2 + \psi^2 = 2\omega^2 - 13 \\ x\psi = 2 \end{cases}$$

$$3) \begin{cases} x^2 + z^2 = 46 + \psi^2 \\ x + \psi - z = 14 \\ x^2 = 9 \end{cases} \quad 4) \begin{cases} x^2 + \psi^2 + \omega^2 = 84 \\ x + \psi + \omega = 14 \\ x\omega = \psi^2 \end{cases} \quad 5) \begin{cases} x(x + \psi + \omega) + \psi\omega = 21 \\ \psi(x + \psi + \omega) + \omega x = 18 \\ \omega(x + \psi + \omega) + x\psi = 42 \end{cases}$$

$$6) \begin{cases} x(x + \psi + \omega) = \alpha^2 \\ \psi(x + \psi + \omega) = \beta^2 \\ \omega(x + \psi + \omega) = \gamma^2 \end{cases} \quad 7) \begin{cases} x(\psi + \omega) = \alpha^2 \\ \psi(x + \omega) = \beta^2 \\ \omega(x + \psi) = \gamma^2 \end{cases}$$

Όμιλος γ'

403) Νὰ ἐπιλυθοῦν τὰ ἀκόλουθα συστήματα :

$$1) \begin{cases} \sqrt{x} + \sqrt{\psi} = 11 \\ x + \psi = 65 \end{cases} \quad 2) \begin{cases} x^3 + \psi^3 = 19 \\ x + \psi = 1 \end{cases}$$

$$3) \begin{cases} x^3 - \psi^3 = 37 \\ x^2 + x\psi + \psi^2 = 37 \end{cases} \quad 4) \begin{cases} x + \psi - 2\sqrt{x\psi} = \sqrt{x} - \sqrt{\psi} \\ \sqrt{x} + \sqrt{\psi} = 5 \end{cases} \quad 5) \begin{cases} x\psi = \alpha^2 \\ \psi\omega = \beta^2 \\ \omega x = \gamma^2 \end{cases}$$

$$6) \begin{cases} x\psi z = 6 \\ z\omega x = 12 \\ \psi z\omega = 8 \\ \omega x\psi = 24 \end{cases} \quad 7) \begin{cases} (x + \psi)(x^3 + \psi^3) = 432 \\ x^2 + \psi^2 = 20 \end{cases}$$

**ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΥΟΜΕΝΑ ΔΙ' ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΒΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ**

125. ΟΡΙΣΜΟΣ. "En πρόβλημα θὰ καλῆται πρόβλημα ἀνωτέρου τοῦ πρώτου βαθμοῦ ἐὰν ἡ λύσις τοῦ ἀνάγεται εἰς τὴν ἐπίλυσιν μιᾶς ἐξισώσεως μὲν ἔνα ἄγνωστον βούν βαθμοῦ, ἢ εἰς τὴν ἐπίλυσιν ἐνὸς συστήματος ἐξισώσεων ἀνωτέρου τοῦ πρώτου βαθμοῦ. Διὰ τὴν λύσιν ἐνὸς τοιούτου προβλήματος, δέον νὰ ἔχωμεν ὑπ' ὅψιν τὰ εἰς τὴν προτιγούμενην τάξιν ἀναφερθέντα διὰ τὰ προβλήματα αὐτοῦ βαθμοῦ."

- "Ητοι: α) Έκλεγομεν τὸν ἀγνωστον ἢ τοὺς ἀγνώστους τοῦ προβλήματος.
 (β) Καταστρώνομεν τὴν ἔξισωσιν ἢ τὰς ἔξισώσεις τοῦ προβλήματος.
 (γ) Θέτομεν τοὺς περιορισμούς τῶν ἀγνώστων, τοὺς πηγάζοντας
 ἀπὸ τὴν φύσιν τοῦ προβλήματος.
 (δ) Ἐπιλύομεν τὴν ἔξισωσιν ἢ τὸ σύστημα τῶν ἔξισώσεων.
 (ε) Ἐκτελοῦμεν τὴν διερεύνησιν τοῦ προβλήματος.

Διὰ τὸ τελευταῖον στάδιον τῆς διερευνήσεως ἀπαιτεῖται μεγάλη προσοχή, ίδιως ὅταν τὰ δεδομένα τοῦ προβλήματος παρίστανται διὰ γραμμάτων, διότι αἱ λύσεις πρέπει νὰ εἰναι πραγματικαὶ (συνθήκη πραγματικότητος), θετικαὶ ἢ ἀρνητικαὶ (σημεῖον τῶν λύσεων) καὶ μεγαλύτεραι ἢ μικρότεραι ἀριθμοῦ τινὸς Σ (θέσις ἀριθμοῦ ὡς πρὸς τὰς ρίζας τριωνύμου).

126. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΥΓΟΜΕΝΑ ΔΙ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ Βού ΒΑΘΜΟΥ

α) **Πρόβλημα.** Νὰ εύρεθῃ ἀκέραιος ἀριθμός, τοῦ δποίου τὸ τετράγωνον αὐξανόμενον κατὰ τὸ 5/πλάσιον αὐτοῦ γίνεται 50.

Αύσις: Εὰν x εἰναι ὁ ζητούμενος ἀριθμός, τότε τὸ τετράγωνον αὐτοῦ εἰναι x^2 , τὸ δὲ 5/πλάσιον τοῦ ἀριθμοῦ $5x$.

Οὕτως ἔχομεν τὴν ἔξισωσιν $x^2 + 5x = 50$.

Περιορισμός : 'Ο x δέον νὰ εἰναι ἀκέραιος ($x \in \mathbb{Z}$)

'Επίλυσις τῆς $x^2 + 5x - 50 = 0$. Ἐχομεν $x_1 = 5$, $x_2 = -10$.

Διερεύνησις : Αἱ εύρεθεῖσαι τιμαι $x_1 = 5$, $x_2 = -10$ πληροῦν τὸν τεθέντα περιορισμὸν καὶ συνεπῶς τὸ πρόβλημα ἔχει δύο λύσεις.

β) **Πρόβλημα :** Νὰ μερισθῇ ὁ ἀριθμὸς 15 εἰς δύο μέρη τοιαῦτα, ὥστε τὸ τετράγωνον τοῦ πρώτου ἐλαττούμενον κατὰ 41 νὰ καθίσταται ἵσον πρὸς τὸ 5/πλάσιον τοῦ τετραγώνου τοῦ ἄλλου.

Αύσις : Εὰν x εἰναι τὸ ἐν μέρος, τὸ ἄλλο θὰ εἰναι $15-x$. 'Επομένως ἔχομεν τὴν ἔξισωσιν $x^2 - 41 = 5(15-x)^2$

Περιορισμός : Πρέπει νὰ εἰναι $0 < x < 15$.

'Επίλυσις τῆς $x^2 - 41 = 5(15-x)^2$. 'Η ίσοδύναμος αὐτῆς εἰναι $4x^2 - 150x + 1166 = 0$, ἐξ ἣς $x = \frac{53}{2}$, $x_2 = 11$.

Διερεύνησις : 'Η ρίζα $x_1 = \frac{53}{2}$ ἀπορρίπτεται, διότι $\frac{53}{2} > 15$. Τὰ ζητούμενα λοιπὸν μέρη εἰναι 11 καὶ 4.

γ) **Πρόβλημα.** Εμπόρος πωλῶν ἐλαφίας πρὸς 22 δρχ. τὸ χιλιόγραμμον, κερδίζει ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν τὸ ἡμισυ τοῦ κόστους ἑκάστου χιλιογράμμου. Πόσον κοστίζει τὸ χιλιόγραμμον;

Αύσις : Εὰν τὸ χιλιόγραμμον κοστίζῃ x δρχ., θὰ κερδίζῃ $\frac{x}{2}\%$ καὶ ἐπο-

$$\text{μένως άπό } x \text{ δρχ. θά κερδίζη } \frac{x}{2} \cdot \frac{x}{100} = \frac{x^2}{200}.$$

$$\text{Συνεπώς, εχομεν τὴν ἔξισωσιν } x + \frac{x^2}{200} = 22$$

Περιορισμός : Πρέπει νὰ είναι $0 < x < 22$.

$$\text{Έπιλυσις: } x + \frac{x^2}{200} = 22 \Leftrightarrow x^2 + 200x - 4400 = 0, \text{ έε ήσ εχομεν } x_1 = 20, \\ x_2 = -220$$

Διερεύνησις : Ή $x_2 = -220$ ἀπορρίπτεται.

"Ωστε, τὸ χιλιόγραμμον κοστίζει 20 δρχ.

δ) Πρόβλημα. Ἐὰν αἱ πλευραὶ τετραγώνου αὔξηθοῦν κατὰ μ μονάδας μῆκους, τὸ ἐμβαδόν του θὰ γίνῃ μ - 3 φορὰς τοῦ ἄλλου. Ποιὸν τὸ μῆκος τῆς πλευρᾶς αὐτοῦ ;

Λύσις : Ἐὰν τὸ μῆκος τῆς πλευρᾶς τοῦ τετραγώνου είναι x , τότε ἡ πλευρὰ τοῦ νέου τετραγώνου θὰ είναι $x + \mu$ μονάδας μῆκους καὶ τὰ ἐμβαδὰ αὐτῶν ἀντιστοίχως x^2 καὶ $(x+\mu)^2$. Έπομένως εχομεν τὴν ἔξισωσιν $(x + \mu)^2 = (\mu - 3)x^2$.

Περιορισμός : Πρέπει $x > 0$ καὶ $x + \mu > 0$

$$\text{Έπιλυσις: } (x + \mu)^2 = (\mu - 3)x^2 \Leftrightarrow (4 - \mu)x^2 + 2x\mu + \mu^2 = 0, \text{ ήτις δι-} \\ \text{δει δύο ρίζας } x_1 = \frac{-\mu + \sqrt{\mu^2(\mu - 3)}}{4 - \mu}, \quad x_2 = \frac{-\mu - \sqrt{\mu^2(\mu - 3)}}{4 - \mu}$$

Διερεύνησις : Τὸ εἶδος τῶν ρίζῶν καὶ τὸ πρόσημον αὐτῶν, ὡς γνωστὸν ἔξαρτάται ἀπό τὸ σημεῖον τῶν Δ, P, S.

Σχηματίζοντες τὸν πίνακα διερευνήσεως διαπιστοῦμεν ὅτι διὰ $\mu > 4$ εχομεν λύσιν εἰς τὸ πρόβλημα.

Οὕτω, διὰ $\mu = 7$ εχομεν $x_1 = -\frac{7}{3}$, ήτις ἀπορρίπτεται καὶ $x_2 = 7$, ήτις είναι δεκτή.

127. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΥΟΜΕΝΑ ΔΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ

α) Πρόβλημα. Τὰ ψηφία διψηφίου ἀριθμοῦ εχουν γινόμενον 35. Ἐὰν γίνη ἀντιμετάθεσις τῶν ψηφίων, προκύπτει ἀριθμὸς μεγαλύτερος τοῦ γινομένου τῶν ψηφίων κατὰ 40. Ποιὸς είναι ὁ ἀριθμός ;

Λύσις : Ἐὰν ὁ ἀριθμὸς εχῇ x δεκάδας καὶ ψ ἀπλᾶς μονάδας, τότε θὰ εχωμεν : $x\psi = 35$ καὶ $10\psi + x = x\psi + 40$

Περιορισμός : Πρέπει νὰ είναι $0 < x < 10$, $0 < \psi < 10$ καὶ $x, \psi \in \mathbb{Z}$

$$\text{Έπιλυσις: } \begin{cases} x\psi = 35 \\ x + 10\psi = 75 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (75 - 10\psi)\psi = 35 \\ x = 75 - 10\psi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2\psi^2 - 15\psi + 7 = 0 \\ x = 75 - 10\psi \end{cases}$$

τὸ δόποιον είναι ισοδύναμον πρὸς τὸ ζεῦγος τῶν συστημάτων

$$\left\{ \begin{array}{l} \psi = 7 \\ x = 75 - 10\psi \end{array} \right| \quad \left\{ \begin{array}{l} \psi = \frac{1}{2} \\ x = 75 - 10\psi \end{array} \right| \quad \text{"Άρα έχομεν τάς λύσεις : } \\ \quad \quad \quad (x, \psi) = (5, 7), (x, \psi) = \left(70, \frac{1}{2}\right)$$

Διερεύνησις : Τό ζεῦγός $(x, \psi) = \left(70, \frac{1}{2}\right)$ προφανῶς ἀπορρίπτεται.

"Ωστε ό ζητούμενος ἀριθμός εἶναι ό 57.

β) Πρόβλημα. "Η περίμετρος ὁρθογ. τριγώνου εἶναι 60 cm καὶ τὸ ἐπὶ τὴν ὑποτείνουσαν ὑψος 12cm. Ποῖα τὰ μήκη τῶν πλευρῶν του ;

Λύσις : 'Εὰν x, ψ, z εἶναι τὰ μήκη τῶν καθέτων πλευρῶν καὶ τῆς ὑπότεινούσης, τότε θὰ εἶναι $x^2 + \psi^2 = z^2$ καὶ $x + \psi + z = 60$

'Εξ ἄλλου τὸ ἐμβαδὸν τοῦ τριγώνου εἶναι $E = \frac{x\psi}{2} = \frac{12z}{2} \Rightarrow x\psi = 12z$. Τὸ σύστημα λοιπὸν εἶναι :

$$x^2 + \psi^2 = z^2, \quad x + \psi + z = 60, \quad x\psi = 12z$$

Περιορισμός : Πρέπει $x > 0, \psi > 0, z > 0$ καὶ μικρότεροι τοῦ 60. 'Επιλύοντες τὸ σύστημα έχομεν $x = 20, \psi = 15, z = 25$.

γ) Πρόβλημα. Δύο ἔργαται ἐκτελοῦν ἐν ἔργον εἰς λ ὥρας. 'Ο πρῶτος μόνος τὸ ἐκτελεῖ εἰς α ὥρας ὀλιγωτέρας τοῦ δευτέρου. Εἰς πόσας ὥρας ἔκαστος μόνος ἐκτελεῖ τὸ ἔργον ; $\alpha > 0, \lambda > 0$

Λύσις: 'Εὰν ό α' χρειάζεται x ὥρας καὶ ό β' ψ ὥρας, τότε θὰ εἶναι $x + \alpha = \psi$.

'Ο πρῶτος εἰς 1 ὥραν ἐκτελεῖ τὸ $\frac{1}{x}$ τοῦ ἔργου, ό β' τὸ $\frac{1}{\psi}$ καὶ ἀμφότεροι διμοῦ τὸ $\frac{1}{x} + \frac{1}{\psi}$, εἰς λ δὲ ὥρας ἐκτελοῦν τὸ ὅλον ἔργον. "Ητοι θὰ έχωμεν :

$$\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{\psi}\right)\lambda = 1.$$

Περιορισμός : Πρέπει νὰ εἶναι $x > 0, \psi > 0, x > \lambda, \psi > \lambda$

Έπιλυσις : $\left\{ \begin{array}{l} \psi = \alpha + x \\ \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{\psi}\right)\lambda = 1 \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \psi = \alpha + x \\ \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{\alpha+x}\right)\lambda = 1 \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \psi = \alpha + x \\ x^2 - (2\lambda - \alpha)x - \alpha\lambda = 0 \end{array} \right.$

τὸ ὅποιον δίδει :

$$(x, \psi) = \left(\frac{2\lambda - \alpha + \sqrt{4\lambda^2 + \alpha^2}}{2}, \frac{2\lambda + \alpha + \sqrt{4\lambda^2 + \alpha^2}}{2} \right) \text{ ήτις εἶναι δεκτὴ.}$$

"Η ἄλλη λύσις ἀπορρίπτεται ἐπειδὴ $x < 0, \psi < 0$, ως τοῦτο φαίνεται ἐκ τοῦ γινομένου τῶν $x_1x_2 = -\alpha\lambda < 0$

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

'Ο μάς α' :

404) Τὸ τετράγωνον τῆς ἡλικίας παιδός ἐλαττωθὲν κατὰ τὸ διπλάσιον της, γίνεται ἵσον πρὸς τὸ διπλάσιόν της. Νὰ εύρεθῇ ἡ ἡλικία αὐτῆς.

405) Νὰ εύρεθῃ ἀκέραιος ἀριθμός, ό ὅποιος διαιρούμενος διὰ 25 γίνεται ἵσος πρὸς τὸν ἀντίστροφον τοῦ πηλίκου.

406) Νὰ εύρεθῃ ἀριθμός, ό ύποιος αὐξανόμενος κατὰ τὸ 7/πλάσιον τῆς τετραγωνικῆς ρίζης του γίνεται 44.

407) Νὰ εύρεθοῦν δύο ἀκέραιοι διαδοχικοὶ περιττοὶ ἀριθμοὶ τοιοῦτοι, ώστε τὸ ἄθροισμα τῶν τετραγώνων των νὰ εἶναι 74.

408) Ἐμπορος πωλῶν τὸ ἀμπόρευμά του ἀντὶ 39 δραχ. κερδίζει τόσον τοῖς ἑκατόν, ὅσον τὸ εἰχεν ἀγοράσει. Πόσον τὸ ἡγόρασεν.

409) Πατήρ 40 ἔτῶν ἔχει υἱὸν 3 ἔτῶν. Μετὰ πόσον χρόνον ἡ ἡλικία τοῦ πατρὸς θὰ εἶναι κατὰ 5 ἔτη μικροτέρα τοῦ τετραγώνου τῆς ἡλικίας τοῦ υἱοῦ;

410) Ποσότης 630 κιλῶν τροφίμων ἐπρόκειτο νὰ διανεμηθῇ εἰς ὀρισμένας πτωχάς οἰκογενείας. Ἐπειδὴ 15 ἔκ τῶν οἰκογενειῶν δὲν προσῆλθον, ἐκάστη τῶν ὑπολοίπων ἔλαβεν 1 κιλὸν τροφίμων ἐπὶ πλέον. Ποιὸν τὸ πλῆθος τῶν οἰκογενειῶν;

411) Τριγώνου αἱ τρεῖς πλευραὶ εἶναι 3 cm, 6 cm, 8 cm. Κατὰ ποῖον τμῆμα πρέπει νὰ αὐξηθοῦν αἱ πλευραί, ἵνα δύναται νὰ σχηματισθῇ ἐξ αὐτῶν τρίγωνον δρυσιγώνιον;

‘Ο μὰς β’ :

412) Νὰ εύρεθῇ διψήφιος ἀριθμὸς τοιοῦτος, ώστε τὸ ψηφίον τῶν δεκάδων νὰ εἶναι κατὰ 1 μεγαλύτερον τοῦ διπλασίου τοῦ ψηφίου τῶν μονάδων, διαιρούμενος δὲ διὰ τοῦ γινομένου τῶν ψηφίων του νὰ δίδῃ πληλίκον 3 καὶ ὑπόλοιπον 10.

413) Κεφαλαίου ἔξ 27.000 δραχ. τοκίζεται πρὸς 6% χωριζόμενον εἰς δύο μέρη. Τὸ πρῶτον ἔτοκίσθη ἐπὶ 5 μῆνας περισσότερον καὶ ἔδωσε τόκον 1500 δραχ., τὸ δὲ β' ἔδωσε τόκον 900 δραχμάς. Νὰ εύρεθοῦν τὰ δύο μέρη τοῦ κεφαλαίου.

414) Νὰ εύρεθοῦν αἱ διαστάσεις δρυσιγώνιου, τὸ ὅποιον ἔχει διαγώνιον 20 cm καὶ ἐμβαδὸν 192 cm².

415) Δύο ποδηλάται ἀναχωροῦν συγχρόνως ἐκ τίνος τόπου διὰ νὰ διανύσουν ἀπόστασιν 90 km. Τὸ ἥμισυ τῆς ταχύτητος τοῦ πρώτου καὶ τὸ τρίτον τῆς ταχύτητος τοῦ β' ἔχουν ἄθροισμα 16 km. Νὰ εύρεθοῦν αἱ ταχύτητες, ἂν δ' α' ἐτερμάτισε $\frac{1}{2}$ τῆς ὠρας ἐνωρίτερον τοῦ β'.

416) Τρεῖς ἀριθμοὶ εἶναι ἀνάλογοι τῶν ἀριθμῶν 2, 3, 4. Τὸ τετράγωνον τοῦ μεγαλύτερου εἶναι μεγαλύτερον τοῦ διπλασίου γινομένου τῶν ἀλλῶν κατὰ 36. Νὰ εύρεθοῦν οἱ ἀριθμοὶ οὗτοι.

417) Ὁ ἀριθμὸς 3 καὶ τρεῖς ἀλλοι συνιστοῦν ἀναλογίαν, τῆς ὅποιας οἱ ἡγούμενοι ἔχουν ἄθροισμα 9, οἱ ἐπόμενοι 12 καὶ τὸ ἄθροισμα τῶν τετραγώνων πάντων τῶν ὅρων εἶναι 125. Ποία ἡ ἀναλογία;

418) Νὰ υπολογισθοῦν αἱ πλευραὶ δρυσιγώνιου αἱ κάθετοι πλευραὶ διαφέρουν κατὰ 5m καὶ ἡ ὑποτείνουσα μὲ τὸ ἐπί της ὑψος δίδει ἄθροισμα 37 m.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΣ

419) Νὰ ἐπιλυθῇ ἡ ἔξισωσις $x^4 - 2(\alpha + \beta)x^3 + (\alpha - \beta)^2 = 0$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, καὶ νὰ τεθοῦν αἱ ρίζαι αὐτῆς ὑπὸ μορφὴν ἀπλῶν ριζικῶν.

420) Διὰ ποίας τιμᾶς τῶν α καὶ β ἡ ἔξισωσις $(\alpha + \beta)x^4 + (2\alpha - \beta - 10)x^3 + 2x^2 - (\alpha - \beta - 7)x + 6 - \alpha = 0$ εἶναι διτετράγωνος καὶ διὰ ποίας δευτεροβάθμιος. Εἰς ἀμφοτέρας τὰς περιπτώσεις νὰ εύρεθῃ τὸ εἶδος τῶν ριζῶν.

421) Ὅποια ποιαν συνθήκην τὸ τριώνυμον $\phi(x) \equiv \alpha x^4 + \beta x^2 + \gamma$, $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{Q}$, ἔχει ρίζας τῆς μορφῆς $\sqrt{\lambda} \pm \sqrt{\mu}$, δουλο $\lambda, \mu \in \mathbb{Q}^+$

422) Νὰ μετασχηματισθοῦν εἰς ἀπλὰ ριζικά αἱ ἀκόλουθοι παραστάσεις :

$$1) \sqrt{x^2 + 1 + \sqrt{x^4 + x^2 + 1}} \quad (x \in \mathbb{R}), \quad 2) \sqrt{\frac{5x}{\psi} + \frac{2x}{z}} \sqrt{\frac{5x}{\psi} - \frac{x^2}{z^2}}$$

423) Νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι ἡ παράστασις $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}^+$

$$A = \sqrt{\alpha + 2\beta \sqrt{\alpha - \beta^2}} + \sqrt{\alpha - 2\beta \sqrt{\alpha - \beta^2}} \text{ ισοῦται μὲ 2}\beta, \text{ ἀν } \beta^2 \leq \alpha \leq 2\beta^2 \text{ καὶ μὲ } 2\sqrt{\alpha - \beta^2}, \text{ ἀν } \alpha > 2\beta^2$$

424) Νά έπιλυθούν αἱ ἀκόλουθοι ἔξισώσεις :

$$1) x^3 + \frac{1}{x^3} = 6 \left(x + \frac{1}{x} \right), \quad 2) x^4 + x^3 + x^2 + kx + k^2 = 0 \quad (k \in \mathbb{R})$$

425) Νά εύρεθοῦν αἱ συνθῆκαι, ώπό τὰς ὁποίας ἡ ἐπιλύουσα τῆς ἔξισης
 $x^6 + \alpha x^5 + \beta x^4 + \gamma x^3 + \beta x^2 + \alpha x + 1 = 0$ είναι ἀντίστροφος ἔξισωσις.

$$426) \text{Νά ἐπιλυθῇ ἡ ἔξισωσις } \left(x + \frac{1}{x} \right)^6 - 9 \left(x + \frac{1}{x} \right)^3 + 8 = 0$$

427) Νά ἐπιλυθοῦν ἐν \mathbb{R} αἱ ἀκόλουθοι ἔξισώσεις

$$1) 5x \sqrt[4]{x-3} \sqrt[4]{x^3} = 296, \quad 2) \sqrt[3]{x+1} - \sqrt[3]{x-1} = \sqrt[6]{x^2-1}$$

428) Νά ἐπιλυθῇ καὶ νά διερευθῇ ἡ ἔξιση. $\sqrt{x^2-4x} = x-\lambda$ διὰ πραγματικάς τιμάς τοῦ λ καὶ x .

429) Νά ἐπιλυθοῦν τὰ ἀκόλουθα συστήματα :

$$\begin{array}{lll} 1) x^2 + \psi^2 + \omega^2 = 21\alpha^2 & 2) z^2 + x^2 = 1 & x\psi + z\omega = 0 \\ \psi\omega + \alpha x - x\psi = 6\alpha^2 & \psi^2 + \omega^2 = 1 & (2x + \psi)(2z + \omega) = 2 \\ 3x + \psi - 2\omega = 3\alpha \end{array}$$

430) Νά εύρεθῃ ἡ ἀπαλείφουσα τοῦ συστήματος.

$$x^2 + \psi^2 + \omega^2 = \alpha^2, \quad x\psi = \beta^2, \quad \psi\omega = \gamma^2, \quad \omega x = \delta^2$$

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΥΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΥΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΣ

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ XV

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

128. ΕΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ.

Η στατιστική είς τὴν ἐποχήν μας, μὲ τὴν ὅλως ἴδιαιτέραν σπουδαιότητα τὴν ὁποίαν ἀπέκτησε διὰ τὴν ἀνθρωπότητα, ἀνεπτύχθη εἰς μίαν ἐκτεταμένην ἐπιστήμην μὲ πολλοὺς κλάδους.

Η σπουδαιότης τῆς Στατιστικῆς ἔγκειται εἰς τὸ ὅτι αὕτη ἐπιτυγχάνει προβλέψεις τῆς συμπεριφορᾶς ἐνὸς «πληθυσμοῦ» χωρὶς νὰ εἴναι ἀνάγκη (ἢ ὅταν δὲν εἴναι δυνατὸν) νὰ προβλεφθῇ ἢ συμπεριφορὰ τῶν ἀτόμων αὐτοῦ. Ὅπολιστὴν δὲ τὴν ἔννοιαν ἔχει ἐφαρμογὰς ὅχι μόνον εἰς τὴν Οἰκονομίαν ἢ τὴν Κοινωνιολογίαν γενικῶς, ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν νεωτέραν Φυσικήν.

Η Στατιστική, ὡς κλάδος τῶν «Ἐφηρμοσμένων Μαθηματικῶν», ἔχει ὡς ἔργον τὴν συλλογὴν στοιχείων, τὴν ταξινόμησίν των καὶ τὴν παρουσίασιν αὐτῶν εἰς κατάλληλον μορφήν, δυναμένων νὰ ἀναλυθοῦν καὶ ἐρμηνευθοῦν διὰ τὴν ἔξυπηρέτησιν διαφόρων σκοπῶν. Π.χ. διὰ τὴν παρακολούθησιν τῆς ἀναπτύξεως καὶ ἔξελίξεως τοῦ «κτηνοτροφικοῦ πληθυσμοῦ» τῆς χώρας μας τὸ «Υπουργεῖον Γεωργίας συνεκέντρωσε στοιχεῖα, τὰ ὅποια μετὰ τὴν ταξινόμησιν παρουσίασε διὰ τοῦ ἀκολούθου πίνακος :

Ἐξέλιξις Κτηνοτροφικοῦ πληθυσμοῦ

Εἶδος ζώου	Εἰς χιλιάδας κεφαλῶν			
	1959	1961	1963	1964
Βόες	1045,7	1108,9	1160,0	1140,3
Βούβαλοι	72,6	67,2	63,5	60,8
Πρόβατα	9333,9	9593,5	9720,0	9450,0
Αίγες	5066,1	4979,0	4700,0	4570,0
Χοῖροι	638,1	621,6	632,0	646,8
Πτηνά	15146,3	16341,9	18000,0	18426,3

Εἰς τὴν προηγουμένην τάξιν ἔγνωρίσαμεν ὡρισμένας βασικὰς ἔννοιας τῆς

Στατιστικής, τούς τρόπους συγκεντρώσεως τῶν στατιστικῶν δεδομένων, ἐπεξεργασίας καὶ παρουσιάσεως αὐτῶν διὰ τῶν ἀριθμητικῶν πινάκων καὶ διαγραμμάτων.

Κατωτέρω ἐπαναλαμβάνομεν τοὺς τρόπους παρουσιάσεως τῶν στατιστικῶν δεδομένων, λόγῳ τῆς ἴδιαιτέρας σημασίας αὐτῶν.

129. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ — ΠΙΝΑΚΕΣ

Τὰ στατιστικὰ στοιχεῖα, τὰ ὅποια προκύπτουν ἀπὸ τὴν διαλογήν καὶ ἐπεξεργασίαν, παρουσιάζονται κατὰ τοιοῦτον τρόπον, ὥστε νὰ εἰναι εὔχερής ἡ μελέτη τῶν καὶ ἡ συναγωγὴ συμπερασμάτων. Ἡ παρουσιάσις αὕτη γίνεται συνήθως κατὰ δύο τρόπους.

- α) Ὅποιοι μορφήν ἀριθμητικοῦ στατιστικοῦ πίνακος
- β) Ὅποιοι μορφήν γραφικοῦ στατιστικοῦ πίνακος.

Ἄριθμοι πίνακες. Οὗτοι δύνανται νὰ ἔχουν μορφὴν ἐνὸς κειμένου ἑκθέσεως τῶν πληροφοριῶν μὲ πᾶσαν δυνατήν λεπτομέρειαν. Συνήθως ὅμως εἰναι συγκεντρωτικοὶ μὲ στήλας καὶ γραμμάς, ἀπλοῖ εἰς τὴν ἀνάγνωσιν καὶ εἰς τὴν μεταξύ τῶν στοιχείων σύγκρισιν.

Συχνότης — πίναξ συχνοτήτων. Ὅποθέτομεν ὅτι αἱ τιμαὶ μιᾶς μεταβλητῆς x , εἰς μίαν στατιστικὴν ἔρευναν ἐκ N παρατηρήσεων εἰναι: $x_1, x_2, x_3, \dots, x_N$ καὶ ὅτι ἐξ αὐτῶν τῶν τιμῶν v_1 εἰναι ἵσαι πρὸς x_1 , v_2 ἵσαι πρὸς x_2, \dots, v_μ ἵσαι πρὸς x_μ .

Οὔτω, σχηματίζομεν τὸν πίνακα τῶν δύο σειρῶν.

x_1	x_2	x_3	...	x_μ
v_1	v_2	v_3	...	v_μ

Ἐκαστος τῶν ἀριθμῶν v_1, v_2, \dots, v_μ καλεῖται ἀπόλυτος συχνότης ἢ ἀπλῶς συχνότης τῆς ἀντιστοίχου τιμῆς x καὶ συμβολίζεται μὲ τὸ γράμμα f . Προφανῶς εἰναι $v_1 + v_2 + \dots + v_\mu = N$. Ὁ N εἰναι ὁ πληθάριθμος τοῦ πληθυσμοῦ (σύνολον παρατηρήσεων) καὶ καλεῖται ὄλικὴ συχνότης, συμβολίζεται δὲ καὶ μὲ Σf .

Οἱ λόγοι $\frac{v_1}{N}, \frac{v_2}{N}, \dots, \frac{v_\mu}{N}$ καλοῦνται σχετικαὶ συχνότητες τῶν x_1, x_2, \dots, x_μ ἀντιστοίχως καὶ τὸ γινόμενον αὐτῶν ἐπὶ 100 ἐκφράζει τὴν ἑκατοστιαία (%) σχετικὴν συχνότητα. Τὰ ἀθροίσματα $\Sigma_1 = v_1, \Sigma_2 = v_1 + v_2, \Sigma_3 = v_1 + v_2 + v_3, \dots, \Sigma_\mu = v_1 + v_2 + \dots + v_\mu$ ἢ ὅπερ τὸ αὐτό, τὰ ἀθροίσματα $\Sigma_1 = f_1, \Sigma_2 = f_1 + f_2, \dots, \Sigma_\mu = f_1 + f_2 + \dots + f_\mu$ καλοῦνται ἀθροιστικαὶ συχνότητες.

Τὸ ἀθροισμα ὅλων τῶν σχετικῶν συχνοτήτων μιᾶς στατιστικῆς ἐρεύνης ισοῦται μὲ τὴν μονάδα.

$$\text{Πρόγραματι, ἔχομεν: } \frac{v_1}{N} + \frac{v_2}{N} + \dots + \frac{v_\mu}{N} = 1 \quad \text{ἢ} \quad \frac{f_1}{\Sigma f} + \frac{f_2}{\Sigma f} + \dots + \frac{f_\mu}{\Sigma f} = 1$$

‘Ο πίναξ (1), ὅστις δύναται νὰ γραφῇ καὶ εἰς δύο στήλας, ἀποτελεῖ τὸν πίνακα συχνοτήτων ἢ τὴν κατανομὴν συχνοτήτων.

Παραδείγματα συγκεντρωτικῶν ἀριθμ. πινάκων.

1) Κατὰ τὸ σχολ. ἔτος 1967 - 68 ἐνεγράφησαν εἰς τι Γυμνάσιον 764 μαθηταί, τῶν δποίων τὰ στοιχεῖα κατεγράφησαν εἰς ἓν βιβλίον, «τὸ Μαθητολόγιον». Τούτο ἀποτελεῖ ἔνα γενικὸν πίνακα λεπτομερῆ ἀνευ ταξινομήσεως, ἀπὸ ὃπου δυνάμεθα νὰ ἔχωμεν στατιστικὰς πληροφορίας σχετικὰς μὲ τὸν πληθυσμὸν τῶν μαθητῶν τοῦ σχολείου τούτου. Ἡ συμπλήρωσις τοῦ κάτωθι συγκεντρωτικοῦ πίνακος ἔγινεν ἐπὶ τῇ βάσει τῆς ποιοτικῆς ἴδιότητος «τάξις ἑγγραφῆς»

Κατανομὴ τῶν μαθητῶν τοῦ Γυμνασίου κατὰ τάξεις

Τάξεις ἑγγραφῆς	'Αριθμὸς μαθητῶν 'Απόλυτος συχνότης f	'Αθροιστικὴ συχνότης	'Εκατοστιαία σχετικὴ συχνότης $\frac{f}{100 \sum f}$	'Αθροιστικὴ έκατοστιαία σχετικὴ συχνότης
A'	f ₁ = 245	$\Sigma_1 = 245$	32,1	32
B'	f ₂ = 160	$\Sigma_2 = 405$	21	53
Γ'	f ₃ = 134	$\Sigma_3 = 539$	17,5	70,5
Δ'	f ₄ = 90	$\Sigma_4 = 629$	11,8	82,3
E'	f ₅ = 70	$\Sigma_5 = 699$	9,1	91,5
ΣΤ'	f ₆ = 65	$\Sigma_6 = 764$	8,5	100
	$\Sigma f = 764$		100,0	

Ἡ συμπλήρωσις τῆς β' στήλης εἶναι προφανῆς. Ἡ τρίτη στήλη «ἀθροιστικὴ συχνότης» συνεπληρώθη ὡς ἔξης : Διὰ κάθε τάξιν ἀντιστοιχίζεται τὸ ἀθροισμα τῆς ἀπολύτου συχνότητος τῆς τάξεως καὶ ὅλων τῶν προηγουμένων αὐτῆς. Ἡ συμπλήρωσις τῆς δ' στήλης ἔγινε βάσει τοῦ τύπου $100 \cdot f / \Sigma f$, ἢ δὲ συμπλήρωσις τῆς ε' στήλης ἔγινε ὡς καὶ τῆς γ' στήλης ἐκ τῆς δ' στήλης.

Ο πίναξ οὗτος εἶναι ἀπλοῦς, τὰ δὲ συμπεράσματα ἐκ τῆς μελέτης αὐτοῦ προφανῆ.

2) Εἰς μίαν ἔρευναν τοῦ ὑψους τῶν 764 μαθητῶν τοῦ Γυμνασίου τοῦ προηγουμένου παραδείγματός μας κατεγράφησαν εἰς προχείρους καταστάσεις τὰ ὑψη αὐτῶν, τὰ δποία ἐνεφάνισαν τιμᾶς μεταξύ τοῦ 135cm καὶ 185cm. Ἡ ποσοτικὴ ἴδιότης «ὕψος μαθητοῦ» εἶναι μία συνεχὴς μεταβλητὴ (θεωρητικῶς) μὲ τιμᾶς εἰς τὸ διάστημα [135cm, 185 cm], τοῦ δποίου ἢ διαφορὰ τῶν δύο ἀκρων τιμῶν, δηλαδὴ τὸ εὐρος τῆς μεταβλητῆς, ὥπως λέγεται, εἶναι $185 - 135 = 50\text{cm}$.

Τὸ σύνολον τῶν τιμῶν τῆς μεταβλητῆς ταύτης χωρίζεται εἰς 5 τάξεις (δμάδας) τοῦ αὐτοῦ εὔρους $50/5 = 10\text{cm}$.

Ἡ ἐργασία αὕτη καλεῖται ὁμαδοποίησις τῶν παρατηρήσεων.

Ο κάτωθι συγκεντρωτικὸς πίναξ ἔγινεν ἐπὶ τῇ βάσει τῆς ποσοτικῆς ἴδιότητος «ὕψος μαθητοῦ» κατόπιν τῆς ἀνωτέρω ὁμαδοποίησεως.

Κατανομή 764 μαθητῶν ἐνὸς Γυμνασίου κατὰ ὕψη

Τάξεις ὕψους	Μέση τιμὴ	Ἀριθμὸς Ἀπόλ. συχνότης f	Ἀθροιστική συχνότης	Σχετική συχνότης %	Ἀθροιστική σχετική συχνότης
1η 135–145	140	94	94	12,3	12,3
2α 145–155	150	176	270	23	35,3
3η 155–165	160	278	548	36,4	71,7
4η 165–175	170	180	728	23,6	95,3
5η 175–185	180	36	764	4,7	100
		$\Sigma f = 764$		100,0	

Εἰς τὴν α' στήλην αἱ τάξεις εἰναι διαστήματα τῆς μεταβλητῆς χ τοῦ ὕψους κλειστὰ ἀριστερὰ καὶ ἀνοικτὰ δεξιά, πλὴν τῆς 5ης τάξεως, ἣτις εἰναι διάστημα κλειστὸν ἑκατέρῳ.

Τὸ ἡμιάθροισμα τῶν ἄκρων τιμῶν ἑκάστης τάξεως καλεῖται μέση τιμὴ καὶ μὲ τὰς μέσας τιμὰς συμπληροῦται ἡ β' στήλη.

Ἡ συμπλήρωσις τῶν ὑπολοίπων στηλῶν ἔγινεν ὡς καὶ προηγουμένως.

Καὶ ὁ πίνας οὗτος εἰναι ἀπλοῦς καὶ ἡ ἀνάγνωσις αὐτοῦ εὔκολος.

Π.χ. ἀπὸ τὴν γ' στήλην φαίνεται, ὅτι 36 μαθηταὶ ἔχουν μέσον ὕψος 180 cm, ἐνῷ ἀπὸ τὴν δ' στήλην φαίνεται, ὅτι 548 μαθηταὶ ἔχουν ἀνάστημα κάτω τοῦ 165cm. Ἐκ τῆς ε' στήλης συμπεραίνομεν, ὅτι τὸ 12,3% τῶν μαθητῶν εἰναι ἀναστήματος κάτω τῶν 145 cm, ἐνῷ ἐκ τῆς τελευταίας στήλης ὅτι τὸ 71,7% εἰναι ὕψους κάτω τῶν 165 cm.

Σημείωσις. Εἰς κάθε πίνακα πρέπει νὰ ὑπάρχῃ εἰς τὸ ἄνω μέρος ἵνας τίτλος, ίσως καὶ ἵνας ὑπότιτλος. Ἀκόμη δὲν ἀποκλείεται νὰ γραφοῦν καὶ ὑποσημειώσεις. Πάντα ταῦτα μὲ τὸν σκοπὸν νὰ πληροφοροῦν συντόμως καὶ σαφῶς τὶ περιέχει ὁ πίνας, μὲ ποίαν κατάταξιν συνετάχθη καὶ εἰς ποίαν χρονικὴν περίοδον καὶ εἰς ποῖον τόπον ἀναφέρεται.

Γραφικοὶ πίνακες (διαγράμματα)

Ἡ παρουσίασις τῶν στατιστικῶν δεδομένων διὰ συγκεντρωτικῶν ἀριθμητικῶν πινάκων, παρουσιάζει μερικάς δυσκολίας ὡς πρὸς τὴν ἐρμηνείαν, διότι ἀπαιτεῖται ἀπὸ τοὺς περισσοτέρους ἀνθρώπους μεγάλη προσπάθεια κατανοήσεως τῆς ἀκριβοῦς σημασίας των.

Τελείως ὅμως διάφορος εἰναι ἡ ἐντύπωσις, τὴν δποίαν δοκιμάζομεν, ὅταν ἡ παρουσίασις τῶν στατιστικῶν δεδομένων γίνηται ὑπὸ μορφὴν γεωμετρικοῦ σχήματος, γραφικῆς παραστάσεως. Ἐπὶ πλέον δὲ ἡ ἐντύπωσις αὕτη εἰναι ζωηροτέρα καὶ μεγαλυτέρας διαρκείας.

Αἱ γραφικαὶ παραστάσεις ἡ ἀπλῶς διαγράμματα εἰναι αἱ εἰκόνες τῶν ἀριθμῶν καὶ παρέχουν ἀμέσως καὶ συνοπτικῶς διαφόρους χρησιμούς πληροφορίας.

Ἡ ποικιλία τῶν γραφικῶν παραστάσεων, τὰς δποίας χρησιμοποιεῖ ἡ Στατιστική, εἰναι μεγάλη. Θὰ ἀναφέρωμεν τὰς δύο κυριωτέρας κατηγορίας :


α) τάς γραμμικάς παραστάσεις ή γραμμικά διαγράμματα και β) τάς δι' ἐπιφανειῶν γραφικάς παραστάσεις. Συνήθως ἀναφερόμεθα εἰς τὸ γνωστὸν σύστημα τῶν ὀρθογωνίων ἀξόνων.

1) Πολύγωνον συχνότητος.

"Οταν ἡ μεταβλητὴ χ εἰς μίαν στατιστικὴν ἔρευναν εἰναι συνεχῆς, τότε τὰ [ζεύγη (x, f), ἀπεικονιζόμενα εἰς τὸ σύστημα τῶν ὀρθογ. ἀξόνων χθψ, δίδουν συνεχῆ τεθλασμένην γραμμήν, τὸ καλούμενον Πολύγωνον συχνότητος. Ἡ παραπλεύρως γραμμικὴ παράστασις δίδει τὴν γεωμετρικὴν εἰκόνα τῆς κάτωθεν αὐτῆς κατανομῆς 68 ἐργατῶν ἐνὸς ἐργοστασίου κατὰ βάρη.

Πολλάκις εἰς τὴν Στατιστικὴν εἰναι χρήσιμος ἡ γραφικὴ παράστασις τῆς


Σχ. 129.1



Κατανομὴ 68 ἐργατῶν κατὰ βάρη εἰς kg

Τάξεις	Μέση τιμὴ	f	$100 \frac{f}{\Sigma f}$	Άθροιστικὴ συχνότης	Άθρ. σχετικὴ συχνότης %
55– 65	60	3	4,4	3	4,4
65– 75	70	11	16,2	14	20,6
75– 85	80	24	35,3	38	55,9
85– 95	90	15	22,1	53	78
95–105	100	13	19,1	66	97,1
105–115	110	0	0,0	66	97,1
115–125	120	2	2,9	68	100
		$\Sigma f = 68$	100		

ἀθροιστικῆς συχνότητος, διπότε τὸ πολύγωνον ποὺ λαμβάνομεν καλεῖται πολύγωνον ἀθροιστικῆς συχνότητος. Ἡ παρακειμένη γραμμικὴ παράστασις εἰναι τὸ πολύγωνον ἀθροιστικῆς συχνότητος τῆς κατανομῆς τῶν 68 ἐργατῶν κατὰ βάρη. Ἐὰν ἐκ τοῦ σημείου A φέρωμεν AB \perp 0ψ και ἀκολούθως BG \perp 0x, συμπεράνομεν ὅτι 35 ἐργάται ἔχουν βάρος διλιγότερον τῶν 78 Kg (τὸ 78 εἰναι ἡ τετμημένη τοῦ Γ).



Σχ. 129.2


2) Ιστόγραμμον συχνότητος

Τὸ ιστόγραμμον συχνότητος εἶναι ὁ συνηθέστερος τρόπος παρουσιάσεως στατιστικῶν δεδομένων. Διὰ τὴν κατασκευὴν αὐτοῦ κατασκευάζομεν ὄρθιογώνια μὲ βάσεις τὰ ἵσα τμήματα τοῦ ἀξονοῦ Ox , εἰς τὰ ὅποια ἀντιστοιχεῖ τὸ εὔρος ἑκάστης τάξεως τῆς ὁμαδοποιημένης κατανομῆς, καὶ ὑψη τὰς ἀντιστοίχους συχνότητας αὐτῆς.

Τὸ ἐμβαδὸν ἑκάστου ὄρθιογωνίου ἀπεικονίζει τὴν ἀντιστοιχὸν πρὸς τὴν βάσιν αὐτοῦ συχνότητα. Τὸ ιστόγραμμον συχνότητος τοῦ σχήματός μας δίδει τὴν γεωμετρικὴν εἰκόνα τῆς κατανομῆς τῶν 68 ἐργατῶν κατὰ βάρη μὲ τεθλασμένην δὲ γραμμὴν παρίσταται τὸ πολύγωνον συχνότητος.

3) Τὸ ραβδογράμμον.

Τοῦτο ἀποτελεῖται ἀπὸ μίαν σειρὰν ὄρθιογωνίων, τῶν ὅποιων αἱ βάσεις εἶναι ἵσαι καὶ στηρίζονται εἰς τὸν αὐτὸν ἀξονα (ἢ τὸν Ox ἢ τὸν Oy). Τὰ μήκη τῶν εἶναι ἀνάλογα πρὸς τὰς ἀντιστοίχους τιμὰς ποὺ παριστοῦν. Εἰς τὰ δύο



Κτηνοτροφικά προϊόντα ἔτους 1964

Σχ. 129.4



Σχ. 129.5

παρακείμενα σχήματα δίδομεν δύο ραβδογράμματα. Τὸ πρῶτον ἀναφέρεται εἰς τὴν παραγωγὴν τῆς Ἑλλάδος κατὰ τὸ ἔτος 1964 τῶν κυριωτέρων κτηνοτροφικῶν προϊόντων καὶ τὸ δεύτερον εἰς τὰς ἔξαγωγὰς τῶν βιομηχανικῶν προϊόντων τῆς χώρας μας κατὰ τὴν τετραετίαν 1964 - 1967. Τὸ βον ραβδογράμμα καλεῖται καὶ χρονοδιάγραμμα.

4) Τὸ κυκλικὸν διάγραμμα

Τοῦτο εἶναι κύκλος σύθαιρέτου ἀκτίνος διαμερισμένος εἰς κυκλικούς τομεῖς, οἱ ὅποιοι ἔχουν ἐμβαδὸν ἀνάλογα πρὸς τὰς ἀντιστοίχους τιμὰς τῆς μεταβλητῆς

καὶ τῶν ὁποίων συνεπῶς τὰ τόξα ἔχουν μέτρα ἀνάλογα πρὸς τὰς αὐτὰς ἀντιστοίχους τιμὰς τῆς μεταβλητῆς. Ἐνταῦθα δίδομεν ἐν τοιοῦτον διάγραμμα ἀπεικονίζον τὴν χρηματοδότησιν διαφόρων κλάδων τῆς οἰκονομικῆς ζωῆς τῆς χώρας

Χρηματοδότησις 5 κλάδων εἰς ἑκατομ. δραχμῶν (Αὔγουστος 1968)			
Κλάδοι	Ποσὸν	%	Μοῖραι
1. Τουρισμὸς Ξενοδοχεῖα	3.900	19,5	70 ^ο 10'
2. Ἡλεκτρικὴ ἐνέργεια	3.300	16,5	59 ^ο 24'
3. Μεταφοραὶ ἐπικοινωνίαι	5.000	25	90 ^ο
4. Ἔργα κοινῆς ὡφελείας	6.600	33	118 ^ο 50'
5. Ἐτεροὶ σκοποὶ	1.200	6	21 ^ο 36'
Ἄθροισμα	20.000	100	360 ^ο

μᾶς κατὰ τὸν Αὔγουστον 1968. Τὸ 1% ἀντιστοιχίζεται εἰς τόξον $\frac{360^{\circ}}{100} = 3,6^{\circ} = 3^{\circ}36'$, ἐπομένως τὰ 16,5% εἰς τόξον $3,6 \times 16,5 = 59^{\circ} 24'$.

Ἐκτὸς τῶν ἀνωτέρω γραφικῶν παραστάσεων τῶν στατιστικῶν δεδομένων ὑπάρχουν ἀκόμη τὰ χαρτογράμματα, τὰ δόποια εἰναι γεωγραφικοὶ χάρται μὲ ποικιλίαν χρωμάτων, ἐπίσης ὑπάρχουν τὰ ειδογραφήματα ἢ εἰδογράμματα, τὰ δόποια εἰναι πίνακες σχεδίων καὶ εἰκόνων προσώπων ἢ πραγμάτων καὶ τὰ δόποια χρησιμοποιοῦνται μὲ ποικίλας μορφάς εἰς τὰς διαφημίσεις.



Σχ. 129.6

130. KENTRIKAI TIMAI

Εἰς τὰ προηγούμενα εἶδομεν τρόπους παρουσιάσεως τῶν στατιστικῶν δεδομένων δι' ἀριθμητικῶν πινάκων καὶ γραφικῶν παραστάσεων. Ἡ φάσις αὕτη τῆς παρουσιάσεως ἀποτελεῖ ἔναν οὐσιώδη τομέα τῆς περιγραφικῆς Στατιστικῆς, διότι μᾶς ἀπαλλάσσει ἀπὸ τὸν κόπον ἐκ τῆς παρατηρήσεως μεγάλου πλήθους ἀριθμῶν.

Τίθεται ὅμως τὸ ἔρωτημα : μήπως εἰναι δυνατὸν ἡ περιγραφὴ μιᾶς σειρᾶς

στατιστικῶν στοιχείων νὰ γίνη μὲ ἐλαχίστας χαρακτηριστικάς τιμάς, αἱ ὅποιαι νὰ δεικνύουν τὴν τάσιν τοῦ ἔξεταζομένου φαινομένου καὶ νὰ διατηρῶνται εὐκόλωτερον εἰς τὴν μνήμην; π.χ. Ἡ ἐντύπωσις, ἡ ὅποιᾳ δημιουργεῖται ἐκ τῆς ἔξετάσεως τοῦ πίνακος βαθμολογίας ἐνὸς μαθητοῦ εἰς ἕκαστον μάθημα κεχωρισμένως, εἰναι βεβαίως ἀσφαλής, ὅμως εἰναι κατὰ πολὺ ἀπλουστέρα, σαφεστέρα καὶ διαρκῆς εἰς τὴν μνήμην, ἀντὶ ἵδωμεν τὸν γενικὸν βαθμὸν ἐπιδόσεως, τὸν μέσον ὅρον ὅπως λέγομεν.

Εἰς τὴν Στατιστικὴν συνήθως ἀναζητοῦμεν μερικάς χαρακτηριστικάς τιμάς, αἱ ὅποιαι ἀντικαθιστοῦν ἔνα σύνολον ἀριθμῶν συγκεντρουμένων ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον πέριξ αὐτῶν καὶ αἱ ὅποιαι νὰ δίδουν μίαν ἰκανοποιητικὴν ἴδεαν τοῦ συνόλου τῶν ἔξεταζομένων ἀριθμῶν.

Αἱ χαρακτηριστικαὶ αὐταὶ τιμαὶ λέγονται **κεντρικαὶ τιμαὶ** ἢ μέσοι, διακρίνονται δὲ συνήθως εἰς μέσους **κεντρικῆς τάσεως** καὶ εἰς μέσους **θέσεως**. Οἱ πρῶτοι εἰναι ὁ ἀριθμητικός, ὁ γεωμετρικός καὶ ὁ ἀρμονικός μέσος καὶ οἱ δεύτεροι ἡ **διάμεσος** καὶ ἡ **ἐπικρατοῦσα τιμή**. Ἐκ τῶν πρώτων θὰ γίνῃ ἡ ἔξετασις μόνον τοῦ ἀριθμητικοῦ μέσου.

*Αριθμητικὸς μέσος (ἢ μέση τιμῇ)

α) **Άριθμητικὸς μέσος** ἐπὶ ἀταξινομήτων στοιχείων.

Ἐὰν x_1, x_2, \dots, x_N εἰναι αἱ παρατηρηθεῖσαι τιμαί, τότε τὸ πηλίκον τοῦ ἀθροίσματος ὅλων τῶν τιμῶν διὰ τοῦ πλήθους N αὐτῶν δίδει τὸν ἀριθμητικὸν μέσον, ὅστις παρίσταται διὰ τοῦ \bar{x} .

$$\text{Ητοι : } \bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_N}{N} \quad \text{ἢ} \quad \bar{x} = \frac{\Sigma x}{N} \quad (1)$$

β) **Άριθμητικὸς μέσος** ἐπὶ ταξινομηθέντων στοιχείων.

Ἐὰν αἱ x_1, x_2, \dots, x_N παρατηρηθεῖσαι τιμαὶ ταξινομηθοῦν εἰς πίνακα κατανομῆς συχνοτήτων, τότε τὸ πηλίκον τοῦ ἀθροίσματος τῶν γινομένων ὅλων τῶν τιμῶν x_1, x_2, \dots, x_μ ἐπὶ τὰς ἀντιστοίχους συχνότητάς των f_1, f_2, \dots, f_μ διὰ τῆς ὀλικῆς συχνότητος $N = \Sigma f$ δίδει τὸν ἀριθμητικὸν μέσον \bar{x} .

x_1	x_2	\dots	x_μ
f_1	f_2	\dots	f_μ

$$\text{Ητοι : } \bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_N}{N} = \frac{f_1 x_1 + f_2 x_2 + \dots + f_\mu x_\mu}{\Sigma f} = \frac{\Sigma f x}{\Sigma f} \quad (2)$$

Παράδειγμα : 1) Νὰ εύρεθῇ ὁ ἀριθμητικὸς μέσος τοῦ ἀναστήματος 12 μαθητῶν. Τὰ ἀναστήματα αὐτῶν ἀταξινόμητα εἰναι :

151, 152, 152, 156, 156, 156, 162, 162, 162, 162, 168, 168 cm

(*)'Εκ τῶν τιμῶν x_1, x_2, \dots, x_N αἱ f_i εἰναι ἵσται πρὸς x_1 , αἱ f_2 ἵσται πρὸς x_2, \dots , αἱ f_μ ἵσται πρὸς x_μ καὶ συνεπῶς ἔχομεν $x_1 + x_2 + \dots + x_N = f_1 x_1 + f_2 x_2 + \dots + f_\mu x_\mu$.

Μέσον άναστημα :

$$\bar{x} = \frac{151+152+152+156+156+156+162+162+162+162+168+168}{12} = \frac{1907}{12} = 158,9 \text{ cm}$$

Ό πίνακας κατανομής συχνοτήτων είναι :
και συνεπώς κατά τὸν τύπον (2)

151	152	156	162	168
1	2	3	4	2

Έχομεν : $\bar{x} = \frac{1 \cdot 151 + 2 \cdot 152 + 3 \cdot 156 + 4 \cdot 162 + 2 \cdot 168}{12} = 158,9 \text{ cm}$

2) Νὰ εύρεθῇ τὸ μέσον βάρος τῶν 68 ἑργατῶν ἐκ τοῦ πίνακος κατανομῆς συχνοτήτων τοῦ παραδείγματος τῆς σελ. 211.

Ούπολογισμὸς ἐνταῦθα τοῦ ἀριθμητικοῦ μέσου γίνεται κατά προσέγγισιν, διότι θεωροῦμεν ὡς τιμᾶς τῆς x τὰς μέσας τιμᾶς τῆς β' στήλης.

Οὕτως ἔχομεν :

$$\bar{x} = \frac{3 \cdot 60 + 11 \cdot 70 + 24 \cdot 80 + 15 \cdot 90 + 13 \cdot 100 + 0 \cdot 110 + 2 \cdot 120}{68} = 84,7$$

Άρα τὸ μέσον βάρος τῶν 68 ἑργατῶν είναι 84,7 Kg.

Ιδιότητες τοῦ ἀριθμητικοῦ μέσου

1) Ἐστω $x_1, x_2, \dots, x_\mu, \dots, x_N$ αἱ παρατηρηθεῖσαι τιμαὶ καὶ \bar{x} ὁ ἀριθμός μέσος αὐτῶν. Ἐὰν τὴν διαφορὰν $x_\mu - \bar{x}$ καλέσωμεν ἀπόκλισιν τῆς τυχούστης τιμῆς x_μ ἀπὸ τοῦ μέσου \bar{x} , τότε τὸ ἄθροισμα τῶν ἀποκλίσεων τοῦ συνόλου τῶν δεδομένων ἀπὸ τοῦ \bar{x} είναι μηδέν.

Πράγματι, $(x_1 - \bar{x}) + (x_2 - \bar{x}) + \dots + (x_N - \bar{x}) = x_1 + x_2 + \dots + x_N - N\bar{x} = N\bar{x} - N\bar{x} = 0$.

2) Ο μέσος \bar{x} ἰσοῦται μὲ τὸ ἄθροισμα τῶν γινομένων τῶν τιμῶν x_1, x_2, \dots, x_μ ἐπὶ τὰς σχετικὰς συχνότητας αὐτῶν.

Πράγματι, ἐκ τοῦ τύπου (2) ἔχομεν :

$$\bar{x} = \frac{f_1}{\Sigma f} x_1 + \frac{f_2}{\Sigma f} x_2 + \dots + \frac{f_\mu}{\Sigma f} \cdot x_\mu = F_1 x_1 + F_2 x_2 + \dots + F_\mu x_\mu = \Sigma F x, \text{ δῆποι } F_1, F_2, \dots, F_\mu \text{ είναι αἱ σχετικαὶ συχνότητες}$$

Διάμεσος (x_δ)

Ἐὰν x_1, x_2, \dots, x_N είναι αἱ N παρατηρηθεῖσαι τιμαὶ καὶ γράψωμεν αὐτὰς κατὰ τὰξιν αὐξανομένου μεγέθους, τότε ἂν μὲν ὑπάρχῃ μεσαῖος ὅρος τῆς σειρᾶς τῶν ἀριθμῶν αὐτῶν, αὐτὸς είναι ἡ διάμεσος τῶν ἀριθμῶν x_1, x_2, \dots, x_N , ἢν δὲ δὲν ὑπάρχῃ μεσαῖος ὅρος, λαμβάνεται ὡς διάμεσος τὸ ἡμιάθροισμα τῶν δύο μεσαίων ὅρων.

Εἰς ἀμφοτέρας τὰς περιπτώσεις ἡ διάμεσος είναι ἀριθμός, ὁ ὅποιος χωρίζει τὸ σύνολον τῶν τιμῶν x_1, x_2, \dots, x_N εἰς δύο τάξεις μὲ τὸν αὐτὸν πληθύραθμον. Ὁ τύπος δὲ $\frac{N+1}{2}$ δίδει τὴν τάξιν τῆς διαμέσου εἰς τὴν σειρὰν τῶν ἀριθμῶν. Π.χ.

ἡ διάμεσος τῶν ἀριθμῶν 3, 10, 13, 19, 20, 30, 32 εἶναι ὁ ἀριθμὸς 19, ὅστις κατέχει τὴν τάξιν $\frac{7+1}{2} = 4$ ος. Ἐνῷ τῶν ἀριθμῶν 12, 15, 15, 15, 19, 40, 40, 41 εἶναι ὁ ἀριθμὸς $\frac{15+19}{2} = 17$. Ἐπειδὴ δὲ εἶναι $\frac{8+1}{2} = 4,5$ ἡ περιοδος τῆς διάμεσος τῶν 5ην τάξιν καὶ συνεπῶς κεῖται μεταξύ τῶν ἀριθμῶν 15 καὶ 19.

‘Ο ὑπολογισμὸς τῆς διαμέσου ὁμαδοποιημένων παραστηρήσεων παρουσιάζει δυσκολίαν τινὰ καὶ κάποιαν ἀριστίαν διὰ τὴν τιμὴν αὐτῆς, διότι δὲν γνωρίζομεν τὰς ἀκριβεῖς τιμὰς τῆς μεταβλητῆς. Πρὸς τοῦτο, διὰ τὸν ὑπολογισμὸν τῆς διαμέσου τῶν τιμῶν τοῦ πίνακος κατανομῆς τῶν 68 ἐργατῶν τῆς σελ. 211 σκεπτόμεθα ὡς ἔξῆς :

“Ἐχομεν $N = 68$ καὶ $\frac{N+1}{2} = \frac{68+1}{2} = 34,5$. Ἐφαρμόσοντας τὴν παραπομένην μεταξύ τῆς 34ης καὶ 35ης ἑπτατεταγμένων κατὰ τάξιν μεγέθους τιμῶν τῆς μεταβλητῆς χ καὶ συνεπῶς ἀνήκει εἰς τὴν τάξιν 75 – 85, ὡς τοῦτο φαίνεται ἐκ τῆς στήλης (ἀθροιστικὴ συχνότης).

Πρὸς τῆς διαμέσου ταύτης τιμῆς ὑπάρχουν 34 τιμαί, ἔξι δὲν αἱ 14 ἀνήκουν εἰς τὴν τάξιν 55 – 75 καὶ αἱ 20 ἀνήκουν εἰς τὴν τάξιν 75 – 85. “Ωστε ἡ τάξις 75 – 85, εὔρους 10 μονάδων, περιλαμβάνει εἰς τὰς 24 τιμὰς αὐτῆς τὴν τιμὴν τῆς διαμέσου καὶ 20 τιμὰς πρὸ αὐτῆς. Ἐπειδὴ δὲ 24 τιμαὶ καλύπτουν εὔρος 10 μονάδων, αἱ 20 τιμαὶ θὰ καλύπτουν εὔρος $10 \cdot \frac{20}{24}$ μον.

‘Ἐπομένως ἡ διάμεσος τιμὴ κατὰ προσέγγισιν εἶναι :

$$x_{\delta} = 75 + 10 \cdot \frac{20}{24} = 75 + 8,3 = 83,3 \text{ κρ.}$$

Σημείωσις. ‘Ο ἀριθμητικὸς μέσος τοῦ παραδείγματός μας ὑπελογίσθη εἰς τὰ προηγούμενα καὶ εὐρέθη δῆτα εἶναι $\bar{x} = 84,7$. ‘Η τιμὴ αὗτη δίλγονος διαφέρει τῆς διαμέσου τιμῆς $x_{\delta} = 83,3$.

Γενικῶς, ἐὰν x_{λ} εἶναι ἡ ἀρχικὴ τιμὴ τῆς τάξεως, εἰς ᾧ ἀνήκει ἡ διάμεσος τιμὴ x_{δ} , Σf ἡ διάλικη συχνότης, f_{δ} ἡ συχνότης τῆς τάξεως εἰς ᾧ ἀνήκει ἡ x_{δ} , F ἡ ἀθροιστικὴ συχνότης ὅλων τῶν τάξεων πρὸ τῆς τάξεως τῆς x_{δ} καὶ εἰς τὸ εὔρος τῆς τάξεως τῆς x_{δ} , τότε, δύοις σκεπτόμενοι εύρίσκομεν τὸν τύπον :

$$x_{\delta} = x_{\lambda} + \varepsilon \cdot \frac{\frac{1}{2} \Sigma f - F}{f_{\delta}}$$

Γραφικὸς προσδιορισμὸς τῆς διαμέσου. Οὕτος εἶναι πολὺ εύκολος, ἀλλὰ δὲν παρέχει μεγάλην ἀκρίβειαν.

Κατασκευάζομεν τὸ πολύγωνον ἀθροιστικῆς συχνότητος καὶ φέρομεν τὴν κάθετον πρὸς τὸν ἄξονα Οψ εἰς τὸ σημεῖον, τὸ ὅποιον χωρίζει εἰς δύο ισοπληθεῖς διμάδας τὴν διάλικη συχνότητα. ‘Η κάθετος αὗτη τέμνει τὸ πολύγωνον εἰς ἓν σημεῖον, ἡ δὲ κάθετος ἀπό τὸ πρόσωπον τὸν ἄξονα Οψ όριζει σημεῖον ἐπὶ τοῦ ἄξονος Οχ, τοῦ ὅποιού εἴη τετμημένη εἶναι ἡ διάμεσος τιμὴ. Εἰς τὸ πολύγωνον ἀθροιστικῆς συχνότητος τῆς σελ. 211 ἡ διάμεσος εἶναι ἡ τετμημένη τοῦ σημείου Γ.

Έπικρατοῦσα τιμὴ (X_e)

Ό μέσος αὐτὸς είναι ή τιμὴ τῆς μεταβλητῆς, ήτις παρουσιάζεται συχνότερον, ήτοι ἀντιστοιχεῖ εἰς τὴν μεγίστην συχνότητα, καὶ συνεπῶς ἔχει ἔννοιαν, ὅταν τὰ δεδομένα ἐμφανίζονται εἰς κατανομὴν συχνοτήτων. Π.χ. Ἐάν ἐκ τῶν ἐργατῶν ἐνὸς ἐργοστασίου οἱ λαμβάνοντες ἡμερομίσθιον 200 δρχ. είναι οἱ πολυαριθμότεροι, τότε λέγομεν ὅτι τὸ ἐπικρατέστερον ἡμερομίσθιον (ἐπικρατοῦσα τιμὴ) εἰς τὸ ἐργοστάσιον είναι 200 δρχ.

Ο προσδιορισμὸς μὲν ἀκρίβειαν τῆς ἐπικρατούστης τιμῆς προϋποθέτει τὴν γνῶσιν δλων τῶν στοιχείων τῆς κατανομῆς καὶ ἐπομένως είναι δυσχερής, ὅταν τὰ στοιχεῖα είναι πολυπληθῆ καὶ ἀκανόνιστα.

Εἰς μίαν κανονικὴν κατανομὴν συχνοτήτων ὁ προσδιορισμὸς τῆς ἐπικρατούστης τιμῆς κατὰ προσέγγισιν στηρίζεται ἐπὶ τοῦ ἐμπειρικοῦ τύπου :

$$x_e - x_d = 2(x_d - \bar{x})$$

Σημείωσις: Κατόπιν παρατηρήσεως προέκυψεν ὅτι, ἐάν ή κατανομὴ συχνοτήτων είναι κάπως κανονική, ή διάμεσος x_d περιέχεται μεταξὺ τῆς ἐπικρατούστης τιμῆς x_e καὶ τοῦ ἀριθμητικοῦ μέσου \bar{x} . Ἐάν ή κατανομὴ είναι συμμετρικὴ (ίστογραμμον συχνότητος συμμετρικόν), τότε είναι $x_e = x_d = \bar{x}$.

Γραφικῶς δυνάμεθα νὰ προσδιορίσωμε τὴν ἐπικρατοῦσαν τιμὴν ἀπὸ τὸ ίστογραμμὸν συχνότητος ὡς ἔξῆς : Συνδέομεν δι' εύθυγράμμων τμημάτων τὰς ἄνω κορυφὰς τοῦ ὀρθογωνίου τῆς μεγαλυτέρας συχνότητος μὲ τὰς γειτονικὰς κορυφὰς τῶν δύο ἑκατέρωθεν αὐτοῦ ὀρθογωνίων καὶ ἀπὸ τὸ σημεῖον τοῦ μέσου τῶν τμημάτων τούτων φέρομεν κάθετον πρὸς τὸν ἀξονα OX, ή ὅποια δρίζει τὴν ἐπικρατοῦσαν τιμὴν. π.χ. Εἰς τὸ ίστογραμμὸν συχνότητος τῆς σελ. 212 ή ἐπικρατοῦσα τιμὴ είναι ή τετμημένη τοῦ σημείου A.

Ἐάν ἐφαρμόσωμεν τὸν τύπον τῆς ἐπικρατούστης τιμῆς εἰς τὴν κατανομὴν τῶν 68 ἐργατῶν εἰς σελ. 211 λαμβάνομεν :

$$x_e - 83,3 = 2(83,3 - 84,7) \Rightarrow x_e = 80,5 \text{ kg.}$$

Παρατηρήσεις ἐπὶ τῶν κεντρικῶν τιμῶν

Ο ἀριθμητικὸς μέσος ὑπολογίζεται εὐκόλως καὶ ἔχει καθωρισμένην τιμὴν, ήτις δῶμας ἐπιτρέαζεται ἀπὸ τὰς ἀκραίας τιμάς, διὰ τοῦτο είναι δυνατὸν νὰ μὴν είναι ἐπαρκῶς ἀντιπροσωπευτικὴ κεντρικὴ τιμὴ. Ἐν τούτοις, είναι δὲ πλέον εὔχρηστος, δὲ πλέον κατανοητὸς καὶ δὲ πλέον γνωστὸς μέσος εἰς τὴν Στατιστικὴν πρᾶξιν.

Η διάμεσος ὑπολογίζεται σχετικῶς εὐκόλως καὶ ή τιμὴ τῆς ἐπιτρέαζεται μόνον ἀπὸ τὸ πλήθος τῶν δεδομένων τιμῶν (δὲν ἐπιτρέαζεται ἀπὸ τὰς ἀκραίας τιμάς), διὰ τοῦτο είναι περισσότερον κεντρικὴ τιμὴ καὶ συνεπῶς μᾶς πληροφορεῖ πληρέστερον τοῦ ἀριθμ. μέσου.

Η ἐπικρατοῦσα τιμὴ, τέλος, ὑπολογίζεται μόνον κατὰ προσέγγισιν σχετικῶς εύχερῶς (ή εὔρεσις τῆς ἀληθοῦς τιμῆς είναι δύσκολος καὶ δὲν ἐπιτρέαζεται ἀπὸ τὰς ἀκραίας τιμάς).

Τὰ πλεονεκτήματα καὶ μειονεκτήματα τῶν κεντρικῶν τιμῶν ἐμφανίζονται

κατά περίπτωσιν καὶ συνεπῶς εἰς τὰς στατιστικὰς ἐφαρμογὰς ἡ προτίμησις των γίνεται κατά περίπτωσιν.

131. ΔΙΑΣΠΟΡΑ — ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΙΣ — ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ

Εἴδομεν εἰς τὰ προηγούμενα, ὅτι αἱ τρεῖς κεντρικαὶ τιμαὶ (ἀριθμητ. μέσος, διάμεσος, ἐπικρατοῦσα τιμή) παρέχουν πολλάκις μόνον ἐνδείξεις διὰ τὴν τάσιν τῶν δεδομένων μιᾶς κατανομῆς. Εἰναι φυσικὸν λοιπόν, ὅτι εἰναι ἀνεταρκεῖς νὸν περιγράψουν μὲ κάποιαν ἀκρίβειαν τὴν φυσιογνωμίαν τῆς κατανομῆς. Π.χ. Εἰς ἓνα ἔρανον οἱ 12 ὑπάλληλοι μιᾶς ὑπηρεσίας προσέφερον τὰ ἔξης ποσά : 10, 15, 15, 20, 20, 20, 25, 30, 30, 45, 50. (1). Αἱ κεντρικαὶ τιμαὶ τῆς σειρᾶς αὐτῆς εἰναι : $\bar{x} = 25$, $x_{\delta} = 20$, $x_{\epsilon} = 20$. Ἐὰν ἀπὸ τοὺς ίδίους ὑπαλλήλους ἡ σειρὰ τῶν εἰσφορῶν ἦτο :

$$5, 10, 10, 10, 20, 20, 20, 20, 30, 35, 100 \quad (2)$$

τότε αἱ κεντρικαὶ τιμαὶ πάλιν εἰναι : $\bar{x} = 25$, $x_{\delta} = 20$, $x_{\epsilon} = 20$. Αἱ σειραὶ (1) καὶ (2) παρ' ὅλον ὅτι ἔχουν τὰς αὐτὰς κεντρικὰς τιμὰς ἐν τούτοις διαφέρουσιν μεταξύ των πάρα πολύ. Εἰς τὴν σειράν (1) αἱ τιμαὶ διασπείρονται ἀπὸ 10 ἕως 50 καὶ τὸ εὔρος τῆς κατανομῆς εἰναι $50 - 10 = 40$, ἐνῷ εἰς τὴν (2) ἀπὸ 5 ἕως 100 μὲ εὔρος $100 - 5 = 95$, διὰ τοῦτο λέγομεν, ὅτι ἡ κατανομὴ τῆς σειρᾶς (2) ἔχει μεγαλυτέραν διασπορὰν ἀπὸ τὴν κεντρικὴν τιμήν.

Ἡ Στατιστικὴ ἔρευνα, ως ἐκ τούτου, εἰναι ὑποχρεωμένη, ὅπως ἔξετάσῃ καὶ ἄλλας τιμὰς τῆς μεταβολῆς τῶν στατιστικῶν δεδομένων πέριξ μιᾶς κεντρικῆς τιμῆς ὁνομάζομεν διασποράν.

Τὴν συγκέντρωσιν ἡ ἀπομάκρυνσιν τῶν στατιστικῶν δεδομένων πέριξ μιᾶς κεντρικῆς τιμῆς ὀνομάζομεν διασποράν.

Τὸ εὔρος τῆς κατανομῆς δὲν εἰναι κατάλληλον διὰ τὴν περιγραφὴν τῆς διασπορᾶς τῶν δεδομένων, διότι ἔξαρτᾶται μόνον ἀπὸ τὰς ἀκραίας τιμάς. Θὰ ἥδυνάμεθα νὰ ὑπολογίσωμεν τὴν διασπορὰν μὲ τὴν εὔρεσιν τοῦ μέσου ὄρου τῶν ἀποκλίσεων τῶν τιμῶν ἀπὸ τοῦ μέσου \bar{x} αὐτῶν, ὅμως, ἀτυχῶς, τὸ ἀθροισμα τῶν ἀποκλίσεων τούτων εἰναι μηδὲν (σελ. 215, 1η ίδιότης τοῦ ἀριθμ. μέσου). Τὰ τετράγωνα ὅμως τῶν ἀποκλίσεων, ἦτοι τὰ $(x_{\lambda} - \bar{x})^2$, εἰναι θετικοὶ ἀριθμοὶ καὶ συνεπῶς ὁ ἀριθμητικὸς μέσος αὐτῶν $\frac{\sum (x_{\lambda} - \bar{x})^2}{N}$ διάφορος τοῦ μηδενός.

Τὴν ποσότητα αὐτὴν συμβολίζομεν μὲ τὸ σ^2 καὶ καλοῦμεν μέσην τετραγωνικὴν ἀπόκλισιν ἡ διακύμανσιν τῆς κατανομῆς, τὴν δὲ θετικὴν τετραγωνικὴν ρίζαν αὐτῆς σ τυπικὴν ἀπόκλισιν.

"Ωστε ἔχομεν :
 $\lambda = 1, 2, \dots, N$

$$\sigma^2 = \frac{\sum (x_{\lambda} - \bar{x})^2}{N} \quad (1) \text{ καὶ } \sigma = \sqrt{\frac{\sum (x_{\lambda} - \bar{x})^2}{N}} \quad (2)$$

*Αναπτύσσοντες τὸ ἀθροισμα $\sum (x_{\lambda} - \bar{x})^2$ λαμβάνομεν :

$$\sum (x_1 - \bar{x})^2 = (x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \dots + (x_N - \bar{x})^2 =$$

$$= (x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_N^2) - 2\bar{x}(x_1 + x_2 + \dots + x_N) + N\bar{x}^2 = \\ = (x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_N^2) - 2\bar{x} \cdot N\bar{x} + N\bar{x}^2 = \sum_{\lambda} x_{\lambda}^2 - N\bar{x}^2$$

καὶ ἄρα οἱ τύποι

(1) καὶ (2) γράφονται:

$$\sigma^2 = \frac{\sum x_{\lambda}^2}{N} - \bar{x}^2 \quad (1') \quad \text{καὶ } \sigma = \sqrt{\frac{\sum x_{\lambda}^2}{N} - \bar{x}^2} \quad (2')$$

Παραδείγματα. 1) Αἱ διακυμάνσεις τοῦ προηγουμένου παραδείγματος τοῦ ἔρανου τῶν 12 ὑπαλλήλων εἶναι εἰς τὰς δύο περιπτώσεις :

$$\sigma_1^2 = \frac{1}{12} [(10-25)^2 + (15-25)^2 + \dots + (50-25)^2] = \frac{1}{2} (15^2 + 10^2 + \dots + 25^2) = \\ = \frac{400}{3}$$

$$\sigma_2^2 = \frac{1}{12} [(5-25)^2 + (10-25)^2 + \dots + (100-25)^2] = \frac{1}{12} (20^2 + 15^2 + \dots + 75^2) = \\ = \frac{3475}{6}$$

$$\text{Αἱ δὲ τυπικαὶ ἀποκλίσεις εἶναι : } \sigma_1 = \sqrt{\frac{400}{3}} = \frac{20\sqrt{3}}{3}, \sigma_2 = \sqrt{\frac{3475}{6}}$$

$$2) \text{Νὰ ὑπολογισθῇ ἡ διακύμανσις τῶν ἀριθμῶν } 6, 8, 11, 12. \text{ "Εχομεν } \bar{x} = \frac{37}{4} = 9,25. \text{ Χρησιμοποιοῦντες τὸν τύπον (1) ἔχομεν : }$$

$$\sigma^2 = \frac{1}{4} [(6-9,25)^2 + \dots + (12-9,25)^2] = \frac{1}{4} (3,25^2 + 1,25^2 + 1,75^2 + 2,75^2) \simeq 5,7$$

Χρησιμοποιοῦντες τὸν τύπον (1') ἔχομεν :

$$\sigma^2 = \frac{1}{4} (6^2 + 8^2 + 11^2 + 12^2) - \left(\frac{37}{4}\right)^2 = \frac{1}{4} (36 + 64 + 121 + 144) - \frac{1369}{16} \simeq 5,7$$

‘Ο τύπος (1') ἐνταῦθα μᾶς ἀπαλλάσσει ἀπὸ πολυπλόκους πολλαπλασιασμούς.

Ἐὰν αἱ τιμαὶ τῆς μεταβλητῆς ἔχουν ταξινομηθῆ ἐις ἓναν πίνακα κατανο-

$$\text{μῆς } \begin{array}{|c|c|c|c|c|} \hline x_1 & x_2 & \dots & x_{\lambda} \\ \hline f_1 & f_2 & \dots & f_{\lambda} \\ \hline \end{array} \quad f_1 + f_2 + \dots + f_{\lambda} = N = \Sigma f, \quad \text{τότε τὰ τετράγωνὰ τῶν ἀποκλίσεων, πολλαπλασιαζόμενα ἐπὶ τὰς ἀντιστοίχους συχνότητας, δίδουν μέσην τετραγωνικὴν ἀπόκλισιν } \sigma^2 = \frac{\sum f_{\lambda} (x_{\lambda} - \bar{x})^2}{\Sigma f} \quad (3) \quad \text{καὶ τυπικὴν ἀπόκλισιν } \sigma = \sqrt{\frac{\sum f_{\lambda} (x_{\lambda} - \bar{x})^2}{\Sigma f}} \quad (4)$$

Ἐὰν δὲ σκεφθῶμεν ὡς καὶ προηγουμένως, τότε οἱ τύποι (3) καὶ (4) γράφονται :

$$\sigma^2 = \frac{\sum f_{\lambda} x_{\lambda}^2}{\Sigma f} - \bar{x}^2 \quad (3') \quad \text{καὶ } \sigma = \sqrt{\frac{\sum f_{\lambda} x_{\lambda}^2}{\Sigma f} - \bar{x}^2} \quad (4')$$

Εἰς τὴν περίπτωσιν τῆς ὁμαδοποιημένης κατανομῆς αἱ ἀποκλίσεις ὑπολογίζονται μὲν τὰς μέσας τιμὰς τῶν τάξεων.

Σημείωσις: ‘Η τυπικὴ ἀπόκλισις σ εἶναι τὸ μέτρον τῆς διασπορᾶς καὶ ἐκφράζεται διὰ τῶν ἀρχικῶν μονάδων μετρήσεως τῶν δεδομένων.

Παράδειγμα : Νά ύπολογισθῇ ἡ τυπικὴ ἀπόκλισις τῆς ὁμαδοποιημένης κατανομῆς τῶν 68 ἐργατῶν τῆς σελίδος 211.

Σχηματίζομεν τὸν πίνακα : Ἀριθμητικὸς μέσος $\bar{x} = 84,7 \text{ kg}$

Μέση τιμὴ	f_{λ}	x_{λ}^2	$f_{\lambda} x_{\lambda}^2$	$x_{\lambda} - \bar{x}$	$(x_{\lambda} - \bar{x})^2$	$f_{\lambda} (x_{\lambda} - \bar{x})^2$
60	3	3600	10800	-24,7	610,09	1830,27
70	11	4900	53900	-14,7	216,09	2376,99
80	24	6400	153600	-4,7	22,09	530,16
90	15	8100	121500	5,3	28,09	421,35
100	13	10000	130000	15,3	234,09	3043,17
110	0	12100	—	25,3	640,09	—
120	2	14400	28800	35,3	1246,09	2492,18
Ἄθροισμα	68		498600			10694,12


"Αρα, συμφώνως τῷ τύπῳ (4') $\sigma = \sqrt{\frac{498600}{68}} - 84,7^2 \approx 12,6 \text{ kg}$
ἔχομεν :

συμφώνως δὲ τῷ τύπῳ (4) $\sigma = \sqrt{\frac{10694,12}{68}} \approx 12,6 \text{ kg}$
ἔχομεν :

Σημασία τῆς τυπικῆς ἀποκλίσεως

Ἡ γνῶσις τῆς μέσης τιμῆς \bar{x} καὶ τῆς τυπικῆς ἀποκλίσεως σ παρέχει ἀνεκτίμητον συμβολήν διὰ τὸν προσδιορισμὸν τῆς μορφῆς τῆς κατανομῆς συχνοτήτων κατὰ τρόπον ἱκανοποιητικόν, εἰς τὴν περίπτωσιν καθ' ἥν τὰ δεδομένα διασπείρονται κανονικῶς καὶ συμμετρικῶς περὶ τὸν μέσον \bar{x} . "Οταν ἡ τυπικὴ ἀπόκλισις εἴναι μικρά, τὰ δεδομένα τείνουν νὰ συσσωρευθοῦν πέρι τοῦ μέσου, καὶ ὅταν εἴναι μεγάλη, τείνουν νὰ διασπαροῦν. Αἱ στατιστικαὶ μελέται δεικνύουν ὅτι εἰς μίαν κανονικὴν καὶ συμμετρικὴν κατανομὴν τὰ διαστήματα ἔκατέρωθεν τοῦ μέσου \bar{x} εἰς ἀπόστασιν ἵσην πρὸς σ , 2 σ , 3 σ περιλαμβάνουν τὰ 68%, 95%, 99,7% περίπου ἀντιστοίχως τῆς ὀλικῆς συχνότητος τῶν δεδομένων.

Ο ἀκόλουθος πίνακας δίδει συνοπτικῶς τὴν διασπορὰν τῶν τιμῶν τῆς μεταβλητῆς ἔκατέρωθεν τῆς μέσης τιμῆς \bar{x} εἰς ἑκατοστιαῖα ποσοστὰ τῆς ὀλικῆς



Σχ. 131.1

συχνότητος, έχει δὲ σκοπὸν νὰ θέσῃ κατώτερα ὅρια ἀσφαλείας καὶ νὰ βοηθήσῃ συνεπῶς εἰς τὴν διαπίστωσιν τυχὸν λαθῶν εἰς τοὺς ὑπολογισμούς.

Εἰς τὸ προηγούμενον παράδειγμα εὔρομεν $\sigma = 12,6 \text{ kg}$ καὶ $\bar{x} = 84,7 \text{ kg}$. "Αρα εἰς τὸ διάστημα ἀπὸ $\bar{x} - \sigma = 84,7 - 12,6 = 72,1$ ἕως $\bar{x} + \sigma = 84,7 + 12,6 = 97,3$ διαπιστοῦμεν, κατόπιν ἔξετάσεως τοῦ πολυγώνου ἀθροιστικῆς συχνότητος, ὅτι ἀνήκουν αἱ 46 ἐκ τῶν 68 τιμῶν, ἤτοι τὸ 67,6%. Πράγματι, ἡ τιμὴ 72,1 ἀντιστοιχεῖ περίπου εἰς τὴν ἀθροιστικὴν συχνότητα 19 καὶ ἡ τιμὴ 97,3 ἀντιστοιχεῖ εἰς τὸ 65 καὶ συνεπῶς $65 - 19 = 46$.

"Ἐπίσης, εἰς τὸ διάστημα ἀπὸ $\bar{x} - 2\sigma = 84,7 - 2 \cdot 12,6 = 59,5$ ἕως $\bar{x} + 2\sigma = 109,9$ ἀνήκουν 63 ἐκ τῶν 68 τιμῶν, ἤτοι τὸ 92,6%. Πράγματι, ἡ τιμὴ 59,5 ἀντιστοιχεῖ περίπου εἰς τὴν ἀθροιστικὴν συχνότητα 3 καὶ ἡ τιμὴ 109,9 εἰς τὴν 66 καὶ συνεπῶς $66 - 3 = 63$.

Τὸ διάγραμμα τῆς διασπορᾶς

Εἴδομεν, ὅτι κάθε κατανομὴ συχνοτήτων δύναται νὰ παρασταθῇ γραφικῶς μὲ ἐν ἰστόγραφμον ἡ πολύγωνον συχνότητος. "Η εἰκὼν αὕτη εἶναι τυπικὴ τοῦ ἔξεταζομένου πληθυσμοῦ. "Αν ὅμως φαντασθῶμεν ὅτι ὁ πληθυσμὸς μεταβάλλεται συνεχῶς, ἐνῷ ταυτοχρόνως τὸ εὔρος τῶν τάξεων μικραίνει, τότε τὸ ἰστόγραφμον ἡ τὸ πολύγωνον ὅριακῶς θὰ ταυτισθῇ μὲ μίαν καμπύλην (τὸ διάγραμμα τῆς διασπορᾶς), ἡ ὁποία καθορίζεται πλήρως ἀπὸ τὸν μέσον \bar{x} καὶ τὴν τυπικὴν ἀπόκλισιν σ . "Ο μέσος \bar{x} ἀποτελεῖ τὸ μέτρον θέσεως ἐπὶ τοῦ ἄξονος OX καὶ ἡ τυπικὴ ἀπόκλισις τὸ μέτρον διασπορᾶς. "Ἐὰν ἡ τιμὴ σ εἶναι μικρά, τότε ἡ καμπύλη παρουσιάζει μεγάλην κυρτότητα, ἐὰν δὲ μεγάλη, τότε ἡ καμπύλη εἶναι ἀπλωμένη. Κατωτέρω δίδομεν τὸ διάγραμμα διασπορᾶς τῆς κατανομῆς τῶν 68 ἐργατῶν ἐκ τοῦ ἰστογράφμου συχνότητος τῆς σελ. 212.


"Ἐχομεν $\bar{x} = 84,7$ καὶ $\sigma = 12,6$. Εἰς τὸ διάστημα $(\bar{x} - \sigma, \bar{x} + \sigma)$ ἀνήκουν 46 ἐκ τῶν 68 τιμῶν, ἤτοι τὸ 67,6%. Εἰς τὸ διάστημα $(\bar{x} - 2\sigma, \bar{x} + 2\sigma)$ ἀνήκουν 63 ἐκ τῶν 68 τιμῶν, ἤτοι τὸ 92,6%.

Οὕτω συμπεραίνομεν, ὅτι ἡ διασπορὰ δὲν εἶναι μεγάλη.


Δύο ἡ καὶ περισσότεροι πληθυσμοὶ εἶναι δυνατόν: 1) νὰ ἔχουν τὸν αὐτὸν μέσον καὶ νὰ διαφέρουν ὡς πρὸς τὴν διασποράν, 2) νὰ ἔχουν τὴν ἴδιαν διασπορὰν καὶ διάφορον μέσον καὶ 3) νὰ διαφέρουν ὡς πρὸς τὴν διασπορὰν καὶ τὸν μέσον.

Τὰ ἀκόλουθα διαγράμματα διασπορᾶς ἀναφέρονται εἰς τὰς ἀνωτέρω περιπτώσεις ἀντιστοίχως.

"Ο πίνακας τοῦ σχ. 131.1, ὁ ὁποῖος δίδει τὴν διασποράν εἰς ἑκατοστιαῖα ποσοστά,




Σχ. 131.2



Σχ. 131.3

ίσχυει άπολύτως, όταν ή κατανομή συχνοτήτων είναι κανονική και συμμετρική περὶ τὸν μέσον \bar{x} . Τὸ ἀκόλουθον στικτὸν διάγραμμα δίδει τὴν εἰκόνα μιᾶς τοιαύτης κατανομῆς.



Σχ. 131.4

132. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΣ

Ἡ σύγκρισις τῶν στατιστικῶν δεδομένων ἀποτελεῖ τὴν τελικὴν φάσιν μιᾶς στατιστικῆς ἐρεύνης καὶ ἀποσκοπεῖ εἰς τὴν ἀνεύρεσιν νόμου τινός, ὅστις νὰ διέπῃ τὰς σχέσεις δύο ή περισσοτέρων ὑπὸ ἔξετασιν φαινομένων. Διὰ τῆς συγκρίσεως τῶν στατιστικῶν σειρῶν δύναται ὁ ἐρευνητὴς νὰ εὕρῃ τὰς δμοιότητας ή τὰς διαφοράς, αἱ ὁποῖαι χαρακτηρίζουν δύο φαινόμενα καὶ νὰ ἀνακαλύψῃ, συνεπῶς, τοὺς δεσμοὺς ή τὰς σχέσεις ἔξαρτήσεώς των.

Ἡ σύγκρισις τῶν στατιστικῶν δεδομένων, ἐφ' ὅσον λαμβάνει χώραν ἐπὶ πραγμάτων ἐπιδεκτικῶν συγκρίσεως, παρουσιάζει δυσκολίας, διότι ή σχέσις ἀλληλοεξαρτήσεως τῶν διαφόρων φαινομένων (φυσικῶν ή οἰκονομικῶν) είναι πολυσύνθετος, ίδιως ὅταν πρόκειται περὶ οἰκονομικῶν.

Αἱ Φυσικαὶ ἐπιστῆμαι, τὰ Μαθηματικά, ἡ Ἀστρονομία, ἡ Βιολογία παρέχουν πλεῖστα ὅσα παραδείγματα συγκρίσεως διαφόρων ποσῶν καὶ ἐκφράζουν τὰς σχέσεις ἀλληλοεξαρτήσεως αὐτῶν διὰ τύπων (νόμων) ἀπολύτως σταθερῶν καὶ ἀναλογιώτων.

Αἱ σχέσεις αὗται δὲν ὑφίστανται προκειμένου περὶ οἰκονομικῶν φαινομένων. Ἐν τούτοις ἡ Στατιστικὴ παρέχει ίκανοποιητικάς ἐνδείξεις ἐπὶ τῆς πορείας τῶν φαινομένων τούτων, καίτοι τὰ στοιχεῖα αὐτῶν εἰναι ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἐτερογενῆ.

Συχνὰ συμβαίνει αἱ μεταβολαὶ εἰς μίαν μεταβλητὴν νὰ συνοδεύωνται ἀπὸ παραλλήλους μεταβολάς, εἰς μίαν ἄλλην μεταβλητὴν καὶ νὰ ὑπάρχῃ μεταξύ των σχέσις τις, ἡ ὅπως λέγομεν αἱ μεταβληταὶ νὰ εἰναι συσχετισμέναι. Π.χ. τὸ ὕψος καὶ τὸ βάρος ἀνθρώπων, τὸ ὕψος καὶ ἡ ἡλικία ἀνθρώπων, ἡ θερμοκρασία καὶ ἡ διαστολὴ μετάλλων κ.λ.π.

Οταν δύο μεταβληταὶ χ καὶ ψ μεταβάλλωνται παραλλήλως κατὰ τρόπον, ὃστε εἰς μεγάλας ἡ μικρὰς τιμάς τῆς χ νὰ ἀντιστοιχοῦν κατὰ τὸ πλεῖστον μεγάλαις ἡ μικραὶ τιμαὶ τῆς ψ ἀντιστοίχως, χωρὶς ὅμως νὰ ὑπάρχῃ Μαθηματικὴ τις σχέσις (σταθερὸς νόμος) μεταξύ τῶν μεταβλητῶν τούτων, τότε λέγομεν ὅτι ὑπάρχει θετικὴ συσχέτισις μεταξύ τῶν μεταβλητῶν χ καὶ ψ. Π.χ. τὸ ὕψος καὶ τὸ βάρος ἀνθρώπων εὑρίσκονται εἰς θετικὸν συσχετισμόν.






Οταν δὲ εἰς μεγάλας τιμὰς τῆς χ ἀντιστοιχοῦν κατὰ τὸ πλεῖστον μικραὶ τιμαὶ τιμαὶ τῆς ψ καὶ ἀντιστρόφως, τότε λέγομεν ὅτι ὑπάρχει ἀρνητικὴ συσχέτισις. Π.χ. ὁ ἀριθμὸς τῶν φυτῶν ἀνά μονάδα ἐπιφανείας καὶ ἡ ἀπόδοσις ἐκάστου τῶν φυτῶν.

Τέλος, ὅταν αἱ τιμαὶ τῆς μιᾶς μεταβλητῆς δὲν φαίνονται νὰ ἔπηρεάζουν τὰς τιμὰς τῆς ἄλλης, δηλ. ὅταν αἱ δύο μεταβληταὶ εἰναι ἀνεξάρτητοι, τότε λέγομεν ὅτι εἰναι ἀσυσχέτιστοι. Π.χ. τὸ ὕψος καὶ τὸ ἐτήσιον εἰσόδημα ἀνθρώπων.

Ἡ γραφικὴ παράστασις ὑποβοηθεῖ εἰς τὴν προσπάθειαν ἀνευρέσεως μιᾶς σχέσεως ἔξαρτήσεως μεταξύ δύο φαινομένων.

Οὕτως, ἀς ὑποθέσωμεν ὅτι ἔχομεν πρὸς ἔξέτασιν ἐν σύνολον διατεταγμένων ζευγῶν ἀντιστοίχων τιμῶν δύο μεταβλητῶν χ καὶ ψ. Ἡτοι τὸ $\Sigma = \{ (x_1, \psi_1), (x_2, \psi_2), \dots, (x_n, \psi_n), \dots (x_N, \psi_N) \}$

Εἰς ἐν σύστημα ὄρθογ. ἀξόνων $x\Omega\psi$ κατασκευάζουμεν τὰς εἰκόνας τῶν ζευγῶν τούτων. Τότε εἰναι δυνατόν νὰ λάβωμεν τὰ ἔξης στικτὰ διαγράμματα, τὰ ὅποια εἰναι ίκανὰ νὰ καταδείξουν, ὅν ὑπάρχῃ σχέσις τις ἔξαρτήσεως μεταξύ τῶν δύο μεταβλητῶν θετικὴ ἡ ἀρνητική.



Σημείωσις. Έκτός τῶν στικτῶν διαγραμμάτων γίνεται χρῆσις καὶ τῶν γραμμικῶν διαγραμμάτων (καμπύλων) κατὰ τοιοῦτον τρόπον, ώστε ἡ μία καμπύλη νὰ πίπτῃ ἐπὶ τῆς ἀλλής καὶ νὰ καθίσταται προφανῆς ὁ συσχετισμός ἢ μὴ τῶν δύο μεταβλητῶν.

Τὰ ἀνωτέρω διαγράμματα εἰναι μὲν ἀναγκαῖα, ὡς προπαρασκευαστικὴ ἔργασία, ὅχι δμως καὶ ἐπαρκῆ. Διὰ νὰ ἐπιτύχωμεν σαφεστέρας, ἐνδείξεις καὶ νὰ ἐρμηνεύσωμεν τὰς τυχὸν ὄμοιότητας καὶ διαφοράς, εἰναι ἀνάγκη νὰ κάμωμεν ἀριθμητικὰς συγκρίσεις.

Οὕτως, ἐὰν \bar{x} καὶ $\bar{\psi}$ εἰναι οἱ μέσοι τῶν σειρῶν τοῦ πίνακος τῶν ἀντιστοίχων τιμῶν $\begin{cases} x_1, x_2, \dots, x_{\lambda}, \dots, x_N \\ \psi_1, \psi_2, \dots, \psi_{\lambda}, \dots, \psi_N \end{cases}$, τότε ἐν πρῶτον κριτήριον διὰ τὴν

ὕπαρξιν συσχετίσεως μεταξὺ τῶν x καὶ ψ , παρέχει τὸ ἄθροισμα :

$(x_1 - \bar{x})(\psi_1 - \bar{\psi}) + (x_2 - \bar{x})(\psi_2 - \bar{\psi}) + \dots + (x_N - \bar{x})(\psi_N - \bar{\psi})$ (1), τὸ ὅποιον ἐὰν εἰναι θετικόν, δηλοῦ ὅτι ἡ συσχέτισις εἰναι θετική, διότι τότε τὰ περισσότερα γινόμενα $(x_{\lambda} - \bar{x})(\psi_{\lambda} - \bar{\psi})$ εἰναι θετικά, ποὺ σημαίνει ὅτι τὰ περισσότερα ζεύγη $(x_{\lambda}, \psi_{\lambda})$ δίδουν ἀποκλίσεις ἐκ τῶν μέσων \bar{x} καὶ $\bar{\psi}$ δμοσήμους. Ἐὰν τὸ ἄθροισμα (1) εἰναι ἀρνητικόν, τότε δηλοῦ ὅτι ἡ συσχέτισις εἰναι ἀρνητική. Ἐάν, τέλος, εἰναι ἐγγύς τοῦ μηδενός, τότε δεικνύει τὸ ἀσυσχέτιστον τῶν x καὶ ψ .

Ο βαθμὸς τῆς συσχετίσεως μεταξὺ δύο μεταβλητῶν μετρεῖται ὑπὸ τοῦ καλουμένου συντελεστοῦ συσχετίσεως r , ὁ ὅποιος δρίζεται ἀπὸ τὸ πηλίκον τοῦ μέσου ὄρου τοῦ ἀθροίσματος (1) διὰ τοῦ γινομένου τῶν τυπικῶν ἀποκλίσεων s_x καὶ s_{ψ} τῶν μεταβλητῶν x καὶ ψ .

$$\text{Ήτοι ἔχομεν : } r = \frac{\frac{1}{N} \sum (x_{\lambda} - \bar{x})(\psi_{\lambda} - \bar{\psi})}{\sqrt{\frac{\sum (x_{\lambda} - \bar{x})^2}{N}} \sqrt{\frac{\sum (\psi_{\lambda} - \bar{\psi})^2}{N}}} = \frac{\sum (x_{\lambda} - \bar{x})(\psi_{\lambda} - \bar{\psi})}{\sqrt{\sum (x_{\lambda} - \bar{x})^2 \cdot \sum (\psi_{\lambda} - \bar{\psi})^2}} \quad (2)$$

Ο συντελεστὴς r εἰναι ἀνεξάρτητος τῶν μονάδων μετρήσεως, ἀποδεικνύεται δὲ ὅτι περιέχεται μεταξὺ -1 καὶ $+1$. Ήτοι $-1 \leq r \leq +1$. "Οταν $r > 0$, τότε ἔχομεν θετικὴν συσχέτισιν, ἡ ὅποια καθίσταται ίσχυροτέρα, καθὼς ὁ r πλησιάζει πρὸς τὸ $+1$. "Οταν $r < 0$, τότε ἔχομεν ἀρνητικὴν συσχέτισιν, ἡ ὅποια καθίσταται ίσχυροτέρα, καθὼς ὁ r πλησιάζει πρὸς τὸ -1 . "Οταν τὸ r εἰναι ἐγγύς τοῦ μηδενός, τότε ἡ συσχέτισις εἰναι λίαν ἀσθενῆς ἢ οὐδεμία συσχέτισις ὑπάρχει. Τέλος, ἐὰν $r = +1$ ἢ $r = -1$, τότε ἔχομεν ἀπόλυτον θετικὴν ἢ ἀρνητικὴν συσχέτισιν, ὅπότε μεταξὺ τῶν μεταβλητῶν x καὶ ψ ὑπάρχει μαθηματικὴ γραμμικὴ σχέσις τῆς μορφῆς $\psi = ax + b$. Ο συντελεστὴς συσχετίσεως r χρησιμοποιεῖται διὰ τὴν ἔξακριβωσιν τοῦ ὑπάρχοντος δεσμοῦ ἔξαρτήσεως μεταξὺ δύο φαινομένων εἰς πλείστας ὄσας περιπτώσεις, Ιδιαιτέρως δὲ εἰς τὴν Μετεωρολογίαν, Βιολογίαν, Ιατρικήν, Γεωργικήν ἔρευναν καὶ εἰς τὴν Οἰκονομίαν.

Κατὰ τὴν ἑφαρμογὴν ὅμως δέον ὁ ἐρευνητὴς νὰ ἐνεργῇ μετὰ πολλῆς περισκέψεως, διότι πολλάκις εύρισκομεν ίσχυρὸν συντελεστὴν συσχετίσεως διὰ φαι-

νόμενα τὰ δποια λογικῶς οὐδένα δεσμὸν ἔξαρτήσεως δύνανται νὰ ἔχουν.

Τὸ δρθὸν εἶναι νὰ ἔειτάζωμεν λογικῶς τὸ πρόβλημα πρῶτον καὶ ἀκολούθως νὰ διερευνῶμεν τὸ ἀποτέλεσμα.

‘Ο διάσημος στατιστικολόγος Tschuprow ἀναφέρει, ὅτι εἰς μίαν στατιστικὴν ἔρευναν ἐπὶ τοῦ μεγέθους τῶν ζημιῶν ἐκ πυρκαϊῶν καὶ τῆς παρουσίας ἡ μὴ πυροσβεστικῶν ἀντλιῶν ὁ συντελεστὴς συσχετίσεως ἀπέδειξεν, ὅτι αἱ πλέον ἐνδιαφέρουσαι ζημίαι συμπίπτουν γενικῶς μὲ τὴν παρουσίαν τῶν ἀντλιῶν. Πρέπει λοιπὸν νὰ καύσωμεν τὰς ἀντλίας ;

Παράδειγμα: Οἱ βαθμοὶ 12 μαθητῶν εἰς τὰ ‘Ελληνικά, Μαθηματικά, Φυσική εἶναι.

‘Ελληνικά	x	1	2	4	5	6	7	10	12	13	15	16	19	9,2 = \bar{x}
Μαθηματικά	ψ	2	10	4	12	12	16	16	18	18	16	18	19	13,4 = $\bar{\psi}$
Φυσική	z	1	9	4	10	16	12	14	16	14	16	18	18	12,3 = \bar{z}

Νὰ ύπολογισθῇ ὁ συντελεστὴς συσχετίσεως τῶν ἐπιδόσεων τῶν μαθητῶν εἰς τὰ 1) ‘Ελληνικά καὶ Μαθηματικά, 2) Μαθηματικά καὶ Φυσική.

Εύρισκομεν τὰς ἀποκλίσεις καὶ ἐφαρμόζομεν τὸν τύπον 2.

Oύτω:	$x_\lambda - \bar{x}$	-8,2	-7,2	-5,2	-4,2	-3,2	-2,2	0,8	2,8	3,8	5,8	6,8	9,8
	$\psi_\lambda - \bar{\psi}$	-11,4	-3,4	-9,4	-1,4	-1,4	2,6	2,6	4,6	4,6	2,6	4,6	5,6
	$z_\lambda - \bar{z}$	-11,3	-3,3	-8,3	-2,3	3,7	-0,3	1,7	3,7	1,7	3,7	5,8	5,8

$$\Sigma (x_\lambda - \bar{x})(\psi_\lambda - \bar{\psi}) = (-8,2)(-11,4) + (-7,2)(-3,4) + \dots + (9,8)(5,6) = 305,16$$

$$\Sigma (\psi_\lambda - \bar{\psi})(z_\lambda - \bar{z}) = (-11,4)(-11,3) + (-3,4)(-3,3) + \dots + (5,6)(5,8) = 313,36$$

$$\Sigma (x_\lambda - \bar{x})^2 = (-8,2)^2 + (-7,2)^2 + \dots + (6,8)^2 + (9,8)^2 = 377,68$$

$$\Sigma (\psi_\lambda - \bar{\psi})^2 = (-11,4)^2 + (-3,4)^2 + \dots + (4,6)^2 + (5,6)^2 = 348,92$$

$$\Sigma (z_\lambda - \bar{z})^2 = (-11,3)^2 + (-3,3)^2 + \dots + (5,8)^2 + (5,8)^2 = 326,98$$

$$\text{Άρα } \text{ἔχομεν : 1) } r_1 = \frac{305,16}{\sqrt{377,68 \cdot 348,92}} = \frac{305,16}{363,01} \approx 0,84$$

$$2) r_2 = \frac{313,36}{\sqrt{348,92 \cdot 326,98}} = \frac{313,36}{337,77} \approx 0,93$$

Ἐκ τῶν εὑρεθέντων συντελεστῶν συσχετίσεως συμπεραίνομεν :

- 1) ὅτι ἀμφότεραι αἱ συσχετίσεις εἶναι θετικαὶ καὶ λίαν ἰσχυραὶ
- 2) ὅτι ἡ συσχέτισις τῶν ἐπιδόσεων τῶν μαθητῶν εἰς τὰ Μαθηματικά – Φυσική εἶναι ἰσχυρότερα τῆς τοιαύτης εἰς τὰ ‘Ελληνικά – Μαθηματικά.

Οἱ μαθηταὶ εἰς ἀμφοτέρας τὰς συσχετίσεις δύνανται νὰ κατασκευάσουν τὸ μικτὸν διάγραμμα.

A S K H S E I S

- 431) Ἐκ τῶν κατωτέρω ἰδιοτήτων ποῖαι εἶναι ποιοτικαὶ καὶ ποῖαι ποσοτικαὶ ; Ἐκ δὲ τῶν μεταβλητῶν ποῖαι εἶναι συνεχεῖς καὶ ποῖαι ἀσυνεχεῖς. Ἀνάστημα – ἥλικια – ἐπάγγελμα – εἰσόδημα – θρησκεία – γλώσσα – οἰκογενειακὴ κατάστασις – ἀριθμὸς ἀγάμων – γεωργικὸς

κλῆρος — θερμοκρασία άέρος — θεραπευτήρια κατά γεωγραφικόν διαμέρισμα — βάρος — έξαγωγή σταφίδος εἰς τόνους — ἀπουσίαι μαθητῶν.

432) Εἰς ἓνα πρόχειρον δισγωνισμὸν οἱ 42 μαθηταὶ τῆς τάξεως μας ἔλαβον τοὺς ἀκολούθους βαθμούς :

12,	8,	15,	17,	10,	11,	6,	10,	12,	14,	11,	19,	16,	12
16,	10,	20,	7,	12,	11,	10,	13,	15,	9,	17,	18,	14,	2
13,	17,	18,	10,	14,	6,	11,	12,	14,	10,	13,	15,	13,	12

Νὰ σχηματισθῇ πίνακας κατανομῆς συχνοτήτων μὲ στήλας ἀπολύτου, σχετικῆς καὶ ἀθροιστικῆς συχνότητος.

433) Τὸ ἔτος 1965 οἱ μετανάσται ἐξ Ἑλλάδος ἀνῆλθον εἰς 117 χιλιάδας περίπου, ἐξ ὡν 65 χιλ. ἄνδρες καὶ 52 χιλ. γυναῖκες ἡλικίας ἀπὸ 0 — 75 ἑτῶν, ὡς ὁ ἀκόλουθος πίνακας : (Πηγὴ : Στατιστικὴ Ἐπετηρίς 1966)

Ἑλλικία	0-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	Σύνολον
Ἄνδρες	1,8	1,6	1,3	5,3	10,2	17	11,9	8,6	3,8	1,5	0,9	0,5	0,3	0,2	0,1	65
Γυναῖκες	1,8	1,6	1,4	8	11	10,3	7,1	4,7	2	1	1,1	0,8	0,6	0,4	0,2	52

Νὰ σχηματισθῇ πίνακας κατανομῆς μὲ στήλας ὡς τῆς προηγ. ἀσκήσεως.

434) Αἱ ἀφίεις εἰς Ἑλλάδα περιηγητῶν ἐκ τοῦ Ἐξωτερικοῦ ἀπὸ τοῦ ἔτους 1959—1965 ἔχουν ὡς ἀκολούθως : (Στατιστικὴ Ἐπετηρίς 1966)

Ἐτος	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	Εἰς χιλιάδας
Ἀφίεις	340,0	399,4	494,2	597,9	741,2	757,5	976,1	

Νὰ σχηματισθῇ πίνακας κατανομῆς μὲ στήλας ὡς τῆς προηγ. ἀσκήσεως.

435) Νὰ κατασκευασθῇ τὸ πολύγωνον συχνότητος τῶν ἀσκήσεων 432, 433 καὶ 434 ὡς καὶ τὸ πολύγωνον ἀθροιστικῆς συχνότητος.

436) Νὰ κατασκευασθῇ τὸ ιστόγραμμον συχνότητος καὶ ἀθροιστικῆς συχνότητος τῶν ἀσκήσεων 432 καὶ 433.

437) Νὰ κατασκευασθῇ ραβδόγραμμον διὰ τὰ στοιχεῖα τῆς ἀσκ. 434.

438) Τὰ γενικὰ ἔξοδα μιᾶς ἐπιχειρήσεως εἰναι :

Μισθοὶ δραχμαὶ 300.000, ἐνοίκια δραχ. 200.000, ἀσφάλειαὶ καὶ φόροι δραχ. 100.000, διαφήμισις 150.000, διάφορα δρχ. 50.000. Νὰ κατασκευασθῇ κυκλικὸν διάγραμμα αὐτῆς τῆς κατανομῆς.

439) Τὸ ἔτος 1966 ἡ ἔκτασις τῆς Ἑλλάδος παρουσίασεν τὴν ἔξῆς κατανομήν : Γεωργικὴ ἔκτασις 30%, Δασικὴ ἔκτασις 20,3%, Ἔκτασις βοσκῆς 38,2%, Οἰκοδομημένη ἔκτασις 3,5%, ἀμμώδης ἔκτασις 4,8%, ἔκτασις καλυπτομένη ὑπὸ ὑδάτων 3,2%. Νὰ κατασκευασθῇ κυκλικὸν διάγραμμα αὐτῆς τῆς κατανομῆς.

440) Νὰ εὑρεθῇ ὁ ἀριθμὸς μέσος καὶ ἡ διάμεσος εἰς τὰ δεδομένα τῶν ἀσκήσεων 432, 433 καὶ 434.

441) Νὰ εύρεθῃ ἡ ἐπικρατοῦσα τιμὴ εἰς τὰ δεδομένα τῆς ἀσκήσεως 433 κεχωρισμένως διὰ τοὺς ἄνδρας καὶ γυναῖκας καὶ ἀκολούθως διὰ τὸ σύνολον τῶν μεταναστῶν.

442) Τὸ προσωπικόν μιᾶς ἐπιχειρήσεως κατανέμεται ἀναλόγως τῶν ἑτῶν ὑπηρεσίας ὡς κάτωθι :

Ἐτη ύπηρεσίας	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45
Ἀριθμὸς ύπαλληλῶν	108	70	39	20	11	5	5	3	2

Νά γίνη ό πίναξ κατανομής συχνοτήτων δπολύτου, σχετικής καὶ άθροιστικής καὶ νά εύρεθοῦν αἱ κεντρικαὶ τιμαὶ \bar{x} , x_{δ} , x_{ε}

443) Οἱ δριθμ. μέσοις τῶν ἀριθμῶν x_1, x_2, \dots, x_v , $v \in N$, εἰναι \bar{x} .

Νά εύρεθῇ δριθμ. μέσοις τῶν ἀριθμῶν α) $x_1 + \kappa, x_2 + \kappa, \dots, x_v + \kappa$, β) $x_1 - \kappa, x_2 - \kappa, \dots, x_v - \kappa$, γ) kx_1, kx_2, \dots, kx_v , δ) $\frac{x_1}{\kappa}, \frac{x_2}{\kappa}, \dots, \frac{x_v}{\kappa}$, $\kappa \neq 0$, καὶ ε) $kx_1 + \lambda, kx_2 + \lambda, \dots, kx_v + \lambda$.

444) Δίδονται τὰ ἔξῆς βάρη εἰς kg : 3, 6, 6, 12, 9, 12, 10, 9, 12, 14, 17. Νά ύπολογισθῇ δριθμ. μέσος καὶ ἡ τυπικὴ ἀπόκλισις.

445) Τὰ ἡμερομίσθια 500 ἐργατῶν ἐνὸς ἐργοστασίου κατανέμονται ως ἔξῆς :

Τάξεις ἡμερομίσθ.	...-55	55-65	65-75	75-85	85-95	95-105	105-...
'Αριθμὸς ἐργατῶν	40	190	120	70	50	20	10

Νά εύρεθῇ δριθμ. μέσος, ἡ τυπικὴ ἀπόκλισις καὶ δριθμὸς τῶν ἐργατῶν, οἱ διποῖοι ἔχουν ἡμερομίσθιον α) ἀπό $\bar{x} - s$ ἕως $\bar{x} + s$ καὶ β) ἀπό $\bar{x} - 2s$ ἕως $\bar{x} + 2s$. Νά γίνη δὲ καὶ τὸ διάγραμμα διασπορᾶς.

446) Τὰ ἀναστήματα καὶ τὰ βάρη 346 δτόμων κατανέμονται ως ἔξῆς :

Βάρος εἰς kg	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95-100
'Αριθμὸς ἀπόμων	2	3	12	38	88	70	55	39	26	13

'Ανάστημα cm	150-155	155-160	160-165	165-170	170-175	175-180	180-185	185-190
'Αριθμὸς ἀπόμων	1	2	9	48	131	102	40	13

Νά εύρεθοῦν οἱ μέσοι, αἱ διακυμάνσεις, αἱ τυπικαὶ ἀποκλίσεις εἰς ἔκαστην σειρὰν καὶ νά ἔτετασθῇ εἰς ποιάν εἰναι μεγαλυτέρα ἡ διασπορά.

447) Δύο τυχαῖαι μεταβληταὶ ἐνεφανίσθησαν εἰς ζεύγη ἀντιστοίχων τιμῶν ως ἀκολούθως :

x	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ψ	4	5	10	12	5	5	4	5	4	3

Νά ύπολογισθῇ δ συντελεστής συσχετίσεως καὶ νά γίνη τὸ στικτὸν διάγραμμα τῶν 10 τούτων ζευγῶν.

448) Τὰ χρησιμοποιηθέντα ὑπὸ μιᾶς ἑταίρειας κεφάλαια ἐπὶ 10 διαδοχικά ἔτη ως καὶ τὰ ἀντίστοιχα κέρδη δίδονται ως ἀκολούθως :

Κεφάλαιον εἰς ἑκατομ. δρχ.	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Κέρδος εἰς ἑκατομ. δρχ.	2	4	8	5	10	15	14	20	22	30

Νά εύρεθῇ δ συντελεστής συσχετίσεως καὶ νά γίνη τὸ στικτὸν διάγραμμα.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ XVI

ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ

133. ΤΟ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΝ ΤΟΞΟΝ ΚΥΚΛΟΥ ΚΑΙ Η ΓΩΝΙΑ. ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ

Ἐπὶ ἑνὸς κύκλου κέντρου Ο (Σχ. 133.1) ἀς θεωρήσωμεν δύο σημεῖα Α καὶ Β. Τὰ σημεῖα Α καὶ Β χωρίζουν τὴν περιφέρειαν εἰς δύο τόξα, τὸ \widehat{AMB} καὶ τὸ \widehat{BMA} . Αἱ ἡμιευθεῖαι Οα καὶ Οβ ὁρίζουν δύο ἐπικέντρους γωνίας, τὰς $\angle(Oa, Ob)$ καὶ $\angle(Ob, Oa)$. Ἡ $\angle(Oa, Ob)$ ἀντιστοιχεῖ εἰς τὸ τόξον \widehat{AMB} καὶ ἡ $\angle(Ob, Oa)$ εἰς τὸ τόξον \widehat{BMA} . Ἐὰν φαντασθῶμεν ὅτι τὸ ἐπίπεδον τοῦ κύκλου στρέφεται περὶ τὸ Ο κατὰ τὴν θετικὴν φορὰν περιστροφῆς, ὅταν τὸ σημεῖον Α κινούμενον διαγράψῃ τὸ τόξον \widehat{AMB} , ἡ ἀκτὶς Οα, ἐπὶ τῆς ὁποίας κεῖται τὸ σημεῖον Α, θὰ διαγράψῃ τὸ ἐσωτερικὸν τῆς ἀντιστοίχου ἐπικέντρου γωνίας (Oa, Ob)


Ἡ ἀπόλυτος τιμὴ ἑνὸς τόξου (ἢ μιᾶς γωνίας) εἶναι ὁ λόγος τοῦ τόξου (ἢ τῆς γωνίας) πρὸς τὴν μονάδα τῶν τόξων (ἢ τῶν γωνιῶν).

Ἡ γεωμετρία διδάσκει ὅτι λόγος δύο τόξων τῆς αὐτῆς ἀκτίνος ίσοῦται πρὸς τὸν λόγον τῶν ἀντιστοίχων ἐπικέντρων γωνιῶν καὶ ἐπομένως : ἐν τόξον ἔχει τὴν αὐτὴν ἀπόλυτον τιμὴν μὲ τὴν ἀντιστοιχόν του ἐπίκεντρον γωνίαν, ἐὰν βεβαίως ὡς μονάς μετρήσεως τῶν τόξων λαμβάνεται τὸ τόξον τὸ ἀντιστοιχοῦν εἰς τὴν μονάδα τῶν γωνιῶν.

Ἐκ τούτου ἔπειται, ὅτι τόξα ἀνήκοντα εἰς κύκλους μὲ διαφορετικάς ἀκτίνας ἔχουν τὴν αὐτὴν ἀπόλυτον τιμήν, ἢ ὅπως ἄλλως λέγομεν, ἐκφράζονται μὲ τὸν αὐτὸν ἀπόλυτον ἀριθμόν, ὅταν ἀντιστοιχοῦν εἰς τὴν αὐτὴν ἢ ἵσας ἐπικέντρους γωνίας.

Τὸ μέγεθος ἑνὸς τόξου ἐκφράζεται κατὰ "δύο, τρόπους :

- 1) μὲ τὸ μῆκος του, ὅταν εἴναι γωνστὴ ἡ ἀκτὶς του καὶ
- 2) μὲ τὴν ἀπόλυτον τιμήν του, τῇ βοηθείᾳ μιᾶς ὠρισμένης μονάδος τόξων,



Σχ. 133.1

ή όποιας άπόλυτος τιμή δὲν έξαρτάται από την άκτινα τοῦ κύκλου.

Βασικὴ μονὰς μετρήσεως τῶν γωνιῶν εἶναι ή όρθη γωνία. Ἡ ἀντίστοιχος μονὰς τόξων εἶναι τὸ $\frac{1}{4}$ τοῦ κύκλου. Ἡ όρθη γωνία ὑποδιαιρεῖται εἰς 90 ἵσας γωνίας ἑκάστη ἐκ τῶν ὅποιων λέγεται **μία μοῖρα**, συμβολικῶς 1^o. Ἡ γωνία μιᾶς μοίρας ὑποδιαιρεῖται εἰς 60 ἵσας γωνίας ἑκάστη ἐκ τῶν ὅποιων λέγεται **ἕν λεπτόν**, συμβολικῶς 1'. Ἡ γωνία τοῦ 1' ὑποδιαιρεῖται εἰς 60 ἵσα μέρη, **ἕκαστον** ἐκ τῶν ὅποιων λέγεται **ἕν δεύτερον λεπτόν**, συμβολικῶς 1''.

Ἄντιστοίχως τὸ 1/4 τοῦ κύκλου ὑποδιαιρεῖται εἰς 90 ἵσα τόξα **ἕκαστον** ἐκ τῶν ὅποιων λέγεται μία μοῖρα κύκλου καὶ συμβολίζεται ὁμοίως 1^o. Τὸ τόξον μιᾶς μοίρας ὑποδιαιρεῖται εἰς 60 ἵσα μέρη **ἕκαστον** ἐκ τῶν ὅποιων λέγεται **ἕν λεπτόν** (1') κύκλου κ.τ.λ.

Ἡ θεωρητικὴ μονὰς τόξων ἡ γωνιῶν εἶναι τὸ ἀκτίνιον (rad). **Τὸ ἀκτίνιον** εἶναι τόξον τοῦ ὅποιου τὸ μῆκος εἶναι π πρὸς τὸ μῆκος τῆς ἀκτίνος τοῦ κύκλου εἰς τὸν ὅποιον ἀνίκει τὸ τόξον. Ἐπίστης γωνία **ἐνὸς ἀκτίνιον** λέγεται ή ἀντίστοιχος ἐπίκεντρος γωνία τοῦ τόξου **ἐνὸς ἀκτινίου** (Σχ. 133.2).

Ἡ ἀπόλυτος τιμὴ ἐπομένως **ἐνὸς τόξου** εἰς ἀκτίνια εἶναι ὁ λόγος τοῦ μήκους τοῦ τόξου τούτου πρὸς τὴν ἀκτίνα. Τὸ μῆκος s ἐνὸς τόξου κύκλου ἀκτίνος r συνδέεται μὲ τὴν ἀπόλυτον τιμὴν α τοῦ τόξου τούτου εἰς ἀκτίνια διὰ τῆς **ἰσότητος**:

$$\alpha = \frac{s}{r} \Leftrightarrow s = \alpha r$$

Ἐὰν ως μονὰς μετρήσεως τοῦ μήκους ληφθῇ ή ἀκτὶς r , τότε τὸ μῆκος τοῦ τόξου **ἐκφράζεται** μὲ τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν μὲ τὸν ὅποιον **ἐκφράζεται** καὶ ή ἀπόλυτος τιμὴ τοῦ τόξου τούτου εἰς ἀκτίνια.

"Οθεν ή ἀπόλυτος τιμὴ τοῦ κύκλου ὀλοκλήρου εἰς ἀκτίνια εἶναι $\frac{2\pi r}{r} = 2\pi$. Ο ἀριθμὸς αὐτὸς 2π **ἐκφράζει** ἐπίστης τὸ μῆκος κύκλου ἀκτίνος π στης μὲ τὴν μονάδα. Ἡ ἀπόλυτος τιμὴ τοῦ ἡμικυκλίου εἶναι π καὶ τοῦ $\frac{1}{4}$ τοῦ κύκλου εἶναι $\frac{\pi}{2}$.

Αναφέρομεν ἐδῶ καὶ μίαν μονάδα, τὴν ὅποιαν ἐσχάτως χρησιμοποιοῦν εἰς τὰς στρατιωτικὰς ἐφαρμογάς, τὸ **mil** *, τὸ ὅποιον **ἰσοῦται** μὲ τὸ $\frac{1}{6400}$ τοῦ κύκλου. Τοῦτο κατὰ μεγάλην προσέγγισιν **ἰσοῦται** μὲ $\frac{1}{1000}$ rad.

Ἐὰν διὰ τῶν α καὶ μ παραστήσωμεν τὰς ἀπολύτους τιμὰς τοῦ αὐτοῦ τόξου μὲ μονάδας ἀντίστοιχως τὸ ἀκτίνιον καὶ τὴν μοῖραν, ἐὰν τὸ τόξον τούτο δὲν ὑπερβαίνῃ τὸν κύκλον, θὰ **ἰσχύῃ** ή **ἰσότης**:

$$\frac{\alpha}{\pi} = \frac{\mu}{180} \quad (133, \alpha)$$

(*) «χιλιοστὸν» κατὰ τὴν ἐλληνικὴν στρατιωτικὴν ὄρολογίαν.


Πράγματι, δύο τόξα ἃς μετρηθοῦν διαδοχικῶς μὲν μονάδας τὸ ἀκτίνιον καὶ τὴν μοίραν. Ἐστωσαν δὲ αἱ καὶ μὲν ἀπόλυτοι τιμαὶ τοῦ πρώτου τόξου εἰς ἀκτίνια καὶ μοίρας καὶ αἱ καὶ μὲν τοῦ δευτέρου τόξου ἀντιστοίχως εἰς ἀκτίνια καὶ μοίρας. Ἡ γεωμετρία διδάσκει ὅτι ὁ λόγος δύο τόξων δὲν ἔξαρτᾶται ἀπὸ τὴν μονάδα μετρήσεως των καὶ ὅτι $\frac{\alpha}{\alpha'} = \frac{\mu}{\mu'}$.

Ἐὰν ὡς δεύτερον τόξον ληφθῇ τὸ ἡμισυ κύκλου τότε ἡ ἴσοτης $\frac{\alpha}{\alpha'} = \frac{\mu}{\mu'}$ γίνεται $\frac{\alpha}{\pi} = \frac{\mu}{180}$.

Ἡ ἴσοτης λοιπὸν (133, α) μᾶς ἐπιτρέπει νὰ εὑρίσκωμεν τὴν ἀπόλυτον τιμὴν ἐνὸς τόξου ὡς πρὸς τὴν μίαν ἐκ τῶν μονάδων, ὅταν γνωρίζωμεν τὴν ἀπότον τιμὴν του ὡς πρὸς τὴν ἄλλην.

134. ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΕΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΕΝΟΝ ΤΟΞΟΝ.

Ἐὰν ἐν κινητὸν σημεῖον ἀναχωρήσῃ ἐκ τίνος σημείου Α ἐνὸς κύκλου (Σχ. 134), δύναται νὰ διαγράψῃ αὐτὸν κινούμενον ἐπ' αὐτοῦ κατὰ δύο φοράς. Ἐκ τῶν φορῶν τούτων ἡ ἀντίθετος πρὸς τὴν φορὰν τῆς κινήσεως τῶν δεικτῶν τοῦ ὡρολογίου δρίζεται ὡς **θετικὴ φορὰ** καὶ ἡ συμφωνοῦσα μὲ τὴν τῆς κινήσεως τῶν δεικτῶν τοῦ ὡρολογίου ὡς **ἀρνητικὴ φορά**. Ὄταν ἐπὶ ἐνὸς κύκλου, ἔχῃ δρισθῆ ἡ θετική, ἐπομένως καὶ ἡ ἀρνητικὴ φορά, δικύκλος λέγεται **προσανατολισμένος**. Τὴν θετικὴν φορὰν συμβολίζομεν εἰς τὸ σχῆμα μὲν ἐν βέλος συνοδευόμενον μὲ τὸ σύμβολον +.



Σχ. 134

Ἐὰν τώρα ἐπὶ ἐνὸς προσανατολισμένου, κύκλου ἔχωμεν δύο σημεῖα Α καὶ B, τότε ἐπὶ τοῦ κύκλου τούτου δρίζονται τέσσαρα τόξα προσανατολισμένα, τῶν δποίων τὸ μῆκος εἶναι μικρότερον τοῦ κύκλου διότι ἐν τόξον \widehat{AB} εἶναι δυνατὸν νὰ διαγραφῇ ὑπὸ κινητοῦ σημείου εἴτε ἐκ τοῦ A πρὸς τὸ B εἴτε ἐκ τοῦ B πρὸς τὸ A. Ὁρίζονται λοιπὸν δύο τόξα AB : ἐν λεγόμενον **θετικὸν τόξον AB**, συμβολιζόμενον μὲ \widehat{AB}^+ , καὶ ἐν **ἀρνητικὸν τόξον AB**, συμβολιζόμενον μὲ \widehat{AB}^- , καθ' ὅσον τὸ ἔχει τὴν θετικὴν φορὰν τοῦ προσανατολισμένου κύκλου καὶ τὸ ἄλλο τὴν ἀρνητικήν. Γενικῶς ἐν τόξον προσανατολισμένον συμβολίζεται μὲ \widehat{AB} .

Ορίζονται ἐπίσης δύο τόξα \widehat{BA} , τὸ ἔνθιθετον \widehat{BA}^+ καὶ τὸ ἄλλο ἀρνητικὸν \widehat{BA}^- . Διὰ νὰ μὴ γίνεται σύγχυσις δυνάμεθα νὰ διατηρήσωμεν τὸ ὄνομα γεωμετρικὸν τόξον AB , συμβολικῶς \widehat{AB} , διὰ τὸ μικρότερον θετικὸν τόξον \widehat{AB}^+ .

Τοῦ προσανατολισμένου τόξου \widehat{AB} , τὸ σημεῖον A λέγεται : **ἡ ἀρχὴ** τοῦ \widehat{AB} καὶ τὸ B : **τὸ πέρας** τοῦ \widehat{AB} .

Τὰ κατὰ τὸν ἀνωτέρω τρόπον δρισθέντα τόξα εἶναι μερικαὶ περιπτώσεις

γενικωτέρων προσανατολισμένων τόξων, τῶν ὅποίων τὸ μῆκος δύναται νὰ εἰναι μεγαλύτερον τοῦ μήκους τοῦ κύκλου.

Πράγματι, ἂν φαντασθῶμεν ἐν κινητὸν σημεῖον ἐπὶ τοῦ κύκλου (Σχ. 134), τοῦτο δύναται ἀναχωροῦ ἐκ τοῦ Α νὰ ἔκτελέσῃ μίαν ἡ περισσοτέρας περιστροφὰς διατρέχον τὸν κύκλον καὶ νὰ σταματήσῃ εἰς τὸ Β. Τὸ κινητὸν τοῦτο σημεῖον δύναται μάλιστα νὰ κινηθῇ κατὰ τὴν θετικὴν ἡ τὴν ἀρνητικὴν φορὰν ἐπὶ τοῦ κύκλου.

Τὰ οὕτως δριζόμενα τόξα λέγονται **τριγωνομετρικά** τόξα, καὶ συμβολίζονται ἐπίσης διὰ τοῦ συμβόλου **ΑΒ**.

Διὰ νὰ εἴναι ὅμως ἐν τριγωνομετρικὸν τόξον τελείως ὠρισμένον, πρέπει νὰ γνωρίζωμεν 1) τὴν ἀρχήν του, 2) τὸ πέρας του, 3) τὴν φορὰν του καὶ 4) τὸν ἀριθμὸν τῶν ὀλοκλήρων περιστροφῶν, τὰς ὅποιας τὸ κινητὸν σημεῖον διέγραψε μέχρις ὅτου σταματήσῃ εἰς τὸ πέρας τοῦ τόξου. "Ωστε :

Τριγωνομετρικὸν τόξον ΑΒ λέγονται ὅλα τὰ τόξα, τὰ ὅποια διαγράφονται ὑπὸ κινητοῦ σημείου, τὸ ὅποιον ἀναχωροῦ ἐκ τοῦ Α καὶ κινούμενον πάντοτε κατὰ τὴν αὐτὴν φοράν, θετικὴν, ἀρνητικὴν, σταματᾶ εἰς τὸ Β πρὶν ἡ διατρέξῃ ὀλόκληρον τὸν κύκλον ἡ ἀφοῦ διατρέξῃ προηγουμένως ἔνα ἀκέραιον ἀριθμὸν κύκλων.

Οὕτως ἐννοοῦμεν ὅτι ὑπάρχουν ἀπειράθιμα τριγωνομετρικὰ τόξα ἔχοντα τὴν αὐτὴν ἀρχὴν καὶ τὸ αὐτὸ πέρας, θετικὰ καὶ ἀρνητικά.

135. ΑΛΓΕΒΡΙΚΗ ΤΙΜΗ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΤΟΞΟΥ,

"Ἐν τριγωνομετρικὸν τόξον, ὅπως ἐν γεωμετρικὸν τόξον, δύναται νὰ μετρηθῇ μὲ μίαν ἐκ τῶν μονάδων τόξων. 'Ο ἀριθμὸς, ὁ ὅποιος θὰ προκύψῃ κατ' αὐτὸν τὸν τρόπον εἰναι ἡ ἀπόλυτος τιμὴ, ἡ ὅποια χαρακτηρίζει τὸ μέγεθος, ἀλλ' ὅχι καὶ τὴν φορὰν τοῦ τόξου. 'Εὰν τώρα εἰς τὴν ἀπόλυτον τιμὴν προτάξωμεν τὸ +, ἐὰν τὸ τόξον εἰναι θετικὸν καὶ τὸ —, ἐὰν αὐτὸ εἰναι ἀρνητικόν, ἔχομεν τὴν λεγομένην ἀλγεβρικὴν τιμὴν τοῦ προσανατολισμένου τόξου.

Δύο προσανατολισμένα τόξα τοῦ αὐτοῦ κύκλου ἡ ἵσων κύκλων εἰναι **ἴσα**, δταν ἔχουν τὴν αὐτὴν ἀλγεβρικὴν τιμήν. Εἰναι ἀντίθετα, ἐὰν αἱ ἀλγεβρικαὶ τιμαὶ των εἰναι ἀριθμοὶ ἀντίθετοι.

Τὸ προσανατολισμένον τόξον, τὸ ὅποιον ἔχει ἀρχὴν καὶ πέρας ταυτιζόμενα πρὸ πάστης περιστροφῆς, εἰναι ἐν **συμβατικὸν τόξον**, λεγόμενον **μηδενικὸν τόξον**. Τούτου ἀλγεβρικὴ τιμὴ εἰναι ὁ ἀριθμὸς 0.

'Εκ τῶν ἀνωτέρω γίνεται φανερὸν ὅτι τὸ προσανατολισμένον τόξον δύναται νὰ θεωρηθῇ ὡς μία μεταβλητή, ἡ ὅποια δύναται νὰ λάβῃ ὅλας τὰς πραγματικά τιμάς, ἡ ὅποια δηλ. διατρέχει τὸ σύνολον R, ἐὰν θεωρήσωμεν τὴν ἀλγεβρικὴν τιμὴν τῶν τόξων ὡς ἔνα ἄλλο σύμβολον διὰ τὸ τόξον.

136. ΤΟΞΑ EXONTA KOINHN ARXHN KAI KOINON PEPAS.

"Εστω προσανατολισμένος κύκλος κέντρου O (Σχ.136), A ἡ ἀρχὴ τῶν τόξων

καὶ Μ τυχὸν σημείον τοῦ κύκλου. Ἐστω τὴν ἀλγεβρικὴν τιμὴν τοῦ πρώτου θετικοῦ τόξου \widehat{AM} . Ἐὰν εἰναι ἡ ἀλγεβρικὴ τιμὴ τοῦ θετικοῦ κύκλου (ἡ ἀπόλυτος τιμὴ τῶν τόξων εὐρίσκεται πάντοτε εἰς τὴν αὐτήν μονάδα: εἰς μοίρας ἢ εἰς ἀκτίνια), τότε τὸ δεύτερον θετικὸν τόξον \widehat{AM} θὰ ἔχῃ ἀλγεβρικὴν τιμὴν $c + t$ τὸ τρίτον $2c + t$, τὸ τέταρτον $3c + t$ καὶ γενικῶς ἡ ἀλγεβρικὴ τιμὴ τοῦ τυχόντος θετικοῦ τόξου \widehat{AM} , θὰ δίδεται ὑπὸ τοῦ τύπου $kc + t$, ὅπου καὶ εἰναι θετικὸς ἀκέραιος ἢ ὁ 0.

Ἡ ἀλγεβρικὴ τιμὴ τοῦ πρώτου ἀρνητικοῦ τόξου \widehat{AM} θὰ εἰναι $-c + t$, τοῦ δευτέρου ἀρνητικοῦ τόξου \widehat{AM} θὰ εἰναι $-2c + t$, τοῦ τρίτου $-3c + t$, τοῦ τετάρτου $-4c + t$ καὶ γενικῶς ἡ ἀλγεβρικὴ τιμὴ τοῦ τυχόντος ἀρνητικοῦ τόξου \widehat{AM} θὰ δίδεται ὑπὸ τοῦ τύπου $kc + t$, ὅπου καὶ κάποιος ἀρνητικὸς ἀκέραιος.

Ἐὰν λοιπὸν διὰ τοῦ χαραστήσωμεν τὴν ἀλγεβρικὴν τιμὴν τοῦ τυχόντος τόξου \widehat{AM} (θετικοῦ ἢ ἀρνητικοῦ), αὐτῇ θὰ δίδεται ὑπὸ τοῦ τύπου

$$x = kc + t, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Ἐὰν ως μονὰς ἔχῃ ληφθῆ τὸ ἀκτίνιον ὁ τύπος γίνεται :

$$x = 2k\pi + t, \quad k \in \mathbb{Z} \quad (\alpha)$$

Ἐὰν ως μονὰς ἔχῃ ληφθῆ ἡ μοῖρα ὁ τύπος γίνεται :

$$x^0 = 360^\circ k + t^0, \quad k \in \mathbb{Z} \quad (\alpha')$$

Ἡ ισότης (α), καὶ ἐπίσης ἡ (α'), δὲν μεταβάλλεται, ἀντὶ τῆς τοῦ λάθισμαν τὴν ἀλγεβρικὴν τιμὴν ἔνος διποιουδήποτε ἄλλου, ἀλλ' ὠρισμένου, τόξου \widehat{AM} . Πράγματι, ἐὰν εἰς τὸν ἀνωτέρω τύπον (α) ἀντικαταστήσωμεν τὸ k μὲ κάπιον ἀριθμὸν τοῦ συνόλου Z , π.χ. τὸν k_1 , θὰ εὔρωμεν τὴν ἀλγεβρικὴν τιμὴν t_1 ἐνὸς ἐκ τῶν τόξων \widehat{AM} . Θὰ εἰναι λοιπόν :

$$x = 2k\pi + t$$

$$t_1 = 2k_1\pi + t$$

καὶ ἐκ τούτων δι' ἀφαιρέσεως κατὰ μέλη :


$$x - t_1 = 2(k - k_1)\pi, \quad \text{δηλ. } x = 2\lambda\pi + t_1$$

ὅπου $\lambda \in \mathbb{Z}$ καὶ t_1 εἰναι ἡ ἀλγεβρικὴ τιμὴ τοῦ τυχόντος ἀλλ' ὠρισμένου τόξου \widehat{AM} .

Ο τύπος λοιπὸν (α) μᾶς δίδει τὴν ἀλγεβρικὴν τιμὴν τοῦ τυχόντος προσανατολισμένου τόξου \widehat{AM} , ὅταν γνωρίζωμεν τὴν ἀλγεβρικὴν τιμὴν ἔνος τυχόντος ἀλλ' ὠρισμένου τόξου \widehat{AM} .

Ο αὐτὸς τύπος (α) γράφεται :

$$x - t = 2k\pi \quad \text{ἢ } x^0 - t^0 = 360^\circ k, \quad k \in \mathbb{Z}$$



Σχ. 136

Δηλαδή: Δύο τριγωνομετρικά τόξα, τὰ όποια ἔχουν τὴν αὐτὴν ἀρχὴν καὶ τὸ αὐτὸν πέρας διαφέρουν κατὰ ἀκέραιον ἀριθμὸν κύκλου.

'Αντιστρόφως : ὅς θεωρήσωμεν ἐν τόξον \widehat{AM} μὲ ἀλγεβρικὴν τιμὴν
 $\tau_1 = 2\kappa\pi + \tau$

καὶ ἐν ἄλλῳ τόξον μὲ τὴν ίδιαν ἀρχὴν A καὶ ἀλγεβρικὴν τιμὴν τ_2 διαφέρουσαν τῆς τ_1 , κατὰ ἀκέραιον πολλαπλάσιον τῆς ἀλγεβρικῆς τιμῆς ὀλοκλήρου κύκλου ἔστω κατὰ $\kappa_2 2\pi$. Τότε, συμφώνως πρὸς ὅσα ἀνωτέρω εἴπομεν, θὰ εἶναι :

$\tau_2 = \tau_1 + \kappa_2 2\pi = 2\kappa\pi + \tau + 2\kappa_2\pi = 2(\kappa + \kappa_2)\pi + \tau$
 καὶ ἐπειδὴ $\kappa_1 \in \mathbb{Z}$, $\kappa_2 \in \mathbb{Z}$ θὰ εἶναι καὶ $(\kappa_1 + \kappa_2) \in \mathbb{Z}$ καὶ ἐπομένως

$$\tau_2 = 2\lambda\pi + \tau, \lambda \in \mathbb{Z}$$

'Εκ τῆς τελευταίας ταύτης ισότητος συνάγομεν ὅτι τὸ τόξον μὲ ἀλγεβρικὴν τιμὴν τ_2 θὰ ἔχῃ πέρας τὸ σημεῖον M .

Ωστε: *'Αναγκαία καὶ ίκανὴ συνθήκη ίνα δύο προσανατολισμένα τόξα τοῦ αὐτοῦ κύκλου ἔχοντα κοινὴν ἀρχὴν ἔχουν καὶ κοινὸν πέρας εἰναι αἱ ἀλγεβρικαὶ τιμαὶ τῶν νὰ διαφέρουν κατὰ $2\kappa\pi$ ($360^\circ\kappa$), ὅπου $\kappa \in \mathbb{Z}$.*

137. ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΕΝΗ ΓΩΝΙΑ. ΑΛΓΕΒΡΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΥΤΗΣ.

'Η ἔννοια τῆς προσανατολισμένης γωνίας καὶ τῆς ἀλγεβρικῆς τιμῆς τῆς μᾶς εἶναι γνωστὴ ἀπὸ τὴν γ' τάξιν.

'Η ἀντιστοιχία, ἡ ὅποια ὑπάρχει μεταξὺ τόξου καὶ ἐπικέντρου γωνίας του μᾶς ἐπιπρέπει νὰ συνδέσωμεν τὴν ἔννοιαν τοῦ προσανατολισμένου τόξου μὲ τὴν ἔννοιαν τῆς προσανατολισμένης γωνίας (Σχ. 137).

Πράγματι ὅταν τὸ κινητὸν σημεῖον ἀναχωροῦν ἐκ τοῦ A διαγράφῃ τὸ τόξον \widehat{AB} , τότε ἡ ἡμιευθεῖα Oa διαγράφει τὸ ἐσωτερικὸν τῆς προσανατολισμένης γωνίας (Oa, Ob), τὴν ὅποιαν συμβολίζομεν μὲ $\vec{\alpha}$ (Oa, Ob), ἃν εἶναι θετικὴ ἢ μὲ $\vec{\alpha}$ (Oa, Ob), ἃν εἶναι ἀρνητική. 'Η τελικὴ πλευρὰ Ob τῆς προσανατολισμένης γωνίας, πρὶν ἡ λάβῃ τὴν τελικὴν θέσιν Ob δύναται νὰ ἐκτελέσῃ

μίαν ἢ περισσοτέρας περιστροφὰς περὶ τὸ O καὶ νὰ διαγράψῃ οὕτω ἔνα ἀκέραιον ἀριθμὸν θετικῶν ἢ ἀρνητικῶν πλήρων γωνιῶν. 'Υπάρχουν ἐπομένως ἀπειράριθμοι προσάνατολισμέναι γωνίαι ἔχουσαι τὴν αὐτὴν ἀρχικὴν καὶ τὴν αὐτὴν τελικὴν πλευρὰν. 'Εκάστη ἐκ τῶν γωνιῶν τούτων λέγεται : **τριγωνομετρικὴ γωνία.** Κατὰ ταῦτα ὑπάρχει μία ἀμφιμονοσήμαντος ἀντιστοιχία μεταξὺ τῶν τόξων \widehat{AB} καὶ τῶν προσανατολισμένων γωνιῶν (Oa, Ob)

'Η μικροτέρα θετικὴ γωνία $\vec{\alpha}$ (Oa, Ob), ἡ ὅποια ἀντιστοιχεῖ εἰς τὸ τόξον \widehat{AB}^+ , ἥμπορει νὰ ὀνομασθῇ **γεωμετρικὴ γωνία**, ἡ ὅποια συμβολίζεται $\vec{\alpha}$ (Oa, Ob).

'Η ἀλγεβρικὴ τιμὴ x τῆς τυχούσης τριγωνομετρικῆς γωνίας μὲ ἀρχικὴν πλευρὰν Oa καὶ τελικὴν πλευρὰν Ob δίδεται προφανῶς ὑπὸ τοῦ τύπου :

$x^o = 360^o k + \tau^o$ ή $x = 2k\pi + \tau$, όπου $k \in \mathbb{Z}$ καὶ τ είναι ἡ ἀλγεβρικὴ τιμὴ μιᾶς δόποιασδήποτε ἐκ τῶν γωνιῶν τούτων, ἀλλ' ὥρισμένης, εἰς μοίρας η ἀκτίνια.

Δυνάμεθα δὲ νὰ διατυπώσωμεν τὴν ἔξῆς πρότασιν :

Ἀναγκαία καὶ ἵκανη συνθήκη, ἵνα δύο τριγωνομετρικαὶ γωνίαι ἔχουσαι κοινὴν ἀρχικὴν ἔχουν καὶ κοινὴν τελικὴν πλευράν, εἶναι αἱ ἀλγεβρικαὶ τιμαὶ των νὰ διαφέρουν κατὰ $2k\pi$ ($360^o k$), ὅπου $k \in \mathbb{Z}$.

Δυνάμεθα ἑπομένως νὰ μεταβαίνωμεν ἀδιαφόρως ἀπὸ τὰ τόξα εἰς τὰς ἀντιστοίχους γωνίας καὶ ἀντιστρόφως καὶ νὰ ἐφαρμόζωμεν εἰς ἕκαστον ἐκ τῶν μεγεθῶν τούτων τὰς μετρικὰς ἰδιότητας τοῦ ἄλλου, διότι ἐν προσανατολισμένον τόξον καὶ ἡ ἀντίστοιχος προσανατολισμένη γωνία ἔχουν πάντοτε τὴν αὐτὴν φοράν.

Δύο τριγωνομετρικαὶ γωνίαι λέγονται ἀντίθετοι, ὅταν αἱ ἀλγεβρικαὶ τιμαὶ των είναι ἀριθμοὶ ἀντίθετοι.

138. ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΥΟ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΞΩΝ

Ἄθροισμα προσανατολισμένων τόξων ἐνὸς κύκλου δυνομάζομεν τὸ προσανατολισμένον τόξον, τὸ δποῖον ἔχει ὡς ἀλγεβρικὴν τιμὴν τὸ ἄθροισμα τῶν ἀλγεβρικῶν τιμῶν τῶν διθέντων τόξων.

Ἐκ τοῦ ὁρισμοῦ τούτου καθίσταται φανερὸν ὅτι διὰ τὸ ἄθροισμα τῶν προσανατολισμένων τόξων ἴσχύουν αἱ ἔξῆς ἰδιότητες.

1) Δυνάμεθα εἰς ἐν ἄθροισμα προσανατολισμένων τόξων νὰ ἀλλάξωμεν τὴν σειρὰν τῶν προσθετέων.

2) Δυνάμεθα νὰ ἀντικαταστήσωμεν ὁσουσδήποτε προσθετέους δι' ἐνός, τοῦ ἀθροίσματός των.

Διὰ νὰ εὔρωμεν τὸ ἄθροισμα προσανατολισμένων τόξων \widehat{AB} , \widehat{CD} , \widehat{DE} , ... καθιστῶμεν αὐτὰ διαδοχικά. Λαμβάνομεν, π.χ., ἀπὸ τοῦ σημείου B ἐν τόξον \widehat{BZ} ἀλγεβρικῆς τιμῆς ἵστης μὲ τὴν τοῦ \widehat{CD} καὶ ἀπὸ τοῦ σημείου Z ἐν τόξον \widehat{ZD} ἀλγεβρικῆς τιμῆς ἵστης πρὸς τὴν τοῦ \widehat{DE} κ.ο.κ. Τὸ τόξον, τὸ δποῖον ἔχει ἀρχὴν τὴν ἀρχὴν τοῦ πρώτου A καὶ πέρας τὸ πέρας τοῦ τελευταίου, θὰ ἔχῃ ἀλγεβρικὴν τιμὴν ἵσην πρὸς τὸ ἄθροισμα τῶν ἀλγεβρικῶν τιμῶν τῶν διθέντων τόξων, δηλ. θὰ είναι τὸ ἄθροισμα αὐτῶν.


Οὕτω, π.χ., ἀν A, B, C ($\Sigma\chi.$ 134, σελ. 231) είναι τρία σημεῖα ἐπὶ κύκλου προσανατολισμένου καὶ θεωρήσωμεν τὰ τόξα \widehat{AB} καὶ \widehat{BC} , τότε ἄθροισμά των είναι τὸ τόξον \widehat{AC} . Ἐὰν α είναι ἡ ἀπόλυτος τιμὴ τοῦ γεωμετρικοῦ τόξου \widehat{AB} , β ἡ ἀπόλυτος τιμὴ τοῦ γεωμετρικοῦ τόξου \widehat{BC} , τότε θὰ ἔχωμεν :

ἀλγ. τιμὴ τοῦ $\widehat{AB} = \alpha + 2k\pi$, ἀλγ. τιμὴ τοῦ $\widehat{BC} = \beta + 2k'\pi$, ἑπομένως ἡ ἀλγεβρικὴ τιμὴ τοῦ ἀθροίσματος $\widehat{AC} = \alpha + \beta + 2\lambda\pi$, ὅπου $\lambda \in \mathbb{Z}$.

Τὰ ἀνωτέρω ἐπεκτείνονται εύκολως εἰς τὰς προσανατολισμένας γωνίας.

139. ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΕΝΗ ΓΩΝΙΑ ΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΝ ΘΕΣΙΝ.

Λέγομεν ότι μία προσανατολισμένη γωνία εύρισκεται εἰς κανονικήν θέσιν ώς πρὸς ἓν σύστημα δόρθογωνών ἀξόνων x' Ox, ψ' Oψ, ἢ κορυφὴ τῆς γωνίας εύρισκεται εἰς τὴν ἀρχὴν O τῶν ἀξόνων καὶ ἡ ἀρχικὴ πλευρὰ αὐτῆς ταυτίζεται μὲ τὸν θετικὸν ἡμιάξονα Ox, ὅταν ἡ γωνία τοποθετηθῇ ἐπὶ τοῦ ἐπιπέδου τῶν ἀξόνων.



Σχ. 139

Διὰ νὰ τοποθετήσωμεν, π.χ., γωνίαν 240° εἰς κανονικήν θέσιν φανταζόμεθα ότι ἡ ἡμιευθεῖα Ox στρέφεται κατὰ τὴν θετικὴν φορὰν κατὰ 240° (Σχ. 139), δόποτε δρίζεται ἡ τελικὴ πλευρὰ τῆς γωνίας. Οὕτως ἡ γωνία β ἔχει ἀλγεβρικὴν τιμὴν 240° . Τοῦτο συμβολίζομεν γράφοντες $\beta = 240^\circ$. Όμοιως εἰς τὸ αὐτὸ σχῆμα εἶναι $\alpha = -60^\circ$ καὶ $\theta = 30^\circ$.

Ἐὰν μὲ κέντρον τὴν ἀρχὴν τῶν ἀξόνων καὶ ἀκτῖνα τὴν μονάδα τοῦ μήκους γράψωμεν κύκλον (Σχ. 139), τότε εἰς ἑκάστην τῶν προσανατολισμένων γωνιῶν, π.χ., θ , β , α ἀντιστοιχεῖ ἐν προσανατολισμένον τόξον, τὸ δόποιον, ὅπως γνωρίζομεν, ἔχει τὴν αὐτὴν ἀλγεβρικὴν τιμὴν μὲ τὴν ἀντίστοιχον αὐτοῦ γωνίαν. Δι’ αὐτὸ δυνάμεθα ἀδιαφόρως νὰ ὅμιλῶμεν περὶ γωνίας α ἢ περὶ τόξου \widehat{AP} , τὸ δόποιον ὀνομάζομεν ἐπίσης τόξον α . Ἐπίσης ἔχομεν τὴν γωνίαν θ ἢ τὸ τόξον θ ($\equiv \widehat{AP}$).

Ο ἀνωτέρω κύκλος, δοτις γράφεται μὲ κέντρον τὴν ἀρχὴν τῶν ἀξόνων καὶ ἀκτῖνα τὴν μονάδα, λέγεται τριγωνομετρικὸς κύκλος. Τὸ σημεῖον A (1,0) λέγεται ἀρχὴ τῶν τόξων τοῦ τριγωνομετρικοῦ κύκλου. Εἶναι τὸ σημεῖον, εἰς τὸ δόποιον δ τριγωνομετρικὸς κύκλος τέμνει τὸν ἄξονα Ox. Τὸ \overrightarrow{OA} εἶναι ἐπομένως τὸ μοναδιαῖον διάνυσμα τοῦ ἄξονος x' Ox.

Η ἀκτὶς τοῦ τριγωνομετρικοῦ κύκλου, ἢ δόποια διέρχεται διὰ τοῦ πέρατος ἐνὸς τόξου τοῦ κύκλου, λέγεται τελικὴ ἀκτὶς τοῦ τόξου τούτου.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

449) Νὰ τρέψετε ἐν ἀκτίνιον εἰς μοίρας.

450) Νὰ τρέψετε μίαν μοίραν εἰς ἀκτίνια.

451) Νὰ τρέψετε 45° εἰς ἀκτίνια.

452) Νὰ τρέψετε $\frac{\pi}{16}$ ἀκτίνια εἰς μοίρας.

453) Μὲ τὴν βοήθειαν μοιρογωμονίου νὰ κατασκευάσετε εἰς κανονικήν θέσιν γωνίας ἔχουσας ἀλγεβρικὰς τιμάς :

α) 75° β) 125° γ) 210° δ) -150° ε) 330°
 στ) -330° ζ) 385° η) -370° θ) 930° ι) -955°

454) Νὰ ἀναφέρετε πέντε γωνίας, αἱ δόποιαι εἰς κανονικήν θέσιν ἔχουσι τὴν αὐτὴν τελικὴν πλευρὰν μὲ τὴν $\theta = 100^\circ$.


455) Αι γωνίαι $\theta = 125^\circ$ και $\phi = -955^\circ$ εις κανονικήν θέσιν έχουν τὴν αὐτήν τελικήν πλευράν. Νὰ ξέγηγήσετε τὸ διατό.

456) Νὰ ξέπετε ἂν αἱ γωνίαι $\kappa = 930^\circ$ και $\lambda = -870^\circ$ έχουν, εις κανονικήν θέσιν, τὴν αὐτήν τελικήν πλευράν.

140. ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΓΩΝΙΩΝ.

"Εστω θ μία μεταβλητή, ἡ ὅποια λαμβάνει τιμὰς ἀπὸ τὸ σύνολον Γ ὅλων τῶν τριγωνομετρικῶν γωνιῶν. Τὰ στοιχεῖα λοιπὸν τοῦ συνόλου Γ εἰναι γωνίαι, ὅχι ὀρθογώνια.

Διὰ κάθε γωνίαν θ τοῦ συνόλου Γ φανταζόμεθα ὅτι τίθεται εἰς κανονικήν



Σχ. 140.1

θέσιν ὡς πρὸς Ἑν δρθοκανονικὸν σύστημα ἀξόνων (Σχ. 140.1).

"Εστω $P(x, \psi)$ τυχόν σημεῖον ἐπὶ τῆς τελικῆς πλευρᾶς τῆς γωνίας θ διάφορον τῆς ἀρχῆς O .

1) Όνομάζομεν **ήμιτονον** τῆς γωνίας θ , συμβολικῶς ημθ, τὸν λόγον τῆς τεταγμένης τοῦ τυχόντος σημείου P πρὸς τὸ μῆκος ρ τῆς διανυσματικῆς ἀκτίνος \overrightarrow{OP} . "Ωστε εἰναι ἔξι ὄρισμοῦ :

$$\eta\mu\theta = \frac{\psi}{\rho}$$

"Ας λάβωμεν ἄλλο, ἐπίστης τυχόν, σημεῖον $P'(x', \psi')$ ἐπὶ τῆς τελικῆς πλευρᾶς τῆς γωνίας θ , διάφορον τῆς ἀρχῆς. Συμφώνως πρὸς τὸν δοθέντα ὄρισμὸν θά εἰναι $\eta\mu\theta = \frac{\psi'}{\rho'}$, ὅπου ρ' τὸ μῆκος τῆς διανυσματικῆς ἀκτίνος τοῦ σημείου P' . Παρατηροῦμεν ὅμως ὅτι $\overrightarrow{OP}' = \lambda \overrightarrow{OP}$ καὶ ἐπομένως θά ἔχωμεν $x' = \lambda x$ καὶ $\psi' = \lambda \psi$, ἐκ τῶν ὁποίων ἐπεταί $\frac{x}{x'} = \frac{\psi}{\psi'} = \frac{\sqrt{x^2 + \psi^2}}{\sqrt{x'^2 + \psi'^2}} = \frac{\rho}{\rho'}$. "Οθεν $\frac{\psi}{\rho} = \frac{\psi'}{\rho'}$, $\frac{x}{\rho} = \frac{x'}{\rho'}$, $\frac{\psi}{x} = \frac{\psi'}{x'}$ κτλ.

Παρατηροῦμεν λοιπὸν ὅτι ισχύει $\frac{\psi}{\rho} = \frac{\psi'}{\rho'}$. Τοῦτο σημαίνει ὅτι ἡ τιμὴ τοῦ

λόγου $\frac{\Psi}{\rho}$ δὲν ἔξαρτάται ἐκ τῆς θέσεως τοῦ σημείου P ἐπὶ τῆς τελικῆς πλευρᾶς τῆς γωνίας, ἀλλὰ μόνον ἐκ τῆς θέσεως αὐτῆς ταύτης τῆς τελικῆς πλευρᾶς, δηλαδὴ ἐκ τοῦ μεγέθους τῆς γωνίας θ.

“Ωστε : εἰς κάθε γωνίαν θ ($\theta \in \Gamma$) ἀντιστοιχεῖ εἰς καὶ μόνον πραγματικὸς ἀριθμός : ἡ τιμὴ τοῦ λόγου $\frac{\Psi}{\rho}$.

‘Ορίζεται λοιπὸν ἔδω μία συνάρτησις μὲ πεδίον ὁρισμοῦ τὸ σύνολον Γ , ὅλων τῶν γωνιῶν, καὶ πεδίον τιμῶν ἐν σύνολον πραγματικῶν ἀριθμῶν, ἡ συνάρτησις θ → ημθ.

2) Ὁνομάζομεν συνημίτονον τῆς γωνίας θ, συμβολικῶς συνθ, τὸν λόγον τῆς τετμημένης τοῦ τυχόντος σημείου P τῆς τελικῆς πλευρᾶς τῆς γωνίας πρὸς τὸ μῆκος ρ , τῆς διανυσματικῆς ἀκτίνος τοῦ P . “Ωστε εἴναι ἔξ ὁρισμοῦ :

$$\text{συνθ} = \frac{x}{\rho}$$

‘Ἄσ λάβωμεν ἄλλο, ἐπίστης τυχόν, σημείον P' (x' ψ') ἐπὶ τῆς τελικῆς πλευρᾶς τῆς γωνίας θ, διάφορον τῆς ἀρχῆς. Συμφώνως πρὸς τὸν δοθέντα ὁρισμὸν εἴναι ημθ = $\frac{x'}{\rho}$. Παρατηροῦμεν ὅμως πάλιν ὅτι ισχύει $\frac{x}{\rho} = \frac{x'}{\rho}$, ὅπερ σημαίνει ὅτι ἡ τιμὴ τοῦ λόγου $\frac{x}{\rho}$ δὲν ἔξαρτάται ἐκ τῆς θέσεως τοῦ σημείου ρ ἐπὶ τῆς τελικῆς πλευρᾶς, ἀλλ’ ἐκ τῆς θέσεως αὐτῆς ταύτης τῆς τελικῆς πλευρᾶς, δηλαδὴ ἐκ τοῦ μεγέθους τῆς γωνίας θ.

“Ωστε : εἰς κάθε τιμὴν τῆς μεταβλητῆς θ ($\theta \in \Gamma$) ἀντιστοιχεῖ εἰς καὶ μόνον πραγματικὸς ἀριθμός : ἡ τιμὴ τοῦ λόγου $\frac{x}{\rho}$.

‘Ορίζεται λοιπὸν μία συνάρτησις μὲ πεδίον ὁρισμοῦ τὸ σύνολον Γ , ὅλων τῶν γωνιῶν, καὶ πεδίον τιμῶν ἐν σύνολον πραγματικῶν ἀριθμῶν, ἡ συνάρτησις θ → συνθ.

3) Ὁνομάζομεν ἐφαπτομένην μιᾶς γωνίας θ ($\theta \in \Gamma$), συμβολικῶς εφθ, τὸν λόγον τῆς τεταγμένης τοῦ τυχόντος σημείου P τῆς τελικῆς πλευρᾶς τῆς γωνίας πρὸς τὴν τετμημένην τοῦ σημείου τούτου. “Ωστε εἴναι ἔξ ὁρισμοῦ :

$$\text{εφθ} = \frac{\Psi}{x} \quad x \neq 0$$

‘Ἄσ λάβωμεν ἄλλο, ἐπίστης τυχόν, σημείον P' (x' , ψ') ἐπὶ τῆς τελικῆς πλευρᾶς τῆς γωνίας θ, διάφορον τῆς ἀρχῆς, θὰ εἴναι συμφώνως πρὸς τὸν δοθέντα ὁρισμὸν εφθ = $\frac{\Psi'}{x'}$. ‘Αλλ’, ώς εἴδομεν ἀνωτέρω, ισχύει $\frac{\Psi}{x} = \frac{\Psi'}{x'}$, τὸ δόποιον σημαίνει ὅτι ἡ ἐφαπτομένη μιᾶς γωνίας, δὲν ἔξαρτάται ἐκ τῆς θέσεως τοῦ P ἐπὶ τῆς τελικῆς πλευρᾶς τῆς γωνίας, ἀλλ’ ἐκ τῆς θέσεως αὐτῆς ταύτης τῆς τελικῆς πλευρᾶς, δηλαδὴ ἐκ τοῦ μεγέθους, τῆς γωνίας θ.

Σημείωσις. “Οταν $x = 0$, ὁ λόγος Ψ/x δὲν ἔχει ἔννοιαν πραγματικοῦ ἀριθμοῦ καὶ ἐπομένως δὲν ὁρίζεται τότε ἐφαπτομένη τῆς γωνίας θ. Τούτο συμβαίνει, π.χ., διὰ τὰς γωνίας, αἱ δόποιαὶ ἔχουν ἀλγεβρικήν τιμὴν $90^\circ, -90^\circ, 270^\circ, -270^\circ, 450^\circ$ κτλ., ὅπως θὰ ἴδωμεν κατωτέρω.

"Ωστε : είς κάθε τιμήν τῆς μεταβλητῆς θ ἀντιστοιχεῖ είς καὶ μόνον πραγματικὸς ἀριθμός, ἡ τιμὴ τοῦ λόγου $\frac{\psi}{x}$.

'Ορίζεται λοιπὸν καὶ ἐδῶ μία συνάρτησις μὲ πεδίον ὁρισμοῦ τὸ σύνολον Γ, δλων τῶν γωνιῶν, καὶ πεδίον τιμῶν ἐν σύνολον πραγματικῶν ἀριθμῶν, ἡ συνάρτησις θ → εφθ.

4) Ὁνομάζομεν συνεφαπτομένην μιᾶς γωνίας θ ($\theta \in \Gamma$), συμβολικῶς σφθ, τὸν λόγον τῆς τετμημένης τοῦ τυχόντως σημείου P, τῆς τελικῆς πλευρᾶς τῆς γωνίας, πρὸς τὴν τεταγμένην τοῦ σημείου τούτου. "Ωστε εἰναι ἔξ ὁρισμοῦ :

$$\sigma\phi\theta = \frac{x}{\psi} \quad \psi \neq 0$$

Σημείωσις. Παρατηροῦμεν καὶ πάλιν ὅτι δὲν ὁρίζεται συνεφαπτομένη διὰ γωνίας, τῶν δποίων τὸ τυχόν σημεῖον τῆς τελικῆς πλευρᾶς των ἔχει τεταγμένην 0. Τοιαῦται γωνίαι εἰναι, π.χ., αἱ ἔχουσαι ἀλγεβρικὴν τιμὴν : $0^\circ, 180^\circ, -180^\circ, 360^\circ$ κτλ. ὅπως θὰ ἴδωμεν κατωτέρω.

Εὐκόλως βλέπομεν καὶ ἐδῶ ὅτι ἡ συνεφαπτομένη μιᾶς γωνίας δὲν ἔξαρτᾶται ἐκ τῆς θέσεως τοῦ σημείου P ἐπὶ τῆς τελικῆς πλευρᾶς τῆς γωνίας, ἀλλ' ἐκ τοῦ μεγέθους τῆς γωνίας.

"Ωστε: είς κάθε τιμὴν τῆς μεταβλητῆς θ ($\theta \in \Gamma$) ἀντιστοιχεῖ είς πραγματικὸς ἀριθμός, ἡ τιμὴ τοῦ λόγου $\frac{x}{\psi}$ καὶ ὁρίζεται οὕτω μία συνάρτησις μὲ πεδίον ὁρισμοῦ τῆς τὸ σύνολον Γ, καὶ πεδίον τῶν τιμῶν τῆς ἐν σύνολον πραγματικῶν ἀριθμῶν, ἡ συνάρτησις θ → σφθ.

5) Ὁνομάζομεν τέμνουσαν τυχούστης γωνίας θ ($\theta \in \Gamma$), συμβολικῶς τεμθ, τὸν λόγον τοῦ μήκους ρ τῆς διανυσματικῆς ἀκτίνος τοῦ τυχόντος σημείου P(x,ψ) τῆς τελικῆς πλευρᾶς τῆς γωνίας θ, πρὸς τὴν τετμημένην τοῦ σημείου τούτου. "Ητοι εἰναι ἔξ ὁρισμοῦ :

$$\text{τεμθ} = \frac{\rho}{x} \quad x \neq 0$$

Παρατηροῦμεν καὶ ἐδῶ ὅτι δὲν ὁρίζεται τέμνουσα διὰ γωνίας, τῶν δποίων τὸ τυχόν σημεῖον ἐπὶ τῆς τελικῆς πλευρᾶς των ἔχει τετμημένην 0. Τοιαῦται γωνίαι εἰναι, π.χ., αἱ γωνίαι, αἱ δποῖαι ἔχουν ἀλγεβρικὴν τιμὴν $90^\circ, -90^\circ, 270^\circ, -270^\circ$, κ.τ.λ ὅπως θὰ ἴδωμεν εἰς τὰ ἐπόμενα.

Καὶ πάλιν ἀποδεικνύεται εὐκόλως ὅτι ἡ τέμνουσα μιᾶς γωνίας θ δὲν μεταβάλλεται, ἀλλὰ διάφορον τῆς ἀρχῆς, σημεῖον ἐπὶ τῆς τελικῆς πλευρᾶς τῆς γωνίας. "Ωστε: είς κάθε τιμὴν τῆς μεταβλητῆς θ ($\theta \in \Gamma$) ἀντιστοιχεῖ είς πραγματικὸς ἀριθμός, ἡ τιμὴ τοῦ λόγου $\frac{\rho}{x}$ καὶ ὁρίζεται οὕτω μία συνάρτησις μὲ πεδίον ὁρισμοῦ τὸ σύνολον Γ, δλων τῶν γωνιῶν, καὶ πεδίον τῶν τιμῶν τῆς ἐν σύνολον πραγματικῶν ἀριθμῶν, ἡ συνάρτησις θ → τεμθ.

β) Ὁνομάζομεν συντέμνουσαν τυχούστης γωνίας θ ($\theta \in \Gamma$), συμβολικῶς στεμθ, τὸν λόγον τοῦ μήκους ρ τῆς διανυσματικῆς ἀκτίνος τοῦ τυχόντος ση-

μείου $P(x, \psi)$, τῆς τελικῆς πλευρᾶς τῆς γωνίας θ , πρὸς τὴν τεταγμένην τοῦ σημείου P . Ἡτοι εἶναι ἔξι δρισμοῦ :


$$\text{στεμθ} = \frac{\rho}{\psi} \quad \psi \neq 0$$

Κάμνομεν καὶ διὰ τὸν λόγον $\frac{\rho}{\psi}$ ἀναλόγους παραπτηρήσεις μὲ ἐκείνας, τὰς δόπιοις ἑκάμομεν διὰ τοὺς δρισθέντας ἀνωτέρω λόγους.

Ορίζεται καὶ πάλιν μία συνάρτησις μὲ πεδίον δρισμοῦ τὸ σύνολον Γ , ὅλων τῶν γωνιῶν, καὶ πεδίον τῶν τιμῶν τῆς ἐν σύνολον πραγματικῶν ἀριθμῶν, ἡ συνάρτησις $\theta \rightarrow \text{στεμθ}$.

Ανακεφαλαιώνοντες τοὺς ἀνωτέρω δοθέντας δρισμοὺς ἔχομεν ὅτι, διὰ τυχούσαν τριγωνομετρικὴν γωνίαν θ εἰς κανονικὴν θέσιν ὡς πρὸς ἐν σύστημα ὀρθοκανονικὸν καὶ διὰ $P(x, \psi)$ τυχὸν σημεῖον ἐπὶ τῆς τελικῆς πλευρᾶς τῆς γωνίας, τοῦ δόπιου τὸ μῆκος τῆς διανυσματικῆς ἀκτίνος \overline{OP} εἶναι ρ , ἔχομεν (Σχ. 140.2)

$$\left. \begin{array}{l} \text{ημθ} = \frac{\psi}{\rho} \\ \text{συνθ} = \frac{x}{\rho} \\ \text{εφθ} = \frac{\psi}{x} \\ \text{σφθ} = \frac{x}{\psi} \\ \text{τεμθ} = \frac{\rho}{x} \\ \text{στεμθ} = \frac{\rho}{\psi} \end{array} \right\} (\tau)$$



Σχ. 140.2


Αἱ δρισθεῖσαι ἀνωτέρω ἔξι συναρτήσεις : $\theta \rightarrow \text{ημθ}$, $\theta \rightarrow \text{συνθ}$, $\theta \rightarrow \text{εφθ}$, $\theta \rightarrow \text{σφθ}$, $\theta \rightarrow \text{τεμθ}$, $\theta \rightarrow \text{στεμθ}$, λέγονται τριγωνομετρικαὶ συναρτήσεις τῆς γωνίας θ .

Διὰ μίαν δεδομένην τριγωνομετρικὴν γωνίαν δρίζονται κατὰ τὸν ἀνωτέρω ἐκτεθέντα τρόπον οἱ ἔξι ὀρισμένοι λόγοι (τ), οἱ δόπιοι λέγονται τριγωνομετρικοὶ ἀριθμοὶ τῆς δεδομένης γωνίας.

Εἶναι φανερὸν ὅτι τριγωνομετρικαὶ γωνίαι εἰς κανονικὴν θέσιν, ἔχουσαι κοινὴν τελικὴν πλευράν, ἔχουν ἵσους τοὺς ὁμωνύμους τριγωνομετρικοὺς ἀριθμούς των. Οὕτω, π.χ., ἐπειδὴ αἱ γωνίαι μὲ ἀλγεβρικὰς τιμὰς 30° καὶ -330° ἔχουν τὴν αὐτὴν τελικὴν πλευράν θὰ ἔχουν τοὺς αὐτοὺς ὁμωνύμους τριγωνομετρικούς ἀριθμούς.

Παράδειγμα : Νὰ εύρεθοῦν οἱ τριγωνομετρικοὶ ἀριθμοὶ μιᾶς γωνίας θ , ἐάν ἡ τελικὴ αὐτῆς πλευρά, εἰς κανονικὴν θέσιν, διέρχεται διὰ τοῦ σημείου $P(3, -4)$.

Λύσις : Μία τοιαύτην γωνίαν θ βλέπετε εἰς τὸ παραπλεύρως σχῆμα. Ἐκ τοῦ ὀρθογωνίου τριγώνου OPR ἔχομεν $\rho^2 = x^2 + \psi^2 \Leftrightarrow \rho = \sqrt{x^2 + \psi^2}$. Ἐπομένως $\rho = \sqrt{3^2 + (-4)^2} = \sqrt{25} = 5$. Εἶναι τότε συμφώνως πρὸς τοὺς δρισμούς (τ):



Σχ. 140.3

$$\begin{aligned}\eta\mu\theta &= \frac{\Psi}{\rho} = -\frac{4}{5} \\ \sigma\nu\theta &= \frac{x}{\rho} = \frac{3}{5} \\ \epsilon\phi\theta &= \frac{\Psi}{x} = -\frac{4}{3} \\ \sigma\phi\theta &= \frac{x}{\psi} = -\frac{3}{4} \\ \tau\epsilon\mu\theta &= \frac{\rho}{x} = \frac{5}{3} \\ \sigma\tau\epsilon\mu\theta &= \frac{\rho}{\psi} = -\frac{5}{4}\end{aligned}$$

Παρατήρησις 1η. Άπο τοὺς ὄρισμοὺς (τ) βλέπομεν ἀμέσως ὅτι ἴσχύουν αἱ ἔξις ἰσότητες αἵτινες εἰναι ταυτότητες (διότι εἰναι ἀληθεῖς προτάσεις διὰ κάθε τιμὴν τῆς γωνίας θ, διὰ τὴν ὅποιαν ἀμφότεραι αἱ συναρτήσεις εἰς ἑκάστην ἰσότητα εἰναι ὡρισμέναι):

$$\begin{aligned}\eta\mu\theta &= \frac{1}{\sigma\tau\epsilon\mu\theta} \Leftrightarrow \sigma\tau\epsilon\mu\theta = \frac{1}{\eta\mu\theta} \\ \sigma\nu\theta &= \frac{1}{\tau\epsilon\mu\theta} \Leftrightarrow \tau\epsilon\mu\theta = \frac{1}{\sigma\nu\theta} \\ \epsilon\phi\theta &= \frac{1}{\sigma\phi\theta} \Leftrightarrow \sigma\phi\theta = \frac{1}{\epsilon\phi\theta}\end{aligned}$$

Παρατήρησις 2α. Άπο τοὺς ἀνωτέρω ὄρισμοὺς (τ) βλέπομεν ἐπίστης ὅτι εὐκόλως εύρισκομεν τὰ πρόσημα τῶν τριγωνομετρικῶν ἀριθμῶν μιᾶς γωνίας, ὅταν γνωρίζομεν εἰς ποιαν γωνίαν τῶν ἀξόνων εύρισκεται ἡ τελικὴ πλευρά τῆς δοθείσης γωνίας.

α) $\eta\mu\theta = \frac{\Psi}{\rho}$. Ἐπειδὴ ψ εἰναι θετικὸς ἀριθμὸς εἰς τὴν I καὶ II καὶ ἀρνητικὸς εἰς τὴν III καὶ IV γωνίαν τῶν ἀξόνων καὶ τὸ ρ πάντοτε θετικὸς ἀριθμός, διὰ τοῦτο τὸ ημ θ εἰναι θετικὸν διὰ γωνίας μὲ τελικήν πλευρὰν εἰς τὴν I καὶ II γωνίαν τῶν ἀξόνων καὶ ἀρνητικὸν διὰ γωνίας μὲ τελικήν πλευρὰν εἰς τὴν III καὶ IV γωνίαν τῶν ἀξόνων.

β) $\sigma\nu\theta = \frac{x}{\rho}$. Ἐπειδὴ x εἰναι θετικὸν εἰς τὴν I καὶ IV γωνίαν τῶν ἀξόνων καὶ ἀρνητικὸν εἰς τὴν II καὶ III, διὰ τοῦτο τὸ συνθ εἰναι θετικὸν διὰ γωνίας μὲ τελικήν πλευρὰν εἰς τὰς I καὶ IV γωνίας τῶν ἀξόνων καὶ ἀρνητικὸν διὰ τὰς γωνίας μὲ τελικήν πλευρὰν εἰς τὰς II καὶ III γωνίας τῶν ἀξόνων.

γ) $\epsilon\phi\theta = \frac{\Psi}{x}$. Ἐπειδὴ x καὶ ψ ἔχουν τὰ αὐτὰ πρόσημα εἰς τὴν I καὶ III γωνίαν τῶν ἀξόνων καὶ ἀντίθετα πρόσημα εἰς τὴν II καὶ IV γωνίαν τῶν ἀξόνων, διὰ τοῦτο ἡ εφθ εἰναι θετικὴ διὰ γωνίας μὲ τελικήν πλευρὰν εἰς τὴν I καὶ III γωνίαν τῶν ἀξόνων καὶ ἀρνητικὴ διὰ γωνίας μὲ τελικήν πλευρὰν εἰς τὰς II καὶ IV γωνίας τῶν ἀξόνων.

Ἀναλόγους παρατηρήσεις δυνάμεθα νὰ κάμωμεν καὶ διὰ τοὺς ἄλλους τριγωνομετρικοὺς ἀριθμοὺς τῆς γωνίας θ.

457) Νά εύρετε τούς τριγωνομετρικούς άριθμούς της μικροτέρας θετικής γωνίας θ εἰς κανονικήν θέσιν, έάν Ρ είναι σημείον τῆς τελικής πλευρᾶς τῆς γωνίας θ καὶ αἱ συντεταγμέναι τοῦ Ρ είναι : α) $P(3,4)$ β) $P(-5,12)$ γ) $P(-1,-3)$

458) Εἰς ποίαν γωνίαν τῶν ἀξόνων εύρισκεται ἡ τελικὴ πλευρὰ μιᾶς γωνίας θ εύρισκομένης εἰς κανονικήν θέσιν, έάν :

- α) ημθ καὶ συνθ είναι ἀμφότερα ἀρνητικά.
- β) ημθ καὶ εφθ είναι ἀμφότερα θετικά.
- γ) ημθ είναι θετικὸν καὶ τεμθ είναι ἀρνητική.
- δ) τεμθ είναι θετικὴ καὶ εφθ είναι ἀρνητική.
- ε) εφθ είναι θετικὴ καὶ τεμθ είναι ἀρνητική.
- στ) ημθ είναι θετικὸν καὶ συνθ είναι ἀρνητικόν.

459) Εἰς ποίαν γωνίαν τῶν ἀξόνων εύρισκεται ἡ τελικὴ πλευρὰ γωνίας θ, εἰς κανονικήν θέσιν, έάν :

- α) ημθ > 0
- β) συνθ < 0
- γ) εφθ < 0
- δ) τεμθ > 0

460) Γνωστοῦ ὅντος ὅτι $\eta\mu\theta = \frac{8}{17}$ καὶ ὅτι ἡ τελικὴ πλευρὰ τῆς θ, εἰς κανονικήν θέσιγ εύρισκομένης, εύρισκεται εἰς τὴν I γωνίαν τῶν ἀξόνων, νὰ εὔρεθοῦν τὰ συνθ καὶ εφθ.

$$461) \text{Έάν } \sigma\mu\theta = \frac{5}{6}, \text{ νὰ εύρετε τὰ } \eta\mu\theta \text{ καὶ } \epsilon\phi\theta.$$

$$462) \text{Έάν } \epsilon\phi\theta = -\frac{3}{4}, \text{ νὰ εύρετε τὰ } \eta\mu\theta \text{ καὶ } \sigma\mu\theta.$$

(Υπόδειξις : ἐπειδὴ $\epsilon\phi\theta = \frac{\psi}{x}$ είναι ἀρνητική, ἡ θ είναι γωνία μὲ τελικήν πλευράν εἰς τὴν II γωνίαν τῶν ἀξόνων, ἂν λάβωμεν $x=-4$, $\psi=3$ ἢ γωνία μὲ τελικήν πλευράν εἰς τὴν IV γωνίαν τῶν ἀξόνων, ἂν λάβωμεν $x=4$, $\psi=-3$. Εἰς ἀμφοτέρας τὰς περιπτώσεις $\rho = \sqrt{4^2 + (-3)^2} = \sqrt{25} = 5$.)

$$463) \text{Νά εύρετε τὸ } \eta\mu\theta, \text{ δοθέντος } \text{ὅτι } \sigma\mu\theta = -\frac{4}{5} \text{ καὶ } \text{ὅτι } \epsilon\phi\theta > 0.$$

464) Νά εύρετε τούς τριγωνομετρικούς άριθμούς μιᾶς γωνίας θ, διὰ τὴν ὅποιαν γνωρίζομεν ὅτι $\eta\mu\theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$ καὶ $\sigma\mu\theta = \frac{1}{2}$.

465) Εἰς ποίαν γωνίαν τῶν ἀξόνων εύρισκονται αἱ τελικαὶ πλευραὶ καὶ ποῖα είναι τὰ πρόσημα τοῦ ήμιτόνου, τοῦ συνημιτόνου καὶ τῆς ἔφαπτομένης ἐκάστης ἐκ τῶν γωνιῶν μὲ ἀλγεβρικήν τιμήν :

- α) 125°
- β) 75°
- γ) -320°
- δ) 210°
- ε) 460°
- στ) -250°
- ζ.) -1000°

466) Νά εύρετε τούς τριγωνομετρικούς άριθμούς γωνίας θ, έάν γνωρίζετε ὅτι :

$$\alpha) \eta\mu\theta = \frac{7}{25} \quad \beta) \epsilon\phi\theta = \frac{3}{5} \quad \text{καὶ } 180^\circ < \theta < 270^\circ.$$

141. ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΩΝ ΓΩΝΙΩΝ $0^\circ, 90^\circ, 180^\circ, 270^\circ, 360^\circ$.

A) Έν πρώτοις συμφωνοῦμεν τὸ ἔξῆς : θὰ γράφωμεν, π.χ., $\eta\mu\theta = 18^\circ$ καὶ θὰ ἔννοοῦμεν τὸ ήμιτόνον γωνίας, ἡ ὅποια ἔχει ἀλγεβρικήν τιμὴν 18° . Ἐπίσης εἰς τούς συμβολισμούς ημθ, συνθ, εφθ κτλ. τὸ θ θὰ τὸ νοοῦμεν ὡς ἀλγεβρικήν τιμὴν γωνίας. Τοῦτο πράττομεν, διότι ἡ τριγωνομετρικὴ γωνία προσδιορίζεται ἀκριβῶς, ὅταν γνωρίζωμεν τὴν ἀλγεβρικὴν τιμὴν της.

Ἐπειτα ἀπὸ τὴν συμφωνίαν αὐτὴν ἡ θ δύναται νὰ θεωρηθῇ ὅτι είναι μία

μεταβλητή, ή όποια δύναται νά διατρέχῃ τὸ σύνολον R , τῶν πραγματικῶν ἀριθμῶν, οἱ όποιοι εἰναι ἀλγεβρικαὶ τιμαὶ γωνιῶν, αἱ όποιαι ἔχουν μετρηθῆ μὲ μονάδα τὴν μοῖραν.

B) Θὰ ζητήσωμεν τώρα νὰ εύρωμεν τοὺς τριγωνομετρικοὺς ἀριθμοὺς τῶν γωνιῶν $0^\circ, 90^\circ, 180^\circ, 270^\circ, 360^\circ$.

"Εστω P τυχόν σημεῖον (σχι ἢ ἀρχὴ) ἐπὶ τῆς τελικῆς πλευρᾶς τῆς γωνίας θ


α) "Οταν $\theta = 0^\circ$, τότε $x = \rho$, $\psi = 0$ καὶ ἐπομένως :

$$\eta\mu 0^\circ = \frac{\psi}{\rho} = \frac{0}{\rho} = 0$$

$$\sigma u n 0^\circ = \frac{x}{\rho} = \frac{\rho}{\rho} = 1$$

$$\epsilon\phi 0^\circ = \frac{\psi}{x} = \frac{0}{\rho} = 0$$

$$\sigma\phi 0^\circ = \frac{x}{\psi} = \frac{\rho}{0} \quad (\deltaὲν ὁρίζεται) *$$



Σχ. 141.1

$$\tau e\mu 0^\circ = \frac{\rho}{x} = \frac{\rho}{\rho} = 1$$

$$\sigma t e\mu 0^\circ = \frac{\rho}{\psi} = \frac{\rho}{0} \quad (\deltaὲν ὁρίζεται)$$

β) "Οταν $\theta = 90^\circ$, τότε $x = 0$, $\psi = \rho$ καὶ ἐπομένως :

$$\eta\mu 90^\circ = \frac{\psi}{\rho} = \frac{\rho}{\rho} = 1$$


$$\sigma u n 90^\circ = \frac{x}{\rho} = \frac{0}{\rho} = 0$$

$$\epsilon\phi 90^\circ = \frac{\psi}{x} = \frac{\rho}{0} \quad (\deltaὲν ὁρίζεται)$$

$$\sigma\phi 90^\circ = \frac{x}{\psi} = \frac{0}{\rho} = 0$$

$$\tau e\mu 90^\circ = \frac{\rho}{x} = \frac{\rho}{0} \quad (\deltaὲν ὁρίζεται)$$

$$\sigma t e\mu 90^\circ = \frac{\rho}{\psi} = \frac{\rho}{\rho} = 1$$



Σχ. 141.2

γ) "Οταν $\theta = 180^\circ$, τότε $x = -\rho$, $\psi = 0$ καὶ ἐπομένως :

$$\eta\mu 180^\circ = \frac{\psi}{\rho} = \frac{0}{\rho} = 0$$


$$\sigma u n 180^\circ = \frac{x}{\rho} = \frac{-\rho}{\rho} = -1$$

$$\epsilon\phi 180^\circ = \frac{\psi}{x} = \frac{0}{-\rho} = 0$$

$$\sigma\phi 180^\circ = \frac{x}{\psi} = \frac{-\rho}{0} \quad (\deltaὲν ὁρίζεται)$$

$$\tau e\mu 180^\circ = \frac{\rho}{x} = \frac{\rho}{-\rho} = -1$$

$$\sigma t e\mu 180^\circ = \frac{\rho}{\psi} = \frac{\rho}{0} \quad (\deltaὲν ὁρίζεται)$$



Σχ. 141.3

(*) Δηλ. δὲν ἔχει ἔννοιαν πραγματικοῦ ἀριθμοῦ.

δ) "Όταν $\theta = 270^\circ$, τότε $x = 0$, $\psi = -\rho$ και έπομένως :

$$\eta\mu 270^\circ = \frac{\psi}{\rho} = \frac{-\rho}{\rho} = -1$$

$$\sigma\nu 270^\circ = \frac{x}{\rho} = \frac{0}{\rho} = 0$$

$$\epsilon\phi 270^\circ = \frac{\psi}{x} = \frac{-\rho}{0} \text{ (δὲν δρίζεται)}$$

$$\sigma\phi. 270^\circ = \frac{x}{\psi} = \frac{0}{-\rho} = 0$$

$$\tau\epsilon\mu 270^\circ = \frac{\rho}{x} = \frac{\rho}{0} \text{ (δὲν δρίζεται)}$$

Σχ. 141.4


$$\sigma\tau\epsilon\mu 270^\circ = \frac{\rho}{\psi} = \frac{\rho}{-\rho} = -1$$

ε) "Όταν $\theta = 360^\circ$, τότε ή τελική πλευρά τῆς θ ταυτίζεται μὲ τὸν ἄξονα Οχ καὶ οἱ τριγωνομετρικοὶ ἀριθμοὶ τῆς γωνίας 360° εἰναι ἵσοι μὲ τοὺς ὅμωνύμους τριγωνομετρικούς ἀριθμούς τῆς γωνίας 0° .

142. ΟΙ ΤΡΙΓΩΝΙΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΩΝ ΓΩΝΙΩΝ 45° , 60° , 30° .

α) "Οπως ἐμάθομεν εἰς τὴν γ' τάξιν εἰναι :

$$\eta\mu 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad \sigma\nu 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad \epsilon\phi 45^\circ = 1.$$



Εὐκόλως εύρισκομεν ὅτι εἰναι :

$$\tau\epsilon\mu 45^\circ = \frac{\rho}{x} = \frac{\sqrt{2}}{1} = \sqrt{2}$$

$$\sigma\tau\epsilon\mu 45^\circ = \frac{\rho}{\psi} = \frac{\sqrt{2}}{1} = \sqrt{2}$$

$$\sigma\phi. 45^\circ = \frac{x}{\psi} = \frac{1}{1} = 1$$

Σχ. 142.1

β) "Ἐμάθομεν εἰς τὴν γ' τάξιν ὅτι :

$$\eta\mu 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \sigma\nu 60^\circ = \frac{1}{2}, \quad \epsilon\phi 60^\circ = \sqrt{3}$$

Εὐκόλως εύρισκομεν τώρα ὅτι :

$$\sigma\phi. 60^\circ = \frac{x}{\psi} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$


$$\tau\epsilon\mu 60^\circ = \frac{\rho}{x} = \frac{2}{1} = 2$$

$$\sigma\tau\epsilon\mu 60^\circ = \frac{\rho}{\psi} = \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

Σχ. 142.2

γ) "Ἐμάθομεν εἰς τὴν γ' τάξιν ὅτι :

$$\eta\mu 30^\circ = \frac{1}{2}, \quad \sigma\nu 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \epsilon\phi 30^\circ = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$



Εύκολως εύρισκομεν ὅτι :

$$\text{σφ}30^\circ = \frac{x}{\psi} = \frac{\sqrt{3}}{1} = \sqrt{3}$$





$$\text{τεμ}30^\circ = \frac{p}{x} = \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

$$\Sigma\chi. 142.3 \quad \text{στεμ}30^\circ = \frac{p}{\psi} = \frac{2}{1} = 2$$

143. ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ.

*Εστω θ δοθεῖσα γωνία εἰς κανονικήν θέσιν (Σχ. 143).

Μὲ κέντρον τὴν ἀρχὴν καὶ ἀκτίνα τὴν μονάδα χαράσσομεν κύκλον, τὸν γνωστόν



Σχ. 143

μας τριγωνομετρικὸν κύκλον, τέμνοντα τὸν ἄξονα τῶν x εἰς τὸ σημεῖον $A(1,0)$, τὸν ἄξονα τῶν ψ εἰς τὸ $B(0,1)$, τὴν δὲ τελικὴν πλευρὰν τῆς γωνίας θ εἰς τὸ P .

Φέρομεν τὴν PR κάθετον πρὸς τὸν ἄξονα Ox καὶ τὰς ἐφαπτομένας εἰς τὰ σημεῖα A καὶ B , αἵτινες τέμνουν τὴν τελικὴν πλευρὰν τῆς θ ἢ τὴν προέκτασιν αὐτῆς κατ' ἀντίθετον φοράν εἰς τὰ T καὶ S ἀντιστοίχως.

"Οπως εἴναι εὔκολον νὰ παρατηρήσωμεν εἰς τὰ ἀνωτέρω σχήματα 143, τὰ ὁρθογώνια τρίγωνα OPR , OAT καὶ $OBΣ$ εἴναι ὅμοια μεταξύ των ἀνὰ δύο. "Εχομεν λοιπόν :

$$\text{ημθ} = \frac{\overline{PR}}{\overline{OP}} = \overline{PR} \quad \text{σφθ} = \frac{\overline{OP}}{\overline{PR}} = \frac{\overline{BS}}{\overline{OB}} = \overline{BS}$$

$$\text{συνθ} = \frac{\overline{OP}}{\overline{OP}} = \overline{OP} \quad \text{τεμθ} = \frac{\overline{OP}}{\overline{OT}} = \frac{\overline{OT}}{\overline{OA}} = \overline{OT}$$

$$\text{εφθ} = \frac{\overline{PR}}{\overline{OP}} = \frac{\overline{AT}}{\overline{OA}} = \overline{AT} \quad \text{στεμθ} = \frac{\overline{OP}}{\overline{PR}} = \frac{\overline{OS}}{\overline{OB}} = \overline{OS}$$

Τὰ διανύσματα \vec{PP} , \vec{OP} , \vec{AT} , \vec{BS} , \vec{OT} , \vec{OS} είναι άντιστοίχως αἱ γεωμετρικαὶ παραστάσεις τῶν συναρτήσεων ημθ, συνθ, εφθ, σφθ, τεμθ, στεμθ τῆς γωνίας (τοῦ τόξου $\widehat{AP} \equiv$)θ, αἱ δὲ ἀλγεβρικαὶ τιμαὶ τῶν διανυσμάτων είναι αἱ τιμαὶ τῶν άντιστοίχων τριγωνομετρικῶν συναρτήσεων τῆς θ. Διὰ τὰ \vec{OS} καὶ \vec{OT} λαμβάνεται ἡ φορὰ των θετικής, ὅταν αὕτη συμφωνεῖ μὲ τὴν φορὰν τῆς τελικῆς πλευρᾶς τῆς γωνίας, ἄλλως ἡ φορὰ των θεωρεῖται ὡς ἀρνητική.

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω ἐννοοῦμεν ὅτι δυνάμεθα, ὁσάκις τοῦτο μᾶς ἔξυπηρετεῖ, ὡς τυχὸν σημεῖον ἐπὶ τῆς τελικῆς πλευρᾶς τῆς τριγωνομετρικῆς γωνίας νὰ λαμβάνωμεν ἑκεῖνο τὸ σημεῖον, εἰς τὸ ὅποιον ὁ τριγωνομετρικὸς κύκλος τέμνει τὴν τελικὴν πλευράν. Τότε ἔπειδὴ $\rho = 1$ θὰ είναι (Σχ. 143) :

1) ἡμίτονον τοῦ τόξου θ ($\widehat{AP} \equiv \theta$) = \vec{PP} , δηλαδὴ ἡ τεταγμένη τοῦ πέρατος τοῦ τόξου θ.

2) συνημίτονον τοῦ τόξου $\theta = \vec{OP}$, δηλαδὴ ἡ τετμημένη τοῦ πέρατος τοῦ τόξου θ.

3) ἐφαπτομένη τοῦ τόξου $\theta = \vec{AT}$, δηλαδὴ ἡ ἀλγεβρικὴ τιμὴ τοῦ διανύσματος \vec{AT} , τὸ ὅποιον ὁρίζεται ἐπὶ τῆς ἐφαπτομένης εἰς τὴν ἀρχὴν A τῶν τόξων ἀπὸ τὸ A καὶ τὸ σημεῖον T, εἰς τὸ ὅποιον ἡ προέκτασις τῆς τελικῆς ἀκτίνος τοῦ τόξου θ τέμνει τὴν εἰς τὸ A ἐφαπτομένην τοῦ τριγωνομετρικοῦ κύκλου (ἄξονα τῶν ἐφαπτομένων).

4) συνεφαπτομένη τοῦ τόξου $\theta = \vec{BS}$, δηλαδὴ ἡ ἀλγεβρικὴ τιμὴ τοῦ διανύσματος \vec{BS} , τὸ ὅποιον ὁρίζεται ἐπὶ τῆς ἐφαπτομένης εἰς τὸ B(0,1) ἀπὸ τὸ B καὶ τὸ σημεῖον S, εἰς τὸ ὅποιον ἡ προέκτασις τῆς τελικῆς ἀκτίνος τοῦ τόξου θ τέμνει τὴν εἰς τὸ B ἐφαπτομένην τοῦ τριγωνομετρικοῦ κύκλου (ἄξονα τῶν συνεφαπτομένων).

Αναλόγως ὁρίζεται ἡ τέμνουσα καὶ ἡ συντέμνουσα τοῦ τόξου θ(*)

144. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ.

Ἄσ ύποθέσωμεν ὅτι τὸ σημεῖον P (Σχ. 143) ἀναχωροῦν ἐκ τοῦ A κινεῖται κατὰ τὴν θετικὴν φορὰν διαγράφον τὸν τριγωνομετρικὸν κύκλον. Τότε είναι φανερὸν ὅτι ἡ γωνία θ (τὸ τόξον $\theta \equiv \widehat{AP}^+$) μεταβάλλεται συνεχῶς ἀπὸ 0° ἕως 360° .

Είναι ἐπίσης φανερὸν ὅτι ἔχομεν διὰ τὰς τριγωνομετρικὰς συναρτήσεις τὸν κάτωθι πίνακα, ὃστις δεικνύει τὰς μεταβολὰς τῶν τιμῶν των, διὰ τὰς άντιστοίχους μεταβολὰς τῶν τιμῶν τῆς μεταβλητῆς θ.

(Εἰς τὸν πίνακα τὸ \nearrow = αὐξάνει καὶ τὸ \searrow = ἐλαττοῦται)

(*) Οἱ ὁρισμοὶ νὰ δοθεῖν ἀπὸ τοὺς μαθητὰς μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ διδάσκοντος.

Πίναξ μεταβολῶν τῶν τριγωνομετρικῶν συναρτήσεων

θ αύξάνει ἀπό	$0 \leq \theta < \frac{\pi}{2}$ $(0^\circ \leq \theta < 90^\circ)$	$\frac{\pi}{2} \leq \theta < \pi$ $(90^\circ \leq \theta < 180^\circ)$	$\pi \leq \theta < \frac{3\pi}{2}$ $(180^\circ \leq \theta < 270^\circ)$	$\frac{3\pi}{2} \leq \theta \leq 2\pi$ $(270^\circ \leq \theta \leq 360^\circ)$
ημθ	↗ ἀπό $0 \leq \theta < 1$	↘ ἀπό $1 \leq \theta < 0$	↖ ἀπό $0 \leq \theta < -1$	↗ ἀπό $-1 \leq \theta < 0$
συν θ	↘ ἀπό $1 \leq \theta < 0$	↘ ἀπό $0 \leq \theta < -1$	↗ ἀπό $-1 \leq \theta < 0$	↗ ἀπό $0 \leq \theta < 1$
εφ θ	↗ ἀπό $0 \leq \theta < 90^\circ$ διπλάσιες θετικές τιμές, καθ' ὅσον τὸ θ πλησιάζει τὰς 90° $(0 \leq \theta < +\infty)$	↗ ἀπό ἀρνητικάς τιμάς δσονδήποτε μεγάλας κατ' ἀπόλυτον τιμήν ≤ 0 .	↗ ἀπό $0 \leq \theta < 270^\circ$ διπλάσιες θετικές τιμές, καθ' ὅσον πλησιάζει τὸ θ τὰς 270° $(0 \leq \theta < +\infty)$	↗ ἀπό ἀρνητικάς τιμάς δσονδήποτε μεγάλας κατ' ἀπόλυτον τιμήν ≤ 0 .
σφθ	↘ ἀπό θετικάς τιμάς δσονδήποτε μεγάλας ≤ 0 . $(+\infty \leq \theta < 0)$	↘ ἀπό $0 \leq \theta < 180^\circ$ διπλάσιας θετικές τιμές, καθ' ὅσον τὸ θ πλησιάζει τὰς 180° $(0 \leq \theta < -\infty)$	↘ ἀπό $0 \leq \theta < 270^\circ$ διπλάσιας θετικές τιμές, καθ' ὅσον τὸ θ πλησιάζει τὰς 270° $(-\infty \leq \theta < 0)$	↘ ἀπό $0 \leq \theta < 360^\circ$ διπλάσιας θετικές τιμές, καθ' ὅσον τὸ θ πλησιάζει τὰς 360° $(0 \leq \theta < -\infty)$
τεμ θ (*)	↗ ἀπό $1 \leq \theta < 90^\circ$ διπλάσιας θετικές τιμές, καθ' ὅσον τὸ θ πλησιάζει τὰς 90° $(1 \leq \theta < +\infty)$	↗ ἀπό ἀρνητικάς τιμάς δσονδήποτε μεγάλας κατ' ἀπόλυτον τιμήν ≥ -1 .	↗ ἀπό $-1 \leq \theta < 270^\circ$ διπλάσιας θετικές τιμές, καθ' ὅσον τὸ θ πλησιάζει τὰς 270° $(-1 \leq \theta < -\infty)$	↗ ἀπό $0 \leq \theta < 90^\circ$ διπλάσιας θετικές τιμές, καθ' ὅσον τὸ θ πλησιάζει τὰς 90° $(+\infty \leq \theta < 1)$
στεμ θ	↘ ἀπό μεγάλας θετικάς τιμάς ≤ 1 . $(+\infty \leq \theta < 1)$	↗ ἀπό $1 \leq \theta < +\infty$ διπλάσιας θετικές τιμές, καθ' ὅσον τὸ θ πλησιάζει τὰς $+∞$. $(1 \leq \theta < +\infty)$	↗ ἀπό ἀρνητικάς τιμάς μεγάλας κατ' ἀπόλυτον τιμήν ≥ -1 . $(-\infty \leq \theta < -1)$	↗ ἀπό $-1 \leq \theta < +\infty$ διπλάσιας θετικές τιμές, καθ' ὅσον τὸ θ πλησιάζει τὰς $+∞$. $(-1 \leq \theta < +\infty)$

Σημ. Εἰς τὴν § 9 ἐμάθομεν διὰ ποίας τιμάς τῆς θ δὲν ὁρίζονται αἱ συναρτήσεις $\theta \rightarrow$ εφθ, $\theta \rightarrow$ σφθ, $\theta \rightarrow$ τεμθ καὶ $\theta \rightarrow$ στεμθ.

(*) Ἡ μεταβολὴ τῆς τεμθ καὶ στεμθ δύναται νὰ διδαχθῇ ἢ νὰ παραλειφθῇ κατὰ τὴν κρίσιν τοῦ διδάσκοντος.

145. ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ.

Α) Έθεωρήσαμεν ἔως τώρα τὰς τριγωνομετρικὰς συναρτήσεις, ὡς συναρτήσεις τῆς μεταβλητῆς θ , ἡ ὅποια λαμβάνει τιμὰς ἀπὸ τὸ σύνολον Γ , ὅλων τῶν τριγωνομετρικῶν γωνιῶν. Εἴδομεν δὲ ὅτι δυνάμεθα νὰ λάβωμεν, ἀντὶ τῶν γωνιῶν θ , τὰς ἀλγεβρικὰς των τιμὰς εἰς μοίρας, ὅποτε ἡ μεταβλητὴ θ διατρέχει τὸ σύνολον R , τῶν πραγματικῶν ἀριθμῶν. "Ἄν αἱ γωνίαι τοῦ συνόλου Γ μετρηθοῦν μὲ μονάδα τὸ ἀκτίνιον, τότε δυνάμεθα νὰ θεωρῶμεν τὴν τιμὴν μιᾶς γωνίας x εἰς ἀκτίνια ὡς ἔνα ἀλλο σύμβολον διὰ τὴν γωνίαν καὶ νὰ ἀναφερώμεθα εἰς τὴν μεταβλητὴν x , ὡς μίαν μεταβλητήν, ἡ ὅποια διατρέχει τὸ R .

Τότε εἰς κάθε τιμὴν τῆς μεταβλητῆς $x \in R$, ἀντιστοιχεῖ μία τιμὴ ἑκάστης τῶν τριγωνομετρικῶν συναρτήσεων ἀνήκουσα εἰς ἓν σύνολον πραγματικῶν ἀριθμῶν, ὅταν, ἐννοεῖται, ἡ συνάρτησις ὁρίζεται διὰ τὴν τιμὴν ταύτην τῆς μεταβλητῆς x . Εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν αἱ ἀνωτέρω ὁρισθεῖσαι συναρτήσεις λέγονται: πραγματικαὶ τριγωνομετρικαὶ συναρτήσεις. Οὕτως αἱ συναρτήσεις, αἱ ὅποιαι ὁρίζονται ἀπὸ τὰς $\psi = \eta x$, $\psi = \sigma x$, $\psi = \epsilon x$, $\psi = \sigma \epsilon x$ κ.τ.λ. εἰς τὰς ὅποιας ἡ μεταβλητὴ x νοεῖται διατρέχουσα τὸ σύνολον R καὶ ἡ ψ ὠρισμένα σύνολα πραγματικῶν ἀριθμῶν, εἶναι τριγωνομετρικαὶ συναρτήσεις τῶν πραγματικῶν ἀριθμῶν.

Κάθε τριγωνομετρικὴ συνάρτησις ἔχει ὡς πεδίον ὁρισμοῦ της τὸ σύνολον R , τῶν πραγματικῶν ἀριθμῶν, ἔξαιρουμένων τῶν τιμῶν, αἱ ὅποιαι ἐμφαίνονται εἰς τὸν κάτωθι πίνακα *

συνάρτησις	πεδίον ὁρισμοῦ	πεδίον τιμῶν
$\psi = \eta x$	R	$\{\psi \in R \mid -1 \leq \psi \leq 1\}$
$\psi = \sigma x$	R	$\{\psi \in R \mid -1 \leq \psi \leq 1\}$
$\psi = \epsilon x$	$R - \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \right\}, k \in \mathbb{Z}$	R
$\psi = \sigma \epsilon x$	$R - \{k\pi\}, k \in \mathbb{Z}$	R
$\psi = \tau x$	$R - \left\{ \frac{\pi}{2} k + \pi \right\}, k \in \mathbb{Z}$	$\{\psi \in R \mid \psi \leq -1\}, \{\psi \in R \mid \psi \geq 1\}$
$\psi = \sigma \tau x$	$R - \{k\pi\}, k \in \mathbb{Z}$	$\{\psi \in R \mid \psi \leq -1\}, \{\psi \in R \mid \psi \geq 1\}$

Β) Αἱ τιμαὶ τῶν τριγωνομετρικῶν συναρτήσεων τῶν πραγματικῶν ἀριθμῶν δίδονται εἰς πίνακας, εύρισκονται δὲ αἱ τιμαὶ αὗται μὲ μεθόδους, τὰς ὅποιας χρησιμοποιοῦν τὰ ἀνώτερα μαθηματικά. (Βλέπε πίνακας εἰς τὰς τελευταίας σελίδας τοῦ βιβλίου).


Προκειμένου νὰ κατασκευάσωμεν τὴν γραφικὴν παράστασιν, π.χ., τῶν τριγωνομετρικῶν συναρτήσεων $\psi = \eta x$, $\psi = \sigma x$, $\psi = \epsilon x$, δίδομεν εἰς τὴν μεταβλητὴν x τιμὰς ἀπὸ 0 ἕως 2π καὶ εύρισκομεν τὰς ἀντιστοίχους τιμὰς τῆς μεταβλητῆς ψ ἀπὸ τοὺς πίνακας. Κάθε ζεῦγος ἀντιστοίχων τιμῶν ἀπεικονίζεται μὲ ἔν σημεῖον τοῦ ἐπιπέδου, εἰς τὸ ὅποιον ἔχομεν λάβει ἔν σύστημα ἀξόνων ὁρθο-

(*) Δὲν εἶναι ἀπαραίτητον οἱ μαθηταὶ νὰ ἀπομνημονεύσουν τὸν πίνακα. Δύνανται νὰ συμβουλεύωνται αὐτὸν δσάκις τὸν χρειάζονται.

κανονικόν. Οὕτω, π.χ. εύρισκομεν διὰ τὰς ἀνωτέρω συναρτήσεις τὰς ἀντιστοίχους τιμάς, αἱ ὅποιαι ἐμφαίνονται εἰς τὸν κάτωθι πίνακα :



x	$\psi = \eta \mu x$	$\psi = \sin x$	$\psi = \epsilon \phi x$
0	0	1	0
$\frac{\pi}{6} \approx 0,52$	0,50	0,87	0,58
$\frac{\pi}{4} \approx 0,79$	0,71	0,71	1
$\frac{\pi}{3} \approx 1,05$	0,87	0,50	1,73
$\frac{\pi}{2} \approx 1,57$	1	0	δὲν δρίζεται (*)
$\frac{2\pi}{3} \approx 2,09$	0,87	-0,50	-1,73
$\frac{3\pi}{4} \approx 2,36$	0,71	-0,71	-1
$\frac{5\pi}{6} \approx 2,62$	0,50	-0,87	-0,58
$\pi \approx 3,14$	0	-1	0
$\frac{7\pi}{6} \approx 3,66$	-0,50	-0,87	0,58
$\frac{5\pi}{4} \approx 3,92$	-0,71	-0,71	1
$\frac{4\pi}{3} \approx 4,19$	-0,87	-0,50	1,73
$\frac{3\pi}{2} \approx 4,71$	-1	0	δὲν δρίζεται
$\frac{5\pi}{3} \approx 5,23$	-0,87	0,50	-1,73
$\frac{7\pi}{4} \approx 5,49$	-0,71	0,71	-1
$\frac{11\pi}{6} \approx 5,76$	-0,5	0,87	-0,58
$2\pi \approx 6,28$	0	1	0

Εύρισκομεν τὰ ἀντίστοιχα σημεῖα εἰς τὸ ἔπιπεδον $xO\psi$ καὶ ἐνώνυμεν αὐτὰ διὰ μιᾶς ὁμαλῆς καμπύλης. Προκύπτουν τότε αἱ κάτωθι γραφικαὶ παραστάσεις, ἐκ τῶν δποιών ἡ πρώτη λέγεται ἡμιτονοειδῆς καμπύλη καὶ ἡ δευτέρα συνημιτονοειδῆς καμπύλη.



Σχ. 145

(*) δηλ. δὲν ἔχει ἔννοιαν πραγματικοῦ ἀριθμοῦ.



Σχ. 145

146. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ. ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ.

Έστω f μία συνάρτησις μιᾶς μεταβλητῆς μὲ πεδίον όρισμοῦ ἐν σύνολον Σ , πραγματικῶν ἀριθμῶν, ἔστω δὲ ὅτι ὑπάρχει εἰς πραγματικὸς ἀριθμὸς p διάφορος τοῦ 0 τοιοῦτος, ὥστε νὰ ἴσχῃ :

$$f(x + p) = f(x) \quad (\alpha)$$

διὰ κάθε τιμὴν τῆς μεταβλητῆς, διὰ τὴν ὅποιαν ἡ f ἔριζεται. Λέγομεν εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν ὅτι p εἶναι **μία περίοδος** τῆς συναρτήσεως f , ἡ δὲ f λέγεται **περιοδικὴ** συνάρτησις. Κατὰ τὰ ἀνωτέρω θὰ εἴναι :

$$f[(x + p) + p] = f(x + p) = f(x)$$

δηλ. $f(x + 2p) = f(x)$, ὅπερ σημαίνει ὅτι $2p$ εἶναι ἐπίσης μία περίοδος τῆς f . 'Ομοίως $3p, 4p, \dots, kp$, ὅπου $k \in \mathbb{N}$, εἶναι περίοδος τῆς f . 'Εὰν ἡ f εἶναι περιοδικὴ δὲ μικρότερος θετικὸς ἀριθμὸς p , δὲ δόποιος εἶναι περίοδος τῆς f , λέγεται : **πρωτεύουσα περίοδος** τῆς f .

'Εὰν εἰς τὴν ἀνωτέρω ἰσότητα (α) θέσωμεν ὅπου x τὸ $x - p$, λαμβάνομεν $f[(x - p) + p] = f(x - p)$, ἦτοι

$$\forall x \in \Sigma : f(x) = f(x - p)$$

δηλαδὴ καὶ δὲ $-p$ εἶναι μία περίοδος τῆς f καὶ ἐπομένως καὶ δὲ $-2p, -3p, \dots$. Γενικῶς λοιπὸν μία συνάρτησις f θὰ λέγεται περιοδική, ἔαν διὰ κάθε τιμὴν τῆς μεταβλητῆς ἀπὸ τὸ πεδίον όρισμοῦ τῆς, ἴσχῃ :

$f(x) = f(x + kp)$, όπου $k \in \mathbb{Z} - \{0\}$ και p είναι σταθερός ώρισμένος πραγματικός όριθμος.

‘Η έλαχιστη θετική τιμή του $k p$ λέγεται : ή πρωτεύουσα περίοδος της συναρτήσεως f .

Ούτω, π.χ., έπειδή αἱ γωνίαι $\theta(*)$ καὶ $\theta + 2\pi \cdot k$ έχουν τὴν αὐτὴν τελικὴν πλευράν, θὰ ισχύουν αἱ ισότητες :

$$\eta x = \eta m(x + 2kp), \quad \sigma vx = \sigma v(x + 2kp)$$

διὰ κάθε τιμὴν τῆς γωνίας x . ‘Επομένως αἱ συναρτήσεις $\psi = \eta x$, $\psi = \sigma vx$ είναι περιοδικά. Καί, έπειδὴ διὰ $k = 1$ ἡ παράμετρος $2kp$ λαμβάνει τὴν έλαχιστην θετικὴν τιμήν, διὰ τοῦτο αἱ συναρτήσεις αὗται έχουν πρωτεύουσαν περίοδον τὸ 2π . ‘Η συνάρτησις $\psi = \epsilon \varphi$ έχει ὡς περίοδον τὸ 2π , διότι $\epsilon \varphi(x + 2\pi) = \epsilon \varphi x$, ἀλλ’ ὅχι ὡς πρωτεύουσαν περίοδον, ὅπως θὰ ίδωμεν εἰς τὰ ἐπόμενα.

‘Η κατασκευὴ τῆς γραφικῆς παραστάσεως μιᾶς περιοδικῆς συναρτήσεως, ὅπως ἡ $\psi = \eta x$, καθίσταται εὐκολωτέρα, διότι ἀρκεῖ νὰ κατασκευάσωμεν ἐν τῷ μήμα αὐτῆς. Πράγματι, έπειδὴ $\eta x = \eta(m(x + 2\pi)) = \eta(m(x + 4\pi))$ κ.τ.λ., αἱ τιμαὶ τῆς συναρτήσεως, αἱ ὁποῖαι ἀντιστοιχοῦν εἰς τὰς τιμὰς τῆς x ἀπὸ 0 ἕως 2π συμπίπτουν μὲν ἑκείνας, αἱ ὁποῖαι ἀντιστοιχοῦν εἰς τὰς τιμὰς τῆς x ἀπὸ 2π ἕως 4π , ἀπὸ 4π ἕως 6π κ.τ.λ. Ἡ εἰς τὰς τιμὰς τῆς x ἀπὸ -2π ἕως 0, -4π ἕως -2π κ.τ.λ. Ἐάν λοιπόν κατασκευάσωμεν ἐν τῷ μήμα τῆς γραφικῆς παραστάσεως τῆς $\psi = \eta x$, π.χ. τὸ τῷ μήμα, τὸ ὁποῖον ἀντιστοιχεῖ εἰς τὰς τιμὰς τῆς x ἀπὸ 0 ἕως 2π , ἀρκεῖ ἔπειτα μία παραλληλος μετάθεσις πρὸς τὸν ἄξονα Οχ κατὰ διάνυσμα ἀλγεβρικῆς τιμῆς 2π ἢ -2π διὰ νὰ έχωμεν τὸ ἀμέσως ἐπόμενον ἢ τὸ ἀμέσως προηγούμενον τῷ μήμα τῆς παραστατικῆς καμπύλης, ποὺ ἀντιστοιχεῖ εἰς τὰς τιμὰς τῆς x ἀπὸ 2π ἕως 4π ἢ ἀπὸ -2π ἕως 0.

‘Η συνάρτησις $\psi = \epsilon \varphi$ έχει πρωτεύουσαν περίοδον τὸ π , ὅπως θὰ ίδωμεν εἰς τὰ ἐπόμενα.


147. ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΥΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ (ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΤΟΞΟΥ).

‘Εμάθομεν εἰς τὰ προηγούμενα (§ 140, παρατήρησις 1η) ὅτι μεταξὺ τῶν τριγωνομετρικῶν συναρτήσεων τῆς αὐτῆς γωνίας θὰ ισχύουν αἱ ταυτότητες :

$$\text{τεμθ} = \frac{1}{\sigma v \theta}, \quad \sigma \text{τεμθ} = \frac{1}{\eta \mu \theta}, \quad \sigma \vartheta \theta = \frac{1}{\epsilon \varphi \theta} \quad (\alpha)$$

‘Εστω τώρα τυχοῦσα γωνία θ , εἰς κανονικὴν θέσιν, τῆς ὁποίας ἡ τελικὴ πλευρὰ δὲν συμπίπτει μὲν ἡμιάξονα (Σχ. 147). Τότε, μὲ τὴν προϋπόθεσιν ὅτι $x \neq 0$ καὶ ἐπομένως $\sigma v \theta \neq 0$ (δηλ. $\theta \neq k\pi + \pi/2$, $k \in \mathbb{Z}$), θὰ έχωμεν :

(*) Ἐννοοῦμεν γωνίαν ἀλγεβρικῆς τιμῆς θ , τῆς ὁποίας γωνίας ἡ ἀπόλυτος τιμὴ έχει εὐρεθῆ εἰς ἀκτίνια.



Σχ. 147

$$\epsilon \varphi \theta = \frac{\Psi}{x} = \frac{\frac{\rho}{\rho}}{\frac{x}{\rho}} = \frac{\eta \mu \theta}{\sigma \nu \theta}, \text{ δηλ.}$$

$$\epsilon \varphi \theta = \frac{\eta \mu \theta}{\sigma \nu \theta} \quad (\beta)$$

$$\sigma \varphi \theta = \frac{x}{\Psi} = \frac{\frac{\rho}{\rho}}{\frac{\Psi}{\rho}} = \frac{\sigma \nu \theta}{\eta \mu \theta}, \text{ δηλ.}$$

$$\sigma \varphi \theta = \frac{\sigma \nu \theta}{\eta \mu \theta} \quad (\gamma) \text{ ὅπου } \text{ ὑποτί-}$$

θεται ὅτι ή θ είναι γωνία διά τὴν ὅποιαν $\eta \mu \theta \neq 0$ (δηλ. $\theta \neq \kappa \pi$, $\kappa \in \mathbb{Z}$).

Ἐξ ἀλλου, ἐκ τοῦ ὀρθογωνίου τριγώνου ΟΠΡ, ἔχομεν :

$$x^2 + \psi^2 = \rho^2 \quad (\delta)$$

Διαιροῦντες τὰ μέλη τῆς (δ) διά ρ^2 εύρισκομεν :

$$\frac{x^2}{\rho^2} + \frac{\psi^2}{\rho^2} = 1, \text{ δηλ. } \left(\frac{x}{\rho}\right)^2 + \left(\frac{\psi}{\rho}\right)^2 = 1,$$

ἡ ὅποια, ἐπειδὴ $x/\rho = \sigma \nu \theta$ καὶ $\psi/\rho = \eta \mu \theta$, γίνεται

$$\sigma \nu^2 \theta + \eta \mu^2 \theta = 1 \quad (\epsilon)$$

Διαιροῦντες τὰ μέλη τῆς (δ) διά x^2 , ὑποτιθεμένου $x \neq 0$, εύρισκομεν $1 + \left(\frac{\psi}{x}\right)^2 = \left(\frac{\rho}{x}\right)^2$, δηλαδή :

$$1 + \epsilon \varphi^2 \theta = \tau \epsilon \mu^2 \theta \quad (\zeta)$$

Διαιροῦντες τὰ μέλη τῆς (δ) διά ψ^2 ($\psi \neq 0$) εύρισκομεν $\left(\frac{x}{\psi}\right)^2 + 1 = \left(\frac{\rho}{\psi}\right)^2$, δηλαδή :

$$1 + \sigma \varphi^2 \theta = \sigma \tau \epsilon \mu^2 \theta \quad (\eta)$$

Αἱ ταυτότητες (α), (β), (γ), (δ), (ε), (ζ), (η) είναι αἱ θεμελιώδεις σχέσεις μεταξὺ τῶν τριγωνομετρικῶν συναρτήσεων τῆς αὐτῆς γωνίας (τοῦ αὐτοῦ τόξου).

148. ΕΦΑΡΜΟΓΑΙ

1) Νὰ ἐκφρασθῇ ἐκάστη τῶν τριγωνομετρικῶν συναρτήσεων τῆς γωνίας θ ἐκ τοῦ $\eta \mu \theta$.

Αύστις : Ἐκ τοῦ τύπου $\sigma \nu^2 \theta + \eta \mu^2 \theta = 1$ ἔχομεν :

$$\sigma \nu^2 \theta = 1 - \eta \mu^2 \theta \Rightarrow |\sigma \nu \theta| = \sqrt{1 - \eta \mu^2 \theta}, \text{ ἄρα}$$

$$\sigma \nu \theta = \sqrt{1 - \eta \mu^2 \theta} \text{ καὶ } \sigma \nu \theta = -\sqrt{1 - \eta \mu^2 \theta}$$

Συμβολικώς τούς δύο τύπους γράφομεν :

$$\begin{aligned} \text{συν}\theta &= \pm \sqrt{1 - \eta\mu^2\theta} \\ \text{εφ}\theta = \frac{\eta\mu\theta}{\text{συν}\theta} &= \frac{\eta\mu\theta}{\pm\sqrt{1 - \eta\mu^2\theta}}, \quad \text{σφ}\theta = \frac{1}{\text{εφ}\theta} = \frac{\pm\sqrt{1 - \eta\mu^2\theta}}{\eta\mu\theta} \end{aligned}$$

$$\text{τεμ}\theta = \frac{1}{\text{συν}\theta} = \frac{1}{\pm\sqrt{1 - \eta\mu^2\theta}}, \quad \text{στεμ}\theta = \frac{1}{\eta\mu\theta}$$

Τό πρόσημον τής τετραγ. ρίζης καθορίζεται, έτσι γνωρίζομεν είς ποίαν γωνίαν τῶν ἀξόνων εύρισκεται ἡ τελικὴ πλευρά τῆς γωνίας θ. Οὔτω, π.χ., έτσι εύρισκεται είς τὴν δευτέραν γωνίαν τῶν ἀξόνων, θὰ λάβωμεν προκειμένου νὰ εὕρωμεν τὸ συνθ τὸν τύπον συνθ = $-\sqrt{1 - \eta\mu^2\theta}$, διότι μία τοιαύτη γωνία ἔχει ὡς συνημίτονον ἀρνητικὸν ἀριθμόν.

2) Νὰ ἐκφρασθοῦν αἱ τριγωνομετρικαὶ συναρτήσεις τῆς γωνίας θ ἐκ τῆς εφθ.

Λύσις : 'Ο τύπος (ζ) τῆς προηγουμένης § 147 δίδει :

$$\text{τεμ}^2\theta = 1 + \text{εφ}^2\theta \Leftrightarrow \frac{1}{\text{συν}^2\theta} = 1 + \text{εφ}^2\theta \Leftrightarrow$$

$$\text{συν}^2\theta = \frac{1}{1 + \text{εφ}^2\theta} \Leftrightarrow \boxed{\text{συν}^2\theta = \frac{1}{\pm\sqrt{1 + \text{εφ}^2\theta}}} \quad (\alpha)$$

Ἐκ δὲ τοῦ τύπου $\frac{\eta\mu\theta}{\text{συν}\theta} = \text{εφ}\theta$ εύρισκομεν :

$$\frac{\eta\mu\theta}{\text{συν}\theta} = \text{εφ}\theta \Leftrightarrow \eta\mu\theta = \text{συν}\theta \text{εφ}\theta \Leftrightarrow$$

$$\eta\mu\theta = \frac{1}{\pm\sqrt{1 + \text{εφ}^2\theta}} \text{εφ}\theta \Leftrightarrow \boxed{\eta\mu\theta = \frac{\text{εφ}\theta}{\pm\sqrt{1 + \text{εφ}^2\theta}}} \quad (\beta)$$

Τέλος εἶναι $\text{σφ}\theta = \frac{1}{\text{εφ}\theta}$ καὶ $\text{στεμ}\theta = \frac{1}{\eta\mu\theta} = \frac{\pm\sqrt{1 + \text{εφ}^2\theta}}{\text{εφ}\theta}$

Καὶ ἔδω τὸ πρόσημον τῆς τετραγ. ρίζης καθορίζεται, ὅταν γνωρίζωμεν είς ποίαν γωνίαν τῶν ἀξόνων εύρισκεται ἡ τελικὴ πλευρά τῆς γωνίας θ.

3) Χρησιμοποιοῦντες τὰς θεμελιώδεις ταυτότητας δυνάμεθα νὰ εὕρωμεν τὰς τιμὰς τῶν ἄλλων τριγωνομετρικῶν συναρτήσεων, ὅταν δοθῇ ἡ τιμὴ μιᾶς ἔξ αὐτῶν.

Ἐστω, π.χ., ὅτι εἶναι $\eta\mu\theta = \frac{3}{5}$ καὶ $-360^\circ < \theta < -270^\circ$.

Ἐκ τοῦ τύπου $\text{συν}^2\theta + \eta\mu^2\theta = 1$, εύρισκομεν $\text{συν}^2\theta = 1 - \eta\mu^2\theta$, ὅθεν $\text{συν}\theta = \pm\sqrt{1 - \eta\mu^2\theta} = \pm\sqrt{1 - \frac{9}{25}} = \pm\sqrt{\frac{16}{25}} = \pm\frac{4}{5}$. Ἐπειδὴ ἡ τελικὴ πλευρά τῆς γωνίας θ εύρισκεται είς τὴν I γωνίαν τῶν ἀξόνων θὰ λάβωμεν τὸ πρόσημον +, διότι μία τοιαύτη γωνία ἔχει συνημίτονον θετικόν. Όμοιώς εύ-

$$\text{ρίσκομεν ότι: } \epsilon\phi\theta = \frac{\eta\mu\theta}{\sigma\nu\theta} = \frac{\frac{3}{5}}{\frac{4}{5}} = \frac{3}{4}, \quad \sigma\phi\theta = \frac{4}{3}, \quad \tau\epsilon\mu\theta = \frac{5}{4}, \quad \sigma\tau\epsilon\mu\theta = \frac{5}{3}.$$

"Ως δεύτερον παράδειγμα έστω $\epsilon\phi\theta = -\frac{5}{12}$. Επειδή ή $\epsilon\phi\theta$ είναι άρνητική, ή θ θά είναι γωνία με τελικήν πλευράν είς τήν II ή IV γωνίαν τῶν ἀξόνων. Εύρισκομεν:

$$\sigma\phi\theta = \frac{1}{\epsilon\phi\theta} = -\frac{12}{5}$$

$$\sigma\nu\theta = \frac{1}{\pm\sqrt{1+\epsilon\phi^2\theta}} = \frac{1}{\pm\sqrt{1+\frac{25}{144}}} = \frac{1}{\pm\sqrt{\frac{169}{144}}} = \pm\frac{12}{13}$$

$$\tau\epsilon\mu\theta = \frac{1}{\sigma\nu\theta} = \pm\frac{13}{12}$$

$$\eta\mu\theta = \frac{\epsilon\phi\theta}{\pm\sqrt{1+\epsilon\phi^2\theta}} = \frac{-\frac{5}{12}}{\pm\frac{13}{12}} = \pm\frac{5}{13}$$

$$\sigma\tau\epsilon\mu\theta = \frac{1}{\eta\mu\theta} = \pm\frac{13}{5}$$

"Εάν ή θ έχη τελικήν πλευράν είς τήν II γωνίαν τῶν ἀξόνων.

$$\epsilon\phi\theta = -\frac{5}{12}$$

$$\sigma\phi\theta = -\frac{12}{5}$$

$$\tau\epsilon\mu\theta = -\frac{13}{12}$$

$$\sigma\nu\theta = -\frac{12}{13}$$

$$\sigma\tau\epsilon\mu\theta = \frac{13}{5}$$

$$\eta\mu\theta = \frac{5}{13}$$

"Εάν ή θ έχη τελικήν πλευράν είς τήν IV γωνίαν τῶν ἀξόνων

$$\epsilon\phi\theta = -\frac{5}{12}$$

$$\sigma\phi\theta = -\frac{12}{5}$$

$$\tau\epsilon\mu\theta = \frac{13}{12}$$

$$\sigma\nu\theta = \frac{12}{13}$$

$$\sigma\tau\epsilon\mu\theta = -\frac{13}{5}$$

$$\eta\mu\theta = -\frac{5}{13}$$

4) Μὲ βάσιν τὰς θεμελιώδεις τριγωνομετρικὰς ταυτότητας δυνάμεθα νὰ ἀποδείξωμεν ἄλλας τριγωνομετρικὰς ταυτότητας.

Παράδειγμα 1ον: Νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι :

$$\eta\mu^3\theta + \eta\mu\sigma\nu^2\theta = \eta\mu\theta$$

Αύσις: $\eta\mu^3\theta + \eta\mu\sigma\nu^2\theta = \eta\mu\theta$ ($\eta\mu^2\theta + \sigma\nu^2\theta$) = $\eta\mu\theta \cdot 1 = \eta\mu\theta$

Παράδειγμα 2ον: Νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι :

$$\epsilon\phi x + \sigma\phi x = \frac{\sigma\tau\epsilon\mu x}{\sigma\nu x}$$

$$\text{Άύσις: } \epsilon\phi x + \sigma\phi x = \frac{\eta\mu x}{\sigma\nu x} + \frac{\sigma\nu x}{\eta\mu x} = \frac{\eta\mu^2 x + \sigma\nu^2 x}{\sigma\nu x \cdot \eta\mu x} = \frac{1}{\sigma\nu x \cdot \eta\mu x} = \frac{1}{\sigma\nu x} \cdot \frac{1}{\eta\mu x} = \frac{1}{\sigma\nu x} \sigma\tau\epsilon\mu x = \frac{\sigma\tau\epsilon\mu x}{\sigma\nu x}$$

Παράδειγμα 3ον : Νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι

$$\frac{1 + \sin x}{\eta \mu x} = \frac{\eta \mu x}{1 - \sin x}$$

Λύσις : Ἐν πρώτοις πρέπει : $\eta \mu x \neq 0$ καὶ $1 - \sin x \neq 0$.

$$\frac{1 + \sin x}{\eta \mu x} = \frac{(1 + \sin x)(1 - \sin x)}{\eta \mu x(1 - \sin x)} = \frac{1 - \sin^2 x}{\eta \mu x(1 - \sin x)} = \frac{\eta \mu^2 x}{\eta \mu x(1 - \sin x)} = \frac{\eta \mu x}{1 - \sin x}$$

Παράδειγμα 4ον : Νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι :

$$2 \text{ στεμ } x = \frac{\eta \mu x}{1 + \sin x} + \frac{1 + \sin x}{\eta \mu x}$$

$$\text{Λύσις : } \frac{\eta \mu x}{1 + \sin x} + \frac{1 + \sin x}{\eta \mu x} = \frac{\eta \mu^2 x + (1 + \sin x)^2}{\eta \mu x(1 + \sin x)} =$$

$$= \frac{\eta \mu^2 x + 1 + 2 \sin x + \sin^2 x}{\eta \mu x(1 + \sin x)} = \frac{(\eta \mu^2 x + \sin^2 x) + 1 + 2 \sin x}{\eta \mu x(1 + \sin x)} =$$

$$= \frac{1 + 1 + 2 \sin x}{\eta \mu x(1 + \sin x)} = \frac{2 + 2 \sin x}{\eta \mu x(1 + \sin x)} = \frac{2(1 + \sin x)}{\eta \mu x(1 + \sin x)} =$$

$$= \frac{2}{\eta \mu x} = 2 \cdot \frac{1}{\eta \mu x} = 2 \text{ στεμ } x$$

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω παραδειγμάτων γίνεται φανερὸν ὅτι, διὰ νὰ ἀποδείξω-
μεν ὅτι μία ἰσότης περιέχουσα τριγωνομετρικὰς συναρτήσεις, εἶναι ταυτότης,
πρέπει καὶ ἀρκεῖ νὰ λάβωμεν τὸ ἐν μέλος αὐτῆς (τὸ πρῶτον ἢ τὸ δεύτερον) καὶ
διὰ καταλλήλων μετασχηματισμῶν νὰ καταλήξωμεν εἰς τὸ ἄλλο μέλος. Εἰς σπα-
νίας περιπτώσεις μετασχηματίζουμεν καὶ τὰ δύο μέλη, διὰ νὰ δυνηθῶμεν νὰ ἴδω-
μεν δὲν πρόκειται περὶ ταυτότητος.

A S K H S E I S

467) Ἐὰν $\eta \mu \theta = \frac{2}{3}$ καὶ $0^\circ < \theta < 90^\circ$, νὰ εὕρετε τοὺς ἄλλους τριγωνομετρικοὺς
ἀριθμοὺς τῆς θ .

468) Ἐὰν $\sin \theta = -\frac{5}{6}$ καὶ $90^\circ < \theta < 180^\circ$, νὰ εὕρετε τοὺς ἄλλους τριγωνομετρι-
κούς ἀριθμούς τῆς γωνίας θ .

469) Ἐὰν $\epsilon \phi \theta = -\frac{5}{4}$ καὶ $90^\circ < \theta < 180^\circ$ νὰ εὕρετε τοὺς ἄλλους τριγωνομετρι-
κούς ἀριθμούς τῆς γωνίας θ .

470) Ἐὰν $\epsilon \phi \theta = -\frac{4}{3}$ καὶ $270^\circ < \theta < 360^\circ$ νὰ εὕρετε τὴν ἀριθμητικὴν τιμὴν τοῦ

κλάσματος $\frac{\eta \mu \theta + \sin \theta - \epsilon \phi \theta}{\tau e m \theta + s t e m \theta - s \phi \theta}$

471) Νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι :

α) $\eta \mu \theta \cdot \sigma \phi \theta = 1$

β) $\tau e m \theta - \tau e m \theta \cdot \eta \mu^2 \theta = \sin \theta$

472) Νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι :

α) $\eta \mu^2 \theta \cdot (1 + \sigma \phi^2 \theta) = 1$

β) $\eta \mu^2 \theta \cdot \tau e m^2 \theta - \tau e m^2 \theta = -1$

473) Νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι :

($\eta \mu \theta + \sin \theta$)² + ($\eta \mu \theta - \sin \theta$)² = 2

474) Νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι :

$\epsilon \phi^2 \theta \cdot \sin^2 \theta + \sigma \phi^2 \theta \cdot \eta \mu^2 \theta = 1$

475) Νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι :

$$\epsilon\phi\theta + \frac{\sigma\upsilon\theta}{1 + \eta\mu\theta} = \tau\epsilon\mu\theta \quad \text{Εγγ.} \quad \text{εγγ.}$$

476) Ὁμοίως ὅτι :

$$\alpha) \frac{1 - \eta\mu\theta}{\sigma\upsilon\theta} = \frac{\sigma\upsilon\theta}{1 + \eta\mu\theta} \quad \beta) \eta\mu^4\theta - \sigma\upsilon\theta^4 = 2\eta\mu^2\theta - 1$$

477) Νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι :

$$\frac{\epsilon\phi\theta - \eta\mu\chi}{\eta\mu^3\chi} = \frac{\tau\epsilon\mu\chi}{1 + \sigma\upsilon\chi}$$

478) Νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι :

$$\frac{\sigma\upsilon\chi \sigma\phi\chi - \eta\mu\chi \epsilon\phi\chi}{\sigma\tau\epsilon\mu\chi - \tau\epsilon\mu\chi} = 1 + \eta\mu\chi \sigma\upsilon\chi$$

479) Νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι :

$$\frac{\eta\mu\chi - \sigma\upsilon\chi}{\epsilon\phi\chi \sigma\tau\epsilon\mu\chi - \tau\epsilon\mu\chi \sigma\phi\chi} = \eta\mu\chi \sigma\upsilon\chi$$

480) Νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι :

$$\alpha) \frac{1 - \epsilon\phi^2\chi}{1 + \epsilon\phi^2\chi} = 1 - 2\eta\mu^2\chi \quad \beta) 1 - \frac{\sigma\upsilon\theta^2\chi}{1 + \eta\mu\chi} = \eta\mu\chi$$

481) Νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι :

$$\frac{1}{\sigma\tau\epsilon\mu\chi - \sigma\phi\chi} - \frac{1}{\sigma\tau\epsilon\mu\chi + \sigma\phi\chi} = \frac{2}{\epsilon\phi\chi}$$

482) Νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι :

$$\eta\mu^2\alpha(1 + \sigma\phi^2\alpha) + \sigma\upsilon\theta^2\alpha(1 + \epsilon\phi^2\alpha) = 2$$

483) Νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι :

$$(\tau\epsilon\mu\alpha + \epsilon\phi\alpha - 1)(\tau\epsilon\mu\alpha - \epsilon\phi\alpha + 1) = 2\epsilon\phi\alpha$$

484) Νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι :

$$(1 - \eta\mu\alpha + \sigma\upsilon\alpha)^2 = 2(1 - \eta\mu\alpha)(1 + \sigma\upsilon\alpha)$$

485) Νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι :

$$\frac{\epsilon\phi\alpha + \sigma\phi\beta}{\sigma\phi\alpha + \epsilon\phi\beta} = \frac{\epsilon\phi\alpha}{\epsilon\phi\beta}$$

486) Νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι :

$$\eta\mu^2\alpha \sigma\upsilon\theta^2\beta - \sigma\upsilon\theta^2\alpha \eta\mu^2\beta = \eta\mu^2\alpha - \eta\mu^2\beta$$

487) Νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι :

$$(\eta\mu\alpha \sigma\upsilon\beta + \sigma\upsilon\alpha \eta\mu\beta)^2 + (\sigma\upsilon\alpha \sigma\upsilon\beta - \eta\mu\alpha \eta\mu\beta)^2 = 1$$

488) Νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι ἡ παράστασις :

$$\eta\mu^6\alpha + \sigma\upsilon^6\alpha - \frac{3}{2}(\eta\mu^4\alpha + \sigma\upsilon^4\alpha)$$

ἔχει μίαν σταθεράν τιμήν ἀνεξάρτητον τοῦ α.

489) Νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι ἡ παράστασις

$$\eta\mu^8\alpha + \sigma\upsilon^8\alpha - 2(1 - \eta\mu^2\alpha \sigma\upsilon^2\alpha)^2$$

ἔχει μίαν σταθεράν τιμήν ἀνεξάρτητον τοῦ α.

490) Νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι παράστασις

$$\eta\mu^4\alpha(3 - 2\eta\mu^2\alpha) + \sigma\upsilon^4\alpha(3 - 2\sigma\upsilon^2\alpha)$$

ἔχει τιμήν σταθεράν ἀνεξάρτητον τοῦ α

491) Νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι :

$$2\sigma\upsilon^8\chi - 2\eta\mu^8\chi + 3\eta\mu^6\chi - 5\sigma\upsilon^6\chi + 3\sigma\upsilon^4\chi = \eta\mu^8\chi$$

492) Νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι ἡ παράστασις

$$\eta\mu^6\chi + 3\eta\mu^2\chi \sigma\upsilon^2\chi + \sigma\upsilon^6\chi$$

ἔχει τιμήν σταθεράν ἀνεξάρτητον τοῦ χ.

ΑΝΑΓΩΓΗ ΕΙΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΟΞΕΙΩΝ ΓΩΝΙΩΝ

149. ΓΩΝΙΑΙ ΜΕ ΚΟΙΝΗΝ ΤΕΛΙΚΗΝ ΠΛΕΥΡΑΝ

Έμάθομεν εις τὴν § 140 ὅτι γωνίαι μὲ κοινὴν τελικὴν πλευρὰν ἔχουν τοὺς αὐτοὺς τριγωνομετρικούς ἀριθμοὺς καὶ εἰς τὴν § 137 ὅτι, ὅταν δύο γωνίαι (έννοεῖται πάντοτε : εἰς κανονικὴν θέσιν) διαφέρουν κατὰ 2κπ (360°), τότε ἔχουν κοινὴν τελικὴν πλευράν.

Ἐπομένως ἔχομεν τὰς κάτωθι ταυτότητας, ὅπου $\kappa \in \mathbb{Z}$.

$$\eta\mu(\theta^0 + 360^\circ\kappa) = \eta\mu\theta^0 \quad \sigma\phi(\theta^0 + 360^\circ\kappa) = \sigma\phi\theta^0$$

$$\sigma\nu(\theta^0 + 360^\circ\kappa) = \sigma\nu\theta^0 \quad \tau\epsilon\mu(\theta^0 + 360^\circ\kappa) = \tau\epsilon\mu\theta^0$$

$$\epsilon\phi(\theta^0 + 360^\circ\kappa) = \epsilon\phi\theta^0 \quad \sigma\tau\epsilon\mu(\theta^0 + 360^\circ\kappa) = \sigma\tau\epsilon\mu\theta^0$$

Οὕτω, π.χ., εἴναι :

$$\eta\mu 410^\circ = \eta\mu(50^\circ + 360^\circ) = \eta\mu 50^\circ$$


$$\sigma\nu 870^\circ = \sigma\nu(150^\circ + 2 \cdot 360^\circ) = \sigma\nu 150^\circ$$

$$\epsilon\phi(-1000^\circ) = \epsilon\phi(80^\circ - 3 \cdot 360^\circ) = \epsilon\phi 80^\circ$$

150. ΓΩΝΙΑΙ ΑΝΤΙΘΕΤΟΙ (ΤΟΞΑ ΑΝΤΙΘΕΤΑ)

Ἔστωσαν δύο γωνίαι θ καὶ $-\theta$ εἰς κανονικὴν θέσιν. Ἐπὶ τῆς τελικῆς πλευρᾶς τῆς θ λαμβάνομεν τυχὸν σημεῖον $P(x, \psi)$ καὶ ἐπὶ τῆς τελικῆς πλευρᾶς τῆς $-\theta$ λαμβάνομεν τὸ σημεῖον $P'(x', -\psi)$ οὕτως, ὥστε νὰ εἴναι $(OP') = (OP)$, δηλ. $\rho' = \rho$ (Σχ. 150).

Ἐπειδὴ τὸ τρίγωνον OPP' είναι ἴσοσκελὲς καὶ ἡ Ox διχοτομεῖ τὴν γωνίαν τῆς κορυφῆς του, θὰ εἴναι $PP' \perp Ox$ καὶ $AP = AP'$. Τὸ σημεῖον λοιπὸν P' είναι συμμετρικὸν τοῦ P ὡς πρὸς τὸν ἄξονα $x'ox$, ἀρά είναι $P'(x, -\psi)$.



Σχ. 150

Ἔχομεν λοιπὸν ὅτι :

$$\eta\mu(-\theta) = \frac{-\psi}{\rho'} = \frac{-\psi}{\rho} = -\frac{\psi}{\rho} = -\eta\mu\theta$$

$$\sigma\nu(-\theta) = \frac{x}{\rho'} = \frac{x}{\rho} = \sigma\nu\theta$$

$$\epsilon\phi(-\theta) = \frac{-\psi}{x} = -\frac{\psi}{x} = -\epsilon\phi\theta$$

$$\sigma\phi(-\theta) = \frac{x}{-\psi} = -\frac{x}{\psi} = -\sigma\phi\theta$$

$$\tau\epsilon\mu(-\theta) = \frac{\rho'}{x} = \frac{\rho}{x} = \tau\epsilon\mu\theta$$

$$\sigma\tau\epsilon\mu(-\theta) = \frac{\rho'}{-\psi} = -\frac{\rho}{\psi} = -\sigma\tau\epsilon\mu\theta$$

(150,α)

"Ωστε : έὰν δύο γωνίαι εἶναι ἀντίθετοι, τότε ἔχουν τὸ αὐτὸ συνημίτονον καὶ τὴν αὐτὴν τέμνουσαν, ἀντιθέτους δὲ τοὺς ἄλλους ὁμωνύμους τριγωνομετρικοὺς των ἀριθμούς.

Οὔτω, π.χ., ημ $(-20^\circ) = -\text{ημ } 20^\circ$


συν $(-20^\circ) = \text{συν } 20^\circ$

εφ $(-20^\circ) = -\text{εφ } 20^\circ$ κ.τ.λ. κ.τ.λ.

$$\text{συν } (-30^\circ) = \text{συν } 30^\circ = \sqrt{\frac{3}{2}}$$

151. ΓΩΝΙΑΙ ΕΧΟΥΣΑΙ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΜΙΑΝ ΠΛΗΡΗ ΓΩΝΙΑΝ. (ΤΟΞΑ ΕΧΟΝΤΑ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΜΙΑΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΝ)

"Εστωσαν, εἰς κανονικήν θέσιν, δύο γωνίαι θ καὶ $360^\circ - \theta$. Γνωρίζομεν (\S 137) ὅτι αἱ γωνίαι $-\theta$ καὶ $360^\circ - \theta$ ἔχουν κοινὴν τελικὴν πλευράν καὶ ἐπομένως ἔχουν τοὺς αὐτοὺς τριγωνομετρικούς ἀριθμούς. Ἐπομένως θὰ ἔχωμεν :



Σχ. 151

$$\left. \begin{aligned} \text{ημ } (360^\circ - \theta) &= \text{ημ } (-\theta) = -\text{ημ} \theta \\ \text{συν } (360^\circ - \theta) &= \text{συν } (-\theta) = \text{συν} \theta \\ \text{εφ } (360^\circ - \theta) &= \text{εφ } (-\theta) = -\text{εφ} \theta \\ \text{σφ } (360^\circ - \theta) &= \text{σφ } (-\theta) = -\text{σφ} \theta \\ \text{τεμ } (360^\circ - \theta) &= \text{τεμ } (-\theta) = \text{τεμ} \theta \\ \text{στεμ } (360^\circ - \theta) &= \text{στεμ } (-\theta) = -\text{στεμ} \theta \end{aligned} \right\} (151,\alpha)$$

"Ωστε : έὰν δύο γωνίαι ἔχουν ἀθροισμα μίαν πλήρη γωνίαν (360°), τότε ἔχουν τὸ αὐτὸ συνημίτονον καὶ τὴν αὐτὴν τέμνουσαν, ἀντιθέτους δὲ ὅλους τοὺς ἄλλους ὁμωνύμους τριγωνομετρικούς ἀριθμούς.

Οὔτω, π.χ., εἶναι :





$$\text{ημ. } 330^\circ = -\text{ημ} 30^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\text{εφ } 300^\circ = -\text{εφ } 60^\circ = -\sqrt{3}$$

$$\text{συν } 315^\circ = \text{συν } 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2} \quad \text{κ.τ.λ.}$$

152. ΓΩΝΙΑΙ ΠΑΡΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑΙ (ΤΟΞΑ ΕΧΟΝΤΑ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΗΜΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΝ)

"Εστωσαν είς κανονικήν θέσιν δύο γωνίαι θ καὶ $180^\circ - \theta$. (Διὰ νὰ σχεδιάσωμεν τὴν $180^\circ - \theta$ κατασκευάζωμεν τὴν $-\theta$ καὶ προεκτείνομεν ἔπειτα τὴν τελικήν αὐτῆς πλευρὰν κατ' ἀντίθετον φοράν δηλ. στρέφομεν τὴν τελικήν πλευρὰν αὐτῆς κατὰ γωνίαν 180°). Λαμβάνομεν τυχὸν σημεῖον $P(x, \psi)$ ἐπὶ τῆς τελικῆς πλευρᾶς τῆς θ καὶ ἐπὶ τῆς τελικῆς πλευρᾶς τῆς γωνίας $180^\circ - \theta$ λαμβάνομεν σημεῖον P' ὥστε νὰ εἶναι $OP' = OP$, ὅπότε θὰ εἶναι $\rho' = \rho$ (Σχ. 152).



Σχ. 152

Λόγω τῆς ισότητος τῶν τριγώνων OPR καὶ $OP'P'$ εἶναι : $(OP) = (OP')$ καὶ $(PP') = (P'P)$. Ἐπομένως αἱ συντεταγμέναι τοῦ P' εἶναι $-x$ καὶ ψ , δηλ. $P(-x, \psi)$. Θὰ εἶναι λοιπόν :

$$\left. \begin{array}{l} \text{ημ } (180^\circ - \theta) = \frac{\psi}{\rho'} = \frac{\psi}{\rho} = \eta \mu \theta \\ \text{συν } (180^\circ - \theta) = \frac{-x}{\rho'} = -\frac{x}{\rho} = -\sigma \nu \theta \\ \text{εφ } (180^\circ - \theta) = \frac{\psi}{-x} = -\frac{\psi}{x} = -\epsilon \phi \theta \\ \text{σφ } (180^\circ - \theta) = \frac{-x}{\psi} = -\frac{x}{\psi} = -\sigma \phi \theta \\ \text{τεμ } (180^\circ - \theta) = \frac{\rho'}{-x} = -\frac{\rho}{x} = -\tau \epsilon \mu \theta \\ \text{στεμ } (180^\circ - \theta) = \frac{\rho'}{\psi} = \frac{\rho}{\psi} = \sigma \tau \epsilon \mu \theta \end{array} \right\} (152,\alpha)$$

“Ωστε : Έάν δύο γωνίαι είναι παραπληρωματικαί, τότε έχουν τὸ αὐτὸν ήμίτονον καὶ τὴν αὐτὴν συντέμνουσαν καὶ ἀντιθέτους τοὺς ἄλλους ὄμωνύμους τριγωνομετρικούς των ἀριθμούς.


Ούτω, π.χ. ἐπειδὴ $150^\circ + 30^\circ = 180^\circ$ θὰ είναι :

$$\text{ημ } 150^\circ = \text{ημ } 30^\circ = \frac{1}{2}$$


$$\text{συν } 150^\circ = -\text{συν } 30^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2} \quad \text{κ.τ.λ.}$$

153. ΓΩΝΙΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑΙ (ΤΟΞΑ ΕΧΟΝΤΑ ΑΘΡΟΙΣΜΑ $\frac{1}{4}$ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ)

Έστωσαν εἰς κανονικήν θέσιν, δύο γωνίαι θ καὶ $90^\circ - \theta$. (Διὰ νὰ κατασκευάσωμεν τὴν $90^\circ - \theta$ κατασκευάζομεν τὴν $-\theta$ καὶ στρέφομεν ἔπειτα τὴν τελικήν πλευρὰν αὐτῆς κατὰ τὴν θετικήν φοράν κατὰ 90°). Λαμβάνομεν τυχὸν σημεῖον $P(x, \psi)$ ἐπὶ τελικῆς πλευρᾶς τῆς γωνίας θ καὶ ἐπὶ τῆς τελικῆς πλευρᾶς τῆς $90^\circ - \theta$ λαμβάνομεν σημεῖον $P'(x', \psi')$ οὔτως, ὥστε νὰ είναι $OP' = OP$, δηλ. $\rho' = \rho$ (Σχ. 153).



Σχ. 153



Λόγω τῆς ἴσοτητος τῶν τριγώνων OPR καὶ $O'P'R'$ ἔχομεν $(OP') = (PR)$ καὶ $(P'R') = (OP)$. Ἐπομένως τὸ P' ἔχει τετμημένην ψ καὶ τεταγμένην x . Ἐχομεν λοιπόν :

$$\text{ημ } (90^\circ - \theta) = \frac{x}{\rho'} = \frac{x}{\rho} = \text{συν}\theta$$

$$\text{συν } (90^\circ - \theta) = \frac{\psi}{\rho'} = \frac{\psi}{\rho} = \text{ημ}\theta$$

$$\text{εφ } (90^\circ - \theta) = \frac{x}{\psi} = \sigma\phi\theta$$

$$\text{σφ } (90^\circ - \theta) = \frac{\psi}{x} = \epsilon\phi\theta$$

$$\text{τεμ } (90^\circ - \theta) = \frac{\rho'}{\psi} = \frac{\rho}{\psi} = \sigma\tau\epsilon\mu\theta$$

$$\text{στεμ } (90^\circ - \theta) = \frac{\rho'}{x} = \frac{\rho}{x} = \tau\epsilon\mu\theta$$

(153,α)

"Ωστε : έὰν δύο γωνίαι εἰναι συμπληρωματικαί, τότε τὸ ήμίτονον ἐκάστης ἔξι αὐτῶν ισοῦται μὲ τὸ συνημίτονον τῆς ἄλλης, ἡ ἐφαπτομένη μὲ τὴν συνεφαπτομένην καὶ ἡ τέμνουσα μὲ τὴν συντέμνουσαν.

Οὔτω, π.χ., ἐπειδὴ $20^\circ + 70^\circ = 90^\circ$, θὰ ἔχωμεν

$$\text{ημ } 70^\circ = \text{συν } 20^\circ$$

$$\text{συν } 70^\circ = \text{ημ } 20^\circ$$

$$\text{εφ } 70^\circ = \text{σφ } 20^\circ \quad \text{κ.τ.λ.}$$

154. ΓΩΝΙΑΙ ΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑΙ ΚΑΤΑ ΜΙΑΝ ΟΡΘΗΝ (ΤΟΞΑ ΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ)

"Εστω ὅτι ἔχομεν, εἰς κανονικήν θέσιν, τὰς γωνίας θ καὶ $90^\circ + \theta$. Θέλομεν νὰ ἴδωμεν πῶς σχετίζονται οἱ τριγωνομετρικοὶ των ἀριθμοί. Ἐπειδὴ $(90^\circ + \theta) + (90^\circ - \theta) = 180^\circ$, διὰ τοῦτο θὰ ἔχωμεν (§ 152) :

$$\left. \begin{array}{l} \text{ημ } (90^\circ + \theta) = \text{ημ } (90^\circ - \theta) = \text{συν } \\ \text{συν } (90^\circ + \theta) = -\text{συν } (90^\circ - \theta) = -\text{ημ } \theta \\ \text{εφ } (90^\circ + \theta) = -\text{εφ } (90^\circ - \theta) = -\text{σφ } \theta \\ \text{σφ } (90^\circ + \theta) = -\text{σφ } (90^\circ - \theta) = -\text{εφ } \theta \\ \text{τεμ } (90^\circ + \theta) = -\text{τεμ } (90^\circ - \theta) = -\text{στεμ } \theta \\ \text{στεμ } (90^\circ + \theta) = \text{στεμ. } (90^\circ - \theta) = \text{τεμ } \theta \end{array} \right\} (154,\alpha)$$

Οὔτω, π.χ., ἐπειδὴ $110^\circ = 90^\circ + 20^\circ$, διὰ τοῦτο θὰ εἴναι :

$$\text{ημ } 110^\circ = \text{συν } 20^\circ$$

$$\text{συν } 110^\circ = -\text{ημ } 20^\circ$$

$$\text{εφ } 110^\circ = -\text{σφ } 20^\circ \quad \text{κ.τ.λ.}$$

155. ΓΩΝΙΑΙ ΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑΙ ΚΑΤΑ ΕΥΘΕΙΑΝ – ΓΩΝΙΑΝ (ΤΟΞΑ ΔΙΑΦΟΡΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΗΜΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΝ)

"Εστωσαν αἱ γωνίαι θ καὶ $180^\circ + \theta$, αἱ ὁποῖαι διαφέρουν κατὰ 180° . Ἐπειδὴ $180^\circ + \theta = 90^\circ + (90^\circ + \theta)$, διὰ τοῦτο θὰ ἔχωμεν :

$$\left. \begin{array}{l} \text{ημ } (180^\circ + \theta) = \text{ημ } [90^\circ + (90^\circ + \theta)] = \text{συν } (90^\circ + \theta) = -\text{ημ } \theta \\ \text{συν } (180^\circ + \theta) = \text{συν } [90^\circ + (90^\circ + \theta)] = -\text{ημ } (90^\circ + \theta) = -\text{συν } \theta \\ \text{εφ } (180^\circ + \theta) = \text{εφ } [90^\circ + (90^\circ + \theta)] = -\text{σφ } (90^\circ + \theta) = \text{εφ } \theta \\ \text{σφ } (180^\circ + \theta) = \text{σφ } [90^\circ + (90^\circ + \theta)] = -\text{εφ } (90^\circ + \theta) = \text{σφ } \theta \\ \text{τεμ } (180^\circ + \theta) = \text{τεμ } [90^\circ + (90^\circ + \theta)] = -\text{στεμ } (90^\circ + \theta) = -\text{τεμ } \theta \\ \text{στεμ } (180^\circ + \theta) = \text{στεμ } [90^\circ + (90^\circ + \theta)] = \text{τεμ } (90^\circ + \theta) = -\text{στεμ } \theta \end{array} \right\}$$

Δυνάμεθα νὰ ἐργασθῶμεν καὶ ὡς ἔξῆς : ἐπειδὴ $(180^\circ + \theta) + (180^\circ - \theta) = 360^\circ$, διὰ τοῦτο (§ 151) θὰ ἔχωμεν :

$$\left. \begin{array}{l} \text{ημ } (180^\circ + \theta) = -\text{ημ } (180^\circ - \theta) = -\text{ημ } \theta \\ \text{συν } (180^\circ + \theta) = \text{συν } (180^\circ - \theta) = -\text{συν } \theta \\ \text{εφ } (180^\circ + \theta) = -\text{εφ } (180^\circ - \theta) = \text{εφ } \theta \\ \text{σφ } (180^\circ + \theta) = -\text{σφ } (180^\circ - \theta) = \text{σφ } \theta \\ \text{τεμ } (180^\circ + \theta) = \text{τεμ } (180^\circ - \theta) = -\text{τεμ } \theta \\ \text{στεμ } (180^\circ + \theta) = -\text{στεμ } (180^\circ - \theta) = -\text{στεμ } \theta \end{array} \right\}$$

"Ωστε : έάν δύο γωνίαι διαφέρουν κατά 180° , τότε έχουν τὴν αὐτὴν ἐφαπτομένην καὶ τὴν αὐτὴν συνεφαπτομένην, ἀντιθέτους δὲ τοὺς ἄλλους ὄμωνύμους τριγωνομετρικούς των ἀριθμούς.

Οὔτω, π.χ., ἐπειδὴ $225^\circ = 180^\circ + 45^\circ$, διὰ τοῦτο θὰ εἶναι :

$$\text{ημ } 225^\circ = -\text{ημ } 45^\circ = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\text{εφ } 225^\circ = \text{εφ } 45^\circ = 1$$

$$\text{συν } 225^\circ = -\text{συν } 45^\circ = -\frac{\sqrt{2}}{2} \quad \text{κ.τ.λ.}$$

Σημείωσις. Παρατηροῦμεν ὅτι $\text{εφ } (\pi + \theta) = \text{εφ } \theta$ καὶ $\text{σφ } (\pi + \theta) = \text{σφ } \theta$. Ἐπίσης $\text{εφ } (2\pi + \theta) = \text{εφ } \theta$ καὶ $\text{σφ } (2\pi + \theta) = \text{σφ } \theta$, δῆπες γνωρίζουμεν. Ὁμοίως εἶναι $\text{εφ } (3\pi + \theta) = \text{εφ } [2\pi + (\pi + \theta)] = \text{εφ } (\pi + \theta) = \text{εφ } \theta$ κτλ. Ἡτοι αἱ συναρτήσεις $\psi = \text{εφ } x$ καὶ $\psi = \text{σφ } x$ έχουν περίοδον τὸν π .

156. ΑΝΑΓΩΓΗ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΥΧΟΥΣΗΣ ΓΩΝΙΑΣ (ΤΥΧΟΝΤΟΣ ΤΟΞΟΥ) ΕΙΣ ΤΡΙΓΩΝΟΜΜΕΤΡΙΚΟΝ ΑΡΙΘΜΟΝ ΜΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑΣ (ΜΗ ΑΡΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΞΟΥ) ΜΙΚΡΟΤΕΡΑΣ ΤΩΝ 45° .

Ἐφαρμόζοντες τοὺς τύπους, τοὺς ὅποιους ἔμάθομεν εἰς τὰς παραγράφους 149 ἕως 155, δυνάμεθα νὰ ἀναγάγωμεν τὴν εὑρεσιν ἐνὸς τριγωνομετρικοῦ ἀριθμοῦ τυχούσης γωνίας θ (θετικῆς ἢ ἀρνητικῆς) εἰς τὴν εὑρεσιν τριγωνομετρικοῦ ἀριθμοῦ γωνίας μὴ ἀρνητικῆς καὶ μικρότερας τῶν 45° .

"Εστω, π.χ., ὅτι ζητεῖται ἡ $\text{εφ } (-1250^\circ)$. Ἐν πρώτοις γνωρίζουμεν ὅτι $\text{εφ } (-1250^\circ) = -\text{εφ } 1250^\circ$ (§ 150).

Διαιροῦμεν τώρα τὸν 1250° διὰ 360° καὶ εύρισκομεν πιηλίκον 3 καὶ ύπόλοιπον 170, ἀρα εἶναι $1250^\circ = 170^\circ + 3 \cdot 360^\circ$. Ἐχομεν ἐπομένως :

$$\begin{aligned} \text{εφ } (-1250^\circ) &= -\text{εφ } 1250^\circ = -\text{εφ } (170^\circ + 3 \cdot 360^\circ) \\ &= -\text{εφ } 170^\circ && (\S \, 149) \\ &= \text{εφ } 10^\circ && (\S \, 152) \end{aligned}$$

‘Ομοίως εύρισκομεν ὅτι :

$$\begin{aligned} \text{ημ } (-1385^\circ) &= -\text{ημ } 1385^\circ && (\S \, 150) \\ &= -\text{ημ } (305^\circ + 3 \cdot 360^\circ) \\ &= -\text{ημ } 305^\circ && (\S \, 149) \\ &= \text{ημ } 55^\circ && (\S \, 151) \\ &= \text{συν } 35^\circ && (\S \, 153) \end{aligned}$$

Γενικῶς δυνάμεθα νὰ ἀκολουθῶμεν τὸν ἔξιτης κανόνα : Ἀναγόμεθα πρῶτον εἰς γωνίαν θετικήν καὶ μικροτέρα τῶν 360° . Ἐπειτα ἔάν ἡ γωνία αὕτη εἶναι μεγαλυτέρα τῶν 270° τὴν συνδυάζομεν μὲ τὴν 360° . "Αν εἶναι μεταξὺ 180° καὶ 270° , εύρισκομεν πόσον διαφέρει ἀπὸ 180° καὶ τὴν συνδυάζομεν μὲ τὴν διαφορὰν αὕτην. Ἐάν εἶναι μεγαλυτέρα τῶν 90° καὶ μικροτέρα τῶν 180° τὴν συνδυάζομεν μὲ τὴν παραπληρωματικήν της καὶ τέλος ἔάν εἶναι μεγαλυτέρα τῶν 45° καὶ μικροτέρα τῶν 90° τὴν συνδυάζομεν μὲ τὴν συμπληρωματικήν της.

Παραδείγματα :

$$\text{ημ } 290^\circ = -\text{ημ } 70^\circ = -\text{συν } 20^\circ$$

$$\text{συν } 260^\circ = -\text{συν } 80^\circ = -\text{ημ } 10^\circ$$

$$\text{εφ } 140^\circ = -\text{εφ } 40^\circ$$

$$\text{σφ } 85^\circ = \text{εφ } 5^\circ$$

Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ

493) Νά άναχθούν είς τριγωνομετρικούς άριθμούς μή άρνητικής γωνίας μικροτέρας τῶν 45° οι κάτωθι τριγωνομετρικοί άριθμοί :

- | | | | | |
|------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| α) ημ 135° | β) συν 315° | γ) εφ 200° | δ) σφ 400° | ε) τεμ 325° |
| στ) συν (-760°) | ζ) εφ (-1385°) | η) ημ 2880° | θ) στεμ 825° | ι) στεμ 610° |

494) Νά εύρετε τάς τιμάς (άκριβεις) τῶν τριγωνομετρικῶν συναρτήσεων : ημ, συν, εφ, σφ τῶν γωνιῶν :

- | | | | | | |
|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| α) 150° | β) 225° | γ) -330° | δ) -120° | ε) -210° | στ) -315° |
|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

495) Νά έκφρασθούν οι κάτωθι τριγωνομετρικοί άριθμοι μὲ τριγωνομετρικούς άριθμούς τῆς γωνίας θ.

- | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| α) συν $(\theta - 90^\circ)$, | β) εφ $(270^\circ - \theta)$, | γ) συν $(\theta + 540^\circ)$ |
| δ) ημ $(\theta - 270^\circ)$ | ε) ημ $(\theta - 180^\circ)$ | στ) συν $(270^\circ + \theta)$ |
| ζ) ημ $(\theta - 720^\circ)$ | η) εφ $(-540^\circ + \theta)$ | θ) συν $(\theta - 180^\circ)$ |

496) *Εάν εφ $25^\circ = \alpha$, νά εύρεθῇ ή τιμὴ τῶν κλασμάτων :

$$\alpha) \frac{\text{εφ } 155^\circ - \text{εφ } 115^\circ}{1 + \text{εφ } 155^\circ \text{ εφ } 115^\circ} \quad \beta) \frac{\text{εφ } 205^\circ - \text{εφ } 115^\circ}{\text{εφ } 245^\circ + \text{εφ } 335^\circ}$$

$$497) *Εάν A + B + \Gamma = 180^\circ, \text{ νά δειχθῇ ότι } \etaμ(B + \Gamma) = \etaμ A \text{ καὶ συν } \frac{B + \Gamma}{2} = \etaμ \frac{A}{2}.$$

498) *Εάν θ είναι γωνία μὲ τὴν τελικήν της πλευράν εἰς τὴν δευτέραν γωνίαν τῶν ἀξόνων (δηλ. $90^\circ < \theta < 180^\circ$) διὰ τὴν ὅποιαν είναι : εφ $\theta = -2/3$, νά ἀποδειχθῇ ότι τότε :

$$\alpha) \frac{\etaμ(90^\circ - \theta) - \text{συν}(180^\circ - \theta)}{\text{εφ}(270^\circ + \theta) + \text{σφ}(360^\circ - \theta)} = -\frac{2}{\sqrt{13}} \quad \text{καὶ}$$

$$\beta) \frac{\text{εφ}(90^\circ + \theta) + \text{συν}(180^\circ + \theta)}{\etaμ(270^\circ - \theta) - \text{σφ}(-\theta)} = \frac{2 + \sqrt{13}}{2 - \sqrt{13}}$$

499) Νά ἀποδειχθῇ ότι :

$$\alpha) \text{συν } 0^\circ \etaμ^2 270^\circ - 2 \text{ συν } 180^\circ \text{ εφ } 45^\circ = 3$$

$$\beta) 3 \etaμ 0^\circ \text{ τεμ } 180^\circ + 2 \text{ στεμ } 90^\circ - \text{συν } 360^\circ = 1$$

$$\gamma) 2\text{τεμ} \text{ συν} 0+3 \etaμ^3 \frac{3\pi}{2} - \text{στεμ} \frac{\pi}{2} = -6$$

$$\delta) \text{εφ} \text{ συν} \frac{3\pi}{2} + \text{τεμ } 2\pi - \text{στεμ} \frac{3\pi}{2} = 2$$

500) Νά ἀπλοποιηθοῦν τὰ κάτωθι κλάσματα :

$$\alpha) \frac{\text{συν}(90^\circ + \alpha) \text{ τεμ}(-\alpha) \text{ εφ}(180^\circ - \alpha)}{\text{τεμ}(360^\circ + \alpha) \etaμ(180^\circ + \alpha) \text{ σφ}(270^\circ - \alpha)}$$

$$\beta) \frac{\etaμ(180^\circ - \alpha) \text{ σφ}(270^\circ - \alpha) \text{ συν}(\alpha - 360^\circ)}{\text{εφ}(180^\circ + \alpha) \text{ εφ}(90^\circ + \alpha) \text{ συν}(270^\circ + \alpha)}$$

501) *Ομοίως τὰ κάτωθι κλάσματα :


$$\alpha) \frac{\text{συν}\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) \text{ τεμ}(-\alpha) \text{ εφ}(\pi - \alpha)}{\text{τεμ}(2\pi + \alpha) \etaμ(\pi + \alpha) \text{ σφ}\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right)}$$

$$\beta) \frac{\eta\mu \left(\frac{3\pi}{2} - \alpha\right) \epsilon\varphi (\pi - \beta)}{\epsilon\varphi (\pi - \beta) \sigma\text{vn} (\pi - \alpha)} + \frac{\sigma\varphi \left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) \eta\mu \left(\gamma - \frac{\pi}{2}\right)}{\sigma\text{vn} (\pi - \gamma) \epsilon\varphi (-\alpha)}$$

$$\gamma) \frac{\epsilon\varphi (\pi - \theta) \sigma\varphi (\pi + \theta) \epsilon\varphi (-\theta) \epsilon\varphi \left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)}{\epsilon\varphi (\pi + \theta) \sigma\varphi (\pi - \theta) \sigma\varphi \theta \epsilon\varphi (2\pi - \theta)}$$

157. ΝΟΜΟΣ ΤΩΝ ΗΜΙΤΟΝΩΝ.

Εις τὴν γ' τάξιν ἐμάθομεν πῶς σχετίζονται μεταξύ των τὰ κύρια στοιχεῖα ἐνὸς δρθιογωνίου τριγώνου. "Υπενθυμίζομεν ἐδῶ τοὺς σχετικοὺς τύπους :



Σχ. 157.1


$$\begin{aligned} \beta &= \alpha\mu & B &= \alpha \text{ svn } \Gamma \\ \gamma &= \alpha \eta\mu & \Gamma &= \alpha \text{ svn } B \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\}$$

$$\begin{aligned} \beta &= \gamma\epsilon\varphi & B &= \gamma \sigma\varphi \Gamma \\ \gamma &= \beta \epsilon\varphi & \Gamma &= \beta \sigma\varphi B \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\}$$

$$\alpha^2 = \beta^2 + \gamma^2$$

Θὰ ζητήσωμεν τώρα νὰ εὑρωμεν τύπους συνδέοντας τὰ στοιχεῖα τυχόντος μὴ δρθιογωνίου τριγώνου.

"Εστω ΑΒΓ τυχὸν μὴ δρθιογώνιον τρίγωνον (Σχ. 157.2).



Σχ. 157.2

Εις τὸ σχ. 157-2,(α) ἔχομεν ἔνα δέξιγωνιον τρίγωνον. Εἰς τὸ σχ. 157-2, (β) ἔχομεν ἔνα τρίγωνον ἀμβλυγώνιον. Φέρομεν τὴν ΓΔ κάθετον πρὸς τὴν ΑΒ καὶ ὀνομάζομεν ($\Gamma\Delta$) = λ. Ἀπὸ τὸ δρθιογώνιον τρίγωνον ΑΓΔ δι' ἀμφότερα τὰ σχήματα ἔχομεν $\lambda = \beta\mu A$. (1)

'Απὸ τὸ δρθιογώνιον τρίγωνον ΓΔΒ τοῦ σχ. (α) ἔχομεν $\lambda = \alpha\mu B$. (2)

'Απὸ δὲ τὸ δρθιογώνιον τρίγωνον ΓΒΔ τοῦ σχ. (β) ἔχομεν $\lambda = \alpha\mu\varphi = \alpha\mu B$ (διότι $B + \varphi = 180^\circ$), ἔχομεν δηλ. πάλιν τὴν (2). 'Επομένως ἐκ τῶν (1) καὶ (2) ἔχομεν :

$$\begin{aligned} \lambda &= \beta \eta\mu A \\ \lambda &= \alpha \eta\mu B \end{aligned} \Rightarrow \beta \eta\mu A = \alpha \eta\mu B \Rightarrow \frac{\alpha}{\eta\mu A} = \frac{\beta}{\eta\mu B} \quad (3)$$

Φέρομεν τώρα τὴν κάθετον ἐκ τοῦ B ἐπὶ τὴν ΑΓ καὶ θέτομεν (BE) = μ. Δι' ἀμφότερα τὰ σχήματα ἔχομεν :

$\mu = \alpha \text{ημ } \Gamma$ καὶ $\mu = \gamma \text{ημ } A$. Επομένως ἔχομεν :

$$\begin{aligned} \mu &= \alpha \text{ημ } \Gamma \\ \mu &= \gamma \text{ημ } A \end{aligned} \Rightarrow \alpha \text{ημ } \Gamma = \gamma \text{ημ } A \Rightarrow \frac{\alpha}{\eta \mu \Gamma} = \frac{\gamma}{\eta \mu A} \quad (4)$$

*Εκ τῶν (3) καὶ (4) συνάγομεν ὅτι

$$\frac{\alpha}{\eta \mu A} = \frac{\beta}{\eta \mu B} = \frac{\gamma}{\eta \mu \Gamma} \quad (157,\alpha)$$


*Ωστε: εἰς κάθε τρίγωνον τὰ μήκη τῶν πλευρῶν εἶναι ἀνάλογα πρὸς τὰ ήμιτονα τῶν ἀπέναντι γωνιῶν.

Αἱ ἀναλογίαι (157,α) ἀποτελοῦν τὸν λεγόμενον νόμον τῶν ήμιτόνων.

158. ΝΟΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΗΜΙΤΟΝΩΝ

*Ἄσ λάβωμεν πάλιν ἐν μὴ ὁρθογώνιον τρίγωνον $AB\Gamma$ (Σχ. 158) *Απὸ τὸ ὁρθογώνιον τρίγωνον $A\Gamma\Delta$ δι' ἀμφότερα τὰ σχήματα ἔχομεν :

$$\beta^2 = \lambda^2 + (\Delta\Gamma)^2 \quad (1)$$



Σχ. 158

*Απὸ τὸ ὁρθογώνιον τρίγωνον $B\Gamma\Delta$ τοῦ σχ. (α) ἔχομεν :

$$\lambda = \alpha \text{ημ } B \quad \text{καὶ } (\Delta\Gamma) = \alpha \text{ συν } B$$

*Επομένως εἴναι :

$$(\Delta\Gamma) = (AB) - (\Delta B) = \gamma - \alpha \text{συν } B$$

καὶ ἡ (1) γίνεται :

$$\beta^2 = \lambda^2 + (\Delta\Gamma)^2 = \alpha^2 \eta \mu^2 B + \gamma^2 - 2\gamma\alpha \text{ συν } B + \alpha^2 \text{συν}^2 B =$$

$$= \alpha^2 (\eta \mu^2 B + \text{συν}^2 B) + \gamma^2 - 2\gamma\alpha \text{ συν } B$$

$$= \alpha^2 + \gamma^2 - 2\gamma\alpha \text{ συν } B$$

*Απὸ τὸ τρίγωνον $B\Gamma\Delta$ τοῦ σχ. (β) ἔχομεν :

$$\lambda = \alpha \text{ημφ} = \alpha \text{ημ } B \quad (\text{διότι } B + \phi = 180^\circ) \quad \text{καὶ } (\Delta\Gamma) = \alpha \text{συνφ} = -\alpha \text{συν } B$$

*Επομένως εἴναι :

$$(\Delta\Gamma) = (AB) + (\Delta B) = \gamma - \alpha \text{ συν } B$$

καὶ ἡ (1) γίνεται καὶ διὰ τὸ τρίγωνον τούτο :

$$\beta^2 = \alpha^2 + \gamma^2 - 2\gamma\alpha \text{συν } B$$

*Ἐὰν ἐργασθῶμεν ὁμοίως φέροντες τὰς καθέτους ἀπὸ τὰς κορυφὰς Γ καὶ

Α ἐπὶ τὰς ἀντιστοίχους πλευράς εύρισκομεν ἀκόμη δύο ὁμοίους τύπους :

$$\alpha^2 = \beta^2 + \gamma^2 - 2\beta\gamma \text{ συν } A$$

$$\gamma^2 = \alpha^2 + \beta^2 - 2\alpha\beta \text{ συν } A$$

"Ωστε ἔχομεν τοὺς τύπους :

$$\left. \begin{array}{l} \alpha^2 = \beta^2 + \gamma^2 - 2\beta\gamma \text{ συν } A \\ \beta^2 = \gamma^2 + \alpha^2 - 2\alpha\gamma \text{ συν } B \\ \gamma^2 = \alpha^2 + \beta^2 - 2\alpha\beta \text{ συν } \Gamma \end{array} \right\} (158, \alpha)$$

Οι ἀνωτέρω τύποι* (158, α) ἀποτελοῦν τὸν λεγόμενον νόμον τῶν συνημιτόνων, δ ὅποιος λεκτικῶς διατυπώνεται ὡς ἔξῆς :

Τὸ τετράγωνον τοῦ μήκους μιᾶς πλευρᾶς τριγώνου ίσουται μὲ τὸ ἄθροισμα τῶν τετραγώνων τῶν μηκῶν τῶν δύο ἄλλων πλευρῶν μεῖον τὸ διπλάσιον γινόμενον τῶν μηκῶν τῶν πλευρῶν αὐτῶν ἐπὶ τὸ συνημίτονον τῆς ὑπὸ αὐτῶν περιεχομένης γωνίας.

159. ΕΦΑΡΜΟΓΑΙ

1) Εἰς ἓν τρίγωνον ABG εἴναι $\gamma = 25\text{cm}$, $A = 35^\circ$ καὶ $B = 68^\circ$. Ζητεῖται νὰ εὑρεθοῦν τὰ α, β, Γ .

Λύσις : Ἐπειδὴ $A + B + \Gamma = 180^\circ$, θὰ εἴναι $\Gamma = 180^\circ - (A + B) = 77^\circ$. Εκ τοῦ νόμου τῶν ἡμιτόνων ἔχομεν :

$$\frac{\alpha}{\eta\mu A} = \frac{\gamma}{\eta\mu \Gamma} \Rightarrow \alpha = \frac{\gamma \eta\mu A}{\eta\mu \Gamma} = \frac{25 \cdot \eta\mu 35^\circ}{\eta\mu 77^\circ} = \frac{25 \cdot 0,574}{0,974} \simeq 15 \text{ cm.}$$

Ἐκ τοῦ νόμου τῶν ἡμιτόνων ἔχομεν ἐπίσης :

$$\frac{\beta}{\eta\mu B} = \frac{\gamma}{\eta\mu \Gamma} \Rightarrow \beta = \frac{\gamma \eta\mu B}{\eta\mu \Gamma} = \frac{25 \cdot \eta\mu 68^\circ}{\eta\mu 77^\circ} = \frac{25 \cdot 0,927}{0,974} \simeq 24 \text{ cm}$$

2) Εἰς ἓν τρίγωνον ABG εἴναι $\alpha = 132\text{m}$, $\beta = 124\text{m}$, $\Gamma = 28^\circ 40'$. Ζητεῖται νὰ εὑρεθοῦν ἡ πλευρὰ γ καὶ αἱ γωνίαι A καὶ B .

Λύσις : Ἐκ τοῦ νόμου τῶν συνημιτόνων ἔχομεν :

$$\gamma^2 = \alpha^2 + \beta^2 - 2\alpha\beta \text{ συν } \Gamma = 132^2 + 224^2 - 2 \cdot 132 \cdot 224 \text{ συν } 28^\circ 40' = 15714, \text{ ἅρα}$$

$$\gamma = \sqrt{15714} \simeq 125 \text{ m}$$

$$\text{Διὰ τὴν } A : \frac{\alpha}{\eta\mu A} = \frac{\gamma}{\eta\mu \Gamma} \Rightarrow \eta\mu A = \frac{\alpha \eta\mu \Gamma}{\gamma} = \frac{132 \eta\mu 28^\circ 40'}{125} = \frac{132 \cdot 0,480}{125} =$$

$$= 0,507 \text{ καὶ ἐκ τῶν πινάκων τῶν φυσικῶν τριγωνομετρικῶν ἀριθμῶν εύρισκομεν } A = 30^\circ 30'.$$

$$\text{Ἐργαζόμενοι ὁμοίως εύρισκομεν ἐκ τῆς } \eta\mu B = \frac{\beta \eta\mu \Gamma}{\gamma} \text{ ὅτι } B = 120^\circ 40'.$$

Δυνάμεθα, βεβαίως, νὰ ὑπολογίσωμεν τὴν B ἀπὸ τὸν τύπον $A + B + \Gamma = 180^\circ$.

Εἰς τὴν E' τάξιν θὰ μάθωμεν νὰ ὑπολογίζωμεν τὰ στοιχεῖα ἐνὸς τυχόντος τριγώνου, ὅταν δίδωνται ἀρκετὰ πρὸς τοῦτο στοιχεῖα καὶ θὰ ἴδωμεν πότε καὶ πῶς γίνεται ἡ ἐργασία αὕτη, τὴν δόποιαν ὀνομάζομεν ἐπίλυσιν τοῦ τριγώνου.

(*) Οἱ τύποι προκύπτοιν δ εἰς ἑκ τοῦ ἄλλου διὰ κυκλικῆς τροπῆς τῶν α, β, γ καὶ A, B, Γ

Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ

502) Τρίγωνου ΑΒΓ είναι $\alpha = 384$ mm, $\beta = 593$ mm, $\gamma = 276$ mm. Ζητεῖται νά
ύπολογισθοῦν αἱ γωνίαι του.

503) Εἰς ἓν τρίγωνον ΑΒΓ είναι $\beta = 300$ mm, $A = 36^\circ$, $B = 65^\circ$. Ζητεῖται νά
ύπολογισθοῦν αἱ πλευραὶ αἱ καὶ γ.

504) Νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι εἰς τυχὸν τρίγωνον ΑΒΓ ισχύει :

$$\beta^2 - \gamma^2 = \alpha \quad (\beta \text{ συν } \Gamma - \gamma \text{ συν } B)$$

505) Νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι εἰς τυχὸν τρίγωνον ΑΒΓ ισχύει :

$$\alpha = \beta \text{ συν } \Gamma + \gamma \text{ συν } B \quad (\text{Θεώρημα τῶν προθιλῶν})$$

(Νὰ εὕρετε διὰ κυκλικῆς τροπῆς τῶν γραμμάτων τὰς ἄλλας ταυτότητας διὰ τὰ β καὶ γ).

506) Νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι εἰς τυχὸν τρίγωνον ΑΒΓ ισχύει :

$$\frac{\text{εφ } A}{\text{εφ } B} = \frac{\gamma^2 + \alpha^2 - \beta^2}{\gamma^2 + \beta^2 - \alpha^2}$$

Ημίτονα όξειδων γωνιών.

Μολύβδος	Μολύβδος					Μολύβδος	Μολύβδος					
	0'	10'	20'	30'	40'	50'	0'	10'	20'	30'	40'	
0	0,000	0,003	0,006	0,009	0,012	0,015	45	0,707	0,709	0,711	0,713	0,715
1	0,017	0,020	0,023	0,026	0,029	0,032	46	0,719	0,721	0,723	0,725	0,727
2	0,035	0,038	0,041	0,044	0,047	0,049	47	0,731	0,733	0,735	0,737	0,739
3	0,052	0,055	0,058	0,061	0,064	0,067	48	0,743	0,745	0,747	0,749	0,751
4	0,070	0,073	0,076	0,078	0,081	0,084	49	0,755	0,757	0,759	0,760	0,762
5	0,087	0,090	0,093	0,096	0,099	0,102	50	0,766	0,768	0,770	0,772	0,773
6	0,105	0,107	0,110	0,113	0,116	0,119	51	0,777	0,779	0,781	0,783	0,784
7	0,122	0,125	0,128	0,131	0,133	0,136	52	0,788	0,790	0,792	0,793	0,795
8	0,139	0,142	0,145	0,148	0,151	0,154	53	0,799	0,800	0,802	0,804	0,806
9	0,156	0,159	0,162	0,165	0,168	0,171	54	0,809	0,811	0,812	0,814	0,816
10	0,174	0,177	0,179	0,182	0,185	0,188	55	0,819	0,821	0,822	0,824	0,826
11	0,191	0,194	0,197	0,199	0,202	0,205	56	0,829	0,831	0,832	0,834	0,835
12	0,208	0,211	0,214	0,216	0,219	0,222	57	0,839	0,840	0,842	0,843	0,845
13	0,225	0,228	0,231	0,233	0,236	0,239	58	0,848	0,850	0,851	0,853	0,854
14	0,242	0,245	0,248	0,250	0,253	0,256	59	0,857	0,859	0,860	0,862	0,863
15	0,259	0,262	0,264	0,267	0,270	0,273	60	0,866	0,867	0,869	0,870	0,872
16	0,276	0,278	0,281	0,284	0,287	0,290	61	0,875	0,876	0,877	0,879	0,880
17	0,292	0,295	0,298	0,301	0,303	0,306	62	0,883	0,884	0,886	0,887	0,888
18	0,309	0,312	0,315	0,317	0,320	0,323	63	0,891	0,892	0,894	0,895	0,896
19	0,326	0,328	0,331	0,334	0,337	0,339	64	0,899	0,900	0,901	0,903	0,904
20	0,342	0,345	0,347	0,350	0,353	0,356	65	0,906	0,908	0,909	0,910	0,911
21	0,358	0,361	0,364	0,367	0,369	0,372	66	0,914	0,915	0,916	0,917	0,918
22	0,375	0,377	0,380	0,383	0,385	0,388	67	0,921	0,922	0,923	0,924	0,925
23	0,391	0,393	0,396	0,399	0,401	0,404	68	0,927	0,928	0,929	0,930	0,931
24	0,407	0,409	0,412	0,415	0,417	0,420	69	0,934	0,935	0,936	0,937	0,938
25	0,423	0,425	0,428	0,431	0,433	0,436	70	0,940	0,941	0,942	0,943	0,944
26	0,438	0,441	0,444	0,446	0,449	0,451	71	0,946	0,946	0,947	0,948	0,949
27	0,454	0,457	0,459	0,462	0,464	0,467	72	0,951	0,952	0,953	0,954	0,955
28	0,469	0,472	0,475	0,477	0,480	0,482	73	0,956	0,957	0,958	0,959	0,960
29	0,485	0,487	0,490	0,492	0,495	0,497	74	0,961	0,962	0,963	0,964	0,965
30	0,500	0,503	0,505	0,508	0,510	0,513	75	0,966	0,967	0,967	0,968	0,969
31	0,515	0,518	0,520	0,523	0,525	0,527	76	0,970	0,971	0,972	0,972	0,973
32	0,530	0,532	0,535	0,537	0,540	0,542	77	0,974	0,975	0,976	0,976	0,977
33	0,545	0,547	0,550	0,552	0,554	0,557	78	0,978	0,979	0,979	0,980	0,981
34	0,559	0,562	0,564	0,566	0,569	0,571	79	0,982	0,982	0,988	0,983	0,984
35	0,574	0,576	0,578	0,581	0,583	0,585	80	0,985	0,985	0,986	0,986	0,987
36	0,588	0,590	0,592	0,595	0,597	0,599	81	0,988	0,988	0,989	0,989	0,990
37	0,602	0,604	0,606	0,609	0,611	0,613	82	0,990	0,991	0,991	0,991	0,992
38	0,616	0,618	0,620	0,623	0,625	0,627	83	0,993	0,993	0,993	0,994	0,994
39	0,629	0,632	0,634	0,636	0,638	0,641	84	0,995	0,995	0,995	0,995	0,996
40	0,643	0,645	0,647	0,649	0,652	0,654	85	0,996	0,996	0,997	0,997	0,997
41	0,656	0,658	0,660	0,663	0,665	0,667	86	0,998	0,998	0,998	0,998	0,998
42	0,669	0,671	0,673	0,676	0,678	0,680	87	0,999	0,999	0,999	0,999	0,999
43	0,682	0,684	0,686	0,688	0,690	0,693	88	0,999	0,999	1,000	1,000	1,000
44	0,695	0,697	0,699	0,701	0,703	0,705	89	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Συνημίτονα δέξιειῶν γωνιῶν.

Μολφάς:	Αριθμός Αγωνών					Μολφάς:	Αριθμός Αγωνών					
	0'	10'	20'	30'	40'		0'	10'	20'	30'	40'	50'
0	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	45	0,707	0,705	0,703	0,701	0,699	0,697
1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	46	0,695	0,693	0,690	0,688	0,686	0,684
2	0,999	0,999	0,999	0,999	0,999	47	0,682	0,680	0,678	0,676	0,673	0,671
3	0,999	0,998	0,998	0,998	0,998	48	0,669	0,667	0,665	0,663	0,660	0,658
4	0,998	0,997	0,997	0,997	0,997	49	0,656	0,654	0,652	0,649	0,647	0,645
5	0,996	0,996	0,996	0,995	0,995	50	0,643	0,641	0,638	0,636	0,634	0,632
6	0,995	0,994	0,994	0,994	0,993	51	0,629	0,627	0,625	0,623	0,620	0,618
7	0,993	0,992	0,992	0,991	0,991	52	0,616	0,613	0,611	0,609	0,606	0,604
8	0,990	0,990	0,989	0,989	0,989	53	0,602	0,599	0,597	0,595	0,592	0,590
9	0,988	0,987	0,987	0,986	0,986	54	0,588	0,585	0,583	0,581	0,578	0,576
10	0,985	0,984	0,984	0,983	0,983	55	0,574	0,571	0,569	0,566	0,564	0,562
11	0,982	0,981	0,981	0,980	0,979	56	0,559	0,557	0,554	0,552	0,550	0,547
12	0,978	0,978	0,977	0,976	0,976	57	0,545	0,542	0,540	0,537	0,535	0,532
13	0,974	0,974	0,973	0,972	0,972	58	0,530	0,527	0,525	0,523	0,520	0,518
14	0,970	0,970	0,969	0,968	0,967	59	0,515	0,513	0,510	0,508	0,505	0,503
15	0,966	0,965	0,964	0,964	0,963	60	0,500	0,497	0,495	0,492	0,490	0,487
16	0,961	0,960	0,960	0,959	0,958	61	0,485	0,482	0,480	0,477	0,475	0,472
17	0,956	0,955	0,955	0,954	0,953	62	0,469	0,467	0,464	0,462	0,459	0,457
18	0,951	0,950	0,949	0,948	0,947	63	0,454	0,451	0,449	0,446	0,444	0,441
19	0,946	0,945	0,944	0,943	0,942	64	0,438	0,436	0,433	0,431	0,428	0,425
20	0,940	0,939	0,938	0,937	0,936	65	0,423	0,420	0,417	0,415	0,412	0,409
21	0,934	0,933	0,931	0,930	0,929	66	0,407	0,404	0,401	0,399	0,396	0,393
22	0,927	0,926	0,925	0,924	0,923	67	0,391	0,388	0,385	0,383	0,380	0,377
23	0,921	0,919	0,918	0,917	0,916	68	0,375	0,372	0,369	0,367	0,364	0,361
24	0,914	0,912	0,911	0,910	0,909	69	0,358	0,356	0,353	0,350	0,347	0,345
25	0,906	0,905	0,904	0,903	0,901	70	0,342	0,339	0,337	0,334	0,331	0,329
26	0,899	0,898	0,896	0,895	0,894	71	0,326	0,323	0,320	0,317	0,315	0,312
27	0,891	0,890	0,888	0,887	0,886	72	0,309	0,306	0,303	0,301	0,298	0,295
28	0,883	0,882	0,880	0,879	0,877	73	0,292	0,290	0,287	0,284	0,281	0,278
29	0,875	0,873	0,872	0,870	0,869	74	0,276	0,273	0,270	0,267	0,264	0,262
30	0,866	0,865	0,863	0,862	0,860	75	0,259	0,256	0,253	0,250	0,248	0,245
31	0,857	0,856	0,854	0,853	0,851	76	0,242	0,239	0,236	0,233	0,231	0,228
32	0,848	0,847	0,845	0,843	0,842	77	0,225	0,222	0,219	0,216	0,214	0,211
33	0,839	0,837	0,835	0,834	0,832	78	0,208	0,205	0,202	0,199	0,197	0,194
34	0,829	0,827	0,826	0,824	0,822	79	0,191	0,188	0,185	0,182	0,179	0,177
35	0,819	0,817	0,816	0,814	0,812	80	0,174	0,171	0,168	0,165	0,162	0,159
36	0,809	0,807	0,806	0,804	0,802	81	0,156	0,154	0,151	0,148	0,145	0,142
37	0,799	0,797	0,795	0,793	0,792	82	0,139	0,136	0,133	0,131	0,128	0,125
38	0,788	0,786	0,784	0,783	0,781	83	0,122	0,119	0,116	0,113	0,110	0,107
39	0,777	0,775	0,773	0,772	0,770	84	0,105	0,102	0,099	0,096	0,093	0,090
40	0,766	0,764	0,762	0,760	0,759	85	0,087	0,084	0,081	0,078	0,076	0,073
41	0,755	0,753	0,751	0,749	0,747	86	0,070	0,067	0,064	0,061	0,058	0,055
42	0,743	0,741	0,739	0,737	0,735	87	0,052	0,049	0,047	0,044	0,041	0,038
43	0,731	0,729	0,727	0,725	0,723	88	0,035	0,032	0,029	0,026	0,023	0,020
44	0,719	0,717	0,715	0,713	0,711	89	0,017	0,015	0,012	0,009	0,006	0,003

Έφαπτόμεναι ὁξειῶν γωνιῶν.

Μολύβδος	Μολύβδος						Μολύβδος	Μολύβδος					
	0'	10'	20'	30'	40'	50'		0'	10'	20'	30'	40'	50'
0	0,000	0,003	0,006	0,009	0,012	0,015	45	1,000	1,006	1,012	1,018	1,024	1,030
1	0,017	0,020	0,023	0,026	0,029	0,032	46	1,036	1,042	1,048	1,054	1,060	1,066
2	0,035	0,038	0,041	0,044	0,047	0,049	47	1,072	1,079	1,085	1,091	1,098	1,104
3	0,052	0,055	0,058	0,061	0,064	0,067	48	1,111	1,117	1,124	1,130	1,137	1,144
4	0,070	0,073	0,076	0,079	0,082	0,085	49	1,150	1,157	1,164	1,171	1,178	1,185
5	0,087	0,090	0,093	0,096	0,099	0,102	50	1,192	1,199	1,206	1,213	1,220	1,228
6	0,105	0,108	0,111	0,114	0,117	0,120	51	1,235	1,242	1,250	1,257	1,265	1,272
7	0,123	0,126	0,129	0,132	0,135	0,138	52	1,280	1,288	1,295	1,303	1,311	1,319
8	0,141	0,144	0,146	0,149	0,152	0,155	53	1,327	1,335	1,343	1,351	1,360	1,368
9	0,158	0,161	0,164	0,167	0,170	0,173	54	1,376	1,385	1,393	1,402	1,411	1,419
10	0,176	0,179	0,182	0,185	0,188	0,191	55	1,428	1,437	1,446	1,455	1,464	1,473
11	0,194	0,197	0,200	0,203	0,206	0,210	56	1,483	1,492	1,501	1,511	1,520	1,530
12	0,213	0,216	0,219	0,222	0,225	0,228	57	1,540	1,550	1,560	1,570	1,580	1,590
13	0,231	0,234	0,237	0,240	0,243	0,246	58	1,600	1,611	1,621	1,632	1,643	1,653
14	0,249	0,252	0,255	0,259	0,262	0,265	59	1,664	1,675	1,686	1,698	1,709	1,720
15	0,268	0,271	0,274	0,277	0,280	0,284	60	1,732	1,744	1,756	1,767	1,780	1,792
16	0,287	0,290	0,293	0,296	0,299	0,303	61	1,804	1,816	1,829	1,842	1,855	1,868
17	0,306	0,309	0,312	0,315	0,318	0,322	62	1,881	1,894	1,907	1,921	1,935	1,949
18	0,325	0,328	0,331	0,335	0,338	0,341	63	1,963	1,977	1,991	2,006	2,020	2,035
19	0,344	0,348	0,351	0,354	0,357	0,361	64	2,050	2,066	2,081	2,097	2,112	2,128
20	0,364	0,367	0,371	0,374	0,377	0,381	65	2,145	2,161	2,177	2,194	2,211	2,229
21	0,384	0,387	0,391	0,394	0,397	0,401	66	2,246	2,264	2,282	2,300	2,318	2,337
22	0,404	0,407	0,411	0,414	0,418	0,421	67	2,356	2,375	2,394	2,414	2,434	2,455
23	0,424	0,428	0,431	0,435	0,438	0,442	68	2,475	2,496	2,517	2,539	2,560	2,583
24	0,445	0,449	0,452	0,456	0,459	0,463	69	2,605	2,628	2,651	2,675	2,699	2,723
25	0,466	0,470	0,473	0,477	0,481	0,484	70	2,747	2,773	2,798	2,824	2,850	2,877
26	0,488	0,491	0,495	0,499	0,502	0,506	71	2,904	2,932	2,960	2,989	3,018	3,047
27	0,510	0,513	0,517	0,521	0,524	0,528	72	3,078	3,108	3,140	3,172	3,204	3,237
28	0,532	0,535	0,539	0,543	0,547	0,551	73	3,271	3,305	3,340	3,376	3,412	3,450
29	0,554	0,558	0,562	0,566	0,570	0,573	74	3,487	3,526	3,566	3,606	3,647	3,689
30	0,577	0,581	0,585	0,589	0,593	0,597	75	3,732	3,776	3,821	3,867	3,914	3,962
31	0,601	0,605	0,609	0,613	0,617	0,621	76	4,011	4,061	4,113	4,165	4,219	4,275
32	0,625	0,629	0,633	0,637	0,641	0,645	77	4,331	4,390	4,449	4,511	4,574	4,638
33	0,649	0,654	0,658	0,662	0,666	0,670	78	4,705	4,773	4,843	4,915	4,989	5,066
34	0,675	0,679	0,683	0,687	0,692	0,696	79	5,145	5,226	5,309	5,396	5,485	5,576
35	0,700	0,705	0,709	0,713	0,718	0,722	80	5,671	5,769	5,871	5,976	6,084	6,197
36	0,727	0,731	0,735	0,740	0,744	0,749	81	6,314	6,435	6,561	6,691	6,827	6,968
37	0,754	0,758	0,763	0,767	0,772	0,777	82	7,115	7,219	7,429	7,596	7,770	7,953
38	0,781	0,786	0,791	0,795	0,800	0,805	83	8,144	8,345	8,556	8,777	9,010	9,255
39	0,810	0,815	0,819	0,824	0,829	0,834	84	9,514	9,788	10,08	10,39	10,71	11,06
40	0,839	0,844	0,849	0,854	0,859	0,864	85	11,43	11,83	12,25	12,71	13,20	13,73
41	0,869	0,874	0,880	0,885	0,890	0,895	86	14,30	14,92	15,60	16,35	17,17	18,07
42	0,900	0,906	0,911	0,916	0,922	0,927	87	19,08	20,21	21,47	22,90	24,54	26,43
43	0,933	0,938	0,943	0,949	0,955	0,960	88	28,64	31,24	34,37	38,19	42,96	49,10
44	0,966	0,971	0,977	0,983	0,988	0,994	89	57,29	68,75	85,94	114,6	171,9	343,8

Τριγωνομετρικαί συναρτήσεις

Γωνία είς :		ημ	συ	εφ	σφ
άκτινα	μοίρας				
0,00	0,0	0,00	1,00	0,00	*
0,09	5,0	0,087	0,996	0,087	11,4
0,10	5,7	0,10	0,995	0,10	10,0
0,17	10,0	0,17	0,98	0,18	5,7
0,20	11,5	0,20	0,98	0,20	4,9
0,26	15,0	0,26	0,97	0,27	3,7
0,30	17,2	0,30	0,96	0,31	3,2
0,35	20,0	0,34	0,94	0,36	2,7
0,40	22,9	0,39	0,92	0,42	2,4
0,44	25,0	0,42	0,91	0,47	2,1
0,50	28,6	0,48	0,88	0,55	1,8
0,52 ($\pi/6$)	30,0	0,50	0,87	0,58	1,7
0,60	34,4	0,56	0,83	0,68	1,5
0,61	35,0	0,57	0,82	0,70	1,4
0,70	40,1	0,64	0,76	0,84	1,2
0,78 ($\pi/4$)	45,0	0,71	0,71	1,00	1,00
0,80	45,8	0,72	0,70	1,0	0,97
0,87	50,0	0,77	0,64	1,2	0,84
0,90	51,6	0,78	0,62	1,3	0,79
0,96	55,0	0,82	0,57	1,4	0,70
1,00	57,3	0,84	0,54	1,6	0,64
1,08 ($\pi/3$)	60,0	0,87	0,50	1,7	0,58
1,10	63,0	0,89	0,45	2,0	0,51
1,13	65,0	0,91	0,42	2,1	0,47
1,20	68,7	0,93	0,36	2,6	0,39
1,22	70,0	0,94	0,34	2,8	0,37
1,30	74,5	0,96	0,27	3,6	0,28
1,40	80,2	0,985	0,17	5,8	0,17
1,48	85,0	0,996	0,09	11,4	0,09
1,50	85,9	0,998	0,07	14,1	0,07
1,57 ($\pi/2$)	90,0	1,00	0,00	*	0,00

* δέν όριζεται



024000039891

ΕΚΔΟΣΙΣ Ζ', 1975 (IV)-ΑΝΤΙΤΥΠΑ 70.000 - ΣΥΜΒΑΣΙΣ 2547/1-4-1975

Έκτύπωσης — Βιβλιοθεσία 'Αφών Γ. ΡΟΔΗ — Αμαρονστον 59 — Αμαρονστον



Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής