

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΤ. ΚΑΤΣΑΡΛΙΝΟΥ - ΜΑΤΘ. ΜΠΑΪΜΠΑ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΑΘΗΝΑΙ 1975

Δωρήθη ανταπό

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΔΩΡΕΑΝ

ΑΚΙΣΑΜΗΘΑΜ

ΑΚΙΣΑΜΗΘΑΜ

19989

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΤ. ΚΑΤΣΑΡΑΙΝΟΥ — ΜΑΤΘ. ΜΠΑΪΜΠΑ

Ε. Δ. Εβίνα Επαγγελματικό Λύκειο Αθηνών

Είναι το απαραίτητο βιβλίο για τη μαθηση των μαθημάτων στην πρώτη δεκαετία του μέσου γυμνασίου. Το βιβλίο περιλαμβάνει τα μαθηματικά για την πρώτη δεκαετία του μέσου γυμνασίου.

Είναι το απαραίτητο βιβλίο για τη μαθηση των μαθημάτων στην πρώτη δεκαετία του μέσου γυμνασίου.

Είναι το απαραίτητο βιβλίο για τη μαθηση των μαθημάτων στην πρώτη δεκαετία του μέσου γυμνασίου.

Είναι το απαραίτητο βιβλίο για τη μαθηση των μαθημάτων στην πρώτη δεκαετία του μέσου γυμνασίου.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΛΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΑΘΗΝΑΙ 1975

ΙΩΤΑΜΟΣ ΕΠΙΦΑΝΗΣ ΤΟΜΙΑΣΑΣΤΑΚΗΣ ΙΩΤΑΜΟΣ

Α Ι Ι Τ Α Μ Η Θ Α Μ Υ Ο Ι Ζ Α Μ Υ Τ Λ Α

ΑΠΙΣΤΑΜΟΣ ΕΠΙΦΑΝΗΣ ΤΟΜΙΑΣΑΣΤΑΚΗΣ ΙΩΤΑΜΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

ΕΚ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ

1. ΤΟ ΣΥΝΟΛΟΝ

1. 1. Εισαγωγή

Εις τὴν καθημερινὴν ζωὴν ὁμιλοῦμεν διά :

Τὴν ἀθλητικὴν ὁ μάδα τῆς τάξεως μας.

Τὴν συλλογὴν τῶν γραμματοσήμων μας.

Τὸν σύλλογον τῶν καθηγητῶν τοῦ γυμνασίου μας.

Τὸ σύνολον τῶν ἀντικειμένων, τὰ δποῖα εὑρίσκονται εἰς τὴν σάκκαν μας.

Ἡτοι χρησιμοποιοῦμεν τὰς λέξεις

ὅμας, συλλογή, σύλλογος, σύνολον,

ὅταν θέλωμεν νά̄ ὁμιλήσωμεν δι' ἀντικείμενα, τὰ δποῖα λαμβάνομεν ὡς μίαν ὅλη τα.

Εἰς τὰ Μαθηματικά, ὅταν ἀναφερώμεθα εἰς ἀντικείμενα*, ωρισμένα καὶ διακεκριμένα μεταξὺ των, τὰ δποῖα λαμβάνομεν ὡς μίαν ὅλη την, χρησιμοποιοῦμεν τὴν λέξιν σύνολον.

Τὰ ἀντικείμενα ἐκ τῶν δποίων ἀπαρτίζεται ἐν σύνολον τὰ ὄνομάζομεν στοιχεῖα ἢ μέλη αὐτοῦ. Π.χ. ἡ ἀνοιξις είναι στοιχεῖον τοῦ συνόλου τῶν ἐποχῶν τοῦ ἔτους. Ἡ δπος λέγομεν ἡ ἀνοιξις ἀνήκει εἰς τὸ σύνολον τῶν ἐποχῶν τοῦ ἔτους.

1. 2. Πότε ἐν σύνολον είναι καθωρισμένον

Εἰς τὸ κατωτέρω σχέδ. 1 εἰκονίζεται ἡ οἰκογένεια Σαμπάνη κατὰ τὴν ὥραν τοῦ φαγητοῦ. Ἡ οἰκογένεια αύτή ἀποτελεῖ ἐν σύνολον τὸ δποῖον, ἃς ὄνομάσωμεν σύνολον A.

Ἐάν μᾶς ἐρωτήσουν :

Ποῖον είναι τὸ σύνολον A;

Θὰ ἀπαντήσωμεν : Τὸ σύνολον A ἀπαρτίζεται ἀπὸ τὸν πατέρα α, τὴν μητέρα β, τὸν υἱὸν γ, καὶ τὴν θυγατέρα δ. Ἡ δτι είναι τὸ σύνολον τῶν μελῶν τῆς οἰκογενείας Σαμπάνη.

* Ἡ λέξις ἀντικείμενον χρησιμοποιεῖται μὲ εύρεται σημασίαν π.χ. ὡς ἀντικείμενα λαμβάνονται καὶ ἀριθμοί, σχήματα κλπ.


Εις τὴν α' περίπτωσιν διὰ νὰ καθορίσωμεν τὸ σύνολον Α, ἀνεφέραμεν ἀκριβῶς ἀπὸ ποια στοιχεῖα ἀπαρτίζεται τοῦτο. Εις τὴν β' περίπτωσιν ἔχρησιμοποιήσαμεν ἐν χαρακτηριστικὸν γνώρισμα τῶν στοιχείων αὐτοῦ· τὸ γνώρισμα «μέλος τῆς οἰκογενείας Σαμπάνη».

Γενικῶς, λέγομεν ὅτι ἔν σύνολον Α εἶναι καθωρισμένον :

α) "Οταν γνωρίζωμεν ἀκριβῶς ἀπὸ ποῖα στοιχεῖα ἀπαρτίζεται τοῦτο.

β) "Οταν γνωρίζωμεν ἐν χαρακτηριστικὸν γνώρισμα τῶν στοιχείων αὐτοῦ.

"Ητοι, ἐν γνώρισμα, τὸ ὅποιον μᾶς ἐπιτρέπει νὰ ἀποφανθῶμεν, ἐὰν ἐν διποιοδήποτε ἀντικείμενον εἴναι ή δὲν εἴναι στοιχεῖον τοῦ θεωρουμένου συνόλου.



Σχ. 1. Οἰκογένεια Σαμπάνη.

Π.χ. τὸ σύνολον «οἱ μαθηταὶ τῆς τάξεώς μας μὲ ἀνάστημα ἀνωτοῦ 1,60m», εἶναι καθωρισμένον. Πράγματι· τὸ γνώρισμα «μαθητής τῆς τάξεώς μας μὲ ἀνάστημα ἀνωτοῦ 1,60m» μᾶς ἐπιτρέπει νὰ ἀπαντήσωμεν χωρὶς δισταγμούς, ἐὰν εἰς, οἰσθήποτε, μαθητής τῆς τάξεώς μας ἔχῃ ή δὲν ἔχῃ ἀνάστημα ἀνωτοῦ 1,60m καὶ συνεπῶς εἶναι ή δὲν εἶναι στοιχεῖον τοῦ συνόλου τούτου.

"Αντιθέτως· τὸ σύνολον «οἱ ύψηλοὶ μαθηταὶ τῆς τάξεώς μας» δὲν ἀποτελοῦν καθωρισμένον σύνολον. Πράγματι· τὸ γνώρισμα «ύψηλὸς μαθητής τῆς τάξεώς μας», εἰς δισταγμένας τούλαχιστον περιπτώσεις, δὲν μᾶς ἐπιτρέπει νὰ ἀπαντήσωμεν, χωρὶς δισταγμούς, ἐὰν εἰς τυχών μαθητής τῆς τάξεώς μας εἶναι ή δὲν εἶναι ύψηλός.

1. 3. Εἰδικὰ σύνολα

α) Μονομελῆ σύνολα. Τὸ κενὸν σύνολον.

"Οταν μίαν ἡμέραν ἀπουσιάζουν ἀπὸ τὴν τάξιν μας δύο μαθηταὶ π.χ. ὁ Καλῆς καὶ ὁ Σαμπάνης, τότε τὸ σύνολον τῶν ἀπόντων μαθητῶν ἀπαρτίζεται

ἀπό τούς δύο αὐτούς μαθητάς. Ἐὰν μίαν ἀλλην ἡμέραν ἀπουσιάζῃ μόνον ὁ Σαμπάνης, ποιὸν θὰ εἰναι τότε τὸ σύνολον τῶν ἀπόντων μαθητῶν;

Εἶναι ἐν σύνολον μὲν ὁ να σικὸν στοιχεῖον τὸν Σαμπάνην.

Μίαν τρίτην ἡμέραν οὐδεὶς μαθητής ἀπουσιάζει. Ποιὸν θὰ εἰναι τὸ σύνολον τῶν ἀπόντων μαθητῶν ἑκείνης τῆς ἡμέρας;

"Ισως νὰ εἴπωμεν ὅτι δὲν ὑπάρχει τότε σύνολον. Δυνάμεθα δῦμας νὰ εἴπωμεν ὅτι τὸ σύνολον τῶν ἀπόντων εἶναι σύνολον χωρὶς στοιχεῖα: Εἶναι τὸ κενὸν σύνολον.

Διὰ νὰ γενικεύσωμεν τὴν ἔννοιαν τοῦ συνόλου δεχόμεθα ὅτι ὑπάρχουν σύνολα μὲν μόνον στοιχεῖον (Μονομελῆ). Δεχόμεθα ἐπίσης ὅτι ὑπάρχει ἐν κενὸν σύνολον.

β) Βασικὸν σύνολον.

Ἄς ἐνθυμούμεθα ἀπὸ τὸ Δημοτικὸν Σχολεῖον εἰς τὴν Φυτολογίαν δὲν ἀσχολούμεθα μὲν ὅλα τὰ ἀντικείμενα ἀλλὰ μόνον μὲν τὰ φυτά. Ὁμοίως εἰς τὴν Ζωολογίαν ἔχεταξομεν ἀποκλειστικῶς τὰ ζῶα.

Γενικῶς, ὅταν ἀσχολούμεθα μὲν ἐν θέμα, ἐν πρόβλημα, χρησιμοποιοῦμεν ἀποκλειστικῶς στοιχεῖα ἐνὸς συνόλου: ἐνὸς συνόλου εἰς τὸ ὅποιον ἀνήκουν δλα τὰ στοιχεῖα τοῦ προβλήματός μας. Εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτῆν τὸ σύνολον τοῦτο λέγεται βασικὸν σύνολον, συμβολίζεται δὲ μὲν Ω. Τοιουτοράπως, εἰς τὴν Φυτολογίαν ἔχομεν ὡς βασικὸν σύνολον τὸ σύνολον τῶν φυτῶν, ἐνῶ εἰς τὴν Ζωολογίαν τὸ σύνολον τῶν ζώων.

2. ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ

2. 1. Δι' ἀναγραφῆς

α) Διὰ νὰ παραστήσωμεν συμβολικῶς τὸ σύνολον τῶν φωνηέντων γράφομεν
{ α, ε, η, ο, ω, υ, ι }

"Ητοι ἀναγράφομεν δλα τὰ στοιχεῖα τοῦ συνόλου ἐντὸς ἀγκίστρου, { }, χωρὶς νὰ λάβωμεν ὑπ' ὅψιν τὴν σειρὰν ἀναγραφῆς αὐτῶν. Διαβάζομεν δέ: Σύνολον μὲν στοιχεῖα α, ε, η, ο, ω, υ, ι.

"Ο τρόπος αὐτὸς συμβολισμοῦ τοῦ συνόλου λέγεται δι' ἀναγραφῆς τῶν στοιχείων του ἢ σύντομως δι' ἀναγραφῆς.

Μάλιστα, ἐπειδὴ τὰ στοιχεῖα ἐνὸς συνόλου πρέπει νὰ εἰναι ἀνὰ δύο διαφορετικά (διακεκριμένα), δὲν ἀναγράφομεν δύο φοράς τὸ σύντοιχεῖον. Π.χ. τὸ σύνολον τῶν ψηφίων τοῦ δριθμοῦ 122 γράφεται

{ 1, 2 } ἢ { 2, 1 } ἀλλὰ ὅχι { 1, 2, 2 }.

β) "Ας λάβωμεν ἥδη τὸ σύνολον τῶν λεγομένων φυσικῶν* δριθμῶν, οἱ δριθοὶ

* Φυσικοί δριθμοί είναι οι δριθμοί 1, 2, 3, 4...

είναι μικρότεροι του 1000. Έπειδή τὰ στοιχεῖα τοῦ συνόλου τούτου ἔχουν μίαν διάταξιν (σειράν ἀναγραφῆς), δυνάμεθα νὰ τὸ παραστήσωμεν ὡς ἔξῆς :

{ 1, 2, 3, ... 999 }

”Ητοι, ἀναγράφομεν ἐντὸς ἀγκίστρου κατὰ σειρὰν τὰ τρία πρῶτα στοιχεῖα, ἔπειτα τρεῖς τελείας καὶ τέλος τὸ τελευταῖον στοιχεῖον 999.

2. 2. Διὰ περιγραφῆς

Τὸ σύνολον τῶν φωνηέντων δυνάμεθα νὰ τὸ παραστήσωμεν συμβολικῶς καὶ ὡς ἔξῆς :

{ ”Ολα τὰ στοιχεῖα χ, δπου χ εἶναι φωνῆεν }

ἢ συντόμως { χ δπου χ φωνῆεν }

ἢ { χ | χ φωνῆεν }

(Τὸ διαχωριστικὸν | σημαίνει δπο).
Διαβάζομεν δὲ «σύνολον μὲ στοιχεῖα χ δπου χ φωνῆεν».

’Ο τρόπος αὐτὸς τοῦ συμβολισμοῦ ἐνὸς συνόλου λέγεται διὰ περιγραφῆς τῆς χαρακτηριστικῆς ιδιότητος τῶν στοιχείων του. ”Η συντόμως διὰ περιγραφῆς.”

Παραδείγματα

α) Διὰ τὸ σύνολον τῶν ψηφίων τοῦ ἀριθμοῦ 1969 ἔχομεν τοὺς συμβολισμούς : { 1, 9, 6 } ἢ { χ | χ ψηφίον τοῦ ἀριθμοῦ 1969 }.

β) Διὰ τὸ σύνολον τῶν μαθητῶν τοῦ γυμνασίου μας ἔχομεν τὸν συμβολισμὸν { χ | χ μαθητὴς τοῦ γυμνασίου μας }.

(Διατὶ δὲν χρησιμοποιούμεν καὶ τὸν ἄλλον συμβολισμόν ;)

γ) Διὰ τὸ σύνολον, τὸ ὅποιον ἀπαρτίζεται ἀπὸ τοὺς μῆνας ’Ιούνιον, ’Ιούλιον καὶ Αὔγουστον ἔχομεν τοὺς συμβολισμούς :

{ ’Ιούνιος, ’Ιούλιος, Αὔγουστος } { χ | χ μῆν τοῦ θέρους }

Ειδικῶς τὸ κενὸν σύνολον * τὸ συμβολίζομεν { } ἢ Ø

2. 3. Ο συμβολισμὸς τοῦ «ἀνήκειν»

”Ἄσ ἐπανέλθωμεν εἰς τὸ σύνολον τῶν ψηφίων τοῦ ἀριθμοῦ 122 ἢ συμβολικῶς εἰς τὸ σύνολον $A = \{1, 2\}$. Τὰ ψηφία 1, 2 εἶναι τὰ στοιχεῖα τοῦ συνόλου τούτου. ”Η κατ’ ἄλλον τρόπον τὰ στοιχεῖα 1, 2 ἀνήκουν εἰς τὸ σύνολον A. ”Η σχέσις «1 ἀνήκει εἰς τὸ σύνολον A» συμβολίζεται $1 \in A$.

* Δέν πρέπει νὰ συγχέωμεν τὰς γραφὰς { 0 } καὶ φ | η πρώτη γραφὴ παριστάνει ἐν μονομελὲς σύνολον μὲ στοιχεῖον τὸ 0, ἐνῷ η δευτέρα τὸ κενὸν σύνολον. Έπισης σημειώνομεν δτὶ τὸ σύνολον { 0 } εἶναι διάφορον ἀπὸ τὸν ἀριθμὸν 0.

‘Η σχέσις «Ξ δέν ἀνήκει εἰς τὸ σύνολον Α» συμβολίζεται $\exists x A$. Είναι φανερόν ότι δι’ ἕκαστον στοιχείου δύο μόνον δυνατότητες ύπτάρχουν: Νά ανήκη ή νά μη ανήκη εἰς έν σύνολον. Τοιουτοτρόπως ξέχομεν:

$$1 \in \{1, 2\}, \quad 2 \in \{1, 2\}, \quad 3 \notin \{1, 2\}, \quad 4 \notin \{1, 2\} \dots$$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

- Παραστήσατε μὲ άναγραφήν καὶ περιγραφήν τὸ σύνολον τῶν ἡμέρων τῆς ἐβδομάδος, τῶν δόπιοί τοῦ σύνολου ἀρχίζει ἀπὸ Π. Γράψατε ἔπειτα συμβολικῶς ποιαὶ ἡμέραι τῆς ἐβδομάδος ἀνήκουν εἰς τὸ σύνολον αὐτὸῦ καὶ ποιαὶ δὲν ἀνήκουν.
 - Νὰ παραστήσετε διά περιγραφῆς τὰ σύνολα
 $A = \{ \text{'Ιανουάριος}, \text{'Ιούνιος}, \text{'Ιούλιος} \}$ καὶ $B = \{ 1, 2, \dots, 9 \}$
 - Ποιον είναι τὸ σύνολον τῶν ἀκεραίων, οἱ δόπιοι περιέχονται μεταξὺ 4 καὶ 5;
 - 'Εὰν $A = \{ 0, 1, \{ 2 \} \}$, τότε ποιαὶ ἀπό τὰς σχέσεις $0 \in A$, $1 \in A$, $2 \in A$ είναι ἀληθεῖς;
 - Τι δύνασθε νὰ εἴπετε διά τὸ σύνολον $\{ \text{γιγ ώασιον ποιπια} \}$.

3. 1. "Ориенти.

⁷ Ας λάβωμεν ως βασικὸν σύνολον ἡ τὸ σύνολον τῶν μαθητῶν τοῦ γυμνα-
ζίου μας καὶ τὰ δύο σύνολα:

$A = \{ x | x \text{ μαθητής τῆς τάξεως μας} \}$.

καὶ $B = \{ x | x \text{ ἀριστοῦχος μαθητής τῆς τάξεως μας} \}$.

Παρατηροῦμεν ὅτι:

"Εκαστον στοιχείου του Β είναι και στοιχείον του Α. Διὰ τοῦτο λέγομεν ὅτι τὸ οὐνόδον Β είναι ὑποσύνοδον τοῦ συνόδου Α.

Γράφομεν δὲ συμβολικῶς

$$B \subset A$$

και διαθάζουμεν : Β είναι ύποστύνολον τοῦ Α.

Γενικώς: "Εν σύνολον B λέγεται ύποσύνολον ένας συνόλου A , έάν
έκαστον αποιγείον του B είναι και αποιγείον του A .

"Ητοι, δταν $B \subseteq A$, τότε δέν ύπάρχει στοιχεῖον τοῦ B τὸ ὅποιον νὰ μὴ είναι
καὶ στοιχεῖον τοῦ A .

Ἡ σχέσις «Β είναι ὑποσύνολον τοῦ Α» διατυπώνεται καὶ ὡς ἔξης:

«Τὸ Β περιέχεται ἢ ἐγκλείεται εἰς τὸ Α».

὾ Η Τὸ Α περιέχει ἢ ἔγκλείει τὸ Β.

«Β ἐγκλείεται εἰς τὸ σύνολον Α» (1) καὶ «α ἀνήκει εἰς τὸ σύνολον Α» (2)

έχουν διαφορετικήν σημασίαν. Ή (1) είναι σχέσις συνόλου πρὸς σύνολον, ένω ή (2) είναι σχέσις στοιχείου πρὸς σύνολον.

Παραδείγματα

α) Τὸ σύνολον τῶν φωνήντων είναι ὑποσύνολον τοῦ συνόλου τῶν γραμμάτων.

β) Τὸ σύνολον τῶν κατοίκων τῶν Ἀθηνῶν είναι ὑποσύνολον τοῦ συνόλου τῶν κατοίκων τῆς Ἑλλάδος.

γ) Τὸ σύνολον τῶν μηνῶν τῆς ἀνοίξεως είναι ὑποσύνολον τῶν μηνῶν τοῦ ἔτους.

δ) Τὸ σύνολον $\{1, 2\}$ είναι ὑποσύνολον τοῦ $\{1, 2, 5\}$, ἀλλὰ δὲν είναι ὑποσύνολον τοῦ $\{1, 3, 4, 5\}$ (Διατί ;)

$$\{1, 2\} \subseteq \{1, 2, 5\}, \{1, 2\} \not\subseteq \{1, 3, 4, 5\}$$

3. 2. Ειδικαὶ περιπτώσεις

i) Ἐκ τοῦ ὄρισμοῦ τοῦ ὑποσυνόλου προκύπτει ὅτι :

"Ἐκαστὸν σύνολον είναι ὑποσύνολον τοῦ ἔαυτοῦ του.

$$\Sigma \subseteq \Sigma \quad (\text{Έγκλεισμὸς μὲν εὔρειαν ἔννοιαν})$$

Παράδειγμα. Ἐάν λάβωμεν τὸ σύνολον Σ τῶν μαθητῶν τῆς τάξεως μας καὶ τὸ ὑποσύνολον αὐτοῦ A τῶν μαθητῶν, οἱ ὅποιοι μαθαίνουν Γαλλικά.

"Ητοι

$$A \subseteq \Sigma$$

Ἐάν υποθέσωμεν ὅτι δῆλοι οἱ μαθηταὶ τῆς τάξεως μας μαθαίνουν Γαλλικά, τότε τὸ σύνολον Σ ταυτίζεται μὲν τὸ ὑποσύνολον αὐτοῦ A .

ii) Ἐπίστης ἐκ τοῦ ὄρισμοῦ τοῦ ὑποσυνόλου προκύπτει ὅτι :

Τὸ κενὸν σύνολον είναι ὑποσύνολον παντὸς συνόλου.

$$\emptyset \subseteq \Sigma$$

Πράγματι· δὲν ὑπάρχει στοιχεῖον τοῦ κενοῦ συνόλου, τὸ ὅποιον νὰ μὴ ἀνήκῃ εἰς ἓν σύνολον Σ .

Παράδειγμα. Ἐάν υποθέσωμεν ὅτι οὐδεὶς μαθητὴς τῆς τάξεως μας μαθαίνει Γαλλικά, τότε τὸ σύνολον A , ὑποσύνολον τοῦ Σ , είναι τὸ κενὸν σύνολον.

3. 3. Γνήσιον ὑποσύνολον συνόλου

"Ἄσ λάβωμεν τὰ σύνολα $A = \{1, 2, 3, 4\}$ καὶ $B = \{1, 2\}$

Κατὰ τὰ ἀνωτέρω εἰναι : $B \subseteq A$. Τὸ σύνολον A ἔχει καὶ ἀλλα στοιχεῖα ἑκτὸς τῶν στοιχείων τοῦ ὑποσυνόλου του B . Διὰ τοῦτο τὸ σύνολον B λέγεται γνήσιον ὑποσύνολον τοῦ A .

Ἐάν σύνολον A ἔχῃ τούλάχιστον ἓν στοιχεῖον, ἑκτὸς τῶν στοιχείων ἐνδὸς ὑποσυγόλου του B , τότε λέγομεν ὅτι τὸ B είναι γνήσιον ὑποσύνολον τοῦ A .

Γράφομεν δὲ

$B \subseteq A$. (Έγκλεισμὸς μὲ στενὴν ἔννοιαν).

Π.χ. τὰ σύνολα $\{1\}$, $\{1, 2\}$ καὶ $\{2\}$ εἶναι γνήσια ὑποσύνολα τοῦ συνόλου $\{1, 2, 3\}$. Ἀντιθέτως τὸ σύνολον $\{1, 2, 3\}$ δὲν εἶναι γνήσιον ὑποσύνολον τοῦ ἑαυτοῦ του.

3. 4. Ιδιότητες

α) Καθὼς εἴδομεν εἰς τὴν $3, 2$ ἐκαστὸν σύνολον Σ εἶναι ὑποσύνολον (δχι γνήσιον) τοῦ ἑαυτοῦ του.

$$\boxed{\Sigma \subseteq \Sigma}$$

Διὰ τοῦτο λέγομεν ὅτι ἡ σχέσις ἔγκλεισμοῦ (μὲ εύρειαν σημασίαν) ἔχει τὴν ἀνακλαστικὴν ιδιότητα.

β) Εὰν σᾶς εἴπουν ὅτι μεταξὺ τριῶν συνόλων A, B, Γ ισχύουν αἱ σχέσεις :

$$A \subseteq B \quad (1) \quad \text{καὶ} \quad B \subseteq \Gamma \quad (2)$$

Τί συμπεραίνετε ἀπό αὐτὰς διὰ τὴν σχέσιν τοῦ A ὡς πρὸς τὸ Γ ;

*Ἐκ τῶν (1) καὶ (2) συμπεραίνομεν ὅτι τὸ A περιέχεται εἰς τὸ Γ .
 $A \subseteq \Gamma$. Τὰ ἀνωτέρω διατυπώνονται συμβολικῶς ὡς ἔτι:

$$\boxed{(A \subseteq B \quad \text{καὶ} \quad B \subseteq \Gamma) \Rightarrow A \subseteq \Gamma^*} \quad (3)$$

*Ητοι: *Εὰν $A \subseteq B$ καὶ $B \subseteq \Gamma$, τότε θὰ εἶναι καὶ $A \subseteq \Gamma$.

*Η $A \subseteq B$ καὶ $B \subseteq \Gamma$ συνεπάγεται ὅτι $A \subseteq \Gamma$.

*Η ιδιότης αὗτη τῆς σχέσεως ἔγκλεισμοῦ λέγεται μεταβατικὴ ιδιότης.

*Ωστε ὁ ἔγκλεισμός, μὲ εύρειαν σημασίαν, ἔχει τὴν ἀνακλαστικὴν καὶ τὴν μεταβατικὴν ιδιότητα.

4. ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ ΣΥΝΟΛΟΥ **

4. 1. Καθὼς γνωρίζετε εἰς πολλὰς περιπτώσεις χρησιμοποιοῦνται διαγράμματα. Π.χ. χρησιμοποιοῦμεν διαγράμματα διὰ νὰ ἔχωμεν μίαν σύντομον καὶ παραστατικὴν εἰκόνα τῆς πορείας τοῦ πυρετοῦ ἐνὸς ἀσθενοῦς, τῶν μεταβολῶν τῆς θερμοκρασίας κατὰ μίαν περίοδον, τῆς κινήσεως τῶν κερδῶν μιᾶς ἐπιχειρήσεως . . .

* Τὸ σύμβολον \Rightarrow εἶναι γνωστὸν ὡς σύμβολον τῆς συνεπαγόμενης.

** *Η συστηματικὴ χρῆσις διαγράμμάτων διὰ τὴν γραφικὴν παράστασιν συνόλων ὀφείλεται εἰς τὸν "Ἀγγελον μαθηματικὸν J. Venn (1834-1923)". Διὰ τοῦτο εἶναι γνωστὰ ὡς διαγράμματα τοῦ Venn.





Διαγράμματα χρησιμοποιούμεν, διά νάς έχωμεν μίαν παραστατικήν είκόνα συνόλων και τῶν μεταξύ αὐτῶν σχέσεων.

4. 2. Πῶς θὰ παραστήσωμεν γραφικῶς ἐν σύνολον; Π.χ. τὸ σύνολον $A = \{\alpha, \beta, \gamma\}$;

Πρὸς τοῦτο παριστάνομεν ἔκαστον στοιχεῖον τοῦ συνόλου μὲ ἐν σημείον

καὶ ἔπειτα ἐγκλείομεν ὅλα τὰ σημεῖα αὐτὰ καὶ μόνον αὐτά, ἐντὸς μιᾶς ἀπλῆς κλειστῆς γραμμῆς, (σχ. 2α.)

Κατὰ τὰ ἀνωτέρω: ἐν μονομελὲς σύνολον B , ἐν διμελὲς Γ , ἐν τριμελὲς Δ , ἔχουν τὰ παραπλεύρως ἀντίστοιχα διαγράμματα σχ. 2β, 2γ καὶ 2δ.



Σχ. 2.

Διὰ νὰ παραστήσωμεν γραφικῶς ὅτι τοῦ συνόλου $A = \{1, 2, 3\}$ βασικὸν σύνολον εἰναι π.χ. τὸ $\Omega = \{1, 2, 3, \dots, 9\}$, σχηματίζομεν τὸ διάγραμμα τοῦ σχεδ. 3. Ἀπὸ τὸ διάγραμμα τοῦτο ἐννοοῦμεν ὅτι:

$$A \subseteq \Omega, \quad 1 \in A, \quad 2 \in A, \quad 3 \in A, \\ 4 \notin A, \quad 5 \notin A \dots$$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

6. Ἀναφέρατε παραδείγματα ὑποσυνόλων τοῦ συνόλου τῶν μαθημάτων τῆς ταξεώς σας.

7. Εάν $A = \{1, 2, 3, \dots, 99\}$, $B = \{1, 2, 3, \dots\}$ καὶ $\Gamma = \{1, 2, 3, \dots, 99\}$ νὰ σχηματίσετε τάς σχέσεις ἐγκλεισμοῦ μεταξὺ αὐτῶν.

8. Εάν $A = \{x|x \text{ Εύρωπαίος}\}$, $B = \{x|x \text{ "Ελλην}\}$, $\Gamma = \{x|x \text{ Καναδός}\}$ καὶ $\Delta = \{x|x \text{ Βέλγος}\}$ νὰ ἔξετάσετε ποια ἀπὸ τὰ σύνολα B , Γ , Δ εἶναι ὑποσύνολα τοῦ A .

9. Νὰ ἔξετάσετε ἐάν ἡ σχέσις ἐγκλεισμού, μὲ στενὴν σημασίαν, ἔχει τὴν ἀνακλαστικήν ιδιότητα.

10. Ποια εἶναι τὰ ὑποσύνολα τοῦ συνόλου $\{0, 1\}$ καὶ ποια τὰ γνήσια ὑποσύνολα τοῦ συνόλου $\{0, 1, 2\}$.

5. ΙΣΑ ΣΥΝΟΛΑ

5. 1. Όρισμός

Εἰδομεν ὅτι ἡ σειρά ἀναγραφῆς τῶν στοιχείων ἐνὸς συνόλου δὲν ἔχει σημασίαν. Ήτοι οἱ συμβολισμοὶ $A = \{1, 2\}$

καὶ $B = \{ 2, 1 \}$ παριστάνουν τὸ αὐτὸ σύνολον * ἢ καθώς λέγομεν παριστάνουν δύο ίσα σύνολα.

Ἐὰν προσέξωμεν τὰ στοιχεῖα τῶν δύο αὐτῶν συνόλων A καὶ B , διακρίνομεν ὅτι :

Ἐκαστον στοιχεῖον τοῦ A εἶναι καὶ στοιχεῖον τοῦ B ἀλλὰ καὶ
» » B » » A

Ἐν σύνολον A λέγεται Ἰσον μὲ ἐν σύνολον B , ἐὰν ἔκαστον στοιχεῖον τοῦ A εἶναι καὶ στοιχεῖον τοῦ B καὶ ἔκαστον στοιχεῖον τοῦ B εἶναι καὶ στοιχεῖον τοῦ A .

Γράφομεν δὲ $A = B$ (1)

Ἡ σχέσις (1) λέγεται Ἰσότης. Τὰ ἑκατέρωθεν τοῦ συμβόλου (=) μέρη αὐτῆς λέγονται μέλη τῆς Ἰσότητος. Πρῶτον μέλος τὸ ἔξι ἀριστερῶν καὶ δεύτερον τὸ ἔκ δεξιῶν.

Παραδείγματα

α) Τὰ σύνολα $\Gamma = \{ 3, 5, 7 \}$ καὶ $\Delta = \{ 7, 5, 3 \}$ εἶναι Ἱσα καὶ γράφομεν $\Gamma = \Delta$. Ἀντιθέτως τὰ σύνολα $\Gamma = \{ 3, 5, 7 \}$ καὶ $E = \{ 3, 5, 7, 9 \}$ (Δ ιστί;) καὶ γράφομεν $\Gamma \neq E$.

β) Τὰ σύνολα $K = \{ 5, 6, 4 \}$ καὶ $\Lambda = \{ x | x \text{ ψηφίον τοῦ ἀριθμοῦ } 4665 \}$ εἶναι Ἱσα (Δ ιστί;)

5. 2. Ἰδιότητες

i) Ἐκ τοῦ ὀρισμοῦ τῆς Ἰσότητος ἐννοοῦμεν ὅτι ἔκαστον σύνολον A εἶναι Ἰσον μὲ τὸν ἔσατόν του.

$A = A$ Ἀνακλαστικὴ Ἰδιότης.

ii) Εύκολως ἐννοοῦμεν ὅτι, ἐὰν εἶναι $A = B$, τότε θὰ εἶναι καὶ $B = A$

*Η συμβολικῶς : $A = B \Rightarrow B = A$ Συμμετρικὴ Ἰδιότης.

*Η ιδιότης αὗτη μᾶς ἐπιτρέπει νὰ ἐναλλάσσωμεν τὸ α' μέλος τῆς Ἰσότητος μὲ τὸ β' μέλος αὐτῆς.

Π.χ. γράφομεν $\{ 3, 5, 6 \} = \{ 5, 3, 6 \}$ ἢ $\{ 5, 3, 6 \} = \{ 3, 5, 6 \}$

iii) Ἐὰν γνωρίζετε ὅτι $A = B$ καὶ $B = \Gamma$, τί συνάγετε διὰ τὰ σύνολα A καὶ Γ ;

Ἐὰν εἶναι $A = B$ καὶ $B = \Gamma$, τότε συμπεραίνομεν ὅτι θὰ εἶναι καὶ $A = \Gamma$. *Η συμβολικῶς :

$(A = B \text{ καὶ } B = \Gamma) \Rightarrow A = \Gamma$ Μεταβατικὴ Ἰδιότης.

*Η μεταβατικὴ Ιδιότης μᾶς ἐπιτρέπει ἐμμέσους συγκρίσεις. Π.χ. χάρις εἰς

* Εἰς τὰ Μαθηματικὰ εἶναι δυνατὸν τὸ ἴδιον ἀντικείμενον (ἐννοια) νὰ παριστάνεται μὲ δύο διαφορετικά σύμβολα.

αύτήν είναι δυνατόν να εύρωμεν έαν δύο σύνολα A και Γ είναι ίσα χωρίς άπ' εύθειας σύγκρισιν αύτῶν άλλα μόνον διὰ συγκρίσεως πρὸς ἐν ἄλλο σύνολον B
"Ωστε ή ίσότης συνόλων ἔχει τὰς ίδιότητας :

1. Άνακλαστικήν	$A = A$
2. Συμμετρικήν	$A = B \Rightarrow B = A$
3. Μεταβατικήν	$A = B \quad \left. \begin{array}{l} \\ B = \Gamma \end{array} \right\} \Rightarrow A = \Gamma$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

11. Ποια ἐκ τῶν συνόλων { 12 }, { 1,2 }, { 2,1 }, { 1,2,0 } είναι ίσα μεταξύ των,
12. Πόσας συγκρίσιες πρέπει νὰ κάνετε, διὰ νὰ εὑρετε, ἐν τρία σύνολα είναι ίσα μεταξύ των.
Όμοιως, δταν τὰ σύνολα είναι τέσσαρα;

6. ΜΟΝΟΣΗΜΑΝΤΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ

6.1. Πολὺ συχνά τὰ στοιχεῖα ἐνὸς συνόλου σχετίζονται μὲ στοιχεῖα ἐνὸς ἄλλου συνόλου.

"Ἄσ είναι A τὸ σύνολον τῶν μαθητῶν τῆς τάξεως μας καὶ B τὸ σύνολον τῶν θρανίων τῆς αιθούσης μας. "Οταν λέγωμεν νὰ καθήσουν οἱ μαθηταὶ εἰς τὰς θέσεις των, ἀντιστοιχίζομεν ἔκαστον μαθητήν (στοιχεῖον τοῦ A), μὲ ἐν θρανίον (στοιχεῖον τοῦ B). Τὸ ώρισμένον θρανίον εἰς τὸ δόπιον κάθεται ὁ μαθητής.

"Ἄσ λάβωμεν ἀκόμη δύο σύνολα : τὸ σύνολον Γ τῶν μαθητῶν τοῦ γυμνασίου μας καὶ τὸ σύνολον T τῶν 6 τάξεων αὐτοῦ. "Οταν λέγωμεν οἱ μαθηταὶ νὰ μεταβοῦν εἰς τὰς τάξεις των, ἀντιστοιχίζομεν ἔκαστον μαθητήν, στοιχεῖον τοῦ Γ, μὲ μίαν τάξιν, στοιχεῖον τοῦ T, τὴν τάξιν εἰς τὴν δόπιαν φοιτᾶ οὗτος.

6.2 "Ἄσ προσέξωμεν τὰς κατωτέρω ἀντιστοιχίας (α) καὶ (β) τὰς δόπιας ἔχομεν σημειώσει μὲ βέλη.

$$\begin{array}{lll} A = \{ \alpha, \beta, \gamma \} & \Gamma = \{ \alpha, \beta, \gamma \} & E = \{ \alpha, \beta, \gamma \} \\ \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow & \downarrow \quad \downarrow \swarrow & \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \\ B = \{ 1, 2, 3, 4 \} & \Delta = \{ 1, 2, \} & Z = \{ 1, 2, 3, 4 \} \\ (\alpha) & (\beta) & (\gamma) \end{array}$$

Καὶ αἱ δύο ἔχουν ἐν κοινὸν γνώρισμα : "Οτι εἰς ἔκαστον στοιχείον τοῦ συνόλου A (ἢ Γ) ἀντιστοιχεῖ ἐν καὶ μόνον ἐν στοιχεῖον τοῦ B (ἢ Δ). Π.χ. εἰς τὴν ἀντιστοιχίαν (α) καθὼς δεικνύουν τὰ βέλη παρατηροῦμεν δτι :

Εἰς τὸ στοιχεῖον α τοῦ συνόλου A ἀντιστοιχεῖ τὸ 1 τοῦ B

$$\begin{array}{ccccccc} \gg & \gg & \beta & \gg & \times & 2 & \gg B \\ \gg & \gg & \gamma & \gg & \gg & 3 & \gg B \end{array}$$

‘Η ἀντιστοιχία, εἰς τὴν ὁποίαν εἰς ἕκαστον στοιχεῖον συνόλου **A** ἀντιστοιχεῖ ἐν καὶ μόνον ἐν στοιχείον τοῦ συνόλου **B**, λέγεται μονοσήμαντος ἀντιστοιχία τοῦ **A** εἰς τὸ **B**.

‘Αντιθέτως· ἡ ἀνωτέρω ἀντιστοιχία (γ) δὲν εἶναι μονοσήμαντος. Διατί;

Παραδείγματα μονοσημάντων ἀντιστοιχιῶν ἔχουμεν πολλά. ‘Η ἀντιστοιχία «μαθητῆς → μὴν γεννήσεως αὐτοῦ» εἶναι μία μονοσήμαντος ἀντιστοιχία τοῦ συνόλου τῶν μαθητῶν εἰς τὸ σύνολον τῶν μηνῶν.

7. ΑΜΦΙΜΟΝΟΣΗΜΑΝΤΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΣΥΝΟΛΑ

7.1. Όρισμοι

“Ἄσ προσέξωμεν ἡδη τὴν παραπτλεύρως ἀντιστοιχίαν (I).”

Εἶναι μία μονοσήμαντος ἀντιστοιχία τοῦ συνόλου **A** εἰς τὸ σύνολον **B**. Ἐπὶ πλέον ὅμως εἰς τὸ (II) βλέπομεν καὶ μίαν ἄλλην μονοσήμαντον ἀντιστοιχίαν ἀπὸ τὸ **B** εἰς τὸ **A**.

“Ἡτοι : Μεταξὺ τῶν δύο συνόλων **A** καὶ **B** ὑπάρχει μία ἀντιστοιχία τοιαύτη, ὥστε :

Εἰς ἕκαστον στοιχεῖον τοῦ **A** νὰ ἀντιστοιχῇ ἐν καὶ μόνον ἐν στοιχεῖον τοῦ **B**, καὶ ἐπὶ πλέον εἰς ἕκαστον στοιχεῖον τοῦ **B** νὰ ἀντιστοιχῇ ἐν καὶ μόνον ἐν στοιχείον τοῦ **A**. ‘Η ἀνωτέρω διπλῆ ἀντιστοιχία λέγεται ἀμφιμονοσήμαντος ἀντιστοιχία μεταξὺ τῶν συνόλων **A** καὶ **B**. Εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν τὸ σύνολον **A** λέγεται Ισοδύναμον μὲ τὸ σύνολον **B**.

Γράφομεν δὲ

$A \sim B$.

“Ἐν σύνολον **A** εἶναι ισοδύναμον μὲ ἐν σύνολον **B**, ἐὰν εἶναι δυνάτων νὰ θέσωμεν τὰ στοιχεῖα τοῦ **A** εἰς ἀμφιμονοσήμαντον ἀντιστοιχίαν μὲ τὰ στοιχεῖα τοῦ **B**.

Τὸ σύμβολον \sim λέγεται σύμβολον τῆς ισοδυναμίας μεταξὺ δύο συνόλων.

Παραδείγματα

α) “Οταν τὸ μικρὸ παιδί μετρῷ μὲ τὰ δάκτυλα τῆς μιᾶς χειρός του ἀπὸ τὸ 1 ἔως καὶ τὸ 5, σχηματίζει μίαν ἀμφιμονοσήμαντον ἀντιστοιχίαν μεταξὺ τοῦ συνόλου τῶν δακτύλων τῆς μιᾶς χειρός του καὶ τοῦ συνόλου {1, 2, 3, 4, 5}.

β) Τὸ σύνολον τῶν ἡμερῶν τῆς ἑβδομάδος εἶναι ισοδύναμον μὲ τὸ σύνολον τῶν φωνητῶν τῆς ἀλφαριθμήτου μας.

‘Αντιπαράδειγμα

Τὸ σύνολον **A** = { α, β } δὲν εἶναι ισοδύναμον μὲ τὸ σύνολον **B** = {1, 2, 3}.

$$\begin{array}{c} A = \{ \alpha, \beta, \gamma \} \\ \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \\ B = \{ 1, 2, 3 \} \end{array}$$

$$\begin{array}{c} A = \{ \alpha, \beta, \gamma \} \\ \uparrow \quad \uparrow \quad \uparrow \\ B = \{ 1, 2, 3 \} \end{array}$$

$$\begin{array}{c} A = \{ \alpha, \beta, \gamma \} \\ \uparrow \quad \uparrow \quad \uparrow \\ B = \{ 1, 2, 3 \} \end{array}$$

Πράγματι : ένως έκαστον στοιχείον τοῦ Α είναι δυνατόν νά άντιστοιχισθῇ κατὰ μοναδικὸν τρόπου, μὲ ἐν στοιχείον τοῦ Β,

π.χ.

$$\alpha \rightarrow 1, \quad \beta \rightarrow 2,$$


έκαστον στοιχείον τοῦ Β δὲν είναι δυνατόν νά άντιστοιχισθῇ κατὰ τρόπον μοναδικόν μὲ ἐν στοιχείον τοῦ Α.

$$1 \rightarrow \alpha, \quad 2 \rightarrow \beta, \quad 3 \rightarrow ;$$

7.2. Παρατηρήσεις

α) Τὰ στοιχεῖα δύο ίσοδυνάμων συνόλων δυνάμεθα νά τὰ άντιστοιχίσωμεν άμφιμονοσήμαντως κατὰ διαφόρους τρόπους.

π.χ. διά τὰ ίσοδύναμα σύνολα $A = \{1, 2\}$ καὶ $B = \{\alpha, \beta\}$



* Επίσης διά τὰ ίσοδύναμα σύνολα $A = \{1, 2, 3\}$ καὶ $B = \{\alpha, \beta, \gamma\}$ έχομεν :

$1 \longleftrightarrow \alpha$	$1 \longleftrightarrow \alpha$	$1 \longleftrightarrow \beta$	$1 \longleftrightarrow \beta$	$1 \longleftrightarrow \gamma$	$1 \longleftrightarrow \gamma$
$2 \longleftrightarrow \beta$	$2 \longleftrightarrow \gamma$	$2 \longleftrightarrow \gamma$	$2 \longleftrightarrow \alpha$	$2 \longleftrightarrow \beta$	$2 \longleftrightarrow \alpha$
$3 \longleftrightarrow \gamma$	$3 \longleftrightarrow \beta$	$3 \longleftrightarrow \alpha$	$3 \longleftrightarrow \gamma$	$3 \longleftrightarrow \alpha$	$3 \longleftrightarrow \beta$

(6 τρόποι)

β) Δύο ίσα σύνολα είναι πάντοτε ίσοδύναμα, ένως δύο ίσοδύναμα δέν είναι κατ' άνάγκην ίσα.

7.3. Ιδιότητες ίσοδυναμίας

α) Άπδ τὸν δρισμὸν τῶν ίσοδυνάμων συνόλων συνάγομεν ὅτι

$$A \sim A$$

* Ανακλαστικὴ Ιδιότης.

β) Έὰν ύπάρχῃ μία άμφιμονοσήμαντος άντιστοιχία μεταξὺ τῶν στοιχείων συνόλου Α μὲ τὰ στοιχεῖα τοῦ συνόλου Β, τότε ἡ αὐτὴ άντιστοιχία ύπάρχει μεταξὺ τῶν στοιχείων τοῦ Β μὲ τὰ στοιχεῖα τοῦ Α.

$$A \sim B \Rightarrow B \sim A$$

* Συμμετρικὴ Ιδιότης

γ) Έὰν ύπάρχῃ μία άμφιμονοσήμαντος άντιστοιχία μεταξὺ τῶν στοιχείων τῶν συνόλων Α καὶ Β, $A \sim B$ καὶ ύπάρχῃ ἀκόμη μία άμφιμονοσήμαντος άντιστοιχία μεταξὺ τῶν στοιχείων τῶν συνόλων Β καὶ Γ, $B \sim \Gamma$, τότε θὰ ύπάρχῃ μία άμφιμονοσήμαντος άντιστοιχία μεταξὺ τῶν συνόλων Α καὶ Γ, $A \sim \Gamma$.

$$(A \sim B \text{ καὶ } B \sim \Gamma) \Rightarrow A \sim \Gamma$$

* Μεταβατικὴ Ιδιότης.

* Ήσαν τις σχέσεις ισοδυναμίας μεταξύ συνόλων έχει τάς έξης ιδιότητας:

1. Άνακλαστικήν $A \sim A$
2. Συμμετρικήν $A \sim B \Rightarrow B \sim A$
3. Μεταβατικήν $\begin{array}{l} A \sim B \\ B \sim C \end{array} \Rightarrow A \sim C$

Ποια άλλη σχέσης συνόλων έχει τάς άνωτέρω ιδιότητας;

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

13. Αναφέρατε παραδείγματα μονοσημάντων άντιστοιχιών και άμφιμονοσημάντων άντιστοιχιών.

14. Ποιαί είναι τών σχέσεων:

$$\begin{array}{ll} \phi \sim \{0\} & \{\phi, \{\alpha\}, \beta\} \sim \{\alpha, \beta, 1\} \\ \phi \sim 0 & \{\alpha, \beta, 1\} \sim \{\{\alpha, \beta\}, 1\} \end{array}$$

είναι άλλητες και ποιαί ψευδεῖς;

15. Οι μαθηταί, Τζιτζάς, Παγώνης και Νίκας κάθονται εις τρεις θέσεις α, β, γ. Κατά πόσους και ποιους τρόπους είναι δυνατόν νά σχηματίσετε άμφιμονοσήμαντον άντιστοιχίαν μεταξύ του συνόλου τών μαθητών αύτών και τού συνόλου τών θέσεών των;

8. ΤΟΜΗ ΣΥΝΟΛΩΝ

8.1. Όρισμα

Εις τό σύνολον Σ τών μαθητών τῆς τάξεως μας οι μαθηταί Νίκας, Σαμπάνης, Δουζίνας και Σχοινᾶς είναι άριστοῦχοι εις τὰ Ελληνικά. Οι μαθηταί Κυριαζής, Κουμαντάνος, Νίκας, Δουζίνας και Μανιάτης είναι άριστοῦχοι εις τὰ Μαθηματικά.

Καθώς παρατηρούμεν οι δύο μαθηταί Νίκας και Δουζίνας είναι άριστοῦχοι και εις τὰ δύο μαθήματα: Εις τὰ Μαθηματικά και εις τὰ Ελληνικά. "Ας διατυπώσωμεν τ' άνωτέρω εις τήν γλῶσσαν τών συνόλων.

Θέτομεν $A = \{\text{Νίκας, Σαμπάνης, Δουζίνας, Σχοινᾶς}\}$

$B = \{\text{Κυριαζής, Κουμαντάνος, Νίκας, Δουζίνας, Μανιάτης}\}$

$\Gamma = \{\text{Νίκας, Δουζίνας}\}$

Τὸ σύνολον Γ , τὸ δποῖον ἀπαρτίζεται ἀπὸ τὰ κοινὰ στοιχεῖα τῶν συνόλων A, B καὶ μόνον ἀπὸ αὐτά, λέγεται τομὴ τοῦ συνόλου A μὲ τὸ σύνολον B .

Γράφομεν δέ

$$A \cap B = \Gamma$$

(\cap είναι τὸ σύμβολον τῆς τομῆς)

καὶ διαβάζομεν: Α τομὴ Β ίσον Γ.


* Ήτοι ἔκαστον στοιχείον τῆς τομῆς $A \cap B$ ἀγήκει εις τὸ A καὶ εις τὸ B .

* Η συμβολικῶς:

$$A \cap B = \{x / x \in A \text{ καὶ } x \in B\}$$

* Απὸ τὸν ὄρισμὸν τῆς τομῆς ἐννοούμεν ὅτι:

$$A \cap B \subseteq A \text{ καὶ } A \cap B \subseteq B,$$



Παραδείγματα

α) Εάν $A = \{1, 2, 3, 4\}$ και $B = \{0, 1, 2, 5\}$,

(α) τότε $A \cap B = \{1, 2\}$.

Η τομή αυτή είσι το σχ. 4α παριστάνεται υπό της σκιερᾶς έπιφανείας.

β) Εάν $A = \{1, 2, 3, 4\}$ και $B = \{1, 2\}$,


τότε $A \cap B = \{1, 2\}$

Η τομή αυτή είσι το σχ. 4β παριστάνεται υπό της σκιερᾶς έπιφανείας.

γ) Εάν $A = \{1, 2, 3\}$ και $B = \{4, 5\}$, τότε παρατηρούμεν δτι τά A και B ούδεν κοινόν στοιχείον έχουν.

Συνεπώς $A \cap B = \emptyset$. (σχ. 4γ.)

Εις τήν περίπτωσιν αύτήν λέγομεν δτι τά σύνολα A και B είναι ξένα μεταξύ των,



Σχ. 4.

8.2. Ιδιότητες τής τομῆς

α) Μεταθετική

Άπο τὸν δρισμὸν τῆς τομῆς ἐννοοῦμεν δτι

$$A \cap B = B \cap A.$$

Τοῦτο σημαίνει δτι εἰς τὴν εὔρεσιν τῆς τομῆς δυὸς συνόλων δὲν έχει σημασίαν ή σειρὰ (διάταξις) κατά τὴν δόποιαν θὰ λάβωμεν τά δύο αύτά σύνολα. Διὰ τοῦτο λέγομεν δτι ή τομή δύο συνόλων είναι πρᾶξις μεταθετική ή κατ' ἄλλον τρόπον, έχει τὴν μεταθετικὴν ιδιότητα.

β) Προσεταιριστικὴ

Εις τὰ προηγούμενα ώρισαμεν τὴν τομὴν δυὸς συνόλων. Τί θὰ δνομάσωμεν τομὴν τριῶν συνόλων κατά σειράν A, B, Γ;

Τομὴν τριῶν συνόλων, κατὰ τὴν σειρὰν A, B, Γ δνομάζομεν τὸ σύνολον, τὸ δόποιον προκύπτει, έὰν σχηματίσωμεν: α) τὴν τομὴν τῶν συνόλων A και B, $A \cap B$, και β) τὴν τομὴν τοῦ συνόλου A $\cap B$ μὲ τὸ σύνολον Γ.

* Καθώς βλέπομεν χάρις εἰς τὴν εἰσαγωγὴν τοῦ κενοῦ συνόλου κατέστη δυνατή ή τομὴ δύο συνόλων ξένων μεταξύ των.

Γράφομεν δέ

$$(A \cap B) \cap \Gamma.$$

*

"Ητοι διά τὴν εὑρεσιν τῆς τομῆς τῶν τριῶν συνόλων, κατὰ τὴν σειρὰν A, B, Γ, ὅπου $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{2, 3, 4\}$ καὶ $\Gamma = \{2, 4, 6, 8\}$ ἔκτελούμεν κατὰ σειρὰν τὰς ἀκολούθους δύο πράξεις:

$$A \cap B = \{2, 3\},$$

$$(A \cap B) \cap \Gamma = \{2, 3\} \cap \{2, 4, 6, 8\} = \{2\}$$

"Ωστε $(A \cap B) \cap \Gamma = \{2\}$ (1)

"Ἄσ εὕρωμεν ἡδη καὶ τὴν τομὴν τῶν δύο συνόλων A καὶ B $\cap \Gamma$.

"Ἐχομεν : $B \cap \Gamma = \{2, 4\},$

$$A \cap (B \cap \Gamma) = \{1, 2, 3\} \cap \{2, 4\}$$

ἡ $A \cap (B \cap \Gamma) = \{2\}$ (2)

'Απὸ τὰς (1) καὶ (2) ἔχομεν ὅτι :

$$(A \cap B) \cap \Gamma = A \cap (B \cap \Gamma)$$

(3)

Διὰ τοῦτο λέγομεν ὅτι ἡ τομὴ τῶν συνόλων ἔχει τὴν προσεταιριστικήν Ιδιότητα. "Ἡ ὅτι είναι πρᾶξις προσεταιριστική.

"Ωστε ἡ τομὴ συνόλων ἔχει τὰς Ιδιότητας :

1. Μεταθετικήν

$$A \cap B = B \cap A$$

2. Προσεταιριστικήν

$$(A \cap B) \cap \Gamma = A \cap (B \cap \Gamma)$$

Σημειώσεις

1) Μὲ συνδυασμὸν τῆς προσεταιριστικῆς καὶ τῆς μεταθετικῆς Ιδιότητος εὑρίσκομεν ὅτι ἡ τομὴ τῶν τριῶν συνόλων δὲν ἔξαρτάται ἐκ τῆς σειρᾶς αὐτῶν.

Π.χ. $(A \cap B) \cap \Gamma = A \cap (B \cap \Gamma)$ Προσεταιρ. Ιδιότης

$$= A \cap (\Gamma \cap B) \quad \text{Μεταθετική.}$$

$$= (A \cap \Gamma) \cap B \quad \text{Προσεταιριστική.}$$

2) Εάν ζητοῦμεν τὴν τομὴν περισσοτέρων συνόλων, εὑρίσκομεν τὴν τομὴν τῶν τριῶν πρώτων, ἔπειτα τὴν τομὴν τοῦ ἀποτελέσματος αὐτοῦ μὲ τὸ τέταρτον σύνολον κ.ο.κ.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

16. Νὰ εύρεθοῦν αἱ τομαι $A \cap B$, $A \cap \Gamma$, $(A \cap \Gamma) \cap B$, δῆποι $A = \{\alpha, \beta, \gamma\}$, $B = \{\chi, \eta\}$ γράμμα τῆς λέξεως «διά» καὶ $\Gamma = \{\kappa, \lambda, \mu\}$ καὶ νὰ παρασταθοῦν μὲ διαγράμματα.

17. Επαληθεύσατε ὅτι $(A \cap B) \cap \Gamma = (\Gamma \cap A) \cap B$

(Χρησιμοποιήσατε Ιδιά σύνολα).

18) Νὰ εύρεθῇ ἡ τομὴ $A \cap \phi$, δῆποι A είναι τυχὸν σύνολον.

"Εάν $A \cap B = \phi$, τί συνάγετε διὰ τὰ σύνολα A καὶ B; 'Ομοίως ἔαν $A \cap B = B$.

* 'Η παρένθεσις δηλοῖ ὅτι θὰ εύρεθῇ πρῶτον-ή τομὴ τῶν συνόλων A καὶ B.

9. ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΟΛΩΝ

9.1. Όρισμός

"Ας έπανέλθωμεν εις τὰ σύνολα" $A = \{ \text{Νίκας}, \text{Σαμπάνης}, \text{Δουζίνας}, \text{Σχοινᾶς} \}$ και $B = \{ \text{Κυριαζῆς}, \text{Κουμαντόνος}, \text{Νίκας}, \text{Δουζίνας}, \text{Μανιάτης} \}$. "Ητοι εις τὰ σύνολα τῶν ὀριστούχων μαθητῶν τῆς τάξεως μας εις τὰ 'Ελληνικά (σύνολον A) καὶ εις τὰ Μαθηματικά (σύνολον B). 'Εάν ζητήσωμεν τὸ σύνολον Γ, τῶν ὀριστούχων μαθητῶν τῆς τάξεως μας εις τὰ 'Ελληνικά ή εις τὰ Μαθηματικά ή εις διμφότερα θά ἔχωμεν :

$\Gamma = \{ \text{Νίκας}, \text{Σαμπάνης}, \text{Δουζίνας}, \text{Σχοινᾶς}, \text{Κυριαζῆς}, \text{Κουμαντάνος}, \text{Μανιάτης} \}$.

Τὸ σύνολον Γ , τὸ ὁποῖον ἀπαρτίζεται ἀπὸ τὰ στοιχεῖα τῶν συνόλων A καὶ B καὶ μόνον ἀπ' αὐτά, λέγεται ἐνώσις** τοῦ συνόλου A μὲ τὸ σύνολον B.

Γράφομεν δὲ

$$A \cup B = \Gamma \quad (\text{υ εἶναι τὸ σύμβολον τῆς ἐνώσεως})$$

καὶ διαβάζομεν

Α ἐνώσις B ίσον Γ .

Κατὰ τὸν ὀρισμὸν ή ἐνώσις $A \cup B$ δύναται νὰ ἐκφρασθῇ καὶ ως ἔξῆς δια τῶν στοιχείων τῶν συνόλων A καὶ B.

$$A \cup B = \{ x | x \in A \text{ εἴτε } ** x \in B \}$$

*Ἐπίσης ἀπὸ τὸν ὀρισμὸν τῆς ἐνώσεως ἐννοοῦμεν δτι :

$$A \subseteq A \cup B \text{ καὶ } B \subseteq A \cup B$$

* * * Εννοεῖται ἐνταῦθα ως βασικὸν σύνολον τὸ σύνολον τῶν μαθητῶν τῆς τάξεως μας.

** Εννοεῖται δτι ἐκαστον κοινὸν στοιχεῖον τῶν A καὶ B δὲν ἐμφανίζεται δύο φοράς εις τὴν ἐνώσιμην.


*** Τὸ «εἴτε» σημαίνει εις τὸ A ή εις τὸ B ή εις διμφότερα.

Παραδείγματα:


Έάν $A = \{2, 3, 4\}$ και $B = \{3, 4, 5, 6\}$, τότε $A \cup B = \{2, 3, 4, 5, 6\}$. Εις τὸ σχ. 5 ή ἔνωσις αύτη παριστάνεται ύπο τῆς σκιερᾶς ἐπιφανείας.

β) Έάν $A = \{2, 3, 4\}$ και $B = \{5, 6\}$, τότε $A \cup B = \{2, 3, 4, 5, 6\}$ (Σχ. 7).

γ) Έάν $A = \{2, 3, 4\}$ και $B = \{2, 3\}$, τότε $A \cup B = \{2, 3, 4\} = A$ (Σχ. 6)



Σχ. 5.



Σχ. 6.

9.2. Ιδιότητες

α) Μεταθετική

Είναι φανερόν ότι :

$$A \cup B = B \cup A \quad \text{Μεταθετική Ιδιότητας}$$

β) Προσεταιριστική

Όπως καὶ εἰς τὴν τομήν, ἔνωσις τριῶν συνόλων κατὰ σειράν, A, B, Γ , λέγεται ἡ ἔνωσις τῶν δύο συνόλων $A \cup B$ καὶ Γ . Έάν συνεπῶς είναι :

$$A = \{1, 2, 3\}, \quad B = \{2, 3, 4\} \quad \text{καὶ} \quad \Gamma = \{3, 4, 5\},$$

τότε θὰ ἔχωμεν

$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4\},$$

$$(A \cup B) \cup \Gamma = \{1, 2, 3, 4\} \cup \{3, 4, 5\}$$

$$\text{ή} \quad (A \cup B) \cup \Gamma = \{1, 2, 3, 4, 5\} \quad (1)$$


Είναι δῆμος :

$$B \cup \Gamma = \{2, 3, 4, 5\}$$

$$\text{καὶ} \quad A \cup (B \cup \Gamma) = \{1, 2, 3\} \cup \{2, 3, 4, 5\}$$

$$\text{ή} \quad A \cup (B \cup \Gamma) = \{1, 2, 3, 4, 5\} \quad (2)$$

Ἐκ τῶν ισοτήτων (1) καὶ (2) ἔχομεν ότι :



Σχ. 7.

Ητοι ἡ ἔνωσις συνόλων είναι πρᾶξις προσεταιριστική.

γ) Οὐδέτερον στοιχεῖον

Τὸ κενὸν σύνολον ἔχει ἔνα ιδιαίτερον ρόλον εἰς τὴν πρᾶξιν τῆς ἔνώσεως. Είναι

$$A \cup \emptyset = \emptyset \cup A = A.$$



Διά τοῦτο τὸ κενὸν σύνολον λέγεται ο Úδέτερον στοιχεῖον εἰς τὴν ἔνωσιν συνόλων.

"Ωστε ἡ ἔνωσις συνόλων ἔχει τάς ίδιοτητας :

1. Μεταθετικήν
2. Προσεταιριστικήν
3. Ούδετερον στοιχεῖον

$$\begin{aligned} A \cup B &= B \cup A \\ (A \cup B) \cup \Gamma &= A \cup (B \cup \Gamma) \\ A \cup \emptyset &= \emptyset \cup A = A \end{aligned}$$

Ποιας ἐκ τῶν ἀνωτέρω ίδιοτήτων ἔχει ἡ τομή συνόλων ;

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

19. Νὰ εύρεθοῦν αἱ ἐνώσεις : {1,2,5} \cup {2,4,6}, {1,3,4} \cup {2,5,6}

20. Νὰ ἐπαληθεύσετε δῆτι $A \cup (\Gamma \cup B) = (A \cup B) \cup \Gamma$

Χρησιμοποιήσατε ίδικά σας σύνολα

21. Ἐάν $A = \{1,2,3\}$, $B = \{3,4,5\}$ καὶ $\Gamma = \{0,1,2\}$ νὰ ἔξετάσετε, ἐάν ισχύῃ ἡ σχέσις
 $A \cap (B \cup \Gamma) = (A \cap B) \cup (A \cap \Gamma)$.

22. Ἐάν διὰ τρία σύνολα A, B, Γ είναι $A \cup B \subset \Gamma$, ποία σχέσις υπάρχει μεταξὺ τῶν A καὶ Γ ἢ B καὶ Γ .

23. Νὰ ἐπαληθεύσετε τάς σχέσεις : $A \cup (A \cap B) = A$ καὶ $A \cap (A \cup B) = A$ μὲν ίδικά σας σύνολα.

10. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ (ἢ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΝ) ΣΥΝΟΛΟΥ

10.1 Ὁρισμὸς

"Ἄσ λάβωμεν ὡς βασικὸν σύνολον Ω τὸ σύνολον τῶν γραμμάτων τῆς ἀλφα-βήτου μας καὶ ἄς δρίσωμεν ἐν ὑποσύνολον αὐτοῦ : Τὸ σύνολον A τῶν φωνηέντων. Μὲ τὸν τρόπον αὐτὸν δρίζεται καὶ ἐν ἄλλῳ σύνολον B : Τὸ σύνολον τῶν συμφώνων. Ἡτοι τὸ σύνολον τῶν στοιχείων τοῦ Ω , τὰ δόποια δὲν ἀνήκουν εἰς τὸ A . Τὸ σύνολον B λέγεται συμπλήρωμα τοῦ Ω καὶ τοῦ A δέν ἀνήκουν εἰς τὸ A . Τὸ σύνολον A ὡς πρὸς βασικὸν σύνολον Ω .

Γενικῶς : Συμπλήρωμα συνόλου A ὡς πρὸς βασικὸν σύνολον Ω λέγεται τὸ σύνολον τῶν στοιχείων τοῦ Ω , τὰ δόποια δὲν ἀνήκουν εἰς τὸ A .

Τὸ συμπλήρωμα τοῦ συνόλου A ὡς πρὸς τὸ βασικὸν σύνολον Ω σημειώνεται A' .

'Απὸ τὸν ἀνωτέρω δρισμὸν τοῦ συμπληρώματος τοῦ συνόλου A ὡς πρὸς βασικὸν σύνολον Ω , ἔχομεν :

$$A \cap A' = \emptyset$$

καὶ

$$A \cup A' = \Omega$$


10.2 Γραφικὴ παράστασις

'Η γραφικὴ παράστασις τοῦ συμπληρώματος A' ἐνὸς συνόλου A ὡς πρὸς

βασικὸν σύνολον Ω ἀποδίδεται εἰς τὸ σχ. 8.
(Σκιερά ἐπιφάνεια).

Εἶναι τὸ μέρος, τὸ δποῖον ἀπομένει ἀπὸ τὸ διάγραμμα τοῦ Ω , ὅταν ἀφαιρέσωμεν ἀπὸ αὐτὸ τὸ μέρος, τὸ δποῖον παριστάνει τὸ A .


Παράδειγμα : Εάν λάβωμεν ως βασικὸν σύνολον Ω τὸ σύνολον $\{2,3,4,5,6\}$ καὶ τὸ σύνολον $A = \{2,3\}$, τότε τὸ συμπλήρωμα τοῦ A ως πρὸς τὸ Ω εἶναι τὸ $A' = \{4,5,6\}$. (Σχ. 9).



Σχ. 8.

ΑΣΚΗΣΙΣ

24. Εάν $\Omega = \{1, 2, 3, 4\}$, νὰ εύρετε τὸ συμπλήρωμα : α) A' τοῦ $A = \{1, 3\}$ β) Τοῦ ϕ . γ) Ἐκάστου διμελοῦς ύποσυνόλου τοῦ Ω .



Σχ. 9.

11. ΖΕΥΓΟΣ

Προσέξατε εἰς τὸν κατωτέρῳ πίνακα τοῦ σχ. 10.

Πῶς θὰ δρίσωμεν τὴν θέσιν τοῦ A ;

Θὰ εἴπωμεν δὴ τὸ A εύρικεται εἰς τὴν διασταύρωσιν τῆς 3ης σειρᾶς καὶ τῆς 2ας στήλης. Θέσις τοῦ A : 3η σειρὰ καὶ 2α στήλη. "Η συντόμως $A = (3,2)$. "Ητοι εἰς τὴν παράστασιν $(3,2)$ δ' ὁρος, τὸ 3, παριστάνει τὸν ἀριθμὸν σειρᾶς καὶ ὁ 2' ὄρος, τὸ 2, τὸν ἀριθμὸν στήλης. Εάν μεταβάλωμεν τὴν σειρὰν τῶν ὄρων τῆς παρενθέσεως, δὲν ὀρίζομεν πλέον τὴν θέσιν τοῦ A ἀλλὰ τοῦ B .

Θέσις τοῦ B : 2α σειρά 3η στήλη ἡ συντόμως $B = (2,3)$. Καταστάσεις ως ἡ ἀνωτέρω μᾶς δῆγοιον εἰς τὴν χρησιμοποίησιν διμελῶν συνόλων, τῶν ὅποιών τὰ στοιχεῖα ἔχουν ὠρισμένην σειράν μεταξὺ των.

Τὸ σύνολον δύο στοιχείων α, β , ἐκ τῶν ὅποιών τὸ α πρῶτον καὶ τὸ β δεύτερον, λέγεται διατεταγμένον ζεῦγος ή συντόμως ζεῦγος.

Γράφομεν δὲ (α, β).

"Ητοι ἡ γραφὴ $(3,2)$ παριστάνει ἐν ζεῦγος μὲ πρῶτον στοιχεῖον τὸ 3 καὶ δεύτερον τὸ 2. Δὲν ἀποκλείεται τὰ στοιχεῖα ἐνὸς ζεύγους νὰ εἶναι ἵσα. Π.χ. διὰ τὴν θέσιν Δ ἔχομεν τὸ ζεῦγος $(2,2)$. Κατὰ τὰ ἀνωτέρω :

1) Ἀπὸ ἐν διμελὲς σύνολον $\{\alpha, \beta\}$ γεννῶνται δύο ζεύγη τὰ (α, β) καὶ (β, α) .

2) Εἶναι $(\alpha, \beta) = (\gamma, \delta)$, ὅταν καὶ μόνον ὅταν $\alpha = \gamma$ καὶ $\beta = \delta$.

"Ητοι $(\alpha, \beta) \neq (\beta, \alpha)$ ἐκτὸς ἐάν $\alpha = \beta$.

0	1	2	3	4
1				
2		Δ	B	Γ
3		A	E	
4				

Σχ. 10.

ΑΣΚΗΣΙΣ

25. Εἰς τὸν πίνακα τοῦ σχεδίου 10 νὰ προσδιορίσετε τὰς θέσεις τῶν σημείων Γ , E μὲ ζεύγη. Εἰς τὸν αὐτὸν πίνακα νὰ εύρετε ποιά τετραγωνίδια δρίζουν τὰ ζεύγη $(1,2)$, $(2,1)$, $(1,1)$ $(2,2)$.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΝ

26. Ποιαί είκ τῶν σχέσεων: $x = \{x\}$, $x \in \{x\}$, $x \neq \{x\}$ είναι ἀληθεῖς;
27. Έάν $\alpha \neq \beta$ καὶ $x \neq \psi$, τότε δικαιολογήσατε τὴν συνεπαγωγὴν
 $\{\alpha, x\} = \{\beta, \psi\} \Rightarrow (\alpha = \psi \text{ καὶ } \beta = x)$
28. Διατί $A \not\subseteq B \Rightarrow A \not\subset B$
29. 'Απὸ τὸν σύνολον $A = \{1, 2, 3, 4\}$ πόσα γνήσια ὑποσύνολα σχηματίζονται;
30. 'Εάν $A \subseteq \phi$, τότε δεῖξατε ότι $A = \phi$
31. Νὰ ἔρετασθῇ έάν ἀληθεύει ἡ σχέσις $(A \cap B) \cup \Gamma = (A \cup \Gamma) \cap (B \cup \Gamma)$
32. Ποια ζεύγη δύνασθε νὰ σχηματίσετε μὲ τὰ στοιχεία τοῦ συνόλου $\{1, 2, 3\}$;

ΠΙΝΑΞ

Τῶν κυριωτέρων συμβολισμῶν

$\alpha \in A$: Τὸ στοιχεῖον α ἀνήκει εἰς τὸ σύνολον A

$\alpha \notin A$: » » δὲν ἀνήκει » » α

$\{ \ldots \}$: "Ἀγκιστρον διὰ τὴν παράστασιν ουνόλου

$X : X \dots$: X ὅπου $X \dots$

$X | X \dots$: » » »

\emptyset : τὸ κενὸν σύνολον

$A \subseteq B$: A είναι ὑποσύνολον τοῦ B

$A \subset B$: A γνήσιον ὑποσύνολον τοῦ B

\Rightarrow : Τὸ σύμβολον τῆς συνεπαγωγῆς

\Leftrightarrow : » » » διπλῆς συνεπαγωγῆς.

$A \cap B$: A τομὴ B

$A \cup B$: A ἔνωσις B

Ω : Βασικὸν σύνολον

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

προσδιορίζεται από την παραπάνω συνεπαγωγήν. Η συνεπαγωγή από την παραπάνω συνεπαγωγήν διατίθεται στην ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ η παραπάνω συνεπαγωγή, διότι η παραπάνω συνεπαγωγή διατίθεται στην ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.

πλοιαρίου. Το β' παρότι δε να είναι αποτελεσματικό θεωρείται ότι από την παραγόμενη γενικότερη συνάντηση της παραγόμενης γενικότερης συνάντησης προσπέρασε ο ίδιος πλοιαρίου. Η παραγόμενη γενικότερη συνάντηση παραγόμενης γενικότερης συνάντησης προσπέρασε ο ίδιος πλοιαρίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

ΕΚ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

12. ΤΟ ΣΥΝΟΛΟΝ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

12. 1. Έπει της έδρας τοποθετούμενεν άντικείμενον α. Έπειτα δλλο β, δλλο γ, κ.ο.κ. Μὲ τὸν τρόπον αὐτὸν σχηματίζονται κατὰ σειρὰν τὰ σύνολα

$$\begin{aligned} & \{\alpha\} \\ & \{\alpha, \beta\} \\ & \{\alpha, \beta, \gamma\} \quad \text{κ.ο.κ.} \end{aligned}$$

*Έὰν προσέξωμεν τὸ σύνολον $\{\alpha\}$ καὶ δλα τὰ πρὸς αὐτὸν ισοδύναμα: π.χ. $\{+\}, \{-\}, \{x\} \dots$

γεννᾶται εἰς τὴν σκέψιν μας ἡ Ιδέα τοῦ ἀριθμοῦ ἐν α. Δ. 2.81
'Απὸ τὸ σύνολον $\{\alpha, \beta\}$ καθὼς καὶ δλα τὰ ισοδύναμά του:

γεννᾶται εἰς τὴν σκέψιν μας ἡ Ιδέα τοῦ ἀριθμοῦ δύο. 'Ομοίως ἀπὸ τὸ σύνολον $\{\alpha, \beta, \gamma\}$ καὶ δλα τὰ ισοδύναμα πρὸς αὐτό, ἡ Ιδέα τοῦ ἀριθμοῦ τρία κ.ο.κ.

Οἱ ἀριθμοὶ ἔν, δύο, τρία, .. δηλοῦν συγχρόνως τὸ πλήθος τῶν στοιχείων ἐκάστου τῶν ἀνωτέρω συνόλων. Διὰ τοῦτο λέγονται πληθικοὶ ἀριθμοὶ τούτων. Π.χ. πληθικὸς ἀριθμὸς τοῦ συνόλου $\{\alpha, \beta\}$ ὡς καὶ ἐκάστου τῶν ισοδυνάμων πρὸς αὐτὸν συνόλων εἶναι ὁ ἀριθμὸς δύο. 'Ομοίως, πληθικὸς ἀριθμὸς τοῦ συνόλου $\{\alpha, \beta, \gamma\}$ καὶ ἐκάστου τῶν ισοδυνάμων πρὸς αὐτὸν συνόλων, εἶναι ὁ ἀριθμὸς 3.

12.2 Παρατηροῦμεν ὅτι:

$$\{\alpha\} \cup \{\beta\} = \{\alpha, \beta\}$$

$$\{\alpha, \beta\} \cup \{\gamma\} = \{\alpha, \beta, \gamma\}$$

$$\{\alpha, \beta, \gamma\} \cup \{\delta\} = \{\alpha, \beta, \gamma, \delta\} \quad \text{κ.ο.κ.}$$

"Ητοι τὸ σύνολον $\{\alpha, \beta\}$ παράγεται ἀπὸ τὴν ἔνωσιν τοῦ προτιγουμένου του συνόλου $\{\alpha\}$ μὲ τὸ ἔνον πρὸς αὐτὸν σύνολον $\{\beta\}$. 'Ομοίως τὸ σύνολον $\{\alpha, \beta, \gamma\}$ παράγεται ἀπὸ τὴν ἔνωσιν τοῦ συνόλου $\{\alpha, \beta\}$ μὲ τὸ ἔνον πρὸς αὐτὸν σύνολον $\{\gamma\}$ κ.ο.κ.

Έκ τῶν ἀνωτέρω ἐννοοῦμεν δτι καὶ ἔκαστος ἐκ τῶν ἀριθμῶν 2, 3, 4... προκύπτει ἐκ τοῦ προηγουμένου του 1, 2, 3, ... ἀντιστοίχως, ἐδὲ οὗτος αὐξηθῆ κατὰ τὸν ἀριθμὸν ἐνα (1). Εἰναι φανερὸν δτι μὲ τὸν τρόπον αὐτὸν δυνάμεθα νὰ συνεχίσωμεν ἀπεριορίστως καὶ νὰ σχηματίσωμεν τὴν σειρὰν τῶν φυσικῶν ἀριθμῶν.

1, 2, 3, 4, 5...

Ἡ σειρὰ αὕτη ἔχει ἐν ἀρχικὸν στοιχεῖον καὶ οὐδὲν τελευταῖον. Τὸ σύνολον τῶν φυσικῶν ἀριθμῶν τὸ παριστάνομεν μὲ τὸ γράμμα N.

$$N = \{ 1, 2, 3, 4, 5, \dots \}$$

13. ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΙΣ

13.1 Ἐκ τοῦ συνόλου τῶν φυσικῶν ἀριθμῶν $N = \{ 1, 2, 3, 4, \dots \}$ σχηματίζομεν τὰ ὑποσύνολα

$$N_1 = \{ 1 \}$$

$$N_2 = \{ 1, 2 \}$$

$$N_3 = \{ 1, 2, 3 \} \quad \text{κ.ο.κ.}$$

Καθὼς παρατηροῦμεν, τὸ τελευταῖον στοιχεῖον (ἀριθμός) ἐκάστου ἐκ τῶν συνόλων N_1, N_2, N_3, \dots εἶναι καὶ ὁ πληθικός ἀριθμὸς αὐτοῦ.

13.2 Διὰ νὰ εύρωμεν τὸ πλῆθος τῶν στοιχείων ἐνὸς συνόλου π.χ. τοῦ συνόλου A = { α, β, γ, δ }, λέγομεν ἐν, δύο, τρία, τέσσαρα, δεικνύοντες ἐν πρὸς ἐν τὰ στοιχεῖα αὐτοῦ μέχρις ὅτου τελειώσουν. Μὲ τὸν τρόπον αὐτὸν ἀντιστοιχίζομεν ἀμφιμονοσημάντως τὰ στοιχεῖα τοῦ συνόλου A μὲ τὰ στοιχεῖα ἐνὸς ἐκ τῶν ὑποσυνόλων N_1, N_2, N_3, \dots τοῦ N καὶ συγκεκριμένως εἰς τὴν περίπτωσίν μας τοῦ N_4 .

$$A = \{ \alpha, \beta, \gamma, \delta \}$$

↑ ↑ ↑ ↑

↓ ↓ ↓ ↓

$$N = \{ 1, 2, 3, 4, 5, \dots \}$$

Ο 4, τελευταῖος ἀριθμὸς τοῦ N_4 εἶναι ὁ πληθικὸς ἀριθμὸς τοῦ συνόλου A.

Ἡ εὑρεσις τοῦ πληθικοῦ ἀριθμοῦ ἐνὸς συνόλου λέγεται ἡ παρίθμησις τῶν στοιχείων τοῦ συνόλου τούτου.

14. ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΣΥΝΟΛΑ

14.1 Τὰ στοιχεῖα τοῦ συνόλου A = { χ | χ ἡμέρα τῆς ἑβδομάδος } εἶναι φανερὸν ὅτι δύνανται νὰ τεθοῦν εἰς ἀμφιμονοσήμαντον ἀντιστοιχίαν μὲ τὸ ἀρχικὸν ἀπόκομμα

πόσο πολλούς τούτους θα μπορούσαμε να ταξινομήσουμε; { θ, α, γ, δ } κανονικά δεν μπορούμενοι να ταξινομήσουμε; { η, β, ε, ζ } κανονικά δεν μπορούμενοι να ταξινομήσουμε; { ι, ια, ιαα }

τῆς σειρᾶς τῶν φυσικῶν ἀριθμῶν. Οι πρώτοι τρεις τούτων ταξινομήσαμε { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 }

Τὸ σύνολον A καὶ γενικῶς ἔκαστον σύνολον, τοῦ δποίου τὰ στοιχεῖα δύναν-

ταὶ νὰ τεθοῦν εἰς ἀμφιμονοσήμαντον ἀντιστοιχίαν μὲ τὰ στοιχεῖα ἐνὸς ἀρχικοῦ ἀποκόμματος τῆς σειρᾶς τῶν φυσικῶν ἀριθμῶν, λέγομεν ὅτι ἔχει πεπερασμένον πλῆθος στοιχείων ἢ ὅτι εἶναι πεπερασμένον σύνολον.

14.2 "Ἄσ προσπαθήσωμεν νὰ εύρωμεν τὸν πληθικὸν ἀριθμὸν τοῦ συνόλου

$$N = \{1, 2, 3, \dots\}.$$

Θὰ διαπιστώσωμεν ὅτι δὲν δυνάμεθα. "Οποιον φυσικὸν ἀριθμὸν καὶ ἕαν σκεφθῶμεν, θὰ ὑπάρχῃ πάντοτε ὁ ἀμέσως ἐπόμενός του, ὁ ὅποιος θὰ εἶναι καὶ αὐτὸς στοιχεῖον τοῦ συνόλου N . Διὰ τοῦτο λέγομεν ὅτι τὸ σύνολον N τῶν φυσικῶν ἀριθμῶν εἶναι μὴ πεπερασμένον σύνολον ἢ ἀπειρονόνον.

Παραθέτομεν κατωτέρω ἄλλα παραδείγματα πεπερασμένων καὶ μὴ πεπερασμένων συνόλων.

Πεπερασμένα σύνολα

Μὴ πεπερασμένα

- 1) Οἱ κάτοικοι τῆς γῆς
- 2) Αἱ λέξεις ἐνὸς ὡρισμένου λεξικοῦ
- 3) Τὰ κυκλόφοροῦντα αὐτοκίνητα

- 1) Οἱ ἄρτιοι ἀριθμοί.
- 2) Οἱ περιττοὶ ἀριθμοί.
- 3) Τὰ σημεῖα μιᾶς εὐθείας.

15. ΤΟ ΣΥΝΟΛΟΝ ΤΩΝ ΑΚΕΡΑΙΩΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ

15.1 Τὸν πληθικὸν ἀριθμὸν τοῦ κενοῦ συνόλου τὸν καλοῦμεν μὴ δὲν $\emptyset(0)$. Ἡ ἐνωσις τοῦ συνόλου $\{0\}$ μὲ τὸ σύνολον N τῶν φυσικῶν ἀριθμῶν ὀνομάζεται σύνολον τῶν ἀκεραίων τῆς ἀριθμητικῆς.

$$\{0\} \cup \{1, 2, 3, \dots\} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$$

Τὸ νέον τοῦτο σύνολον παριστάνομεν συντόμως μὲ N_0 .

$$\text{Ήτοι : } N_0 = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$$

Τὰ σύμβολα μὲ τὰ ὅποια παριστάνομεν τοὺς ἀκεραίους λέγονται ψηφία. Ειδικῶς τὰ ψηφία

$$0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9$$

ὄνομάζονται ἀραβικά ψηφία, διότι πρῶτοι οἱ "Αραβεῖς τὰ ἔχρησιμοποίησαν καὶ ἀπὸ αὐτούς τὰ παρέλαθον περὶ τὸν 9ον αἰῶνα οἱ λαοὶ τῆς Δύσεως.

15.2 Παράστασις τῶν ἀκεραίων ἐπὶ ἡμιευθείας

Χαράσσομεν ἡμιευθεῖαν Οχ καὶ λαμβάνομεν ἐπ' αὐτῆς διαδοχικῶς ἵσα τμήματα $OA = AB = BC = CD = \dots$ (σχ. 11).



Τοὺς ἀριθμοὺς $0, 1, 2, 3, 4, \dots$ τοὺς παριστάνομεν μὲ τὰ σημεῖα Ο, Α, Β, Γ, ...

άντιστοίχως. Διὰ τοῦτο τὰ σημεῖα Α, Β, Γ... δύνομάζονται εἰκόνες τῶν ἄριθμῶν αὐτῶν. Ἡ ήμιευθεῖα Οχ λέγεται ἡ μιευθεῖα διατάξεως τοῦ συνόλου τῶν ἀκέραιων.

15.3. Συγκεκριμένοι, ἀφηρημένοι, γενικοὶ ἀριθμοὶ

α) Ἀρχικῶς ὁ ἀνθρωπος ἔκανε χρῆσιν μόνον συγκεκριμένων ἀριθμῶν. Π. χ. 1 δένδρον, 2 ζῶα, 3 παιδιά...

Ἡ παρατήρησις δύμως ὅτι

$$2 \text{ δένδρα} + 3 \text{ δένδρα} = 5 \text{ δένδρα}$$

$$2 \text{ παιδιά} + 3 \text{ παιδιά} = 5 \text{ παιδιά}$$

$$2 \text{ ζῶα} + 3 \text{ ζῶα} = 5 \text{ ζῶα}$$

δηλαδὴ ὅτι τὸ πλῆθος τῶν μονάδων τοῦ ἀθροίσματος δὲν ἔχει παραταται ἀπό τὴν ὑλικὴν φύσιν ἐκάστου προσθετέου ἀλλὰ μόνον ἀπό τὸ πλῆθος τῶν μονάδων αὐτοῦ. πιθανῶς ὡδήγησεν εἰς τὴν ἴδεαν τῶν ἀφηρημένων ἀριθμῶν.

β) Καθώς εἶδομεν, διὰ νὰ συμβολίσωμεν τὸ σύνολον τῶν μονοψήφων φυσικῶν ἀριθμῶν, γράφομεν

$$\{ \chi | \chi \text{ μονοψήφιος φυσικός ἀριθμός } \}$$

Εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν τὸ χ χρησιμοποιεῖται διὰ νὰ παραστήσῃ ἕνα ὥρισμένον μὲν ἀλλὰ ὅποιονδήποτε ἐκ τῶν ἀριθμῶν 1,2,3...9.

Γνωρίζομεν ὅτι διὰ νὰ εὔρωμεν τὸ ἐμβαδὸν ἐνὸς ὀρθογωνίου πολλαπλασιάζομεν τὸ μῆκος ἐπὶ τὸ πλάτος αὐτοῦ. Ὁ ίδιος κανὸν ἀποδίδεται συντόμως ὑπὸ τοῦ γνωστοῦ τύπου.

$$E = \alpha \cdot \beta$$

ὅπου τὰ γράμματα α καὶ β παριστάνουν τὸ μῆκος καὶ τὸ πλάτος ὀρθογωνίου. Ἡτοι καὶ εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν χρησιμοποιοῦμεν γράμματα διὰ νὰ παραστήσωμεν ὥρισμένους μὲν ἀλλὰ ὅποιουσδήποτε ἀριθμούς. Ὑπὸ τὴν ἔννοιαν αὐτὴν λέγομεν ὅτι τὰ γράμματα α καὶ β παριστάνουν γενικούς ἀριθμούς:

ΑΣΚΗΣΙΣ

33. Τὸ σύνολον $A = \{ \chi | \chi \text{ μήν τοῦ έτους} \}$, μὲ ποιὸν ἐκ τῶν συνόλων N_1, N_2, N_3, \dots είναι ισοδύναμον; Ποιος δὲ πληθ. ἀριθμός αὐτοῦ;

34. Ἀναφέρατε παραδείγματα πεπερασμένων καὶ μὴ πεπερασμένων συνόλων.

35. Νὰ εὔρεθοιν γνήσια ὑποσύνολα τοῦ N_n τὰ δημοσιεύονται ισοδύναμα μὲν αὐτό.

16. ΤΟ ΔΕΚΑΔΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΙΘΜΗΣΩΣ

16.1 Ἀριθμησις

Καθώς εἶδομεν, οἱ ἀκέραιοι ἀποτελοῦν μίαν σειρὰν ἀριθμῶν χωρὶς τέλος. Είναι δηλαδὴ ἀπειροί εἰς πλῆθος. Ἐὰν δι' ἐκαστον ἀκέραιον εἴχομεν διαφορετικὸν

δόνομα, ἄσχετον μὲ τὰ δύνοματα τῶν ἄλλων, θὰ ἔχρειαζόμεθα ἀπείρους λέξεις ἡ καὶ ἀπειρα σύμβολα διά νὰ δύνομάσωμεν καὶ νὰ γράψωμεν αὐτούς. Ἐκτὸς τούτου θὰ ἥτο ἀδύνατος ἡ ἀπομνημόνευσις καὶ χρησιμοποίησις τῶν ἀριθμῶν.

Προέκυψεν οὕτω τὸ ἔξῆς πρόβλημα.

Πᾶς εἶναι δυνατὸν μὲ συνδυασμὸν δλίγων λέξεων καὶ συμβόλων νὰ δύνομάζωμεν καὶ νὰ γράψωμεν δλους τοὺς ἀκεραίους.

Τὴν ἀπάντησιν εἰς τὸ πρόβλημα αὐτὸ τὴν δίδει ἡ ἀριθμησίς (προφορική καὶ γραπτή).

16.2 Προφορική ὀρθομησίς

Ἡ ἀπαρίθμησις τῶν στοιχείων ἐνὸς συνόλου μᾶς δίδει ἔνα ἀριθμόν. Θὰ ἴδωμεν κατωτέρω μὲ ποιὸν τρόπον δυνάμεθα νὰ δύνομάσωμεν τὸν ἀριθμὸν αὐτὸν εἰς τὸ δεκαδικὸν σύστημα.

"Ἄς λάβωμεν ἔν σύνολον βώλων :

α) Ἐάν οἱ βῶλοι εἶναι δλιγώτεροι τῶν δέκα, χρησιμοποιοῦμεν ἔν ἐκ τῶν ἔννέα δύνομάτων τῶν ἀριθμῶν, ἔν, δύο, τρία, τέσσαρα, πέντε, ἔξ, ἑπτά, ὀκτώ, ἐννέα.

β) Ἐάν οἱ βῶλοι εἶναι περισσότεροι ἀπὸ δέκα, σχηματίζομεν ἐκ τούτων δοσις δεκάδας βώλων είναι δυνατόν.

Οὕτω ὁ ἀριθμὸς τῶν βώλων θὰ ἀποτελεῖται ἀπὸ δεκάδας καὶ πιθανῶς ἀπὸ μονάδας, π.χ. 3 μονάδας. Ἐκάστη δεκάς λέγεται μονάς 2ας τάξεως, ἐνῶ ἐκάστη μονάς λέγεται & πλὴ μονάς 1ης τάξεως.

γ) Ἐάν τὰ ὑποσύνολα τῶν δεκάδων τὰ ὅποια εύρομεν είναι περισσότερα τῶν δέκα, ἔνώνομεν αὐτὰ ἀνὰ δέκα καὶ οὕτω δημιουργεῖται μία νέα μονάς ἡ ἐκατοντάς ἢ μονάς 3ης τάξεως. Αἱ δεκάδες τῶν βώλων αἱ ὅποιαι πιθανῶς θὰ μείνουν θὰ είναι δλιγώτεραι τῶν δέκα, π.χ. 5. Κατ' αὐτὸν τὸν τρόπον συνεχίζομεν μέχρις ὅτου αἱ μονάδες ἐκάστης τάξεως αἱ ὅποιαι θὰ σχηματισθοῦν είναι δλιγώτεραι τῶν δέκα. Οὕτω, ἐάν εύρωμεν π.χ. 7 ἐκατοντάδας, λέγομεν :

7 ἐκατοντάδες, 5 δεκάδες, 3 μονάδες

"Ἐκ τῶν ἀνωτέρω ἔννοοῦμεν ὅτι εἰς τὸ δεκαδικὸν συστήμα ἀριθμήσεως :

i) Δέκα μονάδες μιᾶς τάξεως σχηματίζουν μίαν μονάδα τῆς ἀμέσως ἀνωτέρας τάξεως.

ii) "Ἐκαστος ἀριθμὸς ἀποτελεῖται ἀπὸ μονάδας διαφόρων τάξεων.

"Ἐάν ὑπάρχουν πολλαὶ τάξεις, τὰς χωρίζομεν διαδοχικῶς, ἀνὰ τρεῖς, εἰς κλάσεις, ὅπως φαίνεται εἰς τὸν κατωτέρω πίνακα,

(πίνακας)

Τάξις		Όνόματα τάξεων	Γραφή με ψηφία	Κλάσεις
1η		‘Απλή μονάς	1	
2α		Δεκάς	10	1η κλάσις (μονάδων)
3η		‘Εκατοντάς	100	
4η		Χιλιάς	1000	
5η		Δεκάς χιλιάδων	10000	2α κλάσις (χιλιάδων)
6η		‘Εκατοντάς χιλιάδων	100000	
7η		‘Εκατομύριον	1000000	
8η		.Δεκάς έκατομμυρίων	10000000	3η κλάσις
9η		‘Εκατοντάς έκατομμυρίων	100000000	(έκατομμυρίων)

Βάσις ενός συστήματος άριθμήσεως είναι ο άριθμός των μονάδων τάς διποίας πρέπει νὰ λάβωμεν διά νὰ δημιουργήσωμεν μίαν μονάδα τῆς άμεσως άνωτέρας τάξεως. Η βάσις ενός συστήματος δύναται νὰ είναι δέκα, οπως είς τὰ άνωτέρω, 5 (πενταδικὸν σύστημα), 12 (δωδεκαδικὸν σύστημα) κ.ο.κ.

16.3. Γραπτή άριθμησις

Διὰ νὰ γράψωμεν ἕνα άριθμὸν εἰς τὸ δεκαδικὸν σύστημα ἀπαιτοῦνται ἐν δλῷ δέκα διαφορετικὰ σύμβολα. Μὲ τὰ ἀραβικὰ ψηφία

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

γράφομεν τοὺς άριθμοὺς ἀκολουθοῦντες τὰς ἔξις συμφωνίας.

α) Ἐκαστος ἀκέραιος γράφεται μὲ ἐν ἡ περισσότερα ψηφία τὰ διποία τίθενται τὸ ἐν παραπλεύρως τοῦ ἄλλου. Ἐκαστον ψηφίον ἀναλόγως τῆς θέσεως του παριστάνει μονάδας μιᾶς τάξεως. Τὸ πρῶτον ψηφίον δεξιὰ παριστάνει μονάδας 1ης τάξεως (ἀπλᾶς μονάδας) ἔκαστον δὲ ψηφίον, τὸ διποίον γράφεται ἀμέσως ἀριστερὰ ἄλλου ψηφίου, παριστάνει μονάδας τῆς άμεσως άνωτέρας τάξεως.

β) Ὄταν δὲν ὑπάρχουν μονάδες μιᾶς τάξεως, τοποθετοῦμεν εἰς τὴν θέσιν των τὸ μηδέν.

Π.χ. διὰ τὸ σύνολον τῶν βώλων τοῦ παραδείγματος ἀντὶ 7 ἔκατοντάδες, 5 δεκάδες,, 3 μονάδες γράφομεν 753.

17. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

Οι ἀρχαῖοι Ἐλληνες ἔχρησιμοποίουν τὸ δεκαδικὸν σύστημα ἀριθμήσεως ἀλλ’ ἀντὶ τῶν ἀραβικῶν συμβόλων μετεχειρίζοντο τὰ γράμματα τῆς ἀλφαβήτου καὶ τὰ σύμβολα 5 (στίγμα), 4 (κότιγπα) καὶ ȝ (σαμπτί).

Ούτω διὰ τὰς ἀπλᾶς μονάδας	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
είχον τὰ σύμβολα	α' β' γ' δ' ε' Σ, ζ' η' θ' ἀντιστοίχως
διὰ τὰς δεκάδας	10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90
τὰ σύμβολα	ι', κ', λ', μ', ν', ξ', ο', π', ι'
διὰ τὰς ἑκατοντάδας	100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900
τὰ σύμβολα	ρ', σ', τ', υ', φ', χ', ψ', ω', Χ'

Διὰ τὰς χιλιάδας μετεχειρίζοντο τὰ ἔδια γράμματα ἀλλὰ μὲ τόνον ἀριστερά καὶ κάτω.

Π. χ. ἀντὶ τῶν	1000	2000	3000
είχον τὰ σύμβολα	, α,	, β,	, γ

Ἡ γραφὴ τῶν ὅλων ἀκεραίων γίνεται μὲ τὴν συμφωνίαν :

«Ο ἀριθμὸς δ ὁ ποιῶς σχηματίζεται, ὅταν γράψωμεν γράμματα εἰς τὴν σειράν, παριστάνει τὸ ἄθροισμα τῶν μονάδων ὅλων τῶν ψηφίων».

Π. χ.	ια'	σημαίνει	10 + 1 = 11
	ξη'	σημαίνει	60 + 8 = 68

Ο ἀριθμὸς 1821 γράφεται ,αωκα'

18. Η ΡΩΜΑΪΚΗ ΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

Οἱ Ρωμαῖοι ἔχρησιμοποιούν ἐπίσης τὸ δεκαδικὸν σύστημα ἀριθμήσεως καὶ ἔγραφον τοὺς ἀριθμοὺς χρησιμοποιοῦντες ὡς ψηφία τὰ γράμματα

I, V, X, L, C, D, M

ἀντὶ τῶν 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000 ἀντιστοίχως

Διὰ τὴν γραφὴν τῶν ὅλων ἀριθμῶν είχον τοὺς ἔξης κανόνας.

α) Ὄμοια γράμματα, ὅταν γραφοῦν τὸ ἐν παραπλεύρως τοῦ ἀλλου, προστίθενται

Π.χ. XX = 10 + 10 = 20

CCC = 100 + 100 + 100 = 300

β) "Οταν ἐν γράμμα γράφεται ἀριστερά μεγαλυτέρου του ἀφαιρεῖται ἀπὸ αὐτό, ἀντιθέτως ὅταν γράφεται δεξιά μεγαλυτέρου του, προστίθεται.

Π.χ. IV = 4 XI = 40 XC = 90

VI = 6 LX = 60 CCXVI = 216

γ) Έκαστον ψηφίον τοποθετημένον μεταξύ δύο δλλων μεγαλυτέρων του. Άφαιρείται άπό έκεινο τό δύο ποιόν εύρισκεται δεξιά του και ή διαφορά προστίθεται εἰς τό διάστερόν ψηφίον

$$\text{Π.χ. } \text{XIV} = 10 + (5 - 1) = 14.$$

δ) Όταν έν γράμμα έχει μίαν δριζοντίαν γραμμήν έπάνω παριστάνει χιλιάδας, δύο γραμμάδις έκατομμύρια κ.ο.κ.

$$\overline{\text{V}} = 5.000 \quad \overline{\text{XIX}} = 19.000.000$$

Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ

36. α) Πόσας μονάδας, δεκάδας, έκατοντάδας έχει έκαστος τῶν δριθμῶν 200, 8.000, 32.000, 1.000.000; β) Πόσους διψηφίους, τριψηφίους δριθμούς δύνασθε νά γράψετε μέ ψηφίον μονάδος 3;

37. Νά εμπρέτε ένα διψηφίου δριθμὸν τοιοῦτον ώστε. έάν παρεμβάλωμεν τό 0 μεταξύ τῶν ψηφίων του, νά αύξηθῇ κατά 4 έκατοντάδας και νά έλαττωθῇ κατά 4 δεκάδας.

38. Γράψατε δισφόρους διψηφίους δριθμούς και έπειτα έναλλάξστε εἰς έκαστον τούτων τό ψηφίον τῶν μονάδων μέ τό ψηφίον τῶν δεκάδων. Τί παρατηρεῖτε διά τὴν μεταβολὴν τῶν δριθμῶν τούτων;

39) Νά γράψετε μέ δραστικά ψηφία τοὺς δριθμούς κγ' ρογ', αωκα' XC, CLX, MCX, MXV

19. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟΝ ΤΩΝ ΑΚΕΡΑΙΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

19.1 "Ισοι καὶ ἀνισοι ἀριθμοί

"Όταν εἰσέλθωμεν εἰς έν λεωφορεῖον καὶ παραστηρήσωμεν τὰ δύο σύνολα, «ἐπιβάται» καὶ «καθίσματα» αὐτοῦ, εἰναι δυνατόν νά διαπιστώσωμεν δτι:

I. Οι ἐπιβάται εἰναι δσοι καὶ τὰ καθίσματα. "Ητοι τὸ πεπερασμένον σύνολον «ἐπιβάται» εἰναι ισοδύναμον μέ τὸ πεπερασμένον σύνολον «καθίσματα».

II. Έκαστος ἐπιβάτης κατέχει έν κάθισμα καὶ μένουν κενά καθίσματα.

III. 'Υπάρχει αις έκαστον κάθισμα ἐς ἐπιβάτης καὶ ἐπὶ πλέον δρθοι ἐπιβάται.

"Έάν παραστήσωμεν μέ α τὸν πληθικὸν δριθμὸν τοῦ συνόλου «ἐπιβάται» καὶ μέ β τὸν πληθικὸν δριθμὸν τοῦ συνόλου «καθίσματα», τότε:

Εἰς τὴν 1ην περίπτωσιν λέγομεν δτι οἱ δριθμοὶ α καὶ β εἰναι ἵσοι μεταξύ τῶν καὶ γράφομεν

$$\alpha = \beta$$

Εἰς τὴν 2αν περίπτωσιν λέγομεν δτι δ δριθμὸς α εἰναι μικρότερος τοῦ β καὶ γράφομεν

$$\alpha < \beta$$

Εἰς τὴν 3ην περίπτωσιν λέγομεν δτι δ δριθμὸς α εἰναι μεγαλύτερος τοῦ β καὶ γράφομεν

$$\alpha > \beta$$

Εἰς τὰς δύο τελευταίας περίπτωσεis οἱ δριθμοὶ εἰναι μεταξύ των ἄνισοι.

Είναι φανερόν δτι, έάν δοθούν οι άριθμοί α και β, μία και μόνον μία όπό τας τρεῖς άνωτέρω σχέσεις θὰ ισχύη.

Γενικῶς: α) Δύο άριθμοί α, β λέγονται ίσοι, όταν είναι πληθυκοί άριθμοί ισοδυνάμων πεπερασμένων συνόλων.

β) Είς άκέραιος α λέγεται μεγαλύτερος άλλου άκεραιου β, έάν δ α είναι πληθυκός άριθμός ένδει πεπερασμένου συνόλου Α και δ β ένδει γνησίου ίσου ίσος συνόλου Β αύτού.

Έάν δ α είναι μεγαλύτερος τού β τότε λέγομεν δτι και δ β είναι μικρότερος τού α.

Η σχέσις $\alpha = \beta$, διά της δποίας δηλώνομεν δτι δ άκέραιος α είναι ίσος με τὸν β, λέγεται ίσο της. Τὰ έκατέρωθεν τοῦ συμβόλου = της ίσότητος γραφόμενα λέγονται μέλη της ίσότητος· τὸ μὲν πρὸς τὰ άριστερὰ λέγεται πρῶτον μέλος τὸ δὲ πρὸς τὰ δεξιά δεύτερον μέλος αὐτῆς.

Αἱ σχέσεις $\alpha < \beta$, καὶ $\alpha > \beta$ λέγονται ἀνισότητες μὲ πρῶτον μέλος πρὸς τὰ άριστερὰ καὶ δεύτερον μέλος πρὸς τὰ δεξιά τῶν συμβόλων άνισότητος ($<$) ($>$).

Σημειώνομεν δτι αἱ σχέσεις $\alpha < \beta$ καὶ $\beta > \alpha$ αἱ έχουν τὴν αὐτὴν σημασίαν.

19.2. Ιδιότητες ίσότητος

Είναι φανερόν δτι:

1. Έκαστος άκέραιος α είναι ίσος με τὸν έαυτόν του.
 $\alpha = \alpha$ Ανακλαστική ίδιότητα.

2. Έάν δ άκέραιος α είναι ίσος με τὸν άκέραιον β, τότε και δ άκέραιος β είναι ίσος με τὸν α.
 $\alpha = \beta \Rightarrow \beta = \alpha$ Συμμετρική ίδιότητα.

3. Έάν μεταξὺ τῶν άκεραιών, α, β, γ είναι:
 $\alpha = \beta$ καὶ $\beta = \gamma$, τότε θὰ είναι και $\alpha = \gamma$
"Η συμβολικῶς $\alpha = \beta$
 $\beta = \gamma$ } $\Rightarrow \alpha = \gamma$ Μεταβατική ίδιότητα

Η συμμετρική ίδιότης μᾶς έπιτρέπει νὰ έναλλάσσωμεν τὸ ίον μέλος μιᾶς ίσότητος με τὸ 2ον, ή μεταβατική μᾶς έπιτρέπει έμμεσους συγκρίσεις.

Αἱ άνωτέρω τρεῖς ίδιότητες τῆς ίσότητος άκεραιών είναι συνέπειαι τῶν ίδιοτήτων τῶν ισοδυνάμων συνόλων.

19.3. Ιδιότητες άνισότητος
Η σχέσις $5 > 5$ δὲν είναι άληθής.
Ομοίως δὲν είναι άληθες δτι

$5 > 3 \Rightarrow 3 > 5$

Γενικῶς: Εἰς τὴν άνισότητα άκεραιών δὲν ισχύει ή άνακλαστική

καὶ ἡ συμμετρικὴ ἴδιοτηταὶ σχύει ὅμως ἡμεταβατική·

Πράγματι: Εάν $\alpha > 4$ και $\beta > 4$ θα είναι και $\alpha + \beta$ (επειδή)

Γενικῶς ἔτιν α, β, γ, ἀκέραιοι, τότε

(b) Είναι σημαντικό να δείξουμε ότι αυτή η προσέγγιση είναι σωστή. Από την προηγούμενη στοά έχουμε παρατηρήσει ότι $\alpha > \beta$ και $\beta > \gamma$. Στη συνέχεια θα δείξουμε ότι $\alpha > \gamma$.

AMERICAN

α) $\alpha = \delta$ ἀριθμός τῶν δραχμῶν καὶ $\beta = \delta$ ἀριθμός τῶν δισδράχμων εἰς ἓν εἰκοσάδραχμον.
 β) $\alpha = \text{πληθ. } \delta\text{ριθμός τοῦ συνόλου } A = \{ x | \chi \text{ ψηφίον τοῦ } \delta\text{ριθμοῦ } 35 \}, \beta = \text{πληθ. } \delta\text{ριθμός τοῦ συνόλου } B = \{ x | \chi \text{ ψηφίον τοῦ } \delta\text{ριθμοῦ } 15673 \}.$

41. Εάν α, β, γ είναι τὰ βάρη τριών κιβωτίων Α, Β, Γ ἀντιστοιχώς πόσας τὸ διγιώτερον μετρήσεις χρειάζεσθε; διὰ νὰ συγκρίνετε τὰ βάρη αὐτά;

20. ΤΟ ΣΥΝΟΛΟΝ ΤΩΝ ΑΚΕΡΑΙΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΩΣ ΔΙΑΤΕΤΑΓΜΕΝΟΝ ΣΥΝΟΔΟΝ

20.1. Διάταξις

Εις ἐν λεγικὸν δυνάμεθα νὰ εύρωμεν εὐκόλως ὅποιανδήποτε λέξιν θελήσωμεν, διότι αἱ λέξεις εἰναι τοποθετημέναι κατ' ἀλφαβητικὴν σειράν.

"Οταν ή τοποθέτησις ἀντικειμένων γίνεται ἐπὶ τῇ βάσει κάποιου κανόνου, τότε λέγομεν διτί τὰ ἀντικείμενα αὐτὰ εἰναι διατεταγμένα.

Οι μαθηταί κατά τὴν ὥραν τῆς γυμναστικῆς εἶναι διατεταγμένοι κατ' ἀνάστημα.

20.2. Εις τὰ προηγούμενα ἔθεωρήσαμεν τὰ σύνολα ἀνεξαρτήτως τῆς διατάξεως τῶν στοιχείων των, $\{1, 2, \} = \{2, 1\}$.

Κατωτέρω θά έξετάσωμεν τό σύνολον N_0 ως διατεταγμένον σύνολον. Τὰ στοιχεῖα τοῦ συνόλου $N_0 = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ ως ἐκ τοῦ τρόπου τῆς κατασκευῆς των πάρουσιάζονται εἰς διάταξιν αὐξόντος με γέθους.

Συγκεκριμένως :

1) "Υπάρχει εἰς τὸ σύνολον N_0 ἐν πρῶτον στοιχεῖον, τὸ μηδέν, τὸ δποιον εἶναι τὸ ἔλαχιστον στοιχεῖον καὶ δὲν ὑπάρχει τελευταῖον (μέγιστον).

ii) "Εκαστον στοιχείον αὐτοῦ, ἐκτὸς τοῦ πρώτου, ἔχει ἀριστερά του ἐν ὀρισμένον προγόνοιν στοιχείον τὸ δποῖον εἶναι μικρότερον αὐτοῦ καὶ δεξιά του ἐν ὀρισμένον ἐπόμενον τὸ δποῖον εἶναι καὶ μεγαλύτερόν του. Π.χ. τὸ στοιχείον 5 ἔχει προηγούμενον τὸ 4 καὶ ἐπόμενον τὸ 6 καὶ εἶναι 4<5<6.

Τὸ αὐτὸ σύνολον N_0 δυνάμεθα νὰ τὸ διατάξωμεν καὶ κατὰ τάξιν φθὲν ο ν-
τος (έλαττουμένου) μεγέθους :

$$\mathbb{N}_0 = \{\dots, 3, 2, 1,$$

Εἰς τὴν διάταξιν αὐτήν :

1) "Υπάρχει ἐν τελευταῖον στοιχείον τὸ δόγματον εἶναι καὶ τὸ μικρότερον καὶ δὲν ὑπάρχει πρῶτον στοιχείον (μέγιστον).

ii) "Εκαστον στοιχείον αύτου, έκτος τοῦ τελευταίου, ἔχει ἀριστερὰ ἐν ὥρι-
σμένον προηγούμενον τὸ ὅποιον εἶναι καὶ μεγαλύτερον του καὶ δεξιά ἐν ὥρι-
σμένον ἐπόμενον μικρότερόν του. Π. χ. τὸ στοιχεῖον 5 ἔχει προηγούμενον τὸ
6, ἐπόμενον τὸ 4 καὶ εἶναι 6 > 5 > 4.

20.3. Είναι φανερόν δτι έκαστον πεπερασμένον ύποσύνολον του N_0 δυνάμεθα να το διατάξωμεν κατά τάξιν αρχοντος ή φθίνοντος μεγέθους. Π.χ. οι λάβωμεν το σύνολον $\{2, 5, 6, 4\}$. Τούτο γράφεται κατά τάξιν αρχοντος μεγέθους ως έξι:

{ 2, 4, 5, 6 }

Τοιουτοτρόπως διατεταγμένον τὸ σύνολον αὐτὸ ἔχει : "Ἐν πρῶτον στοιχεῖον, τὸ 2, τὸ δρόποιον εἶναι καὶ τὸ μικρότερον στοιχεῖον τοῦ συνόλου, ἐν τελευταῖον στοιχεῖον, τὸ 6, τὸ δρόποιον εἶναι καὶ τὸ μεγαλύτερον. Τὸ αὐτὸ σύνολον δυνάμεθα νὰ τὸ διατάξωμεν κατὰ τάξιν φθίνοντος μεγέθους :

{ 6, 5, 4, 2 }

γ Καὶ εἰς τὴν διάταξιν αὐτὴν διακρίνομεν ἐν πρῶτον στοιχείου, τὸ δποῖον ὅμως εἶναι μεγαλύτερον ὀλων τῶν ἄλλων καὶ ἐν τελευταῖσιν στοιχείου τὸ μικρότερον ὀλων.

42. Νά διατάξετε κατά τάξιν αύξοντος μεγέθους τὰ στοιχεῖα τοῦ συνόλου $A = \{3, 8, 12, 5, 18\}$

43. Τὰ στοιχεῖα τοῦ σύνόλου $A = \{x | x \text{ περιττός ἀκέραιος}\}$ νά διαταχθοῦν κατά τάξιν αύξοντος μεγέθους, τὰ δὲ στοιχεῖα τοῦ συνόλου $B = \{x | x \text{ ἀρτίος ἀκέραιος}\}$ κατά τάξιν φθίνοντος μεγέθους.

44. Οι αριθμοί 41532 και 12345 έχουν τό σύντο πλήθος ψηφίων. Ποιον έξ αυτών δύνασθε νά διπλασιασθεί επειδή είναι εύκολώτερον και διατί;

Nº 81 - guitarrista

Οι φίλοι μας στην Ελλάδα αποδέχονται την πρόταση της Κυβερνήσεως για την απόσπαση της Αιγαίου.

N₀ » » » άκεραίων της Ἀριθμητικῆς > Τὸ... εἶναι μεγαλύτερον τοῦ...

{ Τὸ... εἶναι μικρότερον τοῦ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.

ΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟΝ ΤΩΝ ΑΚΕΡΑΙΩΝ

21. Η ΠΡΑΞΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΩΣ

21.1. Ὁρισμός

Τὰ σύνολα $A = \{+, -, X\}$ καὶ $B = \{\alpha, \beta, \gamma, \delta\}$ είναι ξένα μεταξύ των καὶ έχουν πληθικούς ἀριθμούς 3 καὶ 4 ἀντιστοίχως. Ὁ πληθικός ἀριθμός τῆς ένωσεως $A \cup B = \{+, -, X, \alpha, \beta, \gamma, \delta\}$, δηλαδὴ τὸ 7, δονομάζεται ἀθροισματῶν ἀκεραίων 3 καὶ 4.

Γενικῶς : Έάν A, B είναι δύο πεπερασμένα σύνολα ξένη μεταξύ των μὲ πληθικοὺς ἀριθμοὺς α, β ἀντιστοίχως, τότε ὁ πληθικὸς ἀριθμὸς γ τῆς ἐνώσεως $A \cup B$ λέγεται ἄθροισμα τῶν ἀριθμῶν α καὶ β .

Γράφομεν δὲ $\alpha + \beta = \gamma$

"**Ητοι** : Πληθ. ἀριθμός τοῦ A + Πληθ. ἀριθμός τοῦ B = Πληθ. ἀριθ. τοῦ A ∪ B

‘Η πρᾶξις διὰ τῆς δποίας εἰς τὸ ζεῦγος (α, β) ἀντιστοιχίζομεν τὸ ἔθροισμα $\alpha + \beta$, λέγεται πρόσθετις * τῶν ἀριθμῶν α καὶ β .

$$(\alpha, \beta) \longrightarrow \alpha + \beta$$


Οι ἀριθμοὶ α καὶ β λέγονται δροὶ τῆς προσθέσεως ή προσθέτεοι.

“Η πρᾶξις τῆς προσθέσεως ἀναφέρεται πάντοτε εἰς δύο ἀκέραιους. Διὰ τοῦτο λέγεται διμελής πρᾶξις.

21.2. Γεωμετρική έρμηνεία της προσθέσεως

Χαράσσομεν τὴν ἡμιευθείαν διατάξεως τῶν ἀκεραίων ἀριθμῶν.

* Δέν πρέπει νά συγχέωμεν την «πρόσθεσιν» με το «άθροισμα». Η πρόσθεσις είναι πρᾶξις ένω το άθροισμα το αποτέλεσμα της πράξεως (ἀριθμός).



Σχ. 12.

1) Τὸ εὐθ. τμῆμα OA , σχ. 12, ἀποτελεῖται ἀπὸ τρία ἵσα διαστήματα καὶ παριστάνει τὸν ἀκέραιον 3. Τὸ διαδοχικὸν πρὸς αὐτὸν εὐθ. τμῆμα AB ἀποτελεῖται ἀπὸ δύο ἵσα διαστήματα καὶ παριστάνει τὸν ἀκέραιον 2. Τὸ εὐθ. τμῆμα $OB = OA + AB$ παριστάνει τὸ ἀθροισμα 3 + 2

ii) Ἡ πρόσθεσις τοῦ 2 εἰς τὸ 3 δυνατὸν νὰ ἐρμηνευθῇ καὶ ως μετατόπισης τοῦ σημείου A , εἰκόνος τοῦ 3, πρὸς τὰ δεξιά κατὰ 2 διαστήματα.

22. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΣΕΩΣ

22.1. "Υπαρξίες ἀθροίσματος, μονότιμον

"Ἄσ ἑκτελέσωμεν μερικάς προσθέσεις μὲ στοιχεῖα τοῦ συνόλου

$$A = \{1, 2, 3, 4\}$$

Π.χ. τὰς προσθέσεις: $1 + 2 = 3$, $1 + 3 = 4$, $2 + 3 = 5$.

Παρατηροῦμεν δτι τὰ δύο πρῶτα ἀθροίσματα $1 + 2 = 3$, $1 + 3 = 4$ εἰναι στοιχεῖα τοῦ ἴδιου συνόλου, ἐνῷ τὸ τρίτον ἀθροισμα $2 + 3 = 5$ δὲν εἰναι. Τὸ τελευταῖον τοῦτο δὲν παρουσιάζεται εἰς τὸ σύνολον N_0 .

Πράγματι ἀπὸ τὴν πείραν σας γνωρίζετε δτι: ἐὰν δοθοῦν δύο τυχόντες ἀκέραιοι α, β ὡς πάρχει εἰς καὶ μόνον εἰς ἀκέραιος, δ ὅποιος είναι τὸ ἀθροισμα αὐτῶν.

Διὰ τοῦτο λέγομεν δτι ἡ πρᾶξις τῆς προσθέσεως εἰς τὸ σύνολον N_0 εἰναι πάντοτε δυνατὴ καὶ μονότιμος.

22.2. Μεταθετικὴ

α) Παρατηροῦμεν δτι $2 + 3 = 3 + 2$, $3 + 4 = 4 + 3$, $5 + 6 = 6 + 5 \dots$

β) "Ἄσ εἰναι A, B δύο σύνολα ἔνεα μεταξύ των καὶ α, β οἱ πληθικοὶ ἀριθμοὶ αὐτῶν ἀντιστοίχως.

'Ἐκ τοῦ δρισμοῦ τοῦ ἀθροίσματος δ πληθικὸς ἀριθμὸς τῆς ἐνώσεως $A \cup B$ εἰναι $\alpha + \beta$ καὶ τῆς ἐνώσεως $B \cup A$ εἰναι $\beta + \alpha$.

'Αλλά

$$A \cup B = B \cup A$$

(Διατί;)

"Ἄρα

$$\alpha + \beta = \beta + \alpha.$$

"Ήτοι, ἡ ἀλλαγὴ τῆς τάξεως τῶν προσθετέων δὲν μεταβάλλει τὸ ἀθροισμα αὐτῶν.

Διὰ τοῦτο λέγομεν ὅτι ἡ πρόσθεσις τῶν ἀκεραίων εἶναι πρᾶξις μετατεχνή.

22.3. Προσεταιριστική

"Ἄσ λάβωμεν κατὰ σειρὰν τοὺς ἀκεραίους 2, 3, 7 καὶ ἃς προσπαθήσωμεν νὰ προσθέσωμεν αὐτοὺς συγχρόνως. Παρατηροῦμεν ὅτι τοῦτο δὲν ἔχει ἔννοιαν. Ἡ πρόθεσις εἶναι πρᾶξις διμελῆς: ἥτοι δύο μόνον ἀκεραίους δυνάμεθα νὰ προσθέσωμεν συγχρόνως. Εἶναι δυνατὸν ὅμως νὰ προχωρήσωμεν μὲν δὲν ο προσθέσεις ὡς ἔξης:

$$2 + 3 = 5 \quad (1\text{η πρόσθεσις})$$

$$5 + 7 = 12 \quad (2\text{α πρόσθεσις})$$

"Ἡ συντόμως $(2 + 3) + 7 = 12 *$ (1)

Εἰς τὸ αὐτὸ διποτέλεσμα καταλήγομεν καὶ ἔχων ἐκτελέσωμεν κατὰ σειρὰν τὰς ἔξης προσθέσεις:

$$3 + 7 = 10 \quad (1\text{η πρόσθεσις})$$

$$2 + 10 = 12 \quad (2\text{α πρόσθεσις})$$

"Ἡ συντόμως $2 + (3 + 7) = 12$ (2)

*Ἐκ τῶν (1) καὶ (2) ἔχομεν:

$$(2 + 3) + 7 = 2 + (3 + 7)$$

Γενικῶς δι' ἑκάστην τριάδα ἀκεραίων α, β, γ ἔχομεν:

$$(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma)$$

Διὰ τοῦτο λέγομεν ὅτι ἡ πρόσθεσις ἀκεραίων εἶναι πρᾶξις προσεταιριστική.

Σημείωσις

"Ἡ ἀνωτέρω ἰδιότης προκύπτει ἐκ τῆς προσεταιριστικῆς ἰδιότητος τῆς ἔνωσεως συνόλων.

22.4. "Υπαρξίς οὐδετέρου στοιχείου

'Από τὰς ισότητας

$$2 + 0 = 2, \quad 0 + 2 = 2, \quad 3 + 0 = 3, \quad 0 + 3 = 3 \text{ οὐδὲ } ?A^*$$

καὶ γενικῶς $\alpha + 0 = \alpha, \quad 0 + \alpha = \alpha$ δῆπον $\alpha \in N_0$

συνάγομεν ὅτι εἰς τὸ σύνολον τῶν ἀκεραίων ὑπάρχει ἐν στοιχείον, τὸ μηδὲν τὸ δηποτὸν προστιθέμενον εἰς οίονδήποτε ἀκέραιον τὸν ἀφήνει ἀμετάβλητον. Διὰ τοῦτο λέγομεν ὅτι τὸ μηδὲν εἶναι οὐδέτερον στοιχείον τῆς προσθέσεως ἀκεραίων.

Χρησιμόδηλός εἰναι τὸ μηδέν, μέσον τοῦτον μηδὲ συνάθετον, μηδὲ μηδαλλός, μηδὲ τοιτόντος.

* Ἡ παρένθεσις δηλοῖ ὅτι πρέπει νὰ εὑρεθῇ πρῶτον τὸν ἀθροισμα $2 + 3$.

"Ἔτοι τὸ μηδέν εἶναι τὸ μοναδικὸν οὐδέτερον στοιχεῖον εἰς τὴν πρόσθεσιν ἀκέραιών.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

45. Συμπληρώσατε τὰς συνεπαγωγάς

$$\alpha + \beta = \beta \Rightarrow \alpha = \dots \text{ und } \alpha + \beta = \alpha \Rightarrow \beta = \dots$$

46. Εάν $\alpha, \beta \in N_0$ και $\alpha + \beta = 1$ ποιαί είναι αι δυναται τιμαι των α και β ;

47. Το δάθροισμα δύο ἀριθμῶν είναι 100. Πόσα ψηφία δύναται νά ἔχῃ ἑκαστος τῶν ἀριθμῶν τούτων; ("Εξετάστε διαφόρους περιπτώσεις")

23. ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΤΡΙΩΝ "Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΕΩΝ

23.1. Ὁρισμὸς

Εις ἐν καλάθιον ἔχομεν 2 μῆλα. Θέτομεν διαδοχικῶς εἰς αὐτὸ 3 μῆλα, 4 μῆλα καὶ 5 μῆλα. Πόσα μῆλα ἔχομεν τελικῶς εἰς τὸ καλάθιον; Τὸ ἀνωτέρω παράδειγμα μᾶς ὀδηγεῖ εἰς τὰς ἔξις κατὰ σειράν πράξεις μεταξύ τῶν ἀριθμῶν 2, 3, 4 καὶ 5

$$2 + 3 = 5$$

$$5 + 4 = 9$$

$$9 + 5 = 14$$

Ε πλέον ταῦτα πάρεις τὸν ἀριθμὸν τοῦτον κατελήξαμεν τοιουτοτρόπως, λέγεται ἡ θροισματικὴ τῶν ἀριθμῶν 2, 3, 4, 5 πέδη τῷ μὲν πτυχῇ στοιχῆρας ποιεῖται Η ἡ οὐδεὶς δύο οὐδεὶς

γράφομεν δὲ $2+3+4+5=14.$

$$H_{\text{TOI}}: \quad 2+3+4+5 = [(2+3)+4] + 5 = 14$$

"Οπου ή γραφή $(2+3)$ δηλώνει ἐν αριθμόν : Τὸ ἀθροισμα τῶν ἀριθμῶν 2 καὶ 3. Ὁμοίως ή γραφή $[(2+3) + 4]$ δηλώνει ἐν αριθμόν : Τὸ ἀθροισμα τῶν ἀριθμῶν $(2+3)$ καὶ 4.

Γενικῶς : "Αθροισμα τριῶν ή περισσοτέρων ἀκεραίων δοθέντων εἰς μίαν σειρὰν λέγεται ὁ ἀριθμός, ὁ δποῖος προκύπτει, δταν εἰς τὸν πρώτον ἔξ αὐτῶν προσθέσωμεν τὸν δεύτερον, εἰς τὸ εύρεθν ἀθροισμα τὸν τοίτον κ.ο.κ. μέγυρις δτου τελειώσουν δλοι οι ἀκέραιοι.

· Η συμβολικῶς : Ἐὰν $\alpha, \beta, \gamma, \delta \in N_0$:

$$\text{τότε} \quad (b) + \alpha + \beta + \gamma + \delta = [(\alpha + \beta) + \gamma] + \delta$$

23. 2. Ιδιότητες.

α) Έάν είσι τό καλάθιον θέσωμεν πρώτα τά 5 μῆλα, έπειτα τά 3 καὶ τελευταῖς τά 4 εἰναι φανερὸν δτι θά ἔχωμεν θέσει πάλιν τό αὐτό πλῆθος μῆλων. Άπο τήν παρατήρησιν αὐτήν ἐννοοῦμεν δτι ή σειρὰ μὲ τήν δποίαν λαμβάνομεν τούς προσθετέους, διὰ νὰ εὔρωμεν τό ἀθροισμά των, δὲν μεταβάλλει τό τελικὸν ὄθροισμα. Π.χ.

$$\alpha + \beta + \gamma + \delta = \alpha + \delta + \gamma + \beta = \alpha + \gamma + \beta + \delta = \dots, \quad \alpha, \beta, \gamma, \delta \in N.$$

Ήτοι : 'Η μεταθετικὴ ιδιότης ισχύει καὶ δταν οἱ προσθετέοι εἰναι τρεῖς η περισσότεροι.'

β) Εἰς τό παράδειγμά μας ἐλαττώνομεν τόν ἀριθμὸν τῶν ἔργασιῶν μας, χωρὶς νὰ μεταβληθῇ ὁ ἀριθμὸς τῶν μῆλων, τὰ δποία ἔχομεν εἰς τό καλάθιον, ἔτον θέσωμεν 7 μῆλα συγχρόνως ἀντὶ νὰ θέσωμεν 3 μῆλα τήν μίαν φορὰν καὶ 4 τήν ἔπομένην. Ή παρατήρησις αὗτη μᾶς δδηγεῖ νὰ γράψωμεν :

$$2 + 3 + 4 + 5 = 2 + (3 + 4) + 5$$

Ή αλλίας αύτοί εἰς κακοχρόσια παραγόνται $= 2 + 7 + 5$ ασφατωό ΑΤ γνωμάρικό ὃ εἰς κακοάετ παραγόνται α/βια ταύτη αλλικάς εἰς τόν αλλικάς καὶ γενικῶς υπόταμα $\alpha + \beta + \gamma + \delta = \alpha + (\beta + \gamma) + \delta$ α. β. γ. δ $\in N$.

Ήτοι : Τό ἀθροισμα δοθέντων ἀριθμῶν δὲν μεταβάλλεται, έάν ἀντικαταστήσωμεν δύο η περισσοτέρους τῶν προσθετέων μὲ τό ἀθροισμα αύτῶν.

γ) Προφανῶς θά ἔχωμεν εἰς τό καλάθιον τό αὐτό πλῆθος μῆλων, έάν ἀντιτῶν 5 μῆλων, τὰ δποία ἔθέσαμεν τήν τελευταίσαν φοράν, θέτομεν διαδοχικῶς 3 μῆλα καὶ 2 μῆλα. Ή παρατήρησις αὗτη μᾶς δδηγεῖ νὰ γράψωμεν :

$$2 + 3 + 4 + 5 = 2 + 3 + 4 + 3 + 2$$

καὶ γενικῶς $\alpha + \beta + (\gamma + \delta) = \alpha + \beta + \gamma + \delta \quad \alpha, \beta, \gamma, \delta, \in N.$

Ήτοι : Δυνάμεθα εἰς ἓν ἀθροισμα νὰ ἀντικαταστήσωμεν ἓνα προσθετέον μὲ δύο η περισσοτέρους ἀλλους, οἱ δποίοι νὰ ἔχουν αύτὸν ὡς ἀθροισμα.

Αι ἀνωτέρω ιδιότητες μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ συντομεύσωμεν τούς ὑπολογισμούς ἀθροισμάτων.

Παραδείγματα

$$1. 56 + 75 + 44 + 25 = (56 + 44) + (75 + 25) \\ = 100 + 100 = 200$$

$$2. 115 + 36 + 14 + 985 = 100 + 15 + 36 + 14 + 985 \\ = 100 + (15 + 985) + (36 + 14) \\ = 100 + 1000 + 50 = 1150$$

23.3. Παραθέτομεν κατωτέρω πίνακα τῶν ἀνωτέρω ιδιοτήτων τῆς προσθέσεως.

Έάν $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ είναι τυχόντες ἀκέραιοι τότε :

$$1. \alpha + \beta \in N_0$$

$$2. \alpha + \beta = \beta + \alpha$$

$$3. (\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma)$$

$$4. \alpha + 0 = 0 + \alpha = \alpha$$

$$5. \alpha + \beta + \gamma + \delta = \alpha + \gamma + \beta + \delta = \alpha + \delta + \gamma + \beta = \dots$$

$$6. \alpha + \beta + \gamma + \delta = \alpha + (\beta + \gamma) + \delta = \alpha + (\beta + \delta) + \gamma = \dots$$

$$7. \alpha + (\beta + \gamma) + \delta = \alpha + \beta + \gamma + \delta$$

παρατητούσται

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

23.3 φάση 3

$x + s + e = e + x$

48. Χρησιμοποιήσατε ιδιότητας τῆς προσθέσεως διά να υπολογισθῆ συντομώτερον τὸ δέθροισμα

$$\delta + x = (x + 1) 17 \dots (2 + 83) + 98 \quad \delta = 1 + \dots$$

49. Νά υπολογισθοῦν μέ τὸν συντομώτερον τρόπον τὰ δέθροισματα :

$$\alpha = (5 + 20 + 4) + (95 + 80 + 996)$$

$$\beta = 24 + (52 + 35) + (65 + 48) + 976$$

50. Χρησιμοποιήσατε τὴν μεταθετικὴν καὶ τὴν προσεταιριστικὴν ιδιότητα διά νὰ δικαιολογησετε δτι :

$$(\alpha + \beta) + \gamma = (\alpha + \gamma) + \beta$$

$$01 = 0 + y \quad 01 = x - x$$

23.4. Εξισώσεις, ταυτότητες

Ἄσ προσέξωμεν τὰς κατωτέρω Ισότητας :

$$3 + 4 = 7 \quad (1) \quad 5 + 3 = 9 \quad (2) \quad e - 5 + 9 = 14 \quad (3)$$

Ἄπο αὐτᾶς ἡ (1) καὶ ἡ (3) είναι ἀληθεῖς, ἐνῶ ἡ (2) είναι ψευδῆς.

Τὶ δυνάμεθα ὅμως νὰ εἴπωμεν διά τὰς κατωτέρω ἐγγραμμάτους Ισότητας ;

$$x + 3 = 5 \quad (4)$$

$$x + 3 = 3 + x \quad (5)$$

Είναι φανερὸν δτι ἡ (4) είναι ἀληθῆς μόνον διά τὴν τιμὴν $x = 2$, ἐνῶ ἡ (5) ἀληθεύει διά πᾶσαν ἀκεραίαν τιμὴν τοῦ x .

Π.χ. διά $x = 1$ ἔχομεν $1 + 3 = 3 + 1 \quad (4 - 4)$
» $x = 2$ » $2 + 3 = 3 + 2 \quad (5 - 5) \dots$

Ἡ Ισότης (5) ὡς καὶ πᾶσα ἐγγράμματος Ισότης ἡ δποιά ἀληθεύει διὰ πᾶσαν τιμὴν τοῦ γράμματος τὸ δποιὸν περιέχει λέγεται ταυτότης.

Η ισότης (4) ως και πᾶσα άλλη έγγραμματος ισότης ή δύο ίδια σημεία στην ίδια γραμμή αποτελούνται από την ίδια τιμή τους.

Η τιμή του χ διά την διάταξης ή διά την ίδια τιμή της ρίζας της έξισώσεως (4) διότι $2+3=5$.

Π.χ. δ άριθμός $\chi = 2$ είναι ρίζα της έξισώσεως (4) διότι $2+3=5$. Η έξισώση διά την εύρεσιν της ρίζης μιας έξισώσεως καλείται έπιλυσης της έξισώσεως.

Είναι δυνατόν μία έξισώσης να μη έχῃ λύσιν είς έναν ωρισμένον σύνολον. Π.χ. η έξισώσης $\chi + 4 = 3$ δεν έχει λύσιν είς το σύνολον N_0 . Πράγματι δεν υπάρχει άκεραιος, στοιχείον του συνόλου N_0 , δ οποίος προστιθέμενος είς το 4 δίδει άθροισμα 3 . Εις την περίπτωσιν αυτήν η έξισώσης λέγεται ότι δεν έχει λύση είς το σύνολον N_0 .

Παραδείγματα

Έξισώσεις

Ταυτότητες

$$x + 5 = 5$$

$$x + 5 = 3 + 2 + x$$

$$7 + x = 12$$

$$x + 2 = 2 + x$$

$$a + 1 = 9$$

$$5 + (1 + x) = x + 6$$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

51. Εάν x λαμβάνη τιμάς έκ του συνόλου $\{1, 2, 3, \dots, 10\}$, να εύρεθη ή ρίζα έκάστης των κατωτέρω έξισώσεων.

$$x + 7 = 12$$

$$4 + x = 10$$

$$x + 5 = 17$$

$$x + 0 = 10$$

Ποια έκ των άνωτέρω έξισώσεων δεν έχει λύσιν είς το θεωρούμενον σύνολον τιμών του x ;

52. Ποιαί έκ των κατωτέρω έγγραμμάτων ισοτήτων είναι έξισώσεις και ποιαί ταυτότητες;

$$x + 8 = 12$$

$$x + 7 = 7 + x$$

$$2 + (x + 1) = 3 + x$$

$$9 + x = 20$$

24. Η ΠΡΑΞΙΣ ΤΗΣ ΑΦΑΙΡΕΣΕΩΣ

24.1. Όρισμδς

Όταν δίδωμεν 100 δρχ. διά την πληρώσωμεν είς έναν κατάστημα όντικείμενας άξιας 53 δρχ., ή ταμίας διά την μάς δώση τά ύπολοιπα χρήματα (ρέστα) σκέπτεται νά εύρη πόσας δραχμάς πρέπει νά προσθέση είς τας 53 δρχ. διά νά γίνουν αύται 100 δρχ.

Ήτοι, έάν παραστήσωμεν μέ χ τὸν άριθμὸν τῶν δραχμῶν τὰς δύοις θά λάβωμεν πρέπει:

$$53 + x = 100$$

$$(1)$$

Ό άριθμός $\chi = 47$ ό όποιος πρέπει νά προστεθῇ εἰς τὸ 53 διὰ νά δώσῃ ἄθροισμα 100 λέγεται διαφορὰ τῶν ἀριθμῶν 100 καὶ 53
γράφομεν δέ $100 - 53 = \chi$ ($= 47$) (2)

Γενικῶς : * Εὰν $\alpha, \beta \in \mathbb{N}_0$ καὶ ὑπάρχῃ ἀκέραιος χ ό όποιος προστιθέμενος εἰς τὸ β δίδει ἄθροισμα α

$$\beta + \chi = \alpha \quad (3)$$

οὗτος λέγεται διαφορὰ τῶν ἀριθμῶν α καὶ β .

Γράφομεν δέ : $\alpha - \beta = \chi$ (4)

Από τὰ ἀνωτέρω ἐννοοῦμεν δτι :

α) Αἱ (3) καὶ (4) εἰναι ταυτόσημοι*, (ἔχουν τὴν αὐτὴν σημασίαν).

Ητοι, εάν ισχύῃ ἡ μία ἀπὸ αὐτάς, θά ισχύῃ καὶ ἡ ἄλλη.

$$\beta + \chi = \alpha \Rightarrow \alpha - \beta = \chi$$

$$\alpha - \beta = \chi \Rightarrow \beta + \chi = \alpha$$

Διὰ τοῦτο λέγονται ισοδύναμοι μεταξύ τῶν ἡ ἀπλῶς ισοδύναμοι.

Γράφομεν δέ

$$\boxed{\beta + \chi = \alpha \Leftrightarrow \alpha - \beta = \chi} \quad (5)$$

Τὸ σύμβολον \Leftrightarrow λέγεται σύμβολον τῆς ισοδυναμίας δύο σχέσεων.

β) Υπάρχει εἰς τὸ σύνολον \mathbb{N}_0 διαφορὰ $\alpha - \beta$ δσάκις μόνον εἰναι

$$\alpha \geq \beta$$

Η πρᾶξις μὲ τὴν όποιαν εἰς τὸ ζεῦγος (α, β) , δπου $\alpha \geq \beta$, ἀντιστοιχίζομεν τὴν διαφορὰν $\alpha - \beta$ λέγεται ἀφαιρέσεις.

$$(\alpha, \beta) \longrightarrow \alpha - \beta$$

Οι ἀκέραιοι α, β λέγονται δροὶ τῆς ἀφαιρέσεως. Ειδικῶς δ μὲν α λέγεται μειωτέος δ δὲ β ἀφαιρετέος. Η διαφορὰ λέγεται καὶ ὑπόλησις.


24.2. Ισοδυναμία τῶν σχέσεων $\alpha + \beta = \gamma$, $\gamma - \beta = \alpha$, $\gamma - \alpha = \beta$

Απὸ τὸν δρισμὸν τῆς διαφορᾶς ἔχομεν :

$$3 + 4 = 7 \Leftrightarrow 7 - 4 = 3$$

$$3 + 4 = 7 \Leftrightarrow 7 - 3 = 4$$

* Συνεπῶς δυνάμεθα νά ἀντικαταστήσωμεν ἐνάστην τούτων μὲ τὴν ἀλλην δσάκις τοῦτο μᾶς διευκολύνει.



(S) Σχ. 13.

Γενικώς, όπως φαίνεται παραστάτικώς και εἰς τὸ σχ. 13, ἐὰν μεταξύ τριῶν ἀκεραίων α , β , γ εἴναι $\alpha + \beta = \gamma$, θὰ είναι $\gamma - \beta = \alpha$ καὶ $\gamma - \alpha = \beta$.

'Επίσης, ἐὰν είναι $\gamma - \beta = \alpha$ (ἢ $\gamma - \alpha = \beta$), θὰ είναι καὶ $\alpha + \beta = \gamma$.

"Η συμβολικῶς :

$$\alpha + \beta - \gamma \iff \begin{cases} \gamma - \beta = \alpha \\ \gamma - \alpha = \beta \end{cases}$$

Παραδείγματα :

1) Ἐφου είναι $5 + 7 = 12$ είναι καὶ $12 - 7 = 5$ καθώς καὶ $12 - 5 = 7$

2) Ἐφου είναι $15 - 6 = 9$ είναι καὶ $9 + 6 = 15$, καθώς καὶ $15 - 9 = 6$

24.3. Η ἀφαίρεσις ὡς πρᾶξις ἀντιστροφος τῆς προσθέσεως

Ἐὰν εἰς τὸ 3 προσθέσωμεν τὸ 4, εύρισκομεν τὸ 7. Ἐὰν δὲ ἀκολούθως ἀφαίρεσωμεν τὸ 4 ἀπὸ τὸ 7, ἐπανευρίσκομεν 3.

$$3 + 4 = 7$$

$$7 - 4 = 3$$

Πρόσθεσις τοῦ 4

$$\boxed{3 \xrightarrow{\text{Πρόσθεσις τοῦ 4}} 7 + 4}$$

Ἀφαίρεσις τοῦ 4

$$(3 + 4) - 4 = 3$$

$$(\alpha + \beta) - \beta = \alpha,$$

Διὰ τοῦτο λέγομεν ὅτι ἡ ἀφαίρεσις είναι ἡ ἀντιστροφος πρᾶξις τῆς προσθέσεως.

24.4. Ειδικαὶ περιπτώσεις.

i) Η διαφορά

$$\alpha - 0 = \alpha$$

Είναι $\alpha - 0 = \alpha \iff 0 + \alpha = \alpha$ ἢ $\alpha - \alpha = 0$
"Ωστε" $\alpha - 0 = \alpha$

ii) Διαφορά δύο ίσων δριθμῶν $\alpha = \beta$

"Εχομεν :

$$\alpha = \beta \iff \alpha = \beta + 0 \quad (\text{Οὐδέτερον στοιχείον})$$

$$\iff \alpha - \beta = 0 \quad (\text{Διατί ;})$$

"Ωστε, ἐὰν

$$\alpha = \beta \quad \text{τότε} \quad \alpha - \beta = 0 \quad \text{καὶ ἀντιστρόφως}$$

$$\alpha - \beta = 0 \quad \Rightarrow \quad \alpha = \beta$$

25. ΕΠΙΛΥΣΙΣ ΑΠΛΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ

25.1. Πρόβλημα

Ο Λεωνίδας είναι 29 έτών και μεγαλύτερος από τον Νίκον κατά 12 έτη. Πόσων έτών είναι ο Νίκος;

Έαν παραστήσωμεν μέχι x τὸν ἀριθμὸν τῶν έτῶν τοῦ Νίκου, θὰ πρέπει

$$x + 12 = 29 \quad (1)$$

Η (1) παριστάνει μίαν ἔξισωσιν τὴν δποίαν δυνάμεθα νὰ ἐπιλύσωμεν, ἐάν σκεφθῶμεν ὅτι:

$$\alpha + \beta = \gamma \iff \alpha = \gamma - \beta$$

$$\text{Συνεπῶς} \quad x + 12 = 29 \iff x = 29 - 12. \quad \text{Ήτοι } x = 17$$

“Ωστε ο Νίκος είναι 17 έτῶν.

25.2. Πρόβλημα

Απὸ ποιὸν ἀριθμὸν πρέπει νὰ ἀφαιρέσωμεν 43 διὰ νὰ εὔρωμεν ὑπόλοιπον 24;

Έαν x παριστάνῃ τὸν ζητούμενον ἀριθμόν, πρέπει:

$$x - 43 = 24 \quad (3)$$

Η (3) είναι μία ἔξισωσις. Διὰ νὰ τὴν ἐπιλύσωμεν, σκεπτόμεθα ὅτι:

$$\gamma - \beta = \alpha \iff \gamma = \alpha + \beta \quad (4)$$

$$\text{Συνεπῶς} \quad x - 43 = 24 \iff x = 24 + 43. \quad \text{Ήτοι } x = 67$$

“Ωστε ο ζητούμενος ἀριθμὸς είναι 67.

25.3. Πρόβλημα

Κατὰ ποιὸν ἀριθμὸν πρέπει νὰ ἐλαττώσωμεν τὸ 324 διὰ νὰ εὔρωμεν 169;

Έαν x παριστάνῃ τὸν ζητούμενον ἀριθμόν, τότε συμφώνως πρὸς τὸ πρόβλημα ἔχομεν:

$$324 - x = 169 \quad (5)$$

Διὰ νὰ ἐπιλύσωμεν τὴν ἔξισώσιν (5), σκεπτόμεθα ὅτι:

$$\alpha - \beta = \gamma \iff \beta = \alpha - \gamma$$

$$\text{Ήτοι } 324 - x = 169 \iff x = 324 - 169. \quad \text{“Ωστε } x = 155$$

25.4. Γενικῶς

Διὰ νὰ ἐπιλύσωμεν μίαν ἔξισωσιν τῆς μορφῆς $x + \beta = \gamma$,

σκεπτόμεθα ὅτι: $\alpha + \beta = \gamma \iff \alpha = \gamma - \beta$

Συνεπῶς ἔχομεν $x + \beta = \gamma \iff x = \gamma - \beta$

Με άναλογον τρόπον εύρισκομεν δτι :

$$x - \alpha = \beta \Leftrightarrow x = \beta + \alpha$$

$$\alpha - x = \beta \Leftrightarrow x = \alpha - \beta$$

"Εξισώσις νόμος Αύσις"

(D)

$$x - \alpha = \beta \Leftrightarrow x = \beta + \alpha$$

$$x + \beta = \alpha \Leftrightarrow x = \alpha - \beta$$

$$\alpha - x = \beta \Leftrightarrow x = \alpha - \beta$$

Φυσικά αι άνωτέρω σχέσεις ισχύουν, δταν αι έξισώσεις είναι έπιλύσιμοι εις τό σύνολον N_0 .

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

53. Συμπληρώσατε τάς Ισοδυναμίας

$$\alpha) 5 + 7 = 12 \Leftrightarrow \gamma) \alpha + \beta = 10 \Leftrightarrow$$

$$\beta) 5 + 7 = 12 \Leftrightarrow \delta) \alpha + \beta = 10 \Leftrightarrow$$

54. Επιλύσατε τάς έξισώσεις :

$$x + 7 = 19, \quad 18 - x = 11, \quad x - 24 = 36, \text{ δπου } x \in N_0$$

55. Ηρωτήθη κάποιος διά τήν ήλικιάν του και διπήντησεν δτι μετά 24 έτη θα είναι 89 έτῶν. Πόση είναι ή σημερινή του ήλικιά;

56. Τό διθροισμα δύο δριμάδων είναι 76. Ο εις έξ αυτῶν είναι δ 37. Ποιος είναι δ άλλος δριμός;

26. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΦΑΙΡΕΣΕΩΣ

26.1 Παρατηρούμεν δτι, ένδη ή άφαίρεσις 7-4 είναι δυνατή, δέν υπάρχει διαφορά 4-7 εις τό σύνολον N_0 . "Ητοι ή άφαίρεσις άκεραίων δέν είναι πρᾶξις μεταθετική".

26.2 Μήπως είναι πρᾶξις προσεταιριστική ; Παρατηρούμεν δτι :

$$\begin{array}{rcl} \alpha) & 10 - 6 = 4 \\ & \underline{4 - 1 = 3} \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} \beta) & 6 - 1 = 5 \\ & \underline{10 - 5 = 5} \end{array}$$

$$"H \quad (10 - 6) - 1 = 3$$

$$"H \quad 10 - (6 - 1) = 5$$

$$"Ητοι : \quad (10 - 6) - 1 \neq 10 - (6 - 1)$$

Έκ τῶν άνωτέρω έννοούμεν δτι ή άφαίρεσις άκεραίων δέν είναι πρᾶξις προσεταιριστική.

26.3. Θεμελιώδης Ιδιότης

'Ο Νίκος είναι 18 έτῶν και ή Κλαίρη 12. "Ητοι αι ήλικιαι των διαφέρουν κατά 6 έτη.

$$18 - 12 = 6$$

(1)

Μετά 5 έτη δ Νίκος θα είναι 23 έτών και η Κλαίρη 17. Και πάλιν αι ήλικιας των θά διαφέρουν κατά 6 έτη.

$$(18+5) - (12+5) = 6 \quad (2)$$

* Εκ των Ισοτήτων (1) και (2) έχομεν : $\alpha + \gamma = \beta + \gamma$ $\alpha - \beta = (\alpha + \gamma) - (\beta + \gamma)$

Πρό 5 έτῶν δ Νίκος ήτο 13 έτών ή δε Κλαίρη 7 έτῶν και είχον πάλιν διαφοράν ήλικιας 6 έτη.

$$\text{Ήτοι } 18 - 12 = (18 - 5) - (12 - 5)$$

Γενικώς διὰ τοὺς ἀκεραίους α, β, γ έχομεν :

$$\alpha - \beta = (\alpha + \gamma) - (\beta + \gamma) \quad \alpha \geq \beta$$

$$\alpha - \beta = (\alpha - \gamma) - (\beta - \gamma) \quad \alpha \geq \beta, \quad \beta \geq \gamma$$

Παράδειγμα

$$7 - 4 = (7 + 2) - (4 + 2) = (7 - 2) - (4 - 2) = 3$$

26.4. Αφαίρεσις ἀριθμοῦ ἀπὸ άθροισμα.

Διὰ τὴν εύρεσιν τῆς διαφορᾶς $(17+6) - 7$ παρατηροῦμεν ὅτι :

$$\alpha) 17 + 6 = 23$$

$$\beta) 17 - 7 = 10$$

$$23 - 7 = 16$$

$$10 + 6 = 16$$

$$\text{Ή } (17+6) - 7 = 16$$

$$\text{Ή } (17 - 7) + 6 = 16$$

$$\text{“Ωστε } (17+6) - 7 = (17 - 7) + 6$$

Γενικῶς έχομεν

$$(\alpha + \beta) - \gamma = (\alpha - \gamma) + \beta \quad \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{N}_0 \text{ καὶ } \alpha \geq \gamma$$

26.5. Αφαίρεσις ἐνδὸς ἀθροίσματος

Διὰ τὴν εύρεσιν τῆς διαφορᾶς $15 - (5+7)$ παρατηροῦμεν ὅτι :

$$\alpha) 5 + 7 = 12$$

$$\beta) 15 - 5 = 10$$

$$15 - 12 = 3$$

$$10 - 7 = 3$$

$$\text{Ή } 15 - (5+7) = 3$$

$$\text{Ή } (15 - 5) - 7 = 3$$

$$\text{“Ωστε } 15 - (5+7) = (15 - 5) - 7$$

(1) $\alpha - (\beta + \gamma) = (\alpha - \beta) - \gamma$

Γενικῶς

$$\alpha - (\beta + \gamma) = (\alpha - \beta) - \gamma$$

"Όπου $\alpha, \beta, \gamma \in N_0$ καὶ αἱ σημειούμεναι ἀφαιρέσεις εἶναι δυναταῖ.

26.6. Πρόσθεσις μιᾶς διαφορᾶς

"Ομοίως διὰ τὴν εὔρεσιν τοῦ ἀθροίσματος $4 + (6 - 5)$ παρατηροῦμεν ὅτι :

$$\begin{array}{rcl}
 \text{α)} & 6 - 5 = 1 & \text{β)} & 4 + 6 = 10 \\
 & 4 + 1 = 5 & & 10 - 5 = 5 \\
 \text{Η} & 4 + (6 - 5) = 5 & \text{Η} & (4 + 6) - 5 = 5
 \end{array}$$

"Ητοι

$$4 + (6 - 5) = (4 + 6) - 5$$

Γενικῶς

$$\alpha + (\beta - \gamma) = (\alpha + \beta) - \gamma \quad \text{ὅπου } \alpha, \beta, \gamma \in N_0 \text{ καὶ } \beta \geq \gamma$$

26.7. Αφαίρεσις μιᾶς διαφορᾶς.

"Ομοίως διὰ τὴν εὔρεσιν τῆς διαφορᾶς $15 - (10 - 4)$ παρατηροῦμεν ὅτι :

$$\begin{array}{rcl}
 \text{α)} & 10 - 4 = 6 & \text{β)} & 15 + 4 = 19 \\
 & 15 - 6 = 9 & & 19 - 10 = 9 \\
 \text{Η} & 15 - (10 - 4) = 9 & \text{Η} & (15 + 4) - 10 = 9
 \end{array}$$

"Ωστε

$$15 - (10 - 4) = (15 + 4) - 10$$

Γενικῶς

$$\alpha - (\beta - \gamma) = (\alpha + \gamma) - \beta$$

ὅπου $\alpha, \beta, \gamma \in N_0$ καὶ αἱ σημειούμεναι ἀφαιρέσεις εἶναι δυναταῖ.

26.8. Παρατηρήσεις

i) Θὰ ἦτο δυνατὸν νὰ ἀποδεῖξωμεν τὰς ἀνωτέρω ἰδιότητας μὲ τὴν χρησιμοποίησιν τῶν γνωστῶν Ισοδυναμιῶν (παρ. 24.2.). Π.χ. διὰ νὰ ἀποδεῖξωμεν τὴν ἰδιότητα $\alpha - (\beta + \gamma) = (\alpha - \beta) - \gamma$ ἐργαζόμεθα ὡς ἔξις :

Θέτομεν $x = \alpha - (\beta + \gamma)$, δόποτε ἔχομεν :

$$x = \alpha - (\beta + \gamma) \iff x + (\beta + \gamma) = \alpha \quad (\Delta \text{ιατί?})$$

$$\iff (x + \gamma) + \beta = \alpha$$

$$\iff x + \gamma = \alpha - \beta$$

$$\iff x = (\alpha - \beta) - \gamma$$

ii) Αἱ πρόηγούμεναι ἰδιότητες μᾶς διευκολύνονται συχνὰ εἰς τὸν ἀπὸ μνήμης λογισμόν.


Π.χ. διὰ τὴν ἀπὸ μνήμης εὕρεσιν τῆς διαφορᾶς σκεπτόμεθα δτὶ:

$$192 - (50 - 8) = (192 + 8) - 50 \\ = 200 - 50 = 150$$

26.9 Ιδιότητες τῆς διαγραφῆς

1) 'Ο ζυγὸς τοῦ σχ. 14 ισορροπεῖ, ὅταν τεθοῦν ἐπὶ τῶν δίσκων του τὰ βάρη A καὶ B . "Αρά

$$A = B$$



Σχ. 14.

Εἰς τὸν ζυγὸν τοῦ σχ. 15 ἔχομεν τοποθετήσεις ἐπὶ τῶν δίσκων του καὶ ἐν νέον βάρος Γ , βλέπομεν δὲ δτὶ καὶ πάλιν ἔχομεν ισορροπίαν. "Αρά

$$A + \Gamma = B + \Gamma$$


Τὸ ἀνωτέρω πείραμα μᾶς διευκολύνει νὰ κατανοήσωμεν τὴν ἀκόλουθον ιδιότητα τῶν ἀριθμῶν.

'Εὰν $\alpha = \beta$ τότε εἶναι καὶ $\alpha + \gamma = \beta + \gamma$

Καὶ ἀντιστρόφως. 'Εὰν εἶναι $\alpha + \gamma = \beta + \gamma$

τότε

$$\alpha = \beta$$



Σχ. 15.

"Η συμβολικῶς: $\alpha = \beta \iff \alpha + \gamma = \beta + \gamma \quad \alpha, \beta, \gamma \in N_0$

'Εὰν προσθέσωμεν (ἢ ἀφαιρέσωμεν) τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν εἰς τὰ μέλη μιᾶς ισότητος, λαμβάνομεν πάλιν ισότητα.

Εἰς τὴν περίπτωσιν τῆς ἀφαιρέσεως ἡ ἀφαίρεσις θὰ πρέπει νὰ εἶναι δυνατὴ εἰς τὸ N_0 .


Εἰς τὴν ἀνωτέρω ιδιότητα δυνάμεθα νὰ φθάσσωμεν ὡς ἔξῆς :

Κατὰ τὴν 24.4, ἔχομεν


$$\begin{aligned} \alpha = \beta &\iff \alpha - \beta = 0 \\ &\iff (\alpha + \gamma) - (\beta + \gamma) = 0 \quad (\text{Κατὰ τὴν 26.3.)} \\ &\iff \alpha + \gamma = \beta + \gamma \end{aligned}$$

ii) Εἰς τὸν ζυγὸν τοῦ σχ. 16 τὸ βάρος A εἶναι μεγαλύτερον τοῦ βάρους B

$$A > B \quad (1)$$



Εἰς τὸ ζυγὸν τοῦ σχ. 17 ἔχομεν τοποθετήσεις ἐπὶ



Σχ. 17.

τοῦ βάρους Α καὶ ἐπὶ τοῦ βάρους Β τὸ αὐτὸν βάρος Γ. Παρατηροῦμεν δὲ :

$$A + \Gamma > B + \Gamma \quad (2)$$

Τὸ ἀνωτέρω πείραμα μᾶς διευκολύνει νὰ κατανοήσωμεν δὲ, ἐὰν μεταξὺ δύο ἀκεραίων α, β εἶναι $\alpha > \beta$ τότε θὰ εἶναι καὶ $\alpha + \gamma > \beta + \gamma$, ὅπου $\gamma \in N_0$ καὶ ἀντιστρόφως, ἐὰν $\alpha + \gamma > \beta + \gamma$ τότε θὰ εἶναι καὶ $\alpha > \beta$.

$$\alpha > \beta \iff \alpha + \gamma > \beta + \gamma, \quad \alpha, \beta, \gamma \in N_0$$

*Ἐὰν προσθέσωμεν (ἢ ἀφαιρέσωμεν) τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν εἰς τὰ μέλη μιᾶς ἀνισότητος, λαμβάνομεν πάλιν ἀνισότητα τῆς αὐτῆς φορᾶς.

Αἱ Ιδιότητες τῆς διαγραφῆς εἰς τὴν πρόσθεσιν καὶ τὴν ἀφαίρεσιν εἶναι δυνατὸν νὰ γραφοῦν καὶ ὡς ἔξῆς.

$$\begin{aligned} \alpha = \beta &\iff \alpha - \gamma = \beta - \gamma \\ \alpha > \beta &\iff \alpha - \gamma > \beta - \gamma \end{aligned}$$

ὅπου $\alpha, \beta, \gamma \in N_0$ καὶ $\beta \geq \gamma$

Παραθέτομεν κατωτέρω συγκεντρωτικὸν πίνακα τῶν Ιδιοτήτων τῆς ἀφαιρέσεως.

*Ἐὰν $\alpha, \beta, \gamma \in N_0$ τότε

1. $\alpha - \beta = (\alpha + \gamma) - (\beta + \gamma)$
2. $\alpha - \beta = (\alpha - \gamma) + (\beta - \gamma)$
3. $\alpha = \beta \iff \alpha + \gamma = \beta + \gamma$
4. $\alpha = \beta \iff \alpha - \gamma = \beta - \gamma$
5. $\alpha > \beta \iff \alpha + \gamma > \beta + \gamma$
6. $\alpha > \beta \iff \alpha - \gamma > \beta - \gamma$
7. $(\alpha + \beta) - \gamma = (\alpha - \gamma) + \beta$
8. $\alpha + (\beta - \gamma) = (\alpha + \beta) - \gamma$
9. $\alpha - (\beta - \gamma) = (\alpha + \gamma) - \beta$
10. $\alpha - (\beta + \gamma) = (\alpha - \beta) - \gamma$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

57. Νὰ ἐκτελέσετε μὲν δύο τρόπους τάς κάτωθι πράξεις :

$$\begin{array}{ll} \text{α)} & (100 - 60) + 59 \\ \text{γ)} & 105 - (80 - 50) \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} \text{β)} & (80 - 50) - 25 \\ \text{δ)} & 80 + (40 - 30) \end{array}$$

58. Χρησιμοποιήσατε τὴν ιδιότητα προσθέσεως μᾶς διαφορᾶς εἰς ἀριθμόν διὰ νὰ συμπληρώσετε τὰς ισότητας.

$$\alpha) 20 + (\alpha - 2) = \beta \quad \beta) 60 + (\alpha - 10) = \delta$$

59. Χρησιμοποιήσατε τὴν ιδιότητα ἀφαιρέσεως μᾶς διαφορᾶς διὰ νὰ συμπληρώσετε τὰς ἔξιτις ισότητας.

$$\alpha) 30 - (\alpha - 10) = \gamma \quad \beta) \alpha - (\beta - 12) = \xi$$

$$\gamma) \alpha - (\dots - 5) = \alpha + 5 - \beta$$

$$60. Νά ύπολογισθῆται διαφορὰ $(5 + \alpha) - (3 + \alpha) =$$$

$$(5 - 01) - (3 + 0) = 00$$

27. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Εἰς ταμίας ἔχει εἰς τὸ ταμεῖον του 800 δραχ. Ἐν συνεχείᾳ εἰσπράττει 120 δραχ., πληρώνει 50 δραχ. καὶ τέλος εἰσπράττει 70 δραχ. Πόσα χρήματα θὰ ἔχῃ τελικῶς εἰς τὸ ταμεῖον του;

Οἱ ύπολογισμοὶ τοῦ ταμίου μᾶς δύνηγοῦν εἰς τὰς ἔξιτις κατὰ σειρὰν πράξεις μεταξὺ ἀριθμῶν :

$$800 + 120 = 920$$

$$920 - 50 = 870$$

$$870 + 70 = 940$$

Αἱ τρεῖς αὔται διαδοχικαὶ πράξεις σημειώνονται χάριν συντομίας ὡς ἔξιτις :
800 + 120 - 50 + 70 (1)

Οἱ ἀριθμοὶ 80, 120, 50 καὶ 70 λέγονται δροὶ τῆς παραστάσεως αὔτης. Τὸ ἔξαγόμενον τῆς διαδοχικῆς ἐκτελέσεως τῶν πράξεων λέγεται τιμὴ τῆς ἀριθμητικῆς παραστάσεως.

Κατὰ τὰ ἀνωτέρω ἡ ἀριθμητικὴ παράστασις

$$25 - 8 + 5 - 12$$

δηλώνει τὴν ἔξιτις διαδοχικὴν πράξεων :

$$25 - 8 = 17, \quad 17 + 5 = 22 \quad \text{καὶ} \quad 22 - 12 = 10$$

Συνεπῶς ἔχει ἀριθμητικὴν τιμὴν 10.

Παρατήρησις

Είναι δυνατὸν εἰς μίαν ἀριθμητικὴν παράστασιν νὰ ὑπάρχουν παρενθέσεις. Εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν χρησιμοποιοῦμεν τὰς ιδιότητας τῆς προσθέσεως καὶ ἀφαιρέσεως διὰ νὰ εὕρωμεν τὴν τιμὴν τῆς.

$$\text{Π.χ.} \quad 10 + 7 - (5 - 3) = 10 + 7 + 3 - 5 = 15$$

$$10 + 7 + (5 - 3) = 10 + 7 + 5 - 3 = 19$$

$$\text{παλλοπ ο'} \quad \text{ενδέου} 100 - (34 + 5 + 12) = 100 - 34 - 5 - 12 = 49 \text{ παλλοπ νίδη}$$

$$\text{παλλοπ ο'} \quad \text{ενδέου} \text{ γρήτη παραλλοπη ποιει νομιμόντη μὲν εἰσι γρήδητη ποιει γόνιμοι παραλλοπη$$

κατά τη διεύθυνση της επαρχίας της ΑΣΚΗΣΕΙΣ ανά περιφέρεια της ΒΔ
συγχρόνως με την παραδοσιακή

61. Νά εύρετε τάς τιμάς τῶν ἀριθμητικῶν παραστάσεων :

$$\alpha) 20 - 5 + 15 + 30 - 22 - 7 \quad \beta) 12 - 10 + 30 - 8 + 7$$

62. Νά έκτελεσθούν αἱ πράξεις :

$$\alpha) 13 - (6 - 1) - (9 - 8 + 1) \quad \beta) 8 + [3 + (7 - 5) - (5 - 2)]$$

$$63. \text{Νά} \ \overset{\text{έπιλυθη}}{\text{έπιλυθη}} \ \text{ή} \ \overset{\text{έξισωσις}}{\text{έξισωσις}} : \ x - 4 + 6 + 2 = 28$$

64. 'Εὰν $\alpha + \beta = 12$ νὰ ὑπολογισθῇ ἡ τιμὴ τῆς παραστάσεως

$$30 + (\alpha + 3) - (10 - \beta)$$

28. ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ

28.1. Ὁρισμός

Τὸ ἄθροισμα

ἀποτελεῖται ἀπὸ Ἰους προσθετέους. Συνεπῶς διὰ νὰ τὸ δρίσωμεν ἀρκεῖ νὰ γνω-

ρίζωμεν π ο ι ο ν προσθετέους λαμβάνομεν καὶ π ο σ ας φοράς.

Διὰ τοῦτο ἀντὶ νὰ γράφωμεν

$$12 + 12 + 12 + 12 + 12 \quad \text{γράφομεν} \quad 5 \cdot 12$$

Τὸ ἀγωτέρω ἄθροισμα ὀνομάζεται γινόμενον 5 ἐπὶ 12.

Ἐις τὸ γινόμενον τοῦτο ὁ ἀριθμὸς 5, ὁ ὅποιος δηλώνει τὸ πλῆθος τῶν Ἰων ὅρων ὀνομάζεται πολλαπλασιαστής, δὲ 12 πολλαπλασιαστέος ὀνομάζονται δροι ἢ παράγοντες τοῦ γινομένου.

Ομοίως τὸ ἄθροισμα

λέγεται γινόμενον τοῦ 4 ἐπὶ τὸ β καὶ γράφεται 4β.

Γενικῶς τὸ ἄθροισμα

$$\beta + \beta + \dots + \beta \quad (\alpha \text{ φοράς})$$

λέγεται γινόμενον τοῦ α ἐπὶ τὸ β

Γράφεται δὲ

$$\alpha \cdot \beta \quad \text{ἢ} \quad \alpha \times \beta.$$

Ἄπο τὸν δρισμὸν τοῦτον ἐννοοῦμεν ὅτι ὁ α παριστάνει ἀκέραιον μεγαλύτερον τῆς μονάδος ($\alpha > 1$).

Ἡ πρᾶξις διὰ τῆς δποίας εἰς τὸ ζεῦγος (α, β) ἀντιστοιχίζομεν τὸ γινόμενον $\alpha \cdot \beta$ ὀνομάζεται πολλαπλασιασμὸς τοῦ α ἐπὶ τὸ β.

$$\begin{array}{rcl} \alpha & = & \beta - \beta + (\alpha, \beta) \\ & = & \beta - \beta + \beta + \beta + \dots + \beta \end{array}$$

* Δὲν πρέπει νὰ συγχέωμεν τὸ «γινόμενον» μὲ τὸν «πολλαπλασιασμόν». Ο πολλαπλασιασμὸς εἶναι πρᾶξις, ἐνῶ τὸ γινόμενον εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς πρᾶξεως (ἀριθμός).

Είναι φανερόν ότι έπως ή πρόσθετις και διπολλαπλασιασμός είναι διί μελής πρᾶξης.

28.2. Ειδικαί περιπτώσεις

Διάλαγε νά γενικεύσωμεν τὸν δρισμὸν τοῦ πολλαπλασιασμοῦ καὶ εἰς τὴν περίπτωσιν κατὰ τὴν διποίαν διπολλαπλασιαστῆς είναι 1 ή 0 συμφωνοῦμεν ότι :

$$\begin{aligned} \text{εἰς νοτικότο τοῦ πολλαπλασιασμοῦ} & 1 \cdot \beta = \beta, \quad \text{όπου } \beta \in N_0 \\ & \text{εἰς νότιον τοῦ πολλαπλασιασμοῦ} & 0 \cdot \beta = 0 \end{aligned}$$

28.3. Γεωμετρικὴ παράστασις τοῦ γινομένου

Τὸ παραπλεύρως δριθογώνιον παραλληλόγραμμον, σχ. 18 ἔχει διαστάσεις 2cm καὶ 3cm καὶ είναι χωρισμένον εἰς τετράγωνα πλευρᾶς 1cm. Τὸ διγινόμενον $2 \cdot 3 = 6$, είναι οὖν μὲ τὸ πλήθος τῶν τετραγώνων τούτων. $\delta = (\alpha \cdot \beta) \cdot H^2$

Γενικῶς : 'Εὰν $\alpha, \beta \in N_0$, τότε τὸ γινόμενον $\alpha \cdot \beta$ είναι οὖν μὲ τὸ πλήθος τῶν τετραγώνων πλευρᾶς 1cm εἰς τὰ διποία χωρίζεται ἐν δριθογώνιον μὲ διαστάσεις α cm καὶ β cm, σχ. 19.

29. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ

29.1. "Υπαρξίες γινομένου, μονότιμον

"Εὰν σκεφθῶμεν ότι ἔκαστον γινόμενον είναι ἐν διθροισμα:

$$\text{Π.χ. } 3.4 = 4 + 4 + 4$$

$$5 \cdot \beta = \beta + \beta + \beta + \beta + \beta$$

ἐννοοῦμεν ότι, ἔάν διθοῦν δύο ἀκέραιοι, α, β τότε ὑπάρχει εἰς καὶ μόνον εἰς ἀκέραιος διποίος είναι τὸ γινόμενον $\alpha \cdot \beta$ αὐτῶν.

29.2. Μεταθετικὴ

Είναι τὸ διποίο $3.5 = 5 + 5 + 5 = 15$ εἰς διθροισμάτων 0.

"Αλλὰ καὶ $5.3 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 15$

"Ητοι $3.5 = 5.3$

Γενικῶς ἔάν $\alpha, \beta \in N_0$ τότε

$$\alpha \cdot \beta = \beta \cdot \alpha$$


Ιούς άλλα

"Ο πολλαπλασιασμός είναι πρᾶξης μεταθετική

ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής



Σχ. 18



Σχ. 19.

29. 3. Ούδετερον στοιχείον της γεωμετρίας δι' ωσπότε το νόρμανθικό ιστού
Καθώς είδομεν : $3 \cdot 1 = 1 \cdot 3 = 3$
 $5 \cdot 1 = 1 \cdot 5 = 5$

Γενικώς δι' έκαστον άκεραιον α είναι :

πλήκτρο για την πολλαπλασιασμό $a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$

Διά τούτο λέγομεν ότι ή μονάς είναι ούδετερον στοιχείον εἰς τὸν πολλαπλασιασμὸν καὶ μάλιστα τὸ μοναδικόν.

29.4. Προσεταιριστικὴ

Ἄσ είναι τρεῖς άκεραιοι κατὰ σειράν, π.χ. οἱ άκεραιοι 2, 5, 6.

Παρατηροῦμεν ότι :

$$2 \cdot 5 = 10 \quad | \quad 5 \cdot 6 = 30$$

$$\underline{10 \cdot 6 = 60} \quad | \quad \underline{2 \cdot 30 = 60}$$

$$H(2 \cdot 5) \cdot 6 = 60 \quad H(2 \cdot 5 \cdot 6) = 60$$

"Αστε

$(2 \cdot 5) \cdot 6 = 2 \cdot (5 \cdot 6)$

Γενικώς δι' έκαστην τριάδα άκεραίων α, β, γ , είναι :

$$(\alpha \cdot \beta) \cdot \gamma = \alpha \cdot (\beta \cdot \gamma)$$

Ο πολλαπλασιασμὸς είναι πρᾶξις προσεταιριστικὴ

29.5. Ἐπιμεριστικὴ

α) Ὡς πρὸς τὴν πρόσθεσιν:

$$Elναι \quad 3 \cdot (2+5) = (2+5) + (2+5) + (2+5)$$

$$\eta \quad 3 \cdot (2+5) = (2+2+2) + (5+5+5)$$

$$\tilde{\eta} \quad 3 \cdot (2+5) = 3 \cdot 2 + 3 \cdot 5$$

(Μὲ τὴν γραφὴν $2 \cdot 3 + 3 \cdot 5$ ἐννοοῦμεν τὸ ἀθροισμα ($2 \cdot 3$) + ($3 \cdot 5$)).

Γενικώς δι' έκαστην τριάδα άκεραίων α, β, γ είναι :

$$\alpha \cdot (\beta + \gamma) = \alpha \cdot \beta + \alpha \cdot \gamma$$

Ο πολλαπλασιασμὸς είναι πρᾶξις ἐπιμεριστικὴ ὡς πρὸς τὴν πρόσθεσιν.

β) Ὡς πρὸς τὴν ἀφαίρεσιν:

$$Παρατηροῦμεν ότι : 3 \cdot (7 - 5) = 3 \cdot 2 = 6$$

$$\text{Άλλα καὶ } 3 \cdot 7 - 3 \cdot 5 = 21 - 15 = 6$$

$$\text{Ἄρα } 3 \cdot (7 - 5) = 3 \cdot 7 - 3 \cdot 5$$

Γενικῶς ἔαν $\alpha, \beta, \gamma \in N_0$ καὶ $\beta > \gamma$

τότε

$$\alpha \cdot (\beta - \gamma) = \alpha \cdot \beta - \alpha \cdot \gamma$$

πρώτοι δίπ ταξίδια για την Ελλάδα

πρώτοι δίπ ταξίδια για την Ελλάδα

‘Ο πολλαπλασιασμὸς εἶναι πρᾶξις ἐπιμεριστικὴ ὡς πρὸς τὴν ἀφαίρεσιν.
Ἐφαρμογαὶ

1) Ἡ ισότης

γράφεται

$$\alpha \cdot (\beta + \gamma) = \alpha \cdot \beta + \alpha \cdot \gamma$$

$$\alpha \cdot \beta + \alpha \cdot \gamma = \alpha \cdot (\beta + \gamma)$$

Διατί;

Τὸ α' μέλος αὐτῆς εἶναι ἀθροισμα δυο γινομένων, ἐνῶ τὸ β μέλος γινόμενον ἐνὸς ἀριθμοῦ ἐπὶ ἐν ἀθροισμα. Συμφώνως πρὸς αὐτὴν ἔχομεν:

$$\alpha) \quad 5 \cdot 4 + 5 \cdot 6 = 5 \cdot (4 + 6)$$

$$= 5 \cdot 10$$

$$\beta) \quad 2 \cdot \alpha + 3 \cdot \alpha = (2 + 3) \cdot \alpha$$

$$= 5 \cdot \alpha$$

2) Ἡ ἐπιμεριστικὴ ιδιότης τοῦ πολλαπλασιασμοῦ ὡς πρὸς τὴν πρόσθεσιν μᾶς ἐπιτρέπει νὰ ὑπολογίσωμεν τὸ γινόμενον: $(\alpha + \beta) \cdot (\gamma + \delta)$ (ἀθροισμα ἐπὶ ἀθροισμα).

$$(\alpha + \beta) \cdot (\gamma + \delta) = (\alpha + \beta) \cdot \gamma + (\alpha + \beta) \cdot \delta$$

$$\ast \text{Η} \quad (\alpha + \beta) \cdot (\gamma + \delta) = \alpha \cdot \gamma + \beta \cdot \gamma + \alpha \cdot \delta + \beta \cdot \delta$$

“Ητοι: Διὰ νὰ πολλαπλασιάσωμεν ἀθροισμα ἐπὶ ἀθροισμα (πολλαπλασιάζομεν ἔκαστον προσθετέον τοῦ ἐνὸς ἀθροίσματος μὲ ἔκαστον προσθετέον τοῦ ἄλλου ἀθροίσματος καὶ προσθέτομεν τὰ μερικὰ γινόμενα.

Π.χ. διὰ τὸ γινόμενον $(2+4) \cdot (3+5)$

$$\text{ἔχομεν: } (2+4) \cdot (3+5) = 2 \cdot 3 + 2 \cdot 5 + 4 \cdot 3 + 4 \cdot 5$$

$$= 6 + 10 + 12 + 20 = 48$$

29. 6. Ιδιότητες διαγραφῆς

α) Ἀπὸ τὴν γνωστὴν ισοδυναμίαν

$$\alpha = \beta \iff \alpha + \gamma = \beta + \gamma \quad \text{ὅπου } \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{N}_{\text{οὐδενὸν}}$$

ἔχομεν $\alpha = \beta \iff \alpha + \alpha = \beta + \alpha$

$$\alpha = \beta \iff \alpha + \alpha = \beta + \beta \quad \text{ἐπειδὴ } \alpha = \beta \text{ νοւσιανῆται}$$

$\alpha = \beta \iff 2 \cdot \alpha = 2 \cdot \beta$

Εἶναι φανερὸν ὅτι ἔαν συνεχίσωμεν ὁμοιώσις, εὐρίσκομεν

$$\alpha = \beta \iff 3 \cdot \alpha = 3 \cdot \beta$$

Γενικῶς, ἔαν $\gamma \in \mathbb{N}$

τότε

$$\alpha = \beta \iff \alpha \cdot \gamma = \beta \cdot \gamma$$

‘Υπογραμμίζομεν ὅτι ἡ ἀνωτέρω ισοδυναμία ισχύει ὅτον δὲ γ εἶναι φυσικὸς ἀριθμὸς καὶ ὅχι μηδέν.

$$\text{Π.χ. } ' \text{Εκ της Ισότητος } 6 \cdot x = 6 \cdot 7 \quad \text{πότε} \\ \text{έπειται ότι} \quad x = 7$$

$$\text{Ένω } ' \text{Εκ της Ισότητος } 0 \cdot 6 = 0 \cdot 3 \quad \text{πότε} \quad 0' \\ \text{δεν έπειται ότι} \quad 6 = 3 \quad \text{ίεργοιασθετική}$$

$$\beta) \text{ Σκεπτόμενοι ως άνωτέρω, } ' \text{Εκ της σχέσεως} \quad \text{πρόσοι Η'} \\ \alpha > \beta \iff \alpha + \gamma > \beta + \gamma \quad \text{ιατφόργη} \\ \text{δοδηγούμεθα εις τὴν σχέσιν} \quad \text{πρόσοι Η'}$$

$$\alpha > \beta \iff \alpha \cdot \gamma > \beta \cdot \gamma \quad \text{όπου } \gamma \in \mathbb{N}$$

Π.χ. 'Εκ της άνισότητος $3 > 2$ συνάγομεν ότι και $3.1524 > 2.1524$.

AΣΚΗΣΕΙΣ

65. Συμπληρώσατε τάς Ισότητας

$$6 \cdot 9 = 9 + 9 + \dots \quad \text{όπου } 4. \alpha = \alpha + \text{ιαπτη Η'}$$

$$66) \text{ Συμπληρώσατε τὴν συνεπαγγεήν } \alpha \cdot \beta = \alpha \implies \beta = \text{; δη; } \text{πότε} \quad \text{πρόσοι Η'}$$

$$\text{δπον } \alpha \neq 0. \text{ Τί δύνασθε νά είπετε όταν } \alpha = 0' \quad \text{πρόσοι Η'}$$

67. Συμπληρώσατε τάς Ισότητας

$$4 \cdot \beta = \beta. \dots \quad 3 \cdot (5 \cdot \alpha) = 15 \dots \quad \text{Η'}$$

68. Νά εμρετε κατά δύο τρόπους τὰ γινόμενα

$$\alpha) 3(4+7) \quad \beta) (3+2) \cdot (5+4) \quad \gamma) (8+3) \cdot (12+5) \quad \text{Η'}$$

69. Νά γράψετε ύπο μορφήν γινομένου τὰ δέροισματα

$$\alpha) 3 \cdot \alpha + 5 \cdot \alpha, \quad \beta) 7 \cdot \alpha + 3 \cdot \alpha + 2 \cdot \alpha, \quad \gamma) 6 \cdot 9 \quad \text{πρόσοι Η'}$$

70. Τί παθαίνει τὸ γινόμενον δύο ἀκεραιών όταν ἡ εἰς ἐξ αὐτῶν αύξανεται ἡ ἀλιτεύη ται κατά μονάδα.

(Χρησιμοποιήσατε ἀριθμητικά παραδείγματα και ἔπειτα γενικούς ἀριθμούς).

30. ΓΙΝΟΜΕΝΟΝ ΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

Μία πόλις ἔχει 3 Γυμνάσια. "Εκαστον Γυμνάσιον ἔχει 6 τάξεις. 'Εκαστη τάξις ἔχει 2 τμήματα. "Εκαστον τμῆμα ἔχει 50 μαθητάς. Πόσους μαθητάς ἔχουν τὰ Γυμνάσια τῆς πόλεως αὐτῆς :

Διὰ νὰ ύπολογισωμεν τὸν συνολικὸν ἀριθμὸν τῶν μαθητῶν τῶν τριῶν αὐτῶν Γυμνασίων δυνάμεθα νὰ ἐργασθῶμεν ως ἔξῆς :

$$\begin{aligned} \text{'Αριθμὸς τάξεων} & 3 \cdot 6 = 18 \\ \text{» τμημάτων} & 18 \cdot 2 = 36 \quad \text{ή } (3 \cdot 6) \cdot 2 = 36 \\ \text{» μαθητῶν} & 36 \cdot 50 = 1800 \quad \text{ή } [(3 \cdot 6) \cdot 2] \cdot 50 = 1800 \end{aligned}$$

'Ο ἀριθμὸς 1800 λέγεται γινόμενον τῶν ἀριθμῶν 3, 6, 2, 50 κατὰ τὴν σειρὰν αὐτήν.

$$\text{γράφομεν δὲ } 3 \cdot 6 \cdot 2 \cdot 50 = 1800$$

$$\text{"Ητοι } 3 \cdot 6 \cdot 2 \cdot 50 = [(3 \cdot 6) \cdot 2] \cdot 50 \text{ δημι τηδη λοιπούς σόκιο}$$

Σημειώνομεν ότι ή γραφή $(3 \cdot 6)$ δηλώνει ένα άριθμόν: τὸ γινόμενον $3 \cdot 6 = 18$, ή δὲ γραφή $[(3 \cdot 6) \cdot 2]$ δηλώνει ένα άριθμόν: τὸ γινόμενον $18 \cdot 2$.

Γενικῶς δύνομάζομεν γινόμενον τριῶν ή περισσοτέρων ἀκέραιων διθέντων εἰς μίση σειράν, τὸν άριθμὸν τὸν ὅποιον εύρισκομεν δταν πολλαπλασιάσωμεν τὸν πρῶτον ἐπὶ τὸν δεύτερον, τὸ γινόμενον ἐπὶ τὸν τρίτον κ.ο.κ. μέχρι καὶ τοῦ τελευταίου.

"Η συμβολικῶς: 'Εάν $\alpha, \beta, \gamma, \delta \in N_0$ τότε $\alpha \cdot \beta \cdot \gamma \cdot \delta = [(\alpha \cdot \beta) \cdot \gamma] \cdot \delta$

31. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΝΟΜΕΝΟΥ ΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

31. 1. Μεταθετικὴ ίδιότης

Είναι $2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 = 6 \cdot 4 \cdot 5 = 24 \cdot 5 = 120$

Άλλα καὶ $2 \cdot 5 \cdot 3 \cdot 4 = 10 \cdot 3 \cdot 4 = 30 \cdot 4 = 120$

Ήτοι $2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 = 2 \cdot 5 \cdot 3 \cdot 4$

Γενικῶς $\alpha \cdot \beta \cdot \gamma \cdot \delta = \alpha \cdot \delta \cdot \beta \cdot \gamma = \gamma \cdot \alpha \cdot \beta \cdot \delta = \dots$, δπου $\alpha, \beta, \gamma, \delta \in N_0$

31. 2. Συνθετικὴ, ἀναλυτικὴ = $\beta \cdot \delta \cdot \alpha \cdot \gamma = (\beta \cdot \alpha) \cdot (\delta \cdot \gamma)$

Είναι $2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 = 6 \cdot 4 \cdot 5 = 24 \cdot 5 = 120$

Άλλα καὶ $2 \cdot (3 \cdot 4) \cdot 5 = 2 \cdot 12 \cdot 5 = 24 \cdot 5 = 120$

Ήτοι $2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 = 2 \cdot (3 \cdot 4) \cdot 5$

Γενικῶς $\alpha \cdot \beta \cdot \gamma \cdot \delta = \alpha \cdot (\beta \cdot \gamma) \cdot \delta = \alpha \cdot (\beta \cdot \delta) \cdot \gamma \dots$, δπου $\alpha, \beta, \gamma, \delta \in N_0$

"Ήτοι εἰς τὸ γινόμενον πολλῶν παραγόντων δυνάμεθα:

α) Νὰ ἀντικαταστήσωμεν δύο (ἢ περισσοτέρους) παράγοντας μὲ τὸ γινόμενον αὐτῶν.

β) Νὰ ἀντικαταστήσωμεν ἔνα παράγοντα μὲ δύο (ἢ περισσοτέρους) ἄλλους οἱ ὅποιοι ἔχουν αὐτὸν ὡς γινόμενον.

'Εφαρμογαί. 1) $6 \cdot 4 \cdot 25 \cdot 2 = 6 \cdot 100 \cdot 2 = 1200$

2) $20 \cdot 25 \cdot 3 = 5 \cdot 4 \cdot 25 \cdot 3 = 5 \cdot 100 \cdot 3 = 1500$

31. 3. Γινόμενον ἐπὶ άριθμὸν

"Εάν πολλαπλασιάσωμεν τὸ γινόμενον $(2 \cdot 3 \cdot 5)$ ἐπὶ τὸν ἀκέραιον 4.

"Έχομεν $(2 \cdot 3 \cdot 5) \cdot 4 = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 4$ ('Αναλυτικὴ ίδιότης)

καὶ $2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 4 = 2 \cdot 3 \cdot (5 \cdot 4)$ ('Συνθετικὴ ίδιότης)

"Ήτοι $(2 \cdot 3 \cdot 5) \cdot 4 = 2 \cdot 3 \cdot (5 \cdot 4)$

Γενικώς

$$(\alpha \cdot \beta \cdot \gamma) \cdot \delta = \alpha \cdot \beta \cdot (\gamma \cdot \delta)$$

$\Rightarrow \alpha \cdot (\beta \cdot \delta) \cdot \gamma = \alpha \cdot (\beta \cdot \delta) \cdot \gamma$ δηλατούσαν
 $\alpha \cdot \beta \cdot \delta \cdot \gamma = (\alpha \cdot \delta) \cdot \beta \cdot \gamma$

Διὰ νὰ πολλαπλασιάσωμεν ἐν γινόμενον μὲ ἔνα ἀριθμὸν ἀρκεῖ νὰ πολλαπλασιάσωμεν ἔνα μόνον παράγοντα τοῦ γινομένου μὲ τὸν ἀριθμὸν αὐτόν.

Έφαρμογή. $(2 \cdot \alpha) \cdot 3 = (2 \cdot 3) \cdot \alpha = 6 \cdot \alpha$

31. 4. Γινόμενον ἐπὶ γινόμενον

Ἄσ πολλαπλασιάσωμεν τὸ γινόμενον 2.3 ἐπὶ τὸ γινόμενον 4.5.

Έχομεν : $(2 \cdot 3) \cdot (4 \cdot 5) = 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5$ ('Αναλυτικὴ Ιδιότης)

Γενικῶς

$$(\alpha \cdot \beta) \cdot (\gamma \cdot \delta) = \alpha \cdot \beta \cdot \gamma \cdot \delta \text{ δῆλον } \alpha, \beta, \gamma, \delta \in N_0$$

Διὰ νὰ πολλαπλασιάσωμεν δύο γινόμενα ἀρκεῖ νὰ σχηματίσωμεν ἐν νέον γινόμενον τὸ διποῖον νὰ περιέχῃ δλους τοὺς παράγοντας τῶν δύο γινομένων καὶ μόνον αὐτούς.

Έφαρμογή : $(2 \cdot \alpha) \cdot (3 \cdot \beta) = 2 \cdot \alpha \cdot 3 \cdot \beta = (2 \cdot 3) \alpha \cdot \beta = 6 \cdot \alpha \cdot \beta$ δῆλον $\alpha, \beta \in N_0$

32. ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑ ΑΚΕΡΑΙΩΝ

Οἱ ἀριθμοὶ 0, 7, 14, 21, 28 προκύπτουν ἐὰν πολλαπλασιάσωμεν τὸ 7 ἐπὶ 0, 1, 2, 3, 4 ἀντιστοίχως. Διὰ τοῦτο λέγονται πολλαπλάσια τοῦ 7.

Γενικῶς τὸ γινόμενον ἐνὸς ἀκέραιου α μὲ οἰονδήποτε ἀκέραιου λέγεται πολλαπλάσιον τοῦ α .

"Ητοι τὰ πολλαπλάσια τοῦ $\alpha \in N_0$ εἶναι : 0.α, 1.α, 2.α, 3.α, ..."

Τὸ σύνολον $\Pi(7) = \{0, 7, 14, 21, 28, \dots\}$ τὸ διποῖον ἀπαρτίζεται ἀπὸ τὰ πολλαπλάσια τοῦ 7, λέγεται σύνολον τῶν πολλαπλάσιων τοῦ ἀκέραιου 7.

Τοιουτοτρόπως τὸ σύνολον τῶν πολλαπλασίων τοῦ α εἶναι :

$$\Pi(\alpha) = \{0, \alpha, 2\alpha, 3\alpha, \dots\}$$

Εἶναι φανερὸν ὅτι τὸ σύνολον τῶν πολλαπλασίων ἐνὸς ἀκέραιου εἶναι ἐν ἀπειροσύνολον.

Παρατηρήσεις

1) Ἐπειδὴ $0 \cdot \alpha = 0$, δῆλον $\alpha \in N_0$, ἐπεταί δῆλον τὸ 0 εἶναι πολλαπλάσιον οἰονδήποτε ἀκέραιου.

2) Ἐπειδὴ $\alpha \cdot 1 = \alpha$, δῆλον $\alpha \in N_0$, ἐπεταί δῆλον ἕκαστος ἀκέραιος εἶναι πολλαπλάσιον τοῦ ἑαυτοῦ του.

ΣΙ νότιον καιρού περιοδού ήταν το πάσχα της οποίας η ζωή στην Ελλάς ήταν απλή. Οι Έλληνες έπαιζαν σκάκι, διαβάζουν βιβλία, γέμισαν την πόλη με λαούς από όλη την Ευρώπη. Τα θερινά μέση ήταν ιδανικά για την αθλητική δραστηριότητα.

ΠΙΝΑΞ

Ένα παιχνίδι που ήταν πολύ δημοφιλές στην Ελλάς ήταν το πινάκι.

ΣΙ ίσως

- (5) 1. Έάν $\alpha, \beta \in N_0$, τότε υπάρχει είς καὶ μόνον είς ἀκέραιος γ - α · β.
2. Έάν $\alpha, \beta \in N_0$, τότε $\alpha \cdot \beta = \beta \cdot \alpha$.
3. Έάν $\alpha, \beta, \gamma \in N_0$, τότε $(\alpha \cdot \beta) \cdot \gamma = \alpha \cdot (\beta \cdot \gamma)$.
4. » » τότε $\alpha \cdot (\beta + \gamma) = \alpha \cdot \beta + \alpha \cdot \gamma$.
5. » $\alpha \in N_0$ τότε $\alpha \cdot 1 = 1 \cdot \alpha = \alpha$.
6. » $\alpha, \beta, \gamma \in N_0$ τότε $\alpha \cdot \beta \cdot \gamma \cdot \delta = \alpha \cdot \gamma \cdot \beta \cdot \delta = \alpha \cdot \delta \cdot \beta \cdot \gamma$.
7. » $\alpha, \beta, \gamma, \delta \in N_0$ τότε $\alpha \cdot \beta \cdot \gamma \cdot \delta = \alpha \cdot (\beta \cdot \gamma) \cdot \delta = \alpha \cdot (\delta \cdot \beta) \cdot \gamma$.
8. » » τότε $(\alpha \cdot \beta \cdot \gamma) \cdot \delta = \alpha \cdot \beta \cdot (\gamma \cdot \delta)$.
9. » » τότε $(\alpha \cdot \beta) \cdot (\gamma \cdot \delta) = \alpha \cdot \beta \cdot \gamma \cdot \delta$.
10. » $\alpha, \beta \in N_0, \gamma \in N$ » $\alpha = \beta \iff \alpha \cdot \gamma = \beta \cdot \gamma$.
11. » » $\alpha > \beta \iff \alpha \cdot \gamma > \beta \cdot \gamma$.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

71. Εις τάς Ισότητας i) $\alpha \cdot \beta \cdot \gamma = 24$; ii) $\alpha \cdot \beta \cdot \gamma = 72$ νά δώσετε έκαστην δυνατήν τιμήν εἰς τά γράμματα α, β, γ ώστε νά διληθεύνουν αύται.

72. Ποιαί Ισότητες τοῦ πολλαπλασιασμοῦ μᾶς ἐπιτρέπουν νά γράψωμεν:

$$i) 2 \cdot 7 \cdot 9 \cdot 4 = 8 \cdot 63 = 2 \cdot 7 \cdot 36 \quad ii) 25 \cdot 4 \cdot 5 = 100 \cdot 5 = 25 \cdot 20$$

73. Τὸ γινόμενον δύο ἀριθμῶν εἶναι 50. Πῶς θὰ μεταβληθῇ τοῦτο:

α) Έάν πολλαπλασάσωμεν τὸν ἑνα παράγοντα ἐπὶ 3, β) Έάν πολλαπλασιάσωμεν τὸν ἑνα παράγοντα ἐπὶ 5 καὶ τὸν δλλον ἐπὶ 2.

74. Συμπληρώσατε τάς κατωτέρω σχέσεις:

$$x = 3 \iff 5 \cdot x = ; \quad x < 4 \iff 7 \cdot x < \dots$$

75. α) Γράψατε τὸ σύνολον τῶν πολλαπλασίων τοῦ 6 τὰ δποτα περιέχονται μεταξὺ 20 καὶ 76.

β) Γράψατε 3 διψήφια καὶ 4 τριψήφια πολλαπλάσια τοῦ 15.

33. Η ΠΡΑΞΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΕΩΣ

33. 1. Όρισμός

Ο ἐπιστάτης τοῦ Γυμνασίου διὰ νὰ δώσῃ 5 κιμωλίας εἰς ἔκαστον τῶν 12 τμημάτων αὐτοῦ λαμβάνει ἐν δλω κιμωλίας $12 \cdot 5 = 60$.

Όταν φθάνῃ εἰς τὴν Α' τάξιν λησμονεῖ πόσας κιμωλίας πρέπει νὰ δώσῃ εἰς ἔκαστον τμῆμα. Τοιουτορόπως γεννᾶται τὸ ἑξῆς πρόβλημα:

Τὸ γινόμενον τοῦ 12 μὲ «κάποιον» ἀκέραιον ίσοῦται μὲ 60. Ποῖος εἶναι ὁ ἀκέραιος οὗτος;

«Ητοι, έὰν παραστήσωμεν μὲ χ τὸν ζητούμενον ἀκέραιον θὰ πρέπει

$$12 \cdot x = 60 \quad (1)$$

Ο δριθμός $\chi = 5$ μὲ τὸν ὅποιον πρέπει νὰ πολλαπλασιάσωμεν τὸν 12 διὰ νὰ δώσῃ γινόμενον 60 λέγεται ἀκριβὲς πηλίκον τῶν δριθμῶν 60 καὶ 12.

Γράφομεν δὲ

$$60 : 12 = \chi$$

(2)

Απὸ τὰ ἀνωτέρω ἔννοῦμεν δτι αἱ σχέσεις (1) καὶ (2) ἐκφράζουν τὸ αὐτὸ πρόβλημα, ἔχουν τὴν αὐτὴν σημασίαν (εἰναι ταυτόσημοι). "Ητοι : 'Εὰν ισχύῃ ἐκάστη ἀπὸ αὐτὰς θὰ ισχύῃ καὶ ἡ ἄλλη. Διὰ τοῦτο γράφομεν

$$12 \cdot \chi = 60 \iff 60 : 12 = \chi$$

Γενικῶς : 'Εὰν $\beta \in N_0$, $\alpha \in N$ καὶ ὑπάρχῃ ἀκέραιος χ τοιοῦτος ὥστε
 $\alpha \cdot \chi = \beta$

τότε λέγομεν δτι ὁ χ εἶναι τὸ ἀκριβὲς πηλίκον τοῦ β διὰ α .

Γράφομεν δὲ

$$\beta : \alpha = \chi$$

Ἡ πρᾶξις μὲ τὴν ὅποιαν εἰς τὸ ζεῦγος (β, α) ἀντιστοιχίζομεν τὸ ἀκριβὲς πηλίκον $\beta : \alpha$, ἐὰν ὑπάρχῃ, δονομάζεται τελεία διαιρεσίς.

$$(\beta, \alpha) \longrightarrow \beta : \alpha$$

β εἶναι ὁ διαιρετέος αὐτῆς καὶ ὁ α διαιρέτης. Τὸ σύμβολον τῆς διαιρέσεως εἶναι :

33.2. "Ἄσ ἐπανέλθωμεν εἰς τὸ παράδειγμά μας.

"Ο ἐπιστάτης ἔγνωριζεν δτι δ 60 ἦτο πολλαπλάσιον τοῦ 12. 'Ελησμόνησεν δμῶς ποιὸν πολλαπλάσιον.

"Ἄσ ιδωμεν πρὸς τοῦτο τὰ διαδοχικὰ πολλαπλάσια τοῦ 12

$$0 \cdot 12, 1 \cdot 12, 2 \cdot 12, 3 \cdot 12, 4 \cdot 12, \dots, 5 \cdot 12, \dots$$

$$" \quad 0 \quad 12 \quad 24 \quad 36 \quad 48 \quad 60 \quad \dots$$

Μεταξὺ αὐτῶν ὑπάρχει τὸ 60. Εἶναι δὲ $60 = 5 \cdot 12$. Τοῦτο σημαίνει δτι τὸ 5 εἶναι τὸ ἀκριβὲς πηλίκον τοῦ 60 διὰ 12.

Γενικῶς, ἐὰν σ καὶ β εἶναι δύο ἀκέραιοι, $\alpha \neq 0$, διὰ νὰ εὔρωμεν τὸ ἀκριβὲς πηλίκον $\beta : \alpha$ σχηματίζομεν τὸ σύνολον τῶν διαδοχικῶν πολλαπλασίων τοῦ α .

"Υπάρχουν τότε δύο περιπτώσεις :

i) 'Ο β νὰ εἶναι στοιχεῖον τοῦ ἀνωτέρω συνόλου' π.χ. νὰ εἶναι $\beta = \pi$. Ο Τότε ὑπάρχει εἰς τὸ σύνολον N_0 ἀκριβὲς πηλίκον τοῦ β διὰ α εἶναι τὸ π .

ii) 'Ο β νὰ μὴ εἶναι στοιχεῖον τοῦ συνόλου τούτου. Τότε δὲν ὑπάρχει ἀκριβὲς πηλίκον τοῦ β διὰ α εἰς τὸ N_0 .

"Ωστε: 'Η τελεία διαιρέσις β διά α είναι δυνατή είς τὸ σύνολον №₀ μόνον όταν δ β είναι πολλαπλάσιον τοῦ α.'

33.3. Ισοδυναμία σχέσεων $\alpha \cdot \beta = \gamma$, $\gamma : \beta = \alpha$, $\gamma : \alpha = \beta$.

'Από τὸν δρισμὸν τῆς διαιρέσεως ἔχομεν:

$$\begin{array}{l} \alpha \cdot \beta = \gamma \\ 3 \cdot 4 = 12 \end{array} \iff \begin{array}{l} 12 : 4 = 3 \\ 4 \cdot 3 = 12 \end{array}$$

Γενικῶς, δηλαδὴ φαίνεται παραστατικῶς καὶ εἰς τὸ σχ. 19, ὅταν μεταξὺ τριῶν ἀκεραιῶν α, β, γ είναι $\alpha \cdot \beta = \gamma$, θὰ είναι ἐπίσης καὶ $\gamma : \beta = \alpha$ καὶ $\gamma : \alpha = \beta$. Ἐπίσης, ἔτσι είναι $\gamma : \beta = \alpha$ (ἢ $\gamma : \alpha = \beta$). θὰ είναι καὶ $\alpha \cdot \beta = \gamma$.

"Η συμβολικῶς:

$$\begin{array}{ll} \alpha \cdot \beta = \gamma & \iff \gamma : \beta = \alpha \\ \alpha \cdot \beta = \gamma & \iff \gamma : \alpha = \beta \end{array}$$

Παραδείγματα

- α) Άφοῦ είναι $4 \cdot 5 = 20$ είναι ἐπίσης $20 : 4 = 5$ καὶ $20 : 5 = 4$
 β) Άφοῦ είναι $36 : 12 = 3$ είναι ἐπίσης $3 \cdot 12 = 36$ καὶ $36 : 3 = 12$

33.4. Ἐπίλυσις ἀπλῶν ἔξισώσεων

α) Νὰ εύρεθῇ ἀριθμὸς χ τοιοῦτος ώστε $8 \cdot \chi = 56$

Διὰ νὰ ἐπιλύσωμεν τὴν ἀνωτέρω ἔξισωσιν σκεπτόμεθα ὅτι:

$$\begin{array}{ll} \alpha \cdot \beta = \gamma & \iff \beta = \gamma : \alpha \\ 8 \cdot \chi = 56 & \iff \chi = 56 : 8 \end{array} \text{ "Ητοι } \chi = 7$$

'Επαλήθευσις $8 \cdot 7 = 56$

β) Νὰ εύρεθῇ ἀριθμὸς χ τοιοῦτος ώστε $\chi : 7 = 4$

$$\begin{array}{ll} \text{Σκεπτόμεθα ὅτι} & \gamma : \beta = \alpha \iff \gamma = \alpha \cdot \beta \\ \text{"Άρα} & \chi : 7 = 4 \iff \chi = 7 \cdot 4 \quad \text{"Ητοι } \chi = 28 \end{array}$$

'Επαλήθευσις $28 : 7 = 4$

γ) Νὰ εύρεθῇ ἀριθμὸς χ τοιοῦτος ώστε $72 : \chi = 8$

$$\begin{array}{ll} \text{Σκεπτόμεθα ὅτι} & \alpha : \gamma = \beta \iff \alpha : \beta = \gamma \\ \text{"Άρα} & 72 : \chi = 8 \iff 72 : 8 = \chi \quad \text{"Ητοι } \chi = 9 \end{array}$$

'Επαλήθευσις $72 : 9 = 8$

Γενικῶς, ἐκάστη ἔξισωσις τῆς μορφῆς $\alpha \cdot \chi = \beta$ ἔχει τὴν λύσιν $\chi = \beta : \alpha$

'Ομοίως ἡ ἔξισωσις τῆς μορφῆς $\chi : \alpha = \beta$ ἔχει τὴν λύσιν $\chi = \beta \cdot \alpha$ καὶ ἡ ἔξισωσις τῆς μορφῆς $\beta : \chi = \alpha$ ἔχει τὴν λύσιν $\chi = \beta : \alpha$ ὅπου $\alpha \in \mathbb{N}_0$, $\beta \in \mathbb{N}_0$ καὶ αἱ ἔξισώσεις ἔχουν λύσιν εἰς τὸ σύνολον №.

•Εξισωσις

Δύσις

$$\alpha \cdot x = \beta$$

$$x = \beta : \alpha$$
 .ε. 28

$$x : \alpha = \beta$$

$$x = \beta \cdot \alpha$$

$$\beta : x = \alpha$$

$$x = \beta : \alpha$$

33.5. Η διαίρεσις ως πρᾶξις άντιστροφος του πολλαπλασιασμού.

Έαν τὸν ἀριθμὸν 4 πολλαπλασιάσωμεν ἐπὶ 5 λαμβάνομεν 20. Εάν τὸν 20 διαιρέσωμεν διὰ 5 ἔπανευρίσκομεν 4.

$$4 \cdot 5 = 20$$

καὶ

$$20 : 5 = 4$$

"Ητοι :

$$(4 \cdot 5) : 5 = 4$$

Γενικῶς

$$(\alpha \cdot \beta) : \beta = \alpha$$

Διὰ τοῦτο λέγομεν ὅτι η διαίρεσις εἶναι ἀντίστροφος πρᾶξις του πολλαπλασιασμού.

34. ΕΙΔΙΚΑΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΙΡΕΣΕΩΣ

34.1. Η διαίρεσις $0 : \alpha$, δηλου $\alpha \in \mathbb{N}$.

Θέτομεν

$$0 : \alpha = x \iff 0 = x \cdot \alpha$$

Έπειδὴ $\alpha \neq 0$, τὸ γινόμενον $x \cdot \alpha$ εἶναι 0 μόνον ὅταν $x = 0$.

"Ἄρα

$$0 : \alpha = 0$$

34.2. Η διαίρεσις $0 : 0$

Θέτομεν

$$0 : 0 = x \iff 0 = 0 \cdot x$$

Η ισότης $0 = 0 \cdot x$ ἀληθεύει δι' οἰανδήποτε τιμὴν τοῦ x . (Διατί;)

Συνεπῶς, ἔκαστος ἀριθμὸς δύναται νὰ εἶναι πηλίκον τῆς διαιρέσεως $0 : 0$. Διὰ τοῦτο λέγομεν ὅτι η διαίρεσις $0 : 0$ εἶναι ἀδύνατος.

34.3. Η διαίρεσις $\alpha : 0$, δηλου $\alpha \in \mathbb{N}$

Θέτομεν

$$\alpha : 0 = x \iff \alpha = 0 \cdot x$$

Η ισότης $\alpha = 0 \cdot x$ δι' ούδεμίαν τιμὴν τοῦ x ἀληθεύει (Διατί;)

Συνεπῶς, η διαίρεσις $\alpha : 0$ εἶναι ἀδύνατος.

34.4. Η διαίρεσις $\alpha : 1$, δηλου $\alpha \in \mathbb{N}_0$

Θέτομεν

$$\alpha : 1 = x \iff \alpha = x \cdot 1 \iff \alpha = x$$

"Ἄρα $\alpha : 1 = \alpha$

34.5. Η διαιρέσις $\alpha : \alpha$ δύναται αντικαθίστανται με την πολλαπλότητα $\alpha \cdot 1$. Επομένως $\alpha : \alpha \iff \alpha = \alpha \cdot 1$.

Είτε πάντα σύνοδος ή αλλιώς γένησε την απόφαση την οποία πρέπει να παραβεβαιώσει ο Συνέδριος.

76) Ἀπό τὴν Ισότητα $325 = 13.25$ ποιας τελείας διαιρέσεις συνάγεται; ποιδ γιρή όπα?

a) $20 \cdot x = 80$
b) $x : 19 = 21$

79. Πάτην την πλευρά του λαβήσει και ποικιλές δένει εναντίον πονήματος.

$$0 : 5 = 5 \quad 0 : 3 = 0 \quad 0 : 0 = 2 \quad 3 : 0 = 3$$

$$3 : 1 = 0$$

$$0 : 3 = 0$$

$$6 : 6 = 1 \quad (S) \quad 6 : 6 = 0$$

35. Η ΑΤΕΛΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΙΣ

3.5.1 Ὁρισμὸς

Καθόδης είδομεν η $\hat{E} \xi \varsigma \omega \sigma i s$ $12 \cdot x = 60$ ἔχει τὴν λύσιν $x = 5$ διότι ὁ 60 είναι πολλαπλάσιον τοῦ 12.

"Ἄς λάβωμεν ἀντὶ τοῦ 60 τὸν ἀκέραιον 67· ἢτοι ἂς λάβωμεν τὴν ἔξισωσιν

$$12 \cdot x = 672$$

Διὸς οὐδὲ τίδωμεν ἐάν τι ἀνωτέρω ἔχεισθαις ἔχῃ λύσιν εἰς τὸ σύνολον Ν. ἀρκεῖ
νὰ τίδωμεν ἐάν τὸ 67 εἴναι πολλαπλάσιον τοῦ 12. Διὸς τούτῳ γράφομεν τὸ σύνολον
τῶν διαδοχικῶν πολλαπλασίων τοῦ 12.

$$A = \{12.0, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, \dots\}$$

$$H \quad A = \{ \quad 0, \quad 12, \quad 24, \quad 36, \quad 48, \quad 60, \quad 72 \quad \dots \}$$

Καθώς παρατηρούμεν τό 67 δὲν είναι πολλαπλάσιον τοῦ 12. Τούτο σημαίνει ότι δὲν υπάρχει εἰς τὸ σύνολον N_0 ἀκριβὲς πηλίκον τῆς διαιρέσεως 67 διὰ 12. Εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν λέγομεν ότι ἡ διαιρέσις είναι ἀτελὴς εἰς τὸ σύνολον N_0 . Παρατηρούμεν ότι ὁ 67 περιέχεται μεταξὺ δύο διαδοχικῶν πολλαπλασίων τοῦ 12. Συγκεκριμένως μεταξὺ τοῦ 60 καὶ τοῦ 72.

$$60 < 67 < 72$$

$$5.12 < 67 < 6.12$$

Από τὴν ἀνωτέρω διπλῆν ἀνισότητα ἐννοοῦμεν ὅτι ὁ ἀριθμὸς 5 εἰναι δι-
μέγιστος ἀκέραιος μὲ τὸν δποῖον εἶναι δυνατὸν νὰ πολλαπλασιασθῇ ὁ 12
καὶ νὰ δώσῃ γινόμενον μικρότερον τοῦ 67. Τὸν ἀκέραιον 5 ὀνομάζομεν ἀκέ-
ραιον πηλίκον τῆς ἀτελοῦς διαιρέσεως 67 διὰ 12· τὴν δὲ διαφορὰν

$$67 - 5 \cdot 12 = 67 - 60 = 7$$

ὄνομάζομεν ύπόλοιπον αὐτῆς.

Γενικῶς : 'Εὰν εἰναι α καὶ β δύο ἀκέραιοι $\alpha \neq 0$, $\beta > \alpha$ τότε, ἔὰν τὸ β δὲν εἰναι πολλαπλάσιον τοῦ α , θὰ περιέχεται μεταξὺ δύο διαδοχικῶν πολλαπλασίων π α καὶ $(\pi + 1) \cdot \alpha$ αὐτοῦ.

*Ητοι :

$$\pi \cdot \alpha < \beta < (\pi + 1) \cdot \alpha \quad (1)$$

Εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν λέγομεν ὅτι ἡ διαιρεσις β διὰ α εἰναι ἀτελὴς εἰς τὸ σύνολον N_0 .

*Απὸ τὴν διπλῆν ἀνισότητα (1) ἐννοοῦμεν ὅτι δὲ ἀκέραιος περιέχεται μεγιστος ἀκέραιος τοῦ διποίου τὸ γινόμενον ἐπὶ α εἰναι μικρότερον τοῦ β . Διὰ τοῦτο δὲ ἀκέραιος περιέχεται ἀκέραιον πηλίκον τῆς ἀτελοῦς διαιρέσεως β διὰ α .

*Η διαιροφά

$$\beta - (\pi \cdot \alpha) = u \quad (2)$$

εἰναι μικρότερα τοῦ α (διατί;) καὶ δυνομάζεται ύπόλοιπον τῆς ἀτελοῦς διαιρέσεως β διὰ α .

*Έκ τῆς (2) λαμβάνομεν

$$\beta = (\pi \alpha) + u \quad (3)$$

$$u < \alpha$$

*Ἐπειδὴ δὲ συνήθως παριστάνομεν μὲν Δ τὸν διαιρετέον, δὲ τὸν διαιρέτην, περὶ τὸ πηλίκον καὶ υ τὸ ὑπόλοιπον, αἱ ἀνωτέρω σχέσεις (3) γράφονται :

$$\Delta = \delta \cdot \pi + u \quad (4)$$

$$u < \delta$$

Αἱ σχέσεις (4), ὡς εἰναι γραμμέναι, ἀποτελοῦν τὰς βασικὰς συνθήκας τῆς ἀτελοῦς διαιρέσεως. Μᾶς ἐπιτρέπουν δὲ ἐκ τῶν Δ καὶ δ νὰ εὔρωμεν κατὰ ἔνα μόνον τρόπον * δύο ἄλλους ἀριθμούς : τὸ ἀκέραιον πηλίκον περιέχεται τὸ ὑπόλοιπον τῆς ἀτελοῦς διαιρέσεως Δ διὰ δ.

Εἰς τὸ παράδειγμά μας ἡ σχέσις

$$67 = 5 \cdot 12 + 7$$

δηλῶνει ὅτι δ 5 εἰναι τὸ ἀκέραιον πηλίκον, δ 12 διαιρέτης καὶ δ $7 < 12$ τὸ ὑπόλοιπον.

* Ή ίδια σχέσις δὲν μᾶς ἐπιτρέπει νὰ λάβωμεν τὸν 12 ὡς πηλίκον καὶ τὸν 5 ὡς διαιρέτην, διότι τότε τὸ ὑπόλοιπον 7 θὰ ἔται μεγαλύτερον τοῦ διαιρέτου 5.

Παρατηρήσεις

i) * Εάν εἰς τὰς συνθήκας (4) εἰναι $u = 0$, ἔχομεν $\Delta = \delta \cdot \pi$.

* Ητοι ἡ διαιρεσις εἰναι τελεία καὶ δ ἀκέραιος περιέχεται τὸ ἀκριβὲς πηλίκον αὐτῆς.

ii) * Εάν λάβωμεν $\Delta = 2$ καὶ $\delta = 3$ ήτοι $\Delta < \delta$ παρατηροῦμεν ὅτι αἱ συνθήκαι (4) ἀληθεύουν μόνον ὅταν $\pi = 0$.

* Πράγματι $(\pi \cdot \delta) + u < (\pi \delta) + \delta$ διότι $u < \delta$

$$\pi \delta < (\pi + 1) \delta$$

Δηλαδὴ δ ἀκέραιος περιέχεται τὸ μοναδικὸς μέγιστος ἀκέραιος διὰ τὸ διποίον εἰναι $\pi \cdot \delta < \Delta$.

$$2 = 0 \cdot 3 + 2 \quad \text{καὶ} \quad 2 < 3$$

Εις τὴν περίπτωσιν αὐτὴν λέγομεν ὅτι τὸ ἀκέραιον πηλίκον τῆς διαιρέσεως 2 διὰ 3 εἶναι τὸ μηδέν.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

79. Νὰ εύρεθοῦν τὰ δύο διαδοχικά πολλαπλάσια τοῦ 15 μεταξὺ τῶν διποίων περιέχεται ὁ ἀριθμός 80. Νὰ ἐκφρασθῇ τὸ ἀποτέλεσμα μὲ μίαν διπλήν ἀνίστοτηα· νὰ εύρεθῃ τὸ ἀκέραιον πηλίκον καὶ τὸ ὑπόλοιπον τῆς διαιρέσεως.

80. Νὰ γραφῇ τὸ σύνολον τῶν ὑπολοίπων τῶν διαιρέσεων αἱ διποῖαι ἔχουν ὡς διαιρέτην:

$$\begin{array}{lll} 1) \ 4 & 11) \ 9 & 111) \ \gamma \in N_0 \end{array}$$

81. Συμπληρώσατε τὸν ἀκέραιον ὁ διποῖος λείπει εἰς τὰς ισότητας:

$$97 \cdot 122 + 38 = \dots$$

$$615 = \dots 30 + 15$$

82. Ὁ διαιρέτης μιᾶς διαιρέσεως είναι Ἰσος μὲ 7 ποτοῖαι είναι αἱ δυναταὶ τιμαὶ τοῦ ὑπολοίπου;

36. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΙΡΕΣΕΩΣ

36.1. Παρατηροῦμεν ὅτι ἔνω $35 : 7 = 5$, δὲν ὑπάρχει ἀκριβὲς πηλίκον τῆς διαιρέσεως $7 : 35$ εἰς τὸ σύνολον N_0 .

"Ωστε: Δὲν ισχύει ἡ μεταθετικὴ ιδιότης.

36.2. "Ἄς λάβωμεν τὰς διαιρέσεις $(40 : 10) : 2$ καὶ $40 : (10 : 2)$

"Ἔχομεν: α) $40 : 10 = 4$ καὶ $4 : 2 = 2$.

"Ητοι $(40 : 10) : 2 = 2$ (1)

β) $10 : 2 = 5$ καὶ $40 : 5 = 8$

"Ητοι $40 : (10 : 2) = 8$ (2)

"Ἐκ τῶν (1) καὶ (2) προκύπτει ὅτι

$$(40 : 10) : 2 \neq 40 : (10 : 2)$$

"Ωστε: Δὲν ισχύει ἡ προσεταιριστικὴ ιδιότης.

36.3. Πολλαπλασιασμὸς τῶν ὅρων διαιρέσεως μὲ τὸν αὐτὸν φυσικὸν ἀριθμόν.

Εις τὸν παραπλεύρως πίνακα ἔχομεν συγκεντρώσει στοιχεῖα ἀπὸ τέσσαρας διαιρέσεις. "Ἄς προσέχωμεν τὸν διαιρετέον (Δ), τὸ διαιρέτην (δ), τὸ πηλίκον (π) καὶ τὸ ὑπόλοιπον (υ). Παρατηροῦμεν ὅτι:

"Όταν πολλαπλασιάζεται ὁ διαιρετέος καὶ ὁ διαιρέτης ἐπὶ 2, 3, 4 τότε τὸ μὲν πηλίκον δὲν μεταβάλλεται, τὸ δὲ ὑπόλοιπον πολλαπλασιάζεται ἐπὶ 2, 3, 4 ἀντιστοίχως.

Δ	δ	π	υ
23	5	4	3
46	10	4	6
69	15	4	9
92	20	4	12

Γενικώς, ος λάβωμεν τάς συνθήκας διαιρέσεως

$$\Delta = \delta \cdot \pi + v, \quad v < \delta$$

και ος πολλαπλασιάσωμεν έκαστην τούτων μέ τὸν φυσικὸν ἀριθμὸν μ .

"Έχομεν $\Delta \cdot \mu = (\delta \cdot \pi + v) \cdot \mu, \quad \mu \cdot v < \mu \cdot \delta$

ή $\Delta \cdot \mu = \mu \cdot \delta \cdot \pi + \mu \cdot v, \quad \mu \cdot v < \mu \cdot \delta$

» $\Delta \cdot \mu = (\mu \cdot \delta) \cdot \pi + \mu \cdot v \quad \mu \cdot v < \mu \cdot \delta \quad \text{as (1)}$

Ἐκ τῶν συνθηκῶν (1) συνάγομεν δτι τὸ γινόμενον $\mu \cdot v$ είναι τὸ ὑπόλοιπον τῆς διαιρέσεως εἰς τὴν ὅποιαν διαιρετέος είναι τὸ γινόμενον $\Delta \cdot \mu$, διαιρέτης τὸ γινόμενον $\delta \cdot \mu$ καὶ πηλίκον τὸ π .

"Ωστε: Ἐὰν πολλαπλασιάσωμεν καὶ τοὺς δύο δρους μιᾶς διαιρέσεως μὲ τὸν αὐτὸν φυσικὸν ἀριθμὸν τὸ μὲν πηλίκον δὲν μεταβάλλεται, τὸ δὲ ὑπόλοιπον πολλαπλασιάζεται μὲ τὸν αὐτὸν ἀριθμόν.

Τοιουτορόπως, μία τελεία διαιρεσίς παραμένει τελεία καὶ μετά τὸν πολλαπλασιασμὸν τῶν δρων τῆς μὲ τὸν αὐτὸν φυσικὸν ἀριθμόν.

36.4. Διαιρεσίς διὰ φυσικοῦ ἀριθμοῦ ἐνὸς ἀθροίσματος μὲ δρους πολλαπλάσια τοῦ ἀριθμοῦ αὐτοῦ.

Ἐις τὸ ἀθροίσμα $12 + 20 + 16$ δλοι οἱ δροι του είναι πολλαπλάσια τοῦ 4.

"Ητοι ἔχομεν: $12 = 4 \cdot 3 \iff 12 : 4 = 3$

$$20 = 4 \cdot 5 \iff 20 : 4 = 5$$

$$\underline{16 = 4 \cdot 4} \iff \underline{16 : 4 = 4}$$

Ἄπὸ τὰ πρῶτα μέλη τῶν ἀνωτέρω ίσοδυναμιῶν ἔχομεν

$$12 + 20 + 16 = 4 \cdot 3 + 4 \cdot 5 + 4 \cdot 4$$

"Η $12 + 20 + 16 = 4 \cdot (3 + 5 + 4) \quad (\text{Διατί?})$

"Η $(12 + 20 + 16) : 4 = 3 + 5 + 4 \quad (1)$

Ἄπὸ τὰ δεύτερα μέλη ἔχομεν

$$(12 : 4) + (20 : 4) + (16 : 4) = 3 + 5 + 4 \quad (2)$$

Ἐκ τῶν (1) καὶ (2) λαμβάνομεν

$$(12 + 20 + 16) : 4 = (12 : 4) + (20 : 4) + (16 : 4)$$

Γενικῶς: Ἐὰν $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{N}_0$ καὶ πολλαπλάσια τοῦ v

$$(\alpha + \beta + \gamma) : v = (\alpha : v) + (\beta : v) + (\gamma : v)$$

"Ωστε: Ἡ διαιρεσίς είναι ἐπιμεριστικὴ πρᾶξις ὡς πρὸς τὴν πρόσθεσιν ὅταν αἱ μερικαὶ διαιρέσεις είναι δυνάται εἰς τὸ \mathbb{N}_0 .

36.5. Διαιρεσίς διὰ φυσικοῦ ἀριθμοῦ μιᾶς διαιφορᾶς μὲ δρους πολλαπλάσια τοῦ ἀριθμοῦ αὐτοῦ.

Οι ἀκέραιοι 28 καὶ 21 εἶναι πολλαπλάσια τοῦ 7.

Ήτοι ἔχομεν $28 = 4 \cdot 7 \iff 28 : 7 = 4$
καὶ $\underline{21 = 3 \cdot 7} \iff \underline{21 : 7 = 3}$

Από τὰ πρῶτα μέλη τῶν ἀνωτέρω ίσοδυναμιῶν ἔχομεν

$$28 - 21 = 7 \cdot 4 - 7 \cdot 3 = 7 \cdot (4 - 3) \quad (\text{Διατί?})$$

Ήτοι $(28 - 21) : 7 = 4 - 3 \quad (1)$

Από τὰ δεύτερα μέλη τῶν ίδιων ίσοδυναμιῶν ἔχομεν

$$(28 : 7) - (21 : 7) = 4 - 3 \quad (2)$$

Έκ τῶν (1) καὶ (2) ἔχομεν:

$$(28 - 21) : 7 = (28 : 7) - (21 : 7)$$

Γενικῶς, ἐὰν οἱ ἀκέραιοι α, β εἶναι πολλαπλάσια τοῦ φυσικοῦ ἀριθμοῦ v καὶ

$\alpha > \beta$ τότε

$$(\alpha - \beta) : v = (\alpha : v) - (\beta : v)$$

Ωστε: Ή διαιρέσις εἶναι ἐπιμεριστική πρᾶξις ώς πρὸς τὴν ἀφαίρεσιν δτῶν δλαι αὶ μερικαὶ διαιρέσεις εἶναι δυναταὶ εἰς τὸ N_0 .

36.6. Διαιρέσις διὰ φυσικοῦ ἀριθμοῦ ἐνὸς γινομένου τὸ ὅποιον ἔχει ἔνα τούλαχιστον παράγοντα πολλαπλάσιον τοῦ ἀριθμοῦ αὐτοῦ.

Ἐστω τὸ γινόμενον $13 \cdot 12 \cdot 5$ τοῦ ὅποιου ὁ παράγων 12 εἶναι πολλαπλάσιον τοῦ 4.

Έχομεν

$$13 \cdot 12 \cdot 5 = 13 \cdot (3 \cdot 4) \cdot 5$$

$$= 4 \cdot (13 \cdot 3 \cdot 5) \quad (\text{Διατί?})$$

Ή διαιρέσις τοῦ $(13 \cdot 12 \cdot 5) : 4 = 13 \cdot 3 \cdot 5$ αριθμοῦ τοῦ διαιρέσιος τοῦ πολλαπλασιώρο τουλί γένοτο στο $= 13 \cdot (12 : 4) \cdot 5$ διαιρέσιος τοῦ πολλαπλασιώρο τουλί γένοτο στο

Γενικῶς, ἐὰν $\alpha, \beta, \gamma \in N_0$, $v \in N$ καὶ $\beta =$ πολλαπλάσιον τοῦ v τότε

$$(\alpha \cdot \beta \cdot \gamma) : v = \alpha \cdot (\beta : v) \cdot \gamma \quad (1)$$

Εἰδικὴ περίπτωσις

Ἐὰν $v = \beta$, ἡ σχέσις (1) γίνεται

$$(\alpha \cdot \beta \cdot \gamma) : \beta = \alpha \cdot (\beta : \beta) \cdot \gamma = \alpha \cdot 1 \cdot \gamma = \alpha \cdot \gamma$$

Ωστε: Διὰ νὰ διαιρέσωμεν ἐν γινομένον δι' ἐνὸς ἐκ τῶν παραγόντων του, ἀρκεῖ νὰ ἔξαλείψωμεν αὐτὸν ἀπὸ τὸ γινόμενον.

Έφαρμογή: $(25 \cdot 38 \cdot 13) : 38 = 25 \cdot 13$

36.7. Πηλίκον ἀριθμοῦ διὰ γινομένου

Διὰ τὸ πηλίκον 50: $(2 \cdot 5)$ ἔχομεν

$$2.5 = 10 \quad \text{καὶ} \quad 50 : 10 = 5$$

Ήτοι $50 : (2.5) = 5$ (1)

Παρατηροῦμεν ότι

$$50 : 2 = 25 \quad \text{καὶ} \quad 25 : 5 = 5$$

Ήτοι $(50 : 2) : 5 = 5$ (2)

Έκ τῶν (1) καὶ (2) έχομεν ότι

$$50 : (2.5) = (50 : 2) : 5$$

Γενικῶς, ἐάν $\alpha \in N_0$ καὶ $\beta, \gamma, \delta \in N$, έχομεν:

$$\alpha : (\beta. \gamma. \delta.) = [(\alpha : \beta) : \gamma] : \delta$$

μὲ τὴν προϋπόθεσιν ότι δλαι αἱ σημειούμεναι διαιρέσεις είναι δυναταὶ εἰς τὸ N_0

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

83. Ύπολογίσατε μὲ διαφόρους τρόπους τὰ ἔξῆς πιηλίκα:

$$36 \cdot (3 \cdot 4) = (36 + 24) : 12 =$$

$$(24 - 8) : 2 = (53 \cdot 14) : 7 =$$

$$(12 \cdot 19 \cdot 5) : 19 = (12 \cdot 19 \cdot 5) : 38 =$$

84) Νὰ ἑκτελεσθῶν αἱ διαιρέσεις:

$$(27 \cdot \alpha - 12) : 3. \quad 36\alpha : (3\alpha \cdot 4) = (120 \cdot \alpha + 8\alpha + 24) : 8 =$$

85. Έπαληθεύσατε ότι, ἐάν εἰς τὸν διαιρέτον μιᾶς διαιρέσεως προσθέσωμεν ἐν πολλαπλάσιον τοῦ διαιρέτου τὸ ύποδόιπον τῆς διαιρέσεως δὲν μεταβάλλεται.

37. ΑΛΛΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

37.1. Έκτὸς τῶν ἀριθμητικῶν παραστάσεων αἱ ὅποιαι περιέχουν προσθέσεις εἴτε ἀφαιρέσεις συνηντήσαμεν ἥδη καὶ ἄλλας ἀριθμητικὰς παραστάσεις, ήτοι ἀριθμητικὰς παραστάσεις εἰς τὰς ὅποιας είναι σημειωμέναι καὶ ἄλλαι πράξεις (πολλαπλασιασμὸς ἢ διαιρεσις).

37.2. Ὡς γνωστὸν ἡ γραφὴ $3 + (8 : 2)$ (1)

δηλώνει τὰς ἔξῆς κατά σειρὰν πράξεις:

$$\alpha) \quad 8 : 2 = 4 \quad \text{καὶ} \quad \beta) \quad 3 + 4 = 7$$

Ήτοι $3 + (8 : 2) = 3 + 4 = 7$

Όμοίως ἡ γραφὴ $23 - (8.2)$ (2)

δηλώνει: α) $8.2 = 16$ καὶ β) $23 - 16 = 7$

Ήτοι $23 - (8.2) = 23 - 16 = 7$

Διὰ νὰ ἀπλοποιήσωμεν τὴν γραφὴν τῶν παραστάσεων (1) καὶ (2) παραλείπομεν τὰς παρενθέσεις καὶ συμφωνοῦμεν τὰ ἔξῆς:

"Οταν εἰς μίαν ἀριθμητικὴν παράστασιν είναι σημειωμένοι καὶ πολλαπλασιασμοὶ ἢ διαιρέσεις ἑκτελοῦμεν πρῶτα τὰς πράξεις αὐτὰς καὶ

έπειτα τὰς προσθέσεις ή ἀφαιρέσεις κατά σειράν ἐξ ἀριστερῶν πρὸς τὰ δεξιά.

Παραδείγματα

$$\text{Άντι } 7 + (4 \cdot 5) \quad \text{γράφομεν} \quad 7 + 4 \cdot 5 \quad \text{καὶ εύρισκομεν} \quad 7 + 20 = 27$$

$$\Rightarrow (20 : 5) - 2 \quad \Rightarrow \quad 20 : 5 - 2 \quad \Rightarrow \quad 4 - 2 = 2$$

$$\Rightarrow (60 : 2) + (5 \cdot 3) \quad \Rightarrow \quad 60 : 2 + 5 \cdot 3 \quad \Rightarrow \quad 30 + 15 = 45$$

$$\Rightarrow 3 + (7 \cdot 2) - (2 + 3 \cdot 2) \Rightarrow 3 + 7 \cdot 2 - (2 + 6)$$

$$\qquad\qquad\qquad \Rightarrow 3 + 14 - 8 \quad \Rightarrow \quad 17 - 8 = 9$$

$$\text{Όμοιως ἡ γραφὴ } 6 \cdot 5 - 7 \cdot 3 + 1 \text{ σημαίνει } (6 \cdot 5) - (7 \cdot 3) + 1 = 30 - 21 + 1 = 10$$

$$\Rightarrow \quad \Rightarrow \quad 12 \cdot 2 + 3 \cdot 2 - 1 \quad \Rightarrow \quad (12 : 2) + (3 \cdot 2) - 1 = 6 + 6 - 1 = 11$$

$$\Rightarrow \quad \Rightarrow \quad 3 \cdot 4 : 2 + 5 \quad \Rightarrow \quad (3 \cdot 4) : 2 + 5 = 12 : 2 + 5 = 11$$

Αντιπαράδειγμα

$$\text{Ἡ παράστασις } (7 + 4) \cdot 5 \text{ δὲν γράφεται } 7 + 4 \cdot 5$$

$$\text{Πράγματι } (7 + 4) \cdot 5 = 11 \cdot 5 = 55 \quad \text{ἐνώ } 7 + 4 \cdot 5 = 7 + 20 = 27$$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

86. Νὰ υπολογισθῶν αἱ κάτωθι ἀριθμητικαὶ παραστάσεις:

$$\alpha) 6 \cdot 5 - 3 \cdot 2 \quad \beta) 6 \cdot 5 - 3 \cdot 2 - 2$$

$$\gamma) 88 : 4 \cdot 2 + 3 \cdot 4 - 5 \quad \delta) 120 : 8 - 2 \cdot 4 + 2$$

$$\varepsilon) 3 + 4 \cdot 2 + 8 \cdot (12 - 4)$$

ΠΙΝΑΞ

Ίδιοτήτων τῆς διαιρέσεως

1. $\Delta : \delta = \pi \Leftrightarrow \Delta = \delta \cdot \pi$ (τελεία διαιρέσις)
2. $\Delta = \delta \cdot \pi + \upsilon$ καὶ $\upsilon < \delta$ (ἀτελής διαιρέσις)
3. 'Εάν $\Delta = \delta \cdot \pi + \upsilon$ καὶ $\upsilon < \delta$
τότε $\mu \cdot \Delta = (\mu \cdot \delta) \pi + \mu \cdot \upsilon$ καὶ $\mu \cdot \upsilon < \mu \cdot \delta$
4. $(\alpha + \beta + \gamma) : \delta = (\alpha : \delta) + (\beta : \delta) + (\gamma : \delta)$
5. $(\alpha - \beta) : \gamma = (\alpha : \gamma) - (\beta : \gamma)$
6. $(\alpha \cdot \beta) : \gamma = (\alpha : \gamma) \cdot \beta$
7. $\alpha : (\beta \cdot \gamma) = (\alpha : \beta) : \gamma$
8. $0 : \alpha = 0, \quad 0 : 0 \text{ ἀόριστος},$
 $\alpha : \alpha = 1 \quad \alpha : 0 = \text{ἀδύνατος},$

Ἐννοεῖται ὅτι αἱ ἀνωτέρω ίδιότητες ισχύουν ὑπὸ τοὺς ἔξις περιορισμούς:
-ύπτα α) Οἱ διαιρέται νὰ εἰναι διάφοροι τοῦ μηδενός.

β) Αἱ σημειωμέναι διαιρέσεις νὰ εἰναι δυναταὶ εἰς N_0 .

38. ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΔΕΚΑΔΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ

Καθώς είδομεν είς τὸν κεφάλαιον τῆς ἀριθμήσεως ἔκαστος ἀριθμὸς εἰς τὸ δεκαδικὸν σύστημα ἀποτελεῖται ἀπὸ μονάδας διαφόρων τάξεων. Π.χ. ὁ ἀριθμὸς 2537 ἀποτελεῖται ἀπὸ 7 μονάδας (M), 3 δεκάδας (Δ), 5 ἑκατοντάδας (E) καὶ 2 χιλιάδας (X), γράφεται δὲ κατὰ τρόπον ἀνεπτυγμένον ὡς ἔξης :

$$2537 = 2X + 5E + 3\Delta + 7M$$

$$\text{Όμοιώς} \quad 4052 = 4X + 0E + 5\Delta + 2M$$

Ἡ ἀνωτέρω ἀνεπτυγμένη γραφὴ καὶ αἱ Ιδιότητες τῶν πράξεων θὰ μᾶς βοηθήσουν εἰς τὴν κατανόησιν τῆς τεχνικῆς τῆς ἐκτελέσεως αὐτῶν.

39. ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΣΕΩΣ

39.1. Διακρίνομεν τὰς ἔξης περιπτώσεις :

α) Οἱ ἀριθμοὶ εἶναι μονοψήφοι.

Διὰ νὰ εὔρωμεν τὸ ἄθροισμα δύο μονοψηφίων, π.χ. τὸ ἄθροισμα 5 σὺν 3, ἀρκεῖ νὰ γράψωμεν μετὰ τὸ 5 τοὺς τρεῖς διαδοχικοὺς ἀκεραίους 6, 7, 8 καὶ νὰ λάβωμεν τὸν τελευταῖον ἔξ αὐτῶν. Τὸ ἄθροισμα δύο μονοψηφίων ὀφείλομεν νὰ τὸ γνωρίζωμεν ἀπὸ μνήμης.

Ὁ κατωτέρω πίνακας μᾶς βοηθεῖ εἰς τὴν ἀσκησιν τῆς προσθέσεως μονοψηφίων ἀριθμῶν.

+	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Ο τρόπος συντάξεως τοῦ πίνακος γίνεται ἀμέσως φανερός, ὅταν προσέξωμεν κατὰ ποῖον τρόπον ἐίναι γραμμέναι αἱ διαδοχικαὶ σειραὶ τῶν ἀριθμῶν. Τὸ ἄθροισμα π.χ. $5+3$ εὑρίσκεται εἰς τὴν διασταύρωσιν τῆς σειρᾶς μὲ ἐπικεφαλίδα 5 καὶ τῆς στήλης μὲ ἐπικεφαλίδα 3. Τὸ ίδιον ἄθροισμα εὑρίσκομεν εἰς τὴν διασταύρωσιν τῆς σειρᾶς μὲ ἐπικεφαλίδα 3 καὶ τῆς στήλης μὲ ἐπικεφαλίδα 5. Διατί ;

β) Οι άριθμοί είναι πολυψήφιοι.

Η πρόσθεσης πολυψηφίων άριθμών ανάγεται εἰς τὴν πρόσθεσην μονοψηφίων ὡς ἔξης:

Έστω τὸ ἀθροισμα $235 + 528$

$$\begin{array}{r} 235 = 2E + 3\Delta + 5M \\ 528 = 5E + 2\Delta + 8M \end{array} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} \quad (\text{Πρόσθεσης ἀθροισμάτων})$$

$$7E + 5\Delta + 13M = 7E + 6\Delta + 3M \quad (\text{Διότι } 10M = 1\Delta)$$

$$= 763$$

Συντομώτερον ἡ ἀνωτέρω διαδικασία ἐκτελεῖται μὲ τὴν γνωστὴν πρακτικὴν διάταξιν τῆς προσθέσεως. Θέτομεν τὰς μονάδας τῆς αὐτῆς τάξεως εἰς $\frac{235}{+ 528}$
τὴν αὐτὴν στήλην καὶ μεταφέρομεν νοερῶς τὸ κρατούμενον μιᾶς $\frac{+ 528}{763}$
τάξεως εἰς τὴν ἀμέσως ἐπομένην τάξιν.

39.2. Δι' ἑφαρμογῆς τῶν Ἰδιοτήτων τῆς προσθέσεως είναι δυνατόν νὰ ἐλέγχωμεν ἐὰν ἐν ἀθροισμα εὑρέθη δρθῶς (δοκιμή) ἢ καὶ νὰ ἐκτελέσωμεν πολλάκις ἀσφαλέστερον μίαν πρόσθεσιν.

895	Ἡ πρόσθεσις ἔκ	124	Μερικὰ ἀθροίσματα
379	τῶν ἄνω πρὸς	7832	
+ 27	τὰ κάτω καὶ ἀν-	28	Ἡ ἀντικατάστασις
1521	τιστρόφως πρέ-	589	
2822	πει νὰ δώσῃ τὸ	375	προσθετέων μὲ τὸ
	αὐτὸ ἀποτέλεσμα	8948	
	(Διατί ;)	= 8948	ἀθροισμα των διευ-
			κολύνει ἢ ἐλέγχει
			τὸ τελικὸν ἀποτέ-
			λεσμα (Διατί ;)

40. ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ ΤΗΣ ΑΦΑΙΡΕΣΕΩΣ

40.1. Διακρίνομεν τὰς ἔξης περιπτώσεις :

α) Οι άριθμοί είναι μονοψήφιοι

$$9 - 5 = 4 \quad \text{διότι} \quad 4 + 5 = 9$$

β) Ἔκαστον ψηφίον τοῦ ἀφαιρετέου είναι μικρότερον ἢ ἵσον τοῦ ψηφίου τῆς αὐτῆς τάξεως τοῦ μειωτέου.

$$\begin{array}{r} 678 = 6E + 7\Delta + 8M \\ 375 = 3E + 7\Delta + 5M \end{array} \quad \left. \begin{array}{l} \text{'Αφαίρεσις ἀθροίσματος} \\ \text{ἀπὸ ἀθροισμα} \end{array} \right\} \quad 3E + 0\Delta + 3M = 303$$

Συντόμως
678
375
303

γ) Μερικὰ ψηφία τοῦ ἀφαιρετέου είναι μεγαλύτερα τῶν ἀντιστοίχων ψηφίων τοῦ μειωτέου.

$$\begin{array}{rcl} 4827 & = & 4X + 8E + 2\Delta + 7M \\ - 369 & = & 3E + 6\Delta + 9M \end{array}$$

Προσθέτομεν εις τὸν μειωτέον καὶ ἀφαιρέτον τὸν αὐτὸν ἀριθμόν, ἥτοι προσθέτομεν:
Εἰς τὸν μειωτέον 10M, 10Δ
Εἰς τὸν ἀφαιρετέον 1Δ, 1E

$$\begin{array}{rcl} 4X + 8E + 2\Delta + 7M & & \text{Η συντόμως} \\ 13E + 16\Delta + 9M & & 4827 \\ \hline 4X + 4E + 5\Delta + 8M & = & 4458 \\ (-) - M & & - 369 \\ \hline 4X + 4E + 5\Delta + 8M & = & 4458 \end{array}$$

40.2. Δοκιμή

Διὰ τὴν δοκιμὴν τῆς ἀφαιρέσεως, χρησιμοποιοῦμεν μίαν ἀπὸ τὰς γιω-
στὰς Ισοδυναμίας.

$$\alpha - \beta = \gamma \Leftrightarrow \alpha = \beta + \gamma \Leftrightarrow \alpha - \gamma = \beta$$

$$\text{Π.χ. } 837 - 253 = 584 \Leftrightarrow 584 + 253 = 837 \Leftrightarrow 837 - 584 = 253$$

41. ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ

41.1 Διακρίνομεν τὰς ἔξις περιπτώσεις :

α) Γινόμενον μονοψηφίων

Π.χ.

$$3.5 = 5 + 5 + 5$$

$$= 10 + 5 = 15$$

Τὰ γινόμενα, τὰ δποία εύρισκομεν, δταν πολλαπλασάσωμεν δύο οιουσδή-
ποτε μονοψηφίους ἀριθμούς είναι συγκεντρωμένα εἰς τὸν κατωτέρῳ Πυθαρία γό-
ρειον* πίνακα:

X	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18
3	0	3	6	9	12	15	18	21	24	27
4	0	4	8	12	16	20	24	28	32	36
5	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45
6	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54
7	0	7	14	21	28	35	42	49	56	63
8	0	8	16	24	32	40	48	56	64	72
9	0	9	18	27	36	45	54	63	72	81

* Πυθαρία γόρας: Ἐλλην φιλόσοφος καὶ μαθηματικός, γεννηθεὶς εἰς Σάμον περὶ τὸ 580 π.Χ. Ἰδρυτής τῆς Πυθαγορείου Σχολῆς, ἥτις ἀπετέλεσεν κέντρον διασπτύζεως τῶν Μαθηματικῶν, καὶ ιδίως τῆς Γεωμετρίας.

Ο τρόπος τῆς κατασκευῆς τοῦ πίνακος γίνεται ἀμέσως φανερός, ἐάν προσέξωμεν δτι 1) ή πρώτη στήλη ἔχει μόνον μηδενικά. 2) Εἰς τὴν δευτέραν στήλην οἱ ἀριθμοὶ αὐξάνονται κατὰ ἓν, εἰς τὴν τρίτην κατὰ δύο, εἰς τὴν τετάρτην κατὰ τρία κ.ο.κ.

Τό γινόμενον 5 · 7 εύρισκεται εἰς τὴν διασταύρωσιν τῆς σειρᾶς μὲ έπικεφαλίδα 5 καὶ τῆς στήλης μὲ έπικεφαλίδα 7 ή....

β) Ο εἰς παράγων εἶναι: 10, 100, 1000 κ.ο.κ.

Π.χ. $15 \cdot 10 = 15$ δεκάδες = 150 μονάδες
 $15 \cdot 100 = 15$ έκατοντάδες = 1500 μονάδες

Wrote: . . .

γ) Ο εις παραγων μονοψήφιος καὶ ὁ ἄλλος πολυ-
ψήφιος

$$\begin{array}{rcl} \text{π.χ.} & 218 = 2E + 1\Delta + 8M & (\text{'Επιμεριστική Ιδιότης}) \\ & \times \quad 3 & \\ \hline & 654 & 6E + 3\Delta + 24M = 6E + 5\Delta + 4M \\ & - 88 & = 654 - 108 \\ & & = 546 \end{array}$$

δ) Και οι δύο παράγοντες πολυψήφιοι

$$\text{Π.χ. } 318 \cdot 253 = 318 \cdot (2E + 5Δ + 3M) \\ = 318 \cdot 200 + 318 \cdot 50 + 318 \cdot 3 \quad (\text{'Επιμεριστική ιδιοτης'})$$

Υπολογίζομεν τὰ μερικὰ γινόμενα καὶ προσθέτομεν :

$$318 \cdot 200 = (318 \cdot 2) \cdot 100 = 636 \cdot 100 = 63600 \quad (\text{Για νόμενον έτη} \ 200)$$

$$318 \cdot 50 = (318 \cdot 5) \cdot 10 = 1590 \cdot 10 = 15900 \quad \Rightarrow \quad \Rightarrow \quad 50$$

$$318 \cdot 3 = 954$$

$$318.200 + 318.50 + 318.3 = 80454$$

‘Η διάταξις τῆς πράξεως γίνεται κατὰ τὸν γνωστὸν τρόπον ὡς ἔξις

$\begin{array}{r} 318 \\ \times 253 \\ \hline 954 \\ 1590 \\ 636 \\ \hline 80454 \end{array}$	<p>(Γινόμενον 318 ἐπί 3)</p> <p>(» » » 50)</p> <p>(» » » 200)</p>
---	---

"Όταν ό πολλαπλασιαστής έχη ένδιάμεσα μηδενικά έχομεν τὴν ἔξης συντομίαν :

$$\begin{array}{r}
 \text{σημειώσεις} \\
 \text{αριθμητικής} \\
 \text{πολλαπλασιασμού} \\
 \hline
 \begin{array}{r}
 3768 \\
 \times 1007 \\
 \hline
 26376 \\
 0000 \\
 \hline
 3768 \\
 \hline
 3794376
 \end{array}
 \end{array}$$

41.2. Δοκιμή τοῦ πολλαπλασιασμοῦ

Διά τὴν δοκιμήν τοῦ πολλαπλασιασμοῦ χρησιμοποιούμεν τὴν μεταθετικὴν ίδιότητα, ἐναλλάσσοντες τὸν πολλαπλασιαστὴν μὲ τὸν πολλαπλασιαστέον.

41.3. Συντομίαι τοῦ πολλαπλασιασμοῦ

Εἰς πολλὰς περιπτώσεις ἡ ἔφαρμογή τῶν γνωστῶν ίδιοτήτων τοῦ πολλαπλασιασμοῦ μᾶς ὀδηγεῖ συντομώτερον εἰς τὸ ἀποτέλεσμα.

α) 'Ο εἰς τῶν παραγόντων εἶναι, 9, 99, 999, . . .

$$\begin{array}{rl}
 \text{Π.χ. } 35 \cdot 9 &= 35 \cdot (10 - 1) = 350 - 35 = 315 \\
 &= 35 \cdot 10 - 35 \cdot 1 \\
 &= 28 \cdot 100 - 28 \cdot 1 = 2800 - 28 = 2772
 \end{array}$$

β) 'Ο εἰς τῶν παραγόντων εἶναι 11, 101, 1001 . . .

$$\begin{array}{rl}
 \text{Π.χ. } 32 \cdot 11 &= 32 \cdot (10 + 1) = 320 + 32 = 352 \\
 &= 32 \cdot 10 + 32 \cdot 1 = 3200 + 32 = 3232 \\
 &= 175 \cdot 101 = 17500 + 175 = 17675
 \end{array}$$

42. ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΕΩΣ

Διά τὴν κατανόησιν τοῦ τρόπου ἐκτελέσεως τῆς διαιρέσεως, ὑπενθυμίζομεν τὰς βασικὰς συνθήκας.

$$\left. \begin{array}{l} \Delta = \delta \pi + v \\ v < \delta \end{array} \right\}$$

Διακρίνομεν τὰς ἔξις περιπτώσεις :

42.1. 'Ο διαιρέτης καὶ τὸ πηλίκον εἰναι μονοψήφιοι

Ἐστω ἡ διαιρέσις τοῦ 65 διὰ 7. Μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ πισθαγορείου πίνακος εύρισκομεν

$$65 = 7 \cdot 9 + 2$$

$$\text{"Άρα } \pi = 9 \text{ καὶ } v = 2$$

Αι διαιρέσεις αύται εκτελοῦνται συνήθως άπό μνήμης.

42. 2. 'Ο διαιρέτης μονοψήφιος καὶ τὸ πηλίκον πολυψήφιον.

"Εστω ἡ διαιρέσις 953 διὰ 7. Δοῦμεν

$$\text{Είναι : } 7.100 < 953 < 7.1000$$

"Αρα τὸ πηλίκον θὰ είναι τριψήφιος ἀριθμός.

Διὰ τὸν ύπολογισμὸν τῶν ψηφίων του ἔργαζόμεθα ὡς ἔξης :

α) Ψηφίον ἑκατοντάδων (E) : 'Ο Διαιρετέος γράφεται

$$953 = 9E + 5\Delta + 3M$$

$$= (7E + 2E) + 5\Delta + 3M$$

"Η διαιρέσις 7E : 7 είναι τελεία καὶ δίδει πηλίκον 1. "Αρα E = 1.

β) Ψηφίον δεκάδων (Δ) : 'Απὸ τὴν προηγουμένην διαιρέσιν ἔχομεν ύπόλοιπον

$$2E + 5\Delta + 3M = 25\Delta + 3M$$

$$= (21\Delta + 4\Delta) + 3M$$

Αι 21Δ διαιρούμεναι διὰ 7 δίδουν ἀκριβές πηλίκον 3. "Αρα Δ = 3.

γ) Ψηφίον μονάδων (M) : 'Η προηγουμένη διαιρέσις ἀφήνει ύπόλοιπον

$$4\Delta + 3M = 43M$$

$$= 42M + 1M$$

Αι 42M διαιρούμεναι διὰ 7 δίδουν ἀκριβές πηλίκον 6. "Αρα M = 6.

Κατὰ τὰ ἀνωτέρω τὸ ζητούμενον πηλίκον είναι

$$1E + 3\Delta + 6M = 136$$

Τὸ τελικὸν ύπόλοιπον τῆς διαιρέσεως είναι 1.

953	7
25	
43	136

Εἰς τὴν χώραν μας ἡ ἀνωτέρω διαδοχὴ

τῶν πράξεων γίνεται συντόμως μὲ τὴν γνωστὴν πρακτικὴν διάταξιν τῆς διαιρέσεως

42.3. 'Ο διαιρέτης καὶ τὸ πηλίκον είναι πολυψήφιοι.

Καὶ εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν εύρισκομεν πρῶτον τὸ πλῆθος τῶν ψηφίων τοῦ πηλίκου, ἐν συνεχείᾳ ύπολογίζομεν τὰ ψηφία αὐτοῦ, ὡς ἀνωτέρω.

Παράδειγμα : Εἰς τὴν διαιρέσιν 3763 διὰ 23 τὸ πηλίκον είναι τριψήφιον, διότι

$$23 \cdot 100 < 3763 < 23 \cdot 1000$$

Διὰ τὴν ἔναρξιν τῆς πράξεως, γράφομεν : $3763 = 3X + 7E + 6Δ + 3M$

$$3763 = 3X + 7E + 6Δ + 3M \quad \text{μη εργάσιμη θέση}$$
$$= \quad \quad \quad 37E + 6Δ + 3M \quad \text{εργάσιμη θέση}$$

Παράδειγμα 2ον : Εἰς τὴν διαιρεσίν $3763:52$ τὸ πηλίκον είναι διψήφιον, διότι

$$52 \cdot 10 < 3763 < 52 \cdot 100$$

Διὰ τὴν ἔναρξιν τῆς πράξεως γράφομεν :

$$3763 = M \cdot 3X + 7E + 6Δ + 3M$$
$$M = Δ = 3E \quad 37E + 6Δ + 3M$$
$$= 376Δ + 3M$$

Παρατηροῦμεν διτὶ ἀρχίζομεν ἀπὸ τὰς δεκάδας τοῦ διαιρετέου, διότι αἱ ἑκατοντάδες του (37) δὲν διαιροῦνται διὰ τοῦ 52.

Εἰς τὴν πρακτικὴν διάταξιν τῆς διαιρέσεως τοῦτο σημαίνει ὅτι, ἐνῷ ὁ διαιρέτης ἔχει δύο ψηφία, χωρίζομεν τρία ψηφία ἀπὸ τὸν διαιρετέον διὰ νὰ ἀρχίσωμεν τὴν διαιρεσίν.

Διὰ τὴν δοκιμὴν τῆς διαιρέσεως χρησιμοποιοῦμεν τὰς συνθήκας.

$$\Delta = \delta\tau + u \\ u < \delta$$

Π.χ. εἰς τὴν διαιρεσίν μὲν $\Delta = 953$ καὶ $\delta = 7$

ἡ εὗρεσις τοῦ π = 136 καὶ $u = 1$, είναι ὀρθή, διότι $1 < 7$ καὶ $953 = 7 \cdot 136 + 1$.

43. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΡΑΣΕΩΝ

43.1. Πρόσθεσις

Πρόβλημα : 'Η ΣΤ' τάξις ἔνδος Γυμνασίου ἔχει 48 μαθητάς, ἡ Ε' 15 περισσοτέρους ἀπὸ τὴν ΣΤ' καὶ ἡ Δ' 12 περισσοτέρους ἀπὸ τὴν Ε'. Πόσους μαθητάς ἔχουν συνολικῶς αἱ 3 αὗται τάξεις;

Κατὰ τὸ πρόβλημα τοῦτο ἔχομεν :

'Αριθμὸς μαθητῶν ΣΤ' τάξεως 48
Ε' » 48 + 15
Δ' » $(48 + 15) + 12$
Συνολικὸς ἀριθμὸς μαθητῶν : $48 + (48 + 15) + (48 + 15) + 12$

ή

$$48 + 63 + 75 = 186$$

43.2. Άφαρέσις. Στο παρόν αύδη γίνεται γενική μετανεμούσα

¹⁰⁰ Ἡ ἀφαίρεσις χρησιμοποιεῖται διὰ τὴν ἐπίλυσιν προβλημάτων τῶν ἔξις δύο τύπων :

α) Ἐχει τις α δρχ. καὶ δαπανᾷ ἐξ αὐτῶν β δρχ. Πόσαι δραχμαὶ ἀπομένουν;

β) Ἐχει τις α δραχμὰς καὶ εἰς ἄλλος β δρχ. Πόσας δραχμὰς περισσοτέρας ἀπὸ τὸν δεύτερον ἔχει δ πρῶτος; (*Ἐννοεῖται βεβαίως ότι $\alpha > \beta$*).

Είναι φανερόν δτι καὶ εἰς τὰς δύο περιπτώσεις θά πρέπει ἀπὸ τὸ αὐτὸν ἀφαιρέσωμεν τὸ β. Εἰς τὴν πρώτην ὅμως περιπτώσιν τὸ ἀπότολεσμα τῆς ἀφαιρέσεως αὐτῆς δεικνύει πόσαις δρχ. ἀπέμειναν· διὰ τοῦτο καὶ δυνομάζεται ὑπόλοιπον τῆς ἀφαιρέσεως τοῦ απλήν β.

Εἰς τὴν δευτέραν περίπτωσιν τὸ ὅποτελεσμα τῆς ἀφαιρέσεως δεικνύει τὴν ύπεροχήν τῶν χρημάτων τοῦ πρώτου ὡς πρὸς τὰ χρήματα τοῦ δευτέρου· διὰ τοῦτο ὀνομάζεται διαφορὰ μεταξὺ αὐτῶν.

Σημειούμεν δτι, δσάκις έχομεν νά προσθέσωμεν ή αφαιρέσωμεν συγκεκριμένους όριθμούς, πρέπει νά προσέχωμεν νά είναι ούτοι όμοειδείς (νά άναφέρωνται εις πράγματα μέ την ίδιαν όνομασίαν).

ПРОВАЛМАТА

87. Τὸ δῆμοισμα τριῶν ἀριθμῶν εἶναι 53775. Τὸ δῆμοισμα τῶν δύο πρώτων εἶναι 43253 καὶ δέ δεύτερος εἶναι 17473. Νὰ εὑρεθοῦν οἱ δλλοι ἀριθμοί.

88. Εις ἔμπορος διέφελε 300.000 δρχ. καὶ κατέβαλεν ἔναντι τοῦ χρέους του διαδοχικῶς 27450 δρχ. 65880 δρχ. 84978 δρχ. Πόσα χρήματα διέφελε ἀκόμη;

89. Εἰς ἐν ἑργοστάσιον ἐργάζονται 100 ἄτομα, ἀνδρες, γυναικες και παιδιά. Οι ἀνδρες και τὰ παιδιά μαζὶ είναι 70, ἐνῷ οἱ γυναικες και τὰ παιδιά μαζὶ 40. Πόσοι εἰναι οἱ ἀνδρες, πόσαι αἱ γυναικες και πόσα τὰ παιδιά;

90. Έαν διατηρούμενη κατά 35 τὸν μειωτέον μιᾶς διαφορᾶς καὶ αὔξησωμεν τὸν ἀφαιρετέον κατά 16, ποιάν μεταβολὴν ὑφίσταται ἡ διαφορά;

44. ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ

Καθώς είναι γνωστόν ὁ πολλαπλασιασμός χρησιμοποιείται διά στήν. ἐπίλυσιν προβλημάτων τοῦ ἔχοντος τύπου. (τυποβολήση νοος)

Διέδεται ή τιμή της μιᾶς μονάδος και ζητεῖται ή τιμή τῶν πολλῶν όμοιειδῶν μονάδων. Π.χ. ἐν αὐτοκίνητον τρέχει μέσα σταθεράν ταχύτητα 60 kin/h. Εἰς 4 h πόσα χιλιόμετρα θὰ διανύσῃ; πόσα χιλιόμετρα θὰ διανύσῃ σε 4 ώρες

$$\begin{aligned} \text{Έχομεν} \quad & 60 \text{ km} + 60 \text{ km} + 60 \text{ km} + 60 \text{ km} \\ \text{ή} \quad & 4 \cdot 60 \text{ km} = 240 \text{ km.} \end{aligned}$$

Εις τὰ προβλήματα τοῦ ἀνωτέρῳ τύπου πολλαπλασιάζομεν ἔνα συγκεκριμένον δριθμὸν (πολλαπλασιαστέος) μὲν ἔνα ἄλλον, τὸν δποτοῖν λαμβάνομεν ὡς

άφηρημένον (πολλαπλασιαστής). Ή ως τόσον ύπάρχουν προβλήματα, εις τά δόποια ἔχομεν νὰ πολλαπλασιάσωμεν δύο συγκεκριμένους ἀριθμούς· τότε τὸ ἔξαγόμενον είναι ἐτεροειδές καὶ πρὸς τοὺς δύο παράγοντας.

Π.χ. διὰ τὴν εὔρεσιν τοῦ ἐμβαδοῦ ἐνὸς ὀρθογωνίου μὲ διαστάσεις 3 m καὶ 4 m, ἔχομεν

$$3m \cdot 4m = 12 \text{ m}^2 \quad (m \neq m^2).$$

45. ΔΙΑΙΡΕΣΙΣ

πολλαπλασιάζει τὸ κύριον γεύμα, γεύμα τὸ οὐδὲν τὸ οὐδὲν;

Ιον Πρόβλημα: Θέλομεν νὰ μοιράσωμεν 3.600 δραχ. εἰς 8 ἀπόρους μαθητάς. Πόσας δραχμάς θὰ δώσωμεν εἰς ἕκαστον;

Καθὼς γνωρίζομεν, ὅταν δίδεται ἡ τιμὴ τῶν πολλῶν μονάδων καὶ ζητεῖται ἡ τιμὴ τῆς μιᾶς ὁμοειδοῦς πρὸς αὐτὰς μονάδος, ἐκτελοῦμεν διαιρεσιν.

Συγκεκριμένως διὰ τὸ ἀνωτέρω πρόβλημα ἔχομεν:

$$3.600 \text{ δρχ.} : 8 = 450 \text{ δρχ.}$$

Παρατηροῦμεν δὲ ὅτι: Διαιρετέος είναι ἡ τιμὴ τῶν πολλῶν μονάδων (3.600 δρχ.), διαιρέτης είναι ὁ ἀφηρημένος ἀριθμός 8, ὁ δόποιος δεικνύει εἰς πόσα ἵστα μέρη μερίζεται ὁ διαιρετός, τὸ δὲ πηλίκον είναι ὁμοειδές πρὸς τὸν διαιρετόν ὡς μέρος αὐτοῦ.

Ζον Πρόβλημα: Θέλομεν νὰ τοποθετήσωμεν 1.300 kg. σάπωνος εἰς κιβώτια χωρητικότητος 25 kg. Πόσα κιβώτια θὰ χρειασθῶμεν;

Καθὼς γνωρίζωμεν, ὅταν δίδεται ἡ τιμὴ τῆς μιᾶς μονάδος (χωρητικότης ἑνὸς κιβωτίου) καὶ ἡ τιμὴ τῶν πολλῶν ὁμοειδῶν πρὸς αὐτὴν μονάδων, ζητοῦμεν δὲ νὰ εὑρωμεν τὸ πλήθος τῶν πολλῶν αὐτῶν μονάδων, ἐκτελοῦμεν διαιρεσιν.

Συγκεκριμένως είς τὸ ἀνωτέρω πρόβλημα ἔχομεν:

$$1300 \text{ kg.} : 25 \text{ kg.} = 52$$

Παρατηροῦμεν δὲ ὅτι:

Διαιρετέος είναι ἡ τιμὴ τῶν πολλῶν μονάδων (1300 kg.), διαιρέτης ἡ τιμὴ τῆς μιᾶς μονάδος (25 kg.) καὶ πηλίκον ὁ ἀφηρημένος ἀριθμός 52, ὁ δόποιος δηλώνει πόσας φοράς περιέχεται ὁ διαιρέτης εἰς τὸν διαιρετόν.

Τὰ ἀνωτέρω δύο προβλήματα είναι ἀντιπροσωπευτικά τῶν δύο γνωστῶν τύπων διαιρέσεως: Μερισμόν (Ιον πρόβλημα) καὶ μετρήσεως (Ζον πρόβλημα).

Καθὼς εἴδομεν εἰς τὴν διαιρέσιν μερισμοῦ, μερίζομεν ἐν μέγεθος (Διαιρετέος) εἰς ἵστα μέρη (τὸ πλήθος τῶν καθορίζει ὁ διαιρέτης). Εἰς τὴν διαιρέσιν μετρήσεως εύρισκομεν πόσας τὸ πολὺ φοράς ἐν μέγεθος (διαιρέτης) περιέχεται εἰς ἐν δλλο- ὁμοειδές πρὸς αὐτὸ μέγεθος (διαιρετός).

Καὶ εἰς τὰ δύο εἶδη διαιρέσεως, ἐάν ὑπάρχῃ ὑπόλοιπον, είναι ὁμοειδές πρὸς τὸν διαιρετόν.

Τὸ εἶδος τῆς διαιρέσεως καθορίζεται ἐκάστην φοράν ἐκ τῆς φύσεως τοῦ προβλήματος.

91. Δύο έργαται ειργάσθησαν μερικάς ήμέρας και έλαβον ό μέν πρώτος 750 δρχ., ό δε δεύτερος 525 δρχ. 'Ο πρώτος έλαμβανεν 15 δρχ. τὴν ήμέραν περισσότερον ἀπὸ τὸν δεύτερον Ζητεῖται : α) Πόσας ήμέρας ειργάσθησαν, β) τὸ ημεροιασθιον ἐκάστου.

92. 'Ηγόρασε κάποιος ἀπὸ τὸν παντοπώλην 11 kg. ἔλαιον και ἔδωσεν εἰς αὐτὸν ἐν χιλιόδραχμον. 'Ο παντοπώλης τοῦ ἐπέστρεψεν 769 δρχ. Πόσους ἡγόρασεν τὸ κιλὸν τοῦ ἔλαιου ;

93. 12 ἀτομα, ὀνδρες και γυναικες, ἐπλήρωσαν μαζὶ δι' ἐν γεῦμα 364 δρχ. 'Εκαστος ἐκ τῶν ὀνδρῶν ἐπλήρωσεν 32 δρχ. και ἐκάστη ἐτῶν γυναικῶν 28 δρχ. Πόσοι ήσαν οἱ ὀνδρες και πόσαι αἱ γυναικες :

94. Εἰς τὸ γινόμενον 427. 25 αὐξάνομεν τὸν πολλαπλασιαστέον κατὰ 36. Νά εύρεθῇ πόσον αὐξάνει τὸ γινόμενον, χωρὶς νὰ ἐκτελέσωμεν κανονικῶν τὸν πολλαπλασιασμόν.

95. Μία ἀγελάδας μετά τοῦ μόσχου τῆς ἐπωλήθησαν ἀντὶ 4800 δρχ. 'Η ἀξία τῆς ἀγελάδος ἥτο 8πλαστια τῆς ἀξίας τοῦ μόσχου σύν 300 δρχ. Νά εύρεθῃ ἡ ἀξία ἐκάστου ζώου.

96. 'Υπάλληλος ὑπελογίσθη διτ, ἐάν δαπανᾷ 5520 δρχ. τὸν μῆνα, εἰς ἐν ἔτος θά ἔχῃ Ἐλειμα 6.720 δρχ. Πόσας δραχμὰς πρέπει νὰ δαπανᾶτ τὸν μῆνα, διὰ νὰ ἔχῃ περίσσευμα 4.320 δρχ. ;

97. 'Ἐν ἀτόπλοιον, κινούμενον μὲ ταχύτητα 14 κόμβων τὴν ὁραν, διέτρεψε τὴν ἀπόστασιν μεταξὺ δύο λιμένων εἰς 9 ὥρας. Μὲ ποιάν ταχύτητα ἐπρεπει νὰ κινηθῇ διὰ νὰ φθάσῃ 2 ὥρας ἐνωρίτερον.

98. Εἰς ἔμπορος ἡγόρασεν 180 kg καφὲ πρὸς 56 δρχ. τὸ kg. 'Ἐπωλησεν ἐπειτα ἐν μέρος αὐτοῦ πρὸς 72 δρχ. τὸ kg και τὸ δἄλλο τοῦ ἔμεινε κέρδος. Ποσα kg τοῦ ἔμειναν ὡς κέρδος ;

Π Ι Ν Α Ξ

Βασικῶν ιδιοτήτων τῶν πράξεων εἰς τὸ N_o

1. Υπάρξεως, : 'Εὰν $\alpha, \beta \in N_0$, ύπάρχει εἰς και μόνον εἰς, μονοτίμον : ἀριθμὸς γ ̄σος μὲ $\alpha + \beta$, και εἰς και μόνον εἰς ἀριθμὸς δ ̄σος μὲ α, β .

2. Μεταθετικὴ : $\alpha + \beta = \beta + \alpha$ } $\alpha, \beta \in N_0$, $\alpha \cdot \beta = \beta \cdot \alpha$ }

3. Προσεταιρι- : $(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma)$ } $\alpha, \beta, \gamma \in N_0$, στικὴ $(\alpha \cdot \beta) \cdot \gamma = \alpha \cdot (\beta \cdot \gamma)$

4. Επιμεριστικὴ : $(\alpha + \beta) \cdot \gamma = \alpha \cdot \gamma + \beta \cdot \gamma$

5. Οὐδέτερον στοιχείον : $\alpha + 0 = 0 + \alpha = \alpha$ } $\alpha \in N_0$, $\alpha \cdot 1 = 1 \cdot \alpha = \alpha$

6. Διαγραφῆς : $\alpha = \beta \iff \alpha + \gamma = \beta + \gamma$ } $\alpha, \beta, \gamma \in N_0$, $\alpha = \beta \iff \alpha \cdot \gamma = \beta \cdot \gamma$ } $\alpha, \beta \in N_0, \gamma \in N$

$\alpha > \beta \iff \alpha + \gamma > \beta + \gamma$ } $\alpha, \beta, \gamma \in N_0$, $\alpha > \beta \iff \alpha \cdot \gamma > \beta \cdot \gamma$ } $\alpha, \beta \in N_0, \gamma \in N$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΝ

99. Οι μικροί τροχοί μιᾶς ἀμάξης κάμουν 56 στροφάς ἀνά λεπτόν, ἐνῶ οι μεγάλοι 42. Πόσας διλιγωτέρας στροφάς θὰ κάμουν οι μεγάλοι τροχοί εἰς 2 ὥρας.

100. Μὲ ποιὸν ἀριθμὸν πρέπει νὰ διαιρέσωμεν τὸ 4227 διὰ νὰ εὑρώμεν πηλίκον 13 καὶ ὑπόλοιπον 171;

101. 9 ἐργάται καὶ 5 ἐργάτριαι δι' ἐργασίαν 6 ἡμερῶν ἔλαβον 11340 δρχ. Ἐάν ἐκάστη ἐργάτρια λαμβάνῃ 70 δρχ. τὴν ἡμέραν διλιγότερον ἀπό δικαιοστὸν ἐργάτην, πόσον είναι τὸ ἡμερομήσιον ἐκάστου ἐργάτου;

102. Τρεῖς ἀδελφοὶ ἐπλήρωσαν ἐν χρέος ἑκατόν 125.000 δρχ. Οι δύο μεγαλύτεροι ἐπλήρωσαν ἐκαστος κατά 12.500 δρχ. διλιγότερα ἀπό τὸ διπλάσιον τῶν δισων ἐπλήρωσεν ὁ τρίτος. Πόσα χρήματα ἐπλήρωσεν ἐκαστος;

103. "Εμπορος ἔχωρισεν ὑφασμα εἰς δύο τεμάχια, τὰ διποια διέφερον εἰς μῆκος κατά 42 π. Νὰ εὐρεθοῦν τὰ μῆκη τῶν τεμαχίων, ἐάν γνωρίζωμεν διτὸ μῆκος τοῦ πρώτου ἢ τὸ τετραπλάσιον ἀπό τὸ μῆκος τοῦ δευτέρου.

104. Κάποιος ἡγόρασεν 360 ὠδὲ πρὸς 27 δρχ. τὰ 15 καὶ ἀλλα 360 πρὸς 21 δρχ. τὰ 18. Ἀπὸ τὰ ὠδὲ αὐτὰ 72 κατεστράφησαν καὶ τὰ ὑπόλοιπα τὰ ἐπώλησεν πρὸς 45 δρχ. τὰ 27. Πόσας δραχμὰς ἐκέρδισεν οὕτος;

105. Τὸ ἡμερομήσιον ἐνὸς τεχνίτου είναι 3/πλάσιον τοῦ ἡμερομήσιου τοῦ βοηθοῦ του. Εἰς 5 ἡμέρας ἐργασίας ἔλαβον καὶ οἱ δύο 1200 δρχ. Ποιὸν είναι τὸ ἡμερομήσιον ἐκάστου;

106. Νὰ ἐπιλυθοῦν αἱ ἔξισώσεις

$$3x + (5x + 1) = 33, \quad 2 \cdot (3x + 4) = 20$$

107. Νὰ ὑπολογισθετε τὴν ἀριθμητικὴν τιμὴν τῆς παραστάσεως

$$10\alpha - 2\beta + 3(\gamma - \alpha) + 2(\alpha + 3\beta - \gamma) \quad \text{δταν } \alpha = 5, \beta = 9, \gamma = 10$$

108. Ποιὸν ἀριθμὸν τὸ πενταπλάσιον ἡλστρωμένον κατά 30 ισοῦται μὲ τὸν ἀριθμὸν της ηὗημένον κατά 10;

109. Μία μητέρα ἔχει ἡλικίαν τριπλασίαν τῆς κόρης της. Αἱ ἡλικίαι καὶ τῶν δύο μαζὺ είναι 80 ἑτη. Ποια είναι ἡ ἡλικία τῆς κόρης καὶ ποια τῆς μητέρας;

110. Δεῖχτε διτὸ τὸ ἄδροισμα τριῶν διαδοχικῶν ἀκεραιῶν είναι πάντοτε πολλαπλάσιον τοῦ 3

111. Εἰς τὰς σχέσεις $\alpha - 15 = \beta$, $\alpha - 15 < \beta$ ποιαὶ είναι αἱ μικρότεραι δυναται τιμαὶ, τὰς ὅποιας δύνανται νὰ λάβουν τὰ α καὶ β ;

112. Ποιας τιμᾶς πρέπει νὰ λάβῃ ὁ α , ἵνα αἱ παραστάσεις

$$\alpha \cdot (7 - \beta) \quad \text{καὶ} \quad \alpha \cdot 7 - \beta$$

είναι ἵσαι μεταξύ των;

113. "Ἐστω διτὸ $B = 25.8.28$ χωρὶς νὰ ὑπολογισθῇ ἡ τιμὴ τοῦ B , νὰ εὕρετε τὸ πηλίκον διαιρέσεως τοῦ B διὰ 28, 100, 56.

114. Διαιρέσατε τὸ 353 διὰ 43. Κατὰ πόσας μονάδας δυνάμεθα νὰ αὔξησωμεν τὸν διαιρετέον, χωρὶς νὰ μεταβληθῇ τὸ πηλίκον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'

46. ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΑΚΕΡΑΙΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

46.1. Όρισμός

Μία πολυκατοικία έχει 5 δρόφους. "Έκαστος δρόφος έχει 5 διαμερίσματα και έκαστον διαμέρισμα 5 δωμάτια. Πόσα διαμερίσματα και πόσα δωμάτια έχει η πολυκατοικία;

Είναι φανερόν ότι δύο μέν άριθμός των διαμερίσματων είναι $5 \cdot 5 = 25$ δύο μέν άριθμός των δωμάτων είναι $5 \cdot 5 \cdot 5 = 125$.

Τὸ γινόμενον $5 \cdot 5$ ἀποτελεῖται ἀπὸ δύο παράγοντας ἢ σούς μὲ τὸν ἀριθμὸν 5, λέγεται δὲ δευτέρα δύναμις τοῦ 5 καὶ γράφεται συντόμως 5^2 .

Τὸ γινόμενον $5 \cdot 5 \cdot 5$ ἀποτελεῖται ἀπὸ τρεῖς παράγοντας ἢ σούς μὲ τὸν ἀριθμὸν 5, λέγεται δὲ τρίτη δύναμις τοῦ 5 καὶ γράφεται συντόμως 5^3 .

"Ωστε ἐὰν $\alpha \in \mathbb{N}_0$, τότε:

Τὸ γινόμενον $\alpha \cdot \alpha$ λέγεται δευτέρα δύναμις τοῦ α καὶ γράφεται α^2 .

Τὸ γινόμενον $\alpha \cdot \alpha \cdot \alpha$ λέγεται τρίτη δύναμις τοῦ α καὶ γράφεται α^3 .

Τὸ γινόμενον $\alpha \cdot \alpha \cdot \alpha \cdot \alpha$ λέγεται τετάρτη δύναμις τοῦ α καὶ γράφεται α^4 .
κ.ο.κ.

Γενικῶς: "Ἐὰν ν ἀριθμὸς μεγαλύτερος τῆς μονάδος, τὸ γινόμενον ν παραγόντων ἵσων μὲ α, λέγεται νιοστὴ δύναμις τοῦ α.
Γράφομεν δὲ α^v.

$$\alpha^v = \underbrace{\alpha \cdot \alpha \cdot \alpha \cdots \alpha}_{v \text{ παράγοντες}}$$

"Οπου $v \in \mathbb{N}$ καὶ $v > 1$

"Ο ἀριθμὸς α λέγεται βάσις τῆς δυνάμεως. "Ο ἀριθμὸς ν, τὸν δύποιον γράφομεν δεξιά καὶ δλίγον ὑψηλότερον τῆς βάσεως, λέγεται ἐκθέτης τῆς δυνάμεως.

Δύναμις → α^v

ἐκθέτης
βάσις

"Η πρᾶξις, διὰ τῆς δύποιας ἀπὸ ἓνα ἀριθμὸν εὑρίσκομεν τὴν νιοστὴν δύ-

ναμιν αύτοῦ α'', λέγεται ύψωσις τοῦ α εἰς τὴν ν, τὸ δὲ ἔξαγόμενον λέγεται τιμὴ τῆς δυνάμεως α''.

Παραδείγματα

$$3^2 = 3 \cdot 3 = 9$$

$$2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 2^4$$

$$2^3 = 2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$$

$$3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = 3^5$$

$$5^4 = 5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5 = 625$$

$$\alpha \cdot \alpha \cdot \alpha \cdot \alpha \cdot \alpha = \alpha^6$$

46.2. Παρατηρήσεις

α) 'Η ἀντιμετάθεσις τῆς βάσεως μὲ τὸν ἐκθέτην εἰς μίαν δύναμιν α'' μεταβάλλει τὴν τιμὴν τῆς δυνάμεως, διὰ τοῦτο $\alpha \neq v$.

Π.χ.

$$5^2 = 25 \quad \text{ἐνῶ} \quad 2^5 = 32$$

β) Δὲν πρέπει νὰ συγχέωμεν τὰς γραφὰς 2^8 καὶ $2 \cdot 3$, διότι τούτοις οικ

$$2^8 = 2 \cdot 2 \cdot 2 = 8 \quad \text{ἐνῶ} \quad 2 \cdot 3 = 3 + 3 = 6.$$

γ) 'Η δευτέρα δύναμις ἐνὸς ἀριθμοῦ λέγεται καὶ τετράγωνον αύτοῦ, ἐνῷ ἡ τρίτη δύναμις κύβος αύτοῦ.

46.3. Ειδικαὶ περιπτώσεις

I. Δυνάμεις τοῦ 0

Κατὰ τὸν δρισμὸν τῆς δυνάμεως ἔχομεν

$$0^2 = 0 \cdot 0 = 0, \quad 0^3 = 0 \cdot 0 \cdot 0 = 0$$

Γενικῶς $0^n = 0 \cdot 0 \cdots 0 = 0$, δῆτα $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$

ν παράγοντες

II. Δυνάμεις τοῦ 1

$$1^2 = 1 \cdot 1 = 1, \quad 1^3 = 1 \cdot 1 \cdot 1 = 1$$

Γενικῶς: $1^n = 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdots 1 = 1$ δῆτα $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$

ν παράγοντες

III. Δυνάμεις τοῦ 10

Κατὰ τὸν δρισμὸν τῆς δυνάμεως ἔχομεν

$$10^2 = 10 \cdot 10 = 100$$

$$10^3 = 10 \cdot 10 \cdot 10 = 1000$$

$$10^4 = 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 10000$$

$$10^5 = 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 100000$$

Γενικῶς: 'Εκάστη δύναμις τοῦ 10 ἰσοῦται μὲ τὴν μονάδα ἀκολουθουμένην ἀπὸ τόσα μηδενικά, ὅσας μονάδας ἔχει ὁ ἐκθέτης.

Η χρησιμοποίησις δυνάμεων τοῦ 10 συντομεύει τὴν γραφήν καὶ τὴν ἑκτέλεσιν πράξεων μὲν μεγάλους ἀριθμούς.

Παραδείγματα

$$\alpha) 10.000.000 = 10^7$$

$$\beta) 36.000.000 = 36.1000.000 = 36 \cdot 10^6$$

$$\gamma) \text{Η ταχύτης τοῦ φωτός εἶναι } 299.00000000 \text{ cm ἀνὰ sec}$$
$$\text{ή } 299 \cdot 10^8 \text{ cm ἀνὰ sec.}$$

47. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

47. 1. Γινόμενον δυνάμεων τοῦ αὐτοῦ ἀριθμοῦ

Ἄς λάβωμεν τὰ γινόμενα $3^2 \cdot 3^3$ καὶ $\alpha^8 \cdot \alpha^4$. Ἐχομεν:

$$3^2 \cdot 3^3 = (3 \cdot 3) \cdot (3 \cdot 3 \cdot 3)$$

$$= 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3$$

$$= 3^5 = 3^{2+3}$$

$$\alpha^8 \cdot \alpha^4 = (\alpha \cdot \alpha \cdot \alpha) \cdot (\alpha \cdot \alpha \cdot \alpha \cdot \alpha)$$

$$= \alpha \cdot \alpha \cdot \alpha \cdot \alpha \cdot \alpha \cdot \alpha \cdot \alpha$$

$$= \alpha^7 = \alpha^{8+1}$$

$$\alpha^{\mu} \cdot \alpha^{\nu} = \alpha^{\mu+\nu}$$

ὅπου $\alpha \in N_0$, $\mu, \nu \in N$

$$\alpha^{\mu} \cdot \alpha^{\nu} \cdot \alpha^{\rho} = \alpha^{\mu+\nu+\rho}$$

καὶ $\mu, \nu, \rho > 1$

Γενικῶς:

Διὰ νὰ πολλαπλασιάσωμεν δυνάμεις μὲ τὴν αὐτὴν βάσιν, σχηματίζομεν μίαν δύναμιν μὲ τὴν ίδιαν βάσιν καὶ ἐκθέτην τὸ ἄθροισμα τῶν ἔκθετῶν.

47. 2. Δύναμις γινομένου

Ἄς λάβωμεν τὰς δυνάμεις $(3 \cdot 5)^2$ καὶ $(\alpha \cdot \beta \cdot \gamma)^3$. Ἐχομεν:

$$(3 \cdot 5)^2 = (3 \cdot 5) \cdot (3 \cdot 5)$$

$$= 3 \cdot 5 \cdot 3 \cdot 5$$

$$= 3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 5$$

$$= 3^2 \cdot 5^2$$

$$(\alpha \cdot \beta \cdot \gamma)^3 = (\alpha \cdot \beta \cdot \gamma) \cdot (\alpha \cdot \beta \cdot \gamma) \cdot (\alpha \cdot \beta \cdot \gamma)$$

$$= \alpha \beta \gamma \cdot \alpha \beta \gamma \cdot \alpha \beta \gamma$$

$$= \alpha \alpha \alpha \cdot \beta \beta \beta \cdot \gamma \gamma \gamma$$

$$= \alpha^3 \cdot \beta^3 \cdot \gamma^3$$

Γενικῶς:

$$(\alpha \cdot \beta \cdot \gamma)^v = \alpha^v \cdot \beta^v \cdot \gamma^v \quad \text{ὅπου } \alpha, \beta, \gamma \in N_0, v \in N \text{ καὶ } v > 1$$

Διὰ νὰ ὑψώσωμεν ἐν γινόμενον εἰς μίαν δύναμιν ὑψώνομεν ἔκαστον παράγοντα τοῦ γινομένου εἰς τὴν δύναμιν αὐτῆν.

47. 3. "Ὑψωσις δυνάμεως εἰς δύναμιν

Κατὰ τὸν δρισμὸν τῆς δυνάμεως, τὸ γινόμενον $3^2 \cdot 3^2 \cdot 3^2$ δύναται νὰ γραφῇ $(3^2)^3$. Ἡ γραφὴ αὐτὴ λέγεται ὑψωσις δυνάμεως εἰς δύναμιν.

"Ωστε

$$(3^2)^3 = 3^2 \cdot 3^2 \cdot 3^2$$

$$= 3^{2+2+2} = 3^{2 \cdot 3}$$

Γενικώς

$$(\alpha^{\mu})^v = \alpha^{\mu \cdot v} \quad \text{όπου } \alpha \in N_0 \quad \mu, v \in N \quad \text{και } \mu, v > 1$$

Διά νά ύψωσωμεν μίαν δύναμιν εις άλλην δύναμιν, σχηματίζομεν μίαν δύναμιν μὲ τὴν ίδιαν βάσιν καὶ ἐκθέτην τὸ γινόμενον τῶν ἐκθετῶν.

47. 4. Πηλίκον δύο δυνάμεων τοῦ ίδιου ἀριθμοῦ

Ἄπο τὴν Ισότητα

$$5^3 \cdot 5^4 = 5^7$$

συνάγομεν ὅτι 5^3 εἶναι τὸ ἀκριβές πηλίκον τῆς διαιρέσεως 5^7 διὰ 5^4 .

$$\text{''Ητοι } 5^7 : 5^4 = 5^3$$

$$\text{''Η } 5^7 : 5^4 = 5^{7-4}$$

$$\text{''Ομοίως εύρισκομεν ὅτι, } \alpha^7 : \alpha^4 = \alpha^{7-4}$$

Γενικώς

$$\alpha^{\mu} : \alpha^v = \alpha^{\mu-v} \quad \text{όπου } \mu, v \in N \quad \text{και } \mu > v$$

Τὸ πηλίκον δύο δυνάμεων τοῦ αὐτοῦ ἀριθμοῦ εἶναι δύναμις τοῦ αὐτοῦ ἀριθμοῦ μὲ ἐκθέτην τὴν διαιφορὰν τῶν ἐκθετῶν (Διαιρετέου μεῖον διαιρέτου).

47. 5. Ἐφαρμογαί

Νὰ ἔκτελεσθοῦν αἱ πράξεις

$$3 \cdot 5^2, \quad 3 \cdot 5^2 + 2, \quad 3 \cdot 5 + 2^2, \quad 3 \cdot (5+2)^2$$

$$\text{''Εχομεν } 3 \cdot 5^2 = 3 \cdot 25 = 75$$

$$(3 \cdot 5) \cdot (3 \cdot 5) = 3 \cdot 5^2 + 2 \cdot 3 \cdot 5 + 2^2 = 77$$

$$3 \cdot 5 + 2^2 = 3 \cdot 5 + 4 = 19$$

$$3 \cdot (5+2)^2 = 3 \cdot 7^2 = 3 \cdot 49 = 147$$

48. ΕΠΕΚΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΕΩΣ ΔΙΑ $v=1$ ΚΑΙ $v=0$

48. 1. Τὸ σύμβολον α^1 , $\alpha \in N_0$

Εἶναι δυνατόν, κατὰ τὴν ἐφαρμογὴν τῆς ίδιοτητος 47. 4, νὰ εὑρωμέν;

$$\alpha^3 : \alpha^2 = \alpha^{3-2}$$

$$\text{ή } \alpha^3 : \alpha^2 = \alpha^1$$

Ἡ γραφὴ α^1 , κατὰ τὸν δρισμὸν τῆς δυνάμεως, δὲν ἔχει ἔννοιαν, διότι ὁ ἐκθέτης τῆς εἶναι μικρότερος τοῦ 2. Διὰ νὰ γενικεύσωμεν τὴν Ισχὺν τῆς ίδιότητος 47. 4 δεχόμεθα ὅτι καὶ τὸ σύμβολον α^1 παριστᾶ δύναμιν. Ἡτοι ἐπεκτείνομεν τὴν ἔννοιαν τῆς δυνάμεως, καὶ ὅταν $v=1$

Διὰ νὰ ὀρίσωμεν τὴν τιμὴν τῆς δυνάμεως αὐτῆς, σκεπτόμεθα ὅτι :

$$\begin{array}{l} \alpha^3 \cdot \alpha^2 = (\alpha \cdot \alpha \cdot \alpha) \cdot (\alpha \cdot \alpha) \\ \text{ή} \quad \alpha^3 \cdot \alpha^2 = \alpha \end{array}$$

Διὰ τοῦτο θέτομεν

$$\alpha^1 = \alpha, \quad \alpha \in N_0$$

"Ητοι : 'Η πρώτη δύναμις ἐνὸς ἀριθμοῦ εἶναι ὁ ίδιος ὁ ἀριθμός.

Παραδείγματα

$$8^1 = 8, \quad 2^8 \cdot 2^1 = 2^{8+1} = 2^9, \quad (\alpha^5)^1 = \alpha^{5 \cdot 1} = \alpha^5$$

48. 2. Τὸ σύμβολον $\alpha^0, \alpha \in N$

Σκεπτόμενοι ὅπως προηγουμένως, εύρισκομεν :

$$\alpha^3 \cdot \alpha^0 = \alpha^{3+0} = \alpha^3 \quad (1)$$

$$\alpha^3 \cdot \alpha^0 = 1 \quad (2)$$

Διὰ νὰ ισχύῃ γενικῶς ἡ Ιδιότης 47. 4 δεχόμεθα ὅτι τὸ σύμβολον α^0 παριστᾶ δύναμιν καὶ θέτομεν

$$\alpha^0 = 1, \quad \alpha \in N$$

'Η μηδενικὴ δύναμις παντὸς φυσικοῦ ἀριθμοῦ ισοῦται μὲ τὴν μονάδα.

Παραδείγματα

$$7^0 = 1, \quad (3 \cdot 5)^0 = 1, \quad (\alpha^3)^0 = 1$$

Παραθέτομεν κατωτέρω πίνακα ίδιοτήτων τῶν δυνάμεων

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. $\alpha^\mu \cdot \alpha^\nu = \alpha^{\mu+\nu}$ | όπου $\alpha, \beta, \gamma \in N_0$ |
| 2. $(\alpha \cdot \beta \cdot \gamma)^\nu = \alpha^\nu \cdot \beta^\nu \cdot \gamma^\nu$ | $\nu \in N$ |
| 3. $(\alpha^\mu)^\nu = \alpha^{\mu \cdot \nu}$ | |
| 4. $\alpha^\mu : \alpha^\nu = \alpha^{\mu-\nu}$ | $\mu > \nu$ |
| 5. $\alpha^1 = \alpha, \quad \alpha^0 = 1$ | |

Σημείωσις

Δέν δρίζομεν τὸ σύμβολον 0^0 . 'Η ἔξετασις αὐτοῦ θὰ γίνῃ εἰς ἄλλην τάξιν.

(1) ΑΣΚΗΣΕΙΣ
(2)

115. Γράψατε ὑπὸ μορφὴν δυνάμεων τὰ γινόμενα :

$$3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3, \quad 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1, \quad 0 \cdot 0 \cdot 0 \cdot 0 \cdot 0, \quad \alpha \cdot \alpha \cdot \alpha$$

116. Νὰ εύρετε τὰς τιμάς τῶν παραστάσεων

$$3^4 - 2^3 + 1^{15}, \quad 7^3 - 2^2 \cdot 2^8 + 1, \quad (2^2 \cdot 3^2)^8 - 5^8$$

$$5 \cdot 2^7 : 4, \quad 7 \cdot 3^4 : 9$$

117. Νὰ εύρετε τὰ τετράγωνα καὶ τοὺς κύβους τῶν ἀριθμῶν:

$$10, 20, 30, 40 \quad \text{Τί παρατηρεῖτε?}$$

118. Χρησιμοποιήσατε Ιδιότητας τῶν δυνάμεων διὰ νὰ ὑπολογίσετε συντόμως τὰ γινόμενα

$$2^9 \cdot 5^8, \quad 4^2 \cdot 25^2, \quad 2^4 \cdot 8^2 \cdot 125^8 \cdot 5^4$$

119. Τί παθαίνει τὸ τετράγωνον ἐνὸς ἀκεραίου, ὅταν διπλασιάζωμεν, τριπλασιάζωμεν... τοῦτον. Χρησιμοποιήσατε παραδείγματα.

49. ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΟΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ

49. 1. Τετράγωνον ἀθροίσματος

Διὰ νὰ ὑπολογίσωμεν τὸ τετράγωνον τοῦ ἀθροίσματος $3+5$ δυνάμεθα νὰ ἔργασθωμεν καὶ ως ἔξις:

$$\begin{aligned} (5+3)^2 &= (5+3) \cdot (5+3) && (\text{Ορισμὸς δυνάμεως}) \\ &= 5 \cdot 5 + 5 \cdot 3 + 3 \cdot 5 + 3 \cdot 3 && (\text{Ἐπιμεριστικὴ Ιδιότης}) \\ &= 5^2 + 2 \cdot (5 \cdot 3) + 3^2 \\ &= 25 + 30 + 9 = 64 \end{aligned}$$

Γενικῶς, διὰ δύο ἀκεραίους α, β ἔχομεν

$$\begin{aligned} (\alpha+\beta)^2 &= (\alpha+\beta) \cdot (\alpha+\beta) \\ &= \alpha \cdot \alpha + \alpha \cdot \beta + \beta \cdot \alpha + \beta \cdot \beta \\ &= \alpha^2 + 2 \cdot \alpha \cdot \beta + \beta^2 \end{aligned}$$

Ήτοι, ἔχομεν τὸν τύπον

$$(\alpha+\beta)^2 = \alpha^2 + 2 \cdot \alpha \cdot \beta + \beta^2 \quad (1)$$

Ο τύπος οὗτος συχνὰ εἶναι χρήσιμος διὰ τὴν συντόμευσιν τῶν ὑπολογισμῶν μας.

$$\begin{aligned} \text{Π.χ. } 1001^2 &= (1000+1)^2 \\ &= 1000^2 + 2 \cdot 1000 \cdot 1 + 1^2 \\ &= 1000.000 + 2000 + 1 = 1002001 \end{aligned}$$

49. 2. Τετράγωνον διαφορᾶς

Διὰ τὸ τετράγωνον τῆς διαφορᾶς $8-3$, ἔχομεν

$$(8-3)^2 = 5^2 = 25 \quad (1)$$

$$\text{'Αλλὰ καὶ } 8^2 - 2 \cdot 8 \cdot 3 + 3^2 = 64 - 48 + 9 = 25 \quad (2)$$

Έκ τῶν (1) καὶ (2) ἔχομεν

$$(8-3)^2 = 8^2 - 2 \cdot (8 \cdot 3) + 3^2$$


Γενικῶς, δι' οίουσδήποτε ἀκέραιους α , β , δημο $\alpha > \beta$, εἶναι :

$$(\alpha - \beta)^2 = \alpha^2 - 2 \cdot \alpha \cdot \beta + \beta^2 \quad (2)$$

•Εφαρμογή

$$\begin{aligned} 999^2 &= (1000 - 1)^2 \\ &\equiv 1000^2 - 2 \cdot 1000 \cdot 1 + 1 \\ &= 1000000 - 2000 + 1 = 998001 \end{aligned}$$

Παραθέτομεν κατωτέρω γεωμετρικήν πάραστασιν τῶν ἀνωτέρω δύο τύπων



ΑΣΚΗΣΕΙΣ

120. Νὰ εὕρετε συντόμως τὰ τετράγωνα τῶν ἀκέραιων: 102, 98, 998, 1002.

121. Νὰ εὕρετε τὰ τετράγωνα τῶν παραστάσεων:

$$2+\alpha, \quad \alpha+3, \quad 2\alpha+3$$

122. Μὲ ἀριθμητικά παραδείγματα ἐπαληθεύσατε διτι:

$$(\alpha+\beta)(\alpha-\beta)=\alpha^2-\beta^2 \quad \alpha, \beta \in \mathbb{N}_0 \quad \alpha > \beta$$

50. ΧΡΗΣΙΣ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΟΥ 10 ΕΙΣ ΤΟ ΔΕΚΑΔΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΙΘΜΗΣΕΩΣ

Γνωρίζομεν διτι ὁ ἀριθμὸς 1265 τοῦ δεκαδικοῦ συστήματος ἀποτελεῖται ἀπὸ 1 χιλιάδα, 2 ἑκατοντάδας, 6 δεκάδας καὶ 5 μονάδας, γράφεται δὲ

$$\begin{aligned} 1265 &= 1 \cdot 10^4 + 2 \cdot 10^3 + 6 \cdot 10^2 + 5 \cdot 10^1 \\ &\text{ή} \quad 1265 = 1 \cdot 1000 + 2 \cdot 100 + 6 \cdot 10 + 5 \cdot 1 \end{aligned} \quad (1)$$

Οἱ ἀκέραιοι 1000, 100, 10, 1 εἶναι δῆλοι δυνάμεις τοῦ 10. Συγκεκριμένως εἶναι: $1000 = 10^3$, $100 = 10^2$, $10 = 10^1$ καὶ $1 = 10^0$.

Ἐάν θέσωμεν τὰς ἀνωτέρω δυνάμεις τοῦ 10 εἰς τὴν (1), ἔχομεν

$$1265 = 1 \cdot 10^4 + 2 \cdot 10^3 + 6 \cdot 10^2 + 5 \cdot 10^1$$

Εἶναι φανερὸν διτι ὑπὸ τὴν μορφὴν αὐτὴν δυνάμειθα νὰ θέσωμεν οἵονδή-
ποτε ἄλλον ἀκέραιον, γραμμένον εἰς τὸ δεκαδικὸν σύστημα ἀριθμήσεως.

Παραδείγματα

$$36723 = 3 \cdot 10^4 + 6 \cdot 10^3 + 7 \cdot 10^2 + 2 \cdot 10^1 + 3 \cdot 10^0$$

$$52001 = 5 \cdot 10^4 + 2 \cdot 10^3 + 0 \cdot 10^2 + 0 \cdot 10^1 + 1 \cdot 10^0$$

Αντιστρόφως, όταν δοθήκει ένα αριθμητικό διαδικτυακό σύνολο από μόνο 10 πολλαπλασιασμένων μὲν ακεραίους μικροτέρους τοῦ 10, δημιουργεῖται τό αριθμητικό

$$x = 3 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^2 + 9 \cdot 10^1 + 5 \cdot 10^0$$

έχομεν :

$$x = 3 \cdot 1000 + 2 \cdot 100 + 9 \cdot 10 + 5 \cdot 1$$

ή
ή

$$x = 3 \cdot X + 2 \cdot E + 9 \cdot Δ + 5 \cdot M$$

$$x = 3295$$

Όμοιως διὰ τὸ αριθμητικό

$$y = 3 \cdot 10^3 + 0 \cdot 10^2 + 0 \cdot 10^1 + 4 \cdot 10^0$$

έχομεν :

$$y = 3 \cdot 1000 + 0 \cdot 100 + 0 \cdot 10 + 4 \cdot 1$$

ή

$$y = 3004$$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

123. Νὰ γράψετε τοὺς ακεραίους 2378, 3005 10709 ὑπὸ μορφὴν αριθμητικῶν δυνάμεων τοῦ 10 πολλαπλασιασμένων μὲ 0, 1, 2 ... 9.

124. Τὰ κατωτέρω αριθμητικά

$$\alpha = 8 \cdot 10^4 + 0 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^2 + 1 \cdot 10^1 + 2 \cdot 10^0$$

$$\beta = 5 \cdot 10^5 + 3 \cdot 10^4 + 7 \cdot 10^3$$

$$\gamma = 7 \cdot 10^6 + 5 \cdot 10^5 + 3 \cdot 10^4$$

ποιούς ακεραίους παριστάνουν;

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΝ

125. Εάν $\alpha = 2^3 \cdot 3$, $\beta = 2^4 \cdot 3^2$ καὶ $\gamma = 2^3 \cdot 5 \cdot 7$, νὰ εύρεθοῦν αἱ τιμαὶ τῶν αριθμητικῶν παραστάσεων:

$$\alpha^2 \cdot \beta, \quad (\alpha^2 \cdot \beta^2)^3, \quad (\alpha \cdot \beta^2 \cdot \gamma)^2, \quad \beta : \alpha, \quad \beta^2 : \alpha$$

126. Νὰ εὕρετε τὸ πηλίκον τῆς διαιρέσεως:

$$(3^4 \cdot 3^2 \cdot 5^2) : (9^2 \cdot 25)$$

127. Νὰ έκφράσετε ὑπὸ μορφὴν δυνάμεως τὰ αριθμητικά:

$$9 + 6 \cdot \beta + \beta^2, \quad 4 \alpha^2 - 4 \alpha + 1$$

128. Νὰ έκφράσετε ὑπὸ μορφὴν γινομένου τὴν διαφορὰν $25\alpha^4 - 9$. (ἀσκ. 122).

129. Ποιῶν αριθμῶν εἶναι τετράγωνα οἱ αριθμοί;

$$2^6 \cdot 3^2, \quad 5^4 \cdot 7^2, \quad 3^3 \cdot 2^4 \cdot 5^3, \quad 1 \cdot 9 \cdot 5^4, \quad 0 \cdot 36 \cdot 2^8 \cdot 3^{10}$$

130. Τὶ παθαίνει ὁ κύβος ἐνὸς αριθμοῦ αἱ ἀλλαγὲς τοῦ πολλαπλασιασμοῦ τὸν τρισμόν τοῦ παραδείγματος;

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'.

ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΣ

51. ΔΙΑΙΡΕΤΑΙ ΑΚΕΡΑΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΥ

51. 1. Ἀκέραιος διαιρετός διὰ φυσικοῦ ἀριθμοῦ

Ός χωρίστηκε σε 20 έγχαι πολλαπλάσιον του 5, ($20=4 \cdot 5$).

Πολλάς φοράς ἀντὶ νὰ λέγωμεν 20 εἶναι πολλαπλάσιον τοῦ 5

λέγομεν 20 είναι διατρεπτὸς διὰ 5

Ἔτοι δέ τις πάντα τούτη την ιδέαν είναι διατερέτης τοῦ 20

Γενικῶς, ἐάν δὲ ἀκέραιος αἱ εἶναι πολλαπλάσιον τοῦ φυσικοῦ ἀριθμοῦ β

51.2. Πρῶτοι καὶ σύνθετοι ἀριθμοί

⁷ Ας εὕρωμεν τοὺς διαιρέτας τῶν ἀριθμῶν 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Διατίρεται τοῦ 2 εἶναι οἱ φυσικοὶ ἀριθμοὶ 1, 2

Διαιρέται τοῦ 3 είναι οι φυσικοὶ ἀριθμοὶ 1, 3

Διαιρέται τοῦ 4 εἶναι οἱ φυσικοὶ ἀριθμοὶ 1, 2, 4

Διαιρέται τοῦ 5 είναι οἱ φυσικοὶ ἀριθμοὶ 1, 5

Διατίρεται τοῦ 6 εἶναι οἱ φυσικοὶ ἀριθμοὶ 1, 2

Διατρέται τοῦ 7 εἶναι οἱ φυσικοὶ ἀριθμοὶ 1,

Διαιρέται τοῦ 8 είναι οἱ φυσικοὶ ἀριθμοὶ 1, 2

Διαιρέται τού 9 είναι οι φυσικοί αριθμοί 1, 2,

'Eκ τῶν δικαιοτέρων προστηροῦμεν ὅτι:

εἰς οὐτόν τοις δέσμοις πάντας.

α) Η παρθένη ακέρατοι, εί τοις οι ουρανοί ταν και τὰς μονάδας. "Οπως π.χ. οι ἀκέρατοι

α) Υπότασμα δικαιού εις φύρεις ἔχουν και

β) Η παρχόσυν ακέρατοι, εί τοιοις τάξει και
ποῖη τραύμα καὶ τῆς μανθάνος

Από τέλος παρατηρούσεις αύτάς δύνησε μεθαί εἰ-

Allo Tas, Napari Project, 2013, 001, 001

"Έκαστος φυσικός άριθμός μεγαλύτερος της μονάδος λέγεται, πρώτος είδην έχη δύο μόνον διαιρέτας, σύνθετος*" έχη ένα τούλαχιστον διαιρέτην, έκτος της μονάδος καὶ τοῦ έαυτοῦ του.

Σημείωσις

Σημειούμεν ότι ο δεύτερος εἰς σειράν διαιρέτης έκαστου τῶν ἀνωτέρω ἀκεραίων 2, 3, ..., 9, εἶναι πρῶτος άριθμός. Τὸ αὐτὸν δυνάμεθα νὰ διαπιστώσωμεν καὶ εἰς τὴν περίπτωσιν οἰουδήποτε ἀκεραίου.

51. 3. Κόσκινον τοῦ Ἐρατοσθένους

Γεννᾶται τὸ ἐρώτημα: Πόσοι εἶναι οἱ πρῶτοι άριθμοὶ καὶ κατὰ ποῖον τρόπον θὰ τοὺς εύρωμεν;

Οἱ ἀρχαῖοι "Ἐλληνες ἔγνωριζον ότι δὲν ὑπάρχει μέγιστος πρώτος άριθμός· ήτοι τὸ σύνολον τῶν πρώτων άριθμῶν εἶναι μή πεπερασμένον.

$$\{2, 3, 5, 7, 11, 13, \dots\}$$

"Ἔγνωριζον ἀκόμη, ότι δὲν ὑπάρχει ἀπλοῦς κανὼν ό δόποιος νὰ μᾶς δίδῃ τὸν ένα μετά τὸν ἄλλον τοὺς διαιφόρους πρῶτους άριθμούς. Εἶχον δῶμας ἀνακαλύψει μίαν μέθοδον διὰ νὰ εύρισκωμεν τοὺς πρῶτους άριθμούς, οἱ δόποιοι εἶναι μικρότεροι ἀπὸ ἕνα δεδομένον ἀκέραιον. 'Η μέθοδος αὕτη εἶναι γνωστὴ ὡς κόσκινον τοῦ Ἐρατοσθένους** καὶ ἔχει συντόμως ὡς ἔξῆς.

Διὰ τὴν εὕρεσιν τῶν πρώτων άριθμῶν οἱ δόποιοι εἶναι μικρότεροι π.χ. τοῦ 100, γράφομεν δῆλους τοὺς ἀκέραιους 1, 2, 3, ..., 100. Ἐν συνεχείᾳ διαγράφομεν:

1) τὴν μονάδα

2) τὰ πολλαπλάσια τοῦ 2 ἀρχίζοντες ἀπὸ τὸ $2^2=4$

3) τὰ πολλαπλάσια τοῦ 3 ἀρχίζοντες ἀπὸ τὸ $3^2=9$

4) τὰ πολλαπλάσια τοῦ 5 ἀρχίζοντες ἀπὸ τὸ $5^2=25$

5) τὰ πολλαπλάσια τοῦ 7 ἀρχίζοντες ἀπὸ τὸ $7^2=49$

Οἱ ἀριθμοὶ οἱ δόποιοι ἀπομένουν εἶναι δῆλοι οἱ πρῶτοι, οἱ μικρότεροι τοῦ 100. Εἶναι δὲ οἱ: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

131. Εἰς τὸ σύνολον $A=\{2, 4, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 21, 29\}$ ποια ἐκ τῶν στοιχείων του εἶναι πρῶτοι καὶ ποια σύνθετοι άριθμοί;

132. Τὸ διπλάσιον ἐνὸς πρώτου άριθμού εἶναι πρῶτος ἢ σύνθετος άριθμός;

* Η δυνομασία σύνθετος άριθμος δικαιολογεῖται ἐκ τοῦ δτι ἔκαστος σύνθετος άριθμός δύναται νὰ ἔκφρασθῇ ὡς γινόμενον πρώτων παραγόντων. Π.χ. $6=2 \cdot 3$, $30=2 \cdot 3 \cdot 5$

** Ο Ἐρατοσθένης (276 – 195 π.Χ.) ὑπῆρξεν εἰς ἐκ τῶν ἐπιστημόνων καὶ λογίων τῆς ἀρχαιότητος. Διεκρίθη ὡς μαθηματικός, φιλόλογος, γεωγράφος, ιστορικός καὶ ποιητής.

133. Ποιον είναι τὸ σύνολον τῶν διαιρετῶν τῶν ἀριθμῶν: $25=5^2$, $49=7^2$, 11^2 , 13^2 ; Τὶ παρατηρεῖτε; $\sqrt{5}$ $\sqrt{7}$ $\sqrt{11}$ $\sqrt{13}$

134. Μία δύναμις αὐτὸς ἀκεραίου α > 1, ήμπορεῖ ἔργα γένεται εἰναι πρῶτος ἀριθμός, δταν ν > 1;

52. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΙΡΕΤΩΝ ΑΚΕΡΑΙΟΥ

52. 1. Ὡς γνωστὸν ὁ 5 διαιρεῖ ἕκαστον πολλαπλάσιον αὐτοῦ. Ήτοι διαιρεῖ τοὺς ἀριθμούς: $0 \cdot 5 = 0$, $1 \cdot 5 = 5$, $2 \cdot 5 = 10$, $3 \cdot 5 = 15 \dots$

Ἀντιστρόφως. Ἐάν ὁ 5 διαιρῇ ἔνα ἀριθμὸν α, οὗτος θὰ εἴναι πολλαπλάσιον τοῦ 5.

$$\alpha : 5 = \beta \iff \alpha = 5 \cdot \beta \quad \alpha, \beta \in \mathbb{N}_0$$

Ωστε: ὁ 5 διαιρεῖ ὅλα τὰ πολλαπλάσια αὐτοῦ καὶ μόνον αὐτά.

Γενικῶς ἐκ τῆς γνωστῆς ίσοδυναμίας

$$\alpha : \beta = \gamma \iff \alpha = \beta \cdot \gamma$$

ἐννοοῦμεν ὅτι:

Ἐκαστος φυσικὸς ἀριθμὸς διαιρεῖ τὰ πολλαπλάσια αὐτοῦ καὶ μόνον αὐτά.

52. 2. Ο φυσικὸς ἀριθμὸς 5 διαιρεῖ τοὺς ἀριθμούς 15 καὶ 30, διότι εἴναι πολλαπλάσια αὐτοῦ.

Ήτοι ἔχομεν $15 = 3 \cdot 5$
 $30 = 6 \cdot 5$

"Ἄρα $15 + 30 = 3 \cdot 5 + 6 \cdot 5$

$$= 5 \cdot (3+6) \quad (\text{ἐπιμεριστικὴ ιδιότης})$$
$$= 5 \cdot 9 = \text{πολλαπλάσιον } 5$$

Παρατηροῦμεν ὅτι τὸ ἄθροισμα $15 + 30$ εἴναι πολλαπλάσιον τοῦ 5 καὶ συνεπῶς διαιρετὸν διὰ 5. Όμοίως ἐννοοῦμεν ὅτι τὸ ἄθροισμα $15 + 30 + 40$ εἴναι διαιρετὸν διὰ 5.

Απὸ τὰς παρατηρήσεις αὐτὰς συνάγομεν ὅτι:

Ἐάν εἰς φυσικὸς ἀριθμὸς διαιρῇ δύο ἢ περισσοτέρους ἄλλους, θὰ διαιρῇ καὶ τὸ ἄθροισμα αὐτῶν.

Ἐφαρμογή: Διαιρεῖ ὁ ἀριθμὸς 6 τὸν 324;

$$\Gammaράφομεν \quad 324 = 300 + 24$$

Εύκολως διακρίνομεν ὅτι ὁ 6 διαιρεῖ τὸ 300 καὶ τὸ 24, ἀρα θὰ διαιρῇ καὶ τὸ ἄθροισμα αὐτῶν $300 + 24 = 324$.

52. 3. Κατὰ τὴν προηγουμένην ίδιότητα ὁ ἀριθμὸς 5, ἀφοῦ διαιρεῖ τὸν ἀριθμὸν 15, θὰ διαιρῇ καὶ τὸ ἄθροισμα $15 + 15 + 15$, ἥτοι τὸ γινόμενον 3·15.

Ωστε: Ἐάν εἰς φυσικὸς ἀριθμὸς διαιρῇ ἔνα ἄλλον, θὰ διαιρῇ καὶ τὰ πολλαπλάσια αὐτοῦ.

Ἐφαρμογή: Διαιρεῖ ὁ ἀριθμὸς 4 τὸν ἀριθμὸν 280; Ἀφοῦ ὁ 4 διαιρεῖ τὸ 28 θὰ διαιρῇ καὶ τὸ πολλαπλάσιον αὐτοῦ $28 \cdot 10 = 280$.

52. 4. Ο φυσικός δριθμός 5 διαιρεῖ τούς δριθμούς 60 καὶ 35. Θὰ διαιρῇ καὶ τὴν διαφοράν των 60—35;

Εἶναι :

$$60 = 5 \cdot 12$$

$$35 = 5 \cdot 7$$

"Αρα

$$60 - 35 = 5 \cdot 12 - 5 \cdot 7$$

$$= 5 \cdot (12 - 7)$$

$$= 5 \cdot 5 = \text{πολλαπλάσιον } 5$$

"Ωστε: Εάν εἰς φυσικός δριθμός διαιρῇ δύο ἀλλους, θὰ διαιρῇ καὶ τὴν διαφοράν αὐτῶν.

Έφαρμογή: Διαιρεῖ δριθμός 2 τὸν δριθμὸν 196;

Γράφομεν

$$196 = 200 - 4$$

Εὐκόλως διαιρένομεν διτὶ δριθμός 2 διαιρεῖ τοὺς δριθμούς 200 καὶ 4.

Συνεπῶς διαιρεῖ καὶ τὴν διαφοράν αὐτῶν $200 - 4 = 196$.

52. 5. Εάν διαιρέσωμεν τὸν ἀκέραιον 78 διὰ τοῦ φυσικοῦ δριθμοῦ 9 εὑρίσκομεν πηλίκον 8 καὶ ὑπόλοιπον 6.

"Ητοι : $78 = 9 \cdot 8 + 6$

$$\begin{array}{r} 78 \\ - 9 \cdot 8 \\ \hline 6 \end{array}$$

Παρατηροῦμεν διτὶ διαιρέτος 78 καὶ διαιρέτης 9 εἶναι διαιρετοί διὰ 3. Ο 3 ὡς διαιρῶν τὸ 9 διφείλει νὰ διαιρῇ καὶ τὸ πολλαπλάσιον αὐτοῦ 9·8.

"Επειδὴ δὲ διαιρεῖ καὶ τὸ 78 θὰ διαιρῇ καὶ τὴν διαφοράν $78 - 9 \cdot 8 = 6$.

"Ομοίας παρατηρήσεις δυνάμεθα νὰ κάνωμεν εἰς ὅλας τὰς ἀτελεῖς διαιρέσεις.

"Ωστε: Εάν εἰς φυσικός δριθμός διαιρῇ τὸν διαιρετέον καὶ τὸν διαιρέτην μιᾶς ἀτελοῦς διαιρέσεως, θὰ διαιρῇ καὶ τὸ ὑπόλοιπον αὐτῆς.

Έφαρμογή: Οἱ ἀκέραιοι 69 καὶ 9 εἶναι διαιρετοί διὰ τοῦ φυσικοῦ δριθμοῦ 3. Καὶ τὸ ὑπόλοιπον τῆς διαιρέσεως αὐτῶν 6 εἶναι διαιρετὸν διὰ 3. Σημειώνομεν διτὶ τὸ πηλίκον 7 τῆς διαιρέσεως τοῦ 69 διὰ 9 δὲν εἶναι κατ' ἀνάγκην διαιρετὸν διὰ 3.

ΣΥΝΟΨΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ

"Εάν δριθμὸς α διαιρῇ τοὺς ἀκέραιους β καὶ

$$1) \beta + \gamma$$

γ, τότε θὰ διαιρῇ καὶ τούς :

$$2) \beta - \gamma,$$

$$\beta > \gamma$$

$$3) \beta \cdot \gamma$$

$$\lambda \in N$$

$$4) \beta / \gamma$$

$$\beta < \gamma$$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

135. Οι δριθμοὶ α καὶ β, διποὺ α > β, εἶναι διαιρετοί διὰ τοῦ 5. Νὰ σχηματίσετε μὲ αὐτοὺς ἀλλους δριθμούς διαιρετούς διὰ 5.

136. Νὰ ἔξετάσετε ἐάν οἱ ἀριθμοί : $A=7\cdot\alpha+21$ καὶ $B=28\cdot\alpha+14$, αὲν, εἶναι διαιρετοί διὰ 7.

137. Νὰ ἔξετάσετε ἐάν ὁ ἀριθμὸς $X=18\alpha^2\cdot\beta$ εἶναι διαιρετός διὰ 9.

138. Ο 9 εἶναι διαιρέτης τῶν ἀριθμῶν 27, 45 καὶ 81. Αἰτιολογήσατε διατὶ θὰ εἶναι διαιρέτης καὶ τῶν ἀριθμῶν 153, 243, 378.

53. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΟΣ

53. 1. Διὰ νὰ διαιπιστώσωμεν ἐάν ὁ ἀκέραιος α εἶναι διαιρετός διὰ τοῦ φυσικοῦ ἀριθμοῦ β, δυνάμεθα νὰ ἐκτελέσωμεν τὴν διαιρεσιν τοῦ α διὰ β καὶ νὰ ἴωμεν ἐάν αὕτη εἶναι τελεία ἢ ὄχι.

Ἐν τούτοις εἶναι δυνατόν, δι' ὧρισμένας τιμᾶς τοῦ β, νὰ διακρίνωμεν ἐάν δ α εἶναι ἢ ὄχι διαιρετός διὰ β, χωρὶς νὰ ἐκτελέσωμεν τὴν διαιρεσιν. Αἱ Ιδιότητες τῶν διαιρετῶν θὰ μᾶς δύνηγήσουν εἰς κανόνας, κριτήρια διαιρετότητος, τὰ δρποῖα θὰ μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ διακρίνωμεν συντόμως πότε ὁ ἀκέραιος α εἶναι διαιρετός διὰ τοῦ φυσικοῦ ἀριθμοῦ β. Τὰ ἐπόμενα κριτήρια ἴσχουν διὰ τὸ δεκαδικὸν σύστημα γραφῆς τῶν ἀκεραίων.

53. 2. Τρόπος ἐργασίας

Εἰς τὴν εὑρεσιν τῶν κριτηρίων διαιρετότητος θὰ ἀκολουθήσωμεν κατώτερω τὴν ἔξι γενικὴν μέθοδον. Διὰ νὰ διακρίνωμεν π.χ., ἐάν ὁ ἀκέραιος 2630 εἶναι διαιρετός διὰ 25, ἀναλύομεν αὐτὸν εἰς δύο μέρη

$$2630 = 2500 + 130$$

τοιαῦτα, ώστε τὸ πρῶτον μέρος νὰ φαίνεται ἀμέσως διὰ εἶναι διαιρετὸν διὰ 25, διόποτε ἢ προσοχή μας περιορίζεται εἰς τὸ δεύτερον μέρος αὐτοῦ.

Γενικῶς διὰ νὰ διακρίνωμεν ἐάν ὁ ἀκέραιος α εἶναι διαιρετός διὰ τοῦ φυσικοῦ β, ἀναλύομεν τὸ α κατὰ τὸν τύπον

$$\alpha = \text{πολλαπλάσιον } \beta + \nu$$

(1)

53. 3. Ιον κριτήριον. Ἀριθμοὶ διαιρετοί διὰ 10, 100, 1000 . . .

"Ας λάβωμεν τὸν ἀριθμὸν 3567 καὶ ἀς ἀναλύσωμεν αὐτὸν κατὰ τὸν τύπον (1)."

Συγκεκριμένως ἔχομεν :

$$3567 = 3560 + 7$$

$$3567 = 356 \cdot 10 + 7$$

$$3567 = \text{πολλαπλάσιον } 10 + 7$$

'Ανωτέρω ὁ ἀριθμὸς 3567 ἀνελύθη εἰς δύο μέρη (προσθετέους). Τὸ πρῶτον μέρος διαιρεῖται διὰ 10, ὡς πολλαπλάσιον αὐτοῦ. Συνεπῶς, ἐάν καὶ τὸ δεύτερον μέρος (7) διαιρῆται διὰ 10, δλόκληρος ὁ ἀριθμὸς θὰ εἶναι διαιρετός διὰ 10.

"Ητοι είς άριθμός είναι διαιρετός διά 10, έάν τὸ τελευταῖον ψηφίον αὐτοῦ διαιρήται διά 10, δηλαδή έάν είναι 0.

Μὲ δύοιον τρόπον ἐργαζόμεθα καὶ σταν διαιρέτης είναι 100, 1000....

Π.χ.	3567=3500+67
ἢ	3567=35·100+67
ἢ	3567=πολλαπλάσιον 100+67

"Ωστε: Είς άριθμός είναι διαιρετός διά 10, 100, 1000 . . . , έάν λήγῃ τούλαχιστον εἰς ἔν, δύο, τρία, . . . μηδενικά ἀντιστοίχως.

'Εφαρμογή: 'Απὸ τοὺς άριθμούς: 175, 15360, 38600, 1867 είναι διαιρετοὶ διά 10 οἱ 15360, 38600 ἐνῷ διά 100 είναι διαιρετός διά 38600

53. 4. 2ον κριτήριον. 'Αριθμοὶ διαιρετοὶ διὰ 2 η διὰ 5

"Ας λάβωμεν τὸν άριθμὸν 1536 καὶ διὰ διαλύσωμεν αὐτὸν κατὰ τὸν τύπον (1).

Συγκεκριμένως ἐπειδὴ 2·5=10

γράφομεν 1536=153·10+6

ἢ 1536=πολλαπλάσιον 10+6 (2)

"Ας προσέξωμεν εἰς τὸ δεύτερον μέρος τῆς (2). "Εκαστος τῶν ἀκέραιων 2 καὶ 5 διαιρεῖ τὸν 10 ὡς πολλαπλάσιον αὐτοῦ. "Αρα θὰ διαιρῇ καὶ τὰ πολλαπλάσια τοῦ 10. 'Εάν καὶ ὁ 6, τελευταῖον ψηφίον τοῦ άριθμοῦ, διαιρῆται διὰ 2 η 5, ὀλόκληρος ὁ άριθμός θὰ είναι διαιρετός διὰ 2 η 5 ἀντιστοίχως.

"Ωστε: Είς άριθμός είναι διαιρετός διὰ 2 η 5, έάν τὸ τελευταῖον ψηφίον του είναι διαιρετὸν διὰ 2 η 5 ἀντιστοίχως.

Παράδειγμα

'Απὸ τοὺς άριθμούς 172, 57, 1160, 475 είναι διαιρετοὶ διὰ 2 οἱ 172, 1160 καὶ διὰ 5 οἱ 1160, 475.

Σημείωσις

Οἱ ἀκέραιοι, οἱ ὅποιοι είναι διαιρετοὶ διὰ 2, λέγονται ἄρτιοι άριθμοί. "Ητοι ἄρτιοι είναι ὅλα τὰ πολλαπλάσια τοῦ 2. Διά τοῦτο ὁ συμβολισμὸς

$$\alpha = 2 \cdot n \text{ ὅπου } n \in \mathbb{N}_0$$

σημαίνει ὅτι ὁ ἀκέραιος α είναι ἄρτιος άριθμός. Οἱ ἀκέραιοι, οἱ ὅποιοι δὲν είναι διαιρετοὶ διὰ 2, λέγονται περιττοὶ άριθμοί. Οὗτοι διαιρούμενοι διὰ 2 ἀφήνουν ὑπόλοιπον πάντοτε 1. Διά τοῦτο ὁ συμβολισμὸς $\alpha = 2 \cdot n + 1$ ὅπου $n \in \mathbb{N}_0$. σημαίνει ὅτι ὁ α είναι περιττός άριθμός.

53. 5. Ζον κριτήριον. Άριθμοί διαιρετοί διά 4 ή διά 25

"Ας λάβωμεν τὸν ἀριθμὸν 6575 καὶ ὅς ἀναλύσωμεν αὐτὸν κατὰ τὸν τύπον (1).

Συγκεκριμένως ἐπειδὴ $4 \cdot 25 = 100$
 γράφομεν $6575 = 65 \cdot 100 + 75$
 ή $6575 = \text{πολλαπλάσιον } 100 + 75 \quad (3)$

Εἰς τὸ δεύτερον μέλος τῆς (3) παρατηροῦμεν ὅτι ὁ 100 εἶναι διαιρετὸς διά 4 καὶ 25 ἀρα καὶ τὸ πολλαπλάσιον αὐτοῦ 65.100. Συνεπῶς ἔαν ὁ 75 εἶναι διαιρετὸς διά τοῦ 4 ή 25, ὀλόκληρος ὁ ἀριθμὸς θά εἶναι διαιρετὸς διά 4 ή 25 ἀντιστοίχως.

"Ωστε: Εἰς ἀριθμὸς εἶναι διαιρετὸς διά 4 ή 25, ἔαν τὸ τελευταῖον διψήφιον τμῆμα του ἀποτελῇ ἀριθμὸν διαιρετὸν διά τοῦ 4 ή 25 ἀντιστοίχως.

Παραδείγματα

'Απὸ τοὺς ἀριθμοὺς 6736, 2300, 638, 3275, οἱ ἀριθμοὶ 6736, 2300 εἶναι διαιρετοί διά 4, ἐνῶ οἱ 2300, 3275 εἶναι διαιρετοί διά 25.

53. 6. Ζον. Κριτήριον Ἀριθμοί διαιρετοί διά 9 ή διά 3

"Ας λάβωμεν τὸν ἀριθμὸν 7382.

Ἐπειδὴ $10 = 9 + 1 = \text{πολ. / σιον } 9 + 1$

$100 = 99 + 1 = 9 \cdot 11 + 1 = \text{πολ. / σιον } 9 + 1$

$1000 = 999 + 1 = 9 \cdot 111 + 1 = \text{πολ. / σιον } 9 + 1$ κήρησαν πρᾶξη

γράφομεν $7382 = 7 \cdot 1000 + 3 \cdot 100 + 8 \cdot 10 + 2$

'Αλλὰ $7 \cdot 1000 = 7 \cdot (\text{πολ. } 9 + 1) = 7 \cdot (\text{πολ. } 9) + 7 = \text{πολ. } 9 + 7$

$3 \cdot 100 = 3 \cdot (\text{πολ. } 9 + 1) = 3 \cdot (\text{πολ. } 9) + 3 = \text{πολ. } 9 + 3$

$8 \cdot 10 = 8 \cdot (\text{πολ. } 9 + 1) = 8 \cdot (\text{πολ. } 9) + 8 = \text{πολ. } 9 + 8$

$2 = 2$

"Ἄρα: $7 \cdot 1000 + 3 \cdot 100 + 8 \cdot 10 + 2 = \text{πολ. } 9 + (7 + 3 + 8 + 2) \quad (4)$

"Ἐκ τῆς (4) εἶναι φανερὸν ὅτι, ἔαν καὶ τὸ ἄθροισμα $(7 + 3 + 8 + 2)$ εἶναι διαιρετὸν διά 9 ή 3, ὀλοκληρος ὁ ἀριθμὸς θά εἶναι διαιρετὸς διά 9 ή 3 ἀντιστοίχως.

"Ωστε: Εἰς ἀριθμὸς εἶναι διαιρετὸς διά 9 ή 3, ὅταν τὸ ἄθροισμα τῶν ψηφίων του εἶναι διαιρετὸν διά 9 ή 3 ἀντιστοίχως.

Παρατήρησις

Ἐπειδὴ δ 9 εἶναι πολλαπλάσιον τοῦ 3, ἔκαστος ἀριθμὸς διαιρετὸς διά 9

Θὰ είναι διαιρετός καὶ διά 3. Τὸ ἀντίστροφον ὅμως δὲν ισχύει. Είναι δυνατόν τὸ ἀθροισμα τῶν ψηφίων ἐνὸς ἀριθμοῦ νὰ είναι διαιρετὸν διὰ 3 ὅχι ὅμως καὶ διὰ 9, π.χ. δ ἀριθμὸς 33.

Παραδείγματα

‘Απὸ τοὺς ἀριθμοὺς 561, 783, 75234, 11342 είναι διαιρετός διὰ τοῦ 9 μόνον δ ἀριθμὸς 783 ἐνῷ διὰ 3 οἱ ἀριθμοὶ 561, 75234, 783.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

139. Ποιοι ἀπὸ τοὺς ἀριθμοὺς 216, 7852, 189756, 810, 3775, 328 είναι διαιρετοὶ διὰ 2, 5, 4, 25, 3, 9;

140. Εἰς τὸ τέλος τῶν ἀριθμῶν 13, 63, 22 νὰ θέσετε ἐν ψηφίον, ὡστε νὰ προκύψουν ἀριθμοὶ διαιρετοὶ συγχρόνως διὰ 5 καὶ 9

141. Δίδονται οἱ ἀριθμοὶ 10802, 180540. ἀντικαταστήσατε τὰ μηδὲν μὲ δλλα ψηφία, ὡστε νὰ προκύψουν ἀριθμοὶ διαιρετοὶ συγχρόνως διὰ 4 καὶ 9.

142. Νὰ ἀντικαταστήσετε τὸ τετραγωνίδιον μὲ ἐν ψηφίον, ὡστε δ ἀριθμὸς 35 □, δὲν διαιρεθῇ διὰ 9, νὰ ἀφήσῃ ὑπόλοιπον 4.

54. ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΙΣ ΓΙΝΟΜΕΝΟΝ ΠΡΩΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

54. 1. “Ἄσ προσέξωμεν τὰς Ισότητας

$$3 \cdot 4 = 12$$

$$2 \cdot 3 \cdot 5 = 30$$

Τὰ πρῶτα μέλη αὐτῶν παριστάνουν τοὺς ἀριθμοὺς 12 καὶ 30 ὑπὸ μίαν ἄλλην μορφὴν. Υπὸ μορφὴν γινομένου παραγόντων.

Ἡ γραφὴ ἐνὸς ἀριθμοῦ ὑπὸ τὴν μορφὴν αὐτὴν λέγεται ἀνάλυσις τοῦ ἀριθμοῦ εἰς γινόμενον παραγόντων ἢ παραγοντοποίησις εἰς αὐτοῦ.

Εἰς τὴν δευτέραν Ισότητα παρατηροῦμεν δτὶ δλοι οἱ παράγοντες εἰς τοὺς δποίους ἀνελύθη δ ἀριθμὸς 30 είναι πρῶτοι ἀριθμοί. Διὰ τοῦτο λέγομεν δτὶ ἀνελύσαμεν τὸν ἀριθμὸν 30 εἰς γινόμενον πρώτων παραγόντων ἢ δτὶ ἔχομεν πλήρη παραγοντοποίησιν αὐτοῦ.

Πολὺ συχνά εἰς τὰ μαθηματικά μᾶς διευκολύνει ἢ παράστασις ἐνὸς ἀριθμοῦ ὑπὸ μορφὴν γινομένου πρώτων παραγόντων. Διὰ νὰ ἀναλύσωμεν ἔνα σύνθετον ἀριθμὸν εἰς γινόμενον πρώτων παραγόντων, π.χ. τὸν ἀριθμὸν 150, ἔργαζόμεθα ὡς ἔξι:

$$150 = 2 \cdot 75$$

$$\Deltaιότι \quad 2 \cdot 75 = 150$$

$$= 2 \cdot 3 \cdot 25$$

$$\gg 3 \cdot 25 = 75$$

$$= 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 5$$

$$\gg 5 \cdot 5 = 25$$

$$= 2 \cdot 3 \cdot 5^2$$

Ήτοι εύρισκομεν τὸν ἔλαχιστον πρῶτον παράγοντα (δεύτερον διαιρέ-

την) τοῦ 150, τὸν 2, ἔπειτα τὸν ἐλάχιστον πρῶτον παράγοντα τοῦ πηλίκου 150:2=75, τὸν 3, τὸν ἐλάχιστον πρῶτον παράγοντα τοῦ πηλίκου 75:3=25, τὸν 5.

Τοιουτοτρόπως καταλήγομεν εἰς τὸ γινόμενον $2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 5 = 2 \cdot 3 \cdot 5^2$ τοῦ ὅποιου δῆλοι οἱ παράγοντες εἶναι πρῶτοι. Ἡ ἀνωτέρω διαδικασία γράφεται συντόμως κατὰ τὴν κατωτέρω διάταξιν

150	2	$150:2=75$
75	3	$75:3=25$
25	5	$25:5=5$

^aH_{TQI} = 150 = 2 · 3 · 5³

"Αλλα παραδείγματα

60	2	72	2	180	2
30	2	36	2	90	2
15	3	18	2	45	3
5	5	9	3	15	3
1	3	3	3	5	5
	1	1	1	1	1

$$\text{కీ} \text{TOI } 60 = 2^3 \cdot 3 \cdot 5 \quad \text{కీ} \text{TOI } 72 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 2 \cdot 3 \quad \text{కీ} \text{TOI } 180 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5$$

54. 3. Ἐφαρμογαὶ

$$72 = 2^3 \cdot 3^2$$

$$\begin{aligned} 72 \cdot 2^5 \cdot 7 &= (2^3 \cdot 3^2) \cdot (2^5 \cdot 7) \\ &= (2^3 \cdot 2^5) \cdot 3^2 \cdot 7 \\ &= 2^8 \cdot 3^2 \cdot 7 \\ &= 256 \cdot 9 \cdot 7 = 16128 \end{aligned}$$

Νότιο πολεοχισθή τὸ πυλίκων

$$(2^{10} \cdot 3^2) : 256$$

"EVOLUÇÃO"

Exposure

$$(2^{10} : 3^2) : 256 = (2^{10} \cdot 3^2) : 2^8 \\ = (2^{10} : 2^8) \cdot 3^2 \\ = 2^2 \cdot 3^2 = 36$$

$12^3 : (2 \cdot 6^3)$ օր պատճեն գոյացնելով

No. 6

παρατίθεται ότι ανυπογόνως κατέδειπται πάντας στην ίδια. Σ' αὐτό, θέλει να το γίνεται σύντομα. Έτσι μεταβιβάζεται στην αναλυτική μετατροπή της παραγόντων στην παρατηρητική.

143. Νά συγκριθοῦν οι άριθμοι

216 και $2^8 \cdot 3^8$

144. Νά διαλυθοῦν εἰς γινόμενα πρώτων παραγόντων οι άκεραιοι

580, 612, 1245, 1440

145. Εάν $\alpha = 2^8 \cdot 3^7 \cdot 5^2$, $\beta = \alpha^4 \cdot 3^8 \cdot 7$ και $\gamma = 2^8 \cdot 3^8 \cdot 7$

νά εύρεθοῦν τὰ γινόμενα

$\alpha \cdot \beta$, $\alpha \cdot \gamma$, $(\alpha \cdot \beta) \cdot \gamma$

και τὰ πηλίκα $\alpha : \beta$, $(\alpha : \beta) : \gamma$

146. Άφοι άναλυσετε εἰς γινόμενα πρώτων παραγόντων τοὺς άκεραιους 6, 15, 18, 30 νά εύρετε τὰ τετράγωνα αὐτῶν. Τι παρατηρεῖτε διὰ τούς ἑκάτεας; Στηριζόμενοι εἰς τὴν παρατήρησίν σας, νά εύρετε ποιών τὰ τετράγωνα είναι οι άκεραιοι $2^8 \cdot 3^4$, $2^8 \cdot 3^8 \cdot 5^4$ και 256.

55. KOINOI DIAIPETAI KAI M.K.D. AKERAION APIOMON

55. 1. "Ἄσ λάβωμεν δύο άριθμούς, τοὺς 16 και 24 και ἄς εὗρωμεν τὰ σύνολα τῶν διαιρετῶν αὐτῶν. Ξέχομεν:

Σύνολον τῶν διαιρετῶν τοῦ 16 : $A = \{1, 2, 4, 8, 16\}$

» » 24 : $B = \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24\}$

"Ἄσ σχηματίσωμεν και τὴν τομὴν τῶν συνόλων A και B

$$A \cap B = \{1, 2, 4, 8\}$$

Εἰς τὸ σύνολον $A \cap B$ παρατηροῦμεν τὰ ἔχεις :

i) "Ἔχει ως στοιχεῖα του τούς άριθμούς, οι δύοιοι είναι οι κοινοὶ διαιρέται τῶν 16 και 24. Διὰ τούτο και λέγεται σύνολον τῶν κοινῶν διαιρετῶν τῶν άριθμῶν αὐτῶν.

ii) Είναι πεπερασμένον σύνολον και ἔχει ως ἐλάχιστον στοιχεῖον τὸ 1 και μέγιστον τὸ 8. Τὸν άκέραιον 8, μέγιστον στοιχεῖον τοῦ συνόλου τῶν κοινῶν διαιρετῶν, δονομάζομεν μέγιστον κοινὸν διαιρέτην τῶν άριθμῶν 16 και 24, σημειώνομεν δὲ συντόμως M.K.D. $(16, 24) = 8$.

iii) Τὸ σύνολον Γ τῶν διαιρετῶν τοῦ M.K.D., $\Gamma = \{1, 2, 4, 8\}$, ταυτίζεται μὲ τὸ σύνολον $A \cap B = \{1, 2, 4, 8\}$.

"Ητοι : $A \cap B = \Gamma$

Μὲ ἐντελῶς ἀνάλογον τρόπον δυνάμεθα νά εὗρωμεν τὸν M.K.D. τριῶν ἢ περισσοτέρων άκεραιών.

Π.χ. διὰ τούς άκεραιους 12, 20, 28 ἔχομεν :

Σύνολον διαιρετῶν τοῦ 12 : $A = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$

Σύνολον διαιρετῶν τοῦ 20 : $B = \{1, 2, 4, 5, 10, 20\}$

Σύνολον διαιρετῶν τοῦ 28 : $\Gamma = \{1, 2, 4, 7, 14, 28\}$

Σύνολον κοινῶν διαιρετῶν :

$$\Delta = A \cap B \cap \Gamma = \{1, 2, 4\}$$

"Ωστε Μ.Κ.Δ. (12, 20, 28) είναι ό 4. Δ.Κ.Μ. τρόπος μαθησης φορμή

Αἱ ἀνωτέρω παρατηρήσεις μᾶς διευκολύνουν εἰς τὴν ἀκατάνόησιν τῶν ἔξις γενικῶν προτάσεων.

"Ἄσ εἶναι α, β, γ... δύο ή περισσοτέροι ἀκέραιοι, ἐκ τῶν δύοιν δεῖς τούλαχιστον εἶναι διάφορος τοῦ μηδενός. Π.χ. $\alpha \neq 0$.

Τὸ σύνολον Δ τῶν κοινῶν διαιρετῶν αὐτῶν:

i) Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ εἶναι τὸ κενὸν σύνολον Δ.Κ.Μ.Ο. οὐδεὶς θέλει Γνωρίζομεν ὅτι δῆλοι οἱ ἀριθμοὶ ἔχουν διαιρέτην τὴν μονάδα.

"Ἄρα καὶ ἡ τομὴ Δ θὰ ἔχῃ ἐν τούλαχιστον στοιχεῖον, τὴν μονάδα.

ii) Εἴναι πεπερασμένον σύνολον, διότι δῆλα τὰ στοιχεῖα του εἴναι μικρότερα (ἢ ἵσα) μὲν α. Συνεπῶς ὑπάρχει ἐν μέγιστον στοιχεῖον: δ M.Κ.Δ. τῶν διοθέντων ἀριθμῶν.

iii) Ταυτίζεται μὲ τὸ σύνολον τῶν διαιρετῶν τοῦ M.Κ.Δ. τῶν διοθέντων ἀριθμῶν.

55. 2. Ἀριθμοὶ πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους

"Ἄσ ζητήσωμεν τὸν M.Κ.Δ. τῶν ἀριθμῶν 5 καὶ 8. "Εχομεν :

Σύνολον διαιρετῶν τοῦ 5 : A = {1, 5}

Σύνολον διαιρετῶν τοῦ 8 : B = {1, 2, 4, 8}

"Ἄρα M.Κ.Δ. (5, 8) εἶναι ἡ μονάς.

"Οταν δύο ή περισσότεροι ἀκέραιοι, ὅπως οἱ 5 καὶ 8, ἔχουν ὃς M.Κ.Δ. τὴν μονάδα, λέγονται πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους.

55. 3. Παρατήρησις

Δὲν πρέπει νὰ συγχέωμεν τὰς ἔννοιας :

1) «Πρῶτος ἀριθμὸς» π.χ. δ 7 εἶναι πρῶτος ἀριθμός.

2) «Πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους ἀριθμοί» π.χ. οἱ ἀριθμοὶ 6, 4, 9 εἶναι πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους χωρὶς ἕκαστος τούτων νὰ εἶναι πρῶτος.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ γέμεο, νῦν καὶ σφέδες γένεθλιον

147. Εὑρετε τὰ σύνολα τῶν διαιρετῶν τῶν ἀριθμῶν 15, 20, 30 καὶ τὸν M.Κ.Δ. αὐτῶν.

148. 'Ο M.Κ.Δ. τριῶν ἀριθμῶν εἶναι δ 17. Ποιὸν εἶναι τὸ σύνολον τῶν κοινῶν διαιρετῶν τῶν ἀριθμῶν αὐτῶν;

149. Εὑρετε τὸν M.Κ.Δ. τῶν ἀριθμῶν 3, 8, 30.

150. Δύο ἀριθμοὶ εἶναι πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους. 'Ο εἰς εἶναι ἄρτιος. Εἶναι δυνατόν καὶ δῆλος νὰ εἶναι ἄρτιος ἢ δῆλος;

56. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ M.Κ.Δ.

56. 1. 1η Ιδιότης

"Ἄσ θεωρήσωμεν τὸν M.Κ.Δ. (36, 14)=2 καὶ δις ἀντικαταστήσωμεν τὸν 36 μὲ τὴν διαφορὰν 36 - 14=22

Παρατηροῦμεν ότι Μ.Κ.Δ. $(22, 14)=2$ (8, 08, 2) Δ.Κ.Μ. αποτελεί.
"Ωστε Μ.Κ.Δ. $(36, 14)=M.K.D.$ $(36-14, 14)$.
πρόσωποι αφίσαις IA

Εις τὴν ἀνωτέρω παρατήρησιν δυνάμεθα νὰ φθάσωμεν, ὅτι σκεφθῶμεν
ὅτι οἰσδήποτε κοινὸς διαιρέτης τῶν ἀριθμῶν 36 καὶ 14, συνεπῶς καὶ ὁ Μ.Κ.Δ.
αὐτῶν, ὅφελει νὰ διαιρῇ καὶ τὴν διαφορὰν 36 - 14 ($\S\ 52. 4$).

Γενικῶς: 'Ο Μ.Κ.Δ. δύο ἢ περισσοτέρων ἀκεραίων δὲν ἀλλάζει, ἐὰν
ἀντικαταστήσωμεν τὸν ἔνα ἐξ αὐτῶν μὲ τὴν διαφορὰν αὐτοῦ καὶ ἐνὸς ἀλλού
ἐκ τῶν δοθέντων ἀριθμῶν.

'Εφαρμογή. 'Ας ἐφαρμόσωμεν διαδοχικῶς τὴν ἀνωτέρων ίδιότητα διὰ τὴν
εὑρεσιν τοῦ Μ.Κ.Δ. τῶν ἀριθμῶν 42 καὶ 18.

'Ἐπειδὴ $42-18=24$, $24-18=6$, $18-6=12$, $12-6=6$

'Εχομεν: Μ.Κ.Δ. $(42, 18)=M.K.D.$ $(24, 18)=M.K.D.$ $(6, 18)=M.K.D.$
 $(6, 12)=M.K.D.$ $(6, 6)=6$

'Η εὑρεσις τοῦ Μ.Κ.Δ. διὰ τῆς μεθόδου αὐτῆς εἶναι ἐπίπονος, ιδίως ὅταν
οἱ ἀριθμοὶ εἶναι μεγάλοι.

56. 2. 2α Ἰδιότης

'Ας ἐπανέλθωμεν εἰς τὸ παράδειγμα τῆς 1ης ίδιότητος καὶ ὡς ἀντικατα-
στήσωμεν τὸν 36 μὲ τὸ ὑπόλοιπον τῆς διαιρέσεως αὐτοῦ διὰ 14 δηλ. 8. Παρα-
τηροῦμεν ότι καὶ πάλιν Μ.Κ.Δ. $(8, 14)=2$

'Ητοι: Μ.Κ.Δ. $(36, 14)=M.K.D. (8, 14)$

Εις τὴν ἀνωτέρω παρατήρησιν δῆγούμεθα, ὅτι διοσδήποτε κοινὸς διαιρέτης τῶν ἀριθμῶν 36 καὶ 14, συνεπῶς καὶ ὁ Μ.Κ.Δ. αὐτῶν,
ὅφελει νὰ διαιρῇ καὶ τὸ ὑπόλοιπον τῆς διαιρέσεως 36 διὰ 14. ($\S\ 52. 5$).

Γενικῶς: 'Ο Μ.Κ.Δ. δύο ἢ περισσοτέρων ἀκεραίων δὲν ἀλλάζει, ἐὰν
ἀντικαταστήσωμεν ἔνα ἐξ αὐτῶν μὲ τὸ ὑπόλοιπον τῆς διαιρέσεως αὐτοῦ
δι' ἐνὸς ἀλλού ἐκ τῶν δοθέντων ἀριθμῶν.

Εις τὴν 2αν ίδιότητα τοῦ Μ.Κ.Δ. στηρίζεται μία σύντομος μέθοδος διὰ
τὴν εὑρεσιν Μ.Κ.Δ. δύο ἀκεραίων. 'Η μέθοδος αὗτη λέγεται Εὐκλείδειος
ἀλγόριθμος ἐκ τοῦ δόνματος τοῦ μεγάλου "Ἐλληνος μαθηματικοῦ Εὐ-
κλείδου δ ὅποιος τὴν ἐδίδαξεν.

* 'Η λέξις ἀλγόριθμος εἶναι ἀραβικῆς προελεύσεως καὶ σημαίνει μίαν σειράν πράξεων, ἣ
ὅποια ἐπαναλαμβανομένη μᾶς ὁδηγεῖ εἰς τὴν εὑρεσιν τοῦ τελικοῦ ἀποτελέσματος π.χ. τὴν
εὑρεσιν τοῦ Μ.Κ.Δ.

Παράδειγμα

Νὰ εύρεθῃ ὁ Μ.Κ.Δ. τῶν ἀριθμῶν 256 καὶ 120.

$$\begin{aligned}
 \text{Έχομεν : } & \text{M.K.Δ. (256, 120)} = \text{M.K.Δ. (16, 120)} \text{ διότι } 256 = 2 \cdot 120 + 16 \\
 & = \text{M.K.Δ. (16, 8)} \text{ διότι } 120 = 7 \cdot 16 + 8 \\
 & = \text{M.K.Δ. (8, 0)} \text{ διότι } 16 = 2 \cdot 8 + 0
 \end{aligned}$$

Ἡ πρᾶξις διατάσσεται σχηματικῶς ὡς ἔξῆς.

Πηλίκα	2	7	2
Ἄριθμοί	256	120	16
Υπόλοιπα	16	8	0

Γενικῶς ἔχομεν τὸν ἔξης κανόνα

Διὰ γὰ εὕρωμεν τὸν Μ.Κ.Δ. δύο ἀκεραίων α καὶ β , δταν $\alpha > \beta$, διαιροῦμεν τὸ α διὰ β :

i) 'Εὰν τὸ ὑπόλοιπον εἶναι 0, τότε Μ.Κ.Δ. (α, β) = β

ii) 'Εὰν ἡ διαιρεσίς τοῦ α διὰ β δίδη ὑπόλοιπον $u_1 \neq 0$, διαιροῦμεν τὸ β διὰ u_1 . 'Εὰν τὸ προκῦπτον ὑπόλοιπον u_2 τῆς νέας διαιρέσεως είναι μηδὲν ($u_2 = 0$), τότε Μ.Κ.Δ. (α, β) = u_1 . 'Εὰν $u_2 \neq 0$, διαιροῦμεν τὸ u_1 διὰ u_2 κ.ο.κ. μέχρις δτου εὕρωμεν μίαν διαιρέσιν μὲν ὑπόλοιπον 0. Αὗτὸ θὰ συμβῇ κατ' ἀνάγκην, διότι οἱ ἀκέραιοι β, u_1, u_2 , γίνονται διαρκῶς μικρότεροι $\beta > u_1 > u_2 \dots$

Ο διαιρέτης τῆς τελευταίας διαιρέσεως εἶναι ὁ Μ.Κ.Δ. τῶν ἀκεραίων α καὶ β .

58. ΕΥΡΕΣΙΣ Μ.Κ.Δ. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΔΥΟ ΑΚΕΡΑΙΩΝ

58. 1. Ἡς εὕρωμεν τὸν Μ.Κ.Δ. τῶν ἀριθμῶν 96, 72 καὶ 24. Παρατηροῦμεν δτι ὁ μικρότερος τούτων, ὁ 24, εἶναι κοινὸς διαιρέτης τῶν 96 καὶ 72. 'Εὰν σκεφθῶμεν δὲ δτι ὁ Μ.Κ.Δ. τῶν τριῶν ἀνωτέρω ἀριθμῶν 96, 72, 24, δὲν δύναται νὰ εἶναι μεγαλύτερος τοῦ 24, (Διατί;), ἐννοοῦμεν δτι ὁ 24 εἶναι ὁ Μ.Κ.Δ. αὐτῶν.

58. 2. Ἡς εὕρωμεν τὸν Μ.Κ.Δ. τῶν ἀριθμῶν 36, 48, 60.

Γνωρίζομεν δτι τὸ σύνολον τῶν κοινῶν διαιρετῶν τῶν ἀριθμῶν 60 καὶ 48 ταυτίζεται μὲ τὸ σύνολον τῶν διαιρετῶν τοῦ Μ.Κ.Δ. αὐτῶν. Δυνάμεθα συνεπῶς νὰ ἀντικαταστήσωμεν τοὺς δύο ἀριθμοὺς 48 καὶ 60 διὰ τοῦ Μ.Κ.Δ. αὐτῶν, δηλαδὴ τὸν 12. Μὲ τὸν τρόπον αὐτὸν καταλήγωμεν εἰς τὴν εὔρεσιν τοῦ Μ.Κ.Δ. δύο ἀριθμῶν τοῦ 36 καὶ 12.

Ητοι Μ.Κ.Δ. (36, 48, 60) = Μ.Κ.Δ. (36, 12) = 12.

Ἐντελῶς ἀναλόγως ἐργαζόμεθα καὶ δταν οἱ ἀριθμοὶ εἶναι περισσότεροι τῶν τριῶν. Τοὺς ἀντικαθιστῶμεν ἀνὰ δύο μὲ τὸν Μ.Κ.Δ. αὐτῶν ἔως δτου καταλήξωμεν εἰς τὴν περίπτωσιν εὐρέσεως Μ.Κ.Δ. δύο ἀριθμῶν.

58.3. Πολλάς φοράς είς τὴν πρᾶξιν ἐφαρμόζομεν καὶ τὴν ἔξῆς σύντομον διάταξιν, ἡ δποία είναι μία ἐφαρμογὴ τῶν ἰδιοτήτων τοῦ Μ.Κ.Δ.

α) Γράφομεν εἰς μίαν σειρὰν τοὺς δοθέντας ἀριθμούς. 240 48 64

β) Τὸν μικρότερὸν ἔξ αὐτῶν (48) τὸν γράφομεν πάλιν εἰς τὴν ἰδίαν στήλην· κάτωθι δὲ τῶν ἄλλων ἀριθμῶν γράφομεν τὸ ὑπόλοιπον τῆς διαιρέσεως ἔκάστου διὰ τοῦ 48.

γ) Ἐπαναλαμβάνομεν τὴν ἰδίαν διαιδικασίαν* μέχρις ὅτου εὑρωμεν εἰς μίαν σειρὰν μηδενικὰ καὶ ἕνα μή μηδενικὸν ἀριθμὸν (16).

Οὗτος θὰ είναι ὁ Μ.Κ.Δ. τῶν δοθέντων ἀριθμῶν.

$$\text{Μ.Κ.Δ. } (240, 48, 64) = 16$$

59. ΕΥΡΕΣΙΣ Μ.Κ.Δ. ΑΚΕΡΑΙΩΝ ΔΙΓΑΝΑΛΥΣΕΩΣ ΤΟΥΤΩΝ ΕΙΣ ΓΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

Ποιος είναι ὁ Μ.Κ.Δ. τῶν ἀκεραίων 120, 360, 36;

"Ἄσ ἀναλύσωμεν κατὰ τὸν γνωστὸν τρόπον εἰς γινόμενον πρώτων παραγόντων τοὺς δοθέντας ἀριθμούς.

"Έχομεν :

$$120 = 2^3 \cdot 3 \cdot 5$$

$$360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$$

$$36 = 2^2 \cdot 3^2$$

Παρατηροῦμεν τὰ ἔξης :

α) Οἱ ἀριθμοὶ 2 καὶ 3 είναι οἱ μόνοι κοινοὶ πρῶτοι παράγοντες εἰς τὰ ἀνωτέρω γινόμενα, ἀρα θὰ είναι κοινοὶ διαιρέται τῶν ἀριθμῶν 120, 360 καὶ 36.

β) Ὁ Μ.Κ.Δ. τῶν 120, 360, 36 δὲν είναι δυνατὸν νὰ ἔχῃ ἄλλους πρώτους παράγοντας ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς ἀριθμούς 2 καὶ 3· μάλιστα θὰ περιέχῃ ἔκαστον τούτων μὲ τὸν μικρότερον ἐκθέτην τὸν δποίον ἔχει οὗτος εἰς τὰς ἀναλύσεις.

Εἰς τὸν Μ.Κ.Δ. δὲν δυνάμεθα νὰ συμπεριλάβωμεν τὸν παράγοντα 5, διότι δ 5 δὲν διαιρεῖ τὸν 36, οὔτε τὰς δυνάμεις 2^3 ή 3^2 , διότι τὸ 2^3 δὲν διαιρεῖ τὸν 36 καὶ τὸ 3^2 τὸν 120.

"Ωστε : $\text{Μ.Κ.Δ. } (120, 360, 36) = 2^2 \cdot 3$

$$= 4 \cdot 3 = 12$$

'Ἐκ τῶν ἀνωτέρω διδηγούμεθα εἰς τὸν ἔξης γενικὸν κανόνα.

Διὰ νὰ εὑρωμεν τὸν Μ.Κ.Δ. ἀριθμῶν ἀναλελυμένων εἰς γινόμενον πρώτων παραγόντων, σχηματίζομεν τὸ γινόμενον τῶν κοινῶν πρώτων παραγόντων αὐτῶν λαμβάνοντες ἔκαστον παράγοντα μὲ τὸν μικρότερον ἐκθέτην.

* Λαμβάνοντες πάντοτε τὸν μικρότερον ἀριθμόν, διάφορον τοῦ μηδενός.

είναι **Έφαρμογή**: 'Ο Μ.Κ.Δ. τῶν ἀριθμῶν 2², 5², 7², 2².3.5².7, 2².5².7².11 είναι 2².5².7

νῶτος καθαύτου δέ τότε λοιποῖς **ΑΣΚΗΣΕΙΣ** στάσιμοι είναι;

151. Νὰ εύρετε τὸν Μ.Κ.Δ. τῶν ἀριθμῶν: α) 78, 104, β) 504, 576, 1140 γ) 24, 72, 108

152. Ποιος είναι δέ Μ.Κ.Δ. τῶν ἀριθμῶν: α) 1080 νῶτος νῶτοις καὶ νοναῖς β) 2².3.5, 300, 2².3.5² γ) 3.5.7, 2².5.11, 2².3².11² εἰσιού

153. Μία χωροδία ἀποτελεῖται ἀπὸ 60 ὑψηφώνους, 120 μέσους καὶ 40 βαθυφώνους. Πόσας τὸ πολὺ δροίας δμάδας δυνάμεθα νὰ σχηματίσωμεν ἐξ αὐτῶν καὶ πόσους ὑψηφώνους, μέσους καὶ βαθυφώνους θὰ ἔχῃ ἐκάστη δμάς;

154. Ἀπὸ τὰς Ιστότητας 33=11.3, 132=11.12, 154=11.14 νὰ εύρετε ἕνα κοινὸν διαιρέτην τῶν ἀριθμῶν 33, 132 καὶ 154.

155. Δύο ἀριθμοὶ ἔχουν τὸν 15 ὡς κοινὸν διαιρέτην. Δείξατε δτι οἱ ἀριθμοὶ αὐτοὶ θὰ ἔχουν καὶ δλλους κοινούς διαιρέτας.

60. KOINA POLLAPLASIA PHYSIKOU ARIOMOU

"Ἄσ λάβωμεν δύο ἀριθμοὺς π.χ. τοὺς 3 καὶ 5 καὶ ἀς σχηματίσωμεν τὰ σύνολα τῶν πολλαπλασίων αὐτῶν. "Εχομεν :

Σύνολον πολλαπλασίων τοῦ 3 : $\Pi_1 = \{0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24\ldots\}$

Σύνολον πολλαπλασίων τοῦ 5 : $\Pi_2 = \{0, 5, 10, 15, 20, 25, 30\ldots\}$.

'Η τομὴ τῶν συνόλων Π_1 καὶ Π_2

$$\Pi_1 \cap \Pi_2 = \{0, 15, 30 \ldots\}$$

είναι ἐν νέον σύνολον τὸ δροῖον ἔχει ὡς στοιχεῖα τὰ κοινὰ πολλαπλασία τῶν ἀριθμῶν 3 καὶ 5. Τὸ ἐλάχιστον στοιχεῖον, ἐκτὸς τοῦ μηδενὸς, τοῦ συνόλου τούτου είναι ὁ ἀκέραιος 15. Διὰ τοῦτο ὁ ἀκέραιος 15 δύνομάζεται ἐλάχιστον κοινὸν πολλαπλάσιον τῶν ἀριθμῶν 3 καὶ 5.

Σημειώνεται δὲ συντόμως Ε.Κ.Π. (3, 5)

"Ἄσ σχηματίσωμεν τὸ σύνολον

$$\Pi = \{x | x \text{ πολλαπλάσιον τοῦ } E.K.P.\} = \{0, 15, 30, 45 \ldots\}$$

Παρατηροῦμεν δτι τοῦτο ταυτίζεται μὲ τὸ σύνολον

$$\Pi_1 \cap \Pi_2 = \{0, 15, 30 \ldots\}$$

"Ητοι :

$$\Pi_1 \cap \Pi_2 = \Pi$$

'Ομοίας παρατηρήσεις δυνάμεθα νὰ κάμωμεν καὶ δταν οἱ ἀριθμοὶ είναι τρεῖς ἢ περισσότεροι.

Π.χ. διὰ τὸ Ε.Κ.Π. (12, 15, 20) ἔχομεν :

Σύνολον πολλαπλασίων 12 : $\Pi_1 = \{0, 12, 24, 36, 48, 60 \ldots\}$

Σύνολον πολλαπλασίων 15 : $\Pi_2 = \{0, 15, 30, 45, 60, 75 \ldots\}$

Σύνολον πολλαπλασίων 20 : $\Pi_3 = \{0, 20, 60, 80 \ldots\}$

καὶ ἐπομένως

$$\Pi_1 \cap \Pi_2 \cap \Pi_3 = \{0, 60, 120 \ldots\}$$

$\Pi_1 \cap \Pi_2 \cap \Pi_3 = \{x | x \text{ πολλαπλάσιον τοῦ } 60\}$ νῶτων

Αι δινωτέρω παραστηρήσεις μᾶς διευκολύνουν εις τὴν κατανόησιν τῶν ἔξῆς γενικῶν προτάσεων :

Ἐάν δοθοῦν δύο ἢ περισσότεροι φυσικοὶ ἀριθμοί, τότε τὸ σύνολον τῶν κοινῶν πολλαπλασίων των :

1) Είναι ἐν ἀπειροσύνολον, διότι μεταξὺ τῶν ἄλλων στοιχείων του περιέχει τὸ γινόμενον τῶν ἀριθμῶν αὐτῶν ὡς καὶ τὰ πολλαπλάσια αὐτοῦ, τὰ δόποια εἰναι εἰς ἀπειρον πλῆθος (Διατί;) ;

2) Ἐχει ἐν ἐλάχιστον στοιχείον, διάφορον τοῦ μηδενός, τὸ δόποιον εἰναι καὶ τὸ Ε.Κ.Π. τῶν δοθέντων ἀριθμῶν.

3) Ταυτίζεται μὲ τὸ σύνολον τῶν πολλαπλασίων τοῦ Ε.Κ.Π. τῶν δοθέντων ἀριθμῶν.

61. ΕΥΡΕΣΙΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Π. ΔΥΟ Ἡ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

Εἰς τὴν προηγουμένην παράγραφον ἔγνωρίσαμεν μίαν γενικήν μέθοδον εὑρέσεως τοῦ Ε.Κ.Π. δύο ἢ περισσότερων φυσικῶν ἀριθμῶν. Ἡ μέθοδος αὕτη εἰναι ἐπίπονος, ίδιως ὅταν οἱ ἀριθμοὶ εἰναι μεγάλοι.

Τὰ κατωτέρω παραδείγματα μᾶς δύνησον εἰς δύο ἄλλους τρόπους εὑρέσεως τοῦ Ε.Κ.Π., οἱ δόποιοι μᾶς εἰναι χρήσιμοι εἰς τοὺς ὑπολογισμούς.

Παράδειγμα 1ον

Νὰ εύρεθῇ τὸ Ε.Κ.Π. τῶν ἀριθμῶν 20 καὶ 24.

Ἐχομεν :

Σύνολον πολ/σίων τοῦ 20: $\Pi_1 = \{0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, \dots\}$

Σύνολον πολ/σίων τοῦ 24: $\Pi_2 = \{0, 24, 48, 72, 96, 120, \dots\}$

Σύνολον $\Pi_1 \cap \Pi_2 = \{0, 120, 240, \dots\}$

Ωστε $\text{Ε.Κ.Π. } (20, 24) = 120$

Ἄσ ἀναλύσωμεν ἡδη τοὺς ἀριθμοὺς 20, 24 καὶ τὸ Ε.Κ.Π. αὐτῶν 120, εἰς γινόμενα πρώτων παραγόντων.

Ἐχομεν $20 = 2^2 \cdot 5$

$24 = 2^3 \cdot 3$

$120 = 2^3 \cdot 3 \cdot 5$

Ἄρα ἀντί $\text{Ε.Κ.Π. } (20, 24) = 120$

ἔχομεν $\text{Ε.Κ.Π. } (2^2 \cdot 5, 2^3 \cdot 3) = 2^3 \cdot 3 \cdot 5$ (1)

Όμοίως ἔργαζόμενοι εύρισκομεν ὅτι :

$\text{Ε.Κ.Π. } (2^3 \cdot 7, 2 \cdot 3 \cdot 5) = 2^3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7$ (2)

$\text{Ε.Κ.Π. } (2 \cdot 3, 2 \cdot 5, 3^2 \cdot 7) = 2 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7$ (3)

Αι δινωτέρω ἰσότητες (1), (2), (3) μᾶς δύνησον εἰς τὸν ἔξης κανόνα :

Διὰ νὰ εύρωμεν τὸ Ε.Κ.Π. ἀριθμῶν ἀναλελυμένων εἰς γινόμενον πρώτων παραγόντων, σχηματίζομεν τὸ γινόμενον τῶν μεγίστων δυνά-

μεων τῶν κοινῶν καὶ μὴ κοινῶν παραγόντων, οἱ δποῖοι ὑπάρχουν εἰς τὰς ἀναλύσεις τῶν ἀριθμῶν.

Παράδειγμα 2ον

Νὰ εύρεθῇ δὲ Ε.Κ.Π. τῶν ἀριθμῶν 12, 14, 42.

Γράφομεν τούς ἀριθμούς εἰς μίαν σειράν καὶ φέρομεν κατακόρυφον εὐθεῖαν δεξιὰ τοῦ τελευταίου. Ἐάν ύπάρχουν δύο ἢ περισσότεροι ἀριθμοί, οἱ ὅποιοι ἔχουν ἔνα κοινὸν πρῶτον διαιρέτην, γράφομεν αὐτὸν δεξιὰ τῆς κατακορύφου γραμμῆς καὶ διαιροῦμεν τοὺς ἀριθμούς δι' αὐτοῦ. Κάτωθι τὰν ἀριθμῶν, οἱ ὅποιοι διαιροῦνται ἀκριβῶς, γράφομεν τὰ πηλίκα φέρομεν ὡς ἔχουν.

Τοιουτορόπως λαμβάνομεν μίαν νέαν σειράν ἀριθμῶν εἰς αὐτήν ἔργα-
ζόμεθα δμοίως, ἔως ὅτου φθάσωμεν εἰς σειράν ἀριθμῶν, οἱ ὅποιοι ἀνὰ δύο εἰ-
ναι πρῶτοι πρὸς ἄλλήλους. Τὸ Ε.Κ.Π., ίσοῦται μὲ τὸ γινόμενον τῶν διαιρετῶν,
τοὺς διποίους ἐγράψαμεν δεξιά τῆς κατακορύφου, πολλαπλασιασμένον ἐπὶ τὸ
γινόμενον τῶν ἀριθμῶν τῆς τελευταίας σειρᾶς.

Παρατήρησις

Τό Ε.Κ.Π. διοθέντων ἀριθμῶν, τῶν δποίων δ μεγαλύτερος ἐξ αὐτῶν εἶναι διαιρετός δι' ὅλων τῶν ἀλλων, εἴναι δ μεγαλύτερος οὗτος ἀριθμός (Διατί;)

Π.χ. Ε.Κ.Π. (6, 12, 48)=48

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

156. Νὰ εὕρετε τὸ Ε.Κ.Π. τῶν ἀριθμῶν:

α) 6, 18 β) 8, 20, 30 γ) 14, 31, 24, 48

157. Ποιοι διπό τούς δριθμούς: 885, 1670, 8976, 336 και 2340 είναι κοινά πολλαπλάσια των δριθμών 3 και 5;

158. Ποιον είναι τὸ Ε.Κ.Π. τῶν ἀριθμῶν 2^ο.5.7 καὶ 644;

159. Τρεις ποδηλάται ἀναχωροῦν συγχρόνως ἐκ τοῦ αὐτοῦ σημείου ἐνὸς κυκλικοῦ στίβου καὶ κινοῦνται κατά τὴν αὐτήν φοράν. 'Ο πρῶτος διανύει τὸν στίβον εἰς 25 sec, ὁ δεύτερος εἰς 36 sec καὶ ὁ τρίτος εἰς 45 sec. Μετὰ πάσον χρόνον ἀπό τῆς ἀναχωρήσεώς των θὰ συναντηθοῦν εἰς τὸ σημείον τῆς ἀφετηρίας καὶ πάσους γύρους θὰ ἔχῃ κάνει ἕκαστος ἐξ αὐτῶν;

160. Οι μαθηταί μιᾶς τάξεως δύνανται νὰ παραπαχθοῦν εἰς τριάδας ή τετράδας ή πεντάδας χωρὶς νὰ περισσεύσῃ κανεῖς, εἴναι δὲ διλγίωτεροι ἀπὸ 80. Πόσους μαθητάς ἔχει ἡ τάξις;

161. Όλα τά ψηφία ένός αριθμού είναι 5. Είναι δυνατόν νά είναι διαιρετός ο αριθμός διά 2 ή 3 ή 4 ή 5 ή 9;

162. Εἰς ἀριθμὸς εἶναι διαιρέτος διὰ 9. Ἐάν τινας ἀλλάξωμεν τὴν σειράν τῶν ψηφίων των, δέ νέος ἀριθμός θά εἶναι διαιρέτος διὰ 9:

163. Δίδεται ό ἀριθμός 7254; Ἀντικαταστήσατε τά ἔρωτηματικά μὲ ψηφία ώστε δ προκύπτων ἀριθμός νὸ εἶναι διαιρέτος συγχρόνως διὰ 4 καὶ 9.

164. Η διαίρεσις ἐνὸς ἀκεραιού α διὰ 72 ἀφήνει ὑπόλοιπον 64. Ποιος εἶναι δὲ Μ.Κ.Δ. τῶν ἀριθμῶν α καὶ 72;

165. Νὰ εὑρεθοῦν δύο ἀριθμοὶ οἱ ὅποιοι νὰ ἔχουν ἀθροισμα 288 καὶ Μ.Κ.Δ. 24.

166. Δικαιολογήσατε διατί, όταν ένας ἀκέραιος διαιρῆτης δύο διάλογους ἀκέραιους, θα διαιρῆτης τὸν Μ.Κ.Δ. αὐτῶν.

167. Νὰ εύρετε τὸν Μ.Κ.Δ. καὶ τὸ Ε.Κ.Π. τῶν ἀριθμῶν: $A = 2 \cdot 3 \cdot 5^2 \cdot 7$ καὶ $B = 2^3 \cdot 3^4 \cdot 5$. Ἐπει-
τα νὰ συγκρίνετε τὸ γινόμενον $A \cdot B$ μὲ τὸ γινόμενον τοῦ Μ.Κ.Δ. ἐπὶ τὸ Ε.Κ.Π. Τί παρατηρεῖτε;

168. Οι μαθηταί ἐνδε σχολείου είναι τόσοι ὡστε, ἐάν τοποθετηθοῦν κατά 10 δας λείπει εἰς, ἐνῷ ἐάν τοποθετηθοῦν κατά 9 δας περισσεύνειν 7. Ποιος είναι ὁ ἀριθμός τῶν μαθητῶν τοῦ σχολείου τούτου, ἐάν γνωρίζωμεν δτι είναι περισσότεροι ἀπὸ 300 καὶ διλιγώτεροι ἀπὸ 400;

169. Θέλουμεν νά μοιράσωμεν 8800 δρχ., 200 ζεύγη κάλτσες και 80 φανέλλες ἐξ ίσου εἰς πτωχάς οικογενείας. Πόσας τὸ πολὺ οικογενείας δυνάμεθα νά βοηθήσωμεν και πόσα από ἑκα- στον εἶδος θὰ λάβῃ ἐκάστη οικογένεια;

170. Τρία ἀτμόπλοια ἐκτελοῦντα τὰ δρυμολόγια των ἀνεχώρησαν συγχρόνως μίαν ἡμέραν ἐκ Πειραιῶς. Τὸ πρῶτον ἀτμόπλοιον ἐπανέρχεται καὶ ἀναχωρεῖ πάλιν ἐκ Πειραιῶς ἀνά 18 ἡμέρας, τὸ δεύτερον ἀνὰ 20 ἡμέρας καὶ τὸ ταίτιον ἀνὰ 24 ἡμέρας.

Μετά πόσας τὸ δλιγώτερον ἡμέρας θὰ συναντηθοῦν καὶ πάλιν εἰς τὸν Πειραιᾶ;

171. Εἰς μίαν ἀτελῆ διάιρεσιν ὁ διαιρετέος εἶναι πολλαπλάσιον τοῦ 5 καὶ ὁ διαιρέτης 25. Ποιὸν εἶναι τὸ σύνολον τῶν δυνατῶν τιμῶν τοῦ ὑπολοίπου;

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'.

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟΝ ΤΩΝ ΡΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ

62. КЛАСМАТА

62. 1. Διαίρεσις εύθ. τμήματος διὰ φυσικοῦ ἀριθμοῦ

α) Είς τὸ παραπλέυρως σχεδ. 20 διακρίνομεν πῶς χωρίζομεν γεωμετρικῶς τὸ εὐθ. τμῆμα AB εἰς 5 ἵσα μέρη.

Ἐκ τοῦ ἐνὸς ἄκρου Α' φέρομεν τὴν
μιευθεῖαν Αχαίην ἐπ' αὐτῆς λαμβάνομεν
διαδοχικῶς 5 Ισα εύθ. τμήματα.

$$AM = MN = NP = P\Sigma = \Sigma T$$

Φέρομεν τὸ εύθ. τμῆμα TB καὶ ἐκ τῶν σημείων M, N, P, Σ παραλλήλους πρὸς TB. Μὲ τὸν διαβήτην μας ἐπαληφ AB εἰς 5 ἵσα τμήματα.

Σχ. 20

Μὲ δομοιον τρόπον ἐργαζόμεθα διὰ νὰ χωρίσωμεν τὸ AB εἰς ν (νεΝ) ίσα

β) "Ας προσέξουμεν ένα όποιο τόξο 5. Ήσα τυφλωτά του ΑΒ, π.χ. τόξο ΑΓ-

ELUGA 5.47-AB

Τὸ εὐθ. τηᾶς ΑΓ λέγεται προλίκων τῆς θιστορέσσεως τοῦ ΑΒ διὰ 5.

Γράφομεν δὲ ΑΒ : 5 = ΑΓ


5. $A\Gamma = AB \Leftrightarrow AB : 5 = A\Gamma$

Γενικῶς: Ὄνομάζομεν πηλίκον διαιρέσεως ἐνὸς τμήματος α διὰ φυσικοῦ ἀριθμοῦ ν ἐν εὐθ. τμῆμα β τοιοῦτον, ὥστε ν.β=α

$$\alpha : \gamma = \beta \iff \gamma : \beta = \alpha \quad \forall \alpha, \beta, \gamma \in N$$

Ειδικῶς διὰ $v=1$ θέτομεν $\alpha:1=\alpha$

62. 2. Κλασματική μονάς



Σχ. 21

Εις τὸ σχ. 21 εἶναι $AM = AB:2$.

«Άλλος τρόπος νὰ δηλώσωμεν τοῦτο εἶναι νὰ εἴπωμεν AM εἶναι «Ἐν δεύτερον τοῦ AB » ή «Ἐν δεύτερον ἐπὶ AB », νὰ γράψωμεν δὲ

$$AM = \frac{1}{2} \cdot AB$$

«Ἔντιτημοιαὶ εἰς τὸν πρώτον οὐλονυζ ὅτε

”Ητοὶ ή γραφὴ $\frac{1}{2}$ παριστάνει ἔνα «νέον» ἀριθμὸν τοιοῦτον ώστε τὸ

γινόμενον αὐτοῦ ἐπὶ AB νὰ ισοῦται μὲ τὸ πηλίκον $AB:2$

$$\frac{1}{2} \cdot AB = AB : 2$$

Ομοίως θεωροῦμεν «νέους» ἀριθμοὺς $\frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \dots$ τοιούτους ώστε:

$$\frac{1}{3} \cdot AB = AB : 3, \quad \frac{1}{4} \cdot AB = AB : 4, \quad \frac{1}{5} \cdot AB = AB : 5 \dots$$

Ἐκαστος ἐκ τῶν «νέων» αὐτῶν ἀριθμῶν

$$\frac{1}{2}, \quad \frac{1}{3}, \quad \frac{1}{4}, \quad \frac{1}{5}, \quad \dots \quad v \in N$$

λέγεται κλασματική μονάς.

Κατὰ τ' ἀνωτέρω: 'Εὰν $\frac{1}{v}$ εἶναι μία κλασματική μονάς καὶ AB ἐν εύθ.

τμῆμα, τότε

$$\frac{1}{v} \cdot AB = AB : v$$

62. 3. Κλασματικοὶ ἀριθμοὶ

$$IA = 2 : BA$$

α) "Οπως ἀπὸ τὴν ἀκεραίαν μονάδα σχηματίζομεν τοὺς ἀκεραίους ἀριθμούς, π.χ. $1+1=2 \cdot 1=2$, $1+1+1=3 \cdot 1=3$, τοιουτοτρόπως ἀπὸ ἑκάστην κλασματικήν μονάδα σχηματίζομεν «νέους» ἀριθμούς, τοὺς κλασματικούς.

Συγκεκριμένως: 'Αντὶ 2 φοράς τὸ $\frac{1}{7}$ » λέγομεν «γινόμενον 2 ἐπὶ $\frac{1}{7}$ »

ἢ «κλάσμα δύο ἐβδομά». $x = q \cdot v \iff q = x/v$

Γράφομεν δέ $2 \cdot \frac{1}{7} = \frac{2}{7}$

Έπισης $3 \cdot \frac{1}{7} = \frac{3}{7}$, $3 \cdot \frac{1}{8} = \frac{3}{8}$, $5 \cdot \frac{1}{9} = \frac{5}{9}$

Γενικώς, άντι «α φοράς τό $\frac{1}{\beta}$ » λέγομεν «γινόμενον α ἐπὶ $\frac{1}{\beta}$ » ή «κλάσμα α διὰ β».

Γράφομεν δέ $\alpha \cdot \frac{1}{\beta} = \frac{\alpha}{\beta}$, διότου $\alpha \in N_0$ καὶ $\beta \in N$.

Ήτοι: "Εκαστον κλάσμα είναι γινόμενον ἐνδεικτής ακεραίου ἐπὶ μίαν κλασματικήν μονάδα.

Εἰς τό κλάσμα $\frac{\alpha}{\beta}$ διότι α ἀκέραιος ἀριθμός α (ύπεράνω τῆς δριζοντίας γραμμῆς) λέγεται ἀριθμός α θ μη τής, ἐνῶ διότι β φυσικός ἀριθμός β (κάτω τῆς δριζοντίας γραμμῆς) παρονομαστής. Οἱ ἀριθμοὶ α καὶ β λέγονται διότι τοῦ κλάσματος αὐτοῦ.

62. 4. Γινόμενον κλάσματος ἐπὶ εύθ. τμῆμα

Ως εἶδομεν ἀνωτέρω, τό γινόμενον μιᾶς κλασματικῆς μονάδος $\frac{1}{v}$ ἐπὶ εύθ. τμῆμα AB ισοῦται μὲ τὸ πηλίκον $AB:v$. Κατωτέρω θὰ δρίσωμεν τό γινόμενον ἐνδεικτής κλάσματος ἐπὶ εύθ. τμῆμα.

Χαράσσομεν ἐν εύθ. τμῆμα AB καὶ εύρισκομεν:

α) Τό πηλίκον αὐτοῦ διὰ 4

β) Τό γινόμενον τοῦ 3 ἐπὶ τό εύρεθέν πηλίκον, σχ. 22.

Τό ἀποτέλεσμα τῶν δύο ἀνωτέρω διαδοχικῶν πράξεων ήτοι τό τμῆμα

$$EZ = 3 \cdot \Gamma \Delta$$

$$\text{ή } EZ = 3 \cdot \left(\frac{1}{4} AB \right)$$


λέγεται γινόμενον τοῦ κλάσματος $\frac{3}{4}$ ἐπὶ τό εύθ. τμῆμα AB .

Γράφομεν δέ:

$$EZ = \frac{3}{4} \cdot AB$$

Ωστε:

$$\frac{3}{4} \cdot AB = 3 \cdot \left(\frac{1}{4} AB \right)$$



Σχ. 22

Γενικώς: Γινόμενον κλάσματος $\frac{\alpha}{\beta}$ ἐπὶ εὐθ. τμῆμα AB λέγεται τὸ γινόμενον τοῦ α ἐπὶ τὸ τμῆμα $\frac{1}{\beta} \cdot AB$.

$$\frac{\alpha}{\beta} \cdot AB = \alpha \cdot \left(\frac{1}{\beta} \cdot AB \right)$$



Π.χ. είς τὸ σχέδιον 23 ἔχομεν

Σχ. 23

$$A\Gamma = \frac{2}{5} \cdot AZ, \quad AE = \frac{4}{5} \cdot AZ, \quad A\Delta = \frac{3}{4} \cdot AE \dots$$

62. 5. Ἡ ἀκεραία μονάς ὡς κλάσμα

Εἰς τὸ σχ. 23 εἶναι

$$AB + BC + CA + AE + EZ = AZ$$

$$\frac{1}{5} \cdot AZ + \frac{1}{5} \cdot AZ + \frac{1}{5} \cdot AZ + \frac{1}{5} \cdot AZ + \frac{1}{5} \cdot AZ = AZ$$

$$5 \cdot \left(\frac{1}{5} AZ \right) = AZ$$

Επί της ίδιας θεώρησης, αντικαθιστώντας τον πλευρά της σχέσης $\frac{5}{5} \cdot AZ = 1 \cdot AZ$, έχουμε:

‘Η τελευταία ίσότης μᾶς δδηγεῖ νὰ γράψωμεν

$$\text{Ομοίωση} \quad \frac{2}{2} = \frac{3}{3} = \frac{4}{4} = \frac{5}{5} = \frac{\alpha}{\alpha} = 1 \quad \alpha \in N$$

Κατ' ἐπέκτασιν δὲ σημειώνομεν καὶ $\frac{1}{1} = 1$ νῶτ χωράστορθ ὅτι

ΑΜΚΗΣΕΙ

172. Поеамъ хлѣбнаѧ тѣсъ дѣтѣль усмигіе сѣкаць пісѧ усмигіа 40° 50°.

172. Πολεμού καρδιά της σρότης γνωνίας είναι μια γνώνη 40, 50,

173. Νὰ γράψετε ἐν εὐθ. τμῆμα \overline{AB} καὶ ἔπειτα τμήματα ἴσα πρὸς $\frac{1}{3}$ \overline{AB} , $\frac{1}{4}$ \overline{AB} ,

$$\frac{2}{3} \cdot AB, \quad \frac{3}{4} \cdot AB. \quad \left(BA \frac{1}{\frac{1}{4}} \right) \cdot \xi = BA \cdot \frac{\xi}{\frac{1}{4}}$$

174. Ποια γινόμενα παριστοῦν τά κλάσματα $\frac{3}{11}, \frac{5}{13}, \frac{7}{9}$;
 175. Έάν $x \in \mathbb{N}_0$, νά εύρετε διά ποίαν τιμήν του x τό κλάσμα $\frac{5}{x+3}$ ισούται μέ 1.

176. Διά ποίαν τιμήν του $x \in \mathbb{N}_0$ τό κλάσμα $\frac{2 \cdot x + 3}{9}$ ισούται μέ τήν μονάδα;

63. ΓΙΝΟΜΕΝΟΝ ΑΚΕΡΑΙΟΥ ΕΠΙ ΚΛΑΣΜΑ

63. 1. Όρισμός


"Ας προσπαθήσωμεν νά δρίσωμεν τό γινόμενον $3 \cdot \frac{2}{7}$

Εις τό σχ. 24α έσχημα-
τίσαμεν άρχικῶς τό γινόμε-
νον $\frac{2}{7} \cdot AB$ καὶ ἔπειτα τό



γινόμενον $3 \cdot \left(\frac{2}{7} AB\right)$.

Εις τό σχ. 24β έσχημα-
τίσαμεν τό γινόμενον $\frac{6}{7} \cdot AB$



Σχ. 24

Παρατηροῦμεν δτι καὶ εις τάς δύο περιπτώσεις κατελήξαμεν εις το αύτο
άποτέλεσμα. "Ητοι έάν πολλαπλασιάσωμεν τό $\frac{2}{7}$ ἐπί AB καὶ ἔπειτα τό 3

ἐπί τό εύρεθέν γινόμενον, θά εύρωμεν τό γινόμενον $\frac{6}{7} \cdot AB$.

$$3 \cdot \left(\frac{2}{7} \cdot AB\right) = \frac{6}{7} \cdot AB$$

"Η παρατήρησις αύτη μᾶς δόηγει νά λάβωμεν

$$3 \cdot \frac{2}{7} = \frac{6}{7} \quad \text{ἢ} \quad 3 \cdot \frac{2}{7} = \frac{3 \cdot 2}{7}$$

Γενικῶς:

$$\alpha \cdot \frac{\beta}{\gamma} = \frac{\alpha \cdot \beta}{\gamma} \quad \alpha, \beta \in \mathbb{N}_0, \gamma \in \mathbb{N} \quad (1)$$

Τό γινόμενον άκεραίου α ἐπί τό κλάσμα $\frac{\beta}{\gamma}$ ισούται πρὸς τό κλάσμα

$$\frac{\alpha \cdot \beta}{\gamma}.$$

63. 2. Έφαρμογαί

i) Εάν εις τὸν τύπον (1) θέσωμεν $\gamma = \beta$, θὰ έχωμεν $\alpha \cdot \frac{\beta}{\beta} = \frac{\alpha \cdot \beta}{\beta}$.

Η

$$\alpha = \frac{\alpha \cdot \beta}{\beta} \quad (2)$$

Ο τύπος (2) μᾶς έπιτρέπει :

α) Νὰ θέσωμεν τὸν ἀκέραιον α ὑπὸ μορφὴν κλάσματος.

Παραδείγματα :

$$2 = \frac{2 \cdot 3}{3} = \frac{2 \cdot 4}{4} = \frac{2 \cdot 5}{5} \dots$$

$$\alpha = \frac{\alpha \cdot 2}{2} = \frac{\alpha \cdot 3}{3} = \frac{\alpha \cdot 4}{4} = \frac{\alpha \cdot 5}{5}$$

(β) Νὰ θέσωμεν ὑπὸ μορφὴν ἀκέραιου ἐν κλάσμα τοῦ διοτού δ ἀριθμητῆς εἶναι γινόμενον ἐνὸς ἀκέραιου ἐπὶ τὸν παρονομαστήν.

Παραδείγματα :

$$\frac{2 \cdot 3}{3} = 2, \quad \frac{3 \cdot 3}{3} = 3, \quad \frac{4 \cdot 3}{3} = 4 \dots$$

επειδὴ αὐτὸς τὸν κλάσματος σηματίζει αὐτὸν τὸν παρονομαστήν.

$$\frac{2 \cdot \alpha}{\alpha} = 2, \quad \frac{3 \cdot \alpha}{\alpha} = 3, \quad \frac{4 \cdot \alpha}{\alpha} = 4 \text{ . . . } \alpha \in \mathbb{N}$$

ii) Εάν εις τὸν τύπον (1) θέσωμεν $\gamma = \alpha$ θὰ έχωμεν τὴν νόμιμον στὴν

$$\alpha \cdot \frac{\beta}{\alpha} = \frac{\alpha \cdot \beta}{\alpha} \text{ καὶ ἐπειδὴ } \frac{\alpha \cdot \beta}{\alpha} = \beta$$

θὰ έχωμεν

$$\alpha \cdot \frac{\beta}{\alpha} = \beta \quad (3)$$

Ο τύπος (3) δηλοῖ διτὶ τὸ γινόμενον ἐνὸς φυσικοῦ ἀριθμοῦ ἐπὶ κλάσμα μὲ παρονομαστὴν τὸν ἀριθμὸν αὐτὸν ισοῦται μὲ τὸν ἀριθμητὴν τοῦ κλάσματος.

Παραδείγματα :

$$3 \cdot \frac{2}{3} = 2, \quad 4 \cdot \frac{3}{4} = 3, \quad 5 \cdot \frac{3}{5} = 3$$

$$\alpha \cdot \frac{2}{\alpha} = 2, \quad \alpha \cdot \frac{3}{\alpha} = 3, \quad \alpha \cdot \frac{4}{\alpha} = 4 \quad \text{ὅπου } \alpha \in \mathbb{N}$$

177. Έάν αύξησωμεν τὸν δριθμὸν 36 κατά τὰ $\frac{3}{9}$ αὐτοῦ πόσος θα γίνη;

178. Νά γραφοῦν ὡς ἀκέραιοι τὰ κλάσματα:

$$\frac{12}{4}, \quad \frac{5 \cdot \alpha}{5}, \quad \frac{5 \cdot \alpha}{\alpha} \quad \text{δόπου } \alpha \in \mathbb{N}$$

—Με νότι ληπτικούς ρυθμούς μεριδιώντας τον πολλαπλασιασμόν

Σωματική 179. Εἰς τὰς κατωτέρω Ισότητας ἀντικαταστήσατε τὸ x μὲν καταλλήλον ἀκέραιον ὡστε αὐταὶ γὰρ εἶναι ἀληθεῖς καθεὶς ἀπό τοῦτο, εἰσαγόμενοί ἐστι ταῦτα τὰ μονίμα κατόπιν, διαφέρει δέ τοι γάρ τοῦτο.

$$4 = \frac{11 + x}{5}, \quad x = \frac{24}{4}, \quad 9 = \frac{3x + 3}{6}$$

Ισότητα

64. Η ΣΧΕΣΙΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΟΣ

64. 1. Όρισμάς

Χαράξατε ἐν εύθ. τμῆμα AB καὶ εὔρετε:

α) τὰ $\frac{6}{8}$ αὐτοῦ καὶ β) τὰ $\frac{3}{4}$ αὐτοῦ. Συγκρίνατε αὐτά. Τί παρατηρεῖτε;

$$\text{Είναι } \frac{3}{4} \cdot AB = \frac{6}{8} \cdot AB \quad (1)$$

Ἡ ἀνωτέρω Ισότης μᾶς δύναται νὰ λάβωμεν τὰ κλάσματα $\frac{3}{4}$ καὶ $\frac{6}{8}$

ἴσα μεταξύ των,

"Ητοι: $\frac{3}{4} = \frac{6}{8}$ καὶ τούτων ταῦτα τὰ δύο μεταξύ των

Γενικῶς: 'Εάν $\frac{\alpha}{\beta} \cdot AB = \frac{\gamma}{\delta} \cdot AB$, δόπου $\alpha, \gamma \in \mathbb{N}_0$, $\beta, \delta \in \mathbb{N}$,

τότε λέγομεν ὅτι τὰ κλάσματα $\frac{\alpha}{\beta}$ καὶ $\frac{\gamma}{\delta}$ είνα ίσα μεταξύ των ἢ ἀντίστοιχα μονίμα κατόπιν της πολλαπλασιασμού της κατόπιν της πολλαπλασιασμού της πλώς ίσα γράφομεν δὲ $\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta}$.

64. 2. Χαρακτηριστικὴ Ιδιότης

"Ἄσ ίδωμεν πῶς εἶναι δυνατὸν ἔκαστον τῶν ίσων κλασμάτων $\frac{3}{4}$ καὶ $\frac{6}{8}$

νὰ προκύψῃ ἀπό τὸ ἄλλο. Παρατηροῦμεν ὅτι ἔάν μὲν πολλαπλασιασμού τοὺς ὅρους τοῦ $\frac{3}{4}$ ἐπὶ 2 θὰ εὑρωμεν $\frac{6}{8}$. Ἐάν δὲ διαιρέσωμεν τοὺς ὅρους τοῦ

$\frac{6}{8}$ διὰ 2 εύρισκομεν $\frac{3}{4}$.

$$\frac{3}{4} = \frac{3 \cdot 2}{4 \cdot 2} = \frac{6}{8}, \quad \frac{6}{8} = \frac{6 : 2}{8 : 2} = \frac{3}{4}.$$

Από την παρατήρησιν αύτην δύναμεθα είσι την έξις θεμελιώδη ιδιότητα των ίσων κλασμάτων.

Έαν πολλαπλασιάσωμεν τους δρους ένδεις κλάσματος ἐπὶ τὸν αὐτὸν φυσικὸν ἀριθμὸν ἢ ἔαν τους διαιρέσωμεν διὰ τοῦ αὐτοῦ φυσικοῦ ἀριθμοῦ, δταν είναι δυναταὶ αἱ διαιρέσεις, τότε προκύπτει κλάσμα ἵσον πρὸς τὸ ἀρχικόν.

$$\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\alpha \cdot \gamma}{\beta \cdot \gamma}, \quad \frac{\alpha \cdot \gamma}{\beta \cdot \gamma} = \frac{(\alpha \cdot \gamma) : \gamma}{(\beta \cdot \gamma) : \gamma} = \frac{\alpha}{\beta} \quad \alpha \in \mathbb{N}_0 \quad \beta, \gamma \in \mathbb{N}$$

Κατὰ τὰ ἀνωτέρω ἢ ἔαν διθῆ ἔν κλάσμα, π.χ. τὸ $\frac{3}{4}$, δυνάμεθα νὰ εὔρωμεν

μὴ πεπερασμένον πλῆθος κλασμάτων ίσων πρὸς αὐτό.

$$\text{Ήτοι: } \frac{3}{4} = \frac{3 \cdot 2}{4 \cdot 2} = \frac{3 \cdot 3}{4 \cdot 3} = \frac{3 \cdot 4}{4 \cdot 4} = \frac{3 \cdot 5}{4 \cdot 5} = \dots$$

$$\frac{6}{8} = \frac{9}{12} = \frac{12}{16} = \frac{15}{20} = \dots$$

Τὸ σύνολον ὅλων αὐτῶν τῶν ίσων κλασμάτων λέγομεν διὰ ἀποτελεῖ μίαν κλάσιν ίσοδυναμίας.

Ομοίως τὸ σύνολον τῶν κλασμάτων τῶν ίσων πρὸς τὸ $1/2$, ἢ τοι τὸ σύνολον

$$\left\{ \frac{1}{2}, \quad \frac{2}{4}, \quad \frac{3}{6}, \quad \frac{4}{8}, \quad \dots \right\}$$

ἀποτελεῖ μίαν ἄλλην κλάσιν ίσοδυναμίας.

Γενικῶς τὸ σύνολον ὅλων τῶν κλασμάτων, τὰ ὅποια είναι ίσα πρὸς δοθὲν κλάσμα, ἀποτελεῖ μίαν κλάσιν ίσοδυναμίας.

65. ΕΦΑΡΜΟΓΑΙ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΟΣ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ

65. 1. Ανάγωγα κλάσματα

1) "As προσέξωμεν τὰ κλάσματα μιᾶς κλάσεως ίσοδυναμίας, π.χ. τῆς κλάσεως

$$\left\{ \frac{1}{2}, \quad \frac{2}{4}, \quad \frac{3}{6}, \quad \frac{4}{8}, \quad \dots \right\}$$

Μεταξὺ ὅλων αὐτῶν τῶν κλασμάτων πλέον εὔχρηστον είναι τὸ κλάσμα

$\frac{1}{2}$. (Διατί;). Οι δροι τούτου είναι πρότοι πρὸς ἀλλήλους καὶ λέγεται ἡ νά-

γωγὸν κλάσμα.

Γενικῶς : "Όταν ἔν κλάσμα ἔχῃ τοὺς ὅρους του πρώτους πρὸς ἀλλή-

λους λέγεται ἀνάγωγον.

Παραδείγματα

Τὰ κλάσματα $\frac{2}{5}, \frac{4}{9}, \frac{8}{11}$ είναι ἀνάγωγα. Ἀντιθέτως τὰ κλάσματα $\frac{2}{6},$

$\frac{4}{8}, \frac{2}{36}$ δὲν είναι ἀνάγωγα. (Διατί;)

65. 2. Ἀπλοποίησις κλάσματος

'Εάν μᾶς δοθῇ ἔν ἀνάγωγον κλάσμα, π.χ. τὸ κλάσμα $\frac{1}{2}$, τότε δυνάμεθα νὰ πολλαπλασιάσωμεν τοὺς ὅρους αὐτοῦ ἐπὶ 2, 3, 4 ... καὶ νὰ εὔρωμεν τὰ μὴ ἀνάγωγα κλάσματα $\frac{2}{4}, \frac{3}{6}, \frac{4}{8} \dots$ τὰ ὅποια είναι Ἱσα πρὸς αὐτὸ.

'Ἀντιστρόφως ἔαν μᾶς δοθῇ ἔν μὴ ἀνάγωγον κλάσμα, π.χ. τὸ κλάσμα $\frac{24}{60}$, δυνάμεθα νὰ διαιρέσωμεν τοὺς ὅρους του διὰ τοῦ M.K.D. αὐτῶν,

$$\text{M.K.D. (24 καὶ 60)} = 12, \quad \frac{24}{60} = \frac{24:12}{60:12} = \frac{2}{5}$$

καὶ νὰ εὔρωμεν τὸ Ἱσον πρὸς αὐτὸ ἀνάγωγον κλάσμα.

Τὸ ἀνάγωγον κλάσμα $\frac{2}{5}$ ἔχει τοὺς ὅρους του μικροτέρους ἀπὸ τοὺς ἀντι-

στοίχους ὅρους τοῦ Ἱσον πρὸς αὐτὸ κλάσματος $\frac{24}{60}$. είναι ὅπως λέγομεν ἀ-

πλούστερον. Διὰ τοῦτο ἡ ἀνωτέρω ἔργασία λέγεται ἀπλοποίησις

τοῦ κλάσματος $\frac{24}{60}$.

Γενικῶς : "Ἀπλοποίησις ἐνὸς κλάσματος λέγεται ἡ εὕρεσις ἀλλού κλάσματος Ἱσον πρὸς αὐτὸ ἀλλὰ μὲ μικροτέρους ὅρους.

Παραδείγματα ἀπλοποιήσεως

$$\frac{125}{1500} = \frac{125:125}{1500:125} = \frac{1}{12}$$

$$\text{Διότι M.K.D. (125, 1500)} = 125$$

$$\frac{2 \cdot \alpha}{5 \cdot \alpha} = \frac{(2 \cdot \alpha) : \alpha}{(5 \cdot \alpha) : \alpha}$$

$$= \frac{2 \cdot (\alpha : \alpha)}{5 \cdot (\alpha : \alpha)} = \frac{2}{5} \quad \alpha \in \mathbb{N}$$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

180. Γράψατε τό σύνολον τῶν κλασμάτων τά δόποια έχουν παρονομαστήν 30 ή 50 και είναι ίσα πρός τό κλάσμα $\frac{5}{6}$.

181. Νὰ εύρεθη κλάσμα ίσον πρός τὸ $\frac{3}{5}$ καὶ τοῦ δόποιον οἱ δροὶ έχουν Μ.Κ.Δ. τὸν ἀριθμὸν 7.

182. Νὰ διπλοποιηθῶν τὰ κλάσματα

$$\frac{3 \cdot 5^2 + 3 \cdot 10}{15}, \quad \frac{3^2 \cdot 5^2 \cdot 7^4}{3^4 \cdot 5^2 \cdot 7^4}, \quad \frac{2 \cdot \alpha + 3 \cdot \alpha}{6 \cdot \alpha} \quad \alpha \in \mathbb{N}$$

183. Μία δόποιαδή πρότεινε κλασματική μονάδα είναι άναγωγὸν κλάσμα; Διατί;

184. Νὰ προσδιορίσετε τὸν ἀκέραιον χ εἰς τρόπον ὅστε

$$\frac{2x+2}{5} = \frac{8}{10}$$

66. Ο ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΣ ΠΗΛΙΚΟΝ ΔΙΑΙΡΕΣΕΩΣ

66. 1. "Έχομεν δρίσει τὸ κλάσμα $\frac{\alpha}{\beta}$, $\alpha \in \mathbb{N}_0$, $\beta \in \mathbb{N}$ ὡς γινόμενον τοῦ

ἀκέραιον α ἐπὶ τὴν κλασματικὴν μονάδα $\frac{1}{\beta}$, $\frac{\alpha}{\beta} = \alpha \cdot \frac{1}{\beta}$.

Κατωτέρω θὰ ξωμεν μίαν ἀλλην σημασίαν τοῦ κλάσματος αὐτοῦ.

66. 2. "Ἄσ ζητήσωμεν τὸ ἀκριβὲς πηλίκον τῆς διαιρέσεως 2:3. "Ητοι ἀς ζητήσωμεν ἔνα ἀριθμὸν τοῦ δόποιον τὸ γινόμενον ἐπὶ 3 νὰ ισοῦται μὲ 2. Ὡς γνωστὸν δὲν ὑπάρχει ετοιοῦτος ἀκέραιος. "Υπάρχει ὅμως κλάσμα

Πράγματι: $3 \cdot \frac{2}{3} = 2$

"Ἡ ἀνωτέρω ισότης μᾶς ἐπιτρέπει νὰ εἴπωμεν ὅτι τὸ κλάσμα $\frac{2}{3}$ είναι τὸ ἀκριβὲς πηλίκον τῆς διαιρέσεως 2:3. (Διατί; Ενθυμηθῆτε ὅτι $\delta \cdot \pi = \Delta \iff \Delta : \delta = \pi$)

"Ωστε $2 : 3 = \frac{2}{3}$

Γενικῶς διὰ τὸ κλάσμα $\frac{\alpha}{\beta}$ $\left. \begin{array}{l} \alpha \in \mathbb{N}_0 \\ \beta \in \mathbb{N} \end{array} \right\}$

ἔχομεν

$$\beta \cdot \frac{\alpha}{\beta} = \alpha$$

"Ητοι

$$\alpha : \beta = \frac{\alpha}{\beta} \quad \alpha \in \mathbb{N}_0, \quad \beta \in \mathbb{N}$$

(1)

66. 3. Συμπέρασμα

Χάρις εις τὰ κλάσματα ἐκάστη διαιρεοῖς κατέστη δυνατή καὶ τελείᾳ ἐκτὸς βεβαίως τῆς περιπτώσεως εἰς τὴν ὅτοίαν ὃ διαιρέτης εἶναι μηδέν. Τὸ ἀκριβὲς πτηλίκον ἐκάστης διαιρέσεως, μὲ διαιρέτην διάφορον τοῦ μηδενός, εἶναι κλάσμα μὲ ἀριθμητὴν τὸν διαιρετόν καὶ παρονομαστὴν τὸν διαιρέτην.

$$\left. \begin{array}{l} \text{'Αριθμητής} \quad \alpha = \text{Διαιρετός} \\ \text{Παρονομαστής} \quad \beta = \text{διαιρέτης} \end{array} \right\} \Rightarrow \frac{\alpha}{\beta} \text{ ἀκριβὲς πτηλίκον}$$

66. 4. Λόγος δύο ἀκεραίων

Τὸ ἀκριβὲς πτηλίκον τῆς διαιρέσεως 2 διὰ 3, ἥτοι τὸ κλάσμα $\frac{2}{3}$, λέγεται

καὶ λόγος τοῦ 2 πρὸς τὸ 3.

Γενικῶς, ἔὰν $\alpha \in \mathbb{N}_0$ καὶ $\beta \in \mathbb{N}$, τότε λόγος τοῦ α πρὸς τὸ β λέγεται τὸ κλάσμα $\frac{\alpha}{\beta}$.

66. 5. Ἡ ἔξισωσις $\alpha \cdot x = \beta$ ὅπου $\alpha \in \mathbb{N}$, $\beta \in \mathbb{N}_0$.

Τὸ συμπέρασμα τῆς 66.3 μᾶς ἐπιτρέπει νὰ ἐπιλύσωμεν τὴν ἔξισωσιν $\alpha \cdot x = \beta$ ὅπου $\alpha \in \mathbb{N}$, $\beta \in \mathbb{N}_0$, καὶ ὅταν ἀκόμη β δὲν εἶναι πολλαπλάσιον τοῦ α .

Π.χ. διὰ τὴν ἔξισωσιν $2 \cdot x = 3$ συμφώνως πρὸς τὴν γνωστὴν Ισοδυναμίαν

$\alpha \cdot \beta = \gamma \Leftrightarrow \beta = \gamma : \alpha$

ἔχομεν $2 \cdot x = 3 \Leftrightarrow x = 3 : 2 = \frac{3}{2}$

Γενικῶς διὰ τὴν ἔξισωσιν $\alpha \cdot x = \beta$ ὅπου $\alpha \in \mathbb{N}$, $\beta \in \mathbb{N}_0$, ἔχομεν

$$\alpha \cdot x = \beta \Leftrightarrow x = \beta : \alpha$$

Ἡ $\alpha \cdot x = \beta \Leftrightarrow x = \frac{\beta}{\alpha}$

66. 6. Παρατηρήσεις

α) Τὸ κλάσμα $\frac{\alpha}{1}$, $\alpha \in \mathbb{N}_0$.

Κατὰ τὸν τύπον $\alpha : \beta = \frac{\alpha}{\beta}$

ἔχομεν $3 : 1 = \frac{3}{1}$

'Αλλά $3 : 1 = 3$

$\left. \begin{array}{l} 3 : 1 = \frac{3}{1} \\ 3 : 1 = 3 \end{array} \right\} \text{'Αρα } \frac{3}{1} = 3$

Όμοιως $4 = \frac{4}{1}, 5 = \frac{5}{1}, 6 = \frac{6}{1}, \dots$

και γενικώς: $\alpha = \frac{\alpha}{1}$ όπου $\alpha \in N_0$

β) Τό κλάσμα $\frac{0}{\alpha}, \alpha \in N$

είναι $0 : 2 = \frac{0}{2}$

διλλά $0 : 2 = 0$

Άρα $\frac{0}{2} = 0$ ούτε έχει λόγο.

Όμοιως $\frac{0}{3} = 0, \frac{0}{4} = 0, \frac{0}{5} = 0 \dots$, ούτε έχει λόγο.

Γενικώς: $\frac{0}{\alpha} = 0$ όπου $\alpha \in N$

$q - x = 0$ ή $x = q$ είναι λόγος.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ: Εάν $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ τότε $a \cdot d = b \cdot c$.

185. Να εύρεθούν τά άκριβη πηλίκα των διαιρέσεων $5:9, 3a^2:5.a$ όπου $a \in N$.

186. Είς μίαν έκδρομήν έκ τών 48 μαθητῶν τῆς τάξεως ἀπουσίαζον οι 2. Ποιος είναι ο λόγος τῶν άριθμῶν τῶν ἀπόντων μαθητῶν α) πρὸς τὸν συνολικὸν άριθμὸν τῶν μαθητῶν τῆς τάξεως, β) πρὸς τὸν άριθμὸν τῶν μαθητῶν τῆς τάξεως οἱ ὅποιοι ήσαν παρόντες εἰς τὴν έκδρομήν;

187. Ἐπιλύσατε τὰς ἔξι σώσεις:

$$2 \cdot x = 5, \quad \frac{x}{3} = 4, \quad \frac{x}{2} = 0, \quad \frac{2x+1}{3} = 3$$

188. Ποιαὶ ἔκ τῶν κατωτέρω ἴσοτήτων είναι ἀληθεῖς;

$$\frac{0}{4} = 0, \quad \frac{0}{4} = 4, \quad \frac{5}{5} = 0, \quad \frac{5}{1} = 5, \quad \frac{6}{0} = 6$$

67. ΟΜΩΝΥΜΑ, ΕΤΕΡΩΝΥΜΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ

67. 1. Όρισμοι

Τὰ κλάσματα $\frac{3}{8}, \frac{5}{8}, \frac{7}{8}$, ἔχουν ἐν κοινὸν γνώρισμα: "Έχουν τοῦ παρονομαστάς. Διὰ τοῦτο λέγονται ὁμώνυμα."

Τὰ κλάσματα $\frac{3}{8}$ καὶ $\frac{4}{7}$ ἔχουν διαφορετικοὺς παρονομαστάς. Διὰ τοῦτο λέγονται ἑτερόνυμα.

67. 2. Τροπή έτερωνύμων κλασμάτων είς δημόνυμα

Συχνά είς τούς ύπολογισμούς είναι άναγκη νά χωρεί δώματα κλάσματα. Γεννᾶται συνεπῶς τό πρόβλημα: Πώς θὰ τρέψωμεν ἔτερώνυμα κλάσματα εἰς ίσα πρός αύτα δώματα.

"Ἄς λάβωμεν δύο κλάσματα, π.χ. τὰ κλάσματα $\frac{9}{10}$, $\frac{7}{8}$ καὶ ἂς προσ-
παθήσωμεν νὰ τὰ τρέψωμεν εἰς ἄλλα ἵσα πρὸς αὐτὰ ἄλλα ὅμώνυμα.

Πρὸς τοῦτο εὑρίσκομεν τὰ ἵσα πρὸς αὐτὰ κλάσματα:

$$\frac{9}{10} = \frac{18}{20} = \frac{27}{30} = \frac{36}{40} = \frac{45}{50}$$

$$\frac{7}{2} = \frac{14}{16} = \frac{21}{24} = \frac{28}{32} = \frac{35}{40} = \frac{42}{48}$$

и на български език

"Ας προσέξωμεν τὰ δύμώνυμα κλάσματα $\frac{36}{40}$ καὶ $\frac{35}{40}$, τὰ δόποια είναι ίσα

πρὸς τὰ κλάσματα $\frac{9}{10}$ καὶ $\frac{7}{8}$ ἀντιστοίχως

$$\frac{9}{10} = \frac{36}{40}, \quad \frac{7}{8} = \frac{35}{40}$$

Παρατηροῦμεν τὰ ἔξῆς :

α) Ο κοινός παρονομαστής 40 είναι το Ε.Κ.Π. των παρονομαστών 10 και 8.

β) "Εκαστον πολλαπλάσιον του 40, ήτοι έκαστον κοινὸν πολλαπλάσιον τῶν παρονομαστῶν 8 και 10, δύναται νὰ χρησιμοποιηθῇ ὡς κοινὸς παρονομαστής δύων μέρων κλασμάτων ἀντιστοίχως ἵσων πρός τὸ κλάσματα

$$\frac{9}{10} \text{ kai } \frac{7}{8}$$

$$\frac{9}{10} = \frac{72}{80} = \frac{108}{120} = \dots$$

Είναι δημόσιος προτιμότερον να χρησιμοποιούμεν τό Ε.Κ.Π. διά να έχωμεν κλάσματα μὲ τοὺς μικρότερους δυνατούς δρους.

⁷ Εκ της περώτης παρατηρήσεως δόδηγούμεθα εἰς τὸν γνωστὸν τρόπον τροπῆς ἐτερω νῦμαν κλασμάτων εἰς δύμανυμα ἵσα πρὸς αὐτὰ.

67. 3. Παραδείγματα

1) Διά τὰ κλάσματα $\frac{2}{15}$ καὶ $\frac{7}{9}$ ἔχομεν: ποιοῦστο γάρ μὲν τὸ διάστημα
μὲν τόπος συναντήσεως καὶ ποιοῦστο γάρ μὲν τὸ διάστημα στάθμη τοῦ τόπου.

$$\alpha) \text{Ε.Κ.Π. } (15, 9) = 45 \quad \beta) \text{ } 45 : 15 = 3, \quad 45 : 9 = 5$$

$$\gamma) \frac{2}{15} = \frac{2 \cdot 3}{15 \cdot 3} = \frac{6}{45}, \quad \frac{7}{9} = \frac{7 \cdot 5}{9 \cdot 5} = \frac{35}{45}$$

2) Διά τὰ κλάσματα $\frac{4}{15}, \frac{5}{12}, \frac{2}{3}$ ἔχομεν: ὅτι τὰ κλάσματα στάθμη τοῦ τόπου

$$\alpha) \text{Ε.Κ.Π. } (15, 12, 3) = 60 \quad \beta) \text{ } 60 : 15 = 4, \quad 60 : 12 = 5, \quad 60 : 3 = 20$$

$$\gamma) \frac{4}{15} = \frac{4 \cdot 4}{15 \cdot 4} = \frac{16}{60}, \quad \frac{5}{12} = \frac{5 \cdot 5}{12 \cdot 5} = \frac{25}{60}, \quad \frac{2}{3} = \frac{2 \cdot 20}{3 \cdot 20} = \frac{40}{60}$$

3) Διά τὰ κλάσματα $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{5}$, τῶν διποτῶν οἱ παρονομασται εἶναι

ἀνὰ δύο πρῶτοι μεταξύ των, ἔχομεν:

$$\alpha) \text{Ε.Κ.Π. } (2, 3, 5) = 2 \cdot 3 \cdot 5 = 30, \quad \beta) (2 \cdot 3 \cdot 5) : 2 = 3 \cdot 5, \quad (2 \cdot 3 \cdot 5) : 3 = 2 \cdot 5, \\ (2 \cdot 3 \cdot 5) : 5 = 2 \cdot 3$$

$$\gamma) \frac{1}{2} = \frac{1 \cdot 5 \cdot 3}{2 \cdot 5 \cdot 3} = \frac{15}{30}, \quad \frac{2}{3} = \frac{2 \cdot 2 \cdot 5}{3 \cdot 2 \cdot 5} = \frac{20}{30}, \quad \frac{3}{5} = \frac{3 \cdot 2 \cdot 3}{5 \cdot 2 \cdot 3} = \frac{18}{30}$$

67. 4. Μία ἄλλη ιδιότης τῶν ἵσων κλασμάτων

1) "Ἄσ λάβωμεν δύο ἵσα κλάσματα, π.χ. τὰ κλάσματα $\frac{2}{3}$ καὶ $\frac{6}{9}$, καὶ

διὰ σχηματίσωμεν τὸ γινόμενον τοῦ ἀριθμητοῦ ἑκάστου τούτων μὲ τὸν παρονομαστὴν τοῦ ἄλλου. "Ητοι τὰ γινόμενα $2 \cdot 9$ καὶ $6 \cdot 3$. Παρατηροῦμεν ὅτι τὰ γινόμενα αὐτὰ εἶναι ἵσα

$$2.9 = 6.3 \quad (=18).$$

"Ομοίως διὰ τὰ ἵσα κλάσματα $\frac{3}{7}, \frac{12}{28}$ ἔχομεν

$$3 \cdot 28 = 7 \cdot 12$$

Γενικῶς ἄσ λάβωμεν δύο τυχόντα ἵσα κλάσματα

$$\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta} \quad \left. \begin{array}{l} \alpha, \gamma \in N_0 \\ \beta, \delta \in N \end{array} \right\} \quad (1)$$

καὶ ἄσ τρέψωμεν αὐτὰ εἰς διμόνια.

$$\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\alpha \cdot \delta}{\beta \cdot \delta}, \quad \frac{\gamma}{\delta} = \frac{\gamma \cdot \beta}{\delta \cdot \beta}$$

Θά είναι

$$\frac{\alpha \cdot \delta}{\beta \cdot \delta} = \frac{\gamma \cdot \beta}{\delta \cdot \beta} \quad (2)$$

Έκ της ισότητος (2) έννοούμεν ότι $\alpha \cdot \delta = \beta \cdot \gamma$

Όστε: $\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta} \Rightarrow \alpha \cdot \delta = \beta \cdot \gamma, \quad \left. \begin{array}{l} \alpha, \gamma \in \mathbb{N}_0 \\ \beta, \delta \in \mathbb{N} \end{array} \right\} \quad (3)$

ii) Είναι εύκολον νά έπαληθεύσωμεν ότι ή δινωτέρω συνεπαγώγη ισχύει και διντιστρόφως.

Π.χ. έκ της ισότητος $3 \cdot 4 = 6 \cdot 2$ προκύπτει ότι $\frac{3}{6} = \frac{2}{4}$

Όμοιως έκ της ισότητος $7 \cdot 8 = 4 \cdot 14 \Rightarrow \frac{7}{4} = \frac{14}{8}$

Γενικώς $\alpha \cdot \delta = \beta \cdot \gamma \Rightarrow \frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta} \quad \left. \begin{array}{l} \alpha, \gamma \in \mathbb{N}_0 \\ \beta, \delta \in \mathbb{N} \end{array} \right\} \quad (4)$

Έκ τῶν (3) και (4) έχομεν ότι

$$\boxed{\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta} \Leftrightarrow \alpha \cdot \delta = \beta \cdot \gamma \quad \beta, \delta \in \mathbb{N}, \quad \alpha, \gamma \in \mathbb{N}_0}$$

ΕΤΩ. Η δινωτέρω σχέσις μᾶς δίδει ένα άλλον τρόπον διά νά έξακριβώσωμεν έλαν δύο κλάσματα είναι ίσα.

Παραδείγματα

Τά κλάσματα $\frac{3}{10}, \frac{21}{70}$ είναι ίσα, διότι $3 \cdot 70 = 10 \cdot 21 (= 210)$

Άντιθέτως τά κλάσματα $\frac{7}{9}$ και $\frac{20}{27}$ δὲν είναι ίσα, διότι $7 \cdot 27 \neq 9 \cdot 20$.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

189. Νά τρέψετε εις διμόνυμα τά έτερώνυμα κλάσματα

$$\frac{3}{10}, \quad \frac{2}{2 \cdot 5}, \quad \frac{1}{4}$$

190. Όμοιως τά κλάσματα $\frac{14}{35}$, και $\frac{18}{27}$.

191. Ποιά έκ τῶν κατωτέρω ζευγῶν κλασμάτων δποτελούνται άπο ίσα κλάσματα;

$$\alpha) \frac{7}{75}, \frac{35}{375} \quad \beta) \frac{3}{29}, \frac{7}{90} \quad \gamma) \frac{2}{11}, \frac{14}{77}$$

Έργασθήτε χωρίς νά τρέψετε τά κλάσματα εις διμόνυμα.

192. Άπο τήν ισότητα $\alpha \cdot 4 = 2 \cdot 18$ ποιάς ισότητας κλασμάτων συνάγετε; $\alpha \in \mathbb{N}_0$

68. Η ΣΧΕΣΙΣ ΤΗΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΟΣ

68. 1. Όρισμάς


"Ας λέμε ότι το μήμα και οι σχηματίσωμεν:

α) τὰ $\frac{2}{3}$ αὐτοῦ καὶ β) τὰ $\frac{3}{4}$ αὐτοῦ,



σχ. 25. Παρατηροῦμεν ότι

$$\frac{3}{4} \cdot AB > \frac{2}{3} \cdot AB$$



σχ. 25

Διὰ τοῦτο λέγομεν ότι τὸ $\frac{3}{4}$ εἶναι μεγαλύτερον τοῦ $\frac{2}{3}$ ἢ ὅτι τὸ $\frac{2}{3}$

εἶναι μικρότερον τοῦ $\frac{3}{4}$.

Γράφομεν δὲ ἀντιστοίχως

$$\text{Ηετοῦ, } \text{Ηετοῦ} \quad \frac{3}{4} > \frac{2}{3}$$

$$\frac{2}{3} < \frac{3}{4}$$

$$\frac{\gamma}{\delta} > \frac{\alpha}{\beta}$$

Γενικῶς: Εάν $\frac{\alpha}{\beta} > \frac{\gamma}{\delta}$ δῆπον $\alpha, \gamma \in \mathbb{N}_0$ καὶ $\beta, \delta \in \mathbb{N}$ τότε

λέγομεν ότι $\frac{\alpha}{\beta}$ εἶναι μεγαλύτερον τοῦ $\frac{\gamma}{\delta}$.


Γράφομεν δὲ

$$\frac{\alpha}{\beta} > \frac{\gamma}{\delta}$$

68. 2. Ομώνυμα κλασμάτων

Είναι φανερόν ότι

$$\frac{3}{4} \cdot AB > \frac{2}{4} AB, \quad \text{σχ. 26}$$



$$\text{Άρα } \frac{3}{4} > \frac{2}{4}.$$

σχ. 26

Γενικῶς: Μεταξὺ δύο δημωνύμων κλασμάτων μεγαλύτερον είναι τὸ ἔχον μεγαλύτερον κριθμητήν.

$$\frac{\alpha}{\gamma} > \frac{\beta}{\delta} \quad \text{ἐὰν } \alpha > \beta \quad \left. \begin{array}{l} \alpha, \beta \in \mathbb{N}_0 \\ \gamma, \delta \in \mathbb{N} \end{array} \right\}$$

760 68. 3. Κλάσματα μὲ 1σους ἀριθμητὰς

Εἶναι φανερὸν ὅτι

$$\frac{2}{3} AB > \frac{2}{4} AB, \text{ σχ. 27}$$



"Ἄρα $\frac{2}{3} > \frac{2}{4}$



Σχ. 27

ΓΕΝΙΚΩΣ: Μεταξὺ δύο κλασμάτων μὲ 1σους ἀριθμητὰς μεγαλύτερον εἶναι τὸ ἔχον μικρότερον παρονομαστὴν

$\frac{\alpha}{\beta} > \frac{\alpha}{\gamma}$	έὰν	$\beta < \gamma$	$\left. \begin{array}{l} \alpha \in \mathbb{N}_0 \\ \beta, \gamma \in \mathbb{N} \end{array} \right\}$
--	-----	------------------	--

68. 4. Τυχόντα κλάσματα

α) "Ἄσ προσπαθήσωμεν νὰ εύρωμεν ποῖον ἐκ τῶν κλασμάτων $\frac{3}{5}$ καὶ $\frac{2}{3}$ εἶναι μεγαλύτερον.

Τὰ κλάσματα αὐτὰ οὔτε διμώνυμα εἶναι οὔτε 1σους ἀριθμητὰς ἔχουν. "Ἄσ τὰ τρέψωμεν εἰς διμώνυμα. "Έχομεν

$$\frac{3}{5} = \frac{3 \cdot 3}{5 \cdot 3}, \quad \frac{2}{3} = \frac{2 \cdot 5}{3 \cdot 5}$$

Παρατηροῦμεν ὅτι εἰς τὰ διμώνυμα κλάσματα $\frac{3}{5}$ καὶ $\frac{2}{3}$ εἶναι $3 \cdot 3 < 2 \cdot 5$. τοῦτο σημαίνει ὅτι

$$\frac{3 \cdot 3}{5 \cdot 3} < \frac{2 \cdot 5}{3 \cdot 5} \quad \text{ἢ} \quad \frac{3}{5} < \frac{2}{3}$$

β) "Ἄσ λάβωμεν ἡδη τὰ τυχόντα κλάσματα $\frac{\alpha}{\beta}$ καὶ $\frac{\gamma}{\delta}$ καὶ ἄσ τρέψωμεν αὐτὰ εἰς διμώνυμα.

$$\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\alpha \cdot \delta}{\beta \cdot \delta}, \quad \frac{\gamma}{\delta} = \frac{\gamma \cdot \beta}{\delta \cdot \beta}$$

Παρατηροῦμεν τότε ὅτι ἡ σύγκρισις τῶν κλασμάτων $\frac{\alpha}{\beta}$, $\frac{\gamma}{\delta}$ ἀνάγεται

είς τὴν σύγκρισιν τῶν ἀριθμητῶν $\alpha \cdot \delta$ καὶ $\beta \cdot \gamma$ τῶν ἀντιστοίχως ἵσων πρὸς αὐτὰ κλασμάτων $\frac{\alpha \cdot \delta}{\beta \cdot \delta}$ καὶ $\frac{\gamma \cdot \beta}{\delta \cdot \beta}$

"Ητοι : ἐὰν $\alpha \cdot \delta > \beta \cdot \gamma$, τότε $\frac{\alpha}{\beta} > \frac{\gamma}{\delta}$

ἐὰν $\alpha \cdot \delta < \beta \cdot \gamma$, τότε $\frac{\alpha}{\beta} < \frac{\gamma}{\delta}$

'Η ἀνωτέρω ίδιότης ισχύει καὶ ἀντιστρόφως. "Ητοι :

'Ἐὰν $\frac{\alpha}{\beta} > \frac{\gamma}{\delta}$, τότε καὶ $\alpha \cdot \delta > \beta \cdot \gamma$ $\alpha, \gamma \in \mathbb{N}_0$

» $\frac{\alpha}{\beta} < \frac{\gamma}{\delta}$, » $\alpha \cdot \delta < \beta \cdot \gamma$ $\beta, \delta \in \mathbb{N}$

68. 5. Ἐφαρμογαὶ

1) Σύγκρισις μὲν τὴν μονάδα

Παρατηροῦμεν δτι : $\frac{3}{5} < \frac{5}{5}$ ή $\frac{3}{5} < 1$

$$\frac{6}{5} > \frac{5}{5} \text{ ή } \frac{6}{5} > 1$$

Γενικῶς : 'Ἐὰν ὁ ἀριθμητής εἴναι μικρότερος τοῦ παρονομαστοῦ, τὸ κλάσμα είναι μικρότερον τῆς μονάδος. 'Αντιστρόφως· ἐὰν τὸ κλάσμα είναι μικρότερον τῆς μονάδος τότε ὁ ἀριθμητής είναι μικρότερος τοῦ παρονομαστοῦ.

$$\boxed{\alpha < \beta \iff \frac{\alpha}{\beta} < 1}$$

$$\boxed{\alpha > \beta \iff \frac{\alpha}{\beta} > 1}$$

Εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν τὸ κλάσμα λέγεται καταχρηστικὸν

2) Νὰ συγκριθοῦν τὰ κλάσματα $\frac{327}{421}, \frac{79}{85}$


*Έχομεν $327 \cdot 85 = 27795$ $421 \cdot 79 = 33259$

Εἶναι $\frac{27795}{33259} < 1$ ἕπειτα $\frac{327}{421} < \frac{79}{85}$

193. Νὰ διατάξετε κατά σειράν αύξοντος μεγέθους τὰ κλάσματα $\frac{8}{9}$, $\frac{27}{35}$, $\frac{15}{19}$ χωρὶς νὰ τρέψετε αὐτά εἰς διμώνυμα.

194. Νὰ εύρετε τὸ σύνολον τῶν ἀναγώγων κλασμάτων τὰ δόποια εἶναι μικρότερα τῆς μονάδος καὶ ἔχουν παρονομαστὴν μικρότερον τοῦ 5, νὰ διατάξετε δὲ αὐτὰ κατά σειράν αύξοντος μεγέθους.

69. ΤΟ ΣΥΝΟΛΟΝ ΤΩΝ ΡΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ



Σχ. 28

69. 1. Διὰ τὸ εὐθ. τμῆμα AB τοῦ σχ. 28 δυνάμεθα νὰ εἴπωμεν ὅτι τοῦτο εἶναι ἴσον πρὸς τὸ $\frac{1}{2}$ ἢ τὰ $\frac{2}{4}$ ἢ τὰ $\frac{3}{6}$ τοῦ AG .

$$AB = \frac{1}{2} \cdot AG \quad \text{ἢ} \quad AB = \frac{2}{4} \cdot AG \quad \text{ἢ} \quad AB = \frac{3}{6} \cdot AG \dots$$

Ἡ παρατήρησις αὗτη μᾶς ἐπιτρέπει νὰ εἴπωμεν ὅτι τὰ κλάσματα

$$\frac{1}{2}, \quad \frac{2}{4}, \quad \frac{3}{6}, \quad \frac{4}{8}, \quad \frac{5}{10} \dots$$

δὲν εἶναι διαφορετικοὶ ἀριθμοί, ἀλλὰ μόνον διαφορετικαὶ παραστάσεις, «ἀντιπρόσωποι» ἐνὸς καὶ τοῦ αὐτοῦ ἀριθμοῦ.

Μὲ ἄλλους λόγους: 'Ἡ κλάσις ίσοδυναμίας $\left\{ \frac{1}{2}, \frac{2}{4}, \frac{3}{6}, \frac{4}{8} \dots \right\}$ δρίζει

ἔνα καὶ μόνον ἔνα ἀριθμὸν τὸν δόποιον καὶ δυνομάζομεν ρητὸν ἀριθμὸν τῆς ἀριθμητικῆς ἢ ἀπλῶς ρητόν.

Ομοίως ἐκάστη τῶν κλάσεων ίσοδυναμίας $\left\{ \frac{1}{3}, \frac{2}{6}, \frac{3}{9}, \frac{4}{12} \dots \right\}$,

$\left\{ \frac{1}{4}, \frac{2}{8}, \frac{3}{12} \dots \right\}$, $\left\{ \frac{1}{5}, \frac{2}{10}, \frac{3}{15} \dots \right\}$, δρίζει ἔνα ρητὸν ἀριθμόν. Εἰς

τοὺς ὑπολογισμούς εἰς ρητὸς «ἀντιπροσωπεύεται» μὲ ἐν δόποιοδήποτε ἀπὸ τὰ κλάσματα τῆς κλάσεως ίσοδυναμίας ἢ δόποια δρίζει αὐτόν, συνήθως ὅμως μὲ τὸ ἔξ αὐτῶν ἀνάγωγον κλάσμα. Π.χ. ὁ ρητὸς τὸν δόποιον δρίζει ἢ κλάσις ίσοδυναμίας

$$\left\{ \frac{3}{7}, \frac{6}{14}, \frac{9}{21} \dots \right\},$$

δύναται νά άντιπροσωπευθῇ μὲ ἐν τῶν κλασμάτων $\frac{3}{7}, \frac{6}{14}, \frac{9}{21} \dots$

συνήθως δύμας άντιπροσωπεύεται μὲ τὸ ἀνάγωγον κλάσμα $\frac{3}{7}$.

Εξ ἄλλου εἶναι φανερὸν ὅτι ἕκαστος ἀκέραιος ἢ κλάσμα δύναται νά άντιπροσωπεύσῃ ἐναὶ καὶ μόνον ἐναὶ ρητόν.

Π.χ. ὁ ἀκέραιος 2 δύναται νά άντιπροσωπεύσῃ τὸν ρητὸν τὸν ὅποιον δρίζει ἢ κλάσις ἴσοδυναμίας

$$\left\{ \frac{2}{1}, \frac{4}{2}, \frac{6}{3} \dots \right\}$$

καὶ οὐδένα ἄλλον. (Διατί;).

Εἰς τὰ ἐπόμενα ἢ ἔκφρασις «ρητὸς $\frac{1}{2}$ » σημαίνει «κλάσμα $\frac{1}{2}$ » καὶ οἰονδή-

πιτε ἄλλο κλάσμα ἵσον πρὸς αὐτό». Μὲ τὴν σημασίαν αὐτὴν τὸ κλάσμα $\frac{1}{2}$ θὰ χρησιμοποιῆται ως ἀντιπρόσωπος τοῦ ρητοῦ

$$\left\{ \frac{1}{2}, \frac{2}{4}, \frac{3}{6} \dots \right\}$$

Κατὰ τὸ ἀνωτέρω ἢ γραφὴ $\frac{1}{2} = \frac{2}{4}$ δηλώνει ὅτι τὰ κλάσματα εἶναι ἴσα. Δηλώνει ἐπίστης καὶ ὅτι $\frac{1}{2}$ καὶ $\frac{2}{4}$ εἶναι διαφορετικαὶ γραφαὶ

ἐνὸς καὶ τοῦ αὐτοῦ ρητοῦ.

Τὸ σύνολον τῶν ρητῶν τῆς ἀριθμητικῆς παριστάνεται συνήθως μὲ τὸ σύμβολον Q_0^+ . Γεννᾶται τὸ ἐρώτημα: Ποίαν σχέσιν ἔχουν μεταξύ των τὰ δύο σύνολα N_0 καὶ Q_0^+ ;

Ως γνωστὸν ἕκαστος ἀκέραιος εἶναι ρητός.

$$\text{Π.χ. } 3 = \frac{3}{1} = \frac{6}{2} = \frac{9}{3} \dots, \quad 0 = \frac{0}{1} = \frac{0}{2} = \frac{0}{3} \dots$$


Ἐξ ἄλλου ὑπάρχουν ρητοὶ οἱ ὅποιοι δὲν εἶναι ἀκέραιοι. Π.χ. $\frac{2}{3} \notin N_0$.

Απὸ τὰ ἀνωτέρω ἔννοοῦμεν ὅτι τὸ σύνολον N_0 εἶναι γησιονύποσύνολον τοῦ συνόλου τοῦ συνόλου Q_0^+ .

$$N_0 \subset Q_0^+$$

ΕΠΙ ΤΩΝ 69. 2. Ημιευθεία διατάξεως τοῦ συνόλου Q_0^+

Γνωρίζομεν νὰ παριστάνωμεν ἀκεραιούς μὲ σημεῖα μιᾶς ήμιευθείας. "Ας ίδω-
μεν πῶς δυνάμεθα νὰ παραστήσωμεν ρητούς μὲ σημεῖα ήμιευθείας.



Σχ. 29

"Επὶ ήμιευθείας Οχ σημειώνομεν ἵσα τμήματα $OA = AB = BG \dots$, σχ. 29. Εί-
ναι φυσικὸν νὰ παραστήσωμεν τοὺς ρητοὺς $0 = \frac{0}{1}$, $1 = \frac{1}{1}$, $2 = \frac{2}{1}$, $3 = \frac{3}{1}$,

μὲ τὰ σημεῖα Ο, Α, Β, Γ ἀντιστοίχως.

Τὸν ρητὸν $\frac{1}{2}$ τὸν παριστάνωμεν μὲ τὸ μέσον τοῦ τμήματος OA. 'Ομοίως
τὸν ρητὸν $\frac{3}{2}$ παριστάνομεν μὲ τὸ μέσον M τοῦ εὐθ. τμήματος AB.

Διὰ νὰ παραστήσωμεν τὸν ρητὸν $\frac{3}{4}$ χωρίζομεν τὸ τμῆμα OA εἰς 4 ἵσα
τμήματα. Τὸ τρίτον κατὰ σειρὰν πρὸς τὰ δεξιὰ σημεῖον διαιρέσεως τοῦ OA
παριστάνει τὸν ρητὸν τοῦτον.

Εἶναι φανερὸν ὅτι μὲ τὸν τρόπον αὐτὸν δυνάμεθα νὰ παραστήσωμεν
ἔκαστον ρητὸν μὲ ἓν καὶ μόνον ἐν σημείον τῆς ήμιευθείας Οχ.

Διὰ τὴν παράστασιν αὐτὴν τῶν ρητῶν παρατηροῦμεν τὰ ἔξις:
α) 'Ο ρητὸς $\frac{3}{2}$ εἶναι ἡ ἀριθμητικὴ τιμὴ τοῦ τμήματος OM, σχ. 29, μὲ
μονάδα μετρήσεως τὸ τμῆμα OA.

Γενικῶς ἔκαστος ρητὸς α παριστάνεται μὲ ἓν σημείον Ma τῆς Οχ τοιοῦ-
τον ὥστε ἡ ἀριθμητικὴ τιμὴ τοῦ τμήματος OMα νὰ εἶναι α. (Μονάς εἶναι
πάντοτε τὸ τμῆμα OA).

β) Δύο ἄνισοι ρητοὶ α, β παριστάνονται μὲ δύο διαφορετικὰ σημεῖα
Ma, Mb τοιαῦτα ὥστε, ἐὰν α εἶναι μεγαλύτερος β, τότε τὸ Ma κεῖται «δεξιά»
τοῦ Mb.

"Ητοι τὸ σύνολον τῶν ρητῶν Q_0^+ εἶναι διατεταγμένον ἐπὶ τῆς ήμιευ-
θείας Οχ. Διὰ τοῦτο ἡ ήμιευθεία Οχ λέγεται καὶ ήμιευθεία διατάξεως
τοῦ συνόλου τῶν ρητῶν.

Σημείωσις

Καθὼς εἶδομεν ἔκαστος ρητὸς παριστάνεται μὲ ἓν καὶ μόνον ἐν σημείον
τῆς ήμιευθείας διατάξεως Οχ.

Γεννᾶται τὸ ἔρώτημα: "Εκαστον σημείον τῆς ήμιευθείας Οχ παριστάνει
ένα ρητόν;

"Η ἀπάντησις εἰς τὸ ἔρώτημα τοῦτο εἶναι ἀρνητική. Εἰς ἄλλην τάξιν θὰ
μάθωμεν διτὶ ὑπάρχουν σημεῖα τῆς Οχ τὰ δόποια οὐδένα ρητὸν παριστάνουν.
Τὰ σημεῖα αὗτὰ θὰ «συμπληρωθοῦν» μὲ «νέους» ἀριθμούς, τοὺς ἀσυμμέ-
τρους.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

195. Νὰ γραφῇ μὲ ἀναγραφὴν τῶν στοιχείων του τὸ σύνολον $\{x|x = \frac{3}{5}\}$.

196. Πῶς ἐπὶ τῆς ήμιευθείας διατάξεως φαίνεται διτὶ τὰ κλάσματα $\frac{3}{4}, \frac{6}{8}, \frac{9}{12}$ ἀντιπροσωπεύουν τὸν ίδιον ρητόν;

197. Ἐπὶ τῆς ήμιευθείας διατάξεως νὰ τοποθετήσετε τοὺς ρητούς

$$\frac{2}{3}, \frac{3}{4}, 1\frac{1}{4}.$$

ΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟΝ ΤΩΝ ΡΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ

ΑΟ διτὶ καταστάσιοιδες στοιχεῖα τοῖς διάφοροις στοιχείοις στὸ πρόβλημα

70. ΠΡΟΣΘΕΣΙΣ

τελεταρίτεροι, δια τριηγάνδης κάτιον κατέλατον καὶ δια τὸν κάθονοφ τοὺς

70. 1. "Οταν οἱ ρητοὶ ἀντιπροσωπεύωνται ὑπὸ δύμανύμων ακλασμά-
των.

1) Εἰς τὸ σχ. 30 ὅπου ἐλάβθημεν τὴν πατήσιδα δια τοὺς $\frac{5}{6} \text{ κάτηρος Ο'}$ (ο

$$AB=BG=GD=DE=EZ=ZH \quad \text{εἶναι } \begin{array}{ccccccc} & & & & & & \\ & A & B & G & D & E & Z \\ \hline & \leftarrow \frac{2}{6} AH & \rightarrow & \leftarrow \frac{3}{6} AH & \rightarrow & & \end{array} \text{οὕτους}$$

$$AH = \frac{2}{6} \cdot AH + \frac{3}{6} \cdot AH = \frac{5}{6} \cdot AH \quad (\text{ΑΟ αγῆτε δια πατησίδα})$$

ΑΓ + ΓΖ = AZ $\Sigma x. 30$ δια τοὺς κατεύθυνσι τοῦ πατησίδα

"Η ἀνωτέρω ισότης μεταξὺ τῶν τμημάτων αὐτῶν μᾶς δύνηται ὥντες
λάβωμεν τὸν ρητὸν $\frac{5}{6}$ ὡς ἀθροισμα τῶν ρητῶν $\frac{2}{6}$ καὶ $\frac{3}{6}$, τοῦ Η"

$$\text{γράφομεν δέ: } \frac{2}{6} + \frac{3}{6} = \frac{5}{6} \quad \text{ἢ} \quad \frac{2}{6} + \frac{3}{6} = \frac{2+3}{6} \quad (\text{δια πατησίδα})$$

Γενικῶς: 'Ονομάζομεν ἀθροισμα δύο ρητῶν $\frac{\alpha}{\gamma}$ καὶ $\frac{\beta}{\gamma}$ τὸν ρητὸν $\frac{\alpha+\beta}{\gamma}$

Γράφομεν δέ

$$\frac{\alpha}{\gamma} + \frac{\beta}{\gamma} = \frac{\alpha+\beta}{\gamma} \quad \left. \begin{array}{l} \alpha, \beta \in N_0 \\ \gamma \in N \end{array} \right\}$$

70. 2. "Οταν οι ρητοί ἀντιπροσωπεύωνται ὑπό ἐτερωνύμων κλασμάτων

Εις τὴν περίπτωσιν αὐτὴν τρέπομεν τὰ ἔτερώνυμα κλάσματα εἰς δημώνυμα (ἐπιλέγοιμεν ὡς ἀντιπροσώπους τῶν ρητῶν δημώνυμα κλάσματα) καὶ ἐργαζόμεθα ὡς προηγουμένως.

$$\text{Παραδείγματα: α) } \frac{3}{5} + \frac{2}{7} = \frac{3 \cdot 7}{5 \cdot 7} + \frac{2 \cdot 5}{7 \cdot 5}, \quad \frac{3 \cdot 7 + 2 \cdot 5}{5 \cdot 7} = \frac{31}{35}$$

$$\beta) \quad \frac{2 \cdot \alpha}{11} + \frac{3 \cdot \alpha}{22} = \frac{4 \cdot \alpha}{22} + \frac{3 \cdot \alpha}{22} = \frac{(4+3) \cdot \alpha}{22} = \frac{7 \cdot \alpha}{22}.$$

Ἐντικῶς :

$$\frac{\alpha}{\beta} + \frac{\gamma}{\delta} = \frac{\alpha \cdot \delta}{\beta \cdot \delta} + \frac{\gamma \cdot \beta}{\delta \cdot \beta} = \frac{\alpha \cdot \delta + \gamma \cdot \beta}{\beta \cdot \delta} \quad \left. \begin{array}{l} \alpha, \gamma \in N_0 \\ \beta, \delta \in N \end{array} \right\}$$

70. 3. Μεικτοί

Γνωρίζομεν δτι τὸ ἄθροισμα $2 + \frac{3}{4}$ γράφεται συντόμως $2\frac{3}{4}$ καὶ ὑπὸ τησσεράκου εἴπομεν ιστάνουμεν νόστησαν μὲν βῆτας τοῦ πενταριθμοῦ τὴν μορφὴν αὐτὴν λέγεται μεικτὸς ἀριθμός. Καθὼς οὖν οὐδὲ τετοπικοῦς ζωτοθεούς, τὰς τετοπικὰς λογικὰς τοῦ τετραγώνου στοιχία πλαισίου διαβάζομεν, οὐδὲ τὸ τετράγωνο στοιχίον πλαισίου διαβάζομεν. Ήτοι γάρ τοι $2\frac{3}{4} = 2 + \frac{3}{4} = \frac{2}{1} + \frac{3}{4}$ μεικτὸς αριθμός είναι τὸ τετράγωνο στοιχίον πλαισίου.

$$2 \frac{3}{4} = \frac{2 \cdot 4 + 3}{4} = \frac{11}{4}$$

Αντιστρόφως έκαστον κλάσμα μεγαλύτερον της ἀκέραιας μονάδος δύναται νὰ τεθῇ ύποδο μορφήν μεικτοῦ. Π.χ. διὰ τὸ κλάσμα $\frac{22}{5}$ έχομεν :

$$22 = 4 \cdot 5 + 2$$

$$\frac{22}{5} = \frac{4 \cdot 5 + 2}{5} = \frac{4 \cdot 5}{5} + \frac{2}{5}$$

$$\frac{22}{5} = 4 + \frac{2}{5} = 4\frac{2}{5}$$

Όμοιώς διὰ τὸ κλάσμα $\frac{9}{5}$ ἔχομεν $9 = 1 \cdot 5 + 4$

$$\frac{9}{5} = \frac{1.5}{5} + \frac{4}{5}$$

$$= 1 + \frac{4}{5} = 1\frac{4}{5}$$

Γενικώς έάν $\alpha \in N_0$, $\beta \in N$ και $\alpha > \beta$ τότε κατά τὸν γνωστὸν τύπον $\Delta = \delta \pi + v$, $v < \delta$ ξύνομεν

$$\alpha = \beta \cdot \pi + v, \quad v < \beta$$

$$\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\beta \cdot \pi}{\beta} + \frac{v}{\beta} = \pi + \frac{v}{\beta}$$

ὅπου π εἶναι τὸ ἀκέραιον μέρος τοῦ κλάσματος $\frac{\alpha}{\beta}$.

"Ωστε: "Έκαστος μεικτός δύναται νὰ τεθῇ υπὸ μορφὴν κλάσματος. 'Αντιστρόφως' έκαστον κλάσμα μεγαλύτερον τῆς ἀκεραίας μονάδος δύναται νὰ τεθῇ υπὸ μορφὴν μεικτού.

70. 4. Διατήρησις τῶν ἴδιοτήτων τῆς προσθέσεως εἰς τὸ σύνολον Ω^+

Παραστήροῦμεν δτὶ ή πρόσθεσις δύο ρητῶν ἀνάγεται εἰς τὴν πρόσθεσιν τῶν ἀριθμητῶν δύο δύμωνύμων κλασμάτων· Δηλαδὴ εἰς τὴν πρόσθεσιν ἀκεραίων. Τοῦτο σημαίνει δτὶ αἱ γνωσταὶ Ιδιότητες τῆς προσθέσεως ἀκεραίων ἰσχύουν καὶ εἰς τὴν πρόσθεσιν ρητῶν. Τοιουτορόπως διὰ τὰς βασικὰς Ιδιότητας τῆς προσθέσεως ἔχομεν :

ι) "Υπαρξις ἀθροίσματος, μονότιμον

Εάν $\alpha, \beta \in \mathbb{N}_0$ και $\pi \in \mathbb{N}$, τότε τὸ ἀθροισμα $\frac{\alpha}{\pi} + \frac{\beta}{\pi}$ είναι εἶς καὶ μόνον εἰς ρητὸς ἀριθμός.

ii) Μεταθετικότης

$$\left. \begin{array}{l} \frac{\alpha}{\pi} + \frac{\beta}{\pi} = \frac{\alpha+\beta}{\pi} \\ \frac{\beta}{\pi} + \frac{\alpha}{\pi} = \frac{\beta+\alpha}{\pi} \end{array} \right\} \Rightarrow \frac{\alpha}{\pi} + \frac{\beta}{\pi} = \frac{\beta}{\pi} + \frac{\alpha}{\pi} \quad \left. \begin{array}{l} \alpha, \beta \in N_0 \\ \pi \in N \end{array} \right\}$$

iii) Προσεταιριστικότης

$$\left. \begin{aligned} \left(\frac{\alpha}{\pi} + \frac{\beta}{\pi} \right) + \frac{\gamma}{\pi} &= \frac{\alpha+\beta}{\pi} + \frac{\gamma}{\pi} = \frac{\alpha+\beta+\gamma}{\pi} \\ \frac{\alpha}{\pi} + \left(\frac{\beta}{\pi} + \frac{\gamma}{\pi} \right) &= \frac{\alpha}{\pi} + \frac{\beta+\gamma}{\pi} = \frac{\alpha+\beta+\gamma}{\pi} \end{aligned} \right\} \Rightarrow$$

$$\left(\frac{\alpha}{\pi} + \frac{\beta}{\pi} \right) + \frac{\gamma}{\pi} = \frac{\alpha}{\pi} + \left(\frac{\beta}{\pi} + \frac{\gamma}{\pi} \right) \quad \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{N}_0 \text{ καὶ } \pi \in \mathbb{N}$$

iv) Ούδέτερον στοιχείου

$$\frac{\alpha}{\pi} + 0 = \frac{\alpha}{\pi} + \frac{0}{\pi} = \frac{\alpha+0}{\pi} \Rightarrow \frac{\alpha}{\pi} + 0 = \frac{\alpha}{\pi} \quad \alpha \in \mathbb{N}_0, \pi \in \mathbb{N}$$

v) Γενίκευσις τῆς προσεταιριστικότητος

Εἰς τὸ σύνολον \mathbb{Q}_0^+ τὸ ἀθροισμα πολλῶν προσθετέων δρίζεται ὅπως καὶ εἰς τὸ σύνολον \mathbb{N}_0 . Εἰναι δὲ εὐκολὸν νὰ ἐπαληθεύσωμεν ὅτι :

- 1) "Ἐν ἀθροισμα ρητῶν εἶναι ἀνεξάρτητον ἀπὸ τὴν σειρὰν τῶν προσθετέων.
- 2) Εἰς ἐν ἀθροισμα ρητῶν δυνάμεθα νὰ ἀντικαταστήσωμεν :
 - α) Δύο ἢ περισσοτέρους προσθετέους μὲ τὸ ἀθροισμά των.
 - β) "Ἐνα προσθετέον μὲ ἄλλους ἔχοντας ἀθροισμα αὐτόν.

Παραδείγματα

$$2 \frac{3}{7} + \frac{2}{7} = 2 + \left(\frac{3}{7} + \frac{2}{7} \right) = 2 \frac{5}{7}$$

$$2 + \frac{3}{7} + 5 = (2 + 5) + \frac{3}{7} = 7 \frac{3}{7}$$

$$2 \frac{1}{4} + 3 \frac{5}{8} + 5 = (2 + 3 + 5) + \left(\frac{1}{4} + \frac{5}{8} \right) = 10 \frac{7}{8}$$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

198. Νὰ ὑπολογισθοῦν κατὰ τὸν ἀπλούστερον τρόπον τὰ ἀθροίσματα:

$$\alpha = \left(\frac{2}{5} + \frac{3}{7} \right) + \left(\frac{1}{7} + \frac{3}{5} \right), \quad \beta = \left(2 \frac{1}{3} + \frac{4}{9} \right) + \left(\frac{3}{8} + 4 \frac{2}{3} \right) + \left(\frac{5}{9} + \frac{1}{4} \right)$$

$$199. \text{Νὰ τεθῇ ὑπὸ μορφὴν μεικτοῦ ἑκαστον τῶν κλασμάτων } \frac{17}{9}, \frac{35}{11}, \frac{23}{8}.$$

$$200. \text{Μία γωνία εἶναι } \theta \text{ μὲ τὰ } \frac{3}{9} \text{ τῆς δρθῆς, μία ἄλλη μεγαλυτέρα αὐτῆς κατὰ τὰ } \frac{2}{13} \text{ τῆς δρθῆς. Νὰ εύρεθῇ τὸ ἀθροισμα τῶν δύο αὐτῶν γωνιῶν.}$$

201. Νὰ εύρεθη τὸ βάρος τριῶν δοχείων α,β,γ ἐὰν εἶναι γνωστόν ὅτι τὸ α' ζυγίζει $10\frac{2}{5}$ kg, τὸ β' $1\frac{3}{4}$ kg περισσότερον τοῦ α' καὶ τὸ γ' $2\frac{4}{5}$ kg, περισσότερον ἀπὸ τὸ δύοτεσμα τῶν α' καὶ β'.

71. ΑΦΑΙΡΕΣΙΣ

71. 1. Ὀρισμὸς

Ἡ ἀφαίρεσις εἰς τὸ σύνολον τῶν ρητῶν Q^+ δρίζεται ὅπως καὶ εἰς τὸ σύνολον τῶν ἀκεραίων N_0 .

Π.χ. λέγομεν ὅτι ἡ διαφορὰ τῶν ρητῶν $\frac{5}{7}$ καὶ $\frac{3}{7}$ εἶναι $\frac{2}{7}$ καὶ γράφουμεν

Исп

$$\frac{5}{7} - \frac{3}{7} = \frac{2}{7} \quad \text{διότι} \quad \frac{2}{7} + \frac{3}{7} = \frac{5}{7}$$

Γενικῶς $\frac{\alpha}{\pi} - \frac{\beta}{\pi} = \frac{x}{\pi}$ σημαίνει ὅτι $\frac{x}{\pi} + \frac{\beta}{\pi} = \frac{\alpha}{\pi}$ $\alpha, \beta, x \in N_0$

Θυοῦται νῦν τὸ εὐθύνομον τὸ πρώτον μέρος τῆς ορισμοῦ.

Ἡτοι $\frac{\alpha}{\pi} - \frac{\beta}{\pi} = \frac{x}{\pi} \Leftrightarrow \frac{x}{\pi} + \frac{\beta}{\pi} = \frac{\alpha}{\pi}$

71. 2. Εὔρεσις τῆς διαφορᾶς

Διὰ νὰ εὔρωμεν τὴν διαφορὰν δύο ρητῶν π.χ. τὴν διαφορὰν $\frac{7}{13} - \frac{4}{13}$ σκε-

πτόμεθα ὅτι πρέπει νὰ εὔρωμεν ἔνα ρητὸν $\frac{x}{13}$ τοιοῦτον ὥστε $\frac{x}{13} + \frac{4}{13} = \frac{7}{13}$

Ἡτοι $\frac{7}{13} - \frac{4}{13} = \frac{x}{13} \Leftrightarrow \frac{x}{13} + \frac{4}{13} = \frac{7}{13}$ (1)

$$\Leftrightarrow \frac{x+4}{13} = \frac{7}{13} \quad (2)$$

Ἄλλὰ ἐκ τῆς (2) ἔννοοῦμεν ὅτι $x+4=7 \Leftrightarrow x=7-4$

Ωστε $\frac{7}{13} - \frac{4}{13} = \frac{7-4}{13}$

Γενικῶς $\frac{\alpha}{\pi} - \frac{\beta}{\pi} = \frac{\alpha-\beta}{\pi}$ (3)

Ἐκ τῆς (3) εἶναι φανερὸν ὅτι

Ūπάρχει διαφορὰ $\frac{\alpha}{\pi} - \frac{\beta}{\pi}$ δταν καὶ μόνον δταν $\alpha \geq \beta$.

"Ωστε

$$\frac{\alpha}{\pi} - \frac{\beta}{\pi} = \frac{\alpha - \beta}{\pi}, \quad \text{όπου } \frac{\alpha, \beta \in \mathbb{N}_0}{\pi \in \mathbb{N}} \quad \text{καὶ } \alpha \geq \beta$$

Έάν οι ρητοί τῶν δποίων ζητοῦμεν τὴν διαφοράν παριστάνωνται ὑπό ἔτερωνύμων κλασμάτων, τότε τρέπομεν τὰ κλάσματα αὐτὰ εἰς δμώνυμα καὶ ἐργαζόμεθα ὡς ἀνωτέρω.

Π.χ. $\frac{2}{3} - \frac{1}{4} = \frac{2 \cdot 4}{3 \cdot 4} - \frac{1 \cdot 3}{4 \cdot 3} = \frac{2 \cdot 4 - 1 \cdot 3}{3 \cdot 4}$

"Η $\frac{2}{3} - \frac{1}{4} = \frac{8-3}{12} = \frac{5}{8}$

Γενικῶς: $\frac{\alpha}{\beta} - \frac{\gamma}{\delta} = \frac{\alpha \cdot \delta - \gamma \cdot \beta}{\beta \cdot \delta} \quad \text{όπου } \alpha, \gamma \in \mathbb{N}_0 \quad \text{καὶ } \alpha \cdot \delta > \beta \cdot \gamma$

η (παρατήρηση) Οι μεταβολές στην παραπάνω εξίσωση γίνονται όταν το $\frac{\alpha \cdot \delta - \gamma \cdot \beta}{\beta \cdot \delta}$ αποτίνεται στον παραπάνω συντελεστή $\frac{\beta \cdot \delta}{\beta \cdot \delta}$ έτσι ώστε να πάρει τη μορφή $\frac{\alpha \cdot \delta - \gamma \cdot \beta}{\beta \cdot \delta}$.

71. 3. Ιδιότητες

Καθώς βλέπομεν, ἡ ἀφαίρεσις ρητῶν «μεταφέρεται» εἰς ἀφαίρεσιν τῶν ἀριθμητῶν δύο δμώνυμων κλασμάτων ἥτοι εἰς ἀφαίρεσιν δύο ἀκεραίων.

Από τὴν παρατήρησιν αὐτὴν ἔννοοῦμεν ὅτι ὅλαις αἱ γνωσταὶ ιδιότητες τῆς ἀφαίρέσεως εἰς τὸ σύνολον \mathbb{N}_0 ισχύουν καὶ εἰς τὸ σύνολον \mathbb{Q}_0^+ .

71. 4. Παραδείγματα

1. $5 \frac{1}{2} - 3 = \left(5 + \frac{1}{2}\right) - 3 = (5 - 3) + \frac{1}{2} = 2 \frac{1}{2}$

[Κατὰ τὸν τύπον $(\alpha + \beta) - \gamma = (\alpha - \gamma) + \beta$]

2. $5 \frac{7}{8} - \frac{3}{8} = \left(5 + \frac{7}{8}\right) - \frac{3}{8} = 5 + \left(\frac{7}{8} - \frac{3}{8}\right) = 5 \frac{4}{8}$

[Κατὰ τὸν τύπον $(\alpha + \beta) - \gamma = \alpha + (\beta - \gamma)$].

3. $9 \frac{4}{7} - 5 \frac{3}{7} = 9 \frac{4}{7} - \left(5 + \frac{3}{7}\right)$

= $\left(9 \frac{4}{7} - 5\right) - \frac{3}{7}$

= $4 \frac{4}{7} - \frac{3}{7} = 4 \frac{1}{7}$

[Κατὰ τὸν τύπον $\alpha - (\beta + \gamma) = (\alpha - \beta) - \gamma$]

$$4. \quad 9 \frac{4}{7} - 5 \frac{4}{7} = \left(9 + \frac{4}{7}\right) - \left(5 + \frac{4}{7}\right) = 9 - 5 = 4$$

Κατά τὸν τύπον

$$(\alpha \pm \mu) - (\beta \pm \mu) = \alpha - \beta$$

Επειδή η διαφορά μεταξύ των αριθμητικών των πρώτων και των δεύτερων στοιχείων είναι ίση, οπότε η διαφορά μεταξύ των αποτελεσμάτων είναι ίση.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

202. Νὰ ἐκτελεσθοῦν κατὰ δύο τρόπους αἱ πράξεις

$$\frac{25}{8} - \left(\frac{3}{8} - \frac{1}{4}\right), \quad \frac{25}{8} - \left(\frac{3}{8} + \frac{1}{4}\right)$$

203. Ποῖον ρητὸν πρέπει νὰ προσθέσωμεν εἰς τὸ $\frac{4}{9}$ διὰ νὰ εὑρωμεν ἀθροισμα $1 \frac{1}{3}$;

204. Ποίαν μεταβολὴν ὑφίσταται τὸ κλάσμα $\frac{5}{7}$, ἐὰν προσθέσωμεν τὴν μονάδα α) εἰς τὸν ἀριθμητὴν β) εἰς τὸν παρανομαστὴν γ) καὶ εἰς τοὺς δύο δρους αὐτοῦ;

205. Τρεῖς ἀδελφοὶ α, β, γ διένειμον ἔνα ἀγρόν. Ὁ α' ἔλαβε $4 \frac{2}{5}$ στρέμματα ὀλιγώτερα ἀπὸ τὸν β' καὶ $3 \frac{1}{2}$ στρέμματα ὀλιγώτερα ἀπὸ τὸν γ'. Νὰ εὕρετε πόσα στρέμματα ἔλαβεν ἕκαστος, ἐὰν γνωρίζετε ὅτι δ' γ' ἔλαβεν $7 \frac{1}{2}$ στρέμματα.

206. Κατὰ ποῖον ρητὸν πρέπει νὰ ἔλαττωθῇ δ $2 \frac{3}{7}$ διὰ νὰ γίνῃ ἴσος μὲ $1 \frac{8}{9}$;

72. ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ

72. 1. Όρισμὸς

Ως γνωστὸν τὸ ἐμβαδὸν ἐνὸς ὀρθογωνίου δίδεται ὑπὸ τοῦ τύπου $E = \alpha \cdot \beta$, ὅπου α, β εἶναι αἱ διαστάσεις (εἰς ὁμοειδῆς μονάδας) τοῦ ὀρθογωνίου, καὶ E τὸ ἐμβαδὸν αὐτοῦ εἰς τετραγωνικάς μονάδας τῶν διαστάσεων αὐτοῦ.

Π.χ. ἐὰν $\alpha = 2 \text{ cm}$, $\beta = 3 \text{ cm}$, τότε $E = 2 \cdot 3 \text{ cm}^2$.

* Ας ἴωμεν ποῖον εἶναι τὸ ἐμβαδὸν E ἐνὸς ὀρθογωνίου μὲ διαστάσεις $\frac{4}{5} \text{ m}$ καὶ $\frac{3}{4} \text{ m}$.

Τὸ τετράγωνον τοῦ σχ. 31 πλευρᾶς 1 m (μία τετραγωνική μονάδας) εἶναι χωρισμένον εἰς 5 ἴσας ταινίας δριζοντίως καὶ εἰς 4 ἴσας ταινίας κατακορύφως. Τοιουτορόπως τὸ τετράγωνον αὐτὸ τὸ εἶναι χωρισμένον εἰς $5 \cdot 4 = 20$ ἴσα ὀρθογώνια, ἕκαστον τῶν διποίων ἔχει ἐμβαδὸν 1 σον

πρὸς τὸ $1/20$ τοῦ ἐμβαδοῦ τῆς τετραγωνικῆς μονάδος (1 m^2). Παρατηροῦμεν

όμως ότι τὸ δρθιγώνιον μὲ διαστάσεις $\frac{4}{5}$ m καὶ $\frac{3}{4}$ m, (σκιερὰ ἐπιφάνεια τοῦ σχ. 31) καλύπτει ἀκριβῶς 12 ἀπὸ τὰ 20 ἵσα δρθιγώνια τῆς τετραγωνικῆς αὐτῆς μονάδος.

ἀποτέλεσμα (ii)

$$\text{"Ἄρα"} \quad E = \frac{3}{4} m \cdot \frac{4}{5} m = \frac{12}{20} m^2.$$

$$\left| \begin{array}{l} \frac{Y \cdot \alpha}{\delta \cdot \beta} = \frac{Y}{\delta} \cdot \frac{\alpha}{\beta} \\ \frac{\alpha \cdot Y}{\beta \cdot \delta} = \frac{\alpha}{\beta} \cdot \frac{Y}{\delta} \end{array} \right. \quad (1)$$

$$\text{"Ἔπειτα"} \quad E = \frac{3}{4} m \cdot \frac{4}{5} m = \frac{3 \cdot 4}{4 \cdot 5} m^2.$$

Μὲ ὅμοιον τρόπον, ἀπὸ τὸ αὐτὸ σχέδιον, εύρισκομεν π.χ. ὅτι

$$\left(\frac{3}{5} \cdot \frac{4}{3} \right) \cdot \frac{\alpha}{\beta} = \frac{3}{5} \cdot \left(\frac{3}{4} m \cdot \frac{2}{5} m \right) = \frac{3 \cdot 2}{4 \cdot 5} m^2. \quad (2)$$

$$\frac{1}{4} m \cdot \frac{4}{5} m = \frac{1 \cdot 4}{4 \cdot 5} m^2. \quad (3)$$

Αἱ ἀνωτέρω Ισότητες (1), (2), (3), μᾶς ὀδηγοῦν εἰς τὸν ἔξις δρισμὸν τοῦ γινομένου δύο ρητῶν.

"Ἐὰν $\frac{\alpha}{\beta}, \frac{Y}{\delta}$ είναι δύο ρητοὶ τότε δνόμαζομεν γινόμενὸν αὐτῶν τὸν ρητὸν $\frac{\alpha \cdot Y}{\beta \cdot \delta}$.

Γράφομεν δὲ

$$\boxed{\frac{\alpha}{\beta} \cdot \frac{Y}{\delta} = \frac{\alpha \cdot Y}{\beta \cdot \delta} \quad \left. \begin{array}{l} \alpha, Y \in N_0 \\ \beta, \delta \in N \end{array} \right\}}$$

Παραδείγματα

$$\frac{2}{5} \cdot \frac{3}{7} = \frac{2 \cdot 3}{5 \cdot 7} = \frac{6}{35}$$

$$\frac{2}{5} \cdot \frac{3}{4} = \frac{2 \cdot 3}{5 \cdot 4} = \frac{6}{20} = \frac{3}{10}$$

72. 2. Διατήρησις τῶν ιδιοτήτων τοῦ πολλαπλασιασμοῦ

Καθὼς εἶδομεν, δ πολλαπλασιαμὸς ρητῶν ἀνάγεται εἰς τὸν πολλαπλασιασμὸν τῶν ἀριθμητῶν καὶ τῶν παρονομαστῶν δύο κλασμάτων τὰ ὅποια ἀντιπροσωπεύουν τοὺς ρητούς. Ἡτοι εἰς τὸν πολλαπλασιασμὸν ἀκεραίων. Διὰ τοῦτο ὅλαι αἱ γνωσταὶ ιδιότητες τοῦ πολλαπλασιασμοῦ εἰς τὸ σύνολον N_0 Ισχύουν καὶ εἰς τὸ σύνολον Q_0^+ .

i) "Υπαρξις γινομένου, μονότιμον

Από τὸν δρισμὸν προκύπτει ὅτι τὸ γινόμενον δύο ρητῶν εἶναι πάντοτε εἷς καὶ μόνον εἰς ρητός.

ii) Μεταθετικότης

$$\left. \begin{array}{l} \frac{\alpha}{\beta} \cdot \frac{\gamma}{\delta} = \frac{\alpha \cdot \gamma}{\beta \cdot \delta} \\ \frac{\gamma}{\delta} \cdot \frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma \cdot \alpha}{\delta \cdot \beta} \end{array} \right\} \Rightarrow \frac{\alpha}{\beta} \cdot \frac{\gamma}{\delta} = \frac{\gamma}{\delta} \cdot \frac{\alpha}{\beta}$$

iii) Προσεταιριστικότης

$$\left. \begin{array}{l} \left(\frac{\alpha}{\beta} \cdot \frac{\gamma}{\delta} \right) \cdot \frac{\epsilon}{\zeta} = \frac{\alpha \cdot \gamma}{\beta \cdot \delta} \cdot \frac{\epsilon}{\zeta} = \frac{\alpha \cdot \gamma \cdot \epsilon}{\beta \cdot \delta \cdot \zeta} \\ \frac{\alpha}{\beta} \cdot \left(\frac{\gamma}{\delta} \cdot \frac{\epsilon}{\zeta} \right) = \frac{\alpha}{\beta} \cdot \frac{\gamma \cdot \epsilon}{\delta \cdot \zeta} = \frac{\alpha \cdot \gamma \cdot \epsilon}{\beta \cdot \delta \cdot \zeta} \end{array} \right\} \Rightarrow \left(\frac{\alpha}{\beta} \cdot \frac{\gamma}{\delta} \right) \cdot \frac{\epsilon}{\zeta} = \frac{\alpha}{\beta} \cdot \left(\frac{\gamma}{\delta} \cdot \frac{\epsilon}{\zeta} \right)$$

iv) Ούδέτερον στοιχείου

$$\frac{\alpha}{\beta} \cdot \frac{1}{1} = \frac{\alpha \cdot 1}{\beta \cdot 1} \quad \text{ή} \quad \frac{\alpha}{\beta} \cdot \frac{1}{1} = \frac{\alpha}{\beta}$$

v) Επιμεριστικότης ως πρὸς τὴν πρόσθεσιν ἢ ἀφαίρεσιν

$$\frac{\alpha}{\beta} \cdot \left(\frac{\gamma}{\delta} \pm \frac{\epsilon}{\zeta} \right) = \frac{\alpha}{\beta} \cdot \frac{\gamma}{\delta} \pm \frac{\alpha}{\beta} \cdot \frac{\epsilon}{\zeta}$$

vi) Γινόμενον πολλῶν παραγόντων

Τὸ γινόμενον πολλῶν παραγόντων δρίζεται δπως καὶ εἰς τὸ σύνολον N_0 . Ήτοι ἔχομεν :

$$\frac{\alpha}{\beta} \cdot \frac{\gamma}{\delta} \cdot \frac{\epsilon}{\zeta} \cdot \frac{\eta}{\theta} = \left[\left(\frac{\alpha}{\beta} \cdot \frac{\gamma}{\delta} \right) \cdot \frac{\epsilon}{\zeta} \right] \cdot \frac{\eta}{\theta}$$

$$\frac{\alpha}{\beta} \cdot \frac{\gamma}{\delta} \cdot \frac{\epsilon}{\zeta} \cdot \frac{\eta}{\theta} = \frac{\alpha}{\beta} \cdot \frac{\eta}{\theta} \cdot \frac{\gamma}{\delta} \cdot \frac{\epsilon}{\zeta} = \dots$$

$$\frac{\alpha}{\beta} \cdot \frac{\gamma}{\delta} \cdot \frac{\epsilon}{\zeta} \cdot \frac{\eta}{\theta} = \frac{\alpha}{\beta} \cdot \left(\frac{\gamma}{\delta} \cdot \frac{\epsilon}{\zeta} \right) \cdot \frac{\eta}{\theta} = \frac{\alpha}{\beta} \cdot \left(\frac{\eta}{\theta} \cdot \frac{\epsilon}{\zeta} \right) \cdot \frac{\gamma}{\delta} = \dots$$

"Οπου $\alpha, \gamma, \epsilon, \eta \in N_0$ καὶ $\beta, \delta, \zeta, \theta \in N$

72. 3. Έφαρμογαί

α) Πολλαπλασιασμὸς κλάσματος ἐπὶ διαιρέτην τοῦ παρανομαστοῦ.

$$3 \cdot \frac{5}{6} = \frac{3 \cdot 5}{6} = \frac{(3 \cdot 5) : 3}{6 : 3} = \frac{5}{2} = 2 \frac{1}{2}$$

$$\left. \begin{array}{l} \alpha \cdot \frac{\beta}{\alpha \cdot \gamma} = \frac{\alpha \cdot \beta}{\alpha \cdot \gamma} = \frac{\beta}{\gamma} \\ \qquad \qquad \qquad \beta \in N_0 \\ \qquad \qquad \qquad \alpha, \gamma \in N \end{array} \right\} \text{"Αρα..."}$$

β) Μεικτός έπλι κλάσμα

$$6 \frac{4}{5} \cdot \frac{2}{3} = \left(6 + \frac{4}{5} \right) \cdot \frac{2}{3} = 6 \cdot \frac{2}{3} + \frac{4}{5} \cdot \frac{2}{3} = \dots$$

γ) Μεικτός έπλι μεικτόν

$$\begin{aligned} 36 \frac{2}{5} \cdot 2 \frac{3}{4} &= \left(36 + \frac{2}{5} \right) \cdot \left(2 + \frac{3}{4} \right) \\ &= 36 \cdot 2 + 36 \cdot \frac{3}{4} + \frac{2}{5} \cdot 2 + \frac{2}{5} \cdot \frac{3}{4} \\ &= 72 + 27 + \frac{4}{5} + \frac{3}{10} = 100 \frac{1}{10} \end{aligned}$$

(Διπλή έφαρμογή της έπιμεριστικής ιδιότητος)

72. 4. Άντιστροφοι άριθμοι

α) Προσέξατε τὰ γινόμενα

$$\frac{3}{5} \cdot \frac{5}{3}, \quad 2 \cdot \frac{1}{2}, \quad \frac{1}{7} \cdot 7$$

Έκαστον τούτων ισοῦται μὲ τὴν μονάδα.

β) Ποιοι ρητοί έπαληθεύουν τὰς ἔξισώσεις

$$\frac{3}{7} \cdot x = 1, \quad \frac{1}{5} \cdot \psi = 1$$

$$\text{Είναι } x = \frac{7}{3} \quad \text{καὶ} \quad \psi = 5$$

Έὰν δύο ρητοί α, β ἔχουν γινόμενον ίσον μὲ 1, τότε λέγομεν ὅτι

ὅτι εἰς ἕξ αὐτῶν εἶναι ἀντίστροφος τοῦ ἄλλου.

Γεννᾶται τὸ ἐρώτημα : "Έκαστος ρητὸς ἔχει ἔνα, πολλοὺς ἢ οὐδένα ἀντί-

στροφον;"

Είναι εὔκολον νὰ διακρίνωμεν ὅτι :

α) Τὸ μηδὲν οὐδένα ἀντίστροφον ἔχει (Διατί; Είναι δυνατὸν τὸ γινό-

μενον τοῦ μηδενὸς μὲ οἰονδήποτε ρητὸν νὰ ισοῦται μὲ 1;)

β) Έὰν μᾶς δοθῇ εἰς ρητός, π.χ. δ $\frac{4}{9}$, τότε δ ρητὸς $\frac{9}{4}$ εἶναι ἀντίστρο-

φος αὐτοῦ καὶ μάλιστα ὁ μοναδικός.

$$\frac{4}{9} \cdot \frac{9}{4} = 1$$

Γενικῶς: "Έκαστος ρητὸς $\frac{\alpha}{\beta}$, διάφορος τοῦ μηδενός, ἔχει ἕνα και μόνον ἕνα ἀντίστροφον· τὸν ρητὸν $\frac{\beta}{\alpha}$

$$\boxed{\frac{\alpha}{\beta} \cdot \frac{\beta}{\alpha} = \frac{\alpha \cdot \beta}{\beta \cdot \alpha} = 1 \quad (\alpha, \beta \in \mathbb{N})}$$

προβλήματα για τούτων (4)

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

207. Έπαληθεύσατε ότι $\frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{2 \cdot 3}$, $\frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \frac{1}{3 \cdot 4}$ και ἐπὶ τῇ βάσει αὐτῶν νὰ εὕρετε ότι:

$$\frac{1}{\alpha} - \frac{1}{\alpha+1} = \frac{1}{\alpha \cdot (\alpha+1)} \quad \alpha \in \mathbb{N}$$

208. Δύο ἀδελφοί α, β διένειμον μίαν περιουσίαν. 'Ο α' ἔλαβεν τὸ $\frac{1}{3}$ αὐτῆς καὶ τὸ $\frac{1}{4}$ τοῦ ὑπόλοιπου. Ποιὸν κλάσμα τῆς περιουσίας ἔλαβεν ὁ β';

209. 'Υπολογίσατε μὲ δύο τρόπους τὰ γινόμενα

α) $\frac{3}{5} \cdot \left(\frac{4}{9} + \frac{1}{2} \right)$

β) $\frac{3}{5} \cdot \left(\frac{5}{9} - \frac{1}{2} \right)$

γ) $3\frac{1}{2} \cdot 5\frac{2}{3}$

δ) $4\frac{3}{4} \cdot 3\frac{4}{5}$

210. Συμπληρώσατε τὰς Ισότητας $\frac{4}{9} \dots = 1$, $\frac{3}{8} \dots = 0$, $\frac{3}{8} \dots \frac{5}{9} \dots = \frac{5}{24}$

211. 'Υπολογίσατε μὲ τὸν συντομώτερον τρόπον τὰ γινόμενα:

$$\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{7}{9} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{5}{3} \cdot \frac{9}{7}, \quad \frac{4}{5} \cdot \frac{10}{8} \cdot \frac{11}{12} \cdot \frac{24}{22}$$

73. ΔΙΑΙΡΕΣΙΣ

73. 1. Ορισμὸς

'Η διαίρεσις εἰς τὸ σύνολον $Q_{\neq 0}$ δρίζεται ὅπως καὶ εἰς τὸ σύνολον N_0 .

Π.χ. λέγομεν ότι τὸ (ἀκριβές) πηλίκον τοῦ ρητοῦ $\frac{8}{9}$ διὰ τοῦ ρητοῦ 4

είναι ὁ ρητὸς $\frac{2}{9}$ καὶ γράφομεν

$\frac{8}{9} : 4 = \frac{2}{9}$, διότι $\frac{2}{9} \cdot 4 = \frac{8}{9}$

Γενικῶς $\frac{\alpha}{\beta} : \frac{\gamma}{\delta} = x$ σημαίνει ότι $\frac{\gamma}{\delta} \cdot x = \frac{\alpha}{\beta}$

"Ητοι:

$$\frac{\alpha}{\beta} : \frac{\gamma}{\delta} = x \iff \frac{\gamma}{\delta} : x = \frac{\alpha}{\beta}, \quad x \in Q_0^+$$

73. 2. Εύρεσις τοῦ πηλίκου

Διά τὴν εύρεσιν τοῦ (άκριβοῦ) πηλίκου μιᾶς διαιρέσεως, π.χ. τῆς διαιρέσεως $4 : \frac{2}{3}$ σκεπτόμεθα ότι πρέπει νὰ εὑρωμεν ἔνα ρητὸν x τοιοῦτον, ὥστε

$$\frac{2}{3} \cdot x = 4$$

"Ητοι

$$4 : \frac{2}{3} = x \iff \frac{2}{3} \cdot x = 4 \quad (1)$$

"Ἄσ προσπαθήσωμεν νὰ ἐπιλύσωμεν τὴν ἔξισώσιν $\frac{2}{3} \cdot x = 4$

$$\frac{2}{3} \cdot x = 4 \iff \frac{3}{2} \cdot \left(\frac{2}{3} \cdot x \right) = \frac{3}{2} \cdot 4 \quad (\text{Πολ / σμὸς ἐπὶ } \frac{3}{2})$$

$$\iff \left(\frac{3}{2} \cdot \frac{2}{3} \right) \cdot x = 4 \cdot \frac{3}{2} \quad (\text{Προσεταιριστικὴ ἴδιότης})$$

$$\iff x = 4 \cdot \frac{3}{2} \quad \left(\frac{3}{2} \cdot \frac{2}{3} = 1 \right)$$

"Ωστε

$$4 : \frac{2}{3} = 4 \cdot \frac{3}{2}$$

Μὲ ὅμοιον τρόπον εύρισκομεν δτι $\frac{5}{8} : \frac{4}{7} = \frac{5}{8} \cdot \frac{7}{4}$

$$\frac{5}{8} : 3 = \frac{5}{8} \cdot \frac{1}{3}$$

Γενικῶς

$$\frac{\alpha}{\beta} : \frac{\gamma}{\delta} = \frac{\alpha}{\beta} \cdot \frac{\delta}{\gamma} \quad \begin{array}{l} \text{ὅπου} \\ \beta, \gamma, \delta \in N \end{array} \quad \alpha \in N_0 \quad \boxed{\quad }$$

Τὸ (άκριβὲς) πηλίκον ἐνὸς ρητοῦ δι' ἄλλου, μὴ μηδενικοῦ, ἵσοῦται πρὸς τὸ γινόμενον τοῦ διαιρέτου ἐπὶ τὸν ἀντίστροφὸν τοῦ διαιρέτου.

Παρατήρησις

"Οπως γνωρίζομεν, εἰς τὸ σύνολον N_0 ἡ διαιρέσις εἶναι δυνατὴ καὶ τελεία μόνον ὅταν ὁ διαιρέτος εἶναι πολλαπλάσιον τοῦ διαιρέτου καὶ ὁ διαιρέτης

είναι διάφορος του μηδενός. Είσ τό σύνολον Q_0^+ ή διαιρέσις είναι δυνατή και τελεία εκτός μόνον τής περιπτώσεως είσ τήν όποιαν διαιρέτης είναι μηδέν.

73. 3. Διαιτήρησις τῶν ίδιοτήτων

Είναι εύκολον νά έννοήσωμεν ότι δλαι αι ίδιότητες τῆς διαιρέσεως είσ τό σύνολον N_0 ίσχύουν καί είσ τό σύνολον Q_0^+ καί μάλιστα μὲ δλιγωτέρους περιορισμούς.

Παραθέτομεν κατωτέρω σύντομον πίνακα τούτων.

$$1. \left(\frac{\alpha}{\pi} + \frac{\beta}{\pi'} \right) : \frac{\gamma}{\pi''} = \left(\frac{\alpha}{\pi} : \frac{\gamma}{\pi''} \right) + \left(\frac{\beta}{\pi'} : \frac{\gamma}{\pi''} \right)$$

$$2. \left(\frac{\alpha}{\pi} - \frac{\beta}{\pi'} \right) : \frac{\gamma}{\pi''} = \left(\frac{\alpha}{\pi} : \frac{\gamma}{\pi''} \right) - \left(\frac{\beta}{\pi'} : \frac{\gamma}{\pi''} \right)$$

$$3. \left(\frac{\alpha}{\pi} \cdot \frac{\beta}{\pi'} \right) : \frac{\gamma}{\pi''} = \left(\frac{\alpha}{\pi} : \frac{\gamma}{\pi''} \right) \cdot \frac{\beta}{\pi'}$$

$$4. \frac{\alpha}{\pi} : \left(\frac{\beta}{\pi'} \cdot \frac{\gamma}{\pi''} \right) = \left(\frac{\alpha}{\pi} : \frac{\beta}{\pi'} \right) : \frac{\gamma}{\pi''}$$

$$5. \frac{\alpha}{\pi} = \frac{\beta}{\pi'} \Leftrightarrow \frac{\alpha}{\pi} \cdot \frac{\gamma}{\pi''} = \frac{\beta}{\pi'} \cdot \frac{\gamma}{\pi''}$$

$$6. \frac{\alpha}{\pi} > \frac{\beta}{\pi'} \Leftrightarrow \frac{\alpha}{\pi} \cdot \frac{\gamma}{\pi''} > \frac{\beta}{\pi'} \cdot \frac{\gamma}{\pi''}$$

73. 4. Έφαρμογαί

1. Διαιρεσις διὰ διαιρέτου τοῦ ἀριθμητοῦ

$$\frac{4.5}{3} : 5 = \frac{4.5}{3} \cdot \frac{1}{5} = \frac{4.5}{3.5} = \frac{4}{3}$$

$$\frac{\alpha \cdot \beta}{\gamma} : \beta = \frac{\alpha \cdot \beta}{\gamma} \cdot \frac{1}{\beta} = \frac{\alpha \cdot \beta}{\gamma \cdot \beta} = \frac{\alpha}{\gamma}$$

Ητοι $\frac{\alpha \cdot \beta}{\gamma} : \beta = \frac{\alpha}{\gamma}$ α $\in N_0$ {α ∈ N_0 } {β, γ ∈ N }.

2. Μεικτὸς διὰ ἀκεραίου

$$24 \frac{3}{4} : 4 = (24 : 4) + \left(\frac{3}{4} : 4 \right) = 6 + \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{4} = 6 \frac{3}{16}$$

3. Μεικτός διάλασματος

$$3 \frac{1}{2} : \frac{4}{5} = 3 \frac{1}{2} \cdot \frac{5}{4} = \left(3 \cdot \frac{5}{4} \right) + \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{5}{4} \right) = 4 \frac{3}{8}$$

4. Μεικτός διάλασματος μεικτού

$$6 \frac{2}{3} : 2 \frac{3}{6} = 6 \frac{2}{3} : \frac{15}{3} = 6 \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{15} = 2 \frac{2}{3}$$

(Χρησιμοποιήσατε και άλλους τρόπους)

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

212. Έάν πολλαπλασιάσετε ένα αριθμόν έπι $\frac{2}{3}$ θά εύρετε 48. Ποιος είναι ο αριθμός;

213. Ο λόγος ένός ρητού πρὸς $\frac{7}{8}$ ισοῦται μὲν $\frac{7}{8}$. Ποιος είναι ο ρητός αὐτός;

214. Υπολογίσατε μὲν δύο τρόπους τὰ ἔξαγόμενα $(8+6\frac{4}{9}):2$, $(3\frac{6}{7}-1\frac{4}{5}):3$

215. Πόσον αύξάνεται ή ἐλαττούται ο ρητός $\frac{3}{5}$ ἐάν τὸν διαιρέσωμεν διά $\frac{3}{4}$;

216. Μὲ ποιὸν ρητὸν πρέπει νὰ διαιρέσωμεν τὸν $\frac{4}{9}$ διά νὰ λάβωμεν πηλίκον 8;

74. ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΡΗΤΩΝ

74. 1. Όρισμοί

Όπως ἀντὶ $2 \cdot 2 \cdot 2$ γράφομεν 2^3 δύοις ἀντὶ $\frac{2}{5} \cdot \frac{2}{5} \cdot \frac{2}{5}$ γράφομεν $\left(\frac{2}{5}\right)^3$

"Ητοι: $\left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^3 = \frac{\alpha}{\beta} \cdot \frac{\alpha}{\beta} \cdot \frac{\alpha}{\beta}$

καὶ γενικῶς: $\left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^n = \frac{\alpha}{\beta} \cdot \frac{\alpha}{\beta} \cdot \frac{\alpha}{\beta} \cdots \text{(n παράγοντες)} \quad \begin{matrix} \alpha \in \mathbb{N}_0 \\ \beta \in \mathbb{N} \end{matrix}$

Απὸ τὸν δρισμὸν αὐτὸν ἔχομεν

$$\left(\frac{2}{3}\right)^4 = \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} = \frac{2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2}{3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3} = \frac{2^4}{3^4}$$

$$\left(\frac{3}{4}\right)^3 = \frac{3}{4} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{3}{4} = \frac{3 \cdot 3 \cdot 3}{4 \cdot 4 \cdot 4} = \frac{3^3}{4^3}$$

Γενικῶς :

$$\left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^v = \frac{\alpha}{\beta} \cdot \frac{\alpha}{\beta} \cdot \frac{\alpha}{\beta} \cdots \quad (\text{ν παράγοντες})$$

$$= \frac{\alpha \cdot \alpha \cdot \alpha \cdots}{\beta \cdot \beta \cdot \beta \cdots} \quad (\text{ν παράγοντες})$$

"H

$$\boxed{\left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^v = \frac{\alpha^v}{\beta^v} \quad \begin{array}{l} \alpha \in \mathbb{N}_0 \\ \beta, v \in \mathbb{N} \end{array}}$$

74. 2. "Οπως είσ τὸ σύνολον \mathbb{N}_0 , ἐλάβομεν $\alpha^0=1$ ὅπου $\alpha \in \mathbb{N}$, δημοίως λαμβάνομεν

$$\left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^0 = 1 \quad \begin{array}{l} \text{ὅπου} \\ \alpha, \beta \in \mathbb{N} \end{array}$$

74. 3. Ιδιότητες

Εύκλως εύρισκομεν ὅτι :

$$1. \left(\frac{2}{3}\right)^3 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{2^3}{3^3} \cdot \frac{2^3}{3^3} = \frac{2^2 \cdot 2^3}{3^2 \cdot 3^3} = \frac{2^{2+3}}{3^{2+3}} = \left(\frac{2}{3}\right)^{2+3}$$

Γενικῶς : $\left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^\mu \cdot \left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^\nu = \left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^{\mu+\nu} \quad \begin{array}{l} \alpha \in \mathbb{N}_0 \\ \beta, \mu, \nu \in \mathbb{N} \end{array}$

$$2. \left(\frac{2}{3}\right)^5 : \left(\frac{2}{3}\right)^3 = \left[\left(\frac{2}{3}\right)^3 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^2\right] : \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \left(\frac{2}{3}\right)^3$$

Γενικῶς : $\left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^\mu : \left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^\nu = \left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^{\mu-\nu} \quad \begin{array}{l} \alpha \in \mathbb{N}_0 \\ \beta, \mu, \nu \in \mathbb{N}, \mu \geq \nu \end{array}$

$$3. \left(\frac{2}{3} \cdot \frac{5}{7}\right)^2 = \left(\frac{2}{3} \cdot \frac{5}{7}\right) \cdot \left(\frac{2}{3} \cdot \frac{5}{7}\right) = \left(\frac{2}{3}\right)^2 \cdot \left(\frac{5}{7}\right)^2$$

Γενικῶς : $\left(\frac{\alpha}{\beta} \cdot \frac{\gamma}{\delta}\right)^\mu = \left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^\mu \cdot \left(\frac{\gamma}{\delta}\right)^\mu \quad \begin{array}{l} \alpha, \gamma \in \mathbb{N}_0 \\ \beta, \delta, \mu \in \mathbb{N} \end{array}$

$$4. \left[\left(\frac{2}{3}\right)^2\right]^3 = \left(\frac{2}{3}\right)^2 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^2 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \left(\frac{2}{3}\right)^{2+2+2} = \left(\frac{2}{3}\right)^{3 \cdot 2}$$

Γενικῶς : $\left[\left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^\mu\right]^\nu = \left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^{\mu \cdot \nu} \quad \begin{array}{l} \alpha \in \mathbb{N}_0 \\ \beta, \nu, \mu \in \mathbb{N} \end{array}$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ Από την παραπάνω ανάλυση, οι περιοχές που διατίθενται σε μεγαλύτερη έκθεση σε παραβιάσεις είναι η Κεντρική Ελλάδα και η Βόρεια Ελλάδα.

217. Υπολογίσατε τὰς δυνάμεις:

$$\left(\frac{2}{5}\right)^6, \quad \left(\frac{1}{2}\right)^6, \quad \left(\frac{3}{5}\right)^3, \quad \left(\frac{5}{9}\right)^3$$

218. Προσδιορίσατε τὸν ἀκέραιον αἱ ὥστε νὰ δηλωθεῖη ἡ Ιστός.

218. Προσδιορίσατε τὸν ἀκέραιον α ωστε να αληθεύει η ισοτητα. Διάπο μὲν πρόσφατα
νοικίζεται ὅτι επιθετικοὶ ποσοῦς $\frac{\alpha}{625} = \left(\frac{7}{25}\right)^2$ καὶ εμπόριον στενοὶ σχόλιοι
δοτύνει οικοδομεῖσθαι διαδικασία δοτημένοι διογκώνεισθαι γωνιαστικοὶ έργοι.

219. Γράψατε ύπόδι μορφήν μιᾶς δυνάμεως τὰ κάτωθι γινόμενα ἢ πηλίκα

$$\left(\frac{2}{3}\right)^3 \cdot \frac{4}{9} \cdot \left(\frac{8}{27}\right)^2, \quad \frac{2^3}{5^3} \cdot \left(\frac{8}{125}\right)^3, \quad \left(\frac{4}{9}\right)^4 : \left(\frac{2}{3}\right)^2, \quad \left(\frac{3}{4}\right)^4 \cdot \left(\frac{7}{9}\right)^0 : \frac{9}{16}$$

75. ΣΥΝΘΕΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ

75. 1. Ὀρισμὸς

"Οπως γράφομεν

$$2:3 = \frac{2}{3}, \quad 3:5 = \frac{3}{5},$$

κατὰ τὸν ταόπον αὐτὸν συμφωνοῦμεν νὰ γράφωμεν

$$\frac{2}{3} : 5 = \frac{\frac{2}{3}}{5}, \quad 3 : \frac{2}{5} = \frac{3}{\frac{2}{5}}, \quad \frac{2}{3} : \frac{4}{5} = \frac{\frac{2}{3}}{\frac{4}{5}}$$

Γενικῶς τὸ πηλίκον $\frac{\alpha}{\beta} : \frac{Y}{\delta}$ τῶν ρητῶν $\frac{\alpha}{\beta}$ καὶ $\frac{Y}{\delta}$ γράφεται καὶ ὑπό τὴν

μορφήν

$$\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\delta \cdot q}{\gamma \cdot d} \quad \text{οπου } \alpha \in N_0, \beta, \gamma, \delta \in N$$

“Υπὸ τὴν μορφὴν αὐτῆν δὲ λέγεται σύνθετον κλάσμα.

—αφεντικώς : Σύνθετον κλάσμα λέγεται τὸ κλάσμα τοῦ ὅποιου εἰς τοὺς λάγιστον ὅρος είναι κλάσμα. Οὗτος νωτιδιορικός καὶ πάπικος καὶ πάπικος

Πρὸς ἀποφυγὴν συγχύσεως ἡ γραμμὴ τοῦ συνθέτου κλάσματος γράφεται πάντοτε μεγαλυτέρα ἀπὸ τὴν γραμμὴν ἐκάστου κλάσματος — ὅρου αὐτοῦ.

Π.χ. διὰ τὸ πηλίκον $\frac{2}{3} : 4$ γράφομεν $\frac{2}{\cancel{3}} \quad \text{καὶ όχι} \quad \frac{2}{\cancel{4}}$

Λιγότεροι διακοίνωνεν τὰ κλάσματα τῶν διτοίων ὁ ἀριθμητής εἶναι ἀκέ-

ραιος και δ παρο νομαστής φυσικός από τά σύνθετα κλάσματα, δι νομάζομεν τά πρώτα & π λ ἀ κ λ ἀ σ μ α τ α.

75. 2. Τροπή συνθέτου κλάσματος είς άπλοιν

Διά νά έκτελεσωμεν πράξεις με σύνθετα κλάσματα πρέπει νά τά τρέψωμεν πρώτα είς άπλα.

Πρός τούτο σκεπτόμεθα δτι ἔν σύνθετον κλάσμα παριστάνει τό πηλίκον τῆς διαιρέσεως τοῦ ἀριθμητοῦ διά τοῦ παρο νομαστοῦ αύτοῦ.

$$\frac{\frac{2}{3}}{\frac{5}{7}} = \frac{2}{3} : \frac{5}{7} = \frac{2}{3} \cdot \frac{7}{5} = \frac{2 \cdot 7}{3 \cdot 5}$$

"Ητοι :

$$\frac{\frac{2}{3}}{\frac{5}{7}} = \frac{2 \cdot 7}{3 \cdot 5}$$

$$\frac{\frac{\alpha}{\beta}}{\frac{\gamma}{\delta}} = \frac{\alpha}{\beta} : \frac{\gamma}{\delta} = \frac{\alpha}{\beta} \cdot \frac{\delta}{\gamma} = \frac{\alpha \cdot \delta}{\beta \cdot \gamma}$$

"Ητοι :

$$\frac{\frac{\alpha}{\beta}}{\frac{\gamma}{\delta}} = \frac{\alpha \cdot \delta}{\beta \cdot \gamma} \quad \text{όπου } \left. \begin{array}{l} \alpha \in N_0 \\ \beta, \gamma, \delta \in N \end{array} \right\}$$

Δυνάμεθα διμως νά έργασθῶμεν και ώς ἔξης :

$$\frac{\frac{2}{3}}{\frac{5}{7}} = \frac{\frac{2}{3} \cdot 3 \cdot 7}{\frac{5}{7} \cdot 3 \cdot 7} = \frac{2 \cdot 7}{5 \cdot 3}, \quad \frac{\frac{\alpha}{\beta}}{\frac{\gamma}{\delta}} = \frac{\frac{\alpha}{\beta} \cdot \beta \cdot \delta}{\frac{\gamma}{\delta} \cdot \beta \cdot \delta} = \frac{\alpha \cdot \delta}{\beta \cdot \gamma}$$

"Ητοι στηριζόμενοι είς τήν θεμελιώδη ίδιότητα τῶν κλασμάτων πολλαπλασιάζομεν τοὺς ὅρους τοῦ συνθέτου κλάσματος ἐπί τό Ε.Κ.Π. τῶν παρονομαστῶν τῶν ἀπλῶν κλασμάτων αύτοῦ.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

220. Νά έκτελεσθοῖν αἱ πράξεις :

$$\frac{\frac{3}{4}}{\frac{5}{7}} + \frac{1}{\frac{2}{3}}, \quad \frac{\frac{4}{7}}{\frac{2}{2}}, \quad \frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{3}}{\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) \cdot 2}, \quad \frac{2 \cdot \left(\frac{4}{5}\right)^3}{\left(1 - \frac{1}{8}\right)^2}$$

221) Ποιον ἐκ τῶν κατωτέρω δύο συνθέτων κλασμάτων ἔναι τὸ μεγαλύτερον; — καὶ τοι
—οι τόνι μήτραν ἡ τοιάδε γενικοτεροτάτην πεποιησανταπόκλιτην πεποιησαντην
τεμνοτρόπην τοῦ νότιοῦ γεωδόνος $\frac{2}{2}$ τὸ μεγαλύτερον ἡ γενικοτεροτάτην πεποιησαντην
 $\frac{2}{2}$ καὶ $\frac{2}{2}$ τὸ μεγαλύτερον ἡ γενικοτεροτάτην πεποιησαντην

76. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΥΟΜΕΝΑ ΔΙΑ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΡΗΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

76. 1. Εις τὰ προβλήματα τεσσάρων πράξεων, τὰ ὅποια ἔχομεν ἐπιλύσει, ὡς βασικὸν σύνολον ἀριθμῶν εἶχομεν τὸ σύνολον τῶν ἀκεραίων N₀. "Ηδη ἡ ἐπέκτασις τῶν τεσσάρων πράξεων καὶ εἰς τὸ σύνολον τῶν ρητῶν ἀριθμῶν μᾶς ἐπιτρέπει νὰ ἐπιλύσωμεν καὶ νέους τύπους προβλημάτων.

76. 2. Πρόσθεσις — Ἀφαίρεσις

Πρόβλημα Θέλει τις νά διανύσῃ μίαν ἀπόστασιν 25 km εις τρεῖς ἡμέρας. Τὴν α' ἡμέραν διήνυσε $8 \frac{1}{3} \text{ km}$ καὶ τὴν β' ἡμέραν 3 km περισσότερα τῆς α'. Πόσα χιλιόμετρα πρέπει νὰ διανύσῃ τὴν τρίτην ἡμέραν;

Ἐπίλυσις

Κατὰ τὸ πρόβλημα ἔχομεν τὴν ἐξῆς σειρὰν προσθέσεων καὶ ἀφαιρέσεων:

Αριθμός km διανυθέντων τήν α' ήμέραν: 8 $\frac{1}{3}$ αν διανύγεσθαι

$$\text{Άριθμός km διανυθέντων τήν β' ήμέραν: } 8\frac{1}{3} + 3 = 11\frac{1}{3}$$

$$\text{Άριθμός km διανυθέντων τή ν α' και β' ημέραν : } 8 \frac{1}{3} + 11 \frac{1}{3} = 19 \frac{2}{3}$$

Αριθμός km τά δύο ημέρες που απαιτούνται για την επίσκεψη:

$$25 - 19 \frac{2}{3} = 24 \frac{3}{3} - 19 \frac{2}{3} = 5 \frac{1}{3}$$

"Ωστε τὴν τρίτην ἡμέραν πρέπει νὰ διανύσῃ $5\frac{1}{3}$ km.

76. 3. Πολλαπλασιασμός

Πρόβλημα 1ον
 Τό 1 μ. ένδος ύφασματος τιμάται $60 \frac{1}{2}$ δρχ. Πόσον τιμώνται τά 5 παρόπιστα αυτού ύφασματος;

Ἐπίλυσις πρωτότοπη γένεσις διατάχει την αποτύπωση της στοιχειώδους ιδέας.

Εις τὸ πρόβλημα αὐτὸ γνωρίζομεν τὴν τιμὴν τῆς μιᾶς μονάδος καὶ ζητοῦ-

μεν τὴν τιμὴν τῶν πολλῶν διμοειδῶν πρὸς αὐτὴν μονάδων. Ως γνωστὸν θὰ ἐκτελέσωμεν πολλαπλασιασμόν. Πολλαπλασιαστέος εἶναι ἡ τιμὴ τῆς μιᾶς μονάδος καὶ πολλαπλασιαστής ὁ ἀριθμὸς τῶν μονάδων τῶν διποίων ζητοῦμεν τὴν τιμὴν.

Ἐχομεν

$$5 \cdot 60 \frac{1}{2} = 302 \frac{1}{2}$$

"Ητοι τὰ 5 τὸ ὑφάσματος τιμῶνται $302 \frac{1}{2}$ δρχ.

Πρόβλημα 2ον

Τὸ 1 μ. ἐνὸς ὑφάσματος τιμᾶται 60 δρχ. Πόσον τιμῶνται τὰ $\frac{7}{10}$ μ. τοῦ ιδίου ὑφάσματος;

Ἐπίλυσις

'Εάν φαντασθῶμεν ὅτι τὸ ἐν μέτρον, ὅπως καὶ ἡ ἀξία αὐτοῦ, χωρίζεται εἰς 10 ίσα μέρη, τότε τὸ $1/10$ τοῦ μέτρου θὰ ἔχῃ ἀξίαν τὸ $1/10$ τῶν 60 δρχ. 'Επομένως τὰ $7/10$ τοῦ μέτρου θὰ ἀξίζουν τὰ $7/10$ τῶν 60 δρχ. Γνωρίζομεν δημοσίᾳ διά τοι διὰ νὰ εὕρωμεν τὰ $7/10$ τοῦ 60 πολλαπλασιάζομεν τὸ $7/10$ ἐπὶ 60.

$$\frac{7}{10} \cdot 60 = 42.$$

"Ητοι τὰ $7/10$ μ. ὑφάσματος ἀξίζουν 42 δρχ.

Πρόβλημα 3ον

Τὸ 1 μ. ἐνὸς ὑφάσματος τιμᾶται $60 \frac{1}{4}$ δρχ. Πόσον τιμῶνται τὰ $5 \frac{1}{4}$ μ. τοῦ αὐτοῦ ὑφάσματος;

Ἐπίλυσις

Σκεπτόμενοι ὅπως καὶ προηγουμένως εύρισκομεν ὅτι τὰ $5 \frac{1}{4}$ μ. $= \frac{21}{4}$ μ. ὑφάσματος ἀξίζουν τὰ $\frac{21}{4}$ τῶν $60 \frac{1}{2}$ δρχ.

$$5 \frac{1}{4} \cdot 60 \frac{1}{2} = 317 \frac{5}{8}.$$

"Ωστε, τὰ $5 \frac{1}{4}$ μ. ὑφάσματος ἀξίζουν $317 \frac{5}{8}$ δρχ.

'Απὸ τὴν ἐπίλυσιν τῶν ἀνωτέρω προβλημάτων συνάγομεν ὅτι:

"Οταν γνωρίζωμεν τὴν τιμὴν τῆς μιᾶς ἀκεραίας μονάδος καὶ θέλωμεν τὴν τιμὴν τῶν πολλῶν διμοειδῶν πρὸς αὐτὴν μονάδων ἡ μέρους αὐτῆς, ἐκτελοῦμεν πολλαπλασιασμόν.

Πολλαπλασιαστέος εἶναι, πάντοτε, ἡ τιμὴ τῆς μιᾶς ἀκεραίας μονάδος καὶ πολλαπλασιαστής ὁ ἀριθμὸς τῶν πολλῶν μονάδων ἡ τῶν μερῶν τῆς μονάδος.

Σημείωσις

ὅτι η Είναι γνωστὸν ὅτι καὶ διὰ τὴν εὔρεσιν μέρους ἐνὸς ἀριθμοῦ πολλαπλασιάζομεν τὸν ἀριθμὸν ἐπὶ τὸ ζητούμενον μέρος αὐτοῦ. Π.χ. τὰ $\frac{3}{5}$ τοῦ ἀριθμοῦ 30 εἰναι

$$\frac{3}{5} \cdot 30 = 18.$$

76. 4. Διαίρεσις

Πρόβλημα 1ον

Τὰ 4 kg ἐνὸς ἐμπορεύματος τιμῶνται $20 \frac{2}{5}$ δρχ. Πόσον τιμᾶται τὸ 1 kg αὐτοῦ;

Ἐπίλυσις

Ἐπειδὴ γνωρίζομεν τὴν τιμὴν τῶν πολλῶν μονάδων καὶ ζητοῦμεν τὴν τιμὴν τῆς μιᾶς, δύοειδοῦς πρὸς αὐτάς, μονάδος, θὰ ἔκτελέσωμεν, κατὰ τὰ γνωστά, διαιρέσιν.

$$20 \frac{2}{5} : 4 = 5 \frac{1}{10}$$

"Ητοι τὸ 1 kg τοῦ ἐμπορεύματος ἀξίζει $5 \frac{1}{10}$ δρχ.

Πρόβλημα 2ον

Τὰ $\frac{5}{7}$ kg ἐνὸς ἐμπορεύματος τιμῶνται 20 δρχ. Πόσον τιμᾶται τὸ 1 kg αὐτοῦ;

"Οτε τὸ 1 kg τοῦ ἐμπορεύματος τιμᾶται $20 \frac{2}{5}$ δρχ.

Σκεπτόμεθα ὅτι, ἐὰν πολλαπλασιάσωμεν τὴν τιμὴν τοῦ 1 kg ἐπὶ $5/7$, θὰ πρέπει νὰ εὑρωμεν 20 δρχ. Συνεπῶς, κατὰ τὸν ὄρισμὸν τῆς τελείας διαιρέσεως, ἡ τιμὴ τοῦ 1 kg, θὰ εἰναι τὸ ἀκριβὲς πηλίκον τῆς διαιρέσεως 20 διὰ $5/7$.

$$20 : \frac{5}{7} = 20 \cdot \frac{7}{5} = 28$$

"Οτε τὸ 1 kg τοῦ ἐμπορεύματος τιμᾶται 28 δρχ.

"Εκ τῆς ἐπιλύσεως τῶν ἀνωτέρω προβλημάτων συνάγομεν ὅτι :

"Οταν γνωρίζωμεν τὴν τιμὴν τῶν πολλῶν μονάδων ἀκεραίων ἢ κλασματικῶν ἢ μέρους καὶ ζητοῦμεν νὰ εὑρωμεν τὴν τιμὴν τῆς μιᾶς (ἀκεραίας μονάδος), δύοειδοῦς πρὸς τὰς πολλάς, ἔκτελοῦμεν διαιρέσιν.

Διαιρετέος εἶναι πάντοτε ἡ τιμὴ τῶν πολλῶν μονάδων ἢ τοῦ μέρους. Τὴν διαιρέσιν αὐτὴν ἔχομεν ὄνομάσει μερισμόν.

Πρόβλημα 3ον

Τὸ 1 kg ἐνὸς ἐμπορεύματος τιμᾶται $10 \frac{2}{5}$ δρχ. Πόσα kg ἐμπορεύματος

ἀγοράζομεν μὲ $33 \frac{4}{5}$ δρχ;

Έπιλυσις

Είναι φανερόν ότι, έαν πολλαπλασιάσωμεν τὸν ἀριθμὸν τῶν kg τὰ δροῖα θέλομεν νὰ ἀγοράσωμεν, ἐπὶ τὴν τιμὴν τοῦ 1 kg, θὰ πρέπει νὰ εὑρώμεν 33 $\frac{4}{5}$ δρχ. Συνεπῶς ὁ ἀριθμὸς τῶν ζητουμένων kg θὰ εἶναι τὸ ἀκριβὲς

πηλίκον τῆς διαιρέσεως $33 \frac{4}{5}$ διὰ $10 \frac{2}{5}$

$$33 \frac{4}{5} : 10 \frac{2}{5} = 3 \frac{1}{4}$$

"Ητοι, θὰ ἀγοράσωμεν $3 \frac{1}{4}$ kg ἐμπορεύματος.

'Εκ τῆς ἐπιλύσεως τοῦ ἀνωτέρω προβλήματος συνάγομεν ὅτι :

"Οταν γνωρίζωμεν τὴν τιμὴν τῆς μιᾶς μονάδος καὶ τὴν τιμὴν τῶν πολλῶν ὁμοιδῶν ἀκεραίων ἡ κλασματικῶν μονάδων καὶ ζητοῦμεν πόσαι εἶναι αὗται, ἔκτελοῦμεν διαιρεσιν.

Διαιρετέος εἶναι πάντοτε ἡ τιμὴ τῶν πολλῶν μονάδων. Τὴν διαιρεσιν αὐτὴν ἔχομεν ὀνομάσει μέτρησιν.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

222. Τρία πρόσωπα ἐμοιράσθησαν ἐν τεμάχιον ὑφάσματος. Τὸ α' ἐλαβεν $12 \frac{3}{5}$ m, τὸ β' ἐλαβε $2 \frac{2}{3}$ m ὀλιγώτερα τοῦ α' καὶ $2 \frac{5}{8}$ m περισσότερα τοῦ γ'. Πόσον ἦτο τὸ μῆκος τοῦ ὑφάσματος;

223. Εἰς ἐμπορος ἡγόρασε ἐμπορεύματα ἀξίας 72000 δρχ. καὶ κατέβαλε ἀμέσως τὰ $3/4$ τῆς ἀξίας τῶν. Πόσα δοφείλει ἀκόμη;

224. 'Ο στὸς δίδει τὸ $11/12$ τοῦ βάρους του εἰς ἀλευρὸν καὶ τὸ ἀλευρὸν δίδει τὰ $13/10$ τοῦ βάρουστου εἰς ἄρτον. Πόσον ἄρτον θὰ λάβωμεν ἀπὸ 150 kg σίτου;

225. "Ἐν ὀρολόγιον εἰς $15 \frac{1}{2}$ h μένει ὀπίσω $\frac{6}{60}$ h. Πόσον μένει ὀπίσω εἰς μίαν ὥραν;

226. Μία ἐλαστικὴ σφαῖρα ἀφέθη νὰ πέσῃ ἐλευθέρως εἰς τὸ πάτωμα καὶ ἀναπτηδᾶ ἐκάστην φοράν εἰς τὰ $2/3$ τοῦ προηγουμένου ὑψους. 'Αφοῦ προσέκρουσεν 3 φοράς εἰς τὸ πάτωμα ἀνηλθεν εἰς ὕψος 48 cm. 'Απὸ ποιὸν ὕψος ἀφέθη νὰ πέσῃ;

77. ΕΠΙΛΥΣΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ

Πρόβλημα 1ον

Τὰ 5 kg ἀλεύρου τιμῶνται 30 δρχ. Πόσον τιμῶνται τὰ 8 kg ἀλεύρου;

Έπιλυσις

Δυνάμεθα νὰ ἀναλύσωμεν τὸ πρόβλημα εἰς τὰ ἑξῆς δύο ἀπλὰ προβλήματα:

α) Τὰ 5 kg ἀλεύρου ἀξίζουν 30 δρχ.

Τὸ 1 kg ἀλεύρου πόσον ἀξίζει;

$$\text{Εἶναι } \frac{30}{5} = 6. \text{ Συνεπῶς τὸ 1 kg ἀλεύρου ἀξίζει 6 δρχ.}$$

β) Τὸ 1 kg ἀλεύρου ἀξίζει 6 δρχ. Τὰ 8 kg πόσον ἀξίζουν,
Εἶναι $8 \cdot 6 = 48$. Συνεπῶς τὰ 8 kg ἀλεύρου ἀξίζουν 48 δρχ.

Κατὰ τὴν ἀνωτέρω ἀνάλυσιν διὰ νὰ εὔρωμεν ἐκ τῆς τιμῆς τῶν 5 kg
τὴν τιμὴν τῶν 8 kg εὐρήκαμεν πρῶτον τὴν τιμὴν τοῦ 1 kg καὶ ἔπειτα τὴν τι-
μὴν τῶν 8 kg ἀλεύρου.

Διὰ τοῦτο δὲ τρόπος αὐτὸς $\frac{\text{Τιμὴ } 5\text{kg}}{\text{Τιμὴ } 1\text{kg}}$ $\frac{\text{Τιμὴ } 8\text{kg}}{\text{Τιμὴ } 1\text{kg}}$
ἔργασίας λέγεται μέθοδος ἀ-
ναγωγῆς εἰς τὴν μονάδα.

Αἱ ἐπιλύσεις τῶν δύο ἀπλῶν προβλημάτων γράφονται συντόμως ὡς ἔξις.

Τὰ 5 kg ἀλεύρου ἀξίζουν 30 δρχ.

Τὸ 1 kg » ἀξίζει $\frac{30}{5}$ δρχ.

Τὰ 8 kg » ἀξίζουν $8 \cdot \frac{30}{5}$ δρχ. = 48 δρχ.

Πρόβλημα 2ον

Τὰ $2/3$ μιᾶς ἀποστάσεως εἶναι 24 km. Πόσα km εἶναι τὰ $3/5$ τῆς ἀπο-
στάσεως ταύτης;

Ἐπίλυσις

Χάριν συντομίας τρέπομεν εἰς δημώνυμα τὰ κλάσματα $2/3$ καὶ $3/5$. Λαμ-
βάνομεν $10/15$ καὶ $9/15$.

Σκεπτόμεθα δὲ

τὰ $\frac{10}{15}$ τῆς ἀποστάσεως εἶναι 24 km

τὸ $\frac{1}{15}$ » » » $\times \frac{24}{10}$ km

τὰ $\frac{9}{15}$ » » » $9 \cdot \frac{24}{10}$ km = $21 \frac{3}{5}$ km

Παρατηροῦμεν δὲ καὶ εἰς τὸ πρόβλημα αὐτὸς εὐρήκαμεν πρῶτον τὴν τιμὴν
τῆς μιᾶς κλασματικῆς μονάδος ($1/15$) καὶ ἐν συνεχείᾳ τῶν πολλῶν κλασματικῶν
μονάδων ($9/15$).

Πρόβλημα 3ον

Τὰ $2/3$ καὶ τὰ $3/4$ ἑνὸς ἀριθμοῦ εἶναι 51. Ποῖος εἶναι δὲ ὁ ἀριθμός;

Ἐπίλυσις

$$\text{Εἶναι } \frac{2}{3} + \frac{3}{4} = \frac{8}{12} + \frac{9}{12} = \frac{17}{12}$$

$$\text{Τά } \frac{17}{12} \text{ τοῦ ἀριθμοῦ εἶναι } 51 \text{ καὶ νοεῖται } 1 \frac{5}{12}$$

$$\text{Τὸ } \frac{1}{12} \quad » \quad » \quad » \quad \frac{51}{17} = 3$$

$$\text{Τά } \frac{12}{12} \quad » \quad » \quad » \quad 3 \cdot 12 = 36$$

"Ωστε ὁ ζητούμενος ἀριθμός εἶναι ὁ 36.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

227. Ποιος εἶναι ὁ ἀριθμὸς τοῦ ὅποιον τὰ $7/12$ εἶναι 21 ;

228. Ἐὰν τὸ $1/5$ ἑνὸς ἀριθμοῦ τὸ ἀφαιρέσωμεν ἀπὸ τὸ $1/2$ αὐτοῦ εὑρίσκομεν τὸν ἀριθμὸν 7 . Ποιος εἶναι ὁ ἀριθμός;

229. Τὰ $3/4$ kg ἔλαιου ἔχουν 18 δρχ. Πόσον ἔχουν τὰ $2 \frac{4}{5}$ kg αὐτοῦ;

230. Μία δεξαμενὴ περιέχει 216 kg. ὕδατος καὶ εἶναι γεμάτη κατὰ τὰ $3/7$ αὐτῆς. Πόσα kg ὕδατος ἀπαιτοῦνται ἀκόμη διὰ νὰ γεμίσῃ;

231. Τὸ τριπλάσιον καὶ τὰ $2/3$ ἑνὸς ἀριθμοῦ ἀποτελοῦν τὸν ἀριθμὸν 11 . Ποιος εἶναι ὁ ἀριθμὸς αὐτός;

νος αγράθηση

78. ΕΠΙΛΥΣΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΔΙΓ' ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ

Πρόβλημα 1ον

Ποιὸν ἀριθμὸν πρέπει νὰ προσθέσωμεν εἰς τὸ κλάσμα $\frac{4}{7}$ διὰ νὰ λάβωμεν ἀθροισμα $1 \frac{6}{11}$;

Σχηματισμὸς τῆς ἔξισώσεως.

Ἐὰν παραστήσωμεν μὲν x τὸν ζητούμενον ἀριθμόν, κατὰ τὸ πρόβλημα θὰ ἔχωμεν

$$\frac{4}{7} + x = 1 \frac{6}{11}$$

Ἐπίλυσις τῆς ἔξισώσεως.

$$\frac{4}{7} + x = 1 \frac{6}{11} \iff x = 1 \frac{6}{11} - \frac{4}{7} \quad \text{ἢ } x = \frac{75}{77}$$

Ἐπαλήθευσις.

$$\frac{4}{7} + \frac{75}{77} = \frac{119}{77} = 1 \frac{42}{77} = 1 \frac{6}{11}$$

"Ωστε ὁ ζητούμενος ἀριθμός εἶναι $\frac{75}{77}$

Πρόβλημα 2ον

"Εν δοχείον ἔχει $18\frac{3}{4}$ kg έλασίου. Πόσα kg αύτοῦ πρέπει νὰ ἀφαιρέσωμεν

διὰ νὰ μείνουν $6\frac{4}{5}$ kg ἑλαίου εἰς τὸ δοχεῖον; οὐσῶνται αὗται ταῦτα γάλη

Σχηματισμός της έξισωσεως. Ήστιν κοίνωνο τον πρώτον γεννητόν της στην αρχή της ζωής της.

Ἐάν παραστήσωμεν μὲν Χ τὸ ἀριθμὸν kg. ἐλαίου τὰ δύοτα πρέπει νὰ ἀφαιρέσωμεν, θὰ ἔχωμεν

$$18 \frac{3}{4} - x = 6 \frac{4}{5}$$

Ἐπίλυσις τῆς ἔξισώσεως.

$$18\frac{3}{4} - x = 6\frac{4}{5} \Leftrightarrow 18\frac{3}{4} - 6\frac{4}{5} = x \quad \text{et} \quad x = 11\frac{19}{20}$$

$$\text{Έπαλθευσις} \quad 18\frac{3}{4} - 11\frac{19}{20} = 17\frac{35}{20} - 11\frac{19}{20} = 6\frac{4}{5}.$$

"Ωστε πρέπει να σφαιρέσωμεν $11\frac{19}{20}$ kg

Почтамтъ

Τά $\frac{2}{5}$ τοῦ βάρους ἐνὸς κιβωτίου εἶναι $30 \frac{1}{2}$ kg. Ποιὸν εἴναι τὸ βάρος

5
12 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013

REFERENCES

Σχηματισμός της εξισωσεως.
Έαν παραστήσωμεν μὲ χ τὴν ἀριθ. τιμὴν τοῦ βάρους τοῦ κιβωτίου θὰ
έγγωμεν

$$\frac{2}{5} \cdot x = 30 \cdot \frac{1}{2}$$

Ἐπίλυμα τῆς ἐξισώσεως.

$$\frac{2}{5} \cdot x = 30 \frac{1}{2} \Leftrightarrow x = 30 \frac{1}{2} : \frac{2}{5} \quad \text{et} \quad x = 76 \frac{1}{4}$$

$$\text{Έπαλθευστικός: } \frac{2}{7} \cdot 76\frac{1}{3} = \frac{2}{7} \cdot \frac{305}{3} = \frac{305}{16} = 30\frac{1}{16}$$

"Οπός τὰ Βάσεις ἀλεκτήσους τοῦ κυβωτίου εἴναι 76 $\frac{1}{4}$ kg.

Παρατηρήσεις Το παρόν έγγραφο αποτελεί μέρος της συνθήκης για την επίτευξη της συμφωνίας για την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

α) Ἀπό τὰ ἀνωτέρω παραδείγματα γίνεται φανερὸν ὅτι διὰ γὰρ ἐπιλύσωμεν ἐν πρόβλημα μὲ τὴν βοήθειαν ἔξισώσεων, ἀκολουθοῦμεν γενικῶς τὰ ἔξη:

- 1) Παριστάνομεν μὲ χ τὸν ζῆτούμενον ἀριθμὸν τοῦ προβλήματος.
- 2) Σχηματίζομεν μίαν ἔξισωσιν διὰ τῆς δόποίας ἐκφράζομεν μὲ μαθηματικά σχέσεις τὴν λεκτικήν διατύπωσιν τοῦ προβλήματος.
- 3) Ἐπιλύομεν τὴν ἔξισωσιν.
- 4) Ἐπανερχόμεθα εἰς τὸ πρόβλημα καὶ δίδομεν τὴν ἀπάντησιν εἰς αὐτὸ προσέχοντες πάντοτε ποῖον στοιχεῖον τοῦ προβλήματος ὡνομάσαμεν εἰς τὴν ἀρχὴν μὲ χ.
- 5) Εἶναι δυνατὸν ὀρισμένας φοράς ἢ ἔξισωσις τοῦ προβλήματος νὰ μὴ εἶναι ἐπιλύσιμος εἰς τὸ σύνολον τῶν ἀριθμῶν τοὺς δόποίους χρησιμοποιοῦμεν. Εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν λέγομεν διὰ τὸ πρόβλημά μας δὲν ἔχει λύσιν εἰς τὸ θεωρούμενον σύνολον ἀριθμῶν.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

232. Ποιον ἀριθμὸν πρέπει νὰ προσθίσωμεν εἰς τὸ $\frac{3}{5}$ διὰ νὰ λάβωμεν διθροισμα $7\frac{2}{3}$;
233. Ἐάν ἀφαιρέσωμεν $2\frac{3}{4}$ kg ἀπὸ ἐν δοχείον βενζίνης, θὰ μείνουν εἰς αὐτὸ $8\frac{1}{5}$ kg. Πόσα kg βενζίνης περιέχει τὸ δοχεῖον;
234. Δύο ἀριθμοὶ ἔχουν γινόμενον 32. Ο εἰς ἑξ αὐτῶν εἶναι $18\frac{2}{5}$. Ποῖος εἶναι ὁ ἄλλος;
235. Ἐάν ἀπὸ τὸ διπλάσιον ἐνὸς ἀριθμοῦ ἀφαιρέσετε τὸ κλάσμα $\frac{2}{5}$, θὰ εὑρετε $7\frac{3}{5}$. Ποῖος εἶναι ὁ ἀριθμὸς αὐτός;

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΣ

236. Κρουνὸς γεμίζει μίαν δεξαμενὴν εἰς 8 h, δεύτερος εἰς 12 h καὶ τρίτος εἰς 15 h. Εάν ἀνοίξωμεν ταύτοχρόνως τοὺς τρεῖς κρουνούς εἰς πόσον χρόνον θὰ γεμίσῃ ἡ δεξαμενὴ; Ποιον μέρος αὐτῆς θὰ ἔχῃ γεμίση ἔκαστος κρουνός;
237. Τρεῖς ἀδελφοὶ ἐκληρονόμησαν τὰ 8/9 μιᾶς περιουσίας. Ἐκαστος τούτων ἔλαβεν 2400 δρχ. Πόση ἦτο ὀλόκληρος ἢ περιουσία;
238. Ἡ ἀξία ἐνὸς οικοπέδου τηύχηθη κατὰ τὰ 3/20 τῆς ἀξίας τοῦ προτιγουμένου ἔτους καὶ ἀνήλθεν εἰς 325.000 δρχ. Πόση ἦτο ἡ ἀξία τοῦ οικοπέδου πρὸ τῆς αὔξησεως;
239. Ἐν ἐμπόρευμα κατὰ τὴν μεταφοράν του εἶχεν φθοράν ἵσην πρὸς τὰ 3/4 τῆς ἀξίας του. Νὰ εὗρετε τὴν ἀξίαν τοῦ ἐμπόρευματος αὐτοῦ πρὸ τῆς φθορᾶς, ἐάν γνωρίζετε διὰ μετὰ τὴν φθοράν ἡ ἀξία ἦτο 60.000 δρχ.

240. Τὰ 2/5 τῶν 3/4 τῆς ἡλικίας ἐνὸς ἀτόμου εἶναι 18 ἔτη. Πόση εἶναι ἡ ἡλικία του;
241. Τὰ 3/4 ἐνὸς ἀριθμοῦ ἐάν αὐξήθοιν κατὰ τὰ 2/5 αὐτοῦ δίδουν ἀποτέλεσμα 21. Ποῖος εἶναι ὁ ἀριθμὸς οὗτος;
242. Τὸ 1/3 καὶ τὰ 3/8 ἐνὸς ποσοῦ εἶναι 3400 δρχ. Νὰ εὔρεθη τὸ ποσὸν τοῦτο.
243. Ἐάν ἀπὸ ἐν ποσὸν ἀφαιρέσωμεν τὰ 3/4 αὐτοῦ καὶ τὸ 1/3 τοῦ ὑπολοίπου, θὰ απομείνουν 1440 δρχ. Νὰ εὔρεθη τὸ ἀρχικὸν ποσόν.
244. Ἐξ ἀτομα διένειμον μεταξύ των τὰ 5/8 ἐνὸς ποσοῦ καὶ ἀπέμειναν 57.600 δρχ. Ποιον ἦτο τὸ ἀρχικὸν ποσόν;
245. Νὰ μοιρασθοῦν 20.230 δρχ. εἰς τρία ἀτομα α', β', γ' εἰς τρόπον διστεῖ: τὸ μερίδιον τοῦ β' νὰ εἴναι τὰ 7/22 τοῦ μερίδιον τοῦ α' καὶ τὸ μερίδιον τοῦ γ' νὰ εἴναι τὰ 16/33 τοῦ μερίδιον τοῦ α'.

— είδης ήδησαν μεταπολεμικό δικαστήριο (Ι) που αφέλει όχι τις τοινής από την ίδια την ίδια (θεωρείται στην έρευνα) αρχαία πολιτική της Ελλάς και της Κύπρου διότι γνωστούς γενικούς νόμους δεν έχουν διατηρηθεί στην Κύπρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'.

79. ΔΕΚΑΔΙΚΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

Το (Ζ) της (I) γνωστήσιμη μονάδα είναι η δεκαδική μονάδα. Η πιο γνωστή κατωτέρω θά χρησιμοποιήσωμεν το δεκαδικόν σύστημα αριθμήσεως καὶ εἰς τήν περίπτωσιν τῶν ἀριθμῶν οἱ ὅποιοι εἶναι μικρότεροι τῆς ἀκρεβίας μονάδος.

79. 1. Δεκαδικαὶ κλασματικαὶ μονάδες. Δεκαδικὴ κλίμαξ.

Από τὰς κλασματικὰς μονάδας

$$\frac{1}{2}, \quad \frac{1}{3}, \quad \frac{1}{10}, \quad \frac{1}{20}, \quad \frac{1}{100}, \quad \frac{1}{500}, \quad \frac{1}{1000}, \quad \frac{1}{10000}$$

αἱ κλασματικαὶ μονάδες $\frac{1}{10}, \frac{1}{100}, \frac{1}{1000}, \frac{1}{10000}$ είναι μονάδες δεκαδικές, οι οποίες έχουν έναν ιδιαίτερον γνώρισμα. Ξέχουν ως παρονομαστὰς δυνάμεις τοῦ 10. $10 = 10^1, \quad 100 = 10^2, \quad 1000 = 10^3, \quad 10.000 = 10^4$.

Διὰ τοῦτο δινομάζονται δεκαδικαὶ κλασματικαὶ μονάδες. Ιδιαίτερως :

Τὸ $\frac{1}{10}$ λέγεται δεκαδικὴ κλασμ. μονάς 1ης τάξεως

Τὸ $\frac{1}{100}$ » » » » 2ας »

Τὸ $\frac{1}{1000}$ » » » » 3ης » κ.ο.κ.

Τὰς ἀνωτέρω δεκαδικὰς κλασματικὰς μονάδας, δυνάμεθα νὰ τὰς γράψωμεν κατὰ τάξιν φθίνοντος μεγέθους ἐξ ἀριστερῶν πρὸς τὰ δεξιά :

$$\frac{1}{10}, \quad \frac{1}{100}, \quad \frac{1}{1000}, \quad \frac{1}{10.000} \quad (1)$$

Παραστηροῦμεν δὲ ὅτι

$$10 \cdot \frac{1}{10.000} = \frac{1}{1000}, \quad 10 \cdot \frac{1}{1000} = \frac{1}{100}, \quad 10 \cdot \frac{1}{100} = \frac{1}{10}$$

"Ήτοι είς τὴν κλίμακα (1) ἑκάστη δεκαδική κλασματική μονάς εἶναι δεκαπλάσια ασθενέστερη τῆς (πρὸς τὰ δεξιά) καὶ ύποδεκαπλάσια ασθενέστερη τῆς (πρὸς τὰ ἀριστερά).

*Ως ἐνθυμούμεθα δὲ καὶ ἡ δεκαδική κλίμαξ

$$\dots 10000, \quad 1000, \quad 100, \quad 10, \quad 1 \quad (2)$$

ἔχει τὴν αὐτὴν ιδιότητα,

$$1 \cdot 10 = 10, \quad 10 \cdot 10 = 100, \quad 10 \cdot 100 = 1000, \quad 10 \cdot 1000 = 10000$$

*Άρα δυνάμεθα νὰ συνδυάσωμεν τὰς δύο αὐτὰς κλίμακας (1) καὶ (2), διὰ νὰ σχηματίσωμεν τὴν ἀκόλουθον πλάτην κλίμακα τῶν ἀκεραίων καὶ τῶν δεκαδικῶν κλασματικῶν μονάδων κατὰ φθίνουσαν τάξιν μεγέθους ἐξ ἀριστερῶν πρὸς τὰ δεξιά.

$$\dots 10.000, \quad 1000, \quad 100, \quad 10, \quad 1, \quad 1/10, \quad 1/100, \quad 1/1000, \quad 1/10000, \dots$$

$$\dots 10^4, \quad 10^3, \quad 10^2, \quad 10^1, \quad 10^0, \quad 1/10^1, \quad 1/10^2, \quad 1/10^3, \quad 1/10^4, \dots (3)$$

Καθώς παρατηροῦμεν ἡ τελευταία αὕτη κλίμαξ εἶναι ἡ περιόριστος πρὸς τὰ ἀριστερά καὶ πρὸς τὰ δεξιά.

79. 2. Δεκαδικὰ κλάσματα. Δεκαδικοὶ ἀριθμοί.

*Έκαστον κλάσμα τοῦ ὅποιου ὁ πάρο νομαστής εἶναι δύναμις τοῦ δέκα λέγεται δεκαδικὸν κλάσμα. Π.χ. τὰ κλάσματα

$$\frac{3}{10}, \quad \frac{7}{100}, \quad \frac{254}{1000}, \quad \text{εἶναι δεκαδικὰ κλάσματα.}$$

Μὲ τὴν βοήθειαν τῆς δεκαδικῆς κλίμακος (3) δυνάμεθα νὰ θέτωμεν τὰ δεκαδικὰ κλάσματα ὑπὸ δεκαδικὴν μορφὴν. Π.χ. ὅπως ὁ ἀκέραιος 547 γράφεται

$$547 = 5 \cdot 100 + 4 \cdot 10 + 7$$

$$= 5 \cdot 10^2 + 4 \cdot 10^1 + 7 \cdot 10^0$$

*Όμοίως καὶ τὸ δεκαδικὸν κλάσμα $547/1000$ γράφεται

$$\frac{547}{1000} = \frac{500+40+7}{1000} = \frac{500}{1000} + \frac{40}{1000} + \frac{7}{1000}$$

$$= \frac{5}{10} + \frac{4}{100} + \frac{7}{1000} = 5 \cdot \frac{1}{10^1} + 4 \cdot \frac{1}{10^2} + 7 \cdot \frac{1}{10^3}$$

Κατὰ τὸν ἴδιον τρόπον ἔχομεν :

$$135 \frac{24}{100} = \frac{13524}{100} = \frac{1 \cdot 10000 + 3 \cdot 1000 + 5 \cdot 100 + 2 \cdot 10 + 4}{100}$$

$$= \frac{1 \cdot 10000}{100} + \frac{3 \cdot 1000}{100} + \frac{5 \cdot 100}{100} + \frac{2 \cdot 10}{100} + \frac{4 \cdot 1}{100}$$

$$= 1 \cdot 10^4 + 3 \cdot 10^3 + 5 \cdot 10^2 + 2 \cdot \frac{1}{10^1} + 4 \cdot \frac{1}{10^2} \quad (4)$$

Έπειδή δὲ εἰς δλόκληρον τὴν κλίμακα μονάδων 10 μονάδες μιᾶς τάξεως ισοδυναμοῦν μὲν μίαν μονάδα τῆς ἀμέσως ἀνωτέρας τάξεως, γράφομεν τὸ 2ον μέλος τῆς (4) ὡς ἔξης

135,24

(5)

ὅπου ἡ ὑποδιαστολὴ χρησιμοποιεῖται διὰ νὰ χωρίσῃ τὰς ἀκεραίας μονάδας ἀπὸ τὰς δεκαδικάς. Συγκεκριμένως: ἀριστερὰ τῆς ὑποδιαστολῆς εύρισκονται κατὰ σειρὰν τὰ ψηφία τῶν ἀκεραίων μονάδων, τῶν δεκάδων, τῶν ἑκατοντάδων . . . δεξιὰ δὲ καὶ κατὰ σειρὰν τὰ ψηφία τῶν δεκάτων, τῶν ἑκατοστῶν . . .

"Οταν εἰς ρητὸς γράφεται ὑπὸ τὴν μορφὴν (5), λέγεται δεκαδικὸς ἀριθμός*. Τὰ ψηφία τοῦ δεκαδικοῦ μέρους ἐνὸς δεκαδικοῦ ἀριθμοῦ λέγονται δεκαδικὰ ψηφία αὐτοῦ.

79. 3. Παραδείγματα

$$\alpha) \frac{3756}{10000} = \frac{3000}{10000} + \frac{700}{10000} + \frac{50}{10000} + \frac{6}{10000}$$

$$= \frac{3}{10} + \frac{7}{100} + \frac{5}{1000} + \frac{6}{10000}$$

$$= 3 \cdot \frac{1}{10^1} + 7 \cdot \frac{1}{10^2} + 5 \cdot \frac{1}{10^3} + 6 \cdot \frac{1}{10^4}$$

Μονιδικεῖν νήστην να πορθῇ τοῦ καταστατικοῦ εἴτε να ποιείται τοῦ δημιουργοῦ "Ητοι": $\frac{3756}{10000} = 0,3756$ (6)

$$\beta) \frac{30402}{1000} = \frac{3 \cdot 10000}{1000} + \frac{0 \cdot 1000}{1000} + \frac{4 \cdot 100}{1000} + \frac{0 \cdot 10}{1000} + \frac{2 \cdot 1}{1000}$$

$$= 3 \cdot 10^1 + 0 \cdot 10^0 + 4 \cdot \frac{1}{10^1} + 0 \cdot \frac{1}{10^2} + 2 \cdot \frac{1}{10^3}$$

(Έπειδὴ δὲν ὑπάρχουν ἑκατοστὰ ἔθεσαμεν εἰς τὴν θέσιν τῶν 0.)

"Ητοι $\frac{30402}{1000} = 30,402$ (7)

$$\gamma) \frac{342}{10000} = \frac{300+40+2}{10000} = \frac{300}{10000} + \frac{40}{10000} + \frac{2}{10000}$$

$$= 3 \cdot \frac{1}{10^2} + 4 \cdot \frac{1}{10^3} + 2 \cdot \frac{1}{10^4}$$

* Πρόκειται περὶ μιᾶς ἄλλης, ἀπλουστέρας γραφῆς ἐνὸς ρητοῦ ἀριθμοῦ.

$$\text{Ητοι} \quad \frac{342}{10000} = 0,0342 \quad (8)$$

Άντιστρόφως: είς δεκαδικός ἀριθμός π.χ. ο δεκαδικός 3,02, γράφεται ύπο μορφήν κλάσματος ως ἑξῆς:

$$3,02 = 3 + 0,02 = 3 + 0 \cdot \frac{1}{10^1} + 2 \cdot \frac{1}{10^2}$$

$$= \frac{3 \cdot 10^2}{10^2} + \frac{0 \cdot 10^1}{10^2} + \frac{2 \cdot 1}{10^2}$$

$$= \frac{3 \cdot 10^2 + 0 \cdot 10^1 + 2}{10^2} = \frac{302}{100}$$

$$3,02 = \frac{302}{100} \quad (9)$$

¹ Από τάς Ισότητας (6), (7), (8) καὶ (9) ἐννοοῦμεν τοὺς ἔξῆς κανόνας.

1. Διὰ νὰ γράψωμεν ἐν δεκαδικὸν κλάσμα ὑπὸ μορφὴν δεκαδικοῦ ἀριθμοῦ ,γράφομεν τὸν ἀριθμητὴν τοῦ κλάσματος καὶ χωρίζομεν ἐκ δε-
ξιῶν τόσα δεκαδικὰ ψηφία , δσα μηδενικὰ ἔχει ὁ παρονομαστής.

$$\text{П.х.} \quad \frac{349}{100} = 3,49 \quad \frac{28}{1000} = 0,028$$

2. Διὰ νὰ γράψωμεν ἔνα δεκαδικὸν ἀριθμὸν ὑπὸ μορφὴν δεκαδικοῦ κλάσματος παραλείπομεν τὴν ὑποδιαστολὴν καὶ γράφομεν αὐτὸν ὡς ἀριθμητὴν κλάσματος μὲ παρονομαστὴν τὴν μονάδα ἀκολουθουμένην ἀπὸ τόσα μηδενικά, δσα δεκαδικὰ Ψηφία ἔχει οὗτος.

$$\text{П.Х. } \frac{1,8}{1000} + 0,005 = \frac{5}{1000}, \quad 32,04 = \frac{3204}{100} = \frac{3204}{1000} \quad (4)$$

79. 4. Ἀπαγγελία δεκαδικοῦ ἀριθμοῦ.

Διὰ νὰ ἀπαγγεῖλωμεν τὸν δεκαδικὸν 4.125 λένομεν

τέσσαρα καὶ ἑκατὸν εἴκοσι πέντε χιλιοστά.

τέσσαρα ἀκέραιος, ἐν δέκατον, δύο ἑκατοστά καὶ πέντε χιλιοστά
τέσσαρες χιλιάδες, ἑκατὸν εἴκοσι πέντε χιλιοστά.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

246. Γράψατε ύπό δεκαδικήν μορφήν τὰ κάτωθι δεκαδικά κλάσματα :

$$\frac{1}{10^5}, \quad \frac{23}{10^4}, \quad \frac{201}{100000}, \quad \frac{234}{10^3}$$

247. Γράψατε ύπό μορφήν δεκαδικῶν κλασμάτων τούς κάτωθι δεκαδικούς ἀριθμούς:

4,002, 1,002, 0,005, 0,000104

80. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΕΚΑΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

80. 1. Έκ τῶν ἵσων κλασμάτων

$$\frac{24}{10} = \frac{240}{100} = \frac{2400}{1000} \dots$$

$$2,4 = 2,40 = 2,400 \dots$$

Παρατηροῦμεν δηλαδή ότι :

Έάν εἰς τὸ τέλος ἐνδέ δεκαδικοῦ ἀριθμοῦ γράψωμεν δύσαδήποτε μηδενικὰ ἢ ἔάν παραλείψωμεν ἀπὸ τὸ τέλος του δσα μηδενικὰ τυχόν ὑπάρχουν, ἢ τιμή του δὲν μεταβάλλεται.

80. 2. Παρατηροῦμεν ἐπίστης ότι

$$\frac{245}{1000} \cdot 10 = \frac{245}{100}$$

$$\frac{245}{1000} \cdot 100 = \frac{245}{10}$$

$$\frac{245}{1000} \cdot 1000 = 245$$

$$\text{ἢ } 0,245 \cdot 10 = 2,45$$

$$0,245 \cdot 100 = 24,5$$

$$0,245 \cdot 1000 = 245$$

Ήτοι : Διὰ νὰ πολλαπλασιάσωμεν ἔνα δεκαδικὸν ἀριθμὸν ἐπὶ 10, 100, 1000 ..., ἀρκεῖ νὰ μεταθέσωμεν τὴν ὑποδιαστολὴν αὐτοῦ μίαν, δύο, τρεῖς.... θέσεις πρὸς τὰ δεξιὰ ἀντιστοίχως.

Παρατηροῦμεν ἀκόμη ότι :

$$\frac{245}{1000} : 10 = \frac{245}{10000},$$

$$\frac{245}{1000} : 100 = \frac{245}{100000}$$

$$\text{Ή } 0,245 : 10 = 0,0245 \quad 0,245 : 100 = 0,00245$$

Ήτοι : Διὰ νὰ διαιρέσωμεν ἔνα δεκαδικὸν ἀριθμὸν διὰ 10, 100, 1000... ἀρκεῖ νὰ μεταθέσωμεν τὴν ὑποδιαστολὴν αὐτοῦ μίαν, δύο, τρεῖς... θέσεις πρὸς τὰ ἀριστερὰ ἀντιστοίχως.

Σημείωσις

Έάν τὰ ὑπάρχοντα δεκαδικὰ ψηφία δὲν ἀρκοῦν, τὰ συμπληρώνομεν μὲ μηδενικά. Π.χ. $0,24 \cdot 1000 = 240$, $0,24 : 1000 = 0,00024$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

248. Νὰ εύρεθοιν τὰ γινόμενα

$$4,002 \cdot 10, \quad 4,002 \cdot 100, \quad 4,002 \cdot 10^6$$

249. Νὰ εύρεθοιν τὰ πηλίκα

$$4,002 : 10, \quad 4,002 : 100, \quad 4,002 : 10^6$$

250. Συμπληρώσατε τὰς Ισότητας

$$7,05 \cdot 10 = \dots \quad 100 = \dots \quad 1000 \quad \text{ἐιδ. ἐκαδικός ἐιδ.}$$

81. ΠΡΟΣΘΕΣΙΣ ΔΕΚΑΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

81. 1. Νὰ εύρεθῇ τὸ ἀθροισμα : $x = 13,45 + 12,7 + 0,3$

$$x = 13,45 + 12,7 + 0,3$$

Γράφομεν τοὺς δεκαδικούς ἀριθμούς ὑπὸ μορφὴν δεκαδικῶν κλασμάτων καὶ προσθέτομεν αὐτά.

$$13,45 + 12,7 + 0,3 = \frac{1345}{100} + \frac{127}{10} + \frac{3}{10} = \frac{1345}{100} + \frac{1270}{100} + \frac{30}{100} = \frac{1345 + 1270 + 30}{100}$$

‘Η πρόσθεσις (I) δίδει τὸ ἀθροισμα

εἰς τὸν ἀριθμητὴν τοῦ τελευταίου (I) $\frac{1345}{1270}$ (II) $\frac{12,7}{0,3}$

$$\text{κλάσματος. } "Αρα \ x = \frac{2645}{100} = 26,45$$

Τὸ αὐτὸ ἀποτέλεσμα δίδει συντόμως καὶ ἡ πρόσθεσις (II).

Εἰς αὐτὴν αἱ ὑποδιαστολαὶ, ἅρα καὶ τὰ ψηφία τῆς αὐτῆς τάξεως, εύρισκονται εἰς τὴν ίδιαν στήλην. Ἐκ τούτου δόηγούμενοι συνάγομεν τὸν γνωστὸν κανόνα προσθέσεως δεκαδικῶν ἀριθμῶν.

82. ΑΦΑΙΡΕΣΙΣ ΔΕΚΑΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

Νὰ εύρεθῃ ἡ διαφορὰ $\delta = 31,4 - 8,32$

Ἐργαζόμενοι ὡς ἀνωτέρω, ἔχομεν

$$31,4 - 8,32 = \frac{314}{10} - \frac{832}{100} = \frac{3140}{100} - \frac{832}{100} = \frac{3140 - 832}{100}$$

‘Απὸ τὴν ἀφαίρεσιν (I) ἔχομεν τὸν αὐτὸν τοιούτον διαφοράν :

$$\text{τὴν διαφορὰν εἰς τὸν ἀριθμητὴν (I) } \frac{3140}{2308} \text{ (II) } \frac{31,40}{23,08}$$

“Αρα $\delta = \frac{2308}{100} = 23,08$

Εἰς τὸ ίδιον ἀποτέλεσμα φθάνομεν συντόμως καὶ μὲ τὴν ἀφαίρεσιν (II). Ἐξ αὐτῆς συνάγομεν τὸν γνωστὸν κανόνα ἀφαίρέσεως δεκαδικῶν ἀριθμῶν.

Σκόπιμον εἶναι νὰ συμπληρώνωμεν τὰ ἐλλείποντα δεκαδικὰ ψηφία τῶν ἀριθμῶν μὲ μηδενικὰ διὰ νὰ ἀποφεύγωνται λάθη.

83. ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΔΕΚΑΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

"Ας εύρωμεν τὸ γινόμενον $x = 15,32 \cdot 3,4$

Δυνάμεθα νὰ γράψωμεν

$$x = \frac{1532}{100} \cdot \frac{34}{10} = \frac{1532 \cdot 34}{100 \cdot 10} = \frac{52088}{1000} = 52,088$$

Παρατηροῦμεν ὅτι

α) 'Ο ἀριθμητής τοῦ κλάσματος $52088/1000$ προκύπτει ἐάν πολλαπλασιάσωμεν τοὺς διθέντας δεκαδικούς, ὡς ἐάν ήσαν ἀκέραιοι.

β) 'Ο παρανομαστής δρίζει ὅτι θὰ χωρίσωμεν τόσα δεκαδικὰ ψηφία, ὅσα ἔχουν ὁμοῦ καὶ οἱ δύο παράγοντες.

"Ωστε : Διὰ νὰ πολλαπλασιάσωμεν δεκαδικούς ἀριθμούς, πολλαπλασιάζομεν αὐτοὺς ὡς ἐάν ήσαν ἀκέραιοι καὶ εἰς τὸ γινόμενον χωρίζομεν ἀπὸ δεξιὰ τόσα δεκαδικὰ ψηφία, ὅσα ἔχουν καὶ οἱ δύο παράγοντες διοῦ.

'Η διάταξις τῆς πράξεως γίνεται ὡς κατωτέρω

$\begin{array}{r} 15,32 \\ \times 3,4 \\ \hline 6128 \\ 4596 \\ \hline 52,088 \end{array}$	$\begin{array}{r} 2,35 \\ \times 6 \\ \hline 14,10 \\ 14,10 \\ \hline 201 \end{array}$	$\begin{array}{r} 0,67 \\ \times 3,2 \\ \hline 134 \\ 201 \\ \hline 2,144 \end{array}$
--	--	--

Γενικὴ παρατήρησις

Καθὼς εἶδομεν οἱ δεκαδικοὶ ἀριθμοὶ εἶναι δεκαδικὰ κλάσματα γραμμένα ὑπὸ ἄλλην μορφῆν. Διὰ τοῦτο ὅλαι αἱ ἴδιότητες τῶν ρητῶν ἀριθμῶν, τὰς ὅποιας εἶδομεν εἰς τὴν πρόσθεσιν, ἀφαιρέσιν καὶ πολλαπλασιασμὸν Ἰσχύουν καὶ δι' αὐτούς. Π.χ. ἡ πρόσθεσις δεκαδικῶν εἶναι μεταθετικὴ καὶ πρόσεταιριστική.

251. Νὰ εύρετε τὰ ἀθροίσματα :

- i) $28,3 + 0,625$ ii) $6,25 + 47,4 + 175,803$

252. Νὰ εύρεθοῦν αἱ διαφοραὶ :

- i) $0,84 - 0,76$ ii) $12 - 0,075$ iii) $135,1 - 37,803$

253. Νὰ ἐκτελεσθοῦν οἱ πολλαπλασιασμοὶ :

- i) $3,45 \cdot 0,37$ ii) $101,11 \cdot 31,9$ iii) $0,01^3 \cdot 0,02$

254. Χρησιμοποιήσατε γνωστὴν ἴδιότητα διὰ νὰ ὑπολογίσετε συντόμως τὰς ἀριθμητικὰς παραστάσεις :

- i) $9,1 \cdot 72,65 + 0,9 \cdot 72,65$
ii) $81,2 \cdot 0,48 - 81,2 \cdot 13,42$

255. Νά ύπολογισθή με δύο τρόπους ή άριθμητική παράστασις
8,12 — (0,385 — 0,03)

256. Ἐν πεντάδραχμον ἔχει πάρος 1,5 cm. Πόσον ὄψος ἔχει μία στήλη Δπὸ 35 πεντάδραχμα, 1) εἰς διπλανήν καὶ 11) εἰς επιπλανήν. Πόσον ὄψος ἔχουν τὰ 0,75 τῆς στήλης, εἰς cm;

84. ΔΙΑΙΡΕΣΙΣ ΔΕΚΑΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

84. 1. Ὁ διαιρέτης εἶναι ἀκέραιος

α) Ἀς προσέξωμεν τὴν διαίρεσιν 8,55:3
Δυνάμεθα νὰ γράψωμεν

$$8,55 : 3 = \frac{855}{100} : 3 = \frac{855 : 3}{100} = \frac{285}{100} = 2,85$$

Εύρισκομεν συντόμως τὸ αὐτὸ ἀ-
ποτέλεσμα κατὰ τὴν γνωστὴν παρα-
πλεύρως διάταξιν.

8,55 3
25 2,85
15
0

Εις τὴν διάταξιν αὐτῆν, ὅταν δεξιά τοῦ πρώτου ύπολοίσπου 2 τοποθετοῦ-
μεν τὸ 5, σχηματίζεται ὁ ἀριθμὸς 25, ὁ ὅποιος σημαίνει πλέον δέκατα
 $(2,5 = \frac{25}{10})$. Ἐπομένως καὶ τὸ δεύτερον ψηφίον τοῦ πηλίκου θὰ εἴναι δέκα-
τα. Διὰ τοῦτο καὶ ἐθέσαμεν πρὸ αὐτοῦ ύποδιαστολήν.

‘Ομοίως, τὸ νέον ὑπόλοιπον εἶναι ἑκατοστά. $0,15 = \frac{15}{100}$.
 ‘Επομένως καὶ τὸ νέον ψηφίον τοῦ πηλίκου θὰ εἶναι ἑκατοστά κ.ο.κ.
 “Ωστε: Διὰ νὰ διαιρέσωμεν δεκαδικὸν δι’ ἀκεραίου, διαιροῦμεν
 αὐτούς ως ἔαν ήσαν ἀκέραιοι, θέτομεν δὲ εἰς τὸ πηλίκον ὑποδιαστολὴν
 διμέσως μόλις τελειώσει ἡ διαιρεσίς τοῦ ἀκεραίου μέρους.

β) "Ἄς προσέξωμεν τὴν διαίρεσιν 2,3:3.
Δυνάμειθα πάλιν νὰ γράψωμεν

$$2,3 : 3 = \frac{23}{10} : 3 = \frac{23}{30}$$

Παρατηροῦμεν ότι τὸ κλάσμα $\frac{23}{30}$ εἶναι ἀνάγωγον καὶ ὁ παρονομαστής

του δὲν εἶναι, οὔτε δύναται νὰ γίνη δύναμις τοῦ 10. (Τὸ 23 δὲν διαιρεῖται διὰ 3).

"Ητοι τὸ κλάσμα $\frac{23}{3 \cdot 10} = \frac{23}{30}$ δὲν εἶναι δεκαδικὸν κλάσμα· ἀρα καὶ τὸ πηλίκον τῆς διαιρέσεως 2,3:3.

"Ωστε: τὸ πηλίκον ἐνδς δεκαδικοῦ δι' ἀκεραιοῦ δὲν εἶναι πάντοτε δεκαδικὸν κλάσμα.

Τὶ δῆμος θὰ λάβωμεν ως πηλίκον εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτῆν;

Δυνάμεθα:

1) Νὰ λάβωμεν τὸ κλάσμα 23/30 ως τὸ ἀκριβὲς πηλίκον τῆς διαιρέσεως τοῦ 2,3 διὰ 3.

2) Νὰ εύρωμεν τὸ πηλίκον κατὰ προσέγγισιν μὲ τὸν ἔξῆς τρόπον.
Ἐκτελοῦμεν τὴν διαιρεσιν, ως εἰς τὸ προηγούμενον παράδειγμα.

2,3 | 3
2 | 0,7
βές πηλίκον εἶναι: 0,7 καὶ $\frac{2}{3}$ τοῦ δεκάτου. Ἐὰν συνεπῶς παραλείψωμεν τὸ ὑπόλοιπον καὶ λάβωμεν ως πηλίκον τὸ 0,7 κάνωμεν λάθος.

Παρατηροῦμεν δτι τὸ λάθος αὐτὸν εἶναι μικρότερον τοῦ ἐνὸς δεκάτου.

Διὰ τοῦτο λέγομεν δτι τὸ 0,7 εἶναι τὸ πηλίκον τῆς διαιρέσεως κατὰ προσέγγισιν δεκάτου.

Ἐπειδὴ εἶναι καὶ μικρότερον τοῦ πραγματικοῦ, δινομάζεται πηλίκον κατὰ προσέγγισιν δεκάτου κατ' Ἑλλειψιν. Ἐὰν ἀντὶ νὰ παραλείψωμεν τὸ ὑπόλοιπον 2/3 τοῦ δεκάτου, τὸ δποῖον εἶναι μεγαλύτερον τοῦ ἡμίσεως δεκάτου, τὸ κάνωμεν ἐν δέκατον καὶ τὸ προσθέτωμεν εἰς τὸ 0,7, θὰ ἔχωμεν ως πηλίκον 0,8. Τὸ πηλίκον τώρα εἶναι μεγαλύτερον τοῦ ἀληθοῦ πηλίκου κατὰ 1/3 τοῦ δεκάτου. Εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν λέγομεν δτι τὸ πηλίκον εύρεθη κατὰ προσέγγισιν δεκάτου καθ' ὑπεροχήν.

Ἐφ' ὅσον θελήσωμεν μεγαλυτέραν προσέγγισιν δυνάμεθα νὰ συνεχίσωμεν τὴν διαιρεσιν καὶ νὰ εύρωμεν, πηλίκον κατὰ προσέγγισιν ἐκατοστοῦ, χιλιοστοῦ κ.ο.κ. ως κατωτέρω:

Προσέγγισις ἑκατοστοῦ

$$\begin{array}{r} 2,3 \\ | \quad 3 \\ 20 \quad 0,76 \\ 2 \quad \end{array}$$

Προσέγγισις χιλιοστοῦ

$$\begin{array}{r} 2,3 \\ | \quad 3 \\ 20 \quad 0,766 \\ 20 \quad \end{array}$$

Κατ' Ἑλλειψιν : 0,76

Κατ' Ἑλλειψιν : 0,766

Καθ' ὑπεροχήν : 0,77

Καθ' ὑπεροχήν : 0,767

Παρατηροῦμεν ἐπὶ πλέον δτι: τὸ ἑκάστοτε νέον ὑπόλοιπον εἶναι πάντοτε 2. Αὐτὸν σημαίνει δτι ὅσον καὶ ἀν συνεχίσωμεν τὴν διαιρεσιν δὲν θὰ τελειώσῃ αὐτῇ ποτὲ καὶ δτι εἰς τὸ πηλίκον θὰ εύρισκωμεν διαρκῶς τὸ αὐτὸν ψηφίον 6.

Διὰ τοῦτο λέγομεν δτι τὸ πηλίκον τῆς διαιρέσεως τοῦ 2, 3 διὰ 3 ἢ τὸ κλάσμα 23/30 δὲν δύναται νὰ λάβῃ τερματιζομένην δεκαδικὴν μορφὴν. Διὰ νὰ δηλώσωμεν δὲ τοῦτο γράφομεν, $\frac{23}{30} = 0,766 \dots$

84. 2. Διαιρέτης δεκαδικός άριθμός

Έστω πρός έκτελεσιν ή διαιρεσις $0,45:1,5$

Η περίπτωσις αύτή άναγεται εις τήν διαιρεσιν μὲ διαιρέτην άκεραιον.

Πράγματι: $0,45:1,5=4,5:15=0,3$ (πολλαπλασιασμὸς ἐπὶ 10).

Όμοιως τὸ πηλίκον τῆς διαιρέσεως τοῦ 49 διὰ 0,72 εὑρίσκεται ἐὰν ἐκτελέσωμεν τήν διαιρεσιν 4900 διὰ 72 (πολλαπλασιασμὸς ἐπὶ 100). Η διαιρεσις αύτη εἶναι ὀτελής. Τὸ ὑπόλοιπον τῆς ἀρχικῆς διαιρέσεως δὲν εἶναι 4, ἀλλὰ $\frac{4}{100}$. Διατί;

4900	72
580	68
4	

Σημείωσις

Δυνάμεθα πάντοτε νὰ τρέψωμεν τοὺς δεκαδικοὺς διαιρέτας εἰς δεκαδικὰ κλάσματα ὅπότε ἐκτελοῦμεν διαιρεσιν διὰ κλάσματος.

85. ΤΡΟΠΗ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ ΕΙΣ ΔΕΚΑΔΙΚΟΝ

Γνωρίζομεν ὅτι ἔκαστον κλάσμα παριστάνει τὸ ἀκριβὲς πηλίκον τῆς διαιρέσεως τοῦ ἀριθμητοῦ διὰ τοῦ παρανομαστοῦ του. Διὰ νὰ τὸ τρέψωμεν εἰς δεκαδικὸν ἐκτελοῦμεν τήν διαιρεσιν αὐτήν. Π.χ. διὰ τὰ κλάσματα

$$\frac{3}{5}, \quad \frac{7}{8}, \quad \frac{7}{6} \quad \text{ἔχομεν:}$$

$$30 \left| \begin{array}{r} 5 \\ 0 \end{array} \right. \quad 0,6$$

$$70 \left| \begin{array}{r} 8 \\ 60 \\ 40 \\ 0 \end{array} \right. \quad 0,875$$

$$10 \left| \begin{array}{r} 6 \\ 40 \\ 40 \\ 4 \end{array} \right. \quad 1,166$$

$$\text{Ήτοι } \frac{3}{5} = 0,6$$

$$\frac{7}{8} = 0,875$$

$$\frac{7}{6} = 1,166 \dots$$

Παρατη ἡσυμεν ὅτι τὰ κλάσματα $\frac{3}{5}, \frac{7}{8}$, τρέπονται εἰς τερματιζομένους

δεκαδικούς ἀριθμούς ἐνῷ τὸ κλάσμα $\frac{7}{6}$ εἶναι ἀδύνατον νὰ λάβῃ τερματιζόμενην δεκαδικήν μορφήν.

86. ΠΟΙΑ ΑΝΑΓΩΓΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ ΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ΤΕΡΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΔΕΚΑΔΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Εἴδομεν ἀνωτέρω ὅτι ὡρισμένα κλάσματα τρέπονται εἰς τερματιζομένους δεκαδικούς ἀριθμούς ἐνῷ ἀλλα δὲν τρέπονται. Γεννᾶται τὸ ἔρωτημα: Δυνά-

μεθα νὰ διακρίνωμεν, πρὶν ἐκτελέσωμεν τὴν διαίρεσιν, ἐὰν ἔν κλάσμα τρέπεται εἰς τερματιζόμενον δεκαδικὸν ἀριθμόν;

Εἰς τὴν ἀπάντησιν θὰ δῦγηθῶμεν ἀπὸ τὰς ἑξῆς παρατηρήσεις :

α) Ἄσ λάβωμεν τοὺς τερματιζομένους δεκαδικούς ἀριθμούς 0,4, 0,15, 0,625 καὶ ἄς εύρωμεν τὰ δεκαδικὰ κλάσματα εἰς τὰ δποῖα τρέπονται οὗτοι.

Ἐχομεν :

$$0,4 = \frac{4}{10}, \quad 0,15 = \frac{15}{100}, \quad 0,625 = \frac{625}{1000}$$

Μετὰ τὴν ἀπλοποίησιν, ὡστε νὰ καταστοῦν ταῦτα ἀνάγωγα, ἔχομεν :

$$\frac{4}{10} = \frac{2 \cdot 2}{2 \cdot 5} = \frac{2}{5}, \quad \frac{15}{100} = \frac{3 \cdot 5}{2^2 \cdot 5^2} = \frac{3}{2^2 \cdot 5}, \quad \frac{625}{1000} = \frac{5^4}{2^3 \cdot 5^3} = \frac{5}{2^3}.$$

Παρατηροῦμεν ὅτι :

Τὰ ἀνάγωγα κλάσματα, εἰς τὰ δποῖα τρέπονται οἱ ἀνωτέρω δεκαδικοί, ἔχουν παρονομαστὰς μόνον δυνάμεις τῶν ἀριθμῶν 2 καὶ 5 ἢ μόνον τοῦ ἐνὸς ἔξ αὐτῶν.

β) Ἄσ λάβωμεν ἀνάγωγα κλάσματα, π.χ. τὰ $\frac{1}{2}, \frac{3}{5}, \frac{9}{20}$, τῶν δποίων οἱ παρονομασταὶ οὐδένα πρῶτον παράγοντα διαφορετικὸν ἀπὸ τοὺς 2 καὶ 5 περιέχουν.

Ἐχομεν :

$$\frac{1}{2} = \frac{5 \cdot 1}{5 \cdot 2} = \frac{5}{10} = 0,5 \quad \frac{3}{5} = \frac{3 \cdot 2}{5 \cdot 2} = \frac{6}{10} = 0,6 \quad \frac{9}{20} = \frac{5 \cdot 9}{5 \cdot 20} = 0,45$$

Παρατηροῦμεν ὅτι τὰ κλάσματα δίδουν τερματιζομένους δεκαδικούς ἀριθμούς.

Ἄπὸ τὰς ἀνωτέρω παρατηρήσεις ἔννοοῦμεν ὅτι :

Διὰ νὰ τρέπεται ἔν ἀνάγωγον κλάσμα εἰς τερματιζόμενον δεκαδικὸν ἀριθμὸν πρέπει καὶ ἀρκεῖ, δ παρονομαστής του, ἀναλελυμένος εἰς γινόμενον πρώτων παραγόντων, νὰ ἔχῃ ὡς μόνους πρώτους παράγοντας τοὺς 2 καὶ 5 ἢ τὸν ἔνα ἔξ αὐτῶν.

Παράδειγμα

Τὸ ἀνάγωγον κλάσμα $\frac{147}{40}$ τρέπεται εἰς τερματιζόμενον δεκαδικόν, διότι δ παρονομαστής του, $40=2^3 \cdot 5$, ἔχει ὡς μόνους πρώτους παράγοντας τοὺς 2 καὶ 5. Ἀντιθέτως τὸ κλάσμα $\frac{2}{35}$ δὲν τρέπεται, διότι δ παρονομαστής του, $35=5 \cdot 7$, ἔχει ὡς πρῶτον παράγοντα καὶ τὸ 7.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΝΟΥΜΕΡΑ

257. Νὰ ἐπιλυθοῦν αἱ ἑξισώσεις :

$$\alpha) 5 \cdot x = 0,0125$$

$$\beta) 12 \cdot x = 0,0144$$

258. Νὰ τραποῦν εἰς δεκαδικούς τὰ κλάσματα :

$$\frac{1}{8}, \quad \frac{3}{25}, \quad \frac{7}{2 \cdot 5^3}, \quad \frac{9}{2^3 \cdot 5}$$

259. Νὰ ἐκτελεσθοῦν αἱ πράξεις :

$$i) \frac{3}{8} - 0,07$$

$$ii) \frac{3}{5} \cdot 0,75$$

$$iii) 0,225 : 5$$

260. Νὰ εύρετε μὲ προσέγγισιν ἑκατοστοῦ τὰ πηλίκα τῶν διαιρέσεων :

$$i) 10:28$$

$$ii) 6:4:3$$

261. Ποια ἀπὸ τὰ κάτωθι κλάσματα τρέπονται εἰς τερματιζομένους δεκαδικούς :

$$\frac{3}{5}, \quad \frac{11}{50}, \quad \frac{7}{15}, \quad \frac{6}{48}, \quad \frac{9}{32}, \quad \frac{718}{325}$$

262. Νὰ γράψετε τὸ σύνολον τῶν κλασματικῶν μονάδων μὲ παρανομαστὴν μικρότερον τοῦ 20, αἱ δῆποι τρέπονται εἰς τερματιζομένους δεκαδικούς.

87. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΙ ΔΕΚΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

Απὸ τοὺς παρονομαστὰς τῶν ἀναγώγων κλασμάτων $\frac{2}{3}, \frac{9}{11}, \frac{1}{12}$

διακρίνομεν ὅτι ταῦτα δὲν τρέπονται εἰς τερματιζομένους δεκαδικούς ἀριθμούς.

Ἄσ προσέξωμεν τὰ πηλίκα τῶν διαιρέσεων 2:3, 9:11 καὶ 1:12.

20	3	90	11	100	12
20	0,666...	20	0,8181...	40	0,0833...
20		90		40	
20		20		4	
2		9		..	
..					

Διακρίνομεν ὅτι τὰ ψηφία ἑκάστου πηλίκου ἐπάναλαμβάνονται ἀπεριορίστως, τὰ αὐτὰ καὶ μὲ τὴν ίδιαν σειρὰν διαδοχῆς. (Διατί;) Ἐπαναλαμβάνονται, δῆποι λέγομεν, περιοδικῶς.

Διὰ τοῦτο οἱ ἀριθμοί :

$$0,666 \dots, 0,8181 \dots, 0,08333 \dots$$

λέγονται περιοδικοὶ δεκαδικοὶ ἀριθμοί.

Τὸ τμῆμα τοῦ δεκαδικοῦ μέρους, τὸ δῆποι τὸν ἐπαναλαμβάνεται λέγεται περίοδος.

Π.χ. τοῦ ἀριθμοῦ 0, 666 ... περίοδος εἶναι 6

$$\gg \gg 0,8181 \dots \gg \gg 81$$

$$\gg \gg 0,0833 \dots \gg \gg 3$$

Εις τούς περιοδικούς δριθμούς 0,666... καὶ 0,8181... παρατηροῦμεν ότι ή περίοδος ἀρχίζει ἀμέσως μετά τὴν ὑποδιαστολήν. Διὰ τοῦτο οὗτοι λέγονται ἀπλοὶ περιοδικοί. Εις τὸν δεκαδικὸν 0,0833... ή περίοδος ἀρχίζει μετά ἀπό δύο δεκαδικά ψηφία. "Hτοι τὸ δεκαδικὸν μέρος αὐτοῦ ἀποτελεῖται ἀπό ἐν περιοδικὸν τμῆμα καὶ ἀπό ἐν μή περιοδικόν. Διὰ τοῦτο οὗτος λέγεται μεικτὸς περιοδικός.

*Από τας ίσοτητας: $\frac{4}{10} = 0,4 = 0,4000 \dots$, $\frac{25}{100} = 0,25 = 0,25000 \dots$

είναι εύκολον νά έννοήσωμεν ότι και έκαστον κλάσμα τό δόποιον τρέπεται εις τερματιζόμενον δεκαδικόν δύναται νά λάβη μορφήν περιοδικοῦ ἀριθμοῦ. Αρκεῖ νά θεωρήσωμεν ως περίοδόν του τό 0.

Δυνάμεθα λοιπὸν γενικῶς νὰ εἴπωμεν ὅτι :

"Έκαστος ρητός άριθμός δύναται νά τεθῇ υπό μορφήν δεκαδικού περιοδικού άριθμού ή δηλαδή λέγομεν έχει ἐν δεκαδικὸν περιοδικὸν ἀνάπτυγμα.

Αντιστρόφως :

"Εκαστος περιοδικός ἀριθμός παριστάνει ἔνα ρητόν, τὸν ὅποιον δυνάμεθα νὰ εύρωμεν.

Διακρίνομεν πρὸς τοῦτο τὰς ἔξης περιπτώσεις :

α) Ό περιοδικός δριθμός είναι απλούς: π.χ. δ 0,777...
 Έάν δονιμάσωμεν μὲ χ τὸν ζητούμενον ρητὸν δριθμόν, θὰ ἔχωμεν τὴν Ισό-
 χ: χ = 0,777... (1)

$$1) \text{ Πολλαπλασιάζομεν τὰ μέλη τῆς (1) ἐπὶ } 10 \rightarrow 10 \cdot x = 7,77\dots \quad (2)$$

ii) Άφαιρούμεν ἀπό τὰ μέλη τῆς (2) τοὺς ίσους ἀριθμοὺς χ καὶ $0,777\dots$ → $\chi = 0,777\dots$

$${}^{18} \text{Ar} = \frac{81 - 73}{99} x = \frac{7}{9} \quad {}^{18} \text{Hg} = 0,777\ldots = \frac{7}{9}$$

Όμοίως διά τὸν περιοδικὸν ἀριθμὸν $\chi=0,6363\ 63\dots$ (3)

$$\text{i) Πολλαπλασιάζομεν ἐπὶ 100 τὰ μέλη τῆς (3) } \quad 100 \cdot x = 63,6363\dots \quad (4)$$

$$\text{ii) Ἀφαιροῦμεν ἀπὸ τὰ μέλη τῆς (4) } \quad \cancel{100} \cdot \cancel{x} = \cancel{63,6363\dots}$$

$$\text{Ἔστω } \cancel{\text{έπιστριψόμεν}} \text{ } x \text{ καὶ } 0.636363\dots \quad x = 0.636363\dots$$

$$\Delta \text{αφορά} \quad 99 \cdot x = 63$$

$$\text{Therefore } x = \frac{63}{99}$$

"Ητοι : $0,636363 \dots = \frac{63}{99}$

'Ο άνωτέρω τρόπος έργασίας μᾶς δύνηγε είς τὸ ἀκόλουθον συμπέρασμα

"Εκαστος ἀπλοῦς περιοδικὸς δεκαδικὸς ἀριθμὸς < 1 εἶναι ἵσος μὲ κλάσμα, τὸ δποῖον ἔχει ὡς ἀριθμητὴν τὴν περίοδὸν του, καὶ παρανομαστὴν τόσα 9, ὅσα εἶναι τὰ ψηφία τῆς περιόδου.

β) 'Ο περιοδικὸς ἀριθμὸς εἶναι μεικτὸς

"Εστω $x = 0,8333\dots$ (5)

"Έχομεν :

$$100 \cdot x = 83,33 \dots \quad \text{Πολ/σμὸς τῶν μελῶν τῆς (5) ἐπὶ 100}$$

$$10 \cdot x = 8,33 \dots \quad \gg \gg \gg \gg \gg \gg 10$$

$$\underline{90 \cdot x = 83 - 8} \quad \text{Διαφορά}$$

$$\text{"Η } x = \frac{83 - 8}{90}$$

"Ητοι $0,8333 \dots = \frac{83 - 8}{90}$

'Εργαζόμενοι μὲ δημοιον τρόπον εύρισκομεν : $0,54888 \dots = \frac{548 - 54}{900}$

"Ητοι : ἔκαστος μεικτὸς περιοδικὸς εἶναι ἵσος μὲ κοινὸν κλάσμα τοῦ δποίου ὁ ἀριθμητὴς εἶναι ὁ ἀριθμός, ὁ δποῖος σχηματίζεται ἀπὸ τὰ ψηφία τοῦ μὴ περιοδικοῦ τμῆματος καὶ μᾶς περιόδου ἡλαττωμένος κατὰ τὸ μὴ περιοδικὸν τμῆμα, ὁ δὲ παρονομαστὴς σχηματίζεται ἀπὸ τόσα 9, ὅσα ψηφία ἔχει ἡ περίοδος ἀκολουθούμενα ἀπὸ τόσα μηδενικά, ὅσα δεκαδικὰ ψηφία ἔχει τὸ μὴ περιοδικὸν τμῆμα.

Εἰς τὴν περίπτωσιν κατὰ τὴν δποίαν ὁ δεκαδικὸς περιοδικὸς ἀριθμὸς ἔχει καὶ ἀκέραιον μέρος, μὲ ἀνάλογον τρόπον, σχηματίζομεν τὸ κλάσμα τὸ δποῖον ἀντιστοιχεῖ εἰς αὐτόν.

Παραδείγματα

α) $12,4343 \dots = 12 + 0,4343 \dots = \frac{1243 - 12}{99}$

β) $5,423636 \dots = \frac{54236 - 542}{9900}$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

263. Νὰ γράψετε ὡς περιοδικούς δεκαδικούς ἀριθμοὺς τὰ κλάσματα :

$$\frac{1}{7}, \quad \frac{2}{75}, \quad \frac{5}{21}, \quad \frac{31}{33}$$

264. Νὰ τραποῦν εἰς κλάσματα οἱ κάτωθι περιοδικοὶ δεκαδικοὶ ἀριθμοί :

i) 0,4545 ... ii) 0,3141414 ... iii) 7,555 ...

iv) 15,32858585 ... v) 0,006767 ...

265) Εις τὸ σύνολον $A = \left\{ \frac{2}{5}, \frac{1}{7}, \frac{3}{12}, \frac{5}{8}, \frac{15}{45}, \frac{4}{40} \right\}$. ποιον είναι τὸ ὑποσύνολον

κλασμάτων, τὰ δόποια τρέπονται εἰς δεκαδικούς περιοδικούς ἀριθμούς:


266. Δείξατε δτὶ τὸ κλάσμα: $\frac{\frac{1}{5} - 0,1}{\frac{1}{5} + 0,1}$ τρέπεται εἰς ἀπλοῦν περιοδικόν.

267. Νὰ ἐκτελέσετε τὰς πράξεις:

$$i) \frac{5}{6} + 2,353535\dots \quad ii) 0,7272\dots - 0,444\dots$$

88. ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΔΥΟ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

88. 1. Ὡς γνωστόν, ἔὰν δοθῇ ἐν εὐθ. τμῆμα AB καὶ εἰς ρητὸς $\lambda \neq 0$, δυνάμεθα νὰ κατασκεύσωμεν ἐν ἄλλῳ εὐθύγραμμον τμῆμα ἵσον πρὸς τὸ γινόμενον $\lambda \cdot AB$. Π.χ. ἔὰν δοθῇ ἐν εὐθύγραμμον τμῆμα AB καὶ δὲ ρητὸς $3/4$, δυνάμεθα νὰ κατασκεύσωμεν εὐθ. τμῆμα $\Gamma\Delta = 3/4 \cdot AB$. Πρὸς τοῦτο ἀρκεῖ νὰ χωρίσωμεν τὸ AB εἰς 4 ἴσα τμήματα καὶ νὰ λάβωμεν ἐν τμῆμα ἵσον πρὸς τὸ ἀθροισμα ἐκ τριῶν αὐτῶν. Τοιουτοτρόπως εἰς τὸ σχ. 33 ἔχομεν $\Gamma\Delta = \frac{3}{4} \cdot AB$



Σχ. 33

Ο ρητὸς $\frac{3}{4}$ λέγεται λόγος τοῦ $\Gamma\Delta$ πρὸς τὸ AB . γράφομεν δὲ $\frac{\Gamma\Delta}{AB} = \frac{3}{4}$.

Ωστε $\frac{\Gamma\Delta}{AB} = \frac{3}{4}$ σημαίνει δτὶ $\Gamma\Delta = \frac{3}{4} \cdot AB$

$$\frac{\Gamma\Delta}{AB} = \frac{3}{4} \Leftrightarrow \Gamma\Delta = \frac{3}{4} \cdot AB$$

Συμφώνως πρὸς τ' ἀνωτέρω εἰς τὸ παραπλεύρως σχ. 34 δπου ἐλάβομεν $AB = B\Gamma = \Gamma\Delta$ ἔχομεν

$$AB = \frac{1}{3} \cdot A\Delta \Leftrightarrow \frac{AB}{A\Delta} = \frac{1}{3}$$



$$AB = \frac{1}{2} \cdot A\Gamma \Leftrightarrow \frac{AB}{A\Gamma} = \frac{1}{2}$$

$$A\Gamma = \frac{2}{3} \cdot A\Delta \Leftrightarrow \frac{A\Gamma}{A\Delta} = \frac{2}{3}$$

Σχ. 34

88. 2. "Ας έξετάσωμεν και τὸ ἀντίστροφὸν πρόβλημα.

"Ητοι : ἐὰν δοθοῦν δύο εὐθ. τμήματα, $AB, \Gamma\Delta$, δυνάμεθα νὰ ὅριστωμεν τὸν λόγον τοῦ AB πρὸς τὸ $\Gamma\Delta$ ≠ 0;

1) Εἰς τὸ σχ. 35 τὸ τμῆμα $\Gamma\Delta$ χωρεῖ ἀκριβῶς 4 φορᾶς εἰς τὸ τμῆμα AB .

"Ητοι ἔχομεν $AB = 4 \cdot \Gamma\Delta \Leftrightarrow \frac{AB}{\Gamma\Delta} = 4$

Εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν ὁ λόγος τοῦ AB πρὸς τὸ $\Gamma\Delta$ ισοῦται μὲ 4. Ἐὰν δὲ τὸ $\Gamma\Delta$ ληφθῇ ὡς μονάς μετρήσεως τοῦ AB τότε ὁ ἀκέραιος 4 εἶναι ἡ ἀριθμητικὴ τιμὴ τοῦ AB .



2) Εἰς τὸ σχῆμα 36 τὸ $\Gamma\Delta$ δὲν χωρεῖ ἀκριβῶς ν φορᾶς ($n \in \mathbb{N}$) εἰς τὸ AB .

Διὰ τοῦτο χωρίζομεν τὸ $\Gamma\Delta$ εἰς ἵσα μέρη, π.χ. εἰς 10 ἵσα μέρη. Ἐάν δυνομάσωμεν M τὸ ἓν ἀπὸ αὐτά, θὰ ἔχωμεν: $\Gamma\Delta = 10 \cdot M \Leftrightarrow M = \frac{1}{10} \cdot \Gamma\Delta$ (1)

"Ας μετρήσωμεν ἦδη τὸ AB μὲ μονάδα τὸ M . Εἰναι δυνατόν:

α) Ἡ μονάς μετρήσεως M . νὰ χωρῇ εἰς τὸ AB ἀκριβῶς ν φορᾶς ($n \in \mathbb{N}$) π.χ. 12 φορᾶς ὅπως εἰς τὸ AB , σχ. 36.


"Ητοι $AB = 12 \cdot M \quad \text{ἢ} \quad AB = 12 \cdot \left(\frac{1}{10} \Gamma\Delta \right)$

ἢ $AB = \frac{12}{10} \Gamma\Delta \Leftrightarrow \frac{AB}{\Gamma\Delta} = \frac{12}{10}$

Εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν ὁ ρῆτος $\frac{12}{10} = 1,2$, εἶναι ὁ λόγος τοῦ AB πρὸς

τὸ $\Gamma\Delta$ ἢ ἡ ἀριθμητικὴ τιμὴ τοῦ AB μὲ μονάδα μετρήσεως τὸ $\Gamma\Delta$.

β) Ἡ μονάς μετρήσεως M νὰ μὴ χωρῇ ἀκριβῶς ν φορᾶς ($n \in \mathbb{N}$) εἰς τὸ AB , ὅπως π.χ. φαίνεται εἰς τὸ σχῆμα 37. ὅπου εἶναι $12 \cdot M < AB < 13 \cdot M$ (Διότι $EB < M$).



Σχ. 37

"Ητοι $AB > \frac{12}{10} \cdot \Gamma\Delta$ καὶ $AB < \frac{13}{10} \cdot \Gamma\Delta$

ἢ $\frac{12}{10} < \frac{AB}{\Gamma\Delta} < \frac{13}{10}$

Καθώς βλέπομεν εις τὴν περίπτωσιν αὐτὴν δ λόγος τοῦ ΑΒ πρὸς τὸ ΓΔ εἶναι μόνον κατὰ προσέγγισιν (κατ' ἔλλειψιν) ἵσος πρὸς $\frac{12}{10} = 1,2$.

"Ητοι ἡ ἀριθμ. τιμὴ τοῦ ΑΒ μὲ μονάδα μετρήσεως τὸ ΓΔ εἶναι κατὰ προσέγγισιν (κατ' ἔλλειψιν) ἵση πρὸς 1,2. Τὴν ἀνωτέρω προσέγγισιν δυνάμεθα νὰ τὴν κάνωμεν ὅσον θέλομεν μεγάλην. Ἀρκεῖ πρὸς τοῦτο νὰ λάβωμεν ὡς μονάδα Μ 10 ή 100 ή 1000... φοράς μικροτέραν*.

88. 3. "Ας ὑποθέσωμεν δτὶ $AB=12 \cdot M$, $ΓΔ=10 \cdot M$ δπότε $AB/\GammaΔ=12/10$, σχ. 36.

"Απὸ τὰς ἴσοτητας αὐτὰς, ἐὰν προσέξωμεν δτὶ οἱ ρητοὶ 10 καὶ 12 εἶναι ἀντιοίχως αἱ ἀριθμητικαὶ τιμαὶ τῶν τμημάτων ΓΔ καὶ ΑΒ μὲ τὴν αὐτὴν μονάδα μετρήσεως Μ,

$$\text{ἔχομεν } \frac{AB}{\Gamma\Delta} = \frac{12}{10} = \frac{\text{'Αριθ. τιμὴ τοῦ } AB \text{ μὲ μονάδα } M}{\text{'Αριθ. τιμὴ τοῦ } \Gamma\Delta \text{ μὲ μονάδα } M}$$

"Ητοι: 'Ο λόγος ἐνὸς εὐθ. τμῆματος πρὸς ἕνν οὐλλο εἶναι ἵσος πρὸς τὸν λόγον τῆς ἀριθ. τιμῆς τοῦ πρώτου πρὸς τὴν ἀριθμ. τιμὴν τοῦ δευτέρου, ἐὰν μετρηθοῦν μὲ τὴν ἴδιαν μονάδα καὶ τὰ δύο.

$$\boxed{\frac{AB}{\Gamma\Delta} = \frac{\alpha \cdot M}{\beta \cdot M}} \Rightarrow \frac{AB}{\Gamma\Delta} = \frac{\alpha}{\beta}$$

Σημειώνομεν δτὶ δ ἀνωτέρω λόγος εἶναι ἀνεξάρτητος ἀπὸ τὴν μονάδα τὴν δποίαν θὰ χρησιμοποιήσωμεν διὰ τὴν μέτρησιν τῶν δύο αὐτῶν τμημάτων.

Π.χ. ἐὰν εἶναι $AB=40$ cm καὶ $\Gamma\Delta=50$ cm.
δπότε $\frac{AB}{\Gamma\Delta} = \frac{40}{50}$, τότε θὰ εἶναι $AB=0,4$ m, $\Gamma\Delta=0,5$ m καὶ $\frac{AB}{\Gamma\Delta} = \frac{0,4}{0,5} = \frac{40}{50}$.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

268. Χαράξατε ἐν εὐθ. τμῆμα M καὶ ἐπειτα τρία ἀλλα τμήματα A, B, Γ τοιαῦτα ὥστε :

$$\frac{A}{M} = 2, \quad \frac{B}{M} = 2,5, \quad \frac{\Gamma}{M} = 3.$$

269. Τρία εὐθ. τμήματα A,B,Γ ἐμετρήθησαν μὲ τὴν αὐτὴν μονάδα M καὶ αἱ τιμαὶ τῶν ήσαν αἱ ἔξι :

$$A = \frac{3}{4} \cdot M, \quad B = 5 \cdot M, \quad \Gamma = 2 \cdot M$$

Νὰ εύρεθοῦν οἱ λόγοι : $\frac{A}{M}, \frac{M}{A}, \frac{A}{B}, \frac{A}{\Gamma}, \frac{B}{\Gamma}$.

* Υπάρχουν περιπτώσεις κατὰ τὰς ὁποίας ὅσον δηπότε μικράν κι ἀν λάβωμεν τὴν μονάδα M, ή ἀκριβής τιμὴ τοῦ λόγου AB/ΓΔ δὲν εἶναι ρητὸς ἀριθμός.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'.

89. ΣΥΜΜΙΓΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΙ

89. 1. Ὀρισμὸς

‘Ως γνωστὸν αἱ μονάδες μετρήσεως τόξων, γωνιῶν, χρόνου, δὲν ἔχουν διεκαθιδίας ὑποδιαιστέσεις.

$$1^\circ = 60', \quad 1' = 60'', \quad 1 \text{ h} = 60 \text{ min}, \quad 1 \text{ min} = 60 \text{ sec.}$$

Συνεπῶς ὅταν μετρήσωμεν μίαν γωνίαν ἢ ἐν τόξον ἢ ἐν χρονικὸν διάστημα μὲ τὰς μονάδας αὐτάς, εἶναι πιθανὸν νὰ εὕρωμεν τιμᾶς συγκεκριμένους ἀριθμούς ὅπως π.χ. $30^{\circ} 20' 10''$ ἢ $2\text{ h }10\text{ min }5\text{ sec.}$

Οι ἀνωτέρω δριθμοὶ ἀποτελοῦνται ἀπὸ ἄλλους συγκεκριμένους τῶν δποίων οἱ μονάδες εἰναι πολλαπλάσια ἢ ὑποπολλαπλάσια τῆς αὐτῆς ἀρχικῆς μονάδος. Διὰ τοῦτο λέγονται συμμιγεῖς δριθμοί.

Τούς ἔως τώρα γνωστούς μας ἀριθμούς διὰ νὰ τοὺς διακρίνωμεν ἀπὸ τοὺς συμμιγεῖς θὰ τοὺς λέγωμεν ἀπλοῦς ἀριθμούς.

89. 2. Τρεις συμμετοῦς ἀριθμοῦ εἰς ἀπλοῦν

Διὰ νά εὑρωμεν τὴν τιμὴν μιᾶς γωνίας $10^{\circ} 20' 12''$ εἰς δεύτερα λεπτὰ σκοπευτόμεθα ὅτι :

$$\text{g) } 1^\circ = 60' \quad \text{"And } 10^\circ = 10.60' = 600'$$

$$\text{B) } 1' = 60'' \quad \text{Ap\alpha} \quad 600' + 20' = 620', \quad 620' = 620.60'' = 37200''$$

$$\gamma) 37200'' + 12'' = 37212''$$

"H_{T01}: 10° 20' 12" = 37212"

‘Ομοίως διὰ νὰ εύρωμεν τὸν χρόνον 1 h 20 min 15 sec εἰς δευτερόλεπτα (sec) σκεπτόμεθα ὅτι :

1 h = 60 min. 1 min = 60 sec

$${}^{\text{*}}\text{Ap}\alpha : \quad 60 \text{ min} + 20 \text{ min} = 80 \text{ min}. \quad 80 \text{ min} = 80.60 \text{ sec} = 4800 \text{ sec}.$$

$$4800 \text{ sec} + 15 \text{ sec} = 4815 \text{ sec.}$$

^aH_{T01}: 1 h 20 min 15 sec = 4815 sec.

89. 3. Τροπή συμμιγοῦς εἰς μονάδας μιᾶς τάξεως αὐτοῦ

Διά ήταν τρέψωμεν τὸν συμμιγῆ 2 h 10 min 45 sec εις πρώτα λεπτά (min) σκεπτόμεθα δτι

$$2 \text{ h} = 2.60 \text{ min} = 120 \text{ min}, \quad 45 \text{ sec} = \frac{45}{60} \text{ min} = 0,75 \text{ min}$$

Άρα: $2 \text{ h } 10 \text{ min } 45 \text{ sec} = 120 \text{ min} + 10 \text{ min} + 0,75 \text{ min}$
 $= 130,75 \text{ min.}$

Θά ήτο όμως δυνατόν νά τρέψωμεν πρώτα τὸν συμμιγή εἰς μονάδας τῆς τελευταίας τάξεως (sec) και έπειτα νά τρέψωμεν αύτάς εἰς πρώτα λεπτά (min).

α) $2 \text{ h} = 120 \text{ min}, \quad 120 \text{ min} + 10 \text{ min} = 130 \text{ min.}$

$130 \text{ min} = 130.60 \text{ sec} = 7800 \text{ sec} \quad 7800 \text{ sec} + 45 \text{ sec} = 7845 \text{ sec.}$

β) $7845 \text{ sec} : 60 = 130,75 \text{ min.}$

Ήτοι: $2 \text{ h. } 10 \text{ min } 45 \text{ sec} = 130,75 \text{ min.}$

89. 4. Τροπή άπλού συγκεκριμένου άριθμού εἰς συμμιγή

Είναι φανερόν ὅτι έχομεν σαφεστέραν ἀντίληψιν τῆς διαρκείας ἐνὸς ταξιδίου ἔὰν μᾶς εἴπουν ὅτι τοῦτο διήρκεσεν $1 \text{ h } 20 \text{ min } 10 \text{ sec}$ παρ' ὅτι ἔὰν μᾶς εἴπουν ὅτι διήρκεσεν 4830 sec ($1 \text{ h } 20 \text{ min } 10 \text{ sec}$).

Τὸ γεγονός τοῦτο μᾶς δύηγει εἰς τὴν τροπήν ἐνὸς άπλού συγκεκριμένου άριθμοῦ εἰς συμμιγή.

Διὰ νὰ τρέψωμεν ἔνα άπλον συγκεκριμένον άριθμόν, π.χ. τὸν άριθμὸν 4830 sec , εἰς συμμιγή, ἐργαζόμεθα ὡς ἔξῆς:

1) Διαιροῦμεν τὰ 4830 sec διὰ 60 , δπότε εύρισκομεν 80 min καὶ 30 sec.

2) Διαιροῦμεν τὰ 80 min διὰ 60 δπότε εύρισκομεν 1 h. καὶ 20 min.

α) $\begin{array}{r} 4830 \text{ sec} \\ \hline 30 \text{ sec} \end{array} \left| \begin{array}{c} 60 \\ \hline 80 \text{ min} \end{array} \right.$

β) $\begin{array}{r} 80 \text{ min} \\ \hline 20 \text{ min} \end{array} \left| \begin{array}{c} 60 \\ \hline 1 \text{ h} \end{array} \right.$

Ήτοι $4830 \text{ sec} = 1 \text{ h } 20 \text{ min } 30 \text{ sec.}$

‘Ομοίως διὰ νὰ τρέψωμεν τὸν συγκεκριμένον άριθμὸν $72620''$ εἰς συμμιγή ἐργαζόμεθα ὡς ἔξῆς:

α) $\begin{array}{r} 72620'' \\ \hline 20'' \end{array} \left| \begin{array}{c} 60 \\ \hline 1210' \end{array} \right. \quad \beta) \begin{array}{r} 1210' \\ \hline 10' \end{array} \left| \begin{array}{c} 60 \\ \hline 20^{\circ} \end{array} \right.$

Ήτοι $72620'' = 20^{\circ} 10' 20''$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

270. Νὰ τραποῦν εἰς δευτερόλεπτα (sec).

α) $3 \text{ h } 25 \text{ min } 40 \text{ sec} \quad \beta) 2 \text{ h } 10 \text{ min } 48 \text{ sec}$

271. Νά τραποῦν εἰς πρῶτα λεπτά: α) $2^{\circ} 32' 48''$ β) $9^{\circ} 20' 15''$

272. Νά τραποῦν εἰς συμμιγεῖς: α) $3 \frac{1}{4} \text{ h}$, β) $2 \frac{4}{5} \text{ h}$

273. 'Ο χρόνος μεταξὺ δύο πανσελήνων είναι $29 \text{ h}, 12 \text{ min}$. Νά τραπῆ ό χρόνος οὗτος α) εἰς sec β) εἰς min.

90. ΠΡΟΣΘΕΣΙΣ, ΑΦΑΙΡΕΣΙΣ ΣΥΜΜΙΓΩΝ

90. 1. Πρόσθεσις

Νά εύρεθη τό άθροισμα των συμμιγών ωρών πάνω:

$$\begin{array}{r} 25^{\circ} 17' 32'' \\ + 5^{\circ} 20' 19'' \\ + 10^{\circ} 32' 51'' \\ \hline \end{array}$$

"Εχομεν

$$\begin{array}{r} 25^{\circ} 17' 32'' \\ + 5^{\circ} 20' 19'' \\ + 10^{\circ} 32' 51'' \\ \hline 40^{\circ} 69' 102'' \end{array}$$
$$\begin{array}{r} \text{η} \\ + 40^{\circ} 70' 42'' \\ + 41^{\circ} 10' 42'' \\ \hline \end{array}$$

90. 2. Αφαίρεσις

α) Νά εύρεθη ή διαφορά $18^{\circ} 20' 31'' - 7^{\circ} 17' 26''$

"Εχομεν

$$\begin{array}{r} 18^{\circ} 20' 31'' \\ - 7^{\circ} 17' 26'' \\ \hline 11^{\circ} 3' 5'' \end{array}$$

β) Νά εύρεθη ή διαφορά $18^{\circ} 20' 31'' - 7^{\circ} 24' 41''$

"Εχομεν

$$\begin{array}{r} 18^{\circ} 20' 31'' \\ - 7^{\circ} 24' 41'' \\ \hline 10^{\circ} 55' 50'' \end{array}$$

"Ητοι διά νά καταστήσωμεν δυνατάς τάς άφαίρέσεις (όπου δὲν έσαν δυνατά), άνελύσαμεν μίαν μονάδαν εἰς μονάδας τῆς άμεσως κατωτέρας τάξεως...

91. ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ, ΔΙΑΙΡΕΣΙΣ ΣΥΜΜΙΓΩΝ

91. 1. Πολλαπλασιασμὸς ἐπὶ ἀκέραιον

Νά εύρεθη τό γινόμενον ($13^{\circ} 20' 12''$). 6

$$\begin{array}{r} 13^{\circ} 20' 12'' \\ \times 6 \\ \hline 78^{\circ} 120' 72'' \end{array}$$
$$\begin{array}{r} \text{η} \\ + 78^{\circ} 121' 12'' \\ \hline 80^{\circ} 1' 12'' \end{array}$$

91. 2. Διαίρεσις δι' ἀκεραίου

Νὰ εύρεθῇ τὸ πηλίκον ($15^{\circ} 12' 20''$): 4

$$\begin{array}{r}
 15^\circ & 12' & 20'' \\
 - 12^\circ & = 180' & + \\
 \hline
 3^\circ & 192' & \\
 & 32' & \\
 \hline
 & 0' & = 0'' \\
 & & 20'' \\
 & & 0'' \\
 \hline
 & & 4 \\
 & & 3^\circ 48' 5'' \\
 \hline
 \end{array}$$

91. 3. Πολλαπλασιασμὸς ἐπὶ κλάσμα

$$\text{Elevat} \quad (3^{\circ} 13' 20'') \cdot \frac{3}{5} = [(3^{\circ} 13' 20'') \cdot 3] : 5$$

$$\begin{array}{r}
 3^\circ 13' 20'' \\
 \times \quad \quad 3 \\
 \hline
 9^\circ 39' 60'' \\
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 90^\circ & 39' & 60'' \\
 + 50^\circ & & \\
 \hline
 40^\circ & = 240' \\
 + 279' & \\
 \hline
 4' & = 240' \\
 + 300'' & \\
 \hline
 \end{array}
 \quad
 \left. \begin{array}{r}
 5 \\
 1^\circ 55' 60'' \\
 \hline
 \end{array} \right\}$$

$$\text{H}_{\text{TOI}} \quad (3^{\circ} 13' 20'') \cdot \frac{3}{5} = 1^{\circ} 55' 60'' = 1^{\circ} 56'$$

91. 4. Διαιρέσις διὰ κλάσματος

‘Η προπτεύσις σύνηθε ἀνάγεται εἰς τὴν προπτεύσην.

$$\text{П.Х. } (2 \text{ h } 31 \text{ min } 15 \text{ sec}) : \frac{2}{5} = (2 \text{ h } 31 \text{ min } 14 \text{ sec}) \cdot \frac{5}{2}$$

91. 5. Γινόμενον δύο συμμιγῶν

"Ἐν κινητὸν εἰς χρόνον 1 h διαγράφει τόξον $30^{\circ} 20' 10''$. Πόσον τόξον
θὰ διαγράψῃ εἰς 2 h 40 min 30 sec; ΘΑΣΑ

Ἐπίλυσις

Τρέπομεν τὸν συμμιγῆ 2 h 40 min 30 sec εἰς ἀπλοῦν καὶ συγκεκριμένως ἐνταῦθα εἰς ώρας.

$$2 \text{ h } 40 \text{ min } 30 \text{ sec} = 2 \frac{27}{40} \text{ h}.$$

"Ηδη είναι εύκολον νὰ έννοήσωμεν ότι πρέπει νὰ πολλαπλασιάσωμεν τὸν ἀριθμὸν τῶν ὥρων ἐπὶ τὸν συμμιγῆ $30^{\circ}20'10''$ ".

$$2 \frac{27}{40} \cdot (30^{\circ} 20' 10'') = 81^{\circ} 8' 56,75''$$

91. 6. Διαιρεσις διὰ συμμιγοῦς

α) Μερισμός

"Εν κινητὸν εἰς 2 h 40 min διατρέχει τόξον $34^{\circ} 9' 20''$. Πόσον τόξον (τοῦ ίδιου κύκλου) διατρέχει εἰς μίαν ὥραν;

Έπιλυσις

Τρέπομεν τὸν χρόνον 2 h 40 min εἰς ὥρας: $2 h 40 min = 2 \frac{2}{3} h$.

$$(34^{\circ} 9' 20'') : 2 \frac{2}{3} = 12^{\circ} 48' 30''.$$

$$(34^{\circ} 9' 20'') : 2 \frac{2}{3} = 12^{\circ} 48' 30''.$$

"Ωστε τὸ κινητὸν εἰς 1 h διατρέχει τόξον $12^{\circ} 48' 30''$

β) Μέτρησις

"Εν κινητὸν εἰς 1 h διατρέχει τόξον $3^{\circ} 20' 10''$. Εἰς πόσον χρόνον θὰ διατρέξῃ τόξον (τοῦ αὐτοῦ κύκλου) $23^{\circ} 21' 10''$;

Έπιλυσις

"Έχομεν τὴν διαιρεσιν:

$$(23^{\circ} 21' 10'') : (3^{\circ} 20' 10'')$$

Εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν τρέπομεν διαιρέτεον καὶ διαιρέτην εἰς μονάδας τῆς αὐτῆς κατωτέρας τάξεως (εἰς sec) καὶ ἔπειτα ἐκτελοῦμεν τὴν διαιρεσιν κατὰ τὰ γνωστά.

$$23^{\circ} 21' 10'' = 84070'', \quad 3^{\circ} 20' 10'' = 12010'' \quad 84070:12010=7$$

"Ητοι τὸ κινητὸν θὰ διατρέξῃ τόξον $23^{\circ} 21' 10''$ εἰς 7 h.

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο ΑΣΚΗΣΕΙΣ

274. "Εν κινητὸν διατρέχει ἐπὶ ἐνὸς κύκλου τόξον $50^{\circ}10'20''$ εἰς 1 min. Πόσον τόξον τοῦ ίδιου κύκλου θὰ διατρέξῃ εἰς 8 min.

275. "Εν ὥρολόγιον εἰς 6 h μένει ὄπίσω 8 min, 30 sec. Πόσον μένει ὄπίσω εἰς 1 h;

276. "Εν αὐτοκίνητον διατρέχει εἰς 1 min 30 sec ἀπόστασιν 1 km. Εἰς πόσον χρόνον θὰ διατρέξῃ ἀπόστασιν $8 \frac{3}{4}$ km.

277. Τὰ 5/8 ἐνὸς τόξου ἔχουν τιμὴν $50^{\circ}12'55''$. Πόση εἶναι ἡ τιμὴ τοῦ τόξου τούτου;

278. "Ἐν διαστημικὸν πλοῖον ἑκτελεῖ μίαν πλήρη περιφορὰν περὶ τὴν γῆν εἰς 1 h καὶ 12 min. Πόσας τοιαύτας περιφοράς ἑκτελεῖ εἰς 14 h 24 min;

279. "Ἐν διαστημόπλοιον ἑκτελεῖ μίαν πλήρη περιφορὰν τῆς γῆς εἰς 1 h 20 min. Εἰς πόσον χρόνον θὰ διανύσῃ τοῦτο τόξον $30^{\circ} 20'$ τῆς ἀνωτέρω περιφορᾶς;

(Θεωροῦμεν τὴν τροχιάν τοῦ διαστημοπλοίου κυκλικήν).

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΝ

280) Εἰς μεικτὸν γυμνάσιον ἐνεγράφησαν 635 μαθηταὶ καὶ μαθήτριαι. Ἐὰν ἐνεγράφοντο 50 μαθηταὶ δόλιγώτεροι καὶ 15 μαθήτριαι περισσότεροι δὲ ἀριθμὸς τῶν μαθητῶν καὶ τῶν μαθητριῶν θὰ ἦτο ὁ αὐτός. Πόσοι μαθηταὶ καὶ πόσαι μαθήτριαι ἐνεγράφησαν;

281. Ἐργάτης ἑξετέλεσεν τὰ 3/5 ἐνὸς ἔργου ἐργασθεὶς 12 h μετὰ τὰς δόποιας προσελήφθη καὶ δεύτερος ἐργάτης. Τοιουτορόπως τὸ ἔργον ἑξετέλεσθη ἐν δλῶ εἰς 15 h. Ποῖον μέρος τοῦ ἔργου ἑξετέλεσεν δὲ δεύτερος ἐργάτης;

282. Ἐκ δύο πόλεων A, B ἀναχωροῦν συγχρόνως δύο κινητὰ α., β. Ἐὰν ἡ ταχύτης τοῦ α εἴναι μεγαλυτέρα τῆς ταχύτητος τοῦ β κατά 10 km τὴν δραν καὶ τὰ κινητὰ κινηθοῦν κατὰ τὴν αὐτήν φοράν, θὰ συναντηθοῦν μετὰ 42 h. Ἐὰν δὲ κινηθοῦν ἀντιθέτως θὰ συναντηθοῦν μετά 7 h. Νὰ εὐρεθοῦν αἱ ταχύτητες καὶ ἡ ἀπόστασις AB.

283. Ἐργολάβος ἔχει 3 συνεργεία ἐργατῶν. Τὸ α' δύναται νὰ περατώσῃ ἐν ἔργον εἰς 8 ἡμέρας, τὸ β' εἰς 5 ἡμέρας καὶ τὸ γ' εἰς 15 ἡμέρας. Λαμβάνει δὲ ἐργολάβος τὰ 2/3 τῶν ἐργατῶν τοῦ α' συνεργείου, τὸ 1/3 τοῦ β' καὶ τὰ 3/4 τοῦ γ' καὶ σχηματίζει νέον συνεργείον. Εἰς πόσας ἡμέρας τὸ νέον τοῦτο συνεργείον θὰ περατώσῃ τὸ αὐτὸ ἔργον;

284. Μία περιουσία ἔπρεπε νὰ διανεμηθῇ μεταξὺ τῶν κληρονόμων θανόντος, ἔκαστος τῶν δόποιων θὰ ἐλάμβανε 288000 δρχ. Λόγῳ διμως τῆς παραπήσεως δύο ἔξ αὐτῶν οἱ ὑπόδοιποι ἔλαβον διὰ 432000 δρχ. ἔκαστος. Πόσοι ήσαν οἱ κληρονόμοι;

285. Νὰ εὐρεθῇ ἀριθμὸς τοῦ δόποιου τὰ 2/3 αὐξανόμενα κατά 52 διδουν ἀθροισμα μεγαλύτερον τοῦ διπλασίου του κατά 12.

286. Εἰς πόσας ὥρας θὰ ἑκτελέσουν ἔργον τι τρεῖς ἐργάται ἐργαζόμενοι ὅμοι, ὅταν δὲ πρῶτος καὶ δεύτερος ἑκτελοῦν ὅμοι ἐργαζόμενοι τὸ ημίσυ τοῦ ἔργου εἰς 6 h καὶ δὲ πρῶτος καὶ δεύτερος διλοκληρον τὸ ἔργον εἰς 15 h. καὶ δὲ β' καὶ δὲ γ' εἰς 20 h.

287. Ἀποθηνήσκων τις ἀφίνει εἰς τὸν οὐλόν του τὰ 2/5 τῆς περιουσίας του, εἰς τὴν θυγατέραν τὰ 3/8 καὶ εἰς τὴν σύζυγόν του τὸ ὑπόλοιπον ήτοι 315.000 δρχ. Πόση ἦτο ἡ περιουσία;

288. "Ἐνας ἐργάτης ἑκτελεῖ τὰ 2/3 ἐνὸς ἔργου εἰς 9 ἡμέρας. "Άλλος ἐργάτης ἑκτελεῖ τὰ 5/8 τοῦ ίδιου ἔργου εἰς 5 ἡμέρας. Εἰς πόσας ἡμέρας θὰ ἑκτελέσουν τὸ ἔργον τοῦτο ἐὰν ἐργασθοῦν συγχρόνως καὶ οἱ δύο ἐργάται;

289. Τὰ 2/3 τοῦ 1/4 τῶν 3/5 τῆς ἡλικίας ἐνὸς ἀνθρώπου εἶναι 10 ἔτη. Πόση εἶναι ἡ ἡλικία τοῦ ἀνθρώπου τούτου.

290. Τρεῖς ἐργάται ἐμοιράσθησαν 19600 δρχ. κατά τοιοῦτον τρόπον ὥστε δὲ εἰς τούτων νὰ λάβῃ 800 δρχ. διλιγωτέρας τῶν δσων, ἔλαβεν ἔκαστος τῶν δύο δλλων. Πόσα χρήματα ἔλαβεν ἔκαστος;

Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ Ι Α

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

1. ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ

1. ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ

1.1. Τὸ παρόδν βιβλίον μᾶς εἰσάγει εἰς ἔνα βασικόν, ἔχαιρετικῶς ἐνδιαφέροντα καὶ χρήσιμον κλάδον τῶν Μαθηματικῶν, εἰς τὴν Γεωμετρίαν.

Τὸ δνομα «Γεω-μετρία» μαρτυρεῖ τὴν προέλευσιν της. Πρακτικαὶ ἀνάγκαι, ὅπως ἡ μέτρησις τεμαχίων γῆς, στερεῶν σωμάτων, καθώς καὶ ἡ ἔξτασις τοῦ σχήματος αὐτῶν ὀδήγησαν εἰς τὰς πρώτας γεωμετρικὰ γνώσεις.

1. 2. Μεταξύ των διαφόρων στερεῶν*, τὰ δποτα εύρισκονται γύρω μας, είναι εγκόλαρν γάτα παραπτηρήσωμεν μερικά βασικά, κοινά γνωρίσματα:

Τὸ βάρος: "Ολα τὰ στερεὰ σώματα ἔχουν βάρος.

Τὸν δύκον: "Ητοι τὴν περιωρισμένην ἔκτασιν τὴν δποίαν καταλαμβάνει ἔκαστον στερεόν εἰς τὸ ἀπεριόριστον διάστημα (χῶρον) τοῦ περιβάλλοντός μας. Αὕτη ἐκτείνεται ἐντὸς τοῦ χώρου εἰς βάθος, εἰς πλάτος καὶ εἰς μῆκος. Διὰ τοῦτο λέγομεν διτὶ ἔκαστον στερεόν σῶμα καθὼς καὶ διπεριβάλλων χώρος ἔνουν τρεῖς διαστάσεις.

Τὸ σχῆμα. Ἔκαστον στερεόν ἔχει μίαν ώρισμένην μορφήν, ἐν ώρισμένον σχῆμα. Τὴν μορφὴν (σχῆμα) τοῦ στερεοῦ τὴν ἀντιλαμβανόμεθα ἀπό τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ.

1.3.3. Ή συστηματική σπουδή τῶν στερεῶν σωμάτων ἐπέβαλεν τὴν ἔξι-
τασιν τούτων ἀπό διαφόρους ἀπόψεις. Πρῶτοι οἱ ἀρχαῖοι "Ελληνες** φιλό-

^{**} Ενα ύλικον σώμα λέγεται στερεόν, έαν το σχήμα και το μέγεθος αύτού είναι αμετάβλητα διπλανών αι ξεωτερικα συνθήκαι δεν διλλάζουν αισθητῶς.


** Αι μέχρι τήν ἐποχὴν ἔκεινην γεωμετρικαὶ γνώσεις ἀπέτελουν μίαν πρακτικὴν τέχνην καὶ δχι ἐπιστήμην. Οι ἀρχαῖοι Ἑλλῆνες ἐδημιούργησαν τὸ λαμπρὸν οἰκοδόμημα τῆς Μαθη-ματικῆς ἐπιστήμης.

σοφοί έξήτασαν τὰ στερεά, ίδιαιτέρως ὡς πρὸς τὸ σχῆμα καὶ τὸ μέγεθος, ἀδιαφοροῦντες διὰ τὰ λοιπὰ γνωρίσματα αὐτῶν (βάρος, ὑλην, χρῶμα . . .). Τοιουτότροπως ἀπὸ τὰ στερεὰ τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος ὡδηγήθησαν εἰς τὴν Ιδέαν τοῦ γεωμετρικοῦ στερεοῦ. 'Εὰν φαντασθῆτε ἐν στερεὸν μὲ σχῆμα καὶ μέγεθος ὡρισμένα καὶ ἀμετάβλητα εἰς τὰς μετατοπίσεις του ἐντὸς τοῦ χώρου, χωρὶς ἀλλα γνωρίσματα (βάρος, χρῶμα . . .) θὰ ἔχετε τὴν Ιδέαν ἐνὸς γεωμετρικοῦ στερεοῦ. Βεβαίως εἰς τὸ φυσικόν μας περιβάλλον δὲν ὑπάρχει τοιοῦτον στερεὸν χωρὶς ὑλην, βάρος . . . "Οπως δὲν ὑπάρχει π.χ. ὑλικὸς ἄξων περὶ τὸν ὅποιον περιστρέφεται ἡ γῆ ἀλλὰ εἶναι μόνον νοητός.

Γεωμετρικὰ στερεά ὑπάρχουν μόνον εἰς τὰς σκέψεις μας, εἶναι δημιουργίατα τοῦ νοῦ μας, τὰ ὅποια προέρχονται ἀπὸ τὰ φυσικὰ στερεά, δταν «λημμονήσωμεν» γνωρίσματα αὐτῶν.

2. ΑΠΛΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ

1. 2. 'Απὸ τὸ δημοτικὸν σχολεῖον ἔχετε μίαν πρώτην γνωριμίαν μὲ μερικὰ ἀπλᾶ γεωμετρικὰ στερεά, τὰ ὅποια προέρχονται ἀπὸ τὰ ἀντίστοιχα φυσικά στερεά.




"Ανω: Εἰκόνες φυσικῶν στερεῶν. Κάτω: Εἰκόνες γεωμετρικῶν στερεῶν.

Κατωτέρω θὰ περιγράψωμεν συντόμως δύο χαρακτηριστικά ἐκ τῶν ἀπλουστέρων γεωμ. στερεῶν. Τὸ δρθογώνιον υπαράσταλη λεπίδεον καὶ τὸν κύλινδρον.

2. 2. Τὸ δρθογώνιον παραλληλεπίδεον

"Ἐν κυτίον ἀπὸ κιμωλίας ἢ ἀπὸ σπίρτα, πολλὰ κιβώτια καὶ γενικῶς πολλὰ ἀντικείμενα τοῦ περιβάλλοντος μας ἔχουν σχῆμα δρθογώνιου παραλληλ-

πιπέδου. "Ας προσέξωμεν τὸ ὄρθογώνιον παραλληλεπίπεδον τοῦ σχ. 2. Παρατηροῦμεν ὅτι δόλκληρος ἡ ἐπιφάνεια αὐτοῦ ἀποτελεῖται ἀπὸ 6 διακεκριμένα ἐπίπεδα μέρη, τὰς ἔδρας. Ἐκάστη ἔδρα ἔχει σχῆμα ὁρθογωνίου. Ἀνὰ δύο ἀπέναντι ἔδραι δὲν τέμνονται, ἐνῶ ἀνὰ δύο συνεχόμεναι τέμνονται (συναντῶνται) κατὰ μίαν γραμμήν. Ἐκάστη ἀπὸ τὰς γραμμάς αὐτᾶς λέγεται ἀκμή τοῦ στερεοῦ. Μερικαὶ ἀπὸ τὰς ἀκμάς ἀνὰ τρεῖς τέμνονται (συναντῶνται) εἰς ἓν σημεῖον. Ἐκαστὸν τῶν σημείων αὐτῶν λέγεται κορυφὴ τοῦ ὄρθογ. παραλληλεπιπέδου.



Σχ. 2

"Ητοι ἔκαστον ὄρθογώνιον παραλληλεπίπεδον ἔχει:

6 ἔδρας, 12 ἀκμάς καὶ 8 κορυφάς.

2. 3. Ὁ κύλινδρος

"Ἐν κυτίον γάλακτος, εἰς κλειστὸς σωλὴν θερμάστρας ἢ ὑδατος, πολλὰ μολύβια, ἢ ἀξιονες διαφόρων ἐργαλείων, μηχανῶν, ἔχουν σχῆμα κυλίνδρου.

Μία περιστρεφομένη θύρα, ὅπως π.χ. ὥρισμέναι θύραι τραπεζῶν καὶ μεγάλων καταστημάτων, μᾶς δεικνύει πῶς γεννᾶται εἰς κύλινδρος ἐκ τῆς περιστροφῆς ἐνὸς ὄρθογωνίου παραλληλογράμμου ΑΒΓΔ περὶ μίαν πλευρὰν ΑΔ αὐτοῦ (σχ. 3).

"Ας προσέξωμεν ἕνα κύλινδρον π.χ. τὸν κύλινδρον τοῦ σχ. 3. Παρατηροῦμεν ὅτι οὗτος περατοῦται:

α) Εἰς μίαν καμπύλην ἐπιφάνειαν, ἡ ὁποία γεννᾶται ὑπὸ τῆς πλευρᾶς ΒΓ κατὰ τὴν περιστροφὴν αὐτῆς περὶ τὴν ΑΔ.


β) Εἰς δύο ἐπιπέδους ἐπιφανείας, αἱ ὁποῖαι γεννῶνται ὑπὸ τῶν πλευρῶν ΑΒ, ΓΔ κατὰ τὴν περιστροφὴν τοῦ ὄρθογωνίου ΑΒΓΔ περὶ τὴν ΑΔ.

Παρατηροῦμεν ἀκόμη ὅτι ἔκάστη ἐπίπεδος ἐπιφάνεια τοῦ κυλίνδρου περατοῦται εἰς μίαν καμπύλην γραμμήν, ἡ ὁποία δονομάζεται κύκλος.

3. ΤΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ


3. 1. Τὸ γεωμετρικὸν σχῆμα ὡς σύνολον σημείων

α) Καθὼς εἴδομεν εἰς τὸ ὄρθογ. παραλ/δον ἀνὰ δύο συνεχόμεναι ἀκμαὶ μιᾶς ἔδρας αὐτοῦ συναντῶνται εἰς ἓν σημεῖον. Ὁ κόκκος κόνεως, τὸ ἵχνος τῆς μύτης τοῦ μολυβιοῦ μας (ὅταν τὸ κρατοῦμεν ἀκίνητον) εἰς τὸ σχέδιον,



Σχ. 3

μᾶς δίδουν μίαν ίδεαν τοῦ σημείου. Τὸ σημεῖον ὡς γεωμετρικὸν στοιχεῖον δὲν ἔχει διαστάσεις. 'Απλῶς δρίζει μίαν θέσιν. Εἰς τὸ σχέδιον τὸ παριστάνομεν μὲν μίαν τελείαν καὶ τὸ ὄνομάζομεν μὲν ἐν κεφαλαίον γράμμα (Σημεῖον Α, Σημεῖον Β...).



Σχ. 4

Τὸ δόποιον μετατοπίζεται εἰς τὸν χῶρον. Διὰ τοῦτο λαμβάνομεν τὴν γραμμὴν ὡς σύνολον σημείων (σημειοσύνολον).

'Εξ ἄλλου τὰ γνωστά μας σχήματα (τὸ ὅρθιογώνιον παραλληλόγραμμον, ὁ κύκλος, τὸ τρίγωνον...) ἀπαρτίζονται ἀπὸ γραμμάς. Εἶναι συνεπῶς καὶ αὐτὰ σύνολα σημείων.


3. 2. Ἰσότης γεωμετρικῶν σχημάτων

Τὸ σχ. 5 δεικνύει πῶς δυνάμεθα νὰ ἀναπτύξωμεν τὴν ἐπιφάνειαν ἐνὸς ὅρθιογωνίου παραλληλεπιπέδου (σχ. 5α) ἐπὶ τοῦ ἐπιπέδου μιᾶς ἔδρας αὐτοῦ (οχ. 5β).

'Ἐπὶ διαφανοῦς φύλλου χάρτου ἀντιγράφομεν τὸ σχῆμα τῆς ἔδρας ΑΒΓΔ.

τὸν διαφανὸν φύλλον χάρτου μετατοπίζομεν τὸ σχῆμα τῆς ἔδρας ΑΒΓΔ.

τὸν διαφανὸν φύλλον χάρτου μετατοπίζομεν τὸ σχῆμα τῆς ἔδρας ΑΒΓΔ.



Σχ. 5

Τὸ ἀντίγραφον τοῦτο δυνάμεθα νὰ τὸ τοποθετήσωμεν καταλλήλως ἐπὶ τοῦ σχήματος τῆς ἀπέναντι ἔδρας EZΗΘ εἰς τρόπον ὥστε τὰ δύο σχήματα νὰ ἐφαρμόσουν καὶ νὰ ἀποτελέσουν ἐν σχῆμα*. Διὰ τοῦτο λέγομεν δτὶ τὰ δύο δύο αὐτὰ σχήματα εἶναι ἵσα μεταξύ των ἢ ἀπλῶς ἴσα.

Γενικῶς : Δύο γεωμετρικὰ σχήματα Σ, Σ' λέγονται ἴσα μεταξύ των, ὅταν εἶναι δυνατὸν γὰ τοποθετήσωμεν τὸ ἐπὶ τοῦ ἄλλου εἰς τρόπον ὥστε νὰ ἐφαρμόσουν καὶ νὰ ἀποτελέσουν ἐν σχῆμα.

* Ἡ ἐργασία αὐτῇ ἀντιστοιχεῖ εἰς τὴν νοερὰν μετατόπισιν τῶν γεωμετρικῶν σχημάτων.

Κατά τ' ἀνωτέρω :

Αἱ ἀπέναντι ἔδραι δρθογωνίου παραλληλογράμμου εἰναι ἵσαι.

"Οταν δύο γεωμ. σχήματα Σ , Σ' δὲν εἶναι ἵσα μεταξύ των, λέγομεν διτι εἰναι ἄνισα καὶ γράφομεν $\Sigma \neq \Sigma'$.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1. Αναφέρατε φυσικά ἀντικείμενα τὰ δόποια ἔχουν σχῆμα γνωστῶν γεωμετρικῶν στερεῶν.
2. Κατασκευάσατε ὑποδείγματα (μοντέλα) κύβου, πρίσματος, πυραμίδος καὶ περιγράψατε αὐτά.
3. Μὲ ἐν διαφανὲς φύλλον χάρτου συγκρίνατε τὰ σχήματα τῶν παραπλεύρων ἔδρῶν ἐνὸς τριγωνικοῦ πρίσματος. Πόσας συγκρίσεις χρειάζεσθε;
4. Εὑρέτε φυσικά ἀντικείμενα τῶν δόποιων τὸ σχῆμα εἶναι σύνθεσις σχημάτων ἀπλῶν γεωμ. στερεῶν.

4. Η ΕΥΘΕΙΑ

4. 1. Μία φωτεινὴ ἀκτίς, ἐν τεντωμένον νῆμα, εἰκονίζουν εύθειας γραμμάς. "Η εύθεια ὡς γεωμετρικὸν στοιχείον δὲν ἔχει τὰ γνωρίσματα τῶν ὑλικῶν εύθειῶν (πάχος, χρῶμα, βάρος). "Εχει μόνον μίαν διάστασιν ἐκτείνεται εἰς μῆκος. Εἰς τὴν πρακτικὴν ἡ εύθεια ἀντιπροσωπεύεται συνήθως ἀπὸ τὴν ἀκμὴν ἐνὸς κανόνος σχεδιάσεως. Π.χ. διὰ νὰ ἐλέγξωμεν ἐὰν μία ἀκμὴ ἐνὸς στερεοῦ εἶναι εύθεια, τοποθετοῦμεν ἐπ' αὐτῆς τὴν ἀκμὴν τοῦ κανόνος καὶ ἔξετάζομεν ἐὰν αἱ δύο αὗται ἀκμαὶ εἶναι δυνατὸν νὰ ἐφαρμόσουν.

"Ομοίως μὲ δόηγδον τὴν ἀκμὴν τοῦ κανόνος χαράσσομεν εύθειας γραμμάς, σχ. 6.


4. 2. Εἰς τὸ σχέδιόν σας σημειώσατε ἐν σημείον A. Πόσαι εύθειαι διέρχονται δι' αὐτοῦ; "Απειροι.

Σημειώσατε ἐπίστη δύο διαφορετικά σημεῖα B, Γ. Πόσαι εύθειαι διέρχονται καὶ διὰ τῶν δύο αὐτῶν σημείων; Μία καὶ μόνον μία.

Παρατηρήσεις ὡς αἱ ἀνωτέρω μᾶς ἔξηγοῦν διατί εἰς τὴν Γεωμετρίαν δεχόμεθα διτι:

Διὰ δύο διαφορετικῶν σημείων διέρχεται μία καὶ μόνον μία εύθεια.

Διὰ τοῦτο λέγομεν διτι δύο διαφορετικά σημεῖα A, B δρίζουν μίαν εύθειαν: τὴν εύθειαν AB η BA.



Σχ. 6

* "Ητοι ἡ Ισότης $\Sigma = \Sigma'$ σημαίνει ἐνταῦθα διτι τὸ Σ εἶναι ἐφαρμόσιμον (δύναται νὰ ἐφαρμόσῃ) ἐπι τοῦ Σ' .

*Επίσης μίαν εύθειαν τήν δυνομάζομεν μέ έν μικρόν γράμμα τοῦ ἀλφαβήτου μας. (εύθεια ε, εύθεια δ...).

4. 4. Είναι εύκολον νὰ ἀντιληφθῶμεν ὅτι ἡ εύθεια προεκτεῖ νεται ὅσον θέλομεν. Διὰ τοῦτο εἰς τὴν Γεωμετρίαν δεχόμεθα ὅτι:

*Η εύθεια δύναται νὰ προεκταθῇ ἀπεριορίστως ἑκατέρωθεν.

4. 5. α) Προσέξατε τὰς εύθειας τῶν πλευρῶν ἐνὸς δρθιγωνίου παραλληλογράμμου. Ἀνὰ δύο ἀπέναντι εύρισκονται εἰς τὸ αὐτὸν ἐπίπεδον καὶ οὐδὲν κοινὸν σημεῖον ἔχουν. Ἀντιθέτως ἀνὰ δύο συνεχόμεναι ἔχουν ἐν κοινὸν σημεῖον.


β) Εἰς τὸ «ἐπίπεδον» ἐνὸς φύλλου τοῦ τετραδίου χαράξατε δύο εύθειας.

Πόσα τὸ πολὺ κοινὰ σημεῖα δυνατὸν νὰ ἔχουν αὗται;

Παρατηροῦμεν ὅτι :

*Η οὐδὲν κοινὸν σημεῖον ἔχουν, δοσονδήποτε καὶ ἀν προεκταθοῦν, ὅπως π.χ. αἱ εύθειαι α , α' τοῦ σχ. 7.

*Η ἔχουν ἐν μόνον κοινὸν σημεῖον, ὅπως συμβαίνει μὲ τὰ ζεύγη τῶν εὐθειῶν β , β' καὶ γ , γ' τοῦ σχ. 7.



Σχ. 7

Εἰς τὴν πρώτην περίπτωσιν λέγομεν ὅτι αἱ εύθειαι α , α' εἶναι παράλληλοι*, ἐνῶ εἰς τὴν δευτέραν ὅτι τέμνονται. Τὸ μοναδικὸν κοινὸν σημεῖον αὐτῶν λέγεται σημεῖον τομῆς.

Αἱ ἀνωτέρω παρατηρήσεις μᾶς δόηγοῦν εἰς τὸ ἔξῆς συμπέρασμα τὸ δόποιον ἰσχύει τόσον διὰ τὰς ύλικὰς εύθειας τοῦ σχεδίου ὅσον καὶ διὰ τὰς γεωμετρικὰς εύθειας.

Δύο διαφορετικαὶ εύθειαι τοῦ ἐπιπέδου εἶναι δυνατόν:

α) Οὐδὲν κοινὸν σημεῖον νὰ ἔχουν, ὅπότε λέγομεν ὅτι εἶναι μεταξύ των παράλληλοι.

β) Νὰ ἔχουν ἐν μόνον κοινὸν σημεῖον, ὅπότε λέγομεν ὅτι τέμνονται.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

5. Σημειώσατε δύο σημεῖα A , B καὶ ἔπειτα χαράξατε δύο εύθειας ϵ , ϵ' τοιαύτας ὥστε $A\epsilon$, $B\epsilon$, $A\epsilon'$.

6. Μὲ τὴν βοήθειαν τῆς ἀκμῆς τοῦ κανόνος νὰ εύρετε ἐπί τῆς κυρτῆς ἐπιφανείας τοῦ κυλίνδρου εύθειας. Τι παρατηρεῖτε;

7. Σημειώσατε εἰς τὸ τετράδιόν σας τρία διαφορετικά σημεῖα καὶ χαράξατε ἔπειτα δύλα

* Μὲ τὰς παραλλήλους εύθειας θὰ ἀσχοληθῶμεν ἑκτενέστερον εἰς δλλο κεφάλαιον.


τάς εύθειας, αι δποίαι διέρχονται από αύτά. Πόσαι τοιαῦται εύθειαι οπάρχουν; (Διακρίνατε περιπτώσεις).

8. Ἐπαναλάβατε τὸ ἀνωτέρω πρόβλημα διὰ τέσσαρα διαφορετικά σημεῖα. (Διακρίνατε διαφόρους περιπτώσεις).

9. Διὰ τρεῖς εύθειας α , β , γ καὶ ἐν σημείον M τοῦ ἐπιπέδου γνωρίζετε διὰ $M\epsilon(\alpha\beta)\gamma$. Ποιον είναι τὸ σχετικὸν σχέδιον;

5. ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟΝ

5. 1. Ἡ ἑπιφάνεια τοῦ πίνακος, τοῦ ἡρεμοῦντος ὅδατος, τοῦ λείου δαπέδου, είναι ὑλικαὶ παραστάσεις ἑπιπέδων ἑπιφανειῶν. Ἀπὸ αὐτὰς ἔδημιουργήθη εἰς τὴν σκέψιν μας ἡ γεωμετρικὴ ἴδεα τῆς ἐπιπέδου ἐπιφανείας ἡ ἀπλῶς τοῦ ἐπιπέδου.




Σχ. 8

5. 2. Διὰ νὰ ἐλέγξωμεν ἐὰν ἡ ἑπιφάνεια τοῦ πίνακος είναι ἐπιπέδος, τοποθετοῦμεν ἐπ' αὐτῆς τὴν ἀκμὴν τοῦ κανόνος. Πρέπει τότε, δποιαδήποτε καὶ ἐὰν είναι ἡ θέσις τοῦ κανόνος, ἡ εύθεια, ἡ δποία δρίζεται ἀπὸ δύο σημεία αὐτοῦ, νὰ εύρισκεται δλόκληρος ἐπὶ τοῦ ἐπιπέδου.

Ἀπὸ τὸ πείραμα τοῦτο δηγούμεθα εἰς τὴν ἑέῆς ιδιότητα τοῦ ἐπιπέδου:

Ἡ εύθεια ἡ δποία δρίζεται ἀπὸ δύο δποιαδήποτε διαφορετικὰ σημεῖα τοῦ ἐπιπέδου κεῖται δλόκληρος ἐπ' αὐτοῦ.

Ἀπὸ τὴν ἀνωτέρω πρότασιν ἐννοοῦμεν διτι, δπως ἡ εύθεια δὲν ἔχει ἄκρα, ἀλλὰ δυνάμεθε νὰ τὴν προεκτείνωμεν ὅσον θέλομεν, τοιουτοτρόπως καὶ τὸ ἐπιπέδον προεκτείνεται ἀπεριορίστως πρὸς ὅλας τὰς διευθύνσεις αὐτοῦ.



Σχ. 9

5. 3. α) Ἡ θύρα τοῦ σχεδ. 9 παριστάνει ἐν ἐπιπέδον τὸ δποίον διέρχεται ἀπὸ δύο διαφορετικὰ σημεῖα A , B (τὰ κέντρα τῶν στροφέων). Ἀπὸ τὴν στροφὴν τοῦ ἐπιπέδου τῆς θύρας περὶ τὴν εύθειαν AB αὐτοῦ ἐννοοῦμεν διτι:

Ἀπὸ μίαν εύθειαν διέρχονται ἄπειρα ἐπίπεδα.

Τὰ ἐπίπεδα αὐτὰ ἀντιπροσωπεύονται ἀπὸ τὰς διαφόρους θέσεις τῆς στροφομένης θύρας.

β) Ἐάν τοποθετήσωμεν μίαν καρφίδα εἰς τὸ δάπτεδον, (σημείον G) ἔκτὸς τῆς εύθειας AB τῶν στροφέων, τότε ἡ θύρα θὰ προσκρούσῃ εἰς αὐτὴν καὶ θὰ σταθεροποιηθῇ εἰς μίαν ὥρισμένην θέσιν.

"**Ητοι : Μία εύθεια AB καὶ ἐν σημείον Γ ἑκτὸς αὐτῆς δρίζουν ἐν καὶ μόνον ἐν ἐπίπεδον.**


Εἰς τὸ ἐπίπεδον τοῦτο κεῖται ἡ εύθεια AB καὶ τὸ σημείον Γ.

γ) Ἐὰν σκεφθῶμεν ὅτι ἡ εύθεια AB δρίζεται ἀπὸ τὰ δύο διαφορετικά στη- μεῖα A, B, τότε ἡ προτιγουμένη πρότασις διατυπώνεται καὶ ὡς ἔχει :

Τρία διαφορετικά σημεῖα A, B, Γ μὴ κείμενα ἐπ' εύθειας δρίζουν ἐν καὶ μόνον ἐν ἐπίπεδον.

5. 6. Γένεσις ἐπιπέδου διὰ κινήσεως εύθειας

Τὰ κατωτέρω σχέδια 10α, β, γ δεικνύουν πῶς γεννᾶται ἐν ύλικὸν ἐπίπεδον διὰ καταλλήλου μετατοπίσεως μιᾶς ύλικῆς εύθειας.



(α) (β) (γ)

Σχ. 10

α) Διὰ στροφῆς μιᾶς εύθειας

Ἐπὶ τοῦ ἐπιπέδου ἐνὸς σκληροῦ φύλλου χάρτου σχεδιάζομεν μίαν εύθειαν ε καὶ ἔπειτα κατὰ μῆκος αὐτῆς τοποθετοῦμεν τὴν ἀκμὴν τοῦ κανόνος, (σχ. 11). Ἐὰν ἢδη περιστρέψωμεν τὸν κανόνα περὶ ἐν σημείον A τῆς ε, προσέ- χοντες ὥστε ἡ ἀκμὴ τοῦ νὰ παραμένῃ ἐπὶ τοῦ ἐπιπέδου τοῦ χάρτου, θὰ παρα- τηρήσωμεν ὅτι εἰς μίαν πλήρη περιστροφήν, ἡ ἀκμὴ τοῦ κανόνος θὰ δια- γράψῃ δλόκληρον τὸ ἐπίπεδον.

Ο ἀνωτέρω τρόπος ἐργασίας εἶναι μία στροφὴ τῆς εύθειας ε περὶ τὸ σημείον A.


β) Διὰ παραλλήλου μετατοπίσεως

Ἐπὶ τοῦ ἐπιπέδου τοῦ πίνακος ἡ μιᾶς πινακίδος σχεδιάσεως, τοποθετοῦ- μεν τὸ ταῦ, ὡς δεικνύει τὸ σχ. 12 καὶ δλίσθαί νομεν αὐτὸ προσέχοντες ὥστε ἡ κεφαλή του νὰ ἐφαρμόζῃ σταθερῶς ἐπὶ τῆς πλευρᾶς τοῦ πίνακος (ἡ τῆς πινα- κίδος).


Παρατηροῦμεν ὅτι κατὰ τὴν δλίσθησιν αὐτὴν ἡ εύθεια ε τῆς ἀκμῆς τοῦ βραχίονος τοῦ ταῦ διαγράφει τὸ ἐπίπεδον, τοῦ πίνακος.

Ο ἀνωτέρω τρόπος ἐργασίας λέγεται παράλληλος μετατόπισις τῆς εύθειας ε.

‘Από τ’ ἀνωτέρω συνάγομεν ὅτι : Ηδη διαφέρει ο περιπτώσεως αριθμός της εύθειας.



Σχ. 11



Σχ. 12

5. 7. Τὸ ἐπίπεδον ὡς σημειοσύνολον

Ἐπειδὴ ἡ εύθεια εἶναι ἐν σημειοσύνολον, τὸ δὲ ἐπίπεδον γεννᾶται ἀπὸ τὴν εὐθεῖαν, εἶναι φυσικὸν νὰ θεωρήσωμεν τὸ ἐπίπεδον ὡς σημειοσύνολον*.

(Ἐάν κτυπήσωμεν ἔνα σπόγγον ἐπὶ τοῦ πίνακος τότε ὁ πίναξ καλύπτεται μὲ κόνιν κιμωλίας Ἐάν ἑκαστος κόκκος κόνεως παριστάνῃ ἐν σημείον, τότε τὸ στρῶμα τῆς κόνεως τοῦ πίνακος παριστάνει τὸ σημειοσύνολον τοῦ ἐπιπέδου).

5. 8. Τομὴ δύο διαφορετικῶν ἐπιπέδων

Προσέξατε δύο συνεχομένας ἔδρας τοῦ ὀρθογωνίου παραλληλεπιπέδου. Ἐχουν κοινὰ σημεία κείμενα ἐπὶ μιᾶς εύθειας. Ὁταν δύο διαφορετικὰ ἐπίπεδα ἔχουν κοινὰ σημεῖα, τότε λέγομεν ὅτι τέ μνονται. Εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν τὸ σύνολον τῶν κοινῶν σημείων εἶναι μία εὐθεῖα, ἡ ὁποία λέγεται τομὴ τῶν δύο ἐπιπέδων.

5. 9. Ἐπίπεδα σχήματα

Εἰς τὸ βιβλίον αὐτὸν θὰ περιορισθῶμεν εἰς τὴν μελέτην γεωμετρικῶν σχημάτων ὅπως εἶναι ἡ εύθεια, ὁ κύκλος, τὸ τρίγωνον, ἡ γωνία, τὰ ὅποια ἔχουν ὅλα των τὰ σημεῖα ἐπὶ ἑνός ἐπιπέδου καὶ ὀνομάζονται διὰ τοῦτο ἐπιπέδα σχήματα. Ὁ ιδιαίτερος κλάδος τῆς γεωμετρίας ὁ ὅποιος ἀναφέρεται εἰς τὰ ἐπίπεδα σχήματα, λέγεται ἐπιπέδομετροία.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

10 Ἀναφέρατε παραδείγματα σχηματισμοῦ ἐνὸς ἐπιπέδου διὰ καταλλήλου κινήσεως εύθειας.

* Τὸ σημειοσύνολον ἐνὸς ἐπιπέδου εἶναι διαφορετικὸν εἶδος σημειοσύνολου ἀπὸ τὸ σημειοσύνολον μιᾶς εύθειας.

11. 'Εξετάσατε έδαν είναι δυνατόν νά μη είναι έπιπεδον σχῆμα ήν τρίγωνον.
 12. 'Εξετάσατε έδαν είναι δυνατόν ήν τετράπλευρον νά μη είναι έπιπεδον σχῆμα.
 13. Τέσσαρα διαφορετικά στημεῖα δέν εύρισκονται επὶ τοῦ αὐτοῦ έπιπέδου. 'Εξετάσατε έδαν τρία έξι αὐτῶν εύρισκονται επὶ τῆς αὐτῆς εὐθείας.
 14. Πόσα έπιπεδα δρίζουν 4 διαφορετικά στημεῖα ἀνὰ τρία τῶν όποιών δὲν κείνται επὶ τῆς αὐτῆς εὐθείας;

ΕΠΙΠΕΔΟΜΕΤΡΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.

6. Η ΗΜΙΕΥΘΕΙΑ

*Ἐπὶ μιᾶς εὐθείας χ' χ σημειώνομεν ἐν σημείον Α, σχ. 13.

Παρατηροῦμεν τότε ὅτι ἡ ε χωρίζεται εἰς δύο ἀπεριόριστα μέρη. *Ἐκαστὸν τούτων λέγεται ἡ μιευθεία.

Τὸ σημείον Α, τὸ δόποιον είναι τὸ μοναδικὸν ἄκρον ἐκάστης τῶν ήμιευθειῶν τοῦ σχ. 13α, λέγεται ἀρχή ἡ ἐκάστης τῶν ήμιευθειῶν τούτων.


*Ητοι, ἡ ήμιευθεία δύναται νὰ προεκταθῇ ἀπεριορίστως πρὸς μίαν μόνον κατεύθυνσιν.

Μία ήμιευθεία δονομάζεται κατὰ δύο τρόπους:

α) Μὲ δύο κεφαλαῖα γράμματα, π.χ. ΑΜ. *Ἐκ τούτων τὸ μὲν πρῶτον είναι τὸ ὄνομα τῆς ἀρχῆς, τὸ δὲ δεύτερον ἐνός δόποιου δῆλου σημείου αὐτῆς. Π.χ. ἡ ήμιευθεία ΑΜ τοῦ σχ. 13β ἔχει ἀρχὴν τὸ Α.

β) Μὲ ἐν κεφαλαίον γράμμα, τὸ ὄνομα τῆς ἀρχῆς της, καὶ ἐν μικρὸν γράμμα διὰ τὴν κατεύθυνσιν πρὸς τὴν δόποιαν ἡ ήμιευθεία δύναται νὰ προεκταθῇ ἀπεριορίστως. Π.χ., εἰς τὸ σχ. 13α, τὸ σημείον Α χωρίζει τὴν εὐθείαν χ' Αχ εἰς τὰ δύο ήμιευθείας Αχ καὶ Αχ'. *Ἐκάστη τῶν ήμιευθειῶν τούτων λέγεται ἀντίθετος ἢ ἀντικειμένη τῆς δῆλης.

7. ΤΟ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΝ ΤΜΗΜΑ



*Ἐπὶ μιᾶς εὐθείας ε σημειώνομεν δύο σημεῖα Α, Β.

Τὸ σύνολον τὸ δόποιον ἀπαρτίζεται ἀπὸ τὰ δύο σημεῖα καὶ ἀπὸ τὰ μεταξὺ αὐτῶν κείμενα σημεῖα τῆς εὐθείας ε λέγεται εὐθύγραμμον τμῆμα ΑΒ ἢ ΒΑ.

Τὰ σημεῖα Α, Β λέγονται ἄκρα τοῦ εὐθ. τιμήματος ΑΒ. Ἐάν τὰ ἄκρα αὐτὰ συμπέσουν ($A \equiv B$), τότε τὸ ΑΒ λέγεται μηδενικὸν εὐθύγραμμον τμῆμα.


8. Η ΤΕΘΛΑΣΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

8. 1. Εἰς τὸ σχ. 15 ἔχομεν τέσσαρα εὐθύγραμμα τμήματα. Κατὰ σειρὰν τὰ ΑΒ, ΒΓ, ΓΔ καὶ ΔΕ. Παρατηροῦμεν ὅτι :


Τὸ πρῶτον ΑΒ καὶ τὸ δεύτερον ΒΓ ἔχουν ἐν κοινὸν ἄκρον καὶ δὲν κεῖνται ἐπ' εὐθείας. Ὁμοίως τὸ δεύτερον ΒΓ καὶ τὸ τρίτον ΓΔ ἔχουν ἐν κοινὸν ἄκρον καὶ δὲν κεῖνται ἐπ' εὐθείας κ.ο.κ. Ἡ γραμμὴ ΑΒΓΔΕ λέγεται τεθλασμένη γραμμῆς τὰ σημεῖα Α, Β, Γ, Δ, Ε λέγονται κορυφαῖ. Τὰ σημεῖα Α καὶ Ε ἄκρα καὶ τὰ τμήματα ΑΒ, ΒΓ, ΓΔ καὶ ΔΕ πλευραῖ.

Τῆς ἀνωτέρω τεθλασμένης γραμμῆς τὰ σημεῖα Α, Β, Γ, Δ, Ε λέγονται κορυφαῖ. Τὰ σημεῖα Α καὶ Ε ἄκρα καὶ τὰ τμήματα ΑΒ, ΒΓ, ΓΔ καὶ ΔΕ πλευραῖ.

8. 2. Μία τεθλασμένη γραμμὴ τοῦ ἐπιπέδου λέγεται κυρτή ὅταν ἡ



Σχ. 15



Σχ. 16

εὐθεῖα, ἡ δόποια διέρχεται ἀπό δύο τυχούσας διαδοχικάς κορυφάς αὐτῆς, ἀφήνη δὲν τὰς ἄλλας κορυφάς πρὸς τὸ αὐτὸ μέρος μετά τῆς τεθλασμένης γραμμῆς. Π.χ. ἡ τεθλασμένη γραμμὴ τοῦ σχ. 16 εἶναι κυρτή ἢ τεθλασμένη γραμμὴ τοῦ σχ. 15 δὲν εἶναι κυρτή. Διατί;

8. 3. "Οταν τὰ ἄκρα μιᾶς τεθλασμένης γραμμῆς συμπίπτουν, σχ. 16, τότε αὐτῇ λέγεται κλειστὴ τεθλασμένη γραμμὴ ἢ πολύγωνον.

"Ἐν πολύγωνον ἔχει τὸν ἴδιον ἀριθμὸν κορυφῶν καὶ πλευρῶν. Ἐάν δὲ ἀριθμὸς οὗτος εἴναι 3, 4, 5... τὸ πολύγωνον λέγεται τρίγωνον, τετράπλευρον, πεντάγωνον... ἀντιστοίχως. Ἐκαστον εὐθ. τμῆμα τὸ δόποιον συνδέει δύο μή γειτονικάς κορυφάς τοῦ πολυγώνου λέγεται διαγώνιος αὐτοῦ.

ΑΙΓΑΙΟΝ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

15. Ἐπὶ μιᾶς εὐθείας ε σημειώσατε δύο διαφορετικά σημεῖα Α καὶ Β. Ποῖαι ἡμιευθεῖαι δρίζονται α) μὲ ἀρχὴν τὸ Α β) μὲ ἀρχὴν τὸ Β;

16. Ἐπὶ μιᾶς εὐθείας ε σημειώσατε 4 διαφορετικά σημεῖα Α, Β, Γ, Δ. Νὰ εὑρετε δλα τὰ εὐθύγραμμα τμήματα τὰ δόποια σχηματίζονται.

17. Ἐπὶ ἑνὸς ἐπιπέδου σημειώσατε 5 διαφορετικά σημεῖα Α, Β, Γ, Δ, Ε τοιαῦτα ώστε ἀνὰ τρία νὰ μή κεῖνται ἐπὶ τῆς αὐτῆς εὐθείας. Πόσα εὐθ. τμήματα δρίζονται τοιουτορόπτως;

18. Νὰ σχεδιάσετε ἐν ἑξάγωνον καὶ ἔπειτα νὰ εὕρετε πόσαι διαγώνιοι ἀγονται α) ἐκ μιᾶς κορυφῆς, β) ἐξ δλων τῶν κορυφῶν αὐτοῦ δμοῦ.

19. Τὸ ἀνωτέρω πρόβλημα νὰ ἔρεταισθῇ καὶ εἰς τὴν περίπτωσιν 7/γώνου, 8/γώνου.

9. ΙΣΑ, ΑΝΙΣΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

9. 1. Ὁρισμοί

Χαράσσομεν δύο εὐθύγραμμα τμήματα AB , $\Gamma\Delta$ καὶ μίαν ἡμιευθεῖαν $O\chi$. Μὲ τὸν διαβήτην ἢ τὸ διαστημόμετρον μεταφέρομεν τὸ AB ἐπὶ τῆς $O\chi$ εἰς τρόπον ὥστε τὸ ἐν ἄκρον του νὰ συμπέσῃ μὲ τὴν ἀρχὴν O αὐτῆς, σχ. 17.

Τὸ αὐτὸν ἐπαναλαμβάνομεν καὶ διὰ τὸ $\Gamma\Delta$.

Ὑπάρχουν τότε ἀποκλειστικῶς τὰ ἀκόλουθα τρία ἐνδεχόμενα :


α) Τὸ Δ νὰ κεῖται μεταξὺ τῆς ἀρχῆς O καὶ τοῦ B , σχ. 17α. Λέγομεν τότε ὅτι AB εἶναι μεγαλύτερον τοῦ $\Gamma\Delta$ καὶ γράφομεν $AB > \Gamma\Delta$.

β) Τὸ B νὰ κεῖται μεταξὺ τῆς ἀρχῆς O καὶ τοῦ Δ (σχ. 17β), δόποτε λέγομεν ὅτι AB εἶναι μικρότερον τοῦ $\Gamma\Delta$ καὶ γράφομεν $AB < \Gamma\Delta$.

γ) Τὸ B νὰ συμπέσῃ (ταυτισθῇ) μὲ τὸ Δ (σχ. 17γ). λέγομεν δὲ ὅτι AB εἶναι ίσον μὲ $\Gamma\Delta$ καὶ γράφομεν $AB = \Gamma\Delta$.

“Οταν AB δὲν εἶναι ίσον μὲ $\Gamma\Delta$, δόποτε θὰ εἶναι ἡ μεγαλύτερον ἢ μικρότερον ἀπὸ αὐτό, λέγομεν ὅτι τὰ τμήματα AB καὶ $\Gamma\Delta$ εἶναι ἀνισά γράφομεν δὲ $AB \neq \Gamma\Delta$.

Σημειωτέον ὅτι αἱ σχέσεις $AB > \Gamma\Delta$ καὶ $\Gamma\Delta < AB$ ἔχουν τὴν αὐτὴν σημασίαν.



9. 2. Ἰδιότητες

α) Ἀπὸ τὸν δρισμὸν τῆς ἴσοτητος εὐθ. τμημάτων ἐννοοῦμεν ὅτι :

i) $\Delta\Gamma\Delta\Gamma = AB = AB$. Αν ακλαστικὴ ἴδιότης.

ii) Ἐάν εἶναι $AB = \Gamma\Delta$, τότε θὰ εἶναι καὶ $\Gamma\Delta = AB$.

“Η συμβολικῶς :

$AB = \Gamma\Delta \Rightarrow \Gamma\Delta = AB$ Συμμετρικὴ ἴδιότης

β) Ἐάν συγκρίνοντες τρία εὐθύγραμμα τμήματα AB , $\Gamma\Delta$, EZ εὕρετε ὅτι :

σχ. 17

$AB = \Gamma\Delta$ (1) και $\Gamma\Delta = EZ$ (2) τι συμπεραίνετε διά τὰ AB καὶ EZ ?
'Από τὰς Ισότητας (1) καὶ (2) συμπεραίνομεν ότι καὶ $AB = EZ$.
(Έπαλθεύσατε τὸ συμπέρασμα τοῦτο μὲν τὸν διαβήτην σας).

"Η συμβολικῶς:

$(AB = \Gamma\Delta \text{ καὶ } \Gamma\Delta = EZ) \Rightarrow AB = EZ$ Μεταβατικὴ Ιδιότης.

γ) Μὲ τὸν διαβήτην σας εύρισκετε ότι $AB > \Gamma\Delta$ καὶ $\Gamma\Delta > EZ$. Κατόπιν τούτου δύνασθε νὰ συγκρίνετε, χωρὶς ὄργανα, τὰ τμήματα AB καὶ EZ ; Θά εἶναι $AB > EZ$.

"Ωστε: $(AB > \Gamma\Delta \text{ καὶ } \Gamma\Delta > EZ) \Rightarrow AB > EZ$ Μεταβατικὴ Ιδιότης.

9. 3. Μέσον εύθυγρ. τμήματος

"Ἐπὶ μιᾶς εὐθείας $\chi'\chi$ σημειώνομεν ἐν σημεῖον O . "Ἐπειτα ἐπὶ τῶν ἀντιθέτων ἡμειυθειῶν $O\chi$, $O\chi'$, μὲ τὸν διαβήτην μας, λαμβάνομεν δύο ίσα τμήματα OM , OM' .

Λέγομεν ότι τὸ σημεῖον O εἶναι μὲ σον τοῦ εύθ. τμῆματος MM' .

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

20. "Ἐάν ἐν εύθ. τμῆμα AB δὲν εἶναι μεγαλύτερον ἀπὸ ἐν ἀλλῳ $\Gamma\Delta$ τότε θὰ εἶναι διπλασίη ποτε τούν μὲ αὐτό;


21. Χαράξατε τρία εύθ. τμήματα καὶ κατατάξατε αὐτὰ κατὰ μέγεθος. Ποία Ιδιότης θὰ σᾶς διευκολύνῃ διά νὰ κάνετε δίλιγωτέρας συγκρίσεις;

22. Τὸ αὐτὸ πρόβλημα καὶ εἰς τὴν περίπτωσιν τεσσάρων εύθ. τμημάτων.

10. ΠΡΟΣΘΕΣΙΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

10. 1. "Ἐπὶ εὐθείας ε σημειώνομεν τρία διαφορετικὰ σημεῖα A , B , Γ , κατὰ τὴν διάταξιν (σειρὰν) τοῦ σχ. 18.

Παρατηροῦμεν ότι τὰ τμήματα AB , $B\Gamma$, ἔχουν A ————— B ————— Γ τὸ ἐν ἄκρον, τὸ B , κοινὸν καὶ μεταξὺ τῶν δύο ἀλλων ἄκρων. Διὰ τοῦτο λέγονται διαδοχικὰ ή ἐφεξῆς. Τὸ εύθ. τμῆμα $A\Gamma$ λέγεται ἀθροισμα τῶν διαδοχικῶν εύθ. τμημάτων AB καὶ $B\Gamma$.



Γράφομεν δὲ

$$AB + B\Gamma = A\Gamma$$

10. 2. Δίδονται δύο εύθυγραμμα τμήματα AB , $\Gamma\Delta$.

Μὲ τὸν διαβήτην μας ἐπὶ μιᾶς εὐθείας ε λαμβάνομεν διαδοχικὰ τμήματα $EZ = AB$ καὶ $ZH = \Gamma\Delta$.

Τὸ εύθ. τμῆμα $EH = EZ + ZH$ εἶναι τὸ ἀθροισμα τῶν εύθυγράμμων τμημάτων AB καὶ $\Gamma\Delta$. $AB + \Gamma\Delta = EH$

Η πρᾶξις διὰ τῆς ὁποίας εἰς ἕκαστον ζεῦγος εὐθυγράμμων τμημάτων ἀντιστοιχίζομεν τὸ ἄθροισμα τῶν δύο τούτων τμημάτων, λέγεται πρόσθεσις ή σύνθεση.


10. 3 "Αθροισμα περισσοτέρων εὐθ. τμημάτων

Τρία ή περισσότερα κατὰ σειρὰν εὐθ. τμήματα ἐπὶ μιᾶς εὐθείας λέγονται διαδοχικά ὅταν τὸ 2ον εἶναι ἑφεξῆς πρὸς τὸ 1ον, τὸ 3ον πρὸς τὸ 2ον κ.ο.κ.

Διὰ νὰ εὔρωμεν τὸ ἄθροισμα τριῶν ή περισσοτέρων εὐθ. τμημάτων εύρισκομεν τὸ ἄθροισμα τῶν δύο πρώτων, εἰς τὸ ἄθροισμα τοῦτο προσθέτομεν τὸ τρίτον εὐθ. τμῆμα κ.ο.κ.

10. 4. 'Ιδιότητες

Καθώς φαίνεται εἰς τὸ σχ. 20 μὲ τὸν διαβήτην μας δυνάμεθα νὰ ἔπει-



ληθεύσωμεν ὅτι εἰς τὸ σύνολον τῶν εὐθ. τμημάτων ἡ πρόσθεσις εἶναι πρᾶξις μεταθετική καὶ προσεταιριστική.

10. 5. Μία βασικὴ ιδιότης τῶν εὐθ. τμημάτων


Σημειώνομεν δύο σημεῖα A, καὶ B. Χαράσσομεν ἐπειτα τὸ εὐθύγραμμον τμῆμα AB καθὼς καὶ ἄλλας τεθλασμένας γραμμὰς μὲ ἄκρα τὰ σημεῖα A καὶ B, (σχ. 21).

"Ας εὔρωμεν τὰ ἄθροισματα $A\Gamma + \Gamma\Delta + \Delta B$, $A\epsilon + \epsilon Z + ZH + HB$ καὶ ἂς συγκρίνωμεν ἕκαστον τούτων μὲ τὸ εὐθύγραμμον τμῆμα AB.

Θά παρατηρήσωμεν ὅτι :

$$\begin{aligned} AB &< A\Gamma + \Gamma\Delta + \Delta B \\ AB &< A\epsilon + \epsilon Z + ZH + HB \end{aligned}$$

Αἱ ἀνωτέρω παρατηρήσεις μᾶς ὀδηγοῦν εἰς τὴν ἑξῆς γεωμετρικὴν πρότασιν :



Τὸ εύθ. τμῆμα εἶναι μικρότερον πάσης ἄλλης γραμμῆς, ή δποία ἔχει ἄκρα τὰ ἄκρα τοῦ εύθ. τμήματος.

11. ΑΦΑΙΡΕΣΙΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

11. 1. "Ἄς σημειώσωμεν ἐπ' εύθείας ε δύο διαδοχικά εὐθύγραμμα τμήματα AB καὶ BG , σχ. 22.

Θά ἔχωμεν τότε

$$AB + BG = AG \quad (1)$$

Παρατηροῦμεν διτὶ τὸ εὐθύγραμμον τμῆμα BG^* προστίθεται εἰς τὸ AB διὰ δώσῃ ἀθροισμα τὸ AG . Διὰ τοῦτο λέγεται διαφορὰ τῶν AG καὶ AB .

Γράφομεν δὲ

$$AG - AB = BG \quad (2)$$

"Απὸ τὰ ἀνωτέρω ἐννοοῦμεν διτὶ ὑπάρχει διαφορὰ $AG - AB$ δσάκις τὸ AG εἶναι μεγαλύτερον τοῦ AB .

Γενικῶς : 'Εὰν α εἶναι ἐν εὐθύγραμμον τμῆμα, μεγαλύτερον ἀπὸ ἄλλο β ($\alpha > \beta$), τότε ὑπάρχει εύθ. τμῆμα γ τὸ δόποιον προστιθέμενον εἰς τὸ β δίδει τὸ α. Τοῦτο λέγεται διαφορὰ α μετον β.

Γράφομεν δὲ

$$\alpha - \beta = \gamma$$

"Η πρᾶξις μὲ τὴν δόποιαν εύρισκομεν τὴν διαφορὰν $\alpha - \beta$ λέγεται ἀφαίρεσις τοῦ β ἀπὸ τὸ μεγαλύτερον αὐτοῦ α.

11. 2. "Ἄς προσέξωμεν πάλιν εἰς τὰς Ισότητας (1) καὶ (2). Κατὰ τὸν δρισμὸν τῆς διαφορᾶς ἐκάστη ἀπὸ αὐτᾶς ἔχει ὡς συνέπειαν τὴν ἄλλην.

"Ητοι :

$$AB + BG = AG \Rightarrow AG - AB = BG \quad (3)$$

$$AG - AB = BG \Rightarrow AB + BG = AG \quad (4)$$

Αἱ συνεπαγωγαὶ (3) καὶ (4) γράφονται ὁμοῦ ὡς ἔξης :

$$AB + BG = AG \Leftrightarrow AG - AB = BG \quad (5)$$

11. 3. Δίδονται δύο εὐθύγραμμα τμήματα AB , $ΓΔ$, ($AB > ΓΔ$). Πᾶς θά εύρωμεν τὴν διαφορὰν των $AB - ΓΔ$;

"Ἐπὶ τοῦ μεγαλυτέρου τμήματος AB λαμβάνομεν σημεῖον E τοιοῦτον ὥστε $AE = ΓΔ$, σχ. 23. Τὸ τμῆμα EB Ισοῦται μὲ τὴν διαφορὰν $AB - ΓΔ$. Διατί ;

* ὅπως καὶ δλα τὰ τμήματα τὰ ίσα πρὸς τὸ BG

Σχ. 23

Πράγματι έχομεν :

$$\begin{aligned} AE + EB &= AB \iff AB - AE = EB \\ \text{ή } AB - \Gamma\Delta &= EB \end{aligned}$$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

23. Χαράξατε τρία εύθυγραμμα τμήματα α , β , γ και ἔπειτα νὰ ἐπαληθεύσετε δτὶ :

$$(\alpha + \gamma) + \beta = \alpha + (\beta + \gamma)$$

24. Χαράξατε τέσσαρα εύθυγραμμα τμήματα α , β , γ , δ και ἔπειτα σχηματίσατε τὰ ἀδροί-
σματα :

$$(\alpha + \beta) + (\gamma + \delta), \quad \alpha + (\beta + \gamma + \delta)$$


25. Χαράξατε δύο εύθυγραμμα τμήματα α , β ($\alpha = \beta$) και ἔν αλλο γ (β. Μὲ αὐτὰ ἐπα-
θεύσατε δτὶ : $\alpha + \gamma = \beta + \gamma$ και $\alpha - \gamma = \beta - \gamma$

26. Χαράξατε δύο εύθ. τμήματα α , β ($\alpha > \beta$). ἔπειτα νὰ εύρετε ἐν αλλο εύθ. τμῆμα χ τοιοῦ-
τον δωτε $\beta + \chi = \alpha$

12. ΓΙΝΟΜΕΝΟΝ ΕΥΘ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΦΥΣΙΚΟΝ ΑΡΙΘΜΟΝ

Χαράσσομεν ἐν εύθυγραμμον τμῆμα AB και εύρισκομεν τὸ ἄθροισμα

$$AB + AB + AB = \Gamma\Delta$$

Τὸ $\Gamma\Delta$ λέγεται γινόμενον 
τοῦ AB ἐπὶ 3.

Γράφομεν δὲ $\Gamma\Delta = 3 \cdot AB$ Σχ. 24

Γενικῶς : Γινόμενον ἔνδος εύθ. τμήματος AB ἐπὶ 2, 3, 4... λέγεται
τὸ ἄθροισμα 2, 3, 4... τμημάτων ἵσων πρὸς τὸ AB .



Εἰδικῶς συμφωνοῦμεν δτὶ :

$$1 \cdot AB = AB.$$

13. ΜΕΤΡΗΣΙΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

13. 1. Ἀριθμητικὴ τιμὴ εύθ. τμήματος

Αἱ καθημεριναὶ ἀνάγκαι μᾶς ἐπιβάλλουν τὴν μέτρησιν διαφόρων μεγε-
θῶν. Καθὼς γνωρίζετε, διὰ νὰ μετρήσωμεν ἐν εύθ. τμῆμα AB χρειαζόμεθα
πρῶτον ἐν αλλο εύθ. τμῆμα M τὸ δόπτοιον συμφωνοῦμεν νὰ λάβωμεν ὡς μονάδα
μετρήσεως. "Ἐπειτα εύρισκομεν ἀπὸ πόσας μονάδας (και μέρη τῆς ληφθείσης
μονάδος) ἀποτελεῖται τὸ πρὸς μέτρησιν εύθ. τμῆμα AB . Οὕτως εύρισκομεν



"Οργανα μετρήσεως εύθ. τμημάτων

ένα δάριθμόν δ όποιος λέγεται δάριθμητική τιμή ή διπλώς τιμή του εύθ. τμήματος.

Π.χ. έάν όνομάσωμεν AB τήν μίαν πλευράν του πίνακος της τάξεως μας καὶ εύρωμεν ότι αύτη περιέχει 6 φοράς δάκριβως τήν μεγαλυτέραν πλευράν του γνώμονος, τότε δάριθμός 6 είναι ή δάριθμητική τιμή ή ή τιμή της πλευρᾶς AB μὲ μονάδα μετρήσεως τήν μεγαλυτέραν πλευράν του γνώμονος.

Έάν δημιώς ως μονάδα μετρήσεως λάβωμεν τήν μικροτέραν πλευράν του γνώμονος καὶ εύρωμεν ότι αύτη περιέχεται 9 φοράς δάκριβως εἰς τήν πλευράν AB, τότε δάριθμός 9 είναι ή δάριθμητική τιμή ή ή τιμή της πλευρᾶς AB μὲ μονάδα μετρήσεως τήν μικροτέραν πλευράν του γνώμονος.

Παρατήρησις

Έάν κατὰ τήν μέτρησιν ή μονάδα M τήν διποίαν έκλεξαμεν δὲν περιέχεται δάκριβως ν φοράς ($n \in N$) εἰς τὸ μετρούμενον τμῆμα, τότε λαμβάνομεν μίαν ἄλλην μονάδα 10 ή 100 ή 1000... φοράς μικροτέραν τῆς M.

13. 2. Μονάδες μετρήσεως εύθ. τμημάτων

Σχεδόν δια τὰ κράτη διὰ νὰ διευκολύνουν τὰς συναλλαγάς συνεφώνησαν καὶ ἔλαβον τήν ίδιαν μονάδα μετρήσεως εύθυγρ. τμημάτων.

Αύτη είναι τὸ Γαλλικὸν μέτρον n^* ή διπλώς μέτρον (m). Τοῦτο είναι ίσον πρὸς τὸ $1/40.000.000$ ἐνὸς μεσημβρινοῦ τῆς γῆς.

Χαρακτηριστικὸν είναι ότι εἰς τὸ σύστημα μετρήσεων, τὸ διποίον ἔχει ως βάσιν τὸ μέτρον, αἱ διάφοροι μονάδες είναι δάκριβως 10, 100, 1000 φοράς μεγαλύτεραι ή μικρότεραι αὐτοῦ. "Ητοι ἀκολουθοῦν τὸ δεκαδικὸν σύστημα γεγονὸς τὸ διποίον διευκολύνει εἰς τοὺς σχετικούς ὑπολογισμούς.

I. Υποδιαιρέσεις τοῦ m

Τὸ δεκατόμετρον: $dm = 1/10$ m

Τὸ ἑκατοστόμετρον: $cm = 1/100$ m

Τὸ χιλιοστόμετρον: $mm = 1/1000$ m

II. Πολλαπλάσια τοῦ m

Τὸ δεκάμετρον: $dam = 10$ m

Τὸ ἑκατόμετρον: $hm = 100$ m

Τὸ χιλιόμετρον: $km = 1000$ m

Παραπλέυρως παραθέτομεν πίνακα οποιαὶ διαιρέσεων ή πολλαπλασίων τοῦ m αἱ διποῖαι χρησιμοποιοῦνται συνήθως ως μονάδες. Ἀπὸ τὸν πίνακα αὐτὸν προκύπτουν αἱ σχέσεις: $1 m = 10 dm = 100 cm = 1000 mm$
 $1 km = 1000 m = 10000 dm = 100000 cm$

"Ἄλλαι χρησιμοποιούμεναι μονάδες μήκους είναι αἱ ἔξις:

1 τεκτονικὸς πῆχυς = 0,75 m = 75 cm

1 ύάρδα (yrd) = 0,914 m = 91,4 cm = 914 mm

* Σήμερον τὸ μέτρον καθορίζεται ὑπὸ τοῦ προτύπου μέτρου τὸ διποίον φυλάσσεται εἰς τὸ έν Sèvres τῆς Γαλλίας διεθνὲς γραφεῖον μέτρων καὶ σταθμῶν. Βάσει αὐτοῦ βαθμολογοῦνται μὲ δάκριβειαν οἱ συνήθεις κανόνες, μέτρα, μετροτατινίαι...

Έκαστη ύάρδα ύποδιαιρεῖται εἰς 3 πόδας (ft)

Έκαστος πούς » εἰς 12 ίντσας (in)

Ήτοι 1 yrd=3 ft=36 in

Εἰς τὴν ναυτιλίαν ἔξ αλλου χρησιμοποιεῖται τὸ γαλλικὸν ναυτικὸν μίλιον=1852 m.

13. 3. Σημείωσις

Ἐὰν κατὰ τὴν μέτρησιν ἐνὸς εὐθ. τμήματος AB εύρωμεν ὅτι ἡ μονάς 1 cm περιέχεται εἰς αὐτὸν ἀκριβῶς 3 φοράς τότε γράφομεν :

AB=3 cm καὶ διάβαζομεν : τὸ AB ἔχει μῆκος 3 cm.

Ήτοι ἡ γραφὴ ΓΔ=2 m σημαίνει ὅτι τὸ ΓΔ ἔχει μῆκος 2 m.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

27. Γράψατε ἐν εὐθύγραμμον τμῆμα AB καὶ ἔπειτα ἐπαληθεύσατε ὅτι

$$2 \cdot (3 \cdot AB) = (2 \cdot 3) \cdot AB$$

28. Ἐπὶ μιᾶς εὐθείας ε σημειώσατε δύο τμήματα AB καὶ ΓΔ τοιαῦτα, ὥστε $AB \cap \Gamma\Delta = \phi$ καὶ $AB = \Gamma\Delta = 2$ cm. Νὰ ἔξετάσετε ἐὰν $\Gamma\Delta = BD$.

29. Εἰς τριψήφιος ἀκέραιος, π.χ. δ 856, παριστάνει χιλιοστά (mm). Ποιὸν ψηφίον αὐτοῦ παριστάνει επι καὶ ποιὸν dm.

30. Ἐπὶ ήμιευθείας Οχ λαμβάνομεν σημεῖα A, B τοιαῦτα, ὥστε $OA = 4$ cm καὶ $OB = 6$ cm. Εἰναι τὸ μέσον τοῦ AB, νὰ υπολογισθῇ τὸ μῆκος τοῦ OM. Γενίκευσις διὰ $OA = \alpha$ καὶ $OB = \beta$.

31. Μὲ πόσα mm ισοῦται τὸ 1/100 τοῦ γαλλικοῦ ναυτικοῦ μίλιου.

32. Μὲ πόσα mm ισοῦται μῆκος 2 ίντσῶν (in).

14. ΤΟ ΗΜΙΕΠΙΠΕΔΟΝ

Εἰς τὸ ἐπίπεδον Π χαράσσομεν μίαν εὐθείαν ε. Αὕτη διαχωρίζει τὰ ἔκτὸς αὐτῆς σημεῖα τοῦ ἐπιπέδου εἰς δύο «περιοχάς» I καὶ II, σχ. 25.


Τὰ σημεῖα A, B κείνται ἀμφότερα εἰς τὴν μίαν ἀπὸ τὰς περιοχάς αὐτάς. Διὰ τοῦτο λέγομεν ὅτι κείνται πρὸς τὸ αὐτὸν μέρος τῆς εὐθείας ε.

Εἰς τὸ αὐτὸν σχέδιον τὰ σημεῖα Γ καὶ Δ ἐκ τῶν διποίων τὸ ἐν κείται εἰς τὴν μίαν περιοχὴν καὶ τὸ ἄλλο εἰς τὴν ἄλλην, λέγομεν ὅτι κείνται ἐκατέρωθεν τῆς εὐθείας ε.

Τὸ σύνολον τῶν σημείων τοῦ ἐπιπέδου, τὰ διποῖα κείνται πρὸς τὸ αὐτὸν μέρος τῆς εὐθείας ε, λέγεται ήμιεπίπεδον.

Ἡ εὐθεία ε λέγεται ἀκμὴ τοῦ ήμιεπιπέδου τούτου.

Είναι φανερὸν ὅτι ἐν ήμιεπίπεδον δρίζεται ὑπὸ τῆς ἀκμῆς ε καὶ ἐνὸς ση-



Σχ. 25

μείου αύτοῦ, κειμένου ἔκτὸς τῆς ε. Διὰ νὰ ὀνομάσωμεν ἐν ἡμιεπίπεδον ἀναφέρομεν πρῶτον τὴν ἄκμὴν καὶ ἔπειτα ἐν σημείον αύτοῦ. Π.χ. εἰς τὸ σχέδιον 25, διακρίνομεν τὸ ἡμιεπίπεδον (ϵ , A) ἢ (ϵ , B) καὶ τὸ ἡμιεπίπεδον (ϵ , Γ).

Ἄπὸ τὰ ἀνωτέρω ἐννοούμεν ὅτι, ἐάν εἰς ἐπίπεδον Π δοθῇ μία εὐθεῖα ε., τότε δρίζονται τρία σημειοσύνολα, ὑποσύνολα τοῦ Π . Ἡ εὐθεῖα ε. (τὸ ἐν) καὶ τὰ δύο ἡμιεπίπεδα τὰ διποῖα ἔχουν ἄκμὴν τὴν ε. (τὰ δύο ἄλλα). Τὰ δύο ὡς δινω ἡμιεπίπεδα λέγονται ἢ ντίθετα μεταξύ των.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

33. Ἡ ἔνωσις ἐνδός ἡμιεπίπεδου καὶ τῆς ἄκμῆς αὐτοῦ λέγεται κλειστὴ ἡμιεπίπεδον. Ἐάν δύο ἡμιεπίπεδα K_1 , K_2 τὰ δύο κλειστά ἡμιεπίπεδα, τὰ διποῖα δρίζονται ἐπὶ ἐπίπεδον Π ὑπὸ μιᾶς εὐθείας ε. αύτοῦ, νὰ εὑρετε τὰ σύνολα $K_1 \cup K_2$ καὶ $K_1 \cap K_2$.


34. Εἰς ἐπίπεδον χαράξατε δυό εὐθείας τεμνομένας καὶ σημειώσατε τὰ 4 ἡμιεπίπεδα τὰ διποῖα δρίζουν αὗται.

15. Η ΓΩΝΙΑ

15. 1. Ὁρισμὸς

Χαράσσομεν δύο ἡμιευθείας OA , OB μὲ κοινὴν ἀρχὴν O , σχ. 26. Σχηματίζεται τότε μία γωνία.

Γενικῶς : "Ἐκαστον ζεῦγος ἡμιευθεῶν μὲ κοινὴν ἀρχὴν λέγεται γωνία.



Σχ. 26

Αἱ δύο ἡμιευθεῖαι καλοῦνται πλευραί. τῆς γωνίας ἡ δὲ κοινὴ ἀρχὴ αὐτῶν κορυφή.

Π.χ. ἡ γωνία τοῦ σχ. 26 ἔχει κορυφήν τὸ σημεῖον O καὶ πλευράς τὰς ἡμιευθείας OA , OB .

Όνομάζομεν μίαν γωνίαν :

α) Μὲ τὸ γράμμα τῆς κορυφῆς της.

β) Μὲ τρία γράμματα: ἐξ αὐτῶν τὸ μὲν μεσαῖον εἶναι τὸ γράμμα τῆς κορυφῆς τὰ δὲ δόλλα δύο εἶναι γράμματα δύο σημείων: "Ἐν ἀπὸ

ἐκάστην πλευράν αὐτῆς. Π.χ. εἰς τὸ σχ. 26 εἰκονίζεται ἡ γωνία O ἢ γωνία AOB ἢ BOA . Ἡ συμβολικῶς :

$\widehat{\alpha}$ ἢ $A\widehat{O}B$ ἢ $B\widehat{O}A$

γ) Μὲ ἓν μικρὸν γράμμα τοποθετούμενον πλησίον τῆς κορυφῆς. Π.χ. διὰ τὴν γωνίαν τοῦ σχ. 26 λέγομεν: γωνία α ἢ συμβολικῶς α.


15. 2. Ἐσωτερικόν, ἔξωτερικόν γωνίας. Κυρτή, μὴ κυρτή γωνία

Εἰς τὴν γωνίαν AOB , σχ. 27α, θεωροῦμεν :

ι) Τὸ ἡμιεπίπεδον (ϵ , B). Ἡτοι τὸ ἡμιεπίπεδον τῆς εὐθείας ε. (τῆς πλευρᾶς OA) καὶ ἐνδός σημείου B τῆς πλευρᾶς OB , σχ. 27β.

ii) Τὸ ἡμιεπίπεδον (ϵ' , A). "Ἡτοὶ τὸ ἡμιεπίπεδον τῆς εὐθείας ϵ' , (τῆς πλευρᾶς OB) καὶ ἐνὸς σημείου A τῆς πλευρᾶς OA, σχ. 27γ.

iii) Τὴν τομὴν τῶν δύο αὐτῶν ἡμιεπιπέδων (ϵ , B) \cap (ϵ' , A), σχ. 27δ. (Δι-



Σχ. 27

πλογραμμοσκιασμένον μέρος τοῦ ἐπιπέδου). Ἡ τομὴ αὗτη λέγεται ἐσωτερικὸν τῆς γωνίας AOB. Τὸ σύνολον τῶν σημείων τοῦ ἐπιπέδου, τὰ δόποια

δὲν ἀνήκουν εἰς τὸ ἐσωτερικὸν τῆς γωνίας, οὔτε εἰς τὰς πλευρὰς αὐτῆς, λέγεται ἐξωτερικὸν τῆς γωνίας AOB. Ἡ ἔνωσις τῆς γωνίας AOB καὶ τοῦ ἐσωτερικοῦ αὐτῆς λέγεται κυρτὴ γωνία AOB. Ἡ ἔνωσις τῆς γωνίας AOB καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ αὐτῆς λέγεται μὴ κυρτὴ γωνία AOB.

"Ωστε: Ἐκάστη γωνία δρίζει μίαν κυρτήν καὶ μίαν μὴ κυρτήν γωνίαν.

'Ἐπειδὴ εἰς τὴν τάξιν αὐτὴν θὰ ἀσχοληθῶμεν κυρίως μὲ κυρτὰς γωνίας, εἰς τὰ ἐπόμενα ὅταν γράφωμεν γωνία AOB ή AÔB, θὰ ἔννοοῦμεν τὴν κυρτήν γωνίαν AOB. Εἰς πᾶσαν δὲλην περίπτωσιν θὰ γίνεται ειδικὴ μνεῖα.


15. 3. Σχηματισμὸς γωνίας διὰ στροφῆς

α) Οἱ δύο δεῖκται τοῦ ὀρολογίου εἰκονίζουν δύο ἡμιευθείας κοινῆς ὁρίζοντος O, αἱ δόποια στρέφονται εἰς τὸ ἐπίπεδον αὐτῶν περὶ τὸ O. Εἰς ἐκάστην θέσιν δρίζουν μίαν κυρτήν καὶ μίαν μὴ κυρτήν γωνίαν.

β) Φαντασθῆτε ὅτι δύο ἡμιευθεῖς OA, OB συμπίπτουν, σχ. 29α, ὅπως συμβαίνει ἔνιοτε μὲ τοὺς δεῖκτας τοῦ ὀρολογίου. Κρατοῦμεν τὴν μίαν σταθεράν, τὴν OA καὶ στρέφομεν* περὶ τὸ O τὴν OB (προσέχοντες νὰ παραμένῃ αὕτη πάντοτε ἐπὶ τοῦ ἐπιπέδου). Εἰς ἐκάστην θέσιν ή OB μετὰ τῆς OA δρίζει μίαν κυρτήν καὶ μίαν μὴ κυρτήν γωνίαν, σχ. 29. Εἰδικῶς:

i) Εἰς τὸ σχ. 29δ ἡ OB ἔχει γίνει ἀντίθετος τῆς OA. Εἰς τὴν περίπτωσιν ταύτην λέγομεν ὅτι αἱ δύο ἀντίθετοι ἡμιευθεῖς OA, OB σχηματίζουν εὐθεῖαν γωνίαν.

* Ἡ στροφὴ προφανῶς δύναται νὰ γίνῃ κατά δύο φοράς. Κατά τὴν φοράν τῆς κινήσεως τῶν δεῖκτῶν τοῦ ὀρολογίου ή κατά τὴν ὄντιθετον αὐτῆς. Πρὸς τὸ παρόν δὲν θὰ λαμβάνωμεν ὑπ' δρψιν μας κατά ποίαν φοράν ἐγένετο ἡ στροφὴ.



Σχ. 29

ii) Εις τὸ σχ. 29οτ ή OB ἔχει συμπέσει μὲ τὴν OA μετὰ ἀπὸ μίαν πλήρη στροφήν. Δι’ αὐτὸ λέγομεν αἱ συμπίπτουσαι ἡμιευθεῖαι OA, OB σχηματίζουν μίαν πλήρη γωνίαν.

Σημείωσις

i) Ὡς ἐσωτερικὸν μιᾶς εὐθείας γωνίας λαμβάνομεν τὸ ἐν ἑκ τῶν ἡμιεπίπεδων τὰ δόποια δρίζουν αἱ πλευραὶ αὐτῆς. Ὡς ἐσωτερικὸν μιᾶς πλήρους γωνίας λαμβάνομεν δλόκληρον τὸ ἐπίπεδον.


ii) Ἡ γωνία ἡ δριζομένη διὰ στροφῆς μιᾶς ἡμιευθείας περὶ τὴν ἀρχὴν αὐτῆς εἶναι πολὺ χρήσιμος εἰς τὴν μέτρησιν περιστροφικῶν κινήσεων.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

35. Νὰ δνομάσετε διαφόρους γωνίας ἐνὸς δρθιγωνίου παραλληλογράμμου.

36. Χαράξατε δύο τεμνομένας εὐθείας ε, ε' καὶ ἐπειτα χρωματίσατε τὰ 4 ἡμιεπίπεδα τὰ δόποια δρίζουν αὗται (ἔκαστον μὲ διαφορετικὸν χρῶμα). Ποια εἶναι τὰ ἐσωτερικὰ τῶν τεσσάρων γωνιῶν, τὰς δόποιας δρίζουν αἱ δύο τεμνόμεναι εὐθεῖαι;

37. Ὄνομάστε ὅλας τὰς κυρτὰς καὶ μὴ κυρτὰς γωνίας, αἱ δόποιαι σχηματίζονται ὑπὸ τῶν ἡμιευθεῶν OA, OB, OG τοῦ παραπλεύρως σχεδίου 30.




Σχ. 30

16. ΙΣΑΙ, ΑΝΙΣΟΙ ΓΩΝΙΑΙ

16. 1. Ὁρισμοὶ

Σχεδιάζομεν δύο γωνίας AOB καὶ A'O'B', σχ. 31α. "Ἐπειτα μὲ ἐν φύλλον διαφανοῦς χάρτου λαμβάνομεν τὸ ἀποτύπωμα τῆς μιᾶς, π.χ. τῆς γωνίας A'O'B', καὶ τὸ ἐπιθέτομεν ἐπὶ τῆς ἄλλης, ὡς δεικνύει τὸ σχ. 31β,γ,δ." Ήτοι αἱ μὲν



Σχ. 31

δύο πλευραὶ OA, O'A' νὰ συμπέσουν (ταυτισθοῦν) αἱ δὲ δύο ἄλλαι OB, O'B' νὰ εύρισκωνται εἰς τὸ ἐν ἀπὸ τὰ δύο ἡμιεπίπεδα, τὰ δόποια δρίζει ἡ εὐθεία OA.

"Υπάρχουν τότε τὰ ἑξῆς τρία ἐνδεχόμενα.

α) Ἡ πλευρὰ O'B' νὰ εύρεθῇ εἰς τὸ ἐσωτερικὸν τῆς γωνίας AOB, σχ. 31β. Λέγομεν τότε ὅτι ἡ γωνία AOB εἶναι μεγαλυτέρα τῆς γωνίας A'O'B'.

Γράφομεν δὲ

$$\widehat{AOB} > \widehat{A'O'B'}$$

β) Ἡ πλευρὰ O'B' νὰ εύρεθῇ εἰς τὸ ἐξωτερικὸν τῆς γωνίας AOB, σχ. 31γ. Λέγομεν τότε ὅτι ἡ γωνία AOB εἶναι μικροτέρα τῆς γωνίας A'O'B'.

Γράφομεν τότε

$$\widehat{AOB} < \widehat{A'OB'}$$

γ) 'Η πλευρά $O'B'$ νὰ ταυτισθῇ μὲ τὴν πλευράν OB , σχ. 31δ. Λέγομεν τότε ὅτι ἡ γωνία $A'O'B'$ εἶναι ἵση μὲ τὴν γωνίαν AOB καὶ γράφομεν:

$$\widehat{AOB} = \widehat{A'OB'}$$


'Εννοεῖται ὅτι αἱ σχέσεις

$$\widehat{AOB} > \widehat{A'OB'} \text{ καὶ } \widehat{A'OB'} < \widehat{AOB}$$

ἔχουν τὴν αὐτήν σημασίαν.

16. 2. Παρατηρήσεις

α) Εἶναι φανερὸν ὅτι, ἐὰν δύο κυρταὶ γωνίαι α, β εἶναι ἵσαι, τότε καὶ αἱ ὑπὸ αὐτῶν δριζόμεναι μὴ κυρταὶ γωνίαι α', β' ἀντιστοίχως εἶναι ἐφαρμόσιμοι, σχ. 32. Συνεπῶς εἶναι καὶ αὐταὶ ἵσαι.



Σχ. 32

β) Δύο εὐθεῖαι γωνίαι εἶναι μεταξύ των ἵσαι.

γ) 'Εκάστη μὴ κυρτὴ γωνία εἶναι μεγαλυτέρα οἰασδήποτε κυρτῆς.

16. 3. 'Ιδιότητες τῆς ισότητος γωνιῶν

α) 'Εκ τοῦ δρισμοῦ τῆς ισότητος γωνιῶν ἔννοοῦμεν ὅτι ἐκάστη γωνία εἶναι ἵση πρὸς ἕαυτήν.

$$\widehat{\alpha} = \widehat{\alpha} \quad \text{'Ανακλαστικὴ ίδιότης}$$

β) 'Ομοίως ἔννοοῦμεν ὅτι ἐὰν εἶναι $\widehat{\alpha} = \widehat{\beta}$, τότε θὰ εἶναι καὶ $\widehat{\beta} = \widehat{\alpha}$.

'Η συμβολικῶς :

$$\widehat{\alpha} = \widehat{\beta} \Rightarrow \widehat{\beta} = \widehat{\alpha} \quad \text{Συμμετρικὴ ίδιότης}$$

γ) 'Εὰν $\widehat{\alpha} = \widehat{\beta}$ καὶ $\widehat{\beta} = \widehat{\gamma}$ τὶ συνάγομεν διὰ τὰς γωνίας α καὶ γ ;

Εὐκόλως συμπεραίνομεν ὅτι καὶ $\widehat{\alpha} = \widehat{\gamma}$

'Η συμβολικῶς :

$$(\widehat{\alpha} = \widehat{\beta} \text{ καὶ } \widehat{\beta} = \widehat{\gamma}) \Rightarrow \widehat{\alpha} = \widehat{\gamma} \quad \text{Μεταβατικὴ ίδιότης}$$

16. 4. 'Ιδιότητες τῆς ἀνισότητος γωνιῶν

α) 'Επειδὴ ἀληθεύει ἡ ισότης $\widehat{\alpha} = \widehat{\alpha}$ δὲν ἀληθεύουν αἱ ἀνισότητες :

$$\widehat{\alpha} > \widehat{\alpha} \text{ καὶ } \widehat{\alpha} < \widehat{\alpha}$$

β) 'Εὰν εἶναι $\widehat{\alpha} > \widehat{\beta}$ προφανῶς δὲν θὰ εἶναι καὶ $\widehat{\beta} > \widehat{\alpha}$.

γ) $(\widehat{\alpha} > \widehat{\beta} \text{ καὶ } \widehat{\beta} > \widehat{\gamma}) \Rightarrow \widehat{\alpha} > \widehat{\gamma}$

"Ωστε: 'Η ἀνισότης γωνιῶν ἔχει τὴν μεταβατικὴν ίδιότητα ἀλλὰ δὲν ἔχει τὴν ἀνακλαστικὴν καὶ τὴν συμμετρικήν.


17. ΠΡΟΣΘΕΣΙΣ ΓΩΝΙΩΝ

17. 1. Ἐφεξῆς γωνίαι

Εις τὸ σχ. 33 αἱ κυρταὶ γωνίαι AOM καὶ MOB ἔχουν τὴν πλευρὰν OM κοινήν, τὰς δὲ πλευράς OA , OB , ἐκατέρωθεν τῆς εὐθείας τῆς κοινῆς πλευρᾶς OM . Διὰ τοῦτο λέγονται Ἐφεξῆς γωνίαι.

Δύο κυρταὶ γωνίαι τοῦ ἐπιπέδου λέγονται Ἐφεξῆς ὅταν ἔχουν μίαν πλευρὰν κοινὴν καὶ τὰς μὴ κοινὰς πλευρὰς αὐτῶν ἐκατέρωθεν τῆς εὐθείας τῆς κοινῆς πλευρᾶς.

Π.χ. εἰς τὸ σχ. 33 αἱ γωνίαι AOM , MOB εἰναι Ἐφεξῆς ἐνῷ αἱ γωνίαι AOM , AOB δὲν εἶναι. (Διατί;)



Sch. 33

17. 2. Ἀθροισμα γωνιῶν.


Διὰ νὰ προσθέσωμεν δύο γωνίας α , β , σχ. 34α, τὰς καθιστῶμεν Ἐφεξῆς, σχ. 34β. (Μὲ τὴν βοήθειαν διαφανοῦς χάρτου).

Ἡ κυρτὴ (ἢ μὴ κυρτὴ) γωνία AOB ἡ ὅποια γεννᾶται ὑπὸ μιᾶς ἡμιευθείας ὅταν αὐτῇ, διαγράφῃ διαδοχικῶς τὰς Ἐφεξῆς κυρτὰς γωνίας α , β καὶ μόνον αὐτάς, λέγεται ἀθροισμα τῶν γωνιῶν τούτων.


Γράφομεν δὲ $\hat{\alpha} + \hat{\beta} = A\hat{O}\hat{B}$

Τοιουτορόπως εἰς τὸ σχ. 33 τὸ ἀθροισμα τῶν κυρτῶν γωνιῶν AOM καὶ MOB εἰναι ἡ κυρτὴ γωνία AOB ,

εἰς τὸ σχ. 35 ἀθροισμα τῶν κυρτῶν γωνιῶν AOB καὶ BOG εἰναι ἡ μὴ κυρτὴ γωνία AOG .



Sch. 34



Sch. 35

17. 3. Διὰ


νὰ εύρωμεν τὸ ἀθροισμα περισ-

σοτέρων γωνιῶν, εύρισκομεν τὸ ἀθροισμα τῶν δύο πρώτων. Εἰς τὸ ἀθροισμα τοῦτο προσθέτομεν τὴν τρίτην γωνίαν κ.ο.κ.

17. 4. Ἰδιότητες

Μὲ τὴν βοήθειαν ἐνὸς φύλλου διαφανοῦς χάρτου δυνάμεθα νὰ ἐπαλη-

θεύσωμεν ότι ή πρόσθεσις γωνιῶν είναι πρᾶξις μεταθετική καὶ προσεταιριστική.



$$\hat{\alpha} + \hat{\beta} = \hat{\beta} + \hat{\alpha}$$

$$(\hat{\alpha} + \hat{\beta}) + \hat{\gamma} = \hat{\alpha} + (\hat{\beta} + \hat{\gamma})$$

Σχ. 36

18. ΑΦΑΙΡΕΣΙΣ ΓΩΝΙΩΝ

18. 1. Όρισμός

Ἄσ ἐπανέλθωμεν εἰς τὸ σχ. 33. Ἐὰν εἰς τὴν γωνίαν AOM προσθέσωμεν τὴν γωνίαν MOB θὰ εύρωμεν τὴν γωνίαν AOB . Διὰ τοῦτο ἡ γωνία MOB λέγεται διαφορά τῶν γωνιῶν AOB καὶ AOM .

Γράφομεν δέ :

$$\widehat{AOB} - \widehat{AOM} = \widehat{MOB} \quad (1)$$

Εἶναι φανερὸν ότι ὑπάρχει διαφορά

$$\widehat{AOB} - \widehat{AOM} \text{ ἐπειδὴ } \widehat{AOB} > \widehat{AOM}$$

18. 2. Παρατηροῦμεν ότι : 'Εκάστη ἐκ τῶν ισοτήτων

Σχ. 37

$$\widehat{AOB} - \widehat{AOM} = \widehat{MOB} \text{ καὶ } \widehat{AOM} + \widehat{MOB} = \widehat{AOB} \text{ ἔχει ως συνέπειαν τὴν ἀλλην.}$$

$$\widehat{AOB} - \widehat{AOM} = \widehat{MOB} \Rightarrow \widehat{AOM} + \widehat{MOB} = \widehat{AOB}$$


$$\widehat{AOM} + \widehat{MOB} = \widehat{AOB} \Rightarrow \widehat{AOB} - \widehat{AOM} = \widehat{MOB}$$

Διὰ τοῦτο γράφομεν :

$$\widehat{AOB} - \widehat{AOM} = \widehat{MOB} \Leftrightarrow \widehat{AOM} + \widehat{MOB} = \widehat{AOB}$$

Γενικῶς δι' ἕκαστον ζεῦγος γωνιῶν $\hat{\alpha}$ καὶ $\hat{\beta}$ ὅπου $\hat{\alpha} > \hat{\beta}$ ἔχομεν:

$$\hat{\alpha} - \hat{\beta} = \hat{\gamma} \Leftrightarrow \hat{\beta} + \hat{\gamma} = \hat{\alpha}$$



18. 3. Εύρεσις τῆς διαφορᾶς

Διὰ τὴν εύρεσιν τῆς διαφορᾶς δύο γωνιῶν AOB , $A'OB'$, ἐργαζόμεθα ὅπως φαίνεται εἰς τὸ σχ. 37. Ἡτοι τοποθετοῦμεν τὴν μικροτέραν γωνίαν $A'OB'$ ἐπὶ τῆς γωνίας AOB εἰς τρόπον ὥστε νὰ ταυτισθοῦν αἱ δύο πλευραὶ OA , $O'A'$ ἡ δὲ $O'B'$ νὰ εύρεθῇ εἰς τὸ ἐσωτερικὸν τῆς γωνίας AOB .

Τότε ἔχομεν

$$\widehat{BOB'} = A\widehat{OB} - A\widehat{O'B'}$$

Εἰδικῶς ὅταν αἱ γωνίαι AOB , $A'OB'$ εἶναι ἴσαι, τότε λέγομεν ὅτι ἡ διαφορά των εἶναι μηδενική γωνία.

Μία μηδενική γωνία ἀποτελεῖται ἀπὸ δύο ἡμιευθείας, αἱ δόποιαι ταυτίζονται (συμπίπτουν) καὶ ἔχει ὡς ἐσωτερικὸν αὐτῆς τὸ κενὸν σύνολον.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

38. Πόσας συγκρίσεις χρειάζεσθε διὰ νὰ βεβαιωθῆτε ὅτι τρεῖς γωνίαι εἶναι μεταξύ των ἴσαι;

39. Χαράξατε τρεῖς γωνίας, ἐπειτα μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ διαφανοῦς κατατάξατε αὐτάς κατὰ μέγεθος.

40. Χαράξατε τρεῖς γωνίας $\widehat{\alpha}$, $\widehat{\beta}$, $\widehat{\gamma}$ καὶ ἐπειτα ἐπαληθεύσατε μὲ αὐτάς ὅτι $\widehat{\alpha} + (\widehat{\beta} + \widehat{\gamma}) = (\widehat{\alpha} + \widehat{\gamma}) + \widehat{\beta}$.

41. Χαράξατε τρεῖς γωνίας $\widehat{\alpha}$, $\widehat{\beta}$, $\widehat{\gamma}$, ὅπου $\widehat{\alpha} > \widehat{\beta} > \widehat{\gamma}$ καὶ ἐπαληθεύσατε μὲ αὐτάς ὅτι $\widehat{\alpha} - \widehat{\gamma} > \widehat{\beta} - \widehat{\gamma}$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΝ

42. Ἐπὶ εύθειας εὑρίσκονται κατὰ σειράν τὰ σημεῖα A , B , G καὶ D . Είναι δὲ τὸ BG 3 cm μεγαλύτερον τοῦ AB καὶ 2 cm μικρότερον τοῦ GD . Νὰ εύρετε τὰ μήκη τῶν τμημάτων τούτων ἐξαν γνωρίζετε ὅτι $AD=17$ cm.

43. Γράψατε δύο εὐθ. τμήματα α , β ($\alpha > \beta$) καὶ ἐπαληθεύσατε ὅτι α) $2(\alpha + \beta) = 2\alpha + 2\beta$, β) $2(\alpha - \beta) = 2\alpha - 2\beta$, $\gamma)$ $\alpha > \beta \Rightarrow 3 \cdot \alpha > 3 \cdot \beta$

44. Γράψατε δύο εὐθ. τμήματα α , β καὶ ἐπειτα σχηματίσατε τμήματα ἴσα μὲ $2\alpha + \beta$, $\alpha + 2\beta$.

45. Γράψατε ἐν εὐθ. τμῆμα α καὶ ἐπαληθεύσατε ὅτι $2 \cdot (3 \cdot \alpha) = (2 \cdot 3) \alpha$.


46. Γράψατε τρία εὐθ. τμήματα α , β , γ καὶ ἐπαληθεύσατε ὅτι $\alpha > \beta \Rightarrow \alpha + \gamma > \beta + \gamma$

47. Μὲ εὐθ. τμήματα α , β , γ ἐπαληθεύσατε ὅτι $(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma) = (\gamma + \alpha) + \beta$.

48. Μὲ τὴν βοήθειαν ἐνὸς διαφανοῦς νὰ εύρετε τὸ ἀθροισμα τῶν γωνιῶν ἐνὸς τριγώνου.

49. Όμοιώς ἐνὸς κυρτοῦ τετραπλεύρου.

50. Μὲ κατάλληλα εὐθ. τμήματα α , β , γ ἐπαληθεύσατε ὅτι $\alpha - (\beta + \gamma) = (\alpha - \beta) - \gamma$



ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.

19. Η ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΕΥΘΕΙΑΝ ΕΙΣ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟΝ (ΑΞΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ)

19. 1. Εισαγωγή


Η «συμμετρία» συναντάται συχνά είς τὴν φύσιν, είς σχέδια, είς τὰς κατασκευάς. Τὴν ἀντιλαμβανόμεθα καθώς παρατηροῦμεν ἐν φύλλον δένδρου, τὸν σκελετὸν ἐνὸς ζώου, μίαν πεταλούδαν . . .




19. 2. Ὁρισμὸς

Εἰς τὸ ἐπίπεδον Π ἐνὸς φύλλου χάρτου χαράσσομεν μίαν εὐθεῖαν ϵ . Ὁρίζονται τότε δύο ἀντίθετα ἡμιεπίπεδα: Τὰ Π_1 , Π_2 , σχ. 38α.


Ἄς διπλώσωμεν τὸ ἐπίπεδον Π περὶ τὴν εὐθεῖαν αὐτοῦ ϵ , σχ. 38β. Παρατηροῦμεν τότε ὅτι τὰ δύο ἡμιεπίπεδα Π_1 , Π_2 συμπίπτουν. "Εκαστον δὲ σημεῖον



(α)



ΣΧ. 38



(γ)

τοῦ ἐνὸς ἡμιεπίπεδου, π.χ. τὸ σημεῖον M τοῦ Π_1 συμπίπτει μὲν ἐν σημεῖον M' τοῦ Π_2 , σχ. 38β, γ.

Τὸ σημεῖον M' λέγεται συμμετρικὸν τοῦ σημείου M ὡς πρὸς τὴν εὐθεῖαν ϵ .

Ἄπὸ τὰ ἀνωτέρω ἐννοοῦμεν ὅτι, ἔκαστον σημείου τοῦ Π_1 ἔχει ἐν (καὶ μόνον ἐν) συμμετρικὸν σημείον ὡς πρὸς τὴν εὐθεῖαν ϵ . Τοῦτο εύρίσκεται ἐπὶ τοῦ Π_2 . Ὄμοιώς ἔκαστον σημείου τοῦ Π_2 ἔχει ὡς πρὸς τὴν εὐθεῖαν ϵ , ἐν (καὶ μόνον ἐν) συμμετρικὸν σημείον καὶ εύρίσκεται τοῦτο ἐπὶ τοῦ Π_1 .

Διὰ τὰ σημεῖα τῆς εὐθείας ϵ παρατηροῦμεν ὅτι κατὰ τὴν δίπλωσιν ἔκα-

στον τούτων μένει ἀκίνητον ἢ ὅπως λέγομεν συμπίτει (ταυτίζεται) μὲ τὸ συμμετρικόν του.

"*Ητοι*: 'Εὰν εἰς ἐπίπεδον Π διθῆ μία εύθεια ε, τότε μεταξὺ τῶν σημείων τοῦ Π δυνάμεθα νὰ δρίσωμεν μίαν ἀντιστοιχίαν τοιαύτην ὥστε: Εἰς ἕκαστον σημεῖον Μ τοῦ Π νὰ ἀντιστοιχῇ τὸ συμμετρικὸν Μ' αὐτοῦ ὡς πρὸς τὴν ε.'

'Η ἀντιστοιχία αὕτη δυνομάζεται συμμετρία ὡς πρὸς τὴν εὐθεῖαν (ἄξονα) ε. Χάριν συντομίας ἀντὶ «συμμετρία ὡς πρὸς εὐθεῖαν ε» γράφομεν $\Sigma(\epsilon)$.

Εἰς τὴν δίπλωσιν περὶ τὴν ε ἀντὶ νὰ εἴπωμεν ὅτι τὸ Μ συμπίπτει μὲ τὸ Μ' δυνάμεθα νὰ εἴπωμεν ὅτι τὸ Μ' συμπίπτει μὲ τὸ Μ. "Ητοι ὅτι καὶ τὸ Μ' εἶναι συμμετρικὸν τοῦ Μ.


Διὰ τοῦτο λέγομεν ὅτι τὰ σημεῖα Μ, Μ' εἶναι μεταξύ των συμμετρικὰ ἢ ἀπλῶς συμμετρικά ἢ διμόλογα εἰς τὴν $\Sigma(\epsilon)$.

19. 3. 'Εὰν στρέψωμεν δόλοκληρον τὸ ἐπίπεδον Π περὶ τὴν εὐθεῖαν αὐτοῦ ε, κατὰ ἡμισείαν στροφήν, θὰ παρατηρήσωμεν ὅτι ἔκαστον σημεῖον Μ αὐτοῦ ἐν αλλάσσεται μὲ τὸ συμμετρικόν του Μ'. (Τὸ Μ λαμβάνει τὴν θέσιν τοῦ Μ' καὶ τὸ Μ' τοῦ Μ).

20. ΕΥΘΕΙΑΙ ΚΑΘΕΤΟΙ. ΟΡΘΑΙ ΓΩΝΙΑΙ

20. 1. Ὁρθή γωνία

Εἰς τὴν $\Sigma(\epsilon)$, σχ. 39 εύρισκομεν* τὸ συμμετρικὸν Μ' ἐνὸς σημείου Μ, ($M \notin \epsilon$) καὶ χαράσσομεν τὸ εύθ. τμῆμα MM' τὸ ὅποιον τέμνει τὴν εἰς τὸ σημεῖον I.



Σχ. 39

"Ἄσ προσέξωμεν τὰς δύο γωνίας $\widehat{MIZ} = \widehat{\omega}$

καὶ $\widehat{M'IZ} = \widehat{\omega'}$.

α) Ἐχουν ἀθροισμα μίαν εὐθεῖαν γωνίαν.

$\widehat{\omega} + \widehat{\omega'} = 1$ εὐθεῖα γωνία

β) Κατὰ τὴν δίπλωσιν περὶ τὴν ε ἡ κοι-

νὴ πλευρὰ αὐτῶν IZ θὰ μείνῃ ἀκίνητος αἱ δὲ ἄλλαι πλευραὶ IM, IM', θὰ συμπέσουν. (Τὸ I θὰ μείνῃ ἀκίνητον, ἐνῷ τὰ Μ καὶ Μ' θὰ συμπέσουν).

"Απὸ τὴν παρατήρησιν αὐτὴν ἐννοοῦμεν ὅτι αἱ γωνίαι ω, ω' εἶναι ἴσαι.

$$\widehat{\omega} = \widehat{\omega'}$$

"Ωστε: αἱ γωνίαι $\widehat{\omega}$, $\widehat{\omega'}$ ἔχουν ἀθροισμα μίαν εὐθεῖαν γωνίαν καὶ εἰναι ἴσαι.

* Διὰ διπλώσεως περὶ τὴν ε.

'Εκάστη τούτων λέγεται δρθή γωνία
 Ήτοι : 'Ορθή γωνία είναι τὸ ἡμίσυ μιᾶς εύθειας γωνίας
 'Εάν σκεφθῶμεν ότι δῆλοι αἱ εὐθεῖαι γωνίαι εἰναι τοις συμπεραίνομεν ότι :
 "Ολαι αἱ δρθαὶ γωνίαι εἰναι τοις.

20. 2. Εύθειαι κάθετοι

Αἱ εύθειαι MM' καὶ εἰ ἐπὶ τῶν διποίων κεῖνται αἱ πλευραὶ μιᾶς δρθῆς γωνίας λέγονται καὶ θετοὶ μεταξύ των ἢ ἀπλῶς καὶ θετοὶ. Διὰ νὰ γράψωμεν συντόμως ότι δύο εύθειαι δ, δ' εἰναι κάθετοι γράφομεν :

διδ' ἢ διδ.

"Οταν δύο εύθειαι τέμνωνται, ἀλλὰ δχι καθέτως, λέγομεν ότι τέμνονται πλαγίως ἢ ότι εἰναι μεταξύ των πλαγίων.

Παραδείγματα εύθειῶν καθέτων μεταξύ των γνωρίζομεν πολλά. (Π.χ., ἀνὰ δύο συνεχόμεναι ἀκμαὶ δρθογωνίου παραλληλεπιπέδου εἰναι τμήματα καθέτων εύθειῶν.

20. 3. "Ἄς ἐπανέλθωμεν εἰς τὸ σχ. 39. Κατὰ τὴν δίπλωσιν περὶ τὴν εἰναι φανερὸν ότι θὰ συμπέσουν καὶ τὰ τμήματα IM , IM' .

"Ωστε : 'Η εύθεια ε διχοτομεῖ τὸ εύθ. τμῆμα MM' καὶ εἰναι καὶ θετοὶ πρὸς τὴν εύθειαν αὐτοῦ. "Η κατ' ἄλλην ἔκφρασιν : 'Η εύθεια ε εἰναι καὶ θετοὶ πρὸς τὸ τμῆμα MM' εἰς τὸ μέσον | αὐτοῦ. Διὰ τοῦτο λέγομεν ότι ἢ ε εἰναι ἢ μεσοκάθετος τοῦ εύθ. τμήματος MM' .

"Ωστε : Εἰς τὴν $\Sigma(\epsilon)$: M , M' συμμετρικὰ σημαίνει ότι ἢ ε εἰναι ἢ μεσοκάθετος τοῦ MM'


21. ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ

21. 1. Νὰ κατασκευασθῇ μία δρθή γωνία.

Διὰ νὰ χαράξωμεν πρακτικῶς μίαν δρθήν γωνίαν χρησιμοποιοῦμεν τὸν γνώμονα (τρίγωνον), σχ. 40α, ἐργαζόμεθα δὲ ὡς ἔχεις :

Χαράσσομεν μίαν ἡμιευθεῖαν OA καὶ ἐπειτα τοποθετοῦμεν τὸν γνώμονα εἰς τρόπον ὡστε : 'Η κορυφὴ τῆς δρθῆς γωνίας αὐτοῦ νὰ ταυτισθῇ μὲ τὸ O , καὶ ἢ μία ἀκμὴ νὰ ἐφαρμόσῃ ἐπὶ τῆς OA . "Ἐπειτα μὲ τὴν μίαν χεῖρα μας κρατοῦμεν σταθερῶς τὸν γνώμονα καὶ μὲ τὴν ἄλλην χαράσσομεν τὴν ἡμιευθεῖαν OB κατὰ μῆκος τῆς ἀλληλούπιας αὐτοῦ, σχ. 40β.


Μὲ δόμοιον τρόπον ἐλέγχομεν ἐάν μία γωνία εἰναι δρθή ἢ ἐάν δύο εύθειαι εἰναι κάθετοι μεταξύ των.



21. 2. Νὰ χαραχθῇ κάθετος ἀπὸ σημείου A πρὸς εὐθεῖαν ϵ .

α) Ἐὰν A κεῖται ἐπὶ τῆς ϵ .

Τοποθετοῦμεν τὸν γνώμονα ἐπὶ τοῦ ἐπιπέδου εἰς τρόπον ὥστε ἡ μία ἀκμὴ αὐτοῦ νὰ ἐφαρμόζῃ ἐπὶ τῆς ϵ , σχ. 41 β. Ἔπειτα μετακινοῦμεν τὸν γνώμονα, προσέχοντες νὰ ἐφαρμόζῃ πάντοτε ἡ ἀκμή του ἐπὶ τῆς ϵ , μέχρις ὅτου ἡ κορυφὴ τῆς δρθῆς γωνίας ταυ-



Σχ. 41


τισθῇ μὲ τὸ σημεῖον A , σχ. 41α. Εἰς τὴν θέσιν αὐτὴν χαράσσομεν τὴν εὐθεῖαν ϵ ἡ ὅποια εἶναι καὶ ἡ μοναδικὴ κάθετος πρὸς τὴν ϵ εἰς τὸ σημεῖον A αὐτῆς.

β) Ἐὰν τὸ A κεῖται ἐκτὸς τῆς ϵ .

Ἐργαζόμεθα ὡς προηγουμένως μὲ τὴν διαφορὰν ὅτι εἰς τὴν τελικὴν θέσιν τοῦ γνώμονος τὸ A θὰ κεῖται ἐπὶ τῆς ϵ . Τοιουτοτρόπως, εἰς τὸ σχ. 42, ἡ εὐθεῖα ϵ εἶναι κάθετος πρὸς τὴν εὐθεῖαν ϵ καὶ διέρχεται διὰ τοῦ σημείου A . Τὸ σημεῖον O ὃπου ἡ ϵ συναντᾷ τὴν ϵ λέγεται δρθὴ προβολὴ ἡ ἀπλῶς προβολὴ τοῦ σημείου A ἐπὶ τὴν εὐθεῖαν ϵ .

21. 3. Εἰς ἀνωτέραν τάξιν θὰ ἀποδείξωμεν ὅτι :


Ἐξ ὀλῶν τῶν εὐθειῶν τοῦ ἐπιπέδου αἱ ὅποιαι διέρχονται διὰ τοῦ A , ὑπάρχει μία καὶ μόνον μία κάθετος πρὸς τὴν εὐθεῖαν ϵ .




Σχ. 42

21. 4. Ἀπόστασις σημείου ἀπὸ εὐθεῖαν

Εἰς ἓν φύλλον χάρτου χαράσσομεν μίαν εὐθεῖαν ϵ καὶ λαμβάνομεν ἓν σημεῖον A ἐκτὸς αὐτῆς. Ἔπειτα φέρομεν τὴν κάθετον AO ἐκ τοῦ A πρὸς τὴν ϵ καὶ διάφορα ἄλλα εὐθ. τμήματα AB_1, AB_2, AB_3, AB_4 , ἐκ τοῦ σημείου A μέχρι τῆς εὐθείας ϵ . Ἐὰν μὲ τὸν διαβήτην μας συγκρίνωμεν τὸ τμῆμα AO μὲ τὰ τμήματα AB_1, AB_2, AB_3 καὶ AB_4 , θὰ διαπιστώσωμεν ὅτι:



Σχ. 43



Σχ. 44

Τὸ κάθετον τμῆμα AO εἶναι μικρότερον παντὸς ἄλλου τμήματος ἀπὸ τὸ σημεῖον A μέχρι τῆς εὐθείας ϵ .

Ήτοι :

$$AO < AB_1, \quad AO < AB_2, \quad AO < AB_3 \dots$$

Τὸ μῆκος τοῦ καθέτου τμήματος ΑΟ λέγεται ἀπόστασις τοῦ σημείου Α ἀπὸ τῆν εύθειαν ε.

21. 5. Νὰ εύρεθῇ τὸ συμμετρικὸν M' ἐνὸς σημείου M εἰς τὴν συμμετρίαν ὡς πρὸς εὐθεῖαν ε.

α) Ἐὰν M κεῖται ἐκτὸς τῆς ε, σχ. 44.

Φέρομεν τὴν κάθετον ἐκ τοῦ M πρὸς τὴν ε. Ἐπειτα δὲ ἐπὶ αὐτῆς καὶ ἐκατέρωθεν τοῦ σημείου τοῦ M μετὰ τῆς ε, λαμβάνομεν ἵσα τμήματα $M=M'$.

Τὸ σημείον M' εἶναι τὸ συμμετρικὸν τοῦ M εἰς τὴν $\Sigma(\epsilon)$. Διατί;

β) Ἐὰν M κεῖται ἐπὶ τῆς ε.

Εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτῆν, καθὼς εἴδομεν εἰς τὴν παρ. 19.2, τὸ M' συμπίπτει μὲ τὸ συμμετρικὸν αὐτοῦ M' , $M \equiv M'$.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

51. Χαράξατε μίαν εὐθείαν ε καὶ νὰ λάβετε δύο σημεία A , B . Εἰς τὴν $\Sigma(\epsilon)$ νὰ εύρετε τὰ συμμετρικὰ τῶν A , B καὶ τοῦ μέσου M τοῦ εὐθ. τμήματος AB . Τὶ παρατηρεῖτε διὰ τὴν θέσιν τοῦ συμμετρικοῦ τοῦ M ;

52. Χαράξατε μίαν εὐθείαν ε καὶ δύο συμμετρικά σημεία A , A' ὡς πρὸς αὐτήν. Ἐὰν ο εἶναι ἐν σημείον τῆς ε συγκρίνατε τὰ τμήματα OA καὶ OA' .

53. Χαράξατε ἐν εὐθ. τμῆμα AB καὶ δύο εὐθείας δ , δ' καθέτους πρὸς αὐτὸν εἰς τὰ σημεία A καὶ B ἀντιστοίχως.


54. Χαράξατε μίαν εὐθείαν ε καὶ ἐν εὐθ. τμῆμα AB . Νὰ εύρετε, εἰς τὴν $\Sigma(\epsilon)$, τὰ συμμετρικὰ διαφόρων σημείων τοῦ AB . Τὶ παρατηρεῖτε;

55. Κατασκευάσατε ἐν ὁρθογώνιον παραλληλόγραμμον.

22. ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΟΝ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΕΥΘΕΙΑΝ

22. 1. Ὁρισμὸς

Ἄσ λαβωμεν ἐν σχῆμα (K) καὶ ἄς εὔρωμεν εἰς τὴν $\Sigma(\epsilon)$ τὰ συμμετρικὰ A' , B' , G' ... τῶν σημείων A , B , G ,... αὐτοῦ, σχ. 45. Τὸ σχῆμα (K') τὸ δόποιον ἀποτελεῖται ἀπὸ τὰ συμμετρικὰ τῶν σημείων τοῦ σχήματος (K) καὶ μόνον ἀπὸ αὐτά, λέγεται συμμετρικὸν τοῦ (K) εἰς τὴν $\Sigma(\epsilon)$. Εἶναι φανερὸν ὅτι καὶ τὸ σχῆμα (K) εἶναι συμμετρικὸν τοῦ (K') εἰς τὴν ίδιαν συμμετρίαν (K) \rightleftharpoons (K'). Διὰ τοῦτο λέγομεν ὅτι τὰ σχήματα (K) καὶ (K') εἶναι μεταξύ των συμμετρικὰ ἢ ἀπλῶς συμμετρικὰ ἢ δυόλογα.



Σχ. 45

22. 2. Ισότης συμμετρικῶν σχημάτων

Ἄσ στρέψωμεν τὸ ἐπίπεδον Π περὶ τὴν εὐθείαν αὐτοῦ ε, κατὰ ήμισείαν στροφήν. Ἐκαστον σημείον τοῦ (K) θὰ λάβῃ τὴν θέσιν τοῦ συμμετρικοῦ του

είς τὸ σχῆμα (K'). Ἐπίστης ἔκαστον σημεῖον τοῦ (K') θὰ λάβῃ τὴν θέσιν τοῦ συμμετρικοῦ του εἰς τὸ (K). "Ητοι τὰ συμμετρικά σχήματα (K) καὶ (K') εἶναι ἐφαρμόσιμα (ἴσα).

"Ωστε: Εἰς τὴν Σ(ε) τὰ συμμετρικὰ σχήματα εἶναι ίσα.

22. 3. Σπουδαία παρατήρησις.

Είναι εύκολον νὰ παρατηρήσωμεν ὅτι ἡ ἡμισεία στροφὴ τοῦ ἐπιπέδου περὶ τὴν ε ἀναστρέψει* τὸ ἐπίπεδον. Συνεπῶς δύο συμμετρικά σχήματα εἰς τὴν Σ(ε) εἶναι ἐφαρμόσιμα μόνον ἐπειτα ἀπὸ ἀναστροφὴν τοῦ ἐνὸς ἐξ αὐτῶν. Π.χ. τὰ σχήματα (K) καὶ (K') τοῦ σχ. δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ τὰ φέρωμεν εἰς σύμπτωσιν μὲ ἀπλῆ δλίσθησιν. Πρέπει καὶ νὰ ἀναστρέψωμεν τὸ ἐξ αὐτῶν. Διὰ τοῦτο λέγομεν ὅτι τὰ σχήματα (K) καὶ (K') εἶναι κατ' ἀναστροφὴν ίσα.

"Ωστε: Εἰς τὴν Σ(ε) δύο διμόλιγα σχήματα εἶναι κατ' ἀναστροφὴν ίσα.


23. ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΑΠΛΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

23. 1. Παραπλεύρως παραθέτομεν εἰκόνας συμμετρικῶν σχημάτων. "Οπως βλέπομεν εἶναι σχήματα κατ' ἀναστροφὴν ίσα.

23. 2. Συμμετρικὸν εύθ. τμήματος

'Ως εἰδομεν προηγουμένως τὸ συμμετρικὸν ἐνὸς σχήματος, ως πρὸς εύθειαν, εἶναι ἐν σχῆμα ίσον πρὸς αὐτό.

Συνεπῶς τὸ συμμετρικὸν ἐνὸς εύθ. τμήματος AB, ως πρὸς τὴν εύθειαν ε, εἶναι ἐν εύθ. τμῆμα A'B' ίσον πρὸς τὸ AB. Διὰ νὰ τὸ εὔρωμεν δέ, ἀρκεῖ νὰ εὕρωμεν τὰ συμμετρικὰ τῶν ἄκρων τοῦ AB. Τὰ κατωτέρω σχέδια 46 δεικνύουν τὸ συμμετρικὸν A'B' τοῦ τμήματος AB εἰς πέντε διαφορετικάς περιπτώσεις.



Σχ. 46

* Κάμνει τὴν «ἐπάνω» δψιν τοῦ ἐπιπέδου «κάτω» καὶ τὴν «κάτω» δψιν «ἐπάνω».

Ειδικῶς είσ τὸ σχ. 46α παρατηροῦμεν ὅτι ἀρκεῖ νὰ εὑρωμεν μόνον τὸ συμμετρικὸν B' τοῦ B , διότι τὸ A κεῖται ἐπὶ τῆς ϵ , συνεπῶς συμπίπτει μὲ τὸ συμμετρικὸν του A' .

Εις τὸ σχ. 46β, αἱ εὐθεῖαι τῶν συμμετρικῶν τμημάτων AB , $A'B'$ συναντοῦν τὴν ϵ εἰς τὸ σήμα Ε οὐ τὸ σήμα ΕΙΟ ν. (Διατί; Ποιὸν εἰναι τὸ συμμετρικὸν τοῦ σημείου τοῦ ΗΤΗΣ τῶν εὐθειῶν ϵ καὶ $A'B$;).

Εις τὸ σχ. 46γ αἱ εὐθεῖαι τῶν AB καὶ $A'B'$ εἰναι παράλληλοι μεταξύ των καὶ πρὸς τὴν ϵ .

Εις τὸ σχ. 46δ τὰ εὐθ. τμήματα AB καὶ $A'B'$ συναντοῦν τὴν ϵ εἰς τὸ αὐτὸ σημεῖον.

Εις τὸ σχ. 46ε τὰ AB , $A'B'$ εἰναι τμήματα τῆς αὐτῆς εὐθείας ή ὅποια εἰναι κάθετος πρὸς τὴν ϵ . (Διατί;)

"Ωστε: α) 'Ἐὰν τὸ AB κεῖται ἐπὶ εὐθείας παραλλήλου πρὸς τὴν ϵ , τότε καὶ τὸ $A'B'$ κεῖται ἐπίσης ἐπὶ παραλλήλου πρὸς τὴν ϵ .

β) 'Ἐὰν τὸ AB τέμνῃ τὴν ϵ , τότε καὶ τὸ $A'B'$ τέμνει τὴν ϵ εἰς τὸ αὐτὸ σημεῖον.

γ) 'Ἐὰν τὸ AB κεῖται ἐπὶ εὐθείας καθέτου πρὸς τὴν ϵ , τότε καὶ τὸ $A'B'$ κεῖται ἐπὶ τῆς ίδιας εὐθείας.

23. 3. Συμμετρικὸν ἡμιευθείας Οχ. Διχοτόμος γωνίας

α) "Οταν O κεῖται ἐπὶ τῆς ϵ :

Διὰ νὰ προσδιορίσωμεν τὴν συμμετρικήν τῆς ἡμιευθείας Οχ ἀρκεῖ νὰ προσδιορίσωμεν τὸ συμμετρικὸν τῆς αρχῆς O καὶ ἐνὸς οὐσυδήποτε σημείου αὐτῆς A .

'Αλλὰ ἡ ἀρχὴ O εἰναι σημείον τῆς ϵ , συνεπῶς συμπίπτει μὲ τὸ συμμετρικὸν O' αὐτῆς ($O \equiv O'$). Διὰ τοῦτο εύρισκομεν μόνον τὸ συμμετρικὸν A' ἐνὸς σημείου A τῆς Οχ καὶ χαράσσομεν ἔπειτα τὴν ἡμιευθείαν OA' . Αὕτη εἰναι ἡ ζητουμένη.


"Ἄσ προσέξωμεν τὰς γωνίας ω , ω' τὰς ὅποιας σχηματίζουν αἱ συμμετρικαὶ ἡμιευθείαι OA , OA' μετὰ τῆς OZ , σχ. 47.

Παρατηροῦμεν ὅτι ἡ δίπλωσις τοῦ ἐπιπέδου περὶ τὴν ϵ ἀφήνει ἀκίνητον τὴν OZ καὶ φέρει εἰς σύμπτωσιν τὰς OA , OA' . 'Απὸ τὴν παρατήρησιν αὐτὴν ἐννοοῦμεν ὅτι αἱ ἀνωτέρω γωνίαι ω καὶ ω' εἰναι ἴσαι.

"Ἡ ἡμιευθεία OZ , ἡ ὅποια κεῖται εἰς τὸ ἐσωτερικὸν τῆς γωνίας AOA' καὶ τὴν χωρίζει εἰς δύο ἴσας γωνίας, λέγεται διχοτόμος αὐτῆς.


β) "Οταν O κεῖται ἐκτὸς τῆς ϵ :

Διακρίνομεν ίδιαιτέρως δύο περιπτώσεις:



Σχ. 47

i) Ή Οχ τέμνει τήν ε καὶ ii) ή Οχ κείται




Σχ. 48

Εἰς τὴν α' περίπτωσιν αἱ εὐθεῖαι Οχ, Ο'χ' συναντοῦν τὴν ε εἰς τὸ αὔτὸ σημεῖον.

Εἰς τὴν β' περίπτωσιν αἱ συμμετρικαὶ ἡμιευθεῖαι Οχ, Ο'χ' εἶναι παράλληλοι * μεταξύ τῶν καὶ πρὸς τὴν ε, κείνται δέ, πρὸς τὸ αὐτὸ ἡμιεπίπεδον ἀκμῆς ΟΟ' (διμόρροποι).

23. 4. Συμμετρικὸν εὐθείας α

Διὰ νὰ εύρωμεν τὴν συμμετρικὴν α' τῆς εὐθείας α, ἀρκεῖ νὰ εύρωμεν δύο οἰαδῆποτε σημεῖα αὐτῆς. "Ητοι τὰ συμμετρικὰ Α', Β' δύο τυχόντων σημείων Α, Β τῆς α. Διακρίνομεν ιδιαιτέρως τέσσαρας περιπτώσεις:



Σχ. 49

α) Ὅταν ἡ α τέμνῃ τὴν ε.

Τότε αἱ συμμετρικαὶ εὐθεῖαι α, α' συναντοῦν τὴν ε εἰς τὸ αὔτὸ σημεῖον καὶ σχηματίζουν ἴσας γωνίας $\omega = \omega'$, μὲ αὐτήν, σχ. 49α.

β) Ὅταν ἡ α εἶναι παράλληλος πρὸς τὴν ε.

Τότε αἱ συμμετρικαὶ εὐθεῖαι α, α' εἶναι παράλληλοι μεταξύ τῶν καὶ πρὸς τὴν ε. (Διατί; 'Ἐὰν ἡ α' ἔτεμνε τὴν ε εἰς ἐν σημεῖον Α, ποῖον θὰ ἥτο τὸ συμ-

* Δύο ἡμιευθεῖαι εἶναι παράλληλοι μεταξύ τῶν δταν κείνται ἐπὶ παραλλήλων εὐθειῶν.

ἐπὶ εὐθείας παραλλήλου πρὸς αὐτήν, σχ. 48. Καὶ εἰς τὰ δύο περιπτώσεις τὰ ἀρχικὰ σημεῖα Ο, Ο' τῶν συμμετρικῶν ἡμιευθειῶν Οχ, Ο'χ' εἰναι συμμετρικά.

Συνεπῶς διὰ νὰ χαράξωμεν τὴν Ο'χ' ἀρκεῖ νὰ εύρωμεν ἔκτὸς τοῦ Ο' καὶ τὸ συμμετρικὸν Α' ἐνὸς ἀλλού σημείου Α, τῆς Οχ. Ιδιαιτέρως παρατηροῦμεν δτι:

μετρικὸν αὐτοῦ . . .). Ἐὰν διπλώσωμεν δὲ τὸ ἐπίπεδον περὶ τὴν ε θά διαπιστώσωμεν δτι ἡ ταινία* τῶν παραλλήλων α καὶ ε θὰ ἔλθῃ εἰς σύμπτωσιν μὲ τὴν ταινίαν τῶν παραλλήλων ε καὶ α'.

"Ητοι : 'Η ε χωρίζει τὴν ταινίαν τῶν παραλλήλων α καὶ α' εἰς δύο ἴσας (έφαρμοσίμους) ταινίας.

γ) "Οταν $\alpha \perp \epsilon$

Παραπτηροῦμεν τότε ὅτι ἕκαστον στημεῖον τῆς α ἔχει τὸ συμμετρικὸν αὐτοῦ ἐπὶ τῆς α. "Ητοι ἡ α συμπίπτει μὲ τὴν συμμετρικήν της ($\alpha \equiv \alpha'$).

δ) "Οταν $\alpha \equiv \epsilon$

Τότε ἕκαστον στημεῖον τῆς α συμπίπτει μὲ τὸ συμμετρικόν του. "Ητοι ἡ α ταυτίζεται μὲ τὴν συμμετρικήν της ($\alpha \equiv \alpha'$).

"Ωστε: Εἰς τὴν $\Sigma(\epsilon)$ τὸ συμμετρικὸν μιᾶς εύθείας α εἶναι μία εύθεία α' καὶ ἑάν:


α) 'Η α τέμνη τὴν ε καὶ ἡ α' τέμνει τὴν ε εἰς τὸ αὐτὸ σημεῖον.

β) 'Η α εἶναι παράλληλος πρὸς τὴν ε καὶ ἡ α' εἶναι παράλληλος πρὸς τὴν ε.

γ) 'Η α εἶναι κάθετος πρὸς τὴν ε ἢ κεῖται ἐπ' αὐτῆς, τότε ἡ α' συμπίπτει μὲ τὴν α.

23. 5. Συμμετρικὸν γωνίας

Εἰς τὸ σχ. 50 φαίνεται τὸ συμμετρικὸν γωνίας AOB εἰς τρεῖς διαφορετικὰς περιπτώσεις. Είναι ως ἀνεμένετο, μία γωνία $A'OB'$ κατ' ἀναστροφὴν ἵστη μὲ αὐτήν, ἔχει δὲ τὴν κορυφὴν καὶ τὰς πλευρὰς ἀντιστοίχως συμμετρικὰ τῆς κορυφῆς καὶ τῶν πλευρῶν τῆς διθείστης γωνίας. Συνεπῶς διὰ νὰ τὴν κατασκευά-



σωμεν ἀρκεῖ νὰ κατασκευάσωμεν τὸ συμμετρικὸν τῆς κορυφῆς Ο καθὼς καὶ τὰ συμμετρικὰ τῶν πλευρῶν OA , OB .

* Ταινία δύο παραλλήλων λέγεται τὸ μέρος τοῦ ἐπιπέδου τὸ ὅποιον περικλείεται ὑπ' αὐτῶν.

23. 6. Συμμετρικὸν τριγώνου

Χαράσσομεν ἐν τρίγωνον $AB\Gamma$. Διὰ νὰ εὕρωμεν τὸ συμμετρικὸν αὐτῷ εἰς τὴν $\Sigma(\epsilon)$ εύρισκομεν τὰ συμμετρικὰ τῶν κορυφῶν A, B, Γ , τὰ A', B', Γ' ἀντιστοίχως.

Τὸ τρίγωνον $A'B'\Gamma'$ εἶναι τὸ συμμετρικὸν τοῦ τριγώνου $AB\Gamma$ εἰς τὴν $\Sigma(\epsilon)$

(Διατί;). Ἡ δίπλωσις περὶ τὴν ϵ φέρει^ε εἰς σύμπτωσιν τὰ δύο αὐτὰ τρίγωνα, συνεπῶς φέρει εἰς σύμπτωσιν τὰς γωνίας καὶ τὰς πλευρὰς τοῦ ἐνὸς μὲ τὰς δομολόγους πρὸς αὐτὰς γωνίας καὶ πλευρᾶς τοῦ ἄλλου :

ϵ "Ητοι εἰς τὸ σχ. 51 ἔχομεν :

$$A = \widehat{A}', \quad \widehat{B} = \widehat{B}', \quad \widehat{\Gamma} = \widehat{\Gamma}'$$

$$\text{καὶ } AB = A'B', \quad B\Gamma = B'\Gamma', \quad \Gamma A = \Gamma'A'$$

Γενικῶς διὰ δύο συμμετρικὰ εὐθ. σχήματα (K), (K') δυνάμεθα νὰ διατυπώσωμεν τὸν ἔξις κανόνα :

"Οταν δύο εὐθ. σχήματα (K), (K') εἶναι συμμετρικὰ ως πρὸς εὐθεῖαν τότε τὰ δομολόγα στοιχεῖα αὐτῶν εἶναι ἵσα.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

56. Νὰ εὕρετε τὸ συμμετρικὸν ἐνὸς εὐθ. τμήματος AB ως πρὸς εὐθεῖαν εἰς τὸ A .

57. Νὰ εύρεθῇ ἡ συμμετρικὴ μιᾶς ἡμιευθείας $O\chi$ ως πρὸς εὐθεῖαν εἰς τὸ $O\chi$. (Διακρίνατε δύο περιπτώσεις).

58. Νὰ εὕρετε τὰ συμμετρικὰ (K'), (K'') ἐνὸς σχήματος (K) ως πρὸς δύο εὐθείας ϵ , ϵ' . Τὶ παρατηρεῖτε; (Ἄλλετε ως σχῆμα (K) ἔν τετράπλευρον).

59. Νὰ σχεδιάσετε ἐν δρόσιγώνιον παραλληλόγραμμον καὶ νὰ εὕρετε τὸ συμμετρικὸν αὐτοῦ:

α) Ὡς πρὸς τὴν εὐθεῖαν μιᾶς πλευρᾶς αὐτοῦ.

β) Ὡς πρὸς τὴν εὐθεῖαν μιᾶς διαγώνιου αὐτοῦ.

60. Νὰ χαράξετε μίαν εὐθεῖαν ϵ , μίαν ἡμιευθείαν $O\chi$, (διποὺς O , κεῖται ἐπὶ τῆς ϵ) καὶ τὴν συμμετρικὴν αὐτῆς $O\chi'$ ως πρὸς τὴν ϵ . "Ἐπειτα ἐπὶ τῶν ἡμιευθεῶν $O\chi$, $O\chi'$ δύο ἵσα τμήματα $OA = OA'$ καὶ νὰ ἔξετάσετε, χωρὶς δργανα, ἐὰν τὰ σημεῖα A, A' εἶναι συμμετρικά.

61. 'Ἐπι εὐθείας ε φέρομεν κάθετον δ , ἡ ὁποία τέμνει τὴν ϵ εἰς τὸ σημεῖον A . 'Ἐπι τῆς δ καὶ ἐκατέρωθεν τοῦ A λαμβάνομεν δύο ἵσα τμήματα AB καὶ AB' . 'Ἐὰν O εἶναι τυχὸν σημεῖον τῆς ϵ νὰ δικαιολογήσετε δτὶ τὰ τυμάτα OB καὶ OB' εἶναι ἵσα.

24. ΑΞΩΝ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ

24. 1. Ὁρισμός

Γνωρίζομεν δτὶ ἐὰν μία εὐθεῖα δ εἶναι κάθετος πρὸς εὐθεῖαν ϵ , τότε εἰς τὴν $\Sigma(\epsilon)$ ἡ δ συμπίπτει μὲ τὴν συμμετρικὴν τῆς δ' (23.4.). Διὰ τοῦτο λέγομεν δτὶ ἡ εὐθεῖα δ ἔχει τὴν εὐθεῖαν ϵ ἄξονα συμμετρίας.

Γενικώς : 'Εάν είς τὴν $\Sigma(\epsilon)$ ἔν σχῆμα (Κ) συμπίπτη μὲ τὸ συμμετρικόν του (Κ'), τότε λέγομεν ὅτι τὸ σχῆμα (Κ) ἔχει τὴν εύθειαν εἰς ἀξονα συμμετρίας.

24. 2. Παραδείγματα

α) Τὰ σχήματα τοῦ συμμετρίαν ἔχουν ἀξονα συμμετρίας.


β) Μία εὐθεία δὲ ἔχει ἐκάστην κάθετον πρὸς αὐτὴν ἀξονα συμμετρίας.

'Αλλὰ καὶ εἰς τὴν συμμετρίαν ως πρὸς τὸν ἑαυτόν της, ἡ δὲ συμπίπτει μὲ τὴν συμμετρικήν της. $\delta \equiv \delta'$.

"Ητοι : 'Ἐκάστη εὐθεία ἔχει ἀπείρους ἀξονας συμμετρίας: τὸν ἑαυτόν της καὶ πᾶσαν κάθετον πρὸς αὐτὴν.

γ) "Ἄσ εὑρωμεν τὸ συμμετρικὸν ἐνὸς εὐθ. τμῆματος AB ως πρὸς τὴν μεσοκάθετον μ αὐτοῦ, σχ. 53.

Παρατηροῦμεν ὅτι εἰς τὴν $\Sigma(\mu)$ τὰ σημεῖα A καὶ B είναι ὁμόλογα (διατί;) ; 'Αλλὰ καὶ ἕκαστον σημεῖον M τοῦ AB ἔχει τὸ ὁμόλογόν του M' ἐπὶ τοῦ AB. "Ητοι εἰς τὴν $\Sigma(\mu)$ τὸ τμῆμα AB συμπίπτει μὲ τὸ συμμετρικόν του. Μὲ ἄλλους λόγους τὸ AB ἔχει τὴν μεσοκάθετον αὐτοῦ μ ἀξονα συμμετρίας.



Σχ. 53

"Ωστε : "Ἐν εὐθ. τμῆμα ἔχει δύο ἀξονας συμμετρίας, τὴν μεσοκάθετον αὐτοῦ καὶ τὴν εὐθείαν ἐπὶ τῆς ὅποιας κείται.


δ) Μία ἡμιευθεία Οχ ἔχει μοναδικὸν ἀξονα συμμετρίας τὴν εὐθείαν ἐπὶ τῆς ὅποιας κείται αὐτῇ (Διατί;) ;

ε) "Ἄσ ἀναζητήσωμεν ἀξονα συμμετρίας μιᾶς γωνίας AOB. Πρὸς τοῦτο εὑρίσκομεν τὴν διχοτόμον* αὐτῆς OZ καὶ στρέφομεν περὶ αὐτὴν τὸ ἐπίπεδον κατὰ ἡμισείαν στροφήν, σχ. 54. Παρατηροῦμεν τότε ὅτι :


α) 'Η διχοτόμος OZ μένει ἀκίνητος.

β) Αἱ πλευραὶ OA, OB ἐναλλάσσονται. ('Ἐκάστη τούτων λαμβάνει τὴν θέσιν τῆς ἀλλης).

* Ἐπὶ τοῦ παρόντος εὑρίσκομεν τὴν διχοτόμον, ἐάν διπλῶσωμεν τὸ ἐπίπεδον τῆς γωνίας εἰς τρόπον ὃστε ἐκάστη πλευρά αὐτῆς νὰ ἔλθῃ εἰς σύμπτωσιν μὲ τὴν ἄλλην.



Σχ. 52



Σχ. 54

"Ητοι είς τήν $\Sigma(\epsilon)$ ή γωνία AOB συμπίπτει μὲ τήν συμμετρικήν της. Συμπέρασμα :

"Εκάστη γωνία ἔχει ἄξονα συμμετρίας τήν εύθειαν τῆς διχοτόμου αὐτῆς.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

62. Νὰ εὕρετε σύμβολα (άριθμούς, γράμματα) τὰ διποτα ἔχουν ἵνα ἡ περισσοτέρους ἄξονας συμμετρίας.

63. Σχεδιάστε ἵνα δρομογώνιον παραλληλόγραμμον καὶ μὲ διπλώσεις προσπαθήσατε νὰ εὕρετε ἄξονας συμμετρίας αὐτοῦ. Τὸ αὐτὸν ἐπαναλάβατε καὶ εἰς ἓν τετράγωνον.

64. Εἰς ἓν φύλλον τετραγωνισμένου χάρτου σχεδιάστε ἵνα εύθυγραμμον σχῆμα, τὸ διποτον νὰ ἔχῃ ὡς ἄξονα συμμετρίας μίαν εύθειαν τῆς ἑκογῆς σας.

65. Ἐπὶ τῆς πλευρᾶς Οχ γωνίας χΟψ λαμβάνομεν δύο σημεῖα A, B καὶ ἐπὶ τῆς πλευρᾶς Οψ δύο σημεῖα A', B' τοιαῦτα ὥστε : $OA=OA'$, $OB=OB'$.

α) Εἰς τήν συμμετρίαν ὡς πρὸς τήν εύθειαν τῆς διχοτόμου τῆς γωνίας νὰ εὕρετε τὰ διμόλογα τῶν A, B, OA, OB, AA', AB', A'B'.

β) Διατί αἱ εύθειαι AB' καὶ A'B' τέμνονται ἐπὶ τῆς διχοτόμου;

25. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΚΑΘΕΤΟΥ

25. 1. Ἐπὶ μιᾶς εύθειας λαμβάνομεν σημεῖον O καὶ ἐκατέρωθεν αὐτοῦ δύο ἵσα τμήματα $OA=OB$, σχ. 55. Ἐπειτα φέρομεν τήν εύθειαν ε κάθετον πρὸς τήν AB εἰς τὸ σημεῖον O αὐτῆς. "Ητοι τήν μεσοκάθετον τοῦ τμήματος AB.

"Ἄσ συγκρίνωμεν τὰς ἀποστάσεις MA, MB ἐνὸς σημείου M τῆς ε ἀπὸ τὰ ἄκρα τοῦ AB.

Εἰς τήν $\Sigma(\epsilon)$ παρατηροῦμεν ὅτι τὰ A, B εἰναι μεταξύ των διμόλογα ἔνω τὸ M εἰναι διμόλογον πρὸς ἑαυτό. Συνεπῶς καὶ τὰ τμήματα MA, MB, εἰναι διμόλογα καὶ ἵσα.

$$MA=MB$$

Εἶναι φανερὸν ὅτι ὅπως εἰργάσθημεν μὲ τὸ σημεῖον M εἰναι δυνατὸν νὰ ἐργασθῶμεν μὲ διποιοδήποτε ἄλλο σημεῖον τῆς ε.

"Ητοι: M κεῖται ἐπὶ τῆς μεσοκαθέτου τοῦ AB $\Rightarrow MA=MB$ (1)

25. 2. "Ἄσ λάβωμεν μὲ τὸν διαβήτην μας ἔν σημεῖον M τοῦ ἐπιπέδου, τοιοῦτον ὥστε $MA=MB$, καὶ ἄς φέρωμεν τήν διχοτόμον MO τῆς γωνίας AMB, σχ. 55.

Εἰς τήν συμμετρίαν ὡς πρὸς τήν εύθειαν MO γνωρίζομεν ὅτι αἱ πλευραὶ MA, MB τῆς γωνίας AMB εἰναι διμόλογοι.

"Ητοι : Εἰς τήν δίπλωσιν περὶ τὴν MO αἱ πλευραὶ MA, MB θὰ συμπέσουν. Ἐπειδὴ δὲ εἰναι $MA=MB$, θὰ συμπέσουν καὶ τὰ σημεῖα A καὶ B. Αὐτὸ σημαίνει

ὅτι καὶ τὰ A, B εἶναι δύο λόγα. Συνεπῶς ἡ εὐθεῖα MO=ε εἶναι ἡ μεσοκάθετος τοῦ AB.

"Ωστε : $MA=MB \Rightarrow M$ κεῖται ἐπὶ τῆς μεσοκάθετου τοῦ AB. (2)

Μὲ τὰ ὅργανά σας δύνασθε νὰ ἐπιληφθεύσετε ὅτι εἰς τὸ ἐπίπεδον ὃποιο-δήποτε σημεῖον N, ἔκτος τῆς μεσοκάθετου τοῦ AB, ἀπέχει ἄνισον ἀπὸ τὰ ἄκρα A καὶ B τοῦ AB.

25. 3. Αἱ ἀνωτέρω προτάσεις διὰ τὴν μεσοκάθετον διατυπώνονται δύο ως ἔξῆς :

Εἰς τὸ ἐπίπεδον τὰ σημεῖα τῆς μεσοκάθετου πρὸς εὐθ. τμῆμα AB καὶ μόνον αὐτὰ ἀπέχουν ἕξ ΐσου ἀπὸ τὰ ἄκρα αὐτοῦ.

"Η συμβολικῶς :

$$MA=MB \iff M \text{ κεῖται εἰς τὴν μεσοκάθετον τοῦ AB}$$

Μία ἄλλη διατύπωσις τῆς ίδιας προτάσεως εἶναι ἡ ἀκόλουθος :

"Ο γεωμετρικὸς τόπος* τῶν σημείων τοῦ ἐπιπέδου, τὰ δόπια ἀπέχουν ἕξ ΐσου ἀπὸ δύο σημεῖα A καὶ B αὐτοῦ, εἶναι ἡ μεσοκάθετος πρὸς τὴν AB.

26. ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΔΥΟ ΚΑΘΕΤΩΝ ΕΥΘΕΙΩΝ

26. 1. Χαράσσομεν δύο εὐθείας δ, ε καθέτους μεταξύ των, σχ. 56.

Ποιὸν εἶναι τὸ συμμετρικὸν τῆς δ εἰς τὴν $\Sigma(\epsilon)$;

Παρατηροῦμεν ὅτι ἡ δ εἶναι κάθετος πρὸς τὴν ε. "Αρα συμπίπτει μὲ τὴν συμμετρικήν της ($\delta \equiv \delta'$).

"Ωστε : 'Εὰν δύο εὐθεῖαι εἶναι κάθετοι μεταξύ των, τότε ἐκάστη τούτων συμπίπτει μὲ τὴν συμμετρικήν της εἰς τὴν συμμετρικήν της εἰς τὴν συμμετρίαν ὡς πρὸς τὴν ἀλλήν.


"Η συμβολικῶς : Εἰς τὴν $\Sigma(\epsilon)$: $\delta \perp \epsilon \Rightarrow \delta \equiv \delta'$.

σχ. 56

26. 2. Εἰς τὴν $\Sigma(\epsilon)$ μία εὐθεῖα $\delta \neq \epsilon$ συμπίπτει μὲ τὴν συμμετρικήν της ($\delta \equiv \delta'$). Ποιία εἶναι ἡ θέσις τῆς δ ὡς πρὸς τὴν ε;

Σκεπτόμεθα ὅτι : 'Εφ' ὅσον ἡ δ συμπίπτει μὲ τὴν συμμετρικήν της πρέπει τὸ συμμετρικόν M' τυχόντος σημείου M τῆς δ νὰ κεῖται ἐπὶ τῆς δ. 'Αλλὰ ἡ MM' εἶναι κάθετος πρὸς τὴν ε. "Ητοι ἡ δ εἶναι κάθετος πρὸς τὴν ε.

* Η ἔννοια καὶ ὁ δρός «γεωμετρικὸς τόπος» διερμηνεύεται εἰς τὸν διάστημον "Ελληνα φιλόσοφον καὶ μαθηματικὸν τῆς ἀρχαιότητος Πλάτωνα.



"Ωστε. Έάν είς τὴν $\Sigma(\epsilon)$ μία εύθεια $\delta \neq \epsilon$ ε συμπίπτη μὲ τὴν συμμετρικήν της, τότε αἱ εύθειαι δ καὶ ε είναι κάθετοι μεταξύ των.

"Η συμβολικῶς: Εἰς τὴν $\Sigma(\epsilon)$: $\delta \perp \epsilon \Rightarrow \delta \equiv \delta'$ (2)

26. 3. Αἱ συνεπαγωγαὶ (1) καὶ (2) γράφονται ὅμοῦ ὡς ἔξῆς:

$$\boxed{\text{Εἰς τὴν } \Sigma(\epsilon): \delta \perp \epsilon \iff \delta \equiv \delta', \quad \delta \neq \epsilon}$$

"Ινα είς τὴν $\Sigma(\epsilon)$ μία εύθεια $\delta \neq \epsilon$ συμπίπτη μὲ τὴν συμμετρικήν της, πρέπει καὶ ἀρκεῖ νὰ είναι κάθετος πρὸς τὴν ϵ .

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

66. 'Εάν M, M' είναι ἐν ζεῦγος σημείων συμμετρικῶν ὡς πρὸς εύθειαν ϵ καὶ N ἐν σημείον τῆς ϵ , τὶ συνάγετε διὰ τὰ τμήματα NM καὶ NM' ;

67. 'Εάν τὸ σημείον N τῆς προηγουμένης ἀσκήσεως κεῖται ἐκτὸς τῆς εύθειας ϵ , τὶ συνάγετε διὰ τὰ τμήματα NM καὶ NM' ;


68. Χαράξατε μίαν εύθειαν ϵ καὶ ἓπι της σημείον M ἐκτὸς τῆς ϵ φέρατε τὴν κάθετον MO πρὸς αὐτήν. "Ἐπειτα φέρατε ἐπὶ τοῦ M δύο πλαγίας πρὸς τὴν ϵ . Εἰς ποίαν περίπτωσιν τὰ τμήματα τῶν πλαγίων ἀπὸ τὸ M μέχρι τῆς ϵ είναι ἴσα;

69. Σχηματίσατε μίαν γωνίαν $\chi O \psi$ καὶ ἐπὶ τῆς πλευρᾶς $O\psi$ σημειώσατε ἐν σημείον A . Νὰ εύρεθῇ ἐπὶ τῆς πλευρᾶς $O\psi$ ἐν σημείογ B τὸ ὅποιον νὰ ἀπέχῃ ἐξ I ου ἀπὸ τὴν κορυφὴν O καὶ ἀπὸ τὸ σημεῖον A .


27. ΟΞΕΙΑΙ, ΑΜΒΛΕΙΑΙ ΓΩΝΙΑΙ



Σχ. 57



Σχ. 58



Σχ. 59

"Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ὁρθὴν γωνίαν, τὴν εύθειαν γωνίαν καὶ τὴν πλήρη γωνίαν τὰς ὅποιας ἔχομεν γνωρίσει, ὑπάρχει καὶ πλήθος διαφόρων ἄλλων γωνιῶν.

27. 1. Οξεῖα γωνία

"Ἐκάστη γωνία μικροτέρα τῆς ὁρθῆς λέγεται οξεῖα γωνία.

27. 2. Αμβλεῖα γωνία

"Ἐκάστη γωνία μεγαλυτέρα τῆς ὁρθῆς καὶ μικροτέρα τῆς εύθειας γωνίας λέγεται ἀμβλεῖα γωνία.

28. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑΙ, ΠΑΡΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑΙ, ΚΑΤΑ ΚΟΡΥΦΗΝ ΓΩΝΙΑΙ


28. 1. Συμπληρωματικάι

Χαράσσομεν μίαν δρθήν γωνίαν καὶ φέρομεν μίαν ήμιευθεῖαν OM εἰς τὸ ἑσωτερικόν αὐτῆς, σχ. 60.

Αἱ γωνίαι AOM καὶ MOB ἔχουν ἀθροισμα μίαν δρθήν γωνίαν.

Διὰ τοῦτο λέγομεν ὅτι ἐκάστη τούτων εἶναι συμπληρωματικὴ τῆς ἄλλης. "Ἡ ὅτι εἴναι μεταξύ των συμπληρωματικαί.

Γενικῶς: Δύο γωνίαι λέγονται συμπληρωματικαὶ ὅταν ἔχουν ἀθροισμα μίαν δρθήν γωνίαν



28. 2. Παραπληρωματικάι


σχ. 60

Εἰς τὸ σχ. 61 αἱ γωνίαι O_1 καὶ O_2 ἔχουν ἀθροισμα μίαν εὐθεῖαν γωνίαν. Διὰ τοῦτο λέγομεν ὅτι ἐκάστη τούτων εἴναι παραπληρωματικὴ τῆς ἄλλης. Ἡ ὅτι εἴναι μεταξύ των παραπληρωματικαί.

Γενικῶς: Δύο γωνίαι λέγονται παραπληρωματικαὶ ὅταν ἔχουν ἀθροισμα μίαν εὐθεῖαν γωνίαν.

28. 3. Παρατηρήσεις

Εἰς τὰ σχήματα 60, 61 αἱ γωνίαι ἐκτὸς τοῦ ὅτι εἴναι συμπληρωματικαὶ ἡ παραπληρωματικαὶ εἴναι καὶ ἐφεξῆς. "Ἡτοι αἱ γωνίαι AOM καὶ MOB , σχ. 60, εἴναι ἐφεξῆς συμπληρωματικαὶ ἐνῷ αἱ γωνίαι O_1 καὶ O_2 , σχ. 61, εἴναι ἐφεξῆς παραπληρωματικαί.



28. 4. Κατὰ κορυφὴν γωνίαι

σχ. 62

"Ἄσ προσέξωμεν τὰς γωνίας O_1 , O_2 τοῦ σχ. 62. Αἱ πλευραὶ τῆς μιᾶς εἴναι ἀντίθετοι τῶν πλευρῶν τῆς ἄλλης ἀντιστοίχως. Διὰ τοῦτο λέγονται κατὰ κορυφὴν γωνίαι.

"Ωστε: Δύο γωνίαι λέγονται κατὰ κορυφὴν ἐὰν αἱ πλευραὶ τῆς μιᾶς εἴναι ήμιευθεῖαι ἀντίθετοι τῶν πλευρῶν τῆς ἄλλης.

Κατὰ τὰ ἀνωτέρω, εἰς τὸ αὐτὸ σχέδιον καὶ αἱ γωνίαι O_3 , O_4 εἴναι κατὰ κορυφὴν.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

70. Μὲ τὴν βοήθειαν τῶν δργάνων σας χαράξατε μίαν δξεῖαν γωνίαν καὶ ἔπειτα μίαν συμπληρωματικὴν καὶ μίαν παραπληρωματικὴν αὐτῆς.

71. Είναι δυνατὸν δύο δξεῖα γωνίαι ἥ δύο ἀμβλεῖα γωνίαι νὰ είναι παραπληρωματικαί;

72. Δύο παραπληρωματικαὶ γωνίαι είναι ἴσαι. Τὶ συμπεραίνετε δι' ἐκάστην τούτων;

73. Χαράξτε δύο εύθειας τεμνομένους και ενρετε δλα τά ζεύγη τῶν παραπληρωματικῶν γωνιῶν τά δποια ὑπάρχουν εἰς τό σχέδιον αὐτό.

74. Διατί δταν δύο γωνίαι είναι παραπληρωματικαὶ τῆς αὐτῆς γωνίας είναι ίσαι; Μὲ τὴν βοήθειαν τούτου ἀποδεῖστε δτι δύο κατά κορυφὴν γωνίαι είναι ίσαι.

29. ΜΕΤΡΗΣΙΣ ΓΩΝΙΩΝ

29. 1. Εἰς τὰς κατασκευάς, εἰς τοὺς ὑπολογισμούς, εἰς τὴν τεχνικὴν ἔχομεν ἀνάγκην μετρήσεως γωνιῶν. "Οταν μετρῶμεν μίαν γωνίαν κυρτὴν ἢ μὴ κυρτὴν, δὲν μετροῦμεν φυσικὰ τὰς πλευράς, οὔτε τὸ ἐσωτερικὸν αὐτῆς, ἀλλὰ πόσην περιστροφὴν δρίζει αὗτη.

29. 2. Ἀριθμητικὴ τιμὴ γωνίας

"Οιως εἰς τὴν περίπτωσιν τῶν εὐθυγράμμων τμημάτων, διὰ νὰ μετρήσωμεν μίαν γωνίαν πρέπει πρῶτον νὰ ἐκλέξωμεν μίαν ὀρισμένην γωνίαν ὡς μονάδα. "Ἐπειτα νὰ εῦρωμεν πόσας φοράς περιέχει ἢ διθεῖσα γωνία τὴν μονάδα καὶ τὰ μέρη αὐτῆς.

Προκύπτει τοιουτοτρόπως εἰς ἀριθμὸς ὁ δποιος λέγεται ἀριθμητικὴ τιμὴ ἢ τιμὴ τῆς γωνίας.

29. 3. Μονάδες μετρήσεως γωνιῶν

Συνήθεις μονάδες μετρήσεως γωνιῶν, είναι ἢ δριθή γωνία (L), ἢ γωνία μιᾶς μοίρας (1°) καὶ ἢ γωνία ἐν δισ βαθμοῦ (1 gr).

α) Ἡ γωνία μιᾶς μοίρας ισοῦται μὲ τὸ $1/90$ τῆς δριθῆς γωνίας ἢ τὸ $1/360$ τῆς πλήρους γωνίας.

$$1^{\circ} = 1/90 \text{ L}$$

"Εκάστη γωνία μιᾶς μοίρας ὑποδιαιρεῖται εἰς 60 γωνίας τοῦ ἐνὸς πρώτου λεπτοῦ ($1'$). 'Εκάστη δὲ γωνία ἐνὸς πρώτου λεπτοῦ ὑποδιαιρεῖται εἰς 60 γωνίας τοῦ ἐνὸς δευτέρου λεπτοῦ ($1''$).

"Ητοι :

$$1^{\circ} = 60', \quad 1' = 60''$$

β) 'Εκάστη γωνία ἐνὸς βαθμοῦ ισοῦται μὲ $1/100$ τῆς δριθῆς γωνίας
Κατὰ τὰ ἀνωτέρω :

Μία πλήρης γωνία ισοῦται μὲ 4 L ἢ 360° ἢ 400 gr
Μία εὐθεῖα γωνία ισοῦται μὲ 2 L ἢ 180° ἢ 200 gr

29. 4. Σημείωσις

'Εάν κατὰ τὴν μέτρησιν μιᾶς γωνίας ω εὕρωμεν δτι ἢ μονάς μία μοίρα περιέχεται εἰς αὐτὴν π.χ. ἀκριβῶς 60 φοράς τότε γράφομεν :

$$\widehat{\omega} = 60^{\circ}$$

29. 5. Γωνιόμετρον (Μοιρογνωμόνιον)

Διὰ τὴν μέτρησιν γωνιῶν χρησιμοποιοῦμεν συχνά τὸ γωνιόμετρον


Τὸ ὅργανον τοῦτο ἀποτελεῖται ἀπὸ ἓν ἡμικύκλιον, μετάλλιον δὲ πλαστικόν, διηρημένον εἰς 180 ὑποδιαιρέσεις ἐξ ἀριστερῶν πρὸς τὰ δεξιά καὶ ἀντιστρόφως. Αἱ ἐνδείξεις ἀναγράφονται ἀνά 10°. Ἀναφέρομεν κατωτέρω παραδείγματα δύο χρήσεων τοῦ γωνιομέτρου.

29. 6. Νὰ εύρεθῇ ἡ τιμὴ δοθείσης γωνίας AKB, σχ. 63.


Τοποθετοῦμεν τὸ γωνιόμετρον εἰς τρόπον ὥστε νὰ ταυτιστοῦν:

α) Τὸ κέντρον Ο αὐτοῦ, μὲ τὴν κορυφὴν K τῆς γωνίας, καὶ β) ἡ διάμετρος τοῦ γωνιομέτρου μὲ τὴν μίαν πλευρὰν KA τῆς γωνίας. (Ἡ πλευρὰ KA νὰ διέρχεται διὰ τοῦ μηδενὸς τῆς κλίμακος μετρήσεως).

"Ηδη ἀρκεῖ νὰ ἀναγνώσωμεν εἰς τὴν βαθμολογημένην κλίμακα τὴν ἔν-



Σχ. 63



Σχ. 64

δειξιν τὴν δόποιαν δεικνύει ἡ πλευρὰ KB. Π.χ. ἡ γωνία AKB τοῦ σχ. 63 εἶναι περίπου 130°

29. 7. Νὰ κατασκευασθῇ γωνία 80° μὲ μίαν πλευρὰν δοθεῖσαν ἡμιευθεῖαν OA.

Τοποθετοῦμεν τὸ γωνιόμετρον εἰς τρόπον ὥστε νὰ ταυτισθῇ:

α) τὸ κέντρον αὐτοῦ Ο μὲ τὴν ἀρχὴν Ο τῆς δοθείσης ἡμιευθείας καὶ β) ἡ διάμετρος τοῦ γωνιομέτρου μὲ τὴν ἡμιευθεῖαν OA.

(Ἡ OA νὰ διέρχεται ἐκ τοῦ μηδενὸς τῆς κλίμακος).

"Ἐπειτα χαράσσομεν τὴν ἡμιευθεῖαν OB ἡ δόποια διέρχεται ἀπὸ τὸ σημεῖον τῆς ἐνδείξεως 80° τοῦ γωνιομέτρου, σχ. 64.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

75. Μία γωνία εἶναι διπλασία μιᾶς συμπληρωματικῆς τῆς. Νὰ εύρετε εἰς μοίρας, εἰς βαθμοὺς καὶ εἰς δρῦάς, ἐκάστην τῶν γωνιῶν αὐτῶν.

76. Μία γωνία ὑπερβαίνει τὴν παραπληρωματικήν αὐτῆς κατά 30°. Νὰ ὑπολογίσετε ἐκάστην τῶν δύο αὐτῶν γωνιῶν.

30. 1. 'Ορισμός

α) Εις ἐν ἐπίπεδον σημειώσατε σημεῖον O καὶ μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ διαβῆτου, εῦρετε διάφορα ἄλλα σημεῖα $M_1, M_2, M_3 \dots$ τὰ δόποια ἀπέχουν 4 cm ἀπὸ τὸ O , σχ. 65.

Ποιὸν εἶναι τὸ σχῆμα τῶν σημείων αὐτῶν;

β) Στερεώνομεν τὰ σκέλη τοῦ διαβήτου μας ὥστε νὰ μὴ μεταβάλλεται ἡ γωνία αὐτῶν. Ἐπειτα, στηρίζομεν τὴν αἰχμὴν τοῦ ἐνὸς σκέλους εἰς ἐν σημεῖον O ἐνὸς ἐπιπέδου καὶ περιφέρομεν τὸν διαβήτην εἰς τρόπον ὥστε ἡ γραφὶς τοῦ ἄλλου σκέλους νὰ ἔγγίζῃ συνεχῶς τὸ ἐπίπεδον. Τοιουτοτρόπως ἡ γραφὶς χαράσσει μίαν γραμμὴν, σχ. 66, τῆς δόποιας ὅλα τὰ σημεῖα ἀπέχουν ἐξ ἵσου ἀπὸ τὸ σημεῖον O .


γ) Ἐὰν εἰς τὸ ἐπίπεδον δοθῇ ἐν σημεῖον O καὶ ἐν εὐθ. τμῆμα α , τότε τὸ σύνολον τῶν σημείων τοῦ ἐπιπέδου τὰ δόποια ἀπέχουν ἀπὸ τὸ O ἀπόστασιν ἴσην μὲ α , λέγεται κύκλος.

Τὸ σημεῖον O λέγεται κέντρον καὶ τὸ τμῆμα α ἀκτίς τοῦ κύκλου. Ἐπειδὴ δὲ κύκλος δρίζεται ἐδὲ γνωρίζωμεν τὸ κέντρον O καὶ τὴν ἀκτίναν αὐτοῦ, συμβολίζεται (O, α).


30. 2. Στοιχεῖα τοῦ κύκλου

α) Ἐσωτερικὰ καὶ ἔξωτερικὰ σημεῖα


ι) Εἰς τὸ σχ. 67 τὸ σημεῖον A ἀπέχει ἀπὸ τὸ κέντρον O ἀπόστασιν



Σχ. 65



Σχ. 66



Σχ. 67

μικροτέραν τῆς ἀκτίνος α , ($OA < \alpha$) καὶ λέγεται ἐσωτερικὸν σημεῖον τοῦ κύκλου (O, α). Εἰς τὸ αὐτὸ σχέδιον τὸ σημεῖον B ἀπέχει ἀπὸ τὸ κέντρον O ἀπόστασιν OB μεγαλυτέραν τῆς ἀκτίνος α , ($OB > \alpha$) καὶ λέγεται ἔξωτερικὸν σημεῖον τοῦ κύκλου (O, α).

Τὸ σύνολον τῶν ἐσωτερικῶν σημείων τοῦ κύκλου λέγεται ἐσωτερικὸν τοῦ κύκλου. Τὸ σύνολον τῶν ἔξωτερικῶν σημείων τοῦ κύκλου λέγεται ἔξωτερικὸν τοῦ κύκλου.

"НТОІ :

$OA < \alpha \iff A$ κείται εις τὸ ἐσωτερικὸν τοῦ κύκλου

$\Omega M = \alpha \iff M$ κεῖται ἐπὶ τοῦ κύκλου

$\Omega B \geq g$ \Leftrightarrow Β κείται εἰς τὸ ἔξωτερικὸν τοῦ κύκλου



β) Χορδή, διάμετρος, τόξον.

Ἐὰν Α, Β είναι δύο σημεία τοῦ κύκλου, τότε τὸ εὐθύτμημα ΑΒ λέγεται χ ορδὴ τοῦ κύκλου.

Σχ. 68

Ειδικῶς έαν μία χορδὴ ΓΔ διέρχεται διὰ τοῦ κέντρου Ο τοῦ κύκλου, αὕτη λέγεται διάμετρος τοῦ κύκλου, σχ. 68.

Έκαστη χορδή, π.χ. ή χορδή AB, σχ. 68, χωρίζει τὸν κύκλον εἰς δύο μέρη τὰ δποια κείνται ἑκατέρωθεν αὐτῆς. "Έκαστον τούτων λέγεται τόξον.

"*Ητοι ή χορδὴ AB δρίζει εἰς τὸν κύκλον δύο τόξα μὲ ἄκρα τὰ σημεῖα A καὶ B.*

31. ΙΑΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ

31. 1. Είναι φανερόν ότι έκαστη διάμετρος όποτελείται άπό δύο άκτινας.
"Αρα: "Ολαι αἱ διάμετροι κύκλου είναι ίσαι.

31. 2. Ἐάν χαράξωμεν μὲ τὸν διαβήτην ἓνα κύκλον, μίση διáμετρον AB αὐτοῦ καὶ ἀς διπλώσωμεν τὸ ἐπίπεδον τοῦ κύκλου περὶ τὴν διáμετρον AB .

‘Η δίπλωσις αὕτη :

α) Θὰ ἀφήσῃ ἀκίνητον τὸ κέντρον Ο τοῦ κύκλου.

β) Θά φέρη τυχόν σημείον M αύτοῦ εἰς σημείον M' καὶ θά είναι $OM=OM'$. (Διατί;).

"**Ητοι,** θὰ φέρῃ ἔκαστον σημείον τοῦ κύκλου ἐπὶ τοῦ ιδίου κύκλου. Τοῦτο σημαίνει ότι τὸ πρός τὴν εὐθεῖαν AB είναι δὲ ιδίος δὲ κύκλος.

"**ΜΤΟΙ: 1.** Ἡ εὐθεῖα ἐκάστης διαμέτρου εἶναι ἀξιῶν συμμετρίας τοῦ κύκλου.

2. Ἐκάστη διάμενρος χωρίζει τὸν κύκλον εἰς δύο ἵσα μέρη.

"Ἐκαστον τῶν δύο τούτων μερῶν τοῦ κύκλου λέγεται ἡ μικύκλιον.

32. ΙΣΟΤΗΣ ΚΥΚΛΩΝ, ΤΟΞΩΝ

32. 1. Ἰσότης, ἀνισότης κύκλων

Χαράσσομεν δύο κύκλους (O, α), (O', α') μὲ τὸς ὀκτῖνας $\alpha = \alpha'$. "Επειτα μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ διαφανοῦς ἐπιθέτομεν τὸν Ἑνα ἐπὶ τοῦ ἄλλου γις τρόπου

ώστε νά συμπέσουν τά κέντρα Ο, Ο' αύτῶν. Παρατηροῦμεν τότε ότι οι δύο κύκλοι ταυτίζονται.

Τὸ πείραμα τοῦτο ὁδηγεῖ εἰς τὸν ἔξῆς ὄρισμόν.

"Οταν αἱ ἀκτῖνες δύο κύκλων εἰναι ἵσαι τότε καὶ οἱ κύκλοι εἰναι ἴσοι.

"Αντιστρόφως: δυνάμεθα νά ἐπαληθεύσωμεν ότι:

"Ἐὰν δύο κύκλοι εἰναι ἴσοι θὰ ἔχουν ἴσας ἀκτῖνας.

$$(O, \alpha) = (O', \alpha') \iff \alpha = \alpha'$$

Ἐὰν δύο κύκλοι δὲν εἰναι ἴσοι τότε λέγονται ἀνισοι.

32. 2. Τόξα ἴσων κύκλων

Χαράσσομεν δύο κύκλους μὲ ἴσας ἀκτῖνας: "Ητοι δύο ἴσους κύκλους.

"Ἐπὶ τῶν δύο τούτων κύκλων λαμβάνομεν δύο τόξα AB καὶ A'B'.

"Ἐπειτα μὲ τὴν βοήθειαν ἐνὸς φύλλου διαφανοῦς χάρτου, ἐπιθέτομεν τὸν ἕνα κύκλον ἐπὶ τοῦ ἄλλου εἰς τρόπον ὡστε οἱ δύο κύκλοι νὰ ἐφαρμόσουν. Παρατηροῦμεν τότε ότι, τὸ τόξον AB τοῦ ἐνὸς κύκλου ταυτίζεται μὲ τὸ τόξον A'B' τοῦ ἄλλου κύκλου (ἔστω καὶ ἐὰν χρειασθῇ νὰ περιστρέψωμεν περὶ τὸ κέντρον τὸν ἕνα κύκλον) ἢ δὲν ταυτίζεται. Εἰς τὴν πρώτην περίπτωσιν λέγομεν ότι τὰ δύο τόξα AB, A'B' εἰναι ἴσα καὶ εἰς τὴν δευτέραν ότι εἰναι ἀνισα. "Ητοι εἰς δύο ἴσους κύκλους (ἢ εἰς τὸν αὐτὸν κύκλον) δύο τόξα εἰναι ἴσα ἢ ἀνισα.

32. 3. "Ελασσον, μεῖζον τόξον

Καθὼς εἶδομεν τὰ ἄκρα A, B μιᾶς χορδῆς AB εἰναι ἄκρα δύο τόξων τοῦ κύκλου. Τὰ τόξα αὐτὰ εἰναι ἀνισα. Τὸ ἐν, τὸ μικρότερον, δυνομάζεται ἔλασσον τόξον AB καὶ τὸ ἄλλο, τὸ μεγαλύτερον, μεῖζον τόξον AB.

Εἰς τὰ ἐπόμενα δσάκις γράφομεν «τόξον AB» ἢ συμβολικῶς \widehat{AB} , θὰ ἐννοοῦμεν τὸ ἔλασσον τόξον AB. Διὰ τὸ μεῖζον τόξον θὰ γίνεται ειδικὴ μνεία.

32. 4. Τόξα ἀνίσων κύκλων

Χαράξατε δύο ἀνίσους κύκλους καὶ μὲ τὴν βοήθειαν ἐνὸς φύλλου διαφανοῦς χάρτου προσπαθήσατε νὰ φέρετε εἰς σύμπτωσιν (νὰ ἐφαρμόσετε) ἐν τόξον τοῦ ἐνὸς μὲ δόποιο δήποτε τόξον τοῦ ἄλλου. Θὰ πεισθῆτε ότι τοῦτο εἰναι ἀδύνατον.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

77. Χαράξατε δύο κύκλους (O, α) καὶ (O', β) διπού $\alpha > \beta$. Νὰ εύρετε τὸ σύνολον τῶν σημείων

μείων τοῦ ἐπιπέδου τὰ δόποια εἶναι ἑσωτερικά τοῦ κύκλου (O, α) καὶ ἑξωτερικά τοῦ κύκλου (O, β).

78. Θέλομεν νὰ χαράξωμεν κύκλους μὲ ἀκτῖνα μήκους 3 cm καὶ διερχομένους ἀπὸ τὸ αὐτὸ σημεῖον A. Πόσους τοιούτους κύκλους δυνάμεθα νὰ χαράξωμεν εἰς τὸ ἐπίπεδον; Ποῦ εὑρίσκονται τὰ κέντρα αὐτῶν;

79. Εἰς ἓνα κύκλον χαράξατε δύο διαμέτρους καθέτους μεταξὺ των. Ἔπειτα μὲ τὴν βοήθειαν ἐνὸς φύλλου διαφανοῦς χάρτου συγκρίνατε τὰ ὅπ' αὐτῶν δριζόμενα 4 τόξα τοῦ κύκλου.

80. Χαράξατε εὐθ. τμῆμα AB μήκους 4 cm. Ἔπειτα νὰ εὑρετε σημεῖα τοῦ ἐπιπέδου τὰ δόποια ἀπέχουν 3 cm ἀπὸ ἔκαστον ἄκρων τοῦ AB.

33. ΑΘΡΟΙΣΜΑ, ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΟΞΩΝ ΙΣΩΝ ΚΥΚΛΩΝ

33. 1. Ὁρισμοί

α) Εἰς τὸ κατωτέρω σχ. 71 τὰ ἐλάσσονα τόξα AB, BG ἔχουν τὸ ἐν ἄκρων αὐτῶν κοινὸν καὶ μεταξὺ τῶν δύο ἄλλων ἄκρων. Διὰ τοῦτο λέγονται διαδοχικά.

Τὸ μεῖζον ἢ ἔλασσον τόξον AG, τὸ δόποιον περιέχει τὸ σημεῖον λέγεται διαδοχικῶν τόξων AB καὶ BG.

Γράφομεν δὲ

$$\widehat{AB} + \widehat{BG} = \widehat{AG} \quad (1)$$

β) Τὸ τόξον BG προστίθεται εἰς τὸ τόξον AB καὶ δίδει διαδοχικά τὸ τόξον AG καὶ λέγεται διὰ τοῦτο διαφορὰ τῶν τόξων AG καὶ AB.


Γράφομεν δὲ :

$$\widehat{AG} - \widehat{AB} = \widehat{BG} \quad (2)$$


Συμφώνως πρὸς τὰ ἀνωτέρω ἀπὸ τὴν (1) ἔχομεν ἀκόμη δῆτα

$$\widehat{AG} - \widehat{BG} = \widehat{AB} \quad (\text{Διατί;})$$


33. 2. Διὰ νὰ προσθέσωμεν μὴ διαδοχικὰ τόξα τοῦ αὐτοῦ κύκλου ἢ



Σχ. 71



Σχ. 72



Σχ. 73

δύο ίσων κύκλων, μὲ ἐν φύλλον διαφανοῦς χάρτου τὰ καθιστῶμεν διαδοχικὰ καὶ ἔπειτα τὰ προσθέτομεν.

Π.χ. διὰ νὰ προσθέσωμεν τὰ τόξα AB καὶ ΓΔ τοῦ σχ. 72 λαμβάνομεν :

$$\widehat{EZ} = \widehat{AB} \quad \text{καὶ} \quad \widehat{ZH} = \widehat{GD}$$

$$\widehat{AB} + \widehat{GD} = \widehat{EZ} + \widehat{ZH}$$

$$\widehat{AB} + \widehat{GD} = \widehat{EZH}$$

81. Μὲ τὴν βοήθειαν ἐνὸς φύλλου διαφανοῦς χάρτου ἐπαληθεύσατε δτὶ ἡ πρόσθεσις τῶν τόξων Ἰσων κύκλων εἰναι πρᾶξις μεταθετικὴ καὶ προσεταιριστικὴ.

82. Εἰς δύο Ἰσους κύκλους δυὸς τόξα (ἐλάσσονα) εἰναι Ἰσα. Τι συνάγετε διὰ τὰ ἀντίστοιχα μείζονα τόξα αὐτῶν; Δικαιολογήσατε τὴν ἀπάντησίν σας.

83. Εἰς δύο Ἰσους κύκλους σημειώσατε δύο ἀνισα ἐλάσσονα τόξα. Μὲ τὴν βοήθειαν ἐνὸς φύλλου διαφανοῦς χάρτου νὰ συγκρίνετε τὰ ἀντίστοιχα μείζονα τόξα αὐτῶν. Τι παρατηρεῖτε;

34. ΕΠΙΚΕΝΤΡΟΣ ΓΩΝΙΑ - ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΝ ΤΟΞΩΝ

34. 1. Ὁρισμοί

Ἐκάστη γωνίᾳ AOB , ἡ διποία ἔχει τὴν κορυφήν της εἰς τὸ κέντρον τοῦ κύκλου, λέγεται ἐπίκεντρος γωνίᾳ εἰς τὸν κύκλον τοῦτον. Τὰ σημεῖα A, B εἰς τὰ διποῖα ἡ ἐπίκεντρος γωνίᾳ AOB , σχ. 74, τέμνει τὸν κύκλον εἰναι ἄκρα δύο τόξων. Τὸ μὲν ἐλάσσον τόξον AB λέγεται ἀντίστοιχον τόξον τῆς κυρτῆς ἐπίκεντρου γωνίας AOB , τὸ δὲ μείζον τόξον $A'B'$ ἀντίστοιχον τόξον τῆς μὴ κυρτῆς ἐπίκεντρου γωνίας AOB .


34. 2. Σχέσις ἐπίκεντρων γωνιῶν καὶ ἀντίστοιχων τόξων

α) Εἰς δύο Ἰσους κύκλους σημειώνομεν δύο Ἰσας ἐπίκεντρους γωνίας AOB καὶ $A'O'B'$, σχ. 75.

Ἐάν μὲ τὴν βοήθειαν διαφανοῦς χάρτου φέρωμεν εἰς σύμπτωσιν τὰς γωνίας αὐτάς, εἶναι φανερόν, δτὶ θὰ ἐφαρμόσουν καὶ τὰ ἀντίστοιχα τόξα.



Σχ. 74



Σχ. 75



β) Εἰς δύο Ἰσους κύκλους, μὲ ἐν φύλλον διαφανοῦς χάρτου, σημειώνομεν δύο Ἰσα τόξα $AB=A'B'$. ᘾάν φέρωμεν εἰς σύμπτωσιν τὰ τόξα αὐτά, θὰ παρατηρήσωμεν δτὶ καὶ αἱ ἀντίστοιχοι ἐπίκεντροι γωνίαι αὐτῶν συμπίπτουν (ταυτίζονται).

Τὰ ἀνωτέρω πειράματα μᾶς ὁδηγοῦν εἰς τὴν ἔχης γεωμετρικὴν πρότασιν.

Εἰς δύο Ἰσους κύκλους (ἢ εἰς τὸν αὐτὸν κύκλον):

Εἰς Ἰσας κυρτὰς (ἢ μὴ κυρτὰς) ἐπίκεντρους γωνίας ἀντίστοιχοῦν Ἰσα τόξα καὶ ἀντίστροφας εἰς Ἰσα τόξα ἀντίστοιχοῦν Ἰσαι κυρταί (ἢ μὴ κυρταί) ἐπίκεντροι γωνίαι.

"Ἡ συμβολικῶς :

Εἰς Ἰσους κύκλους :

$$\widehat{AB} = \widehat{A'B'} \iff \widehat{AOB} = \widehat{A'O'B'}$$

35. ΙΣΑ ΤΟΞΑ, ΙΣΑΙ ΧΟΡΔΑΙ

35. 1. α) Εις δύο ίσους κύκλους (ή εις τὸν αὐτὸν κύκλον) χαράξατε, μὲ τὴν βοήθειαν φύλλου διαφανοῦς χάρτου, δύο ίσας χορδὰς $AB = A'B'$ καὶ συγκρίνατε τὰ δύο ἐλάσσονα καθώς καὶ τὰ δύο μείζονα τόξα $AB, A'B'$. Φέρατε πρὸς τοῦτο (μὲ τὴν βοήθειαν φύλλου διαφανοῦς χάρτου) εἰς σύμπτωσιν τοὺς ίσους κύκλους εἰς τρόπον ὥστε νὰ συμπέσουν αἱ ίσαι χορδαί. Τὶ παρατηρεῖτε;

β) Εις δύο ίσους κύκλους (ή εις τὸν αὐτὸν κύκλον) σημειώσατε, μὲ φύλλον διαφανοῦς χάρτου, δύο ίσα τόξα καὶ ἐπειτα συγκρίνατε τὰς χορδὰς αὐτῶν.

Πρὸς τοῦτο φέρατε εἰς σύμπτωσιν τοὺς δύο ίσους κύκλους εἰς τρόπον ὥστε νὰ ἔφαρμόσουν τὰ ίσα τόξα. Τὶ παρατηρεῖτε;

Τὰ ἀνωτέρω πειράματα μᾶς δόηγοῦν εἰς τὰς ἑξῆς γεωμετρικὰς προτάσεις.

Εἰς ίσους κύκλους ἡ εἰς τὸν αὐτὸν κύκλον:

1. **Εἰς ίσας χορδὰς ἀντιστοιχοῦν ίσα ἐλάσσονα ἡ μείζονα τόξα.**
2. **Εἰς ίσα τόξα ἀντιστοιχοῦν ίσαι χορδαί.**

Σημείωσις

‘Η Ιη ἐκ τῶν ἀνωτέρω Ιδιοτήτων μᾶς ἐπιτρέπει νὰ λάβωμεν εἰς ίσους κύκλους ίσα τόξα, λαμβάνοντες μὲ τὸν διαβήτην ίσας χορδάς.

35. 2. Μέσον τόξου. Διχοτόμος ἐπικέντρου γωνίας

Εἰς ἓνα κύκλον σημειώνομεν δύο διαδοχικὰ ίσα τόξα, $\widehat{AB} = \widehat{B\Gamma}$, σχ. 76. Τὸ σημεῖον B τὸ δόποιον κεῖται εἰς τὸ τόξον AG καὶ τὸ χωρίζει εἰς δύο ίσα τόξα λέγεται μὲ σον αὐτοῦ.

Παρατηροῦμεν ἡδη ὅτι αἱ κυρταὶ ἐπίκεντροι γωνίας AOB καὶ BOD εἰναι ίσαι. (Διατί;. Προσέξατε τὰ ἀντιστοιχὰ τόξα αὐτῶν). ‘Αρα ή ήμιευθεῖσα OB , η δόποια διέρχεται ἀπὸ τὸ μέσον τοῦ τόξου AG εἶναι καὶ διχοτόμος τῆς ἐπικέντρου γωνίας AOG .


‘Η διχοτόμος μιᾶς ἐπικέντρου γωνίας διέρχεται ἀπὸ τὸ μέσον τοῦ ἀντιστοίχου τόξου αὐτῆς.

‘Η πρότασις αὕτη μᾶς ἐπιτρέπει νὰ κατασκευάσωμεν μὲ χάρακα τὴν διχοτόμον μιᾶς ἐπικέντρου γωνίας, ὅταν γνωρίζωμεν τὸ μέσον τοῦ ἀντιστοίχου τόξου αὐτῆς.

36. ΜΕΤΡΗΣΙΣ ΤΟΞΩΝ

36. 1. Ἀριθμητικὴ τιμὴ τόξου

Διὰ νὰ μετρήσωμεν ἐν τόξον AB συγκρίνομεν αὐτὸν μὲ ἐν ἄλλῳ τόξον M τοῦ ίδιου κύκλου, τὸ δόποιον λαμβάνομεν ὡς μονάδα. Ἀπὸ τὴν σύγκρισιν




σχ. 76

αύτήν προκύπτει είς άριθμός, ό δόποιος δεικνύει πόσας φοράς χωρεῖ ή μονάς τόξων (καὶ τὰ μέρη αὐτῆς) εἰς τὸ μετρούμενον τόξον. Ὁ άριθμός οὗτος εἶναι ή ἀριθμητική τιμὴ ή τιμὴ τοῦ τόξου.

36. 2. Μονάδες μετρήσεων τόξων

α) Μονάς μετρήσεως τόξων εἶναι τὸ τόξον μιᾶς μοίρας (1°). Αὕτη δριζεται ως ἔξης:

Φαντασθῆτε ὅτι ἐκ τοῦ κέντρου Ο τοῦ κύκλου φέρομεν ἡμιευθείας ΟΑ, ΟΒ, ΟΓ... οὔτως ὥστε νὰ σχηματίσωμεν 360 διαδοχικὰ ἵσα τόξα, σχ. 77.



"Εκαστον τῶν τόξων τούτων λέγεται τόξον μιᾶς μοίρας.

Παρατηροῦμεν ὅτι αἱ ἀντίστοιχοι ἐπίκεντροι γωνίαι τῶν τόξων τούτων εἶναι ἴσαι. Ἐκάστη δὲ τούτων εἶναι ἴση μὲ 1° .

Κατὰ τὰ ἀνωτέρω εἰς ἐπίκεντρον γωνίαν μιᾶς μοίρας ἀντίστοιχεῖ τόξον μιᾶς μοίρας, εἰς ἐπίκεντρον γωνίαν 2, 3, 4... μοιρῶν ἀντίστοιχεῖ τόξον 2, 3, 4... μοιρῶν ἀντίστοιχως.

"Ητοι ή τιμὴ μιᾶς ἐπικέντρου γωνίας εἶναι ή ἰδία μὲ τὴν τιμὴν τοῦ ἀντίστοιχου τόξου αὐτῆς (ὅταν μετρηθοῦν μὲ μοίρας).

Διὰ τοῦτο, ὅταν μετρῶμεν μὲ τὸ μοιρογνωμόνιον μίαν γωνίαν (§ 29), τὴν καθιστῶμεν ἐπίκεντρον καὶ μετροῦμεν τὸ ἀντίστοιχον τόξον αὐτῆς ἐπὶ τοῦ ἡμικυκλίου τοῦ μοιρογνωμονίου.

β) "Εκαστον τόξον μιᾶς μοίρας (1°) ὑποδιαιρεῖται εἰς 60 ἵσα τόξα. "Εκαστον τούτων λέγεται τόξον ἐνὸς πρώτου λεπτοῦ ($1'$). Ὁμοίως, ἔκαστον τόξον ἐνὸς πρώτου λεπτοῦ ὑποδιαιρεῖται εἰς 60 ἵσα τόξα. "Εκαστον τούτων, λέγεται τόξον τοῦ ἐνὸς δευτέρου λεπτοῦ ($1''$).

$$1^{\circ} = 60', \quad 1' = 60'', \quad 1^{\circ} = 3600''$$

γ) "Άλλαι μονάδες μετρήσεως τόξων εἶναι τὸ ἀκτίνιον καὶ ὁ βαθμός (gr).

Τόξον ἐνὸς ἀκτινίου = Τόξον μὲ μῆκος ἵσον πρὸς τὴν ἀκτίνα τοῦ κύκλου.

Τόξον ἐνὸς βαθμοῦ = Τόξον ἵσον πρὸς τὸ $1/400$ τοῦ κύκλου.

Ο βαθμὸς ὑποδιαιρεῖται εἰς δέκατα (dgr), ἑκατοστά (cgr.)

Παρατηρήσεις

α) "Οταν δύο τόξα ἔχουν τὴν αὐτὴν τιμὴν δὲν εἶναι κατ' ἀνάγκην ἴσα.

Π.χ. τὰ τόξα AB , GD τοῦ σχεδ. 78, ἔχουν ἵσας τιμὰς (εἰς μοίρας) χωρὶς νὰ εἶναι ἵσα.

β) Ἡ λέξις «μοίρα» δταν χρησιμοποιεῖται ὡς μονάς τόξων δηλώνει ἐν τόξον, ἐνῶ δταν χρησιμοποιεῖται ὡς μονάς γωνιῶν δηλώνει μίαν γωνίαν.

(*Επειδή τόξον καὶ γωνία παραπάνω σύμφωνα μονάς εἰσιν*)

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

84. Εἰς ἑνα κύκλον φέρατε δύο καθέτους μεταξύ των διαμέτρους. Συγκρίνατε ἐπειτα τὰς τέσσαρας χορδὰς αἱ δποιαὶ δρίζονται ὑπὸ αὐτῶν.

85. Μὲ τρεῖς διαμέτρους χωρίζομεν ἑνα κύκλον εἰς 6 ἵσα τόξα. Νὰ εὑρετε τὰς τιμὰς (εἰς μοίρας) καὶ τῶν 6 τόξων ὡς καὶ τῶν ἀντιστοίχων ἐπικεντρων γωνιῶν αὐτῶν.

86. Εἰς ἑνα κύκλον νὰ λάβετε δύο ἀνίσους χορδὰς καὶ ἐπειτα νὰ συγκρίνετε τὰς ἀποστάσεις τοῦ κέντρου ἀπὸ αὐτάς. Τι παρατηρεῖτε; Διατυπώσατε τὰ συμπεράσματά σας.

87. Νὰ ἔξετάσετε ἐάν ἡ μεσοκάθετος μιᾶς χορδῆς διέρχεται διὰ τοῦ κέντρου τοῦ κύκλου καὶ διὰ τῶν μέσων τῶν τόξων αὐτῆς.

37. ΣΧΕΤΙΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΥ


37. 1. Ἐὰν σᾶς ζητήσουν νὰ χαράξετε μίαν εύθειαν καὶ ἑνα κύκλον εἰς ποίας θέσεις εἶναι δυνατὸν νὰ τοποθετήσετε τὴν εύθειαν ὡς πρὸς τὸν κύκλον;

Αἱ δυναταὶ σχετικαὶ θέσεις φαίνονται εἰς τὸ σχ. 79.

Εἰς ἐκάστην περιπτώσιν θὰ συγκρίνωμεν τὴν ἀκτίνα α μὲ τὴν ἀπόστασιν δ τοῦ κέντρου O ἀπὸ τὴν εύθειαν.



Σχ. 79



Σχ. 80

37. 2. Χαράσσομεν ἑνα κύκλον (O, α) καὶ τρεῖς εύθειας $\epsilon_1, \epsilon_2, \epsilon_3$. εἰς ἀποστάσεις ἀπὸ τὸ κέντρον $OA > \alpha$, $OB = \alpha$ καὶ $OG < \alpha$ ἀντιστοίχως, σχ. 80.

Διακρίνομεν τότε τὰ ἔξις:

1η περίπτωσις: $OA > \alpha$.

Οὐδὲν κοινὸν σημεῖον ἔχει ἡ εύθεια μὲ τὸν κύκλον. (Διατί; Συγκρίνατε τὴν ἀπόστασιν τοῦ κέντρου O ἀπὸ ἐν σημεῖον τῆς ϵ_1 μὲ τὴν ἀκτίνα α).

2α περίπτωσις: $OB = \alpha$

Τὸ σημεῖον B τῆς ϵ_2 κεῖται ἐπὶ τοῦ κύκλου. "Όλα τὰ ἄλλα σημεῖα τῆς ϵ_2 ἀπέχουν ἀπὸ τὸ κέντρον ἀπόστασιν μεγαλυτέραν τῆς $OB = \alpha$ (§ 21. 4.)

Συνεπῶς τὸ B εἶναι τὸ μοναδικὸν κοινὸν σημεῖον τῆς εύθειας ϵ_2 μὲ τὸν κύκλον. Διὰ τούτο λέγομεν ὅτι ἡ εύθεια ϵ_2 εἶναι ἐφαπτομένη τοῦ, κύκλου εἰς τὸ σημεῖον B αὐτοῦ τὸ ὁποῖον ὀνομάζεται σημεῖον ἐπαφῆς.

3η περίπτωσις: $O\Gamma < \alpha$

Τό σημείον Γ είναι έσωτερικόν του κύκλου (O, α) ή δέ εύθεια ϵ_3 έχει δύο οκούνα νά σημεία Μ καὶ Ν μὲ τὸν κύκλον, διὰ τοῦτο λέγεται τέ μ ν ου σ α αύτοῦ.

"Ωστε:

"Έὰν $\delta > \alpha$ τότε ή εύθεια είναι έξωτερική (Ούδεν κοινὸν σημείον)

" $\delta = \alpha$ " " " έφαπτομένη (1 κοινὸν σημείον).

" $\delta < \alpha$ " " " τέμνουσα (2 κοινὰ σημεῖα)

Αἱ τρεῖς αὐταὶ προτάσεις ισχύουν καὶ ἀντιστρόφως.

"Ητοι: "Έὰν δὲν ὑπάρχουν κοινὰ σημεῖα, τότε* είναι $\delta > \alpha$

"Έὰν ὑπάρχῃ 1 μόνον κοινὸν σημείον, τότε $\delta = \alpha$

"Έὰν ὑπάρχουν 2 κοινὰ σημεῖα, τότε είναι $\delta < \alpha$

Αἱ ἔξ (6) ἀνωτέρω προτάσεις γράφονται συμβολικῶς ὡς ἔξῆς:

$$\delta > \alpha \iff \epsilon \cap (O, \alpha) = \emptyset, \quad \epsilon = \text{έξωτερικὴ τοῦ κύκλου} \quad (1)$$

$$\delta = \alpha \iff \epsilon \cap (O, \alpha) = \{B\}, \quad \epsilon = \text{έφαπτομένη} \quad (2)$$

$$\delta < \alpha \iff \epsilon \cap (O, \alpha) = \{M, N\}, \quad \epsilon = \text{τέμνουσα} \quad (3)$$

37. 3. Παρατηρήσεις


α) Ἡ έφαπτομένη τοῦ κύκλου εἰς τὸ σημείον M αύτοῦ είναι κάθετος πρὸς τὴν ἀκτίνα OM. Ἀντιστρόφως, ἔὰν OM είναι μία ἀκτίς τοῦ κύκλου καὶ φέρομεν τὴν κάθετον πρὸς αὐτὴν εἰς τὸ ἄκρον τῆς M, αὕτη θὰ είναι έφαπτομένη τοῦ κύκλου εἰς τὸ σημείον M. (Διατί;)

"Ητοι: "Ἡ κάθετος πρὸς μίαν ἀκτίνα εἰς τὸ ἄκρον αὐτῆς είναι έφαπτομένη τοῦ κύκλου.

β) Ἐὰν διπλώσωμεν τὸ ἐπίπεδον τοῦ σχ. 80 περὶ τὴν εύθειαν OΓ, τὰ κοινὰ σημεῖα M καὶ N θὰ συμπέσουν**. "Ητοι ή OΓ είναι μεσοκάθετος τοῦ τμήματος MN.

37. 4. Εφαρμογαὶ

α) Νὰ κατασκευασθῇ ἡ έφαπτομένη κύκλου εἰς σημεῖον M αύτοῦ.



Σχ. 81 τοιχός καὶ σημ. Σχ. 82

Χαράσσομεν τὴν ἀκτίνα OM καὶ ἐπειτα τὴν κάθετον πρὸς αὐτὴν εἰς τὸ σημείον M, σχ. 81.

* Ιδίον πᾶς δικαιολογήσωμεν τὴν μίαν ἀπὸ αὐτάς, π.χ. τὴν πρώτην. "Έὰν δὲν ήτο δ α, θὰ ήτο:

$\delta < \alpha$, διόποτε ή εθὰ εἶχε 2 κοινὰ σημεῖα μὲ τὸν κύκλον

$\delta = \alpha$, " " " 1 κοινὸν σημείον " " "

** Ἡ εύθεια OΓ είναι: α) Φορές μιᾶς διαμέτρου, ήτοι ἀξων συμμετρίας τοῦ κύκλου.
β) Κάθετος πρὸς τὴν εύθειαν ε, ήτοι ἀξων συμμετρίας αὐτῆς.

β) Νὰ κατασκευασθῇ κύκλος ἀκτίνος α ὁ δόποιος νὰ ἐφάπτεται μιᾶς δοθεὶ-
στης εὐθείας ε εἰς τὸ σημεῖον A αὐτῆς, σχ. 82.

1) Χαράσσομεν τὴν εὐθεῖαν δ κάθετον πρὸς τὴν εὐθεῖαν ε εἰς τὸ σημεῖον
A αὐτῆς.

ii) Ἐπὶ τῆς δ λαμβάνομεν τμῆμα OA=α καὶ γράφομεν τὸν κύκλον (O, α).
‘Ο κύκλος οὗτος εἶναι δ ζητούμενος.

Πράγματι: ἡ ἀκτὶς OA εἶναι κάθετος πρὸς τὴν εὐθεῖαν ε εἰς τὸ σημεῖον A
Συνεπῶς δ κύκλος (O, OA) ἐφάπτεται τῆς εὐθείας ε (§37. 3).

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

88. Νὰ εύρετε τὸν ἀριθμὸν τῶν κοινῶν σημείων εὐθείας ε καὶ κύκλου (O, α) εἰς τὰς ἔξις
περιπτώσεις:

α) ὅταν $\alpha = 3 \text{ cm}$ καὶ $\delta = 2 \text{ cm}$, β) δταν $\alpha = 3 \text{ cm}$ καὶ $\delta = 3 \text{ cm}$, γ) δταν $\alpha = 3 \text{ cm}$
καὶ $\delta = 4 \text{ cm}$.


“Οπου δ εἶναι ἡ ἀπόστασις τοῦ κέντρου O ἀπὸ τὴν εὐθεῖαν ε.

89. Νὰ χαράξετε ἐφαπτομένας κύκλου εἰς τὰ ἄκρα μιᾶς διαμέτρου αὐτοῦ.

90. Νὰ χαράξετε εὐθ. τμῆμα AB καὶ ἔπειτα κύκλους ἐφαπτομένους αὐτοῦ εἰς τὸ ἄκρον A.
Πόσας λύσεις ἔχει τὸ πρόβλημα;


38. ΣΧΕΤΙΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ

38. 1. Ἡς χαράξωμεν δύο κύκλους μὲ κέντρα O, O'. Ἐὰν σκεφθῶμεν ὅτι
ἡ εὐθεία μιᾶς διαμέτρου κύκλου εἶναι ἄξων συμ-
μετρίας αὐτοῦ, εἶναι εὔκολον νὰ ἐννοήσωμεν ὅτι
ἡ εὐθεία OO' εἶναι ἄξων συμμετρίας τοῦ σχήματος
τῶν δύο κύκλων. Ἡ εὐθεία OO' λέγεται διά-
κεντρος τῶν δύο τούτων κύκλων, σχ. 83.



Σχ. 83

38. 2. Ποῖαι εἶναι αἱ δυναταὶ σχετικαὶ θέσεις μεταξὺ δύο κύκλων (O, α),
(O', α') εἰς τὸ ἑπτάπεδον; (α) α').



Σχ. 84

Διακρίνομεν τὰς ἀνωτέρω εἰκονιζομένας περιπτώσεις.

1η περίπτωσις

Οἱ κύκλοι ἔχουν δύο κοινὰ σημεῖα τὰ σημεῖα A, A', σχ. 84α. Λέγο-
μεν τότε ὅτι οἱ κύκλοι τέμνονται τὸ δὲ τμῆμα AA' εἶναι ἡ κοινὴ χορδὴ

"Ας διπλώσωμεν τὸ ἐπίπεδον τοῦ σχήματος περὶ τὸν ἄξονα συμμετρίας ΟΟ' τῶν δύο κύκλων.

Παρατηροῦμεν ὅτι τὰ δύο κοινὰ σημεῖα A, A' συμπίπτουν. (Διατί;).

"Ητοι ἡ διάκεντρος εἶναι μεσοκάθετος τῆς κοινῆς χορδῆς AA'.

2α περίπτωσις

Οἱ κύκλοι ἔχουν μόνον ἐν κοινῷ σημεῖον. Τοῦτο κεῖται ἐπὶ τῆς διακέντρου*, σχ. 84β, καὶ λέγεται σημεῖον ἐπαφῆς, οἱ δὲ κύκλοι ἐφαπτόμενοι ἔξωτερικῶς ἢ ἐσωτερικῶς (2 περιπτώσεις).

3η περίπτωσις

Οὐδὲν κοινὸν σημεῖον ἔχουν οἱ κύκλοι (σχ. 84 γ, δ, ε).

Εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν οἱ δύο κύκλοι :

i) "Η εὐρίσκονται ἐκτὸς ἀλλήλων (σχ. 84 γ).

ii) "Η δὲ εἶς εὐρίσκεται εἰς τὸ ἐσωτερικὸν τοῦ ἀλλοῦ (σχ. 84 δ).

iii) "Η ἔχουν κοινὸν κέντρον (διάκεντροι κύκλοι, σχ. 84 ε).

38.3. Θὰ συγκρίνωμεν τὸ ἀθροισμα α+α' ἢ τὴν διαφορὰν α—α' τῶν ἀκτίνων μὲ τὴν ἀπόστασιν ΟΟ'=δ τῶν δύο κέντρων εἰς τὰς ἀνωτέρω περιπτώσεις.

α) "Οταν οἱ κύκλοι τέμνωνται: Τότε μὲ τὸν διαβήτην εὐρίσκομεν ὅτι :

$\delta < \alpha + \alpha'$ καὶ $\delta > \alpha - \alpha'$ ἢ συντόμως $\alpha - \alpha' < \delta < \alpha + \alpha'$

β) "Οταν οἱ κύκλοι ἐφάπτωνται. Τότε εἶναι $\delta = \alpha + \alpha'$, ἐὰν ἐφάπτωνται ἔξωτερικῶς καὶ $\delta = \alpha - \alpha'$, ἐὰν ἐφάπτωνται ἐσωτερικῶς.

γ) "Οταν ἔκαστος κύκλος εὐρίσκεται εἰς τὸ ἐξωτερικὸν τοῦ ἀλλοῦ. Τότε εἶναι $\delta > \alpha + \alpha'$.

δ) "Οταν δὲ εἶς κύκλος κεῖται εἰς τὸ ἐσωτερικὸν τοῦ ἀλλοῦ. Τότε εἶναι $\delta < \alpha - \alpha'$.

Αἱ ἀνωτέρω τέσσαρες προτάσεις ισχύουν καὶ ἀντιστρόφως. (Διατυπώσατε αὐτάς).

Θέσεις 2 κύκλων	Σχέσεις μεταξὺ τῶν δ καὶ α+α'	Άριθμὸς κοινῶν σημείων
Κύκλοι τεμνόμενοι	$\alpha - \alpha' < \delta < \alpha + \alpha'$	2
» ἐφαπτόμενοι	$\delta = \alpha + \alpha'$	1
» ἔξωτερικοὶ ἀλλήλων	$\delta > \alpha + \alpha'$	0
Ο εἶς κύκλος ἐσωτερικὸς τοῦ ἀλλοῦ	$\delta < \alpha - \alpha'$	0

* Τὰ δύο σημεῖα τομῆς A', A τοῦ σχ. 84α συμπίπτουν εἰς τὸ σχ. 84β.

91. Έάν α , α' παριστοῦν τὰ μήκη εἰς (cm) τῶν ἀκτίνων δύο κύκλων καὶ δ τὸ μῆκος τῆς διακέντρου αὐτῶν (εἰς cm), νὰ εὑρετε τὰς σχετικὰς θέσεις τῶν δύο αὐτῶν κύκλων εἰς τὰς περιπτώσεις τοῦ παραπλεύρως πίνακος.


δ	5	1	6	2	2
α	3	3	3	5	5
α'	3	2	2	2	3

γράψατε κύκλον μὲ κέντρον τὸ μέσον τοῦ AB καὶ ἀκτίνα τοιαύτην ὥστε οἱ δύο κύκλοι α) νὰ ἐφάπτωνται ἐσωτερικῶς, β) νὰ τέμνωνται, γ) νὰ μὴ ἔχουν κοινά σημεῖα.

39. ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ

39. 1. Η χρησιμοποίησις διαφανοῦς χάρτου καὶ γνώμονος εἰς τὴν κατασκευὴν ἐνὸς σχεδίου, ἀνεξαρτήτως τῶν προσπαθειῶν μας, δὲν μᾶς ἐπιτρέπει μεγάλην ἀκρίβειαν. Διὰ τοῦτο ἐφεξῆς θὰ χρησιμοποιοῦμεν μόνον κανόνα, (χάρακα), καὶ διαβήτην. Μὲ τὸν ὄρον δὲ γεωμετρικὴ κατασκευὴ θὰ ἐννοοῦμεν κατασκευὴν μὲ χρησιμοποίησιν μόνον κανόνος καὶ διαβήτου.

39. 2. Έκ σημείου A, ἐκτὸς εὐθείας ε, νὰ ἀχθῇ κάθετος πρὸς αὐτὴν



Σχ. 85

1) Μὲ κέντρον ἐν σημείον O τῆς εὐθείας ε καὶ ἀκτίνα OA γράφομεν κύκλον, σχ. 85α.

2) Μὲ κέντρον ἐν ἄλλῳ σημείον O' τῆς ε καὶ ἀκτίνα O'A γράφομεν κύκλον, σχ. 85β.

3) Χαράσσομεν τὴν κοινὴν χορδὴν AA' αὐτῶν, σχ. 85γ.




Η εὐθεία AA' εἶναι ἡ ζητουμένη κάθετος πρὸς τὴν ε. (Διατί;).

39. 3. Νὰ κατασκευασθῇ ἡ μεσοκάθετος εὐθυγρ. τμήματος AB

1) Μὲ κέντρον τὸ ἄκρον A καὶ ἀκτίνα AB γράφομεν κύκλον, σχ. 86α.

2) Μὲ κέντρον τὸ ἄλλο ἄκρον B καὶ ἀκτίνα ίσην μὲ τὴν προηγουμένην γράφομεν κύκλον, σχ. 86β.

3) Χαράσσομεν τήν κοινήν χορδήν $\Gamma\Gamma'$. Αύτη είναι ή μεσοκάθετος τοῦ τμήματος AB , σχ. 86γ.



Σχ. 86

Μὲ τὸν ὕδιον τρόπον χωρίζομεν ἐν εὐθύγρ. τμῆμα εἰς 2 ἴσα μέρη.



39. 4. Νὰ κατασκευασθῇ ἡ κάθετος πρὸς εὐθεῖαν εἰς δεδομένον σημεῖον A αὐτῆς

Ἐπὶ τῆς ε καὶ ἐκατέρωθεν τοῦ A λαμβάνομεν δύο ἴσα τμῆματα $AB=AG$.

Μὲ τὸν τρόπον αὐτὸν κατεστήσαμεν τὸ A μέσον τοῦ BG . Ἀρκεῖ συνεπῶς νὰ χαράξωμεν κατὰ τὰ γνωστὰ τὴν μεσοκάθετον αὐτοῦ.

39. 5. Νὰ κατασκευασθῇ γωνία ἵση πρὸς δοθεῖσαν γωνίαν $\chi O\psi$.

1. Χαράσσομεν μίαν ἡμιευθεῖαν $O'X'$, σχ. 87.



Σχ. 87

2. Μὲ κέντρον O καὶ ἀκτῖνα ὅστην θέλομεν (δχι πολὺ μικρὰν) γράφομεν τόξον κύκλου, τὸ δόποιον τέμνει τὰς πλευράς $O\chi$, $O\psi$ εἰς τὰ σημεῖα A , B ἀντιστοίχως, σχ. 87α. Μὲ ἄλλους λόγους : Καθιστῶμεν τὴν γωνίαν $\chi O\psi$ ἐπίκεντρον.

3. Μὲ κέντρον O' καὶ ἀκτῖνα ὅστην μὲ τὴν προηγουμένην γράφομεν δεύτερον τόξον κύκλου, τὸ δόποιον τέμνει τὴν $O'\chi'$ εἰς ἐν σημείον A' , σχ. 87β.

4. Μὲ κέντρον A' καὶ ἀκτῖνα ἵσην μὲ τὴν χορδὴν AB γράφομεν ἐν τρίτον τόξον κύκλου, τὸ δποῖον νὰ τέμνῃ τὸ δεύτερον εἰς ἐν σημεῖον B' , σχ. 87γ.

Ἡ γωνία $A'O'B'$ εἶναι ἡ ζητούμενη. Ἰδού διατί :

α) Οἱ δύο κύκλοι (O, OA) καὶ ($O', O'A'$) εἶναι ἵσοι ἐκ κατασκευῆς.

β) Αἱ χορδαὶ AB καὶ $A'B'$ αὐτῶν εἶναι ἵσαι.

γ) Τὰ τόξα AB , $A'B'$ εἶναι ἵσα. (Διατί;)

Συνεπῶς καὶ αἱ ἐπίκεντροι γωνίαι AOB καὶ $A'O'B'$ εἶναι ἵσαι.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Αἱ κατωτέρω κατασκευαὶ νὰ γίνουν διὰ τοῦ κανόνος καὶ τοῦ διαβήτου.

93. Νὰ χαράξετε ἐν εύθ. τμῆμα AB καὶ ἔπειτα καθέτους πρὸς αὐτὸν εἰς τὰ ἄκρα A καὶ B .

94. Νὰ χαράξετε μίαν ἡμιευθεῖαν καὶ ἔπειτα μίαν ὁρθὴν γωνίαν μὲ μίαν πλευράν τὴν ἡμιευθεῖαν αὐτήν.

95. Νὰ χωρίσετε ἐν εύθ. τμῆμα εἰς 4 ἵσα μέρη.

96. Νὰ γράψετε κύκλον μὲ διάμετρον ἵσην πρὸς δοθὲν εύθ. τμῆμα.

97. Νὰ χαράξετε ἐφαπτομένας κύκλου εἰς τὰ ἄκρα μιᾶς χορδῆς αὐτοῦ.

40. ΚΥΚΛΟΙ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑ ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΩΝ


Εἰς ἐν ἐπίπεδον δίδονται δύο διαφορετικά σημεῖα A , B καὶ ζητοῦμεν νὰ χαράξωμεν κύκλον διερχόμενον δι' αὐτῶν.

Γωρίζομεν ὅτι ἕκαστον σημεῖον O τῆς μεσοκαθέτου τῆς AB , σχ. 88, ἀπέχει ἐξ ἵσου ἀπὸ τὰ ἄκρα A καὶ B ($OA=OB$). Ἐάν συνεπῶς μὲ κέντρον τὸ σημεῖον O καὶ ἀκτῖνα OA γράψωμεν κύκλον, οὗτος θὰ διέλθῃ καὶ διὰ τοῦ B .

Πόσας λύσεις ἔχει τὸ πρόβλημα τοῦτο;

Εἶναι φανερὸν ὅτι ὅπως εἰργάσθημεν μὲ τὸ σημεῖον O δυνάμεθα νὰ ἐργασθῶμεν μὲ δποιοδήποτε ἄλλο σημεῖον τῆς μεσοκαθέτου.

"Ητοι ὑπάρχουν εἰς τὸ ἐπίπεδον ἄπειροι κύκλοι διερχόμενοι διὰ τῶν σημείων A καὶ B . Τὰ κέντρα ὅλων αὐτῶν εἶναι σημεῖα τῆς μεσοκαθέτου πρὸς τὸ τμῆμα AB .



Σχ. 88

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

98. Σημειώσατε τρία διαφορετικά σημεῖα μὴ κείμενα ἐπὶ τῆς αὐτῆς εύθειας καὶ κατασκεύαστε κύκλον διερχόμενον καὶ διὰ τῶν τριῶν αὐτῶν σημείων. Πόσους τοιούτους κύκλους δυνάμεθα νὰ εύρωμεν;

99. Σημειώσατε 4 διαφορετικά σημεῖα A , B , G , Δ μὴ κείμενα ἀνὰ τρία ἐπὶ τῆς αὐτῆς εύθειας. "Ἐπειτα χαράξατε δύο κύκλους, οἱ δποῖοι διέρχονται δὲ μὲν εἰς διὰ τῶν A , B , G , δὲ δὲλλος διὰ τῶν A , B , Δ .

**41. Η ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΣΗΜΕΙΟΝ ΕΙΣ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟΝ
(ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ)**

‘Η συμμετρία ως πρός εύθειαν δὲν είναι τὸ μόνον εἶδος συμμετρίας, τὸ δποτοῖν συναντῶμεν εἰς τὸ περιβάλλον μας.


Εἰς τὸ σχ. 89 διακρίνομεν μίαν ἄλλην συμμετρίαν τὴν συμμετρίαν ως πρός σημείον.



Σχ. 89

Εἰς τὸ ἐπίπεδον Π δίδονται δύο διαφορετικὰ σημεῖα O καὶ A . Χαράσσομεν τὴν εὐθείαν AO καὶ ἐπ’ αὐτῆς λαμβάνομεν σημείον A' εἰς τρόπον ὡστε νὰ είναι $OA = OA'$, σχ. 90. ‘Ητοι τὸ σημείον O νὰ είναι μέσον τοῦ τμήματος AA' . Τὸ σημείον A' λέγεται συμμετρικὸν τοῦ A ως πρὸς τὸ O . Μὲ δομοιον τρόπον δυνάμεθα νὰ εύρωμεν τὸ συμμετρικὸν ἑκάστου σημείου τοῦ ἐπιπέδου ως πρὸς τὸ σημείον O .

Συνεπῶς : ‘Εάν εἰς τὸ ἐπίπεδον Π δοθῇ ἐν σημείον O , δυνάμεθα νὰ δρίσωμεν μεταξὺ τῶν σημείων αὐτοῦ μίαν ἀντιστοιχίαν τοιαύτην ὡστε :



Σχ. 90

Εἰς ἕκαστον σημείον M τοῦ Π νὰ ἀντιστοιχῇ ἐν καὶ μόνον ἐν σημείον τοῦ P . τὸ συμμετρικὸν M' τοῦ M ως πρὸς O .

‘Η ἀντιστοιχία αὗτη δινομάζεται συμμετρία ως πρὸς τὸ O γράφεται δὲ συντόμως $\Sigma(O)$.


Εἰς τὴν $\Sigma(O)$ τὸ M' είναι συμμετρικὸν τοῦ M . ‘Απὸ τὸν τρόπον δημοσιεύεται τὸ M' ἐννοοῦμεν διττῶς τὸν σημείον M' ‘Ητοι : Εἰς τὴν $\Sigma(O)$ τὰ σημεῖα M , M' ἀντιστοιχοῦν διττῶς (ἀμφιμοσημάντως) μεταξύ των ($M \leftrightarrow M'$). Διὰ τοῦτο λέγομεν διττῶς τὸν σημείον $\Sigma(O)$ τὰ σημεῖα M , M' είναι συμμετρικά μεταξύ των ἢ ἀπλῶς συμμετρικά ἢ διμόλογα. Ειδικῶς τὸ σημείον O , τὸ δποτοῖν εἰς τὴν $\Sigma(O)$ λέγεται κέντρον συμμετρίας, συμπίπτει (ταυτίζεται) μὲ τὸ συμμετρικόν τοῦ.

‘Ωστε : Εἰς τὴν $\Sigma(O)$: M , M' είναι συμμετρικά σημαίνει διττῶς τὸ O είναι μέσον τοῦ τμήματος MM' .

41. 2. Εἰς ἐν φύλλον χάρτου σημειώνομεν σημείον M , σχ. 91α. Διπλώνομεν ἔπειτα τὸ φύλλον τοῦτο δύο φοράς διαδοχικῶς. Τὴν πρώτην φοράν κατὰ μίαν εὐθείαν αὐτοῦ ε, μὴ διερχομένη διὰ τοῦ M , σχ. 91β, καὶ τὴν δευτέραν κατὰ εὐθείαν ε' κάθετον πρὸς τὴν ε, σχ. 91γ (Διπλῆ διπλωσίσις).

Σημειώνομεν τὸ συμμετρικὸν M' τοῦ M εἰς τὴν $\Sigma(\epsilon)$ καὶ τὸ συμμετρικὸν M'' τοῦ M' εἰς τὴν $\Sigma(\epsilon')$. ‘Ας ἀναπτύξωμεν ἡδη τὸ φύλλον καὶ ἀς προσέξωμεν


τὴν θέσιν τῶν σημείων M καὶ M'' ὡς πρὸς τὸ σημεῖον τοῦ O τῶν δύο καθέτων εύθειῶν ϵ, ϵ' . Διαπιστώνομεν* ότι τὸ O εἶναι μέσον τοῦ εὐθ. τμήμα-



τος MM'' . "Ητοι τὰ σημεῖα M, M'' εἶναι συμμετρικά ὡς πρὸς κέντρον συμμετρίας τὸ O .

Τὸ ἀνωτέρω πείραμα μᾶς δύνηγει εἰς τὸ ἔξῆς συμπέρασμα:

Τὸ ἀποτέλεσμα δύο διαδοχικῶν συμμετριῶν ὡς πρὸς δύο εύθειας καθέτους εἶναι μία συμμετρία ὡς πρὸς τὴν τομὴν τῶν εύθειῶν αὐτῶν.




* Ή παρατήρησις αὗτη μᾶς δύνηγει εἰς τὸ ἀκόλουθον συμπέρασμα.

Ἐὰν στρέψωμεν τὸ ἐπίπεδον ἐπὶ τοῦ ἑαυτοῦ του περὶ τὸ O κατὰ ἡμισείαν στροφῆν, τότε ἔκαστον σημεῖον αὐτοῦ ἐναλλάσσεται μὲ τὸ συμμετρικόν του ὡς πρὸς O .

42. ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΟΝ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΣΗΜΕΙΟΝ

42. 1. Ὁρισμός Ἀς εύρωμεν εἰς τὴν $\Sigma(O)$ τὰ ὁμόλογα $A', B', \Gamma \dots$ τῶν σημείων $A, B, \Gamma \dots$ ἐνὸς σχήματος (K) , σχ. 93.

Τὸ σχῆμα (K') , τὸ ὅποιον ἀποτελεῖται ἀπὸ τὰ ὁμόλογα διλῶν τῶν σημείων τοῦ (K) καὶ μόνον ἀπὸ αὐτά, λέγεται συμμετρικὸν τοῦ σχήματος (K) εἰς τὴν $\Sigma(O)$.




* Ἡ ἀπόδειξις θὰ δοθῇ ἀργότερον.

** Μὲ τὴν βοήθειαν μᾶς καρφίδος.

* Από τά δύο συμμετρικά σχήματα (Κ) και (Κ') είναι φανερόν ότι και τό (Κ) είναι συμμετρικόν του (Κ') είς τήν Σ(Ο). Διά τούτο λέγομεν ότι τά σχήματα (Κ) και (Κ') είναι συμμετρικά μεταξύ των ή απλώς συμμετρικά ώς πρὸς Ο.

42. 2. Ισότης συμμετρικῶν σχημάτων

Καθώς είδομεν, έάν στρέψωμεν τό έπιπεδον ἐπὶ τοῦ ἑαυτοῦ του περὶ τὸ



Ο κατὰ ήμισείαν στροφήν, ἔκαστον σημείον ἐναλλάσσεται μὲ τὸ συμμετρικόν του, συνεπῶς καὶ ἔκαστον σχῆμα (Κ) τοῦ ἐπιπέδου μὲ τὸ συμμετρικόν του (Κ').

Σχ. 94. Εικόνες συμμετρικῶν σχημάτων

"*Ητοι: Δύο σχήματα συμμετρικά ώς πρὸς κέντρον είναι ίσα.*


42. 3. Παρατήρησις

* Αντιθέτως πρὸς τὴν συμμετρίαν ώς πρὸς εύθειαν, ὅπου ἐν σχῆμα (Κ) ἐφαρμόζει ἐπὶ τοῦ συμμετρικοῦ (Κ') ἀφοῦ πρὶν τὸ ἐν ἀπὸ αὐτὰ ἀναστραφῆ, εἰς τὴν συμμετρίαν ώς πρὸς σημεῖον ή ἀνωτέρω ἐφαρμογὴ ἐπιτυγχάνεται μόνον δι' δισθήσεως. Διά τούτο λέγομεν ότι εἰς τὴν συμμετρίαν ώς πρὸς σημεῖον δύο συμμετρικά σχήματα είναι εὐθέως ίσα.

43. ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΤΙΝΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ Σ(Ο)

43. 1. Συμμετρικὸν ήμιευθείας Αχ

Καθώς είδομεν, τὰ συμμετρικά σχήματα ώς πρὸς κέντρον είναι ίσα. Συνεπῶς καὶ τὸ συμμετρικὸν ήμιευθείας Αχ θὰ είναι ἐπίσης ήμιευθεία. Διά νὰ τὴν εύρωμεν δέ, ἀρκεῖ νὰ εύρωμεν τὸ συμμετρικὸν τοῦ ἄκρου Α καὶ ἐνὸς ἄλλου σημείου Μ αὐτῆς. Διακρίνομεν ίδιατέρως τὰς ἔξις περιπτώσεις.



1) Έὰν $O \equiv A$, σχ. 95.

Σχ. 95

Παρατηροῦμεν ότι :

α) Τὸ συμμετρικὸν τῆς ἀρχῆς Α συμπίπτει μὲ τὸ Α β) τὸ συμμετρικὸν τυχόντος σημείου Μ τῆς Αχ κεῖται ἐπὶ τῆς ἀντιθέτου ήμιευθείας αὐτῆς Αχ'. * Απὸ τὴν παρατήρησιν αὐτὴν δόηγούμεθα εἰς τὸ συμπέρασμα ότι τὸ συμμετρικὸν τῆς ήμιευθείας Αχ είναι ή ἀντιθετος αὐτῆς ήμιευθεία Αχ'.

2) Έὰν τὸ Ο κεῖται ἐκτὸς τῆς εὐθείας τῆς Αχ, σχ. 96.

Εύρισκομεν τὰ συμμετρικὰ δύο σημείων Α καὶ Μ, τῆς Αχ.

Παρατηροῦμεν ότι :

α) Ταῦτα κεῖνται ἐπὶ ήμιευθείας Α'χ' παραλλήλοι μὲ πρὸς τὴν Αχ.

* Τὸ ότι αἱ Αχ, Α'χ' είναι παραλληλοι τὸ διαπιστώνομεν μὲ παραλληλον μετατόπισιν. Δυνάμεθα δικινούσθωμεν ώς ἔξις. Εὰν αἱ εὐθείαι τῶν ήμιευθείων Αχ, Α'χ' είχον ξενούν σημεῖον, τότε τούτο...


β) Αἱ παράλληλοι ἡμιευθεῖαι $A\chi$, $A'\chi'$ εὐρίσκονται εἰς τὰ ἀντίθετα ἡμιεπίπεδα ἀκμῆς AA' (ἀντίρροποι).

43. 2. Συμμετρικὸν εύθειας ε

α) Ἐὰν Ο κεῖται ἐπὶ τῇ ε.

Ἄπο τὴν §43.1 ἐννοοῦμεν ὅτι τὸ συμμετρικὸν εύθειας ε διερχομένης διὰ τοῦ κέντρου Ο συμπίπτει μὲ τὴν ε ($\epsilon \equiv \epsilon'$).

β) Ἐὰν Ο κεῖται ἐκτὸς τῆς ε.




Σχ. 96

Σκεπτόμεθα ὅτι τὸ συμμετρικὸν τῆς ε πρέπει νὰ εἴναι μία εύθεια ε' (§42.2). Συνεπῶς διὰ τὴν προσδιορίσωμεν ἀρκεῖ νὰ εύρωμεν τὰ συμμετρικὰ A' καὶ B' δύο σημείων A , B τῆς ε, σχ. 97. Μὲ παράλληλον μετατόπισιν διαπιστώνομεν ὅτι ἡ ε' εἴναι παράλληλος πρὸς τὴν ε. Τοῦτο ἀλλωστε ἔπρεπε νὰ τὸ ἀναμένωμεν ἀφοῦ, καθὼς εἶδομεν, τὸ συμμετρικὸν ἡμιευθεῖας μὴ διερχομένης διὰ τοῦ Ο, εἴναι ἡμιευθεῖα παράλληλος πρὸς αὐτήν.


43. 3. Συμμετρικὸν γωνίας. Ἰσότης τῶν κατὰ κορυφὴν γωνιῶν

Είναι φανερὸν ὅτι διὰ νὰ εύρωμεν τὸ συμμετρικὸν μιᾶς γωνίας ἀρκεῖ νὰ εύρωμεν τὰ συμμετρικὰ τῶν πλευρῶν αὐτῆς.


Διακρίνομεν τὰς ἑξῆς περιπτώσεις



Σχ. 97



Σχ. 98



Σχ. 99

α) Ὅταν ἡ κορυφὴ συμπίπτῃ μὲ τὸ κέντρον συμμετρίας. Ἀς εύρωμεν τὸ συμμετρικὸν τῆς γωνίας AOB , σχ. 98.

Εἰς τὴν $\Sigma(O)$ αἱ ἡμιευθεῖαι OA , OB ἔχουν συμμετρικὰ τὰς ἀντιθέτους αὐτῶν ἡμιευθεῖαι OA' , OB' ἀντιστοίχως. Τυχοῦσα ἡμιευθεῖα OM , ἐσωτερικὴ τῆς γωνίας AOB , ἔχει συμμετρικὴν τὴν ἀντιθέτον αὐτῆς OM' , ἐσωτερικὴν τῆς γωνίας $A'OB'$.

Ἡτοι : Εἰς τὴν $\Sigma(O)$ ἡ γωνία AOB ἔχει ὡς συμμετρικὴν τὴν κατὰ κορυφὴν αὐτῆς γωνίαν.

Ἄπο τὴν Ἰσότητα τῶν συμμετρικῶν σχημάτων συμπεραίνομεν ὅτι :

Αἱ κατὰ κορυφὴν γωνίαι εἰναι ἴσαι.


β) "Οταν ή κορυφή δὲν συμπίπτη μὲ τὸ κέντρον συμμετρίας.

"Ἄσ εύρωμεν τὸ συμμετρικὸν τῆς γωνίας χΑψ, σχ. 99.

Εύρισκομεν ἡμιευθεῖας $A'X'$, $A'\psi'$ συμμετρικάς τῶν $A\chi$, $A\psi$ ἀντιστοίχως εἰς τὴν $\Sigma(O)$. 'Ἡ γωνία $X'A'\psi'$ εἶναι συμμετρική τῆς γωνίας $\chi A\psi$ εἰστὶν $\Sigma(O)$.

43. 4. Συμμετρικὸν εὐθ. τμήματος

Διὰ νὰ προσδιορίσωμεν τὸ συμμετρικὸν τὸν εὐθ. τμήματος AB ἀρκεῖ νὰ εύρωμεν τὰ συμμετρικὰ τῶν ἄκρων A καὶ B αὐτοῦ.



Εἰς τὸ σχ. 100 φαίνεται τὸ συμμετρικὸν τοῦ εὐθ. τμήματος AB εἰς τὴν $\Sigma(O)$, δῆποτε οὐκέτι εἴκοσις AB .


Εἰναι τὸ εὐθ. τμῆμα $A'B'$ παράλληλον καὶ ἵσον πρὸς τὸ AB . 'Ἔχει δὲ ὡς ἄκρα A' , B' τὰ συμμετρικὰ τῶν ἄκρων τοῦ AB .

43. 5. Συμμετρικὸν τριγώνου

Σχ. 100

Διὰ νὰ εύρωμεν τὸ συμμετρικὸν τριγώνου ABG εἰς τὴν $\Sigma(O)$ εύρισκομεν τὰ συμμετρικὰ A' , B' , G' τῶν κορυφῶν αὐτοῦ, σχ. 101. Τὸ τρίγωνον $A'B'G'$ εἶναι τὸ ζητούμενον εἰναι δὲ εὐθέως ἵσον μὲ τὸ τρίγωνον ABG .

Εἰναι εὐκολὸν νὰ ἔννοήσωμεν ὅτι ἐὰν φέρωμεν εἰς συμπτωσιν τὰ δύο ἵσα τρίγωνα ABG καὶ $A'B'G'$, τότε ἐκάστη πλευρὰ καὶ ἐκάστη γωνία τοῦ ἐνὸς τριγώνου συμπίπτει μὲ μίαν πλευράν καὶ μὲ μίαν γωνίαν τοῦ ἄλλου τριγώνου. Τοιουτοτρόπως εἰς τὰ ἵσα τρίγωνα τοῦ σχ. 101 ἔχομεν τὰς ἑξῆς ισότητας.



Σχ. 101

$$\widehat{A} = \widehat{A}'$$

$$\widehat{B} = \widehat{B}'$$

$$\widehat{G} = \widehat{G}'$$

$$AB = A'B'$$

$$BG = B'G'$$

$$AG = A'G'$$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

100. Χαράξατε δύο τεμνομένας εὐθείας ϵ , ϵ' . Μετρήσατε τὴν μίαν ἀπὸ τὰς 4 σχηματιζόμενας γωνίας καὶ ὑπολογίσατε τὰς ἀλλας τρεις γωνίας.

101. Νὰ εύρετε τὸ συμμετρικὸν μιᾶς μὴ κυρτῆς γωνίας ὡς πρὸς τὴν κορυφὴν αὐτῆς.

102. Χαράξατε δύο εὐθείας ϵ , ϵ' τεμνομένας εἰς τὸ σημεῖον O . 'Ἐπι τῆς ϵ καὶ ἐκατέρωθεν τοῦ O , λάβετε δύο σημεῖα A , B τοιαῦτα ὥστε $OA = OB$. 'Ἐπι δὲ τῆς ϵ' καὶ ἐκατέρωθεν τοῦ O , δύο ἄλλα σημεῖα τοιαῦτα ὥστε $OG = OD$:

- α) Εις τὴν $\Sigma(O)$ νὰ εύρετε τὰ δμόλογα τῶν OA , $ΓΔ$, καὶ $ΒΔ$.
β) Νὰ ἔξετάσετε ἐάν αἱ εὐθεῖαι $ΑΓ$ καὶ $ΒΔ$ εἶναι παράλληλοι.

103. Εις τὸ σχέδιον τῆς προηγουμένης ἀσκήσεως νὰ ἔξετάσετε διατὶ ἡ εὐθεία τῶν μέσων τῶν τημηάτων $ΑΓ$ καὶ $ΒΔ$ διέρχεται διὰ τοῦ σημείου O .

104. Ποιὸν εἶναι τὸ συμμετρικὸν τοῦ σχήματος $ΑΒΓΔ$, τῆς ἀσκήσεως 103 εἰς τὴν $\Sigma(O)$;

44. ΚΕΝΤΡΟΝ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ


44. 1. Ὁρισμὸς

Ποιὸν εἶναι τὸ συμμετρικὸν ἐνὸς κύκλου εἰς τὴν συμμετρίαν ὡς πρὸς τὸ κέντρον O αὐτοῦ;

Παρατηροῦμεν ὅτι τὸ συμμετρικὸν ἐνὸς σημείου A αὐτοῦ εἶναι τὸ σημεῖον A' , τὸ δποιὸν κεῖται ἐπὶ τοῦ ίδιου κύκλου ($OA = OA'$), σχ. 102.

Γενικῶς τὸ συμμετρικὸν ἐκάστου σημείου τοῦ κύκλου κεῖται ἐπὶ τοῦ ίδιου κύκλου.

"*Ητοι* : Εἰς τὴν $\Sigma(O)$, διάκριτος (O, α) συμπίπτει μὲ τὸν συμμετρικὸν του. Διὰ τοῦτο λέγομεν ὅτι τὸ κέντρον τοῦ κύκλου εἶναι κέντρον συμμετρίας αὐτοῦ.



Σχ. 102

Γενικῶς : "Ἐν σημεῖον O εἶναι κέντρον συμμετρίας σχήματος, ἐάν εἰς τὴν $\Sigma(O)$, τὸ σχῆμα τοῦτο συμπίπτει μὲ τὸ συμμετρικόν του.

: "Ἐν σχῆμα δυνατὸν νὰ ἔχῃ ἢ περισσότερα κέντρα συμμετρίας.

44. 2. Παραδείγματα

ἀ) Τὰ σύμβολα X , H , N , $Ξ$, Z ἔχουν κέντρον συμμετρίας. Ποιὸν;



Σχ. 103

β) Τὸ μέσον εὐθ. τημήματος εἶναι τὸ μοναδικὸν κέντρον συμμετρίας αὐτοῦ. (Διατί;).

γ) Εἴδομεν ὅτι τὸ συμμετρικὸν εὐθείας ὡς πρὸς σημεῖον αὐτῆς εἶναι ἡ ίδια εὐθεία.

"*Ητοι* :

"Ἡ εὐθεία ἔχει ἔκαστον σημεῖον αὐτῆς κέντρον συμμετρίας. Ἀντιθέτως :

Μία ἡμιευθεία οὐδὲν κέντρον συμμετρίας ἔχει. (Διατί;).

δ) Εἰς τὸ σχέδιον 103 ὑπάρχει κέντρον συμμετρίας; Ποιὸν;

ΑΣΚΗΣΕΙΣ


105. Νὰ εύρετε γνωστὰ σύμβολα, σχέδια, μὲ κέντρον συμμετρίας.

106. Νὰ εύρετε τὸ κέντρον συμμετρίας :

α) Δύο τεμνομένων εύθειῶν. β) Δύο παραλλήλων καὶ ίσων εύθ. τμημάτων. γ) Δύο κατά κορυφήν γωνιῶν. δ) Τοῦ σχήματος, τὸ δποίον ἀποτελεῖται ἀπὸ ἐν εύθ. τμῆμα καὶ τὴν μεσοκάθετον αὐτοῦ.

45. ΕΥΘΕΙΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ

Γνωρίζομεν ἡδη τὶ εἶναι παράλληλοι εύθειαι. Κατωτέρω θὰ ἔχωμεν τὴν εὐκαιρίαν διὰ μίαν καλυτέραν γνωριμίαν μὲ αὐτάς.



Σχ. 104

Εἰς ἐν ἐπίπεδον χαράσσομεν μίαν εύθειαν ε καὶ δύο καθέτους πρὸς αὐτὴν $\delta \perp \epsilon$, $\delta' \perp \epsilon$. (σχ. 104).

"Ας προσέξωμεν τὰς δύο διαφορετικάς εύθειας δ, δ'.

α) Εύρισκονται εἰς τὸ αὐτό ἐπίπεδον καὶ

β) δὲν τέμνονται*

Δύο εύθειαι, αἱ δποῖαι εύρισκονται εἰς τὸ αὐτὸ ἐπίπεδον καὶ δὲν τέμνονται, λέγονται παράλληλοι

'Ἐκ τῶν ἀνωτέρω συνάγομεν δτι :

"Οταν δύο εύθειαι τοῦ ἐπιπέδου είναι κάθετοι πρὸς τὴν αὐτὴν εύθειαν, τότε αὗται είναι μεταξύ των παράλληλοι.

"Η συμβολικῶς :

$$\left\{ \begin{array}{l} \delta, \delta' \epsilon \\ \delta \perp \epsilon \\ \delta' \perp \epsilon \end{array} \right\} \Rightarrow \delta \parallel \delta'$$

46. ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟ ΣΗΜΕΙΟΝ ΠΡΟΣ ΕΥΘΕΙΑΝ

Διὰ νὰ χαράξωμεν ἀπὸ τὸ σημεῖον Α εύθειαν παράλληλον πρὸς τὴν δοθεῖσαν εύθειαν ε, σχ. 105, ἐργαζόμεθα ὡς ἔξης :


1. Τοποθετοῦμεν κατά μῆκος τῆς ε μίαν ἀπὸ τὰς καθέτους πλευρὰς τοῦ γνώμονος γ. Π.χ. τὴν πλευράν α.

2. Κατὰ μῆκος τῆς δευτέρας καθέτου πλευρᾶς αὐτοῦ β, τοποθετοῦμεν τὴν ἀκμὴν τοῦ κανόνος Κ.

3. Κρατοῦμεν ἀκίνητον τὸν κανόνα καὶ μετακινοῦμεν (μὲ δλίσθησιν) τὸν γνώμονα προσέχοντας νὰ ἐφαρμόζῃ διαρκῶς ἡ δευτέρα κάθετος πλευρά β αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ κανόνος. Εἰς τὴν θέσιν (!) τοῦ γνώμονος, σχ. 105, ἡ κάθετος πλευρά α αὐτοῦ διέρχεται διὰ τοῦ σημείου Α.

4. Χαράσσομεν τὴν εύθειαν ε' ἡ δποία δρίζεται ὑπὸ τῆς πλευρᾶς α. 'Η εύθεια αὕτη διέρχεται διὰ τοῦ σημείου Α καὶ είναι παράλληλος πρὸς τὴν εύθειαν ε. (Διατί;).

* Εάν ἔτεινωντο (ἔστω εἰς τὴν προέκτασίν των), τότε ἀπὸ τὸ σημεῖον τομῆς θὰ είχομεν δύο καθέτους πρὸς τὴν εύθειαν ε.....



Σχ. 105

Γενικῶς ἑκάστη θέσις τῆς πρώτης καθέτου πλευρᾶς α δρίζει μίαν παράλληλον εύθειαν πρὸς τὴν εύθειαν ε.

47. ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΟΝ ΑΙΤΗΜΑ

Γεννᾶται τὸ ἔρωτημα: οἷς γένεσις τὸ σημεῖον τὸ παράλληλον εύθειαν ε.

Μήπως ἀπὸ τὸ αὐτὸ σημεῖον Α ἢτο δυνατὸν νὰ χαράξωμεν καὶ ἄλλην παράλληλον πρὸς τὴν εύθειαν ε; Πρακτικῶς εἰς τὸ σχέδιόν μας βεβαιούμεθα ὅτι τοῦτο εἶναι ἀδύνατον. Εἰς τὴν Γεωμετρίαν, τὴν ὅποιαν μελετοῦμεν, παραδεχόμεθα ὅτι :

'Απὸ ἐν σημεῖον ἔκτὸς εύθειας, μία καὶ μόνον μία παράλληλος διέρχεται πρὸς τὴν εύθειαν αὐτὴν.

'Η ἀνωτέρω πρότασις εἶναι θεμελιώδης, εἶναι δὲ γνωστὴ ὡς Εὔκλειδειον αἴτημα.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

107. Χαράξατε δύο εύθειας παραλλήλους καὶ μίαν ἀλλην εύθειαν κάθετον πρὸς τὴν μίαν ἀπὸ αὐτάς. Πῶς τέμνει ἡ κάθετος αὐτὴ τὴν ἀλλην παράλληλον; Χρησιμοποιήσατε τὰ ὅργανά σας.


108. Χαράξατε δύο εύθειας παραλλήλους καὶ μίαν ἀλλην παράλληλον πρὸς μίαν ἀπὸ αὐτάς. Ποιὰ ἡ θέσις τῆς τελευταίας αὐτῆς εύθειας ὡς πρὸς τὴν ἀλλην παράλληλον; (Χρησιμοποιήσατε παράλληλον μετατόπισιν).

109. Νὰ εὑρετε διατὶ αἱ ἑφαπτόμεναι κύκλου εἰς τὰ ἄκρα μιᾶς διαμέτρου αὐτοῦ εἶναι παράλληλοι.

48. ΚΕΝΤΡΑ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ ΔΥΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ

48.1. Χαράσσομεν δύο εύθειας παραλλήλους, $\epsilon \parallel \epsilon'$, λαμβάνομεν δὲ ἐν σημεῖον Α τῆς ϵ καὶ ἐν σημεῖον A' τῆς ϵ' . "Ἄσ συγκεντρώσωμεν τὴν προσοχὴν μας εἰς τὴν συμμετρίαν ὡς πρὸς τὸ μέσον O_1 τοῦ τμήματος AA' , σχ. 106.

α) Εἶναι φανερὸν ὅτι τὰ A καὶ A' εἶναι συμμετρικά.



β) 'Η συμμετρικὴ τῆς ϵ , διπος γνωρίζομεν (§43.2), εἶναι παράλληλος πρὸς αὐτὴν καὶ διέρχεται διὰ τοῦ A' "Ητοι εἶναι ἡ ϵ' .


* Εὐκλείδης: Διάσημος Ἑλλην μαθηματικός (300 π.Χ.). Εἰς τὸ περίφημον ἔργον του εἰς τὰ «Στοιχεῖα», δῷργάνωσε κατὰ διαυμάσιον τρόπον τὰς μαθηματικὰς γνώσεις τῆς ἀποχῆς του. "Ἐκτοτε τὰ «Στοιχεῖα» διποτελοῦν τὰς βάσεις τῆς γεωμετρικῆς μορφώσεως.

γ) 'Ομοίως ή συμμετρική τῆς ε' είναι ή ε.

'Από τά άνωτέρω έννοοῦμεν δτι :

Εἰς τὴν $\Sigma(O_1)$ τὸ σχῆμα τῶν δύο παραλλήλων ε, ε' ἔχει κέντρον συμμετρίας τὸ σημεῖον O_1 .

48. 2. "Αραγε τὸ σημεῖον O_1 είναι τὸ μοναδικὸν κέντρον συμμετρίας τῶν παραλλήλων ε, ε'; Εἰς τὸ σχ. 107, ἐπὶ τῶν ίδιων εὐθειῶν ε, ε' ἔχομεν λάβει ἐν ἀλλο ζεῦγος σημείων B, B' , τοῦ δποίου τὸ μέσον O_2 είναι διάφορον τοῦ O_1 . Έργαζόμενοι ως άνωτέρω εύρίσκομεν δτι καὶ τὸ σημεῖον O_2 είναι κέντρον συμμετρίας τῶν ε, ε'.



Σχ. 110

48. 3. 'Από τὰ προηγούμενα έννοοῦμεν δτι τὸ σχῆμα τῶν δύο παραλλήλων ε, ε' ἔχει ἄπειρα κέντρα συμμετρίας.

"Ἄσ εύρωμεν μερικὰ ἀπὸ αὐτά : Τὰ $O_1, O_2, O_3 \dots$, σχ. 108. Παρατηροῦμεν δτι ὅλα κείνται ἐπὶ εὐθείας μ παραλλήλου πρὸς τὰς ε, ε'. 'Η εὐθεία μ λέγεται μεσοπαραλλήλος τῶν δύο παραλλήλων ε, ε'.

48. 4. Λαμβάνομεν ἐν τυχόν σημεῖον N τῆς μεσοπαραλλήλου μ τῶν ε, ε', σχ. 109. "Ἐπειτα διὰ τοῦ N φέρομεν διάφορα εὐθ. τμήματα $v_1, v_2, v_3 \dots$ περατούμενα εἰς τὰς παραλλήλους ε, ε'. Μὲ τὸν διαβήτην μας είναι εύκολον νὰ διαπιστώσωμεν δτι τὸ σημεῖον N είναι τὸ μέσον ἑκάστου τῶν τμημάτων τούτων. 'Από τὴν διαπιστωσιν αὐτὴν διδηγούμεθα εἰς τὸ συμπέρασμα δτι :

Πᾶν σημεῖον τῆς μεσοπαραλλήλου μ είναι κέντρον συμμετρίας τοῦ σχήματος τῶν δύο παραλλήλων ε, ε'.

48. 5. "Ἄσ διπλώσωμεν τὸ ἐπίπεδον τῶν δύο παραλλήλων ε, ε' περὶ τὴν μεσοπαραλλήλον μ αὐτῶν. Παρατηροῦμεν τότε δτι αἱ παράλληλοι ε, ε' συμπίπτουν : 'Από τὸ πείραμα τοῦτο διδηγούμεθα εἰς τὸ συμπέρασμα δτι :

"Ἡ μεσοπαραλλήλος μ είναι ἀξων συμμετρίας τῶν δύο παραλλήλων ε, ε'.

49. ΓΩΝΙΑΙ ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑΙ ΥΠΟ ΔΥΟ ΕΥΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΆΛΛΗΣ ΤΕΜΝΟΥΣΗΣ ΑΥΤΑΣ

Χαράσσομεν δύο εὐθείας α, β καὶ μίαν τρίτην τέμνουσαν αὐτάς, σχ. 110. Καθὼς παρατηροῦμεν, τὸ κοινὸν σημεῖον A τῶν εὐθειῶν α καὶ γ είναι κορυφὴ 4 γωνιῶν (A_1, A_2, A_3, A_4) μὲ τὴν μίαν πλευράν ἐπὶ τῆς γ καὶ τὴν ἄλλην ἐπὶ τῆς α . 'Ομοίως τὸ σημεῖον B , τῶν εὐθειῶν β καὶ γ , είναι κορυφὴ 4 γωνιῶν (B_1, B_2, B_3, B_4) μὲ τὴν μίαν πλευράν ἐπὶ τῆς γ καὶ τὴν ἄλλην ἐπὶ τῆς β .

'Από τὰς 8 αὐτάς γωνίας αἱ 4, καὶ συγκεκριμένως αἱ A_1, A_2, B_1, B_2 , ἔχουν

ώς μίαν πλευράν τήν ήμιευθείαν AB ή τήν ήμιευθείαν BA καὶ λέγονται ἐσωτερικαὶ ἢ ἐντός.

Αἱ ἄλλαι τέσσαρες γωνίαι, αἱ A_3, A_4, B_3, B_4 , ἔχουν ως μίαν πλευράν τήν ήμιευθείαν AZ ή τήν ήμιευθείαν BZ' καὶ λέγονται ἐξωτερικαὶ ἢ ἐκτός.

Αἱ γωνίαι A_1 καὶ B_1 , ἐπειδὴ εἰναι ἀμφότεραι ἐντός καὶ κεῖνται πρὸς τὸ αὐτὸ μέρος τῆς τεμνούστης γ, λέγονται ἐντός ἐναλλάξ. Ὁμοίως καὶ αἱ γωνίαι A_2, B_2 .

Αἱ γωνίαι A_3 καὶ B_1 εἰναι ἀμφότεραι ἐντός ἀλλὰ οὐχὶ καὶ πρὸς τὸ αὐτὸ μέρος τῆς τεμνούστης γ καὶ λέγονται ἐντός ἐναλλάξ. Ὁμοίως καὶ αἱ γωνίαι A_1 καὶ B_2 .

Αἱ γωνίαι A_4 καὶ B_2 κεῖνται ἡ μία ἐντός, ἡ ἄλλη ἐκτός ἀλλὰ ἀμφότεραι πρὸς τὸ αὐτὸ μέρος τῆς γ καὶ λέγονται ἐντός ἐκτός καὶ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη.

50. ΓΩΝΙΑΙ ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑΙ ΥΠΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΤΕΜΝΟΥΣΣΕΣ ΑΥΤΑΣ

Εἰς τὸ σχ. 111 ἔχομεν χαράξει δύο παραλλήλους, $\epsilon \parallel \epsilon'$, καὶ μίαν εύθειαν την τέμνουσσαν αὐτὰς εἰς τὰ σημεῖα A καὶ A' .

"Ἄσ συγκεντρώσωμεν τήν προσοχήν μας εἰς τήν συμμετρίαν ως πρὸς τὸ μέσον Ο τοῦ τμήματος AA' .


Παρατηροῦμεν ὅτι: αἱ εύθειαι ϵ, ϵ' εἰναι συμμετρικαὶ ἡ δὲ η συμπίπτει μὲ τήν συμμετρικήν της. Συνεπῶς τὸ Ο εἰναι κέντρον συμμετρίας τοῦ σχήματος.

α) "Ἄσ προσέξωμεν ἡδη δύο ἐντός ἐναλλάξ γωνίας τοῦ σχήματος αὐτοῦ. Παρατηροῦμεν ὅτι: Αἱ ἐντός ἐναλλάξ γωνίαι α' καὶ γ εἰναι συμμετρικαὶ ως πρὸς Ο· ἕρα καὶ ἵσαι.

$$\widehat{\alpha} = \widehat{\gamma}$$

β) "Ἐὰν λάβωμεν ὑπ' ὅψιν μας ὅτι καὶ $\widehat{\alpha} = \widehat{\gamma}$ (κατὰ κορυφὴν γωνίαι), εύρισκομεν ὅτι καὶ: $\widehat{\alpha} = \widehat{\alpha}'$

$$(\widehat{\alpha} = \widehat{\gamma} \text{ καὶ } \widehat{\gamma} = \widehat{\alpha}') \Rightarrow \widehat{\alpha} = \widehat{\alpha}'$$



Σχ. 111

γ) "Ἐπειδὴ $\widehat{\alpha} = \widehat{\alpha}'$ καὶ $\widehat{\alpha} + \widehat{\delta} = 2\pi$ θὰ εἰναι καὶ $\widehat{\alpha}' + \widehat{\delta}' = 2\pi$

"Ωστε: Δύο εύθειαι παράλληλοι σχηματίζουν μὲ μίαν τέμνουσσαν αὐτάς:

- Τὰς ἐντός ἐναλλάξ γωνίας ἴσαις.
- Τὰς ἐντός ἐκτός καὶ ἐπὶ τὰ αὐτὰ γωνίας ἴσαις.
- Τὰς ἐντός καὶ ἐπὶ τὰ αὐτὰ γωνίας παραπληρωματικάς.

51. ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΥΘΕΙΩΝ

51. 1. Σχηματίζομεν δύο ίσας γωνίας, $\widehat{\omega} = \widehat{\varphi}$ και τάς τοποθετούμεν διπλώς δεικνύει τό σχ. 112. Παρατηρούμεν διπλώς είς τό σχέδιον αύτό αι εύθειαι ε, ε' τέμνονται ύπο τής εύθειας ΟΟ' και σχηματίζουν δύο έντδες έναλλάξ γωνίας ίσας. Ποίαν θέσιν έχουν μετατάξυ των αι εύθειαι ε, ε'; Μὲ παράλληλον μετατόπισιν διαπιστώνομεν διπλώς αι εύθειαι ε, ε' είναι π αρά λ λ η λ οι.

Τούτο δικαιολογεῖται ως έξῆς :

'Εάν ή ε' δέν ήτο παράλληλος πρός τήν ε τότε ως γνωστὸν θά ύππρεχε μία δλλη εύθεια η, ή δποια θά δηρχετο διά τοῦ Ο και θά ήτο παράλληλος πρός τήν ε. Εἰς τήν περίπτωσιν αύτήν αι γωνίαι φ' και ω, σχ. 112, θά ήσαν ίσαι (έντδες έναλλάξ τῶν παραλλήλων ε καὶ η).

Σχ. 112

$$\left. \begin{array}{l} \text{ΖΑΤΤΑ Α} \\ \text{"Ήτοι θά ήτο} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \widehat{\omega} = \widehat{\varphi} \\ \widehat{\omega} = \widehat{\varphi'} \end{array} \Rightarrow \widehat{\varphi} = \widehat{\varphi'}$$

'Από τήν ισότητα τῶν γωνιῶν φ και φ' έννοούμεν διπλώς αι εύθειαι ε' και η συμπίπτουν.

"Ωστε : 'Εάν δύο εύθειαι τέμνωνται ύπο τρίτης και σχηματίζουν δύο έντδες έναλλάξ γωνίας ίσας θά είναι παράλληλοι.

51. 2. 'Από τήν ἀνωτέρω πρότασιν προκύπτουν και αι έξῆς :

'Εάν δύο εύθειαι τέμνομεναι ύπο τρίτης σχηματίζουν :

δύο έντδες, έκτδες και ἐπὶ τὰ αὐτὰ γωνίας ίσας

η δύο έντδες και ἐπὶ τὰ αὐτὰ γωνίας παραπληρωματικάς τότε αὗται θά είναι παράλληλοι.

Σύνοψις. Αι προτάσεις τῶν παραγράφων 50 και 51 συνοψίζονται ως έξῆς :

$\varepsilon \parallel \varepsilon'$



- 1. 'Έντδες έναλλάξ γωνίαι ίσαι.
- 2. 'Έντδες έκτδες και ἐπὶ τὰ αὐτὰ γωνίαι ίσαι.
- 3. 'Έντδες και ἐπὶ τὰ αὐτὰ γωνίαι παραπληρωματικαί.

52. Έφαρμογαί

52. 1. Η πρότασις τής παρ. 50 μᾶς ἐπιτρέπει, διταν γνωρίζωμεν μίαν διπλώς τάς 8 γωνίας αι δποιαί σχηματίζονται ύπο δύο παραλλήλων και μιᾶς τέμνοντης αὐτάς, νὰ ύπολογίσωμεν τάς δλλας 7.

Π.χ. έάν είς τό σχ. 111 είναι $\widehat{\alpha} = 60^\circ$ τότε θά έχωμεν :


$$\widehat{\alpha} = \widehat{\alpha'} = \widehat{\gamma} = \widehat{\gamma'} = 60^\circ$$

$$\widehat{\beta} = 180^\circ - 60^\circ = 120^\circ \quad \text{και} \quad \widehat{\beta} = \widehat{\delta} = \widehat{\beta'} = \widehat{\delta'} = 120^\circ$$

52. 2. Η πρότασις τῆς παρ. 51 μᾶς δδηγεῖ εἰς τὸν ἔξῆς τρόπον χαράξεως παραλλήλων μὲν γνώμονα καὶ κανόνα.

"Εστω ὅτι θέλωμεν νὰ χαράξωμεν εύθειαν ε' παράλληλον πρὸς δοθεῖσαν εὐθεῖαν ε., σχ. 113.

Πρὸς τοῦτο τοποθετοῦμεν κατὰ μῆκος τῆς εἰς μίαν πλευρὰν τοῦ γνώμονος καὶ ἐφαρμόζομεν εἰς μίαν ἐκ τῶν δύο ἄλλων πλευρῶν αὐτοῦ τὴν ἀκμὴν τοῦ κανόνος (θέσις α'). "Ἐπειτα ὀλισθαῖ νομεν τὸν γνώμονα, κατὰ μῆκος τῆς ἀκμῆς τοῦ κανόνος εἰς μίαν ἄλλην θέσιν (θέσις β'). Εἰς αὐτὴν τὴν θέσιν χαράσσομεν εὐθεῖαν ε' κατὰ μῆκος τῆς πλευρᾶς τοῦ γνώμονος, ἡ δποιά ἀρχικῶς ἐφήρμοζε ἐπὶ τῆς εὐθεῖας ε. Αἱ εὐθεῖαι ε., ε' εἶναι μεταξύ τῶν παραλληλοι. (Διατί; Προσέξατε τὰς γωνίας α, α' τοῦ σχεδίου 113).



Σχ. 113

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

110. Δύο εὐθεῖαι παραλληλοι τέμνονται ὑπὸ τρίτης εὐθείας καὶ σχηματίζουν μίαν γωνίαν.
75ο. Νὰ εὑρετε τὰς τιμὰς (εἰς μοίρας) τῶν ἄλλων 7 γωνιῶν.

111. Χαράξατε δύο εὐθεῖας παραλλήλους $\alpha//\beta$ κι' ἐπειτα δύο ἄλλας παραλλήλους $\gamma//\delta$, αἱ δποιαὶ τέμνονται τὰς δύο πρώτας. Νὰ εὑρεται δλας τὰς ίσας γωνίας τοῦ σχήματος αὐτοῦ.

112. Δύο εὐθεῖαι παραλληλοι (α/β) τέμνονται ὑπὸ εὐθείας γ καὶ σχηματίζουν δύο ἐντὸς ἐναλλάξ γωνίας δρόσας. Ποιαν θέσιν ἔχει ἡ εὐθεία γ ὡς πρὸς τὰς εὐθείας α καὶ β;

113. 'Απὸ ἐν σημείον τῆς διχοτόμου μιᾶς γωνίας 50° φέρομεν παραλλήλους πρὸς τὰς πλευρὰς αὐτῆς. Νὰ ὑπολογίσετε τὰς ἄλλας γωνίας τοῦ σχήματος αὐτοῦ.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΝ

114. Νὰ χαράξετε δύο ίσους κύκλους καὶ ἐπειτα ἔνα ἄξονα συμμετρίας τοῦ σχήματος τὸ δποιαὶ δποτελεῖται ἀπὸ τοὺς δύο αὐτοὺς κύκλους.

115. Δύο εὐθεῖαι παραλληλοι τέμνονται ὑπὸ τρίτης εὐθείας καὶ σχηματίζουν δύο ἐντὸς ἐναλλάξ γωνίας παραπληρωματικάς. Ποια εἶναι ἡ θέσις τῆς τεμνούστης ὡς πρὸς τὰς πλευράς;

116. Τὸ ἀνθροισμα 4 διαδοχικῶν γωνιῶν εἶναι 360° . 'Εὰν ἡ 1η εἶναι 70° , ἡ 2α τριπλασία τῆς τρίτης καὶ ἡ 4η ίση μὲ 90° , ὑπολογίσετε ἑκάστην τῶν γωνιῶν αὐτῶν.

117. Δύο εὐθεῖαι ε., ε' τέμνονται εἰς τὸ σημείον Ο. 'Εὰν λάβωμεν ἐπὶ τῆς ε.: $AO=OB$ καὶ ἐπὶ τῆς ε': $GO=OD$, νὰ ἔξετάσετε ἐάν αἱ εὐθεῖαι ΑΔ καὶ ΓΒ εἶναι παραλληλοι. Νὰ εὑρετε ἐπίστης τὸ συμμετρικὸν τοῦ σχήματος $AGB\Delta$ ὡς πρὸς τὸ Ο.

118. Χαράσσομεν μίαν εὐθεῖαν ε καὶ δύο ἡμιευθεῖας Αχ, Βψ, δπου Α, Βε. "Ἐπειτα χαράσσομεν τὰς συμμετρικὰς Αχ', Βψ' τῶν ἡμιευθεῖων Αχ, Βψ εἰς τὴν Σ(ε). 'Εὰν Μ, Μ' εἶναι τὰ σημεῖα τομῆς τῶν Αχ, Βψ καὶ Αχ', Βψ', νὰ ἔξετάσετε ἐάν η ε εἶναι μεσοκάθετος πρὸς τὸ τμῆμα MM' . (Δικαιολογήσατε τὴν ἀπάντησίν σας).

119. 'Εξετάσατε ἐάν ισχύει ἡ ἔξις πρότασις :

Εἰς τὴν συμμετρίαν (ὡς πρὸς εὐθεῖαν ή πρὸς σημείον) ή τομῆ δύο σχημάτων (Κ), (Λ) ἔχει δμόλογον τὴν τομήν τῶν δμολόγων (Κ'), (Λ') τῶν σχημάτων (Κ) καὶ (Λ).

Λάβατε ὡς σχήματα (Κ), (Λ) 2 εὐθεῖας ή δύο κύκλους ή εὐθεῖαι καὶ κύκλον.

120. Χαράξατε δύο τεμνομένας εὐθεῖας ε., ε'. "Ἐπειτα γράψατε κύκλον μὲ κέντρον τὸ σημείον τομῆς αὐτῶν Ο. 'Εὰν δ κύκλος οὗτος τέμνῃ τὴν μὲν εἰς τὰ σημεῖα Α, Γ τὴν δὲ ε' εἰς τὰ Β καὶ Δ, νὰ εὑρετε :

α) τὰ συμμετρικὰ τῶν ΑΒ, ΒΓ, ΓΔ, ΔΑ, ΑΓ, ΒΔ, ὡς πρὸς τὸ Ο.


β) τὸ συμμετρικὸν τοῦ σχήματος $ABGD$ πρὸς τὸ κέντρον Ο. Τὶ παραπτηρεῖτε;

ποτέ ποτε τοποθετεῖσθαι κατὰ τὴν αὐτὴν τὴν θέσην, τὸ δέ προτερότερον ἡγεμόνης ποτὲ ποτε τοποθετεῖσθαι κατὰ τὴν αὐτὴν τὴν θέσην.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'.

53. ΤΟ ΤΡΙΓΩΝΟΝ

53. 1. Ἐστὶν οὐδὲν οὐδὲν τὸ τρίγωνον μέτρον οὐδὲν. Τὸ τρίγωνον τῶν εὐθείας, σχ. 114. Τὸ σύνολον τῶν εὐθείας τμημάτων AB , BG , GA λέγεται τριγώνον.



Σχ. 114

Τὰ σημεῖα A , B , G , λέγονται κορυφαῖς, ἐνῷ τὰ εὐθεῖα τμήματα AB , BG καὶ GA πλευραῖς τοῦ τριγώνου τούτου.


"Ἐν τρίγωνον μὲν κορυφᾶς A , B , G , δονομάζεται τριγώνον ABG ή συμβολικῶς: $\Delta. ABG$.

53. 2. Εἰς τὸ τρίγωνον ABG , σχ. 115, ἔχομεν σημεῖώσει τὰ τρία ἡμιεπίπεδα (BG , A), (AB , G) καὶ (AG , B). "Ητοι τὰ ἡμιεπίπεδα τὰ δόποια ὁρίζει ή εὐθεῖα ἑκάστης πλευρᾶς μὲ τὴν ἀπέναντι αὐτῆς κορυφήν. Ἡ τομὴ καὶ τῶν τριῶν αὐτῶν ἡμιεπίπεδων λέγεται ἐσωτερικόν τοῦ τριγώνου. "Ἐκαστὸν σημεῖον τοῦ ἐπιπέδου τὸ δόποιον δὲν κεῖται εἰς τὸ ἐσωτερικόν τοῦ τριγώνου, οὔτε εἰς τὰς πλευράς αὐτοῦ, λέγεται ἐξωτερικόν τοῦ τριγώνου.

"Ἐκάστη κορυφὴ τοῦ τριγώνου εἶναι κορυφὴ μιᾶς κυρτῆς γωνίας εἰς τὰς πλευράς τῆς δόποιας κεῖνται δύο πλευραὶ τοῦ τριγώνου· λέγεται δὲ γωνία ή τοῦ τριγώνου. Συνήθως ἑκάστῃ γωνίᾳ τοῦ τριγώνου δονομάζεται μὲν τὸ γράμμα τῆς κορυφῆς τῆς. Π.χ. γωνία A , γωνία B , γωνία G .

Εἰς τὸ τρίγωνον ABG ή γωνία A ἔχει προσκειμένας τὰς πλευράς AB καὶ AG καὶ ἀπέναντι τὴν πλευράν BG .

Αἱ τρεῖς πλευραὶ καὶ αἱ τρεῖς γωνίαι ἐνὸς τριγώνου λέγονται πρωτεύοντα στοιχεῖα αὐτοῦ.




Σχ. 115

54. ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΙΓΩΝΟΥ

54. 1. "Υψος"

"Από τήν κορυφήν Α τριγώνου ABG , σχ. 116, 117, δυνάμεθα νὰ χαράξωμεν μίαν κάθετον πρὸς τήν εύθειαν τῆς ἀπέναντι πλευρᾶς BG .



Τὸ τμῆμα AD τῆς καθέτου ταύτης ἢ καὶ δόλοκληρος ἢ εὐθεῖα τῆς καθέτου, λέγεται ὑψος τοῦ τριγώνου ABG πρὸς τήν πλευρὰν BG . Τὸ σημεῖον D λέγεται ἕχ νος τοῦ ὑψους τούτου.

54. 2. Διάμεσος

"Η κορυφὴ A καὶ τὸ μέσον M τῆς ἀπέναντι αὐτῆς πλευρᾶς BG , σχ. 118, δρίζουν τὸ εὐθ. τμῆμα AM . Τὸ τμῆμα τοῦτο ἢ καὶ δόλοκληρος ἢ εὐθεῖα αὐτοῦ λέγεται διάμεσος τοῦ τριγώνου ABG πρὸς τήν πλευρὰν BG .

54. 3. Διχοτόμος

Τὸ τμῆμα AE , σχ. 119, τῆς διχοτόμου τῆς γωνίας A τριγώνου ABG ἢ δόλοκληρος ἢ ἡμιευθεῖα αὐτῆς λέγεται διχοτόμος τῆς γωνίας A τοῦ τριγώνου τούτου. Τὸ σημεῖον E λέγεται ἕχ νος τῆς διχοτόμου αὐτῆς.

Κατὰ τὰ ἀνωτέρω :

"Ἐκαστὸν τρίγωνον ἔχει 3 ὑψη, 3 διάμεσους καὶ 3 διχοτόμους


Τὰ ὑψη, αἱ διάμεσοι καὶ αἱ διχοτόμοι λέγονται δευτερεύοντα στοιχεῖα τοῦ τριγώνου. Ἀργότερον θὰ γνωρίσωμεν καὶ ἄλλα δευτερεύοντα στοιχεῖα αὐτοῦ.

55. ΑΝΙΣΟΤΙΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΛΕΥΡΩΝ ΤΡΙΓΩΝΟΥ

55. 1. "Ας ζητήσωμεν νὰ συγκρίνωμεν ἑκάστην πλευράν τριγώνου ABG πρὸς τὸ ἀθροίσμα τῶν δύο ἄλλων πλευρῶν αὐτοῦ.

Παρατηροῦμεν ὅτι :

$$\left. \begin{array}{l} BG < AB + AG \\ AB < AG + GB \\ AG < AB + BG \end{array} \right\} (\S \ 10. \ 5)$$



"Ητοι : 'Ἐκάστη πλευρὰ τριγώνου εἶναι μικροτέρα τοῦ ἀθροίσματος τῶν δύο ἄλλων πλευρῶν αὐτοῦ.'

55. 2. Εις τὸ τρίγωνον $AB\Gamma$, σχ. 120, εἶναι $AB > \Gamma B > A\Gamma$.

Ἄσ εύρωμεν μὲ τὰ δργανά μας* τὴν διαφοράν $AB - A\Gamma$, καὶ ἃς συγκρίνωμεν αὐτὴν πρὸς τὴν πλευρὰν ΓB .

Εύρισκομεν ὅτι : $\Gamma B > AB - A\Gamma$

Ομοίως εύρισκομεν ὅτι : $AB > \Gamma B - A\Gamma$ καὶ $A\Gamma > AB - \Gamma B$


Ἡτοι : Ἐκάστη πλευρὰ τριγώνου εἶναι μεγαλυτέρα τῆς διαφορᾶς τῶν δύο ἄλλων πλευρῶν αὐτοῦ.

56. ΕΙΔΗ ΤΡΙΓΩΝΩΝ

56. 1. Διάκρισις τριγώνων ως πρὸς τὰς γωνίας

α) Ὁρθογώνιον τρίγωνον

Κατασκευάζομεν μίαν δρθήν γωνίαν χΑψ. Ἐπὶ τῆς μιᾶς πλευρᾶς $A\chi$ λαμβάνομεν σημεῖον B καὶ ἐπὶ τῆς ἄλλης πλευρᾶς $A\psi$ σημεῖον Γ . Ὁρίζομεν τοι-



Σχ. 121

ουτοτρόπως τὸ τρίγωνον $AB\Gamma$ τὸ δόποιον ἔχει τὴν γωνίαν A δρθήν καὶ καθὼς παρατηροῦμεν, τὰς ἄλλας γωνίας δξείσ. Διὰ τοῦτο λέγεται ὁρθογώνιον.

Ἡ ἀπέναντι τῆς δρθῆσ γωνίας A , πλευρὰ $B\Gamma$, λέγεται ὑποτείνουσα.

β) Ὁξυγώνιον τρίγωνον

Κατασκευάζομεν μίαν δξείσ γωνίαν χΑψ = 40° . Ἐπειτα μὲ κορυφήν ἔν σημεῖον B τῆς πλευρᾶς $A\chi$ καὶ μὲ μίαν πλευρὰν τὴν ἡμιευθεῖαν BA σχηματίζομεν μίαν γωνίαν 60° , σχ. 121 β. Ἡ ἄλλη πλευρὰ τῆς γωνίας αὐτῆς τέμνει τὴν $A\psi$ εἰς ἓν σημεῖον Γ .

Τοιουτοτρόπως σχηματίζεται τὸ τρίγωνον $AB\Gamma$, σχ. 121 β, τὸ δόποιον, καθὼς παρατηροῦμεν, ἔχει δλας τὰς γωνίας αὐτοῦ δξείσ. Διὰ τοῦτο λέγεται ὥξυγώνιον τρίγωνον.

* Θεωρητική δξέτασις θὰ γίνη εἰς ἄλλην τάξιν.

γ) Άμβλυγώνιον τρίγωνον

Κατασκευάζομεν μίαν ἀμβλεῖαν γωνίαν χΑψ καὶ σημειώνομεν ἐπὶ τῶν πλευρῶν Αχ, Αψ αὐτῆς τὰ σημεῖα Β καὶ Γ ἀντιστοίχως, σχ. 121 γ.

Τοιουτοτρόπως δρίζεται τὸ τρίγωνον ΑΒΓ, τὸ δόποιον ἔχει τὴν μίαν γωνίαν αὐτοῦ ἀμβλεῖαν καὶ τὰς ἄλλας ὁξείας. Διὰ τοῦτο λέγεται ἀμβλυγώνιον τρίγωνον.

Ἡτοι τὰ τρίγωνα ἀναλόγως τῶν γωνιῶν των διακρίνονται εἰς δρθογώνια, δξυγώνια καὶ ἀμβλυγώνια.

56. 2. Διάκρισις ὡς πρὸς τὰς πλευράς

α) Ἰσόπλευρον τρίγωνον

Χαράσσομεν ἐν εὐθ. τμῆμα ΑΒ καὶ ἐπειτα δύο κύκλους, τὸν ἔνα μὲ κέντρον Α καὶ ἀκτίνα ΑΒ καὶ τὸν ἄλλον μὲ κέντρον Β καὶ ἀκτίνα πάλιν ΑΒ, σχ. 122α. Τὸ ἐν ἀπὸ τὰ δύο κύκλων, τὸ σημεῖον Γ, μὲ τὰ σημεῖα Α καὶ Β δρίζει ἔν τρίγωνον ΑΒΓ εἰς τὸ δόποιον εἶναι:

$$AB = AG = BG$$



Ἐκαστὸν τρίγωνον τὸ δόποιον ἔχει καὶ τὰς τρεῖς πλευρᾶς αὐτοῦ ἵσας, λέγεται Ἰσόπλευρον τρίγωνον.

β) Ἰσοσκελές τρίγωνον

Χαράσσομεν εὐθ. τμῆμα ΒΓ = 2 cm. Ἐπειτα γράφομεν δύο κύκλους· τὸν ἔνα μὲ κορυφὴν Β καὶ ἀκτίνα 3 cm καὶ τὸν ἄλλον μὲ κορυφὴν Γ καὶ ἀκτίνα ἐπίσης 3 cm. Τὸ ἐν ἀπὸ τὰ σημεῖα τομῆς τῶν δύο κύκλων, π.χ. τὸ σημεῖον Α, μὲ τὰ σημεῖα Β καὶ Γ δρίζει τὸ τρίγωνον ΑΒΓ, σχ. 122β. Τοῦτο ἔχει δύο πλευρᾶς ἵσας.

$$AB = AG$$

Ἐκαστὸν τρίγωνον τὸ δόποιον ἔχει δύο πλευρᾶς ἵσας, λέγεται Ἰσοσκελές τρίγωνον.

γ) Σκαληνὸν τρίγωνον

Χαράσσομεν εὐθ. τμῆμα ΓΒ = 3 em καὶ δύο κύκλους μὲ κέντρα Γ, Β καὶ ἀκτίνας 2,5 em καὶ 4 em ἀντιστοίχως. Τὸ ἐκ τῶν σημείων τομῆς τῶν δύο κύκλων, π.χ. τὸ σημεῖον Α, μὲ τὰ σημεῖα Β καὶ Γ δρίζει τὸ τρίγωνον ΑΒΓ, τὸ δόποιον ἔχει :


$$AB \neq BG, \quad AB \neq AG, \quad \text{καὶ} \quad AG \neq BG$$

Ἐκαστὸν τρίγωνον τὸ δόποιον ἔχει τὰς πλευρᾶς του ἀνίσους ἀνά δύο, λέγεται σκαληνὸν τρίγωνον.

56. 3. "Ωστε: τὰ τρίγωνα ἀναλόγως τῶν πλευρῶν των διακρίνονται εἰς Ἰσόπλευρα, Ἰσοσκελῆ καὶ σκαληνά.

Κατὰ τὰ ἀνωτέρω ἐδὲν λάβωμεν ὡς βασικὸν σύνολον Ω τῶν γεωμ. σχημάτων τοῦ ἐπιπέδου καὶ παραστήσωμεν:

Μὲ Τ τὸ σύνολον τῶν τριγώνων, μὲ Τ' τὸ σύνολον τῶν Ἰσοσκελῶν τριγώνων καὶ μὲ Τ'' τὸ σύνολον τῶν Ἰσοπλεύρων τριγώνων, τότε αἱ σχέσεις μεταξὺ τῶν Ἰσοσκελῶν, Ἰσοπλεύρων καὶ σκαληνῶν τριγώνων, ἀποδίδονται ὑπὸ τοῦ διαγράμματος τοῦ σχ. 123.



Σχ. 123

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

121. Χαράξατε προσεκτικῶς τὰ 3 ὄψη ἐνὸς διχοτόμου τριγώνου. Τί παρατηρεῖτε;

122. Χαράξατε προσεκτικῶς τὰ 3 διαιμέσους ἐνὸς διχοτόμου τριγώνου. Τί παρατηρεῖτε;

123. Χαράξατε προσεκτικῶς τὰ 3 διχοτόμους ἐνὸς διχοτόμου τριγώνου. Τί παρατηρεῖτε;

124. Σχεδιάσατε ἐν τρίγωνον ΑΒΓ. Νὰ ἔξετάσετε ἐάν εἰς τὸ ἐπίπεδον αὐτοῦ ὑπάρχουν δύο σημεῖα Δ καὶ Ε, τὸ Δ ἐσωτερικὸν καὶ τὸ Ε ἐξωτερικὸν τοῦ τριγώνου, τοιαῦτα ὡστε ΔΕΠ ΑΒΓ=∅.

125. Τὰ μήκη δύο πλευρῶν τριγώνου εἰναι 5 cm καὶ 7 cm. Μεταξύ ποιῶν τιμῶν εύρισκεται τὸ μῆκος τῆς τρίτης πλευρᾶς αὐτοῦ;

57. ΤΟ ΙΣΟΣΚΕΛΕΣ ΤΡΙΓΩΝΟΝ

57. 1. Κατασκευάζομεν μίαν γωνίαν χΑψ καὶ ἐπὶ τῶν πλευρῶν αὐτῆς λαμβάνομεν $AB=AG$. Ἐπειτα χαράσσομεν τὸ εὐθέαν τμῆμα BG , σχ. 124· τὸ τρίγωνον ABG εἰναι Ἰσοσκελές.

57. 2. Ἰδιότητες

"Ἄσ συγκεντρώσωμεν τὴν προσοχὴν μας εἰς τὴν συμμετρίαν ὡς πρὸς τὴν εύθεταν ε τῆς διχοτόμου $A\Delta$, σχ. 124.

Ἐις τὴν συμμετρίαν αὐτὴν παρατηροῦμεν ὅτι:

α) Τὸ σημεῖον A ἀντιστοιχεῖ εἰς τὸν ἑαυτόν του.

β) Αἱ πλευραὶ $A\chi$ καὶ $A\psi$ τῆς γωνίας A ἀντιστοιχοῦν μεταξύ των.

($A\chi \rightleftharpoons A\psi$). Ἐπειδὴ δὲ $AB=AG$, ἀντιστοιχοῦν μεταξύ των καὶ αἱ κορυφαὶ B καὶ G . ($B \rightleftharpoons G$)

"Ητοι : α) Εἰς τὴν $\Sigma(\epsilon)$ τὸ Ἰσοσκελές τρίγωνον ABG ἀντιστοιχεῖ εἰς ἑαυτό.

Συνεπῶς ἡ ε εἰναι ἄξων συμμετρίας αὐτοῦ.


β) $BG \perp A\Delta$ καὶ $B\Delta=\Delta G$

γ) $\widehat{B}=\widehat{G}$

"Ωστε: Εἰς τὸ Ἰσοσκελές τρίγωνον :

α) Ἡ εὐθετα τῆς διχοτόμου τῆς γωνίας τῶν Ἰσων πλευρῶν εἰναι ἄξων συμμετρίας αὐτοῦ.

β) Αἱ παρὰ τὴν βάσιν γωνίαι εἰναι ἴσαι.



Σχ. 124

γ) Ἡ διχοτόμος, ἡ διάμεσος καὶ τὸ ψῆφος πρὸς τὴν βάσιν ταυτίζονται.

57. 3. Τρίγωνον μὲν ἄξονα συμμετρίας

Ἐὰν τρίγωνον ABG ἔχῃ ἄξονα συμμετρίας διερχόμενον διὰ τῆς κορυφῆς A , τότε ἡ δίπλωσις περὶ αὐτόν:

α) Ἀφήνει ἀκίνητον τὴν κορυφὴν A (Διατί;)

β) Φέρει εἰς σύμπτωσιν τὰς κορυφὰς B καὶ G (Διατί;)

Συνεπῶς φέρει εἰς σύμπτωσιν καὶ τὰς πλευρὰς AB καὶ AG ($AB \rightleftharpoons AG$).


Ἡτοι εἶναι: $AB=AG$

Ἐὰν ἔν τρίγωνον ἔχῃ ἄξονα συμμετρίας εἶναι ισοσκελές.

57. 4. Τρίγωνον μὲν δύο γωνίας ίσας

Χαράξατε εὐθ. τμῆμα BG καὶ δύο ίσας διξείας γωνίας μὲν κορυφὰς τὰ ἄκρα

ψ αὐτοῦ. (Αἱ γωνίαι νὰ εύρισκωνται εἰς τὸ αὐτὸν ἥμιεττον ἀκμῆς BG καὶ κατὰ τὴν διάταξιν τοῦ σχ. 125). Παρατηροῦμεν ὅτι δρίζεται τὸ τρίγωνον ABG . Μὲ τὸν διαβήτην δυνάμεθα νὰ διαπίστωσωμεν ὅτι τὸ τρίγωνον τοῦτο εἶναι ισοσκελές ($AB=AG$).



Σχ. 125

Εἰς τὸ αὐτὸν ἀποτέλεσμα καταλήγομεν διὰ τῆς συμμετρίας ὡς πρὸς τὴν μεσοκάθετον ε τοῦ BG . Πράγματι ἡ δίπλωσις περὶ τὴν μεσοκάθετον ε φέρει εἰς σύμπτωσιν:

α) Τὰς κορυφὰς B καὶ G .

β) Τὰς ίσας γωνίας B καὶ G (Διατί;)

Συνεπῶς φέρει εἰς σύμπτωσιν καὶ τὰς πλευρὰς BG καὶ $\Gamma\psi$ τῶν γωνιῶν αὐτῶν.

Ἡτοι: αἱ BG καὶ $\Gamma\psi$ εἶναι συμμετρικαὶ καὶ συναντοῦν δὲ τὸν ἄξονα ε εἰς τὸ αὐτὸν σημεῖον Α. Συνεπῶς καὶ αἱ πλευραὶ AB καὶ AG εἶναι συμμετρικαὶ καὶ ίσαι.

“Ωστε: Ἐὰν τρίγωνον ἔχῃ δύο γωνίας ίσας εἶναι ισοσκελές.


$$\Gamma = B \Rightarrow AB = AG$$

57. 5. Ἄλλαι ίδιότητες τοῦ ισοσκελοῦς τριγώνου

Μὲ διαφόρους κατασκευᾶς καὶ συλλογισμοὺς δυνάμεθα νὰ ἀνακαλύψωμεν καὶ ἄλλας ίδιότητας τοῦ ισοσκελοῦς τριγώνου.

α) Τρίγωνον τοῦ ὁποίου μία διχοτόμος εἶναι καὶ ψῆφος.

ι) Κατασκευάζομεν μίαν γωνίαν $\chi\psi$ καὶ τὴν διχοτόμον AZ αὐτῆς, σχ. 126. Ἐπὶ τῆς διχοτόμου AZ , λαμβάνομεν ἐν σημεῖον M καὶ φέρομεν τὴν κάθετον πρὸς τὴν AZ εἰς τὸ M . Ἡ κάθετος αὗτη τέμνει τὰς πλευρὰς $A\chi$, $A\psi$ εἰς τὰ σημεῖα B καὶ G ἀντιστοίχως.



Σχ. 126

Παρατηροῦμεν ὅτι εἰς τὸ τρίγωνον ABG ή AM εἶναι ὑψος καὶ διχοτόμος.
Μὲ τὸν διαβήτην δυνάμεθα νὰ διαπιστώσωμεν τότε ὅτι $AB=AG$.

Εἰς τὸ ἀποτέλεσμα αὐτὸν ὁδηγούμεθα μὲ τὸν ἔκῆς συλλογισμὸν.

Ἡ διπλωσις περὶ τὴν εὐθεῖαν AZ θὰ φέρῃ εἰς σύμπτωσιν :


1) Τὰς πλευρὰς AX , AY ($AX \longleftrightarrow AY$).

2) Τὰς ἡμιευθείας MB , MG ($MB \longleftrightarrow MG$).

"Ἄρα θὰ φέρῃ εἰς σύμπτωσιν καὶ τὰς κορυφὰς B καὶ G . Εἶναι συνεπῶς $AB=AG$.

"Ωστε : 'Ἐὰν μία διχοτόμος τριγώνου εἶναι καὶ ὑψος, τὸ τρίγωνον εἶναι ἴσος.'

Σχ. 127



β) Τρίγωνον τοῦ δποίου ἐν ὑψος εἶναι καὶ διάμεσος

Χαράσσομεν ἐν εὐθ. τμῆμα BG καὶ ἐπὶ τῆς μεσοκαθέτου πρὸς αὐτό, λαμβάνομεν ἐν σημείον A , σχ. 127.

Παρατηροῦμεν ὅτι τὸ τρίγωνον ABG ἔχει τὸ τμῆμα AD διάμεσον καὶ ὑψος.

Μὲ τὸν διαβήτην δυνάμεθα νὰ διαπιστώσωμεν ὅτι $AB=AG$.

Εἰς τὸ ἀποτέλεσμα αὐτὸν ὁδηγούμεθα ἐὰν σκεφθῶμεν ὅτι τὸ A ἀνήκει εἰς τὴν μεσοκάθετον τοῦ BG συνεπῶς ἀπέχει ἐξ' ἵσου ἀπὸ τὰ ἄκρα αὐτοῦ.

"Ωστε : 'Ἐὰν ἐν ὑψος τριγώνου εἶναι καὶ διάμεσος αὐτοῦ, τότε τὸ τρίγωνον εἶναι ἴσος.'

γ) Εἰς ἄλλην τάξιν θὰ ἀποδείξωμεν ὅτι :

'Ἐὰν μία διχοτόμος τριγώνου εἶναι καὶ διάμεσος αὐτοῦ, τότε τὸ τρίγωνον εἶναι ἴσος.'

Π Ι Ν Α Ζ

'Ιδιοτήτων τῶν ἴσοσκελῶν τριγώνων'

α) 'Ἐὰν τὸ τρίγωνον ABG εἶναι ἴσοσκελές μὲ ἴσας πλευράς τὰς AB καὶ AG , τότε :

1. "Ἔχει ἄξονα συμμετρίας διερχόμενον διὰ τῆς κορυφῆς A

2. $\widehat{B} = \widehat{G}$

3. 'Ἡ διχοτόμος, τὸ ὑψος καὶ ἡ διάμεσος πρὸς τὴν BG ταυτίζονται.'

β) 'Ἐν τρίγωνον εἶναι ἴσοσκελές, ὅταν :

1. 'Ἔχη ἄξονα συμμετρίας.'

2. 'Ἔχη δύο γωνίας ἴσας.'

3. Μία διχοτόμος εἶναι καὶ διάμεσος αὐτοῦ.'

4. Μία διχοτόμος εἶναι καὶ ὑψος αὐτοῦ (ποία;)

5. Μία διάμεσος εἶναι καὶ ὑψος αὐτοῦ (ποία;)

58. ΤΟ ΙΣΟΠΛΕΥΡΟΝ ΤΡΙΓΩΝΟΝ

Ἐκ τῶν ιδιοτήτων τῶν ισοσκελῶν τριγώνων συνάγομεν ὅτι:

1. Εἰς τὸ ισόπλευρον τρίγωνον:

α) Ὑπάρχουν τρεῖς ἄξονες συμμετρίας (ποιοι;)

β) Αἱ τρεῖς γωνίαι αὐτοῦ εἰναι ίσαι.


γ) Τὰ τρία ύψη ταυτίζονται μὲ τὰς τρεῖς διαμέσους καὶ τὰς τρεῖς διχοτόμους.

2. Τὸ ισογώνιον τρίγωνον εἶναι καὶ ισόπλευρον.

59. ΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΑΙ

59. 1. Νὰ διχοτομηθῇ τόξον AB δοθέντος κύκλου

Χαράσσομεν τὴν χορδὴν AB καὶ φέρομεν ἐπειτα τὴν ἐκ τοῦ κέντρου Ο κάθετον ΟΔ πρὸς αὐτήν, σχ. 128. Ἡ ΟΔ προεκτεινομένη συναντᾷ τὸ τόξον AB εἰς τὸ μέσον M αὐτοῦ. (Διατί; Εἰς τὸ ισοσκελὲς τρίγωνον OAB , τὸ ύψος ΟΔ εἶναι καὶ διχοτόμος τῆς ἐπικέντρου γωνίας Ο...)



Σχ. 128

59. 2. Νὰ διχοτομηθῇ δοθεῖσα γωνία.

Καθιστῶμεν τὴν γωνίαν ἐπίκεντρον, σχ. 128 καὶ εὑρίσκομεν τὸ μέσον M τοῦ ἀντιστοίχου τόξου αὐτῆς. Ἡ ἡμιευθεῖα OM εἶναι ἡ ζητούμενη διχοτόμος. (Διατί;).

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

126. Νὰ συγκρίνετε τὰς γωνίας αἱ ὁποίαι σχηματίζονται ἀπὸ τὰς προεκτάσεις τῶν ίσων πλευρῶν ισοσκελῶν τριγώνων μὲ τὴν βάσιν αὐτοῦ.

127. Νὰ κατασκευασθῇ ισοσκελὲς τρίγωνον $ABΓ$, τοῦ ὁποίου, ἡ πλευρὰ $BΓ$ νὰ ἔχῃ μῆκος 4 cm καὶ τὸ ἐπ' αὐτήν ύψος 3 cm.

128. Νὰ κατασκευασθῇ ισοσκελὲς τρίγωνον $ABΓ$ τοῦ ὁποίου ἡ γωνία τῶν ίσων πλευρῶν AB καὶ AG νὰ εἴναι 45° , ἡ δὲ διχοτόμος αὐτῆς νὰ ἔχῃ μῆκος 4 cm.

129. Νὰ κατασκευασθῇ ισοσκελὲς τρίγωνον $ABΓ$ ($AB=AG$) τοῦ ὁποίου, $B=50^{\circ}$ καὶ $BΓ=4$ cm.

130. Χαράξατε ἔνα κύκλον καὶ μίαν χορδὴν AB αὐτοῦ. Ἐάν M εἶναι τὸ μέσον τοῦ μικροτέρου τόξου AB καὶ M' τοῦ μεγαλυτέρου, νὰ δικαιολογήσετε ὅτι :

α) Τὰ τρίγωνα AMB καὶ $AM'B$ εἶναι ισοσκελῆ. β) Ἡ MM' εἶναι διάμετρος τοῦ κύκλου.

131. Πόσα ισοσκελῆ τρίγωνα δύνασθε μὲ βάσιν δοθὲν θεό. τμῆμα $BΓ$; Τὶ παρατηρεῖτε σχετικῶς μὲ τὴν θέσιν τῆς ἄλλης κορυφῆς αὐτῶν;


132. Κατασκευάσσατε δύο ίσα ὅρθογώνια τρίγωνα (μὲ τὴν βοήθειαν διαφανοῦς) καὶ ἐπειτα σχηματίσατε μὲ αὐτά ἐν ισοσκελὲς τρίγωνον.

133. Νὰ χαράξετε τὴν διχοτόμον μίας γωνίας χΑψ καὶ ἔπειτα ἀπὸ ἐν ἑσωτερικὸν σημεῖον τῆς γωνίας νὰ φέρητε μίαν εὐθείαν τέμνουσαν τὰς πλευράς αὐτῆς εἰς τρόπον ὡστε τὸ τρίγωνον, τὸ διποίον δρίζεται νὰ εἶναι ἰσοσκελές.

134. Νὰ διατερέθῃ δοθὲν τόξον εἰς 4 ἵσα τόξα.

60. ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΓΩΝΙΩΝ ΤΡΙΓΩΝΟΥ

Σχηματίσατε τρίγωνον ABC . Ἀποκόψατε ἔπειτα τὰς γωνίας του καὶ σχηματίσατε τὸ ἀθροισμὰ των, σχ. 129α, β
Τι εύρίσκετε;



$$\text{Εἶναι: } \widehat{A} + \widehat{B} + \widehat{C} = 2 \text{ δρθαί.}$$

"Ωστε: Τὸ ἀθροισμὰ τῶν γωνιῶν πάντὸς τριγώνου ἴσουνται μὲ δύο δρθάς γωνίας.

Εἰς τὸ αὐτὸ συμπέρασμα ἡτο δύνατὸν νὰ φθάσωμεν ὡς ἔξῆς:


"Ἀπὸ τὴν κορυφὴν A φέρομεν εὐθείαν επαράλληλον πρὸς τὴν BC , σχ. 130. Παρατηροῦμεν τότε ὅτι:

$$\widehat{B} = \widehat{\omega} \text{ καὶ } \widehat{C} = \widehat{\phi} \quad (\Delta \text{ιατί!})$$

$$'\text{Αλλὰ } (\widehat{B} = \widehat{\omega} \text{ καὶ } \widehat{C} = \widehat{\phi}) \Rightarrow \widehat{B} + \widehat{C} = \widehat{\omega} + \widehat{\phi}$$

$$'Εξ ἀλλου $\widehat{A} + \widehat{\omega} + \widehat{\phi} = 2 \text{ L}$$$

$$'Ἄρα $\widehat{A} + \widehat{B} + \widehat{C} = 2 \text{ L}$$$



Σχ. 130

61. ΕΦΑΡΜΟΓΑΙ

61. 1. Ἀπὸ τὴν ἀνωτέρω πρότασιν συνάγομεν ὅτι:

α) Αἱ δξεῖαι γωνίαι δρθογωνίου τριγώνου εἶναι συμπληρωματικαί.

β) "Ἐν τρίγωνον δύναται νὰ ἔχῃ μίαν δρθήν ἢ μίαν ἀμβλεῖαν γωνίαν. αἱ ἄλλαι δύο εἶναι δξεῖαι.


61. 2. Ἐξωτερικὴ γωνία τριγώνου

Σχεδιάζομεν ἐν τρίγωνον ABC , σχ. 131 καὶ προεκτείνομεν μίαν πλευράν αὐτοῦ, π.χ. τὴν AB , κατὰ τὴν ἡμιευθείαν AM ἀντίθετον τῆς AB . Ἡ γωνία $\Gamma AM = \omega$ εἶναι ἐφεξῆς παραπληρωματικὴ τῆς γωνίας A καὶ λέγεται ἐξ ὁ τερικὴ γωνία τοῦ τριγώνου ABG εἰς τὴν κορυφὴν A . Κατὰ τὸν δρισμὸν αὐτὸν τὸ τρίγωνον ABG ἔχει ἔξ (6) ἐξωτερικὰς γωνίας (Ποίας;).

Θὰ συγκρίνωμεν κατωτέρω τὴν ἐξωτερικὴν γωνίαν ω , σχ. 131, μὲ τὸ

άθροισμα τῶν γωνιῶν B καὶ G . "Ἄς φέρωμεν ἐκ τοῦ A ἡμιευθεῖαν AZ παράλληλον πρὸς τὴν BG . Παρατηροῦμεν ὅτι :

$$\begin{array}{l} \text{ΑΖ} \parallel \text{ΒΓ} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \widehat{B} = \widehat{\omega}_1 \\ \widehat{G} = \widehat{\omega}_2 \end{array} \right. \\ \text{"Αρα"} \qquad \qquad \widehat{B} + \widehat{G} = \widehat{\omega}_1 + \widehat{\omega}_2 \\ \text{ή} \qquad \qquad \qquad \widehat{\omega} = \widehat{B} + \widehat{G} \end{array}$$



Σχ. 131


"Ωστε : 'Εκάστη ἔξωτερική γωνία τριγώνου ισοῦται μὲ τὸ άθροισμα τῶν δύο ἀπέναντι γωνιῶν αὐτοῦ.

Σημείωσις


'Απὸ τὴν ἀνωτέρω πρότασιν συμπεραίνομεν ὅτι: 'Εκάστη ἔξωτερική γωνία τριγώνου εἶναι μεγαλυτέρα ἀπὸ ἑκάστην ἀπέναντι αὐτῆς ἔσωτερικήν.

61. 3. Έφαρμογαὶ εἰς τὴν κατασκευὴν γωνιῶν.


- i) Εάν κατασκευάσωμεν ἐν δρθιογώνιον καὶ ισοσκελὲς τρίγωνον, θὰ ἔχωμεν γωνίας 45° καὶ 135° , (σχ. 132). (Διατί;)
- ii) Εάν κατασκευάσωμεν ἐν ισόπλευρον τρίγωνον, σχ. 133, θὰ ἔχωμεν γωνίας 60° καὶ 120° . (Διατί;).
- iii) Εάν εἰς τὸ ισόπλευρον τρίγωνον, σχ. 134, φέρωμεν ἐν ὑψὸς, π.χ. τὸ ΔD , θὰ ἔχωμεν γωνίας 60° , 30° καὶ 150° . (Διατί;)



Σχ. 132



Σχ. 133



Σχ. 134

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

135. Νὰ ὑπολογισθοῦν αἱ γωνίαι ισοσκελοῦς τριγώνου, ἐὰν μία ἀπὸ τὰς ἵσταις γωνίαις εἶναι 52° .

136. Νὰ ὑπολογισθοῦν αἱ γωνίαι ισοσκελοῦς τριγώνου, ἐὰν ἡ γωνία τῆς κορυφῆς τῶν ίσων πλευρῶν εἶναι 70° .

137. Νὰ ὑπολογισθοῦν αἱ γωνίαι δρθιογωνίου τριγώνου, δταν ἡ διαφορὰ δύο ἐξ αὐτῶν εἶναι 20° . (Διακρίνατε περιπτώσεις).

138. Νά ύπολογισθοῦν αἱ γωνίαι δρθιγωνίου τριγώνου, δταν ἡ μία γωνία του εἶναι τριπλασία μιᾶς ἀλλης. (Δύο περιπτώσεις).

139. Εἰς τρίγωνον $AB\Gamma$ εἶναι $A=50^\circ$, $\Gamma=55^\circ$. Νά ύπολογισθοῦν αἱ ἔξωτερικαὶ γωνίαι αὐτοῦ.

140. Εἰς τρίγωνον $AB\Gamma$ εἶναι $B=50^\circ$, $\Gamma=80^\circ$. Νά ύπολογισθῇ ἡ γωνία A , καθὼς καὶ ἡ γωνία τῶν διχοτόμων τῶν γωνιῶν B καὶ Γ αὐτοῦ.

141. Δύο τρίγωνα $AB\Gamma$ καὶ $A'B'\Gamma'$, ἔχουν $\widehat{A}=\widehat{A'}$ καὶ $\widehat{B}=\widehat{B'}$. Συγκρίνατε τὰς γωνίας Γ καὶ Γ' .

142. "Εν τρίγωνον ἔχει δύο γωνίας ἵσας τὴν δὲ ἀλλην μεγαλυτέραν ἐκάστης τούτων κατὰ 30° . Νά ύπολογισθοῦν αἱ γωνίαι τοῦ τριγώνου τούτου.

62. ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΓΩΝΙΩΝ ΚΥΡΤΟΥ* ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ

Διὰ νὰ εὔρωμεν τὸ ἀθροισμα τῶν γωνιῶν τοῦ κυρτοῦ ἐξαγώνου $AB\Gamma\Delta E Z$ σχ. 135, σκεπτόμεθα ὡς ἔξῆς :

"Ἐὰν χωρίσωμεν τὸ πολύγωνον εἰς τρίγωνα διὰ τῶν διαγωνίων, αἱ δόποιαι ὅγονται ἀπὸ μίαν κορυφὴν αὐτοῦ, τότε τὸ ἀθροισμα τῶν γωνιῶν τῶν τριγώνων αὐτῶν θὰ εἶναι τὸ ἀθροισμα τῶν γωνιῶν τοῦ πολυγώνου. Φέρομεν λοιπὸν δλας τὰς διαγωνίους ἀπὸ τὴν κορυφὴν A . "Ητοι τὰς διαγωνίους $A\Gamma$, $A\Delta$, AE .

Σχηματίζονται 4 τρίγωνα. "Ητοι τόσα τρίγωνα, δσος ὁ ἀριθμὸς τῶν πλευρῶν τοῦ πολυγώνου πλὴν 2.

Συνεπῶς : τὸ ἀθροισμα τῶν γωνιῶν κυρτοῦ ἐξαγώνου = $4 \cdot 2$ δρθάς. "Εργαζόμενοι μὲ δύοιον τρόπον εἰς διάφορα κυρτὰ πολύγωνα σχηματίζομεν τὸν ἀκόλουθον πίνακα.

*Ἀριθμὸς πλευρῶν	*Ἀριθμὸς τριγώνων	*Ἀθροισμα γωνιῶν τῶν τριγώνων εἰς δρθάς	*Ἀθροισμα γωνιῶν πολυγώνου εἰς δρθάς
4	4-2	(4-2)·2	4
5	5-2	(5-2)·2	6
6	6-2	(6-2)·2	8
...
n	$n-2$	$(n-2) \cdot 2$	$2 \cdot (n-2)$

"Ωστε : Τὸ ἀθροισμα Σ τῶν γωνιῶν κυρτοῦ πολυγώνου ν πλευρῶν εἶναι ἵσον μὲ $2 \cdot (n-2)$ δρθάς γωνίας.

$$\Sigma = 2 \cdot (n-2) \text{ δρθάλ}$$

* "Εν πολύγωνον λέγεται κυρτὸν δταν ἡ εύθετα ἐκάστης πλευρᾶς αὐτοῦ ἀφήνῃ τὸ πολύγωνον πρὸς τὸ αὐτό μέρος αὐτῆς.


ΑΣΚΗΣΕΙΣ

142. Νὰ ὑπολογισθῇ τὸ ἄθροισμα τῶν γωνιῶν ἐνὸς κυρτοῦ:
α) 14/γώνου, β) 16/γώνου, γ) 50/γώνου.
143. Νὰ εὐρεθῇ ὁ ἀριθμὸς τῶν πλευρῶν ἐνὸς κυρτοῦ πολυγώνου, τοῦ ὅποιου τὸ ἄθροισμα τῶν γωνιῶν είναι ίσον μὲ 60L.
144. "Ἐν κυρτὸν πολύγωνον ἔχει ἄθροισμα γωνιῶν ίσον μὲ 10 ὀρθᾶς. Νὰ εὕρετε ἐκάστην τῶν γωνιῶν αὐτοῦ ἐὰν γνωρίζετε ὅτι αὐταὶ εἰναι ὅλαι ίσαι.

63. ΤΕΤΡΑΠΛΕΥΡΑ

Πολλάς εἰκόνας τετραπλεύρων διακρίνομεν εἰς τὸ περιβάλλον μας, πολλά δὲ καὶ γνωστά τὰ γεωμετρικά στερεά ἔχουν ὡς ἔδρας των τετράπλευρα.

Εἰς τὸ σχ. 136 ἔχομεν σχεδιάσει διάφορα ἕιδη τετραπλεύρων. Τὸ (α) εἶναι



Σχ. 136

ἐν τυχόν κυρτὸν τετράπλευρον ἐνῷ τὸ (β) ἐν μὴ κυρτὸν τετράπλευρον.

Τὸ (γ), ἔχει δύο μόνον πλευράς παραλλήλους καὶ ὀνομάζεται δι' αὐτὸ τραπέζιον.

Τὸ (δ) ἔχει καὶ τὰ δύο ζεύγη τῶν ἀπέναντι πλευρῶν παράλληλα καὶ ὀνομάζεται δι' αὐτὸ παραλλήληγραμμον.

Κατωτέρω θὰ ἔξετάσωμεν μόνον κυρτὰ τετράπλευρα.

64. ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΑ

Χαράσσομεν δύο παραλλήλους εύθειας, $\alpha \parallel \alpha'$ καὶ ἔπειτα ἄλλας δύο παραλλήλους, $\beta \parallel \beta'$, αἱ ὅποιαι νὰ τέμνουν τὰς πρώτας, σχ. 137. Ὁρίζεται τότε τετράπλευρον $AB\Gamma\Delta$, τὸ ὅποιον ἔχει τὰς ἀπέναντι πλευράς παραλλήλους. "Ητοι είναι παραλληλόγραμμον."


$$AB\Gamma\Delta \text{ παραλ/μον} \iff AB \parallel \Gamma\Delta \text{ καὶ } B\Gamma \parallel A\Delta$$

65. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΩΝ

65. 1. Μὲ τὰ δργανά σας ἔξετάσσατε:

Τὰς ἀπέναντι πλευράς, τὰς ἀπέναντι γωνίας,

τὴν χαρακτηριστικὴν θέσιν τοῦ σημείου τοῦ α' μῆς τῶν διαγωνίων ἐνὸς παραλληλογράμμου. Τὶ παρατηρεῖτε;



Σχ. 137

65. 2. 'Ως γνωστὸν ἔκαστον σῆμεῖον τῆς μεσοπαραλλήλου ϵ_1 τῶν δύο παραλλήλων εὐθείῶν AB , $ΓΔ$ εἶναι κέντρον συμμετρίας τοῦ σχήματος αὐτῶν. Τὸ αὐτὸ διχοτόμει καὶ διὰ τὰ σημεῖα τῆς μεσοπαραλλήλου ϵ_2 τῶν $ΑΔ$ καὶ $ΒΓ$.

"Ἄσ συγκεντρώσωμεν τὴν προσοχήν μας εἰς τὴν συμμετρίαν ως πρὸς τὴν τομήν $Ο$ τῶν ϵ_1 καὶ ϵ_2 , σχ. 137.

Παρατηροῦμεν διτι:

'Ομάλογος τῆς εὐθείας $α$ εἶναι ἡ εὐθεία $α'$.

'Ομάλογος τῆς εὐθείας $β$ εἶναι ἡ εὐθεία $β'$.

"Ἄρα διμόλογον τῆς τομῆς A τῶν $α$, $β$ εἶναι ἡ τομὴ $Γ$ τῶν $α'$, $β'$.

'Ομοίως εύρισκομεν διτι: διμόλογον τοῦ B εἶναι τὸ $Δ$

$$A \rightleftarrows Γ \text{ καὶ } B \rightleftarrows Δ$$

"Ητοι: α) Τὸ O εἶναι κέντρον συμμετρίας τοῦ παραλληλογράμμου.

β) 'Εκάστη διαγώνιος ἔχει τὰ ἄκρα της συμμετρικά. Συνεπῶς διέρχεται διὰ τοῦ κέντρου συμμετρίας καὶ διχοτομεῖται ὑπ' αὐτοῦ.

γ) Τὰ ἄκρα τῆς πλευρᾶς AB εἶναι συμμετρικά τῶν ἄκρων τῆς ἀπέναντι πλευρᾶς αὐτῆς $ΓΔ$. Διὰ τοῦτο $AB=ΓΔ$

'Ομοίως συνάγομεν διτι καὶ $ΑΔ=ΒΓ$

δ) 'Ανὰ δύο αἱ ἀπέναντι γωνίαι εἶναι διμόλογοι. (Διατί;). "Ἄρα καὶ ἔσαι.

$$\widehat{Α}=\widehat{Γ} \text{ καὶ } \widehat{Β}=\widehat{Δ}$$

"Ωστε εἰς τὸ παραλληλόγραμμον:

- 1. Αἱ ἀπέναντι πλευραὶ εἶναι ἔσαι.
- 2. Αἱ ἀπέναντι γωνίαι εἶναι ἔσαι.
- 3. 'Εκάστη διαγώνιος διχοτομεῖ τὴν ἄλλην.

65. 3. "Άλλοι τρόποι κατασκευῆς παραλληλογράμμου

α) Χαράσσομεν δύο εὐθείας ϵ_1 , ϵ_2 , τεμνομένας εἰς τὸ σημεῖον O . "Επειτα ἐπὶ τῆς μιᾶς τούτων, π.χ. τῆς ϵ_1 , λαμβάνομεν δύο ἔσαι τμήματα τὰ $OA=ΟΓ$ ἐπὶ δὲ τῆς ἄλλης, τῆς ϵ_2 , ἐπίστης δύο ἔσαι μεταξύ των τμήματα $OB=ΟΔ$. καὶ σχηματίζομεν τὸ τετράπλευρον $ABΓΔ$, σχ. 138. "Ητοι ἔν τετράπλευρον τοῦ ὅποιου αἱ διαγώνιοι διχοτομοῦνται.

Μὲ παραλληλον μετατόπισιν διαπιστώνομεν διτι αἱ ἀπέναντι πλευραὶ αὐτοῦ εἶναι παράλληλοι.

"Ητοι: $AB||ΓΔ$ καὶ $ΒΓ||ΑΔ$.

Συνεπῶς τὸ τετράπλευρον $ABΓΔ$ εἶναι παραλληλόγραμμον.

Εις τὸ αὐτὸ διποτέλεσμα καταλήγομεν καὶ διὰ τῆς συμμετρίας ὡς πρὸς κέντρον τὸ Ο.

Πράγματι εἰς τὴν συμμετρίαν αὐτὴν παρατηροῦμεν δτὶ ἡ κορυφὴ Γ εἶναι δύμόλογος τῆς κορυφῆς Α καὶ ἡ κορυφὴ Δ τῆς κορυφῆς Β. Συνεπῶς καὶ αἱ πλευραὶ ΑΒ καὶ ΓΔ εἶναι δύμόλογοι ἕστα ἔσται καὶ παράλληλοι. Όμοιως εὑρίσκομεν δτὶ καὶ αἱ πλευραὶ ΑΔ καὶ ΒΓ εἶναι ἔσται καὶ παράλληλοι.


“Ωστε: ‘Ἐὰν αἱ διαγώνιοι τετραπλεύρου διχοτομοῦνται, τοῦτο εἶναι παραλληλόγραμμον.’

β) Χαράσσομεν δύο εύθειας ϵ_1 , ϵ_2 παραλλήλους καὶ λαμβάνομεν ἐπ’ αὐτῶν δύο ἔστα τμήματα. $AB = \Gamma\Delta$, σχ. 139. Τοιουτοτρόπως δρίζομεν τὸ κυρτὸν τετράπλευρον $AB\Gamma\Delta$ τοῦ ὅποιου δύο ἀπέναντι πλευραί, αἱ AB , $\Gamma\Delta$ εἶναι ἔσται καὶ παράλληλοι.


Μὲ παράλληλον μετατόπισιν δυνάμεθα νὰ διαπιστώσωμεν δτὶ καὶ αἱ ἄλλαι δύο ἀπέναντι πλευραὶ $A\Delta$ καὶ $B\Gamma$ εἶναι μεταξύ των παράλληλοι. Έπομένως τὸ τετράπλευρον $AB\Gamma\Delta$ εἶναι παραλληλόγραμμον.

“Ωστε: ‘Ἐὰν κυρτὸν τετράπλευρον ἔχῃ δύο ἀπέναντι πλευράς ἔσται καὶ παραλλήλους, θὰ εἶναι παραλληλόγραμμον.’

Σημείωσις: “Ἐν ὑλικὸν ἀρθρωτὸν παραλληλογράμμον (μοντέλον), μὲ πλευράς ἀπὸ διάτρητα ἐλάσματα καὶ διαγώνιους ἀπὸ ἐλαστικά τήματα, σχ. 140, θὰ μᾶς βοηθήσῃ νὰ κατανοήσωμεν τὰς ἀνωτέρω Ιδιότητας.



Σχ. 140



Σχ. 139

145. Ενὸς παραλληλογράμμου ἡ μία γωνία εἶναι 75° . Νὰ ύπολογισθοῦν αἱ ἄλλαι τρεῖς γωνίαι αὐτοῦ.

146. Παραλληλογράμμου ἡ περίμετρος ἔχει μῆκος 20 cm , μία δὲ πλευρά αὐτοῦ ἔχει μῆκος 4 cm . Νὰ ύπολογισθοῦν τὰ μῆκη τῶν ἄλλων πλευρῶν.

147. Νὰ κατασκευασθῇ παραλληλόγραμμον μὲ μῆκη διαγώνιων 4 cm καὶ 6 cm . Πόσας λύσεις ἔχει τὸ πρόβλημα;

148. “Ἐὰν M , N εἶναι τὰ μέσα τῶν ἀπέναντι πλευρῶν AB , $\Gamma\Delta$ παραλληλογράμμου $AB\Gamma\Delta$, νὰ ἔχεταστε, ἐάν τὸ $AMND$ εἶναι παραλληλόγραμμον.

149. Χαράστε ἐν εὐθ. τμῆμα τὸ ὅποιον νὰ διέρχεται ἀπὸ τὸ κέντρον συμμετρίας παραλληλογράμμου καὶ νὰ περατοῦται εἰς δύο ἀπέναντι πλευράς αὐτοῦ. Μήπως τὸ κέντρον ο τοῦ παραλληλογράμμου διχοτομεῖ τὸ τμῆμα τοῦτο; Δικαιολογήσατε τὴν ἀπάντησίν σας.


150. Νὰ ύπολογίσετε τὰς γωνίας παραλληλογράμμου, ἐάν γνωρίζετε δτὶ ἡ μία ἀπὸ αὐτὰς εἶναι διπλασία μιᾶς ἀλλής.

Πάνω προτείνεται γραμμή της ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΑ οπότε έτσι στην αγριότερη πολύτελη θέση η παραλληλόγραμμη γραμμή μετατρέπεται σε γραμμή παραλληλογράμμου. Η διαδικασία αυτή είναι παραπομπή στην ίδια γραμμή της παραλληλόγραμμης.

66. ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟΝ

66. 1. Όρισμός

"Ας κατασκευάσωμεν ἐν παραλληλόγραμμον μὲ μίαν γωνίαν δρθήν. Πρὸς τοῦτο κατασκευάζομεν μίαν δρθήν γωνίαν χΑψ καὶ ἔπειτα φέρομεν :



Σχ. 141

α) Ἀπὸ ἐν σημεῖον B τῆς Αχ τὴν παράλληλον πρὸς τὴν Αψ.

β) Ἀπὸ ἐν σημεῖον Δ τῆς Αψ τὴν παράλληλον πρὸς τὴν Αχ.

Τοιουτορόπως δρίζεται τὸ παραλληλόγραμμον ΑΒΓΔ, σχ. 141, τὸ δόποιον ἔχει τὴν γωνίαν Α δρθήν. Ας προσέξωμεν δύο διαδοχικάς γωνίας αὐτοῦ, π.χ. τὰς γωνίας Α καὶ Δ. Αὗται εἰναι παραπληρωματικαὶ

$$\widehat{A} + \widehat{D} = 2 \text{ δρθαί (Διατί!)}.$$

'Επειδὴ δὲ $\widehat{A} = 1$ δρθή θά εἰναι καὶ $\widehat{D} = 1$ δρθή. Ομοίως εύρισκομεν ὅτι καὶ $\widehat{B} = 1$ δρθή καὶ $\widehat{G} = 1$ δρθή.

"Ωστε : "Εὰν ἐν παραλληλόγραμμον ἔχῃ μίαν γωνίαν δρθήν θά ἔχῃ καὶ τὰς ἄλλας γωνίας αὐτοῦ δρθάς.

Τὸ παραλληλόγραμμον τοῦ δόποιου αἱ γωνίαι εἰναι δρθαὶ λέγεται δρθογώνιον παραλληλόγραμμον.

Όρθογώνιον παραλ/μον \iff παραλ/μον μὲ δλας τὰς γωνίας δρθάς

66. 2. Ιδιότητες

Τὸ δρθογώνιον ὡς παραλληλόγραμμον ἔχει δλας τὰς Ιδιότητας αύτοῦ. Μὲ τὰ δργανά μας καὶ μὲ συλλογίσμονς δυνάμεθα νὰ εύρωμεν καὶ ἄλλας.

α) Αξονες σύμμετριας.

"Ας διπλώσωμεν τὸ δρθογώνιον περὶ τὴν μεσοπαράλληλον μ₁ τῶν ΑΔ καὶ ΒΓ, σχ. 141.

"Η κορυφὴ Α θὰ συμπέσῃ μὲ τὴν κορυφὴν Β καὶ ἡ κορυφὴ Δ μὲ τὴν κορυφὴν Γ. "Ητοι εἰς τὴν $\Sigma(\mu_1)$ αἱ κορυφαὶ Α καὶ Δ εἰναι ὁμόλογοι τῶν κορυφῶν Β καὶ Γ ἀντιστοίχως. Συνεπῶς τὸ δρθογώνιον ΑΒΓΔ εἰναι ὁμόλογον πρὸς ἑαυτό. Τοῦτο σημαίνει ὅτι ἡ μ₁ εἰναι ἀξων συμμετρίας τοῦ δρθογωνίου ΑΒΓΔ.

"Ομοίως εύρισκομεν ὅτι καὶ ἡ μ₂ εἰναι ἀξων συμμετρίας αύτοῦ.

β) Ισότης διαγωνίων

Εις τὴν $\Sigma(\mu_1)$ ἡ εἰς τὴν $\Sigma(\mu_2)$, ἐκάστη διαγώνιος εἶναι ὀμόλογος τῆς ἄλλης. (Διατί;) "Ητοι αἱ διαγώνιοι εἶναι ἵσαι.

"Ωστε: Εἰς τὸ δρθιογώνιον :

1. Ὑπάρχουν δύο ἄξονες συμμετρίας. Εἶναι αἱ μεσοπαράλληλοι τῶν ἀπέναντι πλευρῶν αὐτοῦ.

2. Αἱ διαγώνιοι εἶναι ἵσαι.

γ) Παραλληλόγραμμον μὲν ἵσας διαγωνίους.


Ἐπὶ δύο εὐθειῶν ϵ_1, ϵ_2 τεμνομένων εἰς τὸ σημεῖον Ο, λαμβάνομεν ἵσα τμήματα: $OA=OB=OG=OD$, σχ. 142

Τοιουτορόπτως δρίζεται ἐν παραλληλόγραμμον $AB\Gamma\Delta$ μὲ τὰς διαγώνιους αὐτοῦ ἵσας. Μὲ τὸν γνώμονά μας διαπιστώνομεν ὅτι τὸ παραλληλόγραμμον τοῦτο εἶναι δρθιογώνιον.

"Ωστε: Ἐὰν παραλληλόγραμμον ἔχῃ τὰς διαγωνίους ἵσας, εἶναι δρθιογώνιον.

Σημείωσις

Μὲ ἐν δρθωτὸν παραλληλόγραμμον μὲ διαγωνίους ἀπὸ ἔλαστικά νήματα, δυνάμεθα νὰ διαπιστώσωμεν ὅτι, ὅταν αἱ διαγώνιοι γίνωνται ἵσαι, τότε τὸ παραλληλόγραμμον γίνεται δρθιογώνιον.



Σχ. 142

67. ΜΙΑ ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

67. 1. Σχεδιάστε ἐν δρθιογώνιον τρίγωνον $AB\Gamma$ καὶ συγκρίνατε τὴν ὑποτείνουσαν $B\Gamma$ μὲ τὴν διάμεσον AM . Τὶ παρατηρεῖτε;


Εἶναι: $AM=BG/2$

"Η παρατήρησις αὕτη μᾶς δύνηγε εἰς τὴν ἔξτην πρότασιν, ἡ ὁποία ἴσχύει εἰς δλα τὰ δρθιογώνια τρίγωνα τοῦ σχεδίου ἢ τῆς γεωμετρίας.

Εἰς τὸ δρθιογώνιον τρίγωνον ἡ διάμεσος πρὸς τὴν ὑποτείνουσαν ἰσοῦται μὲ τὸ ἥμισυ αὐτῆς.

"Ιδοὺ πῶς δυνάμεθα νὰ δικαιολογήσωμεν τὴν πρότασιν αὐτήν.

Εἰς τὸ τρίγωνον $AB\Gamma$ ($A=IL$) τοῦ σχ. 143, ἔχομεν προεκτείνει τὴν διάμεσον AM μέχρι τοῦ σημείου Δ , συμμετρικοῦ τοῦ A ὡς πρὸς τὸ μέσον M τῆς $B\Gamma$.



Σχ. 143

"Ἐὰν προσέξωμεν εἰς τὸ τετράπλευρον $AB\Delta\Gamma$, παρατηροῦμεν ὅτι:

$$BM=MG \text{ καὶ } AM=MD$$

"Ητοι τοῦ τετραπλέυρου $AB\Delta\Gamma$ αἱ διαγώνιοι διχοτομοῦνται, εἶναι δηλαδὴ τοῦτο παραλληλόγραμμον. Ἐπειδὴ δὲ καὶ $\widehat{A}=IL$, εἶναι δρθιογώνιον.

"Ἄρα: $AD=BG$ ἢ $AM=BG/2$

67. 2. Άς κατασκευάσωμεν ἐν ἴσοσκελὲς τρίγωνον AMB καὶ ἄς προεκτείνωμεν τὴν πλευρὰν BM κατὰ τμῆμα $MG=MB$, σχ. 143.

Τοιουτοτρόπως δρίζεται τὸ τρίγωνον $ABΓ$, τοῦ ὅποιού ἡ AM εἶναι διάμεσος καὶ ἴσοῦται μὲ τὸ ἥμισυ τῆς $BΓ$.

$$AM=BG/2$$

$$BM=GM$$

Μὲ τὸν γνώμονά μας εἶναι εύκολον νὰ διαπιστώσωμεν ὅτι

$$\widehat{BAG}=1L$$

Εἰς τὸ αὐτὸ ἀποτέλεσμα καταλήγομεν καὶ ὡς ἔξῆς :

Προεκτείγομεν τὴν διάμεσον AM τοῦ τριγώνου $ABΓ$ κατὰ τμῆμα $MΔ=MA$ καὶ χαράσσομεν τὰ εὐθύγρ. τμήματα $ΔΓ$ καὶ $ΔB$.

Άς προσέξωμεν τὸ τετράπλευρον $ABΔΓ$.


Εἶναι : $\begin{cases} AM=MΔ \\ BM=MG \end{cases}$ καὶ $AM=BG/2$ ἢ $AΔ=BΓ$

Ἡτοι αἱ διαγώνιοι τοῦ τετραπλεύρου $ABΔΓ$ διχοτομοῦνται καὶ εἶναι ἵσαι. Άρα εἶναι δρθιγώγιον. Συνεπῶς $\widehat{A}=1L$.

Ἐὰν εἰς τρίγωνον μία διάμεσος ἴσοῦται πρὸς τὸ ἥμισυ τῆς πλευρᾶς τὴν ὅποιαν διχοτομεῖ, τὸ τρίγωνον θὰ εἶναι δρθιγώνιον μὲ ὑποτείνουσαν τὴν πλευράν αὐτήν.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

151. Ἐξηγήσατε πῶς διὰ τῆς διατάξεως τοῦ παραπλεύρως σχεδίου ὑπολογίζεται ἡ ἀπόστασις AB , σχ. 144;




Σχ. 144

152. Μία διαγώνιος δρθιγώνιον παραλληλογράμμου σχηματίζει μὲ μίαν πλευρὰν αὐτοῦ γωνίαν 50° . Νὰ υπολογισθοῦν αἱ ὅλαις γωνίαι, τὰς ὅποιας σχηματίζουν αἱ διαγώνιοι μὲ τὰς πλευρὰς τοῦ δρθιγώνιου.

153. Νὰ υπολογισθοῦν αἱ γωνίαι τῶν διαγωνίων τοῦ δρθιγώνιου παραλληλογράμμου τῆς προηγουμένης ἀσκήσεως.

154. Τὸ κυρτὸν τετράπλευρον, τὸ ὅποιον ἔχει διαγωνίους δύο διαμέτρους κύκλου, εἶναι δρθιγώνιον (διατί;).

155. Νὰ χαράξετε δρθιγώνιον παραλληλόγραμμον μὲ μίαν διαγώνιον 5 cm καὶ μὲ μίαν γωνίαν διαγωνίων 60° .



68. ΡΟΜΒΟΣ

68. 1. Ἐπὶ τῶν πλευρῶν γωνίας χΑψ λαμβάνομεν ἵσα τμήματα $AB=AD$, (σχ. 145) καὶ ἐκ τῶν σημείων B , D φέρομεν παραλλήλους πρὸς τὰς πλευρὰς τῆς γωνίας. Τοιουτοτρόπως σχηματίζεται ἐν παραλληλόγραμμον $ABΓΔ$ τὸ ὅποιον ἔχει $AB=AD$. Ἐὰν δὲ σκεφθῶμεν ὅτι : $AB=ΓΔ$ καὶ $AΔ=BΓ$ εύρισκομεν ὅτι $AB=AD=ΔΓ=ΓB$

Σχ. 145

"Ητοι : Ἐάν ἔν παραλληλόγραμμον ἔχῃ δύο διαδοχικάς πλευράς ίσας
θά ἔλας τάς πλευράς ίσας.

Τὸ παραλληλόγραμμον τοῦ δποίου ὅλαι αἱ πλευραὶ εἰναι ίσαι, λέγεται ρόμβος.

Ρόμβος \Leftrightarrow παραλ/μον μὲ δλας τάς πλευράς ίσας

68. 2. Ιδιότητες

Ο ρόμβος, δπως καὶ τὸ δρθογώνιον, ὡς παραλληλόγραμμον ἔχει ὅλας τάς ιδιότητας αύτοῦ. "Ἔχει ὅμως καὶ ἄλλας.

Μὲ τὰ δργανά μας καὶ μὲ διπλώσεις περὶ τάς εύθειας τῶν διαγωνίων εύρισκομεν δτι :

- Αἱ εύθειαι τῶν διαγωνίων ρόμβου εἰναι ἀξονες συμμετρίας αύτοῦ.
- Αἱ διαγώνιοι ρόμβου τέμνονται καθέτως. Ἐκάστη δὲ διχοτομεῖ δύο ἀπέναντι γωνιας αύτοῦ.

Τάς ἀνωτέρω ιδιότητας δυνάμεθα νὰ τάς δικαίολγήσωμεν ὡς ἔξῆς :

$AB=AD \Rightarrow$ Α κεῖται ἐπὶ τῆς μεσοκαθέτου τοῦ ΒΔ.

$GB=\Gamma D \Rightarrow$ Γ κεῖται ἐπὶ τῆς μεσοκαθέτου τοῦ ΒΔ.

"Ητοι ή εύθεια ΑΓ είναι μεσοκαθέτος τοῦ ΒΔ, συνεπῶς καὶ ἀξων συμμετρίας αύτοῦ.

Εἰς τὴν συμμετρίαν ὡς πρὸς τὴν εύθειαν ΑΓ αἱ μὲν κορυφαὶ Α, Γ ἀντιστοιχοῦν εἰς ἑαυτάς ($A \longleftrightarrow A$, $G \longleftrightarrow G$) αἱ δὲ κορυφαὶ Β, Δ πρὸς ὀλλήλας ($B \longleftrightarrow D$). (Διατι;) ;


Συνεπῶς ή εύθεια ΑΓ είναι ἀξων συμμετρίας καὶ τοῦ ρόμβου. Διὰ τοῦτο είναι καὶ διχοτόμος τῶν ἀπέναντι γωνιῶν Α καὶ Γ αύτοῦ.

69. ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΝ

69. 1. Όρισμὸς

Σχῆμα τετραγώνου ἔχουν αἱ ἔδραι κύβου.

Διὰ νὰ κατασκευάσωμεν ἔν τετράγωνον χαράσσομεν μίαν δρθήν γωνίαν χΑψ καὶ ἐπὶ τῶν πλευρῶν τῆς λαμβάνομεν ίσα τμήματα $AB=AD$, σχ. 146. Εἰς τὰ σημεῖα Β καὶ Δ χαράσσομεν καθέτους πρὸς τὰς Αχ καὶ Αψ ἀντιστοιχως. Τὸ τετράπλευρον $AB\Gamma\Delta$ είναι δρθογώνιον καὶ ρόμβος, λέγεται δὲ τετράγωνον.



Σχ. 146

τετράγωνον \Leftrightarrow δρθογώνιον καὶ ρόμβος

69. 2. Ιδιότητες


Τὸ τετράγωνον ὡς δρθογώνιον καὶ ρόμβος ἔχει ὅλας τάς ιδιότητας τῶν δύο αὐτῶν σχημάτων. "Ητοι ἔχει :

"Ολας τάς πλευράς ίσας καὶ τάς διαγώνιους ίσας, τεμνομένας δίχα, καθέτως καὶ διχοτόμους τῶν γωνιῶν αὐτοῦ.


Τὸ τετράγωνον ἔχει τέσσαρας ὅξονας συμμετρίας. Οἱ δύο εἰναι φορεῖς τῶν διαγώνιων (ϵ_1, ϵ_2) καὶ οἱ ἄλλοι δύο (ϵ_3, ϵ_4) εἰναι αἱ μεσοπαράλληλοι τῶν εὔθειῶν τῶν ἀπέναντι πλευρῶν αὐτοῦ.

69. 3. Παρατήρησις

Τὰς σχέσεις μεταξὺ τῶν παραλληλογράμμων (Π) τῶν δρθιογωνίων (Ο), ρόμβων (Ρ), καὶ τῶν τετραγώνων (Τ) δυνάμεθα νὰ τὰς παραστήσωμεν γραφικῶς μὲ τὸ διάγραμμα τοῦ σχ. 148. Ἐξηγήσατε καὶ δικαιολογήσατε τὰς σχετικὰς θέσεις τῶν συνόλων αὐτῶν.



Σχ. 148



Σχ. 147

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

156. Κατασκευάστε δύο ίσα ισοσκελῆ τρίγωνα καὶ ἐπειτα μὲ αὐτὰ ἓνα ρόμβον.

157. Μία διαγώνιος ρόμβου σχηματίζει μὲ μίαν πλευρὰν αὐτοῦ γωνίαν 40° . Νὰ υπολογισθοῦν αἱ γωνίαι τοῦ ρόμβου.

158. Νὰ κατασκευάστε ρόμβον μὲ διαγωνίους 6 cm, 8 cm.

159. Νὰ κατασκευάστε 4 ίσα δρθιογώνια καὶ ισοσκελῆ τρίγωνα κι' ἐπειτα μὲ αὐτὰ ἓν τετράγωνον.

160. Νὰ κατασκευάστε ἓν τετράγωνον μὲ περίμετρον 16 cm.


161. Ἐν τετράπλευρον, τὸ ὅποιον ἔχει διαγώνιους δύο καθέτους διαμέτρους κύκλου, εἰναι τετράγωνον;

70. ΤΡΑΠΕΖΙΟΝ

70. 1. Ὁρισμὸς

Χαράσσομεν δύο εὐθείας παραλλήλους $\epsilon_1 || \epsilon_2$ καὶ δύο ἄλλας (μὴ παραλλήλους) τὰς αὶ καὶ β. Αὗται τέμνουν τὰς δύο πρώτας εἰς τὰ σημεῖα Α, Δ, Β, Γ, σχ. 149.

Τὸ τετράπλευρον ΑΒΓΔ ἔχει παραλλήλους μόνον τὰς δύο ἀπέναντι πλευράς αὐτοῦ ΑΒ καὶ ΓΔ· λέγεται δὲ τραπέζιον.



Σχ. 149

Γενικῶς : "Ἐκαστον τετράπλευρον, τὸ ὅποιον ἔχει τὰς δύο πλευράς αὐτοῦ παραλλήλους καὶ τὰς ἄλλας δύο μὴ παραλλήλους, λέγεται τραπέζιον.

Αἱ δύο παραλλήλοι πλευραὶ (ΑΒ || ΓΔ) εἰναι αἱ βάσεις τοῦ τραπεζίου.

70. 2. Ιδιότητες

α) Εις τὸ τραπέζιον ΑΒΓΔ τοῦ σχ. 149 παρατηροῦμεν ὅτι αἱ γωνίαι αὐτοῦ Β καὶ Γ εἰναι ἐντὸς καὶ ἐπὶ τὰ αὐτὰ τῶν παραλλήλων ΑΒ, ΓΔ τεμνομένων ὑπὸ τῆς ΒΓ. Συνεπῶς εἶναι παραπληρωματικαῖ. Τὸ αὐτὸ ἰσχύει καὶ διὰ τὰς ἄλλας δύο γωνίας Α, Δ αὐτοῦ.

"Ωστε : Εἰς τὸ τραπέζιον αἱ βάσεις σχηματίζουν μὲ ἐκάστην ἐκ τῶν δύο ἄλλων πλευρῶν γωνίας παραπληρωματικάς.

β) Ἡ ἀνωτέρω πρότασις ἰσχύει καὶ ἀντιστρόφως. Πράγματι, ἐὰν εἰς ἐν κυρτόν τετράπλευρον ΑΒΓΔ δύο διαδοχικαὶ γωνίαι εἰναι παραπληρωματικαὶ ($\widehat{B} + \widehat{G} = 2\pi$), τότε θὰ πρέπει δύο πλευραὶ τῶν γωνιῶν αὐτῶν νὰ εἶναι παράλληλοι. (Διατί;) Συνεπῶς τὸ τετράπλευρον τοῦτο θὰ εἶναι τραπέζιον ἢ παραλληλόγραμμον.

"Ωστε : Ἐὰν δύο διαδοχικαὶ γωνίαι κυρτοῦ τετραπλεύρου εἶναι παραπληρωματικαὶ τοῦτο εἶναι τραπέζιον ἢ παραλληλόγραμμον.

γ) Καθὼς εἴδομεν εἰς τὴν § 48. 2. τὰ μέσα τῶν εὐθ. τμημάτων, τὰ ὅποια περατοῦνται εἰς τὰς παραλλήλους πλευράς ΑΒ, ΓΔ, σχ. 149, κείνται εἰς τὴν μεσοπαράλληλον τῶν παραλλήλων τούτων.

"Ητοι: Τὰ μέσα τῶν μὴ παραλλήλων πλευρῶν τραπεζίου καὶ τὰ τὰ μέσα τῶν διαγωνίων κείνται ἐπὶ τῆς μεσοπαραλλήλου τῶν βάσεων αὐτοῦ.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ


162. Εἰς ἐν τραπέζιον εἶναι δυνατὸν αἱ προσκείμεναι εἰς ἐκάστην τῶν μὴ παραλλήλων πλευρῶν αὐτοῦ γωνίαι νὰ εἶναι καὶ αἱ δύο δξεῖαι;

163. Κατασκευάσατε ἐν τραπέζιον ΑΒΓΔ, μὲ βάσεις ΑΒ, ΓΔ καὶ διχοτομήσατε τὰς γωνίας Β καὶ Γ αὐτοῦ. Νὰ υπολογίσετε τὰς γωνίας τῶν δύο τούτων διχοτόμων.

164. Κατασκευάσατε τραπέζιον ΑΒΓΔ, μὲ βάσεις ΑΒ, ΓΔ, ἐὰν γνωρίζετε ὅτι: $ΒΓ=3$ cm, $ΓΔ=6$ cm καὶ $Γ=120^\circ$.

71. ΙΣΟΤΗΣ ΤΡΙΓΩΝΩΝ

71. 1. Ὡς γνωστόν, ἐὰν ἔχωμεν δύο ἵσα τρίγωνα, εἴτε μὲ ἀπλῆν ὀλίσθησιν εἴτε μὲ ὀλίσθησιν καὶ ἀναστροφὴν τοῦ ἐνός, δυνάμεθα νὰ φέρωμεν αὐτὰ εἰς σύμπτωσιν. Τότε ἐκάστη πλευρὰ καὶ ἐκάστη γωνία τοῦ ἐνός ἐφαρμόζει εἰς μίαν πλευρὰν καὶ εἰς μίαν γωνίαν τοῦ ἄλλου. Ἐάν κατὰ τὴν σύμπτωσιν αὐτὴν ἡ κορυφὴ Α συμπίπτῃ μὲ τὴν A' , ἡ B μὲ τὴν B' καὶ ἡ G μὲ τὴν G' , σχ. 150, τότε θὰ ἔχωμεν τὰς ἔξης ἔξι ἰσότητας :



$$\begin{array}{lll} \widehat{A}=\widehat{A'} & \widehat{B}=\widehat{B'} & \widehat{G}=\widehat{G'} \\ B\Gamma=B'\Gamma' & A\Gamma=A'\Gamma' & AB=A'B' \end{array}$$

Ήτοι ή Ισότης δύο τριγώνων δρίζει μεταξύ τῶν γωνιῶν αὐτῶν μίαν ἀμφιμονοσήμαντον ἀντίστοιχον τοιαύτην ὥστε :

Αἱ ἀντίστοιχοι γωνίαι νὰ εἰναι ἵσαι
ἀπέναντι δὲ ἀπὸ τὰς ἵσας γωνίας κεῖνται ἵσαι πλευραί.

71. 2. Μέχρι τοῦτο ή ἔξακριβωσις τῆς Ισότητος δύο τριγώνων ἐγένετο δι' ἐπιθέσεως αὐτῶν. Γεννᾶται τὸ ἔρωτημα : Μήπως, ἐκ τῆς Ισότητος μερικῶν στοιχείων (πλευρῶν καὶ γωνιῶν) ἐνδὸς τριγώνου μὲ στοιχεῖα (πλευράς καὶ γωνίας) ἄλλου τριγώνου, δυνάμεθα νὰ συμπεράνω με τὴν Ισότητα τῶν τριγώνων τούτων;

Καθὼς θὰ ἴδωμεν κατωτέρω, ἐάν ἐκ τῶν 6 κυρίων στοιχείων ἐνὸς τριγώνου (3 πλευράι, 3 γωνίαι) τρία κατάλληλα εἰναι ἵσα μὲ τρία στοιχεῖα ἐνὸς ἄλλου τριγώνου, τότε τὰ τρίγωνα αὐτὰ θὰ εἰναι ἵσα.

Ήτοι καὶ τὰ λοιπὰ 3 κύρια στοιχεῖα τοῦ πρώτου τριγώνου εἰναι ἵσα μὲ τὰ 3 ἀντίστοιχα στοιχεῖα τοῦ δευτέρου τριγώνου.

72. 1ον ΚΡΙΤΗΡΙΟΝ ΙΣΟΤΗΤΟΣ ΤΡΙΓΩΝΩΝ

72. 1. Δύο τρίγωνα $AB\Gamma$, $A'B'\Gamma'$ μὲ $\widehat{A}=\widehat{A}'$, $AB=A'B'$ καὶ $A\Gamma=A'\Gamma'$. Σχηματίζομεν ἐν τριγώνον $AB\Gamma$ καὶ μίαν γωνίαν $\chi A'\psi$ ἵσην μὲ τὴν γωνίαν A αὐτοῦ.

Ἐπὶ τῶν πλευρῶν $A'\chi$, $A'\psi$ λαμβάνομεν τμήματα : $A'B'=AB$ καὶ $A'\Gamma'=A\Gamma$, σχ. 151. Ὁρίζομεν τοιουτορόπως τὸ τρίγωνον $A'B'\Gamma'$ εἰς τὸ δόποιον ἔχομεν :

$$\widehat{A}=\widehat{A}', \quad A'B'=AB \quad \text{καὶ} \quad A'\Gamma'=A\Gamma$$

Φανταζόμεθα ὅτι τὸ τρίγωνον $A'B'\Gamma'$ τίθεται ἐπὶ τοῦ τριγώνου $AB\Gamma$

εἰς τρόπον ὡστε ἡ $A'B'$ νὰ ἐφαρμόσῃ ἐπὶ τῆς ἱσης της AB καθὼς καὶ ἡ γωνία A' ἐπὶ τῆς ἱσης της γωνίας A . Τότε κατ' ἀνάγκην καὶ ἡ $A'\Gamma'$ θὰ ἐφαρμόσῃ ἐπὶ τῆς ἱσης της $A\Gamma$ δόποτε καὶ ἡ $B'\Gamma'$ ἐπὶ τῆς $B\Gamma$.

Συνεπῶς κατὰ τὴν τοποθέτησιν αὐτὴν τὸ τρίγωνον $A'B'\Gamma'$ θὰ ἐφαρμόσῃ ἐπὶ τοῦ τριγώνου $AB\Gamma$.

"Ωστε : 'Εὰν εἰς δύο τρίγωνα, μία γωνία τοῦ ἐνὸς ισοῦται μὲ μίαν γωνίαν τοῦ ἄλλου καὶ αἱ πλευραὶ τῆς μιᾶς ἐκ τῶν γωνιῶν αὐτῶν εἰναι ἵσαι μὲ τὰς πλευράς τῆς ἄλλης γωνίας, τότε τὰ τρίγωνα

ἀντίστοιχως ἵσαι μὲ τὰς πλευράς τῆς ἄλλης γωνίας, τότε τὰ τρίγωνα εἰναι ἵσα.



Σχ. 151

"Η συμβολικῶς :

$$(\widehat{A}=\widehat{A}', AB=A'B', AG=A'G') \Rightarrow \Delta ABG = \Delta A'B'G'$$

72. 2. Παρατηρήσεις

"Από τὴν ισότητα τῶν δύο ἀνωτέρω τρίγωνων προκύπτει ὅτι καὶ $\widehat{B}=\widehat{B}'$, $\widehat{G}=\widehat{G}'$ καὶ $BG=B'G'$.

"Ητοι : Εἰς τὰ ἵσα τρίγωνα, αἱ ἵσαι γωνίαι κεῖνται ἀπέναντι ἵσων πλευρῶν καὶ αἱ ἵσαι πλευραὶ ἀπέναντι τῶν ἵσων γωνιῶν.

Κατὰ τὰ ἀνωτέρω : Εἶναι δυνατὸν νὰ συμπεράνωμεν τὴν ισότητα δύο γωνιῶν (ἢ δύο εὐθ. τμημάτων) χωρὶς ἀπ' εὐθείας σύγκρισιν αὐτῶν. Ἀρκεῖ νὰ εὔρωμεν ὅτι αἱ δύο αὐταὶ γωνίαι (ἢ εὐθ. τμήματα) εἶναι ἀντίστοιχα στοιχεῖα δύο ἵσων τρίγωνων.

73. ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Νὰ εὑρεθῇ ἡ ἀπόστασις δύο σημείων A καὶ B , ἐὰν τὸ τμῆμα AB , σχ. 152, εἶναι ἀπρόσιτον.

α) Λαμβάνομεν ἔν σημείον G , ἑκτὸς τῆς εὐθείας AB καὶ μετροῦμεν τὰς ἀποστάσεις GA καὶ GB .

β) Προεκτείνομεν τὰς GA καὶ GB κατὰ τμήματα $GA'=GA$ καὶ $GB'=GB$, σχ. 152.


γ) Τὰ τρίγωνα ABG καὶ $A'B'G$ ἔχουν :

$\widehat{G}=\widehat{G}$ (ὡς κατὰ κορυφὴν)

$GB=GB'$ (ἐκ κατασκευῆς)

$GA=GA'$ (ἐκ κατασκευῆς)

"Ἄρα εἶναι ἵσα. 'Απὸ τὴν ισότητα αὐτὴν ουνάγομεν ὅτι $AB=A'B'$. 'Εὰν συνεπῶσι μετρήσωμεν τὴν $A'B'$, θὰ ἔχωμεν καὶ τὸ μῆκος τῆς AB .



Σχ. 152

74. 2ον ΚΡΙΤΗΡΙΟΝ ΙΣΟΤΗΤΟΣ ΤΡΙΓΩΝΩΝ

Δύο τρίγωνα ABG καὶ $A'B'G'$ μὲν $\widehat{B}=\widehat{B}'$, $\widehat{G}=\widehat{G}'$ καὶ $BG=B'G'$.

Σχηματίζομεν ἔν τρίγωνον ABG καὶ εὐθ. τμῆμα $B'G'=BG$. "Επειτα εἰς τὸ αὐτὸν ἡμιεπίπεδον τῆς $B'G'$ σχηματίζομεν γωνίας $B'=B$ καὶ $G'=G$, ὡς εἰς τὸ σχ. 153.

"Ορίζομεν τοιουτοτρόπως ἔν ἄλλο τρίγωνον $A'B'G'$ μὲν $\widehat{B}'=\widehat{B}$, $\widehat{G}'=\widehat{G}$ καὶ $B'G'=BG$.

"Ἄσ συγκρίνωμεν τὰ δύο ἀνωτέρω τρίγωνα.

Πρὸς τοῦτο τοποθετοῦμεν τὸ τρίγωνον $A'B'G'$ ἐπὶ τοῦ $AB\Gamma$ εἰς τρόπον ὡστε νὰ ἔφαρμόσουν αἱ ἵσαι πλευραὶ $B\Gamma$, $B'\Gamma'$ καὶ αἱ ἵσαι γωνίαι B , B' .

Παρατηροῦμεν τότε ὅτι καὶ τὰ τρίγωνα ἔφαρμόζουν. Δυνάμεθα ὅμως νὰ ἐργασθῶμεν καὶ ὡς ἔξῆς :

Νὰ τοποθετήσωμεν τὸ τρίγωνον $A'B'G'$ παραπλεύρως τοῦ τριγώνου $AB\Gamma$ εἰς τρόπον ὡστε νὰ ἔφαρμόσουν αἱ ἵσαι πλευραὶ $B\Gamma$, $B'\Gamma'$ ($B \equiv B'$, $\Gamma \equiv \Gamma'$) αἱ δὲ γωνίαι B' καὶ Γ' νὰ γίνουν ἔφεξῆς μὲ τὰς ἵσας τῶν B καὶ Γ ἀντιστοίχως, σχ. 153.

Εἰς τὴν θέσιν αὐτὴν παρατη-

ροῦμεν ὅτι ἡ $B\Gamma$ εἶναι κοινὴ διχοτόμος τῶν γωνιῶν ABA' καὶ $A\Gamma A'$ (Διατί;)

"Ἄσ συγκεντρώσωμεν τὴν προσοχὴν μας εἰς τὴν συμμετρίαν ὡς πρὸς τὴν εύθεταν $\epsilon=B\Gamma$ τῆς κοινῆς αὐτῆς δοχοτόμου. 'Ἐάν διπλώσωμεν τὸ ἐπίπεδον περὶ τὴν ϵ , αἱ κορυφαὶ B , Γ θὰ μείνουν ἀκίνητοι. Αἱ πλευραὶ τῆς γωνίας ABA' θὰ συμπέσουν (Διατί;). 'Ἐπίσης θὰ συμπέσουν αἱ πλευραὶ τῆς γωνίας $A\Gamma A'$."

"Ἄρα καὶ ἡ τομὴ A τῶν πλευρῶν BA , ΓA θὰ συμπέσῃ μὲ τὴν τομὴν A' τῶν BA' , $\Gamma A'$.

"Ωστε : 'Ἐάν εἰς δύο τρίγωνα, μία πλευρὰ τοῦ ἐνδέσ ἴσοιςται μὲ μίαν πλευρὰν τοῦ ἄλλου καὶ αἱ προσκείμεναι γωνίαι εἰς τὰς ἴσας πλευράς εἶναι ἀντιστοίχως ἴσαι, τὰ τρίγωνα εἶναι ἴσα.

$$(B\Gamma=B'\Gamma', \quad \widehat{B}=\widehat{B}', \quad \widehat{\Gamma}=\widehat{\Gamma}') \Rightarrow \Delta.AB\Gamma=\Delta.A'B'\Gamma'$$

Σημείωσις


Μὲ ἐντελῶς ἀνάλογον τρόπον ἥτο δυνατὸν νὰ ἐργασθῶμεν διὰ νὰ εὔρωμεν καὶ τὸ λοιν κριτήριον ἰσότητος τριγώνων.

75. Ζον ΚΡΙΤΗΡΙΟΝ ΙΣΟΤΗΤΟΣ ΤΡΙΓΩΝΩΝ

Δύο τρίγωνα μὲ τὰς πλευρὰς τοῦ ἐνδέσ ἀντιστοίχως ἴσας πρὸς τὰς πλευρὰς τοῦ ἄλλου.

75. 1. Σχεδιάζομεν τρίγωνον $AB\Gamma$ καὶ εὐθ. τμῆμα $B'\Gamma'=B\Gamma$. "Ἐπειτα μὲ κέντρον τὰ σημεῖα B' καὶ Γ' καὶ ἀκτίνας BA καὶ ΓA ἀντιστοίχως γράφομεν δύο κύκλους. 'Ἐάν A' εἶναι τὸ ἐν σημεῖον τομῆς αὐτῶν, τότε δρίζεται τὸ τρίγωνον $A'B'\Gamma'$. Τοῦτο ἔχει ἐκάστην πλευράν αὐτοῦ ἴσην μὲ μίαν πλευράν τοῦ τριγώνου $AB\Gamma$.

$$(B'\Gamma'=B\Gamma, \quad B'A'=BA, \quad \Gamma'A'=\Gamma A)$$



Σχ. 154

55. 2. "Ας φαντασθῶμεν ότι τοποθετοῦμεν τὸ τρίγωνον $A'B'G'$ παραπλεύρως τοῦ ABG εἰς τρόπον ὡστε, νὰ ταυτισθοῦν αἱ ἵσαι πλευραὶ AB , $A'B'$ ($A \equiv A'$, $B \equiv B'$) αἱ δὲ γωνίαι A' , B' νὰ γίνουν ἐφεξῆς μὲ τὰς γωνίας A καὶ B ἀντιστοίχως, σχ. 154.

'Απὸ τὴν ισότητα $A\Gamma=A\Gamma'$ ἐννοοῦμεν ότι τὸ σημεῖον A κεῖται ἐπὶ τῆς μεσοκαθέτου τοῦ τμήματος $\Gamma\Gamma'$. 'Ομοίως ἐπειδὴ $B\Gamma=B\Gamma'$ τὸ B κεῖται ἐπὶ τῆς μεσοκαθέτου τοῦ $\Gamma\Gamma'$.

"Ητοι : ἡ εὐθεία AB εἶναι ἡ μεσοκάθετος τοῦ τμήματος $\Gamma\Gamma'$. 'Εὰν ἡδη διπλώσωμεν τὸ ἐπίπεδον περὶ τὴν μεσοκάθετον AB , πρέπει : Τὰ σημεῖα A καὶ B νὰ μείνουν ἀκίνητα, ἐνῶ τὸ σημεῖον G θὰ συμπέσῃ μὲ τὸ σημεῖον Γ' . (Διατί;) "

Τοῦτο σημαίνει ότι τὰ τρίγωνα ABG καὶ $A'B'\Gamma'$ εἶναι συμμετρικά ὡς πρὸς τὴν AB καὶ συνεπῶς ἴσα.

"Ωστε : 'Εὰν αἱ τρεῖς πλευραὶ ἐνὸς τριγώνου εἶναι ἀντιστοίχως ἴσαι μὲ τὰς πλευρὰς ἐνὸς δὲλλου τριγώνου, τότε τὰ τρίγωνα αὗτὰ εἶναι ἴσα.

$$(AB=A'B', B\Gamma=B'\Gamma', \Gamma A=\Gamma'A') \Rightarrow \Delta.AB\Gamma=\Delta.A'B'\Gamma'$$

Παραθέτομεν κατωτέρω πίνακα τῶν τριῶν κριτηρίων ισότητος τριγώνων.

$$\begin{array}{l} \widehat{A}=\widehat{A}' \\ AB=A'B' \\ A\Gamma=A'\Gamma' \end{array}$$



$$\Delta.AB\Gamma=\Delta.A'B'\Gamma'$$



$$\begin{array}{l} \widehat{B}=\widehat{B}' \\ \widehat{\Gamma}=\widehat{\Gamma}' \\ B\Gamma=B'\Gamma' \end{array}$$

$$AB=A'B', B\Gamma=B'\Gamma', A\Gamma=A'\Gamma'$$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

165. Δύο ισοσκελῆ τρίγωνα $AB\Gamma$, $A'B'\Gamma'$ ($AB=A\Gamma$, $A'B'=A'\Gamma'$) ἔχουν $\widehat{A}=\widehat{A}'$ καὶ $AB=A'B'$. Νὰ ἔχετάσσετε ἐάν ταῦτα εἶναι ἴσα. 'Εὰν ναὶ, ποιᾶ εἶναι τὰ λοιπὰ ἴσα στοιχεῖα αὐτῶν;

166. Δύο δρθογώνια τρίγωνα $AB\Gamma$, $A'B'\Gamma'$ ($\widehat{A}=\widehat{A}'=IL$) ἔχουν $A\Gamma=A'\Gamma'$ καὶ $\widehat{\Gamma}=\widehat{\Gamma}'$. Νὰ ἔχετάσσετε ἐάν ταῦτα εἶναι ἴσα. 'Εὰν ναὶ, ποιᾶ εἶναι τὰ λοιπὰ ἴσα στοιχεῖα αὐτῶν;

167. Νὰ συγκρίνετε τὰς διαμέσους δύο ἴσων τριγώνων.

168. Νὰ συγκρίνετε τὰ 4 τρίγωνα εἰς τὰ δύο οποῖα χωρίζεται εἰς ρόμβος ὑπὸ τῶν διαγωνίων αὐτοῦ.

169. Εἰς κυρτὸν τετράπλευρον $AB\Gamma\Delta$ εἶναι $AB=\Delta$ καὶ $\Gamma\Delta=GB$. Νὰ συγκρίθοῦν αἱ γωνίαι $A\Delta\Gamma$ καὶ $AB\Gamma$ αὐτοῦ.

170. Χαράξατε ἐν παραλληλόγραμμον καὶ συγκρίνατε τὰ δύο τρίγωνα εἰς τὰ δύο οποῖα τὸ παραλ/μον χωρίζεται ὑπὸ μιᾶς διαγωνίου αὐτοῦ.

76. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΣΟΤΗΤΟΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΩΝ ΤΡΙΓΩΝΩΝ


*Εκτὸς ἀπὸ τὰ τρία γενικὰ κριτήρια ισότητος τριγώνων, τὰ δύο οποῖα ισχύ-

ουν φυσικά καὶ εἰς τὰ δρθιγώνια τρίγωνα, ὑπάρχουν καὶ τρία εἰδικά κριτήρια ισότητος δρθιγώνιών τριγώνων.

1ον Κριτήριον

Ορθιγώνια τρίγωνα μὲ τὰς ὑποτεινούσας ἵσας καὶ ἀνὰ μίαν κάθετον πλευρὰν ἴσην,

α) Σχηματίζομεν δρθιγ. τρίγωνον $AB\Gamma$ καὶ ἐπὶ τῆς μίας πλευρᾶς δρ-



Σχ. 155

β) "Ας συγκρίνωμεν τὰ τρίγωνα $AB\Gamma$ καὶ $A'B'\Gamma'$, σχ. 155.

Πρὸς τοῦτο τοποθετοῦμεν τὸ τρίγωνον $AB\Gamma$ παρὰ τὸ τρίγω-

νον $A'B'\Gamma'$ εἰς τρόπον, ὡστε νὰ ἐφαρμόσουν αἱ ἵσαι πλευραὶ $A'B'$ καὶ AB .

Τότε ἡ $A\Gamma$ θὰ ἔλθῃ εἰς τὴν θέσιν $A'\Gamma'$, προέκτασιν τῆς πλευρᾶς $A'\Gamma'$. (Διατί; Προσέξατε τὰς γωνίας A , A'). Εἰς τὴν θέσιν αὐτὴν τὰ δύο τρίγωνα σχηματίζουν ἐν ἰσοσκελές τρίγωνον: τὸ τρίγωνον $\Gamma'B'\Gamma'$ μὲ ἵσας πλευρᾶς τὰς $B'\Gamma'$ καὶ $B'\Gamma$.

"Αρα τὸ ὡς πρὸς τὴν βάσιν $\Gamma'\Gamma''$ ὑψος $B'A$, θὰ εἶναι καὶ ἄξων συμμετρίας.

Συνεπῶς $\Delta \cdot A'B'\Gamma'' = \Delta \cdot A'B'\Gamma'$ ἢ $\Delta \cdot AB\Gamma = \Delta \cdot A'B'\Gamma'$

Ἐὰν δύο δρθιγώνια τρίγωνα ἔχουν τὰς ὑποτεινούσας ἵσας καὶ ἀνὰ μίαν κάθετον πλευρὰν ἴσην, εἶναι ἵσα.

$$(\widehat{A}=\widehat{A}'=1L, AB=A'B', BG=B'G') \Rightarrow \Delta \cdot AB\Gamma = \Delta \cdot A'B'\Gamma'$$

2ον Κριτήριον

Δύο δρθιγώνια τρίγωνα $AB\Gamma$, $A'B'\Gamma'$ ($\widehat{A}=\widehat{A}'=1L$), μὲ $BG=B'G'$ καὶ $\widehat{B}=\widehat{B}'$.

Παρατηροῦμεν ὅτι ἡ γωνία Γ εἶναι συμπληρωματικὴ τῆς γωνίας B , ἡ γωνία $\widehat{\Gamma}$ εἶναι συμπληρωματικὴ τῆς γωνίας B' . Ήτοι $\widehat{\Gamma}=1L-\widehat{B}$ (1)

"Επίσης καὶ ἡ γωνία Γ' εἶναι συμπληρωματικὴ τῆς γωνίας B'

$$\widehat{B}+\widehat{\Gamma}'=1L \quad \text{Ήτοι} \quad \widehat{\Gamma}'=1L-\widehat{B}' \quad (2)$$

"Απὸ τὰς (1) καὶ (2) ἐννοοῦμεν ὅτι αἱ γωνίαι Γ , Γ' εἶναι ἵσαι.

Συνεπώς τὰ δρθιογώνια τρίγωνα $AB\Gamma$, $A'B'\Gamma'$ έχουν $B\Gamma=B'\Gamma'$, $\widehat{B}=\widehat{B}'$ καὶ $\widehat{\Gamma}=\widehat{\Gamma}'$ καὶ διὰ τοῦτο εἶναι ἵσα. (Ζεν κριτ. Ισότητος τυχόντων τριγ.).

*Ωστε: 'Εάν δύο δρθιογώνια τρίγωνα έχουν τὰς ὑποτεινούσας ἵσας καὶ ἀνὰ μέσαν δέξεισαν γωνίαν ἵσην, εἶναι ἵσα.

$$(\widehat{A}=\widehat{A}'=1L, \quad B\Gamma=B'\Gamma', \quad \widehat{B}=\widehat{B}') \Rightarrow \Delta.AB\Gamma=\Delta.A'B'\Gamma'$$

Ζεν Κριτήριον

Δύο δρθιογώνια τρίγωνα $AB\Gamma$, $A'B'\Gamma'$ ($\widehat{A}=\widehat{A}'=1L$) μὲν $AB=A'B'$ καὶ $\widehat{\Gamma}=\widehat{\Gamma}'$.

Σκεπτόμενοι ὅπως προηγουμένως εύρισκομεν ὅτι τὰ τρίγωνα αὐτὰ έχουν καὶ τὰς γωνίας B καὶ B' ἵσας.

"Ητοι έχουν $AB=A'B'$, $\widehat{A}=\widehat{A}' (=1L)$ καὶ $\widehat{B}=\widehat{B}'$

"Αρα εἶναι ἵσα.

'Εάν δύο δρθιογώνια τρίγωνα έχουν ἀνὰ μέσαν κάθετον πλευρὰν ἵσην καὶ τὰς δέξειας γωνίας, αἱ δποῖαι κείνται ἀπέναντι τῶν ἵσων πλευρῶν ἵσας, θὰ εἶναι ἵσα.

$$\widehat{A}=\widehat{A}'=1L, \quad \widehat{\Gamma}=\widehat{\Gamma}', \quad AB=A'B' \Rightarrow \Delta.AB\Gamma=\Delta.A'B'\Gamma'$$

Παραθέτομεν κατωτέρω συνοπτικὸν πίνακα κριτηρίων Ισότητος δρθιογώνιων τριγώνων.

$$\begin{array}{l} \widehat{A}=\widehat{A}'=1L \\ AB=A'B' \\ B\Gamma=B'\Gamma' \end{array}$$

\Leftrightarrow

$$\begin{array}{l} \Delta.AB\Gamma=\Delta.A'B'\Gamma' \\ \widehat{A}=1L \quad \widehat{A}'=1L \end{array}$$

\Leftrightarrow

$$\begin{array}{l} \widehat{A}=\widehat{A}'=1L \\ B\Gamma=B'\Gamma' \\ \widehat{B}=\widehat{B}' \end{array}$$

\Downarrow

$$\begin{array}{l} \widehat{A}=\widehat{A}'=1L \\ \widehat{\Gamma}=\widehat{\Gamma}', \quad AB=A'B' \end{array}$$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

171. Δικαιολογήσατε ὅτι αἱ ἀποστάσεις τῶν μέσων τῶν ἵσων πλευρῶν Ισοσκελοῦς τριγώνου ἀπό τὴν βάσιν εἶναι ἵσαι.

172. Δικαιολογήσατε ὅτι τὰ ὑψη τοῦ Ισοσκελοῦς τριγώνου πρὸς τὰς ἵσας πλευρὰς αὐτοῦ εἶναι ἵσαι.

173. Δικαιολογήσατε τὴν ἔξῆς πρότασιν : 'Εάν δύο ὑψη ἐνὸς τριγώνου ἔιναι ἵσα, τότε τοῦτο εἶναι ἴσοσκελές.


174. Δικαιολογήσατε ὅτι τὰ τρία ὑψη ἴσοπλεύρου τριγώνου εἶναι ἵσα.

174. Μὲ τὴν βοήθειαν ἵσων τριγώνων δικαιολογήσατε διατὶ αἱ διαγώνιοι δρθογωνίου εἶναι ἵσαι.

77. ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΤΡΙΓΩΝΩΝ

Τὰ κριτήρια ἴσοτητος τριγώνων μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ κατασκευάσωμεν γεωμετρικῶς ἐν τρίγωνον, ὅταν γνωρίζωμεν τρία κατάλληλα στοιχεῖα αὐτοῦ καὶ καθορίζουν τὸ πλήθος ἢ τὴν μοναδικότητα τῶν λύσεων.

87
β
γ'



Σχ. 156

77. 1. Νὰ κατασκευασθῇ τρίγωνον ABG , τοῦ δοποίου δίδονται δύο πλευραὶ $\text{AB}=\gamma$, $\text{AG}=\beta$ καὶ ἡ περιεχομένη γωνία $\text{A}=\omega$.

α) Μὲ κορυφὴν ἐν σημείῳ A κατασκευάζομεν κατὰ τὰ γνωστὰ (§ 39.2) γωνίαν ἵσην μὲ τὴν δοθεῖσαν.

β) Ἐπὶ τῶν πλευρῶν τῆς γωνίας αὐτῆς λαμβάνομεν τμῆματα $\text{AB}=\gamma$ καὶ $\text{AG}=\beta$, σχ. 156.

Τὸ τρίγωνον ABG εἶναι τὸ ζητούμενον. (Διατὶ;).

Ἄπὸ τὴν ἀνωτέρω κατασκευὴν ἐννοοῦμεν ὅτι ἐν τριγώνων ABG δρίζεται πλήρως, ὅταν γνωρίζωμεν τὰς πλευράς AB , AG καὶ τὴν γωνίαν A , ἀρκεῖ αὐτῇ νὰ εἶναι μικροτέρα μιᾶς εὐθείας γωνίας.

Ἐάν μὲ τὰ αὐτὰ στοιχεῖα κατασκευάσωμεν ἄλλο τρίγωνον $\text{A}'\text{B}'\text{G}'$ τότε τὰ δύο αὐτὰ τρίγωνα θὰ εἶναι ἵσα. (Διατὶ;)

77. 2. Νὰ κατασκευασθῇ τρίγωνον ABG , τοῦ δοποίου δίδεται ἡ μία πλευρὰ $\text{BG}=\alpha$ καὶ αἱ δύο προσκείμεναι αὐτῆς γωνίαι B καὶ Γ .


Δεδομένα : Σχ. 157α.

Ἐπὶ εὐθείας ε λαμβάνομεν ἐν τμῆμα $\text{BG}=\alpha$. Ἐπειτα μὲ κορυφὰς τὰ ἄκρα B , Γ κατασκευάζομεν δύο γωνίας ἀντιστοίχως ἵσας πρὸς τὰς γωνίας ω , καὶ ϕ (κατὰ τὴν διάταξιν τοῦ σχ. 157).

Κατασκευάζεται τοιουτοπότως τὸ τρίγωνον ABG , τὸ δόποιον εἶναι τὸ ζητούμενον. (Διατὶ;).

Ἐάν ἐλαμβάνομεν τὰς γωνίας ω , ϕ πρὸς τὸ ἄλλο ἡμιεπίπεδον ὡς πρὸς τὴν BG , τότε θὰ εῖχομεν ἐν ἄλλῳ τρίγωνον κατ' ἀναστροφὴν ἵσον μὲ τὸ ABG .

Ἄπὸ τὴν ἀνωτέρω κατασκευὴν ἐννοοῦμεν ὅτι τὸ τρίγωνον ABG δρίζεται πλήρως ὅταν μᾶς δοθοῦν ἡ πλευρὰ BG καὶ αἱ γωνίαι B, Γ αὐτοῦ, ἀρκεῖ μόνον νὰ εἶναι $\widehat{\text{B}} + \widehat{\text{G}} < 2L$.



Σχ. 157

77. 3. Νὰ κατασκευασθῇ τρίγωνον ἐκ τῶν τριῶν πλευρῶν αὐτοῦ $BΓ=α$, $AΓ=β$, $AB=γ$, $\alpha>\gamma>\beta$

α) Ἐπὶ εὐθείᾳ εἰ λαμβάνομεν τμῆμα $BΓ=α$

β) Μὲ κέντρα τὰ σημεῖα B καὶ $Γ$ καὶ ἀκτίνας ἵσας μὲ $γ$ καὶ $β$ ἀντιστοίχως, γράφομεν δύο κύκλους. Ἐάν οἱ κύκλοι αὐτοὶ τέμνωνται εἰς δύο διαφορετικά σημεῖα A , A' , τότε τὰ τρίγωνα $ABΓ$ καὶ $A'BG$, σχ. 158, τὰ ὅποια εἶναι συμμετρικά ὡς πρὸς τὴν εὐθεῖαν $BΓ$, εἶναι λύσεις τοῦ προβλήματος.

Παρατήρησις

Εἶναι προφανὲς ὅτι διὰ νὰ σχηματισθοῦν τὰ τρίγωνα πρέπει οἱ δύο κύκλοι νὰ τέμνωνται. Ἡτοι πρέπει μεταξὺ τῆς διακέντρου $BΓ=α$ καὶ τῶν ἀκτίνων β, γ νὰ ἴσχύουν αἱ σχέσεις

$$\gamma - \beta < \alpha < \beta + \gamma \quad (1) \quad (\S\ 38, 2)$$

Μάλιστα ἐπειδὴ $\alpha>\gamma>\beta$, θὰ εἶναι καὶ $\alpha>\gamma-\beta$

Ἡτοι αἱ συνθῆκαι (1) περιορίζονται εἰς τὴν $\alpha<\beta+\gamma$

"Ινα τρία τμήματα α, β, γ εἶναι πλευραὶ τριγώνου, πρέπει καὶ ἀρκεῖ τὸ μεγαλύτερον νὰ εἶναι μικρότερον τοῦ ἀθροίσματος τῶν δύο ἄλλων.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

176. Κατασκευάστε γεωμετρικῶς τρίγωνον $ABΓ$, δταν γνωρίζετε ὅτι :

- 1) $A=30^\circ$, $AB=4$ cm $AΓ=2$ cm.
- 2) $A=30^\circ$, $AB=AΓ=4$ cm.
- 3) $A=60^\circ$, $B=45^\circ$ καὶ $AB=4$ cm.
- 4) $AB=3$ cm, $AΓ=4$ cm καὶ $BΓ=5$ cm.

177. Κατασκευάστε ισοσκελές τρίγωνον $ABΓ$ μὲ βάσιν $BΓ$ ἵσην μὲ 5 cm καὶ μὲ ὕψος πρὸς αὐτήν ἰσον μὲ 4 cm.

178. Κατασκευάστε δρθογώνιον τρίγωνον μὲ ὑποτείνουσαν $BΓ=5$ cm καὶ μὲ γωνίαν $B=60^\circ$.

78. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΧΟΤΟΜΟΥ



78. 1. Χαράσσομεν μίαν κυρτήν γωνίαν $χΟψ$ καὶ τὴν διχοτόμον τῆς OZ , σχ. 161. Λαμβάνομεν ἐν σημεῖον M τῆς διχοτόμου καὶ φέρομεν τὰς ἀποστάσεις αὐτοῦ ἀπὸ τὰς πλευρὰς $Oχ$, $Oψ$,

$$MA \perp Oχ, \quad MB \perp Oψ$$

Θὰ συγκρίνωμεν τὰς ἀποστάσεις αὐτάς.

"Ἄσ προσέξωμεν τὰ τρίγωνα OAM καὶ OBM :

- 1) Εἶναι δρθογώνια $\widehat{A}=\widehat{B}=1L$
- 2) "Ἔχουν τὴν ὑποτείνουσαν OM κοινήν
- 3) "Ἔχουν τὰς δέξιες γωνίας O_1, O_2 ἵσας. (Διατί;).



"Αρα τὰ τρίγωνα εἶναι ἵσα. Ἀπὸ τὴν ἴσοτητα αὐτὴν συνάγομεν διτὶ :
 $MA = MB$

"Ωστε : "Ἐκαστον σημεῖον τῆς διχοτόμου γωνίας ἀπέχει ἐξ ἵσου ἀπὸ τὰς πλευρὰς αὐτῆς.

78. 2. "Εχουμεν μίαν κυρτήν γωνίαν χΟψ καὶ ἓν σημεῖον M, εἰς τὸ ἑσωτερικὸν αὐτῆς, τὸ διποίον ἀπέχει ἐξ ἵσου ἀπὸ τὰς πλευρὰς τῆς γωνίας.

"Ητοι : $MA \perp OX$, $MB \perp OY$, καὶ $MA = MB$, σχ. 159.

Μήπως τὸ σημεῖον M κείται ἐπὶ τῆς διχοτόμου τῆς γωνίας;

"Ἄσ λάβωμεν τὰ τρίγωνα OAM καὶ OBM.

1) Εἶναι ὁρθογώνια ($\widehat{A} = \widehat{B} = 90^\circ$). 2) "Ἐχουν τὴν ὑποτείνουσαν OM κοινήν.

3) Μία κάθετος πλευρά τοῦ ἐνὸς εἶναι ἵση μὲ μίαν κάθετον πλευράν τοῦ ἄλλου : $MA = MB$. "Αρα εἶναι ἵσα. Ἀπὸ τὴν ἴσοτητα αὐτὴν συνάγομεν διτὶ καὶ

$$\widehat{O}_1 = \widehat{O}_2$$

"Ητοι : 'Ἐὰν ἔν τις ἑσωτερικὸν σημεῖον γωνίας ἀπέχῃ ἐξ ἵσου ἀπὸ τὰς πλευρὰς αὐτῆς, θὰ εὑρίσκεται ἐπὶ τῆς διχοτόμου τῆς γωνίας.

78. 3. Αἱ ἀνωτέρω δύο προτάσεις συνοψίζονται εἰς τὴν ἀκόλουθον :

Εἰς τὸ ἐπίπεδον τὰ σημεῖα τῆς διχοτόμου μιᾶς κυρτῆς γωνίας καὶ μόνον αὐτά, ἀπέχουν ἐξ ἵσου ἀπὸ τὰς πλευρὰς τῆς γωνίας.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ


179. Κατασκευάστε μίαν γωνίαν καὶ μίαν εὐθείαν εἰς τέμνουσαν τὰς πλευρὰς τῆς γωνίας. Ἐπὶ τῆς εὐθείας εἰ νὰ εύρεθῇ ἔν σημεῖον M, τὸ διποίον νὰ ἀπέχῃ ἐξ ἵσου ἀπὸ τὰς πλευρὰς τῆς γωνίας.

180. "Ἐὰν Ο εἶναι τὸ σημεῖον τομῆς τῶν διχοτόμων δύο γωνιῶν τριγώνου ἀποδείξατε διτὶ τοῦτο ἀπέχει ἐξ ἵσου ἀπὸ τὰς τρεῖς πλευρὰς τοῦ τριγώνου.


79. ΚΥΚΛΟΙ ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΟΙ ΔΥΟ ΕΥΘΕΙΩΝ

79. 1. Χαράσσομεν δύο εὐθείας ε, ε' τεμνομένας εἰς τὸ σημεῖον O καὶ εύρισκομεν τὴν διχοτόμον OZ μιᾶς ἐκ τῶν σχηματιζομένων κυρτῶν γωνιῶν.

"Ἀπὸ ἔν σημεῖον M τῆς OZ φέρομεν τὰς MA, MB καθέτους πρὸς τὰς πλευρὰς τῆς γωνίας. Θὰ εἶναι τότε $MA = MB$.



Σχ. 160



Σχ. 161

Συνεπῶς, έάν μὲ κέντρον M καὶ ἀκτῖνα MA γράψωμεν κύκλον, οὗτος θὰ ἐφάπτεται καὶ τῶν δύο εὐθειῶν ϵ , ϵ' , σχ. 160.

79. 2. Πόσους κύκλους ἐφαπτομένους τῶν δύο αὐτῶν εὐθειῶν ϵ , ϵ' δυνάμεθα νὰ γράψωμεν;

Εἶναι φανερὸν ὅτι ὅπως εἰργάσθημεν μὲ τὸ σημεῖον M θὰ ἥτο δυνατὸν νὰ ἐργασθῶμεν καὶ μὲ οἰονδήποτε ἄλλο σημεῖον τῆς διχοτόμου ἑκάστης ἐκ τῶν τεσσάρων κυρτῶν γωνιῶν τῶν εὐθειῶν ϵ , ϵ' , σχ. 161.

Συνεπῶς ὑπάρχουν ἄπειροι εἰς πλῆθος κύκλοι ἐφαπτόμενοι τῶν ϵ , ϵ' . Τὰ κέντρα ὅλων αὐτῶν εὑρίσκονται ἐπὶ τῶν διχοτόμων τῶν 4 γωνιῶν τὰς δοποίας σχηματίζουν αἱ εὐθεῖαι ϵ , ϵ' .

79. 3. Εἰδικὴ περίπτωσις

Ἐάν αἱ ϵ , ϵ' εἴναι παράλληλοι ὑπάρχουν πάλιν ἄπειροι εἰς πλῆθος κύκλοι ἐφαπτόμενοι αὐτῶν. Οὗτοι εἴναι ἴσοι καὶ ἔχουν τὰ κέντρα τῶν ἐπὶ τῆς μεσοπαραλλήλου τῶν ϵ , ϵ' .



Σχ. 162

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

181. Χαράξατε κύκλους ἐφαπτομένους τῶν πλευρῶν μίας ὁρθῆς γωνίας.

182. Χαράξατε κύκλον ἐφαπτόμενον τῶν πλευρῶν ἑνὸς τριγώνου.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΝ

183. Κατασκευάσατε ἐν τετράγωνον, έάν γνωρίζετε μίαν διαγώνιον αὐτοῦ.

184. Κατασκευάσατε ἐν δρθογώνιον, έάν γνωρίζετε μίαν πλευράν καὶ μίαν διαγώνιον αὐτοῦ.

185. Κατασκευάσατε ἐνα ρόμβον ἔάν γνωρίζετε μίαν διαγώνιον καὶ μίαν πλευράν αὐτοῦ.

186. Εἰς ἐν παραλ/μον $AB\Gamma\Delta$ ἡ διαγώνιος $A\Gamma$ διχοτομεῖ τὴν γωνίαν $B\Delta$. Εξετάσατε ἔάν τὸ παραλ/μον εἴναι ρόμβος.

187. Έάν M εἴναι σημεῖον τῆς διχοτόμου τῆς γωνίας A Ισοσκελοῦς τριγώνου $AB\Gamma$ ($AB=A\Gamma$) νὰ δικαιολογήσετε ὅτι:

α) Τὰ τμήματα MG MB είναι ἴσα, β) αἱ γωνίαι ΓBM καὶ BGM είναι ἴσαι.

188. Νὰ εὐρεθῇ τὸ σύνολον τῶν σημείων τοῦ ἐπιπέδου P τὰ ὅποια εἴναι συμμετρικά ἑνὸς σταθεροῦ σημείου A ὡς πρὸς τὰς εὐθείας αἵτινες διέρχονται δι' ἄλλου σημείου O . Τὰ O καὶ A κείνται ἐπὶ τοῦ ἐπιπέδου P .

189. Νὰ δικαιολογήσετε διτὶ έάν δύο ὑψη τριγώνου είναι ἴσα τοῦτο είναι Ισοσκελές.

190. Δικαιολογήσατε διτὶ αἱ μεσοκάθετοι παντὸς τριγώνου διέρχονται διὰ τοῦ αὐτοῦ σημείου.

ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

	Σελίς
1. Τὸ σύνολον	5
2. Συμβολισμὸς τοῦ συνόλου	7
3. Ὅποσύνολον συνόλου	9
4. Γραφικὴ παράστασις συνόλου	11
5. Ἰσα σύνολα	12
6. Μονοσήμαντος ἀντιστοιχία	14
7. Ἀμφιμονοσήμαντος ἀντιστοιχία. Ἰσοδύναμα σύνολα	15
8. Τομῆ συνόλων	17
9. Ἐνωσῖς συνόλων	20
10. Συμπλήρωμα (ἢ συμπληρωματικὸν) συνόλου	22
11. Ζεῦγος	23

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

	Σελίς
12. Τὸ σύνολον τῶν φυσικῶν ἀριθμῶν	25
13. Ἀπαριθμησις	26
14. Πεπερασμένα καὶ μὴ πεπερασμένα σύνολα	26
15. Τὸ σύνολον τῶν ἀκεραίων τῆς Ἀριθμητικῆς	27
16. Τὸ δεκαδικὸν σύστημα ἀριθμήσεως	28
17. Ἑλληνικὴ γραφὴ τῶν ἀριθμῶν	30
18. Ρωμαϊκὴ γραφὴ τῶν ἀριθμῶν	31
19. Ἡ ἔννοια τῆς ἴσοτητος καὶ ἀνισότητος εἰς τὸ σύνολον τῶν ἀκεραίων ἀριθμῶν	32
20. Τὸ σύνολον τῶν ἀκεραίων ἀριθμῶν ὡς διατεταγμένον σύνολον	34

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'

	Σελίς
21. Ἡ πρᾶξις τῆς προσθέσεως	36
22. Ἰδιότητες τῆς προσθέσεως	37
23. Ἀθροισμα τριῶν ἢ περισσοτέρων προσθετέων	39
24. Ἡ πρᾶξις τῆς ἀφαιρέσεως	42
25. Ἐπιλυσις διπλῶν ἔξισώσεων	45
26. Ἰδιότητες τῆς ἀφαιρέσεως	46
27. Ἀριθμητικοὶ παραστάσεις	51
28. Πολλαπλασιασμὸς	52
29. Ἰδιότητες πολλαπλασιασμοῦ	53
30. Γινόμενον πολλῶν παραγόντων	56
31. Ἰδιότητες γινομένου πολλῶν παραγόντων	57
32. Πολλαπλάσια ἀκεραίων	58
33. Ἡ πρᾶξις τῆς διατρέσεως	59
34. Εἰδικοὶ περιπτώσεις διατρέσεως	62
35. Ἡ ἀτέλης διατρέσις	63
36. Ἰδιότητες διατρέσεως	65
37. Ἄλλαι ἀριθμητικοὶ παραστάσεις	68
38. Τεχνικὴ τῶν πράξεων εἰς τὸ δεκαδικὸν σύστημα	70
39. Ἐκτέλεσις τῆς προσθέσεως	70
40. Ἐκτέλεσις τῆς ἀφαιρέσεως	71
41. Ἐκτέλεσις τοῦ πολλαπλασιασμοῦ	72
42. Ἐκτέλεσις τῆς διατρέσεως	74

43. Προβλήματα τῶν τεσσάρων πράξεων (πρόσθεσις—άφαίρεσις)	76
44. Πολλαπλασιασμὸς	77
45. Διάλρεσις	78
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'	
46. Δυνάμεις ἀκεραίων ἀριθμῶν	81
47. Ἰδιότητες τῶν δυνάμεων	83
48. Ἐπέκτασις τῆς ἑννοίας τῆς δυνάμεως διὰ $v=1$ καὶ $v=0$	84
49. Ἀξιοσημείωτοι ταυτότητες.....	86
50. Χρῆσις τῶν δυνάμεων τοῦ 10 εἰς τὸ δεκαδικὸν σύστημα ἀριθμῆσεως.....	87
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'	
51. Διαιρέταις ἀκεραίου ἀριθμοῦ.....	89
52. Ἰδιότητες διαιρετῶν ἀκεραίου	91
53. Κριτήρια διαιρετότητος.....	93
54. Ἀνάλυσις φυσικοῦ συνθέτου ἀριθμοῦ εἰς γινόμενον πρώτων παραγόντων.....	96
55. Κοινοὶ διαιρέταις καὶ Μ.Κ.Δ. ἀκεραίων ἀριθμῶν	98
56. Ἰδιότητες τοῦ Μ.Κ.Δ.	99
57. Ἀλγόριθμος τοῦ Εὐκλείδου.....	100
58. Εὔρεσις Μ.Κ.Δ. περισσοτέρων τῶν δύο ἀκεραίων.....	101
59. Εὔρεσις Μ.Κ.Δ. ἀκεραίων δι' ἀναλύσεως τούτων εἰς γινόμενον πρώτων παραγόντων.....	102
60. Κοινὰ πολλαπλάσια φυσικοῦ ἀριθμοῦ	103
61. Εύρεσις τοῦ Ε.Κ.Π. δύο ἢ περισσοτέρων φυσικῶν ἀριθμῶν	104
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'	
62. Κλάσματα	107
63. Γινόμενον ἀκεραίου ἐπὶ κλάσμα	111
64. Ἡ σχέσις τῆς ισότητος	113
65. Ἐφαρμογαὶ τῆς ισότητος κλασμάτων	114
66. Ὁ κλασματικὸς ἀριθμὸς ὡς πηλίκον διαιρέσεως.....	116
67. Ὁμώνυμα καὶ ἔτερώνυμα κλάσματα	118
68. Ἡ σχέσις ἀνισότητος	122
69. Τὸ σύνολον τῶν ρητῶν τῆς ἀριθμητικῆς	125
70. Πρόσθεσις	128
71. Ἀφαίρεσις	132
72. Πολλαπλασιασμὸς	134
73. Διαιρέσις	138
74. Δυνάμεις ρητῶν.....	141
75. Σύνθετα κλάσματα	143
76. Προβλήματα ἐπιλυόμενα διὰ τῶν τεσσάρων πράξεων τῶν ρητῶν ἀριθμῶν	145
77. Ἐπίλυσις προβλημάτων διὰ τῆς μεθόδου ἀναγωγῆς εἰς τὴν μονάδα	148
78. Ἐπίλυσις προβλημάτων δι' ἔξισώσεων	150
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'	
79. Δεκαδικὰ κλάσματα καὶ δεκαδικοὶ ἀριθμοὶ.....	153
80. Ἰδιότητες δεκαδικῶν ἀριθμῶν	157
81. Πρόσθεσις δεκαδικῶν ἀριθμῶν	158
82. Ἀφαίρεσις δεκαδικῶν ἀριθμῶν.....	158
83. Πολλαπλασιασμὸς δεκαδικῶν ἀριθμῶν	159
84. Διαιρέσις δεκαδικῶν ἀριθμῶν.	160
85. Τροπὴ κλάσματος εἰς δεκαδικὸν.	162

86. Ποια διάγωγα κλάσματα τρέπονται εις τερματιζομένους δεκαδικούς δριθμούς	162
87. Περιοδικοί δεκαδικοί δριθμοί	164
88. Περὶ τοῦ λόγου δύο εὐθ. τμημάτων	167
89. Συμμιγεῖς δριθμοί	170
90. Πρόσθεσις, ἀφαίρεσις συμμιγῶν	172
91. Πολλαπλασιασμός, διαίρεσις συμμιγῶν	172

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

1. Φυσικά καὶ γεωμετρικά στερεά	177
2. Ἀπλά γεωμετρικά στερεά	178
3. Τὰ γεωμετρικά σχήματα	179
4. Ἡ εὐθεῖα	181
5. Τὸ ἐπίπεδον	183

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

6. Ἡ ἡμιευθεῖα	187
7. Τὸ εὐθύγραμμον τμῆμα	187
8. Ἡ τεθλασμένη γραμμὴ	188
9. "Ισα, ἀνισα εὐθύγραμμα τμήματα.	189
10. Πρόσθεσις εὐθυγράμμων τμημάτων.	190
11. Ἀφαίρεσις εὐθυγράμμων τμημάτων.	192
12. Γινόμενον εὐθ. τμήματος ἐπὶ φυσικὸν δριθμὸν	193
13. Μέτρησις εὐθυγράμμων τμημάτων	193
14. Τὸ ἡμιεπίπεδον	193
15. Ἡ γωνία	195
16. "Ισαι ἀνισοὶ γωνίαι	196
17. Πρόσθεσις γωνιῶν	198
18. Ἀφαίρεσις γωνιῶν	200
	201

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'

19. Ἡ συμμετρία ὡς πρὸς εὐθεῖαν.	203
20. Εὐθεῖαι κάθετοι. Ὁρθὴ γωνία	204
21. Ἀξιοσημείωτοι κατασκευαστικοὶ σχηματισμοί	205
22. Συμμετρικὸν σχήματος ὡς πρὸς εὐθεῖαν	207
23. Συμμετρικά ἀπλῶν σχημάτων	208
24. Ἄξων συμμετρίας	212
25. Χαρακτηριστικὴ ιδιότης τῆς μεσοκαθέτου	214
26. Συμμετρία μεταξὺ δύο καθέτων εὐθειῶν.	215
27. Ὁφεῖται, ἀμβλεῖται γωνίαι	216
28. Συμπληρωματικαὶ, παραπληρωματικαὶ, κατά κορυφὴν γωνίαι	217
29. Μέτρησις γωνιῶν	218
30. Ὁ κύκλος	220
31. Ἰδιότητες διαμέτρου	221
32. Ἰσότης κύκλων, τόξων.	221
33. Ἀθροισμα, διαφορὴ τόξων ἵσων κύκλων	223
34. Ἐπίκεντρος γωνία, ἀντίστοιχον τόξον	224

35. "Ισα τόξα. "Ισαι χορδαί.	225
36. Μέτρησις τόξων.	225
37. Σχετικαὶ θέσεις εύθείας καὶ κύκλου.	227
38. Σχετικαὶ θέσεις δύο κύκλων.	229
39. Γεωμετρικαὶ κατασκευαὶ.	231
40. Κύκλοι διερχόμενοι διὰ δύο σημείων.	233
41. Ἡ συμμετρία ὡς πρὸς σημεῖον εἰς τὸ ἐπίπεδον (κεντρικὴ συμμετρία)	234
42. Συμμετρικὸν σχήματος ὡς πρὸς σημεῖον.	235
43. Συμμετρικὰ σχημάτων τινῶν εἰς τὴν Σ(ο)	236
44. Κέντρον συμμετρίας σχήματος.	239
45. Εύθεται παράλληλοι.	240
46. Παράλληλος ἀπὸ σημεῖον πρὸς εὐθεῖαν.	240
47. Εὐκλείδειον αἴτημα.	241
48. Κέντρα συμμετρίας δύο παραλλήλων.	241
49. Γωνίαι σχηματιζόμεναι ὑπὸ δύο εὐθειῶν καὶ μιᾶς ἀλλῆς τεμνούσης αὐτὰς.	242
50. Γωνίαι σχηματιζόμεναι ὑπὸ παραλλήλων καὶ μιᾶς τεμνούσης αὐτάς.	243
51. Γωνιώματα παραλλήλων εὐθειῶν.	244
52. Ἐφαρμογαί.	244

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'

53. Τὸ τρίγωνον.	246
54. Δευτερεύοντα στοιχεία τριγώνου.	247
55. Ἀνισοτικαὶ σχέσεις μεταξὺ τῶν πλευρῶν τριγώνου.	247
56. Εἶδος τριγώνων.	248
57. Τὸ ισοσκελὲς τρίγωνον.	250
58. Τὸ ισόπλευρον τρίγωνον.	253
59. Γραφικαὶ ἐφαρμογαὶ.	253
60. Ἀθροισμα γωνιῶν τριγώνου.	254
61. Ἐφαρμογαὶ.	254
62. Ἀθροισμα γωνιῶν κυρτοῦ πολυγώνου.	256
63. Τετράπλευρα.	257
64. Παραλληλόγραμμα.	257
65. Ἰδιότητες παραλληλογράμμων.	257
66. Ὁρθογώνιον παραλληλόγραμμον.	260
67. Μία σπουδαία ἐφαρμογὴ.	261
68. Ρόμβος.	262
69. Τετράγωνον.	263
70. Τροπέζιον.	264
71. Ἰσότης τριγώνων.	265
72. Ιον Κριτήριον Ἰσότητος τριγώνων.	266
73. Ἐφαρμογὴ.	267
74. Ιον Κριτήριον Ἰσότητος τριγώνων.	267
75. Ζον Κριτήριον Ἰσότητος τριγώνων.	268
76. Κριτήρια Ἰσότητος δρθιγωνίων τριγώνων.	269
77. Γεωμετρικαὶ κατασκευαὶ τριγώνων.	272
78. Χαρακτηριστικὴ Ἰδιότης τῆς διχοτόμου.	273
79. Κύκλοι ἐφαπτόμενοι δύο εὐθειῶν.	274

ΕΚΔΟΣΙΣ ΣΤ', 1975 (V) — ANTIT. 130.000 — ΣΥΜΒΑΣΙΣ: 2546/31-3-75

ΕΚΤΥΠΩΣΙΣ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ : Μ. ΠΕΧΑΙΒΑΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ - Α. Ε.



024000039903

