

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

(ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΣ)

ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

Β. ΣΤΑΪΚΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΑΘΗΝΑΙ 1976

40673

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΪΚΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΑΔΙΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΔΩΡΕΑΝ

1000

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΛΟΓΕΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ

Κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - Σ. ΣΤΑΪΚΟΥ

ΚΕΝΤΡΕΙΟΝ

ΠΕΡΙ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

(ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΣ)

ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΪΚΟΥ

$$2 = 2, \quad 3 = 3, \quad 4 = 2^2, \quad 5 = 5, \quad 6 = 2 \cdot 3, \quad 7 = 7, \quad 8 = 2^3, \quad 9 = 3^2, \quad 10 = 2 \cdot 5, \quad 11 = 11, \quad 12 = 2^2 \cdot 3, \quad 13 = 13, \quad 14 = 2 \cdot 7, \quad 15 = 3 \cdot 5, \quad 16 = 2^4, \quad 17 = 17, \quad 18 = 2 \cdot 3^2, \quad 19 = 19, \quad 20 = 2^2 \cdot 5, \quad 21 = 3 \cdot 7, \quad 22 = 2 \cdot 11, \quad 23 = 23, \quad 24 = 2^3 \cdot 3, \quad 25 = 5^2, \quad 26 = 2 \cdot 13, \quad 27 = 3^3, \quad 28 = 2^2 \cdot 7, \quad 29 = 29, \quad 30 = 2 \cdot 3 \cdot 5, \quad 31 = 31, \quad 32 = 2^5, \quad 33 = 3 \cdot 11, \quad 34 = 2 \cdot 17, \quad 35 = 5 \cdot 7, \quad 36 = 2^2 \cdot 3^2, \quad 37 = 37, \quad 38 = 2 \cdot 19, \quad 39 = 3 \cdot 13, \quad 40 = 2^3 \cdot 5, \quad 41 = 41, \quad 42 = 2 \cdot 3 \cdot 7, \quad 43 = 43, \quad 44 = 2^2 \cdot 11, \quad 45 = 3^2 \cdot 5, \quad 46 = 2 \cdot 23, \quad 47 = 47, \quad 48 = 2^4 \cdot 3, \quad 49 = 7^2, \quad 50 = 2 \cdot 5^2, \quad 51 = 3 \cdot 17, \quad 52 = 2^2 \cdot 13, \quad 53 = 53, \quad 54 = 2 \cdot 3^2 \cdot 3, \quad 55 = 5 \cdot 11, \quad 56 = 2^3 \cdot 7, \quad 57 = 3 \cdot 19, \quad 58 = 2 \cdot 29, \quad 59 = 59, \quad 60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5, \quad 61 = 61, \quad 62 = 2 \cdot 31, \quad 63 = 3^2 \cdot 7, \quad 64 = 2^6, \quad 65 = 5 \cdot 13, \quad 66 = 2 \cdot 3 \cdot 11, \quad 67 = 67, \quad 68 = 2^2 \cdot 17, \quad 69 = 3 \cdot 23, \quad 70 = 2 \cdot 5 \cdot 7, \quad 71 = 71, \quad 72 = 2^3 \cdot 3^2, \quad 73 = 73, \quad 74 = 2 \cdot 37, \quad 75 = 3 \cdot 5^2, \quad 76 = 2^2 \cdot 19, \quad 77 = 7 \cdot 11, \quad 78 = 2 \cdot 3 \cdot 13, \quad 79 = 79, \quad 80 = 2^4 \cdot 5, \quad 81 = 3^4, \quad 82 = 2 \cdot 41, \quad 83 = 83, \quad 84 = 2^3 \cdot 3 \cdot 7, \quad 85 = 5 \cdot 17, \quad 86 = 2 \cdot 43, \quad 87 = 3 \cdot 29, \quad 88 = 2^3 \cdot 11, \quad 89 = 89, \quad 90 = 2 \cdot 3^2 \cdot 5, \quad 91 = 7 \cdot 13, \quad 92 = 2^3 \cdot 23, \quad 93 = 3 \cdot 31, \quad 94 = 2 \cdot 47, \quad 95 = 5 \cdot 19, \quad 96 = 2^5 \cdot 3, \quad 97 = 97, \quad 98 = 2 \cdot 7^2, \quad 99 = 3^2 \cdot 11, \quad 100 = 2^2 \cdot 5^2$$

- N των φυσικών αριθμών
- N₀ των άκερων της αριθμητικής
- Z των άκερων αριθμών (αγέτων άκερων)
- Q των ρητών αριθμών
- R των πραγματικών αριθμών
- R' των θετικών πραγματικών αριθμών

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΑΘΗΝΑΙ 1976

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Τ. ΑΥΚΕΙΟΥ
(ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΣ)

ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΪΚΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΑΘΗΝΑΙ 1978

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ

Ν. ΒΑΡΟΥΧΑΚΗ — Β. ΣΤΑΪΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι

ΠΕΡΙ ΣΥΝΟΛΩΝ

1. ΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ

1.1 Σύμβολα. Κάθε λέξις τήν ὁποίαν μεταχειρίζομεθα, εἶναι τὸ *σύμβολον* μιᾶς ἔννοιᾳς. Τὰς διαφόρους μαθηματικὰς ἔννοιᾳς παριστῶμεν ὄχι μόνον με λέξεις ἀλλὰ καὶ με ἄλλα *σύμβολα* π.χ. με ἀπλᾶ γράμματα ἢ ἄλλα γραφικὰ σήματα καὶ συνδυασμοὺς αὐτῶν. Π.χ.

«ἡ εὐθεῖα AB », «ὁ ἀριθμὸς 5 », « \vec{AB} », « $ax + \beta = 0$ », « $\sqrt{\alpha}$ ».

1.2 Ἴσότης. Δύο σύμβολα x καὶ y δύνανται νὰ παριστοῦν τὴν αὐτὴν ἔννοιαν ἢ καὶ ἔννοιᾳς, αἱ ὁποῖαι θεωροῦνται ἀπὸ μίαν ὠρισμένην ἔποψιν ταυ-τόσημοι. Εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν γράφομεν $x = y$, χρησιμοποιοῦντες τὸ σύμ-βολον $=$ τῆς *ἰσότητος*. Ἡ ἄρνησις τοῦ $x = y$ προίσταται με $x \neq y$ (τὸ σύμ-βολον \neq ἀναγιγνώσκεται «διαφορὸν τοῦ»). Π.χ.

$$5 = 5, 5 = 2 + 3, \eta\mu \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}, \frac{2}{3} = \frac{20}{30}, 3 \neq 4.$$

1.3 Σύνολα - Στοιχεῖα. Εἰς ὠρισμένας περιπτώσεις μία ἔννοια δύναται νὰ νοηθῆται ὡς *σύνολον* ὠρισμένων καὶ διακεκριμένων ἄλλων ἔννοιῶν τῶν *στοι-χεῖων* του. Π.χ. μία εὐθεῖα ὡς σύνολον τῶν σημείων τῆς, μία τάξις ὡς σύνολον τῶν μαθητῶν τῆς κ.ο.κ. Ἄλλὰ καὶ ἓν σύνολον δύναται νὰ εἶναι στοιχεῖον ἄλλου συνόλου. Π.χ. μία εὐθεῖα στοιχεῖον μιᾶς πρισματικῆς ἐπιφανείας, μία τάξις στοι-χεῖον ἑνὸς σχολείου θεωρουμένου ὡς σύνολον τάξεων κ.λ.π. Ἄξιοσημεῖωτα σύν-ολα ἀριθμῶν με τὰ ὁποῖα ἤδη ἔχομεν ἀσχοληθῆ εἶναι τὰ σύνολα :

N	τῶν φυσικῶν ἀριθμῶν
N_0	τῶν ἀκεραίων τῆς ἀριθμητικῆς
Z	τῶν ἀκεραίων ἀριθμῶν (σχετικῶν ἀκεραίων)
Q	τῶν ρητῶν ἀριθμῶν
R	τῶν πραγματικῶν ἀριθμῶν
R^+	τῶν θετικῶν πραγματικῶν ἀριθμῶν
R_0^+	τῶν μὴ ἀρνητικῶν πραγματικῶν ἀριθμῶν
C	τῶν μιγαδικῶν ἀριθμῶν.

Τὴν ἔκφρασιν «τὸ x εἶναι στοιχεῖον τοῦ E » γράφομεν $x \in E$ (ἢ καί: $E \ni x$, ὁπότε καὶ ἀναγιγνώσκομεν «ἐκ τοῦ συνόλου E τὸ στοιχεῖον x ») χρησιμοποιοῦντες τὸ σύμβολον \in τοῦ ἀνήκειν εἰς σύνολον. Τὴν ἄρνησιν αὐτῆς θὰ συμβολίζωμεν μὲ $x \notin E$ (ἢ καί : $E \not\ni x$) καὶ γενικῶς τὴν ἄρνησιν τῆς ἔννοιας τὴν ὁποῖαν παριστᾷ ἓν σύμβολον θὰ σημειώωμεν διὰ διαγραφῆς τούτου μὲ μίαν γραμμὴν.

Παρατήρησις. Ἀντὶ τοῦ ὅρου στοιχεῖον χρησιμοποιεῖται ἰσοδυνάμως καὶ ὁ ὅρος σημεῖον καὶ μάλιστα οὗτος εἶναι λίαν ἐπιτυχῆς εἰς τὴν περίπτωσιν τοῦ συνόλου R τῶν πραγματικῶν ἀριθμῶν καὶ τοῦ συνόλου C τῶν μιγαδικῶν ἀριθμῶν, τὰ στοιχεῖα τῶν ὁποίων, ὡς ἤδη γνωρίζομεν, παρίστανται διὰ τῶν σημείων μιᾶς εὐθείας ἢ ἐνὸς ἐπιπέδου ἀντιστοίχως.

1.4 Προτασιακὸς τύπος - Συνθήκη. Εἰς τὰ μαθηματικὰ χρησιμοποιοῦνται συχνὰ ἔκφράσεις ὡς αἱ ἀκόλουθοι :

« x εἶναι ἀκέραιος »

« x εἶναι ἰσοσκελὲς τρίγωνον »

« x διαιρεῖ τὸν ἀριθμὸν 10 »

« $x \in E$ », αἱ ὁποῖαι καὶ ἀποδίδουν ὠρισμένας ιδιότητες εἰς τὸ x .

Ἐκφράσεις περιέχουσαι ἓν σύμβολον x , ὡς αἱ ἀνωτέρω, χαρακτηρίζονται, ὡς εἶναι γνωστὸν ἐκ τῶν μαθημάτων τῶν προηγουμένων τάξεων, διὰ τοῦ ὅρου *προτασιακὸς τύπος περιέχων ἓν σύμβολον x* . Ἄν εἰς ἓνα προτασιακὸν τύπον $p(x)$, περιέχοντα ἓν σύμβολον x , ἀντικαταστήσωμεν τὸ σύμβολον x μὲ ἓν συγκεκριμένον στοιχεῖον α ἢ, ὡς λέγομεν, τὸ x λάβῃ ὡς τιμὴν τὸ α , τότε, ἐξ ὀρισμοῦ, ὁ προτασιακὸς τύπος καθίσταται πρότασις τὴν ὁποῖαν συμβολίζομεν μὲ $p(\alpha)$. Π.χ.

$p(x)$: Ὁ x εἶναι φυσικὸς ἀριθμὸς

$p(2)$: Ὁ 2 εἶναι φυσικὸς ἀριθμὸς (ἀληθής)

$p\left(\frac{3}{4}\right)$: Ὁ $\frac{3}{4}$ εἶναι φυσικὸς ἀριθμὸς (ψευδής)

Συνθῆως εἰς ἓνα προτασιακὸν τύπον $p(x)$ ὑποτίθεται ὅτι τὸ x λαμβάνει ὡς τιμὰς τὰ στοιχεῖα ἑνὸς συγκεκριμένου συνόλου E , ἥτοι ὡς λέγομεν, τὸ x διατρέχει τὸ E . Τότε τὸ x καλεῖται *μεταβλητή*, ὃ δὲ προτασιακὸς τύπος *συνθήκη εἰς τὸ E* . Οὕτως, ἡ ἐξίσωσις

$$x^2 - x + 2 = 0,$$

ἢ ὁποῖα εἶναι προτασιακὸς τύπος (διατί;) γράφεται μὲ τὴν προϋπόθεσιν ὅτι τὸ x εἶναι ἀριθμὸς. Εἶναι λοιπὸν ἡ ἐξίσωσις αὕτη μίᾳ συνθήκῃ εἰς ἓν σύνολον ἀριθμῶν π.χ. τὸ R ἢ τὸ C .

Ἄν $p(x)$ εἶναι μίᾳ συνθήκῃ εἰς τὸ σύνολον E , τότε θὰ λέγομεν ὅτι *ἓν στοιχεῖον α τοῦ E πληροῖ τὴν συνθήκην αὐτήν* τότε καὶ μόνον τότε, ἂν ἡ πρότασις $p(\alpha)$ εἶναι ἀληθής. Ἄν ἐπὶ πλέον κάθε στοιχεῖον τοῦ E πληροῖ τὴν συνθήκην $p(x)$, τότε ἡ συνθήκη αὕτη καλεῖται *ταυτότης εἰς τὸ E* . Οὕτως :

« Ὁ x εἶναι φυσικὸς ἀριθμὸς » εἶναι ταυτότης εἰς τὸ N

« $(x + 1)^2 = x^2 + 2x + 1$ » εἶναι ταυτότης εἰς τυχὸν σύνολον ἀριθμῶν

« $x^2 + 1 \geq 1$ » εἶναι ταυτότης εἰς τὸ R .

Επίσης, αν $p(x)$ και $q(x)$ είναι συνθήκαι εις τὸ σύνολον E , θὰ λέγωμεν ὅτι ἡ συνθήκη $p(x)$ συνεπάγεται τὴν συνθήκην $q(x)$ καὶ θὰ συμβολίζωμεν τοῦτο μὲ $p(x) \Rightarrow q(x)$ τότε καὶ μόνον τότε, ἂν κάθε στοιχείου τοῦ E τὸ ὁποῖον πληροῖ τὴν $p(x)$, πληροῖ καὶ τὴν $q(x)$.

Αἱ συνθήκαι $p(x)$ καὶ $q(x)$ καλοῦνται *ισοδύναμοι* τότε καὶ μόνον τότε, ἂν $p(x) \Rightarrow q(x)$ καὶ $q(x) \Rightarrow p(x)$. Τὴν ἰσοδυναμίαν τῶν συνθηκῶν $p(x)$ καὶ $q(x)$ συμβολίζωμεν μὲ $p(x) \Leftrightarrow q(x)$ καὶ ἀναγινώσκομεν «ἡ συνθήκη $p(x)$ εἶναι ἰσοδύναμος πρὸς τὴν $q(x)$ ». Ἐάν θέλωμεν νὰ δηλώσωμεν ὅτι ἡ ἰσοδυναμία $p(x) \Leftrightarrow q(x)$ δύο συνθηκῶν ὑφίσταται ἐξ ὀρισμοῦ, τότε χρησιμοποιοῦμεν τὸ σύμβολον $\overset{\text{ορισ}}{\Leftrightarrow}$, δηλαδὴ γράφομεν $p(x) \overset{\text{ορισ}}{\Leftrightarrow} q(x)$.

1.5 Ἄλγεβρα συνόλων. Κατὰ τὴν ἐπεξεργασίαν ἐνὸς μαθηματικοῦ θέματος, κατὰ κανόνα, ὑπεισέρχονται ἀποκλειστικῶς τὰ στοιχεῖα ἐνὸς συνόλου Ω , τὸ ὁποῖον καλεῖται *βασικὸν σύνολον*. Π.χ. εἰς μὲν διάφορα προβλήματα τῆς ἀλγέβρας ἔχομεν ἤδη θεωρήσει ὡς βασικὸν σύνολον τὸ σύνολον \mathbb{R} τῶν πραγματικῶν ἀριθμῶν, εἰς δὲ τὴν ἐπεξεργασίαν ὠρισμένων γεωμετρικῶν προβλημάτων ὡς βασικὸν σύνολον Ω ἔχομεν θεωρήσει τὸ σύνολον ἑλλων τῶν ἐπιπέδων σχημάτων. Ἐστῶσαν A καὶ B δύο σύνολα μὲ στοιχεῖα ἐκ τοῦ βασικοῦ συνόλου Ω . Ὡς γνωστὸν, λέγομεν ὅτι τὸ σύνολον A εἶναι ὑποσύνολον τοῦ B καὶ συμβολίζωμεν τοῦτο μὲ $A \subseteq B$ τότε καὶ μόνον τότε, ἂν ἡ συνθήκη $x \in A$ συνεπάγεται τὴν $x \in B$. Συντόμως :

$$A \subseteq B \overset{\text{ορισ}}{\Leftrightarrow} (x \in A \Rightarrow x \in B).$$

Επίσης ἡ *ἰσότης* δύο συνόλων καὶ ἡ ἔννοια τοῦ *γνησίου ὑποσυνόλου* (συμβολιζομένη μὲ \subset) ὀρίζονται, ὡς γνωστὸν, ὡς κάτωθι :

$$A = B \overset{\text{ορισ}}{\Leftrightarrow} A \subseteq B \text{ καὶ } B \subseteq A$$

$$A \subset B \overset{\text{ορισ}}{\Leftrightarrow} A \subseteq B \text{ καὶ } A \neq B.$$

Μία συνθήκη $p(x)$ εἰς τὸ βασικὸν σύνολον Ω ὀρίζει τὸ σύνολον S ὅλων τῶν στοιχείων τοῦ Ω , τὰ ὁποῖα πληροῦν ταύτην. Τοῦτο παριστῶμεν μὲ $\{x \in \Omega : p(x)\}$, ἤτοι $S = \{x \in \Omega : p(x)\}$. Π.χ. ἂν $\Omega = \mathbb{R}$, ἡ συνθήκη $x^2 - 1 = 0$ ὀρίζει τὸ σύνολον $S = \{x \in \mathbb{R} : x^2 - 1 = 0\} = \{-1, 1\}$. Ἄλλα ἀξιοσημείωτα ὑποσύνολα τοῦ \mathbb{R} ὀριζόμενα ὑπὸ συνθηκῶν εἶναι τὰ ἀκόλουθα, γνωστὰ ὡς διαστήματα τοῦ \mathbb{R} :

1. Ἀνοικτὸν διάστημα μὲ ἄκρα α, β ($\alpha < \beta$) :
 $(\alpha, \beta) = \{x \in \mathbb{R} : \alpha < x < \beta\}$
2. Κλειστὸν διάστημα μὲ ἄκρα α, β ($\alpha < \beta$) :
 $[\alpha, \beta] = \{x \in \mathbb{R} : \alpha \leq x \leq \beta\}$
3. Ἀνοικτὸν ἀριστερά, κλειστὸν δεξιὰ διάστημα μὲ ἄκρα α, β ($\alpha < \beta$) :
 $(\alpha, \beta] = \{x \in \mathbb{R} : \alpha < x \leq \beta\}$
4. Κλειστὸν ἀριστερά, ἀνοικτὸν δεξιὰ διάστημα μὲ ἄκρα α, β ($\alpha < \beta$) :
 $[\alpha, \beta) = \{x \in \mathbb{R} : \alpha \leq x < \beta\}$

5. Ἀπέραντον ἀριστερά, ἀνοικτὸν δεξιὰ διάστημα μεῖ ἄκρον β :
 $(-\infty, \beta) = \{x \in \mathbb{R} : x < \beta\}$
6. Ἀπέραντον ἀριστερά, κλειστὸν δεξιὰ διάστημα μεῖ ἄκρον β :
 $(-\infty, \beta] = \{x \in \mathbb{R} : x \leq \beta\}$
7. Ἀπέραντον δεξιὰ, ἀνοικτὸν ἀριστερὰ διάστημα μεῖ ἄκρον α :
 $(\alpha, +\infty) = \{x \in \mathbb{R} : \alpha < x\}$
8. Ἀπέραντον δεξιὰ, κλειστὸν ἀριστερὰ διάστημα μεῖ ἄκρον α :
 $[\alpha, +\infty) = \{x \in \mathbb{R} : \alpha \leq x\}$

Ἐπίσης παρατηροῦμεν ὅτι καὶ κάθε ὑποσύνολον S ἐνὸς βασικοῦ συνόλου Ω δύναται νὰ παρασταθῆ, ὡς ἀνωτέρω, διὰ μιᾶς συνθήκης, τῆς συνθήκης $x \in S$. Οὕτως ἔχομεν $S = \{x \in \Omega : x \in S\}$.


Τὸ σύνολον ὄλων τῶν ὑποσυνόλων ἐνὸς βασικοῦ συνόλου Ω συμβολίζομεν μεῖ $\mathcal{P}(\Omega)$. Εἰς τοῦτο ὀρίζονται, ὡς γνωστόν, αἱ πράξεις $\cup, \cap, -$ ὑπὸ τῶν τύπων :

$$A \cup B = \{x \in \Omega : x \in A \text{ ἢ } x \in B\}$$


$$A \cap B = \{x \in \Omega : x \in A \text{ καὶ } x \in B\}$$

$$A - B = \{x \in \Omega : x \in A \text{ καὶ } x \notin B\}$$


Μία ἐπιποπτικὴ ἐρμηνεῖα τῶν πράξεων τούτων δίδεται εἰς τὰ κάτωθι σχήματα :



Σχ. 1 $A \cup B$



Σχ. 2 $A \cap B$



Σχ. 3 $A - B$

Τὸ κενὸν σύνολον \emptyset εἶναι, ὡς γνωστόν, ἡ διαφορὰ $A - A$, ὅπου A τυχόν ὑποσύνολον τοῦ Ω . Ἐπίσης τὸ συμπλήρωμα A^c ἐνὸς συνόλου A , ὑποσυνόλου τοῦ βασικοῦ συνόλου Ω , ὀρίζεται, ὡς γνωστόν, ὡς ἡ διαφορὰ $\Omega - A$, ἥτοι :

$$A^c = \Omega - A = \{x \in \Omega : x \notin A\}$$

Μεταξὺ τῶν πράξεων $\cup, \cap, -$ ὑφίστανται οἱ κάτωθι τύποι (ταυτότητες εἰς τὸ $\mathcal{P}(\Omega)$), γνωστοὶ εἰς ἡμᾶς ἐκ τῶν μαθημάτων τῶν προηγουμένων τάξεων :

$$\begin{aligned} A \cup B &= B \cup A \\ A \cup (B \cap \Gamma) &= (A \cup B) \cap \Gamma \\ A \cup \emptyset &= A \\ A \cup (A \cap B) &= A \\ (A - B) \cup B &= A \cup B \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A \cap B &= B \cap A \\ A \cap (B \cap \Gamma) &= (A \cap B) \cap \Gamma \\ A \cap \Omega &= A \\ A \cap (A \cup B) &= A \\ (A - B) \cap B &= \emptyset \end{aligned}$$

$$A \cap (B \cup \Gamma) = (A \cap B) \cup (A \cap \Gamma)$$

1.6 Ζεβγος - Καρτεσιανὸν γινόμενον. Ἐν στοιχείου α διδόμενον ὡς πρῶτον

καί ἔν στοιχείου β διδόμενον ὡς *δεύτερον* σχηματίζουν ἔν νέον στοιχείου, τὸ ὁποῖον γράφεται (α, β) καί καλεῖται *ζεύγος* (διατεταγμένον). Τὰ στοιχεῖα α καί β τοῦ ζεύγους καλοῦνται *πρώτη* καί *δευτέρα*, ἀντιστοίχως, *συντεταγμένη* (ἢ *προβολή*) τοῦ ζεύγους.

Ἐκ τοῦ ἀνωτέρω ὀρισμοῦ τοῦ ζεύγους συνάγεται ὅτι δύο ζεύγη εἶναι ἴσα, ὅταν ὄχι μόνον σχηματίζονται ἀπὸ τὰ ἴδια στοιχεῖα, ἀλλὰ τὰ στοιχεῖα αὐτὰ δίδονται καί με τὴν αὐτὴν διαδοχὴν, δηλαδὴ

$$(\alpha, \beta) = (\gamma, \delta) \Leftrightarrow \alpha = \gamma \text{ καί } \beta = \delta.$$

Καθ' ὅμοιον τρόπον ὀρίζεται μία (διατεταγμένη) τριάς $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ ἢ μία νιάς $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$.

Παραδείγματα :

1. Ἐν κλάσμα με ἀριθμητὴν α καί παρονομαστὴν β δύναται νὰ παρασταθῇ ὡς ζεύγος (α, β) .
2. Εἰς μιγαδικὸς ἀριθμὸς $\alpha + \beta i$ δύναται νὰ παρασταθῇ ὡς ζεύγος (α, β) .
3. Εἰς ἀγών μεταξύ δύο ομάδων α καί β δύναται νὰ παρασταθῇ ὡς ζεύγος (α, β) ἢ (β, α) ἀναλόγως τοῦ ἐὰν διεξάγεται εἰς τὴν ἔδραν τῆς α ἢ τῆς β ἀντιστοίχως.

Ἐστῶσαν τώρα δύο σύνολα A καί B . Τὸ σύνολον τῶν ζευγῶν (α, β) με $\alpha \in A$ καί $\beta \in B$ γράφεται $A \times B$ καί καλεῖται *καρτεσιανὸν γινόμενον τοῦ A ἐπὶ τοῦ B* . Ἦτοι :

$$A \times B = \{ (x, y) : x \in A \text{ καί } y \in B \}.$$

Ὁμοίως ὀρίζεται τὸ γινόμενον $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$ ὡς τὸ σύνολον τῶν νιάδων $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ με $\alpha_k \in A_k$ διὰ κάθε $k \in \{1, 2, \dots, n\}$ (ἢ, ὡς λέγομεν, καί ἄλλως: διὰ κάθε $k = 1, 2, \dots, n$). Εἰδικώτερον τὸ $A \times A$ συμβολίζεται με A^2 , τὸ $A \times A \times A$ με A^3 κ.ο.κ.

Τὸ σύνολον Δ τῶν ζευγῶν (α, α) με $\alpha \in A$ καλεῖται *διαγώνιος* τοῦ A^2 . Προφανῶς $\Delta \subseteq A^2$.

Παραδείγματα :

$$1. A = \{ \alpha, \beta, \gamma \}, B = \{ 1, 2 \}$$

$$A \times B = \{ (\alpha, 1), (\alpha, 2), (\beta, 1), (\beta, 2), (\gamma, 1), (\gamma, 2) \}$$

$$B \times A = \{ (1, \alpha), (1, \beta), (1, \gamma), (2, \alpha), (2, \beta), (2, \gamma) \} \neq A \times B.$$

2. Ἄν A εἶναι τὸ σύνολον τῶν ποδοσφαιρικῶν ομάδων, αἱ ὅποια λαμβάνουν μέρος εἰς ἔν πρωτάθλημα, τότε τὸ σύνολον τῶν ἀγώνων τοῦ πρωταθλήματος εἶναι $A^2 - \Delta$, ἐφ' ὅσον τὸ πρωτάθλημα διεξάγεται εἰς δύο γύρους (διατί:).

Παρατηρήσεις. Μία ἔκφρασις περιέχουσα δύο σύμβολα x καί y δύναται νὰ θεωρηθῇ ὡς περιέχουσα ἔν σύμβολον, τὸ ζεύγος (x, y) . Π.χ. αἱ ἔκφρασεις:

« Τὸ κλάσμα $\frac{x}{y}$ εἶναι ἀνάγωγον »

« $0 < x$ διαιρεῖ τὸν y »

« $x^2 + 2y^2 = 2$ »

καλούνται *προτασιακοί τύποι περιέχοντες δύο σύμβολα* x και y και δύνανται να θεωρηθούν ως προτασιακοί τύποι περιέχοντες *έν σύμβολον*, τὸ ζεύγος (x,y) . Κατ' ἀναλογίαν ὀρίζονται καὶ προτασιακοί τύποι περιέχοντες τρία σύμβολα η καὶ περισσότερα (πεπερασμένα) τοιαῦτα.

2. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΙ – ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ


2.1 Ἀντιστοιχία. Δύο στοιχεῖα τοῦ αὐτοῦ ἢ διαφορετικῶν συνόλων δύνανται νὰ συνδέωνται λογικῶς, νὰ συσχετίζωνται. Π.χ. ὅταν λέγωμεν «τὸ τρίγωνον ΑΒΓ ἔχει ἔμβαδὸν 100m^2 » συσχετίζομεν ἔν *τρίγωνον* με ἓνα *ἀριθμὸν*, ἢ ὅταν λέγωμεν «ὁ ἀριθμὸς 25 εἶναι τετράγωνον τοῦ 5» συσχετίζομεν δύο *ἀριθμοὺς* κ.ο.κ. Κατωτέρω ἐξετάζομεν τοιαύτας συσχετίσεις στοιχείων δύο συνόλων, τὰ ὅποια δὲν εἶναι ἀναγκαίως διαφορετικά.

Ἔστωσαν Α καὶ Β δύο μὴ κενὰ σύνολα καὶ εἷς συγκεκριμένους τρόπος (π.χ. εἷς κανὼν ἢ μία διαδικασία) με τὸν ὅποιον εἶναι δυνατὸν τούλάχιστον ἔν $x \in A$ νὰ συσχετίζεται με ἓν ἢ περισσότερα $y \in B$. Θὰ λέγωμεν τότε ὅτι ὠρίσθη μία *ἀντιστοιχία* ἢ *ἀπεικόνισις* σ ἐκ τοῦ Α εἰς τὸ Β. Θὰ σημειώσωμεν δὲ

$\sigma : A \rightarrow B$ διὰ τὰ σύνολα

$x \xrightarrow{\sigma} y$ διὰ τὰ συσχετιζόμενα στοιχεῖα.

Μία ἐποπτική ἐρμηνεία τῆς ἀπεικόνισεως δίδεται εἰς τὸ κάτωθι σχῆμα :



Σχ. 4

Τὸ σύνολον Α καλεῖται *σύνολον ἀφετηρίας* τῆς σ . Τὸ σύνολον Β καλεῖται *σύνολον ἀφίξεως* τῆς σ , ἢ δὲ ἔκφρασις $x \xrightarrow{\sigma} y$ (ἢ ὅποια εἶναι ἡ συμβολικὴ μορφή τοῦ τρόπου, βάσει τοῦ ὁποίου καθορίζονται τὰ ἀντίστοιχα στοιχεῖα) καλεῖται *τύπος τῆς* σ . Ἡ ἔκφρασις $x \xrightarrow{\sigma} y$ ἀναγιγνώσκεται «τὸ x ἀντιστοιχίζεται (ἢ ἀπεικονίζεται) διὰ τῆς σ εἰς τὸ y » ἢ «τὸ y εἶναι ἀντίστοιχον (ἢ εἰκὼν) τοῦ x διὰ τῆς σ ».

Ἔστωσαν τὰ στοιχεῖα $x \in A$, τὰ ὅποια ἔχουν (τούλάχιστον ἓν) ἀντίστοιχον $y \in B$, ἀποτελοῦν ἓν σύνολον $\mathcal{D}(\sigma)$ τὸ ὅποιον καλεῖται *πεδῖον ὀρισμοῦ* (*domain*) τῆς ἀντιστοιχίας σ . Εἶναι λοιπὸν :

$$\mathcal{D}(\sigma) = \{x \in A : \exists y \in B \text{ με } x \xrightarrow{\sigma} y\} \subseteq A \quad (1)$$

(1) « \exists ...» σημαίνει «ὑπάρχει (τούλάχιστον ἓν)».

Όλα τα στοιχεία $y \in B$, τα όποια είναι αντίστοιχα ενός (τουλάχιστον) $x \in A$, αποτελούν έν σύνολον $\mathcal{R}(\sigma)$ το όποιον καλείται πεδόν τιμών (range) τής αντίστοιχίας σ . Είναι λοιπόν:

$$\mathcal{R}(\sigma) = \{y \in B : \exists x \in A \text{ με } x \xrightarrow{\sigma} y\} \subseteq B.$$

Έε όρισμοϋ τής. αντίστοιχίας ισχύει $\mathcal{D}(\sigma) \neq \emptyset$ και $\mathcal{R}(\sigma) \neq \emptyset$ (διατί;).

Όλα τα ζεύγη (x, y) διά τα όποια ισχύει $x \xrightarrow{\sigma} y$ αποτελούν έν σύνολον S_σ , υποσύνολον του $\mathcal{D}(\sigma) \times \mathcal{R}(\sigma)$ άρα και του $A \times B$, το όποιον καλείται γράφημα (graph) τής αντίστοιχίας σ . Είναι λοιπόν:

$$S_\sigma = \{(x, y) \in A \times B : x \xrightarrow{\sigma} y\} \neq \emptyset.$$

Όστε κάθε αντίστοιχία $\sigma : A \rightarrow B$ έχει έν γράφημα $S_\sigma \subseteq A \times B$, αλλά και αντίστροφως κάθε μη κενόν σύνολον S , υποσύνολον του $A \times B$ όρίζει μίαν αντίστοιχίαν σ_S με τύπον:

$$x \xrightarrow{\sigma_S} y \Leftrightarrow (x, y) \in S$$

και ή όποια έχει γράφημα τό S , ήτοι $S_{\sigma_S} = S$ (διατί;).

Παραδείγματα:

1. $A = B = \mathbb{R}$, $x \xrightarrow{\sigma} y \Leftrightarrow x^2 + 2y^2 = 1$.

$x^2 + 2y^2 = 1 \Rightarrow 1 - x^2 = 2y^2 \geq 0 \Rightarrow x^2 \leq 1 \Rightarrow \mathcal{D}(\sigma) \subseteq [-1, 1]$. Άλλά και $[-1, 1] \subseteq \mathcal{D}(\sigma)$, διότι άν $x \in [-1, 1]$, τότε ύπάρχει y , π.χ. $y = \sqrt{\frac{1-x^2}{2}}$ με $x \xrightarrow{\sigma} y$ (διατί;).

Άρα $\mathcal{D}(\sigma) = [-1, 1]$.

$x^2 + 2y^2 = 1 \Rightarrow 1 - 2y^2 = x^2 \geq 0 \Rightarrow y^2 \leq \frac{1}{2} \Rightarrow \mathcal{R}(\sigma) \subseteq \left[-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right]$. Άλ-

λά και $\left[-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right] \subseteq \mathcal{R}(\sigma)$, διότι άν $y \in \left[-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right]$, τότε ύπάρχει x ,

π.χ. $x = \sqrt{1-2y^2}$, με $x \xrightarrow{\sigma} y$ (διατί;). Άρα $\mathcal{R}(\sigma) = \left[-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right]$.

2. $A = B = \mathbb{R}$, $x \xrightarrow{\sigma} y \Leftrightarrow (x^2 + 1)y^2 - x^2 = 0$.

Έν πρώτοις παρατηρούμεν ότι διά κάθε $x \in \mathbb{R}$ ύπάρχει y , π.χ. $y = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$, με $x \xrightarrow{\sigma} y$ (διατί;). Άρα $\mathcal{D}(\sigma) = \mathbb{R}$.

$(x^2 + 1)y^2 - x^2 = 0 \Rightarrow y^2 = \frac{x^2}{x^2+1} < 1 \Rightarrow \mathcal{R}(\sigma) \subseteq (-1, 1)$. Άλλά και $(-1, 1) \subseteq \mathcal{R}(\sigma)$,

διότι άν $y \in (-1, 1)$, τότε ύπάρχει x , π.χ. $x = \frac{y}{\sqrt{1-y^2}}$, με $x \xrightarrow{\sigma} y$ (διατί;). Άρα $\mathcal{R}(\sigma) = (-1, 1)$.

3. $A = B = \mathbb{R}$, $x \xrightarrow{\sigma} y \Leftrightarrow (y^2 + 1)x^2 - y^2 = 0$.

Ίσχύουν $\mathcal{D}(\sigma) = (-1, 1)$ και $\mathcal{R}(\sigma) = \mathbb{R}$ (διατί;).

4. $A = B = \mathbb{R}$. $x \xrightarrow{\sigma} y \Leftrightarrow x + y < 1$.

Ίσχύουν $\mathcal{D}(\sigma) = \mathbb{R}$ και $\mathcal{R}(\sigma) = \mathbb{R}$ (διατί);.


Έπειδή $\mathcal{D}(\sigma) \subseteq A$ και $\mathcal{R}(\sigma) \subseteq B$ μεταχειριζόμεθα ειδικότερον τὰς ἐκφράσεις «ἀντιστοιχία τοῦ $A \dots$ » (ἀντί ἐκ τοῦ), ὅταν θέλωμεν νὰ δηλώσωμεν ὅτι $\mathcal{D}(\sigma) = A$ καὶ «ἀντιστοιχία... ἐπὶ τοῦ B », ὅταν θέλωμεν νὰ δηλώσωμεν ὅτι $\mathcal{R}(\sigma) = B$. Οὕτως ἡ ἀντιστοιχία

τοῦ παραδείγματος 2 εἶναι τοῦ \mathbb{R} εἰς τὸ \mathbb{R}


τοῦ παραδείγματος 3 εἶναι ἐκ τοῦ \mathbb{R} ἐπὶ τοῦ \mathbb{R}

τοῦ παραδείγματος 4 εἶναι τοῦ \mathbb{R} ἐπὶ τοῦ \mathbb{R} .


Γεωμετρικὴ (ἢ γραφικὴ) παράστασις ἀντιστοιχίας. Εἰς τὴν περίπτωσιν, ὅπου τόσο τὸ σύνολον ἀφετηρίας μῆς ἀντιστοιχίας $\sigma : A \rightarrow B$, ὅσον καὶ τὸ σύνολον ἀφίξεως αὐτῆς εἶναι ὑποσύνολα τοῦ συνόλου \mathbb{R} τῶν πραγματικῶν ἀριθμῶν, τὸ γράφημα S_σ αὐτῆς ἀποτελεῖται ἀπὸ ζεύγη πραγματικῶν ἀριθμῶν (x, y) , τὰ ὁποῖα, ὡς γνωστόν, παρίστανται διὰ σημείων P τοῦ ἐπιπέδου ὡς ἐμφαίνεται εἰς τὸ σχ. 5. Οὕτω τὸ γράφημα S_σ παρίσταται δι' ἑνὸς σημειοσυνόλου τοῦ ἐπιπέδου (βλ. σχ. 6), τὸ ὁποῖον καλεῖται *γεωμετρικὴ (ἢ γραφικὴ) παράστασις* τῆς ἀντιστοιχίας σ ἢ ἀκόμη καὶ *διάγραμμα* τῆς σ .



Σχ. 5




Σχ. 6




Σχ. 7

ἀντιστοιχία τοῦ A εἰς τὸ B



Σχ. 8

ἀντιστοιχία ἐκ τοῦ A ἐπὶ τοῦ B



Σχ. 9

ἀντιστοιχία τοῦ A ἐπὶ τοῦ B

Άντιστροφος αντιστοιχία. Έστω ή αντιστοιχία $\sigma : A \rightarrow B$ τής όποιάς τό γράφημα είναι

$$S_{\sigma} = \{ (x, y) \in A \times B : x \xrightarrow{\sigma} y \} \neq \emptyset.$$

Δι' έναλλαγής τής διαδοχής τών στοιχείων του ζεύγους (x, y) προκύπτει τό ακόλουθον ύποσύνολον του καρτεσιανού γινομένου $B \times A$

$$S^* = \{ (y, x) \in B \times A : (x, y) \in S_{\sigma} \},$$

τό όποιον προφανώς είναι επίσης μή κενόν σύνολον.

Ός είδομεν άνωτέρω τό σύνολον S^* όρίζει μίαν αντιστοιχίαν έκ του B εις τό A μέ τύπον :

$$y \xrightarrow{\sigma^*} x \Leftrightarrow (y, x) \in S^*.$$

Έπειδή δέ $(y, x) \in S^* \Leftrightarrow (x, y) \in S_{\sigma} \Leftrightarrow x \xrightarrow{\sigma} y$, θά ισχύη και

$$y \xrightarrow{\sigma^*} x \Leftrightarrow x \xrightarrow{\sigma} y.$$

Άν λοιπόν έν σημείον x αντιστοιχίζεται διά τής σ εις τό y , τότε τό τελευταίον τούτο διά τής σ^* αντιστοιχίζεται πάλιν εις τό x . Η αντιστοιχία σ^* καλείται **άντιστροφος αντιστοιχία** τής σ και συμβολίζεται μέ σ^{-1} . Όστε

$$x \xrightarrow{\sigma} y \Leftrightarrow y \xrightarrow{\sigma^{-1}} x.$$

Άρα ή αντιστοιχία σ^{-1} έχει πεδίου όρισμοϋ τό πεδίου τιμών τής σ και πεδίου τιμών τό πεδίου όρισμοϋ τής σ , δηλαδή ισχύουν

$$\mathcal{D}(\sigma^{-1}) = \mathcal{R}(\sigma) \text{ και } \mathcal{R}(\sigma^{-1}) = \mathcal{D}(\sigma).$$

Παρατήρησις. Συνήθως, όταν πρόκειται νά μελετηθί μεμονωμένως ή σ^{-1} , έναλλάσσομεν τά x και y μεταξύ των, δηλαδή θεωρούμεν $x \in B$ και $y \in A$, ώστε τό x νά συμβολίζη πάντοτε τυχόν στοιχείον του συνόλου άφετηρίας. "Ητοι $x \xrightarrow{\sigma^{-1}} y$ (και ίσοδυνάμως $y \xrightarrow{\sigma} x$).

Παραδείγματα :

1. Η αντίστροφος αντιστοιχία τής αντιστοιχίας του παραδείγματος 1 δίδεται ύπό του τύπου

$$x \xrightarrow{\sigma^{-1}} y \Leftrightarrow y^2 + 2x^2 = 1.$$

2. Η αντίστροφος αντιστοιχία τής αντιστοιχίας του παραδείγματος 2 είναι ή αντιστοιχία του παραδείγματος 3.

3. Η αντίστροφος αντιστοιχία τής αντιστοιχίας του παραδείγματος 4 είναι ή ίδια.

Έπειδή, έξ όρισμοϋ τής αντιστρόφου αντιστοιχίας, είναι προφανής ή ίσοδυναμία

$$(x, y) \in S_{\sigma} \Leftrightarrow (y, x) \in S_{\sigma^{-1}}$$

και επειδη, όταν πρόκειται περι γραφημάτων εις το R^2 , τα σημεια $P = (x, y)$ και $P^* = (y, x)$ είναι συμμετρικά ως προς την πρώτην διχοτόμον d της γωνίας των άξόνων (βλ. σχ. 10), τα διαγράμματα των αντιστοιχιών σ και σ^{-1} θα είναι επίσης συμμετρικά ως προς την d .

Ως ειδομεν ανωτέρω, δια κάθε αντιστοιχίαν σ ισχύει

$$x \xrightarrow{\sigma} y \Leftrightarrow y \xrightarrow{\sigma^{-1}} x$$

και επομένως δια την αντίστροφον αντιστοιχίαν σ^{-1} τής σ θα ισχύη

$$y \xrightarrow{\sigma^{-1}} x \Leftrightarrow x \xrightarrow{(\sigma^{-1})^{-1}} y,$$

όπου $(\sigma^{-1})^{-1}$ είναι η αντίστροφος τής σ^{-1} . Άρα ισχύει και

$$x \xrightarrow{\sigma} y \Leftrightarrow x \xrightarrow{(\sigma^{-1})^{-1}} y,$$

δηλαδή η αντίστροφος τής αντίστροφου μιās αντιστοιχίας σ είναι η ίδια η σ . Συντόμως γράφομεν

$$(\sigma^{-1})^{-1} = \sigma.$$

Η ιδιότης αυτή έρμηνεύεται γεωμετρικώς τη βοηθεία τής συμμετρίας ως προς την διχοτόμον d (βλ. σχ. 10) των διαγραμμάτων των αντιστοιχιών σ και σ^{-1} (διατί:).

2.2 Συνάρτησις. Η έννοια τής συναρτήσεως είναι από τās θεμελιώδεις μαθηματικās έννοιās. Την όρίζομεν ως ειδικήν αντιστοιχίαν.

Μία αντιστοιχία f του A εις το B καλεΐται *συνάρτησις* τότε και μόνον τότε, αν κάθε $x \in A$ έχη έν και μοναδικόν αντίστοιχον $y \in B$. Θα λέγωμεν τότε ότι η f είναι *συνάρτησις με πεδιον όρισμοϋ το A και τιμάς εις το B* ή η f είναι *μονοσήμαντος αντιστοιχία* (ή *μονοσήμαντος απεικόνισις*) του A εις το B και θα γράφομεν

$$f: A \rightarrow B \text{ ή } A \ni x \xrightarrow{f} y \in B.$$

Το y , αντίστοιχον (είκων) του x δια τής f , λέγεται και *τιμή τής f εις το x* , συμβολίζεται δε και με $f(x)$. Γράφομεν τότε :

$$y = f(x).$$

Άρα η έκφρασις $y = f(x)$ είναι άλλη μορφή του $x \xrightarrow{f} y$, δηλαδή ο τύπος τής f . Το $x \in A$ λέγεται *ανεξάρτητος μεταβλητή* τής f , το δε $y \in B$ *εξαρτημένη μεταβλητή* τής f .

Αν $B = R$, τότε η f λέγεται *πραγματική συνάρτησις*. Αν δε επί πλέον

Ισχύη και $A \subseteq \mathbb{R}$, τότε αυτή λέγεται *πραγματική συνάρτησις μιᾶς πραγματικής μεταβλητῆς* (διὰ τὸ διάγραμμα μιᾶς τοιαύτης συναρτήσεως βλ. σχ. 11).


Π.χ. διὰ τοῦ τύπου $\mathbb{R} \ni x \xrightarrow{f} x^2$ ὀρίζεται μία πραγματικὴ συνάρτησις μιᾶς πραγματικῆς μεταβλητῆς. Ὁμοίως καὶ διὰ τοῦ τύπου $x \xrightarrow{f} \sqrt{1-x^2}$ ὀρίζεται μία πραγματικὴ συνάρτησις μιᾶς πραγματικῆς μεταβλητῆς μὲ πεδίου ὀρισμοῦ τὸ διάστημα $[-1, 1]$. Ἀντίθετως παρατηροῦμεν ὅτι ἐκ τῶν ἀντιστοιχιῶν τῶν παραδειγμάτων τῆς προηγουμένης § 2.1 οὐδεμία εἶναι συνάρτησις (διατί;).

Τὸ σύνολον τῶν τιμῶν τῆς $f: A \rightarrow B$, δηλαδὴ τὸ πεδίου τιμῶν $\mathcal{R}(f)$ αὐτῆς συμβολίζεται καὶ μὲ $f(A)$, ἥτοι :


$$f(A) = \{y \in B : \exists x \in A \text{ μὲ } y = f(x)\}.$$

Γενικώτερον, ἂν $X \subseteq A$, τότε μὲ $f(X)$ συμβολίζομεν τὸ σύνολον τῶν τιμῶν τῆς f εἰς τὰ διάφορα στοιχεῖα τοῦ X (βλ. καὶ σχ. 12), ἥτοι :

$$f(X) = \{y \in B : \exists x \in X \text{ μὲ } y = f(x)\}.$$



Σχ. 11 $x \xrightarrow{f} y$



Σχ. 12

Ἀντίστροφος συνάρτησις. Ἐστω μία συνάρτησις $f: A \rightarrow B$. Ἀφοῦ ἡ f εἶναι ἀντιστοιχία τοῦ A εἰς τὸ B , ὑπάρχει ἡ ἀντίστροφος ἀντιστοιχία $f^{-1}: B \rightarrow A$ καὶ μάλιστα, ὡς γνωστόν, ἰσχύουν :

$$\mathcal{D}(f^{-1}) = \mathcal{R}(f) \text{ καὶ } \mathcal{R}(f^{-1}) = \mathcal{D}(f) = A.$$

Ἄν ἡ ἀντιστοιχία $f^{-1}: B \rightarrow A$ εἶναι ἐπίσης συνάρτησις, τότε αὐτὴ καλεῖται *ἀντίστροφος συνάρτησις τῆς f* , ὅποτε θὰ πρέπει νὰ ἰσχύουν :

1) $\mathcal{D}(f^{-1}) = B$, ἄρα $\mathcal{R}(f) = B$, τὸ ὅποιον σημαίνει ὅτι ἡ f πρέπει νὰ εἶναι ἀντιστοιχία ἐπὶ τοῦ B , δηλαδὴ κάθε $y \in B$ νὰ εἶναι ἀντίστοιχον διὰ τῆς f ἑνὸς $x \in A$.

2) Κάθε $y \in B$ νὰ ἔχη διὰ τῆς f^{-1} ἓν καὶ *μοναδικὸν* ἀντίστοιχον $x \in A$, ἄρα ἐκεῖνο ἀκριβῶς τοῦ ὁποῦ ἀντίστοιχον διὰ τῆς f εἶναι τὸ y .

Ὡστε, ἂν ἡ ἀντιστοιχία f^{-1} εἶναι συνάρτησις, τότε κάθε $y \in B$ εἶναι ἀντίστοιχον διὰ τῆς f ἑνὸς καὶ *μοναδικοῦ* $x \in A$, ἢ ὅπερ τὸ αὐτὸ (διατί;), $f(A) = B$ καὶ

$$\left. \begin{array}{l} x_1 \in A, x_2 \in A \\ x_1 \neq x_2 \end{array} \right\} \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2).$$

Μία συνάρτησις f πληροῦσα τὴν συνθήκην ταύτην καλεῖται *ἄμφιμονο-*

σήμαντος συνάρτησης (ή άπεικόνισις) του A επί του B. Τότε, βεβαίως, και η f^{-1} είναι άμφιμονοσήμαντος συνάρτησης του B επί του A (διατί ;). Ίσχύει φυσικά ή ισοδυναμία τών τύπων (βλ. σχ. 13) :


$$y = f(x) \leftrightarrow x = f^{-1}(y).$$



Σχ. 13


Άπεδείχθη λοιπόν άνωτέρω τό ακόλουθον θεώρημα.

2.2.1 ΘΕΩΡΗΜΑ. Η συνάρτησις $f : A \rightarrow B$ έχει αντίστροφον συνάρτησιν, δηλαδή ή αντιστοιχία $f^{-1} : B \rightarrow A$ είναι επίσης συνάρτησις, τότε καί μόνον τότε, αν αυτή (δηλαδή ή f) είναι άμφιμονοσήμαντος συνάρτησις του A επί του B.



Σχ. 14


άμφιμονοσήμαντος συνάρτησις



Σχ. 15

αντίστροφος συνάρτησις

Σύνθεσις συναρτήσεων. Έστωσαν δύο συναρτήσεις $f_1 : A \rightarrow B$ και $f_2 : B \rightarrow \Gamma$. Διά διαδοχικής άπεικόνισεως άφ' ενός μόν ενός στοιχείου $x \in A$ διά τής f_1 , άφ'




Σχ. 16

έτερου δὲ τῆς εἰκόνας τοῦ $f_1(x) \in B$ διὰ τῆς f_2 ἀντιστοιχίζεται εἰς τὸ $x \in A$ ἓν στοιχεῖον $y = f_2(f_1(x)) \in \Gamma$ (βλ. σχ. 16). Ἡ ἀντιστοιχία $h: A \rightarrow \Gamma$ μὲ $x \xrightarrow{h} f_2(f_1(x))$ εἶναι μία συνάρτησις (διατί;), ἡ ὁποία καλεῖται *σύνθεσις τῶν συναρτήσεων* f_1 καὶ f_2 καὶ συμβολίζεται μὲ $f_2 \circ f_1$, ἥτοι $h = f_2 \circ f_1$. Ὁ τύπος τῆς h εἶναι λοιπὸν $y = h(x) = f_2(f_1(x))$.

Ἡ πράξις τῆς συνθέσεως συναρτήσεων εἶναι *προσεταιριστική*, δηλαδὴ ἰσχύει

$$f_3 \circ (f_2 \circ f_1) = (f_3 \circ f_2) \circ f_1$$

ὡς συνάγεται ἐκ τοῦ κάτωθι σχήματος.



Σχ. 17

Παραδείγματα :

1. $f_1(x) = 2x + 3$, $x \in \mathbb{R}$ καὶ $f_2(x) = \eta\mu x$, $x \in \mathbb{R}$. Ἡ σύνθεσις $f_2 \circ f_1$ αὐτῶν ἔχει τύπον $f_2 \circ f_1$
 $x \rightarrow \eta\mu(2x + 3)$.

2. $f_1(x) = x^2 + 1$, $x \in \mathbb{R}$ καὶ $f_2(x) = \sqrt{x}$, $x \in \mathbb{R}_0^+$. Ἡ σύνθεσις $f_2 \circ f_1$ αὐτῶν ἔχει τύπον $f_2 \circ f_1$
 $x \rightarrow \sqrt{x^2 + 1}$.

3. $f_1(x) = |x|$, $x \in \mathbb{R}$ καὶ $f_2(x) = \sqrt{x}$, $x \in \mathbb{R}_0^+$. Ἡ σύνθεσις $f_2 \circ f_1$ αὐτῶν ἔχει τύπον $f_2 \circ f_1$
 $x \rightarrow \sqrt{|x|}$.

3. ΑΣΚΗΣΕΙΣ

3.1 Δείξατε ὅτι εἰς τὸ $\mathcal{P}(\Omega)$ ἰσχύουν :

$$1) A \subseteq B \Leftrightarrow A \cup B = B \quad 2) A \subseteq B \Leftrightarrow A \cap B = A$$

3.2 Δείξατε ὅτι εἰς τὸ $\mathcal{P}(\Omega)$ ἰσχύουν :

$$1) \Omega^c = \emptyset \quad 2) \emptyset^c = \Omega \quad 3) (A^c)^c = A \quad 4) A \cup A^c = \Omega \quad 5) A \cap A^c = \emptyset$$

3.3 Δείξατε ὅτι εἰς τὸ $\mathcal{P}(\Omega)$ ἰσχύουν (τύποι τοῦ de Morgan) :

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c \quad \text{καὶ} \quad (A \cap B)^c = A^c \cup B^c$$

3.4 Εύρετε το πεδίον ορίσμου και το πεδίον τιμών των αντιστοιχιών $\sigma : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, αί όποίαι όρίζονται υπό τών :

- 1) $y^2 = x$ 2) $y = x^2$ 3) $y = x^2 + 1$ 4) $3x + 2y = 1$
 5) $x^2 + y^2 = 1$ 6) $x < y$ 7) $x^2 + y^2 \leq 1$ 8) $x^2 < y < x^2 + 1$

3.5 Ποία είναι αί αντίστροφοι αντιστοιχίαί τών αντιστοιχιών τής προηγούμενης άσκήσεως 3.4 ;

3.6 Ποία έκ τών αντιστοιχιών τής άσκήσεως 3.4 είναι συναρτήσεis και ποία δέν είναι ;

3.7 Διά τās συναρτήσεis έκ τών αντιστοιχιών τής άσκήσεως 3.4 ποία έχουν αντίστροφους συναρτήσεis ;



1.1 Δείξτε ότι εκ τών $\mathcal{P}(A)$ ισχύουν :

1) $A \subseteq B \Leftrightarrow A \cup B = B$ 2) $A \subseteq B \Leftrightarrow A \cap B = A$

1.2 Δείξτε ότι εκ τών $\mathcal{P}(A)$ ισχύουν :

1) $\Omega \cap A = A$ 2) $\Omega \cap \Omega = \Omega$ 3) $(A^c)^c = A$ 4) $A \cap A^c = \emptyset$

1.3 Δείξτε ότι εκ τών $\mathcal{P}(A)$ ισχύουν (τόν νόμον τών Μογαν) :

$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$ και $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΙ

ΑΛΓΕΒΡΙΚΑΙ ΕΝΝΟΙΑΙ ΚΑΙ ΔΟΜΑΙ

1. ΔΙΜΕΛΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟΝ

1.1 Ἡ ἔννοια τῆς σχέσεως. Εἰς τὰ μαθηματικά παρουσιάζουν ἰδιαίτερον ἐνδιαφέρον ἀντιστοιχίαι, τῶν ὁποίων τὰ σύνολα ἀφετηρίας καὶ ἀφίξεως συμπίπτουν. Τοιαῦται ἀντιστοιχίαι χαρακτηρίζονται ὡς *σχέσεις*. Ἀκριβέστερον, μία ἀντιστοιχία $\sigma : E \rightarrow E$ καλεῖται *διμελῆς σχέση* εἰς τὸ E ἢ καὶ ἀπλῶς *σχέσις εἰς τὸ E* . Π.χ. αἱ ἀντιστοιχίαι τῶν παραδειγμάτων τῆς § 2.1 τοῦ κεφ. I εἶναι σχέσεις εἰς τὸ σύνολον R τῶν πραγματικῶν ἀριθμῶν.

Εἰς τὴν περίπτωσιν μιᾶς σχέσεως $\sigma : E \rightarrow E$ ὁ τύπος αὐτῆς γράφεται συνήθως μὲ x ἀντὶ $x \xrightarrow{\sigma} y$, ἥτοι

$$x\sigma y \Leftrightarrow x \xrightarrow{\sigma} y$$

καὶ ἀναγιγνώσκωμεν τοῦτον « x εὑρίσκεται εἰς τὴν σχέσιν σ μὲ τὸ y ».

Παραδείγματα :

Ε: *τυχὸν μὴ κενὸν σύνολον*

1. $x\sigma_1 y \Leftrightarrow x$ καὶ y συμβολίζουν τὸ αὐτὸ στοιχεῖον τοῦ E (συντόμως: $x = y$)

$E = N$

2. $x\sigma_2 y \Leftrightarrow \delta$ x διαιρεῖ τὸν y (συντόμως: $x|y$)

3. $x\sigma_3 y \Leftrightarrow$ τὸ κλάσμα $\frac{x}{y}$ εἶναι ἀνάγωγον (A)

4. $x\sigma_4 y \Leftrightarrow$ ἡ διαφορά $x - y$ εἶναι πολλαπλάσιον τοῦ 5 (συντόμως: $x = y \pmod{5}$)

$E = R$

5. $x\sigma_5 y \Leftrightarrow \delta$ x εἶναι μεγαλύτερος τοῦ y (συντόμως: $x > y$)

6. $x\sigma_6 y \Leftrightarrow \delta$ x εἶναι μικρότερος ἢ ἴσος τοῦ y (συντόμως: $x \leq y$)

Ε: *τὸ σύνολον τῶν ἀνθρώπων*

7. $x\sigma_7 y \Leftrightarrow \delta$ x εἶναι πατὴρ τοῦ y

8. $x\sigma_8 y \Leftrightarrow x$ καὶ y φοιτοῦν εἰς τὴν αὐτὴν τάξιν (I)

E : τὸ σύνολον τῶν εὐθειῶν τοῦ ἐπιπέδου

9. $x\sigma_9 y \Leftrightarrow$ ἡ x εἶναι κάθετος πρὸς τὴν y (συντόμως: $x \perp y$)

10. $x\sigma_{10} y \Leftrightarrow$ x καὶ y ἔχουν τὴν αὐτὴν διεύθυνσιν (συντόμως: $x \parallel y$)


$E = \mathcal{P}(\Omega)$

11. $x\sigma_{11} y \Leftrightarrow$ τὸ x εἶναι ὑποσύνολον τοῦ y (συντόμως: $x \subseteq y$)


Παρατηροῦμεν ὅτι δι' ὠρισμένες ἐκ τῶν ἀνωτέρω σχέσεων ἔχουν καθιερωθῆ εἰδικὰ σύμβολα. Οὕτως :

ἀντί : $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_5, \sigma_6, \sigma_8, \sigma_{10}, \sigma_{11}$
 γράφομεν ἀντιστοιχῶς : $=, |, >, \leq, \perp, \parallel, \subseteq$.


Αἱ σχέσεις $=, >$ καὶ \leq , ὡς σχέσεις εἰς τὸ \mathbf{R} , ἔχουν διαγράμματα, τὰ ὁποῖα δίδονται εἰς τὰ κάτωθι σχήματα :



Σχ. 18



Σχ. 19



Σχ. 20

1.2 Βασικαὶ κατηγορίαι σχέσεων. Ἔνεκα τῆς σπουδαιότητος μερικῶν ἰδιοτήτων, αἱ ὁποῖαι ἀφοροῦν εἰς σχέσεις, διακρίνομεν τὰς κατωτέρω βασικὰς κατηγορίας σχέσεων :

Ἄνακλαστικαὶ σχέσεις. Μία σχέσηις σ εἰς τὸ σύνολον E καλεῖται ἀνακλαστικὴ (ἢ αὐτοπαθῆς) τότε καὶ μόνον τότε, ἂν

$$(A) \quad x\sigma x \quad \forall x \in E \quad (1).$$

Τοῦτο σημαίνει ὅτι τὸ ζεύγος (x, x) εἶναι στοιχεῖον τοῦ γραφήματος S_σ καὶ μάλιστα διὰ κάθε $x \in E$, δηλαδὴ ἡ διαγώνιος Δ τοῦ E^2 εἶναι ὑποσύνολον τοῦ S_σ . Ἄλλὰ καὶ τὸ ἀντίστροφον εἶναι ἀληθές, καθ' ὅσον

$$\Delta \subseteq S_\sigma \Rightarrow (x, x) \in S_\sigma \quad \forall x \in E \Rightarrow x\sigma x \quad \forall x \in E.$$

Ἔστω

$$\sigma \text{ εἶναι ἀνακλαστικὴ} \Leftrightarrow \Delta \subseteq S_\sigma.$$

Αἱ σχέσεις $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_4, \sigma_6, \sigma_8, \sigma_{10}$ καὶ σ_{11} τῶν παραδειγμάτων τῆς προηγουμένης § 1.1 εἶναι ἀνακλαστικαί.

(1) « $\forall \dots$ » σημαίνει «διὰ κάθε...»

Συμμετρικοί σχέσεις. Μία σχέση σ εις τὸ σύνολον E καλεῖται *συμμετρική* τότε καὶ μόνον τότε, ἂν

$$(\Sigma) \quad x\sigma y \Rightarrow y\sigma x.$$

Τοῦτο συνεπάγεται τὴν ἰσοδυναμίαν $x\sigma y \Leftrightarrow y\sigma x$ (διατί;) καὶ ἐπειδὴ $x\sigma y \Leftrightarrow y\sigma^{-1}x$, θὰ ἰσχύη $y\sigma x \Leftrightarrow y\sigma^{-1}x$, ἥτοι $\sigma = \sigma^{-1}$. Ἀλλὰ καὶ ἀντιστρόφως, $\sigma = \sigma^{-1}$ συνεπάγεται ὅτι $x\sigma y \Leftrightarrow x\sigma^{-1}y \Leftrightarrow y\sigma x$. Ὡστε ἰσχύει

$$\sigma \text{ εἶναι συμμετρική} \Leftrightarrow \sigma = \sigma^{-1}.$$

Ἐκ τῶν σχέσεων τῶν παραδειγμάτων τῆς προηγούμενης § 1.1, αἱ $\sigma_1, \sigma_3, \sigma_4, \sigma_8, \sigma_9$ καὶ σ_{10} εἶναι συμμετρικαί.

Ἀντισυμμετρικοί σχέσεις. Μία σχέση σ εις τὸ σύνολον E καλεῖται *ἀντισυμμετρική* τότε καὶ μόνον τότε, ἂν

$$(A - \Sigma) \quad x\sigma y \text{ καὶ } y\sigma x \Rightarrow x = y.$$

Οὕτως, ἐκ τῶν σχέσεων τῶν παραδειγμάτων τῆς προηγούμενης § 1.1, αἱ σχέσεις $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_6$ καὶ σ_{11} εἶναι ἀντισυμμετρικαί.

Μεταβατικοί σχέσεις. Μία σχέση σ εις τὸ σύνολον E καλεῖται *μεταβατική* τότε καὶ μόνον τότε, ἂν

$$(M) \quad x\sigma y \text{ καὶ } y\sigma z \Rightarrow x\sigma z.$$

Οὕτως, ἐκ τῶν σχέσεων τῶν παραδειγμάτων τῆς προηγούμενης § 1.1, αἱ $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_4, \sigma_5, \sigma_6, \sigma_8, \sigma_{10}$ καὶ σ_{11} εἶναι μεταβατικαί.

2. ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑΙ - ΚΛΑΣΕΙΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑΣ

2.1 Ἴσοδυναμία. Μία σχέση εις τὸ σύνολον E , ἡ ὁποία εἶναι :

(A) ἀνακλαστική, (Σ) συμμετρική καὶ (M) μεταβατική καλεῖται *ἰσοδυναμία* (ἢ *σχέσις ἰσοδυναμίας*) εις τὸ E .

Μία ἰσοδυναμία συμβολίζεται συνήθως μὲ \sim ἢ \simeq καὶ \equiv .

Παραδείγματα :

1. Ἡ ἰσότης εἶναι μία ἰσοδυναμία.

2. Ἡ ὁμοιότης εις ἓν σύνολον τριγώνων εἶναι μία ἰσοδυναμία, διότι :

(A) Πᾶν τρίγωνον εἶναι ὁμοιον πρὸς ἑαυτό.

(Σ) Ἄν τρίγωνον $ΑΒΓ$ εἶναι ὁμοιον πρὸς τὸ $Α'Β'Γ'$, τότε καὶ τὸ $Α'Β'Γ'$ εἶναι ὁμοιον πρὸς τὸ $ΑΒΓ$.

(M) Ἄν τρίγωνον $ΑΒΓ$ εἶναι ὁμοιον πρὸς τὸ $Α'Β'Γ'$ καὶ τοῦτο εἶναι ὁμοιον πρὸς τὸ $Α''Β''Γ''$, τότε καὶ τὸ $ΑΒΓ$ εἶναι ὁμοιον πρὸς τὸ $Α''Β''Γ''$.

3. Ἡ παραλληλία μὲ εὐρείαν σημασίαν (\parallel), καθὼς καὶ αἱ σχέσεις σ_1, σ_8 τῆς § 1.1 εἶναι ἰσοδυναμίαι.

4. Ἐστω τὸ σύνολον $E = \mathbb{N} \times \mathbb{N}$. Ὅριζομεν εις τὸ $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ τὴν σχέσηιν σ διὰ τοῦ τύπου

$$(\mu, \nu)\sigma(\mu', \nu') \Leftrightarrow \mu + \nu' = \mu' + \nu.$$

Π.χ. $(3,5)\sigma(7,9)$, διότι $3 + 9 = 7 + 5$, ἐνῶ $(6,3)\not\sigma(5,4)$, διότι $6 + 4 \neq 5 + 3$.

Ἡ σχέσηis αὐτὴ εἶναι μίᾳ ἰσοδυναμίᾳ, καθ' ὅσον ἰσχύουν :

(A) Οἷονδήποτε ζεύγος (μ, ν) εὐρίσκεται εἰς τὴν σχέσιν σ πρὸς ἑαυτὸ, ἥτοι $(\mu, \nu)\sigma(\mu, \nu)$, διότι $\mu + \nu = \mu + \nu$.

(Σ) Ἐν τὸ (μ, ν) εὐρίσκεται εἰς τὴν σχέσιν σ μὲ τὸ (μ', ν') , τότε καὶ τὸ (μ', ν') εὐρίσκεται εἰς τὴν σχέσιν σ μὲ τὸ (μ, ν) . Πράγματι:

$$(\mu, \nu)\sigma(\mu', \nu') \Leftrightarrow \mu + \nu' = \mu' + \nu \Leftrightarrow \mu' + \nu = \mu + \nu' \Leftrightarrow (\mu', \nu')\sigma(\mu, \nu).$$

(M) Ἐν τὸ (μ, ν) εὐρίσκεται εἰς τὴν σχέσιν σ μὲ τὸ (μ', ν') καὶ τοῦτο μὲ τὸ (μ'', ν'') , τότε καὶ τὸ (μ, ν) εὐρίσκεται εἰς τὴν σχέσιν σ μὲ τὸν (μ'', ν'') . Πράγματι:

$$\left. \begin{array}{l} (\mu, \nu)\sigma(\mu', \nu') \\ (\mu', \nu')\sigma(\mu'', \nu'') \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \mu + \nu' = \mu' + \nu \\ \mu' + \nu'' = \mu'' + \nu' \end{array} \right\} \Rightarrow (\mu + \nu') + (\mu' + \nu'') = (\mu' + \nu) + (\mu'' + \nu') \Leftrightarrow \mu + \nu'' = \mu'' + \nu \Leftrightarrow (\mu, \nu)\sigma(\mu'', \nu''). \quad \text{Ἔστω}$$

$$\left. \begin{array}{l} (\mu, \nu)\sigma(\mu', \nu') \\ (\mu', \nu')\sigma(\mu'', \nu'') \end{array} \right\} \Rightarrow (\mu, \nu)\sigma(\mu'', \nu'').$$

2.2 Κλάσεις ἰσοδυναμίας - Σύνολον πηλίκον. Ἐστω \sim μίᾳ ἰσοδυναμίᾳ εἰς τὸ σύνολον E . Κάθε στοιχείον $\alpha \in E$ εἶναι ἰσοδύναμον πρὸς ἑαυτὸ ($\alpha \sim \alpha$) καὶ ἐνδεχομένως πρὸς ἄλλα στοιχεῖα τοῦ E . Τὸ σύνολον τῶν στοιχείων τοῦ E , τὰ ὅποια εἶναι ἰσοδύναμα πρὸς τὸ α καλεῖται *κλάσις ἰσοδυναμίας τοῦ* α . Αὐτὴ συμβολίζεται συνήθως μὲ $[\alpha]$ ἢ A ἢ $κλ(\alpha)$ (πρὸς ἀποφυγὴν συγχύσεως ἀπαιτεῖται, ἐνίοτε, ὅπως γράφωμεν, ἀντιστοίχως, καὶ $[\alpha]_{\sim}$ ἢ A_{\sim} ἢ $κλ_{\sim}(\alpha)$), ἵνα δηλώσωμεν τὴν ἰσοδυναμίαν \sim , ὡς πρὸς τὴν ὁποῖαν θεωρεῖται ἡ κλάσις ἰσοδυναμίας τοῦ α .

Παρατηροῦμεν ὅτι :

1. Αἱ κλάσεις ἰσοδυναμίας εἶναι μὴ κενὰ σύνολα.

Πράγματι: ἐκ τοῦ ὀρισμοῦ τῆς κλάσεως ἑνὸς στοιχείου α , προκύπτει ὅτι αὕτη περιέχει τοῦλάχιστον τὸ α .

2. Αἱ κλάσεις δύο ἰσοδυνάμων στοιχείων ταυτίζονται.

Πράγματι: ἂν $\alpha \sim \beta$, τότε $x \in A \Leftrightarrow x \sim \alpha$, ὅπου A εἶναι ἡ κλάσις ἰσοδυναμίας τοῦ α . Ἐπομένως, λόγῳ τῆς μεταβατικότητος τῆς \sim , ($x \sim \alpha$ καὶ $\alpha \sim \beta$) $\Rightarrow x \sim \beta \Leftrightarrow x \in B$, ὅπου B εἶναι ἡ κλάσις ἰσοδυναμίας τοῦ β . Ἔστω $A \subseteq B$. Ὁμοίως ἀποδεικνύεται καὶ $B \subseteq A$ (διατί;). Ἄρα $A = B$.

3. Αἱ κλάσεις δύο μὴ ἰσοδυνάμων στοιχείων οὐδὲν κοινὸν στοιχεῖον ἔχουν, ἥτοι, ὡς λέγομεν αὐταὶ εἶναι ξένα.

Πράγματι: ἂν $\alpha \not\sim \beta$, τότε αἱ κλάσεις ἰσοδυναμίας A, B αὐτῶν εἶναι ξένα, διότι ἄλλως θὰ ὑπῆρχε $x \in A \cap B$, ὁπότε βεβαίως $x \in A \Leftrightarrow \alpha \sim x$ καὶ $x \in B \Leftrightarrow x \sim \beta$. Ἀλλά, λόγῳ τῆς μεταβατικότητος τῆς \sim , ($\alpha \sim x$ καὶ $x \sim \beta$) $\Rightarrow \alpha \sim \beta$, ὅπερ ἄτοπον.

Συμπεραίνομεν λοιπὸν ὅτι αἱ κλάσεις ἰσοδυναμίας εἶναι μὴ κενὰ ὑποσύνολα τοῦ E , ἕνα μεταξὺ τῶν ἀνά δύο καὶ ἐπὶ πλέον κάθε στοιχείου τοῦ E εἶναι κατατεταγμένον εἰς μίαν κλάσιν. Ἄρα ἡ ἰσοδυναμίᾳ ὀρίζει μίαν *διαμέρισιν* τοῦ E .

Το σύνολον τῶν κλάσεων ἰσοδυναμίας καλεῖται *σύνολον πηλίκου τοῦ E* διὰ τῆς \sim καὶ συμβολίζεται μὲ E/\sim .

Παράδειγμα. Ἐστωσαν E τὸ σύνολον, τῶν μαθητῶν ἑνὸς γυμνασίου καὶ ἡ ἰσοδυναμία \sim εἰς τὸ E , ἡ ὀριζομένη ὑπὸ τοῦ τύπου

$$x \sim y \Leftrightarrow \text{οἱ μαθηταὶ } x \text{ καὶ } y \text{ φοιτοῦν εἰς τὴν αὐτὴν τάξιν.}$$

Ἡ κλάσις ἰσοδυναμίας τοῦ μαθητοῦ α εἶναι τὸ σύνολον, τὸ ὁποῖον ἔχει στοιχεῖα τὸν α καὶ τοὺς συμμαθητὰς του, δηλαδὴ εἶναι ἡ τάξις μαθητῶν εἰς τὴν ὁποῖαν φοιτᾷ. Τὸ E διαμερίζεται λοιπὸν εἰς τάξεις μαθητῶν, δηλαδὴ τὸ σύνολον πηλίκου E/\sim εἶναι ἐδῶ τὸ σύνολον τῶν τάξεων τοῦ γυμνασίου.

3. ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟΝ

3.1 Ἡ ἔννοια τῆς διατάξεως. Μία σχέσις εἰς τὸ σύνολον E , ἡ ὁποία εἶναι:

(A) ἀνακλαστική, (A-Σ) ἀντισυμμετρική καὶ (M) μεταβατική καλεῖται *διάταξις* (ἢ *σχέσις διατάξεως*) εἰς τὸ E .

Μία διάταξις συμβολίζεται συνήθως μὲ \prec . Ἄν ἐν στοιχείῳ α τοῦ E εὐρίσκεται εἰς τὴν σχέσιν \prec μὲ στοιχείῳ β αὐτοῦ, δηλαδὴ $\alpha \prec \beta$, τότε λέγομεν ὅτι « α προηγείται τοῦ β » ἢ ἰσοδυνάμως « β ἔπεται τοῦ α ».

Τὸ σύνολον E εἰς τὸ ὁποῖον ἔχει ὀρισθῆ μία διάταξις \prec καλεῖται τότε *διατεταγμένον σύνολον* (ὡς πρὸς τὴν \prec). Ἀκριβέστερον τὸ διατεταγμένον σύνολον παρίσταται διὰ τοῦ ζεύγους (E, \prec) .

Παραδείγματα :

1. Ἡ σχέσις \leq εἶναι μία διάταξις εἰς τὸ \mathbb{R} , διότι ἰσχύουν :

(A) $\alpha \leq \alpha$, διότι $\alpha = \alpha$.

(A-Σ) Ἄν $\alpha \leq \beta$ καὶ $\beta \leq \alpha$, τότε εἶναι καὶ $\alpha = \beta$

(M) Ἄν $\alpha \leq \beta$ καὶ $\beta \leq \gamma$, τότε εἶναι καὶ $\alpha \leq \gamma$

Ἵστε τὸ σύνολον \mathbb{R} εἶναι διατεταγμένον ὡς πρὸς τὴν σχέσιν \leq .

2. Ὁμοίως ἡ σχέσις \subseteq εἶναι μία διάταξις εἰς τὸ $\mathcal{P}(\Omega)$ (διατί;).

3. Ἡ σχέσις σ_2 (I) τῆς § 1.1 εἶναι μία διάταξις εἰς τὸ \mathbb{N} , διότι ἰσχύουν :

(A) $\alpha | \alpha$

(A-Σ) Ἄν $\alpha | \beta$ καὶ $\beta | \alpha$, τότε ὑπάρχουν φυσικοὶ ἀριθμοὶ k καὶ λ μὲ $\beta = k\alpha$ καὶ $\alpha = \lambda\beta$, ἄρα $\beta = k(\lambda\alpha) = (k\lambda)\alpha$ καὶ ἔπομένως $k\lambda = 1$, δηλαδὴ $k = \lambda = 1$, ἦτοι $\alpha = \beta$

(M) Ἄν $\alpha | \beta$ καὶ $\beta | \gamma$, τότε ὑπάρχουν φυσικοὶ ἀριθμοὶ k καὶ λ μὲ $\beta = k\alpha$ καὶ $\gamma = \lambda\beta$, ἄρα $\gamma = \lambda(k\alpha) = (\lambda k)\alpha$, δηλαδὴ $\alpha | \gamma$.

Παρατήρησις. Μία μεταβατική σχέσις \prec^* εἰς τὸ σύνολον E καλεῖται *γνησία διάταξις* εἰς τὸ E τότε καὶ μόνον τότε, ἂν $x \prec^* y \Rightarrow x \neq y$. Οὕτω π.χ. ἡ σχέσις $<$ εἰς τὸ \mathbb{R} εἶναι μία *γνησία διάταξις* εἰς τὸ \mathbb{R} , ἐνῶ αὕτη δὲν εἶναι διάταξις εἰς τὸ \mathbb{R} (διατί;). Τὸ αὐτὸ ἰσχύει καὶ διὰ τὴν σχέσιν τοῦ γνησίου ὑποσυνόλου C εἰς τὸ $\mathcal{P}(\Omega)$ (διατί;).

Ἄν \prec εἶναι μία διάταξις εἰς τὸ E , τότε, δυνάμει ταύτης, ὀρίζεται μία σχέσις \prec^* εἰς τὸ E ὑπὸ τοῦ τύπου

$$x \prec^* y \Leftrightarrow x \prec y \text{ καὶ } x \neq y,$$

ἡ ὁποία δὲν εἶναι διάταξις εἰς τὸ E , ἀλλὰ μία γνησία διάταξις εἰς αὐτὸ (διατί;).

3.2 Όλική, μερική διάταξις. Έστω \rightarrow μία διάταξις εις τὸ E. Δύο στοιχεῖα α, β τοῦ E καλοῦνται *συγκρίσιμα* (διὰ τῆς \rightarrow), τότε καὶ μόνον τότε, ἂν ἰσχύη $\alpha \rightarrow \beta$ ἢ $\beta \rightarrow \alpha$. Οὕτω π.χ. οἱ πραγματικοὶ ἀριθμοὶ 1, $\sqrt{2}$ εἶναι συγκρίσιμοι (διὰ τῆς \leq), διότι ἰσχύει $1 \leq \sqrt{2}$. Γενικῶς παρατηροῦμεν ὅτι τυχόντες πραγματικοὶ ἀριθμοὶ α, β εἶναι συγκρίσιμοι, δηλαδὴ ἰσχύει $\alpha \leq \beta$ ἢ $\beta \leq \alpha$. Μία διάταξις εις τὸ E, ὡς π.χ. \leq εις τὸ R, διὰ τὴν ὁποῖαν *οἰαδήποτε* στοιχεῖα τοῦ E εἶναι συγκρίσιμα καλεῖται *ὀλική* ἢ *γραμμικὴ διάταξις* εις τὸ E. Μία διάταξις εις τὸ E, ἢ ὁποῖα δὲν εἶναι ὀλική διάταξις, καλεῖται *μερικὴ διάταξις* εις τὸ E. Εἰς τὴν περίπτωσιν μερικῆς διατάξεως εις τὸ E ὑπάρχουν βεβαίως στοιχεῖα τοῦ E, τὰ ὁποῖα δὲν εἶναι συγκρίσιμα ὡς πρὸς τὴν ὑπ' ὄψιν διάταξιν.

Παραδείγματα :

1. Εἰς ἓν σύνολον E ὁμοκέντρων κύκλων ἑνὸς ἐπιπέδου, ὀρίζεται μία σχέσις διατάξεως \rightarrow ὑπὸ τοῦ τύπου $x \rightarrow y \Leftrightarrow$ ἄκτις τοῦ x μικρότερη ἢ ἴση τῆς ἄκτινος τοῦ y. Αὕτη εἶναι μία σχέσις ὀλικῆς διατάξεως εις τὸ E (διατί;).

2. Ἡ διάταξις \subseteq εις τὸ $\mathcal{P}(\Omega)$ (ὅταν τὸ Ω ἔχη τούλάχιστον δύο στοιχεῖα) εἶναι μία μερικὴ διάταξις εις τὸ $\mathcal{P}(\Omega)$, διότι ἂν A εἶναι μὴ κενὸν καὶ γνήσιον ὑποσύνολον τοῦ Ω , τότε τὰ A καὶ A^c δὲν εἶναι συγκρίσιμα (διατί;).

3. Ἡ σχέσις διατάξεως σ_2 (I) τοῦ παραδείγματος 3 τῆς § 3.1 εἶναι προφανῶς μία μερικὴ διάταξις εις τὸ N.

4. ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟΝ

4.1 Ἐσωτερικὴ πρᾶξις. Ἀπὸ τὰ πρῶτα χρόνια τῆς σχολικῆς ζωῆς, ὁ μαθητὴς ἐξοικειώνεται μὲ τὰς καλουμένας πράξεις, ὅπως π.χ. ἡ πρόσθεσις, ἡ ἀφαίρεσις, ὁ πολλαπλασιασμός καὶ ἡ διαίρεσις ἀριθμῶν. Ἀργότερον εἶναι εἰς θέσιν νὰ ὑψώνη ἀριθμὸν εἰς δύναμιν, νὰ εὐρίσκη τὴν ἔνωσιν ἢ τὴν τομὴν δύο συνόλων κ.λ.π. Κοινὸν χαρακτηριστικὸν ὄλων αὐτῶν τῶν «πράξεων» εἶναι ὅτι ἐκκινουμέν ἀπὸ δύο στοιχεῖα ἑνὸς συνόλου διὰ νὰ καταλήξωμεν διὰ μιᾶς διαδικασίας (ἢ ὁποῖα ὀρίζεται ἀπὸ τὴν συγκεκριμένην πρᾶξιν) εἰς ἓν *τρίτον* στοιχείου (τὸ καλούμενον ἀποτέλεσμα τῆς πράξεως) τοῦ αὐτοῦ συνόλου. Οὕτω π.χ. ἀπὸ τοὺς ἀριθμοὺς 3 καὶ 5 διὰ μὲν τῆς διαδικασίας τῆς προσθέσεως καταλήγομεν εἰς τὸν ἀριθμὸν 8, διὰ δὲ τῆς διαδικασίας τοῦ πολλαπλασιασμοῦ εἰς τὸν 15. Ἐπειδὴ εἰς ὠρισμένας πράξεις ἀλλάσσει τὸ ἀποτέλεσμα ὅταν ἀπλῶς καὶ μόνον ἐναλλάξωμεν τὴν διαδοχὴν τῶν στοιχείων, τὰ ὁποῖα τὸ δημιουργοῦν, ὅπως π.χ. εἰς τὴν ἀφαίρεσιν ἀριθμῶν, διὰ τοῦτο θὰ θεωροῦμεν ὅτι εἰς μίαν πρᾶξιν ἐκκινουμέν ἀπὸ ζευγὸς στοιχείων εἰς τὸ ὁποῖον καὶ ἀντιστοιχίζομεν ἓν τρίτον στοιχείου, τὸ ἀποτέλεσμα τῆς πράξεως.

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω ὀδηγοῦμεθα εἰς τὸ νὰ δώσωμεν τὸν ἀκόλουθον γενικὸν ὀρισμὸν :

Μία μονοσήμαντος ἀπεικόνισις ἐκ τοῦ $E \times E = E^2$ εἰς τὸ E καλεῖται *ἐσωτερικὴ πρᾶξις* ἢ ἀπλῶς *πρᾶξις* εἰς τὸ E. Ἄν διὰ μιᾶς πράξεως * εἰς τὸ E τὸ ζευ-

ζος $(\alpha, \beta) \in E^2$ αντιστοιχίζεται εις τὸ στοιχείον $\gamma \in E$, τότε τοῦτο εἶναι βεβαίως μονοσήμαντως ὠρισμένον καὶ καλεῖται ἀποτέλεσμα τῆς πράξεως * ἐπὶ τῶν α, β συμβολίζεται δὲ μὲ $\alpha * \beta$, ἤτοι $\gamma = \alpha * \beta$. Εἰς τὴν περίπτωσιν ταύτην, ὅπου ὑπάρχει τὸ ἀποτέλεσμα τῆς πράξεως * ἐπὶ τῶν α, β λέγομεν ἰσοδυνάμως καὶ ὅτι ἡ πράξις $\alpha * \beta$ εἶναι ἐπιτρεπτή.

Πρὸς συμβολισμόν διαφόρων πράξεων χρησιμοποιοῦνται καὶ σύμβολα ὡς π.χ. τὰ $+, \cdot, \circ, \oplus, \Delta, \blacktriangle$ κ.λ.π.

Διὰ τὰς πράξεις πρόσθεσις (+) καὶ ἀφαίρεσις (-) εἰς τὸ σύνολον N τῶν φυσικῶν ἀριθμῶν παρατηροῦμεν ὅτι διὰ μὲν τῆς προσθέσεως κάθε ζεύγος (α, β) φυσικῶν ἀριθμῶν αντιστοιχίζεται εἰς ἓνα καὶ μοναδικὸν φυσικὸν ἀριθμὸν, τὸ ἄθροισμα τῶν α καὶ β , π.χ. $3 + 5 = 8, 7 + 9 = 16$ κ.ο.κ., δηλαδὴ ἡ πρόσθεσις εἶναι μίᾳ μονοσήμαντος ἀπεικόνισις τοῦ N^2 εἰς τὸ N . Ἀντιθέτως ἡ ἀφαίρεσις δὲν εἶναι μίᾳ μονοσήμαντος ἀπεικόνισις τοῦ N^2 εἰς τὸ N , διότι εἰς τὸ ζεύγος $(7, 10)$ δὲν αντιστοιχίζεται διὰ τῆς ἀφαιρέσεως φυσικὸς ἀριθμὸς, δηλαδὴ $(7 - 10) \notin N$. Πρὸς διάκρισιν τῶν ἀνωτέρω περιπτώσεων λέγομεν ἀφ' ἑνὸς μὲν ὅτι ἡ πρόσθεσις εἶναι μίᾳ πράξις ἐπὶ τοῦ N , ἀφ' ἑτέρου δὲ ὅτι ἡ ἀφαίρεσις εἶναι μίᾳ μερική πράξις εἰς τὸ N .

Γενικῶς μίᾳ μονοσήμαντος ἀπεικόνισις τοῦ E^2 εἰς τὸ E καλεῖται (ἔσωτερική) πράξις ἐπὶ τοῦ E , ἐνῶ μίᾳ (ἔσωτερική) πράξις εἰς τὸ E , ἡ ὁποία δὲν εἶναι πράξις ἐπὶ τοῦ E καλεῖται μερική πράξις εἰς τὸ E .

Παραδείγματα :

1. Ὁ πολλαπλασιασμός (\cdot) εἶναι πράξις ἐπὶ τοῦ N , διότι διὰ κάθε ζεύγος $(\alpha, \beta) \in N^2$ ὑπάρχει ἓν καὶ μοναδικὸν γινόμενον $\alpha \cdot \beta \in N$. Ἀντιθέτως ἡ διαίρεσις ($:$) εἶναι μερική πράξις εἰς τὸ N , διότι $(3:5) \notin N$.

2. Ἡ «ὑψωσις εἰς δύναμιν», διὰ τὴν ὁποίαν ἀντὶ $\alpha * \beta$ γράφομεν α^β εἶναι πράξις ἐπὶ τοῦ N , διότι διὰ κάθε $(\alpha, \beta) \in N^2$ εἶναι καὶ $\alpha^\beta \in N$. Ἀντιθέτως αὕτη εἶναι μερική πράξις εἰς τὸ σύνολον Q τῶν ρητῶν ἀριθμῶν ὡς ἐπίσης καὶ εἰς τὸ σύνολον R τῶν πραγματικῶν ἀριθμῶν, διότι ἡ πράξις $(-2)^{\frac{1}{2}}$ δὲν εἶναι ἐπιτρεπτή.

3. Ἡ ἔνωσις καὶ ἡ τομὴ συνόλων εἶναι πράξεις ἐπὶ τοῦ $\mathcal{P}(\Omega)$.

4. Ἄν \mathcal{F}_A εἶναι τὸ σύνολον ὄλων τῶν συναρτήσεων μὲ πεδίον ὀρισμοῦ τὸ A καὶ τιμὰς εἰς τὸ A , τότε ἡ σύνθεσις συναρτήσεων (πρβλ. § 2.2 τοῦ κεφ. I) εἶναι πράξις ἐπὶ τοῦ \mathcal{F}_A , διότι διὰ κάθε ζεύγος συναρτήσεων $(f, g) \in \mathcal{F}_A^2$ ἡ σύνθεσις $f \circ g \in \mathcal{F}_A$.

Παρατήρησις. Ἡ πράξις τοῦ πολλαπλασιασμοῦ εἰς τὸ R ἔχει τὴν ἰδιότητα : τὸ γινόμενον δύο φυσικῶν ἀριθμῶν εἶναι ἐπίσης φυσικὸς ἀριθμὸς. Ἡ ἰδιότης αὕτη δὲν ὑφίσταται διὰ τὴν πράξιν τῆς διαιρέσεως εἰς τὸ R , διότι τὸ πηλίκον $3:5$ δὲν εἶναι φυσικὸς ἀριθμὸς. Τὰ ἀνωτέρω ἐκφράζομεν λέγοντες ἀφ' ἑνὸς μὲν ὅτι ἡ πράξις τοῦ πολλαπλασιασμοῦ εἶναι κλειστὴ εἰς τὸ σύνολον N τῶν φυσικῶν ἀριθμῶν, ἀφ' ἑτέρου δὲ ὅτι ἡ πράξις τῆς διαιρέσεως δὲν εἶναι κλειστὴ εἰς τὸ N . Γενικῶς μίᾳ πράξις * εἰς τὸ σύνολον E καλεῖται κλειστὴ εἰς ἓν ὑποσύνολον A τοῦ E τότε καὶ μόνον τότε, ἂν διὰ κάθε ζεύγος (α, β) στοιχείων τοῦ A τὸ ἀποτέλεσμα τῆς πράξεως $\alpha * \beta$ ἀνήκει ἐπίσης εἰς τὸ A .

Ἀντιμεταθετικά πράξεις. Μία πράξις $*$ ἐπὶ τοῦ E καλεῖται *ἀντιμεταθετική* τότε καὶ μόνον τότε, ἂν ἰσχύη :

$$(A) \quad \alpha * \beta = \beta * \alpha \quad \forall \alpha \in E \text{ καὶ } \beta \in E.$$

Οὕτω :

1. Ἡ πρόσθεσις καὶ ὁ πολλαπλασιασμός ἐπὶ τοῦ R εἶναι πράξεις ἀντιμεταθετικά.

2. Ἡ ἔνωσις καὶ ἡ τομὴ ἐπὶ τοῦ $\mathcal{P}(\Omega)$ εἶναι ὁμοίως ἀντιμεταθετικά πράξεις.

3. Ἀντιθέτως ἡ «ὑψωσις εἰς δύναμιν» ἐπὶ τοῦ N δὲν εἶναι ἀντιμεταθετική πράξις, διότι π.χ. $2^3 \neq 3^2$.

Προσεταιριστικά πράξεις. Μία πράξις $*$ ἐπὶ τοῦ E καλεῖται *προσεταιριστική* τότε καὶ μόνον τότε, ἂν ἰσχύη :

$$(B) \quad (\alpha * \beta) * \gamma = \alpha * (\beta * \gamma) \quad \forall \alpha \in E, \beta \in E \text{ καὶ } \gamma \in E.$$

Οὕτω π.χ. ἡ πρόσθεσις καὶ ὁ πολλαπλασιασμός ἐπὶ τοῦ R ὡς ἐπίσης ἡ ἔνωσις καὶ ἡ τομὴ ἐπὶ τοῦ $\mathcal{P}(\Omega)$ εἶναι πράξεις προσεταιριστικά, ἐνῶ ἀντιθέτως ἡ «ὑψωσις εἰς δύναμιν» ἐπὶ τοῦ N δὲν εἶναι, διότι

$$(2 * 1) * 3 = (2^1)^3 = 8 \quad \text{καὶ} \quad 2 * (1 * 3) = 2^{(1^3)} = 2,$$

δηλαδή $(2 * 1) * 3 \neq 2 * (1 * 3)$.

Γενικά παρατηρήσεις. Μὲ $\alpha_1 * \alpha_2 * \alpha_3$ συμβολίζομεν τὸ $(\alpha_1 * \alpha_2) * \alpha_3$, ἦτοι $\alpha_1 * \alpha_2 * \alpha_3 = (\alpha_1 * \alpha_2) * \alpha_3$. Ὅμοίως ὀρίζομεν $\alpha_1 * \alpha_2 * \alpha_3 * \alpha_4 = (\alpha_1 * \alpha_2 * \alpha_3) * \alpha_4$ καὶ γενικῶς $\alpha_1 * \alpha_2 * \dots * \alpha_{v-1} * \alpha_v = (\alpha_1 * \alpha_2 * \dots * \alpha_{v-1}) * \alpha_v$.

1. Ἄν ἡ πράξις $*$ εἶναι προσεταιριστική δυνάμεθα π.χ. εἰς τὸ $\alpha_1 * \alpha_2 * \alpha_3 * \alpha_4 * \alpha_5$ νὰ ἀντικαταστήσωμεν ὅσαδήποτε *διαδοχικά* στοιχεῖα μὲ τὸ ἀποτέλεσμα τῆς πράξεως ἐπὶ αὐτῶν. Οὕτω π.χ. $\alpha_1 * \alpha_2 * \alpha_3 * \alpha_4 * \alpha_5 = (\alpha_1 * \alpha_2 * \alpha_3) * \alpha_4 * \alpha_5 = \alpha_1 * (\alpha_3 * \alpha_4) * \alpha_2 * \alpha_5 = \alpha_1 * (\alpha_2 * \alpha_3 * \alpha_4) * \alpha_5$.

2. Ἄν ἡ πράξις $*$ εἶναι ἀντιμεταθετική καὶ προσεταιριστική, τότε δυνάμεθα π.χ. εἰς τὸ $\alpha_1 * \alpha_2 * \alpha_3 * \alpha_4 * \alpha_5$:

α) Νὰ ἀντιμεταθέσωμεν δύο *οιαδήποτε* στοιχεῖα. Π.χ. τὰ διαδοχικά α_3 καὶ α_4 , διότι $\alpha_1 * \alpha_2 * \alpha_3 * \alpha_4 * \alpha_5 = \alpha_1 * \alpha_2 * (\alpha_3 * \alpha_4) * \alpha_5 = \alpha_1 * \alpha_2 * (\alpha_4 * \alpha_3) * \alpha_5 = \alpha_1 * \alpha_2 * \alpha_4 * \alpha_3 * \alpha_5$, τὰ μὴ διαδοχικά α_2 καὶ α_5 δι' ἐπανηλειμμένης ἀντιμεταθέσεως διαδοχικῶν ὡς ἐξῆς :

$$\alpha_1 * \alpha_2 * \alpha_3 * \alpha_4 * \alpha_5 = \alpha_1 * \alpha_3 * \alpha_2 * \alpha_4 * \alpha_5 = \alpha_1 * \alpha_3 * \alpha_5 * \alpha_2 * \alpha_4 = \alpha_1 * \alpha_5 * \alpha_3 * \alpha_4 * \alpha_2.$$

β) Νὰ ἀντικαταστήσωμεν *οιαδήποτε* στοιχεῖα μὲ τὸ ἀποτέλεσμα τῆς πράξεως ἐπὶ αὐτῶν, διότι δυνάμεθα πρῶτον νὰ τὰ καταστήσωμεν διαδοχικά.

3. Τὸ $\alpha * \alpha * \dots * \alpha$ γράφομεν συντόμως $\cdot^v \alpha$. Εἰδικῶς τὰ $+^v \alpha$ καὶ $\cdot^v \alpha$ παριστῶμεν ἀντιστοίχως μὲ $n \alpha$ καὶ α^n , ἦτοι $+^v \alpha = n \alpha$ καὶ $\cdot^v \alpha = \alpha^n$.

Οὐδέτερον στοιχεῖον πράξεως. Ἐστω $*$ μία πράξις εἰς τὸ σύνολον E . Ἐν στοιχεῖον $\omega \in E$ καλεῖται *οὐδέτερον στοιχεῖον* τῆς $*$ τότε καὶ μόνον τότε, ἂν ἰσχύη :

$$(O) \quad \omega * \alpha = \alpha * \omega = \alpha \quad \forall \alpha \in E.$$

Ούτω :

Ουδέτερον στοιχείον τῆς $+$ ἐπὶ τοῦ R εἶναι τὸ 0

» » τοῦ \cdot ἐπὶ τοῦ R εἶναι τὸ 1

» » τῆς \cup ἐπὶ τοῦ $\mathcal{P}(\Omega)$ εἶναι τὸ \emptyset

» » τῆς \cap ἐπὶ τοῦ $\mathcal{P}(\Omega)$ εἶναι τὸ Ω .

Τὸ ουδέτερον στοιχείον μιᾶς πράξεως εἶναι *μονοσημάντως* ὠρισμένον. Πράγματι· ἂν ἡ πράξις $*$ ἔχη δύο ουδέτερα στοιχεῖα τὰ ω καὶ ω' , τότε ἀφ' ἑνὸς μὲν $\omega * \omega' = \omega'$, διότι τὸ ω εἶναι ουδέτερον στοιχείον τῆς $*$, ἀφ' ἑτέρου δὲ $\omega * \omega' = \omega$, διότι καὶ τὸ ω' εἶναι ουδέτερον στοιχείον τῆς $*$. Ἄρα $\omega = \omega'$.

Συμμετρικὰ στοιχεῖα ὡς πρὸς πράξιν. Ἐστω $*$ μία πράξις εἰς τὸ E , ἡ ὁποία ἔχει ουδέτερον στοιχείον τὸ ω . Δύο στοιχεῖα α, β τοῦ E καλοῦνται *συμμετρικὰ ὡς πρὸς τὴν $*$* τότε καὶ μόνον τότε, ἂν ἰσχύη

$$(\Sigma) \quad \alpha * \beta = \beta * \alpha = \omega.$$

Τὸ α λέγεται τότε *συμμετρικὸν τοῦ β ὡς πρὸς τὴν $*$* καὶ ἰσοδύναμως τὸ β λέγεται *συμμετρικὸν τοῦ α ὡς πρὸς τὴν $*$* . Οὔτω :

1. Συμμετρικὸν τοῦ $\alpha \in R$ ὡς πρὸς τὴν πρόσθεσιν εἶναι ὁ ἀντίθετός του $-\alpha \in R$.

2. Ἄν $\alpha \in R - \{0\}$, τότε τὸ συμμετρικὸν αὐτοῦ ὡς πρὸς τὸν πολλαπλασιασμόν εἶναι ὁ ἀντίστροφός του $\frac{1}{\alpha} \in R - \{0\}$.

3. Συμμετρικὸν ἑνὸς μὴ κενοῦ συνόλου $A \in \mathcal{P}(\Omega)$ ὡς πρὸς τὴν ἔνωσιν δὲν ὑπάρχει. Ὁμοίως δὲν ὑπάρχει καὶ συμμετρικὸν ἑνὸς γνησίου ὑποσυνόλου τοῦ Ω ὡς πρὸς τὴν τομὴν (διατί);.

Ὁμαλὸν στοιχείον ὡς πρὸς πράξιν. Ἐστω $*$ μία πράξις ἐπὶ τοῦ E . Ἐν στοιχείον αὐτοῦ καλεῖται *ὀμαλὸν* ἢ *ἀπλοποιήσιμον ὡς πρὸς τὴν $*$* τότε καὶ μόνον τότε, ἂν διὰ κάθε $x \in E$ καὶ $y \in E$ ἰσχύουν :

$$\alpha * x = \alpha * y \Rightarrow x = y \quad \text{καὶ} \quad x * \alpha = y * \alpha \Rightarrow x = y.$$

Οὔτως ὡς πρὸς μὲν τὴν πρόσθεσιν κάθε στοιχείον $\alpha \in R$ εἶναι ὀμαλόν, ὡς πρὸς δὲ τὸν πολλαπλασιασμόν κάθε στοιχείον $\alpha \in R - \{0\}$ εἶναι ὀμαλόν, ἐνῶ ἀντιθέτως τὸ 0 δὲν εἶναι ὀμαλόν, διότι π.χ.

$$0 \cdot 3 = 0 \cdot 5 \neq 3 = 5.$$

Ἐπιμεριστικὴ πράξις ὡς πρὸς ἄλλην. Ἐστώσαν δύο πράξεις $*$ καὶ \square ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ συνόλου E . Ἡ πράξις $*$ καλεῖται *ἐπιμεριστικὴ ὡς πρὸς τὴν \square* τότε καὶ μόνον τότε, ἂν διὰ κάθε $\alpha \in E$, $\beta \in E$ καὶ $\gamma \in E$ ἰσχύουν :

$$(E) \quad \alpha * (\beta \square \gamma) = (\alpha * \beta) \square (\alpha * \gamma) \quad \text{καὶ} \quad (\beta \square \gamma) * \alpha = (\beta * \alpha) \square (\gamma * \alpha).$$

Παρατήρησις. Ἄν ἡ πράξις $*$ εἶναι ἀντιμεταθετικὴ, τότε προφανῶς ἰσχύει $\alpha * (\beta \square \gamma) = (\alpha * \beta) \square (\alpha * \gamma) \Leftrightarrow (\beta \square \gamma) * \alpha = (\beta * \alpha) \square (\gamma * \alpha)$ καὶ ἐπομένως μία ἀντιμεταθετικὴ πράξις $*$ ἐπὶ τοῦ E εἶναι ἐπιμεριστικὴ ὡς πρὸς τὴν πράξιν \square (ἐπὶ τοῦ E) τότε καὶ μόνον τότε, ἂν

$$\alpha * (\beta \square \gamma) = (\alpha * \beta) \square (\alpha * \gamma) \quad \forall \alpha \in E, \beta \in E \text{ καὶ } \gamma \in E.$$

Ούτω :

1. 'Επί του \mathbf{R} ό πολλαπλασιασμός είναι έπιμεριστική πράξις ώς πρός τήν πρόσθεσιν, διότι άφ' ενός μόν ούτος είναι άντιμεταθετική πράξις, άφ' έτέρου δέ ισχύει

$$\alpha(\beta + \gamma) = \alpha\beta + \alpha\gamma \quad \forall \alpha \in \mathbf{R}, \beta \in \mathbf{R} \text{ και } \gamma \in \mathbf{R}.$$

'Αντιθέτως ή πρόσθεσις δέν είναι έπιμεριστική ώς πρός τόν πολλαπλασιασμόν, διότι $2 + (3 \cdot 5) \neq (2 + 3) \cdot (2 + 5)$.

2. 'Επί του $\mathcal{P}(\Omega)$ ή ένωσις είναι έπιμεριστική ώς πρός τήν τομήν, διότι αύτη είναι άντιμεταθετική και ισχύει

$$A \cup (B \cap \Gamma) = (A \cup B) \cap (A \cup \Gamma) \quad \forall A \in \mathcal{P}(\Omega), B \in \mathcal{P}(\Omega) \text{ και } \Gamma \in \mathcal{P}(\Omega).$$

'Ομοίως και ή τομή είναι έπιμεριστική ώς πρός τήν ένωσιν, διότι αύτη είναι έπίσης άντιμεταθετική και ισχύει

$$A \cap (B \cup \Gamma) = (A \cap B) \cup (A \cap \Gamma) \quad \forall A \in \mathcal{P}(\Omega), B \in \mathcal{P}(\Omega) \text{ και } \Gamma \in \mathcal{P}(\Omega).$$

4.2 'Εξωτερική πράξις. Είς πολλάς περιπτώσεις έχομεν συναντήσει «πράξεις» αί όποίαι έκτελούνται επί στοιχείων άνηκόντων εις διαφορετικά σύνολα μέ άποτέλεσμα άνήκον εις τό έν έκ τών συνόλων τούτων. Π.χ. τούτο συμβαίνει εις τόν πολλαπλασιασμόν ενός πολυωνύμου επί ένα αριθμόν, όπου τό άποτέλεσμα είναι έπίσης έν πολυώνυμον. Τάς πράξεις αύτάς, πρός διάκρισιν από τάς τοιαύτας τής προηγούμενης παραγράφου, ονομάζομεν *έξωτερικάς* πράξεις. 'Ακριβέστερον ή έννοια τής έξωτερικής πράξεως όρίζεται ώς εξής :

"Εστωσαν δύο μη κενά σύνολα Λ και E . Μία μονοσήμαντος άπεικόνισις (συνάρτησις) του $\Lambda \times E$ εις τό E καλεΐται *έξωτερική πράξις επί του E* και συμβολίζεται συνήθως μέ \cdot . Ούτω διά μιās έξωτερικής πράξεως \cdot κάθε ζεύγος $(\lambda, x) \in \Lambda \times E$ άντιστοιχίζεται εις έν και μοναδικόν στοιχείον $y \in E$, τό όποιον καλεΐται άποτέλεσμα τής (έξωτερικής) πράξεως επί τών στοιχείων λ, x και συμβολίζεται μέ $\lambda \cdot x$, ήτοι

$$y = \lambda \cdot x.$$

Συνήθως τό σύμβολον \cdot παραλείπεται, δηλαδή γράφομεν λx και έννοούμεν $\lambda \cdot x$, ώς συμβαίνει διά κάθε πράξιν συμβολιζομένην μέ \cdot .

Παραδείγματα :

1. 'Ο πολλαπλασιασμός διανύσματος του χώρου επί πραγματικών αριθμόν είναι μία έξωτερική πράξις εις τήν περίπτωσην, όπου $\Lambda = \mathbf{R}$ και E είναι τό σύνολον όλων τών διανυσμάτων του χώρου.

2. $\Lambda = \mathbf{R}$, $E = \mathcal{F}(A, \mathbf{R})$ τό σύνολον όλων τών πραγματικών συναρτήσεων μέ πεδίον όρισμοϋ. τό μη κενόν σύνολον A . 'Η πράξις του πολλαπλασιασμού συναρτήσεως επί αριθμόν, ή όποία διά $(\lambda, f) \in \mathbf{R} \times \mathcal{F}(A, \mathbf{R})$ όρίζεται υπό του τύπου

$$g = \lambda \cdot f \Leftrightarrow g(x) = \lambda f(x) \quad \forall x \in A$$

είναι προφανώς μία έξωτερική πράξις επί του $\mathcal{F}(A, \mathbf{R})$.

Ἐὰς θεωρήσωμεν ἐπὶ τοῦ E ἐκτὸς τῆς ἐξωτερικῆς πράξεως · καὶ μίαν ἐσωτερικὴν πράξιν $*$. Θὰ λέγωμεν ὅτι ἡ ἐξωτερικὴ πράξις εἶναι ἐπιμεριστικὴ ὡς πρὸς τὴν (ἐσωτερικὴν) πράξιν $*$ τότε καὶ μόνον τότε, ἂν ἰσχύη

$$\lambda(x * y) = (\lambda x) * (\lambda y) \quad \forall \lambda \in \Lambda, x, y \in E.$$

Π.χ. ἐπὶ τοῦ συνόλου E τῶν διανυσμάτων τοῦ χώρου ὀρίζονται, ὡς γνωστόν, δύο πράξεις, μία ἐξωτερικὴ, ὁ πολλαπλασιασμός (\cdot) διανύσματος ἐπὶ πραγματικῶν ἀριθμῶν καὶ μία ἐσωτερικὴ, ἡ πρόσθεσις $(+)$ διανυσμάτων, διὰ τὰς ὁποίας ἰσχύει

$$\lambda(\vec{V}_1 + \vec{V}_2) = \lambda\vec{V}_1 + \lambda\vec{V}_2 \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}, \vec{V}_1 \in E \text{ καὶ } \vec{V}_2 \in E$$

Οὕτως ὁ πολλαπλασιασμός διανύσματος ἐπὶ πραγματικῶν ἀριθμῶν εἶναι ἐπιμεριστικὴ πράξις ὡς πρὸς τὴν πρόσθεσιν διανυσμάτων τοῦ χώρου.

5. ΙΣΟΜΟΡΦΙΣΜΟΣ.

5.1 Ἡ ἔννοια τοῦ ἰσομορφισμοῦ. Εἶδομεν εἰς τὴν § 2.2 τοῦ κεφ. I ὅτι μία ἀμφιμονοσήμαντος ἀπεικόνισις (συνάρτησις) f ἐνὸς μὴ κενοῦ συνόλου A ἐπὶ ἐνὸς ἄλλου ἐπίσης μὴ κενοῦ συνόλου A' παρέχει τὴν εὐχέρειαν ἀφ' ἐνὸς μὲν νὰ «μεταβαινῶμεν» ἀπὸ ἓν στοιχεῖον $x \in A$ εἰς ἓν ἀκριβῶς στοιχεῖον $x' \in A'$, ἀφ' ἐτέρου δὲ διὰ τῆς ἀντιστρόφου f^{-1} νὰ «ἐπιστρέφωμεν» ἀπὸ τὸ x' εἰς τὸ x . Τοῦτο ἔχει ἀξιοποιηθῆ καταλλήλως, ὅταν τὰ σύνολα A καὶ A' εἶναι ἐφωδιασμένα μὲ πράξεις.

Ἐὰς θεωρήσωμεν τώρα ὅτι $*$ εἶναι μία (ἐσωτερικὴ) πράξις ἐπὶ τοῦ A . Τότε ὀρίζεται καὶ ἐπὶ τοῦ A' μία πράξις \equiv ὡς κατωτέρω :

$$\begin{array}{ccc} \alpha' & \equiv & \beta' \\ \downarrow f^{-1} & & \downarrow f^{-1} \\ \alpha & * & \beta \end{array} \quad \begin{array}{c} \xrightarrow{\text{οπσ}} \\ \gamma' \\ \uparrow f \\ \gamma \end{array}$$

δηλαδὴ διὰ τυχόντα $\alpha', \beta' \in A'$ θεωροῦμεν τὰ ἀντίστοιχα α, β αὐτῶν ἐν A διὰ τῆς ἀντιστρόφου f^{-1} , ὅποτε τὸ ἀποτέλεσμα γ τῆς πράξεως $*$ ἐπὶ τῶν α, β ἀντιστοιχίζεται διὰ τῆς f εἰς τὸ $\gamma' \in A'$, τὸ ὁποῖον ὀρίζεται ὡς τὸ ἀποτέλεσμα τῆς πράξεως \equiv ἐπὶ τῶν α', β' .

Πολλάκις συμβαίνει ἡ πράξις \equiv νὰ εἶναι ἀπλουστερά τῆς $*$ καὶ ἐκμεταλλεύομενοι τοῦτο νὰ ἐκτελοῦμεν τὴν $*$ ἐμμέσως διὰ τῆς \equiv ὡς κατωτέρω :

$$\begin{array}{ccc} \alpha & * & \beta \\ \downarrow f & & \downarrow f \\ \alpha' & \equiv & \beta' \end{array} \quad \begin{array}{c} \gamma \\ \uparrow f^{-1} \\ \gamma' \end{array}$$

δηλαδὴ εὐρίσκομεν πρῶτον τὰ ἀντίστοιχα στοιχεῖα $\alpha', \beta' \in A'$ τῶν α, β διὰ τῆς f καὶ ἀκολούθως τὸ ἀποτέλεσμα γ' τῆς \equiv ἐπὶ τούτων, ὅποτε τὸ ἀντίστοιχον τοῦ γ' διὰ τῆς ἀντιστρόφου f^{-1} εἶναι τὸ ἀποτέλεσμα γ τῆς $*$ ἐπὶ τῶν α, β .

Οὕτω π.χ. ἂν A εἶναι τὸ σύνολον τῶν ἀριθμῶν τῆς μορφῆς $1 \overbrace{00\dots0}^{\text{ν μηδενικά}}$ μὲ πράξιν τὸν πολλαπλασιασμόν καὶ $A' = \mathbb{N}$, τότε

$$\begin{array}{ccc} \overbrace{1\ 00000}^{5\ \text{μηδενικά}} & \overbrace{1\ 0000}^{4\ \text{μηδενικά}} & = & \overbrace{1\ 00000000}^{9\ \text{μηδενικά}} \\ \downarrow f & \downarrow f & & \uparrow f^{-1} \\ 5 & + & 4 & = & 9 \end{array}$$

Έκ τῶν ἀνωτέρω ἀγόμεθα εἰς τὸ νὰ δώσωμεν τὸν ὄρισμόν .

Ἐστώσαν δύο μὴ κενὰ σύνολα E καὶ E' ἐπὶ τῶν ὁποίων θεωροῦμεν ἀντιστοιχῶς τὰς (ἐσωτερικὰς) πράξεις $*$ καὶ \square . Μία ἀμφιμονοσήμαντος ἀπεικόνισις f τοῦ E ἐπὶ τοῦ E' καλεῖται **ἰσομορφισμὸς ὡς πρὸς τὰς πράξεις $*$ καὶ \square** τότε καὶ μόνον τότε, ἂν ἰσχύη

$$f(x * y) = f(x) \square f(y) \quad \forall x \in E \text{ καὶ } y \in E.$$

Ἄν ὑπάρχη εἰς ἰσομορφισμὸς τοῦ E ἐπὶ τοῦ E' , ὡς ἀνωτέρω, τότε τὰ σύνολα E καὶ E' καλοῦνται **ἰσόμορφα ὡς πρὸς τὰς πράξεις $*$ καὶ \square** .

Παραδείγματα :

1. $E = \mathbb{R}^+$ τὸ σύνολον τῶν θετικῶν ἀριθμῶν μὲ πράξιν \cdot .

$E' = \mathbb{R}$ τὸ σύνολον τῶν πραγματικῶν ἀριθμῶν μὲ πράξιν $+$.

$f = \log$ (ὁ δεκαδικὸς λογάριθμος) : $\mathbb{R}^+ \ni x \xrightarrow{f} \log x \in \mathbb{R}$.

Ἡ $f = \log$ εἶναι, ὡς γνωστὸν, ἀμφιμονοσήμαντος ἀπεικόνισις τοῦ \mathbb{R}^+ ἐπὶ τοῦ \mathbb{R} καὶ μάλιστα ἰσχύει

$$\log(xy) = \log x + \log y,$$

δηλαδὴ ὁ \log εἶναι εἰς ἰσομορφισμὸς ὡς πρὸς τὰς πράξεις \cdot καὶ $+$.

Οὕτω διὰ τὸν ὑπολογισμὸν τοῦ γινομένου $\alpha\beta$ δύο θετικῶν ἀριθμῶν ἐργαζόμεθα ὡς ἑξῆς :

$$\text{Διὰ χρήσεως λογαριθμικῶν πινάκων} \quad \alpha \xrightarrow{\log \alpha} \beta \xrightarrow{\log \beta} \alpha\beta \xrightarrow{\log \alpha\beta}$$

$$\log \alpha + \log \beta = \log(\alpha\beta),$$

δηλαδὴ ἂν γινόμενον εὐρίσκειται δι' ἀπλῆς προσθέσεως.

Ὅμοίως, ἐπεὶ ὁ \log εἶναι ἐπίσης εἰς ἰσομορφισμὸς ὡς πρὸς τὰς πράξεις $:$ καὶ $-$ (διατί:), ἐν πηλίκον εὐρίσκειται δι' ἀπλῆς ἀφαιρέσεως.

Τὰ ἀνωτέρω ἐξηγοῦν τὴν εὐρυτάτην χρῆσιν εἰς τὴν πρακτικὴν τῶν λογαριθμικῶν πινάκων καὶ τοῦ λογαριθμικοῦ κανόνου.

2. $E = \mathbb{C}$ τὸ σύνολον τῶν μιγαδικῶν ἀριθμῶν μὲ πράξιν $+$,

$E' :$ τὸ σύνολον τῶν διανυσμάτων τοῦ ἐπιπέδου τῶν ἐχόντων ἀρχὴν τὴν ἀρχὴν O τῶν ἀξόνων μὲ πράξιν $+$,

$f : \mathbb{C} \rightarrow E'$ διὰ τῆς ὁποίας ἀντίστοιχον τοῦ μιγαδικοῦ ἀριθμοῦ $\alpha + \beta i$ εἶναι τὸ διάνυσμα \vec{OV} μὲ συντεταγμένας α, β .

Ἡ ἀπεικόνισις f εἶναι ἰσομορφισμὸς ὡς πρὸς τὰς πράξεις $+$ καὶ \cdot .

Ἡ ἀπεικόνισις f εἶναι ἰσομορφισμὸς ὡς πρὸς τὰς πράξεις $+$ καὶ \cdot .

Ἡ ἀπεικόνισις f εἶναι ἰσομορφισμὸς ὡς πρὸς τὰς πράξεις $+$ καὶ \cdot .


Ἡ ἀπεικόνισις f εἶναι ἰσομορφισμὸς ὡς πρὸς τὰς πράξεις $+$ καὶ \cdot .

Ἡ ἀπεικόνισις f εἶναι ἰσομορφισμὸς ὡς πρὸς τὰς πράξεις $+$ καὶ \cdot .


Ἡ ἀπεικόνισις f εἶναι ἰσομορφισμὸς ὡς πρὸς τὰς πράξεις $+$ καὶ \cdot .

Ἡ ἀπεικόνισις f εἶναι ἰσομορφισμὸς ὡς πρὸς τὰς πράξεις $+$ καὶ \cdot .

Ἡ ἀπεικόνισις f εἶναι ἰσομορφισμὸς ὡς πρὸς τὰς πράξεις $+$ καὶ \cdot .



Σχ. 21



Σχ. 22

Ἡ f είναι εἰς ἰσομορφισμὸς ὡς πρὸς τὰς πράξεις τῆς προσθέσεως μιγαδικῶν ἀριθμῶν καὶ τῆς προσθέσεως διανυσμάτων (διατί);.

5.2 Βασικὰ θεωρήματα ἐπὶ τῶν ἰσομορφισμῶν. Ἄν f εἶναι εἰς ἰσομορφισμὸς τοῦ E ἐπὶ τοῦ E' ὡς πρὸς τὰς πράξεις $*$ καὶ \square , τότε ἰσχύουν τὰ ἀκόλουθα θεωρήματα :

5.2.1. Ἡ f^{-1} , ἀντίστροφος τῆς f , εἶναι εἰς ἰσομορφισμὸς τοῦ E' ἐπὶ τοῦ E ὡς πρὸς τὰς πράξεις \square καὶ $*$.

Πράγματι· ἡ f^{-1} , ὡς ἀντίστροφος ἀμφιμονοσημάντου ἀπεικονίσεως, εἶναι μίᾳ ἀμφιμονοσημάντος ἀπεικόνισις (συνάρτησις) τοῦ E' ἐπὶ τοῦ E (πρβλ. § 2.2 τοῦ κεφ. I). Ἄν τώρα x' καὶ y' εἶναι τυχόντα στοιχεῖα τοῦ E' , τότε ταῦτα διὰ τῆς συναρτήσεως f^{-1} ἀντιστοιχίζονται ἀντιστοίχως εἰς τὰ στοιχεῖα x καὶ y τοῦ E , ἥτοι

$$x = f^{-1}(x') \text{ καὶ } y = f^{-1}(y') \text{ ἢ ἰσοδυνάμως : } x' = f(x) \text{ καὶ } y' = f(y).$$

Ἐπομένως, ἐπειδὴ ἡ f εἶναι εἰς ἰσομορφισμὸς ὡς πρὸς τὰς πράξεις $*$ καὶ \square , θὰ ἔχωμεν

$$x' \square y' = f(x) \square f(y) = f(x * y),$$

ἄρα καὶ

$$f^{-1}(x' \square y') = f^{-1}(f(x * y)) = x * y = f^{-1}(x') * f^{-1}(y'),$$

ἥτοι

$$f^{-1}(x' \square y') = f^{-1}(x') * f^{-1}(y') \quad \forall x' \in E' \text{ καὶ } y' \in E',$$

δηλαδὴ ἡ f^{-1} εἶναι εἰς ἰσομορφισμὸς τοῦ E' ἐπὶ τοῦ E ὡς πρὸς τὰς πράξεις \square καὶ $*$.

5.2.2 Ἡ πράξις $*$ ἐπὶ τοῦ E εἶναι ἀντιμεταθετικὴ τότε καὶ μόνον τότε, ἂν ἡ πράξις \square ἐπὶ τοῦ E' εἶναι ἀντιμεταθετικὴ.

Πράγματι· ἀρκεῖ νὰ δεῖξωμεν ὅτι ἡ ἀντιμεταθετικότης τῆς $*$ συνεπάγεται τὴν ἀντιμεταθετικότητα τῆς \square , διότι τὸ ἀντίστροφον προκύπτει τότε ἐκ τούτου καὶ τοῦ γεγονότος ὅτι, δυνάμει τοῦ προηγουμένου θεωρήματος 5.2.1, ἡ f^{-1} εἶναι ἐπίσης ἰσομορφισμὸς.

Ἐστῶσαν λοιπὸν δύο τυχόντα στοιχεῖα x' καὶ y' τοῦ E' . Ταῦτα διὰ τῆς f^{-1} ἀντιστοιχίζονται ἀντιστοίχως εἰς τὰ στοιχεῖα x καὶ y τοῦ E , ἥτοι

$$x = f^{-1}(x') \text{ καὶ } y = f^{-1}(y') \text{ ἢ ἰσοδυνάμως : } x' = f(x) \text{ καὶ } y' = f(y),$$

ὁπότε, ἐπειδὴ ἡ f εἶναι εἰς ἰσομορφισμὸς ὡς πρὸς τὰς πράξεις $*$ καὶ \square , θὰ ἔχωμεν

$$x' \square y' = f(x) \square f(y) = f(x * y).$$

Ἀλλὰ, λόγῳ καὶ τῆς ἀντιμεταθετικότητος τῆς $*$, ἰσχύει

$$f(x * y) = f(y * x) = f(y) \square f(x) = y' \square x'.$$

Ἄρα $x' \square y' = y' \square x' \quad \forall x' \in E' \text{ καὶ } y' \in E'$,

δηλαδὴ καὶ ἡ πράξις \square εἶναι ἀντιμεταθετικὴ.

5.2.3 Ἡ πράξις $*$ ἐπὶ τοῦ E εἶναι προσεταιριστικὴ τότε καὶ μόνον τότε,

αν η πράξις \blacksquare επί του E' είναι προσεταιριστική.

Πράγματι: διὰ τὸν αὐτὸν λόγον, ὡς καὶ εἰς τὸ προηγούμενον θεώρημα, ἀρκεῖ νὰ ἀποδείξωμεν ὅτι ἡ προσεταιριστικότης τῆς $*$ συνεπάγεται τὴν προσεταιριστικότητά τῆς \blacksquare .

Ἐστῶσαν λοιπὸν τυχόντα στοιχεῖα x', y', z' τοῦ E' . Ταῦτα διὰ τῆς f^{-1} ἀντιστοιχίζονται ἀντιστοίχως εἰς τὰ στοιχεῖα x, y καὶ z τοῦ E , ἥτοι

$$x = f^{-1}(x'), \quad y = f^{-1}(y') \quad \text{καὶ} \quad z = f^{-1}(z')$$

ἢ ἰσοδυνάμως :

$$x' = f(x), \quad y' = f(y) \quad \text{καὶ} \quad z' = f(z),$$

ὁπότε, ἐπειδὴ ἡ f εἶναι εἰς ἰσομορφισμὸς ὡς πρὸς τὰς πράξεις $*$ καὶ \blacksquare , θὰ ἔχωμεν

$$(x' \blacksquare y') \blacksquare z' = (f(x) \blacksquare f(y)) \blacksquare f(z) = f(x * y) \blacksquare f(z) = f((x * y) * z).$$

Ἀλλὰ, λόγῳ καὶ τῆς προσεταιριστικότητος τῆς $*$, ἰσχύει

$$f((x * y) * z) = f(x * (y * z)) = f(x) \blacksquare f(y * z) = f(x) \blacksquare (f(y) \blacksquare f(z)) = x' \blacksquare (y' \blacksquare z').$$

Ἄρα $(x' \blacksquare y') \blacksquare z' = x' \blacksquare (y' \blacksquare z') \quad \forall \quad x' \in E', y' \in E' \text{ καὶ } z' \in E'$, δηλαδὴ καὶ ἡ πράξις \blacksquare εἶναι προσεταιριστική.

5.2.4 Ἄν ἡ πράξις $*$ ἐπὶ τοῦ E ἔχει οὐδέτερον στοιχεῖον τὸ ω , τότε καὶ ἡ πράξις \blacksquare ἐπὶ τοῦ E' ἔχει οὐδέτερον στοιχεῖον τὸ $f(\omega) = \omega' \in E'$.

Πράγματι: ἔστω x' τυχὸν στοιχεῖον τοῦ E' καὶ ἔστω x τὸ ἀντίστοιχον αὐτοῦ διὰ τῆς f^{-1} , ἥτοι $x = f^{-1}(x')$ ἢ ἰσοδυνάμως $x' = f(x)$. Ἐπειδὴ τὸ ω εἶναι οὐδέτερον στοιχεῖον τῆς $*$ θὰ ἰσχύουν

$$\omega * x = x \quad \text{καὶ} \quad x * \omega = x,$$

ὁπότε, λόγῳ τοῦ ὅτι ἡ f εἶναι εἰς ἰσομορφισμὸς ὡς πρὸς τὰς πράξεις $*$ καὶ \blacksquare , θὰ ἔχωμεν ἀφ' ἑνὸς μὲν

$$x' = f(x) = f(\omega * x) = f(\omega) \blacksquare f(x) = f(\omega) \blacksquare x',$$

ἀφ' ἑτέρου δὲ

$$x' = f(x) = f(x * \omega) = f(x) \blacksquare f(\omega) = x' \blacksquare f(\omega),$$

ἥτοι

$$f(\omega) \blacksquare x' = x' \quad \text{καὶ} \quad x' \blacksquare f(\omega) = x' \quad \forall \quad x' \in E',$$

δηλαδὴ τὸ $\omega' = f(\omega)$ εἶναι οὐδέτερον στοιχεῖον τῆς πράξεως \blacksquare .

6. ΟΜΑΣ.

6.1 Ἡ ἔννοια τῆς ὁμάδος. Παρατηρήσαμεν ἤδη ὅτι πράξεις ὀριζόμεναι εἰς διαφορετικὰ σύνολα ἔχουν κοινὰς ιδιότητες π.χ. ἡ πρόσθεσις εἰς τὸ \mathbb{R} καὶ ἡ τομὴ εἰς τὸ $\mathcal{P}(\Omega)$ εἶναι πράξεις ἀντιμεταθετικά, προσεταιριστικά, ἔχουν οὐδέτερον στοιχεῖον κ.λ.π. Τὸ φαινόμενον τοῦτο εἶναι σύνηθες εἰς τὰ μαθηματικά καὶ ὠδήγησεν εἰς τὴν κατάταξιν τοιούτων συνόλων (εἰς τὰ ὁποῖα ὀρίζονται πράξεις μὲ κοινὰς ιδιότητας) εἰς κατηγορίας μὲ ἰδιαίτεραν ὀνομασίαν.

Εστωσαν ἐν μὴ κενὸν σύνολον E καὶ $$ μία (ἔσωτερική) πράξις ἐπὶ τούτου. Τὸ E καλεῖται ὁμάς ὡς πρὸς τὴν πράξιν $*$ τότε καὶ μόνον τότε, ἂν

(Π) ἡ πράξις $*$ εἶναι προσεταιριστική

(Ο) ἡ πράξις $*$ ἔχει οὐδέτερον στοιχεῖον $\omega \in E$

(Σ) κάθε στοιχεῖον τοῦ E ἔχει συμμετρικὸν ὡς πρὸς τὴν $*$.

Ἄν ἡ πράξις $$ εἶναι ἐπὶ πλέον καὶ ἀντιμεταθετική, τότε ἡ ὁμάς E καλεῖται, εἰδικώτερον, ἀντιμεταθετική ὁμάς ὡς πρὸς τὴν πράξιν $*$.

Παρατηρήσεις :

1. Τὸ οὐδέτερον στοιχεῖον ω τῆς $*$ εἶναι μοναδικόν (πρβλ. § 4.1).

2. Τὸ συμμετρικὸν τυχόντος στοιχείου $\alpha \in E$ ὡς πρὸς τὴν $*$ εἶναι ἐπίσης μοναδικόν. Πράγματι ἂν β καὶ γ εἶναι συμμετρικά τοῦ α ὡς πρὸς τὴν $*$, τότε θὰ ἔχωμεν

$$\alpha * \beta = \beta * \alpha = \omega \quad \text{καὶ} \quad \alpha * \gamma = \gamma * \alpha = \omega,$$

ὁπότε, ἐπειδὴ ἡ $*$ εἶναι προσεταιριστική, θὰ ἔχωμεν καὶ

$$\beta = \beta * \omega = \beta * (\alpha * \gamma) = (\beta * \alpha) * \gamma = \omega * \gamma = \gamma.$$

Τὸ μοναδικὸν συμμετρικὸν τοῦ α ὡς πρὸς τὴν $*$ παριστῶμεν συνήθως μὲ $\hat{\alpha}$.

Παραδείγματα :

1. Τὸ σύνολον Z τῶν ἀκεραίων εἶναι ὁμάς ὡς πρὸς τὴν πρόσθεσιν, διότι :

(Π) $\alpha + (\beta + \gamma) = (\alpha + \beta) + \gamma \quad \forall \alpha \in Z, \beta \in Z, \gamma \in Z$ (προσεταιριστικότης),

(Ο) $\alpha + 0 = 0 + \alpha = \alpha \quad \forall \alpha \in Z$, δηλαδή τὸ 0 ($0 \in Z$) εἶναι οὐδέτερον στοιχεῖον τῆς πρόσθεσως.

(Σ) $\alpha + (-\alpha) = 0 \quad \forall \alpha \in Z$, δηλαδή κάθε ἀκέραιος α ἔχει συμμετρικὸν ὡς πρὸς τὴν πρόσθεσιν τὸν ἐπίσης ἀκέραιον $-\alpha$.

*Ἀντιθέτως τὸ σύνολον Z δὲν εἶναι ὁμάς ὡς πρὸς τὸν πολλαπλασιασμόν, διότι, ἂν καὶ ὁ πολλαπλασιασμός εἶναι προσεταιριστικός καὶ ἔχει οὐδέτερον στοιχεῖον τὸ 1 ($1 \in Z$), ἐν τούτοις κάθε ἀκέραιος, διάφορος τῶν -1 καὶ 1 , δὲν ἔχει συμμετρικὸν ὡς πρὸς τὸν πολλαπλασιασμόν ἐν Z (διατί;).

2. Τὸ σύνολον A τῶν ἄρτίων ἀκεραίων εἶναι ὁμάς ὡς πρὸς τὴν πρόσθεσιν, διότι ἡ πρόσθεσις εἶναι προσεταιριστική, ἔχει οὐδέτερον στοιχεῖον τὸ 0 ($0 \in A$) καὶ κάθε ἄρτιος α ἔχει συμμετρικὸν ὡς πρὸς τὴν πρόσθεσιν τὸν ἐπίσης ἄρτιον $-\alpha$.

*Ἀντιθέτως τὸ σύνολον A τῶν ἄρτίων δὲν εἶναι ὁμάς ὡς πρὸς τὸν πολλαπλασιασμόν, διότι δὲν ὑπάρχει οὐδέτερον στοιχεῖον τοῦ πολλαπλασιασμοῦ ἐν A (διατί;).

3. Τὸ σύνολον Q τῶν ρητῶν ἀριθμῶν εἶναι ὁμάς ὡς πρὸς τὴν πρόσθεσιν, διότι ἡ πρόσθεσις εἶναι προσεταιριστική, ἔχει οὐδέτερον στοιχεῖον τὸ 0 ($0 \in Q$) καὶ κάθε ρητὸς α ἔχει συμμετρικὸν ὡς πρὸς τὴν πρόσθεσιν τὸν ἐπίσης ρητὸν $-\alpha$.

Ἐπίσης τὸ σύνολον $Q^ = Q - \{0\}$ τῶν ρητῶν ἀριθμῶν τῶν διαφόρων τοῦ 0 εἶναι ὁμάς ὡς πρὸς τὸν πολλαπλασιασμόν, διότι ὁ πολλαπλασιασμός εἶναι προσεταιριστικός, ἔχει οὐδέτερον στοιχεῖον τὸ 1 ($1 \in Q^*$) καὶ κάθε ρητὸς $\alpha \neq 0$ ἔχει συμμετρικὸν ὡς πρὸς τὸν πολλαπλασιασμόν τὸν ἐπίσης ρητὸν $\frac{1}{\alpha} \neq 0$.

4. Τὸ σύνολον R τῶν πραγματικῶν ἀριθμῶν εἶναι ὁμάς ὡς πρὸς τὴν πρόσθεσιν. *Ὁμοίως τὸ σύνολον $R^* = R - \{0\}$ εἶναι ὁμάς ὡς πρὸς τὸν πολλαπλασιασμόν.

5. Έστωσαν $E = \{0, 1, 2\}$ και $*$ μία πράξις οριζόμενη υπό του πίνακος :

$*$	0	1	2
0	0	1	2
1	1	2	0
2	2	0	1

δηλαδή
$$\begin{cases} 0 * 0 = 0, & 1 * 0 = 1, & 2 * 0 = 2 \\ 0 * 1 = 1, & 1 * 1 = 2, & 2 * 1 = 0 \\ 0 * 2 = 2, & 1 * 2 = 0, & 2 * 2 = 1 \end{cases}$$

Ευκόλως προκύπτει ότι η πράξις $*$ είναι προσεταιριστική, έχει ουδέτερον στοιχείον το 0 και ότι τα στοιχεία 1 και 2 είναι συμμετρικά ως προς την $*$, δηλαδή ότι το σύνολον E είναι ομάδα ως προς την πράξιν $*$.

Τέλος παρατηρούμεν ότι όλα τα άνωτέρω παραδείγματα ομάδων αποτελούν αντιμεταθετικά ομάδας (διατί;).

6.2 Βασικά θεωρήματα επί των ομάδων. "Αν E είναι μία ομάδα με πράξιν $*$, τότε ισχύουν τα ακόλουθα θεωρήματα :

6.2.1 Κάθε στοιχείον $\alpha \in E$ είναι άπλοποιήσιμον (όμαλόν).

Πράγματι· αν $\alpha * x = \alpha * y$, τότε, έπειδή υπάρχει το συμμετρικόν $\hat{\alpha}$ του α ως προς την $*$, θα έχωμεν

$$\hat{\alpha} * (\alpha * x) = \hat{\alpha} * (\alpha * y)$$

και λόγω της έπιμεριστικότητας της πράξεως $*$,

$$(\hat{\alpha} * \alpha) * x = (\hat{\alpha} * \alpha) * y \quad \eta \quad \omega * x = \omega * y \quad \eta \quad x = y.$$

"Ωστε έδειχθή ότι $\alpha * x = \alpha * y \Rightarrow x = y$. "Ομοίως αποδεικνύεται και ότι $x * \alpha = y * \alpha \Rightarrow x = y$. "Αρα το στοιχείον α είναι άπλοποιήσιμον.

6.2.2 "Αν α, β είναι τυχόντα στοιχεία έν E , τότε τóσον η έξίσωσις $x * \beta = \alpha$, όσον και η έξίσωσις $\beta * x = \alpha$ έχει μίαν μοναδικήν λύσιν έν E .

Πράγματι· (i) $x * \beta = \alpha \Leftrightarrow (x * \beta) * \hat{\beta} = \alpha * \hat{\beta}$, διότι το $\hat{\beta}$ κατά το προηγούμενον θεώρημα 6.2.1 είναι άπλοποιήσιμον. "Αλλά, λόγω της προσεταιριστικότητας της $*$, $(x * \beta) * \hat{\beta} = x * (\beta * \hat{\beta}) = x * \omega = x$. "Αρα

$$x * \beta = \alpha \Leftrightarrow x = \alpha * \hat{\beta}.$$

(ii) "Ομοίως: $\beta * x = \alpha \Leftrightarrow \hat{\beta} * (\beta * x) = \hat{\beta} * \alpha \Leftrightarrow (\hat{\beta} * \beta) * x = \hat{\beta} * \alpha \Leftrightarrow \omega * x = \hat{\beta} * \alpha \Leftrightarrow x = \hat{\beta} * \alpha$.

6.2.3 "Αν α, β είναι τυχόντα στοιχεία έν E , τότε το συμμετρικόν του $\alpha * \beta$ είναι το $\hat{\beta} * \hat{\alpha}$, ήτοι $\widehat{\alpha * \beta} = \hat{\beta} * \hat{\alpha}$.

Πράγματι· λόγω της προσεταιριστικότητας της $*$, ισχύει άφ' ενός μόν $(\alpha * \beta) * (\hat{\beta} * \hat{\alpha}) = \alpha * (\beta * (\hat{\beta} * \hat{\alpha})) = \alpha * ((\beta * \hat{\beta}) * \hat{\alpha}) = \alpha * (\omega * \hat{\alpha}) = \alpha * \hat{\alpha} = \omega$, άφ' ετέρου δέ,

$$(\hat{\beta} * \hat{\alpha}) * (\alpha * \beta) = \hat{\beta} * (\hat{\alpha} * (\alpha * \beta)) = \hat{\beta} * ((\hat{\alpha} * \alpha) * \beta) = \hat{\beta} * (\omega * \beta) = \hat{\beta} * \beta = \omega. \text{ Άρα } \alpha * \beta = \omega.$$

$$\alpha * \beta = \hat{\beta} * \hat{\alpha}.$$

Γενικώτερον, αν $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ είναι τυχόντα στοιχεία εν E , τότε το συμμετρικόν του $\alpha_1 * \alpha_2 * \dots * \alpha_{n-1} * \alpha_n$ είναι το $\hat{\alpha}_n * \hat{\alpha}_{n-1} * \dots * \hat{\alpha}_2 * \hat{\alpha}_1$.

Δυνάμεθα τώρα, τῆ βοηθεία τοῦ θεωρήματος 6.2.2, νὰ ὀρίσωμεν ἐπὶ τοῦ E καὶ μίαν πράξιν $*$ «συμμετρικήν» τῆς $*$ διὰ τῆς ὁποίας εἰς κάθε ζεύγος (α, β) ἀντιστοιχίζεται ἡ μοναδικὴ λύσις τῆς ἐξίσωσσεως $x * \beta = \alpha$, δηλαδὴ τὸ στοιχεῖον $\alpha * \hat{\beta}$. Τοῦτέστιν ἡ πράξις $*$ ἐπὶ τοῦ E ὀρίζεται ὑπὸ τοῦ τύπου

$$\alpha * \hat{\beta} = \alpha * \hat{\beta}.$$

Τὴν πράξιν $*$ μιᾶς ὁμάδος E συχνὰ συμβολίζομεν μὲ $+$ καὶ τὴν καλοῦμεν πρόσθεσιν ἢ μὲ καὶ τὴν καλοῦμεν πολλαπλασιασμόν. Τότε συμβολίζομεν ἀντιστοίχως

τὸ οὐδέτερον στοιχεῖον μὲ 0 (μηδέν) ἢ 1 (μονὰς)
 τὸ συμμετρικόν τοῦ α μὲ $-\alpha$ (ἀντίθετον τοῦ α) ἢ $\frac{1}{\alpha}$ καὶ α^{-1} (ἀντίστροφον τοῦ α)
 τὴν συμμετρικήν πράξιν $*$ μὲ $-$ (ἀφαίρεσις) ἢ $:$ (διαίρεσις).

6.2.4 Εἰς μίαν ὁμάδα E μὲ πράξιν $+$ ἢ \cdot ἰσχύον, ἀντιστοίχως, διὰ κάθε $\alpha \in E, \beta \in E$ καὶ $\gamma \in E$ τὰ κάτωθι :

- | | |
|--|---|
| 1. $(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma)$ | 1'. $(\alpha\beta)\gamma = \alpha(\beta\gamma)$ |
| 2. $\alpha + 0 = 0 + \alpha = \alpha$ | 2'. $\alpha 1 = 1\alpha = \alpha$ |
| 3. $\alpha + (-\alpha) = 0$ | 3'. $\alpha \frac{1}{\alpha} = 1$ |
| 4. $-(-\alpha) = \alpha$ | 4'. $1/\frac{1}{\alpha} = \alpha$ |
| 5. $-0 = 0$ | 5'. $\frac{1}{1} = 1$ |
| 6. $\alpha - \beta = \alpha + (-\beta)$ | 6'. $\alpha : \beta = \alpha \frac{1}{\beta}$ |
| 7. $-(\alpha + \beta) = (-\beta) + (-\alpha) = -\beta - \alpha$ | 7'. $\frac{1}{\alpha\beta} = \frac{1}{\beta} \frac{1}{\alpha} = \frac{1}{\beta} : \alpha$ |
| 8. $-(\alpha - \beta) = -[\alpha + (-\beta)] = -(-\beta) + (-\alpha) = \beta + (-\alpha) = \beta - \alpha$ | 8'. $\frac{1}{\alpha:\beta} = \frac{1}{\alpha} \frac{1}{\frac{1}{\beta}} = \frac{1}{\alpha} \beta = \beta : \alpha$ |
| 9. $\gamma + (\alpha - \beta) = \gamma + [\alpha + (-\beta)] = (\gamma + \alpha) + (-\beta) = (\gamma + \alpha) - \beta$ | 9'. $\gamma(\alpha : \beta) = \gamma(\alpha \frac{1}{\beta}) = (\gamma\alpha) \frac{1}{\beta} = (\gamma\alpha) : \beta$ |

$$\begin{aligned}
 10. \gamma - (\alpha + \beta) &= \gamma + [-(\alpha + \beta)] = 10.' \gamma : (\alpha\beta) = \gamma \frac{1}{\alpha\beta} = \\
 &= \gamma + [(-\beta) + (-\alpha)] = &= \gamma \left(\frac{1}{\beta} \frac{1}{\alpha} \right) \\
 &= [\gamma + (-\beta)] + (-\alpha) = (\gamma - \beta) - \alpha &= \left(\gamma \frac{1}{\beta} \right) \frac{1}{\alpha} = (\gamma : \beta) : \alpha \\
 11. \gamma - (\alpha - \beta) &= \gamma + (\beta - \alpha) = 11.' \gamma : (\alpha : \beta) = \gamma (\beta : \alpha) = (\gamma\beta) : \alpha \\
 &= (\gamma + \beta) - \alpha.
 \end{aligned}$$

7* ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ

7.1 Ἡ ἔννοια τοῦ δακτύλιου. Ἐστώσαν E ἓν μὴ κενὸν σύνολον καὶ $*$, \cdot δύο πράξεις ἐπὶ τούτου. Τὸ σύνολον E καλεῖται *δακτύλιος* ὡς πρὸς τὰς πράξεις $*$ καὶ \cdot τότε καὶ μόνον τότε, ἂν τὸ E εἶναι *ἀντιμεταθετικὴ ὁμάς* ὡς πρὸς τὴν πράξιν $*$ καὶ ἐπὶ πλέον ἢ πράξεις \cdot εἶναι *προσεταιριστικὴ* καὶ *ἐπιμεριστικὴ* ὡς πρὸς τὴν $*$.

Ἄς συμβολίσωμεν, ὡς συνήθως, τὰς πράξεις $*$ καὶ \cdot μὲ $+$ καὶ \cdot ἀντιστοίχως, ὁπότε εἰς ἓνα δακτύλιον E (ὡς πρὸς τὰς πράξεις $+$ καὶ \cdot) διὰ κάθε α, β καὶ γ ἰσχύουν :

$$\begin{array}{l|l}
 (A) & \alpha + \beta = \beta + \alpha \\
 (Π) & (\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma) \\
 (O) & \alpha + 0 = 0 + \alpha = \alpha \\
 (\Sigma) & \alpha + (-\alpha) = (-\alpha) + \alpha = 0
 \end{array} \quad \left| \begin{array}{l} \text{-----} \\ \alpha(\beta\gamma) = (\alpha\beta)\gamma \\ \text{-----} \\ \text{-----} \end{array} \right.$$

$$\begin{aligned}
 & \alpha(\beta + \gamma) = \alpha\beta + \alpha\gamma \\
 & (\beta + \gamma)\alpha = \beta\alpha + \gamma\alpha
 \end{aligned}$$

Ἄν ἡ πράξις \cdot μείναι ἐπίσης ἀντιμεταθετικὴ, τότε ὁ δακτύλιος E καλεῖται *ἀντιμεταθετικὸς δακτύλιος* ὡς πρὸς τὰς πράξεις $+$ καὶ \cdot . Ὁ ὀρισμὸς τοῦ δακτύλιου δὲν ἀπαιτεῖ τὴν ὑπαρξιν οὐδετέρου στοιχείου τῆς πράξεως (μονάδος), εἰς τὰς περιπτώσεις ὅμως, ὅπου τοῦτο ὑπάρχει λέγομεν ὅτι ὁ δακτύλιος E ἔχει *μονάδα*.

Παραδείγματα :

1. Τὸ σύνολον A τῶν ἀρτίων ἀκεραίων εἶναι ἀντιμεταθετικὸς δακτύλιος ὡς πρὸς τὴν πρόσθεσιν καὶ τὸν πολλαπλασιασμόν (χωρὶς μονάδα), διότι ἀφ' ἑνὸς μὲν, ὡς εἶδομεν εἰς τὸ παράδειγμα 2 τῆς § 6.1, τὸ A εἶναι μία ἀντιμεταθετικὴ ὁμάς ὡς πρὸς τὴν πρόσθεσιν, ἀφ' ἑτέρου δὲ ὁ πολλαπλασιασμός εἶναι, ὡς γνωστὸν, ἀντιμεταθετικὸς, προσεταιριστικὸς καὶ ἐπὶ πλέον ἐπιμεριστικὸς ὡς πρὸς τὴν πρόσθεσιν.

2. Τὸ σύνολον Z τῶν ἀκεραίων ἀριθμῶν εἶναι ἀντιμεταθετικὸς δακτύλιος ὡς πρὸς τὴν πρόσθεσιν καὶ τὸν πολλαπλασιασμόν καὶ μάλιστα μὲ μονάδα, διότι ἀφ' ἑνὸς μὲν, ὡς εἶδομεν εἰς τὸ παράδειγμα 1 τῆς § 6.1 τὸ Z εἶναι ἀντιμεταθετικὴ ὁμάς ὡς πρὸς τὴν πρόσθεσιν, ἀφ' ἑτέρου δὲ ὁ πολλαπλασιασμός, ὁ ὁποῖος ἔχει οὐδέτερον στοιχείον τὸν ἀριθμὸν 1 ($1 \in Z$), εἶναι, ὡς γνωστὸν, ἀντιμεταθετικὸς, προσεταιριστικὸς καὶ ἐπὶ πλέον ἐπιμεριστικὸς ὡς πρὸς τὴν πρόσθεσιν.

3. Όμοιως τὰ σύνολα Q τῶν ρητῶν καὶ R τῶν πραγματικῶν ἀριθμῶν εἶναι ἀντιμεταθετικοὶ δακτύλιοι ὡς πρὸς τὰς πράξεις τῆς προσθέσεως καὶ τοῦ πολλαπλασιασμοῦ καὶ μάλιστα ἀμφότεροι ἔχουν μονάδα.

7.2 Βασικὰ θεωρήματα ἐπὶ τῶν δακτυλίων. Ἐὰν E εἶναι εἷς δακτύλιος ὡς πρὸς τὰς πράξεις $+$ καὶ \cdot , τότε, ἐκτὸς τῶν θεωρημάτων τῆς § 6.2 τῶν ἀφορώντων εἰς τὴν πρόσθεσιν, ἰσχύουν καὶ τὰ κάτωθι :

1. $\alpha 0 = 0\alpha = 0,$

διότι: $\alpha(\beta + 0) = \alpha\beta + \alpha 0 \Leftrightarrow \alpha\beta = \alpha\beta + \alpha 0 \Rightarrow \alpha 0 = 0$
 $(\beta + 0)\alpha = \beta\alpha + 0\alpha \Leftrightarrow \beta\alpha = \beta\alpha + 0\alpha \Rightarrow 0\alpha = 0.$

2. $\alpha(-\beta) = (-\alpha)\beta = -(\alpha\beta),$

διότι: $0 = \alpha 0 = \alpha[\beta + (-\beta)] \Leftrightarrow 0 = \alpha\beta + \alpha(-\beta) \Rightarrow \alpha(-\beta) = -(\alpha\beta)$
 $0 = 0\beta = [\alpha + (-\alpha)]\beta \Leftrightarrow 0 = \alpha\beta + (-\alpha)\beta \Rightarrow (-\alpha)\beta = -(\alpha\beta).$

3. $\alpha(\beta - \gamma) = \alpha\beta - \alpha\gamma$ καὶ $(\beta - \gamma)\alpha = \beta\alpha - \gamma\alpha,$

διότι: $\alpha(\beta - \gamma) = \alpha[\beta + (-\gamma)] = \alpha\beta + \alpha(-\gamma) = \alpha\beta + (-\alpha\gamma) = \alpha\beta - \alpha\gamma$
 $(\beta - \gamma)\alpha = [\beta + (-\gamma)]\alpha = \beta\alpha + (-\gamma)\alpha = \beta\alpha + (-\gamma\alpha) = \beta\alpha - \gamma\alpha.$

4. $(\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n)(\beta_1 + \beta_2 + \dots + \beta_k) =$
 $= \alpha_1\beta_1 + \alpha_1\beta_2 + \dots + \alpha_1\beta_k + \alpha_2\beta_1 + \alpha_2\beta_2 + \dots + \alpha_2\beta_k + \dots +$
 $+ \alpha_n\beta_1 + \alpha_n\beta_2 + \dots + \alpha_n\beta_k.$

5. Ἐὰν ὁ δακτύλιος E εἶναι ἀντιμεταθετικός, τότε ἰσχύει καὶ ὁ τύπος τοῦ διωνύμου, ἥτοι :

$$(\alpha + \beta)^v =$$

$$= \alpha^v + \binom{v}{1}\alpha^{v-1}\beta + \binom{v}{2}\alpha^{v-2}\beta^2 + \dots + \binom{v}{v-2}\alpha^2\beta^{v-2} + \binom{v}{v-1}\alpha\beta^{v-1} + \beta^v =$$

$$= \alpha^v + v\alpha^{v-1}\beta + \frac{v(v-1)}{2}\alpha^{v-2}\beta^2 + \dots + \frac{v(v-1)}{2}\alpha^2\beta^{v-2} + v\alpha\beta^{v-1} + \beta^v.$$

8* Σ Ω Μ Α

8.1. Ἡ ἔννοια τοῦ σώματος. Ἐστω E εἷς ἀντιμεταθετικὸς δακτύλιος ὡς πρὸς τὰς πράξεις $+$ καὶ \cdot . Ὁ δακτύλιος E καλεῖται *σῶμα* ὡς πρὸς τὰς πράξεις $+$ καὶ \cdot τότε καὶ μόνον τότε, ἂν τὸ σύνολον $E^* = E - \{0\}$ εἶναι (ἀντιμεταθετικὴ) ὁμάς ὡς πρὸς τὴν πρᾶξιν \cdot , ὁπότε εἰς ἓν σῶμα E διὰ κάθε α, β καὶ γ ἰσχύουν :

(A)	$\alpha + \beta = \beta + \alpha$	$\alpha\beta = \beta\alpha$
(B)	$(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma)$	$(\alpha\beta)\gamma = \alpha(\beta\gamma)$
(C)	$\alpha + 0 = 0 + \alpha = \alpha$	$\alpha 1 = 1\alpha = \alpha$
(D)	$\alpha + (-\alpha) = (-\alpha) + \alpha = 0$	$\alpha\alpha^{-1} = \alpha^{-1}\alpha = 1, \alpha \neq 0$

$$\alpha(\beta + \gamma) = \alpha\beta + \alpha\gamma.$$

Ἄρα τὰ ἀνωτέρω εἶναι ἀμειψίως συνέπειαι τοῦ ὁρισμοῦ τοῦ σώματος πλὴν τῆς $\alpha 1 = 1\alpha = \alpha$, ἣ ὁποία κατὰ τὸν ὁρισμὸν τοῦ σώματος ἰσχύει μόνον διὰ

$\alpha \in E^*$, δηλαδή διὰ $\alpha \neq 0$. Αποδεικνύεται όμως ότι ισχύει και $0 \cdot 1 = 1 \cdot 0 = 0$, διότι διὰ $\alpha \neq 0$ (π.χ. ως α δυνάμεθα νὰ λάβωμεν τὸ 1 καθ' ὅσον $1 \in E^*$, ἤτοι $1 \neq 0$) ἔχομεν :

$$0 \cdot 1 = (\alpha - \alpha)1 = \alpha 1 - \alpha 1 = \alpha - \alpha = 0$$

$$1 \cdot 0 = 1(\alpha - \alpha) = 1\alpha - 1\alpha = \alpha - \alpha = 0.$$

Παραδείγματα :

1. Τὸ σύνολον Q τῶν ρητῶν ἀριθμῶν εἶναι σῶμα ὡς πρὸς τὴν πρόσθεσιν καὶ τὸν πολλαπλασιασμόν, διότι ἀφ' ἑνὸς μὲν κατὰ τὸ παράδειγμα 3 τῆς § 7.1 εἶναι ἀντιμεταθετικός δακτύλιος ὡς πρὸς τὴν πρόσθεσιν καὶ τὸν πολλαπλασιασμόν, ἀφ' ἑτέρου δὲ κατὰ τὸ παράδειγμα 3 τῆς § 6.1 τὸ σύνολον $Q^* = Q - \{0\}$ εἶναι ὁμάς ὡς πρὸς τὸν πολλαπλασιασμόν.

2. Ὅμοίως τὸ σύνολον R τῶν πραγματικῶν ἀριθμῶν εἶναι σῶμα ὡς πρὸς τὴν πρόσθεσιν καὶ τὸν πολλαπλασιασμόν (διατί);).

3. Τὸ σύνολον Z τῶν ἀκεραίων ἀριθμῶν δὲν εἶναι σῶμα (ὡς πρὸς τὴν πρόσθεσιν καὶ τὸν πολλαπλασιασμόν), διότι, ἂν καὶ τὸ Z εἶναι ἀντιμεταθετικός δακτύλιος (παράδειγμα 2 τῆς § 7.1), τὸ $Z^* = Z - \{0\}$ δὲν εἶναι ὁμάς ὡς πρὸς τὸν πολλαπλασιασμόν καθ' ὅσον δὲν ὑπάρχει, ἐν γένει, ὁ ἀντίστροφος ἑνὸς ἀκεραίου ἐν Z π.χ. τοῦ 2.

8.2 Βασικὰ θεωρήματα ἐπὶ τῶν σωμάτων. Ἐν E εἶναι ἕν σῶμα ὡς πρὸς τὰς πράξεις $+$ καὶ \cdot , τότε ισχύουν τὰ κάτωθι :

1. Ὅλα τὰ θεωρήματα τοῦ δακτυλίου ὡς πρὸς τὰς πράξεις $+$ καὶ \cdot (§7.2).

2. Ὅλα τὰ θεωρήματα τῆς ὁμάδος ὡς πρὸς τὴν πράξιν \cdot (§6.2) μετὰ τὴν προϋπόθεσιν ὅτι τὰ στοιχεῖα ἀνήκουν εἰς τὸ $E^* = E - \{0\}$, δηλαδή εἶναι $\neq 0$.

3. $\alpha\beta = 0 \Leftrightarrow \alpha = 0$ ἢ $\beta = 0$.

Πράγματι· (i) $\alpha\beta = 0 \Rightarrow \alpha = 0$ ἢ $\beta = 0$, διότι ἀφ' ἑνὸς μὲν

$$(\alpha\beta = 0 \text{ καὶ } \alpha \neq 0) \Rightarrow \frac{1}{\alpha}(\alpha\beta) = 0 \Rightarrow \left(\frac{1}{\alpha}\alpha\right)\beta = 0 \Rightarrow 1\beta = 0 \Rightarrow \beta = 0,$$

ἀφ' ἑτέρου δὲ $(\alpha\beta = 0 \text{ καὶ } \beta \neq 0) \Rightarrow \alpha = 0$ (διατί);).

(ii) $(\alpha = 0 \text{ ἢ } \beta = 0) \Rightarrow \alpha\beta = 0$,

διότι : $\alpha = 0 \Rightarrow \alpha\beta = 0\beta = 0$

$\beta = 0 \Rightarrow \alpha\beta = \alpha 0 = 0$.

8.3 Διατεταγμένον σῶμα. Ἐστώσαν τὸ σῶμα R τῶν πραγματικῶν ἀριθμῶν (ὡς πρὸς τὰς πράξεις τῆς προσθέσεως καὶ τοῦ πολλαπλασιασμοῦ) καὶ τὸ ὑποσύνολόν του R^+ τῶν θετικῶν πραγματικῶν ἀριθμῶν. Ὡς γνωστὸν ισχύουν :

(i) Διὰ κάθε $x \in R$ ισχύει ἀκριβῶς μία ἐκ τῶν κάτωθι συνθηκῶν :

$$x = 0 \text{ ἢ } x \in R^+ \text{ ἢ } -x \in R^+$$

(ii) $\left. \begin{array}{l} x \in R^+ \\ y \in R^+ \end{array} \right\} \Rightarrow (x + y) \in R^+ \text{ καὶ } (xy) \in R^+,$

δηλαδή το \mathbb{R}^+ είναι κλειστόν ως προς την πρόσθεσιν και τὸν πολλαπλασιασμόν.

Σώματα με τὰς ἀνωτέρω ιδιότητες τοῦ σώματος \mathbb{R} τῶν πραγματικῶν ἀριθμῶν χαρακτηρίζονται διὰ τοῦ ὄρου *διατεταγμένα σώματα*. Ἀκριβέστερον ἐν σῶμα E (ὡς πρὸς τὰς πράξεις $+$ καὶ \cdot) καλεῖται *ὀλικῶς διατεταγμένον* ἢ καὶ ἀπλῶς *διατεταγμένον* τότε καὶ μόνον τότε, ἂν ὑπάρχη ἐν ὑποσύνολον E^+ τοῦ-του τοιοῦτον, ὥστε νὰ ἰσχύουν :

(i) Διὰ κάθε $x \in E$ ἰσχύει ἀκριβῶς μία ἐκ τῶν κάτωθι συνθηκῶν :

$$x = 0 \quad \text{ἢ} \quad x \in E^+ \quad \text{ἢ} \quad -x \in E^+$$

(ii)
$$\left. \begin{array}{l} x \in E^+ \\ y \in E^+ \end{array} \right\} \Rightarrow (x + y) \in E^+ \quad \text{καὶ} \quad (xy) \in E^+$$

Τὰ στοιχεῖα τοῦ E^+ καλοῦνται *θετικὰ στοιχεῖα* τοῦ διατεταγμένου σώματος E τὰ δὲ ἀντίθετα τούτων *ἀρνητικὰ*.

Παράδειγμα : Ἐκτός τοῦ σώματος \mathbb{R} τῶν πραγματικῶν ἀριθμῶν καὶ τὸ σῶμα \mathbb{Q} τῶν ρητῶν ἀριθμῶν εἶναι διατεταγμένον, διότι διὰ τὸ ὑποσύνολον τοῦ \mathbb{Q}^+ τῶν θετικῶν ρητῶν ἰσχύουν :

(i) Διὰ κάθε ρητὸν ἀριθμὸν x ἰσχύει ἀκριβῶς μία ἐκ τῶν κάτωθι συνθηκῶν :

$$x = 0 \quad \text{ἢ} \quad x \in \mathbb{Q}^+ \quad \text{ἢ} \quad -x \in \mathbb{Q}^+$$

(ii)
$$\left. \begin{array}{l} x \in \mathbb{Q}^+ \\ y \in \mathbb{Q}^+ \end{array} \right\} \Rightarrow (x + y) \in \mathbb{Q}^+ \quad \text{καὶ} \quad (xy) \in \mathbb{Q}^+.$$

Διάταξις καὶ διατεταγμένον σῶμα. Ἄν ἐν σῶμα E εἶναι διατεταγμένον με σύνολον θετικῶν στοιχείων τὸ E^+ , τότε ὀρίζεται εἰς τὸ E καὶ μία ὀλική διάταξις \prec διὰ τοῦ τύπου :

$$x \prec y \Leftrightarrow (y - x) \in E_0^+ = E^+ \cup \{0\}.$$

Πράγματι :

(A) $x \prec x$, διότι $(x - x) = 0 \in E_0^+$.

(A - Σ) Ἄν $x \prec y$ καὶ $y \prec x$, τότε $x = y$,

διότι, ἂν $x \neq y$, τότε $[(y - x) \in E_0^+ \text{ καὶ } (x - y) \in E_0^+] \Rightarrow [(y - x) \in E^+ \text{ καὶ } (x - y) \in E^+]$, τὸ ὁποῖον ἀντίκειται εἰς τὴν συνθήκην (i) τοῦ διατεταγμένου σώματος.

(M) Ἄν $x \prec y$ καὶ $y \prec z$, τότε καὶ $x \prec z$,

διότι ἀφ' ἐνός μὲν διὰ $x = y$ ἢ $y = z$ τοῦτο εἶναι προφανές, ἀφ' ἑτέρου δὲ διὰ $x \neq y$ καὶ $y \neq z$ ἔχομεν

$$(x \prec y \text{ καὶ } y \prec z) \Rightarrow [(y - x) \in E^+ \text{ καὶ } (z - y) \in E^+],$$

τὸ ὁποῖον, λόγῳ τῆς συνθήκης (ii) τοῦ διατεταγμένου σώματος, συνεπάγεται ὅτι $(y - x) + (z - y) = (z - x) \in E^+$, ἄρα καὶ $(z - x) \in E_0^+$, δηλαδή $x \prec z$.

Εἰς τὸ διατεταγμένον σῶμα \mathbb{R} τῶν πραγματικῶν ἀριθμῶν π.χ., ἡ διάταξις \leq ὀρίζεται ὑπὸ τοῦ τύπου :

$$x \leq y \Leftrightarrow (y - x) \in \mathbb{R}_0^+.$$

9*. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑΙ ΕΝΝΟΙΑΙ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΑΙ

9.1 Ὁ δακτύλιος τῶν πραγματικῶν συναρτήσεων. Ἐστω $\mathcal{F} = \mathcal{F}(A, \mathbb{R})$

τὸ σύνολον ὄλων τῶν πραγματικῶν συναρτήσεων μὲ κοινὸν πεδίου ὀρισμοῦ ἐν μὴ κενὸν σύνολον A . Ἄν α εἶναι εἰς πραγματικὸς ἀριθμὸς, τότε τὴν συνάρτησιν, ἢ ὁποῖα ἀπεικονίζει κάθε $x \in A$ εἰς τὸν ἀριθμὸν α , συμβολίζομεν πάλιν μὲ α καὶ λέγομεν, πρὸς διάκρισιν ἀπὸ τοῦ ἀριθμοῦ α , ἢ σταθερὰ συνάρτησις α (ἐπὶ τοῦ A). Οὕτω π.χ. γράφοντες $5 \in \mathcal{F}$ ἐννοοῦμεν ὅτι ἡ σταθερὰ συνάρτησις 5 (ἐπὶ τοῦ A) ἀνήκει εἰς τὸ σύνολον \mathcal{F} .

Θὰ ὀρίσωμεν κατωτέρω ἐπὶ τοῦ \mathcal{F} δύο (ἑσωτερικὰς) πράξεις, τὴν πρόσθεσιν καὶ τὸν πολλαπλασιασμόν.

Πρόσθεσις. Ἄν f καὶ g εἶναι δύο τυχόντα στοιχεῖα τοῦ \mathcal{F} , δηλαδὴ δύο συναρτήσεις, τότε διὰ τοῦ τύπου :

$$s(x) = f(x) + g(x)$$

ὀρίζεται μία νέα πραγματικὴ συνάρτησις s μὲ πεδίου ὀρισμοῦ τὸ A , δηλαδὴ $s \in \mathcal{F}$. Τὴν συνάρτησιν αὐτὴν καλοῦμεν ἄθροισμα τῶν f καὶ g καὶ τὴν συμβολίζομεν μὲ $f + g$, ἤτοι $s = f + g$.

Ἡ οὕτως ὀρισθεῖσα ἐπὶ τοῦ \mathcal{F} πράξις + τῆς προσθέσεως πληροῖ τὰ κάτωθι :

1. *Εἶναι ἀντιμεταθετικὴ*, διότι, ἂν $s' = g + f$, τότε θὰ εἶναι

$$s(x) = f(x) + g(x) = g(x) + f(x) = s'(x) \quad \forall x \in A.$$

Ἄρα $s = s'$, δηλαδὴ

$$(A) \quad f + g = g + f$$

2. *Εἶναι προσεταιριστικὴ*, διότι, ἂν $s = (f + g) + h$ καὶ $s' = f + (g + h)$, τότε θὰ εἶναι

$$\begin{aligned} s(x) &= (f + g)(x) + h(x) = (f(x) + g(x)) + h(x) = f(x) + (g(x) + h(x)) \\ &= f(x) + (g + h)(x) = s'(x) \quad \forall x \in A. \end{aligned}$$

Ἄρα $s = s'$, δηλαδὴ

$$(B) \quad (f + g) + h = f + (g + h)$$

3. Ἐπάρχει οὐδέτερον στοιχεῖον τῆς προσθέσεως καὶ εἶναι τοῦτο ἡ σταθερὰ συνάρτησις 0 (ἐπὶ τοῦ A), διότι

$$(f + 0)(x) = f(x) + 0 = f(x) \quad \forall x \in A,$$

ἄρα, λόγῳ καὶ τῆς ἀντιμεταθετικότητος τῆς προσθέσεως,

$$(C) \quad f + 0 = 0 + f = f \quad \forall f \in \mathcal{F}.$$

4. *Γιὰ κάθε $f \in \mathcal{F}$ ὑπάρχει ἀντίθετος συνάρτησις $-f$ (συμμετρικὸν στοιχεῖον τῆς f ὡς πρὸς τὴν πρόσθεσιν) καὶ εἶναι αὕτη ἡ συνάρτησις, ἢ ὁποῖα τὸ $x \in A$ ἀντιστοιχίζει εἰς τὸ $-f(x)$, δηλαδὴ*

$$(-f)(x) = -f(x) \quad \forall x \in A.$$

Πράγματι:

$$f(x) + (-f)(x) = f(x) + (-f(x)) = f(x) - f(x) = 0 \quad \forall x \in A,$$

ἄρα, λόγῳ καὶ τῆς ἀντιμεταθετικότητος τῆς προσθέσεως,

$$(D) \quad f + (-f) = (-f) + f = 0 \quad \forall f \in \mathcal{F}.$$

Έκ τῶν ἀνωτέρω συνάγεται λοιπὸν ὅτι (πρβλ. § 6.1): τὸ σύνολον \mathcal{F} ὄλων τῶν πραγματικῶν συναρτήσεων μὲ κοινὸν πεδίου ὀρισμοῦ ἐν σύνολον A εἶναι μία ἀντιμεταθετικὴ ὁμάς ὡς πρὸς τὴν πράξιν $+$ τῆς προσθέσεως.

Πολλαπλασιασμός. Ὅμοίως ὀρίζομεν τὸ γινόμενον τῆς συναρτήσεως $f \in \mathcal{F}$ ἐπὶ τὴν συνάρτησιν $g \in \mathcal{F}$, ὡς τὴν συνάρτησιν p τὴν ὀριζομένην ὑπὸ τοῦ τύπου:

$$p(x) = f(x) \cdot g(x).$$

Ταύτην συμβολίζομεν μὲ $f \cdot g$, ἤτοι $p = f \cdot g$.

Ἡ οὕτως ὀρισθεῖσα ἐπὶ τοῦ \mathcal{F} πράξις τῶν πολλαπλασιασμοῦ εἶναι, ὡς εὐκόλως συνάγεται, ἀντιμεταθετικὴ, προσηταιριστικὴ καὶ ἐπιμεριστικὴ ὡς πρὸς τὴν πρόσθεσιν, δηλαδὴ ἰσχύουν :

$$(A) \quad fg = gf$$

$$(B) \quad (fg)h = f(gh)$$

$$(C) \quad f(g+h) = fg + fh.$$

Ὡστε λοιπὸν (πρβλ. § 7.1) τὸ σύνολον \mathcal{F} ὄλων τῶν πραγματικῶν συναρτήσεων μὲ κοινὸν πεδίου ὀρισμοῦ ἐν σύνολον A εἶναι ἀντιμεταθετικὸς δακτύλιος ὡς πρὸς τὰς πράξεις $+$ καὶ \cdot .

Παρατηρήσεις :

1. Ἐπειδὴ τὸ \mathcal{F} εἶναι ὁμάς ὡς πρὸς τὴν πρόσθεσιν, ὀρίζεται ἐπομένως καὶ ἡ πράξις τῆς ἀφαίρεσεως ἐπὶ τοῦ \mathcal{F} ὡς συνηθὼς διὰ τοῦ τύπου

$$f - g = f + (-g).$$

2. Ὁ δακτύλιος \mathcal{F} ἔχει μονάδα, δηλαδὴ ὑπάρχει οὐδέτερον στοιχεῖον τοῦ πολλαπλασιασμοῦ καὶ μάλιστα τοῦτο εἶναι ἡ σταθερὰ συνάρτησις 1, διότι διὰ τυχούσας συνάρτησιν $f \in \mathcal{F}$ ἰσχύει

$$f(x)1 = 1f(x) = f(x) \quad \forall x \in A.$$

Ἄρα

$$f1 = 1f = f \quad \forall f \in \mathcal{F}.$$

3. Ἄν f εἶναι μία συνάρτησις εἰς τὸ $\mathcal{F}^* = \mathcal{F} - \{0\}$, τότε μὲ $\frac{1}{f}$ συμβολίζομεν τὴν συνάρτησιν τὴν ὀριζομένην ὑπὸ τοῦ τύπου

$$\frac{1}{f}(x) = \frac{1}{f(x)}.$$

Ἡ συνάρτησις $\frac{1}{f}$ δὲν ἀνήκει ἐν γένει εἰς τὸ \mathcal{F}^* , διότι αὐτὴ ἔχει πεδίου ὀρισμοῦ τὸ σύνολον $B = \{x \in A : f(x) \neq 0\}$, τὸ ὁποῖον εἶναι ὑποσύνολον τοῦ A . Ἄν ὁμως $B = A$, δηλαδὴ $f(x) \neq 0$,

$\forall x \in A$, τότε ἡ συνάρτησις $\frac{1}{f} \in \mathcal{F}^*$ καὶ εἶναι τὸ συμμετρικὸν στοιχεῖον τῆς f ὡς πρὸς τὴν πράξιν τοῦ πολλαπλασιασμοῦ, διότι ἀφ' ἐνὸς μὲν

$$\frac{1}{f}(x) f(x) = \frac{1}{f(x)} f(x) = 1 \quad \forall x \in A,$$

δηλαδὴ

$$\frac{1}{f} f = f \frac{1}{f} = 1,$$

ἀφ' ἑτέρου δὲ ἂν g εἶναι ἐπίσης συμμετρικὸν στοιχείον τῆς f , τότε $fg = 1$, δηλαδή

$$f(x)g(x) = 1 \quad \forall x \in A \text{ καὶ ἔπομένως } g(x) = \frac{1}{f(x)} \quad \forall x \in A.$$

Ἄρα $g = \frac{1}{f}$.

4. Ὁ δακτύλιος \mathcal{F} δὲν εἶναι σῶμα (ὡς πρὸς τὰς πράξεις $+$ καὶ \cdot) διότι τὸ $\mathcal{F}^* \equiv \mathcal{F} - \{0\}$ δὲν εἶναι ὁμάς ὡς πρὸς τὸν πολλαπλασιασμόν, καθ' ὅσον δὲν ὑπάρχει ἐν γένει συμμετρικὸν στοιχείον ὡς πρὸς τὸν πολλαπλασιασμόν, π.χ. διὰ τὴν συνάρτησιν $f \in \mathcal{F}^*$, ἡ ὁποία εἰς ἓν ὠρισμένον $x_0 \in A$ λαμβάνει τὴν τιμὴν 0, ἐνῶ διὰ κάθε $x \in A$ διάφορον τοῦ x_0 λαμβάνει τὴν τιμὴν 5.

9.2 Ὁ δακτύλιος τῶν πολυωνυμικῶν συναρτήσεων. Μία πραγματικὴ συνάρτησις p μιᾶς πραγματικῆς μεταβλητῆς δεδομένη δι' ἑνὸς τύπου τῆς μορφῆς

$$p(x) = \alpha_n x^n + \alpha_{n-1} x^{n-1} + \dots + \alpha_1 x + \alpha_0,$$

ὅπου $\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_n$ εἶναι πραγματικοὶ ἀριθμοί, καλεῖται *πολυωνυμικὴ συνάρτησις* μιᾶς πραγματικῆς μεταβλητῆς.

Τὸ σύνολον \mathcal{F}_π ὄλων τῶν πολυωνυμικῶν συναρτήσεων μιᾶς πραγματικῆς μεταβλητῆς εἶναι προφανῶς ὑποσύνολον τοῦ συνόλου $\mathcal{F} = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ ὄλων τῶν πραγματικῶν συναρτήσεων μὲ πεδίον ὀρισμοῦ τὸ σύνολον \mathbb{R} τῶν πραγματικῶν ἀριθμῶν. Ἡ πρόσθεσις καὶ ὁ πολλαπλασιασμός ἐπὶ τοῦ \mathcal{F} εἶναι πράξεις κλεισταὶ εἰς τὸ ὑποσύνολον \mathcal{F}_π τῶν πολυωνυμικῶν συναρτήσεων, διότι, ὡς εἶναι γνωστὸν, τόσον τὸ ἄθροισμα ὅσον καὶ τὸ γινόμενον δύο πολυωνυμικῶν συναρτήσεων εἶναι ἐπίσης πολυωνυμικὴ συνάρτησις.

Τὸ οὐδέτερον στοιχείον τῆς προσθέσεως, δηλαδή ἡ σταθερὰ συνάρτησις 0, ὡς ἐπίσης καὶ τὸ οὐδέτερον στοιχείον τοῦ πολλαπλασιασμοῦ, δηλαδή ἡ σταθερὰ συνάρτησις 1, εἶναι πολυωνυμικαὶ συναρτήσεις, ἤτοι $0 \in \mathcal{F}_\pi$ καὶ $1 \in \mathcal{F}_\pi$. Ἐπίσης, ἡ ἀντίθετος συνάρτησις $-p$ μιᾶς πολυωνυμικῆς συναρτήσεως p εἶναι καὶ αὕτη πολυωνυμικὴ συνάρτησις.

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω προκύπτει ὅτι εἰς τὸ ὑποσύνολον \mathcal{F}_π τῶν πολυωνυμικῶν συναρτήσεων πληροῦνται ὅλαι αἱ ιδιότητες τῆς προσθέσεως $+$ καὶ τοῦ πολλαπλασιασμοῦ \cdot τῆς προηγουμένης § 9.1. Ἐπομένως: τὸ σύνολον \mathcal{F}_π ὄλων τῶν πολυωνυμικῶν συναρτήσεων μιᾶς πραγματικῆς μεταβλητῆς εἶναι εἰς ἀντιμεταθετικὸς δακτύλιος ὡς πρὸς τὴν πρόσθεσιν καὶ τὸν πολλαπλασιασμόν καὶ μάλιστα ὁ δακτύλιος οὗτος ἔχει μονάδα. Τὸ συμπέρασμα τοῦτο ἐκφράζομεν λέγοντες ὅτι τὸ σύνολον \mathcal{F}_π τῶν πολυωνυμικῶν συναρτήσεων ἀποτελεῖ ἓνα ἀντιμεταθετικὸν ὑποδακτύλιον τοῦ δακτυλίου \mathcal{F} τῶν πραγματικῶν συναρτήσεων, ὁ ὁποῖος ἔχει μονάδα.

9.3 Τὸ σῶμα τῶν ρητῶν συναρτήσεων. Μία πραγματικὴ συνάρτησις r μιᾶς πραγματικῆς μεταβλητῆς δεδομένη δι' ἑνὸς τύπου τῆς μορφῆς

$$r(x) = \frac{p(x)}{q(x)},$$

ὅπου p καὶ q εἶναι πολυωνυμικαὶ συναρτήσεις μιᾶς πραγματικῆς μεταβλητῆς μὲ τὴν q διάφορον τῆς σταθερᾶς συναρτήσεως 0, καλεῖται *ρητὴ συνάρτησις*

μιᾶς πραγματικῆς μεταβλητῆς, συμβολίζεται δὲ καὶ μὲ $\frac{p}{q}$, ἥτοι $r = \frac{p}{q}$.

Αἱ πολυωνυμικαὶ συναρτήσεις εἶναι καὶ ρηταί, διότι, ὡς προκύπτει ἀμέσως ἐκ τοῦ ἀνωτέρω ὀρισμοῦ τῆς ρητῆς συναρτήσεως, ἡ πολυωνυμικὴ συνάρτησις p συμπίπτει μὲ τὴν ρητὴν συνάρτησιν $\frac{p}{1}$. Ὡστε τὸ σύνολον \mathcal{F}_π τῶν πολυωνυμικῶν συναρτήσεων εἶναι ὑποσύνολον τοῦ συνόλου \mathcal{F}_ρ τῶν ρητῶν συναρτήσεων.

Ἄς θεωρήσωμεν τώρα τὰς ρητὰς συναρτήσεις r_1, r_2, r_3 τὰς διδομένας ἀντιστοιχῶς ὑπὸ τῶν τύπων :

$$r_1(x) = \frac{x^3 + 2x + 1}{x^2 + 1}, \quad r_2(x) = \frac{x}{x^2 - x}, \quad r_3(x) = \frac{1}{x - 1}.$$

Τὰ πεδία ὀρισμοῦ τῶν συναρτήσεων αὐτῶν εἶναι ἀντιστοιχῶς

$$\mathcal{D}(r_1) = \mathbb{R}, \quad \mathcal{D}(r_2) = \mathbb{R} - \{0, 1\}, \quad \mathcal{D}(r_3) = \mathbb{R} - \{1\}.$$

Διὰ τὰς συναρτήσεις r_2 καὶ r_3 παρατηροῦμεν ὅτι εἰς τὴν τομὴν $\mathcal{D}(r_1) \cap \mathcal{D}(r_2) = \mathbb{R} - \{0, 1\}$ τῶν πεδίων ὀρισμοῦ τῶν συμπίπτουν, δηλαδὴ ἰσχύει

$$r_2(x) = \frac{x}{x^2 - x} = \frac{1}{x - 1} = r_3(x) \quad \forall x \in \mathbb{R} - \{0, 1\}$$

ἢ ἰσοδυνάμως :

$$x(x - 1) = 1(x^2 - x) \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Τοῦτο ἐκφράζομεν λέγοντες ὅτι αἱ ρηταὶ συναρτήσεις r_2 καὶ r_3 εἶναι ἰσοδύναμοι ἢ ἴσαι. Γενικῶς, ἂν $r = \frac{p}{q}$ καὶ $r' = \frac{p'}{q'}$ εἶναι τυχούσαι ρηταὶ συναρτήσεις, θὰ λέγωμεν ὅτι αὐταὶ εἶναι ἴσαι καὶ θὰ γράφωμεν $r = r'$ τότε καὶ μόνον τότε, ἂν ἰσχύη $pq' = p'q$, ἥτοι :

$$\frac{p}{q} = \frac{p'}{q'} \iff pq' = p'q.$$

Οὕτω π.χ., ὡς εἶδομεν ἀνωτέρω, $r_2 = r_3$, ἐνῶ ἀντιθέτως, ὡς εὐκόλως διαπιστοῦται, $r_1 \neq r_2$ καὶ $r_1 \neq r_3$.

Ἄνωτέρω εἶδομεν ὅτι τὰ πεδία ὀρισμοῦ τῶν ρητῶν συναρτήσεων r_1, r_2 καὶ r_3 εἶναι διαφορετικά, δηλαδὴ αἱ ρηταὶ συναρτήσεις δὲν ἔχουν κοινὸν πεδίου ὀρισμοῦ, ὡς συμβαίνει διὰ τὰς πολυωνυμικὰς συναρτήσεις. Ἐπομένως δὲν δυνάμεθα νὰ θεωρήσωμεν τὸ σύνολον \mathcal{F}_ρ τῶν ρητῶν συναρτήσεων ὡς ὑποσύνολον τοῦ συνόλου \mathcal{F} τῶν πραγματικῶν συναρτήσεων μὲ κάποιον (συγκεκριμένον) κοινὸν πεδίου ὀρισμοῦ καὶ κατὰ συνέπειαν δὲν δυνάμεθα νὰ ὀρίσωμεν τὴν πρόσθεσιν καὶ τὸν πολλαπλασιασμὸν ἐπὶ τοῦ \mathcal{F}_ρ , ὡς ὠρίσαμεν αὐτὰς εἰς τὴν § 9.1 ἐπὶ τοῦ συνόλου \mathcal{F} . Αἱ πράξεις αὐταὶ ὀρίζονται ἐπὶ τοῦ \mathcal{F}_ρ ὡς ἑξῆς :

Πρόσθεσις. Ἐπιπέρισμα δύο ρητῶν συναρτήσεων $\frac{p_1}{q_1}$ καὶ $\frac{p_2}{q_2}$ καλεῖται ἡ ρητὴ ἐπίσης συνάρτησις $\frac{p_1q_2 + p_2q_1}{q_1q_2}$, ἥτοι :

$$\frac{p_1}{q_1} + \frac{p_2}{q_2} = \frac{p_1q_2 + p_2q_1}{q_1q_2}.$$

Ἡ οὕτως ὀρισθεῖσα πράξις τῆς προσθέσεως ἐπὶ τοῦ \mathcal{F}_p πληροῖ τὰ κάτωθι :

1. *Εἶναι ἀντιμεταθετική*, διότι, ἂν $r_1 = \frac{p_1}{q_1}$ καὶ $r_2 = \frac{p_2}{q_2}$ εἶναι τυχοῦσαι ρηταὶ συναρτήσεις, θὰ ἔχωμεν

$$\frac{p_1}{q_1} + \frac{p_2}{q_2} = \frac{p_1 q_2 + p_2 q_1}{q_1 q_2} = \frac{p_2 q_1 + p_1 q_2}{q_2 q_1} = \frac{p_2}{q_2} + \frac{p_1}{q_1},$$

ἥτοι

$$r_1 + r_2 = r_2 + r_1.$$

2. *Εἶναι προσεταιριστική*, διότι, ἂν $r_1 = \frac{p_1}{q_1}$, $r_2 = \frac{p_2}{q_2}$ καὶ $r_3 = \frac{p_3}{q_3}$ εἶναι τυχοῦσαι ρηταὶ συναρτήσεις, θὰ ἔχωμεν

$$\begin{aligned} \left(\frac{p_1}{q_1} + \frac{p_2}{q_2} \right) + \frac{p_3}{q_3} &= \frac{p_1 q_2 + p_2 q_1}{q_1 q_2} + \frac{p_3}{q_3} = \frac{(p_1 q_2 + p_2 q_1) q_3 + p_3 q_1 q_2}{q_1 q_2 q_3} = \\ &= \frac{p_1 q_2 q_3 + (p_2 q_3 + p_3 q_2) q_1}{q_1 q_2 q_3} = \frac{p_1}{q_1} + \frac{p_2 q_3 + p_3 q_2}{q_2 q_3} = \frac{p_1}{q_1} + \left(\frac{p_2}{q_2} + \frac{p_3}{q_3} \right), \end{aligned}$$

ἥτοι

$$(r_1 + r_2) + r_3 = r_1 + (r_2 + r_3).$$

3. *Υπάρχει τὸ οὐδέτερον στοιχεῖον τῆς προσθέσεως καὶ εἶναι τοὔτο ἡ σταθερὰ συνάρτησις 0* ($0 \in \mathcal{F}_p$, ὡς πολυωνυμική συνάρτησις), διότι, διὰ τυχοῦσαν ρητὴν συνάρτησιν $r = \frac{p}{q}$, ἰσχύει

$$\frac{p}{q} + 0 = \frac{p}{q} + \frac{0}{1} = \frac{p \cdot 1 + 0q}{q \cdot 1} = \frac{p}{q},$$

ἄρα, λόγω καὶ τῆς ἀντιμεταθετικότητος τῆς προσθέσεως,

$$(O) \quad r + 0 = 0 + r = r \quad \forall r \in \mathcal{F}_p.$$

4. *Διὰ κάθε ρητὴν συνάρτησιν $r = \frac{p}{q}$ ὑπάρχει ἀντίθετος ρητὴ συνάρτησις $-r$ καὶ εἶναι αὕτη ἡ $-\frac{p}{q}$* , διότι

$$r + (-r) = \frac{p}{q} + \frac{-p}{q} = \frac{pq + (-p)q}{q^2} = \frac{0}{q^2} = 0,$$

ἄρα, λόγω καὶ τῆς ἀντιμεταθετικότητος τῆς προσθέσεως,

$$(Σ) \quad r + (-r) = (-r) + r = 0 \quad \forall r \in \mathcal{F}_p.$$

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω συνάγεται λοιπὸν ὅτι (πρβλ. § 6.1) τὸ σύνολον \mathcal{F}_p τῶν ρητῶν συναρτήσεων μιᾶς πραγματικῆς μεταβλητῆς εἶναι μία ἀντιμεταθετικὴ ὁμάς ὡς πρὸς τὴν πράξιν + τῆς προσθέσεως.

Πολλαπλασιασμός. Γινόμενον δύο ρητῶν συναρτήσεων $\frac{p_1}{q_1}$ καὶ $\frac{p_2}{q_2}$ καλεῖται ἡ ρητὴ ἐπίσης συνάρτησις $\frac{p_1 p_2}{q_1 q_2}$, ἥτοι

$$\frac{p_1}{q_1} \cdot \frac{p_2}{q_2} = \frac{p_1 p_2}{q_1 q_2}.$$

Ἡ οὕτως ὀρισθεῖσα ἐπὶ τοῦ \mathcal{F}_p πράξις τοῦ πολλαπλασιασμοῦ εἶναι, ὡς

εύκόλως συνάγεται, *αντιμεταθετική, προσεταιριστική* και *έπιμεριστική* ως προς την πρόσθεση, δηλαδή διὰ τυχούσας ρητάς συναρτήσεις r_1, r_2, r_3 ισχύουν :

$$\begin{aligned} \text{(A)} \quad & r_1 r_2 = r_2 r_1 \\ \text{(B)} \quad & (r_1 r_2) r_3 = r_1 (r_2 r_3) \\ \text{(C)} \quad & r_1 (r_2 + r_3) = r_1 r_2 + r_1 r_3. \end{aligned}$$

“Ωστε λοιπόν (πρβλ. § 7.1) τὸ σύνολον \mathcal{F}_ρ τῶν ρητῶν συναρτίσεων μῆς πραγματικῆς μεταβλητῆς εἶναι *αντιμεταθετικός δακτύλιος* ως προς τὰς πράξεις + καί ·.

Ἐπί πλέον παρατηροῦμεν ὅτι :

1. Ὑπάρχει τὸ οὐδέτερον στοιχείον τοῦ πολλαπλασιασμοῦ (μονάς) καὶ εἶναι τοῦτο ἡ σταθερὰ συνάρτησις 1 ($1 \in \mathcal{F}_\rho$, ὡς πολυωνυμική συνάρτησις), διότι, διὰ τυχούσαν ρητὴν συνάρτησιν $r = \frac{p}{q}$, ἰσχύει

$$r1 = \frac{p}{q} \cdot \frac{1}{1} = \frac{p1}{q1} = \frac{p}{q} = r,$$

ἄρα, λόγω καὶ τῆς ἀντιμεταθετικότητος τοῦ πολλαπλασιασμοῦ,

$$1r = 1r = r \quad \forall \quad r \in \mathcal{F}_\rho.$$

2. Διὰ κάθε ρητὴν συνάρτησιν $r = \frac{p}{q}$ διάφορον τῆς σταθερᾶς συναρτίσεως 0, δηλαδή $r \in \mathcal{F}_\rho^* = \mathcal{F}_\rho - \{0\}$ ὑπάρχει *συμμετρικὸν στοιχείον* $\frac{1}{r}$ ὡς προς τὸν πολλαπλασιασμόν καὶ εἶναι τοῦτο ἡ ρητὴ συνάρτησις $\frac{q}{p}$, διότι

$$r \frac{1}{r} = \frac{p}{q} \cdot \frac{q}{p} = \frac{pq}{qp} = \frac{pq}{pq} = \frac{1}{1} = 1,$$

ἄρα, λόγω καὶ τῆς ἀντιμεταθετικότητος τοῦ πολλαπλασιασμοῦ,

$$r \frac{1}{r} = \frac{1}{r} r = 1 \quad \forall \quad r \in \mathcal{F}_\rho^* = \mathcal{F}_\rho - \{0\}.$$

“Ωστε λοιπόν τὸ σύνολον $\mathcal{F}_\rho^* = \mathcal{F}_\rho - \{0\}$ εἶναι ὁμᾶς ὡς προς τὸν πολλαπλασιασμόν καὶ ἔπομένως (πρβλ. § 8.1) τὸ σύνολον \mathcal{F}_ρ ὄλων τῶν ρητῶν συναρτίσεων μῆς πραγματικῆς μεταβλητῆς ἀποτελεῖ σῶμα ὡς προς τὰς πράξεις τῆς προσθέσεως καὶ τοῦ πολλαπλασιασμοῦ.

9.4 Διανυσματικός χώρος. Ὡς εἶδομεν, τόσοσιν εἰς τὴν περίπτωσιν τοῦ δακτυλίου ὅσον καὶ τοῦ σώματος, ὀρίζονται δύο πράξεις + καὶ · ἀμφότεραι ἔσωτερικαί. Εἰς τὰ μαθηματικά ὁμως παρουσιάζονται συχνὰ καὶ σύνολα ἐφωδιασμένα μὲ μίαν ἔσωτερικὴν πρᾶξιν + καὶ μίαν ἐξωτερικὴν πρᾶξιν ·. Π.χ. ἐπὶ τοῦ συνόλου ὄλων τῶν διανυσμάτων τοῦ χώρου ἔχουν ὀρισθῆ ἡ ἔσωτερικὴ πρᾶξις τῆς προσθέσεως καὶ ἡ ἐξωτερικὴ τοῦ πολλαπλασιασμοῦ ἐπὶ ἀριθμὸν (πρβλ. παράδειγμα 1, § 4.2). Ὡς εἶναι γνωστὸν ἐκ τῶν μαθημάτων προηγουμένων τάξεων διὰ τυχόντα διανύσματα $\vec{V}, \vec{V}_1, \vec{V}_2, \vec{V}_3$ καὶ τυχόντας πραγματικούς ἀριθμούς λ, μ , ἰσχύουν :

$$\vec{V}_1 + \vec{V}_2 = \vec{V}_2 + \vec{V}_1$$

$$\vec{V}_1 + (\vec{V}_2 + \vec{V}_3) = (\vec{V}_1 + \vec{V}_2) + \vec{V}_3$$

$$\vec{V} + \vec{0} = \vec{0} + \vec{V} = \vec{V}$$

$$\vec{V} + (-\vec{V}) = (-\vec{V}) + \vec{V} = \vec{0}$$

(άντιμεταθετική όμας)

$$\lambda(\vec{V}_1 + \vec{V}_2) = \lambda\vec{V}_1 + \lambda\vec{V}_2 \quad (A)$$

$$(\lambda + \mu)\vec{V} = \lambda\vec{V} + \mu\vec{V} \quad (B)$$

$$\lambda(\mu\vec{V}) = (\lambda\mu)\vec{V} \quad (C)$$

$$1\vec{V} = \vec{V}$$

Επίσης επί του συνόλου \mathcal{F}_π τών πολυωνυμικών συναρτήσεων, εκτός τής (έσωτερικής) πράξεως τής προσθέσεως, δύναται να όρισθῆ και μία έξωτερική πράξις, ο *πολλαπλασιασμός επί αριθμών*, ως έξῆς : αν p είναι μία πολυωνυμική συνάρτησις με $p(x) = \alpha_n x^n + \alpha_{n-1} x^{n-1} + \dots + \alpha_1 x + \alpha_0$ και $\lambda \in \mathbb{R}$, τότε *γινόμενον τής p επί τόν αριθμόν λ* καλείται ἡ πολυωνυμική συνάρτησις q ἡ *διδομένη* ὑπό τοῦ τύπου $q(x) = (\lambda\alpha_n)x^n + (\lambda\alpha_{n-1})x^{n-1} + \dots + (\lambda\alpha_0)$, ἤτοι $q = \lambda p$.

Παρατηροῦμεν και εις τὴν περίπτωση ταύτην τοῦ συνόλου \mathcal{F}_π ὅτι, διὰ τυχούσας πολυωνυμικὰς συναρτήσεσις p, p_1, p_2, p_3 και τυχόντας πραγματικῶν ἀριθμῶν λ, μ ἰσχύουν :

προσθεσις

$$p_1 + p_2 = p_2 + p_1$$

$$p_1 + (p_2 + p_3) = (p_1 + p_2) + p_3$$

$$p + 0 = 0 + p = p$$

$$p + (-p) = (-p) + p = 0$$

πολλαπλασιασμός επί αριθμών

$$\lambda(p_1 + p_2) = \lambda p_1 + \lambda p_2$$

$$(\lambda + \mu)p = \lambda p + \mu p$$

$$\lambda(\mu p) = (\lambda\mu)p$$

$$1p = p$$

Αί μὲν ιδιότητες τής προσθέσεως είναι ἄμεσος συνέπεια τοῦ ὅτι, ὡς εἶδομεν εις τὴν § 9.2, τὸ \mathcal{F}_π είναι ἀντιμεταθετική όμας ὡς πρὸς τὴν πρόσθεσιν, αἱ δὲ ιδιότητες τοῦ πολλαπλασιασμοῦ επί ἀριθμῶν συνάγονται εὐκόλως ἐκ τοῦ ὀρισμοῦ τής έξωτερικῆς ταύτης πράξεως.

Τὰ ἄνωτέρω σύνολα, τῶν διανυσμάτων τοῦ χώρου και τῶν πολυωνυμικῶν συναρτήσεων μιᾶς πραγματικῆς μεταβλητῆς, εις τὰ ὁποῖα, ὡς εἶδομεν, αἱ πράξις τής προσθέσεως και τοῦ πολλαπλασιασμοῦ επί ἀριθμῶν ἔχουν κοινὰς ιδιότητες ὡς ἄνωτέρω, ὀνομάζονται *διανυσματικοὶ χώροι*. Ἐπίσης παρατηροῦμεν ὅτι ἂν τὰ λ, μ περιορισθοῦν εις τὸ σῶμα Q τῶν ρητῶν ἀριθμῶν, τότε αἱ ἄνωτέρω ιδιότητες τοῦ πολλαπλασιασμοῦ επί ἀριθμῶν διατηροῦνται. Πρὸς διάκρισιν τοῦ ἂν τὰ λ, μ θεωροῦνται εις τὸ σῶμα Q τῶν ρητῶν ἀριθμῶν ἢ εις τὸ σῶμα \mathbb{R} τῶν πραγματικῶν ἀριθμῶν, λέγομεν π.χ. ὅτι τὸ σύνολον \mathcal{F}_π τῶν πολυωνυμικῶν συναρτήσεων είναι εἰς *διανυσματικὸς χώρος ὑπεράνω τοῦ σώματος Q* ἢ τὸ \mathcal{F}_π είναι εἰς *διανυσματικὸς χώρος ὑπεράνω τοῦ σώματος \mathbb{R}* .

Γενικῶς, ἂν Λ είναι ἓν σῶμα (ὡς πρὸς τὰς πράξις τής προσθέσεως και τοῦ πολλαπλασιασμοῦ) και E είναι ἓν μὴ κενὸν σύνολον ἐφωδιασμένον με δύο πράξις, μιάν ἔσωτερικὴν τὴν *πρόσθεσιν* και μιάν έξωτερικὴν τὸν *πολλαπλασιασμόν επί στοιχείων* τοῦ Λ , θὰ λέγωμεν ὅτι E είναι εἰς *διανυσματικὸς χώρος ὑπερ-*

άνω τοῦ σώματος Λ τότε καί μόνον τότε, ἂν τὸ E εἶναι ἀντιμεταθετικὴ δμάς
ὡς πρὸς τὴν πρόσθεσιν καὶ διὰ κάθε x, y ἐν E καὶ λ, μ ἐν Λ ἰσχύουν :

$$\lambda(x + y) = \lambda x + \lambda y$$

$$(\lambda + \mu)x = \lambda x + \mu x$$

$$\lambda(\mu x) = (\lambda\mu)x$$

$$1x = x.$$

10. ΑΣΚΗΣΕΙΣ

10.1 Εὑρετε τὰς ἀνακλαστικές, συμμετρικές, ἀντισυμμετρικές καὶ μεταβατικές σχέσεις $\sigma : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, αἱ ὁποῖαι ὀρίζονται ὑπὸ τῶν :

1) $x^2 - y^2 = 0$

2) $x^2 + y^2 = 1$

3) $x + y \leq 0$

4) $x^2 - y^2 = \text{πολ. } 10$

5) $xy \geq 0$

6) $x^2 - xy \leq 0.$

Ποῖα ἐκ τῶν ἀνωτέρω σχέσεων εἶναι ἰσοδυναμίας;

10.2 Δείξατε ὅτι ἡ ἰσότης εἰς ἓν σύνολον E εἶναι ἡ μόνη σχέση, ἡ ὁποία εἶναι ταυτοχρόνως ἀνακλαστικὴ, συμμετρικὴ καὶ ἀντισυμμετρικὴ.

10.3 Ἐστώσαν μία εὐθεῖα D καὶ ἓν σημεῖον P αὐτῆς. Ἐξ ὀρισμοῦ λέγομεν ὅτι τὸ σημεῖον $A \in D - \{P\}$ εὐρίσκεται εἰς τὴν σχέσιν σ μὲ τὸ σημεῖον $BeD - \{P\}$ τότε καὶ μόνον τότε, ἂν τὸ P δὲν κεῖται ἐπὶ τοῦ εὐθυγράμμου τμήματος AB , ἥτοι

$$A\sigma B \Leftrightarrow AB \cap \{P\} = \emptyset.$$

Δείξατε ὅτι ἡ σχέση σ εἶναι μία ἰσοδυναμία καὶ εὑρετε τὸ σύνολον πηλίκον $(D - \{P\})/\sigma$.

10.4 Ἐστώσαν ἐπίπεδον E καὶ εὐθεῖα D αὐτοῦ. Ἐξ ὀρισμοῦ λέγομεν ὅτι τὸ σημεῖον $A \in E - D$ εὐρίσκεται εἰς τὴν σχέσιν σ μὲ τὸ σημεῖον $BeE - D$ τότε καὶ μόνον τότε, ἂν τὸ εὐθύγραμμον τμήμα AB δὲν τέμνει τὴν εὐθείαν D , ἥτοι

$$A\sigma B \Leftrightarrow AB \cap D = \emptyset.$$

Δείξατε ὅτι ἡ σχέση σ εἶναι μία ἰσοδυναμία καὶ εὑρετε τὸ σύνολον πηλίκον $(E - D)/\sigma$.

10.5 Ἐστώσαν E_1 καὶ E_2 δύο τεμνόμενα ἐπίπεδα. Ἐξ ὀρισμοῦ λέγομεν ὅτι τὸ σημεῖον $A \in (E_1 \cup E_2)^c$ εὐρίσκεται εἰς τὴν σχέσιν σ μὲ τὸ σημεῖον $Be(E_1 \cup E_2)^c$ τότε καὶ μόνον τότε, ἂν τὸ εὐθύγραμμον τμήμα AB δὲν τέμνει τὰ ἐπίπεδα E_1 καὶ E_2 , ἥτοι

$$A\sigma B \Leftrightarrow AB \cap (E_1 \cup E_2) = \emptyset.$$

Δείξατε ὅτι ἡ σχέση σ εἶναι μία ἰσοδυναμία καὶ εὑρετε τὸ σύνολον πηλίκον $(E_1 \cup E_2)^c/\sigma$.

10.6 Ἐστώσαν ἐπίπεδον E καὶ σημεῖον P αὐτοῦ. Ἐξ ὀρισμοῦ λέγομεν ὅτι τὸ σημεῖον $A \in E - \{P\}$ εὐρίσκεται εἰς τὴν σχέσιν σ μὲ τὸ σημεῖον $BeE - \{P\}$ τότε καὶ μόνον τότε, ἂν τὰ σημεῖα P, A, B κεῖνται ἐπὶ εὐθείας.

Δείξατε ὅτι ἡ σχέση σ εἶναι μία ἰσοδυναμία καὶ εὑρετε τὸ σύνολον πηλίκον $(E - \{P\})/\sigma$.

10.7 Ἐστω εὐθεῖα D . Ἐξ ὀρισμοῦ λέγομεν ὅτι τυχόν σημεῖον μὴ κεῖμενον ἐπὶ τῆς D εὐρίσκεται εἰς τὴν σχέσιν σ μὲ σημεῖον B μὴ κεῖμενον ἐπίσης ἐπὶ τῆς D τότε καὶ μόνον τότε, ἂν ἡ εὐθεῖα D καὶ τὰ σημεῖα A, B κεῖνται ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ ἐπιπέδου.

Δείξατε ὅτι ἡ σχέση σ εἶναι μία ἰσοδυναμία καὶ εὑρετε τὸ σύνολον πηλίκον D^c/σ .

10.8 Ἐστω εἰς τὸ σύνολον $Z \times (Z - \{0\})$ ἡ σχέση σ , ἡ ὁποία ὀρίζεται ὑπὸ τοῦ τύπου

$$(\alpha, \beta)\sigma(\alpha', \beta') \Leftrightarrow \alpha\beta' = \alpha'\beta.$$

Δείξτε ότι η σχέση σ είναι μία Ισοδυναμία και εὑρετε τὰς κλάσεις Ισοδυναμίας τῶν στοιχείων $(1,3)$, $(0,7)$, $(-5,8)$, $(2,4)$ καὶ $(3,-2)$.

10.9 Δείξτε ὅτι :

- 1) ἡ σχέση \geq εἰς τὸ \mathbf{R} εἶναι μία ὀλικὴ διάταξις.
- 2) ἡ σχέση \geq τοῦ ὑπερσυνόλου εἰς τὸ $\mathcal{P}(\Omega)$ (ὅταν τὸ Ω ἔχη τοῦλάχιστον δύο στοιχεῖα) εἶναι μία μερικὴ διάταξις.

10.10 Δείξτε ὅτι, ἂν \prec εἶναι μία διάταξις εἰς ἓν σύνολον E , τότε διὰ τοῦ τύπου

$$x \succ y \Leftrightarrow y \prec x$$

ὀρίζεται ἐπίσης μία διάταξις \succ εἰς τὸ E καλουμένη *δυσκὴ διάταξις* τῆς \prec .

Ἐπί πλέον δείξτε ὅτι, ἂν μὲν ἡ \prec εἶναι ὀλικὴ διάταξις, τότε καὶ ἡ *δυσκὴ* τῆς \prec εἶναι ἐπίσης ὀλικὴ διάταξις, ἂν δὲ ἡ \prec εἶναι μερικὴ διάταξις, τότε καὶ ἡ \succ εἶναι ἐπίσης μερικὴ διάταξις. Δι' ἐφαρμογῆς τούτων ἀποδείξτε ἐκ νέου τὴν προηγουμένην ἀσκήσιν.

10.11 Εἰς τὸ σύνολον C τῶν μιγαδικῶν ἀριθμῶν ὀρίζομεν τὴν σχέσηιν \prec ὡς ἑξῆς :

"Ἐστώσαν δύο μιγαδικοὶ ἀριθμοὶ $\alpha + \beta i$ καὶ $\gamma + \delta i$. Τότε, ἂν μὲν $\alpha < \gamma$, γράφομεν $\alpha + \beta i \prec \gamma + \delta i$, ἂν δὲ $\alpha = \gamma$ καὶ $\beta < \delta$, γράφομεν ἐπίσης $\alpha + \beta i \prec \gamma + \delta i$. Συντόμως :

$$\alpha + \beta i \prec \gamma + \delta i \Leftrightarrow \alpha < \gamma \text{ ἢ } (\alpha = \gamma \text{ καὶ } \beta < \delta).$$

Δείξτε ὅτι ἡ σχέσηιν αὕτη εἶναι μία ὀλικὴ διάταξις εἰς τὸ σύνολον C τῶν μιγαδικῶν ἀριθμῶν, ἡ ὁποία καλεῖται συνήθως *λεξικογραφικὴ διάταξις* εἰς τὸ C .

10.12 Ἐστώσαν αἱ πράξεις $*$, \square , \blacktriangle , \square καὶ Δ εἰς τὸ σύνολον \mathbf{N} τῶν φυσικῶν ἀριθμῶν, αἱ ὀριζόμεναι ὑπὸ τῶν τύπων :

$$x * y = 2x + y, \quad x \square y = x + y^2, \quad x \blacktriangle y = xy^2, \quad x \square y = x - 2y, \quad x \Delta y = \frac{x}{y^2 + 1}.$$

Ποῖαι ἐκ τῶν ἀνωτέρω πράξεων εἶναι πράξεις ἐπὶ τοῦ \mathbf{N} καὶ ποῖαι εἶναι μερικαὶ πράξεις εἰς τὸ \mathbf{N} ;

10.13 Ἐστώσαν αἱ πράξεις $*$, \square , \blacktriangle , \square καὶ Δ εἰς τὸ \mathbf{R} , αἱ ὀριζόμεναι ὑπὸ τῶν τύπων :

$$x * y = x + y + 3, \quad x \square y = x^2 + y^2, \quad x \blacktriangle y = 4xy, \quad x \square y = x^2 y, \quad x \Delta y = x^2 y^2.$$

Ποῖαι ἐκ τῶν ἀνωτέρω πράξεων εἶναι κλεισταὶ εἰς τὸ σύνολον \mathbf{A} τῶν ἀρτίων ἀκεραίων;

10.14 Ποῖαι ἐκ τῶν πράξεων τῆς προηγουμένης ἀσκήσεως εἶναι

- 1) ἀντιμεταθετικά;
- 2) προσεταιριστικά;
- 3) ἐπιμεριστικά ὡς πρὸς τὴν πρόσθεσιν;
- 4) ἐπιμεριστικά ὡς πρὸς τὸν πολλαπλασιασμόν;

10.15 Ποῖαι ἐκ τῶν πράξεων τῆς ἀσκήσεως 10.13 ἔχουν οὐδέτερον στοιχεῖον; Εὑρετε τὰ συμμετρικά στοιχεῖα ὡς πρὸς τὰς πράξεις ταύτας.

10.16 Δείξτε ὅτι τὰ σύνολα \mathbf{R} καὶ C_0 τῶν μιγαδικῶν ἀριθμῶν τῆς μορφῆς $\alpha + 0i$ εἶναι ἰσομορφα τόσο ὡς πρὸς τὰς πράξεις τῆς προσθέσεως πραγματικῶν ἀριθμῶν καὶ τῆς προσθέσεως μιγαδικῶν ἀριθμῶν, ὅσον καὶ πρὸς τὰς πράξεις τοῦ πολλαπλασιασμοῦ πραγματικῶν ἀριθμῶν καὶ πολλαπλασιασμοῦ μιγαδικῶν ἀριθμῶν.

Ὁμοίως δείξτε ὅτι καὶ τὰ σύνολα \mathbf{R} καὶ C^0 τῶν φανταστικῶν ἀριθμῶν, δηλαδὴ τῶν μιγαδικῶν ἀριθμῶν τῆς μορφῆς $0 + \alpha i$, εἶναι ἰσομορφα ὡς πρὸς τὰς πράξεις τῆς προσθέσεως πραγματικῶν ἀριθμῶν καὶ τῆς προσθέσεως μιγαδικῶν ἀριθμῶν.

10.17 Δείξτε ὅτι ἡ πρόσθεσις ἐπὶ τοῦ N_0 ($N_0 = \mathbf{N} \cup \{0\}$) εἶναι προσεταιριστικὴ, ἔχει οὐδέτερον στοιχεῖον τὸ 0, ἀλλὰ τὸ N_0 δὲν εἶναι ὁμάς ὡς πρὸς τὴν πρόσθεσιν.

10.18 Δείξτε ότι :

1) Το σύνολον C τών μιγαδικών αριθμών είναι αντιμεταθετική ομάδα ως προς την πρόσθεση.

2) Το $C^* = C - \{0\}$ είναι αντιμεταθετική ομάδα ως προς τον πολλαπλασιασμό.

3)* Το C είναι αντιμεταθετικός δακτύλιος ως προς τās πράξεις τής προσθέσεως και του πολλαπλασιασμού.

4)* Το C είναι σώμα ως προς τās πράξεις τής προσθέσεως και του πολλαπλασιασμού.

10.19* Δείξτε ότι το σώμα C τών μιγαδικών αριθμών δεν είναι διατεταγμένο σώμα.

10.20 'Επί του συνόλου $\mathcal{P}(\Omega)$ ($\Omega \neq \emptyset$) θεωρούμεν τήν πράξιν \dagger τήν οριζομένην υπό του τύπου

$$A \dagger B = (A - B) \cup (B - A),$$

ή οποία καλείται *συμμετρική διαφορά*.

Δείξτε ότι :

1) Το $\mathcal{P}(\Omega)$ είναι αντιμεταθετική ομάδα ως προς τήν συμμετρικήν διαφοράν, ήτοι

(Α) $A \dagger B = B \dagger A$

(Π) $A \dagger (B \cap \Gamma) = (A \dagger B) \cap \Gamma$

(Ο) $A \dagger \emptyset = \emptyset \dagger A = A$


(Σ) $A \dagger A = \emptyset$.

2)* Το $\mathcal{P}(\Omega)$ είναι αντιμεταθετικός δακτύλιος ως προς τās πράξεις \dagger και \cap .

3)* "Αν τὸ Ω ἔχη τουλάχιστον δύο στοιχεῖα, τότε τὸ $\mathcal{P}(\Omega)$ δὲν εἶναι σώμα ως προς τās πράξεις \dagger καὶ \cap .

10.21* "Εστῶσαν τὸ σύνολον $\mathcal{F} = \mathcal{F}(A, \mathbb{R})$ τών πραγματικῶν συναρτήσεων με κοινὸν πεδίων ὀρισμοῦ τὸ σύνολον A καὶ αἱ πράξεις τής προσθέσεως (ἐσωτερική) ἐπὶ τοῦ \mathcal{F} καὶ τοῦ πολλαπλασιασμοῦ ἐπὶ πραγματικῶν ἀριθμῶν (ἐξωτερική), ὡς αὐταὶ ὠρίσθησαν ἀντιστοιχῶς εἰς τήν § 9.1 καὶ εἰς τὸ παράδειγμα 2 τής § 4.2. Δείξτε ὅτι τὸ σύνολον \mathcal{F} (ὡς πρὸς τās πράξεις ταύτας) εἶναι εἰς διανυσματικὸς χώρος ὑπεράνω τοῦ σώματος \mathbb{R} τών πραγματικῶν ἀριθμῶν.

'Εξετάσατε ἰδιαίτερωσ τās περιπτώσεις, ὅπου $A = \{1, 2\}$, $A = \{1, 2, 3\}$ καὶ $A = \{1, 2, \dots, n\}$.



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΣ

Β. ΣΤΑΪΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΙΙ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

Ι. ΜΟΝΟΤΟΝΟΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

1.1 Αύξουσαι και φθίνουσai συναρτήσεις. Ἡ συνάρτησις φ με $\varphi(x) = x^3$ διατρεῖ προφανῶς τὴν φυσικὴν διάταξιν τῶν πραγματικῶν ἀριθμῶν, δηλαδὴ ἰσχύει

$$x_1 < x_2 \Rightarrow x_1^3 < x_2^3 \Rightarrow \varphi(x_1) < \varphi(x_2).$$

Γενικῶς μία πραγματικὴ συνάρτησις f μιᾶς πραγματικῆς μεταβλητῆς διατηροῦσα, ὡς καὶ ἡ φ , τὴν φυσικὴν διάταξιν τῶν πραγματικῶν ἀριθμῶν καλεῖται *γνησίως αύξουσα*. Ἀκριβέστερον διὰ μιᾶς συνάρτησις $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ με $A \subseteq \mathbb{R}$ ὀρίζομεν :

Ἡ συνάρτησις f καλεῖται *γνησίως αύξουσα* τότε καὶ μόνον τότε, ἂν διὰ κάθε $x_1, x_2 \in A$ ἰσχύη.

$$(1) \quad x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2).$$

Ὁμοίως ἡ συνάρτησις f καλεῖται *γνησίως*

φθίνουσα τότε καὶ μόνον τότε, ἂν διὰ κάθε $x_1, x_2 \in A$ ἰσχύη

$$(2) \quad x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2).$$

Π.χ. ἡ συνάρτησις ψ με $\psi(x) = -x$ εἶναι γνησίως φθίνουσα συνάρτησις.

Ἄν αἱ (1), (2) ἀντικατασταθοῦν ἀντιστοιχῶς ὑπὸ τῶν

$$(1') \quad x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \leq f(x_2)$$

$$(2') \quad x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \geq f(x_2),$$


τότε λέγομεν εἰς μὲν τὴν περίπτωσιν τῆς (1') ὅτι ἡ συνάρτησις f εἶναι *αύξουσα*, εἰς δὲ τὴν περίπτωσιν τῆς (2') ὅτι ἡ f εἶναι *φθίνουσα*, ἤτοι :

Ἡ συνάρτησις f καλεῖται *αύξουσα* τότε καὶ μόνον τότε, ἂν διὰ κάθε $x_1, x_2 \in A$ ἰσχύη


$$x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \leq f(x_2).$$

Ἡ συνάρτησις f καλεῖται *φθίνουσα* τότε καὶ μόνον τότε, ἂν διὰ κάθε $x_1, x_2 \in A$ ἰσχύη

$$x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \geq f(x_2).$$



Σχ. 23 $\varphi : y = x^3$



Σχ. 24 $\psi : y = -x$

Επίσης λέγουμε ότι μία συνάρτησις f είναι *γνησίως μονότονος* τότε και μόνον τότε, αν αυτή είναι γνησίως αύξουσα ή γνησίως φθίνουσα. Αντιστοίχως δέ λέγουμε ότι ή f είναι *μονότονος*, αν αυτή είναι αύξουσα ή φθίνουσα. Διά να δηλώσωμεν τὸ εἶδος τῆς μονοτονίας μιᾶς συναρτήσεως χρησιμοποιοῦμεν τὰ κάτωθι σύμβολα :

$$\begin{array}{l} f \uparrow \quad \eta \quad f \nearrow \Leftrightarrow f \text{ \textit{εἶναι γνησίως αύξουσα} } \\ f \downarrow \quad \eta \quad f \searrow \Leftrightarrow f \text{ \textit{εἶναι γνησίως φθίνουσα} } \\ f \uparrow \quad \eta \quad f \nearrow \Leftrightarrow f \text{ \textit{εἶναι αύξουσα} } \\ f \downarrow \quad \eta \quad f \searrow \Leftrightarrow f \text{ \textit{εἶναι φθίνουσα.} } \end{array}$$

"Αν ή συνάρτησις f είναι σταθερά, δηλαδή κάθε $x \in A$ ἀπεικονίζεται διὰ τῆς f εἰς τὸν αὐτὸν πραγματικὸν ἀριθμὸν ἢ τὸ αὐτὸ τὸ πεδίου τιμῶν $\mathcal{R}(f)$ αὐτῆς εἶναι ἓν μονομελὲς σύνολον, τότε, προφανῶς, ή f εἶναι ταυτοχρόνως αύξουσα καὶ φθίνουσα. Ἀλλὰ καὶ ἀντιστρόφως, αν ή συνάρτησις f εἶναι ταυτοχρόνως αύξουσα καὶ φθίνουσα θὰ ἔχωμεν διὰ $x_1, x_2 \in A$ ($x_1 \neq x_2$) ὅτι $f(x_1) = f(x_2)$, δηλαδή ὅτι ή f εἶναι σταθερά συνάρτησις. Πράγματι: διὰ $x_1 < x_2$, ἔχομεν ἀφ' ἑνὸς μὲν $f(x_1) \leq f(x_2)$ (διότι $f \uparrow$), ἀφ' ἑτέρου δὲ $f(x_1) \geq f(x_2)$ (διότι $f \downarrow$), ἦτοι $f(x_1) = f(x_2)$. Ὁμοίως διὰ $x_2 < x_1$, ἔχομεν $f(x_2) \leq f(x_1)$ (διότι $f \uparrow$) καὶ $f(x_2) \geq f(x_1)$ (διότι $f \downarrow$), ἦτοι πάλιν $f(x_1) = f(x_2)$. "Ωστε ἐδείχθη ὅτι :

1.1.1 Ἡ συνάρτησις $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ ($A \subseteq \mathbb{R}$) εἶναι σταθερά τότε καὶ μόνον τότε, αν ή f εἶναι ταυτοχρόνως αύξουσα καὶ φθίνουσα.

"Ας μελετήσωμεν τώρα ὡς πρὸς τὴν μονοτονίαν τὴν πραγματικὴν συνάρτησιν ω μὲ $\omega(x) = \frac{1}{x}$, ἡ ὁποία προφανῶς ἔχει πεδίου ὀρισμοῦ τὸ σύνολον $\mathbb{R} - \{0\}$.

"Αν δεχθῶμεν ὅτι ή συνάρτησις ω εἶναι φθίνουσα, δηλαδή ὅτι

$$x_1 < x_2 \Rightarrow \omega(x_1) \geq \omega(x_2),$$

τότε διὰ $x_1 = -1, x_2 = 1$ καταλήγομεν εἰς τὸ ἄτοπον $-1 = \omega(-1) \geq \omega(1) = 1$.

Ὁμοίως, αν δεχθῶμεν ὅτι ή ω εἶναι αύξουσα, δηλαδή ὅτι


$$x_1 < x_2 \Rightarrow \omega(x_1) \leq \omega(x_2),$$

τότε διὰ $x_1 = 1, x_2 = 2$ καταλήγομεν εἰς τὸ ἄτοπον $1 = \omega(1) \leq \omega(2) = \frac{1}{2}$.

"Ωστε ή συνάρτησις ω δὲν εἶναι μονότονος. Παρατηροῦμεν ὁμως ὅτι, αν περιορισθῶμεν διὰ $x_1, x_2 \in (-\infty, 0)$, ἰσχύει

$$(3) \quad x_1 < x_2 \Rightarrow \omega(x_1) = \frac{1}{x_1} > \frac{1}{x_2} = \omega(x_2),$$

ἦτοι πληροῦται ή συνθήκη γνησίως φθίνουσης συναρτήσεως ἐν $(-\infty, 0)$ λέγο-



Σχ. 25 $\omega: y = \frac{1}{x}$

μεν δὲ εἰς τὴν περίπτωσιν ταύτην ὅτι ἡ συνάρτησις ω εἶναι γνησίως φθίνουσα ἐν $(-\infty, 0)$.

Ὅμοιως καὶ διὰ $x_1, x_2 \in (0, +\infty)$ ἰσχύει ἡ (3) καὶ λέγομεν ἀναλόγως ὅτι ἡ ω εἶναι γνησίως φθίνουσα ἐν $(0, +\infty)$.

Γενικῶς, ἂν διὰ τὴν συνάρτησιν f ἰσχύη ἡ (2) διὰ κάθε $x_1, x_2 \in B$, ὅπου B εἶναι ἐν μὴ κενὸν ὑποσύνολον τοῦ πεδίου ὀρίσμου A αὐτῆς, τότε λέγομεν ὅτι ἡ f εἶναι γνησίως φθίνουσα ἐν B καὶ συμβολίζομεν τοῦτο μὲ $f \downarrow B$.

Ὅμοιως λέγομεν ὅτι ἡ f εἶναι γνησίως ἀύξουσα ἐν B , ἂν ἡ (1) ἰσχύη διὰ κάθε $x_1, x_2 \in B$, ὡς ἐπίσης καὶ ὅτι ἡ f εἶναι ἀύξουσα ἐν B ἢ φθίνουσα ἐν B , ἂν ἡ (1') ἢ (2') ἀντιστοίχως ἰσχύη διὰ κάθε $x_1, x_2 \in B$. Χρησιμοποιοῦμεν δὲ τοὺς συμβολισμοὺς $f \uparrow B$, $f \uparrow B$ καὶ $f \downarrow B$, ἵνα δηλώσωμεν ἀντιστοίχως ὅτι ἡ f εἶναι γνησίως ἀύξουσα ἐν B , ἀύξουσα ἐν B καὶ φθίνουσα ἐν B .

Π.χ. ἡ συνάρτησις ἡμίτονον, συντόμως $\eta\mu$, εἶναι γνησίως ἀύξουσα ἐν $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ καὶ γνησίως φθίνουσα ἐν $[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}]$. Γενικώτερον, ἂν k ἀκέραιος, ἰσχύει:

$$\eta\mu \uparrow [2k\pi - \frac{\pi}{2}, 2k\pi + \frac{\pi}{2}] \quad \text{καὶ} \quad \eta\mu \downarrow [2k\pi + \frac{\pi}{2}, (2k+1)\pi + \frac{\pi}{2}].$$

1.2 Τὸ μονότονον καὶ ἡ σύνθεσις συναρτήσεων. Ἡ πραγματικὴ συνάρτησις σ μὲ $\sigma(x) = \alpha x$, ὅπου α σταθερὸς πραγματικὸς ἀριθμὸς διάφορος τοῦ 0 εἶναι


γνησίως μονότονος καὶ μάλιστα διὰ μὲν $x > 0$ εἶναι γνησίως ἀύξουσα, διότι

$$x_1 < x_2 \Rightarrow \alpha x_1 < \alpha x_2 \Rightarrow \sigma(x_1) < \sigma(x_2),$$

διὰ δὲ $\alpha < 0$ εἶναι γνησίως φθίνουσα, διότι

$$x_1 < x_2 \Rightarrow \alpha x_1 > \alpha x_2 \Rightarrow \sigma(x_1) > \sigma(x_2).$$

Ἦτοι :




$y = \alpha x, \alpha > 0$
Σχ. 26



$y = \alpha x, \alpha < 0$
Σχ. 27

$$\alpha > 0 \Rightarrow \sigma \uparrow$$

$$\alpha < 0 \Rightarrow \sigma \downarrow$$



$y = x + \beta (\beta > 0)$
Σχ. 28

Γεωμετρικῶς ἡ συνάρτησις σ παρίσταται διὰ μιᾶς εὐθείας ὡς εἰς τὰ σχήματα 26 καὶ 27.

Ἐπιπλέον θεωρήσωμεν ἐπίσης καὶ τὴν πραγματικὴν συνάρτησιν τ μὲ $\tau(x) = x + \beta$, ὅπου β σταθερὸς πραγματικὸς ἀριθμὸς. Ἡ συνάρτησις τ εἶναι γνησίως ἀύξουσα, διότι

$$x_1 < x_2 \Rightarrow x_1 + \beta < x_2 + \beta \Rightarrow \tau(x_1) < \tau(x_2).$$

Τὸ διάγραμμα τῆς συναρτήσεως τ εἶναι ἡ εὐθεῖα τοῦ σχήματος 28, ἡ διερχομένη διὰ τῶν σημείων $(-\beta, 0)$ καὶ $(0, \beta)$.

Αν τώρα $\omega = \tau \circ \sigma$ είναι η σύνθεση των συναρτήσεων σ και τ , δηλαδή η συνάρτησις ή διδομένη υπό του τύπου

$$\omega(x) = \tau(\sigma(x)) = ax + \beta,$$

όπου α, β πραγματικοί αριθμοί με $\alpha \neq 0$, τότε παρατηρούμεν ότι ισχύουν :

$$\alpha > 0 \Rightarrow \omega \uparrow \quad \alpha < 0 \Rightarrow \omega \downarrow,$$

διότι διὰ μὲν $\alpha > 0$,

$$x_1 < x_2 \Rightarrow \alpha x_1 + \beta < \alpha x_2 + \beta \Rightarrow \omega(x_1) < \omega(x_2),$$

διὰ δὲ $\alpha < 0$

$$x_1 < x_2 \Rightarrow \alpha x_1 + \beta > \alpha x_2 + \beta \Rightarrow \omega(x_1) > \omega(x_2).$$

Τὸ διάγραμμα τῆς συνθέσεως ω τῶν συναρτήσεων σ καὶ τ εἶναι ἡ εὐθεῖα τῶν σχημάτων 29 καὶ 30, ἡ διερχομένη διὰ τῶν σημείων $(-\frac{\beta}{\alpha}, 0)$ καὶ $(0, \beta)$.

Ἐξ ὧν τῶν ἀνωτέρω συνάγομεν ὅτι εἰς μὲν τὴν περίπτωσιν $\alpha > 0$ ἡ σύνθεσις ω τῆς γνησίως ἀυξούσης συναρτήσεως σ καὶ τῆς ἐπίσης γνησίως ἀυξούσης συναρτήσεως τ εἶναι ὁμοίως γνησίως ἀυξουσα συνάρτησις, εἰς δὲ τὴν περίπτωσιν $\alpha < 0$ ἡ σύνθεσις ω τῆς γνησίως φθίνουσας συναρτήσεως σ καὶ τῆς γνησίως ἀυξούσης συναρτήσεως τ εἶναι γνησίως φθίνουσα συνάρτησις.

Γενικῶς, ἂν $g : A \rightarrow B$, $f : B \rightarrow R$ εἶναι πραγματικαὶ συναρτήσεις (A, B ὑποσύνολα τοῦ R), τότε ὀρίζεται, ὡς γνωστόν, ἡ σύνθεσις αὐτῶν $f \circ g : A \rightarrow R$, ἰσχύει δὲ τὸ κάτωθι θεώρημα.

1.2.1 ΘΕΩΡΗΜΑ. Ἐστω ὅτι αἱ συναρτήσεις g καὶ f εἶναι γνησίως μονότονοι. Τότε, ἂν μὲν ἀμφότεροι εἶναι τοῦ αὐτοῦ εἶδους μονοτονίας, ἡ σύνθεσις $f \circ g$ αὐτῶν εἶναι γνησίως ἀυξουσα συνάρτησις, ἂν δὲ αὗται εἶναι διαφορετικοῦ εἶδους μονοτονίας, ἡ σύνθεσις $f \circ g$ αὐτῶν εἶναι γνησίως φθίνουσα συνάρτησις. Ἀκριβέστερον ἰσχύουν τὰ κάτωθι :

a) $\left. \begin{matrix} f \uparrow \\ g \uparrow \end{matrix} \right\} \Rightarrow f \circ g \uparrow$	b) $\left. \begin{matrix} f \downarrow \\ g \uparrow \end{matrix} \right\} \Rightarrow f \circ g \downarrow$
c) $\left. \begin{matrix} f \downarrow \\ g \downarrow \end{matrix} \right\} \Rightarrow f \circ g \uparrow$	d) $\left. \begin{matrix} f \uparrow \\ g \downarrow \end{matrix} \right\} \Rightarrow f \circ g \downarrow$

Ἀπόδειξις: α) $x_1 < x_2 \Rightarrow g(x_1) < g(x_2) \xRightarrow{f \uparrow} f(g(x_1)) < f(g(x_2))$, ἥτοι $x_1 < x_2 \Rightarrow f \circ g(x_1) < f \circ g(x_2)$. Ἄρα $f \circ g \uparrow$.

β) $x_1 < x_2 \Rightarrow g(x_1) < g(x_2) \xRightarrow{f \downarrow} f(g(x_1)) > f(g(x_2))$, ἥτοι $x_1 < x_2 \Rightarrow f \circ g(x_1) > f \circ g(x_2)$. Ἄρα $f \circ g \downarrow$.

γ) $x_1 < x_2 \Rightarrow g(x_1) > g(x_2) \xRightarrow{f \downarrow} f(g(x_1)) < f(g(x_2))$, ἥτοι

$x_1 < x_2 \Rightarrow f \circ g(x_1) < f \circ g(x_2)$. Άρα $f \circ g \uparrow$.

$$d) x_1 < x_2 \xrightarrow{g \downarrow} g(x_1) > g(x_2) \xrightarrow{f \uparrow} f(g(x_1)) > f(g(x_2)), \text{ \u0397\u03c4\u03bf}$$

$x_1 < x_2 \Rightarrow f \circ g(x_1) > f \circ g(x_2)$. Άρα $f \circ g \downarrow$.

1.2.2. Θα εφαρμόσωμεν τώρα τ\u03cc \u03b1νωτέρω θεω\u03c1ημα 1.2.1. δια \u03c4\u03bd \u03bd \u03bc\u03b5\u03bb\u03b7\u03c4\u03b9\u03c3\u03c9\u03bc\u03b5\u03bd \u03c9\u03c3 \u03c0\u03c1\u03cc\u03c2 \u03c4\u03b7\u03bd \u03bc\u03bf\u03bd\u03bf\u03c4\u03bf\u03bd\u03b9\u03b1 \u03c4\u03b7\u03bd \u03c0\u03c1\u03b1\u03b3\u03bc\u03b1\u03c4\u03b9\u03ba\u03b7\u03bd \u03c3\u03bd\u03ac\u03c1\u03c4\u03b7\u03c3\u03b9\u03bd w \u03bc\u03b5 $w(x) = \frac{\alpha x + \beta}{\gamma x + \delta}$, \u03cc\u03c0\u03c5 $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ \u03b5\u03b9\u03bd\u03b1 \u03c3\u03c4\u03b1\u03b8\u03b5\u03c1\u03cc\u03b9 \u03c0\u03c1\u03b1\u03b3\u03bc\u03b1\u03c4\u03b9\u03ba\u03cc\u03b9 \u03b1\u03c1\u03b9\u03b8\u03bc\u03cc\u03b9 \u03bc\u03b5 $\gamma \neq 0$. \u038c\u03bd \u03c0\u03c1\u03c9\u03c4\u03bf\u03b9\u03c2 \u03c0\u03b1\u03c1\u03b1\u03c4\u03b7\u03c1\u03cc\u03c5\u03bc\u03b5\u03bd \u03cc\u03c4\u03b9 \u03c4\u03cc \u03c0\u03b5\u03b4\u03b9\u03cc\u03bd \u03cc\u03c1\u03b9\u03c3\u03bc\u03bf\u03c5 \u03c4\u03b7\u03c2 w \u03b5\u03b9\u03bd\u03b1 \u03c4\u03cc \u03c3\u03cd\u03bd\u03bf\u03bb\u03bf\u03bd $\mathbb{R} \setminus \left\{ -\frac{\delta}{\gamma} \right\}$ \u03ba\u03b9 \u03cc\u03c4\u03b9 \u03b5\u03c0\u03b9 \u03c0\u03bb\u03b5\u03cc\u03bd \u03b9\u03c3\u03c7\u03c5\u03b5\u03b9

$$w(x) = \frac{\alpha x + \beta}{\gamma \left(x + \frac{\delta}{\gamma} \right)} = \frac{\alpha \left(x + \frac{\delta}{\gamma} \right) - \frac{\alpha\delta}{\gamma} + \beta}{\gamma \left(x + \frac{\delta}{\gamma} \right)} = \frac{\alpha}{\gamma} - \frac{\alpha\delta - \beta\gamma}{\gamma^2 \left(x + \frac{\delta}{\gamma} \right)},$$

\u0397\u03c4\u03bf

$$(4) \quad y = w(x) = \frac{\alpha}{\gamma} + \frac{c}{x + \frac{\delta}{\gamma}},$$

\u03cc\u03c0\u03c5 \u03b5\u03c4\u03b5\u03c4\u03b7 $c = -\frac{\alpha\delta - \beta\gamma}{\gamma^2} = -\frac{\left| \begin{smallmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{smallmatrix} \right|}{\gamma^2}$.

\u038c\u03bd \u03c0\u03c1\u03cc\u03c6\u03b1\u03bd\u03b5\u03c2, \u03b5\u03ba \u03c4\u03cc\u03c5 \u03c4\u03cd\u03c0\u03c5 (4), \u03cc\u03c4\u03b9 \u03b4\u03b9\u03ac $c = 0$ (\u03b4\u03b7\u03bb\u03b1\u03b4\u03b7 $\left| \begin{smallmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{smallmatrix} \right| = 0$) \u03b7 w \u03b5\u03b9\u03bd\u03b1 \u03c3\u03c4\u03b1\u03b8\u03b5\u03c1\u03ac \u03c3\u03bd\u03ac\u03c1\u03c4\u03b7\u03c3\u03b9\u03c2, \u0397\u03c4\u03bf

$$\left| \begin{smallmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{smallmatrix} \right| = 0 \Rightarrow w \text{ \u03c3\u03c4\u03b1\u03b8\u03b5\u03c1\u03ac}$$

\u038c\u03bd $c \neq 0$ \u03c0\u03b1\u03c1\u03b1\u03c4\u03b7\u03c1\u03cc\u03c5\u03bc\u03b5\u03bd \u03cc\u03c4\u03b9 \u03b7 w \u03b5\u03b9\u03bd\u03b1 \u03c3\u03cd\u03bd\u03b8\u03b5\u03c3\u03b9\u03c2 \u03b1\u03c0\u03bb\u03c9\u03bd \u03c4\u03b9\u03bd\u03c9\u03bd \u03c3\u03bd\u03ac\u03c1\u03c4\u03b7\u03c3\u03b5\u03c9\u03bd g_1, g_2, g_3, g_4 \u03bc\u03b5 $g_1(x) = x + \frac{\delta}{\gamma}, g_2(x) = \frac{1}{x}, g_3(x) = cx$ \u03ba\u03b9 $g_4(x) = \frac{\alpha}{\gamma} + x$, \u0397\u03c4\u03bf $w = g_4 \circ (g_3 \circ (g_2 \circ g_1))$. \u038c\u03c0\u03cc\u03bc\u03b5\u03bd\u03c9\u03c2, \u03b4\u03c5\u03bd\u03b1\u03bc\u03b5\u03b9 \u03c4\u03cc\u03c5 \u03b8\u03b5\u03c9\u03c1\u03b7\u03bc\u03b1\u03c4\u03bf\u03c2 1.2.1.

\u03c0\u03b5\u03c1\u03b9\u03c0\u03c4\u03c9\u03c3\u03b9\u03c2 $c > 0$:

$$\left. \begin{smallmatrix} g_1 \uparrow \\ g_2 \downarrow (-\infty, 0) \end{smallmatrix} \right\} \Rightarrow g_2 \circ g_1 \downarrow \left(-\infty, -\frac{\delta}{\gamma} \right)$$

$$\left. \begin{smallmatrix} g_2 \circ g_1 \downarrow \left(-\infty, -\frac{\delta}{\gamma} \right) \\ g_3 \uparrow \end{smallmatrix} \right\} \Rightarrow g_3 \circ (g_2 \circ g_1) \downarrow \left(-\infty, -\frac{\delta}{\gamma} \right)$$

$$\left. \begin{smallmatrix} g_3 \circ (g_2 \circ g_1) \downarrow \left(-\infty, -\frac{\delta}{\gamma} \right) \\ g_4 \uparrow \end{smallmatrix} \right\} \Rightarrow w \downarrow \left(-\infty, -\frac{\delta}{\gamma} \right)$$

Παραδείγματα :

1. $w(x) = \frac{2x+8}{x+3}$


$y = w(x) = 2 + \frac{2}{x+3}$

$C = (-3, 2)$

Βοηθητικοί υπολογισμοί

$$\frac{2x+8}{x+3} = \frac{2}{1} + \frac{c}{x+3}$$

$$x=0: \frac{8}{3} = 2 + \frac{c}{3} \Rightarrow 8 = 6 + c \Rightarrow c=2$$



Σχ. 34 $w: y = \frac{2x+8}{x+3}$

$w \searrow (-\infty, -3)$ και $w \searrow (-3, +\infty)$.

2. $w(x) = \frac{5x+3}{2x+3}$


$$y = w(x) = \frac{5}{2} + \frac{-\frac{9}{2}}{x+\frac{3}{2}}$$

$C = \left(-\frac{3}{2}, \frac{5}{2}\right)$

Βοηθητικοί υπολογισμοί

$$\frac{5x+3}{2x+3} = \frac{5}{2} + \frac{c}{x+\frac{3}{2}}$$

$$x=0: \frac{3}{3} = \frac{5}{2} + \frac{c}{\frac{3}{2}} \Rightarrow 1 - \frac{5}{2} = \frac{2}{3}c \Rightarrow c = -\frac{9}{4}$$



Σχ. 35 $w: y = \frac{5x+3}{2x+3}$

$w \nearrow (-\infty, -\frac{3}{2})$ και $w \nearrow (-\frac{3}{2}, +\infty)$.

1.3 Τò μονότονον καὶ ἡ ἀντίστροφος συνάρτησις. Ἐστω $f: A \mapsto B$ ($A \subseteq \mathbb{R}$, $B \subseteq \mathbb{R}$) μία γνησίως μονότονος συνάρτησις τοῦ A ἐπὶ τοῦ B . Αὕτη εἶναι τότε καὶ ἀμφιμονοσήμαντος, δηλαδή διὰ κάθε $x_1, x_2 \in A$ ἰσχύει

$$(5) \quad x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2).$$

Πράγματι· δυνάμεθα νὰ ὑποθέσωμεν, χωρὶς βλάβην τῆς γενικότητος, ὅτι $x_1 < x_2$ (εἰς τὴν ἀντίθετον περίπτωσιν, δηλαδή $x_1 > x_2$, ἐναλλάσσομεν τὸν ρόλον τῶν x_1, x_2), ὁπότε θὰ ἰσχύη

$$f(x_1) < f(x_2), \text{ ἂν } f \uparrow \text{ ἢ } f(x_1) > f(x_2), \text{ ἂν } f \downarrow.$$

Ἄρα πάντοτε ἰσχύει ἡ (5) καὶ ἐπομένως ἡ f εἶναι ἀμφιμονοσήμαντος συνάρτησις τοῦ A ἐπὶ τοῦ B .

Κατὰ τὸ θεώρημα 2.2.1 τοῦ κεφ. I ὑπάρχει καὶ ἡ ἀντίστροφος τῆς γνησίως μονοτόνου συναρτήσεως f . Ἀκριβέστερον ἰσχύει τὸ ἀκόλουθον θεώρημα.

1.3.1. ΘΕΩΡΗΜΑ. Ἐάν $f: A \rightarrow B$ εἶναι μία γνησίως μονότονος συνάρτησις τοῦ A ἐπὶ τοῦ B , τότε ὑπάρχει ἡ ἀντίστροφος συνάρτησις f^{-1} αὐτῆς καὶ μάλιστα ἰσχύουν:

$$f \uparrow \Rightarrow f^{-1} \uparrow$$

$$f \downarrow \Rightarrow f^{-1} \downarrow$$

Ἀπόδειξις. Ἡ ὑπαρξις τῆς ἀντιστρόφου συναρτήσεως f^{-1} ἔχει ἤδη ἀποδειχθῆ ἀνωτέρω. Πρὸς ἀπόδειξιν καὶ τῶν λοιπῶν συμπερασμάτων τοῦ θεωρήματος διακρίνομεν τὰς περιπτώσεις:

a) $f \uparrow$ καὶ $f^{-1} \uparrow$. Ἐπειδὴ ἡ f^{-1} δὲν εἶναι γνησίως αὐξουσα, ὑπάρχουν x_1, x_2 εἰς τὸ πεδίου ὀρισμοῦ B αὐτῆς μὲ

$$x_1 < x_2 \quad \text{καὶ} \quad f^{-1}(x_1) \geq f^{-1}(x_2).$$

Ἀλλὰ

$$\left. \begin{array}{l} f \uparrow \\ f^{-1}(x_1) \geq f^{-1}(x_2) \end{array} \right\} \Rightarrow f(f^{-1}(x_1)) \geq f(f^{-1}(x_2)) \Rightarrow x_1 \geq x_2,$$

ὅπερ ἄτοπον, διότι $x_1 < x_2$.

Ἄρα ὥστε ἐδείχθη ὅτι $f \uparrow \Rightarrow f^{-1} \uparrow$.

b) $f \downarrow$ καὶ $f^{-1} \downarrow$. Ὁμοίως, ὡς καὶ εἰς τὴν προηγουμένην περίπτωσιν, ἐπειδὴ ἡ f^{-1} δὲν εἶναι γνησίως φθίνουσα ὑπάρχουν $x_1, x_2 \in B$ μὲ

$$x_1 < x_2 \quad \text{καὶ} \quad f^{-1}(x_1) \leq f^{-1}(x_2).$$

Ἀλλὰ

$$\left. \begin{array}{l} f \downarrow \\ f^{-1}(x_1) \leq f^{-1}(x_2) \end{array} \right\} \Rightarrow f(f^{-1}(x_1)) \geq f(f^{-1}(x_2)) \Rightarrow x_1 \geq x_2,$$


τὸ ὁποῖον εἶναι ἐπίσης ἄτοπον.

Ἄρα ὥστε ἐδείχθη ὅτι $f \downarrow \Rightarrow f^{-1} \downarrow$.

Παραδείγματα :


1. Ἡ πραγματικὴ συνάρτησις ϕ μὲ $\phi(x) = x^3$ (βλ. σ.χ. 23) εἶναι ὡς γνωστὸν γνησίως αὐξουσα, ἄρα καὶ ἡ ἀντίστροφος αὐτῆς συνάρτησις ϕ^{-1} τῆς ὁποίας ὁ τύπος εἶναι $y = \sqrt[3]{x}$

είναι επίσης γνησίως αύξουσα και μάλιστα το διάγραμμα αυτής (βλ. σχ. 36) είναι συμμετρικόν, ως πρὸς τὴν διχοτόμον τῆς πρώτης γωνίας τῶν ἀξόνων, τοῦ διαγράμματος τῆς φ .



$$\varphi: y = x^3 ; \varphi^{-1}: y = \sqrt[3]{x}.$$

Σχ. 36



$$f: y = x^{2v+1} ; f^{-1}: y = \sqrt[2v+1]{x}.$$

Σχ. 37

2*. Γενικώτερον, ἡ συνάρτησις f μὲ $f(x) = x^{2v+1}$ (v φυσικὸς ἀριθμὸς) εἶναι γνησίως αὐξουσα, διότι $x_1 < x_2 \Rightarrow x_1^{2v+1} < x_2^{2v+1} \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$. Ὁμοίως καὶ ἡ ἀντίστροφος f^{-1} αὐτῆς, τῆς ὁποίας ὁ τύπος εἶναι $f^{-1}(x) = \sqrt[2v+1]{x}$, εἶναι ἐπίσης γνησίως αὐξουσα. Τὰ διαγράμματα τῶν συναρτήσεων f καὶ f^{-1} εἶναι βεβαίως συμμετρικὰ ὡς πρὸς τὴν διχοτόμον τῆς πρώτης γωνίας τῶν ἀξόνων (βλ. σχ. 37).

2. ΑΚΡΟΤΑΤΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΣ

2.1 Μέγιστον καὶ ἐλάχιστον συναρτήσεως. Διὰ τὴν συνάρτησιν φ μὲ $\varphi(x) = 1 - x^2$ παρατηροῦμεν ὅτι ἰσχύει

$$\varphi(x) = 1 - x^2 \leq 1 = \varphi(0) \quad \forall x \in \mathbb{R},$$

δηλαδή αἱ τιμαὶ τῆς φ οὐδέποτε ὑπερβαίνουν τὴν τιμὴν τῆς εἰς τὸ 0, ἥτοι τὸν ἀριθμὸν $\varphi(0)$. Εἰς τὴν περίπτωσιν ταύτην λέγομεν ὅτι ἡ φ παρουσιάζει μέγιστον εἰς τὸ σημεῖον 0, τὴν δὲ τιμὴν τῆς $\varphi(0)$ καλοῦμεν μέγιστην τιμὴν τῆς φ . Ἐπίσης παρατηροῦμεν ὅτι ἡ φ εἶναι γνησίως αὐξουσα ἀριστερὰ τοῦ 0 καὶ ἀκριβέστερον ἐν $(-\infty, 0]$, διότι ἰσχύει

$$x_1 < x_2 \leq 0 \Rightarrow 1 - x_1^2 < 1 - x_2^2 \Rightarrow$$

φ παρουσιάζει μέγιστον εἰς τὸ 0.

$$\varphi(x_1) < \varphi(x_2),$$

ὡς ἐπίσης καὶ ὅτι αὕτη εἶναι γνησίως φθίνουσα δεξιὰ τοῦ 0, διότι

$$0 \leq x_1 < x_2 \Rightarrow 1 - x_1^2 > 1 - x_2^2 \Rightarrow \varphi(x_1) > \varphi(x_2).$$

Τὸ διάγραμμα τῆς συναρτήσεως φ δίδεται εἰς τὸ σχ. 38.

Ἀναλόγως διὰ τὴν συνάρτησιν ψ μὲ $\psi(x) = (x-1)^2$ παρατηροῦμεν ὅτι $\psi(x) = (x-1)^2 \geq 0 = \psi(1) \quad \forall x \in \mathbb{R}$,

δηλαδή αἱ τιμαὶ τῆς συναρτήσεως ψ ὑπερβαίνουν τὴν τιμὴν $\psi(1)$ αὐτῆς. Εἰς

τήν περίπτωσησιν ταύτην λέγομεν ὅτι ἡ συνάρτησις ψ παρουσιάζει ἐλάχιστον εἰς τὸ σημεῖον 1, τὴν δὲ τιμὴν τῆς $\psi(1)$ καλοῦμεν ἐλάχιστην τιμὴν αὐτῆς. Ἐπίσης παρατηροῦμεν ὅτι ἡ ψ εἶναι γνησίως φθίνουσα ἐν $(-\infty, 1]$, δηλαδὴ ἀριστερὰ τοῦ 1 καὶ γνησίως αὐξουσα ἐν $[1, +\infty)$, δηλαδὴ δεξιὰ τοῦ 1. Τὸ διάγραμμα τῆς συναρτήσεως ψ δίδεται εἰς τὸ σχ. 39.

Γενικῶς διὰ μίαν συνάρτησιν $f: A \rightarrow \mathbb{R} (A \subseteq \mathbb{R})$ λέγομεν ὅτι παρουσιάζει μέγιστον (ἢ ὀλικὸν μέγιστον) εἰς ἓν σημεῖον $x_0 \in A$ τότε καὶ μόνον τότε, ἂν ἰσχύη

$$f(x) \leq f(x_0) \quad \forall x \in A.$$

Τὴν τιμὴν $f(x_0)$ καλοῦμεν τότε *μεγίστην τιμὴν* (ἢ ὀλικὸν μέγιστον) τῆς f .

Ὅμοίως λέγομεν ὅτι ἡ f παρουσιάζει ἐλάχιστον (ἢ ὀλικὸν ἐλάχιστον) εἰς ἓν σημεῖον $x_0 \in A$ τότε καὶ μόνον τότε, ἂν ἰσχύη

$$f(x) \geq f(x_0) \quad \forall x \in A.$$

Τὴν τιμὴν $f(x_0)$ καλοῦμεν τότε *ἐλάχιστην τιμὴν* (ἢ ὀλικὸν ἐλάχιστον) τῆς f .

Ἐφαρμογαί :

1. Ἡ συνάρτησις f μὲ $f(x) = ax^2$ ($a \in \mathbb{R} - \{0\}$). Διακρίνομεν τὰς ἑξῆς δύο περιπτώσεις :

περίπτωσης $a > 0$

Ἡ f παρουσιάζει ἐλάχιστον εἰς τὸ 0, διότι

$$f(x) = ax^2 \geq 0 = f(0) \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

$f \downarrow (-\infty, 0]$, διότι

$$x_1 < x_2 \leq 0 \Rightarrow ax_1^2 > ax_2^2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2).$$

$f \uparrow [0, +\infty)$, διότι

$$0 \leq x_1 < x_2 \Rightarrow ax_1^2 < ax_2^2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2).$$

περίπτωσης $a < 0$

Ἡ f παρουσιάζει μέγιστον εἰς τὸ 0, διότι


$$f(x) = ax^2 \leq 0 = f(0) \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

$f \uparrow (-\infty, 0]$, διότι


$$x_1 < x_2 \leq 0 \Rightarrow ax_1^2 < ax_2^2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2).$$

$f \downarrow [0, +\infty)$, διότι

$$0 \leq x_1 < x_2 \Rightarrow ax_1^2 > ax_2^2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2).$$



Σχ. 40 $f: y = ax^2, a > 0$



Σχ. 41 $f: y = ax^2, a < 0$

Παρατήρησις. Ἡ ἀνωτέρω συνάρτησις f δὲν εἶναι ἀμφιμονοσήμαντος, διότι διὰ κάθε πραγματικὸν ἀριθμὸν x ἰσχύει


$$f(x) = ax^2 = a(-x)^2 = f(-x).$$

Ἀντιθέτως, αἱ συναρτήσεις $\varphi: [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ καὶ $\psi: (-\infty, 0] \rightarrow \mathbb{R}$, αἱ ὁποῖαι ὀρίζονται ὑπὸ


του αυτού τύπου

$$y = ax^2$$


είναι γνησίως μονότονοι και έπομένως άμφιμονοσήμαντοι συναρτήσεις. Άρα αύται έχουν άντιστρόφους συναρτήσεις, οι όποιοι παρίστανται γεωμετρικώς ως εις τά κάτωθι σχήματα.




$\alpha > 0$



$\alpha > 0$



$\alpha < 0$



$\alpha < 0$

2. Η τριώνυμος συνάρτησις δευτέρου βαθμού f με $f(x) = ax^2 + bx + \gamma$, όπου α, β, γ πραγματικοί αριθμοί και $\alpha \neq 0$.

Έν πρώτοις ισχύει

$$y = ax^2 + bx + \gamma = \alpha \left(x^2 + \frac{\beta}{\alpha} x \right) + \gamma = \alpha \left(x + \frac{\beta}{2\alpha} \right)^2 + \left(\gamma - \frac{\beta^2}{4\alpha} \right),$$

τότε, αν τεθῆ

$$X = x + \frac{\beta}{2\alpha} \quad \text{και} \quad Y = y - \frac{4\alpha\gamma - \beta^2}{4\alpha},$$

τότε ἀφ' ἐνὸς μὲν θὰ ἰσχύη

$$Y = \alpha X^2,$$

ἀφ' ἑτέρου δὲ οἱ ἀξονες x, y θὰ μεταφερθοῦν παραλλήλως εἰς τοὺς X, Y μὲ ἀρχὴν τὸ σημεῖον

$$C = \left(-\frac{\beta}{2\alpha}, \frac{4\alpha\gamma - \beta^2}{4\alpha} \right) \quad (\text{βλ. κατωτέρω σχ. 42 και 43}).$$

Λαμβάνοντας τώρα ὑπ' ὄψιν τὸ προηγούμενον παράδειγμα, συμπεραίνομεν εὐκόλως ὅτι :

περίπτωσης $\alpha > 0$


ἢ f παρουσιάζει ελάχιστον εἰς τὸ $-\frac{\beta}{2\alpha}$

$$f \downarrow \left(-\infty, -\frac{\beta}{2\alpha} \right) \quad \text{και} \quad f \uparrow \left[-\frac{\beta}{2\alpha}, +\infty \right)$$


περίπτωσης $\alpha < 0$

ἢ f παρουσιάζει μέγιστον εἰς τὸ $-\frac{\beta}{2\alpha}$

$$f \uparrow \left(-\infty, -\frac{\beta}{2\alpha} \right) \quad \text{και} \quad f \downarrow \left[-\frac{\beta}{2\alpha}, +\infty \right).$$



Σχ. 42 $f: y = \alpha x^2 + \beta x + \gamma, \alpha > 0$



Σχ. 43 $f: y = \alpha x^2 + \beta x + \gamma, \alpha < 0$

3. Ἡ διτετράγωνος τριώνυμος συνάρτησις f μὲ $f(x) = \alpha x^4 + \beta x^2 + \gamma$, ὅπου α, β, γ πραγματικοὶ ἀριθμοὶ και $\alpha \neq 0$. Ἡ μελέτη τῆς διτετραγώνου τριωνύμου συναρτήσεως f βασίζεται ἐπὶ τῆς θεωρήσεως ταύτης ὡς συνθέσεως τῆς συναρτήσεως h μὲ $h(x) = x^2$ και τῆς τριωνύμου συναρτήσεως g μὲ $g(x) = \alpha x^2 + \beta x + \gamma$. Χρησιμοποιοῦντες τοῦτο, δηλαδὴ τὸ ὅτι $f = g \circ h$, ἐν συνδυασμῷ μετὰ τοῦ θεωρήματος 1.2.1, δυνάμεθα νὰ μελετήσωμεν τὴν μεταβολὴν τῆς f και νὰ χαράξωμεν τὸ διάγραμμα αὐτῆς, ὡς ἐμφαίνεται εἰς τὰ κάτωθι παραδείγματα :

Παράδειγμα 1. $f(x) = 2x^4 - 4x^2 - 1$

$$h(x) = x^2$$

$$g(x) = 2x^2 - 4x - 1 = 2(x-1)^2 - 3.$$

Δυνάμει τῶν συμπερασμάτων τῶν προηγούμενων ἐφαρμογῶν 1 και 2, ἡ μεταβολὴ τῶν συναρτήσεων h και g δίδεται ὑπὸ τῶν κάτωθι πινάκων :

x	0
$h(x)$	0

x	1
$g(x)$	-3

Ἐπειδὴ $f(x) = g(h(x))$, πρέπει νὰ μελετήσωμεν τὴν συνάρτησιν f , ὡς πρὸς τὴν μονοτονίαν, εἰς τὰ ὑποδιαστήματα τῶν $(-\infty, 0]$, και $[0, +\infty)$ εἰς τὰ ὁποῖα ἡ h πληροῖ τὰς συνθήκας

$$h(x) = x^2 \leq 1 \text{ και } h(x) = x^2 \geq 1,$$

ήτοι εις τὰ διαστήματα $(-\infty, -1]$, $[-1, 0]$, $[0, 1]$ και $[1, +\infty)$.

(i) Εις τὸ διάστημα $(-\infty, -1]$, ὡς προκύπτει ἐκ τοῦ πρώτου πίνακος, ἡ συνάρτησις h εἶναι γνησίως φθίνουσα, ἄρα

$$h(x) = x^2 \geq (-1)^2 = 1 \quad \forall x \in (-\infty, -1],$$

δηλαδή αἱ ἀντίστοιχοι τιμαὶ τῆς h ἀνήκουν εἰς τὸ διάστημα $[1, +\infty)$, ὅπου, ὡς προκύπτει ἐκ τοῦ δευτέρου πίνακος, ἡ g εἶναι γνησίως αὔξουσα. Ἄρα, κατὰ τὸ θεώρημα 1.2.1, ἡ σύνθεσις $g \circ h$, δηλαδή ἡ συνάρτησις f , εἶναι *γνησίως φθίνουσα ἐν* $(-\infty, -1]$.

(ii) Εἰς τὸ διάστημα $[-1, 0]$, ὡς προκύπτει ἐκ τοῦ πρώτου πίνακος, ἡ συνάρτησις h εἶναι γνησίως φθίνουσα, ἄρα

$$h(x) = x^2 \leq (-1)^2 = 1 \quad \forall x \in [-1, 0],$$

δηλαδή αἱ ἀντίστοιχοι τιμαὶ τῆς h ἀνήκουν εἰς τὸ διάστημα $(-\infty, 1]$, ὅπου, ὡς προκύπτει ἐκ τοῦ δευτέρου πίνακος, ἡ g εἶναι ἐπίσης γνησίως φθίνουσα. Ἄρα, κατὰ τὸ θεώρημα 1.2.1, ἡ σύνθεσις $f = g \circ h$, εἶναι *γνησίως αὔξουσα ἐν* $[-1, 0]$.

(iii) Ὅμοιως εἰς τὸ διάστημα $[0, 1]$ ὡς προκύπτει ἐκ τοῦ πρώτου πίνακος, ἡ συνάρτησις h εἶναι γνησίως αὔξουσα, ἄρα

$$h(x) = x^2 \leq 1^2 = 1 \quad \forall x \in [0, 1],$$

δηλαδή αἱ ἀντίστοιχοι τιμαὶ τῆς h ἀνήκουν εἰς τὸ διάστημα $(-\infty, 1]$, ὅπου ἡ g εἶναι γνησίως φθίνουσα. Ἄρα ἡ σύνθεσις $f = g \circ h$ εἶναι *γνησίως φθίνουσα ἐν* $[0, 1]$.

(iv) Τέλος, εἰς τὸ διάστημα $[1, +\infty)$ ἡ συνάρτησις h εἶναι γνησίως αὔξουσα, ἄρα


$$h(x) = x^2 \geq 1^2 = 1 \quad \forall x \in [1, +\infty),$$

δηλαδή αἱ ἀντίστοιχοι τιμαὶ τῆς h ἀνήκουν εἰς τὸ διάστημα $[1, +\infty)$, ὅπου, ὡς προκύπτει ἐκ τοῦ δευτέρου πίνακος, ἡ g εἶναι ἐπίσης γνησίως αὔξουσα. Ἄρα ἡ σύνθεσις $f = g \circ h$ εἶναι *γνησίως αὔξουσα ἐν* $[1, +\infty)$.

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω προκύπτει ὁ κάτωθι πίναξ μεταβολῆς τῆς f .

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
$f(x)$	$-\infty$	-3	-1	-3	$+\infty$

περίπτωσης $\alpha\beta < 0$



Σχ. 44 $f: y = 2x^4 - 4x^2 - 1$.

Παράδειγμα 2. $f(x) = 2x^4 + 4x^2 - 3$
 $h(x) = x^2$
 $g(x) = 2x^2 + 4x - 3 = 2(x+1)^2 - 5.$

Οι πίνακες μεταβολής των συναρτήσεων h και g είναι οι κάτωθι :


x	0
h(x)	0

x	-1
g(x)	-5

Έκ των ανωτέρω πινάκων μεταβολής των συναρτήσεων h και g , δυνάμει και του θεωρήματος 1.2.1, συνάγεται εύκολως ο κάτωθι πίναξ μεταβολής της διτετραγώνου τριωνύμου συναρτήσεως $f = g \circ h$.

x	0
f(x)	-3

περίπτωσης $\alpha\beta \geq 0$



Σχ. 45 $f: y = 2x^4 + 4x^2 - 3.$

2.2 Τοπικά άκρότατα συναρτήσεως. Είς το παράδειγμα 1 της ανωτέρω εφαρμογής 3 είδομεν ότι ή διτετράγωνος τριωνύμος συνάρτησις f με $f(x) = 2x^4 - 4x^2 - 1$ (βλ. σχ. 44) παρουσιάζει τόσον εις το σημείον -1 όσον και εις το 1 (όλικόν) έλάχιστον με έλαχίστην τιμήν τό -3 . Αντιθέτως ή συνάρτησις αύτη δέν παρουσιάζει (όλικόν) μέγιστον. Αν όμως περιορισθώμεν εις τό άνοικτόν διάστημα $(-1,1)$, τότε παρατηρούμεν ότι ισχύει

$$f(x) \leq f(0) = -1 \quad \forall x \in (-1,1),$$

δηλαδή αι τιμαι της f εις τό διάστημα $(-1,1)$ δέν υπερβαίνουν τήν τιμήν αύτης εις τό σημείον 0 . Εις τήν περίπτωση ταύτην λέγομεν ότι ή συνάρτησις f παρουσιάζει εις τό σημείον 0 τοπικόν μέγιστον.

Γενικώς λέγομεν ότι μία συνάρτησις $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ ($A \subseteq \mathbb{R}$) παρουσιάζει

τοπικὸν μέγιστον εἰς ἓν σημεῖον $x_0 \in A$ τότε καὶ μόνον τότε, ἂν ὑπάρχη ἓν ἀνοικτὸν διάστημα (a, b) περιέχον τὸ x_0 καὶ περιεχόμενον εἰς τὸ πεδῖον ὀρισμοῦ Ἄ τῆς f , ἤτοι $x_0 \in (a, b) \subseteq A$, τοιοῦτον, ὥστε νὰ ἰσχύη

$$f(x) \leq f(x_0) \quad \forall x \in (a, b).$$

Τὴν τιμὴν $f(x_0)$ καλοῦμεν τότε *τοπικῶς μεγίστην τιμὴν* (ἢ *τοπικὸν μέγιστον*) τῆς f .

Ὅμοιως λέγομεν ὅτι ἡ συνάρτησις f παρουσιάζει *τοπικὸν ἐλάχιστον* εἰς ἓν σημεῖον $x_0 \in A$ τότε καὶ μόνον τότε, ἂν ὑπάρχη ἓν ἀνοικτὸν διάστημα $(a, b) \subseteq A$ περιέχον τὸ x_0 καὶ τοιοῦτον, ὥστε νὰ ἰσχύη

$$f(x) \geq f(x_0) \quad \forall x \in (a, b).$$

Τὴν τιμὴν $f(x_0)$ καλοῦμεν τότε *τοπικῶς ἐλάχιστην τιμὴν* (ἢ *τοπικὸν ἐλάχιστον*) τῆς f .

Ὅταν μία συνάρτησις f παρουσιάζη εἰς ἓν σημεῖον x_0 τοπικὸν μέγιστον ἢ τοπικὸν ἐλάχιστον, τότε λέγομεν ὅτι αὕτη παρουσιάζει εἰς τὸ σημεῖον x_0 *τοπικὸν ἀκρότατον*. Π.χ. ἡ διτετράγωνος τριώνυμος συνάρτησις f μὲ $f(x) = 2x^4 - 4x^2 - 1$ (βλ. σχ. 44) παρουσιάζει εἰς τὰ σημεῖα $-1, 0, 1$ τοπικά ἀκρότατα. Ἀκριβέστερον αὕτη παρουσιάζει εἰς τὰ σημεῖα $-1, 1$ (ὀλικόν) ἐλάχιστον καὶ εἰς τὸ σημεῖον 0 τοπικὸν μέγιστον.

3. ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ ΑΥΤΗΣ

3.1 Ἡ μελέτη μιᾶς πραγματικῆς συναρτήσεως μιᾶς πραγματικῆς μεταβλητῆς συνίσταται εἰς τὴν τοπικὴν (κατὰ διαστήματα) μελέτην τῆς μονοτονίας αὐτῆς, τὸν καθορισμὸν τῶν σημείων εἰς τὰ ὁποῖα αὕτη παρουσιάζει τοπικά ἀκρότατα καὶ τὸν ὑπολογισμὸν τῶν ἀκροτάτων τιμῶν αὐτῆς, ἤτοι τῶν τοπικῶς μεγίστων καὶ τοπικῶς ἐλάχιστων τιμῶν τῆς. Τῇ βοηθειᾷ τῶν ἀνωτέρω στοιχείων, τὰ ὁποῖα προκύπτουν ἐκ τῆς μελέτης μιᾶς συναρτήσεως, δυνάμεθα νὰ παραστήσωμεν γεωμετρικῶς τὴν ὑπ' ὄψιν συνάρτησιν, ἤτοι νὰ χαράξωμεν τὸ διάγραμμα αὐτῆς. Εἰς τὴν χάραξιν τοῦ διαγράμματος μιᾶς συναρτήσεως διευκολύνει πολὺ ὁ ἐκ τῶν προτέρων καθορισμὸς ὠρισμένων σημείων τοῦ διαγράμματος ἐκλεγομένων ἀθαιρέτως μὲν, ἀλλὰ εἰς τρόπον, ὥστε νὰ χαρακτηρίζουν τὸ διάγραμμα καθ' ὅλην, εἰ δυνατόν, τὴν ἔκτασίν του.

3.2 Ἡ συνάρτησις f μὲ $f(x) = \gamma \sqrt{\alpha^2 - x^2}$, ὅπου α, γ πραγματικοὶ ἀριθμοὶ καὶ $\alpha > 0$. Τὸ πεδῖον ὀρισμοῦ αὐτῆς εἶναι προφανῶς τὸ κλειστὸν διάστημα $[-\alpha, \alpha]$. Ἐπίσης διὰ $\gamma > 0$ ἡ συνάρτησις f εἶναι γνησίως αὐξουσα εἰς τὸ διάστημα $[-\alpha, 0]$, διότι διὰ x_1, x_2 ἐν $[-\alpha, 0]$ ἰσχύει

$$x_1 < x_2 \Rightarrow x_1^2 > x_2^2 \Rightarrow \alpha^2 - x_1^2 < \alpha^2 - x_2^2 \Rightarrow \sqrt{\alpha^2 - x_1^2} < \sqrt{\alpha^2 - x_2^2} \Rightarrow$$

$$f(x_1) = \gamma \sqrt{\alpha^2 - x_1^2} < \gamma \sqrt{\alpha^2 - x_2^2} = f(x_2),$$

ἐνῶ αὕτη εἶναι γνησίως φθίνουσα εἰς τὸ διάστημα $[0, \alpha]$ διότι διὰ x_1, x_2 ἐν $[0, \alpha]$ ἰσχύει

$$x_1 < x_2 \Rightarrow x_1^2 < x_2^2 \Rightarrow \alpha^2 - x_1^2 > \alpha^2 - x_2^2 \Rightarrow \sqrt{\alpha^2 - x_1^2} > \sqrt{\alpha^2 - x_2^2} \Rightarrow$$

$$f(x_1) = \gamma \sqrt{\alpha^2 - x_1^2} > \gamma \sqrt{\alpha^2 - x_2^2} = f(x_2).$$

Όμοίως διὰ $\gamma < 0$ έχουμε $f \downarrow [-\alpha, 0]$ καὶ $f \uparrow [0, \alpha]$.

Ὅθεν ἡ μεταβολὴ τῆς συναρτήσεως f δίδεται ὑπὸ τῶν πινάκων :

x	$-\alpha$	0	α
f(x)	0	$\nearrow \gamma\alpha$	$\searrow 0$


$\gamma > 0$

x	$-\alpha$	0	α
f(x)	0	$\searrow \gamma\alpha$	$\nearrow 0$


$\gamma < 0$

Προφανῶς ἡ συνάρτησις f παρουσιάζει εἰς τὸ σημεῖον 0 εἰς μὲν τὴν περίπτωσιν $\gamma > 0$ μέγιστον μὲ μείστην τιμὴν $\gamma\alpha$, εἰς δὲ τὴν περίπτωσιν $\gamma < 0$ ἐλάχιστον μὲ ἐλάχιστην τιμὴν $\gamma\alpha$.

Τὸ διάγραμμα τῆς συναρτήσεως f δίδεται εἰς τὰ κάτωθι σχήματα:



Σχ. 46. $f: y = \gamma\sqrt{\alpha^2 - x^2}, \gamma > 0$



Σχ. 47. $f: y = \gamma\sqrt{\alpha^2 - x^2}, \gamma < 0$


Πρὸς ἀκριβεστέραν χάραξιν τοῦ διαγράμματος μιᾶς συναρτήσεως σχεδιάζομεν πρῶτον ὠρισμένα σημεῖα τοῦ διαγράμματος, τὰ ὅποια χαρακτηρίζουν αὐτὸ καθ' ὅλην τὴν ἑκτίασίν του. Οὕτω π.χ. εἰς τὴν ἀνωτέρω περίπτωσιν διὰ $\alpha = 4, \gamma = \frac{3}{4}$ χαράσσομεν τὸ διάγραμμα τῆς συναρτήσεως f μὲ $f(x) =$

$\frac{3}{4}\sqrt{16 - x^2}$ τῇ βοθηθεῖα ἀφ' ἑνὸς μὲν τοῦ πίνακος μεταβολῆς αὐτῆς

x	-4	0	4
f(x)	0	$\nearrow 3$	$\searrow 0$

ἀφ' ἑτέρου δὲ τοῦ κατωτέρω πίνακος, ὁ ὁποῖος δίδει τὰς συντεταγμένας ὠρισμένων σημείων τοῦ διαγράμματος.


x	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
f(x)	0	$\frac{3\sqrt{7}}{4}$	$\frac{3\sqrt{3}}{2}$	$\frac{3\sqrt{15}}{4}$	3	$\frac{3\sqrt{15}}{4}$	$\frac{3\sqrt{3}}{2}$	$\frac{3\sqrt{7}}{4}$	0
Κατὰ προσέγγισιν									
f(x)	0	1,98	2,60	2,90	3	2,90	2,60	1,98	0




Σχ. 48 $f: y = \frac{3}{4} \sqrt{16 - x^2}$.

Είδικαι περιπτώσεις :


3.2.1. $\gamma = 1$, δηλαδή $f(x) = \sqrt{\alpha^2 - x^2}$. Εις τήν περίπτωσιν ταύτην ἔχομεν ὡς διάγραμμα τῆς f τὸ ἄνω ἡμικύκλιον κέντρου O καὶ ἀκτίνοσ α . Πράγματι· ἀφ' ἑνὸσ μὲν, δυνάμει τοῦ πυθαγορείου θεωρήματος, τυχόν σημείον $P = (x, y)$ τοῦ διαγράμματος τῆς f πληροῖ τήν σχέσιν $OP^2 = x^2 + y^2 = x^2 + (\sqrt{\alpha^2 - x^2})^2 = x^2 + (\alpha^2 - x^2) = \alpha^2$, ἄρα ἡ ἀπόστασις τυχόντος σημείου τοῦ διαγράμματος τῆς f ἀπὸ τὴν ἀρχὴν τῶν ἀξόνων εἶναι σταθερὰ ἴση μὲ α . Ἐτέρου δὲ τυχόν σημείον $P = (x, y)$ τοῦ ἄνω ἡμικυκλίου (ἄρα $y \geq 0$) εἶναι σημείον τοῦ διαγράμματος τῆς f καθ' ὅσον, δυνάμει πάλιν τοῦ πυθαγορείου θεωρήματος,

$$\alpha^2 = OP^2 = x^2 + y^2 \Rightarrow y^2 = \alpha^2 - x^2 \Rightarrow y = \sqrt{\alpha^2 - x^2} = f(x).$$


Σχ. 49 $f: y = \sqrt{\alpha^2 - x^2}$



Σχ. 50 $-f: y = -\sqrt{\alpha^2 - x^2}$



Σχ. 51 $x^2 + y^2 = \alpha^2$

Προφανῶσ τὸ διάγραμμα τῆς συναρτήσεωσ $-f$ εἶναι τὸ κάτω ἡμικύκλιον κέντρου O καὶ ἀκτίνοσ α (βλ. σχ. 50). Ἄρα ὁ κύκλωσ κέντρου O καὶ ἀκτίνοσ α εἶναι ἡ ἔνωσις τῶν διαγραμμάτων τῶν συναρτήσεων f καὶ $-f$. Τυχόν σημείον $P = (x, y)$ τοῦ κύκλωσ κέντρου O καὶ ἀκτίνοσ α ἰκανοποιεῖ τήν σχέσιν

$$(6) \quad x^2 + y^2 = \alpha^2,$$

ὡσ εὐκόλωσ συνάγεταί ἐκ τοῦ πυθαγορείου θεωρήματος. Ἄλλὰ καὶ ἀντιστρόφωσ τυχόν σημείον $P = (x, y)$, τὸ ὁποῖον ἰκανοποιεῖ τήν (6) κεῖται ἐπὶ τοῦ κύκλωσ

κέντρου O και άκτινος α , ως εύκολως συνάγεται πάλιν εκ του πυθαγορείου θεωρήματος.

“Ωστε η σχέση (6) χαρακτηρίζει το σύνολον τών σημείων του επιπέδου, τα όποια κείνται επί του κύκλου κέντρου O και άκτινος α και καλείται *έξίσωσις* του έν λόγω κύκλου.

Γενικώτερον η σχέση

$$(7) \quad (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = \alpha^2,$$

όπου x_0, y_0 είναι σταθεροί πραγματικοί αριθμοί, διά της αντικαταστάσεως $X = x - x_0$ και $Y = y - y_0$ γράφεται και ούτω

$$X^2 + Y^2 = \alpha^2,$$


ή όποια είναι η έξίσωσις του κύκλου με κέντρον την άρχην $C = (x_0, y_0)$ τών νέων άξόνων X, Y και άκτινος α (βλ. σχ. 52). Η άνωτέρω σχέση (7) καλείται *έξίσωσις* του κύκλου κέντρου $C = (x_0, y_0)$ και άκτινος α .

Σχ. 52 $(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 = \alpha^2$


3.2.2 $\gamma = \frac{\beta}{\alpha}$, δηλαδή $f(x) = \frac{\beta}{\alpha} \sqrt{\alpha^2 - x^2}$, όπου εκτός του α και το β είναι θετικός αριθμός. Εις την περίπτωση ταύτην ό πίναξ μεταβολής της f είναι

x	$-\alpha$	0	α
$f(x)$	0	β	0

Τα διαγράμματα της f και της $-f$ δίδονται εις τα κάτωθι σχήματα :



Σχ. 53 $f: y = \frac{\beta}{\alpha} \sqrt{\alpha^2 - x^2}$



Σχ. 54 $-f: y = -\frac{\beta}{\alpha} \sqrt{\alpha^2 - x^2}$

Την ένωσιν τών άνωτέρω διαγραμμάτων τών συναρτήσεων f και $-f$ καλούμεν *έλλειψιν* με κέντρον O και ήμισιάσας α, β .

Τυχόν σημείον $P = (x, y)$ της έν λόγω έλλειψεως ίκανοποιεί την σχέσηιν


$$(8) \quad \frac{x^2}{\alpha^2} + \frac{y^2}{\beta^2} = 1,$$

διότι, αν μὲν τὸ P ἀνήκει εἰς τὸ διάγραμμα τῆς f (καλούμενον καὶ ἄνω ἡμιέλλειψις μὲ κέντρον 0 καὶ ἡμιμάξονας α, β), ἔχομεν

$$y = \frac{\beta}{\alpha} \sqrt{\alpha^2 - x^2} \Rightarrow y^2 = \frac{\beta^2}{\alpha^2} (\alpha^2 - x^2) \Rightarrow (8),$$

ἂν δὲ τὸ P ἀνήκει εἰς τὸ διάγραμμα τῆς $-f$ (καλούμενον καὶ κάτω ἡμιέλλειψις μὲ κέντρον 0 καὶ ἡμιμάξονας α, β), ἔχομεν πάλιν

$$y = -\frac{\beta}{\alpha} \sqrt{\alpha^2 - x^2} \Rightarrow y^2 = \frac{\beta^2}{\alpha^2} (\alpha^2 - x^2) \Rightarrow (8).$$



Ἄλλὰ καὶ ἀντιστρόφως, ἂν δι' ἓν σημεῖον $P = (x, y)$ ἱκανοποιεῖται ἡ (8), τότε τὸ P εἶναι σημεῖον τῆς ἔλλειψως, διότι

$$(8) \left. \begin{array}{l} \\ y \geq 0 \end{array} \right\} \Rightarrow y = \frac{\beta}{\alpha} \sqrt{\alpha^2 - x^2} \Rightarrow$$

$$\text{Σχ. 55 } \frac{x^2}{\alpha^2} + \frac{y^2}{\beta^2} = 1$$

ἔλλειψις μὲ κέντρον 0 καὶ ἡμιμάξονας α, β

P ἀνήκει εἰς τὸ διάγραμμα τῆς f

$$(8) \left. \begin{array}{l} \\ y < 0 \end{array} \right\} \Rightarrow y = -\frac{\beta}{\alpha} \sqrt{\alpha^2 - x^2} \Rightarrow P \text{ ἀνήκει εἰς τὸ διάγραμμα τῆς } -f$$

Ἡ σχέσηις (8) χαρακτηρίζει τὰ σημεῖα τῆς ἔλλειψως μὲ κέντρον 0 καὶ ἡμιμάξονας α, β καὶ καλεῖται ἐξίσωσις τῆς ἐν λόγω ἔλλειψως.


3.3 Ἡ συνάρτησις f μὲ $f(x) = \gamma \sqrt{x^2 - \alpha^2}$, ὅπου α, γ πραγματικοὶ ἀριθμοὶ καὶ $\alpha > 0$. Τὸ πεδῖον ὀρίσμοῦ αὐτῆς εἶναι προφανῶς ἡ ἔνωσις τῶν διαστημάτων $(-\infty, -\alpha]$ καὶ $[\alpha, +\infty)$. Κατ' ἀναλογίαν πρὸς τὴν προηγουμένην § 3.2 συνάγεται εὐκόλως ὅτι ὁ πίναξ μεταβολῆς τῆς συναρτήσεως f ἔχει ὡς κάτωθι :

x	$-\alpha$	α
$f(x)$	$\searrow 0$	$0 \nearrow$


$\gamma > 0$

x	$-\alpha$	α
$f(x)$	$\nearrow 0$	$0 \searrow$

$\gamma < 0$



Σχ. 56 $f : y = \gamma \sqrt{x^2 - \alpha^2}, \gamma > 0$



Σχ. 57 $f : y = \gamma \sqrt{x^2 - \alpha^2}, \gamma < 0$

Εἰς τὴν χάραξιν τῶν διαγραμμάτων τῶν ἀνωτέρω σχημάτων 56 καὶ 57 δι-

ευκολύνουν και αί ευθείαι με εξισώσεις $y = \gamma x$ και $y = -\gamma x$, διότι, π.χ. εις την περίπτωσιν $\gamma > 0$ έχομεν

$$f(x) = \gamma \sqrt{x^2 - \alpha^2} = \gamma |x| \sqrt{1 - \frac{\alpha^2}{x^2}} < \gamma |x|$$

άρα και

$f(x) < -\gamma x \forall x \in (-\infty, -\alpha]$ ως επίσης και $f(x) < \gamma x \forall x \in [\alpha, +\infty)$.

Ειδικώς τώρα αν θεωρήσωμεν τὰ διαγράμματα τῶν συναρτήσεων, τὰ ὁποῖα


ἀντιστοιχοῦν εις τὰς τιμὰς $\gamma = \frac{\beta}{\alpha}$ και $\gamma = -\frac{\beta}{\alpha}$,

ὅπου ἐκτὸς τοῦ α και τὸ β εἶναι θετικὸς ἀριθμὸς, τότε τὴν ἔνωσιν αὐτῶν (βλ. σχ. 58) καλοῦμεν ὑπερβολήν.

Ἡ σχέσηις

$$(9) \quad \frac{x^2}{\alpha^2} - \frac{y^2}{\beta^2} = 1,$$

ὡς εὐκόλως συνάγεται, κατ' ἀναλογίαν και πρὸς τὴν περίπτωσιν τῆς ἑλλείψεως, χαρακτηρίζει τὰ σημεῖα τῆς ὑπερβολῆς και καλεῖται *ἐξίσωσις* αὐτῆς.



Σχ. 58 $\frac{x^2}{\alpha^2} - \frac{y^2}{\beta^2} = 1$
ὑπερβολή

Τὰς ευθείαις με εξισώσεις $y = \frac{\beta}{\alpha} x$ και $y =$

$= -\frac{\beta}{\alpha} x$, αἱ ὁποῖαι διευκολύνουν τὴν χάραξιν

τῆς ὑπερβολῆς με εξίσωσιν τὴν (9) καλοῦμεν *ἀσυμπτώτους* αὐτῆς.

4. ΑΣΚΗΣΕΙΣ

4.1 α) Μελετήσατε ὡς πρὸς τὴν μονοτονίαν τὰς συναρτήσεις, αἱ ὁποῖαι ὀρίζονται ὑπὸ τῶν τύπων :

1) $f(x) = x^3 + 1$

2) $f(x) = -x^3 - 1$

3) $f(x) = x^3 + 1, x \geq 0$

4) $f(x) = \frac{1}{x^2 + 1}, x \geq 0$

β) Ἄν ἡ f εἶναι μία μονότονος ἢ γνησίως μονότονος συνάρτησις, τί συμπεραίνεται γενικῶς διὰ τὴν συνάρτησιν $-f$ σχετικῶς με τὴν μονοτονίαν αὐτῆς ; Ἄν και αὐτὴ, δηλαδὴ ἡ $-f$ εἶναι μονότομος, πῶς συσχετίζεται τὸ εἶδος τῆς μονοτονίας ταύτης με τὸ εἶδος τῆς μονοτονίας τῆς f ;

γ) Ἐξετάσατε τὸ αὐτὸ ἐρώτημα, ὡς ἐν β), διὰ τὴν συνάρτησιν $\frac{1}{f}$, ὅπου ἐδῶ ὑποτίθεται βεβαίως ὅτι $f(x) \neq 0$ διὰ κάθε x τοῦ πεδίου ὀρισμοῦ τῆς f .

4.2 Ἄν f και g εἶναι μονότονοι συναρτήσεις με κοινὸν πεδίου ὀρισμοῦ, τί συμπεραίνεται, ὡς πρὸς τὴν μονοτονίαν, διὰ τὸ ἄθροισμα $f + g$ και τὸ γινόμενον fg αὐτῶν ;

4.3 Μελετήσατε και παραστήσατε γεωμετρικῶς τὰς συναρτήσεις, αἱ ὁποῖαι ὀρίζονται ὑπὸ τῶν τύπων :

$$1) f(x) = \frac{3x+1}{2x+5}$$

$$2) f(x) = \frac{1}{x+7}$$

$$3) f(x) = \frac{x+2}{8x+1}$$

$$4) f(x) = \frac{x}{3x+2}$$

$$5) f(x) = \frac{3x+2}{x}$$

$$6) f(x) = \frac{7x+2}{5x+1}$$

4.4 Μελετήσατε και παραστήσατε γεωμετρικώς τās συναρτήσεις, αι όποιαί όρίζονται υπό τών τύπων:

$$1) f(x) = 3x^2 + 2$$

$$2) f(x) = -4x^3 + 1$$

$$3) f(x) = 2x^4 - 1$$

$$4) f(x) = x^2 - 3x + 2$$

$$5) f(x) = -2x^2 + 3x + 5$$

$$6) f(x) = 3x^2 - 2x - 5$$

$$7) f(x) = x^4 + 2x^2 - 3$$

$$8) f(x) = -2x^4 + 3x^2 + 5$$

4.5 Χαράξατε τās έλλείψεις με έξισώσεις:

$$1) \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$$

$$2) x^2 + \frac{y^2}{4} = 1$$

$$3) \frac{x^2}{9} + y^2 = 1$$

$$4) \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1$$

$$5) x^2 + \frac{y^2}{4} = 4$$

$$6) \frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{12} = 3$$

4.6 Χαράξατε τās υπερβολάς με έξισώσεις:

$$1) \frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$$

$$2) x^2 - \frac{y^2}{9} = 1$$

$$3) \frac{x^2}{16} - y^2 = 1$$

$$4) \frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{8} = 8$$

$$5) x^2 - \frac{y^2}{9} = 4$$

$$6) \frac{x^2}{16} - y^2 = 4$$

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙV

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΙ ΚΑΙ ΣΥΓΚΛΙΣΙΣ ΑΥΤΩΝ

1. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

1.1 Ἡ ἔννοια τῆς ἀκολουθίας. Γνωρίζομεν ἤδη (κεφ. I, § 2.2) τὴν ἔννοιαν τῆς συναρτήσεως ὡς μιᾶς μονοσημάντου ἀπεικονίσεως f ἐνὸς συνόλου A εἰς ἕνα σύνολον B (A, B ὑποτίθενται μὴ κενά). Γράφομεν δὲ

$$f : A \rightarrow B \text{ ἢ καὶ ἄλλως } A \ni x \rightarrow f(x) \in B$$

καὶ λέγομεν ὅτι ἡ f εἶναι μία συνάρτησις μὲ πεδίον ὀρισμοῦ τὸ σύνολον A καὶ τιμὰς εἰς τὸ B .

Κατὰ ταῦτα μία συνάρτησις α μὲ πεδίον ὀρισμοῦ τὸ σύνολον N τῶν φυσικῶν ἀριθμῶν καὶ τιμὰς εἰς τὸ B θὰ συμβολισθῇ οὕτω :

$$\alpha : N \rightarrow B \text{ ἢ καὶ ἄλλως } N \ni n \rightarrow \alpha(n) \in B.$$

Κάθε συνάρτησις ὡς ἡ ἀνωτέρω α καλεῖται *μία ἀκολουθία στοιχείων τοῦ συνόλου B* . Εἰδικῶς, ἂν $B \subseteq R$ ἡ ἀκολουθία α καλεῖται *ἀκολουθία πραγματικῶν ἀριθμῶν*.

Ἔστω : *ἀκολουθία πραγματικῶν ἀριθμῶν εἶναι κάθε συνάρτησις μὲ πεδίον ὀρισμοῦ τὸ σύνολον N τῶν φυσικῶν ἀριθμῶν καὶ τιμὰς εἰς τὸ σύνολον R τῶν πραγματικῶν ἀριθμῶν, δηλαδὴ μία μονοσήμαντος ἀπεικόνισις τοῦ N εἰς τὸ R .*

Εἰς τὴν περίπτωσιν μιᾶς ἀκολουθίας α συνηθίζομεν ὅπως τὴν τιμὴν $\alpha(n)$ αὐτῆς συμβολίζομεν μὲ α_n γράφοντες τὸν φυσικὸν ἀριθμὸν n ὡς κάτω δείκτην τοῦ α . Αἱ τιμαὶ μιᾶς ἀκολουθίας α καλοῦνται ὅροι αὐτῆς καὶ δυνάμεθα νὰ τοὺς καταχωρίσωμεν εἰς ἕνα πίνακα ὡς κάτωθι :

1	2	3	...	n	...
α_1	α_2	α_3	...	α_n	...

εἰς τὸν ὁποῖον παραλείπεται συνήθως ἡ πρώτη γραμμὴ καὶ γράφονται μόνον οἱ ὅροι τῆς ἀκολουθίας, ἤτοι :

$$(1) \quad \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_n, \dots$$

Ὁ ὅρος α_1 καλεῖται πρῶτος ὅρος τῆς ἐν λόγῳ ἀκολουθίας, ὁ α_2 δεῦτερος ὅρος καὶ γενικῶς ὁ α_n νιοστὸς ὅρος αὐτῆς.

Ἐχει ἐπικρατήσῃ ὅπως εἰς τὴν περίπτωσιν μιᾶς ἀκολουθίας α παρίσταται αὕτη διὰ τῶν ὀρων της ὡς ἐν (1). Λέγομεν δὲ τότε «*ἡ ἀκολουθία $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_n, \dots$* » ἢ καὶ ἄλλως «*ἡ ἀκολουθία $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots$* ». Συντομώτερον ἡ ἀκολουθία (1) παρίσταται καὶ οὕτω :

$$\alpha_n, n \in N \text{ ἢ καὶ ἄλλως } \alpha_n, n = 1, 2, \dots$$

Παραδείγματα :

1. η ακολουθία τῶν φυσικῶν ἀριθμῶν, ἤτοι ἡ ἀκολουθία

$$1, 2, 3, \dots, n, \dots$$

τῆς ὁποίας νιοστὸς ὄρος εἶναι ὁ ἀριθμὸς n , ἤτοι $a_n = n$.

2. ἡ ἀκολουθία

$$1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{n}, \dots$$

τῆς ὁποίας ὁ νιοστὸς ὄρος εἶναι ὁ ἀριθμὸς $\frac{1}{n}$, ἤτοι $a_n = \frac{1}{n}$.

3. ἡ ἀκολουθία


$$1, 4, 9, \dots, n^2, \dots$$

4. ἡ ἀκολουθία

$$-1, \frac{1}{2}, -\frac{1}{3}, \dots, (-1)^n \frac{1}{n}, \dots$$

1.1.1 Γεωμετρικὴ παράστασις ἀκολουθίας. Ἐστω a_n , $n = 1, 2, \dots$ μία ἀκολουθία πραγματικῶν ἀριθμῶν. Τὸ γράφημα S_a αὐτῆς εἶναι τότε τὸ σύνολο $\{(1, a_1), (2, a_2), \dots, (n, a_n), \dots\}$.


Ἡ γεωμετρικὴ παράστασις (τὸ διάγραμμα) αὐτοῦ ἢ ὡς ἄλλως λέγομεν τῆς ἀκολουθίας a_n , $n = 1, 2, \dots$ ἀποτελεῖται ἀπὸ μεμονωμένα σημεῖα τοῦ ἐπιπέδου ὡς ἐμφαίνεται εἰς τὸ κάτωθι σχῆμα 59.



Σχ. 59

1.1.2 Φραγμένη ἀκολουθία. Διὰ τὴν ἀκολουθίαν $a_n = \frac{1}{n}$, $n = 1, 2, \dots$ παρατηροῦμεν ὅτι ἰσχύει

$$0 \leq a_n = \frac{1}{n} \leq 1 \quad \forall n \in \mathbb{N}$$



ἤτοι ὅλοι οἱ ὄροι τῆς ἀκολουθίας ταύτης ἀνήκουν εἰς τὸ κλειστὸν διάστημα $[0, 1]$, λέγομεν δὲ ὅτι ἡ ἀκολουθία αὕτη εἶναι φραγμένη.

Γενικῶς : μία ἀκολουθία πραγματικῶν ἀριθμῶν a_n , $n = 1, 2, \dots$ καλεῖται φραγμένη τότε καὶ μόνον τότε, ἂν ὑπάρχουν πραγματικοὶ ἀριθμοὶ γ καὶ δ τοιοῦτοι, ὥστε νὰ ἰσχύη

$$(2) \quad \gamma \leq \alpha_n \leq \delta \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

"Αν τώρα θ είναι αριθμός μεγαλύτερος ή ίσος τῶν $|\gamma|$ καὶ $|\delta|$, τότε ἡ (2) συνεπάγεται ἀφ' ἐνὸς μὲν

$$\alpha_n \leq \delta \leq |\delta| \leq \theta \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

ἀφ' ἑτέρου δὲ

$$\alpha_n \geq \gamma \geq -|\gamma| \geq -\theta \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

"Αρα, ἰσχύει τότε

$$(3) \quad -\theta \leq \alpha_n \leq \theta \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

ἢ ἰσοδυνάμως

$$(4) \quad |\alpha_n| \leq \theta \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

"Αλλὰ καὶ ἀντιστρόφως, ἂν ἰσχύῃ ἡ (4), τότε προφανῶς ἡ ἀκολουθία $\alpha_n, n = 1, 2, \dots$ εἶναι φραγμένη, διότι ἡ (4) εἶναι ἰσοδύναμος πρὸς τὴν (3). "Εδείχθη λοιπὸν ὅτι :

Μία ἀκολουθία πραγματικῶν ἀριθμῶν $\alpha_n, n = 1, 2, \dots$ εἶναι φραγμένη τότε καὶ μόνον τότε, ἂν ὑπάρχῃ πραγματικὸς ἀριθμὸς θ τοιοῦτος, ὥστε νὰ ἰσχύῃ

$$|\alpha_n| \leq \theta \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

"Ο ἀριθμὸς θ καλεῖται τότε *φράγμα* τῆς ἀκολουθίας $\alpha_n, n = 1, 2, \dots$

Φραγμέναι ἀκολουθίαι εἶναι π.χ. αἱ $\frac{v\eta\mu v}{v+1}, v = 1, 2, \dots$ καὶ $\frac{2\sigma\upsilon\nu v}{v^3}$:
 $v = 1, 2, \dots$, διότι ἰσχύουν

$$\left| \frac{v\eta\mu v}{v+1} \right| = \frac{v|\eta\mu v|}{v+1} \leq \frac{v}{v+1} \leq 1 \quad \forall v \in \mathbb{N}$$

καὶ

$$\left| \frac{2\sigma\upsilon\nu v}{v^3} \right| = \frac{2|\sigma\upsilon\nu v|}{v^3} \leq \frac{2}{v^3} \leq 2 \quad \forall v \in \mathbb{N}.$$

"Αντιθέτως αἱ ἀκολουθίαι $v^3, v = 1, 2, \dots$ καὶ $-v^2 + v, v = 1, 2, \dots$ δὲν εἶναι φραγμέναι (διατί);

1.1.3 Μονότονος ἀκολουθία. "Εφ' ὅσον ἐκ τοῦ ὀρισμοῦ τῆς ἡ ἀκολουθία εἶναι μία εἰδικὴ περίπτωσις συναρτήσεως, αἱ ἔννοιαι *μονότονος* καὶ *γνησίως μονότονος* ἀκολουθία πραγματικῶν ἀριθμῶν εἶναι προφανεῖς συμφώνως πρὸς τοὺς ἀντιστοίχους ὀρισμοὺς τοὺς δοθέντας εἰς τὴν § 1.1 τοῦ κεφ. III, διὰ πραγματικὰς συναρτήσεις μιᾶς πραγματικῆς μεταβλητῆς.

"Ακριβέστερον μία ἀκολουθία πραγματικῶν ἀριθμῶν $\alpha_n, n = 1, 2, \dots$ εἶναι *αἰξουσα* τότε καὶ μόνον τότε, ἂν

$$v < \mu \Rightarrow \alpha_v \leq \alpha_\mu.$$

"Ομοίως ἡ $\alpha_n, n = 1, 2, \dots$ εἶναι *φθίνουσα* τότε καὶ μόνον τότε, ἂν

$$v < \mu \Rightarrow \alpha_v \geq \alpha_\mu.$$

Κατ' ἀναλογία, ἡ ἀκολουθία $\alpha_n, n = 1, 2, \dots$ εἶναι μὲν *γνησίως αἰξουσα*, ἂν

$$v < \mu \Rightarrow \alpha_v < \alpha_\mu,$$

εἶναι δὲ *γνησίως φθίνουσα*, ἂν

$$v < \mu \Rightarrow \alpha_v > \alpha_\mu.$$

Π.χ. ή άκολουθία v^2 , $v = 1, 2, \dots$ είναι γνησίως αύξουσα, διότι

$$v < \mu \Rightarrow v^2 < \mu^2,$$

ένώ ή άκολουθία $\frac{1}{v}$, $v = 1, 2, \dots$ είναι γνησίως φθίνουσα, διότι

$$v < \mu \Rightarrow \frac{1}{v} > \frac{1}{\mu}.$$

1.2 Ή έννοια τής ύπακολουθίας. Έστω ή άκολουθία α_v , $v = 1, 2, \dots$ Αν

θεωρήσωμεν και τήν άκολουθίαν τών άρτίων φυσικών άριθμών $2v$, $v = 1, 2, \dots$, τότε διά διαδοχικής αντιστοιχίσεως ώς κατωτέρω

$$v \rightarrow 2v \rightarrow \alpha_{2v}$$

όρίζεται μία νέα άκολουθία α_{2v} , $v = 1, 2, \dots$, δηλαδή ή άκολουθία

$$\alpha_2, \alpha_4, \alpha_6, \dots, \alpha_{2v}, \dots$$

ή όποία άποτελείται από εκείνους τούς όρους τής α_v , $v = 1, 2, \dots$, οί όποιοί έχουν άρτιον δείκτην. Ή νέα αύτη άκολουθία καλείται *ύπακολουθία* τής α_v , $v = 1, 2, \dots$ και μάλιστα *ύπακολουθία τών άρτίων δεικτών*.

Όμοίως δύναται νά όρισθῆ και ή *ύπακολουθία τών περιττών δεικτών* τής α_v , $v = 1, 2, \dots$, ώς ή άκολουθία

$$\alpha_1, \alpha_3, \alpha_5, \dots, \alpha_{2v-1}, \dots$$

Π.χ. αν $\alpha_v = (-1)^v \frac{1}{v}$, $v = 1, 2, \dots$, τότε ή μέν ύπακολουθία τών άρτίων δεικτών είναι ή

$$\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{6}, \dots, \frac{1}{2v}, \dots$$

ή δέ ύπακολουθία τών περιττών δεικτών είναι ή

$$-1, -\frac{1}{3}, -\frac{1}{5}, \dots, -\frac{1}{2v-1}, \dots$$

Γενικώς, αν αντί τής άκολουθίας τών άρτίων ή περιττών φυσικών άριθμών θεωρήσωμεν μίαν γνησίως αύξουσαν άκολουθίαν φυσικών άριθμών k_v , $v = 1, 2, \dots$ (άρα $k_v < k_{v+1}$), τότε διά διαδοχικής αντιστοιχίσεως ώς κατωτέρω

$$v \rightarrow k_v \rightarrow \alpha_{k_v}$$

όρίζεται μία νέα άκολουθία α_{k_v} , $v = 1, 2, \dots$ (ή σύνθεσις $\alpha \circ k$ τών άκολουθιών (συναρτήσεων) k και α), δηλαδή ή άκολουθία

$$\alpha_{k_1}, \alpha_{k_2}, \alpha_{k_3}, \dots, \alpha_{k_v}, \dots$$


ή όποία καλείται *ύπακολουθία* τής α_v , $v = 1, 2, \dots$

1.3. Μηδενικαί άκολουθίαί. Έστω ή άκολουθία α_v , $v = 1, 2, \dots$ με $\alpha_v =$

$= (-1)^v \frac{1}{v}$, ήτοι ή άκολουθία

$$-1, \frac{1}{2}, -\frac{1}{3}, \dots, (-1)^v \frac{1}{v}, \dots$$

Άς θεωρήσωμεν τώρα τό διάγραμμα αύτῆς (βλ. σχ. 60), ένα θετικόν άριθμόν ε π.χ. τόν $\varepsilon = 0,4$ και τάς ευθείας με έξισώσεις $y = \varepsilon$ και $y = -\varepsilon$, αί όποίαί είναι παράλληλοι πρὸς τόν άξονα τών x και όρίζουν επί τοῦ έπιπέδου μίαν *ταινίαν*.



Σχ. 60

Παρατηρούμεν εις τὸ ἀνωτέρω σχ. 60 ὅτι τὰ σημεῖα P_1 καὶ P_2 κεῖνται ἐκτὸς τῆς ταινίας, ἐνῶ τὰ ἀπὸ τοῦ δείκτου $v = 3$ καὶ πέραν ἀντίστοιχα σημεῖα, ἦτοι τὰ σημεῖα P_3, P_4, P_5, \dots εὐρίσκονται ὅλα ἐντὸς τῆς ταινίας τῶν δύο παραλλήλων. Τοῦτο σημαίνει ὅτι αἱ τεταγμέναι τούτων, ἦτοι οἱ ὄροι $\alpha_3, \alpha_4, \alpha_5, \dots$ τῆς ἐν λόγῳ ἀκολουθίας κεῖνται εις τὸ ἀνοικτὸν διάστημα $(-\epsilon, \epsilon)$, ἦτοι

$$-\epsilon < \alpha_v < \epsilon \quad \forall v \geq v_0 = 3 \quad (\epsilon = 0,4)$$

ἢ ἰσοδυνάμως

$$|\alpha_v| < \epsilon \quad \forall v \geq v_0 = 3.$$

Ἄν τώρα λάβωμεν ἕνα ἄλλον θετικὸν ἀριθμὸν ἐ π.χ. τὸν $\epsilon = 0,16$ (μικρότερον τοῦ προηγουμένου) καὶ ἐπαναλάβωμεν τὰ ἀνωτέρω τότε καταλήγομεν εἰς τὸ συμπέρασμα ὅτι τὰ σημεῖα P_1, P_2, P_3, P_4, P_5 καὶ P_6 κεῖνται ἐκτὸς τῆς ἀντιστοίχου ταινίας, ἐνῶ τὰ σημεῖα P_7, P_8, P_9, \dots εὐρίσκονται ἐντὸς τῆς ἐν λόγῳ ταινίας, δηλαδὴ αἱ τεταγμέναι τῶν σημείων τούτων, ἦτοι οἱ ὄροι $\alpha_7, \alpha_8, \alpha_9, \dots$ τῆς ἐν λόγῳ ἀκολουθίας κεῖνται εἰς τὸ ἀνοικτὸν διάστημα $(-\epsilon, \epsilon)$, ἦτοι ἰσχύει

$$-\epsilon < \alpha_v < \epsilon \quad \forall v \geq v_0 = 7 \quad (\epsilon = 0,16)$$


ἢ ἰσοδυνάμως

$$|\alpha_v| < \epsilon \quad \forall v \geq v_0 = 7.$$


Εἰς τὸ αὐτὸ συμπέρασμα καταλήγομεν καὶ ἂν λάβωμεν ὡς ϵ οἴονδηποτε θετικὸν ἀριθμὸν, μόνον ποῦ δι' ἕκαστον ἐ ἀλλάσσει ὁ δείκτης v_0 (ἀνωτέρω εἶδομεν ὅτι διὰ $\epsilon = 0,4$ ἔχομεν ὡς v_0 τὸ 3, ἐνῶ διὰ $\epsilon = 0,16$, τὸ 7).

Τὴν ἐν λόγῳ ἀκολουθίαν, $\alpha_v, v = 1, 2, \dots$ με $\alpha_v = (-1)^v \frac{1}{v}$, ἢ ὅποια πληροῖ τὰ ἀνωτέρω, χαρακτηρίζομεν ὡς μηδενικὴν ἀκολουθίαν.

Ἀντιθέτως αἱ ἀκολουθίαι $\beta_v = (-1)^v, v = 1, 2, \dots$ καὶ $\gamma_v = \frac{1 - (-1)^v}{2}, v = 1, 2, \dots$ δὲν πληροῦν τὰ ἀνωτέρω (βλ. σχ. 61 καὶ 62) καὶ ἐπομένως δὲν δύναται νὰ χαρακτηρισθοῦν ὡς μηδενικαὶ ἀκολουθίαι.



Σχ. 61



Σχ. 62

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω ὀδηγούμεθα εἰς τὸ νὰ δώσωμεν τὸν ἑξῆς ὀρισμὸν :

Μία ἀκολουθία πραγματικῶν ἀριθμῶν $\alpha_n, n = 1, 2, \dots$ καλεῖται μηδενικὴ ἀκολουθία καὶ θὰ συμβολίζωμεν τοῦτο μὲ $\alpha_n \rightarrow 0$ ἢ καὶ ἄλλως $\lim \alpha_n = 0$ τότε καὶ μόνον τότε, ἂν διὰ κάθε $\varepsilon > 0$ ὑπάρχη δείκτης $n_0 = n_0(\varepsilon)$ (ἐξαρτώμενος ἐκ τοῦ ε) τοιοῦτος, ὥστε νὰ ἰσχύη

$$|\alpha_n| < \varepsilon \quad \forall \quad n \geq n_0.$$

Συντόμως :

$$\alpha_n \rightarrow 0 \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists n_0 = n_0(\varepsilon) : |\alpha_n| < \varepsilon \quad \forall n \geq n_0$$

Παραδείγματα :

1. Ἡ ἀκολουθία $\alpha_n = \frac{1}{n}, n = 1, 2, \dots$ εἶναι μηδενικὴ, διότι διὰ τυχόντα θετικὸν ἀριθμὸν ε ὑπάρχει δείκτης $n_0 = n_0(\varepsilon)$, καὶ ὡς τοιοῦτος δύναται ἐδῶ νὰ ληφθῆ εἰς φυσικὸς ἀριθμὸς μεγαλύτερος τοῦ $\frac{1}{\varepsilon}$, τοιοῦτος, ὥστε ἀφ' ἑνὸς μὲν

$$n \geq n_0 \Rightarrow |\alpha_n| = \frac{1}{n} \leq \frac{1}{n_0},$$

ἀφ' ἑτέρου δέ, λόγῳ τῆς ἐκλογῆς τοῦ n_0 ,

$$n_0 > \frac{1}{\varepsilon} \Rightarrow \frac{1}{n_0} < \varepsilon.$$

Ἄρα ἰσχύει $|\alpha_n| < \varepsilon \quad \forall n \geq n_0$. Ὡστε ἐδείχθη ὅτι

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 = n_0(\varepsilon) \left(\text{ἀρκεῖ νὰ ληφθῆ } n_0 > \frac{1}{\varepsilon} \right) : |\alpha_n| < \varepsilon \quad \forall n \geq n_0, \text{ ἤτοι } \alpha_n = \frac{1}{n} \rightarrow 0.$$

2. Ἡ ἀκολουθία $\alpha_n = \frac{1}{\sqrt{n}}, n = 1, 2, \dots$ εἶναι μηδενικὴ, διότι διὰ τυχόντα θετικὸν ἀριθμὸν ε ὑπάρχει δείκτης $n_0 = n_0(\varepsilon)$, καὶ ὡς τοιοῦτος δύναται νὰ ληφθῆ εἰς φυσικὸς ἀριθμὸς μεγαλύτερος τοῦ $\frac{1}{\varepsilon^2}$, τοιοῦτος, ὥστε ἀφ' ἑνὸς μὲν

$$n \geq n_0 \Rightarrow |\alpha_n| = \frac{1}{\sqrt{n}} \leq \frac{1}{\sqrt{n_0}},$$

ἀφ' ἑτέρου δέ, λόγῳ τῆς ἐκλογῆς τοῦ n_0 ,

$$n_0 > \frac{1}{\varepsilon^2} \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{n_0}} < \varepsilon.$$

*Αρα ισχύει $|\alpha_n| < \varepsilon \quad \forall \quad n \geq n_0$.

Ωστε έδειχθη ότι

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_0(\varepsilon) \left(\text{άρκει να ληφθῆ } n_0 > \frac{1}{\varepsilon^2} \right) : |\alpha_n| < \varepsilon \quad \forall \quad n \geq n_0, \text{ ἤτοι } \alpha_n = \frac{1}{\sqrt{n}} \rightarrow 0.$$

1.3.1. Ιδιότητες τῶν μηδενικῶν ἀκολουθιῶν. Γνωρίζομεν ἤδη ἐκ τῶν μαθημάτων τῆς προηγουμένης τάξεως τὰς κάτωθι ιδιότητες τῶν μηδενικῶν ἀκολουθιῶν :

1. $\alpha_n \rightarrow 0 \Leftrightarrow |\alpha_n| \rightarrow 0$

Αὕτη συνεπάγεται καὶ τὴν

$$\alpha_n \rightarrow 0 \Leftrightarrow -\alpha_n \rightarrow 0 \text{ (διατί;)}$$

2. $\alpha_n \rightarrow 0 \Rightarrow \alpha_{k_n} \rightarrow 0$,

ὅπου $k_n, n = 1, 2, \dots$ εἶναι τυχούσα ὑπακολουθία τῆς $\alpha_n, n = 1, 2, \dots$, δηλαδὴ κάθε ὑπακολουθία μηδενικῆς ἀκολουθίας εἶναι ἐπίσης μηδενικὴ ἀκολουθία.

3. $\alpha_n \rightarrow 0 \Rightarrow \alpha_n, n = 1, 2, \dots$ εἶναι φραγμένη.

Τὸ ἀντίστροφον δὲν ισχύει ὡς ἀποδεικνύεται διὰ τοῦ παραδείγματος $\alpha_n = (-1)^n$ (διατί;).

4. $\left. \begin{array}{l} \alpha_n \rightarrow 0 \\ \beta_n \rightarrow 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \alpha_n + \beta_n \rightarrow 0.$

5. $\left. \begin{array}{l} \alpha_n \rightarrow 0 \\ \beta_n, n = 1, 2, \dots \text{ φραγμένη} \end{array} \right\} \Rightarrow \alpha_n \beta_n \rightarrow 0.$

Αὕτη μετὰ τῆς ιδιότητος 3 συνεπάγονται τὴν

$$\left. \begin{array}{l} \alpha_n \rightarrow 0 \\ \beta_n \rightarrow 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \alpha_n \beta_n \rightarrow 0 \text{ (διατί;)}.$$

6. $\left. \begin{array}{l} \xi \in \mathbb{R} \\ \alpha_n \rightarrow 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \xi \alpha_n \rightarrow 0.$

Αὕτη μετὰ τῆς ιδιότητος 4 συνεπάγονται τὴν

$$\left. \begin{array}{l} \xi \in \mathbb{R}, \alpha_n \rightarrow 0 \\ \eta \in \mathbb{R}, \beta_n \rightarrow 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \xi \alpha_n + \eta \beta_n \rightarrow 0 \text{ (διατί;)}.$$

Εἰδικῶς διὰ $\xi = 1$ καὶ $\eta = -1$, προκύπτει

$$\left. \begin{array}{l} \alpha_n \rightarrow 0 \\ \beta_n \rightarrow 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \alpha_n - \beta_n \rightarrow 0.$$

7. $\left. \begin{array}{l} |\alpha_n| \leq |\beta_n| \quad \forall \quad n \in \mathbb{N} \\ \beta_n \rightarrow 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \alpha_n \rightarrow 0.$

8. $\alpha_n \rightarrow 0 \Rightarrow \sqrt{|\alpha_n|} \rightarrow 0.$

Έφαρμογαι :

1. Η ακολουθία $\alpha_n = \frac{v}{v^2 + v + 2}$, $v = 1, 2, \dots$ είναι μηδενική. Πράγματι:

$$|\alpha_n| = \frac{v}{v^2 + v + 2} \leq \frac{v}{v^2} = \frac{1}{v} \quad \forall v \in \mathbb{N}$$

και επειδή $\frac{1}{v} \rightarrow 0$ έπεται, δυνάμει της ιδιότητας 7, ότι και $\frac{v}{v^2 + v + 2} \rightarrow 0$.

2. Η ακολουθία $\alpha_n = \sqrt{v^2 + 2} - \sqrt{v^2 + 1}$, $v = 1, 2, \dots$ είναι μηδενική. Πράγματι:

$$|\alpha_n| = \sqrt{v^2 + 2} - \sqrt{v^2 + 1} = \frac{1}{\sqrt{v^2 + 2} + \sqrt{v^2 + 1}} < \frac{1}{\sqrt{v^2} + \sqrt{v^2}} = \frac{1}{2v\sqrt{v}} < \frac{1}{v} \quad \forall v \in \mathbb{N}$$

και επειδή $\frac{1}{v} \rightarrow 0$, κατά την ιδιότητα 7, είναι και η ακολουθία $\alpha_n = \sqrt{v^2 + 2} - \sqrt{v^2 + 1}$, $v = 1, 2, \dots$ μηδενική.

3. Η ακολουθία $\alpha_n = \omega^n$, $n = 1, 2, \dots$ με ω σταθερόν πραγματικόν αριθμόν και $|\omega| < 1$ είναι μηδενική. Πράγματι:

Διά $\omega = 0$ είναι προφανές.

Διά $\omega \neq 0$, έχομεν $0 < |\omega| < 1 \Rightarrow \frac{1}{|\omega|} > 1$. Άρα $\frac{1}{|\omega|} = 1 + \theta$, $\theta > 0$ και έπομένως

$$(5) \quad |\alpha_n| = |\omega|^n = \frac{1}{(1 + \theta)^n} \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Άλλά επειδή $1 + \theta > 0$ κατά την γνωστήν ανισότητα του Bernoulli

$$(1 + \theta)^n \geq 1 + n\theta$$

έχομεν

$$(1 + \theta)^n > n\theta \quad \forall n \in \mathbb{N},$$

όποτε η (5) δίδει

$$|\alpha_n| < \frac{1}{n\theta} = \frac{1}{\theta} \frac{1}{n} \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Άρα, επειδή $\frac{1}{n} \rightarrow 0$, δυνάμει τών ιδιοτήτων 6 και 7, προκύπτει ότι και η ακολουθία $\alpha_n = \omega^n$, $n = 1, 2, \dots$ ($0 < |\omega| < 1$) είναι μηδενική.

Π.χ. αι ακολουθιαί $\frac{1}{2^n}$, $n = 1, 2, \dots$, $\frac{1}{3^n}$, $n = 1, 2, \dots$ και $\frac{1}{10^n}$, $n = 1, 2, \dots$ είναι δλοι μηδενικαι ακολουθιαί.

1.4 Συγκλίνουσαι ακολουθιαί. Διά την ακολουθίαν $\alpha_n = \frac{v+1}{v}$, $v = 1, 2, \dots$ παρατηρούμεν ότι ισχύει $\alpha_n - 1 = \frac{1}{v}$, ήτοι η ακολουθία $\alpha_n - 1$, $n = 1, 2, \dots$ είναι μηδενική ακολουθία. Τούτο έκφράζομεν λέγοντες ότι η ακολουθία $\frac{v+1}{v}$, $v = 1, 2, \dots$ συγκλίνει πρὸς τὸν ἀριθμὸν 1.

Γενικῶς λέγομεν ὅτι «μία ακολουθία πραγματικῶν ἀριθμῶν α_n , $n = 1, 2, \dots$ συγκλίνει πρὸς τὸν πραγματικὸν ἀριθμὸν l » ἢ ἄλλως στείνει πρὸς τὸν πραγματικὸν ἀριθμὸν l » και συμβολίζομεν τούτο με $\alpha_n \rightarrow l$ ἢ $\lim \alpha_n = l$ τότε και μόνον τότε, ἂν ἡ ακολουθία $\alpha_n - l$, $n = 1, 2, \dots$, δηλαδή ἡ ακολουθία

$$\alpha_1 - l, \alpha_2 - l, \alpha_3 - l, \dots, \alpha_n - l, \dots$$

είναι μηδενική. Τὸν ἀριθμὸν l καλοῦμεν *ὄριον* ἢ *ὄριακὴν τιμὴν* τῆς ἀκολουθίας $\alpha_n, n = 1, 2, \dots$. Συντόμως :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = l \Leftrightarrow \alpha_n - l \rightarrow 0$$

Γνωρίζομεν ἤδη ἐκ τῶν μαθημάτων τῆς προηγουμένης τάξεως ὅτι ἡ ὄριακὴ τιμὴ ἀκολουθίας εἶναι μονοσημάντως ὠρισμένη, δηλαδὴ ἰσχύει

$$\left. \begin{array}{l} \lim \alpha_n = l_1 \\ \lim \alpha_n = l_2 \end{array} \right\} \Rightarrow l_1 = l_2 \text{ (διατί;)}.$$

1.4.1 ΘΕΩΡΗΜΑ. "Αν $\alpha_n, n = 1, 2, \dots$ εἶναι μία ἀκολουθία πραγματικῶν ἀριθμῶν, τότε αἱ κάτωθι προτάσεις εἶναι ἰσοδύναμοι.

(i) $\lim \alpha_n = l$

(ii) Διὰ κάθε $\varepsilon > 0$ ὑπάρχει δείκτης $n_0 = n_0(\varepsilon)$ (ἐξαρτώμενος ἐκ τοῦ ε) τοιοῦτος, ὥστε γὰ ἰσχύει $|\alpha_n - l| < \varepsilon$ διὰ κάθε $n \geq n_0$.

Ἀπόδειξις.* (i) \Rightarrow (ii). Πράγματι: $\lim \alpha_n = l \Rightarrow \lim (\alpha_n - l) = 0$, τὸ ὁποῖον, δυνάμει τοῦ ὀρισμοῦ τῆς μηδενικῆς ἀκολουθίας, σημαίνει ὅτι

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 = n_0(\varepsilon) : |\alpha_n - l| < \varepsilon \quad \forall n \geq n_0.$$

(ii) \Rightarrow (i). Πράγματι: δυνάμει τοῦ ὀρισμοῦ τῆς μηδενικῆς ἀκολουθίας ἡ πρότασις (ii) σημαίνει ὅτι ἡ ἀκολουθία $\alpha_n - l, n = 1, 2, \dots$ εἶναι μηδενικὴ καὶ τοῦτο συνεπάγεται τὴν (i).

Παρατήρησις. "Αν θεωρήσωμεν τὴν ἀκολουθίαν $\frac{n+1}{n}, n = 1, 2, \dots$, ἡ ὁποία, ὡς γνωστόν, συγκλίνει πρὸς τὸν ἀριθμὸν 1, τότε παρατηροῦμεν ὅτι καὶ ἡ ἀκολουθία $\frac{n+11}{n+10}, n = 1, 2, \dots$, δηλαδὴ ἡ ἀκολουθία

$$\frac{12}{11}, \frac{13}{12}, \frac{14}{13}, \dots$$

ἡ ὁποία προκύπτει ἐκ τῆς $\frac{n+1}{n}, n = 1, 2, \dots$ διὰ διαγραφῆς τῶν δέκα πρώτων ὄρων αὐτῆς,

ἐπίσης συγκλίνει καὶ μάλιστα πρὸς τὸν ἀριθμὸν 1, διότι

$$\left| \frac{n+11}{n+10} - 1 \right| = \frac{1}{n+10} < \frac{1}{n} \rightarrow 0.$$

Γενικῶς ἐκ τοῦ ὀρισμοῦ τῆς συγκλινοῦσης ἀκολουθίας συνάγεται εὐκόλως ὅτι ἡ ἰδιότης τοῦ νὰ εἶναι μία ἀκολουθία συγκλίνουσα διατηρεῖται καὶ μετὰ τὴν διαγραφὴν ἐνὸς πεπερασμένου πλήθους ὄρων αὐτῆς καὶ μάλιστα ἡ ὄριακὴ τιμὴ παραμένει ἀμετάβλητος.

1.4.2 Ἰδιότητες τῶν συγκλινουσῶν ἀκολουθιῶν. Γνωρίζομεν ἤδη ἐκ τῶν μαθημάτων τῆς προηγουμένης τάξεως τὰς κάτωθι ἰδιότητες τῶν συγκλινουσῶν ἀκολουθιῶν :

1. $\alpha_n \rightarrow l \Rightarrow |\alpha_n| \rightarrow |l|$

2. $\alpha_n \rightarrow l \Rightarrow \alpha_{kn} \rightarrow l,$

ὅπου $\alpha_{kn}, n = 1, 2, \dots$ εἶναι μία ὑπακολουθία τῆς $\alpha_n, n = 1, 2, \dots$, δηλαδὴ *κάθε ὑπακολουθία συγκλίνουσης ἀκολουθίας εἶναι ἐπίσης συγκλίνουσα ἀκολουθία μετὰ τὴν αὐτὴν ὄριακὴν τιμὴν.*

3. $\alpha_n \rightarrow l \Rightarrow \alpha_n, n = 1, 2, \dots$ είναι φραγμένη.

Τι συμπεραίνετε περί του $\tilde{\alpha}$ αντίστροφου ;

$$4. \left. \begin{array}{l} \alpha_n \rightarrow l_1 \\ \beta_n \rightarrow l_2 \end{array} \right\} \Rightarrow \alpha_n + \beta_n \rightarrow l_1 + l_2.$$

$$5. \left. \begin{array}{l} \alpha_n \rightarrow l_1 \\ \beta_n \rightarrow l_2 \end{array} \right\} \Rightarrow \alpha_n \beta_n \rightarrow l_1 l_2.$$

Αυτή συνεπάγεται την

$$\left. \begin{array}{l} \xi \in \mathbb{R} \\ \alpha_n \rightarrow l \end{array} \right\} \Rightarrow \xi \alpha_n \rightarrow \xi l \text{ (διατι;),}$$

ή όποια, δυνάμει τής (4), συνεπάγεται και την

$$\left. \begin{array}{l} \xi \in \mathbb{R}, \alpha_n \rightarrow l_1 \\ \eta \in \mathbb{R}, \beta_n \rightarrow l_2 \end{array} \right\} \Rightarrow \xi \alpha_n + \eta \beta_n \rightarrow \xi l_1 + \eta l_2.$$

Ειδικώς, διά $\xi = 1$ και $\eta = -1$, προκύπτει

$$\left. \begin{array}{l} \alpha_n \rightarrow l_1 \\ \beta_n \rightarrow l_2 \end{array} \right\} \Rightarrow \alpha_n - \beta_n \rightarrow l_1 - l_2.$$

$$6. \left. \begin{array}{l} \alpha_n \rightarrow l \neq 0 \\ \alpha_n \neq 0 \forall n \in \mathbb{N} \end{array} \right\} \Rightarrow \frac{1}{\alpha_n} \rightarrow \frac{1}{l}.$$

Αυτή μετά τής προηγούμενης ιδιότητας 5 συνεπάγονται και την

$$\left. \begin{array}{l} \alpha_n \rightarrow l_1 \neq 0 \\ \beta_n \rightarrow l_2 \\ \alpha_n \neq 0 \forall n \in \mathbb{N} \end{array} \right\} \Rightarrow \frac{\beta_n}{\alpha_n} \rightarrow \frac{l_2}{l_1}.$$

$$7. \left. \begin{array}{l} \alpha_n \rightarrow l_1 \\ \beta_n \rightarrow l_2 \\ \alpha_n \leq \beta_n \forall n \in \mathbb{N} \end{array} \right\} \Rightarrow l_1 \leq l_2.$$

$$8. \left. \begin{array}{l} \beta_n \rightarrow l \\ \gamma_n \rightarrow l \\ \beta_n \leq \alpha_n \leq \gamma_n \forall n \in \mathbb{N} \end{array} \right\} \Rightarrow \alpha_n \rightarrow l.$$

$$9. \alpha_n \rightarrow l \Rightarrow \sqrt{|\alpha_n|} \rightarrow \sqrt{|l|}.$$

Έφαρμογαι :

1. $\lim \frac{n^2 + 3n + 5}{4n^2 + 1} = \frac{1}{4}$. Πράγματι:

$$\frac{n^2 + 3n + 5}{4n^2 + 1} = \frac{n^2 \left(1 + \frac{3}{n} + \frac{5}{n^2}\right)}{n^2 \left(4 + \frac{1}{n^2}\right)} = \frac{1 + \frac{3}{n} + \frac{5}{n^2}}{4 + \frac{1}{n^2}}.$$

Αί ακολουθείται όμως $\frac{3}{v} = 3 \frac{1}{v}$, $v = 1, 2, \dots$, $\frac{1}{v^2} = \frac{1}{v} \cdot \frac{1}{v}$, $v = 1, 2, \dots$ και $\frac{5}{v^2} = 5 \frac{1}{v^2}$, $v = 1, 2, \dots$ είναι όλα μηδενικά ακολουθείται. Έπομένως

$$\lim \left(1 + \frac{3}{v} + \frac{5}{v^2} \right) = 1 + 0 + 0 = 1 \text{ και } \lim \left(4 + \frac{1}{v^2} \right) = 4 + 0 = 4.$$

*Άρα, δυνάμει τής ιδιότητας 6 τών συγκλινουσών ακολουθειών, έχουμε

$$\lim \frac{v^2 + 3v + 5}{4v^2 + 1} = \lim \frac{1 + \frac{3}{v} + \frac{5}{v^2}}{4 + \frac{1}{v^2}} = \frac{1}{4}.$$

2. $\lim \sqrt[v]{\alpha} = 1$, όπου α σταθερός θετικός αριθμός. Διακρίνομεν τας έξι περιπτώσεις :

i) $\alpha = 1$. Είναι προφανές.

ii) $\alpha > 1$. Θέτομεν $\delta_v = \sqrt[v]{\alpha} - 1$, $v = 1, 2, \dots$, όποτε άρκει νά δείξωμεν ότι $\delta_v \rightarrow 0$.

Πράγματι έχουμε $\sqrt[v]{\alpha} = 1 + \delta_v$, ήτοι

$$(6) \quad \alpha = (1 + \delta_v)^v.$$

Έπειδή $\delta_v > 0 \quad \forall v \in \mathbb{N}$, δυνάμει τής ανισότητας του Bernoulli, θά έχουμε και $(1 + \delta_v)^v \geq 1 + v\delta_v$, όποτε ή (6) δίδει

$$\alpha \geq 1 + v\delta_v > v\delta_v.$$

*Άρα

$$0 < \delta_v < \frac{\alpha}{v} \rightarrow 0,$$

τό όποιο, κατά την ιδιότητα 8 τών συγκλινουσών ακολουθειών, συνεπάγεται ότι $\delta_v \rightarrow 0$.

iii) $\alpha < 1$. Είς την περίπτωση ταύτην έχουμε $\frac{1}{\alpha} > 1$ και έπομένως, κατά την προ-

γυόμενη περίπτωση $\sqrt[v]{\frac{1}{\alpha}} \rightarrow 1$, ήτοι $\frac{1}{\sqrt[v]{\alpha}} \rightarrow 1$, τό όποιο, δυνάμει τής ιδιότητας 6 τών

συγκλινουσών ακολουθειών, συνεπάγεται ότι $\sqrt[v]{\alpha} \rightarrow \frac{1}{1} = 1$.

1.4.3 Το μονότονον και ή σύγκλιση ακολουθίας - "Ο αριθμός e. Άς θεωρήσωμεν πρώτον την ακολουθία $\frac{v-1}{v}$, $v = 1, 2, \dots$, ήτοι την

$$0, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \dots, \frac{v-1}{v}, \dots$$

και δεύτερον την ακολουθία v^2 , $v = 1, 2, \dots$, ήτοι την ακολουθία

$$1, 4, 9, 16, \dots, v^2, \dots$$

Δι' άμφοτέρας παρατηρούμεν ότι είναι αύξουσαι και μάλιστα γνησίως αύξουσαι ακολουθείται. Έκ τούτων όμως μόνον ή πρώτη, δηλαδή ή ακολουθία $\frac{v-1}{v}$, $v = 1, 2, \dots$ είναι φραγμένη (διατί;). Έπί πλέον παρατηρούμεν ότι ή ακολουθία αύτη συγκλίνει και μάλιστα $\lim \frac{v-1}{v} = 1$, ένφ άντιθέτως ή v^2 , $v = 1, 2, \dots$, ή όποία δέν είναι φραγμένη, δέν συγκλίνει πρós πραγματικόν άριθμόν (διατί;).

Τό γεγονός ότι ή αύξουσα και φραγμένη ακολουθία $\frac{v-1}{v}$, $v = 1, 2, \dots$

συγκλίνει πρὸς πραγματικὸν ἀριθμὸν δεχόμεθα ὅτι ἰσχύει γενικῶς διὰ κάθε αὐ-
 Ξουσα καὶ φραγμένη ἀκολουθία. Ἀκριβέστερον δεχόμεθα τὸ ἀκόλουθον ἄξιωμα

Ἄξιωμα. Ἐάν $\alpha_n, n=1, 2, \dots$ εἶναι μία μονότονος καὶ φραγμένη ἀκολουθία πρα-
 γματικῶν ἀριθμῶν, τότε αὕτη συγκλίνει πρὸς κάποιον πραγματικὸν ἀριθμὸν

Ὁ ἀριθμὸς ε. Θεωροῦμεν τὰς ἀκολουθίας $\alpha_n, n=1, 2, \dots$ καὶ $\beta_n, n=1, 2, \dots$
 ὅπου

$$\alpha_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \quad \text{καὶ} \quad \beta_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}$$

διὰ τὰς ὁποίας κατὰ πρῶτον θὰ ἀποδείξωμεν ὅτι εἶναι γνησίως μονότονοι καὶ
 μάλιστα ἢ μὲν $\alpha_n, n=1, 2, \dots$ (γνησίως) αὐξουσα, ἢ δὲ $\beta_n, n=1, 2, \dots$ (γνησίως)
 φθίνουσα.

Διὰ τὴν ἀκολουθίαν $\beta_n, n=1, 2, \dots$ ἔχομεν

$$\begin{aligned} \frac{\beta_n}{\beta_{n+1}} &= \frac{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}}{\left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+2}} = \left(\frac{1 + \frac{1}{n}}{1 + \frac{1}{n+1}}\right)^{n+1} \cdot \frac{1}{1 + \frac{1}{n+1}} = \frac{(n+1)^2}{n(n+2)} \cdot \frac{n+1}{n+2} = \\ &= \left(1 + \frac{1}{n(n+2)}\right)^{n+1} \cdot \frac{n+1}{n+2} > \left(1 + \frac{n+1}{n(n+2)}\right) \frac{n+1}{n+2} > \left(1 + \frac{1}{n+1}\right) \frac{n+1}{n+2} = 1 \end{aligned}$$

ὅπου διὰ τὴν πρώτην ἀνισότητα ἐχρησιμοποιήθη ἡ ἀνισότης τοῦ Bernoulli
 $(1+\omega)^{n+1} > 1+(n+1)\omega$.

Ἄρα $\beta_{n+1} < \beta_n \quad \forall n \in \mathbb{N}$

τὸ ὁποῖον σημαίνει ὅτι ἡ ἀκολουθία $\beta_n, n=1, 2, \dots$ εἶναι γνησίως φθίνουσα.
 Ἀκολουθῶς, λαμβάνοντες ὑπ' ὄψιν καὶ τὴν μονοτονίαν τῆς $\beta_n, n=1, 2, \dots$,
 συμπεραίνομεν ὅτι ἡ ἀκολουθία $\alpha_n, n=1, 2, \dots$ εἶναι γνησίως αὐξουσα, καθόσον
 διὰ τυχόντα φυσικὸν ἀριθμὸν n ἔχομεν

$$\begin{aligned} \frac{\alpha_{n+1}}{\alpha_n} &= \frac{\left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1}}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} = \left(\frac{1 + \frac{1}{n+1}}{1 + \frac{1}{n}}\right)^{n+1} \left(1 + \frac{1}{n}\right) = \left(\frac{n(n+2)}{(n+1)^2}\right)^{n+1} \cdot \left(1 + \frac{1}{n}\right) \\ &= \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n(n+2)}\right)^{n+1}} \left(1 + \frac{1}{n}\right) = \left[\frac{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}}{\left(1 + \frac{1}{n(n+2)}\right)^{n(n+2)+1}}\right]^{\frac{1}{n+1}} = \left[\frac{\beta_n}{\beta_{n(n+2)}}\right]^{\frac{1}{n+1}} > 1 \end{aligned}$$

δηλαδή

$$\alpha_n < \alpha_{n+1} \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω εἶναι προφανές ὅτι διὰ κάθε φυσικὸν ἀριθμὸν n ἰσχύει

$$2 = \alpha_1 \leq \alpha_n < \beta_n \leq \beta_1 = 4$$

καὶ ἐπομένως, λόγῳ τῆς μονοτονίας τῶν ἀκολουθιῶν $\alpha_n, n=1, 2, \dots$ καὶ $\beta_n,$
 $n=1, 2, \dots$, δυνάμει καὶ τοῦ ἀνωτέρω ἀξιώματος, λαμβάνομεν ὅτι ἀμφότεραι
 αὐτὰ ἀκολουθία εἶναι συγκλίνουσαι, ὁπότε θὰ ἰσχύη

$$2 \leq \lim \alpha_n \leq \lim \beta_n \leq 4.$$

Ἐπί πλέον ἔχομεν

$$\lim_{\nu \rightarrow \infty} \frac{\beta_{\nu}}{\alpha_{\nu}} = \lim_{\nu \rightarrow \infty} \frac{\beta_{\nu}}{\alpha_{\nu}} = \lim_{\nu \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{\nu}\right) = 1 + \lim_{\nu \rightarrow \infty} \frac{1}{\nu} = 1,$$

δηλαδή

$$\lim \alpha_{\nu} = \lim \beta_{\nu}.$$

Τὴν κοινὴν ὀριακὴν τιμὴν τῶν ἀκολουθιῶν α_{ν} , $\nu=1, 2, \dots$ καὶ β_{ν} , $\nu=1, 2, \dots$ παριστῶμεν μὲ e , ἥτοι

$$e = \lim_{\nu \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{\nu}\right)^{\nu} = \lim_{\nu \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{\nu}\right)^{\nu+1}.$$

Προφανῶς διὰ κάθε φυσικὸν ἀριθμὸν ν ἰσχύει

$$\left(1 + \frac{1}{\nu}\right)^{\nu} < e < \left(1 + \frac{1}{\nu}\right)^{\nu+1}.$$

Παρατήρησις. Ἀποδεικνύεται ὅτι ὁ ἀριθμὸς e εἶναι ἄρρητος. Μία προσέγγι-
σις αὐτοῦ μὲ τρία δεκαδικὰ ψηφία δίδεται ὑπὸ τοῦ ἀριθμοῦ 2,718, ἥτοι

$$e \approx 2,718$$

2. ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ $+\infty$ καὶ $-\infty$. ΕΠΙΤΡΕΠΤΑΙ ΚΑΙ ΜΗ ΠΡΑΞΕΙΣ

2.1 Τὰ σύμβολα $+\infty$ καὶ $-\infty$. Μία μὴ φραγμένη ἀκολουθία πραγμα-
τικῶν ἀριθμῶν α_{ν} , $\nu=1, 2, \dots$ δὲν συγκλίνει πρὸς πραγματικὸν ἀριθμὸν, διότι
ἄλλως, δηλαδή ἂν αὕτη συνέκλινε πρὸς πραγματικὸν ἀριθμὸν, τότε, κατὰ τὴν
ιδιότητα 3 τῶν συγκλινουσῶν ἀκολουθιῶν, θὰ ἦτο φραγμένη, ὅπερ ἄτοπον.
Εἰς τὴν περίπτωσιν, ὅπου ἡ μὴ φραγμένη ἀκολουθία α_{ν} , $\nu=1, 2, \dots$ εἶναι καὶ
αὐξουσα, ὡς π.χ. ἡ ν^2 , $\nu=1, 2, \dots$, λέγομεν ὅτι αὕτη «ἀπειρίζεται θετικῶς» ἢ
«συγκλίνει πρὸς τὸ $+\infty$ » ἢ ἀκόμη «τείνει πρὸς τὸ $+\infty$ » (τὸ σύμβολον $+\infty$
ἀναγινώσκεται «σὺν ἄπειρον»).

Εἰς τὴν περίπτωσιν αὐξούσης καὶ μὴ φραγμένης ἀκολουθίας α_{ν} , $\nu=1, 2, \dots$,
δηλαδή ἀπειριζομένης θετικῶς ἀκολουθίας, ἂν ε εἶναι εἰς θετικὸς ἀριθμὸς, τότε
ὑπάρχει δείκτης $\nu_0 = \nu_0(\varepsilon)$ τοιοῦτος, ὥστε νὰ ἰσχύη

$$(7) \quad \alpha_{\nu_0} > \frac{1}{\varepsilon}.$$

Πράγματι· ἂν τοῦτο δὲν ἴσχυε, τότε θὰ ἦτο

$$\alpha_{\nu} \leq \frac{1}{\varepsilon} \quad \forall \nu \in \mathbb{N}$$

καὶ ἐπειδὴ ἡ α_{ν} , $\nu=1, 2, \dots$ εἶναι αὐξουσα,

$$\alpha_1 \leq \alpha_{\nu} \leq \frac{1}{\varepsilon} \quad \forall \nu \in \mathbb{N},$$

τὸ ὁποῖον σημαίνει ὅτι ἡ α_{ν} , $\nu=1, 2, \dots$ θὰ ἦτο φραγμένη, ὅπερ ἄτοπον.

Τώρα, λόγῳ τοῦ ὅτι ἡ α_{ν} , $\nu=1, 2, \dots$ εἶναι αὐξουσα, ἔχομεν

$$\nu \geq \nu_0 \Rightarrow \alpha_{\nu} \geq \alpha_{\nu_0}$$

καὶ δυνάμει τῆς (7),

$$\nu \geq \nu_0 \Rightarrow \alpha_{\nu} > \frac{1}{\varepsilon}.$$

Ὡστε ἐδείχθη ὅτι διὰ τὴν αὐξουσὴν καὶ μὴ φραγμένην ἀκολουθίαν α_n , $n = 1, 2, \dots$ ἰσχύει :

Διὰ τυχόντα θετικὸν ἀριθμὸν ε , δηλαδὴ διὰ κάθε $\varepsilon > 0$, ὑπάρχει δείκτης $n_0 = n_0(\varepsilon)$ τοιοῦτος, ὥστε νὰ ἰσχύη

$$\alpha_n > \frac{1}{\varepsilon} \quad \forall n \geq n_0.$$

Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω εἶναι πλέον φυσικὸν νὰ δώσωμεν τὸν κάτωθι γενικὸν ὀρισμὸν περὶ τῆς συγκλίσεως ἀκολουθίας πραγματικῶν ἀριθμῶν πρὸς τὸ $+\infty$.

Θὰ λέγωμεν ὅτι : ἡ ἀκολουθία πραγματικῶν ἀριθμῶν α_n , $n = 1, 2, \dots$ «ἀπειρίζεται θετικῶς» ἢ ἄλλως «συγκλίνει πρὸς τὸ $+\infty$ » ἢ ἀκόμη «τείνει πρὸς τὸ $+\infty$ », καὶ θὰ συμβολίζωμεν τοῦτο μὲ $\alpha_n \rightarrow +\infty$ ἢ $\lim \alpha_n = +\infty$, τότε καὶ μόνον τότε, ἂν διὰ κάθε $\varepsilon > 0$ ὑπάρχη δείκτης $n_0 = n_0(\varepsilon)$ (ἐξαρτώμενος ἐκ τοῦ ε) τοιοῦτος, ὥστε νὰ ἰσχύη $\alpha_n > \frac{1}{\varepsilon}$ διὰ κάθε $n \geq n_0$. Συντόμως :

$$\lim \alpha_n = +\infty \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists n_0 = n_0(\varepsilon) : \alpha_n > \frac{1}{\varepsilon} \quad \forall n \geq n_0$$

Παραδείγματα :

1. Ἡ ἀκολουθία τῶν φυσικῶν ἀριθμῶν n , $n = 1, 2, \dots$ ἀπειρίζεται θετικῶς, ἥτοι $n \rightarrow +\infty$ (διατί;).

2. Ἡ ἀκολουθία $n^2 + 1$, $n = 1, 2, \dots$, δηλαδὴ ἡ ἀκολουθία $2, 5, 10, \dots, n^2 + 1, \dots$ ἀπειρίζεται θετικῶς. Πράγματι διὰ τυχόντα θετικὸν ἀριθμὸν ε ἀρκεῖ νὰ ληφθῇ ὡς $n_0 = n_0(\varepsilon)$ εἰς φυσικὸς ἀριθμὸς μεγαλύτερος τοῦ $\frac{1}{\varepsilon}$, ὅποτε, ἐπειδὴ $n^2 + 1 > n$, θὰ ἔχωμεν

$$n^2 + 1 > n \geq n_0 > \frac{1}{\varepsilon} \quad \forall n \geq n_0.$$

Ὡστε : διὰ κάθε $\varepsilon > 0$ ὑπάρχει δείκτης $n_0 = n_0(\varepsilon)$ (ἀρκεῖ νὰ ληφθῇ ὡς τοιοῦτος εἰς φυσικὸς ἀριθμὸς μεγαλύτερος τοῦ $\frac{1}{\varepsilon}$) τοιοῦτος, ὥστε

$$n^2 + 1 > \frac{1}{\varepsilon} \quad \forall n \geq n_0,$$

ἥτοι $n^2 + 1 \rightarrow +\infty$.

Ἡ ἀκολουθία $-n^2$, $n = 1, 2, \dots$, δηλαδὴ ἡ ἀκολουθία $-1, -4, -9, \dots, -n^2, \dots$

εἶναι προφανῶς φθίνουσα καὶ μὴ φραγμένη. Κατ' ἀναλογίαν πρὸς τὰ ἀνωτέρω, θὰ ἠδυνάμεθα νὰ εἴπωμεν ὅτι αὕτη ἀπειρίζεται ἀρνητικῶς. Ἄξιζει νὰ παρατηρήσωμεν ἐδῶ ὅτι ἡ ἀντίθετος ἀκολουθία, δηλαδὴ ἡ $-(-n^2)$, $n = 1, 2, \dots$ ἀπειρίζεται θετικῶς.

Γενικῶς θὰ λέγωμεν ὅτι : ἡ ἀκολουθία πραγματικῶν ἀριθμῶν α_n , $n = 1, 2, \dots$ «ἀπειρίζεται ἀρνητικῶς» ἢ ἄλλως «συγκλίνει πρὸς τὸ $-\infty$ » ἢ ἀκόμη «τείνει

πρὸς τὸ $-\infty$ » καὶ θὰ συμβολίζωμεν τοῦτο μὲ $\alpha_n \rightarrow -\infty$ ἢ $\lim \alpha_n = -\infty$ (τὸ σύμβολον $-\infty$ ἀναγινώσκεται «πλὴν ἄπειρον»)· τότε καὶ μόνον τότε, ἂν ἡ ἀντίθετος ἀκολουθία $-\alpha_n, n = 1, 2, \dots$ ἀπειρίζεται θετικῶς. Συντόμως :

$$\lim \alpha_n = -\infty \iff \lim (-\alpha_n) = +\infty$$

Ἴσχύουν τὰ κάτωθι θεωρήματα :

2.1.1 ΘΕΩΡΗΜΑ. Ἡ ἀκολουθία πραγματικῶν ἀριθμῶν $\alpha_n, n = 1, 2, \dots$ ἀπειρίζεται ἀρνητικῶς τότε καὶ μόνον τότε, ἂν διὰ κάθε $\varepsilon > 0$ ὑπάρξῃ δείκτης $n_0 = n_0(\varepsilon)$ (ἐξαρτώμενος ἐκ τοῦ ε) τοιοῦτος, ὥστε νὰ ἰσχύῃ

$$\alpha_n < -\frac{1}{\varepsilon} \quad \forall n \geq n_0.$$

Ἀπόδειξις. $\lim \alpha_n = -\infty \iff \lim (-\alpha_n) = +\infty \iff \forall \varepsilon > 0 \exists n_0 = n_0(\varepsilon) : -\alpha_n > \frac{1}{\varepsilon} \quad \forall n \geq n_0 \iff \forall \varepsilon > 0 \exists n_0 = n_0(\varepsilon) : \alpha_n < -\frac{1}{\varepsilon} \quad \forall n \geq n_0.$

2.1.2 ΘΕΩΡΗΜΑ. Ἐστῶσαν αἱ ἀκολουθίαι $\alpha_n, n = 1, 2, \dots$ καὶ $\beta_n, n = 1, 2, \dots$ μὲ $\alpha_n \leq \beta_n$ διὰ κάθε $n \in \mathbb{N}$. Τότε ἰσχύουν :

$$\lim \alpha_n = +\infty \Rightarrow \lim \beta_n = +\infty$$

καὶ

$$\lim \beta_n = -\infty \Rightarrow \lim \alpha_n = -\infty$$

Ἀπόδειξις. $\lim \alpha_n = +\infty \Rightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists n_0 = n_0(\varepsilon) : \alpha_n > \frac{1}{\varepsilon} \quad \forall n \geq n_0$
καὶ τοῦτο μετὰ τῆς $\alpha_n \leq \beta_n \quad \forall n \in \mathbb{N}$ συνεπάγονται ὅτι

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 = n_0(\varepsilon) : \beta_n > \frac{1}{\varepsilon} \quad \forall n \geq n_0 \Rightarrow \lim \beta_n = +\infty.$$

Ὡστε ἐδείχθη ὅτι : $\lim \alpha_n = +\infty \Rightarrow \lim \beta_n = +\infty$, ἐκ τοῦ ὁποῦ εὐκόλως ἐξάγεται (πῶς;) καὶ ὅτι $\lim \beta_n = -\infty \Rightarrow \lim \alpha_n = -\infty$.

Ἐς εἶδομεν ἀνωτέρω εἰς τὸ παράδειγμα 2, ἡ ἀκολουθία $n^2 + 1, n = 1, 2, \dots$ ἀπειρίζεται θετικῶς. Τοῦτο δυνάμεθα πλεόν νὰ συμπεράνωμεν ἀμέσως, δυνάμει τοῦ ἀνωτέρω θεωρήματος, τῆς σχέσεως $n < n^2 + 1 \quad \forall n \in \mathbb{N}$ καὶ τοῦ ὅτι $n \rightarrow +\infty$. Ὁμοίως ἐκ τοῦ ἀνωτέρω θεωρήματος συνάγονται εὐκόλως ὅτι $n^2 - n + 1 \rightarrow +\infty, -n^3 \rightarrow -\infty$ καὶ $-n^2 + 2n - 2 \rightarrow -\infty$.

2.1.3 Τὰ σύμβολα $-\infty, +\infty$ καὶ ἡ διάταξις τῶν πραγματικῶν ἀριθμῶν. Ὡς γνωστὸν διὰ συγκλινοῦσας ἀκολουθίας πραγματικῶν ἀριθμῶν ἰσχύει (§ 1.4.2, ἰδιότητος 7)

$$\left. \begin{array}{l} \lim \alpha_n = l_1, l_1 \in \mathbb{R} \\ \lim \beta_n = l_2, l_2 \in \mathbb{R} \\ \alpha_n \leq \beta_n \quad \forall n \in \mathbb{N} \end{array} \right\} \Rightarrow l_1 \leq l_2,$$

τὸ ὁποῖον παίζει σπουδαῖον ρόλον εἰς τὴν τεχνικὴν τῶν ἀποδείξεων πολλῶν θεωρημάτων τῆς μαθηματικῆς ἀναλύσεως. Διὰ τὸν λόγον αὐτὸν θὰ ὀρίσωμεν διάταξιν εἰς τὸ σύνολον $\mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$ εἰς τρόπον, ὥστε νὰ ἰσχύῃ τὸ ἀνω-

τέρω και εις τὰς περιπτώσεις, όπου ή μία ή και αί δύο όριακαι τιμαί l_1, l_2 είναι εν τών συμβόλων $-\infty$ και $+\infty$. Πράγματι· αν δεχθώμεν τούτο, θά έχωμεν

$$\left. \begin{array}{l} \lim \alpha_n = l, l \in \mathbb{R} \\ \lim \beta_n = +\infty \\ \alpha_n \leq \beta_n \quad \forall n \in \mathbb{N} \end{array} \right\} \Rightarrow l \leq +\infty$$

και έπειδή, έξ όρισμοϋ, τό $+\infty$ δέν είναι πραγματικός αριθμός θά πρέπει νά όρίσωμεν

$$l < +\infty \quad \forall l \in \mathbb{R}$$

Όμοίως οδηγούμεθα εις τό νά όρίσωμεν

$$-\infty < l \quad \forall l \in \mathbb{R} \quad \text{και} \quad -\infty < +\infty$$

2.2 * Έπιτρεπται και μη πράξεις μεταξύ τών συμβόλων $-\infty, +\infty$ και τών πραγματικών αριθμών. Εις τό σύνολον $\mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$ δύναται νά όρισθούν, ως μερικαι πράξεις, ή πρόσθεσις και ό πολλαπλασιασμός (ως έπίσης ή αφαιρέσις και ή διαίρεισις) εις τρόπον, ώστε νά μη οδηγούμεθα εις αντίφάσεις εις τὰς ήδη γνωστάς ιδιότητες τών όριακών τιμών. Αί πράξεις αϋται όρίζονται ως επέκτάσεις τών αντίστοιχών πράξεων εις τό \mathbb{R} . Πριν προχωρήσωμεν εις τόν όρισμόν τών πράξεων τούτων θά αποδείξωμεν τήν ακόλουθον ιδιότητα:

$$\left. \begin{array}{l} \alpha_n \rightarrow +\infty \\ \beta_n \rightarrow x, x \in \mathbb{R} \end{array} \right\} \Rightarrow \alpha_n + \beta_n \rightarrow +\infty.$$

Έν πρώτοις παρατηρούμεν ότι, δυνάμει τής ιδιότητος 3 τής § 1.4.2, ή ακολουθία β_n είναι φραγμένη, δηλαδή υπάρχει πραγματικός αριθμός θ τοιοϋτος, ώστε $|\beta_n| \leq \theta$ διά κάθε $n \in \mathbb{N}$, ήτοι

$$(8) \quad -\theta \leq \beta_n \leq \theta \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Έστω τώρα τυχόν θετικός αριθμός ϵ και έστω $\epsilon^* = \frac{\epsilon}{1 + \theta\epsilon}$, όποτε

$$\alpha_n \rightarrow +\infty \Rightarrow \exists n_0 = n_0(\epsilon^*): \alpha_n > \frac{1}{\epsilon^*} \quad \forall n \geq n_0.$$

Έπομένως, δυνάμει τής (8), θά έχωμεν και

$$\alpha_n + \beta_n > \frac{1}{\epsilon^*} - \theta = \frac{1 + \theta\epsilon}{\epsilon} - \theta = \frac{1}{\epsilon} \quad \forall n \geq n_0.$$

Όστε έδειχθη ότι

$\forall \epsilon > 0 \exists n_0$ (έξαρτώμενον έκ τοϋ ϵ^* , άρα και έκ τοϋ ϵ): $\alpha_n + \beta_n > \frac{1}{\epsilon} \quad \forall n \geq n_0$, ήτοι ότι $\alpha_n + \beta_n \rightarrow +\infty$.

Τη βοηθειά τής άνωτέρω αποδειχθείσης ιδιότητος δυνάμεθα νά δικαιολογήσωμεν ως έπιτρεπτήν τήν πράξιν $+\infty + x$ ως έπίσης και τήν $x + (+\infty)$ (διότι $\alpha_n + \beta_n \rightarrow +\infty \Leftrightarrow \beta_n + \alpha_n \rightarrow +\infty$) και μάλιστα νά όρίσωμεν

$$+\infty + x = x + (+\infty) = +\infty.$$

Κατ' αναλογίαν πρὸς τὰ άνωτέρω στηριζόμενοι επί ιδιοτήτων τών ακολουθιῶν δυνάμεθα νά όρίσωμεν τὰς διαφόρους έπιτρεπτάς πράξεις ως κατωτέρω:

Ἰδιότητες

Ἐπιτρεπταὶ πράξεις

$$\left. \begin{array}{l} \alpha_v \rightarrow +\infty \\ \beta_v \rightarrow x, x \in \mathbb{R} \end{array} \right\} \Rightarrow \alpha_v + \beta_v \rightarrow +\infty$$

$$+\infty + x = x + (+\infty) = +\infty \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

$$\left. \begin{array}{l} \alpha_v \rightarrow -\infty \\ \beta_v \rightarrow x, x \in \mathbb{R} \end{array} \right\} \Rightarrow \alpha_v + \beta_v \rightarrow -\infty \text{ (διατί;)}$$

$$(-\infty) + x = x + (-\infty) = -\infty \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

$$\left. \begin{array}{l} \alpha_v \rightarrow +\infty \\ \beta_v \rightarrow +\infty \end{array} \right\} \Rightarrow \alpha_v + \beta_v \rightarrow +\infty \text{ (διατί;)}$$

$$+\infty + (+\infty) = +\infty$$

$$\left. \begin{array}{l} \alpha_v \rightarrow -\infty \\ \beta_v \rightarrow -\infty \end{array} \right\} \Rightarrow \alpha_v + \beta_v \rightarrow -\infty \text{ (διατί;)}$$

$$-\infty + (-\infty) = -\infty$$

$$\alpha_v \rightarrow -\infty \Rightarrow (-\alpha_v) \rightarrow +\infty \text{ (ἔξ ὀρισμοῦ)}$$

$$-(-\infty) = +\infty$$

$$\alpha_v \rightarrow +\infty \Rightarrow (-\alpha_v) \rightarrow -\infty$$

$$-(+\infty) = -\infty$$

$$\left. \begin{array}{l} \alpha_v \rightarrow +\infty \\ \beta_v \rightarrow x, x > 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \alpha_v \beta_v \rightarrow +\infty \text{ (διατί;)}$$

$$(+\infty)x = x(+\infty) = +\infty \quad \forall x > 0, \\ \text{ἄρα } (+\infty)(+\infty) = +\infty$$

$$\left. \begin{array}{l} \alpha_v \rightarrow -\infty \\ \beta_v \rightarrow x, x > 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \alpha_v \beta_v \rightarrow -\infty \text{ (διατί;)}$$

$$(-\infty)x = x(-\infty) = -\infty \quad \forall x > 0, \\ \text{ἄρα } (-\infty)(+\infty) = (+\infty)(-\infty) = -\infty$$

$$\left. \begin{array}{l} \alpha_v \rightarrow +\infty \\ \beta_v \rightarrow x, x < 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \alpha_v \beta_v \rightarrow -\infty \text{ (διατί;)}$$

$$(+\infty)x = x(+\infty) = -\infty \quad \forall x < 0, \\ \text{ἄρα } (+\infty)(-\infty) = (-\infty)(+\infty) = -\infty$$

$$\left. \begin{array}{l} \alpha_v \rightarrow -\infty \\ \beta_v \rightarrow x, x < 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \alpha_v \beta_v \rightarrow +\infty \text{ (διατί;)}$$

$$(-\infty)x = x(-\infty) = +\infty \quad \forall x < 0, \\ \text{ἄρα } (-\infty)(-\infty) = +\infty$$

$$\left. \begin{array}{l} \alpha_v \rightarrow x, x \in \mathbb{R} \\ \beta_v \rightarrow +\infty \\ \beta_v \neq 0 \quad \forall v \in \mathbb{N} \end{array} \right\} \Rightarrow \frac{\alpha_v}{\beta_v} \rightarrow 0 \text{ (διατί;)}$$

$$\frac{x}{+\infty} = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

$$\left. \begin{array}{l} \alpha_v \rightarrow x, x \in \mathbb{R} \\ \beta_v \rightarrow -\infty \\ \beta_v \neq 0 \quad \forall v \in \mathbb{N} \end{array} \right\} \Rightarrow \frac{\alpha_v}{\beta_v} \rightarrow 0 \text{ (διατί;)}$$

$$\frac{x}{-\infty} = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω ἐπιτρεπτῶν πράξεων συνάγεται ὅτι καὶ ἡ πράξις $+\infty - (-\infty)$, δηλαδὴ ἡ $+\infty + (-(-\infty))$ εἶναι ἐπιτρεπτή, διότι $-(-\infty) = +\infty$ καὶ ἔπομένως $+\infty - (-\infty) = +\infty + (+\infty) = +\infty$. Ὡστε $+\infty - (-\infty) = +\infty$. Ὁμοίως συνάγεται καὶ $-\infty - (+\infty) = -\infty$.

Ἀντιθέτως ἡ πράξις $+\infty - (+\infty)$ δὲν ὀρίζεται ὡς ἐπιτρεπτή, διότι ἂν $\alpha_v \rightarrow +\infty$ καὶ $\beta_v \rightarrow +\infty$, τότε ἡ ἀκολουθία $\alpha_v - \beta_v$, $v = 1, 2, \dots$ δὲν συγκλίνει πάντοτε πρὸς τὸ μηδὲν ἢ ἄλλον μονοσημάντως ὠρισμένον ἀριθμὸν ἢ ἀκόμη πρὸς ἓν τῶν συμβόλων $-\infty, +\infty$. Πράγματι· ἀρκεῖ νὰ λάβωμεν ἀφ' ἑνὸς μὲν $\alpha_v = v^2 + v \rightarrow +\infty$ καὶ $\beta_v = v^2 \rightarrow +\infty$, ὁπότε $\alpha_v - \beta_v = v \rightarrow +\infty$,

άφ' ἑτέρου δὲ $\alpha_n = n^2 + \frac{1}{n} \rightarrow +\infty$ καὶ $\beta_n = n^2 \rightarrow +\infty$, ὁπότε $\alpha_n - \beta_n = \frac{1}{n} \rightarrow 0$.

Κατ' ἀναλογίαν, δὲν ὀρίζονται ὡς ἐπιτρεπταὶ καὶ αἱ κάτωθι πράξεις (διατί;).

Μὴ ἐπιτρεπταὶ πράξεις

$$+\infty - (+\infty), \quad -\infty + (+\infty), \quad 0(+\infty), \quad 0(-\infty), \quad (+\infty)0, \quad (-\infty)0, \quad \frac{+\infty}{+\infty}$$

$$\frac{-\infty}{-\infty}, \quad \frac{+\infty}{-\infty}, \quad \frac{-\infty}{+\infty}, \quad \frac{+\infty}{0}, \quad \frac{-\infty}{0}, \quad \frac{0}{0} \quad \text{καὶ} \quad \frac{\alpha}{0}, \quad \alpha \in \mathbb{R}.$$

2.3 Γενικὴ παρατήρησις. Ἡ παράστασις $\frac{\mu+1}{\mu\nu}$, ὅπου μ καὶ ν φυσικοὶ ἀριθμοί, διὰ μὲν μ σταθερὸν ὀρίζει μίαν ἀκολουθίαν τὴν $\alpha_\nu = \frac{\mu+1}{\mu\nu}$, $\nu = 1, 2, \dots$, ἥτοι τὴν

$$\frac{\mu+1}{\mu}, \frac{\mu+1}{2\mu}, \frac{\mu+1}{3\mu}, \dots, \frac{\mu+1}{\nu\mu}, \dots,$$

ἢ ὅποια συγκλίνει καὶ μάλιστα $\lim \alpha_\nu = \lim \frac{\mu+1}{\mu\nu} = 0$.

Ἄν ὁμως θεωρήσωμεν τὸ ν σταθερὸν, τότε ἡ παράστασις $\frac{\mu+1}{\mu\nu}$ ὀρίζει μίαν ἄλλην ἀκολουθίαν τὴν $\beta_\mu = \frac{\mu+1}{\mu\nu}$, $\mu = 1, 2, \dots$, ἥτοι τὴν

$$\frac{2}{\nu}, \frac{3}{2\nu}, \frac{4}{3\nu}, \dots, \frac{\mu+1}{\mu\nu}, \dots,$$

ἢ ὅποια ἐπίσης συγκλίνει καὶ μάλιστα $\lim \beta_\mu = \lim \frac{\mu+1}{\mu\nu} = \frac{1}{\nu}$.

Πρὸς διάκρισιν τοῦ ποίαν ἀκολουθίαν ἐκ τῶν α_ν , $\nu = 1, 2, \dots$ ἢ β_μ , $\mu = 1, 2, \dots$ θεωροῦμεν εἰς τὸ $\lim \frac{\mu+1}{\mu\nu}$, γράφομεν ἄφ' ἑνὸς μὲν $\lim_{\nu} \frac{\mu+1}{\mu\nu}$ διὰ τὴν πρῶτην περίπτωσιν, δηλαδὴ διὰ τὴν ἀκολουθίαν α_ν , $\nu = 1, 2, \dots$, ἄφ' ἑτέρου δὲ $\lim_{\mu} \frac{\mu+1}{\mu\nu}$ διὰ τὴν περίπτωσιν τῆς ἀκολουθίας β_μ , $\mu = 1, 2, \dots$. Ὡστε ἔχομεν

$$\lim_{\nu} \frac{\mu+1}{\mu\nu} = 0 \quad \text{καὶ} \quad \lim_{\mu} \frac{\mu+1}{\mu\nu} = \frac{1}{\nu}.$$

Γράφομεν ἐπίσης ἰσοδυνάμως καὶ

$$\frac{\mu+1}{\mu\nu} \xrightarrow{\nu} 0, \quad \frac{\mu+1}{\mu\nu} \xrightarrow{\mu} \frac{1}{\nu}.$$

Ἄντι τῶν συμβόλων $\lim_{\nu} \eta$ ἢ $\xrightarrow{\nu}$ χρησιμοποιοῦνται ἐπίσης καὶ τὰ σύμβολα $\lim_{\nu \rightarrow \infty}$ ἢ $\xrightarrow{\nu \rightarrow \infty}$. Ἐπομένως δυνάμεθα νὰ γράψωμεν ἰσοδυνάμως

$$\lim_{\nu \rightarrow \infty} \frac{\mu+1}{\mu\nu} = 0, \quad \lim_{\mu \rightarrow \infty} \frac{\mu+1}{\mu\nu} = \frac{1}{\nu}$$

ἢ ἀκόμη

$$\frac{\mu+1}{\mu\nu} \xrightarrow{\nu \rightarrow \infty} 0, \quad \frac{\mu+1}{\mu\nu} \xrightarrow{\mu \rightarrow \infty} \frac{1}{\nu}.$$

3. ΑΣΚΗΣΕΙΣ

3.1 Ποιαί εκ τών ακολουθιών α_n , $n = 1, 2, \dots$, αί όποιαί όρίζονται ύπό τών κάτωθι τύπων είναι φραγμέναί και ποιαί δέν είναι ;

$$1) \alpha_n = \frac{n + 100}{n + 10}$$

$$2) \alpha_n = \frac{n^2 + 20}{n + 100}$$

$$3) \alpha_n = \frac{n\eta\mu 5n}{n^2 + 1}$$

$$4) \alpha_n = \frac{n^3 + \eta\mu n}{n}$$

$$5) \alpha_n = \frac{n}{2^n}$$

$$6) \alpha_n = \frac{n^2}{2n + \eta\mu 2n}$$

3.2 Ποιαί εκ τών ακολουθιών πής προηγουμένης άσκήσεως είναι μονότονοι και ποιαί δέν είναι ; Καθορίσατε και τó είδος μονοτονίας διά τás μονοτόνους έξ αυτών.

3.3 Δώσατε τρεις διαφόρους ύπακολουθίας δι' εκάστην εκ τών εις τήν άσκησιν 3.1 ακολουθιών.

3.4 Δείξατε ότι αί ακολουθίαί α_n , $n = 1, 2, \dots$, αί όποιαί όρίζονται ύπό τών κάτωθι τύπων είναι όλαι μηδενικάί

$$1) \alpha_n = \frac{n}{n^3 + 5n + 2}$$

$$2) \alpha_n = \sqrt{n+5} - \sqrt{n}$$

$$3) \alpha_n = \frac{1 + \sqrt{n}}{n^2}$$

$$4) \alpha_n = n (\sqrt{n^3 + 2} - n^{\frac{3}{2}})$$

$$5) \alpha_n = \frac{\eta\mu n + \sigma\upsilon\nu 7n}{\sqrt{n}}$$

$$6) \alpha_n = n^{\frac{3}{2}} (\sqrt{n^4 + 2} - n^2)$$

3.5 Ύπολογίσατε τás όριακάς τιμάς τών ακολουθιών α_n , $n = 1, 2, \dots$, αί όποιαί όρίζονται ύπό τών κάτωθι τύπων:

$$1) \alpha_n = \sqrt{1 + \frac{a}{n}}, \quad a \in \mathbb{R}^+$$

$$2) \alpha_n = \frac{1 + 2 + \dots + n}{n^2}$$

$$3) \alpha_n = \frac{n^3 - 3n + 2}{5n^3 + n + 4}$$

$$4) \alpha_n = \sqrt{(n+a)(n+b)} - n, \quad \begin{matrix} a \in \mathbb{R}^+ \\ b \in \mathbb{R}^+ \end{matrix}$$

$$5) \alpha_n = n \left(1 - \sqrt{1 + \frac{a}{n}} \right), \quad a \in \mathbb{R}^+$$

$$6) \alpha_n = \frac{a^n}{n!}, \quad a \in \mathbb{R}^+$$

3.6 Ύπολογίσατε τás όριακάς τιμάς τών ακολουθιών α_n , $n = 1, 2, \dots$, αί όποιαί όρίζονται ύπό τών κάτωθι τύπων:

$$1) \alpha_n = \frac{n^3 + 7n}{n^3 + 2n + 5}$$

$$2) \alpha_n = -2^n \frac{n^3 + 7}{(n+1)^3}$$

$$3) \alpha_n = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}$$

3.7 Ύπολογίσατε τás κάτωθι όριακάς τιμάς :

$$1) \lim_{\mu} \frac{\mu n^2}{n^2 + 1}$$

$$2) \lim_{\nu} \frac{\mu \nu^2}{\nu^2 + 1}$$

$$3) \lim_{\mu} \frac{\mu^2 \nu^2}{\mu \nu^3 + \nu^2 \mu^2}$$

$$4) \lim_{\nu} \frac{\mu^2 \nu^2}{\mu \nu^3 + \nu^2 \mu^2}$$

$$5) \lim_{\mu} \frac{2\mu \nu^2}{\mu \nu + \nu^2}$$

$$6) \lim_{\nu} \frac{2\mu \nu^2}{\mu \nu + \nu^2}$$

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ V

ΣΥΓΚΛΙΣΙΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

1. ΣΥΓΚΛΙΣΙΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΣ ΔΙΑ $x \rightarrow +\infty$

1.1 Εἰς τὸ προηγούμενον κεφάλαιον ἡσυχολήθημεν μὲ τὴν σύγκλισιν ἀκολουθιῶν πραγματικῶν ἀριθμῶν, αἱ ὁποῖαι, ὡς εἶδομεν, ἀποτελοῦν μίαν ἀπλουστάτην περίπτωσιν πραγματικῶν συναρτήσεων. Εἰς τὸ παρὸν κεφάλαιον θὰ ἐπεκτείνωμεν τὰς ἐννοίας τῆς συγκλίσεως καὶ τῆς ὀριακῆς τιμῆς διὰ πραγματικὰς συναρτήσεις μιᾶς πραγματικῆς μεταβλητῆς καὶ κατὰ πρῶτον θὰ πράξωμεν τοῦτο διὰ πραγματικὰς συναρτήσεις ὠρισμένας τοῦλάχιστον εἰς ἓν ἀπέραντον διάστημα τῆς μορφῆς $(\alpha, +\infty)$, ὅπου α σταθερὸς πραγματικὸς ἀριθμὸς, δηλαδὴ διὰ συναρτήσεις f μὲ $(\alpha, +\infty) \subseteq \mathcal{D}(f)$.

1.2 Μηδενικαὶ συναρτήσεις διὰ $x \rightarrow +\infty$. Ὡς γνωστὸν ἰσχύουν $v \rightarrow +\infty$ καὶ $\frac{1}{v} \rightarrow 0$ καὶ μάλιστα ἡ δευτέρα τούτων εἶναι συνέπεια τῆς πρώτης, ὡς ἄλλωστε καὶ γενικώτερον ἰσχύει

$$(1) \quad \left. \begin{array}{l} x_v \rightarrow +\infty \\ x_v > 0 \quad \forall v \in \mathbb{N} \end{array} \right\} \Rightarrow \frac{1}{x_v} \rightarrow 0,$$

διότι $x_v \rightarrow +\infty \Rightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists v_0 = v_0(\varepsilon): x_v > \frac{1}{\varepsilon} \quad \forall v \geq v_0$ καὶ τοῦτο δεδομένου ὅτι $x_v > 0 \quad \forall v \in \mathbb{N}$, συνεπάγεται ὅτι

$$\forall \varepsilon > 0 \exists v_0 = v_0(\varepsilon): \left| \frac{1}{x_v} \right| = \frac{1}{x_v} < \varepsilon \quad \forall v \geq v_0, \quad \text{ἤτοι} \quad \frac{1}{x_v} \rightarrow 0.$$

Τὴν ιδιότητα (1) ἐκφράζομεν λέγοντες ὅτι ἡ συνάρτησις f μὲ $f(x) = \frac{1}{x}$, $x \in (0, +\infty)$ εἶναι *μηδενικὴ* διὰ $x \rightarrow +\infty$ (τὸ σύμβολον $x \rightarrow +\infty$ ἀναγιγνώσκεται « x τείνει πρὸς τὸ $+\infty$ ») καὶ γράφομεν $\frac{1}{x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$ ἢ $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$.

Γενικῶς, ἂν f εἶναι μία συνάρτησις ὠρισμένη τοῦλάχιστον εἰς ἓν διάστημα τῆς μορφῆς $(\alpha, +\infty)$, θὰ λέγωμεν ὅτι «*ἡ συνάρτησις f εἶναι μηδενικὴ* διὰ $x \rightarrow +\infty$ » καὶ θὰ συμβολίζωμεν τοῦτο μὲ $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$ ἢ $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ τότε καὶ μόνον τότε, ἂν διὰ *κάθε* ἀκολουθίαν x_v , $v = 1, 2, \dots$ μὲ $x_v \in (\alpha, +\infty) \quad \forall v \in \mathbb{N}$ καὶ $x_v \rightarrow +\infty$ ἰσχύη $f(x_v) \rightarrow 0$. Συντόμως :

$$f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0 \iff \left(\begin{array}{l} x_n \rightarrow +\infty \\ x_n \in (\alpha, +\infty) \forall n \in \mathbb{N} \end{array} \right) \Rightarrow f(x_n) \rightarrow 0$$

Παραδείγματα:

1. Η συνάρτησις f με $f(x) = \frac{x+1}{x^2+3x}$, $x \in (0, +\infty)$ είναι μηδενική διά $x \rightarrow +\infty$.

Πράγματι: αν $x_n, n = 1, 2, \dots$ είναι τυχούσα ακολουθία θετικών όρων με $x_n \rightarrow +\infty$, τότε η αντίστοιχος ακολουθία τιμών $f(x_n) = \frac{x_n+1}{x_n^2+3x_n}$, $n = 1, 2, \dots$ είναι μηδενική, διότι αφ' έ-

νός μόν $f(x_n) = \frac{1}{1 + \frac{3}{x_n}}$, αφ' ετέρου δέ, λόγω τής (1), $\frac{1}{x_n} \rightarrow 0$, οπότε και $\frac{3}{x_n} \rightarrow 0$,

$\frac{1}{x_n^2} \rightarrow 0$ και έπομένως

$$f(x_n) \rightarrow \frac{0+0}{1+0} = 0.$$

Ώστε έδειχθη ότι διά κάθε ακολουθίαν θετικών όρων $x_n, n = 1, 2, \dots$ με $x_n \rightarrow +\infty$, ή αντίστοιχος ακολουθία τιμών τής συναρτήσεως f , δηλαδή ή ακολουθία $f(x_n), n = 1, 2, \dots$ είναι μηδενική.

2. Η συνάρτησις f με $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$, $x \in (0, +\infty)$ είναι μηδενική διά $x \rightarrow +\infty$. Πράγματι: άρκει να δείξωμεν ότι αν $x_n, n = 1, 2, \dots$ είναι τυχούσα ακολουθία θετικών όρων με $x_n \rightarrow +\infty$, τότε ή ακολουθία τιμών $f(x_n) = \frac{1}{\sqrt{x_n}}$, $n = 1, 2, \dots$ είναι μηδενική. Προς τούτο έστω τυχόν θετικός άριθμός ϵ , οπότε θα έχωμεν

$$x_n \rightarrow +\infty \Rightarrow \text{διά τόν } \epsilon^2 \exists v_0 = v_0(\epsilon^2) : x_n > \frac{1}{\epsilon^2} \quad \forall n \geq v_0,$$

τό όποιον, έπειδή $x_n > 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}$, συνεπάγεται ότι

$$\frac{1}{x_n} < \epsilon^2 \quad \forall n \geq v_0, \text{ δηλαδή } \frac{1}{\sqrt{x_n}} < \epsilon \quad \forall n \geq v_0.$$

Ώστε έδειχθη ότι διά τυχόντα θετικών άριθμών ϵ , δηλαδή διά κάθε $\epsilon > 0$ ύπάρχει δείκτης v_0 (έξαρτώμενος έκ του ϵ) τοιοϋτος, ώστε να ίσχύη

$$\frac{1}{\sqrt{x_n}} < \epsilon \quad \forall n \geq v_0,$$

ήτοι ότι $\frac{1}{\sqrt{x_n}} \rightarrow 0$

1.3 Συγκλίνουσαι συναρτήσεις διά $x \rightarrow +\infty$. Διά τήν συνάρτησιν f με $f(x) = \frac{3x+1}{x}$ παρατηρούμεν ότι $f(x) - 3 = \frac{1}{x}$ και έπομένως ή συνάρτησις $f - 3$ είναι μηδενική διά $x \rightarrow +\infty$. Κατ' αναλογίαν προς τήν περίπτωσιν των ακολουθιών λέγομεν και έδω ότι ή συνάρτησις f συγκλίνει διά $x \rightarrow +\infty$ προς τόν άριθμόν 3.

Γενικώς λέγομεν ότι μία συνάρτησις f ώρισμένη τουλάχιστον εις έν διάστημα τής μορφής $(\alpha, +\infty)$ «συγκλίνει διά $x \rightarrow +\infty$ προς τόν άριθμόν l » ή

* τó σύμβολον \Rightarrow χρησιμοποιείται παντού έφεξης υπό τήν έννοιαν ή όποία δίδεται εις τήν §1.4 του κεφ. 1 (σελις 7).

άλλως «τείνει δια $x \rightarrow +\infty$ προς τον αριθμόν l » και συμβολίζομεν τούτο με $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} l$ ή $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l$ τότε και μόνον τότε, αν η συνάρτησις $f - l$ είναι μηδενική δια $x \rightarrow +\infty$. Συντόμως :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l \iff \text{ορσ} \quad f(x) - l \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$$

Τόν αριθμόν l καλοῦμεν ὄριον ἢ ὀριακὴν τιμὴν τῆς συναρτήσεως f δια $x \rightarrow +\infty$.

Ἀποδεικνύεται τώρα ὅτι δια μίαν συνάρτησιν f ὠρισμένην τοῦλάχιστον εἰς ἓν διάστημα τῆς μορφῆς $(\alpha, +\infty)$ ἰσχύει τὸ κάτωθι :

1.3.1 ΘΕΩΡΗΜΑ. Ἡ συνάρτησις f συγκλίνει δια $x \rightarrow +\infty$ πρὸς τὸν ἀριθμὸν l τότε καὶ μόνον τότε, ἂν δια κάθε ἀκολουθίαν $x_v, v = 1, 2, \dots$ με $x_v \in (\alpha, +\infty)$ $\forall v \in \mathbb{N}$ καὶ $x_v \rightarrow +\infty$ ἰσχύη $\lim f(x_v) = l$.

Συντόμως :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l \iff \left\{ \begin{array}{l} x_v \rightarrow +\infty \\ x_v \in (\alpha, +\infty) \forall v \in \mathbb{N} \end{array} \right\} \Rightarrow \lim f(x_v) = l$$

$$\begin{aligned} \text{Ἀπόδειξις. } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l &\iff \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - l) = 0 \iff \left\{ \begin{array}{l} x_v \rightarrow +\infty \\ x_v \in (\alpha, +\infty) \forall v \in \mathbb{N} \end{array} \right\} \Rightarrow \\ &\Rightarrow \lim (f(x_v) - l) = 0 \iff \left\{ \begin{array}{l} x_v \rightarrow +\infty \\ x_v \in (\alpha, +\infty) \forall v \in \mathbb{N} \end{array} \right\} \Rightarrow \lim f(x_v) = l \end{aligned}$$

Παραδείγματα :

1. Ἡ συνάρτησις f με $f(x) = \frac{x^2 + 8x + 5}{5x^2 + 15x}$, $x \in (0, +\infty)$ συγκλίνει δια $x \rightarrow +\infty$ πρὸς τὸν ἀριθμὸν $\frac{1}{5}$. Πράγματι :

$$f(x) - \frac{1}{5} = \frac{x^2 + 8x + 5}{5x^2 + 15x} - \frac{1}{5} = \frac{x + 1}{x^2 + 3x}$$

Ἀλλά, ὡς εἶδομεν εἰς τὸ παράδειγμα 1 τῆς προηγουμένης § 1.2, ἰσχύει $\frac{x + 1}{x^2 + 3x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$.

Ἄρα $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + 8x + 5}{5x^2 + 15x} = \frac{1}{5}$.

2. Ἡ συνάρτησις f με $f(x) = \frac{\sqrt{x} + \frac{3}{x}}{2\sqrt{x} + 5}$, $x \in (0, +\infty)$ συγκλίνει δια $x \rightarrow +\infty$ πρὸς τὸν ἀριθμὸν $\frac{1}{2}$. Πράγματι ἂν $x_v, v = 1, 2, \dots$ εἶναι τυχοῦσα ἀκολουθία θετικῶν ὄρων με $x_v \rightarrow +\infty$,

τότε ἡ ἀκολουθία $f(x_v) = \frac{\sqrt{x_v} + \frac{3}{x_v}}{2\sqrt{x_v} + 5}$, $v = 1, 2, \dots$ συγκλίνει πρὸς τὸν ἀριθμὸν $\frac{1}{2}$, διότι ἀφ'

ένος μὲν $f(x_v) = \frac{1 + \frac{3}{x_v} \frac{1}{\sqrt{x_v}}}{2 + \frac{5}{\sqrt{x_v}}}$, ἀφ' ἑτέρου δὲ $\frac{3}{x_v} \rightarrow 0$, $\frac{1}{\sqrt{x_v}} \rightarrow 0$ καὶ $\frac{5}{\sqrt{x_v}} \rightarrow 0$ καὶ ἐπο-

μὲνως $f(x_v) \rightarrow \frac{1+0 \cdot 0}{2+0} = \frac{1}{2}$.

Ὅστε ἐδείχθη ὅτι διὰ κάθε ἀκολουθίαν θετικῶν ὄρων x_v , $v = 1, 2, \dots$ μὲ $x_v \rightarrow +\infty$, ἡ ἀντίστοιχος ἀκολουθία τιμῶν τῆς συναρτήσεως f , δηλαδή ἡ ἀκολουθία $f(x_v)$, $v = 1, 2, \dots$ συγκλίνει πρὸς τὸν ἀριθμὸν $\frac{1}{2}$. Ἄρα, δυνάμει τοῦ ἀνωτέρω θεωρήματος 1.3.1., ἰσχύει

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x} + \frac{3}{x}}{2\sqrt{x} + 5} = \frac{1}{2}.$$

1.3.2* Ἀπειρίζονται θετικῶς ἢ ἀρνητικῶς συναρτήσεις διὰ $x \rightarrow +\infty$. Διὰ τὴν συνάρτησιν f μὲ $f(x) = x^2$ παρατηροῦμεν ὅτι ἂν x_v , $v = 1, 2, \dots$ εἶναι τυχοῦσα ἀκολουθία πραγματικῶν ἀριθμῶν μὲ $x_v \rightarrow +\infty$, τότε καὶ ἡ ἀντίστοιχος ἀκολουθία τιμῶν $f(x_v) = x_v^2$, $v = 1, 2, \dots$ ἀπειρίζεται θετικῶς, διότι

$$f(x_v) = x_v^2 = x_v \cdot x_v \rightarrow (+\infty)(+\infty) = +\infty$$

λέγομεν δὲ εἰς τὴν περίπτωσιν ταύτην ὅτι ἡ συνάρτησις f μὲ $f(x) = x^2$ ἀπειρίζεται θετικῶς διὰ $x \rightarrow +\infty$.

Γενικῶς λέγομεν ὅτι μία συνάρτησις f ὠρισμένη τοῦλάχιστον εἰς ἓν διάστημα τῆς μορφῆς $(\alpha, +\infty)$ «ἀπειρίζεται θετικῶς διὰ $x \rightarrow +\infty$ » ἢ ἄλλως «συγκλίνει διὰ $x \rightarrow +\infty$ πρὸς τὸ $+\infty$ » ἢ ἀκόμη «τείνει διὰ $x \rightarrow +\infty$ πρὸς τὸ $+\infty$ » καὶ συμβολίζομεν τοῦτο μὲ $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$ ἢ $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ τότε καὶ μόνον τότε, ἂν διὰ κάθε ἀκολουθίαν x_v , $v = 1, 2, \dots$ (μὲ $x_v \in (\alpha, +\infty) \forall v \in \mathbb{N}$ καὶ $x_v \rightarrow +\infty$ ἰσχύη $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x_v) = +\infty$. Συντόμως :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \iff_{\text{ορσ}} \left\{ \begin{array}{l} x_v \rightarrow +\infty \\ x_v \in (\alpha, +\infty) \forall v \in \mathbb{N} \end{array} \right\} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x_v) = +\infty$$

Κατ' ἀναλογίαν πρὸς τὴν περίπτωσιν τῶν ἀκολουθιῶν θὰ λέγομεν ὅτι ἡ συνάρτησις f «ἀπειρίζεται ἀρνητικῶς διὰ $x \rightarrow +\infty$ » ἢ ἄλλως «συγκλίνει διὰ $x \rightarrow +\infty$ πρὸς τὸ $-\infty$ » ἢ ἀκόμη «τείνει διὰ $x \rightarrow +\infty$ πρὸς τὸ $-\infty$ » καὶ θὰ συμβολίζομεν τοῦτο μὲ $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} -\infty$ ἢ $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$ τότε καὶ μόνον τότε, ἂν ἰσχύη $\lim_{x \rightarrow +\infty} (-f(x)) = +\infty$ Συντόμως :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty \iff_{\text{ορσ}} \lim_{x \rightarrow +\infty} (-f(x)) = +\infty$$

Π.χ. ἡ συνάρτησις f μὲ $f(x) = \frac{-x^2 + x}{3x + 1}$, $x \in (0, +\infty)$ ἀπειρίζεται ἀρνητικῶς διὰ $x \rightarrow +\infty$. Πράγματι:

$$-f(x) = \frac{x^2 - x}{3x + 1}, \quad x \in (0, +\infty)$$

καί διά τυχούσαν ἀκολουθίαν $x_v, v = 1, 2, \dots$ θετικῶν ὄρων μέ $x_v \rightarrow +\infty$ ἰσχύει

$$-f(x_v) = \frac{x_v^2 - x_v}{3x_v + 1} = \frac{x_v - 1}{3 + \frac{1}{x_v}} \rightarrow \frac{+\infty - 1}{3 + 0} = +\infty,$$

ἄρα $\lim_{x \rightarrow +\infty} (-f(x)) = +\infty$ καί ἐπομένως $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-x^2 + x}{3x + 1} = -\infty$.

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω συνάγεται τώρα εὐκόλως ὅτι τὸ θεώρημα 1.3.1 ἰσχύει καί εἰς τὴν περίπτωσιν, ὅπου ἡ ὀριακὴ τιμὴ l εἶναι ἐν τῶν συμβόλων $+\infty, -\infty$. Ἀκριβέστερον ἰσχύει τὸ ἀκόλουθον θεώρημα.

1.3.3 ΘΕΩΡΗΜΑ. Ἡ συνάρτησις f συγκλίνει διὰ $x \rightarrow +\infty$ πρὸς τὸ l ($l \in \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$) τότε καὶ μόνον τότε, ἀν διὰ κάθε ἀκολουθίαν $x_v, v = 1, 2, \dots$ μέ $x_v \in (\alpha, +\infty) \forall v \in \mathbb{N}$ καὶ $x_v \rightarrow +\infty$ ἰσχύῃ $\lim f(x_v) = l$. Συντόμως :

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l, \\ l \in \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\} \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left(\begin{array}{l} x_v \rightarrow +\infty \\ x_v \in (\alpha, +\infty) \forall v \in \mathbb{N} \end{array} \right) \Rightarrow \lim f(x_v) = l$$

Ἀπόδειξις. Ἡ περίπτωσις $l \in \mathbb{R}$ εἶναι προφανὴς ἐκ τοῦ θεωρήματος 1.3.1, ὡς ἐπίσης καὶ ἡ περίπτωσις $l = +\infty$ ἐκ τοῦ ὀρισμοῦ τῆς ἀπειριζομένης θετικῶς διὰ $x \rightarrow +\infty$ συναρτήσεως. Ἡ ἀπομένουσα περίπτωσις $l = -\infty$ συνάγεται εὐκόλως ὡς ἑξῆς :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty \Leftrightarrow \lim_{\text{ορσ}} (-f(x)) = +\infty \Leftrightarrow \left(\begin{array}{l} x_v \rightarrow +\infty \\ x_v \in (\alpha, +\infty) \forall v \in \mathbb{N} \end{array} \right) \Rightarrow \lim (-f(x_v)) = +\infty \Leftrightarrow \left(\begin{array}{l} x_v \rightarrow +\infty \\ x_v \in (\alpha, +\infty) \forall v \in \mathbb{N} \end{array} \right) \Rightarrow \lim f(x_v) = -\infty.$$

2. ΣΥΓΚΛΙΣΙΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΣ ΔΙΑ $x \rightarrow -\infty$

2.1 Α. Ἐὰς θεωρήσωμεν τὴν συνάρτησιν f μέ $f(x) = \frac{x+1}{3x-2}, x \in (-\infty, 0)$

διὰ τὴν ὁποίαν παρατηροῦμεν ὅτι

$$\left. \begin{array}{l} x_v \rightarrow -\infty \\ x_v < 0 \forall v \in \mathbb{N} \end{array} \right\} \Rightarrow f(x_v) = \frac{x_v + 1}{3x_v - 2} = \frac{1 + \frac{1}{x_v}}{3 - \frac{2}{x_v}} \rightarrow \frac{1 + 0}{3 - 0} = \frac{1}{3}.$$

Τοῦτο ἐκφράζομεν λέγοντες ὅτι ἡ συνάρτησις f μέ $f(x) = \frac{x+1}{3x-2}, x \in (-\infty, 0)$

συγκλίνει διὰ $x \rightarrow -\infty$ πρὸς τὸν ἀριθμὸν $\frac{1}{3}$ καὶ γράφομεν $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x+1}{3x-2} = \frac{1}{3}$.

Γενικῶς λέγομεν ὅτι μία συνάρτησις f ὠρισμένη τούλάχιστον εἰς ἐν διάστημα τῆς μορφῆς $(-\infty, \alpha)$ «συγκλίνει διὰ $x \rightarrow -\infty$ πρὸς τὸν ἀριθμὸν l » ἢ ἄλλως «τείνει διὰ $x \rightarrow -\infty$ πρὸς τὸν ἀριθμὸν l » καὶ συμβολίζομεν τοῦτο μέ $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} l$

ή $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = l$ τότε και μόνον τότε, αν δια κάθε ακολουθία $x_n, n = 1, 2, \dots$ με $x_n \in (-\infty, \alpha) \forall n \in \mathbb{N}$ και $x_n \rightarrow -\infty$ ισχύει $\lim f(x_n) = l$. Συντόμως :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = l \iff \left. \begin{array}{l} x_n \rightarrow -\infty \\ x_n \in (-\infty, \alpha) \forall n \in \mathbb{N} \end{array} \right\} \Rightarrow \lim f(x_n) = l$$

Τον αριθμόν l καλοῦμεν *οριον* ή *οριακήν τιμήν* τής συναρτήσεως f δια $x \rightarrow -\infty$.

B* Αί έννοιαι τής θετικῶς και άρνητικῶς άπειριζομένης συναρτήσεως δια $x \rightarrow -\infty$ όρίζονται κατ' αναλογίαν πρὸς τήν περίπτωσηιν $x \rightarrow +\infty$. Άκριβέστερον, αν f είναι μία συνάρτησις ώρισμένη τουλάχιστον εις έν διάστημα τής μορφής $(-\infty, \alpha)$, τότε όρίζομεν :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty \iff \left. \begin{array}{l} x_n \rightarrow -\infty \\ x_n \in (-\infty, \alpha) \forall n \in \mathbb{N} \end{array} \right\} \Rightarrow \lim f(x_n) = +\infty$$

και

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty \iff \lim_{x \rightarrow -\infty} (-f(x)) = +\infty$$

όποτε, κατ' αναλογίαν πρὸς τὸ θεώρημα 1.3.3, άποδεικνύεται ότι

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = l, \\ l \in \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\} \end{array} \right\} \iff \left. \begin{array}{l} x_n \rightarrow -\infty \\ x_n \in (-\infty, \alpha) \forall n \in \mathbb{N} \end{array} \right\} \Rightarrow \lim f(x_n) = l$$

Παραδείγματα :

1. Η συνάρτησις f με $f(x) = \frac{3x^2 + 1}{x^2 + x}$, $x \in (-\infty, -1)$ συγκλίνει δια $x \rightarrow -\infty$ πρὸς τὸν αριθμόν 3. Πράγματι· αν $x_n, n = 1, 2, \dots$ είναι τυχοῦσα ακολουθία πραγματικῶν αριθμῶν με $x_n < -1 \forall n \in \mathbb{N}$ και $x_n \rightarrow -\infty$, τότε

$$f(x_n) = \frac{3x_n^2 + 1}{x_n^2 + x_n} = \frac{3 + \frac{1}{x_n^2}}{1 + \frac{1}{x_n}} \rightarrow \frac{3 + 0}{1 + 0} = 3,$$

διότι $\frac{1}{x_n} \rightarrow 0$ και $\frac{1}{x_n^2} \rightarrow 0$ (διαιτί);. Ὡστε έδειχθη ότι

$$\left. \begin{array}{l} x_n \rightarrow -\infty \\ x_n < -1 \forall n \in \mathbb{N} \end{array} \right\} \Rightarrow \lim \frac{3x_n^2 + 1}{x_n^2 + x_n} = 3,$$

ήτοι ότι $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x^2 + 1}{x^2 + x} = 3$.

2.* Η συνάρτησις f με $f(x) = \sqrt{x^2 - x}$, $x \in (-\infty, 0)$ άπειρίζεται θετικῶς δια $x \rightarrow -\infty$. Πράγματι· αν $x_n, n = 1, 2, \dots$ είναι τυχοῦσα ακολουθία άρνητικῶν όρων με $x_n \rightarrow -\infty$, τότε

$$f(x_v) = \sqrt{x_v^2 - x_v} = \sqrt{x_v^2 \left(1 - \frac{1}{x_v}\right)} = |x_v| \sqrt{1 - \frac{1}{x_v}} = -x_v \sqrt{1 - \frac{1}{x_v}} \rightarrow$$

$$\rightarrow -(-\infty) \sqrt{1-0} = -(-\infty) 1 = +\infty,$$

ήτοι

$$\left. \begin{array}{l} x_v \rightarrow -\infty \\ x_v < 0 \quad \forall v \in \mathbb{N} \end{array} \right\} \Rightarrow \lim \sqrt{x_v^2 - x_v} = +\infty,$$

δηλαδή $\lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{x^2 - x} = +\infty$

3.* Η συνάρτησις f με $f(x) = x \sqrt{x^2 - x}$, $x \in (-\infty, 0)$ άπειρίζεται άρνητικώς διά $x \rightarrow -\infty$. Πράγματι: αν $x_v, v = 1, 2, \dots$ είναι τυχοῦσα άκολουθία άρνητικῶν όρων με $x_v \rightarrow -\infty$, τότε

$$f(x_v) = x_v \sqrt{x_v^2 - x_v} \rightarrow (-\infty)(+\infty) = -\infty,$$

ήτοι

$$\left. \begin{array}{l} x_v \rightarrow -\infty \\ x_v < 0 \quad \forall v \in \mathbb{N} \end{array} \right\} \Rightarrow \lim x_v \sqrt{x_v^2 - x_v} = -\infty,$$

δηλαδή $\lim_{x \rightarrow -\infty} x \sqrt{x^2 - x} = -\infty$.

3. ΣΥΓΚΛΙΣΙΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΣ ΔΙΑ $x \rightarrow x_0$

3.1. Σύγκλισις συναρτήσεως διά $x \rightarrow x_0 + 0$. Διά τήν συνάρτησιν g με $g(x) = x + \sqrt{x-1}$, $x \in (1, +\infty)$ παρατηρούμεν ότι ισχύει

$$(2) \quad \left. \begin{array}{l} x_v \rightarrow 1 \\ x_v > 1 \quad \forall v \in \mathbb{N} \end{array} \right\} \Rightarrow g(x_v) = x_v + \sqrt{x_v - 1} \rightarrow 1 + \sqrt{1-1} = 1.$$

Όμοίως διά τήν συνάρτησιν h με $h(x) = \frac{1}{x-5}$, $x \in (5, +\infty)$ παρατηρούμεν ότι ισχύει

$$(3) \quad \left. \begin{array}{l} x_v \rightarrow 5 \\ x_v > 5 \quad \forall v \in \mathbb{N} \end{array} \right\} \Rightarrow h(x_v) = \frac{1}{x_v - 5} \rightarrow +\infty,$$

διότι $\left. \begin{array}{l} x_v \rightarrow 5 \\ x_v > 5 \quad \forall v \in \mathbb{N} \end{array} \right\} \Rightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists v_0 = v_0(\varepsilon) : 0 < x_v - 5 < \varepsilon \quad \forall v \geq v_0$

$$\Rightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists v_0 = v_0(\varepsilon) : h(x_v) = \frac{1}{x_v - 5} > \frac{1}{\varepsilon} \quad \forall v \geq v_0,$$

ήτοι ότι $\lim h(x_v) = +\infty$.

Έκ τῶν άνωτέρω, τήν μεν ιδιότητα (2) εκφράζομεν λέγοντες ότι ή συνάρτησις g με $g(x) = x + \sqrt{x-1}$, $x \in (1, +\infty)$ συγκλίνει διά $x \rightarrow 1+0$ πρὸς τὸν αριθμὸν 1 καί γράφομεν $\lim_{x \rightarrow 1+0} (x + \sqrt{x-1}) = 1$, τήν δὲ ιδιότητα (3) εκφράζομεν

λέγοντες ότι ή συνάρτησις h με $h(x) = \frac{1}{x-5}$, $x \in (5, +\infty)$ άπειρίζεται θετικῶς διά $x \rightarrow 5+0$ ή συγκλίνει διά $x \rightarrow 5+0$ πρὸς τὸ $+\infty$ καί γράφομεν $\lim_{x \rightarrow 5+0} \frac{1}{x-5} = +\infty$.

Γενικῶς, αν f είναι μία συνάρτησις ώρισμένη τούλάχιστον εις έν διάστημα

της μορφής (x_0, β) , όπου $x_0 \in \mathbb{R}$, θα λέγουμε ότι αυτή «συγκλίνει δια $x \rightarrow x_0 + 0$ προς το l » ή άλλως «τένει δια $x \rightarrow x_0 + 0$ προς το l », όπου $l \in \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$ και θα συμβολίζουμε τούτο με $f(x) \underset{x \rightarrow x_0+0}{\rightarrow} l$ ή $\lim_{x \rightarrow x_0+0} f(x) = l$ τότε και μόνον τότε, αν δια κάθε ακολουθιαν $x_n, n = 1, 2, \dots$ με $x_n \in (x_0, \beta) \forall n \in \mathbb{N}$ και $x_n \rightarrow x_0$ ισχύη $\lim f(x_n) = l$. Συντόμως :

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow x_0+0} f(x) = l, \\ l \in \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\} \end{array} \right\} \Leftrightarrow_{\text{ορσ}} \left\{ \begin{array}{l} x_n \rightarrow x_0 \\ x_n \in (x_0, \beta) \forall n \in \mathbb{N} \end{array} \right\} \Rightarrow \lim f(x_n) = l$$

Το l καλούμεν *οριον* ή *οριακήν τιμήν* της συναρτήσεως f δια $x \rightarrow x_0 + 0$.

Αν $l = 0$, τότε η συνάρτησις f καλείται *μηδενική* δια $x \rightarrow x_0 + 0$. Επίσης εις τήν περίπτωσιν, όπου $l = -\infty$ λέγομεν και ότι η συνάρτησις f *άπειρίζεται ἀρηθτικῶς* δια $x \rightarrow x_0 + 0$, ἐνῶ εις τήν περίπτωσιν, όπου $l = +\infty$ λέγομεν ότι αυτή *άπειρίζεται θετικῶς* δια $x \rightarrow x_0 + 0$.

Παραδείγματα:

1. Ἡ συνάρτησις f με $f(x) = (x-1)^2 + \sqrt{\frac{x}{x^2+1}}$, $x \in (0, +\infty)$ συγκλίνει δια $x \rightarrow +0$ προς τὸν ἀριθμὸν 1 (+0 τίθεται συνήθως ἀντὶ τοῦ 0 + 0). Πράγματι· αν $x_n, n = 1, 2, \dots$ εἶναι τυχοῦσα μηδενική ἀκολουθία θετικῶν ὀρων, ἔχομεν

$$f(x_n) = (x_n - 1)^2 + \sqrt{\frac{x_n}{x_n^2 + 1}} \rightarrow (0 - 1)^2 + \sqrt{\frac{0}{0^2 + 1}} = 1.$$

Ἄρα $\lim_{x \rightarrow +0} \left((x-1)^2 + \sqrt{\frac{x}{x^2+1}} \right) = 1$.

2. Ἡ συνάρτησις f με $f(x) = \frac{x}{1-x^2}$, $x \in (1, +\infty)$ *άπειρίζεται ἀρηθτικῶς* δια $x \rightarrow 1 + 0$. Πράγματι:

$$\left. \begin{array}{l} x_n \rightarrow 1 \\ x_n > 1 \forall n \in \mathbb{N} \end{array} \right\} \Rightarrow \lim \frac{1}{1-x_n^2} = -\infty \text{ (διατί;)}$$

καὶ ἐπομένως $f(x_n) = \frac{x_n}{1-x_n^2} = x_n \frac{1}{1-x_n^2} \rightarrow 1 \cdot (-\infty) = -\infty$. Ἄρα $\lim_{x \rightarrow 1+0} \frac{x}{1-x^2} = -\infty$.

3.2 Σύγκλισις συναρτήσεως δια $x \rightarrow x_0 - 0$. Δια τήν συνάρτησιν g με $g(x) = x + \sqrt{1-x}$, $x \in (-\infty, 1)$ παρατηροῦμεν, κατ' ἀναλογίαν πρὸς τήν (2), ὅτι ισχύει

$$\left. \begin{array}{l} x_n \rightarrow 1 \\ x_n < 1 \forall n \in \mathbb{N} \end{array} \right\} \Rightarrow g(x_n) = x_n + \sqrt{1-x_n} \rightarrow 1 + \sqrt{1-1} = 1.$$

Ὁμοίως δια τήν συνάρτησιν h με $h(x) = \frac{1}{x-5}$, $x \in (-\infty, 5)$ παρατηροῦμεν ὅτι ισχύει

$$\left. \begin{array}{l} x_n \rightarrow 5 \\ x_n < 5 \forall n \in \mathbb{N} \end{array} \right\} \Rightarrow h(x_n) = \frac{1}{x_n-5} \rightarrow -\infty,$$

διότι

$$\left. \begin{aligned} x_v &\rightarrow 5 \\ x_v < 5 \quad \forall v \in \mathbb{N} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists v_0 = v_0(\varepsilon): 0 < 5 - x_v < \varepsilon \quad \forall v \geq v_0$$
$$\Rightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists v_0 = v_0(\varepsilon): \frac{1}{5 - x_v} > \frac{1}{\varepsilon} \quad \forall v \geq v_0,$$

δηλαδή $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{1}{5 - x} = +\infty$, άρα $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{1}{x - 5} = -\infty$.

Τα άνωτέρω έκφράζουμε λέγοντες άφ' ενός μόνον ότι ή συνάρτησις g με $g(x) = x + \sqrt{1 - x}$, $x \in (-\infty, 1)$ συγκλίνει διά $x \rightarrow 1 - 0$ πρὸς τὸν ἀριθμὸν 1 καὶ γράφομεν $\lim_{x \rightarrow 1-0} (x + \sqrt{1 - x}) = 1$, άφ' ἑτέρου δὲ ότι ή συνάρτησις h με $h(x) =$

$= \frac{1}{x - 5}$, $x \in (-\infty, 5)$ άπειρίζεται ἀρνητικῶς διά $x \rightarrow 5 - 0$ ή συγκλίνει διά $x \rightarrow 5 - 0$ πρὸς τὸ $-\infty$ καὶ γράφομεν $\lim_{x \rightarrow 5-0} \frac{1}{x - 5} = -\infty$.

Γενικῶς, ἂν f εἶναι μία συνάρτησις ὠρισμένη τοῦλάχιστον εἰς ἓν διάστημα τῆς μορφῆς (α, x_0) , ὅπου $x_0 \in \mathbb{R}$, θὰ λέγωμεν ὅτι αὕτη «συγκλίνει διά $x \rightarrow x_0 - 0$ πρὸς τὸ l » ή ἄλλως «τείνει διά $x \rightarrow x_0 - 0$ πρὸς τὸ l », ὅπου $l \in \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$ καὶ θὰ συμβολίζωμεν τοῦτο με $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0-0} l$ ή $\lim_{x \rightarrow x_0-0} f(x) = l$ τότε καὶ μόνον τότε, ἂν διά κάθε ἀκολουθίαν x_v , $v = 1, 2, \dots$ με $x_v \in (\alpha, x_0) \quad \forall v \in \mathbb{N}$ καὶ $x_v \rightarrow x_0$ ισχύη $\lim f(x_v) = l$. Συντόμως :

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0-0} f(x) = l \\ l \in \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\} \end{aligned} \right\} \Leftrightarrow \left. \begin{aligned} x_v \rightarrow x_0 \\ x_v \in (\alpha, x_0) \quad \forall v \in \mathbb{N} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \lim f(x_v) = l$$

Τὸ l καλοῦμεν ὄριον ή ὄρ'ακὴν τιμὴν τῆς συναρτήσεως f διά $x \rightarrow x_0 - 0$.

Ἐάν $l = 0$, τότε ή συνάρτησις f καλεῖται μηδενική διά $x \rightarrow x_0 - 0$. Ἐπίσης εἰς τὴν περίπτωσιν, ὅπου $l = -\infty$ λέγομεν καὶ ότι ή συνάρτησις f άπειρίζεται ἀρνητικῶς διά $x \rightarrow x_0 - 0$, ἔνῳ εἰς τὴν περίπτωσιν, ὅπου $l = +\infty$ λέγομεν ότι αὕτη άπειρίζεται θετικῶς διά $x \rightarrow x_0 - 0$.

Παραδείγματα :

1. Ἡ συνάρτησις f με $f(x) = (x + 2)^2 + \sqrt{\frac{x}{x^2 - 1}}$, $x \in (-1, 0)$ συγκλίνει διά $x \rightarrow -0$ πρὸς τὸν ἀριθμὸν 4 (-0 τίθεται συνήθως ἀντὶ τοῦ $0 - 0$). Πράγματι: ἂν x_v , $v = 1, 2, \dots$ εἶναι τυχοῦσα μηδενική ἀκολουθία με $x_v \in (-1, 0) \quad \forall v \in \mathbb{N}$, ἔχομεν

$$f(x_v) = (x_v + 2)^2 + \sqrt{\frac{-x_v}{1 - x_v^2}} \rightarrow (0 + 2)^2 + \sqrt{\frac{0}{1 - 0^2}} = 4.$$

Ἄρα $\lim_{x \rightarrow -0} \left((x + 2)^2 + \sqrt{\frac{x}{x^2 - 1}} \right) = 4$.

2. Ἡ συνάρτησις f με $f(x) = \frac{1}{x}$, $x \in (-\infty, 0)$ άπειρίζεται ἀρνητικῶς διά $x \rightarrow -0$. Πράγματι:

$$\left. \begin{array}{l} x_v \rightarrow 0 \\ x_v < 0 \quad \forall v \in \mathbb{N} \end{array} \right\} \Rightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists v_0 = v_0(\varepsilon): 0 < -x_v < \varepsilon \quad \forall v \geq v_0 \Rightarrow$$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists v_0 = v_0(\varepsilon): -\frac{1}{x_v} > \frac{1}{\varepsilon} \quad \forall v \geq v_0, \text{ δηλαδή } \lim \left(-\frac{1}{x_v} \right) = +\infty, \text{ \u0391\u03c1\u03ac } \lim \frac{1}{x_v} = -\infty.$$

\u0391\u03c3\u03c4\u03b5 \u03b5\u03b4\u03b5\u03b9\u03c7\u03b8\u03b7 \u03b4\u03c9\u03c4\u03b9

$$\left. \begin{array}{l} x_v \rightarrow 0 \\ x_v < 0 \quad \forall v \in \mathbb{N} \end{array} \right\} \Rightarrow \lim \frac{1}{x_v} = -\infty, \text{ \u03b7\u03c4\u03bf\u03b9 } \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty.$$

3. \u0397 \u03c3\u03bd\u03b1\u03c1\u03c4\u03b7\u03c3\u03b9\u03c2 f \u03bc\u03b5\u03c4 \u03c6(x) = \frac{x}{1-x^2}, x \in (-1, 1) \u03b1\u03c0\u03b5\u03c1\u03b9\u03c6\u03b9\u03c3\u03c4\u03b1\u03b9 \u03b8\u03b5\u03c4\u03b9\u03ba\u03c9\u03c3 \u03b4\u03b9\u03ac x \u2192 1-0.

\u0391\u03c0\u03c1\u03ac\u03b3\u03bc\u03b1\u03c4\u03b9: \u03b1\u03c6' \u03b5\u03bd\u03cc\u03c3 \u03bc\u03b5\u03bd

$$\left. \begin{array}{l} x_v \rightarrow 1 \\ x_v \in (-1, 1) \quad \forall v \in \mathbb{N} \end{array} \right\} \Rightarrow \frac{1}{1-x_v^2} \rightarrow +\infty \text{ (\u03b4\u03b9\u03b1\u03c4\u03b9\u03c3\u03b9),}$$

\u03b1\u03c6' \u03b5\u03c4\u03b5\u03c1\u03bf\u03c5 \u03b4\u03b5

$$\frac{x_v}{1-x_v^2} = x_v \frac{1}{1-x_v^2} \rightarrow 1(+\infty) = +\infty.$$

$$\text{\u0391\u03c1\u03ac } \lim_{x \rightarrow 1-0} \frac{x}{1-x^2} = +\infty.$$

3.3. \u03a3\u03c5\u03b3\u03ba\u03bb\u03b9\u03c3\u03b9\u03c2 \u03c3\u03bd\u03b1\u03c1\u03c4\u03b7\u03c3\u03b5\u03c9\u03c3 \u03b4\u03b9\u03ac x \u2192 x_0. \u0391\u03bd \u03b8\u03b5\u03c9\u03c1\u03b7\u03c3\u03c9\u03bc\u03b5\u03bd \u03bc\u03b9\u03b1\u03bd \u03c3\u03bd\u03b1\u03c1\u03c4\u03b7\u03c3\u03b9\u03bd f \u03c9\u03c1\u03b9\u03c3\u03bc\u03b5\u03bd\u03b7\u03bd \u03c4\u03bf\u03c5\u03bb\u03ac\u03c7\u03b9\u03c3\u03c4\u03bf\u03bd \u03b5\u03b9\u03c2 \u03b5\u03bd \u03c3\u03bd\u03bf\u03bb\u03bf\u03bd \u03c4\u03b7\u03c2 \u03bc\u03bf\u03c1\u03c6\u03b7\u03c2 (\alpha, x_0) \cup (x_0, \beta), \u03c4\u03cc\u03c4\u03b5 \u03b4\u03b9' \u03b1\u03c5\u03c4\u03b7\u03bd \u03b4\u03c5\u03bd\u03b1\u03c4\u03b1\u03b9 \u03c0\u03c1\u03bf\u03b1\u03bd\u03c9\u03c3 \u03bd\u03ac \u03cc\u03c1\u03b9\u03c3\u03b8\u03b7 \u03c4\u03cc\u03c3\u03bf\u03bd \u03b7 \u03b5\u03bd\u03bf\u03b9\u03b1 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03c3\u03c5\u03b3\u03ba\u03bb\u03b9\u03c3\u03b5\u03c9\u03c3 \u03b4\u03b9\u03ac x \u2192 x_0 + 0 \u03b4\u03c3\u03bf\u03bd \u03ba\u03b9 \u03b4\u03b9\u03ac x \u2192 x_0 - 0.

\u0391\u03c0\u03c1. \u03b4\u03b9\u03ac f(x) = \frac{x}{|x|}, x \in (-\infty, 0) \cup (0, +\infty), \u03b5\u03c7\u03c7\u03bf\u03bc\u03b5\u03bd

$$\lim_{x \rightarrow +0} \frac{x}{|x|} = 1 \text{ \u03ba\u03b9 } \lim_{x \rightarrow -0} \frac{x}{|x|} = -1 \text{ (\u03b4\u03b9\u03b1\u03c4\u03b9\u03c3\u03b9);}$$

\u0391\u03c0\u03c1\u03b9\u03c3\u03b7\u03c2 \u03b4\u03b9\u03ac f(x) = \frac{x^2-1}{x-1}, x \in (-\infty, 1) \cup (1, +\infty) \u03b5\u03c7\u03c7\u03bf\u03bc\u03b5\u03bd,

$$\lim_{x \rightarrow 1+0} \frac{x^2-1}{x-1} = 2 \text{ \u03ba\u03b9 } \lim_{x \rightarrow 1-0} \frac{x^2-1}{x-1} = 2 \text{ (\u03b4\u03b9\u03b1\u03c4\u03b9\u03c3\u03b9);}$$

\u0395\u03b9\u03c2 \u03c4\u03b7\u03bd \u03c4\u03b5\u03bb\u03b5\u03c5\u03b1\u03b9\u03b1 \u03c4\u03b1\u03c5\u03c4\u03b7\u03bd \u03c0\u03b5\u03c1\u03b9\u03c0\u03c4\u03c9\u03c3\u03b9\u03bd \u03c0\u03b1\u03c1\u03b1\u03c4\u03b7\u03c1\u03bf\u03c5\u03bc\u03b5\u03bd \u03b4\u03c9\u03c4\u03b9

$$\lim_{x \rightarrow 1+0} \frac{x^2-1}{x-1} = 2 = \lim_{x \rightarrow 1-0} \frac{x^2-1}{x-1}$$

\u03ba\u03b9 \u03b5\u03ba\u03c6\u03c1\u03ac\u03b6\u03bf\u03bc\u03b5\u03bd \u03c4\u03bf\u03c5\u03c4\u03bf \u03bb\u03b5\u03b3\u03bf\u03bd\u03c4\u03b5\u03c2 \u03b4\u03b9 \u03b7 \u03c3\u03bd\u03b1\u03c1\u03c4\u03b7\u03c3\u03b9\u03c2 f \u03bc\u03b5\u03c4 f(x) = \frac{x^2-1}{x-1},

x \in (-\infty, 1) \cup (1, +\infty) \u03c3\u03c5\u03b3\u03ba\u03bb\u03b9\u03bd\u03b5\u03b9 \u03b4\u03b9\u03ac x \u2192 1 \u03c0\u03c1\u03cc\u03c2 \u03c4\u03bf\u03bd \u03b1\u03c1\u03b9\u03b8\u03bc\u03bf\u03bd 2.

\u0393\u03b5\u03bd\u03b9\u03ba\u03c9\u03c2, \u03b1\u03bd f \u03b5\u03b9\u03bd\u03b1\u03b9 \u03bc\u03b9\u03b1 \u03c3\u03bd\u03b1\u03c1\u03c4\u03b7\u03c3\u03b9\u03c2 \u03c9\u03c1\u03b9\u03c3\u03bc\u03b5\u03bd\u03b7 \u03c4\u03bf\u03c5\u03bb\u03ac\u03c7\u03b9\u03c3\u03c4\u03bf\u03bd \u03b5\u03b9\u03c2 \u03b5\u03bd \u03c3\u03bd\u03bf\u03bb\u03bf\u03bd \u03c4\u03b7\u03c2 \u03bc\u03bf\u03c1\u03c6\u03b7\u03c2 (\alpha, x_0) \cup (x_0, \beta) \u03cc\u03c0\u03bf\u03c5 x_0 \in \mathbb{R}, \u03b8\u03ac \u03bb\u03b5\u03b3\u03c9\u03bc\u03b5\u03bd \u03b4\u03c9\u03c4\u03b9 \u03b1\u03c5\u03c4\u03b7 \u03c3\u03c5\u03b3\u03ba\u03bb\u03b9\u03bd\u03b5\u03b9 \u03b4\u03b9\u03ac x \u2192 x_0 \u03c0\u03c1\u03cc\u03c2 \u03c4\u03bf \u03bb \u03b7 \u03b1\u03bb\u03bb\u03c9\u03c2 \u03b1\u03c4\u03b5\u03b9\u03bd\u03b5\u03b9 \u03b4\u03b9\u03ac x \u2192 x_0 \u03c0\u03c1\u03cc\u03c2 \u03c4\u03bf \u03bb, \u03cc\u03c0\u03bf\u03c5 \u03bb \in \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\} \u03ba\u03b9 \u03b8\u03ac \u03c3\u03c5\u03bc\u03b2\u03bf\u03bb\u03b9\u03b6\u03c9\u03bc\u03b5\u03bd \u03c4\u03bf\u03c5\u03c4\u03bf \u03bc\u03b5\u03c4 f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} l \u03b7 \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l \u03c4\u03cc\u03c4\u03b5 \u03ba\u03b9 \u03bc\u03cc\u03bd\u03bf\u03bd

\u03c4\u03cc\u03c4\u03b5, \u03b1\u03bd

$$\lim_{x \rightarrow x_0+0} f(x) = l = \lim_{x \rightarrow x_0-0} f(x).$$

Συνοτόμως :

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l, \\ l \in \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\} \end{array} \right\} \Leftrightarrow \lim_{\text{ορσ } x \rightarrow x_0+0} f(x) = l = \lim_{x \rightarrow x_0-0} f(x)$$

Τò l καλοῦμεν ὄριον ἢ ὀριακὴν τιμὴν τῆς συναρτήσεως f διὰ $x \rightarrow x_0$.

*Αν $l = 0$, τότε ἡ συνάρτησις f καλεῖται μηδενικὴ διὰ $x \rightarrow x_0$. Ἐπίσης εἰς τὴν περίπτωσιν, ὅπου $l = -\infty$ λέγομεν καὶ ὅτι ἡ συνάρτησις f ἀπειρίζεται ἀρνητικῶς διὰ $x \rightarrow x_0$, ἐνῶ εἰς τὴν περίπτωσιν, ὅπου $l = +\infty$ λέγομεν ὅτι αὕτη ἀπειρίζεται θετικῶς διὰ $x \rightarrow x_0$.

Παραδείγματα :

1. Ἡ συνάρτησις f μὲ $f(x) = \frac{x^2 - 5x + 6}{x - 2}$, $x \in (-\infty, 2) \cup (2, +\infty)$ συγκλίνει διὰ $x \rightarrow 2$ πρὸς τὸν ἀριθμὸν -1 . Πράγματι:

$$\frac{x^2 - 5x + 6}{x - 2} = \frac{(x - 2)(x - 3)}{x - 2} = x - 3 \quad \forall x \in \mathbb{R} - \{2\}.$$

Ἄλλὰ τότε προκύπτει εὐκόλως ὅτι $\lim_{x \rightarrow 2+0} (x - 3) = -1 = \lim_{x \rightarrow 2-0} (x - 3)$, δηλαδὴ

$$\lim_{x \rightarrow 2+0} \frac{x^2 - 5x + 6}{x - 2} = -1 = \lim_{x \rightarrow 2-0} \frac{x^2 - 5x + 6}{x - 2}, \quad \text{ἤτοι} \quad \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 5x + 6}{x - 2} = -1.$$

2. Ἡ συνάρτησις f μὲ $f(x) = \frac{1}{x^2}$, $x \in (-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ ἀπειρίζεται θετικῶς διὰ $x \rightarrow 0$. Πράγματι: ἐν πρώτοις ἔχομεν

$$\left. \begin{array}{l} x_v \rightarrow 0 \\ x_v > 0 \quad \forall v \in \mathbb{N} \end{array} \right\} \Rightarrow \frac{1}{x_v} \rightarrow +\infty \quad (\text{διατί;})$$

καὶ ἐπομένως $\frac{1}{x_v^2} = \frac{1}{x_v} \cdot \frac{1}{x_v} \rightarrow (+\infty)(+\infty) = +\infty$, ἤτοι $\lim_{x \rightarrow +0} \frac{1}{x^2} = +\infty$.

Ὁμοίως ἔχομεν

$$\left. \begin{array}{l} x_v \rightarrow 0 \\ x_v < 0 \quad \forall v \in \mathbb{N} \end{array} \right\} \Rightarrow \frac{1}{x_v} \rightarrow -\infty \quad (\text{διατί;})$$

καὶ ἐπομένως $\frac{1}{x_v^2} = \frac{1}{x_v} \cdot \frac{1}{x_v} \rightarrow (-\infty)(-\infty) = +\infty$, ἤτοι $\lim_{x \rightarrow -0} \frac{1}{x^2} = +\infty$.

*Ἀρα $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = +\infty$.

3.* Ἡ συνάρτησις f μὲ $f(x) = \frac{x-1}{x^2}$, $x \in (-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ ἀπειρίζεται ἀρνητικῶς διὰ $x \rightarrow 0$. Πράγματι: ἐν πρώτοις ἔχομεν

$$\left. \begin{array}{l} x_v \rightarrow 0 \\ x_v > 0 \quad \forall v \in \mathbb{N} \end{array} \right\} \Rightarrow \frac{x_v - 1}{x_v^2} = \frac{1}{x_v} \left(1 - \frac{1}{x_v}\right) \rightarrow (+\infty)(1 - (+\infty)) = (+\infty)(-\infty) = -\infty$$

καὶ ἐπομένως $\lim_{x \rightarrow +0} \frac{x-1}{x^2} = -\infty$.

Όμοιος έχουμε

$$\left. \begin{array}{l} x_v \rightarrow 0 \\ x_v < 0 \quad \forall v \in \mathbb{N} \end{array} \right\} \Rightarrow \frac{x_v - 1}{x_v^2} = \frac{1}{x_v} \left(1 - \frac{1}{x_v} \right) \rightarrow (-\infty)(1 - (-\infty)) = (-\infty)(+\infty) = -\infty$$

και επομένως $\lim_{x \rightarrow -0} \frac{x-1}{x^2} = -\infty$. Άρα $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x-1}{x^2} = -\infty$.

Σχετικώς με την σύγκλιση δια $x \rightarrow x_0$, $x_0 \in \mathbb{R}$ ισχύει το ακόλουθον βασικόν θεώρημα, τὸ ὁποῖον εἶναι ἀνάλογον τοῦ θεωρήματος 1.3.3 τοῦ ἀφορῶντος εἰς τὴν σύγκλιση δια $x \rightarrow +\infty$.

3.3.1 ΘΕΩΡΗΜΑ. Ἐστω f μία συνάρτησις ὀρισμένη τοῦλάχιστον εἰς ἐν σύνολον τῆς μορφῆς $(\alpha, x_0) \cup (x_0, \beta)$, $x_0 \in \mathbb{R}$. Ἡ συνάρτησις f συγκλίνει δια $x \rightarrow x_0$ πρὸς τὸ l ($l \in \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$) τότε καὶ μόνον τότε, ἀν δια κάθε ἀκολουθίαν x_v , $v = 1, 2, \dots$ με $x_v \in (\alpha, x_0) \cup (x_0, \beta) \quad \forall v \in \mathbb{N}$ καὶ $x_v \rightarrow x_0$ ἰσχύη $\lim f(x_v) = l$. Συντόμως :

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l, \\ l \in \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\} \end{array} \right\} \iff \left(\begin{array}{l} x_v \rightarrow x_0 \\ x_v \in (\alpha, x_0) \cup (x_0, \beta) \quad \forall v \in \mathbb{N} \end{array} \right) \Rightarrow \lim f(x_v) = l$$

Ἀπόδειξις. Α) Ἐστω $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$. Ἐὰς θεωρήσωμεν τυχοῦσαν ἀκολουθίαν x_v , $v = 1, 2, \dots$ με $x_v \in (\alpha, x_0) \cup (x_0, \beta) \quad \forall v \in \mathbb{N}$ καὶ $x_v \rightarrow x_0$ δια τὴν ὁποῖαν διακρίνομεν τὰς κάτωθι τρεῖς περιπτώσεις :

1. Ἰσχύει $x_v < x_0$ δι' ἐν πεπερασμένον πλῆθος δεικτῶν. Εἰς τὴν περίπτωσιν ταύτην δια διαγραφῆς τῶν ὄρων τῆς x_v , $v = 1, 2, \dots$, οἱ ὁποῖοι πληροῦν τὴν σχέσηιν $x_v < x_0$ προκύπτει μία ἀκολουθία y_v , $v = 1, 2, \dots$ δια τὴν ὁποῖαν προφανῶς ἰσχύει $y_v \in (x_0, \beta) \quad \forall v \in \mathbb{N}$ καὶ ἐπὶ πλέον, δυνάμει τῆς παρατηρήσεως τῆς § 1.4 τοῦ κεφ. IV, $y_v \rightarrow x_0$. Ἐπειδὴ ὑπετέθη $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$, ἰσχύει $\lim f(y_v) = l$, τὸ ὁποῖον, δυνάμει τῆς αὐτῆς ὡς ἀνωτέρω παρατηρήσεως, συνεπάγεται ὅτι $\lim f(x_v) = l$.

2. Ἰσχύει $x_v > x_0$ δι' ἐν πεπερασμένον πλῆθος δεικτῶν. Ἐντελῶς ἀναλόγως πρὸς τὴν προηγουμένην περίπτωσιν συνάγεται καὶ ἐδῶ ὅτι ἰσχύει $\lim f(x_v) = l$ (ἀπόδειξις);.

3. Οὐδέμια τῶν περιπτώσεων 1 ἢ 2 ἰσχύει. Δια διαγραφῆς τῶν ὄρων τῆς x_v , $v = 1, 2, \dots$, οἱ ὁποῖοι πληροῦν τὴν σχέσηιν $x_v < x_0$ προκύπτει μία ὑπακολουθία x_{k_v} , $v = 1, 2, \dots$ τῆς x_v , $v = 1, 2, \dots$ δια τὴν ὁποῖαν προφανῶς ἰσχύει $x_{k_v} \in (x_0, \beta) \quad \forall v \in \mathbb{N}$ καὶ ἐπὶ πλέον $x_{k_v} \rightarrow x_0$ (ἰδιότης 2, § 1.4.2 τοῦ κεφ. IV). Ἐπειδὴ ὑπετέθη $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$, ἰσχύει

$$(4) \quad \lim f(x_{k_v}) = l.$$

Όμοίως δια διαγραφῆς τῶν ὄρων τῆς x_v , $v = 1, 2, \dots$, οἱ ὁποῖοι πληροῦν τὴν σχέσηιν $x_v > x_0$ προκύπτει μία ὑπακολουθία x_{k_v} , $v = 1, 2, \dots$ τῆς x_v , $v = 1, 2, \dots$ δια

την όποιαν ισχύει $x_{\mu\nu} \in (\alpha, x_0) \quad \forall \nu \in \mathbb{N}$ και $x_{\mu\nu} \xrightarrow{\nu} x_0$. Άρα, έπειδή ύπετεθή $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$, ισχύει και

$$(5) \quad \lim f(x_{\mu\nu}) = l.$$

Άνωτέρω διεσπάσαμεν την άκολουθίαν x_ν , $\nu = 1, 2, \dots$ εις δύο ύπακολουθίας της τας $x_{\kappa\nu}$, $\nu = 1, 2, \dots$ και $x_{\mu\nu}$, $\nu = 1, 2, \dots$ διά τας όποίας ισχύουν άντιστοιχώς αι (4) και (5). Έκ τών σχέσεων τούτων άποδεικνύεται ότι ισχύει και $\lim f(x_\nu) = l$.

Όστε και εις τας τρεις άνωτέρω περιπτώσεις έδειχθη ότι $\lim f(x_\nu) = l$, δηλαδή ότι ή σχέσις $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$ συνεπάγεται την

$$(6) \quad \left. \begin{array}{l} x_\nu \rightarrow x_0 \\ x_\nu \in (\alpha, x_0) \cup (x_0, \beta) \quad \forall \nu \in \mathbb{N} \end{array} \right\} \Rightarrow \lim f(x_\nu) = l.$$

B) Έστω ότι ισχύει ή (6). Τότε αύτη προφανώς συνεπάγεται άφ' ένός μόν

$$\left. \begin{array}{l} x_\nu \rightarrow x_0 \\ x_\nu \in (x_0, \beta) \quad \forall \nu \in \mathbb{N} \end{array} \right\} \Rightarrow \lim f(x_\nu) = l, \quad \text{ήτοι} \quad \lim_{x \rightarrow x_0+0} f(x) = l,$$

άφ' έτέρου δε

$$\left. \begin{array}{l} x_\nu \rightarrow x_0 \\ x_\nu \in (\alpha, x_0) \quad \forall \nu \in \mathbb{N} \end{array} \right\} \Rightarrow \lim f(x_\nu) = l, \quad \text{ήτοι} \quad \lim_{x \rightarrow x_0-0} f(x) = l.$$

Άρα ή (6) συνεπάγεται την $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$.

4*. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΛΙΝΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

4.1 Έστωσαν $\sigma \in \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$ και f μία συνάρτησις ώρισμένη τούλάχι- στον εις έν σύνολον $U(\sigma)$ τής μορφής:

$$(\alpha, \sigma) \cup (\sigma, \beta), \quad \text{άν } \sigma \in \mathbb{R}$$

$$(\alpha, +\infty), \quad \text{άν } \sigma = +\infty$$

$$(-\infty, \alpha), \quad \text{άν } \sigma = -\infty.$$

Εις τά προηγούμενα έδάφια έχει όρισθί εις όλας τας περιπτώσεις ή έννοια $\lim_{x \rightarrow \sigma} f(x) = l$, όπου $l \in \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$. Τό l καλείται τότε *όριον* ή *όριακή τιμή*

της συναρτήσεως f διά $x \rightarrow \sigma$.

Ός ειδομεν ήδη ή σύγκλισις μιās συναρτήσεως διά $x \rightarrow \sigma$ χαρακτηρίζεται πάντοτε έκ τών συγκλινουσών άκολουθιών πρός τό σ και τούτο άλλοτε μόν έξ όρισμού (πρβλ. π.χ. § 1.2), άλλοτε δε ύπό θεωρημάτων (πρβλ. π.χ. θεωρήματα 1.3.3 και 3.3.1). Σχετικώς ισχύει δι'όλας τας περιπτώσεις τό ακόλουθον θεώρημα.

4.1.1 ΘΕΩΡΗΜΑ. Η συνάρτησις f συγκλίνει διά $x \rightarrow \sigma$ πρός τό l ($l \in \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$) τότε και μόνον τότε, άν διά κάθε άκολουθίαν x_ν , $\nu = 1, 2, \dots$ με $x_\nu \in U(\sigma) \quad \forall \nu \in \mathbb{N}$ και $x_\nu \rightarrow \sigma$ ισχύη $\lim f(x_\nu) = l$. Συντόμως :

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow \sigma} f(x) = l, \\ l \in \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\} \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left(\begin{array}{l} x_v \rightarrow \sigma \\ x_v \in U(\sigma) \quad \forall v \in \mathbb{N} \end{array} \right) \Rightarrow \lim f(x_v) = l$$

Ἀπόδειξις. Διὰ $\sigma = +\infty$, τὸ θεώρημα τοῦτο συμπίπτει μὲ τὸ θεώρημα 1.3.3. Ὁμοίως καὶ διὰ $\sigma = -\infty$, τὸ θεώρημα πάλιν ἰσχύει (πρβλ. § 2.1). Τέλος, διὰ $\sigma \in \mathbb{R}$, τὸ θεώρημα συμπίπτει μὲ τὸ θεώρημα 3.3.1.

Τῇ βοήθειά τοῦ θεωρήματος τούτου ἀποδεικνύονται εὐκόλως καὶ διὰ τὰς συγκλινοῦσας συναρτήσεις ἀνάλογοι ἰδιότητες πρὸς ἐκείνας τῶν ἀκολουθιῶν. Πρὶν ὅμως διατυπώσωμεν κατωτέρω τὰς ἰδιότητες τῶν συγκλινοῦσῶν συναρτήσεων θὰ ὀρίσωμεν πρῶτον τὴν ἔννοιαν τῆς *φραγμένης συναρτήσεως*, ἡ ὁποία συνδέεται μὲ τὴν ἔννοιαν τῆς συγκλίσεως συναρτήσεως, ὡς ἀκριβῶς συμβαίνει καὶ μὲ τὰς ἀκολουθίας (πρβλ. ἰδιότητες 3 καὶ 5 τῆς § 1.3.1., ὡς ἐπίσης καὶ ἰδιότητα 3 τῆς § 1.4.2 τοῦ κεφ. IV).

Μία συνάρτησις f , ὡς ἀνωτέρω, καλεῖται *φραγμένη εἰς τὴν περιοχὴν τοῦ σ* τότε καὶ μόνον τότε, ἂν ὑπάρχη πραγματικὸς ἀριθμὸς θ τοιοῦτος, ὥστε νὰ ἰσχύη

$$|f(x)| \leq \theta \quad \forall x \in U(\sigma).$$

Τὸ θ καλεῖται τότε *φράγμα τῆς f εἰς τὴν περιοχὴν τοῦ σ* .

Π.χ. ἡ συνάρτησις f μὲ $f(x) = \frac{1}{x}$ εἶναι φραγμένη τόσο εἰς τὴν περιοχὴν τοῦ $+\infty$, ὅσον καὶ τοῦ $-\infty$, διότι ἰσχύει ἀφ' ἑνὸς μὲν

$$\left| \frac{1}{x} \right| \leq 1 \quad \forall x \in (1, +\infty),$$

ἀφ' ἑτέρου δὲ

$$\left| \frac{1}{x} \right| \leq 1 \quad \forall x \in (-\infty, -1).$$

Ὁμοίως αὕτη εἶναι φραγμένη καὶ εἰς τὴν περιοχὴν τοῦ 2, διότι ἰσχύει

$$\left| \frac{1}{x} \right| \leq 1 \quad \forall x \in (1, 2) \cup (2, +\infty).$$

Ἀντιθέτως αὕτη δὲν εἶναι φραγμένη εἰς τὴν περιοχὴν τοῦ 0 (διατί;).

4.1.2 Δυνάμει τοῦ θεωρήματος 4.1.1 ἀποδεικνύονται αἱ κάτωθι ἰδιότητες τῶν συγκλινοῦσῶν συναρτήσεων ὑπὸ τὴν προϋπόθεσιν ὅπως αἱ σημειούμεναι ἐπὶ τῶν ὁριακῶν τιμῶν πράξεις εἶναι ἐπιτρεπταί.

$$1. \left. \begin{array}{l} f \text{ φραγμένη εἰς τὴν περιοχὴν τοῦ } \sigma \\ \lim_{x \rightarrow \sigma} g(x) = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \sigma} f(x)g(x) = 0.$$

$$2. \lim_{x \rightarrow \sigma} f(x) = 0 \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow \sigma} |f(x)| = 0 \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow \sigma} (-f(x)) = 0.$$

$$3. \left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \sigma} g(x) = 0 \\ |f(x)| \leq |g(x)| \quad \forall x \in U(\sigma) \end{aligned} \right\} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \sigma} f(x) = 0.$$

$$4. \lim_{x \rightarrow \sigma} f(x) = l \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \sigma} |f(x)| = \begin{cases} |l|, & \text{\textit{αν } } l \in \mathbb{R} \\ +\infty, & \text{\textit{αν } } l = +\infty \text{ \textit{ ή } } -\infty. \end{cases}$$

$$5. \lim_{x \rightarrow \sigma} f(x) = l, l \in \mathbb{R} \Rightarrow f \text{ \textit{είναι φραγμένη εις τήν περιοχήν του } } \sigma.$$

$$6. \left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \sigma} f(x) = l_1 \\ \lim_{x \rightarrow \sigma} g(x) = l_2 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \sigma} (f(x) + g(x)) = l_1 + l_2$$

$$7. \left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \sigma} f(x) = l_1 \\ \lim_{x \rightarrow \sigma} g(x) = l_2 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \sigma} f(x)g(x) = l_1 l_2.$$

Αυτή μετά της προηγούμενης ιδιότητος 6 συνεπάγονται και την

$$\left. \begin{aligned} \xi \in \mathbb{R}, \lim_{x \rightarrow \sigma} f(x) = l_1 \\ \eta \in \mathbb{R}, \lim_{x \rightarrow \sigma} g(x) = l_2 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \sigma} (\xi f(x) + \eta g(x)) = \xi l_1 + \eta l_2.$$

Ειδικῶς διά $\xi = 1$ καὶ $\eta = -1$, προκύπτει

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \sigma} f(x) = l_1 \\ \lim_{x \rightarrow \sigma} g(x) = l_2 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \sigma} (f(x) - g(x)) = l_1 - l_2.$$

$$8. \left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \sigma} f(x) = l \neq 0 \\ f(x) \neq 0 \quad \forall x \in U(\sigma) \end{aligned} \right\} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \sigma} \frac{1}{f(x)} = \frac{1}{l}.$$

Αυτή μετά της προηγούμενης ιδιότητος 7 συνεπάγονται και την

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \sigma} f(x) = l_1 \neq 0 \\ \lim_{x \rightarrow \sigma} g(x) = l_2 \\ f(x) \neq 0 \quad \forall x \in U(\sigma) \end{aligned} \right\} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \sigma} \frac{g(x)}{f(x)} = \frac{l_2}{l_1}.$$

$$9. \left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \sigma} f(x) = l_1 \\ \lim_{x \rightarrow \sigma} g(x) = l_2 \\ f(x) \leq g(x) \quad \forall x \in U(\sigma) \end{aligned} \right\} \Rightarrow l_1 \leq l_2.$$

$$10. \left. \begin{aligned} f(x) \leq h(x) \leq g(x) \quad \forall x \in U(\sigma) \\ \lim_{x \rightarrow \sigma} f(x) = l, \quad \lim_{x \rightarrow \sigma} g(x) = l \end{aligned} \right\} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \sigma} h(x) = l.$$

$$11. \lim_{x \rightarrow \sigma} f(x) = l \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \sigma} \sqrt{|f(x)|} = \begin{cases} \sqrt{|l|}, & \text{\textit{αν } } l \in \mathbb{R} \\ +\infty, & \text{\textit{αν } } l = +\infty \text{ \textit{ ή } } -\infty. \end{cases}$$

5. ΑΣΚΗΣΕΙΣ

5.1 Υπολογίσατε τās κάτωθι όριακές τιμές :

$$1) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^5 + 3} \quad 2) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\eta\mu x}{x} \quad 3) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\eta\mu 5x}{x^2 + 7}$$

$$4) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x\eta\mu x}{x^2 + 1} \quad 5) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + 1}{x - 1} \quad 6) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + 1}{x^2 - 1}$$

5.2 Υπολογίσατε τās κάτωθι όριακές τιμές :

$$1) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^4 + 3x^2 + 7}{x^4 - x^2 + 2} \quad 2) \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x(x+\alpha)} - x) \quad 3) \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{4x^2 + 5x + 2} - 2x)$$

$$4)^* \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^5 + 7x}{3x^2 + 1} \quad 5)^* \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x - x^3}{5x^2 + 1} \quad 6)^* \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^5 - x^8}{x^4 + 8x^3 + 7}$$

$$7)^* \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^4 - x^7}{x^6 + 7} \quad 8)^* \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3 - x^2}{x^2 + 2} \quad 9)^* \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x - x^5}{7x^2 + 2}$$

5.3 Υπολογίσατε τās κάτωθι όριακές τιμές :

$$1) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 \eta\mu x}{x^3 + 1} \quad 2) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3 + 2x}{-x^2 + 8} \quad 3) \lim_{x \rightarrow -\infty} x (\sqrt{x^2 + 1} + x)$$

5.4 * Υπολογίσατε τās κάτωθι όριακές τιμές :

$$1) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 + 1}{2x + 4} \quad 2) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3}{x + 7} \quad 3) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^7}{x^4 + 2} \quad 4) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x - x^3}{x^2 + 3x + 4}$$

5.5 Υπολογίσατε τās κάτωθι όριακές τιμές :

$$1) \lim_{x \rightarrow 1+0} \frac{x^2 - 2x + 4}{x - 1} \quad 2) \lim_{x \rightarrow 1-0} \frac{x^2 - 2x + 4}{x - 1}$$

$$3) \lim_{x \rightarrow 2+0} \frac{|x - 2| + x^2 - 3x + 2}{x - 2} \quad 4) \lim_{x \rightarrow 2-0} \frac{|x - 2| + x^2 - 3x + 2}{x - 2}$$

$$5) \lim_{x \rightarrow +0} \frac{x^2 + 2}{|x|x} \quad 6) \lim_{x \rightarrow -0} \frac{x^2 + 2}{|x|x}$$

5.6 Όμοίως υπολογίσατε τās όριακές τιμές :

$$1) \lim_{x \rightarrow \sqrt{2}} \frac{x^4 - 4}{x^2 - 2} \quad 2) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 + 2x - 3}{x - 1} \quad 3) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 3x - 4}{2x^2 - 5x + 3}$$

$$4) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^\lambda - 1}{x^\mu - 1} \quad (\lambda, \mu \text{ φυσικοί αριθμοί}) \quad 5) \lim_{x \rightarrow \sqrt{2}} \frac{5x^3 - 3\sqrt{2}x^2 - 4x}{x^2 - 2}$$

$$6) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 + 1}{x^2} \quad 7) \lim_{x \rightarrow -1} \frac{3x^2 + 6x}{x^2 + 2x + 1} \quad 8) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - 1}{|x|}$$

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VI

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

1. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΣ


1.1. Αί θεωρούμεναι και είς τό παρόν κεφάλαιον συναρτήσεις είναι όλαι πραγματικά συναρτήσεις μιās πραγματικής μεταβλητής.

Διά τήν συνάρτησιν g μέ $g(x) = \begin{cases} \frac{x^2-1}{x-1}, & \text{άν } x \neq 1 \\ 0, & \text{άν } x = 1 \end{cases}$ παρατηρούμεν ότι

$$\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2-1}{x-1} = 2 \neq 0 = g(1)$$


Αντιθέτως διά τήν συνάρτησιν h μέ $h(x) = \begin{cases} \frac{x^2-1}{x-1}, & \text{άν } x \neq 1 \\ 2, & \text{άν } x = 1 \end{cases}$ παρατηρούμεν ότι

$$\lim_{x \rightarrow 1} h(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2-1}{x-1} = 2 = h(1).$$



Σχ. 63

g είναι άσυνεχής είς τό 1



Σχ. 64



h είναι συνεχής είς τό 1

Είς τήν δευτέραν περίπτωσιν λέγομεν ότι ή συνάρτησιν h είναι συνεχής είς τό σημείον 1 (σχ. 64), ένώ είς τήν πρώτην περίπτωσιν λέγομεν ότι ή συνάρτησιν g είναι άσυνεχής είς τό σημείον 1 (σχ. 63).

Επίσης, διά τās συναρτήσεις φ και ψ μέ

$$\varphi(x) = \begin{cases} |x|, & \text{άν } x \leq 0 \\ x+1, & \text{άν } x > 0 \end{cases} \quad \text{και} \quad \psi(x) = \begin{cases} x, & \text{άν } x \leq 0 \\ \frac{1}{x}, & \text{άν } x > 0 \end{cases}$$

παρατηρούμεν ότι είναι άσυνεχες εις το σημείον 0, ως εμφανίζεται εις τὰς κατωτέρω γεωμετρικὰς παραστάσεις αὐτῶν.



Γενικῶς διὰ μίαν συνάρτησιν f μὲ πεδίουν ὀρισμοῦ ἐν διάστημα Δ λέγομεν ὅτι αὕτη εἶναι *συνεχῆς* εἰς τὸ σημείον $x_0 \in \Delta$, τότε καὶ μόνον τότε, ἂν

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0).$$

Παρατηρήσεις. Ἐάν τὸ x_0 εἶναι τὸ ἀριστερὸν ἄκρον τοῦ διαστήματος Δ , τότε εἰς τὸν ἀνωτέρω ὀρισμὸν διὰ τοῦ $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ ἐννοοῦμεν τὸ $\lim_{x \rightarrow x_0+0} f(x)$, ἐνῶ ἂν τὸ x_0 εἶναι τὸ δεξιὸν ἄκρον τοῦ διαστήματος Δ , ἐννοοῦμεν τὸ $\lim_{x \rightarrow x_0-0} f(x)$.

Ἐάν ἡ συνάρτησις f εἶναι συνεχῆς εἰς κάθε σημείον τοῦ διαστήματος Δ , τότε λέγομεν ὅτι αὕτη εἶναι *συνεχῆς* εἰς τὸ Δ ἢ ἀπλῶς, εἶναι *συνεχῆς*.

1.1.1 ΘΕΩΡΗΜΑ. Ἡ συνάρτησις f εἶναι συνεχῆς εἰς τὸ σημείον $x_0 \in \Delta$ τότε καὶ μόνον τότε, ἂν διὰ κάθε ἀκολουθίαν $x_n, n = 1, 2, \dots$ μὲ $x_n \in \Delta \forall n \in \mathbb{N}$ καὶ $x_n \rightarrow x_0$ ἰσχύει $\lim f(x_n) = f(x_0)$. Συντόμως :

$$f \text{ συνεχῆς εἰς τὸ } x_0 \in \Delta \Leftrightarrow \left(\begin{array}{l} x_n \rightarrow x_0 \\ x_n \in \Delta \forall n \in \mathbb{N} \end{array} \right) \Rightarrow \lim f(x_n) = f(x_0)$$

Ἀπόδειξις. Ἐξ ὀρισμοῦ, τὸ ὅτι ἡ f εἶναι συνεχῆς εἰς τὸ $x_0 \in \Delta$ σημαίνει ὅτι $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$. Τοῦτο πάλιν, ἂν τὸ x_0 εἶναι ἄκρον τοῦ διαστήματος Δ , σημαίνει, ἐξ ὀρισμοῦ, ὅτι (πρβλ. § 3.1 καὶ § 3.2 τοῦ κεφ. V).

$$(1) \quad \left. \begin{array}{l} x_n \rightarrow x_0 \\ x_n \in \Delta \forall n \in \mathbb{N} \end{array} \right\} \Rightarrow \lim f(x_n) = f(x_0).$$

Εἰς τὴν περίπτωσιν, ὅπου τὸ σημείον $x_0 \in \Delta$ δὲν εἶναι ἄκρον τοῦ διαστήματος Δ , τότε ἡ ἰσοδυναμία τῆς σχέσεως $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$ καὶ τῆς (1) συνάγεται ἐκ τοῦ θεωρήματος 3.3.1 τοῦ κεφ. V.

Παραδείγματα :

1. Κάθε σταθερά συνάρτησις είναι συνεχής (διατί;).

2. 'Η συνάρτησις f με $f(x) = x$ είναι συνεχής. Πράγματι

$$x_v \rightarrow x_0 \Rightarrow f(x_v) = x_v \rightarrow x_0 = f(x_0).$$

"Άρα $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$ και τούτο διά κάθε x_0 .

3. 'Η συνάρτησις f με $f(x) = ax^k$ (κ φυσικός αριθμός) είναι συνεχής. Πράγματι

$$x_v \rightarrow x_0 \Rightarrow f(x_v) = ax_v^k \rightarrow ax_0^k = f(x_0) \text{ (διατί;)}.$$

"Άρα $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$ και τούτο διά κάθε x_0 .

4. 'Η συνάρτησις f με $f(x) = |x|$ είναι συνεχής. Πράγματι κατά την ιδιότητα 1 τών συγκλινουσών ακολουθιών (§ 1.4.2 του κεφ. IV) έχουμε

$$x_v \rightarrow x_0 \Rightarrow |x_v| \rightarrow |x_0| \Rightarrow f(x_v) \rightarrow f(x_0).$$

"Άρα $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$ και τούτο διά κάθε x_0 .

1.2. 'Ιδιότητες τών συνεχών συναρτήσεων. Είς τὰ κατωτέρω θεωρήματα δίδονται μερικοί βασικοί ιδιότητες τών συνεχών συναρτήσεων.

1.2.1 ΘΕΩΡΗΜΑ "Εστωσαν f και g συναρτήσεις με κοινόν πεδίο ορισμού ἐν διάστημα Δ . "Αν αἱ f και g είναι συνεχείς συναρτήσεις, τότε τόσον τὸ ἄθροισμα $f + g$ ὅσον και τὸ γινόμενον fg αὐτῶν είναι συνεχείς συναρτήσεις. "Αν δὲ ἐπὶ πλέον $g(x) \neq 0 \forall x \in \Delta$, τότε και τὸ πηλίκον $\frac{f}{g}$ είναι συνεχής συνάρτησις.

"Απόδειξις. "Επειδὴ αἱ συναρτήσεις f και g είναι συνεχείς εἰς τὸ τυχόν σημείον x_0 τοῦ διαστήματος Δ , θὰ ἰσχύη

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0) \text{ και } \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = g(x_0).$$

"Επομένως διά τὴν τυχούσαν ἀκολουθίαν $x_v, v = 1, 2, \dots$ με $x_v \in \Delta \forall v \in \mathbb{N}$ και $x_v \rightarrow x_0$ θὰ ἰσχύη

$$(2) \quad \lim_{x \rightarrow x_0} f(x_v) = f(x_0) \text{ και } \lim_{x \rightarrow x_0} g(x_v) = g(x_0),$$

ἄρα

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x_v) + g(x_v)) = f(x_0) + g(x_0) \text{ και } \lim_{x \rightarrow x_0} f(x_v)g(x_v) = f(x_0)g(x_0).$$

"Ὡστε ἐδείχθη ὅτι

$$\left. \begin{array}{l} x_v \rightarrow x_0 \\ x_v \in \Delta \forall v \in \mathbb{N} \end{array} \right\} \Rightarrow (f+g)(x_v) = f(x_v) + g(x_v) \rightarrow f(x_0) + g(x_0) = (f+g)(x_0)$$

και

$$\left. \begin{array}{l} x_v \rightarrow x_0 \\ x_v \in \Delta \forall v \in \mathbb{N} \end{array} \right\} \Rightarrow (fg)(x_v) = f(x_v)g(x_v) \rightarrow f(x_0)g(x_0) = (fg)(x_0),$$

ἄρα, δυνάμει τοῦ θεωρήματος 1.1.1, προκύπτει ὅτι αἱ συναρτήσεις $f + g$ και fg είναι συνεχείς εἰς τὸ x_0 και τούτο διά κάθε $x_0 \in \Delta$.

Ἄν τώρα ὑποθέσωμεν καὶ $g(x) \neq 0 \ \forall \ x \in \Delta$, τότε, ἐκ τῆς (2) καὶ τοῦ ὅτι προφανῶς $g(x_v) \neq 0 \ \forall \ v \in \mathbb{N}$, προκύπτει ὅτι

$$\lim \frac{f(x_v)}{g(x_v)} = \frac{f(x_0)}{g(x_0)},$$

ἤτοι ὅτι

$$\left. \begin{array}{l} x_v \rightarrow x_0 \\ x_v \in \Delta \ \forall \ v \in \mathbb{N} \end{array} \right\} \Rightarrow \left(\frac{f}{g} \right)(x_v) = \frac{f(x_v)}{g(x_v)} \rightarrow \frac{f(x_0)}{g(x_0)} = \left(\frac{f}{g} \right)(x_0),$$

ὁπότε, δυνάμει τοῦ θεωρήματος 1.1.1, προκύπτει ὅτι καὶ ἡ συνάρτησις $\frac{f}{g}$ εἶναι συνεχὴς εἰς τὸ x_0 καὶ τοῦτο διὰ κάθε $x_0 \in \Delta$.

Ἐφαρμογή. Ὡς μία ἀπλὴ ἐφαρμογὴ τοῦ θεωρήματος τούτου προκύπτει ὅτι κάθε πολυωνυμικὴ συνάρτησις εἶναι συνεχὴς, ὡς ἄθροισμα μονωνύμων συναρτήσεων, αἱ ὅποιαι, ὡς εἶδομεν εἰς τὸ παράδειγμα 3, εἶναι συνεχεῖς συναρτήσεις. Ἐπίσης καὶ αἱ ρητὰι συναρτήσεις εἶναι συνεχεῖς συναρτήσεις, διότι μία ρητὴ συνάρτησις εἶναι πηλίκον πολυωνυμικῶν συναρτήσεων, δηλαδὴ συνεχῶν συναρτήσεων.

1.2.2 ΘΕΩΡΗΜΑ. Ἐστώσαν αἱ συναρτήσεις $g : \Delta \rightarrow A$ καὶ $f : A \rightarrow R$, ὅπου A καὶ Δ εἶναι διαστήματα. Τότε, ὡς γνωστόν, ὀρίζεται ἡ σύνθεσις $h = f \circ g$ αὐτῶν διὰ τοῦ τύπου $h(x) = f(g(x))$, $x \in \Delta$ καὶ μάλιστα ἰσχύει

$$\left. \begin{array}{l} f \text{ συνεχὴς} \\ g \text{ συνεχὴς} \end{array} \right\} \Rightarrow f \circ g \text{ συνεχὴς}.$$

Ἀπόδειξις. Ἐστώσαν σημεῖον $x_0 \in \Delta$ καὶ x_v , $v = 1, 2, \dots$ τυχοῦσα ἀκολουθία μὲ $x_v \in \Delta \ \forall \ v \in \mathbb{N}$ καὶ $x_v \rightarrow x_0$. Τότε, ἐπειδὴ ἡ συνάρτησις g εἶναι συνεχὴς, ἔχομεν $\lim g(x_v) = g(x_0)$. Ἐπίσης, λόγω τῆς συνεχείας τῆς f , ἔχομεν ὅτι $\lim f(g(x_v)) = f(g(x_0))$.

Ἄρα ἐδείχθη ὅτι ἂν f καὶ g εἶναι συνεχεῖς συναρτήσεις, τότε




$$\left. \begin{array}{l} x_v \rightarrow x_0 \\ x_v \in \Delta \ \forall \ v \in \mathbb{N} \end{array} \right\} \Rightarrow \lim h(x_v) = h(x_0),$$

δηλαδὴ ὅτι ἡ σύνθεσις $h = f \circ g$ τῶν g καὶ f εἶναι συνεχὴς εἰς τὸ σημεῖον x_0 καὶ τοῦτο διὰ κάθε $x_0 \in \Delta$.

Σημείωσις. Ἡ σύνθεσις $h = f \circ g$ δυνατὸν νὰ εἶναι συνεχὴς, χωρὶς αἱ συναρτήσεις g καὶ f νὰ εἶναι συνεχεῖς. Οὕτω διὰ:

$$g(x) = \begin{cases} x, & \text{ἂν } x < 0 \\ x+1, & \text{ἂν } x \geq 0 \end{cases} \quad \text{καὶ} \quad f(x) = \begin{cases} x+1, & \text{ἂν } x < 0 \\ x, & \text{ἂν } x \geq 0 \end{cases}$$

ἔχομεν $h(x) = f(g(x)) = x+1$, (διατί;) δηλαδὴ ἡ σύνθεσις $h = f \circ g$ τῶν ἀσυνεχῶν συναρτήσεων g καὶ f εἶναι συνεχὴς συνάρτησις.



Παραδείγματα :

1. 'Η συνάρτησις h με $h(x) = \sqrt{\alpha^2 - x^2}$ (α θετικός αριθμός) είναι συνεχής. Τοῦτο προκύπτει εύκολως ἐκ τοῦ ἀνωτέρω θεωρήματος 1.2.2, καθ' ὅσον ἡ συνάρτησις h δύναται νὰ θεωρηθῆ ὡς σύνθεσις δύο συναρτήσεων g καὶ f με $g(x) = \alpha^2 - x^2$, $-\alpha \leq x \leq \alpha$ καὶ $f(x) = \sqrt{x}$, $0 \leq x < +\infty$, αὐ ὅποια εἶναι συνεχεῖς (διατί);.

2. 'Η συνάρτησις h με $h(x) = \sqrt{\frac{x^2+1}{x^2+1}}$ εἶναι συνεχής. Πράγματι ἡ συνάρτησις h δύναται νὰ θεωρηθῆ ὡς σύνθεσις δύο συναρτήσεων g καὶ f με $g(x) = \frac{x^2+1}{x^2+1}$ καὶ $f(x) = \sqrt{x}$, αὐ ὅποια εἶναι συνεχεῖς (διατί);.

2. Αἱ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

2.1 'Η συνάρτησις ἡμίτονον εἶναι συνεχής. Ὡς γνωστὸν ἐκ τῆς τριγωνομετρίας ἰσχύει ἀφ' ἑνὸς μὲν ὁ τύπος

$$\eta \mu x - \eta \mu x_0 = 2 \eta \mu \frac{x-x_0}{2} \sigma \nu \nu \frac{x+x_0}{2},$$

ἀφ' ἑτέρου δὲ

$$|\eta \mu t| \leq |t| \text{ καὶ } |\sigma \nu \nu t| \leq 1 \quad \forall t \in \mathbb{R}.$$

Ἐπομένως θὰ ἔχωμεν

$$(3) \quad |\eta \mu x - \eta \mu x_0| = 2 \left| \eta \mu \frac{x-x_0}{2} \right| \left| \sigma \nu \nu \frac{x+x_0}{2} \right| \leq 2 \frac{|x-x_0|}{2} \cdot 1 = |x-x_0|.$$

Ἄν τώρα x_ν , $\nu = 1, 2, \dots$ εἶναι τυχοῦσα ἀκολουθία πραγματικῶν ἀριθμῶν με $x_\nu \rightarrow x_0$, τότε ἡ (3) δίδει

$$|\eta \mu x_\nu - \eta \mu x_0| \leq |x_\nu - x_0| \rightarrow 0,$$

ἥτοι $\eta \mu x_\nu - \eta \mu x_0 \rightarrow 0$, δηλαδή $\lim \eta \mu x_\nu = \eta \mu x_0$.

Ὡστε ἐδείχθη ὅτι $x_\nu \rightarrow x_0 \Rightarrow \lim \eta \mu x_\nu = \eta \mu x_0$ καὶ τοῦτο διὰ κάθε x_0 , ἥτοι ὅτι ἡ συνάρτησις $\eta \mu$ εἶναι συνεχής.


Ἄς μελετήσωμεν τώρα τὴν συνάρτησιν ἡμίτονον. Δι' αὐτὴν εἶναι γνωστὸν ἐκ τῆς τριγωνομετρίας ὅτι εἶναι περιοδική με περίοδον 2π , δηλαδή ἰσχύει

$$\eta \mu(x + 2\pi) = \eta \mu x \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Ἄρκει ἐπομένως νὰ μελετήσωμεν ταύτην εἰς ἓν διάστημα μήκους 2π π.χ. εἰς τὸ διάστημα $[-\pi, \pi]$. Ἡ μεταβολὴ τῆς συνεχοῦς συναρτήσεως $\eta \mu$ εἰς τὸ διάστημα $[-\pi, \pi]$ δίδεται εἰς τὸν κάτωθι πίνακα

x	$-\pi$	$-\frac{\pi}{2}$	0	$\frac{\pi}{2}$	π
ημx	0 ↘	-1 ↗	0 ↗	1 ↘	0

Έκ του πίνακος τούτου έμφαίνεται ότι εις τὸ σημεῖον $-\frac{\pi}{2}$ ἡ συνάρτησις ημ παρουσιάζει ἐλάχιστον ἴσον μὲ -1 , ἐνῶ εις τὸ σημεῖον $\frac{\pi}{2}$ παρουσιάζει μέγιστον ἴσον μὲ 1 . Γενικῶς αὕτη παρουσιάζει εις τὰ σημεία $2k\pi - \frac{\pi}{2}$, $k=0, \pm 1, \pm 2, \dots$ ἐλάχιστον ἴσον μὲ -1 καὶ εις τὰ σημεία $2k\pi + \frac{\pi}{2}$, $k=0, \pm 1, \pm 2, \dots$ μέγιστον ἴσον μὲ 1 .



Σχ. 65 $y = \eta\mu x$.


2.2 Ἡ συνάρτησις συνημίτονον είναι συνεχής. Ὡς γνωστὸν ἐκ τῆς τριγωνομετρίας ἰσχύει

$$(4) \quad \sigma\upsilon\nu x = \eta\mu\left(\frac{\pi}{2} - x\right) \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

καὶ ἐπομένως ἡ συνάρτησις συνημίτονον δύναται νὰ θεωρηθῇ ὡς σύνθεσις τῶν συνεχῶν συναρτήσεων g μὲ $g(x) = \frac{\pi}{2} - x$ καὶ ημ, τὸ ὁποῖον, δυνάμει τοῦ θεωρήματος 1.2.2, συνεπάγεται τὴν συνέχειαν τῆς συναρτήσεως συν.

Ἡ συνάρτησις συνημίτονον είναι περιοδικὴ μὲ περίοδον 2π ὡς τοῦτο συνάγεται ἐκ τοῦ τύπου (4) ἐκ τοῦ ὁποῖου προκύπτει καὶ ὁ κάτωθι πίναξ μεταβολῆς αὐτῆς εις τὸ διάστημα $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right]$.

x	$-\frac{\pi}{2}$	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$
συνx	0 ↗	1 ↘	0 ↘	-1 ↗	0



Σχ. 66 $y = \sigma\upsilon\nu x$.

Ἡ συνάρτησις συνημίτονον παρουσιάζει εἰς τὸ σημεῖον 0 μέγιστον ἴσον μὲ 1, ἐνῶ εἰς τὸ σημεῖον π ἐλάχιστον ἴσον μὲ -1 . Γενικῶς αὕτη παρουσιάζει εἰς τὰ σημεῖα $2k\pi$, $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ μέγιστον ἴσον μὲ 1 καὶ εἰς τὰ σημεῖα $(2k+1)\pi$, $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ ἐλάχιστον ἴσον μὲ -1 .

2.3 Ἡ συνάρτησις ἔφαπτομένη εἶναι συνεχῆς. Ἡ συνάρτησις ἐφ ὀρίζεται, ὡς γνωστόν, ὑπὸ τοῦ τύπου $\epsilon\phi x = \frac{\eta\mu x}{\sigma\upsilon\nu x}$ καὶ ἔχει πεδῖον ὀρισμοῦ τὸ σύνολον τῶν πραγματικῶν ἀριθμῶν ἐξαιρέσει τῶν ριζῶν τῆς συναρτήσεως $\sigma\upsilon\nu$, δηλαδὴ τῶν ἀριθμῶν $k\pi + \frac{\pi}{2}$, $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ Ἡ συνάρτησις ἐφ ὡς πηλίκον συνεχῶν συναρτήσεων εἶναι, δυνάμει τοῦ θεωρήματος 1.2.1, συνεχῆς εἰς κάθε διάστημα τῆς μορφῆς $(k\pi + \frac{\pi}{2}, (k+1)\pi + \frac{\pi}{2})$, $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ Διὰ τὴν συνάρτησιν ταύτην ἰσχύει ὡς γνωστόν

$$\epsilon\phi(x + \pi) = \epsilon\phi x \quad \forall x \neq k\pi + \frac{\pi}{2}, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

καὶ ἔπομένως ἀρκεῖ νὰ τὴν μελετήσωμεν εἰς τὸ διάστημα $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$.

Ἡ συνάρτησις ἐφ εἶναι γνησίως ἀύξουσα ἐν $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$. Πράγματι· ἀφ'

ἐνὸς μὲν ἔχομεν $\eta\mu \nearrow [0, \frac{\pi}{2})$ καὶ $\sigma\upsilon\nu \searrow [0, \frac{\pi}{2})$, τὰ ὁποῖα συνεπάγονται ὅτι

$$0 \leq x_1 < x_2 < \frac{\pi}{2} \Rightarrow \begin{cases} 0 \leq \eta\mu x_1 < \eta\mu x_2 \\ 0 < \sigma\upsilon\nu x_2 < \sigma\upsilon\nu x_1 \end{cases} \Rightarrow \epsilon\phi x_1 < \epsilon\phi x_2,$$

ἦτοι ὅτι ἐφ $\nearrow [0, \frac{\pi}{2})$, ἀφ' ἐτέρου δέ, ἐπειδὴ ἡ ἐφ εἶναι περιττὴ συνάρτησις, δηλαδὴ ἰσχύει $\epsilon\phi x = -\epsilon\phi(-x)$, ἔχομεν

$$-\frac{\pi}{2} < x_1 < x_2 \leq 0 \Rightarrow 0 \leq -x_2 < -x_1 < \frac{\pi}{2} \Rightarrow \epsilon\phi(-x_2) < \epsilon\phi(-x_1) \Rightarrow \epsilon\phi x_1 < \epsilon\phi x_2, \quad \text{ἦτοι ἐφ} \nearrow (-\frac{\pi}{2}, 0].$$

Ἐπίσης διὰ τὴν συνάρτησιν ἐφ ἰσχύουν

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \epsilon\phi x = +\infty \quad \text{καὶ} \quad \lim_{x \rightarrow -\frac{\pi}{2}^+} \epsilon\phi x = -\infty$$

Πράγματι· ἐν πρώτοις ἔχομεν

$$\left. \begin{aligned} x_n &\rightarrow \frac{\pi}{2} \\ -\frac{\pi}{2} < x_n < \frac{\pi}{2} \quad \forall n \in \mathbb{N} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{aligned} \sigma\upsilon\nu x_n &\rightarrow \sigma\upsilon\nu \frac{\pi}{2} = 0 \\ \sigma\upsilon\nu x_n &> 0 \quad \forall n \in \mathbb{N} \end{aligned} \right\} \Rightarrow$$

$$(\forall \epsilon > 0 \exists v_0 = v_0(\epsilon) : 0 < \sigma\upsilon\nu x_n < \epsilon \quad \forall n \geq v_0) \Rightarrow$$


$$\left(\forall \varepsilon > 0 \exists v_0 = v_0(\varepsilon) : \frac{1}{\sin x_v} > \frac{1}{\varepsilon} \forall v \geq v_0 \right) \Rightarrow \frac{1}{\sin x_v} \rightarrow +\infty.$$

“Ωστε λοιπόν ισχύει

$$\left. \begin{array}{l} x_v \rightarrow \frac{\pi}{2} \\ -\frac{\pi}{2} < x_v < \frac{\pi}{2} \forall v \in \mathbb{N} \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \eta \mu x_v \rightarrow \eta \mu \frac{\pi}{2} = 1 \\ \frac{1}{\sin x_v} \rightarrow +\infty \end{array} \right\} \Rightarrow$$

$$\varepsilon \phi x_v = \eta \mu x_v \frac{1}{\sin x_v} \rightarrow 1 \cdot (+\infty) = +\infty, \text{ ήτοι ότι } \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2} - 0} \varepsilon \phi x = +\infty.$$

“Ομοίως αποδεικνύεται και τὸ ὅτι $\lim_{x \rightarrow -\frac{\pi}{2} + 0} \varepsilon \phi x = -\infty$.



Σχ. 67 $y = \varepsilon \phi x$.

2.4 Ἡ συνάρτησις συνεφαπτομένη είναι συνεχής. Ἡ συνάρτησις σφ ὀρίζεται, ὡς γνωστὸν, ὑπὸ τοῦ τύπου $\sigma \phi x = \frac{\sin x}{\eta \mu x}$ καὶ ἔχει πεδίου ὀρισμοῦ τὸ σύνολον τῶν πραγματικῶν ἀριθμῶν ἐξαιρέσει τῶν ριζῶν τῆς συναρτήσεως $\eta \mu$, δηλαδή τῶν ἀριθμῶν $\kappa \pi$, $\kappa = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$. Ἡ συνάρτησις σφ ὡς πηλίκον συνεχῶν συναρτήσεων εἶναι, δυνάμει τοῦ θεωρήματος 1.2.1, συνεχῆς εἰς κάθε διάστημα τῆς μορφῆς $(\kappa \pi, (\kappa + 1)\pi)$, $\kappa = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$. Διὰ τὴν συνάρτησιν ταύτην ἰσχύει ὡς γνωστὸν

$$\sigma \phi(x + \pi) = \sigma \phi x \quad \forall x \neq \kappa \pi, \kappa = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

καὶ ἐπομένως ἀρκεῖ νὰ μελετηθῇ αὐτὴ εἰς τὸ διάστημα $(0, \pi)$. Εἶναι ἐπίσης γνωστὸν ἐκ τῆς τριγωνομετρίας ὅτι ἰσχύει ὁ τύπος

$$\sigma \phi x = \varepsilon \phi \left(\frac{\pi}{2} - x \right),$$

ὁ ὁποῖος μᾶς ἐπιτρέπει νὰ μελετήσωμεν τὴν σφ στηριζόμενοι ἐπὶ τῶν συμπερασμάτων τῆς προηγουμένης παραγράφου. Οὕτω π.χ. ἡ σφ, ὡς σύνθεσις τῆς γνησίως φθινοῦσης συναρτήσεως g μὲ $g(x) = \frac{\pi}{2} - x$, $x \in (0, \pi)$ καὶ τῆς γνη-

σίως αλξούσης έν $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ συναρτήσεως εφ, είναι, κατά τὸ θεώρημα 1.2.1 τοῦ κεφ. ΙΙΙ, γνησίως φθίνουσα έν $(0, \pi)$. Ἐπίσης παρατηροῦμεν ὅτι

$$\lim_{x \rightarrow +0} \sigma\phi x = +\infty \quad \text{καὶ} \quad \lim_{x \rightarrow \pi-0} \sigma\phi x = -\infty$$

Πράγματι: ἀφ' ἐνὸς μὲν

$$\left. \begin{array}{l} x_v \rightarrow 0 \\ 0 < x_v < \pi \cdot \forall v \in \mathbb{N} \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \frac{\pi}{2} - x_v \rightarrow \frac{\pi}{2} \\ -\frac{\pi}{2} < \frac{\pi}{2} - x_v < \frac{\pi}{2} \quad \forall v \in \mathbb{N} \end{array} \right.$$


ἀφ' ἑτέρου δὲ

$$\left. \begin{array}{l} \frac{\pi}{2} - x_v \rightarrow \frac{\pi}{2} \\ -\frac{\pi}{2} < \frac{\pi}{2} - x_v < \frac{\pi}{2} \quad \forall v \in \mathbb{N} \\ \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}-0} \epsilon\phi x = +\infty \end{array} \right\} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}-0} \epsilon\phi(\frac{\pi}{2} - x_v) = +\infty \Rightarrow \lim_{x \rightarrow +0} \sigma\phi x_v = +\infty.$$

Ὡστε ἐδείχθη ὅτι

$$\left. \begin{array}{l} x_v \rightarrow 0 \\ 0 < x_v < \pi \quad \forall v \in \mathbb{N} \end{array} \right\} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow +0} \sigma\phi x_v = +\infty, \quad \text{ἤτοι ὅτι} \quad \lim_{x \rightarrow +0} \sigma\phi x = +\infty.$$

Ὁμοίως ἀποδεικνύεται καὶ ὅτι $\lim_{x \rightarrow \pi-0} \sigma\phi x = -\infty$.



(Σχ. 68) $y = \sigma\phi x$

3. Η ΕΚΘΕΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΛΟΓΑΡΙΘΜΙΚΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΣ

3.1 Ἡ ἐκθετική συνάρτησις. Ὡς γνωστὸν κάθε πραγματικὸς ἀριθμὸς x ἔχει μίαν δεκαδικὴν παράστασιν $x = \psi_0, \psi_1 \psi_2 \dots \psi_n \dots$, ὅπου ψ_0 εἶναι ἀκέραιος ἀρι-

θμός και $\psi_1, \psi_2, \dots, \psi_n, \dots$ Είναι ψηφία, δηλαδή άκεραιοι αριθμοί με $0 \leq \psi_n \leq 9 \forall n \in \mathbb{N}$.
 Η ακολουθία $r_n = \psi_0, \psi_1 \psi_2 \dots \psi_n, n=1, 2, \dots$ είναι μία αύξουσα ακολουθία ρητών αριθμών, η οποία συγκλίνει προς τον πραγματικό αριθμό x , διότι είναι φραγμένη. Ως γνωστόν, ισχύει

$$(5) \quad \psi_0 \leq \psi_n \leq \psi_0 + 1 \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Αν θεωρήσωμεν τώρα και ένα θετικό αριθμό $a > 1$, τότε, επειδή η έννοια της δυνάμεως αυτού με έκθετη ρητόν αριθμόν είναι γνωστή, ορίζεται η ακολουθία

$$a^{r_1}, a^{r_2}, \dots, a^{r_n}, \dots,$$

η οποία μάλιστα είναι γνησίως αύξουσα και επί πλέον φραγμένη, διότι, λόγω και της (5), ισχύει

$$a^{\psi_0} \leq a^{r_n} \leq a^{\psi_0+1} \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Επομένως κατά το αξίωμα της § 1.4.3 του κεφ. IV, η ακολουθία $a^{r_n}, n=1, 2, \dots$ συγκλίνει προς πραγματικό αριθμόν, τον όποιον παριστῶμεν με a^x , ήτοι ορίζομεν

$$a^x = \lim a^{r_n}.$$

Την άνωτέρω έννοιαν της δυνάμεως αριθμού $a > 1$ με έκθετην πραγματικόν αριθμόν επέκτεινομεν και διά $0 < a \leq 1$ ορίζοντες ως κάτωθι:

$$\text{Διά } a=1: \quad 1^x=1$$

$$\text{Διά } 0 < a < 1: \quad a^x = 1 / \left(\frac{1}{a} \right)^x$$

Εκθετικήν (exponential) συνάρτησιν με βάση τον θετικό αριθμόν a καλούμεν τώρα την συνάρτησιν την οριζομένην υπό του τύπου $\psi = a^x$. Ταύτην συμβολίζομεν με \exp_a , ήτοι $\exp_a(x) = a^x$. Την τιμήν $\exp_a(x)$ γράφομεν άπλούστερον και $\exp_a x$. Ειδικῶς την έκθετικήν συνάρτησιν με βάση τον αριθμόν e (§ 1.4.3, κεφ. IV), δηλαδή την συνάρτησιν \exp_e συμβολίζομεν άπλούστερον με \exp και καλούμεν ταύτην άπλῶς *έκθετικήν συνάρτησιν*.

Εκ του όρισμού της έκθετικῆς συναρτήσεως \exp_a προκύπτει εύκόλως ότι αὕτη ἔχει πεδίον όρισμοῦ τὸ σύνολον \mathbb{R} τῶν πραγματικῶν αριθμῶν και λαμβάνει τιμὰς εἰς τὸ σύνολον \mathbb{R}^+ τῶν θετικῶν αριθμῶν, ὁπότε ἰσχύει

$$a^x > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Ἡ έκθετικὴ συνάρτησις \exp_a ἔχει τὰς κάτωθι ιδιότητες:

1. Ἡ συνάρτησις \exp_a εἶναι μονότονος και μάλιστα διά $a > 1$ γνησίως αύξουσα, ἐνῶ διά $0 < a < 1$ γνησίως φθίνουσα.

Ἀπόδειξις. Διά $a=1$ ἡ συνάρτησις \exp_a συμπίπτει με τὴν σταθερὰν συνάρτησιν 1 και εἶναι προφανῶς μονότονος. Διά $a \neq 1$ θεωροῦμεν τυχόντας πραγματικοὺς αριθμοὺς x, y με $x < y$, ὁπότε, ἐξ όρισμοῦ της \exp_a , ἔχομεν

$$a^x = \lim a^{u_n} \quad \text{και} \quad a^y = \lim a^{v_n}$$

ὅπου $u_n, n=1, 2, \dots$ και $v_n, n=1, 2, \dots$ εἶναι ακολουθίαι ρητῶν αριθμῶν με

$$\lim u_n = x \quad \text{και} \quad \lim v_n = y.$$

*Εκλέγομεν τώρα δύο ρητούς αριθμούς z, w με

$$x < z < w < y$$

όποτε εύκολως συνάγεται ότι υπάρχει δείκτης n τοιοῦτος, ὥστε νά ἰσχύη

$$u_n < z < w < u_{n+1}, \quad \forall n = n, n+1, \dots$$

*Αρα, ἐπειδὴ τὰ u_n, z, w, u_{n+1} εἶναι ρητοὶ ἀριθμοὶ, ὡς γνωστόν, θὰ ἰσχύη

$$a^{u_n} < a^z < a^w < a^{u_{n+1}}, \quad \text{ἂν } a > 1$$

ἢ

$$a^{u_n} > a^z > a^w > a^{u_{n+1}}, \quad \text{ἂν } 0 < a < 1$$

διὰ κάθε $n = n, n+1, \dots$. Ἐπομένως διὰ μὲν $a > 1$ ἔχομεν

$$a^x = \lim a^{u_n} \leq a^z < a^w \leq \lim a^{u_{n+1}} = a^y$$

διὰ δὲ $0 < a < 1$

$$a^x = \lim a^{u_n} \geq a^z > a^w \geq \lim a^{u_{n+1}} = a^y.$$

2. Ἐάν $z_n, n = 1, 2, \dots$ εἶναι τυχούσα μηδενικὴ ἀκολουθία, τότε

$$\lim a^{z_n} = 1.$$

*Απόδειξις. Ἐξ ὀρίσμου διὰ $0 < a < 1$ ἔχομεν

$$a^{z_n} = 1 / \left(\frac{1}{a} \right)^{z_n}, \quad \text{ὅπου } \frac{1}{a} > 1$$

τὸ ὅποιο σημαίνει ὅτι ἀρκεῖ νὰ δειχθῆ ἢ πρὸς ἀπόδειξιν ἰδιότης εἰς τὴν περίπτωσιν, ὅπου $a \geq 1$. Ὑποθέτομεν λοιπὸν ὅτι $a \geq 1$ καὶ θεωροῦμεν τυχόντα θετικὸν ἀριθμὸν ϵ , ὅποτε, ἐπειδὴ $\lim \sqrt[n]{a} = 1$ (Ἐφαρμογὴ 2 τῆς § 1.4, κεφ. IV), ὑπάρχει φυσικὸς ἀριθμὸς k τοιοῦτος, ὥστε νά ἰσχύη:

$$a^{\frac{1}{k}} - 1 = \sqrt[k]{a} - 1 < \epsilon \quad \text{καὶ} \quad a^{-\frac{1}{k}} - 1 = \frac{1}{\sqrt[k]{a}} - 1 > -\epsilon.$$

*Ἐπίσης, ἐπειδὴ $\lim z_n = 0$, ὑπάρχει φυσικὸς ἀριθμὸς n τοιοῦτος, ὥστε διὰ κάθε δείκτην n με $n > n$ νά ἰσχύη

$$-\frac{1}{k} < z_n < \frac{1}{k}$$

καὶ ἐπομένως, λόγῳ τοῦ ὅτι ἡ συνάρτησις \exp_a εἶναι (γνησίως) αὐξουσα, θὰ ἰσχύη καὶ

$$a^{-\frac{1}{k}} < a^{z_n} < a^{\frac{1}{k}}.$$

*Αρα διὰ κάθε φυσικὸν ἀριθμὸν n με $n > n$ ἰσχύει

$$-\epsilon < a^{-\frac{1}{k}} - 1 < a^{z_n} - 1 < a^{\frac{1}{k}} - 1 < \epsilon$$

καὶ ἐπομένως

$$|a^{z_n} - 1| < \epsilon$$

τὸ ὅποιο σημαίνει ὅτι $\lim a^{z_n} = 1$.

3. Διὰ κάθε πραγματικὸν ἀριθμὸν x καὶ τυχοῦσαν ἀκολουθίαν ρητῶν ἀριθμῶν $u_n, n=1, 2, \dots$ μὲ $\lim u_n = x$ ἰσχύει

$$a^x = \lim a^{u_n}$$

Ἀπόδειξις. Εἰς τὴν περίπτωσιν $a = 1$ ἡ ἀνωτέρω ιδιότης εἶναι προφανής. Διὰ $a > 1$ θεωροῦμεν καὶ τὴν ἀκολουθίαν $r_n, n=1, 2, \dots$ τοῦ ὀρισμοῦ τῆς δυνάμεως a^x . Προφανῶς, ἐπειδὴ τὰ u_n, r_n , εἶναι ρητοὶ ἀριθμοί, ἰσχύει

$$a^{u_n} = a^{u_n - r_n} \cdot a^{r_n}$$

ὅπου $\lim (u_n - r_n) = \lim u_n - \lim r_n = x - x = 0$. Ἄρα, δυνάμει τῆς προηγουμένης ιδιότητος 2, ἰσχύει

$$\lim a^{u_n - r_n} = 1$$

καὶ ἐπομένως

$$\lim a^{u_n} = (\lim a^{u_n - r_n}) (\lim a^{r_n}) = 1 \cdot a^x = a^x.$$

Τέλος διὰ $0 < a < 1$, ἔχομεν $\frac{1}{a} > 1$ καὶ ἐπομένως

$$\lim a^{u_n} = \frac{1}{\lim \left(\frac{1}{a}\right)^{u_n}} = \frac{1}{\left(\frac{1}{a}\right)^x} = a^x.$$

4. Διὰ τυχόντας πραγματικοὺς ἀριθμοὺς x, y ἰσχύει

$$a^x \cdot a^y = a^{x+y}.$$

Ἀπόδειξις. Θεωροῦμεν δύο ἀκολουθίας ρητῶν ἀριθμῶν $u_n, v_n, n=1, 2, \dots$ καὶ $\lim u_n = x$ καὶ $\lim v_n = y$.

Ἐχομεν τότε

$$a^{u_n} \cdot a^{v_n} = a^{u_n + v_n} \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

καὶ ἐπομένως δυνάμει τῆς προηγουμένης ιδιότητος 3, λαμβάνομεν

$$a^x \cdot a^y = (\lim a^{u_n}) (\lim a^{v_n}) = \lim (a^{u_n} \cdot a^{v_n}) = \lim a^{u_n + v_n} = a^{x+y}$$

διότι $\lim (u_n + v_n) = \lim u_n + \lim v_n = x + y$.

5. Ἡ συνάρτησις \exp_a εἶναι συνεχής.

Ἀπόδειξις. Θεωροῦμεν τυχόντα πραγματικὸν ἀριθμὸν x καὶ τυχοῦσαν ἀκολουθίαν $x_n, n=1, 2, \dots$ μὲ $\lim x_n = x_0$. Δυνάμει τῆς προηγουμένης ιδιότητος 4, ἔχομεν

$$a^{x_n} = a^{(x_n - x_0) + x_0} = a^{x_n - x_0} \cdot a^{x_0} \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

καὶ ἐπομένως, ἐπειδὴ $\lim (x_n - x_0) = 0$, δυνάμει τῆς ιδιότητος 2, λαμβάνομεν

$$\lim a^{x_n} = (\lim a^{x_n - x_0}) \cdot a^{x_0} = 1 \cdot a^{x_0} = a^{x_0}$$

τὸ ὁποῖον σημαίνει ὅτι ἡ συνάρτησις \exp_a εἶναι συνεχῆς εἰς τὸν τυχόντα πραγματικὸν ἀριθμὸν x_0 .

6. Διὰ τυχόντας πραγματικοὺς ἀριθμοὺς x, y ἰσχύει

$$(a^x)^y = a^{xy}.$$

Ἀπόδειξις. Θεωροῦμεν δύο ἀκολουθίας ρητῶν ἀριθμῶν $u_n, n=1, 2, \dots$ καὶ $v_n, n=1, 2, \dots$ μὲ

$$\lim u_n = x \text{ καὶ } \lim v_n = y.$$

Ἄν r εἶναι τυχῶν ρητῶς ἀριθμὸς, τότε θὰ ἔχωμεν

$$(a^{u_n})^r = a^{u_n r} \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

καὶ ἔπομένως, λόγῳ τῆς συνεχείας τῶν συναρτήσεων \exp_a καὶ f μὲ $f(x) = x^r$, λαμβάνομεν

$$(a^x)^r = (\lim a^{u_n})^r = \lim (a^{u_n})^r = \lim a^{u_n r} = a^{\lim (u_n r)} = a^{x r}$$

ἥτοι

$$(a^x)^r = a^{x r}.$$

Ἄρα ἰσχύει καὶ

$$(a^x)^{u_n} = a^{x u_n} \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

ὁπότε, χρησιμοποιοῦντες πάλιν τὴν συνέχειαν τῆς \exp_a , τελικῶς λαμβάνομεν

$$(a^x)^y = \lim (a^x)^{u_n} = \lim a^{x u_n} = a^{\lim (x u_n)} = a^{x y}.$$

7. Ἄν $a > 1$, τότε ἰσχύει

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} a^x = +\infty \text{ καὶ } \lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = 0.$$

Ἀπόδειξις. Θεωροῦμεν τυχοῦσαν ἀκολουθίαν $x_n, n=1, 2, \dots$ μὲ $\lim x_n = +\infty$ καὶ τυχόντα θετικὸν ἀριθμὸν ε . Ἐπειδὴ ἡ ἀκολουθία $a^{x_n}, n=1, 2, \dots$ δὲν εἶναι φραγμένη, ὑπάρχει δείκτης k μὲ

$$a^k > \frac{1}{\varepsilon}.$$

Ἐπίσης, ἐκ τῆς $\lim x_n = +\infty$ προκύπτει ὅτι ὑπάρχει δείκτης n τοιοῦτος, ὥστε νὰ ἰσχύη

$$x_n \geq k \quad \forall n = n, n+1, \dots$$

καὶ ἔπομένως, ἐπειδὴ ἡ συνάρτησις \exp_a εἶναι (γνησίως) αὐξουσα θὰ εἶναι:

$$a^{x_n} \geq a^k > \frac{1}{\varepsilon} \quad \forall n = n, n+1, \dots$$

Ἐπειδὴ τὸ ε εἶναι τυχόν, θὰ ἰσχύη λοιπὸν

$$\lim a^{x_n} = +\infty$$

καὶ ἔπομένως, ἐπειδὴ καὶ ἡ $x_n, n=1, 2, \dots$ εἶναι τυχοῦσα ἀκολουθία μὲ $\lim x_n = +\infty$, θὰ ἰσχύη

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} a^x = +\infty.$$

Πρὸς ἀπόδειξιν τῆς $\lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = 0$, θεωροῦμεν τυχοῦσαν ἀκολουθίαν $x_n, n=1, 2, \dots$ μὲ $\lim x_n = -\infty$, ὁπότε ἔχομεν

$$\lim x_n = -\infty \Rightarrow \lim (-x_n) = +\infty \Rightarrow \lim a^{-x_n} = +\infty$$

καὶ ἔπομένως

$$\lim a^{x_n} = \lim \frac{1}{a^{-x_n}} = \frac{1}{\lim a^{-x_n}} = \frac{1}{+\infty} = 0.$$

Ὡστε διὰ τυχούσαν ἀκολουθίαν $x_n, n=1, 2, \dots$ με $\lim x_n = -\infty$ ἰσχύει $\lim a^{x_n} = 0$, τὸ ὁποῖον σημαίνει ὅτι

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = 0.$$

8. Ἄν $0 < a < 1$, τότε ἰσχύει

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} a^x = 0 \text{ καὶ } \lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = +\infty.$$

Ἀπόδειξις. Ἔχομεν $\frac{1}{a} > 1$ καὶ ἐπειδὴ ἐξ ὀρίσμου

$$a^x = 1 / \left(\frac{1}{a}\right)^x$$

δυνάμει τῆς προηγουμένης ιδιότητος 7, λαμβάνομεν

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} a^x = \frac{1}{\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{a}\right)^x} = \frac{1}{+\infty} = 0.$$

Πρὸς ἀπόδειξιν τῆς $\lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = +\infty$, θεωροῦμεν τυχούσαν ἀκολουθίαν $x_n, n=1, 2, \dots$ με $\lim x_n = -\infty$ καὶ τυχόντα θετικὸν ἀριθμὸν ε . Ἐπειδὴ ἡ ἀκολουθία $a^n, n=1, 2, \dots$ εἶναι μηδενικὴ (ἐφαρμογὴ 2 τῆς § 1.3, κεφ. IV), ὑπάρχει δείκτης k με

$$a^k < \varepsilon.$$

Ἐπίσης, ἐκ τῆς $\lim x_n = -\infty$ προκύπτει ὅτι ὑπάρχει δείκτης n τοιοῦτος ὥστε νὰ ἰσχύη

$$x_n \leq -k \quad \forall n = n, n+1, \dots$$

καὶ ἐπομένως, ἐπειδὴ ἡ συνάρτησις \exp_a εἶναι (γνησίως) φθίνουσα,

$$a^{x_n} \geq a^{-k} = \frac{1}{a^k} > \frac{1}{\varepsilon} \quad \forall n = n, n+1, \dots$$

Ἐπειδὴ τὸ ε εἶναι τυχόν, θὰ ἰσχύη λοιπὸν

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = +\infty$$

καὶ ἐπομένως, ἐπειδὴ καὶ ἡ $x_n, n=1, 2, \dots$ εἶναι τυχούσα ἀκολουθία με $\lim x_n = -\infty$, θὰ ἰσχύη


$$\lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = +\infty.$$

Ἡ μελέτη τῆς συνεχοῦς συναρτήσεως \exp_a παρέχεται βασικῶς εἰς τὸν κάτω-θι πίνακα, ἡ δὲ γεωμετρικὴ ἐρμηνεία τῆς εἰς τὰ κατωτέρω σχήματα 69,70


$a > 1$	$\exp_a \uparrow, \lim_{x \rightarrow +\infty} a^x = +\infty \text{ καὶ } \lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = 0$
$a = 1$	\exp_a σταθερὰ ἴση με 1
$0 < a < 1$	$\exp_a \downarrow, \lim_{x \rightarrow +\infty} a^x = 0 \text{ καὶ } \lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = +\infty$

Ειδικώς, έπειδή $e > 1$, ή έκθετική συνάρτησις είναι γνησίως αύξουσα συνάρτησις με


$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty \text{ και } \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0. \quad (\text{σχ. 71})$$



Σχ. 69 $y = a^x, a > 1$



Σχ. 70 $y = a^x, 0 < a < 1$



Σχ. 71 $y = e^x$

Έκ τῶν ἀνωτέρω σχημάτων καὶ τοῦ συνοπτικοῦ πίνακος τῆς συμπεριφορᾶς τῆς συνεχοῦς συναρτήσεως \exp_a παραστατικῶς προκύπτει ὅτι τὸ πεδίου τιμῶν ταύτης εἶναι ὁλόκληρον τὸ σύνολον \mathbb{R}^+ τῶν θετικῶν ἀριθμῶν, δηλαδὴ

$$\mathcal{R}(\exp_a) = \mathbb{R}^+.$$

3.2 Ἡ λογαριθμικὴ συνάρτησις. Ὡς εἶδομεν ἀνωτέρω ἡ έκθετικὴ συνάρτησις \exp_a διὰ $a \neq 1$ εἶναι γνησίως μονότονος καὶ ἐπομένως (θεώρημα 1.3.1 τοῦ κεφ. III) ὑπάρχει ἡ ἀντίστροφος ταύτης ἡ ὁποία καλεῖται *λογάριθμος ὡς πρὸς βάσιν τὸν ἀριθμὸν a* καὶ συμβολίζεται με \log_a . Ἡ συνάρτησις \log_a ἔχει πεδίου ὀρισμοῦ τὸ πεδίου τιμῶν τῆς συναρτήσεως \exp_a , δηλαδὴ τὸ σύνολον \mathbb{R}^+ τῶν θετικῶν ἀριθμῶν, καὶ πεδίου τιμῶν τὸ πεδίου ὀρισμοῦ τῆς \exp_a , δηλαδὴ τὸ σύνολον \mathbb{R} τῶν πραγματικῶν ἀριθμῶν. Συγκεκριμένως ἰσχύει

$$\mathcal{D}(\log_a) = \mathbb{R}^+ \text{ καὶ } \mathcal{R}(\log_a) = \mathbb{R}.$$

Τὴν τιμὴν $\log_a(x)$ γράφομεν ἀπλούστερον καὶ $\log_a x$. Ἐκ τοῦ ὀρισμοῦ τῆς λογαριθμικῆς συναρτήσεως προκύπτει ἀμέσως ὅτι


$$y = \log_a x \Leftrightarrow a^y = x.$$

Ἐπειδὴ $a^0 = 1$ καὶ $a^1 = a$, ἔχομεν τὰς ἐξῆς ἀξιοσημειώτους τιμὰς τῆς συναρτήσεως \log_a :


$$(6) \quad \log_a 1 = 0 \text{ καὶ } \log_a a = 1 \quad (a \neq 1)$$

Εἰδικῶς ἡ συνάρτησις \log_e καλεῖται *φυσικὸς λογάριθμος* καὶ συμβολίζεται ἀπλούστερον με \log .


Ἡ συνάρτησις \log_a , ὡς ἀντίστροφος γνησίως μονότονου συναρτήσεως, εἶναι ἐπίσης γνησίως μονότονος καὶ μάλιστα διὰ $a > 1$ εἶναι *γνησίως αύξουσα*, ἐνῶ διὰ $0 < a < 1$ εἶναι *γνησίως φθίνουσα* (θεώρημα 1.3.1 τοῦ κεφ. III). Ἐπίσης, τὸ διάγραμμα τῆς συναρτήσεως \log_a εἶναι συμμετρικόν, ὡς πρὸς τὴν διχοτόμον τῆς πρώτης γωνίας τῶν ἀξόνων, τοῦ διαγράμματος τῆς \exp_a . Ἡ γεωμετρικὴ ἔρμηνεία τῆς λογαριθμικῆς συναρτήσεως παρῆχεται εἰς τὰ κάτωθι σχήματα 72, 73 καὶ 74 (ὅπου παρίσταται ἡ $\log x$).



Σχ. 72 $y = \log_a x, a > 1$



Σχ. 73 $y = \log_a x, 0 < a < 1$



Σχ. 74 $y = \log x$

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω προκύπτει εὐκόλως καὶ ὁ κάτωθι συνοπτικός πίναξ βα-
σικῶν ἰδιοτήτων τῆς ἐκθετικῆς συναρτήσεως.

$a > 1$	$\log_a \uparrow, \lim_{x \rightarrow +\infty} \log_a x = +\infty$ καὶ $\lim_{x \rightarrow +0} \log_a x = -\infty$
$0 < a < 1$	$\log_a \downarrow, \lim_{x \rightarrow +\infty} \log_a x = -\infty$ καὶ $\lim_{x \rightarrow +0} \log_a x = +\infty$

Ἐιδικῶς, ἐπειδὴ $e > 1$, ὁ φυσικός λογάριθμος εἶναι γνησίως αὐξουσα συνάρ-
τησις μὲ

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \log x = +\infty \quad \text{καὶ} \quad \lim_{x \rightarrow +0} \log x = -\infty.$$

Ἐκ τοῦ ὀρισμοῦ τῆς λογαριθμικῆς συναρτήσεως \log_a , ὡς ἀντιστρόφου τῆς
 \exp_a , προκύπτουν ἀμέσως καὶ οἱ τύποι:

$$a^{\log_a x} = x \quad \text{καὶ} \quad \log_a a^x = x$$

εἰδικῶς δέ,

$$e^{\log x} = x \quad \text{καὶ} \quad \log e^x = x.$$

Ἐπίσης ἡ λογαριθμικὴ συνάρτησις ἔχει καὶ τὰς κάτωθι ἰδιότητες:

1. Διὰ τυχόντας θετικῶν ἀριθμῶν x, y ἰσχύει

$$\log_a xy = \log_a x + \log_a y$$

Ἀπόδειξις. Ἔχομεν

$$a^{\log_a xy} = xy = a^{\log_a x} a^{\log_a y} = a^{\log_a x + \log_a y}$$

καὶ δεδομένου ὅτι $a \neq 1$, ἡ ἐκθετικὴ συνάρτησις \exp_a εἶναι γνησίως μονότονος,
ἄρα ἀμφιμονοσήμαντος, ὁπότε λαμβάνομεν

$$\log_a xy = \log_a x + \log_a y.$$

2. Διὰ τυχόντας θετικῶν ἀριθμῶν x, y ἰσχύει

$$\log_a \frac{x}{y} = \log_a x - \log_a y.$$

Ἀπόδειξις. Δυνάμει τῆς προηγουμένης ἰδιότητος 1, ἔχομεν

$$\log_a x = \log_a \frac{x}{y} + \log_a y.$$

καὶ ἐπομένως

$$\log_a \frac{x}{y} = \log_a x - \log_a y.$$

3. Διά τυχόντας πραγματικούς αριθμούς x, y με $x > 0$ ισχύει

$$\log_a x^y = y \log_a x$$

Ἀπόδειξις. Ἐχομεν

$$a^{\log_a x^y} = x^y = [a^{\log_a x}]^y = a^{y \log_a x}$$

καὶ ἐπομένως

$$\log_a x^y = y \log_a x.$$

4. Ἰσχύει ὁ τύπος

(7)

$$a^x = e^{x \log_a a}.$$

Ἀπόδειξις. Ἐχομεν

$$a^x = (e^{\log_a a})^x = e^{x \log_a a}$$

5. Ἰσχύει ὁ τύπος

(8)

$$\log_a x = \frac{\log x}{\log a}$$

Ἀπόδειξις. Δυνάμει τῆς ἀνωτέρω ιδιότητος 3, ἔχομεν

$$\log x = \log a^{\log_a x} = (\log_a x) (\log a)$$

καὶ ἐπομένως

$$\log_a x = \frac{\log x}{\log a}.$$

3.3 Ἀξιοσημεῖωτοι ιδιότητες. Θὰ συμπληρώσωμεν ἐνταῦθα τὰ συμπεράσματα τῶν προηγουμένων §§ 3.1 καὶ 3.2 διὰ τῶν κάτωθι αξιοσημεῖωτων ιδιοτήτων τῶν συναρτήσεων \exp_x καὶ \log_a .

1. Διὰ κάθε πραγματικὸν ἀριθμὸν x ισχύει

(9)

$$e^x \geq 1 + x$$

καὶ γενικότερον

$$a^x \geq 1 + x \log a \quad (a \neq 1).$$

Ἀπόδειξις. Θὰ χρησιμοποιήσωμεν ἐνταῦθα τὴν γνωστὴν ἀνισότητα τοῦ Bernoulli

$$(1 + \omega)^n \geq 1 + n\omega$$

ὅπου n εἶναι μὴ ἀρνητικὸς ἀκέραιος καὶ $\omega > -1$ (ἢ ἀπόδειξις ταύτης συνάγεται εὐκόλως διὰ τῆς ἐπαγωγικῆς μεθόδου).

Πρὸς ἀπόδειξιν τοῦ τύπου (9) θεωροῦμεν τυχόντα ρητὸν ἀριθμὸν u , ὅποτε ὑπάρχουν ἀκέραιοι, μ, ν με $u = \frac{\mu}{\nu}$ καὶ $\nu \in \mathbb{N}$, καὶ διακρίνομεν τὰς ἐξῆς δύο περιπτώσεις:

(i) $u \geq 0$, δηλαδὴ $\mu \geq 0$. Θέτομεν

$$K = \left\{ k : \frac{k}{\nu} \in \mathbb{N} \right\}$$

όπότε προφανώς τὸ K εἶναι ἕν ἀπέραντον (μὴ πεπερασμένον) ὑποσύνολον τοῦ συνόλου \mathbb{N} τῶν φυσικῶν ἀριθμῶν καὶ μάλιστα διὰ κάθε $\kappa \in K$ ἰσχύει

$$\kappa u = \kappa \frac{\mu}{\nu} = \frac{\kappa}{\nu} \mu \text{ καὶ ἔπομένως } \kappa u \in \mathbb{N}_0.$$

*Ἄρα

$$\left(1 + \frac{1}{\kappa}\right)^{\kappa u} \geq 1 + (\kappa u) \frac{1}{\kappa} = 1 + u$$

καὶ ἐπειδὴ ἡ συνάρτησις f μὲ $f(x) = x^u$ εἶναι συνεχῆς, λαμβάνομεν

$$\lim_{\kappa \in K} \left(1 + \frac{1}{\kappa}\right)^{\kappa u} = \lim_{\kappa \in K} \left[\left(1 + \frac{1}{\kappa}\right)^{\kappa}\right]^{u^*} = \left[\lim_{\kappa \in K} \left(1 + \frac{1}{\kappa}\right)^{\kappa}\right]^u = e^u$$

καὶ ἔπομένως

$$e^u \geq 1 + u.$$

(ii) $u < 0$, δηλαδὴ $\mu < 0$. Ἐτόμεν

$$\Lambda = \{\lambda : \lambda > 0 \text{ καὶ } \frac{\lambda+1}{\nu} \in \mathbb{N}\},$$

όπότε προφανώς τὸ Λ εἶναι ἕν ἀπέραντον ὑποσύνολον τοῦ συνόλου \mathbb{N} τῶν φυσικῶν ἀριθμῶν καὶ μάλιστα διὰ κάθε $\lambda \in \Lambda$ ἰσχύει

$$-(\lambda+1)u = -(\lambda+1) \frac{\mu}{\nu} = \frac{\lambda+1}{\nu} (-\mu) \text{ καὶ ἔπομένως } -(\lambda+1)u \in \mathbb{N}.$$

*Ἄρα

$$\begin{aligned} \left(1 + \frac{1}{\lambda}\right)^{\lambda u} &= \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{\lambda}\right)^{-\lambda u}} = \left(\frac{1}{1 + \frac{1}{\lambda}}\right)^{-\lambda u} = \left(\frac{\lambda}{\lambda+1}\right)^{-\lambda u} = \left(1 - \frac{1}{\lambda+1}\right)^{-\lambda u} \\ &\geq \left(1 - \frac{1}{\lambda+1}\right)^{-(\lambda+1)u} \geq 1 + [-(\lambda+1)u] \left(-\frac{1}{\lambda+1}\right) = 1 + u \end{aligned}$$

καὶ ἐπειδὴ, ὡς εἰς τὴν περίπτωσιν (i) ἀποδεικνύεται ὅτι

$$\lim_{\lambda \in \Lambda} \left(1 + \frac{1}{\lambda}\right)^{\lambda u} = e^u,$$

λαμβάνομεν

$$e^u \geq 1 + u.$$

Ἔστω ἐδείχθη ὅτι διὰ τυχόντα ρητὸν ἀριθμὸν u ἰσχύει

$$e^u \geq 1 + u$$

* Ἡ ἀκολουθία $\left(1 + \frac{1}{\kappa}\right)^{\kappa}$ εἶναι προφανώς μία ὑπακολουθία τῆς $\left(1 + \frac{1}{\nu}\right)^{\nu}$ ὅπως καὶ ἡ ἀκολουθία $\kappa = \nu\lambda$, $\nu = 1, 2, \dots$ μία ὑπακολουθία τῆς ν , $\nu = 1, 2, \dots$

και επομένως, αν δια τυχόντα πραγματικών αριθμών x θεωρήσωμεν μίαν ακολουθίαν ρητών αριθμών $u_n, n=1, 2, \dots$ με $\lim u_n = x$, τότε, λόγω τῆς συνεχείας τῆς ἐκθετικῆς συναρτήσεως, θὰ ἔχωμεν

$$e^x = \lim e^{u_n} \geq \lim (1 + u_n) = 1 + \lim u_n = 1 + x \quad (\text{Ἰδὲ καὶ σχ. 71}).$$

Τέλος, δυνάμει τῶν τύπων (7) καὶ (9), ἔχομεν

$$a^x = e^{x \log a} \geq 1 + x \log a.$$

Σημείωσις. Ἐάν l εἶναι εἰς πραγματικός αριθμός, $\alpha_n, n=1, 2, \dots$ τυχούσα ἀκολουθία πραγματικῶν αριθμῶν καὶ M τυχόν ἀπέραντον ὑποσύνολον τοῦ συνόλου \mathbb{N} τῶν φυσικῶν ἀριθμῶν, τότε ὀρίζομεν

$$\lim_{n \in M} \alpha_n = l \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists v_0 = v_0(\varepsilon) : |\alpha_n - l| < \varepsilon \forall n \in M \text{ με } n \geq v_0.$$

Προφανῶς ἰσχύει

$$\lim_{n \in M} \alpha_n = l \Rightarrow \lim_{n \in \mathbb{N}} \alpha_n = l.$$

2. Διὰ κάθε θετικὸν ἀριθμὸν x ἰσχύει

$$(10) \quad \log x \leq x - 1$$

καὶ γενικώτερον

$$\log_a x \leq \frac{x-1}{\log a} \quad (a \neq 1).$$

Ἀπόδειξις. Θέτομεν $y = \log x$, ὁπότε $e^y = x$ καὶ δυνάμει τοῦ τύπου (9), ἔχομεν

$$x = e^y \geq 1 + y = 1 + \log x$$

καὶ επομένως

$$\log x \leq x - 1 \quad (\text{Ἰδὲ καὶ σχ. 74}).$$

Τέλος, δυνάμει τοῦ τύπου (8), λαμβάνομεν

$$\log_a x = \frac{\log x}{\log a} \leq \frac{x-1}{\log a}.$$

3. Ἡ λογαριθμικὴ συνάρτησις \log_a εἶναι συνεχής.

Ἀπόδειξις. Δυνάμει τοῦ τύπου (8) ἔχομεν

$$\log_a x = \frac{\log x}{\log a}$$

καὶ επομένως ἀρκεῖ νὰ δείξωμεν τὴν συνέχειαν τοῦ φυσικοῦ λογαρίθμου \log . Πρὸς τοῦτο θεωροῦμεν τυχόντα θετικὸν ἀριθμὸν x_0 καὶ τυχούσαν ἀκολουθίαν θετικῶν ἀριθμῶν $x_n, n=1, 2, \dots$ με $\lim x_n = x_0$. Δυνάμει τῶν ἰσοτήτων 1 καὶ 2 τῆς προηγουμένης § 3.2 καὶ τοῦ τύπου (10), διὰ κάθε φυσικὸν ἀριθμὸν n , ἔχομεν

$$-\log x_n = \log \left(x_0 \frac{x_n}{x_0} \right) = \log x_0 + \log \frac{x_n}{x_0} \leq \log x_0 + \frac{x_n - x_0}{x_0} - 1$$

και

$$\begin{aligned} \log x_v &= \log \left(x_0 / \frac{x_0}{x_v} \right) = \log x_0 - \log \frac{x_0}{x_v} \\ &\geq \log x_0 - \left(\frac{x_0}{x_v} - 1 \right) = \log x_0 + 1 - \frac{x_0}{x_v}. \end{aligned}$$

*Αρα δια κάθε φυσικόν αριθμὸν v ἰσχύει

$$\log x_0 + 1 - \frac{x_0}{x_v} \leq \log x_v \leq \log x_0 + \frac{x_v}{x_0} - 1.$$

*Αλλὰ

$$\lim \left(\log x_0 + 1 - \frac{x_0}{x_v} \right) = \log x_0 + 1 - \frac{x_0}{x_0} = \log x_0$$

και

$$\lim \left(\log x_0 + \frac{x_v}{x_0} - 1 \right) = \log x_0 + \frac{x_0}{x_0} - 1 = \log x_0.$$

*Ἐπομένως ἰσχύει και

$$\lim \log x_v = \log x_0$$

τὸ ὁποῖον, ἐπειδὴ ἡ x_v , $v=1, 2, \dots$ εἶναι τυχοῦσα ἀκολουθία θετικῶν ἀριθμῶν μὲ $\lim x_v = x_0$, σημαίνει ὅτι ὁ φυσικὸς λογάριθμος εἶναι συνεχῆς συνάρτησις εἰς τὸν τυχόντα θετικὸν ἀριθμὸν x_0 .

4. Ἰσχύει

(11)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1.$$

*Ἀπόδειξις. Κατὰ πρῶτον θὰ δείξωμεν ὅτι ἰσχύει

$$1 \leq \frac{e^x - 1}{x} \leq e^x \quad \forall x \in (0, +\infty)$$

και

$$e^x \leq \frac{e^x - 1}{x} \leq 1 \quad \forall x \in (-\infty, 0).$$

Πράγματι· δια $x \in (0, +\infty)$, δυνάμει τοῦ τύπου (9), ἔχομεν

$$e^x - 1 \geq (1+x) - 1 = x, \quad \text{ὅπότε} \quad \frac{e^x - 1}{x} \geq 1$$

και

$$\frac{e^x - 1}{e^x} = 1 - e^{-x} \leq 1 - [1 + (-x)] = x, \quad \text{ὅπότε} \quad \frac{e^x - 1}{x} \leq e^x$$

Δια $x \in (-\infty, 0)$, ἔχομεν $-x \in (0, +\infty)$ και ἔπομένως

$$1 \leq \frac{e^{-x} - 1}{-x} \leq e^{-x}, \quad \text{ὅπότε} \quad e^x \leq e^x \frac{e^x - 1}{-x} \leq 1.$$

Άλλά

$$e^x \frac{e^{-x} - 1}{-x} = \frac{1 - e^x}{-x} = \frac{e^x - 1}{x} \text{ και επομένως } e^x \leq \frac{e^x - 1}{x} \leq 1.$$

Θα δείξωμεν τώρα ότι $\lim_{x \rightarrow +0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$. Πράγματι·

$$\left. \begin{array}{l} x_v \rightarrow 0 \\ x_v > 0 \quad \forall v \in \mathbb{N} \end{array} \right\} \Rightarrow \lim_{x_v} \frac{e^{x_v} - 1}{x_v} = 1,$$

διότι κατά τὰ ἀνωτέρω ισχύει

$$1 \leq \frac{e^{x_v} - 1}{x_v} \leq e^{x_v} \quad \forall v \in \mathbb{N}$$

και, λόγω τῆς συνεχείας τῆς ἐκθετικῆς συναρτήσεως, $\lim_{x_v} e^{x_v} = e^0 = 1$, ὁπότε προκύπτει και

$$\lim_{x_v} \frac{e^{x_v} - 1}{x_v} = 1.$$

Ὁμοίως ισχύει και $\lim_{x \rightarrow -0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$. Πράγματι·

$$\left. \begin{array}{l} x_v \rightarrow 0 \\ x_v < 0 \quad \forall v \in \mathbb{N} \end{array} \right\} \Rightarrow \lim_{x_v} \frac{e^{x_v} - 1}{x_v} = 1,$$

διότι κατά τὰ ἀνωτέρω ισχύει

$$e^{x_v} \leq \frac{e^{x_v} - 1}{x_v} \leq 1 \quad \forall v \in \mathbb{N}$$

και, λόγω τῆς συνεχείας τῆς ἐκθετικῆς συναρτήσεως, $\lim_{x_v} e^{x_v} = e^0 = 1$, ὁπότε προκύπτει και

$$\lim_{x_v} \frac{e^{x_v} - 1}{x_v} = 1.$$

Ὡστε ισχύει

$$\lim_{x \rightarrow +0} \frac{e^x - 1}{x} = 1 = \lim_{x \rightarrow -0} \frac{e^x - 1}{x}$$

δηλαδή

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1.$$

5. Ἴσχύει

$$(12) \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\log x}{x-1} = 1.$$

Ἀπόδειξις. Κατὰ πρῶτον θὰ δείξωμεν ὅτι ισχύει

$$\frac{1}{x} \leq \frac{\log x}{x-1} \leq 1 \quad \forall x \in (1, +\infty)$$

και

$$1 \leq \frac{\log x}{x-1} \leq \frac{1}{x} \quad \forall x \in (0, 1).$$

Πράγματι· δια $x \in (1, +\infty)$, δυνάμει του τύπου (10), έχουμε

$$\log x \leq x-1, \quad \text{όπότε} \quad \frac{\log x}{x-1} \leq 1$$

και

$$\frac{\log x}{x-1} = \frac{-\log \frac{1}{x}}{x-1} \geq \frac{-\left(\frac{1}{x}-1\right)}{x-1} = \frac{x-1}{x-1} = \frac{1}{x}.$$

Δια $x \in (0, 1)$, έχουμε $\frac{1}{x} \in (1, +\infty)$ και επομένως

$$\frac{1}{\frac{1}{x}} \leq \frac{\log \frac{1}{x}}{\frac{1}{x}-1} \leq 1, \quad \text{όπότε} \quad 1 \leq \frac{1}{x} \frac{\log \frac{1}{x}}{\frac{1}{x}-1} \leq \frac{1}{x}.$$

Άλλά

$$\frac{1}{x} \frac{\log \frac{1}{x}}{\frac{1}{x}-1} = \frac{1}{x} \frac{-\log x}{\frac{1-x}{x}} = \frac{-\log x}{1-x} = \frac{\log x}{x-1}$$

και επομένως

$$1 \leq \frac{\log x}{x-1} \leq \frac{1}{x}.$$

Θα δείξουμε τώρα ότι $\lim_{x \rightarrow 1+0} \frac{\log x}{x-1} = 1$. Πράγματι·

$$\left. \begin{array}{l} x_v \rightarrow 1 \\ x_v > 1 \quad \forall v \in \mathbb{N} \end{array} \right\} \Rightarrow \lim_{v \rightarrow \infty} \frac{\log x_v}{x_v - 1} = 1,$$

διότι κατά τα ανωτέρω ισχύει

$$\frac{1}{x_v} \leq \frac{\log x_v}{x_v - 1} \leq 1 \quad \forall v \in \mathbb{N}$$

και $\lim_{v \rightarrow \infty} \frac{1}{x_v} = \frac{1}{1} = 1$, οπότε προκύπτει και

$$\lim_{x_v \rightarrow 1} \frac{\log x_v}{x_v - 1} = 1.$$

Όμοιως ισχύει και $\lim_{x \rightarrow 1-0} \frac{\log x}{x-1} = 1$. Πράγματι:

$$\left. \begin{array}{l} x_v \rightarrow 1 \\ 0 < x_v < 1 \quad \forall v \in \mathbb{N} \end{array} \right\} \Rightarrow \lim_{x_v \rightarrow 1} \frac{\log x_v}{x_v - 1} = 1,$$

διότι κατά τὰ ἀνωτέρω ισχύει

$$1 \leq \frac{\log x_v}{x_v - 1} \leq \frac{1}{x_v} \quad \forall v \in \mathbb{N}$$

και $\lim_{x_v \rightarrow 1} \frac{1}{x_v} = \frac{1}{1} = 1$, ὁπότε προκύπτει και

$$\lim_{x_v \rightarrow 1} \frac{\log x_v}{x_v - 1} = 1.$$

Ὡστε ισχύει

$$\lim_{x \rightarrow 1+0} \frac{\log x}{x-1} = 1 = \lim_{x \rightarrow 1-0} \frac{\log x}{x-1}$$

δηλαδή

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\log x}{x-1} = 1.$$

4. ΑΣΚΗΣΕΙΣ

4.1 Μελετήσατε ὡς πρὸς τὴν συνέχειαν τὰς συναρτήσεις τὰς ὀριζόμενες ὑπὸ τῶν κάτωθι τύπων και παραστήσατε γεωμετρικῶς τὰς τρεῖς πρώτας :

$$1) f(x) = \begin{cases} x, & \text{ἀν } x \in \left[0, \frac{1}{2}\right] \\ \frac{1}{2} + x, & \text{ἀν } x \in \left(\frac{1}{2}, 1\right] \end{cases}$$

$$2) f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & \text{ἀν } x \neq 0 \\ 0, & \text{ἀν } x = 0 \end{cases}$$

$$3) f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x^2}, & \text{ἀν } x \neq 0 \\ 0, & \text{ἀν } x = 0 \end{cases}$$

$$4) * f(x) = \begin{cases} \eta\mu \frac{1}{x}, & \text{ἀν } x > 0 \\ x, & \text{ἀν } x \leq 0 \end{cases}$$

$$5) * f(x) = \begin{cases} x^2 \eta\mu \frac{1}{x}, & \text{ἀν } x \neq 0 \\ 0, & \text{ἀν } x = 0 \end{cases}$$

$$6) * f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} \eta\mu \frac{1}{x}, & \text{ἀν } x \neq 0 \\ 0, & \text{ἀν } x = 0 \end{cases}$$

4.2 Δείξατε ὅτι αἱ συναρτήσεις αἱ ὀριζόμενες ὑπὸ τῶν κάτωθι τύπων εἶναι συνεχεῖς :

$$1) f(x) = \sin(x^2 + 3x)$$

$$2) f(x) = \sin \sqrt{1-x^2}$$

$$3) f(x) = \eta\mu(\sin 3x)$$

- 4) $f(x) = \eta\mu \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1}$ 5) $f(x) = \frac{x^2 + 3x}{2 + \eta\mu x^2}$ 6) $f(x) = \sigma\upsilon\nu(x^2 + \epsilon\phi 3x)$
 7) $f(x) = 2^{2x + \eta\mu x} (i + \epsilon\phi x)$ 8) $f(x) = \log(1 + x^2 \eta\mu^2 x)$ 9) $f(x) = 3^{x\epsilon\phi(x^2 + 1)}$

4.3 Μελετήσατε ως προς την συνέχειαν την συνάρτησιν f με

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} \eta\mu \frac{1}{x}, & \text{\textit{αν } } x \neq 0 \text{ και } |x| \leq 1 \\ 0, & \text{\textit{αν } } x = 0 \\ \eta\mu x, & \text{\textit{αν } } |x| > 1 \end{cases}$$

4.4 Μελετήσατε ως προς την συνέχειαν και παραστήσατε γεωμετρικῶς την συνάρτησιν f με

$$f(x) = \begin{cases} \log x, & \text{\textit{αν } } x > 2 \\ x - 2 + \log x, & \text{\textit{αν } } 1 < x \leq 2 \\ 1 - x, & \text{\textit{αν } } x \leq 1 \end{cases}$$

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VII

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΣ

1. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΣ

1.1 Αί θεωρούμεναι εἰς τὸ παρὸν κεφάλαιον συναρτήσεις εἶναι ὅλαι πραγματικαὶ συναρτήσεις μιᾶς πραγματικῆς μεταβλητῆς. Ἡ ἔννοια τῆς παραγώγου μιᾶς συναρτήσεως εἶναι, ὅπως καὶ ἡ ἔννοια τῆς συνεχείας συναρτήσεως, συνδεδεμένη μὲ τὴν ἔννοιαν τῆς συγκλίσεως.

Ἐστω f μία συνάρτησις μὲ πεδῖον ὀρισμοῦ ἐν διάστημα Δ καὶ ἔστω $x_0 \in \Delta$. Τότε διὰ τοῦ τύπου

$$g_{x_0}(x) = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}, \quad x \in \Delta - \{x_0\}$$

ὀρίζεται μία συνάρτησις g_{x_0} , ἡ ὁποία καλεῖται *πηλίκον διαφορῶν τῆς f εἰς τὸ σημεῖον x_0* . Ἄν ὑπάρχῃ τὸ $\lim_{x \rightarrow x_0} g_{x_0}(x)$, δηλαδὴ τὸ $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ καὶ εἶναι τοῦτο πραγματικὸς ἀριθμὸς, τότε λέγομεν ὅτι «ἡ συνάρτησις f παραγωγίζεται εἰς τὸ σημεῖον x_0 » ἢ ἄλλως «ὑπάρχει ἡ παράγωγος (ἀκριβέστερον ἢ πρώτη παράγωγος) τῆς f εἰς τὸ σημεῖον x_0 ». Τὴν ὀριακὴν ταύτην τιμὴν καλοῦμεν τότε *παράγωγον* (ἀκριβέστερον *πρώτην παράγωγον*) τῆς f εἰς τὸ σημεῖον x_0 καὶ μάλιστα συμβολίζομεν ταύτην μὲ $\left[\frac{df(x)}{dx} \right]_{x=x_0}$ ἢ $(f(x))'_{x=x_0}$ ἢ ἀκόμη $f'(x_0)$.

Συντόμως :

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}.$$

Παρατηρήσεις. 1) Ἄν τὸ x_0 εἶναι τὸ ἀριστερὸν ἄκρον τοῦ διαστήματος Δ , τότε εἰς τὸν ἀνωτέρω ὀρισμὸν ἐννοοῦμεν τὴν ὀριακὴν τιμὴν διὰ $x \rightarrow x_0 + 0$, ἐνῶ ἂν τὸ x_0 εἶναι τὸ δεξιὸν ἄκρον τοῦ διαστήματος Δ ἐννοοῦμεν τὴν ὀριακὴν τιμὴν διὰ $x \rightarrow x_0 - 0$.

2) Ἀποδεικνύεται ὅτι ἡ ὑπαρξις τῆς παραγώγου μιᾶς συναρτήσεως εἰς ἓν σημεῖον συνεπάγεται τὴν συνέχειαν ταύτης εἰς τὸ σημεῖον τοῦτο (πρβλ. κατωτέρω ἰδιότητα 1.5.1).

Παραδείγματα :

1. *Εἰς τὴν περίπτωσιν τῆς σταθερᾶς συναρτήσεως c , ἥτοι $f(x) = c$, ἔχομεν*

$$(c)'_{x=x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{c - c}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} 0 = 0,$$

ήτοι $(c)'_{x=x_0} = 0$.
 και μάλιστα ο τύπος ούτος ισχύει προφανώς διὰ κάθε πραγματικόν ἀριθμὸν x_0 , γράφομεν δὲ

$$(c)' = 0.$$

2. Εἰς τὴν περίπτωσιν, ὅπου $f(x) = x$, ἔχομεν

$$(x)'_{x=x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{x - x_0}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} 1 = 1,$$

ήτοι

$$(x)'_{x=x_0} = 1$$

και μάλιστα ο τύπος ούτος ισχύει διὰ κάθε πραγματικὸν ἀριθμὸν x_0 , γράφομεν δὲ ἐπίσης

$$(x)' = 1.$$

3. Εἰς τὴν περίπτωσιν, ὅπου $f(x) = x^2$, ἔχομεν

$$(x^2)'_{x=x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{x^2 - x_0^2}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} (x + x_0) = x_0 + x_0 = 2x_0,$$

ήτοι

$$(x^2)'_{x=x_0} = 2x_0$$

και μάλιστα ο τύπος ούτος ισχύει διὰ κάθε πραγματικὸν ἀριθμὸν x_0 , γράφομεν δὲ ὁμοίως

$$(x^2)' = 2x$$

καὶ λέγομεν ὅτι ἡ συνάρτησις f μὲ $f(x) = x^2$ παραγωγίζεται εἰς τὸ πεδίου ὀρισμοῦ τῆς καὶ μάλιστα εἰς τὴν προκειμένην περίπτωσιν τὴν συνάρτησιν g μὲ $g(x) = 2x$ καλοῦμεν παράγωγον τῆς f .

Γενικῶς, ἂν διὰ μίαν συνάρτησιν f μὲ πεδίου ὀρισμοῦ ἔν διαστήμα Δ ὑπάρχη ἡ (πρώτη) παράγωγος αὐτῆς διὰ κάθε $x \in \Delta$, τότε ὁ τύπος

$$y = f'(x)$$

ὀρίζει μίαν συνάρτησιν f' , ἡ ὁποία ἔχει πεδίου ὀρισμοῦ ἐπίσης τὸ διάστημα Δ καὶ τὴν ὁποίαν καλοῦμεν *παράγωγον* (ἀκριβέστερον *πρώτην παράγωγον*) τῆς f ἐν Δ ἢ ἀπλῶς (*πρώτην*) *παράγωγον* τῆς f . Ταύτην συμβολίζομεν καὶ μὲ $\frac{df}{dx}$.

Εἰς τὴν περίπτωσιν, ὅπου ὀρίζεται ἡ (πρώτη) παράγωγος f' τῆς συναρτήσεως f λέγομεν ὅτι «*ἡ συνάρτησις f παραγωγίζεται ἐν Δ* » ἢ ἀπλῶς «*ἡ συνάρτησις f παραγωγίζεται*».

Ἄν ἡ συνάρτησις f παραγωγίζεται, τότε εἶναι δυνατὸν νὰ παραγωγίζεται καὶ ἡ συνάρτησις f' εἰς ἓν σημεῖον $x_0 \in \Delta$, ὁπότε, ἂν τοῦτο συμβαίνει, τὴν παράγωγον $(f'(x))'_{x=x_0}$ καλοῦμεν δευτέραν παράγωγον τῆς f εἰς τὸ σημεῖον x_0

καὶ συμβολίζομεν ταύτην μὲ $f''(x_0)$ ἢ $\left[\frac{d^2f(x)}{dx^2} \right]_{x=x_0}$ ἢ ἀκόμη μὲ $(f(x))''_{x=x_0}$.

Ἄν τώρα ὑπάρχη ἡ δευτέρα παράγωγος τῆς f εἰς κάθε σημεῖον $x \in \Delta$, τότε ὁ τύπος

$$y = f''(x)$$

ὀρίζει μίαν συνάρτησιν f'' μὲ πεδίου ὀρισμοῦ ἐπίσης τὸ διάστημα Δ , ἡ ὁποία καλεῖται *δευτέρα παράγωγος* τῆς f ἐν Δ ἢ ἀπλῶς *δευτέρα παράγωγος* τῆς f . Ταύτην συμβολίζομεν καὶ μὲ $\frac{d^2f}{dx^2}$. Π.χ.

$$(x^2)''_{x=x_0} = (2x)'_{x=x_0} = 2,$$

διότι

$$(2x)'_{x=x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{2x - 2x_0}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} 2 = 2.$$

Άρα υπάρχει η δεύτερα παράγωγος της συναρτήσεως f με $f(x) = x^2$ και είναι αυτή ή σταθερά συνάρτησις 2.

Κατ' αναλογία ορίζομεν την τρίτην παράγωγον μιᾶς συναρτήσεως f ὡς τὴν παράγωγον τῆς δευτέρας παραγώγου αὐτῆς καὶ ἐπαγωγικῶς τὴν νιοστὴν παράγωγον $f^{(v)}$ αὐτῆς διὰ τοῦ τύπου

$$f^{(v)} = (f^{(v-1)})', \quad v = 2, 3, \dots,$$

ὅπου με $f^{(v)}$ συμβολίζομεν τὴν μιοστὴν παράγωγον τῆς f . Ἐπίσης διὰ τὴν νιοστὴν παράγωγον $f^{(v)}$ χρησιμοποιεῖται καὶ τὸ σύμβολον $\frac{d^v f}{dx^v}$.

1.2 Γεωμετρικὴ σημασία τῆς παραγώγου. Ἐστω f μία συνάρτησις με πεδῖον ὀρισμοῦ ἐν διάστημα Δ καὶ ἔστω $P_0 = (x_0, f(x_0))$ ἐν σημείον τοῦ διαγράμματος αὐτῆς. Ἄν θεωρήσωμεν καὶ ἕν ἄλλον σημείον $P_\eta = (x_0 + \eta, f(x_0 + \eta))$ τοῦ διαγράμματος ὡς καὶ τὴν διὰ τῶν σημείων P_0, P_η διερχομένην εὐθεΐαν, ἡ ὁποία καλεῖται τεμνοῦσα διὰ τοῦ P_0 εὐθεΐα τὸ διάγραμμα τῆς f , τότε ὁ συντελεστὴς κατευθύνσεως τῆς τεμνοῦσης, δηλαδὴ ἡ ἐφαπτομένη τῆς γωνίας α_η , δίδεται ὑπὸ τοῦ τύπου

$$\epsilon\phi\alpha_\eta = \frac{QP_\eta}{P_0Q} = \frac{f(x_0 + \eta) - f(x_0)}{\eta},$$

ἡ δὲ ἔξισωσις τῆς τεμνοῦσης εἶναι

$$(τ) \quad y - f(x_0) = \frac{f(x_0 + \eta) - f(x_0)}{\eta} (x - x_0).$$

Ἄν τώρα ὑποθέσωμεν ὅτι ὑπάρχει τὸ $\lim_{\eta \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \eta) - f(x_0)}{\eta}$ δηλαδὴ ὅτι ὑπάρχει ἡ παράγωγος $f'(x_0)$ τῆς συναρτήσεως f εἰς τὸ σημείον x_0 , τότε ὀρίζεται ὡς ὀριακὴ ἔξισωσις τῆς (τ) διὰ $\eta \rightarrow 0$ μία ἔξισωσις εὐθεΐας

$$(ε) \quad y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0)$$

διερχομένης ἐκ τοῦ σημείου $P_0 = (x_0, f(x_0))$ καὶ ἐχούσης συντελεστὴν κατευθύνσεως τὴν $f'(x_0)$, ἥτοι (βλ. σχ. 75)


$$\epsilon\phi\alpha = f'(x_0).$$

Τὴν εὐθεΐαν ταύτην ορίζομεν ὡς τὴν ἐφαπτομένην εὐθεΐαν τοῦ διαγράμματος τῆς f εἰς τὸ σημείον P_0 .

1.3 Κινηματικὴ σημασία τῆς παραγώγου. Ἐστω ὅτι ἡ θέσις x ὑλικοῦ σημείου κινουμένου ἐπὶ εὐθείας ἐκφράζεται συναρτήσῃ τοῦ χρόνου t , ἥτοι

$$x = f(t), \quad t \in \Delta = [t_0, t_1] \quad (\text{ἐν χρονικὸν διάστημα}).$$

Τὸ πηλίκον διαφορῶν $\frac{f(t) - f(\tau)}{t - \tau}$ εἰς τὴν χρονικὴν στιγμήν $t \in [t_0, t_1]$ ἐκφράζει τὴν μέσην ταχύτητα τοῦ ὑλικοῦ σημείου κατὰ τὸ χρονικὸν διάστημα μετα-



Σχ. 75

ἐν τῶν στιγμῶν τ καὶ t . Τὴν ὀριακὴν τιμὴν τῆς μέσης ταύτης ταχύτητος διὰ $t \rightarrow \tau$ ὀρίζομεν ὡς τὴν (στιγμαίαν) ταχύτητα $v(t)$ τοῦ ὕλικοῦ σημείου κατὰ τὴν χρονικὴν στιγμήν τ , ἥτοι ὀρίζομεν

$$v(t) = \lim_{t \rightarrow \tau} \frac{f(t) - f(\tau)}{t - \tau} = f'(t).$$

Ἄν τώρα ἡ στιγμιαία ταχύτης $v(t)$ ὀρίζεται διὰ κάθε χρονικὴν στιγμήν $t \in [t_0, t_1]$, τότε τὸ πηλίκον διαφορῶν $\frac{v(t) - v(\tau)}{t - \tau}$ ἐκφράζει τὴν μέσην ἐπιτάχυνσιν τοῦ ὕλικοῦ σημείου κατὰ τὸ χρονικὸν διάστημα μεταξὺ τῶν στιγμῶν τ καὶ t . Τὴν ὀριακὴν τιμὴν τῆς μέσης ταύτης ἐπιτάχυνσεως διὰ $t \rightarrow \tau$ ὀρίζομεν ὡς τὴν (στιγμαίαν) ἐπιτάχυνσιν $\gamma(\tau)$ κατὰ τὴν χρονικὴν στιγμήν τ , ἥτοι ὀρίζομεν

$$\gamma(\tau) = \lim_{t \rightarrow \tau} \frac{v(t) - v(\tau)}{t - \tau} = v'(\tau) = f''(\tau).$$

1.4* Διαφορικὸν συναρτήσεως. Ἐστω f μία συνάρτησις, ἡ ὁποία παραγωγίζεται εἰς ἓν διάστημα Δ . Ἄν x_0 εἶναι τυχὸν σημεῖον τοῦ διαστήματος Δ , τότε διὰ τοῦ τύπου $Y = f'(x_0)X$ ὀρίζεται μία (γραμμικὴ) συνάρτησις, ἡ ὁποία καλεῖται *διαφορικὸν τῆς συναρτήσεως* f εἰς τὸ σημεῖον x_0 καὶ συμβολίζεται μὲ $df(x_0)$, ἥτοι :

$$X \xrightarrow{df(x_0)} Y = f'(x_0)X.$$

Εἰδικῶς, ἂν θεωρήσωμεν τὴν ταυτοτικὴν συνάρτησιν, δηλαδὴ τὴν συνάρτησιν τ μὲ $\tau(x) = x$, τότε τὸ διαφορικὸν $d\tau(x) = dx$ αὐτῆς εἰς τὸ σημεῖον x , ὀρίζεται, κατὰ τὰ ἀνωτέρω, ὡς ἡ συνάρτησις ἡ διδομένη ὑπὸ τοῦ τύπου $Y = \tau'(x)X = 1 \cdot X = X$, ἥτοι

$$X \xrightarrow{dx} Y = X$$

καὶ ἐπομένως ἡ συνάρτησις $f'(x_0)dx$ ἔχει τύπον $Y = f'(x_0)X$, δηλαδὴ αὕτη συμπίπτει μὲ τὸ διαφορικὸν $df(x_0)$. Ἄρα ἰσχύει ὁ τύπος

$$df(x_0) = f'(x_0)dx,$$


ὁ ὁποῖος καὶ δικαιολογεῖ τὸν συμβολισμόν $f'(x_0) = \frac{df(x_0)}{dx}$ τῆς παραγώγου ὡς πηλίκον διαφορικῶν.

Ἡ γεωμετρικὴ ἐρμηνεία τοῦ διαφορικοῦ $df(x_0)$ τῆς συναρτήσεως f εἰς τὸ x_0 δίδεται εἰς τὸ ἔναντι σχ. 75α, ὅπου ἡ ἀρχὴ τῶν ἀξόνων X, Y εἶναι τὸ σημεῖον $P_0 = (x_0, f(x_0))$.

Ὡς εἶδομεν ἀνωτέρω εἰς τυχὸν σημεῖον $x_0 \in \Delta$ ὀρίζεται τὸ διαφορικὸν $df(x_0)$ τῆς f εἰς τὸ x_0 , δηλαδὴ ὀρίζεται μία μοσοσήμαντος ἀπεικόνισις μὲ τύπον :

$$\Delta x \rightarrow df(x),$$

ἡ ὁποία εἰς τὸ τυχὸν $x \in \Delta$ ἀπεικονίζει μίαν συνάρτησιν, τὸ διαφορικὸν $df(x)$ τῆς f εἰς τὸ σημεῖον x . Τὴν ἀπεικόνισιν



Σχ. 75α.

ταύτην καλοῦμεν διαφορικὸν τῆς συναρτήσεως f καὶ συμβολίζομεν μὲ df , ἥτοι :

$$\Delta \ni x \xrightarrow{df} df(x).$$

1.5 Ἰδιότητες τῶν παραγῶγων. Ἐστώσαν δύο συναρτήσεις f καὶ g μὲ κοινὸν πεδίου ὀρισμοῦ ἐν διάστημα Δ . Τότε ἰσχύουν τὰ κάτωθι:

1.5.1 Ἄν ἡ συνάρτησις f παραγωγίζεται ἐν Δ , τότε αὕτη εἶναι συνεχῆς συνάρτησις.

Ἀπόδειξις. Ἐστω τυχὸν σημείου $x_0 \in \Delta$. Ἐχομεν τότε

$$f(x) - f(x_0) = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} (x - x_0) \quad \forall x \in \Delta - \{x_0\}$$

καὶ ἐπομένως

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) - f(x_0)) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \lim_{x \rightarrow x_0} (x - x_0) = f'(x_0) \cdot 0 = 0,$$

ἥτοι $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$, τὸ ὁποῖον σημαίνει ὅτι ἡ συνάρτησις f εἶναι συνεχῆς εἰς τὸ σημεῖον x_0 τοῦ διαστήματος Δ .

Παρατήρησις. Τὸ ἀντίστροφον τῆς ἰδιότητος ταύτης δὲν ἰσχύει, δηλαδὴ μία συνάρτησις δύναται νὰ εἶναι συνεχῆς, ἀλλὰ νὰ μὴ παραγωγίζεται. Τοῦτο ἀποδεικνύεται διὰ τοῦ παραδείγματος τῆς συναρτήσεως f μὲ $f(x) = |x|$, ἡ ὁποία, ὡς εἶδομεν εἰς τὸ παράδειγμα 4 τῆς § 1.1 τοῦ κεφ. VI, εἶναι συνεχῆς. Αὕτη ὁμως δὲν παραγωγίζεται εἰς τὸ σημεῖον 0, διότι

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{|x| - |0|}{x - 0} = \frac{|x|}{x} = \begin{cases} 1, & \text{ἂν } x > 0 \\ -1, & \text{ἂν } x < 0 \end{cases}$$

καὶ ἐπομένως

$$\lim_{x \rightarrow +0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow -0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = -1.$$

Ἄρα δὲν ὑπάρχει τὸ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0}$, δηλαδὴ ἡ συνάρτησις f δὲν παραγωγίζεται εἰς τὸ σημεῖον 0.

1.5.2 Ἄν αἱ συναρτήσεις f καὶ g παραγωγίζονται ἐν Δ , τότε παραγωγίζονται καὶ αἱ συναρτήσεις $f + g$ καὶ $f - g$ καὶ μάλιστα ἰσχύουν

$$(f + g)' = f' + g' \quad \text{καὶ} \quad (f - g)' = f' - g'.$$

Ἀπόδειξις. Ἄν x_0 εἶναι τυχὸν σημεῖον τοῦ διαστήματος Δ , τότε ἔχομεν

$$\frac{(f(x) + g(x)) - (f(x_0) + g(x_0))}{x - x_0} = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} + \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0}$$

καὶ ἐπομένως

$$\begin{aligned} (f(x) + g(x))'_{x=x_0} &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{(f(x) + g(x)) - (f(x_0) + g(x_0))}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \\ &+ \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0} = f'(x_0) + g'(x_0), \end{aligned}$$

ἥτοι $(f(x) + g(x))'_{x=x_0} = f'(x_0) + g'(x_0)$ καὶ τοῦτο διὰ κάθε $x_0 \in \Delta$, τὸ ὁποῖον σημαίνει ὅτι $(f + g)' = f' + g'$.

Όμοίως αποδεικνύεται και ο αντίστοιχος τύπος δια διαφοράν.

Ειδικώς, αν g είναι ή σταθερά συνάρτησις c , ισχύει

$$(f + c)' = f' \quad (\text{διατί;}).$$

1.5.3 "Αν αί συναρτήσεις f και g παραγωγίζονται εν Δ , τότε παραγωγίζεται και τὸ γινόμενον fg και μάλιστα ισχύει

$$(fg)' = f'g + fg'.$$

Ἀπόδειξις. Ἐν x_0 εἶναι τυχὸν σημεῖον τοῦ διαστήματος Δ , τότε ἔχομεν

$$\begin{aligned} \frac{f(x)g(x) - f(x_0)g(x_0)}{x - x_0} &= \frac{[f(x)g(x) - f(x_0)g(x)] + [f(x_0)g(x) - f(x_0)g(x_0)]}{x - x_0} = \\ &= \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} g(x) + f(x_0) \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0}. \end{aligned}$$

Ἐπειδὴ ὅμως ή g παραγωγίζεται εν Δ , λόγω τῆς 1.5.1, αὕτη εἶναι συνεχής και ἐπομένως $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = g(x_0)$, ὁπότε λαμβάνομεν

$$\begin{aligned} (f(x)g(x))'_{x=x_0} &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) + f(x_0) \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0} = \\ &= f'(x_0)g(x_0) + f(x_0)g'(x_0) \end{aligned}$$

και τοῦτο δια κάθε $x_0 \in \Delta$, τὸ ὁποῖον σημαίνει ὅτι

$$(fg)' = f'g + fg'.$$

Ειδικώς, αν g είναι ή σταθερά συνάρτησις c , ισχύει

$$(cf)' = cf' \quad (\text{διατί;}).$$

1.5.4. "Αν αί συναρτήσεις f και g παραγωγίζονται εν Δ και ισχύη $g(x) \neq 0 \quad \forall x \in \Delta$, τότε παραγωγίζεται και τὸ πηλίκον $\frac{f}{g}$ και μάλιστα ισχύει

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}.$$

Ειδικώς, αν f είναι ή σταθερά συνάρτησις 1, ισχύει

$$(1) \quad \left(\frac{1}{g}\right)' = -\frac{g'}{g^2}.$$

Ἀπόδειξις. Ὅθ ἀποδείξωμεν πρῶτον τὴν (1). Ἐν x_0 εἶναι τυχὸν σημεῖον τοῦ διαστήματος Δ , ἔχομεν

$$\frac{\frac{1}{g(x)} - \frac{1}{g(x_0)}}{x - x_0} = -\frac{1}{g(x_0)} \frac{1}{g(x)} \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0}.$$

Ἐπειδὴ ὅμως ή g παραγωγίζεται εν Δ , λόγω τῆς 1.5.1, αὕτη εἶναι συνεχής και ἐπομένως $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = g(x_0)$, ἄρα $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{g(x)} = \frac{1}{g(x_0)}$, ὁπότε λαμβάνομεν

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{g(x)}\right)'_{x=x_0} &= -\frac{1}{g(x_0)} \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{g(x)} \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0} = -\frac{1}{g(x_0)} \frac{1}{g(x_0)} g'(x_0) = \\ &= -\frac{g'(x_0)}{g^2(x_0)} \end{aligned}$$

καί τοῦτο διὰ κάθε $x_0 \in \Delta$, τὸ ὁποῖον σημαίνει ὅτι ἰσχύει ἡ (1).

Τώρα, δυνάμει τῆς (1) καί τῆς 1.5.3, ἔχομεν

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \left(f \frac{1}{g}\right)' = f' \frac{1}{g} + f \left(\frac{1}{g}\right)' = f' \frac{1}{g} + f \left(-\frac{g'}{g^2}\right) = \frac{f'g - fg'}{g^2}.$$

1.6 Αἱ παράγωγοι στοιχειωδῶν τινων συναρτήσεων.

1.6.1 $(x^v)' = vx^{v-1}$ ($v = 2, 3, \dots$).

Διὰ $v = 2$ ἔχομεν ἤδη ὑπολογίσει ὅτι $(x^2)' = 2x = 2x^{2-1}$, δηλαδή ὁ ἐν λόγω τύπος ἰσχύει. Ἡ ἀπόδειξις τοῦ τύπου τούτου εἰς τὴν γενικὴν περίπτωσιν ἐπι-
τυγχάνεται διὰ τῆς ἐπαγωγικῆς μεθόδου ὡς ἑξῆς :

*Ἐστω ὅτι ἰσχύει $(x^k)' = kx^{k-1}$, ὁπότε, δυνάμει τῆς 1.5.3, θὰ ἰσχύη

$$(x^{k+1})' = (x \cdot x^k)' = (x)'x^k + x(x^k)' = 1 \cdot x^k + kx^k = (k+1)x^k.$$

Ἔστω δεχόμενοι ὅτι ὁ τύπος 1.6.1 ἰσχύει διὰ τὸν φυσικὸν ἀριθμὸν k ($k \geq 2$) ἐδεί-
ξαμεν ὅτι οὗτος ἰσχύει καί διὰ τὸν ἐπόμενον αὐτοῦ φυσικὸν ἀριθμὸν $k+1$. Ἄρα
ὁ τύπος 1.6.1. ἰσχύει διὰ κάθε φυσικὸν ἀριθμὸν $v \geq 2$.

1.6.1' $\left(\frac{1}{x^v}\right)' = -\frac{v}{x^{v+1}}$, $x \neq 0$ (v φυσικὸς ἀριθμὸς).

Διὰ $v = 1$ ὁ τύπος οὗτος ἰσχύει, διότι, δυνάμει τῆς (1), ἔχομεν

$$\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{(x)'}{x^2} = -\frac{1}{x^2} = -\frac{1}{x^{1+1}}.$$

Διὰ $v \geq 2$, δυνάμει τόσοσ τῆς (1) ὅσον καί τοῦ τύπου 1.6.1, ἔχομεν

$$\left(\frac{1}{x^v}\right)' = -\frac{(x^v)'}{(x^v)^2} = -\frac{vx^{v-1}}{x^{2v}} = -\frac{v}{x^{v+1}}.$$

1.6.2 $(\eta \mu x)' = \sigma \nu x$.

Κατὰ πρῶτον ἀποδεικνύομεν τὸν τύπον $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\eta \mu y}{y} = 1$. Ἐκ τῆς τριγωνομε-

τρίας εἶναι γνωστὴ ἡ ἀνισότης $\eta \mu y < y < \epsilon \phi y \quad \forall y \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, ἡ ὁποία γράφε-
ται ἰσοδυνάμως καί οὕτω :

$$\sigma \nu y < \frac{\eta \mu y}{y} < 1 \quad \forall y \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right).$$

Ἡ τελευταία αὕτη ἀνισότης ἰσχύει καί διὰ $y \in \left(-\frac{\pi}{2}, 0\right)$, διότι

$$y \in \left(-\frac{\pi}{2}, 0\right) \Rightarrow -y \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right) \Rightarrow \sigma \nu(-y) < \frac{\eta \mu(-y)}{-y} < 1 \Rightarrow \sigma \nu y < \frac{\eta \mu y}{y} < 1.$$

Ἔστω ἐδείχθη ὅτι

$$(2) \quad \sigma \nu y < \frac{\eta \mu y}{y} < 1 \quad \forall y \in \left(-\frac{\pi}{2}, 0\right) \cup \left(0, \frac{\pi}{2}\right).$$

Ἐπειδὴ τὸ σνημίτονον εἶναι συνεχῆς συνάρτησις ἔχομεν $\lim_{y \rightarrow 0} \sigma \nu y = \sigma \nu 0 = 1$

καί ὁ τύπος (2) δίδει τότε $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\eta \mu y}{y} = 1$.

Πρὸς ἀπόδειξιν τώρα τοῦ τύπου 1.6.2 θεωροῦμεν τυχόντα πραγματικὸν
ἀριθμὸν x_0 , ὁπότε ἔχομεν

$$\frac{\eta\mu x - \eta\mu x_0}{x - x_0} = \frac{2\eta\mu \frac{x-x_0}{2} \sigma\upsilon\nu \frac{x+x_0}{2}}{x - x_0} = \frac{\eta\mu \frac{x-x_0}{2}}{\frac{x-x_0}{2}} \sigma\upsilon\nu \frac{x+x_0}{2}$$

και επειδη αφ' ενος μεν, ως ανωτέρω απεδείχθη, $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\eta\mu \frac{x-x_0}{2}}{\frac{x-x_0}{2}} = 1$, αφ' ετέρου δε $\lim_{x \rightarrow x_0} \sigma\upsilon\nu \frac{x+x_0}{2} = \sigma\upsilon\nu \frac{x_0+x_0}{2} = \sigma\upsilon\nu x_0$ (λόγω τής συνεχείας του σινημιτόνου), θα έχωμεν

$$(\eta\mu x)'_{x=x_0} = 1 \cdot \sigma\upsilon\nu x_0 = \sigma\upsilon\nu x_0$$

και τουτο δια κάθε πραγματικόν αριθμόν x_0 , το όποιον σημαίνει ότι $(\eta\mu x)' = \sigma\upsilon\nu x$.

1.6.3 $(\sigma\upsilon\nu x)' = -\eta\mu x$.

Κατ' αναλογίαν προς την προηγουμένην περίπτωσηιν έχομεν

$$\begin{aligned} (\sigma\upsilon\nu x)'_{x=x_0} &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\sigma\upsilon\nu x - \sigma\upsilon\nu x_0}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{-2\eta\mu \frac{x-x_0}{2} \eta\mu \frac{x+x_0}{2}}{x - x_0} = \\ &= - \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\eta\mu \frac{x-x_0}{2}}{\frac{x-x_0}{2}} \lim_{x \rightarrow x_0} \eta\mu \frac{x+x_0}{2} = -1 \cdot \eta\mu \frac{x_0+x_0}{2} = -\eta\mu x_0. \end{aligned}$$

1.6.4. $(\epsilon\phi x)' = \frac{1}{\sigma\upsilon\nu^2 x} = 1 + \epsilon\phi^2 x$, $x \neq \kappa\pi + \frac{\pi}{2}$ ($\kappa = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$).

Η απόδειξις του τύπου τούτου επιτυγχάνεται δι' εφαρμογής τής ιδιότητος 1.5.4.

$$\begin{aligned} (\epsilon\phi x)' &= \left(\frac{\eta\mu x}{\sigma\upsilon\nu x} \right)' = \frac{(\eta\mu x)' \sigma\upsilon\nu x - \eta\mu x (\sigma\upsilon\nu x)'}{\sigma\upsilon\nu^2 x} = \frac{\sigma\upsilon\nu x \sigma\upsilon\nu x - \eta\mu x (-\eta\mu x)}{\sigma\upsilon\nu^2 x} = \\ &= \frac{\sigma\upsilon\nu^2 x + \eta\mu^2 x}{\sigma\upsilon\nu^2 x} = \frac{1}{\sigma\upsilon\nu^2 x}. \end{aligned}$$

1.6.5. $(\sigma\phi x)' = -\frac{1}{\eta\mu^2 x} = -(1 + \sigma\phi^2 x)$, $x \neq \kappa\pi$ ($\kappa = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$).

$$\begin{aligned} (\sigma\phi x)' &= \left(\frac{\sigma\upsilon\nu x}{\eta\mu x} \right)' = \frac{(\sigma\upsilon\nu x)' \eta\mu x - \sigma\upsilon\nu x (\eta\mu x)'}{\eta\mu^2 x} = \frac{(-\eta\mu x) \eta\mu x - \sigma\upsilon\nu x \sigma\upsilon\nu x}{\eta\mu^2 x} = \\ &= -\frac{\eta\mu^2 x + \sigma\upsilon\nu^2 x}{\eta\mu^2 x} = -\frac{1}{\eta\mu^2 x}. \end{aligned}$$

1.6.6. $(e^x)' = e^x$.

Έχομεν

$$\frac{e^x - e^{x_0}}{x - x_0} = \frac{e^{(x-x_0)+x_0} - e^{x_0}}{x - x_0} = e^{x_0} \frac{e^{x-x_0} - 1}{x - x_0},$$

όποτε, επειδη κατά τον τύπον (11) τής § 3.3. του κεφ. VI ισχύει

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{e^{x-x_0} - 1}{x - x_0} = 1, \text{ θα έχωμεν και}$$

$$(\epsilon^x)'_{x=x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{e^x - e^{x_0}}{x - x_0} = e^{x_0} \cdot 1 = e^{x_0}$$

και τουτο δια κάθε πραγματικόν αριθμόν x_0 , το όποιον σημαίνει ότι $(e^x)' = e^x$.

$$1.6.7 \quad (\log x)' = \frac{1}{x}, \quad x \in (0, +\infty).$$

Έχουμε

$$\frac{\log x - \log x_0}{x - x_0} = \frac{\log \frac{x}{x_0}}{x - x_0} = \frac{1}{x_0} \frac{\log \frac{x}{x_0}}{\frac{x}{x_0} - 1},$$

όπότε, επειδή κατά τον τύπον (12) της § 3.3 του κεφ. VI ισχύει

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\log \frac{x}{x_0}}{\frac{x}{x_0} - 1} = 1, \quad \text{θα έχουμε και}$$

$$(\log x)'_{x=x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\log x - \log x_0}{x - x_0} = \frac{1}{x_0} \cdot 1 = \frac{1}{x_0}$$

και τούτο διά κάθε θετικόν αριθμόν x_0 , τὸ ὁποῖον σημαίνει ὅτι $(\log x)' = \frac{1}{x}$.

Ἐπειδή κατά τον τύπον (8) της § 3.2 του κεφ. VI ισχύει

$$\log_a x = \frac{\log x}{\log a} \quad (a \neq 1), \quad \text{θα έχουμε}$$

$$(\log_a x)' = \frac{1}{\log a} (\log x)' = \frac{1}{\log a} \frac{1}{x} = \frac{1}{x \log a}$$

Ὡστε ισχύει, γενικώτερον, ὁ κάτωθι τύπος

$$1.6.7' \quad (\log_a x)' = \frac{1}{x \log a}, \quad x \in (0, +\infty) \quad (a \neq 1).$$

1.7. Παραγωγίσις συνθέτου συναρτήσεως. Ὁ ὑπολογισμὸς τῆς παραγωγῆς μιᾶς συναρτήσεως τῆ βοηθεῖα τοῦ ὀρισμοῦ αὐτῆς εἶναι ἐν γένει λίαν ἐπίπονος καὶ πρακτικῶς εἰς πολλὰς περιπτώσεις ἀδύνατος. Αἱ ἰδιότητες τῶν παραγῶγων καὶ οἱ τύποι οἱ δοθέντες εἰς τὰς προηγουμένας παραγράφους 1.5 καὶ 1.6 δύνανται νὰ ἐφαρμοσθοῦν καταλλήλως διὰ τὸν ὑπολογισμὸν τῶν παραγῶγων καὶ ἄλλων στοιχειωδῶν συναρτήσεων, ὡς π.χ.

$$(\log x + \epsilon \phi x)' = (\log x)' + (\epsilon \phi x)' = \frac{1}{x} + \frac{1}{\sigma \nu \nu^2 x}, \quad x \in \mathbb{R}^+ \quad \text{καὶ } x \neq \kappa \pi + \frac{\pi}{2}$$

$$(\kappa = 0, \pm 1, \pm 2, \dots).$$

Ἐν τούτοις, τούτο εἰς πολλὰς περιπτώσεις στοιχειωδῶν συναρτήσεων δὲν εἶναι δυνατόν, ὡς π.χ. διὰ τὴν συνάρτησιν τὴν ὀριζομένην ὑπὸ τοῦ τύπου $y = \sigma \nu \nu (2x + 3)$, τῆς ὁποίας ὁμως δυνάμεθα νὰ ὑπολογίσωμεν (σχετικῶς εὐκόλως) τὴν παράγωγον δι' ἀπ' εὐθείας ἐφαρμογῆς τοῦ ὀρισμοῦ ὡς ἑξῆς :

$$(\sigma \nu \nu (2x + 3))'_{x=x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\sigma \nu \nu (2x + 3) - \sigma \nu \nu (2x_0 + 3)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{-2\eta \mu (x - x_0) \eta \mu (x + x_0 + 3)}{x - x_0}$$

$$= -2 \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\eta \mu (x - x_0)}{x - x_0} \lim_{x \rightarrow x_0} \eta \mu (x + x_0 + 3) = -2 \cdot 1 \cdot \eta \mu (x_0 + x_0 + 3) =$$

$$= -2\eta \mu (2x_0 + 3) \quad \text{καὶ τούτο διὰ κάθε πραγματικὸν ἀριθμὸν } x_0. \quad \text{Ἄρα.}$$

$$(\sigma \nu \nu (2x + 3))' = -2\eta \mu (2x + 3).$$

Ἡ ἀνωτέρω συνάρτησις τῆς ὁποίας ὑπελογίσαμεν τὴν παράγωγον δύναται νὰ θεωρηθῆ ὡς ἡ σύνθεσις δύο συναρτήσεων, τῆς συναρτήσεως g μὲ $g(x) = 2x + 3$ καὶ τοῦ συνημιτόνου, αἱ παράγωγοι τῶν ὁποίων ὑπολογίζονται εὐκόλως δυνάμει τῶν ἰδιοτήτων καὶ τῶν τύπων τῶν παραγράφων 1.5 καὶ 1.6. Εἶναι λοιπὸν φυσικὸν νὰ ἀναζητηθῆ κάποια σχέσις μεταξὺ τῆς παραγώγου τῆς συνθέτου συναρτήσεως καὶ τῶν παραγῶγων τῶν συναρτήσεων, αἱ ὁποῖαι συνθέτουν ταύτην. Ἡ σχέσις αὕτη δίδεται εἰς τὸ ἀκόλουθον θεώρημα.

1.7.1 ΘΕΩΡΗΜΑ. Ἐστωσαν αἱ συναρτήσεις $g: \Delta \rightarrow A$ καὶ $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, ὅπου A καὶ Δ εἶναι διαστήματα, αἱ ὁποῖαι ὑποθέτομεν ὅτι παραγωγίζονται. Τότε ἡ σύνθεσις $h = f \circ g$ αὐτῶν (ἢ ὁποῖα ὡς γνωστὸν ὀρίζεται ὑπὸ τοῦ τύπου $h(x) = f(g(x))$, $x \in \Delta$) παραγωγίζεται ἐπίσης καὶ μάλιστα ἰσχύει

$$h'(x) = f'(g(x))g'(x).$$

Ἀπόδειξις. * Ἐστω $x_0 \in \Delta$. Ἄς θεωρήσωμεν τυχοῦσαν ἀκολουθίαν x_v , $v = 1, 2, \dots$ μὲ $x_v \in \Delta$. $\{x_0\} \forall v \in \mathbb{N}$ καὶ $x_v \rightarrow x_0$ διὰ τὴν ὁποῖαν διακρίνομεν τὰς κάτωθι τρεῖς περιπτώσεις:

1. $g(x_v) = g(x_0)$ δι' ἕν πεπερασμένον πλῆθος δεικτῶν. Εἰς τὴν περίπτωσιν ταύτην διὰ διαγραφῆς τῶν ὄρων τῆς x_v , $v = 1, 2, \dots$, οἱ ὁποῖοι πληροῦν τὴν σχέσιν $g(x_v) = g(x_0)$ προκύπτει μίᾳ ἀκολουθίᾳ y_v , $v = 1, 2, \dots$ διὰ τὴν ὁποῖαν προφανῶς ἰσχύει $y_v \rightarrow x_0$ (πρβλ. παρατήρησιν § 1.4. τοῦ κεφ. IV) καὶ

$$g(y_v) \neq g(x_0) \quad \forall v \in \mathbb{N},$$

ὁπότε ἔχομεν

$$\begin{aligned} \frac{h(y_v) - h(x_0)}{y_v - x_0} &= \frac{h(y_v) - h(x_0)}{g(y_v) - g(x_0)} \cdot \frac{g(y_v) - g(x_0)}{y_v - x_0} = \\ &= \frac{f(g(y_v)) - f(g(x_0))}{g(y_v) - g(x_0)} \cdot \frac{g(y_v) - g(x_0)}{y_v - x_0}. \end{aligned}$$

Ἐπειδὴ ἔξ ὑποθέσεως ὑπάρχουν αἱ παράγωγοι $f'(g(x_0))$ καὶ $g'(x_0)$, εὐκόλως διαπιστοῦται ὅτι ἰσχύουν καὶ

$$\lim \frac{f(g(y_v)) - f(g(x_0))}{g(y_v) - g(x_0)} = f'(g(x_0)), \quad \lim \frac{g(y_v) - g(x_0)}{y_v - x_0} = g'(x_0).$$

Ἐπομένως $\lim \frac{h(y_v) - h(x_0)}{y_v - x_0} = f'(g(x_0))g'(x_0)$ καὶ, δυνάμει τῆς παρατηρήσεως τῆς § 1.4. τοῦ κεφ. IV, ἰσχύει ἐπίσης

$$(3) \quad \lim \frac{h(x_v) - h(x_0)}{x_v - x_0} = f'(g(x_0))g'(x_0).$$

2. $g(x_v) \neq g(x_0)$ δι' ἕν πεπερασμένον πλῆθος δεικτῶν. Εἰς τὴν περίπτωσιν ταύτην διὰ διαγραφῆς τῶν ὄρων τῆς x_v , $v = 1, 2, \dots$, οἱ ὁποῖοι πληροῦν τὴν σχέσιν $g(x_v) \neq g(x_0)$ προκύπτει μίᾳ ἀκολουθίᾳ y_v , $v = 1, 2, \dots$ διὰ τὴν ὁποῖαν προφανῶς ἰσχύει $y_v \rightarrow x_0$ καὶ

$$g(y_v) = g(x_0) \quad \forall v \in \mathbb{N},$$

ὁπότε ἔχομεν ἄφ' ἐνὸς μὲν

$$g'(x_0) = \lim \frac{g(y_v) - g(x_0)}{y_v - x_0} = \lim \frac{0}{y_v - x_0} = 0,$$

ἀφ' ἑτέρου δὲ

$$\lim \frac{h(y_v) - h(x_0)}{y_v - x_0} = \lim \frac{f(g(y_v)) - f(g(x_0))}{y_v - x_0} = \lim \frac{f(g(x_0)) - f(g(x_0))}{y_v - x_0} = 0$$

καὶ ἐπομένως, κατὰ τὴν παρατήρησιν τῆς § 1.4 τοῦ κεφ. IV, ἰσχύει ἐπίσης

$$\lim \frac{h(x_v) - h(x_0)}{x_v - x_0} = 0.$$

Ἄρα καὶ εἰς τὴν περίπτωσιν ταύτην ἰσχύει ὁ τύπος (3), διότι τότε διαπιστοῦται ὅτι $g'(x_0) = 0$.

3. *Ὁδὲμία τῶν περιπτώσεων 1 ἢ 2 ἰσχύει.* Διὰ διαγραφῆς τῶν ὄρων τῆς x_v , $v = 1, 2, \dots$, οἱ ὅποιοι πληροῦν τὴν σχέσιν $g(x_v) = g(x_0)$ προκύπτει μία ὑπακολουθία x_{k_v} , $v = 1, 2, \dots$ τῆς x_v , $v = 1, 2, \dots$ διὰ τὴν ὁποῖαν προφανῶς ἰσχύει $x_{k_v} \rightarrow x_0$ (ιδιότης 2, § 1.4.2 τοῦ κεφ. IV) καὶ $g(x_{k_v}) \neq g(x_0) \forall v \in \mathbb{N}$. Διὰ τὴν ὑπακολουθίαν ταύτην, ἀκριβῶς ὡς καὶ εἰς τὴν περίπτωσιν 1, προκύπτει ὅτι

$$(4) \quad \lim \frac{h(x_{k_v}) - h(x_0)}{x_{k_v} - x_0} = f'(g(x_0)) g'(x_0).$$

Ὁμοίως διὰ διαγραφῆς τῶν ὄρων τῆς x_v , $v = 1, 2, \dots$, οἱ ὅποιοι πληροῦν τὴν σχέσιν $g(x_v) \neq g(x_0)$ προκύπτει μία ὑπακολουθία x_{μ_v} , $v = 1, 2, \dots$ τῆς x_v , $v = 1, 2, \dots$ διὰ τὴν ὁποῖαν προφανῶς ἰσχύει $x_{\mu_v} \rightarrow x_0$ καὶ $g(x_{\mu_v}) = g(x_0) \forall v \in \mathbb{N}$. Διὰ τὴν ὑπακολουθίαν ταύτην ἀκριβῶς ὡς καὶ εἰς τὴν περίπτωσιν 2 προκύπτει ὅτι

$$(5) \quad \lim \frac{h(x_{\mu_v}) - h(x_0)}{x_{\mu_v} - x_0} = f'(g(x_0)) g'(x_0).$$

Ἄνωτέρω διεσπάσαμεν τὴν ἀκολουθίαν x_v , $v = 1, 2, \dots$ εἰς δύο ὑπακολουθίας τῆς τὰς x_{k_v} , $v = 1, 2, \dots$ καὶ x_{μ_v} , $v = 1, 2, \dots$ διὰ τὰς ὁποίας ἰσχύουν αἱ (4) καὶ (5). Ἐκ τῶν σχέσεων τούτων ἀποδεικνύεται ὅτι ἰσχύει καὶ ὁ τύπος (3).

Ὡστε καὶ εἰς τὰς τρεῖς ἀνωτέρω περιπτώσεις ἐδείχθη ὅτι ἰσχύει ὁ τύπος (3), δηλαδή ὅτι

$$\left. \begin{array}{l} x_v \rightarrow x_0 \\ x_v \in \Delta - \{x_0\} \forall v \in \mathbb{N} \end{array} \right\} \Rightarrow \lim \frac{h(x_v) - h(x_0)}{x_v - x_0} = f'(g(x_0)) g'(x_0),$$

ἢτοι

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{h(x) - h(x_0)}{x - x_0} = f'(g(x_0)) g'(x_0) \quad \text{ἢ} \quad h'(x_0) = f'(g(x_0)) g'(x_0)$$

καὶ τοῦτο διὰ τυχόν $x_0 \in \Delta$, τὸ ὁποῖον σημαίνει ὅτι

$$h'(x) = f'(g(x)) g'(x) \quad \forall x \in \Delta.$$

Παρατήρησις: Εἰς τὴν τελευταίαν περίπτωσιν, ὅπου ὑφίστανται ταυτιχρόνως οἱ τύποι (4) καὶ (5), ἰσχύει, ὡς καὶ εἰς τὴν δευτέραν περίπτωσιν, $g'(x_0) = 0$.

Ἐφαρμογαί :

1. $(\sin(2x + 3))' = (-\eta\mu(2x + 3)) (2x + 3)' = -\eta\mu(2x + 3) \cdot 2 = -2\eta\mu(2x + 3)$.
Εἰς τὸ ἀποτέλεσμα τοῦτο εἶχμεν καταλήξει καὶ προηγουμένως δι' ἀπ' εὐθείας ἐφαρμογῆς τοῦ ὀρισμοῦ τῆς παραγώγου.

2. $(a^x)' = a^x \log a$.

Κατὰ τὸν τύπον (9) τῆς § 3.3 τοῦ κεφ. VI ἔχομεν $a^x = e^{x \log a}$ καὶ ἐπομένως
 $(a^x)' = (e^{x \log a})' = e^{x \log a} (x \log a)' = e^{x \log a} \log a = a^x \log a$.

$$3. (x^a)' = ax^{a-1}, x \in (0, +\infty).$$

Όμοίως έχουμε $x^a = e^{a \log x}$ και επομένως

$$(x^a)' = (e^{a \log x})' = e^{a \log x} (a \log x)' = e^{a \log x} a (\log x)' = x^a a \frac{1}{x} = ax^{a-1}.$$

Ειδικώς διά $a = \frac{1}{2}$ λαμβάνομεν

$$\left(x^{\frac{1}{2}}\right)' = \frac{1}{2} x^{\frac{1}{2}-1} = \frac{1}{2} x^{-\frac{1}{2}}, \text{ ήτοι } (\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}.$$

$$4. (\sqrt{x^2+1})' = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}.$$

$$\text{Πράγματι: } (\sqrt{x^2+1})' = \frac{1}{2\sqrt{x^2+1}} (x^2+1)' = \frac{1}{2\sqrt{x^2+1}} 2x = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}.$$

Γενικώτερον ισχύει ο τύπος

$$(\sqrt{f(x)})' = \frac{f'(x)}{2\sqrt{f(x)}} \quad (\text{διατί;})$$

Πίναξ τῶν παραγῶγων τῶν κυριωτέρων στοιχειωδῶν συναρτήσεων

$f(x)$	$f'(x)$	$f(x)$	$f'(x)$
x^v	$v x^{v-1}$	x^a	$a x^{a-1}$
e^x	e^x	a^x	$a^x \log a$
$\log x$	$\frac{1}{x}$	$\log_a x$	$\frac{1}{x \log a}$
$\eta \mu x$	$\sigma \nu \nu x$	$\sigma \nu \nu x$	$-\eta \mu x$
$\epsilon \phi x$	$\frac{1}{\sigma \nu \nu^2 x}$	$\sigma \phi x$	$-\frac{1}{\eta \mu^2 x}$

2. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΣ

2.1. Ἡ ἔννοια τῆς παραγῶγου ἐξυπηρετεῖ τὰ μέγιστα εἰς τὴν μελέτην μιᾶς συναρτήσεως ὄχι μόνον διότι δυνάμεθα νὰ καταρτίσωμεν ταχύτερον τὸν πίνακα μεταβολῆς αὐτῆς, ἀλλὰ καὶ διότι μέσῳ τῆς παραγῶγου δυνάμεθα νὰ λάβωμεν λεπτομερέστερα στοιχεῖα διὰ τὴν συμπεριφορὰν τοῦ διαγράμματος ταύτης καθ' ὅλην τὴν ἔκτασιν αὐτοῦ. Τὰ ἀκολουθοῦντα θεωρήματα ἐρμηνεύουν τὸν ρόλον τῆς παραγῶγου εἰς τὴν μελέτην συναρτήσεως.

2.1.1 ΘΕΩΡΗΜΑ. Ἐάν ἡ συνάρτησις f παραγωγίζεται εἰς ἓν σημεῖον x_0 καὶ παρουσιάζει τοπικὸν ἀκρότατον εἰς τὸ σημεῖον τοῦτο, τότε ἰσχύει $f'(x_0) = 0$.

Ἀπόδειξις. Ἐς ὑποθέσωμεν ὅτι ἡ συνάρτησις f παρουσιάζει τοπικὸν μέγιστον εἰς τὸ σημεῖον x_0 (ἢ περίπτωσις τοπικοῦ ἐλαχίστου ἀποδεικνύεται ἀναλόγως). Ἐχομεν τότε ὅτι ὑπάρχει ἕν ἀνοικτὸν διάστημα (a, b) μὲ $x_0 \in (a, b) \subseteq \mathcal{D}(f)$ τοιοῦτον, ὥστε νὰ ἰσχύη

$$f(x) \leq f(x_0) \quad \forall x \in (a, b).$$

Ούτως

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq 0 \quad \forall x \in (x_0, b) \quad \text{και} \quad \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq 0 \quad \forall x \in (a, x_0),$$


όποτε επειδή ή f παραγωγίζεται εις τό σημείον x_0 , θά έξωμεν τόσον

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0 + 0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq 0, \quad \delta\sigma\nu\nu \quad \text{και} \quad f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0 - 0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq 0,$$

δηλαδή $f'(x_0) = 0$.

Τό αντίστροφον τοῦ άνωτέρω θεωρήματος δέν ισχύει. 'Η ισότης $f'(x_0) = 0$ δυνατόν νά ύφίσταται, χωρίς ή συνάρτησις f νά παρουσιάξη έν τοπικόν άκρότατον εις τό σημείον x_0 . Τοῦτο π.χ. συμβαίνει εις τήν περίπτωσιν, όπου $f(x) = x^3$, $x_0 = 0$ (διατί;) (βλ. σχ. 23, κεφ. III).


Γεωμετρικῶς ή ύπαρξις ένός τοπικοῦ άκροτάτου τῆς συναρτήσεως εις τό σημείον x_0 σημαίνει (εις τήν περίπτωσιν, όπου ή συνάρτησις παραγωγίζεται εις τό x_0) ότι ή έφαπτομένη τοῦ διαγράμματος τῆς f εις τό σημείον $P_0 = (x_0, f(x_0))$ είναι παράλληλος πρὸς τόν άξονα τῶν x (βλ. σχ. 76).




Σχ. 76

2.1.2 ΘΕΩΡΗΜΑ τοῦ Rolle. "Εστω f μία συνάρτησις με πεδίον ορισμοῦ έν κλειστόν διάστημα $[a, b]$, ή όποία είναι συνεχής και επί πλέον παραγωγίζεται εις τό άνοικτόν διάστημα (a, b) . Τότε, άν $f(a) = f(b)$, ύπάρχει $x_0 \in (a, b)$ τοιοῦτον, ὥστε $f'(x_0) = 0$.

Τό θεωρήμα τοῦτο έρμηνεύεται γεωμετρικῶς (βλ. σχ. 77α) ὡς έξῆς : άν



Σχ. 77α



Σχ. 77β.

μία καμπύλη (δηλαδή τό διάγραμμα μιᾶς συνεχούς συναρτήσεως) έχουσα έφαπτομένην εις κάθε σημείον της τέμνεται ύπό μιᾶς εύθείας παράλληλου πρὸς τόν άξονα τῶν x εις δύο τοῦλάχιστον σημεία, τότε εις έν τοῦλάχιστον σημείον ή έφαπτομένη τῆς καμπύλης ταῦτης είναι παράλληλος πρὸς τόν άξονα τῶν x . Ειδικῶς εις τήν περίπτωσιν, όπου $f(a) = f(b) = 0$, ή γεωμετρική έρμηνεία τοῦ θεωρήματος τοῦτου διδεται εις τό σχ. 77β.

Τό άκολουθοῦν θεωρήμα άποτελεῖ μιάν γενίκευσιν τοῦ θεωρήματος τοῦ Rolle είναι δέ γνωστόν ὡς θεωρήμα τῆς μέσης τιμῆς τοῦ διαφορικοῦ λογιμοῦ ή άκόμη ὡς θεωρήμα τῶν πεπερασμένων αὐξήσεων.

2.1.3. ΘΕΩΡΗΜΑ. "Εστω f μία συνάρτησις με πεδίον ορισμοῦ έν κλειστόν

διάστημα $[a, b]$, ή οποία είναι συνεχής και ἐπὶ πλέον παραγωγίζεται εἰς τὸ ἀνοικτὸν διάστημα (a, b) . Τότε ὑπάρχει $x_0 \in (a, b)$ τοιοῦτον, ὥστε

$$f'(x_0) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Ἀπόδειξις. Τὸ θεώρημα τοῦτο εἶναι ἄμεσος συνέπεια τοῦ θεωρήματος τοῦ Rolle ἐφαρμοζομένου διὰ τὴν συνάρτησιν g μὲ

$$g(x) = f(a) - f(x) + (x - a) \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Ἡ συνάρτησις g ἱκανοποιεῖ πράγματι τὰς ὑποθέσεις τοῦ θεωρήματος τοῦ Rolle, καθ' ὅσον αὕτη εἶναι προφανῶς συνεχής, παραγωγίζεται ἐν (a, b) καὶ μάλιστα


$$g'(x) = -f'(x) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a},$$

ἐπὶ πλέον δὲ $g(a) = 0 = g(b)$. Ἐπομένως ὑπάρχει $x_0 \in (a, b)$ τοιοῦτον, ὥστε νὰ ἰσχύη

$$g'(x_0) = -f'(x_0) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = 0,$$

$$\text{ἤτοι } f'(x_0) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Ἡ γεωμετρικὴ σημασία τοῦ θεωρήματος τούτου (βλ. σχ. 78) εἶναι ἡ ἑξῆς: ἂν μία καμπύλη ἔξη ἐφαπτομένην εἰς κάθε σημεῖον τῆς, τότε εἰς ἓν τοῦλάχιστον σημεῖον ἡ ἐφαπτομένη τῆς καμπύλης ταύτης εἶναι παράλληλος πρὸς τὴν τέμνουσαν εὐθεῖαν τὴν διερχομένην διὰ τῶν ἄκρων τῆς καμπύλης.



Σχ. 78

2.1.4 ΠΟΡΙΣΜΑ. Ἐάν μία συνάρτησις f παραγωγίζεται εἰς ἓν διάστημα Δ καὶ μάλιστα ἰσχύη $f'(x) = 0 \quad \forall x \in \Delta$, τότε ἡ συνάρτησις αὕτη λαμβάνει εἰς τὸ διάστημα Δ σταθερὰν τιμὴν.

Ἀπόδειξις. Ἐστω x^* ἓν σταθερὸν σημεῖον τοῦ διαστήματος Δ καὶ x τυχὸν ἄλλο σημεῖον τοῦ διαστήματος τούτου. Κατὰ τὸ θεώρημα τῆς μέσης τιμῆς τοῦ διαφορικοῦ λογιμοῦ ὑπάρχει σημεῖον x_0 τοιοῦτον, ὥστε νὰ ἰσχύη

$$\frac{f(x) - f(x^*)}{x - x^*} = f'(x_0) = 0, \quad \text{ἄρα } f(x) = f(x^*) \quad \forall x \in \Delta.$$

2.1.5 ΠΟΡΙΣΜΑ. Ἐάν αἱ συναρτήσεσις f καὶ g παραγωγίζωνται εἰς τὸ διάστημα Δ καὶ μάλιστα ἰσχύη $f'(x) = g'(x) \quad \forall x \in \Delta$, τότε αἱ συναρτήσεσις f καὶ g διαφέρουν κατὰ μίαν σταθεράν, δηλαδὴ ἰσχύει $f(x) = g(x) + c \quad \forall x \in \Delta$.

Ἀπόδειξις. Διὰ τὴν συνάρτησιν $h = f - g$ παρατηροῦμεν ὅτι ἰσχύει $h'(x) = f'(x) - g'(x) = 0 \quad \forall x \in \Delta$ καὶ ἐπομένως, κατὰ τὸ πόρισμα 2.1.4, ἡ h λαμβάνει εἰς τὸ διάστημα Δ σταθερὰν τιμὴν, ἔστω c . Ἄρα $f(x) = g(x) + c \quad \forall x \in \Delta$.

2.1.6 ΘΕΩΡΗΜΑ. "Αν η συνάρτησις f παραγωγίζεται εις έν διάστημα Δ , τότε ισχύουν τὰ κάτωθι

$f'(x) > 0 \quad \forall x \in \Delta \Rightarrow f \uparrow \Delta$	$f'(x) < 0 \quad \forall x \in \Delta \Rightarrow f \downarrow \Delta$
$f'(x) \geq 0 \quad \forall x \in \Delta \Rightarrow f \uparrow \Delta$	$f'(x) \leq 0 \quad \forall x \in \Delta \Rightarrow f \downarrow \Delta$

Απόδειξις. Έστω $f'(x) > 0 \quad \forall x \in \Delta$. Τότε, αν x_1, x_2 είναι τυχόντα σημεία του διαστήματος Δ με $x_1 < x_2$, θα έχουμε, δυνάμει του θεωρήματος της μέσης τιμής του διαφορικού λογισμού, ότι υπάρχει $x_0 \in (x_1, x_2) \subseteq \Delta$ τοιοῦτον, ὥστε $f'(x_0) = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$, ἄρα $f(x_2) - f(x_1) = f'(x_0)(x_2 - x_1) > 0$, δηλαδή $f(x_1) < f(x_2)$, τὸ ὁποῖον σημαίνει ὅτι ἡ f εἶναι γνησίως αὐξουσα ἐν Δ . Ὡστε ἐδείχθη ὅτι $f'(x) > 0 \quad \forall x \in \Delta \Rightarrow f \uparrow \Delta$.

Τὰ ὑπόλοιπα συμπεράσματα τοῦ θεωρήματος ἐξάγονται κατ' ἀνάλογον τρόπον.

2.1.7 ΘΕΩΡΗΜΑ. "Έστω f μία συνάρτησις διὰ τὴν ὁποῖαν ὑπάρχει ἡ δευτέρα παραγωγὸς εἰς τὸ διάστημα (a, b) καὶ εἶναι αὕτη συνεχής. Τότε, αν $x_0 \in (a, b)$ με $f'(x_0) = 0$, ισχύουν :

$f''(x_0) < 0 \Rightarrow$ ἡ f παρουσιάζει τοπικὸν μέγιστον εἰς τὸ x_0

$f''(x_0) > 0 \Rightarrow$ ἡ f παρουσιάζει τοπικὸν ἐλάχιστον εἰς τὸ x_0 .

Απόδειξις. Ἡ συνέχεια τῆς δευτέρας παραγωγῶν f'' καὶ ἡ ἀνισότης $f''(x_0) < 0$ συνεπάγονται (βλ. σχ. 79) ὅτι ὑπάρχει διάστημα (a_1, b_1) με $x_0 \in (a_1, b_1) \subseteq (a, b)$ καὶ $f''(x) < 0 \quad \forall x \in (a_1, b_1)$ (ἀπόδειξις;).

Ἄρα, δυνάμει τοῦ προηγουμένου θεωρήματος 2.1.6, $f' \downarrow (a_1, b_1)$ καὶ ἐπομένως

$$\left. \begin{array}{l} f'(x_0) = 0 \\ f' \downarrow (a_1, x_0) \end{array} \right\} \Rightarrow f'(x) \geq f'(x_0) = 0 \quad \forall x \in (a_1, x_0] \Rightarrow$$

$$f \uparrow (a_1, x_0] \Rightarrow f(x) \leq f(x_0) \quad \forall x \in (a_1, x_0].$$

Ὁμοίως

$$\left. \begin{array}{l} f'(x_0) = 0 \\ f' \downarrow [x_0, b_1) \end{array} \right\} \Rightarrow f'(x) \leq f'(x_0) = 0 \quad \forall x \in [x_0, b_1) \Rightarrow f \downarrow [x_0, b_1) \Rightarrow$$


$$f(x_0) \geq f(x) \quad \forall x \in [x_0, b_1).$$

Ὡστε ἐδείχθη (βλ. σχ. 80) ὅτι ἰσχύει


$$f(x) \leq f(x_0) \quad \forall x \in (a_1, b_1),$$

δηλαδή ὅτι ἡ f παρουσιάζει τοπικὸν μέγιστον εἰς τὸ σημεῖον x_0 .

Ἡ περίπτωση $f''(x_0) > 0$ συνάγεται δι' ἐφαρμογῆς τοῦ προηγουμένου συμπεράσματος διὰ τὴν συνάρτησιν $-f$ διὰ τὴν ὁποῖαν προφανῶς θὰ ἰσχύη $(-f)'(x_0) = -f'(x_0) = 0$ καὶ $(-f)''(x_0) = -f''(x_0) < 0$, ὁπότε ἡ



Σχ. 79



Σχ. 80

—f θα παρουσιάσει τοπικόν μέγιστον εις τὸ σημεῖον x_0 , τὸ ὁποῖον σημαίνει ὅτι ἡ f παρουσιάζει τοπικὸν ἐλάχιστον εις τὸ x_0 (διατί;).

Ἐφαρμογή. Ἐὰς μελετήσωμεν τώρα εις ἔφαρμογὴν τῶν ἀνωτέρω τὴν δι-τετράγωνον τριώνυμον συνάρτησιν f με $f(x) = 2x^4 - 4x^2 - 1$, τὴν ὁποίαν ἐμε-λετήσαμεν καὶ εις τὴν § 2.1 (ἐφαρμογὴ 3, παραδ. 1) τοῦ κεφ. III (βλ. σχ. 44).

Κατὰ πρῶτον ὑπολογίζομεν τὴν πρώτην καὶ δευτέραν παράγωγον τῆς f, ἦτοι

$$f'(x) = (2x^4)' - (4x^2)' - 0 = 8x^3 - 8x = 8x(x^2 - 1)$$

$$f''(x) = (8x^3)' - (8x)' = 24x^2 - 8.$$

Αἱ ρίζαι τῆς πρώτης παραγώγου f' εἶναι -1, 0, 1 διὰ τὰς ὁποίας ἰσχύουν $f''(-1) = 24 - 8 = 16 > 0$, $f''(0) = -8 < 0$ καὶ $f''(1) = 16 > 0$ καὶ ἔπομένως, κατὰ τὸ θεώρημα 2.1.7, ἡ f παρουσιάζει τοπικὸν ἐλάχιστον εις τὰ σημεῖα -1 καὶ 1 καὶ τοπικὸν μέγιστον εις τὸ σημεῖον 0.

Ἐπίσης συνάγονται εὐκόλως καὶ τὰ κάτωθι :

$$f'(x) < 0 \quad \forall x \in (-\infty, -1) \quad \text{καὶ} \quad \forall x \in (0, 1)$$

$$f'(x) > 0 \quad \forall x \in (-1, 0) \quad \text{καὶ} \quad \forall x \in (1, +\infty),$$

τὰ ὁποῖα, δυνάμει τοῦ θεωρήματος 2.1.6, συνεπάγονται τὰ ἑξῆς :

$$f \searrow (-\infty, -1), \quad f \nearrow (-1, 0), \quad f \searrow (0, 1) \quad \text{καὶ} \quad f \nearrow (1, +\infty),$$

δηλαδὴ τὰ συμπεράσματα τοῦ πίνακος μεταβολῆς τῆς f τῆς § 2.1 τοῦ κεφ. III.

2.2 Κυρταὶ καὶ κοῖλαι συναρτήσεις. Ἐστω μία συνάρτησις f με πεδίου ὀρισμοῦ ἐν διάστημα Δ , ἡ ὁποία παραγωγίζεται ἐν Δ . Τότε, ὡς γνωστόν, ὑπάρχει ἡ ἐφαπτομένη εις τὸ τυχόν σημεῖον τοῦ διαγράμματός της. Ἐὰς θεωρήσωμεν τώρα τὴν περίπτωσιν κατὰ τὴν ὁποίαν τὸ διάγραμμα τῆς συναρτήσεως f κεῖται ἀνωθεν τῆς ἐφαπτομένης εις τὸ τυχόν σημεῖον P_0 αὐτοῦ (βλ. σχ. 81).

Ἐπειδὴ, ὡς εἶδομεν εις τὴν § 1.2 τοῦ παρόντος κεφαλαίου, ἡ ἐξίσωσις τῆς ἐφαπτομένης τοῦ διαγράμματος τῆς f εις τὸ σημεῖον $P_0 = (x_0, f(x_0))$ εἶναι ἡ


$$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0),$$

τὸ διάγραμμα τῆς f κεῖται ἀνωθεν τῆς ἐφαπτομένης του εις τὸ σημεῖον P_0 τότε καὶ μόνον τότε, ἂν ἰσχύη


$$f(x) - f(x_0) - f'(x_0)(x - x_0) > 0 \quad \forall x \in \Delta - \{x_0\}.$$

Εἰς τὴν ἀνωτέρω περίπτωσιν, ὅπου ἡ τελευταία σχέσις ἰσχύει διὰ τυχόν $x_0 \in \Delta$, λέγομεν ὅτι ἡ συνάρτησις f εἶναι *κυρτὴ ἐν Δ* ἢ ἀπλῶς *κυρτὴ*.

Ἀναλόγως, ἂν δεχθῶμεν ὅτι τὸ διάγραμμα τῆς f κεῖται κάτωθεν τῆς ἐφαπτομένης του εις τὸ τυχόν σημεῖον P_0 αὐτοῦ (βλ. σχ. 82) θὰ καταλήξωμεν, ὁμοίως, εἰς τὸ ὅτι τοῦτο συμβαίνει τότε καὶ μόνον τότε, ἂν διὰ τυχόν $x_0 \in \Delta$ ἰσχύη



Σχ. 81



Σχ. 82

$$f(x) - f(x_0) - f'(x_0)(x - x_0) < 0 \quad \forall x \in \Delta - \{x_0\}.$$

Είς τήν περίπτωσιν ταύτην λέγομεν ὅτι ἡ f εἶναι *κοίλη* ἐν Δ ἢ ἀπλῶς *κοίλη*.

"Ὡστε :


$$f \text{ κυρτή ἐν } \Delta \iff \text{ὅρα} \quad f(x) - f(y) - f'(y)(x - y) > 0 \quad \forall x, y \text{ ἐν } \Delta \text{ μὲ } x \neq y$$

$$f \text{ κοίλη ἐν } \Delta \iff \text{ὅρα} \quad f(x) - f(y) - f'(y)(x - y) < 0 \quad \forall x, y \text{ ἐν } \Delta \text{ μὲ } x \neq y$$


Παραδείγματα :

1. Ἡ συνάρτησις f μὲ $f(x) = x^2$ εἶναι *κυρτή*. Πράγματι· ἔχομεν

$$f(x) - f(y) - f'(y)(x - y) = x^2 - y^2 - 2y(x - y) = x^2 - y^2 - 2xy + 2y^2 = x^2 - 2xy + y^2 = (x - y)^2 > 0 \quad \forall x \neq y \text{ (βλ. σχ. 83)}.$$



Σχ. 83 $y = x^2$



Σχ. 84 $y = -x^2 + 2x - 2$

2. Ἡ συνάρτησις f μὲ $f(x) = -x^2 + 2x - 2$ εἶναι *κοίλη*. Πράγματι· ἔχομεν

$$f(x) - f(y) - f'(y)(x - y) = -x^2 + 2x - 2 - (-y^2 + 2y - 2) - (-2y + 2)(x - y) = -x^2 + 2x - 2 + y^2 - 2y + 2 + 2yx - 2x - 2y^2 + 2y = -x^2 + 2xy - y^2 = -(x - y)^2 < 0 \quad \forall x \neq y \text{ (βλ. σχ. 84)}.$$

3. Ἡ συνάρτησις f μὲ $f(x) = x^3$ εἶναι *κοίλη* ἐν


$(-\infty, 0)$ καὶ *κυρτή* ἐν $(0, +\infty)$. Πράγματι· ἔχομεν

$$f(x) - f(y) - f'(y)(x - y) = x^3 - y^3 - 3y^2(x - y) = (x - y)(x^2 + xy + y^2) - 3y^2(x - y) = (x - y)(x^2 + xy - 2y^2) = (x - y)^2(x + 2y)$$

καὶ ἐπομένως

$$f(x) - f(y) - f'(y)(x - y) < 0 \quad \forall x, y \text{ ἐν } (-\infty, 0) \text{ μὲ } x \neq y$$


$$\text{καὶ} \quad f(x) - f(y) - f'(y)(x - y) > 0 \quad \forall x, y \text{ ἐν } (0, +\infty) \text{ μὲ } x \neq y.$$




Σχ. 85 $y = x^3$

Εἰς τὸ τελευταῖον ἐκ τῶν ἀνωτέρω παραδειγμάτων παρατηροῦμεν ὅτι ἡ ὑπ' ὄψιν συνάρτησις εἶναι *κοίλη* ἀριστερὰ τοῦ 0 καὶ *κυρτή* δεξιὰ τοῦ 0 (βλ. σχ. 85), ἐκφράζομεν δὲ τοῦτο λέγοντες ὅτι ἡ συνάρτησις *παρουσιάζει καμπὴν εἰς τὸ 0*.

Γενικῶς λέγομεν ὅτι μῖα συνάρτησις f μὲ πεδῖον ὀρίσμου ἐν ἀνοικτὸν διάστημα (a, b) *παρουσιάζει καμπὴν εἰς τὸ σημεῖον* $x_0 \in (a, b)$ τότε καὶ μόνον τότε,



Σχ. 86



Σχ. 87

αν αυτή είναι κοίλη έν (a, x_0) και κυρτή έν (x_0, b) ή αν είναι κυρτή έν (a, x_0) και κοίλη έν (x_0, b) (βλ. σχ. 86 και 87). Το αντίστοιχον σημείο $P_0 = (x_0, f(x_0))$ του διαγράμματος της συναρτήσεως καλείται τότε *σημείον καμπής* αυτού.

2.2.1 ΘΕΩΡΗΜΑ. Έστω f μία συνάρτησις διά την οποίαν υπάρχει ή δεν τέρα παράγωγος εις τὸ διάστημα (a, b) . Τότε ισχύουν :

$$f''(x) > 0 \quad \forall \quad x \in (a, b) \Rightarrow f \text{ κυρτή έν } (a, b)$$

$$f''(x) < 0 \quad \forall \quad x \in (a, b) \Rightarrow f \text{ κοίλη έν } (a, b).$$

Ἀπόδειξις. Ἄν x, y εἶναι τυχόντα σημεία τοῦ διαστήματος (a, b) με $x \neq y$, τότε κατὰ τὸ θεώρημα τῆς μέσης τιμῆς τοῦ διαφορικοῦ λογιμοῦ υπάρχει σημείον x_0 μεταξύ τῶν x καὶ y τοιοῦτον, ὥστε

$$f(x) - f(y) = f'(x_0)(x - y),$$

ὁπότε ισχύει καὶ

$$f(x) - f(y) - f'(y)(x - y) = [f'(x_0) - f'(y)](x - y),$$

τὸ ὁποῖον, δι' ἐφαρμογῆς πάλιν τοῦ θεωρήματος τῆς μέσης τιμῆς τοῦ διαφορικοῦ λογιμοῦ διὰ τὴν f' , δίδει

$$(6) \quad f(x) - f(y) - f'(y)(x - y) = f''(y_0)(x_0 - y)(x - y),$$

ὅπου τὸ y_0 κεῖται μεταξύ τῶν x_0 καὶ y .

Ἐπειδὴ τὸ x_0 κεῖται μεταξύ τῶν x καὶ y , ισχύει $(x_0 - y)(x - y) > 0$. Ἐπομένως, ἡ σχέσις (6) εἰς μὲν τὴν περίπτωσιν $f''(x) > 0 \quad \forall \quad x \in (a, b)$ συνεπάγεται ὅτι

$$f(x) - f(y) - f'(y)(x - y) > 0,$$

δηλαδὴ ὅτι ἡ f εἶναι κυρτή έν (a, b) , εἰς δὲ τὴν περίπτωσιν $f''(x) < 0 \quad \forall \quad x \in (a, b)$ συνεπάγεται ὅτι

$$f(x) - f(y) - f'(y)(x - y) < 0,$$

δηλαδὴ ὅτι ἡ f εἶναι κοίλη έν (a, b) .

Ἐφαρμογαί :

1. Ἡ συνάρτησις f με $f(x) = \gamma \sqrt{\alpha^2 - x^2}$, $\alpha > 0$ εἶναι κοίλη διὰ $\gamma > 0$ καὶ κυρτή διὰ $\gamma < 0$. Πράγματι ἔχομεν

$$f'(x) = \gamma \frac{1}{2\sqrt{\alpha^2 - x^2}} (\alpha^2 - x^2)' = \gamma \frac{1}{2\sqrt{\alpha^2 - x^2}} (-2x) = -\gamma \frac{x}{\sqrt{\alpha^2 - x^2}}$$

καὶ

$$f''(x) = -\gamma \frac{(x)' \sqrt{\alpha^2 - x^2} - x (\sqrt{\alpha^2 - x^2})'}{\alpha^2 - x^2} = -\gamma \frac{\sqrt{\alpha^2 - x^2} - x \frac{(-2x)}{2\sqrt{\alpha^2 - x^2}}}{\alpha^2 - x^2} =$$

$$= -\gamma \frac{\alpha^2}{(\alpha^2 - x^2) \sqrt{\alpha^2 - x^2}}.$$

Επομένως, διὰ μὲν $\gamma > 0$ ἔχομεν

$$f'(x) < 0 \quad \forall \quad x \in (-\alpha, \alpha), \text{ ἄρα } f \text{ κοίλη ἐν } (-\alpha, \alpha),$$

διὰ δὲ $\gamma < 0$ ἔχομεν

$$f'(x) > 0 \quad \forall \quad x \in (-\alpha, \alpha), \text{ ἄρα } f \text{ κυρτὴ ἐν } (-\alpha, \alpha)$$

(βλ. σχ. 46 καὶ 47, § 3.2 τοῦ κεφ. III).

2. Ἡ συνάρτησις f μὲ $f(x) = \gamma \sqrt{x^2 - \alpha^2}$, $\alpha > 0$, διὰ $\gamma > 0$ εἶναι κοίλη τόσον ἐν $(-\infty, -\alpha)$ ὅσον καὶ ἐν $(\alpha, +\infty)$, ἐνῶ διὰ $\gamma < 0$ εἶναι κυρτὴ τόσον ἐν $(-\infty, -\alpha)$ ὅσον καὶ ἐν $(\alpha, +\infty)$, (βλ. σχ. 56 καὶ 57, § 3.3 τοῦ κεφ. III). Πράγματι: ἔχομεν

$$f'(x) = \gamma \frac{(x^2 - \alpha^2)'}{2\sqrt{x^2 - \alpha^2}} = \gamma \frac{2x}{2\sqrt{x^2 - \alpha^2}} = \gamma \frac{x}{\sqrt{x^2 - \alpha^2}}$$

καὶ

$$\begin{aligned} f''(x) &= \gamma \frac{(x)' \sqrt{x^2 - \alpha^2} - x(\sqrt{x^2 - \alpha^2})'}{x^2 - \alpha^2} = \gamma \frac{\sqrt{x^2 - \alpha^2} - x \frac{x}{\sqrt{x^2 - \alpha^2}}}{x^2 - \alpha^2} = \\ &= -\gamma \frac{\alpha^2}{(x^2 - \alpha^2) \sqrt{x^2 - \alpha^2}}. \end{aligned}$$

Επομένως, διὰ μὲν $\gamma > 0$ ἔχομεν

$$f''(x) < 0 \text{ τόσον } \forall \quad x \in (-\infty, -\alpha) \text{ ὅσον καὶ } \forall \quad x \in (\alpha, +\infty),$$

διὰ δὲ $\gamma < 0$ ἔχομεν

$$f''(x) > 0 \text{ τόσον } \forall \quad x \in (-\infty, -\alpha) \text{ ὅσον καὶ } \forall \quad x \in (\alpha, +\infty).$$

2.3 Ἀσύμπτωτοι. Ἄς θεωρήσωμεν μίαν συνάρτησιν f ὠρισμένην εἰς ἓν διάστημα τῆς μορφῆς $(\alpha, +\infty)$. Μία εὐθεῖα μὲ ἔξισωσιν $y = ax + \beta$ καλεῖται ἀσύμπτωτος τοῦ διαγράμματος τῆς f (βλ. σχ. 88), ἂν ἰσχύη

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - ax - \beta) = 0.$$


Ἐκ τῆς σχέσεως ταύτης προκύπτουν οἱ τύποι: $\alpha = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ καὶ $\beta = \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - ax)$.

Πράγματι: ὁ τύπος $\beta = \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - ax)$ εἶναι προφανής, ἐνῶ ὁ ἄλλος συνάγεται οὕτω:


$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{f(x)}{x} - \alpha \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x) - \alpha x}{x} = \frac{\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - \alpha x)}{\lim_{x \rightarrow +\infty} x} = \frac{\beta}{+\infty} = 0$$

ἥτοι $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \alpha$.


Ἐκ τῶν ἀνωτέρω συνάγεται εὐκόλως ὅτι ὁ ἄξων τῶν x , δηλαδή ἡ εὐθεῖα μὲ ἔξισωσιν $y = 0$ ($\alpha = \beta = 0$), εἶναι ἀσύμπτωτος τοῦ διαγράμματος τυχούσης μηδενικῆς συναρτήσεως διὰ $x \rightarrow +\infty$. Π.χ. τοῦτο ἐμφαίνεται εἰς τὰ σχ. 89 καὶ 90 διὰ τὰς συναρτήσεις τὰς ὀριζόμενας ὑπὸ τῶν τύπων $y = \frac{1}{x}$ καὶ $y = \frac{1}{x} \eta \mu x$, αἱ ὁποῖαι ὡς γνωστὸν εἶναι μηδενικαὶ διὰ $x \rightarrow +\infty$.



Σχ. 88



$$\text{Σχ. 89 } y = \frac{1}{x}$$



$$\text{Σχ. 90 } y = \frac{1}{x} \eta \mu x$$

Όμοίως, εις τήν περίπτωσιν, όπου ὑποθέτομεν τήν συνάρτησιν f ὠρισμένην εις ἓν διάστημα τῆς μορφῆς $(-\infty, \alpha)$, λέγομεν ὅτι ἡ εὐθεΐα μέ ἐξίσωσιν $y = ax + \beta$ εἶναι ἀσύμπτωτος τοῦ διαγράμματος τῆς f , ἂν ἰσχύη

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - ax - \beta) = 0,$$


ὁπότε ἰσχύουν ἐπίσης καί οἱ τύποι :

$$\alpha = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} \quad \text{καί} \quad \beta = \lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - ax) \quad (\text{διατί};).$$


Εἶναι λοιπόν προφανές ὅτι ὁ ἄξων τῶν x εἶναι ἀσύμπτωτος τοῦ διαγράμματος τυχούσης μηδενικῆς συναρτήσεως διὰ $x \rightarrow -\infty$. Π.χ. τοῦτο ἐμφαίνεται εις τὰ σχ. 89 καί 90, όπου αἱ θεωρούμεναι συναρτήσεις εἶναι μηδενικαί διὰ $x \rightarrow -\infty$.

Τέλος, ἂν διὰ τήν συνάρτησιν f ὑποθέσωμεν ὅτι εἶναι ὠρισμένη (τουλάχιστον) εις ἓν ἀνοικτόν διάστημα (a, b) (a, b πραγματικοί ἀριθμοί), τότε λέγομεν ἄφ' ἐνὸς μὲν ὅτι ἡ εὐθεΐα μέ ἐξίσωσιν $x = a$ εἶναι ἀσύμπτωτος τοῦ διαγράμματος τῆς f , ἂν ἰσχύη $\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = +\infty$ ἢ $-\infty$ (βλ. σχ. 91 καί 92), ἄφ' ἐτέρου δὲ


ὅτι ἡ εὐθεΐα μέ ἐξίσωσιν $x = b$ εἶναι ἀσύμπτωτος τοῦ διαγράμματος τῆς f ἂν ἰσχύη $\lim_{x \rightarrow b-0} f(x) = +\infty$ ἢ $-\infty$ (βλ. σχ. 93 καί 94).




Σχ. 91



Σχ. 92



Σχ. 93



Σχ. 94

Π.χ. εις τὸ σχ. 89 ὁ ἄξων τῶν y εἶναι ἀσύμπτωτος τοῦ διαγράμματος (διατί;), ἐνῶ ἀντιθέτως εις τὸ σχ. 90 τοῦτο δὲν συμβαίνει.

2.4 Ἐφαρμογαὶ εἰς τήν μελέτην συναρτήσεως. Τὰ ἀνωτέρω ἐξαχθέντα συμπεράσματα μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ μελετήσωμεν μίαν συνάρτησιν τῆ βοήθειά τῆς πρώτης καὶ δευτέρας τῆς παραγώγου ἐξετάζοντες μόνον τήν μεταβολήν

του προσήμου αυτών. Ούτως, όχι μόνον δυνάμεθα να καθορίσωμεν τοπικῶς (κατὰ διαστήματα) τὸ εἶδος τῆς μονοτονίας (ἐκ τοῦ προσήμου τῆς πρώτης παραγώγου κατὰ τὸ θεώρημα 2.1.6) ἀλλὰ καὶ τὸ ἂν ἡ συνάρτησις εἶναι κυρτὴ ἢ κοίλη (ἐκ τοῦ προσήμου τῆς δευτέρας παραγώγου κατὰ τὸ θεώρημα 2.2.1). Ἐπίσης ὁ καθορισμὸς τῶν σημείων εἰς τὰ ὁποῖα ἡ συνάρτησις παρουσιάζει τοπικὰ ἀκρότατα ἢ καμπὴν εἶναι εὐχερῆς, ὁ δὲ καθορισμὸς τῶν ἀσυμπτῶτων διευκολύνει εἰς τὴν χάραξιν τοῦ διαγράμματός της. Εἰς τὰ ἀκολουθοῦντα παραδείγματα γίνεται σαφῆς ἡ τεχνικὴ τῆς μελέτης μιᾶς συναρτήσεως.

2.4.1 Ἡ συνάρτησις f μὲ $f(x) = \frac{1}{2} x^2 (x - 3)$. Ἐχομεν :

$$f(x) = \frac{1}{2} x^2 (x - 3) \quad \cdot \text{ρίζαι τῆς } f : 0, 3$$


$$f'(x) = \frac{3}{2} x (x - 2) \quad \cdot \text{ρίζαι τῆς } f' : 0, 2$$

$$f''(x) = 3(x - 1) \quad \cdot \text{ρίζα τῆς } f'' : 1.$$

Σχηματίζομεν τὸν ἀκόλουθον πίνακα διατάσσοντες τὰς ρίζας τῶν f, f', f'' ἐπὶ ἄξονος καὶ σημειοῦμεν ἐπὶ τῶν ἀντιστοιχῶν διαστημάτων τὸ πρόσημον τῶν συναρτήσεων, f', f'' καὶ f . Τέλος, ἐκ τῶν στοιχείων τούτων ἐξάγομεν εἰς τὴν τελευταίαν γραμμὴν τοῦ πίνακος τὰ συμπεράσματά μας ἐπὶ τῆς μονοτονίας τῆς f καὶ τοῦ ἂν αὕτη εἶναι κυρτὴ ἢ κοίλη. Σημειοῦμεν δὲ καὶ τὰ σημεία, ὅπου ἡ συνάρτησις f παρουσιάζει καμπὴν (κ), τοπικὸν μέγιστον ($\tau.μ$) καὶ τοπικὸν ἐλάχιστον ($\tau.ε$). Κάτωθεν ἀκριβῶς τοῦ πίνακος τούτου χαράσσομεν τὸ διάγραμμα τῆς συναρτήσεως (βλ. σχ. 95).

	$-\infty$	0	1	2	3	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-	0	+	+
$f''(x)$	-	-	0	+	+	+
$f(x)$	-	0	-	-	0	+

\swarrow Κοίλη $\tau.μ$ \swarrow Κοίλη κ \swarrow Κυρτή $\tau.ε$ \swarrow Κυρτή \swarrow Κυρτή



Σχ. 95 $y = \frac{1}{2} x^2 (x - 3)$

Είς τήν περίπτωσιν τῆς ἀνωτέρω συναρτήσεως δέν ὑπάρχουν ἀσύμπτωτοι (διατί);

2.4.2*. Ἡ συνάρτησις f μὲ $f(x) = e^{-\frac{1}{x}}$. Ἔχομεν :

$$f'(x) = \frac{e^{-\frac{1}{x}}}{x^2} \text{ καὶ } f''(x) = \frac{1-2x}{x^4} e^{-\frac{1}{x}} \text{ (διατί);}$$

Ἐπίσης $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{-\frac{1}{x}}}{x} = \frac{\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-\frac{1}{x}}}{\lim_{x \rightarrow +\infty} x} = \frac{1}{+\infty} = 0$ καὶ


$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - 0 \cdot x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-\frac{1}{x}} = 1$. Ἄρα ἡ εὐθεῖα μὲ ἐξίσωσιν $y = 0x + 1 = 1$ εἶναι ἀσύμπτωτος (διὰ $x \rightarrow -\infty$ εὐρίσκομεν πάλιν τήν αὐτὴν ἀσύμπτωτον).

Ἐπειδὴ ἡ συνάρτησις f δέν εἶναι ὠρισμένη εἰς τὸ σημεῖον 0, ἡ γνώσις τῶν ὀριακῶν τιμῶν $\lim_{x \rightarrow -0} f(x)$ καὶ $\lim_{x \rightarrow +0} f(x)$ διευκολύνει εἰς τήν χάραξιν τοῦ διαγράμματος.

Εἰς τήν προκειμένην περίπτωσιν ἀποδεικνύεται $\lim_{x \rightarrow -0} e^{-\frac{1}{x}} = +\infty$

καὶ $\lim_{x \rightarrow +0} e^{-\frac{1}{x}} = 0$, ἄρα καὶ ὁ ἄξων τῶν y εἶναι ἀσύμπτωτος (βλ. σχ. 96).

	$-\infty$	0	$\frac{1}{2}$	$+\infty$
$f'(x)$		+	+	+
$f''(x)$		+	0	-
$f(x)$		+	+	+
		Κυρτή	Κυρτή	Κοίτη



Σχ. 96 $y = e^{-\frac{1}{x}}$


2.4.3 Ἡ συνάρτησις f μὲ $f(x) = x + \frac{1}{x}$. Ἔχομεν :

$$f'(x) = 1 - \frac{1}{x^2} \text{ ρίζαι τῆς } f': -1, 1$$

$$f''(x) = \frac{2}{x^3}$$

Επίσης $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x^2}\right) = 1$ και $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - 1 \cdot x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$.

Άρα η ευθεία με εξίσωση $y = 1 \cdot x + 0 = x$ είναι ασύμπτωτος (διότι $x \rightarrow -\infty$ εύρισκομεν πάλιν τήν αὐτήν ασύμπτωτον). Ἐπειδή ἡ συνάρτησις f δὲν εἶναι ὠρισμένη εἰς τὸ 0, ὑπολογίζομεν τὰς ὁριακὰς τιμὰς $\lim_{x \rightarrow -0} f(x) = \lim_{x \rightarrow -0} \left(x + \frac{1}{x}\right) = 0 + (-\infty) = -\infty$ καὶ $\lim_{x \rightarrow +0} f(x) = \lim_{x \rightarrow +0} \left(x + \frac{1}{x}\right) = 0 + (+\infty) = +\infty$. Ἄρα καὶ ὁ ἄξων y εἶναι ασύμπτωτος.



Σχ. 97 $y = x + \frac{1}{x}$

3. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΝ ΟΡΙΑΚΩΝ ΤΙΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΙ ΜΟΡΦΑΙ

3.1 Ἀπροσδιόριστοι μορφαὶ τοῦ τύπου $\frac{0}{0}$. Διὰ τήν συνάρτησιν h μὲ

$h(x) = \frac{\log(1+x)}{e^x - 1}$ παρατηροῦμεν ὅτι ἰσχύει τόσον $\lim_{x \rightarrow 0} \log(1+x) = \log 1 = 0$ ὅσον καὶ $\lim_{x \rightarrow 0} (e^x - 1) = e^0 - 1 = 0$ καὶ ἔπομένως πρὸς ὑπολογισμὸν τῆς ὁριακῆς

τιμής $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1+x)}{e^x - 1}$ δέν δύναται νά εφαρμοσθῆ ὁ τύπος $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow 0} f(x)}{\lim_{x \rightarrow 0} g(x)}$ (ή πρᾶξις $\frac{0}{0}$, ὡς γνωστόν, δέν εἶναι ἐπιτρεπτή). Ἐν τούτοις, δυνάμεθα νά υπολογίσωμεν τήν ὀριακὴν ταύτην τιμὴν ὡς ἑξῆς :

$$\frac{\log(1+x)}{e^x - 1} = \frac{\log(1+x) - \log 1}{e^x - e^0} = \frac{\log(1+x) - \log 1}{x} \quad \forall x > -1 \text{ με } x \neq 0$$

καὶ ἐπομένως

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1+x)}{e^x - 1} = \frac{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1+x) - \log 1}{x}}{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^0}{x}} = \frac{(\log(1+x))'_{x=0}}{(e^x)'_{x=0}} = \frac{1}{e^0} = 1.$$

Ὀριακαὶ τιμαὶ ὡς ἡ ἀνωτέρω, δηλαδή ὀριακαὶ τιμαὶ τῆς μορφῆς :

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)}, \text{ ὅπου } \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0 = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$$

καλοῦνται ἀπροσδιόριστοι μορφαὶ τοῦ τύπου $\frac{0}{0}$. Ἀκολουθοῦντες τήν αὐτήν τεχνικὴν, ὡς ἀνωτέρω διὰ τὸν ὑπολογισμόν τῆς ὀριακῆς τιμῆς $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1+x)}{e^x - 1}$, δυνάμεθα νά ἀποδείξωμεν τὸ ἀκόλουθον θεώρημα.

3.1.1 ΘΕΩΡΗΜΑ. Ἐστωσαν f καὶ g συναρτήσεις με κοινὸν πεδίου ὀρισμοῦ ἐν ὄνολον τῆς μορφῆς $(a, x_0]$ ἢ $[x_0, b)$ ἢ $(a, x_0] \cup [x_0, b) = (a, b)$, αἱ ὁποῖαι παραγωγίζονται, εἰς τὸ σημεῖον x_0 με $g'(x_0) \neq 0$. Τότε, ἀν $f(x_0) = 0 = g(x_0)$, ἰσχύει

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(x_0)}{g'(x_0)}.$$

Ἀπόδειξις. Ἐχομεν

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x) - f(x_0)}{g(x) - g(x_0)} = \frac{\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}}{\frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0}}, \quad x \neq x_0.$$

ὁπότε ἰσχύει καὶ

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}}{\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0}} = \frac{f'(x_0)}{g'(x_0)}.$$

Σημείωσις : Ἀνωτέρω εἰς τήν περίπτωσιν, ὅπου τὸ κοινὸν πεδίου ὀρισμοῦ τῶν f καὶ g εἶναι τῆς μορφῆς $(a, x_0]$ διὰ τοῦ συμβόλου $\lim_{x \rightarrow x_0}$ ἔννοοῦμεν τὸ $\lim_{x \rightarrow x_0-0}$. Ἀναλόγως εἰς τήν περίπτωσιν, ὅπου τὸ κοινὸν πεδίου ὀρισμοῦ τῶν f καὶ g εἶναι τῆς μορφῆς $[x_0, b)$ διὰ τοῦ $\lim_{x \rightarrow x_0}$ ἔννοοῦμεν τὸ $\lim_{x \rightarrow x_0+0}$.

Εφαρμογές:

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{1 - e^{-x}} = 1$. Παρατηρούμεν ότι τούτο είναι μία άπροσδιόριστος μορφή του τύπου $\frac{0}{0}$. Έχουμε $(x)' = 1$ και $(1 - e^{-x})' = 0 - e^{-x}(-x)' = -e^{-x}(-1) = e^{-x}$, οπότε κατά

τὸ ἀνωτέρω θεώρημα λαμβάνομεν $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{1 - e^{-x}} = \frac{(x)'_{x=0}}{(1 - e^{-x})'_{x=0}} = \frac{1}{e^{-0}} = \frac{1}{1} = 1$.

2. $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{1 + \sin x}{x - \pi} = 0$. Παρατηρούμεν ότι τούτο είναι μία άπροσδιόριστος μορφή του τύπου $\frac{0}{0}$. Έχουμε $(1 + \sin x)' = 0 + (-\eta\mu x) = -\eta\mu x$ και $(x - \pi)' = 1 - 0 = 1$, οπότε

κατὰ τὸ ἀνωτέρω θεώρημα λαμβάνομεν $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{1 + \sin x}{x - \pi} = \frac{(1 + \sin x)'_{x=\pi}}{(x - \pi)'_{x=\pi}} = \frac{-\eta\mu\pi}{1} = \frac{-0}{1} = 0$.

Ἐκτὸς τοῦ θεωρήματος 3.1.1 γνωστοῦ εἰς τὴν βιβλιογραφίαν ὡς κανὸνος τοῦ *de l'Hospital* ἰσχύει καὶ τὸ κάτωθι θεώρημα.

3.1.2 ΘΕΩΡΗΜΑ. Ἐστωσαν f καὶ g συναρτήσεις μὲ κοινὸν πεδίου ὀρισμοῦ ἔν συνόλον τῆς μορφῆς (a, x_0) ἢ (x_0, b) ἢ $(a, x_0) \cup (x_0, b)$, αἱ ὁποῖα παραγωγίζονται. Τότε, ἂν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0 = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$, ἰσχύει

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = l \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = l.$$

Εἰς τὸ θεώρημα τούτο τὸ x_0 δύναται νὰ εἶναι καὶ ἓν τῶν συμβόλων $+\infty$ ἢ $-\infty$, ὅποτε τὸ κοινὸν πεδίου ὀρισμοῦ τῶν f καὶ g θὰ εἶναι τῆς μορφῆς $(a, +\infty)$ ἢ $(-\infty, b)$ ἀντιστοίχως, ἀποκλειομένης φυσικὰ τῆς τρίτης περιπτώσεως.

Εφαρμογές:

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{e^{-x} + x - 1} = 2$. Παρατηρούμεν ότι τούτο είναι μία άπροσδιόριστος μορφή του τύπου $\frac{0}{0}$. Έχουμε $(x^2)' = 2x$, $(e^{-x} + x - 1)' = e^{-x}(-x)' + 1 - 0 = e^{-x}(-1) + 1 = 1 - e^{-x}$ καὶ παρατηρούμεν ότι ἡ ὀριακὴ τιμὴ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x^2)'}{(e^{-x} + x - 1)'}$ =

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{1 - e^{-x}} = 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{1 - e^{-x}}$ εἶναι ἐπίσης μία άπροσδιόριστος μορφή του τύπου $\frac{0}{0}$, ἢ ὁποῖα μάλιστα ὑπελογίσθη εἰς τὴν ἀνωτέρω ἐφαρμογὴν 1. Ἄρα κατὰ τὸ ἀνωτέρω θεώρημα 3.1.2 ἰσχύει

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{e^{-x} + x - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x^2)'}{(e^{-x} + x - 1)'} = 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{1 - e^{-x}} = 2 \cdot 1 = 2.$$

2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \eta\mu x}{x^2} = 0$. Παρατηρούμεν ότι τούτο είναι μία άπροσδιόριστος μορφή του τύπου $\frac{0}{0}$. Έχουμε $(x - \eta\mu x)' = 1 - \sigma\upsilon\eta x$, $(x^2)' = 2x$ καὶ παρατηρούμεν ότι ἡ ὀρι-

ακή τιμή $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x - \eta\mu x)'}{(x^2)'} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sigma\upsilon\nu x}{2x}$ είναι επίσης μία άπροσδιόριστος μορφή του τύπου $\frac{0}{0}$. Αύτη, δυνάμει του θεωρήματος 3.1.1, υπολογίζεται ότι είναι ίση με $\frac{(1 - \sigma\upsilon\nu x)'_{x=0}}{(2x)'_{x=0}} = \frac{\eta\mu 0}{2} = \frac{0}{2} = 0$, ήτοι ισχύει $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x - \eta\mu x)'}{(x^2)'} = 0$. Άρα κατά το θεώρημα 3.1.2 λαμβάνομεν και $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \eta\mu x}{x^2} = 0$.

$$3. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log \frac{x-1}{x}}{\frac{1}{x}} = -1. \text{ Παρατηρούμεν ότι ισχύει } \lim_{x \rightarrow +\infty} \log \frac{x-1}{x} = \log \left(\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x-1}{x} \right) = \log 1 = 0, \text{ ως επίσης και } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0, \text{ δηλαδή ή όριακή τιμή } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log \frac{x-1}{x}}{\frac{1}{x}} \text{ είναι}$$

μία άπροσδιόριστος μορφή του τύπου $\frac{0}{0}$ και επομένως, δυνάμει του θεωρήματος 3.1.2, έχουμε

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log \frac{x-1}{x}}{\frac{1}{x}} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\left(\log \frac{x-1}{x}\right)'}{\left(\frac{1}{x}\right)'} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{x}{x-1} \left(\frac{x-1}{x}\right)'}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{x}{x-1} \cdot \frac{1}{x^2}}{-\frac{1}{x^2}} = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{1-x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\frac{1}{x} - 1} = \frac{1}{0-1} = -1. \end{aligned}$$

3.2 Άπροσδιόριστοι μορφαί του τύπου $\frac{+\infty}{+\infty}$. Όριακά τιμαί της μορφής :

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)}, \text{ όπου } \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$$

καλούνται **άπροσδιόριστοι μορφαί του τύπου $\frac{+\infty}{+\infty}$** . Άπροσδιορίστους μορφάς του τύπου τούτου δυνάμεθα να υπολογίσωμεν τη βοήθεια του ακόλουθου θεωρήματος, τὸ ὅποιον εἶναι ἀνάλογον πρὸς τὸ θεώρημα 3.1.2.

3.2.1 ΘΕΩΡΗΜΑ. Ἐστωσαν f καὶ g συναρτήσεις με κοινὸν πεδὸν ὁρισμοῦ ἐν σύνολον τῆς μορφῆς (a, x_0) ἢ (x_0, b) ἢ $(a, x_0) \cup (x_0, b)$, αἱ ὁποῖαι παραγωγίζονται. Τότε, ἂν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$, ἰσχύει

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = l \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = l.$$

Εἰς τὸ θεώρημα τοῦτο δύναται ἐπίσης τὸ x_0 νὰ εἶναι ἐν τῶν συμβόλων $+\infty$ ἢ $-\infty$.

Ἐφαρμογαί :

$$1. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log x}{x} = 0. \text{ Παρατηρούμεν ότι τοῦτο εἶναι μία άπροσδιόριστος μορφή του}$$

τύπου $\frac{+\infty}{+\infty}$ (διατί;). Άρα, δυνάμει του ανωτέρω θεωρήματος 3.2.1, έχουμε

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log x}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\log x)'}{(x)'} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{x}}{1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0.$$

2. $\lim_{x \rightarrow +0} \frac{e^{\frac{1}{x}}}{\log x} = -\infty$. Παρατηρούμεν ότι $\lim_{x \rightarrow +0} \frac{e^{\frac{1}{x}}}{\log x} = -\lim_{x \rightarrow +0} \frac{e^{\frac{1}{x}}}{-\log x}$ και

επί πλέον ότι η όριακή τιμή $\lim_{x \rightarrow +0} \frac{e^{\frac{1}{x}}}{-\log x}$ είναι μία άπροσδιόριστος μορφή του τύπου $\frac{+\infty}{+\infty}$ (διατί;). Άρα έχουμε

$$\lim_{x \rightarrow +0} \frac{e^{\frac{1}{x}}}{-\log x} = \lim_{x \rightarrow +0} \frac{\left(e^{\frac{1}{x}}\right)'}{\left(-\log x\right)'} = \lim_{x \rightarrow +0} \frac{e^{\frac{1}{x}} \left(-\frac{1}{x^2}\right)}{-\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow +0} \frac{e^{\frac{1}{x}}}{x} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow +0} \frac{1}{x} \cdot \lim_{x \rightarrow +0} e^{\frac{1}{x}} = (+\infty)(+\infty) = +\infty$$

και επομένως

$$\lim_{x \rightarrow +0} \frac{e^{\frac{1}{x}}}{\log x} = -\lim_{x \rightarrow +0} \frac{e^{\frac{1}{x}}}{-\log x} = -(+\infty) = -\infty.$$

3.3* Άπροσδιόριστοι μορφαί των τύπων $+\infty - (+\infty)$ και $0(+\infty)$.

3.3.1 Άπροσδιόριστοι μορφαί του τύπου $+\infty - (+\infty)$ είναι όριακαί τιμαί τής μορφής :

$$\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) - g(x)], \text{ όπου } \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x).$$

Αί άπροσδιόριστοι μορφαί του τύπου τούτου ανάγονται εις τοιαύτας του τύπου $\frac{0}{0}$. Πράγματι: αν $F = \frac{1}{f}$ και $G = \frac{1}{g}$ τότε παρατηρούμεν ότι

$$\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) - g(x)] = \lim_{x \rightarrow x_0} \left[\frac{1}{F(x)} - \frac{1}{G(x)} \right] = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{G(x) - F(x)}{F(x)G(x)}$$

όποτε έπειδή

$$\lim_{x \rightarrow x_0} F(x) = \frac{1}{\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)} = \frac{1}{+\infty} = 0 \text{ και } \lim_{x \rightarrow x_0} G(x) = \frac{1}{\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)} = \frac{1}{+\infty} = 0,$$

συνάγομεν ότι η όριακή τιμή $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{G(x) - F(x)}{F(x)G(x)}$ είναι μία άπροσδιόριστος μορφή του τύπου $\frac{0}{0}$.

Παράδειγμα : $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\log(1+x^2)} - \frac{1}{x^2} \right) = \frac{1}{2}$. Πράγματι:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\log(1+x^2)} - \frac{1}{x^2} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - \log(1+x^2)}{x^2 \log(1+x^2)} \text{ και η τελευταία αυτή όριακή}$$

τιμή είναι μία άπροσδιόριστος μορφή του τύπου $\frac{0}{0}$ (διατί;). Άρα

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - \log(1+x^2)}{x^2 \log(1+x^2)} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x^2 - \log(1+x^2))'}{(x^2 \log(1+x^2))'} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{\frac{2x}{1+x^2} (x^2 + (1+x^2) \log(1+x^2))} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{x^2 + (1+x^2) \log(1+x^2)} \quad \left(\text{άπροσδιόριστος μορφή } \frac{0}{0} \right) = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x^2)'}{(x^2 + (1+x^2) \log(1+x^2))'} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{2x(2 + \log(1+x^2))} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2 + \log(1+x^2)} = \\ &= \frac{1}{2+0} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

3.3.2 Άπροσδιόριστοι μορφαι του τύπου $0(+\infty)$ είναι όριακαί τιμαί τής μορφής :

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)g(x), \text{ όπου } \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0 \text{ και } \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = +\infty.$$

Αί άπροσδιόριστοι μορφαι του τύπου τούτου άνάγονται εις τοιαύτας του τύπου $\frac{0}{0}$ και ένιοτε του τύπου $\frac{+\infty}{+\infty}$ (διατί;).

Παράδειγμα : $\lim_{x \rightarrow +0} x \log x = 0$. Πράγματι, $\lim_{x \rightarrow +0} x \log x = \lim_{x \rightarrow +0} \frac{\log x}{\frac{1}{x}} =$

$= \lim_{x \rightarrow +0} \frac{-\log x}{\frac{1}{x}}$, όπου ή τελευταία όριακή τιμή είναι μία άπροσδιόριστος μορφή του τύ-

που $\frac{+\infty}{+\infty}$ και έπομένως $\lim_{x \rightarrow +0} \frac{-\log x}{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow +0} \frac{(-\log x)'}{\left(\frac{1}{x}\right)'} = \lim_{x \rightarrow +0} \frac{-\frac{1}{x}}{\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow +0} x = 0$.

*Άρα και $\lim_{x \rightarrow +0} x \log x = -\lim_{x \rightarrow +0} \frac{-\log x}{\frac{1}{x}} = -0 = 0$.

3.4* Άπροσδιόριστοι μορφαι των τύπων 0^0 , $(+\infty)^0$ και $1^{+\infty}$.

3.4.1 Άπροσδιόριστοι μορφαι του τύπου 0^0 είναι όριακαί τιμαί τής μορφής :

$$\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x)]^{g(x)}, \text{ όπου } \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0 = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x).$$

3.4.2 Άπροσδιόριστοι μορφαι του τύπου $(+\infty)^0$ είναι όριακαί τιμαί τής μορφής :

$$\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x)]^{g(x)}, \text{ όπου } \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty \text{ και } \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0.$$

3.4.3 Άπροσδιόριστοι μορφαι του τύπου $1^{+\infty}$ είναι όριακαί τιμαί τής μορφής :

$$\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x)]^{g(x)}, \text{ όπου } \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 1 \text{ και } \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = +\infty.$$

Όλοι αϊ άνωτέρω άπροσδιόριστοι μορφαι άνάγονται εις την τοιαύτην του τύπου $0(+\infty)$. Πράγματι, ώς γνωστών (πρβλ. τύπον (7), § 3.2 του κεφ. VI) ισχύει

$$[f(x)]^{g(x)} = e^{g(x)\log f(x)}$$

και λόγω της συνεχείας της έκθετικής συναρτήσεως εφαρμόζεται ο τύπος

$$\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x)]^{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} e^{g(x)\log f(x)} = e^{\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)\log f(x)}$$

και έπομένως άγόμεθα εις τό να ύπολογίσωμεν την όριακήν τιμήν $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)\log f(x)$, ή όποια εις όλας τας άνωτέρω περιπτώσεις είναι (ή άναγεται εύκόλως) μία άπροσδιόριστος μορφή του τύπου $0(+\infty)$ (διατί);

Παραδείγματα :

1. $\lim_{x \rightarrow +0} x^x = 1$. Παρατηρούμεν ότι τοϋτο είναι μία άπροσδιόριστος μορφή του τύπου 0^0 . Έχομεν

$$\lim_{x \rightarrow +0} x^x = \lim_{x \rightarrow +0} e^{x \log x} = e^{\lim_{x \rightarrow +0} x \log x} = e^0 = 1,$$

διότι, ώς ύπελογίσθη εις την § 3.3.2, $\lim_{x \rightarrow +0} x \log x = 0$.

2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \frac{1}{x} = 1$. Παρατηρούμεν ότι τοϋτο είναι μία άπροσδιόριστος μορφή του τύπου $(+\infty)^0$. Έχομεν

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x \frac{1}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{\frac{1}{x} \log x} = e^{\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log x}{x}} = e^0 = 1,$$

διότι, ώς ύπελογίσθη εις την § 3.2, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log x}{x} = 0$.

3. $\lim_{x \rightarrow +0} (\sin x)^{\frac{1}{x}} = 1$. Παρατηρούμεν ότι τοϋτο είναι μία άπροσδιόριστος μορφή του τύπου $1^{+\infty}$. Έχομεν

$$\lim_{x \rightarrow +0} (\sin x)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow +0} e^{\frac{1}{x} \log \sin x} = e^{\lim_{x \rightarrow +0} \frac{1}{x} \log \sin x} = e^0 = 1,$$

διότι

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +0} \frac{1}{x} \log \sin x &= \lim_{x \rightarrow +0} \frac{\log \sin x}{x} = \lim_{x \rightarrow +0} \frac{(\log \sin x)'}{(x)'} = \lim_{x \rightarrow +0} \frac{\frac{1}{\sin x} (\sin x)'}{1} = \\ &= - \lim_{x \rightarrow +0} \epsilon \phi x = - \epsilon \phi 0 = 0. \end{aligned}$$

4. ΑΣΚΗΣΕΙΣ

4.1 Υπολογίσατε τας (πρώτας) παραγώγους των συναρτήσεων των όριζομένων υπό των κάτωθι τύπων :

1) $f(x) = x^2 + 2x + 3$

2) $f(x) = x^2(x+1)^3$

3) $f(x) = \frac{x^2}{(x+1)^3}$

4) $f(x) = \frac{3x+2}{x^2+1}$

5) $f(x) = \frac{x^2+2x+5}{x^2-1}$

6) $f(x) = \sin x + \log x$

7) $f(x) = \frac{\epsilon\phi x}{x}$

8) $f(x) = x^2 \epsilon\phi x + \frac{1}{x}$

9) $f(x) = 3\sin x + \frac{x}{x^2+1}$

4.2 Όμοιως υπολογίσατε τὰ παραγώγους τῶν συναρτήσεων τῶν ὀριζομένων ὑπὸ τῶν κάτωθι τύπων :

1) $f(x) = \sqrt[3]{x-1}$

2) $f(x) = \frac{1}{\sqrt[3]{x+1}}$

3) $f(x) = \sqrt{x^2+3x^2+1}$

4) $f(x) = \sqrt{x+1} + \sqrt{x-1}$

5) $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x+1}} - \frac{1}{\sqrt{x-1}}$

6) $f(x) = \sqrt{\frac{x^2-1}{x^2+1}}$

7) $f(x) = \sin(3x+2)$

8) $f(x) = \eta\mu(3x+2)$

9) $f(x) = \frac{1}{\sin 3x}$

10) $f(x) = \frac{\epsilon\phi^2 x - 1}{\epsilon\phi^2 x + 1}$

11) $f(x) = 3\eta\mu^4 x + 2\sin^2 x + 1$

12) $f(x) = \sqrt{\epsilon\phi^2 x + 1}$

13) $f(x) = \frac{2\eta\mu x}{1 + \sin(2x+3)}$

14) $f(x) = \log \eta\mu x + x^x$

15) $f(x) = (x^2+x)^x + \log(x^2+1)$

16) $f(x) = (\eta\mu x)^{\log x}$

17) $f(x) = x^{x^2+1} + 2\sqrt{x}$

18) $f(x) = \epsilon\phi x^x$

4.3 Εύρετε τὰ τοπικά ἀκρότατα τῶν συναρτήσεων τῶν ὀριζομένων ὑπὸ τῶν κάτωθι τύπων :

1) $f(x) = \eta\mu(2x+3)$, 2) $f(x) = x^4 - 2x^2 + 5$, 3) $f(x) = \eta\mu \frac{1}{x}$.

4.4 Δείξατε ὅτι μεταξὺ ὄλων τῶν ὀρθογωνίων μὲ σταθερὰν περίμετρον τὸ τετράγωνον ἔχει τὸ μεγαλύτερον ἐμβαδόν.

4.5 Δείξατε ὅτι μεταξὺ ὄλων τῶν τριγώνων μὲ σταθερὰν περίμετρον καὶ σταθερὰν βάσιν τὸ ἰσοσκελὲς τρίγωνον ἔχει τὸ μεγαλύτερον ἐμβαδόν.

4.6 Δείξατε ὅτι μεταξὺ ὄλων τῶν τριγώνων μὲ σταθερὰν περίμετρον τὸ ἰσόπλευρον τρίγωνον ἔχει τὸ μεγαλύτερον ἐμβαδόν.

4.7 Δείξατε ὅτι

$$f \text{ κυρτὴ ἐν } \Delta \Leftrightarrow -f \text{ κοιλὴ ἐν } \Delta.$$

4.8 Δείξατε ὅτι αἱ ἀσύμπτωτοι τῆς ὑπερβολῆς μὲ ἐξίσωσιν $\frac{x^2}{\alpha^2} - \frac{y^2}{\beta^2} = 1$ (πρβλ. § 3.3 τοῦ κεφ. III) εἶναι καὶ ἀσύμπτωτοι τῶν συναρτήσεων τῶν ὀριζομένων ὑπὸ τῶν τύπων

$$f_1(x) = \frac{\beta}{\alpha} \sqrt{x^2 - \alpha^2} \text{ καὶ } f_2(x) = -\frac{\beta}{\alpha} \sqrt{x^2 - \alpha^2}.$$

4.9 Μελετήσατε καὶ παραστήσατε γεωμετρικῶς τὰς συναρτήσεις τὰς ὀριζομένας ὑπὸ τῶν κάτωθι τύπων :

1) $f(x) = 3x^4 - 2x^2 + 3$

2) $f(x) = x(x^2 - 4)$

3) $f(x) = 2x^4 + 3x^2 + 2$

4) $f(x) = x + \frac{1}{x^2}$

4.10 'Υπολογίσατε τὰς κάτωθι ἀπροσδιορίστους μορφάς :

1) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^a - 1}{x - 1}$

2) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\log x}{x^2 - 1}$

3) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\eta\mu\alpha x}{\eta\mu\beta x}$

4) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\epsilon\phi\alpha x}{\epsilon\phi\beta x}$

5) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x} - 2x}{x - \eta\mu x}$

6) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \eta\mu x}{x^3}$

4.11 'Υπολογίσατε τὰς κάτωθι ἀπροσδιορίστους μορφάς :

1) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x + \log x}$

2) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^{-2x}}{x^2}$

3) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\log(x-1)}{x^3 + x - 10}$

4) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\log(x^2 - 8)}{x^2 + x - 12}$

4.12 * 'Υπολογίσατε τὰς κάτωθι ἀπροσδιορίστους μορφάς :

1) $\lim_{x \rightarrow +0} \sqrt{x} \log x$

2) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}-0} \left(\frac{\pi}{2} - x \right) \epsilon\phi x$

3) $\lim_{x \rightarrow 1+0} \left(\frac{1}{\log x} - \frac{1}{x-1} \right)$

4.13 * 'Υπολογίσατε τὰς κάτωθι ἀπροσδιορίστους μορφάς :

1) $\lim_{x \rightarrow +0} x^{\eta\mu x}$

2) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\log x) 2^{-x}$

3) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x+1}{x} \right)^x$

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VIII

ΠΕΡΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΟΣ

1. ΑΟΡΙΣΤΟΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ

1.1 Παράγουσα και άοριστον ολοκλήρωμα. Έστωσαν f και F συναρτήσεις με κοινόν πεδίον όρισμού έν διάστημα Δ . Θα λέγωμεν ότι ή συνάρτησις F είναι μία παράγουσα ή άλλως έν άοριστον ολοκλήρωμα τής f έν Δ τότε και μόνον τότε, άν ή F παραγωγίζεται και ισχύη

$$F'(x) = f(x) \quad \forall \quad x \in \Delta.$$

Άν F είναι μία παράγουσα τής f έν Δ , τότε συμβολίζομεν τούτο γράφοντες

$$\int f(x)dx = F(x), \quad x \in \Delta$$

(τό σύμβολον $\int f(x)dx$ άναγιγνώσκεται «όλοκλήρωμα $f(x)dx$ »).

Ώστε λοιπόν

$$\int f(x)dx = F(x), \quad x \in \Delta \Leftrightarrow F'(x) = f(x) \quad \forall \quad x \in \Delta.$$

Π.χ. ή συνάρτησις συν έχει παράγουσα τήν συνάρτησιν ημ, διότι, ώς είναι ήδη γνωστόν, $(\eta\mu x)' = \sigma\upsilon\nu x$. Άρα $\int \sigma\upsilon\nu x dx = \eta\mu x$, ώς επίσης και $\int \sigma\upsilon\nu x dx = \eta\mu x + c$, όπου c σταθερά, διότι και ή συνάρτησις $\eta\mu + c$ είναι μία παράγουσα τής συναρτήσεως συν (διατί ;). Αί συναρτήσεις τής μορφής $\eta\mu + c$ είναι και αί μόναι παράγουσαι τής συναρτήσεως συν, καθ' όσον ισχύει τό ακόλουθον θεώρημα.

1.1.1 ΘΕΩΡΗΜΑ. Άν F και G είναι δύο παράγουσαι τής συναρτήσεως f έν Δ , τότε αΰται διαφέρουν κατά μίαν σταθεράν.

Άπόδειξις. Συμφώνως πρòς τόν όρισμόν τής παραγωγύσης ισχύουν

$$F'(x) = f(x) \quad \forall \quad x \in \Delta \quad \text{και} \quad G'(x) = f(x) \quad \forall \quad x \in \Delta.$$

Άρα $F'(x) = G'(x) \quad \forall \quad x \in \Delta$ και έπομένως, κατά τό πόρισμα 2.1.5 τού κεφ. VII, ισχύει $F = G + c$.

Παραδείγματα : Δι' έφαρμογής τών τύπων τών παραγώγων συνάγονται εύκόλως οι ακόλουθοι τύποι :

1. $\int 0 dx = c$. Πράγματι τούτο έξ όρισμού είναι ίσοδύναμον με $(c)' = 0$, τό όποιον ώς γνωστόν ισχύει.

2. $\int a dx = ax$. Πράγματι τούτο έξ όρισμού είναι ίσοδύναμον με τόν γνωστόν τύπον $(ax)' = a$.

3. $\int x^\nu dx = \frac{x^{\nu+1}}{\nu+1}$ ($\nu = 1, 2, \dots$). Πράγματι $\left(\frac{x^{\nu+1}}{\nu+1}\right)' = \frac{(x^{\nu+1})'}{\nu+1} = \frac{(\nu+1)x^\nu}{\nu+1} = x^\nu$.

Όστε έδειχθη ότι $\left(\frac{x^{v+1}}{v+1}\right)' = x^v$, τó όποίον έξ όρισμού είναι ίσοδύναμον με $\int x^v dx = \frac{x^{v+1}}{v+1}$.

$$4. \int \frac{dx}{x^v} = -\frac{1}{(v-1)x^{v-1}} \quad (v=2,3,\dots). \text{ Πράγματι: } \left(-\frac{1}{(v-1)x^{v-1}}\right)' = -\frac{1}{v-1} \left(\frac{1}{x^{v-1}}\right)' = -\frac{1}{v-1} \left(-\frac{(x^{v-1})'}{(x^{v-1})^2}\right) = \frac{(v-1)x^{v-2}}{(v-1)x^2(v-1)} = \frac{1}{x^2(v-1) - (v-2)} = \frac{1}{x^v}.$$

$$5. \int \frac{dx}{x} = \log x \quad (x > 0). \text{ Πράγματι: } (\log x)' = \frac{1}{x}.$$

$$6. \int x^a dx = \frac{x^{a+1}}{a+1} \quad (a \neq -1). \text{ Πράγματι:}$$

$$\left(\frac{x^{a+1}}{a+1}\right)' = \frac{(x^{a+1})'}{a+1} = \frac{(a+1)x^a}{a+1} = x^a.$$

$$7. \int \sin x dx = -\eta\mu x \quad (\text{έδειχθη ήδη άνωτέρω}).$$

$$8. \int \eta\mu x dx = -\sin x. \text{ Πράγματι: } (-\sin x)' = -(-\eta\mu x) = \eta\mu x.$$

$$9. \int \frac{dx}{\sin^2 x} = \epsilon\phi x. \text{ Πράγματι: } (\epsilon\phi x)' = \frac{1}{\sin^2 x}.$$

$$10. \int \frac{dx}{\eta\mu^2 x} = -\sigma\phi x. \text{ Πράγματι: } (-\sigma\phi x)' = -\left(-\frac{1}{\eta\mu^2 x}\right) = \frac{1}{\eta\mu^2 x}.$$

$$11. \int e^x dx = e^x. \text{ Πράγματι: } (e^x)' = e^x.$$

$$12. \int a^x dx = \frac{a^x}{\log a} \quad (a \neq 1). \text{ Πράγματι: } \left(\frac{a^x}{\log a}\right)' = \frac{(a^x)'}{\log a} = \frac{a^x \log a}{\log a} = a^x.$$

Πίναξ άορίστων όλοκληρωμάτων τών κυριωτέρων στοιχειωδών συναρτήσεων

$f(x)$	$\int f(x) dx$	$f(x)$	$\int f(x) dx$
x^v	$\frac{x^{v+1}}{v+1}$	$\frac{1}{x^v} \quad (v \geq 2)$	$-\frac{1}{(v-1)x^{v-1}}$
$x^a \quad (a \neq -1)$	$\frac{x^{a+1}}{a+1}$	$\frac{1}{x} \quad (x > 0)$	$\log x$
$\eta\mu x$	$-\sin x$	$\sin x$	$\eta\mu x$
$\frac{1}{\eta\mu^2 x}$	$-\sigma\phi x$	$\frac{1}{\sin^2 x}$	$\epsilon\phi x$
e^x	e^x	a^x	$\frac{a^x}{\log a}$

1.2 Γενικοί τύποι όλοκληρώσεως. Αί εις τήν παράγραφον ταύτην θεωρούμεναι συναρτήσεις ύποτίθεται, όπου χρειάζεται, ότι έχουν παράγωγον.

$$1.2.1 \quad \int [f(x) + g(x)] dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx.$$

Πράγματι· κατά τον ορισμόν τοῦ ἀορίστου ὀλοκληρώματος, ἔχομεν
 $(\int [f(x) + g(x)] dx)' = f(x) + g(x) = (\int f(x) dx)' + (\int g(x) dx)'$,
 τὸ ὁποῖον ἀποδεικνύει τὸν ἀνωτέρω τύπον.

Παράδειγμα :

$$\int (x + e^x) dx = \int x dx + \int e^x dx = \frac{x^{1+1}}{1+1} + e^x = \frac{x^2}{2} + e^x.$$

$$1.2.2 \quad \int af(x) dx = a \int f(x) dx.$$

Πράγματι· $(\int af(x) dx)' = af(x) = a(\int f(x) dx)' = (a \int f(x) dx)'$.

Παραδείγματα :

$$1. \int ax^v dx = a \int x^v dx = a \frac{x^{v+1}}{v+1} = \frac{a}{v+1} x^{v+1}.$$

$$2. (\text{εἰς συνδυασμὸν μετὰ τοῦ τύπου 1.2.1}) \int (a_0 + a_1 x + \dots + a_k x^k) dx = \\ = \int a_0 dx + \int a_1 x dx + \dots + \int a_k x^k dx = a_0 x + \frac{a_1}{2} x^2 + \dots + \frac{a_k}{k+1} x^{k+1}.$$

1.2.3 Ὁ τύπος τῆς κατὰ παράγοντας ὀλοκληρώσεως :

$$\int f(x)g'(x) dx = f(x)g(x) - \int f'(x)g(x) dx.$$

Πράγματι· $(\int f(x)g'(x) dx)' = f(x)g'(x) = [f(x)g'(x) + f'(x)g(x)] - f'(x)g(x) = (\int f(x)g'(x) dx)' - (\int f'(x)g(x) dx)'$.

Εἰδικῶς διὰ $g(x) = x$ ἔχομεν τὸν ἀκόλουθον τύπον

$$1.2.3' \quad \int f(x) dx = xf(x) - \int xf'(x) dx.$$

Παραδείγματα :

$$1. \int \log x dx = x \log x - \int x(\log x)' dx = x \log x - \int x \frac{1}{x} dx = x \log x - \int dx = x \log x - x = \\ = x(\log x - 1).$$

$$2. \int x \log x dx = \int \left(\frac{x^2}{2}\right)' \log x dx = \frac{x^2}{2} \log x - \int \frac{x^2}{2} (\log x)' dx = \frac{x^2}{2} \log x - \int \frac{x^2}{2} \frac{1}{x} dx = \\ = \frac{x^2}{2} \log x - \frac{1}{2} \int x dx = \frac{x^2}{2} \log x - \frac{1}{2} \frac{x^2}{2} = \frac{x^2}{4} (2 \log x - 1) = \frac{x^2}{4} (\log x^2 - 1), \text{ ἥτοι}$$

$$\int x \log x dx = \frac{x^2}{4} (\log x^2 - 1).$$

$$3. \int e^x \eta \mu x dx = \int (e^x)' \eta \mu x dx = e^x \eta \mu x - \int e^x (\eta \mu x)' dx = e^x \eta \mu x - \int e^x \sigma \nu \nu x dx = \\ = e^x \eta \mu x - \int (e^x)' \sigma \nu \nu x dx = e^x \eta \mu x - [e^x \sigma \nu \nu x - \int e^x (\sigma \nu \nu x)' dx] = e^x \eta \mu x - e^x \sigma \nu \nu x + \\ + \int e^x (-\eta \mu x) dx = e^x (\eta \mu x - \sigma \nu \nu x) - \int e^x \eta \mu x dx. \text{ *Ωστε ἐδείχθη ὅτι}$$

$$\int e^x \eta \mu x dx = e^x (\eta \mu x - \sigma \nu \nu x) - \int e^x \eta \mu x dx,$$

ἐκ τοῦ ὁποῖου εὐκόλως συνάγεται ὅτι

$$\int e^x \eta \mu x dx = e^x \frac{\eta \mu x - \sigma \nu \nu x}{2}$$

1.2.4 Ὁ τύπος τῆς ὀλοκληρώσεως δι' ἀντικαταστάσεως :

$$\int f(g(x))g'(x) dx = \int f(y) dy \Big|_{y=g(x)},$$

ὅπου εἰς τὸ δεξιὸν μέλος τοῦ τύπου ἐννοοῦμεν ὅτι μετὰ τὸν ὑπολογισμὸν τοῦ $\int f(y) dy$ ὀφείλομεν νὰ ἀντικαταστήσωμεν τὸ y μὲ τὸ $g(x)$.

Πρὸς ἀπόδειξιν τοῦ τύπου τούτου θέτομεν $F(y) = \int f(y)dy$ (ἄρα $F'(y) = f(y)$), ὁπότε ἀρκεῖ νὰ δεῖξωμεν ὅτι

$$F(g(x)) = \int f(g(x))g'(x)dx$$

Τοῦτο πράγματι ἰσχύει, διότι κατὰ τὸ θεώρημα 1.7.1 τοῦ κεφ. VII περὶ παραγωγίσεως συνθέτου συναρτήσεως

$$(F(g(x)))' = F'(g(x))g'(x) = f(g(x))g'(x).$$

Παραδείγματα:

$$1. \int \sin(ax + \beta)dx = \frac{1}{a} \int \sin(ax + \beta) \cdot a dx = \frac{1}{a} \int \sin(ax + \beta) \cdot (ax + \beta)' dx = \\ = \frac{1}{a} [\int \sin u dy]_{y=ax+\beta} = \frac{1}{a} [\eta \mu y]_{y=ax+\beta} = \frac{1}{a} \eta \mu(ax + \beta), (\alpha \neq 0).$$

$$2. \int \frac{dx}{x} = \log |x|. \text{ 'Ως γνωστὸν ἰσχύει } \int \frac{dx}{x} = \log x, x \in (0, +\infty). \text{ Διὰ } x \in (-\infty, 0), \\ \text{τὸ ὁλοκλήρωμα τοῦτο ὑπολογίζεται ὡς ἐξῆς:} \\ \int \frac{dx}{x} = \int \frac{1}{-x} (-1)dx = \int \frac{1}{-x} (-x)' dx = \left[\int \frac{1}{y} dy \right]_{y=-x} = [\log y]_{y=-x} = \\ = \log(-x), x \in (-\infty, 0).$$

Οἱ δύο τύποι ὁλοκληρώσεως

$$\int \frac{dx}{x} = \log x, x \in (0, +\infty) \text{ καὶ } \int \frac{dx}{x} = \log(-x), x \in (-\infty, 0)$$

ἐνοποιοῦνται εἰς τὸν $\int \frac{dx}{x} = \log |x|$ (διατί;).

$$3. \int \frac{x}{1+x^2} dx = \frac{1}{2} \int \frac{1}{1+x^2} (2x) dx = \frac{1}{2} \int \frac{1}{1+x^2} (1+x^2)' dx = \\ = \frac{1}{2} \left[\int \frac{1}{y} dy \right]_{y=1+x^2} = \frac{1}{2} [\log |y|]_{y=1+x^2} = \frac{1}{2} \log(1+x^2) = \log \sqrt{1+x^2}.$$

$$4. \int \frac{dx}{(x-1)^2(x-2)} = \frac{1}{x-1} + \log \left| \frac{x-2}{x-1} \right|. \text{ Πρὸς ὑπολογισμὸν τοῦ ὁλοκληρώμα-} \\ \text{τος τούτου θέτομεν}$$

$$\frac{1}{(x-1)^2(x-2)} = \frac{\alpha}{x-1} + \frac{\beta}{(x-1)^2} + \frac{\gamma}{x-2}$$

καὶ ὑπολογίζομεν ἐν συνεχείᾳ τὰ α, β, γ ὡς ἐξῆς:

Διὰ πολλαπλασιασμοῦ ἀμφοτέρων τῶν μελῶν ταύτης ἐπὶ $(x-1)^2(x-2)$ λαμβάνομεν

$$1 = \alpha(x-1)(x-2) + \beta(x-2) + \gamma(x-1)^2$$

καὶ μετὰ τὰς πράξεις

$$1 = (\alpha + \gamma)x^2 + (-3\alpha + \beta - 2\gamma)x + (2\alpha - 2\beta + \gamma)$$

καὶ τοῦτο διὰ κάθε $x \in \mathbb{R}$, τὸ ὁποῖον σημαίνει ὅτι

$$(\alpha + \gamma = 0, -3\alpha + \beta - 2\gamma = 0, 2\alpha - 2\beta + \gamma = 1).$$

Ἐκ τῆς ἐπιλύσεως τοῦ συστήματος τούτου εὐρίσκομεν ($\alpha = -1, \beta = -1, \gamma = 1$) (διατί;)

καὶ ἐπομένως ἰσχύει

$$\frac{1}{(x-1)^2(x-2)} = -\frac{1}{x-1} - \frac{1}{(x-1)^2} + \frac{1}{x-2}.$$

Ἄρα

$$\int \frac{dx}{(x-1)^2(x-2)} = -\int \frac{dx}{x-1} - \int \frac{dx}{(x-1)^2} + \int \frac{dx}{x-2}.$$

$$\int \frac{dx}{x-1} = \int \frac{1}{x-1} (x-1)' dx = \left[\int \frac{dy}{y} \right]_{y=x-1} = \left[\log |y| \right]_{y=x-1} = \log |x-1|$$

$$\int \frac{dx}{(x-1)^2} = \int \frac{1}{(x-1)^2} (x-1)' dx = \left[\int \frac{dy}{y^2} \right]_{y=x-1} = \left[-\frac{1}{y} \right]_{y=x-1} = -\frac{1}{x-1}$$

$$\int \frac{dx}{x-2} = \int \frac{1}{x-2} (x-2)' dx = \left[\int \frac{dy}{y} \right]_{y=x-2} = \left[\log |y| \right]_{y=x-2} = \log |x-2|$$

Θά έχουμε λοιπόν

$$\int \frac{dx}{(x-1)^2(x-2)} = -\log |x-1| + \frac{1}{x-1} + \log |x-2| = \frac{1}{x-1} + \log \left| \frac{x-2}{x-1} \right|$$

Ο άνωτέρω τύπος ισχύει εις έκαστον τῶν διαστημάτων $(-\infty, 1)$, $(1, 2)$ καὶ $(2, +\infty)$.

$$\begin{aligned} 5. \int \frac{dx}{\sqrt{x+2}} &= \int \frac{1}{\sqrt{x+2}} (x+2)' dx = \left[\int \frac{dy}{\sqrt{y}} \right]_{y=x+2} = \left[\int y^{-\frac{1}{2}} dy \right]_{y=x+2} = \\ &= \left[\frac{y^{-\frac{1}{2}+1}}{-\frac{1}{2}+1} \right]_{y=x+2} = \left[2\sqrt{y} \right]_{y=x+2} = 2\sqrt{x+2}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 6. \int \epsilon\phi x dx &= \int \frac{\eta\mu x}{\sigma\upsilon\nu x} dx = - \int \frac{1}{\sigma\upsilon\nu x} (\sigma\upsilon\nu x)' dx = - \left[\int \frac{dy}{y} \right]_{y=\sigma\upsilon\nu x} = \\ &= - \left[\log |y| \right]_{y=\sigma\upsilon\nu x} = -\log |\sigma\upsilon\nu x|. \end{aligned}$$

$$7. \int e^{-x} dx = - \int e^{-x} (-1) dx = - \int e^{-x} (-x)' dx = - \left[\int e^y dy \right]_{y=-x} = -[e^y]_{y=-x} = -e^{-x}$$

8*. $\int e^{-x^v} dx = v! e^{-x} \left(1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^v}{v!} \right)$ ($v=0, 1, 2, \dots$). Το ολοκλήρωμα τούτο υπολογίζομεν τῇ βοηθειᾷ τῆς ἀναγωγικῆς μεθόδου, ὡς ἐξῆς :

Διὰ $\kappa > 0$ ἔχομεν :

$$\begin{aligned} I_{\kappa}(x) &= \int e^{-x} x^{\kappa} dx = - \int x^{\kappa} (e^{-x})' dx = -x^{\kappa} e^{-x} + \int e^{-x} (x^{\kappa})' dx = -x^{\kappa} e^{-x} + \kappa \int e^{-x} x^{\kappa-1} dx = \\ &= -x^{\kappa} e^{-x} + \kappa I_{\kappa-1}(x), \end{aligned}$$

ἤτοι

$$I_{\kappa}(x) = -x^{\kappa} e^{-x} + \kappa I_{\kappa-1}(x),$$

ὁπότε διὰ $\kappa = 1, 2, \dots, v$ λαμβάνομεν :

(σ_1)	$I_1(x) = -x e^{-x} + I_0(x)$	$\frac{1}{1!}$
(σ_2)	$I_2(x) = -x^2 e^{-x} + 2I_1(x)$	$\frac{1}{2!}$
(σ_3)	$I_3(x) = -x^3 e^{-x} + 3I_2(x)$	$\frac{1}{3!}$
\vdots	\vdots	\vdots
(σ_{κ})	$I_{\kappa}(x) = -x^{\kappa} e^{-x} + \kappa I_{\kappa-1}(x)$	$\frac{1}{\kappa!}$
\vdots	\vdots	\vdots
(σ_v)	$I_v(x) = -x^v e^{-x} + v I_{v-1}(x)$	$\frac{1}{v!}$

Διά πολλαπλασιασμού ἀμοτέρων τῶν μελῶν τῶν ἀνωτέρω σχέσεων ἐπὶ τὸν δεξιὰ ἐκάστη ἀναγεγραμμένον ἀριθμὸν (π.χ. πῆς σχέσεως (σ_k) ἐπὶ τὸν $\frac{1}{k!}$) καὶ κατόπιν διὰ προσθέσεως κατὰ μέλη αὐτῶν προκύπτει (ἀφοῦ γίνουν αἱ κατάλληλοι ἀπλοποιήσεις) ὅτι

$$\frac{1}{v!} I_v(x) = I_0(x) - \frac{x}{1!} e^{-x} - \frac{x^2}{2!} e^{-x} - \dots - \frac{x^v}{v!} e^{-x}$$

καὶ ἐπειδὴ, ὡς ἤδη ὑπελογίσθη εἰς τὸ προηγούμενον παράδειγμα, $I_0(x) = \int e^{-x} dx = -e^{-x}$, θὰ ἔχωμεν

$$I_v(x) = \int e^{-x} x^v dx = -v! e^{-x} \left(1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^v}{v!} \right).$$

1.3 Ἀσκήσεις.

1.3.1 Ὑπολογίσατε τὰ κάτωθι ἀόριστα ὀλοκληρώματα :

$$1) \int \frac{dx}{(x-2)(x+3)} \quad 2) \int \frac{x^2 - x + 4}{(x^2 - 1)(x+2)} dx \quad 3) \int \frac{x^3 + 2x^2 - 3x + 1}{(x-1)(x+3)} dx.$$

1.3.2 Ὑπολογίσατε τὰ κάτωθι ἀόριστα ὀλοκληρώματα :

$$1) \int \sqrt{2x+3} dx \quad 2) \int \frac{dx}{\sqrt{x+1} - \sqrt{x-1}} \quad 3) \int \frac{x}{\sqrt{3x+1}} dx.$$

1.3.3 Ὑπολογίσατε τὰ κάτωθι ἀόριστα ὀλοκληρώματα :

$$1) \int \frac{x^3}{\sqrt{1+x^4}} dx \quad 2) \int \frac{3x+1}{\sqrt{3x^2+2x+1}} dx \quad 3) \int (2x-3)\sqrt{x^2-3x+2} dx$$

1.3.4 Ὑπολογίσατε τὰ κάτωθι ἀόριστα ὀλοκληρώματα :

$$\begin{array}{lll} 1) \int \sigma \phi x dx & 2) \int e^{-\sigma x} dx & 3) \int x e^{-\sigma x} dx \\ 4) \int e^x \sin x dx & 5) \int \eta \mu^2 x dx & 6) \int e \phi^2 x dx \end{array}$$

1.3.5 Ὑπολογίσατε τὰ κάτωθι ἀόριστα ὀλοκληρώματα :

$$1) \int \eta \mu x \eta \mu n x dx \quad 2) \int \eta \mu x \sin n x dx \quad 3) \int \sin k \sin n x dx,$$

ὅπου k, n φυσικοὶ ἀριθμοί.

(Χρησιμοποιήσατε ἀντιστοίχως τοὺς τύπους :

$$\eta \mu x \eta \mu n x = \frac{1}{2} [\sin(k-n)x - \sin(k+n)x],$$

$$\eta \mu x \sin n x = \frac{1}{2} [\eta \mu(k+n)x + \eta \mu(k-n)x],$$

$$\sin k \sin n x = \frac{1}{2} [\sin(k+n)x + \sin(k-n)x].$$

1.3.6* Ὑπολογίσατε τὰ κάτωθι ἀόριστα ὀλοκληρώματα :

$$\begin{array}{lll} 1) \int (\sin x + \eta \mu x) \sqrt{\sin x - \eta \mu x} dx & 2) \int \frac{\eta \mu x}{(1 + \sin x)^2} dx & 3) \int \frac{x \sin x}{(x \eta \mu x + \sin x)^2} dx \\ 4) \int \frac{x \eta \mu x}{(1 + \sin x)^2} dx & 5) \int \left(\frac{x}{x \eta \mu x + \sin x} \right)^2 dx \end{array}$$

1.3.7 Εὑρετε ἀναγωγικούς τύπους διὰ τὰ ὀλοκληρώματα :

$$1) \int \eta \mu^v x dx \quad 2) \int \sin^v x dx \quad (v \text{ φυσικός ἀριθμός}).$$

Τῆ βοήθεια τῶν τύπων τούτων ὑπολογίσατε τὰ ὀλοκλήρωμα $\int \eta^{\nu} x dx$ καὶ $\int \sin^{\nu} x dx$.

1.3.8 * Εὑρετε ἀναγωγικὸν τύπον διὰ τὸ ὀλοκλήρωμα $\int \log^{\nu} x dx$ ($\nu = 0, 1, 2, \dots$) καὶ τῆ βοήθεια τούτου ὑπολογίσατε τὸ ὀλοκλήρωμα $\int \log^2 x dx$.

2. ΩΡΙΣΜΕΝΟΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ

2.1 Ὅρισμός καὶ ιδιότητες. Ἐὰς θεωρήσωμεν μίαν συνάρτησιν f ὠρισμένην εἰς ἓν διάστημα Δ , ἢ ὁποῖα ὑποθέτομεν ὅτι εἶναι συνεχῆς καὶ ἔχει παράγουσαν ἐν Δ (1). Ἐὰν α, β εἶναι τυχόντα σημεῖα τοῦ Δ , τότε ἡ διαφορὰ

$$F(\beta) - F(\alpha),$$

ὅπου F εἶναι μία παράγουσα τῆς f , εἶναι ἀνεξάρτητος τῆς ἐκλογῆς τῆς παραγούσης F . Πράγματι: κατὰ τὸ θεώρημα 1.1.1, τυχούσα παράγουσα G τῆς f διαφέρει τῆς F κατὰ μίαν σταθεράν, ἤτοι $G = F + c$ καὶ ἐπομένως

$$G(\beta) - G(\alpha) = (F(\beta) + c) - (F(\alpha) + c) = F(\beta) - F(\alpha).$$

Τὴν διαφορὰν $F(\beta) - F(\alpha)$ καλοῦμεν *ὠρισμένον ὀλοκλήρωμα τῆς f ἀπὸ α ἕως β* καὶ παριστῶμεν τοῦτο μὲ $\int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx$, ἤτοι

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx = F(\beta) - F(\alpha)$$

(τὸ σύμβολον $\int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx$ ἀναγινώσκεται «ὀλοκλήρωμα $f(x) dx$ ἀπὸ α ἕως β »).

Ἐκ τοῦ ἀνωτέρω ὀρισμοῦ τοῦ ὠρισμένου ὀλοκλήρωματος συνάγονται ἀμέσως τὰ ἑξῆς :

$$\int_{\alpha}^{\alpha} f(x) dx = 0$$

καὶ

$$\int_{\beta}^{\alpha} f(x) dx = - \int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx.$$

Τὴν διαφορὰν $F(\beta) - F(\alpha)$ παριστῶμεν συνήθως καὶ μὲ $[F(x)]_{\alpha}^{\beta}$, ἤτοι $[F(x)]_{\alpha}^{\beta} = F(\beta) - F(\alpha)$. Κατὰ ταῦτα

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx = [F(x)]_{\alpha}^{\beta} = \left[\int f(x) dx \right]_{\alpha}^{\beta}.$$

Παρατηροῦμεν ἐπίσης ὅτι τὸ ὀλοκλήρωμα $\int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx$ ἐξαρτᾶται τόσο ἀπὸ τὴν συνάρτησιν f ὅσον καὶ ἀπὸ τοὺς ἀριθμοὺς α, β , οἱ ὁποῖοι καλοῦνται *ἄκρα ὀλοκλήρωσεως*. Ἀντιθέτως τὸ ὀλοκλήρωμα $\int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx$ δὲν ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν μεταβλητὴν x , δηλαδὴ τοῦτο δὲν ἀλλάσσει ἂν ἀντικαταστήσωμεν τὴν μεταβλητὴν x ὑπὸ μιᾶς ἄλλης, ἤτοι ἰσχύει

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx = \int_{\alpha}^{\beta} f(t) dt.$$

(1) ἀποδεικνύεται εἰς τὴν μαθηματικὴν ἀνάλυσιν ὅτι ἡ συνέχεια τῆς f συνεπάγεται τὴν ὑπαρξιν παραγούσης αὐτῆς.

Παραδείγματα :

$$1. \int_a^\beta dx = a(\beta - \alpha).$$

Πράγματι: $\int_a^\beta dx = [\int dx]_a^\beta = [ax]_a^\beta = a\beta - a\alpha = a(\beta - \alpha).$

$$2. \int_0^1 x dx = \frac{1}{2}.$$

Πράγματι: $\int_0^1 x dx = [\int x dx]_0^1 = \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^1 = \frac{1^2}{2} - \frac{0^2}{2} = \frac{1}{2}.$

$$3. \int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}.$$

Πράγματι: $\int_0^1 x^2 dx = [\int x^2 dx]_0^1 = \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1^3}{3} - \frac{0^3}{3} = \frac{1}{3}.$

$$4. \int_0^{\pi/2} \eta \mu x dx = 1.$$

Πράγματι: $\int_0^{\pi/2} \eta \mu x dx = [\int \eta \mu x dx]_0^{\pi/2} = [-\sigma \nu x]_0^{\pi/2} = -\sigma \nu \frac{\pi}{2} + \sigma \nu 0 = -0 + 1 = 1.$

$$5. \int_1^2 \log x dx = \log 4 - 1.$$

Πράγματι: δυνάμει του έν 1.2.3 παραδείγματος 1, έχομεν

$$\int_1^2 \log x dx = [x(\log x - 1)]_1^2 = 2(\log 2 - 1) - 1(\log 1 - 1) = 2\log 2 - 2 + 1 = \log 4 - 1.$$

$$6. \int_0^1 \frac{x}{1+x^2} dx = \log \sqrt{2}.$$

Πράγματι: δυνάμει του έν 1.2.4 παραδείγματος 3, έχομεν

$$\int_0^1 \frac{x}{1+x^2} dx = \left[\int \frac{x}{1+x^2} dx \right]_0^1 = \left[\log \sqrt{1+x^2} \right]_0^1 = \log \sqrt{1+1^2} - \log \sqrt{1+0^2} = \log \sqrt{2}.$$

2.1.1 Έκ του ὀρισμοῦ τοῦ ὠρισμένου ὀλοκληρώματος συνάγονται ἐνκόλως (ἀπόδειξις;) οἱ κάτωθι τύποι :

$$\int_a^\beta [f(x) + g(x)] dx = \int_a^\beta f(x) dx + \int_a^\beta g(x) dx$$

$$\int_a^\beta a f(x) dx = a \int_a^\beta f(x) dx.$$

2.1.2 Ἄν α, β, γ εἶναι σημεῖα τοῦ διαστήματος Δ , τότε ἰσχύει ὁ τύπος

$$\int_a^\gamma f(x) dx + \int_\gamma^\beta f(x) dx = \int_a^\beta f(x) dx.$$

Πράγματι ἂν F εἶναι μία παράγουσα τῆς f , τότε προφανῶς έχομεν

$$[F(\gamma) - F(\alpha)] + [F(\beta) - F(\gamma)] = F(\beta) - F(\alpha),$$

δηλαδὴ τὸν ἀνωτέρω τύπον.

2.1.3 'Ισχύει ο τύπος (γνωστός ως τύπος της μέσης τιμής)

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx = f(x_0)(\beta - \alpha),$$

όπου x_0 έν κατάλληλον σημείον του άνοικτου διαστήματος (α, β) .

Πράγματι· αν F είναι μία παράγουσα τής f (ήτοι $F'(x) = f(x) \forall x \in \Delta$), τότε, κατά τὸ θεώρημα τής μέσης τιμής του διαφορικού λογισμού (θεώρημα 2.1.3 του κεφ. VII), υπάρχει $x_0 \in (\alpha, \beta)$ τοιούτου, ώστε νά ισχύη

$$F(\beta) - F(\alpha) = F'(x_0)(\beta - \alpha) = f(x_0)(\beta - \alpha),$$

δηλαδή

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx = f(x_0)(\beta - \alpha).$$

Δι' εφαρμογής του άνωτέρω τύπου τής μέσης τιμής συνάγονται (άποδείξεις;) τὰ κάτωθι :

$$\left. \begin{array}{l} \alpha < \beta \\ f(x) \geq 0 \quad \forall x \in [\alpha, \beta] \end{array} \right\} \Rightarrow \int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx \geq 0$$

$$\left. \begin{array}{l} \alpha < \beta \\ f(x) \geq g(x) \quad \forall x \in [\alpha, \beta] \end{array} \right\} \Rightarrow \int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx \geq \int_{\alpha}^{\beta} g(x) dx.$$

2.1.4 'Ισχύει επίσης και ο τύπος

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(g(x))g'(x) dx = \int_{g(\alpha)}^{g(\beta)} f(y) dy.$$

Πράγματι· αν F είναι μία παράγουσα τής f , τότε, κατά τον έν 1.2.4 τύπου τής δι' άντικαταστάσεως ολοκληρώσεως, λαμβάνομεν

$$\begin{aligned} \int_{\alpha}^{\beta} f(g(x))g'(x) dx &= \left[\int f(g(x))g'(x) dx \right]_{\alpha}^{\beta} = \left[\int f(y) dy \right]_{y=g(\alpha)}^{y=g(\beta)} = \\ &= \left[F(y) \right]_{y=g(\alpha)}^{y=g(\beta)} = \left[F(g(x)) \right]_{\alpha}^{\beta} = F(g(\beta)) - F(g(\alpha)) = \int_{g(\alpha)}^{g(\beta)} f(y) dy. \end{aligned}$$

'Εφαρμογή: $\int_{-1}^1 \sqrt{1-x^2} dx = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sin^2 x dx.$

Πράγματι· $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sin^2 x dx = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sin x \cos x dx = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sqrt{1-\eta^2 x} (\eta \eta x)' dx =$

$$= \int_{\eta(-\pi/2)}^{\eta(\pi/2)} \sqrt{1-y^2} dy = \int_{-1}^1 \sqrt{1-y^2} dy = \int_{-1}^1 \sqrt{1-x^2} dx.$$

Δυνάμεθα τώρα, τή βοηθεία του τύπου τούτου, νά υπολογίσωμεν τὸ ολοκλήρωμα

$$\int_{-1}^1 \sqrt{1-x^2} dx \text{ ως εξής :}$$

Υπολογίζομεν κατά πρώτον τὸ ὄριστον ὀλοκλήρωμα

$$\begin{aligned} \int \sin^2 x dx &= \int \frac{1 + \sin 2x}{2} dx = \frac{1}{2} \int dx + \frac{1}{2} \int \sin 2x dx = \frac{1}{2} x + \frac{1}{4} \int \sin 2x (2x)' dx = \\ &= \frac{1}{2} x + \frac{1}{4} \left[\int \sin u dy \right]_{y=2x} = \frac{1}{2} x + \frac{1}{4} [\eta\mu y]_{y=2x} = \frac{1}{2} x + \frac{1}{4} \eta\mu 2x = \\ &= \frac{1}{4} (2x + \eta\mu 2x), \end{aligned}$$

ἥτοι

$$\int \sin^2 x dx = \frac{1}{4} (2x + \eta\mu 2x).$$

Ἐν συνεχείᾳ, δυνάμει τοῦ ἀνωτέρω ἀποδείχθεντος τύπου, λαμβάνομεν ὅτι

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 \sqrt{1-x^2} dx &= \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sin^2 x dx = \left[\frac{1}{4} (2x + \eta\mu 2x) \right]_{-\pi/2}^{\pi/2} = \\ &= \frac{1}{4} (\pi + \eta\mu\pi) - \frac{1}{4} (-\pi + \eta\mu(-\pi)) = \frac{1}{4} \pi + \frac{1}{4} \pi = \frac{\pi}{2}, \end{aligned}$$

ἥτοι ὑπελογίσθη ὅτι

$$\int_{-1}^1 \sqrt{1-x^2} dx = \frac{\pi}{2}.$$

2.2 Τὸ ὠρισμένον ὀλοκλήρωμα ὡς ἔμβαδόν. Ἐστω f μία συνάρτησις ὠρι-

σμένη καὶ συνεχῆς εἰς τὸ κλειστὸν διάστημα $[a, \beta]$ με $f(x) \geq 0 \forall x \in [a, \beta]$. Ἐστω ἐπὶ πλέον E τὸ χωρίον τοῦ ἐπιπέδου τὸ ὀρίζομενον ὑπὸ τοῦ διαγράμματος τῆς f , τοῦ ἄξονος τῶν x καὶ τῶν εὐθειῶν με ἐξισώσεις $x = a$ καὶ $x = \beta$ (βλ. σχ. 98), ἥτοι


$E = \text{διάγραμμα } \{(x, y) : a \leq x \leq \beta, 0 \leq y \leq f(x)\}$.

Ἄς θεωρήσωμεν κατὰ πρώτον τὴν περίπτωσιν, ὅπου ἡ f εἶναι γραμμικὴ συνάρτησις δηλαδὴ $f(x) = \gamma x + \delta$. Τότε τὸ χωρίον E εἶναι ἓν τραπέζιον (βλ. σχ. 99) με βάσεις (παραλλήλους πρὸς τὸν ἄξονα τῶν y) ἐχούσας μήκη $f(a)$ καὶ $f(\beta)$ καὶ με ὕψος ἔχον μήκος $\beta - a$. Οὕτως ἡ τιμὴ (E) τοῦ ἔμβαδου τοῦ τραπέζιου E εἶναι


$$\frac{f(a) + f(\beta)}{2} (\beta - a).$$

Ἐξ ἄλλου τὸ ὀλοκλήρωμα

$$\begin{aligned} \int_a^\beta f(x) dx &= \int_a^\beta (\gamma x + \delta) dx = \left[\frac{1}{2} \gamma x^2 + \delta x \right]_a^\beta = \\ &= \frac{1}{2} \gamma \beta^2 + \delta \beta - \left(\frac{1}{2} \gamma \alpha^2 + \delta \alpha \right) = \\ &= \frac{1}{2} \gamma (\beta^2 - \alpha^2) + \delta (\beta - \alpha) = \left(\frac{1}{2} \gamma (\beta + \alpha) + \delta \right) (\beta - \alpha) = \frac{\gamma \beta + \gamma \alpha + 2\delta}{2} (\beta - \alpha) = \\ &= \frac{(\gamma \alpha + \delta) + (\gamma \beta + \delta)}{2} (\beta - \alpha) = \frac{f(a) + f(\beta)}{2} (\beta - \alpha), \text{ ἥτοι} \\ &\int_a^\beta f(x) dx = (E). \end{aligned}$$




Σχ. 98



Σχ. 99

Ο τύπος ούτος ισχύει γενικώτερον και εις τήν περίπτωσιν, όπου ή f είναι μία πολυγωνική συνάρτησις, δηλαδή μία συνάρτησις τής οποίας τὸ διάγραμμα είναι μία πολυγωνική γραμμὴ π.χ. ή $A_1 A_2 A_3 A_4$ τοῦ σχ. 100. Ἐχομεν τότε



$$(E) = (E_1) + (E_2) + (E_3)$$

$$\int_a^{a_1} f(x)dx + \int_{a_1}^{a_2} f(x)dx + \int_{a_2}^{\beta} f(x)dx = \int_a^{\beta} f(x)dx,$$

ἤτοι πάλιν

$$\int_a^{\beta} f(x)dx = (E).$$

Ο τύπος ούτος ισχύει δι' οἰονδήποτε πλῆθος πλευρῶν τῆς ὑπ' ὄψιν πολυγωνικῆς γραμμῆς.

Ἄς ἐπανέλθωμεν τώρα εις τήν περίπτωσιν τῆς τυχούσης συναρτήσεως f .

Διὰ διαμερίσεως τοῦ κλειστοῦ διαστήματος $[a, \beta]$ εις n ἴσα μέρη ὀρίζεται μία πολυγωνική συνάρτησις f_n , προσεγγίζουσα τήν f ὡς ἐμφαίνεται εις τὸ σχ. 101 διὰ $n=4$. Ἄν καλέσωμεν E_n τὸ ἀντίστοιχον χωρίον τοῦ ἐπιπέδου, τὸ ὁποῖον ὀρίζει ή f_n (δηλαδή $E_n = \text{διάγραμμα } \{(x, y) : a \leq x \leq \beta, 0 \leq y \leq f_n(x)\}$), τότε καλοῦμεν τιμὴν τοῦ ἔμβαδοῦ τοῦ χωρίου E τὸ $\lim (E_n)$ (ἂν, βεβαίως, τοῦτο ὑπάρχη καὶ εἶναι πραγματικὸς ἀριθμὸς), ἤτοι

$$(E) = \lim (E_n) = \lim \int_a^{\beta} f_n(x)dx.$$

Ἀποδεικνύεται εις τήν μαθηματικὴν ἀνάλυσιν ὅτι, ὑπὸ τὰς τεθείσας ἀνωτέρω ὑποθέσεις, ισχύει

$$\lim \int_a^{\beta} f_n(x)dx = \int_a^{\beta} f(x)dx.$$

Ὡστε καὶ εις τήν γενικὴν περίπτωσιν ισχύει

$$\int_a^{\beta} f(x)dx = (E).$$

Παρατήρησις. Ἡ ἀνωτέρω μέθοδος στηρίζεται εις τήν ιδέαν τῆς προσεγγίσεως τοῦ ἔμβαδοῦ, τὸ ὁποῖον περικλείει μία καμπύλη, ὑπὸ τοῦ ἔμβαδοῦ, τὸ ὁποῖον περικλείει μία ἔγγεγραμμένη εις αὐτὴν πολυγωνικὴ γραμμὴ. Ἡ ιδέα αὕτη ὀφείλεται εις τὸν Ἀρχιμήδην, ὁ ὁποῖος ἐφήρμοσε ταύτην εις τὸν ὑπολογισμὸν τῆς τιμῆς τοῦ ἔμβαδοῦ παραβολικοῦ χωρίου.


Παραδείγματα :

1. $f(x) = x^2$, $x \in [0, \alpha]$. Εἰς τήν περίπτωσιν ταύτην τὸ ἀντίστοιχον χωρίον E τοῦ ἐπιπέδου εἶναι ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον περιέχεται μεταξύ τοῦ διαγράμματος τῆς f , τοῦ ἄξονος τῶν x καὶ τῆς εὐθείας με' ἐξίσωσιν $x = \alpha$ (βλ. σχ. 102). Ἐχομεν :


$$(E) = \int_0^{\alpha} x^2 dx = \left[\int x^2 dx \right]_0^{\alpha} = \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^{\alpha} = \frac{\alpha^3}{3} - \frac{0^3}{3} = \frac{\alpha^3}{3}.$$

2. $f(x) = \eta\mu x$, $x \in [0, \pi]$. Είς τήν περίπτωσιν ταύτην τὸ ἀντίστοιχον χωρίον E τοῦ ἐπιπέδου εἶναι ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον περιέχεται μεταξύ τῆς ἡμιτονοειδοῦς καμπύλης καὶ τοῦ διαστήματος $[0, \pi]$ (βλ. σχ. 103). Ἐχομεν


$$(E) = \int_0^{\pi} \eta\mu x dx = [-\sigma\upsilon\nu x]_0^{\pi} = -\sigma\upsilon\nu\pi + \sigma\upsilon\nu 0 = -(-1) + 1 = 2.$$



Σχ. 102



Σχ. 103



Σχ. 104

3. Ἐμβαδὸν ἐσωτερικοῦ κύκλου ἀκτίνας a . Ἐς θεωρήσωμεν τὸ ἐπίπεδον χωρίον E τὸ ὁποῖον περιέχεται μεταξύ τοῦ διαγράμματος τῆς f μὲ $f(x) = \sqrt{a^2 - x^2}$, $-a \leq x \leq a$ καὶ τοῦ ἄξονος τῶν x (βλ. σχ. 104). Ἐχομεν

$$\begin{aligned} (E) &= \int_{-a}^a \sqrt{a^2 - x^2} dx = \int_{-a}^a a \sqrt{1 - \left(\frac{x}{a}\right)^2} dx = a^2 \int_{-a}^a \sqrt{1 - \left(\frac{x}{a}\right)^2} \left(\frac{x}{a}\right)' dx = \\ &= a^2 \int_{-1}^1 \sqrt{1 - y^2} dy = a^2 \int_{-1}^1 \sqrt{1 - x^2} dx \end{aligned}$$


καὶ ἐπειδὴ, ὡς ὑπελογίσθη ἐν 2.1.4 (ἐφαρμογή), $\int_{-1}^1 \sqrt{1 - x^2} dx = \frac{\pi}{2}$, θὰ ἔχωμεν $(E) = \frac{\pi a^2}{2}$.

Ἐπομένως ἡ τιμὴ τοῦ ἐμβαδοῦ τοῦ ἐσωτερικοῦ κύκλου ἀκτίνας a θὰ εἶναι $2(E) = 2 \frac{\pi a^2}{2} = \pi a^2$.

4. Ἐμβαδὸν ἐσωτερικοῦ ἐλλείψεως. Ἐς θεωρήσωμεν τὴν ἔλλειψιν μὲ ἐξίσωσιν

$\frac{x^2}{\alpha^2} + \frac{y^2}{\beta^2} = 1$, δηλαδή τὴν ἔλλειψιν μὲ κέντρον O καὶ ἡμιάξονας α, β . Ἐστω δὲ E τὸ χωρίον τοῦ ἐπιπέδου τὸ ὁποῖον περιέχεται μεταξύ τοῦ διαγράμματος τῆς f μὲ $f(x) = \frac{\beta}{\alpha} \sqrt{a^2 - x^2}$, $-a \leq x \leq a$ καὶ τοῦ ἄξονος τῶν x (βλ. σχ. 105). Ἐχομεν τότε


$$\begin{aligned} (E) &= \int_{-a}^a \frac{\beta}{\alpha} \sqrt{a^2 - x^2} dx = \beta \int_{-a}^a \sqrt{1 - \left(\frac{x}{a}\right)^2} dx = \\ &= \alpha\beta \int_{-a}^a \sqrt{1 - \left(\frac{x}{a}\right)^2} \left(\frac{x}{a}\right)' dx = \alpha\beta \int_{-a/a}^{a/a} \sqrt{1 - y^2} dy = \\ &= \alpha\beta \int_{-1}^1 \sqrt{1 - x^2} dx \end{aligned}$$




Σχ. 105 $\frac{x^2}{\alpha^2} + \frac{y^2}{\beta^2} = 1$

και επειδη, ως υπελογισθη εν 1.2.4 (εφαρμογη), $\int_{-1}^1 \sqrt{1-x^2} dx = \frac{\pi}{2}$, θα εχωμεν $(E) = \frac{\pi\alpha\beta}{2}$. Επομενως η τιμη, του εμβαδου του εσωτερικου της ελλειψως με κεντρον 0 και ημιαξονας α, β ειναι $\frac{\pi\alpha\beta}{2}$.


Ας θεωρησωμεν τωρα δυο συναρτησεις f και g ωρισμενες και συνεχεις εν $[\alpha, \beta]$ με $f(x) \geq g(x) \forall x \in [\alpha, \beta]$. Αν E παρισταξ το χωριον του επιπεδου (βλ. σχ. 106), το οποιον περιεχεται μεταλυ των διαγραμμων των συναρτησεων f, g και των ευθειων με εξισωσεις $x = \alpha$ και $x = \beta$, τότε το εμβαδον του χωριου τουτου ειναι η διαφορα των εμβαδων των χωριων E_f και E_g (βλ. σχ. 107 και 108).



Σχ. 106



Σχ. 107



Σχ. 108

Ωστε εχομεν

$$(E) = (E_f) - (E_g) = \int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx - \int_{\alpha}^{\beta} g(x) dx,$$


ητοι

$$(E) = \int_{\alpha}^{\beta} [f(x) - g(x)] dx.$$


Παραδειγματα :

1. $f(x) = x$ και $g(x) = x^2$. Το εμβαδον του χωριου E του επιπεδου (βλ. σχ. 109) ειναι

$$(E) = \int_0^1 (x - x^2) dx = \left[\int (x - x^2) dx \right]_0^1 = \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1^2}{2} - \frac{1^3}{3} - \left(\frac{0^2}{2} - \frac{0^3}{3} \right) = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}.$$



Σχ. 109



Σχ. 110

2. $f(x) = \sigma\upsilon\upsilon\chi$ και $g(x) = \eta\mu\chi$. Το έμβαδόν του χωρίου E του επιπέδου, το οποίο περιέχεται μεταξύ της συνημιτιγνοειδούς καμπύλης, της ημιτιγνοειδούς καμπύλης και του άξονος των y (βλ. σχ. 110) είναι

$$(E) = \int_0^{\pi/4} (\sigma\upsilon\upsilon\chi - \eta\mu\chi) dx = \left[\int (\sigma\upsilon\upsilon\chi - \eta\mu\chi) dx \right]_0^{\pi/4} = \left[\eta\mu\chi + \sigma\upsilon\upsilon\chi \right]_0^{\pi/4} = \eta\mu \frac{\pi}{4} + \sigma\upsilon\upsilon \frac{\pi}{4} - (\eta\mu 0 + \sigma\upsilon\upsilon 0) = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} - (0 + 1) = \sqrt{2} - 1,$$

ήτοι

2.3 Άσκησης

2.3.1 Δείξτε ότι :

1) $\int_{-\pi}^{\pi} \eta\mu\kappa \eta\mu\nu\kappa dx = 0 = \int_{-\pi}^{\pi} \sigma\upsilon\upsilon\kappa\sigma\upsilon\upsilon\nu\kappa dx$ (κ, ν φυσικοί, $\kappa \neq \nu$)

2) $\int_{-\pi}^{\pi} \eta\mu\kappa \sigma\upsilon\upsilon\nu\kappa dx = 0$ (κ, ν φυσικοί)

3) $\int_{-\pi}^{\pi} \eta\mu^2\kappa x dx = \pi = \int_{-\pi}^{\pi} \sigma\upsilon\upsilon^2\kappa x dx$ (κ φυσικός)

2.3.2 Δείξτε ότι διά κάθε φυσικόν αριθμόν n ισχύουν :


1) $\int_0^{\pi/2} \eta\mu^{2n} x dx = \frac{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot (2n)} \cdot \frac{\pi}{2}$ 2) $\int_0^{\pi/2} \eta\mu^{2n+1} x dx = \frac{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot (2n)}{3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n+1)}$

2.3.3 Ύπολογίσατε τὰ ώρισμένα ολοκληρώματα :


1) $\int_0^{\pi/2} \sigma\upsilon\upsilon^{2n} x dx$ 2) $\int_0^{\pi/2} \sigma\upsilon\upsilon^{2n+1} x dx,$

όπου n είναι φυσικός αριθμός.


2.3.4 Νά υπολογισθῆ ἡ τιμὴ τοῦ έμβαδοῦ τοῦ χωρίου E τοῦ επιπέδου, το οποίο περιέχεται μεταξύ τῆς ἑλλείψεως με ἐξίσωσιν $\frac{x^2}{\alpha^2} + \frac{y^2}{\beta^2} = 1$, τοῦ κύκλου κέντρου O καὶ ἀκτί-νος r ($r \leq \alpha$ καὶ $r \leq \beta$) καὶ τῶν θετικῶν ἡμιαξόνων (βλ. σχ. 111).



Σχ. 111



Σχ. 112



Σχ. 113

2.3.5 Νά υπολογισθῆ ἡ τιμὴ τοῦ έμβαδοῦ τοῦ χωρίου E τοῦ επιπέδου, το οποίο περιέχεται μεταξύ τῶν διαγραμμάτων τῶν συναρτήσεων f καὶ g με $f(x) = \sqrt[3]{x}$ καὶ $g(x) = x^2$, $0 \leq x \leq 1$ (βλ. σχ. 112).

2.3.6 Νά υπολογισθῆ ἡ τιμὴ τοῦ έμβαδοῦ τοῦ χωρίου E τοῦ επιπέδου, το οποίο περιέχεται μεταξύ τοῦ διαγράμματος τῆς f με $f(x) = x^{3/2}$ καὶ τῶν εὐθειῶν με ἐξισώσεις $y = 1$, $x = 2$ (βλ. σχ. 113).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι

ΠΕΡΙ ΣΥΝΟΛΩΝ

	Σελίς	
1. 'Ορολογία — Συμβολισμοί	5	
1.1 Σύμβολα	5	»
1.2 'Ισότης	5	»
1.3 Σύνολα — Στοιχεία	5	»
1.4 Προτασιακός τύπος — Συνθήκη	6	»
1.5 'Αλγεβρα συνόλων	7	»
1.6 Ζευγος — Καρτεσιανόν γινόμενον	8	»
2. 'Αντιστοιχίαι — Συναρτήσεις	10	»
2.1 'Αντιστοιχία	10	»
2.2 Συνάρτησις	14	»
3. 'Ασκήσεις	17	»

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΙ

ΑΛΓΕΒΡΙΚΑΙ ΕΝΝΟΙΑΙ ΚΑΙ ΔΟΜΑΙ

	Σελίς	
1. Διμελείς σχέσεις εις σύνολον	19	
1.1 'Η έννοια τής σχέσεως	19	»
1.2 Βασικαί κατηγορίαι σχέσεως	20	»
2. 'Ισοδυναμιαί — Κλάσεις ισοδυναμίας	21	»
2.1 'Ισοδυναμία	21	»
2.2 Κλάσεις ισοδυναμίας — Σύνολον πηλίκον	22	»
3. Διάταξις εις σύνολον	23	
3.1 'Η έννοια τής διατάξεως	23	»
3.2 'Ολική, μερική διάταξις	24	»
4. Πράξεις εις σύνολον	24	»
4.1 'Εσωτερική πράξις	24	»
4.2 'Εξωτερική πράξις	28	»

5. Ίσομορφισμός	Σελίς	29
5.1 'Η έννοια του Ίσομορφισμού	»	29
5.2 Βασικά θεωρήματα επί των Ίσομορφισμών	»	31
6. Όμας	»	32
6.1 'Η έννοια τῆς ομάδος	»	32
6.2 Βασικά θεωρήματα επί των ομάδων	»	34
7* Δακτύλιος	»	36
7.1 'Η έννοια του δακτυλίου	»	36
7.2 Βασικά θεωρήματα επί των δακτυλίων	»	37
8*. Σώμα	»	37
8.1 'Η έννοια του σώματος	»	37
8.2 Βασικά θεωρήματα επί των σωμάτων	»	38
8.3 Διατεταγμένον σώμα	»	38
9*. Συμπληρωματικά Έννοιαι και εφαρμογαί	»	39
9.1 'Ο δακτύλιος των πραγματικῶν συναρτήσεων	»	39
9.2 'Ο δακτύλιος των πολυωνυμικῶν συναρτήσεων	»	42
9.3 Τὸ σῶμα των ρητῶν συναρτήσεων	»	42
9.4 Διανυσματικός χῶρος	»	45
10. Ἀσκήσεις	»	47

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΙΙ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

1. Μονότονοι συναρτήσεις	Σελίς	50
1.1 Αὔξουσαι καὶ φθίνουσαι συναρτήσεις	»	50
1.2 Τὸ μονότονον καὶ ἡ σύνθεσις συναρτήσεων	»	52
1.3 Τὸ μονότονον καὶ ἡ ἀντίστροφος συνάρτησις.	»	57
2. Ἀκρότατα συναρτήσεως	»	58
2.1 Μέγιστον καὶ ἐλάχιστον συναρτήσεως	»	58
2.2 Τοπικὰ ἀκρότατα συναρτήσεως	»	63
3. Μελέτη συναρτήσεως καὶ γεωμετρικὴ παράστασις αὐτῆς	»	64
3.1 (Γενικά)	»	64
3.2 'Η συνάρτησις f μὲ $f(x) = \gamma \sqrt{\alpha^2 - x^2}$, ὅπου α, γ πραγματικοὶ ἀριθμοὶ καὶ $\alpha > 0$	»	64
3.3 'Η συνάρτησις f μὲ $f(x) = \gamma \sqrt{x^2 - \alpha^2}$, ὅπου α, γ πραγματικοὶ ἀριθμοὶ καὶ $\alpha > 0$	»	68
4. Ἀσκήσεις	»	69

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IV

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΙ ΚΑΙ ΣΥΓΚΛΙΣΙΣ ΑΥΤΩΝ

1. Ἀκολουθία πραγματικῶν ἀριθμῶν	Σελίς	71
1.1 Ἡ ἔννοια τῆς ἀκολουθίας	»	71
1.2 Ἡ ἔννοια τῆς ὑπακολουθίας	»	74
1.3 Μηδενικαὶ ἀκολουθίαι	»	74
1.4 Συγκλίνουσαι ἀκολουθίαι	»	78
2. Τὰ σύμβολα $+\infty$ καὶ $-\infty$. Ἐπιτρέπεται καὶ μὴ πράξεις	»	83
2.1 Τὰ σύμβολα $+\infty$ καὶ $-\infty$	»	83
2.2* Ἐπιτρέπεται καὶ μὴ πράξεις μεταξύ τῶν συμβόλων $-\infty$, $+\infty$ καὶ τῶν πραγματικῶν ἀριθμῶν	»	86
2.3 Γενικὴ παρατήρησις	»	88
3. Ἀσκήσεις	»	89

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ V

ΣΥΓΚΛΙΣΙΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

1. Σύγκλισις συναρτήσεως διὰ $x \rightarrow +\infty$	Σελίς	90
1.1 (Γενικά)	»	90
1.2 Μηδενικαὶ συναρτήσεις διὰ $x \rightarrow +\infty$	»	90
1.3 Συγκλίνουσαι συναρτήσεις διὰ $x \rightarrow +\infty$	»	91
2. Σύγκλισις συναρτήσεως διὰ $x \rightarrow -\infty$	»	94
3. Σύγκλισις συναρτήσεως διὰ $x \rightarrow x_0$	»	96
3.1 Σύγκλισις συναρτήσεως διὰ $x \rightarrow x_0 + 0$	»	96
3.2 Σύγκλισις συναρτήσεως διὰ $x \rightarrow x_0 - 0$	»	97
3.3 Σύγκλισις συναρτήσεως διὰ $x \rightarrow x_0$	»	99
4*. Ἰδιότητες τῶν συγκλινουσῶν συναρτήσεων	»	102
5. Ἀσκήσεις	»	105

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VI

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

1. Ἡ ἔννοια τῆς συνεχοῦς συναρτήσεως	Σελίς	106
1.1 (Ὅρισμός)	»	106
1.2 Ἰδιότητες τῶν συνεχῶν συναρτήσεων	»	108
2. Αἱ τριγωνομετρικαὶ συναρτήσεις	»	110
2.1 Ἡ συνάρτησις ἡμίτονου εἶναι συνεχῆς	»	110
2.2 Ἡ συνάρτησις συνημίτονου εἶναι συνεχῆς	»	111
2.3 Ἡ συνάρτησις ἔφαπτομένη εἶναι συνεχῆς	»	112
2.4 Ἡ συνάρτησις συνεφαπτομένη εἶναι συνεχῆς	»	113
3. Ἡ ἐκθετικὴ καὶ ἡ λογαριθμικὴ συνάρτησις	»	114
3.1 Ἡ ἐκθετικὴ συνάρτησις	»	114

3.2	Ἡ λογαριθμική συνάρτησις	Σελίς	120
3.3	Ἀξιοσημείωτοι ἰδιότητες	»	122
4.	Ἀσκήσεις	»	128

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VII

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΣ

1.	Ἡ ἔννοια τῆς παραγώγου συναρτήσεως	Σελίς	130
1.1	(Ὅρισμός)	»	130
1.2	Γεωμετρική σημασία τῆς παραγώγου	»	132
1.3	Κινηματική σημασία τῆς παραγώγου	»	132
1.4*	Διαφορικὸν συναρτήσεως	»	133
1.5	Ἰδιότητες τῶν παραγῶγων	»	134
1.6	Αἱ παράγωγοι στοιχειωδῶν τινῶν συναρτήσεων	»	136
1.7	Παραγωγίσις συνθέτου συναρτήσεως	»	138
2.	Ὁ ρόλος τῆς παραγώγου εἰς τὴν μελέτην συναρτήσεως	»	141
2.1	(Βασικὰ θεωρήματα)	»	141
2.2	Κυρταὶ καὶ κοίλαι συναρτήσεις	»	145
2.3	Ἀσύμπτωτοι	»	148
2.4	Ἐφαρμογαὶ εἰς τὴν μελέτην συναρτήσεως	»	149
3.	Ὁ ρόλος τῆς παραγώγου εἰς τὸν ὑπολογισμὸν ὀριακῶν τινῶν τιμῶν — Ἄπροσδιόριστοι μορφαί	»	152
3.1	Ἄπροσδιόριστοι μορφαί τοῦ τύπου $\frac{0}{0}$	»	152
3.2	Ἄπροσδιόριστοι μορφαί τοῦ τύπου $\frac{+\infty}{+\infty}$	»	155
3.3*	Ἄπροσδιόριστοι μορφαί τῶν τύπων $+\infty - (+\infty)$ καὶ $0(+\infty)$	»	156
3.4*	Ἄπροσδιόριστοι μορφαί τῶν τύπων 0^0 , $(+\infty)^0$ καὶ $1^{+\infty}$	»	157
4.	Ἀσκήσεις	»	158

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VIII

ΠΕΡΙ ὈΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΟΣ

1.	Ἄοριστον ὀλοκλήρωμα	Σελίς	161
1.1	Παράγουσα καὶ ἀόριστον ὀλοκλήρωμα	»	161
1.2	Γενικοὶ τύποι ὀλοκλήρωσεως	»	162
1.3	Ἀσκήσεις	»	166
2.	Ὁρισμένον ὀλοκλήρωμα	»	167
2.1	Ὅρισμός καὶ ἰδιότητες	»	167
2.2	Τὸ ὀρισμένον ὀλοκλήρωμα ὡς ἔμβαδόν	»	170
2.3	Ἀσκήσεις	»	174

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ

Σελίς 57 τελευταίος στίχος:

$$\text{Ἀντί: } -1 = \sqrt[3]{x}$$

$$\text{Γράφει: } y = \sqrt[3]{x}$$

Π Α Ρ Ο Χ Α Μ Α Τ Α

Π Α Ρ Ο Χ Α Μ Α Τ Α

Σελ. 27

Αντί: \sqrt{x}

1.1	131
1.2	132
1.3	133
1.4	134
1.5	135
1.6	136
1.7	137
2.0	138
2.1	139
2.2	140
2.3	141
2.4	142
3.0	143
3.1	144
3.2	145
3.3	146
3.4	147
4.0	148
4.1	149
4.2	150
4.3	151
4.4	152
4.5	153
4.6	154
4.7	155
4.8	156
4.9	157
4.10	158
4.11	159
4.12	160
4.13	161
4.14	162
4.15	163
4.16	164
4.17	165
4.18	166
4.19	167
4.20	168
4.21	169
4.22	170
4.23	171
4.24	172
4.25	173
4.26	174
4.27	175
4.28	176
4.29	177
4.30	178
4.31	179
4.32	180
4.33	181
4.34	182
4.35	183
4.36	184
4.37	185
4.38	186
4.39	187
4.40	188
4.41	189
4.42	190
4.43	191
4.44	192
4.45	193
4.46	194
4.47	195
4.48	196
4.49	197
4.50	198
4.51	199
4.52	200
4.53	201
4.54	202
4.55	203
4.56	204
4.57	205
4.58	206
4.59	207
4.60	208
4.61	209
4.62	210
4.63	211
4.64	212
4.65	213
4.66	214
4.67	215
4.68	216
4.69	217
4.70	218
4.71	219
4.72	220
4.73	221
4.74	222
4.75	223
4.76	224
4.77	225
4.78	226
4.79	227
4.80	228
4.81	229
4.82	230
4.83	231
4.84	232
4.85	233
4.86	234
4.87	235
4.88	236
4.89	237
4.90	238
4.91	239
4.92	240
4.93	241
4.94	242
4.95	243
4.96	244
4.97	245
4.98	246
4.99	247



ΕΚΔΟΣΙΣ Ζ', 1976 (V) — ΑΝΤΙΤ. 29.000 — ΣΥΜΒΑΣΙΣ : 2653/30-3-76
ΕΚΤΥΠΩΣΙΣ - ΒΙΒΛΙΟΔ.: «ΑΤΛΑΝΤΙΣ - Μ. ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ» Α.Ε.

