

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

# ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

## Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΓΕΒΡΑ - ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

Γ. ΓΡΑΦΑΚΟΥ - Κ. ΔΙΑΚΑΚΗ - Σ. ΜΑΝΤΖΑΡΑ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ  
ΑΘΗΝΑΙ 1974



A0692

## ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

## ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Επειδή τα μαθηματικά είναι η βασική γνώση που χρειάζεται για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας, η Ελληνική Κυβέρνηση έχει αναγνωρίσει τη σημασία της και έχει διατάξει την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας να γίνει μία από τις πιο σημαντικές στον κόσμο.

Τα μαθηματικά είναι η βασική γνώση που χρειάζεται για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας. Τα μαθηματικά είναι η βασική γνώση που χρειάζεται για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας. Τα μαθηματικά είναι η βασική γνώση που χρειάζεται για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας.

Τα μαθηματικά είναι η βασική γνώση που χρειάζεται για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας. Τα μαθηματικά είναι η βασική γνώση που χρειάζεται για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας.

Τα μαθηματικά είναι η βασική γνώση που χρειάζεται για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας. Τα μαθηματικά είναι η βασική γνώση που χρειάζεται για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας.

Τα μαθηματικά είναι η βασική γνώση που χρειάζεται για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας. Τα μαθηματικά είναι η βασική γνώση που χρειάζεται για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας.

Τα μαθηματικά είναι η βασική γνώση που χρειάζεται για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας. Τα μαθηματικά είναι η βασική γνώση που χρειάζεται για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας.

## ΔΩΡΕΑΝ

Τα μαθηματικά είναι η βασική γνώση που χρειάζεται για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας.

Τα μαθηματικά είναι η βασική γνώση που χρειάζεται για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας. Τα μαθηματικά είναι η βασική γνώση που χρειάζεται για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας.

Τα μαθηματικά είναι η βασική γνώση που χρειάζεται για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΒΟΥΡΑΝ

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι

### ΠΕΡΙ ΣΥΝΟΛΩΝ

#### 1. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ

(Ἐπαναλήψεις καὶ συμπληρώσεις)

§ 1. Φέρατε εἰς τὸν νοῦν σας τὰ πρόσωπα τῆς οἰκογενείας σας, καὶ θεωρήσατε τὰ ώς ἐν δόλῳ (μίαν ὁμάδα, μίαν συλλογὴν προσώπων). Τί παρατηρεῖτε;

Παρατηροῦμεν ὅτι μὲν ἀντικείμενα τὰ ὅποια γνωρίζομεν καλῶς (τὰ πρόσωπα τῆς οἰκογενείας μας) καὶ μεταξὺ τῶν ὅποιών δὲν κάμνομεν σύγχυσιν, ἐσχηματίσαμεν διὰ τῆς σκέψεως μας ἐν νέον ἀντικείμενον.

Τὸ ἀντικείμενον αὐτὸν ὀνομάζομεν **σύνολον**. Τὸ σύνολον τῶν προσώπων τῆς οἰκογενείας μας. Δυνάμεθα νὰ θεωρήσωμεν ἀντικείμενα α, β, γ, δ καλῶς ὡρισμένα (τὰ ὅποια γνωρίζομεν καλῶς) καὶ διακεκριμένα (τὰ ὅποια δὲν συγχέομεν) ὡς ἐν ἀντικείμενον. Τὸ σύνολον τῶν α, β, γ, δ.

Σύνολον εἶναι τὸ ἀντικείμενον τὸ ὅποιον σχηματίζομεν (διὰ τῆς σκέψεως ἢ τῆς φραντασίας μας) ἐὰν θεωρήσωμεν καλῶς ὡρισμένα καὶ διακεκριμένα ἀντικείμενα, ὡς ἐν ἀντικείμενον.

Τὰ ἀντικείμενα αὐτά λέγονται, **στοιχεῖα τοῦ συνόλου**, καὶ συμβολίζονται μὲν γράμματα πεζά τοῦ ἑλληνικοῦ ἀλφαριθμοῦ: α, β, γ, δ, ... Τὸ σύνολον τῶν ἀντικειμένων α, β, γ, δ, συμβολίζεται διὰ κεφαλαίου γράμματος: Α ἢ Β ἢ....

Λέγομεν ὅτι, τὰ **στοιχεῖα** ἐνὸς συνόλου **A** ἀνήκουν εἰς αὐτό, καὶ συμβολίζομεν α ∈ A. β ∈ A κ.ο.κ. ἢ ὅτι ἐξ τοῦ συνόλου **A** λαμβάνονται τὰ **στοιχεῖα τοῦ**. Συμβολικῶς Α ∈ α ἢ A ∈ β (ἐξ τοῦ Α λαμβάνεται τὸ α κ.λ.π.). Ἐὰν τὸ ἀντικείμενον α δὲν ἀνήκει εἰς τὸ σύνολον Α, γράφομεν α ∉ A.

§ 2. Σύνολον καθορίζεται διὰ δηλώσεως τῶν στοιχείων του καὶ ἀναγραφῆς αὐτῶν μεταξύ δύο ἀγκίστρων π. χ. τὸ σύνολον τῶν α, β, γ, δ, γράφεται {α, β, γ, δ}. Αὐτὸν τὸν τρόπον παραστάσεως λέγομεν καθορισμὸν τοῦ συνόλου δι' ἀναγραφῆς τῶν στοιχείων του.

Παράδειγμα. Νὰ δρισθῇ τὸ σύνολον τῶν φυσικῶν ἀριθμῶν 5, 6, 7, 8, 9.

Τὸ σύνολον αὐτὸν δριζεται ὡς ἔξης: {5, 6, 7, 8, 9}.

Δυνάμεθα ὅμως νὰ δρίσωμεν τὸ σύνολον αὐτὸν ὡς τὸ σύνολον τῶν φυσικῶν ἀριθμῶν, οἱ ὅποιοι εἶναι μεγαλύτεροι τοῦ 4 καὶ μικρότεροι τοῦ 10 καὶ νὰ γράψωμεν {χ/χ φυσικὸς ἀριθμὸς καὶ  $4 < \chi < 10$ }. Τὸν τρόπον αὐτὸν λέγομεν καθορισμὸν τοῦ συόλου διὰ περιγραφῆς.

Σύνολον καθορίζεται διὰ περιγραφῆς, ἐὰν περιγράψωμεν μίαν χαρακτη-

ριστικήν ίδιότητα τῶν στοιχείων του. Δηλαδή μίαν ίδιότητα, τὴν ὅποιαν ἔχουν ὅλα τὰ στοιχεῖα του καὶ μόνον αὐτά.

Μίαν ίδιότητα συμβολίζουμεν διὰ τοῦ  $p(\ )$  τοῦ  $q(\ )$ . Π.χ.  $q(\ )$  σημαίνει: «φυσικὸς ἀριθμὸς μεγαλύτερος τοῦ 10». Διὰ τοὺς 11, 13, 17 οἱ ὅποιοι ἔχουν αὐτὴν τὴν ίδιότητα γράφομεν 11:q(11)\*, 13:q(13), 17:q(17). Διὰ τοὺς 6, 3, 2, οἱ ὅποιοι δὲν ἔχουν τὴν ίδιότητα αὐτὴν γράφομεν ὅχι 6:q(6), ὅχι 3:q(3), ὅχι 2:q(2). Δι’ ἓν ἀντικείμενον χ, τὸ ὅποιον ἔχει τὴν ίδιότητα  $q(\ )$ , γράφομεν  $\chi:q(\chi)$ . Δηλαδὴ τὸ χ ἔχει τὴν ίδιότητα  $q(\ )$ . Δι’ ἓν ἀντικείμενον ψ, τὸ ὅποιον δὲν ἔχει τὴν ίδιότητα αὐτὴν γράφομεν ὅχι  $\psi:q(\psi)$  καὶ διαβάζομεν: τὸ ψ δὲν ἔχει τὴν ίδιότητα  $q(\ )$ .

**§ 3. Ὁρομάσατε Α τὸ σύνολον {3,4,5,6} καὶ Β τὸ {χ/χ φυσικὸς μεγαλύτερος τοῦ 2 καὶ μικρότερος τοῦ 7}. Τὶ παρατηρεῖτε;**

Παρατηροῦμεν ὅτι κάθε στοιχείον τοῦ Α ἀνήκει εἰς τὸ Β καὶ κάθε στοιχεῖον τοῦ Β ἀνήκει εἰς τὸ Α. Λέγομεν τώρα ὅτι τὰ σύνολα Α καὶ Β εἶναι ἵσα καὶ συμβολίζουμεν  $A=B$  ἡ ὅτι πρόκειται περὶ τοῦ αὐτοῦ συνόλου:  $A\equiv B$ . Τὰ αὐτὰ παρατηροῦμεν καὶ εἰς τὰ σύνολα Α καὶ  $\Gamma=\{5, 3, 6, 4\}$ . Ἐπομένως ἡ τάξις (ἢ σειρὰ) μὲν τὴν ὅποιαν ἀναγράφονται τὰ στοιχεῖα ἐνὸς συνόλου, οὐδεμίαν σημασίαν ἔχει διὰ τὸν καθορισμὸν αὐτοῦ.

Δύο σύνολα εἶναι ἵσα, ὅταν κάθε στοιχείον τοῦ ἐνὸς ἔξι αὐτῶν ἀνήκει εἰς τὸ ἄλλο καὶ ἀντιστρόφως. Εὐκόλως διαπιστοῦμεν ἐκ τῶν ἀνωτέρω παραδειγμάτων, ὅτι:  $A=A$ ,  $A=B \Rightarrow B=A$  καὶ  $A=B$  καὶ  $B=\Gamma \Rightarrow A=\Gamma$ .

Ἡ ισότης τῶν συνόλων εἶναι ἀνακλαστική, συμμετρική καὶ μεταβατική.

**§ 4. Ἐὰν προσέξωμεν μόνον τὴν ίδιότητα: κάθε στοιχείον τοῦ Α ἀνήκει εἰς τὸ Β, θὰ λέγωμεν ὅτι τὸ  $A$  εἶναι ὑποσύνολον τοῦ  $B$  ἡ ὅτι ἐγκλείεται (ἢ περιέχεται) εἰς τὸ Β καὶ θὰ γράψωμεν:  $A \subseteq B$ . (εἰς τὸ ἀνωτέρω παράδειγμα, § 3, εἶναι καὶ  $B \subseteq A$ ). Ἐπομένως  $A \subseteq B$  καὶ  $B \subseteq A \Rightarrow A=B$ .**

Τὴν σχέσιν  $A \subseteq B$  δυνάμεθα νὰ γράψωμεν  $B \supseteq A$ . Τότε θὰ λέγωμεν: **Τὸ Β εἶναι ὑπερσύνολον τοῦ Α.**

Εἰς τὰ σύνολα Α καὶ  $\Delta=\{\chi/\chi \text{ φυσικὸς ἀριθμὸς μεγαλύτερος τοῦ } 2\}$  παρατηροῦμεν ὅτι  $A \subseteq \Delta$  ἀλλ’ ὅτι  $\Delta \not\subseteq A$  (διότι τὰ στοιχεῖα 7, 8, 9... τοῦ  $\Delta$  δὲν ἀνήκουν εἰς τὸ Α). Εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν λέγομεν ὅτι: **Τὸ Α εἶναι γνήσιον ὑποσύνολον τοῦ  $\Delta$  καὶ συμβολίζομεν:  $A \subset \Delta$ . Τὸ  $\Delta$  λέγεται γνήσιον ὑπερσύνολον τοῦ Α.** συμβολικῶς  $\Delta \supset A$ .

Ἐάν δρίσωμεν διὰ περιγραφῆς τὸ σύνολον {χ/χ φυσικὸς μεγαλύτερος τοῦ 2 καὶ μικρότερος τοῦ 3}, θὰ παρατηρήσωμεν ὅτι οὐδὲν στοιχείον ἔχει. Καθορίζεται λοιπὸν σύνολον, τὸ ὅποιον στερεῖται στοιχείων. Τὸ σύνολον αὐτὸν

\* Τὸ σύμβολον 11: q(11) διαβάζεται: 11 ἔχει τὴν ίδιότητα...

λέγεται κενὸν σύνολον καὶ συμβολίζεται διὰ τοῦ Ø. Τὸ Ø εἶναι ύποσύνολον κάθε συνόλου. Ø ⊆ A διὰ κάθε σύνολον A.

Δειχόμεθα ὅτι, ὅλα τὰ ἀντικείμενα τὰ ὅποια δύνανται νὰ εἶναι στοιχεῖα τῶν θεωρουμένων συνόλων ἀνήκουν εἰς ἓν σύνολον U. Τὸ U λέγεται βασικὸν (ἢ γενικὸν) σύνολον ἢ σύνολον ἀναφορᾶς τῶν θεωρουμένων συνόλων. Κάθε σύνολον A εἶναι ύποσύνολον τοῦ U. A ⊆ U διὰ κάθε σύνολον A.


'Η σχέσις τοῦ ἐγκλεισμοῦ ⊆ ἔχει τὰς ἔξης ιδιότητας:

A ⊆ A ἀνακλαστικὴν (διότι κάθε στοιχείου συνόλου ἀνήκει εἰς τὸ σύνολον)  
A ⊆ B καὶ B ⊆ A  $\Rightarrow$  A = B ἀντισυμμετρικὴν (§ 4).

A ⊆ B καὶ B ⊆ Γ  $\Rightarrow$  A ⊆ Γ μεταβαστικὴν (διότι ἔὰν κάθε στοιχείου τοῦ A ἀνήκει εἰς τὸ B καὶ κάθε στοιχείου τοῦ B ἀνήκει εἰς τὸ Γ, τότε κάθε στοιχείου τοῦ A ἀνήκει εἰς τὸ Γ). Ἐπαληθεύσατε το εἰς τὰ ἀνωτέρω παραδείγματα.

Διὰ νὰ κάμωμεν αἰσθητὴν τὴν ἔννοιαν τοῦ συνόλου A τῶν στοιχείων α, β, γ, ..., παριστῶμεν ταῦτα διὰ σημείων καὶ τὸ σύνολον {α, β, γ, ...} διὰ κλειστῆς γραμμῆς ἢ ὅποια περιβάλλει τὰ σημεῖα αὐτά. Σχημ. (1)

Τὸ ύποσύνολον B = {α, β, γ} τοῦ A, παριστῶμεν εἰς τὸ ἐσωτερικὸν τοῦ A. Σχημ. (2). Τὸ βασικὸν σύνολον U παριστῶμεν ως ἓν δρθιγώνιον εἰς τὸ ἐξωτερικὸν τοῦ ὅποιου παρίστανται ὅλα τὰ θεωρούμενα σύνολα. Σχημ. (3).



Αἱ παραστάσεις αὐταὶ λέγονται βέννια διαγράμματα πρὸς τιμὴν τοῦ "Ἀγγλου φιλοσόφου καὶ μαθηματικοῦ J. Venn, (1834 - 1923), ὁ ὅποιος τὰς ἔχρησιμοποίησε πρῶτος.

### Ἄσχή σεις

- Nὰ εὑρητε τὰ ύποσύνολα τῶν συνόλων {α}, {1, 2}, {α, β, γ}, {3, 12, 6, 7}.
- Nὰ εὑρητε τὰ ύποσύνολα τοῦ συνόλου  $\left\{ x \mid x \text{ ἀδέρασις μεγαλύτερος τοῦ } \frac{7}{5} \text{ καὶ μικρότερος τοῦ } \frac{10}{3} \right\}$ .

3. Νά δρίστε δι' ἀναγραφῆς τὸ σύνολον  $\{x/x \text{ διαγώνιος τοῦ πενταγώνου } \text{ΑΒΓΔΕ}\}$ .

4. Νά δρίστε δι' ἀναγραφῆς τὸ σύνολον  $\{x/x \text{ ὑπόλοιπον τῆς διαιρέσεως κ:5, δημο} \text{ἀκέραιος}\}$  καὶ διὰ περιγραφῆς τὸ  $(\text{ΑΓ}, \text{ΒΔ})$ .

5. Συγκρίνατε τὰ σύνολα  $A = \{0, 1, 2\}$  καὶ  $B = \{x/x \text{ ὑπόλοιπον διαιρέσεως φυσικοῦ} \text{ἀριθμοῦ διὰ τοῦ 3}\}$ .

6. Συγκρίνατε τὰ σύνολα  $A = \{x/x \text{ παραλληλόγραμμον}\}$ ,  $B = \{x/x \text{ δρθιγώνιον}\}$  καὶ  $G = \{x/x \text{ τετράγωνον}\}$  καὶ κάμετε τὰ διαγράμματά των.

## 2. Η ENNOIA TΗΣ ANTIESTOIXIAS

**Μονοσήμαντος καὶ ἀμφιμονοσήμαντος ἀντιστοιχία.**

**'Ισοδύναμα σύνολα.**

§ 5. *Εἰς μίαν συλλογὴν (ἐν σύνολον) A γραμματοσήμων ἀνήκουν τὰ γραμματόσημα  $a, \beta, \gamma, \delta, \varepsilon$ . Τὰ  $a, \gamma$  καὶ  $\delta$  τιμῶνται 1 δραχμῇ. Τὰ  $\beta$  καὶ  $\varepsilon$  2 δρχ.*


*Τὰ a καὶ δ ἔξεδόθησαν τὸ 1932, τὰ  $\beta, \gamma$  καὶ ε τὸ 1936. Θεωρήσατε τὰ σύνολα  $A = \{a, \beta, \gamma, \delta, \varepsilon\}$  καὶ  $B = \{1, 2, 1932, 1936\}$ . Σκεφθῆτε τώρα ἐν στοιχείον τοῦ A καὶ διπλα εἰς αὐτὸ ἐν στοιχείον τοῦ B. Τί παρατηρεῖτε;*

Παρατηροῦμεν ὅτι εἰς τὸ α παραθέτομεν τὸν 1 ἢ τὸ 1932 (τὴν τιμὴν ἢ τὴν χρονολογίαν ἑκδόσεως), συμβολικῶς ( $\alpha, 1$ ) ἢ ( $\alpha, 1932$ ). Εἰς τὸ β παραθέτομεν ἢ ἀντιστοιχοῦμεν τὸν 2 ἢ τὸ 1936. Συμβολικῶς: ( $\beta, 2$ ) ἢ ( $\beta, 1936$ ) κ.λ.π.

Λέγομεν τώρα ὅτι μεταξὺ τῶν συνόλων A καὶ B ὑπάρχει μία ἀντιστοιχία (ἐπειδὴ εἰς στοιχεῖα τοῦ A παρεθέσαμεν ἢ ἀντιστοιχίσαμεν στοιχεῖα τοῦ B).

'Αντιστοιχία μεταξὺ δύο συνόλων, εἶναι ἢ ἀντιστοιχίσις (ἢ παράθεσις) εἰς στοιχεῖα τοῦ πρώτου συνόλου στοιχείων τοῦ δευτέρου.

Τὴν ἀντιστοιχίαν μεταξὺ τῶν συνόλων A καὶ B δυνάμεθα νὰ παραστήσωμεν ὡς μίαν κίνησιν μὲ ἀναχώρησιν ἐκ στοιχείων τοῦ A καὶ ἀφιξιν εἰς στοιχεῖα τοῦ B. Τοῦτο γίνεται μὲ τὴν βοήθειαν τῶν βεννίων διαγραμμάτων καὶ γραμμῶν κατευθύνσεως εἰς τὸ σχῆμα 4.



Διὰ τοῦτο τὸ Α λέγεται σύνολον ἀφετηρίας καὶ τὸ Β σύνολον ἀφίξεως.

Τὸ σχῆμα 4 ὁ νομάζομεν διάγραμμα (ἢ γράφημα) τῆς ἀντιστοιχίας (eis γραμματόσημον ἀντιστοιχεῖ ἡ τιμὴ του καὶ ἡ χρονολογία ἐκδόσεως αὐτοῦ).

**Σημείωσις.** Άι παραστάσεις (α, 1), (α, 1932), (β, 2) κ.λ.π., τάς δποίας ἔχρησιμοποιήσαμεν διὰ νὰ συμβολίσωμεν τὴν ἀντιστοιχίαν, λέγονται διατεταγμένα ζεύγη. Δυνάμεθα νὰ παραστήσωμεν (ἢ δρίσωμεν) μίαν ἀντιστοιχίαν ὡς σύνολον διατεταγμένων ζευγῶν.


§ 6. Ἐὰν μεταξὺ τοῦ συνόλου Α τῶν γραμματόσημων καὶ τοῦ συνόλου τῶν τιμῶν  $\Gamma = \{1, 2\}$  μελετήσωμεν τὴν ἀντιστοιχίαν: εἰς γραμματόσημον ἀντιστοιχεῖ ἡ τιμὴ του, θὰ παρατηρήσωμεν ὅτι εἰς κάθε στοιχεῖον τοῦ συνόλου Α ἀντιστοιχεῖ ἐν μόνον στοιχείον τοῦ συνόλου  $\Gamma$ . Ἡ ἀντιστοιχία αὐτὴ λέγεται μονοσήμαντος ἀντιστοιχία. Τὰ πρῶτα μέλη τῶν διατεταγμένων ζευγῶν (α, 1), (γ, 1), (δ, 1), (β, 2), (ε, 2) εἶναι τώρα διάφορα μεταξύ των.

Μονοσήμαντον ἀντιστοιχίαν μεταξὺ δύο συνόλων ἔχομεν, ὅταν εἰς κάθε στοιχεῖον τοῦ πρώτου συνόλου ἀντιστοιχῇ ἐν μόνον στοιχείον τοῦ δευτέρου.

Τὸ διάγραμμα τῆς μονοσήμαντου ἀντιστοιχίας μεταξὺ τῶν συνόλων Α καὶ  $\Gamma$  ἔχομεν εἰς τὸ σχῆμα 5.

**Παρατήρησις.** Τὸ σύνολον τῶν διατεταγμένων ζευγῶν, τὸ δποίον πα-A ριστᾶ μίαν μονοσήμαντον ἀντιστοιχίαν λέγεται — ὡς θὰ μάθωμεν ἀργότερον — συνάρτησις. Τὸ Α καὶ  $\Gamma$  θὰ λέγωνται τότε πεδίον δρισμοῦ καὶ πεδίον τιμῶν τῆς συναρτήσεως (ἀντιστοιχίως).

**Σημείωσις.** Εἰς ἀνωτέραν τάξιν θὰ μάθωμεν, ὅτι μία μονοσήμαντος ἀντιστοιχία μεταξὺ τῶν συνόλων Α καὶ Β λέγεται καὶ ἀπεικόνισις τοῦ Α eis τὸ Β. Τὸ Α eis τὴν περίπτωσιν αὐτὴν θὰ δονομάζεται σύνολον ἀρχετύπων καὶ τὸ Β σύνολον εἰκόνων.




σχ. 5.

§ 7. Μεταξὺ τοῦ συνόλου ἀριθμῶν  $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$  καὶ τοῦ συνόλου τῶν διπλασίων των  $B = \{2, 4, 6, 8, 10\}$ , ὑπάρχει μία μονοσήμαντος ἀντιστοιχία. Ἡ: εἰς κάθε ἀριθμὸν τοῦ Α, ἀντιστοιχεῖ ὁ διπλάσιος του εἰς τὸ Β. Ἀλλὰ καὶ μεταξὺ τῶν συνόλων Β καὶ Α ὑπάρχει μία μονοσήμαντος ἀντιστοιχία. Ἡ ἀντιστροφής τῆς προηγουμένης: εἰς κάθε στοιχεῖον (ἀριθμὸν) τοῦ Β ἀντιστοιχεῖ τὸ  $\frac{1}{2}$  αὐτοῦ εἰς τὸ Α. Ἡ ἀντιστοιχία αὐτὴ λέγεται ἀμφιμονοσήμαντος ἀντιστοιχία.

Αμφιμονοσήμαντον ἀντιστοιχίαν μεταξὺ δύο συνόλων (ἢ ἀπεικόνισιν ἔνα πρὸς ἔνα) ἔχομεν ὅταν εἰς κάθε στοιχεῖον τοῦ πρώτου συνόλου ἀντι-

στοιχεῖ ἐν μόνον στοιχείον τοῦ δευτέρου καὶ εἰς κάθε στοιχείον τοῦ δευτέρου συνόλου ἐν μόνον στοιχείον τοῦ πρώτου (ἐκεῖνο τοῦ δποίου αύτὸν ἡτο ἀντιστοιχον) ἢ δταν μεταξὺ τοῦ πρώτου καὶ τοῦ δευτέρου υπάρχῃ μία μονοσήμαντος ἀντιστοιχία καὶ μεταξὺ τοῦ δευτέρου καὶ τοῦ πρώτου υπάρχῃ ἡ ἀντιστροφος αύτῆς.



Τὸ διάγραμμα τῆς ἀμφιμονοσημάντου ἀντιστοιχίας μεταξὺ τῶν συνόλων A καὶ B ἔχομεν εἰς τὸ σχῆμα 6. Τοῦτο δυνάμεθα νὰ παραστήσωμεν καὶ ὡς ἔξῆς:

1	2	3	4	5
2	4	6	8	10

Παρατηροῦμεν ὅτι δυνάμεθα κάτωθεν ἑκάστου στοιχείου τοῦ πρώτου συνόλου, νὰ γράψωμεν ἐν στοιχείον τοῦ δευτέρου, χωρὶς νὰ ἐπαναλάβωμεν καὶ χωρὶς νὰ παραλείψωμεν κανέν. Δηλαδὴ τὰ σύνολα A καὶ B ἔχουν τὸ αὐτὸ πλήθος στοιχείων. Διὰ τοῦτο λέγομεν ὅτι τὰ ἰσοδύναμα σύνολα ἔχουν τὸν αὐτὸν πληθικὸν ἀριθμόν.

§ 8. Τὰ σύνολα A καὶ B μεταξὺ τῶν δποίων εἶναι δυνατή μία ἀμφιμονοσημάντος ἀντιστοιχία λέγονται ἰσοδύναμα σύνολα. Τότε ὅμως, ὡς εἴδομεν, δυνάμεθα κάτωθεν ἑκάστου στοιχείου τοῦ A νὰ γράψωμεν ἐν στοιχείον τοῦ B, χωρὶς νὰ ἐπαναλάβωμεν καὶ χωρὶς νὰ παραλείψωμεν κανέν. Δηλαδὴ τὰ σύνολα A καὶ B ἔχουν τὸ αὐτὸ πλήθος στοιχείων. Διὰ τοῦτο λέγομεν ὅτι τὰ ἰσοδύναμα σύνολα ἔχουν τὸν αὐτὸν πληθικὸν ἀριθμόν.

Συμβολίζομεν τὴν σχέσιν «τὸ A εἶναι ἰσοδύναμον τοῦ B» διὰ τοῦ A~B.

Τὸν ἀριθμόν, δὲ δποίος ἐκφράζει τὸ πλήθος τῶν στοιχείων τοῦ συνόλου A συμβολίζομεν διὰ  $v(A)$ . "Ωστε  $A \sim B \Leftrightarrow v(A) = v(B)$ ". Τοῦτο διαπιστοῦμεν καὶ δι' ἀπαριθμήσεως τῶν στοιχείων τῶν A καὶ B.

Μεταξὺ συνόλου A καὶ τοῦ ἑαυτοῦ του εἶναι δυνατὸν νὰ ἔχωμεν μίαν ἀμφιμονοσήμαντον ἀντιστοιχίαν τὴν 1 2 3 4 5

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

"Ἐάν μεταξὺ τῶν A καὶ B εἶναι δυνατή ἡ ἀμφιμ. ἀντιστοιχία 1 2 3 4 5  
τότε εἶναι δυνατή καὶ ἡ 2 4 6 8 10 μεταξὺ τῶν B καὶ A.

Θεωροῦμεν τώρα καὶ τὸ σύνολον Γ τῶν τριπλασίων τῶν στοιχείων τοῦ συνόλου A:  $\Gamma = \{3, 6, 9, 12, 15\}$ . Παρατηροῦμεν ὅτι μεταξὺ τῶν A καὶ B, A καὶ Γ ἔχομεν τὰς ἀμφιμ. ἀντιστοιχίας: 1 2 3 4 5

2	4	6	8	10
---	---	---	---	----

3 6 9 12 15. Τότε ὅμως ἔχομεν καὶ τὴν

2 4 6 8 10 μεταξὺ τῶν Β καὶ Γ.  
3 6 9 12 15

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω συμπεραίνομεν, ὅτι ἡ ἴσοδυναμία τῶν συνόλων ἔχει τὰς γνωστὰς ιδιότητας τῆς ἴσοτητος.

$A \sim A$ ,  $A \sim B \Rightarrow B \sim A$  και  $A \sim B$  και  $B \sim C \Rightarrow A \sim C$   
 άνακλαστικήν, συμμετρικήν, και μεταβατικήν.

Τὰς αὐτὰς ἐπιμένως ιδιότητας ἔχει καὶ η ἴσοτης τῶν πληθικῶν ἀριθμῶν.

### **3. ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΣΥΝΟΛΑ — ΑΠΕΙΡΟΣΥΝΟΛΑ**

§ 9. Έάν θεωρήσωμεν τό σύνολον  $A = \{\alpha, \beta, \gamma, \delta, \epsilon\}$ , θά παρατηρήσωμεν, ότι τό πλήθος τών στοιχείων του έκφραζεται ύπο τοῦ φυσικοῦ ἀριθμοῦ 5. Συνεπῶς  $n(A) \in N$ .

Τὰ σύνολα τῶν δποίων οἱ πληθικοὶ ἀριθμοὶ εἶναι φυσικοὶ ἀριθμοί, λέγονται πεπερασμένα σύνολα.

Λάβετε τώρα ἐν γνήσιον ὑποσύνολον τοῦ Α καὶ ἔξετάσατε ἐὰν μεταξὺ αὐτοῦ καὶ τοῦ Α δυνάμεθα νὰ ἔχωμεν μίαν ἀμφιμονοσήμαντον ἀντιστοιχίαν. Τί παρατηρεῖτε;

Λαμβάνομεν τὸ  $B = \{\alpha, \gamma, \delta\}$  καὶ παρατηροῦμεν, ὅτι τοῦτο δὲν εἶναι δυνατόν:  $\begin{matrix} \sim & \beta & \gamma & \delta & \epsilon \\ \alpha & & \gamma & \delta & \end{matrix} \quad \begin{matrix} \eta & \alpha & \beta & \gamma & \delta & \epsilon \\ & \alpha & \beta & \delta & \end{matrix}$ .

Τὸ αὐτὸ θὰ παρατηρήσωμεν ἔὰν λάβωμεν ὃποιοδήποτε γνήσιον ὑπό-  
σύνολον τοῦ A. Λέγομεν λοιπὸν ὅτι πεπερασμένον εἶναι ἐν σύνολον, ὅταν  
τοῦτο δὲν ἔη γνήσιον ὑποσύνολον Ισοδύναμον πρὸς αὐτό.

§ 10. Ας λάβωμεν τώρα τὸ σύνολον  $N$  τῶν φυσικῶν ἀριθμῶν:  $N = \{1, 2, 3, 4, 5, \dots\}$  καὶ τὸ σύνολον  $N_\alpha$  τῶν ἀρτίων:  $N_\alpha = \{2, 4, 6, 8, 10, \dots\}$ .

Παρατηροῦμεν ὅτι τὸ  $N_\alpha$  εἶναι γνήσιον ύποσύνολον τοῦ  $N$ ,  $N_\alpha \subset N$  καὶ ὅτι κάτωθεν ἐκάστου στοιχείου τοῦ  $N$  δυνάμεθα νὰ γράψωμεν ἐν στοιχείον τοῦ  $N_\alpha$  χωρὶς νὰ ἐπαναλέγωμεν ή νὰ παραλείψωμεν κανένα.

1 2 3 4 5 6 7 8..... 1000.....  
2 4 6 8 10 12 14 16..... 2000.....

Τὸ σύνολον  $N$  τῶν φυσικῶν ἀριθμῶν ἔχει ἐν γνήσιον ὑποσύνολον ἰσοδύναμον πρὸς αὐτό. Οὐδεὶς φυσικὸς ἀριθμὸς – δισονδήποτε μεγάλος – δύναται νὰ ἐκφράσῃ τὸ πλῆθος τῶν στοιχείων του. Τὸ  $N$  εἶναι ἐν ἀπειροσύνολον. Τὸ  $N_a$  εἶναι ἐπίσης ἐν ἀπειροσύνολον. "Ωστε ἀπειροσύνολον εἶναι ἐν σύνολον, ὅταν ἔχῃ ἐν γνήσιον ὑποσύνολον ἰσοδύναμον πρὸς αὐτό. "Ἐν σύνολον ἰσοδύναμον πρὸς ἀπειροσύνολον, εἶναι ἐπίσης ἀπειροσύνολον. Τὸ ὑπερσύνολον ἐνὸς ἀπειροσύνολου εἶναι ἀπειροσύνολον. Π.χ. τὸ σύνολον  $Q$  τῶν ρητῶν. Τὸ σύνολον  $\Delta$  τῶν σημείων ἐνὸς εὐθυγράμμου τμήματος  $AB$  εἶναι ἀπειροσύνολον.

**§11.** Τὰ ἀνωτέρω σύνολα δὲν δυνάμεθα νὰ δρίσωμεν πλήρως δι' αν-

γραφής. Διά τοῦτο μέχρι τοῦτο έχρησιμο ποιήσαμεν ἀτελεῖς ἀναγραφάς:  $N = \{1, 2, 3, 4, \dots\}$ ,  $Q = \left\{ \dots \frac{1}{3}, \dots \frac{1}{2}, \dots 1, \dots \frac{3}{2} \dots \right\}$ . Δυνάμεθα όμως νὰ δρίσωμεν αὐτά διά περιγραφῆς. Δηλαδὴ ἐὰν δηλώσωμεν μίαν ίδιότητα, τὴν δποίαν ἐὰν μὲν ἔχῃ ἐν ἀντικείμενον, ἀνήκει εἰς τὸ σύνολον, ἐὰν δὲ δὲν ἔχῃ, δὲν ἀνήκει εἰς αὐτό.

$N = \{x/x \text{ εἶναι πληθικὸς ἀριθμὸς πεπερασμένου συνόλου}\}$

$N_\alpha = \{x/x \text{ εἶγαι φυσικὸς ἀριθμὸς διαιρετὸς διὰ } 2\}$

$Q = \{x/x = \frac{\mu}{v} \text{ } \mu: \text{εἶναι ἀκέραιος, } v: \text{εἶναι φυσικὸς καὶ } \frac{\mu}{v} \text{ ἀνάγωγον κλάσμα}\}$ .

$\Delta = \{x/x \text{ εἶναι τὸ σημεῖον } A \text{ ή } B \text{ ή σημεῖον μεταξὺ τῶν } A \text{ καὶ } B\}$ .

Διὰ περιγραφῆς συνεπῶς δρίζονται καὶ πεπερασμένα σύνολα καὶ (ἴδιως) τὰ ἀπειροσύνολα.

**Σημείωσις.** Δυνάμεθα τώρα νὰ εἴπωμεν, διτι σύνολον εἶναι μία κατηγορία ή ἐν εἰδος ἀντικείμενων, τὰ δποία ἔχουν μίαν ὀρισμένην ίδιότητα (ὡς πρὸς τὴν δποίαν θεωροῦνται).

### Α σκήσεις

7. Κάμετε μεταξὺ τῶν συνόλων  $A = \{3, 8, 15, 13, 14, 12, 7\}$  καὶ  $B = \{0, 1, 2, 3, 4\}$  τὴν ἀντιστοιχίαν: εἰς στοιχεῖον τοῦ  $A$  ἀντιστοιχεῖ τὸ ὑπόλοιπον τῆς διαιρέσεως αὐτοῦ διὰ 3, τὸ δποίον ἀνήκει εἰς τὸ  $B$ .

8. Εἰς τὸ σύνολον  $A$  τῶν χωρῶν τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης ἀντιστοιχίσατε τὸ σύνολον  $B$  τῶν πρωτευουσῶν αὐτῶν. Χαρακτηρίσατε τὴν ἀντιστοιχίαν. Κάμετε τὸ διάγραμμα αὐτῆς.

9. Ἐξετάσατε ἐὰν εἶναι ισοδύναμα τὰ σύνολα  $A = \{x/x \text{ εἶναι πολλαπλάσιον τοῦ } 3\}$  καὶ  $B = \{x/x \text{ εἶναι υπόλοιπον διαιρέσεως φυσικοῦ ἀριθμοῦ διὰ } 7\}$ .

10. Νὰ γίνουν δλαι αἱ δυναταὶ ἀμφιμονοσήμαντοι ἀντιστοιχίαι μεταξὺ τῶν συνόλων  $A = \{2, 9, 4\}$  καὶ  $B = \{\alpha, \beta, \gamma\}$ . Πόσαι εἶναι αὐταῖ;

11. Ὁρίσατε δι' ἀναγραφῆς τὸ σύνολον τῶν ὑποσυνόλων ἐνὸς τριμελοῦς συνόλου καὶ τὸ σύνολον τῶν πληθικῶν ἀριθμῶν αὐτῶν. Κάμετε μεταξὺ αὐτῶν μίαν ἀντιστοιχίαν. Χαρακτηρίσατε τὸ εἶδος αὐτῆς.

12. Μεταξὺ τῶν συνόλων  $A = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$  καὶ  $B = \{0, 1, 2, 3, 9, 12, 18\}$  νὰ γίνη ἡ ἀντιστοιχία: εἰς στοιχεῖον τοῦ  $A$ , ἀντιστοιχεῖ τὸ ὑπόλοιπον τῆς διαιρέσεως αὐτοῦ διὰ 3 ἢ πολλαπλάσιον αὐτοῦ, τὸ δποίον ἀνήκει εἰς τὸ  $B$ .

13. Ἐξετάσατε ἐὰν μεταξὺ τῶν συνόλων  $A = \{x/x \text{ εἶναι πολλαπλάσιον τοῦ } 11 \text{ μ-κρότερον τοῦ } 97\}$  καὶ ἐνὸς γνησίου ὑποσυνόλου του, εἶναι δυνατή μία ἀμφιμονοσήμαντο ἀντιστοιχία.

14. Ὁρίσατε διὰ περιγραφῆς τὸ σύνολον  $A = \{0, 7, 14, 21, 28, \dots\}$

15. Ποία σχέσις ὑπάρχει μεταξὺ τοῦ συνόλου τῶν ἀρτίων  $N_\alpha$  καὶ τοῦ συνόλου  $N_\beta$ , τῶν ἀκ. πολλαπλασίων τοῦ 4.

16. Ἐξετάσατε ἐὰν εἶναι ισοδύναμα τὰ σύνολα  $E = \{x/x \text{ εἶναι ἐπίκεντρος εἰς κύκλου } (0) \text{ γωνία}\}$  καὶ  $T = \{x/x \text{ τόξον τοῦ κύκλου } (0)\}$ .

17. Ἐξετάσατε ἐὰν εἶναι ισοδύναμα τὰ σύνολα  $N$  καὶ  $K = \{x/x \text{ εἶναι κλασματική μονάδα}\}$ .

#### 4. ΕΝΩΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΜΗ ΣΥΝΟΛΩΝ – ΔΙΑΖΕΥΞΙΣ ΚΑΙ ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ

§ 12. Τὸ σύνολον εἰς τὸ ὅποιον ἀνήκουν ὅλα τὰ στοιχεῖα δύο συνόλων  $A$  καὶ  $B$ , καὶ μόνον αὐτά, λέγεται "Ἐνωσις τῶν  $A$  καὶ  $B$  καὶ συμβολίζεται  $A \cup B$ .

Ἡ ἐνωσις δρίζεται διὰ τῆς ἴσοδυναμίας  $a \in A \Leftrightarrow a \in B \Leftrightarrow a \in A \cup B$ .



Τὴν πρᾶξιν μὲ τὴν ὅποιαν εύρισκομεν τὴν  $A \cup B$ , ἐὰν δοθοῦν τὰ  $A$  καὶ  $B$  δύνομάζομεν «ἐνωσιν συνόλων» καὶ συμβολίζομεν διὰ τοῦ  $\cup$ .

Τὸ σύνολον εἰς τὸ ὅποιον ἀνήκουν τὰ κοινὰ στοιχεῖα δύο συνόλων  $A$  καὶ  $B$  καὶ μόνον αὐτά, λέγεται **Τομή τῶν  $A$  καὶ  $B$**  καὶ συμβολίζεται  $A \cap B$ .

Ἡ τομὴ δρίζεται ὑπὸ τῆς ἴσοδυναμίας  $a \in A \text{ καὶ } a \in B \Leftrightarrow a \in A \cap B$ .

Τὴν ἀντίστοιχον πρᾶξιν λέγομεν «τομὴ συνόλων» καὶ συμβολίζομεν διὰ τοῦ  $\cap$ .

**Παράδειγμα.** Ἐὰν  $A = \{\alpha, \beta, \gamma, \delta, \varepsilon\}$  καὶ  $B = \{\gamma, \delta, \varepsilon, \zeta\}$  τότε  $A \cup B = \{\alpha, \beta, \gamma, \delta, \varepsilon, \zeta\}$  καὶ  $A \cap B = \{\gamma, \delta, \varepsilon\}$ . Χρησιμοποιοῦντες τὰ βέννια διαγράμματα ἔχομεν :



σχ. 7.

§ 13. Θεωρήσατε τὰ σύνολα  $A = \{x / x \text{ εἶναι διαιρέτης τοῦ } 12\}$  καὶ  $B = \{x / x \text{ εἶναι διαιρέτης τοῦ } 18\}$  καὶ καθορίσατε δι' ἀναγραφῆς Ιον τὴν ἐνωσιν καὶ 2ον τὴν τομὴν αὐτῶν.

'Αφοῦ καθορίσωμεν δι' ἀναγραφῆς τὰ δοθέντα σύνολα  $A = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$  καὶ  $B = \{1, 2, 3, 6, 9, 18\}$  εύρισκομεν :

Ιον τὸ σύνολον  $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18\}$  καὶ παρατηροῦμεν ὅτι κάθε στοιχεῖον τοῦ  $A \cup B$  ἡ διαιρεῖ μόνον τὸν 12 (οἱ 4 καὶ 12) ἢ διαιρεῖ μόνον τὸν 18 (οἱ 9 καὶ 18) ἢ διαιρεῖ ἀμφοτέρους τοὺς 12 καὶ 18 (οἱ 1, 2, 3, 6).

Τὴν σύνθετον αὐτὴν ιδιότητα, τὴν ὅποιαν ἔχουν τὰ στοιχεῖα τοῦ  $A \cup B$  λέγομεν διάζευξιν (συμβολικῶς  $\vee$ ) προφορικῶς « $\epsilon \text{ l t e}$ », τῶν ιδιοτήτων «εἶναι διαιρέτης τοῦ 12», «εἶναι διαιρέτης τοῦ 18» καὶ τὴν συμβολίζομεν :

«εἶναι διαιρέτης τοῦ 12  $\vee$  «εἶναι διαιρέτης τοῦ 18» ἀπλούστερον δὲ «εἶναι διαιρέτης τοῦ 12» εἴτε «εἶναι διαιρέτης τοῦ 18».

Οὐδὲν ἄλλο ἀντικείμενον πλὴν τῶν στοιχείων τοῦ  $A \cup B$  ἔχει τὴν ιδιό-

τητα αύτήν. Συνεπώς δυνάμεθα νὰ δρίσωμεν διὰ περιγραφῆς τὸ σύνολον  $A \cup B$  ὡς ἔξῆς :  $A \cup B = \{x / «x εἶναι διαιρέτης τοῦ 12» \text{ ή } «x εἶναι διαιρέτης τοῦ 18»\}$  ή  $A \cup B = \{x / «x εἶναι διαιρέτης τοῦ 12» \vee «x εἶναι διαιρέτης τοῦ 18»\}$ .

Γενικῶς ἔὰν ἀντικείμενον ἔχῃ μίαν τουλάχιστον ἐκ δύο ιδιοτήτων, λέγομεν ὅτι ἔχει ως ιδιότητα τὴν διάζευξιν αὐτῶν.

Συμβολικῶς :  $x:p(x) \text{ ή } x:q(x) \Rightarrow x:p(x) \vee q(x)$ .

Συνεπῶς : 'Εὰν δύο σύνολα περιγράφονται (ἀντιστοίχως) ὑπὸ τῶν ιδιοτήτων  $p(\quad)$  καὶ  $q(\quad)$ , ή "Ἐνωσις τῶν συνόλων, περιγράφεται ὑπὸ τῆς διαιρέυξεως αὐτῶν :

$$A = \{x / x:p(x)\}, B = \{x / x:q(x)\} \Rightarrow A \cup B = \{x / x:p(x) \vee q(x)\}.$$

Σον. 'Ορίζομεν δι' ἀναγραφῆς τὸ σύνολον  $A \cap B = \{1, 2, 3, 6\}$  καὶ παρατηροῦμεν, ὅτι κάθε στοιχείον αὐτοῦ εἶναι διαιρέτης καὶ τοῦ 12 καὶ τοῦ 18.

Τὴν σύνθετον αὔτὴν ιδιότητα λέγομεν **Σύζευξιν** τῶν ιδιοτήτων «εἶναι διαιρέτης τοῦ 12», «εἶναι διαιρέτης τοῦ 18» καὶ συμβολίζομεν ἀπλῶς μὲν διὰ τῆς: «εἶναι διαιρέτης τοῦ 12» καὶ «εἶναι διαιρέτης τοῦ 18», ἀκριβέστερον δὲ «εἶναι διαιρέτης τοῦ 12»  $\wedge$  «εἶναι διαιρέτης τοῦ 18». 'Επειδὴ οὐδεὶς ἄλλος ἀριθμὸς πλὴν τῶν στοιχείων τοῦ  $A \cap B$  ἔχει αὐτὴν τὴν ιδιότητα, δρίζομεν διὰ περιγραφῆς τὴν τομήν τῶν συνόλων  $A$  καὶ  $B$  ως ἔξῆς :

$A \cap B = \{x / «x: εἶναι διαιρέτης τοῦ 12» \wedge «x εἶναι διαιρέτης τοῦ 18»\}$ . Γενικῶς :

'Εὰν ἀντικείμενον ἔχῃ δύο ιδιότητας, θὰ λέγωμεν ὅτι ἔχει ως ιδιότητα καὶ τὴν σύζευξιν αὐτῶν' (ἡ σύζευξις συμβολίζεται  $\wedge$  καὶ διαβάζεται «καὶ»).

'Εὰν δύο σύνολα περιγράφωνται ἀντιστοίχως ὑπὸ δύο ιδιοτήτων, ή τομῇ αὐτῶν περιγράφεται ὑπὸ τῆς συζεύξεως τῶν ιδιοτήτων.

$$A = \{x / x:p(x)\}, B = \{x / x:q(x)\} \Rightarrow A \cap B = \{x / x:p(x) \wedge q(x)\}.$$

Εύκόλως ἐπαληθεύομεν διὰ παραδειγμάτων τὰς γνωστὰς ιδιότητας τῆς ἐνώσεως καὶ τομῆς.

Τὸ μονότιμον

Τὴν μεταθετικὴν

Τὴν προσεταιριστικὴν

Τοῦ οὐδετέρου

Τὴν ἐπιμεριστικὴν

$$A \cup B = B \cup A \quad A \cap B = B \cap A$$

$$A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$$

$$A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$$

$$A \cup \emptyset = A \quad A \cap U = A$$

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

**Α σκήνη σεις**

18. Ποια είναι ή διάλευξης τῶν Ιδιοτήτων «είναι ἀρτιος», «είναι περιπτός»;
19. Ποια ή σύζευξης τῶν Ιδιοτήτων  $x > 5$ ,  $x < 13$ .
20. Ποιον είναι τὸ σύνολον  $\{x/x : x \text{ είναι ἀρτιος} \wedge x \text{ είναι περιπτός}\}$
21. Νὰ δρισθοῦν διὰ περιγραφῆς καὶ δι' ἀναγραφῆς, ή ἔνωσις καὶ ή τομὴ τῶν συνόλων  $\Delta_1 = \{x/x : x \text{ είναι διαιρέτης τοῦ } 18\}$ ,  $\Delta_2 = \{x/x : x \text{ είναι διαιρέτης τοῦ } 54\}$ .
22. Ποια είναι ή ἔνωσις τῶν τριῶν συνόλων  $A = \{x/x : x \text{ είναι διαιρέτης τοῦ } 32\}$  καὶ  $\{x/x : x \text{ είναι διαιρέτης τοῦ } 40\}$ ,  $B = \{x/x : x \text{ είναι διαιρέτης τοῦ } 40\}$  καὶ  $\Gamma = \{x/x : x \text{ είναι διαιρέτης τοῦ } 40 + 32\}$ .
23. Νὰ εύρεθῃ τὸ σύνολον  $A = \{x/x : x \in Q^+_0 \wedge x+1=5\}$ ,  $B = \{x : x \in Q^+_0 \wedge x-3=7\}$ .
24. Νὰ ἐκτελεσθοῦν αἱ πράξεις  $(A \cup B) \cap (\Gamma \cup B)$ ,  $(A \cup B \cup \Gamma) \cap A$

**5. ΤΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ — ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΩΝ —  
ΚΛΑΣΕΙΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑΣ**


**§ 14.** Εὰν θεωρήσωμεν τὸ σύνολον  $A = \{x/x \text{ διαιρέτης τοῦ } 6\}$  καὶ τὸ σύνολον  $B = \{x/x \text{ διαιρέτης τοῦ } 12\}$  θὰ παρατηρήσωμεν, ὅτι  $A \subseteq B$ . Πράγματι  $B = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$  καὶ  $A = \{1, 2, 3, 6\}$ . Τὸ σύνολον  $\{4, 12\}$  ή  $\{x/x \text{ «διαιρέτης τοῦ } 12\} \wedge x \text{ δὲν είναι διαιρέτης τοῦ } 6\}$  λέγεται συμπλήρωμα τοῦ  $A$  ὡς τοῦ  $12$  Λ « $x$  δὲν είναι διαιρέτης τοῦ  $6$ » λέγεται συμπλήρωμα τοῦ  $A$  ώς τοῦ  $12$  Λ  $x$  δὲν είναι διαιρέτης τοῦ  $6$ » λέγεται συμπλήρωμα τοῦ  $B$  καὶ συμβολίζεται  $A^c_B$  ή  $A'_B$ . Ωστε:

Συμπλήρωμα συνόλου  $A$ , ως πρὸς ὑπερσύνολόν του  $B$ , είναι τὸ σύνολον τῶν στοιχείων τοῦ  $B$ , τὰ δόποια δὲν ἀνήκουν εἰς τὸ  $A$ .


Παρατηροῦμεν ὅτι εἰς τὸ συμπλήρωμα τοῦ  $A$  ἀνήκουν τὰ στοιχεῖα τοῦ  $B$ , τὰ δόποια δὲν ἔχουν τὴν χαρακτηριστικὴν ιδιότητα τῶν στοιχείων τοῦ  $A$ .

Τὸ  $B^c_B$  είναι τὸ  $\emptyset$ . Τὸ  $\emptyset^c_B$  είναι τὸ  $B$ .

Λέγοντες ἀπλῶς συμπλήρωμα τοῦ  $A$  (συμβολικῶς  $A^c$ ), ἔννοοῦμεν τὸ συμπλήρωμα αὐτοῦ ώς πρὸς τὸ βασικὸν σύνολον  $U$  (ὑπερσύνολον δλῶν τῶν συμπλήρωμά των συνόλων). Τὸ βέννιον διάγραμμα τοῦ  $A^c_B$  βλέπομεν εἰς τὸ σχῆμα 8, τὸ δὲ διάγραμμα  $A^c$ , εἰς τὸ σχῆμα 9.



σχ. 8.



σχ. 9.

§ 15. Θεωροῦμεν τὰ σύνολα  $B = \{\alpha, \beta, \gamma, \delta, \varepsilon\}$ ,  $A = \{\beta, \delta, \varepsilon\}$  καὶ  $A_B^C = \{\alpha, \gamma\}$ . Ή τομή τῶν  $A$  καὶ  $A_B^C$  εἶναι τὸ κενὸν σύνολον, ἡ ἄλλως τὰ σύνολα αὐτά εἶναι ξένα μεταξύ των. Ή ἔνωσις αὐτῶν εἶναι τὸ  $B$ . Λέγομεν ὅτι τὰ σύνολα  $A$  καὶ  $A_B^C$  ἀποτελοῦν ἔνα διαμερισμὸν τοῦ συνόλου  $B$ . Όμοίως λέγομεν ὅτι τὰ σύνολα  $\{\alpha, \gamma\}$ ,  $\{\beta, \varepsilon\}$  καὶ  $\{\delta\}$  ἀποτελοῦν ἔνα διαμερισμὸν τοῦ συνόλου  $B$ , διότι εἶναι διάφορα τοῦ κενοῦ συνόλου, εἶναι ἀνὰ δύο μεταξύ των ξένα καὶ ή ἔνωσις ὅλων εἶναι τὸ  $B$ . Δυνάμεθα νὰ εἴπωμεν καὶ ὅτι τὸ  $B$  διαμερίζεται εἰς τὰ σύνολα αὐτά.

Τὰ σύνολα  $A_1$ ,  $A_2$ ,  $A_3 \dots$  εἶναι ἔνας διαμερισμὸς τοῦ συνόλου  $A$ , ὅταν οὐδὲν ἔξ αὐτῶν εἶναι κενόν, εἶναι ἀνὰ δύο ξένα καὶ ή ἔνωσις ὅλων εἶναι τὸ  $A$ .

§ 16. Νὰ διαμερισθῇ τὸ σύνολον

$$K = \left\{ \frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{3}{5}, \frac{3}{3}, \frac{3}{6}, \frac{6}{10}, \frac{7}{14}, \frac{12}{20} \right\}$$

εἰς σύνολα ἵσων ρητῶν ἀριθμῶν. Μὲ βάσιν τὴν σχέσιν ισότητος τῶν κλασμάτων, διαμερίζομεν τὸ  $K$  εἰς τὰ σύνολα

$$K_1 = \left\{ \frac{1}{4}, \frac{3}{3} \right\}, K_2 = \left\{ \frac{1}{2}, \frac{3}{6}, \frac{7}{14} \right\}, K_3 = \left\{ \frac{3}{5}, \frac{6}{10}, \frac{12}{20} \right\}$$

Τὰ στοιχεῖα ἑκάστου τῶν  $K_1$ ,  $K_2$ ,  $K_3$  ἀντιπροσωπεύουν τὸν αὐτὸν ρητὸν ἀριθμόν. Τοῦ  $K_1$  τὸν ρητὸν  $\frac{1}{4}$ , τοῦ  $K_2$  τὸ ρητὸν  $\frac{1}{2}$  καὶ τοῦ  $K_3$  τὸν  $\frac{3}{5}$

Τὰ σύνολα  $K_1$ ,  $K_2$ ,  $K_3$  λέγονται κλάσεις ισοδυναμίας. Γενικῶς ή σχέσις τῆς ισότητος τῶν κλασμάτων διαμερίζει τὸ σύνολον ὅλων τῶν κλασμάτων εἰς κλάσεις ισοδυναμίας. Ἐκάστη κλάσις παριστᾶ ἡ ἀντιπροσωπεύει ἔνα ρητὸν ἀριθμόν.

Ἐάν σύνολον  $A$  διαμερίζεται εἰς ἄλλα σύνολα  $A_1$ ,  $A_2$ ,  $A_3 \dots$  εἰς τρόπον ὥστε ὅλα τὰ στοιχεῖα τοῦ  $A_1$  νὰ ἀντιπροσωπεύουν ἔν αὐτικέμενον, ὅλα τὰ στοιχεῖα τοῦ  $A_2$  ἔη ἄλλο ἀντικείμενον κ.ο.κ., τὰ  $A_1$ ,  $A_2$ ,  $A_3 \dots$ , λέγονται κλάσεις ισοδυναμίας.

Η σχέσις βάσει τῆς ὅποιας γίνεται ὁ διαμερισμὸς αὐτός, λέγεται σχέσις ισοδυναμίας καὶ ἔχει τὰς ιδιότητας τῆς ισότητος.

### 'Α σ κή σ εις

25. Νὰ εύρεθῃ τὸ  $A_N^C$  διόπου  $A = \{x / x \text{ φυσικὸς ἀριθμὸς } \wedge x > 6\}$

26. 'Εάν  $A = \{x / «x \in Q_0^+» \wedge x > 3\}$  καὶ  $B = \{x / «x \in Q_0^+» \wedge x < 11\}$  νὰ εύρεθοῦν τὰ σύνολα  $A \cup B$ ,  $A \cap B$ ,  $A_{Q_0^+}^C$  καὶ ή τομὴ τῶν συμπληρωμάτων τῶν  $A$  καὶ  $B$  ὡς πρὸς  $Q_0^+$ .

27. Νὰ ἐκτελεσθῇ ή πρᾶξις  $(A \cup A_C) \cap A$ .

28. 'Εάν  $A = \{x / x \text{ εἶναι διαιρέτης τοῦ } 60\}$ ,  $B = \{x / x \text{ εἶναι διαιρέτης τοῦ } 12\}$  καὶ  $\Gamma = \{x / x \text{ εἶναι διαιρέτης τοῦ } 15\}$ . Νὰ εύρητε τὰ συμπληρώματα τῶν  $B$  καὶ  $\Gamma$  ὡς πρὸς  $A$ .

29. Νὰ ἐπαληθεύσητε μὲ τὰ σύνολα τῆς προηγουμένης ἀσκήσεως, ὅτι τὸ συμπλήρωμα τῆς ένώσεως τῶν  $B$  καὶ  $\Gamma$  ισοῦται πρὸς τὴν τομὴν τῶν συμπληρωμάτων τῶν συνόλων

αύτῶν (ώς πρὸς τὸ ὑπερσύνολον τῶν A). Ὁμοίως δτι τὸ συμπλήρωμα τῆς τομῆς Ισοῦται πρὸς τὴν ἐνωσιν τῶν συμπληρωμάτων. Συμβολικῶς:

$$(B \cup G)_A^C = (B_A^C) \cap (G_A^C) \quad \text{καὶ} \quad (B_A^C) \cup (G_A^C) = (B \cap G)_A^C$$

30. Ἐπαληθεύσατε διὰ παραδειγμάτων δτι τὸ σύνολον, τὸ ὅποιον περιγράφεται διὰ τῆς συζεύξεως δύο Ιδιοτήτων, εἶναι ὑποσύνολον ἐκείνου, τὸ ὅποιον περιγράφεται διὰ μιᾶς ἔξι αὐτῶν.

31. Διαμερίσατε τὸ σύνολον A = {2, 5, 9, 6} εἰς μονομελῆ σύνολα.

32. Νὰ διαμερισθῇ τὸ σύνολον A = {χ / χ εἶναι διαιρέτης τοῦ 4} εἰς διμελῆ σύνολα.

33. α) Νὰ κάμετε ἔνα διαμερισμὸν τοῦ συνόλου τῶν πλευρῶν ἐνὸς παραλληλογράμμου ΑΒΓΔ μὲ βάσιν τὴν σχέσιν «εἶναι παράλληλος». β) Κάμετε ἔνα διαμερισμὸν τοῦ συνόλου τῶν τριγώνων εἰς τρία ὑποσύνολα.

34. Νὰ διαμερίσητε τὸ σύνολον A = {2, 5, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 13} εἰς κλάσεις Ισοδυναμίας μὲ βάσιν τὴν σχέσιν: οἱ ἀριθμοὶ ἐκάστης κλάσεως ὀφήνουν τὸ αὐτὸν ὑπόλοιπον διαιρούμενοι διὰ 3.

35. Εἰς πόσας κλάσεις Ισοδυναμίας διαιρίζεται τὸ σύνολον N μὲ βάσιν τὴν σχέσιν: ὑπόλοιπον διαιρέσεως τοῦ α διὰ 5 = ὑπόλοιπον διαιρέσεως τοῦ β διὰ 5.

36. Σχηματίσατε τὰ ὑποσύνολα τοῦ συνόλου τῶν διαγωνίων τοῦ πενταγώνου ΑΒΓΔΕ, εἰς τρόπον ὡστε εἰς ἓν ὑποσύνολον, νὰ ἀνήκουν αἱ διαγώνιοι, αἱ δποῖαι διέρχονται διὰ τῆς αὐτῆς κορυφῆς. Ἀποτελοῦν διαμερισμὸν τὰ ὑποσύνολα αὐτά;

## 6. ΔΙΑΤΕΤΑΓΜΕΝΟΝ ΣΥΝΟΛΟΝ

§ 17. "Οταν — κατὰ τὴν μελέτην τῆς ἀντιστοιχίας—ἀντεστοιχίσαμεν εἰς τὸ στοιχεῖον α τὸ στοιχεῖον β, ἔχρησιμοποιήσαμεν τὸν συμβολισμὸν: (α, β). Τοῦτο εἶναι ἐν διμελὲς σύνολον εἰς τὸ ὅποιον τὸ ἐν μέλος προηγεῖται τοῦ ἄλλου (δηλαδὴ ἔχει σημασίαν ἡ τάξις τῶν στοιχείων του). Τὸ (α, β) λέγεται διατεταγμένον ζεῦγος ή διατεταγμένον (διμελὲς) σύνολον. Ἐπειδὴ δυνάμεθα εἰς τὸ α νὰ ἀντιστοιχίσωμεν τὸ α, θεωροῦμεν καὶ τὸ (α, α) διατεταγμένον ζεῦγος.

**Πρόβλημα.** Γράψατε τὸ σύνολον {2, 3, 1, 5, 4} ὥστε νὰ προηγηται δικρότερος ἀριθμός.

Γράφομεν τότε: (1, 2, 3, 4, 5). Τὸ (1, 2, 3, 4, 5) εἶναι ἐν διατεταγμένον σύνολον. (Διὰ τὴν παράστασιν αὐτοῦ ἔχρησιμοποιήσαμεν παρενθέσεις ἀντὶ τῶν ἀγκίστρων).

Διατεταγμένον εἶναι ἐν σύνολον, δταν μεταξὺ δύο στοιχείων του έχῃ δρισθῆ ποῖον προηγεῖται.


Μεταξὺ δύο στοιχείων τοῦ (1, 2, 3, 4, 5) π.χ. τῶν 3 καὶ 2, Ισχύει ἡ σχέσις:  $2 < 3$ . Σχηματίζομεν τότε τὸ ζεῦγος (2, 3). Διὰ τὸ ζεῦγος (4, 4) Ισχύει ἡ  $4 = 4$ . Γενικῶς διὰ δύο στοιχεία τοῦ α καὶ β, δυνάμεθα νὰ γράψωμεν  $\alpha \leq \beta$  ή  $\beta \leq \alpha$ .

Διὰ τοῦτο λέγομεν, δτι τὸ διατεταγμένον σύνολον (1, 2, 3, 4, 5), εἶναι τὸ σύνολον {2, 3, 1, 5, 4} ἐφοδιασμένον μὲ τὴν διάταξιν (ἢ τὴν σχέσιν δια-

τάξεως)  $\leq$ . Τήν διάταξιν αύτήν όνομάζουμεν διάταξιν κατά μέγεθος. Παρατηροῦμεν, ότι όποιοιδή ποτε διμελές ύποσυνόλων τού {2, 3, 1, 5, 4} δύναται νὰ διαταχθῇ μὲ τὴν διάταξιν  $\leq$ . Τὸ {2, 3}: 2  $\leq$  3. Τὸ {5, 4}: 4  $\leq$  5 κ.ο.κ. Διὸ τοῦτο ἡ διάταξις  $\leq$  λέγεται διλικὴ διάταξις καὶ τὸ (1, 2, 3, 4, 5) διλικῶς διατεταγμένον σύνολον.

Γραφικῶς παριστῶμεν τὴν διάταξιν:  $\alpha < \beta$  ὡς ἔξῆς:  $\alpha \curvearrowright \beta$ . Δηλαδὴ μὲ κατευθυνομένη γραμμὴν ἀπὸ τὸ  $\alpha$  πρὸς τὸ  $\beta$ .

Τὴν περίπτωσιν  $\alpha = \alpha$  παριστῶμεν ὡς  $\alpha$ , δηλαδὴ μὲ βρόχον, δ ὅποιος ἐπιστρέφει εἰς τὸ  $\alpha$ . Γραφικὴν παράστασιν (διάγραμμα) τῆς διατάξεως εἰς τὸ διατεταγμένον σύνολον (1, 2, 3, 4, 5) ἔχομεν εἰς τὸ σχῆμα 10.



σχ. 10.



σχ. 11.

Ἐνίστε μᾶς δίδεται ἡ εὐκαρία νὰ κάμωμεν καὶ παιγνιώδῃ διαγράμματα διατεταγμένων συνόλων, ὡς εἰς τὰ σχήματα 11 καὶ 12 διὰ τὸ (1, 2, 3, 4).



σχ. 12.

§ 18. Συμβολίζομεν τὴν σχέσιν δ  $\alpha$  διαιρεῖ τὸν  $\beta$  προσωρινῶς μὲ  $\alpha/\beta$ . Εἳναν ἐφοδιάσωμεν τὸ σύνολον {2, 3, 4, 6, 9} μὲ τὴν διάταξιν αύτήν, θὰ παρατηρήσωμεν διτὶ μερικὰ ἐκ τῶν διμελῶν ύποσυνόλων του δὲν διατάσσονται.

Γράφομεν 2/4 (δ 2 διαιρεῖ τὸν 4), 2/2, 4/4 κ.ο.κ. ἀλλὰ δὲν δυνάμεθα νὰ γράψωμεν: 2/3 (δ 2 διαιρεῖ τὸν 3), 6/9.

Τὸ ἐφοδιασμένον μὲ τὴν διάταξιν / σύνολον {2, 3, 4, 6, 9} λέγεται μερικῶς διατεταγμένον σύνολον καὶ ἡ σχέσις «διαιρεῖ τὸν...» μερικὴ διάταξις.

Ἐἳναν τὴν διάταξιν: τὸ  $\alpha$  προηγεῖται τοῦ  $\beta$  ἢ ταυτίζεται μὲ τὸ  $\beta$  συμβολίσωμεν διὰ τοῦ  $\alpha \leq \beta$  καὶ τὴν: τὸ  $\beta$  ἔπειται τοῦ  $\alpha$  (ἢ ταυτίζεται) διὰ τοῦ

**β**ασι εύκόλως ἐπαγληθεύομεν ἐκ τῶν παραδειγμάτων μας, διτὶ αἱ Ιδιότητες τῆς διατάξεως εἶναι αἱ :

$\alpha \leq \alpha$  Ανακλαστική

$\alpha \leq \beta$  καὶ  $\beta \leq \alpha \Rightarrow \alpha = \beta$  ἀντισυμμετρική καὶ

$\alpha \leq \beta$  καὶ  $\beta \leq \gamma \Rightarrow \alpha \leq \gamma$  μεταβοτική.

ἌΓΓΕΛΟΙ ΣΑΚΗ


37. Διατάξατε τὸ σύνολον { $3^5$ ,  $3^4$ ,  $3^1$ ,  $3^0$ ,  $3^3$ ,  $3^6$ } ὡς  
στε νὰ προηγήται ἡ δύναμις μικροτέρου ἐκθέτου.

38. Κάμετε τὸ αὐτὸ μὲ τὸ σύνολον ( $3^{\text{st}}$ ,  $5^{\text{th}}$ ,  $10^{\text{th}}$ ,  $2^{\text{nd}}$ ).  
Είναι ή διάταξις αὐτή διάταξις κατὰ μέγεθος;

39. Διατάξετε τό δύο σύνολον {4, 8, 9, 3, 12, 16, 18} δώστε μεταξύ δύο στοιχείων του, νά προηγήται τό πολλαπλάσιον τού δόλλου. Θά είναι τότε τό δύο σύνολον διλικῶς διατεταγμένον; διατάξεως.

40. Είγαι δλικῶς διατεταγμένον τὸ Ν μὲ διάσταξιν κατὰ μέγεθος; Διατί;

41. Ἐξηγήσατε διατί είναι δλικῶς διατεταγμένον τὸ σύνολον τῶν ρητῶν τῆς ἀριθμητικῆς, μὲ διάταξιν κατὰ μέγεθος.



9y, 13,

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II

### A'. ΤΟ ΣΥΝΟΛΟΝ ΤΩΝ ΡΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

#### 1. ΤΟ ΣΥΝΟΛΟΝ $Q_0^+$ ΤΩΝ ΡΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ (ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΣ)

§ 19. Έμάθομεν εἰς τὴν Α' τάξιν διὰ τοὺς ρητούς ἀριθμούς, τὰς πράξεις αὐτῶν καὶ τὰς ίδιότητας τῶν πράξεων.

Κατωτέρω θὰ ἐπαναλάβωμεν μερικούς γνωστούς κανόνας διὰ τοὺς ρητούς ἀριθμούς καὶ διὰ τὰς πράξεις αὐτῶν.

$$\text{Τὸ σύνολον } Q_0^+ = \left\{ 0, \dots, \frac{1}{2}, \dots, \frac{3}{4}, \dots, 1, \dots, 2, \dots, 2\frac{1}{2}, \dots \right\}$$


τῶν ρητῶν τῆς ἀριθμητικῆς εἶναι ἡ ἔνωσις τοῦ συνόλου  $N_0$  τῶν ἀκεραίων, καὶ τοῦ συνόλου τῶν μὴ ἀκεραίων πηλίκων ἐνὸς ἀκεραίου δι' ἐνὸς φυσικοῦ.  
Ἔχομεν :

$$Q_0^+ = N_0 \cup \{X/X \text{ μὴ ἀκέραιον πηλίκιον ἐνὸς ἀκερ. δι' ἐνὸς φυσικοῦ}\}$$

Ἡ ἔνωσις τῶν δύο τούτων συνόλων δίδει περιγραφικῶς τὸ  $Q_0^+$  ὡς κάτωθι:


$$Q_0^+ = \{X/X = \frac{\alpha}{\beta} \text{ δταν } \alpha \in N_0, \beta \in N \text{ καὶ } \frac{\alpha}{\beta} \text{ ἀνάγωγον}\}$$

Εἰς τὸ σχῆμα 14 ἔχομεν τὴν γραφικήν παράστασιν τῶν ρητῶν ἐπὶ τῆς ἡμιευθείας  $AX$  καὶ εἰς τὸ σχῆμα 15 τὸ διάγραμμα τοῦ συνόλου  $Q_0^+$ .



σχ. 14.

§ 20. Ἐὰν δοθοῦν δύο ρητοί  $\alpha$  καὶ  $\beta$ , τότε ὑπάρχει πάντοτε ὁ ρητὸς  $\alpha + \beta$ . Δηλαδὴ δυνάμεθα νὰ ἐκτελέσωμεν τὴν πρᾶξιν τῆς προσθέσεως εἰς τὸ σύνολον τῶν ρητῶν· τῆς ἀριθμητικῆς καὶ νὰ εὕρωμεν ὡς ἀθροισμα ἔνα ρητόν. Τοῦτο



σχ. 15.

δὲν συμβαίνει διὰ τὴν πρᾶξιν τῆς ἀφαιρέσεως. ‘Η διαφορὰ  $\alpha - \beta$  ὑπάρχει, ἐὰν  $\alpha > \beta$ . ‘Επομένως δὲν δυνάμεθα πάντοτε νὰ ἐκτελέσωμεν τὴν πρᾶξιν τῆς ἀφαιρέσεως, ἢ λέγομεν, ὅτι ἡ ἀφαιρέσις δὲν εἶναι πάντοτε δυνατή εἰς τὸ σύνολον τῶν ρητῶν τῆς ἀριθμητικῆς.

‘Εὰν ἡ διαφορὰ  $\alpha - \beta$  ὑπάρχῃ καὶ εἶναι ὁ ρητὸς  $\gamma$ , τότε ὡς γνωστὸν ἔχομεν:  $\alpha - \beta = \gamma \iff \alpha = \beta + \gamma \iff \alpha - \gamma = \beta$ . ‘Επίσης ἐὰν  $\gamma, \delta$ , εἶναι ρητοί, ὑπάρχει πάντοτε ὁ ρητὸς  $\gamma \cdot \delta$  καὶ ἐὰν  $\gamma \neq 0$ , ὑπάρχει ὁ ρητὸς  $\frac{1}{\gamma}$  (ἀντίστροφος τοῦ  $\gamma$ ) καὶ ἔχομεν  $\delta : \gamma = \delta \cdot \frac{1}{\gamma}$ .

**§ 21.** Τὸ μηδὲν «0» εἶναι οὐδέτερον στοιχείον τῆς προσθέσεως,  $0 + \alpha = \alpha$ , ὡς παράγων μηδενίζει τὸ γινόμενον,  $0 \cdot \alpha = 0$  καὶ δὲν θεωρεῖται ποτὲ ὡς διαιρέτης. ‘Η μονάς «1» εἶναι οὐδέτερον στοιχείον εἰς τὸν πολλαπλασιασμόν,  $1 \cdot \alpha = \alpha$ .

**§ 22.** Αἱ πρᾶξεις τῆς προσθέσεως καὶ τοῦ πολ./σμοῦ εἶναι μονότιμοι. Δηλαδὴ τὸ ἀθροίσμα καὶ τὸ γινόμενον δύο δοθέντων ρητῶν εἶναι εἰς μόνον ρητός. (Τὸ αὐτὸ συμβαίνει καὶ διὰ τὴν ἀφαιρέσιν, ἐὰν εἶναι δυνατή). Διότι, ἐφόσον ἡ διαφορὰ  $18 - 5$  ἢ  $13$  εἶναι τοιαύτη, ὥστε τὸ ἀθροίσμα αὐτῆς μετὰ τοῦ ἀφαιρετέου  $5$  νὰ δίδῃ τὸν μειωτέον  $18$ , δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ὑπάρχῃ ἄλλη διαφορὰ λόγω τοῦ μονοτίμου τῆς προσθέσεως. ‘Ομοίως καὶ ἡ διαιρέσις  $\alpha : \beta$  ( $\beta \neq 0$ ) εἶναι μονότιμος, διότι  $\alpha : \beta = \alpha \cdot \frac{1}{\beta}$  καὶ ὁ πολ./σμὸς δύο ρητῶν εἶναι πρᾶξις μονότιμος).

‘Ο κατωτέρω πίναξ περιέχει τὰς κυριωτέρας ιδιότητας τῶν πράξεων συμβολικῶν.

Οι $\alpha, \beta, \gamma \in Q_0^+$		
Πράξεις	Πρόσθεσις	Πολ./σμὸς
‘Υπαρξίς ἀθροίσματος καὶ γινομένου	$(\alpha + \beta) \in Q_0^+$	$(\alpha \cdot \beta) \in Q_0^+$
‘Ιδιότης ἀντιμεταθ.	$\alpha + \beta = \beta + \alpha$	$\alpha \cdot \beta = \beta \cdot \alpha$
‘Ιδιότης προσεταιρ.	$(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma)$	$(\alpha \cdot \beta) \cdot \gamma = \alpha \cdot (\beta \cdot \gamma)$
‘Ιδιότης ἐπιτιμεριστ.	$\alpha \cdot (\beta + \gamma) = \alpha \cdot \beta + \alpha \cdot \gamma$	

### Α σ κή σ εις

42. α) Απλοποιήσατε τὰ κλάσματα:

$$\frac{24}{27}, \frac{15}{14}, \frac{55}{30}, \frac{12}{30}, \frac{35}{35}, \frac{42}{21}, \frac{11}{33}, \frac{9}{18}$$

β) Έκτελέστε τάς κάτωθι πράξεις :

$$\frac{3}{4} + \frac{2}{5}, \quad \frac{7}{6} + \frac{8}{9}, \quad \frac{13}{4} - \frac{5}{16}, \quad \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{5}, \quad \frac{7}{3} \cdot \frac{9}{14}, \quad \frac{11}{8} \cdot \frac{0}{4},$$

$$\frac{12}{13} : \frac{4}{13}, \quad \frac{15}{16} : \frac{1}{4}$$

43. Ποιαί είκ τών κάτωθι προτάσεων είναι δρθαί, ποιαί έσφαλμέναι και διατί ;

α)  $(17 : 15,2) \in Q_0^+$ , β)  $\frac{5}{8} - \frac{3}{8} = \frac{3}{8} - \frac{5}{8}$ , γ)  $200 : 40 = 40 : 200$ ,

δ)  $205 \cdot \left( \frac{1}{3} + 19 \right) = 205 \cdot \left( 19 + \frac{1}{3} \right)$ , ε)  $(97 - 98) \in N_0$ ,

στ)  $\frac{3}{4} + 8 = \left( \frac{3}{4} + 8 \right) \cdot \left( \frac{3}{4} + \frac{1}{4} \right)$

η)  $\left( \frac{7}{13} + \frac{3}{7} \right) + 1 = \frac{7}{13} + \left( \frac{3}{7} + 1 \right)$ , η)  $\left( 15 \frac{1}{2} - \frac{31}{2} \right) \in Q_0^+$

θ)  $0,5 \cdot \left( 7 \cdot \frac{1}{3} \right) = (0,5 \cdot 7) \cdot \frac{1}{3}$

44. Νά έκτελεσθούν αι κάτωθι πράξεις :

α)  $\left( \frac{3}{4} + \frac{2}{3} \right) : 2 \frac{2}{3} + \left( 4 \frac{1}{3} - \frac{1}{2} \right) : \frac{2}{5}$ ,

β)  $\left[ \left( \frac{3}{16} + \frac{2}{8} + \frac{3}{4} \right) : \frac{3}{2} - \left( \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) : \frac{3}{4} \right] \cdot 10 \frac{2}{7}$ ,

γ)  $2 \frac{1}{3} \cdot \left( \frac{7}{8} - \frac{1}{2} \right) - \frac{3}{8} \cdot \left( 2 - \frac{3}{4} \right)$ ,

δ)  $\left( 5 \frac{7}{26} - 1 \frac{4}{39} \right) : \left( 6 \frac{2}{9} - 4 \frac{5}{6} \right)$

## 2. ΤΟ ΣΥΝΟΛΟΝ ΤΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΡΗΤΩΝ

§ 23 Θά προσπαθήσωμεν νά έπιλύσωμεν τά κάτωθι προβλήματα:

α) «Εις τὴν πόλιν Α ἡ θερμοκρασία ἦτο 10 βαθμοί ἀνωθεν τοῦ μηδενὸς τὴν μεσημβρίαν. Τὸ ἐσπέρας ἡ θερμοκρασία εἶχε κατέλθει κατὰ 7 βαθμούς. Πολα ἡ θερμοκρασία τὸ ἐσπέρας;».

Έχομεν : 10 βαθμ. — 7 βαθμ. = 3 βαθμ. ἀνωθεν τοῦ μηδενός.

«Ἄρα ἡ θερμοκρασία τὸ ἐσπέρας εἰς τὴν πόλιν Α εἶναι 3 βαθμ. ἀνωθεν τοῦ μηδενός.

β) «Ἡ θερμοκρασία εἰς τὴν πόλιν Β ἦτο 6 βαθμ. ἀνωθεν τοῦ μηδενὸς τὴν μεσημβρίαν. Τὸ ἐσπέρας ἡ θερμοκρασία εἶχε κατέλθει κατὰ 8 βαθμούς. Πολα ἡ θερμοκρασία εἰς τὴν πόλιν Β τὸ ἐσπέρας;»

Έὰν καλέσωμεν χ βαθμ. τὴν θερμοκρασίαν τὸ ἐσπέρας εἰς τὴν πόλιν Β,

τότε συμφώνως πρὸς τὸ πρόβλημα, ἔχομεν νὰ ἐκτελέσωμεν τὴν ἀφαίρεσιν 6 βαθμ.-8 βαθμ. ἢ νὰ ἐπιλύσωμεν τὴν ἔξισωσιν 6-8=χ.

Ἡ ἀφαίρεσις αὐτὴ δὲν εἶναι δυνατὴ εἰς τὸ σύνολον  $Q^+_0$  τῶν ρητῶν τῆς ἀριθμητικῆς. Ἐπομένως καὶ ἡ ἀνωτέρω ἔξισωσις δὲν ἔχει λύσιν εἰς τὸ σύνολον αὐτό.

Ἐν τούτοις τὸ πρόβλημα ἔχει λύσιν καὶ οιοσδήποτε δύναται νὰ ἀπαντήσῃ ὅτι ἡ θερμοκρασία εἰς τὴν πόλιν Β τὸ ἑσπέρας ήτο 2 βαθμοὶ κάτωθεν τοῦ μηδενός.

Ἐχομεν λοιπόν : 6 βαθμ. - 8 βαθμ. = 2 βαθμοὶ κάτωθεν τοῦ μηδενὸς

$$6 - 8 = \chi$$

Διὰ νὰ ἐκφράσωμεν τὴν διαφορὰν αὐτήν, πρέπει νὰ εἰσάγωμεν νέους ἀριθμούς, οἱ δόποιοι νὰ δίδουν λύσιν εἰς τὰ προβλήματα ὅπως τὸ ἀνωτέρω.

Εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν ὁ νέος ἀριθμὸς χ, ὁ δόποιος θὰ ἀντιπροσωπεύῃ τὴν ἐκφρασιν «δύο βαθμοὶ κάτωθεν τοῦ μηδενὸς» πρέπει νὰ δρισθῇ κατὰ τρόπον, ὡστε τὸ ἄθροισμα αὐτοῦ μὲ τὸν 8 νὰ ἰσοῦται μὲ 6, διὰ νὰ διατηρῆται ἡ γνωστή φασις ἰσοδυναμία :  $6 - 8 = \chi \Leftrightarrow 6 = 8 + \chi$ .

Ἄλλὰ τότε ἔχομεν :

$$6 = 8 + \chi \Leftrightarrow 6 = (6 + 2) + \chi \Leftrightarrow 6 = 6 + \underbrace{(2 + \chi)}_0$$

Ἐπειδὴ  $6 = 6 + 0$ , πρέπει ὁ 2 καὶ ὁ χ νὰ ἔχουν ἄθροισμα μηδέν. Δηλαδὴ  $2 + \chi = 0$ .

Ο νέος ἀριθμὸς χ συμβολίζεται -2 καὶ διαβάζεται ἀρνητικὸς δύο ἢ πλὴν δύο

“Ωστε ἡ θερμοκρασία «δύο βαθμ. κάτωθεν τοῦ μηδενὸς» παρίσταται ὑπὸ τοῦ ἀριθμοῦ -2 βαθμ.

Ο ἀρνητικὸς ἀριθμὸς δύο (-2) λέγεται ἀντίθετος τοῦ 2 καὶ εἴδομεν ὅτι  $2 + (-2) = 0$ . Ομοίως ἔχομεν  $(-2) + 2 = 0$ , διότι, ὅταν τὸ θερμόμετρον δεικνύῃ -2 βαθμ. (2 βαθμ. κάτωθεν τοῦ μηδενὸς) καὶ ἀνέλθῃ κατὰ 2 βαθμούς, τούτο θὰ δεικνύῃ τὴν θερμοκρασίαν 0 βαθμ.

Συνεπῶς τὸ ἄθροισμα δύο ἀντιθέτων ἀριθμῶν εἶναι μηδέν. Ἡ ἔξισωσις  $2 + \chi = 0$ , διὰ τὴν δόποιαν ἔχομεν τώρα τὴν λύσιν -2 ἐκφράζει καὶ τὸ ἔξις πρόβλημα :

«Ποιὸν ἀριθμὸν πρέπει νὰ προσθέσωμεν εἰς τὸν 2 διὰ νὰ ἔχωμεν ἄθροισμα μηδέν;»

Ανάλογα προβλήματα ἐκφράζουν καὶ αἱ κάτωθι ἔξισώσεις :

$$1 + \psi = 0 \quad \text{ἢ} \quad \psi + 1 = 0, \quad \frac{1}{2} + \varphi = 0 \quad \text{ἢ} \quad \varphi + \frac{1}{2} = 0$$

$$3 + z = 0 \quad \text{ἢ} \quad z + 3 = 0, \quad \frac{3}{4} + \tau = 0 \quad \text{ἢ} \quad \tau + \frac{3}{4} = 0$$

$$\omega + 4 = 0 \quad \text{ἢ} \quad 4 + \omega = 0$$

Οι άντιθετοι τῶν  $1, 3, 4, -\frac{1}{2}$  καὶ  $\frac{3}{4}$  παρίστανται άντιστοίχως διὰ τῶν  $-1, -3, -4, -\frac{1}{2}$  καὶ  $-\frac{3}{4}$ . Ἐχομεν δέ:  $1 + (-1) = 0$ ,  $3 + (-3) = 0$ ,  $(-4) + 4 = 0$ ,  $\frac{1}{2} + \left(-\frac{1}{2}\right) = 0$  καὶ  $\frac{3}{4} + \left(-\frac{3}{4}\right) = 0$ .

Οι άριθμοι  $-1, -2, -3, -4, -\frac{1}{2}, -\frac{3}{4}$  κ.λ.π. δὲν άνήκουν εἰς τὸ σύνολον  $Q_0^+$  τῶν ρητῶν τῆς άριθμητικῆς Διάτοιτο δρίζομεν τὸ σύνολον τῶν άρνητικῶν ρητῶν, τοῦ δποίου στοιχεῖα εἶναι οἱ άριθμοι  $-1, -2, -3, -\frac{1}{2}, -\frac{3}{4}$ , καὶ γενικῶς ὁ άριθμὸς  $-a$  δπου αε  $Q^+$ .

Τὸ σύνολον τοῦτο συμβολίζομεν διὰ τοῦ  $Q^-$  καὶ ἔχει τὰ στοιχεῖα τοῦ συνόλου  $Q^+$ , πρὸ τῶν δποίων ἔχει τεθῆ τὸ πρόσημον πλήν  $(-)$ . Δηλαδὴ τὰ άντιθετά τῶν στοιχείων τοῦ  $Q^+$ .

Στοιχεῖα τοῦ  $Q^+$ :  $1, \dots, \frac{1}{2}, \dots, \frac{3}{4}, \dots, 2, \dots, 2\frac{1}{2}, \dots, 3, \dots$


Στοιχεῖα τοῦ  $Q^-$ :  $-1, \dots, -\frac{1}{2}, \dots, -\frac{3}{4}, \dots, -2, \dots, -2\frac{1}{2}, \dots, -3, \dots$

**§ 24.** Παρατηροῦμεν εἰς τὸ θερμόμετρον (σχ. 16) διτὶ τὸ ἄκρον τῆς Νδραργυρικῆς στήλης διέρχεται πρὸ τῶν νέων άριθμῶν  $-1, -2, -3$ , κ.λ.π. δταν ἡ θερμοκρασία ἀρχομένη ἐκ τοῦ μηδενὸς θλαττοῦται. (Αὐτὸ δικαιολογεῖ διατί ἐκλέξαμεν τὸ πρόσημον πλήν «» διὰ νὰ παραστήσωμεν τοὺς νέους άριθμούς).

Διὰ νὰ διέλθῃ ὅμως τὸ ἄκρον τῆς Νδραργυρικῆς στήλης πρὸ τῶν ἄνωθεν τοῦ μηδενὸς άριθμῶν, πρέπει ἡ θερμοκρασία, ἀρχομένη ἐκ τοῦ μηδενός, νὰ αὐξάνεται. Διὰ τοῦτο διὰ τὴν παράστασιν τῶν γνωστῶν μας άριθμῶν τοῦ  $Q^+$  θὰ χρησιμοποιήσωμεν τὸ πρόσημον σύν «+».

‘Ως ἐκ τούτου ἐκφράζομεν τὴν λύσιν τοῦ πρώτου προβλήματος ὡς ἔξης: «Ἡ θερμοκρασία τὸ ἐσπέρας θὰ εἶναι  $+3$  βαθμοί».

Εἰς τὸ σύνολον  $Q^+$  άνήκουν τώρα οἱ άριθμοι  $+1, +\frac{1}{2}, +2$ , κ.λ.π. τοὺς δποίους δινομάζομεν θετικούς ρητούς καὶ τὸ σύνολον  $Q^+$  σύνολον τῶν θετικῶν ρητῶν. Ἐχομεν τώρα:



σχ. 16.

$$\begin{array}{l} \text{Στοιχεῖα τοῦ συνόλου } Q^+ : +1, \dots, +\frac{1}{2}, \dots, +2, \dots, +\frac{5}{2}, \dots, +3, \dots \\ \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \\ \text{Στοιχεῖα τοῦ συνόλου } Q^- : -1, \dots, -\frac{1}{2}, \dots, -2, \dots, -\frac{5}{2}, \dots, -3, \dots \end{array}$$

Τὰ στοιχεῖα τοῦ συνόλου τῶν ἀρνητικῶν ρητῶν, λόγω τοῦ δρισμοῦ αὐτῶν, ἀντιστοιχοῦν ἔν πρὸς ἔν πρὸς τὰ στοιχεῖα τοῦ συνόλου  $Q^+$ .

Τὰ στοιχεῖα τοῦ  $Q^-$  λέγονται ἀντίθετα (ἢ συμμετρικά) τῶν ἀντιστοίχων τοῦ  $Q^+$  ὅπως ἐπίσης καὶ τὰ στοιχεῖα τοῦ  $Q^+$  λέγονται ἀντίθετα τῶν ἀντιστοίχων τοῦ  $Q^-$ .

Π.χ. Ὁ ἀντίθετος τοῦ  $+\frac{5}{2}$  εἶναι ὁ  $-\frac{5}{2}$  καὶ ὁ ἀντίθετος τοῦ  $-\frac{5}{2}$  εἶναι ὁ  $+\frac{5}{2}$ . Οὗτοι ἔχουν ἄθροισμα μηδέν.

$$\left( +\frac{5}{2} \right) + \left( -\frac{5}{2} \right) = 0 \quad \text{ἢ} \quad \left( -\frac{5}{2} \right) + \left( +\frac{5}{2} \right) = 0.$$

Ο μηδὲν δὲν ἀνήκει εἰς τὸ  $Q^+$  οὔτε εἰς τὸ  $Q^-$  καὶ συνεπῶς στερεῖται πρόσημοι. (Δὲν γράφομεν  $+0$  ἢ  $-0$ ).

Ἀντίθετος ὅμως τοῦ μηδενὸς εἶναι ὁ μηδέν, διότι  $0+0=0$ .

### § 25. Ἐάν συνοψίσωμεν τὰ ἀνωτέρω ἔχομεν :

Ιον Τὸ γνωστό μας σύνολον  $Q^+$  (τῶν ρητῶν τῆς ἀριθμητικῆς ἑκτὸς τοῦ μηδενὸς) ὡνομάσαμεν σύνολον τῶν θετικῶν ρητῶν καὶ ἔμπροσθεν τῶν στοιχείων αὐτοῦ ἐθέσαμεν τὸ πρόσημον σύν «+».

Εἶναι :

$$\text{Σύνολον θετικῶν ρητῶν} = Q^+ = \{ \dots, +\frac{1}{2}, \dots, +1, \dots, +2, \dots \}$$

Σημείωσις. Εἰς τὰ ἐπόμενα ὁ θετικὸς ρητὸς θὰ γράφεται μετά τοῦ προσήμου του ἢ ἀνευ αὐτοῦ (π.χ. ὁ θετικὸς  $\frac{1}{2}$  θὰ γράφεται  $+\frac{1}{2}$  ἢ  $\frac{1}{2}$ ). Θὰ θέτωμεν δὲ τὸ πρόσημον σύν εἰς τὸν θετικὸν ἀριθμόν, ἐάν θέλωμεν νὰ δώσωμεν μεγαλυτέραν ἔμφασιν εἰς τὴν ἔκφρασιν «θετικός».

**“Ωστε :** Θετικὸς ρητὸς λέγεται κάθε ρητὸς τῆς ἀριθμητικῆς ἑκτὸς τοῦ μηδενός. Πρὸ αὐτοῦ θέτομεν τὸ πρόσημον σύν «+» ἢ οὐδὲν πρόσημον.

Ζον ‘Ωρίσαμεν ἔν νέον σύνολον, τὸ ὅποιον ὡνομάσαμεν σύνολον τῶν ἀρνητικῶν ρητῶν ἐκ τῶν στοιχείων τοῦ συνόλου τῶν ρητῶν τῆς ἀριθμητικῆς, εἰς τὰ ὅποια ἐθέσαμεν ἔμπροσθεν αὐτῶν τὸ πρόσημον πλὴν «—».

**“Ωστε :** Ἀρνητικὸς ρητὸς λέγεται κάθε ἀντίθετος θετικοῦ ρητοῦ. Συμβολικῶς: κάθε ρητὸς τῆς ἀριθμητικῆς, ἑκτὸς τοῦ μηδενός, ὁ ὅποιος ἔχει τὸ πρόσημον πλὴν «—».

Είναι : Σύνολον άρνητικών ρητῶν =  $Q^- = \{..., -\frac{1}{2}, \dots, -1, \dots, -2, \dots\}$ .

Ξον Μεταξύ τῶν στοιχείων τῶν συνόλων  $Q^+$  καὶ  $Q^-$  ὑπάρχει ἀμφιμονοσήμαντος ἀντίστοιχία. Τὰ ἀντίστοιχα στοιχεῖα είναι αὐτά, τὰ δόποια ἔγιναν ἀπό τὸ αὐτὸ στοιχεῖον τοῦ συνόλου τῶν ρητῶν τῆς ἀριθμητικῆς καὶ λέγονται ἀντίθετα στοιχεῖα.

"Ωστε : Κάθε θετικὸς ρητὸς ἔχει ἔνα καὶ μόνον ἔνα ἀρνητικὸν ὡς ἀντίθετόν του. Καὶ κάθε ἀρνητικὸς ἔχει ἔνα καὶ μόνον ἔνα θετικὸν ὡς ἀντίθετόν του.

### Άσκήσεις

45. Ἀπαντήσατε εἰς τὰ κάτωθι ἐρωτήματα :

α) Ἐνήκει δὲ μηδὲν εἰς τὸ σύνολον  $Q^+$  ἢ εἰς τὸ  $Q^-$ ;

β) Ποῖοι οἱ ἀντίθετοι τῶν :  $+\frac{35}{17}$ ,  $-20$ ,  $+\frac{17}{20}$ ,  $-\frac{25}{2}$ ,  $+16$ ,  $15$ ,  $\frac{1}{2}$

46. Ποῖοι είναι οἱ ἀρνητικοὶ ρητοὶ  $x$ ,  $y$ ,  $z$ ,  $w$ ,  $\phi$ , διὰ τοὺς δόποιους ἔχομεν :

$$x + \frac{7}{8} = 0, \quad \frac{11}{3} + y = 0, \quad \frac{1}{5} + z = 0, \quad w + 10,3 = 0, \quad \phi + 12 = 0.$$


47. Ποῖοι είναι οἱ θετικοὶ ρητοὶ  $\kappa$ ,  $\lambda$ ,  $\mu$ ,  $\nu$ , διὰ τοὺς δόποιους ἔχομεν :

$$-\frac{8}{9} + \kappa = 0, \quad \lambda + \left(-\frac{2}{7}\right) = 0, \quad \mu + (-100) = 0, \quad -\frac{35}{2} + \nu = 0;$$

48. Ποῖον κανόνα γνωρίζετε διὰ τοὺς ἀντιθέτους ρητούς;

### 3. ΤΟ ΣΥΝΟΛΟΝ $Q$

#### ΤΩΝ ΡΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ — ΕΦΑΡΜΟΓΑΙ




§ 26. Τὸ σχῆμα 17α παριστᾶ τὴν ἡμιευθεῖαν  $A'X$  ἐπὶ τῆς ὅποιας ἔχουν τοποθετηθῆ, κατὰ τὸν γνωστὸν τρόπον, οἱ ρητοὶ τῆς ἀριθμητικῆς.

Εἰς τὸ σχῆμα 17β γίνεται ἐπέκτασις τῆς ἡμιευθεῖας  $A'X$  κατὰ τὴν ἀντικειμένην αὐτῆς  $A'X'$  καὶ ἐμφανίζεται ἡ εύθεια  $X'A'X$ . Οἱ ρητοὶ τῆς ἀριθμητικῆς (ἐκτὸς τοῦ μηδενὸς), οἱ ὅποιοι εἰναι τοποθετημένοι ἐπὶ τῆς  $A'X$  λέγονται τώρα θετικοὶ ρητοί.

"Ἐπὶ τῆς ἡμιευθεῖας  $A'X'$  δύνανται νὰ τοποθετηθοῦν (εἰς τὸ σχῆμα ἔχουν τοποθετηθῆ) οἱ ἀντίθετοι τῶν ρητῶν τῆς ἀριθμητικῆς, οἱ ἀρνητικοί, κατὰ τρόπον, ὡστε ἕκαστος ἀρνητικὸς νὰ τοποθετήται ἐπὶ σημείου ἀριστερά τοῦ  $A$ , τὸ ὅποιον νὰ ἀπέχῃ ἀπὸ τούτου ὅσον ἀπέχει τὸ σημεῖον ἐπὶ τοῦ ὅποιου ἔχει τοποθετηθῆ ὁ ἀντίθετος αὐτοῦ θετικός.

"Ωστε οἱ ἀντίθετοι τοποθετοῦνται ἐπὶ τῆς  $X'A'X$  συμμετρικῶς ὡς πρὸς τὸ σημεῖον  $A$ .

Δυνάμεθα ἐκ τούτου νὰ παρατηρήσωμεν ὅτι πᾶς θετικὸς εἰναι δεξιὰ τοῦ μηδενὸς καὶ ὅτι πᾶς ἀρνητικὸς εἰναι ἀριστερὰ τοῦ μηδενός.



σχ. 17γ.

Εἰς τὸ σχῆμα 17γ ἔχομεν τοποθετήσει ἐπὶ εύθειας: α) τὸ σύνολον τῶν ἀρνητικῶν ρητῶν, β) τὸ σύνολον τοῦ ὅποιου στοιχείου εἰναι μόνον τὸ μηδὲν καὶ γ) τὸ σύνολον τῶν θετικῶν ρητῶν.

"Ἡ ἔνωσις τῶν τριῶν τούτων συνόλων δίδει ἐν νέον σύνολον  $Q$  ( $Q = Q^- \cup \{0\} \cup Q^+$ ), τὸ ὅποιον λέγεται σύνολον τῶν ρητῶν πραγματικῶν ἀριθμῶν.

**Σημείωσις α'.** Ο τρόπος μὲ τὸν ὅποιον παρεστήσαμεν τοὺς ρητοὺς ἐπὶ τῆς εύθειας  $X'A'X$  σημαίνει ὅτι ἕκαστος ρητὸς ἔχει τοποθετηθῆ ἐπὶ ἑνὸς μόνον σημείου τῆς εύθειας, χωρὶς τούτο νὰ σημαίνῃ ὅτι εἰς κάθε σημεῖον αὐτῆς ἔχει τοποθετηθῆ εἰς ρητὸς πραγματικὸς ἀριθμός.

**Σημείωσις β'.** Εἰς τὰ ἐπόμενα θὰ λέγωμεν «ρητὸς» καὶ θὰ ἐννοοῦμεν «πραγματικὸς ρητός».

**Σημείωσις γ'.** Εἰς παλαιότερα βιβλία οἱ πραγματικοὶ ρητοὶ ὀνομάζοντο σχετικοί (ρητοί) ἀριθμοί.

§ 27. Υποσύνολα τοῦ  $Q$  (συνόλου τῶν ρητῶν) εἶναι προφανῶς τά:  $Q^-$ ,  $\{0\}$ ,  $Q^+$ .

Όμοιώς ύποσύνολα τοῦ  $Q$  εἶναι τὰ σύνολον τῶν ἀρνητικῶν ἀκεραίων, τὸ δποῖον συμβολίζομεν διὰ τοῦ  $Z^-$  (τοῦτο εἶναι ύποσύνολον καὶ τοῦ  $Q^-$ ) καὶ τὸ σύνολον τῶν θετικῶν ἀκεραίων, τὸ δποῖον συμβολίζομεν διὰ τοῦ  $Z^+$ . (Τὸ  $Z^+$  εἶναι ύποσύνολον καὶ τοῦ  $Q^+$ ).


Ἡ ἔνωσις τῶν συνόλων  $Z^-$ ,  $\{0\}$ ,  $Z^+$ , δίδει τὸ σύνολον τῶν ἀκεραίων τὸ δποῖον συμβολίζομεν διὰ τοῦ  $Z$ .

$$\underbrace{\{\dots, -4, -3, -2, -1\}}_{Z^-} \cup \{0\} \cup \underbrace{\{+1, +2, +3, +4, \dots\}}_{Z^+}$$

$$\underbrace{Z^-}_{\text{---}} \cup \underbrace{\{0\}}_{\text{---}} \cup \underbrace{Z^+}_{\text{---}}$$

$$\text{Ωστε } Z = Z^- \cup \{0\} \cup Z^+$$

Τὸ σχῆμα 175 εἶναι τὸ διάγραμμα τοῦ συνόλου  $Q$  τῶν ρητῶν ἀριθμῶν.



σχ. 175.

\*Ανακεφαλαίωσις :

- Οἱ ἀρνητικοὶ ρητοί, τὸ μηδὲν καὶ οἱ θετικοὶ ρητοὶ λέγονται **ρητοὶ ἀριθμοὶ** καὶ τὸ σύνολον αὐτῶν συμβολίζεται διὰ τοῦ  $Q$ .

Τὰ στοιχεῖα τοῦ  $Q$  ἐντὸς τοῦ ἀγκίστρου γράφονται καὶ ὡς ἔξῆς :

$$Q = \{0, \pm \frac{1}{2}, \pm 1, \pm \frac{3}{2}, \pm 2, \pm 3, \dots\}$$

- Οἱ ἀρνητικοὶ ἀκέραιοι, τὸ μηδὲν καὶ οἱ θετικοὶ ἀκέραιοι λέγονται **ἀκέραιοι ἀριθμοὶ** καὶ τὸ σύνολον αὐτῶν συμβολίζεται διὰ τοῦ  $Z$ .

Τὰ στοιχεῖα τοῦ  $Z$  ἐντὸς τοῦ ἀγκίστρου γράφονται, συντόμως καὶ ὡς ἔξῆς :  $Z = \{0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots\}$

§ 28. \*Εφαρμογαὶ :

Τοὺς ρητοὺς ἀριθμοὺς χρησιμοτοιοῦμεν εἰς προβλήματα τῆς καθημερινῆς ζωῆς.

1. Τὸ θερμόμετρον α (σχ. 18) δεικνύει 1 βαθμ. ἀνωθεν τοῦ μηδενός.

Ἐάν καλυφθῇ ἡ θερμομετρικὴ κλίμαξ (σχ. 18β) κατὰ τρόπον, ώστε νὰ διακρίνηται μόνον τὸ ἄκρον τῆς ὑδραργυρικῆς στήλης καὶ ὁ παραπλεύρως ἀριθμὸς τῆς κλίμακος, ὁ ὅποιος εἶναι ὁ «1», δὲν δυνάμεθα μετὰ βεβαιότητος νὰ ἀπαντήσωμεν διὸ ἡ θερμοκρασία εἶναι 1 βαθμ. ἀνωθεν τοῦ μηδενός ἢ 1 βαθμ. κάτωθεν τοῦ μηδενός.


Διὰ τὸ θερμόμετρον δύμας γ δὲν ἀντιμετωπίζουμεν αὐτὴν τὴν δυσκολίαν, διότι, ἐάν τὸ ἄκρον τῆς ὑδραργυρικῆς στήλης εἶναι εἰς τὸν -1, θὰ ἔννοήσωμεν διὸ ἡ θερμοκρασία εἶναι 1 βαθμ. ἀνωθεν τοῦ μηδενός, ἐάν εἶναι εἰς τὸν +1, ἡ θερμοκρασία εἶναι 1 βαθμ. ἀνωθεν τοῦ μηδενός.

2. Οἱ ταμίαις δύναται νὰ ἀντικαταστήσῃ τὰς ἑκφράσεις: «πληρωμὴ 2000 δρχ.», «εἰσπραξὶς 1800 δρχ.» ἀντιστοίχως διὰ τῶν ρητῶν -2000 δρχ. καὶ +1800 δρχ.

3. Αἱ πρὸ Χριστοῦ χρονολογίαι δύνανται νὰ παρασταθοῦν ὑπὸ ἀρνητικῶν ρητῶν καὶ αἱ χρονολογίαι μετὰ Χριστὸν ὑπὸ θετικῶν ρητῶν.

Π.χ. ἐάν γράψωμεν -300 ἔτη, ἔννοοῦμεν 300 ἔτη πρὸ Χριστοῦ, ἐνῷ ἐάν γράψωμεν +1900 ἔτη, (ἢ 1900 ἔτη), ἔννοοῦμεν 1900 ἔτη μ.Χ.

4. Διὰ τὸ κέρδος καὶ τὴν ζημίαν δυνάμεθα νὰ χρησιμοποιήσωμεν τοὺς ρητοὺς ἀριθμούς.



σχ. 18.

### \*Ασκήσεις :

49. Ἀπαντήσατε εἰς τὰ κάτωθι ἔρωτήματα:

- α) Ὁ μηδὲν ἀνήκει εἰς τὸ Q;
- β) Ὁ μηδὲν ἀνήκει εἰς τὸ Z;
- γ) Ποία εἶναι ἡ τομὴ καὶ ἡ ἔνωσις τῶν συνόλων Z-, Z+;
- δ) Ποία εἶναι ἡ τομὴ καὶ ἡ ἔνωσις τῶν συνόλων Q-, Q+;
- ε) Τὸ σύνολον Z είναι ὑποσύνολον τοῦ συνόλου Q+ ἢ τοῦ Q-;
- ζ) Διαμερίσατε τὰ σύνολα Q καὶ Z εἰς γνωστά σας ὑποσύνολα.

50. Χρησιμοποιήσατε τοὺς ρητούς διὰ νὰ ἑκφράσητε συντόμως τὰ κάτωθι:

$\frac{3}{2}$  m ὑπὸ τὴν ἐπιφάνειαν τῆς θαλάσσης.

500 m ὑπὲρ τὴν ἐπιφάνειαν τῆς θαλάσσης.

Κέρδος 2600 δρχ., ζημία 3500 δρχ..

Χρονολογία τῆς μάχης τῶν Θερμοπυλῶν.

Χρονολογία κηρύξεως τῆς Ἑλληνικῆς ἐπαναστάσεως.

“Ετος γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ.

51. Εὑρετε παραδείγματα, εἰς τὰ ὅποια νὰ χρησιμοποιοῦνται οἱ ρητοὶ ἀριθμοί.

**4. ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΤΙΜΗ ΡΗΤΟΥ — Η ΙΣΟΤΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟΝ  
ΤΩΝ ΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΗΣ**

**§ 29. Ἀπόλυτος τιμὴ ρητοῦ.**

Ἄπολύτους ρητούς ἀριθμούς δινομάζομεν τοὺς ρητούς τῆς ἀριθμητικῆς, ἐπομένως καὶ τοὺς θετικούς ρητούς.

Ο θετικὸς ἀριθμὸς πέντε γράφεται  $+5$  ή  $5$ , δηλαδὴ συμβολίζεται μὲ τὸν ἀπόλυτον  $5$  καὶ τὸ πρόσημον σὺν ἔμπροσθεν αὐτοῦ ή μόνον μὲτὸν ἀπόλυτον  $5$ .

Ο ἀπόλυτος ἀριθμὸς  $5$  λέγεται ἀπόλυτος τιμὴ τοῦ  $+5$ . Αὐτὸς συμβολίζεται ὡς ἔξῆς :  $|+5|=5$ .

Ωστε ἀπόλυτον τιμὴν θετικοῦ καλοῦμεν τὸν ἴδιον τὸν ἀριθμόν.

Ο ἀρνητικὸς τρία γράφεται  $-3$ . Συμβολίζεται μὲ τὸν ἀπόλυτον τρία καὶ τὸ πρόσημον πλήν ἔμπροσθεν αὐτοῦ. Ο  $3$  λέγεται ἀπόλυτος τιμὴ τοῦ  $-3$  καὶ συμβολίζεται μὲ  $| -3 |$ . Εἶναι δὲ  $| -3 | = 3$  καὶ διαβάζομεν : «ἀπόλυτος τιμὴ τοῦ πλήν τρία ἵσον τρία».

Ωστε ἀπόλυτος τιμὴ ἀρνητικοῦ ἀριθμοῦ εἶναι ὁ ἀντίθετός του.

Ἐπειδὴ  $| +3 | = 3$  καὶ  $| -3 | = 3$  ἔχομεν  $| +3 | = | -3 |$  (διατί;)

Ἀπόλυτος τιμὴ τοῦ μηδενὸς εἶναι τὸ μηδέν.  $| 0 | = 0$ .

Γενικῶς : ἐὰν  $\alpha$  εἴναι θετικὸς ρητός, ἔχομεν  $|\alpha| = \alpha$ ,

ἐὰν  $\alpha$  εἴναι ἀρνητικὸς ρητός, ἔχομεν  $|\alpha| = \text{ἀντίθετος τοῦ } \alpha$   
καὶ      ἐὰν  $\alpha$  εἴναι μηδέν,      ἔχομεν  $|\alpha| = 0$ .

**Ἐφαρμογαί :**

α) Νὰ εύρεθῇ ἡ ἀπόλυτος τιμὴ τῶν ρητῶν :

$$-\frac{7}{2}, -\frac{1}{8}, +\frac{3}{5}, +2\frac{4}{9}, +3, 6, \frac{4}{5}, 0.$$

$$\text{Έχομεν : } \left| -\frac{7}{2} \right| = \frac{7}{2}, \left| -\frac{1}{8} \right| = \frac{1}{8}, \left| +\frac{3}{5} \right| = \frac{3}{5},$$

$$\left| +2\frac{4}{9} \right| = 2\frac{4}{9}, \quad |+7|=7, \quad |6|=6, \quad \left| \frac{4}{5} \right| = \frac{4}{5}, \quad |0|=0.$$

β) Ἐὰν  $|x-1| = 12$  καὶ  $x-1$  εἴναι θετικὸς ρητός, νὰ εύρεθῇ  $\delta x$ .

Ἐπειδὴ  $x-1$  εἴναι θετικός ἔχομεν  $|x-1| = x-1$ . Ἀρα  $|x-1| = x-1 = 12 \iff x = 12 + 1 \iff x = 13$ .

**§ 30. Συμβολισμὸς ρητοῦ μὲ ἐν γράμμα**

Ως εἶδομεν, συμβολίσαμεν τυχόντα ρητὸν μὲ ἐν γράμμα  $\alpha$ .

Δυνάμεθα πάντοτε νὰ συμβολίζωμεν διὰ γραμμάτων τοὺς ρητοὺς ἀριθμούς.

"Οταν λέγωμεν ότι δ β είναι ρητός άριθμός, θά έννοούμεν ότι δυνάμεθα νὰ άντικαταστήσωμεν τὸν β μὲ δποιονδήποτε ρητὸν άριθμόν, δηλαδὴ θετικόν, άρνητικὸν ἢ μηδέν.

'Η ἔκφρασις «δ β είναι θετικός» συμβολίζεται:  $\beta = +|\beta|$

'Η ἔκφρασις «δ β είναι άρνητικός» συμβολίζεται:  $\beta = -|\beta|$

§ 31. Δύο ἢ περισσότεροι θετικοὶ άριθμοὶ είναι δμόσημοι.

Δύο ἢ περισσότεροι άρνητικοὶ άριθμοὶ είναι δμόσημοι.

Εἰς θετικὸς καὶ εἷς άρνητικὸς είναι ἑτερόσημοι.

Π.χ. δ  $+ \frac{3}{4}$  καὶ  $-\frac{2}{3}$  είναι ἑτερόσημοι

δ - 2 καὶ  $+\frac{1}{2}$  είναι ἑτερόσημοι

δ 3 καὶ -4 είναι ἑτερόσημοι

Οἱ άριθμοὶ:  $+\frac{3}{2}, +2, +1, \frac{4}{7}, 8$  είναι δμόσημοι.

Οἱ άριθμοὶ:  $-\frac{3}{10}, -4, -20, -2\frac{1}{4}, -5$  είναι δμόσημοι.

§ 32. 'Η ισότης εἰς τὸ σύνολον τῶν ρητῶν.

Γνωρίζομεν ότι δ άριθμὸς δκτώ δύναται νὰ παρασταθῇ διὰ τῶν συμβόλων  $8, \frac{16}{2}, 6+2, 2 \cdot 4$  κ.λ.π.

'Επομένως  $8 = \frac{16}{2} = 6 + 2 = 2 \cdot 4$ . "Οταν λέγωμεν ότι δύο άριθμοὶ α καὶ β τῆς άριθμητικῆς είναι ίσοι, έννοούμεν ότι πρόκειται περὶ δύο διαφορετικῶν συμβολισμῶν τοῦ αὐτοῦ ρητοῦ.

'Εὰν ἔχωμεν τώρα τοὺς ρητοὺς  $+3$  καὶ  $+\frac{6}{2}$ , παρατηροῦμεν ότι ἔχουν ίσας ἀπολύτους τιμάς ( $|+3| = 3$  καὶ  $|+\frac{6}{2}| = \frac{6}{2}$  ἕρα  $|+3| = |+\frac{6}{2}|$  ἢ  $3 = \frac{6}{2}$ ) καὶ τὸ αὐτὸν πρόσημον (δμόσημοι).

'Επίσης οἱ ρητοὶ  $-\frac{2}{5}$  καὶ  $-\frac{4}{10}$  ἔχουν ίσας ἀπολύτους τιμάς καὶ είναι δμόσημοι.

Τοὺς ρητούς, οἱ δποῖοι είναι δμόσημοι καὶ ἔχουν ίσας ἀπολύτους τιμάς, δνομάζομεν ίσους.

"Ωστε οἱ ρητοὶ α καὶ β λέγονται ίσοι (συμβολικῶς  $\alpha = \beta$ ), εάν καὶ μόνον εάν είναι δμόσημοι καὶ ἔχουν ίσας ἀπολύτους τιμάς.

'Ο συμβολισμὸς  $\alpha = \beta$ , δ δποῖος σημαίνει ότι δ α είναι ίσος πρὸς τὸν β, λέγεται ισότης.

Έπειδή  $\delta -5 = -5$ , Ισχύει ή άνακλαστική ίδιότης της Ισότητος.

Έπισης έτσι  $-5 = -\frac{10}{2}$ , είναι και  $-\frac{10}{2} = -5$ . Επομένως Ισχύει και ή συμμετρική ίδιότης της Ισότητος.

Τέλος έτσι  $-5 = -\frac{10}{2}$  και  $-\frac{10}{2} = -\frac{15}{3} \Rightarrow -5 = -\frac{15}{3}$  δηρα Ισχύει και ή μεταβατική ίδιότης της Ισότητος.

Ωστε ή Ισότης τῶν ρητῶν δριθμῶν ἔχει τὰς γνωστάς ίδιότητας:  
 $\alpha = \alpha$  (άνακλαστική ίδιότης)

$\alpha = \beta \Rightarrow \beta = \alpha$  (συμμετρική ίδιότης)

$\alpha = \beta$  καὶ  $\beta = \gamma \Rightarrow \alpha = \gamma$  (μεταβατική ίδιότης).

### Α σκήσεις :

52. Νὰ εύρεθῇ ή διπόλυτος τιμὴ τῶν κάτωθι ρητῶν:

$$+8, -\frac{25}{3}, -\frac{13}{20}, +\frac{12}{3}, +\frac{1}{12}, \frac{11}{4}, 0.$$

53. Ποίους ρητοὺς παριστοῦν τὰ  $x, \psi, z$  έτσι :

$$|x| = 1, |\psi| = 0, |z| = \left| -\frac{3}{2} \right|$$

54. α) Έάν  $|x + 3| = 5$  καὶ  $x + 3$  είναι θετικὸς ρητός νὰ εύρεθῇ δ  $x$ .

β) Έάν  $|3x| = 0$  νὰ εύρεθῇ δ  $x$ .

γ) Έάν διὰ τοὺς ρητοὺς  $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ , ξέχωμεν  $\alpha + 1 = \beta + \gamma + \delta$  καὶ  $\beta + \gamma + \delta = 5$  νὰ εύρεθῇ δ  $\alpha$ .

55. Εξετάσατε έτσι οἱ δριθμοὶ  $\alpha$  καὶ  $\gamma$  είναι δμόσημοι ή έτερόσημοι εἰς τὰς κάτωθι περιπτώσεις.

1. α είναι δμόσημος πρὸς τὸν  $\beta$  καὶ  $\beta$  είναι δμόσημος πρὸς τὸν  $\gamma$ .
2. α είναι δμόσημος πρὸς τὸν  $\beta$  καὶ  $\beta$  είναι έτερόσημος πρὸς τὸν  $\gamma$ .
3. α είναι έτερόσημος πρὸς τὸν  $\beta$  καὶ  $\beta$  είναι έτερόσημος πρὸς τὸν  $\gamma$ .
4. α είναι έτερόσημος πρὸς τὸν  $\beta$  καὶ  $\beta$  είναι δμόσημος πρὸς τὸν  $\gamma$ .

## Β'. ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟΝ ΤΩΝ ΡΗΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

Αἱ πράξεις εἰς τὸ σύνολον  $Q$  είναι ή πρόσθεσις, ή άφαίρεσις, ή πολλαπλασιασμός καὶ ή διαιρεσις.

### § 33.

#### 1. ΠΡΟΣΘΕΣΙΣ

α) Αεροπλάνον ἀνῆλθεν κατ' ἀρχὴν 3 km καὶ κατόπιν ἀλλα 2 km. Εἰς ποιὸν ὅψος τελικῶς ἀνῆλθεν τὸ ἀεροπλάνον;

Προφανῶς τὸ ἀεροπλάνον ἀνῆλθεν 5 km.

Έάν χρησιμοποιήσωμεν τούς ρητούς άριθμούς τότε η έκφρασης « $\Delta v$  ήλθεν 3 km» συμβολίζεται  $+3$  km, δημοίως διά το « $\Delta v$  ήλθεν 2 km» έχομεν  $+2$  km καὶ διά το « $\Delta v$  ήλθεν 5 km» γράφομεν  $+5$  km.

Έπειδὴ  $\Delta v$  ήλθεν 3 km +  $\Delta v$  ήλθεν 2 km =  $\Delta v$  ήλθεν 5 km,  
έχομεν  $(+3 \text{ km}) + (+2 \text{ km}) = +5 \text{ km}.$

Έάν το  $\Delta v$  ήλθεν κατά 3 καὶ κατά 2 km, τοῦτο θὰ κατήρχετο τελικῶς κατά 5 km. Άρα  $(-3 \text{ km}) + (-2 \text{ km}) = -5 \text{ km}.$

Συνεπῶς τὸ άθροισμα δύο διαφοράς ρητῶν είναι ρητὸς διαφοράς πρὸς αὐτοὺς καὶ ἔχει ὡς ἀπόλυτον τιμὴν τὸ άθροισμα τῶν ἀπολύτων τιμῶν αὐτῶν.

### Παραδείγματα.

$$(+5) + (+8) = +13 = + (5 + 8)$$

$$(-7) + (-3) = -10 = -(7 + 3)$$

$$\left( +\frac{6}{11} \right) + \left( +\frac{5}{11} \right) = +\frac{11}{11} = +\left( \frac{6}{11} + \frac{5}{11} \right)$$

$$\left( -\frac{3}{4} \right) + \left( -\frac{2}{4} \right) = -\frac{5}{4} = -\left( \frac{3}{4} + \frac{2}{4} \right)$$

Γενικῶς έάν  $\alpha$  καὶ  $\beta$  είναι θετικοί, τὸ άθροισμα  $\alpha + \beta$  είναι θετικός καὶ  $\Delta v$  πρὸς αὐτοῦ ισοῦται πρὸς τὸ άθροισμα τῶν ἀπολύτων τιμῶν.

$$|\alpha + \beta| = |\alpha| + |\beta|$$

(Έάν  $\alpha$  καὶ  $\beta$  είναι ἀρνητικοί, τὸ  $\alpha + \beta$  είναι ἀρνητικός).

β) Είναι γνωστὸν ότι τὸ μηδὲν είναι οὐδέτερον στοιχείον τῆς προσθέσεως εἰς τὸ σύνολον  $Q_0^+$ . Δηλαδὴ  $5 + 0 = 0 + 5 = 5$ , ἐπομένως καὶ  $(+5) + 0 = 0 + (+5) = +5$ .

Έάν ή θερμοκρασία είναι  $-2$  βαθμ. καὶ  $\Delta v$  ήλθη κατά 0 βαθμούς, τελικῶς έχωμεν θερμοκρασίαν  $-2$  βαθμούς. Άρα  $(-2) + 0 = -2$  δημοίως καὶ  $0 + (-2) = -2$ .

Ωστε τὸ μηδὲν είναι οὐδέτερον στοιχείον τῆς προσθέσεως εἰς τὸ σύνολον τῶν ρητῶν.

Συμβολικῶς : Έάν  $\alpha \in Q \Rightarrow \alpha + 0 = 0 + \alpha = \alpha$ .

γ) Έάν ή θερμοκρασία  $\Delta v$  ήλθη κατά 3 βαθμ. καὶ κατόπιν κατέληθη κατά 3 βαθμ., οὐδὲμία τελικῶς μεταβώλη τῆς θερμοκρασίας γίνεται. Δηλαδὴ

$$(+3) + (-3) = 0$$

Τὸ άθροισμα δύο  $\Delta v$  ήλθετων ρητῶν ισοῦται πρὸς μηδέν.

δ) Νά εύρεθη τὸ άθροισμα  $(-3) + (+7)$ .

Διά νά έπιλυσωμεν αύτὸ τὸ πρόβλημα, θὰ στηριχθῶμεν εἰς τοὺς κανόνας τοῦ άθροισμάτος τῶν διαφοράς καὶ τοῦ άθροισμάτος τῶν  $\Delta v$  ήλθετων ρητῶν.

Έπειδή  $+7 = + (3+4) = (+3) + (+4)$ ,  
 έχομεν:  $(-3) + (+7) = (-3) + \underbrace{(+3) + (+4)}_0 = 0 + (+4) = +4 =$   
 $= + (7-3)$ .

Διά την εύρεσιν του άθροίσματος  $(+3) + (-5)$  έργαζόμεθα δμοίως. Δηδή  $-5 = -(3+2) = (-3) + (-2)$ , οπότε  $(+3) + (-5) = \underbrace{(+3) + (-3)}_0 + (-2) =$   
 $= 0 + (-2) = -2 = -(5-3)$ .

Έκ των άνωτέρω παραδειγμάτων άθροίσματος δύο έτεροσήμων ρητῶν έχομεν:

Τὸ ἀθροίσμα δύο έτεροσήμων ρητῶν εἶναι ρητὸς δύμοσημος πρὸς ἔκεινον, δὸποῖος ἔχει τὴν μεγαλυτέραν ἀπόλυτον τιμῆν. Ἡ ἀπόλυτος τιμὴ αὐτοῦ ισοῦται πρὸς τὴν διαφορὰν (τῆς μικροτέρας ἀπὸ τῆς μεγαλυτέρας) τῶν ἀπολύτων τιμῶν.

Παραδείγματα.

$$(-12) + (+11) = -(12 - 11) = -1$$

$$(+10) + (-4) = +(10 - 4) = +6$$

$$\left( -\frac{7}{8} \right) + \left( +\frac{5}{8} \right) = -\left( \frac{7}{8} - \frac{5}{8} \right) = -\frac{2}{8}$$

Γενικῶς:

Έὰν  $\alpha \in Q^+$ ,  $\beta \in Q^-$  καὶ  $|\alpha| > |\beta| \Rightarrow \alpha + \beta = +(|\alpha| - |\beta|)$ , δπου  $|\alpha| - |\beta| > 0$

Έὰν  $\alpha \in Q^+$ ,  $\beta \in Q^-$  καὶ  $|\alpha| < |\beta| \Rightarrow \alpha + \beta = -(|\beta| - |\alpha|)$ , δπου  $|\beta| - |\alpha| > 0$

\*Εφαρμογαί.

1.  $(+4) + (+2) = +6 = + (4+2)$ ,  $(+4) + (-7) = -3 = -(7-4)$   
 $(-2) + (-3) = -5 = -(2+3)$ ,  $(-3) + (+8) = +5 = +(8-3)$

2.  $\left( -\frac{1}{6} \right) + \left( -\frac{5}{6} \right) = -\frac{6}{6} = -\left( \frac{1}{6} + \frac{5}{6} \right)$ ,

- $\left( -\frac{5}{3} \right) + \left( +\frac{2}{3} \right) = -\frac{3}{3} = -\left( \frac{5}{3} - \frac{2}{3} \right)$

§ 34. Έκ τῶν άνωτέρω καὶ τῶν προηγουμένων παραδειγμάτων παρατηροῦμεν δτὶ ύπάρχει πάντοτε τὸ ἀθροίσμα δύο ρητῶν καὶ εἴναι μονότιμον (εύρισκεται μόνον μία τιμὴ αὐτοῦ), διότι δύπολογισμός του άναγεται εἰς τὴν πρόσθεσιν ἢ εἰς τὴν ἀφαίρεσιν τῶν ἀπολύτων ἀριθμῶν.

Γενικώς έλλαν  $\alpha$  και  $\beta$  είναι ρητοί, όπάρχει δι ρητός  $(\alpha + \beta)$  [συμβολικώς :  $\alpha, \beta \in Q \Rightarrow (\alpha + \beta) \in Q$ ], διόποιος λέγεται άθροισμα αυτῶν.

Τὸ ἀθροισμα δύο ρητῶν είναι μονότιμον.


\*Επειδή  $(+2) + (-5) = -3$  και  $(-5) + (+2) = -3$  έχομεν διτι  $(+2) + (-5) = (-5) + (+2)$ .

\*Ωστε :

\*Έλλαν  $\alpha$  και  $\beta$  είναι ρητοί, έχομεν  $\alpha + \beta = \beta + \alpha$  (μεταθετική ίδιότης τῆς προσθέσεως).


3. Κατωτέρω δίδεται γεωμετρική έρμηνεία τῶν προσθέσεων τῆς 1ης έφαρμογῆς.

$$(+4) + (+2) = +6$$




σχ. 19.

$$(-2) + (-3) = -5$$




σχ. 20.

$$(+4) + (-7) = -3$$



σχ. 21.

$$(-3) + (+8) = +5$$



σχ. 22.

4. \*Έλλαν είς άμφότερα τὰ μέλη τῆς ισότητος  $-3 = -\frac{6}{2}$  προσθέσωμεν τὸν  $+2$  λαμβάνομεν :

$$\alpha' \text{ μέλος } -3 + (+2) = -1$$

$$\beta' \text{ μέλος } -\frac{6}{2} + (+2) = -\left(\frac{6}{2} - 2\right) = -1$$

$$\text{Άρα } -3 + (+2) = -\frac{6}{2} + (+2).$$

$$\text{Γενικώς } \alpha = \beta \Rightarrow \alpha + \gamma = \beta + \gamma \quad (\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{Q})$$

**Άσκήσεις :**

56. Νά υπολογισθοῦν τὰ ἀθροίσματα :

$$\alpha) (+3) + \left(+\frac{1}{2}\right), \quad \beta) (-5) + (-19), \quad \gamma) (+12) + (-7),$$

$$\delta) (+7) + (-13,5), \quad \epsilon) \left(-\frac{1}{2}\right) + (+1), \quad \sigma) \left(-\frac{13}{4}\right) + \left(-\frac{1}{2}\right),$$

$$\zeta) \left(+\frac{2}{5}\right) + \left(-\frac{3}{10}\right), \quad \eta) (-1) + \left(+\frac{3}{2}\right), \quad \theta) -\frac{4}{3} + \left(+\frac{1}{6}\right),$$

$$\iota) +\frac{5}{2} + \left(-\frac{3}{5}\right), \quad \varsigma) +\frac{3}{8} + \left(-\frac{87}{16}\right), \quad \wp) +\frac{2}{5} + \left(-\frac{4}{7}\right).$$

57. Νά εύρεθοῦν τὰ κάτωθι ἀθροίσματα μὲ τὸν κανόνα προσθέσεως δμοσήμων ρητῶν.

$$\alpha) (-3) + (-2) + (-1), \quad \beta) \left(-\frac{2}{5}\right) + \left(-\frac{2}{5}\right) + \left(-\frac{2}{5}\right),$$

$$\gamma) (-2) + (-2) + (-2), \quad \delta) -\frac{3}{4} + (-1) + \left(-\frac{3}{8}\right) + \left(-\frac{1}{2}\right).$$

(διὰ τὴν α' νὰ δοθῇ καὶ γεωμετρική ἔρμηνείσ)

58. Εάν  $\alpha, \beta, \gamma, \delta$  εἶναι ρητοί νὰ ἐπαληθεύσητε δι' ἀριθμητικῶν παραδειγμάτων τὴν κάτωθι ίδιότητα.

$$\alpha = \beta \text{ καὶ } \gamma = \delta \Rightarrow \alpha + \gamma = \beta + \delta$$

**Σημείωσις.** Η ἑργασία αὐτή λέγεται πρόσθεσις τῶν δύο ισοτήτων κατὰ μέλη.

Η ἀνωτέρω ίδιότητα ἐκφράζει τὸ μονότιμον τῆς προσθέσεως.

59. Εάν οἱ  $\alpha, \beta$  εἶναι ἀπόλυτοι ἀριθμοὶ καὶ  $\beta < \alpha$ , νὰ δικαιολογήσητε βάσει τῶν κανόνων τῆς προσθέσεως τὰ ἀποτελέσματα τῶν ἀθροίσμάτων :

$$1. (+\alpha) + (-\beta) = +(\alpha - \beta), \quad 2. (-\alpha) + (+\beta) = -( \alpha - \beta)$$

$$3. (-\alpha) + (-\beta) = -(\alpha + \beta), \quad 4. (+\alpha) + (+\beta) = +(\alpha + \beta)$$

## 2. ΠΡΟΣΘΕΣΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΡΟΣΘΕΤΕΩΝ – ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΣΕΩΣ

§ 35. Νά υπολογισθῇ τὸ ἀθροίσμα  $(+2) + (+3) + (-6)$ . Θὰ υπολογίσωμεν τὸ ἀθροίσμα αὐτὸ ἑργαζόμενοι, ὅπως ἐμάθομεν εἰς τὴν Α' τάξιν.

Δηλαδὴ θὰ εύρωμεν τὸ ἀθροίσμα τῶν δύο πρώτων προσθετέων,  $(+2) + (+3) = +5$  καὶ θὰ προσθέσωμεν εἰς αὐτὸ τὸν τρίτον προσθετέον,  $(+5) + (-6) = -1$ .

Τοῦτο γράφομεν καὶ ὡς ἔξῆς :

$$(+2) + (+3) + (-6) = [(+2) + (+3)] + (-6) = (+5) + (-6) = -1$$

Ό ρητός  $-1$  είναι τὸ ἀθροισμα  $(+2) + (+3) + (-6)$ .

Η διγκύλη  $[(+2) + (+3)]$  έχει τὴν ἔννοιαν ὅτι ἐκτελοῦμεν πρῶτον τὴν πρᾶξιν ἐντὸς αὐτῆς.

Αναλόγως ἐργαζόμεθα ἐὰν ἔχωμεν περισσοτέρους προσθετέους τῶν τριῶν.

Ωστε ἀθροισμα περισσοτέρων τῶν δύο ρητῶν είναι ὁ ρητός, τὸν δποῖον εύρισκομεν, ἐὰν εἰς τὸ ἀθροισμα τῶν δύο πρώτων προσθέσωμεν τὸν τρίτον, εἰς τὸ νέον ἀθροισμα προσθέσωμεν τὸν τέταρτον κ.ο.κ.

Γενικῶς ἐὰν  $\alpha, \beta, \gamma, \delta$  είναι ρητοί ἔχομεν :

$$\alpha + \beta + \gamma + \delta = [(\alpha + \beta) + \gamma] + \delta$$

§ 36. α) Παρατηροῦμεν ὅτι :

$$[(+2) + (+3)] + (-6) = (+5) + (-6) = -1$$

καὶ  $[(+3) + (-6)] + (+2) = (-3) + (+2) = -1 \Rightarrow$

$$[(+2) + (+3)] + (-6) = [(+3) + (-6)] + (+2) \text{ ἢ}$$

$$[(+2) + (+3)] + (-6) = (+2) + [(+3) + (-6)]$$

Έκ τῆς ἀνωτέρω ισότητος προκύπτει ὅτι ἡ πρόσθεσις τῶν ρητῶν ἔχει τὴν ίδιότητα τῆς προσεταιριστικότητος.

Γενικῶς ἐὰν  $\alpha, \beta, \gamma \in Q \Rightarrow (\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma)$

β) Νὰ εύρεθῇ τὸ ἀθροισμα τῶν ρητῶν  $-4, +7, -1$  καθ' ὅλους τοὺς δυνατοὺς τρόπους.

Έχομεν :

$$(-4) + (+7) + (-1) = [(-4) + (+7)] + (-1) = (+3) + (-1) = +2$$

$$(-4) + (-1) + (+7) = [(-4) + (-1)] + (+7) = (-5) + (+7) = +2$$

$$(+7) + (-1) + (-4) = [(+7) + (-1)] + (-4) = (+6) + (-4) = +2$$

$$(+7) + (-4) + (-1) = [(+7) + (-4)] + (-1) = (+3) + (-1) = +2$$

$$(-1) + (-4) + (+7) = [(-1) + (-4)] + (+7) = (-5) + (+7) = +2$$

$$(-1) + (+7) + (-4) = [(-1) + (+7)] + (-4) = (+6) + (-4) = +2$$

Έκ τῶν ἀνωτέρω παρατηροῦμεν ὅτι :

τὸ ἀθροισμα τριῶν ρητῶν είναι ἀνεξάρτητον ἀπὸ τὴν σειρὰν μὲ τὴν δποίαν λαμβάνονται οἱ προσθετέοι.

Γενικῶς ἐὰν  $\alpha, \beta, \gamma$  είναι ρητοί ἔχομεν  $\alpha + \beta + \gamma = \alpha + \gamma + \beta = \beta + \alpha + \gamma = \dots$

(Αύτὸ ισχύει καὶ διὰ περισσοτέρους τῶν τριῶν ρητούς).

Ἐφαρμογαί.

1. Νὰ υπολογισθῇ τὸ ἀθροισμα  $(-3) + (+5) + (-4) + (+6)$ .

Συμφώνως πρὸς τὴν ἀνωτέρω β' ίδιότητα ἔχομεν :

$$\begin{aligned} (-3) + (+5) + (-4) + (+6) &= (+6) + (+5) + (-4) + (-3) \\ &= [(+6) + (+5)] + [(-4) + (-3)] \\ &= (+11) + (-7) = +4 \end{aligned}$$

Παρατηρούμεν ότι ή β' ίδιότης και ή προσεταιριστικότης τής προσθέσεως μᾶς έπιπτε πουν νά προσθέσωμεν χωριστά τούς θετικούς και χωριστά τούς άρνητικούς και νά καταλήξωμεν εις διθροισμα δύο έτεροσήμων ρητῶν άριθμῶν.

2. Νά εύρεθη τό διθροισμα:


$$\left( +\frac{5}{2} \right) + (-3) + \left( +\frac{8}{2} \right) + \left( +\frac{1}{2} \right) + \left( -\frac{8}{2} \right)$$

\*Έχομεν :

$$\begin{aligned} &\underbrace{\left( +\frac{5}{2} \right) + \left( +\frac{1}{2} \right)}_{+\frac{6}{2}} + \underbrace{\left( +\frac{8}{2} \right) + \left( -\frac{8}{2} \right)}_0 + (-3) = \\ &= \left( +\frac{6}{2} \right) + 0 + (-3) = (+3) + (-3) = 0 \end{aligned}$$

3. Κατωτέρω δίδεται γεωμετρική έρμηνειά τῶν ίδιοτήτων (άντιμεταθετική, προσεταιριστική) τῆς προσθέσεως.

$$(+2) + (-5) = -3$$




$$(-5) + (+2) = -3$$

σχ. 23.

$$[(+2) + (+3)] + (-6)$$


$$(+5) + (-6) = -1$$



$$(+2) + [(+3) + (-6)]$$

$$[(+3) + (-6)] + (+2)$$

$$(-3) + (+2) = -1$$



Σημείωσις.

σχ. 25.

Συμφωνούμεν εις ἔνα διθροισμα νά παραλείπωμεν τό σύμβολον τῆς προσθέσεως και νά γράψωμεν τούς προσθετέους τὸν ἔνα κατόπιν τοῦ δὲλλου μὲ τό πρόστημάν των.

Π.χ. ἀντί νά ξώμεν  $(+6) + (-5) + (+2)$

γράφομεν  $+6 - 5 + 2$  ή  $6 - 5 + 2$

\*Όταν λοιπόν λέγωμεν νά υπολογισθή τό διθροίσμα :

$$-3+4-12+5, \text{ έννοούμεν τό } (-3)+(+4)+(-12)+(+5)$$

$$\text{Π. χ. } -3+4-12+5=(-3)+(+4)+(-12)+(+5)=(+4)+(+5)+(-12)+(-3)=\\ (+9)+(-15)=-6$$

### \*Ασκήσεις

60. Νά εύρεθοῦν τά διθροίσματα :

$$\alpha) (-10)+(-11)+(-12)+( +13)+(+14)$$

$$\beta) (+15)+(-7)+(+3)+(-5)+(-4)$$

$$\gamma) (-4,2)+(+3,7)+(-2,6)+(+1)$$

$$\delta) \left( +\frac{27}{5} \right) + \left( -\frac{23}{6} \right) + \left( +8\frac{1}{2} \right) + \left( -2\frac{7}{15} \right) + \left( -8\frac{2}{3} \right)$$

$$61. \alpha) \text{Έάν } \alpha = -\frac{1}{2}, \beta = -5\frac{3}{4}, \gamma = -\frac{4}{12} \text{ και } \delta = +6 \text{ νά εύρεθη τό διθροίσμα } \alpha + \beta + \gamma + \delta$$

$$\beta) \text{Νά εύρεθη τό διθροίσμα } -\frac{4}{5} + \frac{2}{10} - 3\frac{1}{2} + 1$$

$$\gamma) \text{Νά εύρεθη τό διθροίσμα } 16 - 7 + 5\frac{1}{6} - 13\frac{1}{3} - 1$$

$$\delta) \text{Νά εύρεθη τό διθροίσμα } -15 + 15,5 - \frac{1}{2} + 2,3 - 0,3$$

62. Νά συγκριθοῦν τά δύο κατωτέρω διθροίσματα :

$$\alpha) [(-4) + (+8) + (-6)] + (-3), (-4) + (+8) + [(-6) + (-3)]$$

$$\beta) \text{δημίους τά : } (-4) + (+12) + (-13), (-4) + (+20) + (-8) + (-13)$$

$$63. \text{Έάν } \alpha, \beta, \gamma, \text{ είναι ρητοί, νά δειχθή διά παραδειγμάτων ότι } \text{Έάν } \alpha + \gamma = \beta + \gamma \text{ συνεπάγεται } \text{ ή } \text{Ισότητα } \alpha = \beta.$$

### 3. ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΤΙΜΗ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΟΣ ΔΥΟ ΡΗΤΩΝ

§ 37. a) Νά συγκριθή ή άπολυτος τιμή των άθροισμάτων  $(+6) + (+3)$  και  $(-6) + (-3)$  πρός τό διθροίσμα τών άπολύτων τιμών των προσθετέων αντών.

$$\text{Γνωρίζομεν ότι } (+6) + (+3) = +9 \text{ και } (-6) + (-3) = -9.$$

$$\text{Έπισης ότι } 6 = |+6| = |-6|, 3 = |+3| = |-3| \text{ και } 9 = |+9| = |-9|$$

\*Επειδή δημοσιεύεται

$$\begin{array}{c}
 & 6 + 3 = 9 \\
 & \diagdown \quad \diagup \\
 \text{Έχομεν } |+6| + |+3| = |+9| & \text{και} & |-6| + |-3| = |-9| \\
 & \diagup \quad \diagdown \\
 & 6 + 3 = 9 & \text{και} & -6 + -3 = -9
 \end{array}$$

$$\begin{aligned}
 & \text{ή } |+6| + |+3| = |(+6) + (+3)| \text{ και } |-6| + |-3| = |(-6) + (-3)| \\
 & \text{ή } |(+6) + (+3)| = |+6| + |+3| \text{ και } |(-6) + (-3)| = |-6| + |-3|
 \end{aligned}$$

"Ωστε ή άπόλυτος τιμή του άθροισματος δύο δημοσήμων ρητῶν ισοῦται πρὸς τὸ άθροισμα τῶν άπολύτων τιμῶν αὐτῶν.

Γενικῶς ἔὰν οἱ ρητοὶ  $\alpha, \beta$  εἰναι δημόσημοι, ἔχομεν :

$$\underbrace{|\alpha + \beta|}_{\text{άπόλυτος τιμή άθροισματος}} = |\alpha| + |\beta| \quad \underbrace{|\alpha| + |\beta|}_{\text{άθροισμα άπολύτων τιμῶν}}$$

β) Νὰ συγκριθῇ ή άπόλυτος τιμὴ τοῦ άθροισματος  $(+8) + (-6)$  πρὸς τὸ άθροισμα τῶν άπολύτων τιμῶν τῶν προσθετέων αὐτοῦ.

"Ἔχομεν :  $|(+8) + (-6)| = |+2| = 2$  καὶ

$|+8| + |-6| = 8 + 6 = 14$  Ἐκ τούτων συνάγεται ὅτι :

$$|(+8) + (-6)| < |+8| + |-6|$$

"Ωστε ή άπόλυτος τιμὴ του άθροισματος δύο έτεροσήμων ρητῶν είναι μικροτέρα του άθροισματος τῶν άπολύτων τιμῶν αὐτῶν.

Γενικῶς ἔὰν οἱ ρητοὶ  $\alpha, \beta$  εἰναι έτερόσημοι, ἔχομεν :

$$|\alpha + \beta| < |\alpha| + |\beta|$$

Παραδείγματα :

1. Νὰ διποδειχθῇ ὅτι  $|(-10) + (+3)| < |-10| + |+3|$

"Ἔχομεν :  $|(-10) + (+3)| = |-7| = 7$  καὶ  $|-10| + |+3| = 10 + 3$

'Ἐπειδὴ  $7 < 10 + 3 \Rightarrow |(-10) + (+3)| < |-10| + |+3|$

2. Νὰ διποδειχθῇ ὅτι  $\left| \left( +\frac{3}{5} \right) + \left( -\frac{3}{5} \right) \right| < \left| +\frac{3}{5} \right| + \left| -\frac{3}{5} \right|$

"Ἔχομεν :

$$\left| \left( +\frac{3}{5} \right) + \left( -\frac{3}{5} \right) \right| = |0| = 0 \text{ καὶ } \left| +\frac{3}{5} \right| + \left| -\frac{3}{5} \right| = \frac{3}{5} + \frac{3}{5} = \frac{6}{5}$$

$$'Ἄρα : \left| \left( +\frac{3}{5} \right) + \left( -\frac{3}{5} \right) \right| < \left| +\frac{3}{5} \right| + \left| -\frac{3}{5} \right|$$

'Ανακεφαλαίωσις :

§ 38. 'Ἐκ τῶν ἀναφερομένων εἰς τὴν «πρόσθεσιν τῶν ρητῶν» συμπεραίνομεν ὅτι :

α. Διθέντων δύο ρητῶν  $\alpha$  καὶ  $\beta$ , ὑπάρχει πάντοτε δρητὸς  $\alpha + \beta$ .

Συμβολικῶς :  $\alpha, \beta \in Q \Rightarrow (\alpha + \beta) \in Q$ .

"Ἡτοι :

'Εὰν  $\alpha$  καὶ  $\beta$  δημόσημοι, τότε δρητὸς  $(\alpha + \beta)$  είναι δημόσημος πρὸς αὐτοὺς μὲ άπόλυτον τιμὴν τὸ άθροισμα τῶν άπολύτων τιμῶν των.

$$|\alpha + \beta| = |\alpha| + |\beta|$$

Έάν  $\alpha, \beta$  έτερόσημοι, τότε δ  $(\alpha + \beta)$  είναι δύμασημος πρὸς τὸν ρητὸν μὲ τὴν μεγαλυτέραν ἀπόλυτον τιμῆν καὶ ἡ ἀπόλυτος τιμὴ αὐτοῦ ισοῦται πρὸς τὴν διαφορὰν τῶν ἀπολύτων τιμῶν τῶν προσθετέων.

$$|\alpha + \beta| = |\alpha| - |\beta| \quad \text{έάν } |\alpha| > |\beta|$$

$$|\alpha + \beta| = |\beta| - |\alpha| \quad \text{έάν } |\alpha| < |\beta|$$

β. Τὸ ἄθροισμα δύο ρητῶν είναι εἰς καὶ μόνον εἰς ρητὸς (μονότιμον τῆς προσθέσεως).

γ. Ισχύει ἡ μεταθετικότης εἰς τὸ ἄθροισμα δύο ρητῶν.

$$\alpha + \beta = \beta + \alpha$$

δ. Δοθέντων τῶν ρητῶν  $\alpha, \beta, \gamma$  Ισχύει ἡ προσεταιριστική ίδιότης τῆς προσθέσεως

$$(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma)$$

ε) Υπάρχει ἐν στοιχείον εἰς τὸ σύνολον τῶν ρητῶν, τὸ μηδέν, τὸ ὅποιον είναι οὐδέτερον στοιχείον τῆς προσθέσεως.

$$\text{Έάν } \alpha \in Q \text{ είναι: } 0 + \alpha = \alpha + 0 = \alpha$$

στ) Διὰ κάθε ρητὸν ὑπάρχει εἰς καὶ μόνον εἰς ἄλλος ρητὸς ἀντίθετος (ἢ συμμετρικὸς) τούτου.

Τὸ ἄθροισμα τῶν ἀντίθετων ισοῦται πρὸς μηδέν.

Έάν  $\alpha$  είναι ἀπόλυτος ἀριθμός, δ ἀντίθετος τοῦ  $+\alpha$  είναι δ  $-\alpha$  καὶ  $(+\alpha) + (-\alpha) = 0$

### Α σκήσεις

64. Δι' ἀριθμητικῶν παραδειγμάτων νὰ συγκρίνητε τὸ  $|\alpha + \beta + \gamma|$  πρὸς τὸ  $|\alpha| + |\beta| + |\gamma|$ , α) έάν  $\alpha, \beta, \gamma$  είναι δύμασημοι καὶ β) έάν είναι ἔτερόσημοι.

65. Νὰ συγκριθῇ ἡ ἀπόλυτος τιμὴ τοῦ ἄθροισματος δύο ἔτεροσημών ρητῶν πρὸς τὴν διαφορὰν τῶν ἀπολύτων τιμῶν αὐτῶν. Δηλαδὴ έάν  $\alpha, \beta$  ἔτερόσημοι νὰ συγκριθῇ τὸ

$$|\alpha + \beta| \text{ πρὸς τὸ } |\alpha| - |\beta|, \text{ έάν } |\alpha| > |\beta| \text{ ἢ τὸ}$$

$$|\alpha + \beta| \text{ πρὸς τὸ } |\alpha| - |\beta|, \text{ έάν } |\alpha| < |\beta|.$$

66. Ποῖοι ρητοὶ δύνανται νὰ ἀντικαταστήσουν τὸ  $x$  εἰς τὸς κάτωθι Ισότητας:

$$\alpha) \left| \left( +\frac{3}{4} \right) + x \right| = \left| +\frac{3}{4} \right| + \left| +\frac{1}{4} \right| \quad \beta) \left| (-3) + x \right| = \left| -3 \right| + \left| -1 \right|$$

$$\gamma) \left| (+5) + \left( +\frac{1}{2} \right) \right| = \left| +5 \right| + \left| x \right|$$

$$\delta) \left| \left( -\frac{5}{8} \right) + \left( -\frac{3}{8} \right) \right| = \left| -\frac{5}{8} \right| + \left| x \right|$$

67. Ποῖον συμπέρασμα προκύπτει διὰ τοὺς ρητοὺς  $\alpha$  καὶ  $\beta$ ,

$$\text{έάν } \alpha + \beta = 0$$

$$\beta) \alpha + \beta = \alpha$$

68. Νὰ εὑρεθοῦν τὰ ἄθροισματα:

$$\alpha) (-12) + (-18) + (+24) + (+30) + (-36)$$

$$\beta) \left(-\frac{5}{8}\right) + \left(-\frac{7}{4}\right) + \left(+\frac{11}{2}\right) + \left(+\frac{10}{16}\right) + (-1)$$

$$\gamma) \left(-\frac{4}{9}\right) + (+2) + \left(-\frac{25}{6}\right) + \left(-\frac{14}{3}\right) + \left(+\frac{8}{18}\right) + (+1)$$

69. Νὰ εύρεθοῦν τὰ ἀθροίσματα :

$$\alpha) -4 - 6 + 8 - 10 + 14 - 20 \quad \beta) 1 + \frac{1}{5} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{6} - 1$$

$$\gamma) 5 + \frac{18}{9} - \frac{15}{3} + \frac{21}{7} - \frac{24}{6} - 2 \quad \delta) 1 + \frac{5}{12} - \frac{4}{3} + \frac{3}{4} - 2.$$

70. Νὰ εύρεθῃ τὸ ἀθροίσμα τῶν δύο ἀθροίσμάτων :

$$\alpha) [(+3) + (-8) + (+2) + (-1)] + [(-7) + (+10) + (-2)]$$

$$\beta) (-1 + 3 - 8 + 12) + (5 - 7 - 13)$$

71. Νὰ ἐπιλυθοῦν αἱ ἔξισώσεις : α)  $(-2) + x = +3$  καὶ β)  $x + \left(-\frac{1}{2}\right) = -2$

#### 4. Η ΠΡΑΞΙΣ ΤΗΣ ΑΦΑΙΡΕΣΕΩΣ

**§ 39. Πρόβλημα.** Τὴν πρωῖαν τὸ θερμόμετρον ἰδείκνυνε  $-2^{\circ}$  καὶ τὴν μεσημέριαν  $+3^{\circ}$ . Κατὰ πόσους βαθμοὺς μετεβλήθη ἡ θερμοκρασία ;

"Εστω ὅτι ἡ θερμοκρασία μετεβλήθη κατὰ  $\chi^{\circ}$ . Διὰ νὰ εὔρωμεν τὸ ζητούμενον πρέπει ἀπὸ τὴν τελικὴν θερμοκρασίαν  $+3^{\circ}$  νὰ ἀφαιρέσωμεν τὴν ἀρχικὴν θερμοκρασίαν  $-2^{\circ}$ .

$$\text{Έχομεν λοιπὸν } \chi^{\circ} = (+3)^{\circ} - (-2)^{\circ}$$

$$\chi = (+3) - (-2)$$

"Η τιμὴ τοῦ  $\chi$  δύναται νὰ θεωρηθῇ καὶ ὡς λύσις τῆς ἔξισώσεως  $(-2) + \chi = +3$ , ἡ ὁποία ἐκφράζει τὸ πρόβλημα : «Ποιὸν ρητὸν πρέπει νὰ προσθέσωμεν εἰς τὸν  $(-2)$  διὰ νὰ εὔρωμεν τὸν  $+3$ ».

"Εμάθομεν εἰς τὴν Α' ταξιν ὅτι ἡ ἀφαίρεσις εἶναι πρᾶξις ἀντίστροφος τῆς προσθέσεως. Τὸ σύντο διστομένον εἰς τὸν δεύτερον, δίδει ἀθροίσμα τὸν πρῶτον.

"Ωστε ἔχομεν τὴν ίσοδυναμίαν :

$$( +3 ) - ( -2 ) = x \Leftrightarrow ( -2 ) + x = +3$$

ση. 27

Διὰ νὰ εὔρωμεν δύμας τὴν διαφορὰν  $(+3) - (-2)$  κάμνομεν τὰς ἔξισ τοκέψεις εἰς τὸ ἀρχικὸν πρόβλημα : Τὸ θερμόμετρον δεικνύει  $-2^{\circ}$  ἀρ πρέπει νὰ ἀνέλθῃ  $2^{\circ}$  ἡ θερμοκρασία διὰ νὰ φθάσῃ εἰς τὸ μηδὲν καὶ κατόπιν νὰ ἀνέλθῃ  $3^{\circ}$ . "Ητοι πρέπει νὰ ἀνέλθῃ ἡ θερμοκρασία κατὰ  $5^{\circ}$ .

"Ἄρα  $\chi^{\circ} = (+2)^{\circ} + (+3)^{\circ} = +5^{\circ}$ . Συνεπῶς ἡ διαφορὰ  $(+3) - (-2) = (+2) + (+3)$  ἡ  $(+3) - (-2) = (+3) + (+2)$ .

"Ωστε ή διαφορὰ δύο ρητῶν εὑρίσκεται, ἐὰν προσθέσωμεν εἰς τὸν μειωτέον τὸν ἀντίθετον τοῦ ἀφαιρετέου. Ἐπομένως καὶ ή ἔξισωσις  $(-2) + x = +3$  ἐπιλύεται ως ἔχει:

$$(-2) + x = +3 \iff x = (+3) - (-2) \iff x = (+3) + (+2) \iff x = +5$$

Χρησιμοποιούμεν τώρα τήν Ιδιότητα  $\alpha = \beta \Leftrightarrow \alpha + \gamma = \beta + \gamma$  ( $\alpha, \beta, \gamma \in Q$ ) διὰ νὰ αίτιολγήσωμεν γενικώτερον τήν έπιλυσιν τῆς έξισώσεως  $(-2) + x = +3$  ή τήν εύρεσιν τῆς διαφορᾶς  $x = (+3) - (-2)$ .

Προσθέτομεν καὶ εἰς τὰ δύο μέλη τῆς  $(-2) + x = +3$  τὸν ἀντίθετον τοῦ  $-2$  καὶ ἔχομεν:

$$(-2) + x = +3 \Leftrightarrow [(-2) + x] + (+2) = +3 + (+2)$$

$$[x + (-2)] + (+2) = +3 + (+2)$$

$$x + [(-2) + (+2)] = +3 + (+2)$$

$$x + 0 = +3 + (+2)$$

$$x = +3 + (+2) = +5$$

( $\pm 2$ ).

$$\text{“}\Omega\sigma\tau\varepsilon\text{” } \chi = (+3) - (-2) = (+3) + (+2).$$

Δηλαδή διαπιστοῦται ότι διά νά άφαιρέσωμεν ρητὸν πρέπει νά προσθέσωμεν τὸν ἀντίθετόν του. ( $-a = \text{ἀντίθετος τού α}$ ). Ἐπειδὴ εἰς τὸ σύνολον τῶν ρητῶν ὑπάρχει πάντοτε δ ἀντίθετος δοθέντος ἀριθμοῦ, ὑπάρχει πάντοτε καὶ ή διαφορὰ δύο ρητῶν καὶ ἐπομένως ή ἀφάίρεσις εἶναι πάντοτε δυνατή εἰς τὸ σύνολον αὐτό.

‘Η ἀφαίρεσις εἶναι πρᾶξις μονότιμος, διότι τὸ ἄθροισμα τοῦ μειωτέου καὶ τοῦ ἀντιθέου τοῦ ἀφαιρετέου εἶναι μονότιμον.

"Ωστε, ἐὰν α καὶ β εἰναι ρητοὶ ἀριθμοί, καλοῦμεν διαφορὰν α - β τὸν ρητὸν γ. ὁ δόποιος ισοῦται μὲ α + (ἀντίθετος τοῦ β).

$$\gamma = \alpha + (\delta\pi(\theta, \beta)) \rightarrow \gamma + \beta = \alpha + (\delta\pi(\theta, \beta)) + \beta$$

Συνθετικῶς :

1.  $\alpha - 0 = \alpha + 0 = \alpha$  (διότι διάντιθετος τοῦ μηδενὸς είναι τὸ μηδέν).  
 $(-3) - (-3) = (-3) + (+3) = 0$ . Γενικῶς  $\alpha - \alpha = 0$ , ( $\alpha \in Q$ )

$$2. \quad 0 - (+3) = 0 + (-3) = -3$$

$$0 - (-3) = 0 + (+3) = +3$$

$$0 - \alpha = 0 + (-\alpha) = -\alpha \quad (\alpha \in Q)$$

\*Επειδή  $0 - \alpha = 0 + (-\alpha)$ , συμβολίζομεν τὸν ἀντίθετον ρητοῦ α μὲν  $-\alpha$ .

"Ωστε διὰ κάθε ρητὸν  $\alpha$  ἔχομεν:  $\alpha - 0 = \alpha$ ,  $0 - \alpha = -\alpha$ ,  $\alpha - \alpha = 0$

### 3. Νέα εύρεθοῦν αἱ κάτωθι διαφοραί·

$$(+6) - (-7) = (+6) + (+7) = +13$$

$$(-7) - (+6) = (-7) + (-6) = -13$$

$$\left(-\frac{3}{4}\right) - \left(-\frac{5}{4}\right) = \left(-\frac{3}{4}\right) + \left(+\frac{5}{4}\right) = +\frac{2}{4}$$

$$\left(-\frac{5}{4}\right) - \left(-\frac{3}{4}\right) = \left(-\frac{5}{4}\right) + \left(+\frac{3}{4}\right) = -\frac{2}{4}$$

\*Έκ τῶν ἀνωτέρω παρατηροῦμεν ὅτι (ἐάν  $\alpha, \beta \in \mathbb{Q}$ ) οἱ ρητοί  $\alpha - \beta$  καὶ  $\beta - \alpha$  εἶναι ἀντίθετοι.

### Α σ κ η σ εις

72. Νὰ εύρεθοῦν αἱ κάτωθι διαφοραί :

- |  |  |
|--|--|
| α) $(-10) - (+25)$ ,   | β) $(+25) - (-10)$   |
| γ) $(+14) - (+11)$ ,   | δ) $(+11) - (+14)$   |
| ε) $(-5) - (+5)$ ,   | ζ) $(-18) - (-18)$   |
| η) $\left(+\frac{3}{16}\right) - \left(-\frac{3}{16}\right)$ , | η) $\left(-\frac{4}{9}\right) - \left(-\frac{2}{3}\right)$ |

73. Νὰ ἐπιλυθοῦν αἱ κάτωθι ἔξισώσεις :

- |  |   |   |
|--|---|---|
| α) $x - \left(+\frac{7}{3}\right) = -1$ ,            | δ) $\left(-\frac{4}{15}\right) + x = -1$ ,  | ζ) $x - \left(-\frac{1}{3}\right) = -\frac{1}{3}$ |
| β) $x + \left(-\frac{3}{20}\right) = -\frac{1}{5}$ , | ε) $-x - \left(+\frac{13}{2}\right) = -2$ , | η) $-x - (-12) = -12$                             |
| γ) $x - (-13) = -13$ ,                               | στ) $-4 - x = -14$ ,                        | θ) $+3 - x = -3$                                  |

74. Νὰ εύρεθοῦν αἱ κάτωθι διαφοραὶ καὶ νὰ ἐπαληθευθῇ ἡ ισότης «Μειωτέος = ἀφαιρέτος + διαφορά».

- |  |  |  |
|--|--|--|
| α) $\left(-\frac{1}{3}\right) - \left(+\frac{3}{4}\right)$ , | β) $(-5) - \left(-\frac{2}{3}\right)$ ,  | γ) $\left(+\frac{1}{2}\right) - \left(+\frac{1}{3}\right)$ |
| δ) $\left(+\frac{3}{5}\right) - \left(-\frac{1}{2}\right)$ , | ε) $\left(-\frac{10}{7}\right) - (-1)$ , | στ) $(+3) - \left(-\frac{11}{2}\right)$ ,                  |

### 5. ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟΝ (-) ΩΣ ΣΥΜΒΟΛΟΝ ΑΦΑΙΡΕΣΕΩΣ ΚΑΙ ΩΣ ΠΡΟΣΗΜΟΝ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΦΑΙΡΕΣΕΩΣ

**§ 40.** Εἴδομεν §36 σημείωσις, ὅτι ἐν ἄθροισμα π.χ. τὸ  $(+3) + (-2)$  γράφεται συντόμως  $+3 - 2$  ἢ  $3 - 2$ .

Τὸ πλήν πρὸ τοῦ δύο θεωρεῖται ὡς πρόσημον.

Δύναται ὅμως τὸ πλήν νὰ θεωρηθῇ καὶ ὡς σύμβολον ὀφαίρεσεως τοῦ θετικοῦ δύο ἀπὸ τὸν τρία διότι :

$$3 - 2 = (+3) - (+2) = (+3) + (-2)$$

Έπισης διά τὸ 3 - 7 ἔχομεν :  $3 - 7 = (+3) + (-7) = -4$

↓  
πρόσημον τοῦ ἐπτά  
Πρόσθεσις τοῦ -7 εἰς τὸν +3

$$3 - 7 = (+3) - (+7) = (+3) + (-7) = -4$$

↓

Σύμβολον ἀφαιρέσεως

Αφαίρεσις τοῦ +7 ἀπὸ τὸν +3  
ἢ τοῦ 7 ἀπὸ τὸν 3

Συνεπῶς τὸ σύμβολον πλὴν (-) δύνεται νὰ θεωρηθῇ ως σύμβολον ἀφαιρέσεως ἢ ως πρόσημον.

### Παραδείγματα

1. Εἰς τὸ σύμβολον  $-(+2)$  τὸ πλήν θεωρεῖται ως πρόσημον τοῦ (+2) ἀλλὰ καὶ ως σύμβολον ἀφαιρέσεως τοῦ +2.

σύμβολον ἀφαιρέσεως τοῦ θετικοῦ πέντε ἀπὸ τὸ μηδὲν

$$2. 0 - 5 = 0 - (+5) = 0 + (-5) = -5$$

$$0 - 5 = 0 + (-5) = -5$$

|  
πρόσημον τοῦ πέντε

$$3. -8 - 3 = (-8) - (+3) = (-8) + (-3) = -11$$

|  
πρόσημον  
|  
σύμβ. ἀφαιρέσεως.

$$-8 - 3 = -(+8) - (+3) = +(-8) + (-3) = (-8) + (-3) = -11$$

|  
πρόσημον  
|  
σύμβολον ἀφαιρέσεως

$$4. \text{Έχομεν : } -4 - 10 = \underline{\underline{(-4)}} + \underline{\underline{(-10)}} = -14 = -(+14) = \underline{\underline{[-(+) + (+10)]}}$$

Δηλαδή :  $-[(+4) + (+10)] = (-4) + (-10)$ , ἀλλὰ  $(+4) + (+10) = [(+4) + (+10)]$  ἢ  $[(+4) + (+10)] = (+4) + (+10)$   
 "Ωστε τὸ ἀντίθετον ἀθροίσματος ισοῦται πρὸς τὸ ἀθροίσμα τῶν ἀντίθέτων προσθετέων.

§ 41. Ιδιότητες τῆς ἀφαιρέσεως (εύκόλως ἐπαληθεύονται αἱ κάτωθι Ιδιότητες).

Ἡ διαφορὰ δὲν μεταβόλλεται, ἔαν προσθέσωμεν (ἢ ἀφαιρέσωμεν) εἰς τὸν μειωτέον καὶ εἰς τὸν ἀφαιρετέον τὸν αὐτὸν ρητόν.

$$\begin{aligned}\alpha - \beta &= (\alpha + \gamma) - (\beta + \gamma) \\ \alpha - \beta &= (\alpha - \gamma) - (\beta - \gamma)\end{aligned} \quad (\alpha, \beta, \gamma \in Q)$$

2. Πᾶς ἀφαιρῶ ρητὸν ἀπὸ ἀθροισμά.

$$\begin{aligned}(\alpha + \beta) - \gamma &= \alpha + (\beta - \gamma) \\ (\alpha + \beta) - \gamma &= (\alpha - \gamma) + \beta\end{aligned}$$

3. Πᾶς ἀφαιρῶ ἀριθμὸν ἀπὸ διαφορὰν

$$\begin{aligned}(\alpha - \beta) - \gamma &= \alpha - (\beta + \gamma) \\ (\alpha - \beta) - \gamma &= (\alpha - \gamma) - \beta\end{aligned}$$

4. Πᾶς ἀφαιρῶ ἀθροισμα ἀπὸ ἀριθμὸν

$$\begin{aligned}\alpha - (\beta + \gamma) &= (\alpha - \beta) - \gamma \\ \alpha - (\beta + \gamma) &= (\alpha - \gamma) - \beta\end{aligned}$$

5. Πᾶς ἀφαιρῶ διαφορὰν ἀπὸ ἀριθμόν.

$$\begin{aligned}\alpha - (\beta - \gamma) &= (\alpha - \beta) + \gamma \\ \alpha - (\beta - \gamma) &= (\alpha + \gamma) - \beta\end{aligned}$$

Αἱ ἀνωτέρω Ιδιότητες ισχύουν χωρὶς κανένα περιορισμόν, διότι ἡ διαφορὰ ὑπάρχει πάντοτε εἰς τὸ σύνολον τῶν ρητῶν ἀριθμῶν.

6. Νὰ ἐπαληθευθῇ ἡ Ιδιότης:  $\alpha = \beta \Rightarrow \alpha - \gamma = \beta - \gamma$ .

Ἀφαιροῦμεν καὶ ἀπὸ τὰ δύο μέλη τῆς Ισότητος  $-5 = -\frac{10}{2}$  τὸν  $-3$ .  
α' μέλος:  $(-5) - (-3) = (-5) + (+3) = -2$

β' μέλος:  $(-\frac{10}{2}) - (-3) = (-\frac{10}{2}) + (+3) = -(\frac{10}{2} - 3) = -(5 - 3) = -2$

Ἄρα  $(-5) - (-3) = (-\frac{10}{2}) - (-3)$ .

Συνεπῶς ἐκ τῆς  $-5 = -\frac{10}{2} \Rightarrow (-5) - (-3) = (-\frac{10}{2}) - (-3)$

### Ἐφαρμογή.

Ἀφαιροῦμεν καὶ ἀπὸ τὰ δύο μέλη τῆς Ισότητος  $-8 + 3 = -5$  τὸν  $3$ .

Ἐχομεν:

$$-8 + 3 - 3 = -5 - 3$$

$$-8 + 0 = -5 - 3$$

$$-8 = -5 - 3$$

Ἐάν παρατηρήσωμεν τὰς Ισότητας:  $-8 + 3 = -5$   
 $-8 = -5 - 3$

καταλήγομεν εἰς τὸ συμπέρασμα ὅτι: 'Ἐάν μεταφέρωμεν δρόν ἀπὸ τὸ ἐν μέλος Ισότητος εἰς τὸ δλλο, δλλάσσομεν τὸ πρόσημόν του.'

7. Έάν  $\alpha, \beta, \gamma, \delta \in Q$ , νά διαληθευθῇ ή ιδιότης  $\alpha = \beta$  και  $\gamma = \delta \Rightarrow \alpha - \gamma = \beta - \delta$  δι'

άριθμητικοῦ παραδείγματος. (Αὕτη ἐκφράζει τὸ μονότιμον τῆς διαφορᾶς).

Σημείωσις. Ή ἔργασία κατὰ τὴν διποίσαν, έάν  $\alpha = \beta$  και  $\gamma = \delta \Rightarrow \alpha - \gamma = \beta - \delta$  λέγεται ἀφαιρεσις τῶν δύο Ισοτήτων κατὰ μέλη.

### Α σ κ ή σ ε ι σ

75. Νά ύπολογισθῇ ή τιμὴ τῶν κάτωθι παραστάσεων :

- α) έάν τὸ (-) ληφθῇ ὡς σύμβολον ἀφαιρέσεως και
- β) έάν τὸ πλήν ληφθῇ ὡς πρόσθμον.

$$\alpha) 7 - 10, \beta) 5 - \frac{1}{2}, \gamma) \frac{1}{3} - \frac{1}{2}, \delta) -17 - 19, \epsilon) -6 - \frac{2}{5}$$

76. Ἐπαληθεύσατε τὰς ιδιότητας 1, 2, 3, 4, 5 τῆς ἀφαιρέσεως διὰ τῶν κάτωθι ἀριθμητικῶν παραδειγμάτων.

$$1. \alpha = +5, \beta = -12 \text{ και } \gamma = +7$$

$$2. \alpha = -\frac{3}{5}, \beta = +1 \text{ και } \gamma = -\frac{2}{3}$$

$$3. \alpha = 5,6, \beta = 7,2 \text{ και } \gamma = -11$$

77. Νά εύρεθοῦν τὰ ἔξαγόμενα τῶν πράξεων:

- α)  $7 - (-3)$ ,
- β)  $(7+8) - (-3+8)$ ,
- γ)  $(7-5) - (-3-5)$ ,
- δ)  $[12 + (-2) + 3] - (-4)$
- ε)  $-7 - (7+3)$
- στ)  $-12 - [5 - (-2)]$ ,
- ζ)  $(-3-7) - 9$ ,
- η)  $(15-21) + (-4)$

78. Νά ύπολογισθοῦν τὰ  $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \chi, \psi$  ἐκ τῶν :

$$1. \alpha = (-4+7) + (5-12), \quad 2. \beta = (-4+5) - [7+(-12)]$$

$$3. \gamma = (-5+9) + (-5-9), \quad 4. \delta = (-5+9) - (-5-9)$$

$$5. -\chi - 3 = -5, \quad 6. \psi + 4 = -7$$

79. Νά εύρεθοῦν δι' ἀναγραφῆς τῶν στοιχείων τῶν τὰ σύνολα:

$$A = (\chi/\chi + 3 = 3), B = (\psi/\psi - 5 = -7), \Gamma = (\omega/2 - \omega = -3)$$

80. Νά δοκιμάστε, έάν τὰ κάτωθι ζεύγη τιμῶν α και β ἐπαληθεύονταν τὴν Ισότητα

$$|\alpha - \beta| = |\alpha| - |\beta|.$$

$$1. \alpha = 7, \beta = 2$$

$$5. \alpha = 7, \beta = -2$$

$$2. \alpha = 2, \beta = 7$$

$$6. \alpha = 2, \beta = -7$$

$$3. \alpha = -7, \beta = -2$$

$$7. \alpha = -2, \beta = -7$$

$$4. \alpha = -7, \beta = 2$$

$$8. \alpha = -2, \beta = 7$$

## 6. ΑΛΓΕΒΡΙΚΑ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ

§ 42. Νά ύπολογισθῇ ή ἀριθμητικὴ παράστασις :

$$(+6) - (-5) + (-3) - (+4)$$

Ἐκτελοῦμεν κατὰ σειρὰν τὰς σημειουμένας πράξεις :

$$(+6) - (-5) + (-3) - (+4)$$

$$\begin{array}{c}
 (+6) + (+5) + (-3) - (+4) \\
 \text{(+ 11)} \quad \text{+ (-3) - (+ 4)} \\
 \hline
 (+8) - (+4) = (+8) + (-4) = +4
 \end{array}$$

Τό διποτέλεσμα  $+4$  είναι ή τιμή της άριθμ. παραστάσεως. Γενικώς έλαν α, β, γ, δ είναι ρητοί έχομεν:

τό σύνολον  $Q$  είναι πάντοτε δυνατά.  
 $\alpha - \beta + \gamma - \delta = [(\alpha - \beta) + \gamma] - \delta$  χωρὶς περιορισμούς, διότι αἱ ἀφαιρέσεις εἰς

Η άριθμ. παράστασις: α)  $(+6) - (-5) + (-3) - (+4)$

καθώς καὶ αἱ: β)  $(+ \frac{1}{2}) + (-\frac{2}{3}) + (+\frac{1}{3}) + (-2)$

γ)  $(-1) + (-3) + (-6) + (-\frac{3}{4})$

δ)  $12 - 6 + 7 - 14$

λέγονται ἀλγεβρικὰ ἀθροίσματα.

"Ωστε κάθε ἀριθμητικὴ παράστασις, ή ὅποια περιέχει ρητοὺς ἀριθμούς, συνδεομένους μὲ τὸ + ή τὸ - λέγεται ἀλγεβρικὸν ἀθροίσμα (ἢ ἀριθμητικὸν πολυώνυμον.)

Τὰ ἀνωτέρω ἀλγεβρικὰ ἀθροίσματα β, γ είναι ἀθροίσματα πολλῶν προστέων (§35). Οἱ προσθετέοι αὐτῶν λέγονται καὶ ὅροι.

Ἐπίσης καὶ τὸ δ είναι ἀθροίσμα πολλῶν προσθετέων μὲ ὅρους: 12, -6, +7, -14 διότι:

$$12 - 6 + 7 - 14 = 12 + (-6) + (+7) + (-14)$$

(ἀπλουστέρα μορφὴ ἀθροίσματος § 36 σημείωσις 4).

Τὸ α' ἀλγεβρικὸν ἀθροίσμα  $(+6) - (-5) + (-3) - (+4)$  δύναται νὰ γραφῇ καὶ:  $(+6) + (+5) + (-3) + (-4)$ . Τοῦτο ἔχει ὅρους τούς: +6, +5, -3, -4, οἱ ὅποιοι είναι ὅροι καὶ τοῦ ἀρχικοῦ καὶ τιμὴν +4.

'Εὰν εἰς ἓνα ἀλγεβρικὸν ἀθροίσμα προσθέσωμεν τοὺς ἀντιθέτους τῶν ρητῶν, οἱ ὅποιοι ἀφαιροῦνται, λαμβάνομεν ἀθροίσμα πολλῶν προσθετέων.

**Παραδείγματα :**

$$1. -\frac{1}{5} + \left(-\frac{4}{9}\right) - \left(-\frac{2}{3}\right) + (-1) = \left(-\frac{1}{5}\right) + \left(-\frac{4}{9}\right) + \left(-\frac{2}{3}\right) + (-1)$$

$$2. 7 - \left(-\frac{1}{2}\right) - \left(+\frac{3}{2}\right) + 2 = 7 + \left(+\frac{1}{2}\right) + \left(-\frac{3}{2}\right) + 2$$

$$3. +8 - (+7) - (-6) + (-5) + (+4) = +8 + (-7) + (+6) + (-5) + (+4) = \\ = 8 - 7 + 6 - 5 + 4$$

**Παρατηρήσεις :**

1. "Εν αθροισμα πολλών προσθετέων είναι άνεξάρτητον της σειρᾶς τῶν δρων του (§36). Τούτο ισχύει και εἰς ένα άλγ. αθροισμα, έπειτα οι άριθμοι οι δροί οι άφαιρούνται, μεταφέρουν πρὸ αὐτῶν, κατὰ τὴν ἐναλλαγὴν των, τὸ σύμβολον τῆς άφαιρέσεως .Π.χ.

$$\begin{array}{ccccccccc} (+6) & - & (-5) & + & (-3) & - & (+4) & = & - & (-5) & + & (+6) & - & (+4) & + & (-3) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{προστίθ.} & \text{άφαιρ.} & \text{προστίθ.} & \text{άφαιρ.} & \text{άφαιρ.} & \text{προστίθ.} \end{array}$$

Δηλαδὴ κάθε άριθμός, δ δροίος προστίθεται (ἢ άφαιρεῖται) εἰς τὸ α' μέλος, πρέπει νὰ προστίθεται (ἢ νὰ άφαιρῆται) καὶ εἰς τὸ β' μέλος.

Εἶπομεν δτι δροι τοῦ  $(+6) - (-5) + (-3) - (+4)$  είναι οι δροι τοῦ  $(+6) + (+5) + (-3) + (-4)$ . Δηλαδὴ οἱ :  $+6, +5, -3, -4$ .

\*Επειδή :

$$\begin{aligned} (+6) &= +(+6) = +6 \\ -(-5) &= +(+)5 = +5 \\ +(-3) &= +(-3) = -3 \\ -(+4) &= +(-4) = -4 \end{aligned}$$

δυνάμεθα νὰ θεωρήσωμεν ώς δρους τοῦ άλγεβρ. αθροίσματος  
 $(+6) - (-5) + (-3) - (+4)$  τούς :  $+6, -(-5), -3, -(+4)$

**Σημειώσεις:** Πρὸς άποφυγὴν σφαλμάτων ἡ ἀντιμετάθεσις τῶν δρων άλγ. αθροίσματος γίνεται συνήθως, ὅταν τοῦτο μετατραπῇ εἰς αθροισμα πολλών προσθετέων.

"Υπενθυμίζομεν δτι κάθε θετικὸς ἢ άρνητικὸς άριθμός, δ δροίος ἔχει πρὸ αὐτοῦ τὸ  $+$  (ἢ οὐδὲν πρόσημον) προστίθεται π.χ. οι άριθμοι  $+(+6), +(-3), (+6)$  προστίθενται.

\*Έαν ύπαρχῃ πρὸ αὐτοῦ τὸ  $-$ , άφαιρεῖται δηλαδὴ προστίθεται δ ἀντίθετός του. Π.χ.  $-(-5) = +(+5) = +5 = 5$

2. "Εχομεν :

$$\begin{aligned} (+6) - (-5) + (-3) - (+4) &= (+6) + (+5) + (-3) + (-4) = 6 + 5 - 3 - 4 \\ (+6) - (-5) - (+3) + (-4) &= (+6) + (+5) + (-3) + (-4) = 6 + 5 - 3 - 4 \end{aligned}$$

\*Έκ τούτων παρατηροῦμεν δτι ἡ ἀπλούστευμένη γραφὴ ἐνὸς αθροίσματος δύναται νὰ προέρχεται ἀπὸ ἐν άλγεβρικὸν αθροισμα, τὸ δροίον ἔχει γραφῆ κατὰ διαφόρους τρόπους.

Π.χ. τό :  $-6 + 3 - 1 + 2 = (-6) + (+3) + (-1) - (-2)$  ἢ

$$\begin{aligned} &= -(+6) - (-3) + (-1) + (+2) \text{ ἢ} \\ &= +(-6) + (+3) - (+1) + (+2) \text{ κ.λ.π.} \end{aligned}$$

**Εφαρμογαί.**

$$\begin{aligned} 1. \alpha) & (-3) + (-6) - (-8) = (-3) + (-6) + (+8) = (-9) + (+8) = -1 \\ \beta) & (+3) - (-6) - (+8) = (+3) + (+6) + (-8) = (+9) + (-8) = +1 \end{aligned}$$

Τά άνωτέρω έχουν άντιθέτους δρους και λέγονται άντιθετα.

$$\begin{aligned} 2. \text{Προσθέτομεν δύο άλγ. άθροισματα π.χ.: } & [(-4) + (-5) - (-10)] + [-(-6) - (+9)] = \\ & [(-4) + (-5) + (+10)] + [+ (+6) + (-9)] = (-4) + (-5) + (+10) + (+6) + (-9) = \\ & \downarrow \qquad \qquad \qquad \downarrow \qquad \qquad \qquad = (+16) + (-18) = -2 \\ [(-9) + (+10)] + [-3] & = [+1] + [-3] = -2. \end{aligned}$$

Η τιμή τού άθροισματος τών δύο άνωτέρω άθροισμάτων εύρεθη κατά δύο τρόπους.

α) Έσχηματίσαμεν έν αθροισματά πάρ τούς δρους τών άλγεβρικών άθροισμάτων, τού δποίου εύρομεν τήν τιμήν κατά τά γνωστά (§ 36 έφαρμογή 1) και

β) Εύρομεν τήν τιμήν έκάστου τών άλγεβρικών άθροισμάτων και κατελήξαμεν εις άθροισμα δύο ρητῶν.

$$3. \quad [(-4) + (-5) - (-10)] - [-(-6) - (+9)] = [(-4) + (-5) + (+10)] - \\ - [+ (+6) + (-9)] = [(-4) + (-5) + (+10)] + [+ (-6) + (+9)] = [+1] + [+3] = +4.$$

Διάτη νά άφαρέσωμεν άλγεβρικόν άθροισμα προσθέτομεν τό άντιθετον αύτού.

**Άσκησεις**

81. Νά ύπολογισθοῦν τά κάτωθι άλγεβρικά άθροισματα :

$$\alpha) (-4) - (+3) + (-15), \quad \gamma) \frac{7}{2} - (+2) + \left( +\frac{1}{2} \right) - (+2,5) - (-0,5)$$

$$\beta) -(+10) - 8 - (-16) + (-7) + 1, \quad \delta) -\frac{3}{11} - \left( -\frac{4}{22} \right) + (-1) - \left( +\frac{8}{11} \right)$$

82. Νά ύπολογισθοῦν τά κάτωθι άλγεβρικά άθροισματα :

$$\alpha) [-5 - (-9) + (-13) + (+17)] + (-13)$$

$$\beta) \left[ (-12) + (+7) - (+19) - \left( -\frac{29}{2} \right) \right] + \left( +\frac{1}{2} \right)$$

$$\gamma) \left[ \frac{1}{2} - (-2) + \left( -\frac{1}{3} \right) \right] + \left[ \frac{1}{3} + \left( -\frac{1}{2} \right) - (+3) \right]$$

$$\delta) -\frac{38}{5} - \left[ 1 - (+7) - \left( -\frac{2}{5} \right) \right]$$

$$\varepsilon) \left[ +3 - (+6) - \left( -\frac{22}{3} \right) \right] - \left[ \left( -\frac{2}{3} \right) - (-3) + (+2) \right]$$

83. Νά ύπολογισθοῦν τά κάτωθι άλγεβρικά άθροισματα :

$$\alpha) \alpha + \beta + \gamma, \quad \gamma) \alpha - \beta + \gamma, \quad \epsilon) \alpha - \beta - \gamma \quad \zeta) -\alpha + \beta + \gamma,$$

$$\beta) -\alpha - \beta - \gamma, \quad \delta) -\alpha - \beta + \gamma, \quad \sigma) -\alpha + \beta - \gamma, \quad \text{έπειτα}$$

$$\alpha = -\frac{1}{2}, \quad \beta = -\frac{3}{4} \quad \text{και} \quad \gamma = 1$$

**7. Η ΣΧΕΣΙΣ ΤΗΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟΝ Q. ΔΙΑΤΑΣΙΣ**

§ 43. Τί σημαίνει ή σχέσις  $\alpha > \beta$ ; Τι ή  $\gamma < \delta$ ;

Είναι γνωστόν ότι ή σχέσις  $\alpha > \beta$  σημαίνει «δ α είναι μεγαλύτερος τού β». Ή σχέσις αύτή λέγεται άνισότης με πρώτον μέλος τόν α και δεύτερον μέλος τόν β.

Η άνισότης  $\gamma < \delta$  έκφραζει ότι « $\delta$  γ είναι μικρότερος του  $\delta$ ».

Αι άνισότητες  $\alpha > \beta$ ,  $\epsilon > \zeta$  είναι δύμοστροφοι (ή της αύτης φοράς).

Αι άνισότητες  $\alpha > \beta$ ,  $\gamma < \delta$  είναι έτερόστροφοι (ή άντιθέτου φοράς).

Παρατηρούμεν το σχήμα 28, το δόποιον παριστά έν μέρος της θερμομετρικής κλίμακος. Είναι φανερόν ότι η θερμοκρασία  $+3^\circ$  είναι μεγαλυτέρα της θερμοκρασίας  $0^\circ$  και ότι η θερμοκρασία  $0^\circ$  είναι μεγαλυτέρα της θερμοκρασίας  $-2^\circ$ .

Έπιστης η θερμοκρασία  $-1^\circ$  είναι μεγαλυτέρα της θερμοκρασίας  $-4^\circ$

Έκ τούτων συνάγομεν τά ξένης:

1. Κάθε θετικός ρητός είναι μεγαλύτερος του μηδενός ή ότι το μηδέν είναι μικρότερον παντός θετικού άριθμού.

$$\alpha \in Q \text{ και } \alpha \text{ είναι θετικός} \Leftrightarrow \alpha > 0$$

2. Ο μηδέν είναι μεγαλύτερος παντός άρνητικού ή ότι κάθε άρνητικός είναι μικρότερος του μηδενός.

$$\beta \in Q \text{ και } \beta \text{ είναι άρνητικός} \Leftrightarrow \beta < 0$$

3. Κάθε θετικός είναι μεγαλύτερος παντός άρνητικού.

$\alpha$  είναι θετικός ρητός και  $\beta$  είναι άρνητικός  $\Rightarrow \alpha > \beta$

4. Μεταξύ δύο θετικών μεγαλύτερος είναι έκεινος, ό δόποιος έχει μεγαλυτέραν άπόλυτον τιμήν.



σχ. 28.

$$\alpha, \gamma \text{ θετικοί και } |\alpha| > |\gamma| \Rightarrow \alpha > \gamma$$

5. Μεταξύ δύο άρνητικών μεγαλύτερος είναι έκεινος, ό δόποιος έχει μικρότεραν άπόλυτον τιμήν.


$$\beta, \delta \text{ άρνητικοί και } |\beta| > |\delta| \Rightarrow \beta < \delta$$

Γνωρίζομεν ότι κάθε άριθμός τοποθετημένος δεξιώτερον άλλου έπι της ήμιευθείας τῶν ρητῶν της άριθμητικῆς είναι μεγαλύτερος αύτοῦ.



σχ. 29.

Τὸ αὐτὸν ισχύει καὶ διὰ τοὺς ρητούς, οἱ δόποιοι είναι τοποθετημένοι ἐπὶ τῆς εὐθείας τῶν ρητῶν άριθμῶν.



σχ. 30

§ 44. Νὰ συγκριθῇ ἡ διαφορὰ δύο ρητῶν πρὸς τὸ μηδέν.

$(+\frac{1}{2}) - 0 = (+\frac{1}{2}) + 0 = +\frac{1}{2}$	ἡ διαφορὰ εἶναι θετικὸς ἀριθμός
$0 - (-1) = 0 + (+1) = +1$	ἡ διαφορὰ εἶναι θετικὸς ἀριθμός
$(+5) - (-2) = (+5) + (+2) = +7$	ἡ διαφορὰ εἶναι θετικὸς ἀριθμός
$(-\frac{2}{3}) - (-\frac{12}{3}) = (-\frac{2}{3}) + (+\frac{12}{3}) = +\frac{10}{3}$	ἡ διαφορὰ εἶναι θετικός ἀριθμός
$(-\frac{5}{8}) - (-\frac{5}{8}) = (-\frac{5}{8}) + (+\frac{5}{8}) = 0$	ἡ διαφορὰ ισοῦται πρὸς μηδέν
$(+3) - (+5) = (+3) + (-5) = -2$	ἡ διαφορὰ εἶναι ἀρνητικὸς ἀριθμός.
$(-6) - (-5) = (-6) + (+5) = -1$	ἡ διαφορὰ εἶναι ἀρνητ. ἀριθμός

\*Ἐκ τούτων παρατηροῦμεν τὰ ἔξῆς :

1. 'Η διαφορὰ μικροτέρου ἀπὸ μεγαλυτέρου εἶναι θετικὸς ἀριθμός.
2. 'Η διαφορὰ ἵσων ἀριθμῶν εἶναι μηδέν.
3. 'Η διαφορὰ μεγαλυτέρου ἀπὸ μικροτέρου εἶναι ἀρνητικὸς ἀριθμός.

\*Ἐπομένως διατυποῦμεν τὸν κάτωθι δρισμόν.

\*Ο ρητὸς α εἶναι μεγαλύτερος τοῦ ρητοῦ β ἐὰν καὶ μόνον ἐὰν α — β εἶναι θετικὸς ἀριθμός, εἶναι ἵσος πρὸς τὸν β ἐὰν α — β ισοῦται πρὸς μηδέν, εἶναι μικρότερος τοῦ β ἐὰν α — β εἶναι ἀρνητικὸς ἀριθμός.

Συμβολικῶς :  $\alpha, \beta \in \mathbb{Q}$

$\alpha - \beta > 0 \iff \alpha > \beta$
$\alpha - \beta = 0 \iff \alpha = \beta$
$\alpha - \beta < 0 \iff \alpha < \beta$

\*Εφαρμογή.

Νὰ συγκριθοῦν οἱ κάτωθι ἀριθμοί.

α)  $+7$  καὶ  $-5$

\*Ἐχομεν  $(+7) - (-5) = (+7) + (+5) = +12 > 0$

\*Αρα  $+7 > -5$

β)  $-13$  καὶ  $-12$

Εἶναι  $(-13) - (-12) = (-13) + (+12) = -1 < 0$

\*Ἐπομένως  $-13 < -12$

γ)  $-\frac{12}{3}$  καὶ  $-4$

\*Ἐπειδὴ  $-\frac{12}{3} - (-4) = \left(-\frac{12}{3}\right) + (+4) = \left(-\frac{12}{3}\right) + \left(+\frac{12}{3}\right) = 0$

$$\Rightarrow -\frac{12}{3} = -4.$$

§ 45. Ιδιότητες.

1. Παρατηρούμεν ότι δπό τάς ἀνισότητας  $+7 > +2$  καὶ  $+2 > -10$  συνεπάγεται ἡ ἀνισότης  $+7 > -10$ . "Ητοι ισχύει ἡ μεταβ. Ιδιότης εἰς τὴν ἀνισότητα.

Γενικῶς:  $\alpha > \beta$  καὶ  $\beta > \gamma \Rightarrow \alpha > \gamma$  ( $\alpha, \beta, \gamma \in Q$ )

Τοῦτο δικαιολογεῖται ὡς ἔξῆς:

'Ἐπειδὴ  $\alpha > \beta$  καὶ  $\beta > \gamma$  ἔχομεν δτι  $\alpha - \beta$  εἶναι θετικός καὶ  $\beta - \gamma$  εἶναι θετικός δριθμός. Τὸ ἄθροισμα αὐτῶν:  $\alpha - \beta + \beta - \gamma = \alpha - \gamma$  εἶναι θετικός δριθμός. 'Άλλα  $-\beta$  καὶ  $\beta$  ἀντίθετοι: ἀρα  $\alpha - \beta + \beta - \gamma = \alpha - \gamma$  εἶναι θετικός δρι-

θμός, ἐπομένως  $\alpha > \gamma$ .

2. 'Ἐπειδὴ  $+\frac{5}{9} > 0$  καὶ δ ἀντίθετός του  $-\frac{5}{9} < 0$ , ἔχομεν γενικῶς τὴν Ισοδυναμίαν:  $\alpha > 0 \Leftrightarrow -\alpha < 0$  ( $\alpha \in Q$ )

3. 'Ἐπισής ἐκ τῶν παραδειγμάτων:

$$\begin{aligned} -3 - (-8) &= -3 + (+8) = +5, & -3 > -8 \\ -8 - (-3) &= -8 + (+3) = -5, & -8 < -3 \end{aligned}$$

'Έχομεν:  $\alpha > \beta \Leftrightarrow \beta < \alpha$  ( $\alpha, \beta \in Q$ )

Δικαιολόγησις:

'Ἐὰν  $\alpha > \beta$  συνεπάγεται  $\alpha - \beta$  εἶναι θετικός δριθμός· ἀλλὰ τότε δ ἀντίθετός του  $\beta - \alpha$  θὰ εἶναι δρητικός δριθμός. Συνεπῶς  $\beta < \alpha$

4. 'Ἐὰν καὶ εἰς τὰ δύο μέλη ἀνισότητος προσθέσωμεν τὸν αὐτὸν ρητὸν εύρισκομεν δμόστροφον ἀνισότητα. Π.χ.  $-5 > -12$  προσθέτομεν τὸν  $-3$ :  $-5 + (-3) > -12 + (-3)$  δηλαδὴ  $-8 > -15$ .

Γενικῶς:  $\alpha > \beta \Leftrightarrow \alpha + \gamma > \beta + \gamma$  ( $\alpha, \beta, \gamma \in Q$ )

Δικαιολόγησις:

'Ἐπειδὴ  $\alpha > \beta \Rightarrow \alpha - \beta > 0$ . Προσθέτομεν τὸ μηδὲν εἰς ἀμφότερα τὰ μέλη:  $\alpha - \beta + 0 > 0$

$\alpha - \beta + \gamma - \gamma > 0 \Rightarrow \alpha + \gamma - \beta - \gamma > 0 \Rightarrow \alpha + \gamma - (\beta + \gamma) > 0 \Rightarrow \alpha + \gamma > \beta + \gamma$

'Εφαρμογή.

$\alpha + \beta > \gamma \Leftrightarrow \alpha + \beta + (-\beta) > \gamma + (-\beta) \Rightarrow \alpha > \gamma - \beta$ . 'Ἐὰν δπό τὸ έν μέλος ἀνισότητος μεταφέρωμεν δρον εἰς τὸ δλλο, ἀλλάσσομεν τὸ πρόσημόν του.

5. Διατυπώσατε λεκτικῶς καὶ ἐπαληθεύσατε τὴν Ιδιότητα:

$\alpha > \beta \Rightarrow \alpha - \gamma > \beta - \gamma$  ( $\alpha, \beta, \gamma \in Q$ )

### § 46. Διάταξις

Έάν δοθεί ένας δύο πραγματικοί αριθμοί, αύτοί ή είναι ίσοι ή όχι είναι μικρότερος του άλλου.

Τήν έκφρασιν: «.... είναι μικρότερος ή ίσος....» συμβολίζομεν διά τοῦ

Έάν λάβωμεν ύπ' θύμην τάς ιδιότητας τής άνισότητος καὶ τής ίσότητος παρατηρούμεν διά ίσχυον αἱ κάτωθι ιδιότητες :

$$\alpha \leq \alpha \quad \text{άνακλαστική}$$

$$\alpha \leq \beta \text{ καὶ } \beta \leq \alpha \implies \alpha = \beta \quad \text{άντισυμμετρική}$$

$$\alpha \leq \beta \text{ καὶ } \beta \leq \gamma \implies \alpha \leq \gamma \quad \text{μεταβατική}$$

Τήν σχέσιν  $\leq$  λέγουμεν διάταξιν τῶν ρητῶν κατὰ μέγεθος.

**Σημείωσις:** Κάθε σχέσις, ή δύοις έχει τάς ιδιότητας «άνακλαστικήν», «άντισυμμετρικήν» καὶ «μεταβατικήν» λέγεται σχέσις διατάξεως.

### Άσκήσεις :

84. Νά θέστε τὸ κατάλληλον σύμβολον ἐκ τῶν:  $>$ ,  $<$ ,  $=$  μεταξὺ τῶν αριθμῶν:

$$-2 \text{ καὶ } -5, \quad -1 \text{ καὶ } -\frac{3}{2}, \quad 0 \text{ καὶ } -6, \quad -\frac{5}{6} \text{ καὶ } -\frac{3}{4}, \quad \frac{1}{4} \text{ καὶ } 0, \quad -\frac{1}{2} \text{ καὶ } -\frac{1}{3}, \\ -\frac{2}{14} \text{ καὶ } -\frac{1}{7}, \quad (-3+1) \text{ καὶ } -8.$$

85. Ποιαί εἰναι τῶν κάτωθι σχέσεων είναι ἀληθεῖς:

$$\text{α) } -12+15-2 > 3-13+17-7, \quad \text{β) } -2+12-5=2-3+10, \quad \text{γ) } -10 > -\frac{21}{2} \\ \text{δ) } -50 < -\frac{1}{2}, \quad \text{ε) } -\frac{3}{4} > 0, \quad \text{στ) } 0 < -20, \quad \zeta) -1+\frac{24}{5} > -0,6+4,2, \\ \eta) -\frac{2}{3} + \frac{3}{4} < 0,75 - \frac{5}{8}$$

86. Δι' ἐφαρμογῆς τῆς ιδιότητος  $\alpha + \beta > \gamma \implies \alpha > \gamma - \beta$  νὰ δείξητε διτι:

$$\alpha + 2 > 12 \implies \alpha > 10$$

$$\beta - 3 < 5 \implies \beta < 8 \quad (\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{Q})$$

$$2 - \gamma > 2 \implies \gamma < 0$$

87. Δι' αριθμητικῶν παραδειγμάτων νὰ δειχθοῦν αἱ κάτωθι ιδιότητες καὶ νὰ διατυπωθοῦν καὶ λεκτικῶς: ( $\alpha, \beta, \gamma, \delta \in \mathbb{Q}$ )

$$\alpha > \beta \iff -\alpha < -\beta$$

$$\alpha > \beta \text{ καὶ } \gamma = \delta \implies \alpha + \gamma > \beta + \delta$$

$$\alpha > \beta \text{ καὶ } \gamma > \delta \implies \alpha + \gamma > \beta + \delta$$

88. Νά προσθέσητε κατὰ μέλη τὰς κάτωθι άνισότητας :

$$\text{α) } -5 < -3 \quad \text{β) } -5 < -3 \quad \text{γ) } -5 < -3 \\ \alpha) \quad 3 < 5 \quad \beta) \quad -4 < -1 \quad \gamma) \quad 1 < 3.$$

Τι παρατηρεῖτε; Δύνασθε νὰ ἀφαιρέσητε κατὰ μέλη; Διατυπώσατε κανόνας.

**\*Ασκήσεις πρόσδικης ημέρας**

89. Εύρετε τὰ ἑξαγόμενα τῶν κάτωθι πράξεων:

α)  $0 - \frac{1}{4}, -\frac{1}{4} - 0, -3 + 4 - 6, -6 + 4 - 3.$

β)  $-1 - \frac{3}{2}, -\frac{3}{2} - 1, -1 - (-\frac{3}{2}), -\frac{3}{2} - (-1)$

γ)  $-1 - 11 - 111, -1 + (-2 - 3), -1 - (-2 - 3)$

δ)  $-30,3 - 15,7 + \frac{63}{5} - 10 + \frac{1}{2}, 17,7 + 12,5 - 9,4 + \frac{2}{5} - 1$

90. Απαντήσατε εἰς τὰ κατωτέρω ἔρωτήματα:

α) Εάν  $\alpha = \beta$  συνεπάγεται  $|\alpha| = |\beta|$ ; Εάν  $|\alpha| = |\beta|$  τί συμπέρασμα ἑξάγεται διὰ τοὺς ρητοὺς  $\alpha, \beta$ ;

β) Ποῖος δὲ ρητὸς  $x$ , δῆταν  $|x| = |-\frac{3}{7}|$ ;

γ) Διὰ τὸν ρητὸν  $y$  ἀληθεύει δῆτι  $y = |-y|$ ;

δ) Εἰς ποιὸν ὑποσύνολον τοῦ  $Q$  ἀνήκει δὲ ρητὸς  $\psi$ , ἐάν 1ον  $\psi = |\psi|$ , 2ον  $0 = |\psi|$  καὶ 3ον  $-\psi = |\psi|$ ;

ε) Ποῖος δὲ ἀντίθετος τοῦ  $\kappa - \lambda$  καὶ ποῖος τοῦ  $-\mu + \nu$ ; ( $\kappa, \lambda, \mu, \nu \in Q$ ).

91. Εάν  $x = -12 + 17 - 9, \psi = 5 - 11 + 20$  καὶ  $z = -19 + 22$ , νὰ εὑρεθοῦν τὰ

α)  $x + \psi - z$ , β)  $x - \psi + z$ , γ)  $-x + z + \psi$  καθώς καὶ τὰ δ)  $x + \psi + z$ , ε)  $(x + \psi) + z$ , στ)  $x + (\psi + z)$

92. Εάν  $x = -\frac{5}{6} + \frac{7}{3} - 1$  καὶ  $\psi = \frac{1}{6} - \frac{2}{3} + 3$ , νὰ εὑρεθοῦν τὰ

α)  $x + \psi$ , β)  $x - \psi$ , γ)  $-x + \psi$ .

93. Νὰ ὑπολογισθοῦν τὰ α)  $-\alpha + \beta - \gamma$        $\alpha = -\frac{3}{2}$

β)  $-\gamma + \beta - \alpha$       ἐάν  $\beta = -\frac{5}{3}$

γ)  $-\alpha - \gamma + \beta$        $\gamma = +\frac{1}{6}$

94. Τὰ στοιχεῖα τοῦ συνόλου  $\left\{ -\frac{1}{3}, -\frac{1}{2}, -1, -5, +\frac{1}{8}, +1, 0 \right\}$  νὰ διαταχθοῦν κατὰ τάξιν μεγέθους.

95. Ποῖαί εἴκε τῶν κάτωθι σχέσεων εἶναι ἀληθεῖς;

α)  $-4 > -2$ , β)  $13 > -31$ , γ)  $-\frac{1}{3} > -\frac{1}{2}$ , δ)  $-\frac{1}{5} < -1$

ε)  $-\frac{3}{2} + 5 - 1 \neq 4 - 1,5$ , στ)  $-\frac{2}{3} + \frac{3}{2} \neq \frac{1}{3} + \frac{1}{2}$

96. Ποῖαί εἴκε τῶν στοιχείων τοῦ συνόλου  $\{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5\}$  ἐπαληθεύουν τὴν σχέσιν  $\chi - 5 < -2$ ;

97. Διὰ παραδειγμάτων νὰ ἐπαληθεύσητε δῆτι:

Ἐάν  $\alpha < \beta$  θὰ εἴναι καὶ  $\alpha < \frac{\alpha + \beta}{2} < \beta$ .

98. Εάν διὰ τοὺς ρητοὺς  $\alpha, \beta$  ἔχωμεν τὴν σχέσιν  $\alpha > \beta$ , νὰ ἔξετάσητε ποία σχέσις ὑπάρχει μεταξὺ τῶν ἀντιθέτων τοῦ  $\alpha$  καὶ  $\beta$ .

99. "Αν  $x \in Q$ ,  $y \in Q^+$ ,  $z \in Q^-$ , νά εύρεθούν δι" διναγραφής τῶν στοιχείων των τὰ σύνολα:

$$\alpha) \{x / \frac{5}{7} - x = -\frac{5}{7}\}, \beta) \{\psi/\psi - 3 = -1\}, \gamma) \{x / -\frac{3}{5} - x = -\frac{3}{5}\}$$

$$\delta) \{\psi / \frac{1}{2} - \psi = 20\}, \epsilon) \{x / -\frac{5}{2} + x = -\frac{5}{2}\}, \sigma) \{z / -\frac{2}{3} + z = -\frac{2}{3}\}$$

100. Έάν  $\alpha=0$ ,  $\beta=-1$  και  $\gamma=-2$ , νά υπολογισθούν τά:

$$1) (\alpha-\beta)+(\beta-\gamma)+(\gamma-\alpha) \text{ και } 2) -(\alpha-\beta)-(\beta-\gamma)-(\gamma-\alpha).$$

### 8. Η ΠΡΑΞΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟΝ Q. ΓΙΝΟΜΕΝΟΝ ΔΥΟ ΡΗΤΩΝ

§ 47. Εις τὰς μέχρι τοῦδε πράξεις τῶν ρητῶν ἀριθμῶν, εἴδομεν δτι, διατηροῦνται αἱ ιδιότητες τῶν πράξεων τῶν ρητῶν τῆς ἀριθμητικῆς.

Διά τοῦτο θὰ δρίσωμεν τὸν πολλαπλασιασμὸν εἰς τὸ σύνολον τῶν ρητῶν ἀριθμῶν ώστε νά ισχύουν αἱ γνωσταὶ ιδιότητες τοῦ πολ/σμοῦ

$$\alpha \cdot \beta = \beta \cdot \alpha$$

$$\text{ἀντιμεταθετικὴ}$$

(α)

$$(\alpha \cdot \beta) \cdot \gamma = \alpha(\beta \cdot \gamma)$$

$$\text{προσεταιριστικὴ}$$

$$\alpha \cdot (\beta + \gamma) = \alpha \cdot \beta + \alpha \cdot \gamma$$

$$\text{ἐπιμεριστικὴ.}$$

$$1. \text{ Έπειδὴ } 3 \cdot 5 = 15 \text{ εἶναι καὶ}$$

$$( +3 ) \cdot ( +5 ) = +15$$

Δηλαδὴ τὸ γινόμενον δύο θετικῶν εἶναι θετικὸς ἀριθμός.

2. Εις τὸν παραπλεύρως πίνακα (α) παρατηροῦμεν τὰ ἔξῆς :

"Οταν δ πολ/στής 3 ἐλαττοῦται κατὰ μονάδα καὶ γίνεται : 2, 1, 0, τὸ γινόμενον ἐλαττοῦται κατὰ 5 καὶ γίνεται: 10, 5, 0. Έάν συνεχίσωμεν νά ἐλαττώνωμεν τὸν πολ/στήν κατὰ ἔνα : -1, -2, -3, ... πρέπει καὶ τὸ γινόμενον νά ἐλαττώνωμεν κατὰ 5 : -5, -10, -15...

Δηλαδὴ πρέπει  $(-1) \cdot 5 = -5$ ,  $(-2) \cdot 5 = -10$ ,  $(-3) \cdot 5 = -15$  κ. ο. κ. ἢ  $(-1) \cdot (+5) = -5$ ,  $(-2) \cdot (+5) = -10$  κ.ο.κ.

Δεχόμεθα δτι  $5 \cdot (-2) = (-2) \cdot 5 = -10$   
(μεταθετικὴ ιδιότης τοῦ πολ/σμοῦ).

Έπομένως τὸ γινόμενον ἐτεροσήμων ρητῶν εἶναι ἀρνητικὸς ἀριθμός.

Παράγοντες	Γινόμενον
3 · 5	15
2 · 5	10
1 · 5	5
0 · 5	0
-1 · 5	; -5
-2 · 5	; -10
-3 · 5	; -15
.	.
.	.
.	.

Παράγοντες	Γινόμενον
5 · (-2)	-10
4 · (-2)	-8
3 · (-2)	-6
2 · (-2)	-4
1 · (-2)	-2
0 · (-2)	0
(-1) · (-2)	2
(-2) · (-2)	4
(-3) · (-2)	6
.	.
.	.
.	.

3. Μετά τὴν παραδοχὴν δτι  $(-2) \cdot 5 = 5 \cdot (-2) = -10$  (μεταθετικὴ ίδιότης τοῦ πολ/σμοῦ) παρατηροῦμεν τὸν πίνακα (β).

"Οταν δ πολ/στής 5 ἐλαττοῦται κατὰ ἓνα, τὸ γινόμενον αὔξανεται κατὰ δύο.

"Αρα πρέπει νὰ δεχθῶμεν δτι :  $0 \cdot (-2) = 0$ ,  $(-1) \cdot (-2) = 2$ ,  $(-2) \cdot (-2) = 4$ ,

$(-3) \cdot (-2) = 6$  κ.ο.κ.

Συνεπῶς τὸ γινόμενον δύο ἀρνητικῶν εἶναι θετικὸς ἀριθμός.

§ 48. Δυνάμεθα νὰ αἰτιολογήσωμεν τὰ ἀνωτέρω ἐὰν δεχθῶμεν δτι ίσχύουν αἱ ίδιότητες :  $\alpha \cdot (\beta + \gamma) = \alpha \cdot \beta + \alpha \cdot \gamma$ ,  $\alpha \cdot \beta = \beta \cdot \alpha$ ,  $\alpha \cdot 0 = 0$

$$1. \text{ 'Επειδὴ } \frac{2}{3} \cdot \frac{7}{5} = \frac{2 \cdot 7}{3 \cdot 5} = \frac{14}{15} \text{ ἔχομεν καὶ } \boxed{\left( + \frac{2}{3} \right) \cdot \left( + \frac{7}{5} \right) = + \frac{14}{15}}$$

$$2. \text{ Εἶναι } \frac{3}{4} \cdot 0 = 0$$

$$\text{ἢ } \frac{3}{4} \cdot (-2+2) = 0$$

$$\text{ἢ } \frac{3}{4} \cdot (-2) + \frac{3}{4} \cdot 2 = 0 \quad (\text{ἐπιμερ. ίδιότης})$$

ἢ  $\frac{3}{4} \cdot (-2) + \frac{6}{4} = 0$ . "Εκ ταύτης παρατηροῦμεν δτι τὸ  $\frac{3}{4} \cdot (-2)$  πρέπει νὰ παριστᾶ τὸν ἀντίθετον τοῦ  $\frac{6}{4}$ , δηλαδὴ τὸν  $-\frac{6}{4}$ .

Συνεπῶς  $\frac{3}{4} \cdot (-2) = -\frac{6}{4}$  θὶ  $\left( + \frac{3}{4} \right) \cdot (-2) = -\frac{6}{4}$  καὶ

$$\boxed{\left( + \frac{3}{4} \right) \cdot (-2) = (-2) \cdot \left( + \frac{3}{4} \right) = -\frac{6}{4}} \quad (\text{μεταθετικὴ ίδιότης}).$$

$$3. \text{ "Έχομεν } (-2) \cdot 0 = 0$$

$$\text{ἢ } (-2) \cdot \left( -\frac{3}{4} + \frac{3}{4} \right) = 0$$

$$\text{ἢ } (-2) \cdot \left( -\frac{3}{4} \right) + (-2) \cdot \left( \frac{3}{4} \right) = 0$$

$$\text{ἢ } (-2) \cdot \left( -\frac{3}{4} \right) + \left( -\frac{6}{4} \right) = 0.$$

"Εκ τῆς τελευταίας αὐτῆς ισότητος συμπεραίνομεν δτι τὸ  $(-2) \cdot \left( -\frac{3}{4} \right)$  παριστᾶ τὸν ἀντίθετον τοῦ  $-\frac{6}{4}$  δηλαδὴ τὸ  $+\frac{6}{4}$ . "Αρα :

$$\boxed{(-2) \cdot \left( -\frac{3}{4} \right) = +\frac{6}{4}}$$

"Εκ τούτων καταλήγομεν εἰς τὸ συμπέρασμα δτι :

Τὸ γινόμενον δύο ρητῶν εἶναι ρητὸς ἀριθμός, δ ὅποῖς ἔχει ἀπόλυτον τιμῆν τὸ γινόμενον τῶν ἀπολύτων τιμῶν καὶ εἶναι θετικὸς μέν, ἐὰν οὗτοι εἶναι ὀδμόσημοι, ἀρνητικὸς δέ, ἐὰν εἶναι ἑτερόσημοι καὶ μηδέν, ἐὰν δ εἰς εἶναι μηδέν.

Συμβολικῶς :  $\alpha, \beta \in Q$  καὶ  $\alpha, \beta$  διάστηματα,  $\alpha \cdot \beta = |\alpha| \cdot |\beta|$   
 $\alpha, \beta$  έπερόστηματα,  $\alpha \cdot \beta = -(|\alpha| \cdot |\beta|)$   
 $\alpha \cdot 0 = 0$

Σημείωσις. Τὸ γινόμενον  $\alpha \cdot \beta$  γράφεται καὶ αβ.

### Παραδείγματα

$$\begin{aligned} (+2) \left( +\frac{3}{5} \right) &= +\left( 2 \cdot \frac{3}{5} \right) = +\frac{6}{5} > 0, \quad \left( -\frac{6}{7} \right) \cdot (+3) = -\left( \frac{6}{7} \cdot 3 \right) = +\frac{18}{7} < 0, \\ \left( -\frac{2}{3} \right) \cdot \left( -\frac{5}{7} \right) &= +\left( \frac{2}{3} \cdot \frac{5}{7} \right) = +\frac{10}{21} > 0, \quad (+4) \cdot \left( -\frac{2}{5} \right) = -\left( 4 \cdot \frac{2}{5} \right) = -\frac{8}{5} < 0, \\ \alpha, \beta \text{ ρητοί διάστηματα} &\iff \alpha\beta > 0, \quad \alpha, \beta \text{ ρητοί έπερόστηματα} \iff \alpha\beta < 0, \\ 0 \cdot \left( -\frac{1}{2} \right) &= 0, \quad 0 \cdot \left( +\frac{5}{16} \right) = 0, \quad 0 \cdot \alpha = 0. \end{aligned}$$

### § 49. Ἰδιότητες.

Συμφώνως πρὸς τὸν κανόνα διὰ τὴν εὔρεσιν τοῦ γινομένου δύο ρητῶν παρατηροῦμεν, δτὶ δ πολὺ σμὸς ἐκτὸς τῶν ἴδιοτήτων τὰς ὅποιας ἔδεχθημεν ἔχει καὶ τὰς κάτωθι :

α) Διοθέντων δύο ρητῶν  $\alpha$  καὶ  $\beta$  ὑπάρχει πάντοτε δ ρητὸς  $\alpha\beta$  (γινόμενον αὐτῶν). Συμβολικῶς,  $\alpha, \beta \in Q \Rightarrow \alpha\beta \in Q$ .

β) Τὸ γινόμενον δύο ρητῶν εἶναι εἰς μόνον ρητός. Δηλαδὴ ἡ πρᾶξις τοῦ πολ / σμοῦ εἶναι μονότιμος.

$$\begin{aligned} \gamma) \text{ Ἐπειδὴ } (+1) \cdot \left( +\frac{2}{3} \right) &= +\left( 1 \cdot \frac{2}{3} \right) = +\frac{2}{3}, \quad \left( -\frac{4}{7} \right) \cdot (+1) = \\ &= -\left( \frac{4}{7} \cdot 1 \right) = -\frac{4}{7} \text{ συμπεραίνομεν δτὶ δ ἀριθμὸς } +1 \text{ εἶναι οὐδέτερον στοιχείον εἰς τὸν πολ / σμόν.} \end{aligned}$$

$$\alpha \in Q \Rightarrow (+1) \cdot \alpha = \alpha$$

$$\delta) \text{ Ἐπειδὴ } (-1) \cdot (-5) = +(1 \cdot 5) = +5, \quad \left( +\frac{3}{10} \right) \cdot (-1) = -\left( \frac{3}{10} \cdot 1 \right) = \\ = -\frac{3}{10} \text{ συνάγομεν δτὶ τὸ γινόμενον ρητοῦ ἐπὶ } (-1) \text{ ισοῦται πρὸς τὸν ἀντίθετον αὐτοῦ.}$$

$$\alpha \in Q \Rightarrow (-1) \cdot \alpha = -\alpha$$

ε) Ἐχομεν :

$$\begin{aligned} (+2) \cdot \left( +\frac{1}{2} \right) &= +\left( 2 \cdot \frac{1}{2} \right) = +1, \quad \left( +\frac{5}{3} \right) \cdot \left( +\frac{3}{5} \right) = +\left( \frac{5}{3} \cdot \frac{3}{5} \right) = +1 \\ (-2) \cdot \left( -\frac{1}{2} \right) &= +\left( 2 \cdot \frac{1}{2} \right) = +1, \quad \left( -\frac{5}{3} \right) \cdot \left( -\frac{3}{5} \right) = +\left( \frac{5}{3} \cdot \frac{3}{5} \right) = +1 \end{aligned}$$

"Αρα οι διμόσημοι ρητοί, οι δύοιοι έχουν άντιστροφώς άπολύτους τιμάς έχουν γινόμενον τὸν +1. Οὔτοι λέγονται άντιστροφοί ρητοί.

Συνεπώς διθέντος ένδος ρητοῦ α ( $\alpha \neq 0$ ) ύπάρχει άλλος, διμόσημος πρὸς αὐτὸν καὶ μὲ άντιστροφὸν άπόλυτον τιμὴν, δ ὅποιος λέγεται άντιστροφος τοῦ α καὶ συμβολίζεται  $\frac{1}{\alpha}$  ή  $\alpha^{-1}$ . Συντομώτερον :

Διὰ κάθε στοιχείου τοῦ συνόλου Q τῶν ρητῶν (έκτὸς τοῦ μηδενὸς) ύπάρχει ἐν μόνῳ άλλῳ στοιχείον, τὸ δύοιον λέγεται άντιστροφὸν αὐτοῦ.

Π.χ. δ ἀντιστροφὸς τοῦ +20 εἶναι δ + $\frac{1}{20}$ , τοῦ -48 εἶναι δ - $\frac{1}{48}$  τοῦ - $\frac{17}{19}$  εἶναι δ - $\frac{19}{17}$  τοῦ +1 εἶναι δ +1 καὶ τοῦ -1 εἶναι δ -1.

### Άσκήσεις

101. Εύρετε τὰ γινόμενα :

$$\alpha) +1 \cdot (-1), \quad (+8) \cdot (+1), \quad -\frac{3}{5} \cdot (-1), \quad \left(-\frac{15}{7}\right) \cdot (+1)$$

$$\beta) 0 \cdot (-12), \quad \left(-\frac{4}{21}\right) \cdot \left(-\frac{21}{4}\right), \quad \left(+\frac{1}{2}\right) \cdot (+2), \quad \left(+\frac{3}{8}\right) \cdot \left(-\frac{8}{3}\right)$$

102. Εύρετε τὰ έξαγόμενα τῶν κάτωθι πράξεων :

$$\alpha) -\frac{13}{15} \cdot \left(-\frac{15}{13}\right) + 8 \cdot \left(-\frac{1}{8}\right), \quad \beta) -\frac{4}{7} \cdot \frac{7}{4} + \frac{10}{17} \cdot \left(-\frac{17}{10}\right) + \frac{21}{29} \cdot \left(-\frac{29}{21}\right)$$

$$\beta) -\frac{1}{2} \cdot (-2) + \frac{41}{61} \cdot \frac{61}{41} + \left(-\frac{101}{119}\right) \cdot \left(-\frac{119}{101}\right),$$

$$\gamma) \frac{5}{3} \cdot \left(-\frac{3}{5}\right) + \frac{1}{2} \cdot (-2) + 15 \cdot \left(-\frac{1}{15}\right) + \frac{46}{3} \cdot \left(-\frac{3}{23}\right)$$

103. Νὰ εύρεθοῦν τὰ έξαγόμενα κατὰ τὸν συντομώτερον τρόπον.

[Χρησιμοποιήσατε τὴν Ιδιότητα:  $\alpha\beta + \alpha\gamma = \alpha(\beta + \gamma)$ ]

$$\alpha) 5 \cdot (-7) + 5 \cdot 27, \quad \gamma) 59 \cdot (-19) + 59 \cdot 9, \quad \epsilon) -21 \cdot (-17) + (-21) \cdot (-13)$$

$$\beta) 6 \cdot (-12) - 6 \cdot 18, \quad \delta) -\frac{2}{5} \cdot 11 - \frac{2}{5} \cdot 19, \quad \sigma) \frac{15}{23} \cdot (-18) - \frac{30}{46} \cdot 12.$$

104. Νὰ υπολογισθοῦν τὰ κάτωθι γινόμενα κατὰ δύο τρόπους :

$$\alpha) -5 \cdot (+12 - 19), \quad \beta) \frac{3}{4} \cdot \left(-\frac{2}{3} + \frac{5}{6}\right), \quad \gamma) \left(-4 + \frac{7}{2} - \frac{3}{5}\right) \cdot \left(-\frac{10}{11}\right)$$

$$\delta) \left(\frac{4}{3} - \frac{3}{4} + \frac{1}{8} - \frac{1}{6}\right) \cdot \left(-\frac{24}{13}\right), \quad \epsilon) \left(\frac{2}{7} - \frac{11}{5} + \frac{7}{2} - 1\right) \cdot \left(-\frac{70}{19}\right)$$

105. Ποιον συμπέρασμα έξαγεται διὰ τοὺς ρητοὺς α, β, ἐὰν  $\alpha\beta > 0$  ή  $\alpha\beta = 0$  ή  $\alpha\beta < 0$ ;

### 9. ΓΙΝΟΜΕΝΟΝ ΤΡΙΩΝ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΡΗΤΩΝ — ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

§ 50. Νὰ υπολογισθῇ τὸ γινόμενον  $2 \cdot (-3) \cdot 4$ .

Εύρισκομεν τὸ γινόμενον τῶν δύο πρώτων παραγόντων,  $2 \cdot (-3) = -6$

καὶ κατόπιν τὸ γινόμενον αὐτὸ ἐπὶ τὸν τρίτον παράγοντα  $-6 \cdot 4 = -24$ .

Τοῦτο γράφομεν καὶ ὡς ἔχεις :

$$2 \cdot (-3) \cdot 4 = [2 \cdot (-3)] \cdot 4 = (-6) \cdot 4 = -24$$

Ἄναλόγως ἐργαζόμεθα, ἐὰν ἔχωμεν περισσοτέρους τῶν τριῶν παράγοντας.

"Ωστε γινόμενον τριῶν ἢ περισσοτέρων ρητῶν εἶναι ὁ ρητός, τὸν ὅποιον εύρισκομεν, ἐὰν πολλαπλασιάσωμεν τοὺς δύο πρώτους, τὸ εὔρεθὲν γινόμενον μὲ τὸν τρίτον κ.ο.κ.

$$\text{Συμβολικῶς : } \alpha \cdot \beta \cdot \gamma \cdot \delta = [(\alpha \cdot \beta) \cdot \gamma] \cdot \delta \quad (\alpha, \beta, \gamma, \delta \in Q).$$

**Παραδείγματα :**

$$( +2 ) \cdot ( +4 ) \cdot ( +5 ) = [ ( +2 ) \cdot ( +4 ) ] \cdot ( +5 ) = ( +8 ) \cdot ( +5 ) = +40 = + ( 2 \cdot 4 \cdot 5 )$$

$$( -2 ) \cdot ( +4 ) \cdot ( +5 ) = [ ( -2 ) \cdot ( +4 ) ] \cdot ( +5 ) = ( -8 ) \cdot ( +5 ) = -40 = - ( 2 \cdot 4 \cdot 5 )$$

$$( -2 ) \cdot ( -4 ) \cdot ( +5 ) = [ ( -2 ) \cdot ( -4 ) ] \cdot ( +5 ) = ( +8 ) \cdot ( +5 ) = +40 = + ( 2 \cdot 4 \cdot 5 )$$

$$( -2 ) \cdot ( -4 ) \cdot ( -5 ) = [ ( -2 ) \cdot ( -4 ) ] \cdot ( -5 ) = ( +8 ) \cdot ( -5 ) = -40 = - ( 2 \cdot 4 \cdot 5 )$$

Ἐκ τούτων παρατηροῦμεν ὅτι :

"Ἐν γινόμενον μὲ περισσοτέρους τῶν δύο παράγοντας ἔχει ἀπόλυτον τιμὴν τὸ γινόμενον τῶν ἀπολύτων τιμῶν τῶν παραγόντων του καὶ εἶναι θετικὸν μέν, ἐὰν οἱ παράγοντες αὐτοῦ εἶναι θετικοὶ ἢ τὸ πλῆθος τῶν ἀρνητικῶν παραγόντων εἶναι ἀριθμός, ἀρνητικὸν δέ, ἐὰν τὸ πλῆθος τῶν ἀρνητικῶν παραγόντων εἶναι περιττὸς ἀριθμός.

Μὲ βάσιν τὸν προηγούμενον κανόνα ὑπολογίσατε τὰ γινόμενα :

$$( +2 ) \cdot ( +3 ) \cdot ( +4 ) \cdot ( +5 ) = + ( 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 ) = +120$$

$$( -2 ) \cdot ( +3 ) \cdot ( +4 ) \cdot ( +5 ) = - ( 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 ) = -120$$

$$( +2 ) \cdot ( +3 ) \cdot ( -4 ) \cdot ( -5 ) = + ( 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 ) = +120$$

$$( +2 ) \cdot ( -3 ) \cdot ( -4 ) \cdot ( -5 ) = - ( 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 ) = -120$$

$$( -2 ) \cdot ( -3 ) \cdot ( -4 ) \cdot ( -5 ) = + ( 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 ) = +120$$

Ἐὰν  $\alpha, \beta, \gamma, \delta$  εἶναι θετικοὶ ἔχομεν :

$$(-\alpha) \cdot \beta \cdot \gamma \cdot \delta = -(\alpha \cdot \beta \cdot \gamma \cdot \delta)$$

$$(-\alpha) \cdot (-\beta) \cdot \gamma \cdot \delta = (\alpha \cdot \beta \cdot \gamma \cdot \delta)$$

$$(-\alpha) \cdot (-\beta) \cdot (-\gamma) \cdot \delta = -(\alpha \cdot \beta \cdot \gamma \cdot \delta)$$

$$(-\alpha) \cdot (-\beta) \cdot (-\gamma) \cdot (-\delta) = (\alpha \cdot \beta \cdot \gamma \cdot \delta)$$

Σημείωσις. Τὸ γινόμενον  $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ . γράφεται καὶ αβγδ.

### § 51. Ἰδιότητες

"Επειδὴ τὸ γινόμενον ρητῶν ἔχει ἀπόλυτον τιμὴν τὸ γινόμενον τῶν ἀπολύτων τιμῶν αὐτῶν, Ισχύουν, δι' αὐτό, δλαι αἱ ἴδιότητες τοῦ γινομένου τῶν ρητῶν τῆς ἀριθμητικῆς.

1.  $(\alpha \cdot \beta) \cdot \gamma = \alpha \cdot (\beta \cdot \gamma) = (\alpha \cdot \gamma) \cdot \beta$
  2.  $(\alpha \cdot \beta \cdot \gamma) \cdot (\delta \cdot \epsilon) = \alpha \cdot \beta \cdot \gamma \cdot \delta \cdot \epsilon$
  3.  $\alpha \beta \gamma \delta = \gamma \alpha \delta \beta = \beta \alpha \delta \gamma = \dots$
  4.  $(\alpha + \beta) \cdot (\gamma + \delta) = \alpha(\gamma + \delta) + \beta(\gamma + \delta) = \alpha \gamma + \alpha \delta + \beta \gamma + \beta \delta$
- Π.χ.  $[( -2) \cdot ( -5)] \cdot ( -6) = ( +10) \cdot ( -6) = -60$   
 $( -2) \cdot [(-5) \cdot (-6)] = ( -2) \cdot ( +30) = -60$ . Υπότιμη  
 $[( -2) \cdot ( -5)] \cdot ( -6) = ( -2) \cdot [(-5) \cdot (-6)]$  καὶ γενικῶς  
 $(\alpha \beta) \gamma = \alpha (\beta \gamma)$  ἡ προσεταιριστική ιδιότης τοῦ πολλαπλασιασμοῦ.

Ἐφαρμογαί :

$$\alpha) 2 \cdot \left( -\frac{3}{5} \right) \cdot \left( -\frac{1}{2} \right) \cdot \frac{3}{4} \cdot \left( -\frac{5}{3} \right) = - \left( 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{5}{3} \cdot \frac{3}{4} \right) = - \left( 1 \cdot 1 \cdot \frac{3}{4} \right) = -\frac{3}{4}$$

$$\beta) (-2) \cdot (-2) = (2 \cdot 2) = 2^2, (-3) \cdot (-3) \cdot (-3) = -(3 \cdot 3 \cdot 3) = -3^3$$

$$\gamma) \left( -\frac{3}{4} \cdot 5 \right) \cdot \left( -\frac{4}{3} \cdot 2 \right) = \left( -\frac{3}{4} \right) \cdot 5 \cdot \left( -\frac{4}{3} \right) \cdot 2 = \left( \frac{3}{4} \cdot \frac{4}{3} \cdot 5 \cdot 2 \right) = 1 \cdot 10 = 10$$

$$\delta) [(-2) \cdot (-2) \cdot (-2)] \cdot [(-2) \cdot (-2)] = [-(2 \cdot 2 \cdot 2)] \cdot [+(2 \cdot 2)] = [-2^3] \cdot [+2^2] = -(2^3 \cdot 2^2) = -2^5$$

$$\epsilon) [(-3) + (-6)] \cdot [(-8) + (-6)] = (-3) \cdot [(-8) + (-6)] + (-6) \cdot [(-8) + (-6)] = 24 + 18 + 48 + 36 = 126$$

$$[(-3) + (-6)] \cdot [(-8) + (-6)] = [-9] \cdot [-14] = 126. (\beta' \text{ τρόπος διπλούστερος}).$$

$$\sigma) (-2 + \alpha) \cdot (-3 + \beta) = (-2)[-3 + \beta] + \alpha[-3 + \beta] = (-2) \cdot (-3) + (-2)\beta + \alpha(-3) + \alpha\beta = 6 - 2\beta - 3\alpha + \alpha\beta$$

$$\zeta) -2 \cdot (-3 + \alpha) + (-5 + \alpha) \cdot 3 = (-2) \cdot (-3) + (-2)\alpha + (-5) \cdot 3 + 3\alpha = 6 - 2\alpha + (-15) + 3\alpha = 6 - 2\alpha - 15 + 3\alpha = 6 - 15 + 3\alpha - 2\alpha = -9 + \alpha$$

### § 52. Απόλυτος τιμὴ γινομένου ρητῶν ἀριθμῶν

Ἐχομεν :  $|(-2) \cdot (+\frac{3}{4})| = \left| -\frac{6}{4} \right| = \frac{6}{4}$

$$\left| -2 \right| \cdot \left| +\frac{3}{4} \right| = 2 \cdot \frac{3}{4} = \frac{6}{4}$$

$$\text{Συνεπῶς } \left| (-2) \cdot \left( +\frac{3}{4} \right) \right| = \left| -2 \right| \cdot \left| +\frac{3}{4} \right|$$

"Ωστε ἡ ἀπόλυτος τιμὴ γινομένου ισοῦται πρὸς τὸ γινόμενον τῶν ἀπολύτων τιμῶν τῶν παραγόντων.

Γενικῶς  $\alpha, \beta \in Q$  εἶναι :  $|\alpha \cdot \beta| = |\alpha| \cdot |\beta|$

\*Η ιδιότης αύτή ισχύει καὶ διὰ περισσοτέρους τῶν δύο παράγοντας.

### \*Ιδιότητες Ισοτήτων καὶ ἀνισοτήτων

§ 53. α) \*Ιδιότης : 'Εάν  $\alpha = \beta \Rightarrow \alpha \cdot \gamma = \beta \cdot \gamma$ . ( $\alpha, \beta, \gamma \in Q$ )

Π.χ. "Έχομεν τὴν Ισότητα  $-\frac{4}{5} = -\frac{8}{10}$  καὶ πολ/μεν καὶ τὰ δύο μέλη αύτῆς ἐπὶ τὸν ρητὸν  $-5$ .

$$\alpha' \text{ μέλος : } -\frac{4}{5} \cdot (-5) = +4.$$

$$\beta' \text{ μέλος : } -\frac{8}{10} \cdot (-5) = +\frac{8}{2} \text{ ἄρα } -\frac{4}{5} \cdot (-5) = -\frac{8}{10} \cdot (-5)$$

\*Ἐπομένως δυνάμεθα νὰ πολ/ωμεν ἀμφότερα τὰ μέλη μιᾶς Ισότητος ἐπὶ τὸν αύτὸν ρητὸν καὶ νὰ λάβωμεν Ισότητα.

β) \*Ιδιότης : 'Εάν  $\alpha \cdot \gamma = \beta \cdot \gamma$  καὶ  $\gamma \neq 0$  θὰ ἔχωμεν καὶ  $\alpha = \beta$ . ( $\alpha, \beta, \gamma \in Q$ )

Π.χ. ἔάν  $\chi \cdot (-5) = (-4) \cdot (-5)$ , ( $\chi \in Q$ ) πολ/μεν καὶ τὰ δύο μέλη ἐπὶ τὸν ἀντίστροφον τοῦ  $-5$ .

$$\alpha' \text{ μέλος : } [\chi \cdot (-5)] \cdot \left(-\frac{1}{5}\right) = \chi \cdot [(-5) \cdot \left(-\frac{1}{5}\right)] = \chi \cdot (+1) = \chi$$

$$\beta' \text{ μέλος : } [(-4) \cdot (-5)] \cdot \left(-\frac{1}{5}\right) = (-4) \cdot \left[(-5) \cdot \left(-\frac{1}{5}\right)\right] = (-4) \cdot (+1) = -4$$

$$\text{Άρα } \chi = -4$$

§ 54. α) \*Ιδιότης : 'Εάν  $\alpha > \beta$  καὶ  $\gamma > 0$  εἶναι καὶ

$$\alpha \cdot \gamma > \beta \cdot \gamma \quad (\alpha, \beta \in Q, \gamma \in Q^+)$$

Π.χ.  $-3 > -4$  πολ/μεν καὶ τὰ δύο μέλη ἐπὶ τὸν  $+2$  καὶ ἔχομεν :

$$\alpha' \text{ μέλος : } (-3) \cdot (+2) = -6$$

$$\beta' \text{ μέλος : } (-4) \cdot (+2) = -8. \text{ Άρα } (-3) \cdot (+2) > (-4) \cdot (+2)$$

β) \*Ιδιότης : 'Εάν  $\alpha > \beta$  καὶ  $\gamma < 0$  εἶναι καὶ :

$$\alpha \cdot \gamma < \beta \cdot \gamma \quad (\alpha, \beta \in Q \text{ καὶ } \gamma \in Q^-)$$

Π.χ.  $+\frac{2}{3} > -\frac{4}{5}$  πολ/μεν καὶ τὰ δύο μέλη ἐπὶ τὸν  $-2$ .

$$\alpha' \text{ μέλος : } +\frac{2}{3} \cdot (-2) = -\frac{4}{3}$$

$$\beta' \text{ μέλος : } -\frac{4}{5} \cdot (-2) = +\frac{8}{5} \text{ καὶ ἐπειδὴ } -\frac{4}{3} < +\frac{8}{5} \text{ ἔχομεν δτι :}$$

$$\left(+\frac{2}{3}\right) \cdot (-2) < \left(-\frac{4}{5}\right) \cdot (-2) \text{ *Ἐπομένως :}$$

\*Ἐάν ἀμφότερα τὰ μέλη ἀνισότητος πολλαπλασιασθοῦν ἐπὶ ἀριθμόν, διάφορον τοῦ μηδενός, προκύπτει ἀνισότης, ὅμοστροφος μέν, ἐάν ὁ ἀριθμὸς εἶναι θετικός, ἑτερόστροφος δέ, ἐάν οὐτος εἶναι ἀρνητικός.

## 'Εφαρμογαί :

§ 55 1. Πολ/μεν άμφότερα τὰ μέλη τῆς Ισότητος  $-10+7=-3$  ἐπὶ τὸν  $-1$ .  
 $-10+7=-3 \Rightarrow (-10+7).(-1)=-3.(-1) \Rightarrow (-10).(-1)+7.(-1)=3 \Rightarrow 10-7=3$

Δηλαδὴ δυνάμεθα νὰ ὀλλάξωμεν τὸ πρόσημον τῶν δρων καὶ τῶν δύο μελῶν μιᾶς Ισότητος  
Γενικῶς :  $(\alpha, \beta, \gamma \in Q)$  ἐὰν  $\alpha-\beta=\gamma \Rightarrow -\alpha+\beta=-\gamma$

2. Πολ/μεν άμφότερα τὰ μέλη τῆς ἀνισότητος  $-\frac{1}{3} > -2$  ἐπὶ τὸν  $-1$ .

$$-\frac{1}{3} > -2 \Rightarrow -\frac{1}{3} < (-2) \quad (-1) \Rightarrow \frac{1}{3} < 2$$

Δυνάμεθα νὰ ὀλλάξωμεν τὸ πρόσημον τῶν δρων καὶ τῶν δύο μελῶν ἀνισότητος, ἐὰν ὀλλάξωμεν τὴν φοράν της.

Γενικῶς :  $(\alpha, \beta, \gamma \in Q)$ . 'Ἐὰν  $\alpha+\beta > \gamma \Rightarrow -\alpha-\beta < -\gamma$

## § 56. 'Ανακεφαλαίωσις.

'Εκ τῶν ἀναφερομένων εἰς τὸν πολ/σμὸν τῶν ρητῶν συμπεραίνομεν ὅτι :

α. Δοθέντων δύο ρητῶν  $\alpha$  καὶ  $\beta$  ὑπάρχει δὲ ρητὸς  $\alpha\beta$  (γινόμενον αὐτῶν).

Συμβολικῶς :  $\alpha, \beta \in Q$  καὶ  $\alpha\beta \in Q$ . "Ητοι :

'Ἐὰν  $\alpha, \beta$  δόμσημοι, τότε  $\alpha\beta=|\alpha| \cdot |\beta|$

ἐὰν  $\alpha, \beta$  ἔτερόσημοι, τότε  $\alpha\beta=-(|\alpha| \cdot |\beta|)$ ,

ἐὰν δὲ εἰς εἶναι μηδέν, τότε  $\alpha\beta=0$ .

Εἰς δλας τὰς ἀνωτέρω περιπτώσεις ἔχομεν

$$|\alpha\cdot\beta|=|\alpha|\cdot|\beta|$$

β. Τὸ γινόμενον δύο ρητῶν εἶναι εἰς καὶ μόνον εἰς ρητὸς (μονότιμον τοῦ πολ/σμοῦ).

γ. 'Ισχύει ἡ μεταθετικὴ ίδιότης :  $\alpha\beta=\beta\alpha, \quad (\alpha, \beta \in Q)$ .

δ. Δοθέντων τῶν ρητῶν  $\alpha, \beta$  καὶ  $\gamma$  ισχύει ἡ προσεταιριστικὴ ίδιότητοῦ πολ/σμοῦ :  $(\alpha\cdot\beta)\cdot\gamma=\alpha\cdot(\beta\cdot\gamma)$

ε. 'Υπάρχει ἐν στοιχείον τοῦ  $Q$ , τὸ  $+1$ , τὸ ὄποιον εἶναι οὐδέτερον εἰς τὸν πολ/σμόν.

$$\alpha \in Q \Rightarrow \alpha \cdot (+1)=\alpha$$

στ. Διὰ κάθε στοιχείον τοῦ  $Q$ , (έκτος τοῦ μηδενός), ὑπάρχει ἐν ἄλλῳ στοιχείον αὐτοῦ, τὸ ὄποιον εἶναι ἀντίστροφον τούτου.

'Ο ἀντίστροφος τοῦ ρητοῦ  $\alpha$  ( $\alpha \neq 0$ ) εἶναι δὲ  $\frac{1}{\alpha}$  καὶ  $\alpha \cdot \frac{1}{\alpha}=1$

ζ. Διὰ τοὺς ρητοὺς  $\alpha, \beta$  καὶ  $\gamma$  ισχύει ἡ ἐπιμεριστικὴ ίδιότης :

$$\alpha(\beta+\gamma)=\alpha\beta+\alpha\gamma.$$

Α σ κ ς η σ εις

106. Νάε εύρεθοῦν τὰ γινόμενα:

α)  $(-8) + (-13) + (+2) + (-5)$ , β)  $(-125) + (-8) + (+179) + (-1)$ ,

γ)  $-\frac{17}{19} + \left(-\frac{3}{16}\right) + (+4) + \left(+\frac{19}{17}\right) + \left(-\frac{16}{3}\right)$ ,

δ)  $\left(-\frac{2}{3}\right) + \left(-\frac{3}{2}\right) + \left(+\frac{2}{3}\right) + \left(+\frac{3}{2}\right)$ ,

ε)  $(-4) + (-4) + (-4) + (-4) + (-4)$ ,

στ)  $\left(-\frac{1}{2}\right) + \left(-\frac{1}{2}\right) + \left(-\frac{1}{2}\right) + \left(-\frac{1}{2}\right)$

107. Όμοιως τὰ γινόμενα:

α)  $\left(-\frac{3}{5}\right) + \left(-\frac{3}{5}\right)$ , δ)  $\left(-\frac{2}{3}\right) + \left(-\frac{2}{3}\right) + \left(-\frac{2}{3}\right)$ ,

β)  $\left[(-2) + (-3) + \left(+\frac{4}{5}\right)\right] + (-5)$ , ε)  $\left[\left(-\frac{2}{7}\right) + \left(-\frac{3}{8}\right) + (-5)\right] + \left(-\frac{56}{6}\right)$

γ)  $\left[(3) + (-3) + (-3)\right] + \left[(-3) + (-3)\right]$ , στ)  $\left[-\frac{7}{8} + \left(-\frac{8}{9}\right) + \left(-\frac{11}{10}\right)\right] + \left[\left(-\frac{9}{7}\right) + \left(-\frac{10}{11}\right)\right]$ .

108. Νάε εύρεθοῦν τὰ κάτωθι γινόμενα κατά δύο τρόπους.

α)  $[-5+2] + [(-3)+(-2)]$ ,

β)  $\left[\left(-\frac{3}{4}\right) + \left(-\frac{2}{3}\right)\right] + \left[\left(-\frac{4}{3}\right) - \left(-\frac{3}{2}\right)\right]$ ,

γ)  $\left[-4 + \left(-\frac{2}{3}\right) + \left(-\frac{4}{5}\right) + \frac{1}{3}\right] + \left(-\frac{15}{16}\right)$ ,

δ)  $\left(-1 + \frac{3}{2} - \frac{5}{3}\right) + \left(-2 + \frac{1}{2}\right)$

109. Εάν  $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{Q}$  έπαληθεύσατε δτι:

$$|\alpha + \beta + \gamma| = |\alpha| + |\beta| + |\gamma|$$

110. Νάε ύπολογισθοῦν τὰ γινόμενα:

α)  $(-4+7) + (-4-7)$ , γ)  $(-3+5) + (-3+5)$ , ε)  $(-4-6) + (-4-6)$ ,

β)  $(-5+\beta) + (\alpha-3)$ , δ)  $(-4+\beta) + (+3+\alpha)$ , στ)  $(\alpha-5) + (\alpha+5)$

111. Νάε έκτελεσθοῦν αι πράξεις:

α)  $3 + (\alpha-\beta) - 4 + (\alpha-4) + 3 + (\beta-2)$

β)  $4(\alpha+\beta+\gamma) - 3(\alpha-\beta) - 2(\beta+\gamma)$

112. Νάε έπιλυθοῦν αι έξισώσεις:

α)  $x + \frac{1}{2} = 1$ , β)  $x + \left(-\frac{1}{3}\right) = 1$ , γ)  $\left(-\frac{5}{7}\right) + x = 1$ , δ)  $\left(-\frac{3}{4}\right) + x = \frac{6}{8}$ .

113. α) Εις τὴν θέσιν τοῦ ἑρωτηματικοῦ νὰ τεθῇ τὸ κατάλληλον σύμβολον ἐκ τῶν = >, < μεταξὺ τῶν παραστάσεων:

$$\alpha) \frac{17}{6} + \frac{2}{3} : \frac{1}{2} + 3, \quad \beta) \frac{2}{5} - 1 ; -\frac{7}{5} + \frac{1}{10}$$

$$\gamma) \frac{20}{3} ; 7 - \frac{1}{3}, \quad \delta) \frac{7}{3} ; 6 - \frac{7}{2}$$

β) Πολλαπλασιάσατε διμόφτερα τὰ μέλη τῶν εὐρεθησομένων σχέσεων:

Ιον ἐπὶ τὸ Ε.Κ.Π. τῶν παρονομαστῶν

Ζον ἐπὶ τὸν ἀντίθετον τοῦ Ε.Κ.Π. τῶν παρονομαστῶν καὶ

Ξον ἐπὶ (-1).

114. Ἀλλάξατε τὸ πρόσθιμον τῶν δρων καὶ τῶν δύο μελῶν τῶν κάτωθι Ισοτήτων καὶ ἀνισοτήτων. Τὶ παρατηρεῖτε;

$$\alpha) -\frac{20}{3} = \frac{1}{3} - 7, \quad \beta) -5 > -\frac{15}{2}, \quad \gamma) -\frac{1}{1000} > -10,$$

$$\delta) \frac{7}{8} - 1 < -\frac{1}{9}, \quad \epsilon) -x + 5 = -12, \quad \sigma) -6 -x > -6$$

115. Πολλαπλασιάσατε κατά μέλη τὰς κάτωθι διαστρόφους ἀνισότητας. Τὶ παρατηρεῖτε,

$$\alpha) -3 > -8$$

$$\beta) -3 < 2$$

$$4 > 2$$

$$-5 < 5$$

$$3 > -2$$

$$2 > -3$$

116. Έάν διά τοὺς θετικούς ρητούς α καὶ β ύψισταται ἡ σχέσις α > β, νὰ ἔξετάσῃτε ποια σχέσις ὑπάρχει μεταξὺ τῶν ἀντιστρόφων τοῦ α καὶ τοῦ β.

## 10. Η ΠΡΑΞΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΕΩΣ ΕΙΣ ΤΟ ζ — ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

### § 57. Πηλίκον δύο ρητῶν.

Νὰ ενδεθῇ ρητός, ὁ δποῖος πολλαπλασιαζόμενος ἐπὶ τὸν  $-\frac{3}{5}$  δίδει γινόμενον τὸν 6.

Ἐάν χ ὁ ζητούμενος ρητὸς ἔχομεν τὴν ἔξισωσιν  $(-\frac{3}{5}) \cdot x = 6$ .

Ἡ διαίρεσις εἰς τὸ σύνολον τῶν ρητῶν ἀριθμῶν δρίζεται ὡς πρᾶξις ἀντίστροφος τοῦ πολ /σμοῦ.

Διαίρεσις εἶναι ἡ πρᾶξις, κατὰ τὴν διόποιαν δίδονται δύο ἀριθμοὶ καὶ εὑρίσκεται τρίτος, ὁ δποῖος πολλαπλασιαζόμενος ἐπὶ τὸν δεύτερον δίδει τὸν πρῶτον.

“Ωστε δυνάμεθα νὰ γράψωμεν:

$$(-\frac{3}{5}) \cdot x = 6 \Rightarrow x = 6 : (-\frac{3}{5})$$

Πρὸς εὔρεσιν τοῦ χ θὰ χρησιμοποιήσωμεν τὴν ίδιότητα:  $\alpha = \beta \Leftrightarrow \gamma \alpha = \gamma \beta$

Ἐχομεν:  $(-\frac{3}{5}) \cdot x = 6 \Rightarrow (-\frac{5}{3}) \cdot [(-\frac{3}{5}) \cdot x] = (-\frac{5}{3}) \cdot 6$

$$\Rightarrow [(-\frac{5}{3}) \cdot (-\frac{3}{5})] \cdot x = 6 \cdot (-\frac{5}{3})$$

$$\Rightarrow [(+1)] \cdot x = 6 \cdot \left(-\frac{5}{3}\right)$$

$$x = 6 \cdot \left(-\frac{5}{3}\right)$$

"Αρα  $x = 6 : \left(-\frac{3}{5}\right) = 6 \cdot \left(-\frac{5}{3}\right)$

"Ωστε διαιρεσις είναι δ πολλαπλασιασμός τοῦ διαιρετέου ἐπὶ τὸν ἀντίστροφον τοῦ διαιρέτου.

$$(\alpha, \beta \in Q) \quad \alpha : \beta = \alpha \cdot \frac{1}{\beta} \quad (\beta \neq 0)$$

### Έφαρμογαί

$$(+12) : (+3) = (+12) \cdot \left(+\frac{1}{3}\right) = +\frac{12}{3} = +4$$

$$(-15) : (-5) = (-15) \cdot \left(-\frac{1}{5}\right) = +\frac{15}{5} = +3$$

$$(+24) : (-7) = (+24) \cdot \left(-\frac{1}{7}\right) = -\frac{24}{7}$$

$$\left(-\frac{4}{7}\right) : \left(+\frac{4}{9}\right) = \left(-\frac{4}{7}\right) \cdot \left(+\frac{9}{4}\right) = -\frac{36}{28} = -\frac{9}{7}$$

$$0 : \left(-\frac{2}{3}\right) = 0 \cdot \left(-\frac{3}{2}\right) = 0$$

"Η διαιρεσις  $\left(-\frac{4}{5}\right) : 0$  είναι ἀδύνατος, διότι δὲν ὑπάρχει ἀντίστροφος τοῦ μη-

δενδός καὶ ἐπομένως δὲν ὑπάρχει καὶ τὸ πηλίκον αὐτό.

'Εκ τούτων παρατηροῦμεν δτι:

"Ἐάν δοθοῦν οἱ ρητοὶ  $\alpha$  καὶ  $\beta$  τὸ πηλίκον τοῦ  $\alpha$  διὰ τοῦ  $\beta$  ( $\beta \neq 0$ ) είναι θετικὸν μέν, ἔαν αὐτοὶ είναι διμόσημοι, ἀρνητικὸν δέ, ἔαν είναι ἑτερόσημοι καὶ μηδέν, ἔαν δὲ είναι μηδέν. "Η ἀπόλυτος τιμὴ αὐτοῦ ἰσοῦται πρὸς τὸ πηλίκον τῶν ἀπολύτων τιμῶν τῶν α καὶ  $\beta$ .

Τὸ πηλίκον  $\alpha : \beta$  γράφεται καὶ ὑπό μορφὴν κλάσματος  $\frac{\alpha}{\beta}$ .

Συμβολικῶς: 1.  $\alpha \cdot \beta > 0$  τὸ  $\alpha : \beta = \frac{\alpha}{\beta} > 0$

( $\alpha, \beta \in Q$ ) 2.  $\alpha \cdot \beta < 0$  τὸ  $\alpha : \beta = \frac{\alpha}{\beta} < 0$

3.  $\alpha = 0$  τὸ  $\alpha : \beta = \frac{0}{\beta} = 0$

$$\left| \frac{\alpha}{\beta} \right| = \frac{|\alpha|}{|\beta|}$$

**Σημείωσις.** Εἴπομεν δτι διαιρεσις είναι δ πολ/σμὸς τοῦ διαιρετέου ἐπὶ τὸν ἀντίστροφον τοῦ διαιρέτου. Συνεπῶς ἐπειδή δ πολ/σμὸς είναι πρᾶξης μονότιμος καὶ ἡ διαιρεσις είναι πρᾶξης μονότιμος.

"Η διαιρεσις είναι δυνατή, δταν ὑπάρχῃ ἀντίστροφος τοῦ διαιρέτου, δλλὰ ἀντίστροφος τοῦ διαιρέτου ὑπάρχει μόνον, δταν διαιρέτης είναι διάφορος τοῦ μηδενός.

### § 58. Ιδιότητες διαιρέσεως.

Λόγω τοῦ δρισμοῦ τοῦ πηλίκου δύο ρητῶν εἶναι φανερόν, ότι Ισχύουν αἱ Ιδιότητες τῆς διαιρέσεως :

1.  $\alpha : \beta = (\alpha \cdot \gamma) : (\beta \cdot \gamma) \quad (\gamma \neq 0)$
2.  $(\alpha + \beta + \gamma) : \delta = (\alpha : \delta) + (\beta : \delta) + (\gamma : \delta)$
3.  $(\alpha - \beta) : \gamma = (\alpha : \gamma) - (\beta : \gamma)$
4.  $(\alpha \cdot \beta) : \gamma = (\alpha : \gamma) \cdot \beta = \alpha \cdot (\beta : \gamma)$
5.  $\alpha : (\beta \cdot \gamma \cdot \delta) = [(\alpha : \beta) : \gamma] : \delta$

\*Επαληθεύομεν τὴν 1ην Ιδιότητα :

$$(+3) : (-4) = -\frac{3}{4}, \quad [(+3) \cdot (-2)] : [(-4) \cdot (-2)] = (-6) : (+8) = -\frac{6}{8}$$

$$\text{Άρα } (+3) : (-4) = [(+3) \cdot (-2)] : [(-4) \cdot (-2)]$$

Δυνάμεθα δικινούμεν νὰ αἰτιολογήσωμεν καὶ γενικώτερον τὴν Ιδιότητα  $\alpha : \beta = (\alpha \cdot \gamma) : (\beta \cdot \gamma)$ .

$$\begin{aligned} \text{Έχομεν } \alpha : \beta &= \alpha \cdot \frac{1}{\beta} = \alpha \cdot \frac{1}{\beta} \cdot (+1) = \alpha \cdot \frac{1}{\beta} \cdot \left( \gamma \cdot \frac{1}{\gamma} \right) = \\ &= \alpha \cdot \gamma \cdot \frac{1}{\beta} \cdot \frac{1}{\gamma} = \alpha \cdot \gamma \cdot \frac{1}{\beta \gamma} = (\alpha \cdot \gamma) : (\beta \cdot \gamma). \end{aligned}$$

Αἰτιολογοῦμεν καὶ τὴν 2αν Ιδιότητα :

$$(\alpha + \beta + \gamma) : \delta = (\alpha + \beta + \gamma) \cdot \frac{1}{\delta} = \alpha \cdot \frac{1}{\delta} + \beta \cdot \frac{1}{\delta} + \gamma \cdot \frac{1}{\delta} = (\alpha : \delta) + (\beta : \delta) + (\gamma : \delta)$$

\*Ομοίως αἰτιολογοῦνται καὶ αἱ ὑπόλοιποι Ιδιότητες.

**Σημείωσις.** Δυνάμεθα νὰ διατυπώσωμεν καὶ λεκτικῶς τὰς δινωτέρω Ιδιότητας. Π.χ. διὰ τὰς 1, 2, Ιδιότητας : 1. Έάν πολὺ/ωμεν διαιρετέον καὶ διαιρέτην, μιᾶς διαιρέσεως, ἐπὶ ρητὸν διάφορον τοῦ μηδενὸς τὸ πηλίκιν *ν* δὲν μεταβάλλεται. 2. Διὰ νὰ διαιρέσωμεν διθροίσμα διὰ ρητοῦ διαφόρου τοῦ μηδενός, διαιροῦμεν ἔκαστον τῶν προσθέτων τοῦ διθροίσματος, διὰ τοῦ ρητοῦ καὶ προσθέτομεν τὰ προκύπτοντα πηλίκα.

### \*Ασκήσεις

117. Νὰ εὑρητε τὰ πηλίκα : α)  $(-24) : (+6)$ , β)  $(-48) : (-16)$ , γ)  $(-4) : \left( +\frac{3}{7} \right)$

δ)  $\left( +\frac{3}{8} \right) : \left( -\frac{5}{7} \right)$ , ε)  $-\frac{10}{11} : (+3)$ , στ)  $(-6) : \left( -\frac{15}{2} \right)$ ,

ζ)  $\left( -\frac{4}{5} \right) : \left( -\frac{3}{10} \right)$ , η)  $\left( +\frac{15}{17} \right) : (+15)$

118. Νὰ ἐκτελεσθοῦν αἱ πράξεις :

α)  $\left( \frac{4}{5} + \frac{2}{3} + 3 \right) : (-3)$ , δ)  $\left[ \left( -\frac{5}{6} \right) - 8 \cdot \left( -\frac{3}{4} \right) \right] : \left( -\frac{1}{2} \right)$

β)  $\left[ \left( -\frac{1}{2} \right) \cdot \left( -\frac{3}{5} \right) \cdot \left( -\frac{2}{7} \right) \right] : \left( -\frac{3}{5} \right)$ , ε)  $\left( -\frac{3}{4} - \frac{6}{2} + 1 \right) : \left( -\frac{1}{2} \right)$

$$\gamma) [(-3) \cdot (-5) \cdot 4] : [(-2) \cdot (-3)], \text{ στ) } [(-3) \cdot (-3) \cdot (-3)] : [(-3) \cdot (-3)]$$

119. Νά παραπομπή σε αι κάτισώσεις :

$$\alpha) x \cdot (-3) = -\frac{27}{31}, \quad \beta) x \cdot \left(-\frac{3}{7}\right) = -8, \quad \gamma) \frac{5}{8} \cdot x = -\frac{4}{15},$$

$$\delta) -x = \frac{3}{11}, \quad \epsilon) x : \left(-\frac{13}{15}\right) = -\frac{5}{26}, \quad \sigma) \left(-\frac{2}{7}\right) : x = -\frac{23}{7}, \quad \zeta) (-10) \cdot x = 0$$

120. Νά παραπομπή τάς ισοδυναμίας :

$$1. \alpha = \beta \iff \alpha : \gamma = \beta : \gamma \quad (\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{Q}, \gamma \neq 0)$$

$$2. \alpha > \beta \iff \alpha : \gamma > \beta : \gamma \quad (\alpha, \beta \in \mathbb{Q}, \gamma \in \mathbb{Q}^+)$$

$$3. \alpha > \beta \iff \alpha : \gamma < \beta : \gamma \quad (\alpha, \beta \in \mathbb{Q}, \gamma \in \mathbb{Q}^-)$$

$$4. \left| \frac{\alpha}{\beta} \right| = \frac{|\alpha|}{|\beta|} \quad (\alpha, \beta \in \mathbb{Q}, \beta \neq 0)$$

Δύνασθε νά τάς δικαιολογήσητε;

## 11. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΕΝΘΕΣΕΩΝ

§ 59. Νά ύπολογισθοῦν αι δριθμητικαὶ παραστάσεις :

$$\alpha. -(-5) + (-2) - (+12)$$

$$\beta. -(-8 + 13 - 14) + (10 - 6 + 1) - (12 - 6)$$

$$\gamma. [(2 - 8) + (-15 + 17)] - [(-6 + 3) - (-12 + 7)] + (-5 + 3)$$

$$\delta. (-7 + 2) - \left(-2 + \frac{3}{4}\right) \cdot \left(-\frac{2}{3}\right) + \left[\left(-\frac{5}{8}\right) \cdot \left(-\frac{8}{6}\right) + 1\right] : \left(-\frac{11}{3}\right)$$

$$\epsilon. \left(-3 + \frac{7}{5}\right) \cdot \left(-\frac{5}{4}\right) + \left(2 - \frac{1}{6}\right) : (-11) - \left(-\frac{3}{5} - 1\right) \cdot \left(\frac{2}{3} + 1\right)$$

Διά τὸν ύπολογισμὸν τῶν παραστάσεων αὐτῶν ἐργαζόμεθα ὡς κατωτέρω:

Παρατηροῦμεν ὅτι εἰς τὰς παραστάσεις  $\alpha, \beta, \gamma$  δὲν ἔχουν σημειωθῆ πολ /σμοι ἢ διαιρέσεις, ἐπομένως δύνανται νά θεωρηθοῦν ἀλγεβρικά ἀθροίσματα. 'Αλλὰ διά τὸ β καὶ γ (ἀλγ. ἀθροίσμα) δ ρητός, δ ὄποιος προστίθεται ἢ ἀφαιρεῖται, εἶναι τὸ ἐντὸς τῆς παρενθέσεως ἀθροίσμα ἢ τὸ ἐντὸς τῆς ἀγκύλης ἀθροίσμα ἀθροίσματων ἢ διαφορὰ ἀθροίσματων.

1. 'Υπολογισμὸς τῆς παραστάσεως γ.

$$\text{Α' τρόπος: } [(2 - 8) + (-15 + 17)] - [(-6 + 3) - (-12 + 7)] + (-5 + 3) =$$

$$= [(-6) + 2] - [(-3) - (-5)] + (-5 + 3) =$$

$$= (-4) - (-3 + 5) + (-2) =$$

$$= (-4) - (2) + (-2) = -8$$

Σημείωσις. 'Αγκύλη ἢ δποία πανει νά περιέχῃ παρενθέσεις ύποθιβάζεται εἰς παρένθεσιν.

‘Υπελογίσαμεν τὰς τιμάς τῶν ἐντὸς τῶν ἀγκυλῶν ἀλγεβρικῶν ἀθροισμάτων καὶ κατελήξαμεν εἰς ἀλγεβρικὸν ἀθροισμα ρητῶν ἀριθμῶν.

$$\begin{aligned} \text{Β' τρόπος: } & [(2-8)+(-15+17)]-[-(6+3)-(-12+7)]+(-5+3) = \\ & [(2-8)+(-15+17)]+[-(6+3)+(-12+7)]+(-5+3) = \\ & (2-8)+(-15+17) \quad -(6+3)+(-12+7) + (-5+3) = \\ & (2-8)+(-15+17) \quad +(6-3)+(-12+7) + (-5+3) = \\ & 2-8 \quad -15+17 \quad +6-3 \quad -12+7 \quad -5+3 = \\ & 2-8-15+17+6-3-12+7-5+3=35-43=-8 \end{aligned}$$

Κατ’ ἀρχὰς προσεθέσαμεν τὸ ἀντίθετον τῶν ἀθροισμάτων τῶν εὐρισκομένων ἐντὸς τῆς δευτέρας ἀγκύλης, ἡ δποία ἔχει ἔμπροσθέν της τὸ πλήν (-).

Κατόπιν παρελείψαμεν τὰς ἀγκύλας καὶ τὸ σύμβολον + ἔμπροσθεν αὐτῶν.

Ἐν συνεχείᾳ προσεθέσαμεν τὸ ἀντίθετον τῶν ἀθροισμάτων, τὰ δποία ἀφαιροῦνται, (ἔχουν ἔμπροσθέν τῆς παρενθέσεως αὐτῶν τὸ πλήν (-)), ἀφαιρεῖται μόνον τὸ (-6+3) καὶ παρελείψαμεν τὰς παρενθέσεις καὶ τὸ σύμβολον + ἔμπροσθεν αὐτῶν.

Τελικῶς ὑπελογίσαμεν τὴν τιμὴν τοῦ προκύπτοντος ἀθροίσματος.

Αναλόγως ἐργαζόμεθα καὶ διὰ τὴν παράστασιν β.

(Εἰς τὴν παράγραφον 42, ἐφαρμογή, ἔχομεν ὑπολογίσει ἀθροισμα καὶ διαφορὰν ἀλγεβρικῶν ἀθροισμάτων).

Ἐκ τοῦ δευτέρου τρόπου ὑπολογισμοῦ τῆς γ’ ἀριθμ. παραστάσεως συνάγομεν τὰ ἔξι :

1ον. Δυνάμειθα νὰ ἔξαλείψωμεν παρένθεσιν (ἢ ἀγκύλην), δταν ἔμπροσθέν της ὑπάρχῃ τὸ σύμβολον + (ἢ οὐδὲν πρόσημον) καὶ νὰ ἀφήσωμεν τοὺς ἐντὸς αὐτῆς δρους μὲ τὸ πρόσημόν των εἰς τὸ νέον ἀθροισμα.

2ον. Ἐὰν ἔμπροσθεν παρενθέσεως (ἢ ἀγκύλης) ὑπάρχῃ τὸ σύμβολον -, προσθέτομεν τὴν περιέχουσαν τὸ ἀθροισμα τῶν ἀντιθέτων δρων, οἱ δποίοι ὑπάρχουν ἐντὸς αὐτῆς καὶ ἀναγόμεθα εἰς τὴν πρώτην περίπτωσιν.

### Παραδείγματα.

$$\begin{array}{lll} \alpha) 10+(-7+5+4)= & \beta) -( -8+13-14)= & \\ 10 \quad -7+5+4= & +(+8-13+14)= & \\ 10-7+5+4=12 & +8-13+14= & \\ & 8-13+14=9 & \\ \\ \gamma) 10+(5-7+4)= & \delta) (10-6+1)-(-12-6)= & \\ 10+(+5-7+4)= & (10-6+1)+(-12+6)= & \\ 10+5-7+4= & 10-6+1-12+6= & \\ 10+5-7+4=12 & 10-6+1-12+6=-1 & \end{array}$$

**Σημείωσις.**

1. "Όταν είναι θετικός δ πρώτος δρος άθροίσματος συνήθως δὲν έχει τὸ πρόσημόν του +. Διὰ νὰ συνδεθῇ δμως εἰς τὸ νέον άθροίσμα πρέπει νὰ τεθῇ τὸ πρόσημόν του. (Βλ. παρ. γ.)

2. Αἱ παραστάσεις  $(\alpha - \beta + \gamma) + (\beta - \gamma + 3\alpha)$  καὶ  $(\alpha + \beta) - (\alpha - \beta)$  ἀπλουστεύονται, ἐὰν ἔξαλεψώμεν τὰς παρενθέσεις.

$$\begin{array}{ll} \text{Π.χ. } (\alpha - \beta + \gamma) + (\beta - \gamma + 3\alpha) = & (\alpha + \beta) - (\alpha - \beta) = \\ \alpha - \beta + \gamma + \beta - \gamma + 3\alpha = & (\alpha + \beta) + (-\alpha + \beta) = \\ \alpha + 3\alpha + \beta - \beta + \gamma - \gamma = 4\alpha & \alpha + \beta - \alpha + \beta = \\ & \alpha + \beta - \alpha + \beta = 2\beta \end{array}$$

$$\text{"Έχομεν: } (\alpha - \beta) - (\delta - \gamma) = (\alpha - \beta) + (-\delta + \gamma) = \alpha - \beta - \delta + \gamma.$$

'Εὰν γράψωμεν κατὰ τὴν συμμετρικὴν ίδιότητα:  $\alpha - \beta - \delta + \gamma = (\alpha - \beta) + (-\delta + \gamma) = (\alpha - \beta) - (\delta - \gamma)$  παρατηροῦμεν ὅτι :

Δυνάμεθα νὰ θέσωμεν δρους άθροίσματος ἐντὸς παρενθέσεως πρὸ τῆς δποίας ἐτέθη τὸ σύμβολον +.

'Εὰν δμως θέσωμεν δρους άθροίσματος ἐντὸς παρενθέσεως, ἐμπροσθεν τῆς δποίας ἐτέθη τὸ -, πρέπει νὰ ἀλλάξωμεν τὸ πρόσημον αὐτῶν.

2. "Υπολογισμὸς τῆς παραστάσεως δ.

$$\begin{aligned} (-7+2) - \left( -2 + \frac{3}{4} \right) \cdot \left( -\frac{2}{3} \right) + \left[ \left( -\frac{5}{8} \right) \cdot \left( -\frac{8}{6} \right) + 1 \right] : \left( -\frac{11}{3} \right) \\ (-5) - \left( -\frac{8}{4} + \frac{3}{4} \right) \cdot \left( -\frac{2}{3} \right) + \left[ \frac{5}{8} \cdot \frac{8}{6} + 1 \right] \cdot \left( -\frac{3}{11} \right) = \\ (-5) - \left( -\frac{5}{4} \right) \cdot \left( -\frac{2}{3} \right) + \left[ \frac{5}{6} + \frac{6}{6} \right] \cdot \left( -\frac{3}{11} \right) = \\ (-5) - \left( +\frac{5}{4} \cdot \frac{2}{3} \right) + \left[ \frac{11}{6} \right] \cdot \left( -\frac{3}{11} \right) = \\ (-5) - \left( +\frac{5}{6} \right) + \left[ -\frac{11 \cdot 3}{6 \cdot 11} \right] = \\ \left( -\frac{30}{6} \right) + \left( -\frac{5}{6} \right) + \left[ -\frac{3}{6} \right] = -\frac{38}{6} = -\frac{19}{3} \end{aligned}$$

3. "Υπολογισμὸς τῆς παραστάσεως ε.

$$\begin{aligned} \left( -3 + \frac{7}{5} \right) \cdot \left( -\frac{5}{4} \right) + \left( 2 - \frac{1}{6} \right) : \left( -11 \right) - \left( -\frac{3}{5} - 1 \right) \cdot \left( \frac{2}{3} + 1 \right) \\ \left( -\frac{8}{5} \right) \cdot \left( -\frac{5}{4} \right) + \left( \frac{11}{6} \right) \cdot \left( -\frac{1}{11} \right) - \left( -\frac{8}{5} \right) \cdot \left( \frac{5}{3} \right) = \\ \frac{8}{4} + \left( -\frac{1}{6} \right) - \left( -\frac{8}{3} \right) = \\ \frac{4}{2} + \left( -\frac{1}{6} \right) + \left( +\frac{8}{3} \right) = \frac{12}{6} - \frac{1}{6} + \frac{16}{6} = \frac{27}{6} \end{aligned}$$

Διὰ τὸν ὑπολογισμὸν τῶν παραστάσεων δ καὶ ε εἰργάσθημεν ὡς ἔξῆς :

α) Εὔρομεν τὸν ρητὸν εἰς ἑκάστην παρένθεσιν (ἢ ἀγκύλην).

β) Ἐξετελέσαμεν τοὺς πολ/σμοὺς καὶ τὰς διαιρέσεις καὶ

γ) Ἐξετελέσαμεν τὰς ἀφαιρέσεις καὶ προσθέσεις.

### Παραδείγματα

$$\alpha) (-4+3) \cdot 2 + (8-6) \cdot (-3) =$$

$$(-8+6) + (-24+18) = -8+6-24+18 = -8$$

$$\beta) (12-15) : (-3) + (23-3) : (-4) =$$

$$(-3) : (-3) + (20) : (-4) = 1 + (-5) = -4$$

$$\gamma) 6 - (-5) \cdot (-2) + (-14) : (-7) + 7 =$$

$$6 - (+10) + (+2) + 7 =$$

$$6 + (-10) + 2 + 7 = 15 - 10 = 5.$$

### Παρατήρησις :

Εἰς τὸ α' παράδειγμα ἔχομεν ἄθροισμα γινομένων. Εὔρομεν πρῶτον τὰ γινόμενα (ἐπιμεριστικὴ ἴδιότης) καὶ κατόπιν προσεθέσαμεν αὐτά.

Εἰς τὸ β' παράδειγμα ἔχομεν ἄθροισμα πηλίκων. Προηγήθησαν αἱ διαιρέσεις (ἐπιμεριστικὴ ἴδιότης) διὰ νὰ εὑρεθῇ τὸ ἄθροισμα.

Καὶ εἰς τὸ γ' παράδειγμα προηγήθησαν οἱ πολ/σμοὶ καὶ αἱ διαιρέσεις.

### Άσκήσεις

121. Νὰ ἑκτελεσθοῦν αἱ πράξεις :

$$\alpha) (-6+2-3)+(13-7), \quad \beta) (7-10)+(-8+10-6)$$

$$\gamma) -(3-12), \quad \delta) -(-4+11), \quad \epsilon) (11-12)-(-2+4),$$

$$\varsigma) (-3+2)-(-8+7)-(7-2)+(-3+1-10)-5$$

122. Νὰ ἑκτελεσθοῦν αἱ πράξεις :

$$\alpha) (20-13)+[(5-10)+(-12+9)], \quad \delta) [(-5+7)+(3-12)]-[-6+(-8)],$$

$$\beta) -[(4-6)+(7-3)]+[-(7+11)-(-5+2)],$$

$$\gamma) [(-7+12)+(-3+10)]-[-(-3+11)-(8-15)]+[-(-17+3)-5]$$

123. Νὰ ἑκτελεσθοῦν αἱ πράξεις :

$$\alpha) \left(\frac{1}{5}-\frac{1}{4}-1\right) + \left(\frac{1}{10}-\frac{3}{20}+1\right) - \left(\frac{3}{4}-\frac{2}{5}\right)$$

$$\beta) 0-\left[\left(5,5-\frac{15}{2}\right)-\frac{3}{2}\right]+[-(0,5-4)+2]-\left(-\frac{1}{2}+1\right),$$

$$\gamma) \left\{(-10,5+15,50)-\frac{1}{2}\right\}+\left[0+\left(-\frac{18}{5}+\frac{15}{7}\right)+\frac{1}{35}\right]-\frac{10}{7}$$

124. Νὰ ἑκτελεσθοῦν αἱ πράξεις :

- α)  $\left(-3 + \frac{2}{5}\right) \cdot \left(-\frac{5}{2}\right) + \left(2 - \frac{5}{8}\right) : (-5)$ ,  
 β)  $\left(-\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right) : \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) - \left(\frac{1}{2} - \frac{3}{4}\right) : \left(1 - \frac{1}{4}\right)$ ,  
 γ)  $\left(\frac{1}{6} - \frac{1}{3}\right) : \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{6}\right) - \left(\frac{3}{2} - \frac{5}{4}\right) : \left(-\frac{5}{2} + \frac{1}{4}\right)$ ,  
 δ)  $\left(2 - \frac{1}{2} + \frac{3}{5}\right) \cdot (-3) - \left(-\frac{1}{3} + 4 - \frac{5}{6}\right) : (-3)$

125. Νὰ ἐκτελεσθοῦν αἱ πράξεις :

- α)  $(-7+13) : (-2) + (12-19) \cdot (15-16) - 4$ ,  
 β)  $(21-27) : (-3) - (12-16) : (-4) + 5 - 5 \cdot (-2)$ ,  
 γ)  $12-6 \cdot (-3) + 7-15 : (-3) + 18-16 : (-4) + 1$

126. Νὰ ἐκτελεσθοῦν αἱ πράξεις :

- α)  $\left(-\frac{5}{3}\right) : \left(-\frac{11}{6}\right) + \left(-\frac{10}{3}\right) : \left(+\frac{2}{9}\right) - 15 : (-1)$ ,  
 β)  $(3-2) \cdot (-3+2) - \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{42}{8} - \frac{11}{4}\right)$ ,  
 γ)  $-0,01 : (0,001 - 0,01) - \frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{3}{4} : \frac{3}{5}\right)$ ,

δ)  $[-3 + (-7+2)-1].[ -2 + (-3+2-9)] - (3-8+2).(-5)$

127. Νὰ ἔξαλείψητε τὰς παρενθέσεις :

- α)  $(\alpha-\beta) + (\gamma-\delta)$ ,  $(\alpha-\beta) - (\gamma-\delta)$ ,  
 β)  $\alpha - (-\beta + \gamma - \delta)$ ,  $-(\alpha-\beta) - (-\gamma+\delta)$ ,  
 γ)  $\alpha - [(\beta-\gamma) + \alpha] - (\gamma-\beta) + (\alpha-\gamma)$ ,  
 δ)  $\alpha + (\beta-\gamma) + [-\delta + (\alpha-\beta) + \gamma] - (\delta-\gamma)$

128. Νὰ ὑπολογισθοῦν αἱ τιμαὶ τῶν κάτωθι παραστάσεων, ἐὰν  $\alpha = -2$ ,  $\beta = -3$  καὶ  $\gamma = 4$ :

$$1. \frac{\alpha+\beta-\gamma}{-\alpha+\gamma-\beta}, \quad 2. \frac{-3\alpha+2\beta-\gamma}{\alpha+\beta+\gamma}, \quad 3. \frac{\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha}{\alpha\beta\gamma}$$

129. Αἱ κάτωθι παραστάσεις νὰ γραφοῦν ὑπὸ μορφὴν ἀθροίσματος περισσοτέρων παραστάσεων.

1)  $-\alpha+\beta+\gamma-\delta+\kappa-\lambda$ , 2)  $\alpha-\beta+\gamma-\delta+\epsilon-\zeta+\eta$

130. Εἰς τὰς κάτωθι παραστάσεις δὲ πρῶτος καὶ δὲ τρίτος ὄρος νὰ τεθοῦν ἐντὸς τῆς περιενθέσεως μὲ τὸ σύμβολον  $+$  ἐμπροσθεν αὐτῆς καὶ οἱ ὑπόλοιποι ἐντὸς ὅλης παρενθέσεως μὲ τὸ σύμβολον  $-$  ἐμπροσθεν αὐτῆς.

- α)  $-15,4 - 11,7 + 12 - 10 + \frac{1}{3}$ , β)  $19,6 + 13,5 - 9,4 + \frac{2}{5} - 1$   
 γ)  $\rho + \tau - \mu - \nu + \sigma - \kappa$ , δ)  $-\alpha - \beta + \gamma - \delta + \epsilon$ .

## 12. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ

### § 60 α) Έφαρμοστὸν διάνυσμα.

Εἰς τὴν Γεωμετρίαν δυνάμεθα νὰ δρίσωμεν τὸ εύθυγραμμὸν τμῆμα AB

ώς τὸ διμελὲς σύνολον τῶν ἄκρων αὐτοῦ, {A, B}.


Διὰ τοῦτο, ὅταν λέγωμεν εὐθυγράμμον τμῆμα AB ή εὐθύγρ. τμῆμα BA, ἐννοοῦμεν τὸ αὐτὸν ἀντικείμενον (διατί;)



### Πρόβλημα.

σχ. 31.

α) Αὐτοκίνητον κινούμενον ἐπὶ εὐθυγράμμου δόσῃ, ἐκ σημείου A ἔφθασε εἰς τὸ σημεῖον B.



β) Αὐτοκίνητον κινούμενον ἐπὶ εὐθυγράμμου δόσῃ ἐκ τοῦ B ἔφθασεν εἰς τὸ A.

σχ. 32.

Πᾶς θὰ ἐκφράσωμεν μαθηματικῶς τὰς διαφορετικὰς αὐτὰς κινήσεις;



Ἐάν εἴπωμεν ὅτι τὸ αὐτοκίνητον διέτρεξε καὶ εἰς τὰς δύο περιπτώσεις τὸ εὐθύγρ. τμῆμα (δόση) AB, δὲν θὰ εἰμέθα ἀκριβεῖς.

σχ. 33.

Ορθὸν εἶναι εἰς τὴν περίπτωσιν α) νὰ εἴπωμεν: «... διήνυσε τὸ εὐθύγ. τμῆμα, τὸ δόποιον ἔχει ἀρχὴν τὸ A καὶ πέρας τὸ B».

Διὰ τὴν περίπτωσιν β) «διήνυσε τὸ εὐθύγ. τμῆμα, τὸ δόποιον ἔχει ἀρχὴν τὸ B καὶ πέρας τὸ A».

Τώρα πλέον τὸ εὐθύγρ. τμῆμα AB διανυόμενον ἐκ τοῦ A πρὸς τὸ B δὲν εἶναι τὸ αὐτὸν μὲ τὸ εὐθύγρ. τμῆμα BA διανυόμενον ἐκ τοῦ B πρὸς τὸ A, διότι διαφέρει ἡ φορὰ τῆς κινήσεως των.

Τὰ ἀντικείμενα αὐτὰ λέγομεν διανύσματα καὶ 

συμβολίζομεν γραπτῶς μὲν  $\overrightarrow{AB}$ ,  $\overrightarrow{BA}$ , γραφικῶς δέ:

(δηλαδὴ ὡς βέλη μὲ τὴν αἰχμὴν εἰς τὸ πέρας αὐτῶν).

Διάνυσμα, λοιπόν, εἶναι ἐν εὐθυγράμμον τμῆμα μὲ ωρισμένην ἀρχὴν καὶ ωρισμένον πέρας.

σχ. 34,

ἢ λέγομεν συντόμως ὅτι:

Διάνυσμα εἶναι ἐν προσανατολισμένον εὐθυγράμμον τμῆμα.

Ἐάν τὸ διάνυσμα ἔχῃ ωρισμένην θέσιν (ἄρα καὶ ἀρχὴν ωρισμένην), λέγεται ἐφαρμοστὸν διάνυσμα (ἢ δεσμευμένον διάνυσμα).

Παρατήρησις:

Τὸ ἐφαρμοστὸν διάνυσμα εἶναι ἐν διατεταγμένον ζεῦγος σημείων καὶ δχι ἀπλῶς ἐν διμελὲς σύνολον σημείων.

Έχομεν λοιπόν : Εύθυγραμμον τμῆμα  $AB \equiv \{A, B\} \equiv \{B, A\}$

Διάνυσμα  $\overrightarrow{AB} \equiv (A, B)$ , διάνυσμα  $\overrightarrow{BA} \equiv (B, A)$ .

### § 61. Στοιχεῖα ἐφαρμοστοῦ διανύσματος.


Τὸ διατεταγμένον ζεῦγος ( $A, B$ ) καθορίζεται :

1. Ἐπὸ τὴν εὐθεῖαν  $AB$ , ἤτοι τὸν φορέα αὐτοῦ ε.
2. Ἐπὸ τὴν φοράν, τὴν δόποιαν καθορίζει ἡ κίνησις ἐκ τοῦ  $A$  πρὸς τὸ  $B$ .
3. Ἐπὸ τὴν τιμὴν τοῦ  $AB$  εὐθυγρ. τμήματος  $AB$ , δηλαδὴ τὸν λόγον\* αὐτοῦ πρὸς τὴν μονάδα μετρήσεως. Ἡ τιμὴ τοῦ  $AB$  συμβολίζεται μὲν  $|\overrightarrow{AB}|$  ( $|\overrightarrow{AB}| \in Q^+$ ) καὶ διαβάζεται «ἀπόλυτος τιμὴ τοῦ  $AB$ ».
4. Ἐπὸ τὴν ἀρχὴν  $A$ .

### § 62. Τὸ ἑλεύθερον διάνυσμα.

σχ. 35.

Πόραυλος ἐκτοξεύεται ἐκ σημείου  $A$  τοῦ πεδίου ἐκτοξεύσεως πυραύλων κατακορύφως πρὸς τὰ ἄνω μὲ ταχύτητα  $5 \text{ km/sec.}$  Πῶς θὰ παραστήσωμεν τὴν ταχύτητά του;



σχ. 36.

ἄνω καὶ ἀπόλυτον τιμὴν 5.

Ο καλύτερος τρόπος παραστάσεως εἰναι: ἐν διάνυσμα μὲ φορέα τὴν κατακόρυφον εὐθεῖαν τὴν διερχόμενην διὰ τοῦ  $A$ , φοράν πρὸς τὰ ἄνω καὶ ἀπόλυτον τιμὴν 5.

Ἐάν δεύτερος πύραυλος ἐκτοξεύθῇ ἐκ σημείου  $B$  κατακορύφως πρὸς τὰ ἄνω μὲ τὴν αὐτὴν ταχύτητα, ἡ ταχύτης τοῦ δευτέρου πυραύλου εἰναι ἐν διάνυσμα μὲ φορέα τὴν διὰ τοῦ  $B$  κατακόρυφον εὐθεῖαν, φοράν πρὸς τὰ

\* Ιδε § 13 τοῦ μέρους τῆς Γεωμετρίας τοῦ παρόντος βιβλίου.

Τὰ δύο αὐτὰ διανύσματα παριστοῦν τὸ αὐτὸ ἀντικείμενον . Τὴν αὐτὴν ταχύτητα.

Διὰ τοῦτο λέγομεν ὅτι εἶναι Ἰσοδύναμα ἡ Ἰσα διανύσματα.

Τὰ Ἰσα αὐτὰ διανύσματα ἔχουν : α) Φορεῖς παραλλήλους.

β) Φοράν τὴν αὐτὴν (πρὸς τὰ ἄνω)

γ) Ἀπολύτους τιμάς Ἰσας.

### Παρατήρησις

Τὸ σύνολον τῶν εὐθεῖων, οἱ ὅποιαι εἶναι παράλληλοι μὲ τὴν εὐρεῖαν ἔννοιαν (εἶναι παράλληλοι ἡ συμπίπτουν), δύναμίζουμεν διεύθυνσιν. Λέγομεν τώρα, ὅτι δύο διανύσματα ἐπὶ παραλλήλων φορέων ἡ τοῦ αὐτοῦ φορέως ἔχουν τὴν αὐτὴν διεύθυνσιν.

Ἐπομένως τὰ διανύσματα τὰ ὅποια ἔχουν : τὴν αὐτὴν διεύθυνσιν, τὴν αὐτὴν φορὰν καὶ Ἰσας ἀπολύτους τιμάς εἶναι Ἰσα.

### § 63. Ἐιδότητες τῆς Ἰσότητος τῶν διανυσμάτων.


1. Κάθε διάνυσμα εἶναι Ἰσον πρὸς τὸν ἑαυτόν του.

$$\vec{AB} = \vec{AB}$$

Σχ. 37.

2. Ἐὰν διάνυσμα  $\vec{GD}$  εἶναι Ἰσον πρὸς τὸ  $\vec{EZ}$  τότε καὶ  $\vec{EZ}$  εἶναι Ἰσον πρὸς τὸ  $\vec{GD}$ .


$$\vec{GD} = \vec{EZ} \Rightarrow \vec{EZ} = \vec{GD}$$



Σχ. 38.

3. Δύο διανύσματα ἵσα πρὸς τρίτον διάνυσμα εἶναι Ἰσα.


$$\begin{aligned} \vec{HO} &= \vec{KL} \\ \vec{KL} &= \vec{MN} \end{aligned} \quad \left\{ \Rightarrow \vec{HO} = \vec{MN} \right.$$



Σχ. 39.


Δηλαδὴ ἡ Ἰσότης τῶν διανυσμάτων ἔχει τὰς Ἐιδότητας ἀνακλαστικὴν — συμμετρικὴν — μεταβατικὴν.

§ 64. Ἐὰν ἔχωμεν ἐν σύνολον Ἰσων διανυσμάτων, ἐπιτρέπεται συμφώνως πρὸς τὰς Ἐιδότητας αὐτὰς νὰ θεωρῶμεν, ὅτι ἐν οἰνδήποτε ἐκ τῶν διανυσμάτων αὐτῶν, ἀντιπροσωπεύει τὸ σύνολον.



Σχ. 40.

"Εν σύνολον ίσων διανυσμάτων δρίζεται έκ τῶν ἑξῆς στοιχείων:




σχ. 41.

1. Διεύθυνσιν

2. Φοράν

3. Ἀπόλυτον τιμήν



σχ. 42.

μέ → a, → b, → c ... ή α, β κ.λ.π.

(Γράμματα τοῦ λατινικοῦ ή Ἑλληνικοῦ ἀλφαριθμήτου μὲ τὸ σύμβολον → ἀνωθεν αὐτῶν).

Τὰς ἀπολύτους τιμὰς τῶν → a, → b, → c

... συμβολίζομεν |→ a|, |→ b|, |→ c|

### Παρατήρησις.

1. Δυνάμεθα νὰ θεωρήσωμεν ἐλεύθερον διάνυσμα ἐν διάνυσμα, τὸ ὅποιον ἔχει καθωρισμένα:

Διεύθυνσιν — φοράν — ἀπόλυτον τιμὴν (δίχως ὠρισμένην ἀρχήν).

2. Δεχόμεθα δτὶ οὐπάρχει ἐν διάνυσμα → AA, τοῦ ὅποιον ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ πέρας συμπίπτουν. Τὸ διάνυσμα αὐτὸ λέγεται μηδενικὸν καὶ συμβολίζεται 0. Ἡ ἀπόλυτος τιμὴ τοῦ μηδενικοῦ διανύσματος εἶναι 0, ἡ διεύθυνσις καὶ ἡ φορὰ δὲν δρίζονται.

### Άσκησεις

131. Αναφέρατε τὰ διανύσματα, τὰ ὅποια δρίζουν τρία σημεῖα A, B, Γ.

132. Αναφέρατε τὰ ζεύγη τῶν ίσων διανύσματων, τὰ ὅποια δρίζουν αἱ κορυφαὶ παραλ/μου ΑΒΓΔ.

133. Σχεδιάσατε δύο διανύσματα μὲ ἀρχὰς τὰ σημεῖα B καὶ Γ καὶ ίσα πρὸς τὸ διάνυσμα → AM, δτου AM διάμεσος τοῦ τριγώνου ΑΒΓ.

134. Διδεται τετράπλευρον ΑΒΓΔ. Μὲ ἀρχὴν τυχὸν σημεῖον 0, σχεδιάσατε δλα τὰ διανύσματα τὰ ίσα πρὸς ἑκεῖνα, τὰ ὅποια δρίζουν αἱ κορυφαὶ τοῦ τετραπλεύρου.


135. Γράψατε πέντε διανύσματα, τὰ ὅποια νὰ ἀντιπροσωπεύουν τὸ αὐτὸ ἐλεύθερον διάνυσμα.

136. Δικαιολογήσατε τὰς ιδιότητας τῆς ισότητος τῶν διανύσματων.

**13. Η ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΕΝΗ ΕΥΘΕΙΑ (ΑΞΩΝ) — ΑΛΓΕΒΡΙΚΗ ΤΙΜΗ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ — ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΙΣ ΤΩΝ ΡΗΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΕΝΗΝ ΕΥΘΕΙΑΝ**

1. Η προσανατολισμένη εύθεια — "Αξων".

§ 65. Έπι τῆς εὐθείας ε λάβετε δύο σημεία  $O$  καὶ  $A$  (τὸ  $A$  δεξιὰ τοῦ  $O$ ). Νὰ συγχριθοῦν τὰ διανύσματα  $OA$  καὶ  $AO$ . Τὶ παρατηρεῖτε;



σχ. 43.

Παρατηροῦμεν διτὶ τὰ διανύσματα  $OA$  καὶ  $AO$  ἔχουν τὴν αὐτὴν διεύθυνσιν καὶ τὴν αὐτὴν ἀπόλυτον τιμήν, διαφέρουν δὲ κατὰ τὴν φοράν. Τὰ διανύσματα αὐτὰ λέγονται ἀντίθετα.


Συμφωνοῦμεν νὰ ὀνομάζωμεν τὴν φοράν τοῦ διανύσματος  $OA$  θετικὴν φοράν τῆς εὐθείας  $\epsilon$ , καὶ τὴν φοράν τοῦ διανύσματος  $AO$  ἀρνητικὴν φοράν τῆς  $\epsilon$ .

Κάθε εὐθεία, τῆς ὅποιας ἔχει δρισθή ἢ θετική φορά, λέγεται προσανατολισμένη.

Η ἡμιευθεία  $OX$ , ἐπὶ τῆς ὅποιας κεῖται τὸ διάνυσμα  $OA$ , λέγεται θετικὴ ἡμιευθεία καὶ ἡ ἀντικειμένη αὐτῆς ἡμιευθεία  $OX'$  ἀρνητικὴ ἡμιευθεία.

Τὸ σημείον  $O$  λέγεται ἀρχὴ τῆς προσανατολισμένης εὐθείας  $\epsilon$ .

Ἐὰν θεωρήσωμεν διτὶ τὸ μῆκος τοῦ εύθυγρ. τιμήματος  $OA$  εἶναι ἡ μονάς τοῦ μῆκους, τὸ διάνυσμα  $OA$  τῆς εὐθείας  $\epsilon$ , λέγεται μοναδιαῖον διάνυσμα. Τοῦτο ἔχει φοράν τὴν θετικὴν φοράν τῆς εὐθείας, ἀρχὴν τὴν ἀρχὴν τῆς προσανατ. εὐθείας  $\epsilon$  καὶ ἀπόλυτον τιμήν 1.



σχ. 43α

Εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν ἡ προσανατ. εὐθεία ε λέγεται ἄξων (σχ. 43α).

"Αξων εἶναι ἡ προσανατολισμένη εὐθεία ἐπὶ τῆς ὅποιας ἔχει δρισθή ἢ ἀρχὴ καὶ τὸ μοναδιαῖον διάνυσμα.


2. Άπεικόνισις τῶν ρητῶν εἰς τὴν προσανατολισμένην εύθειαν.

§ 66. Δυνάμεις νὰ ἀπεικονίσωμεν τὸ σύνολον Q τῶν ρητῶν, ἐπὶ μιᾶς εὐθείας προσανατολισμένης (δξονος), ὡς ἔχει :

Εις τὴν ἀρχὴν Ο τοῦ ἄξιονος Χ'ΟΧ' ἀπεικονίζομεν (δηλαδὴ ἀντιστοιχοῦμεν μονοσημάντως) τὸν ἀριθμὸν 0

Εις τὸ πέρας τοῦ μοναδιαίου διανύσματος  $\overrightarrow{OA}$  τὸν ἀριθμὸν +1, εἰς τὸ πέρας τοῦ διανύσματος  $\overrightarrow{OB}$  τοῦ δποίου ή ἀπόλυτος τιμὴ είναι 2 ἀπεικονίζομεν τὸν +2 κ.ο.κ.

Δηλαδή εις τὰ πέρατα τῶν διαυσμάτων τοῦ ἄξονος, τὰ ὅποια ἔχουν  
ἀρχὴν τὴν ἀρχὴν Ο καὶ φοράν τὴν θετικήν, ἀπεικονίζουμεν τοὺς ἀριθμούς τοῦ  
Q<sup>+</sup> οἱ ὅποιοι εἰναι ἀντιστοίχως ἀπόλυτοι τιμαι αὐτῶν.



νέκτης ΑΟ ρεπορτάριος διε τόδε σχ. 44.

Εἰς τὰ πέρατα τῶν διανυσμάτων  $\vec{OA}$ ,  $\vec{OB}$  κ.λ.π., τὰ ὅποια είναι άντιθεταί άντιστοίχως τῶν  $\vec{OA}$ ,  $\vec{OB}$  κ.ο.κ. ἀπεικονίζομεν τοὺς  $-1$ ,  $-2$  κ.λ.π. άντιθέτους τῶν  $+1$ ,  $+2$  κ.ο.κ.

Κατά τὸν τρόπον αὐτὸν τὸ σύνολον τῶν ρητῶν Q ἀπεικονίζεται μονο-  
σημάντως ἐπὶ τοῦ ἄξονος X'OX (ἐπὶ τοῦ συνόλου τῶν σημείων τῆς εύ-  
θείας ε)

**Παρατηρήσεις.**

1. Δυνάμεθα νὰ λέγωμεν ὅτι τὸ σύνολον  $Q$  ἀπεικονίζεται ἐπὶ τοῦ συνόλου τῶν διανυσμάτων:  $\vec{OA}, \vec{OB}, \vec{OG} \dots, \vec{OA'}, \vec{OB'}, \dots$

2. Τὸ διάνυσμα  $\vec{OB}$  δυνάμεθα νὰ θεωρήσωμεν ὡς γινόμενον τοῦ ἀριθμοῦ  $+2$  ἐπὶ τὸ μοναδιαῖον  $\vec{OA}$  καὶ νὰ γράψωμεν:  $\vec{OB} = (+2) \cdot \vec{OA}$  (ἢ  $\vec{OB} = 2\vec{OA}$ )  
 Ὄμοιῶς  $\vec{OA}' = (-1) \cdot \vec{OA}$ ,  $\vec{OB}' = (-2) \cdot \vec{OA}$  κ.λ.π.

Τούς άριθμούς  $0, +1, +2, \dots -1, -2, \dots$  λέγομεν τετμημένας τῶν σημείων  $O, A, B, \dots A', B' \dots$  ἀντιστοίχως.

Ἐπομένως τετμημένη σημείου ἐνδός ἀξιονος εἶναι δὲ ἀριθμός, δὲ διποῖς ἀπεικονίζεται ἐπ' αὐτοῦ.

3. Άλγεβρική τιμή διανύσματος

§ 67. Άλγεβρική τιμή του διανύσματος  $\vec{OB}$  λέγεται ότι άριθμός +2. Επειδή έθεωρήσαμεν  $\vec{OB} = +2\vec{OA}$ , διότι +2 είναι ότι λόγος του  $\vec{OB}$  πρός το μοναδιαίον  $\vec{OA}$ .

$$\frac{\vec{OB}}{\vec{OA}} = +2$$

Συμβολίζομεν την άλγεβρικήν τιμήν του  $\vec{OB}$  μὲν  $(\vec{OB})$ . Ωστε  $(\vec{OB}) = +2$ ,  $(\vec{OO}) = 0$  (μηδ. διάνυσμα έχει άλγεβρ. τιμήν 0).  $(\vec{OG}) = +3$ ,  $(\vec{OB}') = -2$  κ.λ.π.

Παρατηροῦμεν ότι:  $(\vec{OB}) = +2 = +2 - 0 = \text{τετμ.Β} - \text{τετμ.Ο.}$

"Αρα ή άλγεβρική τιμή διανύσματος ισοῦται πρός την διαφοράν τής τετμημένης τῆς άρχης άπό τής τετμημένης τοῦ πέρατος αὐτοῦ.

Παραδείγματα:

$$\begin{aligned} (\vec{BZ}) &= 2,5 - 2 = 0,5, & (\vec{ZA}) &= 1 - 2,5 = -1,5, \\ (\vec{BA}') &= -1 - (-2) = 1, & (\vec{GO}) &= 0 - (-3) = +3 \end{aligned}$$

Παρατηροῦμεν ότι, έάν ή άλγεβρική τιμή διανύσματος έπι άξονος είναι θετικός άριθμός, τό διάνυσμα έχει φοράν θετικήν καὶ έάν είναι άρνητικός άριθμός, τό διάνυσμα έχει φοράν άρνητικήν.

Έφαρμογή

Θεωροῦμεν τὰ σημεῖα Z, A, B' καὶ τὰ διανύσματα  $\vec{ZA}$ ,  $\vec{AB}'$ ,  $\vec{B'Z}$  (Σχ. 44).

"Υπολογίσατε τὸ άθροισμα  $(\vec{ZA}) + (\vec{AB}') + (\vec{B'Z})$ .

"Εχομεν:  $(\vec{ZA}) = 1 - 2,5$ ,  $(\vec{AB}') = -2 - 1$ ,  $(\vec{B'Z}) = 2,5 - (-2)$ .

$$\begin{aligned} \text{Ωστε: } (\vec{ZA}) + (\vec{AB}') + (\vec{B'Z}) &= (1 - 2,5) + (-2 - 1) + [2,5 - (-2)] = \\ &= 1 - 2,5 - 2 - 1 + 2,5 + (+2) = \\ &= 1 - 2,5 - 2 - 1 + 2,5 + 2 = 0 \end{aligned}$$

Άσκησεις

137. Νά υπολογισθοῦν αἱ άλγεβρικαὶ τιμαὶ τῶν διανυσμάτων  $\vec{KL}$ ,  $\vec{MN}$ ,  $\vec{LM}$ ,  $\vec{MK}$ , έάν αἱ τετμημέναι τῶν σημείων K, L, M, N τοῦ άξονος είναι άντιστοίχως  $-7$ ,  $+2$ ,  $-\frac{3}{8}$ ,  $-\frac{13}{5}$ .

138. Νά εύρεθη<sup>9</sup> ή διανυσματος έαν :

α) ή τετμημένη της άρχης είναι  $\frac{11}{2}$  και ή τετμημένη του πέρατος 8

β) ή τετμημένη της άρχης είναι -4 και ή τετμημένη του πέρατος -1

γ) ή τετμημένη της άρχης είναι  $-\frac{3}{2}$  και ή τετμημένη του πέρατος 4

δ) ή τετμημένη της άρχης είναι 2 και ή τετμημένη του πέρατος -5

ε) ή τετμημένη της άρχης είναι 5 και ή τετμημένη του πέρατος 2

139. Νά εύρεθη<sup>9</sup> ή τετμημένη του πέρατος έαν :

α) ή τετμημένη της άρχης είναι -2 και ή διλγεβρική τιμή αύτοῦ είναι +1

β) ή τετμημένη της άρχης είναι -1 και ή διλγεβρική τιμή αύτοῦ είναι 3

γ) ή τετμημένη της άρχης είναι 2 και ή διλγεβρική τιμή αύτοῦ είναι 2

δ) ή τετμημένη της άρχης είναι -5 και ή διλγεβρική τιμή αύτοῦ είναι -7

ε) ή τετμημένη της άρχης είναι  $\frac{3}{2}$  και ή διλγεβρική τιμή αύτοῦ είναι 4

#### 14. ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΩΝ ΡΗΤΩΝ ΜΕ ΕΚΘΕΤΗΝ ΑΚΕΡΑΙΟΝ — ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΩΝ ΡΗΤΩΝ

§ 68. α) Δυνάμεις μὲ βάσιν ρητὸν καὶ ἐκθέτην ἀκέραιον  $\geq 2$ .

Νὰ διπολογισθοῦν τὰ γινόμενα :  $(-3) \cdot (-3)$ ,  $(-2) \cdot (-2) \cdot (-2)$ ,

$$\left(-\frac{2}{3}\right) \cdot \left(-\frac{2}{3}\right) \cdot \left(-\frac{2}{3}\right) \cdot \left(-\frac{2}{3}\right), (-4) \cdot (-4) \cdot (-4) \cdot (-4) \cdot (-4)$$

Ἐχομεν :  $(-3) \cdot (-3) = +(3 \cdot 3) = 3^2$

$$(-2) \cdot (-2) \cdot (-2) = -(2 \cdot 2 \cdot 2) = -2^3$$

$$\left(-\frac{2}{3}\right) \cdot \left(-\frac{2}{3}\right) \cdot \left(-\frac{2}{3}\right) \cdot \left(-\frac{2}{3}\right) = + \left(\frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3}\right) = \left(\frac{2}{3}\right)^4$$

$$(-4) \cdot (-4) \cdot (-4) \cdot (-4) = -(4 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4) = -4^5$$

Γνωρίζομεν ὅτι τὸ γινόμενον  $\underbrace{\alpha \cdot \alpha \cdot \alpha \cdots \alpha}_{n \text{ παράγοντες}}$  λέγεται νιοστὴ δύναμις τοῦ

καὶ γράφεται συντόμως :  $\alpha^n$  
$$\begin{cases} \text{α λέγεται βάσις, } \alpha \in Q_0^+ \\ \text{ν λέγεται ἐκθέτης, } n \in N \\ \text{καὶ } n \geq 2 \end{cases}$$

Ἐπίστης ὅτι :  $\alpha^1 = \alpha$  καὶ  $\alpha^0 = 1$  ( $\alpha \neq 0$ )

Τοὺς διστιμοὺς αὐτοὺς ἐπεκτείνομεν καὶ διὰ τοὺς ρητοὺς πραγμ. ἀριθμούς, δηλαδὴ ἔαν  $\alpha \in Q$  καὶ  $n \in N$ , τὸ  $\alpha^n$  παριστᾶ τὸ γινόμενον  $n$  παραγόντων ἴσων πρὸς  $\alpha$  καὶ λέγεται νιοστὴ δύναμις τοῦ  $\alpha$ .

\*Επομένως ή  $2\alpha$  δύναμις τοῦ  $-3$  είναι :  $(-3) \cdot (-3) = (-3)^2$

ή  $3\alpha$  δύναμις τοῦ  $-2$  είναι :  $(-2) \cdot (-2) \cdot (-2) = (-2)^3$

ή  $4\alpha$  δύναμις τοῦ  $-\frac{2}{3}$  είναι :  $\left(-\frac{2}{3}\right) \cdot \left(-\frac{2}{3}\right) \cdot \left(-\frac{2}{3}\right) \cdot \left(-\frac{2}{3}\right) = \left(-\frac{2}{3}\right)^4$

καὶ ή  $5\alpha$  δύναμις τοῦ  $-4$  είναι :  $(-4) \cdot (-4) \cdot (-4) \cdot (-4) \cdot (-4) = (-4)^5$

\*Εάν συγκρίνωμεν αύτά πρός τὰ ἀνωτέρω εύρεθέντα ἔχομεν :

$$(-3)^2 = 3^2 \quad (\text{θετικός}) \quad \left(-\frac{2}{3}\right)^4 = \left(\frac{2}{3}\right)^4 \quad (\text{θετικός})$$

$$(-2)^3 = -2^3 \quad (\text{άρνητικός}) \quad (-4)^5 = -4^5 \quad (\text{άρνητικός})$$

\*Αρα ἀρνητικός ἀριθμός ύψουσμενος είς ἀρτίσιαν μὲν δύναμιν δίδει εξαγόμενον θετικόν, είς περιττήν δὲ δύναμιν ἔξαγόμενον ἀρνητικόν.

Παρατηροῦμεν ὅτι :

$$(-2)^2 \cdot (-2)^3 = (-2)^{2+3} = (-2)^5$$

$$[(-2) \cdot (-2)] \cdot [(-2) \cdot (-2) \cdot (-2)] = (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) = (-2)^5$$

$$[(-2)^3]^2 = (-2)^{3 \cdot 2} = (-2)^6$$

$$(-2)^3 \cdot (-2)^3 = (-2)^{3+3} = (-2)^{2 \cdot 3}$$

$$(-3)^4 : (-3)^2 = (-3)^{4-2} = (-3)^2$$

$$\frac{(-3)^4}{(-3)^2} = \frac{(-3) \cdot (-3) \cdot (-3) \cdot (-3)}{(-3) \cdot (-3)} = (-3) \cdot (-3) = (-3)^2$$

$$[(-2) \cdot (-3)]^2 = (-2)^2 \cdot (-3)^2$$

$$[(-2) \cdot (-3)] \cdot [(-2) \cdot (-3)] = (-2) \cdot (-3) \cdot (-2) \cdot (-3) = (-2) \cdot (-2) \cdot (-3) \cdot (-3)$$

$$[(-2) \cdot (-2)] \cdot [(-3) \cdot (-3)] = (-2)^2 \cdot (-3)^2$$

\*Επομένως ισχύουν αἱ γνωσταὶ ιδιότητες τῶν δυνάμεων

$$\alpha^\mu \cdot \alpha^\nu = \alpha^{\mu+\nu} \quad (\alpha^\mu \cdot \alpha^\nu = \underbrace{\alpha \cdot \alpha \cdot \alpha \dots \alpha}_{\mu \text{ παράγ.}} \underbrace{\alpha \cdot \alpha \cdot \alpha \dots \alpha}_{\nu \text{ παράγ.}} = \underbrace{\alpha \cdot \alpha \cdot \alpha \dots \alpha}_{\mu+\nu \text{ παράγ.}} = \alpha^{\mu+\nu})$$

$$\alpha^\mu : \alpha^\nu = \alpha^{\mu-\nu} \quad (\mu \geqslant \nu) \quad \left( \alpha^\mu : \alpha^\nu = \frac{\underbrace{\alpha \cdot \alpha \dots \alpha}_{\mu \text{ παράγ.}}}{\underbrace{\alpha \cdot \alpha \dots \alpha}_{\nu \text{ παράγ.}}} = \underbrace{\alpha \cdot \alpha \dots \alpha}_{\mu-\nu \text{ παρ.}} = \alpha^{\mu-\nu} \right)$$

$$(\alpha^\mu)^\nu = \alpha^{\mu\nu} \quad \left( \underbrace{\alpha^\mu \cdot \alpha^\mu \dots \alpha^\mu}_{\nu \text{ παραγ.}} = \alpha^{\mu+\mu+\dots+\mu} = \alpha^{\mu\nu} \right)$$

$$(\alpha\beta\gamma)^\nu = \alpha^\nu \cdot \beta^\nu \cdot \gamma^\nu \quad \text{καὶ ὅταν } \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{Q} \quad (\mu, \nu \in \mathbb{N}),$$

'Εφαρμογαί

$$(-1)^0 = 1, \quad \left(-\frac{1}{2}\right)^0 = 1, \quad \left(-\frac{3}{2}\right) \cdot \left(-\frac{3}{2}\right)^2 = \left(-\frac{3}{2}\right)^3 = -\frac{27}{8}$$

$$(-1)^1 = -1, \quad \left(-\frac{1}{2}\right)^4 = -\frac{1}{2}, \quad \left(-\frac{3}{5}\right)^5 : \left(-\frac{3}{5}\right)^3 = \left(-\frac{3}{5}\right)^2 = \frac{9}{25}$$

$$(-1)^2 = 1, \quad \left(-\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}, \quad \left[\left(-\frac{1}{2}\right)^2\right]^3 = \left(-\frac{1}{2}\right)^6 = \frac{1}{64}$$

$$(-1)^3 = -1$$

$$(-1)^4 = 1, \quad \left(-\frac{1}{2}\right)^3 = -\frac{1}{8}, \quad \left[\left(-\frac{1}{2}\right) \cdot \frac{3}{4}\right]^2 = \left(-\frac{1}{2}\right)^2 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^2 = \\ = \frac{1}{4} \cdot \frac{9}{16} = \frac{9}{64}$$

**§ 69. β)** Δυνάμεις μὲ έκθέτην ἀκέραιων συμβόλων τοῦ μηδενός.

Γνωρίζομεν τὴ παριστᾶ τὸ σύμβολον  $\alpha^n$ , δταν  $\alpha \in \mathbb{Q}$  καὶ  $n \in \mathbb{Z}^+$ , δηλαδὴ γνωρίζομεν δτι :

$$\alpha^1 = \alpha, \quad \alpha^2 = \alpha \cdot \alpha, \quad \alpha^3 = \alpha \cdot \alpha \cdot \alpha, \quad \text{κ.ο.κ.}$$

Τὴ παριστᾶ ὅμως τὸ σύμβολον  $\alpha^n$ , δταν  $n \in \mathbb{Z}^-$ ; Δηλαδὴ τὴ παριστᾶ τὸ  $\alpha^{-1}$ ; τὸ  $\alpha^{-2}$ ; τὸ  $\alpha^{-3}$ ; κ.ο.κ.

Εἰς τὴν §49ε εἴδομεν, δτι δ ἀντίστροφος τοῦ  $\alpha$  συμβολίζεται μὲ  $\frac{1}{\alpha}$  ή μὲ  $\alpha^{-1}$ . ἄρα τὰ δύο αὐτὰ σύμβολα εἶναι τσα ἐφόσον συμβολίζουν τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν (ἀντίστροφον τοῦ  $\alpha$ ).

$$\Sigma \nu \epsilon \pi \omega s \alpha^{-1} = \frac{1}{\alpha} \quad \text{ή} \quad \alpha^{-1} = \left(\frac{1}{\alpha}\right)^1 = \frac{1}{\alpha}$$

\*Επεκτείνομεν τὸν συμβολισμὸν αὐτὸν καὶ ἔχομεν :

$$\alpha^{-2} = \left(\frac{1}{\alpha}\right)^2 = \frac{1}{\alpha} \cdot \frac{1}{\alpha} = \frac{1}{\alpha^2}$$

$$\alpha^{-3} = \left(\frac{1}{\alpha}\right)^3 = \frac{1}{\alpha^3}$$

.....

.....

$$\alpha^{-v} = \left(\frac{1}{\alpha}\right)^v = \frac{1}{\alpha^v} \qquad v \in \mathbb{N}$$

\*Ωστε δύναμις ρητοῦ (διαφόρου τοῦ μηδενὸς) μὲ έκθέτην ἀρνητικὸν ἀκέραιον, παριστᾶ τὴν δύναμιν τοῦ ἀντιστρόφου τοῦ ρητοῦ μὲ έκθέτην τὸν ἀντίθετον θετικὸν ἀκέραιον.

\*Ἐπειδὴ ὅμως δ ἀντίστροφος τοῦ  $\alpha$  ὑπάρχει δταν δ  $\alpha$  εἶναι διάφορος τοῦ μηδενός, διὰ τοῦτο τὸ σύμβολον  $\alpha^{-v}$ , ( $v \in \mathbb{N}$ ) ἔχει ἔννοιαν δταν  $\alpha \neq 0$ .

Συμβολικῶς : ἔὰν τὸ  $v \in \mathbb{N}_0$  καὶ  $\alpha \neq 0$ , τότε  $\alpha^{-v} = \left(\frac{1}{\alpha}\right)^v$

'Εφαρμογαί

$$\begin{aligned} 2^{-1} &= \left(\frac{1}{2}\right)^1 = \frac{1}{2}, \quad \left(\frac{4}{5}\right)^{-2} = \left(\frac{5}{4}\right)^2 = \frac{25}{16}, (-2)^{-1} = \left(-\frac{1}{2}\right)^1 = -\frac{1}{2} \\ (-3)^{-2} &= \left(-\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{1}{9}, (-3)^{-3} = \left(-\frac{1}{3}\right)^3 = -\frac{1}{27}, (-2)^{-2} = \\ &= \left(-\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4} \\ \left(-\frac{2}{3}\right)^{-3} &= \left(-\frac{3}{2}\right)^3 = -\frac{27}{8}, (-3)^{-1} = \left(-\frac{1}{3}\right)^1 = -\frac{1}{3}, (-2)^{-3} = \left(-\frac{1}{2}\right)^3 = -\frac{1}{8} \end{aligned}$$

**Σημείωσις:**

1. Έκ τῶν ἀνωτέρω παραπτηροῦμεν δτι ισχύει ὁ κανὼν διά τὸ πρόστημον τῆς δυνάμεως, δταν ἡ βάσις εἶναι ἀρνητικὴ καὶ ὁ ἐκθέτης ἀρτιος ἢ περιττός.

2. Εἰς τὸν τύπον  $\alpha^{-v} = \left(\frac{1}{\alpha}\right)^v$ , ἐάν  $v = 0$  ἔχομεν:  $\alpha^{-0} = \left(\frac{1}{\alpha}\right)^0$ . Άλλα ἐπειδὴ  $-0 = 0$  εἶναι  $\alpha^{-0} = \alpha^0 = \left(\frac{1}{\alpha}\right)^0 = 1$ .

3. Εἰς τὰ ἐπόμενα, δταν γράφωμεν τὸ σύμβολον  $\alpha^v$  θὰ ἔννοοῦμεν δτι  $\alpha \in Q$ ,  $\alpha \neq 0$  καὶ  $v \in Z$ .

§ 70. Ιδιότητες τῶν δυνάμεων μὲ βάσιν ρητὸν (διάφορον τοῦ μηδενὸς) καὶ ἐκθέτην ἀκέραιον.

$$1. (-2)^{-2} \cdot (-2)^{-3} = \left(-\frac{1}{2}\right)^2 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)^3 = \left(-\frac{1}{2}\right)^5 = (-2)^{-5}$$

"Αρα γενικῶς:  $\alpha^{\mu} \cdot \alpha^{\nu} = \alpha^{\mu+\nu}$

$$2. [(-2)^{-3}]^{-2} = \left[\left(-\frac{1}{2}\right)^3\right]^{-2} = \left[\frac{1}{\left(-\frac{1}{2}\right)^3}\right]^2 = \left[\left(\frac{1}{-\frac{1}{2}}\right)^3\right]^2 = \\ = \left[\left(\frac{1}{-\frac{1}{2}}\right)\right]^{2 \cdot 3} = (-2)^6 = (-2)^{(-3) + (-2)}$$

"Αρα γενικῶς:  $(\alpha^{\mu})^{\nu} = \alpha^{\mu \cdot \nu}$

$$3. (-4)^{-5} \cdot (-4)^{-3} = \left(-\frac{1}{4}\right)^5 \cdot \left(-\frac{1}{4}\right)^3 = \left(-\frac{1}{4}\right)^8 = (-4)^{-8}$$

"Άλλα καὶ  $(-4)^{-5} \cdot (-4)^{-3} = (-4)^{-5+(-3)} = (-4)^{-5+3} = (-4)^{-2}$

Γενικῶς:  $\alpha^{\mu} : \alpha^{\nu} = \alpha^{\mu-\nu}$

$$4. [(-2) \cdot (-3)]^{-2} = \left[\frac{1}{(-2) \cdot (-3)}\right]^2 = \left[\left(-\frac{1}{2}\right) \cdot \left(-\frac{1}{3}\right)\right]^2 = \\ = \left(-\frac{1}{2}\right)^2 \cdot \left(-\frac{1}{3}\right)^2 = (-2)^{-2} \cdot (-3)^{-2}$$

Γενικῶς:  $(\alpha \cdot \beta)^{\nu} = \alpha^{\nu} \cdot \beta^{\nu}$

Ο τύπος αύτός ισχύει καὶ διὰ περισσοτέρους παράγοντας :  
 $(\alpha \cdot \beta \cdot \gamma \cdot \delta)^v = \alpha^v \cdot \beta^v \cdot \gamma^v \cdot \delta^v$

### Εφαρμογαί

$$(-3) \cdot (-3)^{-2} \cdot (-3)^3 = (-3)^{1-2+3} = (-3)^2 = 9$$

$$\left[ \left( -\frac{1}{2} \right)^2 \right]^{-2} = \left( -\frac{1}{2} \right)^{-4} = (-2)^4 = 16$$

$$\left( -\frac{3}{4} \right)^{-2} : \left( -\frac{3}{4} \right)^{-3} = \left( -\frac{3}{4} \right)^{-2-(-3)} = \left( -\frac{3}{4} \right)^{-2+3} = \left( -\frac{3}{4} \right)^1 = -\frac{3}{4}$$

$$\left[ \left( -\frac{1}{2} \right) \cdot (-3) \right]^{-2} = \left( -\frac{1}{2} \right)^{-2} \cdot (-3)^{-2} = (-2)^2 \cdot \left( -\frac{1}{3} \right)^2 = 4 \cdot \frac{1}{9} = \frac{4}{9}$$

$$\left( -\frac{131}{25} \right) \cdot \left( -\frac{131}{25} \right)^2 \cdot \left( -\frac{131}{25} \right)^{-3} = \left( -\frac{131}{25} \right)^{1+2-3} = \left( -\frac{131}{25} \right)^0 = 1$$

### Άσκησεις

140. Νὰ ύπολογισθοῦν αἱ δυνάμεις :

α)  $4^{-2}$ ,  $(-7)^{-2}$ ,  $(-1)^1$ ,  $(-1)^{-1}$ ,  $(-1)^{-2}$ ,  $-1^{12}$ ,  $-(-1)^{-3}$

β)  $\left( -\frac{1}{3} \right)^{-3}$ ,  $\left( \frac{1}{3} \right)^{-2}$ ,  $\left( -\frac{3}{4} \right)^{-2}$ ,  $\left( \frac{3}{4} \right)^{-2}$ ,  $(-0,5)^3$ ,  $(-0,5)^{-2}$

141. Νὰ ἐκτελεσθοῦν κατὰ τὸν συντομώτερον τρόπον αἱ πράξεις :

α)  $\left( -\frac{101}{305} \right)^{-2} \cdot \left( -\frac{101}{305} \right)^3 \cdot \left( -\frac{101}{305} \right)^{-1}$ , β)  $\left( \frac{259}{748} \right)^2 \cdot \left( \frac{259}{748} \right)^3 \cdot \left( \frac{748}{259} \right)$

γ)  $\left( -\frac{149}{245} \right)^{-4} : \left( -\frac{149}{245} \right)^{-3}$ , δ)  $\left( -\frac{15}{16} \right)^{+3} : \left( -\frac{16}{15} \right)^{-3} + \left( -\frac{1}{2} \right)^{-2}$

142. Νὰ ἐκτελεσθοῦν αἱ πράξεις :

α)  $(-1)^1 + (-1)^{-1} + (-1)^2 + (-1)^{-2} + (-1)^0 + 1^0$ , β)  $(10^{-4})^{-3}$ ,

γ)  $2^{-2} + 4^{-1} + 30^{-81} + (-1)^{-2}$ , δ)  $[(-10)^2]^{-3}$ , ε)  $\left[ \left( -\frac{1}{10} \right)^{-2} \right]^{-3}$

143. Νὰ γραφοῦν ὑπὸ μορφὴν δυνάμεως οἱ κάτωθι ἀριθμοί :

α) 10, -10, 0,1, 0,1, -8,  $-\frac{16}{9}$

β) 100, -100, 0,01, -0,01,

γ) 1000, -1000, 0,001, -0,001,  $-\frac{1}{8}$ ,  $-\frac{27}{64}$

144. Νὰ γράψητε συντόμως τοὺς κάτωθι ἀριθμούς :

α) 0,0000001, δ)  $\frac{1}{0,00000007}$

β) 0,0000000015

γ) -0,00000000045, ε)  $\frac{1}{-0,0000000009}$

145. Νὰ εύρεθῇ ἡ τιμὴ τῶν παραστάσεων :

α)  $2^{x-4} - 6 \cdot 4^{x-3} + 1^{x-2} - 5^{x-1}$  ἔὰν  $x = 1$

β)  $2 \cdot x^{-2} - 2^{-x} + x^{x-3} \cdot (-1)^{-3}$  ἔὰν  $x = -2$

γ)  $(x+4) \cdot 2^{x-2} - 3 \cdot 3^{x+1} + 6 \cdot 3^{x-1}$  ἔὰν  $x = 0$

$$\delta) 2 \cdot \left(-\frac{1}{3}\right)^3 \cdot (-2)^{-2} - (-3)^{-3} + (-1)^{-1}$$

$$\varepsilon) \frac{x^2 - \psi^2}{x + \psi} \quad \text{έπειτα } x = -\frac{1}{2} \quad \text{καὶ } \psi = -2$$

146. Τὰ κάτωθι γινόμενα νὰ γίνουν δυνάμεις ἐνὸς ρητοῦ:

$$\alpha) (-8)^2 \cdot (-4)^3 \quad \beta) \left(-\frac{1}{8}\right) \cdot \left(-\frac{1}{4}\right)$$

$$\gamma) \left(-\frac{1}{2}\right)^{-2} \cdot (-2)^8 \quad \delta) (-1)^{-3} \cdot (-2)^{-1} \cdot 2^8$$

$$\varepsilon) \left(-\frac{1}{3}\right)^{-3} \cdot 3^2 \quad \sigma) \left(-\frac{1}{9}\right) \cdot \frac{1}{3}$$

147. Νὰ ἔπιλυθοῦν αἱ κάτωθι ἔξισώσεις:

$$\alpha) \left(-\frac{1}{2}\right)^{-3} \cdot x = \left(-\frac{1}{2}\right)^{-2} \quad \beta) \left(-\frac{2}{3}\right)^{-2} : x = \left(-\frac{2}{3}\right)$$

$$\gamma) x : \left(-\frac{1}{2}\right)^{-2} = -\frac{1}{2} \quad \delta) 0,00000016 = x \cdot 4^8 \cdot 10^{-8}$$

### 15. ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ II

§ 71. Εἰς τὸν κατωτέρῳ πίνακα περιλαμβάνονται αἱ βασικαὶ πράξεις: Πρόσθεσις — Πολλαπλασιασμὸς καὶ αἱ σπουδαιότεραι ίδιότητες.

**Σημείωσις.** Ἀφαίρεσις ρητοῦ εἶναι ἡ πρόσθεσις τοῦ ἀντιθέτου αὐτοῦ καὶ διαίρεσις ρητοῦ εἶναι ὁ πολλαπλασιασμὸς ἐπὶ τὸν ἀντίστροφον τοῦ διαιρέτου.

Τὰ $\alpha, \beta, \gamma \in Q$		
Πράξεις	Πρόσθεσις	Πολλαπλασιασμὸς
"Υπαρχεῖ ἀθροίσματος καὶ γινομένου	Διὰ κάθε $\alpha$ καὶ $\beta$ $\alpha + \beta \in Q$	Διὰ κάθε $\alpha$ καὶ $\beta$ $\alpha \beta \in Q$
Μεταθετικὴ ίδιότης	Διὰ κάθε $\alpha$ καὶ $\beta$ $\alpha + \beta = \beta + \alpha$	Διὰ κάθε $\alpha$ καὶ $\beta$ $\alpha \beta = \beta \alpha$
Προσεταιριστικὴ ίδιότης	Διὰ κάθε $\alpha, \beta$ καὶ $\gamma$ $(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma)$	Διὰ κάθε $\alpha, \beta$ καὶ $\gamma$ $(\alpha \beta) \gamma = \alpha (\beta \gamma)$
"Υπαρχεῖ οὐδετέρου στοιχείου	Διὰ κάθε $\alpha$ ὑπάρχει τὸ στοιχεῖον 0 ὥστε $\alpha + 0 = \alpha$	Διὰ κάθε $\alpha$ ὑπάρχει τὸ στοιχεῖον 1 ὥστε $1 \cdot \alpha = \alpha$
"Υπαρχεῖς ἀντιθέτου καὶ ἀντιστρόφου στοιχείου	Διὰ κάθε $\alpha$ ὑπάρχει τὸ στοιχεῖον $-\alpha$ ὥστε $\alpha + (-\alpha) = 0$	Διὰ κάθε $\alpha \neq 0$ ὑπάρχει τὸ στοιχεῖον $\frac{1}{\alpha}$ ὥστε $\alpha \cdot \frac{1}{\alpha} = 1$
*Επιμεριστικὴ ίδιότης	Διὰ κάθε $\alpha, \beta$ καὶ $\gamma$ , $\alpha(\beta + \gamma) = \alpha\beta + \alpha\gamma$	

§ 72. Ιδιότητες Ισοτήτων και άνισοτήτων.

$$1. \alpha = \beta \iff \begin{array}{l} \alpha + \gamma = \beta + \gamma \\ \alpha \gamma = \beta \gamma \quad (\gamma \neq 0) \end{array}$$

$$2. \alpha = \beta \Rightarrow \begin{array}{l} \alpha + \gamma = \beta + \delta \\ \gamma = \delta \\ \alpha \gamma = \beta \delta \end{array}$$

$$3. \alpha > \beta \iff \begin{array}{l} \alpha + \gamma > \beta + \gamma \\ \alpha \gamma > \beta \gamma \quad (\gamma > 0) \\ \alpha \gamma < \beta \gamma \quad (\gamma < 0) \end{array}$$

$$4. \alpha > \beta \Rightarrow \begin{array}{l} \alpha + \gamma > \beta + \delta \\ \gamma \geq \delta \end{array}$$

§ 73. Ιδιότητες τῶν δυνάμεων.

$$1. \alpha^{\mu} \cdot \alpha^{\nu} \dots \alpha^{\rho} = \alpha^{\mu+\nu+\dots+\rho}$$

$$2. (\alpha^{\mu})^{\nu} = \alpha^{\mu \nu}$$

$$3. \alpha^{\mu} : \alpha^{\nu} = \alpha^{\mu-\nu}$$

$$4. (\alpha \cdot \beta \cdot \gamma \dots \kappa)^{\nu} = \alpha^{\nu} \cdot \beta^{\nu} \cdot \gamma^{\nu} \dots \kappa^{\nu}$$

$$5. \alpha^1 = \alpha, \quad \alpha^0 = 1 \quad (\alpha \neq 0), \quad \alpha^{-\nu} = \left( \frac{1}{\alpha} \right)^{\nu} \quad (\alpha \neq 0)$$

Γενικαὶ ἀσκήσεις κεφαλαίου II

148. Εάν  $x = -6+7-2+3$ ,  $y = -4+3-7+2$  και  $z = -4+6-3$  νὰ εύρεθοῦν τὰ  $\alpha) x+y+z$ ,  $\beta) x-y-z$ ,  $\gamma) x^2+y^2+z^2$ ,  $\delta) -x^2+y^2-z^2$

149. Νὰ ἐκτελεσθοῦν αἱ πράξεις :

$$\alpha) (2-5+7).(-2+7)+(-13+7):(-12+15),$$

$$\beta) \left( -\frac{2}{5}+1 \right) \cdot \left( -\frac{3}{2}-1 \right) - \left( 1+\frac{5}{2} \right) : \left( -2-\frac{1}{3} \right) ,$$

$$\gamma) \left( -3+\frac{1}{3}-\frac{4}{5} \right) \cdot \left( -\frac{3}{2} \right) + \left( -\frac{1}{4}+3-\frac{1}{2} \right) : \left( -\frac{2}{3} \right) ,$$

$$\delta) \left( -\frac{3}{5}+\frac{7}{3} \right) \cdot \left( -\frac{15}{7} \right) - \left( \frac{7}{2}-1 \right) : \left( -\frac{1}{2} \right) ,$$

$$\epsilon) -[-4-(-3+2)]+[-(-6+2)-14].[-0,5+1]$$

150. Νὰ εύρεθῇ δὲ  $x$  ἐκ τῶν Ισοτήτων :

$$\alpha) -\frac{2}{5}x = -\frac{14}{5} - \frac{5}{10}, \quad \beta) \left( -\frac{1}{3} \right)^{-2} : x = \left( -\frac{1}{3} \right)^{-1},$$

$$\gamma) \left( -\frac{1}{2} \right)^{-2} : x = -\frac{1}{2} \quad \delta) -\frac{1}{4} \cdot x = [(-2)^2 \cdot \left( -\frac{1}{2} \right)^2]^{\frac{1}{2}},$$

$$\epsilon) \left( -\frac{3}{4} \right) : x = \frac{1}{4} - \frac{27}{8}, \quad \sigma) \left( -\frac{1}{2} \right)^2 + (-x) = -\frac{1}{2^2}$$

$$\zeta) [2^2 \cdot 10^{-7}] : x = 5^3 \cdot 10^{-9}$$

151. Εάν  $\alpha = -5$  και  $\beta = +3$ , νὰ εύρεθῇ ἡ τιμὴ τῶν παραστάσεων

$$\alpha) (\alpha+\beta)^2$$

$$\alpha^2 + 2\alpha\beta + \beta^2,$$

$$\beta) (\alpha-\beta)^2$$

$$\alpha^2 - 2\alpha\beta + \beta^2,$$

$$\gamma) \alpha^2 - \beta^2$$

$$(\alpha+\beta)(\alpha-\beta)$$

Τι παρατηρεῖτε;

152. Νὰ εύρεθῇ ἡ τιμὴ τῶν κάτωθι παραστάσεων :

$$\alpha) \frac{3\alpha^8 - 2\beta^8}{2} - \frac{\alpha^8 - \beta^8}{3} \text{ ἐὰν } \alpha = -\frac{1}{2}, \beta = 2$$

$$\beta) \left( \frac{\alpha^8 + \beta^8}{3} - \frac{\alpha^8 - \beta^8}{4} \right) : \left( \frac{\alpha^8 - \beta^8 + 1}{\alpha\beta} \right) \text{ ἐὰν } \alpha = 1, \beta = 2$$

$$\gamma) \frac{\alpha^8 + 3\alpha^2\beta + 3\alpha\beta^8 + \beta^8}{\alpha^8 - 3\alpha^2\beta + 3\alpha\beta^8 - \beta^8} \text{ ἐὰν } \alpha = -3, \beta = 2$$

$$\delta) (4\chi^x)^8 - 6(\chi\psi)^{x\psi} - \psi^{2\psi} \quad \text{ἐὰν } \chi = -1, \psi = 2$$

153. Εἰς τὰς ἀκολούθους παραστάσεις νὰ εύρεθῇ τὸ ἔξαγόμενον, τὸ δποῖον νὰ γραφῆ ὡς δύναμις.

$$\alpha) (3^8 \cdot 3^8) : 3^4 + (2^8 \cdot 2^8) \cdot 2 - 6 \cdot 5$$

$$\beta) \left( -3^{-2} : 3^{-8} \right) \cdot 3^{-4} + \left( -\frac{2}{3} \right)^2 + 4^8 : 3^8$$

$$\gamma) \left( \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{5}{2} \cdot \frac{3}{7} \right)^{-8} : \left[ \frac{4}{7} \left( \frac{2}{3} \cdot \frac{5}{2} \right)^0 \right]^{-2} - \left[ \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{3}{7} \cdot \frac{5}{2} \right]^{-1}$$

$$\delta) 5 \cdot \left( \frac{1}{5} \right)^{-4} + \left( -\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{9} \cdot \frac{1}{27} \cdot \frac{1}{81} \right)^0 - \left( -\frac{2}{3} \right)^2 \cdot \left( \frac{3}{2} \right)^2 - \left( \frac{1}{5} \right)^{-2} : 5^{-2}$$

154. Νὰ εύρεθῇ ἡ τιμὴ τῶν παραστάσεων :

$$\alpha) 4 \cdot 2^x + 1 - 3 \cdot 3^x - 6 \cdot 3^{x-1} + (\chi - 2) \cdot 2^{x-2} \quad \text{ἐὰν } \chi = 0$$

$$\beta) \left( -\frac{1}{2} \right)^{x-4} + \left( -\frac{1}{3} \right)^{x-3} + \left( -\frac{1}{5} \right)^{x-2} + (-1)^{x-1} - (-1)^x \quad \text{ἐὰν } \chi = 1$$

$$\gamma) \left( -\frac{1}{3} \right)^{x-3} + \left( -\frac{1}{5} \right)^{x-2} - \left( -\frac{1}{2} \right)^{x-1} + (-1)^x \quad \text{ἐὰν } \chi = 1$$

155. Εἰς τὴν θέσιν τοῦ ἑρωτηματικοῦ νὰ τεθῇ τὸ κατάλληλον σύμβολον ἐκ τῶν

>, <, = εἰς τὰ κάτωθι :

$$\alpha) -\frac{7}{3} + \frac{14}{6}; -\frac{1}{2}$$

$$\beta) -5 + \frac{1}{2}; \frac{3}{8} - \frac{7}{4}$$

$$\gamma) -\frac{3}{5}; -\frac{4}{3} + \frac{11}{15}$$

καὶ νὰ πολλαπλασιασθοῦν καὶ τὰ δύο μέλη τῶν προκυπτουσῶν σχέσεων ἐπὶ (-1).

δ) Εἰς τὰς προηγουμένας σχέσεις νὰ μεταφερθοῦν οἱ δροὶ τοῦ β' μέλους εἰς τὸ πρῶτον.

156. Νὰ πολ/σιάσητε καὶ τὰ δύο μέλη τῶν κάτωθι Ισοτήτων καὶ ἀνισοτήτων μὲ τὸ Ε.Κ.Π. τῶν παρονομαστῶν αὐτῶν.

$$\alpha) \frac{1}{3} + \frac{1}{2} = 1 - \frac{1}{6} ; \beta) \frac{3}{4} - 1 = \frac{1}{2} - \frac{3}{4} ; \gamma) \frac{12}{14} - \frac{1}{7} = 1 - \frac{2}{7}$$

$$\delta) \frac{13}{14} > 1 - \frac{1}{7} ; \epsilon) \frac{7}{3} < 3 - \frac{1}{2} ; \sigma) 1 - \frac{1}{4} < \frac{25}{8} - 2$$

157. Νά έπαληθεύστε τάς σχέσεις : 1.  $\alpha^2 + \beta^2 \geq 2\alpha\beta$ , 2.  $\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 \geq \alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha$   
δι' δριθμητικών παραδειγμάτων.

158. Νά διποδειχθοῦν τά :

$$\begin{aligned} \alpha) \quad |\alpha^v| &= |\alpha|^v, & \beta) \quad (-1)^{2v} &= 1, \\ \gamma) \quad (-1)^{2v+1} &= -1, & \delta) \quad \alpha^k - \lambda \cdot \alpha^{\lambda-\mu} + \alpha^{\mu-\nu} &= 1 \\ \epsilon) \quad \alpha = \beta \Rightarrow \alpha^v &= \beta^v \end{aligned}$$

για δυοντα διαφορετικά αριθμητικά μέθοδα να παραπομπής για την επίλυση της συνέπειας.

### 5. Τα Επαληθεύσια Παραδείγματα

Ε.Θ.-Σ. (Περιγραφή) (ε)

$$(1) \quad \alpha^2 + \beta^2 = \alpha^2 + \beta^2 \quad \text{διότι } \alpha^2 + \beta^2 = \left( \frac{\alpha + \beta}{2} \right)^2 + \left( \frac{\alpha - \beta}{2} \right)^2 \geq 0 \quad \text{επειδή } \left( \frac{\alpha - \beta}{2} \right)^2 \geq 0$$

$$(2) \quad \left[ \frac{\alpha}{2} + \frac{\beta}{2} + \frac{\gamma}{2} \right]^2 = \left[ \left( \frac{\alpha}{2} + \frac{\gamma}{2} \right) + \frac{\beta}{2} \right]^2 = \left( \frac{\alpha}{2} + \frac{\gamma}{2} \right)^2 + \left( \frac{\beta}{2} \right)^2 \geq 0$$

$$(3) \quad \alpha^2 + \beta^2 = \left( \frac{1}{2} \right)^2 + \left( \frac{\beta}{2} \right)^2 = \left( \frac{\alpha}{2} - \frac{\beta}{2} \right)^2 + \left( \frac{\alpha}{2} + \frac{\beta}{2} \right)^2 \geq 0$$

Ε.Θ.-Σ. (Περιγραφή) (ε)

(4)  $\alpha^2 + \beta^2 = \alpha^2 + \beta^2 \quad \text{επειδή } \alpha^2 + \beta^2 = \alpha^2 + \beta^2$

$$(5) \quad \alpha^2 + \beta^2 = \left( \frac{1}{2} \right)^2 + \left( \frac{\beta}{2} \right)^2 = \left( \frac{\alpha}{2} - \frac{\beta}{2} \right)^2 + \left( \frac{\alpha}{2} + \frac{\beta}{2} \right)^2 \geq 0$$

$$(6) \quad \alpha^2 + \beta^2 = \left( \frac{1}{2} \right)^2 + \left( \frac{\beta}{2} \right)^2 = \left( \frac{\alpha}{2} - \frac{\beta}{2} \right)^2 + \left( \frac{\alpha}{2} + \frac{\beta}{2} \right)^2 \geq 0$$

επειδή τα προϊόντα καθρέπτονται δια την την παραπομπή για την επίλυση της συνέπειας.

Ε.Θ.-Σ. (Περιγραφή) (ε)

$$(7) \quad \left( -\frac{\alpha}{2} - \frac{\beta}{2} \right)^2 = \left( -\frac{\alpha}{2} \right)^2 + \left( -\frac{\beta}{2} \right)^2 = \left( \frac{\alpha}{2} + \frac{\beta}{2} \right)^2 = \left( \frac{\alpha}{2} \right)^2 + \left( \frac{\beta}{2} \right)^2$$

$$(8) \quad \alpha^2 + \beta^2 = \left( \frac{\alpha}{2} + \frac{\beta}{2} \right)^2 + \left( \frac{\alpha}{2} - \frac{\beta}{2} \right)^2 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$$

$$(9) \quad \alpha^2 + \beta^2 = \frac{\alpha^2}{2} + \frac{\beta^2}{2} = \frac{\alpha^2}{2} + \frac{\beta^2}{2} = \left( \frac{\alpha}{2} + \frac{\beta}{2} \right)^2 + \left( \frac{\alpha}{2} - \frac{\beta}{2} \right)^2 = 1$$

Ε.Θ.-Σ. (Περιγραφή) (ε)

(10)  $\alpha^2 + \beta^2 = \left( \frac{\alpha}{2} + \frac{\beta}{2} \right)^2 + \left( \frac{\alpha}{2} - \frac{\beta}{2} \right)^2 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$

$$(11) \quad \alpha^2 + \beta^2 = \left( \frac{\alpha}{2} + \frac{\beta}{2} \right)^2 + \left( \frac{\alpha}{2} - \frac{\beta}{2} \right)^2 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$$

$$(12) \quad \alpha^2 + \beta^2 = \left( \frac{\alpha}{2} + \frac{\beta}{2} \right)^2 + \left( \frac{\alpha}{2} - \frac{\beta}{2} \right)^2 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$$

$$(13) \quad \alpha^2 + \beta^2 = \left( \frac{\alpha}{2} + \frac{\beta}{2} \right)^2 + \left( \frac{\alpha}{2} - \frac{\beta}{2} \right)^2 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$$

### ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΙΙ

#### Α. ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ — ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ — ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ

##### 1. Η ΕΞΙΣΩΣΙΣ $\alpha x + \beta = 0$ , ΕΠΙΛΥΣΙΣ ΑΥΤΗΣ

§ 74. Εις τὴν Α' τάξιν ἐγκωρίσαμεν ἔξισώσεις, δπως τὰς  $x+3=5$ ,  $12-x=8$ ,  $3x=15$  καὶ εἰδομεν δτι αὔται ἀληθεύουν δι' ὥρισμένας τιμᾶς τοῦ γράμματος  $x$ , τὸ δποιον λέγεται ἀγνωστος τῆς ἔξισώσεως.

"Ωστε ἔξισωσις ὡς πρὸς  $x$  εἶναι μία ισότης, περιέχουσα τὸν ἀγνωστὸν  $x$ , ή δποια ἀληθεύει δι' ὥρισμένας ἐκ τῶν τιμῶν, τὰς δποιας δύναται νὰ λάβῃ δ  $x$ .

Ο ἀριθμός, δ δποιος ἐπαληθεύει τὴν ἔξισωσιν, λέγεται λύσις τῆς ἔξισώσεως.

Ἡ εύρεσις τῶν λύσεων λέγεται ἐπίλυσις τῆς ἔξισώσεως.

Σημείωσις.

1. "Οταν λέγωμεν δτι ή ἔξισωσις  $x+3=8$  ἀληθεύει διὰ τὴν τιμὴν 5 τοῦ  $x$ , ή δτι δ ἀριθμὸς 5 ἐπαληθεύει τὴν ἔξισωσιν, ἐννοοῦμεν δτι, ἐὰν εἰς τὴν ἔξισωσιν  $x+3=8$  θέσωμεν ἀντὶ τοῦ  $x$  τὸ 5, θ διαβωμεν τὴν ἀριθμητικὴν ισότητα  $5+3=8$  ή  $8=8$  (Πρῶτον μέλος ίσου πρὸς τὸ δεύτερον μέλος).

Διὰ τῆς ἐργασίας αὐτῆς, διὰ τῆς δποιας θέτομεν ἀντὶ τοῦ  $x$  τὴν λύσιν τῆς ἔξισώσεως καὶ εὐρίσκομεν δτι τὸ πρῶτον μέλος ίσουται πρὸς τὸ δεύτερον, λέγομεν δτι ἐπαληθεύομεν τὴν ἔξισωσιν ή δτι γίνεται ἐπαληθεύσις τῆς ἔξισώσεως.

"Οταν μία ἔξισωσις ἐπαληθεύεται διὰ μίαν τιμὴν τοῦ ἀγνώστου, λέγομεν δτι ή τιμὴ αὐτὴ εἶναι πράγματι λύσις τῆς ἔξισώσεως. Π. χ. ἐπειδὴ δ ἀριθμὸς 3 ἐπαληθεύει τὴν  $x-2=1$  συνάγομεν δτι εἶναι λύσις αὐτῆς.

2. Μία ἔξισωσις εἶναι δυνατὸν νὰ μή ἔχῃ λύσιν. Π. χ. ή ἔξισωσις  $3+x=x+\frac{5}{2}$  δὲν ἐπαληθεύεται, ἐὰν θέσωμεν ἀντὶ τοῦ  $x$  οιονδήποτε ρητόν. Αὐτῇ λέγεται ἀδύνατες ἔξισωσις.

"Υπάρχουν καὶ ἔξισώσεις αἱ δποιαὶ ἔχουν δπείρους λύσεις. Π. χ. ή  $x+5=5+x$  ἐπαληθεύεται δι' οιονδήποτε ρητοῦ. Αὐτῇ λέγεται τευτέτης ή ἀδρίστος ἔξισωσις.

Αἱ ἔξισώσεις, τὰς δποιαὶ ἔχετάζομεν, ἀνάγονται εἰς τὴν γενικὴν μορφὴν  $\alpha x + \beta = 0$ , ή δποια λέγεται ἔξισωσις πρώτου βαθμοῦ ὡς πρὸς  $x$ , ἐπειδὴ δ ἀγνωστος ἔχει ἐκθέτην τὴν μονάδα,  $\alpha x^1 + \beta = 0$  ή  $\alpha x + \beta = 0$ .

Οι α, β εἶναι ἀριθμοὶ ή παραστάσεις ἀνεξάρτητοι τοῦ  $x$  (μὴ περιέχουσαι τὸ  $x$ ). Ο α λέγεται συντελεστὴς τοῦ ἀγνώστου καὶ θεωρεῖται διάφορος τοῦ μηδενός. Ο β λέγεται γνωστὸς δρός.

Εἰς τὴν ἔξισωσιν  $6x - 5 = 3x + 1$ , ή δποια εἶναι ίσου βαθμοῦ ὡς πρὸς  $x$ , παρατηροῦμεν τὰ ἔξις :

Αἱ παραστάσεις  $6x - 5$ ,  $3x + 1$  λέγονται «μέλη τῆς ἔξισώσεως» Οι δροὶ αὐτῶν λέγονται

καὶ δροὶ τῆς ἔξισώσεως. Οἱ  $-5, 1$  εἰναι οἱ γνωστοὶ δροὶ καὶ οἱ  $6x, 3x$  εἰναι οἱ ἀγνωστοὶ δροὶ.

Εἰς τὴν ἔξισωσιν  $\frac{2x+3}{2} + \frac{x-1}{3} = \frac{x+2}{6}$  δυνάμεθα νὰ θεωρήσωμεν ὡς δρους τοῦ 1οῦ μέλους τὰς παραστάσεις  $\frac{2x+3}{2}$  καὶ  $\frac{x-1}{3}$  καὶ τοῦ 2ου μέλους τὴν παράστασιν  $\frac{x+2}{6}$ .

### § 75. Ἰσοδύναμοι ἔξισώσεις.

Αἱ ἔξισώσεις  $x-2=5, x+3=10$  ἔχουν τὴν λύσιν 7, (διότι ἐπαληθεύονται ἐὰν ἀντὶ τοῦ  $x$  τεθῇ δ 7) καὶ μόνον αὐτῇ.

Δύο ἔξισώσεις μὲν ἔνα ἀγνωστὸν λέγονται Ἰσοδύναμοι, ἐὰν ἔχουν τὰς αὐτὰς λύσεις.

### § 76. Ἰδιότητες τῶν ἔξισώσεων

α) Ἐὰν εἰς τὴν ἔξισωσιν  $(x+2).3-6=12$  ἐκτελέσωμεν τὰς πράξεις

$$\underline{3x+6-6=12}$$

$$3x+0=12$$

καταλήγομεν εἰς τὴν ἔξισωσιν  $3x=12$ , ἢ δόποια ἔχει λύσιν τὸν ἀριθμὸν 4.

‘Η λύσις αὐτὴ εἰναι καὶ λύσις τῆς ἀρχικῆς, διότι παρατηροῦμεν ὅτι τὴν ἐπαληθεύει :  $(x+2).3-6=12$  α' μέλος :  $(4+2).3-6=12$

$$6.3-6$$

$$18-6=12$$

$$12$$

β' μέλος :

“Ωστε, ἐὰν εἰς τὰ μέλη ἔξισώσεως ἐκτελέσωμεν τὰς σημειουμένας πράξεις, εὑρίσκομεν Ἰσοδύναμον ἔξισωσιν.

β) ‘Η ἔξισωσις  $x+3=2$  ἔχει τὴν λύσιν  $-1$ . Ἐὰν προσθέσωμεν καὶ εἰς τὰ δύο μέλη αὐτῆς τὸν 4 θὰ ἔχωμεν :

$$x+3+4=2+4 \leftrightarrow x+7=6.$$

‘Η ἔξισωσις  $x+7=6$  ἔχει τὴν λύσιν  $-1$ , διότι τὴν ἐπαληθεύει καὶ ἐπομένως εἰναι Ἰσοδύναμος πρὸς τὴν ἀρχικήν.

“Ἄρα, ἐὰν προσθέσωμεν καὶ εἰς τὰ δύο μέλη ἔξισώσεως τὸν αὐτὸν ρητόν, λαμβάνομεν Ἰσοδύναμον ἔξισωσιν.

Σημείωσις. Τὸ αὐτὸν ισχύει καὶ δταν προσθέσωμεν τὴν αὐτὴν παράστασιν, ἢ δόποια περιέχει τὸν ἀγνωστὸν  $x$ . π.χ.  $x+3=2 \leftrightarrow x+3+(x+1)=2+(x+1) \leftrightarrow 2x+4=x+3$ . Αὗτὴ ἔχει τὴν λύσιν  $-1$ , διότι τὴν ἐπαληθεύει,

$$2.(-1)+4=-1+3$$

$$-2+4=-1+3$$

$$2=2$$

### Πρακτικὸν συμπέρασμα τῆς Ιδιότητος αὐτῆς.

Ἐάν προσθέσωμεν εἰς ἀμφότερα τὰ μέλη τῆς ἑξισώσεως  $2x+3=5$  τὸν  $-3$ , λαμβάνομεν τὴν ίσοδύναμον ἑξισώσιν  $2x+3+(-3)=5+(-3)$  ἢ τὴν  $2x=5-3$ , ἢ ὅποια εἶναι ἀπλουστέρα τῆς ἀρχικῆς.

Παρατηροῦμεν ὅτι ἐκ τῆς ἑξισώσεως  $2x+3=5$  μεταβαίνομεν εἰς τὴν  $2x=5-3$ , ἐάν μεταφέρωμεν τὸν  $3$  ἐκ τοῦ 1ου μέλους εἰς τὸ δεύτερον καὶ τοῦ ἀλλάξωμεν τὸ πρόστημόν του.

“Ωστε δυνάμεθα νὰ μεταφέρωμεν ὅρον ἀθροίσματος ἐνὸς μέλους ἑξισώσεως, εἰς τὸ ἄλλο, ἐάν ἀλλάξωμεν τὸ πρόσημον αὐτοῦ ἢ συντόμως : δ ὅρος ἑξισώσεως, δ ὅποιος ἀλλάσσει μέλος ἀλλάσσει καὶ πρόσημον.

**Παραδείγματα :**

$$\begin{aligned} 1. \quad x - 5 = 7 &\iff x = 7 + 5 \\ 2. \quad 3 - 2x + 6 = 5x - 1 &\iff 3 + 6 = 2x + 5x - 1 \iff 3 + 6 + 1 = 2x + 5x \iff \\ 5x + 2x &= 3 + 6 + 1. \quad \text{Εἰς τὴν μορφὴν αὐτὴν τῆς ἑξισώσεως λέγομεν ὅτι ἔχομεν χωρίσει γνωστούς ἀπὸ ἀγνώστους.} \end{aligned}$$

$$\gamma) \quad \text{Η } \text{ ἑξισώσις } \frac{x}{2} - 1 = 0 \text{ ἔχει τὴν λύσιν } 2, \text{ διότι τὴν ἐπαληθεύει.}$$

$$\begin{aligned} \text{Πολλαπλασιάζομεν καὶ τὰ δύο μέλη αὐτῆς ἐπὶ } 2 \text{ καὶ } \text{ἔχομεν } \left( \frac{x}{2} - 1 \right) \cdot 2 = \\ = 0.2 \iff \frac{x}{2} \cdot 2 - 1 \cdot 2 = 0.2 \iff x - 2 = 0. \end{aligned}$$

Η ἑξισώσις  $x - 2 = 0$  ἔχει τὴν λύσιν  $2$ , ἀρα εἶναι ίσοδύναμος πρὸς τὴν ἀρχικήν.

Ἐπομένως, ἐάν πολ/σωμεν καὶ τὰ δύο μέλη ἑξισώσεως ἐπὶ ρητόν, διάφορον τοῦ μηδενός, λαμβάνομεν ίσοδύναμον ἑξισώσιν.

### Πρακτικὰ συμπεράσματα τῆς Ιδιότητος αὐτῆς.

$$1. \quad \text{Πολ/ζομεν ἐπὶ } (-1) \text{ ἀμφότερα τὰ μέλη τῆς } 2 - x = 3, (2-x) \cdot (-1) = \\ = 3 \cdot (-1) \text{ καὶ λαμβάνομεν τὴν ίσοδύναμον } -2 + x = -3.$$

Παρατηροῦμεν διτι δυνάμεθα νὰ ἀλλάξωμεν τὸ πρόσημον τῶν ὅρων καὶ τῶν δύο μελῶν μιᾶς ἑξισώσεως.

$$\text{Παραδείγματα : } -x = 7 \iff x = -7, \quad -x + 3 = -\frac{1}{2} \iff x - 3 = \frac{1}{2}$$

$$2. \quad \text{Πολ/ζομεν καὶ τὰ δύο μέλη τῆς ἑξισ. } \frac{x}{2} - \frac{x}{3} = 1 \text{ ἐπὶ τὸ } 6, (\text{Ε.Κ.Π.}) \\ \text{τῶν παρονομαστῶν), } 6 \cdot \left( \frac{x}{2} - \frac{x}{3} \right) = 6 \cdot 1 \iff 6 \cdot \frac{x}{2} - 6 \cdot \frac{x}{3} = 6 \iff 3x - 2x = 6$$

Ἄρα δυνάμεθα νὰ ἔξαλείψωμεν τοὺς παρονομαστὰς μιᾶς ἑξισώσεως, ἐάν πολ/μεν τὰ μέλη αὐτῆς ἐπὶ τὸ Ε.Κ.Π. τῶν παρονομαστῶν.

**Παραδείγματα :**

$$1. \frac{x}{2} - 3 = 1 \iff 2 \cdot \frac{x}{2} - 2 \cdot 3 = 2 \cdot 1 \iff x - 6 = 2$$

$$2. \frac{2x}{3} + \frac{1-x}{4} = \frac{3}{2} \iff 12 \cdot \frac{2x}{3} + \frac{12(1-x)}{4} = 12 \cdot \frac{3}{2} \iff 4 \cdot 2x + 3(1-x) = 6 \cdot 3$$

§ 77. Έργασία διὰ τὴν ἐπίλυσιν ἔξισώσεως 1ου βαθμοῦ μὲν ἔνα ἀγνώστου.

Νὰ ἐπιλυθῇ ἡ ἔξισωσις :  $\frac{2x+1}{4} - \frac{x-2}{3} = \frac{1}{2}$

Διὰ νὰ ἐπιλύσωμεν τὴν ἔξισωσιν αὐτὴν ἔξαλείφομεν πρῶτον τοὺς παρονομαστάς.

Πρὸς τοῦτο εύρισκομεν τὸ Ε.Κ.Π. τῶν παρονομαστῶν 4, 3, 2, τὸ δόποιον εἶναι δ 12, πολ /μεν καὶ τὰ δύο μέλη τῆς ἔξισώσεως ἐπὶ τὸν 12 καὶ ἐκτελοῦμεν τὰς πράξεις διαιρέσεως (ἀπλοποιήσεις). Τοῦτο εἶναι πάντοτε δυνατόν, διότι τὸ Ε.Κ.Π. τῶν παρονομαστῶν εἶναι διαιρετὸν ὑπὸ αὐτῶν.

$$\text{"Οστε: } \frac{2x+1}{4} - \frac{x-2}{3} = \frac{1}{2} \iff 12 \left( \frac{2x+1}{4} - \frac{x-2}{3} \right) = 12 \cdot \frac{1}{2}$$

$$\iff \frac{12 \cdot (2x+1)}{4} - \frac{12(x-2)}{3} = 6 \cdot 1 \iff 3 \cdot (2x+1) - 4 \cdot (x-2) = 6$$

Διὰ τὴν ἐπίλυσιν τῆς ἔξισώσεως  $3(2x+1) - 4(x-2) = 6$  (καὶ οἰασδήποτε δλλῆς τῆς μορφῆς αὐτῆς) ἐργαζόμεθα ὡς ἔξῆς :

Ἐκτελοῦμεν τὰς πράξεις τοῦ πολλαπλασιασμοῦ :

$$3(2x+1) - 4(x-2) = 6 \iff (6x+3) - (4x-8) = 6$$

Ἐξαλείφομεν τὰς παρενθέσεις :  $(6x+3) - (4x-8) = 6 \iff 6x+3-4x+8=6$

Ἐκτελοῦμεν τὰς πράξεις προσθέσεως :  $6x+3-4x+8=6 \iff 2x+11=6$ . (Η ἐργασία αὐτὴ λέγεται καὶ ἀναγωγὴ τῶν διοίων δρῶν).

Τώρα διὰ νὰ ἐπιλύσωμεν τὴν  $2x+11=6$ , μεταφέρομεν τὸν 11 εἰς τὸ β' μέλος (χωρίζομεν γνωστούς ἀπὸ ἀγνώστους),  $2x+11=6 \iff 2x=6-11$  καὶ ἐκτελοῦμεν τὴν τελευταίαν πρᾶξιν προσθέσεως ἢ ἀναγωγῆν,

$$2x=6-11 \iff 2x=-5$$

Ἐν συνεχείᾳ ἐπιλύομεν τὴν  $2x=-5$ , ἐὰν διαιρέσωμεν καὶ τὰ δύο μέλη αὐτῆς διὰ τοῦ συντελεστοῦ τοῦ ἀγνώστου, δηλαδὴ ἐὰν πολ /ωμεν καὶ τὰ δύο μέλη αὐτῆς ἐπὶ τὸν ἀντίστροφον συντελεστὴν τοῦ ἀγνώστου.

$$2x = -5 \iff \frac{2x}{2} = -\frac{5}{2} \iff x = -\frac{5}{2}. \text{ Συντομώτερον } 2x = -5 \iff$$

$$x = -\frac{5}{2}. \text{ "Ωστε ἡ λύσις τῆς ἀρχικῆς ἔξισώσεως } \frac{2x+1}{4} - \frac{x-2}{3} = \frac{1}{2} \text{ εἶναι δ ἀριθμὸς } -\frac{5}{2}.$$

Έπαλθευσις :

α' μέλος :

$$\frac{2 \left( -\frac{5}{2} \right) + 1}{4} - \frac{-\frac{5}{2} - 2}{3} = \frac{-5+1}{4} \frac{\frac{-5-4}{2}}{3} = \frac{-4}{4} - \frac{-9}{6} = \\ = -1 + \frac{9}{6} = -\frac{6}{6} + \frac{9}{6} = \frac{-6+9}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

β' μέλος :  $\frac{1}{2}$

'Εάν συνοψίσωμεν τὰ ἀνωτέρω διὰ τὴν ἐπίλυσιν μιᾶς πρωτοβαθμίου ἔξισώσεως, ἔχομεν τὴν ἑξῆς γενικήν πορείαν τῆς ἐπιλύσεως.

1ον. 'Εξαλείφομεν τοὺς παρονομαστὰς (ἔάν ὑπάρχουν).

2ον. 'Εκτελοῦμεν τὰς πράξεις πολ / σμοῦ.

3ον. 'Εξαλείφομεν τὰς παρενθέσεις.

4ον. Χωρίζομεν γνωστούς ἀπό ἀγνώστους.

5ον. 'Εκτελοῦμεν τὰς ἀναγωγὰς τῶν δμοίων ὅρων καὶ εἰς τὰ δύο μέλη.

6ον. Διαιροῦμεν διὰ τοῦ συντελεστοῦ τοῦ ἀγνώστου, ἔάν εἶναι διάφορος τοῦ μηδενός.

Διὰ τῆς ἀνωτέρω ἑργασίας πᾶσα ἔξισωσις 1ου βαθμοῦ μὲν ἔνα ἀγνωστὸν λαμβάνει τὴν μορφὴν  $\gamma x = \delta$  καὶ ἔχει τὴν λύσιν  $x = \frac{\delta}{\gamma}$  ἔάν  $\gamma \neq 0$ .

**Σημείωσις.** Είναι δυνατὸν ἡ ἐκτέλεσις τῶν πράξεων πολ / σμοῦ καὶ ἡ ἔξαλειψις τῶν παρενθέσεων νὰ γίνη συγχρόνως. Π.χ.  $2(3x+1) - 3(x+2) = 5(x+1) - 4(x-1) \Leftrightarrow 6x+2 - 3x - 6 = 5x+5 - 4x+4 \Leftrightarrow 3x - 4 = x+9$ .

'Επίσης πρὶν χωρίσωμεν γνωστούς ἀπό ἀγνώστους, δυνάμεθα νὰ ἐκτελέσωμεν ἀναγωγὰς καὶ εἰς τὰ δύο μέλη τῆς ἔξισώσεως. Π.χ.  $6x+2 - 3x - 6 = 5x+5 - 4x+4 \Leftrightarrow 3x - 4 = x+9$ . 'Ἐν συνεχείᾳ χωρίζομεν γνωστούς ἀπό ἀγνώστους....

### § 78. 'Επίλυσις τῆς γενικῆς πρωτοβαθμίου ἔξισώσεως

'Η γενική ἔξισωσις τοῦ α' βαθμοῦ ἔχει τὴν μορφὴν  $\alpha x + \beta = 0$ . Μεταφέρομεν τὸν γνωστὸν ὅρον  $\beta$  εἰς τὸ β' μέλος καὶ ἔχομεν  $\alpha x = -\beta$  ἢ  $\alpha x = -\beta$ .

Διαιροῦμεν διὰ τοῦ συντελεστοῦ α τοῦ ἀγνώστου:  $\frac{\alpha x}{\alpha} = -\frac{\beta}{\alpha}$  καὶ εύρισκομεν τὴν λύσιν  $x = -\frac{\beta}{\alpha}$

**Σημείωσις.** Ο α θεωρεῖται διάφορος τοῦ μηδενός. 'Εάν  $\alpha = 0$  καὶ  $\beta \neq 0$  ἡ ἔξισωσις εἶναι ἀδύνατος. Π.χ. ἡ ἔξισωσις  $0x = 5$  εἶναι ἀδύνατος, διότι δὲν ὑπάρχει ρητός, δ ὅποιος πολ / μενος ἔτι 0 νὰ διῃ τὸν 5. 'Εάν  $\alpha = 0$  καὶ  $\beta = 0$  ἡ ἔξισωσις εἶναι ἀδριστος, ταυτότης. Π.χ. ἡ ἔξισωσις  $0x = 0$  εἶναι ταυτότης, διότι ἐπαληθεύεται ἀπό κάθε ρητὸν ἀριθμόν.

**Άσκήσεις**

159. Νὰ ἐπιλυθοῦν καὶ ἐπαληθευθοῦν αἱ ἔξισώσεις :

$$\alpha) -12x+60=12, \quad \beta) 3x-14=-8, \quad \gamma) 5(x-2)-2(3-x)=3x-4$$

$$\delta) x-1=2(3-2x)-3(1-x), \quad \varepsilon) 2x-5=\frac{4x-3}{5}, \quad \sigma) \frac{x}{2}+\frac{x}{3}=5$$

$$\zeta) x-\frac{2x-1}{3}=\frac{3(x+1)}{4}$$

160. Νὰ ἐπιλύσητε τὰς ἔξισώσεις :

$$\alpha) \frac{4-5x}{12}-\frac{3(x-1)}{2}=2x-6, \quad \beta) 2x+\left(\frac{x}{3}-\frac{x}{4}\right)=\frac{5x}{3}+30$$

$$\gamma) \frac{3x-5}{2}-\frac{4x-2}{5}=\frac{3(x-2)}{10}+\frac{x-23}{2}, \quad \delta) \frac{2x-1}{3}-\frac{3x-2}{4}=\frac{5x-4}{6}-\frac{7x+6}{6}$$

161. Νὰ εὐρεθῇ δι' ἀναγραφῆς τὸ σύνολον  $A \cup B$  ἕάν :

$$\alpha) A=\left\{x/3(x-1)=12, x \in Q\right\} \text{ καὶ } B=\left\{x/\frac{3x-4}{5}-\frac{3-2x}{2}=0, x \in Q\right\}$$

$$\beta) A=\left\{x/\frac{x}{3}+2=4, x \in Q\right\} \text{ καὶ } B=\left\{x/\frac{2x+3}{3}=\frac{x-1}{4}, x \in Q\right\}$$

$$\gamma) A=\left\{x/\frac{2x}{3}+\frac{x}{6}-5=\frac{5x}{4}, x \in Q\right\} \text{ καὶ } B=\left\{x/6,5-\frac{5x-1}{6}=\frac{20}{3}, x \in Q\right\}$$

162. Νὰ ἐπιλυθοῦν αἱ ἔξισώσεις :

$$\alpha) x+2=x+1, \quad \beta) x+3=2+x+1, \quad \gamma) \frac{2x-3}{2}=x-5,$$

$$\delta) x-\frac{5x-12}{4}=3-\frac{x}{4}, \quad \varepsilon) \frac{3x+7}{15}=\frac{x-1}{5}, \quad \sigma) \frac{5x+6}{6}=0,5x+\frac{x+3}{3}$$

163. Νὰ εὐρεθοῦν τὰ ὑποσύνολα τοῦ  $Q$  :  $A, B, \Gamma, \Delta, E$  καὶ  $Z$ , ἕάν :

$$A=\{x/0x=-4\}, \quad B=\{x/0x=0\}, \quad \Gamma=\{x/x-3=2+x\},$$

$$\Delta=\{x/1x=x\}, \quad E=\left\{x/\frac{2x-1}{3}-\frac{5x-2}{12}=\frac{x+1}{4}\right\}, \quad Z=\left\{x/2x-\frac{5x-12}{4}=3+\frac{3x}{4}\right\}$$

164. Διὰ ποίας τιμάς τῶν  $\alpha, \beta, \gamma, \delta$  αἱ κάτωθι ἔξισώσεις εἶναι ἀδύνατοι;

$$1) (\alpha+2)x=1, \quad 2) \beta x=6+5x, \quad 3) (3\gamma-1)x=2, \quad 4) \delta x+x+1=5x+7$$

165. Διὰ ποίας τιμάς τῶν  $\alpha$  καὶ  $\beta$  αἱ κάτωθι ἔξισώσεις εἶναι ἀδριστοῖ;

$$1) (\alpha-1)x=\beta-2, \quad 2) (3\alpha+4)x=\beta+\frac{1}{2}, \quad 3) \alpha x-1=\beta-3x$$

$$4) \alpha x-\beta=8x+3\beta-1$$

**2. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΥΟΜΕΝΑ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΣ  
ΑOU ΒΑΘΜΟΥ ΜE ΕΝΑ ΑΓΝΩΣΤΟΝ**

§ 79. Πρόβλημα εἶναι μία πρότασις, ἡ ὅποια περιλαμβάνει δεδομένα καὶ ζητούμενα, τὰ δροῖα εἶναι ρητοὶ ἀριθμοὶ συνδεόμενοι μεταξύ των. Ἡ εὑρεσις τῶν ζητουμένων λέγεται ἐπίλυσις τοῦ προβλήματος.

"Εν πρόβλημα δύναται νὰ ἑκφρασθῇ ὑπὸ μιᾶς ἔξισώσεως, ως θὰ ἴδωμεν κατωτέρω.

Διὰ τῶν ἔξισώσεων εὐρίσκομεν συντομώτερον καὶ εύκολώτερον τὴν λύσιν τῶν προβλημάτων.

### Σημείωσις

Δὲν ὑπάρχει πάντοτε λύσις, ἐὰν τὰ δεδομένα τοῦ προβλήματος δὲν εἶναι ἐπαρκῆ καὶ κατάλληλα. Π.χ. εἰς μαθητής ἔχει 20 δρχ. καὶ ἔξοδεύει 3 δρχ. ἡμερησίως. "Άλλος μαθητής ἔχει 12 δρχ. καὶ ἔξοδεύει 2 δρχ. ἡμερησίως. Μετὰ πόσας ἡμέρας θὰ ἔχουν τὸ αὐτὸ ποσόν χρημάτων; Δὲν ὑπάρχει λύσις. "Η λύσις 8 ἡμ. δὲν εἶναι δεκτή, διότι πέραν τῆς δησ ἡμέρας δὲν ἔχουν χρήματα.

### Παραδείγματα :

**1ον.** "Η Α' τάξις ἐνὸς Γυμνασίου ἔχει 2πλασίους μαθητὰς ἀπὸ τὴν Β' τάξιν καὶ ή Γ' τάξις ἔχει 3πλασίους ἀπὸ τὴν Β' τάξιν. "Αν οἱ μαθηταὶ τῶν τριῶν τάξεων ἦσαν 360, πόσους μαθητὰς ἔχει η κάθε τάξις;

Αἱ λύσεις πρέπει νὰ εἶναι ἀριθμοὶ ἀκέραιοι θετικοὶ.

"Ἐν ἑκ τῶν ζητουμένων συμβολίζομεν διὰ τοῦ χ. Εἰς τὸ πρόβλημα αὐτὸ τὸ πλῆθος τῶν μαθητῶν τῆς Β' τάξεως. Διὰ νὰ σχηματίσωμεν τὴν ἔξισωσιν ἔργαζόμεθα ὡς ἀκολούθως :

"Η Β' τάξις ἔχει χ μαθητὰς. "Η Α' τάξις η δόποια ἔχει 2πλασίους μαθητὰς ἀπὸ τὴν Β' τάξιν θὰ ἔχῃ  $2\chi$  μαθητὰς καὶ ή Γ' τάξις 3χ μαθητὰς. 'Άλλα, μαθηταὶ Α' τάξεως + μαθηταὶ Β' τάξεως + μαθηταὶ Γ' τάξεως = 360 μαθ.

$$2\chi + \chi + 3\chi = 360$$

Ἒπιλυσις τῆς ἔξισώσεως :

$$2\chi + \chi + 3\chi = 360 \Leftrightarrow 6\chi = 360 \Leftrightarrow \chi = \frac{360}{6} \Leftrightarrow \chi = 60$$

'Απάντησις εἰς τὸ πρόβλημα:

"Η Β' τάξις ἔχει 60 μαθητὰς.

"Η Α' τάξις ἔχει  $2 \cdot 60 = 120$  μαθητάς.

"Η Γ' τάξις ἔχει  $3 \cdot 60 = 180$  μαθητάς.


'Επαλήθευσις : 60 μαθ.+120 μαθ.+180 μαθ.=360 μαθ.

**2ον.** Δύο αὐτοκίνητα ἐκκινοῦν ταυτοχρόνως ἐκ δύο πόλεων Α καὶ Β μὲ σταθερὰς ταχύτητας  $45 \text{ km/h}$  καὶ  $38 \text{ km/h}$  ἀντιστοίχως καὶ κινοῦνται εύθυγράμμως κατὰ τὴν φοράν τοῦ διανύσματος  $\overrightarrow{AB}$ . Μετὰ πόσας ὥρας θὰ συναντηθοῦν καὶ εἰς ποίαν ἀπόστασιν ἐκ τῆς πόλεως Α, ἐὰν η ἀπόστασις  $AB$  τῶν δύο πόλεων εἴναι  $21 \text{ km}$  ;

Αἱ λύσεις πρέπει νὰ εἶναι θετικοὶ ἀριθμοί.

'Εκλογὴ τοῦ ἀγνώστου :

"Εστω δτι μετὰ χ ὥρας θὰ συναντηθοῦν εἰς τὸ Σ.



σχ. 45.

Σχηματισμός της έξισώσεως :

Έφόσον είσι 1 ώραν τὸ 1ον αὐτοκίνητον διανύει  $45 \text{ km}$  εἰς χ ώρας θὰ διανύσῃ  $45x \text{ km}$ . Τὸ 2ον αὐτοκίνητον εἰσι χ ώρας θὰ διανύσῃ  $38x \text{ km}$ .

"Αρά θὰ έχωμεν τὴν έξισωσιν :

$$\text{ΑΣ} = \text{ΑΒ} + \text{ΒΣ}$$

$$45x = 21 + 38x$$

Έπιλυσις τῆς έξισώσεως

$$45x = 21 + 38x \Leftrightarrow 45x - 38x =$$

$$= 21 \Leftrightarrow 7x = 21 \Leftrightarrow x = \frac{21}{7} \Leftrightarrow x = 3$$

(Έπαλθευσις τῆς έξισώσεως :  $45x = 21 + 38x$ .

α' μέλος :  $45 \cdot 3 = 135$

β' μέλος :  $21 + 38 \cdot 3 = 21 + 114 = 135$ .

Απάντησις εἰσι τὸ πρόβλημα :

Θὰ συναντηθοῦν μετὰ 3 ώρας.

Εἰς ἀπόστασιν  $3 \cdot 45 \text{ km} = 135 \text{ km}$  ἀπὸ τὴν πόλιν A.

Ξεν. Τὸ 3 πλάσιον ἀριθμοῦ αὐξηθὲν κατὰ  $\frac{11}{2}$  γίνεται 41,5. Ποῖος ὁ ἀριθμός;

Ἡ λύσις εἶναι ρητὸς ἀριθμός.

Ἔστω χ ὁ ζητούμενς ἀριθμός, ἕρα τὸ 3πλάσιον αὐτοῦ θὰ εἶναι  $3x$ . Συμφώνως πρὸς τὸ πρόβλημα σχηματίζομεν τὴν έξισωσιν.

«Τὸ 3πλάσιον ἀριθμοῦ» «αὐξηθὲν κατὰ  $\frac{11}{2}$ » «γίνεται» 41,5

$$3x + \frac{11}{2} = 41,5$$

Ἐκ τῆς ἐπιλύσεως τῆς έξισώσεως εὑρίσκομεν τὴν λύσιν 12, ἡ δποία ἐπαληθεύει αὐτὴν καὶ ἐπομένως εἶναι ὁ ζητούμενος ἀριθμὸς τοῦ προβλήματος.

Δύο ἀκέραιοι θετικοὶ ἀριθμοὶ έχουν ἀθροισμα 188. Ο μεγαλύτερος διαιρούμενος διὰ τοῦ μικρότερου δίδει πηλίκον 3 καὶ ὑπόλοιπον 8. Ποῖοι οἱ ἀριθμοί;

Αἱ λύσεις θετικοὶ καὶ ἀκέραιοι ἀριθμοί.

Ἐὰν δ μικρότερος εἶναι χ, τότε ὁ μεγαλύτερος θὰ εἶναι  $188 - \chi$  καὶ συμφώνως πρὸς τὴν ίδιότητα :

Διαιρετέος = διαιρέτης ἐπὶ πηλίκον + ὑπόλοιπον, ἔχομεν τὴν έξισωσιν :

$$188 - \chi = \chi \cdot 3 + 8$$

Ἡ λύσις τῆς έξισώσεως αὐτῆς εἶναι 45.


Ἄρα δ μικρότερος ἀριθμὸς εἶναι ὁ 45 καὶ δ μεγαλύτερος  $188 - 45 = 143$ .

Πρόγματι ό 143 διαιρούμενος διά 45 δίδει πηλίκον 3 καὶ ύπόλοιπον 8.

**5ον.** Κρουνὸς γεμίζει κενὴν δεξαμενὴν εἰς 4 ὥρας καὶ ἄλλος εἰς 12 ὥρας. Εἰς πόσας ὥρας θὰ γεμίσουν τὴν δεξαμενὴν, ἐὰν ρέουν καὶ οἱ δύο συγχρόνως;

"Εστω, διτὶ εἰς χ ὥρας θὰ γεμίσουν καὶ οἱ δύο κρουνοὶ τὴν δεξαμενὴν, ἐὰν ρέουν συγχρόνως. ('Ο χ πρέπει νὰ εἶναι θετικός).

"Επειδὴ δι πρῶτος κρουνὸς γεμίζει τὴν δεξαμενὴν εἰς 4 ὥρας, εἰς 1 ὥραν θὰ γεμίσῃ τὸ  $\frac{1}{4}$  αὐτῆς, εἰς 2 ὥρας τὰ  $\frac{2}{4}$  αὐτῆς καὶ εἰς χ ὥρας τὰ  $\frac{x}{4}$  αὐτῆς.



σχ. 46.

"Ο δεύτερος κρουνὸς εἰς χ ὥρας θὰ γε-  
μίσῃ τὰ  $\frac{x}{12}$  αὐτῆς. "Αρα ἔχομεν τὴν ἑξίσωσιν:

Μέρος τῆς δεξ. τὸ δόποιον + μέρος δεξ. τὸ δόποιον = 'Ολόκληρος ἡ δεξαμενὴ γεμίζει δ' α' κρουνὸς εἰς χ + γεμίζει δ' β' κρουνὸς = (Μία δεξαμενὴ). εἰς χ ὥρας

$$\frac{x}{4} + \frac{x}{12} = 1$$

"Η λύσις τῆς ἑξίσωσεως εἶναι 3.

"Επομένως εἰς 3 ὥρας θὰ γεμίσουν τὴν δεξαμενὴν καὶ οἱ δύο κρουνοί.

**6ον.** Πατήρ εἶναι 42 ἑτῶν καὶ διοίς του 10 ἑτῶν. Μετὰ πόσα ἔτη ἡ ἡλικία τοῦ πατρὸς θὰ εἶναι 3πλασία τῆς ἡλικίας τοῦ υἱοῦ;

"Εστω μετὰ χ ἔτη. ('Εάν ἡ τιμὴ τοῦ χ εύρεθῇ ἀρνητική, τὸ ζητούμενον συνέβη κατὰ τὸ παρελθόν).

Τότε ἡ ἡλικία τοῦ πατρὸς θὰ εἶναι  $42+\chi$  καὶ τοῦ υἱοῦ  $10+\chi$ . 'Επειδὴ ἡ ἡλικία τοῦ πατρὸς εἶναι 3πλασία τῆς ἡλικίας τοῦ υἱοῦ ἔχομεν τὴν' ἑξίσωσιν:

$$42+\chi=3(10+\chi) \Leftrightarrow 42+\chi=30+3\chi \Leftrightarrow 2\chi=12 \Leftrightarrow \chi=6. "Αρα μετὰ 6 ἔτη θὰ συμβῇ τὸ ζητούμενον.$$

**7ον.** Τὸ ἀθροισμα τῶν ψηφίων διψηφίου ἀριθμοῦ εἶναι 10. 'Εάν ἐναλλάξωμεν τὴν θέσιν τῶν ψηφίων του, προκύπτει ἀριθμὸς κατὰ 18 μεγαλύτερος. Ποῖος εἶναι δ' ἀριθμός;

"Εάν χ τὸ ψηφίον τῶν δεκάδων, τότε τὸ ψηφίον τῶν μονάδων θὰ εἶναι  $10-\chi$  καὶ δ' ἀριθμὸς  $10\chi+(10-\chi)$ : (Π.χ.  $53 = 10.5 + 3$ )

$$\begin{array}{ccc} \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ \text{δεκάδες} & \text{μονάδες} & \text{δεκάδες} \text{ μονάδες} \end{array}$$

Περιορισμός : Οι χ,  $10 - \chi$  πρέπει νά είναι μή δρυτητικοί δάκέραιοι και μηκότεροι τού 10. 'Εάν εναλλάξωμεν τά ψηφία, δ' άριθμός θά είναι :

$$\begin{array}{c} \text{χωρίς 10 για τον χωρίς 10 την αριθμητική σύγχρονη γραφή την } \\ \text{τριπλασία του χωρίς 10 την υπόλοιπη } 10 \cdot (10 - \chi) + \chi \\ \text{δηλαδή } 100 - 10\chi + \chi = 100 - 9\chi \\ \text{δηλαδή } 100 - 9\chi = 100 - 9\chi \end{array}$$

δεκάδες μονάδες

'Επειδή δ' β' άριθμός είναι κατά 18 μεγαλύτερος, θά έχωμεν τήν έξισωσιν :

$$10\chi + 10 - \chi + 18 = 10(10 - \chi) + \chi$$

'Η λύσις τής έξισώσεως αυτής είναι 4.

'Επομένως έχομεν 4 δεκάδας και  $10 - 4 = 6$  μονάδας. 'Ο άριθμός είναι δ' 46.

**Θεών.** 'Η τιμή τού κιλοῦ τού κρέατος είναι κατά 9 δρχ. μεγαλυτέρα τού τριπλασίου τής τιμῆς τού κιλοῦ τῶν ζυμαρικῶν. 'Εάν 15 κιλά κρέατος και 50 κιλά ζυμαρικῶν ξέζουν 1370 δρχ., ποία ή τιμή τού κιλοῦ τού κρέατος και τῶν ζυμαρικῶν; (Αἱ λύσεις πρέπει νά είναι θετικοί άριθμοι).

"Εστω χ δρχ. ή τιμή τού κιλοῦ τῶν ζυμαρικῶν. 'Η τιμή τού κιλοῦ τού κρέατος θά είναι  $3\chi + 9$  και θά έχωμεν τήν έξισωσιν :

$$\begin{aligned} (3\chi + 9) \cdot 15 + 50\chi &= 1370 \iff 45\chi + 135 + 50\chi = 1370 \iff 95\chi = 1370 - 135 \\ 95\chi &= 1235 \iff \chi = 13. \quad \text{"Ωστε ή τιμή τού κιλοῦ τῶν ζυμαρικῶν είναι 13 δρχ. και ή τιμή τού κιλοῦ τού κρέατος είναι 48 δρχ."} \end{aligned}$$

### Προβλήματα

166. 'Εμετρήσαμεν 360 άτομα δύνδρας, γυναικας και παιδας. Οι δύνδρες ήσαν 2πλάσιοι τῶν γυναικῶν και οι παιδες τὰ  $\frac{3}{5}$  τῶν γυναικῶν κατά τὸ πλῆθος. Πόσοι ήσαν οι παιδες;

167. 'Ο Πέτρος έχει 3πλασίας δραχμάς ἀπό δσας έχει δ Παῦλος. Πόσας δρχ. έχει έκαστος, έάν δ Πέτρος έχει 12 δρχ. περισσοτέρας τού Παύλου ;

168. Δύο ποδηλάται μέτρας ταχύτητας  $19 \text{ km/h}$  και  $17 \text{ km/h}$  έκκινούν συγχρόνως ἐκ δύο πόλεων, αι δποιοι δέπεχουν  $108 \text{ km}$  και κατευθύνονται πρός συνάντησίν των. Μετά πόσας ὥρας θά συναντηθούν και εἰς ποίαν ἀπόστασιν ἐκ τῶν πόλεων ;

169. 'Εάν εἰς άριθμὸν προσθέσωμεν τὸ  $\frac{1}{3}$  αὐτοῦ, εύρισκομεν τὸν άριθμὸν 19 ήλαττωμένον κατά τὸ  $\frac{1}{4}$  τού ζητουμένου άριθμού. Ποίος δ' άριθμός ;

170. Νά εύρεθούν δύο θετικοί δάκέραιοι άριθμοί, οι δπόιοι νά έχουν διαφορὰν 401, τὸ πηλίκον τού μεγαλυτέρου διά τού μικρότερου νά είναι 6 και τὸ ύπόλοιπον 6.

171. Κρουνός γεμίζει κενήν δεξιαμενήν εἰς 3 ὥρας, δλλος εἰς 6 ὥρας και τρίτος τήν διδειάζει εἰς 4 ὥρας. Εἰς πόσας ὥρας θά γεμίσῃ ή δεξιαμενή έάν ρέουν και οι τρεῖς συγχρόνως;

172. Πατήρ είναι 59 έτῶν καὶ ὁ γιος του 29 έτῶν. Μετὰ πόσα ἔτη ἡ ἡλικία τοῦ πατρὸς θὰ είναι τὰ  $\frac{5}{3}$  τῆς ἡλικίας τοῦ γιοῦ;

173. Ἡ διαφορὰ τοῦ ψηφίου τῶν δεκάδων ἀπὸ τοῦ ψηφίου τῶν μονάδων διψηφίου ἀριθμοῦ είναι 3. Ἐάν προσθέσωμεν εἰς τὸν ἀριθμὸν τὸν δι' ἐναλλαγῆς τῶν ψηφίων του προκύπτοντα νέον ἀριθμόν, εὐρίσκομεν ἀθροισμα 121. Ποία τὰ ψηφία τοῦ ἀριθμοῦ;

174. Ἀπὸ ποιὸν ἀριθμὸν πρέπει νὰ ἀφαιρέσωμεν τὸ 13πλάσιον τοῦ  $\frac{1}{21}$  αὐτοῦ, διὰ νὰ εὑρωμεν ἀριθμὸν κατὰ 4 μικρότερον τοῦ 2πλασίου τοῦ  $\frac{1}{7}$  αὐτοῦ;

175. Ἐκάστη τῶν ἰσων πλευρῶν ἴσοσκελοῦς τριγώνου είναι τὰ  $\frac{5}{3}$  τῆς τρίτης πλευρᾶς αὐτοῦ. Νὰ εύρεθοῦν αἱ πλευραὶ, ἐάν ἡ περίμετρος τοῦ τριγώνου είναι 31,2 cm.

176. Ἡ γωνία Β τριγώνου ΑΒΓ είναι τὰ  $\frac{3}{5}$  τῆς γωνίας Α καὶ ἡ γωνία Γ είναι τὸ  $\frac{1}{3}$  τῆς γωνίας Β. Νὰ εύρεθοῦν αἱ γωνίαι τοῦ τριγώνου ΑΒΓ.

177. Ὑπάρχλησ ἐδαπάνησε τὰ  $\frac{2}{5}$  τοῦ μισθοῦ του διὰ τὴν ἀγορὰν ὑφάσματος καὶ τὸ  $\frac{1}{3}$  αὐτοῦ διὰ ραπτικά. Ἐάν τοῦ ἐπερίσσευσαν 800 δρχ., ποιὸς είναι ὁ μισθός του;

178. Ποίου ἀριθμοῦ τὸ 10πλάσιον είναι μεγαλύτερον κατὰ 16 τοῦ 2πλασίου τοῦ  $\frac{1}{5}$  αὐτοῦ;

179. Νὰ διατυπωθοῦν εἰς προβλήματα αἱ κάτωθι ἑξισώσεις:

$$\alpha) \frac{x}{2} - \frac{x}{4} = 9, \quad \beta) \frac{x}{2} = 35 - \frac{x}{3}, \quad \gamma) x - \frac{3x}{4} = \frac{4x}{5} + \frac{11}{2}$$

### 3. ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΜΕ ΕΝΑ ΑΓΝΩΣΤΟΝ

§ 80. Ἡ σχέσις  $x+1 > 5$  διὰ  $x=7$  ἀληθεύει:  $7+1 > 5$ , ἀλλὰ διὰ  $x=2$  δὲν ἀληθεύει. ( $2+1$  δὲν είναι μεγαλύτερον τοῦ 5). Ἡ  $x+1 > 5$  λέγεται ἀνισώσις πρώτου βαθμοῦ ὡς πρὸς  $x$ .

Ἀνισώσις ὡς πρὸς  $x$  είναι μία ἀνισότητης περιέχουσα τὸν ἄγνωστον  $x$ .

Παραδείγματα ἀνισώσεων 1ου βαθμοῦ:

$$x-1 > 3, \quad 2x+6 > 0, \quad 4x+10 < 0, \quad 3x-1 < 8$$

Γενικῶς τὴν ἀνισώσιν 1ου βαθμοῦ ὡς πρὸς  $x$  παριστῶμεν διὰ τῆς σχέσεως:  $αx+β > 0$  ( $α, β \in \mathbb{Q}$ ).

Λύσις ἀνισώσεως λέγεται κάθε τιμὴ τοῦ ἄγνώστου, ἡ δποία τὴν ἐπαληθεύει.

Π.χ. Τὸ 7 είναι λύσις τῆς  $x+1 > 5$ .

Ἐπίλυσις ἀνισώσεως είναι ἡ εὑρεσις τῶν λύσεων αὐτῆς.

Ίσοδύναμοι λέγονται δύο ἀνισώσεις, δταν ἔχουν τὰς αὐτὰς λύσεις ἡ τὸ αὐτὸ δύναμον λύσεων.

**Ίδιότητες άνισώσεων.**

Αἱ ἀνισώσεις ἔχουν τὰς ίδιότητας, τὰς δποίας ἐμάθομεν εἰς τὰς ἔξισώσεις (§76). Βάσει τῶν ίδιοτήτων αύτῶν, λαμβάνομεν ὅμοστροφον Ισοδύναμον ἀνίσωσιν, μὲ τὴν παρατήρησιν δτι :

Ἐάν πολ/μεν καὶ τὰ δύο μέλη ἀνισώσεως ἐπὶ θετικὸν ἀριθμόν, προκύπτει ὅμοστροφος Ισοδύναμος ἀνίσωσις ἐνώ, ἐάν πολ/μεν ἐπὶ ἀρνητικόν, προκύπτει ἑτερόστροφος Ισοδύναμος ἀνίσωσις.

Ἐπομένως, ἐάν ἀλλάξωμεν τὸ πρόσημον τῶν ὅρων καὶ τῶν δύο μελῶν ἀνισώσεως πρέπει νὰ ἀλλάξωμεν καὶ τὴν φορὰν αὐτῆς.

Διὰ τὴν ἐπίλυσιν ἀνισώσεως ἀκολουθοῦμεν πτοείαν ἔργασίας παρομοίαν ἑκείνης, τὴν δποίαν ἐμάθομεν εἰς τὰς ἔξισώσεις.


**Παραδείγματα.**

$$\text{1ον. Νὰ ἐπιλυθῇ ἡ ἀνίσωσις } 3x - 2 > 4.$$

$$3x - 2 > 4 \Leftrightarrow 3x > 4 + 2 \Leftrightarrow 3x > 6 \Leftrightarrow \frac{3x}{3} > \frac{6}{3} \Leftrightarrow x > 2.$$

Ἐπομένως δλοι οἱ ρητοὶ οἱ μεγαλύτεροι τοῦ 2 εἰναι λύσεις τῆς ἀνισώσεως  $3x - 2 > 4$ .


Ἐάν χρησιμοποιήσωμεν τὸν ἀξονα τῶν ρητῶν ἀριθμῶν, παρατηροῦμεν



ὅτι εἰς τὸ σύνολον τῶν λύσεων ἀνήκουν οἱ ρητοί, οἱ δποίοι εἰναι δεξιά τοῦ 2.

$$\text{2ον. Νὰ ἐπιλυθῇ ἡ ἀνίσωσις } 2x + 5 > 7x - 15$$

$$2x + 5 > 7x - 15 \Leftrightarrow 2x - 7x > -5 - 15 \Leftrightarrow -5x > -20 \Leftrightarrow 5x < 20 \Leftrightarrow \frac{5x}{5} < \frac{20}{5} \Leftrightarrow x < 4$$



Ἄρα οἱ μικρότεροι τοῦ 4 ρητοὶ εἰναι αἱ λύσεις τῆς ἀρχικῆς ἀνισώσεως  $2x + 5 > 7x - 15$ . Εἰς τὸν ἀξονα τῶν ρητῶν αἱ λύσεις εἰναι ἀριστερά τοῦ 4.


$$\text{3ον. Νὰ ἐπιλυθῇ ἡ ἀνίσωσις: } \frac{2x+1}{3} < \frac{x}{2}$$

$$\frac{2x+1}{3} < \frac{x}{2} \Leftrightarrow \frac{6 \cdot (2x+1)}{3} < 6 \cdot \frac{x}{2} \Leftrightarrow 2(2x+1) < 3x \Leftrightarrow 4x+2 < 3x \Leftrightarrow 4x - 3x < -2 \Leftrightarrow x < -2$$

Οἱ ρητοί, οἱ δποίοι εἰναι ἀριστερά τοῦ  $-2$  εἰς τὸν ἀξονα τῶν ρητῶν, ἀνήκουν εἰς τὸ σύνολον τῶν λύσεων τῆς  $x < -2$  καὶ συνεπῶς τῆς Ισοδύναμου πρὸς αύτην  $\frac{2x+1}{3} < \frac{x}{2}$

4ον. Νὰ προσδιορισθοῦν αἱ κοιναὶ λύσεις τῶν ἀνισώσεων:


$$2x+4 > 0 \text{ καὶ } 3x-4 < 11.$$



σχ. 49.

$$\text{"Εχομεν: } 2x+4 > 0 \iff 2x > -4 \iff x > -2$$

$$3x-4 < 11 \iff 3x < 4+11 \iff 3x < 15 \iff x < 5$$



σχ. 50.

Αἱ κοιναὶ λύσεις τῶν ἀνωτέρω ἀνισώσεων εἶναι οἱ ρητοὶ οἱ μεγαλύτεροι τοῦ -2 καὶ μικρότεροι τοῦ 5. Τὸ σύνολον αὐτῶν τῶν ρητῶν περιγράφεται ὑπὸ τῆς:  $-2 < x < 5$ .

Σημείωσις.

$$\text{'Εὰν } A = \{x / 2x+4 > 0\} \text{ καὶ } B = \{x / 3x-4 < 11\}$$

$$\text{"Εχομεν: } A = \{x / x > -2\} \text{ καὶ } B = \{x / x < 5\}$$

$$A \cap B = \{x / x > -2\} \cap \{x / x < 5\} = \{x / -2 < x < 5\}$$

5ον. 'Εὰν  $x \in \mathbb{Z}$  καὶ  $-3 < x < 5$  (διὰ  $x$  περιέχεται μεταξὺ -3 καὶ 5), νὰ εύρεθῇ δι' ἀναγραφῆς τὸ σύνολον  $A = \{x / 2x-1 < 2+x\}$ .

$$\text{"Εχομεν: } 2x-1 < 2+x \iff 2x-x < 2+1 \iff x < 3. \text{ "Αρα δὲ } x \text{ εἶναι: } -2, 0, 1, 2 \text{ καὶ } A = \{-2, 0, 1, 2\}$$

6ον. Νὰ ἀπλουστευθῇ ἡ περιγραφὴ τοῦ συνόλου:

$$A = \{x / 4x-5 < 3+3x \wedge 5x-5 > 4x-2\}$$

$$\text{Εἶναι: } 4x-5 < 3+3x \iff 4x-3x < 3+5 \iff x < 8$$

$$5x-5 > 4x-2 \iff 5x-4x > 5-2 \iff x > 3 \iff 3 < x$$

$$\text{"Αρα } A = \{x / 3 < x < 8\}$$

### 'Α σκήσεις

180. Νὰ ἐπιλυθοῦν αἱ ἀνισώσεις:

$$\alpha) 2x+8 < 0, \quad \delta) 3x < x+1, \quad \sigma) -2x+1 < x, \quad \zeta) x+1 > \frac{x}{2}$$

$$\beta) -3x > \frac{6}{5}, \quad \varepsilon) \frac{3x}{-2} + 5 > x, \quad \eta) 7x-3 < 3(x-2)+2(3-x),$$

$$\gamma) \frac{3x+1}{2} - \frac{x-1}{3} > 0, \quad \theta) \frac{2x+1}{3} + \frac{1-x}{2} > 3, \quad \iota) \frac{3x+1}{4} - \frac{4-x}{3} > 1$$

181. Νὰ ἐπιλυθοῦν αἱ ἀνισώσεις :

$$\alpha) 2-x > 2, \quad \varepsilon) -x + \frac{1}{2} < -\frac{3}{2}, \quad \theta) x - \frac{5}{4} < 2x - \frac{1}{4}$$

$$\beta) 5(x-3) > 3(x-1), \quad \sigma) 18-5(x+1) < 3(x-1)-2$$

$$\gamma) 2(4-x)-3(x-7) < 16x+1, \quad \zeta) -13(x-2) > 1-6(x-3)$$

$$\delta) 6-\frac{x-1}{2} > \frac{x-2}{3}-\frac{x-3}{4}, \quad \eta) \frac{2x-1}{3}-\frac{5x-4}{6} < \frac{3x-2}{4}+\frac{7x+6}{12}$$

$$182. \text{'Εὰν } A = \left\{ x / \frac{x}{3} + 2 > x - \frac{2x-4}{3} \right\} \text{ καὶ } B = \left\{ x / \frac{2}{3}x - \frac{1}{3} > \frac{3}{4}x + \frac{3}{4} \right\},$$

νὰ παρασταθῇ γραφικῶς τὸ σύνολον  $A \cap B$  ἐπὶ τῆς εὐθείας τῶν ρητῶν.

$$183. \text{'Εάν } A = \left\{ x / x - 5 > 5x - 1 \right\} \text{ καὶ } B = \left\{ x / \frac{3}{2}x + 1 > x - 2 \right\}, \text{ νὰ εύρε-$$

$$\theta) \text{ δι' ἀναγραφῆς τὸ σύνολον } A \cap B = \left\{ x / x \in \mathbb{Z} \right\}$$

184. Νὰ παρασταθοῦν γραφικῶς τὰ σύνολα (ἐπὶ τῆς εὐθείας τῶν ρητῶν).

$$\alpha) A = \left\{ x / 8-x < x+2 \wedge 8-x > x-1 \right\}$$

$$\beta) B = \left\{ x / 4x-5 < 3+3x \wedge 5x-5 > 4x-2 \right\}$$

$$\gamma) \Gamma = \left\{ x / \frac{1}{2}x+5 > -3x-2 \wedge \frac{1}{2}x-1 < x-2 \right\}$$

$$\delta) \Delta = \left\{ x / -\frac{2}{3}x-4 > 0 \wedge -\frac{1}{2}x+2 > 0 \right\}$$

185. Νὰ ἐπιλυθοῦν αἱ ἀνισώσεις :

$$\alpha) x-2 > x, \quad \gamma) x+3 < x, \quad \varepsilon) \frac{1}{2}-x < \frac{1}{4}-x$$

$$\beta) x+1 > x, \quad \delta) x-1 < x, \quad \sigma) x+6 > x+4$$

## B'. ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ — ΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΙΣ ΤΗΣ $\alpha x + \beta \geq 0$

### 1. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΚΑΙ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΣ

α) 'Η ἔννοια τῆς μεταβλητῆς.

§ 81. Πολας τιμὰς δύναται νὰ λάβῃ ἡ ἡλικία ἐνὸς παιδίου ;

'Η ἡλικία ἐνὸς παιδίου δύναται νὰ λάβῃ τὰς τιμὰς :  $\frac{1}{2}$  ἔτη, 1 ἔτος, 1,5 ἔτη, ὡς καὶ δῆλας τὰς μεταξὺ αὐτῶν τιμάς. Γενικῶς δὲ δῆλας τὰς μεταξὺ 0 καὶ καὶ 12 ἔτη τιμάς.

'Εὰν συμβολίσωμεν μὲν  $x$  ἔτη τὴν ἡλικίαν τοῦ παιδίου ἔχομεν τὸν πίνακα :

$x$	$\dots$	$\frac{1}{2}$	1	1,5	$\dots$
-----	---------	---------------	---	-----	---------

Αἱ τιμαὶ τοῦ χ εἰναι στοιχεῖα τοῦ συνόλου :

$$A = \{0, \dots, \frac{1}{2}, \dots, 1, \dots, 12\} \text{ ή } A = \{\chi / 0 \leq \chi \leq 12\}$$

Τὸ γράμμα χ λέγεται μεταβλητή.

"Ωστε μεταβλητὴ εἰναι κάθε γράμμα, τὸ δποῖον λαμβάνει τιμὰς ἀπὸ Ἑνα σύνολον ἀριθμῶν.


Σημείωσις. "Η παιδικὴ ἡλικία θεωρεῖται ὅτι διαρκεῖ μέχρι τοῦ 12ου ἔτους.

### β) Ἡ ἔννοια τῆς συναρτήσεως.

§ 82. "Οταν ἐγεννήθη ἐν παιδίόν εἶχεν ὑψος 50 cm, ὅταν ἔγινε 6 μηνῶν εἶχεν ὑψος 64 cm, εἰς ἡλικίαν ἐνὸς ἔτους εἶχεν ὑψος 71 cm κ.ο.κ., ὡς ἐμφαίνεται εἰς τὸν κατωτέρῳ πίνακα, εἰς τὸν δόποιον παριστῶμεν διὰ τοῦ χ ἔτη τὴν ἡλικίαν καὶ διὰ τοῦ ψ cm τὸ ὑψος τοῦ παιδίου. (Εἰς τὰς τιμὰς τῆς ἡλικίας τὰς μεταξὺ τῶν 0,  $\frac{1}{2}$ , 1,  $\frac{3}{2}$  ἀντιστοιχοῦν τιμαὶ τοῦ ὑψους μεταξὺ τῶν 50, 64, 71, 74 ἀντιστοιχωσ).

"Ἡλικία: χ ἔτη	0	...	$\frac{1}{2}$	...	1	...	$\frac{3}{2}$	...
"Ὑψος : ψ cm	50	...	64	...	71	...	74	...

Παρατηροῦμεν ὅτι εἰς κάθε τιμὴν τῆς ἡλικίας τοῦ παιδίου ἀντιστοιχεῖ μία μόνον τιμὴ τοῦ ὑψους. Δηλαδὴ εἰς κάθε στοιχείον τοῦ συνόλου  $A = \{0, \dots, \frac{1}{2}, \dots, 1, \dots, \frac{3}{2}, \dots\}$  ἀντιστοιχεῖ ἐν μόνον στοιχείον τοῦ συνόλου  $B = \{50, \dots, 64, \dots, 71, \dots, 74, \dots\}$ . Ἐπομένως μεταξὺ τῶν συνόλων τιμῶν ἡλικίας  $A$  καὶ τιμῶν ὑψους  $B$  ὑπάρχει μονοσήμαντος ἀντιστοιχία, τῆς δόποιας τὸ διάγραμμα βλέπετε σχ. (51).



σχ. 51.

Τό σύνολον Α, ἐκ τοῦ ὅποιου ἡ μεταβλητὴ χ λαμβάνει τιμάς, λέγεται πεδίον δρισμοῦ καὶ τὸ σύνολον Β πεδίον τιμῶν.

Ἐὰν εἰς κάθε στοιχεῖον ἐνδέ συνόλου ἀντιστοιχεῖ ἐν καὶ μόνιν ἐν στοιχεῖον ἐνδέ ἄλλου συνόλου, τότε ἔχομεν μεταξὺ τῶν συνόλων αὐτῶν μίαν μονοσήμαντον ἀντιστοιχίαν. Ἡ ἀντιστοιχία αὐτὴ δρίζει μίαν συνάρτησιν.

γ) Ἡ συνάρτησις ὡς σύνολον διατεταγμένων ζευγῶν.


§ 83. Ἐὰν σχηματίσωμεν τὰ διατεταγμένα ζεύγη:

$(0,50)$ ,  $(\frac{1}{2}, 60)$ ,  $(1, 71)$ ,  $(\frac{3}{2}, 74)$ , ..., τὰ ὅποια ἔχουν ὡς πρῶτον μέλος μίαν τιμὴν τοῦ χ καὶ ὡς δεύτερον μέλος τὴν ἀντίστοιχον τιμὴν τοῦ ψ λαμβάνομεν ἐν σύνολον διατεταγμένων ζευγῶν τό:

$$F = \left\{ (0,50), \left(\frac{1}{2}, 60\right), (1, 71), \left(\frac{3}{2}, 74\right), \dots \right\}$$

Τὸ σύνολον αὐτὸν παριστᾶ τὴν προηγουμένην συνάρτησιν.

Ἐπειδὴ ἡ ἀντιστοιχία μεταξὺ τῶν συνόλων Α καὶ Β εἶναι μονοσήμαντος, δὲν ὑπάρχουν εἰς τὸ σύνολον F ζεύγη μὲ τὸ αὐτὸν πρῶτον μέλος.



σχ. 52.

δ) Γραφικὴ παράστασις τῆς συναρτήσεως F.

§ 84. Λαμβάνομεν δύο ἄξονας τεμνομένους καθέτως.

Θεωροῦμεν τὸ σημεῖον τοῦτο αὐτῶν ὡς ἀρχὴν καὶ τοποθετοῦμεν ἐπ' αὐτῶν τοὺς ρητούς, ὡς ἐμάθομεν.

Τὸν χ'οχ δινομάζομεν ἄξονα τῶν χ (ἡ ἄξονα τῶν τετμημένων), καὶ τὸν ψ'οψ ἄξονα τῶν ψ ἡ ἄξονα τῶν τεταγμένων.

Τὸ ζεῦγος τῶν ἀξόνων αὐτῶν λέγομεν δρθιγώνιον σύστημα συντεταγμένων. Τεταγμένη σημείου τοῦ ἄξονος τῶν ψ εἶναι δ ἀριθμός, δ ὅποιος ἀντιστοιχεῖ εἰς αὐτό. Διὰ τὴν τετμημένην σημείου τοῦ ἄξονος τῶν χ ἐμάθομεν εἰς τὴν § 66.

Εις τὸ σημεῖον, τὸ ὅποιον ἔχει τετμημένη  $\frac{1}{2}$ , ὑψοῦμεν κάθετον ἐπὶ τὸν ἄξονα τῶν χ καὶ εἰς τὸ σημεῖον, τὸ ὅποιον ἔχει τεταγμένη 64, φέρομεν κάθετον ἐπὶ τὸν ἄξονα τῶν ψ. Αἱ κάθετοι αὐταὶ τέμνουνται εἰς τὸ σημεῖον N. Λέγομεν ὅτι τὸ N εἶναι ἡ γραφικὴ παράστασις τοῦ ζεύγους  $(\frac{1}{2}, 64)$  ἢ ἡ γραφικὴ εἰκὼν αὐτοῦ. Τοὺς ἀριθμοὺς  $\frac{1}{2}$  καὶ 64 ὀνομάζομεν ἀντιστοίχως τετμημένην καὶ τεταγμένην τοῦ σημείου N ἢ συντεταγμένας αὐτοῦ. Κατασκευάζομεν δημόσιως τὰς γραφικὰς παραστάσεις τῶν ζευγῶν τοῦ συνόλου F, δηλαδὴ τῆς συναρτήσεως.

Ἡ γραφικὴ παράστασις τοῦ ζεύγους (0,50) εἶναι τὸ σημεῖον M τοῦ ἄξονος τῶν ψ διότι ἡ τετμημένη τοῦ σημείου αὐτοῦ εἶναι μηδὲν καὶ ἡ τεταγμένη 50.

Τὸ σύνολον τῶν σημείων M...N...Ξ...Ο... λέγομεν γραφικὴν εἰκόνα τῆς συναρτήσεως F.

**Σημείωσις:** Ἐάν λάβθωμεν τὰς γραφικὰς παραστάσεις πολλῶν ζευγῶν, ἡ γραφικὴ παράστασις τῆς συναρτήσεως θά εἶναι μία γραμμή.

### 'Α σκήσεις

186. Ἐάν μὲν χ παραστήσωμεν τὴν ἡλικίαν ἐνὸς παιδίου εἰς ἔτη καὶ μὲν ψ τὸ βάρος αὐτοῦ εἰς kg\*, ἔχομεν τὸν πίνακα:

χ	...	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{3}{2}$	2	...
ψ	...	7	9,2	10,4	11,5	...

Παραστήσατε τὴν συνάρτησιν μεταξὺ ἡλικίας καὶ βάρους ὡς σύνολον διατεταγμένων ζευγῶν καὶ κατασκευάσατε τὴν γραφικὴν παράστασιν αὐτῆς. (Χρησιμοποιήσατε τετραγωνισμένον ἢ χιλιοστομετρικὸν χάρτην).

187. Τὸ σύνολον  $F = \{(1, 0), (2, 1), (3, 2), (4, 3)\}$  εἶναι συνάρτησις; Ποιὸν τὸ πεδίον δρισμοῦ καὶ τὸ πεδίον τιμῶν αὔτης;

188. Ἐάν  $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ , νὰ δρισθῇ τὸ σύνολον  $F = \{\chi, \psi\} / \chi \in A$  καὶ ψ εἴγαι διπλάσιον τοῦ χ, καὶ νὰ παρασταθῇ γραφικῶς.

189. Ἐάν  $A = \{4, 5, 6\}$ , νὰ δρισθῇ τὸ σύνολον:

$S = \{(\chi, \psi) / \chi \in A \text{ καὶ } \psi \text{ διαιρέτης τοῦ } \chi\}$  καὶ νὰ παρασταθῇ γραφικῶς. Εἶναι συνάρτησις τὸ σύνολον  $S$ ;

190. Ἐάν μὲν χ παραστήσωμεν τὴν ὥραν καὶ μὲν ψ τὴν θερμοκρασίαν, τὴν ὅποιαν δεικνύει κατὰ τὴν ὥραν αὐτὴν τὸ θερμόμετρον τῆς οἰκίας σας, κατασκευάσατε πίνακα τῶν ἀντιστοιχῶν τιμῶν καὶ τὴν γραφικὴν παράστασιν τῆς συναρτήσεως αὐτῆς.

191. Μετρήσατε τὴν σκιάν, τὴν ὅποιαν ρίπτει στύλος ἢ δένδρον κατὰ τὰς ἀκεραίας ὥρας, καὶ κατασκευάσατε τὴν γραφικὴν παράστασιν τοῦ μήκους τῆς σκιᾶς συναρτήσει τῆς ὥρας.

2. Η συνάρτησις  $\psi = \alpha x$  και ή γραφική παράστασις αύτῆς.

§ 85. Πρόβλημα. Άεροπλάνον έχει σταθερὰ ταχύτητα 500 km/h. Πόσην απόστασιν θὰ διανύῃ εἰς χ ὥρας κινούμενον ενθυγράμμως;

$$\text{Εἰς } 1 \text{ ὥραν διανύει } 1 \cdot 500 \text{ km} = 500 \text{ km}$$

$$\text{Εἰς } 2 \text{ ὥρας διανύει } 2 \cdot 500 \text{ km} = 1000 \text{ km}$$

$$\text{Εἰς } 3 \text{ ὥρας διανύει } 3 \cdot 500 \text{ km} = 1500 \text{ km}$$

$$\text{Εἰς } x \text{ ὥρας διανύει } x \cdot 500 \text{ km} = \psi \text{ km}$$

Δυνάμεθα νὰ εἴπωμεν ὅτι :

$$\text{Εἰς } 0 \text{ ὥρας διανύει } 0 \cdot 500 \text{ km} = 0 \text{ km}$$

Παρατηροῦμεν ὅτι εἰς κάθε τιμὴν τοῦ χρόνου χ ἀντιστοιχεῖ μία μόνην τιμὴν τῆς ἀποστάσεως. Δηλαδὴ ἡ ἀπόστασις, τὴν ὅποιαν διανύει τὸ ἀεροπλάνον, εἶναι συνάρτησις τοῦ χρόνου χ.

Η συνάρτησις αὐτὴ δρίζεται ὑπὸ τῆς σχέσεως  $\psi = 500x$ .

Η μεταβλητὴ χ λαμβάνει τιμὰς ἐκ τοῦ συνόλου  $Q_0^+$  καὶ αἱ ἀντίστοιχοι τιμαὶ τῆς ψ ὀνήκουν ἐπίσης εἰς τὸ  $Q_0^+$ , ὡς ἔμφαί νεται ἐκ τοῦ κατωτέρω πίνακος. (Δηλαδὴ τὸ πεδίον δρισμοῦ καὶ τὸ πεδίον τιμῶν εἶναι ὑποσύνολα τοῦ  $Q_0^+$ ).

χρόνος εἰς ὥρας $x$	0	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{3}{2}$	2	3	4	...	$x$
Απόστασις εἰς km $\psi$	0	250	500	750	1000	1500	2000	...	$\psi = 500x$

Η συνάρτησις ως σύνολον διατεταγμένων ζευγῶν παρίσταται ως :

$$F = \left\{ (0, 0), \left(\frac{1}{2}, 250\right), (1, 500), \left(\frac{3}{2}, 750\right), (2, 1000), \dots \right\}$$

Η διὰ περιγραφῆς :  $F = \{(x, \psi) / x \in Q_0^+ \text{ καὶ } \psi = 500x\}$


Ἐπειδὴ ή σχέσις  $\psi = 500x$  δρίζει τὴν συνάρτησιν  $F$ , λέγομεν πολλάκις ή συνάρτησις  $\psi = 500x$

Γραφική παράστασις τῆς συναρτήσεως.

Κατασκευάζομεν τὰς γραφικὰς εἰκόνας τῶν διατεταγμένων ζευγῶν τῆς  $F$  καὶ παρατηροῦμεν ὅτι τὰ σημεῖα αὐτὰ κείνται ἐπὶ τῇμειθείας ρητῶν ἀριθμῶν OZ (σχ. 53).


β) Τι παριστά η σχέσης  $\psi = -\frac{1}{2}x$ ; ( $x \in Q$ )

Η σχέσης  $\psi = -\frac{1}{2}x$  είναι συνάρτησης (μὲν πεδίον δρισμοῦ τὸ  $Q$  καὶ πεδίον τιμῶν ἐπίστης τὸ  $Q$ ) διότι, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τοῦ κατωτέρῳ πίνακος, εἰς κάθε τιμὴν τοῦ  $x$  θετικήν, ἀρνητικήν ἢ μηδὲν ἀντιστοιχεῖ μία μόνον ρητὴ τιμὴ τοῦ  $\psi$ . (μονότιμον τοῦ πολ /σμοῦ).



σχ. 53.

$x$	...	-10	-4	-1	0	1	2	3	4	10	...
$\psi = -\frac{1}{2}x$	...	5	2	$-\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	-1	$-\frac{3}{2}$	-2	-5	...



σχ. 54.

Παρατήρησις: Τὸ πηλίκον τῶν ἀντιστοίχων τιμῶν είναι σταθερόν, δηλαδὴ ἵσον μὲ -2, ἐκτὸς τῶν ἀντιστοίχων τιμῶν 0,0.

Κατασκευάζομεν τὴν γραφικὴν παράστασιν τῆς συναρτήσεως  $\psi = -\frac{1}{2}x$  εἰς σύστημα δρθιγωνίων ἀξόνων καὶ παρατηροῦμεν ὅτι αὐτῇ είναι εὐθεῖα ερητῶν πραγματ. ἀριθμῶν διερχομένη διὰ τῆς ἀρχῆς τῶν ἀξόνων (σχῆμα 54).

'Η συνάρτησις ώς σύνολον διατεταγμένων ζευγών είναι :

$$F = \{ \dots (-10,5), (-4, 2), \dots (0, 0), \dots (2,-1), \dots \}$$

$$\text{Διά περιγραφῆς : } F = \{ (x, \psi) / x \in Q \text{ καὶ } \psi = -\frac{1}{2}x \}$$

**Σημείωσις.** "Όταν λέγωμεν εύθειαν ρητῶν ἀριθμῶν, ἐννοοῦμεν τὸ σύνολον τῶν σημείων μιᾶς εὐθείας, ἐπὶ τῶν δόποιων τοποθετοῦνται οἱ ρητοὶ ἀριθμοί.

γ) Γενικῶς ἡ  $\psi = \alpha x$ ,  $(\alpha, x \in Q)$  δρίζει συνάρτησιν, τῆς δόποίας ἡ γραφική παράστασις είναι τὸ σύνολον τῶν ρητῶν σημείων μιᾶς εὐθείας διερχομένης διὰ τῆς ἀρχῆς τῶν ἀξόνων. (Ρητὰ σημεῖα μιᾶς εὐθείας είναι αἱ εἰκόνες τῶν ρητῶν ἀριθμῶν).

**Σημείωσις.** Διὰ νὰ κατασκευάσωμεν τὴν εὐθεῖαν, εἰς τὴν δόποίαν κείνται αἱ εἰκόνες τῶν διατεταγμένων ζευγών τῆς συναρτήσεως  $\psi = \alpha x$ , είναι ἀρκετὸν νὰ εύρωμεν τὰς γραφικάς παραστάσεις δύο μόνον ζευγῶν, διότι δύο σημεῖα δρίζουν μόνον μίαν εὐθείαν.

### \*Ασκήσεις

192. Νὰ σχηματίσητε πίνακας ἀντιστοίχων τιμῶν καὶ νὰ κατασκευάσητε τὴν γραφικήν παράστασιν τῶν κάτωθι συναρτήσεων :

$$\alpha) F_1 = \{ (x, \psi) / x \in Z+ \text{ καὶ } \psi = 2x \}$$

$$\beta) F_2 = \{ (x, \psi) / x \in Q+ \text{ καὶ } \psi = 4x \}$$

$$\gamma) F_3 = \{ (x, \psi) / x \in Q \text{ καὶ } \psi = x \}$$

193. Όμοιως διὰ τὰς συναρτήσεις :

$$\alpha) F_1 = \{ (x, \psi) / x \in Z \text{ καὶ } \psi = -3x \}$$

$$\beta) F_2 = \{ (x, \psi) / x \in Q \text{ καὶ } \psi = -2x \}$$

$$\gamma) F_3 = \{ (x, \psi) / x \in Q \text{ καὶ } \psi = -x \}$$

194. Νὰ κατασκευάσητε τὴν γραφικήν παράστασιν τῶν συναρτήσεων :

$$\alpha) \{(x, \psi) / \psi = 2x \wedge 1 \leq x \leq 5\}$$


$$\beta) \{ (x, \psi) / \psi = \frac{3}{2}x, x \in Z \text{ καὶ } -2 \leq x < 3 \}$$

195. 'Ορίσατε δι' ἀναγραφῆς τὸ σύνολον  $\Sigma = \{ (x, \psi) / |\psi| = 2x, x \in Z \text{ καὶ } 2 \leq x \leq 5 \}$  Είναι αὐτὸν συνάρτησις; Παραστήσατε αὐτὸν γραφικῶς.

### 3. Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΣ $\psi = \alpha x + \beta$ ΚΑΙ Η ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ ΑΥΤΗΣ

§ 86. α) Πρόβλημα. Πλοῖον ἀνεκώρησεν ἐκ λιμένος καὶ εὐθὺς ὡς παρέπλευσεν φάρον, δούλοις ἀπέχει τοῦ λιμένος 40 μίλια, ἀπέκτησε σταθερὰν ταχύτητα 20 μιλίων ἀνὰ ὥραν. Πόσα μίλια θὰ ἀπέχῃ τὸ πλοῖον ἐκ τοῦ λιμένος μετὰ ωρας, ἀφ' ὅτου διῆλθεν ἔμπροσθεν τοῦ φάρου; (Τὸ πλοῖον κινεῖται εὐθυγράμμως κατὰ τὴν διεύθυνσιν καὶ φοράν Λιμῆν-Φάρος).

Τήν 0 ώραν τὸ πλοῖον εὑρίσκεται ἐμπρόσθεν τοῦ φάρου. Έπομένως:



Σχ. 55.

Εἰς 0 ώρας ἔχει διανύσει  $40 + 0 \cdot 20$  μίλια = 40 μίλια

Εἰς 1 ώραν ἔχει διανύσει  $40 + 1 \cdot 20$  μίλια = 60 μίλια

Εἰς 2 ώρας ἔχει διανύσει  $40 + 2 \cdot 20$  μίλια = 80 μίλια

Εἰς 3 ώρας ἔχει διανύσει  $40 + 3 \cdot 20$  μίλια = 100 μίλια

Εἰς  $x$  ώρας ἔχει διανύσει  $40 + x \cdot 20$  μίλια =  $\psi$  μίλια =  $20x + 40$  μίλια

Παρατηροῦμεν ὅτι εἰς ἑκάστην τιμὴν τοῦ  $x$  ἀντιστοιχεῖ μία τιμὴ τοῦ  $\psi$  (μονότιμον πολὺ σμοῦ καὶ προσθέσεως).

Τοῦτο παρατηρήσατε καὶ εἰς τὸν κατωτέρω πίνακα.

Χρόνος $x$ h	0	1	2	3	.	.	.	$x$	.
'Απόστασις $\psi$ mil	40	60	80	100	.	.	.	$\psi = 20x + 40$	.

Συνεπῶς ἡ σχέσις  $\psi = 20x + 40$  δρίζει τὴν συνάρτησιν

$F = \{(0, 40), (1, 60), (2, 80), (3, 100), \dots\}$ . Διὰ περιγραφῆς:


$F = \{(x, \psi) / \psi = 20x + 40 \wedge x \in Q_0^+\}$  μὲν πεδίον δρισμοῦ τὸ  $Q_0^+$  καὶ πεδίον τιμῶν τὸ σύνολον τῶν μεγαλυτέρων ἢ ἵσων τοῦ 40 ρητῶν.

Ἐπειδὴ ἡ σχέσις  $\psi = 20x + 40$  δρίζει τὴν συνάρτησιν  $F$ , λέγομεν:

Ἡ συνάρτησις  $\psi = 20x + 40$ .

Γραφικὴ παράστασις τῆς  $\psi = 20x + 40$ .

Εὑρίσκομεν κατὰ τὰ γνωστὰ τὰς γραφικὰς παραστάσεις τῶν ζευγῶν τῆς συναρτήσεως καὶ παρατηροῦμεν ὅτι γραφικῶς ἡ  $\psi = 20x + 40$  παρίσταται



σχ. 56.

$x$	...	-3	-2	$-\frac{3}{2}$	-1	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	1	2	3	4	...
$\psi = 2x + 1$	...	-5	-3	-2	-1	0	1	2	3	5	7	9	...

Παρατηροῦμεν ότι είς έκάστην τιμήν τοῦ  $x$  άντιστοιχεῖ μία καὶ μόνον μία τιμὴ τοῦ  $\psi$ . "Αρα ἡ  $\psi = 2x + 1$  εἶναι συνάρτησις μὲ πεδίον δρισμοῦ καὶ πεδίον τιμῶν τὸ  $Q$ .

Αύτὴ ὡς σύνολον διατεταγμένων ζευγῶν εἶναι :

$$F = \left\{ (-3, -5), \dots, \left(-\frac{1}{2}, 0\right), \right.$$

$$\left. (0, 1), \left(\frac{1}{2}, 2\right), (1, 3), \dots \right\}$$

Διὰ περιγραφῆς :  $F =$

$$\left\{ (x, \psi) / \psi = 2x + 1 \wedge x \in Q \right\}$$


Γραφική παράστασις τῆς  $\psi = 2x + 1$ .

Κατασκευάζομεν τὰς γραφικάς παραστάσεις (εἰκόνας) τῶν ζευγῶν καὶ

ύπό τῆς ήμιευθείας τῶν ρητῶν ἀριθμῶν AT.

β) Νὰ ἔξετάσητε, ἐὰν ἡ σχέσις  $\psi = 2x + 1$  ( $x \in Q$ ) είναι μία συνάρτησις καὶ νὰ ενδεθῇ ἡ γραφική παράστασις αὐτῆς.

Δίδομεν διαφόρους τιμάς εἰς τὸ  $x$  καὶ εύρισκομεν τὰς άντιστοίχους τιμάς τοῦ  $\psi$ , ώς ἐμφαίνεται εἰς τὸν κατωτέρῳ πίνακα.



σχ. 57.

παρατηροῦμεν ότι αύται κείνται έπι εύθειας ε μὴ διερχομένης διά τῆς ἀρχῆς τῶν ἀξόνων.

γ) Γενικῶς ή  $\psi = \alpha x + \beta$ , δηλαδή  $\alpha, \beta$  σταθεροί ρητοί καὶ  $x$  μεταβλητή λαμβάνουσα τιμὰς ἐκ τοῦ  $Q$ , εἶναι συνάρτησις. Τὸ πεδίον δρισμοῦ καὶ πεδίον τιμῶν εἶναι τὸ  $Q$ .

Γραφικῶς παρίσταται ὑπὸ τῶν ρητῶν σημείων μιᾶς εύθειας, μὴ διερχομένης διά τῆς ἀρχῆς τῶν ἀξόνων.

### 'Α σ κ ή σ εις

196. Νὰ γίνῃ γραφική παράστασις τῆς συναρτήσεως :

$$\psi = -\frac{1}{2}x - 1, \text{ ἐὰν } x \in A = \{-4, -2, 0, 2, 4, 6\}$$

197. Ἐπὶ τετραγωνισμένου χάρτου νὰ σχεδιάσητε δύο δρθιγωνίους ἀξόνας καὶ νὰ εύρητε τὴν γραφικήν παράστασιν τῆς συναρτήσεως  $F = \{(x, \psi) / \psi = -\frac{1}{2}x + 1 \wedge x \in Q\}$ . Ἐπίσης νὰ εύρεθοιν τὰ ζευγή τῆς  $F$ , τὰ δύοια ἔχουν τὰς εικόνας των ἐπὶ τῶν ἀξόνων.

198. Ὁμοίως ὡς ἀνω διὰ τὰς συναρτήσεις :

$$F_1 = \{(x, \psi) / \psi = 0x + 2 \wedge x \in Q\} \text{ καὶ } F_2 = \{(x, \psi) / \psi = 0x + 0 \wedge x \in Q\}$$

199. Νὰ κατασκευάσητε τὴν εὐθείαν, ὑπὸ τῆς δύοις παρίσταται γραφικῶς ή συνάρτησις  $\psi = 2x - 1$  ( $x \in Q$ ) ἐπὶ τετραγωνισμένου χάρτου, καὶ νὰ σημειώσητε τὸ σημεῖον, εἰς τὸ δύοιον  $\psi = 2x - 1$  ( $x \in Q$ ) ἐύθεια τέμνει τὸν ἀξόνα τῶν  $x$ . Ποία ἡ τετμημένη αὐτοῦ τοῦ σημείου; Θέσατε τὴν ἡ ἀνωτέρω εύθεια τέμνει τὸν ἀξόνα τῶν  $x$ . Ποία ἡ τετμημένη αὐτοῦ τοῦ σημείου;

200. Εἰς τὸ αὐτὸν σύστημα δρθιγωνίων ἀξόνων νὰ κατασκευάσητε τὰς γραφικάς παραστάσεις τῶν συναρτήσεων :

$$F_1 = \{(x, \psi) / \psi = x + 1 \wedge x \in Q\}, F_2 = \{(x, \psi) / \psi = 2x - 4 \wedge x \in Q\}$$

$$F_3 = \{(x, \psi) / \psi = -2x + 2 \wedge x \in Q\}, F_4 = \{(x, \psi) / \psi = -2x + 3 \wedge x \in Q\}$$

$$201. \text{ Ὁμοίως διὰ τὰς } F_3 = \{(x, \psi) / \psi = -2x + 2 \wedge x \in Q\}, F_4 = \{(x, \psi) / \psi = \frac{4-4x}{2} \wedge x \in Q\}$$

### 4. ΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΙΣ ΤΗΣ $\alpha x + \beta = 0$ ΚΑΙ ΤΗΣ $\alpha x + \beta > 0$


α) Πρόβλημα. Νὰ ενδεθῇ γραφικῶς ἡ λέσις τῆς ἔξισώσεως  $-\frac{1}{2}x + 1 = 0$

§ 87. Ἐπὶ τετραγωνισμένου χάρτου χαράσσομεν τοὺς δρθιγωνίους ἀξόνας καὶ εύρισκομεν τὴν γραφικήν παράστασιν τῆς συναρτήσεως :  $\psi = -\frac{1}{2}x + 1$

(Δίδομεν δύο τιμὰς εἰς τὸ  $x$  ἵστω τὰς  $x = -2$  καὶ  $x = 4$  καὶ εύρισκομεν τὰς ἀντιστοίχους τιμὰς τοῦ  $\psi$  ἥτοι  $\psi = 2$  καὶ  $\psi = -1$ .

Ἐν συνεχείᾳ εύρισκομεν τὰς εικόνας τῶν ζευγῶν  $(-2, 2), (4, -1)$  ἵστω  $M_1 M_2$ , καὶ  $M_3$  ἀντιστοίχως καὶ χαράσσομεν τὴν εύθειαν  $M_1 M_2$ .

Η εύθεια  $M_1M_2$  παριστά γραφικός τήν συνάρτησιν  $\psi = -\frac{1}{2}x + 1$ . Αύτη τέμνει τούς άξονας  $x$ ,  $y$  και  $\psi$  εις τὰ σημεῖα  $A$  και  $B$  ἀντιστοίχως.



σχ. 58.

$\psi = \alpha x + \beta$  και εύρισκομεν τὸ σημεῖον τομῆς ταύτης και τοῦ ἄξονος τῶν  $x$ . "Η τετμημένη τοῦ σημείου τούτου είναι ἡ λύσις τῆς ἔξισης.  $\alpha x + \beta = 0$ . Σημείωσις.

1. "Η συνάρτησις  $\psi = 0x + \beta$  ( $\beta \neq 0$ ) γραφικῶς παρισταται ύπο εύθειας // πρὸς τὸν ἄξονα τῶν  $x$ . "Αρα γραφικῶς δὲν προσδιορίζεται λύσις τῆς ἔξισης.  $0x + \beta = 0$ . Άλλα οὖν  $0x + \beta = 0$  ( $\beta \neq 0$ ) είναι ἀδύνατος.

Πίναξ τιμῶν τῆς συναρτήσεως  $\psi = 0x + \beta$ :

$x$	0	...	1	...	2	...	3	...
$\psi$	$\beta$	...	$\beta$	..	$\beta$	...	$\beta$	...

y↑


σχ. 59.

Τὸ σημεῖον  $B$  εἶναι ἡ εἰκὼν τοῦ ζεύγους  $(0, 1)$  και τὸ  $A$  εἰκὼν τοῦ ζεύγους  $(2, 0)$ .

Τὸ πρῶτον μέλος τοῦ ζεύγους  $(2, 0)$ , δηλαδὴ ὁ 2, ἐπαληθεύει τὴν ἔξισωσιν :

$$-\frac{1}{2}x + 1 = 0 \quad \text{ἄρα εἶναι λύσις αὐτῆς.}$$

"Ωστε, διὰ νὰ εὕρωμεν γραφικῶς τὴν λύσιν τῆς ἔξισώσεως  $\alpha x + \beta = 0$  ( $\alpha \neq 0$ ), κατασκευάζομεν τὴν γραφικὴν παράστασιν τῆς συναρτήσεως



2. Ή συνάρτησις  $\psi = 0x + 0$  παρίσταται γραφικῶς ὑπὸ τοῦ ἄξονος τῶν  $x$ . "Αρα δὲν προσδιορίζεται γραφικῶς μία λύσις διὰ τὴν ἔξισωσιν  $0x + 0 = 0$ . Αὗτη ἔχει ἀπείρους λύσεις.

Πίνακας τιμῶν τῆς συναρτήσεως  $\psi = 0x + 0$ :

$x$	0	...	1	...	2	...	3	...
$\psi$	0	...	0	...	0	...	0	...


β) Νὰ εὑρεθοῦν γραφικῶς αἱ λύσεις τῆς  $\frac{1}{2}x - 1 > 0$

§ 88. Θεωροῦμεν τὴν συνάρτησιν  $\psi = \frac{1}{2}x - 1$  καὶ ἐργαζόμενοι, ὅπως

προηγουμένως, κατα-  
σκευάζομεν τὴν εὐθεῖαν  
ε (γραφ. παράστασιν  
αὐτῆς), ἡ ὧδοια τέ-  
μνει τὸν ἄξονα τῶν  $x$   
εἰς τὸ σημεῖον A, τὸ δ-  
ποῖον ἔχει τετμημέ-  
νην 2.

Θέτομεν εἰς τὴν  $\frac{1}{2}x - 1 > 0$

ἀντὶ τοῦ  $x$  τὴν τετμη-  
μένην 3 ἐνὸς σημείου B  
εύρισκομένου δεξιὰ τοῦ  
A τοῦ ἄξονος  $x$  καὶ  
παρατηροῦμεν δτὶ δ 3  
ἐπαληθεύει τὴν ἀνί-  
σωσιν.



$$\left( \frac{1}{2} \cdot 3 - 1 > 0 \right)$$

Τὸ αὐτὸ συμβαίνει μὲ τὴν τετμημένην οἰουδῆποτε σημείου εύρισκομένου  
δεξιὰ τοῦ A ἐπὶ τοῦ ἄξονος τῶν  $x$ . "Αρα αἱ λύσεις τῆς ἀνισώσεως  $\frac{1}{2}x - 1 > 0$   
εἶναι οἱ ρητοὶ οἱ μεγαλύτεροι τοῦ 2. ( $x > 2$ ).

Τοῦτο ἐπαληθεύεται καὶ ἀπὸ τὴν ἀριθμ. ἐπίλυσιν τῆς ἀνισώσεως  
 $\frac{1}{2}x - 1 > 0$ .

Σημείωσις. Έάν θέσωμεν τὴν τετμημένην 1 (ἐνὸς σημείων K εύρισκομένου ἀριστερὰ  
τοῦ A ἐπὶ τοῦ ἄξονος τῶν  $x$ , παρατηροῦμεν δτὶ δὲν ἐπαληθεύει τὴν ἀνίσωσιν

$$\frac{1}{2}x - 1 > 0. \quad \left( \frac{1}{2} \cdot 1 - 1 = \frac{1}{2} - \frac{2}{2} = -\frac{1}{2} < 0 \right)$$

"Αρα αἱ τετμημέναι τῶν ἀριστερὰ τοῦ A σημείων τοῦ ἄξονος τῶν  
ἀνισώσεων.

Γενικῶς ἔὰν ἔχωμεν τὴν ὀνίσωσιν  $\alpha x + \beta > 0$  ( $\alpha \neq 0$ ), ἐργαζόμεθα ως ἔξης, διὰ νὰ εὔρωμεν γραφικῶς τὰς λύσεις αὐτῆς :

Ιον Κατασκευάζομεν εύθεϊαν ἀπὸ δύο τυχόντα ζεύγη τῆς συναρτήσεως  $y = \alpha x + \beta$ .

Σον Εύρισκομεν τὸ σημεῖον τομῆς τῆς εὐθείας ταύτης καὶ τοῦ ἄξονος τῶν Χ. Ἐστω Α τὸ σημεῖον αὐτό.

Σον Δοκιμάζομεν, ἔὰν ἡ τετμημένη ἐνὸς τυχόντος σημείου τοῦ ἄξονος τῶν Χ (π.χ. δεξιὰ τοῦ Α) ἐπαληθεύει τὴν ὀνίσωσιν.

Ἐάν τὴν ἐπαληθεύῃ, λύσεις εἶναι αἱ ρηταὶ τετμημέναι τῶν σημείων τῆς ἡμιευθείας ΑΧ. Ἐάν δὲν τὴν ἐπαληθεύῃ λύσεις εἶναι αἱ ρηταὶ τετμημέναι τῶν σημείων τῆς ἀντικειμένης ἡμιευθείας ΑΧ'. (Πλὴν τῆς τετμημένης τοῦ Α)

### Α σκήσεις

203. Νὰ ἐπιλυθοῦν γραφικῶς αἱ κάτωθι ἔξισώσεις :

$$\alpha) 3x - 12 = 0 \quad \beta) -8x - 24 = 0, \quad \gamma) 2x + 3 = 0$$

$$\delta) 5(x - 3) - 3(x - 1) = 0, \quad \epsilon) 18 - 5(x + 1) - 3(x - 1) = 0$$

204. Νὰ ἐπιλυθοῦν γραφικῶς αἱ ἀνισώσεις :

$$\alpha) x + 3 > 0, \quad \beta) 2x - 3 < 0, \quad \gamma) -2x - 6 > 0$$

$$\delta) \frac{1}{2} + 3x - (x + 0,5) > 0, \quad \epsilon) 3.(x - 3) < 0$$

### 5. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΝ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ III

205. Νὰ ἐπιλυθοῦν αἱ ἔξισώσεις :

$$\alpha) 4(x - 3) - 3(3 - x) = 5(x + 2) - 9(8 - x) + 20$$

$$\beta) 20(7x + 4) - 18(3x + 4) - 5 = 25(x + 5)$$

$$\gamma) 6 - [2x - (3x - 4) - 1] = 0$$

206. Νὰ ἐπιλυθοῦν καὶ νὰ ἐπαληθευθοῦν αἱ ἔξισώσεις :

$$\alpha) 5 - 4(x - 3) = x - 2(x - 1), \quad \beta) 6(x - 1) - (3x + 11) + 7 = 0$$

207. Νὰ ἐπιλυθοῦν αἱ ἔξισώσεις :

$$\alpha) \frac{7x - 4}{15} + \frac{x - 1}{3} = \frac{3x - 1}{5} - \frac{7 + x}{10}, \quad \beta) \frac{2x}{15} + \frac{x - 6}{12} = \frac{3}{10} \left( \frac{x}{2} - 5 \right)$$

$$\gamma) \frac{18x + 13}{9} = \frac{6x + 1}{5} + \frac{2}{3} \cdot \left( 6 - \frac{3x}{2} \right), \quad \delta) \frac{2}{5} \left( \frac{3x}{4} - \frac{2}{7} \right) = \frac{5}{7} \left( \frac{12x}{25} - \frac{1}{75} \right)$$

208. Νὰ ἐπιλυθοῦν τὰ κάτωθι προβλήματα τῇ βοηθείᾳ ἔξισώσεων.

α) Νὰ εύρεθοῦν αἱ γωνίαι τοῦ παραλ/μου ΑΒΓΔ, ἔὰν ἡ γωνία Α αὐτοῦ ισοῦται πρὸς τὰ  $\frac{2}{3}$  τῆς γωνίας Β.

β) Νὰ εύρεθοῦν αἱ γωνίαι τριγώνου ΑΒΓ, ἔὰν ἡ γωνία Β ισοῦται πρὸς τὸ  $\frac{1}{2}$  τῆς γωνίας Α καὶ ἡ γωνία Γ ισοῦται πρὸς τὰ  $\frac{3}{8}$  τῆς γωνίας Α αὐτοῦ.

γ) Δύο τεμάχια ύφασματος διαφέρουν κατά 66,5 m. Τὸ μεγαλύτερον εἶναι 5πλάσιον τοῦ μικροτέρου σύν 4,5 m ἐπὶ πλέον. Νὰ εὑρεθοῦν τὰ μῆκη τῶν ύφασμάτων.

δ) Νὰ εὑρεθοῦν τρεῖς διαδοχικοὶ θετικοὶ ἀκέραιοι τοιοῦτοι ὡστε, ἐάν ἀπὸ τὸ ἡμιάρθροι-σμα τῶν δύο μικροτέρων ἀφαιρέσωμεν τὸ τρίτον τοῦ μεγαλυτέρου, θὰ εὑρωμεν τὸν ρητὸν.<sup>127</sup>

ε) Αὐτοκίνητον ἀνεχώρησεν τὴν 7ην πρωΐην ἐκ τῆς πόλεως Α μὲ ταχύτητα 33 km/h. Ποίαν ὥραν πρέπει νὰ ἀναχωρήσῃ ἔτερον αὐτοκίνητον ἐκ τῆς αὐτῆς πόλεως καὶ πρὸς τὴν αὔτην φοράν μὲ ταχύτητα 45 km/h διά νὰ φθάσῃ τὸ πρῶτον μετά 2 ὥρας καὶ 45'.

209. Τῇ βοηθείᾳ ἔξισώσεων νὰ ἐπιλυθοῦν τὰ προβλήματα :

α) Ἐγευμάτισαν 47 ἀνδρες καὶ γυναῖκες. "Ἐκαστος ἀνὴρ ἐπλήρωσεν 50 δρχ. καὶ ἐκάστη ἐκ τῶν γυναικῶν 47 δρχ. "Ἄν οι ἀνδρες ἐπλήρωσαν 1380 δρχ. περισσότερον τῶν γυναικῶν, πόσοι ἦσαν οἱ ἀνδρες;

β) Ἀπὸ τὸ περιεχόμενον βαρελίου ἐπωλήθησαν τὴν α' ἡμέραν τὰ  $\frac{3}{8}$  αὐτοῦ καὶ τὴν β' ἡμέραν 39 κιλά. Ἐάν τὸ πωληθὲν ἀντιπροσωπεύῃ τὰ  $\frac{3}{4}$  τοῦ περιεχομένου, πόσα κιλά ἀπέμειναν εἰς τὸ βαρέλιον ;

γ) Ἐργάτης τελειώνει ἔργον εἰς 3 ἡμέρας καὶ ἄλλος Ἐργάτης τὸ αὐτὸν ἔργον εἰς 6 ἡμέρας. Εἰς πόσας ἡμέρας θὰ τελειώσουν τὸ ἔργον καὶ οἱ δύο Ἐργάται, ἐάν Ἐργάζωνται συγχρόνως;

δ) Πατήρ ἔχει 2πλασίαν ἡλικίαν τοῦ υιοῦ του, ἐνῶ πρὸ 15 ἑτῶν εἶχεν 3πλασίαν. Ποιαὶ αἱ ἡλικίαι των;

ε) Νὰ εὑρεθῇ ἀριθμός, ὃ διποίος διαιρούμενος διὰ 13 νὰ δίδῃ πηλίκον τὸ  $\frac{1}{14}$  αὐτοῦ καὶ ὑπόλοιπον 12.

ζ) Τὸ διθροίσμα τῶν ψηφίων διψηφίου ἀριθμοῦ εἶναι 10. Ἐάν ἐναλλάξωμεν τὴν θέσιν τῶν ψηφίων του, εύρισκομεν ἀριθμὸν κατὰ 36 μικρότερον. Ποιος ὁ ἀριθμός;

210. Νὰ ἐπιλυθοῦν αἱ ἀνισώσεις :

$$\alpha) 2(8x - 5) > 15x - 8, \quad \beta) 2(2x - 3) - 5x + \frac{1}{2} > 0$$

$$\gamma) \frac{x}{4} - x > \frac{1}{6} - \frac{2x}{3}, \quad \delta) \frac{x+1}{2} - \frac{x-1}{3} > 1$$

$$211. \text{Έάν } A = \left\{ x / \frac{3}{4}x + 3 \geq 0 \wedge x \in \mathbb{Z} \right\}, B = \left\{ x / x - 2 < 0 \wedge x \in \mathbb{Z} \right\}$$

νὰ εὑρεθῇ τὸ σύνολον  $A \cap B$  δι' ἀναγραφῆς.

$$212. \text{Νὰ εὑρεθῇ } \eta \text{ τομὴ τῶν συνόλων } A = \left\{ x / x + 1 > \frac{x}{2} - 2 \right\} \text{ καὶ}$$

$$B = \left\{ x / x + 1 < \frac{x}{3} - 3 \right\} \text{ (δι' ἀπλῆς περιγραφῆς).}$$

213. Νὰ κατασκευάσητε τὴν γραφικὴν παράστασιν τῶν συναρτήσεων :

$$\alpha) \psi = 3x \quad \beta) \psi = -2x + 1 \quad \gamma) \psi = 1,5x - \frac{1}{2} \quad (x \in \mathbb{Q}),$$

$$214. \text{Έάν } A = \left\{ (x, \psi) / \psi = 2x \wedge x \in \mathbb{Q} \right\} \text{ καὶ } B = \left\{ (x, \psi) / \psi = x + 2 \wedge x \in \mathbb{Q} \right\}$$

νὰ εὑρεθῇ γραφικῶς τὸ σύνολον  $A \cap B$ .

**A. ΛΟΓΟΙ — ΜΕΓΕΘΗ ΕΥΘΕΩΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ ΑΝΑΛΟΓΑ —  
ΑΝΑΛΟΓΙΑΙ**

**1. ΛΟΓΟΣ ΔΥΟ ΑΡΙΘΜΩΝ — ΛΟΓΟΣ ΔΥΟ ΟΜΟΕΙΔΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ —  
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ**

**§ 89. Λόγος δύο άριθμῶν.**

Δίδονται οι άριθμοι 54 καὶ 9. Ἐπὶ ποῖον ἀριθμὸν πρέπει νὰ πολλαπλασιάσω· μεν τὸν δεύτερον (9) διὰ νὰ εὑρωμεν τὸν πρῶτον (54);

Ἐάν χ ὁ ἀριθμὸς θὰ ἔχωμεν:  $9\chi = 54 \Leftrightarrow \chi = \frac{54}{9} \Leftrightarrow \chi = 6$ . Ὁ ἀριθμὸς 6 λέγεται λόγος τοῦ 54 πρὸς τὸν 9.

Ωστε λόγος τοῦ ἀριθμοῦ α πρὸς τὸν β ( $\beta \neq 0$ ) λέγεται ὁ ἀριθμός, δ ὅποιος πολλαπλασιάζομενος ἐπὶ τὸν β δίδει γινόμενον τὸν α.

Ἐάν λ ὁ λόγος τοῦ α πρὸς τὸν β ἔχομεν:

$$\frac{\alpha}{\beta} = \lambda \Leftrightarrow \beta\lambda = \alpha$$

Συνεπῶς ὁ λόγος δύο ἀριθμῶν εἶναι τὸ πηλίκον τῆς διαιρέσεως αὐτῶν.

Ο λόγος τοῦ α πρὸς τὸν β παρίσταται καὶ: (α, β)

Ο α καὶ δ β λέγονται δροι τοῦ λόγου, δ α λέγεται ἡγούμενος καὶ δ β ἐπόμενος.

**§ 90. Λόγος δύο θμοειδῶν μεγεθῶν.**

Δίδεται τὸ εὐθύγραμμον τμῆμα  $AB$ . Νὰ εὑρεθῇ ἐν ἄλλῳ εὐθύγραμμον τμῆμα  $ΓΔ$  ὥστε  $ΓΔ = AB + AB + \frac{1}{4}AB$ .



Κατὰ τὰ γνωστὰ κατασκευάζομεν

$$\text{τὸ } ΓΔ = AB + AB + \frac{1}{4}AB \text{ ἦ}$$

σχ. 61.

$$ΓΔ = \left(1 + 1 + \frac{1}{4}\right)AB \Leftrightarrow ΓΔ = \frac{9}{4}AB.$$

Ό άριθμός  $\frac{9}{4}$  μὲ τὸν ὅποιον πολλαπλασιάζεται τὸ AB καὶ δίδει τὸ ΓΔ λέγεται λόγος τοῦ ΓΔ πρὸς τὸ AB καὶ συμβολίζεται γραπτῶς  $\frac{\Gamma\Delta}{AB}$  ἢ (ΓΔ, AB).

$$\text{Ωστε} \quad \frac{\Gamma\Delta}{AB} = \frac{9}{4} \iff \Gamma\Delta = \frac{9}{4}AB.$$


Γενικῶς λόγος μεγέθους A πρὸς ἄλλον ὁμοειδὲς μέγεθος B, λέγεται ὁ άριθμὸς λ ἐπὶ τὸν ὅποιον πολλαπλασιαζόμενον τὸ μέγεθος B δίδει τὸ A.

Συμβολικῶς :

$$\frac{A}{B} = \lambda \iff A = \lambda B.$$

§ 91. Εἰς τὸ σχῆμα (62) ὁ λόγος τοῦ ὀρθογωνίου A πρὸς τὸ ὀρθογώνιον B εἶναι ὁ άριθμὸς 4, δηλαδὴ  $\frac{A}{B} = 4$  διότι  $A = 4B$ .

B



A



σχ. 62.

Ἐὰν τὸ τετράγωνον M ληφθῇ ὡς μονάς μετρήσεως τῶν ἐπιφανειῶν, τότε ὁ λόγος  $\frac{B}{M}$  λέγεται τιμὴ τοῦ B καὶ παρίσταται  $\frac{B}{M} = (B)$ . Όμοίως καὶ ὁ λόγος  $\frac{A}{M} = (A)$  λέγεται τιμὴ τοῦ A.

Έχομεν  $\frac{B}{M} = (B) = 6$ , διότι  $B = 6M$  καὶ  $\frac{A}{M} = (A) = 24$ , διότι  $A = 24M$ .

Ἐκ τῶν ἴσοτήτων:  $(A) = 24$   
 $(B) = 6$  διὰ διαιρέσεως κατὰ μέλη λαμβάνομεν :

$$\frac{(A)}{(B)} = \frac{24}{6} = 4. \text{ Άλλὰ καὶ } \frac{A}{B} = 4, \text{ συνεπῶς } \boxed{\frac{A}{B} = \frac{(A)}{(B)}} \quad (1)$$

“Ωστε ὁ λόγος δύο ἐπιφανειῶν ἴσοιςται πρὸς τὸν λόγον τῶν τιμῶν αὐτῶν, ἔὰν μετρηθῶσιν ἢ συγκριθῶσι μὲ τὴν αὐτὴν μονάδα.

‘Η ιδιότης αὐτὴ ἴσχει διὰ οἰαδῆποτε ὁμοειδῆ μεγέθη A καὶ B καὶ ὁ λόγος

$\frac{\alpha}{\beta}$  είναι άνεξάρτητος της μονάδος μετρήσεως αύτῶν. Δηλαδή ή ισότης (1) Ισχύει, καὶ ἔὰν ληφθῇ ἄλλη μονάδας μετρήσεως ἀντὶ τῆς μονάδος Μ.

### § 92. Ἰδιότητες τοῦ λόγου.

1. Νὰ συγκρίνητε τὸν λόγον τῶν ἀριθμῶν  $-5$  καὶ  $-8$  πρὸς τὸν λόγον τῶν  $(-5).(-2)$  καὶ  $(-8).(-2)$ .

$$\text{Έχομεν} \quad \frac{-5}{-8} = \frac{5}{8} \text{ καὶ } \frac{(-5) \cdot (-2)}{(-8) \cdot (-2)} = \frac{10}{16} = \frac{5}{8}$$

$$\text{Άρα} \quad \frac{-5}{-8} = \frac{(-5) \cdot (-2)}{(-8) \cdot (-2)}. \text{ Ισχύει καὶ } \frac{-5}{-8} = \frac{(-5) : (-2)}{(-8) : (-2)}$$

Συνεπῶς ὁ λόγος δύο ἀριθμῶν δὲν μεταβάλλεται, ἔὰν πολλαπλασιάσωμεν (ἢ διαιρέσωμεν) αὐτοὺς ἐπὶ τὸν αὐτὸν ρητὸν ( $\neq 0$ ).

$$\text{Συμβολικῶς: } \frac{\alpha}{\beta} = \frac{\alpha\rho}{\beta\rho} = \frac{\alpha : \kappa}{\beta : \kappa} \quad (\beta, \rho, \kappa \neq 0, \alpha, \beta, \rho, \kappa \in Q).$$

$$2. \text{ Ἐκ τῶν } \text{Ισοτήτων } \frac{-15}{7} + \frac{13}{7} = \frac{-15+13}{7}, \left( -\frac{2}{3} \right) \cdot \left( \frac{-4}{5} \right) = \frac{(-2) \cdot (-4)}{3 \cdot 5}$$

συνάγομεν τοὺς κάτωθι κανόνας :

α) Τὸ ἀθροίσμα δύο λόγων, οἱ δποιοι ἔχουν τὸν αὐτὸν ἐπόμενον, Ισοῦται πρὸς τὸν λόγον τοῦ ἀθροίσματος τῶν ἡγουμένων πρὸς τὸν αὐτὸν ἐπόμενον.

β) Τὸ γινόμενον δύο λόγων Ισοῦται πρὸς τὸν λόγον τῶν γινομένων τῶν ἡγουμένων πρὸς τὸ γινόμενον τῶν ἐπομένων.

$$\text{Συμβολικῶς: } \frac{\alpha}{\beta} + \frac{\gamma}{\delta} = \frac{\alpha+\gamma}{\beta}, \quad \frac{\alpha}{\beta} \cdot \frac{\gamma}{\delta} = \frac{\alpha \cdot \gamma}{\beta \cdot \delta} \quad (\beta, \delta \neq 0).$$

$$3. \text{ Ο λόγος τοῦ } (-3) \text{ πρὸς τὸν } 5 \text{ εἶναι } \frac{-3}{5} = -\frac{3}{5}$$

Ο λόγος τῶν ἀντιστρόφων τῶν ὅρων αὐτοῦ εἶναι :

$$\frac{-\frac{1}{3}}{\frac{1}{5}} = -\frac{\frac{1}{3}}{\frac{1}{5}} = -\frac{5}{3}$$

Ἐπομένως ὁ λόγος τῶν ἀντιστρόφων τῶν ὅρων ἐνδέκα λόγου Ισοῦται πρὸς τὸν ἀντίστροφον τοῦ λόγου.

$$\text{Συμβολικῶς: } \text{Ἐὰν } \lambda_1 = \frac{\alpha}{\beta} \text{ τότε } \lambda_2 = \frac{\frac{1}{\alpha}}{\frac{1}{\beta}} = \frac{\beta}{\alpha} \text{ καὶ } \lambda_1 \lambda_2 = \frac{\alpha}{\beta} \cdot \frac{\beta}{\alpha} = 1$$

Ἐφαρμογαί :

$$\alpha) \frac{-5}{-6} = \frac{(-5) \cdot (-1)}{(-6) \cdot (-1)} = \frac{5}{6} \quad \beta) \frac{-7}{8} = \frac{(-7) \cdot (-1)}{8 \cdot (-1)} = \frac{7}{-8} = -\frac{7}{8}$$

$$\gamma) \frac{6}{17} + \frac{1}{17} + -\frac{5}{17} = \frac{6+1-5}{17} = \frac{2}{17}$$

$$\delta) \frac{-5}{9} \cdot \frac{3}{-4} = \frac{(-5) \cdot 3}{9 \cdot (-4)} = \frac{-15}{-36} = \frac{-5}{-12} = \frac{5}{12}$$

$$\epsilon) \lambda_1 = \frac{-2}{-3} = +\frac{2}{3}, \quad \lambda_2 = \frac{-\frac{1}{2}}{-\frac{1}{3}} = +\frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{3}} = \frac{3}{2} \text{ καὶ } \lambda_1 \lambda_2 = \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{2} = 1.$$

$$\zeta) \text{Έὰν } \frac{x}{\psi} = 2 \text{ νὰ εύρεθῇ δ λόγος } \frac{x+\psi}{2x-\psi}.$$

Διαιροῦμεν καὶ τοὺς δύο δρους τοῦ λόγου  $\frac{x+\psi}{2x-\psi}$  διὰ τοῦ ψ :

$$\frac{x+\psi}{2x-\psi} = \frac{\frac{x}{\psi} + \frac{\psi}{\psi}}{2 \cdot \frac{x}{\psi} - \frac{\psi}{\psi}} = \frac{\frac{x}{\psi} + 1}{2 \cdot \frac{x}{\psi} - 1} = \frac{2+1}{2 \cdot 2-1} = \frac{3}{4-1} = \frac{3}{3} = 1$$

### Α σ κ ḥ σ ε ι ζ

215. Νὰ εύρεθῇ δ λόγος τῆς περιμέτρου ίσοπλ. τριγώνου πρὸς τὴν πλευρὰν αὐτοῦ.

216. Νὰ εύρεθῇ δ λόγος τῆς δρῆς γωνίας πρὸς τὴν γωνίαν ίσοπλεύρου τριγώνου.

217. Ο λόγος τοῦ τ. πήχ. πρὸς τὸ  $m$  εἶναι  $\frac{3}{4}$ , νὰ εύρεθῇ δ λόγος τοῦ τ.τ. πήχ. πρὸς τὸ  $m^2$ .

218. Λάβετε δύο εύθυγρ. τμῆματα μὲ τιμάς ρητούς ἀριθμούς καὶ εύρετε τὸν λόγον αὐτῶν.

219. Δίδεται δ λόγος δύο εύθυγρ. τμημάτων ίσος πρὸς  $\frac{3}{5}$  καὶ τὸ ἐν ἑξ αὐτῶν. Νὰ εύρεθῇ τὸ ἄλλο εύθυγρ. τμῆμα.

220. Έὰν  $\frac{x}{\psi} = -\frac{1}{2}$ , νὰ εύρεθοῦν οἱ λόγοι : α)  $\frac{\psi}{x}$ , β)  $\frac{\psi-x}{x+\psi}$ , γ)  $\frac{x+2\psi}{2x-\psi}$ .

221. Έὰν  $\frac{x}{\psi} = -2$ , νὰ εύρεθοῦν οἱ λόγοι : α)  $\frac{2x+\psi}{x+3\psi}$ , β)  $\frac{2x\psi-\psi^2}{x^2-\psi^2}$ , γ)  $\frac{x^2+\psi^2}{x^2-\psi^2}$

222. Δύνασθε νὰ εύρητε τὸν λόγον δύο τυχόντων εύθυγρ. τμημάτων;

## 2. ΜΕΓΕΘΗ ΕΥΘΕΩΣ ΑΝΑΛΟΓΑ — ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ — ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΣΥ ΑΥΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΣ

§ 93. Έπανερχόμεθα εἰς τὸ πρόβλημα τῆς §85.

Αεροπλάνον κινούμενον εύθυγράμμως μὲ σταθερὰν ταχύτητα  $500 \text{ km/h}$  διέρχεται ώπεράνω τοῦ σχολείου μας  $A$ . Μετά χ ὥρας διέρχεται ώπεράνω σημείου  $B$ . Πολὰ ἡ ἀπόστασις  $AB$ ; (Τὸ ἀεροπλάνον κινεῖται δριζοτίως).

Έὰν  $AB=\psi \text{ km}$ , ἔχομεν τὴν συνάρτησιν  $\psi=500x$ . Σχηματίζομεν τὸν πίνακα ἀντιστοίχων τιμῶν.

Τιμαὶ χρόνου εἰς ὥρας	$x$	0	$\frac{1}{20}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{2}$	1	2	3	...	$x$
Τιμαὶ ἀποστάσεως εἰς km	$\psi = 500x$	0	25	50	250	500	1000	1500	...	$500x$

Παρατηροῦμεν ὅτι, ἐὰν πολλαπλασιάσωμεν τὴν τιμὴν τοῦ χρόνου  $\frac{1}{20}$  ἐπὶ 10, θὰ εὑρωμεν  $\frac{1}{2}$ . Ἐάν πολ/ωμεν καὶ τὴν ἀντίστοιχον τιμὴν 25 τῆς ἀποστάσεως ἐπὶ τὸν 10, θὰ εὑρωμεν 250. Ἀλλὰ ἐκ τοῦ πίνακος διαπιστοῦται ὅτι αἱ τιμαὶ  $\frac{1}{2}$  καὶ 250 εἶναι ἀντίστοιχοι.

Ἐπίστης πολλαπλασιάζοντες τὰς ἀντίστοιχους τιμὰς  $\frac{1}{10}$  καὶ 50 ἐπὶ 30 εὑρίσκομεν τὰς ἀντίστοιχους τιμὰς 3 καὶ 1500.

“Ωστε, ἐὰν πολ/ωμεν ἀντίστοιχους τιμὰς τῶν μεγεθῶν χρόνου καὶ ἀποστάσεως μὲν ἔνα ρητόν, εὑρίσκομεν πάλιν ἀντίστοιχους τιμὰς αὐτῶν. Τὰ μεγέθη χρόνος καὶ ἀπόστασις εἶναι ἀνάλογα.

“Ωστε δύο μεγέθη λέγονται εὐθέως ἀνάλογα, ἐὰν ἔχουν ἀντίστοιχους τιμὰς καὶ τὰ γινόμενα δύο ἀντίστοιχων τιμῶν ἐπὶ τὸν αὐτὸν ρητὸν εἶναι πάλιν ἀντίστοιχοι τιμαί.

Συνεπῶς, ἐὰν αἱ ἀντίστοιχοι τιμαὶ  $\chi$ ,  $\psi$  δύο μεγεθῶν συνδέωνται διὰ τῆς σχέσεως  $\psi = \alpha\chi$  ( $\alpha \neq 0$ ), τὰ μεγέθη αὐτὰ εἶναι εὐθέως ἀνάλογα.

“Ἐάν δύο μεγέθη εἰναι εὐθέως ἀνάλογα, αἱ ἀντίστοιχοι τιμαὶ αὐτῶν συνδέονται διὰ σχέσεως τῆς μορφῆς  $\psi = \alpha\chi$ ;

Δύο μεγέθη Α καὶ Β ἔχουν ἀντίστοιχους τιμὰς τὰς ἀναγραφομένας εἰς τὸν κατωτέρω πίνακα.

Τιμαὶ μεγ. A	1	...	2	...	3	...	4	...	5	...	6	...	7	...	8	...	$x$
Τιμαὶ μεγ. B	2	...	4	...	6	...	8	...	10	...	12	...	14	...	16	...	$\psi$

Τὰ μεγέθη Α καὶ Β εἶναι ἀνάλογα· διότι, ἐὰν πολ/ωμεν δύο ἀντίστοιχους τιμὰς π.χ. τὰς 2 καὶ 4 ἐπὶ τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν 2 ή 3 ή 4 κ.λ.π., εὑρίσκομεν πάλιν ἀντίστοιχους τιμάς.

Παρατηροῦμεν ὅτι:  $\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{3}{6} = \dots = \frac{\chi}{\psi}$ . Ἐκ τούτων ἔχομεν:

$$\frac{1}{2} = \frac{\chi}{\psi} \Leftrightarrow \psi = 2\chi.$$

“Ωστε αἱ ἀντίστοιχοι τιμαὶ  $\chi$  καὶ  $\psi$  τῶν ἀναλόγων μεγεθῶν Α καὶ Β συνδέονται διὰ σχέσεως τῆς μορφῆς  $\psi = \alpha\chi$ .

Δυνάμεθα λοιπόν νὰ εἶπωμεν ὅτι δύο μεγέθη μὲ ἀντιστοίχους τιμὰς χ καὶ ψ εἶναι εὐθέως ἀνάλογα, ἐάν αἱ τιμαὶ αὐτῶν συνδέωνται διὰ σχέσεως τῆς μορφῆς  $\psi = \alpha\chi$  ( $\alpha \neq 0$ ).

### § 94. Ἰδιότητες.

1. Διὰ τὰς τιμὰς τῶν ἀναλόγων μεγεθῶν Α καὶ Β εἴδομεν ὅτι :

$$\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{3}{6} = \dots$$

"Ωστε, ἐάν δύο μεγέθη εἶναι ἀνάλογα, αἱ ἀντιστοιχοὶ τιμαὶ αὐτῶν ἔχουν τὸν αὐτὸν λόγον.

**Σημείωσις.** Εἰς τὴν συνάρτησιν  $\psi = \alpha\chi$  ( $\alpha \neq 0$ ) διὰ  $\chi = 0$  ἔχομεν  $\psi = 0$ . Ἐπειδὴ τὸ  $\frac{0}{0}$  δὲν εἶναι ὡρισμένον, διὰ τοῦτο ἔξαιρεται τοῦ ἀνωτέρω κανόνος ὁ λόγος τῶν ἀντιστοιχῶν τιμῶν 0 καὶ 0.

2. Συγκρίνομεν τὸν λόγον δύο τιμῶν τοῦ μεγέθους Α πρὸς τὸν λόγον τῶν ἀντιστοιχῶν τιμῶν τοῦ μεγέθους Β.

Λόγος τῶν τιμῶν 2 καὶ 6 τοῦ μεγέθους Α :  $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$

Λόγος τῶν ἀντιστοιχῶν τιμῶν 4 καὶ 12 τοῦ μεγέθους Β :  $\frac{4}{12} = \frac{1}{3}$

Συνεπῶς, ἐάν δύο μεγέθη εἶναι εὐθέως ἀνάλογα, ὁ λόγος δύο τιμῶν τοῦ ἐνὸς ισοῦται πρὸς τὸν λόγον τῶν ἀντιστοιχῶν τιμῶν τοῦ ἄλλου.

Παραδείγματα εὐθέως ἀναλόγων μεγεθῶν :

α) Ὁ ἀριθμὸς ἔργατῶν τῆς αὐτῆς ἀποδόσεως καὶ τὸ ἔργον, τὸ δόποιον ἐκτελοῦν εἰς τὸν αὐτὸν χρόνον.

β) Τὸ βάρος ἐνὸς ἐμπορεύματος καὶ ἡ τιμὴ αὐτοῦ.

γ) Ἡ πλευρὰ ισοπλεύρου τριγώνου καὶ ἡ περίμετρος αὐτοῦ.


δ) Ὁ χρόνος καὶ τὸ διάστημα εἰς τὴν ισοταχῆ κίνησιν.

ε) Ἡ ἀκτὶς τοῦ κύκλου καὶ τὸ μῆκος τοῦ κύκλου.

### § 95. Γραφικὴ παράστασις

Ἡ γραφικὴ παράστασις τῆς σχέσεως, ἡ δοποία συνδέει τὰς τιμὰς εὐθέως ἀναλόγων μεγεθῶν, εἶναι ἡ γραφικὴ παράστασις τῆς συναρτήσεως  $\psi = \alpha\chi$ , τὴν δοτοῖσαν ἐμελετήσαμεν εἰς τὴν §85α καὶ συντόμως ἐπαναλαμβάνομεν κατωτέρω διὰ τὴν σχέσιν  $\psi = 2\chi$ , ἡ δοποία συνδέει τὰς ἀντιστοίχους τιμὰς τῶν εὐθέως ἀναλόγων μεγεθῶν Α καὶ Β.

Αἱ τετμημέναι τῶν σημείων τοῦ ἡμιάξονος οχ παριστοῦν τιμὰς τοῦ με-



σχ. 63.

γέθους Α και αἱ τεταγμέναι τῶν σημείων τοῦ οψικού παραστάσεις τῶν τιμάς τοῦ μεγέθους Β.

Τὰ σημεῖα  $M_1$ ,  $M_2$ ,  $M_3$ ... εἰναι αἱ γραφικαὶ παραστάσεις (ἢ εἰκόνες) τῶν ζευγῶν  $(1, 2)$ ,  $(2, 4)$ ,  $(3, 6)$ ... καὶ κεῖνται ἐπὶ ήμιευθείας  $OZ$ .

### Παρατήρησις

Δυνάμεθα νὰ εὔρωμεν διὰ τῆς ήμιευθείας  $OZ$  τιμὰς τοῦ μεγέθους  $B$  ἀντιστοίχους τοῦ  $A$ .

Π.χ. Διὰ νὰ εύ-

ρωμεν ποιὰ τιμὴ τοῦ μεγέθους  $B$  ἀντιστοιχεῖ εἰς τὴν τιμὴν  $\frac{5}{2}$  τοῦ μεγέθους  $A$ , ἐργαζόμεθα ὡς ἔξῆς :

Εἰς τὸ σημεῖον, τὸ ὅποιον ἔχει τετμημένην  $\frac{5}{2}$  ὑψοῦμεν κάθετον ἐπὶ τὸν οχ, ἢ ὅποια τέμνει εἰς τὸ σημεῖον  $M$  τὴν  $OZ$ . Ἀπὸ τὸ σημεῖον  $M$  φέρομεν // πρὸς τὸν οχ (ἢ  $\perp$  ἐπὶ τὸν οψικό). Αὕτη τέμνει τὸν οψικό εἰς ἓν σημεῖον, τοῦ ὅποιου ἡ τεταγμένη 5 εἶναι ἡ ἀντιστοιχος τιμὴ τοῦ  $\frac{5}{2}$ .

### \*Ασκήσεις

223. Ἐξετάσατε, ἐὰν τὰ κάτωθι μεγέθη εἶναι ἀνάλογα :

- α) Ὁ χρόνος καὶ τὸ ἔργον, τὸ ὅποιον ἐκτελεῖ μία δμάς ἐργατῶν.
- β) Ἡ ήλικία ἐνὸς ὀτόμου καὶ τὸ βάρος αὐτοῦ.
- γ) Ὁ ἀριθμὸς τῶν ἐργατῶν καὶ ὁ χρόνος ἐκτελέσεως ἐνὸς ἔργου.

224. Νὰ εύρητε παραδείγματα εὐθέως ἀναλόγων μεγεθῶν .

225. Νὰ συμπληρωθῇ διὰ τοῦτο πίναξ, νὰ εύρεθῃ ἡ σχέσις ἡ ὅποια συνδέει τὰς ἀντιστοίχους τιμὰς καὶ νὰ γίνῃ γραφικὴ παράστασις αὗτῆς.

Τιμαὶ μήκους ὑφάσματος εἰς m	;	;	2	4,5	3		
Τιμαὶ πωλήσεως ὑφάσματος εἰς δρχ.	10	150	400	;	;		

226. Διὰ τὰ μεγέθη «πλευρά τετραγώνου» καὶ «περίμετρος αὐτοῦ» νὰ εύρεθῇ ἡ σχέσις, ἡ δόποια συνδέει τάς ἀντιστοίχους τιμὰς αὐτῶν, καὶ νὰ γίνη γραφική παράστασις αὐτῆς.

227. Τὸ αὐτὸ διὰ τὰ μεγέθη βάρος ἐμπορεύματος καὶ τιμὴ ἐμπορεύματος, ἐὰν ἡ τιμὴ τῆς μονάδος βάρους εἴναι 40 δρχ.

228. Ἐξετάσατε, ἐὰν μεγέθη μὲ τιμὰς συνδεομένας διὰ σχέσεως τῆς μορφῆς  $\psi = \alpha x + \beta$  εἴναι ἀνάλογα.

### 3. ΜΕΓΕΘΗ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ ΑΝΑΔΟΓΑ—ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ—ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΥΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΣ

§ 96. Πρόβλημα. Μὲ πολαν ταχύτητα πρέπει τὰ κινηθῆ αὐτοκίνητον διὰ νὰ διανύῃ ἀπόστασιν 100 χιλιομέτρων εἰς χρόνον 1 ὥρας, 2 ὥρας, 2,5 ὥρας, 4 ὥρας κ.ο.κ.;

Ἐὰν μὲ χ παραστήσωμεν τὴν τιμὴν τοῦ χρόνου εἰς ὥρας καὶ μὲ ψ τὴν τιμὴν τῆς ταχύτητος εἰς χιλιόμετρα ἀνὰ ὥραν θὰ ἔχωμεν τὴν σχέσιν :

$$\text{Ταχύτης ἐπὶ χρόνον} = \text{διάστημα}$$

$$\psi \quad x = 100 \Leftrightarrow \psi = \frac{100}{x}$$

Ἐὰν εἰς τὴν σχέσιν  $\psi = \frac{100}{x}$  θέσωμεν ἀντὶ τοῦ χ τὰς τιμὰς

1, 2, 2,5, . . . εύρισκομεν τὰς ἀντιστοίχους τιμὰς τοῦ ψ

100, 50, 40, . . .

καὶ σχηματίζομεν τὸν κάτωθι πίνακα :

Τιμαι χρόνου εις ὥρας	$x$	...	1	2	2,5	4	5	...	$x$
Τιμαι ταχύτητος εις km/h	$\psi$	...	100	50	40	25	20	...	$\frac{100}{x}$

Ἐκ τοῦ πίνακος τούτου παρατηροῦμεν τὰ ἔξης :

1. Εἰς κάθε τιμὴν τοῦ χρόνου ἀντιστοιχεῖ μία μόνον τιμὴ τῆς ταχύτητος (μονότιμον τῆς διαιρέσεως), ἄρα ἡ  $\psi = \frac{100}{x}$  εἴναι συνάρτησις.

2. Ἐὰν πολ/ῷμεν τὴν τιμὴν 2,5 τοῦ χρόνου ἐπὶ 2, εύρισκομεν 5. Ἐὰν διαιρέσωμεν τὴν τιμὴν 40 τῆς ταχύτητος (ἀντιστοίχον τιμὴν τοῦ 2,5) διὰ 2, εύρισκομεν 20 δηλαδὴ τὴν ἀντιστοίχον τιμὴν τοῦ 5.

Τὰ μεγέθη χρόνος καὶ ταχύτης, τὰ δόποια ἔχουν τὰς ιδιότητας αὐτάς, λέγονται ἀντιστρόφως ἀνάλογα μεγέθη.

Δύο μεγέθη λέγονται ἀντιστρόφως ἀνάλογα, δταν ἔχουν ἀντιστοίχους τιμὰς εἰς τρόπον ὥστε, πολλαπλασιαζομένης μιᾶς τιμῆς τοῦ ἐνὸς ἐπὶ ἔνα ρητὸν ( $\neq 0$ ) καὶ διαιρουμένης τῆς ἀντιστοίχου τιμῆς τοῦ ἀλλοῦ διὰ τοῦ αὐτοῦ ρητοῦ, νὰ εύρισκωνται νέαι τιμαι ἀντιστοιχοι.

§ 97. 'Ιδιότητες.

α) Παρατηρούμεν ότι:  $1.100 = 2.50 = 2,5.40 = \dots$

"Αρα τὸ γινόμενον δύο ἀντιστοίχων τιμῶν τῶν ἀντιστρόφως ἀνάλογων μεγεθῶν εἶναι τὸ αὐτό, (σταθερόν).

β) Αἱ προηγούμεναι ίσοτήτες γράφονται:

$$\frac{1}{\frac{1}{100}} = \frac{2}{\frac{1}{50}} = \frac{2,5}{\frac{1}{40}} = \dots$$

'Επομένως εἰς τὰ ἀντιστρόφως ἀνάλογα μεγέθη αἱ τιμαὶ τοῦ ἐνδέ εἶναι ἀνάλογοι πρὸς τὰς ἀντιστρόφους τῶν ἀντιστοίχων τιμῶν τοῦ ἄλλου.

γ) Παρατηροῦμεν ἐπίσης ότι ὁ λόγος τῶν τιμῶν 1 καὶ 4 τοῦ χρόνου εἶναι  $\frac{1}{4}$ , ὁ δὲ λόγος τῶν ἀντιστοίχων τιμῶν 100 καὶ 25 τῆς ταχύτητος εἶναι  $\frac{100}{25} = 4$ , δηλαδὴ ὁ ἀντίστροφος τοῦ  $\frac{1}{4}$ .

Συνεπῶς εἰς τὰ ἀντιστρόφως ἀνάλογα μεγέθη ὁ λόγος δύο τιμῶν τοῦ ἐνδέ ίσοιςται πρὸς τὸν ἀντίστροφον τοῦ λόγου τῶν ἀντιστοίχων τιμῶν τοῦ ἄλλου.

§ 98. Γραφικὴ παράστασις


$$\text{τῆς σχέσεως } \Psi = \frac{100}{x}$$

Αἱ τετμημέναι τῶν σημείων τοῦ οχ παριστοῦν τιμὰς χρόνου εἰς ὥρας καὶ αἱ τεταγμέναι τῶν σημείων τοῦ οψ τιμὰς ταχύτητος εἰς χιλιόμετρα ἀνά ὥραν.

Εύρισκομεν, κατὰ τὰ γνωστά, τὰς γραφικὰς παραστάσεις (εἰκόνας) τῶν ζευγῶν  $(5, 20)$ ,  $(4, 25)$ ,  $(2,5, 40)$ ... καὶ παρατηροῦμεν ότι τὰ σημεῖα  $M_1$ ,  $M_2$ ,  $M_3$ , ... δὲν κεῖνται ἐπὶ εὐθείας ἀλλὰ ἐπὶ μιᾶς καμπύλης καλουμένης ὑπερβολῆς.

Ἐπειδὴ τὸ πεδίον δρισμοῦ

τῆς συναρτήσεως  $\Psi = \frac{100}{x}$  εἶναι τὸ  $Q^+$ , ἡ ὑπερβολὴ ἀποτελεῖται ἀπὸ ἕνα κλάδον, κείμενον ἐντὸς τῆς  $\not\propto$  χοψ.



σχ. 64.

### 'Εφαρμογή

§ 99. Δίβεται ή συνάρτησις  $\psi = \frac{1}{x}$ .

α) Νά καταρτισθῇ πίναξ ἀντιστοίχων τιμῶν.


β) Νά ἔξετασθῇ, ἐὰν αἱ ἀντιστοίχοι τιμαὶ, εἰναι τιμαὶ ἀντιστρόφως ἀναλόγων μεγεθῶν.

γ) Νά γίνῃ γραφικὴ παράστασις τῆς  $\psi = \frac{1}{x}$ .

α)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th><math>x</math></th><th>...</th><th>-3</th><th>-2</th><th>-1</th><th><math>-\frac{1}{2}</math></th><th>1</th><th><math>\frac{1}{2}</math></th><th><math>\frac{1}{3}</math></th><th>2</th><th>3</th><th>...</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <th><math>\psi</math></th><th>...</th><td><math>-\frac{1}{3}</math></td><td><math>-\frac{1}{2}</math></td><td>-1</td><td>-2</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td><math>\frac{1}{2}</math></td><td><math>\frac{1}{3}</math></td><td>...</td></tr> </tbody> </table>	$x$	...	-3	-2	-1	$-\frac{1}{2}$	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	2	3	...	$\psi$	...	$-\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{2}$	-1	-2	1	2	3	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	...
$x$	...	-3	-2	-1	$-\frac{1}{2}$	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	2	3	...														
$\psi$	...	$-\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{2}$	-1	-2	1	2	3	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	...														

β) Πολλαπλασιάζομεν τὴν τιμὴν  $\frac{1}{2}$  τοῦ  $x$  ἐπὶ 6 καὶ εύρισκομεν τὴν τιμὴν 3. Διατρέψομεν τὴν τιμὴν 2 τοῦ  $\psi$  (ἀντιστοίχον τοῦ  $\frac{1}{2}$ ) διὰ 6 καὶ εύρισκομεν τὴν τιμὴν  $\frac{1}{3}$ . Αἱ τιμαὶ δημως 3 καὶ  $\frac{1}{3}$  εἰναι ἀντιστοίχοι ὡς προκύπτει ἐκ τοῦ πίνακος.

"Ἄρα αἱ ἀντιστοίχοι τιμαὶ εἰναι τιμαὶ ἀντιστρόφως ἀναλόγων μεγεθῶν.



σχ. 65.

γ) Παρατηροῦμεν δτι ή γραφική παράστασις τής συναρτήσεως  $\psi = \frac{1}{x}$  άποτελείται άπό δύο καμπύλας συμμετρικάς ως πρός τήν άρχην τῶν άξόνων, αι δποιαί είναι οι δύο κιλάδοι μιᾶς ύπερβολής.

Γενικῶς ή συνάρτησις  $\psi = \frac{\alpha}{x}$  ( $\alpha, x, \psi \in \mathbb{Q}$  και  $\alpha, x, \psi \neq 0$ ) δρίζει ζεύγη τιμῶν άντιστρόφων άναλόγων μεγεθῶν.

Τό γινόμενον τῶν άντιστοίχων τιμῶν είναι σταθερόν ( $\chi\psi = \alpha$ ). 'Ο λόγος δύο τιμῶν τοῦ χ ίσούται πρός τὸν άντιστροφὸν λόγον τῶν άντιστοίχων τιμῶν τοῦ  $\psi$ .

Γραφικῶς ή  $\psi = \frac{\alpha}{x}$  παρίσταται ύποδ μιᾶς καμπύλης (μέ ένα ή δύο κιλάδους, άναλόγως τοῦ πεδίου δρισμοῦ), καλουμένης ύπερβολῆς (δρθογώνιος ύπερβολῆς).

### Α σ κ ή σ ε ι ζ

229. 'Εξετάσατε, ἐὰν τὰ κάτωθι μεγέθη είναι άντιστρόφως άνάλογα.

α) 'Αριθμὸς ἑργατῶν καὶ χρόνος δι' ἐν ὀρισμένον ἔργον.

β) 'Η πλευρὰ τριγώνου καὶ τὸ άντιστοιχὸν αὐτῆς ὑψος, δταν παραμένη σταθερὸν τὸ ἐμβαδόν του.

230. Νὰ εύρητε παραδείγματα άντιστρόφως άναλόγων μεγεθῶν.

231. Συμπληρώσατε τὸν κάτωθι πίνακα καὶ γράψατε τὴν σχέσιν, ή δποιαί συνδέει δύο

τυχούσας άντιστοίχους τιμᾶς, ἐὰν παραμένη σταθερὰ ή ἐπιφάνεια τοῦ ύφασματος.

Τιμαὶ μήκους ύφασματος εἰς m	;	2	;	5	;	8	x
Τιμαὶ πλάτους ύφασματος εἰς m	80	;	40	;	20	15	ψ

232. Νὰ γίνῃ καὶ γραφική παράστασις τῆς προηγουμένης σχέσεως.

233. Νὰ γίνῃ γραφική παράστασις τῶν κάτωθι συναρτήσεων :

$$\alpha) \psi = -\frac{1}{x} \quad \beta) \psi = -\frac{12}{x} \quad (\chi, \psi \in \mathbb{Q}, \chi, \psi \neq 0).$$

#### 4. ΑΝΑΛΟΓΙΑΙ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΩΝ

§ 100. Άιδεται δ κάτωθι πλάκη, δ δποιος παριστᾶ τὰς άντιστοίχους τιμὰς δύο ενθέως άναλόγων μεγεθῶν. Ποια σχέσις ὑπάρχει μεταξὺ τῶν λόγων τῶν άντιστοίχων τιμῶν;

...	9	...	18	...	$\alpha$	...	$\gamma$
...	7	...	14	...	$\beta$	...	$\delta$

$$(\beta, \delta \neq 0)$$

Γνωρίζομεν διτι  $\frac{9}{7} = \frac{18}{14} = \frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta}$

·Η ίσοτης  $\frac{\gamma}{7} = \frac{18}{14}$  ή γενικώς ή  $\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta}$  δυναμάζεται άναλογία.

·Ωστε άναλογία είναι ή ισότης δύο λόγων.

·Η άναλογία  $\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta}$  συμβολικώς γράφεται:  $(\alpha, \beta, \gamma, \delta)$  ή  $[(\alpha, \beta), (\gamma, \delta)]$ .

Οι  $\alpha, \gamma$  λέγονται ήγούμενοι δροι και οι  $\beta, \delta$  έπόμενοι δροι της άναλογίας.

Οι  $\beta, \gamma$  λέγονται μέσοι δροι και οι  $\alpha, \delta$  άκροι δροι της άναλογίας.

### Σημείωσις

Εις τήν άναλογίαν  $\frac{\chi}{\psi} = \frac{\Psi}{z}$  δι ψ λέγεται μέσος άνάλογος τῶν  $\chi$  καὶ  $z$ .

Εις τήν περίπτωσιν αὐτήν ή άναλογία λέγεται συνεχής. Εις τήν συνεχή άναλογίαν  $\frac{8}{4} = \frac{4}{2}$  δι 4 είναι δι μέσος άνάλογος τῶν 8 καὶ 2.

·Ο μέσος άνάλογος δύο άριθμῶν λέγεται καὶ γεωμετρικός μέσος αὐτῶν.

### § 101. Ιδιότητες τῶν άναλογιῶν.

1. Εις τήν άναλογίαν  $\frac{4}{2} = \frac{6}{3}$  παρατηροῦμεν διτι  $4 \cdot 3 = 2 \cdot 6$ . Όμοιως εἰς τήν  $\frac{9}{6} = \frac{6}{4}$  είναι δι μέσος άνάλογος τῶν 9.6 = 6.6 ή  $9 \cdot 4 = 6^2$ .

·Άρα εις μίαν άναλογίαν τὸ γινόμενον τῶν άκρων δρων ισοῦται πρὸς τὸ γινόμενον τῶν μέσων δρων.

Γενικῶς:  $\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta} \Rightarrow \frac{\alpha}{\beta} \cdot \beta \delta = \frac{\gamma}{\delta} \cdot \beta \delta \Rightarrow \alpha \delta = \gamma \beta$

·Έὰν  $\alpha \delta = \gamma \beta$  καὶ  $\beta \delta \neq 0$  θὰ έχωμεν:

$\alpha \delta = \gamma \beta \Rightarrow \frac{\alpha \delta}{\beta \delta} = \frac{\gamma \beta}{\beta \delta} \Rightarrow \frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta}$

·Ωστε έχομεν τήν ισοδυναμίαν  $\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta} \Leftrightarrow \alpha \delta = \beta \gamma$  ( $\beta, \delta \neq 0$ ).

### Έφαρμογαί

α) Νὰ εύρεθῇ δι δρος  $\chi$  της άναλογίας  $\frac{\chi}{7} = \frac{4}{2}$

·Έχομεν:  $\frac{\chi}{7} = \frac{4}{2} \Rightarrow 2\chi = 4 \cdot 7 \Rightarrow 2\chi = 28 \Rightarrow \chi = \frac{28}{2} = 14$

β) Νὰ εύρεθῇ δι μέσος δρος της συνεχοῦς άναλογίας  $\frac{32}{X} = \frac{X}{2}$ . Είναι:

$\frac{32}{X} = \frac{X}{2} \Rightarrow 32 \cdot 2 = X \cdot X \Rightarrow 64 = X \cdot X \Rightarrow 8^2 = X^2 \Rightarrow X = 8$

2. "Εστω ή άναλογία  $\frac{10}{5} = \frac{8}{4}$ . Οι άντιστροφοί λόγοι είναι ίσοι και έχουμεν τήν νέαν άναλογίαν  $\frac{5}{10} = \frac{4}{8}$ . Έπισης παραστηρούμεν δτι, έτσι έναλλάξωμεν τούς μέσους δρους, προκύπτει νέα άναλογία:  $\frac{10}{8} = \frac{5}{4}$ . Όμοιώς έτσι έναλλάξωμεν τούς άκρους δρους:  $\frac{4}{5} = \frac{8}{10}$ .

Γενικώς, έτσι έχωμεν τήν άναλογίαν  $\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta}$  ( $\alpha, \beta, \gamma, \delta \neq 0$ ), εύρισκομεν τάς νέας άναλογίας: 1)  $\frac{\beta}{\alpha} = \frac{\delta}{\gamma}$ , 2)  $\frac{\alpha}{\gamma} = \frac{\beta}{\delta}$ , 3)  $\frac{\delta}{\beta} = \frac{\gamma}{\alpha}$ . Πράγματι:

$$1) \quad \frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta} \Rightarrow \alpha\delta = \beta\gamma \Rightarrow \frac{\alpha\delta}{\alpha\gamma} = \frac{\beta\gamma}{\alpha\gamma} \Rightarrow \frac{\delta}{\gamma} = \frac{\beta}{\alpha}$$

$$2) \quad \frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta} \Rightarrow \alpha\delta = \beta\gamma \Rightarrow \frac{\alpha\delta}{\gamma\delta} = \frac{\beta\gamma}{\gamma\delta} \Rightarrow \frac{\alpha}{\gamma} = \frac{\beta}{\delta}$$

$$3) \quad \frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta} \Rightarrow \alpha\delta = \beta\gamma \Rightarrow \frac{\alpha\delta}{\alpha\beta} = \frac{\beta\gamma}{\alpha\beta} \Rightarrow \frac{\delta}{\beta} = \frac{\gamma}{\alpha}$$

Έτσι έχωμεν άναλογίαν μὲ μὴ μηδενικούς δρους και α) άντιστρέψωμεν τούς λόγους β) έναλλάξωμεν τούς μέσους δρους γ) έναλλάξωμεν τούς άκρους δρους αύτης, λαμβάνομεν νέας άναλογίας.

### Έφαρμογή

Έκ τής άναλογίας  $\frac{-12}{-6} = \frac{-10}{-5}$  νά σχηματίσητε νέας άναλογίας.

1ον Άντιστρέφομεν τούς λόγους:  $\frac{-6}{-12} = \frac{-5}{-10}$

2ον. Έναλλάσσομεν τούς μέσους δρους:  $\frac{-12}{-10} = \frac{-6}{-5}$

3ον Έναλλάσσομεν τούς άκρους δρους:  $\frac{-5}{-6} = \frac{-10}{-12}$

3. Εις τούς λόγους τής άναλογίας  $\frac{3}{5} = \frac{6}{10}$  προσθέσατε τήν μονάδα και έξετάσατε, έτσι προκύπτη νέα άναλογία.

$$\begin{aligned} \text{Έχομεν: } \frac{3}{5} &= \frac{6}{10} \iff \frac{3}{5} + 1 = \frac{6}{10} + 1 \iff \frac{3}{5} + \frac{5}{5} = \frac{6}{10} + \frac{10}{10} \\ &\iff \frac{3+5}{5} = \frac{6+10}{10}. \quad \left( \frac{8}{5} = \frac{16}{10} \right) \end{aligned}$$

Έτσι εις τούς ήγουμένους δρους μιᾶς άναλογίας προσθέσωμεν τούς έπομένους, λαμβάνομεν άναλογίαν.

$$\text{Γενικῶς: } \frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta} \iff \frac{\alpha+\beta}{\beta} = \frac{\gamma+\delta}{\delta}$$

Έάν διφαιρέσωμεν από τούς λόγους της άναλογίας  $\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta}$  τήν μονάδα, λαμβάνομεν :

$$\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta} \iff \frac{\alpha}{\beta} - 1 = \frac{\gamma}{\delta} - 1 \iff \frac{\alpha}{\beta} - \frac{\beta}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta} - \frac{\delta}{\delta} \iff \frac{\alpha - \beta}{\beta} = \frac{\gamma - \delta}{\delta}$$

Νά διατυπωθῆ τανών διά τήν ίσοδυναμίαν :

$$\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta} \iff \frac{\alpha - \beta}{\beta} = \frac{\gamma - \delta}{\delta}$$

### Έφαρμογα

α) Νά εύρεθῇ δ  $\chi$  ἐκ της άναλογίας  $\frac{28 - \chi}{\chi} = \frac{2}{5}$ . "Εχομεν :

$$\frac{28 - \chi}{\chi} = \frac{2}{5} \iff \frac{28 - \chi + \chi}{\chi} = \frac{2+5}{5} \iff \frac{28}{\chi} = \frac{7}{5} \iff 7\chi = 5 \cdot 28 \iff \\ \iff \chi = \frac{5 \cdot 28}{7} \iff \chi = 5.4 \iff \chi = 20$$

β) Νά εύρεθοιν δύο άριθμοι, οι δύοιοι έχουν άθροισμα 50 και λόγον  $\frac{12}{13}$ .

"Εστω  $\chi$  και  $\psi$  οι άριθμοι. "Εχομεν  $\chi + \psi = 50$  και  $\frac{\chi}{\psi} = \frac{12}{13}$ .

$$\text{Έκ της } \frac{\chi}{\psi} = \frac{12}{13} \iff \frac{\chi + \psi}{\psi} = \frac{12+13}{13} \iff \frac{50}{\psi} = \frac{25}{13} \iff 25\psi = 13 \cdot 50 \iff \\ \psi = \frac{13 \cdot 50}{25} \iff \psi = 13.2 \iff \psi = 26. \text{ Επομένως } \chi = 50 - 26 = 24.$$

4. Νά συγκριθῇ δ λόγος  $\frac{2+8}{3+12}$  πρός τους λόγους της άναλογίας

$$\frac{2}{3} = \frac{8}{12}.$$

Tl παρατηρεῖτε ;

$$\text{Παρατηροῦμεν δτι } \frac{2+8}{3+12} = \frac{10}{15} = \frac{2}{3}.$$

$$\text{"Άρα } \frac{2}{3} = \frac{8}{12} = \frac{2+8}{3+12}. \text{ Γενικώς : } \frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta} = \frac{\alpha+\gamma}{\beta+\delta} \text{ } (\beta, \delta > 0)$$

$$\text{Πράγματι : έάν } \frac{\alpha}{\beta} = \lambda, \text{ τότε καὶ } \frac{\gamma}{\delta} = \lambda. \text{ συνεπῶς έχομεν}$$

$$\alpha = \beta\lambda \quad \gamma = \delta\lambda \Rightarrow \alpha + \gamma = \beta\lambda + \delta\lambda \Rightarrow \alpha + \gamma = (\beta + \delta)\lambda \Rightarrow \frac{\alpha + \gamma}{\beta + \delta} = \lambda = \frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta}$$

Έάν έχωμεν ίσους λόγους μὲ δμοσήμους παρονομαστάς, δ λόγος δ δυοίοις έχει άριθμητήν τὸ άθροισμα τῶν άριθμητῶν καὶ παρονομαστήν τὸ άθροισμα τῶν παρονομαστῶν ισοῦται πρὸς τοὺς διθέντας.

Δηλαδή γενικώτερον

$$\frac{\alpha_1}{\beta_1} = \frac{\alpha_2}{\beta_2} = \frac{\alpha_3}{\beta_3} = \dots = \frac{\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \dots}{\beta_1 + \beta_2 + \beta_3 + \dots}$$

**Σημείωσις.** Έάν δι παρονομασται δὲν είναι διμόσημοι, οὕτοι δύνανται νὰ γίνουν διμόσημοι. Π.χ.  $\frac{-2}{4} = \frac{5}{-10} = \dots$

$$\text{Έχομεν } \frac{-2}{4} = \frac{5(-1)}{-10.(-1)} = \dots \iff \frac{-2}{4} = \frac{-5}{10} = \dots$$

### Έφαρμογή

$$\text{Έάν } \frac{\alpha}{-5} = \frac{\beta}{-7} = \frac{\gamma}{-12} \text{ καὶ } \alpha + \beta + \gamma = 48, \text{ νὰ εύρεθοῦν οἱ } \alpha, \beta, \gamma.$$

$$\text{Έχομεν } \frac{\alpha}{-5} = \frac{\beta}{-7} = \frac{\gamma}{-12} = \frac{\alpha + \beta + \gamma}{-5 - 7 - 12} = \frac{48}{-24} = -2$$

$$\text{Άρα } \frac{\alpha}{-5} = -2 \Rightarrow \alpha = (-5).(-2) \Rightarrow \alpha = 10$$

$$\frac{\beta}{-7} = -2 \Rightarrow \beta = (-7).(-2) \Rightarrow \beta = 14$$

$$\frac{\gamma}{-12} = -2 \Rightarrow \gamma = (-12).(-2) \Rightarrow \gamma = 24$$

### Ασκήσεις

234. Νὰ εύρεθοῦν οἱ διγνωστοι δροι τῶν κάτωθι ἀναλογιῶν.

$$\text{α) } \frac{-10}{x} = \frac{5}{4}, \quad \text{β) } \frac{x}{-4} = \frac{-25}{x}, \quad \text{γ) } \frac{8}{-4} = \frac{4}{x}, \quad \text{δ) } \frac{6}{-3} = \frac{x}{2}$$

$$\text{β) } \frac{-9}{6} = \frac{6}{x}, \quad \text{ε) } \frac{x}{-9} = \frac{-9}{27}, \quad \text{η) } \frac{2}{5} = \frac{6}{\psi}, \quad \text{ια) } \frac{27}{42} = \frac{\psi}{70}$$

$$\text{γ) } \frac{2}{\beta} = \frac{10}{35}, \quad \text{στ) } \frac{16}{y} = \frac{y}{9}, \quad \text{θ) } \frac{4,5}{\psi} = \frac{\psi}{2}, \quad \text{ιβ) } \frac{4}{7} = \frac{y}{56}, \quad \text{ιγ) } \frac{\alpha}{15} = \frac{15}{12}$$

235. Νὰ δειχθῇ δι άποτελοῦν ἀναλογίαν αἱ κάτωθι τετράδες.

$$\text{α) } (15, 35, 9, 21), \quad \text{β) } (-12, 34, -18, 51)$$

$$\text{γ) } (x, \psi, x^2, x\psi), \quad \text{γ) } (9, 21, 21, 49).$$

236. Νὰ εύρεθῃ δι μέσος ἀνάλογος τῶν 16 καὶ 25.

$$237. \text{Νὰ εύρεθοῦν οἱ ἡγούμενοι δροι τῆς ἀναλογίας } \frac{x}{6} = \frac{\psi}{7}$$

$$\text{α) } \text{Έάν } x + \psi = 65 \text{ καὶ } \beta) \text{ έάν } x - \psi = 78$$

$$238. \text{Νὰ εύρεθοῦν δύο ἀριθμοί, οἱ διποτοί οι νὰ ἔχουν διθροισμα 560 καὶ λόγον } \frac{2}{5}$$

$$239. \text{Νὰ εύρεθοῦν δύο ἀριθμοί, οἱ διποτοί οι νὰ ἔχουν διαφορὰν 200 καὶ λόγον } \frac{7}{5}$$

$$240. \text{Έάν } \frac{x}{2} = \frac{\psi}{3} = \frac{z}{5} \text{ καὶ } x + \psi + z = 200, \text{ νὰ εύρεθοῦν τὰ } x, \psi, z.$$

$$241. \text{Νὰ εύρεθοῦν οἱ ἐπόμενοι δροι τῶν ίσων λόγων } \frac{2}{x} = \frac{3}{\psi} = \frac{4}{z}, \text{ έάν } x + \psi + z = 81.$$

$$242. \text{Έάν } \frac{x}{\psi} = \frac{3}{4} \text{ καὶ } x + \psi = 56, \text{ νὰ εύρεθοῦν τὰ } x \text{ καὶ } \psi.$$

$$243. \text{Έάν } \frac{x-3}{x} = \frac{\psi-4}{\psi} \text{ καὶ } x + \psi = 84, \text{ νὰ εύρεθοῦν τὰ } x, \psi.$$

#### **Β. ΕΦΑΡΜΟΓΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΥΣΙΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ**

## 1. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΛΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ

§ 102. Πρόβλημα 1ον. Ἐὰν 6 ἔργάται σκάπτουν 3 στρέμματα εἰς 8 ὥρας, οἱ 14 ἔργάται (τῆς ἴδιας ἀποδόσεως) πόσα στρέμματα θὰ σκάψουν εἰς 8 ὥρας;

“Εστω δι την τιμήν «14 ἔργαται» ἀντιστοιχεῖ ή τιμή «χ στρέμματα»  
Σχηματίζομεν τὸν κάτωθι πίνακα :

Πλήθος έργατων	6	14	2πλάσιοι έργ. 12	3πλάσιοι έργ. 18	...
Τιμαι έργου εις στρέμματα	3	X	2πλάσια στρέμ. 6	3πλάσια στρέμ. 9	...

Ἐπειδὴ τὰ μεγέθη πλῆθος ἔργατῶν καὶ ἔργον εἶναι εὐθέως ἀνάλογα, δὲ λόγος δύο τιμῶν τοῦ ἑνὸς ἴσοῦται πρὸς τὸν λόγον τῶν ἀντιστοίχων τιμῶν τοῦ ἄλλου, δηλαδὴ  $\frac{6}{14} = \frac{3}{x}$

$$\text{Έπιτομένως } \frac{6}{14} = \frac{3}{x} \iff 6x = 3 \cdot 14 \iff 6x = 42 \iff x = 7$$

"Αρα 7 στρέμματα θὰ σκάψουν οι 14 έργαται εἰς 8 ώρας.

### **Σημείωσις 1.**

Δυνάμεις τὸ ἀνωτέρω πρόβλημα νὰ κατατάξωμεν ὡς ἔξι :

Πλήθος έργατῶν τῆς Ιθίας ἀποδόσεως	Τιμai ἔργου εἰς στρέμ.	Τιμai χρόνου εἰς ώρας
6	3	8
14	X	8

ἢ ἀπλούστερον:

14      »      → X      »

Σημείωσις 2.

Σχηματίζομεν τὴν ἀναλογίαν  $\frac{6}{3} = \frac{14}{x}$ , ἐὰν χρησιμοποιήσωμεν τὴν Ιδιότητα: «Εἰς τὰ εὐθέως ἀνάλογα μεγέθη εἶναι τοιοὶ οἱ λόγοι τῶν ἀντιστοίχων τιμῶν». Ἀλλὰ καὶ ἐκ τῆς ἀναλογίας αὐτῆς εὑρίσκουμεν  $x=7$ .

**Πρόβλημα 2ον.** Έάν 10 έργάται σκάπτουν εις 12 ήμέρας 50 στρέμματα, οι 8 έργάται εις πόσας ήμέρας θά σκάψουν τα 50 στρέμματα. (Οι έργάται είναι της ίδιας δύναμης και έργάζονται τάξις ίδιας ώρας ημερησίως).

"Εστω ότι οι 8 έργάται θά σκάψουν εις χ ήμέρας τα 50 στρέμματα.

Σχηματίζομεν τὸν πίνακα :

Πλήθος έργατῶν	10	8		20	5
Τιμαι χρόνου εις ήμέρας	12	X		6	24

'Επειδὴ τὰ μεγέθη πλήθος έργατῶν καὶ χρόνος εἰναι ἀντιστρόφως ἀνάλογα, δ λόγος δύο τιμῶν τοῦ ἐνὸς ισοῦται πρὸς τὸν ἀντίστροφον λόγον τῶν ἀντιστοίχων τιμῶν τοῦ ἄλλου.

"Άρα ἔχομεν τὴν ἀναλογίαν  $\frac{10}{8} = \frac{X}{12}$  ἐκ τῆς διποίας εύρισκομεν  $X = 15$ .

"Ἐπομένως εις 15 ήμέρας θά σκάψουν τὰ 50 στρέμ. οι 8 έργάται.

Σημείωσις 1 :

'Έάν χρησιμοποιήσωμεν τὴν ιδιότητα «εις τὰ ἀντιστρόφως ἀνάλογα μεγέθη, τὰ γινόμενα ἀντιστοίχων τιμῶν εἰναι ίσα» ἔχομεν  $10 \cdot 12 = 8 \cdot X \Leftrightarrow X = \frac{10 \cdot 12}{8} \Leftrightarrow$

$$X = \frac{120}{8} \Leftrightarrow X = 15.$$

Σημείωσις 2 :

Δυνάμεθα νὰ κατατάξωμεν τὸ δινωτέρω πρόβλημα καὶ ως ἔξῆς :

Πλήθος έργατῶν τῆς ίδιας δύναμεως	Τιμαι χρόνου εις ήμέρας	Τιμαι έργου εις στρέμ.
10	12	50
8	X	50

10 έργάται → 12 ήμέραι
8 " " → X "

### Προβλήματα

244. Διὰ τὰ  $\frac{3}{4}$  ἐνὸς έργου διετίθη τὸ ποσὸν τῶν 9000 δρχ. Τί ποσὸν χρημάτων

ἀντιστοιχεῖ εις τὰ  $\frac{5}{6}$  τοῦ ίδιου έργου;

245. Διά 100 ένδυμασίας χρειάζονται 300 m μήκους ύφασματος πλάτους 1,40 m. Διά 125 δύοις ένδυμασίας πόσον πρέπει νά είναι τό πλάτος τοῦ ύφασματος, έλαν τό μήκος παραμένη σταθερόν;

246. Αύτοκίνητον κινεῖται καὶ διατηρεῖ ἐπὶ  $\frac{8}{3}$  ὥρας ταχύτητα 67,5 km/h. Πόσα km

θὰ διανύσῃ μὲ τὴν αὐτὴν ταχύτητα ἐπὶ  $\frac{32}{9}$  ὥρας;

247. Αύτοκίνητον ἔχει ταχύτητα 56 km/h καὶ διανύει ἀπόστασιν 182 km. Εἰς πόσας ὥρας θὰ διανύσῃ τὴν ἀπόστασιν αὐτήν, έλαν ἐλαττώσῃ τὴν ταχύτητά του κατὰ τὸ  $\frac{1}{14}$  αὐτῆς;

248. 50 στρατιῶται ἔχουν τροφάς διά 30 ημέρας. Πόσας ημέρας θὰ περάσουν μὲ τὰ τρόφιμα αὐτά, έλαν αὐξηθῇ ἡ μερὶς κατὰ τὸ  $\frac{1}{5}$  αὐτῆς;

249. "Ἐργον συνεφωνήθη νά τελειώσῃ εἰς 25 ημέρας. Εάν 6 ἐργάται ἔξετέλεσαν τὸ  $\frac{1}{2}$  τοῦ ἐργού εἰς 10 ημέρας, πόσοι ἐργάται πρέπει νά χρησιμοποιηθοῦν, διά νά τελειώσῃ τὸ ὑπόλοιπον ἐργον ἐντὸς τῆς τακτῆς προθεσμίας;

250. 12 ἀνδρες ἐκτελοῦν ἐργον εἰς 20 ημέρας. Εἰς πόσας ημέρας θὰ ἐκτελέσουν τὸ αὐτὸν 20 γυναίκες, έλαν ἡ ἐργασία 4 ἀνδρῶν ισοδυναμεῖ πρὸς τὴν ἐργασίαν 5 γυναικῶν;

## 2. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ

**§ 103. Πρόβλημα 1ον.** Ἐμπόρευμα κόστους 800000 δρχ. ἐπωλήθη μὲ κέρδος 12%<sub>0</sub>. Πόσον είναι τὸ κέρδος;

Ἐάν καλέσωμεν χ δρχ. τὸ κέρδος, ἐπειδὴ 12% σημαίνει «ἐπὶ 100 μονάδων κόστους τὸ κέρδος είναι 12» καὶ τὸ κέρδος θεωρεῖται ἀνάλογον τοῦ κόστους, ἔχομεν:

Κόστος	100	800000
Κέρδος	12	x

$$\Rightarrow \frac{100}{800000} = \frac{12}{x} \Rightarrow x = 96000$$

Ἄρα τὸ κέρδος είναι 96 000 δρχ.

Τὸ κέρδος λέγεται ποσοστὸν ἐπὶ τοῦ κόστους.

Εἰς τὴν πρᾶξιν καὶ τὴν οἰκονομικὴν ζωὴν, ἐν μέγεθος καλούμενον ποσοστὸν θεωρεῖται ἀνάλογον ἄλλου μεγέθους, τὸ δποίον καλεῖται ἀρχικὸν μέγεθος ἢ ἀρχικὸν ποσόν.

Τὸ ποσοστὸν καὶ τὸ ἀρχικὸν ποσὸν είναι δμοειδῆ μεγέθη, συνήθως νομισματικά ἢ μεγέθη βάρους ἢ ὅγκου.

Συμβολίζομεν τὸ ἀρχικὸν μέγεθος μὲ A καὶ τὸ ποσοστὸν μὲ P.

Τὸ ποσοστόν, τὸ δποίον ἀντιστοιχεῖ εἰς 100 μονάδας ἀρχικοῦ ποσοῦ,

καλείται «ποσόστωσις» ή άπλως «ποσοστόν» έπει τοις έκατον και συμβολίζεται διά τοῦ ε. Γράφομεν δὲ  $\epsilon \%$ .

(Δυνάμεθα νὰ ἔχωμεν καὶ ποσοστὸν ἐπὶ 1000 μονάδων ἀρχικοῦ ποσοῦ ὅτε γράφομεν  $\epsilon \%$ ).

Τὸ ἐμπορικὸν κέρδος ή ἡ ζημία εἶναι ποσοστὰ ἐπὶ τῆς τιμῆς κόστους, ἢ δποία εἶναι δι' αὐτὰ ἀρχικὸν ποσὸν (ἐκτὸς ἐὰν ρητῶς δρίζωνται ἐπὶ τῆς τιμῆς πωλήσεως).

Τὰ ἔξοδα μεταφορᾶς - ἀποθηκεύσεως - δασμῶν, μὲ τὰ δποία ἐπιβαρύνεται ἐν προϊόντων εἶναι ποσοστὸν μὲ ἀρχικὸν ποσὸν τὴν τιμὴν ὀγορᾶς.

Ἡ ἀμοιβὴ ἐνὸς ἐμπορικοῦ ἀντιπροσώπου εἶναι ποσοστὸν μὲ ἀρχικὸν ποσὸν τὴν τιμὴν πωλήσεως τῶν προϊόντων, τὰ δποία διαθέτει.

Τὸ ἀπόβαρον (βάρος συσκευασίας ἐνὸς προϊόντος) εἶναι ποσοστὸν μὲ ἀρχικὸν ποσὸν τὸ μεικτὸν βάρος. Τὸ βάρος διαλειμμένου σώματος εἶναι ποσοστὸν μὲ ἀρχικὸν ποσὸν τὸ βάρος τοῦ διαλύματος.

Ἐὰν  $A, \Pi, \epsilon \%$  εἶναι ἀντιστοίχως τὸ ἀρχικὸν ποσόν, τὸ ποσοστὸν καὶ ἡ ποσόστωσις (ποσοστὸν ἐπὶ τοῖς έκατον) ἔχομεν τὸν πίνακα :

Ἀρχικὸν ποσὸν	$A$	100
Ποσοστὸν	$\Pi$	$\epsilon$

καὶ ἐκ τούτου τὴν ἀναλογίαν  $\frac{A}{100} = \frac{\Pi}{\epsilon}$ , ἐκ τῆς δποίας λαμβάνομεν τοὺς τύπους :  
 $A = \frac{100}{\epsilon} \cdot \Pi, \Pi = \frac{\epsilon}{100} \cdot A.$

**Πρόβλημα 2ον.** Ἐμπόρευμα ἐπωλήθη ἀντὶ 805 000 δρχ. μὲ κέρδος 15%. Πόσον τὸ κόστος αὐτοῦ;

Ἐὰν  $x$  δρχ. τὸ κόστος, τὸ ποσοστὸν θὰ εἶναι  $805 000 - x$  δρχ. Κατατάσσομεν αὐτὰ εἰς πίνακα, γράφομεν τὴν ἀναλογίαν καὶ εύρισκομεν τὸν  $x$ .

$A$	100	$x$
$\Pi$	15	$805000 - x$

$$\Rightarrow \frac{x}{100} = \frac{805000 - x}{15} \Leftrightarrow \dots x = 700000$$

Ἐπειδὴ ἔχομεν  $\frac{A}{100} = \frac{\Pi}{\epsilon} = \frac{A+\Pi}{100+\epsilon}$  (ἰδιότης ἀναλογιῶν), τὰ  $A, A+\Pi$  εἶναι μεγέθη ἀνάλογα, ὡς ἐπίσης καὶ τὰ  $\Pi, A+\Pi$ . Τὸ  $A+\Pi$  εἶναι τὸ ἀρχικὸν ποσὸν τὴν ἔνδημένον κατὰ τὸ ἀντίστοιχον ποσοστὸν  $\Pi$ .

Δυνάμεθα λοιπὸν νὰ χρησιμοποιήσωμεν καὶ τὸν ἔξις πίνακα :

$A$	100	$x$
$A+\Pi$	115	805000

$$\Rightarrow \frac{x}{805000} = \frac{100}{115} \Leftrightarrow 115x = 805 000 \cdot 100$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{805000 \cdot 100}{115} \Leftrightarrow x = 7000 \cdot 100 \Leftrightarrow x = 700000$$

"Αρα τὸ κόστος εἶναι 700000 δρχ.

$$\text{Σημείωσις 1. } \text{Έκ τῆς ἀναλογίας } \frac{A}{100} = \frac{\Pi}{\epsilon} \Rightarrow \frac{A}{100} = \frac{A - \Pi}{100 - \epsilon} \text{ καὶ } \frac{\Pi}{\epsilon} =$$

$$\frac{A - \Pi}{100 - \epsilon}. \text{ Τὸ } A - \Pi \text{ εἶναι τὸ ἀρχικὸν ποσὸν ἡλαττωμένον κατὰ τὸ ἀντίστοιχον ποσοστόν.}$$

Τὸ μέγεθος αὐτὸν εἶναι ἀνάλογον καὶ πρὸς τὸ ἀρχ. ποσὸν  $A$  καὶ πρὸς τὸ ποσοστὸν  $\Pi$ . Έκ τῶν ἀνωτέρω ἀναλογιῶν προκύπτουν καὶ οἱ κάτωθι τύποι διὰ τὰ  $A$  καὶ  $\Pi$ .  $A = \frac{(A - \Pi) \cdot 100}{100 - \epsilon}$ ,

$$\Pi = \frac{(A - \Pi) \cdot \epsilon}{100 - \epsilon} \text{ καὶ ἀντίστοιχως οἱ: } A = \frac{(A + \Pi) \cdot 100}{100 + \epsilon}, \quad \Pi = \frac{(A + \Pi) \cdot \epsilon}{100 + \epsilon} \text{ (Πρόβλ. 2ον)}$$

**Σημείωσις 2.** Οἱ ἀνωτέρω δριζόντιοι πίνακες χρησιμοποιοῦνται καὶ κατακορύφωσ.

**Πρόβλημα 3ον.** Τὸ καθαρὸν βάρος ἐμπορεύματος εἶναι 1067 kgr\*. Πόσον εἶναι τὸ μεικτὸν βάρος αὐτοῦ, ὅταν τὸ ἀπόβαρον εἶναι 3%, καὶ πόσον τὸ ἀπόβαρον αὐτοῦ;

α) "Εστω  $x$  kgr\* τὸ μεικτὸν βάρος. Τὸ ἀντίστοιχον ἀπόβαρον εἶναι  $x - 1067$  kgr\*.

A	$\Pi$
100	3
$x$	$x - 1067$

$$\Rightarrow \frac{x}{100} = \frac{x - 1067}{3} \Leftrightarrow \dots x = 1100$$

Δυνάμεθα νὰ χρησιμοποιήσωμεν τὸν πίνακα:

A	$A - \Pi$
100	97
$x$	1067

$$\Rightarrow \frac{x}{100} = \frac{1067}{97} \Leftrightarrow 97x = 106700 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{106700}{97} \Leftrightarrow x = 1100.$$

"Αρα τὸ μεικτὸν βάρος εἶναι 1100 kgr\*.

β) Τὸ ἀπόβαρον εἶναι  $1100 - 1067 = 33$  kgr\*.

Δυνάμεθα νὰ τὸ εὔρωμεν καὶ ἀπ' εύθειας.

"Εστω  $x$  kg \* τὸ ἀπόβαρον. Εχομεν τὸν πίνακα

$\Pi$	$A - \Pi$
3	97
$x$	1067

$$\Rightarrow x = \frac{1067}{3} \Leftrightarrow x = \frac{1067 \cdot 3}{97} \Leftrightarrow x = 11 \cdot 3 = 33$$

**Πρόβλημα 4ον.** Εμπορος ἀγοράζει ἐμπόρευμα ἀντὶ 82 000 δρχ. Εχει ἔξοδα 12% (ἐπὶ τῆς τιμῆς ἀγορᾶς) καὶ πωλεῖ μὲ κέρδος 15% (ἐπὶ τοῦ κόστους). Αντὶ πόσων δρχ. θὰ πωλήσῃ τὸ ἐμπόρευμα;

"Υπολογίζομεν πρῶτον τὸ κόστος· ἔστω  $x$  δρχ. αύτό.

$A$	$A + \Pi$
100	112
82000	$x$

$$\Rightarrow x = 91840$$

"Υπολογίζομεν τώρα τὴν τιμὴν πωλήσεως ψ δρχ.

$A$	$A + \Pi$
100	115
91840	$\psi$

$$\Rightarrow \frac{\psi}{115} = \frac{91840}{100} \Leftrightarrow \psi = \frac{91840 \cdot 115}{100} \Leftrightarrow \psi = 105616$$

"Αρα ἡ τιμὴ πωλήσεως τοῦ ἐμπορεύματος είναι 105 616 δρχ.

**Παρατήρησις.** Εις τὸ αύτὸ δποτέλεσμα καταλήγομεν, ἐὰν κάμωμεν τὴν κατάταξιν:

χ δρχ. πωλήσεως 82000 δρχ. ἀγορᾶς

100 δρχ. ἀγορᾶς 112 δρχ. κόστους

100 δρχ. κόστους 115 δρχ. πωλήσις καὶ σχηματίσωμεν τὴν ἔξισωσιν:  
Διηγήσουμεν τὸ 100.100 - 82000.112.115, ἡ δποία ἐπιλουσιένη δίδει:

$A \cdot \Pi$	$115$	$\psi$
$x = \frac{82000.112.115}{100.100}$	$\Rightarrow x = \frac{105616000}{10000}$	$\Rightarrow x = 105616$

### Προβλήματα

251. Εμπορος έπωλησεν έμπορευμα με κέρδος 20% και είσεπραξεν 360000 δρχ. Ποια ή αξια του έμπορεύματος;

252. Εμπορος έπωλησεν έμπορευμα με κέρδος 15% και έκερδισεν 60000 δρχ. Ποια ή αξια του έμπορεύματος;

253. Το μεικτόν βάρος ένός προϊόντος είναι 375 kgr \* τὸ δὲ καθαρὸν είναι 300 kgr \*. Πόσον τοις ἐκατόν είναι τὸ ἀπόβαρον α) ἐπὶ τοῦ μεικτοῦ βάρους και β) ἐπὶ τοῦ καθαροῦ βάρους;

254. Αντικείμενον αξίας 3750 δρχ. έπωλήθη με κέρδος 25% ἐπὶ τοῦ κόστους. Ποια ή τιμή πωλήσεως και πόσον είναι τὸ κέρδος;

255. Εάν τὸ κέρδος με 20% είναι 4940 δρχ. ποια ή τιμή πωλήσεως και ποιον τὸ κόστος;

256. Τηλεόρασις έπωλήθη με ἔκπτωσιν 30% ἀντὶ 4550 δρχ. Πόσον τὸ κόστος και πόση ήτο ή ἔκπτωσις;

257. Εμπορος πωλει τὸν τ. πῆχυν, δοσον ἀγοράζει τὸ ω. Πόσον τοις ἐκατόν κερδίζει;

258. Εάν έμπορος πωλῇ με κέρδος 25% ἐπὶ τῆς τιμῆς ἀγορᾶς, πόσον τοις ἐκατὸν κερδίζει ἐπὶ τῆς τιμῆς πωλήσεως;

259. Εάν έμπορος έπωλει έμπορευμα ἀντὶ 11500 δρχ., θὰ ἐκέρδιζε 15% ἐπὶ τοῦ κόστους του. Επώλησεν διμως τοῦτο ἀντὶ 9500 δρχ.. Επωλήθη τὸ έμπορευμα δινω ή κάτω τοῦ κόστους του και πόσον τοις ἐκατόν ἐπ' αὐτοῦ;

260. Έμπορος έπωλησεν ἀντικείμενον με ζημιαν 7%. Εάν ἐπωλει τοῦτο με κέρδος 3%, ήλαμβανεν 750 δρχ. περισσότερον. Ποιον τὸ κόστος του ἀντικειμένου;

261. Πόσον ήγοράσθη έμπορευμα, τὸ διποιον ἀπεβαρύνθη με ἔξοδα 10% και έπωλήθη με κέρδος 11% ἀντὶ 183150 δρχ.;

262. Δύο ἀντικείμενα κοστίζουν διμοῦ 5000 δρχ. και έπωλησαν τὸ μὲν α' με κέρδος 20%, τὸ δὲ β' με κέρδος 15%. Εάν τὸ διλικὸν κέρδος ήτο 900 δρχ., νά εύρεθῇ τὸ κόστος ἐκάστου.

263. Εμπορος ύπολογίζει νά κερδίσῃ 25% ἐπὶ τοῦ κόστους ἐνός έμπορεύματος. Επώλησεν διμως αὐτὸ με ὑπερτιμησιν 5% ἐπὶ τῆς ἀναγραφομένης τιμῆς. Πόσον τοις ἐκατόν ἐκέρδισεν ἐπὶ τοῦ κόστους;

264. Εμπορος ἀναγράφει ἐπὶ έμπορεύματος τιμὴν κατά 30% ἀνωτέραν τοῦ κόστους και πωλει αὐτὸ με ἔκπτωσιν κερδίζων οὔτω 23,50% ἐπὶ τοῦ κόστους. Ποια ή ἔκπτωσις ἐπὶ τῆς ἀναγραφομένης τιμῆς;

### 3. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ

#### § 104. Πρόβλημα.

3 m <sup>3</sup>	τοίχου	κτίζονται	ύποδ	5	κτιστῶν	εἰς	2	ἡμέρας
6 m <sup>3</sup>	τοίχου	κτίζονται	ύποδ	;	κτιστῶν	εἰς	2	ἡμέρας
9 m <sup>3</sup>	τοίχου	κτίζονται	ύποδ	;	κτιστῶν	εἰς	2	ἡμέρας
6 m <sup>3</sup>	τοίχου	κτίζονται	ύποδ	5	κτιστῶν	εἰς	;	ἡμέρας
12 m <sup>3</sup>	τοίχου	κτίζονται	ύποδ	5	κτιστῶν	εἰς	;	ἡμέρας

Νά συμπληρωθοῦν αἱ τιμαι «πλήθους κτιστῶν» και «τιμὴ χρόνου».

Αι άπαντήσεις είναι κατά σειράν 10 κτίσται, 15 κτίσται, 4 ήμέραι, 8 ήμέραι, διότι τὸ μέγεθος «τιμὴ ἔργου» είναι ἀνάλογον πρὸς ἕκαστον τῶν μεγεθῶν «πλῆθος ἔργατῶν», «τιμὴ χρόνου», ἐφ' ὅσον τὸ ἄλλο διατηρεῖ τὴν αὐτὴν τιμὴν (παραμένει σταθερόν).

Λέγομεν ὅτι τὸ μέγεθος «τιμὴ ἔργου» είναι ἀνάλογον πρὸς τὸ ζεῦγος τῶν μεγεθῶν «πλῆθος ἔργατῶν», «τιμὴ χρόνου».

Συντάσσομεν τὸν κατωτέρω πίνακα ἀντιστοίχων τιμῶν

Τιμὴ ἔργου	X	3	6	9	6	12
Πλῆθος ἔργατῶν	Ψ	5	10	15	5	5
Τιμὴ χρόνου	z	2	2	2	4	8
Γινόμενον	ψ · z	10	20	30	20	40

καὶ παρατηροῦμεν ὅτι, πολ / μέντης μιᾶς τιμῆς τοῦ χ ἐπὶ ἔνα ἀριθμόν, πολλαπλασιάζεται μία ἐκ τῶν τιμῶν ψ ή z ἐπὶ τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν (ἐφ' ὅσον ἡ ἄλλη παραμένει σταθερά). Ἐπομένως τὸ γινόμενον τῶν ἀντιστοίχων τιμῶν ψ·z πολλαπλασιάζεται ἐπὶ τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν (συμφώνως πρὸς τὴν προσεταιριστικήν ιδιότητα τοῦ πολλαπλασιασμοῦ).

Δηλαδὴ τὸ μέγεθος χ είναι ἀνάλογον πρὸς τὸ μέγεθος ψ·z. Ἐξ αὐτῶν συμπεραίνομεν ὅτι :

1. Μέγεθος είναι ἀνάλογον πρὸς ζεῦγος, τριάδα, κ.ο.κ. μεγεθῶν, δταν είναι ἀνάλογον πρὸς ἕκαστον τούτων, ἐφ' ὅσον τὰ ἄλλα διατηροῦνται σταθερά.

2. Ἐὰν μέγεθος είναι ἀνάλογον πρὸς ζεῦγος, τριάδα κ.ο.κ. μεγεθῶν, είναι ἀνάλογον πρὸς τὸ γινόμενον αὐτῶν.

Ἐὰν εἰς τὸ ζεῦγος ἡ τὴν τριάδα ὑπάρχῃ ἐν μέγεθος π.χ. τὸ ψ ἀντιστρόφως ἀνάλογον τοῦ χ, τότε ἀντικαθιστῶμεν αὐτὸν μὲ ἐκεῖνο, τὸ ὅποιον ἔχει τὰς ἀντιστρόφους τιμάς, δηλαδὴ τὸ  $\frac{1}{\psi}$ , διότι ὡς ἐμάθομεν αἱ τιμαὶ τοῦ χ είναι ἀνάλογοι πρὸς τὰς ἀντιστρόφους τῶν τιμῶν τοῦ ψ.

\*Ἐφαρμογαί. 1η. Οικόπεδον μήκους 32 πι καὶ πλάτους 30 πι τιμᾶται 480000 δρχ. Πόσον πλάτος θὰ είχεν, ἐὰν εἴχε μήκος 20 πι καὶ τιμὴν 450000 δρχ.;

Καλοῦμεν χ δρχ. τὸ ζητούμενον καὶ κατατάσσομεν εἰς πίνακα τὰς ἀντιστοίχους τιμὰς ὁριζοντίως.

Πλάτος	Μήκος	Χρηματική τιμή
30	32	480000
X	20	450000

Συγκρίνομεν τὸ μέγεθος τοῦ ἀγνώστου πρὸς τὸ μέγεθος τοῦ ζεύγους τῶν γνωστῶν.

Ἐπειδὴ τὸ μέγεθος πλάτος εἶναι ἀντιστρόφως ἀνάλογον τοῦ μήκους καὶ εὐθέως ἀνάλογον τῆς χρημ. τιμῆς, τοῦτο εἶναι ἀνάλογον τοῦ γινομένου  $\frac{1}{\text{μήκος}} \cdot \text{χρημ. τιμή.}$

$$\text{Συνεπῶς ἔχομεν τὴν ἀναλογίαν } \frac{30}{X} = \frac{\frac{1}{32} \cdot 480000}{\frac{1}{20} \cdot 450000}$$

Ἐκ τῆς ἀναλογίας αὐτῆς λαμβάνομεν τὴν  $\frac{X}{30} = \frac{32 \cdot 450000}{20 \cdot 480000}$  ἢ τὴν  $X = 30 \cdot \frac{32}{20} \cdot \frac{450000}{480000}$  (1).

Εύρισκομεν  $X = 45$ . Ἀρα τὸ πλάτος τοῦ οἰκοπέδου θὰ ἦτο 45 μ.

**Παρατήρησις.** Ἡ ἑξίσωσις (1) δικαιολογεῖ τὸν γνωστὸν ἐκ τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου κανόνα : διαθέτοντας τὸν ὑπεράνω αὐτοῦ ἀριθμὸν ἐπὶ τὰ κλάσματα ἐκάστης στήλης ἀντετραμένα μὲν, διατάντα τὸ ποσόν εἶναι ἀνάλογον πρὸς ἕκεινο τοῦ ἀγνώστου, ὡς ἔχει δέ, ἐὰν τὸ ποσόν εἶναι ἀντιστρόφως ἀνάλογον.

Ζα. 8 ἐργάται ἐκτελοῦν ἔργον εἰς 12 ἡμέρας ἐργαζόμενοι 7 ὥρας ἡμερησίως. Εἰς πόσας ἡμέρας 18 ἐργάται θὰ ἐκτελέσουν τὸ 3πλάσιον τοῦ ἔργου ἐργαζόμενοι ἐπὶ 8 ὥρας καθ' ἡμέραν. (Οἱ ἐργάται εἶναι τῆς αὐτῆς ἀπόδοσεως).

Ἐάν ἐργασθῶμεν διπλῶς προηγουμένως ἔχομεν :

Ημέραι ἐργασίας	Πλήθος ἐργατῶν	Ώραι ἐργασίας	Έργον
12	8	7	1
X	18	8	3

Ἐπειδὴ τὸ μέγεθος «ἡμ. ἐργασ.» εἶναι ἀντιστρ. ἀνάλογον τοῦ «πλήθους ἐργατῶν» καὶ τοῦ «ὤραι ἐργασίας» καὶ ἀνάλογον τοῦ «ἔργου», θὰ εἶναι

ἀνάλογον τοῦ γινομένου : « $\frac{1}{\text{πλ. } \text{ἐργ.}} \cdot \frac{1}{\text{ὤρ. } \text{ἐργ.}}$  » . «ἔργον».

ἡμ. ἐργασίας

$$\text{Ἐπομένως } 12 \longrightarrow \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{7} \cdot 1 \quad \rightarrow \frac{12}{X} = \frac{\frac{1}{8} \cdot \frac{1}{7} \cdot 1}{\frac{1}{18} \cdot \frac{1}{8} \cdot 3}$$

$$X \longrightarrow \frac{1}{18} \cdot \frac{1}{8} \cdot 3$$

$$\leftrightarrow x \cdot \frac{1}{8} + \frac{1}{7} - 12 \cdot \frac{1}{18} + \frac{1}{8} \cdot 3 \leftrightarrow x \cdot \frac{1}{8} + 12 \cdot \frac{3}{18} - 12 \cdot \frac{1}{18} + \frac{1}{8} \cdot 3 \leftrightarrow x \cdot \frac{1}{8} - 12 \cdot \frac{8}{18} + \frac{7}{8} \cdot 3$$

$$\leftrightarrow x = 14. \text{ Τό } 3\text{πλάσιον } \text{έργου} \text{ θα } \text{έκτελεσθη} \text{ είς } 14 \text{ } \text{ήμερα.}$$

3η. Περιοδεύων έμπορικός άντιπρόσωπος (πλαστέ) άμειβεται με 3% κατ' έτος έπι τής τιμής πωλήσεως τῶν παρ' αύτοῦ πωλουμένων προϊόντων. Ή προμήθεια δημος διπλασιάζεται, τριπλασιάζεται, κ.ο.κ. έavan έπιτυχη τάς πωλήσεις είς τό ήμισυ,  $\frac{1}{3}$ , κ.ο.κ. τοῦ καθωρισμένου χρόνου. Κάποτε έπωλησεν έμπορεύματα έντος 3 μηνῶν και άφου έκρατησε τήν άμοιβήν του παρέδωσεν είς τὸν έργοδότην του 88000 δρχ. Τι ποσόν έκρατησε;

'Ο άντιπρόσωπος έκρατησε τήν προμήθειάν του, ή δόποια είναι άνάλογος πρός τήν τιμήν πωλήσεως (τοῦ χρόνου διαπρομένου σταθεροῦ) και άντιστρόφως άνάλογος πρός τὸν χρόνον (τῆν τιμής πωλήσεως διαπρομένης σταθερᾶς).

'Εάν  $x$  δρχ, είναι τή προμήθειά του, ή άντιστοιχος πρός αύτήν τιμή πωλήσεως είναι 88000 +  $x$  και δ χρόνος 3 μῆνες. 'Εάν ή τιμή πωλήσεως είναι 100 δρχ. και δ χρόνος 12 μῆνες ή προμήθεια είναι 3 δρχ.

Προμήθεια	Τιμή πωλήσεως	Χρόνος
3	100	12
$x$	$88000 + x$	$3$
Προμήθεια	Τιμή πωλήσεως έπι $\frac{1}{3}$ χρόνος	
3	$100 \cdot \frac{1}{12}$	
$x$	$(88000 + x) \cdot \frac{1}{3}$	$\Rightarrow x = \frac{\frac{1}{3}(88000 + x)}{\frac{1}{12} \cdot 100} \leftrightarrow$

$$100x = 12(88000 + x) \leftrightarrow 100x = 12.88000 + 12x \leftrightarrow 100x - 12x = 12.88000 \leftrightarrow 88x = 12.88000$$

$$\leftrightarrow x = \frac{12.88000}{88} \leftrightarrow x = 12.1000 \leftrightarrow x = 12000. \text{ Έκρατησεν ώς προμήθεια } 12000 \text{ δρχ.}$$

### Προβλήματα

265. 8 έργάται τελειώνουν ἐν έργον εἰς 12 ημέρας έργαζόμενοι 7 ώρας ήμερησίως. 12 έργάται εἰς πόσας ημέρας θά τελειώσουν τὸ αὐτὸ δέργον, διαταν έργαζωνται 8 ώρας ήμερησίως;

266. 9 έργάται σκάπτουν 18 στρέμματα εἰς 6 ημέρας έργαζόμενοι 8 ώρας ήμερησίως. 8 έργάται εἰς πόσας ημέρας θά σκάψουν 16 στρέμματα έργαζόμενοι 8 ώρας ήμερησίως;

267. 20 έργάται έργαζόμενοι 8 ώρας ήμερησίως έχετελεσαν τὰ  $\frac{2}{5}$  ένός έργου εἰς 14 ημέρας. Πόσας ώρας τὴν ήμέραν πρέπει νά έργαζωνται 16 έργάται, διά τὰ τελειώσουν τὸ ύπολοιπον έργον εἰς 30 ημέρας;

268. Διά τὸ πάτωμα ἐνὸς δωματίου ήγοράσθησαν 700 σανίδες μήκους 3,4 εμ και πλάτους 6 εμ. Πόσας σανίδας μήκους 3 dm και πλάτους 7 em θά χρειασθοῦν διά τὸ αὐτὸ πάτωμα;

269. Ραπτής χρειάζεται 60 m μήκους ύφασματος και πλάτους 1 m διά 20 όμοιας ένδυμασίας, Πόσα m μήκους θά χρειασθή διά 18 όμοιας ένδυμασίας, έαν τὸ πλάτος τοῦ ύφασματος είναι 1,2 m;

270. Πλοίον άνεχωρήσε διά ταξίδιον 45 ήμερών μὲ 35 ἐπιβάτας. Τὸ ἀπόθεμα τῶν τροφίων αὐτοῦ ἐπιτρέπει νὰ παρέχεται εἰς τοὺς ἐπιβάτας ημερησίᾳ μερὶς τροφίμων βάρους 1200 gr\*. 15 ήμέρας ἀργότερον περισύλλεγει ναυαγούς καὶ συντομεύει τὸ ταξίδιόν του κατά 5 ήμέρας, ένω ἡ μερὶς τῶν τροφίμων περιορίζεται εἰς 1008 gr\*. Πόσους ναυαγούς περισυνέλεξε τὸ πλοίον;

271. Οἱ ἐπιστήμονες ὑπελόγισαν δτὶ τὸ βάρος ἐνὸς σώματος είναι ἀνάλογον τῆς μάζης τοῦ πλανήτου ἐπὶ τοῦ ὅποιου εύρισκεται καὶ ἀντιστρόφως ἀνάλογον πρὸς τὸ τετράγωνον τῆς ἀκτίνος αὐτοῦ. Νὰ ὑπολογισθῇ τὸ βάρος ἀστροναύτου εἰς τὴν Σελήνην, έαν οὗτος ζυγίζῃ ἐπὶ τῆς Γῆς 70 kg\*. Αἱ μᾶζαι Γῆς - Σελήνης είναι ἀντιστοίχως  $6 \cdot 10^{11}$  ton καὶ  $7,5 \cdot 10^{10}$  ton καὶ ἀκτίνες αὐτῶν 6400 km, 1740 km.

272. Μεταξύ παραγωγῶν καὶ ἔταιρειας μεταφορῶν ἔγινε ἡ ἔξης συμφωνία :

‘Η ἔταιρεια θὰ λαμβάνῃ 5% ἐπὶ τῆς τιμῆς πωλήσεως πρωτίων λαχανικῶν, τὰ ὅποια θὰ μεταφέρει εἰς Δυτικήν Γερμανίαν ἐντὸς 10 ήμερῶν καὶ ἡ ἀμοιβὴ τῆς θὰ εἴναι ἐπίσης καὶ ὀντιστρόφως ἀνάλογος τοῦ χρόνου μεταφορᾶς. ‘Η ἔταιρεια μετέφερε προϊόντα ἐντὸς 6 ήμερῶν. Ἐκ τῆς πωλήσεως αὐτῶν εἰστράχθη ποσόν τὸ ὅποιον μετά τὴν ἀφαίρεσιν τῆς ἀμοιβῆς τῆς ἔταιρειας ἀνήλθεν εἰς 102000 δρχ. Ποιὰ ἡ τιμὴ πωλήσεως τῶν προϊόντων ;

#### 4. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΚΟΥ

**§ 105.** ‘Εάν καταθέσωμεν εἰς τὴν Τράπεζαν ἐν ποσὸν χρημάτων καὶ μετὰ ὥρισμένον χρόνον τὸ ἀποσύρωμεν, θὰ λάβωμεν τοῦτο καὶ ἐπὶ πλέον ἐν δλλο ποσὸν χρημάτων, τὸ ὅποιον λέγεται **τόκος**.

‘Ο τόκος δηλαδὴ εἶναι τὸ κέρδος, τὸ ὅποιον λαμβάνομεν, ὅταν τοκίζωμεν τὰ χρήματά μας.

Τὰ χρήματα, τὰ ὅποια καταθέτομεν εἰς τὴν Τράπεζαν ἡ δανείζομεν εἰς ίδιώτας, χρησιμοποιοῦνται εἰς διαφόρους ἐπιχειρήσεις μὲ σκοπὸν τὴν παραγωγὴν κέρδους. Ἐκ τοῦ κέρδους, τὸ ὅποιον ἀποφέρουν αὐτά, δίκαιον εἴναι νὰ λαμβάνωμεν καὶ ἡμεῖς ἐν μέρος αὐτοῦ, δηλαδὴ, τὸν τόκον.

‘**Ἐπιτόκιον** εἶναι δ τόκος τῶν 100 νομισματικῶν μονάδων εἰς ἐν ἔτος.

‘Ο τόκος εἶναι ἀνάλογος πρὸς τὸ κεφάλαιον, πρὸς τὸν χρόνον, κατὰ τὸν ὅποιον τοκίζεται τοῦτο, καὶ πρὸς τὸ ἐπιτόκιον.

#### Σημείωσις.

α) ‘Εάν κάποιος δανεισθῇ π.χ. 100 δρχ. δι’ ἐν ἔτος πρὸς 6% εἰς τὸ τέλος τοῦ ἔτους θὰ ἐπιστρέψῃ 106 δρχ., τὸ κεφάλαιον καὶ τὸν ἀντίστοιχον τόκον του, τὸ ὅποιον λέγεται ηὐξημένον κεφάλαιον κατὰ τὸν ἀντίστοιχον τόκον του.

Εἰς μερικὸς περιπτώσεις δ δανεισθῆς κρατεῖ προκαταβολικῆς τὸν τόκον καὶ δ ὀφειλέτης λαμβάνει ὡς δάνειον 94 δρχ. τοῦτο λέγεται ἡλαττωμένον κεφάλαιον κατὰ τὸν ἀντίστοιχον τόκον του. Εἰς τὸ τέλος τοῦ ἔτους θὰ ἐπιστρέψῃ εἰς τὸν δανειστὴν 100 δρχ.

β) ‘Εάν καταθέσωμεν εἰς τὴν Τράπεζαν ἐν κεφάλαιον λαμβάνομεν ἐν βιβλιάριον, εἰς τὸ ὅποιον ἀναγράφεται δ ἀριθμὸς τοῦ λογαριασμοῦ μας, τὸ δομιστεπώνυμον, ή διεύθυνσίς μας, τὸ ποσόν, τὸ ὅποιον καταθέσαμεν, καὶ ἡ ἡμερομηνία καταθέσεως.

Συνήθως αἱ Τράπεζαι ὑπολογίζουν τοὺς τόκους κατὰ τὸ τέλος 'Ιουνίου καὶ τέλος Δεκεμβρίου ἐκάστου ἔτους. ‘Εάν δὲν ἀποσύρωμεν τοὺς τόκους τὴν στιγμήν, κατὰ τὴν ὅποιαν ὑπο-

λογιζονται ουτοι, τότε δια το έπομενον έξαμηνον, το κεφάλαιον είναι ηύξημένον κατά τόν τόκον του, (Η πρόσθεσις τῶν τόκων εις τό κεφάλαιον λέγεται κεφαλοποίησις αὐτῶν).

Τό αύτό γίνεται και εις τὰ Ταχ. Ταμιευτήρια, ἀλλά ἐκεὶ οι τόκοι ὑπολογίζονται εις τὸ τέλος ἑκάστου ἔτους.

Ἐάν γίνεται κεφαλοποίησις τῶν τόκων, τότε ἔχομεν σύνθετον τόκον ἢ ἀνατοκισμόν.

Εἰς τὰ κατωτέρω προβλήματα τό κεφάλαιον παραμένει σταθερὸν καθ' ὅλην τὴν διάρκειαν τοῦ τοκισμοῦ του.

Προκειμένου περὶ Τραπέζης ἢ Ταμιευτήριου θεωροῦμεν ὅτι οἱ τόκοι ἀποσύρονται κατά τὴν ἡμέραν τοῦ ὑπολογισμοῦ των, (δηλαδὴ δὲν γίνεται κεφαλοποίησις τούτων.)

**Πρόβλημα 1ον.** Ποῖος ὁ τόκος κεφαλαίου 20000 δρχ. εἰς 3 ἔτη πρὸς 5%;

Κεφάλαιον	Χρόνος	Τόκος
100	1	5
20000	3	x

Ἐπειδὴ ὁ τόκος είναι ἀνάλογος πρὸς τὸ κεφάλαιον καὶ πρὸς τὸν χρόνον θὰ είναι ἀνάλογος καὶ πρὸς τὸ γινόμενον «Κεφάλαιον» ἐπὶ «χρόνος». Συνεπῶς ἔχομεν :

Κεφάλαιον · χρόνος	Τόκος
100 · 1	5
20000 · 3	x

$$\begin{aligned} \frac{100 \cdot 1}{20000 \cdot 3} &= \frac{5}{x} \Leftrightarrow 100x = 20000 \cdot 5 \cdot 3 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow x = \frac{20000 \cdot 5 \cdot 3}{100} \quad (1) \Leftrightarrow x = 3000. \end{aligned}$$

"Αρα ὁ τόκος είναι 3000 δρχ.

'Εάν τὸ δ τόκος, κ τὸ κεφάλαιον, ε τὸ ἐπιτόκιον καὶ t δ χρόνος καὶ ἐργασθῶμεν ως καὶ διὰ τὴν ἔξισωσιν (1), θὰ ἔχωμεν τὸν τύπον :

$$t = \frac{\kappa \cdot \epsilon \cdot t}{100}$$

Τὸν τύπον αὐτὸν εύρισκομεν καὶ ως ἔξῆς :

'Επειδὴ 100 δρχ. φέρουν τόκον ε δρχ. εἰς 1 ἔτος

ή 1 δρχ. θὰ φέρῃ τόκον  $\frac{\epsilon}{100}$  δρχ. εἰς 1 ἔτος καὶ

αὶ κ δρχ. θὰ φέρουν τόκον  $\kappa \cdot \frac{\epsilon}{100}$  δρχ. εἰς 1 ἔτος.

Αἱ κ δρχ. εἰς t ἔτη θὰ φέρουν τόκον  $\kappa \cdot \frac{\epsilon}{100} \cdot t$  δρχ. "Αρα  $t = \frac{\kappa \cdot \epsilon \cdot t}{100}$

**Σημείωσις 1.** Εἰς τὸν τύπον τοῦ τόκου ἡ μεταβλητὴ τι παριστά τιμὰς χρόνου εἰς ἔτη. 'Εὰν ἔχωμεν μῆνας ἢ ἡμέρας τότε ὁ ἀνωτέρω τύπος γίνεται:  $\tau = \frac{\text{Κ.Ε.Η}}{1200}$  ἢ  $\tau = \frac{\text{Κ.Ε.Η}}{36000}$  (μ είναι ἡ τιμὴ χρόνου εἰς μῆνας καὶ η τιμὴ χρόνου εἰς ἡμέρας).

2. Θεωροῦμεν τὸ ἐμπορικὸν ἔτος μὲ 360 ἡμέρας καὶ 30 ἡμέρας ἕκαστον μῆνα.

$$3. \text{ Ο τύπος } \tau = \frac{\kappa \cdot \epsilon \cdot \eta}{36000} \text{ λαμβάνει την μορφή } \tau = \frac{\kappa \cdot \eta}{\frac{36000}{\epsilon}} = \frac{v}{\delta}$$

Τό πηλίκον  $\frac{36000}{\epsilon}$  λέγεται σταθερός διαιρέτης και τό γινόμενον  $\kappa.\eta = v$  λέγεται τοκάριθμος. "Αρα δ τόκος ισούται μὲ τό πηλίκον τοῦ τοκαρίθμου διὰ τοῦ σταθεροῦ διαιρέτου  $\tau = \frac{v}{\delta}$

**Πρόβλημα 2ον** Ποιον Κεφάλαιον είσ 11 μήνας πρὸς 6% φέρει τόκον 1100 δρχ;

"Εστω  $x$  δρχ. τὸ κεφάλαιον. Ἐκ τοῦ τύπου τοῦ τόκου  $\tau = \frac{\kappa \cdot \epsilon \cdot μ}{1200}$  λαμβάνομεν τὴν ἔξισωσιν  $1100 = \frac{x \cdot 6 \cdot 11}{1200} \Leftrightarrow 1100 \cdot 1200 = 6 \cdot 11 \cdot x \Leftrightarrow x = \frac{1200 \cdot 1100}{6 \cdot 11} \Leftrightarrow x = 200 \cdot 100 \Leftrightarrow x = 20000.$  Αρα τὸ κεφάλαιον εἶναι 20000 δρχ.

**Πρόβλημα 3ον** Έπι πόσον χρόνον κεφάλαιον 18000 δρχ. τοκιζόμενον πρός 8% έφερε τόκον 160 δρχ;

"Εστω χ έτη δ χρόνος. Έκ τοῦ τύπου  $\tau = \frac{\text{κ.ε.τ}}{100}$  λαμβάνομεν τὴν ἔξισω-  
σιν  $160 = \frac{1800.8 \cdot x}{100} \iff 160 = 180.8 \cdot x \iff x = \frac{160}{180.8} \iff x = \frac{20}{180} \iff$   
 $x = \frac{1}{9}$ . Επομένως δ χρόνος είναι  $\frac{1}{9}$  έτη ή  $\frac{1}{9} \cdot 12 = \frac{4}{3}$  μῆνας ή  $\frac{4}{3} \cdot 30 =$   
 $= 40$  ημέρας.

**Πρόβλημα 4ον.** Πρὸς ποῖον ἐπιτόκιον πρέπει νὰ τοκίσωμεν 45000 δρχ. διὰ νὰ λάβωμεν μετὰ 52 ἡμέρας τόκον 260 δρχ.;

Εις τὸν τύπον  $\tau = \frac{\kappa \cdot \epsilon \cdot \eta}{36000}$  ἀντικαθιστῶμεν τὰ δεδομένα καὶ ἐπιλύομεν τὴν ἔξισωσιν ὡς πρὸς ἄγνωστον τὸ ε.

$$\frac{45.52}{260.36} \Leftrightarrow \epsilon = 4. \text{ Αρα } \epsilon\% = 4\%, \text{ δηλαδή πρέπει νά τοκίσωμεν πρός } 4\%$$

**Πρόβλημα 5ον.** Ποιον Κεφάλαιον τοκιζόμενον πρὸς 5 % διὰ 72 ημέρας  
ξύπνει 10100 δοχ. μὲ τὸν τόκον του;

"Έχουμεν κεφάλαιον σύν τόκος ἵσον 10100 δρχ. Ἐὰν χ δρχ. τὸ κεφάλαιον

$$\text{λαμβάνομεν την έξισωσιν: } x + \frac{x \cdot 5,72}{36000} = 10100 \iff x + \frac{x \cdot 360}{360 \cdot 100} = 10100$$

$$10100 \iff x + \frac{x}{100} = 10100 \iff 100x + x = 1010000 \iff 101x = 1010000$$

$$\iff x = \frac{1010000}{101} \iff x = 10000. \text{ Τότε κεφάλαιον είναι } 10000 \text{ δρχ.}$$

**Πρόβλημα 6ον.** Έτοκισε κάποιος τὰ  $\frac{3}{5}$  τοῦ κεφαλαίου του πρὸς 5,5% καὶ τὸ ύπόλοιπον πρὸς 4,5%. Εάν ἀπὸ τὸ α' μέρος τοῦ κεφαλαίου ἔλαβε μετὰ ἐν ἔτος 120 δρχ. τόκον περισσότερον παρὰ ἀπὸ τὸ β' μέρος, νὰ εύρεθῇ τὸ κεφάλαιον. Εστω  $x$  δρχ. τὸ κεφάλαιον. Τὸ α' μέρος είναι  $\frac{3}{5}x$  καὶ ὁ τόκος αὐτοῦ  $\frac{3}{5}x \cdot 5,5,1$ . Τὸ β' μέρος είναι  $\frac{2}{5}x$  καὶ ὁ τόκος του (εἰς ἐν ἔτος) είναι:  $\frac{2}{5}x \cdot 4,5,1$

"Εχομεν ὅμως: Τόκος α' μέρους πλὴν τόκος β' μέρους ἰσον 120. Συνεπῶς τὴν έξισωσιν:

$$\frac{\frac{3}{5}x \cdot 5,5}{100} - \frac{\frac{2}{5}x \cdot 4,5}{100} = 120 \iff \frac{3x \cdot 1,1}{100} - \frac{2x \cdot 0,9}{100} = 120$$

$$\iff \frac{3x - 1,8x}{100} = 120 \iff \frac{1,5x}{100} = 120 \iff 1,5x = 12000 \iff x = \frac{12000}{1,5}$$

$$\iff x = 8000. \text{ Τότε κεφάλαιον είναι } 8000 \text{ δρχ.}$$

**Σημείωσις.** Ο τόκος κεφαλαίου 6000 δρχ. πρὸς 6% διὰ 89 ήμέρας εύρισκεται συντόμως διὰ τοῦ τύπου  $\tau = \frac{v}{δ} = \frac{6000 \cdot 89}{36000} = \frac{6000 \cdot 89}{6000} = 89$ . Ο τόκος είναι 89 δρχ.

"Οταν τὸ κεφάλαιον ἰσοῦται πρὸς τὸν σταθερὸν διαιρέτην, ὁ τόκος ἰσοῦται πρὸς τὸν ἀριθμὸν τῶν ήμερῶν.

### Προβλήματα

273. Πόσον τόκον φέρουν α) 16000 δρχ. πρὸς 4,5% διὰ 8 μῆνας

β) 4500 δρχ. πρὸς 8% διὰ 179 ήμέρας

γ) 7200 δρχ. πρὸς 5% διὰ 211 ήμέρας

δ) 12000 δρχ. πρὸς 6% διὰ 97 ήμέρας

274. Νὰ εύρεθῇ τὸ κεφάλαιον, ἐάν  $\epsilon\% = 5\%$ , ὁ τόκος είναι 345 δρχ. καὶ ὁ χρόνος 115 ημέρ.

275. Νὰ εύρεθῃ ὁ χρόνος, ἐάν  $\epsilon\% = 6\%$ , ὁ τόκος είναι 138 δρχ. καὶ τὸ κεφ. 4600 δρχ.

276. Νὰ εύρεθῇ τὸ ἐπιτόκιον, ἐάν τὸ κεφαλ. είναι 3600 δρχ., ὁ τόκος 480 δρχ. καὶ ὁ χρ. 20 μῆν.

277. Ποιον κεφάλαιον είς 100 ήμέρας πρός 4,5 % φέρει τόκον, δισον δίδει κεφάλαιον 8000 δρχ. διά 6 μήνας πρός 5%;

278. Τά  $\frac{5}{8}$  κεφαλαίου ἐτοκίσθησαν πρός 6,5% καὶ διά 5 μήνας ἔδωσαν τόκον 650 δρχ. Ποιον τὸ κεφάλαιον;

279. Κεφάλαιον 37500 δρχ. ἐτοκίσθη πρός 6% καὶ ἔγινε μὲ τὸν τόκον του 37750 δρχ. Νὰ εὔρεθῇ ὁ χρόνος.

280. Ἐδανείσθημεν 1200 δρχ. πρὸς 9% καὶ ἐπληρώσαμεν τὴν 2αν Φεβρουαρίου διὰ κεφάλαιον καὶ τόκον 1386 δρχ. Πότε ἔδανείσθημεν τὸ κεφάλαιον;

281. Πρὸς ποιὸν ἐπιτόκιον, κεφάλαιον 12000 δρχ. ἔδωσε τόκον 1250 δρχ. εἰς χρόνον ἴσον πρὸς τὸν χρόνον, κατὰ τὸν ὅποιον ἐτοκίσθησαν 3600 δρχ. πρὸς 4% καὶ ἔγιναν μετὰ τοῦ τόκου τῶν 4000 δρχ.;

282. Κεφάλαιον 111000 δρχ. κατετέθη εἰς τράπεζαν τὴν 14ην Μαρτίου καὶ τὴν 17ην Ὁκτωβρίου τοῦ ἐπομένου ἑτοις ἀπεισύρθη μετὰ τῶν τόκων του. Ποιον τὸ ἐπιτόκιον, ἐὰν κεφάλαιον καὶ τόκος ἀνήρχοντο εἰς 121600,50 δρχ.;

283. Ποιον κεφάλαιον αὐξῆθην κατὰ τὸν τόκον του, ἔγινε εἰς 40 μῆνας πρὸς 4,5 %, 13800 δρχ.; (Ἐὰν  $x$  δρχ. τὸ κεφάλαιον, δ τόκος του θὰ είναι  $\frac{x \cdot 4,5 \cdot 40}{1200}$  καὶ  $\frac{x \cdot 4,5 \cdot 40}{1200} = 13800$ )

284. Ἐδανείσθημεν ἐν ποσὸν χρημάτων μὲ τὴν συμφωνίαν νὰ κρατηθοῦν οἱ τόκοι προκαταβολικῶν. Ποιον ἥτο τὸ κεφάλαιον, ἐὰν μᾶς ἔδωσαν 9800 δρχ. καὶ ἐκράτησαν τόκους 4 μηνῶν πρὸς 6%; (Κεφάλαιον πλὴν τόκος=9800 δρχ.:  $\kappa \cdot \frac{6 \cdot 4}{1200} = 9800$ ).

285. Ἐτόκισε τὶς τὰ  $\frac{2}{3}$  τοῦ κεφαλαίου του πρὸς 4% καὶ τὸ ὑπόλοιπον πρὸς 5% καὶ ἔλαβεν ἑτήσιον τόκον 546 δρχ. Ποιον τὸ κεφάλαιον;

## 5. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΦΑΙΡΕΣΕΩΣ

### § 106. α) Γραμμάτια.

Ἐκεῖνος, δ ὅποιος δανειζέται χρήματα ἢ ἀγοράζει ἐμπορεύματα ἐπὶ πιστώσει (δὲν πληρώνει ἀμέσως τὴν ἀξίαν αὐτῶν) δίδει εἰς τὸν δανειστήν, ἢ πιστωτὴν ἔγγραφον ὑπόσχεσιν πληρωμῆς τοῦ χρέους του. Τὸ ἔγγραφον αὐτὸ λέγεται γραμμάτιον.

### Τύπος γραμμάτου

Ἐν Ἀθήναις τῇ 20ῃ Μαρτίου 1970.

Διὰ δραχμὰς 5000.

Μετὰ δύο μῆνας ἀπὸ σήμερον, ἥτοι τὴν 20ην Μαΐου 1970, ὑπόσχομαι νὰ πληρώσω εἰς τὸν κ. Α..... ἢ εἰς διαταγὴν αὐτοῦ τὸ ἀνω ποσὸν τῶν πέντε χιλιάδων δραχμῶν (5000), ὅπερ ἔλαβον παρ' αὐτοῦ ὡς δάνειον.

Χαρτόσημον

Β.....

(Ὑπογραφὴ καὶ Δ/νσις διφειλέτου)

Συνήθως είς τάς έμπορικάς συναλλαγάς γίνεται χρήσις ένός έγγραφου, τό όποιον λέγεται συναλλαγματική. Τήν συναλλαγματικήν έκδίδει δι πιστωτής και τήν άποδέχεται δι όφειλέτης διά τῆς ύπογραφής του.

### Τύπος συναλλαγματικῆς

Ληξις τῇ 20 - 5 - 1970.

Συναλλαγματική διά δρχ. 5000.

Τήν 20ήν Μαΐου 1970 πληρώσαστε δυνάμει τῆς παρούσης μόνης Συναλλαγματικῆς είς διαταγήν μου καὶ εἰς..... τό ἄνω ποσὸν τῶν πέντε χιλιάδων δραχμῶν, δν τὸ Ισότιμον ἐλάβατε παρ' ἐμοῦ είς έμπορεύματα τῆς τελείας ἀρεσκείας σας καὶ ἐν ὑπερημερίᾳ μετά τοῦ νομίμου τόκου ἀπό τῆς λήξεως μέχρις ἔξοφλήσεως.

Χαρτόσημον

Πρὸς τὸν κ. Β.....	'Εν 'Αθήναις τῇ 20-3-1970
Δ/νσις.....	ὅ ἐκδότης
'Εν 'Αθήναις τῇ 20-3-1970	A.....
Δεκτὴ	(Υπογραφή καὶ Δ/νσις)
B.....	(Υπογραφή)

Τὸ ποσόν, τό όποιον ἀναγράφεται είς έγγραφον ύπόσχεσιν, λέγεται δνομαστική ἀξία τοῦ γραμματίου. Ταύτην συμβολίζομεν μὲ τὸ γράμμα ο.

'Η ἡμερομηνία κατὰ τήν όποιαν είναι πληρωτέον τὸ γραμμάτιον είναι ἡ ληξις τοῦ γραμματίου.

### β) Ὁπισθογράφησις καὶ προεξόφλησις γραμματίου.

"Υποθέτομεν διτὸς δ. κ. Α είναι κάτοχος τοῦ ἀνωτέρω γραμματίου δνομ. ἀξίας 5000 δρχ., τό όποιον λήγει μετά 2 μῆνας. Μετά 20 ἡμέρας ἀπό τήν έκδόσεως τοῦ γραμματίου (ἡ 40 ἡμ. πρὸ τῆς λήξεως του, δηλαδὴ τήν 10-4-1970) δ. κ. Α ἔχει ἀνάγκην χρημάτων καὶ μεταβιβάζει, δηλαδὴ πωλεῖ τὸ γραμμάτιον εἰς τρίτον πρόσωπον (ἥ συνήθως εἰς Τράπεζαν) ἐφ' δσον προηγουμένως ύπογράψη δηπισθεν αὐτοῦ διά τήν ἐν λόγῳ μεταβιβασιν ἡ πώλησιν. Τοῦτο δὲ λέγεται ὥπισθογράφησις τοῦ γραμματίου. 'Ο δέ πωλητής, κ. Α, λέγεται καὶ κομιστής τοῦ γραμματίου.

'Ο ἀγοραστής τοῦ γραμματίου κρατεῖ ἐκ τῆς δν. ἀξίας τὸν τόκον αὔτης διά 40 ἡμέρας πρὸς ἐν ὡρισμένον ἐπιτόκιον π. χ. 4,5 %  $\left( 5000 \cdot \frac{4,5}{100} \cdot \frac{40}{360} = 25 \right)$  καὶ τὸ ὑπόλοιπον, (5000-

25 = 4975), δίδει εἰς τὸν κομιστήν κ. Α. Ἡ διαδικασία αὗτη λέγεται προεξόφλησις τοῦ γραμματίου. Ὁ χρόνος μεταξύ ἡμερομηνίας προεξόφλησεως καὶ λήξεως τοῦ γραμματίου λέγεται καὶ προθεσμία.

Τὸ ποσὸν τῶν 25 δρχ., τὸ δποῖον κρατεῖ ὁ ἀγοραστής, λέγεται ἔξωτερικὴ ὑφαίρεσις. Συμβολίζομεν αὐτὴν μὲ τὸ γράμμα υ. (Γενικῶς ὑφαίρεσις εἶναι ἡ ἐκπτωσις, τὴν δποίαν ὑφίσταται γραμμάτιον, δταν προεξόφληται, δηλαδὴ δταν πλήρωνται πρὸ τῆς λήξεώς του). Εἰς τὰ ἐπόμενα θὰ λέγωμεν ὑφαίρεσιν καὶ θὰ ἐννοοῦμεν ἔξωτερικὴν ὑφαίρεσιν. Τὸ ποσὸν 4975 δρχ. = 5000 δρχ. - 25 δρχ. λέγεται παροῦσα ἀξία τοῦ γραμματίου καὶ ισοῦται πρὸς τὴν διαφοράν τῆς ἔξ.ὑφ. ἀπὸ τῆς δν. ἀξίας. Ἐὰν συμβολίσωμεν μὲ π τὴν παροῦσαν ἀξίαν ἔχομεν τὰς κάτωθι ισοδυναμίας:

$$\pi = o - u \iff \pi + u = o \iff u = o - \pi \quad (1)$$

Ἐπειδὴ ἡ ὑφαίρεσις εἶναι ὁ τόκος τῆς δνομαστικῆς ἀξίας, τὰ προβλήματα τῆς ὑφαίρεσεως ἐπιλύονται μὲ τοὺς τύπους τοῦ τόκου, εἰς τοὺς δποίους τὸ κεφάλαιον κ ἀντικαθίσταται διὰ τῆς δν. ἀξίας ο καὶ τὸ τ διὰ τοῦ υ. π.χ.

Τύπος τοῦ τόκου

$$\tau = \frac{\kappa.e.t}{100}$$

Τύπος ἔξ. ὑφαίρεσεως

$$u = \frac{o.e.t}{100}$$

**Σημείωσις.** Γραμμάτιον ἢ συναλλαγματικὴ μὴ περιέχον τὰς λέξεις εἰς διαταγήν, δὲν δύναται νὰ μεταβιβασθῇ εἰς ἄλλον.

Εἰς τὰ κατωτέρω προβλήματα θὰ χρησιμοποιοῦμεν τὴν λέξιν «γραμμάτιον» καὶ θὰ ἐννοοῦμεν Ἕγγραφον ὑπόσχεσιν (γραμμάτιον ἢ συναλλαγματικήν) μεταβιβαζούμενην εἰς τρίτον πρόσωπον ἢ εἰς Τράπεζαν.

### Παραδείγματα :

1ον. Γραμμάτιον δν. ἀξίας 3000 δρχ. προεξωφλήθη τὴν 10ην Μαΐου πρὸς 6% ἀντὶ 2980 δρχ.. Πότε ἔληγε τὸ γραμμάτιον;

Ἐὰν χ ἔτη ὁ χρόνος μεταξύ προεξόφλησεως καὶ λήξεως τοῦ γραμματίου, ἐκ τοῦ τύπου  $u = o - \pi$  εύρισκομεν τὴν ὑφαίρεσιν 20 δρχ. καὶ ἐκ τοῦ τύπου  $u = \frac{o.e.t}{100}$  ἔχομεν τὴν ἔξισωσιν  $20 = \frac{3000.6.x}{100} \iff 20 = 30.6.x \iff x = \frac{20}{180}$

$\iff x = \frac{1}{9}$ . Ὁ χρόνος εἶναι  $\frac{1}{9}$  ἔτη ἢ  $\frac{1}{9} \cdot 360$  ἡμέρ.= 40 ἡμέρας. Ἀρα τὸ γραμμάτιον ἔληγε εἰς τὰς 20 Ιουνίου τοῦ ίδίου ἔτους.

2ον. Νὰ εύρεθῃ ἡ δν. ἀξία καὶ ἡ ὑφαίρεσις γραμματίου, τὸ δποῖον προεξωφλήθη 40 ἡμέρας πρὸ τῆς λήξεώς του πρὸς 9% ἀντὶ 1980 δρχ..

Ἐὰν χ δρχ. ἡ δν. ἀξία, ἡ ὑφαίρεσις θὰ εἶναι  $\frac{x.e.n}{36000}$  καὶ ὁ τύπος  $o - u = \pi$  γίνεται :

$$\chi - \frac{x.e.n}{36000} = \pi. \text{ Ἐκ τούτου λαμβάνομεν τὴν ἔξισωσιν } \chi - \frac{x.9.40}{36000} = 1980 \iff \\ \chi - \frac{x}{100} = 1980 \iff 100\chi - x = 198000 \iff 99\chi = 198000 \iff x = \frac{198000}{99} \\ \iff x = 2000. \text{ Ἡ δν. ἀξία εἶναι 2000 δρχ. καὶ ἡ ὑφαίρεσις εἶναι 2000 δρχ.} \\ - 1980 δρχ. = 20 δρχ.$$

## Προβλήματα

286. Ποια ή έξ. ύφασματος και ή παρ. αξία γραμματίου όν. αξίας 2600 δρχ., τό δποιον προεξωφλήθη 2 μήνας πρό της λήξεως του πρός 6%;
287. Νά εύρεθη ή όν. αξία και ή παρ. άξ. γραμματίου, τό δποιον προεξωφλήθη 5 μήνας πρό της λήξεως του πρός 7,2% και είχεν έξ. ύφασματος 60 δρχ.
288. Ποιος ό χρόνος μεταξύ λήξεως και προεξοφλήσεως γραμματίου 2160 δρχ., τό δποιον προεξωφλήθη πρός 8% άντι 2131,2 δρχ.;
289. Πρός ποιον έπιτοκιον προεξωφλήθη γραμματίου 3200 δρχ., 50 ήμέρας πρό της λήξεως του άντι 3168 δρχ.;
290. Νά εύρεθη ή έξ. γραμματίου προεξοφληθέντος 3 μήνας πρό της λήξεως του άντι 2751 δρχ. πρός 7%.
291. Γραμμάτιον ήτο πληρωτέον τήν 28ην 'Ιουνίου και προεξωφλήθη άντι 2970 δρχ. τήν 13ην Μαΐου (τοῦ 1δίου έτους) πρός 8%. Ποια ή δν. αξία αύτοῦ;
292. Γραμμάτιον προεξωφλήθη 80 ήμέρας πρό της λήξεως του πρός 9% άντι 4410 δρχ. Τι κέρδος θά είχεν δ κομιστής, έαν ή προεξόφλησης έγένετο πρός 8%;
293. 'Εάν ή δν. αξία είναι 1600 δρχ., ε<sup>0%</sup> = 9%, και η παρ. αξία είναι 1562 δρχ., νά εύρεθη δ χρόνος.
294. 'Εάν ή δν. αξία είναι 1200 δρχ., η παρ. αξία είναι 1155 δρχ. και ό χρόνος είναι 5 μήνες νά εύρεθη τό έπιτοκιον.
295. 'Εάν ή παρ. αξία είναι 4900 δρχ., ε<sup>0%</sup> = 6%, και ό χρόνος είναι 4 μήνες νά εύρεθη ή δνομαστική αξία.
296. Δύο γραμμάτια μέ διθροισμα δινομαστικών αξιῶν 14400 δρχ. προεξοφλούνται δμού πρός 6% άντι 14214 δρχ. 'Εάν τό α' έληγε μετά 3 μήνας και τό β' μετά 2 μήνας νά ύπολογισθῇ ή δν. αξία έκαστου γραμματίου.

### 6. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ

**§ 107.** 'Εάν εις μαθητής έχῃ 8 εις τά γραπτά ένος μαθήματος και 12 εις τά προφορικά, τότε δ βαθμός τοῦ μαθήματος θά είναι  $\frac{8+12}{2} = 10$ . Ό διθριμός 10 λέγεται μέσος όρος τῶν άριθμῶν 8 και 12.

'Εάν οι βαθμοὶ τοῦ μαθητοῦ εις τά μαθήματά του είναι : 10, 11, 17, 12, 14, 13, 16, 14, 15, 17 τότε δ γενικὸς βαθμός εις τό ένδεικτικόν του θά είναι διθριμός  $\frac{10+11+17+12+14+13+16+14+15+17}{10} = \frac{139}{10} = 13\frac{9}{10}$ , δ δ-

ποίος είναι δ μέσος όρος τῶν βαθμῶν τοῦ μαθητοῦ.

Γενικῶς : 'Αριθμητικὸς μέσος όρος διαφόρων δμοειδῶν άριθμῶν λέγεται τό πηλίκον τῆς διαιρέσεως τοῦ άθροίσματος τῶν άριθμῶν διὰ τοῦ πλήθους αὐτῶν.

'Εάν  $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$  είναι δμοειδεῖς άριθμοὶ ( $n \in \mathbb{N}$ ) τότε δ διθριμός  $\frac{x_1+x_2+x_3+\dots+x_n}{n} = x_{\mu}$  είναι δ μέσος όρος αὐτῶν. 'Επειδὴ  $x_1+x_2+\dots+x_n = n x_{\mu}$ , λέγομεν ότι τό άθροισμα διθέντων άριθμῶν ίσοῦται πρός τό γινόμενον τοῦ μέσου όρου των έπι τό πλήθος αὐτῶν.

**Σημειώσις.** Έάν δ ἀριθμός  $x_1$  ἐμφανίζεται  $\kappa_1$  φοράς, δ  $x_2$ ,  $\kappa_2$  φοράς και δ  $x_3$ ,  $\kappa_3$  φοράς τότε  $x = \frac{\kappa_1 x_1 + \kappa_2 x_2 + \kappa_3 x_3}{\kappa_1 + \kappa_2 + \kappa_3}$

### Έφαρμογα!

1. Νὰ εύρεθῇ δ ἀριθμός, δ ὅποιος είναι μέσος δρος τῶν 15 και 20.

Έχομεν  $\frac{15+20}{2} = \frac{35}{2} = 17,5$ . Παρατηροῦμεν δτι  $15 < 17,5 < 20$  και δτι

$$17,5 - 15 = 20 - 17,5.$$

Ο μέσος δρος τῶν ἀριθμῶν α και β είναι δ  $\frac{\alpha+\beta}{2}$ , δ ὅποιος περιέχεται μεταξύ τῶν α

και β (π.χ. έάν  $\alpha < \beta \Rightarrow \alpha < \frac{\alpha+\beta}{2} < \beta$ ) και είναι  $\frac{\alpha+\beta}{2} - \alpha = \beta - \frac{\alpha+\beta}{2}$

2. Έάν 11 είναι δ προφ. βαθμός ἐνὸς μαθητοῦ εἰς ἐν μάθημα και εἰς τὸν ἐλεγχὸν αὐτοῦ δ μ. δρος ήτο 13, διά τὸ μάθημα αὐτό, ποιος δ γραπτὸς βαθμός;

Έάν  $x$  δ βαθμός τῶν γραπτῶν, έχομεν  $\frac{11+x}{2} = 13 \Leftrightarrow 11+x=26 \Leftrightarrow x=15$ .

### Προβλήματα

297. Νὰ εύρεθῃ ἡ μέση θερμοκρασία ἐνὸς ἀσθενοῦς εἰς μίαν ἡμέραν, έάν ἔθερμομετρήθη 3 φοράς και ἔδειχε θερμοκρασίαν 38 β., 38,7 β., και 38,2 β.

298. Νὰ εύρεθῃ δ μ. δρος τῶν ἀριθμῶν 7, 10, 13, 16, 19. Επίστης τῶν ἀριθμῶν 7 και 19. Τι παρατηρεῖτε;

299. Νὰ εύρεθῃ δ μ. δρος τῶν 10, 14, 18, 22. Επίστης τῶν 10 και 22. Τι παρατηρεῖτε;

300. Νὰ εύρεθῃ τὸ δῆμοισα τῶν ἀκέρ. ἀπὸ 1 ἕως 49. (Νὰ εὕρητε πρῶτον τὸν μ. δρον).

301. Ο μ. δρος τῶν βαθμῶν τριῶν μαθημάτων ήτο 14,5. Κατόπιν μετεβλήθη δ βαθμὸς ἐνὸς μαθημάτου και δ μ. δρος ἐγίνε 15,5 Πόσον ηύξηθη δ βαθμὸς τοῦ ἐν λόγῳ μαθήματος;

### 7. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΡΙΣΜΟΥ

#### § 108. Πρόβλημα 1ον.

Νὰ μερισθῇ δ ἀριθμὸς 100 εἰς μέρη ἀνάλογα πρὸς τοὺς ἀριθμοὺς 2, 3 και 5.

Έάν  $x, y, z$  είναι οι ζητούμενοι ἀριθμοὶ θὰ ἔχωμεν  $x+y+z=100$  και ἐπειδὴ είναι ἀνάλογοι πρὸς τοὺς 2, 3 και 5 θὰ ἔχωμεν τοὺς λόγους :

$$\frac{x}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z}{5} \Leftrightarrow \frac{x}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z}{5} = \frac{x+y+z}{2+3+5} = \frac{100}{10} = 10.$$

Άρα  $\frac{x}{2} = 10 \Leftrightarrow x = 20$ ,  $\frac{y}{3} = 10 \Leftrightarrow y = 30$  και  $\frac{z}{5} = 10 \Leftrightarrow z = 50$ .

#### Πρόβλημα 2ον.

Νὰ μερισθῇ δ 130 εἰς μέρη ἀντιστρόφως ἀνάλογα τῶν ἀριθμῶν 2, 3 και 4.

Έάν  $x, y, z$  είναι τὰ μέρη τοῦ 130, θὰ είναι  $x+y+z=130$ .

Έπειδή οι  $x, \psi, z$  είναι άντιστρ. άναλογοι τῶν 2, 3, 4, οὗτοι θὰ είναι άναλογοι τῶν  $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}$ . Έπομένως :

$$\frac{x}{\frac{1}{2}} = \frac{\psi}{\frac{1}{3}} = \frac{z}{\frac{1}{4}} \Leftrightarrow \frac{x}{\frac{1}{2} \cdot 12} = \frac{\psi}{\frac{1}{3} \cdot 12} = \frac{z}{\frac{1}{4} \cdot 12}$$

$$\Leftrightarrow \frac{x}{6} = \frac{\psi}{4} = \frac{z}{3} = \frac{x+\psi+z}{6+4+3} = \frac{130}{13} = 10. \text{ Άρα } x=60, \psi=40, z=30.$$

Πρόβλημα 3ον.

Κεφάλαιον 10000 δρχ. κατετέθη διά 6 μῆνας, ένω δλλο κεφάλαιον 9000 δρχ. κατετέθη διά 10 μῆνας μὲ τὸ αύτὸ ἐπιτόκιον. Έὰν καὶ τὰ δύο κεφάλαια ἔφερον 500 δρχ. τόκον, πόσος τόκος άναλογεῖ εἰς κάθε κεφάλαιον;

Έστω  $x$  δρχ. δ τόκος, δ ὅποιος άντιστοιχεῖ εἰς τὸ κεφάλαιον 10000 δρχ. καὶ  $\psi$  δρχ. δ τόκος, δ ὅποιος άντιστοιχεῖ εἰς τὸ κεφάλαιον 9000 δρχ.

Γνωρίζομεν ὅτι δ τόκος είναι άναλογος πρὸς τὸ κεφάλαιον καὶ πρὸς τὸν χρόνον, ἐπομένως θὰ είναι άναλογος καὶ πρὸς τὸ γινόμενον «κεφάλαιον ἐπὶ χρόνῳ».

Συνεπῶς  $\frac{x}{10000 \cdot 6} = \frac{\psi}{9000 \cdot 10} \Leftrightarrow \frac{x}{6} = \frac{\psi}{9} \Leftrightarrow \frac{x}{2} = \frac{\psi}{3} = \frac{x+\psi}{2+3} =$

$$= \frac{500}{5} = 100.$$

Άρα  $\frac{x}{2} = 100 \Leftrightarrow x = 200$  καὶ  $\frac{\psi}{3} = 100 \Leftrightarrow \psi = 300$ .

Οἱ τόκοι είναι 200 δρχ. καὶ 300 δρχ. άντιστοίχως.

Σημείωσις.

Έὰν  $\tau_1, \tau_2$  τίμαι τοῦ τόκου

$\kappa_1, \kappa_2$  τίμαι τοῦ κεφαλαίου

$t_1, t_2$  τίμαι τοῦ χρόνου, έχομεν τὸν πίνακα

T	$\tau_1$	$\tau_2$
$\kappa$	$\kappa_1$	$\kappa_2$
t	$t_1$	$t_2$
$\kappa t$	$\kappa_1 t_1$	$\kappa_2 t_2$

καὶ ἐκ τούτου τὴν άναλογίαν  $\frac{\tau_1}{\kappa_1 t_1} = \frac{\tau_2}{\kappa_2 t_2}$ .

Έὰν  $\tau_1 = \tau_2$  μερίζομεν τὸν τόκον (ἢ τὸ κέρδος) άναλόγως τῶν κεφαλαίων

Έὰν  $\kappa_1 = \kappa_2$  μερίζομεν τὸν τόκον (ἢ τὸ κέρδος) άναλόγως τῶν χρόνων

(Τὸ ἐπιτόκιον θεωρεῖται σταθερόν. Εἰναι δύνατὸν νὰ εὑρεθῇ τὸ ἐπιτόκιον εἰς τὸ 3ον πρόβλημα;).

**Πρόβλημα 4ον.**

Χρηματικὸν ἔπαθλον ἐκ 4840 δρχ. πρόκειται νὰ μοιρασθῇ εἰς τοὺς τρεῖς πρώτους δρομεῖς, οἱ δόποιοι ἐπέτυχον τὰς ἔξῆς τιμᾶς χρόνου ἐπιδόσεως (εἰς ἀγώνισμα δρόμου μιᾶς ἀποστάσεως)· ὁ πρῶτος ἐτερμάτισεν εἰς 2,4 min, ὁ β' εἰς 2,7 min καὶ ὁ γ' εἰς 3 min. Πόσας δρχ. θὰ λάβῃ ἕκαστος;

"Εστω  $\chi$  δρχ.,  $\psi$  δρχ.,  $z$  δρχ., αἱ ἀμοιβαὶ ἀντιστοίχως τῶν  $\alpha'$ ,  $\beta'$ ,  $\gamma'$ .

Ἀμοιβὴ	$\chi$	$\psi$	$z$
Χρόνος ἐπιδ.	2,4	2,7	3
Ἀπόστασις	1	1	1

'Ἐπειδὴ ἡ ἀμοιβὴ εἶναι ἀντιστρόφως ἀνάλογος τοῦ χρόνου ἐπιδόσεως (διὰ τὴν αὐτὴν ἀπόστασιν), θὰ ἔχωμεν

$$\frac{\chi}{2,4} = \frac{\psi}{2,7} = \frac{z}{3} \leftrightarrow \frac{\chi}{2,4 \cdot 21,6} = \frac{\psi}{2,7 \cdot 21,6} = \frac{z}{\frac{1}{3} \cdot 21,6} \leftrightarrow$$

$$\frac{\chi}{9} = \frac{\psi}{8} = \frac{z}{7,2} = \frac{\chi + \psi + z}{9 + 8 + 7,2} = \frac{4840}{24,2} = 200.$$

"Ἄρα  $\frac{\chi}{9} = 200 \leftrightarrow \chi = 1800$ ,  $\frac{\psi}{8} = 200 \leftrightarrow 1600$  καὶ  $z = 1440$ .

"Ο α' θὰ λάβῃ 1800 δρχ., ὁ β' 1600 δρχ. καὶ ὁ γ' 1440 δρχ.

**Πρόβλημα 5ον.**

Τρεῖς συνεταῖροι κατέθεσαν εἰς μίαν ἐπιχείρησιν τὰ ἔξῆς ποσά: 'Ο α' 500000 δρχ., ὁ β' 600000 δρχ. καὶ ὁ γ' 660000 δρχ.

Τὰ χρήματα τοῦ α' ἔμειναν εἰς τὴν ἐπιχείρησιν ἐπὶ 2 ἔτη,

τὰ χρήματα τοῦ β' ἔμειναν εἰς τὴν ἐπιχείρησιν ἐπὶ 18 μῆνας καὶ

τὰ χρήματα τοῦ γ' ἔμειναν εἰς τὴν ἐπιχείρησιν ἐπὶ 20 μῆνας.

"Εάν ἐκέρδισαν 300000 δραχμάς, πόσον κέρδος πρέπει νὰ λάβῃ ἕκαστος;

Τὸ πρόβλημα αὐτὸν ἐπιλύεται, ὅπως τὸ ἀνωτέρω 3ον πρόβλημα. Μερίζομεν τὸ κέρδος ἀναλόγως πρὸς τὸ γινόμενον τῶν καταθέσεων ἐπὶ τοὺς χρόνους.

"Εστω  $\chi$  δρχ.,  $\psi$  δρχ.,  $z$  δρχ., ἀντιστοίχως τὰ κέρδη. "Έχομεν

$$\frac{\chi}{500000 \cdot 24} = \frac{\psi}{600000 \cdot 18} = \frac{z}{660000 \cdot 20} \leftrightarrow \frac{\chi}{120} = \frac{\psi}{108} = \frac{z}{132} \leftrightarrow$$

$$\frac{\chi}{10} = \frac{\psi}{9} = \frac{z}{11} = \frac{\chi + \psi + z}{10 + 9 + 11} = \frac{300000}{30} = 10000.$$

"Αρα  $\chi = 100000$ ,  $\psi = 90000$ ,  $z = 110000$ .

'Ο α' θά λάβη 100000 δραχμάς, ό β' 90000 δραχμάς και ό γ' 110000 δρχ.

### Προβλήματα

302. Νά μερισθῇ ὁ 180 εἰς μέρη ἀναλόγα τῶν α) 6, 10, 14 β) 3, 5, 7 γ) 18, 30, 42 καὶ δ) 360, 600, 840. Νά συγκρίνητε τὰ ἀποτελέσματα τῶν 4 περιπτώσεων καὶ νὰ δικαιολογήσῃτε αὐτό, τὸ δποιον θὰ εύρητε.

303. Νά μερισθῇ ὁ 260 ἀναλόγως τῶν  $\frac{3}{4}$ ,  $\frac{5}{6}$  καὶ  $\frac{7}{12}$

304. Νά μερισθοῦν: α) ὁ 480 ἀναλόγως τῶν 2,  $\frac{9}{4}$  καὶ  $\frac{6}{8}$  β) ὁ 310 ἀντιστρόφως ἀναλόγως τῶν 2, 3 καὶ 5 καὶ γ) ὁ 24 ἀντιστρόφως ἀναλόγως τῶν 2,  $\frac{1}{3}$  καὶ  $\frac{2}{5}$

305. Φιλόπτωχος σύλλογος ἐμοίρασεν 600 δραχμάς εἰς τρεῖς πτωχάς οἰκογενείας ἀναλόγως τοῦ ἀριθμοῦ τῶν μελῶν αὐτῶν. 'Η α' οἰκογένεια ἔχει 4μελής, ή β' 6μελής καὶ ή γ' 10μελής. Πόσας δραχμάς ἔλαβε κάθε οἰκογένεια;

306. Δύο αὐτοκίνητα ἑκκινοῦν συγχρόνως ἐκ δύο πόλεων, αἱ δποιαὶ ἀπέχουν 220 km πρὸς συνάντησίν των μὲ ταχύτητας 50 km/h καὶ 60 km/h. Νά εύρεθῇ πόσα km θὰ διανύσῃ ἕκαστον, ἔως δτου συναντησθοῦν.

307. Χρηματικὸν ἐπαθλον ἐκ 5200 δρχ. πρόκειται νὰ μοιρασθῇ εἰς δύο ποδηλάτας, οἱ δποιοι εἶχον τὰς ἔξις ἐπιδόσεις εἰς ἀγώνισμα δρόμου μιᾶς ἀποστάσεως: ὁ α' διήνυσε τὴν ἀπόστασιν εἰς 18 min καὶ ὁ β' εἰς 21 min. Πόσας δραχμάς θὰ λάβῃ ἕκαστος;

308. Δύο αὐτοκίνητα μετέφερον ἐμπορεύματα ἀντὶ 6800 δραχμῶν. 'Ο α' μετέφερεν 4,5 τον εἰς ἀπόστασιν 40 km καὶ ὁ β' 5 τον εἰς ἀπόστασιν 32 km. Πόσας δραχμάς ἔλαβεν ἕκαστος;

309. Τρεῖς ἀδελφαὶ ἐκλητρονόμησαν ἀπό τὸν θείον τους 700960 δρχ. ὑπὸ τὸν δρον νὰ διανεμησθοῦν ἀναλόγως τῆς ἡλικίας των. Αἱ ἡλικίαι αὐτῶν εἰναι 14 ἔτη, 16 ἔτη καὶ 21 ἔτη. Πόσας δρχ. θὰ λάβῃ ἕκαστος;

310. Δύο βοσκοὶ ἑνοικίασαν ἀγρὸν ἀντὶ 2850 δρχ. 'Ο α' ἐβόσκησε 200 πρόβατα ἐπὶ 25 ἡμέρας καὶ ὁ β' 150 πρόβατα ἐπὶ 30 ἡμέρας. Ποιὸν ποσὸν χρημάτων θὰ πληρώσῃ ἕκαστος;

311. "Εμπόρος ἥρχισεν ἐπιχειρησιν καταθέσας 100000 δρχ. Δύο μῆνας ἀργότερον προσέλαβε συνετάπιρον δ ὅποιος κατέθεσεν 150000 δρχ. "Ἐν ἔτος μετά τὴν πρόσληψιν τοῦ συνεταίρου εύρον δτι ἐκέρδισαν 99000 δρχ. Πόσον κέρδος θὰ λάβῃ ἕκαστος;

### 8. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΙΣΣΩΣ

§ 109. Τὰ προβλήματα, εἰς τὰ δποιαὶ γίνεται λόγος περὶ ἀναμείξεως διαφόρων ποιοτήτων ἐμπορευμάτων τοῦ αὐτοῦ εἶδους καὶ γενικῶς διαφόρων σωμάτων τὰ δποιαὶ δύνανται νὰ ἀναμιχθοῦν, λέγονται προβλήματα ἀναμείξεως ἢ μείξεως. Τὸ προϊὸν τῆς ἀναμείξεως ἢ μείξεως λέγεται μεῖγμα. Τὰ ἀναμειγνυόμενα σώματα λέγονται μέρη τοῦ μείγματος.

'Η ἐπίλυσις τῶν προβλημάτων τούτων θὰ γίνῃ τῇ βιοθείᾳ τῶν ἔξισώσεων καὶ στηρίζεται ἐπὶ τῶν ἔξις κανόνων :

1. Τὰ βάρη τῶν μερῶν ἔχουν ἀθροισμα τὸ βάρος τοῦ μείγματος.

2. 'Η τιμὴ κόστους τοῦ μείγματος ἰσοῦται πρὸς τὸ ἀθροισμα τῶν τιμῶν κόστους τῶν μερῶν αὐτοῦ.

**Πρόβλημα 1ον.** Έμπορος διέμειξε 150 kgr\* έλαιου των 24 δρχ. κατά kgr\*, με 100 kgr\* διλλης ποιότητος έλαιου των 29 δρχ. κατά kgr\*. Πόσον τιμάται τό kgr\* τού μείγματος;

"Εστω  $\chi$  δρχ. ή τιμή τού kgr\* τού μείγματος.

"Έχομεν: Τιμή α' ποιότητος σύν τιμή β' ποιότητος ίσον τιμή μείγματος.

$$100.29 + 150.24 = (150+100).\chi$$

"Επιλύομεν τήν έξισωσιν και εύρισκομεν  $\chi=26$ .

"Επομένως 26 δρχ. τιμάται τό kgr\* τού μείγματος.

**Σημείωσις.** Εις τό πρόβλημα αυτό δυνάμεθα νά ζητήσωμεν: πόσον πρέπει νά πωλήσουμεν τό κιλόν τού μείγματος διά νά κερδίστη 25% ἐπί τής τιμῆς κόστους τού μείγματος.

Μετά τήν εύρεσιν τής τιμῆς κόστους τού κιλού τού μείγματος προχωροῦμεν εις τήν ἐπιλογήν τά γνωστά ἐκ τῶν ποσοστῶν.

$$100 \text{ δρχ. κόστος} \quad 125 \text{ δρχ. πώλησις}$$

$$26 \text{ δρχ. κόστος} \quad x \quad \Rightarrow \frac{100}{26} = \frac{125}{x} \iff x = 32,50.$$

Πρέπει νά πωληθῇ 32,50 δρχ. τό κιλόν διά νά κερδίζῃ 25% ἐπί τού κόστους.

**Πρόβλημα 2ον.** Οινοπώλης διέμειξε οίνον των 5 δρχ./kgr\* με οίνον διλλης ποιότητος των 4 δρχ./kgr\* και έσχημάτισε μείγμα 100 kgr\* των 4,60 δρχ./kgr\*. Πόσα kgr\* έλαβεν έξι έκαστου είδους;

"Εστω ότι έλαβε  $\chi$  kgr\* ἐκ τής ποιότητος των 5 δρχ./kgr\*. Τότε ἐκ τής διλλης ποιότητος έλαβε  $(100-\chi)$  kgr\*. Επομένως έχομεν τήν έξισωσιν  $5\chi+4(100-\chi)=4,6.100$  ἐκ τής δόπιας εύρισκομεν  $\chi=60$ .

"Αρα έλαβε 60 kgr\* ἐκ τής α' ποιότητος καὶ 40 kgr\* ἐκ τής β' ποιότητος.

**Πρόβλημα 3ον.** Κατά ποίαν ἀναλογίαν πρέπει νά ἀναμείξωμεν λίπος τῶν 35 δρχ./kgr\* μὲ λίπος τῶν 30 δρχ./kgr\* διά νά σχηματίσωμεν μείγμα τῶν 32 δρχ./kgr\*;

"Εὰν λάβωμεν  $\chi$  kgr\* ἐκ τού λίπους τῶν 35 δρχ./kgr\* καὶ  $\psi$  kgr\* ἐκ τού λίπους τῶν 30 δρχ./kgr\*, τότε τό μείγμα θὰ είναι  $(\chi+\psi)$  kgr\* καὶ θὰ ξέχωμεν τήν έξισωσιν.

$35\chi+30\psi=32(\chi+\psi)$  ή δόπια έχει δύο ἀγνώστους. Ή μορφὴ ὅμως τής έξισώσεως αὐτῆς είναι τοιαύτη ὥστε δύναται νά εύρεθῇ δ λόγος τῶν  $\chi$ ,  $\psi$ .

$$\begin{aligned} \text{Π.χ. } 35\chi+30\psi &= 32(\chi+\psi) \iff 35\chi+30\psi-32\chi-32\psi \iff 35\chi-32\chi \\ &= 32\psi-30\psi \iff 3\chi=2\psi \iff \frac{\chi}{\psi} = \frac{2}{3} \iff \frac{\chi}{2} = \frac{\psi}{3} \end{aligned}$$

"Η ἀναλογία ἀναμείξεως είναι 2 kgr\* ἐκ τής ποιότητος τῶν 35 δρχ./kgr\* καὶ 3 kgr\* ἐκ τής διλλης ποιότητος.

**Πρόβλημα 4ον.** Έμπορος διέμειξε δύο ποιότητας ἐνὸς είδους τῶν

36 δρχ./kgr\* και 25 δρχ./kgr\*. Τό κόστος του μείγματος ήτο 30 δρχ./kgr\*. Έαν άπό τήν α' ποιότητα έλαβε 100 kgr\*, πόσα kgr\* έλαβεν έκ τής άλλης;

"Εστω ότι έλαβεν  $\chi$  kgr\* έκ τής β' ποιότητος.

"Έχομεν τήν έξισωσιν  $36 \cdot 100 + 25 \cdot \chi = 30(100 + \chi) \Leftrightarrow$

$$3600 + 25\chi = 3000 + 30\chi \Leftrightarrow 3600 - 3000 = 30\chi - 25\chi$$

$$5\chi = 600 \Leftrightarrow \chi = \frac{600}{5} \Leftrightarrow \chi = 120.$$

120 kgr\* έλαβεν έκ τής β' ποιότητος.

### Προβλήματα

312. Άναμείχθησαν 200 kgr\* οίνου τών 4 δρχ./kgr\* μὲ 300 kgr\* άλλης ποιότητος τών 4,5 δρχ./kgr\*. Πόσον άξιζει τό kgr\* του μείγματος;

313. "Εμπορος άνέμειξε 80 kgr\* έλαιου τών 25 δρχ./kgr\* μὲ 120 kgr\* άλλης ποιότητος τών 30 δρχ./kgr\*. Πόσον πρέπει νά πωλή τό kgr\* του μείγματος, διά νά έχῃ κέρδος 10% έπι τού κόστους; (ΑΙ τιμαι είναι τιμαι κόστους).

314. Κατά ποιάν άναλογίαν πρέπει νά άναμείξωμεν βούτυρον τών 50 δρχ./kgr\* μὲ βούτυρον τών 60 δρχ./kgr\*, διά νά έπιτυχωμεν μείγμα τών 56 δρχ./kgr\*; Και έναν σχηματίσωμεν μείγμα 50 kgr\*, πόσα kgr\* πρέπει νά λάβωμεν έξι έκάστης ποιότητος βουτύρου;

315. Καφεπώλης άνέμειξε καφέ τών 90 δρχ./kgr\* μὲ καφέ τών 82 δρχ./kgr\* και έκαμε μείγμα 12 kgr\* τών 88 δρχ./kgr.\* Πόσα kgr\* άνέμειξε έξι έκάστης ποιότητος;

316. "Εμπορος άνέμειξε 150 kgr\* έλαιου τών 32 δρχ./kgr\* μὲ 100 kgr\* άλλης ποιότητος 26 δρχ./kgr.\* Έαν πωλή τό μείγμα πρός 34,80 δρχ./kgr\* πόσον τοις έκαπτον κερδίζει; (ΑΙ τιμαι είναι τιμαι κόστους).

317. "Εγένετο μείγμα  $(100 + \chi)$  kgr\* έκ δύο ποιοτήτων του αύτοῦ είδους. Ή τιμή τού kgr\* τής α' (ποιότητος ήτο 35 δρχ., τής β' ποιότητος 30 δρχ. και τού μείγματος 32 δρχ. Έαν έκ τής β' ποιότητος έλληφθησαν  $\chi$  kgr\*, νά εύρεθῇ  $\delta \chi$ .

318. "Άναμειγνύονται 100 kgr\* τών 20 δρχ./kgr\* μὲ 80 kgr\* τών ζ δρχ./kgr\* δύο ποιοτήτων ένδος είδους. Έαν ή τιμή τού μείγματος είναι 22 δρχ./kgr\*, νά εύρεθῇ  $\delta \chi$ .

319. Πώς πρέπει νά άναμείξωμεν δύο ποιότητας κόστους 48 δρχ./kgr\* και 44 δρχ./kgr\* ένδος είδους, διά νά σχηματίσωμεν μείγμα, τό όποιον, έαν πωλῶμεν 49,50 δρχ./kgr\*, νά κερδίζωμεν 10% έπι τού κόστους;

### 9. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΡΑΜΑΤΩΝ

**§ 110.** Έαν συγχωνεύσωμεν ή συντήξωμεν (διά διαφόρων μεθόδων) δύο ή περισσότερα μέταλλα λαμβάνομεν έν σώμα τό δόποιον λέγεται **κράμα**.

Εις τήν οικονομικήν ζωήν ένδιαφέρουν τά κράματα πολυτίμων μετάλλων (χρυσοῦ, όργυρου), τών δόποιων ή άξια έκτιμάται έκ τού λόγου τού βάρους τού πολυτίμου μετάλλου πρός τό δλικόν βάρος τού κράματος. Ο λόγος αύτος λέγεται **τίτλος** τού κράματος και έκφραζεται **εις χιλιοστά**.

Έαν Α τό βάρος τού πολυτίμου μετάλλου, Β τό βάρος τού κράματος και τό τίτλος τού κράματος, έχομεν

$$\frac{A}{B} = \tau \Leftrightarrow A = B\tau$$

παραδειγμάτων. Π.χ. δταν λέγωμεν ότι τὸ κρᾶμα ἔχει τίτλον 0,850 ἢ  $\frac{850}{1000}$  ἐννοοῦμεν ότι ἐκ τῶν 1000 gr\* τοῦ κράματος τὰ 850 gr\* εἶναι πολύτιμον μέταλλον καὶ τὰ 150 gr\* εἶναι δόλον ἢ ἄλλα μέταλλα.

Ο τίτλος τῶν χρυσῶν κοσμημάτων ἐκφράζεται καὶ εἰς καράτια. Π.χ. δταν λέγωμεν ότι ἔν χρυσοῦν κόσμημα εἶναι 18 καρατίων, ἐννοοῦμεν ότι ἐκ τῶν 24 μερῶν αὐτοῦ τὰ 18 μέρη εἶναι καθαρὸς χρυσὸς καὶ τὰ ὑπόλοιπα 6 μέρη δόλα μέταλλα.

Ἡ ἐπίλυσις τῶν προβλημάτων θὰ γίνῃ τῇ βοηθείᾳ τῶν ἔξισώσεων, ὅπως καὶ εἰς τὰ προβλήματα ἀναμείχεως, μὲ βάσιν τοὺς κανόνας:

α) «Τὸ ἀθροισμα τῶν βαρῶν τοῦ πολυτίμου μετάλλου εἰς τὰ πρὸς σύντηξιν κράματα ισοῦται πρὸς τὸ βάρος τοῦ πολυτίμου μετάλλου εἰς τὸ νέον κρᾶμα».

β) Τὸ ἀθροισμα τῶν βαρῶν τῶν κραμάτων ισοῦται πρὸς τὸ βάρος τοῦ νέου κράματος.

Πρόβλημα 1ον. Χρυσοχόος συνέτηξε 12 gr\* χρυσοῦ τίτλου 0,900 μὲ 18 gr\* δόλου χρυσοῦ τίτλου 0,800. Νὰ εὑρεθῇ ὁ τίτλος τοῦ νέου κράματος.

Ἐστω  $\chi$  ὁ τίτλος τοῦ νέου κράματος.

Τὸ βάρος τοῦ καθαροῦ χρυσοῦ εἰς τὸ α' κρᾶμα εἶναι  $0,900 \cdot 12 \text{ gr}^*$

Τὸ βάρος τοῦ καθαροῦ χρυσοῦ εἰς τὸ β' κρᾶμα εἶναι  $0,800 \cdot 18 \text{ gr}^*$

Τὸ βάρος τοῦ καθαροῦ χρυσοῦ εἰς τὸ νέον κρᾶμα εἶναι  $\chi \cdot (12 + 18) \text{ gr}^*$

Συμφώνως πρὸς τὸν ἀνωτέρω κανόνα ἔχομεν τὴν ἔξισωσιν

$$0,900 \cdot 12 + 0,800 \cdot 18 = \chi \cdot (12 + 18) \iff 10,8 + 14,4 = 30\chi \iff 30\chi = 25,2$$

$$\chi = \frac{25,2}{30} \iff \chi = 0,840.$$

Ο τίτλος τοῦ νέου κράματος εἶναι 0,840.

Πρόβλημα 2ον. Ἐάν συντήξωμεν δύο εἴδη κραμάτων (τοῦ αὐτοῦ πολυτίμου μετάλλου) τίτλων 0,900 καὶ 0,600, λαμβάνομεν νέον κρᾶμα βάρους 42 gr\* καὶ τίτλου 0,700. Πόσα gr\* ἐλήφθησαν ἐξ ἕκαστου κράματος;

Ἐστω ότι ἐλήφθησαν  $\chi$  gr\* ἐκ τοῦ κράματος τίτλου 0,900, τότε ἐκ τοῦ δόλου κράματος θὰ ἔχουν ληφθῆ  $(42 - \chi)$  gr\*. Ἐπομένως ἔχομεν τὴν ἔξισωσιν:

$$0,900 \cdot \chi + 0,600 \cdot (42 - \chi) = 0,700 \cdot 42 \iff 9\chi + 6(42 - \chi) = 7,42 \iff 9\chi + 6 \cdot 42 - 6\chi = 7,42 \iff 3\chi = 7,42 - 6 \cdot 42$$

$$= 7,42 \iff 9\chi - 6\chi = 7,42 - 6 \cdot 42 \iff 4\chi = (7 - 6) \cdot 42 \iff 3\chi = 42 \iff \chi = \frac{42}{3} \iff \chi = 14$$

Ἐλήφθησαν 14 gr\* ἐκ τοῦ κράματος τίτλου 0,900 καὶ 42 gr\* - 14 gr\* = 28 gr\* ἐκ τοῦ δόλου κράματος.

Πρόβλημα 3ον. Κατὰ ποίαν ἀναλογίαν πρέπει νὰ συγχωνεύσωμεν δύο κράματα (τοῦ αὐτοῦ πολυτίμου μετάλλου) τίτλων 0,920 καὶ 0,800 διὰ νὰ ἐπιτύχωμεν νέον κρᾶμα τίτλου 0,840;

Έάν λάβωμεν  $x$  gr\* έκ τοῦ κράματος τίτλου 0,920 καὶ 4 gr\* έκ τοῦ ἄλλου κράματος, τὸ νέον κράμα θὰ εἶναι  $(x+\psi)$  gr\*.

$$\begin{aligned} \text{Έχομεν τὴν ἔξισωσιν } 0,920x + 0,800\psi = 0,840(x+\psi) &\iff 92x + 80\psi = \\ = 84(x+\psi) &\iff 23x + 20\psi = 21(x+\psi) \iff 23x + 20\psi = 21x + 21\psi \iff \\ 23x - 21x &= 21\psi - 20\psi \iff 2x = \psi \iff \frac{x}{1} = \frac{\psi}{2} \iff \frac{x}{\psi} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Ἡ ἀναλογία συγχωνεύσεως εἶναι 1 gr\* έκ τοῦ κράματος τίτλου 0,920 καὶ 2 gr\* έκ τοῦ ἄλλου κράματος.

### Προβλήματα

320. Χρυσοχόος συγχωνεύει 10 gr\* χρυσοῦ τίτλου 0,900 μὲ 14 gr\* ἄλλου χρυσοῦ τίτλου 0,600. Νὰ εὑρεθῇ ὁ τίτλος τοῦ νέου κράματος.

321. Κάμνομεν νέον κράμα βάρους 90 gr\* καὶ τίτλου 0,840 ἐκ δύο ἄλλων κραμάτων τίτλων 0,900 καὶ 0,800. Πόσα gr\* ἔξι ἑκάστου κράματος θὰ λάβωμεν;

322. Κατὰ ποίαν ἀναλογίαν πρέπει νὰ συγχωνεύσωμεν δύο εἰδῆ χρυσοῦ τίτλων 0,900 καὶ 0,750, διὰ νὰ ἐπιτύχωμεν κράμα τίτλου 0,800 καὶ πόσα gr\* ἔξι ἑκάστου εἰδους θὰ λάβωμεν, ἐάν τὸ νέον κράμα ἔχῃ βάρος 75 gr\*;

323. Συγχωνεύομεν 80 gr\* ἀργύρου τίτλου 0,920 μὲ ἀργυρον τίτλου 0,850 καὶ σχηματίζομεν νέον κράμα τίτλου 0,900. Πόσα gr\* ἔκ τοῦ β' κράματος θὰ χρησιμοποιήσωμεν;

324. α) Πόσα gr\* καθαροῦ χρυσοῦ περιέχονται εἰς 50,5 gr\* χρυσοῦ τίτλου 0,740;

β) Κράμα χρυσοῦ 80 gr\* περιέχει 50 gr\* καθαρὸν χρυσόν. Ποῖος ὁ τίτλος τοῦ κράματος;

325. Χρυσοχόος συνέτηξε 10 gr\* χρυσοῦ τῶν 17 καρατίων μὲ 20 gr\* ἄλλου χρυσοῦ τῶν 20 καρατίων καὶ μὲ 30 gr\* τίτλου 22 καρατίων. Νὰ εὑρεθῇ ὁ τίτλος τοῦ νέου κράματος εἰς καρατία.

326. Πόσα gr\* χαλκοῦ πρέπει νὰ συγχωνεύσωμεν μὲ 140 gr\* καθαροῦ χρυσοῦ, διὰ νὰ ἐπιτύχωμεν κράμα τίτλου 0,700;

### 10. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΝ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙV

327. Έάν  $\frac{x}{\psi} = 2$  καὶ  $x+\psi=15$ , νὰ εύρεθοῦν τὰ  $x, \psi$ .

328. Έάν  $\frac{x}{\psi} = -\frac{2}{3}$  νὰ εύρεθοῦν οἱ λόγοι :

$$\alpha) \frac{2x-\psi}{x+\psi} \quad \beta) \frac{x+2}{\psi-3} \quad (\psi \neq 3) \quad \gamma) \frac{x-2}{\psi+3} \quad (\psi \neq -3) \quad \text{καὶ} \delta) \frac{x+\psi}{3x-2\psi}$$

329. Έάν  $3x+4\psi=52$  καὶ  $\frac{x}{\psi} = \frac{2}{5}$ , νὰ εύρεθοῦν τὰ  $x, \psi$ .

$$\left( \frac{x}{\psi} = \frac{2}{5} \iff -\frac{x}{2} = \frac{\psi}{5} = \frac{3x}{3 \cdot 2} = \frac{4\psi}{4 \cdot 5} = \frac{3x}{6} = \frac{4\psi}{20} = \frac{3x+4\psi}{6+20} = \frac{52}{26} = \dots \right)$$

330. Νὰ εύρεθοῦν οἱ ἡγούμενοι δροὶ τῆς ἀναλογίας  $\frac{x}{3} = \frac{\psi}{1}$ , ἐάν α)  $2x+3\psi=180$  καὶ β)  $2x-5\psi=30$ .

331. Νὰ εύρεθοῦν οι δροι του λόγου  $\frac{X}{\Psi} = \frac{3}{4}$ , έάν α)  $X + 3\Psi = 150$  καὶ β)  $5X - 3\Psi = 30$

332. Δύο έργάται ἔξετέλεσαν ἐν ἔργον. 'Ο α' ἔξετέλεσε τὰ  $\frac{2}{7}$  τοῦ ἔργου καὶ δ β' τὸ ὑπόλοιπον. 'Εάν δ β' ἔλαβε 4200 δρχ., πόσον ἐκόστισεν δλόκληρον τὸ ἔργον;

333. Διὰ τὴν συγοράν ἐνδυμασίας ἐγένετο Ἑκπτωσις 270 δρχ. καὶ ἐπληρώθη τὸ ποσὸν τῶν 1230 δραχμῶν. Πόσον τοῖς ἑκατὸν ὑπελογίσθη ἡ Ἑκπτωσις;

334. Ἀντικείμενον κόστους 1800 δρχ. ἐπωλήθη ἀντὶ 1440 δρχ. Πόσον τοῖς ἑκατὸν ἦτο ἡ Ἑκπτωσις; 'Εάν τὸ κόστος του ἦτο 1400 δρχ. καὶ ἐπωλήθη ἀντὶ 1750 δρχ., πόσον τοῖς ἑκατὸν ἦτο τὸ κέρδος;

335. 15 ἔργάται ἔξετέλεσαν εἰς 8 ἡμέρας τὸ  $\frac{1}{3}$  ἐνὸς ἔργου. 'Εάν ἀπελύθησαν 5 ἔργάται, εἰς πόσας ἡμέρας οἱ ὑπόλοιποι θὰ τελειώσουν τὸ ὑπόλοιπον ἔργου;

336. Πεζοπόρος, ἔάν βαδίσῃ 7 ἡμέρας ἐπὶ 8 ὥρας καθ' ἑκάστην θὰ διανύσῃ τὰ  $\frac{7}{13}$  μιᾶς ἀπόστασεως. Πόσας ὥρας πρέπει νὰ βαδίζῃ ἡμερησίως διὰ νὰ διανύσῃ τὸ ὑπόλοιπον τῆς ἀπόστασεως εἰς 8 ἡμέρας;

337. Τὰ  $\frac{5}{16}$  κεφαλαίου τοκισθέντα πρὸς 7% ἔγιναν μὲ τὸν τόκον τῶν 9831 δρχ. Νὰ εὔρεθῇ δ χρόνος, ἔάν δλόκληρον τὸ κεφάλαιον ἦτο 28928 δραχμάς.

338. Τὰ  $\frac{1}{2}$  κεφαλαίου ἐτοκίσθη πρὸς 5%, τὸ  $\frac{1}{3}$  αὐτοῦ πρὸς 6% καὶ τὸ ὑπόλοιπον πρὸς 4%. 'Εάν εἰς ἐν ἕτος κεφάλαιον καὶ τόκοι ἀνήρχοντο εἰς 18930 δραχμάς, νὰ εὔρεθῇ τὸ κεφάλαιον.

339. 'Ετοκίσθησαν τὰ  $\frac{2}{3}$  ἐνὸς κεφαλαίου πρὸς 6% καὶ τὸ ὑπόλοιπον πρὸς 5%. 'Εάν ἐποιέτε δλόκληρον τὸ κεφάλαιον πρὸς 5%, θὰ εἴδῃ 120 δρχ. τόκον δλιγώτερον τοῦ ἐκ τῆς προγουμένης περιπτώσεως τοκισμοῦ του. 'Εάν δ χρόνος καὶ διὰ τὰς δύο περιπτώσεις εἶναι 12 μῆνες, νὰ εὔρεθῇ τὸ κεφάλαιον.

340. 'Εάν κεφ. + τοκ. εἶναι 10100 δρχ., δ χρόνος εἶναι 2,5 μῆν. καὶ  $\epsilon\% = 4,8\%$ , νὰ εὔρεθῇ τὸ κεφάλαιον.

341. 'Εάν κεφ. + τοκ. εἶναι 9126 δρχ., δ χρόνος εἶναι 63 ἡμ. καὶ  $\epsilon\% = 8\%$ , νὰ εὔρεθῇ τὸ κεφάλαιον.

342. 'Εάν κεφ.-τόκ. εἶναι 4440 δρχ., δ χρόνος εἶναι 4 μῆν. καὶ  $\epsilon\% = 4\%$ , νὰ εὔρεθῇ τὸ κεφάλαιον.

343. 'Εάν εἰς τὰς κατωτέρω ἔξισώσεις ὁ χ παριστᾶ κεφάλαιον εἰς δραχμάς, νὰ διατυπωθοῦν αὐταὶ (λεκτικῶς) εἰς προβλήματα καὶ νὰ ἐπιλυθοῦν.

$$\alpha) X + X \cdot \frac{4}{100} \cdot \frac{5}{12} = 18300, \quad \beta) X - X \cdot \frac{5}{100} \cdot \frac{105}{360} = 9460.$$

344. Δύο αὐτοκίνητα ἔκκινοῦν συγχρόνως ἐκ δύο πόλεων, σὶ δποῖαι ἀπέχουν 360 km μὲ ταχύτητας 65 km/h καὶ 55 km/h πρὸς συνάντησίν των. Εἰς ποιάν ἀπόστασιν θὰ συναντηθοῦν;

345. Νὰ μερισθῇ δ ἀριθμὸς 3600 ἀντιστρ. ἀναλόγως τῶν 12, 15, 20.

346. Νὰ μερισθῇ δ ἀριθμὸς 250 ἀντιστρ. ἀναλόγως τῶν  $\frac{4}{6}$  καὶ  $\frac{4}{9}$ .

347. Δύο ἔμποροι κατέθεσαν 100000 δρχ. δ α' καὶ 80000 δρχ. δ β' δι' ἐπιχείρησιν. Μετὰ 18 μῆνας ἐκέρδισαν 54000 δρχ. Πόσον κέρδος θὰ λάβῃ ἑκαστος;

348. 'Εμπορος ἡρχισεν ἐπιχείρησιν μὲ 500000 δρχ. Μετὰ 3 μῆνας προσέλαβε συνεταίρον δ δποῖος κατέθεσε τὸ αὐτὸ ποσόν. 'Εξ μῆνας μετὰ τὴν πρόσληψιν τοῦ συνεταίρου εὔρον, δτὶ ἐκέρδισαν 60000 δρχ. Πόσον κέρδος θὰ λάβῃ ἑκαστος;

349. Δύο συνεταίροι κατέθεσαν 405 000 δρχ. δι' έπιχείρησιν. Τὰ χρήματα τοῦ α' έμειναν 15 μῆνας και τοῦ β' 12 μῆνας εἰς τὴν ἐπιχείρησιν. Ἐάν ἐλαβον ἵσα κέρδη, νά εύρεθῇ τὸ κεφάλαιον τὸ ὅποιον εἶχε καταθέσει ἑκατόσ.

350. "Εμπορος ἀνέμειχν 100 kgr<sup>2</sup> ἐνὸς εἴδους τῶν 35 δρχ./kgr<sup>2</sup> μὲ δόλλο τῶν 30 δρχ./kgr<sup>2</sup>. Πόσα kgr<sup>2</sup> ἐλαβεν ἐκ τῆς β' ποιότητος ἐὰν ἔπωλει πρὸς 33 δρχ. τὸ kgr<sup>2</sup> τοῦ μείγματος και ἐκέρδισε 250 δραχμάς.

## ΓΕΝΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

351. Ἐάν  $\alpha = -4$  και  $\beta = 2$ , νά εύρεθῇ ἡ ἀριθμ. τιμὴ τῶν παραστάσεων  $\alpha^3 + 3\alpha^2\beta + 3\alpha\beta^2 + \beta^3$  και  $(\alpha + \beta)^3$ . Τι παρατηρεῖτε;

352. Ἐάν  $\alpha = -2$ ,  $\beta = -3$  και  $\gamma = -1$ , νά εύρεθῇ ἡ ἀριθμ. τιμὴ τῶν παραστάσεων:  $\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 + 2\alpha\beta + 2\beta\gamma + 2\gamma\alpha$  και  $(\alpha + \beta + \gamma)^2$ . Τι παρατηρεῖτε;

353. Ἐάν  $x = -2$ ,  $\alpha = -3$  και  $\beta = -4$ , νά εύρεθῇ ἡ ἀριθμ. τιμὴ τῶν παραστάσεων  $x^2 + (\alpha + \beta)x + \alpha\beta$  και  $(x + \alpha)(x + \beta)$ . Τι παρατηρεῖτε;

354. Ἐάν  $x = 3$ ,  $\psi = -4$ ,  $\alpha = -2$  και  $\beta = 1$ , νά εύρεθῇ ἡ ἀριθμητική τιμὴ τῶν παραστάσεων  $(\alpha^2 + \beta^2)(x^2 + \psi^2) - (\alpha x + \beta\psi)^2$  και  $(\alpha\psi - \beta x)^2$ . Τι παρατηρεῖτε;

355. Νά ἐπιλυθοῦν και ἐπαληθευθοῦν αἱ ἔξισώσεις :

$$\alpha) \frac{3x-1}{5} = \frac{5-7x}{15}, \quad \beta) \frac{5x+1}{7} = \frac{2x-3}{3}, \quad \gamma) \frac{2x-2,5}{3} = \frac{4x-5}{6},$$

$$\delta) \frac{2x-1,5}{5} = \frac{0,8x-1}{2}$$

(Διὰ τὴν ἀπαλοιφὴν τῶν παρονομαστῶν νά χρησιμοποιηθῇ ἡ ιδιότης τῶν ἀναλογιῶν:

$$\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta} \iff \alpha\delta = \beta\gamma$$

356. Νά ἐπιλυθοῦν αἱ ἔξισώσεις :

$$\alpha) (x+1)(x+2) = x(x+7)-6, \quad \beta) 2.(x-1).(x+1) = x(2x-6)+16,$$

$$\gamma) (x-3).(x-4)-2x(x-3) = x(11-x), \quad \delta) \frac{1}{3}\left(x-\frac{5}{2}\right) - \frac{3}{5}\left(x+\frac{4}{3}\right) + \frac{7}{2} = 0$$

357. Νά ἐπιλυθοῦν αἱ κάτωθι ἔξισώσεις :

$$\alpha) \frac{x-7}{4} + \frac{x+10}{21} + 1 = \frac{5x-7}{8} - \frac{9x+6}{35}$$

$$\beta) \frac{3x-2}{8} - \frac{13x+3}{27} + 9 = \frac{5x-12}{18} - \frac{2-5x}{4}$$

$$\gamma) \frac{3x}{4} + \frac{5}{17}(2x+1) = (x-1) + \frac{7x-5}{51} - \frac{2-x}{2}.$$

$$\delta) \frac{4+13x}{22} + \frac{x}{2} - \frac{7x-1}{3} + \frac{3-15x}{33} - \frac{6-5x}{4} = 0.$$

Νά έπιλυθούν τά κάτωθι προβλήματα :

358. Ποίου άριθμοῦ τὸ  $\frac{1}{7}$  αὐτοῦ εἶναι κατὰ  $\frac{13}{5}$  μικρότερον τοῦ 3πλασίου του;

359. Ἐάν εἰς ἀριθμὸν προσθέσωμεν τὸ 4πλάσιον αὐτοῦ, εὑρίσκομεν ἀριθμὸν κατὰ  $\frac{8}{25}$  μικρότερον τοῦ 10,32. Ποῖος δὲ ἀριθμός;

360. Ἀπὸ ποιὸν ἀριθμὸν πρέπει νὰ ἀφαιρέσωμεν τὸ 8πλάσιον τοῦ  $\frac{1}{8}$  αὐτοῦ διὰ νὰ εὑρωμεν ἀριθμὸν κατὰ  $\frac{21}{2}$  μεγαλύτερον τοῦ  $\frac{1}{10}$  αὐτοῦ;

361. Διὰ ποιὸν ἀριθμοῦ πρέπει νὰ διαιρεθῇ δὲ 744 διὰ νὰ εὑρεθῇ πηλίκον 14 καὶ ὑπόλοιπον 44;

362. Νά χωρισθῇ δὲ ἀριθμὸς  $\frac{378}{5}$  εἰς δύο ἀλλούς, ὥστε δὲ εἰς νὰ εἶναι 2πλάσιος τοῦ ἀλλοῦ.

363. Ἡ ἡλικία τοῦ Πέτρου εἶναι 2πλασία τῆς ἡλικίας τοῦ Παύλου. Πρὸ 7 ἔτῶν τὸ ἀθροισμα τῶν ἡλικιῶν αὐτῶν ἦτο ἵσον πρὸς τὴν σημερινὴν ἡλικίαν τοῦ Πέτρου. Νά εὑρεθοῦν αἱ ἡλικίαι των.

364. Πλοίον ἀνεχώρησεν ἐκ Πειραιῶς μὲ ταχύτητα 19,5 mil/h. Μετὰ 4 ὥρας ἀνεχώρησεν ἔπειρον πλοίον μὲ ταχύτητα 23,5 mil/h πρὸς τὴν αὐτὴν κατεύθυνσιν. Μετὰ πόσας ὥρας τὸ β' πλοίον θὰ φθάσῃ τὸ πρῶτον;

365. Ἡ γωνία Γ δρθ. τριγώνου ΑΒΓ ( $\widehat{A} = 1$  δρθ.) ισοῦται πρὸς τὰ  $\frac{2}{3}$  τῆς γωνίας Β Νά εὑρεθοῦν αἱ γωνίαι τοῦ τριγώνου ΑΒΓ.

366. Νά εὑρεθοῦν δύο διαδοχικοὶ ἀκέραιοι ἀριθμοὶ τῶν ὅποιων τὰ τετράγωνα διαπέρουν κατὰ 39.

367. Δύο ἀκέραιοι ἀριθμοὶ ἔχουν ἀθροισμα 17 καὶ τὰ τετράγωνα αὐτῶν διαφέρουν κατὰ 119. Ποῖοι οἱ ἀριθμοί;

368. Δύο ἀκέραιοι ἀριθμοὶ ἔχουν ἀθροισμα 27. Ἐάν εἰς τὸ γινόμενον σύτῶν προσθέσωμεν τὸ τετράγωνον τοῦ μικροτέρου εὑρίσκομεν 216. Ποῖοι οἱ ἀριθμοί;

369. Ἀκέραιος ἀριθμὸς διαιρούμενος διὰ 11 δίδει ών πόλοιπον 9, ἐνώ διαιρούμενος διὰ 3 δίδει ών πόλοιπον 2. Ἐάν η διαφορά τῶν πηλίκων εἴναι 53, νὰ εὑρεθῇ δὲ ἀριθμός.

370. Τὸ ψηφίον τῶν δεκάδων διψηφίου ἀριθμοῦ εἶναι κατὰ 4 μεγαλύτερον τοῦ ψηφίου τῶν μονάδων. Ἐάν εἰς τὸν ἀριθμὸν προσθέσωμεν τὸ  $\frac{1}{5}$  αὐτοῦ, εὑρίσκομεν 114. Ποῖος δὲ ἀριθμός;

371. Ὁμολόγιον δεικνύει ἀκριβῶς μεσημβρίαν (12 h 0 min Οκτωβρίου). Ποίαν ὥραν θὰ συναντηθοῦν (διὰ δευτέραν φοράν) δὲ ὠροδείκτης καὶ δὲ λεπτοδείκτης;

372. Δύο θετικοὶ ἀκέραιοι ἀριθμοὶ ἔχουν διαφορὰν 48. Ὁ μεγαλύτερος διαιρούμενος διὰ τοῦ μικροτέρου δίδει πηλίκον 3 καὶ υπόλοιπον 2. Ποῖοι οἱ ἀριθμοί.

373. Νά ἔπιλυθοῦν αἱ κάτωθι ἀνισώσεις :

$$\text{α)} \quad \frac{3x-1}{5} > \frac{x-1}{3}, \quad \text{β)} \quad \frac{x+5}{2} - \frac{x-1}{3} > 3, \quad \text{γ)} \quad 3x-3 : \frac{x-1}{4} > 0.$$

$$\text{δ)} \quad \frac{x+1}{3} - \frac{x-1}{2} < 1, \quad \epsilon) \quad 2\left(\frac{5}{2}-x\right) > \frac{1}{2} + 2(1,5-x).$$

374. Νά προσδιορισθοῦν αἱ κοιναὶ λύσεις τῶν ἀνισώσεων :

$$\alpha) \quad x-1 > -2 \text{ καὶ } 2(x-3) < 0$$

$$\beta) \quad \frac{1}{2} + x > x \text{ καὶ } x-3 < 10$$

$$\gamma) \quad x-3 > x \text{ καὶ } 2-x >-x$$

$$375. \text{Έάν } A = \left\{ x | x - \frac{x-1}{2} > \frac{x-2}{2} - \frac{x-3}{4} \text{ καὶ } x \in \mathbb{Z} \right\} \text{ καὶ}$$

$B = \{ x - x + 1 < 4x + 1 \mid x \in \mathbb{Z} \}$ , νά εύρεθη τό  $A \cap B$  δι' άναγραφής.

376. Νά παρασταθοῦν γραφικῶς αι συναρτήσεις :

$$\alpha) \psi = -2x + 5, \quad \beta) \psi = \frac{24}{x} \quad \gamma) \psi = -4x \quad (x, \psi \in \mathbb{Q})$$

377. Έάν  $\frac{\alpha}{\beta} = \frac{y}{δ}$  νά δποδειχθῆ, δτι ισχύουν αι κάτωθι δναλογίσι:

$$1) \frac{\alpha}{\alpha+\beta} = \frac{y}{y+\delta}, \quad 2) \frac{\alpha}{\alpha-\beta} = \frac{y}{y-\delta}, \quad 3) \frac{\alpha+\beta}{\alpha-\beta} = \frac{y+\delta}{y-\delta} \quad (\beta, \delta \neq 0, \mid \alpha \mid \neq \mid \beta \mid, \mid y \mid \neq \mid \delta \mid)$$

378. Έάν  $\frac{x}{x+1} = \frac{\psi}{\psi+2}$  και  $x + \psi = 21$ , νά εύρεθοῦν τά  $x, \psi$ .

379. Νά εύρεθοῦν οι ήγούμενοι δροι τῶν ίσων λόγων  $\frac{x}{2} = \frac{\psi}{3} = \frac{z}{5}$  έάν  $2x + 3\psi + 4z = 330$

380. Νά μερισθῇ δ 99 δναλόγως τῶν α) 2, 3, 4 και β) 1,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ .

381. Νά μερισθῇ δ 390 άντιστρ. δναλόγως τῶν α) 2, 3, 4 και β)  $\frac{5}{2}$ ,  $\frac{5}{6}$ , 1.

382. "Εμπορος άγοράζει καφέ πρὸς 81 δρχ./kg\*", τόν καθουρδίζει και τόν μεταπωλεῖ. Πόσον πρέπει νά πωλῇ τό kg\* διά νά έπιτύχῃ κέρδος 10 %, έπι τού κόστους λαμβανομένου ύπ' δψιν, δτι δι καφές χάνει τό  $\frac{1}{10}$  τού βάρους του, δταν καθουρδίζεται.

383. "Εμπορος δναγράφει εις έν δμπόρευμα τιμήν κατά 25% μεγαλυτέραν τής τιμῆς κότους αύτοῦ. 'Εν συνεχείς κάμνει έκπτωσιν 10% έπι τής δναγραφομένης τιμῆς. Νά εύρεθη πόσον

384. Έάν κέφ. -τόκ. = 54000 δρχ., δ χρόνος είναι 2,5 έτη και  $\epsilon\% = 4\%$ , νά εύρεθῇ δ τόκος.

395. Έάν κέφ. +τόκ. = 4060 δρχ., δ χρόνος είναι 3 μῆν. και  $\epsilon\% = 6\%$ , νά εύρεθῇ δ τόκος.

386. Έάν κέφ. -τόκ. = 7160 δρχ., δ χρόνος είναι 40 ήμ. και  $\epsilon\% = 5\%$ , νά εύρεθῇ δ τόκος.

387. "Εν μέρος κεφαλαίου 40 000 δρχ. έτοκίσθη πρὸς 4%, διά 5 μῆνας και έφερε 500 δρχ. Νά εύρεθῇ τό τοκισθέν μέρος τού κεφαλαίου.

388. Δύο ίσα κεφάλαια τοκίζονται τό μέν πρὸς 4,5%, τό δὲ πρὸς 5,5% και δίδουν τόκον 4500 δρχ. εις 2 έτη. Ποια τά κεφάλαια;

389. Έάν χ παριστά κεφάλαιον εις δραχμάς είς τάς κάτωθι έξισώσεις νά διατυπωθοῦν αύται (λεκτικῶς) εις προβλήματα και νά έπιλυθοῦν.

$$\alpha) x + x \cdot \frac{6}{100} \cdot \frac{2,4}{12} = 10120, \quad \beta) x - x \cdot \frac{2,5}{100} \cdot \frac{400}{360} = 7000.$$

390. Γεωργός έπώλησε κήπον 1050 m<sup>2</sup>. Τά χρήματα τά δποια έλαβε έτόκισεν πρὸς 12% και μετά 3 έτη και δύο μῆνας έλαβε τόκον και κεφαλαίον 115920 δρχ. Πόσον έπώλησε τό στρέμμα;

391. Εις ήγόρασεν οικόπεδον έκπτωσεως 700 %. Τό ήμισυ τής τιμῆς του έπλήρωσεν άμέσως δρχ. συμπεριλαμβανομένου και τού τόκου πρὸς 6 %. Τι ποσόν έν δλφ έπληρωθῇ διά τό οικόπεδον και ποια ή τιμή τού στρέμματος;

392. Τέσσαρες άδελφοι έμοιράσθησαν κληρονομίαν ἐκ 540 στρέμμάτων ώς έξις: 'Ο πρῶτος έλαβε τό ήμισυ τῶν δσων έλαβον οι άλλοι τρεῖς, τῶν δποιων τά μερίδια ήσαν δνάλογα τῶν άριθμῶν 3, 4 και 5. Πόσα στρέμματα έλαβεν έκαστος;

393. Δύο έμποροι έκαμον έπιχείρησιν. 'Ο α' κατέθεσεν 70 000 δρχ. και έλαβε κέρδος 6000 δρχ., δ β' κατέθεσεν 80000 δρχ. και τό κέρδος του ήτο 8000 δρχ. 'Επι πόσον χρόνον έμειναν τά χρήματα τού β' εις τήν έπιχείρησιν, έάν τά χρήματα τού σ' έμειναν 6 μῆνας.

ΜΕΡΟΣ Β'

# ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ



# ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι


### Α. ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΓΩΝΙΑ

§ 1. Χαράξατε ἐπὶ τοῦ κύκλου σας ἑνα κύκλον καὶ μίαν κυρτὴν γωνίαν ἐπὶ τοῦ χαρτονίου σας. Άποκόψατε τὴν γωνίαν καὶ σχεδιάσατε τὰς διαφόρους θέσεις, τὰς δημοσίας δύναται νὰ λάβῃ αὐτή ἐν σχέσει πρὸς τὸν κύκλον.


Περιγράφομεν μερικὰς ἐκ τῶν θέσεων τούτων :




1α



1β



1γ



1δ



1ε

Σημείωση : Αναγιαστούντων δύο γωνίας σύνθετη γωνία.

Σημείωση : Σημείου γραμμής περιβάλλοντα τοῦ κύκλου ή τοῦ ομοιογενούτου

‘Η γωνία τοῦ σχήματος 1α ἔχει τὴν κορυφήν της εἰς τὸ κέντρον τοῦ κύκλου. ‘Η γωνία αὐτή, ὡς ἔχομεν μάθει εἰς τὴν Α’ τάξιν, λέγεται ἐπίκεντρος. Αἱ γωνίαι τοῦ σχήματος 1β δὲν ἔχουν τὴν κορυφήν των ἐπὶ τοῦ κύκλου καὶ ή μὲν (I) ἔχει αὐτὴν εἰς τὸ ἔσωτερικόν, ή δὲ (II) εἰς τὸ ἔσωτερικόν τοῦ κύκλου. ‘Η γωνία τοῦ σχήματος 1γ ἔχει τὴν κορυφήν της ἐπὶ τοῦ κύκλου καὶ αἱ πλευραί της εὐρίσκονται εἰς τὸ ἔσωτερικόν αὐτοῦ. ‘Η μία πλευρά τῆς γωνίας τοῦ σχήματος 1δ ἀποκόπτει χορδὴν καὶ η ἄλλη εἶναι ἐφαπτομένη τοῦ κύκλου εἰς τὸ ἐν ἄκρον τῆς χορδῆς.

‘Η γωνία  $\widehat{BAG}$  τοῦ σχήματος 1ε ἔχει τὴν κορυφήν της ἐπὶ τοῦ κύκλου καὶ αἱ πλευραί της τέμνουν αὐτόν. ‘Η γωνία αὐτὴ λέγεται ἐγγεγραμμένη εἰς τὸν κύκλον.


Ωστε : ‘Ἐγγεγραμμένη εἰς κύκλον γωνία, δύναμάζεται ἡ γωνία, η δημοσία ἔχει τὴν κορυφήν της ἐπὶ τοῦ κύκλου καὶ αἱ πλευραί της τέμνουν αὐτόν.

Τὸ τόξον  $\widehat{BG}$ , τὸ διοτίον κεῖται εἰς τὸ ἔσωτερικόν τῆς γωνίας αὐτῆς, λέγεται ἀντίστοιχον τόξον τῆς ἐγγεγραμμένης γωνίας. (Σχῆμα 1ε).

Τὴν ἐπίκεντρον γωνίαν  $\widehat{B\bar{O}G}$ , ή δοποία ἔχει τὸ αὐτὸ μετὰ τῆς ἑγγεγραμμένης, ἀντίστοιχον τόξου, λέγομεν ἀντίστοιχον ἐπίκεντρον τῆς ἑγγεγραμμένης γωνίας  $\widehat{B\bar{A}G}$  (σχῆμα 1ε).

§ 2. Σχέσις τῆς ἑγγεγραμμένης γωνίας πρὸς τὴν ἐπίκεντρον, τὴν ἔχουσαν τὸ αὐτὸ ἀντίστοιχον τόξον.

Ναράξατε ἕνα κύκλον, μιαν ἑγγεγραμμένην εἰς αὐτὸν γωνίαν καὶ τὴν ἐπίκεντρον, ή δοποία ἔχει τὸ αὐτὸ ἀντίστοιχο τόξον. Συγκρίνατε τὰς δύο αὐτὰς γωνίας. Τὶ παρατηρεῖτε; (Σχ. 2)



σχ. 2.

"Εστω κύκλος ( $O, R$ ) καὶ ἡ ἑγγεγραμμένη εἰς αὐτὸν γωνία  $\widehat{B\bar{A}G}$ . Χαράσσομεν τὴν ἀντίστοιχον αὐτῆς ἐπίκεντρον γωνίαν  $\widehat{B\bar{O}G}$ .

'Εάν μετρήσωμεν ἡ χρησιμοποιήσωμεν διαφανῆ χάρτην θά διαπιστώσωμεν, διτὶ ἡ ἐπίκεντρος γωνία  $\widehat{B\bar{O}G}$  εἶναι διπλασία τῆς ἑγγεγραμμένης  $\widehat{B\bar{A}G}$  ή ἡ ἑγγεγραμμένη γωνία  $\widehat{B\bar{A}G}$  εἶναι ἴση πρὸς τὸ ἡμισυ τῆς ἐπίκεντρου, ή δοποία ἔχει τὸ αὐτὸ ἀντίστοιχον τόξον.

"Ητοι  $\widehat{B\bar{A}G} = \frac{1}{2} \widehat{B\bar{O}G}$ . 'Επειδὴ ή τιμὴ

τῆς ἐπίκεντρου γωνίας ισοῦται πρὸς τὴν τιμὴν τοῦ ἀντίστοιχου τόξου τῆς συμπεραίνομεν, διτὶ ή τιμὴ τῆς ἑγγεγραμμένης γωνίας ισοῦται πρὸς τὸ ἡμισυ τῆς τιμῆς τοῦ ἀντίστοιχου τόξου αὐτῆς.


Διὰ νὰ αιτιολογήσωμεν τὴν σχέσιν τῆς ἑγγεγραμμένης εἰς κύκλον γωνίας πρὸς τὴν ἀντίστοιχον αὐτῆς ἐπίκεντρον, θά ἐργασθῶμεν ὡς ἔξις:

Διακρίνομεν τρεῖς περιπτώσεις :

α' περίπτωσις. Μία τῶν πλευρῶν τῆς ἑγγεγραμμένης γωνίας εἶναι διάμετρος τοῦ κύκλου: (Σχῆμα 3). "Εστω κύκλος ( $O, R$ ), ή ἑγγεγραμμένη εἰς αὐτὸν γωνία  $\widehat{B\bar{A}G}$  καὶ ἡ ἀντίστοιχος ἐπίκεντρος γωνία  $\widehat{B\bar{O}G}$ . Ή ἐπίκεντρος γωνία  $\widehat{B\bar{O}G}$  εἶναι ἔξωτερικὴ γωνία τοῦ ισοσκελοῦς τριγώνου  $AOB$ . 'Επομένως  $\widehat{B\bar{O}G} = \widehat{B\bar{A}G} + \widehat{A\bar{O}B}$  καὶ ἐπειδὴ  $\widehat{A\bar{O}B} = \widehat{B\bar{A}G}$ , ἔχομεν

$$\widehat{B\bar{O}G} = 2 \cdot \widehat{B\bar{A}G} \text{ ἄρα}$$

$$\widehat{B\bar{A}G} = \frac{1}{2} \widehat{B\bar{O}G}$$



"Ητοι: ή ἑγγεγραμμένη γωνία  $\widehat{B\bar{A}G}$  εἶναι τὸ ἡμισυ τῆς ἐπίκεντρου  $\widehat{B\bar{O}G}$ .

σχ. 3.

**β' Περίπτωσις.** Εστω δτι τὸ κέντρον Ο εῖναι ἐσωτερικὸν τῆς ἑγγεγραμμένης γωνίας  $\widehat{BAG}$ . (Σχ. 4).

Χαράσσομεν τὴν διάμετρον  $AOD$  καὶ σχηματίζονται δύο ἑγγεγραμμέναι γωνίαι αἱ  $\widehat{BAD}$  καὶ  $\widehat{A\Gamma}$ , διὰ τὰς ὅποιας ἔχομεν, (ἐὰν λάβωμεν ὑπὸ δψιν τὴν α' περίπτωσιν):

$$\widehat{BAD} = \frac{1}{2} \widehat{BOD}$$

$$\widehat{A\Gamma} = \frac{1}{2} \widehat{AO\Gamma}$$

$$\widehat{BAG} + \widehat{A\Gamma} = \frac{1}{2} (\widehat{BOD} + \widehat{AO\Gamma}) \quad \text{ἡτοι}$$

$$\boxed{\widehat{BAG} = \frac{1}{2} \widehat{BOD}}$$

**γ' περίπτωσις.** Τὸ κέντρον Ο εῖναι εἰς τὸ ἐξωτερικὸν τῆς γωνίας  $\widehat{BAG}$ . (Σχ. 5).

Χαράσσομεν τὴν διάμετρον  $AOD$  καὶ σχηματίζομεν τὰς ἑγγεγραμμένας γωνίας  $\widehat{B\Delta D}$  καὶ  $\widehat{G\Delta D}$ , διὰ τὰς ὅποιας ἔχομεν (α' περίπτωσις):

$$\widehat{B\Delta D} = \frac{1}{2} \widehat{BOD}$$

$$\widehat{G\Delta D} = \frac{1}{2} \widehat{GOD}$$

Αφαιροῦμεν τὰς ἴσοτητας αὐτὰς κατὰ μέλη καὶ εύρισκομεν:

$$\widehat{B\Delta D} - \widehat{G\Delta D} = \frac{1}{2} (\widehat{BOD} - \widehat{GOD}).$$

Συνεπῶς

$$\boxed{\widehat{BAG} = \frac{1}{2} \widehat{BOD}}$$


Συμπεραίνομεν λοιπὸν δτι: Κάθε ἑγγεγραμμένη εἰς κύκλον γωνία ισοῦται πρὸς τὸ ἡμισυ τῆς ἐπικέντρου, ἢ ὅποια ἔχει τὸ αὐτὸ διάστοιχον τόξον.

### Παρατηρήσεις


- 1) Κάθε ἑγγεγραμμένη εἰς κύκλον γωνία εἶναι πάντοτε κυρτὴ γωνία.
- 2) Ἡ ἐπικέντρος γωνία, ἢ ὅποια ἔχει τὸ αὐτὸ διάστοιχον τόξον μὲ τὴν ἑγγεγραμμένην δύναται νὰ εἶναι κυρτὴ ἢ μὴ κυρτὴ γωνία.

### Άσκησεις

1. Μία ἐπικέντρος γωνία εἶναι  $120^\circ$ . Νὰ εὔρεθῇ ἡ ἑγγεγραμμένη γωνία, ἢ ὅποια ἔχει τὸ αὐτὸ μὲ τὴν ἐπικέντρον διάστοιχον τόξον.



σχ. 4.




σχ. 5.

2. Έάν μία έγγεγραμμένη γωνία είναι  $23^{\circ} 30'$ , νά εύρητε εις μοίρας και εις μέρη δρθῆς τήν ἀντίστοιχον αὐτῆς ἐπίκεντρον γωνίαν.

3. Νά εύρητε τήν έγγεγραμμένη γωνίαν, ή δποία εχει ἀντίστοιχον τόξον α)  $35^{\circ}$ , β)  $42^{\circ}$  γ)  $192^{\circ}$ .

4. Σημειούμεν επί τοῦ κύκλου ( $O, R$ ) τέσσαρα διαδυχικά σημεία  $A, B, \Gamma, \Delta$ , εις τρόπον ώστε νά εχωμεν  $\widehat{A\Delta} = 50^{\circ}$ ,  $\widehat{B\Gamma} = 110^{\circ}$ ,  $\widehat{\Gamma\Delta} = 70^{\circ}$ . Νά υπολογίσητε τάς γωνίας  $B\widehat{A}\Gamma$ ,  $B\widehat{\Delta}\Gamma$ ,  $\Gamma\widehat{\Delta}A$ ,  $\Delta\widehat{B}A$ ,  $\Delta\widehat{\Gamma}A$ , και  $A\widehat{\Gamma}B$ .



σχ. 6.

5. Δίδεται κύκλος ( $O, R$ ). Χαράσσομεν δύο χορδάς αύτοῦ  $A\Delta$  και  $B\Gamma$ , οι δποίαι τέμνονται εις τό σημείον  $E$ , τό δποίον κείται εις τό έσωτερικόν τοῦ κύκλου. Νά συγκρίνητε τήν τιμὴν τῆς γωνίας, ή δποία εχει κορυφήν τό  $E$ , πρὸς τό ήμιάθροισμα τῶν τιμῶν τῶν τόξων, τά δποία περιέχονται μεταξὺ τῶν πλευρῶν της και τῶν προεκτάσεων τῶν πλευρῶν αὐτῆς. (Υπόδειξις: Χαράξατε τήν  $A\Gamma$ ).

6. Δίδεται κύκλος ( $O, R$ ). Χαράσσομεν δύο εύθειας, αι δποίαι τέμνουν αύτὸν ἀντίστοιχως εις τά  $B, \Gamma$  και  $A, \Delta$  και συναντῶνται εις τό σημείον  $Z$ , τό δποίον κείται εις τό έξωτερικόν τοῦ κύκλου. Νά συγκρίνητε τήν τιμὴν τῆς γωνίας, ή δποία εχει κορυφήν τό  $Z$ , πρὸς τήν ήμιδιαφοράν τῶν τιμῶν τῶν τόξων τοῦ κύκλου, τά δποία περιέχονται μεταξὺ τῶν πλευρῶν τῆς γωνίας αὐτῆς. (Υπόδειξις: Χαράξατε τήν  $A\Gamma$  ή  $B\Delta$ ).

7. Δίδεται κύκλος ( $O, R$ ) και μία χορδὴ αύτοῦ  $AB$  (σχ. 6). Εις τό ἐν ἄκρον αὐτῆς (π. χ. τὸ  $A$ ) χαράξατε τήν ἐφαπτομένην τοῦ κύκλου ψώμα. Νά συγκρίνητε τήν γωνίαν  $\psi\widehat{A}B$ , ή δποία σχηματίζεται ὑπὸ τῆς χορδῆς  $AB$  και τῆς ἐφαπτομένης εις τό ἄκρον αὐτῆς, μὲ τήν έγγεγραμμένην  $\widehat{A\Theta B}$ , ή δποία εχει ἀντίστοιχον τόξον τό  $A\widehat{N}B$ . (Υπόδειξις: Συγκρίνατε τάς γωνίας αὐτάς πρὸς τό ήμισυ τῆς ἐπίκεντρου  $B\widehat{O}A$ . Διατυπώσατε τήν σχετικὴν πρότασιν).

### § 3. Ἐφαρμογαὶ τῶν έγγεγραμμένων γωνιῶν

Ἄμεσους ἐφαρμογάς, τῆς ἀνωτέρω προτάσεως, εχομεν εις τὰ κάτωθι:

1. "Εστω κύκλος ( $O, R$ ) και αι έγγεγραμμέναι εις αύτὸν γωνίαι  $A\widehat{\Gamma}B$ ,  $A\widehat{\Delta}B$ ,  $A\widehat{E}B$ , αι δποίαι εχουν τὸ αὐτὸν ἀντίστοιχον τόξον  $AB$ . Συγκρίνατε αὐτάς. (Σχ. 7)

Αι γωνίαι αύται είναι ίσαι, διότι κάθε μία ἔξ αύτῶν είναι ίση πρὸς τό ήμισυ τῆς αὐτῆς ἐπίκεντρου γωνίας  $A\widehat{O}B$ . "Ητοι  $A\widehat{\Gamma}B = A\widehat{\Delta}B = A\widehat{E}B = \frac{1}{2} A\widehat{O}B$ .

"Άρα : Αι έγγεγραμμέναι γωνίαι, αι δποίαι εχουν τὸ αὐτὸν ἀντίστοιχον τόξον, είναι ίσαι.




σχ. 7.

2. "Εχομεν τὰς ἐγγεγραμμένας, εἰς τὸν αὐτὸν κύκλον  $O$ , γωνίας  $B\widehat{A}G$  καὶ  $B'\widehat{A'}G'$ , αἱ δποιαι ἔχουν τὰ ἀντίστοιχα αὐτῶν τόξα ἴσα,  $\widehat{B}\Gamma = \widehat{B'}\Gamma'$ . Νὰ συγκρίνητε αὐτάς. (Σχ. 8).

Εἰς τὰς γωνίας αὐτὰς ἔχομεν τὰς ισότητας  $B\widehat{A}G = \frac{1}{2} B\widehat{O}G$  καὶ  $B'\widehat{A'}G' = \frac{1}{2} B'\widehat{O'}G'$ . Ἐπειδὴ  $\widehat{B}\Gamma = \widehat{B'}\Gamma'$ , ἔχομεν  $B\widehat{O}G = B'\widehat{O'}G'$ , δπότε καὶ  $B\widehat{A}G = B'\widehat{A'}G'$ , ως ήμίση ἴσων γωνιῶν.

Εἰς τὸν αὐτὸν κύκλον (ἢ εἰς ἴσους κύκλους), δύο ἐγγεγραμμέναι γωνίαι, αἱ δποιαι ἔχουν ἴσα τὰ ἀντίστοιχα αὐτῶν τόξα, εἶναι ἴσαι.

Ἄντιστρόφως, ἐὰν αἱ ἐγγεγραμμέναι γωνίαι  $B\widehat{A}G$ ,  $B'\widehat{A'}G'$  εἶναι ἴσαι, ἢτοι  $B\widehat{A}G = B'\widehat{A'}G'$ , θὰ εἶναι καὶ αἱ ἀντίστοιχοι ἐπίκεντροι γωνίαι αὐτῶν ἴσαι ἢτοι  $B\widehat{O}G = B'\widehat{O'}G'$  καὶ συνεπῶς  $\widehat{B}\Gamma = \widehat{B'}\Gamma'$ . "Ωστε παραπτηροῦμεν δτι: Δύο ἴσαι ἐγγεγραμμέναι, εἰς τὸν αὐτὸν κύκλον (ἢ εἰς ἴσους κύκλους), γωνίαι ἔχουν ἴσα ἀντίστοιχα τόξα.



σχ. 9.

3. "Ἐστω κύκλος ( $O, R$ ) καὶ ἡ ἐγγεγραμμένη εἰς αὐτὸν γωνία  $B\widehat{A}G$ , ἡ δποια ἔχει ἀντίστοιχον τόξον ἴσον πρὸς ἐν ήμικύκλιον μετρήσατε αὐτὴν (Σχ. 9).

Διὰ μετρήσεως διαπιστοῦμεν δτι αὐτὴ εἶναι  $90^\circ$  (ἢ 1 δρθ.).

Αὐτὸ δικαιολογεῖται ως ἔξῆς : "Η γωνία αὐτὴ εἶναι δρθή, διότι ἡ ἀντίστοιχος ἐπίκεντρος γωνία εἶναι μία εὐθεῖα γωνία." Ήτοι  $B\widehat{A}G = \frac{1}{2} B\widehat{O}G = \frac{1}{2} \cdot 2 \text{ δρθ.} = 1 \text{ δρθή}$

Κάθε ἐγγεγραμμένη εἰς κύκλον γωνία, τῆς δποιας τὸ ἀντίστοιχον τόξον εἶναι ἐν ήμικύκλιον, εἶναι δρθή.

### Σημείωσις :

Τὴν πρότασιν τῆς § 2: «Κάθε ἐγγεγραμμένη εἰς κύκλον γωνία ἰσοῦται πρὸς τὸ ήμισυ τῆς ἐπίκεντρου γωνίας, ἡ δποια ἔχει τὸ αὐτὸ ἀντίστοιχον τόξον», ἐδικαιολογήσαμεν μὲ τὴν βοήθειαν ἀλλων προτάσεων, γνωστῶν ἐκ τῆς προηγουμένης τάξεως.


Τὸ αὐτὸ ἐπανελάβομεν εἰς τὰς προτάσεις 1, 2, 3, τῆς § 3.

Τὴν ἔργασιν αὐτὴν δνομάζομεν ἀπόδειξιν καὶ τὰς προτάσεις, θεωρήματα.

"Ωστε :

Θεώρημα εἶναι μία πρότασις, τῆς δποιας ἀποδεικνύομεν τὴν ἀλήθειαν.

Εἰς τὴν  $A'$  τάξιν ἐγνωρίσαμεν βασικάς προτάσεις, τὰς δποιας δὲν ἀπεδείξαμεν, ως π.χ.



σχ. 8.

τήν: «διά δύο σημείων διέρχεται μία καὶ μόνην εὐθεία» ή τὴν: «ἐκ σημείου, τὸ διποίον κεῖται ἕκτος εὐθείας, διέρχεται μία μόνην παράλληλος πρὸς αὐτήν.»

Τὰς προτάσεις αὐτὰς δυνούμενον δέξιωματα. Ήστε:

‘Αξιωματα είναι μία βασική πρότασις, τὴν διποίαν δεχόμεθα ως ἀληθῆ.

### Ασκήσεις

8) Εἰς κύκλον χαράξατε δύο καθέτους διαμέτρους  $AA'$  καὶ  $BB'$ . Έάν  $M$  τυχόν σημείον τοῦ τόξου  $A'B'$  νὰ συγκριθῶσιν αἱ γωνίαι  $\widehat{AMB}$  καὶ  $\widehat{B'MA}$ .

9. Εύρετε τὸ είδος τῆς γωνίας τῆς ἑγγεγραμμένης εἰς κύκλον, μὲ ἀντίστοιχον τόξον μεγαλύτερον, ἵσον ἢ μικρότερον ἡμικυκλίου.

10) Δύο κύκλοι μὲ κέντρα  $O$  καὶ  $O'$  τέμνονται εἰς τὰ σημεῖα  $A$  καὶ  $B$ . «Ἐστωσαν  $\Gamma$  καὶ  $\Delta$  τὰ ἐκ διαμέτρου ἀντίθετα σημεῖα τοῦ  $A$  ὡς πρὸς τοὺς κύκλους αὐτούς. Δείξατε ὅτι τὰ σημεῖα  $\Gamma$ ,  $B$ ,  $\Delta$  κείνται ἐπὶ μιᾶς εὐθείας καὶ συγκρίνατε τὰ εὐθ. τμήματα  $OO'$  καὶ  $\Gamma\Delta$ . (Σημ. Μὲ τὸν ὑπολογισμὸν τῶν γωνιῶν  $\widehat{AB\Gamma}$  καὶ  $\widehat{AB\Delta}$  θὰ βοήθητε διὰ τὴν ἀπόδειξιν τῆς προτάσεως).


11) Σημειούμεν ἐπὶ τοῦ κύκλου ( $O, R$ ) τέσσαρα διαδοχικά σημεῖα  $A, B, \Gamma, \Delta$ , οὗτως ὥστε νὰ ἔχωμεν  $\widehat{AB} = 70^\circ$ ,  $\widehat{B\Gamma} = 100^\circ$ ,  $\widehat{\Gamma\Delta} = 110^\circ$ . Νὰ υπολογισθοῦν αἱ γωνίαι  $\widehat{AB\Gamma}$ ,  $\widehat{A\Gamma\Delta}$ . Τι παρατηρεῖτε. Ομοίως διὰ τὰς γωνίας  $\widehat{B\Delta A}$  καὶ  $\widehat{B\Gamma\Delta}$ .

### Β'. ΕΥΘΕΙΑΙ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΣΑΙ ΕΙΣ ΤΡΙΓΩΝΟΝ

νείλη του αποτελεῖ αὐτήν πλευράν.

#### Ιν. Μεσοκάθετοι τῶν πλευρῶν τριγώνου

§ 4. Κατασκευάσατε ἐν τρίγωνον  $ABI'$  μὲ πλευρὰς  $BI' = 5 \text{ cm}$ ,  $AI' = 6 \text{ cm}$ ,  $AB = 4 \text{ cm}$ . Μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ διαβήτου καὶ τοῦ κανόνος χαράσσομεν κατὰ τὰ γωνιῶντα τὰς μεσοκαθέτους  $\epsilon_1, \epsilon_2, \epsilon_3$  τῶν πλευρῶν τοῦ τριγώνου  $AB\Gamma$  καὶ παρατηροῦμεν ὅτι αὗται συντρέχουν εἰς ἓν σημείον  $O$ .



Κατασκευάζομεν τὸ τρίγωνον  $AB\Gamma$ . Μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ διαβήτου καὶ τοῦ κανόνος χαράσσομεν κατὰ τὰ γωνιῶντα τὰς μεσοκαθέτους  $\epsilon_1, \epsilon_2, \epsilon_3$  τῶν πλευρῶν τοῦ τριγώνου  $AB\Gamma$  καὶ παρατηροῦμεν ὅτι αὗται συντρέχουν εἰς ἓν σημείον  $O$ .

Συγκρίνομεν, διὰ τοῦ διαβήτου, τὰ τμήματα  $OA, OB, OG$  καὶ παρατηροῦμεν ὅτι αὗτά είναι ἵσα, ἥτοι  $OA = OB = OG$ . Έάν μὲ κέντρον τὸ  $O$  καὶ ἀκτίνα  $OA$  γράψωμεν κύκλον, αὐτὸς διέρχεται διὰ τῶν τριῶν κορυφῶν  $A, B, \Gamma$  τοῦ τριγώνου  $AB\Gamma$  καὶ λέγεται περιγεγραμμένος περὶ τὸ τρίγωνον κύκλος.

Άρα: Αἱ τρεῖς μεσοκάθετοι τῶν πλευρῶν τριγώνου συντρέχουν εἰς ἓν σημείον, τὸ διποίον είναι τὸ κέντρον τοῦ περιγεγραμμένου περὶ τὸ τρίγωνον κύκλου.

Διά νά αιτιολογήσωμεν τό άνωτέρω άποτέλεσμα, στηριζόμεθα εἰς τήν γνωστήν μας πρότασιν :

«Κάθε σημείον τῆς μεσοκαθέτου εύθ. τμήματος ισαπέχει τῶν ὅκρων αὐτοῦ» καὶ «κάθε σημείον, τὸ δόποιον ἀπέχει τον τῶν ὅκρων εὐθ. τμήματος κεῖται ἐπὶ τῆς μεσοκαθέτου αὐτοῦ».

Αἱ μεσοκάθετοι ε<sub>1</sub> καὶ ε<sub>2</sub>, τῶν πλευρῶν ΒΓ καὶ ΑΓ αὐτοῦ τέμνονται εἰς ἐν σημείον Ο (διότι αἱ κάθετοι πρὸς αὐτὰς ΑΓ καὶ ΒΓ τέμνονται).

Ἐπειδὴ τὸ Ο κεῖται ἐπὶ τῆς μεσοκαθέτου ε<sub>1</sub>, ἔχομεν ΟΒ=ΟΓ. Ὁμοίως, ἐπειδὴ τὸ Ο κεῖται καὶ ἐπὶ τῆς μεσοκαθέτου ε<sub>2</sub>, ἔχομεν καὶ ΟΓ=ΟΑ. Συνεπῶς ΟΑ=ΟΒ. Ἐπειδὴ τὸ Ο ἀπέχει τον τῶν ὅκρων τῆς πλευρᾶς ΑΒ τοῦ τριγώνου ΑΒΓ κεῖται ἐπὶ τῆς μεσοκαθέτου αὐτῆς ε<sub>2</sub>.

Ἐκ τῶν άνωτέρω συμπεραίνομεν δτὶ ΟΑ=ΟΒ=ΟΓ. Ἐάν μὲ κέντρον τὸ Ο καὶ ἀκτίνα ΟΑ γράψωμεν κύκλον, αὐτὸς διέρχεται διά τῶν τριῶν κορυφῶν Α, Β, Γ τοῦ τριγώνου ΑΒΓ καὶ λέγεται περιγεγραμμένος περὶ τὸ τρίγωνον κύκλος.

Ωστε : Αἱ τρεῖς μεσοκάθετοι τῶν πλευρῶν παντὸς τριγώνου συντρέχουν εἰς ἐν σημείον, τὸ δόποιον είναι τὸ κέντρον τοῦ περιγεγραμμένου περὶ τὸ τρίγωνον κύκλου .

### Άσκήσεις

12) Νά χαράξητε τάς μεσοκαθέτους τῶν πλευρῶν ἐνὸς δρθιογωνίου καὶ ἐνὸς ἀμβλυγωνίου τριγώνου. Τι ἔχετε νά παρατηρήσητε διά τήν θέσιν τοῦ κέντρου τῶν περιγεγραμμένων περὶ αὐτά κύκλων ;

13) Χαράξατε τάς μεσοκαθέτους τῶν ίσων πλευρῶν ισοσκελοῦς τριγώνου καὶ τὸ ὑψος, τὸ δόποιον ἀντιστοιχεῖ εἰς τήν βάσιν αὐτοῦ. Τι παρατηρεῖτε; (Δικαιολογήσατε διά συλλογισμῶν τήν παρατήρησίν σας).

14) Κατασκευάσατε τριγώνον ΑΒΓ. Μὲ βάσεις τάς πλευρᾶς αὐτοῦ κατασκευάσατε τά ισοσκελῆ τρίγωνα ΑΟΒ, ΒΚΓ, ΓΛΑ καὶ χαράξατε τά ὑψη αὐτῶν ΟΟ', ΚΚ', ΛΛ'. Προσεκτείνατε αὐτά καὶ δικαιολογήσατε δτὶ ταῦτα συντρέχουν εἰς τὸ αὐτὸ σημείον.


### Σον. "Υψη ἐνὸς τριγώνου

§ 5. "Υψος τριγώνου δυναμάζουμεν τὸ εύθυγρ. τμῆμα, τὸ δόποιον συνδέει κορυφὴν τριγώνου μὲ τὸ ἵχνος τῆς, ἐκ τῆς κορυφῆς ταύτης, καθέτου πρὸς τήν ἀπέναντι πλευράν. "Υψος ὅμως θεωρεῖται καὶ ὁ φορεὺς τοῦ τμήματος τούτου. Κάθε τριγώνον ἔχει, ἐπομένως, τρία ὑψη.

Νά κατασκευάσητε ἐν τρίγωνον ΑΒΓ, μὲ πλευρὰς  $AB = 3,5 \text{ cm}$ ,  $BG = 4 \text{ cm}$

καὶ  $AG = 2,5 \text{ cm}$ . Χαράξατε  $\Gamma_1$  μὲ τήν βοηθειαν τοῦ κανόνος καὶ τοῦ διαβήτου τὰ ὑψη τοῦ τριγώνου. Τι παρατηρεῖτε; (Σχ. 11).

Χαράσσομεν μετά προσοχῆς τὰ ὑψη  $AD$ ,  $BE$  καὶ  $CG$  τοῦ τριγώνου  $ABG$ . Παρατηροῦμεν δὲ δτὶ τὰ τρία ὑψη συντρέχουν εἰς τὸ αὐτὸ σημείον  $H$ , τὸ δόποιον καλοῦμεν δρθόκεντρον τοῦ



τριγώνου. Έχομεν λοιπόν τὴν πρότασιν: Τὰ .ῦψη τριγώνου συντρέ-  
χουν εἰς ἐν σημεῖον.

<sup>1</sup>Ἐάν ἐπιθυμοῦμεν νὸν αἰτιολογήσωμεν διὰ συλλογισμῶν αὐτὴν τὴν παρατήρησιν, ἐργαζόμεθα ὡς ἔξις: (Σχ. 11).

Χαράσσομεν τρεις εύθειας, αι δηοίσαι διέρχονται διά τῶν κορυφῶν Α, Β καὶ Γ τοῦ τριγώνου καὶ εἴναι παράλληλοι ἀντιστοίχως πρὸς τὰς πλευράς αὐτοῦ ΒΓ, ΑΓ, ΑΒ. Αἱ τρεις αὗται εύθειαι τέμνονται ἀνά δύο καὶ σχηματίζουν τὸ τρίγωνον Α<sub>1</sub> Β<sub>1</sub> Γ<sub>1</sub>.

Ἐπομένως  $AB_1 = AG_1$ . Ἀρα τὸ σημείον Α είναι τὸ μέσον τῆς  $B_1G_1$ . Τὸ δύος ΑΔ τοῦ  $ABΓ$  (κάθετον) πρὸς τὴν  $BΓ$  είναι κάθετο ν ἐπὶ τὴν παράλληλὸν τῆς  $B_1Γ_1$ , εἰς τὸ μέσον τῆς Α. Ἡτοὶ δὲ ΑΔ είναι μεσοκάθετος τῆς πλευρᾶς  $B_1Γ_1$  τοῦ τριγώνου  $A_1B_1G_1$ . Όμοιως καὶ τὰ ἄλλα δύο  $BE$  καὶ  $ΓΖ$  τοῦ τριγώνου  $ABΓ$  είναι μεσοκάθετοι τῶν τόπων διαμορφωτῶν τῆς  $A_1B_1G_1$ .

Αἱ μεσοκάθετοι δώματα τῶν πλευρῶν Τ<sub>1</sub>Γ<sub>1</sub>, Α<sub>1</sub>Β<sub>1</sub> τοῦ τριγώνου Α<sub>1</sub>Β<sub>1</sub>Γ<sub>1</sub>. Χουν εἰς ἐν σημείον Η. "Ἄρα και τὰ ίψη ΑΔ, ΒΕ και ΓΖ συντρέχουν εἰς ἐν σημείον Η, τὸ δρόμοκεντρον τοῦ τριγ. ΑΒΓ. "Ωστε. Τὰ ίψη παντὸς τριγώνου συντρέχουν εἰς ἐν σημείον

## Παρατηρήσεις

1) Ἐάν τὸ τρίγωνον εἶναι ὁρθογώνιον εἰς τὸ Α, ἐπειδὴ δύο ὑψη του εἶναι αἱ κάθετοι πλευραὶ του, τὸ ὁρθόκεντρόν του εἶναι ἡ κορυφὴ τῆς ὁρθῆς γωνίας αὐτοῦ.

2) Ἐάν τὸ τρίγωνον εἶναι δέσμωνιον τὸ ὄρθοκεντρόν του κεῖται εἰς τὸ ἐσωτερικὸν αὐτοῦ καὶ σταυρεῖται εἴναι ἀμβλυγώνιον εἰς τὸ ἔξωτερικόν του.

'Α σχήσεις

15. Νά κατασκευάσητε τρίγωνον ΑΒΓ και νά εύρητε τό δρθόκεντρον αύτοῦ Η. Νά δρι-  
στητε τά δρθόκεντρα τών τριγώνων ΑΒΗ ΒCH και ΓAH.

16. Εἰς τριγωνον ΔΕΖ χαράξατε τὰ ὑπὸ ΔΔ' καὶ ΕΕ'. Αὐτά τέμνονται εἰς τὸ σημείον Η. Ἐκ τοῦ Η χαράξατε κάθετον πρὸς τὴν ΕΔ. Διέρχεται αὐτὴ ἐκ τοῦ Ζ; (Διατί;)

17) Εἰς Ισοσκέλες τρίγωνον ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ) χαράξατε τὰ ὑψη ΒΒ' καὶ ΓΓ'. Αὐτά τέμνουνται εἰς ἐν σημεῖον Η. Φέρομεν τὴν ΑΗ. Διέρχεται αὐτὴ διὰ τῶν μέστων τῶν ΒΓ· (Αγωγή).

18) Τριγώνου ΑΒΓ ή γωνία  $\hat{A}$  είναι  $70^\circ$ . Τὰ ύψη αὐτοῦ ΑΔ καὶ ΒΕ τέμνονται εἰς τὸ Η. Νά ύπολογισθοῦν αἱ γωνίαι  $\hat{H}\hat{B}\hat{A}$  καὶ  $\hat{H}\hat{C}\hat{A}$ .

### 3ον. Διάμεσοι τριγώνων

§ 6. Διάμεσον ἐνὸς τριγώνου όνομάζομεν τὸ εὐθ. τμῆμα, τὸ ὅποιον συνδέει μίαν κορυφήν του μὲ τὸ μέσον τῆς ἀπέναντι πλευρᾶς. Κάθε τρίγωνον ἔχει τρεῖς διάμεσους.

Νὰ κατασκευάσητε ἐιρ τρίγωνον  $AB\Gamma$ , τοῦ ὅποίου αἱ πλευραὶ εἰναι  $AB=4$  cm,  $B\Gamma=5$  cm καὶ  $A\Gamma=6$  cm. Χαράξατε μὲ τὴν βοήθειαν τῶν γεωμετρικῶν ὁργάνων τὰς διαμέσους αὐτοῦ (μετὰ προσοχῆς). Τὶ παρατηρεῖτε; (Σχ. 12)

Εἰς τὸ τρίγωνον  $AB\Gamma$  χαράσσομεν τὰς διαμέσους  $AM$ ,  $BN$  καὶ  $\Gamma\Lambda$  καὶ παραπτηροῦμεν δτὶ αὐταὶ συντρέχουν εἰς τὸ αὐτὸ σημεῖον  $\Theta$ . Ἐὰν συγκρινωμεν μὲ τὸν διαβήτην τὰ εὐθ. τμήματα  $A\Theta$  καὶ  $E\Theta$ , τὰ  $B\Theta$  καὶ  $\Theta N$ , καθὼς καὶ τὰ  $\Gamma\Theta$  καὶ  $\Theta L$ , θὰ διαπιστώσωμεν δτὶ  $A\Theta=2\Theta M$  καὶ  $\Theta M=\frac{1}{3}AM$  (ἢ  $A\Theta=\frac{2}{3}AM$ ). Ὁμοίως ἔχομεν

$$N\Theta=\frac{1}{3}BN \text{ καὶ } \Theta L=\frac{1}{3}\Gamma\Lambda.$$

Ἐπομένως: Αἱ τρεῖς διάμεσοι τριγώνου συντρέχουν εἰς ἓν σημεῖον, τὸ ὅποιον λέγεται κέντρον βάρους αὐτοῦ καὶ ἀπέχει τοῦ μέσου ἐκάστης πλευρᾶς τὸ  $\frac{1}{3}$  τῆς ἀντιστοίχου διαμέσου.

(ἢ τὰ  $\frac{2}{3}$  τῆς διαμέσου ἀπὸ τῆς ἀντιστοίχου κορυφῆς).

Δυνάμεθα νὰ εἰτοιογήσωμεν τὸ ἀποτέλεσμα αὐτὸ κατὰ τὸν ἑξῆς τρόπον:

Ἐπὶ τῶν προεκτάσεων τῶν  $AM$  καὶ  $BN$  (πέρα τῶν  $M$  καὶ  $N$ ) λαμβάνομεν ἀντιστοίχως τμήματα  $M\Delta=M\Theta$  καὶ  $NE=N\Theta$ . Χαράσσομεν τὰς  $\Gamma E$  καὶ  $\Gamma\Delta$ . Τὸ σχηματιζόμενον τετράπλευρον  $\Gamma\Theta\Delta E$  εἶναι παραλληλόγραμμον, διότι αἱ διαγώνιοι αὐτοῦ διχοτομοῦνται. ( $GM=MB$  καὶ  $\Theta M=M\Delta$ ). Ὁμοίως καὶ τὸ  $\Gamma\Theta AE$  εἶναι παραλληλόγραμμον, διότι  $\Gamma N=NA$  καὶ  $\Theta N=NE$ . Συνεπῶς  $\Delta A=//\Gamma\Theta$  καὶ  $AE=//\Gamma\Theta$ . Ἀρα  $\Delta A=//AE$ . Ωστὲ τὸ  $AB\Delta E$  εἶναι παραλληλόγραμμον, διότι ἔχει δύο ἀπέναντι πλευράς ἵσας καὶ παραλλήλους. Τότε δῆμος ἔχομεν  $A\Theta=\Theta\Delta$  καὶ  $B\Theta=\Theta E$ . (διότι αἱ διαγώνιοι παραλληλογράμμου διχοτομοῦνται). Ἀλλὰ  $\Theta\Delta=2\Theta M$ , ώστε  $A\Theta=2\Theta M$  καὶ  $\Theta M=\frac{1}{3}AM$ . Ὁμοίως συμπεραίνομεν δτὶ  $\Theta N=\frac{1}{3}BN$ . Καθ' δημοιον τρόπον ἀποδεικνύομεν δτὶ

ἡ διάμεσος  $\Gamma\Lambda$  τέμνει τὴν  $BN$  εἰς ἓν σημεῖον, τὸ ὅποιον ἀπέχει τοῦ  $N$  τὸ  $\frac{1}{3}$  τοῦ  $BN$ , δηλαδὴ εἰς τὸ σημεῖον  $\Theta$ , τὸ ὅποιον ἀπέχει τοῦ  $\Lambda$  τὸ  $\frac{1}{3}$  τῆς  $\Gamma\Lambda$ . Ωστὲ: Αἱ τρεῖς διάμεσοι τριγώνου συντρέχουν εἰς ἓν σημεῖον. Τοῦτο ἀπέχει τοῦ μέσου ἐκάστης πλευρᾶς τὸ  $\frac{1}{3}$  τῆς ἀντιστοίχου διαμέσου ἢ τὰ  $\frac{2}{3}$  τῆς διαμέσου ἀπὸ τῆς ἀντιστοίχου κορυφῆς.

### Ἄσκήσεις


19. Νὰ χαράξητε τρίγωνον  $AB\Gamma$  καὶ νὰ εύρητε τὸ κέντρον βάρους αὐτοῦ.

20. Χαράξατε τὴν διάμεσον  $AM$  τριγώνου  $AB\Gamma$ . Λάβετε ἐπὶ αὐτῆς τμῆμα  $A\Theta=\frac{2}{3}AM$ .

Συγκρίνατε τὰ τμήματα, εἰς τὰ ὅποια αἱ  $B\Theta$  καὶ  $\Gamma\Theta$  τέμνουν τὰς πλευρὰς  $AG$  καὶ  $AB$  αὐτοῦ.

21. Χαράξατε παραλληλόγραμμον  $AB\Gamma\Delta$ . Ἐνώσατε δι' εὐθ. τμημάτων τὴν κορυφὴν  $A$  μὲ τὸ μέσον τῆς  $\Gamma\Delta$ . Συγκρίνατε τὰ τμήματα, εἰς τὰ ὅποια ἡ  $AM$  διαιρεῖται ὑπὸ τῆς  $B\Delta$ .

22. Νὰ χαράξητε ἐν παραλληλόγραμμον  $AB\Gamma\Delta$  καὶ νὰ λάβητε ἐν τυχὸν σημεῖον  $N$  εἰς τὸ ἐπίπεδον τοῦ παραλληλογράμμου. Δείξατε δτὶ τὰ τρίγωνα  $NA\Gamma$  καὶ  $NB\Delta$  ἔχουν τὸ αὐτὸ κέντρον βάρους.




σχ. 12.

**4ον. Διχοτόμοι τριγώνου.**

**§ 7. Διχοτόμοι** έσωτερικήν ένδις τριγώνου καλούμενην τήν διχοτόμον μιᾶς γωνίας αύτοῦ. Διχοτόμον καλούμενην καὶ τὸ ἀπό τῆς κορυφῆς μέχρι τῆς ἀπέναντι πλευρᾶς, τμῆμα τῆς προηγουμένης.

Κάθε τριγώνου ἔχει τρεῖς έσωτερικάς διχοτόμους.

Νὰ κατασκενάστη ἐν τρίγωνον  $ABΓ'$  μὲ πλευρᾶς  $AB = 4 \text{ cm}$ ,  $ΒΓ' = 5 \text{ cm}$ ,  $ΑΓ = 6 \text{ cm}$ . Μὲ τὴν βοήθειαν τῶν γεωμετρικῶν ὁργάνων (διαβήτων - κανόνος) νὰ χαράξῃτε (προσεκτικῶς) τὰς έσωτερικάς διχοτόμους τῶν γωνιῶν αὐτοῦ. Τὶ παρατηρεῖτε; (Σχ. 13)



Σχ. 13.

σημεῖον, τὸ δοποῖον ἀπέχει ἵσον τῶν πλευρῶν αὐτοῦ.

Δυνάμεθα νὰ αιτιολογήσωμεν διὰ συλλογισμῶν τὴν παρατήρησιν αὐτήν στηριζόμενοι εἰς τὰς γυνωτάς ίδιότητας: «Κάθε σημείον τῆς διχοτόμου γωνίας ἀπέχει ἵσον τῶν πλευρῶν αὐτῆς», καὶ «κάθε σημείον, έσωτερικὸν γωνίας, τὸ δοποῖον ἀπέχει ἵσον τῶν πλευρῶν αὐτῆς, εἴναι σημείον τῆς διχοτόμου τῆς γωνίας ταύτης».

Η έσωτερική διχοτόμος  $AΖ$  τῆς γωνίας  $\hat{A}$  τριγώνου  $ABΓ'$  τέμνει τὴν πλευράν  $ΒΓ'$  εἰς τὸ  $Z$ . Η έσωτερική διχοτόμος  $BΔ$  τῆς γωνίας  $\hat{B}$  τοῦ τριγώνου  $ABZ$  τέμνει τὴν πλευράν  $AΖ$  αὐτοῦ εἴς ἐν σημείον  $I$ .

Σημειούμεν διὰ τῶν  $A', B', \Gamma'$  τοὺς πόδας τῶν καθέτων, αἱ δοποῖαι ἀγονται ἀπό τὸ  $I$  πρὸς τὰς  $ΒΓ'$ ,  $ΓΑ$ ,  $ΑΒ$ . Τὸ σημείον  $I$ , ἐπειδὴ κεῖται ἐπὶ τῆς διχοτόμου  $AΖ$  τῆς γωνίας  $\hat{A}$  ἀπέχει ἵσον τῶν  $AB$  καὶ  $ΑΓ$ . Εἶναι δύμας καὶ σημείον τῆς διχοτόμου  $BΔ$ , δρα ἰσαπέχει τῶν  $AB$  καὶ  $ΒΓ'$ . Ὅστε ἀπέχει ἵσον καὶ τῶν πλευρῶν  $ΒΓ'$  καὶ  $ΑΓ$ . Ἐπειδὴ δὲ τὸ  $I$  εἴναι έσωτερικὸν σημείον τοῦ τριγώνου  $ABΓ'$ , ἔπειτα δὴ τὸ  $I$  κεῖται καὶ ἐπὶ τῆς διχοτόμου  $ΓΕ$ , τῆς γωνίας  $\hat{Γ}$  τοῦ τριγώνου  $ABΓ'$ .

**Ωστε:** Αἱ τρεῖς έσωτερικαὶ διχοτόμοι παντὸς τριγώνου συντρέχουν εἰς ἐν σημείον, τὸ δοποῖον ἀπέχει ἵσον τῶν πλευρῶν αὐτοῦ.

**Παρατήρησις**

Ἐκ τῆς ισότητος  $ΙΓ' = IB' = IA'$  τῶν ἀποστάσεων τοῦ  $I$  ἀπό τῶν πλευρῶν, παρατηροῦμεν δὴ ἐὰν μὲ κέντρον τὸ σημείον αὐτὸ  $I$  καὶ ἀκτίνα  $IA' =$

$=IB'=IG'$  γράψωμεν κύκλον, αύτός θά έφαπτεται τῶν πλευρῶν τοῦ τριγώνου  $ABG$  εις τὰ σημεῖα  $A',B',G'$  (διατί;). "Ωστε τὸ σημεῖον, εἰς τὸ ὅποιον συντρέχουν αἱ ἑσωτερικαὶ διχοτόμοι τῶν γωνιῶν ἐνὸς τριγώνου  $ABG$  εἶναι τὸ κέντρον ἐνὸς κύκλου, ὁ ὅποιος έφαπτεται τῶν πλευρῶν τοῦ τριγώνου καὶ λέγεται ἔγγεγραμμένος εἰς τὸ τρίγωνον κύκλος.

2) Εἰς τὸ ισόπλευρον τρίγωνον αἱ διάμεσοι εἶναι καὶ ὑψη αὐτοῦ καὶ διχοτόμοι τῶν γωνιῶν του. "Ἄρα τὸ κοινὸν σημεῖον αὐτῶν εἶναι τὸ κέντρον βάρους του, τὸ κέντρον τοῦ περιγεγραμμένου κύκλου, τὸ κέντρον τοῦ ἔγγεγραμμένου καὶ τὸ δρθόκεντρον αὐτοῦ. Λέγομεν δτι τὸ Ο εἶναι τὸ κέντρον τοῦ ισοπλεύρου τριγώνου.

Σημ. Αἱ προτάσεις τῶν § 4, 5, 6, 7 εἶναι θεωρήματα.

### 'Α σ χ ή σ ε ι 6


23) Κατασκευάσατε ισοσκελὲς τρίγωνον καὶ εὑρετε τὸ σημεῖον τομῆς τῶν διχοτόμων. Έξηγήσατε διατὶ τοῦτο κείται ἐπὶ τοῦ ὑψους του.

24) Τριγώνου  $ABG$  αἱ γωνίαι  $\widehat{B}$  καὶ  $\widehat{G}$  εἶναι ἀντιστοίχως  $60^\circ$  καὶ  $50^\circ$ . Νὰ ὑπολογισθῇ ἡ γωνία  $BIG$  (τῶν διστορικῶν διχοτόμων  $BI$ ,  $IG$  αὐτοῦ). (Σχ. 14)

25) Εἰς ὀρθογώνιον τρίγωνον  $ABG$  ( $\widehat{A}=90^\circ$ ) χαράξατε τὰς διχοτόμους τῶν γωνιῶν  $\widehat{B}$  καὶ  $\widehat{G}$ . Ἐν  $I$  εἶναι τὸ σημεῖον τομῆς αὐτῶν, μετρήσατε τὴν γωνίαν  $BIG$ . Δύνασθε νὰ δικαιολογήσητε τὸ ἀποτέλεσμα αὐτό;

26) Κατασκευάσατε κύκλον ( $O$ ,  $R=2$  cm). Χαράξατε τρεις ἔφαπτομένας αὐτοῦ, αἱ ὅποιαι τέμνονται ἀνά δύο εἰς τὰ σημεῖα  $A$ ,  $B$ ,  $G$ . 'Ἐκ ποιου σημείου διέρχονται αἱ διχοτόμοι τῶν γωνιῶν τοῦ τριγώνου  $ABG$ ;

27. Κατασκευάσατε τετράγωνον  $ABGD$ . Φέρατε τὴν διαγώνιον  $AG$  αὐτοῦ καὶ τὰς διχοτόμους τῶν γωνιῶν  $B\widehat{A}G$ ,  $B\widehat{G}A$ . Τέμνονται αὐταὶ ἐπὶ τῆς διαγώνιου  $BG$  τοῦ τετραγώνου. Διατί;



σχ. 14.

### § 8. Περιγεγραμμένος κύκλος τριγώνου. Κατασκευή.

Κατασκευάσατε τρίγωνον  $ABG$  καὶ χαράξατε κύκλον, διερχόμενον διὰ τῶν κορυφῶν τοῦ τριγώνου.


'Εξ ὅσων εἴπομεν εἰς τὴν § 4 ὑπάρχει εἰς κύκλος, ὁ ὅποιος διέρχεται ἀπὸ τὰς κορυφὰς  $A,B,G$  τριγώνου  $ABG$ . Τοῦτον ὀνομάσαμεν περιγεγραμμένον περὶ τὸ τρίγωνον κύκλον. 'Ἐὰν Ο εἶναι τὸ κέντρον του, τότε  $OA = OB = OG$ . (ἀς ἀκτίνες).

Τὸ κέντρον Ο ἐπομένως εἶναι τὸ σημεῖον, εἰς τὸ ὅποιον συντρέχουν αἱ μεσοκάθετοι τῶν πλευρῶν  $AB$ ,  $BG$  καὶ  $AG$  τοῦ τριγώνου  $ABG$ .

**Κατασκευή :**

έργηντο κανόνα οι γέλι νοέμπρο διατίθεται στην Τ. Β. Α. σύμφωνα με την Τ.Β.Α.

"Εστώ τρίγωνον  $ABG$ . χαράσσομεν μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ διαβήτου καὶ τοῦ κανόνος τὰς μεσοκαθέτους  $\epsilon_1$  καὶ  $\epsilon_2$  τῶν πλευρῶν  $BG$  καὶ  $AG$  αὐτοῦ. Αἱ  $\epsilon_1$  καὶ  $\epsilon_2$  τέμνονται εἰς ἓν σημεῖον  $O$  (καὶ ἐν μόνον), τὸ δόποιον εἶναι τὸ κέντρον τοῦ περιγεγραμμένου περὶ τὸ τρίγωνον  $ABG$  κύκλου, διότι ἔχομεν  $OB=OG=OA$  ἐπειδὴ τὸ  $O$  κεῖται ἐπὶ τῆς  $\epsilon_1$  καὶ  $OG=OA$  ἐπειδὴ τὸ  $O$  κεῖται ἐπὶ τῆς  $\epsilon_2$ . Ἐπομένως  $OA=OB=OG$ .



σχ. 15.

"Ἄρα, ἐὰν μὲ κέντρον τὸ  $O$  καὶ ἀκτῖνα  $OA$  χαράξωμεν κύκλον ( $O$ ,  $OA$ ), αὐτὸς θὰ διέλθῃ διὰ τῶν σημείων  $A$ ,  $B$ ,  $G$  καὶ συνεπῶς θὰ εἶναι ὁ περιγεγραμμένος περὶ τὸ τρίγωνον  $ABG$  κύκλος.

"Ἐὰν τώρα προσπαθήσωμεν νὰ χαράξωμεν καὶ ἄλλον περιγεγραμμένον περὶ τὸ τρίγωνον  $ABG$  κύκλον, θὰ παρατηρήσωμεν δτὶ αὐτὸς ταυτίζεται μὲ τὸν πρῶτον (διότι αἱ  $\epsilon_1$  καὶ  $\epsilon_2$  τέμνονται εἰς ἓν μόνον σημεῖον).

"Ωστε: 'Υπάρχει εἰς κύκλος καὶ μόνον εἰς, δ ὅποιος διέρχεται διὰ τῶν τριῶν κορυφῶν τριγώνου. Αὐτὸς λέγεται περιγεγραμμένος περὶ τὸ τρίγωνον κύκλος.

Τὸ κέντρον του  $O$  εἶναι τὸ σημεῖον, εἰς τὸ δόποιον συντρέχουν αἱ μεσοκάθετοι τῶν πλευρῶν τοῦ τριγώνου. **Άκτις του  $R$**  εἶναι ἡ ἀπόστασις τοῦ σημείου αὐτοῦ ἀπὸ μίαν κορυφήν του.

### § 9. Έγγεγραμμένος εἰς τρίγωνον κύκλος. Κατασκευή.

Νὰ κατασκενάστε τρίγωνον  $ABI$  καὶ νὰ χαλάξητε κύκλον ἐφαπτόμενον καὶ τῶν τριῶν πλευρῶν του, ἐσωτερικῶς.

'Εξ ὅσων εἴπομεν εἰς τὴν § 7 ὑπάρχει κύκλος, δ ὅποιος ἐφάπτεται τῶν πλευρῶν  $AB$ ,  $BG$  καὶ  $AG$  τοῦ τριγώνου  $ABG$ . Τὸ κέντρον  $I$  τοῦ κύκλου αὐτοῦ εἶναι τὸ σημεῖον, εἰς τὸ δόποιον συντρέχουν αἱ ἐσωτερικαὶ διχοτόμοι τῶν γωνιῶν τοῦ τριγώνου. Ο κύκλος αὐτὸς λέγεται ἐγγεγραμμένος εἰς τὸ τρίγωνον κύκλος.

**Κατασκευή :**

Κατασκευάζομεν τρίγωνον  $ABG$ . Μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ διαβήτου καὶ τοῦ κανόνος χαράσσομεν τὰς ἐσωτερικὰς διχοτόμους τῶν γωνιῶν  $B$  καὶ  $G$  τοῦ τριγώνου. (Σχ. 16)

Αὗται δῆπος γνωρίζομεν (§ 7), συντρέχουν εἰς ἓν σημεῖον  $I$ .

Μὲ κέντρον τὸ Ι καὶ ἀκτῖνα τὴν ἀπόστασιν τοῦ Ι ἀπὸ τῆς  $B\Gamma$ , τὴν  $IA'$ , χαράσσο· μεν κύκλον ( $I, IA'$ ) δὲ διποίος ἐφάπτεται εἰς τὸ  $A'$  τῆς πλευρᾶς  $B\Gamma$ .

Οὐ κύκλος αὐτὸς ἐφάπτεται καὶ τῶν πλευρῶν  $AB$  καὶ  $AG$  τοῦ τριγώνου αὐτοῦ, διότι, ἔὰν φέρωμεν τὰς ἀπόστασεις  $IG'$ ,  $IB'$  ἀπὸ τὰς πλευρᾶς  $AB$  καὶ  $AG$ , ἔχομεν ὡς ἐμάθομεν,  $IB' = IG' = IA'$ . 'Ἄρα δὲ κύκλος ( $I, IA'$ ), εἶναι δὲ ἐγγεγραμμένος εἰς τὸ τρίγωνον  $AB\Gamma$ , διότι αἱ πλευραὶ του εἶναι κάθετοι εἰς τὰ ἄκρα τῶν ἀκτίνων  $IA'$ ,  $IB'$ ,  $IG'$ .

Ἐάν ἐπιχειρήσωμεν νὰ χαράξωμεν καὶ ἄλλον ἐγγεγραμμένον εἰς τὸ αὐτὸ τρίγωνον  $AB\Gamma$  κύκλον, αὐτὸς θὰ ταυτισθῇ μὲ τὸν πρῶτον (διότι αἱ διχοτόμοι  $GZ$ ,  $BE$  εἰς ἐν μόνον σημεῖον τέμνονται).

"Ωστε: 'Υπάρχει εἰς κύκλος καὶ μόνον εἰς ἐγγεγραμμένος εἰς τὸ τρίγωνον  $AB\Gamma$ . Τὸ κέντρον του  $I$  εἶναι τὸ σημεῖον, εἰς τὸ διποίον συντρέχουν αἱ τρεῖς ἑσωτερικαὶ διχοτόμοι τοῦ τριγώνου. 'Ακτῖς αὐτοῦ  $r$ , εἶναι ἡ ἀπόστασις τοῦ σημείου αὐτοῦ ἀπὸ μίαν τῶν πλευρῶν του.

### Ασκήσεις

28) Κατασκευάστε ισόπλευρον τρίγωνον  $AB\Gamma$  πλευρᾶς 4 cm καὶ χαράξατε τὸν περιγεγραμμένον περὶ αὐτὸ κύκλον.

29. Κατασκευάστε ισόπλευρον τρίγωνον  $AB\Gamma$  πλευρᾶς μήκους 5 cm καὶ χαράξατε τὸν ἐγγεγραμμένον εἰς αὐτὸ κύκλον.

30) Νὰ χαράξητε τὸν περιγεγραμμένον κύκλον περὶ ἐν δρθογώνιον καὶ περὶ ἐν ἀμβλυγώνιον τρίγωνον.


31) Κατασκευάστε τρίγωνον  $AB\Gamma$  καὶ χαράξατε τὸν περιγεγραμμένον περὶ αὐτὸ κύκλον. Εὑρετε τὸ συμμετρικὸν τοῦ δρθοκέντρου τοῦ τριγώνου ὡς πρὸς τὰς πλευράς. Τὶ παρατηρεῖτε;

32. Λάβετε τρία σημεῖα, μὴ κείμενα ἐπὶ τῆς αὐτῆς εὐθείας καὶ κατασκευάστε, τὸν διερχόμενον δι' αὐτῶν κύκλον.

### Γ. ΔΙΑΙΡΕΣΙΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΙΣ $2^n$ ( $n \in \mathbb{N}$ καὶ $n > 1$ ) ἢ $3 \cdot 2^n$


(ἐνθα  $n$  ἀκερ.) ΙΣΑ ΤΟΞΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ  
ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΠΟΛΥΓΩΝΑ

§ 10. Κατασκευάστε κύκλον ( $O, R$ ) καὶ διαιρέσατε αὐτὸν εἰς 4 ίσα τόξα.  
Ἐν συνεχείᾳ διαιρέσατε τὸν κύκλον εἰς 8, 16, ... ίσα τόξα καὶ ἐνώσατε δι' εὐθυγράμμων τμημάτων τὰ σημεῖα ἐκάστης διαιρέσεως αὐτοῦ. Τὶ παρατηρεῖτε:  
(Σχ. 17).



Χαράσσομεν κύκλον κέντρου Ο και άκτινος R.

Διά νά διαιρέσωμεν τὸν κύκλον αὐτὸν εἰς 4 ἵσα τόξα φέρομεν δύο διαιρέτους καθέτους, τὰς ΑΓ καὶ ΒΔ. Αἱ ἐπίκεντροι γωνίαι ΑΟΒ, ΒΟΓ, ΓΟΔ, ΔΟΑ εἶναι ἵσαι, ως δρθαί. Ἐπομένως καὶ τὰ ἀντίστοιχα τόξα αὐτῶν εἶναι ἵσα, ἢτοι  $\widehat{AB} = \widehat{BG} = \widehat{GD} = \widehat{DA}$ .



σχ. 17.

"Ωστε: Κανονικὸν πολύγωνον λέγεται τὸ πολύγωνον, τὸ δόποιον ἔχει τὰς πλευράς του ἵσας καὶ τὰς γωνίας αὐτοῦ ἵσας. Τὸ μῆκος μιᾶς τῶν ἵσων πλευρῶν αὐτοῦ, συμβολίζομεν μὲ τὸ λ.

'Εάν χαράξωμεν τὰς διχοτόμους τῶν γωνιῶν  $\widehat{AOB}$ ,  $\widehat{BOG}$ ,  $\widehat{GOD}$ ,  $\widehat{DOA}$ , δό κύκλος διαιρεῖται εἰς 8 ἵσα τόξα (ἀντίστοιχα ἵσων ἐπίκεντρων γωνιῶν). Φέρομεν τὰς χορδὰς τῶν τόξων αὐτῶν καὶ ἐπιτυγχάνομεν τὴν κατασκευὴν ἐνὸς κυρτοῦ ὁκταγώνου. Τὸ ὁκτάγωνον τούτο εἶναι κανονικόν, διότι ἔχει τὰς πλευράς του ἵσας, ως χορδὰς ἵσων τόξων, καὶ τὰς γωνίας του ἵσας, ἐπειδὴ ἐκάστη τούτων εἶναι ἐγγεγραμμένη εἰς τὸν κύκλον, καὶ ἔχει ἀντίστοιχον τόξον ἵσον πρὸς τὰ  $\frac{6}{8}$  τοῦ κύκλου.

"Ἐργαζόμενοι καθ' δύμοιον τρόπον διαιροῦμεν τὸν κύκλον εἰς 16 ἵσα τόξα, 32 κ.λ.π. καὶ δρίζομεν κανονικὸν δεκαεξάγωνον, ἐπειτα κυρτὸν κανονικὸν πολύγωνον μὲ 32 πλευράς κ.ο.κ.

'Ἐκ τῶν προηγουμένων κατασκευῶν λέγομεν ὅτι δυνάμεθα νά διαιρέσωμεν τὸν κύκλον, μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ κανόνος καὶ τοῦ διαβήτου, εἰς  $2^2=4$ ,  $2^3=8$ ,  $2^4=16$ ,  $2^5, \dots, 2^v$  ἵσα τόξα καὶ νά δρίσωμεν οὕτω κανονικὰ κυρτὰ πολύγωνα μὲ  $2^2$ ,  $2^3$ ,  $2^4, \dots, 2^v$  πλευράς.

'Ο κύκλος ( $O, R$ ) δό δόποιος διέρχεται διά τῶν κορυφῶν τῶν κανονικῶν τούτων πολυγώνων λέγεται περιγεγραμμένος κύκλος, τὰ δὲ πολύγωνα εἶναι ἐγγεγραμμένα εἰς τὸν κύκλον αὐτὸν. Αἱ ἀκτῖνες τοῦ περιγεγραμμένου κύκλου, αἱ δόποιαι καταλήγουν εἰς τὰς κορυφάς τῶν κανονικῶν πολυγώνων λέγονται ἀκτῖνες τούτων.

Η κυρτή γωνία δύο διαδοχικών άκτινων τοῦ κανονικοῦ πολυγώνου λέγεται κεντρική γωνία αύτοῦ καὶ ισοῦται μὲν  $\frac{360}{v}$ , ὅπου ν τὸ πλῆθος τῶν πλευρῶν τοῦ κανονικοῦ πολυγώνου.

Τὸ κέντρον Ο τοῦ κύκλου λέγεται κέντρον τοῦ κανονικοῦ πολυγώνου.

Αἱ ἀποστάσεις τοῦ κέντρου Ο ἀπὸ τὰς πλευρὰς αὐτοῦ εἰναι ίσαι (ἀποστάσεις τοῦ κέντρου τοῦ κύκλου ἀπὸ τῶν χορδῶν αὐτοῦ). Η ἀπόστασις τοῦ κέντρου ἀπὸ τῆς πλευρᾶς καλεῖται ἀπόστημα τοῦ κανονικοῦ πολυγώνου καὶ τὸ μῆκος του συμβολίζεται μὲν τὸ α (π.χ. τοῦ τετραγώνου α<sub>4</sub>, τοῦ καν. ἑξαγώνου α<sub>6</sub>, κ.ο.κ.). Ἀντιστοίχως τὸ μῆκος τῶν πλευρῶν των συμβολίζεται μὲν λ<sub>4</sub>, λ<sub>6</sub>, κ.ο.κ.)

Ἐάν κανονικὸν πολύγωνον εἰναι κυρτόν, τὸ ἄθροισμα τῶν γωνιῶν του εἰναι  $\Sigma = (v-2) \cdot 2$ . δρθ. =  $(2v-4)$  δρθ. (ὅπου ν τὸ πλῆθος τῶν γωνιῶν του).


Ἐπειδὴ δλαι αἱ γωνίαι αύτοῦ εἰναι ίσαι, ἐκάστη εἰναι ίση πρὸς  $\frac{2v-4}{v}$  δρθ. =  $= \left(2 - \frac{4}{v}\right)$  δρθ.

§ 11. Κατασκευάσατε κύκλον ( $O, R$ ) καὶ ἐγγράψατε εἰς αὐτὸν ἐν κανονικὸν ἑξάγωνον, διὰ διαιρέσεως τοῦ κύκλου εἰς 6 ίσα τόξα. Τὶ παρατηρεῖτε;. (Σχ. 18)

Χαράσσομεν κύκλον κέντρου Ο καὶ ἀκτίνος R.

Ὑποθέτομεν ὅτι διὰ τῶν σημείων A, B, Γ, Δ, E, Z ἔχομεν διαιρέσει τὸν κύκλον εἰς 6 ίσα τόξα. Τὸ τρίγωνον AOB εἰναι ισοπελές ( $OA = OB$ , ὡς ἀκτίνες τοῦ κύκλου) καὶ ἔχει τὴν γωνίαν  $A\hat{O}B = \frac{360^\circ}{6} = 60^\circ$  (κεντρική γωνία). Ἀρα καὶ αἱ γωνίαι του εἰναι  $\hat{A} = \hat{B} = \frac{180^\circ - 60^\circ}{2} = 60^\circ$ . Ήτοι τὸ τρίγωνον AOB εἰναι ισόπλευρον. Ἐπομένως  $AB = R$ .

Διὰ νὰ διαιρέσωμεν λοιπὸν ἔνα κύκλον εἰς 6 ίσα τόξα, γράφομεν 6 διαδοχικὰς χορδάς, ίσας πρὸς τὴν ἀκτίνα. Ἐνώνομεν τὰ σημεῖα διαιρέσεως τοῦ κύκλου A, B, Γ, Δ, E, Z καὶ σχηματίζομεν ἐν κυρτὸν ἑξάγωνον. Τοῦτο εἰναι κανονικόν, δπως δυνάμεθα νὰ διαπιστώσωμεν, ἐάν συγκρίνωμεν τὰς πλευράς του μὲ τὸν διαβήτην καὶ τὰς γωνίας αύτοῦ μὲ τὸν διαφανῆ χάρτην (ἢ τὸ μοιρογνωμόνιον). Δυνάμεθα δημως καὶ νὰ δικαιολογήσωμεν τὴν διαπίστωσίν



σχ. 18.

μας αὐτήν μὲ τὴν παρατήρησιν, ὅτι αἱ μὲν πλευραὶ τοῦ πολυγώνου ΑΒΓΔΕΖ εἰναι ἴσαι, διότι ἐλάβομεν αὐτὰς κατὰ τὴν κατασκευήν του ἴσας πρὸς τὴν ἀκτίνα τοῦ κύκλου, αἱ δὲ γωνίαι αὐτοῦ εἰναι ἴσαι, ὡς ἐγγεγραμμέναι εἰς τὸν αὐτὸν κύκλον μὲ ἀντίστοιχα τόξα ἴσα πρὸς  $\frac{4}{6}$  τοῦ κύκλου.

Διὰ νὰ ἐγγράψωμεν εἰς τὸν κύκλον κανονικὸν δωδεκάγωνον, διαιροῦμεν αὐτὸν εἰς 12 τόξα ἴσα. Πρὸς τὸν σκοπὸν αὐτὸν, χαράσσομεν τὰς διχοτόμους τῶν κεντρικῶν γωνιῶν τοῦ κανονικοῦ ἔξαγρώνου, ἐνώνυμεν τὰ διαδοχικὰ σημεῖα διαιρέσεως τοῦ κύκλου καὶ κατασκευάζομεν οὕτω κανονικὸν δωδεκάγωνον (διατί;). Ἐάν ἐργασθῶμεν δόμοις, διαιροῦμεν τὸν κύκλον εἰς 24, 48 κ.ο.κ. ἴσα τόξα καὶ ἐγγράφομεν εἰς αὐτὸν κανονικὸν εἰκοσιτετράγωνον, ἔπειτα κυρτὸν κανονικὸν πολύγωνον μὲ 48 πλευράς κ.ο.κ. Τέλος συνδέομεν δι' εύθυγράμμων τημημάτων ἀνὰ δύο τὰς μὴ διαδοχικὰς κορυφὰς Α, Γ, Ε τοῦ ἐγγεγραμμένου εἰς τὸν κύκλον κανονικοῦ ἔξαγρώνου ΑΒΓΔΕΖ. Σχηματίζεται οὕτως ἐν τρίγωνον ΑΓΕ, ἐγγεγραμμένον εἰς τὸν κύκλον, τὸ δόποιον εἰναι ἴσοπλευρον, διότι  $ΑΓ=ΓΕ=ΕΑ$  ὡς χορδαὶ ἴσων τόξων τοῦ κύκλου. Τοῦτο εἰναι τὸ κανονικὸν τρίγωνον. Ἐκ τῶν προηγουμένων κατασκευῶν συμπεραίνομεν ὅτι δυνάμεθα νὰ διαιρέσωμεν ἕνα κύκλον εἰς  $3, 3.2 = 6, 3.2^2 = 12, 3.2^3, 3.2^4, \dots 3.2^n$  ἴσα τόξα καὶ νὰ ἐγγράψωμεν κανονικὸν πολύγωνον εἰς τὸν κύκλον μὲ  $3, 3.2 = 6, 3.2^2 = 12, 3.2^3, \dots 3.2^n$  πλευράς.

Συνοψίζομεν τὰ συμπεράσματά μας μὲ τὴν παρατήρησιν, ὅτι δυνάμεθα νὰ διαιρέσωμεν εἰς  $2^n$  ή  $3.2^n$  ἴσα τόξα τὸν κύκλον καὶ ὡς ἐν τούτῳ δυνάμεθα νὰ ἐγγράψωμεν εἰς αὐτὸν κανονικὰ πολύγωνα μὲ  $2^n$  ή  $3.2^n$  πλευράς.

**Σημείωσις.** Μὲ τὴν ἐγγραφὴν εἰς τὸν κύκλον καὶ ἄλλων κανονικῶν πολυγώνων, θὰ ἀσχοληθῶμεν εἰς ἀνωτέρων τάξιν.

### Άσκήσεις

33) Νὰ εὑρητε τὴν κεντρικὴν γωνίαν, ἐνὸς κανονικοῦ α) πενταγώνου, β) δωδεκαγώνου, γ) εἰκοσιτετράγωνου, δ) τριγώνου.

34) Πόσων μοιρῶν είναι ἡ ἐσωτερικὴ γωνία ἐνὸς κανονικοῦ α) ὀκταγώνου, β) δεκαεξαγώνου; γ) δωδεκαγώνου;

35) Ποίου κανονικοῦ πολυγώνου, ἡ κεντρικὴ γωνία είναι α)  $90^\circ$ , β)  $\frac{1}{2}$  δρθ., γ)  $30^\circ$  καὶ δ)  $24^\circ$ ;

36) Ποίου είναι τὸ κανονικὸν πολύγωνον, τοῦ δόποιου ἡ ἐσωτερικὴ γωνία είναι α)  $108^\circ$ , β)  $\frac{4}{3}$  δρθ. γ)  $135^\circ$ , δ)  $\frac{5}{3}$  δρθ. καὶ ε)  $175^\circ$ ;

37) Χαράξατε ἕνα κύκλον κέντρου Ο καὶ ἀκτίνος  $R=5$  cm. Ἐγγράψατε εἰς αὐτὸν ἐν κανονικὸν εἰκοσιτετράγωνον.


38) Νὰ κατασκευάσητε κανονικὸν ἔξαγωνον μὲ πλευρὰν μήκους 4 cm.

39) Χαράξατε εύθ. τμῆμα  $AB$  μῆκους 3 ειν. Νὰ κατασκευασητε ἐν κανονικὸν ὀκτάγωνον, τὸ δποτοὶν νὰ ἔχῃ τὴν  $AB$ , ὡς πλευράν.


40) Ἐγγράψατε εἰς κύκλον ἀκτίνος  $R$  κανονικὸν ἑξάγωνον. 'Ἐνώσατε δι' εύθυγράμμων τμημάτων, τὰ μέσα τῶν οσων πλευρῶν αὐτοῦ. 'Ορίζεται τότε ἐν νέον ἑξάγωνον. Τὶ ἔχετε νὰ παρατηρήσητε δι' αὐτό;

### § 12. Στοιχεῖα συμμετρίας ἑκάστου τῶν κανονικῶν πολυγώνων καὶ ὑπαρξίες τοῦ ἑγγεγραμμένου εἰς αὐτὰ κύκλου


Κατασκευάσατε ἐπὶ διαφανοῦς χάρτου ἐν τετράγωνον, ἐν κανονικὸν ἑξάγωνον καὶ ἐν κανονικὸν τρίγωνον καὶ εἴρετε τοὺς ἄξονας συμμετρίας ἑκάστου τούτων. Τὶ παρατηρεῖτε; (Σχ. 19)



σχ. 19α.



σχ. 19β.



σχ. 19γ.

Κατασκευάζομεν ἐπὶ διαφανοῦς χάρτου τετράγωνον  $ABΓΔ$ , κανονικὸν ἑξάγωνον  $EZHΘΙΚ$  καὶ κανονικὸν τρίγωνον  $ΛΜΝ$  διὰ διαιρέσεως τριῶν κύκλων ἀντιστοίχως εἰς 4, 6 καὶ 3 οσα καὶ γράφομεν τὰς ἀκτίνας καὶ τὰ ἀποστήματά των.

Ἐὰν διπλώσωμεν αὐτὰ κατὰ μῆκος τοῦ φορέως μᾶς ἀκτίνος των, θὰ παρατηρήσωμεν διὰ τὰ δύο τμήματα ἑκάστου ἔξι αὐτῶν ταυτίζονται. Τὸ αὐτὸ δυνάμεθα νὰ διαπιστώσωμεν καὶ εἰς τὰ ἄλλα κανονικὰ πολύγωνα.

**Ἐπομένως :** Οἱ φορεῖς τῶν ἀκτίνων τῶν κανονικῶν πολυγώνων εἶναι ἄξονες συμμετρίας αὐτῶν.

Ἐὰν διπλώσωμεν τὰ ἀνωτέρω κατασκευασθέντα κανονικὰ πολύγωνα κατὰ μῆκος τοῦ φορέως ἐνὸς τῶν ἀποστημάτων των, θὰ παρατηρήσωμεν διὰ τὰ δύο τμήματα ἑκάστου ἔξι αὐτῶν ταυτίζονται. Τὸ αὐτὸ δυνάμεθα νὰ διαπιστώσωμεν καὶ εἰς τὰ ἄλλα κανονικὰ πολύγωνα. Ἀρα οἱ φορεῖς τῶν ἀποστημάτων κανονικοῦ πολυγώνου εἶναι ἄξονες συμμετρίας αὐτοῦ. Παρατηροῦμε λοιπόν, διὰ τὰ κανονικὰ πολύγωνα ἔχουν ὡς ἄξονας συμμετρίας τοὺς φορεῖς τῶν ἀκτίνων αὐτῶν καὶ τοὺς φορεῖς τῶν ἀποστημάτων των.

Εἰς τὰ κανονικὰ πολύγωνα μὲ ἄρτιον πλῆθος πλευρῶν (π.χ. εἰς τὸ

καν. έξαγωνον EZHΘΙΚ), δύο άκτινες κείνται έπι τοῦ αύτοῦ φορέως (ώς αι ΟΗ και ΟΚ τοῦ καν. έξαγώνου EZHΘΙΚ). "Ωστε: 'Ο ἀριθμὸς τῶν φορέων τῶν ἀκτίνων καν. πολυγώνου ἀρτίου πλήθους πλευρῶν, ισοῦται πρὸς τὸ ἥμισυ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν πλευρῶν αὐτοῦ (εἰς τὸ EZHΘΙΚ εἶναι τρεῖς). 'Επίσης τὸ πλῆθος τῶν φορέων τῶν ἀποστημάτων των εἶναι ἵσον πρὸς τὸ ἥμισυ τοῦ πλήθους τῶν πλευρῶν τοῦ κανονικοῦ πολυγώνου, διότι τὰ ἀποστήματα αὐτῶν ἀνὰ δύο έχουν τὸν αὐτὸν φορέα. ('Ως π.χ. εἰς τὸ καν. έξαγωνον EZHΘΙΚ τὰ ἀποστήματα  $OM_1$  και  $OM_4$ , ἤτοι τὸ πλῆθος τῶν φορέων τῶν ἀποστημάτων του εἶναι  $\frac{6}{2} = 3$ ). Τὸ κανονικὸν λοιπὸν έξαγωνον έχει 6 ἄξονας συμμετρίας.

"Ωστε: Κανονικὸν πολύγωνον μὲ ἄρτιον πλῆθος πλευρῶν ν, έχει ν ἄξονας συμμετρίας.

Εἰς τὰ κανονικὰ πολύγωνα μὲ περιττὸν ἀριθμὸν πλευρῶν (π.χ. εἰς τὸ καν. τριγώνον  $\Delta MN$ ) αἱ ἀκτῖνες και τὰ ἀποστήματα ἀνὰ δύο, έχουν τὸν αὐτὸν φορέα (ώς η ἀκτὶς  $ON$  και τὸ ἀπόστημα  $OΞ_3$  τοῦ τριγώνου  $\Delta MN$ ). Παρατηροῦμεν ἀκόμη, ὅτι εἰς τὸ κανονικὸν έξαγωνον EZHΘΙΚ οἱ ἄξονες συμμετρίας  $OM_1$  και  $OH$  εἶναι κάθετοι. ( $M_1\widehat{O}Z=30^\circ$  και  $Z\widehat{O}H=60^\circ$ ). Εἰς τὴν  $A'$  τάξιν δμως, ἐμάθομεν δτι ἔν σχῆμα, τὸ ὅποιον έχει δύο ἄξονας συμμετρίας καθέτους, έχει κέντρον συμμετρίας τὸ σημεῖον τομῆς αὐτῶν. Ἐπομένως τὸ κέντρον τοῦ κανονικοῦ έξαγώνου εἶναι κέντρον συμμετρίας αὐτοῦ. Τὸ αὐτὸ συμβαίνει εἰς δλα τὰ κανονικὰ πολύγωνα μὲ ἄρτιον πλῆθος πλευρῶν. Εἰς τὸ κανονικὸν τρίγωνον  $\Delta MN$  δὲν ὑπάρχουν κάθετοι ἄξονες συμμετρίας. Συνεπῶς τοῦτο δὲν έχει κέντρον συμμετρίας. Τὸ αὐτὸ συμβαίνει εἰς δλα τὰ κανονικὰ πολύγωνα μὲ περιττὸν πλῆθος πλευρῶν. "Ωστε εἰς τὰ κανονικὰ πολύγωνα μὲ ἄρτιον πλῆθος πλευρῶν τὸ κέντρον αὐτῶν εἶναι κέντρον συμμετρίας, ἐνῷ τὸ κέντρον τῶν κανονικῶν πολυγώνων μὲ περιττὸν πλῆθος πλευρῶν δὲν εἶναι κέντρον συμμετρίας.

Τὸ κέντρον ἐκάστου τῶν κανονικῶν πολυγώνων εἶναι κέντρον ἐνὸς κύκλου, ὁ ὅποιος ἐφάπτεται τῶν πλευρῶν αὐτοῦ, διότι, ώς ἐμάθομεν, τοῦτο ἰσαπέχει αὐτῶν. 'Ο κύκλος αὐτὸς λέγεται ἐγγεγραμμένος εἰς τὸ κανονικὸν πολύγωνον.

Κάθε κανονικὸν πολύγωνον έχει ἔνα ἐγγεγραμμένον κύκλον δμόκεντρον τοῦ περιγεγραμμένου μὲ ἀκτῖνα τὸ ἀπόστημα τοῦ καν. πολυγώνου.

### 'Α σ κήσεις

41) Κατασκευάσατε κανονικὸν ὅκταγωνον και χαράξατε τοὺς ἄξονας συμμετρίας αὐτοῦ. Νὰ εὑρητε τὰ ζεύγη τῶν καθέτων ἄξονων.

42) Τὸ αὐτὸ πρόβλημα δι' ἓν κανονικὸν δωδεκάγωνον.


43) Κατασκευάσατε κανονικὸν δεκαεξάγωνον και ἔν κανονικὸν δωδεκάγωνον και χαράξατε τοὺς ἐγγεγραμμένους εἰς ἐκαστον ἐξ αὐτῶν κύκλους.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΙ

### ΟΜΟΙΑ ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΓΩΝΑ

#### Α. ΛΟΓΟΣ ΔΥΟ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

**§ 13.** Λάβετε ενθείαν ε και ενθύγραμμον τμήμα  $AB$ . 'Επι τῆς ε, ἀνχίστετες ἐκ τοῦ  $A'$ , λάβετε τρία ενθύγραμμα τμήματα διαδοχικά και ἵστε πρὸς τὸ  $AB$ . 'Εστω  $B'$  τὸ ἄκρον τοῦ τελευταίου. ( $\Sigma\chi.$  20).



"Ωστε: Λόγος ἐνὸς εὐθυγράμμου τμήματος  $A$  πρὸς ἐν εὐθύγραμμον τμῆμα  $B$  ( συμβολικῶς  $\frac{A}{B}$  ) εἶναι ὁ ἀριθμὸς  $\lambda$  ἐπὶ τὸν ὅποιον πολλαπλασιαζόμενον τὸ δεύτερον δίδει τὸ πρῶτον.

'Εὰν  $\Gamma\Delta$  καὶ  $EZ$  εἶναι εὐθύγρ. τμήματα λέγομεν «τὸ  $\Gamma\Delta$  ἔχει πρὸς τὸ  $EZ$  λόγον  $\lambda$ » ή συντομώτερον « $\Gamma\Delta$  πρὸς  $EZ$  ἰσον  $\lambda$ » καὶ γράφομεν  $(\Gamma\Delta, EZ) = \lambda$  ή συνηθέστερον:

$$\frac{\Gamma\Delta}{EZ} = \lambda$$

ώστε

$$\frac{\Gamma\Delta}{EZ} = \lambda \Leftrightarrow \Gamma\Delta = \lambda \cdot EZ$$

Τιμὴ εὐθυγράμμου τμήματος εἶναι ὁ λόγος αὐτοῦ πρὸς τὴν μονάδα μετρήσεως ή συγχρίσεως. Τὴν τιμὴν τοῦ  $AB$  συμβολίζομεν μὲ (AB). Τὸ  $AB$  εἶναι εὐθύγραμμον τμῆμα. 'Η τιμὴ (AB) εἶναι ἀριθμός. 'Εὰν α εἶναι ἡ μονάδα μετρήσεως τῶν εὐθυγράμμων τμημάτων καὶ  $AB = 5 \cdot \alpha$ ,  $\Gamma\Delta = 8 \cdot \alpha$  τότε  $\frac{AB}{\alpha} = 5$  καὶ  $\frac{\Gamma\Delta}{\alpha} = 8$ . Συνεπῶς  $(AB) = 5$  καὶ  $(\Gamma\Delta) = 8$  (1)

Θεωροῦμεν τὸν λόγον  $\frac{AB}{\Gamma\Delta}$ . 'Εὰν  $\frac{AB}{\Gamma\Delta} = \lambda$  τότε  $AB = \lambda \cdot \Gamma\Delta$ . 'Εὰν ἀντικαταστήσωμεν ἐκ τῶν (1) τὰ  $AB$  καὶ  $\Gamma\Delta$  διὰ τῶν ἰσων των, θὰ λάβωμεν  $5\alpha = \lambda \cdot 8\alpha$ , συνεπῶς  $5 = 8\lambda$  (ἐπειδὴ τὸ γινόμενον εὐθ. τμήματος α ἐπὶ ἀριθμὸν εἶναι μονότιμον) ἀρα  $\lambda = \frac{5}{8}$  δηλαδὴ:

$$\frac{AB}{\Gamma\Delta} = \frac{(AB)}{(\Gamma\Delta)}$$

‘Ο λόγος δύο εύθυγράμμων τμημάτων ισοῦται πρὸς τὸν λόγον τῶν τιμῶν αὐτῶν (ὅταν μετρηθοῦν μὲ τὴν αὐτὴν μονάδα).

**Σημείωσις.** Τοῦτο ισχύει γενικῶς διὰ τὸν λόγον δύο διμοειδῶν μεγεθῶν. Ἐπίστης ἀληθεύει τὸ διτί: ‘Η τιμὴ τοῦ ἀδροίστιμος δύο διμοειδῶν μεγεθῶν ισοῦται πρὸς τὸ ἀδροίστιμα τῶν τιμῶν αὐτῶν (ὅταν μετρηθοῦν μὲ τὴν αὐτὴν μονάδα). Τὴν ίδιότητα αὐτὴν θὰ χρησιμοποιήσωμεν εἰς τὴν μέτρησιν τῶν ἐμβαδῶν καὶ τῶν σγκων τῶν σχημάτων.

### § 14. Ἀνάλογα εύθυγραμμα τμήματα.

Εύθυγραμμα τμήματα λέγονται ἀνάλογα πρὸς ἄλλα ἀντίστοιχά των, ὅταν τὰ γινόμενα δύο ἀντίστοιχα τμημάτων ἔπι τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν εἰναι ἀντίστοιχα εύθυγραμμα τμήματα.

Δηλαδή, ἐὰν τὰ εύθυγραμμα τμήματα α καὶ β εἰναι ἀντίστοιχα τότε καὶ τὰ 2α καὶ 2β εἰναι ἀντίστοιχα ὡς καὶ τὰ 3α, 3β καὶ γενικῶς τὰ λα καὶ λβ. (Λ εἰναι ἀριθμὸς τυχών).

$$\begin{array}{c} \alpha \\ \hline 2\alpha \\ \hline 3\alpha \end{array} \longrightarrow \begin{array}{c} \beta \\ \hline 2\beta \\ \hline 3\beta \end{array}$$

σχ. 21.

Ἐάν συγκρίνωμεν τὸν λόγον δύο ἐξ αὐτῶν π.χ. τῶν 2α καὶ 3α πρὸς τὸν λόγον τῶν ἀντίστοιχων των, (ἀντίστοιχά των εἰναι τὰ 2β καὶ 3β) παρατηροῦμεν ὅτι  $\frac{2\alpha}{3\alpha} = \frac{2}{3}$  καὶ  $\frac{2\beta}{3\beta} = \frac{2}{3}$  (θεωροῦμεν ὡς μονάδα τὸ α διὰ τὰ πρῶτα καὶ τὸ β διὰ τὰ δεύτερα). “Οστε: Ἐάν εύθυγραμμα τμήματα εἰναι ἀνάλογα, δ λόγος δύο (τυχόντων) ἐξ αὐτῶν ισοῦται πρὸς τὸν λόγον τῶν ἀντίστοιχων των.

Ἐάν εἰς ἀνάλογα τμήματα τὰ A'B' καὶ Γ'D' εἰναι ἀντίστοιχα τῶν AB καὶ ΓΔ, τὴν ίσότητα τῶν λόγων  $\frac{AB}{ΓΔ} = \frac{A'B'}{Γ'D'}$  λέγομεν ἀναλογίαν τῶν εύθυγράμμων τμημάτων AB, ΓΔ, A'B', Γ'D'. Δυνάμεθα νὰ ἀντικαταστήσωμεν τοὺς λόγους τῶν εὐθ. τμημάτων μὲ τοὺς λόγους τῶν τιμῶν των καὶ νὰ ἔχωμεν τὴν  $\frac{(AB)}{(ΓΔ)} = \frac{(A'B')}{(Γ'D')}$ , ή ὅποια εἰναι ἀναλογία ἀριθμῶν.

Ἀναλογίαν τῶν ἀριθμῶν α, β, γ, δ ἔχομεν ὅταν  $\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta}$ . Οι α καὶ δ λέγονται ἀκροι δροι τῆς ἀναλογίας, οἱ δὲ β καὶ γ λέγονται μέσοι δροι αὐτῆς. Οι α καὶ γ ἡγούμενοι καὶ οἱ β καὶ δ ἐπόμενοι δροι. Περὶ τῶν ἀναλογιῶν τῶν ἀριθμῶν δύνασθε νὰ լετε εἰς τὴν Ἀριθμητικὴν (Κεφ. 4 § 100, 101).

Ἀναφέρομεν συντόμως μερικὰς ίδιότητας τῶν ἀναλογιῶν, τὰς ὅποιας θὰ χρησιμοποιήσωμεν εἰς τὰ ἐπόμενα.

1)  $\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta} \Leftrightarrow \beta\gamma = \alpha\delta$  συνεπώς τὸ γινόμενον τῶν μέσων ὅρων μιᾶς ἀναλογίας ισοῦται πρὸς τὸ γινόμενον τῶν ἄκρων ὅρων αὐτῆς.

2)  $\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta} \Leftrightarrow \frac{\alpha}{\gamma} = \frac{\beta}{\delta}$  καὶ  $\frac{\delta}{\beta} = \frac{\gamma}{\alpha}$ . Εἰς ἀναλογίαν δυνάμεθα νὰ ἐναλλάξωμεν τοὺς ἄκρους ἢ τοὺς μέσους ὅρους αὐτῆς.

3)  $\frac{\alpha}{\alpha'} = \frac{\beta}{\beta'} = \frac{\gamma}{\gamma'} = \lambda \Rightarrow \lambda = \frac{\alpha + \beta + \gamma}{\alpha' + \beta' + \gamma'}$ . Λόγοι ίσοι μεταξύ των εἰναι ίσοι καὶ πρὸς τὸν λόγον, δ ὅποιος ἔχει ἀριθμητὴν τὸ ἄθροισμα τῶν ἀριθμητῶν καὶ παρονομαστὴν τὸ ἄθροισμα τῶν παρονομαστῶν.

### Α σ κήσεις

44) Νὰ ἔξηγήστε διατί καὶ εἰς μίαν ἀναλογίαν εὐθυγράμμων τμημάτων δυνάμεθα νὰ ἐναλλάξωμεν τοὺς μέσους ἢ τοὺς ἄκρους ὅρους.

45) Νὰ ἔξηγήστε διατί, ἔναν δύο λόγοις εὐθυγράμμων τμημάτων εἰναι ίσοι θὰ εἰναι ίσοι καὶ πρὸς τὸν λόγον τοῦ ἀθροίσματος τῶν ἡγουμένων πρὸς τὸ ἄθροισμα τῶν ἐπομένων.

Ἐπίσης ἔὰν  $\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta}$  δείξατε δὴ  $\frac{\alpha + \beta}{\beta} = \frac{\gamma + \delta}{\delta}$


## Τὸ Θεώρημα τοῦ Θαλοῦ

### 1ον Θεώρημα

§ 15. Ἐπὶ μιᾶς εὐθείας χψ λάβετε ίσα εὐθύγραμμα τμήματα  $AB$ ,  $BΓ$ ,  $ΓΔ$ . Ἐκ τῶν  $A$ ,  $B$ ,  $Γ$  καὶ  $Δ$  φέρατε εὐθείας παραλλήλους μεταξύ των. Χαράξατε μίαν ἀλλην εὐθεῖαν, ἥ δποια νὰ τέμηῃ τὰς παραλλήλους αὐτὰς εἰς τὰ σημεῖα  $A'$ ,  $B'$ ,  $Γ'$ ,  $Δ'$  ἀντιστοιχως. Συγκρίνατε (διὰ τοῦ διαβήτου) τὰ εὐθ. τμήματα  $A'B'$ ,  $B'Γ'$ ,  $Γ'D'$ .

Συγκρίνομεν αὐτὰ καὶ παρατηροῦμεν ὅτι εἰναι ίσα.

Ἐπομένως : Ἐὰν παράλληλοι εὐθεῖαι τέμνουν δύο ἀλλας καὶ δρίζουν ἐπὶ τῆς μιᾶς ίσα εὐθ. τμήματα, θὰ δρίζουν ίσα εὐθ. τμήματα καὶ ἐπὶ τῆς ἀλλης.



σχ. 22.

Διὸς νὰ αἰτιολογήσωμεν τὸ ἀποτέλεσμα αὐτό, ἐργαζόμεθα ὡς ἔξῆς:  
Ἐκ τῶν  $A'$  καὶ  $B'$  φέρομεν παραλλήλους πρὸς τὴν χψ (ἄρα καὶ παραλλήλους μεταξύ των).

Αύται τέμνουν τὰς  $BB'$  καὶ  $\Gamma\Gamma'$  εἰς τὰ  $A_1$  καὶ  $B_1$  ἀντιστοίχως. Παρατηροῦμεν ὅτι τὰ τετράπλευρα  $ABA_1A'$  καὶ  $B\Gamma B_1\Gamma'$  εἰναι παραλληλόγραμμα. Ἐπομένως  $A'A_1 = AB$  καὶ  $B'B_1 = B\Gamma$ . Ἀλλὰ  $AB = B\Gamma$ . συνεπῶς  $A'A_1 = B'B_1$ .

Συγκρίνομεν τώρα τὰ τρίγωνα  $A'A_1B'$  καὶ  $B'B_1\Gamma'$ . Αύτά εἰναι ἵσα, διότι ἔχουν :  
 $A'A_1 = B'B_1$  ως ἀνωτέρω ἔδειξαμεν


$\widehat{A_1}A'\widehat{B'} = \widehat{B_1}B'\widehat{\Gamma'}$  ως ἐντὸς ἐκτὸς ἐπὶ τὰ αὐτὰ τῶν παραλλήλων

$A'A_1, B'B_1$  τεμνομένων ὑπὸ τῆς  $A'\widehat{B}'$  καὶ

$\widehat{A_1} = \widehat{B_1}$  διότι  $\widehat{A_1} = \widehat{B}, \widehat{B_1} = \widehat{\Gamma}$  καὶ  $\widehat{\Gamma} = \widehat{B}$ . (διατί ;)

Ἐπομένως  $A'B' = B'\Gamma'$ . Ὁμοίως  $B'\Gamma' = \Gamma'\Delta'$  κ.ο.κ.

### Ἐφαρμογαί.



σχ. 23.

1. Νὰ διαιρεθῇ εύθυγραμμον τμῆμα  
 $AB$  εἰς τρία ἵσα εύθυγραμμα τμήματα.  
 (Σχ. 23).

Φέρομεν ἡμιευθεῖαν  $Ax$  καὶ ἐπ' αὐτῆς τὰ ἵσα διαδοχικά εύθυγραμμα τμήματα  $A\Gamma, \Gamma\Delta, \Delta E$ . Χαράσσομεν τὴν  $BE$  καὶ ἀπὸ τὸ  $\Delta, \Gamma, \kappa\alpha\iota$   $A$  φέρομεν παραλλήλους πρὸς αὐτὴν, αἱ δόποιαι τέμνουν

τὸ  $AB$  εἰς τὰ σημεῖα  $\Delta'$  καὶ  $\Gamma'$ . Τότε θὰ εἰναι  $A\Gamma' = \Gamma'\Delta' = \Delta'B$ .


Παρατήρησις : Τὸ  $A\Gamma'$  ισοῦται πρὸς τὸ γινόμενον  $\frac{1}{3} AB$ .

2. Ἐκ τοῦ μέσου  $\Delta$  τῆς πλευρᾶς  $AB$  τριγώνου  $AB\Gamma$  (Σχ. 24) φέρομεν παραλληλον πρὸς τὴν  $B\Gamma$ . Αύτὴ θὰ τμῆσῃ τὴν  $A\Gamma$  εἰς τὸ  $E$ . Ἐὰν χαράξωμεν καὶ τὴν  $Ax$  /  $B\Gamma$  παρατηροῦμεν ὅτι, ἐπειδὴ  $A\Delta = \Delta B$ , θὰ εἰναι καὶ  $AE = E\Gamma$ . Ὁστε: Ἐὰν ἐκ τοῦ μέσου πλευρᾶς τριγώνου φέρωμεν παραλληλον πρὸς μίαν πλευρὰν αὐτοῦ, αὐτὴ θὰ διέλθῃ ἐκ τοῦ μέσου τῆς τρίτης πλευρᾶς.

Φέρατε τώρα ἐκ τοῦ  $E$  παράλληλον πρὸς τὴν  $AB$ . Αύτὴ συμφώνως πρὸς τὸ προηγούμενον θὰ διέλθῃ ἐκ τοῦ μέσου  $Z$  τῆς  $B\Gamma$  καὶ ἐπειδὴ τὸ τετράπλευρον  $\Delta BZE$  εἰναι παραλληλόγραμμον θὰ εἰναι  $\Delta E = BZ$  δηλαδὴ  $\Delta E = \frac{1}{2} B\Gamma$ .

3. Σημειώσατε τὰ μέσα  $\Delta$  καὶ  $E$  τῶν πλευρῶν  $AB$  καὶ  $A\Gamma$  ἐνὸς τριγώνου  $AB\Gamma$ . Συγκρίνατε τὴν  $\Delta E$  πρὸς τὴν  $B\Gamma$ .

Ἡ  $\Delta E$  εἰναι παραλληλος πρὸς τὴν  $B\Gamma$ , διότι ἐκ τοῦ  $\Delta$  μία μόνον παραλληλος πρὸς τὴν  $B\Gamma$  διέρχεται. Αύτὴ δημως, ως εἴδομεν εἰς τὸ προηγούμενον, διέρ-



σχ. 24.

χεται και διά τοῦ Ε. Δύο δὲ σημεῖα δρίζουν μίαν εύθειαν. Τὸ τμῆμα ΔΕ ίσοῦται, ως εἶδομεν, πρὸς τὸ  $\frac{1}{2} \cdot \text{ΒΓ}$ . Γράφομεν συντόμως τὰς δύο αὐτὰς ιδιότητας  $\Delta E = // \frac{1}{2} \cdot \text{ΒΓ}$ . "Ωστε:

Τὸ εύθυγραμμον τμῆμα τὸ δποῖον συνδέει τὰ μέσα δύο πλευρῶν τριγώνου είναι παράλληλον πρὸς τὴν τρίτην πλευράν και ίσοῦται πρὸς τὸ ήμισυ αὐτῆς.

### Α σ κή σ εις

46) Νὰ διατεθῇ εύθυγραμμον τμῆμα εἰς πέντε ίσα μέρη.

47) Νὰ λάβητε ἵν εύθυγραμμον τμῆμα AB και νὰ εύρητε τὸ  $\frac{2}{5} \cdot \text{AB}$ .

48) Διδεται τραπέζιον ABΓΔ (AB//ΓΔ). Ἐκ τοῦ μέσου M τῆς διαγωνίου ΒΔ νὰ φέρητε παράλληλον πρὸς τὰς βάσεις, ἢ δποὶα τέμνει τὴν ΑΔ εἰς τὸ N και τὴν διληγονίου εἰς τὸ Λ. Νὰ συγκρίνητε τὸ τμῆμα ΝΛ πρὸς τὴν ΓΔ και τὸ ΜΛ πρὸς τὴν διαφοράν τῶν βάσεων.

49) Νὰ λάβητε τὰ μέσα τῶν πλευρῶν ἐνὸς τετραπλεύρου και νὰ ἔξετάσητε, χρησιμοποιούντες τὰ γεωμ. δργανα, ἐὰν είναι κορυφαι ἐνὸς παραλληλογράμμου.

50) Νὰ ἔξηγήσητε διατὶ τὰ εύθυγραμμα τμήματα, τὰ δποὶα συνδέοντα τὰ μέσα τῶν ἀπέναντι πλευρῶν τετραπλεύρου, διχοτομοῦνται.

### 2ον. Θεώρημα


§ 16. Εἰς τὴν § 15 σχ. 24, εἶδομεν δτι, ἐὰν  $AB = \Gamma\Delta$  θὰ είναι και  $A'B' = \Gamma'\Delta'$ . Τότε ὅμως  $\frac{AB}{\Gamma\Delta} = \frac{A'B'}{\Gamma'\Delta'} = 1$ . Δηλαδὴ τὰ δριζόμενα ὑπὸ τῶν παραλλήλων εὐθειῶν ἔπι τῶν ΑΔ και  $A'\Delta'$  ἀντίστοιχα εύθυγραμμα τμήματα είναι δινάλογα. Συμβαίνει ἀρά γε τοῦτο και δταν  $AB$  είναι διάφορον τοῦ  $\Gamma\Delta$ ; (Σχ. 25).

**Κατασκευάσατε τραπέζιον  $ABB'A'$  ( $AA' // BB'$ ) μὲν  $AB = 3 \text{ cm}$  και  $A'B' = 5 \text{ cm}$  και ἐπὶ τῆς προεντάσεως τοῦ  $AB$  λάβετε εὐθύγραμμον τμῆμα  $\Gamma\Delta = 6 \text{ cm}$ .**

'Απὸ τὰ  $\Gamma$  και  $\Delta$  φέρετε παραλλήλους πρὸς τὰς βάσεις τοῦ τραπέζιου, αἱ δποὶα τέμνονται τὴν πρόεκτασιν τῆς  $A'B'$  εἰς τὰ  $\Gamma'$  και  $\Delta'$  ἀντιστοίχως. Μετρήσατε τὴν  $\Gamma'\Delta'$  και συγκρίνατε τοὺς λόγους:

$$\frac{AB}{\Gamma\Delta} \text{ και } \frac{A'B'}{\Gamma'\Delta'}$$

Εύρισκομεν  $\Gamma'\Delta' = 10 \text{ cm}$  ἐπο-



σχ. 25.

μένως  $\frac{AB}{\Gamma\Delta} = \frac{A'B'}{\Gamma'\Delta'} = \frac{1}{2}$ . Ἐάν παράλληλοι εύθειαι τέμνουν δύο άλλας, τὰ δριζόμενα ὑπ' αὐτῶν ἀντίστοιχα εύθυγραμμα τμῆματα είναι ἀνάλογα.

Διὸ νὰ αἰτιολογήσωμεν τὸ ἀποτέλεσμα αὐτὸ ἐργαζόμεθα ὡς ἔξις: 'Ἐπὶ τῆς προεκτάσεως τῆς AB λαμβάνομεν τμῆμα BE=AB. 'Η ἐκ τοῦ E παράλληλος πρὸς τὰς AA' καὶ BB' τέμνει τὴν A'B' εἰς τὸ E' καὶ εἶναι A'B'=B'E'. Τὰ εὐθ. τμῆματα AB καὶ A'B' είναι ἀντίστοιχα (κείνται μεταξὺ τῶν αὐτῶν παραλλήλων). Ἀλλὰ καὶ τὰ AE καὶ A'E' είναι ἀντίστοιχα. Αὗτά δημοσιεύονται ἀντίστοιχως πρὸς 2AB καὶ 2A'B'. 'Εάν θεωρήσωμεν καὶ τὸ AZ=3.AB, θὰ λάβωμεν ὡς ἀντίστοιχον τὸ A'Z'=3.A'B' κ.ο.κ.

'Ἄποδεικνύεται (ὡς θὰ μάθωμεν εἰς ἀνωτέραν τάξιν) ὅτι, ἐὰν  $\Gamma\Delta=\lambda.AB$  τότε  $\Gamma'\Delta'=\lambda.A'B'$  (λ τυχών ἀριθμός).)

'Ἐπομένως: Τὰ ὑπὸ τῶν παραλλήλων δριζόμενα ἐπὶ τῆς εύθειας AB τμῆματα, είναι ἀνάλογα πρὸς τὰ ἀντίστοιχως δριζόμενα ὑπ' αὐτῶν ἐπὶ τῆς A'B'.

### Ἐφαρμογαὶ

1. Εύθεια παράλληλος πρὸς μίαν πλευρὰν τριγώνου, διαιρεῖ τὰς ἄλλας πλευρὰς αὐτοῦ εἰς τμῆματα ἀνάλογα.

Φέρομεν εύθειαν παράλληλον πρὸς τὴν πλευρὰν ΒΓ τριγώνου ΑΒΓ. Αὔτη τέμνει τὰς AB καὶ AG εἰς τὰ Δ καὶ E ἀντίστοιχως. 'Εάν φέρωμεν καὶ τὴν Ax//ΒΓ θὰ συμπεράνωμεν συμφώνως πρὸς τὸ προηγούμενον ὅτι :

$$\frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AG}, \quad \frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EG} \quad \text{καὶ} \quad \frac{DB}{AB} = \frac{EG}{AG}$$

'Η πρότασις αὐτὴ γνωστὴ ὡς Θεώρημα τοῦ Θαλοῦ ἀποδίδεται εἰς τὸν Θαλῆν τὸν Μιλήσιον.(\*)

2. Χαράξατε τρίγωνον ΑΒΓ μὲ μήκη πλευρῶν AB καὶ AG ἴσα πρὸς 8 cm καὶ 12 cm ἀντίστοιχως. 'Ἐπὶ τῆς AB λάβετε τμῆμα AD=2 cm καὶ ἐπὶ τῆς AG τμῆμα AE=3 cm. Νὰ ενρρητε τὴν σχετικὴν θέσιν τῶν εὐθειῶν ΔE καὶ ΒΓ.

'Εάν μετρήσωμεν τὰς γωνίας  $\widehat{ADE}$  καὶ  $\widehat{ABG}$ , θὰ τὰς εὑρωμεν ἵσας. 'Ἐπομένως  $DE//BG$  (σχηματίζουν τεμνόμενα ὑπὸ τῆς AB δύο ἔκτος ἐντὸς καὶ ἐπὶ τὰ αὐτὰ γωνίας ἵσας). Δυνάμεθα νὰ ἀποδείξωμεν δηλαδή, νὰ αἰτιολογήσω-

**Θαλῆς ὁ Μιλήσιος (637-548 π.Χ.):** Μέγας "Ελλην μαθηματικός καὶ φιλόσοφος. Κατὰ τὴν ἀρχαιότητα ἐθεωρεῖτο εἰς τῶν ἐπτά σοφῶν. Αὐτὸς πρῶτος ἔχρησιμοποίησε τὴν ἀπόδειξιν. Τὴν δικαιολόγησιν, δηλαδή, μιᾶς ἀληθείας μὲ βάσιν δλλας γνωστάς. Διὰ τοῦτο θεωρεῖται Ιδρυτής τῆς μαθηματικῆς ἐπιστήμης καὶ τῆς ἐπιστήμης γενικῶς. 'Υπῆρξεν ίδρυτής τῆς φιλοσοφικῆς σχολῆς τῆς Μιλήτου. Αἱ πρῶται γνώσεις διὰ τὸν ἡλεκτρισμὸν δρείλονται εἰς αὐτὸν.

μεν τὸ ἀποτέλεσμα αὐτό. Παρατηροῦμεν διτὶ  $\frac{AD}{AB} = \frac{1}{4}$  καὶ  $\frac{AE}{AG} = \frac{1}{4}$  ἐπομένως  $\frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AG}$ . Ἐφαίνεται ὅτι τὸ Δ παράλληλος πρὸς τὴν ΒΓ ὁφείλει (κατὰ τὸ προηγούμενον) νὰ διέλθῃ διὰ τοῦ Ε.

"Ωστε: Ἐάν εὐθεῖα διαιρῇ δύο πλευράς τριγώνου εἰς τμήματα ἀνάλογα, εἶναι παράλληλος πρὸς τὴν τρίτην πλευράν αὐτοῦ.

### Α σκήσεις

51) Νὰ διαιρεθῇ εὐθ. τμῆμα εἰς δύο τμήματα ἔχοντα λόγον  $\frac{3}{4}$ .

52) Δίδεται τὸ εὐθύγραμμον τμῆμα ΑΒ. Νὰ διαιρέσητε αὐτὸν εἰς τμήματα ἀνάλογα πρὸς δεδομένα τμήματα α καὶ β.

53) Κατασκευάστε τρίγωνον  $AB\Gamma$  μὲ πλευράς  $AB=5$  cm καὶ  $AG=6$  cm. Λάβετε ἐπὶ τῆς ΑΒ τμῆμα  $AD=\frac{1}{3}AG$  καὶ φέρατε // πρὸς τὴν  $BG$  ἐκ τοῦ Δ. Ἐάν αὐτὴ τέμνῃ τὴν  $AG$  εἰς τὸ Z, εὑρέτε τὸ μῆκος τοῦ  $AZ$ .

54) Ἐκ τοῦ κέντρου βάρους τριγ.  $AB\Gamma$  φέρατε παράλληλον πρὸς τὴν  $BG$ . Ἐάν αὐτὴ τέμνῃ τὴν  $AB$  εἰς τὸ Δ, ὑπολογίσατε τοὺς λόγους  $\frac{AD}{AB}$ ,  $\frac{AB}{AA}$ ,  $\frac{AB}{\Delta B}$

55) Νὰ κατασκευάσητε τὴν διχοτόμον  $AD$  τριγ.  $AB\Gamma$  καὶ ἐκ τοῦ B νὰ φέρητε παράλληλον πρὸς τὴν  $AD$ . Ἐάν αὐτὴ τέμνῃ τὴν προέκτασιν τῆς  $AG$  εἰς τὸ E, νὰ συγκρίνητε τὰ  $AB$  καὶ  $AE$ . Νὰ συγκρίνητε ἐπίσης τοὺς λόγους  $\frac{AB}{\Delta B}$ ,  $\frac{AB}{AE}$ .


56) Νὰ κατασκευάσητε τρεῖς παραλλήλους εὐθείας ε, ε', ε'' ὡστε ἡ ε νὰ ἀπέχῃ τῆς ε' 3 cm καὶ ἡ ε' τῆς ε'' 5 cm. Νὰ τμήσητε αὐτὰς δι' εὐθείας χψ καὶ νὰ ὑπολογήσητε τοὺς λόγους τῶν τμημάτων τὰ διποία αὗται δρίζουν ἐπὶ τῆς χψ.

### B. ΟΜΟΙΑ ΤΡΙΓΩΝΑ

§ 17. Λάβετε τρίγωνον  $AB\Gamma$  καὶ φέρατε παράλληλον πρὸς τὴν  $BG$ , ἡ ὁποία νὰ τέμνῃ τὰς πλευράς  $AB$  καὶ  $AG$  εἰς τὰ σημεῖα Δ καὶ E ἀντιστοίχως. Συγκρίνατε τὰς γωνίας καὶ τὰς πλευράς τῶν τριγώνων  $AD\Gamma$  καὶ  $AB\Gamma$ . Τὶ παρατηρεῖτε;

Παρατηροῦμεν διτὶ,  $\widehat{A}=\widehat{A}$ ,  $\widehat{B}=\widehat{\Delta}$  καὶ  $\widehat{\Gamma}=\widehat{E}$  (εἶναι ἐντὸς ἑκτὸς καὶ ἐπὶ τὰ αὐτὰ τῶν παραλλήλων  $BG$  καὶ  $DE$ , τεμνομένων ὑπὸ τῶν  $AB$  καὶ  $AG$ ).

Διὰ τὰς πλευράς ἔχομεν συμφώνως πρὸς τὸ θεώρημα τοῦ Θαλοῦ:



σχ. 27.

$\frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AF}$ . Φέρομεν τώρα άπό τό Ε παράλληλον πρός τήν AB. Αύτή τέμενε τήν BG εις τό E'. Συμφώνως πάλιν πρός τό θεώρημα τοῦ Θαλοῦ θά είναι  $AE = BE'$ .  $\frac{AE}{AF} = \frac{BE'}{BF}$ .

Τό τετράπλευρον δμως  $\Delta BE'E$  είναι παραλληλόγραμμον. "Αρα  $BE' = DE$ , έπομένως  $\frac{AE}{AF} = \frac{DE}{BF}$ ". Έχομεν λοιπόν  $\frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AF} = \frac{DE}{BF}$ . Τά τρίγωνα  $\Delta DE$  και

$ABG$  έχουν τάς άντιστοίχους γωνίας των ίσας και τάς άπεναντι τῶν ίσων αύτῶν γωνιῶν πλευράς, άναλόγους.

Λέγομεν ότι τά τρίγωνα  $\Delta DE$  και  $ABG$  είναι δμοια.

Αἱ άντιστοίχοι κορυφαὶ A, A, Δ, B καὶ E, Γ τῶν ίσων γωνιῶν λέγονται δμόλογοι. Αἱ γωνίαι αύτῶν λέγονται δμόλογοι γωνίαι, καὶ αἱ πλευραὶ, αἱ δποῖαι συνδέουν δύο δμολόγους κορυφάς ἢ κείνται άπεναντι δμολόγων γωνιῶν, δμόλογοι πλευραὶ.


Θά λέγωμεν ότι, δύο τρίγωνα είναι δμοια οταν έχουν τάς δμολόγους των γωνιῶν ίσας και τάς δμολόγους αύτῶν πλευράς άναλόγους.

$$\widehat{A} = \widehat{\Delta}, \widehat{B} = \widehat{E}, \widehat{F} = \widehat{Z} \text{ καὶ } \frac{AB}{\Delta E} = \frac{BF}{EZ} = \frac{AG}{AZ} \longleftrightarrow \text{Τρίγ. } ABG \text{ δμοιον τρίγ. } \Delta EZ$$

'Ως φαίνεται ἐκ τῶν άνωτέρω, εὐθεία παράλληλος πρός πλευρὰν τριγώνου, δρίζει τρίγωνον δμοιον πρός αύτό.

Σημείωσις : Αἱ δμόλογοι κορυφαὶ πρέπει νὰ γράφωνται κατὰ τήν αύτήν τάξιν.

### § 18. Έφαρμογαὶ.



σχ. 28.

1. Αδβετε δύο ίσα τρίγωνα (μὲ τήν βοηθειαν διαφανοῦς χάρτου) τά  $ABG$  καὶ  $\Delta EZ$  καὶ συγκρίνετε τάς γωνίας καὶ τοὺς λόγους τῶν δμολόγων πλευρῶν των.

'Επειδὴ τά τρίγωνα είναι ίσα θά έχουν τάς δμολόγους αύτῶν γωνίας ίσας, ἢτοι  $\widehat{A} = \widehat{\Delta}$ ,  $\widehat{B} = \widehat{E}$  καὶ  $\widehat{F} = \widehat{Z}$ . Οι λόγοι τῶν δμολόγων πλευρῶν ίσοινται πρός τήν μονάδα (διότι αἱ δμόλογοι πλευραὶ τῶν ίσων τριγώνων είναι ίσαι). 'Επομένως :  $\frac{AB}{\Delta E} = \frac{BF}{EZ} = \frac{AG}{AZ}$  καὶ  $\widehat{A} = \widehat{\Delta}$ ,  $\widehat{B} = \widehat{E}$  καὶ  $\widehat{F} = \widehat{Z}$ .

"Ωστε : Δύο ίσα τρίγωνα είναι δμοια. Άλλα δύο δμοια τρίγωνα δὲν είναι πάντοτε ίσα, δπως φαίνεται εις τό σχῆμα (27) διὰ τά τρίγωνα  $\Delta DE$  καὶ  $ABG$ .

2. Έπειδή εις τὸ σχῆμα (27) ἔχαράξαμεν τὴν ΔΕ παράλληλον πρὸς τὴν ΒΓ, συνεπέραναμεν ὅτι τὸ τρίγ. ΑΔΕ εἶναι ὅμοιον πρὸς τὸ τρίγ. ΑΒΓ.

Παρατηροῦμεν ὅμως, ὅτι καὶ ἡ ΒΓ εἶναι παράλληλος πρὸς τὴν πλευρὰν ΔΕ τοῦ τριγώνου ΑΔΕ. Ἐπομένως, ἐὰν τριγώνον εἶναι ὅμοιον πρὸς ἄλλο καὶ τὸ δεύτερον εἶναι ὅμοιον πρὸς τὸ πρῶτον.

3. Φέρομεν εἰς τὸ σχῆμα (27) τὴν  $\Delta_1 E_1$  παράλληλον τῆς ΒΓ.

Τότε τὸ τρίγ.  $\Delta_1 E_1$  εἶναι ὅμοιον πρὸς τὸ τρίγ. ΑΒΓ. Διεπιστώσαμεν ὅτι τὸ τρίγ. ΑΔΕ εἶναι ὅμοιον πρὸς τὸ τρίγ. ΑΒΓ, καὶ ἐπειδὴ αἱ  $\Delta E // \Delta_1 E_1$  καὶ  $\Delta_1 E_1 // \Delta_1 E_1$  συνεπάγονται τὴν  $\Delta E // \Delta_1 E_1$ , ἔχομεν ὅτι τὸ τρίγ.  $\Delta_1 E_1$  ὅμοιον πρὸς τὸ τρίγ. ΑΔΕ. "Ωστε δύο τριγώνα ὅμοια πρὸς τρίτον εἶναι ὅμοια.

Ἐάν συνοψίσωμεν, θὰ παρατηρήσωμεν ὅτι ἡ σχέσις τῆς ὅμοιότητος ἔχει τὰς γνωστὰς ιδιότητας τῆς Ισότητος.

Τρίγ. ΑΒΓ ὅμοιον τρίγ. ΑΒΓ (ἀνακλαστική),

τρίγ. ΑΒΓ ὅμοιον τρίγ. ΔΕΖ  $\Rightarrow$  τρίγ. ΔΕΖ ὅμοιον τρίγ. ΑΒΓ (συμμετρική) καὶ

τρίγ. ΑΒΓ ὅμοιον τρίγ. ΔΕΖ καὶ τρίγ. ΔΕΖ ὅμοιον τρίγ. ΗΘΙ  $\Rightarrow$  τρίγ. ΑΒΓ ὅμοιον τρίγ. ΘΗΙ (μεταβατική).

### Ασκήσεις

57) Κατασκευάσατε τριγώνον ΑΒΓ μὲ πλευράς  $AB=3$  εμ.,  $BG=5$  εμ. καὶ  $AG=6$  εμ. Ἐπὶ τῆς AB λάβετε τμῆμα  $AD=2$  εμ. καὶ φέρατε παράλληλον πρὸς τὴν BG, ἡ ὁποία νὰ τέμνῃ τὴν AG εἰς τὸ E. Ὑπολογίσατε τὸ μῆκος τῆς ΔΕ.

58) Ἰσοπλεύρου τριγώνου ΑΒΓ ἡ πλευρὰ ἔχει μῆκος 6 εμ. Ἀπὸ τὸ ὀρθόκεντρον τοῦ τριγώνου νὰ φέρητε παράλληλον πρὸς τὴν BG. Ποῖον τὸ μῆκος τοῦ τμήματος αὐτῆς, τὸ ὅποιον εἶναι ἐσωτερικὸν τοῦ τριγώνου;

59) Χαράξατε τριγώνον ΑΒΓ καὶ προεκτείνατε τὰς AB καὶ AG μέχρι τῶν σημείων Δ καὶ Ε ἀντιστοίχως, ώστε  $AD = \frac{3}{5} \cdot AB$  καὶ  $AE = \frac{3}{5} \cdot AG$ . Ὑπολογίσατε τὸν λόγον  $\frac{DE}{BG}$ .


60) Τραπέζιον ἔχει βάσεις 12 εμ. καὶ 7 εμ. Ποιος ὁ λόγος τῶν τμημάτων, εἰς τὰ ὅποια ἡ μία διαγώνιος χωρίζει τὴν διληνή;

61) Εἰς τὸ αὐτὸν τραπέζιον προεκτείνατε τὰς μὴ παραλλήλους πλευρὰς μέχρις ὅτου τμηθοῦν. Ποιος ὁ λόγος τῶν ἀποστάσεων τοῦ σημείου τομῆς ἀπὸ τῶν ἀκρων μιᾶς μὴ παραλλήλου πλευρᾶς;

### Κριτήρια ὅμοιότητος τριγώνων

#### § 19. Ιον Κριτήριον ὅμοιότητος.

Κατασκευάσατε τριγώνον ABI' μὲ πλευρὰς  $BG=2$  εμ.,  $BA=4$  εμ. καὶ  $GA=$



Μετροῦντες δι' ύποδεκαμέτρου εύρισκομεν ὅτι  $\Delta Z = 8 \text{ cm}$  καὶ  $EZ = 10 \text{ cm}$ . Τότε:

$$\frac{BG}{DE} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}, \quad \frac{AB}{ZD} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2} \quad \text{καὶ} \quad \frac{AG}{ZE} = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}.$$

"Ωστε:  $\frac{BG}{DE} = \frac{AB}{ZD} = \frac{AG}{ZE}$ , δηλαδὴ αἱ δόμολογοι πλευραὶ τῶν τρίγωνων μας εἶναι ἀνάλογοι. Ἐπομένως τὰ τρίγωνα  $ABG$  καὶ  $ZDE$ , τὰ ὅποια ἔχουν δύο γωνίας ἵσας μίαν πρὸς μίαν, εἶναι δόμοια.

\*Ἐὰν δύο τρίγωνα ἔχουν δύο γωνίας ἵσας μίαν πρὸς μίαν, εἶναι δόμοια.

Διὰ νὰ αἰτιολογήσωμεν τὸ ἀποτέλεσμα τῆς ἐργασίας μας καὶ νὰ πεισθῶμεν, ὅτι δὲν εἶναι συμπτωματικὸν ἔργαζόμεθα ὡς ἔξῆς: Λαμβάνομεν ἐπὶ τῆς  $\Delta E$  τμῆμα  $\Delta H = BG$  καὶ ἀπὸ τὸ  $H$  φέρομεν παράλληλον πρὸς τὴν  $EZ$ , ἡ ὁποία τέμνει τὴν  $\Delta Z$  εἰς τὸ  $\theta$ . Παρατηροῦμεν ὅτι, τὸ τρίγ.  $\theta\Delta H$  εἶναι δόμ. πρὸς τὸ  $\Delta Z$  ὡς ἐμάθομεν εἰς τὴν § 17. Ἀλλὰ τὰ τρίγωνα  $\theta\Delta H$  καὶ  $ABG$  εἶναι ἵσας, διότι ἔχουν  $\Delta H = BG$  καὶ  $\widehat{\theta} = \widehat{B}$ ,  $\widehat{H} = \widehat{A}$  (ἐπειδὴ  $\widehat{H} = \widehat{E} = \widehat{\theta}$ ). "Ἄρα τὸ τρίγ.  $\theta\Delta H$  εἶναι δόμ. πρὸς τὸ τρίγ.  $ABG$  (2). Ἐκ τῶν (1) καὶ (2) ἐπεταῖ δὲ τὸ τρίγ.  $ABG$  εἶναι δόμοιον πρὸς τὸ τρίγ.  $ZDE$ . Ωστε: Δύο τρίγωνα μὲ δύο γωνίας ἵσας ἀνὰ μίαν, εἶναι δόμοια.

### \*Ἐφαρμογαὶ

1. Δύο Ἰσόπλευρα τρίγωνα εἶναι δόμοια, διότι καθ' ἐν ἔξι αὐτῶν ἔχει γωνίας  $60^\circ$ . Δηλαδὴ ἔχουν δύο γωνίας ἵσας.


2. Κατασκευάσατε δύο δρθογώνια τρίγωνα, ὡστε μία δέξεια γωνία τοῦ ἑνὸς, νὰ ἴσοιται πρὸς μίαν δέξειαν γωνίαν τοῦ ἄλλου. Τὶ παρατηρεῖτε;

Κατασκευάζομεν τὰ δρθογώνια τρίγωνα  $ABG$  καὶ  $\Delta EZ$  εἰς τρόπον ὡστε  $\widehat{\theta} = \widehat{Z}$ . Παρατηροῦμεν ὅτι  $\widehat{\theta} = \widehat{Z}$  καὶ  $\widehat{A} = \widehat{E}$ , ὡς δρθοί. Ἐπομένως, ἐὰν δύο δρθογώνια τρίγωνα ἔχουν μίαν δέξειαν γωνίαν ἵσην, εἶναι δόμοια. (Σχ. 30).


3. Φέρατε εἰς δρθογώνιον τρίγωνον  $BAG$  ( $\widehat{A} = 1$  δρθή), τὸ ὑψος  $A\Delta$  καὶ

συγκρίνατε τὰ δρθογώνια τρίγωνα  $\Delta AB$  καὶ  $\Delta \Gamma A$  πρὸς τὸ  $\Delta \Gamma B$ . Τί παρατηρεῖτε; (Σχ.31).

Παρατηροῦμεν ὅτι τὰ δρθ. τρίγωνα  $\Delta AB$  καὶ  $\Delta \Gamma B$  ἔχουν μίαν δέξιαν γωνίαν κοινήν, τὴν  $\widehat{B}$ . "Αρά εἶναι ὅμοια. 'Ομοίως τὰ δρθ. τρίγωνα  $\Delta \Gamma A$  καὶ  $\Delta \Gamma B$  ἔχουν τὴν δέξιαν γωνίαν  $\widehat{\Gamma}$  κοινήν. Εἶναι λοιπὸν καὶ αὐτὰ ὅμοια. 'Επομένως καὶ τὰ τρίγωνα  $\Delta AB$  καὶ  $\Delta \Gamma A$  εἶναι ὅμοια (ὡς ὅμοια πρὸς τρίτον).



σχ. 30.



σχ. 31.

62) Έξετάσατε, ἐάν δύο ίσοσκελῆ δρθογώνια τρίγωνα εἶναι ὅμοια.

63) Νὰ κατασκευάστε δύο ὅμοια τρίγωνα  $\Delta ABG$  καὶ  $\Delta A'B'G'$  καὶ νὰ φέρητε τὰς διχοτόμους αὐτῶν  $\Delta A$  καὶ  $\Delta A'D'$ . Έξετάσατε, ἐάν τὰ τρίγωνα  $\Delta ABG$  καὶ  $\Delta A'B'D'$  ὡς καὶ τὰ  $\Delta AGD$  καὶ  $\Delta A'G'D'$ , εἶναι ὅμοια.

64) Νὰ κατασκευάστη δρθογώνιον τρίγωνον  $\Delta ABG$  καὶ νὰ φέρητε τὸ υψός αὐτοῦ  $\Delta A$ . Νὰ συγκρίνητε τοὺς λόγους  $\frac{\Delta B}{\Delta A}$  καὶ  $\frac{\Delta B}{\Delta B}$

65) Κατασκευάστε τρίγωνον  $\Delta ABG$  μὲν πλευράς  $AB=7$  cm,  $BG=6$  cm καὶ  $GA=9$  cm. Ἐπὶ τῆς  $AB$  λάβετε τμῆμα  $BD=4$  cm καὶ κατασκευάστε γωνίαν  $\widehat{B}\widehat{D}E=\widehat{\Gamma}$ , τῆς δποίας ἡ πλευρά  $DE$  τέμνει τὴν ἡμιευθεῖαν  $BG$  εἰς τὸ  $E$ . 'Υπολογίσατε τὰ μήκη τῶν πλευρῶν τοῦ τριγώνου  $\Delta BDE$ .

66) Νὰ χαράξητε τρίγωνον  $\Delta BAG$  καὶ τὴν διάμεσον αὐτοῦ  $AM$ . Νὰ φέρητε μίαν παραλληλον πρὸς τὴν  $BG$ , ἡ δποία τέμνει τὰς  $AB$ ,  $AM$ ,  $AG$  εἰς τὰ σημεῖα  $B',M',G'$  ἀντιστοίχως. Νὰ συγκρίνητε τὰ τμῆματα  $B'M'$  καὶ  $G'M'$ .

67) Νὰ κατασκευάστη δύο δέγυγώνια τρίγωνα μὲν πλευράς ἀντιστοίχως παραλλήλους καὶ νὰ τὰ συγκρίνητε. Νὰ διαπιστώσατε, δτι αὐτὰ εἶναι ὅμοια.

## § 20. Συντομεύτε τρίγωναν.

Κατασκευάστε τρίγωνον  $\Delta ABG$  μὲ πλευρὰς  $AB=3$  cm,  $AG=4$  cm καὶ  $BG=6$  cm. Κατασκευάστε ἐν συνεχείᾳ γωνίαν  $\widehat{\Delta}$  ἴσην πρὸς τὴν  $\widehat{A}$  καὶ ἐπὶ τῶν πλευρῶν αὐτῆς λάβετε τμῆμα  $DE=6$  cm καὶ  $DZ=8$  cm. Συγκρίνατε τὰ τρίγωνα  $\Delta ABG$  καὶ  $\Delta EZ$ . Τί παρατηρεῖτε; (Σχ. 32).

Χρησιμοποιοῦντες μοιρογνωμόνιον ἡ διαφανῆ χάρτην, εύρισκομεν δτι  $\widehat{B}=\widehat{E}$  καὶ  $\widehat{Z}=\widehat{G}$ . 'Εὰν μετρήσωμεν τὴν  $EZ$  εύρισκομεν αὐτὴν 12 cm. 'Επειδὴ τώρα εἶναι  $\frac{AB}{DE}=\frac{3}{6}=\frac{1}{2}$ ,  $\frac{AG}{DZ}=\frac{4}{8}=\frac{1}{2}$  καὶ  $\frac{BG}{EZ}=\frac{6}{12}=\frac{1}{2}$ , ἔχομεν  $\frac{AB}{DE}=\frac{AG}{DZ}=\frac{BG}{EZ}$

=  $\frac{BG}{EZ}$  καὶ  $\hat{A} = \hat{\Delta}$ ,  $\hat{B} = \hat{E}$ ,  $\hat{G} = \hat{Z}$ . Τὰ τρίγωνα, συνεπῶς,  $ABG$  καὶ  $\Delta EZ$  εἶναι ὁμοια. Τὰ τρίγωνα αὐτὰ κατεσκεύασθησαν ἐξ ἀρχῆς, ὥστε νά ἔχουν

τὰς ἵσας γωνίας  $\hat{A}$  καὶ  $\hat{\Delta}$  περιεχομένας μεταξὺ τῶν ἀναλόγων πλευρῶν,  $AB$ ,  $A\Gamma$  καὶ  $\Delta E$ ,  $\Delta Z$ . Ὡστε:

'Ἐὰν δύο τρίγωνα ἔχουν δύο πλευράς ἀναλόγους καὶ τὰς περιεχομένας ὑπ' αὐτῶν γωνίας ἵσας, εἶναι ὁμοια.

Αἰτιολογοῦμεν τὸ διποτέλεσμα τῆς ἐργασίας μας ὡς ἔργης: 'Ἐπι τῶν  $\Delta E$  καὶ  $\Delta Z$  λαμβάνομεν τμήματα  $\Delta H = AB$  καὶ  $\Delta \Theta = A\Gamma$ . 'Ἐπειδὴ εἶναι  $\frac{AB}{\Delta E} = \frac{A\Gamma}{\Delta Z}$ , θά εἶναι καὶ  $\frac{\Delta H}{\Delta E} = \frac{\Delta \Theta}{\Delta Z}$ .

Τότε δημως, δπως ἐμάθομεν εἰς τὴν § 16. 2 θὰ εἶναι  $H//EZ$ , συνεπῶς τὸ τρίγωνον  $\Delta H\Theta$  εἶναι δυοιον πρὸς τὸ  $\Delta EZ$ . 'Αλλὰ τὰ τρίγωνα  $\Delta H\Theta$  καὶ  $ABG$  εἶναι ἵσα, διότι ἔχουν μίαν γωνίαν ἴσην περιεχομένην μεταξὺ ἵσων πλευρῶν. 'Ἐπομένως τὰ τρίγωνα  $\Delta H\Theta$  καὶ  $ABG$  εἶναι δυοια. "Αρα τὰ τρίγωνα  $ABG$  καὶ  $\Delta EZ$  εἶναι δυοια (διότι εἶναι δυοια πρὸς τρίτον. Τὸ  $\Delta H\Theta$ ). Ὡστε: Τρίγωνα ἔχοντα δύο πλευράς ἀναλόγους καὶ τὰς γωνίας τῶν πλευρῶν αὐτῶν ἵσας, εἶναι δυοια.

σχ. 32.

### Ἐφαρμογαὶ

1. Δύο δρθιογώνια τρίγωνα, τὰ δποῖα ἔχουν τὰς καθέτους πλευράς των ἀναλόγους εἶναι δυοια, διότι ἔχουν μίαν γωνίαν ἴσην (τὴν δρθήν) περιεχομένην μεταξὺ ἀναλόγων πλευρῶν.


2. Χαράσσομεν τὰ ἰσοσκελῆ τρίγωνα  $ABG$  καὶ  $A'B'\Gamma'$  ὥστε αἱ γωνίαι τῶν κορυφῶν νὰ εἶναι ἵσαι,  $\hat{A} = \hat{A}'$  καὶ  $AB = A\Gamma$ ,  $A'B' = A'\Gamma'$  τότε  $\frac{AB}{A'B'} = \frac{A\Gamma}{A'\Gamma'}$ .

'Ἐξ αὐτῶν συμπεραίνομεν δτι, ἐὰν δύο ἰσοσκελῆ τρίγωνα ἔχουν ἵσας τὰς γωνίας τῶν κορυφῶν των, εἶναι δυοια.

### § 21. Ζον Κριτήριον δμοιότητος τριγώνων

Κατασκευάστε τρίγωνον  $ABG$  μὲ πλευράς  $AB = 4 \text{ cm}$ ,  $BG = 5 \text{ cm}$  καὶ  $GA = 6 \text{ cm}$  καὶ ἐν ἄλλον τρίγωνον  $\Delta EZ$  μὲ πλευράς  $\Delta E = 8 \text{ cm}$ ,  $EZ = 10 \text{ cm}$  καὶ  $Z\Delta = 12 \text{ cm}$ . Συγκρίνετε τὰς γωνίας αὐτῶν τῶν τριγώνων.

Μὲ τὴν βοήθειαν διαφανοῦς χάρτου ἢ μοιρογνωμονίου, εύκόλως εύρισκομεν δτι αἱ δμόλογοι γωνίαι αὐτῶν εἶναι ἵσαι. Τὰ τρίγωνα αὐτὰ ἔξι ἀρχῆς




είχον και τάς διμολόγους πλευράς αύτῶν  
ἀναλόγους.  $\frac{AB}{\Delta E} = \frac{B\Gamma}{EZ} = \frac{\Gamma A}{Z\Delta}$ . Ἐκ τούτων  
συμπεραίνομεν, ὅτι τά τρίγωνα  $AB\Gamma$   
καὶ  $\Delta EZ$  εἰναι ὅμοια. "Ωστε :

'Ἐὰν δύν τρίγωνα ἔχουν τάς (διμολόγους) πλευράς αύτῶν ἀναλόγους εἰναι ὅμοια.

Τὸ ἀποτέλεσμα αὐτὸ δυνάμεθα νὰ αἰτιολογήσωμεν ὡς ἔξης (σχ. 33): Ἐπι τῶν  $\Delta E$  καὶ  $\Delta Z$  λαμβάνομεν τμῆματα  $\Delta H = AB$  καὶ  $\Delta \Theta = AG$  καὶ ἐπειδὴ εἰναι ἐξ ἀρχῆς  $\frac{AB}{\Delta E} = \frac{B\Gamma}{EZ} = \frac{\Gamma A}{Z\Delta}$

θὰ εἰναι καὶ  $\frac{\Delta H}{\Delta E} = \frac{\Delta \Theta}{\Delta Z}$  (ἀντικαθιστῶμεν διὰ τῶν ἴσων των). Τότε δύως τρίγ.  $\Delta H \Theta$  δμ. πρὸς

τρίγ.  $\Delta EZ$  συνεπῶς  $\frac{H\Theta}{EZ} = \frac{\Delta \Theta}{\Delta Z}$ . Θέτομεν δηπου  $\Delta \Theta$  τὸ ἴσον του  $A\Gamma$  καὶ ἔχομεν  $\frac{H\Theta}{EZ} = \frac{\Gamma A}{Z\Delta}$ . Ἐξ ἀρχῆς ὅμως εἰναι  $\frac{\Gamma A}{Z\Delta} = \frac{B\Gamma}{EZ}$  συνεπῶς  $\frac{B\Gamma}{EZ} = \frac{H\Theta}{EZ}$  δρα  $H\Theta = B\Gamma$ . Τὰ τρίγωνα τώρα  $\Delta H \Theta$  καὶ  $AB\Gamma$  εἰναι ἴσα διότι ἔχουν τάς πλευράς των ἴσας ἀνὰ μίαν. Συνεπῶς εἰναι δμοια. "Ἄρα τὰ τρίγωνα  $AB\Gamma$  καὶ  $\Delta EZ$  εἰναι δμοια (διότι εἰναι δμοια πρὸς τὸ τρίγωνον  $\Delta H \Theta$ ). "Ἐπομένως : Δύο τρίγωνα μὲ τάς (διμολόγους) πλευράς των ἀναλόγους εἰναι δμοια.



σχ. 33.

### Ἐφαρμογαὶ

Χαράξατε δρθογώνιον τρίγωνον καὶ κατασκευάσατε τρίγωνον μὲ πλευράς ἀναλόγους πρὸς αὐτό. Τὶ παρατηρεῖτε;

Παρατηροῦμεν ὅτι τὸ δεύτερον τρίγωνον εἰναι δμοιον πρὸς ἕκεινο τὸ δόπιον ἔχαράξαμεν. Αἱ διμόλογοι λοιπὸν γωνίαι του εἰναι ἴσαι πρὸς τάς γωνίας αὐτοῦ. Συνεπῶς καὶ τὸ δεύτερον τρίγωνον εἰναι δρθογώνιον.

### Ἀσκήσεις

68) Νὰ κατασκευάστη δύο ἴσοσκελὴ τρίγωνα  $AB\Gamma$  καὶ  $\Delta AE$  ( $AB = A\Gamma$  καὶ  $\Delta = AE$ ) ὥστε  $\widehat{B\Gamma} = \widehat{\Delta E}$  καὶ  $\Delta$  ἐσωτερικὴ τῆς  $B\widehat{\Gamma}A$ . Νὰ συγκρίνητε τὰ τρίγωνα  $BAD$  καὶ  $\Gamma AE$  καὶ νὰ δικαιολογήσητε διατὶ εἰναι δμοια.

69) Νὰ κατασκευάστη δύο τρίγωνα  $AB\Gamma$  καὶ  $A'B'\Gamma'$  ὥστε  $\widehat{A} = \widehat{A'}$  καὶ  $\frac{AB}{A'B'} = \frac{A\Gamma}{A'\Gamma'} = \frac{2}{3}$ . Νὰ δικαιολογήσητε, διτὶ αὐτὰ εἰναι δμοια.

70) Νὰ χαράξητε τρίγωνον καὶ νὰ ἐνώσητε τὰ μέσα τῶν πλευρῶν του. Νὰ συγκρίνητε τὰ τέσσαρα τρίγωνα τά δόπια σχηματίζονται πρὸς τὸ ἀρχικόν.

71) Νὰ κατασκευάστη τρίγωνον  $AB\Gamma$  μὲ πλευράς  $AB = 2,5$  em,  $B\Gamma = 4,2$  em καὶ  $\Gamma A = 3$  em

καὶ ἄλλο Α'Β'Γ' μὲν ἀντιστοίχους πλευράς διπλασίας. Φέρατε τὰς διαιμέσους ΑΜ καὶ Α'Μ' καὶ δεῖξατε διατί τὰ τρίγωνα ΑΒΜ καὶ Α'Β'Μ' εἶναι δημοια.

72) Νὰ κατασκευάστε ὅρθιογώνιον τρίγωνον ΒΑΓ καὶ ἄλλο τρίγωνον μὲ πλευράς τρι-πλασίας τοῦ πρώτου. Δικαιολογήσατε διατί καὶ αὐτὸ δεῖξατε ὅρθιογώνιον.


73) Νὰ κατασκευάστε δύο τρίγωνα εἰς τρόπον ὡστε τὸ ἐν νὰ εἴναι δημοια τοῦ τρίγωνον καὶ τὸ ἄλλο νὰ ἔχῃ πλευράς ἀντιστοίχως τριπλασίας τῶν πλευρῶν τοῦ πρώτου. Νὰ ἔξηγήσητε διατί καὶ τὸ δεύτερον τρίγωνον θὰ εἴναι δημοια.

74) Κατασκευάστε ἐν ἀμβλυγώνιον τρίγωνον καὶ ἐν ἄλλῳ τρίγωνον μὲ πλευράς τὰς διπλασίας τῶν πλευρῶν τοῦ πρώτου. Νὰ ἔξηγήσητε διατί καὶ τὸ δεύτερον τρίγωνον θὰ ἔχῃ μίσαν γωνίαν ἀμβλεῖαν.

75) Νὰ κατασκευάστε τὰ τρίγωνα ΑΒΓ καὶ ΔΕΖ εἰς τρόπον ὡστε αἱ πλευραὶ τοῦ δευτέρου νὰ εἴναι τὸ  $\frac{1}{3}$  τῶν ἀντιστοίχων (δημολόγων) πλευρῶν τοῦ πρώτου. Νὰ φέρητε ἐν συνεχείᾳ τὰς διαιμέσους ΑΜ καὶ ΔΝ καὶ νὰ τὰς συγκρίνητε.

76) Νὰ κατασκευάστε δύο ὅρθιογνια τρίγωνα μὲ τὰς πλευράς των ἀντιστοίχως πα-ραλλήλους καὶ νὰ ἔξετάσητε ἐάν εἴναι δημοια.

### Γ'. ΟΜΟΙΑ ΠΟΛΥΓΩΝΑ



§ 22. Χαράξατε ἐν πεντά-γωνον ΑΒΓΔΕ καὶ προεκτελ-νατε τὴν ΑΒ ἐως τὸ Β' εἰς τρόπον ὡστε  $AB' = 2.AB$ . Προεκτενατε κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον τὰς διαγωνίους ΑΓ ἐως τὸ Γ', ΑΔ ἐως τὸ Δ' καὶ τὴν πλευρὰν ΑΕ ἐως τὸ Ε'. Συγκρίνατε τὰς δημολόγους (ἀντιστοίχους) γωνίες  $\widehat{A}$ ,  $\widehat{A}'$ ,  $\widehat{B}$ ,  $\widehat{B}'$ ,  $\widehat{G}$ ,  $\widehat{G}'$ ,  $\widehat{D}$ ,  $\widehat{D}'$  καὶ  $\widehat{E}$ ,  $\widehat{E}'$  καὶ τὰς δημολόγους πλευ-ράς  $AB, AB'$ ,  $BG, BG'$ ,  $GD, GD'$ ,  $DE, DE'$ ,  $EA, EA'$  τῶν πενταγώνων ΑΒΓΔΕ καὶ  $AB'G'D'E'$ . Τί παρατηρεῖτε; (Σχ. 34).

Χρησιμοποιοῦμεν μοιρογνωμόνιον ἢ διαφανὲς καὶ εύρισκομεν, ὅτι αἱ δημό-λογοι γωνίαι τῶν πενταγώνων αὐτῶν εἶναι ἴσαι. Μὲ τὸν διαβήτην ἢ τὸ ὑπο-δεκάμετρον διαπιστοῦμεν ὅτι  $AB = \frac{1}{2}.AB'$ ,  $BG = \frac{1}{2}.BG'$ ,  $GD = \frac{1}{2}.GD'$ ,

$\Delta E = \frac{1}{2} \cdot \Delta' E'$  και  $AE = \frac{1}{2} \cdot AE'$  ή  $\frac{AB}{AB'} = \frac{BG}{B'G} = \frac{\Gamma\Delta}{\Gamma'\Delta'} = \frac{\Delta E}{\Delta'E'} = \frac{EA}{E'A}$ , δηλαδή αι διμόλογοι πλευραί των είναι άναλογοι. Τα πεντάγωνα  $AB\Gamma\Delta E$  και  $A B' \Gamma' \Delta' E'$  λέγονται δμοια. 'Ο λόγος λ δύο διμόλογων πλευρών των δμοίων αύτῶν πενταγώνων λέγεται λόγος δμοιότητος αύτῶν (εἰς τὴν περίπτωσίν μας  $\lambda = \frac{1}{2}$ ).

Γενικῶς λέγομεν ότι δύο πολύγωνα (μὲ τὸ αὐτὸ πλῆθος κορυφῶν) είναι δμοια, ἔαν ἔχουν τὰς διμόλογους των γωνίας ἵσας και τὰς διμόλογους αύτῶν πλευράς άναλογους.

Δυνάμεθα νὰ ἐργασθῶμεν μὲ τὰ πεντάγωνα  $AB\Gamma\Delta E$  και  $AB' \Gamma' \Delta' E'$ , (σχ. 34) χωρὶς νὰ χρησιμοποιήσωμεν γεωμετρικά δργανα.

Συγκρίνομεν τὰ τρίγωνα  $AB\Gamma$  και  $AB'\Gamma'$ . Αύτά ἔχουν μίαν γωνίαν κοινήν (τὴν  $\widehat{A}$ ) μεταξὺ άναλογων πλευρών. Τῶν  $AB$ ,  $AG$  και  $AB'$ ,  $AG'$ : "Αρα:  $\widehat{B} = \widehat{B}'$

$$\widehat{\Gamma}_1 = \widehat{\Gamma}', \quad \text{καὶ}$$

$$\frac{AB}{AB'} = \frac{BG}{B'G} = \frac{AG}{AG'}$$

'Ομοιως διαπιστώνομεν ότι τὰ τρίγωνα  $AG\Delta$  και  $AG'\Delta'$  είναι δμοια. 'Ἐπομένως

$$\widehat{\Gamma}_2 = \widehat{\Gamma}', \quad \widehat{\Delta}_1 = \widehat{\Delta}', \quad \text{καὶ} \quad \frac{AG}{AG'} = \frac{\Gamma\Delta}{\Gamma'\Delta'} = \frac{AD}{AD'}$$

'Άλλα και τὰ τρίγωνα  $AD\Gamma$  και  $AD'\Gamma'$  είναι δμοια (ἔχουν κοινήν μίαν γωνίαν μεταξὺ άναλογων πλευρών), συνεπώς

$$\widehat{\Delta}_2 = \widehat{\Delta}', \quad \widehat{E} = \widehat{E}' \quad \text{καὶ} \quad \frac{AD}{AD'} = \frac{DE}{DE'} = \frac{AE}{AE'}$$

'Εξ αύτῶν συμπεραίνομεν ότι αι διμόλογοι γωνίαι τῶν πενταγώνων μας είναι ίσαι εἴτε  $\Delta\Gamma$  εύθειας ( $\widehat{A} = \widehat{A}$ ,  $\widehat{E} = \widehat{E}'$ ,  $\widehat{B} = \widehat{B}'$ ) εἴτε ώς άθροίσματα ἵσων ( $\widehat{\Gamma} = \widehat{\Gamma}'$ ,  $\widehat{\Delta} = \widehat{\Delta}'$ ) και αι διμόλογοι αύτῶν πλευραί άναλογοι.

**Παρατήρησις 1.** Αι διαγώνιοι αι διποῖαι συνδέουν δύο διμόλογους κορυφάς λέγονται διμόλογοι διαγώνιοι. Εις τὰ δμοια πεντάγωνα τοῦ σχήματος 34 δύο διαγώνιοι τοῦ ἐνὸς είναι άναλογοι πρὸς τὰς διμόλογους διαγωνίους τοῦ ἄλλου π.χ. αι  $AG$ ,  $AD$  άναλογοι τῶν  $AG'$ ,  $AD'$ .

Αι διμόλογοι διαγώνιοι δύο δμοίων πολυγώνων είναι άναλογοι.

**Παρατήρησις 2.** Παρατηροῦμεν σχ. 34 ότι τὰ τρίγωνα  $AB'\Gamma'$ ,  $AG'\Delta'$ ,  $AD'\Gamma'$  έχουν τὴν αύτὴν διάταξιν πρὸς τὰ άντιστοίχως δμοιά των  $AB\Gamma$ ,  $AG\Delta$ ,  $AD\Gamma$ .

'Ἐπομένως: Δύο δμοια πολύγωνα χωρίζονται. εἰς τρίγωνα δμοια ἐν πρὸς ἐν και δμοίως διατεταγμένα.


**Παρατήρησις 3.** Εις τὴν ἀρχὴν τῆς ἐργασίας μας πρῶτον κατεσκεύασαμεν τὰ πεντάγωνά μας εἰς τρόπον ὡστε νὰ χωρίζωνται εἰς τρίγωνα κατὰ τὸν ἀνωτέρω τρόπον και ἐξ αὐτοῦ κατελήξαμεν εἰς τὸ συμπέρασμα ότι είναι δμοια.

'Ἐπομένως: 'Εὰν δύο πολύγωνα χωρίζωνται εἰς τρίγωνα δμοια ἐν πρὸς ἐν και δμοίως διατεταγμένα είναι δμοια.

Εις τὰ αὐτά συμπεράσματα καταλήγομεν καὶ ὅταν τὰ πολύγωνα εύρισκωνται εἰς διαφόρους θέσεις, διότι δυνάμεθα νὰ θέσωμεν τὸ ἐν ἐπὶ τοῦ ἄλλου, ως εἰς τὸ σχ. 34, εἴτε χρησιμοποιοῦντες διαφανές, εἴτε κατασκευάζοντες πολύγωνον ἵσουν πρὸς τὸ ἐν.

### § 23 Ἐφαρμογαὶ

1. Δύο ρόμβοι  $AB\Gamma\Delta$  καὶ  $A'B'\Gamma'\Delta'$  μὲν ἵστην μίαν γωνίαν εἶναι ὅμοιοι.



σχ. 35.

Ἐὰν  $\widehat{A}=\widehat{A}'$ , τότε καὶ  $\widehat{\Gamma}=\widehat{\Gamma}'$ . Ἀλλὰ καὶ  $\widehat{B}=\widehat{B}'$  καὶ  $\widehat{\Delta}=\widehat{\Delta}'$  (εἰναι ἵσαι πρὸς ἵσας ἢ παραπληρωματικαὶ ἵσων). Ἐ-  
Γ' πειδὴ δὲ  $AB=B\Gamma=\Gamma\Delta=\Delta A$  καὶ  
 $A'B'=B'\Gamma'=\Gamma'\Delta'=\Delta'A'$ , θὰ εἴναι  

$$\frac{AB}{A'B'} = \frac{B\Gamma}{B'\Gamma'} = \frac{\Gamma\Delta}{\Gamma'\Delta'} = \frac{\Delta A}{\Delta'A'}$$

2. Ὁ λόγος τῶν περιμέτρων δύο δομοίων πολυγώνων ἴσοῦται πρὸς τὸν λόγον τῆς δομοιότητος αὐτῶν. Ἐὰν λ δ λόγος τῆς δομοιότητος τῶν πενταγώνων τοῦ σχήματος (34), θὰ ἔχωμεν  $\lambda = \frac{AB}{AB'} = \frac{B\Gamma}{B'\Gamma'} = \frac{\Gamma\Delta}{\Gamma'\Delta'} = \frac{\Delta E}{\Delta'E'} = \frac{EA}{E'A}$  συνεπῶς :

$$\lambda = \frac{AB+B\Gamma+\Gamma\Delta+\Delta E+EA}{AB'+B'\Gamma'+\Gamma'\Delta'+\Delta'E'+E'A} \quad (\text{iδ. τῶν ἀναλογιῶν § 14}).$$

3. Χαράσσομεν δύο ἀνίσους κύκλους καὶ ἑγγράφομεν εἰς αὐτούς τὰ κανονικὰ ἔξαγωνα  $AB\Gamma\Delta E Z$  καὶ  $A'B'\Gamma'\Delta'E'Z'$  ἀντιστοίχως. Παρατηροῦμεν ὅτι :  $\widehat{A}=\widehat{A}'$ ,  $\widehat{B}=\widehat{B}'$ ,  $\widehat{\Gamma}=\widehat{\Gamma}'$ ,  $\widehat{\Delta}=\widehat{\Delta}'$ ,  $\widehat{E}=\widehat{E}'$ ,  $\widehat{Z}=\widehat{Z}'$  (ἐκάστη τούτων ἴσοῦται πρὸς  $120^\circ$ ) καὶ  $\frac{AB}{A'B'} = \frac{B\Gamma}{B'\Gamma'} = \frac{\Gamma\Delta}{\Gamma'\Delta'} = \frac{\Delta E}{\Delta'E'} = \frac{EZ}{E'Z'} = \frac{ZA}{Z'A'}$  διότι οἱ λόγοι αὐτοὶ ἔχουν ἴσους ὄρους.

Ἐπομένως : (§ 22).

Δύο κανονικὰ πολύγωνα τοῦ αὐτοῦ πλήθους πλευρῶν εἶναι ὅμοια.

\*Α σ κ ἡ σ εις

77) Ἐξετάσατε ἐάν δύο τετράγωνα εἶναι ὅμοια.

78) Δύο δρθογώνια παραλληλόγραμμα ἔχουν διαστάσεις 3 cm, 4 cm καὶ 6 cm, 8 cm ἀντιστοίχως. Είναι ὅμοια ; Διατί ;

79) Ἐξηγήσατε διατί δύο ρόμβοι μὲν ἀναλόγους διαγωνίους εἶναι ὅμοιοι.

80) Κατασκευάσατε δύο δρθογώνια εἰς τρόπον ὃστε αἱ διαγώνιοι ἔκαστου νὰ σχημα-

τιζουν γωνίαν  $30^\circ$  και ή διαγώνιος τοῦ ένός νά είναι τριπλασία μιᾶς διαγωνίου τοῦ δλα-  
λου. Έξηγήσατε διατί αύτά είναι δμοια.



81) Έξηγήσατε διατί δύο παραλληλόγραμμα μὲ πλευράς ἀναλόγους καὶ μίαν γωνίαν  
την είναι δμοια.

82) Χαράξατε τρίγωνον καὶ ἐπὶ ἑκάστης διαμέσου αύτοῦ λάβετε σημεῖον, τὸ δποῖον νά  
ἀπέχῃ τῆς ἀντιστοίχου κορυφῆς τὸ  $\frac{1}{3}$  τῆς διαμέσου. Έξηγήσατε διατί αύτὰ είναι κο-  
ρυφαὶ τριγώνου δμοίου πρὸς τὸ ἀρχικόν.

#### Δ'. ΑΠΛΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ

##### § 24. Κατασκευὴ τετάρτης ἀναλόγου.

Λάβετε τρία εὐθύγραμμα τμῆματα  $a=3\text{cm}$ ,  $b=4\text{cm}$ ,  $c=6\text{cm}$  καὶ εύρετε τέ-  
ταρτον εὐθύγραμμον τμῆμα  $\chi$  ώστε νά είναι  $\frac{a}{b} = \frac{c}{\chi}$ , δηλαδὴ τὰ  $a$ ,  $b$ ,  $c$ ,  $\chi$




σχ. 36.

Έάν φέρωμεν ἐκ τοῦ Ο τὴν Οψ//ΑΓ βλέπομεν δτι τὸ ἀποτέλεσμα αύτὸ  
δικαιολογεῖται ὑπὸ τοῦ θεωρήματος τοῦ Θαλοῦ: Παράλληλοι εύθειαι ὁρίζουν  
ἐπὶ δύο εὐθειῶν, τὰς δποίας τέμνουν (δηλαδὴ τὰς πλευράς τῆς γωνίας Ο),  
ἀνάλογα εὐθύγραμμα τμήματα.

**Σημείωσις:** Έάν μὲ  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ ,  $\chi$  διομάσωμεν τὰς τιμάς τῶν τριῶν τμημάτων καὶ μὲ  $\chi$  τὴν τιμὴν  
τῆς τετάρτης ἀναλόγου των, θὰ ἔχωμεν  $\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\chi} \Leftrightarrow \alpha \cdot \chi = \beta \cdot \gamma$ . Ή ἐργασία τὴν δποίαν  
ἐκάμομεν ἀνωτέρω, ἀποτελεῖ γεωμετρικὴν ἐπίλυσιν τῆς ἔξισώσεως αύτῆς.

§ 25. Λάβετε τὰ εὐθ. τμῆματα  $\alpha=2\text{cm}$  καὶ  $\beta=8\text{cm}$ . Νά εύρητε ἐν εὐθύγραμμον τμῆ-  
μα  $\chi$  ώστε  $\frac{\alpha}{\chi} = \frac{\chi}{\beta}$ . Τὸ  $\chi$  καλοῦμεν μέσην ἀναλόγον τῶν  $\alpha$  καὶ  $\beta$ . Ή λάβωμεν τὰς  
τιμάς θὰ ἔχωμεν:  $\frac{(\alpha)}{(\chi)} = \frac{(\chi)}{(\beta)} \Leftrightarrow (\chi)^2 = (\alpha) \cdot (\beta)$ .

Λαμβάνομεν ἐπὶ εύθειας τὰ διαδοχικὰ τμήματα ΑΒ καὶ ΒΓ οσα ἀντιστοίχως πρὸς 2 cm καὶ  
8 cm. Μὲ διάμετρον τὴν ΑΓ γράφομεν ἡμικύκλιον. Εἰς τὸ Β ύψοιμεν κάθετον πρὸς τὴν ΑΓ, ή




§ 26. Έξι ένδεις σημείου αι δάποστάσεις τεσσάρων πόλεων  $A, B, \Gamma, \Delta$  είναι άντιστοίχως 40 km, 60 km, 50 km και 45 km. Νὰ σχεδιάστητε χάρτην τῆς περιοχῆς αύτῆς ύπότικλίμακα  $1/1000000$ .

Τοῦτο σημαίνει, ὅτι πρέπει νὰ κατασκευάσωμεν σχήματα δμοια πρὸς τὰ τοῦ ἐδάφους μὲ λόγον δμοιότητος  $1/1000000$ . Πρὸς τοῦτο δ' ένδεις δργάνου τὸ δόποιον δνομάζεται γωνιόμετρον, μετρῶμεν (διὰ σκοπεύσεως δπὸ τὸ σημεῖον Ο τοῦ ἐδάφους) τὰς γωνίας  $A\bar{O}B$ ,  $B\bar{O}\Gamma$ ,  $\Gamma\bar{O}\Delta$ ,  $\Delta\bar{O}A$  καὶ τὰς σχεδιάζομεν ἐπὶ τοῦ χάρτου μας. Ἐπὶ τῆς πλευρᾶς  $OA$  λαμβάνομεν τμῆμα  $OE = 4$  cm, ἐπὶ τῆς  $OB$  τμῆμα  $OZ = 6$  cm, ἐπὶ τῆς  $OG$  τμῆμα  $OH = 5$  cm καὶ ἐπὶ τῆς  $OD$  τμῆμα  $O\Theta = 4,5$  cm. Τὰ σημεῖα  $O, E, Z, H, \Theta$  δάποτελοῦν τὸν χάρτην τῆς περιοχῆς  $O, A, B, \Gamma, \Delta$ . Πράγματι τὸ τρίγωνον  $O\Theta E$  είναι δμοιον πρὸς τὸ  $O\Delta A$  (ἔχουν δύο γωνίας ἵσας μεταξὺ ἀναλόγων πλευρῶν) καὶ δ λόγος δμοιότητος λ είναι ἵσος πρὸς  $\frac{OE}{OA} = \frac{4 \text{ cm}}{40 \text{ km}} = \frac{4 \text{ cm}}{4000000 \text{ cm}} = \frac{1}{1000000}$ .


ὅποια τέμνει τὸ ήμικύκλιον εἰς τὸ σημεῖον  $\Delta$ . Διὰ μετρήσεως εύρισκομεν  $BD = 4$  cm. Τότε δμως  $4^\circ = 2,8$ , δηλαδὴ  $(\Delta B)^2 = (AB).(B\Gamma)$ . Ήστε τὸ εὐθ. τμῆμα  $BD$  είναι ή ζητουμένη μέση ἀνάλογος.

Τὸ ἀποτέλεσμα αὐτὸ δέν είναι τυχαίον, διότι ὡς ἔμάθωμεν εἰς τὴν § 19. 3 τὰ δρθ. τρίγωνα  $\Delta BA$  καὶ  $\Gamma BD$  είναι δμοια (τὸ τριγ.  $\Delta\bar{D}B$  είναι δρθογώνιον, ἐπειδὴ  $\widehat{\Delta\bar{D}B} = 1$  δρθὴ ὡς ἔγγεγραμένη εἰς ήμικύκλιον, καὶ  $\Delta B$  ὑψος πρὸς τὴν ὑποτείνουσαν). Ἐπομένως  $\frac{(AB)}{(DB)} = \frac{(\Delta B)}{(B\Gamma)}$  καὶ  $(\Delta B)^2 = (AB).(B\Gamma)$ .



§ 27. Χαράξατε ἐν τρίγωνον  $AB\Gamma$  καὶ κατασκευάσατε ἐν ἄλλῳ τρίγωνον δμοιον πρὸς αὐτό, τὸ δόποιον νὰ ἔχῃ ἐν ὑψος ἵσον πρὸς 6 cm.

Φέρομεν τὸ ὑψος  $A\Delta$  τοῦ τριγώνου  $AB\Gamma$  καὶ λαμβάνομεν ἐπ' αὐτοῦ τμῆμα  $AE$  ἵσον πρὸς 6 cm. Απὸ τὸ  $E$  φέρομεν παράλληλον πρὸς τὴν  $B\Gamma$ , ἡ δποια τέμνει τὰς  $AB$  καὶ  $A\Gamma$  εἰς τὰ  $Z$  καὶ  $H$  ἀντιστοίχως. Συγκρίνομεν τὰ τρίγωνα  $AZH$  καὶ  $AB\Gamma$ . Αύτὰ είναι δμοια συμφώνως πρὸς ὅσα ἐμάθομεν.



Έπι πλέον τὸ AZH έχει ύψος AE = 6 cm, διότι ἐφ' ὅσον AE κάθετος πρὸς BG, ἡ AE θὰ είναι καὶ κάθετος πρὸς τὴν παραλλήλον αὐτῆς ZH "Ωστε τὸ AZH είναι τὸ ζητούμενον τρίγωνον.

### Άσκήσεις

83) Κατασκευάστε τὴν τετάρτην ἀνάλογον τῶν πλευρῶν α, β, γ, ἐνός τριγώνου ABC.

84) Κατασκευάστε τὴν τετάρτην ἀνάλογον τῶν ύψων AD, BE, CZ τοῦ προηγουμένου τριγώνου.

85) Χαράξατε τρίγωνον ABC καὶ κατασκευάστε δῆλον ὅμοιον πρὸς αὐτό, τοῦ ὅποιου τὸ δύδιον ύψος πρὸς τὸ ύψος BE τοῦ τριγώνου ABC νὰ είναι 4 cm.

86) Βορείως, ἀνατολικῶς καὶ βορειοδυτικῶς τοῦ γυμνασίου σας Γ εύρισκονται τὰ σημεῖα A, B καὶ Δ ἀντιστοίχως διπέχοντα τοῦ Γ 4,7 km, 6,5 km καὶ 7,3 km. Κατασκευάστε χάρτην τῆς περιοχῆς. (Κλίμαξ 1:1000000).



Δεῖ καὶ τοποτελεῖ εἴτε μετατοπιζόμενον τοῦ τριγώνου ABC τὸ ύψος AD εἴτε μετατοπιζόμενον τὸ τετάρτην ἀνάλογον τοῦ τριγώνου ABC τὸ δῆλον ὅμοιον πρὸς τὸ τριγώνον ABC.

Δεῖ καὶ τοποτελεῖ εἴτε μετατοπιζόμενον τὸ τετάρτην ἀνάλογον τοῦ τριγώνου ABC τὸ δῆλον ὅμοιον πρὸς τὸ τριγώνον ABC τὸ δῆλον ὅμοιον πρὸς τὸ τριγώνον ABC.

Δεῖ καὶ τοποτελεῖ εἴτε μετατοπιζόμενον τὸ τετάρτην ἀνάλογον τοῦ τριγώνου ABC τὸ δῆλον ὅμοιον πρὸς τὸ τριγώνον ABC τὸ δῆλον ὅμοιον πρὸς τὸ τριγώνον ABC.

Δεῖ καὶ τοποτελεῖ εἴτε μετατοπιζόμενον τὸ τετάρτην ἀνάλογον τοῦ τριγώνου ABC τὸ δῆλον ὅμοιον πρὸς τὸ τριγώνον ABC τὸ δῆλον ὅμοιον πρὸς τὸ τριγώνον ABC.

Δεῖ καὶ τοποτελεῖ εἴτε μετατοπιζόμενον τὸ τετάρτην ἀνάλογον τοῦ τριγώνου ABC τὸ δῆλον ὅμοιον πρὸς τὸ τριγώνον ABC τὸ δῆλον ὅμοιον πρὸς τὸ τριγώνον ABC.

Δεῖ καὶ τοποτελεῖ εἴτε μετατοπιζόμενον τὸ τετάρτην ἀνάλογον τοῦ τριγώνου ABC τὸ δῆλον ὅμοιον πρὸς τὸ τριγώνον ABC τὸ δῆλον ὅμοιον πρὸς τὸ τριγώνον ABC.

Δεῖ καὶ τοποτελεῖ εἴτε μετατοπιζόμενον τὸ τετάρτην ἀνάλογον τοῦ τριγώνου ABC τὸ δῆλον ὅμοιον πρὸς τὸ τριγώνον ABC τὸ δῆλον ὅμοιον πρὸς τὸ τριγώνον ABC.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΙΙ


### ΜΕΤΡΗΣΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

#### Α. ΕΜΒΑΔΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

##### 1. Όρισμοί :

§ 28. Όνομάζομεν ἐπιφάνειαν ἐπιπέδου σχήματος (ἀπλῆς κλειστῆς γραμμῆς) τὸ μέρος τοῦ ἐπιπέδου, τὸ διόποιον εἶναι ἐσωτερικὸν αὐτοῦ.

Ἐπιφανείας ἐπιπέδων σχημάτων δυνάμεθα νὰ παρατηρήσωμεν εἰς τὸ σχῆμα (40). Ἡ εἰκὼν αὐτῇ παριστᾶ δύο ἐπιφανείας ἐπιπέδων σχημάτων  $E_1$  καὶ  $E_2$ . **Άθροισμα** τῶν ἐπιφανειῶν  $E_1$  καὶ  $E_2$  δύνομάζομεν τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ σχήματος, τὸ διόποιον λαμβάνομεν, ἐὰν διαγράψωμεν τὴν κοινὴν γραμμήν.



σχ. 40.

Ἐμβαδὸν ἐπιφανείας καλοῦμεν τὴν ἔκτασιν αὐτῆς, ἐκπεφρασμένην εἰς μονάδας μετρήσεως καὶ συμβολίζομεν αὐτὸν διὰ τοῦ Ε.

Τίθεται τὸ ἔξῆς πρόβλημα : Πῶς δυνάμεθα νὰ προσδιορίσωμεν τὴν ἔκτασιν (δηλ. τὸ ἐμβαδὸν) τῆς ἐπιφανείας τοῦ σχήματος (40) ἢ τῆς ἐπιφανείας παντὸς ἐπιπέδου σχήματος;

Τοῦτο δυνάμεθα νὰ ἐπιτύχωμεν διὰ συγκρίσεως τῆς ἐπιφανείας τοῦ σχήματος πρὸς τὴν ἐπιφάνειαν ὡρισμένου ἐπιπέδου σχήματος, τὴν διόποιαν λαμβάνομεν ὡς μονάδα. Τὸ ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς συγκρίσεως εἶναι εἰς ἀριθμός, δὸς διόποιος καλεῖται τιμὴ τοῦ ἐμβαδοῦ τῆς ἐπιφανείας. (Συμβολίζομεν τὴν τιμὴν τοῦ ἐμβαδοῦ τοῦ ΑΒΓΔ μὲ (ΑΒΓΔ)).

Ἡ εὐρεσις τῆς τιμῆς τοῦ ἐμβαδοῦ μίας ἐπιφανείας λέγεται μέτρησις αὐτῆς. Ἡ τιμὴ λοιπὸν τοῦ ἐμβαδοῦ εἶναι ἀριθμός, μὲ τὸν διόποιον πρέπει νὰ πολλαπλασιάσωμεν τὴν μονάδα διὰ νὰ λάβωμεν τὸ ἐμβαδὸν (δηλ. δὸς λόγος τοῦ ἐμβαδοῦ πρὸς τὴν μονάδα).

#### § 29. Μονάδες μετρήσεως ἐπιφανειῶν

Αἱ μονάδες ἐπιφανειῶν εἶναι ἐπιφάνειαι τετραγώνων, τῶν διόποιων ἢ πλευρὰ ἴσοῦται πρὸς μίαν μονάδα μήκους.

Ἡ κυριωτέρα μονάδα μετρήσεως ἐπιφανειῶν εἶναι :

Τὸ τετραγωνικὸν μέτρον ( $m^2$ ), ἢτοι τὸ ἐμβαδὸν τῆς ἐπιφανείας ἐνὸς τετραγώνου πλευρᾶς 1m.

Τὰ πολλαπλάσια αὐτοῦ εἶναι :


1. Τὸ τετραγωνικὸν δεκάμετρον (dam $^2$ ), ἐμβαδὸν ἐνὸς τετραγώνου πλευρᾶς 1 δεκαμέτρου (dam).
2. Τὸ τετραγωνικὸν ἑκατόμετρον (hm $^2$ ), ἐμβαδὸν ἐνὸς τετραγώνου πλευρᾶς 1 ἑκατομέτρου (hm).
3. Τὸ τετραγωνικὸν χιλιόμετρον (km $^2$ ), ἐμβαδὸν ἐνὸς τετραγώνου πλευρᾶς 1 χιλιομέτρου (km).

Αἱ ὑποδιαιρέσεις του εἶναι :

1. Τὸ τετραγωνικὸν δεκατόμετρον (dm $^2$ ), ἐμβαδὸν ἐνὸς τετραγώνου πλευρᾶς 1 δεκατομέτρου (dm).
2. Τὸ τετραγωνικὸν ἑκατοστόμετρον (cm $^2$ ), ἐμβαδὸν ἐνὸς τετραγώνου πλευρᾶς 1 ἑκατοστόμέτρου (cm).
3. Τὸ τετραγωνικὸν χιλιοστόμετρον (mm $^2$ ), ἐμβαδὸν ἐνὸς τετραγώνου πλευρᾶς 1 χιλιοστόμέτρου (mm).

Κατασκευὴ ὡρισμένων μονάδων ἐπιφανειῶν.

1. Κατασκευάζομεν ἐπὶ φύλου χάρτου χιλιοστομέτρικοῦ ἐν τετράγωνον ΑΒΓΔ πλευρᾶς 1 dm καὶ δρίζομεν οὕτως ἐν τετραγωνικὸν δεκατόμετρον (dm $^2$ ).
2. Ἐντὸς τῆς γωνίας Α τοῦ τετραγώνου ΑΒΓΔ κατασκευάζομεν τὸ τετράγωνον ΑΒ'Γ'Δ', πλευρᾶς 1 cm, ἢτοι ἐν τετραγωνικὸν ἑκατοστόμετρον (cm $^2$ ).
3. Ἐπίσης ἐντὸς τοῦ τετραγώνου ΑΒ'Γ'Δ' ὑπάρχουν τετράγωνα μικρότερα, πλευρᾶς 1 mm, ἔκαστον τῶν δόπιών εἶναι μία ὑποδιαιρέσις τῆς ἀρχικῆς μονάδος ἐπιφανείας. Ἐκαστον ἐξ αὐτῶν ὀνομάσαμεν τετραγωνικὸν χιλιοστόμετρον (mm $^2$ ).



σχ. 41.

Δυνάμεθα οὖτω νὰ εύρωμεν π.χ. πόσα τετράγωνα ίσα πρὸς τὸ AB'Γ'Δ' περιέχει τὸ ABΓΔ καὶ πόσα τετραγωνικὰ χιλιοστόμετρα ὑπάρχουν εἰς τὸ ἐσωτερικὸν τοῦ τετραγώνου AB'Γ'Δ' καὶ νὰ δρίσωμεν τὴν ὑπάρχουσαν σχέσιν μεταξὺ τῶν ἀντιστοίχων μονάδων μονάδων ἐπιφανειῶν.

**Σύγκρισις μονάδων ἐπιφανειῶν :** Διὰ τῆς συγκρίσεως τῆς ἐπιφανείας τοῦ τετραγώνου ABΓΔ πρὸς τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ AB'Γ'Δ', τοῦ ὅποιου ἡ πλευρὰ εἶναι τὸ δέκατον τῆς πλευρᾶς τοῦ πρώτου, εύρίσκομεν ὅτι τὸ τετράγωνον ABΓΔ περιέχει δέκα ταινίας. Ἐκάστη τῶν ταινιῶν τούτων περιέχει 10 τετράγωνα ίσα πρὸς τὸ AB'Γ'Δ'.

"Ωστε :  $AB\Gamma\Delta = 100 \cdot AB'\Gamma'\Delta'$ .

Συνεχίζοντες καθ' ὅμοιον τρόπον καὶ μὲ τὰς ἄλλας ὑποδιαιρέσεις τῆς ἀρχικῆς μονάδος, συμπεραίνομεν γενικῶς ὅτι : «Κάθε μονάς ἐπιφανείας ἀποτελεῖται ἀπὸ 100 μονάδας ἐπιφανείας τῆς ἀμέσως κατωτέρας τάξεως». (1) "Ητοι :

$$1m^2 = 100dm^2 = 10000 \text{ cm}^2 = 1000000 \text{ mm}^2$$

$$1dm^2 = 100 \text{ cm}^2 = 10000 \text{ mm}^2$$

$$1 \text{ cm}^2 = 100 \text{ mm}^2$$

‘Η Ιδιότης (1) μᾶς δόδηγει καὶ εἰς τοὺς ἀκολούθους κανόνας : 1) Διὰ νὰ τρέψωμεν ἀριθμὸν συμμιγῆ εἰς ἀπλοῦν (τῆς τελευταίας τάξεως), δ ὅποιος ἐκφράζει ἐν ἐμβαδόν, παριστῶμεν κάθε ἀριθμὸν τοῦ συμμιγοῦς ὡς διψήφιον (ἐὰν δὲν εἶναι), ἀναπληροῦντες διὰ δύο μηδενικῶν πᾶσαν ἔλλειπουσαν μονάδα.

$$\text{Π.χ. α) } 8\text{hm}^2 \ 2\text{dm}^2 \ 7\text{m}^2 = 808\text{hm}^2 \ 02\text{dm}^2 \ 07\text{m}^2 = 8080207\text{m}^2 = 80207\text{m}^2, \\ \beta) 9\text{m}^2 \ 18\text{cm}^2 = 90018 \text{ cm}^2.$$

2) Δυνάμεθα νὰ μεταβάλωμεν τὴν μονάδα ἐπιφανείας, μεταθέτοντες τὴν ύποδιαστολὴν κατὰ 2, κατὰ 4, κ.ο.κ. Θέσεις πράξ τὰ δεξιὰ μέν, ἐὰν θέλωμεν νὰ μεταβῶμεν ἀπὸ μίαν μονάδα εἰς τὴν ἀμέσως κατωτέραν μονάδα ἐπιφανείας ἢ πρός τὰ ἀριστερά, διὰ νὰ μεταβῶμεν ἀπὸ μίαν μονάδα ἐμβαδοῦ εἰς μίαν ἀμέσως ἀνωτέρας τάξεως. (Ἀναπληροῦμεν μὲν ηγενικὰ τὰ ἑλείποντα ψηφία μονάδος μᾶς ωδισμένης τάξεως).

$$\text{П.ч. } \alpha) 832,18 \text{ м}^2 = 8,3218 \text{ дм}^2 = 83218 \text{ см}^2$$

### Παρατήρησις :

Διὰ τὴν μέτρησιν τῆς ἐπιφανείας τῶν ἀγρῶν χρησιμοποιοῦν ἀλλαχοῦ :


1) Τὸ τετραγωνικὸν δεκάμετρον ( $dam^2$ ) = 100m<sup>2</sup>, τὸ δποιὸν ὀνομάζουν ἄρ (a) καὶ 2) τὸ τετραγωνικὸν ἑκατόμετρον ( $hm^2$ ) = 100dam<sup>2</sup> = 10000 m<sup>2</sup>, τὸ δποιὸν λέγεται ἑκτάριον (ha) καὶ ἰσοῦται μὲ 100 ἄρ. (a). Εἰς τὴν χώραν μας χρησιμοποιεῖται τὸ στρέμμα =  $1000m^2 = \frac{1}{10}$  ha. Διὰ τὴν μέτρησιν τοῦ ἐμβαδοῦ τῶν οἰκοπέδων χρησιμοποιοῦμεν εἰσέτι καὶ τὸν τετραγωνικὸν τεκτονικὸν πῆχυν, 1 τπ<sup>2</sup> =  $\frac{9}{16}$  m<sup>2</sup> = 0,5625m<sup>2</sup>.

Τέλος διὰ τὴν μέτρησιν μεγάλων ἐπιφανειῶν χρησιμοποιοῦμεν τὸ τετραγ.  
χιλιόμετρον ( $1 \text{ km}^2$ ) =  $1000000 \text{m}^2$ .


30. Ἐπιφάνειαι ισοδύναμοι. — Ισοδύναμα σχήματα.

Αἱ ἐπιφάνειαι τῶν Ἰσων σχημάτων εἶναι Ἰσαι.

Δύο ίσαι ἐπιφάνειαι (μετρούμεναι μὲ τὴν αὐτὴν μονάδα) ἔχουν προφανῶς τὸ αὐτὸ ἐμβαδόν. Ἐπὶ παραδείγματι αἱ ἐπιφάνειαι τοῦ σχήματος (42α), αἱ δόποις εἰναι ίσαι καὶ ἔχει ἑκάστη ἐμβαδὸν  $4\text{cm}^2$ .



Αἱ ἐπιφάνειαι τοῦ σχήματος (42β) δὲν εἰναι ἵσα, ἔχουν ὅμως ἐμβαδὸν ἵσον πρὸς  $5\text{cm}^2$ . Αὗται λέγονται ἴσοδύναμοι ἢ ἴσεμβαδικαὶ ἐπιφάνειαι.



σχ. 43.

Τὰ ἐπίπεδα σχήματα  $\text{ABΓΔ}$  καὶ  $\text{E'Ζ'Θ'}$  (σχ. 43) ἔχουν ἴσοδυνάμους ἐπιφάνειας. Τοῦτο δυνάμεθα νὰ διαπιστώσωμεν διὰ καταλλήλου διαιρέσεως αὐτῶν. Τὰ ἀνωτέρω σχήματα λέγονται ἴσοδύναμα σχήματα.

'Ισοδύναμοι ἐπιφάνειαι εἰναι αἱ ἔχουσαι ἵσα ἐμβαδά.

'Ισοδύναμα σχήματα εἰναι τὰ ἔχοντα ἴσοδυνάμους ἐπιφανείας.

**Παρατήρησις :** Δύο ἵσα ἐμβαδὰ ἔχουν ἵσας τιμὰς καὶ ἀντιστρόφως.

$$\text{'Εμβ. } \text{ABΓΔ} = \text{'Εμβ. } \text{A'Ζ'Θ'} \Leftrightarrow (\text{ABΓΔ}) = (\text{A'Ζ'Θ'})$$

### 'Ασκήσεις

87) Νὰ τραποῦν εἰς  $\text{m}^2$  τὰ : 13  $\text{dam}^2$ , 1  $\text{hm}^2$ , 2  $\text{km}^2$ , 18  $\text{dam}^2$ , 58  $\text{hm}^2$ .

88) Πόσα  $\text{mm}^2$  ἔχουν α) 3  $\text{m}^2$ , β) 4  $\text{dam}^2$ , γ) 38  $\text{cm}^2$ .

89) Ἐκφράσατε εἰς  $\text{m}^2$  καὶ κατόπιν εἰς ares α)  $\frac{1}{10} \text{ hm}^2$ , β)  $\frac{1}{10} \text{ km}^2$ .

90) Νὰ τραποῦν εἰς  $\text{m}^2$  τὰ ἐμβαδὰ α) 5  $\text{hm}^2$  6  $\text{dam}^2$  8  $\text{mm}^2$  καὶ β) 156,25  $\text{dm}^2$ .

91) Μετατρέψατε εἰς  $\text{cm}^2$  α) 672  $\text{dm}^2$ , β) 3,84  $\text{hm}^2$  γ) 29  $\text{dam}^2$ .

92) Ἐκτελέσατε τὴν πρόσθειν ἀφοῦ προηγουμένως μετατρέψετε τοὺς προσθετέους εἰς  $\text{cm}^2$ :  $\frac{2}{5} \text{ m}^2 + 560000 \text{ mm}^2 + 152 \text{ cm}^2 + 16 \text{ dm}^2$ .

93) Ὑπολογίσατε εἰς  $\text{m}^2$  τὰς διαφορὰς α) 8 στρέμ. -243  $\text{m}^2$  καὶ β) 4ha - 136,25a.

94) Γήπεδον ἐμβαδοῦ ὃνται ἔχει διαιρεθῆ ἐις δύο μέρη, ἐκ τῶν ὅποιων τὸ ἐν εἰναι μεγαλύτερον τοῦ ἄλλου κατὰ 40a, Νὰ εὕρητε πόσον εἰναι τὸ ἐμβαδὸν ἐκάστου μέρους τοῦ γηπέδου.

### § 31. 'Εμβαδὸν δρθογώνιου.


'Ορθογώνιον εἰναι ἐν παραλληλόγραμμον, τὸ διόποιον ἔχει μίαν γωνίαν δρθῆν :

$$\text{ABΓΔ δρθογώνιον} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \text{ABΓΔ παραλληλόγραμμον} \\ \widehat{\text{A}} = 1 \text{ δρθ} \end{array} \right.$$

(ἡ ἄλλως : 'Ορθογώνιον εἰναι τὸ τετράπλευρον, τὸ διόποιον ἔχει τὰς γωνίας του δρθάς).

"Ἐχομεν ἡδη εὔρει ὅτι αἱ ἀπέναντι πλευραὶ τοῦ δρθογώνιου εἰναι ἵσαι, ἥτοι  $\text{AB} = \text{ΓΔ}$  καὶ  $\text{AD} = \text{ΒΓ}$ .


Τὰ μήκη τῶν πλευρῶν  $\text{AB} = \alpha$  καὶ  $\text{AD} = \beta$  λέγονται διαστάσεις τοῦ δρθογώνιου καὶ ἀντι-



σχ. 44.

στοίχως τὸ μὲν πρῶτον βάσις ἢ μῆκος καὶ τὸ ἔτερον ὑψος ἢ πλάτος αὐτοῦ.

Κατασκευάσατε εἰς γωνίαν φύλλον χάρτου χιλιοστομετρικοῦ (ἢ χάρτου τεραγωνισμένου) ἐν δρθιγώνιον  $ABΓΔ$ , τοῦ δποίου ἡ  $AB = 6 \text{ cm}$  καὶ ἡ  $AD = 4 \text{ cm}$  καὶ νὰ εὕρητε τὸ ἐμβαδὸν αὐτοῦ.



σχ. 45.

Διαπιστοῦμεν ὅτι τὸ ἐν λόγῳ δρθιγώνιον ἀποτελεῖται ἀπὸ  $24 \text{ cm}^2$  ἢ  $(6 \times 4) \text{ cm}^2$  καὶ εὑρίσκομεν οὕτω τὸ ἐμβαδὸν αὐτοῦ  $E_{ABΓΔ} = 24 \text{ cm}^2 = (6 \times 4) \text{ cm}^2$ , ἤτοι  $(6 \text{ cm} \times 4 \text{ cm})$  ἵσον πρὸς τὸ γινόμενον τῶν διαστάσεών του.

Καθ' ὅμοιον τρόπον ἐργαζόμεθα διὰ τὴν εὔρεσιν τοῦ δρθιγώνιου  $A'B'Γ'D'$  μὲν διαστάσεις κλασματικούς ἀριθμούς π.χ.  $A'B' = \frac{4}{10} \text{ dm}$  καὶ  $A'D' = \frac{3}{10} \text{ dm}$ . "Εχομεν  $E_{A'B'Γ'D'} = 12 \text{ cm}^2 = \frac{12}{100} \text{ dm}^2 =$

$$= \left( \frac{4}{10} \cdot \frac{3}{10} \right) \text{dm}^2 = \frac{4}{10} \text{ dm} \cdot \frac{3}{10} \text{ dm} \quad \text{ἵσον πρὸς τὸ γινόμενον τῶν διαστάσεων αὐτοῦ.}$$

'Ἐάν ἐπὶ τοῦ χιλιοστομετρικοῦ χάρτου χαράξωμεν διὰ τῆς αὐτῆς κατασκευῆς ἐν δρθιγώνιον  $ΔΕΖΘ$ , τοῦ δποίου ἡ  $ΔE = 6,5 \text{ cm}$  καὶ  $ΔΘ = 3,4 \text{ cm}$ , δυνάμεθα νὰ εὕρωμεν τὸ ἐμβαδὸν αὐτοῦ εἰς ἀκέραιον ἀριθμὸν μονάδων, ἤτοι εἰς τετρ. χιλιοστόμετρα ( $\text{mm}^2$ ),  $E_{ΔΕΖΘ} = 2210 \text{ mm}^2$ . Μετασχηματίζομεν τὸ ἐμβαδὸν αὐτοῦ εἰς τετρ. ἑκατοστόμετρα  $E_{ΔΕΖΘ} = 22,10 \text{ cm}^2$  καὶ συγκρίνοντες αὐτὸν μὲ τὸ γινόμενον τῶν διαστάσεών του εἰς ἑκατοστόμετρα ( $\text{cm}$ ), εὑρίσκομεν ὅτι τὸ  $E_{ΔΕΖΘ} = 22,10 \text{ cm}^2 = (6,5 \cdot 3,4) \text{ cm}^2$ .

"Ητοι διαπιστοῦμεν καὶ πάλιν ὅτι τὸ ἐμβαδὸν του εἶναι ἵσον πρὸς τὸ γινόμενον τῶν διαστάσεών του (ἢ πρὸς τὸ γινόμενον τοῦ μήκους τῆς βάσεώς του ἐπὶ τὸ μῆκος τοῦ ὕψους αὐτοῦ). (1). Τοῦτο δὲ ἴσχυει, ὡς διεπιστώθη εἰς τὰς ἔξετασθείσας περιπτώσεις, ὅταν τὰ μήκη τῶν διαστάσεων τοῦ δρθιγωνίου εἶναι ρητοὶ ἀριθμοί.

"Αποδεικνύεται ὅμως ὅτι ἡ πρότασις (1) ἴσχυει καὶ ὅταν τὰ μήκη τῶν διαστάσεων τοῦ δρθιγωνίου εἶναι ἀσύμμετροι (μὴ ρητοὶ) ἀριθμοί (ὡς θὰ μάθωμεν εἰς ἀνωτέραν τάξιν).


"Επομένως τὸ ἐμβαδὸν δρθιγωνίου μὲ διαστάσεις α καὶ β δίδεται ὑπὸ τοῦ τύπου  $E = \alpha \cdot \beta$  (2), ἤτοι : Τὸ ἐμβαδὸν ἐνὸς δρθιγωνίου εἶναι ἵσον πρὸς τὸ γινόμενον τῶν διαστάσεών του.

Ο τύπος (2) γράφεται καὶ  $E = \beta \cdot u$ , διότι γνωρίζομεν ότι ή μία τῶν διαστάσεων τοῦ ὀρθογώνιου λέγεται βάσις καὶ ή ἀληθή ὄψος αὐτοῦ. Ἐκ τοῦ τύπου  $E = \beta \cdot u$  λαμβάνομεν καὶ τοὺς  $\beta = \frac{E}{u}$  καὶ  $u = \frac{E}{\beta}$

Είναι φανερόν ὅτι τὸ μῆκος τῶν δύο διαστάσεων πρέπει νὰ ἐκφράζηται εἰς τὴν αὐτὴν μονάδα μήκους, ὅτε τὸ ἐμβαδὸν ἐκφράζεται διὰ τῆς μονάδος τῆς παριστωμένης μὲ τὸ τετράγωνον, τὸ ὄποιον ἔχει ὡς πλευράν τὴν ἐκλεγείσαν μονάδα μήκους.

32. Ἐμβαδὸν τετραγώνου.

**Τετράγωνον** εἶναι ἐν δρθιογώνιον, τοῦ δποίου αἱ δύο διαστάσεις εἶναι ίσαι.



σγ. 46. γώνου, τὸ ἐμβαδόν του εἶναι  $E = \alpha \cdot \alpha = \alpha^2$ . Η τοι :  $E = \alpha^2$

Τὸ ἐμβαδὸν ἐνὸς τετραγώνου εἶναι ἵσον μὲν τὸ τετράγωνον τοῦ μῆκος τῆς πλευρᾶς του.

### Παρατηρήσεις:

1) Είναι γνωστόν ότι η δευτέρα δύναμις ἐνὸς ἀριθμοῦ λέγεται καὶ τετράγωνον τοῦ ἀριθμοῦ αὐτοῦ, διότι δίδει τὴν τιμὴν τοῦ ἐμβαδοῦ τοῦ τετραγώνου, τοῦ ὅποιού τὸ μῆκος τῆς πλευρᾶς του ἔχει τιμὴν ἵσην πρὸ τὸν ἀριθμὸν αὐτόν.

2) Χρήσιμον είναι νά γνωρίζωμεν δπό μηδημης τά τετράγωνα μερικῶν φυσικῶν δριθμῶν:

$\alpha$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	...
$\alpha^3$	1	4	9	16	25	36	49	64	81	100	121	144	169	196	225	...


Ἐφαρμογή

Νά εύρητε τό ἐμβαδὸν ὁρθογωνίου τριγώνου, τοῦ δποίου τὰ μήκη τῶν καθέτων πλευρῶν αὐτοῦ είναι α καὶ β.

\*Έχομεν εῦρει δτι ή διαγώνιος ἐνὸς δρθιογωνίου ΑΒΓΔ διαιρεῖ αὐτό

εις δύο δρθιγώνια τρίγωνα ίσα, τῶν ὅποιων αἱ πλευραὶ τῆς δρθῆς γωνίας ἔχουν μήκη τὰς διαστάσεις τοῦ δρθιγωνίου. Ἀρα τὸ ἐμβαδὸν τοῦ δρθ. τριγώνου π.χ. ΒΑΔ εἶναι ίσον πρὸς τὸ ἡμίσυ τοῦ ἐμβαδοῦ τοῦ δρθιγωνίου ΑΒΓΔ, τοῦ ὅποιου αἱ διαστάσεις εἶναι ίσαι πρὸς τὰς καθέτους πλευρὰς τοῦ δρθ. τριγώνου. Συνεπῶς  $E = \frac{\alpha \cdot \beta}{2}$

(Διατυπώσατε τὸν σχετικὸν κανόνα).



σχ. 47.

### Ἄσκήσεις

95) Νὰ εύρεθῇ τὸ ἐμβαδὸν ἐνὸς δρθιγωνίου, τοῦ ὅποιου αἱ διαστάσεις εἶναι 13 m καὶ 187 m.

96) Ἐν δρθιγωνίον ἔχει ἐμβαδὸν 36cm<sup>2</sup>. Μία τῶν διαστάσεών του εἶναι 4 cm. Ὑπολογίσατε τὸ μῆκος τῆς ἀλλης διαστάσεως αὐτοῦ.

97) Ποιὸν εἶναι τὸ ἐμβαδὸν ἐνὸς τετραγώνου πλευρᾶς μήκους 6 cm;

98) Ποιὸν εἶναι τὸ μῆκος μιᾶς πλευρᾶς ἐνὸς τετραγώνου, τοῦ ὅποιου τὸ ἐμβαδὸν εἶναι 121 cm<sup>2</sup>;

99) Ποιὸν εἶναι τὸ ἐμβαδὸν ἐνὸς τετραγώνου, τοῦ ὅποιον ἡ περίμετρος εἶναι 124 cm;

100) Ποιὸν εἶναι τὸ ἐμβαδὸν ἐνὸς δρθιγωνίου τριγώνου, τοῦ ὅποιου αἱ δύο κάθετοι πλευραὶ εἶναι 14 cm καὶ 23 cm ;

101) Ἡ περίμετρος ἐνὸς δρθιγωνίου εἶναι 150 cm. Ἐάν ἡ μία τῶν διαστάσεών του εἶναι 25 cm, νὰ εὕρητε τὸ ἐμβαδὸν αὐτοῦ.

102) Νὰ ύπολογισθῇ τὸ ἐμβαδὸν ἐνὸς δρθιγωνίου, δταν γνωρίζωμεν δτι ἡ περίμετρος αὐτοῦ ισοῦται πρὸς 24 cm καὶ ὁ λόγος τῶν διαστάσεών του εἶναι  $\frac{1}{3}$ .

103. Νὰ εύρεθῇ ἡ πλευρὰ τετραγώνου ΑΒΓΔ γνωστοῦ δτι, ἐάν αὐξήσωμεν τὴν ΑΒ κατά 4 m καὶ ἀλαττώσωμεν τὴν ΒΓ κατά 8 m εύρισκομεν ἥγ δρθιγωνίου, τὸ ὅποιον ἔχει ἐμβαδὸν κατά 196 m<sup>2</sup> μικρότερον τοῦ ἐμβαδοῦ τοῦ τετραγώνου.

104) Τὰ  $\frac{3}{4}$  τῆς ἐπιφανείας ἐνὸς ἀγροῦ δρθιγωνίου ἔχουν ἐμβαδὸν 8,112 στρέμματα.

Ποιὸν εἶναι τὸ ἐμβαδὸν τοῦ ἀγροῦ; Ποια εἶναι ἡ μία τῶν διαστάσεών του, ἐάν ἡ ἀλλη εἶναι 169 m;


105) Εἰς ἀγρὸς δρθιγωνίος, τοῦ ὅποιού ἡ μία διάστασις εἶναι 180 m ἡγοράσθη 288000 δρχ. δντι 16000 δρχ. τὸ στρέμμα. Εἰς δρόμος πλάτους 3 m κάμνει τὸν γύρον τοῦ δρθιγωνίου ἀγροῦ κατά μῆκος τῆς περιμέτρου αὐτοῦ καὶ εἰς τὸ ἐσωτερικόν του. Δύο δὲ ἀλλοι δρόμοι τῶν 2 m πλάτους εἶναι χαραγμένοι παραλλήλως πρὸς τοὺς ἄξονας συμμετρίας τοῦ δρθιγωνίου. Οἱ τρεῖς αὐτοὶ δρόμοι διατοῦν τὸν ἀγρὸν εἰς 4 ίσα μέρη. Ὑπολογίσατε τὸ ἐμβαδὸν ἐνὸς τῶν ίσων αὐτῶν μερῶν τοῦ ἀγροῦ.

106) Ἡ περίμετρος ἐνὸς ἀγροῦ σχήματος δρθιγωνίου εἶναι 240 m. Φυτεύομεν κατά μῆκος τῆς περιμέτρου τοῦ ἀγροῦ καὶ εἰς τὸ ἐσωτερικόν αὐτοῦ δένδρα, τὰ ὅποια ἀπέχουν 5 m

μεταξύ των και 5 μ από της περιμέτρου. Τό πλάτος του άγρου είναι  $\frac{3}{5}$  του μήκους του. Υπολογίσατε τόν άριθμόν των δένδρων και τήν έπιφάνειαν του άγρου, ή όποια περιλαμβάνεται μεταξύ των δενδροστοιχιών και των πλευρών του άγρου.

107) Χωρικός άντηλλαξεν άγρον σχήματος τετραγώνου πλευρᾶς 60m, μὲ δλλον άγρον (της αύτης ποιότητος χώματος) σχήματος όρθογωνίου, τοῦ όποιου ή περίμετρος ήτο ίση μὲ τὴν περίμετρον τοῦ πρώτου και τὸ πλάτος του 40m. Ήδικήθη ἡ ἐκέρδισεν ἀπὸ τήν άνταλλαγῆν αὐτὴν δ χωρικός;

108) Κατασκευάσατε ἐν τετράγωνον πλευρᾶς μήκους ἔστω α. Αύξησατε τήν πλευρὰν αὐτοῦ κατὰ τὸ μῆκος β ( $\beta \neq \alpha$ ) εἰς τρόπον ὡστε νὰ σχηματίσητε τὸ τετράγωνον  $AB'Γ'D'$  (σχ. 48). Ή προέκτασις τῆς ΔΓ τέμνει τὴν  $B'Γ'$  εἰς τὸ E καὶ ἡ προέκτασις τῆς  $BΓ$  τὴν  $Γ'D'$  εἰς τὸ Z.



σχ. 48.

Νὰ συγκρίνητε τὸ ἐμβαδὸν τοῦ τέτραγώνου  $AB'Γ'D'$  πρὸς ἕκεῖνον τοῦ ἀρχικοῦ τετραγώνου  $ABΓΔ$ . Ποια είναι ἡ πλευρὰ τοῦ τετραγώνου  $AB'Γ'D'$ ; Ποια είναι ἡ φύσις τῶν τετραπλεύρων  $BB'EΓ$ ,  $ΓEΓ'Z$ ,  $ZD'ΔΓ$ . Ποια είναι αἱ διαστάσεις των; Συμπληρώσατε τὰς τιμὰς τῶν ἐμβαδῶν:

$$(AB'Γ'D') = (\alpha + \beta)^2$$

$$(ABΓΔ) = \dots \quad (BB'EΓ) = \dots$$

$$(ΓEΓ'Z) = \dots \quad (ΔΓΖΔ') = \dots$$

Νὰ εὐρητε τὴν σχέσιν ἡ όποια συνδέει τὰ ἐμβαδὰ αὐτά.

(Παρατηροῦμεν δτι τὸ ἐμβαδὸν τοῦ  $AB'Γ'D'$  εἶναι τὸ ἀθροισμα τῶν ἐμβαδῶν τῶν τεσσάρων δλλων. Αὔτο τὸ ἀποτέλεσμα ἐκφράζεται στοιχείωσις τιμῶν τῶν ἐπιφανειῶν:  $(\alpha + \beta)^2 = \alpha^2 + \beta^2 + 2\alpha\beta$ .

Ο τύπος αὐτὸς δύναται νὰ τεθῇ ὑπὸ τὴν ἀκόλουθον μορφὴν  $(\alpha + \beta)^2 = \alpha^2 + \beta^2 + 2\alpha\beta$ , τὸ όποιον ἐκφράζεται οὕτως: Τὸ τετράγωνον τοῦ ἀθροίσματος δύο ἀριθμῶν εἶναι ίσον πρὸς τὸ ἀθροισμα τῶν τετραγώνων τῶν δύο ἀριθμῶν σύν τὸ διπλάσιον γινόμενον αὐτῶν.


'Εφαρμόζομεν τὸν τύπον αὐτὸν εἰς τὸν ὑπολογισμὸν τοῦ τετραγώνου ἐνὸς διψηφίου ἀριθμοῦ π.χ.  $45^2 = 40^2 + 5^2 + 2 \cdot 40 \cdot 5 = 1600 + 25 + 400 = 2025$

109) Νὰ ἐργασθῆτε καθ' διοιον τρόπον και νὰ δώσητε γεωμετρικὴν ἔρμηνειαν τῶν τύπων:

$$\alpha) (\alpha - \beta)^2 = \alpha^2 + \beta^2 - 2\alpha\beta \text{ και } \beta) (\alpha + \beta)(\alpha - \beta) = \alpha^2 - \beta^2$$

### § 33. Ἐμβαδὸν παραλληλογράμμου.

Παραλληλόγραμμον εἶναι ἐν τετράπλευρον, τὸ όποιον ἔχει τὰς ἀπέναντι πλευρὰς παραλλήλους.




σχ. 49.

$ABΓΔ$  παραλληλόγραμμον  $\leftrightarrow$   $\left\{ \begin{array}{l} AB // ΓΔ \\ AD // BG \end{array} \right.$

Βάσις ἐνὸς παραλληλογράμμου λέγεται μία τυχοῦσα πλευρὰ αὐτοῦ.

"**Υψος παραλληλογράμμου είναι τὸ μεταξύ δύο ἀπέναντι βάσεων περιεχόμενον τμῆμα τῆς πρὸς αὐτὰς καθέτου.**



σχ. 50.

*Κατασκευάστε παραλληλόγραμμὸν  $ABΓΔ$ , χαράξατε τὰ ὅψη  $AE$  καὶ  $BZ$  αὐτοῦ καὶ συγκρίνατε τὸ ἐμβαδὸν τοῦ πρὸς τὸ ἐμβαδὸν τοῦ δροθυγανὸν  $AEZB$ . Τί παρατηρεῖτε;*

Τὰ ὄρθιγώνα τρίγωνα  $ADE$  καὶ  $BGZ$  είναι ἵσα, ἐπειδὴ ἔχουν τὰς ὑποτεινούσας των ἵσας ( $AD = BG$ ) καὶ ἀνὰ μίαν πλευράν τῆς ὁρθῆς γωνίας ἵσην ( $AE = BZ$ )

(διατὶ;). "Αρα τὰ τρίγωνα ταῦτα εἶναι ἴσεμβαδικά. Συνεπῶς ( $ADE$ ) = ( $BGZ$ ). (1) Τὰ ἴσεμβαδικά σχήματα ἔχουν ἵσας τιμὰς ἐμβαδῶν § 20.

'Επομένως, ὅπως φαίνεται ἐκ τοῦ σχήματος (50) ἔχομεν:  $(ABΓΔ) = (ABΓE) + (ADE)$  καὶ λόγω τῆς (1)  $(ABΓΔ) = (ABΓE) + (BGZ)$  ἀρα  $(ABΓΔ) = (AEZB)$  μετεσχηματίσαμεν τὸ παραλληλογράμμον  $ABΓΔ$  εἰς ἴσεμβαδικὸν ὄρθιγώνιον  $AEZB$ . 'Αλλ' ὡς εἶναι ἡδη γνωστὸν  $E_{AEZB} = AE \cdot EZ$ . Ἐπειδὴ δὲ  $ΔΓ = AB = EZ = \beta$ ,  $AE = BZ = u$  καὶ  $E_{ABΓΔ} = E_{AEZB}$  ἔχομεν  $E_{ABΓΔ} = \beta \cdot u$  ἢτοι

$$E = \beta \cdot u \quad (2)$$

Τὸ ἐμβαδὸν ἐνὸς παραλληλογράμμου είναι ἵσον πρὸς τὸ γινόμενον τοῦ μήκους τῆς βάσεως του ἐπὶ τὸ μῆκος τοῦ ὕψους, τοῦ ἀντίστοιχοῦντος εἰς αὐτήν. (τὰ μήκη ἐκφράζονται μὲ τὴν αὐτήν μονάδα).




### Παρατηρήσεις

1) Πρωφανῶς δυνάμεθα νὰ χρησιμοποιήσωμεν ὡς βάσιν ὅποιανδήποτε πλευράν τοῦ παραλληλογράμμου ἀρκεῖ νὰ λάβωμεν καὶ τὸ ἀντίστοιχοῦν πρὸς αὐτήν ὕψος. 'Εὰν  $\beta'$  εἴναι τὸ μῆκος τῆς ἀλλῆς πλευρᾶς καὶ  $u'$  τὸ ἀντίστοιχον πρὸς αὐτήν ὕψος ἔχομεν  $E = \beta \cdot u = \beta' \cdot u'$ .

2. 'Εννοεῖται ὅτι τὸ μῆκος τῆς βάσεως καὶ τὸ μῆκος τοῦ ὕψους τοῦ παραλληλογράμμου ἐκφράζονται μὲ τὴν αὐτήν μονάδα μήκους.

$$3. 'Εκ τῆς (2) ἔχομεν \beta = \frac{E}{u} \text{ καὶ } u = \frac{E}{\beta}$$

Σημείωσις: Δυνάμεθα ἐποπτικῶς δι' ἐνὸς ἐκ χαρτονίου παραλληλογράμμου καὶ διὸ



σχ. 51.

διπλώσεως και άναδιπλώσεως τῶν ἵσων ὀρθογωνίων τριγώνων, ὡς τοῦτο γίνεται φανερόν ἐκ τῶν παρατιθέμενων σχημάτων, νὰ θωμεν τὸν μετασχηματισμὸν τοῦ παραλληλογράμμου εἰς ίσεμβαδικὸν ὀρθογώνιον.

### Α σ κή σ εις


110) "Εν παραλληλόγραμμον ἔχει μίαν πλευρὰν 48 cm και ἀντίστοιχον εἰς αὐτὴν ὑψος 3dm. Νὰ εὗρητε τὸ ἐμβαδὸν αὐτοῦ.

111) "Εν παραλληλόγραμμον ἔχει ἐμβαδὸν 72 cm<sup>2</sup> και ὑψος 1,2 dm. Πόση είναι ἡ βάσις του;

112) "Εν παραλληλόγραμμον ἔχει βάσιν 96 cm και ὑψος ἴσου πρὸς τὸ  $\frac{1}{4}$  τῆς βάσεως αὐτοῦ. Νὰ εὔρεθῇ τὸ ἐμβαδὸν του εἰς dm<sup>2</sup>.

### § 34. Ἐμβαδὸν τριγώνου.

Κατασκευάσατε τρίγωνον ΑΒΓ. Νὰ εὕρητε τὸ ἐμβαδὸν αὐτοῦ ἐκ τῆς βάσεως του ΒΓ και τοῦ ὕψους αὐτοῦ ΑΕ.



Εἶναι γνωστὸν ὅτι βάσις ἐνὸς τριγώνου λέγεται μία ὁποιαδήποτε πλευρά αὐτοῦ. Π.χ. ἡ ΒΓ εἶναι βάσις. Ἀντίστοιχον αὐτῆς ὑψος εἶναι τὸ ΑΕ.

Χαράσσομεν ἀπὸ τὰς κορυφὰς Α και Γ τὰς παραλήλους ΑΔ και ΓΔ ἀντίστοιχως πρὸς τὰς ΒΓ και ΑΒ,

ὅτε τὸ σχηματιζόμενον τετράπλευρον ΑΒΓΔ εἶναι παραλληλόγραμμον, τοῦ δποίου ἡ βάσις εἶναι ἡ ΒΓ και ὑψος τὸ ΑΕ.

"Εχομεν μάθει ὅτι κάθε διαγώνιος παραλληλογράμμου διαιρεῖ αὐτὸν εἰς δύο ἵσα τρίγωνα. 'Επομένως ἡ ΑΓ διαιρεῖ τὸ ΑΒΓΔ εἰς δύο τρίγωνα ΑΒΓ και ΑΓΔ ίσεμβαδικά συνεπῶς  $(AB\Gamma) = (AG\Delta)$ .

"Αρα τὸ ἐμβαδὸν ἐκάστου τριγώνου εἶναι ἵσον πρὸς τὸ ἡμισυ τοῦ παραληλογράμμου. 'Επομένως εἶναι :

$$(AB\Gamma) = \frac{1}{2} (AB\Gamma\Delta) = \frac{1}{2} \cdot (BG) \cdot (AE) \text{ και } \text{ἐὰν } \text{τὸ } \text{μῆκος } \text{τῆς } \text{βάσεως } BG$$

εἶναι α και τὸ μῆκος τοῦ ὕψους AE εἶναι υ, ἔχομεν :

$$E = \frac{\alpha \cdot \upsilon}{2}$$

Τὸ ἐμβαδὸν ἐνὸς τριγώνου εἶναι ἵσον πρὸς τὸ ἡμιγινόμενον τοῦ μήκους τῆς βάσεως του ἐπὶ τὸ μῆκος τοῦ ὕψους αὐτοῦ.

## Παρατηρήσεις.

1) Είναι προφανές ότι τὸ αύτὸ ἐμβαδὸν εὐρίσκομεν, ἐάν λάβωμεν βάσιν ἄλλην πλευρὰν τοῦ τριγώνου καὶ ὡς ὑψος τὸ ἀντιστοιχοῦ εἰς τὴν πλευρὰν ταύτην ὑψος. Ἐπομένως :

$$\frac{\alpha \cdot u_1}{2} = \frac{\beta \cdot u_2}{2} = \frac{\gamma \cdot u_3}{2} = E$$

2) Δύο τρίγωνα μὲ ἵσας βάσεις καὶ ἵσα ὑψη εἰναι ἰσεμβαδικά.

3) Δύο τρίγωνα μὲ ἵσας βάσεις ἔχουν ἐμβαδά ἀνάλογα τῶν ἀντιστοιχων ὑψῶν αὐτῶν (διατί!)

4) Τὶ συμπεραίνετε διὰ τὰ ἐμβαδά δύο τριγώνων, τὰ δόποια ἔχουν ἵσα ὑψη;

## Ασκήσεις

113) "Εν τρίγωνον ἔχει βάσιν 62 cm καὶ ὑψος ἵσον πρὸς τὸ ἡμισυ τῆς βάσεώς του. Νὰ εὔρεθῇ τὸ ἐμβαδὸν αὐτοῦ.

114) Πόσον είναι τὸ ὑψος ἐνὸς τριγώνου ἐμβαδοῦ 5m<sup>2</sup> ἐάν ἡ ἀντιστοιχος εἰς τὸ ὑψος τοῦτο πλευρά, ἔχει μῆκος 20 dm.

115) Αἱ πλευραὶ ἐνὸς παραλληλογράμμου ἔχουν μῆκη 24 cm καὶ 27 cm. Τὸ ὑψος τὸ ἀντιστοιχοῦν εἰς τὴν πρώτην πλευρὰν ἔχει μῆκος 18 cm. Νὰ ὑπολογισθῇ τὸ ὑψος, τὸ δόποιον ἀντιστοιχεῖ εἰς τὴν δλῆην πλευράν.

116) "Ἐνὸς κήπου σχήματος παραλληλογράμμου ἡ περιμέτρος είναι 186 m καὶ ἡ μία πλευρά του 24 m, ἡ δὲ ἀπόστασις μεταξὺ τῶν μεγαλυτέρων πλευρῶν αὐτοῦ είναι 19 m. Νὰ εὔρεθῇ τὸ ἐμβαδὸν τοῦ κήπου.

117) Παραλληλογράμμον είναι ἰσεμβαδικὸν πρὸς τετράγωνον πλευρᾶς 16 cm. Ἐάν ἡ βάσις τοῦ παραλληλογράμμου είναι 3,2 dm, νὰ εὔρεθῇ τὸ ἀντιστοιχον ταύτης ὑψος.

118) "Εν τρίγωνον καὶ ἐν ὅρθιογώνιον ἔχουν μίαν πλευρὰν κοινὴν καὶ ἵσα ἐμβαδά. Ποια σχέσις συνδέει τὸ ὑψος τοῦ τριγώνου, τὸ δόποιον ἀντιστοιχεῖ εἰς τὴν κοινὴν πλευρὰν μὲ τὴν πλευρὰν τοῦ ὅρθιογώνιου τὴν κάθετον ἐπὶ τὴν κοινὴν πλευράν;


119) "Εν τρίγωνον ἔχει ἐμβαδὸν 27cm<sup>2</sup>. "Εν τῶν ὑψῶν του είναι τὰ  $\frac{2}{3}$  τῆς πλευρᾶς, ἡ δοπία ἀντιστοιχεῖ εἰς αὐτό. Νὰ ὑπολογισθῇ τὸ ὑψος; καὶ ἡ πλευρὰ τοῦ τριγώνου.

120) Δίδεται ἐν τρίγωνον ABΓ ὅρθιογώνιον καὶ ἰσοσκελές. Αἱ ἵσαι πλευραὶ του AB καὶ AG ἔχουν μῆκος 8 cm ἐκάστη. Ὑπολογισθῆται τὸ ἐμβαδὸν τοῦ τριγώνου ABΓ. Πῶς ὑπολογίζεται γενικῶς τὸ ἐμβαδὸν ἐνὸς ὅρθιογώνιου καὶ ἰσοσκελοῦς τριγώνου;

121) Τὸ ἐμβαδὸν ἐνὸς ὅρθιογώνιου καὶ ἰσοσκελοῦς τριγώνου ABΓ ( $\widehat{A}=1$  ὥρθ.) είναι 50m<sup>2</sup>. Νὰ εὔρεθῇ τὸ μῆκος τῶν ἵσων πλευρῶν AB καὶ AG αὐτοῦ.

122) Εἰς ὅρθιογώνιον τρίγωνον ABΓ ( $\widehat{A}=1$  ὥρθ.) μὲ AB=γ, AG=β καὶ BG=α φέρατε τὸ ὑψος AD=υ καὶ συγκρίνατε τὰ γινόμενα βγ καὶ αυ. Τὶ παρατηρεῖτε;

123) Κατασκευάσατε τρίγωνον ABΓ. Ὁρίσατε τὸ μέσον E τῆς AG καὶ ἐκ τῶν E καὶ B χα-




σχ. 53.

χαράξατε παραλλήλους πρός τάς  $\Gamma B$  και  $\Gamma A$  άντιστοίχως. Αύται τέμνονται εἰς τὸ Ζ. Συγκρίνατε τὸ ἐμβαδὸν τοῦ σχηματιζόμενου παραλληλογράμμου  $E\Gamma BZ$  πρὸς τὸ ἐμβαδὸν τοῦ τριγώνου  $A\Gamma B$ . (Σχ. 53)

124) Χαράξατε κυρτὸν τετράπλευρον  $AB\Gamma\Delta$  καὶ ἔκ τῶν κορυφῶν αὐτοῦ νὰ φέρητε παραλλήλους πρὸς τάς πλευράς του. Σχηματίζεται τότε δεύτερον τρίγωνον  $\Delta EZ$ . Νὰ συγκρίνητε τὰ ἐμβαδὰ τῶν δύο τριγώνων  $AB\Gamma$  καὶ  $\Delta EZ$  (Σχ. 54).


**Σημ.** Εἰς τὰς ἀσκήσεις 123, 124, καὶ 125, γίνεται μετασχηματισμός εὐθ. σχημάτων εἰς δλλο. Ισοδύναμα διὰ χαράξεως καταλλήλων γραμμῶν.



σχ. 54

### § 35. Ἐμβαδὸν τραπεζίου.

Τραπέζιον εἶναι ἐν κυρτὸν τετράπλευρον, τὸ ὅποιον ἔχει δύο μόνον παραλλήλους πλευράς.




σχ. 55.


Τραπέζιον  $AB\Gamma\Delta$   $\leftrightarrow$  {  $AB\Gamma\Delta$  κυρτὸν μόνον  $AB // \Gamma\Delta$

Αἱ παράλληλοι πλευραὶ τοῦ τραπεζίου λέγονται βάσεις αὐτοῦ. "Ψύσος τοῦ τραπεζίου εἶναι τὸ μεταξὺ τῶν βάσεων κάθετον πρὸς αὐτὰς εὐθύγραμμον τμῆμα. Διάμεσος τραπεζίου λέγεται τὸ εὐθ. τμῆμα, τὸ ὅποιον συνδέει τὰ μέσα τῶν μὴ παραλλήλων πλευρῶν αὐτοῦ. (Σχ. 55β)

Ίσοσκελὲς τραπέζιον εἶναι τὸ τραπέζιον, τοῦ ὅποιου αἱ μὴ παραλλήλοι πλευραὶ εἶναι ἴσαι (Σχ. 56).



σχ. 55β.




σχ. 56.

Όρθογώνιον τραπέζιον είναι τὸ τραπέζιον, τὸ ὅποιον ἔχει μίαν πλευράν κάθετον πρὸς τὰς βάσεις (Σχ. 57).

Ζητοῦμεν νὰ εῦρωμεν τὸ ἐμβαδὸν τοῦ τραπεζίου ΑΒΓΔ.

Τὸ τυχόν τραπέζιον ΑΒΓΔ (σχ. 58) ἔχει βάσεις  $AB = \beta_1$ ,  $\Delta\Gamma = \beta_2$  καὶ ὕψος  $\Delta E = u$ . "Εστω I τὸ μέσον τῆς μὴ παραλήλου πλευρᾶς  $B\Gamma$ . Κατασκευάζομεν τὸ συμμετρικὸν τοῦ  $AB\Gamma\Delta$  ὡς πρὸς κέντρον συμμετρίας τὸ I. Τὸ συμμετρικὸν τοῦ τραπεζίου  $AB\Gamma\Delta$  είναι ἐν τραπέζιον  $A'\Gamma B\Delta'$  ἵσον πρὸς τὸ  $AB\Gamma\Delta$ . Τὸ ἀθροισμα τῶν ἐπιφάνειῶν αὐτῶν δύο συμμετρικῶν τραπεζίων είναι ἡ ἐπιφάνεια τοῦ παραληλογράμμου  $A\Delta'A\Delta'$ . ( $\Delta A' // \Delta A$ ,  $\Delta A // \Delta'A$  ὡς συμμετρικά πρὸς κέντρον συμμετρίας τὸ I). Τὸ ἐμβαδὸν ἐκάστου τῶν τραπεζίων  $AB\Gamma\Delta$  καὶ  $A'\Gamma B\Delta'$  είναι τὸ ἥμισυ τοῦ ἐμβαδοῦ τοῦ παραληλογράμμου  $A\Delta'A\Delta$ , ἢτοι  $E_{AB\Gamma\Delta} =$

σχ. 57.



σχ. 58.

"Επειδὴ δὲ τὸ παραληλόγραμμον αὐτὸ ἔχει βάσιν τὴν  $A\Delta' = \beta_1 + \beta_2$  καὶ ὕψος  $u$ , τὸ ἐμβαδὸν τοῦ τραπεζίου δίδεται ὑπὸ τοῦ τύπου :

$$E = \frac{\beta_1 + \beta_2}{2} \cdot u \quad (1)$$


Τὸ ἐμβαδὸν τοῦ τραπεζίου είναι ἵσον πρὸς τὸ ἥμισυ τοῦ γινομένου τοῦ ἀθροισματος τῶν μηκῶν τῶν βάσεών του ἐπὶ τὸ μῆκος τοῦ ὕψους αὐτοῦ.

"Ἐκ τοῦ τύπου (1) ἔχομεν :  $E = \frac{\beta_1 + \beta_2}{2} \cdot u \iff 2E = (\beta_1 + \beta_2) \cdot u \iff \beta_1 + \beta_2 =$

$$= \frac{2E}{u} \iff \beta_1 = \frac{2E}{u} - \beta_2. \quad \text{'Ἐπίστης ἔχομεν τὸν τύπον } u = \frac{2E}{\beta_1 + \beta_2}.$$

### Παρατήρησις :

"Η διάμεσος IM τοῦ τραπεζίου τέμνει τὴν  $A'\Delta'$  εἰς τὸ μέσον της  $M'$  (λόγῳ τῆς συμμετρίας) τότε  $MM' = A\Delta' = \beta_1 + \beta_2$ . "Αλλὰ ἔνεκα τῆς συμμετρίας τὸ I



είναι μέσον του  $MM'$ , έπομένως  $2.MI = \beta_1 + \beta_2$  και  $MI = \frac{\beta_1 + \beta_2}{2}$ . Άρα δ τύπος  
(1) γράφεται και  $E = \mu.u$ , εάν μ τὸ μῆκος τῆς  $MI$ .

### Άσκησεις

126) Ένδος τραπεζίου τά μήκη τῶν βάσεων είναι  $\beta_1 = 8$  cm. και  $\beta_2 = 6$  cm. και τὸ μῆκος τοῦ ύψους  $u = 7$  cm. Νὰ εύρητε τὸ ἐμβαδὸν αὐτοῦ.

127) Τὸ ἐμβαδὸν ἐνὸς τραπεζίου είναι 63 cm<sup>2</sup>. Τὸ ύψος είναι 6 cm. και ἡ μία τῶν βάσεων είναι 14 cm. Νὰ υπολογίσητε τὴν ἄλλην βάσιν.

128) Τὸ ἐμβαδὸν ἐνὸς στροῦ σχήματος τραπεζίου είναι 3 στρέμ. και αἱ βάσεις του ἔχουν μήκη 180 m και 120 m. Ποιὸν είναι τὸ ύψος αὐτοῦ;

129) Τὸ ἐμβαδὸν ἐνὸς τραπεζίου είναι 30 dm<sup>2</sup> και τὸ ύψος του είναι 50 cm. Υπολογίσατε τὰς βάσεις αὐτοῦ, δταν γνωρίζετε δτι ἡ μία βάσις είναι διπλασία τῆς ἄλλης.


130) Νὰ υπολογίσητε τὰς βάσεις ἐνὸς τραπεζίου, τὸ ὅποιον ἔχει ἐμβαδὸν 252 m<sup>2</sup> και ύψος 24 m δταν γνωρίζετε δτι ἡ διαφορὰ τῶν μηκῶν τῶν βάσεων του είναι 5 m.

131) Εἰς στροῦ ἔχει σχῆμα ὀρθογωνίου τραπεζίου. Αἱ βάσεις του είναι 120 m και 144 m

Θέλομεν νὰ διατρέσωμεν αὐτὸν εἰς δύο μέρη ίσεμβαδικά διὰ μιᾶς καθέτου ἐπὶ τὰς βάσεις. Εἰς ποιὰν ἀπόστασιν ἀπὸ τὰς κορυφὰς τῶν ὀρθῶν γωνιῶν τοῦ τραπεζίου ἡ κάθετος αὐτὴ θὰ τέμνῃ τὰς βάσεις του;

Υπόδειξις : Τὸ ἐμβαδὸν τοῦ στροῦ σχήματος ὀρθογ. τραπεζίου είναι  $\frac{1}{2} \cdot (120m + 144m) \cdot u$ . Σοιν πρὸς τὸ ήμισυ τοῦ ἐμβαδοῦ ἔνος ὀρθογωνίου, τὸ ὅποιον ἔχει διαστάσεις τὸ ἀθροισμα τῶν βάσεων τοῦ τραπεζίου ( $120m + 144m = 264m$ ) και τὸ ύψος αὐτοῦ  $u$  ἡ είναι ίσον πρὸς τὸ ἐμβαδὸν ἐνὸς ὀρθογωνίου, τὸ ὅποιον ἔχει διαστάσεις  $\frac{264}{2} = 132m$  και  $u.m$ . Ἡ κάθετος εἰς

τὰς δύο βάσεις χωρίζει τὸ τραπέζιον εἰς ἓν ὀρθογωνίον και εἰς ἓν ὀρθογωνίον τραπεζίου (τὸ ύψος  $u$  τοῦ τραπεζίου είναι ἡ μία διάστασις τοῦ ὀρθογωνίου). Έπειδὴ αἱ δύο αὐταὶ ἐπιφάνειαι ἔχουσιν ίσα ἐμβαδά, πρέπει ἐκάστη νὰ ἔχῃ ἐμβαδὸν τὸ ήμισυ τοῦ εὐρεθέντος ἐμβαδοῦ τοῦ διθέντος τραπεζίου, ήτοι τὸ ήμισυ τοῦ ὀρθογωνίου, τὸ ὅποιον ἔχει διαστάσεις 132 m και  $u.m$  δηλαδὴ τὸ ἐμβαδὸν ἐνὸς ὀρθογωνίου μὲ διαστάσεις  $\frac{132}{2} m = 66 m$  και  $u.m$ .



σχ. 59.


Τώρα καθίσταται πλέον εύκολος ὁ υπολογισμὸς τῆς ἀπόστασεως τῆς καθέτου ἐπὶ τὰς βάσεις τοῦ διθέντος τραπεζίου ἀπὸ τὰς κορυφὰς τῶν ὀρθῶν γωνιῶν αὐτοῦ, τὴν ὅποιαν ἔχετε νὰ υπολογίσητε.

### § 36. Ἐμβαδὸν πολυγώνου


Ἐάν λάβωμεν ἐπὶ ἑνὸς ἐπιπέδου τὰ σημεῖα A, B, Γ, Δ, E, Z μὲ τὴν σειρὰν μὲ τὴν δποίαν ἀναφέρονται καὶ χαράξωμεν τὰ εὐθύγραμμα τμήματα AB, BG, ΓΔ, ΔE, EZ. καὶ ZA ἡ πολυγωνικὴ γραμμὴ ΑΒΓΔΕΖΑ λέγεται πολύγωνος ΑΒΓΔΕΖ.

Λέγομεν δτι ἔν πολύγωνον είναι κυρτὸν (Σχ. 60) δταν τοῦτο εύρισκεται δλόκληρον εις τὸ ἔνα τῶν ἡμιεπιπέδων τῶν δριζομένων ὑπὸ τοῦ φορέως ἐκάστης πλευρᾶς αὐτοῦ. Μή κυρτὸν (σχ. 61) είναι εις πᾶσαν ἄλλην περίπτωσιν. Διαφώνιος πολυγώνου λέγεται τὸ εὐθύγραμμον τμῆμα, τὸ δποτον ἐνώ ψει δύο μή διαδοχικάς κορυφάς αὐτοῦ.

*Zητοῦμεν νὰ εῦρομεν τὸ ἐμβαδὸν ἐνὸς κυρτοῦ πολυγώνου.*



ex. 60.




σχ. 61.

Δυνάμεθα νὰ εὑρωμεν τὸ ἐμβαδὸν αὐτοῦ χρησιμοποιοῦντες τὰς κάτωθι μεθόδους :

#### A. Τὸν προσθετικὸν μέθοδον :

α) Διαιρεσις κυρτοῦ πολυγώνου εἰς τρίγωνα.




σχ. 62.

"Εστω ἐν κυρτὸν πολύγωνον ΑΒΓΔΕΖ. Χαράσσομεν τὰς διαγωνίους αὐτοῦ ΑΓ, ΑΔ, ΑΕ, αἱ δύποιαι διέρχονται διὰ τῆς κορυφῆς Α καὶ διαιροῦμεν τὸ πολύγωνον εἰς 4 τρίγωνα τὰ ΑΒΓ, ΑΓΔ, ΑΔΕ, ΑΕΖ. (Σχ. 62). "Έχομεν :

$$(AB\Gamma\Delta EZ) = (AB\Gamma) + (A\Gamma\Delta) + (A\Delta E) + (AEZ)$$

"Αρα: Τὸ ἐμβαδὸν τοῦ πολυγώνου εἶναι ἵσον πρὸς τὸ ἀθροισμα τῶν ἐμβαδῶν τῶν τριγώνων, εἰς τὰ ὅποια διαιρεῖται.

β) Άναλυσις τοῦ πολυγώνου εἰς κυρτὰ τραπέζια, δρθιογώνια καὶ δρθιογώνια τρίγωνα :




σχ. 63.

Χαράσσομεν τὴν μεγαλυτέραν διαγώνιον, τὴν ΑΔ καὶ ἀπὸ τὰς ἄλλας κορυφὰς ἄγομεν τὰς καθέτους πρὸς αὐτήν. Διαιροῦμεν οὕτω τὸ πολύγωνον, εἰς δρθιογώνια τραπέζια καὶ δρθιογώνια τρίγωνα (Σχ. 63) καὶ ἔχομεν :


$$\begin{aligned} E_{AB\Gamma\Delta E} = & E_{A\theta\theta} + E_{\theta\theta\Gamma} + E_{\Gamma\alpha\alpha} + \\ & + E_{\alpha\epsilon\kappa} + E_{\kappa\epsilon\zeta} + E_{\zeta\alpha\alpha} \end{aligned}$$

B. Τὴν μέθοδον τῆς διαφορᾶς τῶν ἐμβαδῶν :

Χαράσσομεν δρθιογώνιον ΙΚΛΜ διερχόμενον δι' ὅσων τὸ δυνατὸν περισσοτέρων κορυφῶν τοῦ πολυγώνου.



σχ. 64.



σχ. 65.

Τὸ ἐμβαδὸν τοῦ πολυγώνου ΑΒΓΔΕ εἶναι ἵσον πρὸς τὸ ἐμβαδὸν τοῦ δρθιογώνιου ΙΚΛΜ ἡλαττωμένον κατὰ τὰ ἐμβαδὰ τῶν δρθιογωνίων τριγώνων ἢ δρθ. τραπεζίων, τὰ δόποια ἐσχηματίσθησαν (σχ. 64).

"Ητοι :  $E_{AB\Gamma\Delta E} = E_{\text{ΙΚΛΜ}} - E_{\text{ΑΚΒ}} - E_{\text{ΒΑΓ}} - E_{\text{ΓΗΛ}} - E_{\text{ΔΖΕ}} - E_{\text{ΕΙΑ}}$

### § 37. Ἐφαρμογαὶ

1. Κατασκευάστε τετράπλευρον ΑΒΓΔ (σχ. 65) μὲ διαγωνίους καθέτους καὶ χαράξατε ἐκ τῶν κορυφῶν αὐτοῦ παραλλήλους πρὸς τὰς διαγωνίους του. Σχηματίζεται τότε τὸ δρθιογώνιον Α'Β'Γ'Δ' μὲ διαστάσεις ἵσας πρὸς τὰς διαγωνίους τοῦ τετραπλεύρου. 'Επομένως  $(\text{Α}'\text{Β}'\text{Γ}'\text{Δ}') = (\text{ΑΓ})(\text{ΒΔ})$ .

Τὸ δρθιογώνιον Α'Β'Γ'Δ' εἶναι ἀθροισμα τῶν δρθιογωνίων ΑΑ'ΒΟ, ΒΒ'ΓΟ, ΓΓ'ΔΟ, ΟΔΔ'Α ἕκαστον τῶν δόποιων εἶναι ἀντιστοίχως διπλάσιον τῶν δρθιογωνίων τριγώνων ΒΟΑ, ΒΓΟ, ΓΔΟ, ΑΟΔ, τὰ δόποια ἔχουν ἀθροισμα τὸ τετρά-

πλευρών ΑΒΓΔ. Συνεπώς τὸ ἐμβαδὸν τοῦ ΑΒΓΔ εἶναι τὸ ἡμισυ τοῦ ἐμβαδοῦ τοῦ δρθογωνίου Α'Β'Γ'Δ'.


"Αρα: Τὸ ἐμβαδὸν ἐνὸς τετραπλεύρου μὲ διαγωνίους καθέτους, εἶναι  $E = \frac{\delta_1 \cdot \delta_2}{2}$  λίσον πρὸς τὸ ἡμιγινόμενον τῶν μηκῶν τῶν διαγωνίων του.

( $\delta_1, \delta_2$  εἶναι τὰ μήκη τῶν ΑΓ, ΒΔ σχ. 65).

## 2. Ἐμβαδὸν ρόμβου :


"Επειδὴ, ὡς γνωρίζομεν, αἱ διαγώνιοι τοῦ ρόμβου τέμνονται καθέτως (σχ. 66) τὸ ἐμβαδὸν αὐτοῦ λίσοῦται καὶ πρὸς τὸ ἡμιγινόμενον τῶν μηκῶν τῶν διαγωνίων του.

"Ητοι:  $E = \frac{\delta_1 \cdot \delta_2}{2}$  ( $\delta_1, \delta_2$  τὰ μήκη τῶν διαγωνίων τοῦ ρόμβου).



σχ. 66.

3. Ἐμβαδὸν κανονικοῦ πολυγώνου: Λίδεται ἐν κανονικὸν πολύγωνον ἐγγεγραμμένον εἰς κύκλον (π.χ. εἰς τὴν προκειμένην περίπτωσιν ἐν κανονικὸν ἔξαγωνον) καὶ ζητεῖται νὰ ενδεθῇ τὸ ἐμβαδόν του. (Σχ. 67).




σχ. 67.

Περιμέτρον ἐνὸς εὐθ. σχήματος ὀνομάσαμεν τὸ ἀθροισμα τῶν πλευρῶν του. Ἐπειδὴ εἰς τὰ κανονικὰ πολύγωνα αἱ πλευραὶ τῶν εἶναι ὀλαι ἵσαι, ἢ περιμέτρος π.χ. τοῦ ἀνωτέρω ἔξαγώνου θὰ εἶναι  $6 \cdot \lambda_8$  καὶ γενικῶς ἢ περιμέτρος ἐνὸς κανονικοῦ n - πλεύρου εἶναι  $n \cdot \lambda_v$ . Ἐάν χαράξωμεν τὰς ἀκτίνας τοῦ ἀνωτέρω κανονικοῦ πολυγώνου (σχῆμα 67), τοῦτο διαιρεῖται εἰς 6 ἵσα τρίγωνα. Ἀρα

τὸ ἐμβαδόν του εἶναι  $E = 6 \cdot E'$  (ὅπου  $E'$  τὸ ἐμβαδὸν ἐνὸς τῶν λίσων τριγώνων). Συνεπῶς  $E = 6 \cdot \frac{1}{2} \cdot \lambda_8 \cdot \alpha_8 = \frac{1}{2} \cdot (6\lambda_8) \cdot \alpha_8$  δηλαδὴ  $E = \frac{1}{2} \times$  μῆκος περιμέτρου  $\times$  μῆκος ἀποστήματος. Καὶ γενικῶς δι' ἐν κανονικὸν n - πλεύρον  $E = \frac{1}{2} \cdot (n \cdot \lambda_v) \cdot \alpha_v$

Τὸ ἐμβαδὸν ἐνὸς κανονικοῦ κυρτοῦ πολυγώνου λίσοῦται πρὸς τὸ ἡμισυ τοῦ γινομένου τοῦ μήκους τῆς περιμέτρου του ἐπὶ τὸ μῆκος τοῦ ἀποστήματος αὐτοῦ.

παράδειγμα για την εφαρμογή της αρχής της ΑΠΘΑ που διαλέγεται



σχ. 68.

### Α σκήνη σε ένας

132) "Εν πολύγωνον ΑΒΓΔΕ έχει τὴν διαγώνιον ΑΔ= 148 m. Αἱ κάθετοι ΓΖ, ΕΗ καὶ ΒΘ εἰναι ἀντιστοίχως 43m, 45m καὶ 52 m (σχῆμα 68)." Εάν  $\Delta Z = 18m$ ,  $\Theta A = 38m$  καὶ  $\Delta H = 70m$ . Νὰ υπολογίσητε τὸ ἐμβαδὸν αὐτοῦ.

133). Εἰς ρόμβος έχει διαγωνίους 12 cm καὶ 9 cm. Νὰ εύρεθῇ τὸ ἐμβαδὸν αὐτοῦ.

134) "Εάν τὸ ἐμβαδὸν ἐνὸς ρόμβου εἴναι 42 cm<sup>2</sup> καὶ τὴ διαγώνιος του 12 cm, νὰ εύρεθῇ ἡ ἄλλη διαγώνιος.

135) Νὰ εύρεθῇ τὸ ἐμβαδὸν τετραπλεύρου μὲ διαγωνίους καθέτους, δταν τὰ μῆκη τῶν διαγωνίων αὐτῶν εἴναι 14 cm καὶ 27 cm.

136) "Η περίμετρος ἐνὸς ρόμβου εἴναι 144 cm, ἡ δὲ ἀπόστασις δύο παραλλήλων πλευρῶν αὐτοῦ 28 cm. Νὰ εύρητε τὸ ἐμβαδὸν αὐτοῦ.

137) "Ἐκάστη διαγώνιος ἐνὸς τετραγώνου έχει μῆκος 10 cm. Νὰ εύρεθῇ τὸ ἐμβαδὸν αὐτοῦ.


138) Χαράξατε δύο κάθετα εὐθύγραμμα τμήματα ΑΓ καὶ ΒΔ, ἔκαστον τῶν δποίων έχει μῆκος 12 cm. Αὐτὰ τέμνονται εἰς ἐν σημείον I, τὸ δποίον ἀπέχει 5 cm ἀπὸ τοῦ A καὶ 4 cm ἀπὸ τοῦ B. Κατασκευάσατε τὸ τετράπλευρον ΑΒΓΔ καὶ υπολογίσατε τὸ ἐμβαδὸν αὐτοῦ.

139) "Εστω ἐν οἰκόπεδον, τοῦ δποίου τὸ σχῆμα εἴναι τὸ εἰκονιζόμενον παραπλεύρως ΑΒΓΔ (γωνία  $\widehat{A}=1$  δρθῆ). Νὰ εύρεθῇ τὸ ἐμβαδὸν αὐτοῦ. (σχ. 69)

140) Χαράξατε τετράπλευρον ΑΒΓΔ καὶ φέρατε ἐκ τοῦ A παραλληλον πρὸς τὴν διαγώνιον ΒΔ αὐτοῦ. "Η παραλληλος αὗτη τέμνει τὴν εὐθεῖαν ΓΒ εἰς τὸ E. Συγκρίνατε τὸ ἐμβαδὸν τοῦ τετραπλεύρου πρὸς τὸ ἐμβαδὸν τοῦ τριγώνου ΔΕΓ.


### B. ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΝ ΘΕΩΡΗΜΑ

§38. Κατασκευάσατε ἐν δρθογώνιον τρίγωνον  $ABG$  μὲ καθέτους πλευρὰς  $AG=4$  μονάδ. μήκους καὶ  $AB=3$  μονάδ. μήκους. Μετρήσατε τὴν ὑποτείνουσαν αὐτοῦ. "Ἐγ συνεχέιται μὲ πλευράς, τὰς πλευρὰς τοῦ τριγώνου κατασκευάσατε τετράγωνα καὶ συγκρίνατε τὸ ἐμβαδὸν τοῦ τετραγώνου τῆς ὑποτείνουσῆς πρὸς τὸ ἀδροίσμα τῶν ἐμβαδῶν τῶν τετραγώνων τῶν καθέτων πλευρῶν του. Τὶ παρατηρεῖτε;



σχ. 70.

Διαπιστοῦμεν, διὰ μετρήσεως, ἀφ' ἐνὸς δτι ἡ ὑποτείνουσα  $BG$  ίσοῦται πρὸς 5 μον. μήκους καὶ ἀφ' ἐτέρου παρατηροῦμεν (σχ. 70) δτι τὸ τετράγωνον, τὸ δποίον έχει πλευρὰν τὴν ὑποτείνουσαν περιέχει 25 τετραγωνίδια μὲ πλευρὰν τὴν μονάδα μήκους, ἐνῷ τὰ ἄλλα δύο περιέχουν ἀντιστοίχως 9 καὶ 16 τοι-




σχ. 69.

αύτα τετραγωνίδια. <sup>3</sup>Αλλά  $25 = 16 + 9 \text{ ή } 5^2 = 4^2 + 3^2$  άρα  $(B\Gamma)^2 = (A\Gamma)^2 + (AB)^2$  (1). Η σχέση (1), ή δποια συνδέει τὰ τετράγωνα τῶν πλευρῶν τοῦ δρθιγωνίου τριγώνου  $AB\Gamma$  ἐκφράζει τὸ Πιθαγόρειον Θεώρημα.


Δυνάμεθα γενικῶς νὰ αἰτιολογήσωμεν τὴν σχέσην (1) ὡς ἔξῆς :

"Εστω δρθιγώνιον τρίγωνον  $AB\Gamma$  μὲ  $\widehat{A}=1$  δρθ. καὶ μὲ μήκη πλευρῶν  $AB=\gamma$ ,  $A\Gamma=\beta$  καὶ  $B\Gamma=\alpha$ .

Κατασκευάζομεν δύο τετράγωνα ἵσα καὶ ἕκαστον μὲ πλευράν ἵσην πρὸς



(71α)



(71β)

σχ. 71.

τὸ ἀθροισμα  $\beta+\gamma$  τῶν μηκῶν τῶν καθέτων πλευρῶν τοῦ τριγώνου. Παριστῶμεν μὲ  $E_1$  τὸ ἐμβαδὸν ἑκάστου τῶν τετραγώνων αὐτῶν. Κατασκευάζομεν ἐπίστης ἀπὸ χαρτόνιον τέσσαρα δρθιγώνια τρίγωνα ἵσα πρὸς τὸ δοθὲν  $AB\Gamma$  (Ἐ ἐμβαδὸν ἑκάστου). Θέτομεν τὰ τρίγωνα ταῦτα ἐπὶ τοῦ τετραγώνου, ὡς δεικνύει τὸ σχῆμα 71α καὶ παρατηροῦμεν ὅτι τὸ ἐν τετραγώνῳ ἀποτελεῖται ἀπὸ 4 τρίγωνα ἵσα πρὸς τὸ δοθὲν  $AB\Gamma$  καὶ ἀπὸ ἐν τετράγωνον πλευρᾶς ἵσης πρὸς τὴν ὑποτείνουσαν τοῦ  $AB\Gamma$  ἥτοι:  $E_1=\alpha^2+4E$  (2). Ἐν συνεχείᾳ τοποθετοῦμεν τὰ τρίγωνα εἰς τὸ ἔτερον τετράγωνον κατὰ τὸν τρόπον τοῦ σχήματος 71β. Παρατηροῦμεν, ὡς φαίνεται ἐκ τοῦ σχήματος 71β, ὅτι τοῦτο ἀποτελεῖται ἀπὸ 2 τετράγωνα πλευρᾶς ἀντιστοίχως  $\beta$  καὶ  $\gamma$  καὶ ἐκ τεσσάρων δρθιγωνίων τριγώνων ἵσων πρὸς τὸ  $AB\Gamma$ . Ἀρα  $E_1=\beta^2+\gamma^2+4E$  (3).

"Εφαρμόζομεν τὴν μεταβατικὴν Ιδιότητα εἰς τὰς σχέσεις (2) καὶ (3) καὶ ἔχομεν  $\alpha^2+4E=\beta^2+\gamma^2+4E$ . Συνεπῶς  $\alpha^2=\beta^2+\gamma^2$ . Ἡτοι ἔχομεν εὑρεῖ πάλιν τὴν σχέσην  $(B\Gamma)^2=(AB)^2+(A\Gamma)^2$ , ή δποια ἐκφράζει τὸ Πιθαγόρειον θεώρημα:

Τὸ τετράγωνον τῆς ὑποτεινούσης ἐνδὸς δρθιγωνίου τριγώνου εἶναι Ισοδύναμον πρὸς τὸ ἀθροισμα τῶν τετραγώνων τῶν δύο καθέτων πλευρῶν αὐτοῦ.

#### Παρατήρησις :

'Εκ τῆς σχέσεως  $\alpha^2=\beta^2+\gamma^2$  εύρισκομεν τὰς ἔξῆς σχέσεις:  $\beta^2=\alpha^2-\gamma^2$  καὶ  $\gamma^2=\alpha^2-\beta^2$ , ἥτοι: τὸ τετράγωνον ἑκάστης τῶν καθέτων πλευρῶν δρθιγωνίου τριγώνου εύρισκεται, ἐὰν ἀπὸ τὸ τετράγωνον τῆς ὑποτεινούσης ἀφαιρέσωμεν τὸ τετράγωνον τῆς ἄλλης καθέτου πλευρᾶς.

**Σημείωσις 'Ιστορική.** Ό διάσημος μαθηματικός και φιλόσοφος Πυθαγόρας ἐγεννήθη τὸ 580 π.Χ. εἰς Σάμον και ἀπέθανε τὸ 500 π.Χ. εἰς Μεταπόντιον τῆς κάτω Ἰταλίας.

Κατόπιν συστάσεως τοῦ Θαλοῦ μετέβη εἰς Αἴγυπτον (πιθανῶς δὲ και εἰς Βαβύλωνα), όπου παρέμεινεν ἔτη πολλὰ ἔτη και ἐμυήθη εἰς τὰς γυνώσεις τῶν Αιγυπτίων διὰ τῆς μελέτης τῶν βιβλίων αὐτῶν.

Μετά τὴν ἐπιστροφήν του εἰς τὴν Ἑλλάδα μετέβη εἰς Κρήτην και Σάμον και τέλος διεπεραιώθη εἰς τὸν Κρότωνα τῆς Κάτω Ἰταλίας (Μεγάλη Ἑλλάς), διπού τίρυσε και διηνύθηνε Σχολήν, θεωρουμένην ὡς τὸ πρῶτον συστηματικὸν Πανεπιστήμιον τοῦ Κόσμου. Ό Πυθαγόρας και οι μαθηταὶ του, οἱ ὅποιοι ἐκαλοῦντο Πυθαγόρειοι, συνέβαλον εἰς τὴν ἀνάπτυξιν τῶν μαθητικῶν.

'Ο Πυθαγόρας ὑπήρχεν ἐκ τῶν κορυφαίων μορφῶν τῆς ἐπιστήμης δὲλων τῶν ἐποχῶν, ἢ δὲ πνευματική του δραστηριότης ἀναφέρεται εἰς δὲλους τοὺς τομεῖς τῶν φυσικῶν και μαθηματικῶν ἐπιστημῶν.

Εἰς τὸν Πυθαγόρα ἀποδίδεται, μεταξὺ τῶν ἀλλων, και ἡ ἐπινόησις τοῦ ὁμωνύμου θεωρήματος, τοῦ Πυθαγορείου Θεωρήματος.

### 'Α σκήνη σεις

Εἰς τὰς κάτωθι ἀσκήσεις κάμετε χρήσιν τοῦ πίνακος τετραγώνων τῆς § 32.

141) Δίδεται ὀρθογώνιον τρίγωνον μὲ καθέτους πλευρὰς 6 cm και 8 cm. Νὰ ὑπολογισητε τὸ μῆκος τῆς ὑποτείνουσῆς αὐτοῦ.

142) Ὁρθογωνίου τριγώνου AΒΓ δίδεται ἡ ὑποτείνουσα  $BΓ = 15$  cm και ἡ μία τῶν καθέτων πλευρῶν του  $AΒ = 9$  cm. Νὰ ὑπολογισθῇ ἡ ἀλλη κάθετος πλευρά αὐτοῦ AΓ.

143) Αἱ διαγώνιοι ρόμβου εἰναι 6 cm και 8 cm. Νὰ ὑπολογισητε τὸ ὑψος του.

144) Ισοσκελοῦς τραπέζιου ή μικρὰ βάσις εἰναι  $β_1 = 5$  cm, ἐκάστη τῶν μὴ παραλλήλων πλευρῶν του 10 cm και τὸ ὑψος αὐτοῦ 6 cm. Νὰ εύρητε τὸ ἐμβαδὸν αὐτοῦ.

145) Δίδεται ισοσκελὲς τραπέζιον, τοῦ ὅποιους ἡ μεγάλη βάσις εἰναι ἵση πρὸς  $\frac{11}{5}$  α και αἱ ἀλλαι πτεῖς πλευραι ἴσαι πρὸς α. Νὰ ὑπολογισητε τὸ ἐμβαδὸν αὐτοῦ. Ἐφαρμογή :  $α = 5$  cm.

146) Νὰ ὑπολογισθῇ τὸ ἐμβαδὸν ὀρθογωνίου, τὸ ὅποιον ἔχει πλευρὰν μήκους 3 cm και διαγώνιον μήκους 5 cm.

147) Ὁρθογωνίου τριγώνου ἡ ὑποτείνουσα εἰναι 25 cm και μία κάθετος πλευρά αὐτοῦ 24 cm. Νὰ εύρητε τὸ ὑψος, τὸ ὅποιον ἀντιστοιχεῖ εἰς τὴν ὑποτείνουσαν.

148) Τὸ ἐμβαδὸν ὀρθογωνίου τριγώνου εἰναι 6 cm<sup>2</sup>. Μία κάθετος πλευρά αὐτοῦ εἰναι 4 cm. Νὰ εύρεθῃ τὸ μῆκος τῆς ὑποτείνουσῆς αὐτοῦ.

### Περὶ τετραγωνικῆς ρίζης

#### § 39. Τετραγωνικὴ ρίζα θετικοῦ ἀριθμοῦ και ὑπολογισμὸς αὐτῆς.

Νὰ κατασκευάσητε ὀρθογώνιον τρίγωνον μὲ καθέτους πλευρὰς 45 mm και 28 mm και νὰ ὑπολογισητε τὸ τετράγωνον τῆς τιμῆς τῆς ὑποτείνουσῆς, και τὴν τιμὴν αὐτῆς.

Κατασκευάζομεν ὀρθογώνιον τρίγωνον BΑΓ μὲ καθέτους πλευρὰς  $AB = 45\text{mm}$  και  $AG = 28 \text{ mm}$  και ἐφαρμόζομεν τὸ Πυθαγόρειον Θεώρημα. (σχ. 72).

$$(B\Gamma)^2 = (AB)^2 + (A\Gamma)^2 \Rightarrow (B\Gamma)^2 = \\ = 45^2 + 28^2 \Rightarrow (B\Gamma)^2 = 2025 + 784 \Rightarrow \\ (B\Gamma)^2 = 2809$$

Έάν μετρήσωμεν τήν ύποτεινουσαν  $B\Gamma$  θά εύρωμεν ότι  $B\Gamma = 53$  mm. "Ωστε:  $53^2 = 2809$  Τὸν ἀριθμὸν 53 ὀνομάζομεν τετραγωνικὴν ρίζαν τοῦ ἀριθμοῦ 2809 καὶ συμβολίζομεν  $\sqrt{2809}$ . "Ωστε  $\sqrt{2809} = 53$ . Γενικῶς:

Τετραγωνικὴ ρίζα θετικοῦ ἀριθμοῦ αἱναι δὲ θετικὸς ἀριθμὸς  $\sqrt{\alpha}$ , δὲ δποῖος ὑψούμενος εἰς τὴν δευτέραν δύναμιν διδει τὸν  $\alpha$ .  $(\sqrt{\alpha})^2 = \alpha$  ή  $\alpha = \beta^2 \Rightarrow \beta = \sqrt{\alpha}$ .

Έάν συμβουλευθῶμεν τὸν πίνακα τῆς § 32 θὰ συμπεράνωμεν ότι:

$$\sqrt{1} = 1, \quad \sqrt{4} = 2, \quad \sqrt{9} = 3, \quad \sqrt{16} = 4, \quad \sqrt{25} = 5, \quad \sqrt{36} = 6, \\ \sqrt{49} = 7, \quad \sqrt{64} = 8, \quad \sqrt{81} = 9 \text{ κ.λ.π.}$$

Τοὺς ἀριθμοὺς 1...4...9...16...25...36...49...64...81... λέγομεν τέλεια τετράγωνα ἀκέραιών ἢ ἀπλῶς τέλεια τετράγωνα, διότι γράφονται ὑπὸ τὴν μορφὴν  $1^2 \dots 2^2 \dots 3^2 \dots 4^2 \dots 5^2 \dots 6^2 \dots 7^2$  κ.λ.π.

Αἱ τετραγωνικαὶ ρίζαι τῶν ἀνωτέρω τελείων τετραγώνων εἰναι ἀκέραιοι ἀριθμοί.


§ 40. Παρατηροῦμεν ότι κάθε ἀκέραιος ἀριθμός, δὲ δποῖος δὲν εἰναι τέλειον τετράγωνον, εύρισκεται μεταξὺ δύο διαδοχικῶν τελείων τετραγώνων.

$$\text{Π.χ. } 1 < 3 < 4, \quad 25 < 31 < 36, \quad \text{κ.λ.π.} \quad \text{ἢ} \quad 1^2 < 3 < 2^2, \quad 5^2 < 31 < 6^2.$$

Λέγομεν ότι δὲ 1 εἰναι κατ' ἔλλειψιν τετραγωνικὴ ρίζα τοῦ 3 κατὰ προσέγγισιν μονάδος καὶ δὲ 2 εἰναι καθ' ὑπεροχὴν τετραγωνικὴ ρίζα τοῦ 3 κατὰ προσέγγισιν μονάδος καὶ συμβολίζομεν κατ' ἔλ.  $\sqrt{3} = 1$  κατὰ προσέγγισιν μονάδος καὶ καθ' ὑπ.  $\sqrt{3} = 2$  κατὰ προσέγγισιν μονάδος. 'Ομοίως: κατ' ἔλ.  $\sqrt{31} = 5$  κατὰ προσέγγισιν 1 καὶ καθ' ὑπ.  $\sqrt{31} = 6$  κατὰ προσέγγισιν μονάδος.

Τοῦ λοιποῦ λέγοντες τετραγωνικὴν ρίζαν κατὰ προσέγγισιν μονάδος θὰ ἐννοοῦμεν τὴν κατ' ἔλλειψιν.

Τετραγωνικὴ ρίζα ἀριθμοῦ κατὰ προσέγγισιν μονάδος εἰναι δὲ μεγαλύτερος ἀκέραιος, τοῦ δποίου τὸ τετράγωνον εἰναι μικρότερον τοῦ δοθέντος ἀριθμοῦ. 'Ο ἀριθμὸς 2809 εἰναι τέλειον τετράγωνον, διότι ἡ τετραγωνικὴ του ρίζα εἰναι δὲ ἀκέραιος 53.



σχ. 72.

§ 41. Τὴν τετραγωνικὴν ρίζαν τοῦ ἀριθμοῦ 2809 ὑπολογίζομεν ὡς ἔξῆς :

1. Χωρίζομεν αὐτὸν εἰς διψήφια τμήματα, ἀρ-  
χίζοντες ἀπὸ τὸ τέλος.

$$\sqrt{2809}$$

2. Εύρισκομεν τὴν κατ' Ἑλλειψιν τετραγωνικὴν  
ρίζαν τοῦ πρώτου τμήματος 28 κατὰ προσέγγισιν  
μονάδος.

$$\begin{array}{r} \sqrt{2809} \\ \hline 5 \end{array}$$

3. Ἀφαιροῦμεν ἀπὸ τὸ 28 τὸ τετράγωνον τοῦ  
5 (τὸν 25).

$$\begin{array}{r} \sqrt{2809} \\ -25 \\ \hline 3 \end{array} \quad 5$$

4. Παραθέτομεν δεξιὰ τῆς διαφορᾶς 3 τὸ ἐπόμενον  
διψήφιον τμῆμα 09 καὶ χωρίζομεν τὸ τελευταῖον ψη-  
φίον τοῦ σχηματισθέντος ἀριθμοῦ 309.

$$\begin{array}{r} \sqrt{2809} \\ -25 \\ \hline 309 \end{array} \quad 5$$

5. Διπλασιάζομεν τὸν εὑρεθέντα (ἄνω - δεξιά)  
ἀριθμὸν 5 καὶ εύρισκομεν 10, τὸ ὅποιον γράφομεν  
κάτω τοῦ 5.

$$\begin{array}{r} \sqrt{2809} \\ -25 \\ \hline 309 \\ \times 3 \\ \hline 309 \end{array} \quad 5$$

6. Διαιροῦμεν τὸ τμῆμα 30 τοῦ 309 διὰ τοῦ 10  
καὶ τὸ πηλίκον 3 γράφομεν δεξιὰ τοῦ 10 καὶ σχημα-  
τίζομεν τὸν ἀριθμὸν 103· πολλαπλασιάζομεν αὐτὸν ἐπὶ<sup>3</sup>  
3 (γράφομεν καὶ δεξιὰ καὶ κάτω τοῦ 10 τὸ πηλίκον 3).  
Ἀφαιροῦμεν τὸ γινόμενον 309 ἐκ τοῦ ἀριθμοῦ 309.  
(Ἐάν τὸ γινόμενον 103 X 3 εύρισκετο μεγαλύτερον  
τοῦ 309 θὰ ἐγράφομεν δεξιὰ καὶ κάτω τοῦ 10 τὸν ἀμέ-  
σως μικρότερον ἀριθμὸν τοῦ 3 τὸν 2 ὡς ἔξῆς 102 καὶ  
θὰ ἔσυνεχίζομεν ἐργαζόμενοι ὁμοίως). X2

7. Παραθέτομεν δεξιὰ τὸν εὑρεθέντος 5 (στάδιον  
2), τὸ πηλίκον 3. Ὁ εὑρεθεὶς ἄνω δεξιὰ ἀριθμὸς 53  
εἶναι ἡ τετραγωνικὴ ρίζα τοῦ 2809.


$$\begin{array}{r} \sqrt{2809} \\ -25 \\ \hline 309 \\ \times 3 \\ \hline 309 \end{array} \quad 53$$

‘Ο 2809 εἶναι τέλειον τετράγωνον διότι κάτω  
δεξιὰ εύρομεν ὑπόλοιπον 0. Ἐάν ἔχωμεν καὶ τρίτον  
τμῆμα, ἐπαναλαμβάνομεν τὴν ἐργασίαν ἀπὸ τοῦ  
σταδίου 4 καὶ κάτω.

### Ἐφαρμογαὶ

1. Νὰ ὑπολογισθῇ ἡ διαγώνιος ὀρθογωνίου παραλληλογράμμου μὲ δια-  
στάσεις 57m καὶ 176m (σχ. 73).

Έφαρμόζομεν τὸ Πυθαγόρειον Θεώρημα καὶ εύρισκομεν τὸ μῆκος δ τῆς διαγωνίου.  
 $\delta^2 = 57^2 + 176^2 \leftrightarrow \delta^2 = 34225 \leftrightarrow$   
 $\delta = \sqrt{34225}$



σχ. 73.

(έδῶ τὸ πρῶτον τμῆμα εἶναι μονοψήφιον).

$$\begin{array}{r} \sqrt{3'4225} & 185 \\ -1 \\ \hline 24'2 \\ -224 \\ \hline 1825 \\ -1825 \\ \hline 0 \end{array} \quad \begin{array}{r} 29 & 28 & 365 \\ \times 8 & \times 5 \\ \hline 224 & 224 & 1825 \end{array}$$

'Ωστε ἡ διαγώνιος ἔχει μῆκος 185 π.

Παρατήρησις. Κατὰ τὴν διαίρεσιν 24:2 θέτομεν τὸν μεγαλύτερον μονοψήφιον 9. Έάν δως, ὅπως ἔδῶ, τὸ γινόμενον 29X9 εἶναι μεγαλύτερον τοῦ 242, θέτομεν τὸν ἀμέσως κατώτερον ἀριθμὸν 8. κ.ο.κ.

'Εάν ἡ τελικὴ διαφορὰ δὲν εἶναι 0, τότε ἡ εύρισκομένη τετραγωνικὴ ρίζα, εἶναι κατὰ προσέγγισιν μονάδος καὶ κατ' Ἑλλειψιν.

2. Ἡ ὑποτείνουσα δρθιογώνιον τριγώνου εἶναι 139 mm καὶ μία κάθετος πλευρά του 38 mm. Νὰ εὐρεθῇ ἡ ἄλλη κάθετος πλευρά.

'Εάν  $x$  εἴναι ἡ τιμὴ αὐτῆς ἔχομεν :

$$x^2 + 38^2 = 139^2 \leftrightarrow x^2 = 139^2 - 38^2 \leftrightarrow x^2 = 17877 \leftrightarrow x = \sqrt{17877}$$

$$\begin{array}{r} \sqrt{17877} & 133 \\ -1 \\ \hline 0'78 \\ -0'69 \\ \hline 0'977 \\ -0'789 \\ \hline 188 \end{array} \quad \begin{array}{r} 23 \\ \times 3 \\ \hline 69 \\ | \\ 263 \\ \times 3 \\ \hline 789 \end{array}$$

'Ωστε  $\sqrt{17877} = 133$  κατὰ προσέγγισιν μονάδος.Δηλ.  $133^2 < 17877 < 134^2$ . Πράγματι

$$\Rightarrow 17689 < 17877 < 17956.$$

Διαπιστώνομεν διὰ μετρήσεως, ὅτι ἡ πλευρά εἶναι μεγαλυτέρα μὲν τῶν 133 mm ἀλλὰ μικροτέρα τῶν 134 mm.

### Άσκήσεις

149) Υπολογίσατε τοὺς ἀριθμοὺς  $\sqrt{121}$ ,  $\sqrt{6241}$ ,  $\sqrt{12321}$ .

150) Εύρετε τὰς τετραγωνικὰς ρίζας τῶν ἀριθμῶν 11, 45, 1797, 394563 κατὰ προσέγγισιν μονάδος.

151) Ἰσοσκελὲς τρίγωνον ἔχει ἵσας πλευρὰς 185 m καὶ βάσιν 222 m. Υπολογίσατε τὸ ύψος καὶ τὸ ἐμβαδόν του.

152) Χορδὴ κύκλου AB είναι 336 em καὶ ἀπέχει τοῦ κέντρου ἀπόστασιν 374 em. Ποῖον τὸ μῆκος τῆς ἀκτίνος τοῦ κύκλου;

153) Τραπέζιον ΑΒΓΔ έχει βάσεις  $AB = 276$  mm και  $ΔΓ = 78$  mm και πλευράς  $ΒΓ = ΑΔ = 165$  mm. Ύπολογίσυτε τὸ ύψος του και τὸ ἐμβαδόν του.

154) Μεταξύ ποιών μηκῶν εύρισκεται ἡ ὑποτείνουσα δρθιογωνίου τριγώνου, τὸ διάστοιον έχει καθέτους πλευράς μὲ μήκη 389 cm και 214 cm

### § 42. Τετραγωνικὴ ρίζα κατὰ προσέγγισιν

Νὰ εῦρητε μεταξὺ ποιῶν ἀκεραιῶν τετραγώνων περιέχεται ὁ ἀριθμὸς 1200 καὶ τὰ διαιρέσητε τὸν δοθέντα καὶ τοὺς ἀριθμοὺς, τοὺς δύο τοὺς θὰ εῦρητε διὰ 100. Τὶ παρατηρεῖτε;

‘Υπολογίζομεν τὴν κατ’ Ἑλλειψιν τετραγωνικὴν ρίζαν τοῦ 1200 κατὰ προσέγγισιν μονάδος :

Αὔτη εἶναι ὁ ἀριθμὸς 34

$$\begin{array}{r} \sqrt{12'00} \\ - 9 \\ \hline 3'00 \\ - 2'56 \\ \hline 44 \end{array} \quad \begin{array}{l} \frac{34}{64} \\ \times 4 \\ \hline 256 \\ \Rightarrow \frac{34^2}{10^2} < 12 < \frac{35^2}{10^2} \Rightarrow \left(\frac{34}{10}\right)^2 < 12 < \left(\frac{35}{10}\right)^2 \\ \Rightarrow 3,4^2 < 12 < 3,5^2 \end{array}$$

Παρατηροῦμεν, ὅτι ὁ ἀριθμὸς 12 περιέχεται μεταξὺ τῶν τετραγώνων τῶν δεκαδικῶν ἀριθμῶν 3,4 καὶ 3,5. Οἱ ἀριθμοὶ αὐτοὶ διαφέρουν κατὰ 0,1.

‘Ο ἀριθμὸς 3,4 εἶναι ἡ κατ’ Ἑλλειψιν τετραγωνικὴ ρίζα τοῦ 12 κατὰ προσέγγισιν 0,1. ‘Ο ἀριθμὸς 3,5 εἶναι ἡ καθ’ ὑπεροχὴν τετραγωνικὴ ρίζα τοῦ 12 κατὰ προσέγγισιν 0,1.

‘Οταν λέγωμεν ἀπλῶς τετραγωνικὴν ρίζαν κατὰ προσέγγισιν, θὰ ἔννοοῦμεν τὴν κατ’ Ἑλλειψιν καὶ θὰ γράφωμεν κατ’ ἥλ  $\sqrt{12} = 3,4$  κατὰ προσέγγισιν 0,1.

‘Ἐάν ἔργασθῶμεν ὁμοίως μὲ τὸν ἀριθμὸν 120000 θὰ εὕρωμεν :

$$\begin{array}{r} \sqrt{12'000'0} \\ - 9 \\ \hline 3'00 \\ - 2'56 \\ \hline 44'00 \\ - 41'16 \\ \hline 284 \end{array} \quad \begin{array}{r} 346 \\ 64 \quad 686 \\ \times 4 \quad \times 6 \\ \hline 256 \quad 4116 \end{array}$$

Δηλαδὴ  $346^2 < 120000 < 347^2$ . Διαιροῦμεν διὰ  $10\ 000 = 100^2$  καὶ ξ-  
χομεν :  $\left(\frac{346}{100}\right)^2 < 12 < \left(\frac{347}{100}\right)^2 \Rightarrow (3,46)^2 < 12 < (3,47)^2$ .

‘Ο ἀριθμὸς 3,46 εἶναι ἡ τετραγωνικὴ ρίζα τοῦ 12 κατὰ προσέγγισιν ἑκατοστοῦ (0,01).

Τετραγωνική ρίζα δοθέντος άριθμοῦ κατά προσέγγισιν δεκάτου, έκαποστοῦ, χιλιοστοῦ κ.λ.π. είναι ό μεγαλύτερος ἐκ τῶν δεκαδικῶν άριθμῶν μὲν ἐν, δύο, τρία κ.λ.π. ἀντιστοίχως δεκαδικὰ ψηφία, τοῦ δποίου τὸ τετράγωνον είναι μικρότερον τοῦ δοθέντος άριθμοῦ.

Διὰ νὰ εὕρωμεν προηγουμένως τὴν τετραγωνικήν ρίζαν τοῦ 12 κατά προσέγγισιν 0,1 ὑπελογίσαμεν τὴν τετραγωνικήν ρίζαν τοῦ 1200 = 12.100 = = 12·10<sup>2</sup> κατά προσέγγισιν μονάδος καὶ διηρέσαμεν αὐτὴν διὰ τοῦ 10.

Πρὸς ὑπολογισμὸν τῆς τετραγωνικῆς ρίζης τοῦ 12 κατά προσέγγισιν 0,01 ὑπελογίσαμεν τὴν τετραγωνικήν ρίζαν τοῦ 120000 = 12.10000 = 12.100<sup>3</sup> καὶ διηρέσαμεν αὐτὴν διὰ τοῦ 100.

Διὰ νὰ εὕρωμεν τὴν τετραγωνικήν ρίζαν άριθμοῦ κατά προσέγγισιν δεκάτου, έκαποστοῦ, χιλιοστοῦ, . . . ἔργαζόμεθα ως ἔξῆς : 1) Πολλαπλασιάζομεν τὸν άριθμὸν ἐπὶ 100 = 10<sup>2</sup>, 10000 = 100<sup>3</sup>, 1000000 = 1000<sup>4</sup> κ.λ.π. ἀντιστοίχως. 2) Ὑπολογίζομεν τὴν τετραγωνικήν ρίζαν τοῦ γινομένου κατά προσέγγισιν μονάδος καὶ 3) διαιροῦμεν αὐτὴν διὰ τοῦ 10, 100, 1000 ἀντιστοίχως.

### Τετραγωνική ρίζα κλασματικοῦ άριθμοῦ

α) Δίδεται τὸ κλάσμα  $\frac{16}{25}$ . Παρατηροῦμεν ὅτι οἱ ὅροι του είναι ἀκέραια τετράγωνα :  $\frac{16}{25} = \frac{4^2}{5^2} \Rightarrow \frac{16}{25} = \left(\frac{4}{5}\right)^2 \Leftrightarrow \sqrt{\frac{16}{25}} = \frac{4}{5} = \frac{\sqrt{16}}{\sqrt{25}}$ . Ο  $\frac{16}{25}$

λέγεται τέλειον τετράγωνον τοῦ ρητοῦ  $\frac{4}{5}$ . Οἱ άριθμοὶ  $\frac{16}{25}, \frac{36}{81}, \frac{9}{64}, \dots$  είναι τέλεια τετράγωνα ρητῶν άριθμῶν.

$$\text{Γενικῶς : } \sqrt{\frac{\alpha^2}{\beta^2}} = \frac{\alpha}{\beta} = \frac{\sqrt{\alpha^2}}{\sqrt{\beta^2}}, \text{ διότι } \left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^2 = \frac{\alpha^2}{\beta^2}$$

β) Νὰ εὔρεθῇ ἡ τετραγωνική ρίζα τοῦ  $\frac{3}{8}$  κατά προσέγγισιν  $\frac{1}{8}$ . Πολλαπλασιάζομεν αὐτὸν ἐπὶ  $8^2$  καὶ ἔχομεν  $\frac{3}{8} \cdot 8^2 = 3 \cdot 8 = 24$ . Ὑπολογίζομεν τὴν τετραγωνικήν ρίζαν τοῦ γινομένου 24 κατά προσέγγισιν μονάδος καὶ διαιροῦμεν αὐτὴν διὰ τοῦ 8. Δηλ.  $\sqrt{\frac{3}{8}} = \frac{\sqrt{24}}{8} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$  κατά προσέγγισιν  $\frac{1}{8}$ , ἡτοι κατ' ἔλλ.  $\sqrt{\frac{3}{8}} = \frac{1}{2}$  κατά προσέγγισιν  $\frac{1}{8}$ .

Διὰ νὰ εὕρωμεν τὴν τετραγωνικήν ρίζαν κλάσματος κατά προσέγγισιν τῆς κλασματικῆς μονάδος του, πολλαπλασιάζομεν αὐτὸν ἐπὶ τὸ τετράγωνον τοῦ παρονομαστοῦ, ὑπολογίζομεν τὴν τετραγωνικήν ρίζαν τοῦ γινομένου

κατά προσέγγισιν μονάδος καὶ διαιροῦμεν αὐτὴν διὰ τοῦ παρονομαστοῦ τοῦ κλάσματος.

### Εφαρμογαί

1) Νὰ εύρεθῇ ἡ τετραγωνική ρίζα τοῦ 19,763 κατά προσέγγισιν 0,01.

Πολλαπλασιάζομεν ἐπὶ 10000 καὶ ἔχομεν  $19,763 \cdot 10000 = 197630$ .

“Υπολογίζομεν τὴν τετραγωνικὴν ρίζαν τοῦ 197630 κατά προσέγγισιν μονάδος ἢ διποίᾳ εἴναι 444 καὶ διαιροῦμεν αὐτὴν διὰ 100. “Ωστε  $\sqrt{19,763} = 4,44$  κατά προσέγγισιν 0,01.

2) Θέλομεν νὰ μετρήσωμεν τὴν ὑποτείνουσαν ὀρθογωνίου τριγώνου μὲ καθέτους πλευρὰς  $\frac{3}{5}$  m καὶ  $\frac{2}{3}$  m καὶ διαθέτομεν μετροταινίαν διηρημένην εἰς mm

Μεταξὺ ποίων τιμῶν θὰ εὕρωμεν τὸ μῆκος τῆς ὑποτείνουστος; “Εστω  $x$  m τὸ μῆκος τῆς ὑποτείνουστος. Τότε  $x^2 = \left(\frac{3}{5}\right)^2 + \left(\frac{2}{3}\right)^2 \Rightarrow x^2 = \frac{9}{25} + \frac{4}{9} \Rightarrow$

$$x^2 = \frac{81+100}{225} \Rightarrow x^2 = \frac{181}{225} \Rightarrow x = \sqrt{\frac{181}{225}} \quad \text{Διὰ νὰ εὕρωμεν τὸ μῆκος}$$

μέχρι χιλιοστομέτρου πρέπει νὰ ὑπολογίσωμεν τὴν τετραγωνικὴν ρίζαν τοῦ  $\frac{181}{225}$  κατά προσέγγισιν 0,001. Πρὸς τοῦτο πολλαπλασιάζομεν τὸν  $\frac{181}{225}$  ἐπὶ 1000<sup>2</sup>

$$\text{ἵτοι } \frac{181}{225} \cdot 1000000 = \frac{181000000}{225}$$

$$\text{Εύρισκομεν τὸ ἀκέραιον πηλίκον τοῦ } \frac{181000000}{225} = 804444.$$

“Υπολογίζομεν τὴν τετραγωνικὴν ρίζαν τοῦ 804444 κατά προσέγγισιν μονάδος καὶ διαιροῦμεν αὐτὴν διὰ 1000.

$\sqrt{80'44'44}$	896
-64	169 1786
164'4	$\times 9$ $\times 6$
-15 21	1521 10716
1234'4	
- 10716	
1628	


$$\sqrt{\frac{181}{225}} = 0,896 \text{ κατὰ προσέγγισιν 0,001} \Rightarrow \\ 0,896 < x < 0,897.$$

“Ωστε τὸ μῆκος τῆς ὑποτείνουστος εἶναι μεταξὺ 0,896 m καὶ 0,897 m.

**Σημείωσις 1.** Νὰ ὑπολογίσητε τὰς ἀνωτέρας καὶ κατωτέρας τετραγωνικὰς ρίζας τοῦ 3 κατά προσέγγισιν 0,1, 0,01, 0,001 καὶ νὰ διατάξητε αὐτὰς ἐπὶ ἀξονος.

(Λέγοντες ἀνωτέρας καὶ κατωτέρας τετρ. ρίζας ἐννοοῦμεν ἀντιστοίχως τὰς καθ' ὑπεροχὴν καὶ κατ' ἔλειψιν).

$$\begin{array}{lll} \text{Αἱ ρίζαι αὐταὶ εἰναι} & 1,7 & \text{κατὰ προσέγγισιν 0,1} \\ & 1,73 & \text{κατὰ προσέγγισιν 0,01} \end{array}$$



Όσα σδήποτε φοράς και έταν έπαναλάβωμεν τὸν ὑπολογισμόν, οὐδέποτε θὰ εύρωμεν ἀκριβῶς τὴν τετραγωνικὴν ρίζαν τοῦ 3. Ἐάν τοποθετήσωμεν τὰς κατὰ προσέγγισιν τετραγωνικὰς ρίζας ἐπὶ δξονος μεταξὺ τῶν ἀνωτέρων καὶ κατωτέρων, θὰ ὑπάρχῃ πάντοτε ἐν σημείον. Ἐπ' αὐτοῦ τοποθετεῖται ὁ ἀριθμὸς 1,731..., ὁ δποτος ἔχει ἀπειρα δεκαδικὰ ψηφία, ἀλλὰ δὲν εἶναι περιοδικός. Τὸν ἀριθμὸν αὐτὸν καλούμεν τετραγωνικὴν ρίζαν τοῦ 3 καὶ συμβολίζουμεν διὰ τοῦ  $\sqrt{3}$ .

Ο ἀριθμὸς αὐτὸς δὲν ἀνήκει εἰς τὸ Q. Εἰς ἀνωτέραν τάξιν θὰ μάθωμεν ὅτι δινομάζεται ἀσύμμετρος ἀριθμός. Ἀριθμοὶ αὐτοῦ τοῦ εἶδους εἶναι καὶ οἱ  $\sqrt{2}$ ,  $\sqrt{5}$ , κ.λ.π.

**Σημείωσις 2.** Ο ἀριθμὸς 2 εἶναι τετραγωνικὴ ρίζα τοῦ 4 διότι  $2^2 = 4$ . Παρατηροῦμεν δμως ὅτι καὶ  $(-2)^2 = 4$ . Ο  $-2$  λέγεται δευτέρα τετραγωνικὴ ρίζα τοῦ 4.

Γενικῶς, ἔταν  $\alpha > 0$  ἐκτὸς τοῦ θετικοῦ ἀριθμοῦ  $\sqrt{\alpha}$  ὑπάρχει καὶ δευτέρα τετραγωνικὴ ρίζα, ἡ δποτοια συμβολίζεται μὲν  $-\sqrt{\alpha}$ .

### Α σκήσεις

155) Υπολογίσατε τὰς τετραγωνικὰς ρίζας τῶν ἀριθμῶν 138, 272, 19836, κατὰ προσέγγισιν 0,1 καὶ 0,001.

156) Υπολογίσατε τὰς τετραγωνικὰς ρίζας τῶν ἀριθμῶν 97, 635,  $\frac{3}{17}$ , 0,003845 κατὰ προσέγγ. 0,001.

157) Υπολογίσατε τὰς τετραγωνικὰς ρίζας τῶν κλασμάτων  $\frac{2}{5}$ ,  $\frac{13}{19}$ ,  $\frac{47}{131}$ ,  $\frac{656}{713}$  κατὰ προσέγγισιν  $\frac{1}{5}$ ,  $\frac{1}{19}$ ,  $\frac{1}{131}$ ,  $\frac{1}{713}$  ἀντιστοίχως.

158) Ποιον εἶναι κατὰ προσέγγισιν 0,001 τὸ μῆκος τῆς διαγωνίου ἐνὸς τετραγώνου μὲ πλευρὰν τὴν μονάδα μήκους;

159) Ποιον εἶναι κατὰ προσέγγισιν 0,0001 τὸ ὄψος ισοπλεύρου τριγώνου μὲ πλευρὰν 2 cm;

## Γ. ΜΗΚΟΣ ΚΥΚΛΟΥ — ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΥΚΛΟΥ

### Α. Μῆκος κύκλου

**§ 43.** Άποκρψατε ἐκ χονδροῦ χαρτονίου ἡ ἔνδον κύκλον ἀκτῖνος 5 cm. Μετρήσατε τὸ μῆκος τοῦ κύκλου διὰ πανίνης μετροτανίας, περιτυλίσσοντες αὐτὴν πέριξ τοῦ κύκλου καὶ εἴρετε τὸν λόγον τοῦ μήκους τοῦ κύκλου πρὸς τὸ μῆκος τῆς διαμέτρου τοῦ.

Τὸ μῆκος τοῦ μετρηθέντος κύκλου εἶναι 31,4 cm. Ἀρα ἔχομεν  $\frac{31,4 \text{ cm}}{10 \text{ cm}} = 3,14$ .

Έάν έπαναλάβωμεν τήν έργασίαν αύτήν με περισσοτέρους κύκλους, θά παρατηρήσωμεν ότι διάμετρος του μήκους έκαστου κύκλου πρός τό μήκος τής διαμέτρου του είναι 3,14 (κατά προσέγγισιν). "Ητοι :

"Ο λόγος τοῦ μήκους κύκλου πρός τό μήκος τῆς διαμέτρου του είναι σταθερός καὶ ἵσος πρός 3,14.

"Ο ἀριθμὸς αὐτὸς παρίσταται διεθνῶς διὰ τοῦ γράμματος τοῦ ἀλφαριθμοῦ μας π. (\*).

"Εάν παραστήσωμεν διὰ τοῦ Γ τό μήκος ἐνὸς κύκλου, ἀκτίνος R, θά ξέχωμεν :

$$\frac{\Gamma}{2R} = \pi \iff \boxed{\Gamma = 2\pi R}$$

"Ητοι : Τό μήκος τοῦ κύκλου είναι ἵσον πρός τό γινόμενον τοῦ μήκους τῆς διαμέτρου αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ἀριθμὸν π.

#### § 44. Μῆκος τόξου

Είναι γνωστὸν ότι διάμετρος κύκλου διαιρεῖται εἰς 360°. "Εστω τό μήκος τόξου μ° καὶ Γ τό μήκος τοῦ κύκλου, διόποιος είναι τόξον 360°. Τότε έχομεν:  $\frac{\tau}{\Gamma} = \frac{\mu}{360}$  (διότι διάλογος δύο δόμοις διαίρεται μεγεθῶν ίσοῦται πρός τὸν λόγον τῶν τιμῶν των, ἔάν μετρηθῶσιν μὲ τὴν αὐτὴν μονάδα).

"Ἐπομένως:  $\frac{\tau}{2\pi R} = \frac{\mu}{360} \iff \tau = 2\pi R \cdot \frac{\mu}{360} \iff \boxed{\tau = \pi R \frac{\mu}{180}}$ . "Ητοι :

Διεὰ νὰ εὑρωμεν τό μήκος ἐνὸς τόξου μ°, πολλαπλασιάζομεν τό μήκος τοῦ κύκλου ἐπὶ τό κλάσμα  $\frac{\mu}{360}$  ἢ τό μήκος τοῦ ἡμικυκλίου ἐπὶ τό κλάσμα  $\frac{\mu}{180}$ .

**Σημ.** Διά τὴν εὔρεσιν τοῦ μήκους τοῦ κύκλου δυνάμεθα νὰ χρησιμοποιήσωμεν τὴν ἑκῆς μέθοδον : "Εγγράφουμεν εἰς τὸν κύκλον κανονικὸν κυρτὸν ἔξαγωνον. Παρατηροῦμεν, ότι διάμετρος του είναι μικροτέρα τοῦ μήκους τοῦ κύκλου. "Έάν τώρα ἐγγράψωμεν κανονικὸν δωδεκάγωνον παρατηροῦμεν, διότι διάμετρος αὐτοῦ πλησιάζει περισσότερον πρός τό μήκος τοῦ κύκλου, παραμένουσα μικροτέρα αὐτοῦ. "Έάν διπλασιάζωμεν συνεχῶς τό πλήθος τῶν πλευρῶν τοῦ ἔγγεγραμμένου κανονικοῦ πολύγωνου, πλησιάζομεν δύσον θέλομεν τό μήκος τοῦ κύκλου (σχ. 74).


**Σημ.** Τὴν μέθοδον αὐτὴν ἐχρησιμοποιήσεν διάμετρης εἰς τὸ βιβλίον του «Κύκλου μέτρησις».

(\*) **Ιστορικὴ σημείωσις:**

"Από τῆς ἀρχαιότητος είχε διαπιστωθῆ, διότι διάλογος τοῦ μήκους τοῦ κύκλου διά τοῦ μήκους τῆς διαμέτρου του είναι σταθερός. (Ιπποκράτης δ. Χίος 450 π.Χ.).

Παρέστησαν δέ τὸν σταθερὸν τοῦτον λόγον διά τοῦ γράμματος π.

Πρῶτος διέγειρας ἀρχαιότητος Ἑλλην μαθηματικός Ἀρχιμήδης ὠρίσεν κατά προσέγ-



σχ. 74

γισιν ώς τιμήν τοῦ π τὸ κλάσμα  $\frac{22}{7} = 3,1428 \left( \frac{310}{71} < \pi < \frac{31}{7} \right)$ . Ἐχρησιμοποίησεν πρὸς τοῦτο τὴν μέθοδον, τὴν ἀναφερομένην εἰς τὴν προηγουμένην σημείωσιν.

Ο Πτολεμαῖος εὗρε τὴν τιμὴν 3,14166. Ο δὲ Ὁλλανδός γεωμέτρης Μέττιος (1571 - 1635 μ. Χ.). εὗρε τὸ  $\pi = 3,1415920$ .

Τιμήν, κατὰ προσέγγισιν, τοῦ π λαμβάνομεν τὸν ἀριθμὸν 3,14 καὶ διὰ μεγαλυτέραν προσέγγισιν τὸν ἀριθμὸν 3,14159.

Δι' αὐτὴν τὴν τιμὴν τοῦ π ὑπάρχει καὶ μνημονικὸς κανὼν :

δεῖ δὲ Θεός ὁ Μέγας γεωμετρεῖ

3, 1 4 1 5 9

Δηλαδὴ τὸ πλῆθος τῶν γραμμάτων κάθε λέξεως ἀντιπροσωπεύει τὸ ἀντίστοιχον ψηφίον τοῦ ἀριθμοῦ π.

### \*Ασκήσεις

160) Νὰ εὑρητε τὸ μῆκος τοῦ κύκλου, τοῦ ὅποιου ἡ ἀκτὶς εἶναι 4 cm.

161) Ὑπολογίσατε τὴν ἀκτίνα τοῦ κύκλου, τοῦ ὅποιού τὸ μῆκος εἶναι 37,68 cm.

162) Ποιὸν εἶναι τὸ μῆκος τόξου  $50^\circ$  εἰς κύκλον, ἀκτίνος 12 cm ;

163) Νὰ εὕρητε τὸ μῆκος ἐνὸς τόξου  $100^\circ$ , κύκλου ἀκτίνος 5 cm.

164) Ποιά ἡ ἀκτὶς ἐνὸς κύκλου, ἐὰν ἐν τόξον αὐτοῦ  $30^\circ$  ἔχῃ μῆκος 2 cm ;

165) Κύκλος ἔχει μῆκος  $62\pi\beta$  cm. Ποιά εἶναι ἡ ἀκτὶς αὐτοῦ τοῦ κύκλου;

### B. Ἐμβαδὸν κύκλου καὶ κυκλικοῦ τομέως


#### § 45. Ἐμβαδὸν κύκλου.

Ἐμβαδὸν κύκλου καλοῦμεν τὴν ἔκτασιν τῆς ἐπιφανείας αὐτοῦ, ἥτοι τὴν ἔκτασιν τοῦ ἑσωτερικοῦ του, ἐκπεφρασμένην εἰς μονάδας μετρήσεως.


Ἐπὶ χάρτου χριστομετρικοῦ χαράξατε κύκλον ἀκτίνος 2 cm (χρησιμοποιήσατε ώς κέντρον σημεῖον τομῆς δύο ἐντόνων γραμμῶν). Μετρήσατε τὸ ἐμβαδὸν τῆς ἐπιφανείας του εἰς  $cm^2$ . (σχ. 75).

Μετροῦμεν τὰ  $cm^2$ , τὰ ὅποια περικλείει δικύλος καὶ τὰ ἐπὶ πλέον  $mm^2$  καὶ εὐρίσκομεν ὅτι τὸ ἐμβαδὸν τοῦ κύκλου εἶναι περίπου  $12,56 cm^2$ .

Παρατηροῦμεν ὅτι  $3,14 \cdot 2^2 = 3,14 \cdot 4 = 12,56 cm^2$ . Δηλαδὴ τὸ ἐμβαδὸν τοῦ κύκλου δίδεται ὑπὸ τοῦ τύπου  $3,14 R^2$  ἢ  $E = \pi R^2$  (ἐνθα  $R$  τὸ μῆκος τῆς ἀκτίνος τοῦ κύκλου). Δυνάμεθα νὰ αἰτιολογήσωμεν τὸ ἀνωτέρω ώς ἔξης :



σχ. 75.



σχ. 76.

Χαράσσομεν κύκλον ἀκτίνος R (σχ. 76). Εἰς τὸν κύκλον αὐτὸν ἐγγράφομεν ἐν κανονικόν κυρτὸν ἔξαγωνον ΑΒΓΔΕΖ. Ἡ περίμετρος τοῦ κανονικοῦ ἔξαγωνου εἶναι μικρότερα τοῦ μῆκος τοῦ κύκλου. Διχοτομοῦμεν

τὰ τόξα ΑΒ, ΒΓ, ΓΔ, . . . κατὰ τὸν γνωστὸν τρόπον καὶ ἐγγράφομεν οὕτως ἐν κανονικὸν δωδεκάγωνον. Ἡ περίμετρος αὐτοῦ εἶναι μεγαλυτέρα ἀπό τὴν περίμετρον τοῦ ΑΒΓΔΕΖ, ἀλλὰ παραμένει μικρότερα τοῦ μῆκος τοῦ κύκλου, πλησιάζουσα περισσότερον αὐτὸν.

Ἐν συνεχείᾳ ἐγγράφομεν εἰς τὸν κύκλον τοῦτον ἐν κανονικὸν κυρτὸν 24 - γωνιον κ.ο.κ.

Διπλασιάζοντες συνεχῶς τὸ πλήθος τῶν πλευρῶν τοῦ ἐγγεγραμμένου κανονικοῦ πολυγώνου παρατηροῦμεν ὅτι: 1) Ἡ περίμετρος τοῦ κανονικοῦ κυρτοῦ ἐγγεγραμμένου εῖς τὸν κύκλον πολυγώνου πλησιάζει ὅσον θέλομεν τὸ μῆκος τοῦ κύκλου καὶ

2) τὸ ἀπόστημα πλησιάζει ὅσον θέλομεν τὸ μῆκος τῆς ἀκτίνος τοῦ κύκλου

3) Τὸ ἐμβαδὸν τοῦ κανονικοῦ πολυγώνου πλησιάζει ὅσον θέλομεν τὸ ἐμβαδὸν τοῦ κύκλου.

Ἐὰν ἀντικαταστήσωμεν εἰς τὸν τύπον τοῦ ἐμβαδοῦ κανονικοῦ πολυγώνου ( $E = \frac{1}{2}X$  μῆκος περιμέτρου  $X$  μῆκος ἀπόστηματος) τὸ μῆκος τῆς περιμέτρου διὰ τοῦ μῆκος τοῦ κύκλου  $2\pi R$  καὶ τὸ μῆκος τοῦ ἀπόστηματος διὰ τῆς ἀκτίνος  $R$ , ἔχομεν  $E = \frac{1}{2} \cdot 2\pi R \cdot R = \pi R^2$ , ἀρα  $E = \pi R^2$ .


Ἡτοι: Τὸ ἐμβαδὸν ἐνδὲ κύκλου ισοῦται πρὸς τὸ γινόμενον τοῦ π ἐπὶ τὸ τετράγωνον τῆς ἀκτίνος αὐτοῦ.

Σημ. Τὴν μέθοδον αὐτὴν ἔχρησιμοποίησεν ὁ Ἀρχιμῆδης εἰς τὸ βιβλίον του «Κύκλου μέτρησις».

#### § 46 Ἐμβαδὸν κυκλικοῦ τομέως.

Θεωροῦμεν κύκλον κέντρου Ο καὶ ἀκτίνος R. "Εστω OANB εἰς τομεὺς τοῦ κύκλου. Ὡς γνωστὸν κυκλικὸς τομεὺς λέγεται ἡ μεικτὴ κλειστὴ γραμμὴ ἡ ὅποια ἀποτελεῖται ἐξ ἐνὸς τόξου κύκλου (π.χ. τοῦ ANB) καὶ τῶν δύο ἀκτίνων, αἱ ὅποιαι καταλήγουν εἰς τὰ ἄκρα αὐτοῦ τοῦ τόξου (σχ. 77). Τὸ τόξον ANB λέγεται βάσις τοῦ κυκλικοῦ τομέως. Δυνάμεθα νὰ θεωρήσωμεν τὸν κύκλον ὡς ἐνα κυκλικὸν τομέα, τοῦ ὅποιου ἡ γωνία τῆς κορυφῆς εἶναι  $360^\circ$ .

Ἐμβαδὸν κυκλικοῦ τομέως καλοῦμεν τὴν ἐκτασίν τῆς ἐπιφανείας αὐτοῦ (ἥτοι τοῦ ἐσωτερικοῦ του), ἐκπεφρασμένην εἰς μονάδας μετρήσεως.



σχ. 77.

Έάν ε είναι τὸ ἐμβαδὸν κυκλικοῦ τομέως μ<sup>0</sup> καὶ Ε τὸ ἐμβαδὸν τοῦ κύκλου του, θὰ ἔχωμεν  $\frac{\epsilon}{E} = \frac{\mu}{360} \iff \epsilon = \frac{E \cdot \mu}{360} \iff \epsilon = \frac{\pi \cdot R^2 \cdot \mu}{360}$

Άλλα  $\epsilon = \frac{\pi R^2 \mu}{360} = \frac{\pi R \mu}{180} \cdot \frac{R}{2} = \tau \cdot \frac{R}{2}$  (όπου τὸ μῆκος τῆς βάσεως)

Ἐφαρμογαί.


1. Ἐμβαδὸν κυκλικοῦ τμήματος: Ὁ νομάζομεν ἑπιφάνειαν κυκλικοῦ τμήματος τὴν περιεχομένην μεταξὺ ἐνὸς τόξου τοῦ κύκλου καὶ τῆς χορδῆς του (π.χ. εἰς τὸ ἔναντι σχῆμα τὸ ANBA καθὼς καὶ τὸ AMBA είναι κυκλικὰ τμήματα. (σχ. 78).

Διὸ νὰ ὑπολογίσωμεν τὸ ἐμβαδὸν τοῦ κυκλικοῦ τμήματος ANBA, τοῦ δποίου τὸ τόξον είναι μικρότερον τοῦ ἡμικυκλίου, ἀφαιροῦμεν ἀπὸ τὸ ἐμβαδὸν τοῦ κυκλικοῦ τομέως AOBN τὸ ἐμβαδὸν τοῦ τριγώνου AOB.

Δυνάμεθα νὰ εύρωμεν τὸ ἐμβαδὸν τοῦ κυκλικοῦ τμήματος AMBA, τοῦ δποίου τὸ τόξον είναι μεγαλύτερον τοῦ ἡμικυκλίου, προσθέτοντες εἰς τὸ ἐμβαδὸν τοῦ κυκλικοῦ τομέως AOBMA τὸ ἐμβαδὸν τοῦ τριγώνου AOB.

2. Ἐμβαδὸν κυκλικῆς στεφάνης: Ἡ ἑπιφάνεια, ἡ περιεχομένη μεταξὺ δύο δομοκέντρων κύκλων, ἀκτίνων  $R_1$  καὶ  $R_2$  (όπου  $R_1 > R_2$ ) λέγεται κυκλικὴ στεφάνη (ἢ κυκλικὸς δικτύλιος) (σχ. 79). Τὸ ἐμβαδὸν τῆς κυκλικῆς στεφάνης δίδεται ὑπὸ τοῦ τύπου  $E = \pi R_1^2 - \pi R_2^2 = \pi (R_1^2 - R_2^2)$ .

Ἀσκήσεις



σχ. 79.

166) Ὑπολογίσατε τὸ ἐμβαδὸν ἐνὸς κύκλου ἀκτίνος 13 cm.

167) Νὰ εύρεθῇ ἡ ἀκτίς ἐνὸς κύκλου, τοῦ δποίου τὸ ἐμβαδὸν είναι 50,24 dm<sup>2</sup>.

168) Τὸ μῆκος κύκλου είναι 37,68 dm. Νὰ εύρητε τὸ ἐμβαδὸν τοῦ κύκλου τούτου.


169) Νὰ εύρητε τὸ ἐμβαδὸν κυκλικοῦ τομέως 60° κύκλου ἀκτίνος 10 cm.

170) Νὰ ὑπολογισθῇ τὸ ἐμβαδὸν κυκλικῆς στεφάνης, ἡ δποία σχηματίζεται ἀπὸ δύο δομοκέντρους κύκλους ἀκτίνων 8 cm καὶ 5 cm.

171) Νὰ ὑπολογίσητε τὸ ἐμβαδὸν ἐνὸς κύκλου, ἀκτίνος  $R=3\alpha$ .

172) Τὸ ἐμβαδὸν ἐνὸς κύκλου είναι  $24\pi a^2$ . Νὰ ὑπολογίσητε τὴν ἀκτίνα αὐτοῦ.

173) Δίδεται κύκλος ἀκτίνος  $R=4\alpha$  καὶ κυκλικὸς τομεὺς αὐτοῦ γωνίας  $60^\circ$ . Νὰ εύρητε τὸ ἐμβαδὸν αὐτοῦ τοῦ κυκλικοῦ τομέως καὶ τὴν περίμετρόν του.



σχ. 78.


174) Νὰ εύρητε τὸ ἐμβαδὸν ἐνὸς κυκλικοῦ τμήματος, τὸ ὅποιον δρίζεται ἐπὶ κύκλου ἀκτῖνος  $R$ , καὶ τοῦ ὅποιού τὸ ἀντίστοιχον τόξον εἴναι  $60^\circ$ . Ἐφαρμογὴ:  $R=15$  cm.

175) Ἡ περίμετρος ἐνὸς κυκλικοῦ τομέως, ὃ ὅποιος δρίζεται ἐπὶ κύκλου ἀκτῖνος  $6$  dm εἰναι  $13,57$  dm. Νὰ εύρητε τὴν ἐπίκεντρον γωνίαν τοῦ κυκλικοῦ τομέως καὶ τὸ ἐμβαδὸν του.

**Πίνακες τύπων τοῦ ἐμβαδοῦ διαφόρων ἐπιπέδων σχημάτων**

Εἰκὼν τοῦ εὐθ. σχήμα.	"Ονομα τοῦ σχήματος	Τύπος διδών τὸ ἐμβαδὸν τῆς ἐπιφανείας αὐτοῦ
	'Ορθογώνιον	$E = \alpha \beta$ (ἢ $E = B \cdot u$ )
	Τετραγωνον	$E = \alpha^2$
	Παραλληλόγραμμον	$E = \beta \cdot u$
	Τρίγωνον	$E = \frac{\alpha \cdot u_1}{2} = \frac{\beta \cdot u_2}{2} = \frac{\gamma \cdot u_3}{2}$
	Τραπέζιον	$E = \frac{\beta_1 + \beta_2}{2} \cdot u$
	Κύκλος	$E = \pi R^2$


**Ασκήσεις διάφοροι ἐπὶ τῶν ἐμβαδῶν**




176) Δύο ἴσοι κύκλοι, ἀκτῖνος  $\alpha$ , τέμνονται. Τὰ κέντρα των ἀπέχουν μεταξύ των κατά  $\alpha$ . Νὰ εύρητε τὸ ἐμβαδὸν τῆς κοινῆς ἐπιφανείας τῶν δύο κύκλων. Ἐφαρμογὴ:  $\alpha = 5$  cm. (Σχῆμα 80).


177) Δίδεται τετράγωνον πλευρᾶς  $10$  cm. Μὲ κέντρα τὰς κορυφάς του καὶ ἀκτῖνα τὸ ἡμισυ τῆς διαγωνίου του, γράφομεν τέσσαρα τεταρτοκύλια κύκλου (περιστούμενα ἐπὶ τῶν πλευρῶν τοῦ τετραγώνου). Νὰ εύρητε τὸ ἐμβαδὸν τῆς γραμμοσκιασμένης ἐπιφανείας τοῦ σχήματος (81).

178) Δίδονται τρεῖς ἴσοι κύκλοι κέντρων  $O_1$ ,  $O_2$ ,  $O_3$  καὶ ἀκτῖνος  $R=10$  cm. Οὗτοι ἔφαπτονται ἔξωτερικῶς ἀνά δύο καὶ δρίζουν σύντοις ἐν καμπτολόγραμμον τρίγωνον  $ABG$  (τὸ γραμμοσκιασμένον ἐπίπεδον μέρος). Νὰ ύπολογίσητε τὸ ἐμβαδὸν τῆς ἐπιφανείας τοῦ καμπτολόγραμμου αὐτοῦ τριγώνου (σχ. 82).






σχ. 82.



σχ. 83.



σχ. 84.

179) Δίδεται δρθογώνιον καὶ ισοσκελὲς τρίγωνον  $AB\Gamma$ . Τὸ μῆκος τῶν καθέτων πλευρῶν αὐτοῦ εἶναι  $\alpha$ . Μὲ διαμέτρους τὰ ἡμίση τῶν καθέτων πλευρῶν του χαράσσομεν 4 ἡμικύκλια, ὡς φαίνεται εἰς τὸ σχῆμα 83. Νὰ εύρητε τὸ ἐμβαδὸν τῆς γραμμοσκιασμένης ἐπιφανείας.

Ἐφαρμογὴ:  $\alpha = 4$  cm.

180) Δίδεται ισόπλευρον τρίγωνον  $AB\Gamma$  πλευρᾶς μήκους  $\alpha$ . Μὲ κέντρα τὰς κορυφὰς  $B$  καὶ  $A$  καὶ ἀκτῖνα  $\frac{\alpha}{2}$  γράφομεν τόξα κείμενα εἰς τὰ ἑσωτερικὸν τῶν γωνιῶν  $A$  καὶ  $B$  καὶ τὰ ὅποια περατοῦνται ἐπὶ τῶν πλευρῶν των. Ἐπίσης γράφομεν δύο ἡμικύκλια μὲ διαμέτρους  $GM = \Gamma N = \frac{\alpha}{2}$ , ὡς φαίνεται εἰς τὸ σχῆμα 84. Νὰ ύπολογίσητε τὸ ἐμβαδὸν τῆς γραμμοσκιασμένης ἐπιφανείας. Ἐφαρμογὴ:  $\alpha = 6$  cm.

181) Δίδεται τραπέζιον  $AB\Gamma\Delta$ , δρθογώνιον εἰς τὰ  $A$  καὶ  $\Delta$  εἰς τὸ ὅποιον ἔχομεν  $A\Delta = AB = \frac{\Gamma\Delta}{2}$ . Τὸ ἐμβαδὸν αὐτοῦ τοῦ τραπεζίου εἶναι  $6a^2$ . Ὑπόλογίσατε τὰς βάσεις καὶ τὸ ύψος τοῦ τραπεζίου συναρτήσει τοῦ  $a$ .

182) Χαράξατε τραπέζιον  $AB\Gamma\Delta$  ( $\Delta\Gamma//AB$ ). Εύρετε τὸ μέσον  $I$  τῆς  $B\Gamma$  καὶ φέρατε τὴν  $\Delta I$ , ἡ ὅποια τέμνει τὴν  $AB$  εἰς τὸ σημεῖον  $E$ . Συγκρίνατε τὰ ἐμβαδά τοῦ τραπεζίου καὶ τοῦ τριγώνου  $\Delta AE$ .

183) Ἀπό τὸ μέσον  $I$  τῆς πλευρᾶς  $\Delta\Gamma$  τοῦ τραπεζίου  $AB\Gamma\Delta$  ( $\Delta\Gamma//B\Gamma$ ) φέρατε παράλληλον πρὸς τὴν  $AB$ , ἡ ὅποια τέμνει τὰς εὐθεῖας  $A\Delta$  καὶ  $B\Gamma$  εἰς τὰ σημεῖα  $E$  καὶ  $Z$  ἀντιστοίχως.

1ον. Συγκρίνατε τὰ ἐμβαδά τοῦ τραπεζίου  $AB\Gamma\Delta$  καὶ τοῦ παραστηλογράμμου  $ABZE$ .

2ον. Χαράξατε τὴν  $IK$  κάθετον ἐπὶ τὴν  $AB$  καὶ εύρετε τὸ ἐμβαδὸν τοῦ τραπεζίου ἐκ τοῦ μήκους τῆς  $AB$  καὶ τοῦ μήκους τῆς  $IK$ .

184) Εἰς τὸ ἀνωτέρῳ τραπέζιον χαράξατε τὰς διαγωνίους, αἱ ὅποιαι τέμνονται εἰς τὸ  $O$

1ον. Συγκρίνατε τὰ ἐμβαδά τῶν τριγώνων  $AB\Gamma$  καὶ  $\Delta B\Gamma$  καὶ

2ον. Συγκρίνατε ἐπίσης τὰ ἐμβαδά τῶν τριγώνων  $AOB$  καὶ  $\Delta OG$ .


## Δ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

§ 47. Λέγομεν ὅτι κατασκευάζομεν ἐν σχῆμα, ὅταν χαράσσωμεν αὐτὸ μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ κανόνος καὶ τοῦ διαβήτου, βάσει ὀρισμένων δεδομένων. Π.χ. ὅταν κατασκευάζωμεν τρίγωνον, τοῦ ὅποιού δίδονται αἱ πλευραί. "Οταν κατασκευάζωμεν τὴν μεσοκάθετον δεδομένου εύθυγράμμου τμήματος ἢ ὅταν κατασκευάζωμεν τὴν διχοτόμον μιᾶς δεδομένης γωνίας.

Τάς κατασκευάς πραγματοποιούμεν χαράσσουντες εύθειας καὶ κύκλους καὶ στηριζόμενοι εἰς τὰς γνωστὰς ίδιότητας τῶν σχημάτων. Τώρα πλέον γνωρίζομεν πολλάς ίδιότητας αὐτῶν σχετικάς μὲ τὰς ἔγγεγραμμένας εἰς κύκλουν γωνίας, τὴν διμοιότητα καὶ τὰ ἐμβαδά τῶν σχημάτων. Συνεπῶς εἴμεθα εἰς θέσιν νά πραγματοποιήσωμεν καὶ ἄλλας κατασκευάς πέραν τῶν δσων ἔχομεν μάθει.

#### § 48. Πρόβλημα.

Νὰ κατασκευασθῇ τόξον κύκλου μὲ χορδὴν τὸ δεδομένον εὐθ. τμῆμα α., εἰς τὸ δόποιον νὰ ἐγγράφεται δεδομένη γωνία ω.




τὴν κορυφὴν τῆς ἐπ’ αὐτοῦ εἶναι ἵση πρὸς ΑΓΒ, δηλαδὴ ἵση πρὸς ω.

### § 49. Πρόβλημα 1ον.

Νὰ κατασκευασθῇ τετράγωνον τοῦ  
δποίου τὸ ἐμβαδὸν νὰ ίσοιται πρὸς τὸ  
ἄθροισμα δύο δεδομένων τετραγώνων  
*ΑΒΓΔ* καὶ *EZHΘ*.

Ἐὰν καλέσωμεν  $\chi$  τὴν τιμὴν τῆς πλευρᾶς τοῦ ζητουμένου τετραγώνου, θά πρέπει νὰ είναι  $\chi^2 = (AB)^2 + (EZ)^2$ . Ἐπειδή αὐτὸ μᾶς ὑπενθυμίζει τὸ πυθαγόρειον θεώρημα, πραγματοποιοῦμεν τὴν ἔξης κατασκευήν. Κατασκεύαζομεν δρθογώνιον τρίγωνον  $B'A'Γ'$  μὲ καθέτους πλευράς  $A'B' = AB$  καὶ  $A'Γ' = EZ$ . Μὲ πλευράς τὴν ὑποτείνουσαν αὐτοῦ κατασκεύαζομεν τὸ τετρά-


Ἐπὶ εὐθείας εἱ λαμβάνομεν τμῆμα  $AB = \alpha$  καὶ φέρομεν πρὸς τὸ αὐτὸ μέρος τῆς εἰ τὰς παραλλήλους ἡμιευθείας  $AX$  καὶ  $BY$ . Κατασκευάζομεν τώρα γωνίαν  $\hat{Y}BZ = \omega$ . Ἡ  $BZ$  τέμνει τὴν  $AX$  εἰς τὸ σημεῖον  $G$ . (ἢ γωνία  $AGB$  εἶναι ἵση πρὸς  $\omega$  κατὰ τὰς γνωστὰς Ιδιότητας τῶν παραλλήλων). Κατασκευάζομεν κατὰ τὰ γνωστὰ τὸν περιγεγραμμένον κύκλον τοῦ τριγώνου  $ABG$  (σχ. 85). Τὸ τόξον  $AGB$  αὐτοῦ εἶναι τὸ ζητούμενον, διότι κάθε γωνία  $AMB$  μὲ



γωνιον  $B'D'E'\Gamma'$  (σχ. 86). Αύτὸν εἶναι τὸ ζητούμενον, διότι  $(B'\Gamma')^2 = (A'B')^2 + (A'\Gamma')^2$ , δηλαδὴ  $(B'\Gamma')^2 = (AB)^2 + (EZ)^2$ .

### Πρόβλημα 2ον

**Πρόβλημα.** Νὰ κατασκευασθῇ τετράγωνον, τοῦ ὅποίν τὸ ἐμβαδὸν νὰ ισοῖται πρὸς τὴν διαφορὰν δύο δεδομένων τετραγώνων  $AB\Gamma\Delta$  καὶ  $EZH\Theta$  (σχ. 87).




σχ. 87.

Ἐὰν καλέσωμεν χ τὴν τιμὴν τῆς πλευρᾶς τοῦ ζητουμένου τετραγώνου, πρέπει νὰ εἶναι  $\chi^2 = (EZ)^2 - (AB)^2$ . Ἡ σχέσις αὐτὴ δῆμοι εἰς τὴν κατασκευὴν δρθογωνίου τριγώνου μὲ ὑποτείνουσαν τὴν EZ καὶ μίαν κάθετον πλευρὰν AB. Κατασκευάζομεν δρθογωνίου τριγώνον  $A'B'\Gamma'$  ἐκ τῆς καθέτου πλευρᾶς  $A'\Gamma' = AB$  καὶ ἐκ τῆς ὑποτείνουσῆς  $\Gamma'B' = EZ$ . Μὲ πλευρὰν τὴν κάθετον  $A'B'$  κατασκευάζομεν τὸ τετράγωνον  $A'B'\Delta'E'$ , τὸ ὅποῖον εἶναι τὸ ζητούμενον.

§ 50. Ἐνίστε δυνάμεθα, διὰ γεωμετρικῶν κατασκευῶν, νὰ μετρήσωμεν φυσικὰ μεγέθη.

### Παράδειγμα :

Μετροῦμεν τὸ μῆκος σκιᾶς δένδρου καὶ τὸ ενδίσκομεν 22,5 m. Πῶς δυνάμεθα



σχ. 88.

νὰ μετρήσωμεν τὸ ὄψος τοῦ δένδρου (χωρὶς νὰ ἀναρριχηθῶμεν μέχρι τῆς κορυφῆς), χρησιμοποιοῦντες κατακόρυφον στόλον μήκους ἐνός μέτρου; (σχ. 88).

Παριστῶμεν τὸ ὄψος τοῦ δένδρου διὰ τῆς καθέτου πρὸς τὴν ὁρίζονταν γραμμὴν ΑΒ, τὴν σκιὰν διὰ τοῦ τμήματος ΑΓ, τὸν στύλον διὰ τοῦ ΕΔ καὶ τὴν σκιὰν του διὰ τοῦ ΔΖ. Μετροῦμεν ἐπὶ τοῦ ἐδάφους διὰ μετροταῖνας τὴν ΔΖ καὶ εὑρίσκομεν  $\Delta Z = 1,5$  m.

Ἐπειδὴ αἱ ἡλιακαὶ ἀκτῖνες ἔρχονται λόγῳ τῆς μεγάλης ἀποστάσεως παράλληλοι, θὰ εἰναι  $\widehat{Γ} = \widehat{Ζ}$ . Τότε ὅμως τὰ ὄρθιογώνια τρίγωνα ΒΑΓ καὶ ΕΔΖ εἰναι ὅμοια· ἥρα  $\frac{AB}{ED} = \frac{AG}{DZ} \Rightarrow \frac{AB}{1m} = \frac{22,5}{1,5} = 15$  m. Τὸ ὄψος τοῦ δένδρου εἶναι 15 m.

**Σημείωσις.** Λέγεται διτὶ μὲν παρόμοιον τρόπον δὲ Θαλῆς ἐμέτρησε τὸ ὄψος τῆς μεγάλης πυραμίδος (κατὰ ἓν ταξείδιόν του εἰς Αἴγυπτον) καὶ ἀπέσπασε τὸν θαυμασμὸν τῶν αἰγυπτίων σοφῶν.

### \*Α σκήσεις

185) Νὰ κατασκευάσητε τόξον κύκλου εἰς τὸ ὅποιον ἔγγραφεται γωνία  $45^{\circ}$ .

186) Νὰ διατρέψῃ τρίγωνον εἰς δύο ισοδύναμα τρίγωνα δι' εὐθείας διερχομένης διὰ μιᾶς τῶν κορυφῶν του.

187) Νὰ κατασκευασθῇ τετράγωνον, τοῦ ὅποιου τὸ ἐμβαδόν ίσοῦται πρὸς τὸ σθροισμα τῶν ἐμβαδῶν τριῶν δεδομένων τετραγώνων.

188) Νὰ κατασκευασθῇ τετράγωνον, τοῦ ὅποιου ἡ διαγώνιος ίσοῦται πρὸς δεδομένον τμῆμα δ.

# ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IV

### A. ΣΧΕΤΙΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΩΝ

#### § 51. Εισαγωγή

Εις τὴν Α' τάξιν, ἐμάθομεν διὰ τὰ γεωμετρικὰ στερεά(ἢ ἀπλῶς στερεά) καὶ τὰς διαφορὰς αὐτῶν ἀπὸ τῶν ἀντιστοίχων φυσικῶν στερεῶν.

'Εγνωρίσαμεν ίδιότητας τῶν γεωμετρικῶν στερεῶν α) τὸ μέγεθος αὐτῶν ἢ τὴν ἔκτασίν των εἰς τὸν τρισδιάστατον χῶρον, β) τὸ σχῆμα αὐτῶν (τὴν μορφὴν των) καὶ γ) τὴν δυνατότητα νὰ ἀλλάσσωμεν τὴν θέσιν των ἐντὸς τοῦ χώρου, χωρὶς νὰ μεταβάλλωνται τὸ σχῆμα καὶ τὸ μέγεθος αὐτῶν (εἰς ἀνωτέραν τάξιν θὰ ἔξετάσωμεν λεπτομερέστερον τὴν ίδιότητα αὐτῆν καὶ θὰ μάθωμεν, ὅτι εἰς ἑκάστην θέσιν ὑπάρχει στερεὸν ἵσον πρὸς τὸ μετατοπιζόμενον). Τέλος ἐγνωρίσαμεν διάφορα γεωμετρικά σχήματα (εὐθεῖαν, ἐπίπεδον, γωνίαν τρίγωνα, κύκλον, πολύγωνα, πρίσματα, πυραμίδας, κύλινδρον, κῶνον, καὶ σφαῖραν). 'Εκ τῶν γεωμετρικῶν σχημάτων, ἀλλα μὲν ἔχουν ὅλα τὰ σημεῖα των ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ ἐπιπέδου καὶ λέγονται ἐπίπεδα σχήματα (ώς τά: εὐθεῖα, γωνία, τρίγωνον, πολύγωνον, κύκλος), ἀλλων δὲ τὰ σημεῖα δὲν κεῖνται ὅλα ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ ἐπιπέδου καὶ λέγονται μὴ ἐπίπεδα γεωμετρικὰ σχήματα ἢ στερεὰ σχήματα (ώς τά: πρίσματα, πυραμίδες, κύλινδροι, κ.ἄ.).

Τὸ μέρος τῆς Γεωμετρίας, τὸ ὅποιον ἀναφέρεται εἰς τὴν μελέτην τῶν ἐπιπέδων σχημάτων λέγεται Γεωμετρία τοῦ ἐπιπέδου (ἢ ἐπιπεδομετρία). Τὸ δὲ μέρος αὐτῆς τὸ ἀναφερόμενον εἰς τὰς ίδιότητας καὶ τὰς σχέσεις τῶν γεωμετρικῶν σχημάτων ἐπιπέδων καὶ στερεῶν εἰς τὸν χῶρον, λέγεται Γεωμετρία τοῦ χώρου.

Μὲ τὸ δεύτερον αὐτὸ μέρος τῆς γεωμετρίας, θὰ ἀσχοληθῶμεν ἐν συνεχείᾳ.

§ 52. 'Ο χῶρος ἐντὸς τοῦ ὅποιου ἀντιλαμβανόμεθα διὰ τῶν αἰσθήσεών μας τὰ φυσικὰ ἀντικείμενα, δονομάζεται αἰσθητὸς χῶρος. Εἰς τὸν αἰσθητὸν χῶρον λαμβάνομεν «ἱδέαν» τοῦ σημείου διὰ τῆς αἰχμῆς λεπτῆς βελόνης, τῆς εύθειας διὰ τεταμένου λεπτοῦ νήματος καὶ τοῦ ἐπιπέδου διὰ τῆς ἐπιφανείας ὑαλοπίνακος.

'Εκ τοῦ αἰσθητοῦ χώρου σχηματίζομεν διὰ τῆς νοήσεως τὸν Γεωμετρικὸν χῶρον, ἀφαιροῦντες ὀλίγον κατ' ὀλίγον τὰς αἰσθητὰς ίδιότητας τῶν ἀντικειμένων.

**Στοιχεῖα τοῦ Γεωμετρικοῦ χώρου εἶναι τὰ σημεῖα, αἱ εὐθεῖαι καὶ τὰ ἐπίπεδα.**

Τὰς ἴδιότητας τῶν στοιχείων τοῦ Γεωμετρικοῦ χώρου δίδομεν μὲν μερικάς βασικάς προτάσεις, τὰς δόποιας δύνομάζομεν ἀξιώματα.

**§ 53. Καθορισμὸς μιᾶς εὐθείας εἰς τὸν χῶρον —**

**‘Αξιώματα :**

A B

σχ. 89α.

1. Διὰ δύο διακεκριμένων τυχόντων σημείων τοῦ χώρου διέρχεται μία εὐθεῖα καὶ μόνον μία. (σχ. 89α).

2. ‘Η εὐθεῖα εἶναι ἀπεριόριστος (δηλαδὴ τὸ εὐθ. τμῆμα AB δύναται νὰ προεκταθῇ ἐκατέρωθεν).

**§ 54. ‘Ορισμὸς τοῦ ἐπιπέδου.**

‘Εὰν παρατηρήσωμεν τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ ἡρεμοῦντος ὄρατος μιᾶς ὄρατος διεξαμενῆς ἢ ἐνὸς δοχείου ἢ τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ ὑαλοπίνακος, λαμβάνομεν ἵδεαν τῆς ἐπιπέδου ἐπιφανεῖας,


Διὰ νὰ ἔξακριβώσωμεν πρακτικῶς, ἐὰν μία ἐπιφάνεια εἶναι ἐπίπεδος, θέτομεν ἐπ’ αὐτῆς ἔνα κανόνα, τὸν δόποιον μετατοπίζομεν πρὸς διαφόρους διευθύνσεις, παρατηροῦντες ἐὰν ἡ ἀκμὴ αὐτοῦ ἐφαρμόζῃ εἰς ὅλας τὰς θέσεις ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας. “Ἐχομεν λοιπὸν εἰς τὸν Γεωμ. χῶρον τὸ κάτωθι ἀξίωμα :

“Ἐν ἐπίπεδον (p) εἶναι μία ἐπιφάνεια, τοιαύτη ὥστε, ἐὰν δύο σημεῖα μιᾶς εὐθείας κεῖνται ἐπὶ τοῦ ἐπιπέδου, τότε δλόκληρος ἡ εὐθεῖα κεῖται ἐπὶ αὐτοῦ.

Αἱ εὐθεῖαι ἐνὸς ἐπιπέδου εἶναι, ὡς εἴπομεν, ἀπεριόριστοι, ἄρα καὶ τὸ ἐπίπεδον εἶναι μία ἐπιφάνεια ἀπεριόριστος.

**Παράστασις τοῦ ἐπιπέδου**

‘Επειδὴ τὸ ἐπίπεδον εἶναι μία ἀπεριόριστος ἐπιφάνεια, παριστῶμεν μόνον



σχ. 89.

ποία ἐκτείνεται ἀπεριορίστως.

ἐν μέρος αὐτοῦ συνήθως δι’ ἐνὸς ὁρθογώνιου (σχ. 89). Τὸ ὁρθογώνιον αὐτὸ διανετεῖται προσπτικῶς ὡς ἐν παραλληλόγραμμον. ‘Ἐπ’ αὐτοῦ δὲ σημειοῦμεν ἐν τῶν ἐπομένων λατινικῶν γραμμάτων (p), (q), κ.λ.π.

**Σημ.** ‘Η τοιαύτη δύμως παράστασις τοῦ ἐπιπέδου δὲν πρέπει νὰ μᾶς παρασύρῃ, διότε νὰ λησμονῶμεν ὅτι τὸ ἐπίπεδον εἶναι μία ἐπιφάνεια, ἡ δ-


§ 55. Καθορισμός ἐνὸς ἐπιπέδου εἰς τὸν χῶρον

**Άξιωμα :** Διὰ τριῶν σημείων, τὰ δοποῖα δὲν κεῖνται ἐπὶ τῆς αὐτῆς εύθειας διέρχεται ἐν καὶ μόνον ἐν ἐπίπεδον.


Πρακτικῶς εἶναι εὔκολον νὰ ἐπιτύχωμεν τὴν ἀναπαράστασιν τοῦ καθορισμοῦ τοῦ ἐπιπέδου. Τοποθετοῦμεν μίαν μεταλλικὴν πλάκα ἐπὶ τριῶν σημείων π.χ. A, B, Γ μὴ κειμένων ἐπὶ τῆς αὐτῆς εύθειας ε καὶ παρατηροῦμεν διὰ αὐτὴ στηρίζεται ἐπ' αὐτῶν (σχ. 90). (Τοῦτο δὲν ἐπιτυγχάνεται διὰ δύο σημείων). Ἐὰν θελήσωμεν νὰ στηρίξωμεν καὶ ἄλλην μεταλλικὴν πλάκα ἐπὶ τῶν τριῶν σημείων (π.χ. ἄκρων ἀκίδων μεταλλικῶν) A, B, Γ, θά παρατηρήσωμεν διὰ αὐτὴ θὰ ἐφαρμόσῃ ἐπὶ τῆς πρώτης μεταλλικῆς πλακός καὶ αἱ ἐπίπεδοι αὐτῶν ἐπιφάνειαι θὰ ταυτισθοῦν. Ἐκ ταύτης καὶ ἄλλων παρομοίων παρατηρήσεων ἐπὶ φαινομένων τῆς καθημερινῆς ζωῆς (π.χ. τράπεζαι, τρίποδοι, καθίσματα κ.ἄ.), δικαιολογοῦμεν διατὶ ἔθεσαμεν εἰς τὸν Γεωμ. χῶρον τὸ ἀνωτέρω ἀξιωμα. Δυνάμεθα νὰ συμπεράνωμεν ἀκόμη, διὰ:

I. Διὰ μιᾶς εύθειας καὶ ἐνὸς σημείου A, τὸ δοποῖον δὲν κεῖται ἐπὶ αὐτῆς διέρχεται ἐν καὶ μόνον ἐν ἐπίπεδον

Θεωροῦμεν μίαν εύθειαν ε καὶ ἐν σημείον A ἑκτὸς αὐτῆς Ἐὰν λάβωμεν ἐπὶ τῆς ε δύο τυχόντα σημεῖα B καὶ Γ καὶ θεωρήσωμεν καὶ τὸ σημεῖον A, ἔχομεν τρία



σχ. 91.




σχ. 92.

σημεῖα μὴ κείμενα ἐπὶ τῆς αὐτῆς εύθειας καὶ ὡς ἐμάθομεν ταῦτα ὅριζουν ἐν ἐπίπεδον, τὸ P εἰς τὸ δοποῖον κεῖται καὶ ἡ ε (διατί);.


Αὐτὸ δυνάμεθα καὶ πρακτικῶς νὰ διαπιστώσωμεν, ἐὰν στηρίξωμεν μίαν ἐπίπεδον μεταλλικὴν πλάκα ἐπὶ ἐνὸς τεταμένου νήματος (συρματίνου) ε καὶ ἐνὸς σημείου A (ἄκρου ἀκίδος), τὸ δοποῖον κεῖται ἑκτὸς τοῦ νήματος. Τὸ ἐπίπεδον στρεφόμενον περὶ τὴν ε δύναται νὰ διέλθῃ διὰ πάσης νέας θέσεως τοῦ σημείου A. (Σχ. 92).

**II) Διὰ δύο τεμνομένων εύθειῶν διέρχεται ἐν μόνον ἐπίπεδον**

Τοῦτο συμβαίνει, διότι ἔχομεν τρία σημεῖα τὰ Ο, Α καὶ Β τὰ δόποια δὲν κείνται ἐπὶ τῆς αὐτῆς εύθειας.



σχ. 93.



σχ. 94.

Δυνάμεθα νὰ διαπιστώσωμεν τοῦτο καὶ πρακτικῶς, ἐὰν τοποθετήσωμεν μίαν μεταλλικὴν πλάκαν ἐπὶ δύο συρματίνων νημάτων, τὰ δόποια ἔχουν ἐν κοινὸν σημεῖον, δόποτε θὰ ᾔδωμεν ὅτι αὗτη στηρίζεται ἐπ' αὐτῶν (σχ. 94).

**III) Διὰ δύο παραλλήλων εύθειῶν διέρχεται ἐν μόνον ἐπίπεδον**



σχ. 95.

Αὐτὸς εἶναι φανερόν, διότι δύο παράλληλοι εύθειαι, ἐξ δρισμοῦ, κείνται εἰς τὸ αὐτό ἐπίπεδον (σχ. 95).

"ΩΣΤΕ τὸ ἐπίπεδον δρίζεται :

I. 'Υπὸ τριῶν σημείων, τὰ δόποια δὲν κείνται ἐπὶ τῆς αὐτῆς εύθειας.

II. 'Υπὸ μιᾶς εύθειας καὶ ἐνὸς σημείου, τὸ δόποιον δὲν κείται εἰς αὐτήν.

III. 'Υπὸ δύο τεμνομένων εύθειῶν.

IV. 'Υπὸ δύο παραλλήλων εύθειῶν.

### Θέσεις εύθειῶν καὶ ἐπιπέδων

#### § 56. I. Σχετικαὶ θέσεις εύθειῶν εἰς τὸν χῶρον


A. Δύο διακεκριμέναι εύθειαι  $\epsilon_1$ ,  $\epsilon_2$  δύνανται νὰ ἔχουν τὰς ἑξῆς θέσεις :

- α) Νὰ κείνται εἰς τὸ αὐτό ἐπίπεδον (νὰ εἶναι συνεπίπεδοι).
- β) Νὰ μὴ κείνται εἰς τὸ αὐτό ἐπίπεδον.

Εἰς τὴν πρώτην περίπτωσιν αἱ εύθειαι ἢ

θὰ τέμνωνται ἢ θὰ εἶναι παράλληλοι.

Κατὰ τὴν δευτέραν περίπτωσιν δὲν τέμνονται καὶ δὲν εἶναι παράλληλοι. Τότε αἱ εύθειαι  $\epsilon_1$  καὶ  $\epsilon_2$  λέγονται ἀσύμβατοι εύθειαι (ἢ στρεβλοὶ ή μὴ συνεπίπεδοι). (Σχ. 96, 97)




σχ. 96.


σχ. 97

II. Τρεῖς ή περισσότεραι εύθειαι δύνανται :


α) Νὰ εἶναι συνεπίπεδοι (σχ. 98).



σχ. 98.



σχ. 99.



σχ. 100.


β) Νὰ διέρχωνται διὰ τοῦ αὐτοῦ σημείου, χωρὶς νὰ εἶναι συνεπίπεδοι (σχ. 99).

γ) Νὰ εἶναι ἀνὰ δύο παράλληλοι χωρὶς νὰ εἶναι συνεπίπεδοι. (Εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτήν ἔχουν τὰς ιδιότητας τῆς παραλληλίας, τὰς ὅποιας ἐμάθομεν) (σχ. 100).


### § 57. Σχετικαὶ θέσεις εὐθείας καὶ ἐπιπέδου

α' περίπτωσις:

Ἐὰν μία εὐθεία εἴχῃ δύο κοινὰ σημεῖα A καὶ B μὲν ἐν ἐπιπέδῳ (p), αὗτη κείται εἰς τὸ ἐπιπέδον τοῦτο, ὡς ἐμάθομεν κατὰ τὸν δρισμὸν τοῦ ἐπιπέδου. (Σχ. 101)



σχ. 101.




σχ. 102.

β' περίπτωσις :

Ἐὰν εὐθεῖα εἴχῃ ἐν μόνον κοινὸν σημεῖον M μὲ τὸ ἐπιπέδον (p), λέγομεν ὅτι ἡ εὐθεῖα ε τέμνει τὸ ἐπιπέδον αὐτὸ ή ὅτι τὸ ἐπιπέδον (p) τέμνει τὴν εὐθεῖαν ε. Τὸ κοινὸν σημεῖον αὐτῶν M λέγεται σημεῖον τομῆς ή ἰχνος. (Σχ. 102)

ε




σχ. 103.

γ' περίπτωσις :

Ἐὰν τέλος μία εὐθεῖα ε ούδεν ἔχῃ κοινὸν σημεῖον μὲ τὸ ἐπιπέδον (p), λέγομεν ὅτι αὗτη εἶναι παράλληλος πρὸς τὸ ἐπιπέδον αὐτό. (Σχ. 103)

### § 58. Η ἔννοια τοῦ ἡμίχωρου

Ἐν ἐπίπεδον  $p$ , ἐπειδὴ προεκτεῖ νεται ἀπεριορίστως πρὸς ὅλας τὰς διεύθυνσεις, χωρίζει τὸν χῶρον εἰς δύο περιοχάς  $\Sigma_1$  καὶ  $\Sigma_2$ . Αὐταὶ αἱ δύο περιοχαὶ καλοῦνται ἡμίχωροι. (Σχ. 104)



σχ. 104.


Ἐάν δύο σημεῖα  $A$  καὶ  $A'$  ἀνήκουν ἀντιστοίχως εἰς τοὺς δύο ἡμίχωρους  $\Sigma_1$  καὶ  $\Sigma_2$ , ἡ εὐθεῖα  $AA'$  τέμνει τὸ ἐπίπεδον εἰς ἓν σημεῖον  $M$ , μεταξὺ τῶν  $A$  καὶ  $A'$ , τὸ ὅποιον καλοῦμεν σημεῖον τομῆς τῆς εὐθείας καὶ τοῦ ἐπιπέδου. Ἡ ἡμιευθεῖα  $MA$  περιέχεται εἰς τὸν ἡμίχωρον  $\Sigma_1$  καὶ ἡ  $MA'$  περιέχεται εἰς τὸν ἡμίχωρον  $\Sigma_2$ .

### § 59. Σχετικαὶ θέσεις ἐπιπέδων

#### A'. Δύο ἐπιπέδων

α) Ἐάν δύο διακεκριμένα ἐπίπεδα ( $p$ ) καὶ ( $q$ ) ἔχουν κοινὰ δύο σημεῖα  $A$ ,  $B$  θὰ ἔχουν κοινὴν καὶ τῇ εὐθεῖᾳ  $AB$  (διατί;). Τότε λέγομεν ὅτι τὰ ἐπίπεδα ( $p$ ) καὶ ( $q$ ) τέμνονται κατὰ τῇ εὐθεῖᾳ  $AB$ . Ἡ εὐθεῖα αὐτῇ λέγεται τομὴ τῶν δύο ἐπιπέδων.


Τὰ ἐπίπεδα ( $p$ ) καὶ ( $q$ ) δὲν ᔁχουν ἄλλον κοινὸν σημεῖον  $\Gamma$ , τὸ ὅποιον κεῖται ἐκτὸς τῆς εὐθείας  $AB$ , διότι τότε αὐτὰ θὰ ᔁχον τρία κοινὰ σημεῖα μὴ κείμενα ἐπὶ τῇ εὐθείᾳ εὐθείας καὶ θὰ ἐταυτίζοντο. Τοῦτο δῆμως δὲν εἶναι δυνατόν, διότι τὰ ἐπίπεδα ( $p$ ) καὶ ( $q$ ) εἶναι διακεκριμένα. Τὰ ἐπίπεδα ( $p$ ) καὶ ( $q$ ) λέγονται τεμνόμενα. (σχ. 105)



σχ. 105.

Σημ. Δύο διακεκριμένα ἐπίπεδα, ἔάν ᔁχουν ἐν κοινὸν σημεῖον τέμνονται κατὰ μίαν εὐθεῖαν, ἡ ὅποια διέρχεται διὰ τοῦ σημείου αὐτοῦ. (Ἄξιωμα).


β) Δύο ἐπίπεδα, τὰ ὅποια δὲν ᔁχουν κοινὸν σημεῖον λέγονται παράλληλα [ $(p) \parallel (q)$ ]. (σχ. 106).




σχ. 106.

Β'. Περισσοτέρων τῶν δύο ἐπιπέδων


α) Τρία ἢ περισσότερα ἐπίπεδα δύνανται νὰ διέρχωνται διὰ τοῦ αὐτοῦ σημείου (σχ. 107) ἡ διά μιᾶς εὐθείας (σχ. 108).



σχ. 107.



σχ. 108.



σχ. 109.

β) Έάν δύο διακεκριμένα έπιπεδα είναι παράλληλα πρὸς τρίτον είναι καὶ μεταξύ των παράλληλα. Δύνανται συνεπῶς καὶ περισσότερα τῶν δύο έπιπεδα, νὰ είναι ἀνὰ δύο παράλληλα. Παράδειγμα: Αἱ δροφαὶ (ἢ τὰ δάπεδα) τῶν δρόφων μιᾶς πολυκατοικίας, παράλληλοι πρὸς τὴν δροφὴν τοῦ α' δρόφου (ἢ τὸ ἔδαφος) είναι καὶ μεταξύ των παράλληλοι. (Σχ. 109)

### Α σκήνεις

189) Εἰς τὴν αἴθουσαν διδασκαλίας νὰ εὑρῆτε εὐθεῖας α) παραλλήλους, β) τεμνομένας καὶ γ) ἀσυμβάτους.

190) Εἰς τὴν αἴθουσαν διδασκαλίας δρίσατε τὰ ζεύγη τῶν τεμνομένων έπιπεδῶν καὶ τὰ ζεύγη παραλλήλων έπιπεδῶν.

191) Ἐχομεν τέσσαρα σημεῖα A, B, Γ, Δ, τὰ δόποια δὲν κεῖνται ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ έπιπεδου. Εὕρετε τὴν τομὴν τῶν έπιπεδῶν ABΓ καὶ AΒΔ.

192) Κατασκευάσατε τρεῖς παραλλήλους εὐθεῖας εἱ, εἱ₂ καὶ εἱ₃ α) δταν κεῖνται εἰς τὸ αὐτὸ έπιπεδον καὶ β) δταν δὲν κεῖνται δλαι εἰς τὸ αὐτὸ έπιπεδον (π.χ. διὰ νημάτων παραλλήλως διατεθειμένων).


193) Δίδονται έπιπεδον (p) καὶ μία εὐθεῖα ε παράλληλος πρὸς αὐτό. Τὸ τυχὸν σημεῖον M τοῦ έπιπεδον (p), δρίζει μὲ τὴν ε ἐν έπιπεδον (q), τὸ δόποιον τέμνει τὸ έπιπεδον (p) κατὰ μίαν εὐθεῖαν δ. Ποια ἡ σχετικὴ θέσις τῶν εὐθεῶν αὐτῶν ε καὶ δ; (διατι;)

## B. ΕΥΘΕΙΑ ΚΑΘΕΤΟΣ ΕΠΙ ΕΠΙΠΕΔΟΝ—ΚΑΘΕΤΟΤΗΣ ΕΠΙΠΕΔΩΝ


### § 60. Γωνία δύο ἀσυμβάτων εὐθειῶν.

Θεωροῦμεν δύο εὐθεῖας χχ' καὶ ψψ' τοῦ χώρου, αἱ δόποιαι είναι ἀσύμβατοι. Ἀπὸ ἐν τυχὸν σημεῖον τῆς μιᾶς φέρομεν παράλληλον πρὸς τὴν ἄλλην. Σχηματίζονται τότε τέσσares κυρταὶ γωνίαι, ἐκ τῶν δόποιων δύο είναι δξεῖαι (ίσαι) καὶ δύο διμβλεῖαι (ίσαι) ἢ τέσσares γωνίαι δρθαί. (Σχ. 110).


Γωνίαν δύο ἀσυμβάτων εὐθειῶν χχ' καὶ ψψ' δονομάζομεν τὴν δξεῖαν (ἢ τὴν δρθὴν) γωνίαν τὴν δόποιαν σχηματίζουν αἱ ψψ' καὶ ἡ παράλληλος πρὸς τὴν χχ', χχ', ἡ διερχομένη διὰ σημείου O τῆς ψψ'.



σχ. 110.



σχ. 111.



σχ. 112.


"Αρα ή γωνία τῶν δύο εὐθειῶν XX' και ψψ' εἶναι ή γων. (ΟΧ, Οψ) (σχ. 110).

Δύο εὐθεῖαι λέγονται δρθογώνιοι, ὅταν ή γωνία των εἶναι δρθή (Σχ. 111).


Ἐάν δύο εὐθεῖαι τέμνωνται και εἶναι δρθογώνιοι, εἶναι κάθετοι. Ὡς παράδειγμα δρθογωνίων εὐθειῶν, ἀναφέρομεν τὰς μὴ παραλλήλους ἀκμὰς ἐνδικύβου (σχ. 112).

### § 61. Καθετότης εὐθείας καὶ ἐπιπέδου

Μία εὐθεία ε τέμνουσα τὸ ἐπίπεδον (p) εἰς ἐν σημεῖον Ο λέγεται κάθετος ἐπ' αὐτό, ἔάν εἶναι κάθετος πρὸς ὅλας τὰς εὐθείας τοῦ ἐπιπέδου τὰς διερχομένας διὰ τοῦ Ο.




σχ. 113.



σχ. 114.

Δυνάμεθα νὰ διαπιστώσωμεν, ὅτι ή εἶναι δρθογώνιος πρὸς ὅλας τὰς εὐθείας τοῦ (p). (σχ. 113).

Ἡ κατακόρυφος τομὴ δύο τοίχων τῆς σχολικῆς αἱθούσης, εὐθεία AB, εἶναι κάθετος πρὸς τὰς τομάς BZ καὶ BE τῶν ἐπιπέδων τῶν τοίχων καὶ τοῦ ἐπιπέδου τοῦ δαπέδου. Διὰ τοῦ γνώμονος διαπιστοῦμεν, ὅτι ή AB εἶναι κάθετος πρὸς ὅλας τὰς εὐθείας τοῦ πατώματος, τὰς διερχομένας διὰ τοῦ B. Συνεπῶς ή εὐθεία AB εἶναι κάθετος πρὸς τὸ πάτωμα. Τὸ αὐτὸν παρατηροῦμεν διὰ τὴν εὐθείαν περιστροφῆς (ΓΔ) (εὐθείαν διερχομένην διὰ τῶν στροφέων τῆς) τῆς θύρας τῆς αἱθούσης (σχ. 114). Ἐάν ἀνοιγοκλείσωμεν αὐτὴν καὶ σημειώσωμεν διὰ κιμωλίας ἐπὶ τοῦ δαπέδου τὰς διαφόρους θέσεις τῆς κάτω εὐθυγράμμου ἀκμῆς τῆς θύρας, θὰ παρατηρήσωμεν ὅτι αἱ σχηματιζόμεναι γωνίαι οὔποδες τῶν




σχ. 115.

λόγω ήμιευθειῶν καὶ τῆς εὐθείας περιστροφῆς τῆς θύρας, μετρούμεναι διὰ τοῦ γνώμονος εἶναι δρθαί. Ἀρά ή εὐθεῖα ΓΔ εἶναι κάθετος ἐπὶ τὸ ἐπίπεδον τοῦ πατώματος. Διὰ νὰ αἰτιολογήσωμεν τὰς ἀνωτέρω σχημάτων ὁρίσεις, στερεώνομεν δύο γνώμονας τὸν ἔνα ἐπὶ τοῦ ἄλλου εἰς τρόπον ὥστε νὰ ἔχουν μίαν κοινὴν πλευράν AB τῆς δρθῆς γωνίας καὶ τοποθετοῦμεν αὐτούς ἐπὶ τοῦ ἐπιπέδου εἰς τρόπον ὥστε τὸ A νὰ συμπίπτῃ μὲ τὸ σημεῖον O καὶ αἱ πλευραὶ OG καὶ OG' τρόπον ὥστε τὸ O νὰ κοινή την πλευρά OB τῶν δύο γνωμόνων εἶναι κάθετος ἐπὶ τὰς εὐθείας OG καὶ OG' τοῦ ἐπιπέδου εἰς τὸ O (OB ⊥ OG καὶ OB ⊥ OG', ὡς κάθετοι πλευραὶ δρθιογνίου τριγώνου).

Δι᾽ ἐνὸς τρίτου γνώμονος διαπιστοῦμεν, διὰ τὴν εὐθεῖαν OB εἶναι κάθετος ἐπὶ πᾶσαν εὐθεῖαν τοῦ ἐν λόγῳ ἐπιπέδου, διερχομένην διὰ τοῦ κοινοῦ σημείου ο τῶν δύο τεμνομένων εὐθειῶν του, ἅρα εἶναι κάθετος ἐπὶ τὸ ἐπίπεδον (p).

Ἐὰν εὐθεῖα εἶναι κάθετος πρὸς δύο τεμνομένας εὐθείας ἐπιπέδου, εἶναι κάθετος πρὸς τὸ ἐπίπεδον αὐτό. (Ἡ πρότασις αὕτη εἶναι ἐν σπουδαῖον θεώρημα τῆς Γεωμετρίας τοῦ χώρου).

**Σημείωσις.** Μία εὐθεῖα εί κάθετος ἐπὶ μίαν εὐθεῖαν α τοῦ ἐπιπέδου (p) εἶναι δυνατόν νὰ εἶναι κάθετος ἐπὶ τὸ ἐπίπεδον, ἀλλὰ εἶναι δυνατόν καὶ νὰ μὴ εἶναι ἡ νὰ κεῖται εἰς αὐτό. Ἐάν εὐθεῖα τέμνῃ ἐπίπεδον χωρὶς νὰ εἴναι κάθετος πρὸς αὐτό, λέγεται πλαγιὰ πρὸς τὸ (p). (σχ. 116)




σχ. 116.

### § 62. Ἰδιότητες τῆς καθέτου—(Θεώρηματα)


Ἐάν χρησιμοποιήσωμεν τὸ σύστημα τῶν γνωμόνων τῆς § 61 καταλήγομεν εἰς τὰ ἔξι συμπεράσματα :

α) Ἐξ ἐνὸς σημείου O τοῦ ἐπιπέδου δυνάμεθα νὰ φέρωμεν μόνον μίαν εὐθεῖαν κάθετον πρὸς τὸ ἐπίπεδον.

β) Δύο εὐθεῖαι ε καὶ ε' κάθετοι πρὸς τὸ αὐτὸν ἐπίπεδον (p) εἶναι παράλληλοι (σχ. 117).




σχ. 117.




σχ. 118.

γ) Ἀπὸ ἐν σημείον A, ἐπὶ ἡ ἕκτὸς ἐπιπέδου δυνάμεθα νὰ φέρωμεν μόνον κάθετον πρὸς αὐτό (σχ. 118).

δ) Ἐπὶ ἓν σημεῖον δυνάμεθα νὰ φέρωμεν ἐν ἐπίπεδον κάθετον πρὸς μίαν εὐθεῖαν. Τὸ σημεῖον τοῦτο εἶναι δυνατὸν νὰ μὴν κεῖται ἐπὶ τῆς  $AB$  ή νὰ κεῖται




σχ. 119.



σχ. 120.

ἐπὶ αὐτῆς. Διὰ τοῦ συστήματος τῶν δύο γνωμόνων εἴμεθα εἰς θέσιν νὰ δρῶμεν τὴν θέσιν τοῦ ἐν λόγῳ ἐπίπεδου, ώς τοῦτο φαίνεται εἰς τὸ σχῆμα 119 καὶ σχῆμα 120.



σχ. 121.

### § 63. Ἀπόστασις σημείου ἀπὸ ἐπίπεδου


Εἴπομεν ὅτι ἀπὸ ἓν σημεῖον π.χ. Ο, τὸ δόποιον δὲν κεῖται ἐπὶ ἑνὸς ἐπίπεδου (ρ) δυνάμεθα νὰ φέρωμεν μίαν μόνον κάθετον ἐπὶ τὸ ἐπίπεδον, τὴν ΟΔ.

Ἐάν ἔκ τοῦ Ο φέρωμεν καὶ διαφόρους πλαγίας πρὸς τὸ ἐπίπεδον, θὰ διαπιστώσωμεν εὐκόλως ὅτι ἡ κάθετος εἶναι μικροτέρα πάστης τοιαύτης πλαγίας (σχ. 122).

Τὸ μῆκος τῆς καθέτου ΟΔ, τὸ δόποιον ἄγεται ἀπὸ τὸ σημεῖον Ο ἐπὶ τὸ ἐπίπεδον, λέγεται ἀπόστασις τοῦ σημείου Ο ἐπίπεδου. (Τὸ ἵχνος Δ τῆς καθέτου ΟΔ λέγεται προβολὴ τοῦ Α ἐπὶ τοῦ ἐπίπεδου (ρ)).

### § 64. Καθετότης ἐπίπεδων

Εἴπομεν εἰς τὴν προηγουμένην § 61 ὅτι ἡ εὐθεῖα ή διερχομένη διὰ τῶν



σχ. 122.

στροφέων τῆς θύρας σχολικῆς αίθουσης εἶναι κάθετος ἐπὶ τὸ ἐπίπεδον τοῦ δαπέδου. Τότε τὸ ἐπίπεδον Θ τῆς θύρας αὐτῆς λέγεται ἐπίπεδον κάθετον ἐπὶ τὸ ἐπίπεδον τοῦ δαπέδου (διότι ἔτοποθετήθη κατὰ τοιοῦτον τρόπον, ώστε νὰ περιέχῃ τὴν ΓΔ κάθετον ἐπὶ τὸ δριζόντιον ἐπίπεδον τοῦ δαπέδου, ἢ τοι ΓΔ κατακόρυφος) (σχ. 114).

Τὸ αὐτὸ συμβαίνει καὶ διὰ τοὺς τοίχους τῆς αίθουσης διδασκαλίας (ἢ τῆς οἰκίας), οἱ δποῖοι κατεσκευάσθησαν οὕτως, ώστε νὰ περιέχουν κατακορύφους εύθειας, ἢ τοι εύθειας καθέτους ἐπὶ τὸ δριζόντιον ἐπίπεδον τοῦ δαπέδου ἢ τῆς δροφῆς. (Σημ. Οι κτίσται κατὰ τὴν κατασκευὴν τῶν τοίχων μιᾶς οικοδομῆς χρησιμοποιοῦν τὸ νῆμα τῆς στάθμης διὰ νὰ ἐπιτύχουν ώστε οἱ τοίχοι νὰ εἶναι κατακόρυφοι, δηλ. κάθετοι ἐπὶ τὴν δριζόντιον ἐπιφάνειαν τοῦ δαπέδου).

Ἐξ ὅσων ἀναφέρομεν ἀνωτέρω συμπεράνομεν γενικῶς ὅτι: "Ἐν ἐπίπεδον (p) λέγεται κάθετον πρὸς ἓν ἄλλον ἐπίπεδον (q), ἐὰν περιέχῃ μίαν εύθειαν κάθετον ἐπὶ τὸ (q)." (σχ. 123).

Δυνάμεθα νὰ διαπιστώσωμεν ὅτι ἔὰν  $(p) \perp (q)$  τότε καὶ  $(q) \perp (p)$ . Δηλαδὴ εἰς τὴν καθετότητα τῶν ἐπιπέδων ισχύει ἡ συμμετρική ίδιότης, ἢ τοι:

$$(p) \perp (q) \Leftrightarrow (q) \perp (p)$$

### Ἄσκησεις

σχ. 123.

194) Εὑρέτε ἑντός τῆς αίθουσῆς


α) Ἐπίπεδα κάθετα καὶ β) ἐπίπεδον παράλληλον πρὸς τὸ δαπέδον αὐτῆς, γ) ἐπίπεδα δριζόντια καὶ κατακόρυφα καὶ δ) εύθειας καθέτους ἐπὶ ἐπίπεδον.

195) Δίδεται ἐπίπεδον (p) καὶ ἐν σημείον B, τὸ δποῖον δὲν κεῖται ἐπ' αὐτῷ. Ἐκ τοῦ σημείου B χαράσσομεν τὴν BA κάθετον πρὸς τὸ ἐπίπεδον (p) καὶ τὴν πλαγίαν πρὸς αὐτὸ BΓ. Ἐάν τὸ μῆκος τῆς BA εἴναι 6 cm καὶ τῆς BΓ εἴναι 10 cm νὰ ύπολογίσητε τὸ μῆκος τῆς AG.


196) Δίδεται εύθεια ε, ἐπὶ τῆς δποίας λαμβάνομεν σημείον A. Εἰς τὸ σημείον αὐτὸ δυνάμεθα νὰ φέρωμεν εἰς τὸν χῶρον ἀπείρους καθέτους εἰς τὴν ε.

Ἐξετάσατε τὸ είδος τοῦ σχήματος, τὸ δποῖον παράγεται ἀπὸ αὐτὰς τὰς καθέτους. (Διατυπώσατε φραστικῶς τὰ συμπεράσματά σας).

197) Δίδεται ἐπίπεδον (p). "Εστω μία εύθεια, ἡ δποία τέμνει τὸ ἐπίπεδον εἰς ἐν σημείον



σχ. 124.



σχ. 125.

Α και είναι κάθετος ἐπὶ τὸ (ρ). Ἀπὸ ἐν σημεῖον Β τῆς εφέρομεν τὴν κάθετον ΒΓ πρὸς μίαν τυχοῦσαν εὐθείαν ΓΔ τοῦ ἐπιπέδου (ρ). Ἐξετάσατε ἔὰν αἱ ΑΓ καὶ ΓΔ είναι κάθετοι (μὲ τὴν βοήθειαν τῶν τριών γνωμάνων τῆς § 61).

198) Δίδεται ἐπίπεδον (P). Ἐάν οὖν ἔνος σημείου Α τοῦ ἐπίπεδου φέρωμεν τὴν κάθετον ΑΓ εἰς μίαν εὐθείαν αὐτοῦ, δεῖξατε δτὶ ή εὐθεία ή ὅποια συνδέει τὸ σημεῖον Γ μὲν ἕνα σημεῖον τυχόν Β τῆς καθέτου ἐπὶ τὸ ἐπίπεδον (p) εἰς τὸ Α είναι κάθετος ἐπὶ τὴν ΓΔ. (Σχ. 124). (Μὲ τὴν βοήθειαν τῶν γνωμόνων).

199) Δίδεται ἐπίπεδον (p). 'Ἐάν ἔξ ἐνὸς σημείου Β, ἐκτὸς τοῦ ἐπίπεδου (p), φέρωμεν τὴν κάθετον ΒΓ εἰς μίαν εὐθεῖαν ΓΔ τοῦ ἐπίπεδου αὐτοῦ καὶ μετὰ φέρομεν τὴν κάθετον ΓΑ (ἢ δύοις κεῖται ἐπὶ τοῦ (p)), ἐπὶ τὴν ΓΔ, δεῖξατε διτὶ ἡ κάθετος ἡ ἀγομένη ἔκ τοῦ B ἐπὶ τὴν ΓΑ εἶναι κάθετος ἐπὶ τὸ ἐπίπεδον (p). (Σχῆμα 125). (Μὲν τὴν βοήθειαν τῶν γυνωμάνων).



λεπτιπέδου (εἶναι καὶ κέντρον συμμετρίας αὐτοῦ).

**Σημ.** Αἱ ἀνωτέρῳ Ἰδιότητες ἴσχύουν δι' ὅλα τὰ παραλληπίπεδα, ὡς θὰ ἴσωμεν εἰς τὰ προσεκή μαθήματα.

δ) Αἱ διαγώνιοι τοῦ ὀρθογωνίου παραλληλεπιπέδου εἶναι ἴσαι.

Δυνάμεθα νὰ ὑπολογίσωμεν τὸ μῆκος τῆς διαγωνίου ἐνὸς δρόσιγωνίου παραλληλεπιπέδου συναρτήσει τῶν διαστάσεών του.

Διὰ νὰ ὑπολογίσωμεν τὴν διαγώνιον  $\text{ΑΓ}' = \delta$  τοῦ δρθογωνίου παραλη-  
λεπιπέδου  $\text{ΑΒΓΔΑ'Β'Γ'Δ}'$  (σχ. 127) ἐφαρμόζομεν τὸ Πυθαγόρειον Θεώρημα εἰς τὰ  
δρθογώνια τρίγωνα  $\text{ΑΒΓ}$  καὶ  $\text{ΑΓΓ}'$  (τὸ τρίγωνον  $\text{ΑΓΓ}'$  εἶναι δρθογώνιον διότι  
ἡ  $\Gamma'$  εἶναι κάθετος εἰς τὸ ἐπίπεδον  $\text{ΑΒΓΔ}$  ἥπα κάθετος καὶ ἐπὶ τὴν  $\Gamma\Delta$ . Ἐπο-  
μένως γωνία  $\text{ΑΓ}' = 1$  δρθ.).

Ούτως έχομεν:  $A\Gamma'^2 = A\Gamma^2 + \Gamma\Gamma'^2$  και  $A\Gamma^2 = AB^2 + B\Gamma^2$ . "Αρα  $A\Gamma'^2 = AB^2 + B\Gamma^2 + \Gamma\Gamma'^2 \Rightarrow \delta^2 = \alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2$  και έπισημένως  $\delta = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2}$ .


‘Η ἀπόστασις τῶν ἐπιπέδων δύο ἀπέναντι ἔδρῶν ὀρθογωνίου παραλη-  
λεπιπέδου λέγεται ὑψος αὐτοῦ.

Ἐμβαδὸν τῆς ἐπιφανείας ὅρθ. παραλ/δου εἶναι τὸ ἄθροισμα τῶν ἐμβαδῶν τῶν ἑδρῶν αὐτοῦ.

‘Ανάπτυγμα δρθιογωνίου παραλληλεπιπέδου είναι ή ἐπίπεδος ἐπιφάνεια τήν δόποισαν λαμβάνομεν, ἐὰν κόψωμεν αὐτὸν κατά μῆκος τῆς ΒΓ καὶ τῶν BB', BA, A'B', ΓΔ, Δ'Γ', ΓΓ' καὶ ἀναπτύξωμεν ἐπὶ ἐπιπέδου (σχ. 128, 129).

§ 66. Ἐμβαδὸν τῆς ἐπιφανείας δρθογωνίου παραλληλεπιπέδου

Θεωροῦμεν δόθησθαι τὸ παραλληλεπίπεδον μὲν διαστάσεις  $AB=a$ ,  $AD=\beta$   $AA'=\gamma$  (σχ. 130). Νὰ ενθέτε τὸ ἐμβαδὸν τῆς ἐπιφανεῖας αὐτοῦ.



Παρατηροῦμεν ὅτι τὸ ἐμβαδὸν τῆς ἔδρας ΑΒΓΔ είναι α.β καθὼς ἐπίσης α.β είναι τὸ ἐμβαδὸν τῆς ἔδρας Α'Β'Γ'Δ'. (Διατάξις: ).

Τὸ ἔρδαδὸν τῆς ἔδρας ΑΒΒ'Α' εἶναι α.γ  
καθώς καὶ τῆς ἀπέναντι ἔδρας αὐτῆς ΔΓΓ'Δ'.  
Τῆς ἔδρας ΑΑ'Δ'Δ τὸ ἐμβαδὸν εἶναι β.γ κα-  
θώς καὶ τῆς ἀπέναντι της ἔδρας ΒΒ'Γ'Γ. "Ωστε  
τὸ ἐμβαδὸν τῆς ἐπιφανείας τοῦ δρθογωνίου  
παραλληλεπιπέδου ΑΒΓΔΑ'Β'Γ'Δ' εἶναι

$$E = 2\alpha\beta + 2\alpha\gamma + 2\beta\gamma \quad \text{or} \quad E = 2(\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha)$$


## § 67. Κύβος.

Κύβος είναι ἐν δρθιογώνιον παραλληλεπίπεδον, τοῦ διποίου δὲ αἱ ἀκμαὶ εἰναι ἔσαι.

Ἐπομένως αἱ ἔδραι του εἶναι τετράγωνα ἵσα (σχ. 131).

Διὸς νὰ εὑρωμεν τὸ μῆκος τῆς διαγωνίου ἐνὸς κύβου, ἐφαρμόζομεν τὸν τύπον  $\delta^2 = \alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2$  καὶ ἔχομεν  $\delta^2 = \alpha^2 + \alpha^2 + \alpha^2$  ἕπα  $\delta^2 = 3\alpha^2 \iff \delta = \alpha\sqrt{3}$

Τὸ ἐμβαδὸν τῆς ὀλικῆς ἐπιφανείας αὐτοῦ εἶναι :



Sx. 131.

$$E = 2 \cdot (\alpha \cdot \alpha + \alpha \cdot \alpha + \alpha \cdot \alpha) = 2 \cdot 3\alpha^2 \iff E = 6\alpha^2$$

### **Ἄσκησεις**

200) Ὁρθογωνίου παραλληλεπιπέδου αἱ διαστάσεις εἰναι 6 cm, 5 cm, 4 cm. Νὰ ὑπολογίστε τὸ ἐμβαθύν τῆς ἐπιφανείας αὐτοῦ.


201) Κατασκευάστε τό διάπτυγμα ένός κύβου άκμής 3 cm και εύρετε τό έμβασθόν της έπιφανείας του.

202) Δίδεται δρθογώνιον παραλληλεπίπεδον. Αι τρεις αύτοῦ διαστάσεις είναι άνάλογοι πρός τους άριθμούς 8, 10, 12 και τὸ ἐμβαδὸν τῆς ἐπιφανείας (δλικῆς) τοῦ δρθογώνιου παραλληλεπιπέδου 2368  $\text{cm}^2$ . Νὰ υπολογισθοῦν αἱ διαστάσεις αύτοῦ.

203) Το ἐμβαθύδον τῆς δολικῆς ἐπιφανείας ἐνὸς κύθου εἶναι  $54 \text{ cm}^2$ . Νὰ εὕρητε τὸ μῆκος αὐτοῦ καὶ τὸ μῆκος τῆς δισγωνίου τοῦ.

204) Διβεται το μῆκος, τὸ ὑψος, καὶ τὸ μῆκος τῆς δισαγωνίου μᾶς ἕδρας δρθιογωνίου πα-  
σαλληλεπιπέδου. Νά εύρεθη τὸ ἐμβαδὸν τῆς ἐπιφανείας αὐτοῦ.

**Ογκος στερεων**



σχ. 132.

§ 68. "Ογκος ἐνὸς στερεοῦ λέγεται ἡ ἔκτασις τοῦ χώρου, τοῦ περικλειομένου ὑπὸ τοῦ στερεοῦ, ἐκπεφρασμένη εἰς μονάδας μετρήσεως.

Μέτρησις τοῦ ὅγκου ἐνὸς στερεοῦ

Τιμὴ τοῦ ὅγκου ἐνὸς στερεοῦ εἶναι ὁ λόγος τοῦ ὅγκου αὐτοῦ πρὸς τὴν μονάδα μετρήσεως ἢ συγκρίσεως τῶν ὅγκων. Τὴν τιμὴν τοῦ ὅγκου τοῦ στερεοῦ π.χ. ΑΒΓΔ (σχ. 132) συμβολίζουμε διὰ τοῦ (ΑΒΓΔ) καὶ τὸν ὅγκον αὐτοῦ διὰ τοῦ V ἢ V<sub>ΑΒΓΔ</sub>.

**Μέτρησις τοῦ δύκου ἐνὸς στερεοῦ εἶναι ἡ εὔρεσις τῆς τιμῆς τοῦ δύκου αὐτοῦ.** Ἡ τιμὴ τοῦ δύκου ἐνὸς στερεοῦ εἶναι ὁ ἀριθμός, μὲ τὸν ὅποιον πρέπει νὰ πολλαπλασιάσωμεν τὴν μονάδα διὰ νὰ ἔχωμεν τὸν δύκον αὐτοῦ.

### Μονάδες δύκου

Ἡ μονάδα τοῦ δύκου εἶναι ὁ δύκος ἐνὸς κύβου, ὁ ὅποιος ἔχει ὡς ἀκμὴν τὴν ἑκλεγεῖσαν μονάδα μήκους.

Ως μονάδα μήκους ὅμως ἔχομεν δρίσει τὸ μέτρον (1 m), ἕταν ἡ μονάδα δύκου εἶναι ὁ δύκος ἐνὸς κύβου ἀκμῆς ἐνὸς μέτρου· ἥτοι τὸ κυβικὸν μέτρον, τὸ ὅποιον σημειοῦται συντόμως ( $m^3$ ).

Αἱ ὑποδιαιρέσεις τοῦ κυβικοῦ μέτρου εἶναι :

1) Τὸ κυβικὸν δεκατόμετρον ( $dm^3$ ), ἥτοι ὁ δύκος ἐνὸς κύβου πλευρᾶς μήκους 1 dm.


2) Τὸ κυβικὸν ἑκατοστόμετρον ( $cm^3$ ), δηλ. ὁ δύκος ἐνὸς κύβου ἀκμῆς μήκους 1 cm καὶ

3) Τὸ κυβικὸν χιλιοστόμετρον ( $mm^3$ ), ἥτοι ὁ δύκος ἐνὸς κύβου πλευρᾶς μήκους 1 mm.

### § 69. "Ογκος δρθογωνίου παραλληλεπιπέδου

**Δίδεται δρθογώνιον παραλληλεπιπέδον μὲ διαστάσεις  $\alpha=4\text{ cm}$ ,  $\beta=5\text{ cm}$  καὶ  $\gamma=3\text{ cm}$ . Σκεφθεῖτε πῶς δυνάμεθα νὰ μετρήσωμεν τὸ ἐν λόγῳ δρθογώνιον παραλληλεπιπέδον.**

Διὰ νὰ εὔρωμεν τὸν δύκον τοῦ δρθογωνίου παραλληλεπιπέδου πληροῦμεν τὸ στερεὸν μὲ κύβους πλευρᾶς μήκους 1 cm. Διὰ νὰ πληρωθῇ τοῦτο χρειάζονται 60 κύβοι δύκου ἴσου πρὸς  $1\text{ cm}^3$  ἥτοι  $V=60\text{ cm}^3$ .



σχ. 133.

Παραστηροῦμεν ὅμως ὅτι καταλήγομεν εἰς τὸ αὐτὸν ἀποτέλεσμα, ἐάν πολλαπλασιάσωμεν καὶ τὰς τρεῖς διαστάσεις τοῦ δρθογωνίου παραλληλεπιπέδου, διότι

$$4\text{ cm} \cdot 5\text{ cm} \cdot 3\text{ cm} = 60\text{ cm}^3.$$

"Ἄρα  $V=4\text{ cm} \cdot 5\text{ cm} \cdot 3\text{ cm}=60\text{ cm}^3$ , ἥτοι διὰ νὰ εὔρωμεν τὸν δύκον τοῦ δρθογωνίου παραλληλεπιπέδου πολλαπλασιάζομεν τὰς τρεῖς αὐτοῦ διαστάσεις, ἐπεφρασμένας εἰς τὴν αὐτὴν μονάδα μήκους.

Τό διποτέλεσμα τούτο δικαιολογείται ώς έξης :

'Η βάσις τοῦ δρθιγωνίου παραλληλεπιπέδου χωρίζεται εἰς 5 ἐπὶ 4 ἵσα τετράγωνα πλευρᾶς 1 cm. Ἐπὶ ἑκάστου τούτων τοποθετοῦμεν τὴν βάσιν κύβου πλευρᾶς 1 cm καὶ σχηματίζεται δρθιγ. παραλληλεπίπεδον τῆς αὐτῆς βάσεως καὶ ὑψους 1 cm. Τοῦτο ἔχει δύκον 4 cm. 5 cm. 1 cm = 20 cm<sup>3</sup>. Τό δρθιγώνιον παραλληλεπίπεδον χωρίζεται (δι' ἐπιπέδων παραλλήλων πρὸς τὴν βάσιν) εἰς τρία δρθιγώνια παραλληλεπίπεδα τοῦ αὐτοῦ δύκου.

$$\text{Συνεπῶς : } V = 3 \cdot 20 \text{ cm}^3 = 60 \text{ cm}^3 = 3 \cdot (4 \text{ cm} \cdot 5 \text{ cm} \cdot 1 \text{ cm}) = 4 \text{ cm} \cdot 5 \text{ cm} \cdot 3 \text{ cm.}$$

'Εὰν δοθῇ δρθιγώνιον παραλληλεπίπεδον, τοῦ δποίου αἱ διαστάσεις ἔχουν μῆκη  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  δύκος αὐτοῦ εἶναι  $V = \alpha \cdot \beta \cdot \gamma$

'Ο δύκος δρθιγωνίου παραλληλεπιπέδου ισοῦται πρὸς τὸ γινόμενον τῶν τριῶν διαστάσεών του.

'Αποδεικνύεται ὅτι τοῦτο ἀληθεύει καὶ ὅταν αἱ τιμαὶ τῶν  $\alpha, \beta, \gamma$  εἶναι τυχόντες ἀριθμοί.

Παρατηροῦμεν εἰς τὸν τύπον  $V = \alpha \cdot \beta \cdot \gamma$ . ὅτι τὸ γινόμενον  $\alpha \cdot \beta$  δίδει τὸ ἐμβαδὸν  $E_\beta$  τοῦ δρθιγωνίου τῆς βάσεως μὲ διαστάσεις  $\alpha$  καὶ  $\beta$ , ἐνῷ τὸ  $\gamma$  εἶναι τὸ ὑψός τοῦ δρθιγωνίου παραλληλεπιπέδου :

$$\text{Άρα } V = E_\beta \cdot \gamma \quad \text{ήτοι :}$$

'Ο δύκος ἐνὸς δρθιγωνίου παραλληλεπιπέδου ισοῦται πρὸς τὸ γινόμενον τοῦ ἐμβαδοῦ μιᾶς βάσεώς του ἐπὶ τὸ μῆκος τοῦ ἀντιστοίχου ὕψους.

### § 70 "Ογκος κύβου.

Γνωρίζομεν ὅτι δύκος εἶναι ἐν δρθιγώγιον παραλληλεπίπεδον, τοῦ δποίου αἱ τρεῖς διαστάσεις εἶναι ἵσαι (σχ. 134). 'Εὰν ὑποθέσωμεν ὅτι τὸ μῆκος τῆς πλευρᾶς τοῦ κύβου εἶναι  $\alpha$ , δύκος του θὰ εἶναι  $V = \alpha \cdot \alpha \cdot \alpha \Rightarrow$

$$V = \alpha^3 \quad (1) \quad \text{ήτοι :}$$


'Ο δύκος ἐνὸς κύβου ισοῦται μὲ τὴν τρίτην δύναμιν τοῦ μήκους τῆς ἀκμῆς του.

Παρατήρησις. Διὰ τὸν λόγον αὐτὸν ἡ τρίτη δύναμις ἐνὸς ἀριθμοῦ λέγεται κύβος τοῦ ἀριθμοῦ αὐτοῦ.

'Ἐκ τοῦ τύπου (1) ἐνιοῦμεν ὅτι κάθε μονάς δύκου, ισοῦται μὲ  $1000 = 10^3$  μονάδας τῆς ἀμέσως κατωτέρας τάξεως, ἄρα :

$$1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ dm}^3 = 1000000 \text{ cm}^3 = 1000000000 \text{ mm}^3 \quad \text{ή}$$

$$1 \text{ m}^3 = 10^3 \text{ dm}^3 = 10^6 \text{ cm}^3 = 10^9 \text{ mm}^3$$



σχ. 134.

$$1 \text{ dm}^3 = 1000 \text{ cm}^3 = 1000000 \text{ mm}^3$$

$$1 \text{ cm}^3 = 1000 \text{ mm}^3$$

### \*Ασκήσεις

205) Εύρετε τὸν δγκον ἐνὸς κύβου πλευρᾶς 3,5 m.

206) Νὰ εύρητε τὸν δγκον ἐνὸς δρθιγωνίου παραλληλεπιπέδου, τοῦ δποίου αὶ διαστάσεις εἶναι 5 m, 14 dm, καὶ 8 cm.

207) Ο δγκος ἐνὸς δρθιγωνίου παραλληλεπιπέδου εἶναι 64 dm³ καὶ τὸ ἐμβαδὸν τῆς βάσεώς του 16dm². Νὰ εύρητε τὸ μῆκος τοῦ ὑψους του, τὸ δποίον ἀντιστοιχεῖ εἰς τὴν βάσιν ταύτην.

208) Εύρετε τὸ μῆκος τῆς πλευρᾶς ἐνὸς κύβου, τοῦ δποίου δ δγκος εἶναι 4913 cm³. (\*Υπόθεσις: ἀναλύσατε τὸν ἀριθμὸν εἰς γινόμενον παραγόντων).

209) Η δλικὴ ἐπιφάνεια ἐνὸς κύβου εἶναι 294 dm³. Νὰ ὑπολογίσητε τὸν δγκον αὐτοῦ τοῦ κύβου.

210) Σιδηρουργὸς ἔχει μεταλλικὴν πλάκαν σχήματος δρθιγωνίου παραλληλεπιπέδου μὲ διαστάσεις 4m, 5 m καὶ 0,5 m. Σκοπεύει δὲ νὰ διατρέσῃ αὐτὴν εἰς κύβους, ἔκαστος τῶν δποίων νὰ ἔχῃ ἀκμήν 0,05 m. Εἰς πόσους τοιούτους κύβους δύναται νὰ διατρέψῃ ἡ πλάξ;

211). Δίδεται δρθιγωνίον παραλληλεπίπεδον, τοῦ δποίου αὶ διαστάσεις εἶναι ἀνάλογοι πρὸς τοὺς ἀριθμοὺς 3, 5, 6 καὶ ἔχουν ἀδροισμὰ 70dm. Νὰ εύρητε τὸν δγκον αὐτοῦ τοῦ δρθιγωνίου παραλληλεπιπέδου.


212) Δίδεται δρθιγωνίον παραλληλεπίπεδον, τοῦ δποίου δ δγκος εἶναι 960 cm³. Νὰ ὑπολογίσητε τὰς διαστάσεις αὐτοῦ, δταν εἶναι γνωστὸν δτι αὐταὶ εἶναι ἀνάλογοι τῶν ἀριθμῶν 4, 5, 6.

213) "Εν δοχείον ἔχει σχῆμα δρθιγωνίου παραλληλεπιπέδου, τοῦ δποίου αὶ διαστάσεις εἶναι 2m, 3m, 4m. "Εν ἄλλῳ δοχείον σχήματος δρθιγωνίου παραλληλεπιπέδου, τοῦ δποίου δ δγκος εἶναι δκτοπλάσιος τοῦ δγκου τοῦ δοθέντος ἔχει διαστάσεις ἀναλόγους πρὸς τὰς διαστάσεις τοῦ πρώτου δοχείου. Νὰ εύρεθοιν αὶ διαστάσεις τοῦ δευτέρου αὐτοῦ δοχείου.

214) 'Εὰν πολλαπλασιάσωμεν τὸ μῆκος α τῆς ἀκμῆς ἐνὸς κύβου ἐπὶ 2, πόσος γίνεται δ δγκος τοῦ κύβου αὐτοῦ; 'Εφαρμογὴ:  $\alpha=5 \text{ cm}$ .

## B. ΠΡΙΣΜΑΤΑ

### § 71. Πολύεδρον



σχ. 135.


Τὸ παραπλεύρως στερεὸν (σχ. 135) ἀποτελεῖται ἀπὸ πολύγωνα, τὰ δποία δὲν κεῖνται ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ ἐπιπέδου. Κάθε πλευρὰ ἐκάστου πολυγώνου ἀνήκει καὶ εἰς ἓν (μόνον ἓν) ἄλλο πολύγωνον. Τὸ στερεὸν αὐτὸν εἶναι ἐν πολύεδρον. Τὰ πολύγωνα, ἐκ τῶν δποίων ἀποτελεῖται εἶναι αὶ ἔδραι τοῦ πολυέδρου. Αἱ πλευραὶ τῶν ἔδρῶν εἶναι αὶ ἀκμαὶ τοῦ πολυέδρου καὶ αὶ κορυφαὶ τῶν ἔδρῶν αὶ κορυφαὶ τοῦ πολυέδρου. Τὸ δρθιγωνίον παραλληλεπίπεδον καὶ δ κύβος εἶναι πολύεδρα.

**Σημ.** Σημεία τοῦ πολυέδρου λέγονται τὰ σημεία τῶν ὀκμῶν του καὶ τὰ ἐσωτερικά τῶν ἑδρῶν αὐτοῦ.

### § 72. Πρίσμα.

Πρίσμα εἶναι ἐν πολύεδρον, τὸ δποῖον ἔχει δύο ἑδρας ἵσας καὶ παραλλήλους, τὰς δὲ ἄλλας παραλληλόγραμμα (σχ. 136).


Αἱ ἵσαι καὶ παράλληλοι ἑδραὶ  $AB\Gamma\Delta$ ,  $A'B'\Gamma'\Delta'$  λέγονται βάσεις τοῦ πρίσματος. Τὰ παραλληλόγραμμα λέγονται παράπλευροι ἑδραὶ αὐτοῦ, ὡς τὰ  $ABB'A'$ ,  $B\Gamma\Gamma' B'$  κ.λ.π. Αἱ ὀκμαὶ  $AA'$ ,  $BB' \dots$ , αἱ δποῖαι περιέχονται μεταξὺ τῶν βάσεων λέγονται παράπλευραι ὀκμαὶ. Αὗται εἶναι ἵσαι καὶ παράλληλοι.



σχ. 136.

Ἡ ἀπόστασις τῶν ἐπίπεδων τῶν βάσεων λέγεται **ὅψις** τοῦ πρίσματος, π.χ. τὸ  $\Delta\Delta'$  (σχ. 137α). Εάν αἱ παράπλευροι ὀκμαὶ εἶναι κάθετοι πρὸς τὰ ἐπίπεδα τῶν βάσεων τὸ πρίσμα λέγεται **δρθὸν πρίσμα**, ἄλλως λέγεται **πλάγιον**. Συνεπῶς τὸ ὑψὸς τοῦ δρθοῦ πρίσματος, εἶναι ἵσον πρὸς τὴν παράπλευρον ὀκμήν του, αἱ δὲ παράπλευροι ἑδραὶ αὐτοῦ εἶναι δρθογώνια, π.χ. τὸ  $\Delta\Delta'$  (σχ. 137β).

Εάν τὸ πρίσμα ἔχῃ τριγωνικάς βάσεις λέγεται **τριγωνικὸν πρίσμα**, ὡς τὸ  $AB\Gamma A'\Gamma'$  τοῦ σχήματος 137α. Εάν ἔχῃ βάσεις **τετράπλευρα**, πεντά-




σχ. 137.

γωνα κ.λ.π. λέγεται **ἀντιστοίχως τετραπλευρικὸν** (σχ. 137β), πενταγωνικὸν κ.λ.π. πρίσμα.

Οταν ἔνος δρθοῦ πρίσματος, αἱ βάσεις εἶναι κανονικὰ πολύγωνα, τοῦτο λέγεται **κανονικὸν πρίσμα** (σχ. 137γ).

**Παρατήρησις:** Δυνάμεθα, δι' ἀπλῆς κατεσκευῆς, νὰ ἔχωμεν στερεομετρικὸν ὑπόδειγμα (μοντέλον) πρίσματος. Πρὸς τοῦτο λαμβάνομεν δύο (ἢ περισσότερα) πολύγωνα ἵσα ἐκ ἥλου ἢ χαρτονίου. Δι' ὅπῶν κατεσκευασμένων εἰς

τάς κορυφάς τῶν Ἰσων αὐτῶν πολυγώνων ἐπιτυγχάνομεν νὰ διέλθουν νήματα,



σχ. 138.

τὰ δόποια διατίθενται παραπλήλως. Διὰ παραπλήλου μεταφορᾶς τῶν πολυγώνων θὰ ἔχωμεν τὴν ἔννοιαν τοῦ πρίσματος (δρθοῦ καὶ πλαγίου) καθὼς καὶ τῆς παραπλήλου πρὸς τὰς βάσεις ἢ καθέτου τομῆς αὐτοῦ.

Ἐὰν φέρωμεν ἐπίπεδον κάθετον ἐπὶ τὰς παραπλεύρως ἀκμὰς πρίσματος (σχ. 138) λαμβάνομεν ἐν πολύγωνον, τὸ δόποιον λέγεται κάθετος τομὴ τοῦ πρίσματος. Αἱ πλευραὶ τῆς καθέτου τομῆς ἔνὸς πρίσματος εἶναι ὡψὲ τῶν ἀντιστοίχων παραπλεύρων ἐδρῶν, δταν ὡς βάσεις αὐτῶν ληφθοῦν αἱ παράπλευροι ἀκμαῖ. Εἰς τὰ δρθὰ πρίσμα-

τα ἢ κάθετος τομὴ ἴσοῦται πρὸς τὰς βάσεις.

### 73. Ἐμβαδὸν ἐπιφανείας πρίσματος

Ἐμβαδὸν τῆς διλικῆς ἐπιφανείας πρίσματος λέγεται τὸ ἄθροισμα τῶν ἐμβαδῶν τῶν ἐδρῶν αὐτοῦ.

Ἐμβαδὸν τῆς παραπλεύρου ἐπιφανείας πρίσματος εἶναι τὸ ἄθροισμα τῶν ἐμβαδῶν τῶν παραπλεύρων ἐδρῶν του.

Ἄλλεται τὸ πλάγιον πρᾶσμα  $AB\Gamma\Delta'A'B'I''\Delta'$  καὶ ἔστω  $KLMN$  μία κάθετος τομὴ αὐτοῦ. (Σχῆμα 138). Ζητεῖται νὰ εἴρῃτε :


α) Τὸ ἐμβαδὸν τῆς παραπλεύρου ἐπιφανείας αὐτοῦ τοῦ πρίσματος καὶ

β) τὸ ἐμβαδὸν τῆς διλικῆς ἐπιφανείας του.

α) Κατασκευάζομεν στερεομετρικὸν ὑπόδειγμα (μοντέλον) τοῦ πρίσματος αὐτοῦ.

Κόπτομεν κατὰ μῆκος μιᾶς ἀκμῆς π.χ. τῆς  $AA'$  τὴν παραπλεύρου ἐπιφάνειαν τοῦ διθέντος πρίσματος καὶ ἀναπτύσσομεν τὰς ἔδρας αὐτῆς (τοῦ στερ. ὑποδείγματος) ἐπὶ ἔνὸς ἐπιπέδου.

Ἐχομεν οὕτω τὸ σχῆμα 139, τὸ δόποιον εἶναι τὸ ἀνάπτυγμα τῆς παραπλεύρου ἐπιφανείας τοῦ πρίσματος. Παρατηροῦμεν δτι αὐτὸ ἀποτελεῖται ἀπὸ τέσσαρα (4) παραπληλόγραμμα, τὰ  $ABB'A'$ ,  $B\Gamma\Gamma'B'$ ,  $\Gamma\Delta\Delta'\Gamma'$ ,  $\Delta\Delta'\Delta'$ , τῶν δποίων τὰ ὡψὲ εἶναι αἱ πλευραὶ  $K\Lambda$ ,  $\Lambda M$ ,  $MN$ ,  $NK$  τῆς καθέτου τομῆς τοῦ πρίσματος καὶ αἱ βάσεις ἵσαι πρὸς τὴν παραπλεύρου ἀκμὴν αὐτοῦ. Ἐὰν α, β, γ, δ εἶναι ἀντιστοίχως τὰ μήκη τούτων καὶ λ τὸ μῆκος τῆς παραπλεύρου ἀκμῆς



σχ. 139.

τοῦ πρίσματος, τὸ ἐμβαδὸν τοῦ ἀναπτύγματος αὐτοῦ ισοῦται πρὸς τὸ ἐμβαδὸν τῆς παραπλεύρου ἐπιφανείας τοῦ πρίσματος αὐτοῦ. Ἡτοι :

$$\text{Επαρ. ἐπιφ. πρίσμ.} = E_{A B B' A'} + E_{B C C' B'} + E_{C D D' C'} + E_{D A A' D'} \Rightarrow$$

$$\text{Επαρ. ἐπιφ. πρίσμ.} = \alpha \cdot \lambda + \beta \cdot \lambda + \gamma \cdot \lambda + \delta \cdot \lambda \quad \text{συνεπῶς} \quad \text{Επαρ. ἐπιφ. πρίσμ.} = \\ = (\alpha + \beta + \gamma + \delta) \cdot \lambda \quad \text{Ἡτοι :}$$

Τὸ ἐμβαδὸν τῆς παραπλεύρου ἐπιφανείας πρίσματος ισοῦται πρὸς τὸ γινόμενον τῆς περιμέτρου τῆς καθέτου τομῆς του ἐπὶ τὸ μῆκος τῆς παραπλεύρου ἀκμῆς αὐτοῦ.

Ἐὰν τὸ πρίσμα εἶναι δρθόν, τὸ ἀνάπτυγμα τῆς παραπλεύρου ἐπιφανείας του εἶναι ἐν δρθογώνιον, μὲ διαστάσεις τὰ μήκη τῆς περιμέτρου τῆς βάσεως καὶ τοῦ ὕψους.

"Ἄρα : Τὸ ἐμβαδὸν τῆς παραπλεύρου ἐπιφανείας ἐνὸς πρίσματος δρθοῦ ισοῦται πρὸς τὸ γινόμενον τῶν μηκῶν τῆς περιμέτρου τῆς βάσεως του καὶ τοῦ ὕψους αὐτοῦ.

Εἰς τὸ αὐτὸ ἀπότελεσμα δυνάμεθα νὰ καταλήξωμεν καὶ ἐὰν θεωρήσωμεν ἀπ' εὐθείας τὸ στερεόν, χωρὶς νὰ χρησιμοποιήσωμεν τὸ στερεομετρικὸν ὑπόδειγμα καὶ τὸ ἀνάπτυγμα αὐτοῦ. Ἐπειδὴ κάθε παραπλεύρος ἔδρα εἶναι παραλληλόγραμμον ἔχομεν  $E_{\text{παρ. ἐπιφ. πρίσμ.}} = E_{A B B' A'} + E_{B C C' B'} + E_{C D D' C'} + E_{D A A' D'} \Rightarrow$

$$\Rightarrow \text{Επαρ. ἐπιφ. πρίσμ.} = \alpha \cdot \lambda + \beta \cdot \lambda + \gamma \cdot \lambda + \delta \cdot \lambda \Rightarrow \text{Επαρ. ἐπιφ. πρίσμ.} = \\ = (\alpha + \beta + \gamma + \delta) \cdot \lambda$$


β) Διὰ νὰ εὔρωμεν τὸ ἐμβαδὸν τῆς δλικῆς ἐπιφανείας τοῦ πρίσματος προσθέτομεν εἰς τὸ ἐμβαδὸν τῆς παραπλεύρου ἐπιφανείας του τὰ ἐμβαδὰ τῶν δύο ίσων βάσεων αὐτοῦ.

Οὕτως ἔχομεν : Εόλικ. ἐπιφ. πρίσμ. = Επαρ. δλ. πρ. + 2. Εβάσεως

**Σημείωσις :** Εν πρίσμα, τοῦ δποίου αἱ βάσεις εἶναι παραλληλόγραμμα δυνομάζεται παραλληλεπίδεον (σχ. 140). Οὕτω καὶ αἱ 6 ἔδραι τοῦ παραλληλεπίδεον εἶναι παραλληλόγραμμα καὶ ἔπομένως δυνάμεθα νὰ λάβωμεν ὡς βάσεις αὐτοῦ δύο οἰασδήποτε ἀπέναντι ἔδρας του.

Ορθὸν δυνομάζεται ἐν παραλληλεπίδεον, γάν αἱ παραπλεύροι ἔδραι αὐτοῦ εἶναι δρθογώνια.

Συνεπῶς, δσα ἀνεφέρομεν ἀνωτέρω διὰ τὸ ἐμβαδὸν τῆς παραπλεύρου καὶ τῆς δλικῆς ἐπιφανείας πρίσματος, ισχύουν καὶ διὰ τὰ παραλληλεπίδεα.



σχ. 140.

## 'Ασκήσεις

215) Όρθον τριγωνικόν πρίσμα ἔχει βάσιν όρθογώνιον τρίγωνον μὲ καθέτους πλευράς 6 cm καὶ 8 cm καὶ ύψος 15 cm. Νὰ εύρητε τὸ ἐμβαδὸν τῆς παραπλεύρου ἐπιφανείας του, καθὼς καὶ τὸ ἐμβαδὸν τῆς διλικῆς ἐπιφανείας αὐτοῦ.

216) Η κάθετος τομὴ ἐνὸς πλαγίου πρίσματος τριγωνικοῦ εἶναι ισόπλευρον τρίγωνον πλευρᾶς 3 cm. Η παραπλεύρος ἀκμὴ τοῦ πρίσματος εἶναι 8 cm. Νὰ εύρητε τὸ ἐμβαδὸν τῆς παραπλεύρου ἐπιφανείας τοῦ πρίσματος.


217) Δίδεται κανονικόν πρίσμα ἀκμῆς 5m, τοῦ ὅποιου ἡ βάσις εἶναι ἐν τετράγωνον πλευρᾶς 2 m. Νὰ εύρητε τὸ ἐμβαδὸν τῆς παραπλεύρου ἐπιφανείας αὐτοῦ.

218) Κατασκευάστε ἑκ χαρτονίου όρθον πρίσμα, τοῦ ὅποιου τὸ ύψος νὰ είναι 7 cm καὶ ἡ βάσις εἰς ρόμβος μὲ διαγωνίους 6 cm καὶ 8 cm. Νὰ υπολογίσητε τὸ ἐμβαδὸν τῆς διλικῆς ἐπιφανείας αὐτοῦ.

219) Δίδεται κανονικόν πρίσμα ἀκμῆς 5a, τοῦ ὅποιου ἡ βάσις εἶναι ἐν ισόπλευρον τρίγωνον πλευρᾶς  $\alpha$ . Νὰ εύρητε τὸ ἐμβαδὸν α) τῆς παραπλεύρου ἐπιφανείας του καὶ β) τῆς διλικῆς αὐτοῦ ἐπιφανείας. Ἐφαρμογή:  $\alpha = 13$  cm.

## § 74. "Ογκος πρίσματος

α) "Ογκος όρθοιού τριγωνικού πρίσματος μὲ βάσιν όρθογώνιον τρίγωνον:



σχ. 141.

Δίδεται όρθον τριγωνικόν πρίσμα μὲ βάσιν όρθογώνιον τρίγωνον μὲ μήκη καθέτων πλευρῶν  $\alpha$  καὶ  $\beta$  καὶ ύψος μήκους  $\gamma$ . Νὰ εύρητε τὸν ὅγκον αὐτοῦ.

Θεωροῦμεν όρθογώνιον παραλληλεπίδεον μὲ διαστάσεις  $\alpha$ ,  $\beta$  καὶ  $\gamma$ . Τὸ στερεόν αὐτὸ τέμνεται ὑπὸ τοῦ διαγωνίου ἐπιπέδου  $AA'Γ'Γ$  (σχ. 141) εἰς δύο όρθὰ πρίσματα, τὰ ὅποια ἔχουν βάσεις όρθογώνια τρίγωνα μὲ μήκη καθέτων πλευρῶν  $\alpha$  καὶ  $\beta$  καὶ ύψος  $\gamma$ . Τὰ όρθὰ αὐτὰ πρίσματα εἶναι ἴσα. (ώς συμμετρικά σχήματα πρὸς τὸν ἄξονα  $OO'$ , δ ὅποιος συνδέει τὰ κέντρα  $O$  καὶ  $O'$  τῶν βάσεων).

Συνεπῶς ὁ ὅγκος τοῦ όρθοιού τριγωνικού πρίσματος, τὸ ὅποιον ἔχει βάσιν όρθογώνιον τρίγωνον εἶναι τὸ ἡμισυ τοῦ ὅγκου τοῦ όρθογώνιου παραλληλεπιπέδου μὲ διαστάσεις  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ .

$$\text{Ήτοι: } V = \frac{\alpha \cdot \beta \cdot \gamma}{2} \Rightarrow V = \frac{\alpha \cdot \beta}{2} \cdot \gamma. \text{ Άλλα τὸ ἐμβαδὸν τῆς βάσεως τοῦ όρθοιο πρίσματος, ἡ ὅποια εἶναι όρθογώνιον τρίγωνον, εἶναι}$$



$$E = \frac{\alpha \cdot \beta}{2}. \text{ Αρα } \boxed{V = E \cdot \gamma}$$

"Επομένως: 'Ο ὅγκος τοῦ όρθοιού τριγωνικού πρίσματος μὲ βάσιν όρθογώνιον τρίγωνον, ίσουται πρὸς τὸ γινόμενον τοῦ ἐμβαδοῦ τῆς βάσεως ἐπὶ τὸ μῆκος τοῦ ύψους.'

β) "Ογκος τυχόντος δρθού τριγωνικού πρίσματος:

Διδεται δρθόν τριγωνικὸν πρίσμα  $ABΓΑ'B'Γ'$  μὲ βάσιν τυχόν τρίγωνον  $ABΓ$ . Νὰ εύρητε τὸν δγκον αὐτοῦ.

Διὰ νὰ εὔρωμεν τὸν δγκον τοῦ πρίσματος  $ABΓΑ'B'Γ'$ , διαιροῦμεν αὐτὸν εἰς δύο δρθὰ τριγωνικὰ πρίσματα μὲ βάσεις δρθογώνια τρίγωνα, διὰ τοῦ ἐπι-



πέδου  $AHH'A'$ , τὸ δποῖον δρίζεται ὑπὸ τοῦ ὕψους  $AH$  τοῦ τριγώνου  $ABΓ$  καὶ τοῦ ὕψους  $AA'$  τοῦ πρίσματος. Δηλαδὴ δι' ἐπιπέδου καθέτου ἐπὶ τὸ ἐπίπεδον  $BΓΓ'B'$  (σχ. 142).

"Αρα :

$$V_{ABΓΑ'B'Γ'} = V_{ABH'A'H'} + V_{ΓAH'A'H'} = E_{ABH} \cdot u + E_{AH\Gamma} \cdot u = (E_{ABH} + E_{AH\Gamma}) \cdot u = E_{AB\Gamma} \cdot u.$$

"Ωστε  $V_{ABΓΑ'B'Γ'} = E_{AB\Gamma} \cdot u$

"Αρα : 'Ο δγκος κάθε δρθού τριγωνικού πρίσματος ισοῦται πρὸς τὸ γινόμενον τοῦ ἐμβαδοῦ τῆς βάσεως ἐπὶ τὸ μῆκος τοῦ ὕψους.

γ) "Ογκος δρθού πρίσματος μὲ βάσιν τυχόν πολύγωνον.

Διὰ νὰ εὔρωμεν τὸν δγκον τοῦ πρίσματος  $ABΓΔΕΑ'B'Γ'D'E'$  διαιροῦμεν αὐτὸν εἰς δρθὰ τριγωνικὰ πρίσματα, τὰ δποῖα ἔχουν ὡς ὕψος, τὸ ὕψος τοῦ δοθέντος πρίσματος καὶ βάσεις τὰ τρίγωνα  $ABE$ ,  $BEΓ$ ,  $ΓED$  (σχῆμα 143). Ονομάζομεν τοὺς δγκοὺς αὐτῶν  $V_1$ ,  $V_2$ ,  $V_3$  καὶ τὰ ἐμβαδὰ τῶν βάσεών των  $E_1, E_2, E_3$ . Τότε ἔχομεν  $V_{\text{πρίσμ.}} = V_1 + V_2 + V_3$ . Συνεπῶς

$$V_{\text{πρίσμ.}} = E_1 \cdot u + E_2 \cdot u + E_3 \cdot u = (E_1 + E_2 + E_3) \cdot u$$

$$\text{Έπομένως } V_{\text{πρίσμ.}} = E_{\text{βασ.}} \cdot u$$

"Ωστε : 'Ο δγκος κάθε δρθού πρίσματος, ισοῦται πρὸς τὸ γινόμενον τοῦ ἐμβαδοῦ τῆς βάσεως ἐπὶ τὸ μῆκος τοῦ ὕψους.

δ) "Ογκος τυχόντος πλαγίου πρίσματος.

'Ο τύπος  $V_{\text{βάσεως.}} \cdot u$ , δὲ χρησιμοποιούμενος διὰ τὴν εὔρεσιν τοῦ δγκού ἐνὸς δρθού πρίσματος εἶναι γενικὸς καὶ ισχύει, ὡς θὰ μάθωμεν εἰς ἀνωτέραν τάξιν, καὶ διὰ τὰ πλάγια πρίσματα.

"Αρα γενικῶς : 'Ο δγκος οἰουδήποτε πρίσματος ισοῦται πρὸς τὸ γινόμενον τοῦ ἐμβαδοῦ τῆς βάσεως ἐπὶ τὸ μῆκος τοῦ ὕψους.

Σημ. Ο δγκος τυχόντος πρίσματος διδεται και ύπτο του τύπου  $V = \text{Εκκύτεου τομῆς} \cdot \lambda$  (όπου  $\lambda$  μήκος της παραπλεύρου σκμῆς).

### Α σ κή σ εις

220) Όρθον τριγωνικόν πρίσμα ὑψους 40 cm ἔχει ὡς βάσιν ὀρθογώνιον τρίγωνον, τοῦ δποίου αι κάθετοι πλευραι ἔχουν μήκη 6 cm και 8 cm. Νὰ εύρητε τὸν δγκον αύτοῦ.

221) Διδετοι κανονικόν ἔξαγωνικόν πρίσμα ὑψους 12 dm, τοῦ δποίου τὸ μήκος τῆς πλευρᾶς τῆς βάσεως είναι 8 dm. Νὰ εύρητε τὸν δγκον αύτοῦ.


222) Όρθον πρίσμα ἔχει δγκον 200 cm<sup>3</sup> και ὑψος 8 cm. Εάν ἡ βάσις αύτοῦ είναι ἐν τετράγωνῳ, νὰ ὑπολογίσητε τὴν πλευράν τῆς βάσεως αύτοῦ.

223) Ή παράπλευρος ἐπιφάνεια ἐνδός κανονικοῦ τριγωνικοῦ πρίσματος, τοῦ δποίου τὸ ὑψος είναι τριπλάσιον τῆς πλευρᾶς τῆς βάσεως, είναι 324 cm<sup>2</sup>. Νὰ εύρητε τὸν δγκον αύτοῦ τοῦ πρίσματος.

224) Κανονικόν ἔξαγωνικόν πρίσμα ἔχει πλευράν τῆς βάσεως α και ὑψος 2a. Νὰ ὑπολογίσητε τὸν δγκον τοῦ πρίσματος. Εφαρμογή :  $a = 9$  cm.

## Γ. ΠΥΡΑΜΙΣ — ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΥΡΑΜΙΣ — ΜΕΤΡΗΣΙΣ ΠΥΡΑΜΙΔΟΣ

### § 75. Πυραμίς :



σχ. 144.

Πυραμίς είναι ἐν στερεόν, τὸ δποίον δρίζεται ὑπὸ ἐνός πολυγώνου και ὑπὸ τριγωνων. Τὰ τριγωνα ἔχουν μίαν κοινὴν κορυφὴν (κειμένην ἑκτὸς τοῦ ἐπιπέδου τοῦ πολυγώνου) και ἔκαστον τρίγωνον ἔχει μίαν πλευράν κοινὴν μὲ τὸ πολύγωνον. (σχ. 144).


Τὸ πολύγωνον ΑΒΓΔ λέγεται βάσις τῆς πυραμίδος τὰ δὲ τρίγωνα ΑΟΒ, ΒΟΓ, ... παράπλευροι ἔδραι αὐτῆς. Τὸ στημεῖον Ο λέγεται κορυφὴ τῆς πυραμίδος, τὰ δὲ εύθ. τμήματα ΟΑ, ΟΒ, ... παράπλευροι ἄκμαι αὐτῆς. Ή ἀπόστασις ΟΗ τῆς κορυφῆς ἀπὸ τὴν βάσιν τῆς πυραμίδος είναι τὸ ὑψος αὐτῆς. Τὸ σύνολον τῶν παραπλεύρων ἔδρῶν, ἀποτελεῖ τὴν παράπλευρον ἐπιφάνειαν τῆς πυραμίδος. Εάν ἡ βάσις τῆς πυραμίδος είναι τρίγωνον, αὐτῇ λέγεται τριγωνική. Εάν είναι τετράπλευρον, πεντάγωνον κ.λ.π. λέγεται τετραπλεύρική, πενταγωνική κ.λ.π.

Ἡ τριγωνικὴ πυραμίς είναι ἐν πολύεδρον μὲ τέσσαρας ἔδρας, και λέγεται τετράεδρον.

### § 76. Κανονικὴ πυραμίς :

Μία πυραμίς λέγεται κανονική, ὅταν ἡ βάσις τῆς είναι κανονικὸν πολύγωνον και τὸ ἔχνος τοῦ ὑψους είναι τὸ κέντρον τοῦ κανονικοῦ πολυγώνου. (σχ. 145).

Αἱ παράπλευροι ἔδραι τῆς κανονικῆς πυραμίδος εἰναι ίσοσκελὴ τρίγωνα ίσα (AOB, BOΓ, ...). Τὸ ὑψος ΟΘ ἐνὸς ἐκ τῶν ίσων ίσοσκελῶν τριγώνων λέγεται ἀπόστημα τῆς κανονικῆς πυραμίδος (ἢ παράπλευρον ὑψος) καὶ συμβολίζεται μὲν h. Ἐὰν κανονικῆς πυραμίδος ἡ βάσις εἴναι τρίγωνον ίσόπλευρον, αὕτη λέγεται κανονικὴ τριγωνικὴ πυραμίδης. "Ἐν τετράεδρον εἶναι κανονικόν, ἐὰν αἱ τέσσαρες ἔδραι του εἴναι ίσοπλευρα τρίγωνα ίσα.




σχ. 145.

### § 77. Ἐμβαδὸν κανονικῆς πυραμίδος :

Καλοῦμεν ἐμβαδὸν πυραμίδος, τὸ ἀθροισμα τῶν ἐμβαδῶν τῶν ἔδρῶν αὐτῆς. Ἐμβαδὸν τῆς παραπλεύρων ἐπιφανείας λέγομεν τὸ ἀθροισμα τῶν ἐμβαδῶν τῶν παραπλεύρων ἔδρῶν αὐτῆς.

1. Ἐμβαδὸν τῆς παραπλεύρου ἐπιφανείας κανονικῆς πυραμίδος :



σχ. 146.

Διέται κανονικὴ πυραμὶς (π.χ. ἔξαγωνη) OABΓΔΕΖ (σχ. 146) καὶ ζητεῖται νὰ ενύθη τὸ ἐμβαδὸν τῆς παραπλεύρου ἐπιφανείας της, ἐὰν γνωθέωμεν τὸ μῆκος τῆς πλευρᾶς τῆς βάσεως λ<sub>6</sub> καὶ τὸ μῆκος του ἀποστήματος h.

Διὰ νὰ εύρωμεν τὸ ἐμβαδὸν τῆς παραπλεύρου ἐπιφανείας τῆς καν. πυραμίδος αὐτῆς προσθέτομεν τὰ ἐμβαδὰ τῶν παραπλεύρων ἔδρῶν της. Αἱ ἔδραι αὐταὶ εἴναι ίσαι.


$$\text{Ἄρα } \text{Επαρ. ἐπιφ. πυρ.} = 6 \cdot E_{AOB} = 6 \cdot \frac{\lambda_6 \cdot h}{2} = \frac{6\lambda_6 h}{2} =$$

$$= \frac{\text{μῆκος περιμέτρου βάσεως} \times \text{μῆκος ἀποστήματος}}{2}$$

Ἐπομένως : Τὸ ἐμβαδὸν τῆς παραπλεύρου ἐπιφανείας μιᾶς κανονικῆς πυραμίδος ίσοῦται πρὸς τὸ ἡμιγινόμενον του μήκους τῆς περιμέτρου τῆς βάσεώς του ἐπὶ τὸ μῆκος του ἀποστήματος αὐτῆς.

**Παρατήρησις:** 1) Ἐὰν τμήσωμεν τὴν παραπλεύρον ἐπιφάνειαν κατὰ μῆκος μιᾶς παραπλεύρου ἀκμῆς καὶ ἀναπτύξωμεν ἐπὶ ἐπιπέδου, ἔχομεν τὸ ἀνάπτυγμα του σχήματος 146 (σχ. 147).

2) Δυνάμεθα, τέμνοντες τὴν πυραμίδα κατὰ μῆκος ὅλων τῶν παρ-



σχ. 147.



σχ. 148.

πλεύρων άκμῶν, νὰ ᾔχωμεν τὸ ἀνωτέρω ἀνάπτυγμα τῆς παραπλεύρου ἐπιφανείας τῆς κανονικῆς πυραμίδος. (Σχῆμα 148).

Τότε τὸ ἐμβαδὸν τῆς παραπλεύρου ἐπιφανείας αὐτῆς εύρισκεται, ἐὰν λάβωμεν τὸ ἡμίσυ τοῦ ἐμβαδοῦ τοῦ δρθιγωνίου, τοῦ ὅποιου αἱ διαστάσεις εἰναι τὸ μῆκος τῆς περιμέτρου τῆς βάσεως τῆς πυραμίδος καὶ τὸ μῆκος τοῦ ἀποστήματος αὐτῆς.

"Ἄρα Επαρ. ἐπιφ. καν. πυρ. =


$$= \frac{\text{Μῆκος περιμέτρου βάσεως} \times \text{μῆκος τοῦ ἀποστήματος}}{2}$$

Ἐὰν δὲ θεωρήσωμεν ὡς λ., τὸ μῆκος τῆς πλευρᾶς τῆς βάσεως τῆς κανονικῆς πυραμίδος, ν τὸ πλῆθος τῶν πλευρῶν τῆς βάσεως καὶ ἡ τὸ ἀπόστημα τῆς κανονικῆς πυραμίδος θὰ ᾔχωμεν :

$$\boxed{\text{Επαρ. ἐπιφ. καν. πυρ.} = \frac{v. \lambda_{\nu}. h}{2}}$$

2. Ἐμβαδὸν τῆς διλικῆς ἐπιφανείας κανονικῆς πυραμίδος :

Διὰ νὰ εύρωμεν τὸ ἐμβαδὸν τῆς διλικῆς ἐπιφανείας κανονικῆς πυραμίδος, προσθέτομεν εἰς τὸ ἐμβαδὸν τῆς παραπλεύρου ἐπιφανείας τὸ ἐμβαδὸν τῆς βάσεως αὐτῆς.



σχ.. 149

ἡτοι :

$$\boxed{\text{Εολ.} = \text{Επαρ.} + \text{Εβασ.}} \quad (1)$$

$$\boxed{\text{Εολ.} = \frac{v. \lambda_{\nu}. h}{2} + \text{Εβασ.}} \quad (2)$$

"Ο τύπος (1) ισχύει καὶ διὰ τὰς μὴ κανονικὰς πυραμίδας.

Διὰ νὰ εύρωμεν τὸ ἐμβαδὸν τῆς παραπλεύρου ἐπιφανείας, τυχούσης πυραμίδος, προσθέτομεν τὰ ἐμβαδὰ τῶν ἑδρῶν αὐτῆς.

## 'Α σχήματα

225) Δίδεται κανονική έξαγωνική πυραμίδης πλευρᾶς βάσεως 3 cm, η δποία έχει δπόστημα 9 cm. Νὰ εύρητε τὸ ἐμβαδὸν τῆς παραπλεύρου καὶ τῆς δλικῆς ἐπιφανείας αὐτῆς.

226) Κατασκευάσατε τὸ ἀνάπτυγμα μιᾶς κανονικῆς πυραμίδος, τῆς δποίας ή βάσις εἶναι ἐν τετράγωνον πλευρᾶς 3 cm καὶ τὸ δπόστημα 2,5 cm. Νὰ εύρητε τὸ ἐμβαδὸν τῆς παραπλεύρου καὶ τῆς δλικῆς ἐπιφανείας τῆς.

227) Δίδεται κανονικὴ πυραμίδης μὲ βάσιν ἐν τετράγωνον πλευρᾶς 6 cm καὶ ὑψους 4 cm. Νὰ ὑπολογίσητε τὸ ἐμβαδὸν τῆς παραπλεύρου καὶ τῆς δλικῆς ἐπιφανείας τῆς κανονικῆς πυραμίδος.

228) Δίδεται μία κανονικὴ έξαγωνικὴ πυραμίδης, τῆς δποίας ή παραπλεύρου ἀκμῆς εἶναι 10 cm καὶ τὸ ὑψος 6 cm. Νὰ ὑπολογισθῇ τὸ ἐμβαδὸν τῆς δλικῆς ἐπιφανείας τῆς.

229) Τὸ στερεὸν τοῦ σχήματος 150 δποτελεῖται ἀπὸ ἕνα κύβον πλευρᾶς 5 m καὶ μίαν κανονικὴν τετραγωνικὴν πυραμίδαν, τῆς δποίας τὸ δπόστημα εἶναι 7 m. Νὰ εὔρεθῃ τὸ ἐμβαδὸν τῆς ἐπιφανείας του.

## § 78. "Ογκος πυραμίδος

I. Δίδεται κανονικὴ τετραγωνικὴ πυραμίδης μὲ μῆκος πλευρᾶς βάσεως  $\lambda$  καὶ μῆκος ψφους  $v = \frac{\lambda}{2}$ . Ζητεῖται νὰ εὕρητε τὸν ὅγκον αὐτῆς.

Κατασκευάζομεν ἔξ (6) πυραμίδας ἵσας πρὸς τὴν δοθεῖσαν καὶ τοποθετοῦμεν αὐτάς, ὥστε νὰ ἔχουν κοινὴν τὴν κορυφὴν καὶ ἀνὰ δύο κοινὴν παραπλεύρον ἔδραν. Τότε σχηματίζεται κύβος ἀκμῆς  $\lambda$ . (σχ. 151).

"Αρα ὁ ὅγκος ἐκάστης ἐκ τῶν ἴσων αὐτῶν πυραμίδων εἶναι τὸ  $\frac{1}{6}$  τοῦ ὅγκου τοῦ κύβου.


$$\text{"Ήτοι } \text{Έχομεν } V_{\text{καν. πυρ.}} = \frac{1}{6} \lambda^3 = \frac{1}{3} \cdot \lambda^2 \cdot \frac{\lambda}{2} \Leftrightarrow V = \frac{1}{3} E_B \cdot v$$

"Ἐπομένως : 'Ο ὅγκος κανονικῆς πυραμίδος ἴσοῦται πρὸς τὸ  $\frac{1}{3}$  τοῦ γινομένου τοῦ ἐμβαδοῦ τῆς βάσεως ἐπὶ τὸ μῆκος τοῦ ψφους.


2. 'Ο εὐρεθεὶς ἀνωτέρῳ διὰ τὸν ὅγκον τῆς κανονικῆς πυραμίδος τύπος, ἴσχει δι' οἰανδή-πτοτε πυραμίδα, ὡς θὰ ἀποδείξωμεν εἰς ἀνωτέρων τάξιν.

Δυνάμεθα νὰ εύρωμεν πρακτικῶς τὸν τύπον τοῦ ὅγκου τῆς πυραμίδος ὡς ἔξι :


Χρησιμοποιοῦμεν δύο δοχεῖα. Δοχεῖον σχήματος τριγωνικῆς πυραμίδος OABΓ, μὲ ἀνοικτὴν τὴν βάσιν ABΓ καὶ δοχεῖον πρισματικὸν μὲ βάσιν ἴσην πρὸς τὴν βάσιν ABΓ τῆς τριγωνικῆς πυραμίδος, ισούμενός πρὸς αὐτήν.



σχ. 150.




σχ. 151.



σχ. 152.

Παρατηροῦμεν, ότι έάν πληρώσωμεν διά λεπτής άμμου (ή υδατος) τό πρώτον δοχείον και άδειάσωμεν τό περιεχόμενον αύτοῦ εις τό δεύτερον, θά παρατηρήσωμεν ότι, θά χρειασθή νά έπαναλάβωμεν τούτο τρεις φοράς μέχρι ότου πληρωθή τό πρισματικόν δοχείον (σχ. 152).

Έάν  $V$  είναι ο δύκος τής τριγωνικής πυραμίδος και  $V'$  ο δύκος τοῦ πρισμάτος, θά έχωμεν :



σχ. 153.

$$3V = V' \iff V = \frac{V'}{3} \iff V = \frac{1}{3} E_B \cdot u \quad (V' = E_B \cdot u)$$

3. Διά νά μετρήσωμεν τυχοῦσαν πυραμίδα ΟΑΒΓΔΕ (σχ. 153), ή όποια έχει έμβαδόν βάσεως  $E_B$  και ύψος  $u$  διαιροῦμεν αύτήν εις τάς τριγωνικάς πυραμίδας ΟΑΒΓ, ΟΑΓΔ, ΟΑΔΕ, αι όποιαι έχουν τό αύτό ύψος και δύκους άντιστοίχως  $V_1, V_2, V_3$ , έμβαδά δὲ βάσεων τά  $E_1, E_2, E_3$ , έχοντα αθροισμα  $E$ . "Οθεν :

$$\begin{aligned} V_{\text{ΟΑΒΓΔΕ}} &= V_1 + V_2 + V_3 \iff V_{\text{ΟΑΒΓΔΕ}} = \frac{1}{3} E_1 u + \frac{1}{3} E_2 u + \frac{1}{3} E_3 u \\ &\iff V_{\text{ΟΑΒΓΔΕ}} = \frac{1}{3} (E_1 + E_2 + E_3) u \iff V = \frac{1}{3} E_B u \end{aligned}$$

"Αρα καταλήγομεν εις τό συμπέρασμα ότι : 'Ο δύκος μιᾶς οιασδήποτε πυραμίδος ισοῦται πρὸς τὸ  $\frac{1}{3}$  τοῦ γινομένου τοῦ έμβαδοῦ τῆς βάσεως ἐπὶ τὸ μῆκος τοῦ ψήφους.

### 'Α σχήσεις

230) Κανονική πυραμίς έχει ως βάσιν τετράγωνον πλευρᾶς μήκους 8 εμ και ύψος 6 εμ. Υπολογίσατε τόν δύκον αύτής.

231) Κανονική έξαγωνική πυραμίς έχει παράπλευρον άκμήν μήκους 10 εμ και ύψος μήκους 8 εμ. Νά εύρητε τόν δύκον αύτής.

232) Δίδεται τριγωνική πυραμίς ΟΑΒΓ μέ άκμάς  $OA=3a$ ,  $OB=4a$  και  $OG=2a$ , αι όποιαι δύο είναι κάθετοι. Υπολογίσατε τόν δύκον τής πυραμίδος ΟΑΒΓ κορυφής Ο και βάσεως ΑΒΓ. (Τοῦτο θά έπιτύχητε διά τής εύρέσεως τοῦ δύκον τής πυραμίδος ΑΟΒΓ, κορυφής Α και βάσεως ΟΒΓ). 'Εφαρμογή :  $a=5$  εμ.

233) Δίδεται μία πυραμίς ΟΑΒΓΔ κορυφής Ο, τής όποιας ή βάσις είναι εις ρόμβος ΑΒΓΔ πλευρᾶς μήκους 8 εμ και ή διαγώνιος ΑΓ έχει έπιστοις μήκος 8 εμ. Τό Ιχνος Η τοῦ ύψους τής πυραμίδος ΟΗ είναι τό σημείον τομῆς τῶν διαγωνίων ΑΓ και ΒΔ τοῦ ρόμβου. Τό μήκος τής παραπλεύρου άκμής ΟΒ είναι 8 εμ. Νά εύρητε τόν δύκον τής πυραμίδος ΟΑΒΓΔ.

234) Δίδεται κανονικόν τετράεδρον άκμής  $a$ . Υπολογίσατε τόν δύκον αύτοῦ. 'Εφαρμογή :  $a=6$  εμ.

235) Νά συγκρίνητε τά υψη κανονικοῦ τετραέδρου. (Χρησιμοποιήσατε τόν δύκον αύτοῦ)

**Δ. ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΕΚ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ (ΟΡΘΟΣ ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ)–ΜΕΤΡΗΣΙΣ ΟΡΘΟΥ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ**

**§ 79. 'Ορθός κυκλικός κύλινδρος :**

Θεωροῦμεν ἐν δρθογώνιον ΑΟΟ'Α', σχ. 154 περιστρεφόμενον περὶ τὴν ΟΟ', ἡ δποία παραμένει ἀκίνητος. Διὰ τῆς πλήρους περιστροφῆς του παράγεται εἰς δρθός κυκλικός κύλινδρος (ἢ ἐκ περιστροφῆς κύλινδρος).

'Η παραμένουσα ἀκίνητος κατὰ τὴν περιστροφὴν εὔθετα ΟΟ', λέγεται ἄξων τοῦ κυλίνδρου. Αἱ πλευραὶ ΟΑ καὶ ΟΑ' παράγουν, διὰ τῆς περιστροφῆς, δύο ἵσους κυκλικούς δίσκους, τῶν δποίων τὰ ἐπίπεδα εἶναι κάθετα ἐπὶ τὴν ΟΟ' ἢτοι παράλληλα μεταξύ των. Οἱ κύκλοι αὐτοὶ λέγονται βάσεις τοῦ κυλίνδρου. 'Η ἀκτὶς τῆς βάσεως λέγεται ἀκτὶς τοῦ κυλίνδρου.

'Η πλευρὰ ΑΑ' παράγει διὰ τῆς περιστροφῆς τὴν κυρτὴν ἐπιφάνειαν τοῦ κυλίνδρου. 'Η ΑΑ' λέγεται γενέτειρα τοῦ κυλίνδρου. Τὸ κοινὸν μῆκος τῶν γενετειρῶν τοῦ ἐκ περιστροφῆς κυλίνδρου εἶναι ἴσον μὲ τὴν ἀπόστασιν ΟΟ' τῶν κέντρων τῶν βάσεων του καὶ εἶναι τὸ ὑψος τοῦ κυλίνδρου.

'Εξ ὅσων εἴπομεν ἀνωτέρω συμπεραίνομεν ὅτι :

Εἰς κύλινδρος δρθός κυκλικός (ἢ ἀπλῶς κύλινδρος) εἶναι ἐν στερεὸν ἐκ περιστροφῆς, παραγόμενον ὑπὸ ἐνὸς δρθογωνίου, περιστρεφομένου περὶ μίαν τῶν πλευρῶν του, παραμένουσαν ἀκίνητον.

**Σημείωσις:** Δυνάμεθα διὰ τίνος μηχανισμοῦ νὰ περιστρέψωμεν ταχέων ἐν δρθογώνιον (ἐκ χαρτονίου ἢ ἀλλού τινὸς ύλικοῦ) περὶ μίαν τῶν διαστάσεων του καὶ λόγω τοῦ ὀπτικοῦ μετασθήματος, νὰ ἔχωμεν τὴν εἰκόνα ἐνὸς δρθοῦ κυκλικοῦ κυλίνδρου εἰς τὸ χῶρον τῶν τριῶν διαστάσεων. 'Η εἰκὼν δὲ αὐτὴ δικαιολογεῖ καὶ κινητικῶς τὸν τρόπον γενέσεως τοῦ δρθοῦ κυκλικοῦ κυλίνδρου (ἢ ἐκ περιστροφῆς). (Σχ. 155). Εἰς τὸ ἑξῆς, δταν λέγωμεν κύλινδρος, θὰ ἐννοοῦμεν δρθός κυκλικός κύλινδρος.




σχ. 155.

**§ 80. 'Εμβαδὸν δρθοῦ κυκλικοῦ κυλίνδρου.**

α) 'Εμβαδὸν τῆς κυρτῆς ἐπιφανείας δρθοῦ κυκλικοῦ κυλίνδρου.


Δίδεται δρθός κυκλικός κύλινδρος ἀκτῖνος βάσεως  $R$  καὶ ὑψους  $u$ . Νὰ εῦρητε τὸ ἐμβαδὸν τῆς κυρτῆς αὐτοῦ ἐπιφανείας.

'Εὰν τμήσωμεν τὴν κυρτὴν ἐπιφάνειαν τοῦ κυλίνδρου κατὰ μῆκος μιᾶς




σχ. 154.

γενετείρας του (σχ. 156) και άναπτυξωμεν αύτήν έπι ένδος έπιπέδου, θά ξωμεν  
έν δρθογώνιον, τό δόποιον έχει ως διαστάσεις τά μήκη τοῦ κύκλου τῆς βάσεως  
καὶ τοῦ ύψους (σχ. 157). Ἐπομένως :



σχ. 156.



σχ. 157.

Τό έμβαδὸν τῆς κυρτῆς ἐπιφανείας ένδος κυλίνδρου εἰναι λίσον πρὸς  
τὸ γινόμενον τοῦ μήκους τοῦ κύκλου τῆς βάσεως ἐπὶ τὸ μῆκος τοῦ  
ύψους.

Μητοι :

$$\text{Εκυρτ. ἐπιφ. κυλ.} = 2\pi R \cdot u$$

β) Ἐμβαδὸν τῆς δίλικῆς ἐπιφανείας κυλίνδρου :

Διὰ νὰ εὔρωμεν τὸ έμβαδὸν τῆς δίλικῆς ἐπιφανείας τοῦ προηγουμένου κυλίνδρου, προσθέτομεν τὸ έμβαδὸν τῶν βάσεων τοῦ κυλίνδρου εἰς τὸ έμβαδὸν τῆς κυρτῆς ἐπιφανείας αὐτοῦ.

Οὕτως ξέχομεν :

$$\text{Εδλικ.} = 2\pi R \cdot u + 2\pi R^2$$

$$\text{Εδλικ.} = 2\pi R \cdot (u + R)$$

Α σ κή σ ε ι σ

236) Δίδεται κύλινδρος ἀκτίνος βάσεως 5 cm καὶ ύψος u=25 cm. Νὰ εὔρητε τὸ έμβαδὸν α) τῆς κυρτῆς καὶ β) τῆς δίλικῆς ἐπιφανείας τοῦ κυλίνδρου.

237) Μία δεξαμενὴ πετρελαίου σχήματος δρθοῦ κυλίνδρου έχει διάμετρον (έσωτερικήν) βάσεως 10m καὶ ύψος 20m. Νὰ εὔρητε τὸ έμβαδὸν τῆς κυρτῆς (έσωτερικῆς) ἐπιφανείας τῆς δεξαμενῆς αὐτῆς.

238) Δίδεται κύλινδρος, τοῦ δόποιον τὸ έμβαδὸν τῆς δίλικῆς ἐπιφανείας του εἰναι 471 cm<sup>2</sup> καὶ ἡ διάτης τῆς βάσεως 5 cm. Νὰ εύρητε τὸ ύψος τοῦ κυλίνδρου.

239) Ἐν ἀξυστόνι μολύβιον κυλινδρικὸν έχει διάμετρον 6 mm καὶ μῆκος 18 cm. Νὰ εὔρητε τὸ έμβαδὸν τῆς κυρτῆς αὐτοῦ ἐπιφανείας καθὼς καὶ τὸ έμβαδὸν τῆς δίλικῆς ἐπιφανείας αὐτοῦ.

240) Δίδεται ἔν δρθογώνιον μὲ διαστάσεις α καὶ β. Περιστρέφομεν αὐτὸν πρῶτον περὶ τὴν μίαν πλευράν καὶ δεύτερον περὶ τὴν ἄλλην (διαδοχικὴν πρὸς τὴν πρώτην πλευράν).

Παράγονται οὕτω δύο κύλινδροι ἐκ περιστροφῆς. Τι έχετε νὰ παρατηρήσητε διὰ τὰ έμβαδά τῶν κυρτῶν ἐπιφανειῶν αὐτῶν τῶν δύο κυλίνδρων;


### § 81. Ὁγκος δρθοῦ κυκλικοῦ κυλίνδρου

Δίδεται δύθις κυκλικός κύλινδρος ἀκτῖνος βάσεως  $R$  καὶ ὕψους  $v$ . (σχ. 158)  
Νὰ εὕρητε τὸν δύκον αὐτοῦ.

Ὁ δύκος τοῦ δρθοῦ κυκλικοῦ κυλίνδρου ἀκτῖνος βάσεως  $R$  καὶ ὕψους  $v$   
δίδεται ὑπὸ τοῦ τύπου  $V = \pi \cdot R^2 \cdot v$ , ὡς θὰ  
ἀποδείξωμεν εἰς ἀνωτέραν τάξιν.

Σημ. Δυνάμεθα νὰ εὔρωμεν τὸν προτυπούμενον τύπον μὲ τὴν  
βοήθειαν τῆς ἐννοίας τοῦ ἔγγεγραμμένου εἰς τὸν κύλινδρον  
κανονικοῦ πρίσματος. ("Ἐν κανονικὸν πρίσμα λέγεται ἔγγεγραμ-  
μένον εἰς κύλινδρον, ἐάν αἱ βάσεις αὐτοῦ εἶναι πολύγωνα κανονικά  
ἔγγεγραμμένα εἰς τὰς βάσεις τοῦ κυλίνδρου καὶ αἱ παράπλευροι  
ἀκμαὶ αὐτοῦ, γενέτειραι τοῦ κυλίνδρου").

"Ἐν ἔγγεγραμμένον εἰς κύλινδρον κανονικόν πρίσμα, τοῦ ὅποιον  
οὐ διάθιμὸς τῶν πλευρῶν τῆς βάσεως συνεχῶς δικλασίάζεται  
προσεγγίζει (διλίγον κατ' διλίγον) τὸ σχῆμα τοῦ κυλίνδρου.




σχ. 158.

Τοῦτο δυνάμεθα νὰ δείξωμεν μὲ τὴν βοήθειαν ἐνὸς ἀνοικτοῦ ἐκ τῶν ἄνω κυλίνδρου  
καὶ χαρτονίου καὶ τινῶν κανονικῶν πρίσματων, ὑψους ἵσου πρὸς τὸ ὕψος τοῦ κυλίνδρου καὶ  
βάσεων σχήματος τετραγώνου, κανονικοῦ δικλασίαγων κ.λ.π. (πο-  
λυγώνων, τὰ δόποια δύνανται νὰ ἔγγραφοῦν  
εἰς τὴν βάσιν τοῦ κυλίνδρου).

'Ἐάν εἰσαγάγωμεν ἐν ἔξ αὐτῶν εἰς τὸν  
κύλινδρον, αἱ βάσεις του θὰ εἶναι ἔγγεγραμμέ-  
ναι εἰς τὰς βάσεις τοῦ κυλίνδρου καὶ αἱ παρά-  
πλευροὶ ἀκμαὶ αὐτοῦ γενέτειραι τοῦ κυλίνδρου.

Εἰσάγομεν διαδοχικῶς εἰς τὸν κύλινδρον  
τὰ κανονικὰ πρίσματα μὲ βάσιν τετράγωνον,  
κανονικὸν ὀκτάγωνον, κανονικὸν δικλασίαγω-  
νον κ.λ.π. καὶ παρατηροῦμεν, διτὶ ἡ διαφορὰ  
τῶν δύκων τοῦ κυλίνδρου καὶ τῶν πρίσμά-  
των συνεχῶς ἐλαττοῦται, καθ' ὃσον αὔξανει  
τὸ πλῆθος τῶν πλευρῶν τῆς βάσεως τοῦ ἔγ-  
γεγραμμένου πρίσματος καὶ δύναται νὰ γίνῃ δύσον θέλομεν μικρά. (Σχ. 159)



σχ. 159.


γεγραμμένου πρίσματος καὶ δύναται νὰ γίνῃ δύσον θέλομεν μικρά.  
'Ως ἐκ τούτου λέγομεν, διτὶ ὁ δύκος τοῦ πρίσματος προσεγγίζει (ἔχει δρίον) τὸν δύκον  
τοῦ κυλίνδρου. 'Αλλ' ὁ δύκος τοῦ δρθοῦ πρίσματος εἶναι  $V = Eb \cdot v$ . 'Ἐπομένως καὶ τοῦ κυλίν-  
δρου ὁ δύκος θὰ εἶναι  $V = Eb \cdot v = \pi \cdot R^2 \cdot v$ .

(Λεπτομερέστερον θὰ ἔξετάσωμεν τὸ θέμα αὐτὸν εἰς ἀνωτέραν τάξιν).

### Ἄσκήσεις

241) Ὁρθός κυκλικός κύλινδρος ἔχει ἀκτῖνα βάσεως  $R = 5$  cm καὶ ὕψος 15 cm. Νὰ εὕρητε  
τὸν δύκον αὐτοῦ.

242) Κύλινδρος, τοῦ ὅποιον ὁ δύκος εἶναι  $45\pi$  cm<sup>3</sup> ἔχει ὕψος 5 cm. Νὰ εὕρητε τὴν ἀκτῖνα  
τῆς βάσεως αὐτοῦ.



σχ. 160.

243) Ή κυρτή έπιφάνεια κυλίνδρου είναι 94, 20 cm. Τό δύος αύτού είναι 15 cm. Νά ύπολογίσητε τὸν δύκον τοῦ κυλίνδρου.

244) Έν φέαρ σχήματος κυλινδρικοῦ ἔχει βάθος 6 m. Νά ύπολογίσητε τὸν δύκον τῆς λιθοδομῆς αὐτοῦ, ἐάν είναι γνωστόν, δτὶ ή ἑσωτερική διάμετρος τοῦ φρέατος είναι 3 m καὶ τὸ πάχος τοῦ τοίχου 2, 5 dm.

245) Έν δρθογώνιον  $AB\Gamma D$  μὲ διαστάσεις  $AB=10$  cm καὶ  $B\Gamma=4$  cm στρέφεται περὶ μίαν εὐθείαν επαράλληλον πρὸς τὴν  $AB$ , κειμένην εἰς τὸ ἐπίπεδον τοῦ δρθογώνιου καὶ εἰς ἀπόστασιν ἀπ' αὐτῆς ἴσην πρὸς 12 cm. Νά ύπολογίσητε τὸν δύκον τοῦ παραγομένου στερεοῦ, κατὰ τὴν περιστροφὴν τοῦ δρθογώνιου περὶ τὴν εὐθείαν ε. (Σχ. 160).

## Ε. ΟΡΘΟΣ ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΚΩΝΟΣ (ΚΩΝΟΣ ΕΚ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ) — ΜΕΤΡΗΣΙΣ ΟΡΘΟΥ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΩΝΟΥ

### § 82. Όρθος κυκλικός κῶνος

Θεωροῦμεν ἐν δρθογώνιον  $AKO$  (γων.  $K=1$  δρθ.). Περιστρέφομεν αὐτὸν περὶ τὴν  $OK$ . Διὰ τῆς πλήρους περιστροφῆς τοῦ τριγώνου αὐτοῦ περὶ μίαν τῶν καθέτων πλευρῶν του, παράγεται εἰς δρθὸς κυκλικός κῶνος. Ή  $KO$  παραμένει ἀκίνητος κατὰ τὴν περιστροφὴν καὶ ὁ φορεὺς αὐτῆς λέγεται ἀξιῶν τοῦ κώνου. (Σχ. 161).

Ἡ πλευρὰ  $QA$  (ύποτείνουσα τοῦ δρθογώνιου τριγώνου  $AKO$ ) παράγει διὰ τῆς περιστροφῆς τὴν κυρτὴν ἐπιφάνειαν τοῦ κώνου καὶ δομαζέται γενέτειρα ἡ πλευρὰ τοῦ κώνου.

Ἡ πλευρὰ  $KA$  παράγει, διὰ τῆς περιστροφῆς, ἕνα κυκλικὸν δίσκον, τοῦ δόποιου τὸ ἐπίπεδον είναι κάθετον ἐπὶ τὸν ἄξονα τοῦ κώνου εἰς τὸ σημεῖον  $K$ . Ὁ δίσκος αὐτὸς λέγεται βάσις τοῦ κώνου.

Ἡ ἀκτὶς τῆς βάσεως  $R$  είναι ή ἀκτὶς τοῦ κώνου καὶ τὸ σημεῖον  $O$  είναι ή κορυφὴ τοῦ κώνου.

Ἡ ἀπόστασις τῆς κορυφῆς  $O$  τοῦ κώνου ἀπὸ τὴν βάσιν, ἥτοι τὸ εὐθ. τμῆμα  $OK$  τοῦ ἀξιούς αὐτοῦ λέγεται ψώς τοῦ κώνου. Ἡ γωνία  $AOK$  τοῦ δρθογώνιου τριγώνου  $AOK$  είναι τὸ ἡμισυ τῆς γωνίας τῆς κορυφῆς τοῦ κώνου. Ἐάν τὸ τρίγωνον  $AOA'$  είναι ισόπλευρον, ἥτοι ή διάμετρος τῆς βάσεως είναι ἴση μὲ τὴν γενέτειραν τοῦ κώνου, τότε ὁ κῶνος λέγεται ισόπλευρος.

**Σημείωσις.** Δυνάμεθα νὰ περιστρέψωμεν ταχέως, διὰ τίνος μηχανισμοῦ, ἐν δρθογώνιον

τρίγωνον (ἐκ χαρτούνου κ.λ.π.) περὶ μίαν τῶν καθέτων πλευρῶν αὐτοῦ καὶ νὰ ἔχωμεν τὴν εἰκόνα ἐνὸς ἐκ περιστροφῆς κώνου εἰς τὸν χῶρον τῶν τριῶν διαστάσεων (Σχ. 162).




Ἐξ δωσων ἀνωτέρω εἴπομεν, συμπεραίνομεν ὅτι: Τὸ στερεόν τὸ δποίον παράγεται διὰ τῆς πλήρους περιστροφῆς ἐνὸς δρθογωνίου τριγώνου περὶ μίαν ἀκίνητον κάθετον πλευράν του λέγεται δρθὸς κυκλικὸς κῶνος (ἢ κῶνος ἐκ περιστροφῆς). Εἰς τὰ ἐπόμενα, δταν λέγωμεν κῶνος, θά ἐννοοῦμεν δρθὸς κυκλικὸς κῶνος.

### § 83. Ἐμβαδὸν δρθοῦ κυκλικοῦ κώνου.


α) Ἐμβαδὸν τῆς κυρτῆς ἐπιφανείας τοῦ δρθοῦ κυκλικοῦ κώνου:

Δίδεται κῶνος ἀκτίνος βάσεως  $R$  καὶ πλευρᾶς  $\lambda$ . Νὰ ενρῃτετε τὸ ἐμβαδὸν τῆς κυρτῆς αὐτοῦ ἐπιφανείας.


Τέμνομεν τὴν κυρτὴν ἐπιφάνειαν τοῦ κώνου κατὰ μῆκος μᾶς γενετέρας αὐτοῦ καὶ ἀναπτύσσομεν αὐτὴν ἐπὶ ἐνὸς ἐπιπέδου (σχ. 163, 164).



σχ. 163.



σχ. 164.



σχ. 165.

Τὸ ἀνάπτυγμα τῆς κυρτῆς ἐπιφανείας τοῦ κώνου εἶναι εἰς κυκλικὸς τομεὺς τοῦ δποίου τὸ ἐμβαδὸν εἶναι ἵσον πρὸς τὸ ἐμβαδὸν τῆς κυρτῆς ἐπιφανείας τοῦ κώνου καὶ τὸ τόξον ἵσον πρὸς τὸ μῆκος τοῦ κύκλου τῆς βάσεως τοῦ κώνου, ἥτοι  $\tau = 2\pi R$ .

Γνωρίζομεν ὅτι τὸ ἐμβαδὸν τοῦ κυκλικοῦ τομέως δίδεται καὶ ὑπὸ τοῦ τύπου

$$\epsilon = \tau \cdot \frac{\lambda}{2} = \frac{1}{2} 2\pi R \cdot \lambda = \pi R \lambda$$

"Αρα

Εκυρτ. ἐπιφ. κών. ἐκ περ. =  $\pi R \lambda$

ἥτοι:

Τὸ ἐμβαδὸν τῆς κυρτῆς ἐπιφανείας ἐνὸς δρθοῦ κυκλικοῦ κώνου ἵσοῦται πρὸς τὸ γινόμενον τοῦ μήκους τοῦ ἡμικυκλίου τῆς βάσεως ἐπὶ τὸ μῆκος τῆς γενετέρας αὐτοῦ.

β) Ἐμβαδὸν τῆς δὲ δικῆς ἐπιφανείας ὁρθοῦ κυκλικοῦ κώνου :

Διὰ νὰ εὕρωμεν τὸ ἐμβαδὸν τῆς δὲ δικῆς ἐπιφανείας τοῦ ὁρθοῦ κυκλικοῦ κώνου, προσθέτομεν εἰς τὸ ἐμβαδὸν τῆς κυρτῆς αὐτοῦ ἐπιφανείας τὸ ἐμβαδὸν τῆς βάσεως του (σχ. 165).

$$\text{Ητοι } \boxed{\text{Είλικ.} = \pi R\lambda + \pi R^2} \quad \text{ή } \text{ἄλλως} \quad \boxed{\text{Είλικ.} = \pi R \cdot (R + \lambda)}$$

### 'Α σ κ ή σ ε ι σ

246) Δίδεται κῶνος, τοῦ ὅποιου ἡ ἀκτὶς τῆς βάσεως εἶναι 8 cm καὶ ἡ πλευρὰ 10 cm. Νὰ εὔρητε τὸ ἐμβαδὸν τῆς κυρτῆς καὶ τῆς δὲ δικῆς αὐτοῦ ἐπιφανείας.

247) Κῶνος ἐκ περιστροφῆς ἔχει πλευράν μήκους 15 cm καὶ ὑψος 12 cm. Νὰ εὔρητε τὸ ἐμβαδὸν τῆς κυρτῆς αὐτοῦ ἐπιφανείας.

248) Νὰ υπολογίσητε τὸ ἐμβαδὸν τῆς δὲ δικῆς ἐπιφανείας κώνου, τοῦ ὅποιου τὰ μήκη τοῦ ὑψους καὶ τῆς πλευρᾶς εἶναι ἀντιστοίχως 16 cm καὶ 20 cm.

249) Τὸ ἐμβαδὸν τῆς κυρτῆς ἐπιφανείας ἐνὸς κώνου εἶναι 47,10 dm<sup>2</sup>, ἡ δὲ πλευρὰ αὐτοῦ 5 dm. Νὰ εὔρητε τὸ ἐμβαδὸν τῆς δὲ δικῆς ἐπιφανείας τοῦ κώνου.

250) Εἰς ίσοπλευρος ὁρθὸς κυκλικὸς κῶνος ἔχει ὑψος 10 cm. Νὰ εὔρητε τὸ μῆκος τῆς ἀκτίνος τῆς βάσεως, τὸ μῆκος τῆς πλευρᾶς καὶ τὸ ἐμβαδὸν τῆς δὲ δικῆς ἐπιφανείας τοῦ κώνου αὐτοῦ.

251) Ἐν τετράγωνον πλευρᾶς 20 cm περιστρέφεται περὶ μίαν τῶν διαγωνίων του. Νὰ εύρητε τὸ ἐμβαδὸν τῆς ἐπιφανείας τοῦ παραγομένου στρεοῦ.

### § 84. "Ογκος ὁρθοῦ κυκλικοῦ κώνου

Ο ὁγκος ἐνὸς ὁρθοῦ κυκλικοῦ κώνου ἀκτίνος βάσεως R καὶ ὑψους u (σχ.

166) δίδεται ὑπὸ τοῦ τύπου  $\boxed{V = \frac{1}{3}\pi R^2 u}$ , ἢτοι δ ὁγκος ἐνὸς ὁρθοῦ

κυκλικοῦ κώνου ισοῦται μὲ τὸ  $\frac{1}{3}$  τοῦ γινομένου τοῦ ἐμβαδοῦ τῆς βάσεως ἐπὶ τὸ μῆκος τοῦ ὑψους αὐτοῦ.

Εἰς ἀνωτέραν τάξιν θὰ ἀποδείξωμεν τὴν πρότασιν αὐτήν. Δυνάμεθα ὅμως μὲ συλλογισμούς ἀναλόγους πρὸς ἑκείνους τῆς παραγράφου 81, νὰ εὕρωμεν τὸν τύπον αὐτόν.

Πρὸς τοῦτο θὰ χρησιμοποιήσωμεν κανονικὰς πυραμίδας ἐγγεγραμμένας εἰς τὸν κῶνον, τῶν ὅποιων δ ἀριθμὸς τῶν πλευρῶν σχ. 166. τῆς βάσεως συνεχῶς διπλασιάζεται.

**Παρατήρησις:** Ἐκ τῶν τύπων τῶν ὁγκων ὁρθοῦ κυκλικοῦ κυλίνδρου καὶ κώνου, οἱ ὅποιοι ἔχουν τὴν αὐτὴν βάσιν καὶ τὸ αὐτὸν ὑψος παρατηροῦμεν διτι : Ο ὁγκος ἐνὸς ὁρθοῦ κυκλικοῦ κώνου ισοῦται πρὸς τὸ  $\frac{1}{3}$  τοῦ ὁγκοῦ ἐνὸς ὁρθοῦ κυκλικοῦ κυλίνδρου, δ ὁ ποιοῖς ἔχει τὴν αὐτὴν βάσιν καὶ τὸ αὐτὸν ὑψος μὲ τὸν κῶνον.



Τοῦτο διαπιστοῦμεν, ἐὰν χρησιμοποιήσωμεν κωνικὸν καὶ κυλινδρικὸν δοχεῖον μὲ τίσας βάσεις καὶ τίσα ὑψη καὶ ἐργασθῶμεν, ὡς εἰς τὴν § 68.

### Α σ κ ή σ εις

252) Κώνος ἔχει ἀκτίνα βάσεως 15 cm καὶ ὑψος 40 cm. Νὰ ὑπολογίσητε τὸν δγκὸν αὐτοῦ.

253) Κώνος, τοῦ δποίου τὸ ἐμβαδὸν τῆς κυρτῆς ἐπιφανείας εἶναι 47,10 cm<sup>2</sup> ἔχει πλευρὰν μήκους 5 cm. Νὰ ὑπολογίσητε τὸν δγκὸν τοῦ κώνου.

254) Νὰ ὑπολογίσητε τὸν δγκὸν ὁρθοῦ κυκλικοῦ κώνου, δ ὁποῖος ἔχει ὑψος  $u=9$  cm καὶ μῆκος γενετείρας  $\lambda=15$  cm.


255) Τὸ μῆκος τοῦ κύκλου τῆς βάσεως ἐνὸς ὁρθοῦ κυκλικοῦ κώνου εἶναι 18,8 dm καὶ ἡ γενετείρα αὐτοῦ 5 dm. Νὰ ὑπολογίσητε τὸν δγκὸν τοῦ κώνου αὐτοῦ.

256) Δίδεται Ισθιτευρός κώνος, τοῦ δποίου τὸ ὑψος εἶναι 8 cm. Νὰ ὑπολογίσητε τὴν ἀκτίνα τῆς βάσεως καὶ τὸν δγκὸν αὐτοῦ.

### ΣΤ. ΣΦΑΙΡΑ — ΜΕΤΡΗΣΙΣ ΤΗΣ ΣΦΑΙΡΑΣ

#### § 85. Σφαῖρα:

Δίδεται ἐν ἡμικύκλιον AMA'. 'Εὰν περιστρέψωμεν αὐτὸν (κατὰ μίαν πλήρη περιστροφὴν) περὶ τὴν ἀκίνητον διάμετρόν του AA' παράγεται ἐν



σχ. 167.



σχ. 168.

στερεόν, τὸ δποῖον λέγεται σφαῖρα. Κάθε στημεῖον τῆς σφαίρας ἀπέχει τοῦ Ο ἀπόστασιν R, ἵσην πρὸς τὴν ἀκτίνα τοῦ ἡμικυκλίου. Τὸ Ο λέγεται κέντρον τῆς σφαίρας. 'Η σφαῖρα συμβολίζεται: σφαῖρα (O, R).

Κάθε ἐπίπεδον διερχόμενον διὰ τοῦ Ο τέμνει τὴν σφαίραν κατὰ ἕνα κύκλον κέντρου Ο καὶ ἀκτίνος R, δ ὁποῖος λέγεται μέγιστος κύκλος τῆς σφαίρας.

Κάθε δὲ ἐπίπεδον, τὸ δποῖον τέμνει τὴν σφαίραν, ἀλλὰ δὲν διέρχεται διὰ τοῦ κέντρου αὐτῆς, τὴν τέμνει κατὰ ἕνα κύκλον, δ ὁποῖος λέγεται μικρὸς κύκλος τῆς σφαίρας.

**Σημ.** Δι' ένδος μηχανισμού θέτομεν εις ταχεῖαν περιστροφήν ήμικύλιον (εἰκ. χαρτονίου ἢ δλλου τινὸς ὑλικοῦ) καὶ ἔχομεν τὴν εἰκόνα μιᾶς σφαίρας εἰς τὸν χῶρον τῶν τριῶν διαστάσεων (σχ. 168).

### § 86. Ἐμβαδὸν σφαίρας.

Τὸ ἐμβαδὸν τῆς σφαίρας ισοῦται πρὸς τὸ τετραπλάσιον τοῦ ἐμβαδοῦ ἐνὸς κύκλου, δὸποιος ἔχει ἀκτῖνα ἵσην πρὸς τὴν ἀκτῖνα τῆς σφαίρας (μέγιστος κύκλος).

"**Ητοι :**

$$\boxed{\text{Εσφαίρ.} = 4\pi R^2}$$

"**Α σκήσεις**

257) Μία σφαίρα ἔχει ἀκτῖνα 8 cm. Νὰ εὑρητε τὸ ἐμβαδὸν αὐτῆς.

258) Τὸ μῆκος ἐνὸς μεγίστου κύκλου μιᾶς σφαίρας εἶναι 50,24 cm. Νὰ εὑρητε τὸ ἐμβαδὸν τῆς σφαίρας.

259) Τὸ ἐμβαδὸν μιᾶς σφαίρας εἶναι 50,24 cm<sup>2</sup>. Νὰ ὑπολογίσητε τὴν ἀκτῖνα αὐτῆς τῆς σφαίρας, καθὼς καὶ τὴν ἀκτῖνα ἀλλής σφαίρας, τῆς δὸποιας τὸ ἐμβαδὸν εἶναι τετραπλάσιον τοῦ ἐμβαδοῦ τῆς δοθείσης.

260) Νὰ εὕρητε τὸν λόγον τῶν ἐμβαδῶν δύο σφαίρων μὲν ἀκτῖνας 3 cm καὶ 2 cm.

261) Νὰ κάμνετε τὴν αὐτὴν ἐργασίαν, διταν αἱ ἀκτῖνες εἶναι R<sub>1</sub>, R<sub>2</sub>.

### § 87. Ὁγκος σφαίρας:

"Ο δύκος V σφαίρας ἀκτῖνος R δίδεται ὑπὸ τοῦ τύπου  $\boxed{V = \frac{4}{3}\pi R^3}$  (1)

ώς θὰ διποδείξωμεν εἰς ἀνωτέραν τάξιν.

"**Ητοι :** δὸγκος τῆς σφαίρας ισοῦται πρὸς τὸ γινόμενον τοῦ κύβου τοῦ μῆκους τῆς ἀκτῖνος αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ἀριθμὸν  $\frac{4}{3}\pi$ .

"Ο τύπος (1) δύναται νὰ γραφῇ καὶ ως ἔξῆς :  $V = \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{4}{3}\pi \left(\frac{D}{2}\right)^3 = \frac{4}{3}\pi \frac{D^3}{8} \Rightarrow V = \frac{1}{6}\pi D^3$ , δῆπον  $D = 2R$ .

**Σημ.** Ο μέγας Ἑλλην μαθηματικὸς Ἀρχιμήδης ἐπέτυχεν πρῶτος νὰ μετρήσῃ τὸ ἐμβαδὸν καὶ τὸν δύκον τῆς σφαίρας.


"**Ἐφαρμογαί.**

1. Δύο σφαίραι ἔχουν ἀκτῖνας 2 καὶ 3 cm. Νὰ εὔρεθῇ δὸλόγος τῶν δύκων αὐτῶν.

2. Δύο σφαίραι ἔχουν ἀκτῖνας R<sub>1</sub>, R<sub>2</sub>. Εὔρετε τὸν λόγον τῶν δύκων αὐτῶν.

$$\left( \frac{V_1}{V_2} = \frac{R_1^3}{R_2^3} \right)$$

3. Εάν R καὶ 2R εἶναι αἱ ἀκτῖνες δύο σφαίρων, ποιά ἡ σχέσις τῶν δύκων αὐτῶν;




σχ. 169.

Α σκήνσεις


- 262) Νά ύπολογίσητε τὸν δύκον μιᾶς σφαίρας, ἀκτίνος 5 m.  
 263) Νά εύρητε τὴν ἀκτίνα μιᾶς σφαίρας, τῆς δόποιας ὁ δύκος εἶναι  $113,04 \text{ cm}^2$ .  
 264) Τὸ ἐμβαδὸν μιᾶς σφαίρας εἶναι  $314 \text{ cm}^2$ . Νά ύπολογίσητε τὸν δύκον τῆς σφαίρας.  
 265) Τὸ ἐμβαδὸν μιᾶς σφαίρας εἶναι  $113,04 \text{ cm}^2$ . Νά εύρητε τὸν δύκον μιᾶς ἄλλης σφαίρας, τῆς δόποιας ἡ ἀκτίς εἶναι τριπλασία τῆς ἀκτίνος τῆς δοθεῖσης σφαίρας.  
 266) Τὸ ἐμβαδὸν ἐνὸς μεγίστου κύκλου μιᾶς σφαίρας εἶναι  $153,86 \text{ cm}^2$ . Νά ύπολογίσητε τὸν δύκον τῆς σφαίρας ταύτης.

**Άσκήσεις πρὸς ἑπανάληψιν τοῦ κεφαλαίου V.**


- 267) Ἐν σώμα σχήματος κυκλικοῦ κυλίνδρου μὲ ἀκτίνα βάσεως 1,5 dm καὶ μῆκος 4 dm καταλήγει εἰς τὸ ἐν ἄκρον του εἰς κῶνον τῆς αὐτῆς ἀκτίνος καὶ ὑψους 2 dm. Εἰς δὲ τὸ ἔτερον ἄκρον



σχ. 170.



σχ. 171.



σχ. 172.

του καταλήγει εἰς ἡμισφαίριον τῆς αὐτῆς ἀκτίνος (ἔξωτερικῶς). Νά εύρητε τὸ ἐμβαδὸν τῆς ἐπιφανείας (ἔξωτερικῆς) τοῦ στρεβοῦ καὶ τὸν δύκον του. (Σχ. 170)

268) Μία σφαίρα εἶναι ἔγγεγραμμένη εἰς κύλινδρον ἐκ περιστροφῆς (σχῆμα 171), ἥτοι ἡ σφαίρα περιέχεται ἀκριβῶς εἰς τὸ ἔσωτερικό τοῦ κυλίνδρου, ἐφαπτομένη τῶν δύο βάσεων καὶ τῆς κυρτῆς αὐτοῦ ἐπιφανείας κατὰ μῆκος ἐνὸς μεγίστου κύκλου. Ἐάν ἡ ἀκτίς τῆς σφαίρας εἶναι 5 cm νά εύρητε: α) τὴν ἀκτίνα τῆς βάσεως τοῦ κυλίνδρου, β) τὸ μῆκος τοῦ ὑψους αὐτοῦ, γ) τὸ ἐμβαδὸν τῆς κυρτῆς ἐπιφανείας τοῦ ὅρθοῦ κυκλικοῦ κυλίνδρου, δ) τὸ ἐμβαδὸν τῆς σφαίρας ε) τὸν λόγον τῶν δύο αὐτῶν ἐμβαδῶν καὶ στ) τὸ λόγον τῶν δύκων τῶν στρεβῶν αὐτῶν.


269) Εἰς τὸ ἀνωθεν σχῆμα ἔχομεν ἐν τετράγωνον πλευρᾶς 5 cm τὸ δόποιον περιστρέφεται πλήρως περὶ μίαν εὐθείαν εἰς τοῦ ἐπιπέδου του παράλληλον πρὸς μίαν πλευράν αὐτοῦ καὶ κειμένην εἰς ἀπόστασιν ἀπ' αὐτῆς 3 cm. Νά εύρεθῇ τὸ ἐμβαδὸν τῆς διλικῆς ἐπιφανείας τοῦ στρεβοῦ, τοῦ παρασγούμενον ἐπὶ τὴν περιστροφῆς τοῦ τετραγώνου περὶ τὴν εὐθείαν ε. (Σχ. 172)

270) Εἰς ισόπλευρος ὅρθος κυκλικὸς κῶνος εἴναι ἔγγεγραμμένος εἰς μίαν σφαίραν ἀκτίνος 6 cm (δῆλο, ἡ σφαίρα διέρχεται διὰ τῆς κορυφῆς τοῦ κώνου καὶ ὁ κύκλος τῆς βάσεως αὐτοῦ είναι μικρὸς κύκλος τῆς σφαίρας). Νά εύρητε τὸ ἐμβαδὸν τῆς διλικῆς ἐπιφανείας τοῦ κώνου. (Σχ. 173)

271) Ἐν δοχείον ἀνοικτὸν ἐκ τῶν ἀνω σχῆμα δρόθιου κυκλικοῦ κυλίνδρου, μὲ ἀκτίνα βάσεως 6 m καὶ ὑψος 8 m. Τοῦτο στηρίζεται ἐπὶ ἐνὸς κύβου ἀκμῆς 10 m. Τὸ ἔξωτερικὸν τοῦ δοχείου τούτου ἔχει σχῆμα κῶνου ἐκ περιστροφῆς μὲ βάσιν τὴν μίαν τῶν βάσεων τοῦ κυλίνδρου τούτου καὶ κορυφὴν τὸ κέντρον τῆς ἀλληλής βάσεως αὐτοῦ. Πρόσκειται τώρα νὰ ἐπιστρέψει σωματικὸν δόλικληρον τὴν ἐπιφανείαν τοῦ δοχείου (ἔξωτερικὴν καὶ ἔσωτερικὴν) καὶ τὴν ἐλευθέραν ἐπιφάνειαν τῆς κυβικῆς βάσεως ἐπὶ τῆς δόποιας στηρίζεται τὸ κυλινδρικὸν δοχεῖον πρὸς 85 δρχ. τὸ τετραγ. μέτρον. Πόσας δραχμὰς θὰ ἔξοδεύσωμεν;



σχ. 173.



σχ. 174.

Πίνακες τύπων έμβασδών και διγκων διαφόρων στερεών

Εικόνα στερεού	"Όνομα στερεού	'Έμβασδόν πρὸς ύπολογισμὸν	Τύπος δίδων τὸ ἔμβασδὸν	"Ογκος πρὸς ύπολογισμὸν	Τύπος δίδω τὸν διγκον
	Πρίσμα	'Έμβασδόν παραπλ. ἐπιφανείας 'Έμβασδόν δλικῆς ἐπιφανείας	'Ορθοῦ πρίσματος $E_{\pi\alpha,\beta\gamma} = \pi\alpha.\beta\gamma.Xu + 2E\beta$	"Ογκος Πρίσματος	$V = E_{\beta} \cdot u$
	'Ορθ. παρ/διον	'Έμβασδόν δλικῆς ἐπιφανείας	$E = 2(\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha)$	"Ογκος δρθ. παρ/διον	a) $V = \alpha \cdot \beta \cdot \gamma$ καὶ b) $V = E_{\beta} \cdot u$
	Κύβος	'Έμβασδόν δλικῆς ἐπιφανείας	$E = 6\alpha^2$	"Ογκος κύβου	$V = \alpha^3$
	Πυραμίς (κανονική)	'Έμβασδόν παραπλ. ἐπιφανείας 'Έμβασδόν δλικῆς	$E = \frac{\text{περ.βάσ.Χάπόστ.}}{2}$ $E = \frac{\text{περ.βάσ.Χάποστ}}{2} + E_{\beta}$	"Ογκος πυραμίδος	$V = \frac{1}{3} E_{\beta} \cdot u$
	Πυραμίς (τυχοῦσα)	'Έμβασδόν	$E = "Αθροισ. Εἰδρῶν"$	"Ογκος	$V = \frac{1}{3} E_{\beta} \cdot u$
	Κύλινδρος (δρθός κυκλ.)	'Έμβασδόν κυρτ. ἐπιφανείας 'Έμβασδόν δλικῆς ἐπιφανείας	$E = 2\pi Ru$ $E = 2\pi Ru + 2\pi R^2$ ή $E = 2\pi R(u+R)$	"Ογκος κυλίνδρου	$V = \pi R^2 u$
	Κῶνος (δρθός κυκλ.)	'Έμβασδόν κυρτ. ἐπιφανείας 'Έμβασδόν δλικ. ἐπιφανείας	$E = \pi R\lambda$ $E = \pi R\lambda + \pi R^2$ ή $E = \pi R(R+\lambda)$	"Ογκος κώνου	$V = \frac{1}{3} \pi \cdot R^2 u$
	Σφαίρα	'Έμβασδόν	$E = 4\pi R^2$	"Ογκος	$V = \frac{4}{3} \pi \cdot R^3$

Πίναξ τῶν τετραγώνων καὶ τῶν κύβων τῶν φυσικῶν ἀριθμῶν  
ἀπὸ 1 ἕως 100

$\alpha$	$\alpha^2$	$\alpha^3$	$\alpha$	$\alpha^2$	$\alpha^3$
1	1	1	51	2601	132651
2	4	8	52	2704	140608
3	9	27	53	2809	148877
4	16	64	54	2916	157464
5	25	124	55	3025	166375
6	36	216	56	3136	175616
7	49	343	57	3249	185193
8	64	512	58	3364	195112
9	81	729	59	3481	205379
10	100	1000	60	3600	216000
11	121	1331	61	3721	226981
12	144	1728	62	3844	238328
13	169	2197	63	3969	250047
14	196	2744	64	4096	262144
15	225	3375	65	4225	274625
16	256	4096	66	4356	287496
17	289	4913	67	4489	300756
18	324	5832	68	4624	314432
19	361	6859	69	4761	328509
20	400	8000	70	4900	343000
21	441	9261	71	5041	357911
22	484	10648	72	5184	373248
23	529	12167	73	5329	389017
24	576	13824	74	5476	405224
25	625	15625	75	5625	421875
26	676	17576	76	5776	438976
27	729	19683	77	5929	456533
28	784	21952	78	6084	474552
29	841	24389	79	6241	493039
30	900	27000	80	6400	512000
31	961	29791	81	6561	531441
32	1024	32768	82	6724	551368
33	1089	35937	83	6889	571787
34	1156	39304	84	7056	592704
35	1156	39304	85	7224	614125
36	1225	42875	86	7396	636056
37	1296	46656	87	7569	658503
38	1369	50653	88	7744	681472
39	1444	54872	89	7921	704969
40	1600	64000	90	8100	729000
41	1681	68921	91	8281	753571
42	1764	74088	92	8464	778688
43	1849	79507	93	8649	804357
44	1936	85184	94	8836	830584
45	2025	91125	95	9025	857375
46	2116	97336	96	9216	884735
47	2209	103823	97	9409	912673
48	2304	110592	98	9604	941192
49	2401	117649	99	9801	970299
50	2500	125000	100	100000	1000000

Πίνακες τετραγωνικῶν ριζῶν τῶν φυσικῶν ἀριθμῶν ἀπὸ 1 ἕως 100

Ἀριθμός α	Τετραγ. ρίζα $\sqrt{\alpha}$						
1	1,000	26	5,099	51	7,141	76	8,718
2	1,414	27	5,196	52	7,211	77	8,775
3	1,732	28	5,292	53	7,280	78	8,832
4	2,000	29	5,385	54	7,349	79	8,888
5	2,236	30	5,477	55	7,416	80	8,944
6	2,450	31	5,568	56	7,483	81	9,000
7	2,646	32	5,657	57	7,550	82	9,055
8	2,828	33	5,745	58	7,616	83	9,110
9	3,000	34	5,831	59	7,681	84	9,165
10	3,162	35	5,916	60	7,746	85	9,220
11	3,317	36	6,000	61	7,810	86	9,274
12	3,464	37	6,083	62	7,874	87	9,327
13	3,606	38	6,164	63	7,937	88	9,381
14	3,741	39	6,245	64	8,000	89	9,434
15	3,873	40	6,325	65	8,062	90	9,487
16	4,000	41	6,403	66	8,124	91	9,539
17	4,123	42	6,481	67	8,185	92	9,591
18	4,243	43	6,557	68	8,246	93	9,644
19	4,359	44	6,633	69	8,307	94	9,695
20	4,472	45	6,708	70	8,367	95	9,747
21	4,583	46	6,782	71	8,426	96	9,798
22	4,690	47	6,856	72	8,485	97	9,849
23	4,796	48	6,928	73	8,544	98	9,900
24	4,899	49	7,000	74	8,602	99	9,950
25	5,000	50	17,07	75	8,660	100	10,000

Σημείωσις: Αἱ τετραγωνικαὶ ρίζαι τῶν μὴ τελείων τετραγώνων εἰναι κατὰ προσέγγισιν 0,001.

000000	1000	10	10000	100	100000	1000	1000000
000001	1000	11	10000	101	100000	1001	1000000
000002	1000	12	10000	102	100000	1002	1000000
000003	1000	13	10000	103	100000	1003	1000000
000004	1000	14	10000	104	100000	1004	1000000
000005	1000	15	10000	105	100000	1005	1000000
000006	1000	16	10000	106	100000	1006	1000000
000007	1000	17	10000	107	100000	1007	1000000
000008	1000	18	10000	108	100000	1008	1000000
000009	1000	19	10000	109	100000	1009	1000000
00000A	1000	20	10000	10A	100000	100A	1000000
00000B	1000	21	10000	10B	100000	100B	1000000
00000C	1000	22	10000	10C	100000	100C	1000000
00000D	1000	23	10000	10D	100000	100D	1000000
00000E	1000	24	10000	10E	100000	100E	1000000
00000F	1000	25	10000	10F	100000	100F	1000000
00000G	1000	26	10000	10G	100000	100G	1000000
00000H	1000	27	10000	10H	100000	100H	1000000
00000I	1000	28	10000	10I	100000	100I	1000000
00000J	1000	29	10000	10J	100000	100J	1000000
00000K	1000	30	10000	10K	100000	100K	1000000
00000L	1000	31	10000	10L	100000	100L	1000000
00000M	1000	32	10000	10M	100000	100M	1000000
00000N	1000	33	10000	10N	100000	100N	1000000
00000O	1000	34	10000	10O	100000	100O	1000000
00000P	1000	35	10000	10P	100000	100P	1000000
00000Q	1000	36	10000	10Q	100000	100Q	1000000
00000R	1000	37	10000	10R	100000	100R	1000000
00000S	1000	38	10000	10S	100000	100S	1000000
00000T	1000	39	10000	10T	100000	100T	1000000
00000U	1000	40	10000	10U	100000	100U	1000000
00000V	1000	41	10000	10V	100000	100V	1000000
00000W	1000	42	10000	10W	100000	100W	1000000
00000X	1000	43	10000	10X	100000	100X	1000000
00000Y	1000	44	10000	10Y	100000	100Y	1000000
00000Z	1000	45	10000	10Z	100000	100Z	1000000
00000A1	1000	46	10000	10A1	100000	100A1	1000000
00000B1	1000	47	10000	10B1	100000	100B1	1000000
00000C1	1000	48	10000	10C1	100000	100C1	1000000
00000D1	1000	49	10000	10D1	100000	100D1	1000000
00000E1	1000	50	10000	10E1	100000	100E1	1000000

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ - ΑΛΓΕΒΡΑΣ

### ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ I — ΠΕΡΙ ΣΥΝΟΛΩΝ

	Σελίς
1. Η έννοια τοῦ συνόλου — ('Επαναλήψεις καὶ συμπληρώσεις) . . . . .	5
2. Η έννοια τῆς ἀντιστοιχίας — Μονοσήμαντος καὶ ἀμφιμονοσήμαντος ἀντιστοιχία — Ισοδύναμα σύνολα. . . . .	8
3. Πεπερασμένα σύνολα — 'Απειροσύνολα. . . . .	11
4. "Ένωσις καὶ τομὴ συνόλων — Διάζευξις καὶ σύζευξις ίδιοτήτων. . . . .	13
5. Τὸ συμπλήρωμα συνόλου — Διαιμερισμὸς συνόλων — Κλάσεις Ισοδύναμιας. . . . .	15
6. Διατεταγμένον σύνολον. . . . .	17

### ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II — Α' ΤΟ ΣΥΝΟΛΟΝ ΤΩΝ ΡΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

1. Τὸ σύνολον $Q^+$ τῶν ρητῶν ἀριθμῶν τῆς ἀριθμητικῆς (ἐπανάληψις) . . . . .	20
2. Τὸ σύνολον τῶν θετικῶν καὶ ἀρνητικῶν ρητῶν . . . . .	22
3. Τὸ σύνολον $Q$ τῶν ρητῶν πραγματικῶν ἀριθμῶν — 'Εφαρμογαί . . . . .	26
4. 'Απόλυτος τιμὴ ρητοῦ ἀριθμοῦ — Συμβολισμὸς ρητοῦ μὲ ἐν γράμμα—'Η ισότης εἰς τὸ σύνολον τῶν ρητῶν καὶ αἱ ίδιότητες αὐτῆς. . . . .	30

### Β' ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟΝ ΤΩΝ ΡΗΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

1. Πρόσθεσις . . . . .	32
2. Πρόσθεσις περισσοτέρων τῶν δύο προσθετῶν — 'Ιδιότητες προσθέσεως. . . . .	36
3. 'Απόλυτος τιμὴ ἀθροίσματος δύο ρητῶν . . . . .	39
4. 'Η πρᾶξις τῆς ἀφαιρέσεως . . . . .	42
5. Τὸ σύμβολον (-) ὡς σύμβολον ἀφαιρέσεως καὶ ὡς πρόστημον. . . . .	44
6. 'Αλγεβρικὰ ἀθροίσματα . . . . .	47
7. 'Η σχέσης τῆς ἀνισότητος εἰς τὸ σύνολον $Q$ — Διάταξις. . . . .	50
8. 'Η πρᾶξις τοῦ πολ/συμ/εις τὸ σύνολον $Q$ . — Γινόμενον δύο ρητῶν . . . . .	56
9. Γινόμενον τριῶν ἢ περισσοτέρων ρητῶν — 'Ιδιότητες . . . . .	59
10. 'Η πρᾶξις τῆς διαιρέσεως εἰς τὸ $Q$ — Πηλίκον δύο ρητῶν — 'Ιδιότητες . . . . .	65
11. 'Αριθμητικὰ παραστάσεις — Σημασία τῶν παρενθήσεων. . . . .	68
12. 'Η έννοια τοῦ διανύσματος . . . . .	72
13. 'Η προσανατολισμένη εύθεια ("Ἄξων") — 'Αλγεβρικὴ τιμὴ διανύσματος — 'Απει-κόνισις τῶν ρητῶν εἰς τὴν προσανατολισμένη εύθειαν. . . . .	77
14. Δυναμέις τῶν ρητῶν μὲ ἐκθέτην ἀκέραιον — Πράξεις ἐπὶ τῶν δυνάμεων τῶν ρητῶν . . . . .	80
15. Περιλήψις περιεχομένων κεφαλαίου II — 'Ασκήσεις πρὸς ἐπανάληψιν. . . . .	85

### ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ III — Α' ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ — ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ — ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ

1. 'Εξισωσις αχ+β=0. 'Επιλύσις αὐτῆς . . . . .	89
2. Προβλήματα ἐπιλυόμενα τῇ βοηθείᾳ ἔξισώσεως α' βαθμοῦ μὲ ἐνα δύνωστον. . . . .	94
3. 'Ανισώσεις πρότου βαθμοῦ μὲ ἐνα δύνωστον. . . . .	99

### Β' ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ — ΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΙΣ ΤΗΣ $\alphaχ+\beta=0$ ΚΑΙ ΤΗΣ $\alphaχ+\beta > 0$ .

1. 'Η έννοια τῆς μεταβλητῆς καὶ ἡ έννοια τῆς συναρτήσεως. . . . .	102
2. 'Η συνάρτησις $\psi=\alphaχ+\beta$ καὶ ἡ γραφικὴ παράστασις αὐτῆς. . . . .	106
3. 'Η συνάρτησις $\psi=\alphaχ+\beta$ καὶ ἡ γραφικὴ παράστασις αὐτῆς . . . . .	108
4. Γραφικὴ ἐπιλύσις τῆς $\alphaχ+\beta=0$ καὶ τῆς $\alphaχ+\beta > 0$ . . . . .	111
5. 'Ασκήσεις πρὸς ἐπανάληψιν τοῦ κεφαλαίου III. . . . .	114

### ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IV

#### Α' ΛΟΓΟΙ — ΜΕΓΕΘΩΣ ΕΥΘΕΩΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ ΑΝΑΛΟΓΑ — ΑΝΑΛΟΓΙΑΙ

1. Λόγος δύο ἀριθμῶν — Λόγος δύο δύμειδῶν μεγεθῶν — 'Ιδιότητες τοῦ λόγου. . . . .	116
---	-----

2. Μεγέθη εύθεως άναλογα – 'Ιδιότητες – Γραφική παράστασις της $\psi = \alpha x$ .....	Σελις 119
3. Μεγέθη άντιστρόφως άναλογα – 'Ιδιότητες – Γραφική παράστασις της $\psi = \frac{\alpha}{x}$ .....	123
4. 'Αναλογίαι καὶ ιδιότητες αὐτῶν. ....	X
<b>Β' ΕΦΑΡΜΟΓΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΥΣΙΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ</b>	
1. Προβλήματα ἀπλῆς μεθόδου τῶν τριῶν .....	131
2. » Ποσοστῶν .....	133
3. » Συνθέτου μεθόδου τῶν τριῶν .....	137
4. » Τόκου .....	141
5. » 'Υφαιρέσεως .....	145
6. » Μέσου δρου .....	148
7. » Μερισμοῦ .....	149
8. » Μείζεως .....	152
9. » Κραμάτων .....	154
10. 'Ασκήσεις πρὸς ἐπανάληψιν τοῦ κεφαλαίου IV .....	156
<b>ΓΕΝΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ</b> .....	158

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ

### ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ I – A. ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΓΩΝΙΑ

'Εγγεγραμμέναι γωνίαι .....	163
Εφαρμογαὶ τῶν ἐγγεγραμμένων γωνιῶν. 'Ασκήσεις .....	166

### B. ΕΥΘΕΙΑΙ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΣΑΙ ΕΙΣ ΤΡΙΓΩΝΟΝ

Μεσοκάθετοι τῶν πλευρῶν τριγώνου. 'Ασκήσεις .....	168
"Ψηγὴ ἐνὸς τριγώνου. 'Ασκήσεις .....	169
Διαμεσοὶ τριγώνου. 'Ασκήσεις .....	170
Διχοτόμοι τριγώνου. 'Ασκήσεις .....	172
Περιγεγραμμένος καὶ ἐγγεγραμμένος κύκλος τριγώνου. Κατασκευή .....	173

### Γ. ΔΙΑΙΡΕΣΙΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΙΣ 2ν ΚΑΙ 3.2ν ΙΣΑ ΤΟΞΑ – ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΠΟΛΥΓΩΝΑ

Διαίρεσις κύκλου εἰς 2ν ίσα τόξα. – 'Αντίστοιχα ἐγγεγραμμένα κανονικά πολύγωνα .....	175
Διαίρεσις κύκλου εἰς 3.2ν ίσα τόξα. – 'Αντίστοιχα ἐγγεγραμμένα καν. πολύγωνα .....	177
Στοιχεῖα συμμετρίας ἔκαστου τῶν κανονικῶν πολυγώνων. 'Ασκήσεις .....	179

### ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II – A. ΛΟΓΟΣ ΔΥΟ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Λόγος δύο εὐθυγράμμων τημάτων. 'Ανάλογα εὐθύγραμμα τμήματα 'Ασκήσεις .....	181
Τὸ Θεώρημα τοῦ Θαλοῦ Ιον, 2ον θεώρημα. 'Ασκήσεις .....	183

### B. ΟΜΟΙΑ ΤΡΙΓΩΝΑ

"Ομοια τρίγωνα. 'Ασκήσεις .....	187
Κριτήρια διμοιότητος τριγώνων : 'Εφαρμογαὶ. 'Ασκήσεις .....	189

### Γ. ΟΜΟΙΑ ΠΟΛΥΓΩΝΑ

"Ομοια πολύγωνα. 'Εφαρμογαὶ. 'Ασκήσεις .....	194
--	-----

## Δ. ΑΠΛΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ

197

Γεωμετρικαὶ κατασκευαὶ. Ἀσκήσεις.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ III — A. ΕΜΒΑΔΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

1. Ὁρισμός. Μονάδες μετρήσεως ἐπιφανειῶν. Σχέσεις αὐτῶν. Ἀσκήσεις.	200
2. Ἐμβαδὸν ὄρθογωνίου καὶ τετραγώνου. Ἐφαρμογαὶ. Ἀσκήσεις.	204
3. Ἐμβαδὸν παραλληλογράμμου. Ἐμβαδὸν τριγώνου. Ἐφαρμογαὶ. Ἀσκήσεις.	208
4. Ἐμβαδὸν τραπεζίου. Ἀσκήσεις.	212
5. Ἐμβαδὸν πολυγώνου. Ἐφαρμογαὶ. Ἀσκήσεις.	215

## B' ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΝ ΘΕΩΡΗΜΑ

Πυθαγόρειον Θεώρημα. Ἀσκήσεις.	218
Τετραγωνικὴ ρίζα θετικοῦ ἀριθμοῦ — "Υπολογισμὸς αὐτῆς. Ἐφαρμογαὶ. Ἀσκήσεις.	220
Τετραγωνικὴ ρίζα ἀριθμοῦ κατὰ προσέγγισιν. Ἐφαρμογαὶ. Ἀσκήσεις.	224

## Γ. ΜΗΚΟΣ ΚΥΚΛΟΥ — ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΥΚΛΟΥ

Μῆκος κύκλου — Μῆκος τόξου. Ἀσκήσεις.	227
Ἐμβαδὸν κύκλου καὶ κυκλικοῦ τομέως. Ἐφαρμογαὶ. Ἀσκήσεις.	229
Πίνακις τύπων ἐμβαδῶν σχημάτων. Ἀσκήσεις διάφοροι.	232

## Δ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Προβλήματα γεωμετρικῶν κατασκευῶν.	233
------------------------------------	-----

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IV — A. ΣΧΕΤΙΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΩΝ

Εἰσαγωγὴ.	237
Σχετικαὶ θέσεις εὐθειῶν, ἐπιπέδων, εὐθειῶν καὶ ἐπιπέδων. Ἀσκήσεις	240

## B. ΕΥΘΕΙΑ ΚΑΘΕΤΟΣ ΕΠΙ ΕΠΙΠΕΔΟΝ — ΚΑΘΕΤΟΤΗΣ ΕΠΙΠΕΔΩΝ

Γωνία ἀσυμβάτων εὐθειῶν	243
Καθετότης εὐθείας καὶ ἐπιπέδου Καθετότης ἐπιπέδων. Ἀσκήσεις	244

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ V — ΜΕΤΡΗΣΙΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ

"Ορθογώνιον παραλληλεπίπεδον. Ἰδιότητες.	249
"Ἐμβαδὸν ἐπιφανείας ὄρθογωνίου παραλληλεπίπεδου καὶ κύβου. Ἀσκήσεις.	250
"Ογκός στερεοῦ. Μονάδες δύον.	251
"Ογκός ὄρθογωνίου παραλληλεπίπεδου καὶ κύβου. Ἀσκήσεις.	252
Πρίσματα. Ἐμβαδὸν ἐπιφανείας πρίσματος.	254
"Ογκός πρίσματος. Ἐφαρμογαὶ. Ἀσκήσεις.	256
Πύραμις — Κανονικὴ πυραμίς — "Ἐμβαδὸν κανονικῆς πυραμίδος. Ἀσκήσεις.	260
"Ογκός πυραμίδος. Ἀσκήσεις.	263
Κύλινδρος ἐκ περιστροφῆς. "Ἐμβαδὸν ὄρθου κυκλικοῦ κυλίνδρου. Ἀσκήσεις.	265
"Ογκός κυλινδροῦ ἐκ περιστροφῆς. Ἀσκήσεις.	267
"Ορθὸς κυκλικός κῶνος. "Ἐμβαδὸν ὄρθου κυκλικοῦ κώνου. Ἀσκήσεις.	268
"Ογκός ὄρθου κυκλικοῦ κώνου. Ἀσκήσεις.	270
Σφαῖρα — "Ἐμβαδὸν σφαῖρας. Ἀσκήσεις.	271
"Ογκός σφαῖρας. Ἀσκήσεις.	272
Πίνακις τύπων ἐμβαδῶν καὶ δγκων τῶν ἔξετασθέντων στερεῶν. Ἀσκήσεις.	274

ΕΚΔΟΣΙΣ Ε', 1974 (V) — ANTIT. 128.000 — ΣΥΜΒΑΣΙΣ: 2405/48-2-7

ΕΚΤΥΠΩΣΙΣ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ : Μ. ΠΕΧΑΙΒΑΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ





ΟΕ  
ΔΒ



024000039899