

Γραφείο 2

Κατάνη

Επιτομή 2  
Επιτομή 2

Επιτομή 2  
Επιτομή 2

Επιτομή 2



Επιτομή 2

Πατριεὶς  
Μαθημάτων

Σχολιασμοὶ Ἐπιπέδου

Ἔτος 1919-20

Τριανταφυλλίδης



ΜΑΡΙΑΣ Σ. ΖΕΡΒΟΥ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ

4207

# ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ

ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ

ΤΗΣ Α' ΤΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΤΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΙΣΟΔΥΝΑΜΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Ἐγκριθεῖσα διὰ τῆς ὑπ' ἀριθ. 31699 ἀποφάσεως τοῦ  
Ἑπιτελείου τῆς Παιδείας τῆς 6 Ὀκτωβρίου 1917


(Βιβλιοσημον λεπτ. 70.)

Τιμὴ μετὰ βιβλιοσημίου δραχ. 3.50

Ἔκδοσις Α'.

ΕΚΔΟΤΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΣΑΛΙΒΕΡΟΣ



ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΣΑΛΙΒΕΡΟΥ

1917

Ἄριθ.

Πρωτ. 31699

Ἐν Ἀθήναις τῇ 6 Ὀκτωβρίου 1917.



## ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ  
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

Πρὸς τὴν κ. Μαρίαν Ζερβοῦ

Γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι κατ' ἀπόφασιν τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ συμβουλίου ἐνεκρίθη ἡ χρῆσις τῆς ὑφ' ὑμῶν ὑποβληθείσης **Θεωρητικῆς Ἀριθμητικῆς** διὰ τὴν Α' τάξιν τῶν τετραταξίων γυμνασίων καὶ τὴν ἀντίστοιχον τάξιν τῶν λοιπῶν σχολείων τῆς μέσης ἐκπαιδεύσεως, διὰ τὸ σχολικὸν ἔτος 1917 — 1918 καὶ ἐφεξῆς κατὰ τὴν ὑπ' ἀριθ. 126 πράξιν αὐτοῦ.

Ὁρίσθη δὲ ἡ μὲν ἀξία τοῦ βιβλιοσῆμου εἰς λεπτὰ ἑβδομήκοντα (0,70), ἡ δὲ τιμὴ τοῦ βιβλίου μετὰ τοῦ βιβλιοσῆμου εἰς δραχμὰς τρεῖς καὶ λεπτὰ πενήκοντα (3.50)

Ὁ Ὑπουργὸς  
ΔΗΜ. ΔΙΓΚΑΣ

Ν. Δ. ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ

Πᾶν ἀντίτυπον μὴ φέρον τὴν ἰδιόχειρον ὑπογραφήν τῆς συγγραφέως εἶναι κλεψίτυπον καὶ καταδιωχθήσεται κατὰ τὸν Νόμον.

*Μαρία Ζερβοῦ*  
*Σταυρὸς Δίγκος*



ΤΙΚΗ

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄.

### ΑΡΙΘΜΗΣΙΣ

#### Προκαταρκτικαὶ ἔννοιαι.

1. — Πόσα δένδρα ὑπάρχουσιν εἰς αὐτὴν τὴν δενδροστοιχίαν ;  
— Πόσους κατοίκους ἔχει τὸ χωρίον αὐτό ;  
— Πόσα μίλια διήνυσε τὸ τάδε ἀτμόπλοιον, ἵνα φθάσῃ ἀπὸ τοῦ λιμένος Πειραιῶς εἰς τὸν λιμένα Σύρου ;  
Διὰ τὴν ἀπαντήσιν, τις εἰς τὰ ἐρωτήματα ταῦτα, χρειάζεται ἀριθμούς.

2. — Τὸν ἀριθμὸν δὲν ὀρίζομεν. Δυνάμεθα ὁμῶς νὰ εἴπωμεν, ὅτι ἔννοιαν ἀριθμοῦ ἀρχικῶς σχηματίζομεν, ὅταν παρατηροῦντες ἕμοια πράγματα κεχωρισμένα ἀπ' ἀλλήλων πρόκειται ν' ἀπαντήσωμεν εἰς τὸ ἐρώτημα: πόσα εἶναι ταῦτα ; Π. χ. εἰς τὰς φράσεις ὀκτὼ ἄνθρωποι, ἑκατὸν βιβλία, αἱ λέξεις ὀκτὼ, ἑκατὸν ἐκφράζουσιν ἀριθμούς.

3. — Ἡ ταχύτης ἑνὸς πλοίου δυνατὸν νὰ αὐξηθῇ ἢ νὰ ἐλαττωθῇ· τὰ δένδρα μιᾶς δενδροστοιχίας δυνατὸν νὰ γίνωσι περισσότερα ἢ ὀλιγώτερα· ἐξ ἑνὸς ὑφάσματος δυνατὸν νὰ λάβωμεν περισσότερον ἢ ὀλιγώτερον κ. ο. κ. Ταῦτα λέγομεν ποσὰ καὶ γενικῶς :

Ποσὸν καλεῖται πᾶν τὸ ἐπιδεχόμενον αὐξήσιν ἢ ἐλάττωσιν.

Θεωρ. Ἀριθμητικὴ Μ. Σ. Ζερβοῦ

1

4. — Τὰ ζῶα ταῦτα εἶναι δεκαεπτὰ· τὸ μῆκος τοῦ ὑφάσματος τούτου εἶναι δεκαεπτὰ πήχεων. Σύγκρισιν κάμνομεν καὶ τὴν πρώτην καὶ τὴν δευτέραν φοράν· ἀπὸ τὴν σύγκρισιν αὐτὴν, τὴν ὁποίαν καὶ μέτρονσι καλοῦμεν, προέκυψεν εἰς ἀμφοτέρας τὰς περιπτώσεις ὁ ἀριθμὸς δεκαεπτὰ. Ἐστω ὅτι τὰ ζῶα γίνονται περισσότερα ἀπὸ δεκαεπτὰ· τότε εὐθὺς μετὰ τὰ δεκαεπτὰ πόσα εἶναι δυνατόν νὰ γίνουν, τὸ ὀλιγώτερον; Δεκαοκτώ. Ἐπειτα; δεκαεννέα κ. ο. κ.

Ἡ μέτρησις ἐνταῦθα εἶναι οὕτως εἰπεῖν ἀπαρίθμησις.

Ἐνῶ, ἐὰν φαντασθῶμεν αὐξανόμενον τὸ ποσὸν τῶν δεκαεπτὰ πήχεων, δὲν δυνάμεθα νὰ λέγωμεν ὅτι μετὰ τοὺς δεκαεπτὰ πήχεις εὐθὺς ἀμέσως ἔρχεται τὸ ποσὸν τῶν δεκαοκτὼ πήχεων ἢ ἄλλο, διότι καὶ δεκαεπτὰμισοὶ πήχεις ἔχομεν καὶ δεκαεπτὰ καὶ ἐν τέταρτον κ. ο. κ. Διακρίνομεν λοιπὸν ἀμέσως δύο εἶδη ποσῶν.

Πρῶτον· ποσὰ διὰ τὴν μέτρησιν τῶν ὁποίων κάμνομεν ἀπαρίθμησιν, ὅπως ἐπὶ παραδειγματι, ὅταν πρόκειται νὰ μετρήσωμεν βιβλία, δένδρα, πρόβατα καὶ ἐν γένει πράγματα κεχωρισμένα ἀπ' ἀλλήλων· καὶ δεύτερον· ποσὰ συνεχῆ, ὅπως π. χ. τὸ μῆκος ὑφάσματος, τὸ βᾶρος σώματος, ὁ χρόνος κ. λ. π.

5. — Τὸ ποσὸν, πρὸς ὃ κάμνομεν τὴν σύγκρισιν, ἦτοι τὸ ποσὸν δι' οὗ ἀπαριθμοῦμεν (ἐν ζῶον, ἐν δένδρον) ἢ τὸ ποσὸν δι' οὗ μετροῦμεν πάντα τὰ ὁμοειδῆ ποσὰ (εἰς πῆχυς, μίᾳ δακά), λέγεται μονάς.

6. — Ἡ ἐπιστήμη ἣτις πραγματεύεται τὰς μεταξὺ τῶν ἀριθμῶν σχέσεις καλεῖται Ἀριθμητική.

### Ἀριθμησις τῶν ἀκεραίων.

7. — Πῶς σχηματίζονται οἱ ἀκεραῖοι καὶ πόσοι εἶναι;

Ἡ μονάς, ὅταν θεωρῆται ὡς ἀριθμὸς, λέγεται ἐν καὶ παρίσταται διὰ τοῦ συμβόλου 1.

Ἐὰν εἰς τὴν μονάδα προστεθῇ καὶ ἄλλη μονάς, σχηματίζεται ὁ ἀριθμὸς δύο, ὅστις παρίσταται διὰ τοῦ συμβόλου 2. Ἐὰν προστεθῇ καὶ ἄλλη ἀκόμη μονάς, σχηματίζεται ὁ τρία κ. ο. κ.



Οἱ οὕτω σχηματιζόμενοι ἀριθμοὶ εἶναι ἀκέραιοι· ὥστε ἕκαστος ἀκέραιος σχηματίζεται ἐκ τοῦ προηγουμένου του τῆ προσθήκῃ μιᾶς μονάδος. Ὅθεν ἐξ ἑκάστου ἀκεραίου δύναται νὰ σχηματισθῆ κατὰ τὸν τρόπον τοῦτον πάντοτε ἄλλος ἀκέραιος· δὲν ὑπάρχει λοιπὸν ἀκέραιος τελευταῖος πάντων· ἦτοι οἱ ἀκέραιοι εἶναι ἄπειροι τὸ πλῆθος, δι' ὃ καὶ ἐὰν ἠθέλομεν, δὲν θὰ ἠδυνάμεθα νὰ ἔχωμεν ὀνόματα καὶ σύμβολα νέα δι' ἕκαστον νέον ἀκέραιον. Ὡς ἐκ τούτου ἐπενόησαν μέθοδον οἱ ἄνθρωποι, δι' ἧς μὲ ὀλίγας λέξεις καὶ ὀλίγα σύμβολα κατορθώνουν νὰ ὀνομάζωσι καὶ νὰ γράψωσι τὸν τυχόντα ἀριθμὸν (ἀκέραιον).

ΣΗΜ. Εἰς τὰ κατωτέρω μέχρι οὗ συναντήσωμεν τὰ κλάσματα, ὅταν λέγωμεν ἀριθμὸν, θὰ ἐννοοῦμεν πάντοτε ἀκέραιον τοιοῦτον.

8. — Ἡ διδασκαλία τῆς μεθόδου ταύτης, ἦτοι ἡ διδασκαλία περὶ τῆς ὀνομασίας τῶν ἀριθμῶν καὶ τῆς γραφῆς αὐτῶν, λέγεται ἀριθμησις.

9. — Εἰς τὸ ἐν χρήσει σύστημα ἀριθμῆσεως, ὅπερ δεκαδικὸν καλεῖται, μεταχειρίζομεθα πρῶτον τὰ ἐξῆς κατὰ σειρὰν διάφορα ὀνόματα:

Ἐν, δύο, τρία, τέσσαρα, πέντε, ἕξ, ἐπτὰ, ὀκτώ, ἐννέα.

Ἀντίστοιχα σύμβολα τούτων ἔχομεν τὰ ἐξῆς:

**1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,**

τὰ ὁποῖα καλοῦμεν σημαντικὰ ψηφία.

10. — Τὸ ἐν λέγεται καὶ ἀπλή μονάς ἢ καὶ μονάς πρώτης τάξεως.

Ὅταν εἰς τὸν ἐννέα προσθέσωμεν ἓν, σχηματίζομεν τὸν ἀριθμὸν δέκα. Τοῦτον θεωροῦμεν ὡς μονάδα δευτέρας τάξεως· τὸν καλοῦμεν δὲ καὶ δεκάδα. Ἴνα γράψωμεν αὐτόν, θὰ μεταχειρισθῶμεν δύο σύμβολα· τὸ σύμβολον 1 καὶ ἓν ἕτερον σύμβολον, τὸ 0, καλούμενον μηδέν, διὰ τοῦ ὁποῦ παριστῶμεν τὴν ἔλλειψιν μονάδων· τούτεστι τὸν δέκα θὰ παραστήσωμεν διὰ τοῦ 10.

Τὸ σύμβολον 1 κατέχει ἐδῶ τὴν δευτέραν πρὸς τὰ ἀριστερὰ θέσιν ὡς ἀντιπροσωπεῖον μίαν μονάδα δευτέρας τάξεως, ἦτοι γράφοντες 10 ἐννοοῦμεν μίαν μονάδα δευτέρας τάξεως καὶ καμμίαν πρώτης.

Όταν εἰς τὸν δέκα προσθέσωμεν ἓν, ἔχομεν τὸν ἔνδεκα, ὃν παριστῶμεν διὰ τοῦ 11, ἥτοι τὸ 1 τῆς πρώτης ἐκ δεξιῶν θέσεως ἀντιπροσωπεύει μίαν μονάδα πρώτης τάξεως ἢ ἀπλὴν μονάδα, ἐνῶ τὸ 1 τῆς δευτέρας θέσεως ἀντιπροσωπεύει μίαν μονάδα τῆς δευτέρας τάξεως ἢ μίαν δεκάδα. Ὅμοίως προχωροῦντες σχηματίζομεν τοὺς ἀριθμοὺς δώδεκα, δεκατρία... δεκαεννέα καὶ τὰ σύμβολα 12, 13... 19.

11. — Ὅταν εἰς τὸ δεκαεννέα προσθέσωμεν μίαν μονάδα, ἔχομεν ὅ,τι θὰ εἴχομεν, ἐὰν προσεθέτομεν δέκα καὶ δέκα, ἥτοι δύο μονάδας δευτέρας τάξεως. Τὸν ἀριθμὸν τοῦτον παριστῶμεν διὰ τοῦ 20 καὶ καλοῦμεν εἴκοσιν. Ὅμοίως παριστῶμεν διὰ τῶν συμβόλων 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 τοὺς ἀριθμοὺς τοὺς σχηματιζομένους ἀπὸ δεκάδας τρεῖς, τέσσαρας, πέντε, ἕξ, ἐπτά, ὀκτώ, ἑννέα, οὓς καλοῦμεν τριάκοντα, τεσσαράκοντα, πενήκοντα, ἐξήκοντα, ἑβδομήκοντα, ὀγδοήκοντα, ἐνενήκοντα.

12. — Εἰς τὸ εἴκοσι προσθέτοντες τὰ ὀνόματα τῶν ἑννέα πρώτων μονάδων σχηματίζομεν τὰ ὀνόματα τῶν μεταξὺ εἴκοσι καὶ τριάκοντα ἀριθμῶν. Οὗτοι περιέχουσι δύο δεκάδας καὶ τὰς ἑαυτοῦ σημειουμένας μονάδας, γράφονται δὲ 21, 22, 23... 29.

Καθ' ὅμοιον τρόπον ὀνομαζόνται καὶ γράφονται οἱ μεταξὺ δύο οἰωνδήποτε διαδοχικῶν δεκάδων σχηματιζόμενοι ἀριθμοί.

13. — Οὕτω φθάνομεν μέχρι τοῦ ἐνενήκοντα ἑννέα (99). Ἐὰν εἰς τοῦτον προσθέσωμεν μίαν μονάδα, ἔχομεν ἀριθμὸν συγκείμενον ἀπὸ δέκα δεκάδας, οὕτω δὲ φθάνομεν εἰς μίαν μονάδα τρίτης τάξεως. Καλοῦμεν αὐτὸν ἑκατὸν καὶ παριστῶμεν διὰ τοῦ 100. Τοποθετοῦντες τὸ 1 εἰς τὴν τρίτην θέσιν, εἰς δὲ τὰς ἄλλας, πρώτην καὶ δευτέραν, μηδενικὰ συμβολίζομεν τὸν ἀριθμὸν ὅστις προκύπτει, ἐὰν λάβωμεν δέκα φορές τὸ δέκα, ἥτοι δέκα μονάδας δευτέρας τάξεως. Ὅμοίως, ἵνα παραστήσωμεν τὸν ἀριθμὸν ὅστις ἀποτελεῖται ἀπὸ δέκα μονάδας τρίτης τάξεως, ἥτοι ἀπὸ μίαν μονάδα τετάρτης τάξεως, γράφομεν εἰς τὰς τρεῖς πρώτας θέσεις μηδενικὰ, εἰς δὲ τὴν τετάρτην τὸ 1. ἔχομεν οὕτω τὸν 1000, ὃν καλοῦμεν χίλια· ἐπίσης, ἵνα παραστήσωμεν τὸν ἀριθμὸν ὅστις ἀποτελεῖται ἀπὸ δέκα μονάδας τετάρτης τάξεως, ἥτοι ἀπὸ μίαν

μονάδα πέμπτης τάξεως, γράφομεν εἰς τὰς τέσσαρας πρώτας θέσεις μηδενικά, εἰς δὲ τὴν πέμπτην τὸ 1 καὶ ἔχομεν οὕτω τὸν 10 000, ὅστις καλεῖται δέκα χιλιάδες. Κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον ἔχομεν :

100 000 (ἑκατὸν χιλιάδες),  
 1 000 000 (ἓν ἑκατομμύριον),  
 10 000 000 (δέκα ἑκατομμύρια) καὶ οὕτω καθεξῆς.

Τὸν ἀριθμὸν 1 000 000 000 καλοῦμεν δισεκατομμύριον· ἐπίσης τὸν 1 000 000 000 000 τρισεκατομμύριον καὶ οὕτω καθεξῆς. Οὕτως ὁ 10 000 000 000 καλεῖται ἀπλῶς δέκα δισεκατομμύρια κλπ.

Τὴν μονάδα, τὴν χιλιάδα, τὸ ἑκατομμύριον κ.λ.π. καλοῦμεν πρωτευούσας μονάδας.

14.— Ὅπως παρεστήσαμεν διὰ τοῦ 100 τὴν μίαν ἑκατοντάδα, οὕτω παριστώμεν διὰ

200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900

τοὺς ἀριθμοὺς τοὺς σχηματιζομένους ἀπὸ ἑκατοντάδας δύο, τρεῖς, τέσσαρας, πέντε, ἕξ, ἑπτὰ, ὀκτώ, ἑννέα, οὓς καλοῦμεν :

διακόσια, τριακόσια, τετρακόσια, πεντακόσια, ἑξακόσια,  
 ἑπτακόσια, ὀκτακόσια, ἑννεακόσια.

15.— Εἰς τὸ ἑκατὸν προσθέτοντες τὰ ὀνόματα τῶν 99 πρώτων ἀριθμῶν σχηματίζομεν τὰ ὀνόματα τῶν μεταξὺ ἑκατὸν καὶ διακόσια ἀριθμῶν, γράφομεν δὲ 101, 102, 103, . . . 199. Παρατηροῦμεν, ὅτι τὸ μηδὲν τῆς δευτέρας θέσεως παριστᾷ ἔλλειψιν δεκάδων, ὡς προηγουμένως παρέστησεν ἔλλειψιν μονάδων τῆς τάξεως εἰς ἣν ἦτο γεγραμμένον. Κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον ὀνομάζομεν καὶ γράφομεν τοὺς μεταξὺ δύο οἰωνδῆποτε διαδοχικῶν ἑκατοντάδων ἀριθμοὺς. Οὕτω φθάνομεν μέχρι τοῦ χίλια.

16.— Ὅπως ἐσχηματίσαμεν ἐκ τῆς μονάδος τοὺς 999 πρώτους ἀριθμοὺς, οὕτω σχηματίζομεν ἐκ τοῦ χίλια τοὺς ἀριθμοὺς 2 χιλιάδες, 3 χιλιάδες κ.τ.λ. μέχρις 999 χιλιάδες. Εἰς ἕκαστον ἐξ αὐτῶν προσθέτοντες τοὺς 999 πρώτους σχηματίζομεν τοὺς ἐνδιάμεσους. Καὶ φθάνομεν μέχρι τοῦ ἑκατομμυρίου. Ἡ αὐτὴ ἐργασία συνεχίζεται μὲ τὸ ἑκατομμύριον κ. λ. π.

Ἡ προεκτεθεισα ἐργασία μᾶς ἄγει εἰς τοὺς ἐξῆς κανόνας :

17. — Κανὼν πρῶτος. Ἡ γραφὴ παντὸς ἀριθμοῦ γίνεται ἐπὶ τῇ βάσει τῆς ἐξῆς συμφωνίας : Ὅταν ἐν ψηφίον ἀνέροχεται κατὰ μίαν θέσιν ἐκ δεξιῶν πρὸς τὰ ἀριστερά, ἀντιπροσωπεύει μονάδας δεκάκις περισσοτέρας ἐκείνων τὰς ὁποίας ἀντεπροσώπευεν εἰς τὴν προηγουμένην θέσιν. Τοντέστι γράφομεν τὰ ψηφία τῶν διαφόρων μονάδων εἰς μίαν σειρᾶν, οὕτως ὥστε εἰς τὴν πρώτην πρὸς τὰ δεξιὰ θέσιν γὰ εὐρεθῆ γεγραμμένον τὸ ψηφίον τῶν ἀπλῶν μονάδων, εἰς τὴν δευτέραν τὸ τῶν δεκάδων καὶ οὕτω καθεξῆς. Ἐὰν δὲ ἐλλείπωσι μονάδες τάξεως κατωτέρας τῆς μεγίστης τοῦ ἀριθμοῦ, εἰς τὴν θέσιν αὐτῶν γράφομεν 0.

18. — Κανὼν δεύτερος. Ἡ ἀπαγγελία ἀριθμοῦ μείζονος τοῦ 100, γεγραμμένου κατὰ τὰ ἀνωτέρω, γίνεται ἐπὶ τῇ βάσει τῶν πρωτευσουσῶν μονάδων του, ἧτοι : χωρίζομεν αὐτὸν εἰς τριψηφία τμήματα ἐκ δεξιῶν πρὸς τὰ ἀριστερά. Ἐκαστον τῶν τμημάτων τούτων εἶναι ἀριθμὸς μικρότερος τοῦ χίλια· ἀπαγγέλλομεν αὐτὸν ὡς γνωρίζομεν ἤδη καὶ προσθέτομεν τὴν ὀνομασίαν τῆς πρωτεουσῆς μονάδος, ἵνα ἐκφράσωμεν πόσας πρωτεουσῆς μονάδας ἐκάστου εἴδους περιέχει· π. χ. τὸν ἀριθμὸν ἑπτὰ ἑκατοντάδες ἑκατομμυρίου, δύο δεκάδες ἑκατομμυρίου, πέντε δεκάδες χιλιάδων, τρεῖς ἀπλᾶι δεκάδες καὶ δύο μονάδες γράφομεν 720 050 032 καὶ ἀπαγγέλλομεν ὡς ἐξῆς : Ἑπτακόσια εἴκοσιν ἑκατομμύρια πενήτηκοντα χιλιάδες τριακοντα δύο.

### Ἀσκήσεις.

1). Ποῖον ἔχει ὡς ψηφίον ἑκατοντάδων πᾶς ἀριθμὸς περιλαμβανόμενος μεταξὺ χίλια τριακόσια καὶ χίλια τετρακόσια ;

2). Πόσας δεκάδας περιέχει ἡ χιλιάς, ἡ δεκάς χιλιάδων, τὸ ἑκατομμύριον ;

3). Πῶς γράφονται οἱ ἀριθμοὶ δεκατρία ἑκατομμύρια καὶ ἑπτὰ μονάδες· τρία ἑκατομμύρια ἑπτὰ χιλιάδες καὶ πέντε μονάδες· δύο τρισεκατομμύρια καὶ πέντε μονάδες ;

4). Νὰ ἀπαγγεληθῶσιν οἱ ἀριθμοὶ 1001001, 111111, 2222, 123456789.

5). Ποσάκις τὸ ψηφίον 3 θὰ εὐρεθῆ γεγραμμένον εἰς τὸν πίνακα τῶν ἀκεραίων ἀπὸ 1 μέχρι 200 ;

6). Ποίους διψηφίους δυνάμεθα νὰ σχηματίσωμεν μὲ τὰ ψηφία 1, 2, 3 ;

7). Πόσα ψηφία ἔχει ἀριθμὸς οὗ τὸ ψηφίον ἀνωτέρας τάξεως δηλοῖ ἑκατοντάδας τρισεκατομμυρίου ;

8). Εἰς πάντα ἀριθμὸν μίαν μονάδα τῆς ἀνωτέρας τάξεως σημαίνει ἀριθμὸν μεγαλύτερον ἐκείνου ὅστις σχηματίζεται, ἂν ἀποκοπῆ τὸ πρῶτον ἐξ ἀριστερῶν ψηφίων τοῦ ἀριθμοῦ.

### Ἄτερα συστήματα ἀριθμῆσεως.

19. — Ἴνα σχηματίσωμεν ἀριθμὸν τινα εἰς τὸ δεκαδικὸν σύστημα, συμφωνήσαμεν ὅπως δέκα μονάδες μιᾶς τάξεως ἀποτελῶσι μίαν μονάδα τῆς ἀμέσως ἀνωτέρας τάξεως καὶ ὅπως ἐν ψηφίον ἀνερχόμενον κατὰ μίαν θέσιν λαμβάνῃ σημασίαν δεκάκις μείζονα.

20. — Ἄς ἀναχωρήσωμεν ἤδη ἐξ ἄλλης συμφωνίας ἀναλόγου. Θεωροῦμεν ὡς μονοψηφίους ἀριθμοὺς τοὺς 1, 2, 3, 4, 5, 6· συμφωνοῦμεν δὲ ἐπτὰ ἀπλαῖ μονάδες νὰ ἀποτελῶσι μίαν μονάδα δευτέρας τάξεως, ἣν ἄς καλέσωμεν ἐπτάδα, καὶ πάλιν ἐπτὰ ἐπτάδες νὰ ἀποτελῶσι μίαν μονάδα τρίτης τάξεως καὶ οὕτω καθεξῆς». Ἡ συμφωνία αὕτη συνεπάγεται τὴν ἐξῆς: Τὸ ψηφίον 1 τοποθετημένον εἰς τὴν δευτέραν θέσιν νὰ ἀντιπροσωπεύῃ ἐπτά μονάδας, εἰς τὴν τρίτην θέσιν ἐπτὰ ἐπτάδας, ἤτοι τεσσαράκοντα ἐννέα μονάδας καὶ οὕτω καθεξῆς· οὕτως ὁ ἀριθμὸς 546 κατὰ τὰς συμφωνίας αὐτὰς σημαίνει τὸ σύνολον ἐξ μονάδων, τεσσάρων ἐπτάδων καὶ πέντε μονάδων τρίτης τάξεως.

Ἔχομεν οὕτω νέον σύστημα ἀριθμῆσεως μὲ βάσιν τὸ ἐπτὰ, τὸ καλούμενον ἐπταδικόν.

Καὶ ἐν γένει:

21. — Ἴνα σχηματίσωμεν σύστημα ἀριθμῆσεως μὲ βάσιν ἀριθμὸν τινα  $n$ , παριστώμεν δι' ἀπλῶν ψηφίων τοὺς πρώτους ἀριθμοὺς ἀπὸ τῆς μονάδος μέχρι τοῦ ἀριθμοῦ ὅστις προηγείται τοῦ  $n$ . (Ἄν ὁ  $n$  ὑποθεθῆ πέρα τοῦ δέκα, τότε, διὰ νὰ παραστήσω-

μεν τὸν μονοψήφιον δέκα, μεταχειριζόμεθα νέον σύμβολον, ὡς π. χ. τὸ α κλπ.). Συμφωνοῦμεν δὲ ὅπως ν ἀπλαῖ μονάδες ἀποτελῶσι μίαν μονάδα δευτέρας τάξεως, ν μονάδες δευτέρας τάξεως μίαν μονάδα τρίτης κ. ο. κ. Μεταχειριζόμεθα δὲ τὸ 0 (μηδὲν) ὅπως καὶ εἰς τὸ δεκαδικὸν σύστημα. Οὕτως ἔχομεν δυαδικόν, τριαδικόν, . . . δωδεκαδικόν, δεκατριαδικόν. . . κ. λ. π. σύστημα.

**ΣΗΜ.** Κατωτέρω θὰ ἴδωμεν πῶς τρέπομεν ἀριθμὸν τινὰ ἐνὸς συστήματος εἰς ἀριθμὸν ἄλλου συστήματος.

### Ἀσκήσεις.

9). Τίνα βάσιν ἔχει τὸ σύστημα ἐν ᾧ ἡ μονὰς τῆς τρίτης τάξεως ἀντιπροσωπεύει εἴκοσι πέντε μονάδας; τίνα, ὅταν ἐννέα :: τίνα, ὅταν δεκαεξ;

10). Ὁ ἀριθμὸς 100 τοῦ δυαδικοῦ συστήματος ἀπὸ πόσας ἀπλαῖ μονάδας σχηματίζεται;

11). Πόσα ψηφία χρειαζόμεθα εἰς τὸ δυαδικὸν σύστημα;

12). Πόσα ψηφία χρειαζόμεθα εἰς τὸ δωδεκαδικὸν σύστημα;

### Ὅρισμοὶ ἰσότητος καὶ ἀνισότητος.

22.— Εἰς ἕκαστον κεφαλαῖον γράμμα τοῦ ἀλφαβήτου ἀντιστοιχεῖ ἐν μικρὸν καὶ τὰνάπαλιν. Λέγομεν δι' αὐτό, ὅτι ὁ ἀριθμὸς τῶν κεφαλαίων γραμμάτων τοῦ ἀλφαβήτου εἶναι ἴσος μὲ τὸν ἀριθμὸν τῶν μικρῶν. Δι' ὅμοιον λόγον ὁ ἀριθμὸς τῶν δακτύλων τῆς δεξιᾶς χειρὸς τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἴσος πρὸς τὸν τῆς ἀριστερᾶς.

23.— Δύο ἀριθμοὶ λέγονται ἴσοι, ὅταν εἰς ἐκάστην μονάδα τοῦ ἐνὸς ἀντιστοιχῇ μία μονὰς τοῦ ἐτέρου καὶ τὰνάπαλιν. Ἄλλως λέγονται ἀνισοὶ καὶ μεγαλύτερος λέγεται ὁ ἔχων πλὴν τῶν μονάδων τῶν ἀντιστοίχων πρὸς τὰς μονάδας τοῦ ἐτέρου καὶ ἄλλας προσέτι, ὅποτε ὁ ἄλλος λέγεται μικρότερος.

Σημεῖα διὰ μὲν τὴν ἰσότητα ἔχομεν τὸ ἐξῆς = (ὅπερ ἀπαγγέλλεται ἴσον), π. χ.  $6=6$ , διὰ δὲ τὴν ἀνισότητα τὸ ἐξῆς <

Ὁ μικρότερος ἀριθμὸς γράφεται πρὸς τὴν κορυφὴν τῆς γωνίας· π. χ.  $6 < 7, 14 > 12$ .

24.— Ἐκ τοῦ ὀρισμοῦ τῆς ἰσότητος ἔπονται ἀμέσως αἱ ἑξῆς ἰδιότητες :

α΄.) Οἱ τῷ αὐτῷ ἀριθμῷ ἴσοι εἶναι καὶ πρὸς ἀλλήλους ἴσοι.

β΄.) Ἐὰν εἰς ἴσους ἀριθμοὺς προστεθῶσιν ἴσοι, οἱ προκύπτοντες θὰ εἶναι ἴσοι.

γ΄.) Ἐὰν εἰς ἀνίσους ἀριθμοὺς προστεθῶσιν ἴσοι, ὁ μεγαλύτερος ἐξακολουθεῖ ὡν μεγαλύτερος τοῦ ἄλλου.

25.— Παρατήρησις. Ἐὰν λάβωμεν ὑπ' ὄψιν τὴν ἔννοιαν τῆς τάξεως, τὴν σχηματίζομένην, ὅταν φαντασθῶμεν τὴν φυσικὴν σειρὰν τῶν ἀριθμῶν 1, 2, 3 . . ., τότε μικρότερος τοῦ β λέγεται ὁ ἀριθμὸς α, ἐὰν εὑρίσκηται εἰς τοὺς πρὸ τοῦ β, μεγαλύτερος δέ, ἐὰν εἰς τοὺς κατόπιν· ἄλλαις λέξεσιν ὁ κατώτερος, δηλαδὴ ὁ προηγούμενος, εἶναι ὁ μικρότερος.

### Ἀσκήσεις.

13) Οἱ διπλάσιοι τῶν ἴσων εἶναι ἴσοι· οἱ τριπλάσιοι ἐπίσης· κ. ο. κ.

14) Οἱ διπλάσιοι τῶν ἀνίσων εἶναι ἄνισοι· οἱ τριπλάσιοι ὁμοίως ἄνισοι κ. ο. κ.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄.

ΑΙ ΤΕΣΣΑΡΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΕΡΑΙΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΠΡΑΞΕΙΣ

### ΠΡΟΣΘΕΣΙΣ

26.— Πάντα ἀκέραιον δυνάμεθα νὰ φαντασθῶμεν ὡς μίαν συλλογὴν πολλῶν μονάδων. Ὅταν ἐνώνωμεν τὰς μονάδας πολλῶν ἀκεραίων καὶ κάμνωμεν μίαν νέαν συλλογὴν, ἕνα νέον ἀριθμὸν, λέγομεν τότε, ἔτι προσθέτομεν τοὺς ἀκεραίους αὐτοὺς, τὴν δὲ πρᾶξιν καλοῦμεν πρόσθεσις. Τὸ ἐξαγόμενον καλεῖται ἀθροισμα, οἱ δὲ ἐνούμενοι ἀκέραιοι λέγονται προσθετέοι.

Σημείον τῆς προσθέσεως εἶναι τὸ +, ἀπαγγέλλεται δὲ σὺν π. χ.  $7+5$  παριστᾷ τὸ ἄθροισμα τῶν ἀριθμῶν ἑπτὰ καὶ πέντε.

### Ἰδιότητες τῆς προσθέσεως.

27. — Θεωρήσωμεν ἀριθμὸν τινα, ἔστω τὸν 4· ἀποτελεῖται οὗτος ἐκ μονάδων 1, 1, 1, 1. Καθ' οἷονδήποτε τρόπον καὶ ἂν φαντασθῶμεν ὅτι ἐνοῦμεν αὐτὰς πάντοτε θὰ ἔχωμεν τὸν ὠρισμένον ἀριθμὸν 4. ἦτοι :

Ἐὰν ἀλλάξωμεν τὴν τάξιν, καθ' ἣν ἐνώνομεν μονάδας τινάς, δὲν ἀλλάσσει ὁ ἀριθμὸς ὅστις θὰ προκύβῃ.

Καὶ γενικῶς. Ἄς ζητήσωμεν ἐπὶ παραδείγματι τὸ ἄθροισμα τῶν ἀριθμῶν 5, 3, 6. Ἐχομεν νὰ ἐνώσωμεν πέντε μονάδας, τρεῖς μονάδας καὶ ἕξ μονάδας. Δὲν ὑπάρχει ἀνάγκη νὰ προσέξωμεν εἰς τὴν τάξιν καθ' ἣν θὰ τὰς ἐνώσωμεν, ἀρκεῖ νὰ τὰς λάβωμεν ὅλας· ὅθεν ἔπεται ὅτι :

«Καθ' οἷονδήποτε τάξιν καὶ ἂν προσθέσωμεν δοθέντας ἀριθμοὺς εὐρίσκομεν τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν ὡς ἄθροισμα».

Ἡ ἰδιότης αὕτη εἶναι θεμελιώδης καὶ λέγεται εἴτε ἀδιαφορία ὡς πρὸς τὴν τάξιν εἴτε ἰδιότης ἀντιμεταθέσεως.

28. — Κατὰ ταῦτα, ἐὰν τοὺς προσθετέους τοὺς δεδομένους παραστήσωμεν διὰ τῶν α, β, γ, δ, ε, θὰ δυνάμεθα νὰ λέγωμεν ὅτι :

$$\alpha + \beta + \gamma + \delta + \epsilon = \gamma + \beta + \alpha + \epsilon + \delta = \beta + \delta + \alpha + \epsilon + \gamma \text{ κ.λ.π.}$$

Ἐλάβομεν πέντε προσθετέους, ἀλλ' ἠδυνάμεθα νὰ λάβωμεν ὅσουςδήποτε.

Ἐκ τῆς θεμελιώδους ἰδιότητος ἔπονται αἱ ἐξῆς :

α΄.) Ἐστω ὅτι ἐδόθη τὸ ἄθροισμα  $3+5+2$ . ὅπως τὸ ἐσημειώσαμεν ἐδῶ σημαίνει νὰ λάβωμεν 3 μονάδας καὶ εἰς αὐτὰς νὰ ἐνώσωμεν 5, ὁπότε εὐρίσκομεν 8· εἰς αὐτὰς δὲ νὰ ἐνώσωμεν 2 μονάδας, ὁπότε εὐρίσκομεν 10. Κατὰ τὴν θεμελιώδη ὁμως ἰδιότητα ἔχομεν  $3+5+2=5+2+3$ . ἦτοι τὸ αὐτὸ ἄθροισμα εὐρίσκομεν, ἐὰν ἐνώσωμεν πρῶτον τὰς 5 μονάδας καὶ τὰς 2, ὁπότε εὐρίσκομεν 7, εἰς αὐτὰς δὲ κατόπιν τὰς 3. Ἦτοι τὸ



ἄθροισμα 10 δυνάμεθα νὰ θεωρήσωμεν ὡς ἄθροισμα δύο προσθετέων, τῶν 7 καὶ 3, εἴτε τῶν 3 καὶ 7, ἦτοι :

$$3 + 5 + 2 = 3 + (5 + 2),$$

ὅπου διὰ τῆς παρενθέσεως ἐννοοῦμεν ὅτι ἐξετελέσαμεν τὴν πρόσθεσιν τῶν 5 καὶ 2 καὶ ἐθεωρήσαμεν τὸ ἄθροισμα ὡς δεύτερον προσθετέον.

Ἡ, ἐὰν ἀντὶ τῶν 3, 5 καὶ 2 φαντασθῶμεν οἰουσδήποτε ἀκέ-  
/ραιούς  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ , δυνάμεθα νὰ γράψωμεν ὅτι :

$$\alpha + \beta + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma)$$

Τουτέστι· δυνάμεθα νὰ ἀντικαταστήσωμεν τὸν δεύτερον καὶ τρίτον προσθετέον διὰ τοῦ ἄθροίσματος αὐτῶν. Καὶ γενικώτερον:  
2 *Εἰς πᾶν ἄθροισμα δυνάμεθα νὰ ἀντικαταστήσωμεν οἰουσδήποτε προσθετέους διὰ τοῦ ἄθροίσματος αὐτῶν.*

β.) Φανερόν εἶναι ὅτι ἰσχύει καὶ τὸ ἀντίστροφον· δηλαδή, ὅπως συνεπτύξαμεν διαφόρους προσθετέους εἰς ἓνα, οὕτω δυνάμεθα καὶ νὰ ἀναπτύξωμεν ἓνα προσθετέον, ἦτοι :

*Δυνάμεθα νὰ ἀντικαταστήσωμεν (εἰς τὸ δοθὲν ἄθροισμα) ἓνα προσθετέον δι' ἄλλων ἐχόντων αὐτὸν ἄθροισμα.*

$$\text{Κατὰ ταῦτα: } \alpha + (\beta + \gamma) = \alpha + \beta + \gamma$$

$$\alpha + (\beta + \delta + \epsilon) + \zeta = \alpha + \beta + \delta + \epsilon + \zeta \text{ κ. ο. κ.}$$

Πῶς προστίθεται ἀριθμὸς εἰς ἄθροισμα ;

γ.) Τὸ ἄθροισμα  $\alpha + \beta + \gamma + \delta$  ἰσοῦται τῷ ἄθροίσματι

$$(\alpha + \beta + \gamma) + \delta.$$

Ἄλλὰ τὸ αὐτὸ ἄθροισμα ἰσοῦται κατὰ τὴν προηγουμένην ιδιότητα (α') καὶ τῷ ἄθροίσματι

$$\alpha + (\beta + \delta) + \gamma.$$

Ἔθεν καὶ (§ 24)

$$(\alpha + \beta + \gamma) + \delta = \alpha + (\beta + \delta) + \gamma. \text{ Ἄρα:}$$

Χ *Προστίθεται ἀριθμὸς εἰς ἄθροισμα, καὶ ἐὰν προστεθῇ εἰς ἓνα τῶν προσθετέων.* Χ

Πῶς προσθέτομεν διάφορα ἀθροίσματα ;

δ'.) Ἐστω τὸ ἀθροίσμα

$$(\alpha + \beta + \gamma) + (\delta + \epsilon)$$

Τοῦτο κατὰ τὴν ιδιότητα (β'.) ἰσοῦται πρὸς τὸ ἀθροίσμα

$$(\alpha + \beta + \gamma) + \delta + \epsilon$$

καὶ τοῦτο πάλιν πρὸς τὸ ἀθροίσμα

$$\alpha + \beta + \gamma + \delta + \epsilon$$

ὥστε :

Προσθέτομεν διαφορα ἀθροίσματα, καὶ ἐὰν σχηματίσωμεν ἕν  
ἀθροίσμα ἐξ ὅλων τῶν προσθετέων.

Κατὰ ταῦτα :

$$(\alpha + \beta + \gamma) + (\delta + \epsilon) = \alpha + \beta + \gamma + \delta + \epsilon$$

**Ἐφαρμογὴ τῶν ιδιοτήτων τούτων εἰς τὴν ἐκτέλεσιν  
τῆς προσθέσεως.**

29. — Πῶς θὰ προσθέσωμεν τοὺς ἀριθμοὺς 5364 καὶ 237 ;  
Θεωροῦμεν αὐτοὺς ὡς δύο ἀθροίσματα  $5000 + 300 + 60 + 4$   
καὶ  $200 + 30 + 7$ . Κατὰ τὴν ιδιότητα (28 δ'.) ἔχομεν :

$$5000 + 300 + 60 + 4 + 200 + 30 + 7.$$

Τοῦτο ὁμοίως κατὰ τὴν ιδιότητα (§ 28 α'.) ἰσοῦται πρὸς τὸ

$$5000 + (300 + 200) + (60 + 30) + (4 + 7) = \\ = 5000 + 500 + 90 + 11,$$

ἔπερ εἶναι ἴσον κατὰ τὴν ιδιότητα (§ 28 β'.) πρὸς τὸ

$$5000 + 500 + 90 + 10 + 1 =$$

$$= 5000 + 500 + 100 + 1 = 5000 + 600 + 1 = 5601.$$

οὕτως ἐξηγείται διατί προσθέτομεν διαφόρους ἀριθμοὺς κατὰ  
τὴν γνωστὸν κανόνα· τουτέστιν :

30. — Ἴνα προσθέσωμεν ἀκεραίους, γράφομεν συνήθως αὐτοὺς  
οὕτως ὅστε αἱ μονάδες νὰ εὐρίσκωνται ὑπὸ τὰς μονάδας, αἱ δε-  
κάδες ὑπὸ τὰς δεκάδας κ. ο. κ.· προσθέτομεν κατόπιν τὰς μονά-  
δας χωριστά, ὅπως καὶ τὰς δεκάδας, ἑκατοντάδας κ. λ. π. Ὅταν

τὸ ἄθροισμα τῶν ψηφίων μιᾶς στήλης δὲν ὑπερβαίνει τὸ 9, γράφομεν αὐτὸ ὑπὸ τὴν αὐτὴν στήλην· ἐὰν δὲ ὑπερβαίνει τὸ 9, γράφομεν μόνον τὰς μονάδας τοῦ ἀθροίσματος ὑπὸ τὴν αὐτὴν στήλην, τὰς δὲ δεκάδας προσθέτομεν εἰς τὸ ἄθροισμα τῶν ψηφίων τῆς ἀκολουθοῦντος πρὸς τὰ ἀριστερὰ στήλης. Τὸ ἄθροισμα τῶν ψηφίων τῆς τελευταίας στήλης τὸ γράφομεν ὀλόκληρον.

### Βάσανος τῆς προσθέσεως.

31. — Βάσανος πράξεώς τινος καλεῖται ἡ δοκιμὴ τὴν ὁποίαν κάμνομεν, ἵνα ἐξελέγξωμεν ἂν ἐγένετο λάθος τι.

Τὴν βάσανον τῆς προσθέσεως κάμνομεν στηριζόμενοι ἐπὶ τῆς θεμελιώδους ιδιότητος (§ 28). Δηλαδή προσθέτομεν τοὺς αὐτοὺς ἀριθμοὺς κατ' ἄλλην τάξιν. Ἐὰν δὲν εὔρωμεν τὸ αὐτὸ ἄθροισμα, τότε ἐγένετο λάθος ἢ εἰς τὴν πρώτην ἢ εἰς τὴν δευτέραν πράξιν.

### Ἀσκήσεις.

15). Ποίας ιδιότητος ἐφαρμόζομεν διὰ τὰς ἰσότητας:

$$5 + 6 + 2 + 4 + 9 = 5 + 10 + 2 + 9,$$

$$14 + 7 + 32 = 10 + 2 + 4 + 7 + 30.$$

16). Τὸ ἄθροισμα  $21 + 12 + 13$  νὰ γραφῆ ὡς ἄθροισμα ἐξ προσθετέων, ὧν οἱ τρεῖς λήγουσιν εἰς 0, οἱ δὲ λοιποὶ ἔχουσιν ἄθροισμα μικρότερον τοῦ δέκα· κατὰ πόσους τρόπους γίνεται τοῦτο;

17). Διατί ἀρχίζομεν τὴν πρόσθεσιν ἐκ δεξιῶν καὶ πότε δὲν γίνεται πολυπλοκωτέρα ἡ πρόσθεσις, ὅταν ἀρχίζωμεν ἐξ ἀριστερῶν;

18). Θεωρουμένων ὡς θεμελιωδῶν ιδιοτήτων τῆς προσθέσεως τῶν ἐξῆς:

$$\alpha + \beta = \beta + \alpha \quad \text{καὶ} \quad \alpha + (\beta + \gamma) = (\alpha + \beta) + \gamma$$

νὰ ἐξαχθῶσιν αἱ λοιπαί.

19) Πῶς συντομεύεται ἡ πρόσθεσις ὅταν πάντες οἱ προσθετέοι λήγωσιν εἰς μηδενικά.

### ΑΦΑΙΡΕΣΙΣ

32. — Ποῖον ἀριθμὸν πρέπει νὰ προσθέσωμεν εἰς τὸ 5, ἵνα εὕρωμεν ὡς ἄθροισμα τὸ 12;

Ἡ πρᾶξις ἣ ὁποία θὰ γίνῃ λέγεται ἀφαίρεσις, ἦτοι :

Δίδεται τὸ ἐξαγόμενον τῆς προσθέσεως δύο ἀριθμῶν, ἔστω α, δίδεται ἐπίσης καὶ ὁ εἰς τῶν ἀριθμῶν, ἔστω β, ζητεῖται δὲ ὁ ἕτερος. Ἡ πρᾶξις ἣ σκοπὸν ἔχουσα τὴν εὕρεσιν τούτου λέγεται ἀφαίρεσις.

Ἡ ἀφαίρεσις εἶναι πρᾶξις ἀντίστροφος τῆς προσθέσεως.

Ἴνα εὕρωμεν τὸν ζητούμενον ἀριθμὸν, θὰ ἐλαττώσωμεν προφανῶς τὸν α κατὰ τόσας μονάδας, ὅσας ἔχει ὁ β. Ὁ α λέγεται μειωτέος, ὁ δὲ β ἀφαιρετέος· τὸ ἐξαγόμενον διαφορὰ ἢ ὑπόλοιπον.

Ἐὰν δ καλέσωμεν τὸ ὑπόλοιπον, σημειοῦται ἡ ῥηθῆσα ἀφαίρεσις ὡς ἐξῆς:  $\alpha - \beta = \delta$ . Τὸ σημεῖον τῆς ἀφαιρέσεως, ἦτοι τὸ —, λέγεται πλῆν.

33. — Ἡ ἀφαίρεσις εἶναι δυνατὴ, μόνον ὅταν ὁ μειωτέος ἔχῃ μονάδας περισσοτέρας τῶν τοῦ ἀφαιρετέου, ἦτοι ὅταν εἶναι μεγαλύτερος αὐτοῦ.

Ἴνα λέγωμεν, ὅτι εἶναι δυνατὴ ἡ ἀφαίρεσις, καὶ ὅταν ὁ μειωτέος καὶ ἀφαιρετέος εἶναι ἴσοι, θὰ παραδεχθῶμεν τὸ μηδὲν (0) ὡς ἀριθμὸν. Δυνάμεθα μάλιστα νὰ ὀρίσωμεν τὸ 0 ὡς διαφορὰν δύο ἴσων ἀριθμῶν.

### Ἰδιότητες τῆς ἀφαιρέσεως.

34. — Κατὰ τοὺς ἀνωτέρω ὁρισμοὺς ἡ ἰσότης  $\alpha - \beta = \delta$  γράφεται καὶ ὡς ἐξῆς:  $\alpha = \beta + \delta$  καὶ ἀντιστρόφως.

Τοῦτο ἔχοντες ὑπ' ὄψει δυνάμεθα ἐκ τῶν ἰδιοτήτων τῆς προσθέσεως νὰ ἐξαγάγωμεν τὰς ἰδιότητας τῆς ἀφαιρέσεως.

Ἐὰν προσθέσωμεν τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν εἰς τὸν μειωτέον καὶ ἀφαιρετέον, μεταβάλλεται τὸ ὑπόλοιπον ;

α'.) Ἐστω  $\alpha - \beta = \delta$ . ἔχομεν :

$$\alpha = \beta + \delta.$$

Καὶ κατὰ τὴν ιδιότητα (§ 28 γ').

$$\alpha + \gamma = (\beta + \gamma) + \delta.$$

ἔθεν

$$(\alpha + \gamma) - (\beta + \gamma) = \delta.$$

Ἄρα : Ἐὰν προσθέσωμεν καὶ εἰς τὸν μειωτέον καὶ εἰς τὸν ἀφαιρετέον τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν, τὸ ὑπόλοιπον δὲν μεταβάλλεται.

Παρατήρησις. Εἰς τὸ αὐτὸ συμπέρασμα καταλήγομεν καὶ ὡς ἐξῆς.

Ἐὰν προσθέσωμεν εἰς τὸν μειωτέον μίαν μονάδα, αὐξάνει τὸ ὑπόλοιπον κατὰ μονάδα. (§ 32).

Ἐὰν προσθέσωμεν εἰς τὸν ἀφαιρετέον μίαν μονάδα, τὸ ὑπόλοιπον ἐλαττοῦται κατὰ μονάδα ἐπομένως :

Ἐὰν προσθέσωμεν καὶ εἰς τὸν μειωτέον καὶ εἰς τὸν ἀφαιρετέον μίαν μονάδα, τὸ ὑπόλοιπον δὲν ἀλλάσσει.

Πῶς ἀφαιρεῖται ἀριθμὸς ἀπὸ ἀθροίσματος ;

β'.) Ἐστω ἡ διαφορά :

$$(\alpha + \beta) - \gamma$$

Ἀπὸ οἰονδήποτε προσθετέον καὶ ἂν ἀφαιρέσωμεν μίαν μονάδα, τὸ σύνολον ἐλαττοῦται κατὰ μονάδα ἐπομένως :

κ' Ἀφαιρεῖται ἀριθμὸς ἀπὸ ἀθροίσματος, καὶ ἐὰν ἀφαιρεθῇ ἀπὸ ἐνὸς ἐκ τῶν προσθετέων.

Καὶ ἡ πρότασις αὕτη πηγάζει ἐκ τῆς ιδιότητος (§ 28. γ').

Ἐχομεν τουτέστιν :

$$(\alpha + \beta) - \gamma = (\alpha - \gamma) + \beta,$$

διότι :

$$[(\alpha - \gamma) + \beta] + \gamma = [(\alpha - \gamma) + \gamma] + \beta = \alpha + \beta.$$

Πῶς ἀφαιρεῖται ἀθροισμα ἀπὸ ἀριθμοῦ ;

γ'.) Ἐστω ἡ διαφορά

$$\alpha - (\beta + \gamma)$$

Παρατηροῦμεν ὅτι ἀντὶ νὰ ἀφαιρέσω διὰ μιᾶς πάσας τὰς μονάδας τοῦ ἀφαιρετέου δύναμαι νὰ ἀφαιρέσω πρῶτον τὰς β μονάδας καὶ ἔπειτα τὰς γ μονάδας· ὅθεν :

Ἀφαιροῦμεν ἄθροισμα ἀπὸ ἀριθμοῦ, καὶ ἐὰν ἀφαιρέσωμεν πάντα τοὺς προσθετέους τοῦ ἀθροίσματος τὸν ἕνα μετὰ τὸν ἄλλον· ἦτοι :

$$\alpha - (\beta + \gamma) = (\alpha - \beta) - \gamma$$

Ἡ πρότασις αὕτη προκύπτει καὶ ἐκ τῆς (α'.) ιδιότητος  
Καὶ τῷ ὄντι ἔχομεν :

$$(\alpha - \beta) - \gamma = [(\alpha - \beta) + \beta] - (\gamma + \beta) = \alpha - (\gamma + \beta)$$

ὅθεν :

$$\alpha - (\beta + \gamma) = (\alpha - \beta) - \gamma$$

Πῶς ἀφαιρεῖται διαφορά ἀπὸ ἀριθμοῦ ;

δ'.) Ἐστω ἡ διαφορά

$$\alpha - (\beta - \gamma)$$

Κατὰ τὴν ιδιότητα (α'.) ἔχομεν :

$$\alpha - (\beta - \gamma) = (\alpha + \gamma) - [(\beta - \gamma) + \gamma] = (\alpha + \gamma) - \beta$$

ἔρα :

Ἀπὸ ἀριθμοῦ ἀφαιροῦμεν διαφορὰν δύο ἄλλων καὶ ὡς ἐξῆς :  
Προσθέτομεν εἰς αὐτὸν τὸν ἀφαιρετέον τῆς διαφορᾶς καὶ ἀπὸ τοῦ ἀθροίσματος ἀφαιροῦμεν τὸν μειωτέον.

Κατὰ ταῦτα

$$\alpha - (\beta - \gamma) = (\alpha + \gamma) - \beta.$$

Ἐφαρμογὴ τῶν ιδιοτήτων τούτων εἰς τὴν ἐκτέλεσιν τῆς ἀφαιρέσεως.

35. — Ἐστω πρὸς ἀφαιρέσιν ἀπὸ τοῦ 459 ὁ 168. Δυνάμεθα νὰ θεωρήσωμεν τοὺς δύο ἀριθμοὺς ὡς ἀθροίσματα, ὅποτε ἔχομεν :

$$(400 + 50 + 9) - (100 + 60 + 8).$$

Κατὰ τὴν ιδιότητα (§ 34. γ'.) ἀρκεῖ νὰ ἀφαιρέσωμεν ἕκαστον προσθετέον τοῦ δευτέρου ἀθροίσματος ἀπὸ τοῦ μειωτέου. Ἀφαιροῦμεν τὸν 8 ἀπὸ τοῦ πρώτου ἀθροίσματος· ἀρκεῖ πρὸς τοῦτο (§ 34. β'.) νὰ ἀφαιρέσωμεν αὐτὸν ἀπὸ τοῦ 9· μένει 1. Ἐπειτα

ἔχομεν νὰ ἀφαιρέσωμεν τὸν ἕτερον προσθετέον 60, ἦτοι τὰς 6 δεκάδας. Ἐπειδὴ δὲν ἀφαιροῦνται ἀπὸ τὰς 5 δεκάδας τοῦ μειωτέου, θὰ στηριχθῶμεν εἰς τὴν ιδιότητα (§ 34. α'.) Προσθέτομεν τουτέστιν εἰς τὸν μειωτέον δέκα δεκάδας, τὰς ὁποίας κατόπιν θὰ προσθέσωμεν καὶ εἰς τὸν ἀφαιρετέον, καὶ οὕτως αἱ 5 δεκάδες τοῦ μειωτέου μετὰ τὴν πρόσθεσιν γίνονται 15 δεκάδες· δὲν προσθέτομεν ἀμέσως καὶ τὰς δέκα δεκάδας εἰς τὸν ἀφαιρετέον, διότι ἄλλως πάλιν δὲν θὰ ἀφηροῦντο αἱ δεκάδες τοῦ ἀφαιρετέου ἀπὸ τὰς τοῦ μειωτέου· ἀφαιροῦμεν τουτέστι προηγουμένως τὰς 6 δεκάδας τοῦ ἀφαιρετέου ἀπὸ τὰς 15 τοῦ μειωτέου· μένουσιν 9 δεκάδες εἰς τὸ ὑπόλοιπον· καὶ κατόπιν προσθέτομεν εἰς τὸν ἀφαιρετέον τὰς δέκα δεκάδας (τὰς ἀντιστοιχοῦσας πρὸς τὰς προστεθείσας εἰς τὸν μειωτέον), ἦτοι μίαν ἑκατοντάδα, καὶ τότε αἱ ἑκατοντάδες τοῦ ἀφαιρετέου γίνονται 2· ἀφαιροῦμεν ταύτας ἀπὸ τῶν τεσσάρων τοῦ μειωτέου· μένουσιν 2. Ὅθεν δ' κανὼν:

36. — Ἴνα ἀφαιρέσωμεν ἀριθμὸν ἀπὸ ἄλλου, γράφομεν τὸν μικρότερον ὑπὸ τὸν μεγαλύτερον οὕτως ὥστε αἱ μονάδες νὰ εὐρίσκωνται ἐν τῇ αὐτῇ στήλῃ, αἱ δεκάδες ἐπίσης κ.τ.λ.: ἀφαιροῦμεν ἔπειτα τὰς μονάδας ἐκάστης τάξεως τοῦ ἀφαιρετέου ἀπὸ τῶν ἀντιστοιχῶν τοῦ μειωτέου ἀρχόμενοι ἐκ δεξιῶν. Ὅταν ἡ ἀφαίρεσις αὕτη δὲν γίνεται, προσθέτομεν εἰς τὸ ἀντίστοιχον ψηφίον τοῦ μειωτέου 10 μονάδας, ἀλλ' ἔπειτα ἐρχόμενοι εἰς τὸ ἀκόλουθον πρὸς τὰ ἀριστερὰ ψηφίον τοῦ ἀφαιρετέου προσθέτομεν εἰς αὐτό, πρὶν τὸ ἀφαιρέσωμεν, μίαν μονάδα.

### Βάσανος τῆς ἀφαιρέσεως.

37. — Ἡ βάσανος τῆς ἀφαιρέσεως γίνεται, ἐὰν προσθέσωμεν τὸ ὑπόλοιπον καὶ τὸν ἀφαιρετέον. Ἐὰν ὡς ἄθροισμα εὐρεθῇ ὁ μειωτέος, τότε τοῦτο εἶναι ἔνδειξις ὅτι δὲν ὑπεπέσαμεν εἰς λάθος.

### Ἀσκήσεις.

20). Ἴνα προστεθῇ εἰς ἀριθμὸν ἢ διαφορὰ δύο ἄλλων, ἀρκεῖ νὰ προσθέσωμεν εἰς αὐτὸν τὸν μειωτέον τῆς διαφορᾶς καὶ νὰ ἀφαιρέσωμεν τὸν ἀφαιρετέον.

21). Ἐὰν ἀπὸ ἴσων ἀφαιρεθῶσιν ἴσοι, προκύπτουσιν ἀριθμοὶ ἴσοι.

22). Ἐὰν ἀπὸ ἀνίσων ἀφαιρεθῶσιν ἴσοι, προκύπτουσιν ἀριθμοὶ ὁμοίως ἀνίσοι.

23). Νὰ εὐρεθῶσι τὰ ἐξαγόμενα τῶν πράξεων

$$2386 - (475 - 4), 2974 - (900 + 70 + 4)$$

μὲ ἐκτελέσεις πράξεων διαφόρους τῶν σεσημειωμένων.

24). Τρεῖς διαδοχικοὶ ἀριθμοὶ δύνανται νὰ γραφῶσι πάντοτε ὑπὸ τὴν μορφήν  $\alpha - 1, \alpha, \alpha + 1$ . — Ὅθεν τὸ ἄθροισμα τριῶν διαδοχικῶν ἰσοῦται πρὸς τὸ ἄθροισμα τριῶν προσθετέων ἴσων τῶν μεσαίων.

25). Ποῖα λάθη πρέπει νὰ γίνωσιν εἰς τὴν βάσανον τῆς ἀφαιρέσεως καὶ εἰς τὴν ἀφαίρεσιν, ὥστε νὰ νομισθῇ ὅτι ἐγένετο ἡ πράξις ὀρθῆ χωρὶς νὰ ἔχη γίνῃ;

26). Ἐὰν τριψηφίου τινος ἀριθμοῦ μεταθέσωμεν ἐναλλάξ τὰ ψηφία ἑκατοντάδων καὶ μονάδων (ὑποτιθέμενα διάφορα) καὶ ἀφαιρέσωμεν τὸν μικρότερον τριψήφιον ἀπὸ τοῦ μεγαλύτερου, θὰ εὐρεθῇ διαφορά μὲ ψηφίον δεκάδων 9.

27). Νὰ εὐρεθῶσι τρεῖς διαδοχικοὶ ἀριθμοὶ ἔχοντες ἄθροισμα 3003.

28). Ἐὰν ἀπὸ ἀριθμοῦ σχηματιζομένου μὲ τρία διαδοχικά ψηφία ἀφαιρέσωμεν τὸν σχηματιζόμενον μὲ τὰ ἴδια ψηφία ἀλλὰ κατ' ἀντίστροφον τάξιν, εὐρίσκομεν διαφορὰν 198.

### ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ

38. — Πρόσθεσις ἐν ἣ πάντες οἱ προσθετέοι εἶναι ἴσοι ὀνομάζεται καὶ πολλαπλασιασμός.

Πολλαπλασιασμός λέγεται καὶ ἡ πράξις δι' ἧς ἐκτελοῦμεν συντόμως τοιαύτην πρόσθεσιν.

Εἰς οἰοσδήποτε ἐκ τῶν ἴσων προσθετέων λέγεται πολλαπλασιαστέος, ἐνῶ ὁ ἀριθμὸς ὁ δεικνύων τὸ πλῆθος τῶν προσθετέων λέγεται πολλαπλασιαστής.

Τὸ ἐξαγόμενον (τουτέστι τὸ ἄθροισμα) ἐδῶ λέγεται γινόμενον.



Ὁ πολλαπλασιαστέος καὶ ὁ πολλαπλασιαστής εἶναι οἱ δύο παράγοντες τοῦ γινομένου.

Παριστώμεν γινόμενον γράφοντες τὸν πολλαπλασιαστέον καὶ τὸν πολλαπλασιαστήν κατὰ σειράν καὶ χωρίζοντες αὐτοὺς διὰ τοῦ  $\times$  ἢ διὰ μιᾶς στιγμῆς, ἢ καὶ χωρὶς κανὲν σημεῖον. Τὸ σημεῖον εἶναι ἀπαραίτητον, ὅταν οἱ δύο παράγοντες εἶναι ἀριθμοί. Εἰς τὴν ἀπαγγελίαν μεταχειρίζομεθα τὸ ἐπί.

Κατὰ ταῦτα

$\alpha \times \beta$  ἢ  $\alpha \cdot \beta$  ἢ καὶ  $\alpha \beta$  παριστᾷ τὸ ἄθροισμα

$$\alpha + \alpha + \alpha + \alpha + \dots + \alpha,$$

ἔπου τὸ πλῆθος τῶν προσθετέων εἶναι  $\beta$ .

Τὸ  $23 \times 12$  ἢ  $23 \cdot 12$  παριστᾷ τὸ ἄθροισμα 12 προσθετέων ἴσων πρὸς 23.

### Γινόμενον πολλῶν παραγόντων.

39. — Ἐστω ὅτι ἐτοποθετήσαμεν κατὰ τάξιν τινὰ τρεῖς ἀριθμοὺς

$$\alpha, \quad \beta, \quad \gamma$$

καὶ σημειοῦμεν μεταξύ αὐτῶν τὸ  $\times$ , ἤτοι ὅτι γράφομεν

$$\alpha \times \beta \times \gamma.$$

διὰ τούτου θὰ ἐννοοῦμεν ὅτι ζητεῖται τὸ ἐξαγόμενον, ὅπερ εὐρίσκομεν, ἂν πολλαπλασιάσωμεν τὸν  $\alpha$  ἐπὶ  $\beta$  καὶ τὸ εὐρεθὲν γινόμενον ἐπὶ  $\gamma$ , ἐνῶ

$$\alpha \times \gamma \times \beta$$

σημαίνει τὸ ἐξαγόμενον ὅπερ εὐρίσκομεν, ἂν πολλαπλασιάσωμεν τὸν  $\alpha$  ἐπὶ  $\gamma$  καὶ τὸ εὐρεθὲν γινόμενον ἐπὶ  $\beta$ . ὁμοίως

$$\alpha \times \beta \times \gamma \times \delta$$

σημαίνει νὰ εὐρωμεν ὡς ἀνωτέρω τὸ γινόμενον τῶν τριῶν πρώτων καὶ κατόπιν νὰ τὸ πολλαπλασιάσωμεν ἐπὶ τὸν τέταρτον κ. ο. κ. Κατὰ ταῦτα·

$$3 \times 5 \times 2 = 15 \times 2 = 30 \quad \text{καὶ} \quad 3 \times 5 \times 2 \times 4 = 30 \times 4 = 120,$$

$$\text{ἐνῶ} \quad 3 \times 5 \times 4 \times 2 = 60 \times 2 = 120.$$

40. — Παρατηροῦμεν ἐντεῦθεν ὅτι ἄλλον τρόπον ἐκτελέσεως πολλαπλασιασμοῦ ἐννοοῦμεν, ὅταν γράφωμεν

$$3 \times 5 \times 2 \times 4$$

καὶ ἄλλον, ὅταν γράφωμεν

$$3 \times 5 \times 4 \times 2.$$

Φθάνομεν ὁμῶς εἰς τὸ αὐτὸ ἐξαγόμενον.

Προκύπτει τὸ ἐξῆς ἐρώτημα: Εἰς τὸ αὐτὸ ἐξαγόμενον φθάνομεν, καθ' οἵανδήποτε τάξιν φαντασθῶμεν ὅτι ἐκτελοῦμεν τὸν πολλαπλασιασμὸν τῶν ἰδίων παραγόντων;

Αὕτη ἀκριβῶς εἶναι ἡ θεμελιώδης ιδιότης τοῦ πολλαπλασιασμοῦ, ὅτι:

«Καθ' οἵανδήποτε τάξιν καὶ ἂν ἐκτελέσωμεν τὸν πολλαπλασιασμὸν, εἰς τὸ αὐτὸ ἐξαγόμενον φθάνομεν».

Πρὶν ἢ φθάσωμεν ὁμῶς εἰς τὸ γενικὸν αὐτὸ συμπέρασμα θὰ ἀποδείξωμεν τὸ ἀληθές τῆς ιδιότητος ταύτης εἰς μερικὰς περιπτώσεις.

41. — Ἐστω τὸ γινόμενον  $5 \times 2$ . Κατὰ τὸν ὀρισμὸν τοῦ πολλαπλασιασμοῦ ἔχομεν νὰ ὑπολογίσωμεν τὸ ἄθροισμα  $5 + 5$ . Τοῦτο δὲ κατὰ τὸν ὀρισμὸν τῆς προσθέσεως σημαίνει νὰ ἐνώσωμεν τὰς μονάδας τοῦ ἐξῆς πίνακος:

$$\begin{array}{ccccc} \underline{1} & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1. \end{array}$$

ἀλλ' ὁ αὐτὸς ἀριθμὸς προκύπτει, ἐὰν ἐνώσωμεν πρῶτον τὰς μονάδας τῆς πρώτης στήλης, ἔπειτα τὰς τῆς δευτέρας κ. ο. κ. καὶ κατόπιν ἀθροίσωμεν τοὺς οὕτω προκύπτοντας ἀριθμούς, ἧτοι ἐὰν ζητήσωμεν τὸ ἄθροισμα  $2 + 2 + 2 + 2 + 2$ . Τοῦτο ὁμῶς ἰσοῦται μὲ  $2 \times 5$ . ἄρα:

Ἐὰν εἰς γινόμενον δύο παραγόντων ὁ πολλαπλασιαστέος γίνῃ πολλαπλασιαστής καὶ ὁ πολλαπλασιαστής πολλαπλασιαστέος, δὲν ἀλλάσσει τὸ ἐξαγόμενον.

42. — Ἐστω ἤδη τὸ γινόμενον

$$8 \times 3 \times 2.$$

ὡς εἶναι γεγραμμένον σημαίνει εἰς τὸν ἐξῆς πίνακα

$$8 + 8 + 8$$

$$8 + 8 + 8$$

νὰ προσθέσωμεν πρῶτον τὰ 8 τῆς πρώτης γραμμῆς καὶ ἔπειτα τὰ τῆς δευτέρας, καὶ νὰ προσθέσωμεν τὰ μερικὰ ἀθροίσματα. Ἄλλὰ προφανῶς εἰς τὸ αὐτὸ ἐξαγόμενον φθάνομεν, ἐὰν προσθέσωμεν τὰ 8 κατὰ στήλας, ἥτοι ἐὰν ὑπολογίσωμεν τὸ γινόμενον

$$8 \times 2 \times 3. \quad \text{Ἔθεν:}$$

Εἰς γινόμενον τριῶν παραγόντων δυνάμεθα νὰ ἀντιστρέψωμεν τὴν τάξιν τῶν δύο τελευταίων.

43. — Ἐστω τὸ γινόμενον

$$6 \times 5 \times 9 \times 3 \times 7 \times 8 \times 2.$$

θὰ δείξω ὅτι τοῦτο ἰσοῦται πρὸς τὸ γινόμενον

$$6 \times 5 \times 9 \times 7 \times 3 \times 8 \times 2.$$

Ἐπειδὴ κατὰ τὸν ὀρισμὸν (§ 39) τὸ πρῶτον ἰσοῦται πρὸς

$$(6 \times 5 \times 9 \times 3 \times 7) \times 8 \times 2,$$

τὸ δὲ δεύτερον πρὸς

$$(6 \times 5 \times 9 \times 7 \times 3) \times 8 \times 2,$$

ἀρκεῖ νὰ δείξωμεν ὅτι:

$$6 \times 5 \times 9 \times 3 \times 7 = 6 \times 5 \times 9 \times 7 \times 3.$$

Ἄλλὰ τὸ πρῶτον μέλος ἰσοῦται πρὸς

$$(6 \times 5 \times 9) \times 3 \times 7 \text{ καὶ τὸ δεύτερον ἰσοῦται πρὸς}$$

$$(6 \times 5 \times 9) \times 7 \times 3 \text{ (§ 39). Ταῦτα ὅμως εἶναι ἴσα (§ 42). ἄρα:}$$

Ἐὰν ἀνταλλάξωμεν δύο ἐφεξῆς παράγοντας γινόμενον ὁσωνδήποτε παραγόντων, δὲν ἀλλάσσει τὸ ἐξαγόμενον.

44. — Ἐστω ἤδη τὸ τυχὸν γινόμενον

$$\alpha \times \beta \times \gamma \times \delta \times \epsilon \times \zeta \times \eta.$$

Ἄς λάβω τὸν τυχόντα παράγοντα  $\delta$ . Ἔνυμαι νὰ τὸν φέρω εἰς

οίανδήποτε προηγουμένην θέσιν, π. χ. εἰς τὴν δευτέραν, διότι (§ 43)

$$\begin{aligned} \alpha \times \beta \times \gamma \times \delta \times \epsilon \times \zeta \times \eta &= \alpha \times \beta \times \delta \times \gamma \times \epsilon \times \zeta \times \eta = \\ &= \alpha \times \delta \times \beta \times \gamma \times \epsilon \times \zeta \times \eta. \end{aligned}$$

45. — Καὶ γενικῶς δυνάμεθα εἶλον τοὺς παράγοντας νὰ φέρωμεν εἰς ἄς θέσεις θέλομεν π. χ. τὸ γινόμενον

$$\alpha \times \beta \times \gamma \times \delta \times \epsilon \times \zeta$$

γράφεται καὶ

$$\delta \times \beta \times \zeta \times \gamma \times \alpha \times \epsilon \text{ διότι:}$$

$$\alpha \times \beta \times \gamma \times \delta \times \epsilon \times \zeta = \delta \times \alpha \times \beta \times \gamma \times \epsilon \times \zeta. \quad (\S 44)$$

καὶ τοῦτο πάλιν ἰσοῦται πρὸς

$$\begin{aligned} \delta \times \beta \times \alpha \times \gamma \times \epsilon \times \zeta &= \delta \times \beta \times \zeta \times \alpha \times \gamma \times \epsilon = \\ &= \delta \times \beta \times \zeta \times \gamma \times \alpha \times \epsilon. \end{aligned}$$

\* Ἄρα: «ἐὰν ἀλλάξωμεν τὴν τάξιν ὁποσδήποτε τῶν παραγόντων οἰονδήποτε γινόμενον, τὸ ἐξαγόμενον δὲν ἀλλάσσει».

Ἡ ἰδιότης αὕτη λέγεται εἴτε ἀδιαφορία ὡς πρὸς τὴν τάξιν τῶν παραγόντων εἴτε ἰδιότης τῆς ἀντιμεταθέσεως, ὅπως ὠνομάσθη καὶ ἡ ἀνάλογος εἰς τὴν πρόσθεσιν. Ἐχομεν δὲ καὶ ἐνταῦθα τὰς ἐξῆς ὅλως ἀναλόγους πρὸς τὰς ἐκεῖ ἰδιότητας :

46. — α΄.) Εἰς πᾶν γινόμενον δύναμαι ν' ἀντικαταστήσω ὁσοσδήποτε παράγοντας διὰ τοῦ εὐρεθέντος γινόμενου αὐτῶν.

β΄.) Εἰς πᾶν γινόμενον δύναμαι νὰ ἀντικαταστήσω οἰονδήποτε παράγοντα δι' ἄλλων ἀριθμῶν ἐχόντων αὐτὸν ὡς γινόμενον.

γ΄.) Πολλαπλασιάζεται γινόμενον ἐπὶ ἀριθμὸν, καὶ ἐὰν πολλαπλασιασθῇ εἰς τῶν παραγόντων τοῦ γινόμενου ἐπὶ τὸν ἀριθμὸν π. χ.

$$(3 \times 5 \times 7) \times 2 = 3 \times 10 \times 7.$$

δ΄.) Πολλαπλασιάζονται δύο γινόμενα, καὶ ἐὰν πολλαπλασιασθῶσιν ὁμοῦ πάντες οἱ παράγοντες ἀμφοτέρων τῶν γινόμενων π. χ.

$$(2 \times 3) \times (5 \times 7 \times 9) = 2 \times 3 \times 5 \times 7 \times 9.$$

**Ἐπιμεριστικὴ ιδιότης.**

Πῶς πολλαπλασιάζεται ἄθροισμα ἐπὶ ἀριθμὸν ;

47. — Ἐστω :

$$(7 + 4 + 5) \times 3$$

Κατὰ τὸν ὀρισμὸν τοῦ πολλαπλασιασμοῦ ἔχομεν :

$$(7 + 4 + 5) + (7 + 4 + 5) + (7 + 4 + 5)$$

ἢ καὶ (§ 28) δ'.

$$7 + 4 + 5 + 7 + 4 + 5 + 7 + 4 + 5$$

ἢ (§ 28 α')  $(7 + 7 + 7) + (4 + 4 + 4) + (5 + 5 + 5) =$

$$= (7 \times 3) + (4 \times 3) + (5 \times 3) \quad \delta\theta\epsilon\nu :$$

« Πολλαπλασιάζεται ἄθροισμα ἐπὶ ἀριθμὸν καὶ ὡς ἐξῆς: πολλαπλασιάζομεν ἕκαστον τῶν προσθετέων τοῦ ἀθροίσματος ἐπὶ τὸν ἀριθμὸν καὶ προσθέτομεν τὰ μερικὰ γινόμενα ».

Ἐκ τῆς ἀνωτέρω ιδιότητος, ἣτις καλεῖται ἐπιμεριστικὴ, ἔπονται αἱ ἐξῆς :

α'.) Πολλαπλασιάζεται ἀριθμὸς ἐπὶ ἄθροισμα καὶ ὡς ἐξῆς :

Πολλαπλασιάζομεν αὐτὸν ἐφ' ἕκαστον τῶν προσθετέων καὶ προσθέτομεν τὰ μερικὰ γινόμενα

οὕτως :

$$\alpha \times (\beta + \gamma + \delta) = (\alpha \times \beta) + (\alpha \times \gamma) + (\alpha \times \delta).$$

β'.) Πολλαπλασιάζεται ἄθροισμα ἐπὶ ἄθροισμα καὶ ὡς ἐξῆς :

Πολλαπλασιάζομεν ἕκαστον προσθετέον τοῦ πρώτου ἐφ' ἕκαστον προσθετέον τοῦ δευτέρου καὶ προσθέτομεν τὰ μερικὰ ταῦτα γινόμενα.

Οὕτως :  $(\alpha + \beta + \gamma) \times (\delta + \varepsilon) =$

$$= (\alpha \times \delta) + (\beta \times \delta) + (\gamma \times \delta) + (\alpha \times \varepsilon) + (\beta \times \varepsilon) + (\gamma \times \varepsilon).$$

**Ἀσκήσεις.**

29) Νὰ ἐκτελεσθῇ κατὰ διαφόρους τρόπους ὁ πολλαπλασιασμός :

$$5 \times 8 \times 3.$$

30) Νὰ γραφῶσιν ὡς ἀθροίσματα γινομένων τὰ γινόμενα

$$\alpha \cdot (\beta + \gamma) \cdot \delta$$

$$(\alpha_1 + \alpha_2) \cdot (\alpha_3 + \alpha_4) \cdot (\alpha_5 + \alpha_6)$$

ἔσου τὰ  $\alpha_1, \alpha_2, \dots$  δηλοῦσι διαφόρους ἀριθμούς.

31.) Νὰ γραφῶσιν ὡς γινόμενα δύο παραγόντων τὰ ἀθροίσματα:

$$(\alpha \times \delta) + (\beta \times \delta) + (\gamma \times \delta), (\alpha + \beta) \times \lambda + (\beta + \gamma) \times \lambda + (\gamma + \alpha) \times \lambda.$$

32.) Πόσον μεταβάλλεται τὸ γινόμενον  $\alpha \times \beta \times \gamma$ , ἔταν προστεθῶσιν εἰς μὲν τὸν  $\alpha$  μία μονάς, εἰς δὲ τὸν  $\beta$  δύο;

33.) Ἐὰν σχηματίσω ἐξ διψηφίους ἀριθμούς λαμβάνων ἐκ τριῶν διαφόρων ψηφίων τὰ δύο, καθ' ἕνα τοὺς δυνατοὺς τρόπους, καὶ προσθέσω αὐτούς, θὰ εὔρω ὅσον καὶ ἂν ἐπολλαπλασιάζω τὸ ἀθροισμα τῶν τριῶν ψηφίων ἐπὶ 22. Γενίκευσις (εἰς ἐξ ἀριθμούς τριψηφίους μὲ τρία διάφορα ψηφία).

34.) Ἐὰν διπλασιάσωμεν τὸ πρῶτον ψηφίον ἀριθμοῦ τριψηφίου καὶ προσθέσωμεν 5 εἰς τὸ ἐξυχόμενον, τὸ δὲ ἀθροισμα τοῦτο πολλαπλασιάσωμεν ἐπὶ 5 καὶ εἰς τὸ γινόμενον προσθέσωμεν τὸ δεύτερον ψηφίον, ἔπειτα δὲ πολλαπλασιάσωμεν ἐπὶ 10 καὶ προσθέσωμεν εἰς τὸ γινόμενον τὸ τρίτον ψηφίον, ἀφαιρέσωμεν δὲ ἀπὸ τοῦ ἐξαγομένου τὸν 250, εὔρισκομεν τὸν ἀρχικῶς δοθέντα τριψήφιον.

35) Ἐὰν

$$\alpha > \beta,$$

τότε καὶ

$$\alpha \times \gamma > \beta \times \gamma.$$

**Ἐφαρμογὴ τῶν ἰδιοτήτων τούτων εἰς τὴν ἐκτέλεσιν τοῦ πολλαπλασιασμοῦ.**

48.— Παρατηροῦμεν κατ' ἀρχάς, ὅτι ὁ πολλαπλασιασμὸς μονοψηφίου ἐπὶ μονοψηφίου γίνεται εὐκόλως. Ἐπειδὴ ὅμως πᾶς πολλαπλασιασμὸς θὰ ἀναχθῆ εἰς τοιοῦτον πολλαπλασιασμόν, πρέπει νὰ γνωρίζωμεν ἀπὸ μνήμης ὅλα τὰ γινόμενα δύο μονοψηφίων.

Ταῦτα περιέχονται εἰς τὸν Πυθαγόρειον πίνακα

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	4	6	8	10	12	14	16	18
3	6	9	12	15	18	21	24	27
4	8	12	16	20	24	28	32	36
5	10	15	20	25	30	35	40	45
6	12	18	24	30	36	42	48	54
7	14	21	28	35	42	49	56	63
8	16	24	32	40	48	56	64	72
9	18	27	36	45	54	63	72	81

δοῦ, ἵνα εὐρωμεν π. χ. τὸ γινόμενον  $5 \times 9$ , ζητοῦμεν τὸν ἀριθμὸν ὅστις εὐρίσκεται εἰς τὴν πέμπτην γραμμὴν καὶ εἰς τὴν ἐνάτην στήλην ἢ καὶ ἀντιστρόφως.

*Πολλαπλασιασμός πολυψηφίου ἐπὶ μονοψηφίου.*

49. — Ἐστω ὅτι ζητεῖται τὸ γινόμενον  $256 \times 7$ . Παρατηρῶ ὅτι ἔχομεν (§ 47)

$$(200 + 50 + 6) \times 7 = (200 \times 7) + (50 \times 7) + (6 \times 7)$$

καὶ τοῦτο (§ 46) ἰσοῦται πρὸς

$$\begin{aligned} & (2 \times 100 \times 7) + (5 \times 10 \times 7) + (6 \times 7) = \\ & 2 \times 7 \text{ ἑκατοντάδες} + (5 \times 7) \text{ δεκάδες} + 6 \times 7 = \\ & (2 \times 7) \text{ ἑκ.} + (5 \times 7) \text{ δεκ.} + 42 = \\ & (2 \times 7) \text{ ἑκ.} + (5 \times 7) \text{ δεκ.} + 4 \text{ δεκ.} + 2 = \\ & (2 \times 7) \text{ ἑκ.} + 39 \text{ δεκ.} + 2 = \\ & (2 \times 7) \text{ ἑκ.} + 3 \text{ ἑκ.} + 9 \text{ δεκ.} + 2 = 1792. \end{aligned}$$

Ἡ πράξις αὕτη διατάσσεται ὡς ἑξῆς :

$$\begin{array}{r} 256 \\ \cdot 7 \\ \hline 1792 \end{array}$$

Προφανῶς δὲ καταλήγομεν εἰς τὸν ἑξῆς κανόνα :

Πολλαπλασιάζομεν διαδοχικῶς ἕκαστον ψηφίον τοῦ πολλαπλασιαστέου ἐπὶ τὸν πολλαπλασιαστὴν ἀρχόμενοι ἐκ δεξιῶν· ἂν τὸ γινόμενον εἶναι διψήφιον, κρατοῦμεν τὰς δεκάδας του διὰ τὸ ἐπόμενο γινόμενον, ὅπως εἰς τὴν πρόσθεσιν.

50.— Πολλαπλασιασμός ἐπὶ 10, 100, 1000 κ.τ.λ., — Ἀξέριαιος πολλαπλασιάζεται ἐπὶ 10, 100, 1000 κ.τ.λ., ἐὰν γράψωμεν εἰς τὰ δεξιά αὐτοῦ ἓν, δύο, τρία, ... μηδενικά.

Πολλαπλασιασμός πολυψηφίου ἐπὶ πολυψηφίου.

51.— Ἐστω τὸ γινόμενον  $98574 \times 236$  γράφομεν αὐτὸ ὡς ἑξῆς :

$$\begin{array}{r} 98574 \\ \cdot 236 \\ \hline \end{array}$$

Κατὰ τὴν § 47 ἔχομεν νὰ προσθέσωμεν τὰ ἑξῆς τρία μερικὰ γινόμενα :

$$\begin{array}{r} 98574 \times 6 = 591444 = 591444 \text{ μον.} \\ 98574 \times 30 = 2957220 = 295722 \text{ δεκ.} \\ 98574 \times 200 = 19714800 = 197148 \text{ ἑκατ.} \end{array} \left. \begin{array}{l} \\ \\ \\ \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{Διάταξις} \\ \text{τῆς} \\ \text{πράξεως} \end{array}$$

$$\hline 23263464$$

Ὅθεν ὁ κανὼν : Γράφομεν τὸν πολλαπλασιαστὴν ὑπὸ τὸν πολλαπλασιαστέον, πολλαπλασιάζομεν τὸν πολλαπλασιαστέον ἐφ' ἕκαστον ψηφίον τοῦ πολλαπλασιαστοῦ ἀρχόμενοι ἐκ δεξιῶν, γράφομεν δὲ ἕκαστον μερικὸν γινόμενον, οὕτως ὥστε τὸ τελευταῖον ψηφίον του νὰ κεῖται ὑπὸ τὸ ψηφίον ἐφ' ὃ ἐπολλαπλασιάσαμεν καὶ προσθέτομεν τὰῦτα ὡς ἐγράφησαν.

52.— Παρατήρησις. Ἐὰν ὁ εἰς ἢ καὶ ἀμφότεροι οἱ παράγοντες λήγωσιν εἰς μηδενικά, πολλαπλασιάζομεν χωρὶς αὐτὰ, τὰ γράφωμεν ὁμοίως εἰς τὸ τέλος τοῦ ὑπολογισθέντος γινομένου.

Π. χ.  $3850 \times 4500 = (385 \times 45) 000 = 17325000.$



## Βάσανος τοῦ πολλαπλασιασμοῦ.

53. — Ἡ βάσανος τοῦ πολλαπλασιασμοῦ γίνεται, ἐὰν ἐκτελέσωμεν τὸν πολλαπλασιασμὸν ἐκ νέου, ἀλλὰ κατ' ἄλλην τάξιν, ἐπότε (§ 45) πρέπει νὰ εὕρωμεν τὸ αὐτὸ ἐξαγόμενον.

## Ἀσκήσεις.

36). Νὰ ἐκφρασθῶσι δι' ἰσοτήτων γενικῶς αἱ ἰδιότητες (§ 46 α'. β'. γ'. δ').

37). Ὁ πολλαπλασιασμὸς δύο διψηφίων ἐχόντων τὸ αὐτὸ ψηφίον δεκάδων γίνεται καὶ ὡς ἐξῆς : Προσθέτομεν τὰς μονάδας τοῦ ἑνὸς εἰς τὸν ἄλλον καὶ τὸ ἄθροισμα πολλαπλασιάζομεν ἐπὶ τὸν ἀριθμὸν ὃν σχηματίζουσιν αἱ δεκάδες ἑνὸς ἐξ αὐτῶν καὶ προσθέτομεν τὸ γινόμενον τῶν μονάδων.

38). Πῶς εὐρίσκεται τὸ γινόμενον ἀριθμοῦ ἐπὶ 11 δι' ἀπλῆς προσθέσεως ;

39). Πῶς εὐρίσκεται τὸ γινόμενον ἀριθμοῦ ἐπὶ 1001 δι' ἀπλῆς προσθέσεως ;

40). Νὰ εὐρεθῆ τὸ τελευταῖον ψηφίον τοῦ γινομένου

$$37 \times 59 \times 62 \times 2594.$$

41).  $1007 \times 1008 = (1000 \times 1000) + (1000 \times 15) + (7 \times 8).$

42). Τὸ γινόμενον δύο ἀριθμῶν θὰ ἔχη τόσα ψηφία, ὅσα ἔχουν καὶ οἱ δύο ἑαυτοῦ ἢ ἓν ὀλιγώτερον.

43). Κατὰ τὴν ἐκτέλεσιν τοῦ πολλαπλασιασμοῦ τοῦ 756 ἐπὶ ἀριθμὸν τινὰ εὐρέθη ὡς γινόμενον 20412· ἐλήφθη ὁμοῦ ὡς τελευταῖον ψηφίον τοῦ πολλαπλασιαστοῦ τὸ 7 ἀντὶ τοῦ 9· πόσον τὸ λάθος ;

44). Τὰ τρία τελευταῖα πρὸς τὰ δεξιὰ ψηφία γινομένου εἶναι 652 καὶ τὰ τρία τελευταῖα ψηφία τοῦ πολλαπλασιαστοῦ εἶναι 257. Νὰ εὐρεθῶσι τὰ τρία τελευταῖα ψηφία τοῦ πολλαπλασιαστοῦ.

45). Νὰ εὐρεθῆ τὸ πλῆθος τῶν ψηφίων τοῦ μικροτέρου τῶν

ἀριθμῶν τοὺς ὁποίους δυνάμεθα νὰ σχηματίσωμεν πολλαπλασιαζόντες 10 πενταψηφίους.

46)

$$\begin{array}{r} \dots \\ 2 \\ \hline 1468 \end{array}$$

Μὲ ποῖα ψηφία πρέπει νὰ ἀντικαταστήσω τὰς στιγμὰς εἰς τὸν σημειωθέντα πολλαπλασιασμόν ;

### Πολλαπλασιασμὸς διαφορᾶς ἐπὶ ἀριθμὸν.

54. — Ἐστω τὸ γινόμενον

$$(8-5) \times 3$$

τοῦτο ἰσοῦται πρὸς τὸ ἄθροισμα

$$(8-5) + (8-5) + (8-5).$$

Ἄς προσθέσωμεν εἰς αὐτὸ τὸ ἄθροισμα

$$5 + 5 + 5,$$

ὁπότε (§ 28 δ' α'.) λαμβάνομεν τὸ ἄθροισμα

$$[(8-5)+5] + [(8-5)+5] + [(8-5)+5] = 8+8+8$$

ὥστε :

$$(8-5) \times 3 + (5 \times 3) = 8 \times 3$$

καὶ κατὰ τὸν ὅρισμόν (§ 32) ἔχομεν

$$(8-5) \times 3 = (8 \times 3) - (5 \times 3) \quad \text{ἔθεν :}$$

Ἴνα πολλαπλασιάσωμεν διαφορὰν ἐπὶ ἀριθμὸν, ἀρκεῖ νὰ πολλαπλασιάσωμεν μειωτέον καὶ ἀφαιρετέον τῆς διαφορᾶς ἐπὶ τὸν ἀριθμὸν τοῦτον καὶ ἀπὸ τοῦ πρώτου γινομένου νὰ ἀφαιρέσωμεν τὸ δεύτερον. Ἦτοι :

$$(a - \beta) \times \gamma = a \times \gamma - \beta \times \gamma.$$

### Ἀσκήσεις.

47). Πῶς ἐκτελεῖται ὁ πολλαπλασιασμὸς συντόμως, ὅταν ὁ πολλαπλασιαστὴς εἶναι 9 ἢ 99 ἢ 999 κ.τ.λ.;

48). Πόσον ἐλαττωταὶ ἐν γινόμενον, ὅταν εἰς τῶν παραγόντων τοῦ ἐλαττωθῆ κατὰ μονάδας τινὰς καὶ ποῖον παράγοντα πρέπει νὰ ἐλαττώσωμεν, ὥστε νὰ ἔχωμεν τὴν μεγίστην μείωσιν ;

49.) Διατί τὸ γινόμενον  $12345679 \times 9$  δίδει 111111111;

50.) Νὰ ἀναπτυχθῆ τὸ γινόμενον  $(\alpha + \beta) \times (\gamma - \delta)$ .

51.) Νὰ εὐρεθῆ τὸ γινόμενον  $7694 \times 5999$  διὰ πολλαπλασιασμοῦ ἐπὶ ἓν ψηφίον μόνον.

52.) Πῶς μεταβάλλεται γινόμενον δύο παραγόντων, ὅταν αὐξήσωμεν τὸν ἓνα καὶ ἐλαττώσωμεν τὸν ἕτερον κατὰ τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν;

53.) Νὰ χωρισθῆ ὁ ἀριθμὸς 214 εἰς δύο ἀριθμοὺς τοιούτους, ὥστε τὸ γινόμενον αὐτῶν νὰ εἶναι ὅσῳ τὸ δυνατὸν μεγαλύτερον.

Δύναται τις εὐκόλῳ ν' ἀποδείξῃ ὅτι τοιοῦτον γινόμενον θὰ εἶναι τὸ  $107 \times 107$  στηριζόμενος ἐπὶ τῶν ἀσκήσεων 52, 48.

## ΔΙΑΙΡΕΣΙΣ

55.—Δίδεται τὸ γινόμενον δύο ἀριθμῶν καὶ ὁ πολλαπλασιαστέος. Ζητεῖται δὲ ὁ πολλαπλασιασστής. Ἦτοι:

Δίδεται τὸ ἄθροισμα ἴσων προσθετέων καὶ εἷς ἐξ αὐτῶν, ζητεῖται δὲ τὸ πλῆθος τῶν προσθετέων.

π.χ. πόσα 7 ἀθροιζόμενα δίδουσι 35; Προφανῶς τόσα, ὅσας φορές χωρεῖ ὁ 7 εἰς τὸν 35, δηλαδὴ 5 φορές.

56.—Δίδεται τὸ γινόμενον δύο ἀριθμῶν καὶ ὁ πολλαπλασιαστής, ζητεῖται δὲ ὁ πολλαπλασιαστέος. Ἦτοι:

Δίδεται τὸ ἄθροισμα τῶν ἴσων προσθετέων καὶ ὁ ἀριθμὸς τῶν προσθετέων καὶ ζητεῖται ὁ ἐπαναλαμβανόμενος προσθετέος ἦτοι ἀπὸ πόσας μονάδας ἀποτελεῖται ἕκαστος τῶν ἴσων μερῶν, τουτέστι τὸ μερίδιον; Π. χ. 35 δραχμαὶ νὰ μερισθῶσιν εἰς 7 ἴσα μέρη· ἔχομεν 7 ἴσους προσθετέους καὶ ἄθροισμα 35· ζητοῦμεν δὲ τὸν ἐπαναλαμβανόμενον προσθετέον.

57.—Καὶ τὰ δύο ἀνωτέρω ζητήματα λύονται διὰ διαιρέσεως. Ὡστε:

Ἡ διαίρεσις εἶναι πράξις σκοπὸν ἔχουσα, ὅταν δίδεται τὸ γινόμενον δύο ἀριθμῶν καὶ ὁ εἷς ἐξ αὐτῶν, νὰ εὐρίσκηται ὁ ἕτερος.

Τὸ γινόμενον εἰς τὴν περίπτωσιν ταύτην καλοῦμεν *διαιρετέον* καὶ τὸν δεδομένον παράγοντα *διαιρέτην*, τὸ δὲ ζητούμενον *πηλίκον*.

Σημεῖον διαίρεσεως εἶνε τό: ἀπαγγελλόμενον διὰ

π. χ.  $12 : 4 = 3$  διότι  $3 \times 4 = 12$ .

### Ὅρισμοὶ ἀτελοῦς διαίρεσεως.

58. — Δίδονται δύο ἀριθμοί, π.χ. οἱ 38 καὶ 7· ζητῶ ἀκέραιον ὅστις πολλαπλασιαζόμενος ἐπὶ 7 νὰ δίδῃ 38. Ἐὰν ὑπῆρχε τοιοῦτος, θὰ ἔλεγον αὐτὸν *πηλίκον* τῆς διαίρεσεως. Τοιοῦτος ἐνταῦθα δὲν ὑπάρχει. Ζητῶ ἀκέραιον ὅστις πολλαπλασιαζόμενος ἐπὶ 7 νὰ δίδῃ 37· ἐπίσης δὲν ὑπάρχει· ἔπειτα 36· καὶ πάλιν δὲν ὑπάρχει· τέλος 35· τοιοῦτος δ' ὑπάρχει καὶ εἶναι ὁ 5· ὥστε, ὅταν τὸν 38 ἐλαττώσω κατὰ τρεῖς μονάδας, εὐρίσκω τὸν 5, ὅστις πολλαπλασιαζόμενος ἐπὶ 7 δίδει τὸν 38—3. Ἡ πρᾶξις αὕτη λέγεται *διαίρεσις*· ὁ 5 λέγεται *πηλίκον* τῆς διαίρεσεως  $38 : 7$  καὶ ὁ 3 *ὑπόλοιπον*. Ἦτοι ὁ 7 χωρεῖ 5 φορές εἰς τὸ 38 καὶ εἰς τὸ 37 καὶ εἰς τὸ 36 καὶ εἰς τὸ 35. Πηλίκον τουτέστιν εἶναι τὸ αὐτό, οἷον· δῆποτε ἐξ αὐτῶν καὶ ἂν λάβωμεν ὡς *διαιρετέον*. Ὑπόλοιπα ἔχομεν *διάφορα*.

Καὶ ἀντιστρόφως ἠδυνάμην νὰ ἐργασθῶ· δηλαδή ἀπὸ τοῦ 38 ν' ἀφαιρέσω τὸ 7 καὶ ἀπὸ τοῦ ὑπολοίπου 31 πάλιν τὸ 7 κ. ο. κ. εὐρίσκω πάλιν ὅτι χωρεῖ 5 φορές καὶ περισσεύουν 3· ἦτοι:

$$38 = 7 \times 5 + 3.$$

Καὶ γενικῶς· ἐὰν ἔχω τὴν *ισότητα*

$$(1) \quad \alpha = \beta \times \pi + \upsilon,$$

ὅπου  $\upsilon$  μικρότερον τοῦ  $\beta$ , λέγω ὅτι τὸ  $\alpha$ :  $\beta$  δίδει *πηλίκον*  $\pi$  καὶ *ὑπόλοιπον*  $\upsilon$ . Τουτέστι:

*Διαίρεσις* εἶναι ἡ πρᾶξις ἐν ἣ ἰσοθέτων δύο ἀκεραίων  $\alpha$  καὶ  $\beta$  εὐρίσκομεν δύο ἀριθμοὺς  $\pi$  καὶ  $\upsilon$  τοιούτους, ὥστε νὰ ἔχωμεν τὴν *ισότητα* (1), ὅπου  $\upsilon$  νὰ εἶναι εἰς ἕκ τῶν ἀριθμῶν 0, 1, 2, ..., ( $\beta - 1$ )

Ἐὰν τὸ ὑπόλοιπον  $υ=0$ , ἐπαναπίπτομεν εἰς τὴν τελείαν διαίρεσιν.

Προφανῶς δυνάμεθα νὰ δώσωμεν καὶ τὸν ἐξῆς ὄρισμόν :

59. — Διαίρεσις εἶναι ἡ πράξις ἐν ἣ δίδονται δύο ἀριθμοὶ  $\alpha$  καὶ  $\beta$  καὶ ζητεῖται ὁ μεγαλύτερος ἀκέραιος ὅστις πολλαπλασιαζόμενος ἐπὶ  $\beta$  δίδει ἀριθμὸν χωροῦντα εἰς τὸν  $\alpha$ .

π. χ.  $59 : 8$ · ὁ μεγαλύτερος ἀκέραιος ὅστις πολλαπλασιαζόμενος ἐπὶ 8 δίδει ἀριθμὸν χωροῦντα εἰς τὸν 59 εἶναι ὁ 7, διότι  $7 \times 8 = 56$ · ἀλλὰ  $8 \times 8 = 64$ .

### Ἀσκήσεις.

54). Ἐὰν καλέσωμεν πηλίκον εἰς τὴν διαίρεσιν  $59 : 8$  τὸν 8, τότε πρέπει νὰ ἀφαιρῆται τὸ ὑπόλοιπον ἀπὸ τοῦ γινομένου τοῦ διαιρέτου ἐπὶ τὸ πηλίκον, ἵνα εὑρίσκωμεν τὸν διαιρετέον. Ποῖον καλοῦμεν ὑπόλοιπον; Νὰ εὑρεθῇ τὸ ἄθροισμα τοῦ ὑπολοίπου τούτου καὶ τοῦ πραγματικοῦ ὑπολοίπου. Γενίκευσις.

55). Πότε τὸ πηλίκον διαιρέσεως δὲν βλάπτεται, ἐὰν προστεθῇ μία μονὰς εἰς τὸν διαιρετέον; Καὶ γενικῶς πόσαι μονάδες τοῦλάχιστον πρέπει νὰ προστεθῶσιν εἰς τὸν διαιρετέον, διὰ νὰ ἀλλάξῃ τὸ πηλίκον;

56). Ἴσοι διαιρούμενοι δι' ἴσων δίδουσι πηλίκα ἴσα, τῶν διαιρέσεων γινομένων ἀκριβῶς.

57). Ἐστω ὅτι οἱ  $\alpha$  καὶ  $\beta$  διαιροῦνται ἀκριβῶς διὰ τοῦ  $\gamma$ · τότε

$$\text{ἐὰν } \alpha > \beta$$

ἢ ἔχωμεν καὶ

$$\alpha : \gamma > \beta : \gamma.$$

### Ἰδιότητες διαιρέσεως.

Πῶς διαιρεῖται ἄθροισμα δι' ἀριθμοῦ;

60. — Ἐστω ἡ διαίρεσις

$$(\alpha + \beta + \gamma) : \delta,$$

ἔπου ὑποθέτομεν ὅτι πάντες οἱ προσθετέοι τοῦ διαιρετέου διαι-

ροῦνται ἀκριβῶς ὑπὸ τοῦ δ· παρατηροῦμεν ὅτι, ἐὰν τὸ ἀθροί-  
σμα τῶν πηλίκων

$$(\alpha : \delta) + (\beta : \delta) + (\gamma : \delta)$$

πολλαπλασιάσω ἐπὶ δ, εὐρίσκω (§ 47)

$$\alpha + \beta + \gamma \quad \text{ἐθεν}$$

$$(\alpha + \beta + \gamma) : \delta = (\alpha : \delta) + (\beta : \delta) + (\gamma : \delta) \quad \text{ἄρα}$$

Ἐπιπλάσιον διαιρεῖται δι' ἀριθμοῦ, καὶ ἐὰν διαιρεθῇ ἕκαστος  
προσθετός διὰ τοῦ ἀριθμοῦ καὶ προσθεθῶσι τὰ πηλίκα, ὅταν  
πᾶσαι αἱ διαιρέσεις γίνονται ἀκριβῶς.

Πῶς διαιρεῖται διαφορὰ δι' ἀριθμοῦ ;

61. — Ἐστω ἡ διαίρεσις

$$(\alpha - \beta) : \gamma$$

παρατηροῦμεν ὅτι (§ 54)

$$[(\alpha : \gamma) - (\beta : \gamma)] \times \gamma = \alpha - \beta \quad \text{ἄρα}$$

$$(\alpha - \beta) : \gamma = (\alpha : \gamma) - (\beta : \gamma) \quad \text{ἐθεν}$$

Διαφορὰ διαιρεῖται δι' ἀριθμοῦ, καὶ ἐὰν μειωτέος καὶ ἀφαι-  
ρετέος διαιρεθῶσι διὰ τοῦ ἀριθμοῦ καὶ ἀφαιρεθῇ ἀπὸ τοῦ πρώ-  
του πηλίκου τὸ δεύτερον.

Πῶς διαιρεῖται γινόμενον δι' ἀριθμοῦ ;

62. — Ἐστω ἡ διαίρεσις

$$(\alpha \times \beta \times \gamma) : \delta,$$

ὅπου ὑποθέτω ὅτι παράγων τις τοῦ διαιρετέου, ἔστω ὁ β, διαιρεῖ-  
ται διὰ δ· παρατηροῦμεν ὅτι (§ 46 γ'.)

$$[\alpha \times (\beta : \delta) \times \gamma] \times \delta = \alpha \times [(\beta : \delta) \times \delta] \times \gamma = \alpha \times \beta \times \gamma$$

ἐθεν

$$(\alpha \times \beta \times \gamma) : \delta = \alpha \times (\beta : \delta) \times \gamma \quad \text{ἄρα}$$

Γινόμενον διαιρεῖται δι' ἀριθμοῦ, καὶ ἐὰν εἷς παράγων (διαι-  
ρούμενος ἀκριβῶς διὰ τοῦ ἀριθμοῦ) διαιρεθῇ δι' αὐτοῦ.

Ἐντεῦθεν ἐπεταί καὶ ὅτι, ἵνα διαιρέσωμεν δι' ἑνὸς τῶν παρα-  
γόντων τοῦ ἐν γινόμενον, ἀρκεῖ νὰ ἐξαλείψωμεν τὸν παράγοντα  
τοῦτον.

Πῶς διαιρεῖται ἀριθμὸς διὰ γινομένου;

63. — Ἐστω

$$60 : (2 \times 3 \times 5),$$

ἔσου ἢ διαιρέσεις γίνεται ἀκριβῶς· καλέσωμεν π τὸ πηλίκον· ἔχομεν (§ 57)

$$60 = 2 \times 3 \times 5 \times \pi.$$

Διαιροῦμεν ἀμφότερα τὰ μέλη διὰ 2· λαμβάνομεν (§ 62)

$$60 : 2 = 3 \times 5 \times \pi.$$

Διαιροῦμεν διὰ 3 καὶ λαμβάνομεν

$$(60 : 2) : 3 = 5 \times \pi.$$

Τέλος διαιροῦμεν διὰ 5 καὶ λαμβάνομεν

$$[(60 : 2) : 3] : 5 = \pi. \quad \text{ἢ καὶ}$$

$$60 : (2 \times 3 \times 5) = [(60 : 2) : 3] : 5.$$

Καὶ γενικῶς·

$$\alpha : (\beta \times \gamma \times \delta) = [(\alpha : \beta) : \gamma] : \delta. \quad \text{ἦτοι}$$

Ἄριθμὸς διαιρεῖται διὰ γινομένου, καὶ ἐὰν διαιρεθῇ ἀλλεπαλλήλως διὰ πάντων τῶν παραγόντων τοῦ γινομένου (ὑποτιθεμένου ὅτι αἱ διαιρέσεις γίνονται πᾶσαι ἀκριβῶς).

Ὅταν πολλαπλασιάσωμεν διαιρετέον καὶ διαιρέτην ἐπὶ τὴν αὐτὸν ἀριθμὸν, τί γίνεται τὸ πηλίκον καὶ τί τὸ ὑπόλοιπον;

64. — Ἐστω π τὸ πηλίκον καὶ υ τὸ ὑπόλοιπον τῆς διαιρέσεως  $\alpha : \beta$ · ἔχομεν (§ 58)

$$\alpha = \beta \times \pi + \upsilon$$

ἔθεν (§ 47)·

$$\alpha \times \rho = (\beta \times \pi) \times \rho + \upsilon \times \rho \quad \text{ἦ (§ 46γ'.)}$$

$$\alpha \times \rho = (\beta \times \rho) \times \pi + \upsilon \times \rho$$

Παρατηροῦμεν δὲ ὅτι, ἐπειδὴ  $\upsilon < \beta$  (§ 58), ἔχομεν

$$\upsilon \times \rho < \beta \times \rho.$$

Ἐπομένως, ἐὰν λάβωμεν διαιρετέον τὸν  $\alpha \times \rho$  καὶ διαιρέτην τὸν  $\beta \times \rho$ , πηλίκον θὰ ἔχωμεν, ὡς ἢ ἀνωτέρω ἰσότης δεικνύει, τὸ π καὶ ὑπόλοιπον τὸ  $\upsilon \times \rho$ · ἄρα·

Ἐὰν πολλαπλασιάσωμεν διαιρετέον καὶ διαιρέτην ἐπὶ τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν, τὸ πηλίκον μὲν δὲν ἀλλάσσει, τὸ ὑπόλοιπον ὁμῶς πολλαπλασιάζεται ἐπὶ τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν.

Π. χ. ἐκ τοῦ ὅτι ἡ διαίρεσις  $9 : 2$  δίδει πηλίκον 4 καὶ ὑπόλοιπον 1, ἐξάγομεν ὅτι ἡ διαίρεσις  $90 : 20$  δίδει πηλίκον 4 καὶ ὑπόλοιπον 10. Ἐπιτεταί ἐντεῦθεν ὅτι:

Ἐὰν διαιρετέος καὶ διαιρέτης λήγῃσιν εἰς 0, τὸ ὑπόλοιπον θὰ λήγῃ εἰς 0.

Ἔχομεν ἐπίσης ὅτι:

Ἐὰν εἰς τελείαν διαίρεσιν πολλαπλασιάσωμεν διαιρετέον καὶ διαιρέτην ἐπὶ τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν, θὰ προκύψῃ πάλιν διαίρεσις τελεία.

### Ἀσκήσεις.

58.) Πότε δὲν βλάπτεται τὸ πηλίκον, ἐὰν εἰς τὸν διαιρέτην προσθέσω μίαν μονάδα, πότε δύο κ. ο. κ. ;

59.) Πότε δὲν βλάπτεται τὸ πηλίκον, ἐὰν ἀφαιρέσω ἀπὸ τοῦ διαιρέτου μίαν μονάδα ἢ δύο ἢ τρεῖς κλπ. ;

60.) Εἰς πᾶσαν διαίρεσιν ὁ διαιρετέος εἶναι μεγαλύτερος τοῦ διπλασίου τοῦ ὑπολοίπου.

Ἄρκει νὰ παρατηρήσωμεν ὅτι οὔτε ἴσος πρὸς τὸ διπλάσιον τοῦ ὑπολοίπου δύναται νὰ εἶναι ὁ διαιρετέος οὔτε μικρότερος.

61.) Εἰς τὸν διαιρετέον καὶ διαιρέτην μιᾶς διαίρεσεως προσθέτω τὸν αὐτὸν ἀκέραιον. Νὰ εὐρεθῶσι περιπτώσεις καθ' ἃς τὸ πηλίκον δὲν ἀλλάσσει.

62.) Τὸ γινόμενον δύο ἀριθμῶν αὐξανόμενον κατὰ 10 γίνεται 7486· ἐὰν ὁ εἰς ἐξ αὐτῶν εἶναι 356, τίς ὁ ἕτερος ;

63.) Πολλαπλασιάζομεν ἀριθμὸν τινα κατ' ἀρχὰς ἐπὶ 6 καὶ ἔπειτα ἐπὶ 9· τὰ δύο γινόμενα ὑπερβαίνουσιν ἕτερον ἀριθμὸν, τὸ μὲν πρῶτον κατὰ 18 μονάδας, τὸ δὲ δεῦτερον κατὰ 30. Ποῖον ἀριθμὸν ἐπολλαπλασιάσαμεν ;

64.) Ζητεῖται ἀριθμὸς τοῦ ὁποῦ τὸ τετραπλάσιον ὑπερβαίνει τὸν 12 κατὰ τέσας μονάδας, ὅσας ὁ 12 ὑπερβαίνει τὸ διπλάσιον τοῦ ζητουμένου.



65.) Ἀντηλλάγησαν δελτάρια μεταξὺ μαθητῶν τῆς α' καὶ β' τάξεως. Εἰς μαθητῆς τῆς α' τάξεως ἔστειλεν ἀνὰ ἓν δελτάριον εἰς 8 μαθητὰς τῆς δευτέρας· ἐπίσης δεύτερος τῆς πρώτης εἰς 9 τῆς δευτέρας· τρίτος τῆς πρώτης εἰς 10 τῆς δευτέρας κ. ο. κ. καὶ ὁ τελευταῖος εἰς ὅλους τῆς δευτέρας. Πόσοι ἦσαν οἱ μαθηταὶ ἐκάστης τάξεως, γνωστοῦ ὄντος ὅτι οἱ μαθηταὶ καὶ τῶν δύο τάξεων ἐν ὅλῳ ἦσαν 73 ;

66.) Διατὶ δὲν ὑπάρχει τριψήφιος ὅστις διαιρούμενος δι' ἄλλου νὰ δίδῃ πηλίκον 65 καὶ ὑπόλοιπον 41;

Ἄρκει νὰ παρατηρήσωμεν ὅτι ὁ διαιρέτης θὰ εἶναι μεγαλύτερος τοῦ 41.

### Ἐφαρμογὴ τῶν ἰδιοτήτων τούτων εἰς τὴν ἐκτέλεσιν τῆς διαιρέσεως.

65. — Πλήθος τῶν ψηφίων τοῦ πηλίκου. Ἐστω ἡ διαίρεσις  
89543 : 28·

παρατηροῦμεν ὅτι

$$28000 < 89543 < 280000·$$

ἐπομένως τὸ πηλίκον περιέχεται μεταξὺ 1000 καὶ 10000, ἧτοι εἶναι ἀριθμὸς τετραψήφιος· ὅθεν

Ὅσα μηδενικά ἀπαιτεῖται νὰ προσγράψωμεν εἰς τὸν διαιρέτην, ἵνα ὑπερβῶμεν τὸν διαιρετέον, τόσα εἶναι τὰ ψηφία τοῦ πηλίκου.

66. — Ἐστω ἡ διαίρεσις

$$8239 : 54·$$

παρατηροῦμεν ὅτι αἱ διαιρέσεις

$$823 : 5$$

$$\text{καὶ } 8230 : 50$$

δίδουσι τὸ αὐτὸ πηλίκον· ὑπόλοιπον δὲ τῆς δευτέρας διαιρέσεως εἶναι ἢ τὸ 0 ἢ ἀριθμὸς λήγων εἰς 0 (§ 64)· ἵνα ὅμως τὸ πηλίκον τῆς διαιρέσεως 8230 : 50 αὐξηθῇ κατὰ μονάδα, χρειάζεται νὰ προστεθῇ εἰς τὸν διαιρετέον τοῦλάχιστον ἢ διαφορὰ μεταξὺ διαιρέτου καὶ ὑπολοίπου, ἧτις ἐνταῦθα θὰ εἶναι ἢ 50 ἢ 40 ἢ 30 ἢ 20 ἢ 10· ἐπομένως ἡ διαίρεσις

$$8239 : 50$$

δίδει τὸ αὐτὸ πηλίκον μὲ τὴν 823 : 5· ἔθεν ἔπεται ὅτι καὶ ἡ διαίρεσις

$$8239 : 54$$

δὲν δύναται νὰ δίδῃ πηλίκον μεγαλύτερον τῆς διαιρέσεως 823 : 5· ἔθεν·

Ἐὰν εἰς διαίρεσίν τινα ἀπὸ τοῦ διαιρετέου καὶ τοῦ διαιρέτου ἀποκόψωμεν τὸ τελευταῖον ψηφίον, τὸ πηλίκον δὲν ἐλαττοῦται· ὁμοίως ἂν τὰ δύο τελευταῖα, τὰ τρία κ. λ. π.

67. — Εἰς τὴν ἐκτέλεσιν τῆς διαιρέσεως διακρίνομεν τέσσαρας περιπτώσεις.

1η. Διαιρέτης καὶ πηλίκον μονοψήφιοι.

Τότε ἡ διαίρεσις γίνεται ἀπὸ μνήμης· π. χ. διὰ τὴν διαίρεσιν

$$59 : 7$$

ἐκ τοῦ πυθαγορείου πίνακος ἀμέσως ἐνθυμούμεθα ὅτι

$$7 \times 8 = 56, \quad 7 \times 9 = 63$$

ἔθεν πηλίκον εἶναι 8 καὶ ὑπόλοιπον 3·

2α. Διαιρέτης μονοψήφιος καὶ πηλίκον μεγαλύτερον τοῦ 10 ἢ ἴσον πρὸς αὐτό.

Ἐστω ἡ διαίρεσις

$$4396 : 8$$

παρατηροῦμεν ὅτι

$$4396 = 43 \times 100 + 96 =$$

$$(40 + 3) \times 100 + 96 = 40 \times 100 + 3 \times 100 + 9 \times 10 + 6 =$$

$$8 \times (5 \times 100) + 39 \times 10 + 6 =$$

$$8 \times (5 \times 100) + (32 + 7) \times 10 + 6 =$$

$$8 \times (5 \times 100) + 8 \times (4 \times 10) + 7 \times 10 + 6 =$$

$$8 \times (5 \times 100) + 8 \times (4 \times 10) + 76 =$$

$$8 \times (5 \times 100) + 8 \times (4 \times 10) + 8 \times 9 + 4 =$$

$$8 \times (5 \times 100 + 4 \times 10 + 9) + 4 = 8 \times 549 + 4.$$

Διάταξις τῆς πράξεως.

$$\begin{array}{r|l} 4396 & 8 \\ \hline 39 & 549 \\ 76 & \\ 4 & \end{array}$$

3η. Διαιρέτης πολυψήφιος καὶ πηλίκον μονοψήφιον.

Ἐστω ἡ διαίρεσις

$$7396 : 985$$

Κατὰ τὰ προηγούμενα (§ 66) τὸ πηλίκον δὲν δύναται νὰ εἶναι μεγαλύτερον τοῦ πηλίκου τῆς διαιρέσεως  $73 : 9$ , ἤτοι τοῦ 8· δοκιμάζομεν ἂν εἶναι τὸ 8· τούτεστι πολλαπλασιάζομεν ἐπὶ 8 τὸ 985· εὐρίσκομεν 7880, ὅπερ ὑπερβαίνει τὸν 7396· δοκιμάζομεν τὸ 7· εὐρίσκομεν 6895· ἀφαιροῦμεν ἀπὸ τοῦ διαιρετέου καὶ ἔχομεν ὑπόλοιπον 501.

Διάταξις πράξεως.

$$\begin{array}{r|l} 7396 & 985 \\ \hline 6895 & 7 \\ \hline 501 & \end{array}$$

4η. Πηλίκον καὶ διαιρέτης πολυψήφιοι.

Ἐστω ἡ διαίρεσις

$$226238 : 573.$$

Ἐπειδὴ ὁ 2262 διαιρούμενος διὰ 573 δίδει πηλίκον μονοψήφιον, χωρίζω τὸν διαιρετέον ὡς ἑξῆς·

$$2262 \times 100 + 3 \times 10 + 8.$$

εὐρίσκω τὸ ὑπόλοιπον τῆς διαιρέσεως  $2262 : 573$  κατὰ τὰ προηγούμενα καὶ ἔχω

$$2262 = 573 \times 3 + 543. \quad \text{ἔθεν.}$$

$$2262 \times 100 = 573 \times 300 + 543 \times 100.$$

προσθέτοντες καὶ τὸ γινόμενον  $3 \times 10$  ἔχομεν

$$2262 \times 100 + 3 \times 10 = 573 \times 300 + 5433 \times 10.$$

διαιροῦντες ἤδη τὸν 5433 διὰ 573 λαμβάνομεν

$$5433 = 573 \times 9 + 276 \quad \delta\theta\epsilon\nu'$$

$$5433 \times 10 = 573 \times 90 + 2760$$

καὶ ἐπομένως

$$5433 \times 10 + 8 = 573 \times 90 + 2768.$$

Διαιροῦντες ἤδη τὸν 2768 διὰ 573 λαμβάνομεν

$$2768 = 573 \times 4 + 476 \quad \delta\theta\epsilon\nu'$$

$$226238 = 573 \times 300 + 573 \times 90 + 573 \times 4 + 476$$

Ἡ διάταξις τῆς πράξεως γίνεται ὡς ἑξῆς·

$$\begin{array}{r|l} 226238 & 573 \\ 5433 & 394 \\ 2768 & \\ 476 & \end{array}$$

68.—Ἐκ τῶν προηγουμένων συνάγεται ὁ κανὼν·

Πρὸς ἐκτέλεσιν διαιρέσεώς τινος λαμβάνομεν ἀρχόμενοι ἐξ ἀριστερῶν τοῦ διαιρετέου τόσα ψηφία, ὅσα θὰ ἐχρειάζετο, ἵνα τὸ πηλίκον εἶναι μονοψήφιον· διαιροῦμεν τὸν μερικὸν τοῦτον διαιρετέον διὰ τοῦ διαιρέτου, τὸ δὲ εὗρισκόμενον μονοψήφιον πηλίκον πολλαπλασιάζομεν ἐπὶ τὸν διαιρέτην· τὸ γινόμενον τοῦτο ἀφαιροῦμεν ἀπὸ τοῦ ληφθέντος μερικοῦ διαιρετέου· εἰς τὸ ὑπόλοιπον (πρὸς τὰ δεξιὰ) καταβιβάζομεν τὸ πρῶτον ἐκ τῶν παραλειφθέντων ψηφίων τοῦ διαιρετέου· τὸν σχηματιζόμενον ἀριθμὸν θεωροῦμεν ὡς νέον διαιρετέον καὶ ἐργαζόμεθα καθ' ὅμοιον τρόπον, μέχρις οὗ ληφθῶσι καὶ αἱ μονάδες τοῦ ἀρχικοῦ διαιρετέου.

Παρατηρήσεις. 1η) Ἄν εἰς ἐκ τῶν ὡς ἄνω σχηματιζομένων μερικῶν διαιρετέων εἶναι μικρότερος τοῦ διαιρέτου, τότε γράφομεν 0 δεξιὰ τῶν εὐρεθέντων ψηφίων τοῦ πηλίκου, ἵνα διατηρηθῆται ἡ ἀξία των· π. χ.

$$\begin{array}{r|l} 23627 & 58 \\ 427 & 407 \\ 21 & \end{array}$$

2α) Ἐὰν ὁ διαιρέτης εἶναι 10, προφανῶς τὸ πηλίκον θὰ εἶναι ὁ ἀριθμὸς ὄλων τῶν δεκάδων τοῦ διαιρετέου, τὸ δὲ ὑπόλοιπον

ἴσοῦται πρὸς τὸ ψηφίον τῶν μονάδων τοῦ διαιρετέου· ἀνάλογα δυνάμεθα νὰ εἴπωμεν διὰ τὴν διαίρεσιν διὰ 100, 1000 κ. τ. λ. π. χ. εἰς τὴν διαίρεσιν 47588 : 100 ἔχομεν πηλίκον 475 καὶ ὑπόλοιπον 88.

### Βάσανος τῆς διαίρεσεως.

69. — Πολλαπλασιάζομεν τὸν διαιρέτην ἐπὶ τὸ εὑρεθὲν πηλίκον καὶ εἰς τὸ γινόμενον προσθέτομεν τὸ ὑπόλοιπον. Ἐὰν ἐγένετο ἡ πράξις ὀρθῶς, πρέπει νὰ εὔρωμεν (§ 58) τὸν διαιρετέον.

### Ἀσκήσεις.

67.) Νὰ εὑρεθῶσι διαίρεσεις ὅπου ὁ διαιρετέος καὶ ὁ διαιρέτης δὲν ὑπερβαίνουν τὸν 100, πηλίκον δὲ εἶναι ὁ ἀριθμὸς 27 καὶ ὑπόλοιπον 19· ποῖα ἐξ αὐτῶν τῶν διαίρεσεων θὰ ἔχη τὸν μεγαλύτερον διαιρετέον ;

68.) Ἐὰν ὁ διαιρέτης λήγῃ εἰς μηδενικά, παραλείπομεν αὐτὰ ὅπως ἐπίσης καὶ ἰσάριθμα ψηφία ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ διαιρετέου καὶ ἐκτελοῦμεν τὴν διαίρεσιν· εὐρίσκομεν δὲ οὕτω τὸ πηλίκον· Ἐὰν δὲ εὔρωμεν τὸ ὑπόλοιπον προσγράφομεν εἰς τὸ ἤδη εὑρεθὲν ὑπόλοιπον τὰ παραλειφθέντα ψηφία τοῦ διαιρετέου.

69.) Τὰ ψηφία τοῦ πηλίκου εἶναι τόσα, ὅσα ἔχει ὁ διαιρετέος περισσότερα τοῦ διαιρέτου ἢ ἀκόμη ἓν.

70.) Ἐὰν διαίρῃσιν διαιρέτεον καὶ διαιρέτην δι' ἀριθμοῦ ὅστις νὰ διαιρῇ ἀμφοτέρους, τὸ πηλίκον δὲν ἀλλάσσει, τὸ ὑπόλοιπον δὲ διαίρεται διὰ τοῦ αὐτοῦ ἀριθμοῦ.

71.) Πῶς δύναται νὰ συντομευθῇ ἡ διαίρεσις, ἔταν τὰ ψηφία τοῦ διαιρέτου εἶναι πάντα 9 ;

72.) Ἐὰν δύο ἀριθμοὶ  $\alpha$  καὶ  $\beta$  διαιρούμενοι δι' ἄλλου  $\delta$  δίδωσιν ἴσα ὑπόλοιπα, τότε καὶ τὰ γινόμενα  $\rho\alpha$  καὶ  $\rho\beta$  (ὅπου  $\rho$  τυχὸν ἀκέρατος) διαιρούμενα διὰ  $\rho\delta$  δίδουσιν ἴσα ὑπόλοιπα.

73.) Ἐὰν ἀριθμὸς διαιρῇ ἀκριβῶς δύο ἄλλους, θὰ διαιρῇ ἀκριβῶς καὶ τὸ ὑπόλοιπον τῆς διαίρεσεως αὐτῶν.

### Δυνάμεις τῶν ἀκεραίων ἀριθμῶν.

70. — Ὅταν οἱ παράγοντες γινομένου εἶναι πάντες ἴσοι, ὁ πολλαπλασιασμός καλεῖται ὑψώσεις εἰς δύναμιν ἤτοι: ὑψοῦμεν τὸν ἀριθμὸν  $\alpha$  εἰς δύναμιν  $n$  τινά, π. χ. τὴν πέμπτην, ὅταν σχηματίζωμεν γινόμενον 5 παραγόντων ἴσων πρὸς τὸ  $\alpha$ . σημειοῦται δὲ ὡς ἑξῆς  $\alpha^5$ . ὁ  $\alpha$  λέγεται βᾶσις, ὁ 5 ἐκθέτης, τὸ δὲ ἐξαγόμενον δύναμις. π. χ. ὁ 1000 εἶναι τρίτη δύναμις τοῦ 10 ἢ  $10^3 = 1000$ . Ἡ δευτέρα δύναμις ἀριθμοῦ λέγεται καὶ τετράγωνον, ἡ τρίτη λέγεται καὶ κύβος. Καὶ ἐν γένει

Νυοστή δύναμις ἀριθμοῦ λέγεται τὸ γινόμενον  $n$  ἴσων παραγόντων μὲ τὸν ἀριθμὸν τοῦτον.

### Ἰδιότητες τῶν δυνάμεων.

71. — Τὸ γινόμενον δύο δυνάμεων τοῦ αὐτοῦ ἀριθμοῦ πρὸς ποῖαν δύναμιν τοῦ ἀριθμοῦ τούτου ἰσοῦται;

α΄.) Ἐστω τὸ γινόμενον  $\alpha^3 \times \alpha^5$ . παρατηροῦμεν ὅτι κατὰ τὸν ὅρισμὸν (§ 70) ἔχομεν

$$\begin{aligned} \alpha^3 \times \alpha^5 &= (\alpha \times \alpha \times \alpha) \times (\alpha \times \alpha \times \alpha \times \alpha \times \alpha) = \\ &= \alpha \times \alpha \times \alpha \times \alpha \times \alpha \times \alpha \times \alpha \times \alpha \times \alpha \quad (\S 46 \delta') \end{aligned}$$

$$\text{ἢ καὶ} \quad \alpha^3 \times \alpha^5 = \alpha^8 \quad (\S 70)$$

ὁθεν

Τὸ γινόμενον δύο δυνάμεων τοῦ αὐτοῦ ἀριθμοῦ εἶναι δύναμις τοῦ αὐτοῦ ἀριθμοῦ μὲ ἐκθέτην τὸ ἄθροισμα [τῶν ἐκθετῶν].

Ὅμοίως ἔχομεν

$$\alpha^m \times \alpha^n \times \alpha^p = \alpha^{m+n+p}$$

ὅπου οἱ  $m$ ,  $n$  καὶ  $p$  ὑποτίθενται ἀκέραιοι μεγαλύτεροι τῆς μονάδος.

Ἴνα ἡ ἰδιότης αὕτη ἰσχύῃ, καὶ ὅταν ἐκθέτης τοῦ  $\alpha$  εἶναι ἡ μονάς, πρέπει καὶ ἀρκεῖ νὰ θεωρῶμεν ὅτι

$$\alpha^1 = \alpha$$

ὁπότε ἐπιτρέπεται νὰ λέγωμεν ὅτι π. χ.

$$\alpha^5 \times \alpha^1 = \alpha^{5+1} = \alpha^6$$

δι' ὅμοιον λόγον δεχόμεθα ὅτι

$$\alpha^0 = 1,$$

ὁπότε δυνάμεθα νὰ λέγωμεν ὅτι π. χ.

$$\alpha^0 \times \alpha^3 = \alpha^{0+3} = \alpha^3.$$

Κατὰ ταῦτα

$$2^0 = 1, \quad 5^0 = 1, \quad 2^1 = 2, \quad 5^1 = 5.$$

Τὸ πηλίκον δύο δυνάμεων τοῦ αὐτοῦ ἀριθμοῦ πρὸς ποίαν δύναμιν τοῦ ἀριθμοῦ τούτου ἰσοῦται;

β'.) Ἐστω ἡ διαίρεσις

$$\alpha^8 : \alpha^5.$$

παρατηροῦμεν ὅτι

$$\alpha^3 \times \alpha^5 = \alpha^8 \quad \text{ὅθεν}$$

$$\alpha^8 : \alpha^5 = \alpha^3$$

Καὶ γενικῶς

$$\alpha^u : \alpha^v = \alpha^{u-v}.$$

ὅθεν ὁ κανὼν·

Τὸ πηλίκον δύο δυνάμεων τοῦ αὐτοῦ ἀριθμοῦ εἶναι δύναμις τοῦ αὐτοῦ ἀριθμοῦ μὲ ἐκθέτην τὴν διαφορὰν τῶν ἐκθετῶν ( $\mu > \nu$ ).

π. χ.  $2^5 : 2^3 = 2^2 = 4$

$7^{12} : 7^9 = 7^3 = 343$

Πῶς ὑφιοῦται δύναμις εἰς δύναμιν;

γ'.) Ἐστω  $(\alpha^3)^4$ . τοῦτο ἰσοῦται πρὸς

$$\alpha^3 \times \alpha^3 \times \alpha^3 \times \alpha^3 = \alpha^{3+3+3+3} = \alpha^3 \times 4 = \alpha^{12}$$

καὶ γενικῶς

$$(\alpha^u)^v = \alpha^{u \times v}.$$

ὅθεν

Δύναμις ὑφιοῦται εἰς δύναμιν, ἐὰν ἡ βᾶσις ὑψωθῇ εἰς δύναμιν μὲ ἐκθέτην τὸ γινόμενον τῶν ἐκθετῶν.

Πῶς ὑφιοῦται γινόμενον εἰς δύναμιν;

δ'.) Παρατηροῦμεν ὅτι

$$\begin{aligned} (\alpha \times \beta \times \gamma)^2 &= (\alpha \times \beta \times \gamma) \times (\alpha \times \beta \times \gamma) = \\ &= \alpha \times \alpha \times \beta \times \beta \times \gamma \times \gamma = \alpha^2 \times \beta^2 \times \gamma^2 \end{aligned}$$

καὶ γενικῶς

$$(\alpha \times \beta \times \gamma)^v = \alpha^v \times \beta^v \times \gamma^v.$$

ὅθεν

Γινόμενον ὑποῦται εἰς δύναμιν, ἐὰν ὑψωθῆ ἕκαστος τῶν παραγόντων εἰς τὴν δύναμιν ταύτην.

$$\text{Π. χ.} \quad (2 \times 5)^4 = 2^4 \times 5^4$$

Καὶ ἀντιστρόφως·

$$2^7 \times 5^7 = (2 \times 5)^7 = 10^7 \quad 2^v \times 5^v = 10^v.$$

### Ἀσκήσεις.

74.) Εἰς ποῖον ψηφίον λήγει ὁ ἀριθμὸς 2344<sup>83</sup>· εἰς ποῖον ὁ ἀριθμὸς 2356<sup>100</sup> ;

75.) Τὸ ἄθροισμα δύο ἀριθμῶν ἐπὶ τὴν διαφορὰν αὐτῶν ἴσουςται πρὸς τὴν διαφορὰν τῶν τετραγώνων αὐτῶν.

76.) Ἐστω εἰς τὸ ἑπταδικὸν σύστημα (§ 20) ὁ ἀριθμὸς 5326.

Πῶς θὰ γραφῆ εἰς τὸ κοινὸν σύστημα, ἦτοι τὸ δεκαδικόν ;

Παρατηροῦμεν (§ 20) ὅτι

$$5326 = 5 \times 7^3 + 3 \times 7^2 + 2 \times 7 + 6 =$$

$$5 \times 343 + 3 \times 49 + 2 \times 7 + 6 =$$

$$1715 + 147 + 14 + 6 = 1882.$$

Ἀντιστρόφως· ἔστω ὁ ἀριθμὸς 241 τοῦ δεκαδικοῦ· Νὰ τραπῆ εἰς ἀριθμὸν τοῦ πενταδικοῦ.

Παρατηροῦμεν ὅτι

$$241 = 5 \times 48 + 1 = 5 \times (5 \times 9 + 3) + 1 =$$

$$5^2 \times 9 + 5 \times 3 + 1 =$$

$$5^2 \times (5 \times 1 + 4) + 5 \times 3 + 1 =$$

$$5^3 \times 1 + 5^2 \times 4 + 5 \times 3 + 1.$$

Ἐπομένως (§ 21) ὁ ἀριθμὸς 241 τοῦ δεκαδικοῦ γράφεται εἰς τὸ πενταδικὸν ὡς ἐξῆς· 1431.

Οὕτω δ' ἐξάγομεν εὐκόλως κανόνα τροπῆς ἀριθμοῦ συστήματος τινος εἰς τὸ δεκαδικὸν καὶ τὰνάπαλιν.

77.) Νὰ τραπῆ ὁ ἀριθμὸς 324 τοῦ δεκαδικοῦ συστήματος εἰς ἀριθμὸν τοῦ πενταδικοῦ καὶ ἀντιστρόφως ὁ 324 τοῦ πενταδικοῦ νὰ τραπῆ εἰς ἀριθμὸν τοῦ δεκαδικοῦ.

78.) Νὰ τραπῆ

α΄.) ὁ ἀριθμὸς 21011001 τοῦ τριαδικοῦ συστήματος εἰς ἀριθμὸν τοῦ δεκαδικοῦ.

β΄.) Ὁ ἀριθμὸς 3α τοῦ ἑνδεκαδικοῦ (§ 21) νὰ γραφῆ κατὰ τὸ δεκαδικόν.



## ΒΙΒΛΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄.

## ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΣ

72. — Ἐστω δτι ἀριθμός τις  $\alpha$  διαιρεῖται ἀκριβῶς δι' ἄλλου  $\beta$ , ἦτοι ἔστω δτι ὑπάρχει ἀριθμός  $\pi$  ὅστις πολλαπλασιαζόμενος ἐπὶ  $\beta$  δίδει τὸν  $\alpha$ . Τότε ὁ  $\alpha$  λέγεται διαιρετὸς διὰ  $\beta$  ἢ ἀκόμη ὁ  $\alpha$  λέγεται πολλαπλάσιον τοῦ  $\beta$ , διότι σύγκειται ἀπὸ πολλὰ  $\beta$ , ἐνῶ ὁ  $\beta$  λέγεται διαιρέτης τοῦ  $\alpha$  ἢ καὶ ὑποπολλαπλάσιον τοῦ  $\alpha$  ἢ καὶ παράγων αὐτοῦ.

Κατὰ ταῦτα ὁ ἀριθμός 24 εἶναι διαιρετὸς διὰ τῶν ἀριθμῶν 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, ὅπως ἐπίσης εἶναι πολλαπλάσιον αὐτῶν (θεωρουμένου καὶ τοῦ 24 ὡς πολλαπλασίου τοῦ 24).

## Ἄρχαὶ διαιρετότητος.

Ἐὰν ἀριθμός τις διαιρῇ ἄλλους, θὰ διαιρῇ τὸ ἄθροισμα αὐτῶν καὶ διατί ;

73. — Ἐστω δτι δύο ἀριθμοὶ εἶναι πολλαπλάσια ἐνὸς καὶ τοῦ αὐτοῦ ἀριθμοῦ· π. χ. ὁ 78 καὶ ὁ 12 εἶναι πολλαπλάσια τοῦ 6, ἦτοι εἶναι ἀμρότεροι ἄθροίσματα προσθετέων ἴσων τῷ 6· προφανῶς καὶ τὸ ἄθροισμὰ των  $78 + 12$  εἶναι ἐν ἄλλο ἄθροισμα προσθετέων ἴσων τῷ 6 καὶ γενικῶς·

Ἐὰν δύο ἢ πλείοτεροι ἀριθμοὶ εἶναι πολλαπλάσια ἐνὸς ἄλλου, καὶ τὸ ἄθροισμὰ των θὰ εἶναι πολλαπλάσιον τοῦ ἰδίου ἀριθμοῦ ἢ, ὅπερ τὸ αὐτό·

Ἐὰν ἀριθμὸς διαιρῇ ἄλλους, διαιρεῖ καὶ τὸ ἄθροισμα αὐτῶν.

Τοῦτο προέκυπτε καὶ ἀμέσως ἐκ τῆς πρώτης ιδιότητος τῆς διαιρέσεως (§ 60).

74. — Συνάγομεν ἀμέσως ἐκ τοῦ προηγουμένου ὅτι·

Ἐὰν ἀριθμὸς τις β διαιρῆ ἕτερον α, θὰ διαιρῆ καὶ πᾶν πολλαπλάσιον τοῦ α.

Π.χ. ὁ 7 ὡς διαιρῶν τὸν 35 θὰ διαιρῆ καὶ τὸν  $35 \times \rho$ , ὅπου ρ τυχῶν ἀκέραιος.

Ἐὰν ἀριθμὸς τις διαιρῆ δύο ἄλλους, θὰ διαιρῆ καὶ τὴν διαφορὰν αὐτῶν ; καὶ διατί ;

75. — Οἱ ἀριθμοὶ 48 καὶ 32 εἶναι πολλαπλάσια τοῦ 8, ἦτοι

$$48 = 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8,$$

$$32 = 8 + 8 + 8 + 8 \quad \text{ὅθεν}$$

καὶ ἡ διαφορὰ αὐτῶν θὰ εἶναι πολλαπλάσιον τοῦ 8, ἦτοι·

Ἐὰν ἀριθμὸς διαιρῆ δύο ἄλλους, διαιρεῖ καὶ τὴν διαφορὰν αὐτῶν.

Ὅταν λοιπὸν ἔχωμεν

$$\alpha - \beta = \gamma$$

τότε, ἐὰν ὁ δ διαιρῆ τὸν α καὶ τὸν β, θὰ διαιρῆ καὶ τὸν γ. Ἀλλὰ ἡ ἀνωτέρω ἰσότης γράφεται καὶ ὡς ἐξῆς·

$$\alpha = \beta + \gamma \quad (\S 34).$$

Εἶναι λοιπὸν ὁ α ἄθροισμα τῶν ἀριθμῶν β καὶ γ ἐπομένως δυνάμεθα τὴν ἀνωτέρω ἰδιότητα νὰ ἐκφράσωμεν καὶ ὡς ἐξῆς·

Ἐὰν ἀριθμὸς τις διαιρῆ ἄθροισμα δύο ἄλλων καὶ τὸν ἕνα τῶν προσθετέων τοῦ ἀθροίσματος, θὰ διαιρῆ καὶ τὸν ἕτερον προσθετέον.

Π.χ. ὁ 3 διαιρεῖ τὸν 30, ὅστις εἶναι ἄθροισμα τῶν 12 καὶ 18, διαιρεῖ τὸν 12 ἄρα θὰ διαιρῆ καὶ τὸν 18.

Τί γίνεται τὸ ὑπόλοιπον διαιρέσεως, ἐὰν εἰς τὸν διαιρετέον προστεθῆ πολλαπλάσιον τοῦ διαιρέτου ;

76. — Ἐστω ἡ διαίρεσις  $68 : 9$ · ἔχομεν πηλίκον 7 καὶ ὑπόλοιπον 5· ὅθεν (§ 58)

$$68 - 5 = 9 \times 7$$

ἔστω ρ τυχῶν ἀκέραιος· προσθέτοντες εἰς ἀμφότερα τὰ μέλη τῆς ἰσότητος τὸ  $9 \times \rho$  ἔχομεν (§ 24)

$$(68 - 5) + 9 \times \rho = 9 \times 7 + 9 \times \rho$$

ἵνα ἕμως προσθέσωμεν ἀριθμὸν εἰς διαφορὰν, ἀρκεῖ νὰ τὸν προσθέσωμεν εἰς τὸν μειωτέον (§ 34 Παρατ.) ἦτοι·

$$[68 + (9 \times \rho)] - 5 = 9 \times (7 + \rho) \quad (\S 47)$$

ἐπομένως (§ 58) ὁ ἀριθμὸς  $68 + 9 \times \rho$  διαιρούμενος διὰ 9 δίδει πάλιν ὑπόλοιπον 5· ἔθεν·

Ἐὰν προσθέσωμεν εἰς τὸν διαιρετέον πολλαπλάσιον τοῦ διαιρέτου, τὸ ὑπόλοιπον δὲν μεταβάλλεται.

Ἐὰν ἀφαιρέσωμεν ἀπὸ τοῦ διαιρετέου πολλαπλάσιον τοῦ διαιρέτου, τί γίνεται τὸ ὑπόλοιπον;

77. — Κατὰ τὸν αὐτὸν ὡς ἄνω τρόπον ἀποδεικνύεται ὅτι·

Ἐὰν ἀφαιρέσωμεν ἀπὸ τοῦ διαιρετέου πολλαπλάσιον τοῦ διαιρέτου, τὸ ὑπόλοιπον δὲν ἀλλάσσει.

### Ἀσκήσεις.

79.) Ἐὰν ἀριθμὸς διαιρῆ τὸ ἄθροισμα δύο ἄλλων καὶ δὲν διαιρῆ τὸν ἕνα, δὲν θὰ διαιρῆ οὔτε τὸν ἄλλον.

80.) Ἐὰν ἀριθμὸς διαιρῆ τὸ ἄθροισμα  $n$  προσθετέων καὶ τοὺς  $n-1$  προσθετέους χωριστά, θὰ διαιρῆ καὶ τὸν ἀπομένοντα προσθετέον. (§ 28 α'. § 75)

81.) Ἐὰν διαιρέσωμεν δύο ἀριθμοὺς χωριστά διὰ τοῦ αὐτοῦ διαιρέτου καὶ πολλαπλασιάσωμεν τοὺς ἀριθμοὺς, ἀπὸ δὲ τοῦ γινομένου ἀφαιρέσωμεν τὸ γινόμενον τῶν δύο ὑπολοίπων, εὐρίσκομεν πολλαπλάσιον τοῦ διαιρέτου. (§ 58. § 47 β'.)

82.) Τί γίνεται τὸ πηλίκον καὶ τὸ ὑπόλοιπον, ἔταν μόνον τὸν διαιρετέον πολλαπλασιάσωμεν ἐπὶ τινὰ ἀριθμὸν; Εἰς ποίαν περίπτωσιν ὁ νέος διαιρετέος εἶναι διαιρετὸς διὰ τοῦ διαιρέτου;

83.) Νὰ δειχθῆ ὅτι δὲν ὑπάρχει ἀριθμὸς ὅστις διαιρούμενός ἐστὶν διὰ 18 νὰ δίδῃ ὑπόλοιπον 5, διαιρούμενος δὲ διὰ 12 νὰ δίδῃ ὑπόλοιπον 3. (Ἀρκεῖ νὰ παρατηρήσωμεν ὅτι ἀριθμὸς διαιρούμενος διὰ 12 καὶ δίδων ὑπόλοιπον 3 διαιρεῖται διὰ τοῦ 3).

### Χαρακτῆρες διαιρετότητος.

78. — Παρατηροῦμεν ὅτι, ἐὰν ἐνδιαφέρῃ ἡμᾶς μόνον τὸ ὑπόλοιπον μιᾶς διαιρέσεως, ἢ ἀνωτέρω ιδιότης (§ 77) μᾶς ἐπιτρέπει

νά ἀφαιρέσωμεν ἀπὸ τοῦ διαιρετέου πολλαπλάσιον τοῦ διαιρέτου· τοῦτο ἐφαρμόζοντες εὐρίσκομεν χαρακτηριστικὰς ιδιότητες τῶν ὑπολοίπων τῶν διαιρέσεων διὰ διαφόρων ἀριθμῶν π. χ. τοῦ 2, 3, 5 κ. τ. λ.

79. — Διαιρέτης 2.

Ἐστω ἡ διαίρεσις

$$7239 : 2.$$

ἔχομεν

$$7239 = 723 \times 10 + 9 = 723 \times 5 \times 2 + 9 = 2 \times (723 \times 5) + 9.$$

ὁ πρῶτος προσθετέος εἶναι πολλαπλάσιον τοῦ 2 καὶ ἡ ἀφαίρεσις του δὲν μεταβάλλει τὸ ὑπόλοιπον· ἦτοι

Τὸ ὑπόλοιπον τῆς διαιρέσεως ἀριθμοῦ τινος διὰ 2 εἶναι τὸ αὐτὸ μὲ τὸ ὑπόλοιπον τῆς διαιρέσεως τοῦ ψηφίου τῶν μονάδων του διὰ 2· ἔθεν καί·

Ἀριθμὸς τις εἶναι διαιρετὸς διὰ 2, ἐὰν τὸ τελευταῖον αὐτοῦ ψηφίον εἶναι διαιρετὸν διὰ 2· ἦτοι ἐὰν εἶναι 0, 2, 4, 6, 8.

Τοὺς τοιοῦτους ἀριθμοὺς καλοῦμεν ἄρτιους, τοὺς δὲ μὴ διαιρετοὺς διὰ 2 περιττοὺς.

Κατὰ ταῦτα· Πᾶς ἄρτιος ἀριθμὸς δύναται νὰ γραφῆ ὑπὸ τὴν μορφήν  $2n$  καὶ πᾶς περιττὸς ὑπὸ τὴν μορφήν  $2n + 1$ · π. χ.

$$26 = 2 \times 13 \text{ καὶ } 15 = 2 \times 7 + 1.$$

80. — Διαιρέτης 5.

Ὅμοιως σκεπτόμενοι εὐρίσκομεν ὅτι τὸ ὑπόλοιπον τῆς διαιρέσεως ἀριθμοῦ διὰ 5 εἶναι τὸ αὐτὸ μὲ τὸ ὑπόλοιπον τῆς διαιρέσεως τοῦ ψηφίου τῶν μονάδων του διὰ 5· ἔθεν καί·

Ἀριθμὸς τις εἶναι διαιρετὸς διὰ 5, ὅταν λήγῃ εἰς 0 ἢ εἰς 5.

81. — Διαιρέτης 4 ἢ 25.

Ἐστω 68957 διαιρετέος· παρατηροῦμεν ὅτι

$$68957 = 689 \times 100 + 57 = 689 \times 25 \times 4 + 57. \quad \text{ἀρα}$$

Τὸ ὑπόλοιπον τῆς διαιρέσεως ἀριθμοῦ τινος διὰ 4 ἢ 25 εἶναι τὸ αὐτὸ μὲ τὸ ὑπόλοιπον τῆς διαιρέσεως τοῦ ἀριθμοῦ τὸν ὁποῖον ἀποτελοῦσι τὰ δύο τελευταῖα ψηφία του· ἔθεν καί·

Ἄριθμός τις διαιρεῖται διὰ 4 ἢ 25, ὅταν τὰ δύο τελευταῖα ψηφία του σχηματίζωσιν ἀριθμὸν διαιρετὸν διὰ 4 ἢ 25 (καθ' ἣν τάξιν εἶναι γεγραμμένα).

82. — Διαιρέτης 8 ἢ 125.

Εὐρίσκομεν, ὅπως καὶ ἀνωτέρω ὅτι

Τὸ ὑπόλοιπον τῆς διαιρέσεως ἀριθμοῦ τινος διὰ 8 ἢ 125 εἶναι τὸ αὐτὸ μὲ τὸ ὑπόλοιπον τῆς διαιρέσεως τοῦ ἀριθμοῦ, ὃν ἀποτελοῦσι τὰ τρία τελευταῖα ψηφία του· ὅθεν καὶ

Ἄριθμός τις διαιρεῖται διὰ 8 ἢ 125, ὅταν τὰ τρία τελευταῖα ψηφία του σχηματίζωσιν ἀριθμὸν διαιρετὸν διὰ 8 ἢ 125 (καθ' ἣν τάξιν εἶναι γεγραμμένα).

Καὶ γενικῶς ἀριθμός τις διαιρεῖται διὰ  $2^n$  ἢ διὰ  $5^n$ , ὅταν τὰ  $n$  τελευταῖα ψηφία του σχηματίζωσιν ἀριθμὸν διαιρετὸν διὰ  $2^n$  ἢ διὰ  $5^n$ .

83. — Διαιρέτης 9 ἢ 3.

Ἐστω τυχὸν ἀριθμὸς 58737 ὡς διαιρετέος.

$$\begin{aligned} \text{Ἔχομεν: } & 58737 = 50000 + 8000 + 700 + 30 + 7 = \\ & = 5 \times 10000 + 8 \times 1000 + 7 \times 100 + 3 \times 10 + 7 = \\ & 5 \times (9999 + 1) + 8 \times (999 + 1) + 7 \times (99 + 1) + 3 \times (9 + 1) + 7 \\ \text{Ἄλλὰ } & 1 \times 9 = 9, \quad 11 \times 9 = 99, \quad 111 \times 9 = 999, \quad \text{κ. ο. κ. ὅθεν} \\ 58737 & = 5 \times 1111 \times 9 + 5 + 8 \times 111 \times 9 + 8 + 7 \times 11 \times 9 + 7 + \\ & \quad + 3 \times 9 + 3 + 7 = \\ & (5 \times 1111 + 8 \times 111 + 7 \times 11 + 3) \times 9 + (5 + 8 + 7 + 3 + 7) \end{aligned}$$

ἄρα· Τὸ ὑπόλοιπον τῆς διαιρέσεως ἀριθμοῦ τινος διὰ 9 λαμβάνομεν, ἂν διαιρέσωμεν τὸ ἄθροισμα τῶν ψηφίων του.

Ὅθεν καὶ

Ἄριθμός τις εἶναι διαιρετὸς διὰ 9, ἂν τὸ ἄθροισμα τῶν ψηφίων του διαιρῆται διὰ 9 καὶ τότε μόνον.

Ἐπειδὴ δὲ 9 εἶναι πολλαπλάσιον τοῦ 3, ἐπεταὶ ὅτι τὸ ἀνωτέρω ἄθροισμα εἰς τὸ ὅποιον καταλήξαμεν γράφεται καὶ ὡς πολλαπλάσιον τοῦ 3 ἠδὲξημένον κατὰ τὸ ἄθροισμα τῶν ψηφίων του· ἄρα·

Ἄριθμός τις εἶναι διαιρετὸς διὰ 3, ὅταν τὸ ἄθροισμα τῶν ψηφίων του εἶναι διαιρετὸν διὰ 3.

## 84. — Διαιρέτης 11.

Ἐστω ὁ τυχὼν διαιρετέος 5378946· οὗτος γράφεται

$$5000000 + 370000 + 8900 + 46$$

$$= 5 \times 10^6 + 37 \times 10^4 + 89 \times 10^2 + 46.$$

Παρατηροῦμεν ὅτι πᾶσα ἀρτία δύναμις τοῦ 10 εἶναι πολλαπλάσιον τοῦ  $11^2$  ἠδὲξημένον κατὰ μονάδα καὶ τῷ ὄντι

$$10^2 = 100 = 99 + 1 = 9 \times 11 + 1,$$

$$10^4 = 10000 = 9999 + 1 =$$

$$9900 + 99 + 1 = 99 \times 101 + 1 =$$

$$9 \times 11 \times 101 + 1 \text{ κ. ο. κ. ἐπομένως:}$$

[5378946 = πολλαπλάσιον τοῦ 11 + (5 + 37 + 89 + 46)· ὅθεν·

Τὸ ὑπόλοιπον τῆς διαιρέσεως ἀριθμοῦ διὰ 11 ἰσοῦται τῷ ὑπολοίπῳ τῆς διαιρέσεως διὰ 11, τοῦ ἀριθμοῦ, ὃν σχηματίζομεν χωρίζοντες αὐτὸν εἰς διψήφια τμήματα (ἀπὸ τῶν ἀπλῶν μονάδων) καὶ προσθέτοντες αὐτά· ἐπομένως·

Ἀριθμὸς τις διαιρεῖται διὰ 11, ἐὰν διαιρῆται διὰ 11 ὁ ἀριθμὸς, ὃν σχηματίζομεν χωρίζοντες αὐτὸν εἰς διψήφια τμήματα ἀπὸ τῶν ἀπλῶν μονάδων καὶ προσθέτοντες αὐτά.

85. — Διαιρέτης 7. Ἐστω ὁ τυχὼν διαιρετέος 1654. Ἐκάστη δεκάς ἰσοῦται πρὸς 7 + 3· ἐπομένως·

$$1654 = 165 \times 7 + 165 \times 3 + 4.$$

Ἄρα τὸ ὑπόλοιπον τῆς διαιρέσεως ἀριθμοῦ διὰ 7 συμπίπτει μὲ τὸ ὑπόλοιπον τῆς διαιρέσεως διὰ 7 τοῦ ἀριθμοῦ, ὅστις εἶναι ἄθροισμα τοῦ ψηφίου τῶν μονάδων καὶ τοῦ τριπλασίου τοῦ ὅλου ἀριθμοῦ τῶν δεκάδων. Ὅθεν καὶ

Ἀριθμὸς τις εἶναι διαιρετὸς διὰ 7, ἐὰν τὸ ἄθροισμα τοῦ ψηφίου τῶν μονάδων καὶ τοῦ τριπλασίου τοῦ ὅλου ἀριθμοῦ τῶν δεκάδων τοῦ εἶναι διαιρετὸν διὰ 7.

86. — α'. Διαιρέτης 10 ἢ 100. Ἀριθμὸς τις εἶναι διαιρετὸς διὰ 10, ὅταν τελειώσῃ εἰς 0· διὰ 100, ὅταν τελειώσῃ εἰς δύο μηδενικά (§ 98 παρ. 2) κ. ο. κ.

β') Διαιρέτης 6. Ἐὰν ἀριθμὸς τις διαιρῆται διὰ 6, θὰ διαιρῆται καὶ διὰ 2 καὶ διὰ 3· διότι, ἐὰν ἀριθμὸς τις α εἶναι πολλα-

πλάσιον τοῦ 6, ἔχομεν  $\alpha = 6 \times \lambda = 2 \times 3 \times \lambda$ . ἦτοι ὁ  $\alpha$  διαιρεῖται διὰ 2 καὶ διὰ 3.

Ζητήσωμεν ἤδη, ἂν ἀληθεύει τὸ ἀντίστροφον.

Ἐστω ὅτι ἀριθμὸς τις  $\alpha$  διαιρεῖται καὶ διὰ 2 καὶ διὰ 3. Ἀφοῦ διαιρεῖται διὰ 3, γράφεται ὑπὸ τὴν μορφήν  $3 \times \rho = 2 \times \rho + \rho$ . Ἀφοῦ ἔμως καὶ ὁ 2 διαιρεῖ τὸ  $2 \times \rho + \rho$ , διαιρεῖ δὲ ἀφ' ἑτέρου καὶ τὸ  $2 \times \rho$ , ὡς πολλαπλάσιον αὐτοῦ, θὰ διαιρῆ καὶ τὸ  $\rho$  (§ 75). ἦτοι ὁ  $\rho$  θὰ εἶναι ἄρτιος· ἔστω  $\rho = 2 \times \sigma$ . τότε ὁ

$$\alpha = 3 \times \rho = 3 \times 2 \times \sigma = 6 \times \sigma.$$

Ἐθεν ὁ  $\alpha$  εἶναι διαιρετὸς διὰ 6. ἄρα·

Ἴνα ἀριθμὸς τις εἶναι διαιρετὸς διὰ 6, πρέπει καὶ ἀρκεῖ νὰ εἶναι διαιρετὸς διὰ τοῦ 2 καὶ διὰ τοῦ 3.

γ'. Διαιρέτης 12. Ὅμοίως δεικνύεται ὅτι,

Ἴνα ἀριθμὸς τις εἶναι διαιρετὸς διὰ τοῦ 12, πρέπει καὶ ἀρκεῖ νὰ διαιρῆται διὰ τοῦ 3 καὶ διὰ τοῦ 4.

δ'. Διαιρέτης 20. Ὅμοίως ἀποδεικνύεται ὅτι,

Ἴνα ἀριθμὸς τις εἶναι διαιρετὸς διὰ τοῦ 20, πρέπει καὶ ἀρκεῖ νὰ εἶναι διαιρετὸς διὰ τοῦ 4 καὶ διὰ τοῦ 5.

ε'. Καὶ γενικῶς·

Ἴνα ἀριθμὸς τις εἶναι διαιρετὸς διὰ τοῦ γινομένου δύο διαδοχικῶν ἀριθμῶν, πρέπει καὶ ἀρκεῖ νὰ εἶναι διαιρετὸς δι' ἑκατέρου ἐξ αὐτῶν.

Π. γ. Ἐὰν ἀριθμὸς τις διαιρῆται διὰ 7 καὶ 8, θὰ διαιρῆται καὶ διὰ τοῦ 56.

ς'. Διαιρέτης 15. Ἐστω ὅτι ἀριθμὸς τις  $\alpha$  διαιρεῖται δι' ἀμφοτέρων τῶν ἀριθμῶν 3 καὶ 5 Ἀφοῦ διαιρεῖται διὰ 5, γράφεται·

$$\alpha = 5 \times \rho = 3 \times \rho + 2 \times \rho$$

Ὁ 3 ἔμως διαιρεῖ τὸν  $\alpha$ , ὡς ὑπεθέσαμεν, διαιρεῖ ἀφ' ἑτέρου καὶ τὸν  $3 \times \rho$ , ἄρα (§ 75) θὰ διαιρῆ καὶ τὸν  $2 \times \rho$ . ἐπομένως ὁ  $2 \times \rho$  θὰ διαιρῆται ὑπὸ τοῦ 3 (β'). ἦτοι  $2 \times \rho = 3 \times \sigma$ . Ἐθεν διαιρούντες διὰ 2 λαμβάνομεν  $\rho = 3 \times \sigma$ . ἄρα

$$\alpha = 5 \times \rho = 5 \times 3 \times \sigma = 15 \times \sigma \text{ ἔθεν.}$$

Ἴνα ἀριθμὸς τις εἶναι διαιρετὸς διὰ 15, πρέπει καὶ ἀρκεῖ νὰ εἶναι διαιρετὸς διὰ 3 καὶ διὰ 5.

## Ἀσκήσεις.

84) Ἐκ τῶν ἀριθμῶν 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 20, 25, 100, 125 τίνες εἶναι διαιρέται τοῦ ἀριθμοῦ 24876, τίνες τοῦ 68745, τίνες τοῦ 2439360 καὶ τίνες τοῦ 17920;

85) Νὰ εὐρεθῶσι τετραψήφιοι τοιοῦτοι ὥστε, ἐὰν γραφῆ πρὸς τὰ δεξιά αὐτῶν τὸ ψηφίον 5, νὰ σχηματίζεται πενταψήφιος διαιρετὸς διὰ 11.

86) Νὰ εὐρεθῆ ἀριθμὸς ἐπὶ τὸν ὁποῖον ἐὰν πολλαπλασιασθῆ ὁ 12345679 εὐρίσκεται γινόμενον μὲ πάντα τὰ ψηφία ἴσα.

87) Ἐὰν δύο ἀριθμοὶ διαιρεθῶσι διὰ τῆς διαφορᾶς των, δίδουσιν ὑπόλοιπα ἴσα. (§ 77)

88) Ἀριθμὸς τις εἶναι διαιρετὸς διὰ 20, ἐὰν τὸ ψηφίον τῶν μονάδων του εἶναι 0, τὸ δὲ τῶν δεκάδων εἶναι ἢ 0 ἢ ἄρτιος.

89) Ἀριθμὸς τις τοῦ ὁποῖου ἔλα τὰ ψηφία εἶναι 1 τότε μόνον εἶναι διαιρετὸς διὰ 9, ἔταν ὁ ἀριθμὸς τῶν ψηφίων του εἶναι διαιρετὸς διὰ 9. Ἡ αὐτὴ πρότασις ἰσχύει, καὶ ἔταν τὰ ψηφία ἔλα εἶναι 2 ἢ 4 ἢ 5 ἢ 7 ἢ 8.

90) Ἴνα ἀριθμὸς τις εἶναι διαιρετὸς διὰ 11, πρέπει καὶ ἀρκεῖ ἢ διαφορὰ μεταξὺ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν δεκάδων του καὶ τοῦ ψηφίου τῶν μονάδων του νὰ εἶναι πολλαπλάσιον τοῦ 11.

Ἄρκει νὰ παρατηρήσωμεν ὅτι  $10 = 11 - 1$  καὶ νὰ λάβωμεν ὑπ' ὄψιν τὰς προτάσεις (§ 54 § 34 δ').

91) Διακρίνομεν ἂν ἀριθμὸς τις εἶναι διαιρετὸς διὰ 11 καὶ ὡς ἐξῆς: Προσθέτομεν τὰ ψηφία τάξεως περιττῆς (ἀπὸ τῶν ἀπλῶν μονάδων) καὶ τὰ ψηφία τάξεως ἄρτιας ἀπὸ δὲ τοῦ πρώτου ἀθροίσματος (αὐξανόμενον ἐν ἀνάγκῃ κατὰ πολλαπλάσιον τοῦ 11) ἀφαιροῦμεν τὸ δεύτερον. Ἐὰν ἡ διαφορὰ εἶναι 0 ἢ πολλαπλάσιον τοῦ 11, τότε ὁ δοθεὶς ἀριθμὸς εἶναι διαιρετὸς διὰ 11 (§ 84, § 77, § 34).

92) Ἀριθμὸς τις εἶναι διαιρετὸς διὰ 6, ἔταν τὸ ψηφίον τῶν μονάδων του προστιθέμενον εἰς τὸ τετραπλάσιον τοῦ ἀθροίσματος πάντων τῶν λοιπῶν δίδῃ ἄθροισμα διαιρετὸν διὰ 6.

93) Ἐχομεν ἀριθμὸν διαιρετὸν διὰ 12, ἐὰν προσθέτοντες εἰς τὸν ἀριθμὸν τὸν σχηματιζόμενον ἐκ τῶν δύο τελευταίων ψη-



φίων τὸ τετραπλάσιον τοῦ ἀθροίσματος πάντων τῶν λοιπῶν λαμβάνωμεν ἀριθμὸν διαιρετὸν διὰ 12.

Ἡ ἀπόδειξις στηρίζεται εἰς τοῦτο· ὅτι οἱ ἀριθμοὶ 100, 1000, ... διαιρούμενοι διὰ 12 δίδουσιν ὑπόλοιπον 4.

94) Διακρίνομεν ἂν ἀριθμὸς τις εἶναι διαιρετὸς διὰ 15, κατ' ὡς ἐξῆς· προσθέτομεν εἰς τὸν ἀριθμὸν τὸν σχηματιζόμενον ἐκ τῶν δύο τελευταίων ψηφίων (κατὰ τὴν τάξιν αὐτῶν λαμβανομένων) τὸ δεκαπλάσιον τοῦ ἀθροίσματος πάντων τῶν λοιπῶν· ἂν λάβωμεν ἀριθμὸν διαιρετὸν διὰ 15, τότε καὶ ὁ δοθεὶς εἶναι διαιρετὸς διὰ 15.

95.) Νὰ εὑρεθῶσι χαρακτηρὲς διαιρετότητος διὰ τοὺς ἀριθμοὺς 13, 37. (§ 77).

96.) Τὸ γινόμενον δύο διαδοχικῶν ἀριθμῶν διαιρεῖται διὰ 2, τριῶν διαδοχικῶν διὰ 3, τεσσάρων διαδοχικῶν διὰ 4 καὶ γενικῶς  $n$  διαδοχικῶν διὰ  $n$  (διότι εἰς ἕκ τῶν παραγόντων θὰ διαιρῆται δι' αὐτοῦ).

97.) Τὸ γινόμενον τριῶν διαδοχικῶν διαιρεῖται διὰ 6.

98.) Ἐστώσαν οἱ τυχόντες ἀριθμοὶ  $\alpha$  καὶ  $\beta$ · ἂν οὐδεὶς τῶν ἀριθμῶν  $\alpha$  καὶ  $\beta$  διαιρῆται διὰ τοῦ 3, τὸ ἄθροισμα αὐτῶν ἢ ἡ διαφορὰ εἶναι διαιρετὴ διὰ τοῦ 3.

### Βάσανος τοῦ πολλαπλασιασμοῦ καὶ τῆς διαιρέσεως διὰ τοῦ 9.

Τί γίνεται τὸ ὑπόλοιπον διαιρέσεως ἀθροίσματος δι' ἀριθμοῦ, ἂν ἕκαστος προσθετέος ἀντικατασταθῇ διὰ τοῦ ὑπολείπου του ὡς πρὸς τὸν αὐτὸν διαιρέτην ;

87.— Ἐστω ὅτι αἱ διαιρέσεις  $\alpha : \delta$ ,  $\beta : \delta$ ,  $\gamma : \delta$  δίδουσι πηλίκα  $\pi$ ,  $\pi'$ ,  $\pi''$  καὶ ὑπόλοιπα  $\upsilon$ ,  $\upsilon'$ ,  $\upsilon''$ · ἔχομεν (§ 58)

$$\alpha = \delta \times \pi + \upsilon,$$

$$\beta = \delta \times \pi' + \upsilon',$$

$$\gamma = \delta \times \pi'' + \upsilon''.$$

$$\text{ἔθεν·} \quad \alpha + \beta + \gamma = \delta \times (\pi + \pi' + \pi'') + (\upsilon + \upsilon' + \upsilon'')$$

ἔξ οὗ βλέπομεν ὅτι τὸ ἄθροισμα

$$\alpha + \beta + \gamma$$

καὶ τὸ ἄθροισμα

$$\nu + \nu' + \nu''$$

διαφέρουσι κατὰ πολλαπλάσιον τοῦ διαιρέτου καὶ ἐπομένως τὸ ὑπόλοιπον τῆς διαιρέσεως

$$(\alpha + \beta + \gamma) : \delta$$

συμπίπτει μὲ τὸ ὑπόλοιπον τῆς διαιρέσεως

$$(\nu + \nu' + \nu'') : \delta \quad (\S 77)$$

ἄρα· Τὸ ὑπόλοιπον ἄθροίσματος ὡς πρὸς οἰονδήποτε διαιρέτην δὲν βλάπτεται, ἂν αντικαταστήσωμεν ἕκαστον προσθετόν διὰ τοῦ ὑπολοίπου του ὡς πρὸς τὸν αὐτὸν διαιρέτην.

Π. χ. τὸ ἄθροισμα  $15 + 23$  διαιρούμενον διὰ 6 δίδει ὑπόλοιπον ἴσον πρὸς τὸ εὐρισκόμενον ἐκ τῆς διαιρέσεως  $(3 + 5) : 6$ .

ΣΗΜ. Ἡ ἀνωτέρω πρότασις, (ὅπως καὶ ἄλλαι προηγούμεναι) καλεῖται καὶ θεωρήμα, καθόσον ὑπάρχει ἀνάγκη συλλογισμῶν τινῶν, ἵνα γίνῃ φανερὰ ἡ ἀλήθεια αὐτῶν. Οἱ συλλογισμοὶ οὗτοι ἀποτελοῦσι τὴν ἀπόδειξιν τοῦ θεωρήματος.

Τί γίνεται τὸ ὑπόλοιπον διαιρέσεως γινομένου δι' ἀριθμοῦ, ἂν ἕκαστος παράγων αντικατασταθῇ διὰ τοῦ ὑπολοίπου του ὡς πρὸς τὸν αὐτὸν διαιρέτην;

88. — Ἐστω ὅτι αἱ διαιρέσεις  $\alpha : \delta$  καὶ  $\beta : \delta$  δίδουσι πηλίκια  $\pi$  καὶ  $\pi'$ , ὑπόλοιπα δὲ  $\nu$  καὶ  $\nu'$  ἔχομεν·

$$\alpha = \delta \times \pi + \nu \quad \text{καὶ} \quad \beta = \delta \times \pi' + \nu'$$

Ἔθεν·

$$\alpha \times \beta = \delta \times \pi \times \delta \times \pi' + \delta \times \pi \times \nu' + \delta \times \pi' \times \nu + \nu \times \nu'$$

Οἱ τρεῖς πρῶτοι προσθετέοι εἶναι προφανῶς πολλαπλάσια τοῦ  $\delta$ · ἔθεν :

$$\alpha \times \beta = \text{πολλαπλάσιον τοῦ } \delta + (\nu \times \nu')$$

Ἐπομένως (§ 77) οἱ ἀριθμοὶ  $\alpha \times \beta$  καὶ  $\nu \times \nu'$  διαιρούμενοι διὰ  $\delta$  δίδουσι τὸ αὐτὸ ὑπόλοιπον· ἄρα·

Τὸ ὑπόλοιπον γινομένου δύο ἀριθμῶν ὡς πρὸς οἰονδήποτε διαιρέτην δὲν βλέπεται, ἐὰν ἕκαστον παράγοντα ἀντικαταστήσωμεν διὰ τοῦ ὑπολοίπου του ὡς πρὸς τὸν αὐτὸν διαιρέτην· π. χ. τὸ γινόμενον  $394 \times 573$  διαιρούμενον διὰ 9 θὰ δώσῃ ὑπόλοιπον ἴσον πρὸς τὸ διδόμενον ἐν τῇ διαιρέσει

$$(7 \times 6) : 9.$$

89. — Ἐφαρμόζοντες τὰ ἀνωτέρω πρὸς ἐκτέλεσιν δοκιμῆς τοῦ πολλαπλασιασμοῦ φθάνομεν εἰς τὸν ἐξῆς κανόνα·

Ἐὰν λάβωμεν τὰ ὑπόλοιπα τῶν διαιρέσεων διὰ 9 τοῦ πολλαπλασιαστέου, τοῦ πολλαπλασιαστοῦ καὶ τοῦ γινομένου καὶ πολλαπλασιάσωμεν τὰ δύο πρῶτα ὑπόλοιπα καὶ τοῦ γινομένου αὐτοῦ λάβωμεν τὸ ὑπόλοιπον τῆς διαιρέσεως διὰ 9, πρέπει νὰ εὔρωμεν τὸ τρίτον ὑπόλοιπον.

Ἐννοεῖται ὅτι ἡδύνατο νὰ γίνῃ καὶ μὲ ἄλλον διαιρέτην, π. χ. τὸν 11. Προτιμῶμεν ὁμῶς τὸν 9, διότι τὰ ὑπόλοιπα εὐρίσκωμεν εὐκόλως καὶ διότι διὰ τὴν βάσανον μεταχειριζόμεθα ἔλα τὰ ψηφία τῶν παραγόντων καὶ τοῦ γινομένου (§ 83).

Διατάσσομεν τὴν πράξιν καὶ ὡς ἐξῆς·

394	ὑπόλ. 7	7 × 6 = 42, ὑπόλ. 6.
573	ὑπόλ. 6	
1182		
2758		
1970		
Γινόμεν. 225762 ὑπόλ. 6		

Παρατηρητέον ὅτι ἡ δοκιμὴ αὕτη παρέχει μόνον πιθανότητα τοῦ ὅτι ἡ πράξις ἐγένετο ὀρθῶς.

90. — Βάσανος τῆς διαιρέσεως διὰ 9. Ἐὰν ἡ διαίρεσις εἶναι τελεία, πρέπει καὶ τὸ γινόμενον τοῦ διαιρέτου ἐπὶ τὸ πηλίκον νὰ ἴσούται πρὸς τὸν διαιρέτην· ἐπομένως ἐφαρμόζομεν τὰ προηγούμενα· ἐὰν ὁμῶς εὐρίσκωμεν ὑπόλοιπον, πρέπει ἡ διαφορὰ διαιρέτου καὶ ὑπολοίπου νὰ εἶναι γινόμενον τοῦ διαιρέτου ἐπὶ τὸ πηλίκον· ἐπανερχόμεθα τουτέστι πάλιν εἰς τὴν προηγούμενην περίπτωσιν.

## Ἀσκήσεις.

99.) Τὸ ὑπόλοιπον τοῦ γινομένου πολλῶν παραγόντων ὡς πρὸς οἰονδήποτε διαιρέτην δὲν ἀλλάσσει, ἐὰν ἀντικαταστήσωμεν ἕκαστον τῶν παραγόντων διὰ τοῦ ὑπολοίπου τῆς διαιρέσεως αὐτοῦ ὡς πρὸς τὸν αὐτὸν διαιρέτην.

100.) Ποῖον τὸ ὑπόλοιπον τῆς διαιρέσεως διὰ 9 τοῦ ἀριθμοῦ  $73^{15689}$ ; (§ 88).

101.) Διατί ἡ βάσανος τοῦ πολλαπλασιασμοῦ διὰ 9 (§ 89) δὲν μᾶς βεβαιώνει διὰ τὸ ὄρθον τῆς πράξεως;

102.) Ἐὰν  $\alpha$  καὶ  $\beta$  διαιρούμενοι διὰ  $\delta$  δίδωσιν ὑπόλοιπα  $\nu$  καὶ  $\nu'$ , τότε ἡ διαφορὰ  $\alpha - \beta$  διαιρούμενη διὰ  $\delta$  δίδει ὑπόλοιπον ἴσον πρὸς τὴν διαφορὰν  $\nu - \nu'$ , ἐὰν  $\nu > \nu'$ .

103.) Νὰ εὑρεθῇ βάσανος τῆς ἀφαιρέσεως διὰ 9 ἐπὶ τῇ βάσει τῆς προηγουμένης προτάσεως.

104.) Ἐὰν διαιρέσωμεν τὸ γινόμενον δύο διαδοχικῶν ἀριθμῶν διὰ 2 καὶ τὸ πηλίκον διὰ 3, θὰ εὔρωμεν ὑπόλοιπον διαφορον τοῦ 2.

Παρατηροῦμεν ὅτι ἡ  $\delta$  εἰς ἕκ τῶν δύο διαδοχικῶν θὰ διαιρῆται διὰ 3, ἡ  $\delta$  μὲν εἰς διαιρούμενος διὰ 3 θὰ δίδῃ ὑπόλοιπον 1,  $\delta$  δὲ ἄλλος 2.

105.) Νὰ δειχθῇ ἐκ τῆς προτάσεως (§ 88), ὅτι ἡ διαφορὰ  $\alpha^a - \beta^a$  διαιρεῖται διὰ  $\alpha - \beta$ .

Παρατηροῦμεν ὅτι (ἀσκ. 87) αἱ διαιρέσεις

$$\alpha : (\alpha - \beta) \quad \text{καὶ} \quad \beta : (\alpha - \beta)$$

δίδουσιν ἴσα ὑπόλοιπα. (§ 87, § 88)

106.) Ἐὰν ἀριθμὸς τις ὑπερβαίνει κατὰ μονάδα πολλαπλασίον ἄλλου, οἰαδήποτε δύναμις τοῦ πρώτου θὰ εἶναι ἄθροισμα τῆς μονάδος καὶ πολλαπλασίου τινὸς τοῦ δευτέρου (§ 88).

107.) Τὸ ἄθροισμα τῶν τετραγώνων δύο ἀριθμῶν δὲν δύναται νὰ εἶναι διαιρετὸν διὰ 11, ἐὰν ἐκάτερος τῶν ἀριθμῶν τούτων δὲν εἶναι διαιρετὸς διὰ 11, (§ 87, § 88).

108.) Τὸ ἄθροισμα ἀριθμοῦ μὲ ἄρτιον πλήθος ψηφίων καὶ τοῦ διὰ τῶν αὐτῶν ψηφίων κατ' ἀντίστροφον τάξιν γεγραμμένου ἀριθμοῦ εἶναι πάντοτε πολλαπλάσιον τοῦ 11. (Ἐσθ. 91).

109.) Πόσοι τριψήφιοι ἀριθμοὶ λήγοντες εἰς 0 μὲ ψηφία διάφορα σχηματίζονται διαιρετοὶ διὰ 4;

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.

### ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΚΟΙΝΟΣ ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ

91. — Ἔστωσαν οἱ ἀριθμοὶ  
20, 30, 40

Ὁ ἀριθμὸς 2 διαιρεῖ πάντας αὐτοὺς ἀκριβῶς· λέγεται δι' αὐτὸ κοινὸς διαιρέτης τῶν δοθέντων· ὁμοίως κοινὸς διαιρέτης εἶναι καὶ οἱ ἀριθμοὶ 5 καὶ 10· ὁ μεγαλύτερος δὲ τούτων, ὁ 10, λέγεται μέγιστος κοινὸς διαιρέτης αὐτῶν. Καὶ γενικῶς·

Κοινὸς διαιρέτης πολλῶν ἀριθμῶν λέγεται ὁ ἀριθμὸς ὅστις διαιρεῖ πάντας αὐτοὺς ἀκριβῶς. Ὁ μεγαλύτερος δ' ἐκ τῶν κοινῶν διαιρειῶν λέγεται μέγιστος κοινὸς διαιρέτης.

Τὸν κοινὸν διαιρέτην παριστῶμεν διὰ κ. δ., τὸν δὲ μέγιστον κοινὸν διαιρέτην διὰ μ. κ. δ.

92. — Ἔστω ὁ τυχῶν ἀριθμὸς 6· οὗτος θὰ εἶναι διαιρέτης τοῦ ἑαυτοῦ του, ἐπίσης τοῦ διπλασίου του, ἤτοι τοῦ  $2 \times 6 = 12$ , τοῦ τριπλασίου του 18 κ. ο. κ. Ἄν λάβωμεν ὅσουσδήποτε ἐξ αὐτῶν, π. χ. τοὺς 12, 18, 36, οὗτοι θὰ ἔχωσι κοινὸν διαιρέτην τὸν 6. Ἐὰν ὁμοῦ ἐλαμβάνομεν καὶ τὰ πολλαπλάσια τοῦ 2, θὰ εὐρίσκωμεν μεταξὺ αὐτῶν τοὺς

12, 18, 36,

ἤτοι οἱ ἀριθμοὶ 12, 18, 36 ἔχουσι κοινὸν διαιρέτην καὶ τὸν 2· τουτέστι δύο ἢ πλείοτεροι ἀριθμοὶ δυνατὸν νὰ ἔχωσι πολλοὺς κοινοὺς διαιρέτας.

93. — Δύο ἢ περισσότεροι ἀριθμοὶ λέγονται πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους, ἐὰν δὲν ἔχωσιν ἄλλον κοινὸν διαιρέτην πλὴν τῆς μονάδος, ὁπότε λέγομεν ὅτι ἔχουσι μέγιστον κοινὸν διαιρέτην τὴν μονάδα.

Π. χ. οἱ ἀριθμοὶ 7, 10 25 εἶναι πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους

## Ἰδιότητες κοινῶν διαιρετῶν.

Πῶτος εἶναι ὁ μ. κ. δ. ἀριθμῶν ὧν ὁ μικρότερος διαιρεῖ τοὺς λοιπούς ;

94. — Ἐστω ὅτι  $\alpha > \beta > \gamma > \delta$  καὶ ὅτι ὁ δ διαιρεῖ τοὺς  $\alpha, \beta, \gamma$ · τότε ὁ δ εἶναι κ. δ. τῶν ἀριθμῶν

$$\alpha, \beta, \gamma, \delta.$$

Ἄλλος δὲ κοινὸς διαιρέτης μεγαλύτερος τοῦ δ δὲν ὑπάρχει, διότι εἷς ἐκ τῶν δεδομένων ἀριθμῶν εἶναι καὶ ὁ δ ἑθελ.

Ἐὰν ἀριθμοὶ διαιροῦνται διὰ τοῦ ἐλαχίστου ἐξ αὐτῶν, θὰ ἔχωσιν αὐτὸν ὡς μ. κ. δ.

π. χ. οἱ 6, 12, 18, 48 ἔχουσι μ. κ. δ. τὸν 6.

Τί γίνονται οἱ κ. δ. δύο ἀριθμῶν, ἐὰν ἀντικαταστήσωμεν τὸν μεγαλύτερον διὰ τοῦ ὑπολοίπου τῆς διαιρέσεως αὐτοῦ διὰ τοῦ μικροτέρου ;

95. — Ἐστω  $\nu$  τὸ ὑπόλοιπον τῆς διαιρέσεως  $\alpha : \beta$ .

Ἄς θεωρήσωμεν τὸν τυχόντα κ. δ. τῶν ἀριθμῶν

$$\alpha, \beta.$$

Οὗτος ὡς διαιρῶν τὸν διαιρετέον καὶ τὸν διαιρέτην θὰ διαιρῆ καὶ τὸ ὑπόλοιπον τῆς διαιρέσεως αὐτῶν, ἦτοι τὸ  $\nu$  (§ 75)· ἐπομένως θὰ εἶναι κ. δ. καὶ τῶν ἀριθμῶν

$$\nu, \beta.$$

καὶ ἀντιστρόφως ὁ τυχὼν κ. δ. τῶν ἀριθμῶν

$$\nu, \beta$$

θὰ εἶναι προφανῶς καὶ διαιρέτης τοῦ

$$\beta \times \pi + \nu$$

(ἐὰν  $\pi$  καλέσωμεν τὸ πηλίκον), ἦτοι τοῦ  $\alpha$ · ὥστε θὰ εἶναι καὶ κ. δ. τῶν

$$\alpha, \beta.$$

ἄρα

Οἱ κοινοὶ διαιρέται δύο ἀριθμῶν δὲν βλάπτονται, ἐὰν ἀντικαταστήσωμεν τὸν μεγαλύτερον διὰ τοῦ μικροτέρου.

ἔθεν καὶ

Ἐὰν μ. κ. δ. δύο ἀριθμῶν ἐκ τῶν ὁποίων ὁ μικρότερος δὲν διαιρεῖ τὸν μεγαλύτερον δὲν μεταβάλλεται, ἐὰν ἀντικαταστήσωμεν τὸν μεγαλύτερον μὲ τὸ ὑπόλοιπον τῆς διαιρέσεως αὐτοῦ διὰ τοῦ μικροτέρου.

Πῶς γενικεύεται ἡ ἀνωτέρω πρότασις ;

96. — Ἐστω ἡδὴ  $\alpha > \beta > \gamma > \delta$ . ζητῶ τοὺς κοινούς διαιρέτας τῶν ἀριθμῶν τῆς σειρᾶς

$\alpha, \beta, \gamma, \delta$ .

διαιρῶ τοὺς  $\alpha, \beta, \gamma$  διὰ  $\delta$ . ἔστωσαν ὑπόλοιπα τὰ  $\upsilon, \upsilon', \upsilon''$ , σχηματίζω τότε τὴν σειρὰν

$\upsilon, \upsilon', \upsilon'', \delta$ .

Πᾶς κ. δ. τῶν ἀριθμῶν τῆς πρώτης σειρᾶς εἶναι κ. δ. καὶ τῶν ἀριθμῶν τῆς δευτέρας, ὅπως εἶδομεν (§ 95), καὶ ἀντιστρόφως πᾶς κ.δ. τῶν ἀριθμῶν τῆς δευτέρας εἶναι καὶ τῶν τῆς πρώτης. (§ 95, 2) ἔθεν·

Οἱ κοινοὶ διαιρέται ὅσωνδήποτε ἀριθμῶν δὲν βλέπονται, ἐὰν ἀντικαταστήσωμέν τινὰς ἐξ αὐτῶν διὰ τῶν ὑπολοίπων τῆς διαιρέσεως αὐτῶν δι' ἐνὸς ἄλλου ἀριθμοῦ τῆς σειρᾶς μικροτέρου αὐτῶν.

II. χ. οἱ ἀριθμοὶ

96, 44, 20

ἔχουσι τοὺς αὐτοὺς κοινούς διαιρέτας μὲ τοὺς

16, 4, 20.

97. — Ἐὰν μ. κ. δ. πολλῶν ἀριθμῶν δὲν ἀλλάσσει, ὅταν ἀντικαταστήσωμεν μερικοὺς ἐξ αὐτῶν διὰ τοῦ ὑπολοίπου τῆς διαιρέσεως αὐτῶν δι' ἐνὸς ἄλλου (ἐξ αὐτῶν) μικροτέρου των.

### Ἐύρεσις τοῦ μ. κ. δ.

Πῶς εὐρίσκομεν τὸν μ. κ. δ. δύο ἀριθμῶν ;

98. — Ἄς ζητήσωμεν τὸν μ. κ. δ. τῶν ἀριθμῶν 208, 164. Κατὰ τὴν πρότασιν (§ 95) ἀντικαθιστῶμεν τὸν 208 διὰ τοῦ ὑπολοίπου τῆς διαιρέσεως  $208 : 164$ , ἦτοι ἀντὶ τῆς σειρᾶς

208, 164

λαμβάνω τὴν σειρὰν

44, 164.

Διαιρῶ πάλιν τὸ 164 διὰ 44 καὶ ἀντὶ 164 γράφω τὸ ὑπόλοιπον 32 καὶ ἔχω τὴν σειρὰν

44, 32

κ. ο. κ.

Οἱ ἀριθμοὶ ἐκάστης τῶν σειρῶν αὐτῶν ἔχουσι τὸν αὐτὸν μ. κ. δ. (§ 95).

Προχωρῶ, μέχρις οὗ εὕρω σειρὰν εἰς τὴν ὁποίαν ὁ εἰς διαιρεῖ τὸν ἄλλον, διότι τότε αὐτὸς θὰ εἶναι ὁ μ. κ. δ. τῶν ἀριθμῶν τῆς σειρᾶς ταύτης (§ 94).

Ἡ πρᾶξις διατάσσεται ὡς ἑξῆς:

	1	3	1	2	1	2
208	164	44	32	12	8	4
44	32	12	8	4	0	

**Κανὼν.** Πρὸς εὕρεσιν τοῦ μ. κ. δ. δύο ἀριθμῶν διαιροῦμεν τὸν μεγαλύτερον διὰ τοῦ μικροτέρου· ἐὰν εὐρεθῇ ὑπόλοιπον διάφορον τοῦ 0, διαιροῦμεν τὸν μικρότερον διὰ τοῦ ὑπολοίπου τούτου καὶ ἑξακολουθοῦμεν οὕτω διαιροῦντες ἕκαστον διαιρέτην διὰ τοῦ ἀντιστοιχοῦντος πρὸς αὐτὸν ὑπολοίπου, μέχρις οὗ εὕρωμεν ὑπόλοιπον 0· ὁ τελευταῖος διαιρέτης εἶναι ὁ μ. κ. δ.

Πῶς εὕρισκομεν τὸν μ. κ. δ. πολλῶν ἀριθμῶν;

99. — Στηριζόμενοι ἐπὶ τῆς § 97 καὶ σκεπτόμενοι ὡς ἐν τῇ § 98 συνάγομεν τὸν ἑξῆς κανόνα διὰ τὴν εὕρεσιν τοῦ μ. κ. δ. πολλῶν ἀριθμῶν.

Διαιροῦμεν πάντας τοὺς ἄλλους διὰ τοῦ ἐλαχίστου ἐξ αὐτῶν. ἂν ὅλα τὰ ὑπόλοιπα εἶναι 0, ὁ ἐλάχιστος εἶναι ὁ μ. κ. δ., εἰδεμένη, ἀντικαθιστῶμεν τοὺς ἀριθμοὺς ὧν τὰ ὑπόλοιπα δὲν εἶναι 0 ἕκαστον διὰ τοῦ ὑπολοίπου του. Ἔχομεν οὕτω νέαν σειρὰν ἀριθμῶν οἵτινες ἔχουσι τὸν αὐτὸν μ. κ. δ. Εἰς αὐτὴν πράττομεν τὸ αὐτό, μέχρις οὗ εὕρωμεν σειρὰν ἀριθμῶν ὧν ὁ μικρότερος γὰ διαιρῆ πάντας τοὺς ἄλλους· οὗτος θὰ εἶναι ὁ ζητούμενος μ. κ. δ.



Π. χ. μ. κ. δ. τῶν ἀριθμῶν

	5628	2596	352	160	εἶναι δ
μ. κ. δ. τῶν	28	36	32	160	
ἦ τῶν	28	8	4	20	
» »	0	0	4	0	ἦτοι δ 4.

### Ἰδιότητες τοῦ μεγίστου κοινοῦ διαιρέτου.

Τίνες ἐκ τῶν μικροτέρων τοῦ μ. κ. δ. δεδομένων ἀριθμῶν εἶναι κοινοὶ διαιρέται τούτων;

100. — Οἱ ἀριθμοὶ ἐκάστης σειρᾶς ἐκείνων τὰς ὁποίας σχηματίζομεν πρὸς εὐρεσιν τοῦ μ. κ. δ. ἔχουσι τοὺς αὐτοὺς κοινοὺς διαιρέτας· ἐπομένως ὁ τυχὼν κ. δ. τῶν ἀριθμῶν τῆς πρώτης σειρᾶς εἶναι καὶ τῶν ἀριθμῶν τῆς τελευταίας, ὅθεν εἶναι διαιρέτης καὶ τοῦ μ. κ. δ., καὶ ἀντιστρόφως ὁ τυχὼν διαιρέτης τοῦ μ. κ. δ. εἶναι κοινὸς διαιρέτης τῶν ἀριθμῶν τῆς τελευταίας σειρᾶς, ἄρα καὶ τῆς πρώτης· ὅθεν

Κοινοὶ διαιρέται δύο ἢ περισσοτέρων ἀριθμῶν εἶναι μόνον οἱ διαιρέται τοῦ μ. κ. δ. αὐτῶν·

π. χ. εἰς τὸ παράδειγμα τῆς (§ 99) κοινοὶ διαιρέται τῶν ἀριθμῶν.

5628, 2596, 352, 160  
εἶναι μόνον οἱ διαιρέται τοῦ 4, ἦτοι οἱ ἀριθμοὶ  
1, 2, 4.

Ἐὰν δύο ἢ πλείοτεροι ἀριθμοὶ πολλαπλασιασθῶσιν ἐπὶ τινὰ ἀριθμὸν, ποίαν μεταβολὴν πάσχει ὁ μ. κ. δ. αὐτῶν;

101. — Ἔστω

$$(1). \quad \alpha > \beta > \gamma > \dots$$

Πρὸς εὐρεσιν τοῦ μ. κ. δ. τῶν ἀριθμῶν τούτων θὰ σχηματίζομεν (§ 99) ἐκ τῆς σειρᾶς

$$\alpha, \quad \beta, \quad \gamma, \quad \dots$$

ἄλλην σειρὰν ἀριθμῶν, ἔστω τῆν

$$u, \quad u', \quad u'', \quad \dots$$

καὶ ἐκ ταύτης ἄλλην κ. ο. κ. Ἐστω δὲ ὅτι ἡ τελευταία σειρά  
εἶναι

$$0, \quad \mu, \quad 0, \quad 0.$$

τότε ὁ  $\mu$  κατὰ (§ 99) θὰ εἶναι ὁ μ. κ. δ. τῶν  $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ . Ζη-  
τήσωμεν ἤδη τὸν μ.κ.δ. τῶν ἀριθμῶν

$$\alpha \times \rho, \quad \beta \times \rho, \quad \gamma \times \rho, \quad \delta \times \rho.$$

παρατηροῦμεν ὅτι ἐκ τῶν ἀνισοτήτων (1) ἔπονται αἱ ἀνισότητες

$$\alpha \times \rho > \beta \times \rho > \gamma \times \rho > \delta \times \rho. \quad (\text{ἀσκ. 35}).$$

διαιροῦντες λοιπὸν διὰ  $\delta \times \rho$  τοὺς  $\alpha \times \rho, \beta \times \rho, \gamma \times \rho$  πρὸς  
σχηματισμὸν τῆς νέας σειράς θὰ ἔχωμεν τὴν ἐξῆς (§ 64).

$$\alpha \times \rho, \quad \acute{\alpha} \times \rho, \quad \acute{\alpha}' \times \rho, \quad \delta \times \rho,$$

ἦτοι θὰ ἔχωμεν τὴν δευτέραν σειράν ἐνταῦθα, ἐὰν πολλα-  
πλασιάσωμεν ἐπὶ  $\rho$  τοὺς ἀριθμοὺς τῆς δευτέρας σειράς τῆς  
προκυψάσης ἐκ τῶν  $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ . ὁμοίως εὐρίσκομεν τὴν τρίτην  
σειράν, ἐὰν πολλαπλασιάσωμεν ἐπὶ  $\rho$  τοὺς ἀριθμοὺς τῆς ἀντι-  
στοίχου ἀρχικῆς σειράς κ. ο. κ. ὥστε, ἐὰν πολλαπλασιάσωμεν  
ἐπὶ  $\rho$  τὴν τελευταίαν ἀρχικὴν σειράν, ἦτοι τὴν  $0, \mu, 0, 0$ , θὰ  
ἔχωμεν τὴν τελευταίαν σειράν ἐνταῦθα, ἦτοι τὴν

$$0, \quad \mu \times \rho, \quad 0, \quad 0.$$

ἐπομένως μ.κ.δ. τῶν ἀριθμῶν

$$\alpha \times \rho, \quad \beta \times \rho, \quad \gamma \times \rho, \quad \delta \times \rho$$

εἶναι ὁ  $\mu \times \rho$  ὅθεν.

Ἐὰν δύο ἢ περισσότεροι ἀριθμοὶ πολλαπλασιασθῶσιν ἐπὶ ἓνα  
ἀριθμὸν, καὶ ὁ μ.κ.δ. αὐτῶν πολλαπλασιάζεαι ἐπὶ τὸν αὐτὸν  
ἀριθμὸν.

π. χ. ἐκ τοῦ ὅτι ὁ μ.κ.δ. τῶν ἀριθμῶν 75, 125, 625 εἶναι  
ὁ 25 ἐξάγομεν ὅτι

$$\mu.κ.δ. \text{ τῶν } 75000, 125000, 625000 \text{ εἶναι } \delta \text{ } 25000.$$

Ἐὰν δύο ἢ πλείότεροι ἀριθμοὶ διαιρεθῶσι δι' ἐνὸς  
ἀριθμοῦ, ποῖαν μεταβολὴν πάσχει ὁ μ.κ.δ. αὐτῶν;

102. — Ἐστω  $\delta$  κοινός τις διαιρέτης τῶν  $\alpha, \beta, \gamma$ . Καλέσωμεν  
 $\alpha', \beta', \gamma'$  τὰ πηλίκα τῶν διαιρέσεων  $\alpha : \delta, \beta : \delta, \gamma : \delta$ . ἔχομεν

$$\alpha = \alpha' \times \delta, \quad \beta = \beta' \times \delta, \quad \gamma = \gamma' \times \delta.$$

ἔάν ἤδη καλέσωμεν μ' τὸν μ. κ. δ. τῶν

$\alpha', \beta', \gamma'$

καὶ μ τὸν μ. κ. δ. τῶν

$\alpha, \beta, \gamma,$

κατὰ τὴν προηγουμένην πρότασιν θὰ ἔχωμεν  $\mu = \mu' \times \delta$ . ἔθεν

$\mu' = \mu : \delta$ .

ἄρα:

Ἐάν δύο ἢ περισσότεροι ἀριθμοὶ διαιρεθῶσι διὰ τινος κοινοῦ διαιρέτου αὐτῶν, καὶ ὁ μ. κ. δ. διαιρεῖται διὰ τοῦ αὐτοῦ ἀριθμοῦ.

Πολλάκις οὕτως ἐπέρχεται ἀπλοποιήσις εἰς τὴν εὔρεσιν τοῦ μ. κ. δ. Ἵνα εὔρωμεν ἐπὶ παραδείγματι τὸν μ. κ. δ. τῶν ἀριθμῶν

18000(00, 24000000, 12000000,

διαιροῦμεν αὐτοὺς διὰ 1000.000 καὶ εὐρίσκομεν τὸν μ. κ. δ. τῶν ἀριθμῶν

18, 24, 12,

ὅστις εἶναι ὁ 6· ἄρα τῶν δοθέντων εἶναι 6000.000.

Τίνα συμπεράσματα ἐξάγομεν ἐκ τῆς προτάσεως ταύτης;

103. — 1ον). Ἐάν ἀριθμοὶ διαιρεθῶσι διὰ τοῦ μ. κ. δ. αὐτῶν, θὰ δώσωσι πηλίκα πρῶτα πρὸς ἄλληλα.

104. — 2ον). Ἐάν διαιροῦντες ἀριθμοὺς τινὰς διὰ τινος κοινοῦ διαιρέτου αὐτῶν εὔρωμεν πηλίκα πρῶτα πρὸς ἄλληλα, συμπεραίνομεν ὅτι ὁ ληφθεὶς κοινὸς εἶναι καὶ μέγιστος.

ΣΗΜ. Παρατηροῦμεν ὅτι ἡ ὑπόθεσις ἐν τῇ προτάσει (§ 103) εἶναι συμπέρασμα ἐν τῇ προτάσει (§ 104) καὶ ἀντιστρόφως· διὸ αἱ προτάσεις (§ 103) καὶ (§ 104) λέγονται ἀντίστροφοι.

### Ἀσκήσεις.

110). Εὐρεῖν τοὺς κοινὸς διαιρέτας τῶν ἀριθμῶν

360, 164, 280, 96.

111). Εὐρεῖν τοὺς κοινὰς διαιρέτας τῶν ἀριθμῶν

100, 58200, 35000

112). Νὰ εὐρεθῆ ὁ μ. κ. δ. τῶν ἀριθμῶν

$$28 \times 5, 42 \times 10, 63 \times 20.$$

113). Ὁ μ. κ. δ. δύο ἀριθμῶν εἶναι 2, τὰ δὲ πηλίκια τῶν γενομένων διαιρέσεων πρὸς εὐρεσιν αὐτοῦ εἶναι 2, 5, 4, 7· τίνες οἱ δύο οὗτοι ἀριθμοί; (§ 98, § 58)

114). Ὁ μ. κ. δ. δύο ἢ περισσοτέρων ἀριθμῶν δὲν βλάπτεται, ἂν ἀντικαταστήσωμεν δύο ἢ περισσοτέρους ἐξ αὐτῶν διὰ τοῦ μ.κ.δ. αὐτῶν. (§ 100)

115) Ἐὰν ὁ μ. κ. δ. τῶν ἀριθμῶν A, B καὶ ὁ τῶν Γ, Δ πολλαπλασιασθῶσι, τὸ προκύπτον γινόμενον εἶναι μ. κ. δ. τῶν ἀριθμῶν

$$A \times \Gamma, B \times \Gamma, A \times \Delta, B \times \Delta.$$

116). Ὁ μ. κ. δ. δύο ἀριθμῶν α, β εἶναι ὁ αὐτὸς μὲ τὸν μ. κ. δ. τῶν ἀριθμῶν β, β—υ ἔπου υ, εἶναι τὸ ὑπόλοιπον τῆς διαιρέσεως τοῦ α διὰ β. (§ 75)

117) Ἐὰν οἱ ἀριθμοὶ α, β, γ ἔχωσι μ. κ. δ. τὸν Δ, οἱ ἀριθμοὶ β×γ, γ×α, α×β ἔχωσι μ. κ. δ. ἀριθμὸν διαιρετὸν διὰ τοῦ Δ<sup>2</sup>. Πότε ὁ μ. κ. δ. αὐτῶν εἶναι ἀκριβῶς Δ<sup>2</sup>;

Παρατηροῦμεν ὅτι

$$\alpha, \beta = \Delta, \Pi, \gamma = \Delta, \Pi',$$

ἔπου Π, Π', Π'' εἶναι ἀριθμοὶ πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους (§ 103).

118.) Καλέσωμεν Δ, τὸν μ. κ. δ. τῶν ἀριθμῶν α, β, γ, δ. Ἐὰν ὁ δ διαιρῆ τὰ γινόμενα

$$\alpha \times \lambda, \beta \times \lambda, \gamma \times \lambda,$$

τὰ διαιρῆ καὶ τὸ γινόμενον Δ×λ (§ 101).

119) Ἐστω Δ ὁ μ. κ. δ. δύο ἀριθμῶν α καὶ β· τότε ὁ Δ· τὰ εἶναι καὶ μ. κ. δ. τῶν ἀριθμῶν

$$5\alpha + 3\beta \quad 13\alpha + 8\beta$$

Παρατηροῦμεν (§ 74, § 73) ὅτι οἱ κοινοὶ διαιρέται τῶν ἀριθμῶν

$$5\alpha + 3\beta, \quad 13\alpha + 8\beta$$

εἶναι οἱ αὐτοὶ μὲ τοὺς κοινοὺς διαιρέτας τῶν ἀριθμῶν

$$5\alpha + 3\beta, \quad 8\alpha + 5\beta$$

προχωροῦντες οὕτω διὰ διαδοχικῶν ἀφαιρέσεων ἀποδεικνύομεν τὴν πρότασιν.

120.) Ὁ μ. κ. δ. τριῶν ἀριθμῶν

$$\alpha, \beta, \gamma$$

ἰσοῦται πρὸς τὸν μ. κ. δ. τῶν ἀριθμῶν

$$\Delta, \Delta',$$

ἐὰν  $\Delta$  εἶναι ὁ μ. κ. δ. τῶν ἀριθμῶν  $\alpha$  καὶ  $\gamma$  καὶ  $\Delta'$  ὁ μ. κ. δ. τῶν  $\beta$  καὶ  $\gamma$ . (§ 100)

121.) Ὁ μ. κ. δ. δύο ἀριθμῶν  $\alpha$  καὶ  $\beta$  εἶναι καὶ μ. κ. δ. τῶν ἀριθμῶν

$$\alpha + \beta\gamma \quad \text{καὶ} \quad \alpha + \beta(\gamma - 1)$$

Παρατηροῦμεν πρὸς τοῦτο (§ 54 § 34 γ', δ'.) ὅτι, ἐὰν ἀφαιρέσωμεν ἀπὸ τοῦ πρώτου τὸν δεύτερον, εὐρίσκομεν τὸν  $\beta$ .

122.) Ἐστῶσαν τέσσαρες ἀριθμοὶ  $\lambda, \mu, \nu, \rho$  τοιοῦτοι, ὥστε

$$\lambda\nu - \rho\mu = 1.$$

τότε ὁ μ. κ. δ. δύο ἀριθμῶν  $\alpha$  καὶ  $\beta$  εἶναι καὶ μ. κ. δ. τῶν ἀριθμῶν

$$\lambda\alpha + \rho\beta, \quad \mu\alpha + \nu\beta.$$

Παρατηροῦμεν (§ 47, § 34 γ' β' § 54) ὅτι οἱ ἀριθμοὶ

$$(\lambda\alpha + \rho\beta)\nu \quad \text{καὶ} \quad (\mu\alpha + \nu\beta)\rho$$

ἔχουσι διαφορὰν τὸν ἀριθμὸν  $(\lambda\nu - \rho\mu)\alpha = \alpha$  κτλ.

123.) Ἐστῶσαν οἱ πέντε ἀριθμοὶ

$$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$$

καὶ μ. κ. δ. αὐτῶν ὁ  $\Delta$ ; τὸ δὲ ἄθροισμα αὐτῶν  $K$ . οἱ ἀριθμοὶ

$$K - \alpha_1, \quad K - \alpha_2, \quad K - \alpha_3, \quad K - \alpha_4, \quad K - \alpha_5$$

ἔχουσι μ. κ. δ. ἢ τὸν  $\Delta$  ἢ τὸν  $\Delta \times 2$  ἢ τὸν  $\Delta \times 4$ .

Πρὸς ἀπόδειξιν παρατηροῦμεν ὅτι, ἐὰν ἀπὸ τοῦ ἄθροισματος τεσσάρων ἀριθμῶν τῆς δευτέρας σειρᾶς ἀφαιρέσωμεν τὸ τριπλάσιον τοῦ ὑπολειπομένου, εὐρίσκομεν τὸ τετραπλάσιον τοῦ ἀντιστοιχοῦντος πρὸς αὐτὸν ἀριθμοῦ τῆς πρώτης σειρᾶς· συμπεραίνομεν ἐξ αὐτοῦ ὅτι ὁ  $\Delta$  εἶναι κ. δ. τῶν ἀριθμῶν.

$$4 \times \alpha_1, \quad 4 \times \alpha_2, \quad 4 \times \alpha_3, \quad 4 \times \alpha_4, \quad 4 \times \alpha_5.$$

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄.

## ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ ΚΟΙΝΟΝ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΟΝ

105.— Πολλαπλάσια τοῦ 2 εἶναι

οἱ ἀριθμοὶ	2, 2×2, 2×3, 2×4, . . . . .	}	Α
τοῦ 3 εἰ ἀριθμοὶ	3, 3×2, 3×3, 3×4, . . . . .		
τοῦ 4 οἱ ἀριθμοὶ	4, 4×2, 4×3, 4×4, . . . . .		
τοῦ 6 οἱ ἀριθμοὶ	6, 6×2, 6×3, 6×4, . . . . .		

Ζητήσωμεν ἀριθμοὺς κοινούς καὶ εἰς τὰς τέσσαρας σειράς τοιοῦτοι προφανῶς εὐρίσκονται ἀπειροί, π. χ. ὁ ἀριθμὸς

$$2 \times 3 \times 4 \times 6 = 144$$

θὰ εὐρεθῆ εἰς ὅλας ὅπως καὶ πᾶν πολλαπλάσιον αὐτοῦ. Ἐκτὸς ὅμως αὐτῶν καὶ ἄλλος μικρότερος τοῦ 144 εὐρίσκεται ἐν ταῦθα π. χ. ὁ 12, ὅστις ἰσοῦται μὲ  $2 \times 6$ ,  $3 \times 4$ ,  $4 \times 3$ ,  $6 \times 2$ .

Οἱ τοιοῦτοι ἀριθμοὶ ὅπως 144, 12 κ. τ. λ. λέγονται κοινὰ πολλαπλάσια τῶν ἀριθμῶν 2, 3, 4 καὶ 6 ἦτοι

Κοινὸν πολλαπλάσιον ἀριθμῶν λέγεται ἕτερος ἀριθμὸς ὅστις εἶναι διαιρετὸς δι' ἐκάστου ἐξ αὐτῶν.

Τὸ κοινὸν πολλαπλάσιον παρίσταται διὰ κ. π.

106. — Ὅταν εὐρωμεν ἐν κ. π. ἀριθμῶν, εὐρίσκομεν ὁσαδῆποτε ἄλλα, πολλαπλασιάζοντες αὐτὸ ἐπὶ 2, 3, 4, . . . . . Θὰ εἶναι δὲ ταῦτα προφανῶς τὸ ἐν μεγαλύτερον τοῦ ἄλλου, ὥστε δὲν ὑπάρχει μέγιστον.

Ἐλάχιστον κοινὸν πολλαπλάσιον πολλῶν ἀριθμῶν λέγεται τὸ μικρότερον ἐκ τῶν κοινῶν πολλαπλασίων αὐτῶν. Σημειοῦται δὲ διὰ τοῦ ε. κ. π.

## Ἰδιότητες ἐλαχίστου κοινοῦ πολλαπλασίου.

Ποῖον εἶναι τὸ ε. κ. π. ἀριθμῶν ὧν ὁ μεγαλύτερος διαιρεῖται διὰ πάντων τῶν λοιπῶν;

107. — Ἐστῶσαν τυχόντες ἀριθμοὶ α, β, γ, δ τοιοῦτοι, ὥστε ὁ μεγαλύτερος ἐξ αὐτῶν νὰ διαιρῆται ὑπὸ τῶν ἄλλων· τότε οὗτος

θὰ εἶναι κοινὸν πολλαπλάσιον προφανῶς ἄλλων. Ἄλλο κοινὸν πολλαπλάσιον μικρότερον αὐτοῦ δὲν ὑπάρχει, διότι ἀριθμὸς τις δὲν δύναται νὰ ἔχη ὡς πολλαπλάσιον ἀριθμὸν μικρότερόν του ἄρα:

Τὸ ε. κ. π. ἀριθμῶν ὧν ὁ μεγαλύτερος διαιρεῖται διὰ πάντων τῶν λοιπῶν εἶναι αὐτὸς οὗτος.

Π. χ. οἱ ἀριθμοὶ 36, 12, 6, 3 ἔχουσιν ε. κ. π. τὸν 36.

Πῶς εὐρίσκομεν τὸ ε. κ. π. ἀριθμῶν ὧν ὁ μεγαλύτερος δὲν διαιρεῖται δι' ἄλλων τῶν ἄλλων;

108. — Ἄς θεωρήσωμεν π. χ. τοὺς ἐν τῇ (§ 105) δοθέντας ἀριθμοὺς

$$2, 3, 4, 6$$

Τότε θὰ ζητήσωμεν τὸν μικρότερον ἀριθμὸν ἐκ τῶν κοινῶν καὶ εἰς τὰς τέσσαρας σειράς (Α). Ἐστω οὗτος ὁ β'. δηλαδή

$$\beta = 2 \times \lambda = 3 \times \mu = 4 \times \nu = 6 \times \rho$$

Ἐποῦ ἕκαστον τῶν λ, μ, ν, ρ δεικνύει τὴν στήλην ἐν ἣ εὐρίσκεται τὸ πολλαπλάσιον τοῦτο ἐν τῇ α', β', γ', δ' σειρᾷ· προφανῶς ἐκ τῶν ἰσοτήτων τούτων προκύπτει ὅτι  $\rho < \nu < \mu < \lambda$ .

Ὡστε, ἵνα εὐρωμεν τὸ ζητούμενον ε. κ. π. τῶν ἀριθμῶν 2, 3, 4, 6 συμφέρει νὰ ζητήσωμεν αὐτὸ εἰς τὴν τελευταίαν σειρὰν· ἔθεν·

Πρὸς εὐρεσιν τοῦ ε. κ. π. ἀριθμῶν ὧν ὁ μεγαλύτερος δὲν διαιρεῖται διὰ πάντων τῶν λοιπῶν παρατηροῦμεν ἂν τὸ διπλάσιον τοῦ μεγαλύτερου εἶναι κ. π. καὶ τῶν λοιπῶν, ὁπότε θὰ εἶναι καὶ τὸ ε. κ. π. ἄλλως παρατηροῦμεν τὸ τριπλάσιον κ. ο. κ. Τὸ πρῶτον εὐρεθησόμενον τοιοῦτον κ. π. θὰ εἶναι τὸ ζητούμενον ε. κ. π.

Οὕτως εἰς τὸ ἀνωτέρω παράδειγμα (§ 105) ε. κ. π. εἶναι τὸ 12· ὁμοίως τῶν ἀριθμῶν 11, 22, 33, 44 εἶναι τὸ  $44 \times 3 = 132$ .

Τίνες ἀριθμοὶ μεγαλύτεροι τοῦ ε. κ. π. δεδομένων ἀριθμῶν εἶναι κοινὰ πολλαπλάσια αὐτῶν;

Θεωρ. Ἀριθμητικὴ Μ. Σ. Ζερεβοῦ

109. — Ἐστωσαν  $\alpha, \beta, \gamma, \delta$  ἀριθμοί, ὧν  $\epsilon. κ. π.$  εἶναι τὸ  $E$  καὶ ἕτερον τυχὸν  $\kappa. π.$  αὐτῶν τὸ  $\Pi$ · διαιροῦμεν τὸ  $\Pi$  διὰ τοῦ  $E$ · ἔστω  $P$  τὸ πηλίκον καὶ  $\Gamma$  τὸ ὑπόλοιπον· θὰ ἔχωμεν

$$\Pi = E \times P + \Gamma.$$

Οἱ ἀριθμοὶ  $\alpha, \beta, \gamma, \delta$  ἐξ ὑποθέσεως εἶναι διαιρέται τοῦ  $\Pi$  καὶ τοῦ  $E$ · ἄρα εἶναι διαιρέται τοῦ  $\Pi$  καὶ τοῦ  $E \times P$ · ἐπομένως καὶ τοῦ  $\Gamma$  (§ 75)· ἔθεν τὸ  $\Gamma$  θὰ ἦτο  $\kappa. π.$  τῶν ἀριθμῶν  $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ · ἀλλὰ τὸ  $\Gamma$  ὡς ὑπόλοιπον τῆς διαιρέσεως  $\Pi : E$  εἶναι μικρότερον τοῦ  $E$ , ἔπερ ὑπετέθη  $\epsilon. κ. π.$ · ἐπομένως τὸ  $\Gamma$  κατ' ἀνάγκη θὰ εἶναι  $\theta$ , διότι ἄλλως θὰ εἶχομεν ἀριθμὸν μικρότερον τοῦ  $E$  ὅστις θὰ ἦτο  $\kappa. π.$  καὶ ἐπομένως ὁ  $E$  δὲν θὰ ἦτο  $\epsilon. κ. π.$ , ὡς ὑπετέθη· ἔθεν·

*Πᾶν κοινὸν πολλαπλάσιον ἀριθμῶν εἶναι πολλαπλάσιον τοῦ  $\epsilon. κ. π.$  αὐτῶν.*

Ἰσχύει δὲ προφανῶς καὶ τὸ ἀντίστροφον· τουτέστιν ὅτι·

Τὸ τυχὸν πολλαπλάσιον τοῦ  $\epsilon. κ. π.$  εἶναι καὶ κοινὸν πολλαπλάσιον τῶν  $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ · ἄρα·

*Ἴνα ἀριθμὸς τις εἶναι κοινὸν πολλαπλάσιον ἄλλων, πρέπει καὶ ἀρκεῖ νὰ εἶναι πολλαπλάσιον τοῦ  $\epsilon. κ. π.$  αὐτῶν.*

$\Pi$ . χ., ἵνα εὗρωμεν  $\kappa. π.$  ἀριθμῶν τινῶν  $\alpha, \beta, \gamma$  ἐχόντων ὡς  $\epsilon. κ. π.$  τὸν ἀριθμὸν 100, πρέπει καὶ ἀρκεῖ νὰ λάβωμεν ἀριθμὸν λήγοντα εἰς δύο τοῦλάχιστον μηδενικά·-

Τί γίνεται τὸ  $\epsilon. κ. π.$  δεδομένων ἀριθμῶν, ἐὰν ἀντικαταστήσωμεν μερικοὺς ἐκ τούτων διὰ τοῦ  $\epsilon. κ. π.$  αὐτῶν;

110. — Ἐστωσαν οἱ ἀριθμοὶ

$$A, B, \Gamma, \Delta$$

καὶ  $E$  τὸ  $\epsilon. κ. π.$  δύο ἐξ αὐτῶν  $\pi. χ.$  τῶν  $A$  καὶ  $B$ · τότε πᾶν κοινὸν πολλαπλάσιον τῶν ἀριθμῶν

$$E, \Gamma, \Delta$$

εἶναι καὶ  $\kappa. π.$  τῶν δοθέντων (§ 109).

Καὶ ἀντιστρόφως· πᾶν  $\kappa. π.$  τῶν

$$A, B, \Gamma, \Delta$$



εἶναι καὶ κ. π. τῶν

Ε, Γ, Δ.

ἔθεν:

Τὰ κοινὰ πολλαπλάσια ὁσωνδήποτε ἀριθμῶν δὲν μεταβάλλονται, ἂν ἀντικαταστήσωμεν δύο ἐξ αὐτῶν διὰ τοῦ ε. κ. π. αὐτῶν.

Ἔτερος τρόπος εὐρέσεως ἐλαχίστου κοινοῦ πολλαπλασίου.

111. — Ἐκ τῆς ἀνωτέρω προτάσεως συναγομεν τὸν ἐξῆς κανόνα:

Πρὸς εὑρεσιν τοῦ ε. κ. π. ὁσωνδήποτε ἀριθμῶν εὐρίσκομεν τὸ ε. κ. π. δύο ἐξ αὐτῶν καὶ ἀντικαθιστῶμεν τούτους διὰ τοῦ εὐρεθέντος ε. κ. π. αὐτῶν καὶ πάλιν εἰς τὴν νέαν σειρὰν ἀντικαθιστῶμεν δύο διὰ τοῦ ε. κ. π. αὐτῶν κ. ο. κ.)

Π. χ. τὸ ε. κ. π. τῶν ἀριθμῶν

18, 30, 48

συμπίπτει μὲ τὸ ε. κ. π. τῶν ἀριθμῶν

90, 48.

ἦτοι εἶναι ὁ 720.

### Ἀσκήσεις.

124. Νὰ εὐρεθῇ τὸ ε. κ. π. τῶν ἀριθμῶν

120, 125, 230.

ἐπίσης τῶν ἀριθμῶν

12, 24, 48, 96, 984, 328.

125). Ἐὰν Ε εἶναι τὸ ε. κ. π. τῶν ἀριθμῶν

α, β, γ, δ,

τότε πᾶν κοινὸν πολλαπλάσιον αὐτῶν θὰ γράφεται ὑπὸ τὴν μορφήν

$E \times \rho$ .

126). Πρὸς εὑρεσιν τοῦ ε. κ. π. τριῶν ἀριθμῶν

α, β, γ

ἄρκει νὰ εὐρωμεν τὸ ε. κ. π. τῶν ἀριθμῶν

Ε, Ε',

ἐὰν Ε εἶναι τὸ ε. κ. π. τῶν α, γ καὶ Ε' τὸ ε. κ. π. τῶν β, γ.

127). Θεωρήσωμεν τὰς σειρὰς (Α) τῆς § 105· τότε, ἐὰν ἀπηγορεύετο νὰ ἐργασθῶμεν μὲ τὴν τελευταίαν σειρὰν πρὸς εὐρεσιν τοῦ ε. κ. π., μὲ ποίαν σειρὰν συνέφερε νὰ ἐργασθῶμεν ;

128). Νὰ εὐρεθῶσιν ἀριθμοὶ οἵτινες διαιρούμενοι διὰ 9, 12, 15 νὰ δίδωσι πάντοτε ὡς ὑπόλοιπον 5, καὶ τίς ἐξ αὐτῶν εἶναι ὁ ἐλάχιστος.

129). Τὸ ε. κ. π. τῶν ἀριθμῶν

$$1, 2, 3, \dots 14$$

εἶναι καὶ ε. κ. π. τῶν ἀριθμῶν

$$8, 9, 10, \dots 14$$

καὶ γενικῶς τὸ ε. κ. π. τῶν ἀριθμῶν

$$1, 2, 3, \dots 2v$$

εἶναι καὶ ε. κ. π. τῶν ἀριθμῶν

$$v+1, v+2, \dots 2v$$

Πρὸς ἀπόδειξιν παρατηροῦμεν ὅτι ὁ τυχὼν ἀριθμὸς τῆς πρώτης σειρᾶς θὰ διαιρῆ ἕνα τοῦλάχιστον ἀριθμὸν τῆς δευτέρας.

130). Νὰ εὐρεθῆ ἀριθμὸς ὅστις διαιρούμενος διὰ 2 δίδει ὑπόλοιπον 1, διὰ 3 δίδει ὑπόλοιπον 2 καὶ διὰ 4 δίδει ὑπόλοιπον 3. Ποῖος ὁ ἐλάχιστος ;

Παρατηροῦμεν ὅτι πᾶς ἀριθμὸς ὅστις διαιρούμενος διὰ 3 δίδει ὑπόλοιπον 2 εἶναι καὶ πολλαπλάσιον τοῦ 3 ἡλαττωμένον κατὰ μονάδα.

131.) Ἐστω ὅτι οἱ τρεῖς ἀριθμοὶ α, β, γ ἔχουσι μ. κ. δ. διάφορον τῆς μονάδος· τότε θὰ εὐρίσκειται ἀριθμὸς τις ρ μικρότερος τοῦ γ τοιοῦτος ὥστε οἱ ἀριθμοὶ ρα καὶ ρβ νὰ εἶναι πολλαπλάσια τοῦ γ. Ἐστω Δ ὁ μ. κ. δ. τῶν ἀριθμῶν α, β, γ· τότε  $\gamma \times \Delta$  θὰ εἶναι ὁ μ. κ. δ. τῶν  $\gamma \times \alpha$ ,  $\gamma \times \beta$ ,  $\gamma \times \gamma$  (§ 101). Ἐθεν (§ 102 § 62) γ θὰ εἶναι ὁ μ. κ. δ. τῶν

$$(\gamma : \Delta) \times \alpha \quad (\gamma : \Delta) \times \beta \quad (\gamma : \Delta) \times \gamma.$$

132) Ἐστῶσαν τέσσαρα σημεῖα ὠρισμένα ἐπὶ τεσσάρων περιφερειῶν καὶ ὅτι ἐκ τούτων ἐκκينوῦσι συγχρόνως 4 κινητά. Ἐν ᾧ χρόνῳ τὸ πρῶτον κάμνει τέσσαρας περιστροφάς, τὸ δεύτερον

κάμνει 10, τὸ τρίτον 14 τὸ δὲ τέταρτον 16. Μετὰ πόσας περιστροφὰς τοῦ τρίτου θὰ εὐρεθῶσι πάλιν κατὰ τὴν αὐτὴν στιγμὴν εἰς τὰ σημεῖα, ἐξ ὧν ἐξεκίνησαν;

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ.

### ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΛΛΗΛΟΥΣ ΑΡΙΘΜΩΝ

Ἐὰν ἀριθμὸς εἶναι πρῶτος πρὸς ἕκαστον παράγοντα γινομένου, τίνες οἱ κ. δ. αὐτοῦ καὶ τοῦ γινομένου;

**112.** — Α'.) Ἄς ὑποθέσωμεν ὅτι ἀριθμὸς τις  $N$  εἶναι πρῶτος πρὸς τὸν  $A$  καὶ πρὸς τὸν  $B$ . Ζητήσωμεν κοινὸς διαιρέτας τῶν δύο ἀριθμῶν

$$N \text{ καὶ } A \times B.$$

Ἐστω τοιοῦτος κ. δ. ὁ  $\Delta$ . οὗτος ὡς διαιρῶν τὸν  $N$  διαιρεῖ καὶ τὸν  $N \times A$ , ὥστε ὁ  $\Delta$  διαιρεῖ τοὺς ἀριθμοὺς

$$N \times A, \quad B \times A,$$

ἄρα καὶ τὸν μ. κ. δ. αὐτῶν (§ 100). Ἐξ ὑποθέσεως ὁμοίως οἱ ἀριθμοὶ  $N$ ,  $B$  ἔχουσι μ. κ. δ. τὴν μονάδα· ἐπομένως οἱ ἀριθμοὶ  $N \times A$ ,  $B \times A$  θὰ ἔχουσι μ. κ. δ. τὸν  $A$ . (§ 101). Ὅθεν ὁ  $\Delta$  θὰ διαιρῇ τὸν  $A$  (§ 100). Ἀλλὰ τότε οἱ ἀριθμοὶ  $N$  καὶ  $A$ , οἵτινες ὑπετέθησαν πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους, θὰ εἶχον κ. δ. τὸν  $\Delta$ . ἄρα  $\Delta = 1$ . ἐξ οὗ συνάγομεν ὅτι·

Ἐὰν ἀριθμὸς τις εἶναι πρῶτος πρὸς δύο ἄλλους, εἶναι πρῶτος καὶ πρὸς τὸ γινόμενον αὐτῶν.

Ἐστω ἤδη ὅτι ἀριθμὸς τις  $N$  εἶναι πρῶτος πρὸς τοὺς τρεῖς παράγοντας τοῦ γινομένου  $A \times B \times \Gamma$ . τότε, ὡς ἀπεδείξαμεν, οἱ ἀριθμοὶ  $N$  καὶ  $A \times B$  εἶναι πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους· ἀλλ' ἐξ ὑποθέσεως καὶ οἱ ἀριθμοὶ  $N$  καὶ  $\Gamma$  εἶναι πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους· ἄρα ὁ  $N$  θὰ εἶναι πρῶτος καὶ πρὸς τὸ γινόμενον

$$(A \times B) \times \Gamma = A \times B \times \Gamma.$$

Κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον δεικνύεται δι' ὅσουσδήποτε παράγοντας ἢ ἐξῆς πρότασις·

Ἄριθμὸς πρῶτος πρὸς ἕκαστον τῶν παραγόντων γινομένου εἶναι πρῶτος καὶ πρὸς αὐτὸ τὸ γινόμενον.

Π. χ. ὁ 8 εἶναι πρῶτος πρὸς τὸν 9, τὸν 15 καὶ τὸν 27· ἄρα θὰ εἶναι πρῶτος καὶ πρὸς τὸ γινόμενον  $9 \times 15 \times 27$ .

Ἄριθμῶν πρώτων πρὸς ἀλλήλους αἱ δυνάμεις τίνες κ. δ. ἔχουσιν ;

113. — Β'. Ἐστῶσαν α καὶ β δύο ἀριθμοὶ πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους· ὁ α θὰ εἶναι πρῶτος πρὸς τὸν

$$\beta \times \beta \times \dots \times \beta = \beta^n \quad (\S 112)$$

Ὁμοίως ὁ  $\beta^n$  εἶναι πρῶτος πρὸς τὸν

$$\alpha \times \alpha \times \dots \times \alpha = \alpha^n \quad \text{ἄρα}$$

Ἄριθμῶν πρώτων πρὸς ἀλλήλους καὶ αἱ τυχοῦσαι δυνάμεις αὐτῶν εἶναι ἀριθμοὶ πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους.

Π. χ. Ἀφοῦ οἱ ἀριθμοὶ 4 καὶ 25 εἶναι πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους, καὶ οἱ ἀριθμοὶ  $2^6$  καὶ  $25^3$ , ἦτοι οἱ ἀριθμοὶ 64 καὶ 15625, εἶναι ἀριθμοὶ πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους.

Ἐὰν ἀριθμὸς εἶναι διαιρέτης τοῦ γινομένου δύο ἄλλων καὶ εἶναι πρῶτος πρὸς τὸν ἕνα, τί θὰ εἶναι ὡς πρὸς τὸν ἄλλον ;

114. — Γ'. Ἐστῶ ὅτι ὁ N διαιρεῖ τὸ γινόμενον  $A \times B$  καὶ εἶναι πρῶτος πρὸς τὸν A. Καλέσωμεν Δ τὸν μ. κ. δ. τῶν B καὶ N· οἱ ἀριθμοὶ

$$B : \Delta = B' \quad \text{καὶ} \quad N : \Delta = N'$$

θὰ εἶναι πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους, ἀλλὰ οἱ N καὶ A εἶναι πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους, ἐπομένως καὶ οἱ N' καὶ A θὰ εἶναι πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους. Ὅθεν ὁ N' εἶναι πρῶτος καὶ πρὸς τὸν  $A \times B'$  (§ 112). Ἐπειδὴ ὁμοίως ἡ διαιρέσις  $(A \times B) : N$  εἶναι τελεία (§ 64) ἔχομεν  $N' = 1$ , ἦτοι  $\Delta = N$ . ἄρα·

Ἐὰν ἀριθμὸς τις διαιρῇ τὸ γινόμενον δύο ἄλλων καὶ εἶναι πρῶτος πρὸς τὸν ἕνα, θὰ διαιρῇ τὸν ἄλλον.

Π. χ. ὁ 12 διαιρεῖ τὸν 12000, ὅστις ἰσοῦται μὲ  $480 \times 25$ , εἶναι δὲ πρῶτος πρὸς τὸν 25· κατὰ τὰ ἀνωτέρω θὰ διαιρῆ τὸν 480.

Τίς ὁ μ. κ. δ. τῶν πηλίκων τῆς διαιρέσεως τοῦ ε. κ. π. δεδομένων ἀριθμῶν δι' ἐκάστου τούτων ;

115.—Δ'. Ἐστῶσαν ἤδη οἱ ἀριθμοὶ A, B, Γ, καὶ E τὸ ε. κ. π. αὐτῶν. Διαιρῶ τοῦτο δι' ἐνὸς ἐκάστου ἐξ αὐτῶν, ἦτοι σχηματίζω

τὰ πηλικά  $\left\{ \begin{array}{l} E : A \\ E : B \\ E : \Gamma \end{array} \right.$  Τὰ πηλικά ταῦτα εἶναι ἀριθμοὶ πρῶτοι

πρὸς ἀλλήλους. Διότι, ἐὰν εἶχον κοινόν τινα διαιρέτην Δ διάφορον τῆς μονάδος, θὰ ἠγλήθουν αἱ ἰσότητες

$$E : A = \Delta \times \Pi$$

$$E : B = \Delta \times \rho$$

$$E : \Gamma = \Delta \times \Sigma,$$

$$\text{ὅθεν } E = A \times \Delta \times \Pi = B \times \Delta \times \rho = \Gamma \times \Delta \times \Sigma$$

ἐξ οὗ  $E : \Delta = A \times \Pi = B \times \rho = \Gamma \times \Sigma$  ἦτοι·

ὁ E : Δ θὰ ἦτο κ. π. τῶν A, B, Γ, ἀλλὰ E : Δ εἶναι ἀριθμὸς μικρότερος τοῦ E, ὅταν  $\Delta > 1$ · θὰ εἶχομεν ἐπομένως καὶ κ. π. τῶν A, B, Γ μικρότερον τοῦ ἐλαχίστου, ὅπερ ἄτοπον. Ὅθεν·

Ἐὰν διαιρεθῆ τὸ ε. κ. π. ἀριθμῶν δι' ἐκάστου ἐξ αὐτῶν, εὐρίσκονται πηλικά ἀριθμοὶ πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους.

Π. χ. τῶν ἀριθμῶν 12, 20 καὶ 36 ε. κ. π. εἶναι τὸ 180. Τὰ πηλικά  $180 : 12, 180 : 20, 180 : 36$ , ἦτοι οἱ ἀριθμοὶ 15, 9, 5, εἶναι πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους.

Ποῖον κ. π. δεδομένων ἀριθμῶν διαιρούμενον δι' αὐτῶν δίδει πηλικά ἀριθμοὺς πρῶτους πρὸς ἀλλήλους ;

116.—E'. Ἐστω ὅτι ἀριθμὸς τις E διαιρούμενος ἀκριβῶς διὰ τῶν A, B, Γ δίδει πηλικά Π, Π', Π'' ἀριθμοὺς πρῶτους πρὸς

ἀλλήλους· ἐπειδὴ ὁ E εἶναι ἐξ ὑποθέσεως κ. π. τῶν A, B, Γ, θὰ εἶναι πολλαπλάσιον τοῦ ε. κ. π. αὐτῶν E', ἦτοι

$$E = E' \times \rho.$$

Ἄλλὰ (§ 115) οἱ ἀριθμοὶ

$$E' : A, E' : B, E' : \Gamma$$

εἶναι πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους καὶ ἐπομένως οἱ

$$(E' \times \rho) : A, (E' \times \rho) : B, (E' \times \rho) : \Gamma,$$

ἦτοι οἱ

$$E : A, E : B, E : \Gamma$$

θὰ ἔχωσι μ. κ. δ. τὸν ρ· ἀλλ' ὑπετέθησαν πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους· ἐπομένως  $\rho = 1$ · τουτέστιν E εἶναι τὸ ε. κ. π. ἄρα·

Ἐὰν κοινόν τι πολλαπλάσιον τῶν A, B, Γ, διαιρούμενον διὰ τῶν A, B, Γ, δίδῃ πηλικά ἀριθμοὺς πρώτους πρὸς ἀλλήλους, τότε τοῦτο εἶναι καὶ τὸ ε. κ. π.

Π. χ. ὁ 3600 εἶναι κ. π. τῶν ἀριθμῶν

$$720, 900, 1800.$$

Ἐπειδὴ τὰ πηλικά

$$3600 : 720, 3600 : 900, 3600 : 1800,$$

ἦτοι τὰ 5, 4, 2, εἶναι πρῶτα πρὸς ἀλλήλα, ὁ 3600 εἶναι τὸ ε. κ. π. τῶν ἀριθμῶν 720, 900, 1800.

Ἀριθμὸς διαιρετὸς δι' ἄλλων πρώτων πρὸς ἀλλήλους ἀνά δύο διαιρεῖται διὰ τοῦ γινομένου αὐτῶν ; καὶ διατρί ;

117. — 5'. Ἐστω ὅτι ἀριθμὸς τις A εἶναι κ. π. δύο ἄλλων B, Γ πρώτων πρὸς ἀλλήλους. Παρατηροῦμεν ὅτι τὸ γινόμενον  $B \times \Gamma$  διαιρούμενον διὰ τῶν B, Γ δίδει πηλικά Γ, B πρῶτα πρὸς ἀλλήλα· ἔθεν (§ 116) εἶναι ε. κ. π. τῶν B, Γ. Ἐπομένως τὸ A ὡς κ. π. τῶν B, Γ θὰ εἶναι (§ 109) πολλαπλάσιον τοῦ ε. κ. π. αὐτῶν, ἦτοι τοῦ  $B \times \Gamma$ · ἄρα·

Ἐὰν ἀριθμὸς τις A διαιρῆται διὰ δύο ἄλλων πρώτων πρὸς ἀλλήλους, θὰ διαιρῆται καὶ διὰ τοῦ γινομένου αὐτῶν.

π. χ. Ἐὰν ἀριθμὸς τις διαιρῆται διὰ 8 καὶ 15, θὰ διαιρῆται καὶ διὰ τοῦ 120.

Ἔστωσαν ἤδη τρεῖς ἀριθμοὶ Β, Γ, Δ πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους ἀνά δύο. Ἐὰν ἀριθμὸς τις Α διαιρῆται διὰ τῶν Β, Γ, θὰ διαιρῆται καὶ διὰ τοῦ γινομένου  $B \times \Gamma$  ὡς προηγουμένως, εἰδομένου ἅφ' ἐτέρου ὁ Δ θὰ εἶναι πρῶτος πρὸς τὸ γινόμενον  $B \times \Gamma$  (§ 112). Ὡστε, ἐὰν ὁ Α διαιρῆται καὶ διὰ Δ, θὰ διαιρῆται καὶ διὰ τοῦ γινομένου  $(B \times \Gamma) \times \Delta$ , ἥτοι τοῦ  $B \times \Gamma \times \Delta$ . Καὶ γενικῶς:

Ἐὰν ἀριθμὸς τις Α διαιρῆται δι' ἄλλων Β, Γ, Δ, Ε... πρῶτων πρὸς ἀλλήλους ἀνά δύο, θὰ διαιρῆται καὶ διὰ τοῦ γινομένου αὐτῶν.

Π. χ. Ὁ ἀριθμὸς 31500 διαιρεῖται διὰ τῶν 4, 7, 15, οὔτινες εἶναι πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους ἀνά δύο· θὰ διαιρῆται καὶ διὰ τοῦ

$$4 \times 7 \times 15 = 420.$$

ΣΗΜ. Ἐφαρμόζοντες τὴν πρότασιν ταύτην δυνάμεθα νὰ εὔρωμεν πολλοὺς χαρακτῆρας διαιρετότητος.

Π. χ. Ἐπειδὴ  $18 = 2 \times 9$  καὶ 2, 9 εἶναι πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους, ἔπεται ὅτι πᾶς ἀριθμὸς διαιρετὸς διὰ 2 καὶ 9 διαιρεῖται καὶ διὰ 18.

Σχέσις μεταξὺ δύο ἀριθμῶν, τοῦ μ. κ. δ. καὶ τοῦ ε. κ. π. αὐτῶν.

118. — Ἔστωσαν Π, Π' τὰ πηλίκια τῆς διαιρέσεως δύο ἀριθμῶν Α, Β διὰ τοῦ μ. κ. αὐτῶν Δ. Τότε:

$$A = \Delta \times \Pi \text{ καὶ } B = \Delta \times \Pi' \cdot \text{ ὅθεν}$$

$$A \times B = \Delta \times \Pi \times B \text{ καὶ } B \times A = \Delta \times \Pi' \times A \cdot \text{ ἐπομένως}$$

$$(A \times B) : \Delta = \Pi \times B \text{ καὶ } (B \times A) : \Delta = \Pi' \times A.$$

Ἐξ οὗ βλέπομεν ὅτι, ἐὰν τὸν ἀριθμὸν  $(A \times B) : \Delta$  διαιρέσωμεν διὰ Β, εὐρίσκομεν Π, ἐὰν δὲ διὰ Α, εὐρίσκομεν Π'. ἥτοι ὁ ἀριθμὸς  $(A \times B) : \Delta$  διαιρούμενος διὰ τῶν Α, Β δίδει πηλίκια ἀριθμοὺς πρῶτους πρὸς ἀλλήλους (§ 103)· ὥστε εἶναι τὸ ε. κ. π. τῶν Α, Β (§ 116).

$$\begin{array}{l} \text{ἥτοι:} \quad (1) \quad (A \times B) : \Delta = E. \quad \cdot \text{ ὅθεν} \\ \quad \quad \quad A \times B = \Delta \times E \quad \quad \quad \text{ἀρα:} \end{array}$$

Τὸ γινόμενον δύο ἀριθμῶν ἰσοῦται μὲ τὸ γινόμενον τοῦ  
 $\mu. \kappa. \delta.$  ἐπὶ τὸ  $\epsilon. \kappa. \pi.$  αὐτῶν.

119. — Ἐφαρμογή. Ἐκ τῆς ἰσότητος (1) προκύπτει ὅτι τὸ  
 $\epsilon. \kappa. \pi.$  δύο ἀριθμῶν εὐρίσκειται, ἐὰν τὸ γινόμενον τῶν ἀριθμῶν  
 διαιρεθῇ διὰ τοῦ  $\mu. \kappa. \delta.$  αὐτῶν.

### Ἀσκήσεις

133.) Δίδονται δύο ἀριθμοὶ καὶ τὸ  $\epsilon. \kappa. \pi.$  αὐτῶν. Νὰ εὐρεθῇ  
 ὁ  $\mu. \kappa. \delta.$  αὐτῶν.

134.) Δύο διαδοχικοὶ ἀριθμοὶ εἶναι πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους ὡς  
 ἐπίσης καὶ δύο περιττοὶ διαδοχικοὶ εἶναι πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους.

135.) Πάντες οἱ περιττοὶ οἱ μὴ λήγοντες εἰς 5 εἶναι ἀριθμοὶ  
 πρῶτοι πρὸς τὸν 10. Ἐξ αὐτῶν δὲ ὅσοι ἔχουσιν ὡς ἄθροισμα  
 ψηφίων ἀριθμὸν μὴ διαιρετὸν διὰ 3 εἶναι πρῶτοι καὶ πρὸς τὸν 30.

136) Νὰ εὐρεθῶσι χαρακτῆρες διαιρετότητος διὰ 21, 30,  
 63, 105.

137) Ἐὰν εἰς προσθετέος ἄθροισματος εἶναι πρῶτος πρὸς τὸ  
 ἄθροισμα τῶν λοιπῶν προσθετέων, θὰ εἶναι πρῶτος καὶ πρὸς τὸ  
 ὅλον ἄθροισμα.

138.) Πολλαπλασιάζοντες τοὺς ἀριθμοὺς 1, 2 3, . . . 9 ἐπὶ 7  
 λαμβάνομεν ἑννέα ἀριθμοὺς λήγοντας εἰς ἑννέα διάφορα ἀπ' ἀλ-  
 λήλων ψηφία καὶ γενικώτερον τὸ αὐτὸ συμβαίνει, ἂν λάβωμεν ὡς  
 πολλαπλασιαστὴν ἀντὶ τοῦ 7 οἴονδῆποτε ἀριθμὸν πρῶτον  
 πρὸς τὸν 10.

Παρατηροῦμεν πρὸς τοῦτο ὅτι πᾶς ἀριθμὸς πρῶτος πρὸς τὸν  
 10 θὰ λήγῃ εἰς 1 ἢ 3 ἢ 7 ἢ 9

139) Οἱ ἀριθμοὶ

$$A, \quad A+1, \quad 2A+1$$

εἶναι πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους (§ 75, § 73).

140.) Ἐὰν εἰς δοθέντα περιττὸν προσθέσωμεν τὴν μονάδα, τὸ  
 δὲ ἄθροισμα διαιρέσωμεν διὰ 2, εὐρίσκομεν ἀριθμὸν πρῶτον  
 πρὸς τὸν δοθέντα (§ 79).



141.) Οἱ ἀριθμοὶ

$$A \quad \text{καὶ} \quad AB+1$$

εἶναι πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους.

Παρατηροῦμεν ὅτι πᾶς διαιρέτης τοῦ  $A$  εἶναι διαιρέτης τοῦ  $AB$  (§ 74).

142.) Τὸ ἄθροισμα τῶν τετραγώνων δύο ἀριθμῶν πρῶτων πρὸς τὸν 3 δὲν εἶναι διαιρετὸν διὰ 3.

Παρατηροῦμεν ὅτι πᾶς ἀριθμὸς πρῶτος πρὸς τὸν 3 διαιρούμενος διὰ 3 δίδει ὑπόλειπον 1 ἢ 2· κατόπιν δὲ λαμβάνομεν ὑπ' ὄψιν τὰ θεωρήματα (§ 87 καὶ 88).

143.) Ἐὰν δύο ἢ πλείοτεροι ἀριθμοὶ πολλαπλασιασθῶσιν ἐπὶ τινὰ ἀριθμὸν, καὶ τὸ ε. κ. αὐτῶν πολλαπλασιαζέται ἐπὶ τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν.

Τῶ ὄντι ἔστω  $E$  τὸ ε. κ. π. τῶν ἀριθμῶν

$$A \quad B \quad \Gamma.$$

οἱ ἀριθμοὶ

$$E:A \quad E:B \quad E:\Gamma$$

εἶναι πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους (§ 115) ἢ καὶ οἱ ἀριθμοὶ

$$\rho E:\rho A \quad \rho E:\rho B \quad \rho E:\rho \Gamma$$

εἶναι πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους· ὥστε (§ 116) τὸ  $\rho E$  εἶναι ε. κ. π. τῶν ἀριθμῶν  $\rho A, \rho B, \rho \Gamma$ .

144.) Ὁ μ. κ. δ. τριῶν περιττῶν ἀριθμῶν  $A, B, \Gamma$  εἶναι καὶ μ. κ. δ. τῶν ἀριθμῶν

$$(A+B):2 \quad (B+\Gamma):2, \quad (\Gamma+A):2.$$

Παρατηροῦμεν ὅτι 1) τὰ πηλίκα εἶναι ἀριθμοὶ ἀκέραιοι

$$(A+B, B+\Gamma, \Gamma+A \text{ ἄρτιοι.})$$

2) Πᾶς κ. δ. τῶν  $A, B, \Gamma$  εἶναι καὶ κ. δ. τῶν

$$(A+B):2, \quad (B+\Gamma):2 \quad (\Gamma+A):2$$

ὡς διάφορος τοῦ 2 ( $A, B, \Gamma$  περιττοὶ § 73 § 114).

3) Πᾶς κ. δ. τῶν  $(A+B):2, (B+\Gamma):2, (\Gamma+A):2$  εἶναι καὶ κ. δ. τῶν  $A, B, \Gamma$ .

145.) Ἐστω  $M$ . ὁ  $\mu$ . κ. δ. τῶν ἀριθμῶν  $A$  καὶ  $\alpha$ .  $M'$  ὁ τῶν  $A$  καὶ  $\beta$  καὶ  $M''$  ὁ τῶν  $A$  καὶ  $\gamma$ . Νὰ δειχθῇ ὅτι ἕαν οἱ ἀριθμοὶ  $M$ ,  $M'$ ,  $M''$  εἶναι πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους ἀνά δύο, τότε τὸ γινόμενον  $M \times M' \times M''$  εἶναι ὁ  $\mu$ . κ. δ. τῶν ἀριθμῶν  $A$  καὶ  $\alpha \times \beta \times \gamma$ .

Παρατηροῦμεν ὅτι οἱ ἀριθμοὶ  $A : M$  καὶ  $\alpha : M$  εἶναι πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους (§ 103). Ἐπομένως (§ 117) καὶ ὁ ἀριθμὸς

$$A : (M \times M' \times M'')$$

θὰ εἶναι πρῶτος πρὸς τὸν  $\alpha : M$  (§ 74) ἐπίσης θὰ εἶναι πρῶτος καὶ πρὸς τὸν  $\beta : M'$  καὶ τὸν  $\gamma : M''$ . Ἐθεν (§ 112, 104) ἔπεται ἡ πρότασις:

146.) Δίδονται οἱ ἀριθμοὶ

$$\alpha, \beta, \gamma, \delta, \epsilon.$$

Πόσας ἀκεραίας τιμὰς οὐχὶ μεγαλυτέρας τοῦ  $\epsilon$  δύναμαι νὰ δώσω εἰς τὸ  $\rho$  τοιαύτας ὥστε τὰ γινόμενα

$$\alpha \times \rho, \beta \times \rho, \gamma \times \rho, \delta \times \rho$$

νὰ εἶναι πολλαπλάσια τοῦ  $\epsilon$ ;

(μία τιμὴ τοῦ  $\rho$  εἶναι ὁ  $\epsilon : \Delta$ , ἔπου  $\Delta = \mu$ . κ. δ. δεδομένων)

(Ἄσκ. 131).

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'.

### ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

120. — Ζητήσωμεν τοὺς διαιρέτας τοῦ 6· εἶναι τοιοῦτοι οἱ ἀριθμοὶ 1, 2, 3, 6.

Ζητήσωμεν τοὺς διαιρέτας τοῦ 5· εἶναι τοιοῦτοι μόνον οἱ 1, 5. Παρατηροῦμεν ὅτι ὁ 6 ἔχει πλὴν τοῦ ἑαυτοῦ του καὶ τῆς μονάδος καὶ ἄλλους διαιρέτας, τοὺς 2, 3, ἐνῶ ὁ 5 ἔχει μόνον τοὺς 1, 5. Ἐνεκα τῆς ιδιότητος αὐτῆς ὁ 5 λέγεται πρῶτος, ἐνῶ ὁ 6 λέγεται σύνθετος· τουτέστι:

Πρῶτος ἀριθμὸς λέγεται ὁ μὴ ἔχων ἄλλους διαιρέτας εἰμὴ ἑαυτὸν καὶ τὴν μονάδα.

Σύνθετος δὲ λέγεται ὁ ἔχων καὶ ἄλλους διαιρέτας πλὴν αὐτῶν.

Π. γ. οἱ ἀριθμοὶ

1, 2, 3, 5, 7, 11, 13 εἶναι πρῶτοι  
οἱ 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 εἶναι σύνθετοι.

Παρατηροῦμεν ὅτι ἀριθμοὶ τινες δυνατὸν νὰ εἶναι πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους χωρὶς νὰ εἶναι πρῶτοι. Π.γ. οἱ ἀνωτέρω σύνθετοι εἶναι πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους.

\*Ἐστω τυχῶν σύνθετος ἔ 15· διαιρέται αὐτοῦ εἶναι οἱ ἀριθμοὶ 1, 3, 5, 15· ὁ 3 εἶναι δεύτερος διαιρέτης τοῦ 15· ἦτοι.

Δεύτερος διαιρέτης ἀριθμοῦ λέγεται ὁ μετὰ τὴν μονάδα διαιρέτης αὐτοῦ.

### Ἰδιότητες τῶν πρώτων ἀριθμῶν.

121. — Α'.) Ἐκ τῶν διαιρετῶν ἀριθμοῦ τινος Α συνθέτου τινὲς εἶναι σύνθετοί, τινὲς πρῶτοι. Θεωρήσωμεν τὸν δεύτερον διαιρέτην τοῦ Α· οὗτος δὲν εἶναι πολλαπλάσιον ἄλλου ἀριθμοῦ γ μεγαλύτερου τῆς μονάδος, διότι ἐν ἐναντία περιπτώσει καὶ ὁ Α θὰ ἦτο πολλαπλάσιον αὐτοῦ τοῦ ἄλλου ἀριθμοῦ γ, ἦτοι ἔ Α θὰ εἶχε καὶ διαιρέτην μικρότερον τοῦ ὑποτεθέντος ὡς δευτέρου· ὥστε·

Παντὸς ἀριθμοῦ ὁ δεύτερος διαιρέτης εἶναι ἀριθμὸς πρῶτος.

Ἐκ τῶν προηγουμένων συνάγεται ὅτι·

α'.) Πᾶς σύνθετος θὰ ἔχη διαιρέτην ἀριθμὸν πρῶτον.

Π. γ'. ὁ 77 ἔχει δεύτερον διαιρέτην τὸν 7, ὅστις εἶναι πρῶτος.

β'.) Ἐὰν ἀριθμοὶ τινες ἔχωσι μ. κ. δ. διάφορον τῆς μονάδος, ἦτοι ἐὰν δὲν εἶναι πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους, θὰ ἔχωσιν ὡς κ. δ. ἀριθμὸν πρῶτον (§ 100).

122. — Β'.) Ὁ τυχῶν πρῶτος δύναται νὰ θεωρηθῆ ὡς γινόμενον τοῦ ἑαυτοῦ του ἐπὶ τὴν μονάδα.

\*Ἐστω ἤδη τυχῶν σύνθετος ἀριθμὸς Α καὶ δεύτερος αὐτοῦ διαιρέτης ὁ δ. Τότε  $A = \delta \times \pi$ , ὅπου π θὰ εἶναι ἀκέραιος, μικρότερος τοῦ Α· ἐὰν δ π εἶναι πρῶτος, τότε ὁ Α ἀνελύθη εἰς γινό-

μενον δύο πρώτων· ἐὰν ὁ  $\pi$  εἶναι σύνθετος, τότε θὰ ἔχῃ ὡς δεύτερον διαιρέτην ἀριθμὸν τινα  $\delta'$ , ὅστις πάλιν θὰ εἶναι πρῶτος·

$$\text{ἦτοι} \quad \pi = \delta' \times \pi' \quad \delta\text{που} \quad \pi' < \pi.$$

Ἐὰν  $\pi'$  εἶναι καὶ αὐτὸς πρῶτος, τότε ὁ  $A$  ἀνελύθη εἰς γινόμενον τριῶν πρώτων παραγόντων ἄλλως προχωροῦμεν καθ' ὅμοιον τρόπον. Παραιτηροῦμεν ἤδη ὅτι οἱ ἀριθμοὶ  $\pi$ ,  $\pi'$ ... εἶναι ἀκέραιοι τοιοῦτοι ὥστε  $\pi > \pi' > \dots$ . Ἀπὸ τοῦ  $\pi$  φθάνομεν εἰς τὸ  $\pi'$  καὶ δι' ἀφαιρέσεως μονάδων τινῶν, ὅπως ἐπίσης ἀπὸ τοῦ  $\pi'$  εἰς τὸ  $\pi''$  φθάνομεν πάλιν καὶ δι' ἀφαιρέσεως μονάδων κ. ο. κ· ἀλλὰ ὁ  $\pi$  εἶναι ἀκέραιός τις πεπερασμένος, δὲν δυνάμεθα ἐπομένως νὰ ἀφαιρῶμεν ἀδιακόπως ἀπ' αὐτοῦ μονάδας· ἄρα κατ' ἀνάγκην φθάνομεν εἰς ἀριθμὸν τινα μὴ ἔχοντα ἄλλον διαιρέτην μικρότερον τοῦ πλήν τῆς μονάδος καὶ τότε θὰ ἔχωσιν εὐρεθῆ πάντες οἱ πρῶτοι παράγοντες, ὧν γινόμενον εἶναι ὁ  $A$ . ἄρα·

*Πᾶς ἀριθμὸς εἶναι γινόμενον παραγόντων πρώτων.*

$$\text{Π. χ.} \quad 60 = 2 \times 30 = 2 \times 2 \times 15 = 2 \times 2 \times 3 \times 5$$

123.—Γ'. Ἐστῶσαν δύο ἀριθμοὶ  $A, B$ , ἐκ τῶν ὁποίων ὁ μὲν εἰς, ἔστω ὁ  $A$ , εἶναι πρῶτος, ὁ δὲ ἕτερος  $B$  δὲν διαιρεῖται διὰ τοῦ  $A$  τότε ὁ μόνος δυνατὸς κοινὸς διαιρέτης τῶν  $A, B$  θὰ εἶναι ἡ μονάς, διότι ὁ  $A$  δὲν ἔχει ἄλλον διαιρέτην πλην τῆς μονάδος καὶ τοῦ ἑαυτοῦ, του, ὅστις ὅμως ἐξ ὑποθέσεως δὲν δύναται νὰ χρησιμεύσῃ ὡς κοινὸς διαιρέτης· ἄρα·

*Πᾶς πρῶτος εἶναι πρῶτος πρὸς πάντα μὴ διαιρούμενον δι' αὐτοῦ.* Π. χ. ὁ 11 δὲν διαιρεῖ τὸν 100· ἄρα εἶναι πρῶτος πρὸς τὸν 100.

124.—Δ'. Ἄς ὑποθέσωμεν ὅτι δύο γινόμενα παραγόντων πρώτων εἶναι ἴσα· ἔστωσαν δηλαδὴ ἀριθμοὶ

$$A, B, \Gamma, \dots, A', B', \Gamma' \dots$$

πρῶτοι καὶ ὅτι

$$A \times B \times \Gamma \times \dots = A' \times B' \times \Gamma' \dots$$

Ὁ τυχὼν παράγων  $A'$  τοῦ δευτέρου γινομένου, ἐὰν δὲν εἶναι ἴσος μὲ τὸν  $A$ , δὲν θὰ τὸν διαιρῇ, διότι ὁ  $A$  ὑπετέθη πρῶτος·

ἀλλὰ τότε ὁ  $A'$  (§ 123) θὰ ἦτο πρῶτος πρὸς τὸν  $A$ . ὁμοίως φαίνεται ὅτι, ἐὰν ὁ  $A'$  δὲν ἦτο ἴσος πρὸς ἄλλον παράγοντα τοῦ πρώτου γινομένου, θὰ ἦτο πρῶτος πρὸς ἕκαστον ἐξ αὐτῶν· ἄρα ὁ  $A'$  θὰ ἦτο πρῶτος καὶ πρὸς τὸ γινόμενον

$$A \times B \times \Gamma \times \dots$$

ἐὰν δὲν ἦτο ἴσος μὲ κανένα ἐξ αὐτῶν (§ 112)· ἐπομένως ὁ  $A'$  θὰ ἦτο τότε πρῶτος καὶ πρὸς τὸ ἴσον γινόμενον  $A' \times B' \times \Gamma' \times \dots$  ὅπερ ἄτοπον· ἄρα ὁ  $A'$  εἶναι ἴσος πρὸς ἕνα τῶν παραγόντων τοῦ πρώτου γινομένου. Δὲν εἶναι δὲ δυνατόν τὸ πρῶτον γινόμενον νὰ ἔχη παράγοντας ἴσους πρὸς τὸ  $A'$  περισσοτέρους ἢ ὀλιγωτέρους ἀπὸ τὸ δεύτερον γινόμενον· διότι ἔστω ὅτι τὸ πρῶτον γινόμενον εἶχε τρεῖς παράγοντας ἴσους πρὸς τὸ  $A'$ · τὴ δὲ δεύτερον δύο τοιούτους· τότε διαιροῦντες τὰ ἴσα γινόμενα διὰ τοῦ  $A' \times A'$  θὰ ἔχωμεν δύο ἕτερα γινόμενα ἴσα (Ἐσκ. 56), ἐξ ὧν τὸ ἐν θὰ περιεῖχε τὸν πρῶτον παράγοντα  $A'$ , ἐνῶ τὸ ἕτερον οὐχὶ ἄρα·

Ἐὰν δύο γινόμενα παραγόντων πρώτων εἶναι ἴσα θὰ ἔχωσι τοὺς αὐτοὺς πρώτους παράγοντας καὶ ἕκαστον παράγοντα τοσάκις τὸ ἐν ὡσάκις καὶ τὸ ἕτερον· ἦτοι δύο γινόμενα παραγόντων πρώτων ἴσα θὰ ἔχωσι τοὺς αὐτοὺς πρώτους παράγοντας καὶ ἐκθέτας τῶν ἴσων παραγόντων τοὺς ἴδious· π. χ. τὸ γινόμενον  $5^2 \times 7 \times 11$  δὲν εἶναι ἴσον πρὸς τὸ γινόμενον  $5 \times 7 \times 11^2$  οὐδὲ τὸ γινόμενον  $3^2 \times 7 \times 11^2$  μὲ τὸ γινόμενον  $3 \times 7^2 \times 17$ .

125.—E'. Ἐστω ὅτι γινόμενόν τι  $A \times B \times \Gamma$  διαιρεῖται δι' ἐνὸς πρώτου ἀριθμοῦ  $\delta$ · τότε

$$A \times B \times \Gamma = \delta \times \Pi.$$

Ἐὰν φαντασθῶμεν ὅτι ἀναλύομεν τοὺς  $A$ ,  $B$ ,  $\Gamma$  καὶ  $\Pi$  εἰς πρώτους παράγοντας, θὰ ἔχωμεν δύο γινόμενα παραγόντων πρώτων ἴσα· ἐπομένως (§ 124) ὁ  $\delta$  πρέπει νὰ εὑρεθῇ μεταξὺ τῶν πρώτων παραγόντων τοῦλάχιστον ἐνὸς ἐκ τῶν  $A$ ,  $B$ ,  $\Gamma$ · ὅθεν ὁ  $\delta$  θὰ διαιρῇ τοῦλάχιστον ἕνα τῶν παραγόντων  $A$ ,  $B$ ,  $\Gamma$ · ἄρα·

Ἐὰν ἀριθμὸς πρῶτος διαιρῇ γινόμενον, θὰ διαιρῇ τοῦλάχιστον ἕνα τῶν παραγόντων.

Ἐκ τούτου ἔπεται.

Ἐάν ἀριθμὸς πρῶτος διαιρῆ δύναμιν ἀριθμοῦ, θὰ διαιρῆ καὶ αὐτὸν τοῦτον τὸν ἀριθμὸν.

Παραδείγματα. Ὁ 3 διαιρῶν τὸ γινόμενον  $4 \times 75 = 300$  θὰ διαιρῆ καὶ ἕνα τοῦλάχιστον τῶν παραγόντων καὶ πράγματι διαιρεῖ τὸν 75. Ἐπίσης ὁ 5 διαιρῶν τὸ  $25^2 = 625$  θὰ διαιρῆ καὶ τὸ 25.

### Ἀσκήσεις.

147.) Ἀριθμὸς πρῶτος δὲν δύναται νὰ διαιρῆ τὸ γινόμενον ὅσωνδῆποτε ἀκεραίων μικροτέρων αὐτοῦ.

148.) Ἐάν οὐδεὶς ἐκ τῶν παραγόντων γινομένου διαιρητὰ διὰ πρῶτου τινὸς  $\alpha$ , τότε καὶ τὸ γινόμενον δὲν θὰ διαιρητὰ δι' οὐδενὸς πολλαπλασίου τοῦ  $\alpha$ .

149.) Τὸ ε. κ. π. καὶ δ. μ. κ. δ. δύο ἀριθμῶν A καὶ B ἔχουσι τοὺς αὐτοὺς κοινοὺς διαιρέτας οὓς καὶ οἱ ἀριθμοὶ A, B.

150.) Ἐάν δύο ἀριθμοὶ προστιθέμενοι δίδωσιν ὡς ἄθροισμα ἀριθμὸν πρῶτον, εἶναι πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους.

151.) Ἐάν ἡ διαφορὰ τῶν τετραγώνων δύο ἀριθμῶν A καὶ B εἶναι ἀριθμὸς πρῶτος, οἱ ἀριθμοὶ A καὶ B εἶναι διαδοχικοί. (Ἀσκ. 75).

152.) Ἐάν A καὶ B εἶναι πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους, τότε τὸ ἄθροισμα  $A + B$  καὶ τὸ γινόμενον  $AB$  εἶναι πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους. (§ 121. § 125. § 75).

153.) Τὸ ἄθροισμα πάντων τῶν ἀκεραίων τῶν μικροτέρων ἐνὸς πρῶτου εἶναι διαιρετὸν δι' αὐτοῦ. Γενίκευσις.

Ἐστὼ τὸ ἄθροισμα  $1 + 2 + 3 + 4$  τοῦτο γράφεται καὶ

$$4 + 3 + 2 + 1.$$

Ἐθεν τὸ διπλάσιον τοῦ δοθέντος ἄθροισματος ἰσοῦται πρὸς τὸ ἄθροισμα

$$5 + 5 + 5 + 5 = 5 \times 4. \text{ ἔντεῦθεν ἡ πρότασις.}$$

154.) Ἐὰν  $M$  ὁ μ. κ. ε. τῶν  $A, B$  καὶ  $M'$  ὁ μ. κ. δ. τῶν  $A, \Gamma$ , οἱ δὲ ἀριθμοὶ  $A, B, \Gamma$  εἶναι πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους, τότε ὁ μ. κ. ε. τῶν ἀριθμῶν

$$A, \quad B \times \Gamma$$

εἶναι ὁ ἀριθμὸς

$$M \times M'.$$

Παρατηροῦμεν πρὸς τοῦτο ὅτι οἱ ἀριθμοὶ  $M$  καὶ  $M'$  εἶναι πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους (§ 100). Ἐπομένως ὁ  $A$  εἶναι διαιρετὸς διὰ  $M \times M'$ , ἤτοι  $A = M \times M' \times \Pi$ · ἀφ' ἑτέρου  $B = M \times \Pi'$  καὶ  $\Gamma = M' \times \Pi''$ · ἀλλ' οἱ ἀριθμοὶ  $A : M$  καὶ  $\Pi'$  εἶναι πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους· ἐπομένως καὶ οἱ  $\Pi, \Pi'$  εἶναι πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους· ὁμοίως οἱ  $\Pi$  καὶ  $\Pi''$  εἶναι πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους· ἄρα οἱ ἀριθμοὶ  $\Pi$  καὶ  $\Pi' \times \Pi''$  εἶναι πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους (§ 112)· ὅθεν (§ 104)  $M \times M'$  εἶναι ὁ μ. κ. δ. τῶν  $A$  καὶ  $B \times \Gamma$ .

155.) Πᾶς πρῶτος μεγαλύτερος τοῦ 3 θὰ εἶναι ἴσος πρὸς πολλαπλάσιον τοῦ 6 ἠὺξημένον ἢ ἡλαττωμένον κατὰ μονάδα, τουτέστι θὰ γράφεται

$$\text{ἢ ὑπὸ τὴν μορφήν} \quad 6n + 1$$

$$\text{ἢ ὑπὸ τὴν μορφήν} \quad 6n - 1.$$

156.) Ἡ προηγουμένη πρότασις μόνον διὰ τοὺς πρῶτους ἰσχύει;

157.) Διὰ πάντα ἀριθμὸν  $A$  μείζονα τοῦ 4 καὶ ἴσον πρὸς  $\Pi$ · ἔπου  $\Pi$  εἶναι πρῶτος καὶ  $\lambda > 1$ , ἰσχύει ἡ πρότασις ὅτι τὸ γινόμενον

$$1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (A - 1)$$

εἶναι πολλαπλάσιον τοῦ  $A$ .

Ἐὰν παρατηρήσωμεν ὅτι  $A - 1 > \Pi^{2-1}$ , εὐκόλως συνάγομεν τὴν πρότασιν.

158.) Νὰ εὑρεθῇ ἀριθμὸς μεγαλύτερος τοῦ 3 πρῶτος, τοῦ ὁποῖου τὸ τετράγωνον ἐλαττούμενον κατὰ μονάδα καὶ διαιρούμενον διὰ 8 δίδει ὡς πηλίκον ἀριθμὸν πρῶτον.

Πρὸς εὑρεσιν αὐτοῦ παρατηροῦμεν ὅτι πᾶς πρῶτος πλὴν τοῦ 3 δὲν διαιρεῖται διὰ 3· ἄρα εἰς ἓκ τῶν παραγόντων τοῦ γινομένου  $(A - 1)(A + 1)$  διαιρεῖται διὰ 3, ἐὰν  $A$  πρῶτος διάφορος τοῦ 3 (\*Ἀσκ. 98)· ἐπομένως, ἐὰν ὑποθέσωμεν ὅτι ὁ  $A$  εἶναι

Θεωρ. Ἀριθμητικὴ Μ. Σ. Ζερβοῦ

τοιούτος, ὥστε ἡ διαφορά  $A^2 - 1$  νὰ διαιρῆται διὰ 8, τότε τὸ προκύπτον πηλίκον διαιρεῖται διὰ 3 (\**Ασκ.* 75. § 123, § 114) ὅθεν, ἵνα τὸ πηλίκον αὐτὸ εἶναι ἀριθμὸς πρῶτος, πρέπει νὰ εἶναι ἴσον τῷ 3 καὶ ὁ  $A^2 - 1$  νὰ εἶναι ἴσος τῷ 24· ἐπομένως ὁ  $A^2 = 25$  καὶ ὁ  $A$  νὰ εἶναι 5.

### Εὑρεσις τῶν πρώτων ἀριθμῶν.

126. — *Κόσκινον τοῦ Ἐρατοσθένους.* Ζητήσωμεν τοὺς πρώτους τοὺς περιλαμβανομένους μεταξύ 1 καὶ 50. Γράφομεν αὐτοὺς κατὰ σειράν. Διαγράφομεν ἐξ αὐτῶν κατ' ἀρχᾶς τὰ πολλαπλάσια τοῦ 2· κατόπιν παρατηροῦμεν ὅτι ἐκ τῶν πολλαπλασίων τοῦ 3 τινὰ εἶναι ἤδη διαγεγραμμένα ὡς πολλαπλάσια τοῦ 2, τουτέστι τὰ

$$2 \times 3, \quad 4 \times 3, \quad 6 \times 3 \quad \text{κ. τ. λ.,}$$

ἐνῶ τὰ μὴ διαγεγραμμένα εἶναι τὰ

$$3 \times 3, \quad 5 \times 3, \quad 7 \times 3 \quad \text{κ. τ. λ.}$$

διαγράφω ταῦτα.

Τὰ πολλαπλάσια τοῦ 4 εἶναι ἤδη διαγεγραμμένα ὡς πολλαπλάσια τοῦ 2. Ἐκ τῶν πολλαπλασίων τοῦ 5 τὸ πρῶτον μὴ διαγεγραμμένον εἶναι τὸ  $5 \times 5$ · διαγράφομεν τοῦτο ὅπως καὶ ὅσα δὲν ἔχουσιν ἤδη διαγραφῆ. Ἐκ τῶν πολλαπλασίων τοῦ 7 τὸ πρῶτον μὴ διαγεγραμμένον εἶναι τὸ  $7 \times 7$ .

Παρατηροῦμεν ἤδη ὅτι οἱ ἐναπομείναντες ἐν τῷ πίνακι ἀριθμοὶ εἶναι πρῶτοι, διότι οὗτοι δὲν θὰ διαγραφῶσιν, ὅσον καὶ ἂν προχωρήσωμεν καὶ ἐπομένως οὐδενὸς ἀριθμοῦ εἶναι πολλαπλάσια. Ὅμοίως θὰ ἐργασθῶμεν, ἐὰν θέλωμεν νὰ εὑρωμεν πάντας τοὺς πρώτους ἀπὸ τοῦ 1 μέχρι τοῦ 1000, ὁπότε ὅμως δὲν θὰ σταματήσωμεν εἰς τὸ 7, ἀλλ' εἰς τὸ 31, διότι, ὅταν διαγράψωμεν τὰ πολλαπλάσια τῶν πρώτων

$$2, \quad 3, \quad 5, \dots \dots \dots 31,$$

τότε τῶν ἀριθμῶν

$$1, \quad 2, \quad 3, \dots \dots \dots 36$$

ἔχουν διαγραφῆ πάντα τὰ πολλαπλάσια ὥστε τὸ πρῶτον μὴ δια-



γραφὴν θὰ ἦτο τὸ  $37 \times 37$ . Ἀλλὰ τοῦτο δὲν ὑπάρχει ἐν τῷ πίνακι ὡς μεγαλύτερον τοῦ 1000. Ὅμοίως εὐρίσκομεν ὅτι οἱ πρῶτοι ἀριθμοὶ οἱ μεταξὺ 1 καὶ 100 εἶναι οἱ ἑξῆς:

1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97.

ΣΗΜ. Ὑπάρχουσι πίνακες τῶν πρώτων ἀριθμῶν ἐκτεταμένοι.

Εἰς τοὺς λογαριθμικοὺς πίνακας Dupuis εὐρίσκονται οἱ πρῶτοι ἀριθμοὶ ἀπὸ 1 μέχρι 10000.

### Ἀσκήσεις.

159). Νὰ εὐρεθῶσι πάντες οἱ πρῶτοι οἱ περιλαμβανόμενοι μεταξὺ 100 καὶ 200.

160). Ὁ ἀριθμὸς 1036 εἶναι πρῶτος ἢ σύνθετος;

Ὁ ἀριθμὸς 1409 εἶναι πρῶτος ἢ σύνθετος;

### Πληθος τῶν πρώτων ἀριθμῶν.

127. — Ἐστω ὅτι ἐδόθησαν ὁσοιδήποτε πρῶτοι

A, B, Γ, . . . ., K.

Πολλαπλασιάζομεν αὐτοὺς καὶ προσθέτομεν τὴν μονάδα ἔστω

$$[A \times B \times \Gamma \times \dots \times K + 1 = N.]$$

τότε ὁ N ἢ εἶναι πρῶτος ἢ σύνθετος· καὶ, ἂν μὲν εἶναι πρῶτος, θὰ εἶναι προφανῶς πρῶτος διάφορος τῶν

A, B, Γ, . . . ., K.

ἔιν δὲ εἶναι σύνθετος, θὰ ἔχη ὡς δεῦτερον διαιρέτην ἀριθμὸν τινα πρῶτον, ὃν ἄς καλέσω δ. Οὗτος θὰ εἶναι διάφορος τῶν

A, B, Γ, . . . ., K,

διότι, ἐὰν π. χ. εἶχομεν  $B = \delta$ , τότε ὁ δ θὰ διήρει ὄχι μόνον τὸν N ἀλλὰ καὶ τὸν  $A \times B \times \Gamma \times \dots \times K$ , ἐπομένως θὰ διήρει καὶ τὴν διαφορὰν τῶν, ἦτοι τὴν μονάδα, ὅπερ ἄτοπον· ὥστε, ὁσοιδήποτε πρῶτοι καὶ ἂν δοθῶσιν, εὐρίσκεται πάντοτε νέος πρῶτος ἄρα.

Τὸ πλήθος τῶν πρώτων ἀριθμῶν εἶναι ἄπειρον.

Τὸ ὑπόμνημα τῆς ἀσκήσεως ἀριθμῶν εἶναι ἕνα μυστήριον  
Ψηφιοποιήθηκε ἀπὸ τὸ Ἰνστιτούτο Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς

## Ἀσκήσεις.

161.) Νά εὐρεθῶσιν ἀριθμητικὰ παραδείγματα ἑπου ὁ ἀριθμὸς  $N$  τῆς ἀνωτέρω προτάσεως νά εἶναι διαιρετὸς διὰ 3.

Νά σχηματισθῇ κανὼν πρὸς εὑρεσιν τοιούτων παραδειγμάτων.

162.) Ἐστω  $\pi$  ἀριθμὸς πρῶτος· πῶς πρέπει νά ἐκλέγωμεν ἀριθμοὺς πρῶτους τοιούτους ὥστε τὸ γινόμενον αὐτῶν αὐξανόμενον κατὰ μονάδα νά δίδῃ ἀριθμὸν διαιρετὸν ὑπὸ  $\pi$ ;

## Ἀνάλυσις συνθέτου ἀριθμοῦ εἰς τοὺς πρῶτους αὐτοῦ παράγοντας.

128. — Ἐστω  $\pi$ . χ. ὁ 90. Ἐργαζόμενοι κατὰ τὸν τρόπον τὸν ὑποδεικνυόμενον ἀλλαχοῦ (§ 124) λαμβάνομεν

$$90 = 2 \times 45 = 2 \times 3 \times 15 = 2 \times 3 \times 3 \times 5 = 2 \times 3^2 \times 5.$$

Διατάσσεται δὲ ἡ πράξις ὡς ἑξῆς·

90	2
45	3
15	3
5	5
1	

Ἐστω ἐπίσης πρὸς ἀνάλυσιν ὁ ἀριθμὸς 924·  
ἐργαζόμενοι ὁμοίως εὐρίσκομεν

924	2
462	2
231	3
77	7
11	11

$$924 = 2^2 \times 3 \times 7 \times 11$$

καὶ γενικῶς·

Διὰ  $n$  ἀναλύσωμεν ἀριθμὸν σύνθετον εἰς τοὺς πρῶτους αὐτοῦ παράγοντας, διαιροῦμεν αὐτὸν διὰ τοῦ δευτέρου του διαιρέτου (§ 121). Τὸ πηλίκον θεωροῦμεν ὡς νέον διαιρετέον, ἐργαζόμεθα δὲ ὅπως καὶ μὲ τὸν δοθέντα ἀριθμὸν· καὶ ἑξακολουθοῦμεν οὕτω μέχρις οὔ εὑρωμεν πηλίκον τὴν μονάδα.

Ἡ διάταξις δὲ τῆς πράξεως γίνεται ὡς ἐξῆς: Πάντας τοὺς διαιρετέους γράφομεν κατὰ σειρὰν εἰς μίαν στήλην· δεξιὰ δὲ ταύτης γράφομεν τοὺς ἀντιστοιχοὺς διαιρέτας· τὸ γινόμενον τῶν διαιρετῶν τούτων εἶναι γινόμενον πρώτων παραγόντων ἴσον πρὸς τὸν πρώτον διαιρετέον.

Ἐνίοτε συμφέρει ν' ἀναλύωμεν ἀριθμὸν τινα σύνθετον εἰς γινόμενα ἄλλων συνθέτων εὐκόλως ἀναλυομένων.

$$\text{Π. χ. } 72000 = 72 \times 1000 = 8 \times 9 \times 1000 = \\ 2^3 \times 3^2 \times 2^3 \times 5^3 = 2^6 \times 3^2 \times 5^3.$$

Ἐὰν ἀνελύτο ὁ 72000 εἰς πρώτους παράγοντας, κατὰ τὸν προηγούμενον κανόνα θὰ εὐρίσκομεν τὸ αὐτὸ γινόμενον, ὡς ἀμέσως ἔπεται ἐκ τῆς προτάσεως (§ 124), καὶ γενικῶς·

Καθ' οἷονδήποτε τρόπον καὶ ἂν ἀναλύσωμεν ἀριθμὸν εἰς πρώτους παράγοντας πάντοτε τοὺς αὐτοὺς παράγοντας θὰ εὕρωμεν.

### Ἐφαρμογαί.

Πολλαὶ ἰδιότητες τῶν ἀριθμῶν καθίστανται προφανεῖς, ὅταν ἔχωμεν αὐτοὺς ἀναλελυμένους εἰς τοὺς πρώτους αὐτῶν παράγοντας.

#### Α'. Πολλαπλασιασμός.

Τὸ γινόμενον ἀριθμῶν πρὸς ποῖον γινόμενον πρώτων παραγόντων ἰσοῦται :

129. — Ἐστω ὅτι

$$A = 2^3 \times 3^5 \times 7^2$$

καὶ

$$B = 2^2 \times 3^4 \times 11 \times 7^2$$

τότε  $A \times B = (2^3 \times 3^5 \times 7^2) \times (2^2 \times 3^4 \times 11 \times 7^2)$

Ὅθεν (§ 46, δ'. § 71 α').

$$A \times B = 2^3 \times 3^5 \times 7^2 \times 2^2 \times 3^4 \times 11 \times 7^2 = 2^5 \times 3^9 \times 7^4 \times 11$$

(§ 46, α').

ἦτοι τὸ γινόμενον  $A \times B$ , ἰσοῦται πρὸς γινόμενον ἔχον πρώτους παράγοντας πάντας τοὺς πρώτους, τοὺς παρουσιαζομένους εἰς τὰ γινόμενα τὰ ἴσα πρὸς  $A$  καὶ  $B$  καὶ ἐκθέτην εἰς ἕκαστον ἐξ αὐτῶν τὸ ἄθροισμα τῶν ἀντιστοίχων ἐκθετῶν ἐν τοῖς  $A$  καὶ  $B$ .

Καὶ γενικῶς·

Τὸ γινόμενον ἀριθμῶν εἶναι γινόμενον περιέχον πάντας τοὺς πρώτους παράγοντας αὐτῶν καὶ ἕκαστον μὲ ἐκθέτην ἴσον πρὸς τὸ ἄθροισμα τῶν ἀντιστοίχων ἐκθετῶν.

Πῶς ἀριθμὸς ἀναλελυμένος εἰς πρώτους παράγοντας ὑφούται εἰς τὴν δευτέραν, τρίτην, ... νουστήν δύναμιν;

130. Ἐστω

$$A = 2^3 \times 3^5 \times 7^2 \times 11$$

$$\text{τότε (§ 129). } A^2 = 2^{3 \times 2} \times 3^{5 \times 2} \times 7^{2 \times 2} \times 11^{1 \times 2}$$

$$A^3 = 2^{3 \times 3} \times 3^{5 \times 3} \times 7^{2 \times 3} \times 11^{1 \times 3}$$

$$\dots \dots \dots$$

$$A^v = 2^{3 \times v} \times 3^{5 \times v} \times 7^{2 \times v} \times 11^{1 \times v}.$$

Ἔθεν :

Ἄριθμὸς ἀναλελυμένος εἰς πρώτους παράγοντας ὑφούται εἰς τὴν δευτέραν, τρίτην, ... νουστήν δύναμιν ἔὰν οἱ ἐκθέται πολλαπλασιασθῶσιν ἐπὶ  $2, 3, \dots, v$ .

Πῶς διακρίνομεν ἂν ἀριθμὸς τις ἀναλελυμένος εἰς πρώτους παράγοντας εἶναι τετράγωνον ἄλλου ἢ κύβος ἄλλου κ.τ.λ;

\* 131. — α'.) Ἐστω  $A = 2^6 \times 3^8 \times 7^4$ ,

ἴπου πάντες οἱ ἐκθέται εἶναι ἄρτιοι· τότε διαιροῦμεν αὐτοὺς διὰ 2 καὶ σχηματίζομεν τὸ γινόμενον  $2^3 \times 3^4 \times 7^2$ · τὸ τετράγωνον τούτου (§ 130) εἶναι ὁ δοθεὶς ἀριθμὸς.

β'.) Ἐστω  $A = 2^7 \times 3^8 \times 7^4$ ,

ἴπου δὲν εἶναι πάντες οἱ ἐκθέται ἄρτιοι. Παρατηροῦμεν ὅτι, ἔὰν

ὑπῆρχεν ἄλλος τις ἀριθμὸς B τοιοῦτος ὥστε  $A=B^2$ , τότε ἀναλύοντες εἰς πρώτους παράγοντας τὸν B καὶ ὑψοῦντες εἰς τὸ τετράγωνον θὰ ἐλαμβάνομεν (§ 130) ἐκθέτας ἀρτίους· ὥστε δὲν εἶναι δυνατὸν ὁ B<sup>2</sup> νὰ δώσῃ  $2^7 \times 3^8 \times 7^4$ . ἄρα·

Ἄριθμὸς τις εἶναι τέλειον τετράγωνον, ἐὰν οἱ ἐκθέται ἐν τῷ γινομένῳ τῶν πρώτων παραγόντων εἰς οὓς ἀναλύεται εἶναι ἄρτιοι καὶ τότε μόνον.

Ὁμοίως παρατηροῦμεν ὅτι·

Ἄριθμὸς τις εἶναι κύβος ἄλλου, ἐὰν οἱ ἐκθέται τῶν πρώτων παραγόντων τοῦ εἶναι διαιρετοὶ διὰ 3 καὶ τότε μόνον. Καὶ γενικῶς·

Ἄριθμὸς τις εἶναι νιοστή δύναμις ἄλλου, ἐὰν οἱ ἐκθέται τῶν πρώτων αὐτοῦ παραγόντων εἶναι διαιρετοὶ διὰ ν καὶ τότε μόνον.

### Ἀσκήσεις.

163). Ἐστῶσαν

$$A=2^3 \times 3^5 \times 11, B=2 \times 3^4, \Gamma=2^2 \times 5 \times 23$$

Νὰ παρασταθῇ τὸ γινόμενον

$$A^2 \times B^5 \times \Gamma^3$$

ἀναλελυμένον εἰς τοὺς πρώτους αὐτοῦ παράγοντας.

164). Ἄριθμὸς τις εἶναι τετράγωνον ἄλλου, διαιρεῖται δὲ διὰ τοῦ 8. Νὰ δεიχθῇ ὅτι θὰ διαιρῆται διὰ τοῦ 16. (§ 131)

165). Ἐστῶ ὅτι ἀριθμὸς τις A εἶναι διαιρετὸς διὰ πρώτου τινὸς ἀριθμοῦ καὶ δὲν εἶναι διὰ τοῦ τετραγώνου του· τότε ὁ A δὲν εἶναι τετράγωνον. (§ 131)

166). Ἐὰν ἀριθμὸς τις εἶναι διαφορὰ δύο τετραγώνων, θὰ εἶναι ἢ περιττὸς ἢ πολλαπλάσιον τοῦ 4 (ἄσκ 75).

167). Ἐὰν ἀριθμὸς τις A εἶναι τετράγωνον ἄλλου, τότε ὁ ἀριθμὸς  $A \times \Pi$ , ἔπου  $\Pi$  εἶναι οἰοσδήποτε πρώτος, δὲν εἶναι τετράγωνον ἄλλου. (§ 129 131.)

B'. Ἰκανὴ καὶ ἀναγκαία συνθήκη ἵνα ἀριθμὸς τις εἶναι διαιρετὸς δι' ἄλλου.

Πῶς διακρίνομεν ἀμέσως, ὅταν ἔχωμεν δύο ἀριθμοὺς ἀναλελυμένους εἰς πρώτους παράγοντας, ἂν ὁ εἰς εἶναι διαιρετὸς διὰ τοῦ ἄλλου;

132. — Ἐστω

$$A = 2^5 \times 3^4 \times 7^2 \times 11 \text{ καὶ } B = 2^3 \times 3^4 \times 11.$$

Εἰς τὸ παράδειγμα τοῦτο οἱ πρώτοι παράγοντες τοῦ B ἀποτελοῦσιν ἓν μέρος τῶν πρώτων παραγόντων τοῦ A· οἱ ἐπίλοιποι, οἵτινες εἶναι παράγοντες τοῦ A χωρὶς νὰ εἶναι τοῦ B, σχηματίζουν ἀριθμὸν τινα Π καὶ ἔχομεν·

$$A = (2^3 \times 3^4 \times 11) \times (2^2 \times 7^2) = B \times \Pi.$$

Ὅστε, ἂν οἱ πρώτοι παράγοντες τοῦ B εἶναι καὶ πρώτοι παράγοντες τοῦ A καὶ μὲ ἐκθέτην οὐχὶ μικρότερον, ὁ A διαιρεῖται διὰ τοῦ B.

Ἐστω

$$A = 2^5 \times 3^4 \times 7^2 \times 11 \text{ καὶ } B = 2 \times 3 \times 7^2 \times 13.$$

Ἐὰν ὁ A διηρηθεῖ διὰ τοῦ B, θὰ εἶχομεν·

$$2^5 \times 3^4 \times 7^2 \times 11 = 2 \times 3 \times 7^2 \times 13 \times \Pi.$$

Ἀπὸ οἴουσδήποτε πρώτους παράγοντας καὶ ἂν ἀποτελεῖται ὁ Π, θὰ ἔχωμεν εἰς τὸ δεύτερον γινόμενον τὸν παράγοντα 13 μὴ περιεχόμενον εἰς τὸ πρῶτον· ἐπομένως (§ 124) ἡ ἰσότης αὕτη δὲν εἶναι δυνατὴ· λοιπὸν ὁ A δὲν διαιρεῖται διὰ τοῦ B. Ἄρα·

Ἴνα ἀριθμὸς τις A διαιρηθῆται δι' ἄλλου B, πρέπει νὰ περιέχῃ πάντας τοὺς πρώτους παράγοντας τοῦ B καὶ μὲ ἐκθέτην οὐχὶ μικρότερον· τοῦτο δὲ καὶ ἀρκεῖ.

Κατὰ ταῦτα ὁ ἀριθμὸς  $3^5 \times 7 \times 13^4$  διαιρεῖται διὰ τοῦ  $3^4 \times 7 \times 13^2$ , δὲν διαιρεῖται δὲ διὰ τοῦ  $3^6$ . ἐπίσης ὁ  $2^7 \times 3 \times 5^3 \times 17^2$  διαιρεῖται διὰ τοῦ  $2^5 \times 3 \times 5^2 \times 17$ , ἀλλὰ δὲν διαιρεῖται διὰ τοῦ  $3^2$ .

## Ἀσκήσεις.

168). Τὸ ὑπόλοιπον διαιρέσεως περιττοῦ δι' ἀρτίου οὐδέποτε εἶναι μηδέν (§ 132).

$$169). \quad A=2^7 \times 3^5 \times 5^4 \times 7, \quad B=2^4 \times 3^2 \times 5^2 \times \beta^2$$

ὁ β εἶναι πρῶτος διάφορος τῶν 2, 3, 5.

Νὰ εὑρεθῶσιν αἱ τιμαὶ τῶν β, λ, ἵνα ἡ διαίρεσις  $A : B$  εἶναι τελεία.

170). Ἐὰν ἀριθμὸς δὲν διαιρῆται δι' οὐδενὸς ἐκ τῶν πρώτων ὧν τὰ τετράγωνα περιέχει, εἶναι πρῶτος. Ἐστω τοιοῦτος ὁ ἀριθμὸς  $A$ : ἐὰν ἦτο σύνθετος, θὰ ἀνελύετο εἰς γινόμενον παραγόντων πρώτων (§ 122), ἐκάστου τῶν ὁποίων τὸ τετράγωνον θὰ εἶναι μεγαλύτερον τοῦ  $A$ . Ἐπομένως, ἐὰν

$$A = \alpha \times \beta \times \dots,$$

τότε κατὰ τὴν ὑπόθεσιν  $\alpha^2 > A, \beta^2 > A$ .

καὶ ἐπομένως

$$\alpha^2 \times \beta^2 > A \times A.$$

ἄλλ' ἡ ἀνισότης αὕτη δὲν δύναται νὰ συνυπάρχῃ μετὰ τὴν ἰσότητα

$$A = \alpha \times \beta \times \dots$$

171.) Γνωστοῦ ὄντος ὅτι ὁ ἀριθμὸς

$$2 \times 3 \times 5 \times 7 + 1$$

εἶναι μικρότερος τοῦ  $17^2$  καὶ ὅτι δὲν διαιρεῖται διὰ 11 καὶ διὰ 13, νὰ δευχθῆ ὅτι οὗτος εἶναι πρῶτος. (§ 127).

172). Πῶς εὑρίσκονται πάντες οἱ διαιρέται δεδομένων ἀριθμῶν ;

$$\text{Ἐστω} \quad A = \alpha^{\lambda} \times \beta^{\mu} \times \gamma^{\nu},$$

ὅπου  $\alpha, \beta, \gamma$  εἶναι ἀριθμοὶ πρῶτοι: τότε ἄς λάβωμεν ἕνα προσθετέον τοῦ ἀθροίσματος

$$1 + \alpha + \alpha^2 + \dots + \alpha^{\lambda},$$

ἕνα προσθετέον τοῦ ἀθροίσματος

$$1 + \beta + \beta^2 + \dots + \beta^{\mu}$$

καὶ ἓνα προσθετέον τοῦ ἀθροίσματος

$$1 + \gamma + \gamma^2 + \dots + \gamma^{\nu}$$

καὶ ἄς πολλαπλασιάσωμεν αὐτούς· θὰ ἔχωμεν ἓνα διαιρέτην τοῦ  $A$ · καὶ ἀντιστρόφως πᾶς διαιρέτης τοῦ  $A$  περιλαμβάνεται εἰς τοὺς οὕτω σχηματιζομένους. (§ 132)

Ἐκ τοῦ τρόπου καθ' ὃν ἐνταῦθα ἐσχηματίσαμεν τοὺς διαιρέτας δυνάμεθα νὰ συμπεράνωμεν ὅτι ὁ ἀριθμὸς τῶν διαιρητῶν εἶναι

$$(\lambda + 1) \cdot (\mu + 1) \cdot (\nu + 1)$$

καὶ γενικῶς ὁ ἀριθμὸς τῶν διαιρητῶν ἑνὸς ἀριθμοῦ ἀναλελυμένου εἰς πρώτους παράγοντας ἰσοῦται τῷ γινομένῳ τῷ σχηματιζομένῳ μὲ παράγοντας τοὺς ἐκθέτας ἠδὲξημένους κατὰ μονάδα· π. χ.· ἐὰν

$$A = 2^3 \times 3^2 \times 5^7 \times 11,$$

τότε ὁ ἀριθμὸς τῶν διαιρητῶν τοῦ  $A$  θὰ εἶναι

$$(3 + 1) \times (2 + 1) \times (7 + 1) \times (1 + 1) = 192.$$

173.) Νὰ εὑρεθῶσιν ἀριθμοὶ μὲ 12 διαιρέτας. (\* Ἀσκ. 172).

174.) Νὰ εὑρεθῇ ἀριθμὸς διαιρητῶν διὰ 7, 11, 13 καὶ ἔχων 12 διαιρέτας. (\* Ἀσκ. 172).

175.) Ποῖος εἶναι ὁ μικρότερος ἐκ τῶν ἀριθμῶν τῶν ἐχόντων 6 διαιρέτας; (\* Ἀσκ. 172).

176.) Ἐὰν ἀριθμὸς τις εἶναι τετράγωνον ἄλλου, ἔχει περιττὸν πλῆθος διαιρητῶν. (\* Ἀσκ. 172).

177.) Τὸ γινόμενον  $\alpha \times (\alpha^2 + 20)$  διαιρεῖται διὰ τοῦ 8, ἐὰν ὁ  $\alpha$  εἶναι ἄρτιος (§ 132, \* Ἀσκ. 165).

178.) Τὸ γινόμενον τεσσάρων διαδοχικῶν ἀριθμῶν εἶναι διαιρητὸν διὰ 24. (§ 117 § 132).

Ἐῤῥεσις τοῦ  $\mu$ .  $\kappa$ .  $\delta$ . καὶ τοῦ  $\epsilon$ .  $\kappa$ .  $\pi$ . ἀριθμῶν ἀναλελυμένων εἰς πρώτους παράγοντας.

133. — Ἐστῶσαν οἱ ἀριθμοὶ  $A$ ,  $B$ ,  $\Gamma$ , ἔπου

$$A = 2^3 \times 3^2 \times 5 \times 7, \quad B = 2^2 \times 3^4 \times 5^2 \times 11$$

$$\text{καὶ } \Gamma = 2 \times 3^5 \times 5 \times 11^2.$$

Ἐστω  $\kappa$  ὁ τυχὼν  $\kappa$ .  $\delta$ . αὐτῶν· πρέπει οἱ πρώτοι παράγοντες τοῦ  $\kappa$  νὰ περιέχωνται καὶ εἰς τοὺς τρεῖς ἀριθμούς, (§ 132) ἄρα



δὲν δύναται νὰ περιέχῃ ὁ  $x$  πρώτους παράγοντας διαφόρους τῶν 2, 3, καὶ 5 ὅτινες εἶναι κοινοί· ἦτοι ὁ  $x$  θὰ εἶναι τῆς μορφῆς

$$2^\lambda \times 3^\mu \times 5^\nu,$$

ἔπου ὁ  $\lambda$  θὰ εἶναι ἢ 0 ἢ 1 (§ 71, α'), ὁ  $\mu$  ἢ 0 ἢ 1 ἢ 2 καὶ ὁ  $\nu$  ἢ 0 ἢ 1.

Καὶ ἀντιστρόφως· Πᾶς ἀριθμὸς τῆς μορφῆς

$$2^\lambda \times 3^\mu \times 5^\nu$$

(ἔπου οἱ  $\lambda$ ,  $\nu$  δὲν ὑπερβαίνουν τὴν μονάδα καὶ ὁ  $\mu$  τὸν 2) θὰ εἶναι κ. δ. τῶν A, B, Γ (§ 132). Ὁθεν ὁ  $\mu$  κ. δ. θὰ εἶναι

$$2^\lambda \times 3^\mu \times 5^\nu \text{ ἔπου } \lambda=1, \mu=2, \nu=1. \quad \text{ἦτοι}$$

Ἡ ὁ μ. κ. δ. ὁσωνδήποτε ἀριθμῶν ἀναλελυμένων εἰς πρώτους παράγοντας ἰσοῦται πρὸς γινόμενον περιέχον πάντας τοὺς κοινοὺς παράγοντας αὐτῶν ἕκαστον μὲ τὸν ἐλάχιστον ἐκθέτην.

134.— Ἄς ζητήσωμεν τὸ ε. κ. π. τῶν ἰδίων ἀριθμῶν. Ἐστω Π τὸ τυχόν κ.π. αὐτῶν· τὸ Π θὰ περιέχῃ τὸ  $2^3$ , διότι ἄλλως δὲν θὰ ἦτο διαιρετὸν διὰ τοῦ A· ὁμοίως θὰ περιέχῃ τὸ  $3^5$ , τὸ  $5^2$ , τὸ 7 καὶ τὸ  $11^2$  (§ 132), ἦτοι θὰ εἶναι τῆς μορφῆς

$$\begin{aligned} \text{Π} &= 2^\lambda \times 3^\mu \times 5^\nu \times 7^\rho \times 11^\kappa \times \dots, \quad \text{ἔπου} \\ (1) \quad \lambda &\geq 3, \mu \geq 5, \nu \geq 2, \rho \geq 1, \kappa \geq 2 \end{aligned}$$

Καὶ ἀντιστρόφως·

Πᾶς ἀριθμὸς τῆς μορφῆς

$$2^\lambda \times 3^\mu \times 5^\nu \times 7^\rho \times 11^\kappa \times \dots$$

(ἔπου  $\lambda$ ,  $\mu$ ,  $\nu$ ,  $\rho$ ,  $\kappa$  ἔχουσι τιμὰς ὑπαγομένης εἰς τὰς σχέσεις (1)) εἶναι κ. π. τῶν ἀριθμῶν A, B, Γ· ὥστε τὸ ε. κ. π. θὰ εἶναι

$$2^3 \times 3^5 \times 5^2 \times 7 \times 11^2. \quad \text{ἄρα}$$

Τὸ ε. κ. π. ὁσωνδήποτε ἀριθμῶν ἰσοῦται πρὸς γινόμενον περιέχον πάντας τοὺς πρώτους αὐτῶν παράγοντας, κοινοὺς καὶ μὴ κοινοὺς καὶ ἕκαστον μὲ τὸν μεγαλύτερον ἐκθέτην.

## Ἀσκήσεις.

Δι' ἀναλύσεως εἰς τοὺς πρώτους παράγοντας.

179). Νὰ εὑρεθῇ ὁ μ. κ. δ. τῶν ἀριθμῶν 36, 48, 108, τῶν 15, 612, 351 καὶ τῶν 68, 136, 255.

180). Ἐπίσης τῶν 21, 147, 252, τῶν 63, 315, 567, τῶν 56, 411, 602 καὶ τῶν 8496, 3744, 3696 καὶ 3720.

181). Ἐπίσης τῶν 15, 135, 180, τῶν 116, 261, 435, τῶν 140, 175, 315, τῶν 420, 580, 160, 870 καὶ τῶν 670, 315, 720, 1012.

182). Νὰ εὑρεθῇ τὸ ε. κ. π. τῶν ἀριθμῶν 15863 καὶ 21489, τῶν 99, 66, 462, 539, 1089, τῶν 225, 255, 289, 1023, 4095 καὶ τῶν 732, 428, 144, 86.

183). Νὰ εὑρεθῇ τὸ ε. κ. π. τῶν ἀριθμῶν 540, 270, 45, 15, καὶ τῶν 8316, 3414, 2366, 3332.

Διὰ τῆς ἀναλύσεως εἰς πρώτους παράγοντας νὰ δειχθῇ ὅτι

184). α'. Πᾶν ε. κ. π. ἀριθμῶν εἶναι πελλαπλάσιον τοῦ ε. κ. π. αὐτῶν (§ 134)

185). β'. Τὸ ε. κ. π. ἀριθμῶν πρώτων πρὸς ἀλλήλους ἀνά δύο εἶναι τὸ γινόμενον αὐτῶν. (§ 134).

186). γ'. Ὁ μ. κ. δ. δύο ἀριθμῶν ἐπὶ τὸ ε. κ. π. αὐτῶν ἰσοῦται πρὸς τὸ γινόμενον αὐτῶν καὶ γενικῶς ν' ἀποδειχθῶσιν αἱ ἰδιότητες τοῦ μ. κ. δ. καὶ τοῦ ε. κ. π. (§ 100, 101, 102, 103, 104.)

187). Ἐκ τοῦ μ. κ. δ. τῶν ἀριθμῶν A καὶ B νὰ εὑρεθῇ ὁ μ. κ. δ. τῶν ἀριθμῶν  $A^3$  καὶ  $B^3$  (§ 130 § 133).

## ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄.

## ΚΛΑΣΜΑΤΑ

## Ὁρισμοί.

135. Ὅπως, ἐὰν φαντασθῶμεν ἓν πρᾶγμα μοιρασθὲν εἰς δύο ἴσα μέρη, τότε ἕκαστον τῶν ἴσων μερῶν λαμβανόμενον δις δίδει τὸ ἅλον πρᾶγμα, οὕτω καὶ παραδεχόμεθα ὅτι ἔχομεν καὶ ἀριθμὸν ὅστις ἐπαναλαμβάνόμενος δις δίδει τὴν μονάδα 1· τοῦτο καλοῦμεν ἐν δεύτερον ἢ καὶ ἥμισυ καὶ σημειοῦμεν  $\frac{1}{2}$

ὁμοίως καλοῦμεν ἐν τρίτον καὶ σημειοῦμεν  $\frac{1}{3}$  τὸν ἀριθμὸν διὰ τὸν ὅποιον παραδεχόμεθα ὅτι ἐπαναλαμβάνόμενος τρις δίδει τὴν μονάδα 1 κ. ο. κ. Καὶ γενικῶς·

Παριστῶμεν διὰ τοῦ  $\frac{1}{\mu}$  τὸν ἀριθμὸν ὅστις παραδεχόμεθα ὅτι ἐπαναλαμβάνόμενος  $\mu$  φορές δίδει τὴν μονάδα 1.

Οἱ ἀριθμοὶ

$$\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots, \frac{1}{\mu}$$

καλοῦνται κλασματικαὶ μονάδες. Ἡ δὲ μονὰς 1 λέγεται ἀκεραία μονάς. Αἱ κλασματικαὶ αὗται μονάδες καὶ οἱ δι' ἐπαναλήψεως τούτων γινόμενοι ἀριθμοὶ λέγονται κλασματικοὶ ἀριθμοὶ ἢ καὶ κλάσματα π.χ. ἡ ἐπανάληψις τοῦ  $\frac{1}{5}$  τετράκις δίδει τὸ

κλάσμα τέσσαρα πέμπτα, ὅπερ σημειοῦται  $\frac{4}{5}$  Γενικῶς τὸ σύμβολον  $\frac{\alpha}{\beta}$  θὰ δηλοῖ ὅτι τὴν κλασματικὴν μονάδα  $\frac{1}{\beta}$  ἐπανελάβο-

μεν α φοράς· καὶ ὁ α καλεῖται ἀριθμητής. ὁ δὲ β παρονομασ-  
τής τοῦ κλάσματος.

Ἴνα ἀπαγγείλωμεν τὸ κλάσμα, μεταχειρίζομεθα διὰ μὲν  
τὸν ἀριθμητὴν τὰ ὀνόματα τῶν ἀπολύτων ἀριθμητικῶν, διὰ  
δὲ τὸν παρονομαστὴν τὰ τῶν τακτικῶν. Ὁ ἀριθμητής α δηλοῖ  
τὸ πλῆθος τῶν ληφθεισῶν κλασματικῶν μονάδων, ἐνῶ ὁ παρο-  
νομαστής β δεικνύει ποῖα μόνος κλασματικὴ ἐπαναλαμβάνεται  
ἦτοι· ἐὰν ἐπαναλάβωμεν β φορές τὴν ληφθεῖσαν κλασματικὴν  
μονάδα, θὰ ἔχωμεν τὴν ἀκεραίαν.

Ὅροι κλάσματος λέγονται ὁ ἀριθμητής αὐτοῦ καὶ ὁ παρο-  
νομαστής.

Ἐὰν κλάσμα τι ἔχῃ ὄρους ἴσους, ὅπως  $\frac{2}{2}$ ,  $\frac{3}{3}$  ····, εἶναι  
προφανῶς ἴσον τῇ ἀκεραία μονάδι. Ἐπεκτείνοντες τοὺς ὀρι-  
σμοὺς ἰσότητος καὶ ἀνισότητος (§ 23) ἐπὶ τῶν κλασμάτων  
τῶν γινομένων δι' ἐπαναλήψεως τῆς αὐτῆς κλασματικῆς μο-  
νάδος ἔχομεν ὅτι κλάσμα εἶναι μεγαλύτερον τῆς ἀκεραίας μο-  
νάδος, ὅταν ὁ ἀριθμητής εἶναι μεγαλύτερος τοῦ παρονομαστοῦ.

### Τροπὴ ἀκεραίου εἰς κλάσμα.

136. Ἐχομεν τὸν ἀκέραιον 4 νὰ τρέψωμεν εἰς ἑβδομα. Ἐκά-  
στη ἀκεραία μόνος ἰσοῦται (§ 135) πρὸς  $\frac{1}{7}$  ἐπτάκις λαμβανό-  
μενον· ἔθεν αἱ 4 ἀκέραιαι μονάδες ἰσοῦνται πρὸς τὸ 28πλάσιον  
τοῦ  $\frac{1}{7}$  ἦτοι

$$4 = \frac{4 \times 7}{7}$$

ἔθεν·

Πᾶς ἀκέραιος ἰσοῦται μὲ κλάσμα ἔχον παρονομαστὴν δο-  
θέντα ἀριθμὸν, ἀριθμητὴν δὲ τὸ γινόμενον τοῦ ἑαυτοῦ του ἐπὶ  
τὸν ἀριθμὸν.

## Περὶ μικτῶν ἀριθμῶν.

137. — Ὁ  $3\frac{4}{5}$  σύγκειται ἐξ ἀκεραίου καὶ κλάσματος· καλεῖται δὲ μικτός.

Ὁπως ἐπίσης ὁ  $7\frac{2}{9}$  καὶ γενικῶς·

Μικτὸς ἀριθμὸς λέγεται ὁ συγκείμενος ἐξ ἀκεραίου καὶ κλάσματος.

Ἐστω ὁ μικτὸς  $4\frac{2}{7}$ · ἐπειδὴ  $4 = \frac{4 \times 7}{7}$  ἔχομεν·

$$4\frac{2}{7} = \frac{4 \times 7 + 2}{7}$$

ἔθεν·

Μικτὸς τρέπεται εἰς κλάσμα, ἐὰν πολλαπλασιασθῇ ὁ ἀκέραιος ἐπὶ τὸν παρονομαστήν καὶ προστεθῇ εἰς τὸ γινόμενον ὁ ἀριθμητής, ὑπὸ τὸ ἄθροισμα δὲ αὐτὸ γραφῇ ὁ αὐτὸς παρονομαστής.

## Ἐξαγωγή τῶν ἀκεραίων μονάδων τοῦ κλάσματος.

138. Ἐστω τὸ κλάσμα  $\frac{35}{8}$ · τοῦτο ἰσοῦται πρὸς

$$\frac{8+8+8+8+3}{8}$$

ἀλλὰ τὸ αὐτὸ ἄθροισμα θὰ εἶχον, ἐὰν ἐπανελάμβανον τὸ  $\frac{1}{8}$  πρῶτον 8 φορές, ὅποτε θὰ εἶχον τὴν ἀκεραίαν μονάδα, ἔπειτα ἄλλας 8 κ. ο. κ. ὅποτε θὰ εὔρισκον  $4\frac{3}{8}$ · προφανῶς ὁ ἀκέραιος 4 εἶναι ἀκέραιον πηλίκον τῆς διαιρέσεως  $35 : 8$ , ὁ δὲ ἀριθμητής 3 τὸ ὑπόλοιπον ἔθεν :

Διὰ τὰ ἐξαγάγωμεν τὰς ἀκεραίας μονάδας κλάσματος μείζονος τῆς μονάδος, διαιροῦμεν τὸν ἀριθμητὴν διὰ τοῦ παρονομαστοῦ αὐτοῦ. Τὸ πηλίκον δηλοῖ τὸν μεγαλύτερον ἀκέραιον τὸν περιεχόμενον ἐν τῷ κλάσματι, τὸ δὲ ὑπόλοιπον λαμβάνομεν ὡς ἀρι-

θμητήν καὶ τὸν διαιρέτην ὡς παρονομαστήν, ἵνα σχηματίσωμεν τὸ ἀπομένον κλάσμα.

Ἐὰν τὸ ὑπόλοιπον εἶναι 0, τὸ δοθὲν κλάσμα ἰσοῦται πρὸς ἀκέραιον.

### Ἀσκήσεις.

188.) Νὰ τραπῶσιν εἰς κλάσματα οἱ μικτοὶ

$$15\frac{2}{3}, \quad 113\frac{4}{7}, \quad 1043\frac{21}{31}, \quad 15433\frac{35}{33},$$

$$121045\frac{106}{113}, \quad 18300457\frac{1304}{2081}$$

189.) Ὅμοιος οἱ μικτοὶ

$$14\frac{13}{15}, \quad 2003\frac{1}{7}, \quad 57\frac{31}{43}$$

$$13\frac{83}{84}, \quad 106\frac{119}{851}, \quad 17\frac{2605}{2859}$$

190.) Νὰ ἐξαχθῶσιν αἱ ἀκέραιαι μονάδες αἱ περιεχόμεναι εἰς τὰ κλάσματα

$$\frac{41}{9}, \quad \frac{311}{12}, \quad \frac{767}{224}, \quad \frac{472694}{1107}$$

$$\frac{1218}{11}, \quad \frac{315489}{187}$$

191.) Ποσάκις τὸ  $\frac{1}{9}$  περιέχεται εἰς τὸ 6 ;

### Ἰδιότητες τῶν κλασμάτων.

Πόσον εἶναι τὸ γινόμενον κλάσματός τινος ἐπὶ τὸν παρονομαστήν του;

139. Ἐστω τὸ κλάσμα  $\frac{2}{5}$ · τοῦτο κατὰ τὸν ὄρισμόν (135) εἶναι τὸ διπλάσιον τοῦ  $\frac{1}{5}$ · ἄς λάβω 5 φορές τὸ  $\frac{2}{5}$ · ἐπαναλαμ-

βάνω πρώτον 5 φορές τὸ  $\frac{1}{5}$ . ἀλλὰ πεντάκις ἐπαναλαμβανόμενον τὸ  $\frac{1}{5}$  δίδει τὴν μονάδα· ὥστε  $2 \times 5$  φορές θὰ δώσῃ 2 ἀκεραίας

μονάδας· ἔθεν  $\frac{2}{5} \times 5 = 2$ . ἦτοι·

Πᾶν κλάσμα πολλαπλασιαζόμενον ἐπὶ τὸν παρονομαστήν του δίδει γινόμενον τὸν ἀριθμητὴν του.

Ἄρα·

Πᾶν κλάσμα δυνάμεθα νὰ θεωρῶμεν ὡς πηλίκον τοῦ ἀριθμητοῦ του διὰ τοῦ παρονομαστοῦ του (§ 58).

Καὶ οὕτως ἡ διαίρεσις δύο οἰωνδῆποτε ἀκεραίων γίνεται τελεία, ἔταν διὰ τὸ πηλίκον ἐπιτραπῆ νὰ μεταχειρισθῶμεν καὶ κλασματικούς ἀριθμούς· π. χ. τῆς διαιρέσεως  $12 : 5$  πηλίκον εἶναι

$$\text{τὸ } \frac{12}{5} \text{ ἦτοι τὸ } 2 \frac{2}{5}.$$

ὁμοίως πηλίκον τῆς διαιρέσεως  $2 : 3$  εἶναι τὸ  $\frac{2}{3}$ .

Τίνα μεταβολὴν πάσχει ἓν κλάσμα, ἐὰν πολλαπλασιάσωμεν τὴν ἀριθμητὴν του ἐπὶ τινὰ ἀκέραιον ἢ διαιρέσωμεν διὰ τινος ἀκεραίου;

140. Τὸ  $\frac{3}{4}$  σημαίνει νὰ ἐπαναληφθῆ τρεῖς φορές τὸ  $\frac{1}{4}$  (§ 135).

Τὸ  $\frac{3 \times 5}{4}$  σημαίνει νὰ ἐπαναλάβωμεν  $3 \times 5$  φορές τὸ  $\frac{1}{4}$ . εὕρισκομεν προφανῶς ἀριθμὸν πενταπλάσιον τοῦ προηγουμένου· ἢ καὶ ἀντιστρόφως· τὸ  $\frac{3}{4}$  εἶναι πεντάκις μικρότερον τοῦ  $\frac{3 \times 5}{4}$ . ἔθεν·

Ἐὰν ἀριθμητῆς κλάσματος πολλαπλασιασθῆ ἐπὶ ἀκέραιον, τὸ κλάσμα πολλαπλασιάζεται ἐπὶ τὸν αὐτὸν ἀκέραιον, ἐὰν δὲ διαιρεθῆ δι' ἀκέραιον τὸ κλάσμα διαιρεῖται διὰ τοῦ αὐτοῦ ἀκεραίου.

Ποίαν μεταβολήν πάσχει ἓν κλάσμα, ὅταν πολλαπλασιάσωμεν ἢ διαιρέσωμεν τὸν παρονομαστήν του διὰ τινος ἀκεραίου;

141. Ἐστωσαν τὰ κλάσματα  $\frac{5}{6}$  καὶ  $\frac{5}{18}$ · εἰς μὲν τὸ πρῶτον ἔχομεν τὸ  $\frac{1}{6}$  νὰ ἐπαναλάβωμεν πεντάκις, εἰς δὲ τὸ δεύτερον ἔχομεν τὸ  $\frac{1}{18}$  νὰ ἐπαναλάβωμεν πεντάκις. Ἐπειδὴ ἡ κλασματικὴ μονὰς  $\frac{1}{18}$  εἶναι τρεῖς μικρότερα τῆς κλασματικῆς μονάδος  $\frac{1}{6}$  (ὡς φαίνεται, ἂν παρατηρήσωμεν ὅτι τὸ  $\frac{1}{18}$  ἐπαναλαμβανόμενον 18 φορές δίδει τὴν μονάδα, ἐνῶ τὸ  $\frac{1}{6}$  ἐπαναλαμβανόμενον 6 φορές δίδει τὴν μονάδα) τὸ δεύτερον κλάσμα  $\frac{5}{18}$  θὰ εἶναι τρεῖς μικρότερον τοῦ πρώτου  $\frac{5}{6}$  ἢ καὶ ἀντιστρέφως· τὸ πρῶτον θὰ εἶναι τρεῖς μεγαλύτερον τοῦ δευτέρου· ἦτοι:

Ἐὰν ὁ παρονομαστὴς κλάσματος πολλαπλασιασθῇ ἐπὶ τινὰ ἀκέραιον, τὸ κλάσμα διαιρεῖται διὰ τοῦ αὐτοῦ ἀκεραίου, ἂν δὲ ὁ παρονομαστὴς διαιρεθῇ δι' ἐνὸς ἀκεραίου, τὸ κλάσμα πολλαπλασιάζεται ἐπὶ τὸν αὐτὸν ἀκέραιον.

Μεταβάλλεται ἡ ἀξία ἐνὸς κλάσματος, ὅταν πολλαπλασιάσωμεν ἀμφοτέρους τοὺς ὄρους του ἐπὶ τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν;

142. — Ἐστω τὸ κλάσμα  $\frac{5}{9}$  καὶ  $\rho$  τυχὼν ἀκέραιος· τότε τὸ

$$\frac{5 \times \rho}{9} \text{ ἰσοῦται πρὸς } \frac{5}{9} \times \rho \quad (\S 140)$$

Ἄφ' ἐτέρου ἔχομεν (§ 141)

$$\frac{5 \times \rho}{9 \times \rho} = \frac{5 \times \rho}{9} : \rho = \left( \frac{5}{9} \times \rho \right) : \rho = \frac{5}{9}$$



ἔθεν·

Ἡ ἀξία ἐνὸς κλάσματος δὲν ἀλλάσσει, ὅταν πολλαπλασιάσωμεν ἀμφοτέρους τοὺς ὄρους ἐπὶ τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν ἐπίσης·

Ἡ ἀξία ἐνὸς κλάσματος δὲν ἀλλάσσει, ὅταν διαιρέσωμεν ἀμφοτέρους τοὺς ὄρους διὰ τοῦ αὐτοῦ ἀριθμοῦ.

II. χ. τὰ κλάσματα

$$\frac{12}{30}, \frac{6}{15}, \frac{2}{5}$$

ἔχουσι τὴν αὐτὴν ἀξίαν.

### Ἀσκήσεις.

192.)  $\frac{3}{4}$  τοῦ πήχεως διενεμήθησαν ἐξ ἴσου εἰς 8 ἀνθρώπους· πόσον θὰ λάβῃ ἕκαστος ;

193.)  $7\frac{2}{5}$  τοῦ πήχεως διενεμήθησαν εἰς δύο ἀνθρώπους· πόσον ἔλαβεν ἕκαστος ;

194.) Νὰ εὑρεθῶσι κλάσματα ἴσα πρὸς τὰ ἡμίση τῶν

$$\frac{7}{8}, \frac{4}{5}, \frac{1}{6}$$

195) Νὰ εὑρεθῇ τὸ μέγιστον καὶ τὸ ἐλάχιστον τῶν κλασμάτων

$$\frac{2}{3}, \frac{1}{2}, \frac{4}{5}$$

196.) Θεωροῦντες τὴν διαίρεσιν τῶν δύο ἀκεραίων πάντοτε ὡς τελείαν (§ 139) ἔχομεν ὅτι: τὸ πηλίκον δύο ἀκεραίων μένει τὸ αὐτό, ἐὰν πολλαπλασιάσωμεν διαιρετέον καὶ διαιρέτην ἐπὶ τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν.

### Ἀπλοποιήσεις τῶν κλασμάτων.

143.— Λέγομεν ὅτι ἀπλοποιοῦμεν ἐν κλάσμα, ὅταν εὑρίσκωμεν ἄλλο ἔχον τὴν αὐτὴν ἀξίαν ἀλλ' ὄρους μικροτέρους. Εἶδομεν ὅτι

$$\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\alpha \times \rho}{\beta \times \rho} \quad (\S 142).$$

καὶ ἐπειδὴ ὡς πολλαπλασιαστὴν  $\rho$  δυνάμεθα νὰ λάβωμεν οἰονδήποτε ἀκέραιον, ἔπεται ὅτι δυνάμεθα νὰ σχηματίσωμεν ἀπειρίαν κλασμάτων ἰσοδύναμων τῷ  $\frac{\alpha}{\beta}$  μὲ ἀριθμητὰς καὶ παρονομαστὰς διαφόρους τῶν ἀρχικῶν.

Ἀντιστρόφως· ἐὰν διαιρέσωμεν τοὺς ἄρους ἑνὸς κλάσματος δι' ἑνὸς ἀκεραίου (κοινοῦ διαιρέτου τῶν ἄρων) λαμβάνομεν κλάσμα ἰσοδύναμον πρὸς αὐτὸ μὲ μικροτέρους ἄρους (§ 142)· ὥστε, ἐὰν δοθῇ κλάσμα μὲ ἄρους μὴ πρώτους πρὸς ἀλλήλους, δυνάμεθα νὰ εὔρωμεν ἄλλο ἰσοδύναμον πρὸς αὐτὸ μὲ ἄρους πρώτους πρὸς ἀλλήλους· ἀρκεῖ πρὸς τοῦτο προφανῶς νὰ διαιρέσωμεν ἀμφοτέρους τοὺς ἄρους διὰ τοῦ μ. κ. δ. αὐτῶν

$$\text{π. χ.} \quad \frac{48}{108} = \frac{4}{9}$$

Προκύπτει ἤδη τὸ ἐξῆς ἐρώτημα· εἶναι δυνατόν νὰ εὔρωμεν ἄλλο κλάσμα ἰσοδύναμον πρὸς τὸ  $\frac{4}{9}$  καὶ μὲ ἄρους μικροτέρους τῶν ἄρων αὐτοῦ ;

144. — Ἐστω  $\frac{\alpha}{\beta}$  τυχὲν κλάσμα ἐκ τῶν ἴσων ἐν γένει τῷ  $\frac{4}{9}$  ἦτοι:

$$\frac{\alpha}{\beta} = \frac{4}{9}$$

Πολλαπλασιάσω ἀμφοτέρους τοὺς ἄρους τοῦ πρώτου ἐπὶ 9 καὶ τοῦ δευτέρου ἐπὶ β (§ 142)· θὰ ἔχω

$$\frac{\alpha \times 9}{\beta \times 9} = \frac{4 \times \beta}{9 \times \beta}$$

τὰ κλάσματα ταῦτα ἔχουσι τοὺς αὐτοὺς παρονομαστὰς, ἄρα (ὡς ἴσα) θὰ ἔχωσι καὶ τοὺς αὐτοὺς ἀριθμητὰς (§ 135), ἦτοι:

$$(1) \quad \alpha \times 9 = 4 \times \beta$$

Ὁ ἀριθμὸς  $\alpha \times 9$  ὡς ἴσος τῷ  $4 \times \beta$  εἶναι διαιρετὸς διὰ 4· ἀφ' ἑτέρου εἶναι διαιρετὸς καὶ διὰ 9· ἀλλ' οἱ ἀριθμοὶ 4 καὶ 9

είναι πρώτοι πρὸς ἀλλήλους· ὥστε (§ 117) ὁ  $\alpha \times 9$  θὰ εἶναι διαιρετὸς διὰ τοῦ γινομένου  $4 \times 9$ . Ἔθεν

$$\alpha \times 9 = 4 \times 9 \times \pi$$

ἐξ οὗ

$$\alpha = 4 \times \pi$$

Ἀντικαθιστώντες ἤδη εἰς τὴν ἰσότητα (1) τὸν  $\alpha$  διὰ τοῦ ἴσου τοῦ  $4 \times \pi$  λαμβάνομεν

$$4 \times \pi \times 9 = 4 \times \beta$$

ἔθεν·

$$\beta = 9 \times \pi$$

Ἄρα

Ἐὰν δύο κλάσματα εἶναι ἴσα, τοῦ δὲ ἐνὸς οἱ ὄροι εἶναι πρώτοι πρὸς ἀλλήλους, ὁ ἀριθμητὴς καὶ ὁ παρονομαστὴς τοῦ ἐτέρου κλάσματος θὰ παράγονται ἐκ τοῦ ἀριθμητοῦ καὶ τοῦ παρονομαστοῦ τοῦ πρώτου διὰ πολλαπλασιασμοῦ ἐπὶ τὸν αὐτὸν ἀκέραιον.

Ἐκ τῆς προτάσεως ταύτης ἔπεται ἀμέσως ἔτι·

145. — Κλάσμα τοῦ ὁποίου οἱ ὄροι εἶναι πρώτοι πρὸς ἀλλήλους δὲν ἔχει ἄλλο ἰσοδύναμον μὲ μικροτέρους ὄρους, ἤτοι δὲν ἀπλοποιεῖται πλέον.

Τὰ κλάσματα τὰ μὴ ἀπλοποιούμενα καλοῦμεν ἀνάγωγα.

Προφανὲς εἶναι ὅτι·

Πᾶν κλάσμα ἀνάγωγον θὰ ἔχη ὄρους πρώτους πρὸς ἀλλήλους.

Ἐκ τῆς αὐτῆς προτάσεως (§ 144) συνάγομεν καὶ τὰ ἑξῆς συμπεράσματα.

146. — 1ον). Ἐστωσαν δύο ἀνάγωγα κλάσματα ἴσα πρὸς ἀλλήλα·

$$\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta}$$

τότε (§ 144)·

$$\gamma = \alpha \times \pi, \quad \delta = \beta \times \pi$$

ἀλλὰ τὸ  $\frac{\gamma}{\delta}$  ὑπετέθη ἀνάγωγον, ἐπομένως οἱ  $\gamma$  καὶ  $\delta$  εἶναι πρώτοι πρὸς ἀλλήλους· ἔθεν  $\delta$   $\pi$  θὰ ἴσῳται τῇ μονάδι καὶ ἔχομεν·

$$\gamma = \alpha, \quad \delta = \beta$$

ἄρα·

Ἐὰν δύο ἀνάγωγα κλάσματα εἶναι ἴσα, θὰ ἔχωσιν ἴσους ἀριθμητὰς καὶ ἴσους παρονομαστὰς.

147.—2ον) Πᾶν κλάσμα δὲν δύναται νὰ εἶναι ἴσον πρὸς δύο ἀνάγωγα διάφορα.

148.—3ον) Πάντα τὰ ἴσα ἀλλήλοις κλάσματα παράγονται ἐκ τοῦ αὐτοῦ ἀναγώγου διὰ πολλαπλασιασμοῦ τῶν ὄρων του ἐπὶ τὸν αὐτὸν ἀκέραιον.

### Ἀσκήσεις.

197) Νὰ ἀπλοποιηθῶσι τὰ κλάσματα

$$\begin{array}{r} 13585 \\ \hline 27690 \\ \hline 625 \\ \hline 9000 \end{array}, \quad \begin{array}{r} 184568 \\ \hline 2189864 \\ \hline 10265 \\ \hline 14371 \end{array}, \quad \begin{array}{r} 324 \\ \hline 612 \\ \hline 128352 \\ \hline 238368 \end{array}$$

198). Νὰ εὑρεθῆ κλάσμα ἰσοδύναμον πρὸς τὸ  $\frac{4}{5}$  καὶ ἔχον ὄρους, ὧν τὸ ἄθροισμα εἶναι 54.

199). Πόσα εἶναι τὰ κλάσματα τὰ ἴσα πρὸς τὸ κλάσμα  $\frac{84}{108}$  καὶ ἔχοντα ὄρους μικροτέρους μὲν τῶν ὄρων αὐτοῦ, μεγαλύτερους δὲ τῶν ὄρων τοῦ  $\frac{14}{18}$  ;

200). Ὁ μ. κ. ὀ. δύο ὄρων ἑνὸς κλάσματος ἴσου πρὸς τὸ  $\frac{8}{10}$  εἶναι 34. Νὰ εὑρεθῶσιν οἱ ὄροι τοῦ κλάσματος. (§ 148)

201). Τὸ ε. κ. π. δύο ὄρων κλάσματος ἴσου πρὸς τὸ  $\frac{36}{96}$  εἶναι 240. Νὰ εὑρεθῶσιν οἱ ὄροι τοῦ κλάσματος.

Ἐστω  $\frac{\alpha}{\beta}$  τὸ ζητούμενον κλάσμα· τότε (§ 148)

$$\alpha = 3 \times \lambda, \quad \beta = 8 \times \lambda$$

$$\text{καὶ } 240 = 3 \times \lambda \times \rho = 8 \times \lambda \times \sigma$$

έντεῦθεν εὐκόλως συνάγομεν (§ 114) ὅτι

$$\rho=8 \text{ καὶ } \sigma=3 \text{ ἔθεν } \lambda=10.$$

202). Τὸ κλάσμα  $\frac{\alpha}{15\alpha+1}$  εἶναι ἀνάγωγον, οἷοῦδήποτε ἀκεραίου ὄντος τοῦ  $\alpha$ . Γενίκευσις (§ 74 § 75).

203). Τὸ κλάσμα  $\frac{17\alpha+1}{18\alpha+1}$  εἶναι ἀνάγωγον οἷοῦδήποτε ὄντος τοῦ  $\alpha$ . Γενίκευσις.

204). Δίδονται δύο κλάσματα  $\frac{\alpha}{\beta}$  καὶ  $\frac{\gamma}{\delta}$  τοιαῦτα, ὥστε

$$\gamma\beta - \alpha\delta = 1.$$

Νὰ δεიχθῆ ὅτι εἶναι ἀνάγωγα. [Ἄρκει νὰ παρατηρήσωμεν ὅτι πᾶς κ. δ. τῶν  $\alpha, \beta$  διαιρεῖ καὶ τὴν διαφορὰν  $\gamma\beta - \alpha\delta$ .]

205). Τρία κλάσματα  $\frac{\alpha}{\beta}, \frac{\gamma}{\delta}, \frac{\lambda}{\mu}$  εἶναι τοιαῦτα ὥστε

$$\beta\gamma - \alpha\delta = \beta\lambda - \alpha\mu = 1$$

Νὰ δειχθῆ ὅτι τὰ κλάσματα ταῦτα εἶναι ἀνάγωγα.

206). Δίδεται ὁ μ. κ. δ. τῶν ἔρων κλάσματός τινος  $\frac{\alpha}{\beta}$ . Ζητεῖται πόσα εἶναι τὰ κλάσματα τὰ ἰσοδύναμα πρὸς τὸ  $\frac{\alpha}{\beta}$  καὶ μὲ μικροτέρους ἔρους. (§ 148).

207). Ἐὰν  $\alpha$  καὶ  $\beta$  εἶναι πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους, τὰ κλάσματα  $\frac{\alpha+\beta}{\alpha\beta}$  καὶ  $\frac{\alpha+\beta}{\alpha^2+\alpha\beta+\beta^2}$  εἶναι ἀνάγωγα. (Ἔσκ. 152)

208.) Διὰ ποίας ἀκεραίας τιμᾶς τοῦ  $\alpha$  τὸ κλάσμα  $\frac{\alpha+8}{2\alpha-5}$  ἴσούται πρὸς ἀκέραιον;

Διὰ νὰ εἶναι τὸ κλάσμα αὐτὸ ἴσον πρὸς τὴν μονάδα, πρέπει καὶ ἀρκεῖ νὰ ἔχωμεν (§ 135)

$$\alpha+8=2\alpha-5$$

ἢ καὶ

$$8=\alpha-5 \quad (\text{ἔσκ. 21})$$

ἔθεν (§ 34 α'.) λαμβάνομεν  $a=13$ · εὐκόλως ἐξάγομεν ἔντεϋθεν ὅτι, ἵνα τὸ δοθὲν κλάσμα ἰσοῦται πρὸς ἀκέραιον, πρέπει δ α νὰ εἶναι μικρότερος τοῦ 13.

209.) Ποίους ἀκεραίους δύναμαι νὰ προσθέσω εἰς τὸν ἀριθμητὴν καὶ παρονομαστὴν τοῦ κλάσματος  $\frac{17}{25}$  χωρὶς νὰ μεταβάλλω τὴν ἀξίαν τοῦ κλάσματος; (§ 148).

210.) Τὸ πηλίκον δύο ἀριθμῶν εἶναι  $\frac{3}{7}$ , τὸ δὲ ε. κ. π. αὐτῶν εἶναι 189. Τίνες οἱ ἀριθμοί;

211.) Νὰ εὐρεθῶσι δύο κλάσματα ἰσοδύναμα πρὸς τὰ κλάσματα  $\frac{16}{130}$ ,  $\frac{9}{474}$  τοιαῦτα ὥστε, ἐὰν προσθέσωμεν τὸν ἀριθμητὴν τοῦ πρώτου καὶ τὸν παρονομαστὴν τοῦ δευτέρου, εὐρίσκομεν ἄθροισμα ἕσον καὶ ἐὰν προσθέσωμεν τὸν ἀριθμητὴν τοῦ δευτέρου καὶ τὸν παρονομαστὴν τοῦ πρώτου. (§ 148, § 114).

### Τροπὴ ἑτερώνυμων κλασμάτων εἰς ὁμώνυμα.

149.— Τὰ κλάσματα τὰ ἔχοντα τὸν αὐτὸν παρονομαστὴν λέγονται ὁμώνυμα, τὰ δὲ μὴ τοιαῦτα ἑτερόνυμα π. χ. τὰ κλάσματα  $\frac{3}{8}$ ,  $\frac{5}{8}$ ,  $\frac{7}{8}$  εἶναι ὁμώνυμα, τὰ δὲ  $\frac{3}{8}$ ,  $\frac{5}{9}$  ἑτερόνυμα.

150.— Ἐστῶσαν τὰ ἑτερόνυμα κλάσματα

$$(1) \quad \frac{\alpha}{\beta}, \frac{\gamma}{\delta}, \frac{\lambda}{\rho}$$

Πολλαπλασιάσωμεν ἀμφοτέρους τοὺς ὄρους ἐκάστου ἐπὶ τὸ γινόμενον τῶν παρονομαστῶν τῶν λοιπῶν κλασμάτων. Εὐρίσκομεν οὕτω κλάσματα ἰσοδύναμα (§. 142) πρὸς τὰ δοθέντα τὰ ἑξῆς:

$$\frac{\alpha \times \delta \times \rho}{\beta \times \delta \times \rho} \quad \frac{\gamma \times \beta \times \rho}{\delta \times \beta \times \rho} \quad \frac{\lambda \times \beta \times \delta}{\rho \times \beta \times \delta} \quad \text{ἔθεν}$$

Ἴνα τρέψωμεν ἑτερόνυμα κλάσματα εἰς ὁμώνυμα ἀρκεῖ νὰ πολλαπλασιάσωμεν τοὺς δύο ὄρους ἐκάστου ἐπὶ τὸ γινόμενον τῶν παρονομαστῶν πάντων τῶν λοιπῶν.

Π. χ. τὰ κλάσματα  $\frac{5}{8}, \frac{4}{9}, \frac{3}{7}$ , τρέπονται εἰς τὰ

$$\frac{5 \times 9 \times 7}{8 \times 9 \times 7}, \quad \frac{4 \times 8 \times 7}{9 \times 8 \times 7}, \quad \frac{3 \times 8 \times 9}{7 \times 8 \times 9}$$

151. — Γενικώτερον. Ἐστω π τυχόν κ. π. τῶν παρονομαστικῶν τῶν κλασμάτων (1). Δύναμαι νὰ σχηματίσω κλάσματα ἰσοδύναμα πρὸς ταῦτα καὶ μὲ παρονομαστήν π· ἀρκεῖ πρὸς τοῦτο νὰ πολλαπλασιάσω ἀμφοτέρους τοὺς ὄρους τοῦ  $\frac{\alpha}{\beta}$  ἐπὶ τὸν αὐτὸν ἀκέραιον π·β, ἀμφοτέρους τοὺς ὄρους τοῦ  $\frac{\gamma}{\delta}$  ἐπὶ π·δ, κ. ο. κ. ὅθεν·

Πάντοτε δυνάμεθα νὰ τρέψωμεν δοθέντα κλάσματα ἑτερώνυμα εἰς ὁμώνυμα μὲ κοινὸν παρονομαστήν τὸ τυχόν κ. π. τῶν παρονομαστικῶν.

Π. χ. Ἐστωσαν τὰ κλάσματα  $\frac{5}{6}, \frac{1}{8}, \frac{3}{4}$ , καὶ τυχόν κ. π. τῶν παρονομαστικῶν ἔστω ὁ 48· δύναμαι νὰ τρέψω ταῦτα εἰς ἕτερα ἰσοδύναμα μὲ παρονομαστήν 48 τὰ ἑξῆς·  $\frac{5 \times 8}{6 \times 8}, \frac{1 \times 6}{8 \times 6}, \frac{3 \times 12}{4 \times 12}$

Ἐγείρεται ἤδη τὸ ζήτημα· ποῖος εἶναι ὁ μικρότερος κοινὸς παρονομαστής, ὃν δύνανται ν' ἀποκτήσωσι διάφορα κλάσματα;

Παρατηροῦμεν πρῶτον ὅτι, ἐὰν τὰ δοθέντα κλάσματα δὲν εἶναι ἀνάγωγα, ἀρκεῖ νὰ εὑρωμεν κοινὸν παρονομαστήν, ὃν δύνανται ν' ἀποκτήσωσι κλάσματα ἀνάγωγα ἴσα πρὸς τὰ δοθέντα. Θεωρήσωμεν λοιπὸν ἀνάγωγα κλάσματα

π.χ. τὰ κλάσματα  $\frac{7}{12}, \frac{9}{20}, \frac{8}{15}$ .

Ἐστωσαν δὲ ὁμώνυμα ἴσα πρὸς ταῦτα τὰ  $\frac{\alpha}{\pi}, \frac{\beta}{\pi}, \frac{\gamma}{\pi}$ ,

Ἐπειδὴ ἀφ' ἑνὸς μὲν 7 καὶ 12 εἶναι πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους, ἀφ'

ἑτέρου δ' ἔχομεν  $\frac{7}{12} = \frac{\alpha}{\pi}$  ἔπεται (§ 144) ὅτι  $\pi = 12 \times \rho$  ὁμοίως εὐρίσκομεν ὅτι  $\pi = 20 \times \rho'$  καὶ  $\pi = 15 \times \rho''$ , ὅθεν  $\pi$  εἶναι κοινὸν πολλαπλάσιον τῶν 12, 20, 15. Ἐὰν δὲ θέλωμεν ὁ κοινὸς οὗτος παρονομαστῆς  $\pi$  νὰ ἔχη τὴν ἐλαχίστην δυνατὴν τιμὴν, εὐνόητον εἶναι ὅτι πρέπει νὰ εἶναι τὸ ε. κ. π. τῶν παρονομαστῶν

$$12, \quad 20, \quad 15.$$

Ἄρα:

Ὁ ἐλάχιστος κοινὸς παρονομαστῆς, ὃν δύναται ν' ἀποκτήσωσι κλάσματα ἑτερόνυμα ἀνάγωγα εἶναι τὸ ε. κ. π. τῶν παρονομαστῶν αὐτῶν

Π. χ. εἰς τὸ ἀνωτέρω παράδειγμα ἐλάχιστος κοινὸς παρονομαστῆς εἶναι ὁ 60.

### Ἀσκήσεις.

212.) Νὰ τραπῶσιν εἰς ὁμώνυμα τὰ κλάσματα

$$\frac{11}{12}, \quad \frac{19}{20}, \quad \frac{30}{36}$$

213.) Νὰ τραπῶσιν εἰς ὁμώνυμα μὲ τὸν ἐλάχιστον κοινὸν παρονομαστὴν τὰ κλάσματα

$$\frac{5}{12}, \quad \frac{7}{16}, \quad \frac{31}{24}$$

Ὅπως ἐπίσης καὶ τὰ κλάσματα:

$$\frac{11}{12}, \quad \frac{108}{142}, \quad \frac{57}{71}, \quad \frac{140}{1065}, \quad \frac{852}{2130}$$

214) Ἐὰν ὁ ἐλάχιστος κοινὸς παρονομαστῆς ἀναγῶγων κλασμάτων διαιρεθῇ δι' ἑνὸς ἐκάστου τῶν παρονομαστῶν διὰ δῶση πηλίκου ἀριθμοῦς πρώτους πρὸς ἀλλήλους.

215.) Τίνες ἄλλοι ἀριθμοὶ πλὴν τοῦ γινομένου τῶν παρονομαστῶν καὶ τοῦ ε. κ. π. αὐτῶν δύναται νὰ χρησιμεύσουν ὡς κοινοὶ παρονομασταί.



216.) Ἐὰν οἱ παρονομασταὶ ἀναγώγων κλασμάτων εἶναι πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους ἀνά δύο, τότε ὁ ἐλάχιστος κοινὸς παρονομαστής, ὃν δύνανται ν' ἀποκτήσωσι τὰ κλάσματα ταῦτα εἶναι τὸ γινόμενον τῶν παρονομαστῶν.

217.) Ἐὰν οἱ παρονομασταὶ τῶν ἀναγώγων κλασμάτων  $\frac{\gamma}{\alpha}$  καὶ  $\frac{\delta}{\beta}$  εἶναι πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους, τότε ὁ ἐλάχιστος κοινὸς παρονομαστής τῶν κλασμάτων  $\frac{\gamma}{\alpha^{\nu}}$  καὶ  $\frac{\delta}{\beta^{\nu}}$  εἶναι τὸ γινόμενον τῶν παρονομαστῶν ἤτοι  $\alpha^{\nu} \times \beta^{\nu}$  (§ 113.)

218.) Ἐὰν κοινὸς τις παρονομαστής, ὃν δύνανται ν' ἀποκτήσωσι κλάσματα ἀνάγωγα διαιρούμενος διὰ τῶν παρονομαστῶν τῶν δοθέντων κλασμάτων δίδῃ πηλίκια πρῶτα πρὸς ἀλλήλα, τότε αὐτὸς εἶναι ὁ ἐλάχιστος κοινὸς παρονομαστής.

## ΠΡΟΣΘΕΣΙΣ

152. — α) Ἐστω  $\frac{3}{4} + \frac{2}{4} + \frac{1}{4}$ . τοῦτο προφανῶς εἶναι ἴσον πρὸς τὸ

$$\frac{3+2+1}{4} = \frac{6}{4}.$$

Ὅμοίως

$$\frac{2}{7} + \frac{3}{7} + \frac{4}{7} = \frac{2+3+4}{7} = \frac{9}{7} = 1 \frac{2}{7}$$

ἄρα:

Ἴνα προσθέσωμεν κλάσματα ὁμώνυμα, προσθέτομεν τοὺς ἀριθμητὰς καὶ ὑπὸ τὸ ἄθροισμα αὐτὸ γράφομεν τὸν κοινὸν παρονομαστήν.

β) Ἐστω

$$\frac{3}{4} + \frac{2}{5} + \frac{7}{10} = \frac{15}{20} + \frac{8}{20} + \frac{14}{20} = \frac{37}{20} = 1 \frac{17}{20}$$

ἤτοι:

Ἴνα προσθέσωμεν ἑτερόνυμα κλάσματα, τρέπομεν αὐτὰ εἰς ὁμώνυμα καὶ προσθέτομεν.

γ) Ἐστω

$$7\frac{2}{3} + 5\frac{3}{4} = (7+5) + \left(\frac{2}{3} + \frac{3}{4}\right) = 12 + \frac{17}{12} = 13\frac{5}{12}$$

ἦτοι:

Ἴνα προσθέσωμεν μικτούς, προσθέτομεν χωριστὰ τοὺς ἀκεραίους καὶ χωριστὰ τὰ κλάσματα.

Ἡδυνάμεθα, ἐννοεῖται, νὰ τρέψωμεν τοὺς μικτούς εἰς κλάσματα καὶ νὰ ἔχωμεν οὕτω πρόσθεσιν κλασμάτων.

153. — Ἐπειδὴ, ὡς ἐκ τῶν προλεχθέντων εὐκόλως συνάγεται, ἢ πρόσθεσις κλασμάτων, εἴτε ἀκεραίων καὶ κλασμάτων ἀνάγεται εἰς πρόσθεσιν ἀκεραίων, ἔπεται ὅτι ἰσχύει γενικῶς ἡ θεμελιώδης ιδιότης τῆς προσθέσεως τῶν ἀκεραίων (§ 27) καὶ κατ' ἀκολουθίαν καὶ πᾶσαι αἱ ἄλλαι ιδιότητες τῆς προσθέσεως αἱ ἐξ αὐτῆς ἀπορρέουσαι.

Οὕτως ἔχομεν

$$\frac{\alpha}{\beta} + \frac{\gamma}{\delta} + \frac{\varepsilon}{\zeta} + \frac{\eta}{\vartheta} = \frac{\varepsilon}{\zeta} + \frac{\alpha}{\beta} + \frac{\eta}{\vartheta} + \frac{\gamma}{\delta}$$

$$\frac{\alpha}{\beta} + \frac{\gamma}{\delta} + \frac{\varepsilon}{\zeta} = \frac{\alpha}{\beta} + \left(\frac{\gamma}{\delta} + \frac{\varepsilon}{\zeta}\right) \quad \text{κ.τ.λ.}$$

#### ΑΦΑΙΡΕΣΙΣ

154. — Ἡ ἀφαιρέσις εἶναι πρῶξις δι' ἧς δοθέντων δύο ἀριθμῶν εὐρίσκεται τρίτος ὅστις προστιθέμενος εἰς τὸν δευτέρου δίδει τὸν πρῶτον. (§ 32).

ἔχομεν

$$\frac{5}{8} - \frac{3}{8} = \frac{5-3}{8} = \frac{2}{8}$$

ὁμοίως

$$\frac{9}{17} - \frac{5}{17} = \frac{4}{17}$$

ἄρα.

Ἴνα ἀφαιρέσωμεν κλάσματα ὁμώνυμα ἀφαιροῦμεν ἀπὸ τοῦ ἀριθμητοῦ τοῦ μειωτέου τὸν ἀριθμητὴν τοῦ ἀφαιρετέου καὶ ὑπὸ τὴν διαφορὰν γράφομεν τὸν κοινὸν παρονομαστήν.

Ἐχομεν

$$\frac{5}{9} - \frac{3}{8} = \frac{40}{72} - \frac{27}{72} = \frac{13}{72}$$

ὁμοίως

$$\frac{5}{8} - \frac{1}{4} = \frac{5}{8} - \frac{2}{8} = \frac{3}{8}$$

ἦτοι

Ἵνα ἀφαιρέσωμεν κλάσματα ἑτερόνομμα, τρέπομεν προηγουμένως αὐτὰ εἰς ὁμόνομμα.

Ἦδη ἐξετάσωμεν τὰς περιπτώσεις, καθ' ἃς μειωτέος καὶ ἀφαιρετέος εἶναι τυχόντες ἀριθμοί· ἀκέραιοι, κλασματικοὶ ἢ μικτοί.

$$\alpha) \quad 8 - \frac{2}{3} = 7 \frac{3}{3} - \frac{2}{3} = 7 \frac{1}{3}$$

$$\beta) \quad 5 \frac{3}{4} - \frac{2}{3} = 5 \frac{9}{12} - \frac{8}{12} = 5 \frac{1}{12}$$

$$\gamma) \quad 8 \frac{5}{9} - 4 = 4 \frac{5}{9}$$

$$\delta) \quad 15 - 3 \frac{3}{4} = 14 \frac{4}{4} - 3 \frac{3}{4} = 11 \frac{1}{4}$$

$$\epsilon) \quad 7 \frac{2}{5} - 5 \frac{3}{5} = 6 \frac{7}{5} - 5 \frac{3}{5} = 1 \frac{4}{5}$$

155. — Διὰ τῶν ἀνωτέρω πράξεων ἢ ἀφαιρέσεις ἀκεραίων καὶ κλασματικῶν ἀνάγεται εἰς τὴν ἀφαιρέσιν τῶν ἀκεραίων καὶ ἐπομένως εὐκόλως φαίνεται ὅτι ἰσχύουσι καὶ ἐνταῦθα αἱ ἰδιότητες τῆς ἀφαιρέσεως τῶν ἀκεραίων· ἦτοι· αἱ ἰσότητες

$$(\alpha + \gamma) - (\beta + \gamma) = \alpha - \beta,$$

$$(\alpha + \beta + \gamma) - \delta = \alpha + (\beta - \delta) + \gamma,$$

$$\gamma - (\alpha + \beta) = (\gamma - \alpha) - \beta,$$

$$\alpha - (\beta - \gamma) = (\alpha + \gamma) - \beta,$$

ἰσχύουσι, καὶ ἐὰν τὰ  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ ,  $\delta$  δὲν εἶναι μόνον ἀκέραιοι.

## Ἀσκήσεις.

219). Ἐδαπάνησέ τις κατὰ τὸ ἔτος 1914 τὰ  $\frac{3}{10}$  τῆς περιουσίας του· κατὰ τὸ 1915 τὰ  $\frac{2}{7}$  αὐτῆς· ποῖον μέρος τῆς περιουσίας του ἔδαπάνησε κατὰ τὸ 1916 γνωστοῦ ὄντος ὅτι τῷ ἀπέμεινε μετὰ τὸ ἔτος αὐτὸ τὸ  $\frac{1}{20}$  τῆς περιουσίας του ;

220). Προσέλαβέ τις διὰ τὴν ἀντιγραφὴν ἑνὸς ἔργου τέσσαρας γραφεῖς. Ἐκ τούτων ὁ πρῶτος ἠδύνατο μόνος ν' ἀντιγράψῃ αὐτὸ εἰς 15 ἡμέρας, ὁ δεῦτερος εἰς 16, ὁ τρίτος εἰς 12 καὶ ὁ τέταρτος εἰς 20 ἡμέρας. Ποῖον μέρος τοῦ ἔργου δύνανται ν' ἀντιγράψωσιν, ἐὰν ἐργασθῶσιν ὅλοι συγχρόνως ἐπὶ δύο ἡμέρας ;

221). Νὰ εὑρεθῇ ἡ διαφορὰ μεταξὺ τοῦ μεγαλυτέρου καὶ τοῦ μικροτέρου τῶν κλασμάτων

$$\frac{5}{8}, \frac{3}{7}, \frac{4}{9}, \frac{7}{15}$$

222). Ἐστῶσαν τὰ κλάσματα

$$\frac{12}{25}, \frac{3}{20}, \frac{7}{90}, \frac{45}{60}$$

Ἄθροίζω τὸ μέγιστον καὶ ἐλάχιστον τούτων, χωριστὰ δὲ τὰ δύο ἄλλα. Ποῖον ἄθροισμα εἶναι μεγαλύτερον καὶ κατὰ πόσον;

223). Ἐκ τεσσάρων κρηνῶν δεξαμενῆς αἱ δύο πρῶται δύνανται νὰ πληρώσωσι τὴν δεξαμενὴν, ἡ μὲν εἰς 15 ὥρας, ἡ δὲ εἰς 24 ὥρας, αἱ δὲ δύο ἄλλαι, δύνανται νὰ κενώσωσι τὴν δεξαμενὴν ἡ μὲν εἰς 20 ὥρας ἡ δὲ εἰς 48. Τῆς δεξαμενῆς οὕσης κενῆς ἀφήνονται καὶ αἱ τέσσαρες ἀνοικταί. Μετὰ τρεῖς ὥρας τί μέρος τῆς δεξαμενῆς θὰ ἔχῃ πληρωθῆ;

224). Δύο κλάσματα ἀνάγωγα μὲ παρονομαστὰς διαφόρους προστιθέμενα δὲν δίδουσιν ἀκέραιον (§ 75, § 114).

225). Τρία κλάσματα ανάγωγα ἀθροιζόμενα δὲν δίδουσιν ἀκέραιον, ἐὰν πρῶτος τις παράγων ἐνὸς τῶν παρονομαστῶν δὲν εὑρίσκεται εἰς ἓνα τοῦλάχιστον τῶν ἄλλων δύο παρονομαστῶν.

226). Τὸ ἄθροισμα δύο ἀναγῶγων κλασμάτων εἶναι κλάσμα ἀνάγωγον, ἐὰν οἱ παρονομασταὶ εἶναι πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους καὶ κοινὸς παρονομαστὴς ὁ ἐλάχιστος. (§ 114, § 75).

227). Τὸ ἄθροισμα ἀναγῶγων κλασμάτων μὲ παρονομαστὰς πρῶτους πρὸς ἀλλήλους ἀνά δύο δὲν εἶναι ἀριθμὸς ἀκέραιος.

### ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ

Πῶς πολλαπλασιάζεται κλάσμα ἢ μικτὸς ἐπὶ ἀκέραιον ;

156. — Εἶδομεν ὅτι (§ 140, § 141)

$$\frac{7 \times 5}{10} = \frac{7}{10} \times 5 \quad \text{καὶ} \quad \frac{7}{10 : 5} = \frac{7}{10} \times 5$$

ὅθεν καὶ

$$\frac{7}{10} \times 5 = \frac{7 \times 5}{10} \quad \text{καὶ} \quad \frac{7}{10} \times 5 = \frac{7}{10 : 5}$$

ὥστε·

Κλάσμα πολλαπλασιάζεται ἐπὶ ἀκέραιον ἐὰν πολλαπλασιασθῇ ὁ ἀριθμητὴς ἐπὶ τὸν ἀκέραιον ἢ διαιρηθῇ ὁ παρονομαστὴς δι' αὐτοῦ, ἐὰν διαιρηθῆται.

Ἐστω ἤδη

$$\left( 7 \frac{2}{3} \right) \times 4$$

Ἐχόμεν·

$$\left( 7 \frac{2}{3} \right) \times 4 = (7 \times 4) + \left( \frac{2}{3} \times 4 \right) = 28 + \frac{8}{3} = 30 \frac{2}{3}$$

ἢ καὶ

$$\left( 7 \frac{2}{3} \right) \times 4 = \frac{23}{3} \times 4 = \frac{92}{3} = 30 \frac{2}{3}$$

Ἦτοι·

Πολλαπλασιάζεται μικτὸς ἐπὶ ἀκέραιον, ἢ ἐὰν πολλαπλασιάσωμεν τὰ μέρη αὐτοῦ χωριστὰ καὶ προσθέσωμεν τὰ μερικὰ γινόμενα, ἢ ἐὰν τρέψωμεν τὸν μικτὸν εἰς κλάσμα καὶ πολλαπλασιάσωμεν κατὰ τὸν προηγούμενον κανόνα.

### Γενίκευσις τοῦ πολλαπλασιασμοῦ.

157. — Ἐστῶσαν πρὸς λύσιν τὰ ἀκόλουθα προβλήματα.

α.) Ἡ ὀκά ἐνὸς πράγματος ἀξίζει 2 δραχμάς· πόσον ἀξίζουν αἱ 3 ὀκάδες; Προφανῶς ἡ ζητούμενη τιμὴ εἶνε  $2^{\text{δρ.}} \times 3$ .

β.) Ἡ ὀκά ἐνὸς πράγματος ἀξίζει 2 δραχμάς, πόσον ἀξίζουν τὰ  $\frac{3}{7}$  τῆς ὀκάς;

Ἐφοῦ 1 ὀκά ἀξίζει 2 δραχμάς

$$\text{τὸ } \frac{1}{7} \text{ τῆς ὀκάς θὰ ἀξίξῃ } \frac{2}{7} \text{ δρ.}$$

$$\text{καὶ τὰ } \frac{3}{7} \text{ » » θὰ ἀξίξουν } \frac{2}{7} \times 3 \text{ δρ.}$$

ὥστε πρὸς εὐρεσιν τοῦ ζητουμένου ἐνταῦθα θὰ κάμωμεν δύο πράξεις. Θὰ μερίσωμεν κατ' ἀρχὰς τὸν 2 εἰς 7 ἴσα μέρη καὶ θὰ λάβωμεν κατόπιν ἕκαστον τῶν μερῶν τούτων 3 φορές.

γ.) Ὁ πῆχυς ὑφάσματος ἀξίζει 4 δρ. Πόσον ἀξίζουν οἱ  $2\frac{3}{8}$  πῆχεις;

Ἐφοῦ 1 πῆχυς ἀξίζει 4 δρ. οἱ 2 πῆχεις ἀξίζουν  $4^{\text{δρ.}} \times 2$

Ἐπίσης ἀφοῦ 1 πῆχ. ἀξίζει 4 δρ.

$$\frac{1}{8} \text{ πῆχ. ἀξίζει } \frac{4}{8} \text{ δρ.}$$

$$\text{καὶ τὰ } \frac{3}{8} \text{ πῆχ. ἀξίξουν } \frac{4}{8} \times 3$$

$$\text{ὥστε οἱ } 2\frac{3}{8} \text{ πῆχ. θὰ ἀξίξουν } \text{δρ. } 4 \times 2 + \frac{4}{8} \times 3$$

ἦτοι κατὰ τὸν ἀνωτέρω ὄρισμὸν τοῦ πολλαπλασιασμοῦ ἔχομεν·

$$4 \times 2 \frac{3}{8} = 4 \times 2 + \frac{4}{8} \times 3$$

158. — Καὶ εἰς τὰ τρία ἀνωτέρω προβλήματα δίδεται ἡ ἀξία τῆς μιᾶς μονάδος, ζητεῖται δὲ

εἰς μὲν τὸ πρῶτον ἡ ἀξία πολλῶν ἀκεραίων μονάδων,  
εἰς δὲ τὸ δεύτερον ἡ ἀξία πολλῶν κλασματικῶν μονάδων,  
καὶ εἰς τὸ τρίτον ἡ ἀξία πολλῶν ἀκεραίων καὶ κλασματικῶν  
μονάδων.

Τὸ πρῶτον ὁμῶς λύεται προφανῶς διὰ πολλαπλασιασμοῦ.

Συμφωνοῦμεν δι' αὐτὸ αἱ δύο πράξεις δι' ὧν ἐλύσαμεν τὸ  
δεύτερον νὰ ὀνομασθῶσι πολλαπλασιασμός, ἔπως ἐπίσης καὶ αἱ  
πράξεις δι' ὧν ἐλύσαμεν τὸ τρίτον.

Ὅπως δὲ εἰς τὸ πρῶτον πολλαπλασιαστέος ἦτο ἡ ἀξία  
τῆς μιᾶς μονάδος,

οὕτω καὶ εἰς τὸ δεύτερον καὶ εἰς τὸ τρίτον θεωροῦμεν πολ-  
πλασιαστέον πάλιν τὴν ἀξίαν τῆς μιᾶς μονάδος.

Κατόπιν τῆς ἀνωτέρω συμφωνίας δυνάμεθα νὰ λέγωμεν εἰς  
τὸ δεύτερον πρόβλημα ὅτι ἡ ἀξία τοῦ ζητουμένου εἶναι τὸ γινό-

μενον  $2 \times \frac{3}{7}$  δραχ.: ἦτοι κατὰ τὰ προειρημένα θὰ ἔχωμεν·

$$\frac{2}{7} \times 3 = 2 \times \frac{3}{7}$$

ἦ καὶ

$$2 \times \frac{3}{7} = \frac{2}{7} \times 3$$

ὥστε, ὅταν λέγωμεν ὅτι πολλαπλασιάζομεν τὸν 2 ἐπὶ  $\frac{3}{7}$ , ἐννοοῦ-  
μεν ὅτι ἐπαναλαμβάνομεν τὸ ἐν ἑβδομον τοῦ 2 τρεῖς φορές.

Ὅμοίως, ὅταν λέγωμεν ὅτι πολλαπλασιάζομεν τὸν 4 ἐπὶ  $2\frac{3}{8}$ ,  
ἐννοοῦμεν ὅτι ἐπαναλαμβάνομεν τὸν 4 δύο φορές καὶ τὸ ὄγδον  
τοῦ 4 τρεῖς φορές καὶ σχηματίζομεν οὕτως ἕξ αὐτοῦ ἄλλο  
ἀριθμόν.

Τὰς αὐτὰς σχέψεις θὰ ἐκάμνομεν, καὶ ἐὰν ὁ πολλαπλασιαστέος ἦτο κλάσμα ἢ μικτός.

Κατὰ ταῦτα γενικεύεται ὁ πολλαπλασιασμός ὡς ἐξῆς.

Ὁ πολλαπλασιασμός εἶναι πρᾶξις, ἐν ἣ ἔπαναλαμβάνομεν ἓνα ἀριθμὸν ἢ καὶ μέρος τι αὐτοῦ καὶ σχηματίζομεν ἐξ αὐτοῦ ἄλλον ἀριθμὸν.

Πῶς σχηματίζεται τὸ γινόμενον δύο οἰωνδήποτε ἀριθμῶν;

159. — Ἐπειδὴ

$$\alpha) \quad 2 \times 4 = 2 + 2 + 2 + 2$$

$$\text{καὶ} \quad 4 = 1 + 1 + 1 + 1$$

$$\beta) \quad 2 \times \frac{3}{7} = \frac{2}{7} + \frac{2}{7} + \frac{2}{7} \quad (\S 158)$$

$$\text{καὶ} \quad \frac{3}{7} = \frac{1}{7} + \frac{1}{7} + \frac{1}{7}$$

$$\gamma) \quad 4 \times 2 \frac{3}{8} = 4 \times 2 + 4 \times \frac{3}{8} = 4 + 4 + \frac{4}{8} + \frac{4}{8} + \frac{4}{8}$$

$$\text{καὶ} \quad 2 \frac{3}{8} = 1 + 1 + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8}$$

συνάγομεν ὅτι σχηματίζεται γινόμενον ἀριθμοῦ ἐπὶ ἄλλον ὡς ἐξῆς:

Δι' ἐκάστην ἀκεραίαν μονάδα τοῦ πολλαπλασιαστοῦ λαμβάνομεν μίαν φορὰν τὸν πολλαπλασιαστέον καὶ δι' ἐκάστην κλασματικὴν μονάδα τοῦ πολλαπλασιαστοῦ ἔστω τὴν  $\frac{1}{\nu}$  λαμβάνομεν τὸ νουστὸν μέρος τοῦ πολλαπλασιαστέου καὶ προσθέτομεν τὰ ληφθέντα.



Πῶς πολλαπλασιάζεται ἀκέραιος ἐπὶ κλάσμα;

160. — Ἐστω  $8 \times \frac{2}{9}$ . Κατὰ τὴν ἀνωτέρω ὄρισμὸν τοῦ πολλαπλασιασμοῦ ἔχομεν·

$$8 \times \frac{2}{9} = \frac{8}{9} \times 2 = \frac{8 \times 2}{9} \quad (\S 156)$$

ἄρα·

Ἄριθμὸς ἀκέραιος πολλαπλασιάζεται ἐπὶ κλάσμα, ἐὰν πολλαπλασιασθῇ ἐπὶ τὸν ἀριθμητὴν τοῦ κλάσματος καὶ ὑπὸ τὸ γινόμενον γραφῇ ὁ παρονομαστής.

Πῶς πολλαπλασιάζεται κλάσμα ἐπὶ κλάσμα;

161. — Ἐστω  $\frac{3}{4} \times \frac{2}{7}$ . Κατὰ τὸν ὄρισμὸν (§ 158)

$$\frac{3}{4} \times \frac{2}{7} = \left( \frac{3}{4} : 7 \right) \times 2 = \frac{3}{4 \times 7} \times 2 \quad (\S 141)$$

$$\text{ἔθεν·} \quad \frac{3}{4} \times \frac{2}{7} = \frac{3 \times 2}{4 \times 7} \quad (\S 140)$$

ἄρα·

Ἴνα πολλαπλασιάσωμεν κλάσμα ἐπὶ κλάσμα, πολλαπλασιάζομεν ἀριθμητὴν ἐπὶ ἀριθμητὴν καὶ παρονομαστὴν ἐπὶ παρονομαστὴν καὶ γράφομεν τὸ δεύτερον γινόμενον ὑπὸ τὸ πρῶτον.

Πῶς πολλαπλασιάζεται μίχτος ἐπὶ κλάσμα;

162. — Ἐστω

$$5 \frac{7}{8} \times \frac{3}{4}$$

Κατὰ τὸν ὄρισμὸν (§ 158) πρέπει νὰ λάβωμεν κατ' ἀρχὰς τὸ τέταρτον τοῦ  $5 \frac{7}{8}$ .

Ἄλλὰ διὰ νὰ εὐρωμεν αὐτὸ ἀρκεῖ νὰ εὐρωμεν ποῖος ἀριθμὸς τετράκις λαμβανόμενος δίδει τὸν  $5\frac{7}{8}$  παρατηροῦμεν πρὸς τοῦτο

ὅτι, ἐὰν λάβωμεν τὸν  $\frac{5}{4}$  τέσσαρας φορές, εὐρίσκομεν τὸν 5 (§ 139) :

ὡς ἐπίσης, ἐὰν λάβωμεν τὸν  $\frac{7}{8 \times 4}$  τετράκις, ἔχομεν τὸν  $\frac{7}{8}$  (§ 141) :

ὥστε, ἐὰν ληφθῇ δ  $\frac{5}{4} + \frac{7}{8 \times 4}$  τετράκις, εὐρίσκεται δ  $5\frac{7}{8}$  :

ἦτοι τὸ τέταρτον τοῦ  $5\frac{7}{8}$  εἶναι  $\frac{5}{4} + \frac{7}{8 \times 4}$  ἐπομένως

$$\begin{aligned} 5\frac{7}{8} \times \frac{3}{4} &= \left( \frac{5}{4} + \frac{7}{8 \times 4} \right) \times 3 = \frac{5}{4} \times 3 + \frac{7}{8 \times 4} \times 3 = \\ &= \frac{5 \times 3}{4} + \frac{7 \times 3}{8 \times 4} = 5 \times \frac{3}{4} + \frac{7}{8} \times \frac{3}{4} \quad (\S 160, \S 161). \text{ Ἄρα:} \end{aligned}$$

Ἴνα πολλαπλασιάσωμεν μικτὸν ἐπὶ κλάσμα, πολλαπλασιάζομεν χωριστὰ τὸν ἀκέραιον καὶ χωριστὰ τὸ κλάσμα του καὶ προσθέτομεν τὰ μερικὰ γινόμενα.

Ἡδυνάμεθα προφανῶς καὶ νὰ τρέψωμεν τὸν μικτὸν εἰς κλάσμα καὶ νὰ πολλαπλασιάσωμεν.

Πῶς πολλαπλασιάζεται ἀριθμὸς ἐπὶ μικτὸν ;

163. — Ἔστω,

$$\alpha \times 4\frac{2}{9}$$

Κατὰ τὸν ὀρισμὸν (§ 158) ἔχομεν·

$$\alpha \times 4\frac{2}{9} = \alpha \times 4 + \frac{\alpha}{9} \times 2 = \alpha \times 4 + \alpha \times \frac{2}{9} \quad (\S 158).$$

Ἄρα:

Ἴνα πολλαπλασιάσωμεν ἀριθμὸν ἐπὶ μικτὸν, ἀρκεῖ νὰ πολλαπλασιάσωμεν αὐτὸν χωριστὰ ἐπὶ τὸν ἀκέραιον καὶ χωρι-

στά ἐπὶ τὸ κλάσμα τοῦ μικτοῦ καὶ κατόπιν νὰ προσθέσωμεν τὰ μερικὰ γινόμενα.

$$\text{Π. χ. } 6 \times 5 \frac{1}{4} = 6 \times 5 + 6 \times \frac{1}{4} = 30 + \frac{6}{4} = 31 \frac{1}{2}$$

$$\frac{2}{3} \times 5 \frac{1}{4} = \frac{2}{3} \times 5 + \frac{2}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{2 \times 5}{3} + \frac{2 \times 1}{3 \times 4} = 3 \frac{1}{2}$$

$$6 \frac{2}{3} \times 5 \frac{1}{4} = 6 \frac{2}{3} \times 5 + 6 \frac{2}{3} \times \frac{1}{4} =$$

$$= 6 \times 5 + \frac{2}{3} \times 5 + 6 \times \frac{1}{4} + \frac{2}{3} \times \frac{1}{4} =$$

$$= 30 + \frac{10}{3} + \frac{6}{4} + \frac{2}{12} = 35$$

### Γινόμενον πολλῶν παραγόντων.

164. — Ἐστώσαν πρὸς πολλαπλασιασμὸν τὰ κλάσματα (§ 39)

$$\frac{7}{8}, \frac{4}{11}, \frac{5}{6}, \frac{2}{3},$$

καθ' ἣν τάξιν εἶναι γεγραμμένα· τοῦτο θὰ παριστῶμεν ὡς ἑξῆς·

$$\frac{7}{8} \times \frac{4}{11} \times \frac{5}{6} \times \frac{2}{3}.$$

ἔχομεν πρῶτον  $\frac{7}{8} \times \frac{4}{11} = \frac{7 \times 4}{8 \times 11}$  (§ 161) ἔθεν

$$\frac{7}{8} \times \frac{4}{11} \times \frac{5}{6} = \frac{7 \times 4 \times 5}{8 \times 11 \times 6} \quad \text{καὶ ἐπομένως}$$

$$\frac{7}{8} \times \frac{4}{11} \times \frac{5}{6} \times \frac{2}{3} = \frac{7 \times 4 \times 5 \times 2}{8 \times 11 \times 6 \times 3}$$

ἄρα·

Τὸ γινόμενον πολλῶν κλασμάτων εἶναι κλάσμα ἔχον ἀριθμητὴν τὸ γινόμενον τῶν ἀριθμητῶν καὶ παρονομαστὴν τὸ γινόμενον τῶν παρονομαστῶν.

$$165. — \text{Ἐστω } 5 \times \frac{3}{4} \times \frac{8}{9} \times 2 \times \frac{6}{7} \quad (\S 39)$$

Ἔχομεν·

$$5 \times \frac{3}{4} \times \frac{8}{9} \times 2 \times \frac{6}{7} = \frac{5 \times 3 \times 8 \times 2 \times 6}{4 \times 9 \times 7} \quad (\S 160, \S 161)$$

ἀλλὰ καὶ

$$\frac{3}{4} \times 2 \times \frac{6}{7} \times 5 \times \frac{8}{9} = \frac{3 \times 2 \times 6 \times 5 \times 8}{4 \times 7 \times 9}$$

καὶ ἐπειδὴ τὰ δευτέρα μέλη εἶναι ἴσα (§ 40) ἔπεται ὅτι

$$5 \times \frac{3}{4} \times \frac{8}{9} \times 2 \times \frac{6}{7} = \frac{3}{4} \times 2 \times \frac{6}{7} \times 5 \times \frac{8}{9}$$

ἄρα·

Τὸ γινόμενον πολλῶν παραγόντων ἀκεραίων καὶ κλασματικῶν δὲν ἀλλάσσει, ἐὰν μεταβληθῇ ἡ τάξις τῶν παραγόντων.

### Γενικαὶ ἰδιότητες τοῦ πολλαπλασιασμοῦ.

166. — Τοὺς ἀκεραίους καὶ κλασματικούς καλοῦμεν μὲ ἓν ὄνομα *συμμέτρους*.

Κατὰ τὰ ἀνωτέρω ἢ ἰδιότης τῆς ἀντιμεταθέσεως (§ 45) ἰσχύει καὶ εἰς τὸν πολλαπλασιασμόν τῶν συμμέτρων ἀριθμῶν ἐπομένως καὶ αἱ ἐξ αὐτῆς ἀπορρέουσαι.

167. — Εἶδομεν ἀνωτέρω πῶς πολλαπλασιάζεται μικτὸς ἐπὶ ἀριθμὸν· κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον ἀποδεικνύομεν ὅτι·

Ἐπιπολλαπλασιασθῆναι οἰονδήποτε πολλαπλασιάζεται ἐπὶ ἀριθμὸν, καὶ ἐὰν πολλαπλασιασθῇ ἕκαστος τῶν προσθετέων ἐπὶ τὸν ἀριθμὸν τοῦτον καὶ προστεθῶσι τὰ μερικὰ γινόμενα.

Ὡστε καὶ ἡ δευτέρα θεμελιώδης ἰδιότης τοῦ πολλαπλασιασμοῦ, τουτέστιν ἡ ἐπιμεριστικὴ ἰδιότης, ἰσχύει καὶ διὰ τοὺς συμμέτρους ἐν γένει ἀριθμούς, ἐπομένως καὶ αἱ ἐξ αὐτῆς πηγάζουσαι.

Πολλαπλασιασμός διαφορᾶς ἐπὶ ἀριθμὸν.

168. — Ἐστω

$$\begin{aligned} & \left( \frac{3}{5} - \frac{2}{7} \right) \times \frac{4}{9} \cdot \text{ τοῦτο ἰσοῦται πρὸς} \\ & \left( \frac{3 \times 7}{5 \times 7} - \frac{2 \times 5}{5 \times 7} \right) \times \frac{4}{9} = \frac{(3 \times 7) - (2 \times 5)}{5 \times 7} \times \frac{4}{9} = \\ & \frac{(3 \times 7 \times 4) - (2 \times 5 \times 4)}{5 \times 7 \times 9} = \frac{3 \times 7 \times 4}{5 \times 7 \times 9} - \frac{2 \times 5 \times 4}{5 \times 7 \times 9} \\ & = \left( \frac{3}{5} \times \frac{4}{9} \right) - \left( \frac{2}{7} \times \frac{4}{9} \right) \end{aligned}$$

Καὶ γενικῶς·

$$\left( \frac{\alpha}{\beta} - \frac{\gamma}{\delta} \right) \times \frac{\epsilon}{\zeta} = \left( \frac{\alpha}{\beta} \times \frac{\epsilon}{\zeta} \right) - \left( \frac{\gamma}{\delta} \times \frac{\epsilon}{\zeta} \right)$$

ἦτοι·

Διαφορὰ πολλαπλασιάζεται ἐπὶ ἀριθμὸν καὶ ἂν πολλαπλασιασθῇ ὁ μειωτέος καὶ ὁ ἀφαιρετέος ἐπὶ τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν καὶ ἀπὸ τοῦ πρώτου γινομένου ἀφαιρεθῇ τὸ δεύτερον.

**Συμπέρασμα διὰ τὰς ιδιότητας τῶν πράξεων.**

169. — Κατὰ τὰ ἀνωτέρω δυνάμεθα νὰ λέγωμεν διὰ αἱ ιδιότητες αἱ παριστώμεναι διὰ τῶν ἰσοτήτων

$$\begin{aligned} \alpha \times \beta \times \gamma &= \alpha \times (\beta \times \gamma) \\ (\alpha \times \beta \times \gamma) \times \delta &= \alpha \times \beta \times (\gamma \times \delta) \\ (\alpha \times \beta \times \gamma) \times (\delta \times \epsilon) &= \alpha \times \beta \times \gamma \times \delta \times \epsilon \\ (\alpha + \beta) \times \gamma &= (\alpha \times \gamma) + (\beta \times \gamma) \\ (\alpha + \beta) \times (\gamma + \delta) &= (\alpha \times \gamma) + (\beta \times \gamma) + (\alpha \times \delta) + (\beta \times \delta) \\ (\alpha - \beta) \times \gamma &= (\alpha \times \gamma) - (\beta \times \gamma) \end{aligned}$$

ἰσχύουσι, καὶ ὅταν τὰ γράμματα παριστῶσιν οἰουσδήποτε συμμέτρους.

## Ἀσκήσεις.

228.) Πατήρ τις ἀφήνει εἰς τοὺς 4 υἱοὺς του περιουσίαν ἐξ 80000 δραχμῶν. Συμφώνως πρὸς τὴν διαθήκην του δέον νὰ λάβῃ ὁ πρῶτος τὸ  $\frac{1}{4}$  τῆς περιουσίας· ὁ δεῦτερος τὰ  $\frac{3}{5}$  τοῦ ὑπολοίπου· ὁ τρίτος τὰ  $\frac{3}{5}$  τοῦ νέου ὑπολοίπου· ὁ δὲ τέταρτος τὸ τελευταῖον ὑπόλοιπον. Τί μέρος τῆς περιουσίας ἔλαβεν ὁ τέταρτος καὶ ἐκ πόσων δραχμῶν ἀπετελεῖτο;

229.) Ἐλαστική σφαῖρα ἀναπηδᾷ εἰς τὰ  $\frac{3}{8}$  τοῦ ὕψους ἐξ οὗ πίπτει· πεσοῦσα δὲ ἀπὸ ὕψους 7 μέτρων ἀνεπήδησε [τρὶς] εἰς πόσον ὕψος ὑψώθη κατὰ τὴν τρίτην ἀναπήδησιν;

$$230.) \text{Νὰ δειχθῇ ὅτι } \frac{1}{2} \left( \frac{1}{\alpha-1} - \frac{1}{\alpha+1} \right) = \frac{1}{\alpha^2-1}$$

231.) Πότε τὸ γινόμενον δύο ἀναγώγων κλασμάτων εἶναι ἀριθμὸς ἀκέραιος; (§ 132).

$$232.) \text{Ἐστῶσαν δύο ἀνάγωγα κλάσματα } \frac{\alpha}{\beta} \text{ καὶ } \frac{\gamma}{\delta}.$$

πό ε τὸ γινόμενόν των  $\frac{\alpha\gamma}{\beta\delta}$  εἶναι κλάσμα ἀνάγωγον;

233.) Τὸ γινόμενον  $\frac{1}{\mu} \cdot \frac{1}{\mu+1}$  νὰ γραφῇ ὡς διαφορὰ δύο κλασμάτων μὲ τοὺς αὐτοὺς παρονομαστὰς  $\mu$  καὶ  $\mu+1$ .

234.) Τὸ ἄθροισμα

$$\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \dots + \frac{1}{\mu(\mu+1)}$$

ἰσοῦται τῇ διαφορᾷ  $1 - \frac{1}{\mu+1}$  (\*Ασκ. 233)

235.) Τὸ γινόμενον

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{5}{2} \cdot \frac{7}{2} \cdot \dots \cdot \frac{2\mu-1}{2}$$

ἰσοῦται πρὸς τὸ κλάσμα

$$\frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot \dots \cdot (2\mu-1) \cdot 2\mu}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot \mu \cdot 2^{2\mu}}$$

Ἄρκει νὰ παρατηρήσωμεν ὅτι

$$1.2.3....\mu \cdot 2^\mu = (1 \cdot 2) \cdot (2 \cdot 2) \cdot (3 \cdot 2) \dots (\mu \cdot 2) = 2 \cdot 4 \cdot 6 \dots 2\mu$$

καὶ ἐπομένως

$$1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \dots (2\mu - 1) \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3 \dots \mu \cdot 2^\mu = \\ 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7 \dots (2\mu - 1) \cdot 2\mu$$

### ΔΙΑΙΡΕΣΙΣ

170.— Ἡ διαίρεσις εἶναι προᾶξις δι' ἧς δοθέντων δύο ἀριθμῶν εὐρίσκομεν τρίτον ὅστις πολλαπλασιαζόμενος ἐπὶ τὸν δευτέρον δίδει τὸν πρῶτον· ὁ ζητούμενος ἀριθμὸς λέγεται πηλίκον. καὶ ἐκ τῶν δύο δεδομένων ὁ πρῶτος λέγεται διαιρετέος, ὁ δὲ δευτέρος διαιρέτης. (§ 57)

1.) Διαιρέτης ἀκέραιος.

$$171. - \alpha') \text{ Ἔχομεν } \frac{2}{5} : 7 = \frac{2}{5 \times 7} \quad (\S 141)$$

$$\eta \text{ καὶ } \frac{6}{7} : 2 = \frac{6:2}{7} \quad (\S 140)$$

ἔθεν·

Ἴνα διαιρέσωμεν κλάσμα δι' ἀκεραίου, πολλαπλασιάζομεν τὸν παρονομαστήν ἐπὶ τὸν ἀκέραιον ἢ διαιροῦμεν τὸν ἀριθμητὴν δι' αὐτοῦ, ἐὰν γίνεται ἀκριβῶς ἢ διαίρεσις.

172.— β') Ἐστω ἡ διαίρεσις

$$5 \frac{7}{8} : 4$$

$$\text{ἔχομεν } 5 \frac{7}{8} : 4 = \frac{47}{8} : 4 = \frac{47}{8 \times 4} \quad (\S 171)$$

$$\text{ἔχομεν ἐπίσης } 5 \frac{7}{8} : 4 = \frac{5}{4} + \frac{7}{8 \times 4} \quad (\S 162) \text{ ἦτοι}$$

Ἴνα διαιρέσωμεν μικτὸν δι' ἀκεραίου, ἢ τρόπομεν αὐτὸν εἰς κλάσμα ἢ διαιροῦμεν χωριστὰ τὸν ἀκέραιον καὶ χωριστὰ τὸ κλάσμα καὶ προσθέτομεν τὰ πηλικά.

## 2) Διαιρέτης κλάσμα.

173. — Ἐστω

$$\alpha : \frac{4}{9}$$

ἔπου α σύμμετρος· παρατηροῦμεν ὅτι τὸ πηλίκον θὰ εἶναι τοιοῦτον ὥστε, ἐὰν λάβωμεν τὸ  $\frac{1}{9}$  αὐτοῦ τετράκις, γίνεται α (§ 170) καὶ ἐπομένως τὰ 9 ἔνατα αὐτοῦ ληφθέντα· τετράκις γίνονται  $\alpha \times 9$ , ἤτοι ὀλόκληρον τὸ πηλίκον ληφθὲν τετράκις γίνεται  $\alpha \times 9$ . ἄρα ληφθὲν ἅπαξ γίνεται

$$\frac{\alpha \times 9}{4} = \alpha \times \frac{9}{4} \quad \text{ὅθεν}$$

Διὰ τὴν διαιρέσωμεν ἀριθμὸν διὰ κλάσματος, ἀρκεῖ τὴν πολλαπλασιάσωμεν αὐτὸν ἐπὶ τὸ κλάσμα ἀντεστραμμένον·

$$\text{π. χ.} \quad 7\frac{1}{2} : \frac{5}{6} = 7\frac{1}{2} \times \frac{6}{5} = 9$$

$$\text{ἐπίσης} \quad \frac{13}{14} : \frac{14}{13} = \frac{13}{14} \times \frac{13}{14} = \frac{13^2}{14^2}$$

## 3) Διαιρέτης μικτός.

174. — Ἐστω

$$\alpha : 2\frac{5}{9}$$

ἔχομεν·

$$\alpha : 2\frac{5}{9} = \alpha : \frac{23}{9} = \alpha \times \frac{9}{23} \quad (\S 173)$$

ἄρα·

ἵνα διαιρέσωμεν ἀριθμὸν διὰ μικτοῦ, τρέπομεν τὸν μικτὸν εἰς κλάσμα καὶ διαιροῦμεν.

$$\text{Π. χ.} \quad 4\frac{1}{2} : 2\frac{1}{4} = 4\frac{1}{2} \times \frac{4}{9} = 2.$$



## Γενικαὶ ἰδιότητες τῆς διαιρέσεως.

175. — 1) Ἐστω

$$\frac{3}{4} : \frac{2}{7} = \pi$$

τότε

$$\frac{3}{4} = \frac{2}{7} \times \pi \quad \text{καὶ (§ 169)}$$

$$\frac{3}{4} \times \rho = \left( \frac{2}{7} \times \rho \right) \times \pi \quad \text{ἐθεν (§ 170)}$$

$$\left( \frac{3}{4} \times \rho \right) : \left( \frac{2}{7} \times \rho \right) = \pi$$

καὶ γενικῶς

$$(\alpha \times \rho) : (\beta \times \rho) = \alpha : \beta \quad \text{Ἄρα}$$

Ἐὰν πολλαπλασιάσωμεν διαιρετέον καὶ διαιρέτην ἐπὶ τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν, τὸ πηλίκον δὲν μεταβάλλεται.

2) Ὁμοίως καὶ ἐὰν διαιρέσωμεν διαιρετέον καὶ διαιρέτην διὰ τοῦ αὐτοῦ ἀριθμοῦ τὸ πηλίκον δὲν ἀλλάσσει· ἦτοι:

$$(\alpha : \rho) : (\beta : \rho) = \alpha : \beta.$$

Ὅπως διὰ τοὺς ἀκεραίους (§ 60, 61, 62, 63) οὕτω καὶ ἐνταῦθα ἰσχύουσι καὶ ἀποδεικνύονται ὁμοίως αἱ ἰδιότητες αἱ παριστώμεναι διὰ τῶν ἰσοτήτων

$$3) \quad (\alpha + \beta + \gamma) : \delta = (\alpha : \delta) + (\beta : \delta) + (\gamma : \delta)$$

$$4) \quad (\alpha - \beta) : \gamma = (\alpha : \gamma) - (\beta : \gamma)$$

$$5) \quad (\alpha \times \beta \times \gamma) : \delta = \alpha \times (\beta : \delta) \times \gamma$$

$$6) \quad \alpha : (\beta \times \gamma \times \delta) = [(\alpha : \beta) : \gamma] : \delta$$

## Ἀσκήσεις.

236.) Κρουνὸς πληροῖ δεξαμενὴν εἰς  $3\frac{1}{2}$  ὥρας, δεύτερος εἰς  $2\frac{1}{2}$  καὶ τρίτος εἰς 3 ὥρας· ἕτερος δὲ κρουνὸς δύναται νὰ κενώσῃ τὴν δεξαμενὴν ἐντὸς 2 ὥρων. Ἄν ἀνοιχθῶσι καὶ οἱ

τέσσαρες κρουνοὶ συγχρόνως εἰς πόσον χρόνον θὰ πληρωθῆ ἡ δεξαμενὴ ;

237.) Ἐλαστικὴ σφαῖρα ἀναπηδᾷ εἰς τὰ  $\frac{3}{11}$  τοῦ ὕψους ἐξ οὗ πίπτει· πεσοῦσα δὲ ἀπὸ τινος ὕψους καὶ ἀναπηδήσασα τετράκις ὑψώθη κατὰ τὴν τετάρτην ἀναπήδησιν εἰς ὕψος  $\frac{1}{12}$  τοῦ πήχεως. Πόσον εἶναι τὸ ἀρχικὸν ὕψος ;

238.) Ἀπὸ σταθμοῦ τινος σιδηροδρόμου ἀναχωρεῖ ἀτμάμαξα μὲ ταχύτητα 10<sup>κμ.</sup> καθ' ὥραν ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ σταθμοῦ καὶ ἐπὶ τῆς αὐτῆς ὁδοῦ ἀναχωρεῖ μετὰ ἓν τέταρτον ἄλλη ἀτμάμαξα μὲ ταχύτητα 12<sup>κμ.</sup> καθ' ὥραν. Εἰς ποίαν ἀπόστασιν ἀπὸ τοῦ σταθμοῦ τῆς ἐκκινήσεως θὰ συναντηθῶσι ;

239.) Τέσσαρες ἐργάται πρόκειται νὰ ἐκτελέσωσιν ἔργον τι ἢ ἐκτελέσεις τούτου, ἐὰν ἔλειπεν ὁ τέταρτος, θὰ ἀπῆται 8 ἡμέρας, ἐνῶ, ἐὰν ἔλειπεν ὁ τρίτος, θὰ ἀπῆται 10 ἡμέρας, ἐὰν ὁ δευτέρος, 12 ἡμέρας, καὶ ἐὰν ὁ πρῶτος, 18 ἡμέρας. Εἰς πόσας ἡμέρας ἕκαστος ἐκ τούτων μόνος ἐκτελεῖ τὸ ἔργον καὶ εἰς πόσας ὄλοι ὁμοῦ ;

240.) Τρεῖς γεωργοὶ ἀνοίγουν αὐλάκα διερχομένην ἀπὸ τὸν ἀγρὸν τοῦ πρῶτου εἰς μῆκος 128 μέτρων, ἀπὸ τὸν τοῦ δευτέρου εἰς μῆκος 72 μέτρων καὶ ἀπὸ τὸν τοῦ τρίτου εἰς μῆκος 88. Διὰ τὸ ταχύτερον προσλαμβάνουσι καὶ τέταρτον, εἰς ὃν δίδεται ἀμοιβὴ 70 δραχμῶν. Τί θὰ πληρώσῃ ἕκαστος ἐκ τῶν τριῶν εἰς τὸν τέταρτον ἐργάτην ;

241.) Νὰ εὐρεθῆ κλάσμα ἑπερ διαιρούμενον διὰ τῶν κλασμάτων

$$\frac{18}{48}, \frac{56}{45}, \frac{9}{60}$$

δίδει ὡς πηλίκον ἀριθμοὺς ἀκεραίους· ποῖον τὸ μικρότερον ἐξ αὐτῶν ; (§ 143, § 114)

242.) Πότε τὸ πηλίκον δύο ἀναγώγων κλασμάτων εἶναι ἀριθμὸς ἀκέραιος ; (§ 132)

243.) Πότε τὸ πηλίκον δύο ἀναγώγων κλασμάτων εἶναι κλάσμα ἀνάγωγον ;

## ΣΥΝΘΕΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ

176. — Όπως  $\frac{\alpha}{\beta}$ , όπου  $\alpha$  και  $\beta$  ἀκέραιοι, παριστᾶ τὸ πηλίκον  $\alpha : \beta$ , (§ 139), οὕτω θὰ παριστῶμεν καὶ τὸ πηλίκον δύο οἰωνδήποτε συμμετρῶν ἀριθμῶν  $\alpha$  καὶ  $\beta$  διὰ τοῦ  $\frac{\alpha}{\beta}$ . Κατὰ ταῦτα:

$$8 : \frac{2}{3} = \frac{8}{\frac{2}{3}}, \quad 9\frac{3}{7} : 4\frac{5}{6} = \frac{9\frac{3}{7}}{4\frac{5}{6}}$$

Αἱ τοιαῦται παραστάσεις λέγονται σύνθετα κλάσματα.

Γενικῶς: ἂν τὸ πηλίκον δύο τυχόντων συμμετρῶν ἀριθμῶν, τῶν ὁποίων ὁ εἰς τοῦλάχιστον δὲν εἶναι ἀκέραιος, παραστήσωμεν ὡς κλάσμα ἔχον ἀριθμητὴν μὲν τὸν διαιρετέον, παρονομαστὴν δὲ τὸν διαιρέτην, προκύπτει παράστασις ἢ ὁποία λέγεται σύνθετον κλάσμα.

ΣΗΜ. Τὰ κλάσματα, ὧν οἱ ὄροι εἶναι ἀκέραιοι ἀριθμοὶ καλοῦμεν, πρὸς διάκρισιν ἀπὸ τῶν συνθέτων, ἀπλᾶ κλάσματα.

## Ἰδιότητες τῶν συνθέτων κλασμάτων.

177. — Ἐστω τὸ σύνθετον κλάσμα  $\frac{\alpha}{\beta}$ . σχηματίζω τὸ κλάσμα  $\frac{\alpha \times \rho}{\beta \times \rho}$ , ὅπου  $\rho$  τυχὸν σύμμετρος. Κατὰ τὸν ὄρισμὸν τῶν συνθέτων κλασμάτων ἔχομεν  $\frac{\alpha}{\beta} = \alpha : \beta$

$$\text{καὶ} \quad \frac{\alpha \times \rho}{\beta \times \rho} = (\alpha \times \rho) : (\beta \times \rho)$$

$$\text{ἀλλὰ (§ 175)} \quad \alpha : \beta = (\alpha \times \rho) : (\beta \times \rho)$$

$$\text{ἔθεν καὶ} \quad \frac{\alpha}{\beta} = \frac{\alpha \times \rho}{\beta \times \rho} \quad \text{ἄρα}$$

Ἐὰν ἀμφότεροι οἱ ὄροι συνθέτου κλάσματος πολλαπλασιασθῶσιν ἐπὶ τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν, ἡ ἀξία αὐτοῦ δὲν μεταβάλλεται.

Ἐφαρμογαί. — Τὴν ιδιότητα ταύτην ἐφαρμόζομεν εἰς τὴν

τροπήν συνθέτου κλάσματος εἰς ἀπλοῦν ἰσοδύναμον καὶ εἰς τὴν τροπήν ἑτερωνύμων συνθέτων εἰς ὁμώνυμα τοιαῦτα.

$$1) \text{ Ἐστω τὸ σύνθετον κλάσμα } \frac{\frac{5}{12}}{\frac{7}{15}} \cdot \text{διὰ πολλαπλασιασμοῦ ἄμφοτέρων τῶν ὄρων αὐτοῦ ἐπὶ τὸ ε. κ. π. τῶν 12, 15 εὐρίσκομεν}$$

$$\frac{\frac{5}{12}}{\frac{7}{15}} = \frac{\frac{5}{12} \times 60}{\frac{7}{15} \times 60} = \frac{25}{28}$$

$$2.) \text{ Τὰ ἑτερώνυμα κλάσματα } \frac{3}{2}, \frac{7}{9}, \frac{2}{3} \text{ εἶναι προφανῶς ἓν πρὸς ἓν ἰσοδύναμα πρὸς τὰ ὁμώνυμα.}$$

$$\frac{\frac{3}{4} \times 9 \times \frac{3}{5}}{\frac{2}{5} \times 9 \times \frac{3}{5}}, \quad \frac{\frac{7}{8} \times \frac{2}{5} \times \frac{3}{5}}{9 \times \frac{2}{5} \times \frac{3}{5}}, \quad \frac{2 \times \frac{2}{5} \times 9}{\frac{3}{5} \times \frac{2}{5} \times 9}$$

$$- 178. - 1) \text{ Ἐστω τὸ σύνθετον κλάσμα } \frac{\frac{3}{4}}{\frac{5}{7}} \cdot \text{ἐὰν καλέσωμεν π τὸ πηλίκον τοῦ } \frac{3}{4} \text{ διὰ } \frac{5}{7}, \text{ θὰ εἶναι (§ 170) } \frac{3}{4} = \frac{5}{7} \times \pi \cdot \text{ ὅθεν}$$

$$\frac{3}{4} \times \rho = \frac{5}{7} \times (\pi \times \rho) \quad (\S 169) \text{ καὶ ἐπομένως}$$

$$\frac{\frac{3}{4} \times \rho}{\frac{5}{7}} = \pi \times \rho. \quad \text{ἄρα}$$

Ἐὰν ὁ ἀριθμητὴς συνθέτου κλάσματος πολλαπλασιασθῇ ἐπὶ τινὰ ἀριθμὸν, καὶ τὸ κλάσμα πολλαπλασιάζεται ἐπὶ τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν.

2) Ἐκ τῆς ἰσότητος

$$\frac{3}{4} = \frac{5}{7} \times \pi$$

προκύπτει εὐκόλως ἡ ἰσότης

$$\frac{3}{4} = \frac{5}{7} \times [(\pi : \rho) \times \rho] = \frac{5}{7} \times \rho \times \left(\frac{\pi}{\rho}\right) \quad \delta\theta\epsilon\nu$$

$$\frac{\frac{3}{4}}{\frac{5}{7} \times \rho} = \frac{\pi}{\rho} \quad \acute{\alpha}\rho\alpha$$

Ἐὰν ὁ παρονομαστής συνθέτου κλάσματος πολλαπλασιασθῇ ἐπὶ τινὰ ἀριθμὸν, τὸ κλάσμα διαιρεῖται διὰ τοῦ αὐτοῦ ἀριθμοῦ.

3) Ὅμοιος εὐρίσκομεν ὅτι κατ' ἀνάλογον τρόπον ἐργαζόμενοι συναγομεν καὶ τὴν ἀλήθειαν τῆς ἐξῆς ιδιότητος:

Ἐὰν ὁ ἀριθμητὴς συνθέτου κλάσματος διαιρεθῇ διὰ τινος ἀριθμοῦ ἢ πολλαπλασιασθῇ ὁ παρονομαστής ἐπὶ τινὰ ἀριθμὸν, τὸ κλάσμα διαιρεῖται διὰ τοῦ αὐτοῦ ἀριθμοῦ.

Ἐκ τῶν προειρημένων βλέπομεν ὅτι ἐπὶ τῶν συνθέτων κλασμάτων ἰσχύουσι πᾶσαι αἱ ἐπὶ τῶν ἀπλῶν κλασμάτων ἀποδειχθεῖσαι ιδιότητες.

### Πράξεις ἐπὶ τῶν συνθέτων κλασμάτων.

179. — Ἡ πρόσθεσις τῶν συνθέτων κλασμάτων γίνεται ὅπως καὶ τῶν ἀπλῶν, ἦται τρέπομεν αὐτὰ εἰς ὁμώνυμα, ἐὰν εἶναι ἑτερόνυμα, καὶ προσθέτομεν κατόπιν τοὺς ἀριθμητάς, ὑπὸ δὲ τὸ ἄθροισμα αὐτῶν θέτομεν παρονομαστὴν τὸν κοινόν.

Ἐπίσης καὶ ἡ ἀφαίρεσις.

180. — Ἐστωσαν τὰ σύνθετα κλάσματα  $\frac{\alpha}{\beta}$  καὶ  $\frac{\gamma}{\delta}$  ταῦτα τρεπόμενα εἰς ἀπλᾶ θὰ ἔδιδαν ἀριθμούς τινας  $\pi$  καὶ  $\rho$  ὅθεν

$$\frac{\alpha}{\beta} = \pi, \quad \frac{\gamma}{\delta} = \rho$$

ἢ καὶ (§ 176)  $\alpha : \beta = \pi, \quad \gamma : \delta = \rho$

$$\begin{aligned} \xi\xi \text{ οὖ} & \quad \alpha = \beta \times \pi \\ & \quad \gamma = \delta \times \rho \end{aligned}$$

ἔθεν (§ 169)

$$\alpha \times \gamma = \beta \times \pi \times \delta \times \rho \text{ καὶ } \alpha \times \gamma = (\beta \times \delta) \times (\pi \times \rho) \quad \text{ἔθεν}$$

$$\pi \times \rho = \frac{\alpha \times \gamma}{\beta \times \delta} \quad (\S 170), \quad \eta \quad \frac{\alpha}{\beta} \times \frac{\gamma}{\delta} = \frac{\alpha \times \gamma}{\beta \times \delta}$$

Ὅμοιως ἀποδεικνύομεν ὅτι

$$\frac{\alpha}{\beta} \times \frac{\gamma}{\delta} \times \frac{\varepsilon}{\zeta} = \frac{\alpha \times \gamma \times \varepsilon}{\beta \times \delta \times \zeta}$$

ἄρα·

Τὸ γινόμενον δύο ἢ καὶ περισσοτέρων κλασμάτων εἶναι κλάσμα ἔχον ἀριθμητὴν μὲν τὸ γινόμενον τῶν ἀριθμητῶν, παρονομαστὴν δὲ τὸ γινόμενον τῶν παρονομαστῶν.

181. — Ζητήσωμεν ἤδη τὸ πηλίκον τῆς διαιρέσεως δύο συνθέτων κλασμάτων  $\frac{\alpha}{\beta}$  καὶ  $\frac{\gamma}{\delta}$ . Ἐστω τοῦτο π· θὰ ἔχωμεν·

$$\pi \times \frac{\gamma}{\delta} = \frac{\alpha}{\beta}$$

ἔθεν

$$\pi \times \frac{\gamma}{\delta} \times \frac{\delta}{\gamma} = \frac{\alpha}{\beta} \times \frac{\delta}{\gamma} \quad \eta \quad (\S 180) \quad \pi = \frac{\alpha}{\beta} \times \frac{\delta}{\gamma} \quad \text{ἄρα}$$

Ἴνα διαιρέσωμεν κλάσμα διὰ κλάσματος, πολλαπλασιάζομεν τὸν διαιρετέον ἐπὶ τὸν διαιρέτην ἀντεστραμμένον.

### Ἀσκήσεις.

244.) Νὰ εὑρεθῇ ἀπλοῦν κλάσμα ἰσοδύναμον πρὸς τὸ

$$\frac{5}{6 + \frac{7}{8 + \frac{9}{10}}}$$

245.) Νὰ εὐρεθῶσι τὰ ἐξαγόμενα τῶν κάτωθι σημειουμένων πράξεων

$$\alpha') \quad \frac{2}{5 + \frac{2}{7 + \frac{3}{4}}} \times \frac{4}{\left(3 + \frac{2}{9}\right) : \left(3 \frac{5}{6} - \frac{7}{8}\right)}$$

$$\beta') \quad \left(3 \frac{1}{3} \frac{2}{7} + \frac{2}{10 \frac{1}{2}} - \frac{5}{18} \times \frac{4}{7}\right) \times 1 \frac{3}{4}$$

$$\gamma') \quad \left(3 \frac{1}{4} - \frac{5}{6} \times \frac{4}{15}\right) : \left(21 \frac{1}{5} + \frac{3}{10} + 4 \frac{1}{3} \times 5\right)$$

### Δυνάμεις τῶν κλασμάτων.

182. — Ὁ ὅρισμός δυνάμεως (§ 70) ἐκτείνεται καὶ εἰς τὴν περίπτωσιν καθ' ἣν δ α εἶναι κλάσμα.

$$\text{Π. χ.} \quad \left(\frac{5}{6}\right)^3 = \frac{5}{6} \times \frac{5}{6} \times \frac{5}{6}$$

183. — Ἐπειδὴ

$$\left(\frac{5}{6}\right)^3 = \frac{5}{6} \times \frac{5}{6} \times \frac{5}{6}$$

ἀφ' ἑτέρου δὲ (§ 164)

$$\frac{5}{6} \times \frac{5}{6} \times \frac{5}{6} = \frac{5 \times 5 \times 5}{6 \times 6 \times 6} = \frac{5^3}{6^3}$$

$$\text{ἔπεται ὅτι} \quad \left(\frac{5}{6}\right)^3 = \frac{5^3}{6^3}$$

$$\text{καὶ γενικῶς} \quad \left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^n = \frac{\alpha^n}{\beta^n}$$

Ἄρα·

Κλάσμα ὑποῖται εἰς δύναμιν, ἐὰν ἀμφοτέροι οἱ ἄροι αὐτοῦ ὑψωθῶσιν εἰς τὴν δύναμιν ταύτην.

184. — Ἰσχύει λοιπὸν ἐπὶ τῶν δυνάμεων τῶν κλασμάτων ἢ θεμελιώδους ιδιότητος τῶν δυνάμεων (§ 71 α΄.) ἄρα ἰσχύουσι καὶ αἱ ἄλλαι ιδιότητες τῶν δυνάμεων. (§ 71)

### Ἀσκήσεις.

246.) Κλάσμα τι  $\frac{\alpha}{\beta}$  εἶναι ἡ μυστή δύναμις ἄλλου κλάσματος, ἐὰν τὸ γινόμενον  $\alpha \times \beta^{u-1}$  εἶναι ἡ μυστή δύναμις ἀκεραίου.

247.) Ἡ διαφορὰ μεταξὺ ἀναγώγου κλάσματος καὶ τοῦ τετραγώνου του εἶναι κλάσμα ἀνάγωγον, ὅταν ὡς παρονομαστῆς αὐτῆς ληφθῆ τὸ τετράγωνον τοῦ παρονομαστοῦ τοῦ πρώτου κλάσματος.

248.) Ποία ἡ ἱκανὴ καὶ ἀναγκαία συνθήκη ἵνα κλάσμα τι ἀνάγωγον ἰσοῦται πρὸς ἕτερον ἔχον ὡς παρονομαστὴν δύναμιν τινα τοῦ 84;



## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄.

## ΠΕΡΙ ΔΕΚΑΔΙΚΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ

185.—Τὰ κλάσματα  $\frac{7}{10}$ ,  $\frac{9}{100}$ , ... καὶ ἐν γένει τὰ ἔχοντα παρονομαστὴν δύναμιν τοῦ 10 λέγονται δεκαδικὰ κλάσματα.

Αἱ ἀντίστοιχοι μονάδες  $\frac{1}{10}$ ,  $\frac{1}{100}$ , ... λέγονται δεκαδικαὶ μονάδες.

Ὡς ἐλήφθησαν ἐνταῦθα, παρατηροῦμεν ὅτι ἐκάστη δεκαδικὴ μονὰς εἶναι δεκάκις μείζων τῆς ἀμέσως ἐπομένης.

Ἀκεραῖος καὶ δεκαδικὸν κλάσμα ἢ καὶ μόνον δεκαδικὸν κλάσμα καλεῖται δεκαδικὸς ἀριθμὸς.

π. χ.  $7 + \frac{3}{10} + \frac{8}{100} + \frac{9}{1000}$

Τοὺς δεκαδικοὺς ἀριθμοὺς λέγομεν καὶ δεκαδικὰ κλάσματα πρὸς διάκρισιν ἀπὸ τῶν συνήθων κλασμάτων, ἅτινα καλοῦμεν κοινά.

## Γραφὴ καὶ ἀπαγγελία δεκαδικῶν.

186.—Κατὰ τὴν γραφὴν τῶν ἀκεραίων ἢ συμφωνία ἐφ' ἧς ἐβασίσθημεν ἦτο ἡ ἐξῆς.

Ἐν ψηφίον κατέχον θέσιν τινὰ ν' ἀντιπροσωπεύη μονάδας δεκάκις ὀλιγωτέρας ἐκείνων τὰς ὁποίας θ' ἀντεπροσώπευεν εἰς τὴν προηγούμενην πρὸς τὰριστερὰ θέσιν.

Ἴνα ἐπὶ τῆς αὐτῆς συμφωνίας βασιζόμενοι εὐρωμεν θέσεις καὶ διὰ τὰς δεκαδικὰς μονάδας, θέτομεν κόμμα μετὰ τὴν θέσιν τῶν ἀκεραίων μονάδων καὶ τότε κατὰ τὴν συμφωνίαν τὸ ψηφίον τὸ γραφόμενον πρῶτον μετὰ τὴν ὑποδιαστολὴν θὰ φα-

νερώτη δέκατα, τὸ δεύτερον ἑκατοστὰ κ. ο. κ. ὥστε, καὶ ἂν ἀκέραιος δὲν ὑπάρχη, γράφομεν 0 ἀντὶ ἀκεραίου, ἵνα τηρηθῇ ἡ τάξις·

οὕτω τὸ κλάσμα

$$\frac{256}{10000} = \frac{200}{10000} + \frac{50}{10000} + \frac{6}{10000} = \frac{2}{100} + \frac{5}{1000} + \frac{6}{10000} =$$

$$\overset{\text{ἀκέρ.}}{0} + \frac{0}{10} + \frac{2}{100} + \frac{5}{1000} + \frac{6}{10000} = 0,0256$$

187. — Ἐκ τοῦ τρόπου καθ' ὃν γράφεται δεκαδικὸς ἐννοοῦμεν καὶ πῶς ἀπαγγέλλεται. Δυνάμεθα ν' ἀπαγγείλωμεν ἕνα δεκαδικὸν ἀριθμὸν κατὰ διαφόρους τρόπους·

1) Ἀπαγγέλλομεν πρῶτον τὸ ἀκέραιον μέρος καὶ ἔπειτα τὸν μετὰ τὸ κόμμα ἀριθμὸν ὡς εἰάν ἦτο ἀκέραιος προσαρτῶντες μόνον τὸ ὄνομα τῶν μονάδων τὰς ὁποίας παριστᾷ τὸ τελευταῖον ψηφίον· π. χ. ὁ 27, 3054 ἀπαγγέλλεται ὡς ἐξῆς· 27 ἀκέραιος καὶ 3054 δεκάκις χιλιοστά.

Ἡ ἐπίσης ἀπαγγέλλομεν χωριστὰ τὰ δέκατα, χωριστὰ τὰ ἑκατοστὰ κ. ο. κ. Π. χ. ὁ ἀνωτέρω ἀριθμὸς ἀπαγγέλλεται καὶ ὡς ἐξῆς· 27 ἀκέραιος, 3 δέκατα, 5 χιλιοστὰ καὶ 4 δεκάκις χιλιοστὰ. Ἡ καὶ κατὰ τμήματα π. χ. ὁ ἀριθμὸς 4, 7183567 ἀπαγγέλλεται καὶ ὡς ἐξῆς· 4 ἀκέραιος, 718 χιλιοστά, 356 ἑκατομμυριοστά, 7 δεκάκις ἑκατομμυριοστά.

Πᾶς δεκαδικὸς ἀριθμὸς γράφεται καὶ ὡς κλάσμα ἔχον ἀριθμητὴν τὸν ἀκέραιον ὅστις προκύπτει ἀπαλειφομένου τοῦ κόμματος καὶ παρονομαστὴν τὴν μονάδα ἀκολουθουμένην ἀπὸ τόσα μηδενικὰ ὅσα εἶναι τὰ δεκαδικὰ ψηφία τοῦ ἀριθμοῦ· ἐπομένως δύναται ν' ἀπαγγεληθῇ ὅπως καὶ τὸ κοινὸν αὐτὸ κλάσμα· ἦτοι·

Ἀπαγγέλλομεν τὰ ψηφία ὡς εἰάν ἐσχημάτιζον ἕνα ἀκέραιον, προσαρτῶμεν δὲ κατόπιν τὸ ὄνομα τῶν μονάδων τοῦ τελευταίου ψηφίου.

Π. χ. ὁ δεκαδικὸς 5,67 ἀπαγγέλλεται καὶ ὡς ἐξῆς· 567 ἑκατοστά.

### Ἰδιότητες τῶν δεκαδικῶν ἀριθμῶν.

188. — α'.) Ὁ ἀκέραιος 125 εἶναι δεκάκις μικρότερος τοῦ 1250,

ἐνῶ δὲ 1,25 εἶναι ἴσος πρὸς τὸ 1,250,

διότι τὰ ψηφία 1, 2, 5 διατηροῦσι τὴν αὐτὴν θέσιν ὡς πρὸς τὴν ὑποδιαστολὴν καὶ ἐπομένως τὴν αὐτὴν ἀξίαν· ἔθεν·

Ἡ ἀξία δεκαδικοῦ ἀριθμοῦ μένει ἡ αὐτή, ὅταν γραφῶσιν ὁσαδήποτε μηδενικά εἰς τὸ τέλος αὐτοῦ.

Πῶς πολλαπλασιάζεται ἢ διαιρεῖται δεκαδικὸς ἀριθμὸς διὰ 10, 100, 1000, 10000 κ. τ. λ. ;

189. β'.) Ἄς μεταθέσωμεν τὸ κόμμα ἐνὸς δεκαδικοῦ ἀριθμοῦ μίαν θέσιν πρὸς τὰ δεξιά· π. χ. ἀντὶ τοῦ 17,954 ἄς γράψωμεν 179,54· ἕκαστον ψηφίον ἐν τῷ δευτέρῳ ἀριθμῷ ἔχει ἀξίαν δεκαπλασίαν ἐκεῖνης ἣν ἔχει ἐν τῷ 17,954· ἔθεν

$$179,54 = 17,954 \times 10$$

ὁμοίως  $1795,4 = 17,954 \times 100$  κ. τ. λ.

ἔθεν καὶ  $179,54 : 10 = 17,954$ .

ἐπίσης  $1795,4 : 100 = 17,954$

ἦτοι·

Πολλαπλασιάζεται δεκαδικὸς ἀριθμὸς ἐπὶ 10, 100, . . . . ἂν μεταθέσωμεν τὸ κόμμα πρὸς τὰ δεξιά τόσας θέσεις ὅσα ἔχει ὁ πολλαπλασιαστὴς μηδενικά (τιθεμένων ἐν ἀνάγκῃ μηδενικῶν πρὸς τὰ δεξιά τοῦ ἀριθμοῦ).

Διαιρεῖται δὲ δεκαδικὸς ἀριθμὸς διὰ 10, 100, . . . , ἂν μεταθέσωμεν τὸ κόμμα πρὸς τὰ ἄριστερά τόσας θέσεις ὅσα εἶναι τὰ μηδενικά τοῦ διαιρέτου.

Παρατηροῦμεν ὅτι αἱ ἀνωτέρω ἰδιότητες ἐφαίνοντο, καὶ ἂν ἐγράφομεν τοὺς δοθέντας δεκαδικοὺς ὡς κοινὰ κλάσματα.

## Ἀσκήσεις.

249.) Ἡ δὲ πρᾶγματός τινος ἀξίζει: 0,38. Πόσον ἀξίζουν αἱ 1000 δκάδες ;

250.) Προκειμένου νὰ τρέψωμεν ἑτερόνυμα δεκαδικὰ κλάσματα εἰς δμόνυμα, ποῖαν παρατήρησιν δυνάμεθα νὰ κάμωμεν ὡς πρὸς τὸν κοινὸν παρονομαστήν ;

251.) Νὰ παρασταθῶσιν ὡς κοινὰ κλάσματα μὲ παρονομαστήν 200 οἱ δεκαδικοὶ 5,72 καὶ 14,9.

252.) Νὰ εὑρεθῇ κλάσμα ἀνάγωγον ἴσον πρὸς τὸν ἀριθμὸν 17,365.

## Πρόσθεσις.

190. — Ἔχομεν

$$\begin{aligned} & 5,13 + 2,779 + 47 + 0,3 = \\ & 5,130 + 2,779 + 47,000 + 0,300 = \\ & \underline{5130 + 2779 + 47000 + 300} \\ & \qquad \qquad \qquad 1000 \end{aligned}$$

ἐπειδὴ δὲ

$$5130 + 2779 + 47000 + 300 = 55209$$

ἔπεται ὅτι

$$5,13 + 2,779 + 47 + 0,3 = \frac{55209}{1000} = 55,209.$$

Ἡ πρᾶξις διατάσσεται ὡς ἑξῆς:

$$\begin{array}{r} 5,13 \\ 2,779 \\ 47 \\ 0,3 \\ \hline 55,209 \end{array}$$

Ἄρα:

Προσθέτομεν τοὺς δεκαδικοὺς ὅπως καὶ τοὺς ἀκεραίους· εἰς τὸ ἄθροισμα, ἐννοεῖται, θέτομεν τὸ κόμμα μετὰ τὸ ψηφίον τῶν μονάδων· τουτέστι τὸ κόμμα τοῦ ἀθροίσματος καὶ τὰ κόμματα τῶν προσθετέων εὐρίσκονται εἰς τὸ τέλος τῶν ψηφίων τῆς αὐτῆς στήλης.

**Ἀφαιρέσεις.**

191. — Ἐχομεν

$$9,235 - 7,9685 = 9,2350 - 7,9685 =$$

$$\frac{92350}{10000} - \frac{79685}{10000} = \frac{12665}{10000} = 1,2665. \quad \text{ἄρα}$$

Ἀφαιροῦμεν τοὺς δεκαδικοὺς ὅπως καὶ τοὺς ἀκεραίους, διὰ δὲ τὴν τοποθέτησιν τοῦ κόμματος εἰς τὴν διαφορὰν παρατηροῦμεν ὅ,τι καὶ εἰς τὴν πρόσθεσιν.

**Πολλαπλασιασμός.**

192. Ἐστω τὸ γινόμενον

$$3,17 \times 0,0005$$

ἐπειδὴ (§ 189)  $317 = 3,17 \times 100$  καὶ

$$5 = 0,0005 \times 10000,$$

ἔπεται ὅτι  $317 \times 5 = (3,17 \times 100) \times (0,0005 \times 10000)$

ἄρα  $3,17 \times 0,0005 = (317 \times 5) : 1000000$

ἢ καὶ  $3,17 \times 0,0005 = 0,001585$ . ἔθεν

Ἴνα πολλαπλασιάσωμεν δύο δεκαδικούς, πολλαπλασιάζομεν αὐτοὺς ὡς ἐὰν ἦσαν ἀκεραῖοι, χωρίζομεν δ' εἰς τὸ γινόμενον τόσα δεκαδικὰ ψηφία ὅσα ἔχουσιν οἱ δύο παράγοντες. ὁμοῦ

Τοῦτο ἐφαίνεται, καὶ ἐὰν ἐγράφομεν τοὺς παράγοντας ὡς κοινὰ κλάσματα.

**Διαιρέσεις.**

193. — Α'.) Διαιρέτης ἀκέραιος.

Ἐστω  $97,87 : 6$ 

τοῦτο γράφεται καὶ ὡς ἑξῆς·

$$\frac{9787}{100} : 6$$

Ἐπειδὴ διαιροῦντες τὸν 9787 διὰ 6 εὐρίσκομεν πηλίκον 1631 καὶ ὑπόλοιπον 1, ἔπεται ὅτι

$$9787 = 6 \times 1631 + 1$$

ἄρα·

$$97,87 : 6 = \frac{9787}{100} : 6 = \left( \frac{6 \times 1631}{100} + \frac{1}{100} \right) : 6$$

$$\eta \ 97,87 : 6 = \frac{1631}{100} + \left( \frac{1}{100} : 6 \right)$$

$$= 16,31 + (0,01 : 6) \quad (K)$$

Ἦτοι·

Ἴνα διαιρέσωμεν δεκαδικὸν δι' ἀκεραίου, ἐκτελοῦμεν τὴν διαίρεσιν ὡς ἐὰν ἦτο καὶ ὁ διαιρετέος ἀκέραιος καὶ ὅσα ψηφία τοῦ πηλίκου προκύπτουσιν ἐκ τοῦ ἀκεραίου μέρους τοῦ διαιρετέου σχηματίζουσι τὸ ἀκέραιον μέρος τοῦ πηλίκου, τὰ δὲ λοιπὰ εἶναι τὰ δεκαδικὰ ψηφία αὐτοῦ.

Παρατηροῦμεν δ' ὅτι τὸ ὑπόλοιπον τὸ ἀπομένον πρὸς διαίρεσιν διὰ 6, ἦτοι τὸ 1, δηλοῖ μονάδας ὁμοίας μετὰς τὰς μονάδας τὰς ὁποίας παριστᾷ τὸ τελευταῖον ψηφίον τοῦ διαιρετέου, ἦτοι εἶναι 0,01.

194. — Ἡδυνάμεθα εἰς τὸ ἄθροισμα (K) ν' ἀντικαταστήσωμεν τὸν προσθετέον 0,01 : 6 μετὰ τὸν 0,010 : 6 (§ 188)· ἐκτελοῦντες τὴν διαίρεσιν ταύτην κατὰ τὸν ἀνωτέρω κανόνα εὐρίσκομεν

$$0,010 : 6 = 0,001 + (0,004 : 6),$$

ὁπότε τὸ ἄθροισμα (K) γράφεται καὶ ὡς ἐξῆς·

$$16,31 + 0,001 + (0,004 : 6) = 16,311 + (0,004 : 6)$$

Ἔθεν διακρίνομεν ὅτι πηλίκον τῆς διαιρέσεως 97,87 : 6 δυνάμεθα νὰ θεωρήσωμεν καὶ τὸ 16,311 ὁπότε ὑπόλοιπον εἶναι τὸ 0,004. Καὶ πάλιν τὸ 0,004 : 6 δυνάμεθα ν' ἀντικαταστήσωμεν διὰ τοῦ 0,0040 : 6 ἢ διὰ τοῦ 0,0006 + (0,0004 : 6), ὁπότε τὸ ἄθροισμα (K) γράφεται καὶ ὡς ἐξῆς·

$$16,3116 + (0,0004 : 6),$$

ὁπότε θεωροῦμεν ὡς πηλίκον τὸ 16,3116 καὶ ὡς ὑπόλοιπον τὸ 0,0004. Ὅμοίως ἐργαζόμενοι εὐρίσκομεν καὶ ὡς πηλίκον τὸ 16,31166 καὶ ὡς ὑπόλοιπον τὸ 0,00004 κ. ο. κ.

Ἡ πράξις αὕτη διατάσσεται ὡς ἑξῆς·

$$\begin{array}{r|l} 97,87 & 6 \\ \hline 37 & 16,31166... \\ 18 & \\ 07 & \\ 10 & \\ 40 & \\ 40 & \\ 4 & \\ & \vdots \end{array}$$

195. — Καθ' ὁμοιον τρόπον δυνάμεθα νὰ προχωρήσωμεν καὶ εἰς τὴν διαίρεσιν ἀκεραίου δι' ἀκεραίου π.χ. ἡ διαίρεσις  $9787 : 6$  δίδει ὡς πηλίκον  $1631,166\dots$ , ὡς εὐκόλως ἐξάγομεν ἐκ τῶν ἀνωτέρω ὁμοίως ἡ διαίρεσις  $3 : 4$  γίνεται καὶ ὡς ἑξῆς·

$$\begin{array}{r|l} 30 & 4 \\ 20 & 0,75 \\ 0 & \end{array} \quad \text{ἦτοι} \quad \frac{3}{4} = 0,75$$

Εἰς ἀμφότερα ταῦτα τὰ παραδείγματα λέγομεν ὅτι ἐτρέψαμεν κοινὸν κλάσμα εἰς δεκαδικόν.

196. — Β'.) Ὁ διαιρέτης δεκαδικός. Π. χ.  $671,34 : 2,1$ · πολλαπλασιάζομεν διαιρετέον καὶ διαιρέτην ἐπὶ 10, ὅποτε τὸ μὲν πηλίκον δὲν μεταβάλλεται, ὁ δὲ διαιρέτης (§ 189) γίνεται ἀκεραῖος· ἐπανερχόμεθα οὕτως εἰς τὴν προηγουμένην περίπτωσιν διότι ἔχομεν  $6713,4 : 21$ · καὶ γενικῶς·

Ἴνα διαιρέσωμεν δεκαδικὸν διὰ δεκαδικοῦ, πολλαπλασιάζομεν διαιρετέον καὶ διαιρέτην ἐπὶ δύναμιν τοῦ 10 τοιαύτην ὥστε ὁ διαιρέτης νὰ γίνεταί ἀκεραῖος, ὅποτε ἡ προκύπτει διαίρεσις ἀκεραίου δι' ἀκεραίου ἢ δεκαδικοῦ δι' ἀκεραίου.

Ὁ κανὼν οὗτος προφανῶς ἠδύνατο νὰ ἐξαχθῆ, καὶ ἐὰν ἐτρέπομεν τοὺς δεκαδικοὺς εἰς κοινὰ κλάσματα.

### Ἀσκήσεις.

253.) Ἠγόρασέ τις 12 φᾶ ἀντὶ 2,10 δρχ. Πόσα ἔπρεπε ν' ἀγοράσῃ μὲ τὰ αὐτὰ χρήματα, ἵνα στοιχίξῃ ἕκαστον φᾶν 0,025 δρχ. ὀλιγώτερον;

254.) Ἐμπορός τις ἠγόρασεν ὕφασμά τι ἀντὶ 359,75 δραχ., μετεπώλησε δ' αὐτὸ ἀντὶ 400,85 δραχ. κερδίσας ἐξ ἐκάστου πήχους 1,20 δραχ. Πόσων πήχεων ἦτο τὸ ὕφασμα;

255.) Ὑπάλληλός τις ἐξώδευσε τὰ  $\frac{5}{8}$  τοῦ μισθοῦ του δι' ἀγορὰν ἐνδυμασίας καὶ τὰ 0,19 τοῦ ὑπολοίπου δι' ἀγορὰν ὑποδημάτων. τῷ ἔμειναν δὲ τότε ἐκ τοῦ μισθοῦ 121,50 δραχ. Ἀντὶ πόσων δραχμῶν ἠγόρασε τὰ ὑποδήματα;

256.) Ὑπάλληλός τις τοῦ Δημοσίου ἀφήνει εἰς τὸ ταμεῖον λόγῳ συντάξεως τὰ 0,09 τοῦ μισθοῦ του· εἰς δὲ τὸ μετοχικὸν ταμεῖον  $5\frac{1}{3}$  δραχ. κατὰ μῆνα. Πληρώνει διὰ χαρτόσημον κατὰ μῆνα 2 δραχμάς, λαμβάνει δὲ διὰ μισθοὺς τριῶν μηνῶν 676,50 δραχ. Ποῖος ὁ μηνιαῖος μισθὸς του;

257.) Ἀξιωματικὸς διαταχθεὶς νὰ ὀδηγήσῃ 120 στρατιώτας εἰς τι μέρος λαμβάνει ἀναχωρῶν 2700 δραχμ. διὰ νὰ πληρώσῃ 0,15 εἰς ἕκαστον στρατιώτην δι' ἓν χιλιόμετρον. Μερικοὶ ἐξ αὐτῶν ἠσθένησαν· ὁ ἀξιωματικὸς φθάσας εἰς τὸν σκοπὸν τοῦ πληρώνει πρῶτον τὸ ἥμισυ τοῦ κανονισθέντος εἰς τοὺς ἀσθενεῖς καὶ εἶτα τὸ ὑπόλοιπον μοιράζει ἐξ ἴσου εἰς τοὺς ἄλλους, οἵτινες ἔλαβον τότε 24,75 δραχμ. ἕκαστος. Ζητεῖται 1) ὁ ἀριθμὸς τῶν χιλιομέτρων ἅτινα διέτρεξαν· 2) ὁ ἀριθμὸς τῶν στρατιωτῶν οἵτινες ἠσθένησαν.

### Προσεγγίσεις.

Ὑπολογισμὸς πηλίκου κατὰ προσέγγισιν δεκαδικήν.

197. - Ἐστω ἡ διαίρεσις  $97,87 : 6$  ὡς πηλίκον ταύτης δυνάμεθα νὰ θεωρήσωμεν (§ 193) τό·

$$16,31 + \frac{0,01}{6} = 16,31 + \frac{1}{6} \times \frac{1}{100} \quad \text{εἶτε τὸ}$$

$$16,311 + \frac{0,004}{6} = 16,311 + \frac{4}{6} \times \frac{1}{1000}$$



ἦ καὶ

$$16,3116 + \frac{0,0004}{6} = 16,3116 + \frac{4}{6} \times \frac{1}{10000} \text{ κ. ο. κ.}$$

Ὡστε, ἐὰν ὡς πηλίκον τῆς διαιρέσεως ταύτης λάβωμεν μόνον τὸ 16,31 παραλείπομεν τὰ  $\frac{1}{6}$  τοῦ  $\frac{1}{100}$  ἦτοι, ὀλιγώτερον τοῦ  $\frac{1}{100}$ , ἐὰν δὲ λάβωμεν τὸ 16,311 παραλείπομεν τὰ  $\frac{4}{6}$  τοῦ  $\frac{1}{1000}$  ἦτοι ὀλιγώτερον τοῦ  $\frac{1}{1000}$  κ. ο. κ.

Ἀφ' ἐτέρου παρατηροῦμεν ὅτι ὁ 16,32 ὑπερβαίνει τὸ ἀκριβὲς πηλίκον τῆς διαιρέσεως κατὰ ποσότητα μικροτέραν τοῦ  $\frac{1}{100}$  ἐπίσης ὁ 16,312 ὑπερβαίνει τὸ αὐτὸ πηλίκον κατὰ ποσότητα μικροτέραν τοῦ  $\frac{1}{1000}$  κ. ο. κ.

Τὰ πρῶτα πηλίκια (§ 194) καλοῦμεν πηλίκια τῆς διαιρέσεως 97,87 : 6 κατὰ προσέγγισιν  $\frac{1}{100}$ ,  $\frac{1}{1000}$ , ... κατ' ἔλλειψιν, ἐνῶ τὰ δευτέρα καλοῦμεν πηλίκια κατὰ προσέγγισιν  $\frac{1}{100}$ ,  $\frac{1}{1000}$  ... κατ' ὑπεροχὴν.

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω συνάγεται ὁ κανὼν.

198.— Ἴνα ὑπολογίσωμεν πηλίκον διαιρέσεώς τινος κατὰ προσέγγισιν  $\frac{1}{10^v}$  κατ' ἔλλειψιν, προχωροῦμεν εἰς τὴν διαίρεσιν, μέχρις οὗ εὗρωμεν εἰς τὸ πηλίκον δεκαδικὸν ψηφίον τάξεως  $v$ .

Π. χ. τὸ πηλίκον  $\frac{2}{3}$  κατὰ προσέγγισιν  $\frac{1}{1000}$  εἶναι 0,666 κατ' ἔλλειψιν, ἐνῶ κατ' ὑπεροχὴν θὰ ἦτο 0,667.

### Ἀσκήσεις.

258.) Ἐὰν δύο κλάσματα εἶναι ἴσα, ὑπολογιζόμενα κατὰ προσέγγισιν  $\frac{1}{10^v}$  θὰ δίδωσιν ἐξαγόμενα ἴσα, οἷοιδήποτε ὄντος τοῦ  $v$ .

259) Νὰ ὑπολογισθῇ κατὰ προσέγγισιν 0,001 τὸ ἄθροισμα  
 $7,03826 + 51,123 + 0,0124.$

260.) Νὰ ὑπολογισθῇ κατὰ προσέγγισιν 0,01 τὸ ἄθροισμα

$$1 + \frac{1}{1} + \frac{1}{1.2} + \frac{1}{1.2.3} + \frac{1}{1.2.3.4} + \frac{1}{1.2.3.4.5}.$$

Ἑπολογισμὸς πηλίκου κατὰ προσέγγισιν  $\frac{1}{\nu}$ .

199. — Ἐκ τῶν κλασμάτων  $\frac{1}{10}, \frac{2}{10}, \frac{3}{10} \dots$  τῶν  
 ἐχόντων παρονομαστήν 10 τὰ μὲν  $\frac{1}{10}, \frac{2}{10}, \frac{3}{10} \dots$   $\frac{7}{10}$

περιέχονται εἰς τὸ κλάσμα  $\frac{3}{4}$ , τὰ δ' ἄλλα οὐχί. Ἐξ αὐτῶν τὸ  
 $\frac{7}{10}$  καλεῖται πηλίκον τῆς διαιρέσεως 3 : 4 κατὰ προσέγγισιν  $\frac{1}{10}$ .

Γενικῶς καλοῦμεν πηλίκον τῆς διαιρέσεως  $\alpha : \beta$  κατὰ προσέγγισιν  $\frac{1}{\nu}$  τὸ μέγιστον ἐκ τῶν κλασμάτων τῶν ἐχόντων παρονομαστήν  $\nu$  καὶ περιεχομένων εἰς τὸ κλάσμα  $\frac{\alpha}{\beta}$  (§ 197).

Πρὸς εὔρεσιν τοιοῦτου πηλίκου ἀρκεῖ νὰ εὔρεθῇ ἀριθμὸς τις  $\rho$  ἀκέραιος τοιοῦτος ὥστε

$$\frac{\rho}{\nu} \leq \frac{\alpha}{\beta} < \frac{\rho+1}{\nu} \quad \eta$$

$$\rho \leq \frac{\alpha \times \nu}{\beta} < \rho+1.$$

Ἐκ τούτων φαίνεται ὅτι ὁ  $\rho$  εἶναι ὁ μεγαλύτερος ἀκέραιος ἐκ τῶν περιεχομένων εἰς τὸν  $\frac{\alpha \times \nu}{\beta}$ . Ἄρα:

ἵνα εὗρωμεν τὸ πηλίκον  $\alpha : \beta$  κατὰ προσέγγισιν  $\frac{1}{v}$  πολλαπλασιάσωμεν τὸν διαιρετέον ἐπὶ  $v$  καὶ τὸ γινόμενον διαιροῦμεν διὰ  $\beta$ , τοῦ δὲ πηλίκου τούτου τὸ ἀκέραιον μέρος διαιροῦμεν διὰ  $v$ .

Π. χ. Τὸ πηλίκον  $\frac{5}{7}$  κατὰ προσέγγισιν  $\frac{1}{79}$  εἶναι  $\frac{56}{79}$ .

### Ἀσκήσεις.

261.) Νὰ ὑπολογισθῇ τὸ πηλίκον  $97,14 : 12,3$  κατὰ προσέγγισιν  $\frac{1}{21}$ .

262.) Νὰ εὗρεθῇ τὸ μεγαλύτερον ἐκ τῶν ἀπλῶν κλασμάτων τῶν ἐχόντων ἀριθμητὴν τὴν μονάδα καὶ μικροτέρων τοῦ  $\frac{8}{17}$ .

263.) Νὰ ὑπολογισθῇ ὁ ἀριθμὸς 4,5234 κατὰ προσέγγισιν ἡμίσεος χιλιοστοῦ.

264.) Πῶς ὑπολογίζομεν τὸ πηλίκον δύο ἀριθμῶν κατὰ προσέγγισιν  $\frac{1}{v}$ ;

### Τροπὴ κοινοῦ κλάσματος εἰς δεκαδικόν.

200. — Εἶδομεν προηγουμένως (§ 195) πῶς τρέπεται κοινὸν κλάσμα εἰς δεκαδικόν.

Ἄς τρέψωμεν ὁμοίως καὶ τὰ κλάσματα  $\frac{7}{4}$ ,  $\frac{7}{3}$  εἰς δεκαδικούς θεωροῦντες ταῦτα ὡς πηλίκα τῆς διαιρέσεως τοῦ ἀριθμητοῦ τῶν διὰ τοῦ παρονομαστοῦ τῶν.

$$\begin{array}{r} 7 \\ 30 \overline{) 4} \\ \underline{20} \\ 0 \end{array} \quad \begin{array}{r} 4 \\ 1,75 \dots \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7 \\ 10 \overline{) 3} \\ \underline{10} \\ 10 \\ \underline{10} \\ 0 \\ \vdots \end{array} \quad \begin{array}{r} 3 \\ 2,333 \dots \end{array}$$

Παρατηροῦμεν ὅτι χωρὶς  $v$  ἀλλάζωμεν τὸν ἀριθμητὴν εἰς μὲν τὸ πρῶτον εὐρίσκομεν ὑπόλοιπον 0, ἐνῶ εἰς τὸ δεύτερον

ποτέ δὲν φθάνομεν εἰς ὑπόλοιπον 0, ἤτοι ἄλλα μὲν κλάσματα τρέπονται, ἄλλα δὲ δὲν τρέπονται ἀκριβῶς εἰς δεκαδικούς.

Ἐντεῦθεν πηγάζει τὸ ἀκόλουθον ζήτημα·

Τίνα κλάσματα τρέπονται ἀκριβῶς εἰς δεκαδικούς ;

201. — Τάνωτέρω παραδείγματα (§ 200) ἄγουσιν ἡμᾶς εἰς τὴν σκέψιν μήπως μόνος ὁ παρονομαστής ἀρκεῖ νὰ λύσῃ τὴν ἀπορίαν μας ταύτην.

Ἐστω τυχὸν κοινὸν κλάσμα  $\frac{\alpha}{\beta}$  ἀναλύομεν τὸν παρονομαστήν εἰς γινόμενον πρώτων παραγόντων· διακρίνομεν δύο περιπτώσεις·

α') Ὁ  $\beta$  δὲν περιέχει πρώτους παράγοντας διαφόρους τῶν 2 καὶ 5, ἤτοι

$$\beta = 2^{\lambda} \times 5^{\mu}$$

ἔπου ἢ καὶ οἱ δύο ἐκθέται εἶναι ἀκέραιοι ἢ ὁ εἰς ἀκέραιος καὶ ὁ ἄλλος 0.

Ἐὰν  $\lambda = \mu$ , τότε

$$\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\alpha}{2^{\lambda} \times 5^{\lambda}} = \frac{\alpha}{(2 \times 5)^{\lambda}} = \frac{\alpha}{10^{\lambda}} \quad \text{ἤτοι}$$

τὸ  $\frac{\alpha}{\beta}$  τρέπεται εἰς δεκαδικὸν ἀκριβῶς.

Ἐὰν  $\lambda > \mu$ , πολλαπλασιάζομεν ἀμφοτέρους τοὺς ἄρους τοῦ κλάσματος ἐπὶ  $5^{\lambda - \mu}$  καὶ ἔχομεν

$$\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\alpha}{2^{\lambda} \times 5^{\mu}} = \frac{\alpha \times 5^{\lambda - \mu}}{2^{\lambda} \times 5^{\mu} \times 5^{\lambda - \mu}} \quad \text{ἤτοι (§ 71)}$$

$$\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\alpha \times 5^{\lambda - \mu}}{10^{\lambda}} \quad \text{ἤτοι}$$

τρέπεται εἰς δεκαδικὸν ἀκριβῶς.

Ἐὰν  $\lambda < \mu$ , πολλαπλασιάζομεν ἀμφοτέρους τοὺς ὄρους ἐπὶ  $2^{\mu-\lambda}$  καὶ εὐρίσκομεν ὁμοίως

$$\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\alpha \times 2^{\mu-\lambda}}{10^\mu}, \quad \text{ἤτοι}$$

τρέπεται καὶ πάλιν εἰς δεκαδικὸν ἀκριβῶς.

β'.) Ὁ  $\beta$  περιέχει καὶ παράγοντα ἢ παράγοντας διαφόρους τῶν 2 καὶ 5.

Π. γ.  $\beta = 2^\lambda \times 5^\mu \times 7^\nu$ , ὅπου  $\delta$   $\nu$  δὲν εἶναι 0.

Θεωρήσωμεν τὸν ἀριθμητὴν  $\alpha$ · ἐὰν οὗτος διαιρῆται διὰ  $7^\nu$  τότε διαιροῦμεν ἀμφοτέρους τοὺς ὄρους τοῦ  $\frac{\alpha}{\beta}$  διὰ  $7^\nu$ , καὶ λαμβάνομεν κλάσμα μὲ παρονομαστὴν τῆς μορφῆς  $2^\lambda \times 5^\mu$  ὁπότε κατὰ τὴν πρώτην περίπτωσιν τὸ  $\frac{\alpha}{\beta}$  τρέπεται ἀκριβῶς εἰς δεκαδικόν.

Ἐὰν  $\delta$   $\alpha$  δὲν διαιρῆται διὰ τοῦ  $7^\nu$ , τότε καθιστῶντες τὸ  $\frac{\alpha}{\beta}$  ἀνάγωγον (ἐὰν δὲν εἶναι τοιοῦτον) εὐρίσκομεν κλάσμα οὗ  $\delta$  παρονομαστὴς ἔχει τὸν παράγοντα 7,

ἔστω δὲ τοῦτο τὸ 
$$\frac{K}{2^2 \times 5 \times 7}.$$

Ἐὰν  $\delta$  ὑποθέσωμεν ὅτι

$$\frac{\alpha}{\beta} = \frac{K}{2^2 \times 5 \times 7} = \frac{M}{10^\nu}$$

πρέπει (§ 144)  $10^\nu = 2^2 \times 5 \times 7 \times \rho$  (ἐνθα  $\rho$  ἀκέραιος)

ἢ καὶ  $2^\nu \times 5^\nu = 2^2 \times 5 \times 7 \times \rho$

ἔπερ ἄτοπον (§ 124). Τὸ κλάσμα λοιπὸν  $\frac{\alpha}{\beta}$  δὲν τρέπεται εἰς δεκαδικὸν ἀκριβῶς.

Ἐκ πάντων τούτων συνάγομεν ὅτι:

Συνθήκη ἰκανὴ καὶ ἀναγκαία ἵνα κλάσμα τι  $\frac{\alpha}{\beta}$  τρέπηται εἰς δεκαδικὸν ἀκριβῶς εἶναι ἡ ἐξῆς:

Ὁ ἀριθμητὴς νὰ περιέχῃ πάντας τοὺς πρώτους παράγοντας τοῦ παρονομαστοῦ τοὺς διαφόρους τῶν 2 καὶ 5 καὶ οὐδένα μὲ μικρότερον ἐκθέτην.

Ὅθεν καὶ

Ὁ παρονομαστὴς ἀναγωγῶν κλάσματος τροπομένου ἀκριβῶς εἰς δεκαδικὸν δὲν περιέχει πρώτους παράγοντας διαφόρους τῶν 2 καὶ 5.

### Ἀσκήσεις.

265.) Τίνα ἐκ τῶν κλασμάτων

$$\frac{105}{14}, \frac{24}{150}, \frac{6}{18}, \frac{5}{10}$$

τρέπονται εἰς δεκαδικὸν ἀκριβῶς;

266.) Ἐὰν κλάσμα τι ἀνάγωγον ἔχῃ παρονομαστὴν τῆς μορφῆς  $2^λ \times 5^μ$  θὰ τρέπηται εἰς δεκαδικὸν μὲ ψηφία δεκαδικὰ λ τὸ πλῆθος, ἐὰν  $λ > μ$ .

Ἐὰν κλάσμα τι ἀνάγωγον ἔχῃ παρονομαστὴν τῆς μορφῆς  $2^λ \times 5^μ$  θὰ τρέπηται εἰς δεκαδικὸν μὲ δεκαδικὰ ψηφία μ τὸ πλῆθος, ἐὰν  $μ > λ$ .

267.) Ἐστῶσαν δύο κλάσματα  $\frac{\alpha}{\beta}$  καὶ  $\frac{\gamma}{\delta}$  ὧν τὸ πρῶτον

τρέπεται εἰς δεκαδικὸν ἀκριβῶς. Πότε τὸ γινόμενον  $\frac{\alpha}{\beta} \cdot \frac{\gamma}{\delta}$

τρέπεται εἰς δεκαδικὸν ἀκριβῶς; (§ 201, § 132)

268.) Ἐστῶσαν δύο κλάσματα  $\frac{\alpha}{\beta}$  καὶ  $\frac{\gamma}{\delta}$  ὧν τὸ πρῶ-

τον τρέπεται εἰς δεκαδικὸν ἀκριβῶς.

Πότε τὸ πηλίκον  $\frac{\alpha}{\beta} : \frac{\gamma}{\delta}$  τρέπεται εἰς δεκαδικὸν ἀκριβῶς;

269.) Ἐστῶσαν δύο κλάσματα  $\frac{\alpha}{\beta}$  καὶ  $\frac{\gamma}{\delta}$  τὰ ὅποια τρέπονται ἀκριβῶς εἰς δεκαδικούς. Τὸ ἄθροισμα, ἡ διαφορά, τὸ γινόμενον καὶ τὸ πηλίκον τρέπονται ἀκριβῶς εἰς δεκαδικούς;

### Περιοδικά δεκαδικά κλάσματα.

202. — Είδομεν (§ 201) τίνα κοινά κλάσματα δὲν τρέπονται ἀκριβῶς εἰς δεκαδικά· π. χ. κατὰ τὴν διαίρεσιν  $3 : 7$  παρέχονται ἄπειρα δεκαδικὰ ψηφία εἰς τὸ πηλίκον· προκύπτει ἤδη τὸ ἐρώτημα·

Τὰ ἄπειρα ταῦτα δεκαδικὰ ψηφία κατὰ τίνα νόμον διαδέχονται ἀλλήλα ;

Τοῦτο θὰ ἐννοήσωμεν ἀπὸ τὸν τρόπον μὲ τὸν ὅποιον σχηματίζονται οἱ διαιρετέοι.

Ἐκαστος τούτων σχηματίζεται, ὅταν εἰς τὸ ὑπόλοιπον προσγράψωμεν ἓν μηδενικόν. Ἄλλ' ὡς ὑπόλοιπον ἐνταῦθα, ὅπου ὁ διαιρέτης εἶναι 7, δὲν δύναται νὰ ληφθῇ ἀκέραιος διάφορος τῶν ἀριθμῶν 1, 2, 3, 4, 5, 6· ἐπομένως μετὰ ἐξ τὸ πολὺν διαιρέσεις θὰ παρουσιασθῇ ὑπόλοιπον ἴσον μὲ ἓν προηγουμένως εὑρεθέν. Ἀλλὰ τότε θὰ προκύψῃ καὶ διαιρετέος ἴσος μὲ ἄλλον προηγουμένως εὑρεθέντα καὶ ἀφοῦ διαιρέτης εἶναι ὁ αὐτὸς θὰ ἔχωμεν τὴν αὐτὴν σειρὰν πράξεων νὰ ἐκτελέσωμεν· ἐπομένως τὰ πηλικά καὶ τὰ ὑπόλοιπα ἐπαναλαμβάνονται τὰ αὐτὰ καὶ κατὰ τὴν αὐτὴν τάξιν· δηλαδή  $\frac{3}{7} = 0,428571428571\dots$

$$\begin{array}{r|l}
 30 & | \quad 7 \\
 \hline
 20 & 0,42857142 \dots \\
 60 & \\
 40 & \\
 50 & \\
 10 & \\
 30 & \\
 2 & \\
 \vdots &
 \end{array}$$

Ἄρα

Πᾶν κοινὸν κλάσμα μὴ τρεπόμενον ἀκριβῶς εἰς δεκαδικὸν παράγει δεκαδικὸν μὲ ἄπειρα δεκαδικὰ ψηφία διαδεχόμενα ἀλλήλα κατὰ τὸν ἐξῆς νόμον· «Ἀπὸ τινος ψηφίου καὶ ἐφεξῆς ἐπαναλαμβάνονται ἐπ' ἄπειρον τὰ αὐτὰ ψηφία καὶ κατὰ τὴν αὐτὴν τάξιν».

**203.**— Περιοδικὸν δεκαδικὸν κλάσμα λέγεται τὸ δεκαδικὸν κλάσμα, ἐνῶ ἐπαναλαμβάνονται ἐπ' ἄπειρον ἀπὸ τινος καὶ ἐφεξῆς τὰ αὐτὰ δεκαδικὰ ψηφία καὶ κατὰ τὴν αὐτὴν τάξιν.

Τὸ σύνολον τῶν ψηφίων τῶν οὕτως ἐπαναλαμβανομένων λέγεται περίοδος.

Δεκαδικὸν περιοδικὸν κλάσμα λέγεται ἀπλοῦν μὲν, ἂν ἡ περίοδος ἀρχίζῃ ἀπὸ τῶν ψηφίων τῶν δεκάτων,

μικτὸν δέ, ἂν ἡ περίοδος δὲν ἀρχίζῃ ἀμέσως μετὰ τὸ κόμμα.

Π. χ. Τὸ περιοδικὸν δεκαδικὸν κλάσμα  $0,2828\dots$  εἶναι ἀπλοῦν, ἐνῶ τὸ  $9,23457457\dots$  εἶναι μικτὸν.

Τὰ πρὸ τῆς περιόδου δεκαδικὰ ψηφία ἀποτελοῦσι τὸ μὴ περιοδικὸν μέρος.

**Κοινὸν κλάσμα ἐξ οὗ προκύπτει περιοδικὸν δεκαδικὸν κλάσμα.**

**204.**— Ἐστω ἀπλοῦν περιοδικὸν δεκαδικὸν κλάσμα ἀνευ ἀκεραίου μέρους τὸ  $0,368\ 368\ 368\dots$

Ἄς σχηματίσωμεν δύο ἀκριβεῖς δεκαδικοὺς λαμβάνοντες πρῶτον τὰς τρεῖς περιόδους μὲ ἀκέραιον 0 καὶ ἔπειτα τὸ ἴδιον δεκαδικὸν μέρος ἀλλὰ μὲ ἀκέραιον μίαν περίοδον

τουτέστι

$$0,368\ 368\ 368$$

$$368,368\ 368\ 368$$

Ἐὰν τὸν πρῶτον καλέσωμεν  $\alpha_3$ , ὁ δεύτερος θὰ εἶναι

$$1000\alpha_3 + 0,000000368$$

Ἐθεν, ἂν ἀπὸ τοῦ δευτέρου ἀφαιρέσωμεν τὸν πρῶτον, λαμβάνομεν

$$999\alpha_3 + 0,000000368$$

ἀφ' ἑτέρου ὁμοῦ παρατηροῦμεν, ὅτι ἐὰν ἀφαιρέσωμεν αὐτοὺς ὡς εἶναι γεγραμμένοι ὑπὸ δεκαδικὴν μορφήν, λαμβάνομεν  $368$  ἔθεν

$$999\alpha_3 + 0,000000368 = 368$$

$$\eta \quad 999\alpha_3 + \frac{368}{1000^3} = 368.$$



Ὅμοιως ἂν ἐλαμβάνομεν ἐξ ἀρχῆς δεκαδικούς μὲ 4 περιόδους καὶ εἰργαζόμεθα κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον, θὰ εὐρίσκομεν

$$999\alpha_4 + \frac{368}{1000^4} = 368.$$

ἐὰν δὲ μὲ 5 περιόδους, θὰ εὐρίσκομεν

$$999\alpha_5 + \frac{368}{1000^5} = 368 \quad \text{κ.ο.κ.}$$

Παρατηροῦμεν ὅτι ὁ β' προσθετός τοῦ α' μέλους ἀπὸ  $\frac{368}{1000^3}$

ἔγινε  $\frac{368}{1000^4}$ , ἦτοι χιλιάκις μικρότερος κ.ο.κ. καὶ ἂν ἦτο δυνατὸν νὰ συνεχισθῆ ἡ ἐργασία αὕτη οὕτως ὥστε νὰ ἔχουν ληφθῆ πᾶσαι αἱ ἀπειροπληθεῖς περίοδοι τοῦ δοθέντος περιοδικοῦ, ὁ δεύτερος προσθετός θὰ κατήντα μηδὲν καὶ θὰ προέκυπτε

$$999 \times (0,368368\dots) = 368.$$

Ἔθεν ἐξάγομεν, ὅτι ἐὰν ὑπάρχῃ κοινὸν κλάσμα ἐξ οὗ παράγεται τὸ δοθὲν περιοδικόν, τὸ κλάσμα τοῦτο θὰ εἶναι ἴσον πρὸς τὸ  $\frac{368}{999}$ .

Καὶ πράγματι, ἐὰν παρατηρήσωμεν ὅτι ὁ 368000 διαιρούμενος διὰ 999 δίδει πηλίκον 368 καὶ ὑπόλοιπον 368, ἐξάγομεν ὅτι ἐκ τῆς τροπῆς τοῦ κλάσματος  $\frac{368}{999}$  θὰ προκύπτῃ τὸ περιοδικὸν 0,368368...

ἦτοι

Πᾶν ἀπλοῦν περιοδικὸν ἄνευ ἀκεραίου μέρους προκύπτει ἐκ κλάσματος ἔχοντος ἀριθμητὴν μὲν μίαν περίοδον, παρονομαστήν δὲ ἀκέραιον τοῦ ὁποίου πάντα τὰ ψηφία εἶναι 9 καὶ τόσα ὅσα ψηφία ἔχει ἡ περίοδος.

**ΣΗΜ.** Ἀπλοῦ περιοδικοῦ, τοῦ ὁποίου πάντα τὰ δεκαδικὰ ψηφία εἶναι 9, ἂν ληφθῶσιν ἔλαι αἱ μονάδες, συναποτελοῦσιν ἀκέραιον π. χ. 17,999... δίδει τὸν 18.

$$205. — \text{Ἐπίδῃ } 4,7373\dots = 4 + 0,7373\dots$$

$$\text{καὶ } 0,737373\dots = \frac{73}{99} \quad (\S 204)$$

ἔπεται ὅτι

$$4,7373 \dots = 4 + \frac{73}{99} = \frac{4 \times 99 + 73}{99} = \frac{4 \times (100 - 1) + 73}{99}$$

$$= \frac{400 - 4 + 73}{99} = \frac{473 - 4}{99} \quad \text{Ἴρα}$$

Εὐρίσκομεν κοινὸν κλάσμα, ἐξ οὗ παράγεται ἀπλοῦν περι-  
κὸν μετ' ἀκεραίου μέρους ὡς ἐξῆς:

Σχηματίζομεν ἀκεραίων γράφοντες κατὰ σειρὰν τὰ ψηφία τοῦ  
ἀκεραίου μέρους καὶ μιᾶς περιόδου, ἀφαιροῦμεν ἀπ' αὐτοῦ τὸ  
ἀκεραίων μέρος, τὴν δὲ διαφορὰν θεωροῦμεν ὡς ἀριθμητὴν κλά-  
σματος, οὗτινος παρονομαστὴν θέτομεν τὸν ἀριθμὸν ὅσους προ-  
κύπτει ἐκ μιᾶς περιόδου, ὅταν πάντα τὰ ψηφία του γίνωσιν 9.

206. — Ἐστω ἤδη μικτὸν περιοδικὸν τὸ 3,46257257 . . . .  
παρατηροῦμεν ὅτι ἐὰν κλάσμα τι  $\frac{\alpha}{\beta}$  παράγῃ τὸ 3,46257257 . . . ,  
τότε τὸ κλάσμα  $\frac{100 \times \alpha}{\beta}$  θὰ παράγῃ τὸ κλάσμα 346,257257 . . .  
ἀλλὰ τὸ  $\frac{100 \times \alpha}{\beta}$  τὸ γνωρίζομεν κατὰ τὰ προηγούμενα,

$$\text{ἦτοι} \quad 100 \times \frac{\alpha}{\beta} = \frac{346257 - 346}{999} \quad (\S 205)$$

$$\text{ἔθεν} \quad \frac{\alpha}{\beta} = \frac{346257 - 346}{99900}$$

ἄρα:

Εὐρίσκομεν κοινὸν κλάσμα ἐξ οὗ παράγεται δοθέν μικτὸν  
περιοδικὸν ὡς ἐξῆς: Σχηματίζομεν ἀκεραίων γράφοντες κατὰ  
σειρὰν τὰ ψηφία τοῦ ἀκεραίου μέρους, τοῦ μὴ περιοδικοῦ μέ-  
ρους καὶ τῆς πρώτης περιόδου, ὅπως ἐπίσης σχηματίζομεν ἀκε-  
ραίων γράφοντες κατὰ σειρὰν τὰ ψηφία τοῦ ἀκεραίου μέρους  
καὶ τοῦ μὴ περιοδικοῦ, ἀφαιροῦμεν ἀπὸ τοῦ α' σχηματισθέντος  
ἀκεραίου τὸν β' τοιοῦτον καὶ τὴν διαφορὰν θεωροῦμεν ὡς ἀρι-  
θμητὴν κλάσματος οὗτινος παρονομαστὴν θέτομεν τὸν ἀριθμὸν  
ὅσους προκύπτει ἐκ μιᾶς περιόδου, ὅταν πάντα τὰ ψηφία της

γίνωσιν 9 ἀκολουθούμενον ὑπὸ τόσων 0, ὅσα εἶναι τὰ ψηφία τοῦ μὴ περιοδικοῦ δεκαδικοῦ μέρους.

ΣΗΜ. Ἐὰν τὰ περιοδικὰ ψηφία μικτοῦ τινος περιοδικοῦ εἶναι 9, τότε δυνάμεθα νὰ θεωρῶμεν ὅτι αἱ μονάδες τοῦ μικτοῦ περιοδικοῦ, ἐὰν ἦτο δυνατόν νὰ ληφθῶσιν ἅπασαι, θὰ συναπετέλουν ἀριθμὸν δεκαδικόν· π. χ. τοῦ 32,964999... αἱ μονάδες θὰ ἔδιδον τὸν 32,965.

**Ἰδιότητες τῶν κοινῶν κλασμάτων ἐξ ὧν παράγονται δεκαδικὰ περιοδικά.**

207. — Ἐστω ὅτι ἀνάγωγον κλάσμα  $\frac{\alpha}{\beta}$  παράγει

1<sup>ον</sup>) ἀπλοῦν περιοδικόν· π. χ. τὸ 4,535353 . . . .  
τότε

$$\frac{\alpha}{\beta} = \frac{453-4}{99} \quad (\S 205)$$

ὅθεν ὁ 99 θὰ εἶναι πολλαπλάσιον τοῦ β (§ 148).

Ἄλλὰ ὁ 99 δὲν περιέχει οὔτε τὸν παράγοντα 2 οὔτε τὸν 5, ἐπομένως ὁ β δὲν δύναται νὰ περιέχῃ οὔτε τὸν 2 οὔτε τὸν 5 (§ 74)· ἄρα·

Ἐὰν ἀνάγωγον κλάσμα τρέπηται εἰς ἀπλοῦν περιοδικόν, θὰ ἔχῃ παρονομασίην μὴ περιέχοντα οὔτε τὸν παράγοντα 2 οὔτε τὸν 5.

2<sup>ον</sup>) μικτὸν περιοδικόν, π. χ. τὸ 7,12683683 . . . .

$$\text{ἔχομεν } \frac{\alpha}{\beta} = \frac{712683-712}{99900} \quad (\S 206).$$

Τὸ τελευταῖον ψηφίον τῆς περιόδου 3 εἶναι διάφορον τοῦ τελευταίου ψηφίου τοῦ μὴ περιοδικοῦ μέρους του, διότι ἄλλως ἡ περίοδος δὲν θὰ ἤρχιζεν ἀπὸ τοῦ τρίτου μετὰ τὸ κόμμα ψηφίου· ὅθεν, ὅταν ἐκτελέσωμεν τὴν πράξιν εἰς τὸν ἀριθμητήν, θὰ εὐρωμεν ἀριθμὸν μὴ λήγοντα εἰς 0, ἦτοι  $\frac{\alpha}{\beta} = \frac{A}{99900}$ , ὅπου ὁ A δὲν λήγει εἰς 0· ἄρα ὁ A δὲν διαιρεῖται διὰ 10, ἦτοι θὰ εἶναι ἡ

τῆς μορφῆς  $2^e \times \pi$  ἢ τῆς μορφῆς  $5^e \times \pi$  ἢ ἀπλῶς  $\pi$ , ὅπου ὁ  $\pi$  δὲν περιέχει οὔτε τὸν 2 οὔτε τὸν 5, ἐνῶ ὁ παρονομαστής ἰσοῦται μὲ  $999 \times 2^e \times 5^e$ . ὥστε καὶ μετὰ πάσας τὰς δυνατὰς ἀπλοποιήσεις, εἰς τὸν παρονομαστήν θὰ μένη ἀνέπαφον ἢ τὸ  $2^e$  ἢ τὸ  $5^e$  ἢ καὶ τὰ δύο ἕτοι.

Ἐο παρονομαστής κοινοῦ ἀναγώγου κλάσματος τρεπομένου εἰς μικτὸν περιοδικὸν περιέχει τοῦλάχιστον τὸν ἓνα τῶν παρὰ γόντων 2 καὶ 5 μὲ ἐκθέτην ἴσον πρὸς τὸ πλῆθος τῶν μὴ περιοδικῶν δεκαδικῶν ψηφίων.

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω προκύπτουσιν εὐκόλως τὰ ἀκόλουθα συμπεράσματα :

1<sup>ον</sup>) Ἐὰν ὁ παρονομαστής ἀναγώγου κλάσματος εἶναι τῆς μορφῆς  $2^l \times 5^m$  τὸ κλάσμα τρέπεται εἰς δεκαδικὸν ἀκριβῶς (§ 201).

2<sup>ον</sup>) Ἐὰν ὁ παρονομαστής ἀναγώγου κλάσματος δὲν περιέχῃ μήτε τὸν 2 μήτε τὸν 5, τὸ κλάσμα τρέπεται εἰς ἀπλοῦν περιοδικὸν (§ 201, § 202).

3<sup>ον</sup>) Ἐὰν ὁ παρονομαστής ἀναγώγου κλάσματος εἶναι τῆς μορφῆς  $2^l \times 5^m \times \pi$ , ὅπου οἱ ἐκθέται  $l$  καὶ  $m$  δὲν εἶναι ἀμφότεροι μηδενικά, ὁ δὲ  $\pi$  εἶναι ἀριθμὸς μὴ διαιρετὸς διὰ 2 καὶ 5, τὸ κλάσμα τρέπεται εἰς μικτὸν περιοδικὸν (§ 201, § 202).

### Ἀσκήσεις.

270.) Τίνα ἐκ τῶν κλασμάτων

$$\frac{6}{15}, \frac{6}{36}, \frac{6}{48}, \frac{6}{54}, \frac{12}{30}, \frac{12}{46}, \frac{12}{48}$$

τρέπονται εἰς ἀπλᾶ περιοδικά, τίνα εἰς μικτὰ καὶ τίνα εἰς δεκαδικὰ ἀκριβῶς ;

271.) Ἐστω τὸ δεκαδικὸν περιοδικὸν κλάσμα  $42,342342342$ . Ἐὰν μεταθέσωμεν τὴν ὑποδιαστολὴν δύο θέσεις πρὸς τὰριστερά, θὰ ἔχωμεν περιοδικὸν ἐν ᾧ ἡ περίοδος θὰ εἶναι 423. Πῶς διακρίνομεν ἐξ αὐτοῦ ὅτι τὸ δοθὲν περιοδικὸν θὰ παράγεται ἐκ κλάσματος ἔχοντος παρονομαστήν 999 καὶ ἀριθμητὴν λήγοντα εἰς μηδέν.

272.) Ἐὰν ὁ παρονομαστής  $\beta$  ἀναγώγου κλάσματος  $\frac{\alpha}{\beta}$  δὲν περιέχῃ τοὺς παράγοντας 2, 3 καὶ 5 ἡ περίοδος τοῦ ἀπλοῦ περιόδου εἰς 9 τρέπεται τὸ  $\frac{\alpha}{\beta}$  εἶναι ἀριθμὸς διαιρετὸς διὰ 9.

Παρατηροῦμεν ὅτι ἡ περίοδος θὰ εἶναι ἀριθμητῆς κλάσματος ἴσου πρὸς τὸ  $\frac{\alpha}{\beta}$  καὶ ἔχοντος παρονομαστὴν διαιρετὸν ἐν 9 (§ 204).

273.) Τὸ γινόμενον δύο ἀπλῶν περιοδικῶν δεκαδικῶν κλασμάτων μικροτέρων τῆς μονάδος εἶναι ἀπλοῦν περιοδικὸν δεκαδικὸν κλάσμα. (§ 207)

274.) Τὸ γινόμενον δύο μικτῶν περιοδικῶν κλασμάτων δὲν εἶναι πάντοτε μικτὸν περιοδικόν. (§ 207)

275.) Ἐὰν τὸ  $\frac{\alpha}{\beta}$  τρέπηται εἰς περιοδικὸν μικτὸν μὲ μ τὸ πλῆθος ψηφία μὴ περιοδικά, τὸ  $\frac{\alpha^2}{\beta^2}$  θὰ τρέπηται εἰς τοιοῦτον μὲ 2μ ψηφία μὴ περιοδικά.

276.) Τὸ ἄθροισμα δύο ἀπλῶν περιοδικῶν κλασμάτων εἶναι ἀπλοῦν περιοδικόν. (§ 207)

277.) Ἀριθμὸς μὴ ἔχων τὸν παράγοντα 2 μηδὲ τὸν 5 διαιρεῖ ἀριθμὸν τινὰ οὗτινος πάντα τὰ ψηφία εἶναι 9, ἤτοι διαιρεῖ δυνάμιν τινὰ τοῦ 10, ἀφοῦ ἀφαιρεθῇ ἀπ' αὐτῆς μία μονάς, ἤτοι ἀριθμὸν τῆς μορφῆς  $10^e - 1$ .

Ἔχομεν (§ 207) ὅτι ἀριθμὸς μὴ ἔχων τὸν παράγοντα 2 καὶ 5 δύναται νὰ χρησιμεύσῃ ὡς παρονομαστής ἀναγώγου κλάσματος τρεπομένου εἰς ἀπλοῦν περιοδικόν. (§ 204).

278.) Ἐστω ἀνάγωγον κλάσμα  $\frac{\alpha}{\beta}$  τρεπόμενον εἰς ἀπλοῦν περιοδικόν καὶ ἔστω  $v$  τὸ πλῆθος τῶν ψηφίων τῆς περιόδου· τότε  $\varepsilon \beta$  διαιρεῖ τὸν  $10^v - 1$ , ἀλλὰ δὲν διαιρεῖ τὸν  $10^e - 1$ , ἐὰν  $v < e$ .

279.) Αἱ περίοδοι ἀπλῶν περιοδικῶν παραγομένων ἐκ κλασμάτων ἀναγῶγων ὁμώνυμων ἔχουσι τὸ αὐτὸ πλῆθος ψηφίων.

### Ἄσύμμετροι ἀριθμοί.

208. — Ἄς λάβωμεν τὸν ἀριθμὸν 7,999... καὶ ἄς φαντασθῶμεν ὅτι ἀντικαθιστῶμεν τὰ δεκαδικὰ ψηφία ὡς ἐξῆς· 7,13579111315... ὅπου εἶναι προφανὴς ὁ νόμος, καθ' ὃν προχωροῦν τὰ δεκαδικὰ ψηφία· παρατηροῦμεν ὅτι ὁ 7,135 εἶναι μικρότερος τοῦ 7,999, ὁμοίως ὁ 7,1357 εἶναι μικρότερος τοῦ 7,9999, κ. ο. κ. ὥστε, καὶ ὅσα-δήποτε δεκαδικὰ ψηφία καὶ ἂν λάβωμεν τοῦ 7,13579111315..., δὲν ὑπερβαίνομεν ἀριθμὸν δοθέντα, ὅπως π.χ. τὸν ἀριθμὸν 7,9999... δι' αὐτὸ λέγομεν ὅτι ὁ 7,13579111315... εἶναι ἀριθμὸς.

209. — Ὅθεν τοιοῦτον ἄπειρον πλῆθος ἐν ᾧ αἱ μονάδες ἐκάστης τάξεως δὲν εἶναι πλείονες τῶν 9, λαμβάνεται ὡς ἀριθμὸς, οἷαδήποτε καὶ ἂν εἶναι ἡ σειρά τῶν ψηφίων δι' ὧν παρίσταται τὸ πλῆθος τῶν μονάδων ἐκάστης τάξεως· ἐὰν δὲ τὰ ψηφία ταῦτα δὲν ἐπαναλαμβάνωνται τὰ αὐτὰ καὶ κατὰ τὴν αὐτὴν τάξιν (περιοδικὰ δεκαδικὰ κλάσματα), ἀλλὰ βαίνωσι κατ' ἄλλον τινὰ νόμον, π. χ. ὡς ἐν § 208, τότε λέγεται ὁ ἀριθμὸς ἀσύμμετρος· ὥστε πᾶς ἀσύμμετρος εἶναι ἀριθμὸς ἔχων ἀπειρίαν δεκαδικῶν ψηφίων μὴ περιοδικῶν π.χ. ὁ 7,353353335... εἶναι ἀσύμμετρος.

210. — Ἀριθμὸς τις λέγεται μείζων ἄλλου, ἂν περιέχῃ πλὴν τῶν μονάδων ἐκείνου καὶ ἄλλας, ὡς π. χ. 7,999... > 7,353353335...

Δύο ἀριθμοὶ λέγονται ἴσοι, ὅταν πᾶς ἀριθμὸς ἀκέραιος ἢ κλασματικὸς μικρότερος τοῦ ἐνὸς εἶναι μικρότερος καὶ τοῦ ἄλλου.

Οἱ ἀριθμοὶ 7,999... καὶ 8 εἶναι ἴσοι πρὸς ἀλλήλους, διότι δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ εὑρεθῇ ἀριθμὸς μικρότερος τοῦ ἐνὸς χωρὶς νὰ εἶναι μικρότερος καὶ τοῦ ἄλλου· π. χ. ὁ ἀριθμὸς  $7\frac{237}{238}$ , ὅστις εἶναι μικρότερος τοῦ 8 εἶναι μικρότερος καὶ τοῦ 7,999 (διότι ἀπὸ τὸν  $\frac{237}{238}$  λείπει  $\frac{1}{238}$  τῆς μονάδος, ἐνῶ ἀπὸ τὸν 7,999 λείπει μόνον  $\frac{1}{1000}$ , ἐπομένως ἀπὸ τοῦ 7,9999 ... λείπει ἀκόμη ὀλιγώτερον).

Καὶ τὸ ἀγτίστροφον εἶναι προφανές· πᾶς ἀριθμὸς μικρότερος τοῦ 7,999... εἶναι τοῦ 8 μικρότερος.

211. — Κατὰ ταῦτα, ἵνα δύο ἀριθμοὶ γεγραμμένοι ὑπὸ τὴν δεκαδικὴν μορφήν εἶναι ἴσοι, πρέπει ἢ τὰ δεμοταγῆ αὐτῶν ψηφία νὰ εἶναι πάντα τὰ αὐτά, ἢ τὰ πρῶτα δεμοταγῆ ψηφία καθ' ἑαυτὰ διαφέρουσιν ἀλλήλων νὰ ἔχωσι διαφορὰν 1, τὰ δὲ λοιπὰ τοῦ μὲν ἔχοντος τὸ μικρότερον ψηφίον νὰ εἶναι ἄπειρα 9, τοῦ δὲ ἑτέρου 0.

Π.χ. 6,483999... καὶ 6,484

οἱ ἀριθμοὶ  $\left\{ \begin{array}{l} 4,278... \\ 4,276... \end{array} \right.$  δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ εἶναι ἴσοι· διότι

ὑπάρχει ἀριθμὸς μεγαλύτερος τοῦ 4,276 καὶ μικρότερος τοῦ 4,278... π.χ. ὁ 4,277, πολὺ δὲ περισσότερον οἱ 4,278... καὶ 4,275 δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ εἶναι ἴσοι.

212. — Τὰ δεκαδικὰ περιοδικὰ, ἂν καὶ ἔχωσιν ἄπειριαν δεκαδικῶν ψηφίων. ἰσοῦνται πρὸς ἀκεραίους ἢ κλάσματα.

Θεωρήσωμεν ἤδη τὸν τυχόντα ἀσύμμετρον 2,12211221... ἔστω δτι εὑρίσκεται κοινὸν τι κλάσμα ἴσον πρὸς αὐτὸν· θὰ εἶχομεν  $\frac{\alpha}{\beta} = 2,122112211122... \text{ Ἀφ' ἑτέρου ὁμοῦς τὸ κλάσμα θὰ τρέπηται ἢ ἀκριβῶς εἰς δεκαδικὸν ἢ εἰς περιοδικόν, ὅποτε θὰ προέκυπτε ἰσότης μεταξὺ τούτου καὶ τοῦ ἀσυμμέτρου. Ἄρα}$

Πᾶς ἀσύμμετρος ἀριθμὸς δὲν ἰσοῦται πρὸς οὐδένα σύμμετρον.

**Ἀσκήσεις ἐν γένει ἐπὶ κλασμάτων κοινῶν καὶ δεκαδικῶν.**

280.) Ἐκ πίθου περιέχοντος οἶνον ἀφαιρεῖται τὸ  $\frac{1}{3}$  καὶ ἀναπληροῦται δι' ὕδατος· ἔπειτα ἀφαιρεῖται τὸ  $\frac{1}{4}$  τοῦ μίγματος καὶ ἀναπληροῦται δι' ὕδατος καὶ πάλιν ἀφαιρεῖται τὸ  $\frac{1}{5}$  καὶ ἀναπληροῦται δι' ὕδατος. Πόσον μέρος τοῦ ἐν ἀρχῇ οἴνου ἀποτελεῖ ὁ ἀπομείνας καθαρὸς οἶνος εἰς τὸ τελευταῖον κράμα;

281.) Ἀγγεῖον τι περιέχει α ὀκάδας οἴνου· ἀφαιροῦμεν ἀπ' αὐτοῦ β ὀκάδας καὶ ἀναπληροῦμεν δι' ὕδατος· ἐκ τοῦ νέου μίγματος ἀφαιροῦμεν β ὀκάδας καὶ ἀναπληροῦμεν καὶ πάλιν δι' ὕδατος καὶ οὕτω καθ' ἑξῆς. Πόσος καθαρὸς οἶνος ἀπέμεινε τέλος εἰς τὸ ἀγγεῖον; Ἀριθμητικὴ ἐφαρμογή.

282.) Δύο ἀδελφοὶ εἶχον ἐν βλήφ κατατεθειμένα εἰς τὴν Τρά-

πέζαν 58000 δραχμῆς· ἵνα ὁμοῦ πληρώσωσι κοινόν τι χρέος ἐκ 34000 δραχμῶν, ἀπέσυρεν ὁ πρῶτος τὰ  $\frac{3}{4}$  τῶν καταθέσεων του καὶ ὁ δευτέρος τὰ  $\frac{2}{5}$  τῶν ἰδικῶν του. Ἐκ πόσων δραχμῶν ἀπετελοῦντο αἱ καταθέσεις καὶ τί ποσὸν ἐπλήρωσεν ἕκαστος;

283.) Νὰ χωρισθῇ ὁ ἀριθμὸς 340 εἰς δύο μέρη τοιαῦτα ὥστε τὰ  $\frac{3}{5}$  τοῦ πρώτου καὶ τὰ  $\frac{4}{7}$  τοῦ δευτέρου ν' ἀποτελῶσι τὸν ἀριθμὸν 40.

284.) Μοιράζουσιν εἰς στρατιωτικόν τι ἀπόσπασμα συγκείμενον ἐξ ἑνὸς λοχίου, τριῶν δεκανέων καὶ 18 στρατιωτῶν ἀμοιβὴν ἐκ 1000 δραχμῶν διὰ τὴν σύλληψιν ληστοῦ· ἕκαστος δεκανεὺς λαμβάνει τὰ  $\frac{9}{5}$  τῶν λαμβανομένων ὑφ' ἑκάστου στρατιώτου· ὁ δὲ λ:χίας τὰ  $\frac{7}{4}$  ἐκείνων, τὰ ὁποῖα λαμβάνει ἕκαστος δεκανεὺς. Πόσα ἔλαβεν ἕκαστος;

285.) Ἐπὶ τῆς αὐτῆς ὁδοῦ συνδεούσης δύο σημεῖα Α καὶ Β βαδίζουσι δύο ὁδοιπόροι κατ' ἀντίθετον διεύθυνσιν· ὁ πρῶτος διανύει ὁλόκληρον τὴν ὁδὸν εἰς 4,5 ὥρας· ὁ δευτέρος εἰς 7,2· ἐὰν ἀναχωρήσωσι συγχρόνως ἐκ τῶν Α καὶ Β, μετὰ πόσην ὥραν θὰ συναντηθῶσιν;

286.) Δύο ἀμαξοστοιχίαι ἀναχωροῦσιν ἐκ δύο πόλεων Α καὶ Β ἀπέχουσῶν 460 στάδια ἀπ' ἀλλήλων ἢ πρώτη διατρέχει καθ' ὥραν 52,5 στάδια· ἢ δευτέρα 41. Αὕτη ἀνεχώρησε τὴν 6 π. μ. ἐκ τοῦ Β, ἐνῶ ἢ πρώτη τὴν 8 π. μ. ἐκ τοῦ Α. Εἰς ποίαν ἀπόστασιν ἀπὸ τοῦ Α συνηγήθησαν;

287.) Τίνος ἀριθμοῦ τὰ  $\frac{2}{3}$  τῶν  $\frac{5}{7}$  προσλαμβάνοντα καὶ 33 μονάδας δίδουσι τὸν ἀριθμὸν 63;

288.) Παιδίον τι φέρει μεθ' ἑαυτοῦ 7 μῆλα, δευτέρον 5 καὶ τρίτον 4· προσέρχεται τέταρτον φέρον 20 καρύδια· δίδει τὰ καρύδια καὶ τρώγει μετ' αὐτῶν τὰ μῆλα. Πόσα καρύδια ἔδωκεν εἰς ἕκαστον;

289.) Τίνα ἡμερομηνίαν φέρει ἢ ἡμέρᾳ τοῦ ἔτους καθ' ἣν τὸ  $\frac{1}{4}$  τῶν παρελθουσῶν ἡμερῶν τοῦ αὐτοῦ ἔτους ἰσοῦται πρὸς τὰ  $\frac{2}{5}$  τῶν ὑπολειπομένων ἡμερῶν τοῦ ἔτους; (1 ἔτος=365 ἡμ.)



290.) Ἐστῶσαν δύο ἀνάγωγα κλάσματα μὲ παρονομαστὰς 8 καὶ 15 καὶ τρίτον κλάσμα ὑπερ προστιθέμενον εἰς τὰ δοθέντα δίδει ἑξαγόμενον ἀκέραιον; Ποίους πρώτους παράγοντας δύναται νὰ περιέχῃ ὁ παρονομαστής τοῦ τρίτου αὐτοῦ κλάσματος; (§ 114)

291.) Δίδονται τὰ κλάσματα  $\frac{12}{400}$ ,  $\frac{70}{216}$ ,  $\frac{325}{2380}$ . Ζητεῖται τὸ μικρότερον τῶν κλασμάτων τὰ ὅποια εἶναι διαιρετὰ καὶ διὰ τῶν τριῶν δοθέντων. (Λέγομεν ὅτι κλάσμα τι εἶναι διαιρετὸν δι' ἄλλου, ἔταν διαιρούμενον δι' αὐτοῦ δίδῃ ὡς πηλίκον ἀριθμὸν ἀκέραιον· π.χ. ὁ  $\frac{9}{4}$  εἶναι διαιρετὸς διὰ τοῦ  $\frac{3}{8}$  διότι  $\frac{9}{4} : \frac{3}{8} = 6$ ). (§ 114)

292.) Νὰ εὑρεθῇ κλάσμα μεγαλύτερον τριῶν ἄλλων ἀναγῶγων κλασμάτων καὶ διαιροῦν αὐτὰ, τουτέστιν ἕκαστον τῶν τριῶν δοθέντων διαιρούμενον διὰ τοῦ ζητουμένου νὰ δίδῃ πηλίκον ἀκέραιον.

293.) Πόσα ἐκ τῶν κλασμάτων τῶν ἐχόντων ἀριθμητὴν τὴν μονάδα καὶ παρονομαστὰς τοὺς διαφόρους ἀκεραίους τοὺς μεταξὺ 1020 καὶ 1040 τρέπονται εἰς δεκαδικὸν ἀκριβῶς, πόσα ἐξ αὐτῶν εἰς ἀπλᾶ περιδικὰ καὶ πόσα εἰς μικτὰ;

294.) Πότε τὸ γινόμενον ἀναγῶγου κλάσματος ἐπὶ ἀκέραιον δίδει κλάσμα ἀνάγωγον.

295.) Ποίους παρονομαστὰς δύνανται νὰ ἔχωσι κλάσματα ἀνάγωγα τρεπόμενα εἰς ἀπλᾶ περιδικὰ μὲ 2 ψηφία (§ 207).

296.) Νὰ εὑρεθῶσιν οἱ παρονομασταὶ τῶν ἀναγῶγων κλασμάτων ἅτινα τρεπόμενα εἰς δεκαδικὰ δίδουσι περιδικὰ μὲ ἓν ψηφίον μὴ περιδικὸν καὶ ἓν περιδικόν: (§ 207).

297.) Ἐστω ἀνάγωγον κλάσμα  $\frac{\alpha}{\beta}$ , τοῦ ἑποίου ὁ παρονομαστής εἶναι τῆς μορφῆς  $2^{\lambda} \times 5^{\mu} \times 3^{\nu} \times 7^{\sigma}$ . ἐὰν  $\nu$  εἶναι ὁ ἀριθμὸς τῶν ψηφίων τῆς περιόδου τοῦ περιδικοῦ εἰς ὃ τρέπεται, θὰ ἔχωμεν  $10^{\nu} - 1 = 3^{\nu} \times 7^{\sigma} \times K$ . Νὰ γενικευθῇ ἡ πρότασις αὕτη. (§ 207).

## ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ

### ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΗ ΡΙΖΑ

213.— Τετράγωνον ἀριθμοῦ (§ 70) λέγεται τὸ γινόμενον δύο παραγόντων ἴσων πρὸς τὸν ἀριθμόν. Π. χ. τετράγωνον τοῦ 6 εἶναι ὁ  $6 \times 6$ , ἦτοι ὁ 36.

Ἐπίσης τετράγωνον τοῦ  $\frac{2}{3}$  εἶναι ὁ  $\frac{2}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{4}{9}$ : ὁ ἀριθμὸς 6

λέγεται τετραγωνικὴ ρίζα τοῦ 36, ὅπως καὶ ὁ  $\frac{2}{3}$  λέγεται τετραγωνικὴ ρίζα τοῦ  $\frac{4}{9}$  καὶ ἐν γένει· ἀριθμὸς τις β λέγεται τετραγωνικὴ ρίζα ἐτέρου α, ἐὰν ὁ α εἶναι τετράγωνον τοῦ β· ἦτοι:

Τετραγωνικὴ ρίζα ἀριθμοῦ τινος καλεῖται ἕτερος ἀριθμὸς ὅστις πολλαπλασιαζόμενος ἐπὶ τὸν ἑαυτὸν του δίδει τὸν πρῶτον.

Γράφοντες ὑπὸ τὸ σημεῖον  $\sqrt{\quad}$  ἀριθμὸν τινα α ἐννοοῦμεν τὴν τετραγωνικὴν ρίζαν τοῦ α· π. χ. γράφοντες  $\sqrt{49}$  ἐννοοῦμεν τὸν

7· ὁμοίως  $\sqrt{\frac{4}{9}} = \frac{2}{3}$

### Τετράγωνον ἀθροίσματος.

214. Ἐστωσαν δύο ἀκέραιοι α καὶ β· ἔχομεν κατὰ τὰς ιδιότητας τοῦ πολλαπλασιασμοῦ·

$$(α + β)^2 = (α + β) \times (α + β) = α \times α + α \times β + β \times α + β \times β$$

(§ 47 β').

$$\text{ἢ} \quad (α + β)^2 = α^2 + 2 \times α \times β + β^2 \quad \text{ἔθεν·}$$

Τὸ τετράγωνον τοῦ ἀθροίσματος δύο ἀριθμῶν σύγκειται ἐκ τῶν τετραγώνων αὐτῶν καὶ ἐκ τοῦ διπλασίου γινομένου αὐτῶν·

$$\text{π. χ.} \quad (4 + 3)^2 = 4^2 + 2 \times 4 \times 3 + 3^2 = 49$$

215.— Ἐπειδὴ

$$(\alpha + 1)^2 = \alpha^2 + 2 \times \alpha + 1 \quad (\S 214)$$

ἔπεται ὅτι

$$(\alpha + 1)^2 - \alpha^2 = 2 \times \alpha + 1 = \alpha + (\alpha + 1). \quad \text{Ἄρα}$$

Τὰ τετράγωνα δύο διαδοχικῶν ἀκεραίων διαφέρουσι κατὰ τὸ ἄθροισμα αὐτῶν.

216.— Ἐστω  $\delta$  ὁ ἀριθμὸς ὃ δεικνύων τὸ σύνολον τῶν δεκάδων ἀριθμοῦ τινος  $\alpha$  καὶ  $\mu$  τὸ ψηφίον τῶν μονάδων· ἦτοι

$$\alpha = 10 \times \delta + \mu.$$

Υψοῦντες ἀμφότερα τὰ μέλη εἰς τὸ τετράγωνον εὐρίσκομεν

$$\alpha^2 = 100 \times \delta^2 + 2 \times \delta \times 10 \times \mu + \mu^2 \quad (\S 214, \S 71. \delta)$$

Ἐπειδὴ οἱ δύο πρῶτοι προσθετέοι τοῦ β' μέλους λήγουν εἰς 0, ὁ  $\alpha^2$  λήγει εἰς τὸ αὐτὸ ψηφίον εἰς  $\delta$  καὶ  $\delta \mu^2$ .

Ἄρα

Τὸ τετράγωνον παντὸς ἀκεραίου λήγει εἰς τὸ αὐτὸ ψηφίον, εἰς  $\delta$  λήγει τὸ τετράγωνον τοῦ ψηφίου τῶν μονάδων αὐτοῦ.

217.— Οὐδεὶς ἐκ' τῶν μονοψηφίων ἀριθμῶν ἔχει τετράγωνον λήγον εἰς 2, 3, 7, 8· ὅθεν καὶ

Οὐδενὸς ἀκεραίου τὸ τετράγωνον λήγει εἰς 2, 3, 7, 8.

218.— Ἐστω ὅτι ἀκέραιός τις ἀριθμὸς  $\alpha$  λήγει εἰς τρία μηδενικά· τότε διαγράφοντες ταῦτα λαμβάνομεν ἀκέραιον τοῦ ὁποίου τὸ τετράγωνον δὲν λήγει εἰς μηδέν· ἐπομένως τὸ τετράγωνον τοῦ  $\alpha$  θὰ λήγῃ εἰς 6 μηδενικά καὶ ἐν γένει, ὅταν ἀκέραιός τις λήγῃ εἰς  $\nu$  μηδενικά, τὸ τετράγωνόν του θὰ λήγῃ εἰς  $2\nu$  μηδενικά· ὅθεν·

Ἀριθμὸς τις ἀκέραιος λήγων εἰς περιττὸν ἀριθμῶν μηδενικῶν δὲν εἶναι τετράγωνον ἄλλου ἀκεραίου.

219.— Ὅταν ἀκέραιός τις εἶναι τετράγωνον ἄλλου ἀκεραίου, λέγεται τέλειον τετράγωνον.

Κλάσμα δὲ λέγεται τέλειον τετράγωνον, ὅταν εἶναι τετράγωνον ἄλλου κλάσματος, (διότι τὸ τετράγωνον ἀκεραίου εἶναι ἀκέραιος).

**Ἀσκήσεις.**

298.) Τὸ ἄθροισμα τῶν τετραγώνων δύο διαδοχικῶν ἀκεραίων ἐλαττούμενον κατὰ μονάδα γίνεται ἀριθμὸς διαιρητὸς διὰ 4. (§ 214)

299.) Πᾶς περιττὸς μεγαλύτερος τῆς μονάδος δύναται νὰ θεωρηθῆ ὡς διαφορὰ δύο τετραγώνων. (§ 215)

300.) Ἡ διαφορὰ τῶν τετραγώνων δύο ἀκεραίων διαφερόντων κατὰ 2 μονάδας εἶναι πολλαπλάσιον τοῦ 4. (§ 214)

301.) Μεταξὺ τῶν τετραγώνων δύο διαδοχικῶν ἀκεραίων περιλαμβάνονται 24 ἀκέριοι ἀριθμοί: τίνες οἱ διαδοχικοὶ ἀκέριοι; (§ 215)

302.) Ἀκέριος λήγων εἰς 1 ἢ 4 ἢ 9 δὲν εἶναι τέλειον τετράγωνον, ἐὰν ἔχη ψηφίον δεκάδων περιττόν. (§ 216)

303.) Ἐὰν ἀκεραίος τις ἔχη ψηφίον μονάδων 6 καὶ ψηφίον δεκάδων ἄρτιον, δὲν εἶναι τέλειον τετράγωνον.

304.) Ἀκέριος λήγων εἰς 5 καὶ ὧν τέλειον τετράγωνον θὰ ἔχη ὡς ψηφίον δεκάδων 2, ὡς ψηφίον δὲ ἑκατοντάδων 0 ἢ 3 ἢ 6.

305. Πᾶς ἄρτιος ὅστις εἶναι τέλειον τετράγωνον θὰ διαιρητῆται διὰ 4. (ἄσκ. 165)

306.) Τὸ ἄθροισμα τῶν τετραγώνων δύο περιττῶν δὲν εἶναι τετράγωνον ἀκεραίου. (ἄσκ. 165)

307.) Νὰ εὐρεθῶσι δύο ἀκέριοι, ὧν τὰ τετράγωνα νὰ διαφέρωσι κατὰ 285 μονάδας. (§ 217)

308.) Τὸ ἄθροισμα ἀκεραίου καὶ τοῦ τετραγώνου του εἶναι ἀριθμὸς διαιρητὸς διὰ 2.

309.) Παντὸς περιττοῦ τὸ τετράγωνον εἶναι πολλαπλάσιον τοῦ 8 ἠϋξημένου κατὰ μονάδα. (§ 70)

310.) Τὸ ἄθροισμα ἀριθμοῦ τινος καὶ τοῦ τετραγώνου αὐτοῦ εἶναι 240. Τίς ὁ ἀριθμὸς;

**Τετράγωνον γινομένου,**

220. — Ὡς γνωρίζομεν, τὸ τετράγωνον γινομένου ἰσοῦται πρὸς τὸ γινόμενον τῶν τετραγώνων τῶν παραγόντων (§ 71. δ) ὡς ἐπίσης (§ 131) εἶδομεν ὅτι

ἵνα ἀριθμὸς τις ἀναλελυμένος εἰς πρώτους παράγοντας εἶναι τέλειον τετράγωνον πρέπει καὶ ἀρκεῖ οἱ ἐκθέται τῶν πρώτων αὐτοῦ παραγόντων νὰ εἶναι ἄρτιοι.

### Ἀσκήσεις.

311.) Ἐκ τῶν ἀριθμῶν, οἵτινες εἶναι πολλαπλάσια τοῦ 24, συγχρόνως δὲ καὶ τέλεια τετράγωνα, νὰ εὑρεθῇ ὁ μικρότερος.

312.) Τὸ γινόμενον δύο ἀριθμῶν πρώτων πρὸς ἀλλήλους εἶναι τέλειον τετράγωνον, ἐὰν ἐκάτερος αὐτῶν εἶναι τέλειον τετράγωνον καὶ τότε μόνον. (§ 220)

313.) Τὸ γινόμενον τριῶν διαδοχικῶν ἀκεραίων δὲν δύναται νὰ εἶναι τέλειον τετράγωνον.

Παρατηροῦμεν ὅτι πᾶς πρῶτος ἀριθμὸς διάφορος τοῦ 2 δὲν δύναται νὰ εἶναι παράγων συγχρόνως δύο διαδοχικῶν ἀριθμῶν ἢ δύο ἀριθμῶν διαφερόντων κατὰ δύο μονάδας.

314.) Ἐὰν δύο ἀριθμοὶ εἶναι τέλεια τετράγωνα, τότε ὁ μ.κ.δ. αὐτῶν εἶναι τέλειον τετράγωνον, ὡς ἐπίσης καὶ τὸ ε.κ.π. αὐτῶν.

### Τετράγωνον κλάσματος.

Τίνα ἀνάγωγα κλάσματα εἶναι τέλεια τετράγωνα ;

221. — Ἄς ὑποθέσωμεν ὅτι τὸ ἀνάγωγον κλάσμα  $\frac{\alpha}{\beta}$  εἶναι τέλειον τετράγωνον, ἐπειδὴ δὲν δύναται νὰ εἶναι τετράγωνον ἀκεραίου, θὰ εἶναι τετράγωνον κλάσματος καὶ ἔστω τοῦτο τὸ  $\frac{\gamma}{\delta}$ ,

ἥτοι

$$\frac{\alpha}{\beta} = \left( \frac{\gamma}{\delta} \right)^2.$$

Ἄς καλέσωμεν  $\frac{\lambda}{\mu}$  τὸ ἀνάγωγον κλάσμα τὸ ἴσον πρὸς τὸ  $\frac{\gamma}{\delta}$ ,

τότε  $\frac{\alpha}{\beta} = \left( \frac{\gamma}{\delta} \right)^2 = \left( \frac{\lambda}{\mu} \right)^2 = \frac{\lambda^2}{\mu^2}$  (§ 183) ἥτοι

$$\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\lambda^2}{\mu^2}$$

καὶ ἐπομένως

$$\alpha = \lambda^2 \text{ καὶ } \beta = \mu^2 \quad (\S 146). \quad \text{ἄρα}$$

Ἴνα κλάσμα τι ἀνάγωγον εἶναι τέλειον τετράγωνον, πρέπει ἑκάτερος τῶν ὄρων του νὰ εἶναι τέλειον τετράγωνον.

Π. χ. τὸ κλάσμα,  $\frac{5}{9}$ , δὲν εἶναι τετράγωνον ἄλλου, ἐνῶ τὸ κλάσμα  $\frac{18}{32}$  ἦτοι τὸ  $\frac{9}{16}$  εἶναι τετράγωνον ἄλλου τοῦ  $\frac{3}{4}$ .

Ἄκεραιος μὴ ὄν τετράγωνον ἀκεραίου δύναται νὰ εἶναι τετράγωνον κλάσματος ;

§ 222. — Ἐστω ὅτι τὸ τετράγωνον ἐνὸς κλάσματος ἔδιδεν ἀκεραίου, ὅστις δὲν εἶναι τέλειον τετράγωνον· π. χ. ἔστω ὅτι  $\left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^2 = 5$ . τότε, ἐὰν  $\frac{\lambda}{\mu}$  καλέσω τὸ ἀνάγωγον τὸ ἴσον πρὸς  $\frac{\alpha}{\beta}$  θὰ ἔχω

$$\left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^2 = 5 \quad \eta \quad \frac{\lambda^2}{\mu^2} = 5. \quad (\S 183)$$

Ἐπειδὴ ὁμοῦς τὸ  $\frac{\lambda}{\mu}$  εἶναι ἀνάγωγον, καὶ τὸ κλάσμα  $\frac{\lambda^2}{\mu^2}$  θὰ εἶναι ἀνάγωγον (§ 113)· ἐπομένως ὁ  $\mu^2$  δὲν διαιρεῖ τὸν  $\lambda^2$ , εἴθεν ἀδύνατον νὰ ἔχωμεν

$$\frac{\lambda^2}{\mu^2} = 5 \quad \eta \quad \text{καὶ} \quad \left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^2 = 5$$

ἄρα·

Τὸ τετράγωνον κλάσματος δὲν εἶναι ἀκεραῖος καὶ ἐπομένως·

Ἐὰν ἀκεραῖος δὲν εἶναι τετράγωνον ἀκεραίου δὲν εἶναι οὔτε κλάσματος.

### Ἀσκήσεις.

315.) Κλάσμα τι εἶναι τέλειον τετράγωνον ἐὰν τὸ γινόμενον τῶν ὄρων του εἶναι τέλειον τετράγωνον καὶ τότε μόνον. (§ 220, § 221).

316.) Ποῖον κλάσμα αὐξηθὲν κατὰ τὸ τετράγωνόν του γίνεται ἴσον πρὸς τὰ  $\frac{33}{4}$  αὐτοῦ;

317.) Ποῖον κλάσμα διαιρούμενον διὰ τοῦ ἀντιστρόφου του δίδει ὡς πηλίκον  $\frac{28}{63}$ ;

$$318.) \text{ Ἐὰν } \frac{\alpha}{\beta} = \left( \frac{\alpha + \gamma}{\beta + \gamma} \right)^2 \quad \text{τότε } \gamma^2 = \alpha \cdot \beta$$

**Ῥ**πολογισμὸς τῆς τετραγωνικῆς ρίζης τῶν ἀκεραίων καὶ τῶν κλασματικῶν κατὰ προσέγγισιν μονάδος.

223. — Ἄς λάβωμεν δύο διαδοχικοὺς ἀκεραίους καὶ ἃς ὑψώσωμεν αὐτοὺς εἰς τὸ τετράγωνον· π. χ. τὸν 6 καὶ τὸν 7, τῶν ὁποίων τὰ τετράγωνα εἶναι 36 καὶ 49. Τοῦ 36 τετραγωνικὴ ρίζα εἶναι ὁ 6 (§ 213)· τοῦ 49 ὁ 7· πᾶς ἀριθμὸς μεταξὺ τοῦ 36 καὶ τοῦ 49 θὰ λέγωμεν ὅτι ἔχει τετραγωνικὴν ρίζαν κατὰ προσέγγισιν μονάδος τὸν 6· π. χ. οἱ ἀριθμοὶ 37, 38, 48,  $37\frac{1}{2}$  κ. ο. κ. ἦτοι

Τετραγωνικὴ ρίζα ἀριθμοῦ κατὰ προσέγγισιν μονάδος λέγεται ὁ μέγιστος ἀκέραιος τοῦ ὁποίου τὸ τετράγωνον περιέχεται εἰς τὸν ἀριθμὸν τοῦτον.

Π. χ. τετραγωνικὴ ρίζα τοῦ 160 κατὰ προσέγγισιν μονάδος εἶναι ὁ 12, διότι  $12^2 = 144$  καὶ  $13^2 = 169$ .

Ἡ πράξις δι' ἧς εὐρίσκομεν τὴν τετραγωνικὴν ρίζαν ἀριθμοῦ καλεῖται ἐξαγωγή τῆς τετραγωνικῆς ρίζης.

224. — Ἐστω πρῶτον δοθεῖς τυχὼν ἀκέραιος μικρότερος τοῦ 100, π. χ. ὁ 75· τότε λαμβανομένου ὑπ' ὄψει ὅτι τὰ τετράγωνα τῶν μονοψηφίων ἀριθμῶν

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

εἶναι τὰ ἐξῆς

1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81

εὐρίσκομεν ἀμέσως ὅτι τετραγωνικὴ ρίζα τοῦ 75 κατὰ προσέγγισιν μονάδος εἶναι ὁ 8 (§ 223).

225. — Ἦδη πρὶν ἢ προχωρήσωμεν εἰς τὴν δευτέραν περιπτωσιν, καθ' ἣν ὁ ἀριθμὸς τοῦ ὁποίου ζητοῦμεν τὴν τετραγωνικὴν ρίζαν εἶναι μεγαλύτερος τοῦ 100, παρατηροῦμεν τὰ ἑξῆς :

Ἐὰν  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\nu$  εἶναι ἀκέραιοι, ἐκ τῶν ὁποίων  $\delta$   $\nu$  μικρότερος τοῦ 100, τοιοῦτοι δὲ ὥστε

$$\alpha \times 100 < \beta \times 100 + \nu \quad (1)$$

τότε ὁ  $\alpha$  δὲν ὑπερβαίνει τὸν  $\beta$ , διότι, ἐὰν εἶχομεν

$$\alpha > \beta \quad \text{ἦτοι} \quad \alpha = \beta + \rho$$

ἔπου  $\rho$  εἶναι τοῦλάχιστον ἡ μονάς, τότε θὰ ἦτο

$$\alpha \times 100 = \beta \times 100 + \rho \times 100$$

ὁπότε

$$\beta \times 100 + \rho \times 100 > \beta \times 100 + \nu \quad (\text{διότι } \nu < 100)$$

ἢ καὶ

$$\alpha \times 100 > \beta \times 100 + \nu$$

ἔπερ ἀντιβαίνει πρὸς τὴν τεθείσαν ἀνισότητα (1) ὁμοίως, ἐὰν

$$\alpha \times 10 < \beta \times 10 + \nu \quad (2)$$

ἔπου  $\nu < 10$ , συμπεραίνομεν ὅτι ὁ  $\alpha$  δὲν δύναται νὰ ὑπερβαίῃ τὸν  $\beta$ . ἐπίσης ἂν

$$\alpha \times 100 > \beta \times 100 + \nu$$

τότε κατ' ἀνάγκην

$$\alpha > \beta$$

Πῶς ἐξάγεται ἡ τετραγωνικὴ ρίζα ἀκεραίου μεγαλύτερου τοῦ 100 κατὰ προσέγγισιν μονάδος;

226. — Ἐστω ἤδη τυχῶν ἀκέραιος μεγαλύτερος τοῦ 100. π. χ. ὁ 5436. Ζητοῦμεν κατὰ τὸν ὁρισμὸν (§ 223) ἀκέραιόν τινα  $\alpha$  τοιοῦτον ὥστε

$$\alpha^2 \leq 5436 \quad (3)$$

καὶ

$$(\alpha + 1)^2 > 5436 \quad (4)$$

ἀμέσως φαίνεται ὅτι ὁ  $\alpha$  δὲν εἶναι μικρότερος τοῦ 10. θὰ περιέχῃ ἐπομένως δεκάδας τινὰς  $\delta$  καὶ μονάδας  $\mu$ . ὁπότε

$$\alpha = \delta \times 10 + \mu$$



κατὰ τὴν πρότασιν (§ 216) ἔχομεν·

$$\alpha^2 = \delta^2 \times 100 + 2 \times \delta \times \mu \times 10 + \mu^2 \quad (K)$$

ἐπομένως προκύπτει ἐκ τῆς ἀνισότητος (3)

$$\delta^2 \times 100 \leq 5436 \quad \eta \quad \delta^2 \times 100 \leq 54 \times 100 + 36$$

ἔθεν (§ 225)

$$\delta^2 \leq 54 \quad (A)$$

ἀφ' ἐτέρου, ἐπειδὴ ὁ ἀριθμὸς  $\mu$  δὲν ὑπερβαίνει τὸν 9, ἔχομεν ὅτι  $\delta \mu + 1$  δὲν ὑπερβαίνει τὸν 10 καὶ ἐπομένως  $\delta \alpha + 1$  δὲν ὑπερβαίνει τὸν  $(\delta \times 10 + 10)$ . ὥστε  $\delta (\alpha + 1)^2$  δὲν ὑπερβαίνει τὸν  $(\delta + 1)^2 \times 100$ . ἔθεν ἐκ τῆς ἀνισότητος (4) ἔπεται ὅτι

$$(\delta + 1)^2 \times 100 > 5436 \quad \eta \quad (\delta + 1)^2 \times 100 > 54 \times 100 + 36$$

ἔθεν

(§ 225)

$$(\delta + 1)^2 > 54$$

(B).

Ἐκ τῶν ἀνισοτήτων (A) καὶ (B) συμπεραίνομεν (§ 223) ὅτι  $\delta = 7$ . ἤτοι·

Ὁ ἀριθμὸς  $\delta$  τῶν δεκάδων τῆς τετραγωνικῆς ρίζης εὐρίσκειται, ἂν ἐξαχθῇ ἡ τετραγωνικὴ ρίζα τῶν ἑκατοντάδων τοῦ ἀριθμοῦ.

Ζητήσωμεν ἤδη τὸν  $\mu$ : ἀντικαθιστώντες εἰς τὴν ἰσότητα (K) τὸ  $\delta$  διὰ τοῦ 7 ἔχομεν

$$\alpha^2 = 7^2 \times 100 + 2 \times 7 \times \mu \times 10 + \mu^2$$

καὶ ἐπομένως ἡ σχέση (3) γράφεται

$$7^2 \times 100 + 2 \times 7 \times \mu \times 10 + \mu^2 \leq 5436$$

ἔθεν καὶ

$$2 \times 7 \times \mu \times 10 + \mu^2 \leq 536$$

ἢ

$$2 \times 7 \times \mu \times 10 + \mu^2 \leq 53 \times 10 + 6 \quad (I)$$

ἐπομένως

$$2 \times 7 \times \mu \times 10 < 53 \times 10 + 6$$

καὶ κατὰ τὰ ἀνωτέρω (§ 225)

$$2 \times 7 \times \mu \leq 53 \quad \eta \quad \mu \leq \frac{53}{2 \times 7}, \text{ ἔξ οὗ βλέπομεν ὅτι τὸ ψη-}$$

φίον τῶν μονάδων δὲν ὑπερβαίνει τὸ ψηφίον ἕπερ εὐρίσκομεν διαιροῦντες τὸν ἀριθμὸν τῶν δεκάδων τοῦ ὑπολοίπου διὰ τοῦ διπλασίου τοῦ ἀριθμοῦ τῶν δεκάδων τῆς ρίζης.

Κατὰ ταῦτα τὸ ψηφίον τῶν μονάδων δὲν ὑπερβαίνει τὴν 3.

Ἴνα δοκιμάσωμεν ἤδη ἂν  $\mu=3$ , θέτομεν εἰς τὴν σχέσιν (Γ) ὅπου  $\mu$  τὸ 3, ἐὰν ἡ σχέσις ἀληθεύῃ, τότε  $\mu=3$ , ἄλλως δοκιμάζομεν τὸν κατὰ μονάδα μικρότερον. Παρατηρητέον ὅτι τὸ πρῶτον μέλος τῆς ἀνισότητος (Γ) γράφεται καὶ ὡς ἐξῆς:

$$(2 \times 7 \times 10 + \mu) \times \mu.$$

ἢ καὶ

$$(140 + \mu) \times \mu$$

ὥστε,

διὰ νὰ διακρίνωμεν ἂν  $\mu=3$ , παρατηροῦμεν ἂν τὸ  $143 \times 3$  εἶναι μικρότερον τοῦ ὑπολοίπου 536· εὐρίσκομεν οὕτως ἐνταῦθα  $\mu=3$ .

Τουτέστι, πρὸς εὔρεσιν τοῦ ψηφίου τῶν μονάδων σχηματίζομεν ἀριθμὸν μὲ δεκάδας  $2 \times 7$  καὶ μὲ μονάδας τὸ δοκιμαζόμενον ψηφίον 3· πολλαπλασιάζομεν δὲ τοῦτο ἐπὶ τὸ δοκιμαζόμενον ψηφίον 3· ἐπειδὴ τὸ γινόμενον αὐτὸ εἶναι μικρότερον τοῦ ὑπολοίπου 536, ἐπεται ὅτι  $\mu=3$ · καὶ ἐπομένως τετραγωνικὴ ρίζα τοῦ 5436 κατὰ προσέγγισιν μονάδος εἶναι ὁ ἀριθμὸς 73· παρατηροῦμεν δ' ὅτι, ἐὰν τὸ γινόμενον  $143 \times 3$  ἀφαιρέσωμεν ἀπὸ τοῦ 536, θὰ εὔρωμεν ὅτι καὶ ἐὰν ἀφηροῦμεν ἀπ' εὐθείας τὸ  $73^2$  ἀπὸ τοῦ δοθέντος ἀριθμοῦ· καθόσον ἡ διαφορὰ

$$536 - (2 \times 7 \times \mu \times 10 + \mu^2)$$

ἰσοῦται πρὸς τὴν διαφορὰν

$$5436 - (\delta^2 \times 100 + 2 \times 7 \times \mu \times 10 + \mu^2).$$

ὥστε ἐὰν ἡ πράξις ἐγένετο ὀρθῶς, πρέπει  $73^2 + 107 = 5436$ .

Ἡ διάταξις τῆς πράξεως γίνεται ὡς ἐξῆς:

54'36	73
49	143
536	3
429	429
107	

Ζητήσωμεν ἤδη τὴν τετραγωνικὴν ρίζαν τοῦ ἀριθμοῦ 543678· ἔστω δ ὁ ἀριθμὸς τῶν δεκάδων αὐτῆς καὶ  $\mu$  ὁ τῶν μονάδων· κατὰ τὰ προηγούμενα εὐρίσκομεν τὸ δ ἐξάγοντες τὴν τετραγωνικὴν ρίζαν τοῦ 5436, ἦται  $\delta=73$ · ἐπομένως θὰ ἔχωμεν ὡς καὶ προηγουμένως  $73^2 \times 100 + 2 \times 73 \times \mu \times 10 + \mu^2 \leq 543678$ .

ἀφαιρούμεν ὡς καὶ πρότερον τὸ  $73^2 \times 100$  ἢ ἀφαίρεσις ἑμως τοῦ  $73^2 \times 100$  ἀπὸ τοῦ 543678 γίνεται, καὶ ἐὰν ἀφαιρέσωμεν τὸ  $73^2$  ἀπὸ τοῦ 5436, εἰς δὲ τὸ ὑπόλοιπον προσγράψωμεν τὸ 78· ἀλλ' ὡς παρατηρήσαμεν ἤδη ἡ διαφορὰ 5436 —  $73^2$  ἰσοῦται πρὸς τὸ ἤδη εὑρεθὲν ὑπόλοιπον 107· ἀρκεῖ ἐπομένως νὰ προσγράψωμεν εἰς αὐτὸ 78. Προχωροῦμεν κατόπιν ὅπως καὶ ἀνωτέρω πρὸς εὑρεσιν τοῦ μ.

Διάταξις τῆς πράξεως

54'36'78	737	
49	143	1467
536	3	7
429	429	10269
10778		
10269		
509		

Κανὼν

**227.** — Ἴνα ἐξαγάγωμεν τὴν τετραγωνικὴν ρίζαν ἀριθμοῦ ἀκεραίου, χωρίζομεν αὐτὸν εἰς διψήφια τμήματα ἀρχόμενοι ἀπὸ τῶν ἀπλῶν μονάδων. Τὸ πρῶτον πρὸς τὰριστερὰ τμήμα δύναται νὰ εἶναι καὶ μονοψήφιον· τούτου ἐξάγομεν τὴν τετραγωνικὴν ρίζαν, ἣτις θὰ εἶναι καὶ τὸ πρῶτον ψηφίον τῆς ζητουμένης. Τὸ τετράγωνον τοῦ εὑρεθέντος τούτου ψηφίου ἀφαιροῦμεν ἀπὸ τοῦ πρώτου τμήματος. Δεξιᾷ τοῦ μένοντος ὑπολοίπου καταβιβάζομεν τὸ δεύτερον τμήμα, ὅτε σχηματίζεται ἀριθμὸς τις, ἀπὸ τοῦ ὁποίου χωρίζομεν τὸ τελευταῖον ψηφίον πρὸς τὰ δεξιὰ. Τὸ πρὸς τὰριστερὰ τμήμα θεωροῦμεν ὡς διαιρέτεον, ὡς διαιρέτην δὲ τὸ διπλάσιον τοῦ εὑρεθέντος πρώτου ψηφίου τῆς ρίζης. Τὸ ἀκέραιον πηλίκον ὅτερο θὰ εὔρωμεν γράφομεν δεξιᾷ καὶ ὑποκάτω τοῦ διαιρέτου καὶ πολλαπλασιάζομεν. Ἐὰν τὸ γινόμενον ἀφαιρῆται ἀπὸ τοῦ σχηματισθέντος ἀριθμοῦ, τότε τοῦτο εἶναι τὸ δεύτερον ψηφίον τῆς ρίζης καὶ γράφομεν αὐτὸ δεξιᾷ τοῦ πρώτου, εἰ δὲ μὴ, δοκιμάζομεν κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον τὸ κατὰ μονάδα μικρότερον ψηφίον κ. ο. κ. μέχρις οὗ καταστῆ δυνατὴ ἡ ἀφαίρεσις, ὅποτε ἔχομεν καὶ τὸ δεύτερον ψηφίον τῆς ρίζης. Εἰς τὸ ὑπόλοιπον τῆς ἀφαιρέσεως καταβιβάζομεν καὶ τὸ τρίτον

διψήφιον τμήμα τοῦ ἀριθμοῦ. Χωρίζομεν πάλιν ἀπ' αὐτοῦ τὸ ψηφίον τῶν μονάδων, διαιροῦμεν τὸ ἀπομένον τμήμα διὰ τοῦ διπλασίου τοῦ ἀριθμοῦ τοῦ σχηματιζομένου ὑπὸ τῶν εὐρεθέντων ἤδη ψηφίων τῆς ρίζης, προχωροῦμεν δὲ κατόπιν ὕπως καὶ προηγουμένως· τοιοῦτοτρόπως ἐξακολουθοῦμεν μέχρις οὗ καταβιβασθῇ καὶ τὸ τελευταῖον διψήφιον τμήμα.

### Παραδείγματα.

76'78'25	876	257056	507
64	167 1746	25	10 1007
1278	7 6	07056	7
1169	1169 10476	7049	7049
10925		7	
10476			
449			

3'78'75	194
1	29 384
278	9 4
261	261 1536
1775	
1536	
239	

Παρατηρήσεις. Δυνατὸν νὰ συμβῇ, ὅπως εἰς τὸ δεῦτερον τῶν ἀνωτέρω παραδείγματων, ἐν τῶν πηλίκων νὰ εἶναι 0· τότε καὶ τὸ ἀντίστοιχον ψηφίον τῆς ρίζης θὰ εἶναι τὸ 0.

Ἐπίσης δυνατὸν, ὅπως εἰς τὸ τρίτον τῶν ἀνωτέρω παραδειγμάτων, πηλίκον τι νὰ εἶναι μείζον τοῦ 9· τότε ἀρχίζομεν τὴν δοκιμὴν ἀπὸ τοῦ ψηφίου 9.

### Ἀσκήσεις.

319.) Τὰ ψηφία τῆς τετραγωνικῆς ρίζης εἶναι τόσα ὅσα καὶ τὰ τμήματα εἰς ἃ χωρίζεται ἀρχικῶς ὁ δοθεὶς ἀριθμὸς κατὰ τὸν ἀνωτέρω κανόνα.

Π. χ. ἡ τετραγωνικὴ ρίζα ἑπταψηφίου θὰ ἔχη τέσσαρα ψηφία.

320.) Νὰ δειχθῇ ὅτι τὸ ὑπόλοιπον τῆς πράξεως οὐδέποτε ὑπερβαίνει τὸ διπλάσιον τῆς εὐρεθείσης τετραγωνικῆς ρίζης.

Καὶ τῶντι, ἐὰν  $u \geq 2\rho + 1$ , τότε  $\rho^2 + u \geq (\rho + 1)^2$  (§ 215, § 223)

321.) Ἡ τετραγωνικὴ ρίζα κατὰ προσέγγισιν μονάδος ἀριθμοῦ μὴ ἀκεραίου εἶναι ἡ αὐτὴ μὲ τὴν τετραγωνικὴν ρίζαν τοῦ ἀκεραίου μέρους του.

Π. χ. τετραγωνικὴ ρίζα τοῦ 103,25 κατὰ προσέγγισιν μονάδος εἶναι ἡ τετραγωνικὴ ρίζα κατὰ προσέγγισιν μονάδος τοῦ 103, ἧτοι ὁ 10.

322.) Τὸ ψηφίον τῶν μονάδων τῆς τετραγωνικῆς ρίζης ἀριθμοῦ οὐδέποτε εἶναι μικρότερον τοῦ πηλίκου ὅπερ εὐρίσκομεν, ἐὰν διαιρέσωμεν τὸν ἀριθμὸν τῶν δεκάδων τοῦ ὑπολοίπου τοῦ προκύπτοντος μετὰ τὴν ἀφαίρεσιν τοῦ τετραγώνου τῶν δεκάδων τῆς ρίζης ἀπὸ τοῦ δεδομένου ἀριθμοῦ διὰ τοῦ διπλασίου τοῦ ἀριθμοῦ τῶν δεκάδων τῆς ρίζης ἠὺξημένου κατὰ μονάδα. (ἀσκ. 320).

323.) Πόσα τέλεια τετράγωνα περιέχονται εἰς τὸν ἀριθμὸν 56734;

**Ῥηπολογισμὸς τῆς τετραγωνικῆς ρίζης ἀριθμοῦ (ἀκεραίου ἢ κλασματικοῦ) κατὰ προσέγγισιν δοθέντος πολλαστημορίου τῆς μονάδος.**

228. — Ἐστωσαν δύο ὁμώνυμα κλάσματα μὲ ἀριθμητὰς δύο διαδοχικοὺς ἀκεραίους· π. χ.  $\frac{5}{7}$ ,  $\frac{6}{7}$ . Τὰ τετράγωνα αὐτῶν εἶναι

$\frac{25}{49}$ ,  $\frac{36}{49}$ . Πᾶς ἀριθμὸς μεγαλύτερος τοῦ  $\frac{25}{49}$  ἀλλὰ μικρότερος τοῦ  $\frac{36}{49}$  ἔχει ὡς τετραγωνικὴν ρίζαν κατὰ προσέγγισιν  $\frac{1}{7}$  τὸν  $\frac{5}{7}$ .

Ὅμοίως πᾶς ἀριθμὸς μεταξὺ τοῦ  $\left(\frac{3}{10}\right)^2$  καὶ τοῦ  $\left(\frac{4}{10}\right)^2$ , ὅπως

π. χ. ὁ  $\frac{11}{75}$ , ἔχει τετραγωνικὴν ρίζαν κατὰ προσέγγισιν  $\frac{1}{10}$  τὸν

$\frac{3}{10}$ , ἧτοι

Τετραγωνικὴ ρίζα ἀριθμοῦ κατὰ προσέγγισιν  $\frac{1}{v}$  καλεῖται τὸ μεγαλύτερον ἐκ τῶν κλασμάτων τῶν ἐχόντων παρονομαστήν  $v$  καὶ τῶν ὁποίων τὰ τετράγωνα περιέχονται εἰς τὸν δοθέντα ἀριθμόν.

229. — Ἐστω  $\alpha$  ἀριθμὸς τις τοῦ ὁποίου ζητοῦμεν νὰ ὑπολογίσωμεν τὴν τετραγωνικὴν ρίζαν κατὰ προσέγγισιν  $\frac{1}{v}$ . Κατὰ τὸν ἀνωτέρω ὁρισμὸν ζητοῦμεν ἀκέραιόν τινα  $\rho$  τοιοῦτον ὥστε

$$\left(\frac{\rho}{v}\right)^2 \leq \alpha \text{ καὶ } \left(\frac{\rho+1}{v}\right)^2 > \alpha \quad \eta \text{ καὶ}$$

$$\frac{\rho^2}{v^2} \leq \alpha \quad \text{καὶ} \quad \frac{(\rho+1)^2}{v^2} > \alpha, \quad \eta \text{ ἀκόμη}$$

$$\rho^2 \leq \alpha \times v^2 \quad \text{καὶ} \quad (\rho+1)^2 > \alpha \times v^2$$

ἐπομένως  $\rho$  θὰ εἶναι ὁ μεγαλύτερος ἀκέραιος τοῦ ὁποίου τὸ τετράγωνον χωρεῖ εἰς τὸν ἀριθμὸν  $\alpha \times v^2$ , ἤτοι ὁ  $\rho$  θὰ εἶναι ἡ τετραγωνικὴ ρίζα κατὰ προσέγγισιν μονάδος τοῦ ἀριθμοῦ  $\alpha \times v^2$ . ἄρα·

Ἴνα ὑπολογίσωμεν τὴν τετραγωνικὴν ρίζαν οἰουδήποτε ἀριθμοῦ κατὰ προσέγγισιν  $\frac{1}{v}$ , πολλαπλασιάζομεν αὐτὸν ἐπὶ  $v^2$  τοῦ γινομένου ἐξάγομεν τὴν τετραγωνικὴν ρίζαν κατὰ προσέγγισιν μονάδος καὶ ταύτην λαμβάνομεν ὡς ἀριθμητὴν κλάσματος ἔχοντος παρονομαστήν τὸν  $v$ . π. χ. εὐρίσκομεν οὕτω τοῦ 5 τετραγωνικὴν ρίζαν κατὰ προσέγγισιν  $\frac{1}{8}$  τὸν ἀριθμὸν  $\frac{17}{8}$ .

### Ἐφαρμογαὶ τοῦ κανόνος τούτου.

230. — Εἰς τὴν μερικὴν περίπτωσιν καθ' ἣν ὁ παρονομαστής εἶναι δύναμις τοῦ 10, ἤτοι ὅταν ζητῶμεν τὴν τετραγωνικὴν ρίζαν ἀριθμοῦ κατὰ προσέγγισιν δεκαδικῆς μονάδος, αἱ πράξεις γίνονται ἀπλοῦστεραι.

Παραδείγματα. Νὰ ἐξαχθῆ ἡ τετραγωνικὴ ρίζα τοῦ 2 κατὰ προσέγγισιν  $\frac{1}{100}$ .

Κατὰ τὸν κανόνα ἐξάγω τὴν τετραγωνικὴν ρίζαν τοῦ  $2 \times 100^2$ , ἴτοι τοῦ 20000, κατὰ προσέγγισιν μονάδος, ὅτε εὐρίσκω 141 καὶ ταύτην διαιρῶ διὰ τοῦ 100, ἴτοι ἡ ζητούμενῃ τετραγωνικὴ ρίζα εἶναι 1,41.

Ὅμοιως εὐρίσκω ὅτι ἡ τετραγωνικὴ ρίζα τοῦ 2,35416 κατὰ προσέγγισιν 0,01 εἶναι 1,53.

### Ἀσκήσεις.

324.) Νὰ ὑπολογισθῶσιν αἱ

$$\sqrt{2500}, \quad \sqrt{7543,6}, \quad \sqrt{25203}, \quad \sqrt{252300}, \\ \sqrt{9302600}, \quad \sqrt{8035}$$

ἀκριβῶς ἢ κατὰ προσέγγισιν μονάδος.

325.) Νὰ ἐξαχθῆ ἡ τετραγωνικὴ ρίζα τοῦ κλάσματος  $\frac{7}{\beta^2}$  κατὰ προσέγγισιν  $\frac{1}{\beta}$ .

326.) Νὰ ὑπολογισθῆ ἡ  $\sqrt{\frac{11}{2^2 \times 3}}$  κατὰ προσέγγισιν  $\frac{1}{6}$ .

Παρατηροῦμεν ὅτι  $\frac{11}{2^2 \times 3} = \frac{11 \times 3}{(2 \times 3)^2}$

327.) Νὰ ὑπολογισθῶσιν ἀκριβῶς ἢ κατὰ προσέγγισιν  $\frac{1}{5}$  αἱ

$$\sqrt{19}, \quad \sqrt{\frac{16}{49}}, \quad \sqrt{\frac{64}{49}}, \quad \sqrt{\frac{39}{40}}, \quad \sqrt{\frac{7}{25}}$$

328.) Νὰ ὑπολογισθῶσι κατὰ προσέγγισιν 0,1

$$\sqrt{2,79864}, \quad \sqrt{\frac{3}{4}}, \quad \sqrt{12 \frac{2}{5}}, \quad \sqrt{8,333333\dots}$$

329.) Νὰ ὑπολογισθῆ ἡ  $\sqrt{14}$  κατὰ προσέγγισιν  $\frac{3}{7}$ .

330.) Ἡ τετραγωνικὴ ρίζα ἀκεραίου τινὸς καθ' ὅτανδῆποτε προσέγγισιν εἶναι πάντοτε μικροτέρα τοῦ  $\rho + \frac{u}{2\rho}$ , ὅπου  $\rho$  δηλοῖ τὴν τετραγωνικὴν ρίζαν τοῦ αὐτοῦ ἀκεραίου κατὰ προσέγγισιν μονάδος καὶ  $u$  τὸ ὑπόλοιπον τὸ εὑρεθὲν κατὰ τὴν τοιαύτην ἐξαγωγὴν.

Ἄρκει πρὸς ἀπόδειξιν νὰ λάβωμεν ὑπ' ὄψει ὅτι (§ 226)

$$A = \rho^2 + u \text{ καὶ (§ 214) } \left( \rho + \frac{u}{2\rho} \right)^2 = \rho^2 + u + \frac{u^2}{4\rho^2}.$$

331.) Ἐὰν κατὰ τὴν ἐξαγωγὴν τετραγωνικῆς ρίζης ἀριθμοῦ κατὰ προσέγγισιν μονάδος τὸ ὑπόλοιπον δὲν ὑπερβαίῃ τὴν εὑρεθεῖσαν τετραγωνικὴν ρίζαν, τότε αὕτη εἶναι καὶ τετραγωνικὴ ρίζα τοῦ ἰδίου ἀριθμοῦ κατὰ προσέγγισιν  $\frac{1}{2}$ . (§ 226 § 228)

332.) Εἰς μίαν τάξιν σχολείου ὑπάρχουσι τόσα θρανία ὅσοι οἱ μαθηταὶ οἱ καθήμενοι εἰς ἕκαστον θρανίον. Ἐκ τῶν 69 μαθητῶν τῆς τάξεως ταύτης 5 δὲν κάθηται εἰς θρανία. Πόσα εἶναι τὰ θρανία ;

333.) Δι' ἕκαστον λαχὸν ἑνὸς λαχείου πληρώνει τις 0,50 δραχ. Πόσα χρήματα θὰ δώσῃ δι' ἄλλους τοὺς λαχνοὺς τοὺς φέροντας ἀριθμὸν ὅστις εἶναι τέλειον τετράγωνον καὶ εὑρίσκεται μεταξύ 1050 καὶ 1250 ;

334.) Ποῖον κλάσμα διαιρούμενον διὰ τοῦ ἀντιστρόφου του δίδει κλάσμα ἴσον πρὸς τὸ  $\frac{2523}{4107}$ ;

335.) Ἐὰν ἀριθμὸς τις ἄρτιος εἶναι ἄθροισμα 2 τετραγώνων, καὶ τὸ ἥμισυ αὐτοῦ θὰ εἶναι ἄθροισμα δύο τετραγώνων.

Ἄρκει ν' ἀποδείξωμεν ὅτι  $\frac{\alpha^2 + \beta^2}{2} = \left( \frac{\alpha + \beta}{2} \right)^2 + \left( \frac{\alpha - \beta}{2} \right)^2$

336.) Ἀριθμὸς διαιρετὸς διὰ 4, ἐκτὸς τοῦ 4, εἶναι διαφορὰ τῶν τετραγώνων δύο ἀκεραίων.



## Γενικαὶ ἀσκήσεις ἐπὶ τῶν τεσσάρων βιβλίων.

337.) Ἐστω δ κοινὸς διαιρέτης δύο ἀριθμῶν  $\alpha$  καὶ  $\beta$ , ἔστω δὲ  $\nu$  τὸ ὑπόλοιπον τῆς διαιρέσεως  $\alpha : \beta$ . Πῶς ἐκ τῶν τριῶν πηλίκων τῶν διαιρέσεων  $\alpha : \delta$ ,  $\beta : \delta$ ,  $\alpha : \beta$  εὑρίσκεται τὸ πηλίκον τῆς διαιρέσεως  $\nu : \delta$ ;

338.) Τὸ γινόμενον  $(\nu+1)(\nu+2)\dots(2\nu-1)2\nu$  εἶναι ἀριθμὸς διαιρετὸς διὰ  $2^\nu$ .

Ἄρκει (ἄσκ. 235) νὰ λάβω ὑπ' ὄψει μου τὴν προφανῆ ἰσότητα

$$(\nu+1)(\nu+2)\dots(2\nu-1)2\nu = \frac{1.2.3\dots\nu(\nu+1)\dots2\nu}{1.2.3\dots\nu}$$

339.) Διὰ πείρας ἀκεραίας τιμᾶς τοῦ  $\alpha$  ἢ διαιρέσεις

$$[(\alpha+5) \cdot (\alpha+6)] : 6\alpha$$

εἶναι τελεία;

Παρατηροῦμεν ὅτι ὁ 6 πρέπει νὰ διαιρῇ τὸν  $\alpha(\alpha-1)$  καὶ ὁ  $\alpha$  νὰ διαιρῇ τὸν 30.

340.) Νὰ εὑρεθῇ ἀκέραιος διψήφιος ἴσος μὲ τὸ διπλάσιον τοῦ γινομένου τῶν ψηφίων του.

341.) Τὸ γινόμενον πέντε διαδοχικῶν ἀριθμῶν εἶναι διαιρετὸν διὰ 1. 2. 3. 4. 5. (§ 117)

342.) Τὸ γινόμενον ἕξ διαδοχικῶν ἀκεραίων ἀριθμῶν εἶναι διαιρετὸν διὰ 1. 2. 3. 4. 5. 6. (§ 117)

343.) Τὸ γινόμενον 18 διαδοχικῶν ἀκεραίων εἶναι διαιρετὸν διὰ  $720^3$ .

344.) Ν' ἀποδειχθῇ ὅτι εἶναι ἀδύνατον ὁ κύβος ἀριθμοῦ νὰ ὑπερβαίνει τὸ τριπλάσιον αὐτοῦ κατὰ μονάδα

345.) Τὰ πηλίκα τῆς διαιρέσεως δύο ἀριθμῶν διὰ τοῦ μ.κ.δ αὐτῶν ἔχουσιν ἄθροισμα 5, τὸ δὲ εἰς  $\kappa$ . π. τῶν ἀριθμῶν εἶναι 36. Νὰ εὑρεθῶσιν οἱ ἀριθμοί. (§ 103, § 118)

346.) Νὰ εὑρεθῶσιν 6 ἀριθμοὶ ὧν ἕκαστος ἔχει 30 διαιρέτας καὶ εἶναι διαιρετὸς διὰ 3, 5, 7, δι' οὐδενὸς δὲ ἄλλου πρώτου διαιρεῖται. (ἄσκ. 172)

347.) Πρὸς εὑρεσιν τοῦ μ.κ.δ. ἀριθμοῦ τινος  $A$  καὶ τοῦ γινο-

μένου άλλων  $B \times \Gamma \times \Delta$  δυνάμεθα νὰ ἐργασθῶμεν ὡς ἐξῆς· εὐ-  
ρίσκομεν τὸν μ. κ. δ. τοῦ  $A$  καὶ  $B$ · ἔστω οὗτος ὁ  $M$ · διαιροῦμεν  
τὸν  $A$  διὰ  $M$  καὶ ζητοῦμεν τὸν μ. κ. δ. τοῦ πηλίκου  $\Pi$  καὶ τοῦ  
 $\Gamma$ · ἔστω οὗτος ὁ  $M'$ · διαιροῦμεν τὸ  $\Pi$  διὰ τοῦ  $M'$  καὶ ζητοῦμεν  
τὸν μ. κ. δ.  $M''$  τοῦ πηλίκου  $\Pi'$  καὶ τοῦ  $\Delta$ . Ὁ μ. κ. δ. τῶν  
 $A$  καὶ  $B \times \Gamma \times \Delta$  θὰ εἶναι  $M \times M' \times M''$ .

Ἀποδεικνύομεν ὅτι ὁ  $M \times M' \times M''$  διαιρεῖ τὸν ζητούμενον  
μ. κ. δ. καὶ ἀντιστρόφως ὁ ζητούμενος μ. κ. δ. διαιρεῖ τὸν  
 $M \times M' \times M''$ · ὅθεν ἡ πρότασις:

348.) Ἐὰν  $\alpha$  καὶ  $\beta$  εἶναι ἀριθμοὶ πρῶτοι διάφοροι τοῦ 2,  
ὁ μ. κ. δ. τοῦ ἀθροίσματος αὐτῶν καὶ τῆς διαφορᾶς τῶν εἶναι ὁ 2.

349.) Ἐστω  $\delta$  ὁ μ. κ. δ. τῶν ἀριθμῶν  $\alpha$ ,  $\beta$ , καὶ  $\delta'$  ὁ μ. κ. δ.  
τῶν ἀριθμῶν  $\alpha$ ,  $\beta'$ · τότε ὁ μ. κ. δ. τῶν ἀριθμῶν  $\alpha$  καὶ  $\beta\beta'$   
εἶναι ὁ αὐτὸς μὲ τὸν μ. κ. δ. τῶν ἀριθμῶν  $\alpha$  καὶ  $\delta\delta'$ . (§ 125, 74)

350.) Νὰ εὐρεθῶσι δύο ἀριθμοὶ ὧν ὁ πρῶτος εἶναι τριπλά-  
σιος τοῦ δευτέρου καὶ μ. κ. δ. αὐτῶν εἶναι ὁ 22. (§ 103)

351.) Ἐὰν δύο ἀριθμοὶ εἶναι τοιοῦτοι ὥστε, ὅταν ἀυξήσωμεν  
ἢ ἐλαττώσωμεν τὸν ἓνα κατὰ μονάδα, νὰ λαμβάνωμεν πολλα-  
πλάσια τοῦ ἄλλου, οἱ ἀριθμοὶ οὗτοι εἶναι πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους.

352.) Ἐὰν ἀριθμὸς τις  $\Pi$  εἶναι πρῶτος πρὸς ἕκαστον τῶν  
 $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ ,  $\delta$  καὶ εἶναι συγχρόνως κοινὸς διαιρέτης τῶν  $\alpha\delta - \beta\gamma$  καὶ  
 $\alpha - \gamma$ , θὰ διαιρῆ καὶ τὸν  $\delta - \beta$ .

Ἄρκει νὰ παρατηρήσωμεν ὅτι

$$\alpha\delta - \beta\gamma - \beta(\alpha - \gamma) = \alpha\delta - \alpha\beta$$

353.) Ἐὰν οἱ ἀριθμοὶ  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ ,  $\delta$  εἶναι τοιοῦτοι ὥστε  $\alpha\delta - \beta\gamma = 1$ ,  
τότε οἱ ἀριθμοὶ  $\alpha$ ,  $\beta$  εἶναι πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους· ἐπίσης δὲ καὶ  
οἱ ἀριθμοὶ  $\alpha + \gamma$ ,  $\beta + \delta$  εἶναι πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους.

354.) Διὰ ποίας τιμᾶς τοῦ  $\alpha$  οἱ ἀριθμοὶ  $\alpha + 8$ ,  $2\alpha - 5$  εἶναι  
πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους ;

355.) Ἀριθμὸς διαιρετὸς διὰ 2 καὶ οὐχὶ διὰ 4 δὲν δύναται νὰ  
εἶναι ἴσος πρὸς διαφορὰν τετραγώνων δύο ἀκεραίων. (Ἄσκ. 75)

356.) Τὸ γινόμενον δύο διαδοχικῶν ἀκεραίων περιττῶν ἢ ἀρ-  
τιῶν ἀξανθόμενον κατὰ μονάδα γίνεται τέλειον τετραγώνον.

357.) Τὸ τετράγωνον παντὸς πρώτου πρὸς τὸν 6 εἶναι πολλαπλάσιον τοῦ 24 ἠϋξημένον κατὰ μονάδα.

Ἄρκει νὰ δείξωμεν ὅτι πᾶς πρῶτος πρὸς τὸν 6 θὰ εἶναι ἢ τῆς μορφῆς  $6n-1$  ἢ τῆς μορφῆς  $6n+1$ . (\*Ασκ. 155)

358.) Πότε τρεῖς διαδοχικοὶ ἀκέραιοι εἶναι πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους ἀνά δύο;

359.) Ἡ διαφορὰ ἀριθμοῦ ἀκεραίου καὶ τοῦ τετραγώνου του εἶναι ἀριθμὸς διαιρετὸς διὰ 2.

360.) Ἡ τρίτη δύναμις ἀκεραίου εἶναι διαφορὰ δύο τετραγώνων.

Δυνάμεθα πρὸς τοῦτο νὰ στηριχθῶμεν ἐπὶ τῆς ἰσότητος

$$(a+1)^2 - (a-1)^2 = 4a.$$

361.) Πᾶς ἀκέραιος ὅστις εἶναι τετράγωνον ἄλλου ἢ θὰ εἶναι πολλαπλάσιον τοῦ 4 ἢ διαιρούμενος διὰ τοῦ 4 θὰ δίδῃ ὑπόλοιπον 1.

362.) Ἡ διαφορὰ τῶν τετραγώνων δύο περιττῶν εἶναι πάντοτε ἀριθμὸς διαιρετὸς διὰ 8.

363.) Ἐὰν δύο περιττοὶ διαδοχικοὶ εἶναι ἀριθμοὶ πρῶτοι, τὸ τετράγωνον τοῦ μικροτέρου καὶ τὸ διπλάσιον αὐτοῦ προστιθέμενα δίδουσιν ἄθροισμα ἀριθμὸν ἔχοντα ἐν ἄλῃ 4 διαιρέτας.

364.) Νὰ εὑρεθῇ κοινὸν κλάσμα καθιστώμενον ἴσον πρὸς  $\frac{4}{9}$ , ἔταν προσθέσωμεν 5 εἰς τὸν ἀριθμητὴν καὶ  $\frac{2}{3}$  εἰς τὴν παρονομαστήν (τοιούτον δὲν εὑρίσκεται).

365.) Νὰ εὑρεθῶσι δύο ἀκέραιοι  $\alpha$  καὶ  $\beta$  μικρότεροι τοῦ 15 τοιοῦτοι ὥστε

$$\frac{7}{45} = \frac{\alpha}{15} + \frac{\beta}{15^2}$$

Ἄρκει νὰ παρατηρήσωμεν ὅτι

$$\frac{7}{45} = \frac{7}{3^2 \times 5} = \frac{7 \times 5}{15^2} = \frac{35}{15^2} = \frac{2}{15} + \frac{5}{15^2}$$

366.) Ἐὰν ἴσων κλασμάτων προστεθῶσιν οἱ δμώνυμοι ἄροι, προκύπτει κλάσμα ἴσον πρὸν ἕκαστον ἐξ αὐτῶν. (§ 148)

367.) Ποιμήν τις ἔχασεν ἕνεκα ἐπιζωοτίας τὰ  $\frac{2}{3}$  τῶν  $\frac{3}{4}$  τῶν προβάτων του, ἐπώλησε δὲ τὰ πομεινάντα 64 πρόβατα ἀντὶ 230 δρχ. Ἐὰν ἐπώλει ὅλον τὸ ποιμνιόν του πρὶν ἢ ἐνσκήψῃ ἢ ἀσθένειν, θὰ ἐπώλει ἕκαστον ζῷον 2 δρχ. περισσότερον. Πόσα θὰ ἐλάμβανε ;

368.) Δεδομένου κλάσματος τινος, π. χ. τοῦ  $\frac{5}{8}$ , δυνάμεθα εὐκόλως νὰ εὕρωμεν κλάσμα τι  $\frac{\gamma}{\delta}$ , τοιοῦτον ὥστε τὸ γινόμενον  $\frac{\gamma}{\delta} \times \frac{5}{8}$  καὶ τὸ πηλίκον  $\frac{\gamma}{\delta} : \frac{5}{8}$  νὰ εἶναι ἀριθμοὶ ἀκέραιοι. Ποῖαν πρὸς τοῦτο ιδιότητα θὰ ἔχωσιν οἱ ὄροι τοῦ κλάσματος  $\frac{\gamma}{\delta}$  ;

369.) Ἀνταλλάσσει τις 2  $\frac{1}{2}$  ὄκ. καφέ μὲ 1 πῆχυν ὑφάσματος· πόσοι πῆχεις τοῦ αὐτοῦ ὑφάσματος ἀνταλλάσσονται μὲ 9  $\frac{3}{5}$  ὄκ. καφέ ;

370.) Κρουνοὶ πληροὶ δεξαμενὴν εἰς 9 ὥρας· μία στρόφιγξ δύναται νὰ κενώσῃ αὐτὴν εἰς 12 ὥρας· μόλις πληρωθῇ τὸ  $\frac{1}{4}$  τῆς δεξαμενῆς ὑπὸ τοῦ πρώτου κρουνοῦ ἀνοίγεται καὶ ἡ στρόφιγξ ἢ κενούσῃ τὴν δεξαμενὴν· μετὰ πόσῃν ὥραν ἀπὸ τῆς στιγμῆς ταύτης θὰ πληρωθῇ ἡ δεξαμενὴ ;

371.) Δύο ὁδοιπόροι βαδίζοντες ἐπὶ τῆς αὐτῆς ὁδοῦ ἀναχωροῦσιν ἐκ δύο πόλεων Α καὶ Β ἀπεχουσῶν ἀπ' ἀλλήλων 85 χιλιόμετρα καὶ βαίνουσι πρὸς συνάντησιν ἀλλήλων. Ὁ πρῶτος ἀναχωρεῖ ἐκ τοῦ Α τὴν 10 π. μ., ὁ δεῦτερος δ' ἐκ τοῦ Β τὴν 11 π. μ. ἡ ταχύτης τοῦ μὲν πρώτου εἶναι 7 χιλιόμετρα τὴν ὥραν, τοῦ δευτέρου 17. Εἰς ποῖαν ἀπὸ τοῦ Α ἀπόστασιν θὰ συναντηθῶσι καὶ κατὰ ποῖαν ὥραν ;

372.) Δύο ταχυδρόμοι ἀνεχώρησαν συγχρόνως ἐκ δύο τόπων Α καὶ Β διευθυνόμενοι πρὸς ἀλλήλους, ὁ μὲν μὲ ταχύτητα α, ὁ δὲ μὲ ταχύτητα β, τὸ δὲ μῆκος τῆς ὁδοῦ ἐφ' ἧς βαδίζουσιν εἶναι γ. Μετὰ πόσῃν ὥραν ἀπὸ τῆς ἐκκινήσεως θὰ συναντηθῶσιν ;

373.) Ἀτμάμαξά τις ἔχουσα ταχύτητα  $\alpha$  ἀνεχώρησε τρεῖς ὥρας ὕστερον ἄλλης ἐκ τοῦ αὐτοῦ σταθμοῦ καὶ διατρέχει τὴν αὐτὴν ὁδόν, ἣ δὲ ταχύτης αὐτῆς εἶναι τὰ  $\frac{5}{3}$  τῆς ταχύτητος τῆς ἄλλης· μετὰ πόσας ὥρας θὰ φθάσῃ αὐτήν;

374.) Νὰ εὐρεθῶσι τρία κλάσματα, τὰ ἀπλούστερα, ἴσα πρὸς τὰ κλάσματα  $\frac{5}{7}$ ,  $\frac{8}{9}$ ,  $\frac{10}{11}$  καὶ τοιαῦτα ὥστε ὁ παρονομαστῆς τοῦ πρώτου νὰ ἰσοῦται πρὸς τὸν ἀριθμητὴν τοῦ δευτέρου καὶ ὁ παρονομαστῆς τοῦ δευτέρου πρὸς τὸν ἀριθμητὴν τοῦ τρίτου.

Τὰ ζητούμενα (§ 148) θὰ εἶναι τῆς μορφῆς

$$\frac{5 \times \pi}{7 \times \pi} \quad \frac{8 \times \rho}{9 \times \rho} \quad \frac{10 \times \sigma}{11 \times \sigma}$$

ἔθεν ζητοῦμεν ἡμεῖς νὰ ἔχωμεν  $7 \times \pi = 8 \times \rho$  καὶ  $9 \times \rho = 10 \times \sigma$ .

375.) Ἄν ἀφαιρέσωμεν δύο κλάσματα ἀνάγωγα μὲ παρονομαστὰς διαφόρους, δὲν εὐρίσκομεν ἀκεραίους.

376.) Τὰ κλάσματα  $\frac{\alpha - 6}{15}$  καὶ  $\frac{\alpha - 5}{24}$  δὲν εἶναι δυνατὸν

διὰ τὴν αὐτὴν ἀκεραῖαν τιμὴν τοῦ  $\alpha$  νὰ εἶναι ἀκέραιοι. (§ 58, 75)

377.) Τὸ κλάσμα  $\frac{15\alpha^2 + 8\alpha + 6}{30\alpha^2 + 21\alpha + 13}$  εἶναι ἀνάγωγον, τοῦ  $\alpha$

ἔντος οἰουδὴποτε ἀκεραίου.

Πᾶς κ. ὁ. τῶν ὄρων τοῦ κλάσματος θὰ διαιρῆ καὶ τὴν διαφορὰν αὐτῶν, ἦτοι τὸν  $15\alpha^2 + 13\alpha + 7$ · ἐπομένως θὰ διαιρῆ καὶ τὸν

$$(15\alpha^2 + 13\alpha + 7) - (15\alpha^2 + 8\alpha + 6) = 5\alpha + 1$$

ἔθεν καὶ τὸν

$$3\alpha \cdot (5\alpha + 1) = 15\alpha^2 + 3\alpha$$

ἄρα καὶ τὸν

$$(15\alpha^2 + 8\alpha + 6) - (15\alpha^2 + 3\alpha) = 5\alpha + 6$$

ἀλλ' οἱ  $5\alpha + 6$  καὶ  $5\alpha + 1$  εἶναι πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους.

378.) Ἐστωσαν ἴσα κλάσματα

$$\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\alpha'}{\beta'} = \frac{\alpha''}{\beta''} \dots$$

καὶ Μ ὁ μ. κ. δ τῶν παρονομαστώων· καλέσωμεν π, π', π'',...  
τὰ πηλίκα  $\frac{\beta}{M}, \frac{\beta'}{M}, \frac{\beta''}{M} \dots$ . Νὰ δευχθῆ ὅτι οἱ ἀριθμη-  
ταὶ α, α', α'',... εἶναι ἰσάκεις πολλαπλάσια τῶν π, π', π''...

Ἄρκει νὰ δευχθῆ ὅτι ὁ α διαιρεῖται διὰ τοῦ π, ὁ α' διὰ  
τοῦ π' καὶ ὁ α'' διὰ τοῦ π''.

379.) Ἀριθμοῦ τινος, π. χ. τοῦ 36, ἄς ἀθροίσωμεν μερικοὺς  
διαιρέτας, ἔστω τοὺς 2, 3, 4, 9, τοὺς ἀντιστρέφους αὐτῶν, ἦτοι  
τοὺς  $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{9}$ , τάντιστοιχα πηλίκα, ἦτοι 18, 12, 9, 4,

καὶ τάντιστροφα τούτων,  $\frac{1}{18}, \frac{1}{12}, \frac{1}{9}, \frac{1}{4}$ , θὰ παρατηρήσω-  
μεν ὅτι

$$\frac{2+3+4+9}{18+12+9+4} = \frac{\frac{1}{18} + \frac{1}{12} + \frac{1}{9} + \frac{1}{4}}{\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{9}}$$

Τίς ὁ λόγος δι' ὃν πάντοτε τοῦτο συμβαίνει;

380.) Ἄν

$$\frac{\alpha}{A} > \frac{\beta}{B} > \frac{\gamma}{\Gamma} > \frac{\delta}{\Delta}$$

τότε

$$\frac{\alpha}{A} > \frac{\alpha + \beta + \gamma + \delta}{A + B + \Gamma + \Delta} > \frac{\delta}{\Delta} \quad (\text{Ἄσκ. 366})$$

381.) Ἐστωσαν δύο ἀνάγωγα κλάσματα  $\frac{\alpha}{\beta}$  καὶ  $\frac{\gamma}{\delta}$ , ἔστω δὲ Ε  
τὸ ε.κ.π. τῶν ἀριθμητῶν, Δ δὲ ὁ μ.κ.δ. τῶν παρονομαστώων· τὸ  
κλάσμα  $\frac{E}{\Delta}$  εἶναι διαιρετὸν διὰ τῶν κλασμάτων  $\frac{\alpha}{\beta}$  καὶ  $\frac{\gamma}{\delta}$ . του-  
τέστι διαιρούμενον δι' ἐκάστου ἐξ αὐτῶν δίδει ὡς πηλίκον ἀκέραι-  
ον ἀριθμὸν.

Π. χ. Ἄν ἔχωμεν τὰ κλάσματα  $\frac{8}{15}, \frac{18}{25}$  καὶ σχηματίσω-

μεν τὸ κλάσμα  $\frac{72}{5}$ , εὐρίσκομεν  $\frac{72}{5} : \frac{8}{15} = 27$  καὶ

$$\frac{72}{5} : \frac{18}{25} = 20. \quad \text{Γενίκευσις.}$$

382.) Ἡ διαφορὰ δύο περιοδικῶν ἀπλῶν εἶναι ἀπλοῦν περιοδικὸν κλάσμα. (§ 207)

383.) Ποῖους παρονομαστὰς δυνατὸν νὰ ἔχωσι κλάσματα ἀνάγωγα τρεπόμενα εἰς ἀπλᾶ περιοδικὰ μετὰ 4 ψηφία περιόδου ;

384.) Τὸ πηλίκον δύο ἀπλῶν περιοδικῶν κλασμάτων εἶναι πάντοτε ἀπλοῦν περιοδικόν ;

385.) Ἐὰν ἀνάγωγον κλάσμα μετὰ παρονομαστήν ἀριθμὸν πρῶτον πρὸς τὸν 11 παράγῃ περιοδικόν, ἐν ᾧ ἡ περίοδος ἔχει ἄρτιον πλήθος ψηφίων, τότε ἡ περίοδος αὕτη θὰ εἶναι ἀριθμὸς διαιρετὸς διὰ 11. (§ 207 § 204 § 84)

386.) Ἐὰν δύο ἀνάγωγα κλάσματα  $\frac{\alpha}{\beta}$  καὶ  $\frac{\gamma}{\delta}$  τρέπωνται εἰς περιοδικὰ μετὰ περιόδους ὧν τὰ ψηφία εἶναι ἀντιστοίχως  $\nu$  καὶ  $\nu'$ , τότε πᾶν ἀνάγωγον κλάσμα ἔχον ὡς παρονομαστήν τὸ  $\beta \cdot \delta$  θὰ παράγῃ περιοδικόν μετὰ ἀριθμὸν ψηφίων ἴσον πρὸς τὸ ε. κ. π. τῶν  $\nu$  καὶ  $\nu'$ , ἐὰν  $\beta$  καὶ  $\delta$  εἶναι πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους ἢ ἐὰν ὁ μ.κ.δ. εἶναι τῆς μορφῆς  $2^{\lambda} \times 5^{\mu}$ .

Ἔστω

$$\beta = 2^{\eta} \times 5^{\theta} \times \rho \quad \text{καὶ} \quad \delta = 2^{\eta'} \times 5^{\theta'} \times \rho'$$

ἔπου  $\rho, \rho'$  εἶναι πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους καὶ οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν διαιρεῖται διὰ 2 ἢ 5. Τότε (ἄσκ. 277)

$$10^{\nu} - 1 = \rho \cdot \pi \quad 10^{\nu'} - 1 = \rho' \cdot \pi'$$

ἔπομένως, ἐὰν  $N$  εἶναι τὸ τυχὸν κοινὸν πολλαπλάσιον τῶν  $\nu, \nu'$ , θὰ ἔχωμεν (§ 88)

$$10^N - 1 = \rho \Pi = \rho' \Pi'$$

ἔθεν καὶ (§ 117)

$$10^N - 1 = \rho \rho' \sigma$$

Ὅστε κλάσμα ἀνάγωγον μετὰ παρονομαστήν τὸν  $\rho \rho'$  θὰ τρέπηται εἰς περιοδικόν μετὰ περίοδον τῆς ὁποίας ὁ ἀριθμὸς τῶν ψηφίων δὲν ὑπερβαίνει τὸ τυχὸν κοινὸν πολλαπλ. τῶν  $\nu, \nu'$  (ἄσκ. 278)

εὐκόλως ἤδη ἐξάγεται ὅτι τὸ  $\frac{1}{\rho\rho'}$  τρέπεται εἰς περιδικὸν μὲ ψηφία περιόδου Ε τὸ πλῆθος, ὅπου  $E = \epsilon. \kappa. \pi. \tau\omega\nu \nu, \nu'$ .

387.) Ἐὰν δύο ἀνάγωγα κλάσματα  $\frac{\alpha}{\beta}$  καὶ  $\frac{\gamma}{\delta}$  τρέπωνται εἰς ἀπλᾶ περιδικά, ἔχοντα ἀντιστοίχως  $\nu$  καὶ  $\nu'$  ψηφία εἰς τὴν περίδον, τότε πᾶν ἀνάγωγον κλάσμα ἔχον παρονομαστήν τὸ  $\beta.\delta$  παράγει ἀπλοῦν περιδικόν· καὶ ἂν  $\beta$  καὶ  $\delta$  εἶναι πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους ὁ ἀριθμὸς τῶν ψηφίων τῆς περιόδου τοῦ τελευταίου τούτου κλάσματος εἶναι τὸ  $\epsilon.\kappa.\pi.$  τῶν ἀριθμῶν  $\nu$  καὶ  $\nu'$ . (Ἐσκ. 386)

388.) Ἐστω  $\alpha$  ἀριθμὸς τις πρῶτος πρὸς τὸν 7 ὡς ἐπίσης καὶ πρὸς τὸν 13. Ἐὰν  $\gamma$  καὶ  $\delta$  εἶναι οἱ ἀριθμοὶ οὔτινες ἰσοῦνται πρὸς τὰς περιόδους τὰς παραγομένας ἐκ τῶν κλασμάτων  $\frac{\alpha}{7}$  καὶ  $\frac{\alpha}{13}$ . θὰ ἔχωμεν

$$\frac{\delta}{\gamma} = \frac{7}{13}$$

τοῦτο εὐκόλως φαίνεται, ἀφοῦ παρατηρήσωμεν ὅτι ἡ μικροτέρα τιμὴ τοῦ  $\rho$  ἢ καθιστώσα τὸν  $10^p - 1$  διαιρετὸν διὰ τοῦ 7 ἢ 13 εἶναι ὁ 6. (Ἐσκ. 277 § 204)

389.) Ὁ ἀριθμὸς τῶν ψηφίων τῆς περιόδου ἀναγώγου κλάσματος ἔχοντος παρονομαστήν 7 καὶ ὡς ἀριθμητὴν ἀριθμὸν πρῶτον πρὸς τὸν 7 εἶναι ὁ 6. Νὰ δειχθῇ ὅτι τὰ ψηφία τῆς περιόδου θὰ εἶναι πάντοτε 1, 4, 2, 8, 5, 7 κατὰ τινὰ τάξιν τοποθετημένα.

Ἐφοῦ 7 εἶναι ὁ διαιρέτης (§ 202), ἔξ θὰ εἶναι τὰ δυνατὰ ὑπόλοιπα, οὐδὲν δ' ἐκ τούτων θὰ παραλειφθῇ ἐνταῦθα, διότι εἶναι 6 τὰ ψηφία τῆς περιόδου· ἐντεῦθεν εὐκόλως ἐξάγεται ἡ πρότασις:

390.) Ἐὰν τὸ κλάσμα  $\frac{1}{\beta}$  τρέπηται εἰς περιδικὸν οὔτινος ἡ περίδος ἔχει  $\beta - 1$  ψηφία, τὸ κλάσμα  $\frac{2}{\beta}$  θὰ τρέπηται εἰς περιδικὸν οὔτινος ἢ περίδος θὰ ἔχη τὰ αὐτὰ ψηφία ἀλλὰ τοποθετημένα οὕτως ὥστε, ἐὰν  $\pi.$  χ.τὸ ψηφίον τῶν δεκάτων τοῦ δευ-



τέρου περιοδικῷ συμπίπτῃ μὲ τὸ ψηφίον τῶν χιλιοστῶν τοῦ πρώτου, τότε τὸ ψηφίον τῶν ἑκατοστῶν τοῦ δευτέρου θὰ συμπίπτῃ μὲ τὸ ψηφίον τῶν δεκάκις χιλιοστῶν τοῦ πρώτου, τὸ ψηφίον τῶν χιλιοστῶν τοῦ δευτέρου μὲ τὸ ψηφίον τῶν ἑκατοντάκις χιλιοστῶν τοῦ πρώτου κ.ο.κ. Ἀνάλογος παρατήρησις διὰ τὸ  $\frac{\alpha}{\beta}$ , ἔὰν ὁ  $\alpha$  εἶναι πρῶτος πρὸς τὸν  $\beta$ . (§ 202)

391.) Πᾶς ἀριθμὸς περιττὸς μὴ λήγων εἰς 5 ἔχει πολλαπλασιασὸν τῆς μορφῆς  $111 \dots 1$ .

Ἐστω  $A$  τυχὼν περιττὸς μὴ διαιρετὸς διὰ 5· τότε τὸ κλάσμα  $\frac{1}{A}$  τρέπεται εἰς ἀπλοῦν περιοδικόν (§ 207). Ἐὰν  $v$  εἶναι ὁ ἀριθμὸς τῶν ψηφίων τῆς περιόδου, θὰ ἔχωμεν (§ 204)

$$\frac{1}{A} = \frac{\pi}{10^v - 1}$$

ἔπου  $\pi$  ἡ περίοδος. Θὰ ἔχωμεν δὲ προφανῶς καὶ (ἄσκ. 366)

$$\frac{1}{A} = \frac{\pi \cdot 10^{8v} + \pi \cdot 10^{7v} + \dots + \pi}{10^{9v} - 1} = \frac{\pi \cdot (10^{8v} + 10^{7v} + \dots + 1)}{10^{9v} - 1}$$

$$\text{ἔθεν} \quad 10^{9v} - 1 = A \cdot \pi \cdot (10^{8v} + 10^{7v} + \dots + 1)$$

Παρατηροῦμεν ἤδη ὅτι ὁ  $(10^{8v} + 10^{7v} + \dots + 1)$  διαιρεῖται διὰ τοῦ 9 (§ 83)· ἔθεν εὐκόλως ἐξάγεται ἡ πρότασις

392.) Θεωρήσωμεν δύο κοινὰ ἀνάγωγα κλάσματα τρεπόμενα εἰς ἀπλᾶ περιοδικὰ καὶ ἔχοντα ἄθροισμα τὴν μονάδα. Ἐὰν  $v$  εἶναι ὁ ἀριθμὸς ὁ δεικνύων τὸ πλῆθος τῶν ψηφίων τῆς περιόδου τοῦ περιοδικοῦ τοῦ παραγομένου ἐκ τοῦ ἐνὸς τῶν δοθέντων κλασμάτων, τότε αἱ δύο περίοδοι τῶν περιοδικῶν τῶν ἰσοδυνάμων πρὸς τὰ δύο δοθέντα κλάσματα ἔχουσι ἄθροισμα ἴσον πρὸς τὸν  $10^v - 1$ .

Τὰ κλάσματα  $\frac{2}{7}$  καὶ  $\frac{5}{7}$  ἔχουσι ἄθροισμα τὴν μονάδα καὶ

τρέπονται εἰς ἀπλᾶ περιοδικὰ μὲ 6 ψηφία περιόδου ἕκαστον· ἐὰν προσθέσωμεν τὰς δύο περιόδους, θὰ εὕρωμεν  $10^6 - 1$  ὡς ἄθροισμα, διότι (ἄσκ. 278)

$$\frac{2}{7} = \frac{\alpha}{10^6 - 1} \qquad \frac{5}{7} = \frac{\beta}{10^6 - 1}$$

393.) Τὸ κλάσμα  $\frac{\alpha^2 + 2}{\alpha(\alpha^2 - 1)}$  διὰ ποίας ἀκεραίας τιμᾶς τοῦ

$\alpha$  παράγει μικτὸν περιοδικόν;

394.) Πόσα κλάσματα ἀνάγωγα μικρότερα τῆς μονάδος μὲ παρονομαστήν μικρότερον τοῦ 25 τρέπονται εἰς μικτὰ περιοδικὰ μὲ ἓν ψηφίον μὴ περιοδικόν καὶ δύο περιοδικά;

## ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄.

## ΠΕΡΙ ΜΕΤΡΩΝ, ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ

## Μονάδες μήκους.

231. — Ἀρχικὴν μονάδα μήκους μὲ δεκαδικὴν ὑποδιαίρεσιν μεταχειρίζομεθα καὶ ἐν Ἑλλάδι τὸ γαλλικὸν μέτρον, ὅπερ ἐκλήθη καὶ βασιλικὸς πῆχυς.

Τοῦτο εἶναι περίπου τὸ  $\frac{1}{10000000}$  τοῦ τετάρτου τῆς περιφερείας τοῦ μεσημβρινοῦ τῆς γῆς.

Ὑποδιαίρέσεις τοῦ μέτρου εἶναι αἱ ἑξῆς :

ἢ παλάμη  $= \frac{1}{10}$  τοῦ μέτρου,

ἢ δάκτυλος  $= \frac{1}{10}$  τῆς παλάμης,

ἢ γραμμὴ  $= \frac{1}{10}$  τοῦ δακτύλου.

Πολλαπλάσια δὲ τοῦ μέτρου εἶναι τὸ δεκάμετρον  $= 10$  μέτρα, τὸ ἑκατόμετρον  $= 100$  μέτρα, τὸ χιλιόμετρον ἢ στάδιον  $= 1000$  μέτρα, τὸ μυριάμετρον  $= 10000$  μέτρα.

Τὰ πλεονεκτήματα τῶν μονάδων τούτων εἶναι προφανῆ· οἱ ἀριθμοὶ δι' ὧν παρίστανται ποσὰ μεμετρημένα διὰ τῶν τοιούτων μονάδων ὑπάγονται εἰς τοὺς κανόνας τῆς ἀριθμῆσεως κατὰ τὸ δεκαδικὸν σύστημα. Οὕτως, ἐπὶ παραδείγματι, ὁ ἀριθμὸς 7,236<sup>μ</sup> δύναται ν' ἀντικαταστήσῃ τὸν ἀριθμὸν 7 μ. 236 γραμ. ἢ 7<sup>μ</sup>. 2<sup>παλ.</sup> 3<sup>δάκτ.</sup> 6<sup>γε</sup>.

Ἐπίσης ὁ ἀριθμὸς 9<sup>μ</sup>. 4<sup>παλ.</sup> γράφεται 9<sup>μ</sup>, 4

Ἄρχικαὶ μονάδες ἄνευ δεκαδικῆς ὑποδιαίρεσεως εἶναι·

Ὁ τεκτονικὸς πῆχυς ἴσος πρὸς τὰ  $\frac{3}{4}$  τοῦ μέτρου, ἤτοι πρὸς 0,75μ.

Ὁ μικρὸς πῆχυς τῆς Κων/πόλεως ἴσος πρὸς 0,648 τοῦ μέτρου· οὗτος ὑποδιαίρεται εἰς 8 ρούπια.

Ἐν Ἀγγλίᾳ ἡ ὑάρδα ἴση πρὸς 0,914 τοῦ μέτρου· αὕτη διαίρεται εἰς 3 πόδας, ἕκαστος δὲ ποὺς εἰς 12 δακτύλους· ὥστε

$$1 \text{ ὑάρ.} = 0,914 \mu.$$

$$1 \text{ π.} = 0,3046 \mu.$$

$$1 \text{ δ.} = 0,0254 \mu.$$

Ἐν Ρωσίᾳ τὸ ἄρσιν ἴσον πρὸς 0,7112μ.· πολλαπλάσιον τοῦ ἄρσιν εἶναι τὸ βέρστιον ἴσον πρὸς 1500 ἄρσιν.

$$\text{Τὸ ναυτικὸν μίλλιον} = 1852,2 \mu.$$

$$\text{Τὸ ἀγγλικὸν μίλλιον} = 1760 \text{ ὑάρδ.}$$

### Ἄσκήσεις.

395.) Νὰ τραπῶσιν 75 πήχεις Κωνσταντινουπόλεως εἰς παλάμας.

396.) Νὰ τραπῶσιν 100 βέρστια εἰς χιλιόμετρα.

397.) Νὰ τραπῶσι 15 μέτρα εἰς πήχεις Κων/πόλεως.

398.) Νὰ τραπῶσιν 7 χιλιόμετρα εἰς βέρστια.

399.) 55 πήχεις Κων/πόλεως πόσοι τεκτονικοὶ πήχεις εἶναι;

400.) Χίλια ναυτικὰ μίλια μὲ πόσα χιλιόμετρα ἰσοδυναμοῦσι;

401.) 1500 βέρστια νὰ τραπῶσι α΄) εἰς ναυτικὰ μίλλια, β΄) εἰς ἀγγλικά.

402.) 760 ἀγγλικά μίλλια πόσα βέρστια εἶναι;

### Μονάδες ἐπιφανείας.

232. — Ὡς μονάδες ἐπιφανείας λαμβάνονται τετράγωνα.

Ἄρχικὴ μονάς. Τὸ τετραγωνικὸν μέτρον· ἤτοι τετράγωνον μὲ πλευρὰν ἑνὸς μέτρου.

Ἐποδιαίρεσεις τοῦ τετραγωνικοῦ μέτρου εἶναι·

$$1 \text{ τετρ. παλάμη} = \frac{1}{100} \text{ τετρ. μ.}$$

$$1 \text{ τετρ. δάκτυλος} = \frac{1}{100} \text{ τετρ. παλ.}$$

Πολλαπλάσια δὲ τοῦ τετρ. μέτρου εἶναι·

τὸ τετρ. δεκάμετρον ἢ ἄρ (are) = 100 τ. μ. (τετράγωνον πλευρᾶς 10 μέτρων)

1 τετρ. εκατόμμετρον ἢ ἐκτάριον (hectare) = 10000 τ. μ.

Παρ' ἡμῖν ἐν χρήσει διὰ τὰς ἀγροτικὰς μετρήσεις εἶναι τὸ βασιλικὸν στρέμμα = 1000 τ. μ. καὶ τὸ παλαιὸν στρέμμα = 1270 τ. μ.

Διὰ τὰ οἰκόπεδα ἔχομεν τὸν τεκτονικὸν τετραγ. πῆχυν, ἧτοι τετράγωνον οὗ ἡ πλευρὰ εἶναι εἰς τεκτονικὰς πῆχους· ὅθεν

$$1 \text{ τετρ. τεκτ. πῆχ.} = \frac{9}{16} \text{ τ. μ.}$$

### Ἐσκήσεις.

403.) Νὰ τραπῶσι 1732,4550 τετρ. μέτρα εἰς τετραγωνικοὺς τεκτονικοὺς πῆχεις.

404.) Ἐκτασις 94500 τετρ. χιλιομέτρων α') πόσα βασιλικὰ στρέμματα εἶναι ; β') πόσα ἐκτάρια εἶναι ;

405.) 16,920 τετρ. τεκτονικοὶ πῆχεις πόσα ἄρ εἶναι ;

406.) Ἄγρὸς ἐκτάσεως 2 βασιλικῶν στρεμμάτων πρόκειται νὰ πωληθῆ ὡς οἰκόπεδον. Πόσοι τεκτονικοὶ πῆχεις εἶναι ;

### Μονάδες ὄγκου ἢ χωρητικότητος.

233. — Αἱ μονάδες ὄγκου εἶναι κύβοι.

Ἀρχικὴ μονάς. 1 κυβικὸν μέτρον, ἧτοι κύβος μὲ πλευρὰν ἐνὸς μέτρου.

Ἐποδιαίρεσεις τοῦ κ. μ. εἶναι·

$$1 \text{ κυβ. παλάμη} = \frac{1}{1000} \text{ κ. μ.}$$

$$1 \text{ κυβ. δάκτυλος} = \frac{1}{1000} \text{ κ. παλ.}$$

Ἡ κυβική παλάμη προκειμένου περι μετρήσεως ὑγρῶν λέγεται λίτρον. Παρ' ἡμῖν ὡς καὶ ἐν Τουρκίᾳ χρησιμοποιεῖται καὶ ἡ μετρικὴ ὀκά=1,28 λίτρ. Ἐπίσης δὲ (ἐν Ἐπτανήσῳ) καὶ τὸ γαλόγιον=4,543 λίτρ.

Τὸ ἑκατόλλιτρον ἐκλήθη παρ' ἡμῖν κοιλόν· χρησιμεύει ἰδίως διὰ τὴν μέτρησιν τῶν δημητριακῶν καρπῶν.

Διὰ τὴν αὐτὴν μέτρησιν παρ' ἡμῖν καὶ ἐν Τουρκίᾳ χρησιμοποιεῖται τὸ κοιλὸν Κων/πόλεως = 35,37 λίτρ.

Εἰς τὰς Ἡνωμένας Πολιτείας τὸ μπουσσελ=35,23 λίτρ.

Ἐν Ρωσίᾳ τὴν ψάθαν=2,18 ἑκατόλ.

Διὰ τὴν χωρητικότητα τῶν πλοίων λαμβάνεται ὡς μονὰς ὁ τόννος τῶν πλοίων=2,83 κ. μ.

### Ἀσκήσεις.

407.) Πλοῖόν τι ἔχει χωρητικότητα 4575 τόννων. Μὲ πόσα κυβικά μέτρα ἰσοδυναμεῖ ἡ χωρητικότης αὕτη;

408.) 20536 λίτρ. μὲ πόσα κοιλὰ Κων/πόλεως ἰσοδυναμοῦσι;

409.) Μὲ πόσα γαλόγια ἰσοδυναμεῖ ἐν κυβικῶν μέτρον;

410.) Μὲ πόσα γαλόγια ἰσοδυναμεῖ 1 ὀκά;

411.) Εἰς ἔμπορον ἐστάλησαν ἐξ Ἀμερικῆς 2673 μπουσσελ σίτου. Ἠγοράσθη δ' ὁ σίτος οὗτος ἀντὶ 23400 δραχμῶν. Ποία ἡ τιμὴ τῆς ἀγορᾶς ἐκάστου κοιλοῦ Κων/λεως;

### Μονάδες βάρους.

234.—Μονὰς βάρους εἶναι τὸ γραμμάριον (gramme). Καλεῖται οὕτω τὸ βᾶρος ὕδατος ἀπεσταγμένου θερμοκρασίας 4° Κελσίου τὸ ὅποιον χωρεῖ εἰς ἕνα κυβικὸν δάκτυλον. Πολλαπλασία αὐτοῦ εἶναι :

Τὸ χιλιόγραμμα ((kilogramme))=1000 γραμμάρια.

Ὁ τόννος=1000 χιλιόγραμμα.

Ἐν Τουρκίᾳ ὡς καὶ παρ' ἡμῖν μονάδες βάρους ἐν χρήσει εἶναι :

Ἡ ὀκά=400 δράμια.

Ὁ στατήρ=44 δκάδες.

Ἡ δκά ἰσοῦται πρὸς 1282 γραμμάρια. Ὅθεν τὸ χιλιόγραμμον εἶναι 312 δράμια. Παρατηρητέον ὅτι ἐν χιλιόγραμμον ἰσοῦται πρὸς τὸ βάρος τοῦ ἀπεσταγμένου ὕδατος 4<sup>ο</sup> Κ. τὸ περιεχόμενον εἰς μίαν κυβικήν παλάμην.

Ἐν Ἀγγλίᾳ ἀρχικὴ μονὰς εἶναι ἡ ἀγγλικὴ λίτρα=453,6 γρ. χρησιμοποιουμένη καὶ παρ' ἡμῶν ἐν Ἑπτανήσῳ.

Διὰ τὴν μέτρησιν τῶν φαρμάκων χρησιμεύει παρ' ἡμῶν ἡ φαρμακευτικὴ λίτρα (112,5 δράμια)=12 οὔγκιας· 1 οὔγκια=8 δραχμαί· 1 δραχμὴ=20 κόκκοις.

Διὰ τὴν μέτρησιν τῆς σταφίδος ἐν Πελοποννήσῳ χρησιμοποιεῖται ἡ ἐνετικὴ λίτρα=150 δράμ. τὸ χιλιόλιτρον=1000 ἐν. λίτρ.

### Ἀσκήσεις.

412.) 75 ἀγγλικαὶ λίτραι μὲ πόσας δκάδας ἰσοδυναμοῦν;

413.) 35,5 δράμια μὲ πόσα γραμμάρια ἰσοδυναμοῦν;

414.) Ὅπωροπώλης τις εἶχε 56000 δκ γεωμήλων· ἐκτούτων τὸ ἥμισυ ἐπώλησε μὲ τὸ κοιλὸν Κων/πόλεως, τὸ δὲ ἕτερον ἥμισυ πρὸς 0,60 δρχ. τὴν δκάν. Τὸ βάρος ἐνὸς κοιλοῦ γεωμήλων ἦτο τὸ αὐτὸ μὲ τὸ βάρος ἐνὸς κοιλοῦ ὕδατος. Ὅτε δ' ἐπώλει μὲ τὸ κοιλὸν ὠφελεῖτο 1,50 δρχ. κατὰ κοιλόν. Πόσον ὠφελήθη ἐν δλω ἀπὸ τὰ κοιλά καὶ πόσον εἰσέπραξεν ἐκ τῆς πωλήσεως;

### Μονάδες νομισμάτων.

235. — Ἡ Ἑλλάς, ἡ Γαλλία, ἡ Ἰταλία, ἡ Ἑλβετία καὶ τὸ Βέλγιον διὰ συμβάσεως παρεδέχθησαν ὡς ἀρχικὴν μονάδα νομισμάτων τὸ φράγκον· τοῦτο ἐν Ἑλλάδι καλεῖται καὶ δραχμὴ καὶ ἐν Ἰταλίᾳ λίρα. Τὸ ἑκατοστὸν τῆς δραχμῆς καλεῖται λεπτόν. Ὡς ἀρχικὴν μονάδα παρεδέχθησαν τὸ φράγκον καὶ ἄλλα κράτη.

Παρ' ἡμῶν κυκλοφοροῦσι νομίσματα χρυσοῦ, ἀργυροῦ, νικέλινα καὶ χάλκινα.

Ἄργυρᾶ ἔχομεν τὸ μονόδραχμον, δίδραχμον, πεντάδραχμον, πεντηκοντάλεπτον, εἰκοσάλεπτον.

Νικέλινα· τὸ πεντάλεπτον, δεκάλεπτον, εἰκοσάλεπτον.

Χαλκᾶ τὸ πεντάλεπτον, δεκάλεπτον καὶ εἰς μερικὰ μέρη τῆς Ἑλλάδος καὶ τὸ μονόλεπτον καὶ τὸ δίλεπτον.

Τὰ ἀργυρᾶ τῶν 2 φρ., 1 φρ., 50 λεπτ. καὶ 20 λεπτῶν ἔχουσι βαθμὸν καθαρότητος (τίτλον) 0,835, ἤτοι 0,835 τοῦ ἔλου εἶναι καθαρὸς ἄργυρος, τὰ δὲ λοιπὰ εἶναι χαλκός.

Τὰ δὲ λοιπὰ ἀργυρᾶ ὡς καὶ τὰ χρυσᾶ ἔχουσι βαθμὸν καθαρότητος 0,900· ἤτοι τὰ 0,900 εἶναι καθαρὸς ἄργυρος ἢ χρυσοῦς, τὰ δὲ λοιπὰ χαλκός.

Προσέτι ἔχομεν καὶ χαρτονομίσματα τῶν 5, 10, 25, 100, 500, 1000 δραχμῶν.

Ἐν Ἀγγλίᾳ ἀρχικὴ μονὰς εἶναι ἡ λίρα στερλίνα.

1 λίρα στερλίνα = 20 σελλίνα. 1 σελλίσιον = 12 πένναι.

1 πέννα = 4 φαρδ. (1 λίρ. = 25 φρ.)

Ἐν Ρωσίᾳ εἶναι τὸ ρούβλιον·

1 ρούβλιον = 100 καπίκια. (1 ρούβλιον = 2 φρ., 67).

Ἐν Τουρκίᾳ τὸ γρόσιον = 40 παράδες· ἡ λίρα = 100 γρόσ. (1 λίρα = 22 φρ., 78.)

Ἐν Γερμανίᾳ τὸ μάρκον = 100 πφένιγ· (1 μάρκον = 1,23 φρ.)

Ἐν Αὐστρουγγαρίᾳ ἡ κορώνα = 100 χέλλερ·

(1 κορώνα = 1,05 φρ.)

Ἐν Ἠνωμέναις Πολιτείαις τὸ δολλάριον = 100 σέντς·

(1 δολλάριον = 5,18 φρ.)

### Ἀσκήσεις.

Ἐπὶ τῇ βάσει τῶν ἀνωτέρω τιμῶν νὰ ὑπολογίσωμεν:

415.) Πόσας ἀγγλικὰς λίρας δυνάμεθα ν' ἀγορίσωμεν μὲ 1525 εἰκοσάφραγκα;

416.) Πόσα φράγκα κάμνουσιν αἱ 755 Τουρκικαὶ λίραι, πόσα τὰ 535,50 μάρκα, πόσα αἱ 1673,4 κορώναι, πόσα τὰ 78,35 δολλάρια καὶ πόσα τὰ 937,75 ρούβλια;



- 417.) Ἡ πέννα τί μέρος τοῦ φράγκου εἶναι ;  
 418.) Μὲ πόσας λίρας στερλίνας ἰσοδυναμοῦσιν 87 500 πα-  
 ράδες ;  
 419.) 763 ρούβλια πόσα μάρκα καὶ πφένιγ εἶναι ;  
 420.) 1000 δολλάρια πόσαι στερλίται εἶναι ;  
 421.) 1 γρόσιον πόσα πφένιγ, πόσα χέλλερ καὶ πόσα σέντς  
 ἔχει ;

**Ἀσκήσεις ἐν γένει ἐπὶ τῶν μέτρων σταθμῶν  
καὶ νομισμάτων.**

422.) Ἐπωλήθη σταφίς πρὸς 17 λίρας τὸ χιλιόλιτρον, πρὸς  
 πόσας δραχ. ἐπωλήθη τὸ χιλιόγραμ., ἐὰν 1 λίρ. = 25,30 δραχ. ;

423.) Ἡ ὀκᾶ τοῦ πετρελαίου τιμᾶται 1,40 δραχ., ἐνῶ τὸ 1 κυβ.  
 μέτρον τοῦ ἀεριοφωτος θ, <sup>de</sup> 26. Μὲ τὸν φωτισμὸν διὰ <sup>π</sup>πετρελαίου  
 ἐξοδεύει τις 1 ὀκᾶν ἐξ αὐτοῦ εἰς 3 ἡμέρας, ἐνῶ μὲ τὸν δι'  
 ἀεριοφωτος φωτισμὸν θὰ ἐχρειάζετο 1,250 κ. μ. δι' ἐκάστην  
 ἡμέραν· θὰ ἐπλήρωνε δὲ προσέτι. δι' ἐνοίκιον ὠρολογίου κατὰ  
 μῆνα 1,50 δρ. Ποῖος ἐκ τῶν δύο φωτισμῶν εἶναι εὐθηνότερος  
 καὶ κατὰ πόσον ;

424.) Ἀφῆκέ τις διὰ διαθήκης εἰς τοὺς 2 υἱοὺς του  
 37950 δραχμὰς καὶ τινὰ οἰκόπεδα· κατ' ἐπιθυμίαν του θὰ ἐμοι-  
 ράζοντο ἐξ ἴσου τὴν κληρονομίαν οἱ δύο κληρονόμοι· ἐκ τῶν  
 οἰκοπέδων ἄλλα ἐτιμῶντο πρὸς 12 δρ. τὸν τεκτ. τετραγ. πῆχυν  
 καὶ ἄλλα ἐτιμῶντο πρὸς 19 δρχ. τὸ τετραγωνικὸν μέτρον, ἡ δ'  
 ἕκτασις τῶν δευτέρων ἦτο δεκαπλασία τῆς ἐκτάσεως τῶν πρώτων.  
 Ὁ δεύτερος υἱὸς ἔλαβε μόνον τὰ δεύτερα οἰκόπεδα ὡς μερι-  
 δίων του. Ποία ἦ ἕκτασις τῶτων ;

425.) Δοχεῖον πλήρες ἐλαίου ζυγίζει 11 ὀκάδας. Πόση ἡ  
 χωρητικότης τοῦ δοχείου δεδομένου ὅτι μία κυβικὴ παλάμη ἐλαίου  
 ζυγίζει 0,912 χιλιόγραμμα.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄.

## ΣΥΜΜΙΓΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠ' ΑΥΤΩΝ

236. — Λέγοντες ὅτι ὑφασμά τι ἔχει μῆκος 7 πήχ. 3 ρουπ. μεταχειριζόμεθα ἀριθμὸν συμμιγῆ, ὅπως ἐπίσης συμμιγῆς εἶναι καὶ ὁ ἀριθμὸς 12<sup>στ.</sup> 17<sup>όν.</sup> 300<sup>δε.</sup> ὁμοίως οἱ ἀριθμοὶ

$$3^{\text{λιε}} 7^{\text{σελ.}} 2^{\text{πέν.}} 3^{\text{φασδ.}}, \quad 4^{\text{ύασδ.}} 2^{\text{ποδ.}} 9^{\text{δακ}}$$

εἶναι συμμιγεῖς καὶ γενικῶς.

Συμμιγῆς ἀριθμὸς καλεῖται πᾶς ἀριθμὸς συγκείμενος ἐξ ἄλλων τῶν ὁποίων αἱ μονάδες ἴδιον ὄνομα ἔχουσαι εἶναι πολλαπλάσια ἢ ὑποπολλαπλάσια μιᾶς ἀρχικῆς μονάδος.

## Μονάδες χρόνου.

237. Ἀρχικὴ μονάς εἶναι ἡ ἡμέρα ἴση πρὸς 24 ὥρας.

1 ὥρα = 60 πρῶτα λεπτά. 1 πρῶτ. λεπτὸν = 60 δεύτερα λεπτά.

Τὸ ἔτος = 365 ἡμέραι. Τὸ βίσεκτον ἔτος = 366 ἡμέραι.

1 ἔτος = 12 μῆνες.

Μετροῦντες τὸν χρόνον μὲ τὰς μονάδας αὐτὰς λαμβάνομεν ἀριθμὸν συμμιγῆ· π. χ.

$$3^{\text{ἔτη}} 4^{\text{μ.}} 8^{\text{ἡμ.}} 4^{\text{ῶε.}}, \quad 14^{\text{ἡμ.}} 9^{\text{ῶε.}} 35^{\text{π.}} 18^{\text{δ.}}$$

## Διαίρεσις τῆς περιφέρειας.

238. — Ἡ περιφέρεια κύκλου διαιρεῖται εἰς 360 ἴσα μέρη, ὧν ἕκαστον λέγεται μοῖρα.

1 μοῖρα = 60 πρῶτα λεπτά, 1 πρῶτον λεπτὸν = 60 δεύτ. λεπτ.

Καὶ ἐνταῦθα ὁ προκύπτων ἀριθμὸς ἐκ τῆς μετρήσεως διὰ τῶν ἄνω μονάδων εἶναι ἀριθμὸς συμμιγῆς· π. χ. 53 μοῖραι 5 πρῶτα λ. 8 δεύτ. λ., ὅστις σημειοῦται ὡς ἐξῆς :

$$53^{\circ} \quad 5' \quad 8''$$

Παρατήρησις. — Τὸ 1' τῆς περιφέρειας τοῦ μεσημβρινοῦ τῆς γῆς ἰσοῦται μὲ τὸ ναυτικὸν μίλλιον (§ 231)

## Τροπή συμμιγοῦς εἰς ἀπλοῦν.

239. — Νὰ τραπῆ εἰς δεύτερα λεπτά δ συμμιγῆς  
6 ὥρ. 24π. 38δ. Ἔχομεν

$$6\omega\rho. = (6 \times 60)\pi = 360\pi.$$

προσθέτοντες καὶ τὰ 24π. ἔχομεν

$$384\pi. = (384 \times 60)\delta = 23040\delta.$$

προσθέτομεν καὶ τὰ 38δ. ἔχομεν ἐν δλω 23078δ.

## Διάταξις τῆς πράξεως

$$\begin{array}{r} 6 \omega\rho. \quad 24 \pi. \quad 38 \delta. \\ 60 \\ \hline 360 \\ 24 \\ \hline 384 \\ 60 \\ \hline 23040 \\ 38 \\ \hline 23078 \end{array}$$

Ἐὰν θέλωμεν νὰ τρέψωμεν τὸν αὐτὸν συμμιγῆ εἰς πρώτα  
λεπτά, ἀρκεῖ νὰ παρατηρήσωμεν ὅτι  $1\delta. = \frac{1\pi}{60}$  ἑπομένως

$$6 \omega\rho. \quad 24 \pi. \quad 38 \delta. = 384 \pi. \frac{38}{60}$$

Ἐὰν δὲ θέλωμεν εἰς ὥρας, παρατηροῦμεν ὅτι, ἐπειδὴ

$$1\delta. = \frac{1}{3600} \omega\rho.$$

$$\tau\acute{\alpha} \ 24\pi. \quad 38\delta. = 1478\delta. = \frac{1478 \omega\rho.}{3600} \quad \delta\theta\epsilon\nu$$

$$6\omega\rho. \quad 24\pi. \quad 38\delta. = 6 \frac{\omega\rho. \ 1478}{3600} \quad \text{Ἦτοι}$$

Ἵνα τρέψωμεν συμμιγῆ εἰς ἀριθμὸν ὀρισμένης μονάδος, τρέπομεν τὰ μέρη ὧν αἱ μονάδες εἶναι μεγαλύτεραι τῆς ὀρισθείσης εἰς μονάδας τῆς τάξεως ταύτης, τὰ δὲ μέρη ὧν αἱ μονάδες εἶναι μικρότεροι τρέπομεν εἰς μονάδας τῆς τελευταίας τάξεως τῶν ὁποίων τὸν ἀριθμὸν θέτομεν ὡς ἀριθμητὴν κλάσματος, ἔχοντος παρονομαστὴν τὸν ἀριθμὸν ὅστις δεικνύει πόσαι μονάδας τῆς τελευταίας τάξεως ἀποτελοῦσι τὴν ὀρισθεῖσαν μονάδα.

### Τροπὴ ἀπλοῦ εἰς συμμιγῆ.

240. — Νὰ τραπῶσι 253δκ.  $\frac{5}{9}$  εἰς συμμιγῆ.

Ἐξάγομεν ἀπὸ τὰς ὀκάδας τοὺς στατήρας διαιροῦντες διὰ 44. Λαμβάνομεν 5στ. 33δκ. Τὰ  $\frac{5}{9}$  τῆς ὀκάς τρέπομεν εἰς δράμια. Πολλαπλασιάζομεν τὸν ἀριθμητὴν ἐπὶ 400 καὶ διαιροῦντες διὰ τοῦ 9 ἔχομεν

$$\frac{5}{9} \delta\kappa. = 222 \delta\rho. \frac{2}{9}$$

ἄρα ὁ δοθεὶς συμμιγῆς εἶναι 5στ. 33δκ. 222  $\frac{2}{9}$  δρ.

### Διάταξις τῆς πράξεως.

253δκ.	44	5δράμ.	
	5στ.	400	
33δκ.		2000δρ.	9
		20	
		20	222 $\frac{2}{9}$ δρ.
		2	

### Ἀσκήσεις.

426.) Νὰ τραπῶσιν εἰς μονάδας τῆς τελευταίας αὐτῶν τάξεως οἱ ἐπόμενοι συμμιγεῖς:

10πήχ. 4ρ., 1λίρ. 8σελ. 5πέν. 2φαρδ.

5στ. 28δκ. 305δρ.

1φαρμ. λίτρ. 2 δραχμ. 10κκ.,

10ήμ. 7ώρ. 15π. 20δ.

427.) 5δάρδ. 2πόδ. 4δάκτ. νὰ τραπῶσιν εἰς κλάσμα ὑάρδας

4ήμ. 4ώρ. 30π. 20δ. » » » ὥρων

7στ. 250δρ. » » » στατ.

3λίτρ. 4πέν. 2φαρ. εἰς σελλίνια καὶ μέρος σελλινίου

8σελ. 3πέν. 1φαρδ. εἰς δεκαδικόν.

428.) Πόσαι μοῖραι, πρῶτα λεπτά καὶ δεύτερα περιέχονται εἰς τὰ 24325'', εἰς τὰ 238537'';

429.) Πόσαι ἡμέραι, ὥραι, πρῶτα καὶ δεύτερα λεπτά περιέχονται εἰς τὰ  $\frac{9}{11}$  τοῦ ἔτους;

### Πρόσθεσις καὶ ἀφαίρεσις.

241. — Ὅταν προσθέτωμεν δεκαδικούς, ἔχομεν ὑπ' ὄψει 8τι 10 μονάδες μιᾶς τάξεως ἀποτελοῦν μίαν μονάδα τῆς ἀμέσως ἀνωτέρας τάξεως· ὅταν προσθέτωμεν συμμιγεῖς, πρέπει νὰ ἔχωμεν ἐκάστοτε ὑπ' ὄψει τὴν σχέσιν τῶν διαφόρων ὑποδιαίρέσεων τῆς ἀρχικῆς μονάδος πρὸς ἀλλήλας.

Π.χ. ἔστωσαν πρὸς πρόσθεσιν οἱ συμμιγεῖς

4λίτρ. 7σελ. 11πέν. 3 φαρ.

2 17  $2\frac{2}{5}$

4 9 1

προφανῶς τὸ ἄθροισμα εἶναι 7 λίτρ. 9 σελ. 9πέν.  $2\frac{2}{5}$

Ἔστωσαν ἤδη πρὸς ἀφαίρεσιν οἱ συμμιγεῖς

14 πήχ.  $2\frac{1}{4}$  ρούπ.

9  $5\frac{3}{4}$  ρούπ.

4 πήχ.  $4\frac{1}{2}$  ρούπ.

430.) Νὰ ἐκτελεσθῶσιν αἱ προσθέσεις :

$$\alpha') 27^{\circ} 30' 47'' + 35^{\circ} 12' 25'' + 47^{\circ} 48' 27''$$

$$\beta') 15^{\text{ύαρεδ.}} 2^{\text{πόδ.}} 7^{\text{δ.}} + 4^{\text{ύαρεδ.}} 1^{\text{π.}} 9^{\text{δ.}}$$

$$\gamma') 5^{\text{λίε}} 15^{\text{σελ.}} 7^{\text{ύαρεδ.}} + 3, 24^{\text{λίε}} + \frac{5^{\text{λίε.}}}{8}$$

431.) Νὰ ἐκτελεσθῶσιν αἱ ἐξῆς ἀφαιρέσεις:

$$\alpha') 12^{\text{στ.}} 4^{\text{ὸκ.}} 200^{\text{δε.}} - 5^{\text{στ.}} 18^{\text{οκ.}} 350^{\text{δε.}}$$

$$\beta') 25^{\text{ήμ.}} 10^{\text{ὠε.}} 45^{\text{π.}} 20 \frac{1^{\text{δ.}}}{4} - 7^{\text{ή.}} 50^{\text{π.}} 54^{\text{δ.}}$$

432.) Δοχείον κενὸν ζυγίζει 12 ὀκάδας 150 δρμ. πλήρες δ' ἐλαίου ζυγίζει 3<sup>στ.</sup> 4<sup>οκ.</sup> 200<sup>δε.</sup> Ποῖον τὸ βᾶρος τοῦ ἐλαίου;

433.) Ἔχομεν τρία τεμάχια ἐξ ἑνὸς ὑφάσματος

τὸ α' εἶναι 19<sup>πῆχ.</sup> 5<sup>ροῦπ.</sup> τὸ β' 3<sup>ύαε</sup> 2<sup>πόδ</sup> 6<sup>δάκ.</sup>

καὶ τὸ γ' 5<sup>μέτ.</sup> 7<sup>παλ.</sup> 2<sup>δάκ.</sup>

Πόσων μέτρων εἶναι τὸ μῆκος τῶν τριῶν ὁμοῦ τεμαχίων;

434.) Ἡ ἄλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὑπὸ τῶν Τούρκων ἐγένετο τῇ 29 Μαΐου 1453. Πόσος χρόνος παρήλθε μέχρι τῆς ἀπελευθερώσεως τῆς Θεσσαλονίκης ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων;

#### ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΙΣ

242.—α·) Πολλαπλασιασμὸς συμμιγοῦς ἐπὶ ἀκέραιον.

Πρόβλημα. Εἰς σάκκος καφὲ στοιχίζει 4λίρ. 4σελ. 8πέν. 3φ· πόσον στοιχίζουν 11 σάκκοι ἐκ τοῦ ἰδίου καφῆ;

Ἡ ἀξία τῶν 11 σάκκων θὰ εἶναι προφανῶς

$$(4^{\text{λ.}} 7^{\text{σελ.}} 8^{\text{π.}} 3^{\text{φ.}}) \times 11$$

Ὁ πολλαπλασιαστέος δύναται νὰ θεωρηθῆ ὡς ἄθροισμα καὶ πολλαπλασιάζομεν ὡς ἐξῆς:

	4 <sup>λίε.</sup>	7 <sup>σελ.</sup>	8 <sup>πέν.</sup>	3 <sup>φαρ.</sup>
				11
(§ 241)	48	5	0	1

3θεν·

Ἴνα πολλαπλασιάσωμεν συμμιγῆ ἐπὶ ἀκέραιον, πολλαπλα-



ἀκέραιον μέρος τοῦ πηλίκου τούτου συμπέπτει μὲ τὸν ἀριθμὸν τῶν μοιρῶν εἰς τὸ πηλίκον τῆς προηγουμένης διαιρέσεως.

### Ἀσκήσεις.

435.) Δίδει τις εἰς ἕκαστον τῶν 4 ἐργατῶν του δι' ἐκάστην ὥραν ἐργασίας 70<sup>λ</sup>. Ἐξ αὐτῶν δ' α' εἰργάσθη 63<sup>ω</sup>. 35<sup>π</sup>. δ' β' 49<sup>ω</sup>. δ' γ' 47<sup>ω</sup>. 45<sup>π</sup>. καὶ δ' δ' 38<sup>ω</sup>. 25<sup>π</sup>. Πόσα ἐν ὄλφ θὰ λάβωσι καὶ οἱ τέσσαρες ἐργάται ;

436.) Ἐὰν μὲ 15 λίρας ἡγοράσαμεν 35 ὑάρδας, 2 πόδας καὶ 6 δακτύλους ὑφάσματος, πόσον θὰ ἡγοράζομεν μὲ μίαν λίραν;

437.) Εἰς μίαν ὥραν ὠρολόγιόν τι προχωρεῖ κατὰ 3<sup>π</sup>. 38<sup>δ</sup>. ἐκανονίσθη δὲ τὴν μεσημβριαν ἀκριβῶς. Ποίαν ὥραν θὰ δεικνύη κατὰ τὴν 9 π. μ. τῆς ἐπομένης;

### Πολλαπλασιασμὸς συμμιγοῦς ἐπὶ κλάσμα ἢ μεικτόν.

244.—Πρόβλημα. α') Ὁ πήχυς ὑφάσματός τινος τιμᾶται 2τάλ. 3δ. 40<sup>λ</sup>. πόσον τιμῶνται τὰ  $\frac{3}{4}$  τοῦ πήχεως ;

Λύσις. Κατὰ τὰ τεθέντα (§ 158) τὸ ζητούμενον ἰσοῦται πρὸς τὸ γινόμενον

$$(2\tau. 3\delta. 40\lambda.) \times \frac{3}{4}.$$

Ἄλλ' εὐρίσκομεν τὸ ζητούμενον καὶ ὡς ἐξῆς :

Ἄφοῦ 1 πήχυς τιμᾶται 2τ. 3δ. 40λ.

$$\tauὸ \frac{1}{4} \text{ πήχεως } \gg \frac{2\tau. 3\delta. 40\lambda.}{4}$$

$$\text{καὶ τὰ } \frac{3}{4} \gg \text{ τιμῶνται } \frac{2\tau. 3\delta. 40\lambda.}{4} \times 3$$

$$= \frac{(2\tau. 3\delta. 40\lambda.) \times 3}{4}$$



$$\begin{aligned} \text{ὥστε} \quad (2\tau. 3\delta. 40\lambda.) \times \frac{3}{4} &= \frac{(2\tau. 3\delta. 40\lambda.) \times 3}{4} \\ &= \frac{8\tau\alpha\lambda. 20\lambda.}{4} = 2\tau\alpha\lambda. 5\lambda. \end{aligned}$$

Ἄρα:

Συμμιγῆς πολλαπλασιάζεται ἐπὶ κλάσμα, εἰάν οὗτος πολλαπλασιασθῇ ἐπὶ τὸν ἀριθμητὴν τοῦ κλάσματος καὶ τὸ γινόμενον διαιρεθῇ διὰ τοῦ παρονομαστοῦ αὐτοῦ.

Πρόβλημα β' — Μηχανὴ ἐργοστασίου καίει καθ' ἑκάστην ὥραν 3στ. 20δκ. 150δρ. ἀνθράκων. Πόσους ἀνθρακας θὰ καύσῃ εἰς 10  $\frac{3}{4}$  ὥρ;

Λύσις. — Τὸ ζητούμενον ἰσοῦται (§ 158) πρὸς τὸ γινόμενον

$$(3\sigma\tau. 20\delta\kappa. 150\delta\rho.) \times 10 \frac{3}{4}$$

Τοῦτο δ' ἰσοῦται προφανῶς πρὸς

$$(3\sigma\tau. 20\delta\kappa. 150\delta\rho.) \times \frac{43}{4}$$

ἢ καὶ πρὸς

$$(3\sigma\tau. 20\delta\kappa. 150\delta\rho.) \times 10 + (5\sigma\tau. 20\delta\kappa. 150\delta\rho.) \times \frac{3}{4} \cdot \text{ἦτοι}$$

Πολλαπλασιάζομεν συμμιγῆ ἐπὶ μικτόν, καὶ εἰάν πολλαπλασιάσωμεν χωριστὰ ἐπὶ τὸν ἀκέραιον καὶ χωριστὰ ἐπὶ τὸ κλάσμα καὶ προσθέσωμεν τὰ δύο μερικὰ γινόμενα.

**Διαίρεσις συμμιγῶς διὰ κλάσματος ἢ μικτοῦ.**

245. Πρόβλημα. Τὰ  $\frac{2}{5}$  τεμαχίου ὑφάσματος εἶναι 4πλήχ. 6ρ.

Ποῖον τὸ μῆκος τοῦ ὅλου τεμαχίου ;

Λύσις. Ἄφοῦ τὰ  $\frac{2}{5}$  εἶναι 4πλήχ. 6ρ.

$$\text{τὸ } \frac{1}{5} \quad \gg \quad \frac{4\pi\lambda\eta\chi. 6\rho.}{2}$$

καὶ τὰ  $\frac{5}{5}$  εἶναι  $\frac{4\pi\lambda\eta\chi. 6\rho.}{2} \times 5 = (4\pi\lambda\eta\chi. 6\rho.) \times \frac{5}{2}$  (§158)

Καὶ ἐπειδὴ τὸ ζητούμενον μῆκος πολλαπλασιαζόμενον ἐπὶ  $\frac{2}{5}$  θὰ δίδῃ ὡς γινόμενον τὸν συμμιγῆ 4πῆχ. 6ροῦπ. θὰ ἔχωμεν

$$4\pi. 6\rho. : \frac{2}{5} = (4\pi. 6\rho.) \times \frac{5}{2} = 11\pi. 7\rho.$$

Πρόβλημα β΄.) Τὰ  $\frac{5}{8}$  τοῦ πήχεως ὑφάσματος τινος τιμῶνται 2τάλ. 3δρ. 40λ. Πόσον τιμᾶται ὁ πήχυς;

Ἡ ἀξία τοῦ πήχεως πρέπει πολλαπλασιαζομένη ἐπὶ τὸν ἀριθμὸν  $\frac{5}{8}$  νὰ δίδῃ 2τάλ. 3δρ. 40λ. ἄρα αὕτη εἶναι τὸ πηλίκον τῆς διαιρέσεως 2τάλ. 3δρ. 40λ. :  $\frac{5}{8}$  εὐρίσκομεν δὲ πάλιν ὅτι τοῦτο ἰσοῦται πρὸς

$$(2\text{τάλ. } 3\delta\rho. 40\lambda.) \times \frac{8}{5} = 4\text{τάλ. } 1\delta\rho. 40\lambda.$$

Εἰς τὸ πρῶτον ἐκ τῶν δύο ἀνωτέρω προβλημάτων διαιρέτης εἶναι ὁ ἀριθμὸς  $\frac{2}{5}$  καὶ εἰς τὸ δεύτερον ὁ ἐπίσης ἀφηρημένος ἀριθμὸς  $\frac{5}{8}$ .

Παρατηροῦμεν ὅτι δι' ἀμφοτέρα τὰ προβλήματα ταῦτα δυνάμεθα νὰ λέγωμεν ὅτι ἐδόθη τὸ γινόμενον καὶ ὁ πολλαπλασιαστής καὶ ζητεῖται ὁ πολλαπλασιαστέος· εἶναι προβλήματα μερισμοῦ.

Πρόβλημα. Ἐργάτης τις λαμβάνει καθ' ὥραν  $\frac{3}{4}$  δρ. πόσας ὥρας πρέπει νὰ ἐργασθῆ διὰ νὰ λάβῃ 20δρ. 30λ.;

Ζητεῖται ἐνταῦθα ἀριθμὸς ἐπὶ τὸν ὁποῖον πολλαπλασιαζόμενος ὁ  $\frac{3}{4}$  δραχ. νὰ δίδῃ τὸν 20 δρ. 30 λ. Ἐχομεν ἐνταῦθα πρόβλημα μετροῦσεως (§ 55).

Ὁ δὲ ἀφηρημένος ἀριθμὸς ὁ ἀντιστοιχῶν εἰς τὸ πηλίκον τὸ προκύπτον ἐκ τῆς μετροῦσεως ταύτης εἶναι προφανῶς

$$20 \frac{30}{100} : \frac{3}{4} = 20 \frac{30}{100} \times \frac{4}{3} = 27 \frac{2}{30}$$

ἔθεν τὸ ζητούμενον θὰ εἶναι  $27 \frac{2}{30}$  ὥρας = 27 π. 4δ.

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω λοιπὸν συμπεραίνομεν ὅτι

Ἵνα διαιρέσωμεν συμμιγῆ διὰ κλάσματος, πολλαπλασιάζομεν τὸν συμμιγῆ ἐπὶ τὸ κλάσμα ἀντεστραμμένον· ἐὰν ἡ διαίρεσις εἶναι μέτρησις τὸ εἶδος τοῦ πηλίκου προσδιορίζεται ὑπὸ τοῦ προβλήματος.

### Ἀσκήσεις.

438.) Ἐπὶ περιφερείας κύκλου τόξον  $21^{\circ} 2' 15''$  ἔχει μῆκος 1 μέτρου. Εἰς μῆκος ἴσον πρὸς τὸν τεκτονικὸν πῆχυν πόσαι μοῖραι ἀντιστοιχοῦσι;

439.) Μὲ μίαν λίραν ἀγοράζομεν 5 ὀκάδας καὶ 250 δράμ. καφέ μὲ  $10 \frac{2}{5}$  λίρας πόσους στατήρας, ὀκάδας καὶ δράμια θ' ἀγοράσωμεν;

440.) 25 ὀκάδες ἀνθράκων ἐπωλήθησαν ἀντὶ 24 γροσίων καὶ 20 παραδῶν· πόσα λίραι τουρκ. θὰ ἐχρειάζοντο δι' ἓνα στατήρα;

441.) Νὰ εὐρεθῶσι τὰ 0,35 τεμαχίου ὑφάσματος μήκους 9 πήχ. 6ρ.

442.) Ἐὰν 13 ὑάρδαι καὶ 2 πόδες ὑφάσματος τινος ἐπωλήθησαν ἀντὶ 9 λιρῶν, 15 σελλινίων καὶ 10 πεννῶν, πρὸς πόσον ἐπωλήθη ἡ ὑάρδα;

### Πολλαπλασιασμὸς συμμιγοῦς ἐπὶ συμμιγῆ.

246. — Πρόβλημα. — Ἡ ὑάρδα ὑφάσματος ἀξίζει 2σελ. 4πέν. πόσον ἀξίζουν 7 ὑάρ. 2πόδ. ἐξ αὐτοῦ;

Λύσις. Δι' ἐκάστην ὑάρδα πλερώνονται 2σελ. 4πέν.

διὰ τὰς 7 ὑάρδας » (2σελ. 4πέν.)  $\times 7$

δι' ἕκαστον πόδα =  $\frac{1}{3}$  ὑάρδ. »  $\frac{(2σελ. 4πέν.)}{3}$

διὰ τοὺς 2 πόδας πλερώνονται

$$\frac{2σελ. 4πέν.}{3} \times 2 = (2σελ. 4πέν.) \times \frac{2}{3}$$

(§ 159), ἤτοι τὸ ζητούμενον εἶναι ἴσον πρὸς τὸ γινόμενον

$$2\text{σελ. } 4\text{πέν.} \times 7\frac{2}{3} = 17\text{σελ. } 10\text{πέν. } 2\text{φάρδ. } \frac{2}{3}.$$

Ὡστε ὁ ἀφηρημένος ἀριθμὸς  $7\frac{2}{3}$  ὅστις δεικνύει ἀπὸ πόσας ὑάρδας καὶ μέρη ὑάρδας σχηματίζεται ὁ συμμιγῆς 7 ὑάρδ. 2πόδ. εἶναι καθαντὸ ὁ πολλαπλασιαστής.

Ἦτοι:

Ἴνα πολλαπλασιάσωμεν ἐπὶ συμμιγῆ, τρέπομεν αὐτὸν εἰς μονάδας τῆς τάξεως ἐκείνης τὴν ὁποίαν ὀρίζει τὸ πρόβλημα καὶ πολλαπλασιάζομεν ἐπὶ τὸν προκύψαντα μικτὸν ἢ κλάσμα.

### Διαίρεσις συμμιγοῦς διὰ συμμιγοῦς.

247 — Ὅπως εἰς τὴν δι' ἀκεραίου ἢ κλάσματος διαίρεσιν διακρίνομεν δύο εἶδη προβλημάτων, μερισμοῦ καὶ μετρήσεως, οὕτω καὶ ἐνταῦθα α') Ἐργάτης τις δι' ἐργασίαν 18 ἡμ. βῶρ. ἔλαβε 4λρ. 16σελ. πόσον ἐπληρώθη δι' ἐκάστην ἡμέραν, τῆς ἐργασίμου ἡμέρας ὑπολογιζομένης εἰς 8 ὥρας;

Ἐπειδὴ 18 ἡμ. βῶρ. =  $18\frac{6}{8}$  ἡμ. =  $18\frac{3}{4}$  ἡμ., τὸ πρόβλημα διατυπώνεται καὶ ὡς ἑξῆς:

Ἐργάτης δι' ἐργασίαν  $18\frac{3}{4}$  ἡμ. ἔλαβε 4λ. 16σελ. πόσον ἔλαβε δι' ἐκάστην ἡμέραν;

Ἀφοῦ εἰς  $18\frac{3}{4}$  ἡμ. ἔλαβε 4λ. 16σελ.

$$\text{εἰς } 1\text{ἡμ. λαμβάνει } \frac{4\lambda. \ 16\text{σελ.}}{18\frac{3}{4}}$$

Ἦτοι, διὰ νὰ εὔρωμεν τὸ ζητούμενον, πρέπει τὸ ὀλικὸν ποσὸν 4λ. 16σελ. νὰ διαιρέσωμεν διὰ τοῦ ἀφηρημένου ἀπλοῦ ἀριθμοῦ τῶν ἡμερῶν εἰς ὃν ἐτράπη ὁ συμμιγῆς 18 ἡμ. βῶρ. τὴν πρᾶξιν ταύτην καλοῦμεν διαίρεσιν τῶν 4λ. 16σελ. διὰ τοῦ 18 ἡμ. βῶρ. εἶθεν.

$$(4\lambda. 16\sigma\epsilon\lambda.) : (18\eta\mu. 6\omega\rho.) = (4\lambda. 16\sigma\epsilon\lambda.) : 18\frac{3}{4}$$

$$= (4\lambda. 16\sigma\epsilon\lambda.) \times \frac{4}{75} = 5\sigma\epsilon\lambda. 1\pi\epsilon\nu. 1\frac{19}{25} \varphi\alpha\rho\delta.$$

ἄρα·

Εἰς τὰ προβλήματα μερισμοῦ, ἵνα διαιρέσωμεν συμμιγῆ δι' ἄλλου, τρέπομεν τὸν διαιρέτην εἰς μονάδας τῆς τάξεως ἐκείνης τῆς ὁποίας ζητοῦμεν τὴν τιμὴν καὶ διαιροῦμεν διὰ τοῦ π ρ ο κ ὄ ψ α ν τ ο ς μ ι κ τ ο ῦ ἢ κ λ ἄ σ μ α τ ο ς.

β.) Μὲ 1 τάλληρον ἀγοράζει τις 6ὸκ. 100δρ. πράγματός τινος· πόσον θὰ δώσῃ διὰ ν' ἀγοράσῃ 32 ὀκάδ. 300 δράμ. ;

Εἶναι φανερόν ὅτι, διὰ νὰ εὕρωμεν πόσα τάλληρα θὰ δώσῃ καὶ μέρη ταλλήρου, πρέπει νὰ εὕρωμεν πῶς σχηματίζεται ὁ συμμιγῆς 32 ὀκ. 300 δράμ. ἀπὸ τὸν συμμιγῆ 6 ὀκ 100 δράμ. καὶ ἀπὸ τὰ μέρη αὐτοῦ. (§ 158)

$$\text{Ἐπειδὴ } 32\delta\kappa. 300\delta\rho. = 32\frac{3}{4}\delta\kappa. = 13100\delta\rho.$$

$$6\delta\kappa. 100\delta\rho. = 6\frac{1}{4}\delta\kappa. = 2500\delta\rho.$$

ἔχομεν

$$(32\delta\kappa. 300\delta\rho.) : (6\delta\kappa. 100\delta\rho.) = 32\frac{3}{4} : 6\frac{1}{4}$$

ἢ καὶ

$$(32\delta\kappa. 300\delta\rho.) : (6\delta\kappa. 100\delta\rho.) = 13100 : 2500$$

Ἄρα·

Εἰς τὰ προβλήματα μετρήσεως ἵνα διαιρέσωμεν συμμιγῆ δι' ἄλλου, τρέπομεν ἀμφοτέρους εἰς μονάδας τῆς αὐτῆς τάξεως καὶ διαιροῦμεν τὸν ἀπλοῦν ἀριθμὸν εἰς ὃν ἐτραπῆ ὁ διαιρετέος διὰ τοῦ ἀπλοῦ ἀριθμοῦ ὃν ἔδωκεν ὁ διαιρέτης. Τὸ εἶδος δὲ τοῦ πληλικοῦ ὀρίζεται ὑπὸ τοῦ προβλήματος.

### Ἀσκήσεις.

443.) Ἐμπορος ἠγόρασε 45 στατήρας, 25 ὀκάδας, 200 δράμια ἐλαίου πρὸς 5 γρ. 20 παρ. τὴν ὀκᾶν. Κατὰ τὴν μεταφορὰν τοῦ ἐχύθησαν 20 ὀκάδες 200 δρμ. ἐπώλησεν εἶτα αὐτὸ πρὸς 20 γρ. 10 παρ. Πόσον ἐκέρδισεν ;

444.) Ἐὰν 3ὐάρδ., 2πὸδ. καὶ 6δάκτ. ἐπωλήθησαν ἀντὶ 1λίρ. 10σελ. 4πεν., πρὸς πόσα φράγκα ἐπωλήθη ἡ ὕάρδα ;

445.) Τὰ συνήθη δοχεία ἐκ λευκοσιδήρου δέχονται 14 ὀκάδ. 100 δρμ. κατὰ μέσον ὄρον ἕκαστον. Πόσα τοιαῦτα θὰ μᾶς χρειασθῶσιν, ἵνα μετακομίσωμεν 8στατ. 4ὀκ. καὶ 100δρμ.;

### Μέθοδος ἀπλῶν μερῶν.

248.—Πρόβλημα 1<sup>ον</sup>) Βαρέλιον πλήρες ἐλαίου ἔχει βάρος 3 στ. 27 ὀκ. 300 δρ. Πόσον βάρος ἔχουσι 1560 ὅμοια βαρέλια πλήρη ἐλαίου;

Λύσις.—'Εὰν ἕκαστον βαρέλιον εἶχε βάρος 3 στ., τὰ 1560 βαρέλια θὰ εἶχον βάρος 3 στ.  $\times 1560 = 4680$  στ.

'Εὰν δὲ εἶχε βάρος 22 ὀκ.  $= \frac{1\text{στ}}{2}$ , τὰ 1560 θὰ εἶχον βάρος  $\frac{1560\text{στ.}}{2} = 780$  στ.

Ὅμοίως, ἐὰν ἓν βαρέλ. εἶχε βάρος 5 ὀκ. 200 δρ.  $= \frac{1}{4}$  τοῦ  $\frac{1}{2}$  στ.

τὰ 1560 βαρέλια θὰ ἐζυγίζον  $= \frac{780}{4}$  στ.  $= 195$  στ.

'Εὰν δὲ εἶχε βάρος 1 ὀκ., τὰ 1560 θὰ εἶχον βάρος 1ὀκ.  $\times 1560 = 1560$  ὀκ.

Τέλος, ἐὰν εἶχε βάρος 100 δρ.  $= \frac{1}{4}$  ὀκ., τὰ 1560 θὰ εἶχον βάρος  $\frac{1560}{4}$  ὀκ.  $= 8$  στ. 38 ὀκ.

### Διάταξις τῆς πράξεως.

		3στ. 27ὀκ. 300δρ.
		1560
		4680
		780στ.
}	22ὀκ. $= \frac{1}{2}$ στ.	195στ.
	5ὀκ. 200δρ. $= \frac{1}{4}$ τοῦ $\frac{1}{2}$ στ.	8στ. 38ὀκ.
	100δρ. $= \frac{1}{4}$ τῆς ὀκάς	5663στ. 38ὀκ.

Κατὰ τὸν τρόπον τοῦτον ἀναλύομεν ἕκαστον τῶν μερῶν (πλὴν τοῦ τῆς ἀνωτάτης τάξεως) τοῦ πολλαπλασιαστέου εἰς ἀπλᾶ μέρη τῆς μονάδος τῆς προηγουμένης τάξεως καὶ εὐρίσκομεν τὸ γινόμενον ἑκάστου τῶν μερῶν τούτων ἐπὶ τὴν πολλαπλασιαστήν. Διὰ τὸν λόγον τοῦτον ἡ μέθοδος αὕτη λέγεται μέθοδος τῶν ἀπλῶν μερῶν.

Ἡ μέθοδος αὕτη ἐπεκτείνεται προφανῶς καὶ εἰς ἣν περίπτωσιν ἔχομεν πολλαπλασιασμὸν συμμιγοῦς ἐπὶ συμμιγῆ ὡς ἐκ τοῦ ἀκολούθου προβλήματος φαίνεται.

Πρόβλημα 2ον. — Ἡ ὀκτὼ ἐνδὸς πράγματος ἀξίζει 4 δρ. 60 λ. πόσον θὰ πληρώσῃ τις, διὰ νὰ ἀγοράσῃ 3 ὀκ. 350 δρ.;

Λύσις. α'.) Διὰ τὰς 3 ὀκ. θὰ πληρώσῃ

$$\text{πρὸς } 4 \text{ δρ. τὴν } \text{ὀκτὼ} \quad 4 \text{ δρ.} \times 3 = 12 \text{ δρ.}$$

$$\text{πρὸς } 50 \text{ λ.} = \frac{1}{2} \text{ δρ.} \quad \frac{1}{2} \text{ δρ.} \times 3 = 1 \text{ δρ.} 50 \text{ λ.}$$

$$\text{πρὸς } 10 \text{ λ.} = \frac{1}{10} \text{ δρ.} \quad \frac{1}{10} \text{ δρ.} \times 3 = 0 \text{ δρ.} 30 \text{ λ.}$$

$$\text{Διὰ τὰ } 200 \text{ δρ.} = \frac{1}{2} \text{ ὀκ.} \quad \text{θὰ πληρώσῃ} \quad \frac{4 \text{ δρ.} 60 \text{ λ.}}{2} = 2 \text{ δρ.} 30 \text{ λ.}$$

$$\text{Διὰ τὰ } 100 \text{ δρ.} = \frac{1}{2} \text{ τῶν } 200 \text{ δρ.} \quad \gg \quad \frac{2 \text{ δρ.} 30 \text{ λ.}}{2} = 1 \text{ δρ.} 15 \text{ λ.}$$

$$\text{Διὰ τὰ } 50 \text{ δρ.} = \frac{1}{2} \text{ τῶν } 100 \text{ δρ.} \quad \gg \quad \frac{1 \text{ δρ.} 15 \text{ λ.}}{2} = 0 \text{ δρ.} 57, 5 \text{ λ.}$$

ἄρα θὰ πληρώσῃ τὸ ὄλον

$$\underline{\underline{17 \text{ δρ.}, 82, 5 \text{ λ.}}}$$

Ἡ πράξις διατάσσεται ὡς ἐξῆς:

	· 4 δρ.	60 λ.	
	3 ὀκ.	360 δρ.	
ἀξία τῶν 3 ὀκ.	πρὸς 4 δρ. . . . .	12 δρ.	}
	πρὸς 50 λ. = $\frac{1}{2}$ δρ.	1 50 λ.	
	πρὸς 10 λ. = $\frac{1}{10}$ δρ.	0 30	
ἀξία τῶν 300 δρ.	τῶν 200 δρ. = $\frac{1}{2}$ ὀκ.	2 30	}
	τῶν 100 . . . . .	1 15	
	τῶν 50 . . . . .	0 57, 5	

## Ἀσκήσεις.

446.) Πόσον τιμῶνται 6 πῆχ. 7 ρούπ. ὑφάσματος, ἐὰν ὁ πῆχους τιμᾶται 9 δρ. 50 λ. ;

447.) Κινητὸν τι κινούμενον ἐπὶ περιφέρειᾷ διατρέχει εἰς 1 ὥραν τόξον  $60^{\circ} 40' 50''$ . Πόσον τόξον θὰ διατρέξῃ εἰς 7 ὥρ. 30 π. 15 δ. ;

448.) 2 ὑάρδαι ὑφάσματος τινος τιμῶνται 1 λίρ. 9 σελ. 7 π. πόσον τιμῶνται 17 ὑάρδ. 2 πόνδ. .

449.) Ἀτμόπλοῖόν τι διανύει 17 μίλ. εἰς 1 ὥρ. 35 π. 50 δ.

Εἰς πόσας ὥρας θὰ διανύσῃ 85 μίλλια ;

450.) Ἀνθρωπὸς τις κάμνει περὶ τὰς 17 εἰσπνοὰς κατὰ δευτερόλεπτον· εἰς ἐκάστην εἰσπνοὴν εἰσέρχονται εἰς τοὺς πνεύμονας  $\frac{5}{7}$  λίτρα ἀέρος· ποῖον τὸ βάρος τοῦ ἀέρος τὸ εἰσερχόμενον εἰς 1 ἑβδομάδα ;

(τὸ βάρος 1 λίτρου ἀέρος εἶναι 1,29 γραμ.)

451.) Ἐμπορὸς ἀγοράσας βυτίον μὲ 350 ὀκάδας οἴνου πρὸς 0,23 δρχ. τὴν ὀκᾶν ἀπέστειλε τοῦτον σιδηροδρομικῶς εἰς ἄλλο μέρος ἀπέχον 120 χιλ., διὰ τὴν μεταφορὰν δὲ πληρῶνειδι ἕκαστον τόννον καὶ δι' ἀπόστασιν ἑνὸς χιλιομέτρου 0,50· τὸ βυτίον ἐστοίχιζε 14 δραχμάς· ἐζύγιζε δὲ κενὸν 16 ὀκ. 200 δρμ., ἐκάστη ὀκᾶ οἴνου ἐζύγιζεν 350 δρμ., ἐπλήρωσε δὲ διὰ φόρον καὶ λοιπὰ 12,30 δι' ἕκαστον ἑκατόλιτρον. Ὁ οἶνος ἐτέθη εἰς φιάλας τῶν 200 δραμίων τῶν ὁποίων ἐκάστη κενὴ ἐστοίχιζεν 20 λεπτά· ἑκατὸν δὲ πώματα ἐτιμῶντο 3 δραχμάς· 25 φιάλαι πεπληρωμέναι ἐθραύσθησαν, τὸ δὲ βυτίον κενὸν ἐπωλήθη ἀντὶ 10 δρχ. Ζητεῖται πόσον κοστίζει ἐκάστη φιάλη οἴνου.



## ΒΙΒΛΙΟΝ ΕΚΤΟΝ

## ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΑΙ

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄.

## Περὶ λόγων.

249. — Ἐστω ἀριθμὸς τις, π. χ. 3,42· οὗτος γράφεται καὶ ὡς ἐξῆς:  $1+1+1+\frac{1}{10}+\frac{1}{10}+\frac{1}{10}+\frac{1}{10}+\frac{1}{100}+\frac{1}{100}$

Ἐστω ἀφ' ἑτέρου μέγεθός τι π.χ. μία εὐθεῖα Α. Ἄς κατασκευάσωμεν ἤδη ἑτέραν εὐθεῖαν Β ὡς ἐξῆς: Δι' ἑκάστην ἀκεραίαν μονάδα τοῦ δοθέντος ἀριθμοῦ λαμβάνομεν ὀλόκληρον τὴν εὐθεῖαν Α, δι' ἑκάστην δὲ κλασματικὴν μονάδα λαμβάνομεν τὸ ἀντίστοιχον μέρος τῆς εὐθείας Α· π.χ. διὰ τὸ  $\frac{1}{10}$  λαμβάνομεν τὸ  $\frac{1}{10}$  τῆς Α. Τὸ ἄθροισμα τῶν τμημάτων τούτων θὰ εἶναι ἡ εὐθεῖα Β. Λέγομεν τότε ὅτι ἐπολλαπλασιάσαμεν τὸ μέγεθος Α ἐπὶ τὸν δοθέντα ἀριθμὸν καὶ τὸ προκύπτον μέγεθος λέγεται γινόμενον τοῦ Α ἐπὶ τὸν δοθέντα ἀριθμὸν 3,42. Ὁ ἀριθμὸς 3,42 λέγεται λόγος τοῦ μεγέθους Β πρὸς τὸ ὁμοειδὲς μέγεθος Α.

Ἐὰν ἐδίδοντο τὰ ὁμοειδῆ μεγέθη Α καὶ Β καὶ ἐζητεῖτο ὁ λόγος τοῦ Β πρὸς τὸ Α, θὰ εἴχομεν νὰ μετρήσωμεν τὸ Β διὰ τοῦ Α ἢ καὶ θεωροῦντες τὸ Α ὡς μονάδα νὰ μετρήσωμεν ἀπλῶς τὸ Β. Κατὰ ταῦτα·

Λόγος δύο μεγεθῶν ὁμοειδῶν εἶναι ὁ ἀριθμὸς ὅστις σχηματίζεται ἐκ τῆς μονάδος καὶ τῶν μερῶν αὐτῆς ὅπως τὸ πρῶτον μέγεθος γίνεται ἐκ τοῦ δευτέρου καὶ ἐκ τῶν μερῶν αὐτοῦ.

Ἡ καὶ Λόγος δύο μεγεθῶν ὁμοειδῶν εἶναι ὁ ἀριθμὸς ὁ προκύπτων ἐκ τῆς μετρήσεως τοῦ πρώτου μεγέθους διὰ τοῦ δευτέρου λαμβανομένου ὡς μονάδος

Λόγος δὲ δύο ἀριθμῶν λέγεται ὁ ἀριθμὸς ἐφ' ὃν πολλαπλασιάζεται ὁ δεύτερος, ἵνα δώσῃ τὸν πρῶτον, ἤτοι τὸ πηλίκον (§ 170) αὐτῶν.

Π. χ. λόγος τοῦ ἀριθμοῦ 15 πρὸς τὸν 4 εἶναι  $\frac{15}{4} = 3\frac{3}{4}$

Δύο λόγοι λέγονται ἀντίστροφοι, ὅταν τὸ γινόμενόν των ἰσοῦται τῇ μονάδι.

Π.χ. οἱ λόγοι  $\frac{3}{4}$  καὶ  $\frac{4}{3}$  εἶναι ἀντίστροφοι.

Ἐστω δτι ἡ εὐθεῖα A ἔχει μῆκος 21 μέτρων, ἄλλη δ' εὐθεῖα B ἔχει μῆκος  $3\frac{1}{2}$  μέτρων, τουτέστι λόγος τῆς εὐθείας A πρὸς εὐθειάν τινα Γ ἴσην πρὸς ἓν μέτρον εἶναι ὁ 21· τῆς δὲ εὐθείας B πρὸς τὴν αὐτὴν εὐθεῖαν Γ εἶναι ὁ  $3\frac{1}{2}$ . ποτὸς θὰ εἶναι ὁ λόγος τῆς A. πρὸς τὴν B ;

Παρατηροῦμεν δτι, ὅπως ὁ  $3\frac{1}{2}$  λαμβανόμενος ἐξάκις δίδει τὸν 21, οὕτω καὶ ἡ εὐθεῖα B λαμβανομένη ἐξάκις θὰ δίδῃ τὴν εὐθεῖαν A· ἤτοι ὁ λόγος τῆς εὐθείας A πρὸς τὴν εὐθεῖαν B συμπέπει πρὸς τὸν λόγον τοῦ ἀριθμοῦ τοῦ παριστῶντος τὴν εὐθεῖαν A πρὸς τὸν ἀντίστοιχον τῆς B.

Καὶ γενικῶς ἀληθεύει δτι· ἐὰν ἔχωμεν δύο μεγέθη ὁμοειδῆ A καὶ B καὶ μετρήσωμεν ἕκαστον τούτων διὰ τρίτου τινὸς Γ, λαμβάνομεν δύο ἀριθμοὺς ὧν ὁ λόγος ἰσοῦται πρὸς τὸν λόγον τῶν μεγεθῶν, ἤτοι:

Ἐάν οἱ λόγοι δύο μεγεθῶν ὁμοειδῶν ἰσοῦται πρὸς τὸν λόγον τῶν ἀριθμῶν οἵτινες προκύπτουσιν, ὅταν μετρήσωμεν τὰ μεγέθη ταῦτα μὲ τὴν αὐτὴν μονάδα.

Ἐάν οἱ λόγοι μεγεθῶν A πρὸς ἕτερον ὁμοειδῆ B σημειῶται A : B ἢ καὶ  $\frac{A}{B}$ · εἶναι δὲ ὁ A/πρῶτος ὅρος τοῦ λόγου καὶ B ὁ δεύτερος.

Ἐάν A : B =  $\frac{3}{4}$  τότε B : A =  $\frac{4}{3}$  ἔθεν

Οἱ λόγοι A : B καὶ B : A εἶναι ἀντίστροφοι.

**Ἀσκήσεις.**

452.) Ἐκ δύο ἀδελφῶν ὁ πρῶτος ἔχει ἡλικίαν 38 ἐτ. 6 μην., ὁ ἕτερος 34 ἐτ. 3 μην. Μετὰ δύο ἔτη τίνα λόγον θὰ ἔχωσιν αἱ ἡλικίαι των ;

453.) Δύο ὑφάσματα ἔχουσι μῆκος τὸ μὲν 3 πῆχ. 5 ρουπ., τὸ δὲ 4 ὑαρδ. 3 ποδ. Ποῖος ὁ λόγος τοῦ πρώτου μῆκους πρὸς τὸ δεύτερον ;

454.) Ὀδοιπόρος τις ἀναχωρεῖ ἐκ τῆς πόλεως Α διὰ τὴν πόλιν Β· ἕτερος ἐπὶ τῆς αὐτῆς ὁδοῦ βαδίζων ἀλλὰ κατ' ἀντίθετον διεύθυνσιν ἀναχωρεῖ ἐκ τῆς Β διὰ νὰ φθάσῃ εἰς τὴν Γ, ἣτις εὑρίσκειται εἰς τὸ μέσον τῆς ὁδοῦ· συνηντήθησαν οὗτοι εἰς σημεῖόν τι τοιοῦτον ὥστε ὁ λόγος τοῦ διανυθέντος διαστήματος ὑφ' ἑκατέρου πρὸς τὸ διάστημα ὅπερ ἔχει ἀκόμῃ νὰ διανύσῃ νὰ εἶναι ὁ αὐτός. Ποῖος εἶναι ὁ λόγος τοῦ διανυθέντος ὑπὸ τοῦ πρώτου διαστήματος πρὸς τὸ ὅλον;

455.) Πότε τὸ γινόμενον δύο λόγων ἰσοῦται πρὸς ἀριθμὸν ἀκέραιον ;

456.) Πότε τὸ πηλίκον δύο λόγων ἰσοῦται πρὸς ἀκέραιον ;

457.) Πότε τὸ γινόμενον δύο λόγων ὑπερβαίνει τὸν ἕνα ἐξ αὐτῶν ;

**Περὶ ἀναλογιῶν.**

250. — Ἡ ἰσότης δύο λόγων λέγεται ἀναλογία.

$$\text{π. χ.} \quad \frac{4}{6} = \frac{2}{3} \quad \eta \text{ καὶ} \quad 4 : 6 = 2 : 3$$

Ὅταν οἱ ὄροι τῆς ἀναλογίας εἶναι μεγέθη, δυνάμεθα νὰ ἀντικαταστήσωμεν τοὺς λόγους τῶν μεγεθῶν μὲ λόγους ἀριθμῶν (§ 249)

Οἱ τέσσαρες ἀριθμοὶ διὰ τῶν ὁποίων γράφεται ἀναλογία τις λέγονται ὄροι αὐτῆς.

Ὁ α' καὶ ὁ δ' λέγονται ἄκροι ὄροι τῆς ἀναλογίας, ὁ δὲ β' καὶ γ' μέσοι ὄροι αὐτῆς. Ἐπίσης οἱ α' καὶ β' λέγονται ἡγούμενοι, οἱ δὲ γ' καὶ δ' ἐπόμενοι.

## Ἰδιότητες.

251. — Ἐστω ἡ ἀναλογία  $\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta}$  Πολλαπλασιάζοντες ἀμφότερα τὰ μέλη ἐπὶ τὸ γινόμενον τῶν παρονομαστῶν ἔχομεν

$$\frac{\alpha}{\beta} \times \beta \times \delta = \frac{\gamma}{\delta} \times \beta \times \delta \quad \eta \quad \alpha \times \delta = \beta \times \gamma \quad \delta\theta\epsilon\nu.$$

Εἰς πᾶσαν ἀναλογίαν τὸ γινόμενον τῶν μέσων ἰσοῦται τῷ γινομένῳ τῶν ἄκρων π.χ. ἐκ τῆς ἀναλογίας  $\frac{3}{8} = \frac{6}{16}$  ἔπεται ἡ ἰσότης

$$3 \times 16 = 6 \times 8$$

καὶ ἀντιστρόφως.

Ἐὰν τέσσαρες ἀριθμοὶ  $\alpha, \beta, \gamma, \delta$  εἶναι τοιοῦτοι ὥστε  $\alpha \times \delta = \beta \times \gamma$ , τότε ἔχομεν

$$\frac{\alpha \times \delta}{\beta \times \delta} = \frac{\beta \times \gamma}{\beta \times \delta} \quad \eta \quad \frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta} \quad \eta\tau\omicron\iota.$$

οἱ ἀριθμοὶ καθ' ἡν τάξιν εἶναι γεγραμμένοι ἀποτελοῦν ἀναλογίαν. Ὅθεν.

Ἐὰν τὸ γινόμενον δύο ἀριθμῶν ἰσοῦται πρὸς τὸ γινόμενον δύο ἄλλων, οἱ τέσσαρες οὗτοι δύνανται νὰ σχηματίσωσιν ἀναλογίαν, ἀρκεῖ νὰ ληφθῶσι δύο παράγοντες τοῦ ἰδίου γινομένου εἴτε ὡς ἄκροι εἴτε ὡς μέσοι π.χ. ἐκ τῆς ἰσότητος

$$8 \times 6 = 12 \times 4$$

Ἐπεται ἡ ἀναλογία  $\frac{8}{12} = \frac{4}{6}$  ἢ  $8 : 12 = 4 : 6$ .

252. — Κατὰ τὰ προειρημένα, ἐὰν μεταξὺ τῶν ἀριθμῶν  $\alpha, \beta, \gamma, \delta$  ἰσχύη ἡ ἰσότης

$$\alpha \times \delta = \beta \times \gamma$$

ἀληθεύει ἡ ἀναλογία

$$\alpha : \beta = \gamma : \delta$$

Ἐπειδὴ δὲ καὶ ἐπὶ τῶν  $\alpha, \gamma, \beta, \delta$  ἰσχύει ἡ ἰσότης

$$\alpha \times \delta = \gamma \times \beta$$

ἔπεται ὅτι

$$\alpha : \gamma = \beta : \delta.$$

ἢ καὶ

$$\delta : \beta = \gamma : \alpha.$$

Ἄρα.

Εἰς ἐκάστην ἀναλογίαν δυνάμεθα νὰ ἐναλλάξωμεν τοὺς μέ-  
 σους ὡς ἐπίσης καὶ τοὺς ἄκρους· οὕτως ἡ ἀναλογία

$$\frac{20}{5} = \frac{8}{2} \quad \eta \quad 20 : 5 = 8 : 2$$

γράφεται

$$\frac{20}{8} = \frac{5}{2} \quad \eta \quad \frac{2}{5} = \frac{8}{20}$$

253. — Ἐστω ἡ ἀναλογία  $\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta}$ · προσθέτομεν τὴν μονά-  
 δα εἰς ἀμφότερα τὰ μέλη καὶ ἔχομεν

$$\frac{\alpha}{\beta} + 1 = \frac{\gamma}{\delta} + 1 \quad \eta \quad \frac{\alpha + \beta}{\beta} = \frac{\gamma + \delta}{\delta}$$

Ἔθεν·

Εἰς πᾶσαν ἀναλογίαν τὸ ἄθροισμα τῶν δύο πρώτων ὄρων ἔχει  
 λόγον πρὸς τὸν δεύτερον, οἷον τὸ ἄθροισμα τῶν δύο τελευταίων

πρὸς τὸν τέταρτον· π. χ. ἐκ τῆς ἀναλογίας  $\frac{7}{2} = \frac{21}{6}$

ἔπεται ἡ ἀναλογία

$$\frac{7+2}{2} = \frac{21+6}{6} \quad \eta \quad \frac{9}{2} = \frac{27}{6}$$

### Ἀσκήσεις.

458.) Εἰς πᾶσαν ἀναλογίαν τὸ γινόμενον τῶν δύο μέσων διαι-  
 ρούμενον διὰ τοῦ ἐνδὲς ἄκρου δίδει τὸν ἕτερον τῶν ἄκρων.

459.) Εἰς πᾶσαν ἀναλογίαν ἡ διαφορὰ τῶν δύο πρώτων ὄρων  
 ἔχει λόγον πρὸς τὸν δεύτερον, οἷον ἡ διαφορὰ τῶν δύο τελευ-  
 ταίων πρὸς τὸν τέταρτον.

460.) Ἐὰν πολλαπλασιάσωμεν τοὺς ὁμοταγεῖς ὄρους ὁσωνδή-  
 ποτε ἀναλογιῶν, εὐρίσκομεν τέσσαρας ἀριθμοὺς συνιστῶντας  
 ἀναλογίαν.

461.) Τὰ τετράγωνα τῶν ὄρων ἀναλογίας σχηματίζουν ἀνα-  
 λογίαν.

462.) Τὰ πηλίκα τῶν ὁμοταγῶν ὄρων δύο ἀναλογιῶν ἀποτε-  
 λοῦσιν ἀναλογίαν,

463.) Εἰς πᾶσαν ἀναλογίαν τὸ ἄθροισμα τῶν ἡγουμένων ἔχει λόγον πρὸς τὴν διαφορὰν αὐτῶν ἴσον πρὸς τὸν λόγον τοῦ ἄθροίσματος τῶν ἐπομένων πρὸς τὴν διαφορὰν αὐτῶν.

464.) Ἐκ τῆς ἀναλογίας  $\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta}$  ἔπεται ἡ ἀναλογία

$$\frac{\lambda\alpha + \rho\gamma}{\lambda\beta + \rho\delta} = \frac{\alpha}{\beta}, \text{ οἰωνδῆποτε ὄντων τῶν } \lambda \text{ καὶ } \rho.$$

465.) Ἐκ τῆς ἰσότητος

$$(\alpha + \beta + \gamma + \delta)(\alpha - \beta - \gamma + \delta) = (\alpha - \beta + \gamma - \delta)(\alpha + \beta - \gamma - \delta)$$

ἔπεται ἡ ἀναλογία  $\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta}$

466.) Ἐκ τῆς ἀναλογίας  $\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta}$

ἔπεται ἡ ἀναλογία  $\frac{\alpha\beta}{\gamma\delta} = \frac{(\alpha + \beta)^2}{(\gamma + \delta)^2}$

467.) Ἐὰν  $\frac{\alpha + \beta\chi}{\beta + \gamma\omega} = \frac{\beta + \gamma\chi}{\gamma + \alpha\omega} = \frac{\gamma + \alpha\chi}{\alpha + \beta\omega}$  τότε

ἔχομεν ὅτι  $\frac{\alpha + \beta\chi}{\beta + \gamma\omega} = \frac{1 + \chi}{1 + \omega}$

### Μεγέθη εὐθέως καὶ ἀντιστρόφως ἀνάλογα.

254. α'.) 1 πήχυς ἐνὸς ὑφάσματος τιμᾶται 3 δραχμάς.

Τὸ  $\frac{1}{2}$  τοῦ πήχεως τιμᾶται 1,50 δρ.,

οἱ 2 πήχεις τιμῶνται 6 δρ. κ. ο. κ.

τὸ ποσὸν τῶν δραχμῶν ἐξαρτᾶται ἐκ τοῦ ποσοῦ τῶν πήχεων ὅπως καὶ τὸ ποσὸν τῶν πήχεων ἐξαρτᾶται ἐκ τοῦ ποσοῦ τῶν δραχμῶν.

εἰς τὸν 1 πήχυν ἀντιστοιχοῦσιν αἱ 3 δραχμαί,

εἰς τὸν  $\frac{1}{2}$  » » » 1,50 »

εἰς τοὺς 2 πήχεις » » 6 » κ. ο. κ.

Τὰς τιμὰς «1 πήχυς, 3 δραχμαί» καλοῦμεν ἀντιστοίχους

ὡς ἐπίσης καὶ τὰς τιμὰς « $\frac{1}{2}$  πήχ. 1,50 δραχμαί» κ.ο.κ.

β') Εἰς 1 ὥραν κινητόν τι διανύει 4 χιλιάμετρα

εἰς  $\frac{1}{2}$  τῆς ὥρας διανύει 2 χιλ. κ. ο. κ.

Αἱ τιμαὶ 1 ὥρ., 4 χιλ. εἶναι ἀντίστοιχοι· ὡς ἐπίσης ἀντίστοιχοι εἶναι καὶ αἱ τιμαὶ  $\frac{1}{2}$  ὥρ., 2 χιλμ. κ. ο. κ.

Τὸ διανυόμενον διάστημα ἐξαρτᾶται ἐκ τοῦ ποσοῦ τῶν ὥρῶν, ὅπως ἐπίσης καὶ τὸ ποσὸν τῶν ὥρῶν ἐξαρτᾶται ἐκ τοῦ διανυομένου διαστήματος

γ') Σῶμά τι πίπτον διανύει κατὰ τοὺς νόμους τῆς Φυσικῆς

εἰς τὸ πρῶτον δευτερόλεπτον 4,90 μέτρα

εἰς τὰ 2 πρῶτα δευτερόλεπτα  $4 \times 4,90$  μέτρα

εἰς τὰ 3 πρῶτα δευτερόλεπτα  $9 \times 4,90$ , κ. ο. κ.

Ἐνταῦθα ἀντίστοιχοι τιμαὶ εἶναι αἱ

1'' 4,90 μ.

2''  $4 \times 4,90$  μ.

3''  $9 \times 4,90$  μ.

Καὶ ἐνταῦθα τὸ διανυόμενον διάστημα ἐξαρτᾶται ἐκ τοῦ χρόνου τῆς πτώσεως.

Τὰ ἐν ἐκάστῳ τῶν ἀνωτέρω παραδειγμάτων ἀναφερόμενα ποσὰ ἐξαρτῶνται ἀπ' ἀλλήλων οὕτως ὥστε εἰς μίαν τιμὴν τοῦ ἑνὸς ν' ἀντιστοιχῆ μία τιμὴ τοῦ ἄλλου. Ἄλλ' ἢ ἀντιστοιχία δὲν εἶναι τοῦ αὐτοῦ εἶδους εἰς τὸ τρίτον καὶ εἰς τὰ δύο πρῶτα παραδείγματα· διότι εἰς ἕκαστον τῶν παραδειγμάτων α' καὶ β', εἴταν δύο ἀντίστοιχοι τιμαὶ τῶν δύο ποσῶν πολλαπλασιασθῶσιν ἐπὶ τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν, δίδουσι δύο ἀντιστοίχους τιμὰς τῶν ποσῶν τούτων.

Π.χ. εἰς τὸ α' οἱ 4 πήχ. καὶ αἱ 12 δρ. εἶναι δύο τιμαὶ ἀντίστοιχοι.

Ἐὰν δὲ πολλαπλασιάσωμεν τοὺς 4 πήχ. ἔστω ἐπὶ  $\frac{2}{5}$  καὶ τὰς 12

δραχμὰς ἐπὶ  $\frac{2}{5}$ , θὰ λάβωμεν τὰς τιμὰς  $\frac{8}{5}$  πήχ. καὶ  $\frac{24}{5}$  δρ.

αἱ ὁποῖαι θὰ εἶναι ἀντίστοιχοι.

Ἐνῶ εἰς τὸ τρίτον παράδειγμα, ἐὰν λάβωμεν δύο τιμὰς ἀντιστοίχους καὶ τὰς πολλαπλασιάσωμεν ἐπὶ τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν, τὰ χινόμενα δὲν θὰ εἶναι τιμαὶ ἀντίστοιχοι· π.χ. δύο ἀντίστοιχοι τιμαὶ

είναι αί 1'' και 4,90 μέτρα· εάν πολλαπλασιάσωμεν ἐπὶ 2, ἔχομεν τὰς τιμὰς 2'' και 9,80 μ., αἱ ὁποῖαι δὲν εἶναι ἀντίστοιχοι, διότι εἰς τὰ 2'' δὲν διανύει τὸ σῶμα 9,80 μ. ἀλλὰ 19,60.

Ὅταν ποσὰ ἐξαρτῶνται ἀπ' ἀλλήλων οὕτως ὥστε ὁ πολλαπλασιασμός δύο τυχουσῶν ἀντιστοίχων τιμῶν αὐτῶν ἐπὶ ἓνα και τὸν αὐτόν, οἷονδῆποτε, ἀριθμὸν νὰ δίδῃ πάντοτε τιμὰς ἀντιστοίχους, τότε λέγομεν ὅτι τὰ ποσὰ εἶναι εὐθέως ἀνάλογα ἢ ἀπλῶς ἀνάλογα. Π. χ. πήχεις και δραχμαὶ εἰς τὸ α' παράδειγμα εἶναι εὐθέως ἀνάλογα ποσὰ· ὅπως ἐπίσης ὥραι και χιλιόμετρα, ἤτοι χρόνος και διάστημα, εἰς τὸ β'.

Δύο ποσὰ λέγονται ἀνάλογα, εἰὰν πολλαπλασιαζομένης τιμῆς τινος τοῦ ἐνὸς ἐπὶ τινα ἀριθμὸν πολλαπλασιάζεται και ἡ ἀντίστοιχος τιμὴ τοῦ ἄλλου ἐπὶ τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν.

255. δ') Μὲ ὑφασμα πλάτους 1 πήχεως και μήκους 6 πήχεων γίνεται μία ἐνδυμασία. Ἐὰν τὸ πλάτος τοῦ ὑφάσματος γίνῃ διπλάσιον, ἤτοι 2 πήχ., τότε χρειάζεται ὑφασμα ἔχον μῆκος  $\frac{1}{2}$

τοῦ προηγουμένου, ἤτοι 3 πήχ. ἵνα γίνῃ ἡ αὐτὴ ἐνδυμασία. Λοιπὸν εἰς τὴν τιμὴν τοῦ πλάτους 1 ἀντιστοιχεῖ ἡ τιμὴ τοῦ μήκους 6

»   »   »   »   »   2   »   »   »   »   »   3.

Ἐνταῦθα ἔχομεν ποσὰ ἐξαρτώμενα ἀπ' ἀλλήλων τὸ μῆκος και τὸ πλάτος.

Παρατηροῦμεν δ' ὅτι, εἰὰν λάβωμεν δύο τυχούσας ἀντιστοίχους τιμὰς αὐτῶν, ὅπως π. χ. τὰς τιμὰς 1 και 6, και τὴν μὲν πρώτην πολλαπλασιάσωμεν ἐπὶ τυχόντα ἀριθμὸν, π. χ. τὸν 2, τὴν δὲ δευτέραν διαιρέσωμεν διὰ τοῦ αὐτοῦ ἀριθμοῦ 2, θὰ προκύψωσι δύο τιμαὶ πάλιν ἀντίστοιχοι· τὸ μῆκος και τὸ πλάτος ἐνταῦθα εἶναι ποσὰ ἀντιστρόφως ἀνάλογα ἢ ἀντίστροφα· τουτέστιν·

Ὅταν δύο ποσὰ ἐξαρτῶνται ἀπ' ἀλλήλων οὕτως ὥστε, εἰὰν λάβωμεν δύο τυχούσας ἀντιστοίχους τιμὰς αὐτῶν και πολλαπλασιάσωμεν τὴν μὲν μίαν ἐπὶ τὸν τυχόντα ἀριθμὸν ρ, τὴν δὲ ἑτέραν ἐπὶ τὸν ἀντίστροφον αὐτοῦ  $\frac{1}{\rho}$ , νὰ ἔχωμεν πάλιν τιμὰς ἀντιστοίχους, τότε τὰ δύο ποσὰ εἶναι ἀντιστρόφως ἀνάλογα ἢ ἀντί-



στροφα· π.χ. ὁ ἀριθμὸς τῶν ἡμερῶν εἰς ἃς ἐργάτης τις τελειώνει ἐν ἔργον καὶ ὁ τῶν ὥρῶν τῆς καθημερινῆς ἐργασίας του εἶναι ποσὰ ἀντίστροφα.

Ἔθεν καί·

Δύο ποσὰ λέγονται ἀντίστροφα, ἐὰν πολλαπλασιαζομένης τῆς τιμῆς τοῦ ἑνὸς ἐπὶ τὸν τυχόντα ἀριθμὸν διαιρεῖται ἡ ἀντίστοιχος τιμὴ τοῦ ἄλλου διὰ τοῦ αὐτοῦ ἀριθμοῦ.

### Τινὰ ἐπὶ τῆς ἐννοίας τῆς συναρτήσεως.

256. — Ὅταν ποσὸν τι ἐξαρτᾶται ἐξ ἄλλου οὕτως ὥστε ἡ μεταβολὴ τοῦ δευτέρου νὰ συνεπάγεται τὴν μεταβολὴν τοῦ πρώτου, λέγομεν τὸ πρῶτον συνάρτησιν τοῦ δευτέρου.

Π.χ. εἰς τὸ α'. παράδειγμα (§ 254) τὸ ποσὸν τῶν πῆχεων εἶναι συνάρτησις τοῦ ποσοῦ τῶν δραχμῶν καὶ τανάπαλιν· εἰς τὸ β' τὸ διανυόμενον διάστημα εἶναι συνάρτησις τῶν ὥρῶν, ἦτοι τοῦ χρόνου, καὶ τανάπαλιν· εἰς τὸ γ' παράδειγμα ἐπίσης τὸ διανυόμενον διάστημα εἶναι συνάρτησις τοῦ χρόνου καὶ τανάπαλιν· τέλος εἰς τὸ δ' (§ 255) τὸ μῆκος εἶναι συνάρτησις τοῦ πλάτους καὶ τὸ πλάτος τοῦ μήκους.

257. Δυνατὸν ὅμως ποσὸν τι νὰ ἐξαρτᾶται ἐκ ποσῶν πλειοτέρων τοῦ ἐνός· π.χ. τὸ διάστημα τὸ διανυόμενον ὑπὸ ὁδοιπόρου δὲν ἐξαρτᾶται μόνον ἐκ τοῦ χρόνου καθ' ὃν τὸ διανύει, ἀλλὰ καὶ ἐκ τῆς ταχύτητος μὲ τὴν ὁποῖαν τὸ διανύει. Τότε τὸ διανυόμενον διάστημα εἶναι συνάρτησις τοῦ χρόνου καὶ τῆς ταχύτητος, ἦτοι δύο μεταβλητῶν.

\*258. — Θεωρήσωμεν δύο ποσὰ εὐθέως ἀνάλογα· π.χ. ἔστω ὅτι 3 πῆχεις τιμῶνται 8 δρ.  
τότε 6. » » 16 δρ.

Εἰς τὰς τιμὰς τῶν πῆχεων

3, 6 . . . .

ἀντιστοιχοῦσιν αἱ τιμαὶ τῶν δραχμῶν

8, 16 . . . .

παρατηροῦμεν ὅτι  $\frac{3}{8} = \frac{6}{16}$  καὶ ἐν γένει·

Ἐστωσαν δύο ποσὰ  $\alpha$  καὶ  $\beta$  τοιαῦτα ὥστε εἰς μίαν τιμὴν τοῦ ἑνὸς  $\nu$  ἀντιστοιχῆ μία τιμὴ τοῦ ἄλλου· ἄς καλέσωμεν

$$\chi_1, \chi_2, \dots, \chi_\nu$$

τοὺς ἀριθμοὺς δι' ὧν ἐκφράζονται τιμαὶ τινες τοῦ ἑνὸς ποσοῦ. Αἱ ἀντίστοιχοι πρὸς τὰς τιμὰς ταύτας τοῦ  $\alpha$  τιμαὶ τοῦ ποσοῦ  $\beta$  ἐκφράζονται δι' ἀριθμῶν τινῶν, ἔστω τῶν

$$Y_1, Y_2, \dots, Y_\nu$$

τότε, ἐὰν τὰ ποσὰ  $\alpha$  καὶ  $\beta$  εἶναι εὐθέως ἀνάλογα, τὸ κλάσμα

$$\frac{Y_1}{\chi_1} \text{ θὰ ἰσοῦται πρὸς τὸ κλάσμα } \frac{Y_2}{\chi_2}$$

διότι (§ 254) ἐὰν τὸ  $\chi_2$  ἰσοῦται μὲ τὸ  $\rho\chi_1$

$$\text{τότε τὸ } Y_2 \text{ » » » } \rho Y_1$$

Ἐπομένως τὸ κλάσμα ἔμεινε τὸ αὐτό. Καὶ γενικῶς·

$$\frac{Y_1}{\chi_1} = \frac{Y_2}{\chi_2} = \frac{Y_3}{\chi_3} = \dots = \frac{Y_\nu}{\chi_\nu}$$

Ἐὰν τὸν κοινὸν αὐτὸν λόγον καλέσωμεν  $\alpha$  καὶ ἐν οἴονδήποτε τῶν κλασμάτων αὐτῶν  $\frac{Y}{\chi}$ , θὰ ἔχωμεν  $\frac{Y}{\chi} = \alpha$  ἢ  $y = \alpha\chi$ , ὅπου τὸ  $y$  καὶ  $\chi$  φανερώουν δύο ἀντιστοίχους τιμὰς τῶν δύο ποσῶν.

Ὡστε

Ἐὰν δύο ποσὰ μεταβάλλωνται ἀναλόγως, καλέσωμεν δὲ  $\chi$  καὶ  $y$  δύο ἀφηρημένους ἀριθμοὺς δι' ὧν ἐκφράζομεν δύο τυχούσας ἀντιστοίχους τιμὰς αὐτῶν, τότε θὰ ὑπάρχη ἀριθμὸς  $\alpha$  τοιοῦτος ὥστε  $y = \alpha\chi$ , οἰαδήποτε καὶ ἂν εἶναι αἱ ληφθεῖσαι ἀντίστοιχοι τιμαί· τουτέστιν αἱ ἀντίστοιχοι τιμαὶ δύνανται  $\nu$  ἀλλάσσουν, ἀλλ' ὁ  $\alpha$  δὲν ἀλλάσσει.

Ἡ ἰσότης  $y = \alpha\chi$  λέγομεν ὅτι ὀρίζει συνάρτησιν τινὰ  $y$  τῆς μεταβλητῆς  $\chi$ · ἔχομεν ἐνταῦθα τὸν ἀπλοῦστερον τρόπον ἐξαρτήσεως μιᾶς μεταβλητῆς ποσότητος ἐξ ἄλλης· τουτέστιν ἔχομεν τὴν ἀπλουστάτην συνάρτησιν.

\*259. — Θεωρήσωμεν ἤδη τὰ ποσὰ τὰ εἰσερχόμενα ἐν τῷ τρίτῳ παραδείγματι. Εἰς τὰς τιμὰς τοῦ χρόνου

$$1, \quad 2, \quad 3, \dots$$

ἀντιστοιχοῦσιν αἱ τιμαὶ τοῦ διανυομένου διαστήματος

$$4,90 \quad 4 \times 4,90 \quad 9 \times 4,90 \dots \eta$$

ἐὰν καλέσωμεν

$$X_1, X_2, X_3 \dots X_n$$

τοὺς ἀφηρημένους ἀριθμοὺς τῶν τιμῶν τοῦ χρόνου καὶ

$$Y_1, Y_2, Y_3 \dots Y_n$$

τοὺς τῶν ἀντιστοίχων τιμῶν τοῦ διαστήματος, παρατηροῦμεν ὅτι ἔχομεν

$$\frac{Y_1}{(X_1)^2} = \frac{Y_2}{(X_2)^2} = \frac{Y_3}{(X_3)^2} = \dots = \frac{Y_n}{(X_n)^2} = 4,90$$

ἢ ἐὰν καλέσωμεν  $y$  καὶ  $x$  τοὺς ἀφηρημένους ἀριθμοὺς δύο τυχουσῶν ἀντιστοίχων τιμῶν ἔχομεν

$$\frac{y}{x^2} = 4,90 \quad \text{ἢ} \quad y = 4,90x^2$$

ἢ ἂν θέσωμεν  $4,90 = a$  ἔχομεν  $y = ax^2$ . παρατηροῦμεν ἀμέσως ὅτι εἶναι καὶ ἐνταῦθα τὸ  $\psi$  συνάρτησις τοῦ  $x$ , ἀλλ' οὐχὶ ὅπως εἰς τὸ  $\alpha'$  παράδειγμα.

260. — Ἐν τῇ Φυσικῇ συναντῶνται διαρκῶς παραδείγματα συναρτήσεων διαφόρων. π. χ τὸ μῆκος σιδηρᾶς ράβδου εἶναι συνάρτησις τῆς θερμοκρασίας. Ἡ θερμοκρασία ἐν τινι τόπῳ ἐξαρτᾶται ἐκ τῆς ἐποχῆς τοῦ ἔτους, ἐκ τῆς ὥρας τῆς ἡμέρας κ. λ. π.

## ΒΙΒΛΙΟΝ ΕΒΔΟΜΟΝ

## ΜΕΘΟΔΟΙ

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.

## ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ

261.— Μία μέθοδος, τουτέστιν εἰς τρόπον γενικόν, διὰ τοῦ ὁποῦ λύομεν εἶδος τι προβλημάτων εἶναι καὶ ἡ μέθοδος τῶν τριῶν. Εἰς αὐτὴν δίδονται τρεῖς ἀριθμοὶ ἐκ τῶν ὁποῦν οἱ δύο εἶναι ἀντίστοιχοι τιμαὶ δύο ποσῶν ἀναλόγων ἢ ἀντιστρόφων καὶ ὁ τρίτος εἶναι ἑτέρα τιμὴ τοῦ ἑνὸς ποσοῦ· ζητεῖται δὲ ἡ πρὸς αὐτὴν ἀντίστοιχος τιμὴ τοῦ ἑτέρου.

**Ποσὰ ἀνάλογα.**

28 πήχεις ὑφάσματος τιμῶνται 64 δραχμάς· πόσον τιμῶνται οἱ 7 πήχεις ἐκ τοῦ αὐτοῦ ὑφάσματος ;

*Ἀναγωγή εἰς τὴν μονάδα.*

Ἄφοῦ οἱ 28 πήχ. ἀξιζοῦν 64 δρ.

1 » ἀξιζει  $\frac{64}{28}$  δρ.

Καὶ οἱ 7 » ἀξιζοῦν  $\frac{64}{28} \times 7$  δρ. =  $64 \times \frac{7}{28}$  = 16 δραχ.

**Χρησις ἀναλογιῶν.**

Ἐπειδὴ τὰ ποσὰ εἶναι ἀνάλογα, ἔχομεν κατὰ τὸν ὀρισμὸν (§ 254)

$$\frac{28}{7} = \frac{64}{\chi} \quad \delta\theta\epsilon\nu (251)$$

$28 \times \chi = 64 \times 7$ · καὶ ἐπομένως  $\chi = \frac{64 \times 7}{28} = 64 \times \frac{7}{28} = 16$  δρ.

**Ποσὰ ἀντίστροφα.**

Ἄτμόπλοιον ὁμαλῶς κινούμενον μὲ ταχύτητα 28 μιλίων καθ' ὥραν διανύει διάστημά τι εἰς 64 ὥρας· ἐὰν ἕτερον ἀτμόπλοιον ἔχη ταχύτητα 7 μιλίων, εἰς πόσας ὥρας θὰ τὸ διανύσῃ,

Ἀναγωγή εἰς τὴν μονάδα.

Ὅταν	διανύη	28 μίλ.	καθ' ὥραν	χρειάζονται	64 ὥρ.
»	»	1	»	»	$64 \times 28$ ὥρ.
»	»	7	»	»	$\frac{64 \times 28}{7}$ ὥρ.

Χρῆσις ἀναλογιῶν.

Ἐπειδὴ τὰ ποσὰ εἶναι ἀντίστροφα, ἔχομεν (§ 255)

$$\frac{28}{7} = \frac{\chi}{64} \quad \text{ἔθεν (§ 251)} \quad 7 \times \chi = 64 \times 28$$

καὶ ἐπομένως  $\chi = \frac{64 \times 28}{7} = 64 \times \frac{28}{7} = 256$  ὥρας.

Ἐὰν διατάξωμεν εἰς ἀμφότερα τὰ ἀνωτέρω προβλήματα τὰ δεδομένα, οὕτως ὥστε αἱ ἀντίστοιχοι τιμαὶ νὰ εὐρίσκωνται εἰς τὸν αὐτὸν στίχον καὶ ὁ ἄγνωστος εἰς τὴν β' γραμμῆν, δηλ. ὡς ἑξῆς·

α' πρόβλημα $\frac{28 \text{ πῆχ.}}{7} \quad \frac{64 \text{ ὄρχ.}}{\chi}$	β' πρόβλημα $\frac{28 \text{ μίλ.}}{7} \quad \frac{64 \text{ ὥρ.}}{\chi}$
---	--

εὐρίσκομεν τὸ ζητούμενον κατὰ τὸν ἑξῆς κανόνα·

Πολλαπλασιάζομεν τὸν ὑπεράνω τοῦ ἀγνώστου ἀριθμὸν ἐπὶ τὸν λόγον τῶν δύο ἄλλων δεδομένων ἀριθμῶν ἀντεστραμμένον μὲν, ἐὰν τὰ ποσὰ εἶναι ἀνάλογα, ὅπως ἔχει δέ, ἂν τὰ ποσὰ εἶναι ἀντίστροφα.

Γενικὸς τύπος.— Ἐὰν διὰ τῶν α καὶ β παραστήσωμεν τὰς ἀντιστοίχους τιμὰς δύο ποσῶν ἀναλόγων ἢ ἀντιστρέφων καὶ διὰ τοῦ γ νέαν τιμὴν τοῦ πρώτου ποσοῦ

θὰ ἔχωμεν διάταξιν δεδομένων τὴν ἑξῆς ,  $\begin{matrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \chi \end{matrix}$

Καὶ γενικὸς τύπος λύσεως ἐὰν μὲν τὰ ποσὰ εἶναι ἀνάλογα

θὰ εἶναι :  $\chi = \beta \times \frac{\gamma}{\alpha}$

ἐὰν δὲ ἀντίστροφα θὰ εἶναι :  $\chi = \beta \times \frac{\alpha}{\gamma}$

## Ἀσκήσεις.

468.) 5 ὀκάδες 250 δρ. πράγματός τινος τιμῶνται 5δρ. 80λ. πόσον τιμῶνται αἱ 5ὀκ. 300δρ. ;

469.) Ἐκκρεμές τι ἐκτελεῖ 145 αἰωρήσεις εἰς 3π. 45δ. πόσας αἰωρήσεις θὰ ἐκτελέσῃ εἰς 14π. 30δ ;

470.) Τὸ πλήρωμα ἑνὸς πλοίου ἐν ἀνοικτῇ θαλάσῃ εὐρισκομένου ἔχει τροφὰς μόνον διὰ 4 ἡμέρας. Πρόκειται νὰ προσορμισθῇ εἰς λιμένα μετὰ 9 ἡμέρας. Πόσον μέρος τοῦ ἀρχικοῦ σιτηροσίου πρέπει νὰ λαμβάνῃ ἕκαστος διὰ νὰ ἐπαρκέσουν αἱ τροφαί ;

471.) Ἀτμόπλοῖόν τι πρόκειται νὰ διανύσῃ εἰς 12 ὥρας 130 μίλλια. Ἀφοῦ δμως διήνυσε τὰ 72 ἐξ αὐτῶν τῶν μιλίων, ἔσταμάτησεν ἐπὶ ἡμίσειαν ὥραν. Μὲ ποίαν ταχύτητα πρέπει νὰ διανύσῃ τὸ ἐπίλοιπον διάστημα, ἵνα συμπληρώσῃ τὸν δρόμον του εἰς τὴν προσδιορισθεῖσαν ὥραν ;

## ΣΥΝΘΕΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ

262.— Ἔστω ὅτι ποσὸν τι ἐξαρτᾶται ἐκ τριῶν ἄλλων, ὅπως π.χ. ὁ ἀριθμὸς ὁ παριστῶν το παραγόμενον ἔργον δυνάμεθα νὰ φαντασθῶμεν ὅτι ἐξαρτᾶται ἐκ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν δι' αὐτὸ ἐργαζομένων ἐργατῶν, ἐκ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ἡμερῶν καθ' ἃς οὗτοι ἐργάζονται καὶ ἐκ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ἐργασίμων ὡρῶν τῆς ἡμέρας. Τότε εἰς μίαν τριάδα τιμῶν τῶν ποσῶν τούτων, π.χ. εἰς τὴν τριάδα τῶν τριῶν τιμῶν 3 ἐργάται, 17 ἡμέραι, 8 ὥραι, ἀντιστοιχεῖ μία τιμὴ τοῦ παραγομένου ἔργου, π.χ.  $\frac{1}{2}$  ἔργον· εἰς τρεῖς ἄλλας τιμὰς ἀντιστοιχεῖ μία ἄλλη πάλιν τιμὴ τοῦ παραγομένου ἔργου· ἄς ὑποθέσωμεν ἤδη ὅτι διατηροῦμεν σταθερὸν τὸν ἀριθμὸν τῶν ἐργατῶν καὶ ὡρῶν, π.χ. ἀφήνομεν 3 τοὺς ἐργάτας καὶ 8 τὰς ὥρας τὰς ἐργασίμους τῆς ἡμέρας, μεταβάλλομεν δμως τὸν ἀριθμὸν τῶν ἡμερῶν· τότε εἰς ἐκάστην τιμὴν τοῦ ποσοῦ τῶν ἡμερῶν ἀντιστοιχεῖ μία τιμὴ τοῦ ποσοῦ τοῦ παραγομένου ἔργου· ἐπειδὴ, τῶν ἄλλων ποσῶν (ἐργατῶν καὶ ὡρῶν) μενόντων σταθερῶν, αἱ ἡμέραι καὶ τὸ ἔργον μεταβάλλονται ἀναλόγως (§ 255), λέγομεν ὅτι τὰ

ποσὰ ἡμέραι καὶ ἔργον, ἐνταῦθα εἶναι εὐθέως ἀνάλογα. Ὅμοίως σκεπτόμενοι θὰ ἐλέγομεν ὅτι ἡμέραι καὶ ὥραι εἶναι ποσὰ ἀντιστρόφως ἀνάλογα.

Πρόβλημα. Ὅδοιπóρος βαδίζων 6 ὥρας καθ' ἑκάστην διατρέχει εἰς 8 ἡμέρας 180 στάδια. Εἰς πόσας ἡμέρας ἄλλος ὅδοιπóρος βαδίζων μὲ τὴν ἰδίαν ταχύτητα τοῦ πρώτου ἀλλὰ 9 ὥρας καθ' ἑκάστην θὰ διατρέξῃ 540 στάδια.

Διατάσσονται τὰ δεδομένα ὡς ἐξῆς·

6ὥρ.	8ἡμ.	180στ.
9	χ	540

Λύσις. Εὐκόλως ἀνάγεται τοῦτο εἰς ἕτερα προβλήματα τῆς ἀπλῆς.

Ἐὰν βαδίζῃ 6 ὥρ καθ' ἑκάστην ἐπὶ 8 ἡμ. διατρέχει 180 στ.

ἐὰν » 9 ὥρ. πόσας ἡμέρας θὰ χρειασθῇ ἵνα διατρέξῃ

τὰ 180 στάδια;  $\chi = 8 \times \frac{6}{9}$  ἡμέρας.

Ἐὰν βαδίζῃ 9 ὥρ. καθ' ἑκάστην ἐπὶ  $8 \times \frac{6}{9}$  ἡμέρας διατρέχει 180 στάδια· εἰς πόσας ἡμέρας θὰ διατρέξῃ 540 στάδια;

$$\chi = 8 \times \frac{6}{9} \times \frac{540}{180} = 16 \text{ ἡμέραι}$$

Κανὼν. Ἀφοῦ διατάξωμεν τὰ ποσὰ οὕτως ὥστε αἱ τιμαὶ τοῦ αὐτοῦ ποσοῦ νὰ εὐρίσκωνται εἰς τὴν αὐτὴν στήλην, ὁ δὲ ἄγνωστος χ εἰς τὴν δευτέραν γραμμὴν, πολλαπλασιάζομεν τὸν ὑπεράνω τοῦ ἀγνώστου ἀριθμὸν ἐφ' ἕκαστον τῶν κλασμάτων, ἅτινα σχηματίζουσιν αἱ δύο τιμαὶ ἑκάστου ποσοῦ· ἀντιστρέφομεν ὁμοῦς προηγουμένως τὸ κλάσμα, ἐὰν τὸ ποσὸν τοῦτο εἶναι ἀνάλογον πρὸς τὸ ποσὸν τοῦ ἀγνώστου.

### Ἀσκήσεις.

472.) Ἀφοῦ 16 ἐργάται εἶχον ἐργασθῆ ἐπὶ 22 ἡμέρας καὶ εἶχον ἐκτελέσει τὸ  $\frac{1}{3}$  ἔργου τινός, πέντε ἐξ αὐτῶν ἐγκατέλιπον τὴν ἐργασίαν. Μετὰ πόσας ἡμέρας οἱ ἀπομείναντες ἐργάται θ' ἀπεπερατώσουν τὸ ἔργον;

473.) Ὀδοιπόρος βαδίζων 6 ὥρας καθ' ἡμέραν διατρέχει διάστημα τι εἰς δέκα ἡμέρας. Ἐὰν αὐξήσῃ τὴν ταχύτητα αὐτοῦ κατὰ τὸ  $\frac{1}{5}$  τῆς προηγουμένης, ἐπὶ πόσας ὥρας θὰ βαδίξῃ καθ' ἡμέραν, ἵνα διατρέξῃ τὸ αὐτὸ διάστημα εἰς 4 ἡμέρας;

474.) Εἷς τι φρούριον εὐρίσκονται 1840 ἄνδρες καὶ ἔχουσι τροφὰς δι' ἓνα μῆνα. Πόσοι ἔπρεπε νὰ ἐξέλθωσι τοῦ φρουρίου ἵνα οἱ ἀπομένοντες περιορίζοντες ἕκαστος τὸ σιτηρέσιόν του εἰς τὰ  $\frac{2}{3}$  τοῦ προηγουμένου ἔχουσι τροφὰς διὰ δύο μῆνας;

475.) Ὑφάσματος πλάτους 1πῆχ. 3ρουπ. οἱ 25πῆχ. βρούπ. τιμῶνται 206 δραχμάς· πόσον τιμῶνται 15,50μέτρ. ὑφάσματος ἔχοντος πλάτος 1,4 πῆχ., δεδομένου ὄντος ὅτι δι' ὑφασμα ἐνδυμασίας ἐκ τοῦ πρώτου θὰ ἐπλήρυνέ τις διπλάσιον τῶν πληρωνομένων δι' ὑφασμα ἐνδυμασίας ἐκ τοῦ δευτέρου;

476.) Κρουνὸς χύνων 8δκ. 200δρ. ὕδατος εἰς 1π. πληροὶ δεξαμενὴν εἰς 14ῶρ. 45π.· εἰς πόσας ὥρας κρουνὸς χύνων 11δκ. 250δρ. ὕδατος εἰς 1π. θὰ πληρώσῃ δεξαμενὴν, ἧς ἡ χωρητικότης εἶναι τὰ  $\frac{7}{12}$  τῆς χωρητικότητος τῆς πρώτης;

477.) Πατὴρ τις καὶ οἱ δύο τοῦ υἱοῦ ἐκτελοῦσιν ἔργον τι εἰς 8 ἡμέρας. Εἰς πόσας ἡμέρας ὁ πατὴρ μετὰ τοῦ ἀδελφοῦ του καὶ ἑνὸς ἐκ τῶν υἱῶν του θὰ ἐκτελέσῃ ἔργον τριπλάσιον τοῦ πρώτου, δεδομένου ὄντος ὅτι τὸ ὑπὸ τοῦ πατρὸς ἢ τοῦ ἀδελφοῦ παραγόμενον ἔργον ἔχει λόγον πρὸς τὸ ὑφ' ἑκάστου υἱοῦ παραγόμενον, οἷον λόγον ἔχει ὁ 5 πρὸς τὸν 3 :

478.) Ὅταν δύο ποσὰ εἶναι ἀνάλογα πρὸς τρίτον, εἶναι πρὸς ἀλληλα ἀντίστροφα.

479. Ὅταν ἐκ τριῶν ποσῶν τὸ πρῶτον εἶναι ἀνάλογον πρὸς τὸ τρίτον, ἐνῶ τὸ δεύτερον εἶναι ἀντιστρόφως ἀνάλογον πρὸς τὸ τρίτον, τότε τὸ πρῶτον καὶ τὸ δεύτερον εἶναι ἀνάλογα.

### Συνεξευγμένη μέθοδος.

263. Πρόβλημα 1<sup>ον</sup> — Μὲ πόσας ἀγγλικὰς λίρας ἰσοδυναμοῦν 150 λίραι τουρκικαί, γνωστοῦ ὄντος ὅτι 5 τουρκικαὶ λίραι ἰσοδυνα-



μοῦσι πρὸς 114 δραχμὰς, 250 δὲ δραχμαὶ πρὸς 10 ἀγγλικὰς λίρας.

α') Εὐρίσκομεν (μέθοδ. τῶν τριῶν) ὅτι αἱ 5 τουρκικαὶ λίραι ὀθλ. αἰ 114 δραχ., ἰσοδυναμοῦν πρὸς  $10 \times \frac{114}{250}$  ἀγγλ. λίρ.

β') Ἦδη εὐρίσκομεν ὅτι 150 τουρκ. λίρ. ἰσοδυναμοῦν πρὸς  $10 \times \frac{114}{250} \times \frac{150}{5}$  ἀγγλ. λίρ.

Ἡ δὲ διά.αξι γίνεται ὡς ἑξῆς:

χ ἀγγλ. λίρ.	150 λίρ. τουρκ.
5 λίρ. τουρκ.	114 δραχ.
250 δραχ.	10 ἀγγλ. λίρ.

$$\text{ἔπου } \chi = \frac{150 \times 114 \times 10}{5 \times 250} \text{ ἤτοι}$$

τὸ γινόμενον τῶν ἀριθμῶν τῆς πρώτης στήλης ἰσοῦται τῷ γινόμενῳ τῶν ἀριθμῶν τῆς δευτέρας στήλης· ἐπειδὴ δὲ τὸ χ ἐκφράζει λίρας εὐρίσκομεν  $\chi = 136$  λίρ. 16 σελ.

Πρόβλημα 2ον.—Ἐμπορος ἠγόρασεν ἐκ Γαλλίας 500 μέτρα βελούδου πρὸς 8 δραχ. τὸ μέτρον· ἐκτελωνίσας δ' αὐτὸ ἐν Πειραιεὶ ἐπλήρωσεν εἰσαγωγικὸν δασμὸν 30 %· τοῦ ναύλου ὄντος 5 % καὶ τοῦ δημοτικοῦ δι' Ἀθήνας φόρου 1 %, πόσας δραχμὰς τοῦ στοιχίζει ὁ πῆχυς τοῦ ἐμπορίου ἐνταῦθα;

Διατάσσομεν ὡς ἑξῆς (ἔχοντες ὑπ' ὄψιν ὅτι βελούδον ἀρχικῆς ἀξίας 100 δρ. στοιχίζει εἰς Ἀθήνας μετὰ τῶν ἐξόδων 136 δρ.).

χ δρ.	1 πῆχυς
1 πῆχ.	0,648 μ.
1 μ	8 δραχ.
100 δραχ.	136 δραχ.

$$\chi \times 1 \times 1 \times 100 = 1 \times 0,648 \times 8 \times 136$$

$$\chi = \frac{0,648 \times 8 \times 136}{100} = 7,05 \text{ δρ. (περίπου).}$$

ΣΗΜ. Ὡς βλέπομεν, τὰ δεδομένα λαμβάνουν εἰδικὴν διάταξιν εἰς ἕκαστον πρόβλημα, ἐφ' ἧς δέον νὰ καταβάλληται ἰδιόζουσα ἐκάστοτε προσοχή.

Καὶ εἰς τὰ δύο ἀνωτέρω προβλήματα εἰργάσθημεν ὅπως καὶ εἰς τὰ προβλήματα τῆς συνθέτου μεθόδου τῶν τριῶν, ἦτοι ἀνελύσαμεν τὸ πρόβλημα εἰς ἄλλα τῆς ἀπλῆς μεθόδου τῶν τριῶν ἐνταῦθα ὁμοῦς ἢ κατάταξις γίνεται κατ' ἄλλον τρόπον.

Ἡ μέθοδος δι' ἧς ἐλύσαμεν αὐτὰ λέγεται *συνεξευγμένη*.

### Ἀσκήσεις.

480.) Ἡγόρασέ τις ἐν Ἀγγλίᾳ ὕφασμα πρὸς 1,15 τὴν ὑάρδαν, δαπανᾷ δὲ διὰ ναῦλον 20 % , διὰ εἰσαγωγικὸν δασμὸν καὶ λοιποὺς φόρους μέχρις Ἀθηνῶν 30 % . Πόσας δραχ. πρέπει νὰ πωλῇ τὸν πῆχυν, ἂν θέλῃ νὰ κερδίσῃ 60 % ;

481.) Προκειμένου ν' ἀναχωρήσῃ τις δι' Ἀμερικὴν θέλει νὰ μετατρέψῃ τὰ χρήματά του ἐκ 2500 τουρκικῶν λιρῶν εἰς δολλάρια. Γνωστοῦ ὄντος ὅτι 1 τουρκ. λίρ. ἰσοδυναμεῖ πρὸς 22,80 δραχ., τὸ δὲ δολλάριον πρὸς 5,20 δραχ., καὶ ὅτι ἐπλήρωσε δι' ἄμοιβὴν τοῦ ἀργυραμοιβοῦ  $\frac{3}{4}$  % , ζητεῖται πόσον θὰ λάβῃ εἰς δολλάρια.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.

### ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΚΟΥ

264.— Τόκος λέγεται τὸ κέρδος ὅπερ λαμβάνει τις ἐκ ποσοῦ χρημάτων τὰ ὁποῖα δανείζει· ὁ τόκος εἶναι ποσὸν ἐξαρθώμενον ἐκ τριῶν ἄλλων· 1<sup>ον</sup> τῆς δανειζομένης ποσότητος, τοῦ κεφαλαίου· 2<sup>ον</sup> τῆς διαρκείας τοῦ δανείου, τοῦ χρόνου, καὶ 3<sup>ον</sup> τοῦ ὀριζομένου τόκου δι' ἐκάστην μονάδα κεφαλαίου κατὰ συνθήκην 100 δραχ. δι' ἐκάστην χρονικὴν μονάδα, συνήθως ἔτος, ἦτοι τοῦ ἐπιτοκίου. Οὕτως, ἂν κατόπιν συμφωνίας ἕκαστον ἑκατοντάδραχμον κεφαλαίου δι' ἐκάστην χρονικὴν περίοδον φέροι τόκον 3 δραχ., λέγομεν ὅτι τὸ ἐπιτόκιον εἶναι 3. Τοῦτο δηλοῦμεν γράφοντες συμβολικῶς 3 % , ἀπαγγελλόμενον 3 τοῖς ἑκατόν.

Ὁ τόκος λέγεται *ἀπλοῦς*, ὅταν τὸ κεφάλαιον μένη, τὸ αὐτὸ καθ' ἑλὴν τὴν διάρκειαν τοῦ δανείου· *σύνθετος* δέ, ὅταν ὁ τόκος ἐκάστης χρονικῆς μονάδος προστίθεται εἰς τὸ κεφάλαιον καὶ τὸ εὑρισκόμενον ἄθροισμα ἀποτελῆ τὸ τοκίζόμενον κεφάλαιον διὰ τὴν ἐπομένην χρονικὴν μονάδα.

Ἐν τοῖς ἐπομένοις πρόκειται περὶ τόκου ἀπλοῦ.

Ἐκ τῶν εἰσερχομένων εἰς τὰ προβλήματα τοῦ τόκου ποσῶν κεφαλαίου *K*, χρόνου *X*, ἐπιτοκίου *E*, τόκου *T*, ὅταν δοθῶσι τρία, εὑρίσκομεν τὸ τέταρτον.

Οὕτως ἔχομεν 4 εἶδη προβλημάτων τόκου, καθ' ἕσον ζητεῖται τὸ *K*, ὁ *X*, τὸ *E*, ὁ *T*. Ὁ τόκος εἶναι προδήλως πρὸς πάντα τὰ λοιπὰ ἀνάλογος. Πάντα ὁμοίως τὰ ἄλλα ἀνά δύο εἶναι ἀντίστροφα.

Τὰ διάφορα προβλήματα τοῦ τόκου ἀνάγονται εἰς προβλήματα συνθέτου ἢ καὶ ἀπλῆς μεθόδου τῶν τριῶν.

α) Πόσον τόκον φέρει κεφάλαιον 3400 δραχμῶν εἰς 7 ἔτη πρὸς 5 %;

Κατατάσσομεν·

100 δραχ.	1 ἔτ.	5 δρ.
3400	7	T

---

Κατὰ τὰ ἐν τῇ (§ 260)

$$T = 5 \times \frac{3400}{100} \times \frac{7}{1} = \frac{5 \times 3400 \times 7}{100} = 1190 \text{ δραχ.}$$

καὶ γενικῶς

$$T = \frac{E \cdot K \cdot X}{100}$$

β) Εἰς πόσον χρόνον κεφάλαιον 3400 δραχ. τοκίζόμενον πρὸς 5 % φέρει τόκον 1190 δρ. ;

Κατατάσσομεν·

100 δρ.	1 ἔτ.	5 δρ.
3400	X	1190

$$X = 1 \times \frac{100}{3400} \times \frac{1190}{5} = \frac{1 \times 100 \times 1190}{3400 \times 5} = 7 \text{ ἔτη}$$

καὶ γενικῶς

$$X = \frac{T \cdot 100}{K \cdot E}$$

γ') Πόσον κεφάλαιον εἰς 2 ἔτη πρὸς 8 % φέρει τόκον 480 δραχμάς ;

Κατατάσσομεν·

$$\begin{array}{ccc} 100 \text{ δρ.} & 1 \text{ ἔτ.} & 8 \text{ δρ.} \\ \text{K} & 2 & 480 \end{array}$$

$$K = \frac{480 \times 100}{8 \times 2} = 3000$$

καὶ γενικῶς

$$K = \frac{T \cdot 100}{E \cdot X}$$

δ') Πρὸς ποῖον ἐπιτόκιον κεφάλαιον 3000 δραχ. εἰς 3 ἔτη ἔφερε τόκον 720 δραχ. ;

Κατατάσσομεν·

$$\begin{array}{ccc} 3000 \text{ δρ.} & 3 \text{ ἔτ.} & 720 \text{ δρ.} \\ 100 & 1 & E \end{array}$$

$$E = \frac{720 \times 100}{3000 \times 3} = 8 \text{ δρ.}$$

καὶ γενικῶς

$$E = \frac{T \cdot 100}{K \cdot X}$$

### Γενικοὶ τύποι λύσεως.

265. — Ἐχομεν εὔρει τοὺς ἐξῆς γενικοὺς τύπους·

$$T = \frac{K \cdot E \cdot X}{100}, \quad X = \frac{T \cdot 100}{K \cdot E}, \quad K = \frac{T \cdot 100}{X \cdot E}, \quad E = \frac{T \cdot 100}{K \cdot X}$$

ὅπου τὸ X παριστᾷ ἀριθμὸν ἐτῶν καὶ E τὸν τόκον τῶν 100 δραχ. εἰς ἓν ἔτος, ἦτοι ὁ χρόνος πρέπει νὰ μετρηθῆται μὲ τὴν αὐτὴν χρονικὴν μονάδα εἰς ἣν ἀναφέρεται τὸ ἐπιτόκιον· ἂν δὲν συμβαίη τοῦτο, πρέπει πρῶτον νὰ καταστήῃ ὁ χρόνος ὁμοειδῆς πρὸς τὴν μονάδα ταύτην καὶ εἶτα νὰ ἐφαρμοσθῶσιν οἱ τύποι. Π. χ. Ἄν ζητηθῆται ὁ τόκος K δρ. εἰς 8 μῆνας πρὸς E %, ὁ α' τύπος γίνεται

$$T = \frac{K \cdot E \cdot \frac{8}{12}}{100} \quad \eta \quad T = \frac{K \cdot E \cdot 8}{1200}$$

Ἄν δὲ ζητῆται ὁ τόκος εἰς 17 ἡμέρας, ὁ αὐτὸς τύπος γίνεται

$$T = \frac{\text{Κ.Ε.} \cdot \frac{17}{360}}{100} = \frac{\text{Κ.Ε.} \cdot 17}{36000}$$

Κατ' ἀνάλογον τρόπον ἐφαρμόζομεν εἰς τὰς περιστάσεις ταύτας καὶ τοὺς ἄλλους τύπους.

### Ἀσκήσεις.

482.) Ἐκ δύο ἀδελφῶν ὁ μὲν εἰς τοκίζει 5000 δραχμὰς πρὸς 4,5%, ὁ δὲ ἕτερος τοκίζει 3000 πρὸς 5% καὶ 2000 πρὸς 3,5%. Ποῖος ἐκ τῶν δύο κερδίζει περισσότερα;

483.) Ἡγόρασέ τις οἰκίαν ἀντὶ 21000 δραχμῶν· ἐξοδεύει δὲ δι' ἐπισκευὰς καὶ λοιπὰ κατ' ἔτος 200 δραχμὰς· πόσον πρέπει νὰ τὴν ἐνοικιάσῃ, διὰ νὰ κερδίσῃ 10% ἐπὶ τῶν χρημάτων του;

484.) Ποῖον κεφάλαιον τοκίζομενον πρὸς 6% φέρει εἰς 5 ἔτη τόσον τόκον ὅσον 4500 δραχμαὶ εἰς 7 ἔτη πρὸς 5%;

485.) Πόσον τόκον φέρει κεφάλαιον 2360 δρ. πρὸς 7% εἰς 2 ἔτ. 4 μ. 16 ἡμ.

486.) Εἰς πόσον χρόνον κεφάλαιόν τι τοκίζομενον πρὸς 6,5% διπλασιάζεται;

487.) Μετὰ πάροδον 30 μηνῶν κεφάλαιόν τι ἠϋξῆσε κατὰ τὸ  $\frac{1}{4}$  αὐτοῦ. Πρὸς ποῖον ἐπιτόκιον εἶχε τοκισθῆ;

488.) Πρὸς ποῖον ἐπιτόκιον κεφάλαιον 8000 δραχμῶν εἰς 2 ἔτη καὶ 6 μῆνας γίνεται μετὰ τῶν τόκων του 8640 δρ.;

489.) Δανείσας τις πρὸς 6% χρήματα ἔλαβε μετὰ 1 ἔτος καὶ 6 μῆνας ὡς κεφάλαιον καὶ τόκον 8720 δρχ.· ποῖον τὸ κεφάλαιον;

490.) Δανεῖζει τις τὰ μὲν  $\frac{3}{4}$  τῶν χρημάτων του πρὸς 8%· τὸ δὲ  $\frac{1}{3}$  πρὸς 9% καὶ ἀπολαμβάνει ἐξ ἀμφοτέρων τὴν ἑξαμηνίαν 108 δραχ. Ποῖον τὸ κεφάλαιον;

491.) Εἰς τὰς εἰσιτηρίους διὰ τὸ γυμνάσιον ἐξετάσεις εἶχε δοθῆ πρὸς λύσιν πρόβλημα ἐν ᾧ ἐζητεῖτο ὁ τόκος κεφαλαίου τινὸς πρὸς 4 % εἰς 73 ἡμέρας. Δὲν εὔρον ὁμως τὸ αὐτὸ ἐξαγομένον ὅσοι τὸ ἔλυσαν ὀρθῶς, διότι ἄλλοι ἔπελόγισαν τὸ ἔτος ὡς ἔχον 360 ἡμέρας καὶ ἄλλοι ὡς 365. Ἡ διαφορὰ τῶν δύο εὔρεθέντων ἐξαγομένων ἦτο 10 λεπτά. Ποῖον τὸ κεφάλαιον ;

492.) Εἰσπρακτῶρ τις τοῦ Δημοσίου εἰσέπραξε φόρους 132564 δρχ. λαμβάνει δὲ  $\frac{1}{4}$  ἐπὶ τοῖς 100. πόσα πρέπει νὰ λάβῃ ἐκ τῶν εἰσπραχθέντων; Ἦτοι νὰ εὔρεθῶσι τὰ ποσοστὰ αὐτοῦ.


493.) Ποίαν μεσιτείαν ἐπληρώσαμεν πρὸς  $\frac{1}{3}$  % δι' ἐμπόρευμα πληρωθὲν μὲ 285 ἀγγλικὰς λίρας ;

494.) Ἐπὶ τίνος ποσοῦ πωλήσεως ἐπληρώθησαν 38,40 φράγ. διὰ μεσιτείαν πρὸς  $\frac{1}{2}$  %;

495.) Τί θὰ πληρώσωμεν δι' ἀσφάλειαν ἐμπορεύματος 100000 δρχ. πρὸς  $\frac{1}{4}$  τοῖς % ;

496.) Πότε ἔχομεν μεγαλύτερον τόκον· ἐὰν τοκίσωμεν κεφάλαιόν τι πρὸς 3 % ἐπὶ 97 ἡμέρας ἢ ἐὰν τοκίσωμεν αὐτὸ πρὸς  $3\frac{1}{4}$  % ἐπὶ 89 ἡμέρας ;

497.) Ἀγοράσας τις οἰκίαν ἐπώλησεν αὐτὴν ἀντὶ 43500 δρ., ἐκέρδισε δὲ οὕτω 16 %. Ζητεῖται ἀντὶ πόσου ἠγοράσθη ἡ οἰκία, ἂν ὑποτεθῇ ὅτι τὸ κέρδος ἐλογίσθη ἐπὶ τῆς τιμῆς α') τῆς ἀγορᾶς, β') τῆς πωλήσεως;



## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ.

## ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΦΑΙΡΕΣΕΩΣ

266. — Τὸ ποσὸν καθ' ὃ ἐκπίπτει ἐν χρέος, δταν τοῦτο πληρώνεται πρὸ τῆς διορίας του, λέγεται *υφαίρεσις*. τὸ ποσὸν ἀντὶ τοῦ ὁποίου προεξοφλεῖται τότε τὸ χρέος λέγεται *παροῦσα ἀξία*.

267. — Πρόβλημα. Γραμματίον 5100 δραχμῶν προεξοφλεῖται 4 μῆνας πρὸ τῆς λήξεώς του πρὸς 6 % . Πόσῃν υφαίρεσιν ὑφίσταται ;

Λύσις. — Συνήθως τὴν ζητουμένην υφαίρεσιν θεωροῦμεν ὡς τόκον τῶν 5100 δρ. διὰ 4 μῆνας πρὸς 6 % , καὶ ἔχομεν

$$Γ = \frac{5100 \times \frac{4}{12} \times 6}{100} = \frac{5100 \times 2}{100} = 102$$

Ἡ τοιαύτη υφαίρεσις καλεῖται *ἐξωτερικὴ υφαίρεσις*, (ἢ καὶ *ἐμπορικὴ*) ὥστε :

Α' Ἐξωτερικὴ υφαίρεσις καλεῖται ὁ τόκος τοῦ ἐν τῷ γραμματίῳ περιεχομένου ποσοῦ διὰ τὸν χρόνον ὅστις παρέρχεται ἀπὸ τῆς ἡμέρας τῆς προεξοφλήσεως μέχρι τῆς ἡμέρας τῆς λήξεως τοῦ γραμματίου.

Β' Εἰς τὸ προηγούμενον πρόβλημα ἡ ἔκπτωσης εἶναι 102 δρ. ἐπομένως ἡ παροῦσα ἀξία εἶναι  $5100 - 102 = 4998$  δραχ. Παρατηροῦμεν ὅτι ὁ τόκος τῆς παρούσης ἀξίας, δηλαδή τῶν 4998 δραχ. εἰς 4 μῆνας, δὲν εἶναι 102 δρ., ἦτοι ὅτι τὸ ἄθροισμα τῆς παρούσης ἀξίας καὶ τῶν τόκων αὐτῆς εἶναι μικρότερον τῶν 5100 δραχμῶν, δηλαδή τῆς ὀνομαστικῆς ἀξίας.

Ἄν ἀλλάξωμεν τὴν παρούσαν ἀξίαν καταλλήλως, ὥστε ἄθροισμα παρούσης ἀξίας καὶ τόκου αὐτῆς νὰ δίδῃ τὴν ὀνομαστικὴν, τότε τὸν τόκον τῆς τοιαύτης παρούσης ἀξίας καλοῦμεν *ἐσωτερικὴν υφαίρεσιν* ὥστε·

Ἐσωτερικὴ υφαίρεσις καλεῖται ὁ τόκος τῆς παρούσης ἀξίας, δταν ὡς τοιαύτη ληφθῇ ποσὸν ὅπερ μετὰ τοῦ τόκου ἄθροισόμενον δίδει τὴν ὀνομαστικὴν ἀξίαν.

Καὶ εἰς τὴν ἐσωτερικὴν ὑφαίρεσιν λαμβάνομεν ὡς χρόνον τὸν μεσολαβοῦντα ἀπὸ τῆς προεξοφλήσεως μέχρι τῆς λήξεως τοῦ γραμματίου.

Ἄς ζητήσωμεν ἐν τῷ προηγουμένῳ προβλήματι τὴν ἐσωτερικὴν ὑφαίρεσιν· ἂν ἡ παροῦσα ἀξία ἦτο 100 δρ., ἡ ἐσωτερικὴ ὑφαίρεσις θὰ ἦτο ὁ τόκος αὐτῆς εἰς 4 μῆνας πρὸς 6<sup>0</sup>/<sub>100</sub>, ἦτο 2 δραχ., καὶ ἡ ὀνομαστικὴ ἀξία θὰ ἦτο τότε 102 δραχ. ὥστε:

Εἰς ὀνομ. ἀξίαν 102 δραχμῶν ἀντιστοιχεῖ ὑφαίρ. ἐσωτερικὴ 2 δραχμῶν.

Εἰς διπλασίαν ὀνομ. ἀξίαν θ' ἀντιστοιχῆ προφανῶς διπλασία ὑφαίρ. ἐσωτερ. κ. ο. κ. ἦτοι·

Ἡ ἐσωτερικὴ ὑφαίρεσις εἶναι ἀνάλογος τῆς ὀνομ. ἀξίας.

Καὶ ἐπομένως εἰς ὀνομαστικὴν ἀξίαν 5100δρ. ἔχομεν ἐσ. ὑφαίρ.

$$\frac{5100 \times 2}{102} = 100 \text{ δραχμαί.}$$

Καὶ γενικῶς ἡ ἐσωτερικὴ ὑφαίρεσις ὡς δίδεται ὑπὸ τοῦ τύπου

$$υ' = \frac{K \cdot \tau}{100 + \tau}$$

ὅπου K ἡ ὀνομαστικὴ ἀξία καὶ τ ὁ τόκος τῶν 100 δραχμ. διὰ τὸν χρόνον ὅστις παρέρχεται ἀπὸ τῆς προεξοφλήσεως μέχρι τῆς λήξεως τοῦ γραμματίου.

### Ἀσκήσεις.

498.) Διατί ἡ ἐσωτερικὴ ὑφαίρεσις δὲν εἶναι ἀνάλογος οὔτε τοῦ χρόνου οὔτε τοῦ ἐπιτοκίου;

499.) Νὰ δειχθῆ ὅτι ἡ παροῦσα ἀξία ἐν τῇ ἐσωτερικῇ ὑφαίρεσει δίδεται ὑπὸ τοῦ τύπου

$$II = \frac{K \cdot 100}{100 + \tau}$$

500.) Νὰ δειχθῆ ὅτι ἡ ἐσωτερικὴ ὑφαίρεσις γραμματίου καὶ ὁ τόκος αὐτῆς ἔχουσιν ὡς ἄθροισμα τὴν ἐξωτερικὴν ὑφαίρεσιν.

501.) Ποία εἶναι ἡ ὀνομαστικὴ ἀξία γραμματίου προεξοφλουμένου 3 μῆνας πρὸ τῆς λήξεώς του πρὸς 6<sup>0</sup>/<sub>100</sub>, ἐὰν ἡ διαφορά μεταξὺ ἐξωτερικῆς καὶ ἐσωτερικῆς ὑφαίρεσεως εἶναι 4,5 δραχμαί;

502.) Γραμμάτιον 2000 δραχμ. λήγον τὴν 31 Ἰουλίου προ-



εξωφλήθη τὴν 1 Μαΐου πρὸς 6 % . Ζητεῖται ἡ ἔξωτ. ὑφαίρεσις.

503.) Γραμμάτιον 1500 δραχμ. προεξωφλήθη μὲ ἔξωτερ. ὑφαίρ. 4 μῆνας πρὸ τῆς λήξεώς του ἀντὶ δραχμῶν 1470. Πρὸς ποῖον ἐπιτόκιον ἐγένετο ἡ προεξόφλησις ;

504.) Πόσον χρόνον πρὸ τῆς λήξεώς του προεξωφλήθη γραμμάτιον 3250 δραχ., ὅταν ἡ ἔξωτ. ὑφαίρεσις του εἶναι 52 δρ. πρὸς 9 % ;

505.) Τίς ἡ ὄνομ. ἀξία γραμματίου προεξοφληθέντος 3 μῆνας πρὸ τῆς λήξεώς του μὲ ἔξωτ. ὑφαίρεσιν πρὸς 6 % ἀντὶ δραχμῶν 2955 ;

506.) Τίς ἡ ἐσωτερικὴ ὑφαίρεσις γραμματίου 10200 δρ. προεξοφληθέντος 3 μῆνας πρὸ τῆς λήξεώς του πρὸς 8 % καὶ τίς ἡ παροῦσα ἀξία ;

507.) Πόσον χρόνον πρὸ τῆς λήξεώς του προεξωφλήθη γραμμάτιον ἀντὶ 8000 μὲ ἔσωτ. ὑφαίρ. 100 δραχμ., τοῦ ἐπιτοκίου ὄντος 5 % ;

508.) Γραμμάτιον 6480 δρ. προεξωφλήθη  $2\frac{1}{2}$  μῆνας πρὸ τῆς λήξεώς του μὲ ἔσωτ. ὑφαίρεσιν 80 δραχμ. Πρὸς πόσον τοῖς ἑκατὸν ὑπελογίσθη ἡ ὑφαίρεσις ;

509.) Ἐχει τις δύο γραμμάτια, τὸ μὲν 1500 δρ. λήγον μετὰ 160 ἡμέρας ἀπὸ σήμερον, τὸ δὲ 1200 λήγον μετὰ 7 μῆνας. Θέλει νὰ τὰ ἀντικαταστήσῃ δι' ἑνὸς γραμματίου ὅπερ νὰ λήγῃ μετὰ 130 ἡμέρας ἀπὸ σήμερον· τίς ἡ ὄνομαστ. ἀξία αὐτοῦ, ἂν ἡ προεξόφλησις γίνῃ α') μὲ ἔξωτερ. ὑφαίρεσιν, β') μὲ ἐσωτερικὴν, τοῦ ἐπιτοκίου ὄντος 6 % ;

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'.

## ΜΕΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣ ΜΕΡΗ ΑΝΑΛΟΓΑ

## Ὅρισμός.

268. — Πολλαπλασιάσωμεν τοὺς ἀριθμοὺς 3, 5, 8 ἐπὶ τυχόντα ἀριθμὸν, π.χ. τὸν 4. Λαμβάνομεν τοὺς ἀριθμοὺς 12, 20, 32, οἵτινες λέγονται ἀνάλογοι πρὸς τοὺς ἀριθμοὺς 3, 5, 8, διότι οἱ λόγοι  $\frac{12}{3}$ ,  $\frac{20}{5}$ ,  $\frac{32}{8}$  εἶναι ἴσοι.

Γενικῶς οἱ ἀριθμοὶ  $\chi$ ,  $\psi$ ,  $\omega$  . . . . λέγονται ἀνάλογοι πρὸς τοὺς  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  . . . , ἐὰν ὁ ἀριθμὸς ἐπὶ τὸν ὁποῖον πολλαπλασιάζεται ὁ  $\alpha$  ἴνα δώσῃ τὸν  $\chi$  εἶναι ὁ αὐτὸς μὲ τὸν ἀριθμὸν ἐπὶ τὸν ὁποῖον πολλαπλασιάζεται ὁ  $\beta$  ἴνα δώσῃ τὸν  $\psi$  καὶ ὁ  $\gamma$  ἴνα δώσῃ τὸν  $\omega$ . ἤτοι οἱ ἀριθμοὶ  $\chi$ ,  $\psi$ ,  $\omega$  εἶναι ἀνάλογοι πρὸς τοὺς  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ , ἐὰν

$$\frac{\chi}{\alpha} = \frac{\psi}{\beta} = \frac{\omega}{\gamma} = \dots$$

## Ἀσκήσεις.

510.) Ἐὰν ἀριθμοὶ τινες εἶναι ἀνάλογοι πρὸς τοὺς ἀριθμοὺς  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ , εἶναι ἀνάλογοι καὶ πρὸς τοὺς ἀριθμοὺς  $2\alpha$ ,  $2\beta$ ,  $2\gamma$ , καὶ γενικῶς πρὸς τοὺς ἀριθμοὺς  $\rho\alpha$ ,  $\rho\beta$ ,  $\rho\gamma$ . Π. χ. οἱ ἀριθμοὶ 5, 8, 10 οἵτινες εἶναι ἀνάλογοι τῶν 25, 40, 50 θὰ εἶναι ἀνάλογοι καὶ τῶν ἀριθμῶν 50, 80, 100.

511.) Ἐὰν οἱ ἀριθμοὶ  $\chi$ ,  $\psi$ ,  $\omega$  εἶναι ἀνάλογοι πρὸς τοὺς ἀριθμοὺς  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ , τότε καὶ οἱ ἀριθμοὶ  $\chi$ ,  $\psi$ ,  $\omega$ ,  $\chi + \psi + \omega$  θὰ εἶναι ἀνάλογοι τῶν ἀριθμῶν  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ ,  $\alpha + \beta + \gamma$ .

512.) Ἐὰν οἱ ἀριθμοὶ  $\chi$ ,  $\psi$ ,  $\omega$  εἶναι ἀνάλογοι πρὸς τοὺς  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ , καὶ οἱ ἀριθμοὶ  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  θὰ εἶναι ἀνάλογοι πρὸς τοὺς  $\chi$ ,  $\psi$ ,  $\omega$ .

## Ἐκτέλεσις μερισμοῦ.

269. — Ἐστω ἤδη εἶτι δίδονται ἀριθμοὶ τινες, π. χ. οἱ 6, 9, 10, καὶ ζητοῦνται ἄλλοι  $\chi$ ,  $\psi$ ,  $\omega$ , ἀνάλογοι πρὸς αὐτοὺς καὶ μὲ ὠρισμένον ἄθροισμα, π. χ. τὸ 75.

Κατὰ τὰ προηγούμενα ζητοῦμεν νὰ ἔχωμεν

$$\frac{\chi}{6} = \frac{\psi}{9} = \frac{\omega}{10},$$

ἢ καὶ  $\frac{\chi}{6} = \frac{\psi}{9} = \frac{\omega}{10} = \frac{75}{6+9+10},$  ἔθεν

$$\frac{\chi}{6} = \frac{75}{6+9+10} \quad \text{ἦτοι} \quad \chi = \frac{75 \times 6}{6+9+10}$$

ὁμοίως εὐρίσκομεν

$$\psi = \frac{75 \times 9}{6+9+10} \quad \text{καὶ} \quad \omega = \frac{75 \times 10}{6+9+10}.$$

Ἐμερίσαμεν ἐνταῦθα τὸν ἀριθμὸν 75 εἰς μέρη ἀνάλογα τῶν ἀριθμῶν 6, 9, 10· τουτέστι

Νὰ μερισθῇ ἀριθμὸς τις  $K$  εἰς μέρη ἀνάλογα ἄλλων ἀριθμῶν  $\alpha, \beta, \gamma$ , σημαίνει νὰ εὕρωμεν τρεῖς ἄλλους ἀριθμοὺς ἔχοντας ἄθροισμα τὸν  $K$  καὶ ἀναλόγους πρὸς τοὺς  $\alpha, \beta, \gamma$ .

ἦτοι οἱ ζητούμενοι ἀριθμοὶ  $\chi, \psi, \omega$  θὰ εἶναι τοιοῦτοι ὥστε

$$\frac{\chi}{\alpha} = \frac{\psi}{\beta} = \frac{\omega}{\gamma} \quad \text{καὶ} \quad \chi + \psi + \omega = K$$

Ἄλλ' ἔχομεν

$$\frac{\chi}{\alpha} = \frac{\psi}{\beta} = \frac{\omega}{\gamma} = \frac{\chi + \psi + \omega}{\alpha + \beta + \gamma}$$

ἢ καὶ  $\frac{\chi}{\alpha} = \frac{\psi}{\beta} = \frac{\omega}{\gamma} = \frac{K}{\alpha + \beta + \gamma}$  ἔθεν

$$\frac{\chi}{\alpha} = \frac{K}{\alpha + \beta + \gamma}, \quad \frac{\psi}{\beta} = \frac{K}{\alpha + \beta + \gamma}, \quad \frac{\omega}{\gamma} = \frac{K}{\alpha + \beta + \gamma}$$

καὶ ἐπομένως προκύπτουσιν ὡς γενικοὶ τύποι λύσεως οἱ ἑξῆς·

$$\chi = \frac{K \cdot \alpha}{\alpha + \beta + \gamma}, \quad \psi = \frac{K \cdot \beta}{\alpha + \beta + \gamma}, \quad \omega = \frac{K \cdot \gamma}{\alpha + \beta + \gamma}. \quad (1)$$

II  $\chi$ . Νὰ μοιρασθῶσι 15000 δκάδες σίτου εἰς τρεῖς συνοικισμοὺς ἀναλόγως τοῦ πληθυσμοῦ αὐτῶν· τοῦ πρώτου ὁ πληθυσμὸς εἶναι 600 κατ., τοῦ δευτέρου 450 καὶ τοῦ τρίτου 350.

Παρατηροῦμεν ὅτι καὶ τῶν τριῶν χωρῶν οἱ κάτοικοι

ἦτοι	οἱ	1400	θὰ λάβωσι	15000 δκ.
		δ	1 θὰ λάβῃ	15000
				1400
	οἱ	600		15000 × 600
				1400
	οἱ	150		15000 × 150
				1400
καὶ	οἱ	350		15000 × 350
				1400

Τὰ αὐτὰ θὰ εὐρίσκομεν καὶ ἐκ τῶν γενικῶν τύπων.

270.— Οἱ τύποι (1) δεικνύουσιν ὅτι:

α'.) Ἐὰν ἐκ τῶν δεδομένων  $\alpha, \beta, \gamma, K$  ἀλλάξωμεν τὴν τιμὴν τοῦ  $K$ , ἀλλάσσουν καὶ αἱ τιμαὶ τῶν  $\chi, \psi, \omega$ , ἦτοι αἱ τιμαὶ τῶν  $\chi, \psi, \omega$  εἶναι συναρτήσεις τῶν τιμῶν τοῦ  $K$  (§ 256). Καὶ μάλιστα, ἐὰν ὁ  $K$  πολλαπλασιασθῇ ἐπὶ  $\rho$ , καὶ ὁ  $\chi$  θὰ πολλαπλασιασθῇ ἐπὶ  $\rho$ , ἦτοι ὁ  $K$  καὶ ὁ  $\chi$  μεταβάλλονται ἀναλόγως ἐπίσης ὁ  $K$  καὶ ὁ  $\psi$  ὡς ἐπίσης ὁ  $K$  καὶ ὁ  $\omega$ .

β'.) Ἐὰν ἐκ τῶν  $\alpha, \beta, \gamma, K$  ἀφήσωμεν τὸν  $K$  ἀμετάβλητον, πολλαπλασιάσωμεν δὲ τὰ  $\alpha, \beta, \gamma$  ἐπὶ  $\rho$ , αἱ τιμαὶ τῶν  $\chi, \psi, \omega$  δὲν μεταβάλλονται, ἦτοι τὰ μερίδια ἅτινα θὰ προκύψωσιν, ἔταν μερίσωμεν τὸν  $K$  ἀναλόγως τῶν  $\alpha, \beta, \gamma$ , θὰ προκύψωσι τὰ αὐτὰ, ἔταν μερίσωμεν τὸν  $K$  ἀναλόγως τῶν  $\rho\alpha, \rho\beta, \rho\gamma$ . Ἔνεκα τούτου ἀπλοποιοῦνται πολλάκις αἱ πράξεις.

II.  $\chi$ . νὰ μερισθῇ ὁ 30 ἀναλόγως τῶν

$$\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{6}.$$

Μερίζομεν αὐτὸν ἀναλόγως τῶν

$$\frac{1}{2} \times 6, \quad \frac{1}{3} \times 6, \quad \frac{1}{6} \times 6,$$

ἦτοι ἀναλόγως τῶν 3, 2, 1 καὶ εὐρίσκομεν  $\chi=15, \psi=10, \omega=5$ .

271.— Νὰ μερίσωμεν ἀριθμὸν τινα  $K$  εἰς μέρη ἀντιστρόφως ἀνάλογα τῶν ἀριθμῶν  $\alpha, \beta, \gamma$  σημαίνει νὰ μερίσωμεν αὐτὸν εἰς μέρη ἀνάλογα τῶν ἀριθμῶν  $\frac{1}{\alpha}, \frac{1}{\beta}, \frac{1}{\gamma}$ , ὅτινες εἶναι ἀντίστροφοι τῶν δοθέντων.

**Ἀσκήσεις.**

513.) Νὰ μερισθῇ ὁ 96 ἀναλόγως τῶν ἀριθμῶν  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{5}{8}$ .

514.) Νὰ μερισθῇ ὁ 240 ἀντιστρόφως ἀναλόγως τῶν ἀριθμῶν  $\frac{3}{2}$ ,  $\frac{2}{5}$ .

515.) Νὰ μοιρασθῶσι 4000 δραχμαὶ εἰς 3 ἀνθρώπους οὕτως ὥστε ὁ μὲν α' νὰ λάβῃ τὰ τριπλάσια τοῦ β', ὁ δὲ γ' τὰ διπλάσια τοῦ β'.

516.) Νὰ μοιρασθῶσι 5000 δραχ. εἰς 4 ἀνθρώπους, οὕτως ὥστε τὸ μερίδιον τοῦ α' πρὸς τὸ τοῦ β' νὰ ἔχη λόγον  $\frac{5}{6}$ , τὸ μερίδιον τοῦ β' πρὸς τὸ τοῦ γ'  $\frac{12}{13}$  καὶ τὸ τοῦ γ' πρὸς τὸ τοῦ δ'  $\frac{26}{27}$ .

517.) Πρόκειται νὰ μοιρασθῇ ποσὸν τι εἰς 3 ἀνθρώπους, οὕτως ὥστε ὁ πρῶτος νὰ λάβῃ τὸ ἥμισυ τοῦ ποσοῦ καὶ 200 δραχμᾶς, ὁ δεύτερος νὰ λάβῃ τὸ τέταρτον τοῦ ποσοῦ καὶ 300 δραχμᾶς, καὶ ὁ τρίτος τὸ πέμπτον τοῦ ποσοῦ καὶ 800 δραχμᾶς. Πόσα; δραχμᾶς θὰ λάβῃ ἕκαστος ;

**Προβλήματα ἐταιρείας.**

272. — Πρόκειται ἐναυθὰ νὰ μερισθῇ κέρδος ἢ ζημία ἐπιχειρήσεως μεταξὺ συνεταιρῶν ὧν ἕκαστος εἶχε καταβάλλει κεφάλαιόν τι ἐπὶ χρόνον τινὰ διὰ τὴν ἐπιχείρησιν.

Α'. Πρόβλημα. Νὰ μοιρασθῇ κέρδος 4800 δραχμῶν μεταξὺ τριῶν συνεταιρῶν οἵτινες κατέβαλον διὰ τὸν αὐτὸν χρόνον ὁ α' 2500 δραχμᾶς, ὁ β' 2000 δραχμᾶς, ὁ γ' 1000 δραχμᾶς.

Λύσις. — Ἐὰν κληθῇ α τὸ εἰς ἐκάστην δραχμὴν τοῦ ἐταιρικοῦ κεφαλαίου ἀντιστοιχοῦν κέρδος, τότε τὰ κέρδη τῶν συνεταιρῶν θὰ εἶναι κατὰ σειρὰν  $\alpha \times 2500$ ,  $\alpha \times 2000$ ,  $\alpha \times 1000$ , ἤτοι εἶναι ἀνάλογα πρὸς τοὺς ἀριθμοὺς 2500, 2000, 1000, ἐπεὶ δὲ πρέπει τὸ ἄθροισμα αὐτῶν νὰ εἶναι ἴσον πρὸς 4800 εἶναι εὐνόητον ὅτι πρέπει νὰ μερίσωμεν τὸ κέρδος 4800 εἰς μέρη ἀνάλογα πρὸς τὰ κεφάλαια. Τὰ ζητούμενα λοιπὸν κέρδη εἶναι :

$$\frac{4800 \times 2500}{2500 + 2000 + 1000}$$

$$\frac{4800 \times 2000}{2500 + 2000 + 1000}, \quad \frac{4800 \times 1000}{2500 + 2000 + 1000}$$

ἦτοι ἐμερίσαμεν τὸ κέρδος εἰς μέρη ἀνάλογα πρὸς τὰ κεφάλαια.

Β'. Πρόβλημα. Ἐμπορος ἤρχισεν ἐπιχειρήσιν μετ' 20000 δρ., 6 μῆνας βραδύτερον αὐτὸς μὲν κατέθεσεν ἄλλας 12500 δραχμάς, δεύτερος δὲ ἔμπορος κατέθεσε 10000 δραχμάς. Μετὰ τρία ἔτη ἀπὸ τῆς πρώτης ἐνάρξεως τῆς ἐπιχειρήσεως ἐμοιράσθησαν κέρδος 60000 δραχμῶν· πόσον τὸ κέρδος ἐκάστου;

Λύσις. Ἐὰν καλέσωμεν δ τὸ κέρδος ὅπερ φέρει 1 δραχμῆ εἰς 1 μῆνα, θὰ ἔχωμεν ὅτι

$$\begin{array}{lll} \alpha\acute{\iota} \ 20000 \ \delta\rho. \ \text{εἰς} \ 36 \ \mu\eta\nu. & \theta\acute{\alpha} \ \phi\acute{\epsilon}\rho\omega\sigma\iota \ \kappa\acute{\epsilon}\rho\delta\omicron\varsigma & 20000 \times 36 \times \delta \\ \alpha\acute{\iota} \ 12000 & \text{εἰς} \ 30 \ \mu\eta\nu. & \gg \quad \quad \quad : 20000 \times 30 \times \delta \\ \alpha\acute{\iota} \ 10000 & \text{εἰς} \ 30 \ \mu\eta\nu. & \gg \quad \quad \quad 10000 \times 30 \times \delta \end{array}$$

ἐπομένως τὸ ἐξ 60000 δραχμῶν κέρδος θὰ ἰσοῦται πρὸς τὸ

$$20000 \times 36 \times \delta + 12000 \times 30 \times \delta + 10000 \times 30 \times \delta$$

ἦτοι  $(20000 \times 36 + 12000 \times 30 + 10000 \times 30) \times \delta = 60000$

$$\text{ἐπομένως} \quad \delta = \frac{60000}{20000 \times 36 + 12000 \times 30 + 10000 \times 30}$$

καὶ ἐπομένως τὸ κέρδος τοῦ α' ἐκ τῆς α' καταθέσεως ὅπερ εἶναι ἴσον μετ'  $20000 \times 36 \times \delta$  θὰ ἰσοῦται πρὸς

$$\frac{20000 \times 36 \times 60000}{20000 \times 36 + 12000 \times 30 + 10000 \times 30}$$

Ὅμοίως εὐρίσκονται τὸ κέρδος τοῦ α' ἐκ τῆς β' καταθέσεως καὶ τὸ κέρδος τοῦ β'.

Ἦτοι πρὸς λύσιν τοῦ προβλήματος ἀρκεῖ νὰ μερίσωμεν τὸ κέρδος τῶν 60000 δραχ. εἰς μέρη ἀνάλογα πρὸς τὰ γινόμενα τῶν κεφαλαίων ἐπὶ τοὺς ἀντιστοιχοῦντας χρόνους.

### Ἀσκήσεις.

518.) Ἐκ τριῶν μαθητῶν ὁ α' εἶχεν ἀγοράσει 5 τετράδια, ὁ β' 4 καὶ ὁ γ' 3· τέταρτος μαθητῆς μὴ προφθάσας ν' ἀγοράσῃ ἐμοιράσθη μετ' αὐτῶν τὰ τετράδια καὶ ἔδωκεν εἰς αὐτοὺς 60 λεπτά· πόσα λεπτά θὰ λάβῃ ἕκαστος ἐκ τῶν τριῶν πρώτων;

519.) Ἐκ τεσσάρων ἐμπόρων ὁ πρῶτος κατέθεσε δι' ἐπιχείρησιν τινὰ τὰ  $\frac{3}{4}$  τῶν κατατεθέντων ὑπὸ τοῦ δευτέρου διὰ τὴν αὐτὴν ἐπιχείρησιν καὶ 6 μῆνας πρὸ αὐτοῦ· ὁ δὲ τρίτος 8 μῆνας μετὰ τὸν δεύτερον κατέθεσε τετραπλάσια τῶν τοῦ τετάρτου, ὅστις εἶχε καταθέσει τὰ  $\frac{5}{8}$  τῶν τοῦ πρώτου καὶ δύο ἔτη μετ' αὐτόν· τὸ προκῦψαν κέρδος μετὰ πάροδον ἑνὸς ἔτους ἀπὸ τῆς προσελεύσεως τοῦ τετάρτου ἦτο 24000 δραχμῶν. Πῶς θὰ τὸ μοιρασθῶσιν;

520.) Καταστηματάρχης ἐμοίρασεν εἰς τρεῖς ὑπαλλήλους 12400 δραχμὰς ἀναλόγως τοῦ χρόνου τῆς ὑπηρεσίας καὶ τῆς ἡλικίας ἐκάστου· ὁ α' εἶχεν ὑπηρετήσῃ ἐπὶ 6 μῆνας, ἦτο δὲ ἡλικίας 27 ἐτῶν· ὁ β' εἶχεν ὑπηρετήσῃ ἐπὶ 10 μῆνας, εἶχε δὲ ἡλικίαν 30 ἐτῶν, καὶ ὁ γ' εἶχεν ὑπηρετήσῃ ἐπὶ 2 ἔτη, εἶχε δὲ ἡλικίαν 40 ἐτῶν. Πόσα ἔδωκεν εἰς ἕκαστον;

521.) Τέσσαρες συνεταῖροι κατέβαλον διὰ τινὰ ἐπιχείρησιν, ὁ α' 36000 δραχμὰς, ὁ β' 50000, ὁ γ' 64000 καὶ ὁ δ' 35000· ἐκ τοῦ κέρδους ἔδωκαν εἰς μὲν τοὺς ὑπαλλήλους τὸ  $\frac{1}{45}$ , εἰς τὸν διευθυντὴν δὲ τοῦ καταστήματος 3 % ἐπὶ τοῦ κέρδους· ἔλαβε δὲ οὗτος 4000 δραχμὰς. Πόσον τὸ κέρδος τῶν ὑπαλλήλων καὶ ἐκάστου τῶν συνεταίρων;

522.) Τὸ κέρδος μιᾶς ἐπιχειρήσεως εἰς τὸ τέλος τοῦ πρώτου ἔτους εὐρέθη ὅτι ἦτο 72000 δραχ· ὁ διευθύνων τὴν ἐπιχείρησιν ἔλαβε τὸ  $\frac{1}{8}$  αὐτοῦ· τὸ  $\frac{1}{2}$  τῶν  $\frac{7}{9}$  τοῦ ὑπολοίπου προσετέθη εἰς τὰ κεφάλαια· τὰ  $\frac{35}{36}$  τοῦ νέου ὑπολοίπου διανεμήθησαν εἰς

τοὺς μετόχους καὶ τὸ ἀπομείναν ὑπόλοιπον ἐμοιράσθη εἰς 3 ὑπαλλήλους ἀναλόγως ἀφ' ἑνὸς μὲν τῶν ἐτῶν τῆς ὑπηρεσίας, ἀφ' ἑτέρου δὲ τῆς μισθοδοσίας των. Ἐκ τῶν ὑπαλλήλων τούτων ὁ α' εἶχεν ἓν ἔτος ὑπηρεσίας καὶ 800 δραχμὰς μισθόν, ὁ β' 8 μῆνας ὑπηρεσίας καὶ 600 δραχμὰς μισθόν καὶ ὁ γ' 6 μῆνας ὑπηρεσίας καὶ 400 δραχμὰς μισθόν. Ποία ἢ ἀμοιβὴ ἐκάστου τούτων καὶ ποῖον τὸ μερίδιον ἐκάστου μετόχου; πόσα δὲ ἔλαβεν ὁ διευθύνων τὴν ἐπιχείρησιν;

523.) Τρεις ἔμποροι κατέθεσαν 60000 δραχμὰς δι' ἐπιχειρήσιν τινὰ· τὸ κεφάλαιον τοῦ β' εἶναι τὰ  $\frac{5}{6}$  τοῦ κεφαλαίου τοῦ α' καὶ τὸ τοῦ γ' τὰ  $\frac{2}{5}$  τοῦ κεφαλαίου τοῦ β'. Ὁ γ' κατέβαλε τὸ κεφάλαιόν του ἀμέσως ἐξ ἀρχῆς, ὁ β' μετὰ 6 μῆνας, ὁ δὲ α' 5 μῆνας μετὰ τὸν β'. μετὰ 3 ἔτη δὲ ἀπὸ τῆς ἐνάρξεως τῆς ἐπιχειρήσεως εἶχον κέρδος 21312 δραχμὰς. Ζητεῖται τὸ κεφάλαιον καὶ τὸ κέρδος ἐκάστου.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄.

### ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΙΞΕΩΣ

273. — Α΄.) Δίδονται αἱ ποσότητες τῶν ἀναμιγνυομένων πραγμάτων καὶ ἡ τιμὴ τῆς μονάδος ἐκάστου καὶ ζητεῖται ἡ τιμὴ τῆς μονάδος τοῦ μίγματος.

Παράδειγμα. — Ἀνέμιξέ τις 320 ὀκάδας οἴνου τοῦ ὁποίου ἡ ὀκά ἐτιμᾶτο 40 λεπτὰ μὲ 200 ὀκάδας ἄλλου οἴνου τοῦ ὁποίου ἡ ὀκά ἐτιμᾶτο 80 λεπτὰ καὶ μὲ 120 ὀκάδας ὕδατος· ζητεῖται ἡ τιμὴ τῆς ὀκάς τοῦ μίγματος.

Λύσις. — 320ὀκ. πρὸς 40λεπ. ἀξίζουσι 12800 λεπτὰ

200     »   80             »   16000     »

120     »   0             »   0             »

ὥστε αἱ 640 ὀκάδες τοῦ μίγματος τιμῶνται 28800 λεπτὰ καὶ ἐπομένως ἡ μίκα ὀκά  $\frac{28800}{640} = 45$  λεπτὰ.

Β΄) Δίδονται αἱ τιμαὶ τῆς μονάδος δύο ἀναμιγνυομένων πραγμάτων καὶ ἡ τιμὴ τῆς μονάδος τοῦ μίγματος καὶ ζητεῖται κυρίως ὁ λόγος τῶν ἀναμιγνυομένων ποσοτήτων, ἤτοι, ὅταν λαμβάνεται πρὸς ἀνάμιξιν μίκα μονὰς ἐκ τοῦ πρώτου, πόσον πρέπει νὰ λαμβάνεται ἐκ τοῦ δευτέρου.

Παράδειγμα. — Ἐμπόρος ἔχει δύο εἶδη τεύτου. Τοῦ πρώτου τὸ ἐν δράμιον τιμᾶται 6 λεπτὰ, τοῦ δευτέρου 3  $\frac{1}{2}$ . Θέλει δὲ νὰ



κάμνη ἐξ αὐτῆς μίγμα 450 δραμίων τοῦ ὁποίου τὸ δράμιον νὰ ἀξιζῆ 4 λεπτά.

Λύσις. — Ἀρκεῖ νὰ εὕρωμεν προφανῶς πόσα δράμια ἐκ τοῦ δευτέρου θὰ ἔδωτε πρὸς ἀνάμιξιν, ἐὰν ἐκ τοῦ πρώτου ἐλάβμβανεν 1 δράμιον.

Πρὸς τοῦτο παρατηροῦμεν ὅτι·


1 δράμ. τῶν 6 λεπ. πωλούμενον ἀντὶ 4 φέρει ζημίαν 2 λεπ., ἐνῶ

1 δράμ. τῶν  $3\frac{1}{2}$  λεπ. πωλούμενον ἀντὶ 4 λεπ. φέρει κέρδος  $\frac{1}{2}$  λεπ.

Λαμβάνων ἐπομένως 1 δράμιον ἐκ τοῦ πρώτου ἔχει νὰ καλύψῃ ζημίαν δύο λεπτῶν· πρὸς τοῦτο θὰ λάβῃ ἐκ τοῦ δευτέρου προφανῶς τόσα δράμια ὅσας φορὰς χρειάζεται νὰ ἐπαναληφθῇ τὸ  $\frac{1}{2}$  τοῦ λεπ. διὰ νὰ προκύψουν τὰ 2 λεπ., ἤτοι εἰς 1 δράμ. ἐκ τοῦ

πρώτου θὰ λαμβάνῃ  $2 : \frac{1}{2}$  δράμια ἐκ τοῦ δευτέρου, ὁπότε θὰ ἔχῃ κέρδος 2 λεπτά, ἤτοι ὅσην καὶ ζημίαν· ὅθεν ἡ ἀναλογία καθ' ἣν πρέπει νὰ γίνῃ ἡ ἀνάμιξις εἶναι 1 δράμιον ἐκ τοῦ α' εἶδους μὲ 4 δράμ. ἐκ τοῦ δευτέρου ἢ  $\frac{1}{2}$  δρμ. ἐκ τοῦ α' μὲ 2 δράμ. ἐκ τοῦ β'.

Διατάσσομεν ὡς ἑξῆς·



Καὶ νῦν δι' ἀπλῆς ἀναλογίας ἔχομεν τὸ ζητούμενον.

Εἰς  $2\frac{1}{2}$  δράμ. μίγματος τὰ 2 δράμ. εἶναι ἐκ τοῦ β' καὶ  $\frac{1}{2}$  ἐκ τοῦ α'· διὰ 450 δρμ. μίγματος πόσα δράμ. θὰ λάβῃ ἐξ ἐκάστου;

Ὅθεν ἐκ τοῦ α' θὰ λάβῃ  $\frac{1}{2} \times \frac{450}{5} = 90$  δράμια.

$$\text{Εκ δὲ τοῦ } \beta' \text{ θὰ λάβῃ } 2 \times \frac{450}{\frac{5}{2}} = 360 \text{ δράμια.}$$

### Κράματα.

274. — Ἐστω  $\alpha$  τὸ ποσὸν καθαροῦ χρυσοῦ ἢ ἀργύρου περιεχομένου ἐν κράματι καὶ  $\beta$  τὸ ποσὸν τοῦ ὄλου κράματος· τότε ὁ λόγος  $\frac{\alpha}{\beta}$  εἶναι ὁ βαθμὸς καθαρότητος τοῦ κράματος ἢ τίτλος αὐτοῦ καὶ ἐκφράζεται συνήθως εἰς χιλιοστά. Π. χ., ἐὰν εἰς μίαν μονάδα τοῦ κράματος τὰ 0,850 εἶναι καθαρὸς ἄργυρος τότε ὁ τίτλος κράματος τοῦ ἀργύρου εἶναι 0,850.

A') Συνεχωνεύθησαν 40 δράμια ἀργύρου τίτλου 0,850 καὶ 60 δράμια ἀργύρου τίτλου 0,900. Ζητεῖται ὁ τίτλος τοῦ νέου κράματος.

Λύσις. — Εἰς τὸ  $\alpha'$  κράμα περιέχεται καθαρὸς ἄργυρος

$$40 \times 0,850 = 34 \text{ δρ.}$$

εἰς δὲ τὸ δεύτερον  $60 \times 0,900 = 54 \text{ δρ.}$

ὥστε εἰς τὸ τελικὸν κράμα τὸ ἐξ 100 δραμ. περιέχεται καθαρὸς ἄργυρος 88 δρ. ἄρα βαθμὸς καθαρότητος αὐτοῦ εἶναι  $\frac{88}{100} = 0,880$ .

B') Ἐχομεν δύο εἶδη χρυσοῦ, τοῦ μὲν  $\alpha'$  ὁ τίτλος εἶναι 0,800, τοῦ δὲ  $\beta'$  0,910. Ζητεῖται πόσα δράμια τοῦ  $\alpha'$  μὲ πόσα δράμια τοῦ  $\beta'$  πρέπει ν' ἀναμίξωμεν, ἵνα σχηματισθῇ κράμα ἐκ 33 δραμ. τίτλου 0,850.

Λύσις. — Ἐκαστον δράμιον τοῦ  $\alpha'$  εἶδους εἰσάγει χρυσὸν εἰς τὸ κράμα κατὰ 0,050 δρ. μ. ὀλιγώτερον τῶν 0,850, ἦτοι τοῦ χρυσοῦ ὅστις θέλομεν νὰ περιέχηται εἰς ἓν δράμιον τοῦ κράματος· ἐνῶ ἕκαστον δράμ. τοῦ  $\beta'$  εἰσάγει κατὰ 0,060 δρ. περισσότερα· ὥστε, ἐὰν λάβωμεν 0,060 δράμια ἐκ τοῦ  $\alpha'$  εἶδους, εἰσάγομεν χρυσὸν ὀλιγώτερον τοῦ ἀπαιτουμένου  $0,060 \times 0,050$ , ἐὰν δὲ λάβωμεν 0,050 δράμια ἐκ τοῦ  $\beta'$ , εἰσάγομεν περισσότερον τοῦ ἀπαιτουμένου  $0,050 \times 0,060$  δρ. μ. ὥστε ἐὰν λάβωμεν 0,060 δρ. μ. ἐκ τοῦ  $\alpha'$  καὶ 0,050 δρ. μ. ἐκ τοῦ  $\beta'$  ὁ τίτλος τοῦ κράματος θὰ εἶναι ἀκριβῶς 0,850, ἦτοι εἰς τὰ 0,060 δράμια ἐκ τοῦ  $\alpha'$  ἀντιστοιχοῦσιν 0,050 ἐκ τοῦ  $\beta'$  ἢ, ὅπερ τὸ αὐτό, εἰς τὰ 60

δράμ. ἐκ τοῦ α' ἀντιστοιχοῦσι 50 δράμ. ἐκ τοῦ β' ὥστε διὰ κράμα 110 δραμ. λαμβάνομεν 60 δράμ. ἐκ τοῦ α' καὶ 50 ἐκ τοῦ β', διὰ κράμα 33 δραμίων πόσον θὰ λάβω ἐξ ἐκάστου ;

$$\text{Θὰ λάβω ἐκ μὲν τοῦ α' } \frac{60 \times 33}{110} = 18 \text{ δράμια}$$

$$\text{ἐκ δὲ τοῦ β' } \frac{50 \times 33}{110} = 15 \text{ δράμια.}$$

### Ἀσκήσεις.

524.) Σιτέμπορος ἔχει δύο εἶδη σίτου, τοῦ μὲν ἡ ὀκτὰ τιμᾶται 0,70 δραχ., τοῦ δὲ 0,85· ἔχει δὲ ἐκ τοῦ α' 7 στατήρας καὶ 32 ὀκάδας, ἐκ δὲ τοῦ β' 1 στατ. 5 ὀκάδας καὶ 200 δράμια· ἀν ἀναμίξῃ τὰς ἄνω ποσότητας, πόσον τοῦ στοιχίζει ἡ ὀκτὰ ;

525.) Οἰνοπώλης ἔχων 250 ὀκάδας οἴνου, οὗ ἡ ὀκτὰ τιμᾶται 0,60 δραχ., ἀναμιγνύει μετ' αὐτοῦ 20 ὀκάδας ὕδατος. Ζητεῖται τίς ἡ νέα τιμὴ τοῦ οἴνου· ἀν δὲ θέλῃ νὰ κερδίσῃ 10 % ἐπὶ τῆς ἀξίας τοῦ οἴνου, πρὸς πόσον πρέπει ν' πωλήσῃ τὸ μίγμα.

526.) Ἀναλόγως τίνων ἀριθμῶν πρέπει νὰ ἀναμιχθῶσιν οἶνος τιμώμενος πρὸς 70 λεπτὰ κατ' ὀκτὰν μὲ οἶνον τιμώμενον 55 λεπτὰ διὰ νὰ σχηματισθῇ μίγμα οὗ ἡ ὀκτὰ νὰ τιμᾶται 67 λεπτὰ ;

527.) Ἔχομεν 210 ὀκάδας οἴνου, οὗ ἡ ὀκτὰ τιμᾶται 0,60 δραχ. θέλομεν νὰ ρίψωμεν ὕδωρ ἐντὸς αὐτοῦ, ὥστε ἡ τιμὴ του νὰ κατέλθῃ εἰς 0,50· πόσον τοῖς ἑκατὸν ὕδωρ θὰ ρίψωμεν ;

528.) Ἐμπορὸς τις ἀγοράζει ἀντὶ 250 δραχμῶν 300 ὀκάδας οἴνου, πληρώνει δὲ 19 δραχ. δι' ἐξοδα μεταφορᾶς, προσθέτει καὶ 30 ὀκάδας ὕδατος καὶ θέλει νὰ κερδίσῃ 20 % ἐπὶ τῶν ἐξοδευθέντων χρημάτων. Πόσον πρέπει νὰ πωλῇ τὴν ὀκτὰν ;

529.) Ἔχει τις 3 κράματα ἀργύρου τίτλων 0,220, 0,840 καὶ 0,950· ἀν ἀναμίξῃ αὐτὰ ἀναλόγως τῶν ἀριθμῶν 2, 3, 5, τὸ νέον κράμα, τίνος τίτλου θὰ εἶναι ;

530.) Κατὰ τίνα ἀναλογίαν πρέπει νὰ λάβωμεν τὰ βάρη δύο κραμάτων ἐχόντων τίτλους 0,840, καὶ 0,720, διὰ νὰ κάμωμεν κράμα 195 γραμμαρίων τίτλου 0,784 ;

531.) Ἐχομεν κράμα χρυσοῦ 1230 γραμμαρίων τίτλου 0,850-πόσον καθαρὸν χρυσὸν πρέπει ν' ἀναμίξωμεν μετ' αὐτοῦ, ἵνα ὁ τίτλος ἀνέλθῃ εἰς 0,950;

532.) Τρία κράματα ἀργύρου, τίτλων 0,980, 0,900 καὶ 0,840, συγχωνεύονται εἰς κράμα 540 γραμμαρίων, τίτλου 0,950. Πόσον ἐλάβομεν ἐξ ἐκάστου, δεδομένου ὄντος ὅτι ἡ ποσότης ἢ ληφθεῖσα ἐκ τοῦ β' εἶναι διπλασία τῆς ἐκ τοῦ γ';

### ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ

275.— Θέλει τις νὰ εὕρῃ τὸ μῆκος μιᾶς ὁδοῦ καὶ μετρεῖ αὐτὴν τρεῖς φορές· κατὰ τὴν α' μέτρησιν εὔρε μῆκος 615 μέτρων, κατὰ τὴν β' 612 καὶ κατὰ τὴν γ' 621· ἐὰν ἠθέλομεν τὰ τρία ἐξαγόμενα νὰ τὰ καταστήσωμεν ἴσα χωρὶς ν' ἀλλάξῃ τὸ ἀθροισμὰ των, ἔπρεπε νὰ λάβωμεν ἕκαστον τῶν ἴσων ἐξαγομένων αὐτῶν ὡς ἴσον πρὸς

$$\frac{615+612+621}{3}$$

ὅπερ λέγεται μέσος ὄρος τῶν τριῶν ἀρχικῶν ἐξαγομένων καὶ ὑπάρχει πιθανότης ὅτι πλησιάζομεν περισσότερον πρὸς τὴν ἀλήθειαν. Ἦτοι ὁ μέσος ὄρος ὁμοειδῶν ποσῶν εὐρίσκεται, ἐὰν προσθέσωμεν τὰ ποσὰ ταῦτα καὶ διαιρέσωμεν διὰ τοῦ πλήθους τῶν προσθετέων.

276.— Μέσον ὄρον ζητοῦμεν εἰς πλείστας περιστάσεις. Π. χ. δταν θέλωμεν νὰ εὕρωμεν τὴν μέσην θερμοκρασίαν τῆς ἡμέρας ἢ τοῦ ἔτους εἰς τινὰ τόπον, ἐπίσης δταν ζητῶμεν τὴν μέσην ἐτησίαν εἰσπραξιν τελωνείου ἢ τὸν μέσον ὄρον τῶν γεννήσεων κατ' ἡμέραν εἰς ἓνα μῆνα εἰς τινὰ τόπον· κ. ο. κ.

### Ἀσκήσεις.

533.) Ἐξοδεύει τις τὴν Κυριακὴν α' ἡμέραν τῆς ἐβδομάδος 12 δραχ., τὴν β' 7, τὴν γ' 8, τὴν δ' 5, τὴν ε' 7, τὴν ς' 4, καὶ τὴν τελευταίαν 9· πόσα ἢ κατὰ μέσον ὄρον ἡμερησία δαπάνη;

534.) Αἱ εἰσπράξεις τελωνείου κατὰ 4 ἔτη συναπτὰ εἶναι 45033, 48072, 49060, 54333· τίς ἢ μέση ἐτησία εἰσπραξίς κατ' αὐτά;

535.) Μετρήσας τις ὁδὸν εὔρεν ὡς μῆκος αὐτῆς τοὺς ἐξῆς ἀριθμούς:

35,733	χιλιόμετρα
35,732	»
35,739	»
35,734	»
35,732	»

Ποῖον κατὰ μέσον ὄρον τὸ μῆκος τῆς ὁδοῦ; (Νὰ εὐρεθῇ τρόπος εἰς τὸ ἄνω παράδειγμα ἀπλοποιήσεως τῆς εὐρέσεως τοῦ μέσου ὄρου.

**Ἀσκήσεις ἐν γένει ἐπὶ τῶν τριῶν τελευταίων βιβλίων**

536.) Ἐὰν  $\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta}$  καὶ  $\frac{\gamma}{\beta} = \frac{\beta}{\delta}$ , τότε  $\frac{\alpha}{\gamma} = \frac{\gamma}{\beta}$

537.) Δεδομένου ὅτι  $\frac{17}{\alpha} = \frac{25}{\beta} = \frac{26}{\gamma} = \frac{30}{\delta}$

καὶ  $\alpha\beta\gamma\delta = 26851500$

νὰ εὐρεθῶσι τὰ  $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ .

538.) Νὰ δειχθῇ ὅτι ἐκάστη τῶν δύο ἀναλογιῶν

$$\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta} \text{ καὶ } \frac{\lambda\alpha + \rho\beta}{\kappa\alpha - \mu\beta} = \frac{\lambda\gamma + \rho\delta}{\kappa\gamma - \mu\delta}$$

εἶναι συνέπεια τῆς ἄλλης, οἰωνδῆποτε ὄντων τῶν ἀριθμ.  $\lambda, \rho, \kappa, \mu$ .

539.) Ὑπάρχει ἀναλογία τοιαύτη ὥστε, ἂν προσθέσωμεν τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν εἰς τοὺς τέσσαρας ὄρους τῆς, νὰ λάβωμεν νέαν ἀναλογίαν;

540.) Ἐὰν τὰ γινόμενα

$$(\alpha + \beta + \gamma) \cdot (\alpha + \beta + \delta) \text{ καὶ } (\gamma + \delta + \alpha) \cdot (\gamma + \delta + \beta)$$

εἶναι ἴσα, ἕκαστον τούτων ἰσοῦται πρὸς

$$\frac{[(\alpha + \beta)^2 + (\alpha + \beta)(\gamma + \delta) + \gamma\delta] (\alpha\beta - \gamma\delta)}{(\alpha + \beta + \gamma + \delta) (\alpha + \beta - \gamma - \delta)}$$

541.) Εἶναι προτιμότερον νὰ τοκίσῃ τις 4700 δραχ. πρὸς 4 % ἢ 3000 δραχ. πρὸς 5 % καὶ τὸ ὑπόλοιπον πρὸς 3 %;

542.) Τοκίζει τις τὰ  $\frac{2}{3}$  κεφαλαίου πρὸς 5 % καὶ τὸ ἕτερον τρίτον πρὸς 4,5 %· εἰς τὸ τέλος τοῦ ἔτους ἔλαβε 15725 δραχμὰς διὰ κεφάλαιον καὶ τόκους ὁμοῦ· ποῖον ἦτο τὸ κεφάλαιον;

543.) Γραμματίου λήγοντος μετὰ 5 ἔτη ἀπὸ σήμερον ὑπολογίζεται ἡ ἐσωτερικὴ ὑφαίρεσις πρὸς 5 %· πρὸς ποῖον ἐπιτόκιον πρέπει νὰ λογισθῇ ἡ ἐξωτερικὴ, ἵνα εἶναι ἡ αὐτὴ μετὰ τὴν ἐσωτερικὴν;

544.) Τρεῖς ἔμποροι ἐκέρδισαν 15600 δραχ· ὁ α' εἶχε καταθέσει διὰ τὴν ἐπιχειρήσιν 8000 δραχ· ἐπὶ 3 ἔτη· ὁ β' 1000 δραχ· ἐπὶ 4 ἔτη καὶ ὁ γ' 12000 δραχ· ἐπὶ 2 ἔτη. Ποῖον πρέπει νὰ εἶναι τὸ μερίδιον ἐκάστου;

545.) Ἔχει τις καφὲ 5 δραχ·, 6 δραχ·, 9 δραχ·, 15 δραχ· τὴν ὀκτῶν· ζητεῖται νὰ σχηματισθῇ μίγμα 460 ὀκάδων εἰς 8 ὀκάδας νὰ εἶναι ἐκ τοῦ στοιχίζοντος 6 ὄρ. τὴν ὀκτῶν· πόσας ὀκάδας θὰ θέσῃ ἐκ τῶν ἄλλων εἰδῶν, ἵνα ἡ τιμὴ τῆς ὀκτῶν τοῦ μίγματος εἶναι 8 δραχ·;

546.) Ἐκ τῆς ἀναλογίας  $\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta}$  ἔπεται ἡ ἀναλογία

$$\frac{(\alpha^2 + \beta^2)(\alpha + \beta)}{\alpha^3} = \frac{(\gamma^2 + \delta^2)(\gamma + \delta)}{\gamma^3}$$

ΤΕΛΟΣ









