

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Αριστοβαθμίου διδάκτορος καὶ τέως καθηγητοῦ τῶν Μαθηματικῶν



ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

ΔΙΑ ΤΑΣ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΑΘΗΝΑΙ 1956

KAI TAKI

"SANTA LUTSIA"

Si oy aine; c'est ci ey --- //
Si oy faine; c'est quelque chose...
Et --- si oy zine et --- oy taine aussi // //
c'est le -- tout... //

Katy

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

42249

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
'Αριστοβαθμίου διδάκτορος καὶ τέως καθηγητοῦ τῶν Μαθηματικῶν

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

ΔΙΑ ΤΑΣ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΑΘΗΝΑΙ 1956

ΑΓΙΟΝΟΥ ΕΛΛΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΣ

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

§ 1. Ποῖαι ἀνάγκαι ἐγέννησαν τὴν Γεωμετρίαν. 'Αφ' δτου οἱ ἄνθρωποι ἡσθάνθησαν τὴν ἀνάγκην οἰκοδομημάτων χάριν ἀνετωτέρας διαμονῆς· ἀφ' δτου τὸ αἴσθημα τῆς ἰδιοκτησίας ἔδημιούργησε τὴν ἀνάγκην δροθεσίας, μετρήσεως καὶ διαιρέσεως, ἢ δημιουργία Γεωμετρίας κατέστη ἀναγκαῖα καὶ ἀναπόθευκτος, τούλαχιστον ὑπὸ τὴν πρωτόγονον καὶ ἐντελῶς πρακτικὴν μορφήν.

Πληροφορίαι ἀπὸ τὴν ἀπωτάτην ἀρχαιότητα ἐνισχύουσι τὴν ἀποψίν ταύτην. Οὕτως δὲ Ἡρόδοτος (5ος π.Χ. αἰών) ἀναφέρει τὰ ἔξῆς.

'Οσάκις δὲ Νεῖλος ἐκάλυπτε μέρος τῶν ἀγρῶν τῶν Αιγυπτίων, δὲ Βασιλεὺς ἀπέστελλε τοὺς μετρητάς, διὰ νὰ κανονίζωσι τὸν πληρωτέον φόρον ἀναλόγως πρὸς τὴν ὑπολειφθεῖσαν ἔκτασιν τοῦ ἀγροῦ ἐκάστου. Κατ' ἄλλας μαρτυρίας οἱ μετρηταὶ ἡσχολοῦντο νὰ δρίζωσιν ἐκ νέου τὰ δριταὶ τῶν ἀγρῶν τῶν Αιγυπτίων μετὰ τὴν ἀποχώρησιν τῶν ὄδατῶν τοῦ Νείλου.

'Απὸ τὴν ἀνάγκην αὐτῆν, καθ' οἰανδήποτε ἐκδοχήν, ἔξεπήδησαν αἱ πρῶται πρακτικαὶ γνώσεις τῆς Γεωμετρίας.

Παρεμφερεῖς γνώσεις φαίνεται ὅτι εἶχον καὶ οἱ Χαλδαῖοι, ὡς ἀποδεικνύουσι τὰ σχέδια τῶν ἀνασκαπτομένων οἰκοδομημάτων καὶ πολλὰ κείμενα διμιούντα περὶ πωλήσεως οἰκοπέδων.

Αἱ πρακτικαὶ αὗται γνώσεις ἀνευ ἐσωτερικῆς συνοχῆς ἀπετέλουν τέχνην μᾶλλον ἢ ἐπιστήμην. Πρῶτοι δέ οἱ ἀρχαῖοι Ἐλληνες Φιλόσοφοι καὶ Μαθηματικοὶ διὰ τῆς φιλοσοφικῆς ἰδιοφυΐας τῶν ἥρχισαν τὴν ἔξετασιν τῶν σχημάτων καθ' ἔαυτά καὶ οὕτω βαθμηδὸν διεμόρφωσαν τὴν Γεωμετρίαν εἰς Ἐπιστήμην.

"Οθεν δικαίως αὕτη θεωρεῖται ως κατ' ἔξοχὴν Ἐλληνικὴν Ἐπιστήμην.

1. ΑΙ ΠΡΩΤΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑΙ ΕΝΝΟΙΑΙ

§ 2. Τὰ κύρια γεωμετρικὰ στοιχεῖα τῶν σωμάτων.
'Απὸ τὴν πρακτικὴν Γεωμετρίαν ἐνθυμούμεθα ὅτι:

α') 'Ο ἀπέραντος χῶρος, δὲ ὅποιος ἔκτείνεται πέριξ, ἡμῶν, λέγεται διάστημα.

β') Εἰς ἔκαστον σώμα διακρίνομεν δύκον, σχῆμα καὶ ἐπιφάνειαν.

"Ογκος σώματος λέγεται τὸ μέρος τοῦ διαστήματος, τὸ δόποιον καταλαμβάνει τὸ σώμα τοῦτο.


"Ο δύκος ἔκαστου σώματος ἔκτείνεται ἐξ ἀριστερῶν πρὸς τὰ δεξιά, ἐκ τῶν δπισθεν πρὸς τὰ ἔμπροσθεν, ἐκ τῶν κάτω πρὸς τὰ ἄνω. "Ἐχει λοιπὸν ἔκαστον σῶμα τρεῖς διαστάσεις.

Σχῆμα σώματος λέγεται ὁ τρόπος, κατὰ τὸν δόποιον τοῦτο περατοῦται ἔξωτερικῶς.

"Ἐπιφάνεια σώματος λέγεται τὸ σύνολον τῶν ἄκρων αὐτοῦ. Εἶναι δὲ φανερὸν ὅτι ἡ ἐπιφάνεια ἔκαστου σώματος χωρίζει αὐτὸν ἀπὸ τὸ πέριξ διάστημα.

"Ἐκάστη ἐπιφάνεια ἔχει σχῆμα, ἔκτείνεται δὲ κατὰ δύο μόδον διαστάσεις, διότι δὲν ἔχει πάχος.

§ 3. Αἱ γραμμαὶ καὶ τὰ σημεῖα. Ἡ ἐπιφάνεια ἐνδὸς ὑαλοπί-



Σχ. 1

νακος ἐνδὸς παραθύρου περατοῦται εἰς μίαν γραμμήν. "Ομοίως ἔκαστον μέρος τῆς ἐπιφανείας τοῦ σώματος AH (σχ. 1) περα-

τοῦται εἰς γραμμάς. "Εκαστον δὲ μέρος τῆς ἐπιφανείας τοῦ σώματος ΕΖΑ (σχ. 1) περατοῦται εἰς μίαν γραμμήν. "Ωστε:

Τὰ ἄκρα μιᾶς ἐπιφανείας ή ἐνδός μέρους ἐπιφανείας λέγονται γραμμαῖ.

Παρατηροῦμεν δὲ ὅτι ή γραμμὴ ΑΒΖΓ ἀνήκει εἰς τὰ δύο μέρη τῆς ἐπιφανείας τοῦ σώματος ΕΑΖ καὶ ἐκάστη γραμμὴ τῆς ἐπιφανείας τοῦ σώματος ΑΗ κεῖται εἰς δύο μέρη τῆς ἐπιφανείας αὐτοῦ. Ἐπειδὴ δὲ ἐκαστον μέρος ἐπιφανείας εἶναι καὶ αὐτὸς ἐπιφάνεια, ἐννοοῦμεν ὅτι:

Πᾶσα γραμμὴ εἶναι τομὴ δύο ἐπιφανειῶν.

"Ἐκάστη γραμμὴ ἔχει σχῆμα καὶ μίαν μόνον διάστασιν. Διότι δὲν ἔχει πάχος καὶ πλάτος.

Τὰ ἄκρα τῶν γραμμῶν ή ἐνδός μέρους μιᾶς γραμμῆς λέγονται **σημεῖα**. Εὔκολως δὲ ἐννοοῦμεν ὅτι:

"Ἐκαστον σημείου εἶναι τομὴ δύο γραμμῶν.

Τὸ σημεῖον οὐδεμίαν διάστασιν ἔχει.

Εἰς ἐν φύλλον χάρτου ή εἰς τὸν μελανοπίνακα παριστάνομεν ἐν σημείον μὲ μίαν τελείαν στιγμήν. Πλησίον δὲ αὐτῆς γράφομεν ἐν γράμμα, μὲ τὸ δόποιον ὀνομάζομεν τὸ σημεῖον τοῦτο. Π.χ. τὸ σημεῖον Α (σχ. 2).

§ 4. Τί εἶναι γεωμετρικὰ σχήματα. Τὰ σώματα, αἱ ἐπιφάνειαι καὶ αἱ γραμμαὶ λέγονται **γεωμετρικὰ σχήματα**, δταν ἔξετάζωνται ὡς πρὸς τὸ σχῆμα μόνον.

Διά νὰ διευκολύνωμεν δὲ τὴν ἔξετασιν ταύτην παριστάνομεν τὰ σχήματα ταῦτα μὲ εἰκόνας. Καὶ τὰς εἰκόνας δὲ ταύτας λέγομεν σχήματα.

2. ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ

§ 5. α') **Η εύθεια γραμμή.** "Αν τεντώσωμεν καλῶς μίαν λεπτήν τρίχα εἰς τὸ διάστημα, αὕτη λαμβάνει σχῆμα εὐθείας γραμμῆς.

Εύθειας γραμμὰς γράφομεν εἰς ἐν φύλλον χάρτου ή εἰς τὸν πίνακα μὲ τὴν βοή-



Σχ. 2

θειαν τοῦ κανόνος, κατὰ μῆκος τοῦ δποίου σύρομεν τὴν γραφίδα ἢ τὴν κιμωλίαν (σχ. 2).

Ἄν εἰς μίαν εύθεταν δρίσωμεν δύο σημεῖα Α, Β, μεταξὺ αὐτῶν περιέχεται ἐν μέρος ΑΒ τῆς εύθειας ταύτης.

Τὸ μέρος τοῦτο λέγεται Ἰδιαιτέρως εὐθύγραμμον τμῆμα.

Τὰ δὲ δύο σημεῖα, μεταξὺ τῶν δποίων περιέχεται ἐν εὐθ. τμῆμα, λέγονται ἀκρα αὐτοῦ.


β') Ἡ τεθλασμένη γραμμή. Ἡ γραμμὴ ΑΒΓΔΕ ἀποτελεῖται ἀπὸ εὐθ. τμήματα, ἀλλὰ δὲν εἶναι εύθεια (σχ. 3). Λέγεται δὲ αὕτη τεθλασμένη γραμμή.

Διὰ τὸν αὐτὸν λόγον καὶ ἡ γραμμὴ ΖΗΘΙΚ λέγεται τεθλασμένη γραμμὴ (σχ. 3). "Ωστε :


Τεθλασμένη γραμμὴ λέγεται πᾶσα γραμμή, ἡ δποία ἀποτελεῖται ἀπὸ εὐθύγραμμα τμήματα, ἀλλὰ δὲν εἶναι εύθεια γραμμή.

Τὰ εὐθ. τμήματα, ἀπὸ τὰ δποία ἀποτελεῖται μία τεθλασμένη γραμμή, λέγονται πλευραὶ αὐτῆς.

γ') Ἡ καμπύλη γραμμή. Ἡ γραμμὴ ΑΒ (σχ. 4) δὲν ἔχει



Σχ. 4



Σχ. 5

εὐθ. τμήματα. Λέγεται δὲ αὕτη καμπύλη γραμμή. Διὰ τὸν αὐτὸν λόγον καὶ ἡ γραμμὴ ΓΔΕ εἶναι καμπύλη. "Ωστε :

Καμπύλη γραμμή λέγεται πᾶσα γραμμή, ή δποια δὲν ἔχει εὐθ. τμήματα.


δ') *Η μεικτὴ γραμμὴ.* Πᾶσα γραμμή, ή δποια ἀποτελεῖται ἀπὸ εύθείας καὶ καμπύλας γραμμάς, λέγεται μεικτὴ γραμμή. Π.χ. ή ΑΒΓΔΕΖ (σχ. 5) εἶναι μεικτὴ γραμμή.

3. ΙΣΑ ΚΑΙ ΑΝΙΣΑ ΣΧΗΜΑΤΑ



§ 6. Ποῖα σχήματα λέγονται *ἴσα* καὶ ποῖα *ἰσοδύναμα*. Μὲ τὸν διαβήτην βεβαιούμεθα εὔκόλως δτι τὸ εὐθ. τμῆμα ΑΒ ἐφαρμόζει ἀκριβῶς ἐπὶ τοῦ τμήματος ΔE (σχ. 6). Λέγονται δὲ ταῦτα *ἴσα τμήματα*.

Ομοίως τὸ σχῆμα ΑΒΓ ἐφαρμόζει ἀκριβῶς εἰς τὸ ΕΖΗ (σχ. 7) καὶ ἀποτελεῖ μὲ αὐτὸ ἐν σχῆμα. Εἶναι λοιπὸν καὶ ταῦτα *ἴσα σχήματα*. "Ωστε:

*Δύο σχήματα λέγονται *ἴσα*, ἀν καταλλήλως ἐπιτιθέμενα ἐφαρμόζωσι καὶ ἀποτελοῦσιν ἐν μόνον σχῆμα.*



Σχ. 7



Σχ. 6

Τὸ εὐθ. τμῆμα ΑΓ καὶ ή τεθλ. γραμμὴ ΔΕΖ (σχ. 6) δὲν δύνανται νὰ ἐφαρμόσωσιν, δπως εἶναι. Τὸ μέρος δμως ΑΒ ἐφαρμόζει εἰς τὸ ΔE καὶ τὸ ΒΓ εἰς τὸ EZ . Τὰ σχήματα λοιπὸν ταῦτα ἀποτελοῦνται ἀπὸ μέρη *ἴσα*, ἐν πρὸς ἐν. Διὰ τοῦτο δὲ ταῦτα λέγονται *ἴσα κατὰ μέρη* ή *συνηθέστερον ισοδύναμα*.

Ομοίως ἀκέραια τὰ σχήματα ΑΒΔ καὶ ΕΖΘΗ δὲν ἐφαρμόζουσιν. Ἐπειδὴ δμως $\text{ΑΒΓ}=ΕΖΗ$ καὶ $\text{ΑΓΔ}=ΖΗΘ$, τὰ σχήματα ΑΒΔ καὶ ΕΖΘΗ εἶναι *ἰσοδύναμα* (σχ. 7). "Ωστε:

*Δύο σχήματα λέγονται *ἰσοδύναμα* ή *ἴσα κατὰ μέρη*, ἀν ἐφαρμόζωσι μόνον, ἀφ' οὗ καταλλήλως διαιρεθῶσιν εἰς μέρη.*

§ 7. Ποῖα σχήματα λέγονται *ἄνισα*. Τὸ εὐθ. τμῆμα ΔE

(σχ. 6) είναι ίσον πρός ἐν μέρος ΑΒ τοῦ εύθ. τμήματος ΑΓ. Διὰ τοῦτο δὲ τὸ ΔΕ λέγεται μικρότερον ἀπὸ τὸ ΑΓ καὶ τοῦτο μεγαλύτερον ἀπὸ τὸ ΔΕ. Εἶναι δηλ. ΔΕ < ΑΓ. Τὰ δύο δὲ εύθ. τμήματα ΔΕ καὶ ΑΓ μαζὶ λέγονται ἀνισα σχήματα. Ὄμοιως τὸ ΑΒΓ είναι ίσον μὲ ἐν μέρος ΕΖΗ τοῦ σχήματος ΕΖΘΗ. Εἶναι λοιπὸν ταῦτα ἀνισα καὶ ΑΒΓ < ΕΖΘΗ (σχ. 7). "Ωστε:

Δύο σχήματα λέγονται ἀνισα, ἢν τὸ ἐν εἴναι ίσον ἢ καὶ τοσοδύναμον πρός ἐν μέρος τοῦ ἄλλου.

Μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ διαβήτου συγκρίνομεν εύκόλως δύο εύθ. τμήματα καὶ διακρίνομεν, ὃν ταῦτα εἶναι ίσα ἢ ἀνισα. Ἐπίσης μὲ τὸν διαβήτην δυνάμεθα ἐπὶ μιᾶς εύθειας νὰ ὀρίσωμεν εύθ. τμῆμα ίσον πρός ἄλλο δοθὲν εύθ. τμῆμα.

§ 8. Τί λέγεται ἀξιώματα. Πᾶσα πρότασις, τὴν δποίαν δεχόμεθα ὡς ἀληθῆ, λέγεται ἀξιώματα¹:

'Αξιώματα π.χ. εἶναι ἢ πρότασις:

Πᾶν σχῆμα δὲν μεταβάλλεται, δπωσδήποτε καὶ ἢν μετακινηθῇ.

4. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΞΙΩΜΑΤΩΝ

§ 9. 'Αξιώματα περὶ τῶν ίσων σχημάτων. Διὰ τὰ ίσα σχήματα δεχόμεθα τὰ ἀκόλουθα ἀξιώματα:

α') "Αν δύο ἢ καὶ περισσότερα σχήματα είναι ίσα πρός ἐν καὶ τὸ αὐτὸ σχῆμα, είναι καὶ πρός ἄλληλα ίσα.

β') Δύο καὶ τὰ αὐτὰ σχήματα δὲν δύνανται νὰ είναι ίσα καὶ ἀνισα.

§ 10. 'Αξιώματα περὶ τῆς εὐθείας γραμμῆς. Διὰ τὴν εύθειαν γραμμὴν δεχόμεθα τὰ ἀκόλουθα ἀξιώματα.

α') 'Απὸ δύο σημεῖα μία μόνον εὐθεῖα γραμμὴ διέρχεται.

Τὸ ἀξιώματο τοῦτο ἔκφράζομεν καὶ ως ἔξῆς.

Δύο σημεῖα δρίζουσι τὴν θέσιν μιᾶς εὐθείας γραμμῆς.

1. "Αλλοτε πᾶσαν πρότασιν, τὴν δποίαν ἐδέχοντο ὡς ἀληθῆ, ἐκάλουν αἱ τημα. 'Αξιώματα δὲ ἐκάλουν πᾶσαν πρότασιν, τῆς δποίας ἢ ἀλήθεια ἢτο φανερὰ ἀφ' ἔαυτῆς.

Διὰ τοῦτο ἔκάστην εὑθεῖαν δνομάζομεν μὲ τὰ γράμματα δύο σημείων αὐτῆς. "Οταν π.χ. λέγωμεν εὑθεῖαν ΑΒ, ἐννοοῦμεν τὴν εὑθεῖαν, ἡ δποία διέρχεται ἀπὸ τὰ σημεῖα Α καὶ Β (σχ. 6).

β') Πᾶν εὐθ. τμῆμα εἶναι μικρότερον ἀπὸ πᾶσαν ἄλλην γραμμήν, ἡ δποία ἔχει τὰ αὐτὰ ἀκρα.

Διὰ τὸν λόγον τοῦτον τὸ εὐθ. τμῆμα, τὸ δποίον ὁρίζουσι δύο σημεῖα, λέγεται ἀπόστασις τῶν σημείων τούτων.


γ') "Εμαστον εὐθ. τμῆμα ἔχει ἐν μόνον μέσον, ἢτοι σημεῖον τὸ δποίον χωρίζει αὐτὸν εἰς δύο ἵσα τμήματα.

δ') Πᾶν εὐθ. τμῆμα δύναται νὰ νοηθῇ προεκτεινόμενον ἐπ' ἀπειρον καὶ ἀπὸ τὰ δύο ἀκρα αὐτοῦ.

Μὲ τὴν βοήθειαν δὲ τοῦ κανόνος προεκτείνομεν ἐν εὐθ. τμῆμα, δσον θέλομεν.

5. ΠΡΟΣΘΕΣΙΣ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΙΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

§ 11. Πῶς σχηματίζεται τὸ ἄθροισμα εὐθ. τμημάτων. "Εστωσαν τὰ εὐθ. τμήματα ΑΒ, ΓΔ, ΕΖ (σχ. 8). Μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ διαβήτου ὁρίζομεν ἐπὶ μιᾶς εὐθείας τμήματα ΗΘ, ΘΙ, ΙΚ διαδοχικά καὶ κατὰ σειράν ἴσα πρὸς τὰ ΑΒ, ΓΔ, ΕΖ. 'Απὸ τὰ τμήματα ΗΘ, ΘΙ, ΙΚ ἀποτελεῖται τὸ τμῆμα ΗΚ. Τοῦτο λέγεται ἄθροισμα τῶν τμημάτων ΑΒ, ΓΔ, ΕΖ ἡ καὶ τῶν ΗΘ, ΘΙ, ΙΚ.



Σχ. 8

Τὸ ἄθροισμα τῶν πλευρῶν μιᾶς τεθλασμένης γραμμῆς λέγεται περίμετρος αὐτῆς.

§ 12. Πῶς σχηματίζεται ἡ διαφορὰ δύο ἀνίσων εὐθ. τμημάτων. Τὰ εὐθ. τμήματα ΘΚ καὶ ΓΔ εἶναι ἀνισα καὶ ΘΚ>ΓΔ (σχ. 8). Μὲ τὸν διαβήτην ὁρίζομεν ἐπὶ τοῦ μεγαλυτέρου ΘΚ ἐν τμῆμα ΘΙ ἴσον πρὸς τὸ ΔΓ. "Αν νοήσωμεν ὅτι τὸ ΘΙ


ἀποκόπεται, μένει τὸ τμῆμα ΙΚ. Τοῦτο λέγεται διαφορὰ τῶν τμημάτων ΘΚ καὶ ΓΔ.

Εἶναι δηλ. ΘΚ—ΓΔ=ΘΚ—ΘΙ=ΙΚ.

6. ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

§ 13. α') Ἡ ἐπίπεδος ἐπιφάνεια. Εἰς ὅμαλὴν ἐπιφάνειαν μελανοπίνακος δρίζομεν δύο τυχόντα σημεῖα A, B. Μὲ τὴν βοήθειαν δὲ τοῦ κανόνος γράφομεν τὴν εὐθεῖαν AB. Τότε βλέπομεν δτὶ ὅλα τὰ σημεῖα αὐτῆς εύρισκονται ἐπὶ τῆς αὐτῆς ἐπιφανείας τοῦ μελανοπίνακος. Τοῦτο συμβαίνει καὶ ἀν A,B εἶναι τυχόντα σημεῖα τῆς ἐπιφανείας ἐνὸς ὄσλοπίνακος ἐνὸς παραθύρου ἢ διμαλοῦ πατώματος κ.τ.λ. Δὲν συμβαίνει δμως αὐτό, ἀν A,B εἶναι σημεῖα τῆς ἐπιφανείας ἐνὸς ώοῦ ἢ τυχόντα σημεῖα τῆς ἐπιφανείας ἐνὸς μεταλλικοῦ σωλῆνος.

Ἡ ιδιότης λοιπὸν αὕτη χαρακτηρίζει ἐν ὀρισμένον εἶδος



Σχ. 9

ἐπιφανειῶν. Ταύτας δνομάζομεν ἐπιπέδους ἐπιφανείας ἢ ἀπλῶς ἐπίπεδα. "Ωστε:

Ἐπίπεδος ἐπιφάνεια ἢ ἀπλῶς ἐπίπεδον λέγεται πᾶσα ἐπιφάνεια, ἐπὶ τῆς δποίας εὐρίσκονται δλα τὰ σημεῖα μιᾶς εὐθείας, ἢ δποία διέρχεται δπὸ δύο τυχόντα σημεῖα τῆς ἐπιφανείας ταύτης.

Τὸν δρισμὸν τοῦτον ἔκφραζομεν συντομώτερον ώς ἔξῆς:

Ἐπίπεδος ἐπιφάνεια ή ἐπίπεδον λέγεται πᾶσα ἐπιφάνεια, εἰς τὴν δούλαν ή εὐθεῖα γραμμὴ ἔφαρμός εἰ πανταχοῦ.

Δι' αὐτὸν τὸν λόγον οἱ τεχνῖται ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρὸν ἔφαρμόζουσι μίαν εὐθεῖαν τοῦ κανόνος κατὰ διαφόρους διευθύνσεις ἐπὶ σανίδος, διὰ νὰ ἰδωσιν, ἢν εἴκαμον αὐτὴν ἐπίπεδον ή δχι ἀκόμη.

β') *Ἡ τεθλασμένη ἐπιφάνεια.* Ἡ ἐπιφάνεια τοῦ σώματος ΔΕ (σχ. 9) ἀποτελεῖται ἀπὸ ἐπίπεδα μέρη, ἀλλὰ δὲν εἶναι ἐπίπεδον. Αὕτη λέγεται *τεθλασμένη ή πολυεδρική ἐπιφάνεια.* Καὶ ἡ ἐπιφάνεια τοῦ σώματος ΚΛΜΝ (σχ. 9) εἶναι πολυεδρική. "Ωστε:

Μία ἐπιφάνεια λέγεται τεθλασμένη ή πολυεδρική, ἢν ἀποτελῆται ἀπὸ ἐπίπεδα μέρη, ἀλλὰ δὲν εἶναι ἐπίπεδον.


γ') *Ἡ καμπύλη ἐπιφάνεια.* Ἡ ἐπιφάνεια ἐνὸς φοῦ δὲν ἔχει ἐπίπεδα μέρη. Λέγεται δὲ αὕτη *καμπύλη ἐπιφάνεια.* Καὶ ἡ ἐπιφάνεια ἐνὸς βώλου εἶναι καμπύλη ἐπιφάνεια. "Ωστε:

Μία ἐπιφάνεια λέγεται καμπύλη, ἢν δὲν ἔχῃ ἐπίπεδα μέρη.

δ') *Ἡ μεικτὴ ἐπιφάνεια.* Ἡ ἐπιφάνεια τοῦ σώματος ΑΓ (σχ. 10) ἀποτελεῖται ἀπὸ δύο ἐπίπεδα μέρη καὶ ἀπὸ

ἐν καμπύλον. Διὰ τοῦτο αὕτη λέγεται *μεικτὴ ἐπιφάνεια.* Καὶ ἡ ἐπιφάνεια τοῦ σώματος ΕΖΗ (σχ. 10) εἶναι μεικτή. "Ωστε:

Μία ἐπιφάνεια λέγεται μεικτή, ἢν ἀποτελῆται ἀπὸ ἐπίπεδα καὶ καμπύλα μέρη.




Σχ. 10

7. ΕΙΔΗ ΣΧΗΜΑΤΩΝ


§ 14. α') *Ποῖα σχήματα λέγονται ἐπίπεδα σχήματα.* "Ολα τὰ σημεῖα τοῦ σχήματος ΑΒΓ (σχ. 11) κείνται εἰς ἓν ἐπίπεδον. Δι' αὐτὸ δὲ τοῦτο λέγεται ἐπίπεδον σχῆμα. "Ωστε:

"Ἐν σχῆμα λέγεται ἐπίπεδον σχῆμα, ἢν δὲ τὰ σημεῖα αὐτοῦ κεῖνται εἰς τὸ αὐτὸν ἐπίπεδον.

β') Ποια σχήματα λέγονται στερεά σχήματα. Τὰ σημεῖα τοῦ σχήματος ΚΑΒΓ (σχ. 12)



Σχ. 11



Σχ. 12


δὲν κεῖνται δὲν εἰς τὸ αὐτὸν ἐπίπεδον. Αὐτὸ δὲ λέγεται στερεὸν σχῆμα. "Ωστε:

"Ἐν σχῆμα λέγεται στερεὸν σχῆμα, ἢν τὰ σημεῖα αὐτοῦ δὲν κεῖνται δὲν εἰς τὸ αὐτὸν ἐπίπεδον.


8. ΑΙ ΠΡΩΤΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ

§ 15. Ἀξιώματα περὶ τοῦ ἐπίπεδου. Περὶ τοῦ ἐπίπεδου δεχόμεθα τὰ ἀκόλουθα ἀξιώματα :

α') Πᾶν ἐπίπεδον δύναται νὰ νοηθῇ αὐξανόμενον ἐπ' απειρονα
καὶ κατὰ τὰς δύο διαστάσεις αὐτοῦ.
β') "Αν δύο σημεῖα Α, Γ μιᾶς



Σχ. 13



Σχ. 14

εύθειας κεῖνται ἐκατέρωθεν ἐνὸς ἐπίπεδου Π, ἡ εὐθεῖα αὕτη


ἔχει μὲν τὸ ἐπίπεδον Π ἐν κοινὸν σημεῖον B (σχ. 13).

γ') Πᾶσα εὐθεῖα ἐνὸς ἐπίπεδου χωρίζει αὐτὸ δύο μέρη.

"Αν δὲ δύο σημεῖα αὐτοῦ κεῖνται ἐκτὸς τῆς εὐθείας ταύτης, τὸ υπὸ αὐτῶν δριζόμενον εὐθ. τμῆμα τέμνει τὴν εὐθεῖαν ταύτην μόνον, ἀν ταῦτα κεῖνται ἔκατέρωθεν τῆς εὐθείας.

Οὕτω τὸ τμῆμα ΑΒ τέμνει εἰς τὸ σημεῖον Γ τὴν εὐθεῖαν Ε τοῦ ἐπιπέδου Π (σχ. 14). Τὸ δὲ τμῆμα ΔΖ δὲν τέμνει τὴν εὐθεῖαν Ε.

§ 16. Θεώρημα. "Αν δύο ἐπίπεδα Π καὶ Ρ τεθῶσιν οὕτως
ὅστε νὰ ἔχωσι
τρία κοινὰ ση-
μεῖα Α, Β, Γ μὴ
κείμενα ἐπ' εὐ-
θείας, εἰς τὴν θέ-
σιν ταύτην τὰ ἐ-
πίπεδα ταῦτα ἔ-
χουσι κοινὰ δλα
τὰ σημεῖα αὐ-
τῶν, ἥτοι ταυτί-
ζονται καὶ ἀπο-
τελοῦσιν ἐν ἐπί-
πεδον (σχ. 15).



Σχ. 15

"Απόδειξις. Κατὰ τὴν ἐκφώνησιν τῆς προτάσεως τὰ σημεῖα Α, Β, Γ κεῖνται καὶ εἰς τὰ δύο ἐπίπεδα Π καὶ Ρ. Ἐπομένως κατὰ τὸν δρισμὸν τοῦ ἐπιπέδου (§ 13 α') αἱ εὐθεῖαι ΑΒ, ΒΓ, ΓΑ κεῖνται ἐπίσης καὶ εἰς τὰ δύο ταῦτα ἐπίπεδα.

"Εστω δὲ Δ ἐν ἄλλῳ τυχόν σημεῖον τοῦ ἐπιπέδου Π. Γράφομεν εἰς τὸ ἐπίπεδον Π μίαν εὐθεῖαν ΔΗ, ἡ δοιοία νὰ τέμνῃ τὰς εὐθείας ΑΒ, ΒΓ ἀντιστοίχως εἰς τὰ σημεῖα Ε καὶ Ζ.

'Ἐπειδὴ δὲ αἱ εὐθεῖαι ΑΒ καὶ ΒΓ κεῖνται ἐπὶ τοῦ ἐπιπέδου Ρ καὶ τὰ σημεῖα Ε, Ζ θὰ κεῖνται ἐπ' αὐτοῦ. Καὶ διόκληρος δὲ ἡ εὐθεῖα ΕΖ θὰ κεῖται εἰς τὸ Ρ, ἐπομένως καὶ τὸ σημεῖον Δ αὐτῆς κεῖται εἰς τὸ Ρ.

Κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον βεβαιούμεθα ὅτι: Πᾶν σημεῖον τοῦ ἐπιπέδου Ρ εἶναι καὶ σημεῖον τοῦ Π. Ἀπεδείχθη λοιπὸν ὅτι:

Πᾶν σημεῖον τοῦ ἐνδὸς ἐπιπέδου κεῖται καὶ εἰς τὸ ἄλλο ἐπίπεδον. "Ήτοι τὰ ἐπίπεδα ταῦτα εἰς τὴν θέσιν ταύτην ἔχουσι

κοινὰ δла τὰ σημεῖα αὐτῶν. Ἐπομένως ταυτίζονται, ἢτοι ἀποτελοῦσιν ἐν μόνον ἐπίπεδον. δ.ἔ.δ.

Πόρισμα. Ἄν τὰ ἄκρα δύο ἐπιπέδων σχημάτων ἔφαρμό-
ζωσι, τὰ σχήματα ταῦτα εἶναι ἵσα.

9. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΝ ΧΡΗΣΕΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

§ 17. α') Τί λέγεται ἀπόδειξις καὶ τί θεώρημα. Προηγου-
μένως ἑκάμαμεν μίαν σειράν ὁρθῶν συλλογισμῶν, διὰ τῶν
ὅποιων ἐβεβαιώθημεν δτι ἀληθεύει ἡ πρότασις:

Ἄν δύο ἐπίπεδα τεθῶσιν οὕτως, ὥστε νὰ ἔχωσι τρία κοινὰ
σημεῖα μὴ κείμενα ἐπ' εὐθείας, εἰς τὴν θέσιν ταύτην ἔχουσι
κοινὰ δла τὰ σημεῖα αὐτῶν, ἢτοι ταυτίζονται καὶ ἀποτελοῦσιν
ἐν ἐπίπεδον.

Οἱ συλλογισμοὶ οὗτοι ἀποτελοῦσιν ἀπόδειξιν τῆς ἀληθείας
τῆς προτάσεως ταύτης. Αὔτη δὲ ἡ πρότασις, τῆς δοποίας ἡ ἀλή-
θεια ἔγινε φανερὰ διὰ τῆς ἀποδείξεως, λέγεται θεώρημα. "Ωστε :

Ἀπόδειξις εἶναι μία σειρὰ δρθῶν συλλογισμῶν, διὰ τῶν
ὅποιων βεβαιούμεθα δτι μιὰ πρότασις εἶναι ἀληθῆς.

Θεώρημα λέγεται πᾶσα πρότασις, τῆς δοποίας ἡ ἀλήθεια γί-
νεται φανερὰ διὰ τῆς ἀποδείξεως.

Εἰς τὸ προηγούμενον παράδειγμα προηγήθη τὸ θεώρημα,
ἢτοι ἡ ἀποδεικτέα πρότασις καὶ ἡ κοιλούθησεν ἡ ἀπόδειξις. Εἰ-
ναι δύως δυνατόν νὰ προηγηθῇ ἡ ἀπόδειξις καὶ ὡς συμπέρα-
σμα νὰ ἀκολουθήσῃ τὸ θεώρημα. Εἰς τὰ ἀκόλουθα θὰ γίνηται
χρῆσις καὶ τῶν δύο τούτων τρόπων κατὰ τὰς περιστάσεις.

β') Τί λέγεται πόρισμα. Ἀπὸ τὸ προηγούμενον θεώρημα
προκύπτει ἡ ἀλήθεια μιᾶς ἄλλης προτάσεως, τὴν δοποίαν ἑκα-
λέσαμεν πόρισμα. Εἶναι δὲ δυνατόν ἐν πόρισμα νὰ προκύπτῃ
καὶ ἀπὸ περισσότερα θεωρήματα. "Ωστε :

Πόρισμα λέγεται πᾶσα πρότασις, τῆς δοποίας ἡ ἀλήθεια προ-
κύπτει ἀπὸ μίαν ἡ περισσοτέρας ἀληθεῖς προτάσεις.

γ') Τί λέγεται πρόβλημα. Εἰς τὴν Ἀριθμητικὴν καὶ εἰς τὴν
Ἀλγεβραν εἴδομεν διάφορα προβλήματα, εἰς τὰ δοποία ἐζη-

τεῖτο ἡ τιμὴ ἐνδὸς ἢ περισσοτέρων ποσῶν. Εἶναι δὲ δυνατὸν τὰ ποσὰ ταῦτα νὰ εἰναι καὶ γεωμετρικά, π. χ. μήκη γραμμῶν, ἐμβαδά ἐπιφανειῶν κ.τ.λ. Ἐπομένως καὶ εἰς τὴν Γεωμετρίαν θὰ ἀπαντήσωμεν τοιαῦτα ἀριθμητικά, οὕτως εἰπεῖν προβλήματα.

Πλὴν τούτων ὅμως ἐνθυμούμεθα δτι εἰς τὴν Πρακτικὴν Γεωμετρίαν συνηγήσαμεν προτάσεις, διὰ τῶν ὁποίων ἔζητεῖτο νὰ δρισθῇ σημεῖόν τι ἢ νὰ κατασκευασθῇ ἢ τροποποιηθῇ ἐν σχήμα. Πᾶσα τοιαύτη πρότασις λέγεται γεωμετρικὸν πρόβλημα.

10. Η ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

§ 18. Τί διδάσκει ἡ Γεωμετρία. Ἡ Γεωμετρία εἶναι εἰς κλάδος τῆς Μαθηματικῆς Ἐπιστήμης.

Διδάσκει δὲ αὕτη τὰς ἰδιότητας τῶν σχημάτων καὶ τὰς μεθόδους τῆς μετρήσεως αὐτῶν.

Τὸ μέρος τῆς Γεωμετρίας, τὸ ὁποῖον ἔξετάζει τὰ ἐπίπεδα σχήματα, λέγεται **Ἐπιπεδομετρία**.

Τὸ δὲ μέρος τῆς Γεωμετρίας, τὸ ὁποῖον ἔξετάζει τὰ στερεὰ σχήματα, λέγεται **Στερεομετρία**.

Ἐξετάζει δὲ ἡ Γεωμετρία τὰ διάφορα σχήματα χωρὶς νὰ λαμβάνῃ ὑπ' ὅψιν τὴν Ὑλην, ἀπὸ τὴν ὁποίαν ἀποτελοῦνται ταῦτα.



ΕΠΙΠΕΔΟΜΕΤΡΙΑ

ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

1. ΤΑ ΚΥΡΙΩΤΕΡΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΧΗΜΑΤΑ

I. ΑΙ ΓΩΝΙΑΙ


§ 19. Τί είναι γωνία καὶ ποῖα είναι τὰ στοιχεῖα αὐτῆς.
'Από τὴν πρακτικὴν Γεωμετρίαν ἐνθυμούμεθα δτι :

Γωνία λέγεται τὸ σχῆμα, τὸ δποῖον σχηματίζεται ἀπὸ δύο εὐθείας, αἱ δποῖαι ἀρχίζουσιν ἀπὸ ἐν σημεῖον καὶ δὲν ἀποτελοῦσιν εὐθεῖαν.

Τὸ σχῆμα π.χ. $AB\Gamma$ είναι γωνία (σχ. 16).

Αἱ εὐθεῖαι, ἀπὸ τὰς δποῖας σχηματίζεται μία γωνία, λέγονται πλευραὶ τῆς γωνίας ταύτης.

Τὸ κοινὸν σημεῖον τῶν πλευρῶν μιᾶς γωνίας λέγεται κορυφή αὐτῆς. Οὕτως αἱ εὐθεῖαι BA καὶ $B\Gamma$ είναι αἱ πλευραὶ καὶ τὸ σημεῖον B ἡ κορυφὴ τῆς γωνίας $AB\Gamma$. Ταύτην ὀνομάζομεν καὶ ΓBA ἢ ἀπλῶς B ἢ καὶ ω .



Σχ. 16

§ 20. Πῶς γεννᾶται μία γωνία. "Ἄς νοήσωμεν δτι π.χ. ἡ πλευρὰ BA στρέφεται περὶ τὴν κορυφὴν B κατὰ τὴν φορὰν τοῦ βέλους β καὶ ἐν τῷ ἐπιπέδῳ αὐτῆς, ἔως δτου συμπέσῃ μὲ τὴν πλευρὰν $B\Gamma$. Είναι φανερόν δτι τὸ σύνολον τῶν διαδοχικῶν θέσεων αὐτῆς ἀποτελεῖ τὴν γωνίαν ω . Διὰ τοῦτο λέγομεν δτι ἡ εὐθεῖα BA κατὰ τὴν κίνησιν ταύτην γράφει τὴν γωνίαν ω .

‘Η εύθεια ΒΑ λέγεται *δρυκική* πλευρά, ή δὲ ΒΓ *τελική* πλευρά τῆς γωνίας ω.

“Αν ἡ ΒΑ στραφῇ κατὰ φορὰν ἀντίθετον τῆς φορᾶς τοῦ βέλους β, μέχρις οὖ πάλιν συμπέσῃ μὲ τὴν ΒΓ, θά γράψῃ ἄλλην γωνίαν, τὴν φ.

Αἱ δύο γωνίαι ω καὶ φ ἔχουσι τὴν ἐξῆς διαφοράν: “Αν μία πλευρά αὐτῶν προεκταθῇ ἀπὸ τὸ ἄλλο μέρος τῆς κορυφῆς, εἰσέρχεται εἰς τὴν γωνίαν φ, οὐχὶ δύως εἰς τὴν ω.


Πρός διάκρισιν τὴν μὲν γωνίαν ω λέγομεν *κυρτήν* τὴν δὲ φ *μὴ κυρτήν* γωνίαν.

Σημεῖος. Εἰς τὰ ἐπόμενα, δταν θὰ λέγωμεν ἀπλῶς γωνίαν, θὰ ἐννοοῦμεν κυρτὴν γωνίαν.

II. ΤΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΑ ΣΧΗΜΑΤΑ.

§ 21. Τί εἶναι εὐθύγραμμα σχήματα καὶ ποῖα τὰ στοιχεῖα αὐτῶν. Παρατηροῦμεν δτι ἔκαστον ἀπὸ τὰ σχήματα ΑΒΓΔ, ΕΖΗΘΙΚ, ΛΜΝ, (σχ. 17) εἶναι ἐν μέρος ἐπιπέδου, τὸ δόποιον περικλείεται πανταχόθεν ἀπὸ εὐθύγραμμα τμήματα.

Διὰ τοῦτο ἔκαστον ἀπὸ αὐτὰ λέγεται εὐθύγραμμον σχῆμα.



Σχ. 17

Καὶ ἀπὸ τὴν Πρακτικὴν Γεωμετρίαν ἐνθυμούμεθα δτι:

“Ἐκαστον εὐθύγραμμον σχῆμα ἔχει πλευρὰς γωνίας, κορυφὰς καὶ διαγωνίους.

Πλευραὶ ἔνδε εὐθυγράμμου σχήματος λέγονται τὰ εὐθύγραμμα τμήματα, ἀπὸ τὰ δόποια περικλείεται τοῦτο.

Γωνίαι εὐθυγράμμου σχήματος λέγονται αἱ γωνίαι, τὰς δποιας σχηματίζουσιν αἱ πλευραὶ αὐτοῦ.

Άν ή μία πλευρά μιᾶς γωνίας εύθυγράμμου σχήματος προεκταθῆ πρὸς τὸ ἄλλο μέρος τῆς κορυφῆς, σχηματίζεται νέα γωνία. Αὕτη λέγεται **ἔξωτερική** γωνία τοῦ εύθυγράμμου σχήματος. Π.χ. ή ΛΝΠ εἶναι ἔξωτερική γωνία τοῦ εύθυγράμμου σχήματος ΛΜΝ (σχ. 17).

Κορυφαὶ ἐνὸς εὐθυγράμμου σχήματος λέγονται αἱ κορυφαὶ τῶν γωνιῶν αὐτοῦ.

Παρατηροῦμεν δτι ἔκαστον εύθυγράμμον σχῆμα ἔχει τὸν ἀριθμὸν πλευρῶν, γωνιῶν καὶ κορυφῶν. Οὕτω τὸ ΛΜΝ (σχ. 17) ἔχει τρεῖς πλευράς, τρεῖς γωνίας καὶ τρεῖς κορυφάς. Λέγεται δὲ διὰ τοῦτο **τρίπλευρον** ή, συνηθέστερον, **τρίγωνον**.

Τὸ ΑΒΓΔ ἔχει τέσσαρας πλευράς καὶ λέγεται **τετράπλευρον**. Τὸ ΕΖΗΘΙΚ ἔχει ἔξι πλευράς καὶ ἔξι γωνίας. Λέγεται δὲ **έξαπλευρον** ή, συνηθέστερον, **έξάγωνον**.

Τὰ πεντάγωνα, ἔξάγωνα κ.τ.λ. λέγονται δλα μαζὶ πολύγωνα.


Τὸ ἄθροισμα τῶν πλευρῶν ἐνὸς εὐθ. σχήματος λέγεται **περίμετρος** αὐτοῦ.

Τὸ εὐθ. τμῆμα ΑΓ δρίζεται ἀπὸ δύο μὴ διαδοχικὰς κορυφὰς τοῦ τετραπλεύρου ΑΒΓΔ. Τὸ τμῆμα ΑΓ λέγεται **διαγώνιος** τοῦ ΑΒΓΔ. Διὰ τὸν αὐτὸν λόγον καὶ τὸ εὐθ. τμῆμα ΒΔ εἶναι διαγώνιος τοῦ ΑΒΓΔ. “Ωστε:

Διαγώνιος ἐνὸς εὐθ. σχήματος λέγεται πᾶν εὐθ. τμῆμα, τὸ δποὶον δρίζεται ἀπὸ δύο μὴ διαδοχικὰς κορυφὰς αὐτοῦ.

§ 22. Προόβλημα. Νὰ εὑρεθῇ τὸ πλῆθος τῶν διαγώνιων ἐνὸς εὐθ. σχήματος ἐκ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν πλευρῶν αὐτοῦ.

Αὔστις. “Εστω ἔν ἔξαγωνον ΑΒΓΔΕΖ (σχ. 18). Ἀπὸ μίαν κορυφὴν αὐτοῦ π.χ. τὴν Α ἀγονται 6—3 διαγώνιοι, διότι ΑΒ καὶ ΑΖ εἶναι πλευραί. Ἐπομένως ἀπὸ τὰς 6 κορυφὰς αὐτοῦ ἀγονται (6—3). 6 διαγώνιοι. Ἀλλὰ



Σχ. 18

κατ' αύτὸν τὸν τρόπον ἐκάστη διαγώνιος π.χ. ή ΑΓ μετρεῖται δίς, ώς ἀγομένη πρῶτον ἐκ τοῦ Α καὶ δεύτερον ἐκ τοῦ Γ. Ἐπομένως τὸ γινόμενον ($6-3$). 6 εἶναι διπλάσιον τοῦ ἀριθμοῦ διῶν διαγωνίων.

$$\text{Εἶναι λοιπὸν } \delta = \frac{(6-3) \cdot 6}{2} = 9$$

Γενικῶς: "Αν τὸ εὐθύγραμμον σχῆμα ἔχῃ ν πλευράς, ἀπὸ ἐκάστην κορυφὴν ἄγονται $n-3$ διαγώνιοι. Ἀπὸ δὲ τὰς ν κορυφὰς ἄγονται $(n-3) \cdot n$ διαγώνιοι. Ἐπειδὴ δὲ τὸ γινόμενον τοῦτο εἶναι διπλάσιον τοῦ ἀριθμοῦ διῶν διαγωνίων, ἔπειται δὴ $\delta = \frac{(n-3) \cdot n}{2}$

Ἄσκήσεις


1. Μὰ εὔρεθῇ διὰ τοῦ προηγουμένου τύπου δ ἀριθμὸς διῶν διαγωνίων ἐνὸς τριγώνου καὶ ἐνὸς τετραπλεύρου.
2. Μὰ εὔρεθῇ δ ἀριθμὸς διῶν διαγωνίων ἐνὸς πενταγώνου, ἑπταγώνου, δικταγώνου.

III. ΚΥΚΛΟΣ

§ 23. Τί εἶναι κύκλος καὶ ποῖα εἶναι τὰ στοιχεῖα αὐτοῦ.
Ἄπὸ τὴν Πρακτικὴν Γεωμετρίαν γνωρίζομεν δὴ:

Κύκλος εἶναι ἐν μέρος ἐπιπέδου, τοῦ δποίου ἐν σημεῖον ἀπέχει ἴσον ἀπὸ δλα τὰ σημεῖα τῆς γραμμῆς, εἰς τὴν δποίαν περατοῦται.

Ἡ γραμμὴ, εἰς τὴν δποίαν περατοῦται εἰς κύκλος, λέγεται περιφέρεια αὐτοῦ. Περιφέρειαν κύκλου γράφομεν συνήθως μὲ τὸν διαβήτην. Τὸ σημεῖον τοῦ κύκλου, τὸ δποίον ἀπέχει ἴσον ἀπὸ δλα τὰ σημεῖα τῆς περιφερείας, λέγεται κέντρον αὐτοῦ. Οὕτως ἡ γραμμὴ ΑΓΒΕΑ κλείει ἐν μέρος τοῦ ἐπιπέδου, τὸ δποίον λέγεται κύκλος (σχ. 19).



Σχ. 19

Οὕτος ἔχει περιφέρειαν ΑΓΒΕΑ καὶ κέντρον Κ.

Έκτος τούτων είς έκαστον κύκλου διακρίνομεν ἀκτῖνας καὶ διαμέτρους.

Ἄκτις κύκλου λέγεται πᾶν εὐθύγραμμον τμῆμα, τὸ δποῖον ἀρχίζει ἀπὸ τὸ κέντρον καὶ καταλήγει εἰς τὴν περιφέρειαν αὐτοῦ. Οὕτω ΚΑ, ΚΒ, ΚΓ κ.τ.λ. εἶναι ἀκτῖνες τοῦ κύκλου Κ.

Διάμετρος κύκλου λέγεται πᾶν εὐθύγραμμον τμῆμα, τὸ δποῖον διέρχεται ἀπὸ τὸ κέντρον καὶ καταλήγει ἐκατέρωθεν εἰς τὴν περιφέρειαν αὐτοῦ.

Π. χ. ΑΚΒ, ΓΚΔ, ΕΚΘ εἶναι διάμετροι τοῦ κύκλου Κ.

Εἰς τὸ ἔξῆς χάριν συντομίας θὰ σημειώνωμεν μὲ τὸ σύμβολον (K,α) τὸν κύκλον ἢ τὴν περιφέρειαν, ἢ δποία ἔχει κέντρον Κ καὶ ἀκτῖνα α .

§ 24. Ποῖαι σχέσεις ὑπάρχουσι μεταξὺ τῶν ἀκτίνων καὶ τῶν διαμέτρων ἐνδὸς κύκλου.

α') Ἀπὸ τὸν δρισμὸν τοῦ κύκλου εἶναι φανερὸν ὅτι

$$KA = KB = KG \text{ κ.τ.λ., ἥτοι :}$$

"Ολαι αἱ ἀκτῖνες ἐνδὸς κύκλου εἶναι ἵσαι.

β') Ἐπειδὴ ἔκάστη διάμετρος ἀποτελεῖται ἀπὸ δύο ἀκτῖνας, ἔπειται εὐκόλως ὅτι :


$$AKB = GKD = EK\Theta \text{ κ.τ.λ., ἥτοι :}$$

"Ολαι αἱ διάμετροι ἐνδὸς κύκλου εἶναι ἵσαι.

§ 25. Νὰ συγκριθῇ ἡ ἀπόστασις ἐνδὸς σημείου τοῦ ἐπιπέδου κύκλου ἀπὸ τὸ κέντρον πρὸς τὴν ἀκτῖνα αὐτοῦ.

α') "Εστω M ἐν σημεῖον ἐντὸς τοῦ κύκλου K (σχ. 20). Εἶναι φανερὸν ὅτι ἡ εὐθεῖα KM συναντᾷ τὴν περιφέρειαν εἰς σημεῖον A κελμένον πέραν τοῦ M . Εἶναι λοιπὸν $KM < KA$, ἥτοι :

"Ἡ ἀπόστασις ἐνδὸς σημείου, τὸ δποῖον κεῖται ἐνδὸς κύκλου, ἀπὸ τὸ κέντρον εἶναι μικροτέρα ἀπὸ τὴν ἀκτῖνα αὐτοῦ.



Σχ. 20

β') "Εστω ἀκόμη ἐν σημεῖον Ν, τὸ δποῖον κεῖται εἰς τὸ ἐπίπεδον τοῦ κύκλου καὶ ἐκτὸς αὐτοῦ. Εἶναι φανερὸν ὅτι τὸ εύθ. τμῆμα KN τέμνει τὴν περιφέρειαν εἰς ἐν σημεῖον Α μεταξὺ Κ καὶ Ν. Εἶναι λοιπὸν KN > KA, ἡτοι :

"Η ἀπόστασις ἐνδὲ σημείου τοῦ ἐπιπέδου κύκλου, τὸ δποῖον κεῖται ἐκτὸς αὐτοῦ, ἀπὸ τὸ κέντρον εἶναι μεγαλυτέρα ἀπὸ τὴν ἀκτῖνα αὐτοῦ.

γ') "Αν ἐν σημεῖον Α κεῖται ἐπὶ περιφερείας (Κ, α) εἶναι φανερὸν ὅτι KA = α. Ἡτοι :

"Η ἀπόστασις παντὸς σημείου περιφερείας ἀπὸ τὸ κέντρον αὐτῆς ἵσοῦται πρὸς τὴν ἀκτῖνα αὐτῆς.

§ 26. Πρώτη ἔννοια γεωμετρικοῦ τόπου. Ἐπὸ τὰ προηγούμενα ἔννοοῦμεν ὅτι :

"Ἀπὸ τὰ σημεῖα τοῦ ἐπιπέδου ἐνδὲ κύκλου (Κ, α) διὰ τὰ σημεῖα τῆς περιφερείας καὶ μόνον αὐτὰ ἀπέχουσιν ἀπὸ τὸ κέντρον Κ ἀπόστασιν ἵσην πρὸς τὴν ἀκτῖνα α.


Διὰ τοῦτο ἡ περιφέρεια (Κ, α) λέγεται γεωμετρικὸς τόπος ἢ ἀπλῶς τόπος τῶν σημείων τοῦ ἐπιπέδου αὐτῆς, τὰ δποῖα ἀπέχουσιν ἀπὸ τὸ Κ ἀπόστασιν ἵσην πρὸς α.

2. ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΜΕΡΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

§ 27. Τί εἶναι τόξον καὶ χορδὴ αὐτοῦ. Τὸ τυχόν μέρος ΑΔ μιᾶς περιφερείας Κ (σχ. 21) λέγεται τόξον. Καὶ τὰ μέρη ΕΒ, ΒΘ, ΑΓ κ.λ.π. τῆς αὐτῆς περιφερείας εἶναι τόξα. Ὡστε :

Τόξον λέγεται τυχόν μέρος περιφερείας.

Τὸ κέντρον τῆς περιφερείας, εἰς τὴν δποῖαν εὑρίσκεται ἐν τόξον, λέγεται καὶ κέντρον τοῦ τόξου τούτου.



Τὰ ἄκρα ἐνδὲ τόξου δρίζουσιν ἐν εύθυγραμμον τμῆμα. Τοῦτο λέγεται χορδὴ τοῦ τόξου τούτου. Π. χ. τὸ εύθυγραμμον τμῆμα BZΔ.

είναι χορδή τοῦ τόξου ΒΕΔ, ἀλλὰ καὶ τοῦ τόξου ΒΑΔ (σχ. 21).

Περὶ τῶν τόξων δεχόμεθα τὸ ἔξις ἀξιωματα:

Πᾶν τόξον ἔχει ἐν μόνον μέσον.

Εἶναι εὔκολον νὰ νοήσωμεν ὅτι ἐν μέρος π.χ. ΚΒΓ κύκλου (Κ, α) (σχ. 21) δύναται νὰ στραφῇ περὶ τὸ κέντρον Κ χωρὶς νὰ ἔξελθῃ ἀπὸ τὸ ἐπίπεδον τοῦ κύκλου τούτου. Κατὰ τὴν στροφὴν ταύτην πᾶν σημεῖον Θ τοῦ στρεφομένου τόξου ΒΘΓ θὰ μένῃ διαρκῶς ἐπὶ τῆς περιφερείας, διότι εἰς πᾶσαν θέσιν του είναι $K\Theta = \alpha$. "Επεται λοιπὸν ἐκ τούτου ὅτι:

α') Πᾶν τόξον ἔφαρμόζει πανταχοῦ ἐπὶ τῆς περιφερείας, εἰς τὴν ὁποίαν ἀνήκει.

β') Δύο ὀδρισμένα τόξα τῆς αὐτῆς περιφερείας εἰναι ἵσα ἢ ἄνισα.

3. ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΟΞΩΝ

§ 28. Ποῖα τόξα λέγονται διαδοχικά. Τὰ τόξα ΑΔ, ΔΕ λέγονται διαδοχικά. Όμοιώς τὰ τόξα ΔΕ, EB, ΒΘ (σχ. 21) είναι διαδοχικά. Παρατηροῦμεν δὲ ὅτι ἔκαστον ἀπὸ αὐτὰ ἔχει ἀρχὴν τὸ τέλος τοῦ προηγουμένου. "Ωστε:

Δύο ἢ περισσότερα τόξα τῆς αὐτῆς περιφερείας λέγονται διαδοχικά, ἢν ἀρχὴ ἐκάστου είναι τὸ τέλος τοῦ προηγουμένου.

"Ἄθροισμα τόξων τῆς αὐτῆς περιφερείας λέγεται τὸ τόξον, τὸ δποῖον ἀποτελεῖται ἀπὸ αὐτά, ἢν τεθῶσιν διαδοχικῶς ἐπὶ τῆς περιφερείας ταύτης.

$$\text{Π.χ.:} \quad \widehat{AD} + \widehat{DE} + \widehat{EB} = \widehat{AEB}. \quad (1)$$

"Αν είναι $\widehat{DE} = \widehat{EB}$, τὸ ἄθροισμα \widehat{DEB} αὐτῶν λέγεται διπλάσιον τοῦ \widehat{DE} . Εἶναι δηλ. $\widehat{DEB} = \widehat{DE} \cdot 2$

Τὸ δὲ \widehat{DE} λέγεται ἡμισυ τοῦ \widehat{DEB} , ἥτοι $\widehat{DE} = \widehat{DEB} : 2$

"Όμοιώς ἢν είναι $\widehat{AD} = \widehat{DE} = \widehat{EB}$, ἡ λογικὴ (1) γίνεται $\widehat{AEB} = \widehat{AD} \cdot 3$ καὶ ἐξ αὐτῆς ἐπεται ὅτι:

$$\widehat{AD} = \widehat{AEB} : 3, \text{ ἥτοι:}$$

Τὸ \widehat{AEB} εἶναι τριπλάσιον τοῦ $\widehat{AΔ}$. τοῦτο δὲ εἶναι τὸ τρί-
τον τοῦ \widehat{AEB} .

Τὸ $\frac{1}{360}$ μιᾶς περιφερείας λέγεται **μοῖρα**. Αὕτη διαιρεῖται
εἰς 60 πρῶτα λεπτὰ (') καὶ ἔκαστον ἀπὸ αὐτὰ εἰς 60 δεύτερα
λεπτὰ (").

"Οπως δὲ καὶ ἀπὸ τὴν Πρακτικὴν Γεωμετρίαν γνωρίζομεν,
ἡ μοῖρα καὶ τὰ μέρη αὐτῆς χρησιμεύουσιν ὡς μονάς, πρὸς τὴν
διποίαν συγκρίνονται τὰ τόξα. "Αν π.χ. ἐν τόξον εἶναι 20σιον
τοῦ $\frac{1}{360}$ τῆς περιφερείας του, λέγομεν δτι εἶναι τόξον 20 μοι-
ρῶν καὶ σημειώνεται οὕτως 20° .

"Αν δὲ ἐν τόξον ἀποτελήται ἀπὸ 10° , ἀπὸ 15 πρῶτα λεπτὰ
τῆς μοῖρας καὶ ἀπὸ 28 δεύτερα λεπτά, σημειώνεται οὕτω
 $10^{\circ} 15' 28''$.

§ 29. Τί εἶναι διαφορὰ δύο τόξων. "Εστωσαν τὰ ἄνισα
τόξα $AΔE$ καὶ $AΔ$ (σχ. 21). "Αν νοήσωμεν δτι ἀπὸ τὸ τόξον
 $AΔE$ ἀποκόπεται τὸ μικρότερον αὐτοῦ τόξον $AΔ$, μένει τὸ
τόξον $ΔE$. Τοῦτο λέγεται διαφορὰ τῶν τόξων $AΔE$ καὶ $AΔ$. "Ωστε:

Διαφορὰ δύο ἀνίσων τόξων τῆς αὐτῆς περιφερείας λέγεται
τὸ τόξον, τὸ δποῖον μένει, ἀν ἀπὸ τὸ μεγαλύτερον καὶ ἀπὸ τὸ ἐν
ἄκρων αὐτοῦ ἀποκοπῆ τόξον ἵσον πρὸς τὸ μικρότερον.

4. ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΜΕΡΗ ΚΥΚΛΟΥ

§ 30. Τί εἶναι τμῆμα κύκλου καὶ τί κυκλικὸς τομεύς.
Μεταξὺ π.χ. τοῦ τόξου $ΔEB$ καὶ τῆς χορδῆς $ΔB$ αὐτοῦ περιέ-
χεται τὸ μέρος $ΔEBZΔ$ τοῦ κύκλου K (σχ. 21). Τὸ μέρος τοῦτο
λέγεται κυκλικὸν τμῆμα. "Ωστε :

Κυκλικὸν τμῆμα εἶναι μέρος κύκλου, τὸ δποῖον περιέχεται
μεταξὺ ἑνὸς τόξου καὶ τῆς χορδῆς αὐτοῦ.


Μεταξὺ τοῦ τόξου $AΓ$ καὶ τῶν ἀκτίνων KA , $KΓ$ περιέχεται
ἐν μέρος $KAΗΓK$ τοῦ κύκλου K (σχ. 21). Τοῦτο λέγεται κυκλι-
κὸς τομεύς. "Ωστε :

Κυκλικὸς τομεύς εἶναι μέρος κύκλου, τὸ δποῖον περιέχεται
μεταξὺ ἑνὸς τόξου καὶ τῶν ἀκτίνων, αἱ δποῖαι καταλήγουσιν εἰς
τὰ ἄκρα αὐτοῦ.

Τὸ τόξον ἐνὸς κυκλικοῦ τομέως λέγεται βάσις αὐτοῦ. Ἡ δὲ γωνία τῶν ἀκτίνων, αἱ δποῖαι καταλήγουσιν εἰς τὰ ἄκρα τῆς βάσεως ἐνὸς τομέως, λέγεται καὶ γωνία τοῦ τομέως τούτου.

5. ΑΙ ΠΡΩΤΑΙ ΚΥΚΛΙΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

§ 31. Σύγκρισις δύο κύκλων ἢ δύο περιφερειῶν, τῶν δποίων αἱ ἀκτίνες εἶναι ἵσαι. Μὲ κέντρα Κ καὶ Λ καὶ ἀκτῖνα αἱ γράφομεν δύο περιφερείας (σχ. 22). "Ἄς νοήσωμεν δὲ ὅτι ὁ κύκλος Λ τίθεται ἐπὶ τοῦ Κ οὕτως ὥστε νὰ συμπέσωσι τὰ κέντρα αὐτῶν. "Ἐν τυχόν σημεῖον Μ τῆς περιφερείας Λ θὰ εύρεθῇ ἐπὶ τῆς περιφερείας Κ.




Σχ. 22

Διότι, ἂν ἔκειτο ἐντὸς ἢ ἔκτος τοῦ κύκλου Κ, θὰ ἦτο $KM \leq \alpha$, ἐπομένως καὶ $LM \leq \alpha$. Αἱ σχέσεις δὲ αὗται εἶναι ψευδεῖς, διότι τὸ Μ εἶναι σημεῖον τῆς περιφερείας Λ καὶ ἐπομένως $LM = \alpha$.

Κατὰ ταῦτα αἱ δύο περιφέρειαι ἐφαρμόζουσι καὶ ἐπομένως εἶναι ἵσαι. Κατὰ δὲ τὸ πόρισμα τῆς § 16 καὶ οἱ κύκλοι εἶναι ἵσοι. Βλέπομεν λοιπὸν ὅτι:

"Ἄν αἱ ἀκτίνες δύο κύκλων εἶναι ἵσαι, οἱ κύκλοι οὗτοι εἶναι ἵσοι καὶ αἱ περιφέρειαι αὐτῶν εἶναι ἡσπίσης ἵσαι.



Σχ. 23

§ 32. Νὰ συγκριθῶσι τὰ μέρη, εἰς τὰ δποῖα εἰς κύκλος ἢ μία περιφέρεια χωρίζεται ἀπὸ μίαν διάμετρον. "Ἐστω τυχοῦσα διάμετρος ΑΒ ἐνὸς κύκλου Κ (σχ. 23). "Ἄς νοήσωμεν ὅτι τὸ ἐν κυκλικὸν τμῆμα π.χ. τὸ ΑΓΒΚΑ στρέφε-

ται περὶ τὴν ΑΒ, ἔως ὅτου εύρεθῇ ἐπὶ τοῦ ἐπιπέδου τοῦ ΑΔΒΚΑ.

"Αν σκεφθῶμεν, ὅπως προηγουμένως (§ 31), ἐννοοῦμεν ὅτι τὸ μὲν τόξον ΑΓΒ ἐφαρμόζει ἐπὶ τοῦ ΑΔΒ, τὸ δὲ τμῆμα ΑΓΒΚΑ ἐπὶ τοῦ ΑΔΒΚΑ.

Εἶναι λοιπὸν $\widehat{\text{ΑΓΒ}} = \widehat{\text{ΑΔΒ}}$ καὶ $\text{ΑΓΒΚΑ} = \text{ΑΔΒΚΑ}$. "Ωστε:

Πᾶσα διάμετρος κύκλου διαιρεῖ αὐτὸν καὶ τὴν περιφέρειαν αὐτοῦ εἰς δύο ῖσα μέρη.

Διὰ τοῦτο τὰ τμήματα ΑΓΒΚΑ, ΑΔΒΚΑ λέγονται *ἡμικύκλια*. Τὰ δὲ τόξα ΑΓΒ, ΑΔΒ λέγονται *ἡμιπεριφέρεια*.

Πόρισμα I. "Αν μία χορδὴ κύκλου δὲν διέρχηται ἀπὸ τὸ κέντρον, διαιρεῖ τὸν κύκλον καὶ τὴν περιφέρειαν αὐτοῦ εἰς ἄνισα μέρη.

"Αρκεῖ νὰ παρατηρήσωμεν ὅτι $\widehat{\text{ΓΕΒ}} < \widehat{\text{ΑΓΒ}} \text{ καὶ } \widehat{\text{ΒΔΑΓ}} > \widehat{\text{ΒΔΑ}}$ κ.τ.λ.

Πόρισμα II. "Αν ἐν εὐθύγραμμον τμῆμα χωρίζῃ ἕνα κύκλον ἢ μίαν περιφέρειαν εἰς δύο ῖσα μέρη, τοῦτο εἶναι διάμετρος τοῦ κύκλου τούτου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'


1. ΕΙΔΗ ΓΩΝΙΩΝ

§ 33. Ποιαί γωνίαι λέγονται έπικεντροι γωνίαι. 'Η γωνία AKB έχει κορυφήν τό κέντρον K ένδει κύκλου. Δι' αύτού αύτη λέγεται **έπικεντρος γωνία**. 'Όμοιώς αι γωνίαι ZKE , GLD είναι έπικεντροι (σχ. 24). "Ωστε:

Μία γωνία λέγεται έπικεντρος, ἀν νὴ κορυφὴ αὐτῆς εἶναι κέντρον κύκλου.

Τὸ τόξον AB , τὸ δποῖον περιέχεται μεταξὺ τῶν πλευρῶν τῆς έπικέντρου γωνίας AKB , λέγεται **ἀντίστοιχον τόξον αὐτῆς**. Συνηθέστερον έκφράζομεν τοῦτο λέγοντες δτι :

"*Η έπικεντρος γωνία AKB βαίνει ἐπὶ τοῦ τόξου AB .*



Σχ. 24

2. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΝ ΓΩΝΙΩΝ

§ 34. Θεώρημα I. *Εἰς τὸν αὐτὸν κύκλον ἡ εἰς /licenses συνεισθετικούς γωνίας.*

α') "Εστωσαν δύο /licenses κύκλοι K, L καὶ $\widehat{AB} = \widehat{ΓΔ}$. Λέγω δτι $\widehat{AKB} = \widehat{ΓΔ}$ (σχ. 24).

"*Ἄποδειξις.* Νοοῦμεν δτι ὁ κύκλος L τίθεται ἐπὶ τοῦ K οὕτως, ὅτε τὸ κέντρον L νὰ συμπέσῃ μὲ τὸ K , ἡ ἀκτὶς LG μὲ τὴν KA καὶ τὸ $Δ$ πρὸς τὸ αὐτὸ μέρος τῆς KA μὲ τὸ B . Είναι τότε γνωστὸν (§ 31) δτι αἱ δύο περιφέρειαι θὰ ἔφαρμόσωσιν. "Επίσης δὲ θὰ ἔφαρμόσωσι καὶ τὰ licenses τόξα $ΓΔ$ καὶ AB . "Επομένως τὸ μὲν $Δ$ θὰ συμπέσῃ μὲ τὸ B , ἡ δὲ ἀκτὶς $ΔΔ$ μὲ τὴν KB καὶ ἡ γωνία $ΓΔΔ$ μὲ τὴν AKB . Είναι λοιπὸν $\widehat{AKB} = \widehat{ΓΔΔ}$, δ.ε.δ.

β') "Εστωσαν ἀκόμη δύο /licenses τόξα AB καὶ EZ τῆς αὐτῆς

περιφερείας Κ. "Ας νοήσωμεν δὲ καὶ ἐν τόξον ΓΔ ἵσον πρὸς αὐτὰ καὶ κείμενον ἐπὶ ἄλλης περιφερείας Λ ἵσης πρὸς τὴν Κ.

Κατὰ τὴν περίπτωσιν α' εἶναι $\widehat{\text{ΑΚΒ}} = \widehat{\text{ΓΛΔ}}$ καὶ $\widehat{\text{ΕΚΖ}} = \widehat{\text{ΓΛΔ}}$.

'Ἐκ τούτων δὲ ἔπειται (§ 9 α') ὅτι $\widehat{\text{ΑΚΒ}} = \widehat{\text{ΕΚΖ}}$, 8.ε.δ.

§ 35. Θεώρημα II. *Εἰς τὸν αὐτὸν κύκλον ἡ εἰς ἵσον κύκλους ἵσαι ἐπικέντροι γωνίαι βαίνουσιν ἐπὶ ἵσων τόξων.*

α') "Εστωσαν Κ καὶ Λ δύο ἵσαι κύκλοι καὶ $\widehat{\text{ΑΚΒ}} = \widehat{\text{ΓΛΔ}}$. Λέγω ὅτι $\widehat{\text{ΑΒ}} = \widehat{\text{ΓΔ}}$.

'Απόδειξις. Νοοῦμεν, ως προηγουμένως, ὅτι ὁ κύκλος Λ τίθεται ἐπὶ τοῦ Κ οὗτως, ὥστε νὰ συμπέσωσι τὰ κέντρα τῶν καὶ ἡ γωνία ΓΛΔ ἐπὶ τῆς ΑΚΒ μὲ τὴν ΛΓ ἐπὶ τῆς ΚΑ. Εἶναι φανερὸν ὅτι τὸ μὲν σημεῖον Γ θά συμπέσῃ μὲ τὸ Α, τὸ δὲ Δ μὲ τὸ Β. 'Ἐπειδὴ δὲ αἱ περιφέρειαι θὰ συμπέσωσιν, ἔπειται ὅτι τὸ τόξον ΓΔ θὰ συμπέσῃ μὲ τὸ ΑΒ. Εἶναι λοιπὸν $\widehat{\text{ΑΒ}} = \widehat{\text{ΓΔ}}$, 8.ε.δ.

β') "Αν $\widehat{\text{ΑΚΒ}} = \widehat{\text{ΕΚΖ}}$, νοοῦμεν ἐπὶ τοῦ κύκλου Λ μίαν γωνίαν ΓΛΔ ἵσην πρὸς τὰς γωνίας ΑΚΒ καὶ ΕΚΖ. Κατὰ δὲ τὴν προηγουμένην περίπτωσιν εἶναι $\widehat{\text{ΑΒ}} = \widehat{\text{ΓΔ}}$ καὶ $\widehat{\text{ΕΖ}} = \widehat{\text{ΓΔ}}$. 'Ἐπομένως $\widehat{\text{ΑΒ}} = \widehat{\text{ΕΖ}}$, 8.ε.δ.

Πόρισμα I. "Η ἀκτίς, ἡ δποία καταλήγει εἰς τὸ μέσον τοῦ τόξου μιᾶς ἐπικέντρου γωνίας, διαιρεῖ αὐτὴν εἰς δύο ἵσας γωνίας.

"Η εὐθεῖα, ἡ δποία διαιρεῖ μίαν γωνίαν εἰς δύο ἵσας γωνίας λέγεται διχοτόμος αὐτῆς.

Πόρισμα II. "Ἐκάστη γωνία ἔχει μίαν μόνον διχοτόμον.

Πόρισμα III. "Αν δύο τομεῖς τοῦ αὐτοῦ κύκλου ἡ ἵσων κύκλων ἔχωσιν ἵσας βάσεις ἡ ἵσας γωνίας, οὗτοι εἶναι ἵσαι.

§ 36. Ποία λέγονται ἀντίστροφα θεωρήματα. Τὰ δύο προηγούμενα θεωρήματα δυνάμεθα νὰ διατυπώσωμεν συντομώτερον οὕτω:

I. "Αν $\widehat{\text{ΑΒ}} = \widehat{\text{ΓΔ}}$, θὰ εἶναι καὶ $\widehat{\text{ΑΚΒ}} = \widehat{\text{ΓΛΔ}}$,

II. "Αν $\widehat{\text{ΑΚΒ}} = \widehat{\text{ΓΛΔ}}$, θὰ εἶναι καὶ $\widehat{\text{ΑΒ}} = \widehat{\text{ΓΔ}}$.

Ἐννοεῖται δὲ ὅτι πρόκειται περὶ ἵσων κύκλων Κ καὶ Λ.

Ἄπο τὴν διατύπωσιν ταύτην βλέπομεν ὅτι:

Ἡ ὑπόθεσις ἔκατέρου τῶν θεωρημάτων τούτων εἶναι συμ-
πέρασμα τοῦ ἐτέρου.

Τὰ τοιαῦτα θεωρήματα λέγονται ἀντίστροφα θεωρήματα.

§ 37. Θεώρημα III. Εἰς τὸν αὐτὸν κύκλον ἡ εἰς ἵσους κύ-
κλους εἰς ἄνισα τόξα βαίνουσιν δμοίως ἄνισοι ἐπίκεντροι γωνίαι.

Εἰς τοὺς ἵσους κύκλους Κ καὶ Λ θεωροῦμεν τὰ τόξα ΒΑΕ
καὶ ΓΔ, τὰ δποῖα εἶναι ἄνισα καὶ $\widehat{\text{BAE}} > \widehat{\text{ΓΔ}}$ (σχ. 24). Λέγω
ὅτι $\widehat{\text{EKB}} > \widehat{\text{ΓΔ}}$.

Ἀπόδειξις. Ἐπὶ τοῦ μεγαλυτέρου τόξου ΒΑΕ νοοῦμεν
τόξον ΑΒ ἵσον πρὸς ΓΔ. Ἐπειδὴ προφανῶς τὸ Α κεῖται μετα-
ξὺ τῶν ἄκρων Ε καὶ Β τοῦ τόξου ΕΑΒ, ἡ ἀκτὶς ΚΑ θὰ κεῖται
μέσα εἰς τὴν γωνίαν ΕΚΒ. Θὰ εἶναι λοιπὸν $\widehat{\text{EKB}} > \widehat{\text{ΑΚΒ}}$. Ἐπει-
δὴ δὲ $\widehat{\text{ΑΚΒ}} = \widehat{\text{ΓΔ}}$, ἔπειται ὅτι $\widehat{\text{EKB}} > \widehat{\text{ΓΔ}}$.

Ομοίως γίνεται ἡ ἀπόδειξις, ἀν τὰ τόξα κεῖνται εἰς τὴν
αὐτὴν περιφέρειαν.

§ 38. Θεώρημα IV. Εἰς τὸν αὐτὸν κύκλον ἡ εἰς ἵσους
κύκλους ἄνισοι ἐπίκεντροι γωνίαι βαίνουσιν ἐπὶ δμοίως ἄνισων
τόξων.

"Αν δηλ. $\widehat{\text{EKB}} > \widehat{\text{ΓΔ}}$, θὰ εἶναι καὶ $\widehat{\text{ΕΑΒ}} > \widehat{\text{ΓΔ}}$ (σχ. 24).

Ἀπόδειξις. Νοοῦμεν ὅτι ἡ μικροτέρα γωνία $\Gamma\Delta$ τίθεται
ἐπὶ τῆς ΕΚΒ οὕτως, ώστε ἡ ἀκτὶς $\Lambda\Delta$ νὰ ἐφαρμόσῃ ἐπὶ τῆς ΚΒ.
Εύκόλως δὲ ἐννοοῦμεν ὅτι ἡ γωνία $\Gamma\Delta$ ἐφαρμόζει εἰς ἓν μέ-
ρος ΑΚΒ τῆς μεγαλυτέρας γωνίας ΕΚΒ, τὸ δὲ τόξον $\Delta\Gamma$ ἐφαρ-
μόζει εἰς μέρος ΒΑ τοῦ τόξου ΒΑΕ. Εἶναι λοιπὸν $\widehat{\text{ΓΔ}} < \widehat{\text{ΕΑΒ}}$.

Δυνάμεθα δμως νὰ κάμωμεν τὴν ἀπόδειξιν, ἀν σκεφθῶμεν
ώς ἔξης:

"Αν ἡτο $\widehat{\text{ΓΔ}} \cong \widehat{\text{ΕΑΒ}}$, θὰ ἡτο ὀντιστοίχως $\widehat{\text{ΓΔ}} \cong \widehat{\text{ΕΚΒ}}$ (§ 34,
37). Αἱ σχέσεις δμως αὗται εἶναι ψευδεῖς, διότι ὑπετέθη ὅτι
 $\widehat{\text{ΓΔ}} < \widehat{\text{ΕΚΒ}}$. Εἶναι λοιπὸν $\widehat{\text{ΓΔ}} < \widehat{\text{ΕΑΒ}}$, διότι ἄλλο τι δὲν δύναται
νὰ συμβῇ.

Όμοιως γίνεται ή ἀπόδειξις, ἀν αἱ γωνίαι κεῖνται εἰς τὸν αὐτὸν κύκλον.

Σημείωσις. Είναι φανερὸν ότι τὰ θεωρήματα τῶν § § 37 καὶ 38 είναι ἀντίστροφα.

§ 39. Ἡ μέθοδος τῆς εἰς ἄτοπον ἀπαγωγῆς. Διὰ νὰ βεβαιωθῶμεν προηγουμένως (§ 31) ότι ἐν σημεῖον Μ τῆς περιφερείας Λ (σχ. 22) πίπτει ἐπὶ τῆς περιφερείας Κ, παρετηρήσαμεν ότι: "Αν δεχθῶμεν ότι τὸ Μ πίπτει ἐντὸς ἢ ἔκτὸς τοῦ κύκλου, φθάνομεν εἰς τὰ συμπεράσματα ΛΜ \leq α. Ταῦτα δὲ είναι ἀντίθετα πρὸς τὴν ὑπόθεσιν ΛΜ=α καὶ ἐπομένως ἄτοπα.

Δεχόμεθα λοιπὸν κατ' ἀνάγκην ότι τὸ Μ πίπτει ἐπὶ τῆς περιφερείας Κ, διότι ἄλλο τι δὲν δύναται νὰ συμβῇ.

Όμοιως κατὰ τὸν β' τρόπον τῆς ἀποδείξεως τοῦ προηγουμένου θεωρήματος (§ 38) εἴδομεν ότι: "Αν δεχθῶμεν ότι: $\widehat{\Gamma\Delta} > \widehat{E\Delta B}$, εἴμεθα ὑποχρεωμένοι νὰ δεχθῶμεν ότι καὶ $\widehat{\Gamma\Lambda\Delta} \leq \widehat{EKB}$, αἱ δυοῖαι είναι ψευδεῖς κατὰ τὴν ὑπόθεσιν. "Η, ὡς λέγομεν συνήθως, ἀντίκεινται εἰς τὴν ὑπόθεσιν.

Κατ' ἀνάγκην λοιπὸν είναι $\widehat{\Gamma\Delta} < \widehat{E\Delta B}$, διότι ἄλλο τι δὲν δύναται νὰ συμβῇ.

"Η τοιαύτη ἀποδεικτικὴ μέθοδος λέγεται ἀπόδειξις διὰ τῆς εἰς ἄτοπον ἀπαγωγῆς ἢ πλαγία ἀπόδειξις.


Κατὰ ταύτην, ἀν δεχόμενοι ἀληθῆ μίαν πρότασιν καταλήξωμεν εἰς συμπέρασμα ἀντίθετον πρὸς γνωστὴν ἀλήθειαν ἢ πρὸς τὴν ὑπόθεσιν, χαρακτηρίζομεν τὴν πρότασιν ψευδῆ. "Αν δὲ πᾶσαι αἱ περὶ τίνος δυναταὶ κρίσεις, πλὴν μιᾶς, είναι ψευδεῖς, ἢ μία αὕτη είναι ἀληθής.

3. ΓΩΝΙΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗΝ

§ 40. α') Ποῖαι γωνίαι λέγονται ἐφεξῆς γωνίαι. Αἱ δύο γωνίαι ΑΒΓ καὶ ΓΒΔ (σχ. 25) ἔχουσιν κοινὴν κορυφὴν Β, τὴν πλευρὰν ΒΓ κοινὴν καὶ τὰς ἄλλας ἔκατέρωθεν τῆς ΒΓ. Λέγονται δὲ αὗται ἐφεξῆς γωνίαι. Διὰ τούς αὐτοὺς λόγους καὶ αἱ γωνίαι ΓΒΔ, ΔΒΕ είναι ἐφεξῆς. "Ωστε:

Δύο γωνίαι λέγονται έφεξης, ἀν ἔχωσι κοινήν κορυφήν, μίαν πλευράν κοινήν καὶ τὰς μὴ κοινὰς πλευράς ἐκατέρωθεν τῆς κοινῆς.

β') Ποῖαι λέγονται διαδοχικαὶ γωνίαι. Ἡ γωνία $AB\Gamma$ εί-



Σχ. 25

ναι έφεξης μὲ τὴν $\Gamma B\Delta$, ἡ δὲ $\Gamma B\Delta$ εἶναι έφεξης μὲ τὴν $\Delta B E$. Αἱ δὲ γωνίαι $AB\Gamma$, $\Gamma B\Delta$, $\Delta B E$ δλαι μαζὶ λέγονται διαδοχικαὶ γωνίαι. "Ωστε:

Τρεῖς ἢ καὶ περισσότεραι γωνίαι λέγονται διαδοχικαὶ, ἀν εκάστη καὶ ἡ ἐπομένη εἶναι έφεξης γωνίαι.


Εἶναι δὲ φανερὸν ὅτι ἐπίκεντροι διαδοχικαὶ γωνίαι βαίνουσιν ἐπὶ διαδοχικῶν τόξων καὶ ἀντιστρόφως.

γ') Ποῖαι λέγονται κατὰ κορυφὴν γωνίαι. Αἱ γωνίαι ABE καὶ $\Gamma B\Delta$ (σχ. 26) ἔχουσι κορυφὴν κοινήν, αἱ δὲ πλευραὶ τῆς μιᾶς εἶναι προεκτάσεις τῶν πλευρῶν τῆς ἄλλης.

Λέγονται δὲ αὗται κατὰ κορυφὴν γωνίαι.

Διά τοὺς αὐτοὺς λόγους καὶ αἱ γωνίαι $AB\Delta$, $\Gamma B E$ εἶναι κατὰ κορυφὴν γωνίαι. "Ωστε:

Δύο γωνίαι λέγονται κατὰ κορυφὴν, ἀν ἔχωσι κορυφὴν κοινήν, αἱ δὲ πλευραὶ τῆς μιᾶς εἶναι προεκτάσεις τῶν πλευρῶν τῆς ἄλλης.



Σχ. 26.

§ 41. Ποία σχέσις ύπαρχει μεταξὺ δύο κατὰ κορυφὴν γωνιῶν. "Αν μὲ κέντρον τὴν κορυφὴν B (σχ. 26) καὶ μὲ τυχοῦσαν ἀκτῖνα γράψωμεν περιφέρειαν, αἱ κατὰ κορυφὴν γωνίαι γίνον-

ται ἐπίκεντροι. Ἐπειδὴ δὲ ΑΓ καὶ ΔΕ εἰναι διάμετροι, θὰ εἰναι $\widehat{ΑΕ} + \widehat{ΕΓ} = \widehat{ΑΕ} + \widehat{ΑΔ}$ καὶ ἐπομένως $\widehat{ΕΓ} = \widehat{ΑΔ}$. Ἐκ ταύτης δὲ ἔπειται δτὶ $\widehat{ΓΒΕ} = \widehat{ΑΒΔ}$. Ὁμοίως βεβαιούμεθα δτὶ καὶ $\widehat{ΑΒΕ} = \widehat{ΓΒΔ}$. Βλέπομεν λοιπὸν δτὶ:

Αἱ κατὰ κορυφὴν γωνίαι εἰναι ἵσαι.


Πόρισμα "Αν δύο τεμνόμεναι εὐθεῖαι σχηματίζωσι δύο ἐφεξῆς γωνίας ἵσας, πᾶσαι αἱ γωνίαι αὐτῶν εἰναι ἵσαι."

'Ασκήσεις

3. Νὰ γράψητε δύο διαμέτρους τυχόντος κύκλου καὶ νὰ συγκρίνητε ἕκαστον τῶν μεταξὺ αὐτῶν τόξων πρὸς τὸ ἀπέναντί του.
4. Νὰ συγκρίνητε τὰ τόξα, εἰς τὰ δοποῖα διαιροῦσι μίαν περιφέρειαν δύο διάμετροι αὐτῆς, ἢν δύο ἐφεξῆς γωνίαι αὐτῶν εἰναι ἵσαι.
5. "Αν ἐν τόξον ΑΒ μιᾶς περιφερείας Ο εἰναι 50° , νὰ εὕρητε πόσων μοιρῶν εἰναι ἕκαστον ἀπὸ τὰ τόξα, εἰς τὰ δοποῖα διαιρεῖται ἡ περιφέρεια αὐτη, ἢν αἱ ἀκτίνες ΟΑ, ΟΒ προεκταθῶσι μέχρι τῆς περιφερείας.
6. "Αν ἐν τόξον ΑΒ εἰναι 75° καὶ ἐν ἄλλο εἰναι 105° καὶ τὰ τόξα ταῦτα δὲν ἔχωσι κοινὸν μέρος, νὰ συγκρίνητε τὴν χορδὴν ΑΓ πρὸς τὴν διάμετρον τοῦ κύκλου.
7. Νὰ ἔξετάσητε, ἢν αἱ γωνίαι ΑΒΓ καὶ ΑΒΔ (σχ. 25) εἰναι ἐφεξῆς ἢ ὅχι.
8. Νὰ ἔξετάσητε πόσας διχοτόμους ἔχει ἔκάστη γωνία.

4. ΚΑΘΕΤΟΙ ΚΑΙ ΠΛΑΓΙΑΙ ΕΥΘΕΙΑΙ ΚΑΙ ΓΩΝΙΑΙ ΑΥΤΩΝ

§ 42. Ποῖαι λέγονται κάθετοι καὶ ποῖαι πλάγιαι εὐθεῖαι.



Αἱ γωνίαι τῶν τεμνομένων εύθειῶν ΑΒ καὶ ΓΔ (σχ. 27) εἰναι δλαι ἵσαι. Αἱ δὲ ΑΒ καὶ ΓΔ λέγονται κάθετοι εὐθεῖαι. "Ωστε:

Δύο εύθεται λέγονται κάθετοι, ἀν αἱ ὑπὸ αὐτῶν σχηματιζόμεναι γωνίαι εἶναι πᾶσαι ἔσαι.


Πᾶσα γωνία σχηματιζομένη ὑπὸ καθέτων εύθετῶν λέγεται δρυθὴ γωνία. Ἐκάστη λοιπὸν τῶν γωνιῶν ΑΘΓ, ΓΘΒ, ΒΘΔ, ΔΘΑ (σχ. 27) εἶναι δρυθὴ γωνία.

Αἱ γωνίαι τῶν εύθετῶν EZ καὶ HΘ δὲν εἶναι δλαι ἔσαι, αἱ δὲ EZ καὶ HΘ λέγονται πλάγιαι εύθεται (σχ. 27). "Ωστε:

Δύο εύθεται λέγονται πλάγιαι, ἀν αἱ ὑπὸ αὐτῶν σχηματιζόμεναι γωνίαι δὲν εἶναι δλαι ἔσαι.

§ 43. Νὰ ἔξετασθῇ, ἂν ἐκ σημείου A εύθειας X'X ἄγωνται κάθετοι ἐπ' αὐτὴν

καὶ πόσαι (σχ. 28). "Αν μὲ κέντρον A καὶ μὲ τυχοῦσαν ἀκτῖνα γράψωμεν περιφέρειαν, δρίζομεν ἐπὶ τῆς X'X διάμετρον ΓΒ. Αὕτη διαιρεῖ τὴν περιφέρειαν εἰς δύο ἡμιπεριφέρειας. "Αν δὲ Δ εἶναι τὸ μέσον τῆς μιᾶς, θὰ εἶναι $\widehat{B\Delta} = \widehat{\Delta\Gamma}$. "Αν δὲ ἀχθῆται καὶ ἡ εύθεια ΔΑΕ, θὰ εἶναι $\widehat{B\Delta} = \widehat{\Delta\Gamma}$ (§ 34).



Σχ. 28

"Επειδὴ δὲ αἱ γωνίαι BΔΑ, ΔΑΓ εἶναι ἐφεξῆς, θὰ εἶναι καὶ

$$\widehat{B\Delta} = \widehat{\Delta\Gamma} = \widehat{\Gamma\Delta} = \widehat{\Delta\Gamma} \quad (\text{§ 41 Πόρ.})$$

Αἱ εύθειαι λοιπὸν X'X καὶ ΔΑΕ εἶναι κάθετοι.

"Αν δὲ καὶ μία ἄλλη εύθεια AZ ἥτο κάθετος ἐπὶ τὴν X'X,

θὰ ἥτο $\widehat{\Gamma\Delta} = \widehat{\Delta\Gamma}$ καὶ ἐπομένως $\widehat{\Gamma\Delta} = \widehat{\Delta\Gamma}$, ἥτοι τὸ Z θὰ ἥτο μέσον τῆς ἡμιπεριφέρειας BΔΓ. Τὸ Z λοιπὸν ταυτίζεται μὲ τὸ Δ (§ 27) καὶ ἡ AZ μὲ τὴν AΔ (§ 10 α'). Βλέπομεν λοιπὸν ὅτι:

"Απὸ Ἑκαστον σημείου εύθετας ἄγεται μία μόνον κάθετος ἐπ' αὐτήν.


Πόρισμα I. Δύο κάθετοι διάμετροι κύκλου διαιροῦσι τὴν περιφέρειαν εἰς 4 ίσα τόξα (τεταρτημόδια) καὶ τὸν κύκλον εἰς 4 ίσους κυκλικοὺς τομεῖς (τεταρτοκύκλια).

Πόρισμα II. Μία δρυθή ἐπίκεντρος γωνία βαίνει ἐπὶ τεταρτημοδίου περιφερείας.


Πόρισμα III. Ἐν μίᾳ ἐπίκεντρος γωνίᾳ βαίνη ἐπὶ τεταρτημοδίου περιφερείας, εἶναι δρυθή γωνία.

§ 44. Ὁ γνώμων καὶ ἡ χρῆσις αὐτοῦ. Τὸ σχῆμα 29 ἀπεικονίζει τὸ γνωστὸν καὶ ἀπὸ τὴν Πρακτικὴν Γεωμετρίαν ὅργανον, τὸ δποῖον λέγεται γνώμων. Τοῦτο εἶναι ξύλινον ἢ μετάλλινον τρίγωνον μὲ δύο καθέτους πλευράς.

Μὲ τὸν γνώμονα γράφομεν εὐθείας καθέτους ἐπὶ διθεῖσαν εὐθεῖαν AB. Πρὸς τοῦτο τοποθετοῦμεν τὸν γνώμονα οὕτως,



Σχ. 29



Σχ. 30

ῶστε ἡ μία ἀπὸ τὰς καθέτους πλευράς του νὰ ἔφαρμόζῃ ἐπὶ τῆς AB. Ἐὰν δὲ σύρωμεν τὴν γραφίδα κατὰ μῆκος τῆς ἄλλης καθέτου πλευρᾶς τοῦ γνώμονος, γράφομεν εὐθεῖαν κάθετον ἐπὶ τὴν AB.

"Αν θέλωμεν νὰ γράψωμεν τὴν κάθετον, ἡ δποία διέρχεται ἀπὸ ὠρισμένον σημεῖον Γ τῆς εὐθείας AB, τοποθετοῦμεν τὸν γνώμονα οὕτως, ῶστε ἡ κορυφὴ τῆς δρυθῆς γωνίας νὰ συμπίπτῃ μὲ τὸ Γ, ἡ δὲ μία πλευρὰ αὐτῆς μὲ τὴν AB καὶ συνεχίζομεν, ὅπως προηγουμένως.

Πρὸς εὐκολίαν τοποθετοῦμεν τὸν κανόνα ὡς τῶν γωνιῶν, ώστε μία εὐθεῖα αὐτοῦ νὰ συμπίπτῃ μὲ τὴν AB καὶ μετακινοῦμεν τὸν γνώμανα ὡς τῶν γωνιῶν, ώστε ἡ μία κάθετος πλευρὰ αὐτοῦ νὰ διλησθαίνῃ ἐπὶ τοῦ κανόνος.

§ 45. Ποία σχέσις ὑπάρχει μεταξὺ τῶν ὁρθῶν γωνιῶν.
Ἐστωσαν B καὶ E δύο ὁρθαὶ γωνίαι (σχ. 31). Διὰ νὰ συγκρίνωμεν αὐτάς, νοοῦμεν δτὶ

π.χ. ἡ E τίθεται ἐπὶ τῆς B οὕτως, ώστε ἡ κορυφὴ E νὰ συμπέσῃ μὲ τὴν B καὶ ἡ πλευρὰ EZ μὲ τὴν $B\Gamma$. Τοιουτοτρόπως ἡ $E\Delta$ γίνεται κάθετος ἐπὶ τὴν $B\Gamma$ καὶ ἐπομένως συμπίπτει μὲ τὴν BA (§ 43). Ἡ


γωνία λοιπὸν E ἐφαρμόζει ἐπὶ τῆς B καὶ ἐπομένως εἶναι $\widehat{B} = \widehat{E}$, ἥτοι :

Ἄει δρθαὶ γωνίαι εἶναι ἴσαι.

Ἐπειδὴ λοιπὸν ἡ ὁρθὴ γωνία εἶναι σταθερά, χρησιμοποιοῦμεν αὐτὴν ὡς μονάδα, πρὸς τὴν ὁποίαν συγκρίνομεν τὰς ἄλλας γωνίας.

§ 46. Ποῖαι λέγονται ὁξεῖαι καὶ ποῖαι ἀμβλεῖαι γωνίαι.

Ἡ γωνία $AB\Gamma$ εἶναι μικροτέρα τῆς ὁρθῆς γωνίας ΓBH (σχ. 32).



Σχ. 32


Λέγεται δὲ ἡ $AB\Gamma$ ὁξεῖα γωνία. Διὰ τὸν αὐτὸν λόγον καὶ ἡ ABH εἶναι ὁξεῖα γωνία. Ὡστε :

Πᾶσα γωνία μικροτέρα τῆς ὁρθῆς γωνίας λέγεται ὁξεῖα γωνία.

Ἡ γωνία $ΔEZ$ εἶναι μεγαλυτέρα τῆς ὁρθῆς γωνίας.

γωνίας. Λέγεται δὲ ἀμβλεῖα γωνία. Καὶ ἡ γωνία BAZ (σχ. 28) εἶναι ἀμβλεῖα διὰ τὸν αὐτὸν λόγον. Ὡστε :

Πᾶσα γωνία μεγαλυτέρα τῆς ὁρθῆς λέγεται ἀμβλεῖα γωνία.




Σχ. 31

5. ΠΡΟΣΘΕΣΙΣ ΓΩΝΙΩΝ

§ 47. α') Τί είναι ἄθροισμα δύο ἐφεξῆς γωνιῶν. Αἱ ἐφεξῆς γωνίαι $\Gamma\text{ΒΑ}$, ΑΒΗ ἀποτελοῦσι τὴν γωνίαν $\widehat{\Gamma\text{ΒΑ}}$ καὶ $\widehat{\text{ΑΒΗ}}$. Παρατηροῦμεν δὲ ὅτι ἡ $\widehat{\Gamma\text{ΒΗ}}$ σχηματίζεται ἀπὸ τὰς μὴ κοινὰς πλευράς ΒΓ , ΒΗ καὶ περιέχει τὴν κοινὴν πλευράν ΒΑ τῶν $\widehat{\Gamma\text{ΒΑ}}$, $\widehat{\text{ΑΒΗ}}$.

Αἱ ἐφεξῆς γωνίαι ΑΒΓ , ΓΒΔ ἀποτελοῦσι τὴν μὴ κυρτήν γωνίαν $\widehat{\text{ΑΒΔ}}$ (σχ. 33). Εἶναι λοιπόν:



Σχ. 33

$$\widehat{\text{ΑΒΓ}} + \widehat{\text{ΓΒΔ}} = \text{ἡ μὴ κυρτὴ } \widehat{\text{ΑΒΔ}} = \phi.$$

Παρατηροῦμεν ἐπίσης ὅτι ἡ φ σχηματίζεται ἀπὸ τὰς μὴ κοινὰς πλευράς ΒΑ , ΒΔ καὶ περιέχει τὴν κοινὴν πλευράν ΒΓ τῶν προσθετέων. Κατὰ ταῦτα:

"Ἄθροισμα δύο ἐφεξῆς γωνιῶν λεγεται ἡ γωνία, ἡ δποια σχηματίζεται ἀπὸ τὰς μὴ κοινὰς πλευράς καὶ περιέχει τὴν κοινὴν πλευρὰν αὐτῶν.

§ 48. β') Τί είναι ἄθροισμα διαδοχικῶν γωνιῶν. "Εστωσαν αἱ διαδοχικαὶ γωνίαι ΑΒΓ , ΓΒΔ , ΔΒΕ , ΕΒΖ (σχ. 34). Κατὰ τὰ προηγούμενα εἶναι:

$$\widehat{\text{ΑΒΓ}} + \widehat{\text{ΓΒΔ}} = \widehat{\text{ΑΒΔ}}, \quad \widehat{\text{ΑΒΔ}} + \widehat{\text{ΔΒΕ}} = \widehat{\text{ΑΒΕ}}, \quad \widehat{\text{ΑΒΕ}} + \widehat{\text{ΕΒΖ}} = \widehat{\text{ΑΒΖ}}.$$


'Απὸ τὰς δοθείσας λοιπόν διαδοχικὰς γωνίας σχηματίζεται ἡ γωνία ΑΒΖ καὶ ἐπομένως:

$$\widehat{\text{ΑΒΓ}} + \widehat{\text{ΓΒΔ}} + \widehat{\text{ΔΒΕ}} + \widehat{\text{ΕΒΖ}} = \widehat{\text{ΑΒΖ}}.$$

"Ωστε:

"Ἄθροισμα διαδοχικῶν γωνιῶν εἶναι ἡ γωνία, τὴν δποιαν σχηματίζομεν ως ἔξῆς :

Προσθέτομεν τὰς δύο πρώτας εἰς τὸ ἄθροισμα αὐτῶν προσθέτομεν τὴν τρίτην· εἰς τὸ νέον ἄθροισμα προσθέτομεν τὴν τετάρτην καὶ οὕτω καθ' ἔξῆς, ἐως ὅτου προσθέσωμεν δλας τὰς γωνίας.



Σχ. 34

§ 49 γ') Τί είναι ᾱθροισμα οίωνδήποτε γωνιών. "Ας ύποθέσουμεν πρῶτον ότι δύο γωνίαι ω καὶ φ ἔχουσι τυχοῦσαν θέσιν (σχ. 35). "Αν δὲ δύο ἐφεξῆς γωνίαι ω' καὶ φ' είναι τοιαῦται, ὅστε: $\omega = \omega'$, $\phi = \phi'$, καλούμεν ᾱθροισμα $\omega + \phi$ τὸ ᾱθροισμα $\omega' + \phi'$, δηλ. τὴν γωνίαν ΑΚΒ. "Ωστε:


"Ᾱθροισμα δύο οίωνδήποτε γωνιῶν δημάζομεν τὸ ᾱθροισμα δύο ἐφεξῆς γωνιῶν ἵσων ἀντιστοίχως πρὸς ταύτας.

'Ομοίως ᾱθροισμα οίωνδήποτε γωνιῶν περισσοτέρων τῶν δύο, δημάζομεν τὸ ᾱθροισμα διαδοχικῶν γωνιῶν ἀντιστοίχως ἵσων πρὸς ἕκείνας.


"Αν $\Lambda = \omega + \omega$, ή γωνία Λ λέγεται διπλάσια τῆς ω . 'Η δὲ ω λέγεται ἡμισυ τῆς Λ . Ταῦτα γράφονται ως ἐξῆς $\Lambda = \omega \cdot 2$ καὶ $\omega = \Lambda : 2$.

'Ομοίως ἂν $\Theta = \theta + \theta + \theta$, ή γωνία Θ είναι τριπλασία τῆς θ , ή δὲ θ τρίτον τῆς Θ , ἥτοι $\Theta = \theta \cdot 3$ καὶ $\theta = \Theta : 3$ κ.τ.λ.

§ 50. Ποῖαι λέγονται συμπληρωματικαὶ γωνίαι. "Εστω μία δρθὴ γωνία ΓΒΗ (σχ. 32). "Εντὸς αὐτῆς γράφομεν μίαν εὐθεῖαν ΒΑ. Οὕτω δὲ σχηματίζονται αἱ γωνίαι ΓΒΑ καὶ ΑΒΗ, αἱ δόποιαι ἔχουσιν ᾱθροισμα τὴν δρθὴν γωνίαν ΓΒΗ. Αἱ γωνίαι ΓΒΑ καὶ ΑΒΗ λέγονται συμπληρωματικαὶ γωνίαι. "Ωστε:



Σχ. 35



πλευραὶ αὐτῶν κείνται ἐπ' εὐθείας.

Λύσις. "Εστωσαν αἱ ἐφεξῆς γωνίαι ΑΒΓ καὶ ΓΒΔ, τῶν

Δύο γωνίαι λέγονται συμπληρωματικαὶ, ἂν ἔχωσιν ᾱθροισμα μίαν δρθὴν γωνίαν.

§ 51. Πρόβλημα I.
Νὰ εὑρεθῇ τὸ ᾱθροισμα δύο ἐφεξῆς γωνιῶν, ἂν αἱ μὴ κοιναὶ

δποιών αι μὴ κοιναὶ πλευραὶ ΑΒ καὶ ΒΔ κεῖνται ἐπ' εὐθείας (σχ. 36). "Αν ἡ κοινὴ πλευρὰ ΒΓ εἶναι κάθετος ἐπὶ τὴν εὐθεῖαν ΑΔ (σχ. 36 α'), θά εἶναι:

$$\widehat{ΑΒΓ} = 1 \text{ δρθ. καὶ } \widehat{ΓΒΔ} = 1 \text{ δρθ.}$$

$$\cdot \text{Επομένως } \widehat{ΑΒΓ} + \widehat{ΓΒΔ} = 2 \text{ δρθ.}$$

"Αν δὲ ἡ ΒΓ εἶναι πλαγία πρὸς τὴν ΑΔ, αἱ γωνίαι ΑΒΓ καὶ ΓΒΔ θὰ εἶναι ἄνισοι· ἔστω δὲ $\widehat{ΑΒΓ} > \widehat{ΓΒΔ}$. "Αν ἐκ τοῦ Β διχθῆ ἐπὶ τὴν ΑΔ κάθετος εὐθεῖα ΒΕ, αὕτη θὰ κεῖται ἐντὸς τῆς μεγαλυτέρας γωνίας ΑΒΓ. Οὕτω δὲ θὰ εἶναι:

$$\widehat{ΑΒΕ} = 1 \text{ δρθ. καὶ } \widehat{ΕΒΓ} + \widehat{ΓΒΔ} = \widehat{ΕΒΔ} = 1 \text{ δρθ.}$$

"Αν δὲ προσθέσωμεν κατὰ μέλη τὰς λεύκητας ταύτας, εὑρίσκομεν ὅτι $\widehat{ΑΒΕ} + \widehat{ΕΒΓ} + \widehat{ΓΒΔ} = 2 \text{ δρθ.}$ (1)

$$\cdot \text{Επειδὴ δὲ } \widehat{ΑΒΕ} + \widehat{ΕΒΓ} = \widehat{ΑΒΓ}, \text{ ἡ (1) γίνεται}$$

$$\widehat{ΑΒΓ} + \widehat{ΓΒΔ} = 2 \text{ δρθ.}$$

Εὕρομεν λοιπὸν ὅτι:

"Αν αἱ μὴ κοιναὶ πλευραὶ δύο ἐφεξῆς γωνιῶν κεῖνται ἐπ' εὐθείας, τὸ ἀθροισμα αὐτῶν εἶναι δύο δρυταὶ γωνίαι.

§ 52. Πρόβλημα II. *Απὸ ἐν σημεῖον δοθείσης εὐθείας φέρομεν διαφόρους εὐθείας πρὸς τὸ αὐτὸν μέρος αὐτῆς. Νὰ εὑρεθῇ τὸ ἀθροισμα τῶν σχηματιζομένων διαδοχικῶν γωνιῶν.*

§ 53. Πρόβλημα III. *Απὸ ἐν σημεῖον ἐνὸς ἐπιπέδου φέρομεν εἰς αὐτὸν διαφόρους εὐθείας. Νὰ εὑρεθῇ τὸ ἀθροισμα τῶν σχηματιζομένων διαδοχικῶν γωνιῶν.*

§ 54. Ποῖαι λέγονται παραπληρωματικαὶ γωνίαι. *Απὸ τὴν λύσιν τοῦ προβλήματος I (§ 51) εἴδομεν ὅτι $\widehat{ΑΒΓ} + \widehat{ΓΒΔ} = 2 \text{ δρθ.}$ (σχ. 36). Αἱ γωνίαι αὗται ΑΒΓ καὶ ΓΒΔ λέγονται παραπληρωματικαὶ γωνίαι. "Ωστε:*

Δύο γωνίαι λέγονται παραπληρωματικαὶ, ἂν τὸ ἀθροισμα αὐτῶν εἶναι 2 δρυταὶ γωνίαι.

§ 55. Θεώρημα. *"Αν δύο ἐφεξῆς γωνίαι εἶναι παραπληρωματικαὶ, αἱ μὴ κοιναὶ πλευραὶ αὐτῶν κεῖνται ἐπ' εὐθείας.*

"Απόδειξις. Εστωσαν αἱ ἐφεξῆς γωνίαι ΑΒΓ καὶ ΓΒΔ (σχ. 37), αἱ δοποῖαι εἰναι παραπληρωματικαι. Εἶναι δηλαδή:

$$\widehat{ΑΒΓ} + \widehat{ΓΒΔ} = 2 \text{ δρθ.} \quad (1)$$


"Αν BE εἰναι ἡ προέκτασις τῆς AB κατὰ τὴν φορὰν A πρὸς B, θά εἰναι $\widehat{ΑΒΓ} + \widehat{ΓΒΕ} = 2 \text{ δρθ.}$ (§ 51). Απὸ τὴν ἰσότητα ταύτην καὶ ἀπὸ τὴν (1) ἐννοοῦμεν ὅτι

$$\widehat{ΑΒΓ} + \widehat{ΓΒΔ} = \widehat{ΑΒΓ} + \widehat{ΓΒΕ}.$$

"Αν δὲ ἀπὸ τὰ μέλη αὐτῆς ἀφαιρεθῇ ἡ κοινὴ γωνία $ΑΒΓ$, προκύ-

$$\text{πτει } \widehat{\text{η}} \text{ ἰσότης } \widehat{ΓΒΔ} = \widehat{ΓΒΕ}.$$

Σχ. 37



'Εκ ταύτης δὲ ἔπειται ὅτι αἱ πλευραὶ $ΒΔ$ καὶ $ΒΕ$ συμπίπτουσιν. Ή πλευρὰ λοιπὸν $ΒΔ$ εἰναι προέκτασις τῆς AB , ήτοι αἱ μὴ κοιναὶ πλευραὶ AB καὶ BD κείνται ἐπ' εύθειας, δ.ξ.δ.

6. ΑΦΑΙΡΕΣΙΣ ΓΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗΣ

§ 56. Τί εἰναι γεωμετρικὴ διαφορὰ δύο ἀνίσων γωνιῶν.

Γνωρίζομεν ὅτι π.χ. $\widehat{ΑΒΕ} + \widehat{ΕΒΓ} = \widehat{ΑΒΓ}$ (σχ. 36 β'). Απὸ δὲ τὴν ἰσότητα ταύτην ἐννοοῦμεν εὐκόλως ὅτι:

$$\widehat{ΕΒΓ} = \widehat{ΑΒΓ} - \widehat{ΑΒΕ}. \text{ "Ωστε:}$$

Γεωμετρικὴ διαφορὰ δύο ἀνίσων γωνιῶν λέγεται ἡ γωνία ἡ δοποὶα μένει, ἢν ἀπὸ τὴν μεγαλυτέραν διπολοπῆ γωνία ἔχουσα μὲ αὐτὴν μίαν πλευρὰν κοινὴν καὶ ἴση πρὸς τὴν μικροτέραν.

7. ΜΕΤΡΗΣΙΣ ΓΩΝΙΩΝ

§ 57. Τί εἰναι μέτρον τόξου καὶ γωνίας. Εστωσαν T καὶ τ δύο τόξα τῆς αὐτῆς περιφερείας ἡ δύο ἰσων περιφερειῶν. Ας ὑποθέσωμεν δὲ ὅτι:

$$T = \tau + \tau + \tau \text{ ἢ } T = \tau \cdot 3$$

'Ο ἀριθμὸς 3 λέγεται λόγος τοῦ T πρὸς τὸ τόξον καὶ δηλοῦται οὕτω: $T : \tau = 3$.

'Ομοίως, ἢν $T = \tau + \tau + \frac{\tau}{10} + \frac{\tau}{100} \cdot 3$, τὸ τόξον T λέγεται γι-

νόμενον τοῦ τὸ ἐπὶ τὸ ἀριθμὸν 2,13. Οὗτος δὲ λέγεται λόγος τοῦ Τ πρὸς τὸ τ. Εἶναι δηλ. $T:\tau = 2,13$. "Ωστε:

Δόγος ἐνδὲ τόξου πρὸ ἄλλο τόξον τῆς αὐτῆς περιφερείας ἢ ἵσων περιφερεῖῶν λέγεται δ ἀριθμός, μὲ τὸν δποτὸν πρέπει νὰ πολλαπλασιασθῇ τὸ β' τόξον, διὰ νὰ προκύψῃ τὸ α'.

"Αν τὸ β' τόξον τὸ ληφθῆ ως μονάς τῶν τόξων, δ λόγος $T:\tau$ λέγεται ίδιαιτέρως μέτρον τοῦ τόξου Τ.

Τὸ μέτρον τοῦτο σημειούται συντόμως οὕτω (\widehat{T}).

'Η δὲ εὕρεσις τοῦ μέτρου (\widehat{T}) λέγεται μέτρησις τοῦ Τ.

'Ομοίως, ἂν μεταξὺ δύο γωνιῶν Λ καὶ ω ὑπάρχῃ ἡ σχέσις $\Lambda=\omega+\omega$ ἢ $\Lambda=\omega \cdot 2$, δ 2 λέγεται λόγος τῆς Λ πρὸς τὴν ω.

"Αν δὲ $\Lambda=\omega+\omega+\omega+\frac{\omega}{10} \cdot 2 + \frac{\omega}{100} = \omega \cdot (3,21)$, δ ἀριθμὸς 3,21 εἶναι λόγος τῆς Λ πρὸς τὴν ω, ἥτοι:

$$\widehat{\Lambda} : \widehat{\omega} = 3,21.$$

"Αν δὲ ἡ γωνία ω λαμβάνηται ως μονάς τῶν γωνιῶν, δ λόγος $\widehat{\Lambda} : \widehat{\omega}$ λέγεται ίδιαιτέρως μέτρον τῆς γωνίας Λ καὶ σημειούται οὕτω ($\widehat{\Lambda}$). 'Η εὕρεσις τοῦ μέτρου ($\widehat{\Lambda}$) λέγεται μέτρησις τῆς γωνίας Λ .

'Ως μονάς τῶν γωνιῶν (πλήν τῆς δρῆσης γωνίας) λαμβάνεται ἡ ἐπίκεντρος γωνία, ἡ δποια βαίνει ἐπὶ τῆς μονάδος τῶν τόξων. Οὕτως, ἂν μονάς τῶν τόξων εἶναι ἡ μοῖρα, ως μονάς τῶν γωνιῶν λαμβάνεται ἡ ἐπίκεντρος γωνία εἰς κύκλον K , ἡ δποια βαίνει ἐπὶ τόξου 1° τῆς περιφερείας K . Λέγεται δὲ αὐτῇ γωνία μιᾶς μοίρας.

"Υπὸ τὴν ἀνωτέρω προϋπόθεσιν θὰ ἔξετάσωμεν τὸ ἀκόλουθον ζήτημα.

§ 58. Ποία σχέσις ὑπάρχει μεταξὺ τοῦ μέτρου γωνίας καὶ τοῦ μέτρου τοῦ ἀντιστοίχου τόξου. "Εστω Λ μία ἐπίκεντρος γωνία καὶ T τὸ ἀντίστοιχον τόξον αὐτῆς. "Αν τ εἶναι ἡ μονάς τῶν τόξων τῆς αὐτῆς περιφερείας, ἡ εἰς αὐτὸ βανουσα ἐπίκεντρος γωνία ω εἶναι ἡ μονάς τῶν γωνιῶν.

"Επομένως $\widehat{T} : \widehat{\tau} = (\widehat{T})$ καὶ $\widehat{\Lambda} : \widehat{\omega} = (\widehat{\Lambda})$. "Αν δὲ ὑποθέσω-

μεν π.χ. δτι $\widehat{T} = 2,13$, θά είναι $T = \tau \cdot 2,13 = \tau + \tau + \frac{\tau}{10} + \frac{\tau}{100} \cdot 3$.

Έπειδή δὲ εἰς τὸ τόξον τ βαίνει γωνία ω, εἰς τὸ $\frac{\tau}{10}$ θά βαίνῃ γωνία, ἥτις δεκαπλασιαζομένη γίνεται ω, ἥτοι $\frac{\omega}{10}$. εἰς τὸ $\frac{\tau}{100} \cdot 3$ θά βαίνῃ $\frac{\omega}{100} \cdot 3$. Ἐπομένως εἰς τὸ T θά βαίνῃ γωνία

$$\omega + \omega + \frac{\omega}{10} + \frac{\omega}{100} \cdot 3$$

$$\text{ἥτοι θὰ είναι } \widehat{\Lambda} = \widehat{\omega} + \widehat{\omega} + \frac{\widehat{\omega}}{10} + \frac{\widehat{\omega}}{100} \cdot 3 = \widehat{\omega} \cdot 2,13.$$


Ἐκ ταύτης δὲ ἔπειται δτι: $\widehat{\Lambda} : \widehat{\omega} = 2,13$ ἢ $(\widehat{\Lambda}) = 2,13 = (\widehat{T})$.
Βλέπομεν λοιπὸν δτι:

Τὸ μέτρον ἐπικεντρου γωνίας ἴσοῦται πρὸς τὸ μέτρον τοῦ ἀντίστοιχου τόξου, ἀν ως μονάς τῶν γωνιῶν ληφθῆ ἡ ἐπικεντρος γωνία, ἡ δποια βαίνει ἐπὶ τῆς μονάδος τῶν τόξων.

Κατὰ ταῦτα εἰς τόξον π.χ. 25° βαίνει ἐπίκεντρος γωνία ἐπίσης 25° .

Διὰ νὰ μετρήσωμεν λοιπὸν μίαν γωνίαν, ἀρκεῖ νὰ καταστήσωμεν αὐτὴν ἐπίκεντρον καὶ νὰ μετρήσωμεν τὸ ἀντίστοιχον τόξον. Τοῦτο κατορθώνομεν μὲ τὸ μοιρογυγωμόνιον, ως ἀμέσως θὰ ἴδωμεν.

§ 59. Τὸ μοιρογυγωμόνιον καὶ ἡ χρῆσις αὐτοῦ. Τὸ μοιρογυγωμόνιον είναι μετάλλινον ἥκι καὶ ξύλινον ἡμικύκλιον, τοῦ δποιού τὸ τόξον είναι διηρημένον εἰς 180° ἵσα μέρη. Ἐκαστὸν ἐπομένως είναι τὸ τόξον 1° . Είναι δὲ τὰ τόξα ταῦτα ἡριθμημένα ἀπὸ 0 ἕως 180° (σχ. 38).



Σχ. 38

Μὲ τὸ μοιρογνωμόνιον εύρισκομεν τὸ μέτρον μιᾶς γωνίας ΑΟΒ ως ἔξῆς:

Τοποθετοῦμεν αὐτὸς εἰς τὸ ἐπίπεδον τῆς γωνίας καὶ οὕτως, ὥστε τὸ κέντρον νὰ συμπέσῃ μὲ τὴν κορυφὴν Ο τῆς γωνίας, ἡ ἀρχὴ 0° τῶν διαιρέσεων ἐπὶ τῆς μιᾶς πλευρᾶς ΟΑ καὶ τὸ μοιρογνωμόνιον πρὸς τὸ μέρος τῆς ἄλλης πλευρᾶς ΟΒ. Ὁ ἀριθμός, ὃ ὅποιος ἀναγράφεται εἰς τὴν τομὴν τῆς ἡμιπεριφερείας καὶ τῆς πλευρᾶς ΟΒ εἶναι τὸ μέτρον τῆς γωνίας ΑΟΒ εἰς μοίρας.

*Α σκήσεις

9. Νὰ εὕρητε τὸ μέτρον τῆς δρθῆς γωνίας εἰς μοίρας.
10. Νὰ εὕρητε εἰς μοίρας τὸ μέτρον τοῦ $\frac{1}{2}$ καὶ τοῦ $\frac{1}{4}$ τῆς δρθῆς γωνίας.
11. Νὰ εὕρητε τὸ μέτρον γωνίας 50° εἰς μέρη δρθῆς γωνίας.
12. Νὰ εὕρητε τὸ μέτρον γωνίας $40^{\circ} 20'$ εἰς μέρη δρθῆς γωνίας.
13. "Ἄν μία γωνία εἴναι $\frac{7}{10}$ δρθῆς, νὰ εὕρητε τὸ μέτρον τῆς συμπληρωματικῆς καὶ τῆς παραπληρωματικῆς της εἰς μέρη δρθῆς καὶ εἰς μοίρας.
14. Μία γωνία Α ἐνὸς ἔξαγώνου εἴναι $\frac{4}{3}$ δρθῆς. Νὰ εὕρητε τὸ μέτρον τῆς ἔξωτερικῆς γωνίας Α αὐτοῦ εἰς μοίρας.
15. Μία γωνία Α ἐνὸς τετραπλεύρου εἴναι $\frac{7}{5}$ δρθῆς. Νὰ εὕρητε τὸ μέτρον τῆς ἔξωτερικῆς γωνίας Α αὐτοῦ.
16. Μία γωνία Α ἐνὸς πενταγώνου είναι 108° . Νὰ εὕρητε τὸ μέτρον τῆς ἔξωτερικῆς γωνίας Α εἰς μοίρας καὶ εἰς μέρη δρθῆς γωνίας.
17. Μία ἔξωτερική γωνία Α ἐνὸς ἑπταγώνου είναι $51^{\circ} 25' 43''$. Νὰ εὕρητε τὸ μέτρον τῆς ἔσωτερικῆς γωνίας Α αὐτοῦ εἰς μοίρας καὶ εἰς μέρη δρθῆς.
18. "Ἀπὸ ἐν σημεῖον μιᾶς εὐθείας τοῦ τετραδίου σας νὰ γράψητε εἰς αὐτὸ δύο εὐθείας πρὸς τὸ αὐτὸ μέρος ἐκείνης. Νὰ μετρήσητε τὰς δύο ἀπὸ τὰς γωνίας, αἱ ὅποιαι θὰ σχηματισθῶσι, καὶ νὰ ὑπολογίσητε τὸ μέτρον τῆς τρίτης.
19. 'Ἀπὸ ἐν σημεῖον Α μιᾶς εὐθείας ΒΓ τοῦ τετραδίου σας νὰ φέρητε πρὸς τὸ αὐτὸ μέρος αὐτῆς δύο εὐθείας ΑΔ, ΑΕ οὕτως, ὥστε νὰ είναι $(\widehat{BAD}) = 25^{\circ}$ καὶ $(\widehat{GAE}) = 50^{\circ}$. Νὰ εὕρητε τὸ μέτρον τῆς γωνίας ΔΑΕ εἰς μέρη δρθῆς γωνίας.
20. "Ἄν τρεῖς εὐθείαι ἀγόμεναι ἐκ τοῦ αὐτοῦ σημείου σχηματί-

ζωσιν Ισας γωνίας, νά ύπολογίσητε τό μέτρον ἐκάστης τῶν γωνιῶν τούτων. Ἐπειτα νά προεκτείνητε μίαν ἀπό αὐτάς μέσα εἰς τὴν γωνίαν τῶν ἄλλων καὶ νά ύπολογίσητε τὰ μέτρα τῶν γωνιῶν τῆς προεκτάσεως μὲ τὰς ἄλλας δύο εύθείας.

21. Αἱ ἔξωτερικαὶ γωνίαι Α καὶ Δ δύο τριγώνων ΑΒΓ καὶ ΔΕΖ εἰναι Ισαί. Νὰ συγκρίνητε τὰς ἔσωτερικὰς γωνίας Α καὶ Δ αὐτῶν.


22. Νὰ εὕρητε τό μέτρον τῆς γωνίας τῶν εύθειῶν, αἱ δποῖαι διχοτομοῦσι δύο ἔφεξῆς καὶ παραπληρωματικὰς γωνίας.

23. Νὰ καθορίσητε τό σχῆμα τῆς γραμμῆς, τὴν δποίαν ἀποτελοῦσιν αἱ διχοτόμοι δύο κατὰ κορυφὴν γωνιῶν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'


1. ΚΑΘΕΤΟΙ ΚΑΙ ΠΛΑΓΙΑΙ ΠΡΟΣ ΕΥΘΕΙΑΝ ΕΚ ΣΗΜΕΙΟΥ
ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

§ 60. Ποιαi λέγονται κυρτάi τεθλασμέναι γραμμαιⁱ και ποιαi κυρτάe εύθυγραμμα σχήματα. α') "Αν προεκτείνωμεν έκατέρωθεν οιανδήποτε πλευράν τής τεθλασμένης γραμμής ΑΒΓΔ (σχ. 39), βλέπομεν δτι δληή ή άλλη γραμμή μένει πρός τό αύτό μέρος αύτῆς. "Αν δμως προεκτείνωμεν τήν πλευράν ΖΗ τής τεθλασμένης γραμμής ΕΖΗΘΚ, βλέπομεν δτι τά άλλα μέρη ΕΖ και ΗΘΚ αύτῆς εύρισκονται έκατέρωθεν τής εύθείας ΖΗ.



Σχ. 39

β') Κατά ταῦτα ή τεθλ. γραμμή ΑΒΓΔ (σχ. 40) εἶναι κυρτή. Καὶ τό ύπ' αύτῆς περικλειόμενον εύθ. σχήμα ΑΒΓΔΑ λέγεται κυρτὸν εύθ. σχήμα. Εύνόητον δέ δτι τό εύθ. σχήμα ΑΕΖΗΔΑ δὲν εἶναι κυρτόν. "Ωστε:



"Οσαι τεθλασμέναι γραμμαιⁱ ἔχουσι τήν πρώτην ιδιότητα λέγονται κυρταi. Δηλαδή:

Miai τεθλασμένη ἐπίπεδος γραμμὴ λέγεται κυρτὴ, ἀν ἐκάστη πλευρὰ αύτῆς προεκτεινομένη έκατέρωθεν ἀφήνη δλην τήν άλλην γραμμὴν πρός τό αύτό μέρος αύτῆς.

β') Κατά ταῦτα ή τεθλ. γραμμὴ ΑΒΓΔ (σχ. 40) εἶναι κυρτή. Καὶ τό ύπ' αύτῆς περικλειόμενον εύθ. σχήμα ΑΒΓΔΑ λέγεται κυρτὸν εύθ. σχήμα. Εύνόητον δέ δτι τό εύθ. σχήμα ΑΕΖΗΔΑ δὲν εἶναι κυρτόν. "Ωστε:

"Ἐν εὐθύγραμμον σχῆμα λέγεται κυρτόν, ἀν περικλείηται ἀπὸ κυρτήν τεθλασμένην γραμμήν.

§ 61. Νὰ συγκριθῇ ἡ περίμετρος τῆς κυρτῆς τεθλασμένης γραμμῆς **ΑΒΓΔ** πρὸς τὴν περίμετρον τῆς τεθλασμένης γραμμῆς **ΑΕΖΗΔ**, ἣτις ἔχει τὰ αὐτὰ ἄκρα καὶ περικλείει αὐτὴν (σχ. 40).

Προεκτείνομεν τὰς πλευράς **ΑΒ**, **ΒΓ**, ὅπως δεικνύει τὸ σχῆμα καὶ παρατηροῦμεν ὅτι:

$$\begin{aligned} & \text{ΑΒ} + \text{ΒΘ} < \text{ΑΕ} + \text{ΕΘ}, \\ & \text{ΒΓ} + \text{ΓΙ} < \text{ΒΘ} + \text{ΘΖ} + \text{ΖΗ} + \text{ΗΙ} \\ & \text{καὶ } \text{ΓΔ} < \text{ΓΙ} + \text{ΙΔ} \quad (\S\ 10\ \beta'). \end{aligned}$$

"Ἄν δὲ προσθέσωμεν κατὰ μέλη τὰς ἀνισότητας ταύτας καὶ ἀπὸ τὰ ἄνισα ἀθροίσματα ἀφαιρέσωμεν τοὺς κοινοὺς προσθετέους **ΒΘ** καὶ **ΓΙ**, εὑρίσκομεν ὅτι:

$$\text{ΑΒ} + \text{ΒΓ} + \text{ΓΔ} < \text{ΑΕ} + \text{ΕΘ} + \text{ΘΖ} + \text{ΖΗ} + \text{ΗΙ} + \text{ΙΔ} \quad (1)$$

"Ἐπειτα παρατηροῦμεν ὅτι:

$$\text{ΕΘ} + \text{ΘΖ} = \text{ΕΖ} \text{ καὶ } \text{ΗΙ} + \text{ΙΔ} = \text{ΗΔ},$$

ἡ δὲ ἀνισότης (1) γίνεται:

$$\text{ΑΒ} + \text{ΒΓ} + \text{ΓΔ} < \text{ΑΕ} + \text{ΕΖ} + \text{ΖΗ} + \text{ΗΔ}.$$

Βλέπομεν λοιπὸν ὅτι:

"Ἡ περίμετρος μιᾶς κυρτῆς τεθλασμένης γραμμῆς εἶναι μικροτέρα ἀπὸ τὴν περίμετρον πάσης ἀλλῆς τεθλασμένης γραμμῆς, ἡ δποῖα ἔχει τὰ αὐτὰ ἄκρα καὶ περιβάλλει αὐτὴν.

"Α σ κ ή σ ε ις

24. Ἐντὸς τριγώνου **ΑΒΓ** νὰ ὀρίσητε ἐν σημεῖον **Δ**, νὰ γράψητε τὰ εὐθ. τμήματα **ΔΑ**, **ΔΒ**, **ΔΓ** καὶ νὰ συγκρίνητε τὸ ἀθροισμα **ΔΑ** + **ΔΒ** + **ΔΓ** πρὸς τὴν περίμετρον τοῦ τριγώνου τούτου.

25. Νὰ συγκρίνητε τὸ προηγούμενον ἀθροισμα πρὸς τὴν ἡμιπερίμετρον τοῦ τριγώνου **ΑΒΓ**.

26. Νὰ συγκρίνητε τὸ ἀθροισμα τῶν διαγωνίων ἐνὸς κυρτοῦ τετραπλεύρου πρὸς τὴν περίμετρον καὶ πρὸς τὴν ἡμιπερίμετρον τοῦ τετραπλεύρου τούτου.


§ 62. Νὰ ἔξετασθῇ, ἀν ἐκ σημείου **Γ** κειμένου ἐκτὸς εὐθείας **ΑΒ** ἀγωνται κάθετοι ἐπ' αὐτὴν καὶ πόσαι (σχ. 41).

Τὸ ἐπίπεδον, εἰς τὸ δποῖον εὑρίσκεται τὸ **Γ** καὶ ἡ **ΑΒ** διαι-

ρεῖται ύπ' αὐτῆς εἰς δύο μέρη. Νοοῦμεν δτι τὸ μέρος, τὸ δποῖον περιέχει τὸ Γ στρέφεται περὶ τὴν AB , ἔως δτου τὸ σημεῖον Γ εύρεθῇ εἰς σημεῖον Γ' τοῦ ἄλλου μέρους.

"Αν τὸ στραφὲν μέρος τοῦ ἐπιπέδου ἐπανέλθῃ εἰς τὴν πρώτην θέσιν του καὶ ἀχθῇ ἡ εύθεια $\Gamma\Gamma'$, αὕτη τέμνει τὴν AB εἰς ἓν σημεῖον Δ .

"Αν διὰ β' φοράν γίνῃ ἡ αὐτὴ στροφή, τὸ σημεῖον Γ θὰ ἔλθῃ πάλιν εἰς τὸ Γ' . Ἐπειδὴ δὲ ἡ εύθεια AB μένει ἀκίνητος, αἱ εύθειαι $\Delta\Gamma$, ΓE κ.τ.λ. ἐφαρμόζουσιν ἀντιστοιχῶς ἐπὶ τῶν $\Delta\Gamma'$, $E\Gamma'$ κ.τ.λ. καὶ αἱ γωνίαι $\Delta\Gamma$, $\Gamma E\Delta$ ἀντιστοιχῶς ἐπὶ τάς $\Delta\Gamma'$, $\Delta E\Gamma'$.



Σχ. 41

Εἶναι λοιπὸν $\widehat{A\Delta\Gamma} = \widehat{A\Delta\Gamma'}$, $\widehat{E\Delta} = \widehat{\Delta E\Gamma'}$.

'Ἐκ τῆς α' τούτων ἔπειται δτι ἡ $\Gamma\Gamma'$ εἶναι κάθετος ἐπὶ τὴν AB (§ 41 Πόρ. 42). "Αν δὲ καὶ ἡ εύθεια ΓE ἦτο κάθετος ἐπὶ τὴν AB , θὰ ἦτο

$$\widehat{E\Delta} = 1 \text{ δρθ}, \quad \widehat{\Delta E\Gamma'} = 1 \text{ δρθ}. \quad \text{καὶ} \quad \widehat{\Gamma E\Delta} + \widehat{\Delta E\Gamma'} = 2 \text{ δρθ}.$$

'Ἐπομένως (§ 55) ἡ γραμμὴ $\Gamma E\Gamma'$ θὰ ἦτο εύθεια καὶ θὰ συνέπιπτε μὲ τὴν $\Gamma\Delta\Gamma'$ (§ 10 α'). Βλέπομεν λοιπὸν δτι:

'Ἀπὸ σημεῖον, τὸ δποῖον κεῖται ἐκτὸς εὐθείας, ἀγεται κάθετος ἐπ' αὐτὴν καὶ μία μόνον.

Μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ γνώμονος δυνάμεθα εύκόλως νὰ γράψωμεν τὴν κάθετον ταύτην.

Αἱ ἄλλαι εύθειαι, τὰς δποίας δυνάμεθα νὰ φέρωμεν ἐκ τοῦ Γ πρὸς τὴν AB , λέγονται πλαγιαὶ πρὸς αὐτὴν. 'Η ΓE εἶναι λοιπὸν πλαγία πρὸς τὴν AB .

Τὸ κοινὸν σημεῖον Δ τῆς εύθειας AB καὶ τῆς καθέτου ἐπ' αὐτὴν εύθειας $\Gamma\Gamma'$ λέγεται ποὺς τῆς καθέτου ταύτης. 'Ομοίως τὸ σημεῖον E λέγεται ποὺς τῆς ΓE πλαγίας πρὸς τὴν AB .


§ 63. 'Ἀπὸ σημεῖον Γ ἐκτὸς εὐθείας AB (σχ. 42) ἀγομεν τὴν κάθετον $\Gamma\Delta$ καὶ δρίζομεν ἐπὶ τὴν AB τὰ τμῆματα ΔE , ΔZ καὶ $\Delta H > \Delta E$. Νὰ συγκριθῶσι τὰ τμῆματα ΓE , ΓZ , ΓH , $\Gamma\Delta$.

α') Διάτα νά συγκρίνωμεν τὰ τμήματα ΓE καὶ ΓZ , νοοῦμεν ότι τὸ τρίγωνον $\Gamma E \Delta$ στρέφεται περὶ τὴν κάθετον $\Gamma \Delta$, ὡς ὅτου πέσῃ εἰς τὸ μέρος τοῦ ἐπιπέδου, τὸ δποῖον περιέχει τὸ Z .

'Επειδὴ $\omega = \omega'$, ἡ εὐθεῖα ΔE θὰ ἔφαρμόσῃ ἐπὶ τῆς εὐθείας ΔB . 'Επειδὴ δὲ $\Delta E = \Delta Z$, τὸ E θὰ ἔφαρμόσῃ ἐπὶ τοῦ Z . Διὰ τοῦτο τὸ τμῆμα ΓE θὰ ἔφαρμόσῃ ἐπὶ τοῦ ΓZ καὶ ἐπομένως εἶναι $\Gamma E = \Gamma Z$. Βλέπομεν λοιπὸν ότι:

"Αν οἱ πόδες δύο πλαγίων ἐκ τοῦ αὐτοῦ σημείου ἀγομένων

πρὸς μίαν εὐθεῖαν ἀπέχωσιν ἵσον ἀπὸ τὸν πόδα τῆς καθέτου, αἱ πλάγιαι αὗται εἶναι ἵσαι.



Σχ. 42

β') Διάτα νά συγκρίνωμεν τὸ τμῆμα $\Gamma \Delta$ τῆς καθέτου πρὸς τὸ τμῆμα ΓE τυχούσης πλαγίας, ἔργαζόμεθα ὡς ἔξῆς:

'Επὶ τῆς προεκτάσεως

τῆς $\Gamma \Delta$ ὁρίζομεν τμῆμα $\Delta \Theta$ ἵσον πρὸς τὸ $\Gamma \Delta$ καὶ ἄγομεν τὸ εὐθ. τμῆμα $E\Theta$.

'Επειτα παρτηροῦμεν ότι:

$$\Gamma \Delta + \Delta \Theta < \Gamma E + E \Theta \quad (\S 10 \beta') \quad (1)$$

'Επειδὴ δὲ $\Gamma \Delta = \Delta \Theta$ καὶ $\Gamma E = E \Theta$ κατὰ τὴν προηγουμένην περίπτωσιν, ἡ (1) γίνεται

$$\Gamma \Delta + \Gamma \Delta < \Gamma E + \Gamma E \quad \text{ἢ} \quad \Gamma \Delta \cdot 2 < \Gamma E \cdot 2 \text{ καὶ ἐπομένως } \Gamma \Delta < \Gamma E.$$

Οὕτω βλέπομεν ότι:

'Η κάθετος ἐπὶ τοῦ εὐθεῖαν εἶναι μικροτέρα πάσης πλαγίας, ἢντις ἀγεται ἐκ τοῦ αὐτοῦ σημείου πρὸς τὴν αὐτὴν εὐθεῖαν.

Διάτα τὸν λόγον αὐτὸν τὸ τμῆμα $\Gamma \Delta$ τῆς καθέτου ἐπὶ τὴν AB λέγεται ἀπόστασις τοῦ σημείου Γ ἀπὸ τὴν εὐθεῖαν AB .

γ') Διάτα νά συγκρίνωμεν τὰ τμήματα ΓE καὶ ΓH , ἄγομεν τὸ τμῆμα $H\Theta$ καὶ παρατηροῦμεν ότι:

$\Gamma H = H\Theta$ καὶ $\Gamma E = E\Theta$ κατὰ τὴν α' περίπτωσιν καὶ $\Gamma H + H\Theta > \Gamma E + E\Theta \quad (\S 61)$

'Εκ τούτων εὐκόλως εύρισκομεν ότι $\Gamma H > \Gamma E$. "Ωστε:

"Αν οἱ πόδες δύο πλαγίων ἀπέχωσιν ἀνισον ἀπὸ τὸν πόδα

τῆς καθέτου, αἱ πλάγιαι εἶναι ἀνισοὶ καὶ μεγαλυτέρα εἶναι ἐκείνη, τῆς δποίας δὲ ποὺς ἀπέχει περισσότερον ἀπὸ τὸν πόδα τῆς καθέτου.

Αντιστρόφως: Ἐπειδὴ σημεῖον Γ , τὸ δποῖον κεῖται ἐκτὸς εὐθείας AB , ἄγομεν τὴν κάθετον $\Gamma\Delta$ ἐπὶ αὐτὴν. Ἐπειτα μὲ τὸν διαβήτην δρίζομεν ἐπὶ τῆς AB σημεῖα E, Z, H τοιαῦτα, ὅστε νὰ εἶναι $\Gamma E = \Gamma Z$ καὶ $\Gamma H > \Gamma E$. Εύκόλως δὲ διὰ τῆς εἰς ἀτοπὸν ἀπαγωγῆς ἀποδεικνύμεν διτὶ $\Delta E = \Delta Z$ καὶ $\Delta H > \Delta E$.

Ἄν δὲ ἔξ δλων τῶν εὐθείῶν $\Gamma\Delta$, ΓE , ΓZ , $\Gamma H \dots$, αἱ δποῖαι ἄγονται ἐκ τοῦ αὐτοῦ σημείου Γ καὶ περατοῦνται εἰς τὴν αὐτὴν εὐθεῖαν AB , ἡ $\Gamma\Delta$ εἶναι μικροτέρα, αὕτη θὰ εἶναι κάθετος ἐπὶ τὴν AB .

Πόρισμα I. Ἐπειδὴ σημεῖον κείμενον ἐκτὸς εὐθείας εἶναι ἀδύνατον νὰ ἀχθῶσι πρὸς αὐτὴν τρεῖς εὐθεῖαι ἵσαι.


Πόρισμα II. Περιφέρεια κύκλου καὶ εὐθεῖα γραμμὴ δὲν δύνανται νὰ ἔχωσι κοινὰ σημεῖα περισσότερα τῶν δύο.

Πόρισμα III. Ἡ περιφέρεια κύκλου εἶναι καμπύλη γραμμὴ.

§ 64. Ἐπὶ δοθείσης εὐθείας AB δρίζομεν ἵσα τμήματα AD καὶ ΔB . Ἐπειτα ἄγομεν τὴν $\Gamma\Delta$ κάθετον ἐπὶ τὴν AB . Νὰ συγκριθῶσι τὰ τμήματα ΓA καὶ ΓB (σχ. 43).

Ἐπειδὴ αἱ εὐθεῖαι ΓA , ΓB εἶναι πλάγιαι πρὸς τὴν AB καὶ $\Delta A = \Delta B$, ἔπειται (§ 63 α') διτὶ $\Gamma A = \Gamma B$, ἦτοι:

Ἄν εὐθεῖα τέμνῃ καθέτως καὶ εἰς τὸ μέσον ἐν εὐθ. τμῆμα, πᾶν σημεῖον αὐτῆς ἀπέχει ἵσον ἀπὸ τὰ ἀκρα τοῦ τμήματος τούτου.



Σχ. 43

§ 65. Ἐν σημεῖον E κεῖται ἐκτὸς τῆς εὐθείας $\Gamma\Delta$, ἡ δποία εἶναι κάθετος ἐπὶ εὐθ. τμῆμα AB καὶ εἰς τὸ μέσον αὐτοῦ. Νὰ συγκριθῶσι τὰ τμήματα EA καὶ EB (σχ. 43).

Παρατηροῦμεν διτὶ τὸ σημεῖον E καὶ ἐν ἀπὸ τὰ ἀκρα τοῦ AB , π.χ. τὸ A , κεῖνται ἐκατέρωθεν τῆς $\Gamma\Delta$. Αὕτη ἐπομένως τέ-

μνεται ύπο τῆς ΑΕ εις τὸ σημεῖον Η. Κατὰ δὲ τὴν προηγουμένην Ιδιότητα εἶναι ΑΗ=ΗΒ.

Ἐπειδὴ δὲ ΗΒ+ΗΕ>ΕΒ (§ 10 β'), ἔπειται δτὶ¹
ΑΗ+ΗΕ>ΕΒ ἢ ΑΕ>ΕΒ.

Βλέπομεν λοιπὸν δτὶ:

"Ἄν ἐν σημεῖον κεῖται ἀκτὸς τῆς καθέτου τῆς ἀγομένης εἰς τὸ μέσον εὐθ. τμήματος, ἀπέχει ἀνισον ἀπὸ τὰ ἄκρα τοῦ τμήματος τούτου. Ἀπέχει δὲ διλιγάτερον ἀπὸ τὸ ἄκρον, μὲ τὸ δποῖον εὐθράσκεται πρὸς τὸ αὐτὸ μέρος τῆς καθέτου.

Πόρισμα I. "Ἄν ἐν σημεῖον ἀπέχῃ ἵσον ἀπὸ τὸ ἄκρα εὐθ. τμήματος, κεῖται ἐπὶ τῆς καθέτου τῆς ἀγομένης εἰς τὸ μέσον τοῦ τμήματος τούτου.

Πόρισμα II. "Ἡ κάθετος ἐπὶ μίαν χορδὴν τόξου εἰς τὸ μέσον αὐτῆς διέρχεται ἀπὸ τὸ κέντρον τοῦ τόξου τούτου.

§ 66. Ἀξιοσημείωτος γεωμετρικὸς τόπος. Ἀπὸ τὴν Ιδιότητα τῆς § 64 καὶ ἀπὸ τὸ προηγούμενον Πόρισμα I ἐννοοῦμεν δτὶ:

"Ολα τὰ σημεῖα τῆς καθέτου εἰς τὸ μέσον εὐθ. τμήματος καὶ μόνον αὐτὰ ἔχουσι τὴν Ιδιότητα νὰ ἀπέχῃ ἕκαστον ἵσον ἀπὸ τὰ ἄκρα τοῦ τμήματος τούτου.

Δι' αὐτὸν τὸν λόγον ἡ κάθετος εἰς τὸ μέσον εὐθ. τμήματος λέγεται γεωμετρικὸς τόπος τῶν σημείων, ὃν ἕκαστον ἀπέχει ἵσον ἀπὸ τὰ ἄκρα τοῦ τμήματος τούτου.

Ποῖον ἄλλον γεωμετρικὸν τόπον ἐγνωρίσαμεν ἔως τώρα;

'Α σκήσεις

27. Νὰ ἔξετάσητε πόσαι περιφέρειαι διέρχονται ἀπὸ δύο δοθέντα σημεῖα

28. Νὰ γράψητε μίαν περιφέρειαν Κ καὶ δύο καθέτους διαμέτρους ΑΒ καὶ ΓΔ. Ἐπὶ δὲ τῆς ἀκτίνος ΚΑ νὰ δρίσητε ἐν σημεῖον Ε καὶ νὰ συγκρίνητε τὸ τμῆμα ΓΕ πρὸς τὴν χορδὴν ΓΒ.

29. Νὰ συγκρίνητε τὸ προηγούμενον τμῆμα ΓΕ πρὸς τὴν χορδὴν ΓΒ.

30. Ἐπὸ ἐν σημεῖον Γ ἀκτὸς εὐθείας ΑΒ νὰ φέρητε τὴν ΓΔ κάθετον ἐπὶ τὴν ΑΒ καὶ δύο ἵσας πλαγίας ΓΕ καὶ ΓΖ. Νὰ συγκρίνητε δὲ τάς γωνίας ΕΓΔ καὶ ΖΓΔ.

31. "Αν αἱ προηγούμεναι πλάγιαι εἰναι ἄνισοι, νὰ συγκρίνητε πάλιν τὰς γωνίας ΕΓΔ καὶ ΖΓΔ.

2. ΧΑΡΑΞΙΣ ΚΑΘΕΤΩΝ ΕΥΘΕΙΩΝ ΔΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΟΥ

§ 67. Θεώρημα (βοηθητικόν). Μὲ κέντρα δύο σημεῖα **A, B** καὶ ἀκτῖνα τὴν ἀπόστασιν **AB** αὐτῶν γράφομεν δύο περιφερεῖας. Νὰ ἀποδειχθῇ διτὶ αὗται ἔχουσι δύο μόνον κοινὰ σημεῖα (σχ. 44).

"Απόδειξις. Εἶναι φανερὸν διτὶ τὸ μέσον Δ τῆς ἀκτῖνος **AB** τοῦ κύκλου **A** κεῖται ἐντὸς τοῦ κύκλου τούτου. 'Η δὲ δι' αὐτοῦ ἀγομένη εύθεια **XΨ** κάθετος ἐπὶ τὴν **AB** ἔξερχομένη τοῦ κύκλου τούτου ἀπὸ τὸ ἔν μέρος συναντᾷ τὴν περιφέρειαν εἰς τὶ σημεῖον **Γ**.

Τὸ δὲ εύθ. τμῆμα **ΑΓ** εἶναι ἀκτὶς τοῦ κύκλου τούτου καὶ ἐπομένως εἶναι $ΑΓ = AB$.


"Ἐπειδὴ δὲ εἶναι καὶ $ΑΓ = ΓΒ$ (§ 64), ἔπειται διτὶ $ΓΒ = AB$, ἥτοι τὸ τμῆμα $ΓΒ$ λισθεῖται μὲ τὴν ἀκτῖνα τοῦ κύκλου **B**. "Ενεκα δὲ τούτου τὸ **Γ** κεῖται ἐπὶ τῆς περιφερείας **B**. Εἶναι λοιπὸν τὸ **Γ** κοινὸν σημεῖον τῶν περιφερειῶν **A** καὶ **B**.

"Ορίζομεν ἔπειτα ἐπὶ τῆς **XΨ** τμῆμα $ΔΓ'$ ἵσον πρὸς τὸ

$ΔΓ$ καὶ γράφομεν τὰ εύθ. τμήματα $ΑΓ'$ καὶ $ΒΓ'$. Θά εἶναι δὲ $ΑΓ' = AG$ καὶ $ΒΓ' = BG$ (§ 64), ἥτοι τὸ $Γ'$ ἀπέχει ἀπὸ ἔκαστον κέντρον ἵσον πρὸς τὴν ἀκτῖνα τῶν κύκλων τούτων. "Ἐπομένως κεῖται καὶ εἰς τὰς δύο περιφερείας.

"Αν δὲ καὶ τρίτον σημεῖον **E** ἔκειτο ἐπὶ τῶν περιφερειῶν τούτων, θὰ ἦτο $AE = AB$ καὶ $BE = AB$ ἐπομένως $AE = BE$.

"Ενεκα τούτου τὸ **E** θὰ ἔκειτο ἐπὶ τῆς **XΨ**, αὕτη δὲ θὰ εἶχε μὲ ἑκατέραν τῶν περιφερειῶν τούτων τρία κοινὰ σημεῖα $Γ, Γ'$,



Σχ. 44

Ε. Τοῦτο δὲ εἶναι ἀδύνατον (§ 63 Πόρ. II). Πλὴν λοιπὸν τῶν Γ καὶ Γ' οὐδὲν ἄλλο κοινὸν σημεῖον ἔχουσιν αἱ περιφέρειαι αὗται.


Πόρισμα. Ἡ κοινὴ χορδὴ τῶν περιφερειῶν (A, AB) καὶ (B, AB) τέμνει καθέτως καὶ εἰς τὸ μέσον τὴν ἀπόστασιν AB τῶν κέντρων.

§ 68. Πρόβλημα I. Νὰ γραφῆ εὐθεῖα κάθετος ἐπὶ δοθὲν εὐθ. τμῆμα AB εἰς τὸ μέσον αὐτοῦ.


Ἄρκει νὰ γράψωμεν τὴν κοινὴν A-χορδὴν τῶν περιφερειῶν (A, AB) καὶ (B, AB).

§ 69. Πρόβλημα II. Διὰ δοθέντος σημείου Γ εὐθεῖας AB νὰ ἀχθῇ η κάθετος ἐπ' αὐτὴν εὐθεῖα (σχ. 45).

Λύσις: Ὁρίζομεν ἐπὶ τῆς AΓ ἑκατέρωθεν τοῦ Γ δύο ίσα τμήματα ΓΔ, ΓΕ καὶ παρατηροῦμεν ὅτι ἡ ζητουμένη εὐθεῖα εἶναι κάθετος εἰς τὸ μέσον τοῦ τμήματος ΔΕ. Συνεχίζομεν λοιπόν, διπος εἰς τὸ προηγούμενον πρόβλημα.



Σχ. 45



Σχ. 46.

§ 70. Πρόβλημα III. Διὰ δοθέντος σημείου Γ, δπερ κεῖται ἐκτὸς δοθείσης εὐθείας AB, νὰ ἀχθῇ η κάθετος ἐπ' αὐτὴν εὐθεῖα (σχ. 46).

Λύσις. Μὲ κέντρον Γ γράφομεν περιφέρειαν, ή δποία νὰ τέμνῃ τὴν AB, ἔστω εἰς τὰ σημεῖα Δ καὶ E. Ἀν δὲ ἐνθυμηθῶμεν τὸ Πόρισμα II τῆς § 65, ἐννοοῦμεν ὅτι τὸ ζήτημα ἀναγεται εἰς τὴν λύσιν τοῦ ἀνωτέρω προβλήματος I (§ 68).

Θῶμεν τὸ Πόρισμα II τῆς § 65, ἐννοοῦμεν ὅτι τὸ ζήτημα ἀναγεται εἰς τὴν λύσιν τοῦ ἀνωτέρω προβλήματος I (§ 68).

Α σκήσεις

32. Νὰ γράψητε ἐν εύθ. τμῆμα καὶ τὴν περιφέρειαν, ἡ ὅποια ἔχει διάμετρον αὐτό.

33. Νὰ γράψητε ἐν εύθ. τμῆμα ΟΑ καὶ τὴν περιφέρειαν (Ο,ΟΑ). Νὰ δρίσητε δὲ ἐπ' αὐτῆς σημεῖον Μ, τοιοῦτον, ώστε νὰ εἰναι $MO=MA$.

34. Νὰ γράψητε περιφέρειαν κύκλου, νὰ δρίσητε ἐπ' αὐτῆς μίαν χορδὴν ΑΒ καὶ νὰ εὕρητε σημεῖον Μ τῆς περιφερείας, τοιοῦτον, ώστε νὰ εἰναι $MA=MB$.

35. Νὰ γράψητε ἐν εύθ. τμῆμα καὶ νὰ τὸ διαιρέσητε εἰς 4 ίσα μέρη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ

1. ΕΙΔΗ ΤΡΙΓΩΝΩΝ


§ 71. α') Ισόπλευρα τρίγωνα. "Εστω εύθ. τμῆμα AB καὶ Γ ἐν ἀπὸ τὰ κοινὰ σημεῖα τῶν περιφερειῶν (A, AB) καὶ (B, AB) (σχ 47). "Αν φέρωμεν τὰς ἀκτῖνας AG καὶ BG , σχηματίζεται τὸ τρίγωνον ABG . Τοῦτο προφανῶς ἔχει $AB = BG = GA$. Διὰ τοῦτο δὲ λέγεται ισόπλευρον τρίγωνον. "Ωστε:

'Ισόπλευρον τρίγωνον λέγεται πᾶν τρίγωνον, τοῦ δποίου αἱ πλευραὶ εἰναι δλαι ἵσαι.

β') Ισοσκελῆ τρίγωνα. "Εστω τυχὸν εύθ. τμῆμα ΔE καὶ ΘI ἡ κάθετος ἐπ' αὐτὸν εἰς τὸ μέσον του. Μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ διαβήτου ὁρίζομεν ἐπ' αὐτῆς σημεῖον Z , τοιούτον, ὥστε νὰ εἰναι $\Delta Z \neq \Delta E$. "Αν δὲ φέρωμεν τὰ εύθ. τμῆματα $Z\Delta$ καὶ EZ , σχηματίζεται τρίγωνον $Z\Delta E$. Τοῦτο ἔχει προφανῶς $\Delta Z = ZE \neq \Delta E$ καὶ λέγεται ισοσκελὲς τρίγωνον. "Ωστε:

'Ισοσκελὲς τρίγωνον λέγεται πᾶν τρίγωνον, τοῦ δποίου δύο μόνον πλευραὶ εἰναι ἵσαι.

γ') Σκαληνὰ τρίγωνα. "Εστω $\Theta\Lambda$ τυχὸν εύθ. τμῆμα. Γράφομεν τὴν κάθετον ἐπ' αὐτὸν εἰς τὸ μέσον του καὶ τὴν περιφέρειαν ($\Theta, \Theta\Lambda$). 'Απὸ ἐν σημεῖον K τοῦ μικροτέρου τῶν δύο ὁρίζομένων κυκλικῶν τμημάτων ἄγομεν τὰ εύθ. τμῆματα $K\Theta$,




Σχ. 47

ΚΛ. Γνωρίζομεν (§ 65) ότι ΚΛ < ΚΘ. Εἶναι δὲ καὶ ΚΘ < ΘΛ. Αἱ πλευραὶ λοιπὸν τοῦ τριγώνου ΚΘΛ εἶναι ἄνισοι. Τοῦτο δὲ λέγεται σκαληνὸν τρίγωνον. "Ωστε :

Σκαληνὸν τρίγωνον λέγεται πᾶν τρίγωνον, τοῦ δποῖον αἱ πλευραὶ εἶναι ἄνισοι.

§ 72. α') 'Ορθογώνια τρίγωνα. "Εστω Α ὁρθὴ γωνία (σχ. 48 α'). "Αν τμήσωμεν τὰς πλευράς αὐτῆς διὰ μιᾶς εὐθείας ΒΓ, σχηματίζεται ἐν τρίγωνον ΑΒΓ. 'Ἐπειδὴ ἡ γωνία Α αὐτοῦ εἶναι ὁρθὴ ἐκ κατασκευῆς, τοῦτο λέγεται δρθογώνιον τρίγωνον.

Ούδεμία δὲ ἄλλη γωνία αὐτοῦ εἶναι ὁρθή. Διότι, ἀν π. χ.



Σχ. 48

ἢτο ἡ Β ὁρθή, ἡ ΓΒ θά ἢτο κάθετος ἐπὶ τὴν ΑΒ, δπως καὶ ἡ ΓΑ. Τοῦτο δὲ εἶναι ἄποπον (§ 62). "Ωστε :

'Ορθογώνιον τρίγωνον λέγεται πᾶν τρίγωνον, τὸ δποῖον ἔχει μίαν δρθὴν γωνίαν.

β') 'Αμβλυγώνια τρίγωνα. 'Εντὸς ἀμβλείας γωνίας Δ (σχ. 48 β') φέρομεν τὴν ΕΗ κάθετον ἐπὶ τὴν πλευρὰν ΔΕ καὶ τὴν ΖΘ κάθετον ἐπὶ τὴν ΔΖ. "Ἐπειτα φέρομεν τὴν ΕΖ καὶ σχηματίζομεν ἐν τρίγωνον ΔEZ. Τούτου ἡ γωνία Δ εἶναι ἀμβλεῖα ἐκ κατασκευῆς. Διὰ τοῦτο δὲ λέγεται ἀμβλυγώνιον τρίγωνον. Αἱ δὲ γωνίαι Ε καὶ Ζ αὐτοῦ εἶναι δξεῖαι. Διότι ἡ μὲν Ε εἶναι μικροτέρα τῆς ὁρθῆς ΔΕΗ, ἡ δὲ Ζ εἶναι μικροτέρα τῆς ὁρθῆς ΔΖΘ.

"Ωστε :

'Αμβλυγώνιον τρίγωνον λέγεται πᾶν τρίγωνον, τὸ δποῖον ἔχει μίαν ἀμβλεῖαν γωνίαν.

γ') 'Οξυγώνια τρίγωνα. "Εστω δξεῖα γωνία Ι (σχ. 48 γ'). 'Εκ σημείου Κ τῆς μιᾶς πλευρᾶς φέρομεν τὴν ΚΛ κάθετον ἐπὶ

τὴν ἄλλην πλευράν αύτῆς. Ἐπὶ τῆς πλευρᾶς ταύτης ὁρίζομεν σημεῖον Μ, τοιοῦτον, ώστε νὰ εἶναι $IM > IL$. Ἐπειτα ἄγομεν τὴν MN κάθετον ἐπὶ τὴν IM καὶ τὴν KN κάθετον ἐπὶ τὴν IK . Ἀν δὲ φέρωμεν τὴν KM , σχηματίζεται ἐν τρίγωνον IKM , οὗ ἡ γωνία I εἶναι δξεῖα ἐκ κατασκευῆς. Ὡς δὲ προηγουμένως, ἀποδεικνύομεν ὅτι καὶ αἱ ἄλλαι γωνίαι αὐτοῦ εἶναι δξεῖαι. Τοῦτο δὲ λέγεται δξυγώνιον τρίγωνον. Ὡστε:

Οξυγώνιον τρίγωνον λέγεται πᾶν τρίγωνον, τοῦ ὅποιου δλαι αἱ γωνίαι εἶναι δξεῖαι.

§ 73. "Αλλα ἀξιοσημείωτα στοιχεῖα τῶν τριγώνων.

Τὸ εὐθύγραμμον τμῆμα AD (σχ. 49) εἶναι ἡ ἀπόστασις τῆς κορυφῆς A ἀπὸ τὴν πλευράν BG τοῦ τριγώνου ABG . Λέγεται δὲ ἡ μὲν πλευρά BG βάσις τοῦ τριγώνου, ἡ δὲ ἀπόστασις AD ὑψος αύτοῦ. Ἀν ἡ πλευρά ZH τοῦ τριγώνου EZH ληφθῇ ὡς βάσις αύτοῦ, ὕψος θὰ εἶναι τὸ εὐθύγραμμον τμῆμα $E\theta$, τὸ ὅποιον εἶναι ἡ ἀπόστασις τῆς κορυφῆς E ἀπὸ τῆς πλευρᾶς ZH . Γενικῶς λοιπόν:


Βάσις ἐνδὸς τριγώνου λέγεται μία τυχοῦσα πλευρὰ αύτοῦ. Ὅψος δὲ ἐνδὸς τριγώνου λέγεται ἡ ἀπόστασις τῆς ἀπέναντι κορυφῆς ἀπὸ τὴν βάσιν.

Συνήθως ὡς βάσις καὶ ὕψος δρθιογωνίου τριγώνου λαμβάνονται αἱ πλευραὶ τῆς δρθῆς γωνίας αύτοῦ.

Ως βάσις δὲ ἐνδὸς ἴσοσκελοῦς τριγώνου λαμβάνεται ἡ ἄνισος πρὸς τὰς ἄλλας πλευρά αύτοῦ.

"Αν M εἶναι τὸ μέσον τῆς πλευρᾶς BG τοῦ τριγώνου ABG (σχ. 49), τὸ εὐθ. τμῆμα AM λέγεται διάμεσος τοῦ τριγώνου τούτου. Ὡστε:

Διάμεσος τριγώνου λέγεται τὸ εὐθύγραμμον τμῆμα, τὸ ὅποιον δοίζεται ἀπὸ μίαν κορυφὴν καὶ ἀπὸ τὸ μέσον τῆς ἀπέναντι πλευρᾶς.



Σχ. 49

Α σκήσεις

36. Νὰ κατασκευάσητε εἰς τὸ τετράδιόν σας ἀπὸ ἐν λισόπλευρον τρίγωνον μὲν πλευράν 5 ἑκατοστομέτρων.

37. Νὰ κατασκευάσητε ἀπὸ ἐν λισόσκελές τρίγωνον μὲ βάσιν 6 ἑκατ. καὶ ἔκάστη ἀπὸ τάς ἄλλας πλευράς νὰ εἰναι 4 ἑκατ. Καὶ ἄλλο μὲ τὴν ίδιαν βάσιν καὶ ἔκάστη τῶν ἄλλων πλευρῶν νὰ εἰναι 8 ἑκατ.

38. Νὰ κατασκευάσητε ἀπὸ ἐν λισόβλυγώνιον τρίγωνον. Νὰ λάβητε ὡς βάσιν αὐτοῦ μίαν πλευράν τῆς ἀμβλείας γωνίας καὶ νὰ γράψητε τὸ ἀντίστοιχον ὑψος.

39. Νὰ κατασκευάσητε ἀπὸ ἐν δρθιογώνιον καὶ ἀπὸ ἐν λισόβλυγώνιον τρίγωνον. "Ἐπειτα δὲ νὰ φέρητε τὴν διάμεσον ἔκάστου, ἡ ὁποία ἀγεται ἀπὸ τὴν κορυφὴν τῆς μεγαλυτέρας γωνίας αὐτοῦ.

40. Νὰ κατασκευάσητε δύο τυχόντα τρίγωνα καὶ νὰ γράψητε ὅλας τὰς διαμέσους αὐτῶν.

2. ΑΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΙΣΟΤΗΤΟΣ ΤΩΝ ΤΡΙΓΩΝΩΝ


§ 74. Νὰ συγκριθῶσι δύο τρίγωνα $AB\Gamma$, ΔEZ , τὰ ὁποῖα ἔχουνσι $B\Gamma = EZ$, $\widehat{B} = \widehat{E}$ καὶ $\widehat{\Gamma} = \widehat{Z}$ (σχ. 50).

Νοοῦμεν ὅτι τὸ ΔEZ τίθεται ἐπὶ τοῦ $AB\Gamma$ οὕτως, ὥστε ἡ πλευρά EZ νὰ ἔφαρμόσῃ ἐπὶ τῆς $B\Gamma$ μὲ τὴν κορυφὴν E ἐπὶ τῆς B . Παρατηροῦμεν δὲ ὅτι ἡ εύθεια $E\Delta$ θὰ συμπέσῃ μὲ τὴν εύθειαν BA ἔνεκα τῆς λισότητος τῶν γωνιῶν B καὶ E . Δι' ὅμοιον δὲ λόγον καὶ ἡ εύθεια $Z\Delta$ θὰ συμπέσῃ μὲ τὴν εύθειαν ΓA .

Τὸ κοινὸν λοιπὸν σημεῖον Δ τῶν εὐθειῶν $E\Delta$ καὶ $Z\Delta$ θὰ γίνῃ κοινὸν σημεῖον τῶν εὐθειῶν BA καὶ ΓA , ἢτοι θὰ συμπέσῃ μὲ τὸ A . Τὰ τρίγωνα λοιπὸν ἔφαρμόζουσι καὶ ἐπομένως εἰναι ἵσα. "Ωστε:

"Ἄν δύο τρίγωνα ἔχωσι μίαν πλευρὰν ἵσην καὶ τὰς προσκειμένας εἰς αὐτὴν γωνίας ἵσας, μίαν πρὸς μίαν, τὰ τρίγωνα ταῦτα εἰναι ἵσα.

'Ἀπὸ τὸν τρόπον, κατὰ τὸν ὁποῖον ἔγινεν ἡ ἔφαρμογὴ τῶν προηγουμένων τριγώνων προκύπτει ὅτι $AB = \Delta E$, $A\Gamma = \Delta Z$ καὶ $\widehat{A} = \widehat{\Delta}$. Δηλ. τὰ ἵσα αὐτὰ τρίγωνα ἔχουσιν ἵσα καὶ τὰ ἄλλα



δόμοιειδή στοιχεῖα αύτῶν. Εἶναι δὲ ἵσαι πλευραὶ αἱ κείμεναι ἀπέναντι ἵσων γωνιῶν καὶ ἵσαι γωνίαι αἱ κείμεναι ἀπέναντι ἵσων πλευρῶν.

Πόρισμα. "Αν δύο δρθογώνια τρίγωνα $ABΓ$ καὶ $ΔEZ$ ἔχωσιν ἵσας τὰς πλευρὰς AB καὶ $ΔE$ τῶν δρθῶν γωνιῶν A , $Δ$ καὶ τὰς δξείας γωνίας B καὶ E ἵσας, ταῦτα εἶναι ἵσα.

Τὸ πόρισμα τοῦτο συνήθως διατυπώνομεν συντομώτερον καὶ γενικῶς ως ἑξῆς :

"Αν δύο δρθογώνια τρίγωνα ἔχωσι μίαν κάθετον πλευρὰν ἵσην καὶ τὴν προσκειμένην δξεῖαν γωνίαν ἵσην, ταῦτα εἶναι ἵσα.

'Ασκήσεις

41. "Απὸ ἐν σημεῖον, τὸ δόποιον κεῖται ἐκτὸς εὐθείας, ἥχθη ἡ κάθετος ἐπ' αὐτὴν καὶ δύο πλάγιαι. "Αν αῦται σχηματίζωσιν ἵσας γωνίας μὲ τὴν κάθετον, νὰ συγκριθῶσιν αἱ πλάγιαι αὐταῖς.

42. "Απὸ ἐν τυχὸν σημεῖον Δ τῆς διχοτόμου μιᾶς γωνίας A φέρομεν κάθετον ἐπὶ τὴν διχοτόμον ταύτην. Αὕτη τέμνει τὰς πλευρὰς τῆς γωνίας ἀντιστοίχως εἰς τὰ σημεῖα B καὶ G . Νὰ συγκρίνητε τὰ τμῆματα AB καὶ AG .

43. "Αν ἡ διχοτόμος AD τῆς γωνίας A ἐνδὲ τριγώνου $ABΓ$ εἶναι καὶ ὅψος αὐτοῦ, νὰ συγκρίνητε τὰς πλευρὰς AB καὶ AG αὐτοῦ.

§ 75. Νὰ συγκριθῶσι δύο τρίγωνα $ABΓ$ καὶ $ΔEZ$, ἀν ἔχωσιν $AB = ΔE$, $AG = ΔZ$, $\widehat{A} = \widehat{Δ}$ (σχ. 50).

Νοοῦμεν δτὶ τὸ $ΔEZ$ τίθεται ἐπὶ τοῦ $ABΓ$ οὕτως, δστε ἡ πλευρὰ $ΔE$ νὰ ἔφαρμόσῃ ἐπὶ τῆς AB μὲ τὴν κορυφὴν $Δ$ ἐπὶ τῆς A . Εὔκόλως δὲ ἐννοοῦμεν δτὶ ἡ μὲν εὐθεῖα $ΔZ$ θὰ ἔφαρμόσῃ μὲ τὴν εὐθεῖαν AG , ἡ δὲ κορυφὴ Z θὰ συμπέσῃ μὲ τὴν G . Κατ' ἀκολούθιαν ἡ πλευρὰ EZ θὰ ἔφαρμόσῃ ἐπὶ τῆς $BΓ$ καὶ τὸ τρίγωνον $ΔEZ$ ἐπὶ τοῦ $ABΓ$. "Ωστε:

"Αν δύο τρίγωνα ἔχωσι δύο πλευρὰς ἵσας, μίαν πρὸς μίαν, καὶ τὰς ὅπερας αὐτῶν περιεχομένας γωνίας ἵσας, τὰ τρίγωνα ταῦτα εἶναι ἵσα.

Παρατηροῦμεν δὲ δτὶ $BΓ = EZ$, $\widehat{B} = \widehat{E}$, $\widehat{Γ} = \widehat{Z}$, ως καὶ προηγουμένως (§ 74).

Πόρισμα I. "Αν δύο δρθογώνια τρίγωνα ἔχωσι τὰς καθέτους πλευρὰς ἵσας, μίαν πρὸς μίαν, ταῦτα εἶναι ἵσα.

Πόρισμα II. Ἡ διχοτομοῦσα τὴν γωνίαν τῆς κορυφῆς λσοσκελοῦς τριγώνου εἶναι κάθετος ἐπὶ τὴν βάσιν καὶ διχοτομεῖ αὐτήν.

Πόρισμα III. Ἐν δύο τόξα τῆς αὐτῆς περιφερείας ἡ ῖσων περιφερειῶν εἶναι ῖσα, καὶ αἱ χορδαὶ αὐτῶν εἶναι ῖσαι.

'Α σκήσεις


44. Νὰ προεκτείνητε τὰς πλευράς AB καὶ AG ἐνὸς τριγώνου ABG πρὸς τὸ ἄλλο μέρος τῆς κορυφῆς A . Νὰ δρίσητε δὲ ἐπ' αὐτῶν ἀντιστοίχως τμήματα AB' , AG' ῖσα πρὸς τὰ AB καὶ AG ἀντιστοίχως. Νὰ φέρητε τὸ εύθ. τμῆμα $B'G'$ καὶ νὰ συγκρίνητε αὐτὸ πρὸς τὴν πλευράν BG .

45. Ἐπὶ τῶν πλευρῶν γωνίας A νὰ δρίσητε δύο ῖσα τμήματα AB καὶ AG . Ἐν δὲ M εἶναι τυχὸν σημεῖον τῆς διχοτόμου αὐτῆς, νὰ συγκρίνητε τὰ τμήματα MB καὶ MG .

46. Ἐν ἡ διάμεσος AM ἐνὸς τριγώνου ABG εἶναι καὶ ὅψος αὐτοῦ, νὰ ἀποδείξητε ὅτι τοῦτο εἶναι λσοσκελές τρίγωνον.

§ 76. Νὰ συγκριθῶσιν αἱ πλευραὶ BG καὶ EZ δύο τριγώνων ABG καὶ ΔEZ , ἢντα ἔχωσιν $AB = \Delta E$, $AG = \Delta Z$ καὶ $\widehat{A} > \widehat{\Delta}$ (σχ. 51).

Νοοῦμεν ὅτι τὸ τρίγωνον ΔEZ τίθεται ἐπὶ τοῦ ABG οὕτως,



Σχ. 51

ῶστε ἡ κορυφὴ Δ νὰ πέσῃ ἐπὶ τῆς A καὶ ἡ πλευρά ΔE ἐπὶ τῆς AB . Ἐπειδὴ εἶναι $\widehat{\Delta} > \widehat{\Delta}$, ἡ πλευρά ΔZ θὰ πέσῃ ἐντὸς τῆς γωνίας A εἰς μίαν θέσιν AZ' . Τὸ τρίγωνον ΔEZ θὰ καταλάβῃ λοιπὸν τὴν θέσιν ABZ' καὶ ἐπομένως θὰ εἶναι $BZ' = EZ$ καὶ $AZ' = \Delta Z = AG$.

"Αν δὲ ΑΗ εἶναι ἡ διχοτόμος τῆς γωνίας Ζ'ΑΓ, τὰ τρίγωνα Ζ'ΑΗ καὶ ΗΑΓ θά εἶναι ἵσα (§ 75) καὶ ἐπομένως Ζ'Η = ΗΓ. 'Ἐπειδὴ δὲ ΒΗ + ΗΖ' > ΒΖ' (§ 10 β'), ἔπειται ὅτι: ΒΗ + ΗΓ > ΒΖ' ἢ ΒΓ > ΕΖ. Βλέπομεν λοιπὸν ὅτι:

"*Αν δύο τρίγωνα ἔχωσι δύο πλευράς ἵσας, μίαν πρὸς μίαν, καὶ τὰς ὅπερας αὐτῶν περιεχομένας γωνίας ἀνίσους, ἀπέναντι τούτουν κεῖνται διμοίως ἀνισοὶ πλευραί.*

Πόροι σμα I. Δύο ἀνισα καὶ μικρότερα ἡμιπεριφερείας τόξα τῆς αὐτῆς περιφερείας ή ἵσων περιφερειῶν ἔχουσιν διμοίως ἀνίσους χορδάς.

Πόροι σμα II. Δύο ἀνισα καὶ μεγαλύτερα ἡμιπεριφερείας τόξα τῆς αὐτῆς περιφερείας ή ἵσων περιφερειῶν ἔχουσιν διμοίως ἀνίσους χορδάς.

Πόροι σμα III. "Αν δύο τρίγωνα ΑΒΓ καὶ ΔΕΖ ἔχωσιν $AB = \Delta E$, $AG = \Delta Z$ καὶ $BG > \Delta E$, θὰ ἔχωσι καὶ $\widehat{A} > \widehat{\Delta}$.

Πόροι σμα IV. "Αν δύο χορδαὶ τοῦ αὐτοῦ ή ἵσων κύκλων εἶναι ἀνισοὶ, τὰ μικρότερα ἡμιπεριφερείας ἀντίστοιχα τόξα αὐτῶν εἶναι διμοίως ἀνισα. Τὰ δὲ μεγαλύτερα ἡμιπεριφερείας τόξα εἶναι διομοίως ἀνισα.

§ 77. Νὰ συγκριθῶσι δύο τρίγωνα ΑΒΓ καὶ ΔΕΖ, ἀν ἔχωσιν $AB = \Delta E$, $AG = \Delta Z$ καὶ $BG = EZ$.

Συγκρίνομεν τὰς γωνίας Α καὶ Δ αὐτῶν σκεπτόμενοι ώς ἐξῆς:

"Αν ἥτο $\widehat{A} > \widehat{\Delta}$, θὰ ἥτο καὶ $BG > EZ$ (§ 76). Τοῦτο δημοσίευτον πρὸς τὴν ὑπόθεσιν $BG = EZ$.

"Αν πάλιν ἥτο $\widehat{A} < \widehat{\Delta}$, θὰ ἥτο καὶ $BG < EZ$, τό διποτίον ἐπίσης ἀντίκειται εἰς τὴν ὑπόθεσιν.

'Αφ' οὖτε $\widehat{A} > \widehat{\Delta}$ οὖτε $\widehat{A} < \widehat{\Delta}$ εἶναι, ἔπειται κατ' ἀνάγκην ὅτι εἶναι $\widehat{A} = \widehat{\Delta}$. Τὰ δὲ τρίγωνα εἶναι ἵσα (§ 75).

Βλέπομεν λοιπὸν ὅτι:

"Αν δύο τρίγωνα ἔχωσι τὰς πλευράς ἵσας, μίαν πρὸς μίαν, ταῦτα εἶναι ἵσα.

Πόροι σμα. "Αν δύο χορδαὶ μικροτέρων ἡμιπεριφερείας τόξων τῆς αὐτῆς ή ἵσων περιφερειῶν εἶναι ἵσαι, καὶ τὰ τόξα ταῦτα εἶναι ἵσα.

Ἐκ τούτου ἔπειται δτι: Διὰ νὰ δρίσωμεν ἵσα τόξα ἐπὶ μιᾶς περιφερείας ἡ ἐπὶ ἵσων περιφερειῶν, ἀρκεῖ νὰ δρίσωμεν ἐπ' αὐτῶν ἵσας χορδάς διὰ τοῦ διαβήτου.


'Α σκήνεις

47. Νὰ γράψητε μίαν περιφέρειαν καὶ νὰ δρίσητε εἰς αὐτὴν δύο ἀνίσους χορδάς. Ἐπειτα δὲ νὰ συγκρίνητε τὰ μεγαλύτερα ἡμιπεριφερείας ἀντιστοιχα τόξα αὐτῶν.

48. Εἰς τὸ ἐπίπεδον ἔνδος τριγώνου $\Delta\text{B}\Gamma$ νὰ δρίσητε ἐν σημείον Δ καὶ ἐπὶ τῶν εὐθειῶν ΔA , ΔB , $\Delta\Gamma$, νὰ δρίσητε ἀντιστοίχως τμήματα $\Delta\text{A}'$, $\Delta\text{B}'$, $\Delta\Gamma'$, ἵσα ἐν πρός ἐν πρός τὰ ΔA , ΔB , $\Delta\Gamma$. Νὰ σχηματίσητε τὸ τρίγωνον $\Delta'\text{B}'\Gamma'$ καὶ νὰ συγκρίνητε αὐτὸ πρὸς τὸ $\Delta\text{B}\Gamma$.

3. ΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΑΙ

§ 78. Πρόβλημα I. Δίδεται γωνία A καὶ εὐθεῖα $B\Gamma$. Νὰ κατασκευασθῇ γωνία ἵση πρὸς τὴν A καὶ ἔχουσα κορυφὴν B καὶ μίαν πλευρὰν τὴν $B\Gamma$ (σχ. 52).



Λύσις. Καθιστῶμεν τὴν γωνίαν A ἐπίκεντρον καὶ ἔστω ΔE τὸ ἀντίστοιχον τόξον αὐτῆς. Ἐπειτα μὲ κέντρον

Β καὶ ἀκτῖνα ΔD γράφομεν περιφέρειαν, ἥτις τέμνει τὴν $B\Gamma$ εἰς τὸ σημεῖον Z . Ἐπὶ τῆς περιφερείας ταύτης δρίζομεν τόξον ZH ἵσον πρὸς τὸ ΔE καὶ ἄγομεν τὴν εὐθεῖαν BH . Εύκολως δὲ ἀποδεικνύεται δτι ἡ σχηματισθεῖσα γωνία $\Gamma\text{B}H$ εἶναι ἡ ζητουμένη.



§ 79. Πρόβλημα II. Νὰ κατασκευασθῇ τρίγωνον, τοῦ δποίου ἐδόθησαν δύο πλευραὶ α , β καὶ ἡ γωνία τούτων ω (σχ. 53)

Λύσις. Κατασκευάζομεν γωνίαν A ἵσην πρὸς τὴν ω καὶ ἐπὶ τῶν πλευρῶν αὐτῆς δρίζομεν τμῆμα $AB = \alpha$ καὶ ἄλλο $AG = \beta$.

Σχ. 53

"Αγομεν ἔπειτα τὴν ΒΓ καὶ εὐκόλως ἀποδεικνύομεν δτι τὸ σχηματιζόμενον τρίγωνον ΑΒΓ εἶναι τὸ ζητούμενον.

*Ασκήσεις

49. Νὰ κατασκευάσητε ἐν ὁρθογώνιον τρίγωνον, εἰς τὸ ὅποιον ἡ μία πλευρὰ τῆς ὁρθῆς γωνίας νὰ εἶναι 6 ἑκατοστόμετρα καὶ ἡ ἄλλη 5 ἑκατοστόμετρα.

50. Νὰ ἔξετάσητε, ἂν μὲ τὰ ἀνωτέρω δοθέντα στοιχεῖα α, β, ω εἶναι δυνατὸν ἡ δχι νὰ κατασκευασθῇ τρίγωνον διάφορον τοῦ κατασκευασθέντος ΑΒΓ (§ 79, σχ. 53).

4. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΙΣΟΣΚΕΛΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΠΛΕΥΡΩΝ ΤΡΙΓΩΝΩΝ

§ 80. Νὰ συγκριθῶσιν αἱ παρὰ τὴν βάσιν ΒΓ γωνίαις ισοσκελοῦς τριγώνου ΑΒΓ (σχ. 54).

"Αν φέρωμεν τὴν διάμεσον ΑΔ, τὸ τρίγωνον ΑΒΓ χωρίζεται εἰς δύο τρίγωνα ΑΒΔ καὶ ΑΔΓ. Ταῦτα ἔχουσιν $AB = AG$ καὶ $BD = DG$ καὶ τὴν AD κοινήν. Εἶναι ἄρα (§ 77) ταῦτα ἵσα καὶ διὰ τοῦτο εἶναι $\widehat{B} = \widehat{G}$. Βλέπομεν λοιπὸν δτι:

Αἱ παρὰ τὴν βάσιν γωνίαι παντὸς ισοσκελοῦς τριγώνου εἶναι ἵσαι.

Πόρισμα. Πᾶν ισόπλευρον τρίγωνον εἶναι καὶ ισογώνιον.



Σχ. 54

*Ασκήσεις

51. Νὰ δρίσητε τὸ μέσον Μ τῆς βάσεως ΒΓ ἐνδὸς ισοσκελοῦς τριγώνου ΑΒΓ καὶ ἐπὶ τῶν ἵσων πλευρῶν αὐτοῦ νὰ δρίσητε ἵσα τμῆματα ΑΕ, ΑΖ. Νὰ γράψητε τὰ εὐθ. τμῆματα ΜΕ, ΜΖ καὶ νὰ συγκρίνητε ταῦτα.

52. Νὰ δρίσητε τὰ μέσα Δ καὶ Ε τῶν ἵσων πλευρῶν ΑΓ καὶ ΑΒ ἐνδὸς ισοσκελοῦς τριγώνου ΑΒΓ. "Επειτα νὰ γράψητε καὶ νὰ συγκρίνητε τάς διαμέσους ΒΔ καὶ ΓΕ αὐτοῦ.


53. Νὰ κατασκευάσητε ἐν ισόπλευρον τρίγωνον ΑΒΓ, νὰ δρίσητε τὰ μέσα Δ, Ε, Ζ τῶν πλευρῶν αὐτοῦ καὶ νὰ ἀποδείξητε δτι τὸ τρίγωνον ΔΕΖ εἶναι ισόπλευρον.

54. Νὰ προεκτείνητε ἑκατέρωθεν τὴν βάσιν ἐνδὸς ισοσκελοῦς τριγώνου καὶ νὰ συγκρίνητε τάς ἔξωτερικάς γωνίας, αἱ δροῖαι θὰ σχηματισθῶσιν.

§ 81. Νὰ συγκριθῶσιν αἱ πλευραὶ AB καὶ AG ἐνὸς τριγώνου ABG , εἰς τὸ δποῖον εἶναι $\widehat{B}=\widehat{G}$ (σχ. 56).

Κατασκευάζομεν τρίγωνον ΔEZ , τὸ δποῖον ἔχει πλευράς $\Delta E=AB$, $\Delta G=AG$ καὶ $EZ=BG$ (1)

Θὰ εἶναι ἐπομένως τοῦτο ὃσον πρὸς τὸ ABG (§ 77) καὶ ἐπο-



Σχ. 55

μένως $\widehat{E}=\widehat{B}$ καὶ $\widehat{Z}=\widehat{G}$. Ἐπειδὴ δὲ ἔξ ύποθέσεως εἶναι $\widehat{B}=\widehat{G}$, ἐπεται διὶ $\widehat{E}=\widehat{G}$ καὶ $\widehat{Z}=\widehat{B}$.

Νοοῦμεν τώρα διὶ τὸ τρίγωνον ΔEZ τίθεται ἐπὶ τοῦ ABG οὕτως, ὡστε ἡ EZ νὰ ἔφαρμόσῃ ἐπὶ τῆς BG μὲ τὴν κορυφὴν E ἐπὶ τῆς G . Εύκόλως δὲ ἐννοοῦμεν διὶ ἡ μὲν πλευρὰ ED θὰ ἔφαρμό-

σῃ ἐπὶ τῆς GA , ἡ δὲ ZD ἐπὶ τῆς BA . Θὰ εἶναι δηλ. $ED=GA$ καὶ $ZD=BA$. Ἐκ τούτων καὶ τῶν (1) ἐπεται διὶ $AB=AG$.

Βλέπομεν λοιπὸν διὶ:

Ἄν δύο γωνίαι τριγώνου εἶναι ὅσαι καὶ αἱ ἀπέναντι αὐτῶν πλευραὶ εἶναι ὅσαι, ἢτοι τὸ τρίγωνον εἶναι ἰσοσκελές.

Πόρισμα. Πᾶν ἰσογώνιον τρίγωνον εἶναι καὶ ἰσόπλευρον.

Ασκήσεις

55. Νὰ συγκρίνητε τὰς πλευράς AB καὶ AG ἐνὸς τριγώνου ABG , τὸ δποῖον ἔχει ἵσας τὰς ἔξωτερικὰς γωνίας B καὶ G .

56. Νὰ συγκρίνητε τὰς τρεῖς πλευράς ἐνὸς τριγώνου, τοῦ δποίου αἱ τρεῖς ἔξωτερικαὶ γωνίαι μὲ διαφόρους κορυφὰς εἶναι ὅσαι.

57. Νὰ κατασκευάσητε ἐν ἰσογώνιον τρίγωνον ABG , τοῦ δποίου ἡ πλευρὰ BG νὰ εἶναι 6 ἑκατοστομέτρων.

§ 82. Ἀπὸ τὴν κορυφὴν A ἰσοσκελοῦς τριγώνου ABG ἀγεται δὲ $AΔ$ κάθετος ἐπὶ τὴν βάσιν BG αὐτοῦ. Νὰ συγκριθῶσι:

α') Τὰ τμήματα $BΔ$ καὶ $ΔG$ τῆς βάσεως καὶ

β') Αἱ γωνίαι $BΔA$ καὶ $ΔAΓ$ (σχ. 54)

α') Ἐπειδὴ αἱ πλάγιαι πρὸς τὴν βάσιν $B\Gamma$ πλευραὶ AB καὶ AG εἰναι ἵσαι, ἔπειται δτὶ $B\Delta = \Delta\Gamma$ (§ 63 ἀντ.).

β') Τὰ τρίγωνα λοιπὸν BAD καὶ ΔAG εἰναι ἵσα (§ 77) καὶ ἐπομένως $B\Delta\Delta = \Delta A\Gamma$. Βλέπομεν λοιπὸν δτὶ:

Ἡ κάθετος, ἡ δποία ἄγεται ἀπὸ τὴν κορυφὴν ἴσοσκελοῦς τριγώνου ἐπὶ τὴν βάσιν, διχοτομεῖ τὴν βάσιν καὶ τὴν γωνίαν τῆς κορυφῆς.

Πόρισμα I. Τὰ ὑψη ἴσοπλεύρου τριγώνου εἰναι διχοτόμοι τὸν γωνιῶν του καὶ διάμεσοι αὐτοῦ.

Πόρισμα II. Ἡ διάμετρος κύκλου, ἡ δποία εἰναι κάθετος ἐπὶ χορδὴν αὐτοῦ, διχοτομεῖ τὴν χορδὴν καὶ τὰ ἀντίστοιχα αὐτῆς τόξα.

Ἄσκήσεις


58. "Ἐκ σημείου ἔκτος εύθείας κειμένου νὰ φέρητε τὴν κάθετον καὶ δύο ἵσας πλαγίας πρὸς αὐτήν." Ἐπειτα νὰ συγκρίνητε τὰς γωνίας, τὰς δποίας αἱ πλάγιαι αὗται σχηματίζουσι μὲ τὴν κάθετον.

59. "Ἄν εύθεία $A\Delta$ διχοτομῇ τὴν γωνίαν A τῆς κορυφῆς ἴσοσκελοῦς τριγώνου $AB\Gamma$, νὰ ἀποδείξητε δτὶ τὸ μεταξὺ τῆς κορυφῆς καὶ τῆς βάσεως τμῆμα $A\Delta$ εἰναι ὕψος καὶ διάμεσος τοῦ τριγώνου τούτου.


60. Νὰ ἀποδείξητε δτὶ: Ἡ εύθεία, ἡ δποία τέμνει δίχα καὶ καθέτως τὴν βάσιν ἐνὸς ἴσοσκελοῦς τριγώνου, διέρχεται ἀπὸ τὴν κορυφὴν αὐτοῦ καὶ διχοτομεῖ τὴν ἀπέναντι τῆς βάσεως γωνίαν του.

5. ΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΑΙ

§ 83. Πρόβλημα I. Νὰ διχοτομηθῇ δοθὲν τόξον AB περιφερείας (σχ. 56)



Σχ. 56



Σχ. 57

Λύσις: Γράφομεν τὴν $K\Delta\Gamma$ κάθετον ἐπὶ τὴν χορδὴν τοῦ

τόξου εις τὸ μέσον αὐτῆς (§ 65 Πορ. II). Εύκολως δὲ ἀποδεικνύομεν ὅτι $\widehat{AG} = \widehat{GB}$.

§ 84. Πρόβλημα II. Νὰ διχοτομηθῇ δοθεῖσα γωνία A (σχ. 57).


Λύσις: Καθιστῶμεν τὴν γωνίαν A ἐπίκεντρον καὶ δρίζομεν τὸ μέσον Δ τοῦ ἀντιστοίχου τόξου ΒΔΓ, δπως προηγουμένως. Ἀγομεν ἔπειτα τὴν εὐθεῖαν ΑΔ καὶ ἀποδεικνύομεν εύκολως ὅτι αὕτη εἶναι ἡ ζητουμένη διχοτόμος.

Α σκήσεις

61. Νὰ κατασκευάσητε γωνίαν 45° .
62. Νὰ κατασκευάσητε τρίγωνον $AB\Gamma$, τὸ όποιον νὰ ἔχῃ $A = 45^\circ$, $AB = 10$ ἑκατ., καὶ $AG = 6$ ἑκατ.
63. Νὰ διαιρέσητε δοθὲν τόξον περιφερείας εἰς 4 ίσα μέρη.
64. Νὰ διαιρέσητε μίαν γωνίαν εἰς 4 ίσα μέρη.

6. ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΡΙΓΩΝΟΥ

§ 85. Νὰ συγκριθῇ μία πλευρὰ τριγώνου $AB\Gamma$ πρὸς τὸ ἀντοῖσμα καὶ τὴν διαφορὰν τῶν ἀλλων πλευρῶν αὐτοῦ (σχ. 58).



Σχ. 58


α') Ἡ πλευρά π.χ. AG ἔχει μὲ τὴν τεθλ. γραμμὴν $AB\Gamma$ τὰ αὐτὰ ἄκρα. Εἶναι λοιπὸν $AG < AB + BG$ (§ 10β').

β') Διὰ τὸν αὐτὸν λόγον εἶναι $BG < AB + AG$. Ἐν τῷ πλευρᾶν AB , εὑρίσκομεν δτι $AG > BG - AB$.

Ομοίως εὑρίσκομεν δτι $AB > BG - AG$. Ἐπειδὴ δὲ εἶναι $BG > AG$ καὶ $AG > AB$, εἶναι $BG > AG - AB$ κατὰ μείζονα λόγον.

Βλέπομεν λοιπὸν δτι :

Ἐκάστη πλευρὰ τριγώνου εἶναι μικροτέρα τοῦ ἀντοῖσματος τῶν δύο ἀλλων καὶ μεγαλυτέρα τῆς διαφορᾶς αὐτῶν.



Σχ. 59

§ 86. Νὰ συγκριθῇ μία ἔξωτερη γωνία $GB\Delta$ τριγώνου $AB\Gamma$

πρόδεις ἐκατέρων τῶν ἐντὸς καὶ ἀπέναντι γωνιῶν Γ καὶ A αὐτοῦ (σχ. 59).

α') Γράφομεν τὴν διάμεσον AE καὶ εἰς τὴν προέκτασιν αὐτῆς ὁρίζομεν τμῆμα $EZ = AE$. Ἐν ἔπειτα φέρωμεν τὴν BZ , σχηματίζεται τὸ τρίγωνον BEZ . Ἐκ τῆς ἴσοτητος δὲ τῶν τριγώνων AGE καὶ BEZ (§ 75) ἔπειται ὅτι $\widehat{EBZ} = \widehat{\Gamma}$. Ἐπειδὴ δὲ ή BZ κεῖται ἐντὸς τῆς ἑξωτερικῆς γωνίας $\Gamma B\Delta$, εἶναι $\widehat{\Gamma B\Delta} > \widehat{EBZ}$ καὶ ἐπομένως $\widehat{\Gamma B\Delta} > \widehat{\Gamma}$.

β') Κατὰ ταῦτα εἶναι $\widehat{ABH} > \widehat{A}$. Ἐπειδὴ δὲ $\widehat{ABH} = \widehat{\Gamma B\Delta}$, ἔπειται ὅτι $\widehat{\Gamma B\Delta} > \widehat{A}$. Βλέπομεν λοιπὸν ὅτι:


Πᾶσα ἑξωτερική γωνία τριγώνου εἶναι μεγαλυτέρα ἐκατέρας τῶν ἐντὸς καὶ ἀπέναντι γωνιῶν αὐτοῦ.

Πόρισμα. Ἐάν σημεῖον Δ κεῖται ἐντὸς τριγώνου ABG , ή γωνία BAG εἶναι μεγαλυτέρα τῆς γωνίας A τοῦ τριγώνου τούτου (σχ. 60).

Παρατηροῦμεν ὅτι $\widehat{B\Delta G} > \widehat{\phi}$ καὶ $\widehat{\phi} > \widehat{A}$ κ.τ.λ.

§ 87. Νὰ συγκριθῇ τὸ ἄθροισμα δύο γωνιῶν τριγώνου ABG πρὸς 2 δρθὰς γωνίας (σχ. 59).

Σχ. 60



Προεκτείνομεν π.χ. τὴν πλευρὰν AB καὶ παρατηροῦμεν ὅτι $\widehat{\Gamma B\Delta} > \widehat{\Gamma}$. Ἐάν δὲ εἴς τὰ μέλη αὐτῆς προσθέσωμεν τὴν γωνίαν B , εύρισκομεν ὅτι $\widehat{B} + \widehat{\Gamma B\Delta} > \widehat{B} + \widehat{\Gamma}$ ή 2 δρθ. $> \widehat{B} + \widehat{\Gamma}$. Όμοιως ἀποδεικνύομεν ὅτι $\widehat{A} + \widehat{B} < 2$ δρθ. καὶ $\widehat{A} + \widehat{\Gamma} < 2$ δρθ. Ὁστε:

Τὸ ἄθροισμα δύο γωνιῶν τριγώνου εἶναι μικρότερον τῶν 2 δρθῶν γωνιῶν.

Πόρισμα I. Πᾶν δρθογώνιον ή ἀμβλυγώνιον τρίγωνον ἔχει δύο δξείας γωνίας.


Πόρισμα II. Αἱ παρὰ τὴν βάσιν γωνίαι ἰσοσκελοῦς τριγώνου εἶναι ὁξεῖται.

§ 88. Θεώρημα. "Αν δύο πλευραὶ τριγώνου εἶναι ἀνισοί, αἱ ἀπέναντι αὐτῶν γωνίαι εἶναι ὁμοίως ἀνισοί.

Απόδειξις. Εστω τρίγωνον $AB\Gamma$, εἰς τὸ δόποιον εἶναι $A\Gamma > AB$ (σχ. 61) "Αν ἐπὶ τῆς $A\Gamma$ ὅρισωμεν τμῆμα $A\Delta = AB$, θὰ εἶναι $A\Gamma > A\Delta$ καὶ ἐπόμενως τὸ Δ θὰ κεῖται μεταξὺ A καὶ Γ . Ἡ εὐθεῖα λοιπόν $B\Delta$ θὰ κεῖται ἐντὸς τῆς γωνίας B . Διὰ

τοῦτο δὲ θὰ εἶναι $\phi \angle A\bar{B}\Gamma$ ἢ $\phi \angle B$ (1).

Ἐπειδὴ $AB = A\Delta$, εἶναι καὶ $\widehat{\phi} = \widehat{\omega}$ (§ 80), ἢ δὲ (1) γίνεται $\widehat{\omega} < \widehat{B}$. Ἐπειδὴ δὲ $\widehat{\Gamma} < \widehat{\omega}$ (§ 86), ἔπειται κατὰ μείζονα λόγον δτὶ $\widehat{\Gamma} < \widehat{B}$. Ο.Ξ.δ.



Σχ. 61

§ 89. "Αν δύο γωνίαι τριγώνου εἶναι ἀνισοί, νὰ συγκριθῶσιν αἱ ἀπέναντι αὐτῶν πλευραὶ αὐτοῦ.

Εστω δτὶ $\widehat{B} > \widehat{\Gamma}$ (σχ. 61). Διὰ νὰ συγκρίνωμεν τὰς ἀπέναντι τῶν γωνιῶν τούτων πλευράς $A\Gamma$ καὶ AB σκεπτόμεθα ὡς ἔξῆς:

"Αν ἡτο $A\Gamma \leq AB$, θὰ ἡτο $\widehat{B} \leq \widehat{\Gamma}$. Επειδὴ δὲ αἱ σχέσεις αὗται ἀντίκεινται εἰς τὴν ὑπόθεσιν, ἀποκλείεται νὰ εἶναι $A\Gamma \leq AB$. Ἐπομένως εἶναι $A\Gamma > AB$. Ωστε:

"Αν δύο γωνίαι τριγώνου εἶναι ἀνισοί, καὶ αἱ ἀπέναντι αὐτῶν πλευραὶ εἶναι ὁμοίως ἀνισοί.

Ασκήσεις

65. Νὰ συγκρίνητε τὴν ὑποτείνουσαν ἐνὸς δρθογωνίου τριγώνου πρὸς ἑκατέραν τῶν ὄλλων πλευρῶν αὐτοῦ.

66. Νὰ κατασκευάσητε ἴσοσκελές τρίγωνον $AB\Gamma$ μὲν βάσιν $B\Gamma$. Νὰ συγκρίνητε δὲ τὰς ἀποστάσεις τυχόντος σημείου τῆς πλευρᾶς $A\Gamma$ ἀπὸ τὰς κορυφὰς B καὶ Γ .

7. ΑΛΛΑΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΙΣΟΤΗΤΟΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΩΝ ΤΡΙΓΩΝΩΝ



§ 90. Νὰ συγκειθῶσι δύο τρίγωνα $AB\Gamma$ καὶ ΔEZ , ἀν $\widehat{A}=\widehat{\Delta}=1$ δρὸς, $AG=AZ$ καὶ $\widehat{B}=\widehat{E}$ (σχ. 62).

Νοοῦμεν ὅτι τὸ τρίγωνον ΔEZ τίθεται ἐπὶ τοῦ $AB\Gamma$ οὕτως, ὥστε ἡ ὁρθὴ γωνία Δ νὰ ἔφαρμόσῃ ἐπὶ τῆς A μὲ τὴν ΔZ ἐπὶ τῆς Γ . Οὕτως ἡ κορυφὴ Z θὰ πέσῃ ἐπὶ τῆς G , διότι $\Delta Z=AG$. E''

Ἄν δὲ ἡ κορυφὴ E ἥρχετο εἰς ἐν σημεῖον E' ἢ E'' τῆς B AB διάφορον τοῦ B , θὰ ἦτο $\widehat{AE'}\Gamma > \widehat{B}$ ἢ $\widehat{B} > \widehat{AE''}\Gamma E'$ (§ 86). Ἐπειδὴ δὲ θὰ εἶναι $\widehat{E}=AE'\Gamma$ ἢ $\widehat{E}=AE''\Gamma$, θὰ ἦτο $\widehat{B} \leq \widehat{E}$. Αὗται δύος ἀντίκεινται εἰς τὴν ύποθεσιν $\widehat{B}=\widehat{E}$.

“Ωστε ἡ κορυφὴ E συμπίπτει μὲ τὴν B καὶ τὰ τρίγωνα ἔφαρμόζουσιν ἀκριβῶς.

Σχ. 62



Σχ. 63

Βλέπομεν λοιπὸν ὅτι :
“Ἄν δύο δροθογώνια τρίγωνα ἔχωσι μίαν κάθετον πλευρὰν ἵσην καὶ τὰς ἀπένναντι δξεῖας γωνίας ἵσας, ταῦτα εἶναι ἵσα.

§ 91. Νὰ συγκειθῶσι δύο τρίγωνα $AB\Gamma$, ΔEZ , ἀν $\widehat{A}=\widehat{\Delta}=1$ δρὸς, $BG=EZ$ καὶ $\widehat{B}=\widehat{E}$ (σχ. 63).

Νοοῦμεν ὅτι τὸ τρίγωνον ΔEZ τίθεται ἐπὶ τοῦ $AB\Gamma$ οὕτως, ὥστε ἡ γωνία E νὰ ἔφαρμόσῃ ἐπὶ τῆς B μὲ τὴν πλευρὰν EZ ἐπὶ τῆς $B\Gamma$. Οὕτως ἡ κορυφὴ Z θὰ συμπέσῃ μὲ τὴν Γ , ἡ δὲ Δ θὰ ἔλθῃ εἰς ἐν σημεῖον τῆς πλευρᾶς AB . “Ἄν τοῦτο ἦτο A' διάφορον τοῦ A , θὰ ἤγοντο ἐκ τοῦ Γ δύο κάθετοι GA καὶ GA' ἐπὶ τὴν

ΑΒ, δπερ ἄτοπον. Ἡ κορυφὴ Δ λοιπὸν συμπίπτει μὲ τὴν Α καὶ τὰ τρίγωνα ἐφαρμόζουσιν. "Ωστε:

"Ἄν δύο δρθογώνια τρίγωνα ἔχωσι τὰς ὑποτεινούσας ἵσας καὶ μιαν δξεῖαν γωνίαν ἵσην, ταῦτα εἰναι ἵσα.

Πόρισμα. "Ἐκαστον σημεῖον τῆς διχοτόμου γωνίας ἀπέχει ἵσον ἀπὸ τὰς πλευρὰς αὐτῆς.

§ 92. Νὰ συγκριθῶσι δύο τρίγωνα **ΑΒΓ**, **ΔΕΖ**, ἂν $\widehat{A}=\widehat{D}=1$ δρθ. **ΑΒ=ΔΕ** καὶ **ΒΓ=EZ** (σχ. 63).

Νοοῦμεν δτι τὸ τρίγωνον **ΔΕΖ** τίθεται ἐπὶ τοῦ **ΑΒΓ** οὕτως, ώστε ἡ γωνία **Δ** νὰ ἐφαρμόσῃ ἐπὶ τῆς **Α** μὲ τὴν πλευρὰν **ΔΕ** ἐπὶ τῆς **ΑΒ**. Εἶναι οὕτω φανερὸν δτι ἡ εὐθεῖα **ΔΖ** θὰ ἐφαρμόσῃ ἐπὶ τῆς εὐθείας **ΑΓ** καὶ ἡ κορυφὴ **Ε** ἐπὶ τῆς **Β**, ἡ δὲ **EZ** γίνεται πλαγία πρὸς τὴν **ΑΓ** ἀγομένη ἐκ τοῦ **Β**. Ἐπειδὴ δὲ ἡ πλαγία αὕτη εἰναι ἵση πρὸς τὴν πλαγίαν **ΒΓ**, οἱ πόδες αὕτων ἀπέχουσιν ἵσον ἀπὸ τὸν πόδα **Α**. Ἡ κορυφὴ **Ζ** λοιπὸν συμπίπτει μὲ τὴν **Γ** καὶ τὰ τρίγωνα ἐφαρμόζουσιν. Βλέπομεν λοιπὸν δτι:

"Ἄν δύο δρθογώνια τρίγωνα ἔχωσι τὰς ὑποτεινούσας ἵσας καὶ μιαν κάθετον πλευρὰν ἵσην, ταῦτα εἰναι ἵσα.

Πόρισμα I. Τὸ κέντρον κύκλου ἔπεχει ἵσον ἀπὸ ἵσας κορ-δας αὐτοῦ. Καὶ ἀντιστρόφως.

Πόρισμα II. Πᾶν σημεῖον ἵσον ἀπέχον ἀπὸ τῶν πλευρῶν γωνίας κεῖται ἐπὶ τῆς διχοτόμου τῆς γωνίας ταύτης.

§ 93. Εἴς ἀξιοσημείωτος τόπος. Ἀπὸ τὰ πορίσματα (§ 91 καὶ II § 92) ἐννοοῦμεν δτι ὅλα τὰ σημεῖα τῆς διχοτόμου γωνίας καὶ μόνον αὕτα ἔχουσι τὴν ἀκόλουθον ἰδιότητα:

"Ἐκαστον ἀπὸ αὐτὰ ἀπέχει ἵσον ἀπὸ τὰς πλευρὰς τῆς γωνίας ταύτης.

Διὰ τοῦτο ἡ διχοτόμος γωνίας λέγεται γεωμετρικὸς τόπος τῶν σημείων, δν ἔκαστον ἀπέχει ἵσον ἀπὸ τὰς πλευρὰς αὐτῆς.

§ 94. Συντομωτέρα διατύπωσις τῶν περιπτώσεων ἴσοτητος τῶν δρθογωνίων τριγώνων. Τὰς ἀνωτέρω (§ 90 — 93) περιπτώσεις ἴσοτητος τῶν δρθογωνίων τριγώνων καὶ τὰ Πορί-

σματα Ι τῶν § 74 — 75 δυνάμεθα νὰ διατυπώσωμεν περιληπτικώτερον οὕτω:

α') "Αν δύο πλευραὶ δρόθ. τριγώνου εἶναι, μία πρὸς μίαν, ἵσαι ἀντιστοίχως πρὸς δμωνύμους πλευρὰς ἄλλου δρόθ. τριγώνου, τὰ τρίγωνα ταῦτα εἶναι ἵσαι.

β') "Αν μία πλευρὰ δρόθ. τριγώνου εἶναι ἵση πρὸς δμώνυμον πλευρὰν ἄλλου δρόθ. τριγώνου καὶ αἱ πρὸς αὐτὰς προσκείμεναι ἡ ἀντικείμεναι δῆξεῖται γωνίαι εἶναι ἀντιστοίχως ἵσαι, τὰ τρίγωνα ταῦτα εἶναι ἵσαι.

'Ασκήσεις

67. Νὰ γράψητε τυχοῦσαν εύθεῖαν διερχομένην ἀπὸ τὸ μέσον ἐνὸς εύθ. τμήματος. "Επειτα νὰ γράψητε τὰς ἀποστάσεις τῶν ἀκρων αὐτοῦ ἀπὸ τῆς εὐθείας ταύτης καὶ νὰ συγκρίνητε αὐτάς.

68. Νὰ διχοτομήσητε μίαν γωνίαν καὶ ἀπὸ ἐν σημεῖον τῆς διχοτόμου νὰ φέρητε καθέτους ἐπὶ τὰς πλευράς αὐτῆς. Νὰ συγκρίνητε δὲ τὰς ἀποστάσεις τῶν ποδῶν τῶν καθέτων τούτων ἀπὸ τὴν κορυφὴν τῆς γωνίας.

69. Νὰ δρίσητε τὰ μέσα τῶν Ἰσων πλευρῶν ἐνὸς Ισοσκελοῦς τριγώνου καὶ νὰ ἀποδείξητε ὅτι ταῦτα ἀπέχουσιν Ἰσον ἀπὸ τὴν βάσιν τοῦ τριγώνου.

70. Νὰ δρίσητε τὸ μέσον τῆς ὑποτεινούσης δρθογωνίου καὶ Ισοσκελοῦς τριγώνου καὶ νὰ ἀποδείξητε ὅτι τοῦτο ἀπέχει Ἰσον ἀπὸ τὰς καθέτους πλευράς αὐτοῦ.

71. Νὰ δρίσητε τὸ μέσον ἐνὸς τόξου περιφερείας. "Επειτα νὰ γράψητε τὰς ἀποστάσεις αὐτοῦ ἀπὸ τὰς εἰς τὰ ἀκρα αὐτοῦ καταληγούσας ἀκτίνας καὶ νὰ τὰς συγκρίνητε.

72. Νὰ κάμητε τὴν προηγουμένην ἔργασίαν, μὲ τὸ μέσον μιᾶς χορδῆς.

73. Νὰ κατασκευάσητε ἐν δρθογωνίον καὶ σκαληνὸν τρίγωνον καὶ νὰ δρίσητε ἐν σημεῖον τῆς ὑποτεινούσης, τὸ δποῖον νὰ ἀπέχῃ Ἰσον ἀπὸ τὰς ἄλλας πλευράς αὐτοῦ.

"Ασκήσεις πρὸς ἐπανάληψιν τοῦ Γ' καὶ τοῦ Δ' κεφαλαίου

74. Νὰ συγκρίνητε τὴν περίμετρον παντὸς κυρτοῦ εύθ. σχήματος πρὸς τὴν περίμετρον ἄλλου εύθ. σχήματος, τὸ δποῖον περικλείει τὸ πρῶτον.

75. Νὰ σχηματίσητε μίαν δρθὴν γωνίαν Α καὶ νὰ δρίσητε ἐπὶ τῆς μιᾶς πλευρᾶς δύο σημεῖα B, Γ καὶ ἐπὶ τῆς ἄλλης ἄλλα δύο Δ, Ε τοι-


αύτα, ώστε νὰ είναι $AB < AG$ καὶ $AD < AE$. Νὰ συγκρίνητε δὲ τὰ τμήματα BD καὶ GE .

76. Νὰ γράψητε μίαν εύθειαν AB καὶ νὰ δρίσητε ἐκτὸς αὐτῆς ἐν σημεῖον G . Ἐπειτα νὰ δρίσητε ἐπὶ τῆς AB σημεῖον M τοιοῦτον, ώστε νὰ είναι $MA=MG$ καὶ ἀλλο σημεῖον N τοιοῦτον, ώστε νὰ είναι $NB=NG$.

77. Νὰ δρίσητε ἐκτὸς δοθείσης εύθειάς AB δύο σημεῖα Γ , Δ καὶ νὰ δρίσητε ἐπὶ τῆς AB σημεῖον Z , διὰ τὸ δποῖον είναι $Z\Gamma=Z\Delta$.

78. Νὰ κατασκευάσητε τυχόν τρίγωνον ABG . Νὰ φέρητε τὴν διάμεσον AD αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τῆς προεκτάσεως αὐτῆς νὰ δρίσητε τμῆμα DE ἵσον πρὸς AD . Νὰ φέρητε τὸ εύθ. τμῆμα $E\Gamma$ καὶ νὰ συγκρίνητε αὐτὸ πρὸς τὴν πλευράν AB .

79. Εἰς τὸ προηγούμενον σχῆμα νὰ συγκρίνητε τὴν γωνίαν BAD πρὸς τὴν $GE\Delta$.



Σχ. 64

νὰ είναι $AB < AG$. Ἐπειτα νὰ φέρητε τὴν διάμεσον AD καὶ νὰ συγκρίνητε τὰς γωνίας ADB καὶ ADG πρὸς ἀλλήλας καὶ ἐκάστην πρὸς τὴν δρθήν γωνίαν.

82. Νὰ κατασκευάσητε γωνίαν $22^{\circ} 30'$.

83. Νὰ διαιρέσητε μίαν περιφέρειαν εἰς 8 ἵσα τόξα.

84. "Αν εἰς ἐν τρίγωνον ABG είναι $AG > AB$ καὶ AD είναι διάμεσος αὐτοῦ, νὰ ἀποδείξητε ὅτι

$$\frac{AG - AB}{2} < AD < \frac{AG + AB}{2}$$

85. Εἰς τὸ προηγούμενον σχῆμα νὰ ἀποδείξητε ὅτι $\widehat{BAD} > \widehat{AD}$.

86. Νὰ ἀποδείξητε ὅτι τὰ ὄψη ἰσοσκελοῦς τριγώνου, τὰ δποῖα ἄγονται ἀπὸ τὰ ἄκρα τῆς βάσεως αὐτοῦ, είναι ἵσα.

87. Νὰ ἀποδείξητε ὅτι: "Αν δύο ὄψη τριγώνου είναι ἵσα, τοῦτο είναι ἰσοσκελές τρίγωνον.

88. Νὰ ἀποδείξητε ὅτι τὰ ὄψη παντὸς ἰσοπλεύρου τριγώνου είναι ἵσα καὶ ἀντιστρόφως.

89. Νὰ κατασκευάσητε μίαν γωνίαν καὶ τυχοῦσαν εύθειαν. Νὰ εύρητε δὲ ἐπὶ τῆς εύθειάς ταύτης ἐν σημεῖον, τὸ δποῖον νὰ ἀπέχῃ ἵσον ἀπὸ τὰς πλευράς τῆς γωνίας ταύτης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'

1. ΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΕΥΘΕΙΑΙ

§ 95. Αἱ γωνίαι δύο εὐθειῶν τεμνομένων ὑπὸ τρίτης.
Ἐστωσαν ἐν ἐπιπέδῳ δύο εύθειαι AB καὶ $ΓΔ$, αἱ δποῖαι τέμνονται ἀπὸ τρίτην εύθειαν $EΖ$ εἰς σημεῖα διάφορα ἀλλήλων (σχ. 65).

Βλέπομεν δὲ δτι σχηματίζονται ὑπ' αὐτῶν 8 γωνίαι $α, β, γ, δ, ε, ζ, η, θ$. Ταύτας χωρίζομεν εἰς διάφορα ζεύγη, τὰ δποῖα χαρακτηρίζονται ἀπὸ τὴν θέσιν τῶν γωνιῶν των πρὸς τὰς τεμνομένας καὶ τὴν τέμνουσαν εύθειαν. Οὕτω:

$α')$ Δύο γωνίαι, ὡς αὶ α καὶ $β$, αἱ δποῖαι κεῖνται μεταξὺ τῶν τεμνομένων εὐθειῶν καὶ πρὸς τὸ αὐτὸ μέρος τῆς τεμνούσης, λέγονται ἐντὸς καὶ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη.


$β')$ Δύο γωνίαι, ὡς αὶ $α$ καὶ $ε$, αἱ δποῖαι ἔχουσι διαφόρους κορυφάς, κεῖνται μεταξὺ τῶν τεμνομένων εὐθειῶν καὶ ἐκατέρωθεν τῆς τεμνούσης, λέγονται ἐντὸς ἐναλλάξ γωνίαι.

$γ')$ Δύο γωνίαι, ὡς αὶ $α$ καὶ $γ$, αἱ δποῖαι ἔχουσι διαφόρους κορυφάς, κεῖνται πρὸς τὸ αὐτὸ μέρος τῆς τεμνούσης καὶ ή μία μεταξύ, ή δὲ ἄλλη ἐκτὸς τῶν τεμνομένων εὐθειῶν, λέγονται ἐντὸς ἐκτὸς καὶ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη.

Ομοίως γωνίαι ὡς αὶ $θ$ καὶ δ λέγονται ἐκτὸς ἐναλλάξ, αἱ θ καὶ γ ἐκτὸς καὶ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη κ.τ.λ.


Ἄξιοσημείωτον δτι $\alpha + \beta + \epsilon + \zeta = 4$ δρθ. Ἀν δὲ εἶναι $\alpha + \beta \leq 2$ δρθ, θά εἶναι ἀντιστοίχως $\epsilon + \zeta \geq 2$ δρθ. Ἀν δὲ $\alpha + \beta > 2$ δρθ, θά εἶναι $\epsilon + \zeta < 2$ δρθ.

§ 96. Πρόβλημα. Αἰδεται εύθεια AB καὶ ἀγονται δύο



Σχ. 65

ἄλλαι $\Gamma\Delta$, EZ κάθετοι ἐπ' αὐτὴν καὶ εἰς τὸ αὐτὸ μὲ αὐτὴν ἐπίπεδον. Νὰ ἔξετασθῇ, ἂν αἱ κάθετοι αὗται προεκτεινόμεναι τέμνωνται ἢ δχι (σχ. 66).



Σχ. 66

Λύσις. Ἐν αὗται ἐτέμνοντο εἰς τὶ σημεῖον H , θὰ ἥγοντο ἐξ αὐτοῦ δύο κάθετοι ἐπὶ τὴν AB . Τοῦτο δὲ εἶναι ἀδύνατον (§ 62). "Ωστε:

Δύο κάθετοι ἐπὶ τὴν αὐτὴν εὐθεῖαν καὶ δὲν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ μετ' αὐτῆς δὲν τέμνονται, δσον καὶ ἀν προεκταθῶσι.

§ 97. Ποιαὶ λέγονται παράλληλοι εὐθεῖαι. Αἱ προηγούμεναι


εὑθεῖαι $\Gamma\Delta$ καὶ EZ εύρισκονται εἰς τὸ αὐτὸ ἐπίπεδον καὶ οὐδὲν ἔχουσι κοινὸν σημεῖον. Λέγονται δὲ αὗται παράλληλοι εὐθεῖαι. "Ωστε:

Δύο εὐθεῖαι λέγονται παράλληλοι, ἀν κεῖνται εἰς τὸ αὐτὸ ἐπίπεδον καὶ δὲν συναντῶνται, δσον καὶ ἀν προεκταθῶσιν.

Κατὰ ταῦτα ἡ προηγουμένη ἰδιότης διατυπούται καὶ ως ἐξῆς: *Εὐθεῖαι κάθετοι ἐπὶ τὴν αὐτὴν εὐθεῖαν είναι παράλληλοι*. Νοεῖται δμως δτι αἱ εὑθεῖαι αὗται εύρισκονται εἰς τὸ αὐτὸ ἐπίπεδον.

2. ΆΛΛΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΥΘΕΙΩΝ

§ 98. Θεώρημα I. Ἐν δύο εὐθεῖαι AB καὶ $\Gamma\Delta$ τεμνόμεναι ὑπὸ τρίτης EZ σχηματίζωσιν ἔστις δύο ἐντὸς ἐκτὸς καὶ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη γωνίας, αὗται είναι παράλληλαι εὐθεῖαι (σχ. 67).



Σχ. 67

"Εστω δτι $\alpha=\beta$. Ἐν αἱ AB καὶ $\Gamma\Delta$ ἐτέμνοντο εἰς σημεῖον H , ἡ

έξωτερική γωνία β τοῦ τριγώνου ΗΕΖ θά ήτο ἵση πρὸς τὴν ἐντὸς καὶ ἀπέναντι α, δπερ ἄτοπον (§ 86). Αἱ εύθεῖαι λοιπὸν ΑΒ καὶ ΓΔ οὐδέποτε συναντῶνται, κεῖνται δὲ καὶ εἰς τὸ αὐτὸ ἐπίπεδον. "Αρα αὗται εἶναι παράλληλοι εύθεῖαι (§ 97).

Κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον ἀποδεικνύονται καὶ τὰ ἀκόλουθα θεωρήματα.


§ 99. Θεώρημα II. "Αν δύο εὐθεῖαι τεμνόμεναι ὑπὸ τρίτης σχηματίζωσι δύο ἐντὸς ἐναλλάξ γωνίας ἵσας, αἱ εὐθεῖαι αὗται εἶναι παράλληλοι.

§ 100. Θεώρημα III. "Αν δύο ἐντὸς καὶ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη γωνίαι δύο εὐθειῶν τεμνομένων ὑπὸ τρίτης εἶναι παραπληρωματικαί, αἱ εὐθεῖαι ἐκεῖναι εἶναι παράλληλοι (§ 87).

§ 101. Πρόβλημα. Ἀπὸ σημεῖον Γ , τὸ δποῖον κεῖται ἐκτὸς εὐθείας AB , νὰ ἀχθῇ πρὸς αὐτὴν παράλληλος εὐθεῖα (σχ. 68).

Λύσις: "Αγομεν εύθεῖαι $\Gamma\Delta$, ή δποία τέμνει τὴν AB εἰς τὶ σημεῖον Δ . ἔστω δὲ α μία ἀπὸ τὰς σχηματίζομένας γωνίας. Ἐπειτα μὲ κορυφὴν τὸ Γ καὶ πλευρὰν τὴν $\Gamma\Delta$ σχηματίζομεν γωνίαν β ἵσην πρὸς τὴν α καὶ ἀπὸ τὸ ἔτερον μέρος τῆς $\Gamma\Delta$. Εύκόλως δὲ ἀποδεικνύομεν δτι ή ἄλλη πλευρὰ ΓE τῆς β εἶναι παράλληλος πρὸς τὴν AB (§ 99).

Παραλλήλους εύθειας γράφομεν εὐκόλως καὶ μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ κανόνος καὶ τοῦ γνώμονος. Ἐπίσης μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ κονόνος καὶ τοῦ Ταῦ. Τὰς μεθόδους ταύτας γνωρίζομεν ἀπὸ τὴν πρακτικὴν γεωμετρίαν.



Σχ. 68


§ 102. Τὸ Εὐκλείδειον αἴτημα. Ὁ Ἑλλην μαθηματικὸς Εὐκλείδης¹ παρεδέχθη δτι:

1. Ὁ Εὐκλείδης φέρεται γεννηθεὶς ἐν Συρίᾳ περὶ τὸ ἔτος 330 π.Χ. Ὁ πατήρ αὐτοῦ Ναυκράτης ἀπέστειλεν αὐτὸν εἰς Ἀθήνας, διὰ νὰ

‘Απὸ ἐν σημεῖον κείμενον ἔκτος εὐθείας ἄγεται μία μόνον εὐθεῖα παράλληλος πρὸς ἑκείνην. Ἡ πρότασις αὕτη λέγεται Εὐκλείδειον αἴτημα. Ἐπ’ αὐτῷ δὲ στηρίζεται ἡ ἐν χρήσει Γεωμετρία. Διὰ τοῦτο δὲ αὕτη λέγεται Εὐκλείδειος Γεωμετρία’.

3. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΥΘΕΙΩΝ

§ 103. Πρόβλημα I. Ἀπὸ ἐν σημεῖον Z μιᾶς τῶν παραλλήλων εὐθειῶν AB καὶ $ΓΔ$ ἄγομεν τυχοῦσαν εὐθεῖαν EZ . Νὰ




ἔξετασθῇ ἂν αὗτη τέμνη ἢ
δχι τὴν ἄλλην παράλληλον
(σχ. 69).

Λύσις: Ἐν τῇ EZ δὲν ἔτεμνε τὴν ἄλλην παράλληλον $ΓΔ$, θὰ ἥγοντο ἐκ τοῦ Z δύο παράλληλοι πρὸς τὴν $ΓΔ$. Τοῦτο δὲ ἀντίκειται πρὸς τὸ

Εὐκλείδειον αἴτημα. Συμπεραίνομεν λοιπὸν δτι:

‘Ἄν εὐθεῖα τέμνῃ τὴν μίαν ἐκ δύο παραλλήλων εὐθειῶν,
θὰ τέμνῃ καὶ τὴν ἄλλην.


§ 104. Πρόβλημα II. Αἱ-
δεται εὐθεῖα EZ καὶ γράφο-
μεν δύο ἄλλας AB , $ΓΔ$ πα-
ραλλήλους πρὸς αὐτὴν καὶ εἰς
τὸ αὐτὸν ἐπίπεδον μὲν ἑκείνην.
Νὰ ἔξετασθῇ ἂν αὗται εἶναι
παράλληλοι ἢ τέμνωνται (σχ. 70).



σχ. 70

σπουδάσῃ. Ἐξ Ἀθηνῶν μετεκλήθη εἰς Ἀλεξάνδρειαν καὶ ἐδίδαξε Γεωμετρίαν καὶ Ἀριθμητικὴν σχεδὸν μέχρι τοῦ θανάτου του περὶ τὸ ἔτος 270 π.Χ. Περὶ τῶν ἔργων του θὰ γίνη λόγος βραδύτερον.

2. Οἱ νεώτεροι μαθηματικοὶ διέπλασαν καὶ δύο ἄλλα συστήματα Γεωμετρίας. Κατὰ τὸ ἐν τούτων ἀπὸ σημεῖον ἔκτος εὐθείας ἄγονται δύο παράλληλοι πρὸς αὐτήν. Τῆς Γεωμετρίας ταύτης ἰδρυτὴς εἶναι ὁ Ρῶσος μαθηματικός Lobatsheski. Κατὰ τὸ ἄλλο οὐδεμίᾳ ἀγεται παράλληλος κ.τ.λ. Ταύτης ἰδρυτὴς εἶναι ὁ Γερμανὸς μαθηματικός Riemann. Αὗται λέγονται «Μὴ Εὐκλείδειοι Γεωμετρίαι».



ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Ο ΣΤΟΙΧΕΙΩΤΗΣ

"Αν σκεφθώμεν, δπως προηγουμένως, βεβαιούμεθα ότι αἱ ΑΒ καὶ ΓΔ δὲν τέμνονται. Συμπεραίνομεν λοιπὸν ότι:

Εύθεῖαι παράλληλοι πρὸς τὴν αὐτὴν εὐθεῖαν εἰναι καὶ πρὸς ἄλληλας παράλληλοι.


§ 105. Δύο παράλληλοι εὐθεῖαι ΑΒ καὶ ΓΔ τέμνονται ύπὸ τρίτης ΕΘ (σχ. 71). Νὰ συγκριθῶσι:

α') Δύο ἀπὸ τὰς σχηματιζομένας ἐντὸς ἐκτὸς καὶ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη γωνίας.

β') Δύο ἀπὸ τὰς ἐντὸς ἐναλλάξ γωνίας.

γ') Δύο ἀπὸ τὰς ἐντὸς καὶ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη γωνίας.

α') Διὰ νὰ συγκρίνωμεν π.χ. τὰς γωνίας α καὶ β, σκεπτόμεθα ώς ἔξῆς: Νοοῦμεν ότι ἡ α τίθεται ἐπὶ τῆς β οὕτως, ὥστε ἡ κορυφὴ Ε νὰ συμπέσῃ μὲ τὴν κορυφὴν Ζ καὶ ἡ πλευρὰ ΕΖ νὰ συμπέσῃ μὲ τὴν πρό-έκτασίν της ΖΘ. "Αν δὲ ΖΔ' εἶναι ἡ νέα θέσις τῆς ΕΔ, θὰ εἶναι ἡ γωνία ΘΖΔ' = α καὶ ἐπομένως ἡ ΖΔ' εἶναι παράλληλος πρὸς τὴν ΓΔ (§ 98). Διὰ τοῦτο δὲ συμπίπτει μὲ τὴν ΖΒ, ἤτις εἶναι ἔξ



Σχ. 71

ὑποθέσεως παράλληλος πρὸς τὴν ΓΔ (§ 102). Ἐπομένως ἡ γωνία α ἐφαρμόζει ἐπὶ τῆς β. Συμπεραίνομεν λοιπὸν ότι:

"Αν δύο παράλληλοι εὐθεῖαι τμηθῶσιν ύπὸ τρίτης, αἱ σχηματιζόμεναι ἐντὸς ἐκτὸς καὶ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη γωνίαι εἰναι ἔσαι.

β') Ἐπειδὴ ἀπεδείχθη α = β, εἶναι δὲ καὶ γ = β, ἐπεται δτι α = γ. "Ητοι:

Καὶ αἱ σχηματιζόμεναι ἐντὸς ἐναλλάξ γωνίαι εἰναι ἔσαι.

γ') Ἀπὸ τὰς ἴσοτητας α = β καὶ β + δ = 2 δρθ. ἐπεται δτι α + δ = 2 δρθ. "Ητοι:

Δύο ἐντὸς καὶ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη γωνίαι εἰναι παραπληρωματικαὶ.

Πόρισμα. Πᾶσα κάθετος ἐπὶ μίαν τῶν παραλλήλων εἰναι κάθετος καὶ ἐπὶ τὴν ἄλλην.

Ασκήσεις

90. Δίδεται εύθεια AB , έκτος αὐτῆς σημείον Γ καὶ γωνία ω . Νὰ ἀχθῇ ἀπὸ τὸ Γ εύθεια, ἡ δόποια νὰ σχηματίζῃ μὲ τὴν AB μίαν γωνίαν ἵσην πρὸς τὴν ω .

91. Νὰ γράψητε δύο παραλλήλους εύθειας καὶ μίαν τέμνουσαν αὐτάς. Νὰ συγκρίνητε δέ: α') δύο ἔκτος καὶ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη γωνίας αὐτῶν, β') δύο ἔκτος ἐναλλάξ γωνίας καὶ γ') δύο ἐντὸς ἔκτος ἐναλλάξ γωνίας.


92. Νὰ γράψητε δύο παραλλήλους εύθειας καὶ μίαν τέμνουσαν αὐτάς. "Επειτα νὰ διχοτομήσητε δύο ἐντὸς ἐναλλάξ γωνίας αὐτῶν καὶ νὰ ἀποδείξητε δτὶ αἱ διχοτόμοι αὐτῶν εἰναι παράληλοι.

93. Νὰ διχοτομήσητε δύο ἐντὸς καὶ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη γωνίας τῶν προηγουμένων εύθειῶν καὶ νὰ ἀποδείξητε δτὶ αἱ διχοτόμοι εἰναι κάθετοι.

94. Νὰ διχοτομήσητε μίαν γωνίαν A καὶ ἀπὸ ἐν σημείον Δ μιᾶς τῶν πλευρῶν τῆς νὰ φέρητε παράλληλον πρὸς τὴν διχοτόμον. Νὰ ἀποδείξητε δτὶ ἡ παράλληλος αὕτη θὰ τμήσῃ τὴν προέκτασιν τῆς ἄλλης πλευρᾶς εἰς ἐν σημείον E καὶ δτὶ $AE = AD$.

3. ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΕΜΝΟΜΕΝΩΝ ΕΥΘΕΙΩΝ

§ 106. Δύο εύθειαι AB καὶ $ΓΔ$ τεμνόμεναι ὑπὸ ἄλλης EZ σχηματίζουσι δύο ἐντὸς καὶ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη γωνίας ω, φ τοιαύτας ὥστε $\omega + \varphi < 2$ δρθ. Νὰ ἔξετασθῇ ἂν αἱ εύθειαι αὗται εἰναι παράλληλοι ἢ τέμνωνται. (σχ. 72).



"Αν αἱ εύθειαι αὗται ἦσαν παράλληλοι, θὰ ἦτο $\omega + \varphi = 2$ δρθ. (§ 105 γ'), δπερ ἀντίκειται εἰς τὴν ὑπόθεσιν. "Ω-

στε αἱ εύθειαι αὗται τέμνονται.

Γεννᾶται ἡδη τὸ ζήτημα ἀπὸ ποῖον μέρος τῆς EZ τέμνονται.

Διὰ νὰ δρίσωμεν τὸ μέρος τοῦτο, παρατηροῦμεν πρῶτον δτὶ, ἐπειδὴ εἰναι $\omega + \varphi < 2$ δρθ, θὰ εἰναι $\rho + \sigma > 2$ δρθ. (§ 95).

"Επειτα σκεπτόμεθα ως ἔξῆς: "Αν ἐτέμνοντο εἰς σημείον H πρὸς τὸ μέρος τῶν γωνιῶν ρ καὶ σ , τὸ τρίγωνον HZE θὰ εἰχε δύο γωνίας ρ καὶ σ μὲ ἄθροισμα μεγαλύτερον τῶν δύο δρθῶν.

Τοῦτο δὲ εἶναι ἄτοπον (§ 87). Ἡ τομὴ λοιπὸν γίνεται πρὸς τὸ μέρος, εἰς τὸ δόποιον εἶναι αἱ γωνίαι ω καὶ φ. "Ωστε:

"Αν $\omega + \varphi < 2$ δρθ, αἱ εὐθεῖαι AB καὶ $ΓΔ$ τέμνονται πρὸς τὸ μέρος τῆς EZ , πρὸς τὸ δόποιον εὐθεῖαν εὐθεῖαν αὗται.


Τὴν ιδιότητα ταύτην χρησιμοποιοῦμεν συνήθως διὰ ἀποδείξωμεν διὰ δύο εὐθεῖαι τέμνονται, ὡς θὰ γίνη φανερὸν ἀπὸ τὰ ἀκόλουθα ἀξιοσημείωτα θεωρήματα.

§ 107. Θεώρημα I. *Αἱ διχοτόμοι τῶν γωνιῶν τριγώνου διέρχονται διὰ τοῦ αὐτοῦ σημείου.*

"Α πόδειξις. "Εστω τυχὸν τρίγωνον $ABΓ$ (σχ. 73).

"Ἐπειδὴ $B + Γ < 2$ δρθ. (§ 87), κατὰ μείζονα λόγον εἶναι $\frac{B}{2} + \frac{Γ}{2} < 2$ δρθ. Αἱ δι-


χοτόμοι λοιπὸν τῶν γωνιῶν



Σχ. 73

Β καὶ Γ τέμνονται εἰς τὸ σημεῖον D (§ 106).

"Αν δὲ $ΔE$, $ΔZ$, $ΔH$ εἶναι αἱ ἀποστάσεις τοῦ $Δ$ ἀντιστολχῶς ἀπὸ τὰς πλευρᾶς $BΓ$, AB , $AΓ$, θὰ εἶναι $ΔE = ΔZ$ καὶ $ΔE = ΔH$ (§ 91 Πόρ.). "Ἐκ τούτων δὲ ἔπειται διὰ διχοτόμου τῆς A . Καὶ αἱ τρεῖς λοιπὸν διχοτόμοι διέρχονται διὰ τοῦ $Δ$, δ.ε.δ.



Σχ. 74

ρὸν διὰ τὸ εὔθ. τμῆμα ED κεῖται ἐντὸς τῶν δρθῶν γωνιῶν $HΔB$

§ 108. Θεώρημα II. *Αἱ κάθετοι ἐπὶ τὰς πλευρὰς τριγώνου εἰς τὰ μέσα αὐτῶν διέρχονται διὰ τοῦ αὐτοῦ σημείου.*

"Α πόδειξις. "Εστωσαν $ΔH$ καὶ $EΘ$ αἱ κάθετοι εἰς τὰ μέσα δύο πλευρῶν τριγώνου $ABΓ$ (σχ. 74). Εἶναι φανερὸν διὰ τὸ εὔθ. τμῆμα ED κεῖται ἐντὸς τῶν δρθῶν γωνιῶν $HΔB$

καὶ ΘΕΒ. Ἐπομένως εἶναι ω<1 δρθ, θ<1 δρθ. καὶ ω+θ<2 δρθ.

Αἱ εύθεῖαι λοιπὸν ΔΗ καὶ ΕΘ τέμνονται εἰς τι σημεῖον Κ (§ 106).

Ἐπειδὴ δὲ KB=KG καὶ KB=KA (§ 64), ἔπειται δτι KG=KA καὶ ἐπομένως (§ 65 Πόρ. I) τὸ σημεῖον Κ κεῖται ἐπὶ τῆς καθέτου ἐπὶ τὴν πλευράν ΑΓ εἰς τὸ μέσον Ζ αὐτῆς.

Καὶ αἱ τρεῖαι λοιπὸν κάθετοι ἐπὶ τὰς πλευράς τοῦ τριγώνου εἰς τὰ μέσα αὐτῶν διέρχονται ἀπὸ τὸ σημεῖον Κ, δ.ε.δ.


§ 109. Ποία περιφέρεια λέγεται περιγεγραμμένη περὶ εὐθύγραμμον σχῆμα.

Ἄπο τὴν ἀπόδειξιν τοῦ προηγουμένου θεωρήματος γίνεται φανερὸν ὅτι KA=KB=KG.

Ἄν λοιπὸν γραφῇ περιφέρεια μὲ κέντρον Κ καὶ ἀκτῖνα KA, αὕτη θὰ διέλθῃ καὶ ἀπὸ τὰς τρεῖς κορυφὰς τοῦ τριγώνου. Λέ-

γεται δὲ αὕτη περιγεγραμμένη περὶ τὸ τρίγωνον· τοῦτο δὲ λέγεται ἐγγεγραμμένον εἰς τὴν περιφέρειαν ταύτην.

Ομοίως εἰς τὴν περιφέρειαν Κ (σχ. 75) δρίζομεν κατὰ τὴν αὐτὴν φορὰν σημεῖα A,B,Γ,Δ,Ε καὶ φέρομεν τὰς χορδὰς AB,BΓ,ΓΔ,ΔΕ,ΕΑ. Τὸ οὕτω σχηματιζόμενον εύθ. σχῆμα ΑΒΓΔΕ λέγεται ἐγγεγραμμένον εἰς τὴν περιφέρειαν Κ. Αὕτη δὲ περιγεγραμμένη περὶ τὸ ΑΒΓΔΕ. "Ωστε:



Σχ. 75

Mία περιφέρεια λέγεται περιγε-

*γραμμένη περὶ ἓν εὐθ. σχῆμα, ἢν διέρχηται ἀπὸ δλας τὰς κορυ-
φὰς αὐτοῦ.*

"Ἐν εὐθ. σχῆμα λέγεται ἐγγεγραμμένον εἰς μίαν περιφέρει-
αν, ἢν αὕτη εἶναι περιγεγραμμένη περὶ αὐτό.

"Α σκηνις

95. Νὰ κατασκευάσητε τυχὸν τρίγωνον καὶ νὰ περιγράψητε περὶ αὐτὸν περιφέρειαν.

4. ΕΦΑΡΜΟΓΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΥΘΕΙΩΝ

I. ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΥΟ ΓΩΝΙΩΝ ΜΕ ΠΛΕΥΡΑΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥΣ Η ΚΑΘΕΤΟΥΣ

§ 110. Νὰ συγκριθῶσι δύο γωνίαι, αἱ ὅποιαι ἔχουσι τὰς πλευρὰς αὐτῶν παραλλήλους, μίᾳν πρὸς μίᾳν.

α') Αἱ πλευραὶ τῶν γωνιῶν ω καὶ φ (σχ. 76) εἶναι, μίᾳ πρὸς μίᾳν, παράλληλοι καὶ ὁμόρροποι (¹).

Ἐκ τούτων ἡ EZ τέμνουσα τὴν ΕΔ τέμνει καὶ τὴν παράλληλὸν τῆς ΑΓ. Ἐπειδὴ δὲ $\omega = \rho$ καὶ $\phi = \rho$ (§ 105 α'), θά εἶναι καὶ $\omega = \phi$.

β') Αἱ προεκτάσεις τῶν πλευρῶν τῆς φ πρὸς τὸ ἄλλο μέρος τῆς κορυφῆς Ε εἶναι ἀντίρροποι πρὸς τὰς πλευρὰς τῆς ω. Ἐπειδὴ δὲ $\tau = \phi$, ἐπειταὶ δὴ καὶ $\omega = \tau$.

γ') Τὸ ἔν ζεῦγος τῶν παραλλήλων πλευρῶν τῶν γωνιῶν ω καὶ σ ἔχει ὁμορρόπους, τὸ δὲ ἄλλο ἀντίρροπους πλευράς. Εἶναι δὲ $\sigma + \phi = 2$ ὁρθός, ἐπομένως καὶ $\omega + \sigma = 2$ ὁρθός.


Βλέπομεν λοιπὸν δὴ :

"Ἄν δύο γωνίαι ἔχωσι τὰς πλευρὰς αὐτῶν παραλλήλους, μίᾳν πρὸς μίᾳν, αὗται εἶναι ἵσαι μέν, ἂν αἱ παραλλήλοι πλευραὶ εἶναι ὁμόρροποι ἢ ἀντίρροποι, παραπληρωματικαὶ δέ, ἂν αἱ μὲν δύο παραλλήλοι πλευραὶ εἶναι ὁμόρροποι, αἱ δὲ ἄλλαι ἀντίρροποι.

§ 111. Νὰ συγκριθῶσι δύο γωνίαι, ἀν αἱ πλευραὶ τῆς μιᾶς εἶναι ἀντιστοίχως κάθετοι ἐπὶ τὰς πλευρὰς τῆς ἄλλης.

α') "Ἐστωσαν πρῶτον αἱ ὅδειαι γωνίαι ω καὶ φ (σχ. 77), αἱ ὅποιαι ἔχουσι τὴν EZ κάθετον ἐπὶ τὴν ΑΓ καὶ τὴν ΕΔ κάθετον ἐπὶ τὴν ΑΒ. Φέρομεν τὰς εὐθείας ΕΘ καὶ ΕΗ παραλλήλους


1. Δύο παραλλήλοι πλευραὶ λέγονται ὁμόρροποι, ἀν κείνται πρὸς τὸ αὐτὸ μέρος τῆς εὐθείας, ἡτις διέρχεται ἀπὸ τὰς κορυφάς τῶν γωνιῶν. Ἀντίρροποι δέ, ἀν κείνται ἔκατέρωθεν αὐτῆς.



Σχ. 76

καὶ δύορρόπους ἀντιστοίχως πρὸς τὰς ΑΒ καὶ ΑΓ, ἔστω δὲ ρ
ἡ γωνία αὐτῶν καὶ σὴ γωνία ΗΕΔ.

Επειδή ή ΕΔ είναι κάθετος έπι την AB , θα είναι κάθετος και έπι την παράλληλον της ΕΘ. έπομένως είναι $\sigma + \rho = 1$ δρθ. Δι' δυοιον λόγουν είναι $\phi + \sigma = 1$ δρθ.



Σχ. 77

$\phi + \tau = 2 \delta\rho\theta$, $\omega + v = 2 \delta\rho\theta$ καὶ $\phi = \omega$, ἔπειται εὔκολως δτι $\tau = v$.

γ') Καὶ αἱ γωνίαι τοῦ καὶ ω ἔχουσι τὰς πλευράς των καθέτους, μίαν πρὸς μίαν. Ἐκ δὲ τῶν λιστήτων $\tau + \phi = 2$ δρθ καὶ $\phi = \omega$, ἐπεται δητὶ $\tau + \omega = 2$ δρθ. Βλέπομεν λοιπὸν δτι:

"Αν αἱ πλευραὶ μιᾶς γωνίας εἶναι, μία πρός μίαν, κάθετοι ἐπὶ τὰς πλευρὰς ἀλλης γωνίας, αἱ γωνίαι αὗται εἶναι ἔσαι, ἢν ἀμφότεραι εἶναι δξεῖαι ἢ ἀμφότεραι ἀμβλεῖαι, παραπληρωμα-
τικαὶ δέ, ἢν η μία εἶναι δξεῖα καὶ η ἄλλη ἀμβλεῖα.

'Ασκήσεις

96. Νὰ κατασκευάσητε δύο Ἰσας γωνίας μὲ πλευράς παραλλήλους καὶ νὰ διχοτομήσητε αὐτάς. Νὰ ἀποδείξητε δὲ ὅτι αἱ διχοτόμοι αὐτῶν εἰναι παράλληλοι.

97. Νὰ κατασκευάσητε δύο παραπληρωματικάς γωνίας μὲ παραλίγους πλευράς. Νὰ ἀποδείξητε δὲ ὅτι αἱ διχοτόμοι αὐτῶν εἰναι κάθετοι.

98. Νὰ κατασκευάσητε δύο Ἰσας γωνίας μὲ καθέτους πλευράς καὶ νὰ διχοτομήσητε αὐτάς. Νὰ ἀποδείξητε δὲ ὅτι αἱ διχοτόμοι αὐτῶν εἰναι κάθετοι.

99. Νὰ ἔργασθῆτε δημόσιως διὰ παραπληρωματικάς γωνίας μὲ κα-
θέτους πλευράς καὶ νὰ ἀποδείξητε δτι αἱ διχοτόμοι αὐτῶν εἰναι πα-
ράλληλοι.


II. ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΤΩΝ ΓΩΝΙΩΝ ΤΩΝ ΚΥΡΤΩΝ ΕΥΘ. ΣΧΗΜΑΤΩΝ

§ 112. Πρόβλημα I. Νὰ ενρεθῇ τὸ ἀθροισμα τῶν γωνιῶν τυχόντος τριγώνου $ABΓ$ (σχ. 78).

Λύσις: Ἀπὸ μίαν κορυφῆν, π.χ. ἀπὸ τὴν A , ἀγομεν εύθετην $ΔΕ$ παράλληλον πρὸς τὴν ἀπέναντι πλευρὰν $BΓ$. Παρατηροῦμεν δὲ ὅτι $ω + A + \phi = 2$ δρθ, $\omega = B$ καὶ $\phi = \Gamma$. Ἐκ τούτων δὲ ἔπειται εὐκόλως δτι: $A + B + \Gamma = 2$ δρθ.

Βλέπομεν λοιπὸν δτι:

Τὸ ἀθροισμα τῶν γωνιῶν ἐκάστου τριγώνου εἶναι 2 δρθαὶ γωνίαι.




Σχ. 78

Πόρισμα I. Αἱ δξεῖαι γωνίαι παντὸς δρθογωνίου τριγώνου εἶναι συμπληρωματικαὶ.

Πόρισμα II. Ἐκάστη ἔξωτερη γωνία τριγώνου ἰσοῦται πρὸς τὸ ἀθροισμα τῶν δύο ἐντὸς καὶ ἀπέναντι γωνιῶν αὐτοῦ.

Παρατηροῦμεν δτι $A + B + \Gamma = 2$ δρθ. καὶ $\tau + \Gamma = 2$ δρθ. (σχ. 78).

Πόρισμα III. Ἄν δύο τρίγωνα ἔχωσι δύο γωνίας ἵσας, μίαν πρὸς μίαν καὶ αἱ ἄλλαι γωνίαι αὐτῶν εἶναι ἵσαι.



Σχ. 79

§ 113. Πρόβλημα II. Νὰ ενρεθῇ τὸ ἀθροισμα τῶν γωνιῶν τυχόντος εὐθ. σχήματος.

Λύσις: Ἐστω πεντάγωνον $ΑΒΓΔΕ$ (σχ. 79). Ἄν φέρωμεν τὰς διαγωνίους $ΑΓ$ καὶ $ΑΔ$ αὐτοῦ, διαιρεῖται τοῦτο εἰς (5—2)

τρίγωνα, διότι εἰς ἑκάστην τῶν πλευρῶν του, πλὴν τῶν AB καὶ AE ἀντιστοιχεῖ ἐν τρίγωνον. Τὸ ἀθροισμα δὲ τῶν γωνιῶν τούτων εἶναι $2 \cdot (5 - 2) = (2 \cdot 5 - 4)$ δρθ, ἥτοι:

$$\zeta + B + \epsilon + \delta + \gamma + \eta + \beta + E + \alpha = (2 \cdot 5 - 4) \text{ δρθ.} \quad (1)$$

Ἐπειδὴ $\alpha + \eta + \zeta = A$, $\epsilon + \delta = \Gamma$, $\gamma + \beta = \Delta$, ἥ (1) γίνεται

$$\text{Α} + \text{Β} + \text{Γ} + \text{Δ} + \text{Ε} = (2 \cdot 5 - 4) \text{ δρθ.}$$

"Αν τὸ εύθ. σχῆμα ἔχῃ ν πλευράς, διαιρεῖται κατὰ τὸν τρόπον τοῦτον εἰς $v-2$ τρίγωνα καὶ τὸ ἄθροισμα τῶν γωνιῶν του εἶναι $2 \cdot (v-2) = (2 \cdot v - 4)$ δρθ.

'Επειδὴ δὲ καὶ $2 \cdot 3 - 4 = 2$ δρθ, τὸ προηγούμενον συμπέρασμα ἴσχυει καὶ διὰ τὰ τρίγωνα. Βλέπομεν λοιπὸν ὅτι γενικῶς:

Τὸ ἄθροισμα τῶν γωνιῶν τυχόντος εὐθ. σχήματος εἶναι τόσαι δρθαὶ γωνίαι, δσον εἶναι τὸ διπλάσιον τοῦ ἀριθμοῦ τῶν πλευρῶν, ἥλαττωμένον κατὰ 4.

Α σκήσεις

100. Νὰ εὕρητε τὸ ἄθροισμα τῶν γωνιῶν ἐνὸς τετραπλεύρου, πενταγώνου, ἑξαγώνου, ὀκταγώνου καὶ δεκαγώνου.

101. Νὰ κατασκευάσητε ἐν δρθογώνιον καὶ ισοσκελές τρίγωνον καὶ νὰ ὑπολογίσητε τὸ μέτρον ἑκάστης τῶν δξειῶν γωνιῶν αὐτοῦ.

102. "Αν εἰς ἐν τρίγωνον ΑΒΓ εἶναι $\text{AB} = \text{ΑΓ}$ καὶ $\text{A} = 23^\circ 35'$, νὰ εὕρητε τὸ μέτρον τῆς γωνίας Β καὶ τῆς Γ.

103. "Αν ἐν τρίγωνον ΑΒΓ ἔχῃ $\text{AB} = \text{ΑΓ}$ καὶ $\text{B} = 40^\circ 20' 35''$, νὰ εὕρητε τὸ μέτρον τῆς γωνίας Α αὐτοῦ.

104. "Αν ἐν τρίγωνον ΑΒΓ ἔχῃ $\text{A} = \frac{3}{4}$ δρθ καὶ $\text{B} = \frac{2}{5}$ δρθ, νὰ εὕρητε τὸ μέτρον τῆς ἑξατερικῆς γωνίας Γ αὐτοῦ.


105. Νὰ εὕρητε τὸ μέτρον ἑκάστης γωνίας ἐνὸς ισοπλεύρου τριγώνου εἰς μέρη δρθῆς καὶ εἰς μοίρας.

5. ΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΑΙ

§ 114. Πρόβλημα I. "Αν δοθῶσι δύο γωνίαι ω καὶ φ ἐνὸς τριγώνου, νὰ κατασκευασθῇ ἡ τριγωνία αὐτοῦ.

Περιορισμός. Διὰ νὰ ἔχῃ τὸ πρόβλημα λύσιν, πρέπει νὰ εἶναι $\omega + \phi < 2$ δρθ (§ 112).

Ἄνσις. Μὲ πλευράν τυχόν εύθ. τμῆμα ΒΓ καὶ κορυφάς Β καὶ Γ κατασκευάζομεν πρὸς τὸ αὐτὸ μέρος τῆς εύθείας ΒΓ δύο γωνίας Β καὶ Γ ἀντιστοίχως ίσας πρὸς τάς ω καὶ φ.



Εύκολως δὲ ἀποδεικνύομεν δτι αἱ μὴ κοιναὶ πλευραὶ αὐτῶν

τέμνονται εις ἐν σημεῖον Α καὶ ὅτι ἡ γωνία Α εἶναι ἡ ζητου-
μένη (σχ. 80).

§ 115. Πρόβλημα II. Νὰ κατασκευασθῇ τρίγωνον ἐκ μιᾶς
πλευρᾶς α καὶ τῶν προσκειμένων εἰς αὐτὴν γωνιῶν ω καὶ φ.
(σχ. 80).

Περιορισμός. Πρέπει νὰ εἶναι $\omega + \phi < 2$ δρθ.

Ἄν $B\Gamma = \alpha$, $B = \omega$ καὶ $\Gamma = \phi$, τὸ τρίγωνον $AB\Gamma$ θὰ εἶναι
τὸ ζητούμενον. Ἡ λύσις λοιπὸν εἶναι εύνόητος.

§ 116. Πρόβλημα III. Νὰ κατασκευασθῇ τρίγωνον ἐκ μιᾶς
πλευρᾶς α, μιᾶς προσκειμένης εἰς αὐτὴν
γωνίας ω καὶ τῆς ἀντικειμένης γωνίας φ.

Περιορισμός. Πρέπει νὰ εἶναι

$$\omega + \phi < 2 \text{ δρθ.}$$


Διὰ νὰ μάθωμεν τὸν τρόπον τῆς λύ-
σεως τοῦ προβλήματος τούτου, σκεπτό-
μεθα δώς ἔξης:

Ἔστω ὅτι τὸ ζητούμενον τρίγωνον
εἶναι τὸ $AB\Gamma$ (σχ. 81) καὶ ὅτι ἔχει $B\Gamma = \alpha$,
 $B = \omega$ καὶ $A = \phi$.

Ἄν δὲ φέρωμεν τὴν ΔE παράλληλον
πρὸς τὴν $A\Gamma$, γίνεται τὸ τρίγωνον ΔBE .
Τοῦτο ἔχει $B = \omega$, $B\Delta E = A = \phi$ Ἐπειδὴ
δὲ ἡ πλευρὰ $B\Delta$ εἶναι τυχοῦσα, ἵτο δυ-
νατὸν νὰ κατασκευάσωμεν τοῦτο καὶ ἀπὸ τὴν ἀρχήν, χωρὶς
δηλ. νὰ μεσολαβήσῃ τὸ ἄγνωστον $AB\Gamma$.

Ἄν δὲ ἔπειτα ἐπὶ τῆς εὐθείας BE δρίσωμεν τμῆμα $B\Gamma = \alpha$,
δρίζομεν τὴν κορυφὴν Γ . Διὰ νὰ δρισθῇ δὲ ἡ κορυφὴ A , ἀρκεῖ
νὰ ἀχθῇ ἀπὸ τὸ Γ παράλληλος πρὸς τὴν ΔE , ἔως ὅτου συναν-
τήσῃ τὴν $B\Delta$. Ὁδηγούμεθα λοιπὸν εἰς τὴν ἔξης λύσιν:

Κατασκευάζομεν γωνίαν B ἵσην πρὸς τὴν ω καὶ μὲ κορυφὴν
τυχὸν σημεῖον Δ τῆς μιᾶς πλευρᾶς αὐτῆς καὶ ἐντὸς τῆς B κατα-
σκευάζομεν γωνίαν $B\Delta E$ ἵσην πρὸς τὴν ϕ . Ἐπειτα ἐπὶ τῆς
εὐθείας BE δρίζομεν τμῆμα $B\Gamma$ ἵσον πρὸς τὸ δοθὲν α καὶ ἐκ



Σχ. 81

τοῦ Γ ἄγομεν παράλληλον πρὸς τὴν ΔΕ, μέχρις οὗ τμήσῃ τὴν ΒΔ εἰς τὶ σημεῖον Α.

Εύκόλως δὲ ἀποδεικνύομεν ὅτι τὸ σχηματιζόμενον τρίγωνον ΑΒΓ εἶναι τὸ ζητούμενον.

Σημείωσις. "Αν κατασκευάσωμεν τὴν γ' γωνίαν τοῦ ζητουμένου τριγώνου, ἀνάγομεν τὸ πρόβλημα εἰς τὸ προηγούμενον.

'Ασκήσεις

106. Νὰ κατασκευασθῇ ἡ γωνία τῆς κορυφῆς ἐνὸς ισοσκελοῦς τριγώνου, ἢν δοθῇ ἡ παρὰ τὴν βάσιν γωνία αὐτοῦ.

107. "Αν δοθῇ ἡ γωνία τῆς κορυφῆς ισοσκελοῦς τριγώνου, νὰ κατασκευασθῇ ἡ παρὰ τὴν βάσιν γωνία αὐτοῦ.

108. Νὰ κατασκευασθῇ δρθιογώνιον τρίγωνον, ἢν δοθῇ μία κάθετος πλευρὰ καὶ μία δξεῖα γωνία αὐτοῦ.

'Ασκήσεις πρὸς ἔπανάληψιν τοῦ Ε' κεφαλαίου

109. Ἀπὸ ἐν σημεῖον Β τῆς μιᾶς πλευρᾶς γωνίας Α νὰ φέρητε παράλληλον πρὸς τὴν ἀλλήν πλευράν καὶ νὰ δρίσητε ἐπ' αὐτῆς τμῆμα $\text{ΒΔ} = \text{ΑΒ}$ ἐντὸς τῆς γωνίας κείμενον. Νὰ ἀποδείξητε δὲ ὅτι ἡ εύθεια ΑΔ διχοτομεῖ τὴν Α.

110. "Αν τὸ τμῆμα ΒΔ, διὰ τὸ δοποῖον διμιλεῖ ἡ προηγουμένη ἀσκησις, εἶναι ἐκτὸς τῆς γωνίας Α, νὰ ἀποδείξητε ὅτι ἡ ΑΔ διχοτομεῖ τὴν παραπληρωματικὴν τῆς γωνίας Α.

111. Ἀπὸ τὸ κοινὸν σημεῖον τῶν διχοτόμων τῶν γωνιῶν τριγώνου ΑΒΓ νὰ φέρητε εύθειαν ΘΛ παράλληλον πρὸς τὴν ΒΓ . "Αν αὕτη τέμνῃ τὴν πλευράν ΑΒ εἰς τὸ Θ καὶ τὴν ΑΓ εἰς τὸ Λ, νὰ ἀποδείξητε δὲ $\text{ΘΛ} = \text{ΒΘ} + \text{ΓΛ}$ (σχ. 73).

112. Νὰ διχοτομήσητε τὰς γωνίας Β καὶ Γ τυχόντος τριγώνου ΑΒΓ . "Αν δὲ Δ εἴναι τὸ κοινὸν σημεῖον τῶν διχοτόμων αὐτῶν, νὰ ἀποδείξητε δὲ $\widehat{\text{ΒΔΓ}} = 1 \text{ δρθ.} + \frac{\text{Α}}{2}$.

113. Νὰ διχοτομήσητε τὰς ἔξωτερικὰς γωνίας Β καὶ Γ τυχόντος τριγώνου ΑΒΓ . Νὰ ἀποδείξητε δὲ αἱ διχοτόμοι αὐτῶν τέμνονται. "Αν δὲ Ε εἴναι τὸ κοινὸν σημεῖον αὐτῶν, νὰ ἀποδείξητε δὲ $\widehat{\text{ΒΕΓ}} = 1 \text{ δρθ.} - \frac{\text{Α}}{2}$.

114. Νὰ ἀποδείξητε δὲ: "Η διχοτόμος τῆς ἔξωτερικῆς γωνίας ισοσκελοῦς τριγώνου, ἥτις κεῖται ἀπέναντι τῆς βάσεως αὐτοῦ, εἶναι παράλληλος πρὸς τὴν βάσιν.

115. "Αν ἡ διχοτόμος τῆς ἔξωτερικῆς γωνίας Α εἶναι παράλληλος

πρὸς τὴν πλευρὰν ΒΓ, νά̄ ἀποδείξητε ὅτι τὸ τρίγωνον ΑΒΓ εἰναῑ
ἴσοσκελές.

116. Νὰ κατασκευάσητε ἐν ἴσοσκελὲς τρίγωνον, ἢν δοθῆ ἡ βάσις
καὶ ἡ παρ' αὐτὴν γωνία του.

117. Νὰ κατασκευάσητε ἐν ἴσοσκελὲς τρίγωνον, ἢν δοθῆ ἡ βάσις
καὶ ἡ ἀπέναντι αὐτῆς γωνία.

118. Νὰ κατασκευάσητε ἐν ἴσσοκελὲς τρίγωνον, ἢν δοθῆ τὸ ೦ψος
καὶ ἡ παρὰ τὴν βάσιν γωνία του.

119. Νὰ κατασκευάσητε ἐν ἴσοσκελὲς τρίγωνον, ἢν δοθῆ τὸ ೦ψος
καὶ ἡ ἀπέναντι τῆς βάσεως γωνία αὐτοῦ.

120. Νὰ κατασκευασθῇ ἐν δρθιογώνιον τρίγωνον, ἢν δοθῆ ἡ ὑπο-
τείνουσα καὶ μία δξεῖα γωνία αὐτοῦ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'



1. ΤΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΑ

§ 117. Ποῖα είναι τὰ εῖδη τῶν τετραπλεύρων. α') "Αν γράψωμεν δύο παραλλήλους εύθειας AB , $\Delta\Gamma$ καὶ τμήσωμεν αὐτὰς μὲ ἄλλας δύο παραλλήλους εύθειας AD , $B\Gamma$, σχηματίζεται ἐν τετράπλευρον

$AB\Gamma\Delta$ (σχ. 82). Τοῦτο, Δ

ώς ἔχον τὰς ἀπέναντι πλευράς παραλλήλους, λέγεται ἴδιαιτέρως **παραλληλόγραμμον**. Όμοιοι


ως σχηματίζομεν καὶ τὸ παραλληλόγραμμον $EZH\Theta$. "Ωστε:



Σχ. 82

Παραλληλόγραμμον λέγεται πᾶν τετράπλευρον, τὸ δποῖον ἔχει τὰς ἀπέναντι πλευράς παραλλήλους.

β') "Αν δύο παραλλήλους εύθειας AB , $\Delta\Gamma$ τμήσωμεν μὲ δύο ἄλλας AD καὶ $B\Gamma$ μὴ παραλλήλους, σχηματίζεται ἐν τετράπλευρον $AB\Gamma\Delta$ (σχ. 83), τὸ δποῖον ἔχει δύο μόνον παραλλήλους πλευράς. Τοῦτο λέγεται ἴδιαιτέρως **τραπέζιον**. "Ωστε:



Σχ. 83


Τραπέζιον λέγεται πᾶν τετράπλευρον, τὸ δποῖον ἔχει δύο μόνον παραλλήλους πλευράς.

"Αν δύο παραλλήλους εύθειας AB καὶ $\Delta\Gamma$ τμήσωμεν διὰ πλαγίας πρὸς αὐτὰς εύθειας AD , δυνάμεθα διὰ τοῦ διαβήτου νὰ τμήσωμεν αὐτὰς καὶ δι' ἄλλης $B\Gamma$ μὴ παραλλήλου πρὸς τὴν AD καὶ τοιαύτης, ὥστε νὰ είναι $AD=BG$. Τὸ τραπέζιον, τὸ δποῖον σχηματίζομεν τοιουτορόπως, λέγεται ἴδιαιτέρως **ἰσοσκελὲς τραπέζιον**. "Ωστε:

"Ἐν τραπέζιον λέγεται ἴσοσκελές, ἀν αἱ μὴ παραλλήλοι πλευραὶ αὐτοῦ εἰναι ἵσαι.

γ') "Αν δύο μὴ παραλλήλους εύθειας ΙΚ, ΜΛ τμήσωμεν ύπό δύο ἄλλων ἐπίσης μὴ παραλλήλων εύθειών ΙΜ, ΚΛ, σχηματίζεται ἐν τετράπλευρον ΙΚΛΜ (σχ. 84). Τούτο δὲν ἔχει παραλλήλους πλευράς, λέγεται δὲ τραπέζοειδές." Ωστε:

"Ἐν τετράπλευρον λέγεται τράπεζοειδές, ἀν δὲν ἔχῃ παραλλήλους πλευράς.



2. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΩΝ

§ 118. Εἰς παραλληλόγραμμον ΕΖΗΘ ἄγεται μία διαγώνιος ΖΘ. Νὰ συγκριθῶσι τὰ τρίγωνα, εἰς τὰ διαιρεῖται αὐτὸς (σχ. 82).

Προφανῶς τὰ τρίγωνα ΕΖΘ, ΖΗΘ ἔχουσι τὴν ΘΖ κοινήν, $\omega = \phi$ καὶ $\rho = \beta$. Εἶναι ἄρα ἵσα. "Ωστε:

'Εκατέρα διαγώνιος παραλληλογράμμου διαιρεῖται αὐτὸς εἰς δύο ἵσα τρίγωνα.

§ 119. Νὰ συγκριθῶσι πρὸς ἀλλήλας αἱ ἀπέναντι πλευραὶ παραλληλογράμμου καὶ ἔπειτα αἱ ἀπέναντι γωνίαι αὐτοῦ (σχ. 82).

α') 'Επειδὴ τὰ τρίγωνα ΕΖΘ καὶ ΖΗΘ εἶναι ἵσα, ἔπειται δτὶ :

$$\text{EZ} = \text{ZH} \text{ καὶ } \text{E}\theta = \text{Z}\theta \text{ καὶ } \text{E} = \text{H}.$$

β') 'Επειδὴ δὲ $E + \theta = 2 \delta\theta$, $Z + H = 2 \delta\theta$, ἔπειται δτὶ :

$$E + \theta = Z + H \text{ καὶ } \text{ἐπομένως } \theta = Z.$$

Βλέπομεν λοιπὸν δτὶ :


Αἱ ἀπέναντι πλευραὶ παραλληλογράμμου εἶναι ἵσαι καὶ αἱ ἀπέναντι γωνίαι αὐτοῦ εἶναι ἐπίσης ἵσαι.

Πόρισμα I. "Αν μία γωνία παραλληλογράμμου εἶναι δρυῆ, καὶ αἱ ἄλλαι γωνίαι αὐτοῦ εἶναι δρυῖαι.

Πόρισμα II. "Αν δύο προσκείμεναι πλευραὶ παραλληλογράμμου εἶναι ἵσαι, δλαι αἱ πλευραὶ αὐτοῦ εἶναι ἵσαι.

Πόρισμα III. Παραλλήλα εὐθ. τμήματα, τὰ διοῖτα περιέχονται μεταξὺ παραλλήλων εὐθειῶν, εἶναι ἵσαι.

Πόρισμα IV. Τὰ μεταξὺ παραλλήλων εὐθειῶν περιεχόμενα τμῆματα καθέτων ἐπὶ ταύτας εὐθειῶν εἶναι ἔστι.



Σχ. 85

Ἄπο τὰς προφανεῖς ἴσοτητας $AB = \Delta\Gamma$, $\omega = \phi$, $\tau = \rho$ ἐννοοῦμεν διτὶ $AE = EG$ καὶ $\Delta E = EB$. Ὡστε:

Αἱ διαγώνιοι παραλληλογράμμου διχοτομοῦνται.

§ 121. Στοιχεῖα παραλληλογράμμων καὶ τραπεζίων.
Ἐμάθομεν (§ 105 Πόρ.) διτὶ: "Αν εύθεια $A\Gamma$ (σχ. 86) εἶναι κάθετος ἐπὶ μίαν τῶν παραλλήλων εὐθειῶν AB , $\Gamma\Delta$, θὰ εἶναι κάθετος καὶ ἐπὶ τὴν ἄλλην. Γνωρίζομεν δὲ (§ 63 β') διτὶ τὸ τμῆμα $A\Gamma$ εἶναι μικρότερον παντὸς ἄλλου GE πλαγίου πρὸς αὐτὰς καὶ μεταξὺ αὐτῶν περιεχομένου. Διὰ τοῦτο:

Τὸ μεταξὺ δύο παραλλήλων εὐθειῶν περιεχόμενον τμῆμα τυχούσης κοινῆς καθέτου αὐτῶν λέγεται ἀπόστασις τῶν παραλλήλων τούτων.


Βάσις παραλληλογράμμου λέγεται μία τυχοῦσα πλευρὰ αὐτοῦ.

"Ψως παραλληλογράμμου λέγεται ἡ ἀπόστασις τῆς βάσεως ἀπὸ τὴν ἀπέναντι πλευρᾶν αὐτοῦ.

Βάσεις τραπεζίου λέγονται αἱ παράλληλοι πλευραὶ αὐτοῦ.

"Ψως τραπεζίου λέγεται ἡ ἀπόστασις τῶν βάσεων αὐτοῦ.

Διάμεσος τραπεζίου λέγεται ἡ ἀπόστασις τῶν μέσων τῶν μὴ παραλλήλων πλευρῶν αὐτοῦ.



Σχ. 86

Ασκήσεις

121. Μία πλευρά παραλληλογράμμου είναι 15 μέτρα, ή δὲ περίμετρος 70 μέτρα. Νὰ εὕρητε τὰ μήκη τῶν πλευρῶν του.

122. Μία γωνία παραλληλογράμμου είναι $\frac{3}{5}$ δρθῆς. Νὰ εὕρητε τὰ μέτρα τῶν διλλῶν γωνιῶν αὐτοῦ.

123. Μία γωνία παραλληλογράμμου είναι $35^\circ 20' 40''$. Νὰ εὕρητε τὰ μέτρα τῶν διλλῶν γωνιῶν.

124. Νὰ κατασκευάσητε παραλληλόγραμμον ἀπὸ δύο προσκειμένας πλευράς καὶ ἀπὸ τὴν γωνίαν αὐτῶν.

125. "Ἄν αἱ διχοτόμοι δύο ἀπέναντι γωνιῶν παραλληλογράμμου δὲν συμπίπτωσι, ν' ἀποδείξητε ὅτι αὗται εἰναι παράλληλοι.

126. Νὰ διχοτομήσητε δύο γωνίας παραλληλογράμμου, αἱ διποῖαι πρόσκεινται εἰς μίαν πλευρὰν αὐτοῦ. Νὰ ἀποδείξητε δὲ ὅτι αἱ διχοτόμοι αὐτῶν εἰναι κάθετοι.

127. Νὰ ουγκρίνητε τὴν ἀπόστασιν τῶν μέσων δύο ἀπέναντι πλευρῶν παραλληλογράμμου πρὸς μίαν ἀπὸ τὰς διλλὰς πλευράς.

3. ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΩΝ

§ 122. "Ἄν ἐν τετραπλευρον ἔχῃ τὰς ἀπέναντι πλευρὰς ἵσας ἢ τὰς ἀπέναντι γωνίας ἵσας, νὰ ἔξετασθῇ ἂν εἶναι παραλληλογράμμον ἢ δχι.


α') Τὰ τρίγωνα EZΘ, ΘZH (σχ. 87) ἔχουσι τὴν ZΘ κοινὴν καὶ EZ=ΘH, ΕΘ=ZH κατὰ τὴν ύποθεσιν. "Ἔχουσι λοιπὸν $\omega = \phi$ καὶ $\rho = \beta$. "Ενεκα τούτων αἱ ἀπέναντι πλευραὶ τοῦ τετραπλεύρου εἰναι παράλληλοι.

β') "Ἄν E=H, Θ=Z (σχ. 87), θὰ εἶναι καὶ E+Θ=H+Z. Επειδὴ δὲ $(E+\Theta)+(H+Z)=4$ δρθ, ἔπειται ὅτι $E+\Theta=2$ δρθ.

καὶ $E+Z=2$ δρθ. "Ενεκα τούτων αἱ ἀπέναντι πλευραὶ εἰναι παράλληλοι. Συμπεραίνομεν λοιπὸν ὅτι :

"Ἄν αἱ ἀπέναντι πλευραὶ ἢ αἱ ἀπέναντι γωνίαι τετραπλεύρου εἶναι ἵσαι, τοῦτο εἶναι παραλληλόγραμμον.

Πόρισμα I. "Ἄν αἱ πλευραὶ τετραπλεύρου εἶναι διαι ἵσαι, τοῦτο εἶναι παραλληλόγραμμον.



Σχ. 87


Πόρισμα II. "Αν αἱ γωνίαι τετραπλεύρου εἰναι δλαι δρθαι,
τοῦτο εἰναι παραλληλόγραμμον.

§ 123. Ἐπὶ δύο παραλλήλων εὐθειῶν δρίζομεν δύο ἵσα
τμήματα EZ, HΘ (σχ. 87). Νὰ ἔξετασθῇ ἂν τὸ τετράπλευρον
EZHΘ εἰναι παραλληλόγραμμον ἢ δχι.

Παρατηροῦμεν ὅτι $\omega = \phi$ καὶ συμπεραίνομεν εύκόλως ὅτι
 $E\Theta = ZH$. Κατὰ δὲ τὴν ἀνωτέρω (§ 122 α') ἰδιότητα συμπεραί-
νομεν ὅτι:

"Αν δύο πλευραὶ τετραπλεύρου εἰναι ἵσαι καὶ παραλληλοι,
τοῦτο εἰναι παραλληλόγραμμον.

§ 124. "Αν αἱ διαγώνιοι τετραπλεύρου διχοτομοῦνται, νὰ ἔ-
ξετασθῇ, ἂν τοῦτο εἰναι παραλληλόγραμμον ἢ δχι
(σχ. 88).



σχ. 88

Ἄπὸ τὴν προφανῆ
ἰσότητα τῶν τριγώνων
 AEB , $\Delta EΓ$ ἔπειται ὅτι
 $AB = \Delta \Gamma$ καὶ $\phi = \omega$. Ἐκ
δὲ τῆς β' τούτων συνά-
γεται ὅτι αἱ πλευραὶ AB

καὶ $\Delta \Gamma$ εἰναι παραλληλοι. Κατὰ δὲ τὴν προηγουμένην ἰδιότητα
συμπεραίνομεν ὅτι:

"Αν αἱ διαγώνιοι τετραπλεύρου διχοτομοῦνται, τοῦτο εἰναι
παραλληλόγραμμον.

Ασκήσεις

128. Δίδονται δύο εὐθ. τμήματα δ καὶ δ'. Νὰ κατασκευάσητε πα-
ραλληλόγραμμον, τοῦ δποιου μία διαγώνιος νὰ ισοῦται πρὸς τὸ δ, ἥ
ἄλλη πρὸς τὸ δ' καὶ ἡ γωνία τῶν διαγώνιών τούτων νὰ εἰναι 45° .

129. Νὰ δρίσητε τὰ μέσα τῶν ήμισεων τῶν διαγώνιών ἐνὸς παραλ-
ληλογράμμου καὶ νὰ κατασκευάσητε τὸ τετράπλευρον, τὸ δποιον
ἔχει κορυφάς τὰ μέσα ταῦτα. Νὰ ἔξετάσητε δέ, ἂν τοῦτο εἰναι παραλ-
ληλόγραμμον ἢ δχι.

130. Νὰ δρίσητε τὰ μέσα E, Z τῶν ἀπέναντι πλευρῶν AB, $\Delta \Gamma$
παραλληλογράμμου ABΓΔ. "Επειτα νὰ γράψητε τὰ εὐθ. τμήματα AZ,
ΔE καὶ νὰ ἀποδείξητε ὅτι ταῦτα διχοτομοῦνται.

4. ΕΙΔΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΩΝ

§ 125. α') Όρθιογώνια παραλληλόγραμμα. "Αν τιμήσωμεν δύο παραλλήλους εύθειας AB καὶ $\Delta\Gamma$ διὰ δύο καθέτων πρὸς αὐτὰς εύθειῶν $A\Delta$, $B\Gamma$, σχηματίζεται τὸ παραλληλόγραμμὸν $AB\Gamma\Delta$ (σχ. 89). Επειδὴ δὲ ὅλαι αἱ γωνίαι αὐτοῦ εἰναι ὀρθαὶ, τοῦτο λέγεται δρθιογώνιον παραλληλόγραμμον ἢ ἀπλῶς δρθιογώνιον.

Καὶ τὸ EZHΘ εἰναι ὀρθιογώνιον "Ωστε:

Σχ. 89

"Αν πᾶσαι αἱ γωνίαι παραλληλογράμμου εἰναι ὀρθαὶ, τοῦτο λέγεται δρθιογώνιον παραλληλόγραμμον ἢ ἀπλῶς δρθιογώνιον (¹).

Εἶναι φανερὸν δὴ βάσις καὶ ὑψος ἐνδὲ δρθιογωνίου εἰναι αἱ δύο προσκείμεναι πλευραὶ αὐτοῦ. Μαζὶ δὲ αὗται λέγονται διαστάσεις τοῦ δρθιογωνίου.

Τοῦ δρθιογωνίου EZHΘ ὅλαι αἱ πλευραὶ εἰναι ἵσαι. Τοῦτο λέγεται ἴδιαιτέρως τετράγωνον. "Ωστε:


Τετράγωνον εἰναι δρθιογώνιον, τοῦ δποίου ὅλαι αἱ πλευραὶ εἰναι ἵσαι. (²)

β') Ρόμβος. Τὸ παραλληλόγραμμὸν IKLM (σχ. 90) ἔχει ἵσας ὅλαις πλευράς του αἱ γωνίαι δμως αὐτοῦ δὲν εἰναι ὀρθαὶ. Τοῦτο ἴδιαιτέρως λέγεται ῥόμβος. "Ωστε:


Ρόμβος εἰναι παραλληλόγραμμον, τοῦ δποίου αἱ πλευραὶ εἰναι ὅλαι, αἱ δὲ γωνίαι δὲν εἰναι ὀρθαὶ.

1. Κατὰ τὴν § 119 Πόρ. I ἀρκεῖ νὰ εἰναι ἡ μία γωνία τοῦ παραληλογράμμου ὀρθή.

2. Κατὰ τὴν § 119 Πόρ. II ἀρκεῖ νὰ εἰναι ἵσαι αἱ διαστάσεις τοῦ δρθιογωνίου.



Σχ. 90



γ') Ρομβοειδές. Αἱ προσκείμεναι πλευραὶ ΑΒ, ΑΔ τοῦ παραλληλογράμμου ΑΒΓΔ (σχ. 88) εἶναι ἄνισοι· αἱ δὲ γωνίαι αὐτοῦ δὲν εἶναι δρθαί. Τοῦτο ἰδιαιτέρως λέγεται ρομβοειδές. Καὶ τὸ ΕΖΗΘ (σχ. 87) εἶναι ρομβοειδές. "Ωστε:

Ρομβοειδές εἶναι παραλληλόγραμμον, τοῦ δποίου αἱ προσκείμεναι πλευραὶ εἶναι ἄνισοι, αἱ δὲ γωνίαι δὲν εἶναι δρθαί.

§ 126. Ἰδιαιτεραι ἰδιότητες τῶν ὁρθογωνίων καὶ ρόμβων. Τὰ δρθογώνια καὶ οἱ ρόμβοι, πλὴν τῶν γενικῶν ἰδιοτήτων τῶν παραλληλογράμμων, ἔχουσι καὶ τὰς ἀκολούθους ἰδιότητας. Τούτων αἱ ἀποδείξεις γίνονται εύκόλως ὑπό τῶν μαθητῶν.

Θεώρημα I. *Αἱ διαγώνιοι παντὸς ὁρθογωνίου εἶναι ἔσαι.*

"Αντιστρόφως: "Αν αἱ διαγώνιοι παραλληλογράμμου εἶναι ἔσαι, τοῦτο εἶναι ὁρθογώνιον.

Θεώρημα II. "Αν πᾶσαι αἱ πλευραὶ παραλληλογράμμου εἶναι ἔσαι, αἱ διαγώνιοι αὐτοῦ τέμνονται καθέτως καὶ διχοτομοῦσι τὰς γωνίας του.

"Αντιστρόφως: "Αν αἱ διαγώνιοι παραλληλογράμμου τέμνονται καθέτως ἢ διχοτομοῦσι τὰς γωνίας του, δλαι αἱ πλευραὶ αὐτοῦ εἶναι ἔσαι.

Πόρισμα I. *Αἱ διαγώνιοι παντὸς τετραγώνου εἶναι ἔσαι, τέμνονται καθέτως καὶ διχοτομοῦσι τὰς γωνίας του.*

Πόρισμα II. "Αν αἱ διαγώνιοι παραλληλογράμμου εἶναι ἔσαι καὶ τέμνονται καθέτως, τοῦτο εἶναι τετράγωνον.

Πόρισμα III. "Αν αἱ διαγώνιοι παραλληλογράμμου εἶναι ἔσαι καὶ διχοτομοῦσι τὰς γωνίας του, τοῦτο εἶναι τετράγωνον.

'Α σκήσεις

131. Νὰ δρίσητε τὰς δύμοιότητας, αἱ δποῖαι ὑπάρχουσι:

α') Μεταξὺ τετραγώνου καὶ ρόμβου.

β') Μεταξὺ τετραγώνου καὶ ἄλλου δρθογωνίου.

γ') Μεταξὺ δρθογωνίου καὶ ρομβοειδοῦς.

δ') Μεταξὺ ρόμβου καὶ ρομβοειδοῦς.

132. Νὰ δρίσητε τὰς διαφοράς, αἱ δποῖαι ὑπάρχουσι μεταξὺ τῶν προηγουμένων σχημάτων, ως ἀνὰ δύο ἀνεγράφησαν.

133. Νὰ συγκρίνητε τάς γωνίας, τάς δποίας ἑκάστη πλευρά δρθο-γωνίου σχηματίζει μὲ τάς διαγωνίους αύτοῦ.

134. "Αν μία διαγώνιος δρθογωνίου σχηματίζῃ μὲ μίαν πλευράν γωνίαν $25^{\circ} 20' 30''$, νὰ υπολογίσητε τά μέτρα τῶν γωνιῶν τῶν διαγωνίων αύτοῦ.

135. Νὰ γράψητε δύο διαμέτρους κύκλου καὶ τάς χορδάς τῶν τόξων, εἰς τὰ δποία διαιρεῖται ὡπ' αὐτῶν ἡ περιφέρεια. Νὰ ἀποδείξητε δὲ ὅτι τὸ ὡπ' αὐτῶν ἀποτελούμενον εὐθ. σχῆμα εἶναι δρθογώνιον.

136. Νὰ κατασκευάσητε τετράγωνον ἀπὸ τὴν διαγώνιον αύτοῦ.


137. Νὰ κατασκευάσητε ρόμβον ἀπὸ τάς διαγωνίους αύτοῦ.

5. ΕΦΑΡΜΟΓΑΙ ΤΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΩΝ

§ 127. Θεώρημα I. "Αν τμήματα εὐθείας περιεχόμενα μεταξὺ παραλλήλων εὐθειῶν εἶναι ἵσα, καὶ τὰ μεταξὺ τῶν αὐτῶν παραλλήλων περιεχόμενα τμήματα πάσης ἀλλης εὐθείας εἶναι ἵσα

"Αν π. χ. $AG = GK$, θὰ εἶναι καὶ $B\Delta = \Delta Z$ (σχ. 91).

"Α πόδειξις. Φέρομεν τάς εὐθείας AH , $\Gamma\Theta$ παραλλήλους πρὸς τὴν E' . Αὗται δὲ εἶναι καὶ πρὸς ἀλλήλας παράλληλοι καὶ ἔνεκα τούτου εἶναι $\sigma = \tau$.



Σχ. 91


'Επειδὴ δὲ εἶναι καὶ $AG = GK$ καὶ $\phi = \omega$, εύκόλως ἐννοοῦμεν δτι $AH = \Gamma\Theta$. 'Εκ τούτων δὲ καὶ τῶν $AH = B\Delta$, $\Gamma\Theta = \Delta Z$ (§ 119 Πόρ. III) ἔπειται δτι $B\Delta = \Delta Z$, δ.ε.δ.

Πόρισμα I. "Αν ἐκ τοῦ μέσου μιᾶς πλευρᾶς τριγώνου ἀχθῆ παράλληλος πρὸς ἄλλην πλευρὰν αὐτοῦ, αὕτη διέρχεται καὶ ἀπὸ τὸ μέσον τῆς τρίτης πλευρᾶς αὐτοῦ.


Πόρισμα II. Τὸ εὐθ. τμῆμα, τὸ δποῖον ὁρίζεται ἀπὸ τὰ μέσα δύο πλευρῶν τριγώνου, εἶναι παράλληλον πρὸς τὴν τρίτην πλευρὰν καὶ ἰσοῦται πρὸς τὸ ἥμισυ αὐτῆς (σχ. 92).

Πόρισμα III. "Η διάμεσος δρθογωνίου τριγώνου, ἡ δποία

ἀγεται ἀπὸ τὴν κορυφὴν τῆς δρόμης γωνίας, λσοῦται πρὸς τὸ ἥμισυ τῆς ὑποτεινούσης αὐτοῦ (σχ. 93).



Σχ. 92



Σχ. 93

Παρατηροῦμεν ὅτι ἡ ἐκ τοῦ μέσου Δ τῆς ὑποτεινούσης ἀγομένη παράλληλος πρὸς τὴν ΑΒ τέμνει δίχα καὶ καθέτως τὴν ΑΓ.

§ 128. Πρόβλημα. Νὰ διαιρεθῇ δοθὲν εὐθ. τμῆμα ΑΒ εἰς τρία ἴσα μέρη (σχ. 94).


"Εστω ὅτι $AZ = ZH = HB$.

"Αν φέρωμεν τυχοῦσαν εὐθεῖαν ΑΕ καὶ παραλλήλους εὐθείας BE, HD, ZG , θὰ εἶναι

$$AG = GD = DE \text{ (§ 127).}$$


"Αντιστρόφως: "Αν $AG = GD = DE$, θὰ εἶναι καὶ $AZ = ZH = HB$. Εκ τούτων ἔννοοῦμεν τὴν ἔξῆς λύσιν:

"Αγομεν τυχοῦσαν εὐθεῖαν ΑΕ διάφορον τῆς ΑΒ καὶ δριζομεν ἐπ' αὐτῆς ἴσα διαδοχικά τμήματα AG, GD, DE . Φέρομεν ἔπειτα τὴν EB καὶ τὰς παραλλήλους πρὸς αὐτὴν εὐθείας ZG, DH . Οὕτως εἶναι $AZ = ZH = HB$.



Σχ. 95

τὸ δποῖον ἀπέχει ἀπὸ ἐκάστην κορυφὴν τὰ $\frac{2}{3}$ τῆς ἀντιστοίχου διαμέσου.



Σχ. 94

"Εστωσαν ΑΙ, ΒΕ, ΓΔ αἱ διάμεσοι τριγώνου ΑΒΓ (σχ. 95) Παρατηροῦμεν πρῶτον ὅτι $\widehat{\text{ΕΒΓ}} + \widehat{\text{ΔΓΒ}} < 2$ δρθ. καὶ συμπεραίνομεν ὅτι αἱ διάμεσοι ΒΕ καὶ ΓΔ τέμνονται εἰς τὸ σημεῖον Θ, τὸ δόποιον κεῖται ἐντὸς τοῦ τριγώνου (§ 106). "Αν δὲ Ζ καὶ Η εἶναι τὰ μέσα τῶν τμημάτων ΒΘ καὶ ΓΘ, τὸ εύθ. τμῆμα ΖΗ εἶναι παράλληλον πρὸς τὴν πλευράν ΒΓ καὶ ἵσον πρὸς $\frac{ΒΓ}{2}$ (§ 127 Πόρ. II). Ἐπειδὴ δὲ καὶ τὸ τμῆμα ΔΕ ἔχει τὰς αὐτὰς ίδιοτητας, ἔπειται ὅτι τὸ τετράπλευρον ΖΗΕΔ εἶναι παραλλήλογραμμον. Ἐπομένως $\Delta\Theta = \ThetaΗ = ΗΓ = ΓΖ = ΖΒ$.

$$\text{Εἶναι λοιπὸν } \Gamma\Theta = \Gamma\Delta \cdot \frac{2}{3} \text{ καὶ } \text{Β}\Theta = \text{ΒΕ} \cdot \frac{2}{3}.$$

'Ἐπειδὴ ὅμως ἡ ΓΔ ἔληφθη κατὰ τύχην, θὰ πρέπη καὶ ἡ ΑΙ νὰ τέμνῃ τὴν ΒΕ εἰς ἓν σημεῖον, τὸ δόποιον ἀπέχει ἀπὸ τὸ Β τὰ $\frac{2}{3}$ τῆς ΒΕ· τοῦτο δὲ εἶναι τὸ Θ. Ἀποδεικνύομεν δὲ ἐπίσης ὅτι καὶ $\text{Α}\Theta = \text{ΑΙ} \cdot \frac{2}{3}$. "Ωστε καὶ αἱ τρεῖς διάμεσοι διέρχονται ἀπὸ τὸ Θ καὶ εἶναι $\text{Α}\Theta = \text{ΑΙ} \cdot \frac{2}{3}$, $\text{Β}\Theta = \text{ΒΕ} \cdot \frac{2}{3}$ καὶ $\Gamma\Theta = \Gamma\Delta \cdot \frac{2}{3}$.

Α σκήσεις

138. Νὰ ὀρίσητε τὰ μέσα τῶν πλευρῶν ἐνὸς τετραπλεύρου καὶ νὰ κατασκευάσητε τὸ τετράπλευρον, τὸ δόποιον ἔχει κορυφάς αὐτά. Νὰ ἔξετασητε δὲ τὶ εἴδους τετράπλευρον εἶναι τοῦτο.

139. Νὰ γράψητε τὰ εύθ. τμῆματα, τὰ δόποια δρίζονται ἀπὸ τὰ μέσα τῶν ἀπέναντι πλευρῶν ἐνὸς τετραπλεύρου καὶ νὰ συγκρίνητε τὰ τμῆματα, εἰς τὰ δόποια τὸ καθὲν διαιρεῖται ἀπὸ τὸ ἄλλο.

140. Νὰ ὀρίσητε τὰ μέσα τῶν πλευρῶν ἐνὸς τετραγώνου καὶ νὰ ἀποδείξητε ὅτι ταῦτα εἶναι κορυφαὶ δρθογωνίου.

141. Νὰ ὀρίσητε τὰ μέσα τῶν πλευρῶν ἐνὸς ρόμβου καὶ νὰ ἀποδείξητε ὅτι ταῦτα εἶναι κορυφαὶ δρθογωνίου.

142. Νὰ γράψητε τὴν εύθειαν, ἡ δόποια διέρχεται ἀπὸ τὰ μέσα δύο ἀπέναντι πλευρῶν ἐνὸς παραλληλογράμμου καὶ ἐν τυχόν εύθ. τμῆμα, τὸ δόποιον καταλήγει εἰς τὰς ἄλλας πλευράς αὐτοῦ. Νὰ συγκρίνητε δὲ τὰ τμῆματα, εἰς τὰ δόποια τοῦτο διαιρεῖται ὑπὸ τῆς πρώτης εύθειας.


143. Νὰ ὀρίσητε ἐν εύθ. τμῆμα τ καὶ νὰ κατασκευάσητε ἐν τετράγωνον μὲ περίμετρον τ.

144. Νὰ κατασκευάσητε ισόπλευρον τρίγωνον μὲ περίμετρον διθὲν εύθ. τμῆμα τ.

'Ασκήσεις πρὸς ἐπανάληψιν τοῦ ΣΤ' κεφαλαίου

145. Ἀπὸ ἐν σημεῖον Δ τῆς βάσεως ἐνὸς ισοσκελοῦς τριγώνου νὰ φέρητε παραλλήλους πρὸς τὰς ἄλλας πλευρὰς αὐτοῦ. Νὰ ἀποδείξητε ὅτι τὸ σχηματιζόμενον παραλληλόγραμμον ἔχει σταθερὰν περίμετρον, ἥτοι ἀνεξάρτητον ἀπὸ τὴν θέσιν τοῦ Δ ἐπὶ τῆς βάσεως.

146. Νὰ κατασκευάσῃτε δύο παραλληλόγραμμα ΑΒΓΔ καὶ ΕΖΗΘ, τὰ ὁποῖα νὰ ἔχωσιν $A = E$, $AB = EZ$ καὶ $AD = EH$. Νὰ ἀποδείξητε δὲ ὅτι ταῦτα εἰναι ἴσα.



Σχ. 96

ληλος πρὸς τὰς βάσεις καὶ ἴση πρὸς τὸ ήμιάθροισμα αὐτῶν.

149. Νὰ γράψητε ἐν εὐθ. τμῆμα, τὸ δοποῖον νὰ καταλήγῃ εἰς τὰς βάσεις ἐνὸς τραπεζίου καὶ νὰ συγκρίνητε τὰ τμήματα, εἰς τὰ δοποῖα χωρίζεται τοῦτο ἀπὸ τὴν διάμεσον αὐτοῦ.


150. Νὰ ἀποδείξητε ὅτι τὸ εὐθ. τμῆμα, τὸ δοποῖον ὀρίζουσι τὰ μέσα τῶν διαγωνίων ἐνὸς τραπεζίου, εἰναι παράλληλον πρὸς τὰς βάσεις καὶ ἴσον πρὸς τὴν ἡμιδιαφορὰν αὐτῶν.

151. Μὲ διάμετρον τὴν ὑποτείνουσαν ἐνὸς ὀρθογωνίου τριγώνου νὰ γράψητε περιφέρειαν κύκλου καὶ νὰ ἀποδείξητε ὅτι αὕτη διέρχεται ἀπὸ τὴν κορυφὴν τῆς ὀρθῆς γωνίας.

152. Νὰ ἀποδείξητε ὅτι: "Αν δύο διάμεσοι τριγώνου εἰναι ἴσαι, τὸ τρίγωνον τοῦτο εἰναι ισοσκελές.

153. Νὰ γράψητε τὴν διχοτόμον τῆς γωνίας Α ἐνὸς τριγώνου ΑΒΓ καὶ νὰ φέρητε ἐκ τῆς κορυφῆς Β κάθετον ἐπὶ τὴν διχοτόμον ταύτην. "Αν δὲ Ε εἰναι ὁ ποὺς τῆς καθέτου ταύτης καὶ Ζ τὸ μέσον τῆς πλευρᾶς ΒΓ, νὰ ἀποδείξητε ὅτι τὸ τμῆμα EZ εἰναι παράλληλον πρὸς τὴν ΑΓ καὶ ἴσον πρὸς τὴν ἡμιδιαφορὰν τῶν πλευρῶν ΑΒ καὶ ΑΓ.

154. Δύο ἀδελφοὶ ἐκληρονόμησαν ἐν παραλληλόγραμμον οἰκόπεδον, τὸ δοποῖον ἔχει τὴν πλευρὰν ΑΒ παράλληλον πρὸς δημοσίαν ὁδόν, ἡ



Σχ. 97

δποια διέρχεται πρὸ αὐτοῦ. Πῶς θὰ γίνη δικαία διανομὴ αὐτοῦ μεταξὺ τῶν ἀδελφῶν τούτων;

155. Εἰς μίαν πεδιάδα ὑπάρχει λόφος Λ, τὸν ὁποῖον πρόκειται νὰ διασχίσῃ εὑθεῖα σιδηροδρομική γραμμὴ ΑΒΓΔ. Πῶς ὁ μηχανικὸς θὰ χαράξῃ τὴν προέκτασιν ΓΔ αὐτῆς διπισθεν τοῦ λόφου, πρὶν γίνη ἡ διάτρησις αὐτοῦ; (σχ. 96).

156. Νὰ ἵχνογραφήσητε τὸ σχῆμα 97, τὸ ὁποῖον μία δεσποινὶς πρόκειται νὰ κεντήσῃ εἰς ἓν τραπεζομάνδηλον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ

ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΕΝ ΕΠΙΠΕΔΩ


I. ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΟΝ

§ 130. Ποια σημεία ή σχήματα λέγονται συμμετρικά πρὸς κέντρον. Γνωρίζομεν δτι, ἂν MM' εἶναι διάμετρος περιφερείας K , εἶναι $KM = KM'$. Διὰ τοῦτο τὰ σημεῖα M, M' λέγονται συμμετρικά ἀλλήλων πρὸς τὸ κέντρον K .

Γενικώτερον. "Αν AA' εἶναι τυχόν εύθ. τμῆμα καὶ O τὸ

μέσον αὐτοῦ, τὰ σημεῖα A καὶ A' λέγονται συμμετρικά ἀλλήλων πρὸς τὸ σημεῖον O (σχ. 98). "Ωστε:

Δύο σημεῖα A, A' λέγονται συμμετρικά πρὸς ἄλλο σημεῖον O , ἂν τοῦτο διχοτομῇ τὴν ἀπόστασιν AA' . Τὸ δὲ σημεῖον O λέγεται κέντρον συμμετρίας. "Αν τὸ εύθ. τμῆμα OA στραφῇ περὶ τὸ κέντρον συμμετρίας O κατὰ 180° , θὰ ἐφαρμόσῃ ἐπὶ τοῦ OA' , τὸ δὲ A θὰ συμπέσῃ μὲ τὸ συμμετρικὸν αὐ-



Σχ. 98

τοῦ A' .

Κατὰ ταῦτα, ἂν δρισθῇ ἐν κέντρον συμμετρίας ἐν τῷ ἐπὶ-πέδῳ σχήματος $ABΓΔ$, ἔκαστον σημεῖον τοῦ σχήματος τούτου ἔχει συμμετρικὸν ἐν σημεῖον τοῦ αὐτοῦ ἐπιπέδου. Π.χ. τοῦ A συμμετρικὸν εἶναι τὸ A' , τοῦ B τὸ B' κ.τ.λ.

Τὸ σύνολον τῶν συμμετρικῶν τούτων σημείων ἀποτελεῖ σχῆμα $A'B'Γ'D'$. Τοῦτο λέγεται συμμετρικὸν τοῦ $ABΓΔ$ πρὸς κέντρον O .

Εἶναι δὲ εύνόητον δτι καὶ τὸ $ABΓΔ$ εἶναι συμμετρικὸν τοῦ $A'B'Γ'D'$ πρὸς τὸ αὐτὸ κέντρον O . Διὰ τοῦτο τὰ σχήματα

ΑΒΓΔ, Α'Β'Γ'Δ' λέγονται συμμετρικά διλήλων ή απλώς συμμετρικά πρόσ κέντρον Ο. "Ωστε :

Δύο σχήματα λέγονται συμμετρικά πρόσ κέντρον, όταν έκαστον σημείον του διαστήματος είναι συμμετρικόν του άλλου πρόσ το αυτό κέντρον.

Τό συμμετρικόν τυχόντος σημείου περιφερείας Κ πρός κέντρον συμμετριας τό Κ είναι σημεῖον της αύτης περιφερείας. 'Επομένως συμμετρικόν της περιφερείας πρός Κ είναι ή ίδια περιφέρεια. Διὰ τὸν λόγον τοῦτο τὸ Κ λέγεται κέντρον συμμετρίας της περιφερείας. "Ωστε :

"Ἐν σημεῖον λέγεται κέντρον συμμετρίας σχήματος, ὅταν τὸ σχῆμα τοῦτο είναι συμμετρικόν ἐαυτοῦ πρός τὸ σημεῖον τοῦτο.

§ 131. Νὰ συγκριθῶσι τὰ πρόσ κέντρον συμμετρικά σχήματα.

"Εστωσαν ΑΒΓΔ καὶ Α'Β'Γ'Δ' δύο σχήματα συμμετρικά πρός κέντρον Ο (σχ. 98).

"Ἄς νοήσωμεν διτὶ τὸ σχῆμα ΟΑΒΓΔ στρέφεται περὶ τὸ Ο ἐν τῷ αὐτῷ πάντοτε ἐπιπέδῳ καὶ μέχρις οὗ ἡ ΟΑ διαγράψῃ γωνίαν 180° καὶ εύρεθῇ ἐπὶ τῆς ΟΑ'. 'Ἐπειδὴ δὲ ἡ γωνία ΑΟΒ ἰσοῦται πρός τὴν Α'ΟΒ', μένει δὲ καὶ ἀμετάβλητος κατὰ τὴν στροφήν, ἡ ΟΒ θά ἐφαρμόσῃ ἐπὶ τῆς ΟΒ'. 'Ομοίως ἐννοοῦμεν διτὶ ἡ ΟΓ θά ἐφαρμόσῃ ἐπὶ τῆς ΟΓ', ἡ ΟΔ ἐπὶ τῆς ΟΔ' κ.τ.λ. 'Ἐπειδὴ δὲ είναι καὶ ΟΑ=ΟΑ', ΟΒ=ΟΒ', ΟΓ=ΟΓ' κ.τ.λ., τὰ σημεῖα Α,Β,Γ κ.τ.λ. θά συμπέσωσιν ἀντιστοίχως μὲ τὰ Α', Β', Γ' κ.τ.λ. Τό δὲ σχῆμα ΑΒΓΔ ἐφαρμόζει ἐπὶ τοῦ Α'Β'Γ'Δ'. Συμπεραίνομεν λοιπὸν διτὶ :

Τὰ πρόσ κέντρον συμμετρικά ἐπίπεδα σχήματα είναι ἕσα.

'Α σκήνεις

157. Νὰ σχηματίσητε τὸ συμμετρικόν ἐνδὲ δρθογωνίου τριγώνου πρός κέντρον τὴν κορυφὴν τῆς δρθῆς γωνίας αὐτοῦ.

158. Νὰ σχηματίσητε τὸ συμμετρικόν ἐνδὲ δρθογωνίου τριγώνου πρός κέντρον τὸ μέσον τῆς ύποτεινούσης αὐτοῦ.

159. Νὰ σχηματίσητε τὸ συμμετρικόν ἐνδὲ ἰσοσκελοῦς τριγώνου πρός κέντρον τὴν κορυφὴν αὐτοῦ.


160. Νὰ δρίσητε ἐν σημείον ἔκτος δοθείσης εύθείας καὶ νὰ ἀπὸ δεῖξῃτε ὅτι τὸ συμμετρικὸν αὐτῆς πρὸς αὐτὸν εἶναι εύθεῖα παράλληλος πρὸς αὐτήν.

161. Νὰ δρίσητε τὸ συμμετρικὸν ἐνὸς παραλλήλογράμμου πρὸς κέντρον τὸ κοινὸν σημεῖον τῶν διαγωνίων αὐτοῦ. Ποῖον συμπέρασμα περὶ τοῦ σημείου τούτου προκύπτει ἀπὸ τὴν λύσιν τοῦ προβλήματος τούτου;

162. Νὰ προεκτείνητε ἑκάστην διάμεσον τυχόντος τριγώνου πέραν τοῦ ποδὸς αὐτῆς καὶ κατὰ τμῆμα ἵσον πρὸς τὸ $\frac{1}{3}$ αὐτῆς. Νὰ ἀποδείξητε δὲ ὅτι τὰ ἄκρα τῶν προεκτάσεων τούτων εἶναι κορυφαὶ τριγώνου ἵσαι πρὸς τὸ πρῶτον.

2. ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΠΡΟΣ ΑΞΟΝΑ

§ 132. Ποία σημεῖα ἢ σχήματα λέγονται συμμετρικὰ πρὸς ἄξονα. "Ἐστω AA' ἐν εὐθ. τμῆμα καὶ χψ εύθεῖα κάθετος ἐπ' αὐτὸν καὶ εἰς τὸ μέσον του. Τὰ ἄκρα A καὶ A' αὐτοῦ λέγονται συμμετρικὰ ἀλλήλων ἢ ἀπλῶς συμμετρικὰ πρὸς τὴν εύθειαν χψ (σχ. 99).



Σχ. 99

"Η δὲ εύθεῖα χψ λέγεται ἄξων συμμετρίας.

"Ομοίως τὰ B , B' εἶναι συμμετρικὰ πρὸς τὸν αὐτὸν ἄξονα χψ. "Ωστε:

Δύο σημεῖα λέγονται συμμετρικὰ πρὸς εὐθεῖαν, ἐν αὐτῇ τέμνη δίχα καὶ καθέτως τὴν ἀπόστασιν αὐτῶν.

Εἶναι δὲ φανερὸν ὅτι ἔκαστον σημεῖον τοῦ ἄξονος εἶναι συμμετρικὸν αὐτοῦ.

"Ο ἄξων χψ διαιρεῖ τὸ ἐπίπεδον αὐτοῦ καὶ τοῦ σημείου A εἰς δύο μέρη. "Ἄς νοήσωμεν ὅτι τὸ μέρος $A\chi\psi$ στρέφεται περὶ τὸν ἄξονα χψ, ἔως ὅτου πέσῃ ἐπὶ τὸ μέρος $A'\chi\psi$. "Ἐπειδὴ κατὰ τὴν στροφὴν ταύτην ἡ $A\alpha$ μένει διαρκῶς κάθετος ἐπὶ τὴν χψ, θὰ ἐφαρμόσῃ ἐπὶ τῆς $\alpha A'$. "Ἐπειδὴ δὲ εἶναι καὶ $A\alpha = \alpha A'$, τὸ A θὰ συμπέσῃ μὲ τὸ συμμετρικὸν του A' .

"Ἐστω ἥδη τυχὸν εὐθ. σχῆμα ABG . "Έκαστον σημεῖον αὐ-

τοῦ ἔχει ἐν συμμετρικὸν πρὸς τὸν ἄξονα χψ. Τὸ σύνολον τῶν συμμετρικῶν τούτων σημείων ἀποτελεῖ εὐθ. σχῆμα Α'Β'Γ'. Τοῦτο λέγεται συμμετρικὸν τοῦ ΑΒΓ πρὸς ἄξονα συμμετρίας χψ.

Διὰ τὸν αὐτὸν λόγον καὶ τὸ ΑΒΓ εἶναι συμμετρικὸν τοῦ Α'Β'Γ' πρὸς τὸν αὐτὸν ἄξονα χψ. Διὰ τοῦτο δὲ τὰ σχήματα ΑΒΓ καὶ Α'Β'Γ' λέγονται συμμετρικὰ ἀλλήλων ἢ ἀπλῶς συμμετρικὰ πρὸς ἄξονα χψ. "Ωστε :

Δύο σχήματα λέγονται συμμετρικὰ πρὸς ἄξονα, ἀν ἔκαστον σημεῖον ἐνάστον εἶναι συμμετρικὸν ἐνδὲ σημείου τοῦ ἄλλου πρὸς τὸν ἄξονα τοῦτον.

'Επειδὴ ἡ κάθετος εἰς τὸ μέσον χορδῆς εἶναι διάμετρος, ἐννοοῦμεν δτι τὸ συμμετρικὸν τυχόντος σημείου τῆς περιφερείας πρὸς μίαν διάμετρον αὐτῆς εἶναι σημεῖον τῆς αὐτῆς περιφερείας. 'Έκ τούτου δὲ ἔπειτα δτι :

Συμμετρικὸν σχῆμα περιφερείας πρὸς μίαν διάμετρον αὐτῆς εἶναι ἡ ἴδια περιφέρεια.

Διὰ τοῦτο ἔκάστη διάμετρος περιφερείας λέγεται ἄξων συμμετρίας αὐτῆς. "Ωστε :

Μία εὐθεῖα λέγεται ἄξων συμμετρίας ἐνὸς σχήματος, ἀν τὸ σχῆμα τοῦτο εἶναι συμμετρικὸν ἐαυτοῦ πρὸς τὴν εὐθεῖαν ταύτην.

§ 133. Νὰ συγκριθῶσι δύο συμμετρικὰ πρὸς ἄξονα σχήματα.

"Αν ἐν σχήμα, π.χ. τὸ ΑΒΓ, στραφῇ περὶ τὸν ἄξονα συμμετρίας χψ, μέχρις οὖ ἡ Αα ἐφαρμόσῃ ἐπὶ τῆς αΑ', ώς προηγουμένως εἴπομεν, τὰ σημεῖα ΑΒΓ κ.τ.λ. θὰ συμπέσωσι μὲ τὰ συμμετρικὰ των Α', Β', Γ' κ.τ.λ., τὸ δὲ σχῆμα ΑΒΓ θὰ ἐφαρμόσῃ μὲ τὸ Α'Β'Γ'. Συμπεραίνομεν λοιπόν δτι :

Τὰ πρὸς ἄξονα συμμετρικὰ σχήματα εἶναι ἴσα.

'Α σ κ ή σ ε ις

163. Νὰ γράψητε εὐθεῖαν παράλληλον πρὸς δοθέντα ἄξονα καὶ νὰ δρίσητε τὸ συμμετρικὸν αὐτῆς πρὸς τὸν ἄξονα τοῦτον.

164. Νὰ γράψητε μίαν εὐθεῖαν μὴ παράλληλον πρὸς δοθέντα ἄξονα. Νὰ δρίσητε τὸ συμμετρικὸν αὐτῆς πρὸς τὸν ἄξονα τοῦτον καὶ νὰ ἀπο-


δείξητε ὅτι αἱ συμμετρικαὶ αὖται εὐθεῖαι τέμνουσιν αὐτὸν εἰς τὸ αὐτὸν σημεῖον. Ἐπειτα δὲ νὰ συγκρίνητε τὰς γωνίας τῶν εὐθειῶν τούτων μὲ τὸν ἀξονα.

165. Μὰ ἀποδείξητε ὅτι τὸ ὄψος ἴσοσκελοῦς τριγώνου εἶναι ἀξων συμμετρίας αὐτοῦ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η

I. ΘΕΣΣΕΙΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΚΥΚΛΟΝ

§ 134. Εἰς τὰ ἐπόμενα προβλήματα θὰ παριστῶμεν μὲ τὸ Ρ τὴν ἀκτῖνα κύκλου K καὶ θὰ ὀνομάζωμεν $K\Gamma$ τὴν ἀποστάσιν τοῦ κέντρου K ἀπὸ ὀρισμένην εὐθεῖαν AB . Διὰ νὰ ἔννοησωμεν δὲ πόσας καὶ ποίας θέσεις δύνανται νὰ ἔχωσι πρὸς ἄλληλα τὰ σχήματα ταῦτα, θὰ λύσωμεν τὰ ἀκόλουθα προβλήματα.



Σχ. 100

§ 135. Πρόβλημα I. Νὰ εὑρεθῇ δὲ ἀριθμὸς τῶν κοινῶν σημείων εὐθείας AB καὶ κύκλου K , ἀν $K\Gamma > P$ (σχ. 100).


Ἐπειδὴ $K\Gamma > P$, δὲ ποὺς Γ κεῖται ἐκτὸς τοῦ κύκλου K . Ἀν δὲ E εἶναι τυχὸν ἄλλο σημεῖον τῆς εὐθείας AB , θὰ εἶναι $KE > K\Gamma$ καὶ κατὰ μείζονα λόγον θὰ εἶναι $KE > P$. Ἐπομένως καὶ τὸ E κεῖται ἐκτὸς τοῦ κύκλου K .

Συμπεραίνομεν λοιπὸν ὅτι:

“Ἀν $K\Gamma > P$, ἡ εὐθεῖα καὶ δὲ κύκλος οὐδὲν ἔχουσι κοινὸν σημεῖον.

Ἐίναι δὲ φανερὸν ὅτι:

“Ἀν κύκλος καὶ εὐθεῖα οὐδὲν ἔχωσι κοινὸν σημεῖον, δὲ ποὺς Γ θὰ κεῖται ἐκτὸς τοῦ κύκλου καὶ ἐπομένως $K\Gamma > P$.



Σχ. 101

§ 136. Πρόβλημα II. Νὰ εὑρεθῇ δὲ ἀριθμὸς τῶν κοινῶν σημείων κύκλου K καὶ εὐθείας AB , ἀν $K\Gamma = P$ (σχ. 101).

Ἐπειδὴ $K\Gamma = P$, δὲ ποὺς Γ κεῖται ἐπὶ τῆς περιφερείας K .

Είναι λοιπόν τοῦτο κοινὸν σημεῖον τῆς ΑΒ καὶ τοῦ κύκλου Κ.
"Αν δὲ Δ είναι τυχὸν ἄλλο σημεῖον τῆς ΑΒ, θὰ εἰναι ΚΔ > ΚΓ
ἢ ΚΔ < Ρ 'Επομένως τὸ Δ κεῖται ἐκτὸς τοῦ κύκλου Κ. "Ωστε:

"*Αν ΚΓ = P, ή εὐθεῖα καὶ διάμετρος ἔχουσιν ἐν μόνον κοινῷ σημεῖον.*

"Αντιστροφῶς: "Αν ἡ εὐθεῖα καὶ διάμετρος ἔχουσιν ἐν μόνον κοινὸν σημεῖον Γ, τοῦτο θὰ εἰναι προφανῶς σημεῖον τῆς περιφερείας καὶ θὰ εἰναι ΚΓ = P. 'Επειδὴ πᾶν ἄλλο σημεῖον Δ τῆς εὐθείας κεῖται ἐκτὸς τοῦ κύκλου, θὰ εἰναι ΚΔ > Ρ καὶ ἐπομένως ΚΓ < ΚΔ. 'Εκ ταύτης ἐπεται δτι ΚΓ εἰναι ἡ ἀπόστασις τοῦ κέντρου ἀπὸ τὴν αὐτὴν εὐθεῖαν (§ 63 'Αντ.). "Ωστε:

"*Αν εὐθεῖα καὶ κύκλος ἔχουσιν ἐν μόνον κοινῷ σημεῖον, ή ἀπόστασις τοῦ κέντρου ἀπὸ τὴν εὐθεῖαν εἰναι ἵση πρὸς τὴν ἀκτῖνα.*


§ 137. Τί εἰναι ἐφαπτομένη κύκλου. Ἡ εὐθεῖα ΑΒ (σχ. 101), η δποία ἔχει μὲ τὸν κύκλον Κ ἐν μόνον κοινὸν σημεῖον, λέγεται ἐφαπτομένη τοῦ κύκλου ἢ τῆς περιφερείας αὐτοῦ. Τὸ δὲ κοινὸν σημεῖον Γ ἐφαπτομένης καὶ περιφερείας λέγεται σημεῖον ἐπαφῆς.

"Απὸ δσα δὲ εἴπομεν προηγουμένως ἐννοοῦμεν εὔκλως δτι:

α') "Η ἀκτῖς, η δποία καταλήγει εἰς τὸ σημεῖον ἐπαφῆς, εἰναι κάθετος ἐπὶ τὴν ἐφαπτομένην. 'Αντιστρόφως:

β') "Η κάθετος ἐπὶ μίαν ἀκτῖνα εἰς τὸ ἀκρον αὐτῆς εἰναι ἐφαπτομένη τῆς περιφερείας. 'Επομένως:

γ') "Απὸ ἔκαστον σημεῖον περιφερείας ἀγεται μία μόνον ἐφαπτομένη ταύτης.



Σχ. 102

§ 138. Πρόβλημα III. Νὰ εὑρεθῇ διάμετρος τῶν κοινῶν σημείων εὐθείας καὶ περιφερείας, ἀν ΚΓ < Ρ (σχ. 102).

Λύσις: "Επειδὴ ΚΓ < Ρ, δι ποὺς Γ κεῖται ἐντὸς τοῦ κύκλου. Ἡ ἀπέραντος λοιπὸν εὐθεῖα χψ διερχομένη διὰ τοῦ Γ κατὰ τὴν ἔξοδόν της ἀπὸ τὸν πεπερασμένον κύκλον θὰ συναν-

τήση κατ' ἀνάγκην τὴν περιφέρειαν καὶ ἀπὸ τὰ δύο μέρη, ἥτοι εἰς δύο σημεῖα Α καὶ Β· διότι περισσότερα κοινὰ σημεῖα μὲ αὐτὴν δὲν δύναται νὰ ἔχῃ (§ 63 Πόρ. II). Συμπεραίνομεν λοιπὸν δτι:

"Αν ΚΓ < P, ή εὐθεῖα καὶ ή περιφέρεια ἔχουσι δύο κοινά σημεῖα.

'Αντιστρόφως: "Αν εὐθεῖα χψ καὶ περιφέρεια Κ ἔχωσι δύο κοινὰ σημεῖα Α καὶ Β, τὰ εὐθύγραμμα τμήματα ΚΑ, ΚΒ θὰ εἶναι ἀκτῖνες καὶ ἐπομένως ἴσαι. Εἶναι λοιπὸν ἀμφότεραι πλάγιαι πρὸς τὴν ΑΒ· ή δὲ κάθετος ΚΓ θὰ εἶναι μικροτέρα ἐκατέρας, ἥτοι ΚΓ < P.

Σημείωσις. Οἱ μαθηταὶ ὅς ἀποδείξωσι τὴν ἀλήθειαν τῶν δύο τούτων συμπερασμάτων καὶ διὰ τῆς εἰς ἄτοπον ἀπαγωγῆς.

**Α σκήσεις*

166. Νὰ γράψητε τὴν ἐφαπτομένην περιφερείας εἰς ὁρισμένον σημεῖον αὐτῆς.

167. Νὰ γράψητε μίαν διάμετρον κύκλου καὶ τὰς ἐφαπτομένας εἰς τὰ ἀκρα αὐτῆς. Νὰ ἔξετάσητε δὲ ἂν αῦται τέμνωνται ή εἶναι παράλληλοι.

168. Νὰ καθορίσητε τὴν θέσιν τῆς βάσεως ἐνὸς ισοσκελοῦς τριγώνου πρὸς τὴν περιφέρειαν, ή δποία γράφεται μὲ κέντρον τὴν κορυφὴν καὶ ἀκτῖνα τὸ ὑψος τοῦ τριγώνου τούτου.

169. Νὰ γράψητε δύο καθέτους ἀκτῖνας ἐνὸς κύκλου καὶ τὰς ἐφαπτομένας εἰς τὰ ἀκρα αὐτῶν. Νὰ εὕρητε δὲ τὸ μέτρον τῆς γωνίας τῶν ἐφαπτομένων τούτων.

170. Νὰ γράψητε εἰς δοθεῖσαν περιφέρειαν ἐφαπτομένην παράλληλον πρὸς δοθεῖσαν εὐθείαν.


171. Εἰς δοθεῖσαν περιφέρειαν νὰ γράψητε δύο πλαγίας ἀκτῖνας καὶ τὰς ἐφαπτομένας εἰς τὰ ἀκρα αὐτῶν. Νὰ εὕρητε δὲ ποία σχέσις ὑπάρχει μεταξὺ τῆς γωνίας τῶν ἐφαπτομένων τούτων καὶ τῆς γωνίας τῶν ἀκτίνων.

2. ΘΕΣΙΣ ΔΥΟ ΜΗ ΟΜΟΚΕΝΤΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

§ 139. Διάκεντρος δύο περιφερειῶν. Ἡ εὐθεῖα, ή δποία διέρχεται ἀπὸ τὰ κέντρα δύο περιφερειῶν, λέγεται **διάκεντρος αὐτῶν.**

§ 140. Πρόβλημα. Πόσαι περιφέρειαι διέρχονται από τρία σημεῖα A, B, Γ μὴ κείμενα ἐπ' εύθειας. (σχ. 103).

Λύσις: Ἐπειδὴ τὰ σημεῖα A, B, Γ δὲν κείνται ἐπ' εύθειας, εἶναι κορυφαὶ τριγώνου. Ἐμάθομεν δὲ (§ 109) ὅτι περιγράφεται περὶ αὐτὸς περιφέρεια, ἡτοι διὰ τῶν σημείων A, B, Γ διέρχεται μία περιφέρεια. Τὸ κέντρον δὲ K ταύτης εἶναι κοινὸν σημεῖον τῶν εὐθειῶν ΔZ , EH , αἱ δόποιαι εἶναι ἀντιστοίχως κάθετοι ἐπὶ τὰς πλευρὰς AB καὶ $B\Gamma$ εἰς τὰ μέσα αὐτῶν (§ 65 Πόρ. II).



Σχ. 103

"Ἄν δὲ καὶ ἄλλη περιφέρεια K διήρχετο ἀπὸ τὰ σημεῖα A, B, Γ , θά ἦτο $K'A = K'B$ καὶ $K'B = K\Gamma$. "Ενεκα τούτων τὸ κέντρον K' θά ἦτο κοινὸν σημεῖον τῶν εὐθειῶν ΔZ καὶ EH , δπερ ἀδύνατον, διότι αὐταὶ πλὴν τοῦ K οὐδὲν ἄλλο κοινὸν σημεῖον ἔχουσι. Βλέπομεν λοιπὸν ὅτι:

'Απὸ τρία σημεῖα, τὰ δόποια δὲν κείνται ἐπ' εύθειας, διέρχεται περιφέρεια καὶ μία μόνον.


Πόρισμα. Δύο περιφέρειαι δὲν δύνανται νὰ ἔχωσι τρία κοινὰ σημεῖα.

Γεννᾶται δὲ τώρα τὸ ἀκόλουθον ἐρώτημα:

§ 141. Υπάρχουσι δύο περιφέρειαι ἔχουσαι δύο ή ἓν κοινὸν σημεῖον;

Διὰ νὰ ἀπαντήσωμεν εἰς τὸ ἐρώτημα τοῦτο ἐργαζόμεθα ὡς ἔξῆς:

Γράφομεν μίστια περιφέρειαν K καὶ δρίζομεν ἐπ' αὐτῆς ἐν σημεῖον A (σχ. 104). "Ἄν δὲ Λ εἶναι τυχὸν ἄλλο σημεῖον τοῦ ἐπιπέδου αὐτῆς, εἶναι φανερὸν ὅτι ἡ περιφέρεια, ἡ δόποια ἔχει κέντρον Λ καὶ ἀκτῖνα ΛA , διέρχεται ἀπὸ τὸ A . Εἶναι



Σχ. 104


λοιπόν τοῦτο κοινὸν σημεῖον τῶν περιφεριῶν Κ καὶ Λ (σχ. 104).

Διὰ νὰ ἔωμεν δὲ ἄν αὐται ἔχωσιν ἡ μὴ καὶ ἄλλο κοινὸν σημεῖον, διακρίνομεν τὰς ἀκολούθους περιπτώσεις :


α') "Αν τὸ Α κεῖται ἐκτὸς τῆς διακέντρου ΚΛ. Εἰς τὴν περίπτωσιν ταύτην τὸ Α' συμμετρικὸν τοῦ Α πρὸς τὴν ΚΛ εἶναι διάφορον ἀπὸ τὸ Α. Ἐπειδὴ δὲ ἡ εὐθεῖα ΚΛ εἶναι ἄξων συμμετρίας καὶ τῶν δύο περιφερειῶν Κ καὶ Λ (§ 132), τὸ Α' κεῖται καὶ εἰς τὰς δύο ταύτας περιφερείας. Βλέπομεν λοιπόν ὅτι:

"Αν δύο περιφέρειαι ἔχωσι κοινὸν σημεῖον ἐκτὸς τῆς διακέντρου αὐτῶν, θὰ ἔχωσι κοινὸν καὶ τὸ συμμετρικὸν αὐτοῦ πρὸς τὴν διακέντρον." Ωστε :

Εἶναι δυνατὸν δύο περιφέρειαι νὰ ἔχωσι δύο κοινὰ σημεῖα.



(α')



(β')

Σχ. 105

β') "Αν τὸ Α κεῖται ἐπὶ τῆς διακέντρου (σχ. 105). Εἰς τὴν περίπτωσιν ταύτην συμμετρικὸν τοῦ Α πρὸς τὴν ΚΛ εἶναι παλιν τὸ Α. "Αν δὲ αἱ περιφέρειαι εἶχον καὶ ἄλλο κοινὸν σημεῖον Β ἐκτὸς τῆς διακέντρου, θὰ εἶχον κοινὸν καὶ τὸ Β' συμμετρικὸν αὐτοῦ πρὸς τὴν ΚΛ. Θὰ εἶχον δῆλον τρία κοινὰ σημεῖα, δῆπερ ἀδύνατον (§ 140 Πόρ.). Οὕτε δὲ ἐπὶ τῆς διακέντρου ΚΛ ὑπάρχει ἄλλο κοινὸν σημεῖον. Διότι ἐκ τῶν σημείων τῆς ΚΛ μόνον τὸ Α καὶ τὸ ἐκ διαμέτρου ἀντίθετον αὐτοῦ Α' κεῖνται ἐπὶ τῆς περιφερείας Κ. "Αν δὲ καὶ τὸ Α' ἔκειτο ἐπὶ τῆς περιφερείας Λ, αἱ δύο περιφέρειαι θὰ εἶχον κοινὴν τὴν διάμετρον ΑΑ' καὶ θὰ ἐταυτίζοντο. Βλέπομεν λοιπόν ὅτι:

"Αν δύο περιφέρειαι ἔχωσιν ἐν κοινὸν σημεῖον τῆς διακέντρου αὐτῶν, οὐδὲν ἄλλο κοινὸν σημεῖον δύνανται νὰ ἔχωσιν." Ωστε :

Είναι δυνατὸν δύο περιφέρειαι νὰ ἔχωσιν ἐν μόνον κοινὸν σημεῖον.

Στηριζόμενοι δὲ εἰς τὰ προηγούμενα ἐννοοῦμεν εὔκολως ὅτι:

Ιον. "Αν δύο περιφέρειαι ἔχωσι δύο κοινὰ σημεῖα, ταῦτα εἶναι συμμετρικὰ πρὸς τὴν διάκεντρον αὐτῶν, οὐδὲν δὲ τούτων κεῖται ἐπ' αὐτῆς.

Σον. "Αν δύο περιφέρειαι ἔχωσιν ἐν μόνον κοινὸν σημεῖον, τοῦτο κεῖται ἐπὶ τῆς διακέντρου αὐτῶν.

§ 142. Ποῖαι λέγονται τεμνόμεναι περιφέρειαι. "Εστῶσαν δύο περιφέρειαι Κ, Λ (σχ. 104), αἱ δόποῖαι ἔχουσι δύο κοινὰ σημεῖα Α, Α'. Τὸ εὐθ. τμῆμα ΑΑ' εἶναι χορδὴ τόξων καὶ τῶν δύο περιφερειῶν. Εἴναι λοιπὸν κοινὴ χορδὴ αὐτῶν. Τοῦτο σημαίνει ὅτι μέρος ἐκάστου τῶν κύκλων τούτων εἶναι μέρος καὶ τοῦ ἄλλου.

'Επειδὴ δὲ ΚΛ + ΛΑ > ΚΑ καὶ ΛΑ = ΛΓ, ἐπεται ὅτι ΚΓ > ΚΑ, τὸ σημεῖον Γ δηλ. τῆς περιφερείας Λ κεῖται ἐκτὸς τοῦ κύκλου Κ. 'Ομοίως βεβαιούμεθα ὅτι μέρος τῆς Κ κεῖται ἐκτὸς τοῦ Λ.

Διὰ τοὺς λόγους τούτους αἱ περιφέρειαι Κ καὶ Λ λέγονται τεμνόμεναι περιφέρειαι. "Ωστε:

"Αν δύο περιφέρειαι ἔχωσι δύο κοινὰ σημεῖα, αὗται τέμνονται.

§ 143. Ποῖαι λέγονται ἐφαπτόμεναι περιφέρειαι. Δύο περιφέρειαι λέγονται ἐφαπτόμεναι, ἀν ἔχωσιν ἐν μόνον κοινὸν σημεῖον. Π.χ. αἱ περιφέρειαι Κ, Λ (σχ. 105) εἶναι ἐφαπτόμεναι περιφέρειαι ἢ ἐφάπτονται ἀλλήλων.

Τὸ κοινὸν σημεῖον δύο ἐφαπτομένων περιφερειῶν λέγεται σημεῖον ἐπαφῆς.


Οὕτω σημεῖον ἐπαφῆς τῶν Κ, Λ εἶναι τὸ Α (σχ. 105).

"Αν δύο ἐφαπτόμεναι περιφέρειαι κεῖνται ἐκατέρωθεν τοῦ σημείου ἐπαφῆς, λέγονται ὅτι ἐφάπτονται ἐκτὸς (σχ. 105 α').

"Αν δὲ κεῖνται πρὸς τὸ αὐτὸν μέρος τοῦ σημείου ἐπαφῆς, λέγονται ὅτι ἐφάπτονται ἐντὸς (σχ. 105 β').

§ 144. Ποῖαι εἶναι αἱ δυναταὶ θέσεις δύο περιφερειῶν πρὸς ἄλλήλας. Εἴδομεν προηγουμένως ὅτι δύο περιφέρειαι δύνανται νὰ ἔχωσι δύο κοινὰ σημεῖα ἢ ἔν ἢ οὐδέν. Εἰς τὴν τελευταῖαν περίπτωσιν εἶναι δυνατὸν μία περιφέρεια νὰ εἶναι δὴ ἐκτὸς τοῦ ἄλλου κύκλου (σχ. 106 α') ἢ δὴ ἐντὸς αὐτοῦ (σχ. 106 β').

"Ωστε αἱ δυναταὶ θέσεις δύο περιφερειῶν εἶναι αἱ ἔξῆς πέντε:




Σχ. 106

- | | |
|--|--|
| $\alpha')$ Δύο κοινὰ σημεῖα.
$\beta')$
$\gamma')$ "Ἐν κοινὸν σημεῖον
$\delta')$
$\varepsilon')$ Οὐδὲν κοινὸν σημεῖον | Αἱ περιφέρειαι τέμνονται.
Αἱ περιφέρειαι ἐφάπτονται ἐκτός.
Αἱ περιφέρειαι ἐφάπτονται ἐντὸς.
"Εκαστος κύκλος ἐκτὸς τοῦ ἄλλου.
Εἰς κύκλος δῆλος ἐντὸς τοῦ ἄλλου. |
|--|--|

3. ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΑΚΤΙΝΑΣ ΔΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

§ 145. Ποῖαι σχέσεις ύπάρχουσι μεταξὺ τῆς ἀποστάσεως τῶν κέντρων δύο τεμνομένων περιφερειῶν καὶ τῶν ἀκτίνων αὐτῶν.

'Απὸ τὸ τρίγωνον ΚΑΛ (σχ. 107) βλέπομεν ἀμέσως ὅτι:



Σχ. 107

$KA - \Lambda A < KL < KA + \Lambda A$. "Αν δὲ θέσωμεν $KA = P$ καὶ $\Lambda A = \rho$, αῦται γίνονται $P - \rho < KL < P + \rho$.

§ 146. Ποία σχέσις ύπάρχει μεταξὺ τῆς ἀποστάσεως τῶν κέντρων καὶ τῶν ἀκτίνων δύο περιφερειῶν, αἱ ὅποιαι ἐφάπτονται ἐκτὸς (σχ. 105 α').

Παρατηροῦντες ὅτι τὸ σημεῖον ἐπαφῆς Α κεῖται μεταξὺ Κ καὶ Λ ἐννοοῦμεν εὔκόλως ὅτι $KL = P + \rho$.

§ 147. Ποία σχέσις ύπάρχει μεταξὺ τῆς ἀποστάσεως τῶν κέντρων καὶ τῶν ἀκτίνων δύο περιφερειῶν, αἱ ὅποιαι ἐφάπτονται ἐντὸς (σχ. 105 β').

"Αν $KA > \Lambda A$, τὸ Λ κεῖται μεταξὺ Κ καὶ Α. Ἐπομένως εἶναι:

$$KA = KL + \Lambda A, \text{ δθεν εὔκόλως } \xi\pi\tau\alpha\iota\alpha\text{ ὅτι } KL = P - \rho.$$

"Αν δὲ $\Lambda A > KA$, θὰ εἶναι $\Lambda A = \Lambda K + KA$, δθεν $KL = \rho - P$.

§ 148. Ποία σχέσις ύπάρχει μεταξὺ τῆς ἀποστάσεως τῶν κέντρων καὶ τῶν ἀκτίνων δύο κύκλων, ἂν ἔκαστος κεῖται ἐκτὸς τοῦ ἄλλου.

"Εστωσαν Α, Β τὰ σημεῖα, εἰς τὰ ὅποια τὸ τμῆμα KL τέμνει ἀντιστοίχως τὰς περιφερείας Κ καὶ Λ (σχ. 106 α'). Ἐπειδὴ τὸ Β κεῖται ἐξ ὑποθέσεως ἐκτὸς τοῦ κύκλου Κ, εἶναι $KB > KA$ καὶ ἐπομένως $KB + BA > KA + \Lambda B \quad \text{ἢ } KL > P + \rho$.

§ 149. Ποία σχέσις ύπάρχει μεταξὺ τῆς ἀποστάσεως τῶν κέντρων δύο κύκλων καὶ τῶν ἀκτίνων αὐτῶν, ἂν ὁ εἰς κύκλος κεῖται ὅλος ἐντὸς τοῦ ἄλλου.

"Εστω ὅτι ὁ κύκλος Λ κεῖται ὅλος ἐντὸς τοῦ Κ (σχ. 106 β'). "Αν τὸ τμῆμα KL προεκταθῇ κατὰ τὴν φορὰν Κ πρὸς Λ, θὰ συναντήσῃ πρῶτον τὴν περιφέρειαν Λ εἰς τὶ σημεῖον Β καὶ ἔπειτα τὴν Κ εἰς τὶ σημεῖον Α. Θὰ εἶναι λοιπὸν:

$$KL + \Lambda B + BA = KA \quad \text{ἢ } KL + \rho + BA = P.$$

Ἐκ ταύτης δὲ ἔπειται ὅτι:

$$KL + BA = P - \rho \text{ καὶ ἐπομένως } KL < P - \rho.$$

§ 150. Αἱ ἀντίστροφοι τῶν προηγουμένων (§ 145–149) σχέσεων. Διὰ τῆς εἰς ἄτοπον ἀπαγωγῆς βεβαιούμεθα εύκόλως ὅτι:

1. "Αν $P - \rho < K\Lambda < P + \rho$, αἱ περιφέρειαι τέμνονται.
 2. "Αν $K\Lambda = P + \rho$, αἱ περιφέρειαι ἐφάπτονται ἐκτὸς.
 3. "Αν $K\Lambda = P - \rho$, αἱ περιφέρειαι ἐφάπτονται ἐντὸς.
 4. "Αν $K\Lambda > P + \rho$, ἔκαστος κύκλος κεῖται ὅλος ἐκτὸς τοῦ ἀλλοῦ.
 5. "Αν $K\Lambda < P - \rho$, διά τοῦ κύκλος Λ κεῖται ὅλος ἐντὸς τοῦ Κ.
- "Ἐκ τούτων καὶ τῶν προηγουμένων (§ 145–149) ἐπεται διὰ ἔκάστη ἀπὸ τὰς ἀποδειχθείσας σχέσεις εἰναι ἀναγκαία καὶ ἐπαρκής συνθήκη, διὰ νὰ ἔχωσιν αἱ περιφέρειαι τὴν ἀντίστοιχον θέσιν.

'Α σκήσεις

172. Νὰ γράψητε δύο ἐφαπτομένας περιφερείας καὶ νὰ φέρητε ἀπὸ τὸ σημεῖον ἐπαφῆς εύθειαν ἐφαπτομένην τῆς μιᾶς. Νὰ ἀποδείξητε δὲ διὰ αὐτῆς ἐφάπτεται καὶ τῆς ἀλλῆς.

173. Νὰ δρίσητε τὴν ἀμοιβαίαν θέσιν δύο περιφεριῶν, αἱ δοποῖαι γράφονται μὲν κέντρα A, B καὶ ἀκτῖνα $\frac{AB}{2}$.

174. Μὲ κέντρα A, B καὶ ἀκτῖνα μεγαλυτέραν τοῦ $\frac{AB}{2}$ γραφοῦτε δὲ νὰ δένεται μήπως καὶ μὲν τὴν βοήθειαν τῶν περιφερειῶν τούτων δυνάμεθα νὰ λύσωμεν ἐν γνωστὸν πρόβλημα.

175. Νὰ γράψητε μίαν περιφέρειαν K καὶ νὰ δρίσητε ἐπ' αὐτῆς σημεῖον A. Νὰ γράψητε δὲ περιφέρειαν ἐφαπτομένην ταύτης εἰς τὸ A καὶ νὰ ἔχῃ ἀκτῖνα ἵσην πρὸς τὴν διάμετρον τῆς K.

176. Νὰ γράψητε δύο δομοκέντρους περιφερείας καὶ τρίτην τέμνουσαν σύτάς. "Ἐπειτα νὰ γράψητε τὰς κοινὰς χορδὰς ταύτης καὶ ἔκάστης τῶν πρώτων. Νὰ ἀποδείξητε δὲ διὰ αὗταις εἰναι παράλληλοι.

4. ΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ


§ 151. Πρόβλημα. Νὰ κατασκευασθῇ τρίγωνον ἐκ τῶν πλευρῶν α , β , γ αὐτοῦ (σχ. 108).

"Εστω διὰ AΒΓ εἰναι τὸ ζητούμενον τρίγωνον καὶ διὰ $B\Gamma = \alpha$, $A\Gamma = \beta$, $A\Gamma = \gamma$ καὶ $A\Gamma = \beta$. "Αν εἰς μίαν εύθειαν ὁρίσωμεν

τμῆμα $B\Gamma$ ΐσον πρὸς τὸ α , δρίζομεν τὰς δύο κορυφάς B καὶ Γ αὐτοῦ. Διὰ νὰ δρίσωμεν τὴν θέσιν τῆς τρίτης κορυφῆς A , παρατηροῦμεν ὅτι πρέπει νὰ εἶναι $AB = \gamma$. Ἐπομένως ἡ κορυφὴ A πρέπει νὰ κεῖται ἐπὶ τῆς περιφερείας (B, γ). Δι’ ὅμοιον λόγον πρέπει νὰ κεῖται καὶ ἐπὶ τῆς περιφερείας (Γ, β). Θά εἶναι λοιπὸν ἡ κορυφὴ A κοινὸν σημεῖον τῶν δύο τούτων περιφερειῶν.

Ἐκ τούτων ἔννοοῦμεν τὸν ἔχῆς τρόπον λύσεως :

Γράφομεν τυχοῦσαν εύθειαν καὶ εἰς αὐτὴν δρίζομεν τμῆμα $B\Gamma$ ΐσον πρὸς τὸ δοθὲν α , τὸ δποῖον ούδενὸς τῶν ἄλλων εἶναι μικρότερον. Ἐπειτα γράφομεν τὰς περιφερείας (B, γ) καὶ (Γ, β) Ἀν αὗται τέμνωνται καὶ A εἶναι ἐν κοινὸν σημεῖον αὐτῶν, φέρομεν τὰς ἀκτῖνας BA , GA . Οὕτω δὲ σχηματίζεται τρίγωνον $AB\Gamma$, τὸ δποῖον προφανῶς εἶναι τὸ ζητούμενον.



Σχ. 108

δοθέντα στοιχεῖα, εἶναι ΐσον πρὸς τὸ $AB\Gamma$.

“Ωστε, ἂν αἱ περιφέρειαι αὗται τέμνωνται, τὸ πρόβλημα ἔχει μίαν λύσιν.

Διὰ νὰ τέμνωνται δὲ αἱ περιφέρειαι, πρέπει νὰ εἶναι :
 $\beta - \gamma < B\Gamma < \beta + \gamma$ (§ 150,1) ή $\beta - \gamma < \alpha < \beta + \gamma$.

Ἐπειδὴ δὲ $\alpha \geq \beta$, ή ἀνισότης $\beta - \gamma < \alpha$ ἀληθεύει. Ἀρκεῖ λοιπὸν νὰ εἶναι $\alpha > \beta + \gamma$, διὰ νὰ ἔχῃ τὸ πρόβλημα λύσιν.

Αὐτὴ ἡ τελευταία ἔξέτασις λέγεται διερεύνησις τοῦ προβλήματος. “Ωστε :

Διερεύνησις ἐνδὸς προβλήματος λέγεται ἡ ἔξέτασις τῶν συνθηκῶν, αἱ δποῖαι πρέπει νὰ πληροῦνται, διὰ νὰ ἔχῃ τὸ πρόβλημα λύσιν. Ἐν συνεχείᾳ δὲ ἔξετάζονται καὶ οἱ δροὶ, ὑπὸ τοὺς δποῖους δύναται ἐν πρόβλημα νὰ ἔχῃ λύσεις περισσοτέρας τῆς μιᾶς.

Ασκήσεις

177. Νά κατασκευάσητε τρίγωνον μὲ πλευρὰς 3 ἑκατ., 4 ἑκατ., 5 ἑκατ.

178. Νά κατασκευάσητε ίσοσκελές τρίγωνον μὲ βάσιν 5 ἑκατ. καὶ 8 ἑκατ. ἐκάστην τῶν ἄλλων πλευρῶν.

179. Εἰς δοθεῖσαν περιφέρειαν ἀκτίνος 6 ἑκατ. νὰ ἐγγράψητε ίσοσκελές τρίγωνον μὲ βάσιν 4 ἑκατ.

180. Νά κατασκευάσητε δρυθογώνιον ἀπὸ μίαν πλευρὰν καὶ ἀπὸ τὴν διαγώνιον αὐτοῦ.

Ασκήσεις πρὸς ἐπανάληψιν τῶν Ζ' καὶ Η' κεφαλαίων

181. Νά γράψητε δύο δμοκέντρους περιφερείας καὶ δύο χορδᾶς τῆς ἔξωτερικῆς, αἱ δποῖαι νὰ ἐφάπτωνται τῆς ἔσωτερικῆς. "Ἐπειτα δὲ νὰ συγκρίνητε τὰς χορδὰς ταύτας.

182. Εἰς μίαν περιφέρειαν νὰ γράψητε μίαν ἐφαπτομένην καὶ μίαν χορδὴν παράλληλον πρὸς αὐτήν. Νὰ ἀποδείξητε δὲ ὅτι τὸ σημεῖον ἐπαφῆς διχοτομεῖ τὸ ἀντίστοιχον πρὸς τὴν χορδὴν τόξον.

183. Εἰς δοθεῖσαν περιφέρειαν νὰ γράψητε δύο καθέτους διαμέτρους ΑΒ καὶ ΓΔ. "Ἐπειτα νὰ γράψητε τὴν περιφέρειαν (Γ, ΓΑ), νὰ καθορίσητε τὴν θέσιν τῶν δύο τούτων περιφερειῶν καὶ τὸν λόγον, διὰ τὸν δποῖον ἔχουσι τὴν θέσιν ταύτην.

184. "Ἐπὶ δοθεῖσῃς περιφερείας Κ νὰ δρίσητε ἐν σημεῖον Ο καὶ νὰ δρίσητε τὸ Κ' συμμετρικὸν τοῦ Κ πρὸς κέντρον συμμετρίας τὸ Ο. "Ἐπειτα δὲ νὰ ἀποδείξητε ὅτι τὸ συμμετρικὸν τυχόντος σημείου Μ τῆς περιφερείας Κ είναι σημεῖον τῆς περιφερείας, ἡτις ἔχει κέντρον Κ' καὶ είναι ἵση πρὸ τὴν Κ.

185. Εἰς δοθεῖσαν περιφέρειαν Κ νὰ φέρητε διαφόρους ἐφαπτομένας καὶ νὰ δρίσητε τὸ συμμετρικὸν τοῦ κέντρου Κ πρὸς ἐκάστην τούτων. Νὰ ἀποδείξητε δὲ ὅτι δλα τὰ συμμετρικὰ ταῦτα κείνται επὶ μιᾶς περιφερείας.

186. Νά γράψητε δύο ἐφαπτομένας περιφερείας καὶ διὰ τοῦ σημείου ἐπαφῆς νὰ γράψητε εύθειαν τέμνουσαν τὰς περιφερείας ταύτας. "Ἐπειτα νὰ φέρητε ἐφαπτομένην ἐκάστης περιφερείας ἀπὸ τὸ ἐπ' αὐτῆς ἄκρον τῆς τεμνούσης καὶ νὰ ἀποδείξητε ὅτι αἱ ἐφαπτόμεναι αὗται είναι παράλληλοι.


187. Νά κατασκευάσητε παραλληλόγραμμον ἀπὸ μίαν πλευρὰν καὶ ἀπὸ τὰς διαγώνιους του.

188. Νά κατασκευάσητε μίαν ἐπίκεντρον γωνίαν 45° καὶ νὰ φέρητε ἐφαπτομένας τῆς περιφερείας εἰς τὰ κοινὰ σημεῖα τῆς περιφερείας καὶ τῶν πλευρῶν τῆς γωνίας. Νὰ ύπολογίσητε δὲ τὴν γωνίαν τῶν ἐφαπτομένων τούτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ'

1. ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑΙ ΓΩΝΙΑΙ. ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΑ ΣΧΗΜΑΤΑ

§ 152. Ποῖαι λέγονται ἔγγεγραμμέναι γωνίαι. Από ἐν σημεῖον Α περιφερείας Κ φέρομεν δύο χορδάς ΑΒ, ΑΓ (σχ. 109).



Οὕτω σχηματίζεται ἡ γωνία Α. Αὕτη λέγεται ἔγγεγραμμένη εἰς τὸν αὐτὸν κύκλον.
"Ωστε.

Mία γωνία λέγεται ἔγγεγραμμένη εἰς κύκλον, ἀν ἡ μὲν κορυφὴ αὐτῆς κεῖται ἐπὶ τῆς περιφερείας τοῦ κύκλου, αἱ δὲ πλευραὶ εἶναι χορδαὶ αὐτοῦ.

Τὸ τόξον ΒΔΓ, τὸ δόποιον περιέχεται μεταξὺ τῶν πλευρῶν τῆς γωνίας Α, λέγεται ἀντίστοιχον αὐτῆς τόξον. Συνήθως λέγομεν ὅτι ἡ ἔγγεγραμμένη γωνία Α βαίνει ἐπὶ τοῦ τόξου ΒΔΓ.

"Η αὕτη γωνία Α λέγεται ἔγγεγραμμένη καὶ εἰς τὸ κυκλικὸν τμῆμα ΒΑΓΒ (σχ. 109).

2. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΓΩΝΙΩΝ

§ 153. Ποία σχέσις ύπάρχει μεταξὺ ἔγγεγραμμένης καὶ ἐπικέντρου γωνίας, αἱ ὁποῖαι βαίνουσιν εἰς τὸ αὐτὸν τόξον.

α') "Αν τὸ κέντρον Κ κεῖται εἰς μίαν πλευράν τῆς ἔγγεγραμμένης γωνίας (σχ. 110 α'), εἶναι προφανῶς $\widehat{\omega} = \widehat{A} + \widehat{B}$.




'Επειδὴ δὲ $\widehat{A} = \widehat{B}$, ἐπεται ὅτι $\widehat{\omega} = 2\widehat{A}$ καὶ $\widehat{A} = \frac{\widehat{\omega}}{2}$. (1)

β') "Αν τὸ Κ κεῖται ἐντὸς τῆς γωνίας Α (σχ. 110 β') καὶ ἀχθῇ ἡ διάμετρος ΑΚΔ, θὰ εἶναι $\widehat{\rho} = \frac{\widehat{\omega} + \widehat{\phi}}{2}$, $\widehat{\sigma} = \frac{\widehat{\phi}}{2}$ καὶ ἐπομένως:

$$\widehat{A} = \widehat{\rho} + \widehat{\sigma} = \frac{\widehat{\omega} + \widehat{\phi}}{2} = \frac{\widehat{\omega} + \widehat{\phi}}{2}.$$

γ') "Αν τὸ Κ κεῖται ἐκτὸς τῆς \widehat{A} καὶ ἀχθῆ πάλιν ἡ διάμετρος ΑΚΔ (σχ. 110 γ'), θὰ εἶναι $\rho = \frac{\widehat{\omega}}{2}$, $\sigma = \frac{\widehat{\phi}}{2}$ καὶ ἐπομένως:

$$\text{ΒΑΓ} = \rho - \sigma = \frac{\widehat{\omega} - \widehat{\phi}}{2} = \frac{\widehat{\text{ΒΚΓ}}}{2}.$$





Σχ. 110

Βλέπομεν λοιπόν δτι:

Πᾶσα ἐγγεγραμμένη εἰς κύκλον γωνία εἶναι τὸ ἥμισυ τῆς ἐπικέντρου, ἡ δοποίᾳ βαίνει εἰς τὸ αὐτὸ τόξον.

Πόρισμα I. Εἰς τὸν αὐτὸν κύκλον ἡ εἰς ἓσων κύκλους ἐπὶ Β ἵσων τόξων βαίνουσιν ἵσαι ἐγγεγραμμέναι γωνίαι.

Καὶ ἀντιστρόφως: "Ισαι ἐγγεγραμμέναι γωνίαι βαίνουσιν ἐπὶ ἓσων τόξων.



Σχ. 111

Πόρισμα II. "Αν μία ἐγγεγραμμένη γωνία βαίνῃ ἐπὶ ἥμισυ φερεδείας, εἶναι δρῦη.

Πόρισμα III. "Αν μία ἐγγεγραμμένη γωνία βαίνῃ ἐπὶ τόξου μικροτέρου ἥμιπερφερείας, εἶναι δξεῖα.

Πόρισμα IV. "Αν μία έγγεγραμμένη γωνία βαίνη επὶ τόξου μεγαλυτέρου νήματος φερείας, εἶναι διμβλεῖα.

Οὕτως ἐκ τοῦ σχήματος (111 β') βλέπομεν ὅτι:

$$\widehat{B\Lambda\Gamma} = \widehat{\rho} + \widehat{\sigma} = \frac{\widehat{\omega} + \widehat{\phi}}{2} = 1 \text{ δρθ.}, \widehat{\sigma} < 1 \text{ δρθ.}, \widehat{E\Lambda\Gamma} > 1 \text{ δρθ.}$$

Α σκήσεις


189. Νὰ εύρητε τὸ μέτρον ἔγγεγραμμένης γωνίας, ἡ δοπία βαίνει εἰς τεταρτημόριον περιφερείας.

190. Εἰς δοθέντα κύκλον νὰ γράψητε δύο παραλλήλους χορδάς καὶ νὰ συγκρίνητε τὰ μεταξὺ αὐτῶν τόξα.

191. Νὰ γράψητε δύο περιφερείας τεμνομένας εἰς σημεῖα A καὶ B. Νὰ γράψητε τὰς διὰ τοῦ A διερχομένας διαμέτρους ΑΓ, ΑΔ καὶ νὰ ἀποδείξητε ὅτι ἡ γραμμὴ ΓΒΔ εἶναι εὐθεῖα.

192. Ἀπὸ σημείου A ἐντὸς κύκλου νὰ φέρητε δύο χορδάς ΓΑΕ, ΒΑΔ καὶ νὰ ἀποδείξητε ὅτι π.χ. ἡ γωνία ΓΑΒ ίσοῦται πρὸς τὸ ἄθροισμα δύο ἔγγεγραμμένων, τῶν δοπίων ἡ μία βαίνει ἐπὶ τοῦ τόξου ΒΓ, ἡ δὲ ἀλλὴ ἐπὶ τοῦ ΔΕ.

193. Ἀπὸ ἐν σημείον H, τὸ δοπίον εἶναι ἑκτὸς κύκλου, νὰ φέρητε δύο τεμνούσας ΗΕΓ, ΗΖΒ τῆς περιφερείας. Νὰ συγκρίνητε τὴν γωνίαν αὐτῶν πρὸς τὴν διαφορὰν τῶν ἔγγεγραμμένων γωνιῶν, αἱ δοπίαι βαίνουσιν ἐπὶ τῶν τόξων ΒΓ καὶ ΖΕ.



Σχ. 112

§ 154. Ἀξιοσημείωτος τόπος.
Ἐστω τόξον ΑΔΒ, χορδὴ αὐτοῦ ΑΒ καὶ ΑΔ'Β τὸ συμμετρικὸν τοῦ ΑΔΒ πρὸς ἄξονα ΑΒ (σχ. 112). "Αν δὲ Δ' εἶναι τὸ συμμετρικὸν τοῦ Δ, θὰ εἶναι $\widehat{A\Delta B} = \widehat{A\Delta' B} = \widehat{\omega}$ (§ 133). Καὶ ἂν Ζ εἶναι τυχὸν σημεῖον τοῦ τόξου ΑΔΒ ἡ τοῦ ΑΔ'Β, θὰ εἶναι ἐπίσης $\widehat{A\Delta B} = \widehat{\omega}$. Διὰ σημεῖον δὲ Η ἐντὸς τοῦ κύκλου κείμενον εἶναι $\widehat{A\Lambda B} > \widehat{A\Delta B}$ ἢ $\widehat{A\Lambda B} > \widehat{\omega}$. "Αν δὲ Θ εἶναι ἑκτὸς τοῦ κύκλου, θὰ εἶναι $\widehat{A\Theta B} < \widehat{A\Delta B}$ ἢ $\widehat{A\Theta B} < \widehat{\omega}$.

Βλέπομεν λοιπόν ότι: 'Η χορδή AB φαίνεται ύπο γωνίαν ως άπο διάστημα τὰ σημεῖα τῆς γραμμῆς $A\Delta B\Delta' A$ καὶ μόνον ἀπὸ αὐτά. Διὰ τοῦτο ἡ γραμμὴ $A\Delta B\Delta' A$ λέγεται γεωμετρικὸς τόπος τῶν σημείων, ἀπὸ τὰ δύοις ἡ χορδὴ AB φαίνεται ύπο τὴν γωνίαν ω . "Αν ἡ γωνία ω εἶναι δρυθή, τόπος εἶναι ἡ περιφέρεια, ἡ δύοις ἔχει διάμετρον AB .

§ 155. Θεώρημα. 'Η γωνία, ἡ δύοις σχηματίζεται ύπο χορδῆς καὶ ἐφαπτομένης εἰς τὸ ἐν ἀκρον αὐτῆς εἶναι ἵση πρὸς ἕγγεγραμμένην γωνίαν, ἡ δύοις βαίνει ἐπὶ τοῦ τόξου, τὸ δύοις περιέχεται μεταξὺ τῶν πλευρῶν ἐκείνης.

Π.χ. $\widehat{B\Delta} = \widehat{A\Theta}$ καὶ $\widehat{\Gamma A} = \widehat{A\Theta}$ (σχ. 113)

Διὰ νὰ ἐννοήσωμεν πῶς γίνεται ἡ ἀπόδειξις, ἐργαζόμεθα ως ἔξῆς:

Πρῶτον παρατηροῦμεν ότι:

$$\widehat{A\Theta} = \frac{\widehat{AKB}}{2}. "Αν δὲ εἶναι πράγματι$$

$$\widehat{B\Delta} = \widehat{A\Theta}, \text{ πρέπει νὰ εἶναι καὶ}$$


$$\widehat{B\Delta} = \frac{\widehat{AKB}}{2}. \text{ Διὰ νὰ σχηματίσωμεν}$$

δὲ γωνίαν $\frac{\widehat{AKB}}{2}$, ἀρκεῖ νὰ φέρωμεν τὸ ὅψος KE τοῦ ἴσοσκελοῦ τριγώνου

\widehat{AKB} . Οὕτως εἶναι $\widehat{AKE} = \frac{\widehat{AKB}}{2}$. Πρέπει λοιπὸν νὰ εἶναι $\widehat{B\Delta} = \widehat{AKE}$. Ἀλλὰ τοῦτο συμβαίνει πράγματι, διότι αἱ γωνίαι $B\Delta, AKE$ εἶναι δξεῖαι μὲ πλευράς καθέτους μίαν πρὸς μίαν.

"Απὸ αὐτὴν τὴν ἐργασίαν δῆγούμεθα εἰς τὴν ἀκόλουθον ἀπόδειξιν.

'Από δειξις. α') Φέρομεν τὰς ἀκτῖνας KA, KB καὶ τὴν KE κάθετον ἐπὶ τὴν AB . "Επειτα παρατηροῦμεν ότι $\widehat{AKE} = \frac{\widehat{AKB}}{2}$



Σχ. 113

καὶ $\widehat{A\Theta B} = \frac{\widehat{AKB}}{2}$. Ἐπειταὶ λοιπὸν ὅτι $\widehat{A\Theta B} = \widehat{AKE}$. Ἐπειδὴ δὲ καὶ $\widehat{B\Delta D} = \widehat{AKE}$ (§ 111), ἐπειταὶ ὅτι $\widehat{B\Delta D} = \widehat{A\Theta B}$, δ.ἔ.δ.

β') Ἡ εύθεῖα EKZ διχοτομεῖ καὶ τὴν μὴ κυρτὴν γωνίαν AKB, εἶναι δηλαδὴ

$$\widehat{AKZ} = \frac{\text{μὴ κυρ. } \widehat{AK\Gamma}}{2}, \quad \text{Ἐπειδὴ δὲ καὶ } \widehat{AHB} = \frac{\text{μὴ κυρ. } \widehat{AK\Gamma}}{2},$$

ἐπειταὶ ὅτι $\widehat{AHB} = \widehat{AKZ}$. (1)

'Αλλ' αἱ ἀμβλεῖαι γωνίαι AKZ καὶ ΓAB ἔχουσι πλευρὰς καθέτους, μίαν πρὸς μίαν, καὶ διὰ τοῦτο εἶναι $\widehat{AKZ} = \widehat{ΓAB}$. 'Απὸ αὐτὴν δὲ καὶ ἀπὸ τὴν (1) ἐπειταὶ ὅτι $\widehat{ΓAB} = \widehat{AHB}$, δ.ἔ.δ.

Πόρισμα. "Ἄν δύο ἐφαπτόμεναι περιφερείας τέμνωνται, τὸ κοινὸν σημεῖον αὐτῶν ἀπέχει ἵσον ἀπὸ τὰ σημεῖα ἐπαφῆς.

3. ΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΑΙ

§ 156. Πρόβλημα. Νὰ ἀχθῇ ἐφαπτομένη εἰς δοθέντα κύκλου K ἀπὸ σημεῖον A, τὸ δποῖον κεῖται ἐκτὸς αὐτοῦ (σχ. 114).


"Ἄν AB εἶναι ἡ ζητούμενή ἐφαπτομένη, θά εἶναι $\widehat{ABK} = 1$ δρθ.

Ἐπομένως τὸ σημεῖον ἐπαφῆς B κεῖται ἐπὶ τῆς περιφερείας, ἡ δποία γράφεται μὲ διάμετρον AK. 'Απὸ τὸ συμπέρασμα τοῦτο δδηγούμεθα εἰς τὴν ἔξῆς λύσιν.

"Αγομεν τὸ εύθ. τμῆμα AK καὶ γράφομεν τὴν περιφέρειαν, ἡ δποία ἔχει διάμετρον AK. Αὕτη, ὡς διερχομένη διὰ τοῦ κέντρου τῆς περιφερείας K, τέμνει αὐτὴν εἰς δύο

σημεῖα B καὶ Γ. Φέρομεν ἐπειτα τὰς εὐθείας AB καὶ AG. Λέγω δὲ ὅτι αὗται ἐφάπτονται τῆς περιφερείας K.

"Από δειξις. Ἐπειδὴ $\widehat{ABK} = \widehat{AGK} = 1$ δρθ. (§ 153 Πόρ. II).



Σχ. 114

αἱ εὐθεῖαι ΑΒ, ΑΓ εἰναι ἀντιστοίχως κάθετοι ἐπὶ τὰς ἀκτῖνας ΚΒ, ΚΓ εἰς τὰ ἄκρα αὐτῶν. Εἶναι ἅρα ἔφαπτόμεναι τῆς περιφερείας Κ (§ 137 β'). Βλέπομεν λοιπὸν ὅτι:

Ἄπὸ σημεῖον, τὸ δύοιον κεῖται ἐκτὸς κύκλου, ἔγονται δύο ἔφαπτόμεναι εἰς αὐτὸν.

Α σκήσεις

194. Εἰς δοθεῖσαν περιφέρειαν νὰ ἐγγράψητε τρίγωνον ΑΒΓ καὶ νὰ γράψητε τὴν ἔφαπτομένην ΖΑΗ. Νὰ συγκρίνητε δὲ τὴν γωνίαν ΖΑΒ πρὸς τὴν Γ καὶ τὴν ΗΑΓ πρὸς τὴν Β.

195. Νὰ ἀποδείξητε ὅτι ἡ εὐθεῖα ΑΚ (σχ. 114) διχοτομεῖ τὴν γωνίαν ΒΑΓ τῶν ἔφαπτομένων καὶ τὴν γωνίαν ΒΚΓ.

196. Νὰ εὕρητε τὴν σχέσιν, ἡ δποία συνδέει τὰς γωνίας ΒΑΓ καὶ ΒΚΓ τοῦ σχήματος 114.


197. Εἰς δοθέντα κύκλον νὰ ἐγγράψητε τρίγωνον ΑΒΓ, ἀν δοθῶσιν ἡ κορυφὴ Α καὶ αἱ γωνίαι Β καὶ Γ αὐτοῦ.

§ 157. Ποῖα λέγονται περιγεγραμμένα περὶ κύκλον εὐθ. σχήματα. Αἱ ἔφαπτόμεναι ΑΒ, ΒΓ, ΓΔ, ΔΑ εἰς κύκλον Κ (σχ. 115) σχηματίζουσι τετράπλευρον ΑΒΓΔ. Τοῦτο λέγεται περιγεγραμμένον περὶ τὸν κύκλον Κ. "Ωστε:

"Ἐν εὐθύγραμμον σχῆμα λέγεται περιγεγραμμένον περὶ κύκλον, ἀν πᾶσαι αἱ πλευραὶ αὐτοῦ ἔφαπτωνται τὸν κύκλον τούτον.

Ο κύκλος Κ (σχ. 115) λέγεται ἐγγεγραμμένος εἰς τὸ ΑΒΓΔ. "Ωστε:

Ἐτις κύκλος λέγεται ἐγγεγραμμένος εἰς ἐν εὐθύγραμμον σχῆμα, ἀν τοῦτο εἶναι περιγεγραμμένον περὶ τὸν κύκλον τοῦτον.




Σχ. 115

Σημείωσις. Προηγουμένως (§ 109) ἐλάβομεν ἀφορμὴν τὰ δρίσωμεν τὰ εἰς κύκλον ἐγγεγραμμένα εὐθύγραμμα σχήματα.

4. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΤΕΤΡΑΠΛΕΥΡΩΝ

§ 158. Θεώρημα I. Αἱ ἀπέναντι γωνίαι ἐγγεγραμμένου εἰς κύκλον τετραπλεύρου εἶναι παραληγωματικαί.



Σχ. 116

Π.χ. $A + \Gamma = 2$ δρθ. καὶ $B + \Delta = 2$ δρθ. (σχ. 116).

Ἄπόδειξις. Ἀπὸ τὰς γνωστὰς ἴσοτητας $A = \frac{\omega}{2}$, $\Gamma = \frac{\phi}{2}$, ἔπειται ὅτι:

$$A + \Gamma = \frac{\omega + \phi}{2} = \frac{4 \text{ δρθ.}}{2} = 2 \text{ δρθ.}$$


Ἐπειδὴ δὲ $(B + \Delta) + (A + \Gamma) = 4$ δρθαῖ, ἔπειται ὅτι καὶ $A + \Delta = 2$ δρθ., δ.ἔ.δ.

Πόρισμα I. Πᾶν παραλλήλογραμμον ἐγγεγραμμένον εἰς κύκλον εἶναι δρυμώνιον.

Πόρισμα II. Ἐκάστη γωνίᾳ κυρτοῦ ἐγγεγραμμένου τετραπλεύρου εἶναι ἡση πρὸς τὴν ἀπέναντι ἔξωτερικὴν γωνίαν αὐτοῦ.

§ 159. Θεώρημα II (Ἀντίστροφον τοῦ I). Ἄν δύο ἀπέναντι γωνίαι τετραπλεύρου εἶναι παραληγωματικαί, τοῦτο εἶναι ἐγγράψιμον εἰς κύκλον. Ἄν δηλ. $A + \Delta = 2$ δρθ, τὸ τετράπλευρον $AB\Gamma\Delta$ (σχ. 117) εἶναι ἐγγράψιμον εἰς κύκλον.

Ἄπόδειξις. Γνωρίζομεν ὅτι ἀπὸ τὰς τρεῖς κορυφὰς A, B, Γ διέρχεται μία περιφέρεια. Ἐστω δὲ AEG τὸ τόξον αὐτῆς, τὸ δόποιον εύρισκεται πρὸς τὸ αὐτὸ μὲ τὴν κορυφὴν Δ μέρος ὡς πρὸς τὴν διαγώνιον AG . Ἄν φέρωμεν τὰς χορδὰς EA, EG , σχηματίζεται τὸ ἐγγεγραμμένον τετράπλευρον $AEGB$. Κατὰ δὲ τὸ προηγούμενον θεώρημα εἶναι $B + E = 2$ δρθ. Ἐκ ταύτης δὲ καὶ τῆς $B + \Delta = 2$ δρθ. ἔπειται ὅτι $\Delta = E$. Ἐκ ταύτης ἔπειται (§ 154) ὅτι ἡ κορυφὴ Δ κεῖται ἐπὶ τοῦ τόξου AEG . Τὸ τετράπλευρον λοιπὸν $AB\Gamma\Delta$ εἶναι ἐγγράψιμον. Ὁ.ἔ.δ.



Σχ. 117

Πόρισμα I. Πᾶν δρυμώνιον εἶναι ἐγγράψιμον εἰς κύκλον.

Πόρισμα ΙΙ. "Αν μία γωνία κυρτού τετραπλεύρου είναι ίση πρὸς τὴν ἀπέναντι δξιωτερικὴν γωνίαν αὐτοῦ, τὸ τετράπλευρον τοῦτο είναι ἔγγράψιμον εἰς κύκλον.

"Ασκήσεις

198. Εἰς δοθέντα κύκλον νὰ ἔγγράψητε τυχόν τρίγωνον ΑΒΓ καὶ νὰ δρίσητε τὸ μέσον Δ τοῦ τόξου ΒΓ. "Επειτα νὰ φέρητε χορδὴν ΔΕ παραλλήλον πρὸς τὴν ΑΓ. Νὰ ἀποδείξητε δὲ ὅτι $\Delta E = AB$.

199. Περὶ δοθέντα κύκλον νὰ περιγράψητε δρθογώνιον τρίγωνον. Νὰ ἀποδείξητε δὲ ὅτι τὸ ἀθροισμα τῶν καθέτων πλευρῶν αὐτοῦ ὑπερβαίνει τὴν ὑποτείνουσαν κατά τὴν διάμετρον τοῦ ἔγγεγραμμένου κύκλου.

200. Περὶ δοθέντα κύκλον νὰ περιγράψητε τετράπλευρον ΑΒΓΔ καὶ νὰ ἀποδείξητε ὅτι $AB + \Gamma\Delta = BG + DA$.

201. Νὰ συγκρίνητε τὰς πλευράς παραλληλογράμμου, τὸ δοπίον είναι περιγεγραμμένον περὶ κύκλον.

202. Νὰ διχοτομήσητε τὰς γωνίας ἐνὸς κυρτοῦ τετραπλεύρου καὶ νὰ ἀποδείξητε ὅτι, ἂν σχηματίζηται ὑπὸ τῶν διχοτόμων τετράπλευρον, τοῦτο είναι ἔγγράψιμον εἰς κύκλον.

203. Νὰ κατασκευάσητε ἐν τρίγωνον ἀπὸ μίαν πλευράν, ἀπὸ μίαν τῶν εἰς αὐτὴν προσκειμένων γωνιῶν καὶ ἀπὸ τὴν ἀκτῖνα τῆς περιγεγραμμένης περιφερείας.

"Ασκήσεις πρὸς ἐπανάληψιν τοῦ Α' βιβλίου

204. Νὰ κατασκευάσητε ἐν δρθογώνιον τρίγωνον ΑΒΓ, τοῦ δοπίου ἡ ὑποτείνουσα ΒΓ νὰ είναι διπλασία ἀπὸ τὴν πλευράν ΑΓ.

205. Νὰ ἀποδείξητε ὅτι ἡ μία ἀπὸ τὰς δξείας γωνίας τοῦ προηγουμένως κατασκευασθέντος δρθ. τριγώνου ΑΒΓ είναι διπλασία ἀπὸ τὴν ἄλλην.

206. "Αν ἡ μία ἀπὸ τὰς δξείας γωνίας δρθ. τριγώνου είναι διπλασία ἀπὸ τὴν ἄλλην, νὰ ἀποδείξητε ὅτι ἡ ὑποτείνουσα αὐτοῦ είναι διπλασία ἀπὸ τὴν μικροτέραν πλευράν του.

207. Νὰ γράψητε τὰς ἀποστάσεις ΔΕ, ΔΖ τυχόντος σημείου Δ τῆς βάσεως ἐνὸς ισοσκελοῦς τριγώνου ΑΒΓ ἀπὸ τὰς ίσας πλευράς αὐτοῦ καὶ τὴν ἀπόστασιν ΒΗ τοῦ ἐνὸς ἀκρου Β τῆς βάσεως ἀπὸ τὴν πλευράν ΑΓ. Νὰ ἀποδείξητε δὲ ὅτι $\Delta E + \Delta Z = BH$.

208. Νὰ κατασκευάσητε ἐν ισόπλευρον τρίγωνον ΑΒΓ καὶ νὰ δρίσητε ἐντὸς αὐτοῦ τυχόν σημεῖον Δ. Νὰ γράψητε τὰς ἀποστάσεις ΔΕ, ΔΖ, ΔΗ τοῦ Δ ἀπὸ τὰς πλευράς καὶ τὸ ὕψος ΑΚ τοῦ τριγώνου. Νὰ ἀποδείξητε δὲ ὅτι $\Delta E + \Delta Z + \Delta H = AK$.

209. Νὰ γράψητε τὴν διαγώνιον ΑΓ ἐνὸς παραλληλογράμμου

ΑΒΓΔ. Νὰ δρίσητε τὰ μέσα Ε καὶ Ζ τῶν πλευρῶν ΓΔ καὶ ΑΒ. Νὰ φέρητε τάς εύθείας ΒΕ, ΔΖ καὶ νὰ ἀποδείξητε ὅτι ἡ διαγώνιος ΑΓ διαιρεῖται ὑπ' αὐτῶν εἰς τρία ίσα μέρη.

210. Ἀν ἡ μικροτέρα βάσις ΓΔ ἐνὸς ισοσκελοῦς τραπεζίου ΑΒΓΔ είναι ίση πρὸς ΑΔ + ΒΓ καὶ Ε είναι τὸ μέσον τῆς ΓΔ, νὰ ἀποδείξητε ὅτι ἡ εύθεία ΑΕ διχοτομεῖ τὴν γωνίαν Α τοῦ τραπεζίου τούτου.

211. Ἀν ἡ μικροτέρα βάσις ΓΔ ἐνὸς τραπεζίου ΑΒΓΔ είναι ίση πρὸς τὸ ἄθροισμα τῶν μὴ παραλλήλων πλευρῶν ΒΓ καὶ ΑΔ, νὰ ἀποδείξητε ὅτι αἱ διχοτόμοι τῶν γωνιῶν Α καὶ Β τέμνονται εἰς ἐν σημεῖον τῆς ΓΔ.

212. Νὰ κατασκευάσητε ἐν παραλληλόγραμμον ΑΒΓΔ, εἰς τὸ διποῖον νὰ είναι ΑΒ = ΒΓ · 2. Νὰ δρίσητε ἔπειτα τὸ μέσον Ε τῆς ΓΔ καὶ νὰ φέρητε τάς εύθείας ΑΕ καὶ ΒΕ. Νὰ ἀποδείξητε δὲ ὅτι ἡ γωνία ΑΕΒ είναι δρυθή.

213. Νὰ γράψητε τὸ ύψος ΑΔ τριγώνου ΑΒΓ καὶ τὴν διχοτόμον ΑΕ. Νὰ ἀποδείξητε δὲ ὅτι $\widehat{\Delta AE} = \frac{B - G}{2}$, ἀν ΑΓ > ΑΒ.

214. Νὰ διχοτομήσητε δύο διαδοχικάς γωνίας Α καὶ Β ἐνὸς κυρτοῦ τετραπλεύρου ΑΒΓΔ καὶ νὰ ἀποδείξητε ὅτι ἡ γωνία τῶν διχοτόμων ίσουται πρὸς $\frac{G + Δ}{2}$

215. Νὰ ἀποδείξητε ὅτι τὰ εύθ. τμήματα, τὰ δποῖα δρίζονται ἀπὸ τὰ μέσα τῶν ἀπέναντι πλευρῶν καὶ ἀπὸ τὰ μέσα τῶν διαγώνιων ἐνὸς κυρτοῦ τετραπλεύρου, διέρχονται ἀπὸ ἐν σημεῖον.

216. Νὰ γράψητε δύο ἔφαπτομένας περιφερείας καὶ ἀπὸ τὸ σημεῖον τῆς ἐπαφῆς νὰ φέρητε δύο τεμνούσας τῶν περιφερειῶν τούτων. Νὰ γράψητε δὲ τὰς χορδάς, τὰς δποῖας δρίζουσι τὰ ἄκρα αὐτῶν, καὶ νὰ ἀποδείξητε ὅτι αὗται είναι παράλληλοι.

217. Ἀπὸ τὰ ἄκρα μιᾶς διαμέτρου κύκλου νὰ φέρητε δύο παραλλήλους χορδάς καὶ νὰ ἀποδείξητε ὅτι αὗται είναι ίσαι καὶ ὅτι τὰ ἄλλα ἄκρα αὐτῶν κείνται ἐπὶ διαμέτρου τοῦ αὐτοῦ κύκλου.

218. Νὰ ἀποδείξητε ὅτι τὰ ύψη παντὸς τριγώνου διέρχονται ἀπὸ τὸ αὐτὸ σημεῖον. Τὸ σημεῖον τοῦτο λέγεται δρόσις τρον τοῦ τριγώνου.

219. Νὰ ἔγγάψητε τρίγωνον ΑΒΓ εἰς διθέντα κύκλον Ο. Νὰ δρίσητε τὸ Α' συμμετρικὸν τῆς κορυφῆς Α πρὸς τὸ κέντρον Ο καὶ τὸ δρόσικεντρον Η τοῦ τριγώνου. Νὰ ἀποδείξητε δὲ ὅτι ἡ εύθεία ΗΑ' διχοτομεῖ τὴν πλευράν ΒΓ.

220. Εἰς τὸ προηγούμενον σχῆμα νὰ γράψητε καὶ τὴν ἀπόστασιν ΟΘ τοῦ κέντρου Ο ἀπὸ τὴν πλευράν ΒΓ καὶ νὰ ἀποδείξητε ὅτι $O\Theta = \frac{AH}{2}$.

221. Ἀπὸ ἐκάστην κορυφὴν τριγώνου ΑΒΓ νὰ γράψητε παράλληλον πρὸς τὴν ἀπέναντι πλευράν. Οὕτω σχηματίζεται νέον τρίγωνον

ΘΙΚ. Νὰ ἀποδείξητε ὅτι κέντρον τῆς περὶ αὐτὸν περιγεγραμμένης περιφερείας εἶναι τὸ δρόσκεντρον Η τοῦ ΑΒΓ.

222. Ἐάν Η εἶναι τὸ δρόσκεντρον τριγώνου ΑΒΓ, νὰ ἀποδείξητε ὅτι ἔκαστον τῶν σημείων Α, Β, Γ εἶναι δρόσκεντρον τοῦ τριγώνου, τὸ δῆμον ἔχει κορυφάς τὰ δύο δλλα καὶ τὸ Η.

223. Ἐάν Η εἶναι τὸ δρόσκεντρον λσοπλεύρου τριγώνου ΑΒΓ καὶ Δ τὸ μέσον τῆς πλευρᾶς ΒΓ, νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι $\Delta\Delta = \Delta\Delta \cdot 3$.

224. Ἐάν Ο εἶναι τὸ κέντρον τῆς περὶ τρίγωνον ΑΒΓ περιγεγραμμένης περιφερείας καὶ Η τὸ δρόσκεντρον αὐτοῦ, νὰ ἀποδείξητε ὅτι ἡ εύθεια ΟΗ διέρχεται ἀπὸ τὸ κοινὸν σημεῖον τῶν διαμέσων τοῦ αὐτοῦ τριγώνου. Ἡ εύθεια ΟΗ λέγεται εύθεια τοῦ Euler.

225. Νὰ δρίσητε τὰ μέσα Μ, Π, Ν τῶν πλευρῶν τριγώνου ΑΒΓ, τὸ δρόσκεντρον Η αὐτοῦ, τὰ μέσα Ρ, Τ, Σ τῶν τμημάτων ΑΗ, ΒΗ, ΓΗ καὶ τοὺς πόδας Δ, Ε, Ζ τῶν ύψῶν τοῦ τριγώνου ΑΒΓ (σχ. 118). Νὰ ἀποδείξητε δὲ ὅτι :

α') Τὸ τετράπλευρον ΠΝΣΤ εἶναι δρθογώνιον.

β') Τὰ σημεῖα Ζ καὶ Ε κείνται ἐπὶ τῆς περὶ τὸ ΠΝΣΤ περιγεγραμμένης περιφερείας.

γ') Τὸ τετράπλευρο ΡΝΜΤ εἶναι δρθογώνιον ἔγγεγραμμένον εἰς τὸν αὐτὸν κύκλον μὲ τὸ ΠΝΣΤ.


δ') Τὸ Δ κείται ἐπὶ τῆς αὐτῆς περιφερείας.

Κατὰ ταῦτα τὰ 9 σημεῖα Δ, Ε, Ζ, Μ, Π, Ν, Ρ, Σ, Τ κείνται ἐπὶ τῆς αὐτῆς περιφερείας. Αὕτη λέγεται διά τοῦ περιφέρεια τῶν 9 σημείων. Λέγεται δὲ καὶ περιφέρεια τοῦ Euler.

226. Νὰ ἀποδείξητε ὅτι τὸ κέντρον τῆς περιφερείας τῶν 9 σημείων τριγώνου διχοτομεῖ τὴν ἀπόστασιν τοῦ δρόσκεντρου αὐτοῦ ἀπὸ τὸ κέντρον τῆς περιγεγραμμένης περιφερείας.

227. Νὰ ἀποδείξητε ὅτι ἡ διάμετρος τῆς περιφερείας τῶν 9 σημείων τριγώνου λσοῦται πρὸς τὴν ἀκτίνα τῆς περὶ τὸ τρίγωνον τοῦτο περιγεγραμμένης περιφερείας.

228. Ἐάν Η εἶναι τὸ δρόσκεντρον ἐνὸς τριγώνου ΑΒΓ, νὰ ἀποδείξητε ὅτι τὰ τρίγωνα ΑΒΓ, ΗΒΓ, ΑΗΓ, ΑΒΗ ἔχουσι τὴν αὐτὴν περιφέρειαν τῶν 9 σημείων.



Σχ. 118

ΒΙΒΛΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ


ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

Η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ

§ 160. Τί είναι άνάλυσις καὶ σύνθεσις. Διὰ νὰ ἀποδεῖξωμεν τὸ θεώρημα τῆς § 155 ἐκάμαμεν μίαν προκαταρκτικὴν ἐργασίαν. Κατ' αὐτὴν ὑπεθέσαμεν δτὶ ἀληθεύει ἡ ἀποδεικτέα σχέσις $\widehat{B\Delta} = \widehat{A\Theta B}$ (σχ. 119). Ἐπειτα συνεδυάσαμεν αὐτὴν μὲ τὴν γνωστὴν Ισότητα $A\widehat{\Theta}B = \frac{\widehat{AKB}}{2} = A\widehat{K}\Delta$ καὶ ἐπορίσθημεν τὴν

Ισότητα $B\widehat{\Delta} = A\widehat{K}\Delta$. Παρετηρήσαμεν δὲ δτὶ αὐτῇ δντως ἀληθεύει. Αὐτὴ ἡ ἐργασία λέγεται **ἀνάλυσις**.

Μετὰ ταῦτα ἔχοντες ὀδηγὸν τὰ προηγούμενα ἡκολουθήσαμεν ἀντίθετον πορείαν. Ἡρχίσαμεν δηλ. ἀπὸ τὴν ἀληθῆ Ισότητα $B\widehat{\Delta} = A\widehat{K}\Delta$. Παρετηρήσαμεν δτὶ $A\widehat{K}\Delta = \frac{\widehat{AKB}}{2}$ καὶ ἐπορίσθημεν νέαν ἀληθῆ Ισότητα $B\widehat{\Delta} = \frac{\widehat{AKB}}{2}$.



$$\text{ἀληθῆ Ισότητα } B\widehat{\Delta} = \frac{\widehat{AKB}}{2}.$$

Ἄπὸ αὐτὴν τέλος καὶ ἀπὸ τὴν ἀληθῆ Ισότητα $A\widehat{\Theta}B = \frac{\widehat{AKB}}{2}$ ἐπορίσθημεν τὴν ἀλήθειαν τῆς Ισότητος $B\widehat{\Delta} = A\widehat{B}$, ἥτις ἦτο ἡ ἀποδεικτέα πρότασις. Ἡ δευτέρα αὐτῇ ἐργασία λέγεται **σύνθεσις**.

Ἡ σύνθεσις μόνη ἀποτελεῖ πλήρη ἀπόδειξιν. Μεταχειρίζόμεθα δὲ αὐτὴν μόνον, δταν γνωρίζωμεν τὴν σειρὰν τῶν συλλο-

γισμῶν, μὲ τοὺς δποίους καταλήγομεν εἰς τὴν ἀποδεικτέαν ἀλήθειαν ή εύκόλως ἐννοοῦμεν τὴν σειράν ταύτην. Ἡ δὲ ἀνάλυσις μόνη δὲν ἀποτελεῖ πάντοτε πλήρη ἀπόδειξιν. Διότι ἐκ τοῦ παραδεχόμενοι τὸ ἀποδεικτέον ως ἀληθὲς φθάνομεν εἰς ἀληθὲς συμπέρασμα, δὲν ἔπειται πάντοτε δτι ἀληθεύει ή πρότασις, ή δποία ὑπετέθη ἀληθῆς.

Τὸ τοιοῦτον συμπέρασμα εἶναι ἀσφαλὲς μόνον, ἀν αἱ διαδοχικαὶ προτάσεις τῆς ἀναλύσεως εἶναι *ἀντιστρεπταί*. "Ητοι τοιαῦται, ὥστε, ἀν· ἐκ τῆς ἀληθείας μιᾶς πρώτης ἔπειται ή ἀλήθεια δευτέρας καὶ ἐκ τῆς ἀληθείας τῆς δευτέρας νὰ ἔπηται ή ἀλήθεια τῆς πρώτης. Τῆς Γεωμετρίας δημως αἱ προτάσεις δὲν εἶναι δλαι ἀντιστρεπταί. Π.χ. "Αν παραδεχθῶμεν δτι αἱ πλευραὶ δύο γωνιῶν εἶναι παράλληλοι καὶ δμόρροποι, ἀσφαλῶς συμπεραίνομεν δτι αἱ γωνίαι εἶναι ἴσαι. "Αν δημως δεχθῶμεν δτι δύο γωνίαι εἶναι ἴσαι, δὲν ἔπειται δτι αἱ πλευραὶ αὐτῶν εἶναι παράλληλοι.


Διὰ τοῦτο τὴν ἀνάλυσιν ἀκολουθεῖ ή συνθετικὴ ἀπόδειξις.
'Ιδού δὲ δύο ἀκόμη ἀπλὰ παραδείγματα:

§ 161. Θεώρημα I. Πᾶν τραπέζιον $ABΓΔ$ ἐγγεγραμμένον εἰς κύκλον εἶναι ισοσκελές (σχ. 120).

"*Ἄν αληθησις.* "Αν τὸ τραπέζιον $ABΓΔ$ εἶναι ισοσκελές, ήτοι, ἀν $AΔ = BΓ$, θὰ εἶναι καὶ τόξον $AΔ =$ μὲ τόξ. $BΓ$. 'Άλλα τότε θὰ εἶναι καὶ $\phi = \omega$. ἐκ ταύτης δὲ ἔπειται δτι αἱ εύθειαι AB καὶ $ΓΔ$ εἶναι παράλληλοι. Τοῦτο δὲ εἶναι ἀληθές.

Σύνθεσις. 'Επειδὴ αἱ πλευραὶ AB καὶ $ΓΔ$ εἶναι παράλληλοι, εἶναι $\phi = \omega$.


"Ενεκα ταύτης δὲ εἶναι $\widehat{AD} = \widehat{BG}$ καὶ ἔξ αὐτῆς ἔπειται δτι αἱ χορδαὶ $AΔ$ καὶ $BΓ$ εἶναι ἴσαι. 'Επομένως τὸ τραπέζιον $ABΓΔ$ εἶναι ισοσκελές.



Σχ. 120

§ 162. Θεώρημα II. Πᾶν ισοσκελές τραπέζιον εἶναι ἐγγράψιμον εἰς κύκλον.

*Ανάλυσις. "Αν τὸ ισοσκελές τραπέζιον ΑΒΓΔ (σχ. 121) είναι έγγραψιμον, θὰ εἰναι $B + \Delta = 2$ δρθ. (§ 158)." Αν δὲ φέρωμεν τὴν ΓΕ παράλληλον πρὸς τὴν ΑΔ, θὰ εἰναι $E\Gamma = A\Delta$.



Σχ. 121

*Επειδὴ δὲ εἰναι $B\Gamma = A\Delta$, ἔπειται δὴ $\Gamma E = B\Gamma$ καὶ ἐπομένως $B = \omega$. Ή ισότης λοιπὸν $B + \Delta = 2$ δρθ. γίνεται $\omega + \Delta = 2$ δρθ. *Επειδὴ καὶ $\omega = A$, αὕτη γίνεται $A + \Delta = 2$ δρθ. *Εξ αὐτῆς δὲ ἔπειται δὴ αἱ πλευραὶ ΑΒ καὶ ΓΔ πρέπει νὰ εἰναι παράλληλοι. Τοῦτο δὲ εἰναι ἀληθές.

Σύνθεσις. *Επειδὴ αἱ πλευραὶ ΑΒ καὶ ΓΔ εἰναι παράλληλοι, ἔπειται δὴ $A + \Delta = 2$ δρθ. "Αν δὲ φέρωμεν τὴν ΓΕ παράλληλον πρὸς τὴν ΑΔ, θὰ εἰναι $A = \omega$ καὶ $A\Delta = \Gamma E$. *Έκ δὲ τῆς $A = \omega$ καὶ τῆς $A + \Delta = 2$ δρθ, ἔπειται δὴ $\omega + \Delta = 2$ δρθ. *Έκ δὲ τῆς $A\Delta = \Gamma E$ καὶ τῆς $A\Delta = B\Gamma$, ἔπειται δὴ $B\Gamma = \Gamma E$ καὶ ἐπομένως $\omega = B$. Ή προηγουμένη λοιπὸν ισότης $\omega + \Delta = 2$ δρθ. γίνεται $B + \Delta = 2$ δρθ. Κατ' ἀκολουθίαν τὸ ΑΒΓΔ εἰναι έγγραψιμον (§ 159).

Άσκήσεις

229. *Απὸ ἐν κοινὸν σημεῖον δύο τεμνομένων περιφερειῶν φέρομεν εὐθεῖαν παράλληλον πρὸς τὴν διάκεντρον αὐτῶν. Νὰ ἀποδειχθῇ δὴ τὸ ἄκθροισμα τῶν ἐπ' αὐτῆς δριζομένων χορδῶν εἰναι διπλάσιον ἀπὸ τὴν ἀπόστασιν τῶν κέντρων.

230. Εἰς ἐν τραπέζιον ΑΒΓΔ ἡ πλευρὰ ΑΔ εἰναι κάθετος ἐπὶ τὰς βάσεις ΑΒ καὶ ΔΓ καὶ $B\Gamma = AB + \Delta\Gamma$. Νὰ ἀποδειχθῇ δὴ ἡ πλευρὰ ΑΔ ἐφάπτεται τῆς περιφερείας, ἡ δόποια ἔχει διάμετρον $B\Gamma$.

231. Νὰ γράψητε περιφέρειαν Κ καὶ νὰ δρίσητε ἐκτός τοῦ κύκλου σημεῖον Α. Νὰ φέρητε ἔπειτα τὴν εὐθεῖαν ΑΚ, ἥτις τέμνει τὴν περιφέρειαν εἰς δύο σημεῖα Β καὶ Γ. "Αν τὸ Β εἰναι μεταξὺ Α καὶ Κ καὶ Δ εἰναι τυχόν σημεῖον τῆς περιφερείας, νὰ ἀποδείξῃτε δὴ $AB < A\Delta$ καὶ $A\Gamma > A\Delta$.

232. *Απὸ ἔκαστον κοινὸν σημεῖον δύο τεμνομένων περιφερειῶν νὰ φέρητε κοινὴν τέμνουσαν αὐτῶν καὶ νὰ ἀποδείξῃτε δὴ αἱ χορδαὶ, τὰς δόποιας δριζουσι τὰ ἄκρα αὐτῶν εἰναι παράλληλοι.

233. Νὰ ἀποδείξῃτε δὴ τὰ ὅψη τριγώνου διχοτομοῦσι τὰς γωνίας τοῦ τριγώνου, τὸ δοποῖον ἔχει κορυφάς τούς πόδας τῶν ὅψῶν.

Τὸ δεύτερον τοῦτο τρίγωνον λέγεται ὁ ρθικὸν τοῦ πρώτου.


234. Εἰς δοθέντα κύκλον K νὰ ἐγγράψητε τρίγωνον $ABΓ$ καὶ νὰ φέρητε τὰ ὅψη $AΔ$ καὶ BE αὐτοῦ. Νὰ ἀποδείξητε δὲ ὅτι ἡ ἀκτὶς KG εἶναι κάθετος ἐπὶ τὴν $ΔE$.

235. Ἀπὸ ἐν σημεῖον τῆς περὶ τρίγωνον $ABΓ$ περιγεγραμμένης περιφερείας νὰ φέρητε καθέτους ἐπὶ τὰς πλευράς τοῦ τριγώνου τούτου. Νὰ ἀποδείξητε δὲ ὅτι οἱ πόδες τῶν καθέτων τούτων κείνται ἐπ' εύθειας. (Εύθεια τοῦ Simson).

236. Νὰ φέρητε τὰ ὅψη BE καὶ $ΓZ$ ἐνδὸς τριγώνου $ABΓ$. Νὰ δρίσητε τὸ μέσον M τῆς πλευρᾶς $BΓ$ καὶ τὸ μέσον P τοῦ τμήματος AH (H τὸ δρόθικεντρον). Νὰ ἀποδείξητε δὲ ὅτι ἡ εύθεια MP εἶναι κάθετος ἐπὶ τὴν ZE .

§ 163. Χρῆσις τῆς ἀναλύσεως εἰς τὴν λύσιν προβλημάτων.

Διὰ νὰ ἐννοήσωμεν πῶς νὰ λύσωμεν τὸ πρόβλημα τῆς § 156 ἔκαμαμεν τὴν ἑξῆς προκαταρκτικὴν ἐργασίαν. Ὅπεθέσαμεν δτὶ γνωρίζομεν τὴν ζητουμένην εὐθεῖαν καὶ δτὶ ἡ AB (σχ. 122). Παρετηρήσαμεν δὲ τότε δτὶ ἡ γωνία ABK θὰ ἡτο δρθή καὶ τὸ σημεῖον B ἐπὶ τῆς περιφερείας, ἡ δποία ἔχει διάμετρον AK . Κατελήξαμεν δηλ. οὕτως εἰς ἐν σχῆμα, τὸ δποίον ἡδυνάμεθα καὶ ἀπὸ τὴν ἀρχὴν νὰ κατασκευάσωμεν. Ὡ πρώτη αὐτὴ ἐργασία λέγεται ἀνάλυσις.



Σχ. 122

Μετὰ ταῦτα κατεσκευάσαμεν τὴν περιφέρειαν, εἰς τὴν δποίαν ὀδηγήθημεν ἀπὸ τὴν ἀνάλυσιν, ὀρίσαμεν οὕτω τὸ σημεῖον B καὶ ἐφέραμεν τὴν εύθειαν AB . Ὡ δευτέρα αὐτὴ ἐργασία λέγεται σύνθεσις.

Τέλος δὲ ἀπεδείξαμεν δτὶ ἡ AB εἶναι πράγματι ἡ ζητουμένη εὐθεῖα.

Μὲ δμοίον τρόπον είργασθημεν καὶ διὰ τὴν λύσιν τῶν προβλημάτων τῆς § 128 καὶ τῆς § 151. Εἰς τὸ πρόβλημα μάλιστα τῆς § 151 τὴν ἀπόδειξιν ἡκολούθησε καὶ διερεύνησις.

Ἐν γένει, δσάκις ἀγνοοῦμεν τὴν λύσιν ἐνδὸς προβλήματος, κάμνομεν χρῆσιν τῆς ἀναλύσεως, ἡ δποία συνίσταται εἰς τὸ ἑξῆς:

‘Υποθέτομεν δτι κατασκευάσθη τό ζητούμενον σχήμα καὶ μὲ τὴν βοήθειαν γνωστῶν ἴδιοτήτων ἀγόμεθα εἰς τὴν κατασκευὴν ἄλλου σχήματος. Ἀπὸ αὐτὸς εἰς ἄλλο καὶ οὕτω καθ’ ἔξῆς, ἔως δτου καταλήξωμεν εἰς σχήμα, τό δποτον γνωρίζομεν νὰ κατασκευάζωμεν ἀπὸ τὴν ἀρχῆν.

Μετὰ τὴν ἀνάλυσιν ταύτην κάμνομεν σύνθεσιν. Αὕτη συνίσταται εἰς τό ἔξῆς.

‘Αρχίζομεν ἀπὸ τὴν κατασκευὴν τοῦ τελευταίου σχήματος, εἰς τό δποτον μᾶς ὀδήγησεν ἡ ἀνάλυσις καὶ κατασκευάζομεν δλα τὰ προηγούμενα κατὰ σειράν ἀντίστροφον τῆς προηγουμένης. Οὕτω δὲ καταλήγομεν εἰς τὴν κατασκευὴν τοῦ ζητουμένου σχήματος.

Μετὰ τὴν σύνθεσιν πρέπει νὰ ἀκολουθῇ ἀπόδειξις δτι τὸ κατασκευασθὲν σχήμα εἶναι τὸ ζητούμενον. ‘Οσάκις δὲ δὲν εἶναι προφανῆς ἡ ὑπαρξία λύσεως, πρέπει νὰ ἀκολουθῇ διερεύνησις, ἥτοι ἀνεύρεσις τῶν ἀναγκαίων καὶ ἐπαρκῶν σχέσεων τῶν δεδομένων στοιχείων, διὰ νὰ ἔχῃ τὸ πρόβλημα λύσιν.

‘Ως παραδείγματα ἀναγράφομεν ἀκόμη καὶ τὰ ἀκόλουθα:

§ 164. Πρόβλημα I. Νὰ κατασκευασθῇ τρίγωνον ἀπὸ μίαν πλευρὰν α καὶ ἀπὸ τὰς διαμέσους δ καὶ δ’, αἱ δποται ἀρχίζουσιν ἀπὸ τὰ ἀκρα τῆς πλευρᾶς ταύτης.

‘Ανάλυσις. Ἡ οὐποθέσωμεν δτι ΑΒΓ εἶναι τὸ ζητούμενον τρίγωνον καὶ δτι $B\Gamma = \alpha$, ἡ διάμεσος $BE = \delta$ καὶ ἡ διάμεσος $GZ = \delta'$.


‘Ἄν Θ εἶναι τὸ κοινὸν σημεῖον αὐτῶν, ἡ ΑΘΔ θὰ εἶναι ἡ γ’ διάμεσος καὶ $B\Theta = BE \cdot \frac{2}{3} = \delta \cdot \frac{2}{3}$, $\Gamma\Theta = GZ \cdot \frac{2}{3} = \delta' \cdot \frac{2}{3}$, $A\Theta = AD \cdot \frac{2}{3} = \Theta\Delta \cdot 2$ (§ 129).

Γνωρίζομεν λοιπὸν τὰς τρεῖς πλευράς τοῦ τριγώνου $B\Theta\Gamma$ καὶ ἐπομένως δυνάμεθα νὰ κατασκευάσωμεν τοῦτο ἀπ’ ἀρχῆς.

Σύνθεσις. Διαιροῦμεν τὰ διθέντα τμήματα δ καὶ δ’ εἰς τρία ἴσα μέρη ἔκαστον καὶ κατασκευάζομεν τρίγωνον $B\Theta\Gamma$ μὲ πλευράς $B\Gamma = \alpha$, $B\Theta = \delta \cdot \frac{2}{3}$ καὶ $\Gamma\Theta = \delta' \cdot \frac{2}{3}$. Τοιουτοτρόπως

δρίζονται αι δύο κορυφαὶ Β καὶ Γ τοῦ ζητουμένου τριγώνου.

Διὰ νὰ δρίσωμεν δὲ τὴν τρίτην κορυφὴν Α, φέρομεν τὴν διάμεσον ΘΔ τοῦ ΒΘΓ καὶ ἐπὶ τῆς προεκτάσεως αὐτῆς πέραν τῆς κορυφῆς Θ δρίζομεν τμῆμα ΘΑ=ΘΔ·2. Ἀγομέν τέλος τὰς εύθείας ΑΒ, ΑΓ καὶ σχηματίζεται τὸ τριγώνον ΑΒΓ, τὸ δόποιον εἶναι τὸ ζητούμενον.



Ἄπό δειξις. Τοῦτο ἔχει πλευράν ΒΓ = α ἐκ κατασκευῆς. Ἐπειδὴ δὲ Δ εἶναι τὸ μέσον αὐτῆς, ἡ ΑΘΔ εἶναι διάμεσος αὐτοῦ. Ἐκ δὲ τῆς

Σ. 123

ἰσότητος ΑΘ = ΘΔ · 2, ἔπειται δτὶ ΑΘ = ΑΔ · $\frac{2}{3}$ καὶ κατ' ἀκολουθίαν Θ εἶναι τὸ κοινὸν σημεῖον τῶν διαμέσων τοῦ τριγώνου ΑΒΓ.

Αἱ εύθεῖαι λοιπὸν ΒΘΕ καὶ ΓΘΖ εἶναι αἱ ἄλλαι διάμεσοι αὐτοῦ. Καὶ ἐπομένως ΒΘ = BE · $\frac{2}{3}$ καὶ ΓΘ = ΓΖ · $\frac{2}{3}$.

Ἐπειδὴ δὲ ἐλήφθησαν $B\theta = \delta \cdot \frac{2}{3}$, $\Gamma\theta = \delta' \cdot \frac{2}{3}$, ἔπειται δτὶ $BE = \delta$ καὶ $\Gamma Z = \delta'$.

Τὸ τριγώνον λοιπὸν ΑΒΓ ἔχει τὰ δοθέντα στοιχεῖα καὶ ἐπομένως εἶναι τὸ ζητούμενον.

Διερεύνησις. Ἀπὸ τὸν τρόπον τοῦτον τῆς λύσεως ἐννοῦμεν δτὶ: Διὰ νὰ ἔχῃ λύσιν τὸ πρόβλημα, πρέπει νὰ εἶναι δυνατὴ ἡ κατασκευὴ τοῦ τριγώνου ΘΒΓ, διότι αἱ ὑπόλοιποι κατασκευαὶ εἶναι προφανῶς δλαι δυναταὶ. Ἡ δὲ κατασκευὴ τοῦ ΘΒΓ εἶναι δυνατή, ἀν

$$\Gamma\theta - B\theta < B\Gamma < \Gamma\theta + B\theta, \text{ ή } \delta' \cdot \frac{2}{3} - \delta \cdot \frac{2}{3} < \alpha < \delta' \cdot \frac{2}{3} + \delta \cdot \frac{2}{3}.$$

Ἐκ τούτων δὲ ἔπειται δτὶ $\delta' - \delta < \frac{3\alpha}{2} < \delta' + \delta$.

Α σκήνεις


237. Νὰ κατασκευασθῇ τρίγωνον ἐκ δύο πλευρῶν καὶ τῆς διαμέσου, ἡ δοπιά ἀντιστοιχεῖ εἰς μίαν ἀπὸ αὐτᾶς.

238. Νὰ κατασκευασθῇ τρίγωνον $AB\Gamma$ ἀπὸ τὴν πλευράν $B\Gamma$ καὶ ἀπὸ τὰς διαμέσους $A\Delta$ καὶ BE αὐτοῦ.

239. Νὰ κατασκευασθῇ τρίγωνον $AB\Gamma$ ἀπὸ τὰς πλευράς AB , AG καὶ ἀπὸ τὴν διάμεσον $A\Delta$.

§ 165. Πρόβλημα II. Νὰ κατασκευασθῇ ίσοσκελὲς τρίγω-

νον ἐκ τῆς περιμέτρου τ καὶ τοῦ ψηφους ν (σχ. 124).



Σχ. 124

Ἀνάλυσις. Ἐν τῷ ίσοσκελές τρίγωνον $AB\Gamma$ εἶναι τὸ ζητούμενον, θὰ εἴναι $AZ = u$ καὶ $AB + BG + GA = \tau$. Ἐν δὲ ἐπὶ τῆς προεκτάσεως τῆς βάσεως $B\Gamma$ λάβωμεν $B\Delta = \Gamma E = AB$, θὰ εἴναι:

$$\Delta E = AB + BG + GA = \tau.$$

Ἐπειδὴ δὲ $BZ = ZG$, θὰ εἴναι καὶ $\Delta B + BZ = ZG + GE$

ἢ $\Delta Z = ZE$ καὶ ἐπομένως $A\Delta = AE$. Τὸ τρίγωνον λοιπὸν $A\Delta E$ εἴναι ίσοσκελές.

Ἐπειδὴ δὲ γνωρίζομεν τὴν βάσιν ΔE καὶ τὸ ψῆφος AZ αὐτοῦ, δυνάμεθα νὰ κατασκευάσωμεν τοῦτο ἀπ' ἀρχῆς.

Παρατηροῦμεν ἀκόμη ὅτι ἡ κορυφὴ B κεῖται ἐπὶ τῆς καθέτου εἰς τὸ μέσον τῆς πλευρᾶς $A\Delta$, διότι $B\Delta = BA$. Ομοίως ἡ κορυφὴ Γ κεῖται ἐπὶ τῆς καθέτου εἰς τὸ μέσον τῆς AE .

Σύγθεσις. Κατασκευάζομεν ίσοσκελὲς τρίγωνον $A\Delta E$ μὲ βάσιν $\Delta E = \tau$ καὶ ψῆφος $AZ = u$.

Ἐπειτα ἄγομεν τὰς καθέτους εἰς τὰ μέσα τῶν πλευρῶν $A\Delta$, AE . Ἐν δὲ ἡ ΔE τέμνηται ὑπ' αὐτῶν ἀντιστοίχως εἰς τὰ σημεῖα B καὶ Γ , ἄγομεν τὰ εὐθ. τμήματα AB , AG .

Οὕτω δὲ σχηματίζεται τρίγωνον $AB\Gamma$, τὸ δόποῖον εἴναι τὸ ζητούμενον.

Ἀπόδειξις. Τοῦτο ἔχει ψῆφος $AZ = u$ ἐκ κατασκευῆς.

Ἐπειδὴ $AB = BD$ καὶ $AG = GE$, εἶναι καὶ
 $AB + BG + AG = DB + BG + GE = DE = \tau.$

Από δὲ τὰς ισότητας $\Delta = E$, $\widehat{ABG} = \Delta \cdot 2$, $\widehat{AGB} = E \cdot 2$ προκύπτει ἡ ισότης $\widehat{ABG} = \widehat{AGB}$ καὶ ἐπομένως $AG = AB$.

Τὸ τρίγωνον λοιπὸν ABG εἶναι ισοσκελές. "Εχει δὲ καὶ τὰ δοθέντα στοιχεῖα, ἐπομένως εἶναι τὸ ζητούμενον.

Διερεύνησις. Διὰ νὰ ἔχῃ τὸ πρόβλημα λύσιν, πρέπει νὰ εἶναι δυνατὰι αἱ προηγούμεναι κατασκευαὶ καὶ αἱ εὐθεῖαι HB , TH νὰ τέμνωνται ἐκτὸς τοῦ τριγώνου ADE .

Ἡ κατασκευὴ τοῦ ισοσκελοῦ τριγώνου ADE εἶναι δυνατή, οἰαδήποτε καὶ ἀν εἶναι τὰ δοθέντα στοιχεῖα.

Αἱ δὲ κάθετοι εἰς τὰ μέσα τῶν πλευρῶν αὐτοῦ τέμνονται εἰς τὸ κέντρον K τῆς περὶ αὐτὸ περιγεγραμμένης περιφερείας. Διὰ νὰ εἶναι δὲ τὸ K ἐκτὸς τοῦ τριγώνου, πρέπει νὰ εἶναι $\widehat{\Delta AE} > 1$ δρθ. καὶ ἐπομένως $\Delta + E < 1$ δρθ. Ἐπειδὴ δὲ $\Delta = E$, πρέπει νὰ εἶναι $\Delta \cdot 2 < 1$ δρθ. καὶ $\Delta < \frac{1}{2}$ δρθ. Διὰ νὰ συμβαίνῃ δὲ τοῦτο, πρέπει νὰ εἶναι $\widehat{\Delta AZ} > \frac{1}{2}$ δρθ. καὶ ἐπομένως $\widehat{\Delta AZ} > \Delta$. Ἐκ ταύτης δὲ ἔπειται δτὶ πρέπει νὰ εἶναι $\Delta Z > AZ$ καὶ ἐπομένως $\Delta Z \cdot 2 > AZ \cdot 2$ ή $\tau > \upsilon \cdot 2$.

Ἄσκήσεις

240. Νὰ κατασκευάσητε τρίγωνον ABG ἐκ τῶν γωνιῶν καὶ τοῦ ἀθροίσματος $AB+AG$.

241. Νὰ κατασκευάσητε τρίγωνον ABG ἀπὸ τὴν πλευρὰν BG , ἀπὸ τὴν γωνίαν B καὶ ἀπὸ τὸ ἀθροίσμα $AB+AG$.

242. Νὰ κατασκευάσητε τρίγωνον ABG ἀπὸ τὴν πλευρὰν BG , ἀπὸ τὴν γωνίαν G ή B καὶ ἀπὸ τὴν διαφορὰν $AG—AB$ (ὑποτίθεται $AG > AB$).

243. Νὰ κατασκευάσητε τρίγωνον ABG ἐκ τῶν γωνιῶν καὶ τῆς περιμέτρου αὐτοῦ.

244. Νὰ κατασκευάσητε τρίγωνον ἀπὸ δύο γωνίας καὶ ἀπὸ τὴν ἀκτίνα τοῦ ἐγγεγραμμένου κύκλου.

§ 166. Πρόβλημα III. Νὰ γραφῇ κοινὴ ἑσωτερικὴ ἐφαπτομένη δύο δεδομένων περιφερειῶν K καὶ L (σχ. 125).

Ανάλυσις. "Ας ύποθέσωμεν ότι AB είναι ή ζητουμένη κοινή έσωτερική έφαπτομένη τῶν περιφερειῶν K καὶ Λ , ήτοι αὗται κείνται ἐκατέρωθεν τῆς κοινῆς έφαπτομένης AB αὐτῶν. "Αν φέρωμεν τὴν $\Lambda\Gamma$ παράλληλον πρὸς τὴν AB , τὸ τετράπλευρον $\Lambda\Gamma\Lambda B$ θὰ είναι δρθογώνιον καὶ $\Lambda\Gamma = \Lambda B$. 'Η δὲ $\Lambda\Gamma$ θὰ έφάπτηται εἰς τὸ Γ τῆς περιφερείας, ή δοποῖα ἔχει κέντρον K καὶ ἀκτῖνα $K\Gamma = KA + \Lambda\Gamma = KA + \Lambda B$. 'Επειδὴ δὲ ή περιφέρεια αὕτη δύναται νὰ γραφῇ ἀρχικῶς, καὶ ή $\Lambda\Gamma$ δύναται νὰ γραφῇ μετ' αὐτὴν (§ 156).


Σύνθεσις. Γράφομεν περιφέρειαν μὲ κέντρον K καὶ ἀκτῖνα $KA + \Lambda B$. "Επειτα ἄγομεν τὴν $\Lambda\Gamma$ έφαπτομένην εἰς αὐτὴν καὶ τὴν ἀκτῖνα $K\Gamma$. Αῦτη τέμνει τὴν δοθεῖσαν περιφέρειαν K εἰς ἐν σημεῖον A . "Επειτα ἄγομεν ἀκτῖνα ΛB παράλληλον καὶ ἀντίρροπον πρὸς τὴν KA . "Αγομεν τέλος τὴν εύθειαν AB , ήτις είναι ή ζητουμένη.

Απόδειξις. 'Επειδὴ $KA + \Lambda B = K\Gamma$, ἐκ κατασκευῆς δὲ είναι καὶ $KA + \Lambda B = K\Gamma$, ἔπειται ότι $\Lambda B = \Lambda B$. 'Επειδὴ δὲ αὗται είναι καὶ παράλληλοι ἐκ κατασκευῆς, τὸ τετράπλευρον $\Lambda\Gamma\Lambda B$ είναι παραλληλόγραμμον. 'Εκ δὲ τῆς $\Gamma = 1$ δρθ, ἔπειται ότι $B = 1$ δρθ. καὶ $\widehat{KAB} = 1$ δρθ. 'Η AB λοιπὸν έφάπτεται καὶ τῶν δύο περιφερειῶν. "Έχει δὲ προφανῶς τοὺς κύκλους ἐκατέρωθεν αὐτῆς καὶ ἐπομένως είναι πράγματι ή ζητουμένη.

Διερεύνησις. Είναι φανερὸν ότι, διὰ νὰ ἔχῃ τὸ πρόβλημα λύσιν, πρέπει νὰ ἀγηται ἐκ τοῦ Λ έφαπτομένη εἰς τὴν βοηθητικὴν περιφέρειαν (K , $K\Gamma$). Διὰ νὰ συμβαίνῃ δὲ τοῦτο, πρέπει νὰ είναι:

$$KL \cong K\Gamma \text{ ή } KL \cong KA + \Lambda B.$$

"Αν είναι $KL > KA + \Lambda B$, ήτοι, ὅν οἱ δύο κύκλοι είναι



Σχ. 125

έκτδς δλλήλων χωρίς νά έχωσι κοινά σημεῖα, ἄγονται ἐκ τοῦ Λ δύο ἔφαπτόμεναι ΛΓ, ΛΓ' καὶ τὸ πρόβλημα έχει δύο λύσεις, ήτοι ύπάρχουσι δύο κοιναὶ ἔσωτερικαὶ ἔφαπτόμεναι ΑΒ, Α'Β', αἱ δποῖαι γράφονται κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον.

"Αν $\text{ΚΛ} = \text{ΚΑ} + \text{ΛΒ} = \text{ΚΓ}$, τὸ Λ κεῖται ἐπὶ τῆς περιφερείας (Κ, ΚΓ) καὶ ἄγεται πρὸς αὐτὴν μία μόνη ἔφαπτομένη.

"Αν δὲ $\text{ΚΛ} < \text{ΚΑ} + \text{ΛΒ}$, ήτοι $\text{ΚΛ} < \text{ΚΓ}$, τὸ Λ κεῖται ἐντὸς τοῦ κύκλου (Κ, ΚΓ) καὶ τὸ πρόβλημα οὐδεμίαν έχει λύσιν.

'Α σκήσεις

245. Νὰ γράψητε κοινὴν ἔξωτερικὴν ἔφαπτομένην δύο ίσων περιφερειῶν.

246. Νὰ γράψητε κοινὴν ἔξωτερικὴν ἔφαπτομένην δύο ἀνίσων περιφερειῶν.

247. Νὰ γράψητε εύθειαν, ή δποία νὰ τέμνῃ δύο διθείσας περιφερείας, αἱ δὲ ἀποστάσεις τῶν κέντρων ἀπὸ αὐτὴν νὰ εἰναι ἀντιστολχῶς ίσαι πρὸς διθέντα εὐθ. τμῆματα.

248. Νὰ γράψητε εύθειαν, ή δποία νὰ τέμνῃ δύο διθείσας περιφερείας καὶ νὰ δρίζωνται ἐπ' αὐτῆς χορδαὶ ἀντιστοίχως ίσαι πρὸς διθέντα εὐθ. τμῆματα.

249. Ἀπὸ διθέν σημεῖον Γ νὰ γράψητε εύθειαν, ή δποία νὰ τέμνῃ διθεῖσαν περιφέρειαν Κ, ή δὲ ἐπ' αὐτῆς δριζομένη χορδὴ νὰ ισοῦται πρὸς διθέν εὐθ. τμῆμα.

§ 167. Πρόβλημα IV. Νὰ κατασκευασθῇ τμῆμα κύκλου, τὸ δποῖον νὰ ἔχῃ δοθεῖσαν χορδὴν ΑΒ καὶ νὰ δέχηται γωνίαν ἵσην πρὸς δοθεῖσαν γωνίαν ω (σχ. 126).

"Ανάλυσις. "Ας ύποθέσωμεν δτι ΑΔΒΑ εἰναι τὸ ζητούμενον κυκλικὸν τμῆμα, τὸ δποῖον έχει κέντρον Κ.

"Αν φέρωμεν τὴν ἔφαπτομένην ΒΓ, θὰ εἰναι $\widehat{\text{ΑΒΓ}} = \widehat{\text{ΑΔΒ}} = \omega$. Ἐπομένως ή ΒΓ δύναται νὰ γραφῇ ἀπ' ἀρχῆς. Ἐπειδὴ δὲ ή ΚΒ εἰναι κάθετος ἐπὶ τὴν ΒΓ καὶ ή ΚΕ κάθετος ἐπὶ τὴν ΑΒ καὶ αῦται δύνανται νὰ γραφῶσιν, δρίζεται καὶ τὸ Κ.

Σύνθεσις. Κατασκευάζομεν γωνίαν ΑΒΓ ίσην πρὸς τὴν διθεῖσαν ω. "Αγομεν ἔπειτα τὴν ΒΜ κάθετον ἐπὶ τὴν ΒΓ καὶ τὴν ΛΕ κάθετον ἐπὶ τὴν ΑΒ εἰς τὸ μέσον αὐτῆς.


Οὕτως δρίζεται ἡ τομὴ Κ τῶν καθέτων τούτων.

"Ἐπειτα δὲ μὲ κέντρον Κ καὶ ἀκτῖνα KB γράφομεν τὸ τόξον ΑΔΒ, τὸ δποῖον εἶναι ἐκτὸς τῆς γωνίας ΑΒΓ.

Τὸ ύπ' αὐτοῦ καὶ τῆς ΑΒ δριζόμενον κυκλικὸν τμῆμα ΑΒΔΑ εἶναι τὸ ζητούμενον.

"Ἀπόδειξις. Εἶναι φανερὸν ὅτι $\widehat{\text{ΛΕΒ}} + \widehat{\text{ΜΒΑ}} < 2\delta\theta$. Αἱ εὐθεῖαι λοιπὸν ΛΕ καὶ ΜΒ τέμνονται εἰς τι σημεῖον Κ καὶ εἶναι KA = KB. Τὸ γραφὲν λοιπὸν τόξον διέρχεται διὰ τῶν Α, Β καὶ δρίζεται κυκλικὸν τμῆμα ΑΒΔΑ.

"Ἐπειδὴ δὲ ἡ ΒΓ, ὡς κάθετος ἐπὶ τὴν ἀκτῖνα KB εἰς τὸ ἄκρον τῆς εἶναι ἐφαπτομένη, εἶναι $\widehat{\text{ΑΔΒ}} = \widehat{\text{ΑΒΓ}} = \omega$. Τὸ κατασκευασθὲν λοιπὸν κυκλικὸν τμῆμα δέχεται γωνίαν ἵσην πρὸς τὴν ω . Εἶναι λοιπὸν τὸ ζητούμενον.



Σχ. 126

"Διερεύνησις. Αἱ προηγούμεναι κατασκευαὶ εἶναι δλαι δυναταὶ. Τὸ πρόβλημα λοιπὸν ἔχει πάντοτε λύσιν. "Αν δὲ ἡ γωνία ΑΒΓ κατασκευασθῇ ἀπὸ τὸ ἄλλο μέρος τῆς χορδῆς ΑΒ, κατασκευάζομεν καὶ ἄλλο κυκλικὸν τμῆμα, τὸ δποῖον πληροῖ τὰ ἐπιτάγματα τοῦ προβλήματος. Τοῦτο δμως εἶναι ἵσην πρὸς τὸ πρῶτον, διότι εἶναι συμμετρικὸν αὐτοῦ πρὸς τὴν ΑΒ.

Τὸ πρόβλημα ἔπομένως ἔχει μίαν λύσιν.

'Ασκήσεις

250. Νὰ κατασκευάσητε τμῆμα κύκλου μὲ χορδὴν 6 ἑκατ. καὶ νὰ δέχηται γωνίαν 45°.

251. Νὰ κατασκευάσητε τμῆμα κύκλου μὲ χορδὴν 5 ἑκατ. καὶ νὰ δέχηται γωνίαν 60°.

252. Εἰς δοθέντα κύκλον γράφομεν χορδὴν ΑΒ. Οὕτως δὲ κύκλος διαιρεῖται εἰς δύο κυκλικὰ τμήματα. "Αν τὸ ἐν ἀπὸ αὐτὰ δέχηται γωνίαν $52^{\circ} 35' 20''$, νὰ εὕρητε τὸ μέτρον τῆς γωνίας, τὴν δποίαν δέχεται τὸ ἄλλο.


§ 168. Πρόβλημα V. Δίδεται εύθεια AB καὶ πρὸς τὸ αὐτὸν μέρος αὐτῆς δύο σημεῖα Γ καὶ Δ . Νὰ δρισθῇ ἐπὶ τῆς AB σημεῖον E τοιοῦτον, ὥστε νὰ εἰναι $\widehat{GEA} = \widehat{DEB}$ η $\omega = \varphi$. (σχ. 127).

*Ανάλυσις. "Αν $\omega = \varphi$ καὶ προεκτείνωμεν τὴν ΔE κατὰ τὴν φορὰν Δ πρὸς E , θὰ εἰναι $\rho = \phi$, δθεν $\omega = \rho$.

"Αν δὲ ἀχθῇ ή ΓH κάθετος ἐπὶ τὴν AB , αὕτη τέμνει τὴν ΔE εἰς τι σημεῖον Z . Τὰ δὲ δρθ. τρίγωνα ΓHE καὶ EHZ θὰ εἰναι ἵσα. Ἐπομένως $\Gamma H = HZ$.

Τὸ Z λοιπὸν εἰναι συμμετρικὸν τοῦ Γ πρὸς τὴν AB . Ἐπομένως δρίζεται καὶ ἀρχικῶς. Μετ' αὐτὸ δὲ ή $Z\Delta$ καὶ τὸ E .

Σύνθεσις. Ὁρίζομεν τὸ Z συμμετρικὸν τοῦ Γ πρὸς τὴν AB καὶ ἄγομεν τὴν ΔZ . Ἡ τομὴ E ταύτης καὶ τῆς AB εἰναι τὸ ζητούμενον σημεῖον.



Σχ. 127

*Απόδειξις. Τὰ δρθ. τρίγωνα ΓHE καὶ ZHE ἔχουσι $\Gamma H = HZ$ καὶ τὴν HE κοινήν· εἰναι ἕρα ἵσα καὶ ἐπομένως $\omega = \rho$.

*Ἐπειδὴ δὲ καὶ $\phi = \rho$, ἔπειται δτι $\omega = \varphi$. Τὸ E λοιπὸν εἰναι τὸ ζητούμενον.

Διερεύνησις. Τὸ σημεῖον Γ ἔχει ἐν μόνον συμμετρικὸν πρὸς τὴν AB , ἦτοι τὸ Z . Ἐπειδὴ δὲ τοῦτο καὶ τὸ Δ κείνται ἐκατέρωθεν τῆς AB , ή εὐθεῖα ΔZ τέμνει τὴν AB καὶ εἰς ἐν μόνον σημεῖον. "Εχει λοιπὸν πάντοτε λύσιν τὸ πρόβλημα.

*Α σκήσεις

253. Νὰ δρίσητε εἰς τὴν AB τοῦ ἀνωτέρω σχήματος 127 ἐν σημείον Θ καὶ νὰ ἀποδείξητε δτι $\Gamma E + \Delta D < \Gamma\Theta + \Delta\Theta$.

254. Δίδεται ὡς ἀνωτέρω (σχ. 127) εὐθεῖα AB καὶ δύο σημεῖα Γ, Δ . Νὰ δρισθῇ ἐπὶ τῆς AB σημεῖον Θ τοιοῦτον, ὥστε ἡ διχοτόμος τῆς γωνίας $\Gamma\Theta\Delta$ νὰ εἰναι κάθετος ἐπὶ τὴν AB .

255. "Αν ϕ εἰναι φωτεινὸν σημεῖον καὶ ἔχῃ ὡρισμένην θέσιν πρὸ ἐπιπέδου κατόπτρου AB , νὰ δρισθῇ τὸ σημεῖον προσπτώσεως φωτεινῆς ἀκτίνος, τὴν δόποιαν νὰ δεχθῇ μετὰ τὴν ἀνάκλασίν της ὁ δόφθαλμὸς εύρισκόμενος ἐπίσης εἰς ὡρισμένην θέσιν Δ πρὸ τοῦ κατόπτρου.

256. "Αν δύο δοθέντα σημεῖα Α, Β κείνται ἐκατέρωθεν δοθεισῆς εὐθείας ΓΔ, νὰ δρίσητε ἐπ' αὐτῆς σημεῖον Ε τοιοῦτον, ώστε νὰ εἰναι $\widehat{\Gamma\Delta\Lambda} = \widehat{\Gamma\Delta\Beta}$.

'Ασκήσεις πρὸς ἐπανάληψιν τοῦ Α' κεφαλαίου

257. Εἰς δοθέντα κύκλον νὰ γράψητε δύο τεμνομένας καὶ ίσας χορδάς. Νὰ ἀποδείξητε δὲ ὅτι τὰ τμήματα αὐτῶν εἰναι ίσα, ἐν πρὸς έν.

258. Εἰς δρθογώνιον τρίγωνον ΑΒΓ νὰ δρίσητε τὸ μέσον Ε τῆς ὑποτεινούσης ΒΓ. "Επειτα νὰ φέρητε τὸ ὅψος ΑΔ καὶ τὴν διάμεσον ΑΕ. Νὰ ἀποδείξητε δὲ ὅτι $\widehat{\Delta\Alpha\Ε} = \Gamma - \Beta$, δν $\Alpha\Β\Gamma > \Alpha\Γ\Beta$.

259. 'Εκ τοῦ μέσου Γ ἐνὸς τόξου ΑΒ νὰ φέρητε δύο χορδάς ΓΔ, ΓΗ, αἱ δποῖαι τέμνουσαι τὴν χορδὴν ΑΒ ἀντιστοίχως εἰς σημεῖα Ζ καὶ Ε. Νὰ ἀποδείξητε δὲ ὅτι τὸ τετράπλευρον ΔΖΕΗ εἰναι ἔγγράψιμον εἰς κύκλον.

260. 'Απὸ δοθὲν σημεῖον Α, τὸ δποῖον κείται ἐκτὸς δοθεισῆς γωνίας ΓΒΔ, νὰ γράψητε εὐθεῖαν, ἡ δποία νὰ τέμνῃ εἰς σημεῖον Ε τὴν ΒΓ καὶ εἰς σημεῖον Ζ τὴν ἄλλην καὶ νὰ εἰναι $\Alpha\Ε = \Ε\Ζ$ ή $\Alpha\Ε + \Ζ = \Ε\Ζ$.

261. 'Απὸ σημεῖον Α ἐντὸς γωνίας νὰ γράψητε εὐθεῖαν τοιαύτην, ώστε τὸ μεταξὺ τῶν πλευρῶν τμῆμα αὐτῆς νὰ διχοτομῇται ὑπὸ τοῦ Α.

262. Νὰ κατασκευάσητε γωνίαν ΓΑΒ < 1 δρ. καὶ ἐπὶ τῆς πλευρᾶς ΑΒ νὰ δρίσητε ἐν σημεῖον Δ. "Επειτα δὲ ἐπὶ τῆς αὐτῆς πλευρᾶς νὰ δρίσητε ἄλλο σημεῖον, τὸ δποῖον νὰ ἀπέχῃ ίσον ἀπὸ τὸ Δ καὶ ἀπὸ τὴν πλευρὰν ΑΓ.

263. Νὰ κατασκευάσητε τρίγωνον ἀπὸ τὰς διαμέσους αὐτοῦ.

264. Νὰ κατασκευάσητε τετράγωνον ἀπὸ τὴν ἀπόστασιν τοῦ μέσου μιᾶς πλευρᾶς ἀπὸ τὴν διαγώνιον αὐτοῦ.

265. Νὰ κατασκευάσητε τρίγωνον ΑΒΓ ἀπὸ τὸ δρθόκεντρον Η αὐτοῦ, ἀπὸ τὸ κέντρον Ο τῆς περιγεγραμμένης περιφερείας καὶ ἀπὸ τὴν εὐθεῖαν Ε, ἐπὶ τῆς δποίας κείται ἡ πλευρὰ ΒΓ αὐτοῦ.

266. Νὰ δρισθῇ ἡ εὐθεῖα τοῦ Simson, ἡ δποία ἀντιστοιχεῖ εἰς τὴν κορυφὴν Α τοῦ τριγώνου ΑΒΓ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΙ ΤΟΠΟΙ

§ 169. Πώς δορίζεται ὁ γεωμετρικὸς τόπος σημείων, τὰ δποῖα ἔχουσι μίαν κοινὴν ἴδιότητα. Εἰς τὸ Α' βιβλίον ἐλάβομεν ἀφορμὴν νὰ παρατηρήσωμεν μερικὰ παραδείγματα γεωμετρικῶν τόπων. "Ἐνεκα δὲ τῆς σπουδαιότητος αὐτῶν συγκεντρώνομεν ταῦτα εἰς τὰ ἀκόλουθα:

1ον. Ἐκάστη περιφέρεια κύκλου εἶναι γεωμ. τόπος τῶν σημείων, τὰ δποῖα ἀπέχουσιν ἀπὸ τὸ κέντρον ἀπόστασιν ἵσην πρὸς τὴν ἀκτῖνα αὐτοῦ.

2ον. Ἡ εύθεια, ἡτις τέμνει δίχα καὶ καθέτως ἐν εύθ. τμῆμα, εἶναι γεωμ. τόπος τῶν σημείων, ὃν ἔκαστον ἀπέχει ἵσην ἀπὸ τὰ ἄκρα τοῦ εύθυγράμμου τούτου τμήματος.

3ον. Ἡ διχοτόμος γωνίας εἶναι γεωμ. τόπος σημείων, ὃν ἔκαστον ἀπέχει ἵσην ἀπὸ τὰς πλευρὰς αὐτῆς.

4ον. Ἡ γραμμὴ, τὴν δποίαν ἀποτελοῦσι τὰ τόξα τῶν τμημάτων, τὰ δποῖα ἔχουσι χορδὴν ΑΒ ὥρισμένην κατὰ θέσιν καὶ μέγεθος καὶ δέχονται δοθεῖσαν γωνίαν, εἶναι γεωμ. τόπος τῶν σημείων, ἐξ ἔκάστου τῶν δποίων ἡ χορδὴ ΑΒ φαίνεται ὑπὸ τὴν δοθεῖσαν γωνίαν.

5ον. Ἡ περιφέρεια, ἡτις ἔχει διάμετρον δοθὲν κατὰ θέσιν καὶ μέγεθος εύθ. τμῆμα ΑΒ, εἶναι γεωμ. τόπος τῶν σημείων, ἐξ ἔκάστου τῶν δποίων τὸ εύθ. τμῆμα ΑΒ φαίνεται ὑπὸ δρθῆν γωνίαν.

Πλὴν τούτων ἔστωσαν καὶ τὰ ἀκόλουθα παραδείγματα:

6ον. Γεωμετρικὸς τόπος τῶν σημείων, τὰ δποῖα ἀπέχουσιν ἵσην ἀπὸ δύο ὀδρισμένας καὶ παραλλήλους εὐθείας, εἶναι ἡ εὐθεῖα, ἡτις εἶναι παράλληλος πρὸς αὐτὰς καὶ ἀπέχει ἵσην ἀπὸ αὐτὰς.

Διότι προφανῶς πάντα τὰ σημεῖα αὐτῆς καὶ μόνον αὐτὰ

ἔχουσι τὴν ἰδιότητα νὰ ἀπέχωσιν ἵσον ἀπὸ τὰς παραλλήλους ταύτας εὐθείας.

7ον. Ὁ γεωμετρικὸς τόπος τῶν σημείων, τὰ δποῖα ἀπέχουσιν ἀπὸ δοθεῖσαν εὐθεῖαν Ε ὁρισμένην ἀπόστασιν α, ἀποτελεῖται ἀπὸ δύο εὐθείας, αἱ δποῖαι εἶναι παράλληλοι πρὸς τὴν Ε καὶ ἔκαστη ἀπέχει ἀπὸ αὐτὴν ἀπόστασιν α.


Διότι εὐκόλως ἀποδεικνύεται ὅτι πάντα τὰ σημεῖα αὐτῶν καὶ μόνον αὐτὰ ἀπέχουσιν ἀπὸ τὴν Ε ἀπόστασιν α.

8ον. Γεωμετρικὸς τόπος τῶν σημείων, τὰ δποῖα ἀπέχουσιν ἀπὸ τὸ κέντρον δοθέντος κύκλου (K, α) ἀπόστασιν μικροτέραν τῆς ἀκτῖνος α, εἶναι ἡ ἐπιφάνεια τοῦ κύκλου τούτου πλὴν τῆς περιφερείας του.

Διότι προφανῶς δλα τὰ σημεῖα τῆς ἐπιφανείας ταύτης καὶ μόνον αὐτὰ ἔχουσι τὴν ἰδιότητα ταύτην.

Ἄπὸ τὰ παραδείγματα ταῦτα συνάγομεν τὸν ἔξῆς δρισμόν:

Γεωμετρικὸς τόπος σημείων, τὰ δποῖα ἔχουσι μίαν κοινὴν ἰδιότητα, καλεῖται ἡ γραμμὴ ἢ ἡ ἐπιφάνεια, τῆς δποίας δλα τὰ σημεῖα καὶ μόνον αὐτὰ ἔχουσι τὴν κοινὴν ταύτην ἰδιότητα.



Σχ. 128

§ 170. Πρόβλημα I. Νὰ εὑρεθῇ δ γεωμετρικὸς τόπος τῶν μέσων τῶν χορδῶν δοθέντος κύκλου, αἱ δποῖαι διέρχονται ἀπὸ δοθὲν σημεῖον Α τοῦ κύκλου τούτου (σχ. 128).

Λύσις. Ἐστω ΒΓ μία χορδὴ, ἡ δποία διέρχεται ἀπὸ τὸ Α. Τὸ μέσον Μ αὐτῆς εἶναι προφανῶς σημεῖον τοῦ τόπου. Ἀν φέρωμεν τὸ εὐθ. τμῆμα KM , γνωρίζομεν ὅτι $\widehat{KMA} = 1$ δρθ.

“Ητοι, τὸ ὁρισμένον κατὰ θέσιν καὶ μέγεθος εὐθ. τμῆμα KA φαίνεται ἀπὸ τὸ τυχὸν σημεῖον M τοῦ ζητουμένου τόπου ὑπὸ δρθῆν γωνίαν.

Κεῖται λοιπὸν τὸ M ἐπὶ τῆς περιφερείας, ἡ δποία γράφεται μὲ διάμετρον KA (§ 169, 5ον).

“Αν δὲ N εἶναι τυχὸν σημεῖον τῆς περιφερείας ταύτης, θὰ

είναι $\widehat{KNA} = 1$ δρθ. (§ 152, Πόρ. II). Ἡ ΚΝ λοιπὸν εἶναι κάθετος ἐπὶ τὴν χορδὴν ΔΑΕ καὶ τὸ Ν μέσον αὐτῆς. Εἶναι λοιπὸν τοῦτο σημεῖον τοῦ ζητουμένου τόπου. "Ωστε :

Πᾶν σημεῖον τοῦ ζητουμένου τόπου κεῖται ἐπὶ τῆς περιφερείας, ἡ δοποὶα ἔχει διάμετρον KA.

Καὶ πᾶν σημεῖον αὐτῆς, εἶναι σημεῖον τοῦ ζητουμένου τόπου.

"Ο ζητούμενος λοιπὸν τόπος εἶναι ἡ περιφέρεια, ἡ δοποὶα ἔχει διάμετρον KA.

"Ἄν αἱ προεκτάσεις τῶν χορδῶν διέρχωνται ἀπὸ τὸ A (σχ. 129) καὶ ἔργασθωμεν κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον, βεβαιούμεθα ὅτι :

Πᾶν σημεῖον M τοῦ ζητουμένου τόπου κεῖται ἐπὶ τῆς περιφερείας, ἥτις ἔχει διάμετρον KA. Τὰ σημεῖα δύος αὐτῆς, τὰ δοποὶα εἶναι ἑκτὸς τοῦ κύκλου K, δὲν εἶναι σημεῖα τοῦ τόπου.

Ἐις τὴν περίπτωσιν ταύτην διζητούμενος τόπος εἶναι μόνον τὸ ἑντὸς τοῦ κύκλου K τόξον ΔΚΕ τῆς προηγουμένης περιφερείας.

'Α σκήσεις


267. Νὰ εὕρητε τὸν γεωμετρικὸν τόπον τῶν ποδῶν τῶν καθέτων, αἱ δοποὶα ἄγονται ἀπὸ ὁρισμένον σημεῖον A ἐπὶ τὰς εὔθειας, αἱ δοποὶα διέρχονται ἀπὸ ἄλλο ὁρισμένον σημεῖον K.

268. Δίδονται δύο σημεῖα A καὶ B. Νὰ εὕρητε τὸν γεωμετρικὸν τόπον τῶν συμμετρικῶν τοῦ A πρὸς τὰς εὔθειας, αἱ δοποὶα διέρχονται ἀπὸ τὸ B.

269. Δίδονται δύο ίσαι περιφέρειαι K καὶ L. Νὰ εὕρητε τὸν γεωμετρικὸν τόπον τῶν σημείων, ἀπὸ ἔκαστον τῶν δοποῶν ἄγονται ίσαι ἐφαπτόμεναι πρὸς αὐτάς.


§ 171. Πρόβλημα II. Διδεται κύκλος K καὶ εὐθύγραμμον τμῆμα τ. Νὰ ενρεθῇ διγεωμετρικὸς τόπος τῶν μέσων τῶν χορδῶν τοῦ κύκλου K, αἱ δοποὶα εἶναι ίσαι πρὸς τὸ τ (σχ. 130).

Λύσις. "Εστω AB μία χορδὴ ίση πρὸς τ καὶ M τὸ μέσον αὐτῆς. Τοῦτο δὲ εἶναι σημεῖον τοῦ ζητουμένου τόπου. 'Επειδὴ δὲ ἡ ἀπόστασις KM εἶναι ἡ αὐτὴ καὶ ἀν τὸ M κεῖται εἰς ἄλλην



Σχ. 129

χορδὴν ἵσην πρὸς τὸ § 92 Πόρ. I), ἐπειταὶ διὰ τὸ Μ κεῖται ἐπὶ τῆς περιφερείας (Κ, ΚΜ).



Σχ. 130

Ἄν δὲ Ν εἶναι τυχὸν σημεῖον τῆς περιφερείας ταύτης καὶ ἀχθῆ χορδὴ ΓΔ ἔφαπτομένη ταύτης εἰς τὸ Ν, θά εἶναι ἡ ΚΝ κάθετος ἐπὶ αὐτὴν καὶ τὸ Ν μέσον αὐτῆς. Ἐπειδὴ δὲ ΚΜ = ΚΝ, θά εἶναι καὶ ΓΔ = ΑΒ = τὸ § 92 Πόρ. I).
“Ωστε:

Πᾶν σημεῖον τῆς περιφερείας (Κ, ΚΜ) εἶναι σημεῖον τοῦ ζητούμενου τόπου.

Ἐκ τούτων ἐπειταὶ διὰ τὸ ζητούμενος τόπος εἶναι ἡ περιφέρεια (Κ, ΚΜ).

Ασκήσεις

270. Δίδεται κύκλος Κ καὶ εύθ. τμῆμα δ. Νὰ εὕρητε τὸν γεωμ. τόπον τῶν σημείων, ἀπὸ τὰ δόποια ἀγονται εἰς τὸν κύκλον τοῦτον ἔφαπτόμεναι ἵσαι πρὸς τὸ δ.

271 Ἀν δοθῆ κύκλος Κ, νὰ κατασκευάσητε δρθὴν γωνίαν, τῆς δόποιας αἱ πλευραὶ ἔφαπτονται τοῦ Κ. Ἀπὸ τὸν τρόπον τῆς κατασκευῆς ταύτης θὰ ἐννοήσητε διὰ κατασκευάζονται ἄπειροι τοιαῦται γωνίαι. Νὰ εὕρητε τὸν γεωμ. τόπον τῶν κορυφῶν τῶν γωνιῶν τούτων.

272. Νὰ γράψητε δύο διαμετρούς περιφερείας καὶ νὰ κατασκευάσητε δρθὴν γωνίαν, τῆς δόποιας ἡ μία πλευρά νὰ ἔφαπτηται τῆς μιᾶς, ἡ δὲ ἄλλη τῆς ἄλλης περιφερείας. Τοιαῦται γωνίαι δύνανται νὰ κατασκευασθῶσιν ἄπειροι. Νὰ εὕρητε τὸν γεωμ. τόπον τῶν κορυφῶν αὐτῶν.

§ 172. Πρόβλημα III. Νὰ γράψητε ἡμιπεριφέρειαν μὲ διάμετρον AB ὡρισμένην κατὰ θέσιν καὶ μέγεθος. Νὰ φέρητε τυχοῦσαν χορδὴν AG καὶ ἐπὶ τῆς προεκτάσεως αὐτῆς νὰ λάβητε τμῆμα GM ἵσον πρὸς τὴν χορδὴν BG . Νὰ εὕρητε δὲ τὸν γεωμετρικὸν τόπον, τὸν δόποιον γράφει τὸ M , διαγ. τὸ G γράφῃ τὴν δούθεισαν ἡμιπεριφέρειαν (σχ. 131).

Λύσις. Ἐπειδὴ $BG = GM$ καὶ $\widehat{AGB} = 1$ δρθ, ἐπειταὶ εὔκόλως διὰ $M = 45^\circ$ ἥτοι τὸ εύθ. τμῆμα AB φαίνεται ἐκ τοῦ M ὑπὸ γνωστὴν γωνίαν 45° . Κεῖται λοιπὸν τὸ M ἐπὶ τοῦ τόξου τοῦ κυκλι-


κοῦ τμήματος, τὸ δποῖον κεῖται πρὸς τὸ αὐτὸ μὲ τὸ ἡμικύκλιον μέρος τῆς AB , ἔχει χορδὴν AB καὶ δέχεται γωνίαν 45° (§ 169, 4ον).

"Αν δὲ μετὰ τὴν κατασκευὴν τοῦ τόξου τοῦ τμήματος τούτου φέρωμεν τὴν AO ἐφαπτομένην τοῦ διοθέντος ἡμικυκλίου, ἐννοοῦμεν εὔκόλως δτι τὰ σημεῖα τοῦ τόξου AO δὲν ἀποτελοῦσι μέρος τοῦ τόπου.

Πᾶν δὲ σημεῖον N τοῦ ύπολοίπου τόξου BMO εἶναι σημεῖον τοῦ τόπου. Διότι ή γωνία N εἶναι

45° ἐκ κατασκευῆς καὶ $\widehat{BHN} = \widehat{BHA} = 1$ δρθ. "Αρα $HN = HB$.

"Εξ δλων τούτων ἐννοοῦμεν δτι δ ζητούμενος τόπος εἶναι τὸ τόξον BMO .




Σχ. 131

"Ασκησις

273. Νὰ λύσητε τὸ προηγούμενον (§ 172) πρόβλημα, ἀν ἀντὶ ἡμιπεριφερείας γράψωμεν δλόκληρον περιφέρειαν.

§ 173. Χρήσις τῶν γεωμ. τόπων εἰς τὴν λύσιν προβλη-

α —————
 β —————
 γ —————



Σχ. 132


μάτων. Εἰς τὴν λύσιν τοῦ προβλήματος § 151 ἀνεπαισθήτως τρόπον τινά ἐκάμομεν χρῆσιν γεωμ. τόπων. Διότι παρετηρήσαμεν δτι ή ἄγνωστος κορυφὴ A πρέπει νὰ κεῖται ἐπὶ τῆς περιφερείας (B, γ), διότι $AB = \gamma$ καὶ ἐπὶ τῆς περιφερείας (Γ, β), διότι $AG = \beta$. Οὕτω δὲ ὀδηγήθημεν εἰς τὸ νὰ γράψωμεν τὰς περιφερείας ταύτας κ.τ.λ. "Ωστε:

"Οταν διὰ γεωμετρικήν τινα κατασκευὴν (πρόβλημα) εἶναι ἀπαραίτητος ὁ προσδιορισμὸς ἐνὸς σημείου, τὸ δποῖον πρέ-

πει νὰ ἔκπληροὶ δύο ἐπιτάγματα, δυνάμεθα νὰ ἐργασθῶμεν καὶ ως ἔξῆς: Εύρισκομεν καὶ γράφομεν τὸν τόπον τῶν σημείων, τὰ δποῖα πληροῦσι τὸ ἔπιταγμα· ἔπειτα γράφομεν τὸν τόπον τῶν σημείων, τὰ δποῖα πληροῦσι τὸ β' ἐπιταγμα. Τὸ ζητούμενον τότε σημεῖον δρίζεται ως τομὴ τῶν δύο τόπων, διότι πληροὶ καὶ τὰ δύο ἐπιτάγματα.

"Αν δὲ τὰ ἐπιτάγματα εἰναι περισσότερα ἀπὸ δύο, χωρίζομεν αὐτὰ καταλλήλως εἰς δύο διάδας καὶ γράφομεν τὸν τόπον τῶν σημείων, τὰ δποῖα πληροῦσι τὰ ἐπιτάγματα τῆς α' διάδος καὶ τὸν τόπον τῶν σημείων τῶν ἐπιταγμάτων τῆς ἄλλης διάδος.

Εἰς τὰ ἐπόμενα προβλήματα θὰ κάμωμεν χρῆσιν τῆς μεθόδου ταύτης.



Σχ. 133

§ 174. Πρόβλημα I. Νὰ γραφῇ περιφέρεια, ἡ δποῖα νὰ διέρχηται ἀπὸ δύο ὠρισμένα σημεῖα A ; B καὶ νὰ ἔχῃ δοθεῖσαν ἀκτῖνα α (σχ. 133).

Δύσις. "Αγγωστὸν εἶναι τὸ κέντρον τῆς ζητουμένης περιφερείας. "Αν τοῦτο εἶναι K , πρέπει νὰ εἶναι $KA = \alpha$ καὶ $KB = \alpha$. Πρέπει λοιπὸν τὸ K νὰ κεῖται καὶ ἐπὶ τῶν δύο περιφερειῶν (A, α) καὶ (B, α), ητοι θὰ εἶναι τομὴ αὐτῶν.

'Εννοοῦμεν λοιπὸν δτι πρέπει νὰ γράψωμεν τὰς περιφερείας ταύτας καὶ ἔπειτα μὲ κέντρον κοινὸν σημεῖον αὐτῶν καὶ ἀκτῖνα α νὰ γράψωμεν περιφέρειαν. Εύκόλως δὲ ἀποδεικνύομεν δτι αὕτη εἶναι ἡ ζητουμένη.

Διερεύνησις. Διὰ νὰ ἔχῃ τὸ πρόβλημα λύσιν, πρέπει αἱ γραφεῖσαι περιφέρειαι νὰ ἔχωσι κοινὸν ἢ κοινὰ σημεῖα. Πρὸς τοῦτο δὲ πρέπει νὰ εἶναι $AB \leq \alpha + \alpha$ ἢ $AB \leq 2\alpha$ κ.τ.λ.

Α σκήσεις

274. Νὰ γραφῇ περιφέρεια, ἡ δποῖα διέρχεται ἀπὸ δύο δοθέντα σημεῖα A, B καὶ ἔχει τὸ κέντρον ἐπὶ δοθείσης εύθείας E .

275. Νὰ γραφῇ περιφέρεια, ἡ δποῖα διέρχεται ἀπὸ δύο δοθέντα σημεῖα A, B καὶ ἔχει τὸ κέντρον ἐπὶ δοθείσης εύθείας E .

μείον Α, καὶ ἐφάπτεται δοθείσης εύθείας Ε εἰς ὠρισμένον σημεῖον Β αὐτῆς.

276. Νὰ γραφῇ περιφέρεια, ἡ δόποια νὰ ἔχῃ ἀκτῖνα α, νὰ διέρχηται ἀπὸ δοθὲν σημεῖον Α καὶ νὰ ἔχῃ τὸ κέντρον ἐπὶ δοθείσης περιφέρείας Κ.

277. Νὰ γραφῇ περιφέρεια, ἡ δόποια νὰ διέρχηται ἀπὸ δοθὲν σημεῖον Α, νὰ ἐφάπτηται δοθείσης εύθείας Ε καὶ νὰ ἔχῃ ἀκτῖνα α.

278. Νὰ κατασκευάσητε μίαν γωνίαν Α καὶ εἰς τὴν μίαν πλευρὰν αὐτῆς νὰ δρίσητε ἐν σημεῖον Β. *Ἐπειτα νὰ γράψητε μίαν περιφέρειαν, ἡ δόποια νὰ ἐφάπτηται τῶν δύο πλευρῶν αὐτῆς, τῆς δὲ ΑΒ εἰς τὸ Β.


279. Δίδεται περιφέρεια Κ, σημεῖον Α ἐκτὸς τοῦ κύκλου καὶ εὐθ. τμῆμα α. Νὰ γράψητε περιφέρειαν, ἡ δόποια νὰ ἔχῃ ἀκτῖνα α, νὰ διέρχηται ἀπὸ τὸ Α καὶ νὰ ἐφάπτηται ἐκτὸς τῆς Κ.

§ 175. Πρόβλημα II. Διδονται δύο εὐθύγραμμα τμήματα α, υ καὶ μία γωνία ω. Νὰ κατασκευησθῇ τρίγωνον ΑΒΓ, τὸ δποτὸν νὰ ἔχῃ βάσιν ΒΓ ἵσην πρὸς α, υψος ΑΔ ἵσην πρὸς υ καὶ γωνίαν Α ἵσην πρὸς ω (σχ. 134).

Λύσις. Ἀν ἐπὶ εύθείας δρισθῇ τμῆμα $B\Gamma = \alpha$, μένει ἄγνωστος ἡ κορυφὴ Α. Ἐπειδὴ τὸ ψῆφος $A\Delta = \upsilon$, ἡ κορυφὴ Α κεῖται ἐπὶ εύθείας $X\psi$ παραλλήλου πρὸς τὴν $B\Gamma$ εἰς ἀπόστασιν υ ἀπ' αὐτῆς. Ἐπειδὴ δὲ ἡ γωνία Α εἶναι ἵση πρὸς ω, ἡ κορυφὴ Α πρέπει νὰ κεῖται ἐπὶ τοῦ τόξου τοῦ κυκλικοῦ τμήματος, τὸ δποτὸν ἔχει χορδὴν $B\Gamma$ καὶ δέχεται γωνίαν ω.

Κατασκευάζομεν λοιπὸν τοὺς δύο τόπους καὶ ἔστω Α κοινὸν σημεῖον αὐτῶν. Τὸ τρίγωνον $ΑΒΓ$ εἶναι τὸ ζητούμενον, ὃς εὔκλως ἀποδεικνύεται.

Διερεύνησις. Ἀν ἐκ τοῦ κέντρου Κ φέρωμεν κάθετον $\Theta\mathcal{Z}\mathcal{H}$ ἐπὶ τὴν $B\Gamma$, θὰ εἶναι $HZ = \upsilon$. Διὰ νὰ ἔχῃ δὲ τὸ πρόβλημα λύσιν, πρέπει προφανῶς νὰ εἶναι $HZ \leq H\Theta$ ἢ $\upsilon \leq H\Theta$.



Σχ. 134

"Αν υ < ΗΘ, οἱ δύο τόποι ἔχουσι δύο κοινά σημεῖα Α καὶ Α'. Τὰ τρίγωνα δημιουργίας ΑΒΓ καὶ Α'ΒΓ ἔχουσι τὰς πλευράς των ἵσας, μίαν πρὸς μίαν, καὶ εἶναι ἵσα. Διαφέρουσι λοιπὸν μόνον κατὰ τὴν θέσιν καὶ θεωρεῖται διτὶ ἀποτελοῦσι μίαν λύσιν.

"Αν υ = ΗΘ, οἱ δύο τόποι ἔχουσι κοινὸν μόνον τὸ Θ· τὸ δὲ ἰσοσκελές τρίγωνων ΘΒΓ εἶναι τὸ ζητούμενον.

"Αν δὲ υ > ΗΘ, οἱ δύο τόποι οὐδὲν ἔχουσι κοινὸν σημεῖον, τὸ δὲ πρόβλημα δὲν ἔχει λύσιν.

'Ασκήσεις

280. Νὰ κατασκευάσητε δρθογώνιον τρίγωνον ἀπὸ τὴν ὑποτείνουσαν καὶ ἀπὸ τὸ ἐπὶ ταύτην ὄψος.

281. Νὰ κατασκευάσητε δρθογώνιον τρίγωνον ΑΒΓ ἐκ τῆς ὑποτείνουσης ΒΓ καὶ τῆς διαμέσου ΒΜ = δ.

282. Νὰ κατασκευάσητε τρίγωνον ΑΒΓ ἐκ τῆς πλευρᾶς ΒΓ, τοῦ ὄψους ΑΔ καὶ τῆς διαμέσου ΑΜ.

283. Νὰ κατασκευάσητε τρίγωνον ΑΒΓ ἀπὸ τὴν πλευρὰν ΒΓ, τὴν διάμεσον ΑΜ καὶ ἀπὸ τὴν γωνίαν Α.

§ 176. Πρόβλημα III. Νὰ κατασκευασθῇ τρίγωνον ἐκ δύο πλευρῶν α καὶ β καὶ τῆς γωνίας Α, ητις κεῖται ἀπέναντι τῆς πλευρᾶς α (σχ. 135).

"Ανάλυσις. "Αν ΑΒΓ εἶναι τὸ ζητούμενον τρίγωνον, θὰ εἶναι ΑΓ=β, ΓΒ=α καὶ ἀπέναντι τῆς ΓΒ θὰ κεῖται γωνία Ἱση πρὸς τὴν δοθεῖσαν Α. 'Εάν λοιπὸν κατασκευασθῇ γωνία ΧΑΨ=Α καὶ ληφθῇ ἐπὶ τῆς ΑΧ τμῆμα ΑΓ ἵσον πρὸς τὴν β, μένει ἄγνωστος ἡ τρίτη κορυφὴ Β.

Αὕτη ὁφείλει νὰ κεῖται ἐπὶ τῆς ἄλλης πλευρᾶς ΑΨ τῆς ΧΑΨ. 'Ως ἀπέχουσα δὲ τῆς κορυφῆς Γ ἀπόστασιν ΓΒ ἵσην πρὸς τὴν α, ὁφείλει νὰ κεῖται καὶ ἐπὶ τῆς περιφερείας (Γ, α). Θὰ εἶναι ἄρα αὕτη κοινὸν σημεῖον τῶν γραμμῶν τούτων.


Σύνθεσις. Κατασκευάζομεν γωνίαν ΧΑΨ=Α, δρίζομεν ἐπὶ τῆς ΑΧ τμῆμα ΑΓ ἵσον πρὸς τὸ β καὶ γράφομεν τὴν περιφέρειαν (Γ, α).

"Αν αὕτη τέμνῃ τὴν ἄλλην πλευράν εἰς τι σημεῖον Β, ἄγομεν τὴν ΓΒ καὶ σχηματίζομεν τὸ τρίγωνον ΑΓΒ, τὸ ὁποῖον προφανῶς εἶναι τὸ ζητούμενον.

Διερεύνησις. Είναι προφανές ότι τὸ πρόβλημα ἔχει λύσιν, ἀν ἡ περιφέρεια (Γ , α) ἔχῃ μὲ τὴν $A\Psi$ κοινὸν ἡ κοινὰ σημεῖα.

"Αν δὲ $\Gamma\Delta$ είναι ἡ ἀπόστασις τοῦ Γ ἀπὸ τὴν $A\Psi$, πρέπει νὰ είναι $\Gamma\Delta \leq \alpha$. Ἐξαρτᾶται δὲ δ ἀριθμὸς τῶν λύσεων καὶ ἐκ τοῦ εἰδους τῆς γωνίας A . Διακρίνομεν λοιπὸν τὰς ἔξης περιπτώσεις:


1ον. "Αν $A \geq 1$ δρθ. (σχ. 135 α'), ἡ A είναι ἡ μεγαλυτέρα γωνία τοῦ τριγώνου καὶ ἐπομένως πρέπει νὰ είναι καὶ $\alpha > \beta$.



Σχ. 135 α'

'Επειδὴ δὲ τότε είναι $\beta \geq \Gamma\Delta$, θὰ είναι κατὰ μείζονα λόγον $\alpha > \Gamma\Delta$. Κατ' ἀκολουθίαν ἡ περιφέρεια ἔχει μὲ τὴν εὐθεῖαν $A\Psi$ δύο κοινὰ σημεῖα B καὶ B' κείμενα ἐκατέρωθεν τοῦ A , διότι τοῦτο κεῖται ἐντὸς τοῦ κύκλου, διότι $\Gamma A < \alpha$.

Καὶ ἀν μὲν $A > 1$ δρθ., μόνον τὸ τρίγωνον $A\Gamma B$ ἔχει τὰ δο-



Σχ. 135 β' - γ'

θέντα στοιχεῖα· ἀν δὲ $A = 1$ δρθ., ἀμφότερα τὰ τρίγωνα $A\Gamma B$ καὶ $A\Gamma B'$ ἔχουσι τὰ δοθέντα στοιχεῖα, ἀλλὰ είναι ἵσα. "Ἐχει λοιπὸν τὸ πρόβλημα μίαν λύσιν.


2ον. "Αν $A < 1$ δρθ., είναι δυνατὸν νὰ είναι $\alpha > \beta$, $\alpha = \beta$ καὶ $\alpha < \beta$.

"Αν $\alpha > \beta$ (σχ. 135 β'), ή περιφέρεια (Γ, α) έχει μὲ τὴν εύθειαν ΑΨ δύο κοινὰ σημεῖα, δῶν μόνον τὸ ἐν κεῖται ἐπὶ τῆς πλευρᾶς ΑΨ. "Έχει λοιπὸν τὸ πρόβλημα μίαν λύσιν.

"Αν $\alpha = \beta$ (σχ. 135 γ') ή περιφέρεια (Γ, α) τέμνει τὴν πλευρὰν ΑΨ, εἰς τὰ σημεῖα Α καὶ Β, τὸ δὲ τρίγωνον ΑΒΓ εἶναι τὸ ζητούμενον.

"Αν $\alpha < \beta$ (σχ. 135, δ', ε', στ'), διακρίνομεν τρεῖς μερικωτέρας περιπτώσεις, καθ' ὅσον $\alpha > \Gamma\Delta$, $\alpha = \Gamma\Delta$ καὶ $\alpha < \Gamma\Delta$.

"Αν $\alpha > \Gamma\Delta$, ή περιφέρεια (Γ, α) έχει μὲ τὴν ΑΨ δύο κοινὰ σημεῖα Β καὶ Β' ἀμφότερα ἐπὶ τῆς πλευρᾶς ΑΨ κείμενα, διότι τὸ Α κεῖται ἐκτὸς τοῦ κύκλου (Γ, α), διότι εἶναι $\Gamma\Delta > \alpha$. 'Αμφό-



Σχ. 135 δ'-στ'

τέρα λοιπὸν τὰ τρίγωνα ΑΒΓ, ΑΒ'Γ έχουσι τὰ δοθέντα στοιχεῖα, ἥτοι τὸ πρόβλημα έχει δύο λύσεις.

"Αν $\alpha = \Gamma\Delta$, ή περιφέρεια (Γ, α) ἐφάπτεται τῆς πλευρᾶς ΑΨ εἰς τὸ Δ καὶ τὸ δρθ. τρίγωνον ΑΔΓ εἶναι τὸ ζητούμενον.

"Αν $\alpha < \Gamma\Delta$, τὸ πρόβλημα εἶναι ἀδύνατον.

Ασκήσεις

284. Μὰ κατασκευάσητε τρίγωνον ΑΒΓ ἀπὸ τὰς πλευρὰς ΑΒ, ΒΓ καὶ ἀπὸ τὸ ὅψις ΑΔ αὐτοῦ.

285. Μὰ κατασκευάσητε τρίγωνον ΑΒΓ ἀπὸ τὴν γωνίαν Β καὶ ἀπὸ τὰ ὅψη ΑΔ καὶ ΓΕ.

286. Μὰ κατασκευάσητε τρίγωνον ΑΒΓ ἀπὸ τὴν πλευρὰν ΒΓ, τὴν γωνίαν Α καὶ ἀπὸ τὸ ἄθροισμα $ΑΒ + ΑΓ$.

287. Μὰ κατασκευάσητε τρίγωνον ΑΒΓ ἀπὸ τὴν πλευρὰν ΒΓ, ἀπὸ τὴν γωνίαν Α καὶ ἀπὸ τὴν διαφορὰν τῶν δύο ἄλλων πλευρῶν.

§ 177. Πρόβλημα IV. Εἰς δοθὲν τελίγωνον ABG νὰ ἐγγραφῇ κύκλος (σχ. 136).

Ἄνταλυσις. Ἐν K εἶναι τὸ κέντρον τοῦ ζητουμένου κύκλου καὶ Δ, E, Z τὰ σημεῖα τῆς ἐπαφῆς τῶν πλευρῶν μὲ τὴν περιφέρειαν, θὰ εἶναι $K\Delta = KE = KZ$.

Ἐκ τῆς $K\Delta = KZ$ ἐπεται δι τὸ K κεῖται ἐπὶ τῆς διχοτόμου τῆς γωνίας B . Ἐκ δὲ τῆς $K\Delta = KE$ ἐπεται δι τὸ K κεῖται ἐπὶ τῆς διχοτόμου τῆς G .


Σύνθεσις. Διχοτομοῦμεν τὰς γωνίας B καὶ G τοῦ δοθέντος τριγώνου καὶ ἔστω K ἡ τομὴ τῶν διχοτόμων τούτων (§ 107). Γράφομεν τὴν ἀπόστασιν $K\Delta$ τοῦ K ἀπὸ μίσην πλευρὰν π.χ. τὴν BG καὶ γράφομεν τὴν περιφέρειαν ($K, K\Delta$), ἣτις εἶναι ἡ ζητουμένη.

Ἀπόδειξις. Ἐπειδὴ τὸ κέντρον ἀπέχει ἀπὸ τὴν BG ἀπόστασιν τὴν ἵσην πρὸς τὴν ἀκτῖνα, ἡ BG ἐφάπτεται τῆς περιφέρειας. Φέρομεν ἐπειτα τὰς KE, KZ καθέτους ἐπὶ τὰς πλευρὰς AG, AB .

Ἐπειδὴ τὸ K κεῖται ἐπὶ τῆς διχοτόμου τῆς B , εἶναι $K\Delta = KZ$. Ἡ πλευρὰ λοιπὸν AB ἐφάπτεται εἰς τὸ Z τῆς περιφέρειας. Ὁμοίως ἀποδεικνύομεν δι τὴς G πλευρὰ AG ἐφάπτεται εἰς τὸ E τῆς περιφέρειας ταύτης. Εἶναι λοιπὸν δὲ κύκλος K ἐγγεγραμμένος εἰς τὸ τριγώνον.

Διερεύνησις. Ἐπειδὴ αἱ διχοτόμοι παντὸς τριγώνου διέρχονται δι' ἑνὸς σημείου (§ 107), δὲ δρισμὸς τοῦ K εἶναι πάντοτε δυνατὸς κ.τ.λ. Ἐχει λοιπὸν τὸ πρόβλημα μίαν λύσιν.

Παρατήρησις. Ἡ διχοτόμος τῆς A καὶ τῆς ἐξωτερικῆς γωνίας B ἢ G τέμνονται εἰς σημεῖον K' . Τοῦτο εἶναι κέντρον



Σχ. 136

περιφερείας, ή δποία ἔφάπτεται τής ΒΓ καὶ τῶν προεκτάσεων τῶν πλευρῶν ΑΒ, ΑΓ. Ἡ περιφέρεια αὐτὴ εύρισκεται ἐντὸς τῆς γωνίας Α καὶ παραπλεύρως ἀπὸ τὸ τρίγωνον. Διὰ τοῦτο δὲ λέγεται παρεγγεγραμμένη περιφέρεια εἰς τὸ τρίγωνον. Ὁμοίως δρίζομεν τὰ κέντρα Κ'', Κ''' δύο ἄλλων παρεγγεγραμμένων περιφερειῶν.

Α σκήσεις

288. Εἰς δοθεῖσαν γωνίαν Α νὰ ἐγγραφῇ κύκλος, δ δποίος νὰ ἔχῃ δοθεῖσαν ἀκτῖνα ρ.

289. Νὰ κατασκευάσητε τρίγωνον ΑΒΓ ἀπὸ τὴν πλευρὰν ΒΓ, ἀπὸ τὴν γωνίαν Β καὶ ἀπὸ τὴν ἀκτῖνα ρ τῆς ἐγγεγραμμένης περιφερείας.

290. Νὰ κατασκευασθῇ δρθογώνιον τρίγωνον ἀπὸ μίαν δξεῖναν γωνίαν Γ αὐτοῦ καὶ ἀπὸ τὴν ἀκτῖνα ρ τῆς ἐγγεγραμμένης περιφερείας.

Ασκήσεις πρὸς ἐπανάληψιν τοῦ Β' βιβλίου

291. Εἰς τρίγωνον ΑΒΓ εἰναι ΑΒ < ΑΓ. Ἀγεται τὸ ὄψος ΑΔ καὶ δρίζεται τὸ μέσον Ε τῆς πλευρᾶς ΑΓ καὶ ἀγεται ἡ εύθεια ΔΕ. Ἀν Ζ εἰναι ἡ τομὴ ταύτης καὶ τῆς εύθειας ΑΒ, νὰ ἀποδείξητε ὅτι $Z = B - \Gamma$.

292. Ἀν Μ εἰναι τὸ μέσον τῆς πλευρᾶς ΒΓ τριγώνου ΑΒΓ, νὰ ἀποδείξητε ὅτι:

α') "Αν $AM > BM$, θὰ εἰναι $A < 1 \text{ δρθ.}$

β') $\rightarrow AM < BM, \rightarrow A > 1 \text{ δρθ.}$

γ') $\rightarrow AM = BM, \rightarrow A = 1 \text{ δρθ.}$

293. Νὰ διατυπώσητε καὶ νὰ ἀποδείξητε τὰς ἀντιστρόφους τῶν προηγουμένων σχέσεων.

294. Εἰς δοθὲν τρίγωνον ΑΒΓ νὰ περιγράψητε περιφέρειαν Κ. Νὰ φέρητε τὸ ὄψος ΑΕ, τὴν διχοτόμον ΑΔ καὶ τὴν διάμετρον ΑΚΗ τῆς περιγεγραμμένης περιφερείας. Νὰ ἀποδείξητε δὲ ὅτι ΑΔ διχοτομεῖ καὶ τὴν γωνίαν ΕΑΗ.

295. Εἰς δοθέντα κύκλον νὰ φέρητε δύο καθέτους χορδὰς καὶ τὰς ἐφαπτομένας εἰς τὰ ἄκρα αὐτῶν. Νὰ ἀποδείξητε δὲ ὅτι, ἀν αἱ ἐφαπτόμεναι αὖται σχηματίζωσι τετράπλευρον, τοῦτο εἰναι ἐγγράψιμον εἰς κύκλον.

296. Ἀπὸ ἐν σημεῖον Α περιφερείας νὰ φέρητε τρεῖς χορδὰς ΑΒ, ΑΓ, ΑΔ. Ἀν γράψωμεν τὰς περιφερείας, αἱ δποίαι ἔχουσι διαμέτρους τὰς χορδὰς ταύτας καὶ Ε, Ζ, Η εἰναι τὰ ἄλλα κοινὰ σημεῖα αὐτῶν ἀνά δύο λαμβανομένων, νὰ ἀποδείξητε ὅτι ἡ γραμμὴ ΕΖΗ εἰναι εύθεια.

297. Εἰς δοθέντα κύκλον Ο νὰ ἐγγράψητε τυχόν τρίγωνον ΑΒΓ

καὶ νὰ δρίσητε τὸ συμμετρικὸν Α' τῆς κορυφῆς Α πρὸς κέντρον Ο. "Επειτα δὲ νὰ ἀναγνωρίσητε τὴν εύθειαν τοῦ Simson, ἡτις ἀντιστοιχεῖ πρὸς τὸ Α'.

298. Ἀπὸ τὰ σημεῖα διοθείσης περιφερείας Κ ἀγονται εὐθύγραμμα τμῆματα Ισα, παράλληλα καὶ διμόρροπα πρὸς διοθέν εύθ. τμῆμα τ. Νὰ εὕρητε τὸν γεωμ. τόπον τῶν ἄκρων τῶν τοιούτων τμημάτων.

299. Δίδεται κύκλος Κ καὶ σημεῖον Α ἐκτὸς αὐτοῦ. Νὰ δρίσητε ἐν σημεῖον Β ἐπὶ τῆς περιφερείας Κ καὶ τὸ μέσον Μ τοῦ τμήματος ΑΒ. Νὰ εὕρητε δὲ τὸν γεωμ. τόπον, τὸν διποίον γράφει τὸ Μ, ἀν τὸ Β γράφη τὴν περιφέρειαν Κ.

300. "Ἐν σταθερὸν εύθ. τμῆμα τ κινεῖται οὕτως, ὥστε τὰ ἄκρα του εύρισκονται πάντοτε ἐπὶ καθέτων εύθειῶν. Νὰ εὕρητε τὸν γεωμ. τόπον τῶν θέσεων, ἀπὸ τὰς διποίας διέρχεται τὸ μέσον αὐτοῦ.

301. Ἀπὸ ἐν σημεῖον Μ περιφερείας Ο νὰ φέρητε κάθετον ΜΕ ἐπὶ ὀρισμένην διάμετρον ΑΒ. Εἰς δὲ τὴν ἀκτίνα ΟΜ νὰ δρίσητε τμῆμα ΟΝ Ισον πρὸς τὸ ΜΕ. Νὰ εὕρητε δὲ τὸν γεωμ. τόπον, τὸν διποίον γράφει τὸ Ν, ἀν τὸ Μ γράφῃ τὴν περιφέρειαν Ο.

302. Δίδεται περιφέρεια (Κ, R), εύθεια Ε καὶ εύθ. τμῆμα τ. Νὰ γράψῃτε περιφέρειαν μὲ ἀκτίνα τ, ἡ διποία νὰ ἐφάπτηται τῆς Ε καὶ τῆς περιφερείας Κ ἐκτός.

303. Δίδονται δύο περιφέρειαι καὶ εύθ. τμῆμα ρ. Νὰ γραφῇ περιφέρεια μὲ ἀκτίνα ρ, ἡτις νὰ ἐφάπτηται τῶν διοθεισῶν περιφερειῶν ἐκτός.

304. Νὰ κατασκευασθῇ τρίγωνον ΑΒΓ ἐκ τῆς ἀκτίνος R τῆς περιγεγραμμένης περιφερείας, τοῦ ὅψους ΑΕ καὶ τῆς διχοτόμου ΑΔ.

305. Νὰ κατασκευάσητε τρίγωνον ΑΒΓ ἐκ τῆς πλευρᾶς ΒΓ, τῆς γωνίας Α καὶ τῆς ἀκτίνος ρ τῆς ἐγγεγραμμένης περιφερείας.

306. Νὰ κατασκευάσητε δρθογώνιον ἀπὸ τὴν περίμετρον καὶ ἀπὸ τὴν διαγώνιον αὐτοῦ.

307. Νὰ κατασκευάσητε τραπέζιον ἀπὸ τὰς βάσεις του καὶ ἀπὸ τὴν ἀκτίνα R τῆς πέριγεγραμμένης περιφερείας Κ.

308. Δίδονται δύο περιφέρειαι τεμνόμεναι εἰς σημεῖα Α καὶ Α'. Νὰ φέρητε κοινὴν τέμνουσαν ΓΑΒ Ισον πρὸς τὸ διοθέν εύθ. τμῆμα τ.

309. Δίδονται δύο παράλληλοι εύθειαι E, E', ἐν σημεῖον Α ἐκτὸς αὐτῶν καὶ εύθ. τμῆμα τ. Νὰ ἀχθῇ ἀπὸ τὸ Α εύθεια, τῆς διποίας τὸ ἐντὸς τῶν παραλλήλων τμῆμα νὰ ισοῦται πρὸς τὸ τ.

310. Δίδεται κύκλος (Κ, R) καὶ σημεῖον Α ἐκτὸς αὐτοῦ. Νὰ φέρητε ἀπὸ τὸ Α τέμνουσαν τὴν περιφέρειαν καὶ τοιαύτην, ὥστε τὸ ἐκτὸς τοῦ κύκλου τμῆμα ΑΒ αὐτῆς νὰ είναι Ισον πρὸς τὸ ἐντὸς ΒΓ.

BIBLION TRITON

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

1. ΜΕΤΡΗΣΙΣ ΤΩΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

§ 178. Τί είναι ποσά καὶ ποῖα τὰ εἰδη αὐτῶν. Γνωρίζομεν ἀπὸ τὴν Ἀριθμητικὴν δτι:

Ποσὸν λέγεται πᾶν δ, τι ἐπιδέχεται αὐξησιν ή ἐλάττωσιν.

Π.χ. εἰς διμιοὺς μαθητῶν, μία ἐπιφάνεια, μία γραμμὴ κ.τ.λ. είναι ποσά.

Ἐν ποσὸν λέγεται πλῆθος, ἀν ἀποτελήται ἀπὸ μέρη ἀνεξάρτητα ἀλλήλων καὶ αὐτοτελῆ. Π. χ. μία ποίμνη προβάτων, μία δενδροστοιχία είναι πλήθη.

Ἐν ποσὸν λέγεται συνεχές, ἀν δὲν ἀποτελήται ἀπὸ μέρη ἀνεξάρτητα ἀλλήλων. Π. χ. αἱ γραμμαὶ, αἱ ἐπιφάνειαι, ὁ χρόνος είναι συνεχῆ ποσά.

Είναι δὲ φανερὸν δτι ἔκαστον συνεχές ποσὸν δύναται νὰ νοηθῇ διηρημένον εἰς μέρη. Ταῦτα δμως συνέχονται πρὸς ἀλληλα καὶ ἀποτελοῦσιν ἐν δλον.

§ 179. Τί λέγεται γινόμενον ποσοῦ ἐπὶ θετικὸν ἀριθμόν.

Ἄν είναι $\Gamma Z = AB + AB + AB$ (σχ. 137), τὸ ποσὸν ΓZ λέγεται γινόμενον τοῦ AB
$$\overline{A \quad B} \quad \overline{\Gamma} \quad \overline{Z} \quad \begin{matrix} \text{Σχ. 137} \\ \text{ἐπὶ τὸν } 3 \cdot \text{είναι δὲ} \\ 3 = 1 + 1 + 1. \end{matrix}$$

Όμοιως, ἀν δύο γωνίαι (ἢ τόξα) ω καὶ θ συνδέωνται διὰ τῆς σχέσεως $\omega = \theta + \theta + \frac{\theta}{10} + \frac{5\theta}{100}$, τὴν γωνίαν (ἢ τὸ τόξον) ω ἔκαλέσαμεν (§ 57) γινόμενον τῆς γωνίας (ἢ τοῦ τόξου) θ ἐπὶ τὸν ἀριθμὸν $1 + 1 + \frac{1}{10} + \frac{5}{100} = 2,15$. "Ωστε :

Γινόμενον ποσοῦ ἐπὶ θετικὸν ἀριθμὸν λέγεται τὸ ποσὸν, τὸ

δποτον γίνεται ἀπὸ αὐτὸν καὶ τὰ μέρη αὐτοῦ, δπως δ ἀριθμὸς γίνεται ἀπὸ τὴν ἀκεραλαν μονάδα καὶ ἀπὸ τὰ μέρη αὐτῆς.

Α σκήσεις

311. Μὰ δρίσητε εἰς μίαν περιφέρειαν ἐν τόξον μικρότερον τεταρτημορίου καὶ νὰ σχηματίσητε τὸ γινόμενον αὐτοῦ ἐπὶ 2 καὶ ἐπὶ $3 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4}$.

312. Μὰ γράψητε μίαν δίειαν γωνίαν ω καὶ νὰ σχηματίσητε τὸ γινόμενον αὐτῆς ἐπὶ $1 \frac{1}{2}$ ή ἐπὶ $\frac{3}{4}$.

§ 180. Τί λέγεται λόγος ποσοῦ πρὸς ἄλλο ὁμοειδὲς ποσόν. Τί εἶναι μέτρησις καὶ τί μέτρον ποσοῦ. Ἐπειδὴ $\Gamma Z = AB \cdot 3$, δ ἀριθμὸς 3 λέγεται λόγος τοῦ ΓZ πρὸς τὸ AB . Ὁμοίως, ἐπειδὴ $\omega = \theta \cdot 2,15$, δ ἀριθμὸς 2,15 λέγεται λόγος τῆς γωνίας ω πρὸς τὴν γωνίαν θ. “Ωστε:

Δόγος ποσοῦ πρὸς ἄλλο ὁμοειδὲς ποσὸν λέγεται δ ἀριθμός, μὲ τὸν δποτον πρόπει νὰ πολλαπλασιασθῇ τὸ δεύτερον ποσόν, διὰ νὰ προκύψῃ τὸ πρῶτον.

Ο λόγος ποσοῦ P πρὸς P' παρίσταται οὕτω $P : P'$ ή καὶ οὕτω $\frac{P}{P'}$.

Εἶναι δὲ φανερὸν δτὶ δ λόγος οὗτος γίνεται ἀπὸ τὴν μονάδα καὶ ἀπὸ τὰ μέρη αὐτῆς, δπως τὸ πρῶτον ποσὸν γίνεται ἀπὸ τὸ δεύτερον καὶ ἀπὸ τὰ μέρη αὐτοῦ.

Τὰ ποσά, τὰ δποτα αποτελούσιν ἔνα λόγον, λέγονται δροι τοῦ λόγου τούτου.

Ο πρῶτος δρος ἑκάστου λόγου λέγεται ἡγούμενος, δ δὲ δεύτερος λέγεται ἐπόμενος δρος αὐτοῦ.

Αν τὸ ποσὸν AB (σχ. 137) ληφθῇ ως μονάς, δ λόγος $\Gamma Z : AB$ λέγεται μέτρον τοῦ ΓZ . “Ωστε:

Μέτρον ἐνδὲ ποσοῦ λέγεται δ λόγος αὐτοῦ πρὸς ὁρισμένον καὶ ὁμοειδὲς ποσόν, τὸ δποτον λαμβάνεται ως μονάς.

Τὸ μέτρον ποσοῦ P παρίσταται συντόμως οὕτω (P).

Μέτρησις ποσοῦ λέγεται ή εὑρεσις τοῦ μέτρου αὐτοῦ.

Ασκήσεις

313. Νὰ δρίσητε τὸν λόγον μιᾶς περιφερείας πρὸς ἐν τεταρτημόριον αὐτῆς.

314. Νὰ δρίσητε τὸν λόγον ἐνδὸς ρόμβου πρὸς ἐν ἀπὸ τὰ τρίγωνα, εἰς τὰ δυοῖς διαιρεῖται ὑπὸ τῶν διαγωνίων του.

315. Νὰ δρίσητε τὸν λόγον μιᾶς ἔγγεγραμμένης γωνίας πρὸς τὴν ἐπίκεντρον γωνίαν, ἡ δοπία βαίνει εἰς τὸ αὐτὸ τόξον.

2. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ

§ 181. Θεώρημα. Τὸ μέτρον ἐνδὸς ποσοῦ εἶναι ἀθροισμα τῶν μέτρων τῶν μερῶν αὐτοῦ, ἀν μετρηθῶσι μὲ τὴν αὐτὴν μονάδα

"Αν π.χ. ἐν ποσὸν Π ἀποτελήται ἀπὸ μέρη A καὶ B καὶ M εἶναι ἡ μονάς, μὲ τὴν δοπίαν μετροῦμεν αὐτά, θὰ εἶναι $(\Pi) = (A) + (B)$.

Απόδειξις. "Αν ύποθέσωμεν δτὶ $(A) = A : M = \lambda$ καὶ $(B) = B : M = \lambda'$, θὰ εἶναι $A = M \cdot \lambda$, $B = M \cdot \lambda'$. Καὶ ἐπομένως: $\Pi = A + B = M \cdot (\lambda + \lambda')$. 'Εκ ταύτης δὲ ἔπειται δτὶ:

$$(\Pi) = \Pi : M = \lambda + \lambda' = (A) + (B), \text{ δ.ε.δ.}$$

Πόρισμα I. Τὰ ἵστα ἡ ἴσοδύναμα σχήματα ἔχουσιν τὸ αὐτὸ μέτρον, ἀν μετρηθῶσι μὲ τὴν αὐτὴν μονάδα. Καὶ ἀντιστρόφως.

Πόρισμα II. Τὸ μέτρον τῆς διαφορᾶς δύο ποσῶν ἴσονται πρὸς τὴν διαφορὰν τῶν ἀντιστοιχῶν μέτρων αὐτῶν.

§ 182. Θεώρημα II. "Αν ἐν ποσὸν πολλαπλασιασθῇ ἐπὶ θετικὸν ἀριθμὸν καὶ τὸ μέτρον αὐτοῦ πολλαπλασιάζεται ἐπὶ τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν.

"Αν δηλ. Π εἶναι ἐν ποσὸν καὶ $\lambda > 0$, θὰ εἶναι $(\Pi \cdot \lambda) = (\Pi) \cdot \lambda$.

Απόδειξις α' "Αν δὲ λ εἶναι ἀκέραιος, π.χ. 3, θὰ εἶναι $\Pi \cdot 3 = \Pi + \Pi + \Pi$ καὶ κατὰ τὴν προηγουμένην ἰδιότητα θὰ εἶναι $(\Pi \cdot 3) = (\Pi) + (\Pi) + (\Pi) = (\Pi) \cdot 3$.

β' "Αν λ εἶναι κλασματικὴ μονάς, π.χ. $\frac{1}{4}$, θὰ εἶναι $\Pi = [\Pi \cdot \frac{1}{4}] \cdot 4$ καὶ κατὰ τὴν προηγουμένην περίπτωσιν θὰ εἶναι: $(\Pi) = \left(\Pi \cdot \frac{1}{4} \right) \cdot 4$, δηλεν $\left(\Pi \cdot \frac{1}{4} \right) = (\Pi) \cdot \frac{1}{4}$.

γ') "Αν $\lambda = 1,21 \dots$, θά είναι :

$$\Pi \cdot 1,21 \dots = \Pi + \frac{\Pi}{10} + \frac{\Pi}{10} + \frac{\Pi}{100} + \dots$$

Έπομένως (§ 181)

$$(\Pi \cdot 1,21 \dots) = (\Pi) + \left(\frac{\Pi}{10}\right) + \left(\frac{\Pi}{10}\right) + \left(\frac{\Pi}{100}\right) + \dots$$

Έπειδή δὲ κατά τὴν προηγουμένην περίπτωσιν είναι

$$\left(\frac{\Pi}{10}\right) = (\Pi) \cdot \frac{1}{10}, \quad \left(\frac{\Pi}{100}\right) = (\Pi) \cdot \frac{1}{100}, \quad \text{ξεπειδή}$$

$$(\Pi \cdot 1,21 \dots) = (\Pi) + (\Pi) \cdot \frac{1}{10} + (\Pi) \cdot \frac{1}{10} + (\Pi) \cdot \frac{1}{100} + \dots$$

ἡ $(\Pi \cdot 1,21 \dots) = (\Pi) \cdot 1,21 \dots$ "Ωστε δὲ" οιανδήποτε θετικήν τιμήν τοῦ λ., είναι $(\Pi \cdot \lambda) = (\Pi) \cdot \lambda$, δ.ε.δ.

Πόρισμα. "Ο λόγος ποσοῦ πρὸς ἄλλο δμοειδὲς ποσὸν ισοῦται πρὸς τὸν λόγον τῶν μέτρων αὐτῶν, ἢν μετρηθῶσι μὲ τὴν αὐτὴν μονάδα."

Παρατηροῦμεν δτι, ἢν $P : R = \lambda$, θά είναι $P = R \cdot \lambda$ καὶ ἐπομένως $(\Pi) = (P \cdot \lambda) = (P) \cdot \lambda$. Ἐκ ταύτης δὲ βλέπομεν δτι:

$$(\Pi) : (P) = \lambda = P : R.$$

§ 183. Τί είναι κοινὸν μέτρον δύο ποσῶν. Ποῖα λέγονται σύμμετρα καὶ ἀσύμμετρα ποσά. "Αν $P : M = \lambda, R : M = \lambda'$, οἱ δὲ ἀριθμοὶ λ καὶ λ' είναι ἀκέραιοι, τὸ ποσὸν M λέγεται κοινὸν μέτρον τῶν ποσῶν P καὶ R. Ταῦτα δὲ τὰ ποσά λέγονται σύμμετρα ποσά." "Ωστε :

"Ἐν ποσὸν λέγεται κοινὸν μέτρον ἄλλων, ἢν οἱ λόγοι ἐκάστου τούτων πρὸς ἕκεῖνο είναι ἀκέραιοι ἀριθμοί.

Δύο δμοειδῆ ποσὰ λέγονται σύμμετρα ποσά, ἢν ἔχωσι κοινὸν μέτρον.

Δύο δὲ δμοειδῆ ποσὰ λέγονται ἀσύμμετρα ποσά, ἢν δὲν ἔχωσι κοινὸν μέτρον.

Σημεῖος. Βραδύτερον θὰ γνωρίσωμεν ἀσύμμετρα ποσά.

§ 184. Τί λέγεται μῆκος εὐθ. τμήματος καὶ ποῖαι αἱ συνηθέστεραι μονάδες μήκους. Τὸ μέτρον εὐθ. τμήματος λέγεται μῆκος αὐτοῦ. Άλι δὲ διάφοροι μονάδες, τὰς δποίας μετα-

χειριζόμεθα διὰ τὴν μέτρησιν τῶν γραμμῶν, λέγονται **μονάδες μήκους**.

Ἄπο τὴν Ἀριθμητικὴν καὶ ἀπὸ τὴν Πρακτικὴν Γεωμετρίαν γνωρίζομεν δτὶ συνηθεστέρα μονάς μήκους εἶναι τὸ μέτρον ἢ διβασιλικὸς πῆχυς μὲ τὰ πολλαπλάσια καὶ ύποπολλαπλάσια αὐτοῦ.

Πολλαπλάσια δὲ τοῦ μέτρου εἶναι τὸ στάδιον ἢ χιλιόμετρον καὶ τὸ μυριάμετρον = 10 χιλιμ.

Ύποπολλαπλάσια δὲ τοῦ μέτρου εἶναι ἡ παλάμη, ὁ δάκτυλος καὶ ἡ γραμμή.


Καὶ τὸ μέτρον πάσης ἄλλης γραμμῆς, ἢ δποίᾳ ἐμετρήθη μὲ μίαν μονάδα μήκους, λέγεται ἐπίσης μῆκος τῆς γραμμῆς ταύτης.

Γεννᾶται τώρα ἡ ἀπορία: Τι εἰδους ἀριθμὸς δύναται νὰ εἶναι τὸ μέτρον ἐνδος εὐθ. τμήματος.

Τὴν ἀπορίαν ταύτην λύουσι τὰ ἐπόμενα θεωρήματα.

§ 185. Θεώρημα I. "Αν ἔν εὐθ. τμῆμα εἶναι σύμμετρον πρὸς τὴν μονάδα, τὸ μέτρον αὐτοῦ εἶναι ἀκέραιος ἢ κλασματικὸς δῆλος σύμμετρος ἀριθμός. Καὶ ἀντιστρόφως.

"Ἀπόδειξις. "Εστω Π ἔν εὐθ. τμῆμα, Μ ἡ μονάς τοῦ μήκους καὶ Κ κοινὸν μέτρον τῶν Π καὶ Μ (σχ. 138). "Αν ύποθέσωμεν



Σχ. 138

ὅτι $\Pi : K = \mu$ καὶ $M : K = v$, οἱ ἀριθμοὶ μ καὶ v εἶναι ἀκέραιοι (§ 183). Ἐπειδὴ δὲ ἀπὸ τὴν $M : K = v$ προκύπτει δτὶ $K = M \cdot \frac{1}{v}$, ἀπὸ τὴν ἴσοτητα $\Pi : K = \mu$ ἔπειται δτὶ $\Pi = \frac{M}{v} \cdot \mu$ καὶ ἐπομένως $\Pi : M = \frac{\mu}{v}$ ἢ $(\Pi) = \frac{\mu}{v}$.

"Αν δὲ μ εἶναι διαιρετὸς ύπὸ τοῦ v , δὲ ἀριθμὸς $\frac{\mu}{v}$ θά εἶναι ἀκέραιος· ἄλλως οὕτος θά εἶναι κλάσμα, δ.ἔ.δ.


"Ἀντιστρόφως. "Εστω δτὶ $(\Pi) = \frac{\mu}{v}$ καὶ μ , v ἀκέραιοι, δὲ $\frac{\mu}{v}$ ἀκέραιος ἢ κλάσμα. "Αν M εἶναι ἡ μονάς μήκους, θά

είναι (Π) = $\Pi : M = \frac{\mu}{v}$ καὶ ἐπομένως $\Pi = \frac{M}{v} \cdot \mu$. Ἐπειδὴ δὲ καὶ $M = \frac{M}{v} \cdot v$, ἔπειται ὅτι τὸ ποσὸν $\frac{M}{v}$ είναι κοινὸν μέτρον τῶν Π καὶ M , τὸ δὲ Π είναι σύμμετρον πρὸς τὴν μονάδα M .

§ 186. Θεώρημα II. *"Ἄν εν εὐθύγραμμον τμῆμα είναι ἀσύμμετρον πρὸς τὴν μονάδα, τὸ μέτρον αὐτοῦ είναι ἀσύμμετρος ἀριθμός. Καὶ ἀντιστρόφως.*

"Από δειξις. Εστω AB ἐν εύθ. τμῆμα ἀσύμμετρον πρὸς τὴν μονάδα M (σχ. 139).

"Ἄς ὑποθέσωμεν δὲ ὅτι ἡ μονάδα M χωρεῖ εἰς τὸ AB δύο φοράς καὶ μένει ἐν τμῆμα $\Delta B < M$. Εἰς τὸ τμῆμα ΔB χωρεῖ τὸ $\frac{M}{10}$. Εστω 4 φοράς καὶ μένει ἐν τμῆμα $EB < \frac{M}{10}$. Εἰς τὸ EB χωρεῖ τὸ $\frac{M}{100}$ π.χ. 7 φοράς καὶ μένει ἐν μέρος $ZB < \frac{M}{100}$.



"Ἄν ἔξακολουθήσωμεν οὕτω, βλέπομεν ὅτι πάντοτε μένει ἐν μέρος μικρότερον ἀπὸ τὸ τελευταῖως χρησιμοποιούμενον μέρος τῆς μονάδος M . Διότι, ἀν π.χ. τὸ $\frac{M}{100}$ ἔχωρει εἰς τὸ EB ἀκριβῶς 7 φορᾶς, θὰ ἦτο $(AB) = (AD) + (DE) + (EB) = 2,47$, τὸ δὲ AB θὰ ἦτο σύμμετρον πρὸς τὴν μονάδα M (§ 185). Τοῦτο δὲ ἀντίκειται εἰς τὴν ὑπόθεσιν.

Θὰ είναι λοιπὸν τὸ μῆκος τοῦ AB ἀριθμὸς 2,47 μὲ ἄπειρα δεκαδικὰ ψηφία. Δὲν είναι δὲ ταῦτα περιοδικά, διότι ἄλλως δ ἀριθμὸς 2,47 . . . θὰ ἦτο ἵσος πρὸς ἐν κλάσμα καὶ τὰ τμήματα AB καὶ M θὰ ἦσαν σύμμετρα, δπερ ἀντίκειται εἰς τὴν ὑπόθεσιν. Είναι λοιπὸν δ 2,47 . . . , ἥτοι τὸ μέτρον τοῦ AB , ἀσύμμετρος ἀριθμός, δ.ἔ.δ.

Τὸ ἀντιστροφὸν ἀποδεικνύεται εὐκόλως διὰ τῆς εἰς ἄτοπον ἀπαγωγῆς.

Τὰ θεωρήματα ταῦτα ἀληθεύουσι καὶ ἀν Π είναι τόξον ἥ

γωνία ή τυχόν άλλο ποσόν. Ἐποδεικνύονται δὲ κατά τὸν αὐτὸν τρόπον.

Ἐκ τῆς ἀληθείας δὲ τούτων καὶ τῶν ὅρων σύμμετρα καὶ ἀσύμμετρα ποσὰ προηλθον καὶ οἱ ὅροι σύμμετροι καὶ ἀσύμμετροι ἀριθμοί.

§ 187. Ποῖαι εἰναι αἱ μονάδες τῶν ἐπιφανειῶν καὶ τί λέγεται ἐμβαδὸν ἐπιφανείας. Ἀπὸ τὴν Πρακτικὴν Γεωμετρίαν γνωρίζομεν δτι:

Ὄς μονάς τῶν ἐπιφανειῶν λαμβάνεται ἡ ἐπιφάνεια τοῦ τετραγώνου, τὸ δποῖον ἔχει πλευρὰν τὴν μονάδα μήκους.

Οὕτως, ὃν ὡς μονάς μήκους ληφθῇ τὸ μέτρον ἡ ἡ παλάμη ἢ δάκτυλος ἢ ἡ γραμμή, ἀντίστοιχος μονάς τῶν ἐπιφανειῶν θὰ εἰναι τὸ τετράγωνον, τὸ δποῖον ἔχει πλευρὰν ἐν μέτρον ἢ μίαν παλάμην κ.τ.λ.

Λέγονται δὲ τὰ τετράγωνα ταῦτα κατά σειρὰν τετραγωνικὸν μέτρον, τετραγωνικὴ παλάμη, τετραγωνικὸς δάκτυλος, τετραγωνικὴ γραμμή.

Ἄν διαιρέσωμεν εἰς 10 ἵσα μέρη δύο προσκειμένας πλευρὰς τοῦ τετρ. μέτρου καὶ ἐκ τῶν σημείων τῆς διαιρέσεως ἑκατέρας φέρωμεν εύθειας παραλήλους πρὸς τὴν ἄλλην, διαιροῦμεν τὸ τετρ. μέτρον εἰς 100 τετράγωνα. Ἔκαστον δὲ ἀπὸ αὐτὰ ἔχει πλευρὰν μιᾶς παλάμης.

Βλέπομεν λοιπὸν δτι τὸ τετραγωνικὸν μέτρον ἔχει 100 τετραγωνικάς παλάμας.

Ομοίως βεβαιούμεθα δτι μία τετ. παλάμη ἔχει 100 τετ. δάκτυλους καὶ εἰς τετ. δάκτυλος ἔχει 100 τετ. γραμμάς. Κατὰ ταῦτα:

1 τετ. μέτ.=100 τετ. παλ.=10 000 τετ. δακ.=1 000 000 τ. γραμ.

1 τετ. παλ.= 100 τετ. δακ.= 10 000 τ. γραμ.

1 τετ. δάκ.= 100 τ. γραμ.

Ἄν ὡς μονάς μήκους ληφθῇ τὸ χιλιόμετρον, ἀντίστοιχος μονάς τῶν ἐπιφανειῶν θὰ εἰναι τὸ τετραγωνικὸν χιλιόμετρον. Εἶναι δὲ τοῦτο τετράγωνον μὲ πλευρὰν 1 000 μέτρων καὶ περιέχει:

$$1\,000 \cdot 1\,000 = 1\,000\,000 \text{ τετ. μέτρα.}$$

Διὰ τὴν μέτρησιν τῶν ἀγρῶν καὶ ἀμπέλων χρησιμοποιοῦμεν τὸ βασιλικὸν στρέμμα, τὸ δποῖον ἔχει 1 000 τετρ. μέτρα καὶ τὸ παλαιὸν στρέμμα, τὸ δποῖον ἔχει 1 270 τετ. μέτρα.

Διὰ δὲ τὴν μέτρησιν τῶν οἰκοπέδων, πλὴν τοῦ τετ. μέτρου χρησιμοποιοῦμεν ἐνίστε καὶ τὸν τεκτονικὸν τετραγωνικὸν πῆχυν. Οὗτος εἶναι τετράγωνον μὲ πλευρὰν ἐνδός τεκτονικοῦ πῆχεως, ἥτοι $\frac{3}{4}$ τοῦ μέτρου. Εἶναι δὲ 1 τετ. τεκ. πῆχυς = $\frac{9}{16}$ τοῦ τετρ. μέτρου.

'Εμβαδὸν ἐπιφανείας λέγεται τὸ μέτρον αὐτῆς, ἥτοι δὲ λόγος αὐτῆς πρὸς τὴν μονάδα τῶν ἐπιφανειῶν. "Αν π. χ. Ε εἶναι τυχοῦσα ἐπιφάνεια, Μ ἡ μονάς τῶν ἐπιφανειῶν καὶ $E:M=3,25$, δὲ ἀριθμὸς 3,25 λέγεται ἐμβαδὸν τῆς ἐπιφανείας Ε.

Εἶναι δὲ φανερὸν ὅτι τὸ ἐμβαδὸν ἐπιφανείας γίνεται ἀπὸ τὴν ἀκεραίαν μονάδα καὶ ἀπὸ τὰ μέρη αὐτῆς, δπως ἡ ἐπιφάνεια αὐτῇ γίνεται ἀπὸ τὴν μονάδα Μ τῶν ἐπιφανειῶν καὶ ἀπὸ τὰ μέρη αὐτῆς.

Διὰ τὸν λόγον τοῦτον τὸ ἐμβαδὸν λαμβάνει τὸ δνομα τῆς μονάδος Μ. "Αν π.χ. $M=1$ τετ. μέτρον, τὸ ἐμβαδὸν τῆς προηγουμένης ἐπιφανείας Ε εἶναι 3,25 τετ. μέτρα.

3. ΕΜΒΑΔΟΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

I. ΕΜΒΑΔΟΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΩΝ


§ 188. Πρόβλημα I. Νὰ εὑρεθῇ τὸ ἐμβαδὸν δρθογωνίου, ἀν γνωρίζωμεν τὴν βάσιν καὶ τὸ ύψος αὐτοῦ.

Λύσις. α') "Εστω ΑΒΓΔ (σχ. 140) δρθογώνιον, τὸ δποῖον ἔχει (AB) = 4 μέτρα καὶ (AD) = 3 μέτρα.

Τοῦτο διαιρεῖται εὐκόλως εἰς 4×3 , ἥτοι 12 τετράγωνα, τὰ δποῖα ἔχουσι πλευρὰν 1 μέτρου.


Εἶναι λοιπὸν ($AB\Gamma\Delta$) = $4 \times 3 = 12$ τετραγωνικὰ μέτρα.

β') "Εστω ἄλλο δρθογώνιον ΑΒΓΔ (σχ. 141), τὸ δποῖον



Έχει $(AB) = \frac{3}{4}$ μέτρου και $(AD) = \frac{2}{4}$ μέτρου.

Διαιρούμεν τήν AB εις 3, τήν δὲ AD εις 2 ΐσα μέρη και παρατηρούμεν ότι έκαστον από αύτά είναι $\frac{1}{4}$ μέτρου.




Σχ. 141

Εύκολως έπειτα διαιρούμεν τὸ $AB\Gamma\Delta$ εἰς 3×2 , ἡτοὶ 6 τετράγωνα μὲ πλευρὰν $\frac{1}{4}$ μέτ. Ἐπειδὴ δὲ κατὰ τὸν ΐδιον τρόπον τὸ τετραγωνικὸν μέτρον διαιρεῖται εἰς 4×4 , ἡτοὶ 16 τοιαῦτα τετράγωνα, ἔπειται ότι έκαστον τούτων είναι $\frac{1}{16}$ τοῦ τετραγωνικοῦ μέτρου.

Εἶναι λοιπὸν $(AB\Gamma\Delta) = \frac{1}{16} \cdot 6 = \frac{6}{16}$ τετραγωνικοῦ μέτρου ἢ $(AB\Gamma\Delta) = \frac{1}{16} \cdot 2 \cdot 3 = \frac{2}{4} \cdot \frac{3}{4}$ τετραγωνικοῦ μέτρου.

γ') "Αν $(AB) = \frac{2}{3}$ μέτ. καὶ $(AD) = \frac{3}{4}$ μέτ., τρέπομεν τὰ κλάσματα ταῦτα εἰς ὁμόνυμα καὶ εύρισκομεν ότι $(AB) = \frac{8}{12}$ μέτρου καὶ $(AD) = \frac{9}{12}$ μέτρου. Κατὰ δὲ τήν προηγουμένην περίπτωσιν είναι $(AB\Gamma\Delta) = \frac{8}{12} \cdot \frac{9}{12} = \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4}$ τετ. μέτρ.

δ') "Εστω τέλος ἄλλο δρθιογώνιον $AB\Gamma\Delta$ (σχ. 142), τὸ δόποιον έχει $(AB) = 3,627 \dots$ μέτρ. καὶ $(AD) = 2,329 \dots$ μέτρ. Ἐπὶ τῆς AB δρίζομεν διαδοχικὰ τμήματα $AE, EZ, ZH \dots$ τοιαῦτα, ώστε νὰ είναι $(AE) = 3$ μέτ., $(EZ) = 0,6$ μέτ., $(ZH) = 0,02$ μέτ.. Ομοίως ἐπὶ τῆς AD δρίζομεν διαδοχικὰ τμήματα $A\Theta, \Theta I, IS, \dots$ τοιαῦτα, ώστε νὰ



Σχ. 142

είναι (ΑΘ) = 2 μέτ., (ΘΙ) = 0,3 μέτ., (ΙΣ) = 0,02 μέτ... "Επειτα φέρομεν άπό τά σημεῖα E, Z, H, ... παραλλήλους πρὸς τὴν ΑΔ, άπό δὲ τὰ Θ, Ι, Σ, ... παραλλήλους πρὸς τὴν ΑΒ. Οὕτω βλέπομεν δτι:

$$\begin{aligned} (\text{ΑΘΚΒ}) &= (\text{ΑΘΛΕ}) + (\text{ΕΛΜΖ}) + (\text{ΖΜΝΗ}) + \dots \\ &= 3 \times 2 + 0,6 \times 2 + 0,02 \times 2 + \dots = 3,627 \dots \times 2. \end{aligned}$$

'Ομοίως εύρισκομεν δτι:

$$(\text{ΘΙΡΚ}) = 3,627 \dots \times 0,3, (\text{ΙΣΤΡ}) = 3,627 \times 0,02 \text{ κ.τ.λ.}$$

"Αρα (ΑΒΓΔ) = 3,627 \dots \times (2 + 0,3 + 0,02 + \dots) = 3,627 \dots \times 2,329 \dots \text{ τετρ. μέτρα. Βλέπομεν λοιπὸν δτι:}

Τὸ ἐμβαδὸν δρθογωνίου εἶναι γινόμενον τῆς βάσεως ἐπὶ τὸ ύψος αὐτοῦ.

Γενικῶς δηλ., ἀν β εἰναι τὸ μῆκος τῆς βάσεως, υ τὸ μῆκος τοῦ ὕψους καὶ Ε τὸ ἐμβαδὸν δρθογωνίου, θὰ εἶναι $E = \beta \cdot u$.

Εἶναι φανερὸν δτι ἡ βάσις καὶ τὸ ὕψος πρέπει νὰ μετρῶνται μὲ τὴν αὐτὴν μονάδα μῆκους, τὸ δὲ γινόμενον αὐτῶν δηλοὶ μονάδας ἐπιφανειῶν ἀντιστοίχους πρὸς ταύτην. "Αν π.χ. β καὶ υ παριστῶσι μέτρα ἡ παλάμας, τὸ β·υ παριστᾶ ἀντιστοίχως τετ. μέτρα ἡ τετ. παλάμας.

Πόρισμα. Τὸ ἐμβαδὸν τετραγώνου εἶναι γινόμενον τοῦ μῆκους τῆς πλευρᾶς αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ἔαυτόν του.

"Αν δηλ. α εἶναι τὸ μῆκος τῆς πλευρᾶς τετραγώνου καὶ Ε τὸ ἐμβαδὸν αὐτοῦ, θὰ εἶναι $E = \alpha^2$.

Σημείωσις. Διά τὸν λόγον τοῦτον ἡ δευτέρα δύναμις παντὸς ἀριθμοῦ α λέγεται καὶ τετράγωνον τοῦ α.

'Α σκήσεις

316. Νὰ εύρεθῇ τὸ ἐμβαδὸν δρθογωνίου, τὸ δποῖον ἔχει βάσιν 5,20 μέτρα καὶ ὕψος 3,30 μέτρα.

317. "Ο στίβος τοῦ Σταδίου 'Αθηνῶν ἔχει μῆκος 204 μέτρ. καὶ πλάτος 33 μέτρα. Νὰ εύρεθῇ τὸ ἐμβαδὸν αὐτοῦ.

318. Νὰ εύρεθῇ τὸ ἐμβαδὸν τετραγώνου, τὸ δποῖον ἔχει πλευρὰν 5,40 μέτρα.

319. Νὰ εύρεθῇ τὸ ἐμβαδὸν δρθογωνίου, τὸ δποῖον ἔχει βάσιν 45,50 μέτρ. καὶ περίμετρον 150,75 μέτρ.

320. "Ο Παρθενών ἔχει μῆκος 69,51 μέτρ. καὶ περίμετρον 200,74 μέτρ. Νὰ εύρεθῇ τὸ ἐμβαδὸν αὐτοῦ.

321. Τὸ Θησεῖον ἔχει πλάτος 13,72 μέτρ. καὶ περίμετρον 90,98 μέτρα. Νὰ εύρεθῇ τὸ ἐμβαδὸν τοῦ δαπέδου αὐτοῦ.

322. Νὰ εύρεθῇ τὸ ἐμβαδὸν ἑνὸς τετραγώνου, τὸ δόποιον ἔχει περίμετρον 40,36 μέτρων.

323. Ἔν τετράγωνον ἔχει ἐμβαδὸν 14,0625 τετ. μέτρων. Νὰ εύρεθῇ τὸ μῆκος τῆς πλευρᾶς αὐτοῦ.

324. Ὁρθογώνιον ἔχει ἐμβαδὸν 450 τετ. μέτρα καὶ βάσιν 30 μέτρ. Νὰ εύρεθῇ τὸ ὕψος αὐτοῦ.


325. Ἔν τετράγωνον ἔχει ἐμβαδὸν 81 τετ. μέτρα. Νὰ εύρεθῇ τὸ μῆκος τῆς περιμέτρου αὐτοῦ.

326. Ἔν δρθογώνιον ἔχει ὕψος 20 μέτρ. καὶ εἰναι ἴσοδύναμον πρὸς τετράγωνον πλευρᾶς 32 μέτρων. Νὰ εύρεθῇ ἡ βάσις τοῦ δρθογώνιου τούτου.

327. Μία οἰκοδέσποινα θέλει νὰ στρώσῃ μὲ τάπητα πλάτους 1,80 μέτρ. αἴθουσαν μήκους 4,30 μέτρ. καὶ πλάτους 4 μέτρ. Νὰ εὕρητε πόσα μέτρα ἀπὸ τὸν τάπητα αὐτὸν θὰ χρειασθῇ.

328. Εἰς δρθογώνιος διάδρομος ἔχει μῆκος 8 μέτρ. καὶ πλάτος 3 μέτρ. Εἰναι δὲ οὗτος ἐστρωμένος μὲ τετραγωνικάς πλάκας πλευρᾶς 0,20 μέτρ. Νὰ εὕρητε πόσας πλάκας ἔχει.

§ 189. Πρόβλημα II. Νὰ ενρεθῇ τὸ ἐμβαδὸν παραλληλογράμμου $AB\Gamma\Delta$ ἐκ τῆς βάσεως καὶ τοῦ ὕψους αὐτοῦ (σχ. 143).



Σχ. 143

Ἄνσις. Φέρομεν τὰς εὐθείας AH καὶ BZ καθέτους ἐπὶ τὴν $\Delta\Gamma$. Οὕτω δὲ σχηματίζεται τὸ δρθογώνιον $ABZH$.

Τοῦτο καὶ τὸ $AB\Gamma\Delta$ ἔχουσι κοινὸν μέρος τὸ $ABZ\Delta$, τὰ δὲ μὴ κοινὰ μέρη $A\Delta H$, $B\Gamma Z$ εἰναι τρίγωνα ἵσασ' διότι εἰναι δρθ. τρίγωνα καὶ ἔχουσιν $A\Delta = B\Gamma$ καὶ $AH = BZ$.

Τὰ σχήματα λοιπὸν $AB\Gamma\Delta$ καὶ $ABZH$ εἰναι ἴσοδύναμα. Ἐπειδὴ δὲ τὰ ἴσοδύναμα σχήματα ἔχουσιν ἵσα ἐμβαδὰ (§ 181 Πόρ. I), ἔπειται ὅτι

$$(AB\Gamma\Delta) = (ABZH) = (AB) \times (AH). \quad \text{Ἐπομένως} \\ (AB\Gamma\Delta) = (AB) \times (\Delta E). \quad \text{Ωστε:}$$

Τὸ ἐμβαδὸν παντὸς παραλληλογράμμου εἰναι γινόμενον τῆς βάσεως ἐπὶ τὸ ὕψος αὐτοῦ, ἥτοι: $E = \beta \cdot u$.

Πόρισμα I. Ἄν δύο παραλληλόγραμμα ἔχωσιν ἵσας βάσεις καὶ ἵσα ὕψη, εἰναι ἵσα ἥτοι ἴσοδύναμα.

Πόρισμα II. Ἐν δύο παραλληλόγραμμα ἔχωσιν ὥσας βάσεις, είναι ως τὰ ψηφαὶ αὐτῶν. Ἐν δὲ ἔχωσιν ὥσα ψηφη, είναι ως αἱ βάσεις αὐτῶν.

'Α σκήσεις

329. Ἐν παραλληλόγραμμον ἔχει βάσιν 54,36 μέτ. καὶ ὕψος ἵσον πρὸς τὸ τρίτον τῆς βάσεως αὐτοῦ. Νὰ εὔρεθῇ τὸ ἐμβαδὸν αὐτοῦ.

330. Εἰς ρόμβος ἔχει περίμετρον 149,40 μέτ. ἡ δὲ ἀπόστασις δύο παραλλήλων πλευρῶν αὐτοῦ είναι 30,10 μέτ. Νὰ εὔρεθῇ τὸ ἐμβαδὸν αὐτοῦ.


331. Διάφορα ἴσοιδύναμα παραλληλόγραμμα ἔχουσι κοινὴν βάσιν ὀρισμένην κατὰ τὴν θέσιν καὶ τὸ μέγεθος. Νὰ εὔρεθῇ ὁ γεωμ. τόπος τῶν ἀπέναντι αὐτῆς κορυφῶν αὐτῶν, ἢν δοθῇ ἐν ἀπὸ τὰ παραλληλόγραμμα ταῦτα.

II. ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΡΙΓΩΝΟΥ

§ 190. Πρόβλημα III. Νὰ εὑρεθῇ τὸ ἐμβαδὸν τριγώνου $AB\Gamma$ ἐκ τῆς βάσεως καὶ τοῦ ψηφους αὐτοῦ. (σχ. 144).

Ἄνσις. Φέρομεν τὰς εὐθείας AE καὶ GE παραλλήλους ἀντιστοίχως πρὸς τὴν $B\Gamma$ καὶ AB . Οὕτω σχηματίζεται τὸ παραλληλόγραμμον $ABGE$, τὸ δόποιον ἔχει μὲ τὸ τρίγωνον $AB\Gamma$ τὴν αὐτὴν βάσιν $B\Gamma$ καὶ τὸ αὐτὸ ὕψος AD .

Ἐπειδὴ δὲ τὰ τρίγωνα $AB\Gamma$ καὶ $A\Gamma E$ είναι ἴσα (§ 117), ἔπειται δτὶ τὸ $AB\Gamma$ είναι τὸ ἥμισυ τοῦ $ABGE$. Επομένως $(AB\Gamma) = \frac{(ABGE)}{2}$ (1)



Σχ. 144

Ἐπειδὴ δὲ $(ABGE) = (B\Gamma) \times (AD)$, ἡ ἴσοτης (1) γίνεται $(AB\Gamma) = \frac{(B\Gamma) \times (AD)}{2}$. Βλέπομεν λοιπὸν δτὶ:

Τὸ ἐμβαδὸν παντὸς τριγώνου ἴσονται πρὸς τὸ ἥμισυ τοῦ γινομένου τῆς βάσεως ἐπὶ τὸ ψηφος αὐτοῦ, ἥτοι: $E = \frac{1}{2} \beta \cdot v$.

Πόρισμα I. Τὰ τρίγωνα, τὰ δοποῖα ἔχουσιν ὥσας βάσεις καὶ ὥσα ψηφη, είναι ὥσα ἡ ἴσοιδύναμα.

Πόρισμα II. "Αν δύο τρίγωνα έχωσιν την ίδιαν υψην, είναι ως αλ βάσεις αυτῶν. "Αν δὲ έχωσιν την ίδιαν βάσεις, είναι ως τα ίδιαν αυτῶν.

Α σκήσεις

332. Ἐν τρίγωνον ἔχει βάσιν 240 μέτρ. καὶ ὕψος 20 μέτρ. Νὰ εὔρεθῇ τὸ ἐμβαδὸν αὐτοῦ.

333. Μία ἀμπελος ἔχει σχῆμα ὁρθογωνίου τριγώνου, τοῦ διποίου τὸ μὲν ἐμβαδὸν είναι 3 βασιλικὰ στρέμματα, ἡ δὲ μία τῶν καθέτων πλευρᾶν 150 μέτ. Νὰ εὔρεθῇ τὸ μῆκος τῆς ἄλλης καθέτου πλευρᾶς αὐτοῦ.

334. Ἐν τριγωνικὸν οἰκόπεδον ἔχει βάσιν 25,60 μέτ. καὶ ὕψος 13,20 μέτ. Νὰ εὔρεθῇ ἡ ἀξία τοῦ οἰκοπέδου τούτου, ἢν δὲ τετρ. τεκτ. πῆχυς τιμᾶται 36,40 δραχ.

335. Νὰ συγκρίνητε τὰ ἐμβαδὰ τῶν δύο μερῶν, εἰς τὰ διποῖα μία διάμεσος τριγώνου διαιρεῖ αὐτό.

336. Νὰ διαιρέσητε ἐν τρίγωνον εἰς τρία μέρη Ισοδύναμα δι' εὐθειῶν ἀγομένων ἔκ τινος κορυφῆς αὐτοῦ.

337. Νὰ ἀποδειχθῶσι μὲ τὴν βοήθειαν τῶν ἐμβαδῶν αἱ ἀσκήσεις 147, 207 καὶ 208.

338. Νὰ δρίσητε ἐντὸς τριγώνου ἐν σημείον τοιοῦτον, ὥστε αἱ ἔξ αὐτοῦ πρὸς τὰς κορυφὰς ἀγόμεναι εὐθεῖαι νὰ διαιρῶσιν αὐτὸ διεστραγούλα τριγώνα.

339. Ἐπὶ τῆς πλευρᾶς ΒΓ ἐνὸς παραλληλογράμμου ΑΒΓΔ νὰ δρίσητε τυχὸν σημεῖον Ε καὶ νὰ φέρητε τὰς εὐθεῖας ΑΕ καὶ ΔΕ. Νὰ ἀποδείξῃτε δὲ διὰ τὸ τρίγωνον ΑΔΕ είναι Ισοδύναμον πρὸς τὸ ἀθροισμα τῶν τριγώνων ΑΒΕ καὶ ΔΕΓ.

§ 191. Θεώρημα. "Αν μία γωνία τριγώνου είναι την ίδιαν παραπληρωματικὴ μιᾶς γωνίας ἄλλου τριγώνου, δὲ λόγος τῶν ἐμβαδῶν τῶν τριγώνων τούτων Ισοῦται πρὸς τὸν λόγον τῶν γινομένων τῶν πλευρῶν, αἱ διποῖαι περιέχουσι τὰς γωνίας ταύτας.

"Εστωσαν τὰ τρίγωνα ΑΒΓ καὶ ΔΕΖ, εἰς τὰ διποῖα είναι: $A = \Delta$ (σχ. 145 ά) ἢ $A + \Delta = 2$ δρθ. (σχ. 145 β'). Λέγω διὰ:

$$\frac{(ABG)}{(\Delta EZ)} = \frac{(AB)(AG)}{(\Delta E)(\Delta Z)}.$$

"Α πόδειξις. ά) Θέτομεν τὸ τρίγωνον ΔΕΖ εἰς τὴν θέσιν ΑΕΖ' οὕτως, ὥστε ἡ γωνία Δ νὰ ἐφαρμόσῃ ἐπὶ τῆς Α (σχ. 145α') καὶ ἀγομεν τὴν εὐθεῖαν ΒΖ'.

Ἐπειδὴ τὰ τρίγωνα $AB\Gamma$ καὶ ABZ' ἔχουσι κοινὸν ὑψος τὴν ἀπόστασιν τῆς κορυφῆς B ἀπὸ τῆς $A\Gamma$, θά εἶναι


$$\frac{(AB\Gamma)}{(ABZ')} = \frac{(A\Gamma)}{(AZ')} \quad (1)$$

Ἐπειδὴ δὲ καὶ τὰ ABZ' , $AE'Z'$ εἶναι ἴσοϋψη, ἐπειταὶ δτὶ

$$\frac{(ABZ')}{(AE'Z')} = \frac{(AB)}{(AE')} \quad (2)$$

Ἄν πολλαπλασιάσωμεν κατὰ μέλη τὰς ἴσοτητας (1) καὶ (2), εύρισκομεν δτὶ $\frac{(AB\Gamma)}{(AE'Z')} = \frac{(AB)(A\Gamma)}{(AE')(AZ')}$. (3)

Ἐπειδὴ δὲ $AE' = \Delta E$, $AZ' = \Delta Z$ καὶ $(AE'Z') = (\Delta EZ)$, ἡ ἴσοτης (3) γίνεται $\frac{(AB\Gamma)}{(\Delta EZ)} = \frac{(A\Gamma)(A\Gamma)}{(\Delta)(\Delta Z)}$. "Ο.ε.δ.



Σχ. 145

β') Ἄν $A + \Delta = 2$ δρθ, τὸ τρίγωνον ΔEZ τίθεται εἰς τὴν θέσιν $AE'Z'$ (σχ. 145 β') οὕτως, ὥστε ἡ γωνία Δ νὰ ἐφαρμόσῃ ἐπὶ τῆς παραπληρωματικῆς τῆς A . Μετὰ ταῦτα δὲ ἐξακολουθοῦμεν, δπως προηγουμένως.

Α σκήσεις

340. Ἐν τρίγωνον $AB\Gamma$ ἔχει $(AB) = 2$ μέτ., $(A\Gamma) = 8$ μέτ. καὶ εἶναι ἴσοδύναμον πρὸς ἄλλο τρίγωνον $A'B'\Gamma'$, τὸ ὅποιον ἔχει $A'B' = A'\Gamma'$ καὶ $A' = A$. Νὰ εὔρητε τὸ μῆκος τῆς πλευρᾶς $A'B'$.

341. Νὰ κατασκευάσητε δρθογώνιον καὶ ἴσοσκελές τρίγωνον ΔEZ ἴσοδύναμον πρὸς δρθογώνιον τρίγωνον $AB\Gamma$, ἀν αἱ κάθετοι πλευραὶ τούτου εἶναι 4 ἑκατ. ἡ μία καὶ 9 ἑκατ. ἡ ἄλλη.


342. Ἐν δύο τρίγωνα $AB\Gamma$ καὶ $A'B'\Gamma'$ ἔχωσιν: $A = A'$ καὶ $B + B' = 2$ δρθ, νὰ ἀποδείξητε δτὶ $B\Gamma : B'\Gamma' = A\Gamma : A'\Gamma'$.

III. ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ

§ 192. Πρόβλημα IV. Νὰ ενδεθῇ τὸ ἔμβαδὸν τραπεζίου **ΑΒΓΔ** ἐκ τῶν βάσεων καὶ τοῦ ψηφοῦ αὐτοῦ (σχ. 146).

Λύσις. Ἐγομεν τὴν διαγώνιον ΔΒ καὶ διαιροῦμεν τὸ τραπέζιον εἰς τὰ τρίγωνα **ΑΒΔ** καὶ **ΒΓΔ**. Ἐπειδὴ δὲ

$$(AB\Delta) = \frac{(AB)(\Delta E)}{2}, \quad (B\Gamma\Delta) = \frac{(\Delta G)(BZ)}{2} = \frac{(\Delta G)(\Delta E)}{2},$$



Σχ. 146

$$\begin{aligned} \text{Ἐπειτα εὔκολως ὅτι } (AB\Delta) + (B\Gamma\Delta) &= \\ \frac{(AB)(\Delta E)}{2} + \frac{(\Delta G)(\Delta E)}{2}, \quad \text{ὅθεν} \\ (AB\Gamma\Delta) &= \frac{(AB) + (\Delta G)}{2} \times (\Delta E). \end{aligned}$$

Βλέπομεν λοιπὸν ὅτι:

Τὸ ἔμβαδὸν τραπεζίου *ἴσουθαι* πρὸς τὸ γινόμενον τοῦ ἡμιαθροίσματος τῶν βάσεων ἐπὶ τὸ ψῆφος αὐτοῦ.

Ἄν δηλ. B, β, u εἰναι ἀντιστοίχως τὰ μήκη τῶν βάσεων καὶ τοῦ ψηφοῦ, θά εἶναι $E = \frac{B + \beta}{2} \cdot u$.

Πόρισμα. Τὸ ἔμβαδὸν τραπεζίου εἶναι γινόμενον τῆς διαμέσου ἐπὶ τὸ ψῆφος αὐτοῦ.

'Ασκήσεις

343. Νὰ εὕρητε τὸ ἔμβαδὸν τραπεζίου, τὸ δποῖον ἔχει βάσεις 50 μέτρα καὶ 30 μέτ., ψῆφος δὲ 20 μέτρα.

344. Ἐν τραπέζιον ἔχει μίαν βάσιν 65,60 μέτρ., ψῆφος 10 μέτρ. καὶ ἔμβαδὸν 528 τετρ. μέτρων. Νὰ εὕρητε τὸ μῆκος τῆς ἄλλης βάσεως αὐτοῦ.

345. Νὰ εὕρητε τὸ ἔμβαδὸν τραπεζίου, τὸ δποῖον ἔχει διάμεσον 48,30 μέτρ. καὶ ψῆφος 17,50 μέτρ.


346. Νὰ ἀποδείξῃτε ὅτι τὸ ἔμβαδὸν ἐνὸς τραπεζίου εἶναι γινόμενον μιᾶς τῶν μὴ παραλλήλων πλευρῶν αὐτοῦ ἐπὶ τὴν ἀπόστασιν τοῦ μέσου τῆς ἄλλης ἀπὸ ἑκείνης.

IV. ΕΜΒΑΔΟΝ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ

§ 193. Πρόβλημα V. Νὰ ενδεθῇ τὸ ἐμβαδὸν τυχόντος πολυγώνου (σχ. 147).

Λύσις. α') Διαιροῦμεν αὐτὸν εἰς τρίγωνα, ἔπειτα εύρισκομεν καὶ προσθέτομεν τὰ ἐμβαδὰ τῶν τριγώνων τούτων. Γίνεται δὲ ἡ διαιρεσίς αὗτη κατὰ τοὺς ἔξης δύο τρόπους:

1ον. "Ἄγομεν δλας τὰς διαγωνίους, αἱ δποῖαι διέρχονται




Σχ. 147

ἀπὸ μίαν κορυφὴν π.χ. τὴν Α (σχ. 147 α'). Οὕτως, ἀν ἐν πολύγωνον ἔχῃ ν πλευράς, διαιρεῖται εἰς (ν-2) τρίγωνα.

2ον. "Ορίζομεν ἐντὸς αὐτοῦ ἐν σημεῖον Κ καὶ ἄγομεν πάντα τὰ εὐθ. τμήματα ἔξ αὐτοῦ πρὸς τὰς κορυφάς. Οὕτω δὲ πολύγωνον ν πλευρῶν διαιρεῖται εἰς ν τρίγωνα (σχ. 147 β').

β') "Ἄγομεν τὴν μεγαλυτέραν διαγώνιον ΑΔ (σχ. 147 γ') καὶ ἐκ τῶν ἀλλων κορυφῶν καθέτους ΒΗ, ΓΚ, ΕΛ, ΖΘ ἐπ' αὐτὴν. Οὕτω δὲ τὸ πολύγωνον ΑΒΓΔΕΖ διαιρεῖται εἰς δρθιγώνια τρίγωνα καὶ τετράπλευρα (τραπέζια ἢ δρθιγώνια). Εύρισκομεν ἔπειτα καὶ προσθέτομεν τὰ ἐμβαδὰ τούτων.

§ 194. Μία ἀξιοσημείωτος ἐφαρμογή. "Ἐστω εὐθ. σχῆμα ΑΒΓΔ (σχ. 148) περιγεγραμμένον περὶ κύκλον Κ ἀκτῖνος ρ. "Αν Ε εἶναι τὸ ἐμβαδὸν τοῦ ΑΒΓΔ, κατὰ τὰ προηγούμενα,



Σχ. 148

Θά είναι $E = (KAB) + (KBΓ) + (KΓΔ) + (KAΔ)$.

*Επειδή δὲ $(KAB) = \frac{1}{2} (AB) \rho$, $(KBΓ) = \frac{1}{2} (BΓ) \rho$,

$(KΓΔ) = \frac{1}{2} (ΓΔ) \rho$, $(KAΔ) = \frac{1}{2} (AΔ) \rho$,

ἔπειτα διτι $E = \frac{(AB) + (BΓ) + (ΓΔ) + (AΔ)}{2} \cdot \rho$. Ήτοι:

Τὸ ἐμβαδὸν εὐθυγράμμου σχήματος περιγεγραμμένου περὶ κύκλου είναι γινόμενον τῆς ἡμιπεριμέτρου αὐτοῦ ἐπὶ τὴν ἀκτῖνα τοῦ ἐγγεγραμμένου κύκλου.

*Αν λοιπὸν α , β , γ είναι τὰ μήκη τῶν πλευρῶν τριγώνου $ABΓ$ καὶ ρ ἡ ἀκτὶς τοῦ εἰς αὐτὸν ἐγγεγραμμένου κύκλου, θά είναι $E = \frac{\alpha + \beta + \gamma}{2} \cdot \rho$. *Αν δὲ θέσωμεν $\alpha + \beta + \gamma = 2\tau$, ἔπειτα διτι $E = \tau\rho$.

Α σκήσεις

347. *Εκάστη πλευρά ἑξαγώνου ἔχει μῆκος α . Ἐν δὲ σημείον αὐτοῦ ἀπέχει ἀπὸ ἑκάστην πλευρὰν $\frac{\alpha\sqrt{3}}{2}$. Νὰ εὕρητε τὸ ἐμβαδὸν αὐτοῦ.

348. Νὰ εὕρητε τὸ ἐμβαδὸν τοῦ ἑξαγώνου $ABΓΔΕΖ$ (σχ. 147 γ'), ἀν $(AH) = 0,5$ ἑκατ., $(AΘ) = 1$ ἑκατ., $(ΘΛ) = 0,5$ ἑκατ., $(HK) = 3,5$ ἑκατ., $(ΚΔ) = 1,4$ ἑκατ., $(ΛΔ) = 2,8$ ἑκατ., $(ΒΗ) = 1,2$ ἑκατ., $(ΓΚ) = 1,3$ ἑκατ., $(ΕΛ) = 1$ ἑκατ., $(ΖΘ) = 0,8$ ἑκατ.

349. Νὰ ἀποδείξητε διτι τὸ ἐμβαδὸν ἐνὸς τραπεζοειδοῦς είναι γινόμενον μιᾶς διαγωνίου αὐτοῦ ἐπὶ τὸ ἡμιάθροισμα τῶν ἀποστάσεων τῶν ἄκρων τῆς ἄλλης διαγωνίου ἀπ' αὐτῆς.


ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

1. ΜΕΤΡΙΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΛΕΥΡΩΝ ΤΩΝ ΤΡΙΓΩΝΩΝ

§ 195. Τί είναι προβολή σημείου ή εύθυγράμμου τμήματος ἐπὶ ἄξονα. Απὸ ἐν σημεῖον A , τὸ δποῖον κεῖται ἐκτὸς εὐθείας $X'X$, ἀγομεν τὴν εύθειαν Aa κάθετον ἐπὶ τὴν $X'X$ (σχ. 149). Ο ποὺς α τῆς καθέτου ταύτης λέγεται δρῦθη προβολὴ ή ἀπλῶς προβολὴ τοῦ σημείου A ἐπὶ τὴν εύθειαν $X'X$. Ομοίως προβολὴ τοῦ B είναι τὸ β ,

τοῦ Δ τὸ δ κ.τ.λ. "Ωστε:

Προβολὴ σημείου ἐπὶ εὐθεῖαν, λέγεται δ ποὺς τῆς καθέτου, η δποία ἀγεται ἐκ τοῦ σημείου ἐπὶ τὴν εύθειαν ταύτην.



Σχ. 149

"Η εύθεια, ἐπὶ τὴν δποίαν θεωροῦνται αἱ προβολαὶ, λέγεται προβολικὸς ἄξων.

Αἱ προβολαὶ α , β τῶν ἄκρων ἐνδὲς εύθυγράμμου τμήματος AB ὅριζουσι τὸ εύθύγραμμον τμῆμα ab . Τοῦτο λέγεται προβολὴ τοῦ AB . "Ωστε:

Προβολὴ εύθυγράμμου τμήματος ἐπὶ ἄξονα λέγεται τὸ τμῆμα τοῦ ἄξονος τούτου, τὸ δποῖον δρῖζεται ἀπὸ τὰς προβολὰς τῶν ἄκρων τοῦ εύθυγράμμου τμήματος.

Α σκήσεις


350. Νὰ δρίσητε ἐν σημεῖον ἐπὶ μιᾶς εὐθείας καὶ τὴν προβολὴν αὐτοῦ ἐπὶ τὴν εύθειαν ταύτην.

351. Νὰ γράψητε ἐν δροθογώνιον τρίγωνον $AB\Gamma$ καὶ νὰ δρίσητε τὴν προβολὴν τῆς κορυφῆς B ἐπὶ τὴν πλεράν $A\Gamma$ ($A = 1$ δρθ.).

352. Νὰ δρίσητε ἔκατερωθεν ἄξονος $X'X$ δύο σημεῖα A καὶ B . Νὰ γράψητε τὸ εύθ. τμῆμα AB καὶ νὰ δρίσητε τὰς προβολὰς τῶν δύο μερῶν, εἰς τὰ δποῖα τοῦτο διαιρεῖται ὑπὸ τοῦ προβ. ἄξονος $X'X$.

§ 196. Θεώρημα I. Τὸ τετράγωνον μιᾶς καθέτου πλευρᾶς δρθ. τριγώνου εἶναι ἵσοδύναμον πρὸς τὸ δρθογώνιον, τὸ δποῖον ἔχει βάσιν τὴν ὑποτείνουσαν καὶ ύψος τὴν προβολὴν τῆς καθέτου ταῦτης πλευρᾶς ἐπὶ τὴν ὑποτείνουσαν.

Ἄν δηλ. ΑΗ εἶναι κάθετος ἐπὶ τὴν ὑποτείνουσαν ΒΓ (σχ. 150), θὰ εἶναι $(AB)^2 = (BG) \cdot (BH)$ καὶ $(AG)^2 = (BG) \cdot (HG)$.



Σχ. 150

Ἄπό δε ιεις. Κατασκευάζομεν τὸ τετράγωνον ΑΒΕΔ τῆς ΑΒ καὶ τὸ παραλλήλογραμμὸν ΒΓΖΕ. Φέρομεν ἔπειτα τὴν ΒΘ κάθετον ἐπὶ τὴν ΕΖ καὶ βλέπομεν δτι: $(BGZE) = (BG) \cdot (B\Theta)$, ἀλλὰ καὶ $(BGZE) = (BE) \cdot (AB)$.

Ἐκ τούτων ἔπειται δτι: $(BG) \cdot (B\Theta) = (BE) \cdot (AB)$.

Ἐπειδὴ δὲ $(ABED) = (AB)^2 = (BE) \cdot (AB)$, ἔπειται δτι:

$$(AB)^2 = (BG) \cdot (B\Theta). \quad (1)$$

Τώρα παρατηροῦμεν δτι τὰ

δρθ. τρίγωνα ΕΒΘ, ΑΒΗ ἔχουσι:

$$EB = AB \text{ καὶ } \widehat{EB\Theta} = \widehat{EBA} - \widehat{\Theta BA} = \widehat{\Theta BH} - \widehat{\Theta BA} = \widehat{ABH}.$$

Εἶναι λοιπὸν ταῦτα ἵσα καὶ ἐπομένως $B\Theta = BH$. Ἡ δὲ ἵσοτῆς (1) γίνεται $(AB)^2 = (BG) \cdot (BH)$.

Κατὰ τὸν ἴδιον τρόπον ἀποδεικνύομεν δτι καὶ $(AG)^2 = (BG) \cdot (HG)$.

Πόρισμα. Ὁ λόγος τῶν τετραγώνων τῶν καθέτων πλευρῶν δρθ. τριγώνου ἵσοῦται πρὸς τὸν λόγον τῶν προβολῶν αὐτῶν ἐπὶ τὴν ὑποτείνουσαν.

Α σκήσεις

353. Ἡ ὑποτείνουσα ἔνδος δρθ. τριγώνου ἔχει μῆκος 5 ἑκατ. Ἡ δὲ ἐπ' αὐτὴν προβολὴ τῆς ἀπέναντι κορυφῆς διαιρεῖ αὐτὴν εἰς δύο τμῆματα, δῶν τὸ ἔν ἔχει μῆκος 1,8 ἑκατ. Νὰ εὕρητε τὰ μῆκη τῶν καθέτων πλευρῶν αὐτοῦ.

354. Ἡ ὑποτείνουσα δρθ. τριγώνου ἔχει μῆκος 10 ἑκατ. καὶ μία

ἀπὸ τὰς ἄλλας πλευράς 6 ἔκατ. Νὰ εὕρητε τὰ μήκη τῶν προβολῶν τῶν καθέτων πλεύρῶν ἐπὶ τὴν ὑποτείνουσαν.

355. Νὰ γράψητε μίαν διάμετρον κύκλου καὶ ἐκ τοῦ ἐνὸς ἄκρου αὐτῆς νὰ γράψητε δύο χορδάς. Νὰ προβάλητε ταύτας ἐπὶ τὴν διάμετρον ταύτην καὶ νὰ συγκρίνητε τὸν λόγον τῶν τετραγώνων αὐτῶν πρὸς τὸν λόγον τῶν προβολῶν των.

356. Νὰ κατασκευάσητε ἐν δρυθιγώνιον τρίγωνον ΑΒΓ τοιοῦτον, ὥστε νὰ είναι $(AB) = 2 \cdot (AG)$. Νὰ εὕρητε δὲ τὸν λόγον τῆς προβολῆς τῆς ΑΒ πρὸς τὴν προβολὴν τῆς ΑΓ ἐπὶ τὴν ὑποτείνουσάν ΒΓ.

§ 197. Τὸ Πυθαγόρειον θεώρημα *. Τὸ τετράγωνον τῆς ὑποτείνουσῆς δρθ. τριγώνου εἶναι λσοδύναμον πρὸς τὸ ἀθροισμα τῶν τετραγώνων τῶν καθέτων πλευρῶν αὐτοῦ.

Εἶναι δηλ. $(BG)^2 = (AB)^2 + (AG)^2$ (σχ. 150).

* Άποδειξις. Ἐμάθομεν προηγουμένως δτι:

$$(AB)^2 = (BG) \cdot (BH) \text{ καὶ } (AG)^2 = (BG) \cdot (HG).$$

* Εκ τούτων δὲ ἔπειται δτι:

$$(AB)^2 + (AG)^2 = (BG) \cdot [(BH) + (HG)] = (BG)^2, \text{ δ.ε.δ.}$$

Συνήθως χάριν συντομίας θέτομεν $(BG) = \alpha$, $(AG) = \beta$, $(AB) = \gamma$. Τὸ Πυθαγόρειον θεώρημα λοιπὸν ἐκφράζεται διὰ τῆς σχέσεως:

$$\alpha^2 = \beta^2 + \gamma^2.$$

Πόρισμα I. Τὸ τετράγωνον ἐκατέρας τῶν καθέτων πλευρῶν δρθ. τριγώνου εὑρίσκεται, ἢν τὸ τετράγωνον τῆς ἄλλης ἀφαιρεθῇ ἀπὸ τὸ τετράγωνον τῆς ὑποτείνουσῆς.

Εἶναι δηλ. $\beta^2 = \alpha^2 - \gamma^2$ καὶ $\gamma^2 = \alpha^2 - \beta^2$.

* Ο φιλόσοφος καὶ μαθηματικὸς Πυθαγόρας ἐγεννήθη ἐν Σάμῳ περὶ τὸ 580 π. Χ. Οδτος μετέβη εἰς Αἴγυπτον, ἔνθα ἐμυήθη εἰς τὰς γνώσεις τῶν Αἰγυπτίων διὰ τῆς μελέτης τῶν βιβλίων αὐτῶν.

Κατὰ τὴν ἐπιστροφήν του εἰς τὴν Ἑλλάδα διέμενεν δλιγον εἰς τὴν Σάμον, δόποθεν περὶ τὸ 536 π. Χ. διεπεραιώθη εἰς Κρότωνα τῆς Ἰταλίας, ἔνθα ίδρυσε τὴν περίφημον Πυθαγόρειον Φιλοσοφικὴν Σχολήν.

Ο Πυθαγόρας καὶ οἱ μαθηταὶ του ἔδωκαν σπουδαίαν ὀθησιν εἰς τὴν διαμόρφωσιν καὶ ἀνάπτυξιν τῆς θεωρητικῆς Γεωμετρίας. Καταδιωχθεῖς δύμως ὑπὸ τῶν δημοκρατικῶν διὰ τὰ ἀριστοκρατικά του φρονήματα κατέφυγεν εἰς τὸ Ἱερόν τῶν Μουσῶν τῆς πόλεως Μεταπόντιον, ἔνθα ἀπέθανεν ἐκ πείνης περὶ τὸ 500 π. Χ.

Πόρισμα II. Τὸ τετράγωνον, τὸ δποῖον ἔχει πλευρὰν τὴν διαγώνιον ἄλλου τετραγώνου, εἶναι διπλάσιον τούτου.

"Αν δηλ. δ εἶναι ἡ διαγώνιος καὶ αἱ πλευρά τετραγώνου θά εἶναι $\delta^2 = 2\alpha^2$.

Πόρισμα III. Ἡ διαγώνιος τετραγώνου εἶναι ἀσύμμετρος πρὸς τὴν πλευρὰν αὐτοῦ.

'Α σκήσεις

357. Νὰ κατασκευάσῃτε ἐν δρθ. τρίγωνον μὲ καθέτους πλευρὰς 6 ἑκατ. καὶ 8 ἑκατ. Νὰ ὑπολογίσητε δὲ τὸ μῆκος τῆς ὑποτεινούσης αὐτοῦ.

358. Μία ἀμπελος ἔχει σχῆμα δρθ. τριγώνου. Τούτου ἡ ὑποτείνουσα ἔχει μῆκος 50 μέτρων καὶ ἡ μία κάθετος πλευρά 30 μέτρων. Νὰ εὕρητε τὸ ἐμβαδὸν αὐτῆς.

359. Νὰ κατασκευάσῃτε ἐν δρθ. τρίγωνον μὲ καθέτους πλευρὰς 9 ἑκατ. καὶ 12 ἑκατ. Νὰ ὑπολογίσητε δὲ τὰ μήκη τῶν προβολῶν αὐτῶν ἐπὶ τὴν ὑποτείνουσαν.


360. Νὰ κατασκευάσῃτε ἐν παραλληλόγραμμον ΑΒΓΔ, τὸ δποῖον νὰ ἔχῃ (AB) = 28 ἑκατ., (AD) = 3 ἑκατ. καὶ $A = 45^\circ$. Νὰ εὕρητε δὲ τὸ ἐμβαδὸν αὐτοῦ.

361. "Ἐν ἴσοσκελὲς τρίγωνον ἔχει βάσιν 6 μέτρων καὶ τὰς ἄλλας 10 μέτρων ἑκάστην. Νὰ εὕρητε τὸ ἐμβαδὸν αὐτοῦ.

362. Νὰ εὕρητε τὸ ἐμβαδὸν ἴσοπλεύρου τριγώνου ἀπὸ τὴν πλευρὰν αὐτοῦ.

363. Δύο δμόκεντροι περιφέρειαι ἔχουσιν ἀκτίνας P καὶ ρ ($P > \rho$).

"Αν μία χορδὴ τῆς ἔξωτερικῆς ἐφάπτηται τῆς ἔσωτερικῆς περιφερείας, νὰ εὕρητε τὸ μῆκος τῆς χορδῆς ταύτης.



Σχ. 151

§ 198. Θεώρημα III. Τὸ τετράγωνον τῆς ἀποστάσεως AD τῆς κορυφῆς A τῆς δρθῆς γωνίας ἀπὸ τῆς ὑποτεινούσης δρθογώνιον τριγώνου εἶναι ἴσοδύναμον πρὸς τὸ δρθογώνιον τῶν τμημάτων $BΔ$, $ΔΓ$ τῆς ὑποτεινούσης. *Εἶναι δηλ. (AD)² = ($BΔ$) · ($ΔΓ$) (σχ. 151).*

Άπόδειξις. Ἐπειδὴ τὸ τρίγωνον $ABΔ$ εἶναι δρθογώνιον, ἔπειται δτὶ (AD)² = (AB)² - ($BΔ$)². (1)
Ἐμάθομεν δὲ (§ 196) δτὶ (AB)² = ($BΔZE$), ἀν $BE = BG$.
Καὶ ἀν κατασκευάσωμεν τὸ τετράγωνον $BΔΘH$, ἡ (1) γίνεται

$(A\Delta)^2 = (B\Delta ZE) - (B\Delta\Theta H) = (H\Theta ZE)$.
 Ἐπειδὴ δὲ $(H\Theta ZE) = (H\Theta) \cdot (HE)$ καὶ
 $H\Theta = B\Delta$, $HE = BE - BH = BG - B\Delta = \Delta\Gamma$,
 ἔπειται δὴ $(H\Theta ZE) = (B\Delta) \cdot (\Delta\Gamma)$ καὶ $(A\Delta)^2 = (B\Delta) \cdot (\Delta\Gamma)$.

Α σκήσεις

364. "Εν δρθ. τρίγωνον ἔχει καθέτους πλευράς 6 ἑκατ. καὶ 8 ἑκατ. Νὰ ύπολογίσητε τὴν ἀπόστασιν τῆς κορυφῆς Α τῆς δρθῆς γωνίας ἀπὸ τὴν ύποτείνουσαν.

365. Τὸ ἐπὶ τὴν ύποτείνουσαν ὅψος δρθογωνίου τριγωνικοῦ ἀγροῦ διαιρεῖ αὐτὴν εἰς τμήματα 4 μέτρων καὶ 9 μέτρων. Νὰ εὕρητε τὸ ἐμβαδὸν τοῦ ἀγροῦ τούτου.


366. Νὰ γράψητε περιφέρειαν μὲν ἀκτῖνα 3 ἑκατ. καὶ νὰ γράψητε μίαν διάμετρον AB αὐτῆς. "Επειτα νὰ διαιρέσητε ταύτην εἰς 3 ⅓ σα μέρη $A\Gamma$, $\Gamma\Delta$, ΔB καὶ ἐκ τοῦ Δ νὰ φέρητε μέχρι τῆς μιᾶς ἡμιπεριφερείας καθετὸν ἐπὶ τὴν AB . Νὰ εὕρητε δὲ τὸ μῆκος τῆς καθέτου ταύτης.

367. "Αν $A\Delta$ είναι ἡ ἀπόστασις τῆς κορυφῆς Α ἀπὸ τὴν ύποτείνουσαν $B\Gamma$, νὰ ἀποδείξητε δὴ: $\frac{1}{(AB)^2} + \frac{1}{(A\Gamma)^2} = \frac{1}{(A\Delta)^2}$.

2. ΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΑΙ

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣ ΑΛΛΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ

§ 199. Πρόβλημα I. Νὰ κατασκευασθῇ τετράγωνον ισοδύναμον πρὸς τὸ διθροισμα δύο δοθέντων τετραγώνων T καὶ T' (σχ. 152).




Σχ. 152

νάμον πρὸς τὸ διθροισμα δύο δοθέντων τετραγώνων T καὶ T' (σχ. 152).

"Αν χ είναι ή πλευρά τοῦ ζητουμένου τετραγώνου, θά είναι $\chi^2 = \beta^2 + \gamma^2$. 'Εκ ταύτης βλέπομεν δτι χ είναι ύποτεινουσα δρθ. τριγώνου μὲ καθέτους πλευράς β καὶ γ. Κατασκευάζομεν λοιπόν δρθ: τριγώνον $AB\Gamma$ μὲ $AB = \gamma$, $A\Gamma = \beta$ καὶ ἐπειτα τὸ τετράγωνον $B\Gamma\Delta E$ τῆς ύποτεινούσης. Τοῦτο δὲ είναι τὸ ζητούμενον.


Σ 200. Πρόβλημα II. Νὰ κατασκευασθῇ τετράγωνον *ἰσοδύναμον* πρὸς τὴν διαφορὰν δύο δοθέντων τετραγώνων T καὶ T' (σχ. 152 καὶ 153)

Λύσις. "Αν ψ είναι ή πλευρά τοῦ ζητουμένου τετραγώνου, θά είναι $\psi^2 = \beta^2 - \gamma^2$. 'Εννοοῦμεν λοιπόν δτι ψ είναι κάθετος πλευρά δρθ. τριγώνου, τὸ δοποῖον ἔχει ύποτεινουσαν β καὶ ἄλλην πλευρὰν γ. Μετὰ ταῦτα συνεχίζομεν εὐκόλως τὴν λύσιν.



Σ 201. Πρόβλημα III. Νὰ κατασκευασθῇ τετράγωνον *ἰσοδύναμον* πρὸς δοθὲν δρθογώνιον $AB\Gamma\Delta$ (σχ. 154).

α' Τρόπος. Ἀνάλυσις. "Αν χ είναι ή πλευρά τοῦ ζητου-



Σχ. 154

μένου τετραγώνου, θά είναι $\chi^2 = (AB) \cdot (BG)$. "Αν δὲ ἐπὶ τῆς προεκτάσεως τῆς AB δρίσωμεν τμῆμα $BE = BG$, ἡ προηγουμένη *ἰσότης* γίνεται $\chi^2 = (AB) \cdot (BE)$.

Από αύτην δὲ ἐννοῦμεν δτι ἡ πλευρά χ εἶναι τση πρὸς τὴν ἀπόστασιν τῆς κορυφῆς τῆς δρθῆς γωνίας ἐνδές δρθογωνίου τριγώνου ἀπό τὴν ὑποτείνουσαν ΑΕ αὐτοῦ, ἢν ἡ κορυφὴ αὗτη προβάλληται εἰς τὸ B.

Σύνθεσις. Κατὰ ταῦτα πρέπει νὰ κατασκευάσωμεν τὸ τρίγωνον τοῦτο. Πρὸς τοῦτο γράφομεν ἡμιπεριφέρειαν μὲν διάμετρον ΑΕ καὶ προεκτείνομεν τὴν ΓΒ, μέχρις οὗ συναντήσῃ αὕτην εἰς τὸ Z, δπερ εἶναι ἡ γ' κορυφὴ τοῦ ἐν λόγῳ τριγώνου ΖΑΕ.

Εἶναι δὲ $\chi = BZ$, ὡς εὔκόλως ἀποδεικνύεται.

β' Τρόπος. "Αν ἐπὶ τῆς ΑΒ δρίσωμεν τμῆμα $AE = AD$, ἡ ισότης $\chi^2 = (AB)(BG)$ γίνεται $\chi^2 = (AB)(AE)$.

Ἐννοοῦμεν λοιπὸν δτι ἡ πλευρά χ εἶναι τση πρὸς τὴν κάθετον πλευράν ΑΖ δρθ. τριγώνου ΖΑΒ (σχ. 154 β'), ἢτις ἔχει προβολὴν ΑΕ ἐπὶ τὴν ὑποτείνουσαν ΑΒ.

Ασκήσεις

368. Νὰ κατασκευάσητε τετράγωνον διπλάσιον ἀπὸ διθὲν τετράγωνον.

369. Νὰ γράψητε ἐν εὐθ. τμῆμα α καὶ ἔπειτα ἄλλο τσον πρὸς $\alpha \cdot \sqrt{2}$.

370. "Αφ' οδ γράψητε τὸ τμῆμα $\alpha \cdot \sqrt{2}$, νὰ γράψητε ἄλλο τσον πρὸς $\alpha \cdot \sqrt{3}$, $\alpha \cdot \sqrt{4}$, $\alpha \cdot \sqrt{5}$ κ.τ.λ.

371. Νὰ γράψητε τρία εὐθ. τμήματα α, β, γ καὶ ἔπειτα ἄλλο χ τοιοῦτον, ὅστε νὰ εἶναι $\chi^2 = \alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2$.

372. "Απὸ τὰ προηγούμενα τμήματα α, β, γ νὰ κατασκευάσητε ἄλλο $\psi = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2 - \gamma^2}$.


373. Νὰ γράψητε δύο εὐθ. τμήματα α, β καὶ ἔπειτα ἄλλο $\chi = \sqrt{\alpha\beta}$.

374. Νὰ κατασκευάσητε ἐν δρθογώνιον καὶ ἔπειτα τετράγωνον διπλάσιον αὐτοῦ.

§ 202. Πρόβλημα IV. Δίδεται πολύγωνον ΑΒΓΔΕ (σχ. 155). Νὰ κατασκευασθῇ ἄλλο ισοδύναμον πρὸς αὐτὸν καὶ νὰ ἔχῃ μίαν πλευρὰν διλιγωτέραν.

"Ανάλυσις. "Αν ΑΒΓΖ εἶναι τὸ ζητούμενον σχῆμα, τὰ τρίγωνα ΑΔΕ καὶ ΑΔΖ θὰ εἶναι ισοδύναμα. Ἐπειδὴ δὲ ἔχουσιν τὴν αὐτὴν βάσιν ΑΔ, θὰ εἶναι ισούψη. "Η εὐθεῖα λοιπὸν EZ θὰ εἶναι παράλληλος πρὸς τὴν ΑΔ.

Σύνθεσις. "Αγομεν τὴν διαγώνιον ΑΔ, ἡ δποία ἀποχωρίζει ἀπὸ τὸ πολύγωνον τὸ τρίγωνον ΑΕΔ. "Επειτα φέρομεν τὴν



Σχ. 155

EZ παράλληλον πρὸς τὴν ΑΔ, μέχρις οὖτις τὴν εύθεταν ΓΔ. Οὕτως δρίζεται ἡ κορυφὴ Ζ. "Αν φέρωμεν τὴν ΑΖ, σχηματίζεται τὸ ζητούμενον σχῆμα ΑΒΓΖ.

'Απόδειξις. Τοῦτο ἔχει μίαν πλευράν διλιγωτέραν ἀπὸ τὸ ΑΒΓΔΕ, διότι αἱ δύο πλευραὶ ΑΕ καὶ ΕΔ ἀντικατεστάθησαν ἀπὸ τὴν ΑΖ.

$$\begin{aligned} \text{Εἶναι δὲ καὶ } & (AB\Gamma Z) = (AB\Gamma\Delta) + (\Delta\Delta Z) \\ & (AB\Gamma\Delta E) = (AB\Gamma\Delta) + (\Delta E) \end{aligned} \quad \{ \quad (1)$$

'Επειδὴ δὲ τὰ τρίγωνα ΑΔΖ, ΑΔΕ ἔχουσι κοινὴν βάσιν ΑΔ καὶ ίσα ὅψη, ἐνεκα τῆς παραλληλίας τῶν ΑΔ καὶ EZ, ἐπειταὶ δτὶ $(\Delta\Delta Z) = (\Delta\Delta E)$.

'Ἐκ τῶν (1) λοιπὸν προκύπτει δτὶ $(AB\Gamma Z) = (AB\Gamma\Delta E)$.

§ 203. Πρόβλημα V. Νὰ κατασκευασθῇ τρίγωνον ισοδύναμον πρὸς δοθὲν πολύγωνον ΑΒΓΔΕ (σχ. 155).


Μετὰ τὴν κατασκευὴν τοῦ ΑΒΓΖ κατασκευάζομεν δμοίως τρίγωνον ΑΘΖ ισοδύναμον πρὸς αὐτό.

§ 204. Πρόβλημα VI. Νὰ κατασκευασθῇ δρθογώνιον ισοδύναμον πρὸς δοθὲν τρίγωνον ΑΒΓ (σχ. 156).

Λύσις. "Αγομεν εύθεταν ΑΕ παράλληλον πρὸς τὴν ΒΓ καὶ ἐκ τοῦ μέσου Δ αὐτῆς ἄγομεν τὴν ΔΕ παραλληλογραμμὸν ΑΒΔΕ ισοδύναμον πρὸς τὸ τρίγωνον. Διότι

$$(AB\Gamma) = (B\Delta) \cdot (AZ) = (AB\Delta E). \quad (1)$$

"Αν δὲ φέρωμεν τὴν ΕΗ κάθετον ἐπὶ τὴν ΒΓ, σχηματίζεται δρθογώνιον AZHE καὶ βλέπομεν εύκολως δτὶ $(AZHE) = (AB\Delta E)$ καὶ ἐνεκα τῆς (1) εἶναι $(AB\Gamma) = (AZHE)$. Τὸ δρθογώνιον λοιπὸν AZHE εἶναι τὸ ζητούμενον.



Σχ. 156

§ 205. Πρόβλημα VII. Νὰ κατασκευασθῇ τετράγωνον ἰσοδύναμον πρὸς δοθὲν τρίγωνον $\Delta\Gamma\Lambda$ (σχ. 156).

Μετὰ τὴν κατασκευὴν τοῦ δρθιογωνίου $\Delta\Gamma\Lambda$ σχηματίζομεν τετράγωνον ἰσοδύναμον μὲ αὐτὸ (§ 201).

Ασκήσεις

375. Νὰ κατασκευάσῃτε τρίγωνον ἰσοδύναμον πρὸς δοθὲν τραπέζοειδές.

376. Νὰ κατασκευάσῃτε τετράγωνον ἰσοδύναμον πρὸς δοθὲν τραπέζιον.

377. Νὰ κατασκευάσῃτε τετράγωνον διπλάσιον δοθέντος τριγώνου.


378. Νὰ κατασκευάσῃτε δύο ἀνισα δρθιογώνια καὶ ἐπειτα τετράγωνον ἰσοδύναμον πρὸς τὸ ἄθροισμα αὐτῶν.

379. Νὰ κατασκευάσῃτε τυχὸν τετράπλευρον $\Delta\Gamma\Lambda\beta$. Εἰς μίαν πλευρὰν νὰ δρίσῃτε ἐν σημεῖον E καὶ νὰ φέρητε ἐξ αὐτοῦ μίαν εὐθείαν, ἡ δποία νὰ διαιρῇ αὐτὸ εἰς δύο μέρη ἰσοδύναμα.

3. ΑΛΛΑΙ ΜΕΤΡΙΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΡΙΓΩΝΟΥ

§ 206. Θεώρημα I. Τὸ τετράγωνον πλευρᾶς τριγώνου, ἡ δποία κεῖται ἀπέναντι δξείας γωνίας, εἶναι ἰσοδύναμον πρὸς τὸ ἄθροισμα τῶν τετραγώνων τῶν ἀλλων πλευρῶν ἥλαττωμένον κατὰ δύο δρθιογώνια, τὰ δποῖα ἔχουσι βάσιν μίαν ἀπὸ αὐτάς, ψωσ ὁδὲ τὴν προβολὴν τῆς ἀλλῆς ἐπὶ ταύτην (σχ. 157).

"Αν δηλ. εἶναι $\Gamma < 1$ δρθ. καὶ $\Delta\Delta$ κάθετος ἐπὶ τὴν $B\Gamma$, θὰ εἶναι $(AB)^2 = (A\Gamma)^2 + (B\Gamma)^2 - 2(B\Gamma)(\Gamma\Delta)$.



Σχ. 157

*Απόδειξις. Ἐπειδὴ τὸ τρίγωνον $\Delta\Gamma\Lambda$ εἶναι δρθιογώνιον, εἶναι $(AB)^2 = (A\Delta)^2 + (B\Delta)^2$. (1)

*Ἐπειδὴ δὲ $(B\Delta) = (B\Gamma) - (\Gamma\Delta)$ (σχ. 157 α'),
ἢ $(B\Delta) = (\Gamma\Delta) - (B\Gamma)$ (σχ. 157 β'),

ἐπεταὶ δτι $(B\Delta)^2 = (B\Gamma)^2 + (\Gamma\Delta)^2 - 2(B\Gamma)(\Gamma\Delta)$, ἡ δὲ (1) ἀκολούθως γίνεται $(AB)^2 = (A\Delta)^2 + (\Gamma\Delta)^2 + (B\Gamma)^2 - 2(B\Gamma)(\Gamma\Delta)$
 $= (A\Gamma)^2 + (B\Gamma)^2 - 2(B\Gamma)(\Delta\Gamma)$, δ.ε.δ.

§ 207. Θεώρημα II. Τὸ τετράγωνον πλευρᾶς τριγώνου, ἡ δποὶα κεῖται ἀπέναντι ἀμβλεῖας γωνίας, εἶναι λσοδύναμον πρὸς τὸ ἄθροισμα τῶν τετραγώνων τῶν ἀλλων πλευρῶν ηὐξημένον κατὰ δύο δρθογώνια, τὰ δποὶα ἔχουσι βάσιν τὴν μίαν ἀπὸ αὐτᾶς, ὅποιος δὲ τὴν προβολὴν τῆς ἀλλῆς ἐπὶ ταύτην (σχ. 157 β').

"Αν δηλ. $B > 1$ δρθ, θὰ εἰναι

$$(AB)^2 = (AB)^2 + (B\Gamma)^2 + 2(B\Gamma)(B\Delta).$$

"Απόδειξις. "Ενεκα τοῦ δρθογωνίου τριγώνου $A\Gamma\Delta$ εἰναι

$$(A\Gamma)^2 = (A\Delta)^2 + (\Gamma\Delta)^2. \quad (1)$$

"Επειδὴ δὲ $(\Gamma\Delta)^2 = (B\Gamma)^2 + (B\Delta)^2$, θὰ εἰναι
 $(\Gamma\Delta)^2 = (B\Gamma)^2 + (B\Delta)^2 + 2(B\Gamma)(B\Delta)$, ἡ (1) τότε γίνεται
 $(A\Gamma)^2 = (A\Delta)^2 + (B\Delta)^2 + (B\Gamma)^2 + 2(B\Gamma)(B\Delta)$
 $= (AB)^2 + (B\Gamma)^2 + 2(B\Gamma)(B\Delta)$, δ.ε.δ.

Πόρισμα. "Η γωνία A τριγώνου $AB\Gamma$ εἰναι

$$\alpha') \text{ δρθή, } \text{ἄν } (B\Gamma)^2 = (AB)^2 + (A\Gamma)^2,$$

$$\beta') \text{ δξεῖα, } \text{ἄν } (B\Gamma)^2 < (AB)^2 + (A\Gamma)^2,$$

$$\gamma') \text{ ἀμβλεῖα, } \text{ἄν } (B\Gamma)^2 > (AB)^2 + (A\Gamma)^2$$

Άσκήσεις

380. Νὰ κατασκευάσητε ἐν τρίγωνον $AB\Gamma$ μὲ πλευρᾶς $(AB) = 3$ ἑκατ., $(A\Gamma) = 4$ ἑκατ., $(B\Gamma) = 5$ ἑκατ. Νὰ μετρήσητε τὴν γωνίαν A αὐτοῦ καὶ νὰ δικαιολογήσητε τὸ μέτρον, τὸ δποῖον θὰ εὕρητε.

381. "Ἐν τρίγωνον ἔχει πλευρᾶς 4, 5, 6 ἑκατ. Νὰ ἔξετάσητε, ἀν τοῦτο εἰναι δρθογώνιον ἢ δξεῖαν ἢ ἀμβλυγώνιον.

382. Νὰ κάμητε τὴν ἰδίαν ἔργασίαν διὰ τρίγωνον, τὸ δποῖον ἔχει πλευρᾶς 7, 9, 12 ἑκατ.

383. "Αν $\alpha^2 = \beta^2 + \gamma^2$, νὰ ἔξετάσητε τί εἰδους τρίγωνον εἰναι τὸ ἔχον πλευρᾶς λα, λβ, λγ.

384. "Ἐν τρίγωνον $AB\Gamma$ ἔχει $(AB) = 8$ ἑκατ., $(A\Gamma) = 10$ ἑκατ. καὶ $(B\Gamma) = 15$ ἑκατ. Νὰ εὕρητε τὸ μῆκος τῆς προβολῆς τῆς πλευρᾶς $A\Gamma$ ἐπὶ τὴν AB .

385. Νὰ κατασκευάσητε ἐν λσοσκελές τρίγωνον $AB\Gamma$ καὶ νὰ γράψητε ἐντὸς αὐτοῦ εὔθ. τμῆμα ΔE παράλληλον πρὸς τὴν βάσιν $B\Gamma$ καὶ τέμνον τὴν AB εἰς τὸ Δ καὶ τὴν $A\Gamma$ εἰς τὸ E . Νὰ ἀποδείξητε δὲ ὅτι $(BE)^2 = (E\Gamma)^2 + (B\Gamma) \cdot (\Delta E)$.

4. ΘΕΩΡΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΜΕΣΩΝ

§ 208. Θεώρημα I. "Αν AM είναι διάμεσος τριγώνου ABG (σχ. 158), θά είναι:

$$(AB)^2 + (AG)^2 = 2(AM)^2 + 2(BM)^2 \quad (1)$$

*Α πόδειξις α') "Αν $AB = AG$, τά τρίγωνα ABM καὶ AMG είναι δρθογώνια (σχ. 158 α') καὶ ἐπομένως

$$(AB)^2 = (AM)^2 + (BM)^2$$

$$(AG)^2 = (AM)^2 + (GM)^2 = (AM)^2 + (BM)^2$$

*Έκ τούτων δὲ εύρισκομεν ἀμέσως δτι

$$(AB)^2 + (AG)^2 = 2(AM)^2 + 2(BM)^2, \text{ δ.ε.δ.}$$

β') "Αν $AG > AB$ (σχ. 158 β'), θά είναι καὶ $\omega > \phi$ (§ 76 Πόρ. III). *Ένεκα δὲ ταύτης καὶ τῆς $\omega + \phi = 2$ δρθ, είναι $\omega > 1$ δρθ. καὶ $\phi < 1$ δρθ.

*Έάν δὲ ἔφαρμόσωμεν τὰ προηγούμενα θεωρήματα ἀντιστοίχως εἰς τὰ τρίγωνα ABM , AMG εύρισκομεν δτι:

$$(AB)^2 = (AM)^2 + (BM)^2 - 2(BM)(\Delta M)$$

$$\text{καὶ} \quad (AG)^2 = (AM)^2 + (MG)^2 + 2(MG)(\Delta M)$$

$$= (AM)^2 + (BM)^2 + 2(BM)(\Delta M)$$


*Έκ τούτων δὲ εύρισκομεν πάλιν δτι:

$$(AB)^2 + (AG)^2 = 2(AM)^2 + 2(BM)^2, \text{ δ.ε.δ.}$$

*Απεδείχθη λοιπὸν ἡ λσό-

της (1), ἦτοι:

Τὸ ἀθροισμα τῶν τετραγώνων δύο πλευρῶν τριγώνου είναι λσοδύναμον πρὸς τὸ ἀθροισμα τοῦ διπλασίου τετραγώνου τῆς μεταξὺ αὐτῶν διαμέσου καὶ τοῦ διπλασίου τετραγώνου τοῦ ἡμίσεος τῆς τετραγώνου πλευρᾶς.



Σχ. 158

§ 209. Θεώρημα II. "Αν M είναι τὸ μέσον τῆς πλευρᾶς BG τριγώνου ABG , AD κάθετος ἐπὶ τὴν BG καὶ $AG > AB$, θά είναι: $(AG)^2 - (AB)^2 = 2(BG)(AM)$ (σχ. 158 β').

*Α πόδειξις. Εἴδομεν προηγουμένως δτι :

$$(A\Gamma)^2 = (AM)^2 + (MG)^2 + 2(MG)(\Delta M)$$

$$(AB)^2 = (AM)^2 + (BM)^2 - 2(BM)(\Delta M)$$

Έπομένως $(A\Gamma)^2 - (AB)^2 = 2(\Delta M)[(MG) + (BM)] = 2(B\Gamma)(\Delta M)$, δ.δ. "Ωστε:

"Η διαφορά τῶν τετραγώνων δύο πλευρῶν τριγώνου εἶναι ισοδύναμος πρὸς δύο δρθογώνια, ἔχοντα βάσιν μὲν τὴν γ' πλευράν, ὅπος δὲ τὴν ἐπ' αὐτὴν προβολὴν τῆς πρὸς αὐτὴν ἀντιστοίχου διαμέσου.

Α σκήσεις

386. Νὰ εὕρητε τὸ μῆκος τῆς διαμέσου AM τριγώνου ABΓ, ἢν (AB)=8 ἑκατ., (AΓ)=12 ἑκατ., (BΓ)=10 ἑκατ.

387. Εἰς τρίγωνον ABΓ ἄγομεν τὸ ὕψος ΑΔ καὶ τὴν διάμεσον AM. "Αν $AM > 1$ δρθ, νὰ εὔρεθῇ τὸ μῆκος (ΔM) συναρτήσει τῶν πλευρῶν α , β , γ τοῦ τριγώνου τούτου.

388. Νὰ γράψητε δύο διμοκέντρους περιφερείας καὶ μίαν διάμετρον AB τῆς μικροτέρας. "Αν δὲ M εἶναι τυχόν σημεῖον τῆς μεγαλύτερας περιφερείας, νὰ ἀποδείξῃτε δτὶ τὸ διθροισμα $(MA)^2 + (MB)^2$ εἶναι ἀνεξάρτητον ἀπὸ τὴν θέσιν τοῦ M ἐπὶ τῆς περιφερείας ταύτης.

389. Νὰ ἀποδείξῃτε δτὶ αὐτὸ καὶ ἢν μὲν AB εἶναι διάμετρος τῆς ἔξωτερικῆς, τὸ δὲ M σημεῖον τῆς ἔσωτερικῆς περιφερείας.

390. "Αν E καὶ Z εἶναι τὰ μέσα τῶν διαγωνίων AΓ, BΔ τετραπλεύρου ABΓΔ, νὰ ἀποδείξῃτε δτὶ:

$$(AB)^2 + (B\Gamma)^2 + (\Gamma\Delta)^2 + (\Delta A)^2 = (A\Gamma)^2 + (B\Delta)^2 + 4(EZ)^2.$$

391. "Αν ABΓΔ εἶναι παραλληλόγραμμον, νὰ ἀποδείξῃτε δτὶ: $(AB)^2 + (B\Gamma)^2 + (\Gamma\Delta)^2 + (\Delta A)^2 = (A\Gamma)^2 + (B\Delta)^2$.

5. ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΕΚ ΤΩΝ ΠΛΕΥΡΩΝ ΑΥΤΟΥ

§ 210. Νὰ εὑρεθῶσι τὰ ψηφη καὶ τὸ ἐμβαδὸν τριγώνου ABΓ ἐκ τῶν πλευρῶν αὐτοῦ (σχ. 158 β').

Λύσις. α') Θέτομεν $(B\Gamma) = \alpha$, $(A\Gamma) = \beta$, $(AB) = \gamma$. 'Εκ δὲ τοῦ δρθ. τριγώνου AΔB εύρισκομεν δτὶ:

$$(A\Delta)^2 = (AB)^2 - (B\Delta)^2 = \gamma^2 - (\Delta B)^2 \quad (1)$$

"Αν $B < 1$ δρθ, εἶναι $\beta^2 = \alpha^2 + \gamma^2 - 2\alpha \cdot (B\Delta)$ καὶ ἐπομένως

$$(B\Delta) = \frac{\alpha^2 + \gamma^2 - \beta^2}{2\alpha}.$$

"Αν δὲ $B > 1$ δρθ, εἶναι $\beta^2 = \alpha^2 + \gamma^2 + 2\alpha \cdot (B\Delta)$, 8θεν

$$(B\Delta) = \frac{\beta^2 - \alpha^2 - \gamma^2}{2\alpha} = - \frac{\alpha^2 + \gamma^2 - \beta^2}{2\alpha}.$$

Καὶ εἰς τάς δύο λοιπόν περιπτώσεις εἶναι

$$(B\Delta)^2 = \frac{(\alpha^2 + \gamma^2 - \beta^2)^2}{4\alpha^2}, \text{ ή δὲ } \text{Ισότης (1) γίνεται}$$

$$(A\Delta)^2 = \gamma^2 - \frac{(\alpha^2 + \gamma^2 - \beta^2)^2}{4\alpha^2} = \frac{4\alpha^2 \gamma^2 - (\alpha^2 + \gamma^2 - \beta^2)^2}{4\alpha^2}.$$

$$\text{'Επειδὴ δὲ } 4\alpha^2 \gamma^2 - (\alpha^2 + \gamma^2 - \beta^2)^2 =$$

$$(2\alpha\gamma + \alpha^2 + \gamma^2 - \beta^2) \cdot (2\alpha\gamma - \alpha^2 - \gamma^2 + \beta^2) = \\ [(\alpha + \gamma)^2 - \beta^2] \cdot [\beta^2 - (\alpha - \gamma)^2] =$$

$(\alpha + \gamma + \beta)(\alpha + \gamma - \beta)(\beta + \alpha - \gamma)(\beta - \alpha + \gamma)$, ἔπειται δτι

$$(A\Delta) = \frac{1}{2\alpha} \sqrt{(\alpha + \beta + \gamma)(\alpha + \beta - \gamma)(\alpha + \gamma - \beta)(\beta - \alpha + \gamma)} \quad (2).$$

"Αν δὲ θέσωμεν $\alpha + \beta + \gamma = 2\tau$ καὶ ἀφαιρέσωμεν ἀπὸ τὰ μέλη αὐτῆς κατὰ σειράν 2α, 2β, 2γ, εύρισκομεν δτι

$$\beta + \gamma - \alpha = 2(\tau - \alpha), \alpha + \gamma - \beta = 2(\tau - \beta), \alpha + \beta - \gamma = 2(\tau - \gamma).$$

$$\text{'Η δὲ } \text{Ισότης (2) γίνεται } (A\Delta) = \frac{2}{\alpha} \sqrt{\tau(\tau - \alpha)(\tau - \beta)(\tau - \gamma)}.$$

"Εάν δὲ θέσωμεν $(A\Delta) = Y_\alpha$, ή $\text{Ισότης αὗτη γίνεται}$

$$Y_\alpha = \frac{2}{\alpha} \sqrt{\tau(\tau - \alpha)(\tau - \beta)(\tau - \gamma)}$$

$$\text{'Ομοίως εύρισκομεν δτι } Y_\beta = \frac{2}{\beta} \sqrt{\tau(\tau - \alpha)(\tau - \beta)(\tau - \gamma)} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \text{καὶ } Y_\gamma = \frac{2}{\gamma} \sqrt{\tau(\tau - \alpha)(\tau - \beta)(\tau - \gamma)} \end{array} \right\} (3)$$

$$\beta') "Αν εἰς τὴν Ισότητα $E = \frac{1}{2}(B\Gamma)(A\Delta) = \frac{1}{2}\alpha(A\Delta)$$$

ἀντικαταστήσωμεν τὸ $(A\Delta)$ ὑπὸ τῆς εὑρεθείσης τιμῆς του,
εύρισκομεν δτι:

$$E = \sqrt{\tau(\tau - \alpha)(\tau - \beta)(\tau - \gamma)} \quad (4)$$

'Α σκήσεις

392. Νὰ εὕρητε τὸ ἐμβαδὸν τριγώνου, τὸ δποῖον έχει πλευράς 57 μέτ., 76 μέτ. καὶ 95 μέτ.

393. "Εν τρίγωνον $AB\Gamma$ έχει πλευράς $(AB) = 42$ μέτρ., $(A\Gamma) = 56$ μέτ., καὶ $(B\Gamma) = 70$ μέτ. Νὰ εὕρητε τὸ ύψος $B\Delta$ αὐτοῦ. Ποῖον συμπέρασμα προκύπτει περὶ τοῦ τριγώνου τούτου ἀπὸ τὴν τιμήν, τὴν δποῖαν θὰ εὕρητε;

394. "Αν ρ είναι ἡ ἀκτίς τῆς περιφερείας, ἡ δποία είναι ἐγγεγραμμένη εἰς τρίγωνον $AB\Gamma$, νὰ ἀποδείξητε δτι:


$$\rho = \sqrt{\frac{(\tau - \alpha)(\tau - \beta)(\tau - \gamma)}{\tau}}, \text{ ἀν } \alpha + \beta + \gamma = 2\tau.$$

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ

1. ΑΝΑΛΟΓΑ ΠΟΣΑ

§ 211. Ποια ποσὰ λέγονται άνάλογα πρὸς ἄλλα ισάριθμα.

"Εστωσαν τὰ εὐθ. τμήματα A, B, Γ καὶ A', B', Γ' τοιαῦτα, ώστε εἶναι $A' = A \cdot 3, B' = B \cdot 3, \Gamma' = \Gamma \cdot 3$ (σχ. 159). Τὰ A', B', Γ' λέγονται άνάλογα πρὸς τὰ A, B, Γ .



Σχ. 159

Γενικῶς: "Αν $\Pi' = \Pi \cdot \lambda, P' = P \cdot \lambda, \Sigma' = \Sigma \cdot \lambda$ (1) τὰ ποσὰ Π', P', Σ' λέγονται ἀνάλογα πρὸς τὰ Π, P, Σ . "Ωστε:

Δύο ἢ περισσότερα ποσὰ λέγονται ἀνάλογα πρὸς ἄλλα ισάριθμα, ἂν γίνωνται ἐκ τούτων διὰ πολλαπλασιασμοῦ ἐπὶ τὸν αὐτὸν ἀριθμόν.

'Επειδὴ δὲ ἀπὸ τὰς ισότητας (1) προκύπτουσιν αἱ ισότητες

$$\Pi = \Pi' \cdot \frac{1}{\lambda}, \quad P = P' \cdot \frac{1}{\lambda}, \quad \Sigma = \Sigma' \cdot \frac{1}{\lambda}, \quad (2)$$

ἔπειται δτὶ καὶ τὰ ποσὰ Π, P, Σ εἶναι άνάλογα πρὸς τὰ Π', P', Σ' .

Τὰ ἔξι ἀλλήλων διὰ πολ.)σμοῦ προκύπτοντα ποσὰ λέγονται δμόλογα ἢ ἀντίστοιχα ποσά. Π.χ. τὰ Π καὶ Π' εἶναι δμόλογα ποσά, τὰ P, P' δμοίως καὶ τὰ Σ, Σ' ἐπίσης εἶναι δμόλογα ποσά.

$$'Απὸ τὰς ισότητας (1) εύρισκομεν δτὶ \frac{\Pi'}{\Pi} = \frac{P'}{P} = \frac{\Sigma'}{\Sigma}. \quad (3)$$

"Αν δὲ κληθῇ λ ἔκαστος τῶν λόγων τούτων, προκύπτουσιν πάλιν αἱ ισότητες (1).

Όμοιώς δπό τάς (2) εύρισκομεν δτι $\frac{\Pi}{\Pi'} = \frac{P}{P'} = \frac{\Sigma}{\Sigma'}$. (4)
καὶ ἐκ τούτων προκύπτουσιν πάλιν αι (2). Βλέπομεν λοιπὸν δτι:

"Αν ποσά τινα είναι ἀνάλογα πρὸς ἄλλα ἵστοριθμα, δ λόγος
τῶν δμολόγων ποσῶν είναι δ αὐτὸς καὶ ἀντιστρόφως.

Διὰ τοῦτο, διὰ νὰ δηλώσωμεν δτι τὰ ποσά Π', Ρ', Σ', είναι
ἀνάλογα πρὸς τὰ Π, Ρ, Σ, μεταχειριζόμεθα ἀδιαφόρως τάς
ἱστοτητας (1) ἢ (3) ἢ (4).

2. ΑΝΑΛΟΓΙΑΙ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΩΝ

§ 212. Τί είναι ἀναλογία καὶ ποῖα τὰ στοιχεῖα αὐτῆς.
"Αν π. χ. Κ: Π=3 καὶ Ρ:Σ=3, θὰ είναι καὶ Κ:Π=Ρ:Σ.
Αὐτὴ ἡ ιστοτητας λέγεται ἀναλογία. "Ωστε:

"Ἀναλογία εἶχαι ιστοτητας δύο λόγων.

Οι δροι τῶν λόγων μιᾶς ἀναλογίας λέγονται καὶ δροι τῆς
ἀναλογίας.

"Ο α' καὶ δ δ' δροις λέγονται ἀκροι, οἱ δὲ ἄλλοι μέσοι δροι.

Οι προηγούμενοι καὶ οἱ ἐπόμενοι τῶν λόγων λέγονται ἀντι-
στοίχως ήγονύμενοι καὶ ἐπόμενοι τῆς ἀναλογίας.

Εἰς τὴν ἀναλογίαν $\frac{K}{\Pi} = \frac{\Pi}{P}$ οἱ μέσοι δροι είναι ίσοι. Αὐτὴ
λέγεται συνεχής ἀναλογία. "Ο δὲ μέσος δροις Π λέγεται μέσος
ἀνάλογος τῶν ἄκρων Κ καὶ Ρ.

"Η Ἀριθμητικὴ μᾶς διδάσκει διαφόρους ιδιότητας τῶν ἀνα-
λογιῶν. "Απὸ αὐτὰς χρησιμοποιοῦμεν εἰς τὴν Γεωμετρίαν τὰς
ἀκολούθους.

Σημείωσις. Τὰ διὰ τὴν ἀπόδειξιν αὐτῶν χρησιμοποιούμενα
δμοειδῆ ποσά θεωροῦνται μετρημένα μὲ τὴν αὐτὴν μονάδα.

§ 213. "Ιδιότητες τῶν ἀναλογιῶν. "Εστω ἡ ἀναλογία
Κ:Π=Ρ:Σ (1)

"Ἐπειδὴ (§ 182 Πόρ.) Κ:Π=(Κ):(Π) καὶ Ρ:Σ=
(Ρ):(Σ), ἔπειται δτι (Κ):(Π)=(Ρ):(Σ). (2)

Διὰ τὸν αὐτὸν λόγον καὶ ἐκ τῆς (2) προκύπτει ἡ (1). "Ωστε:
α') "Αν 4 ποσὰ συνιστῶσιν ἀναλογίαν καὶ τὰ μέτρα αὐτῶν

συνιστώσιν ἀναλογίαν. Καὶ ἀντιστρόφως: "Αν τὰ μέτρα 4 ποσῶν συνιστώσιν ἀναλογίαν, καὶ τὰ ποσὰ ταῦτα συνιστώσιν ἀντιστοιχον ἀναλογίαν.

Κατὰ ταῦτα ἐκ τῆς ἀναλογίας (1) προκύπτει ἢ (2) ἢ $\frac{(K)}{(\Pi)} = \frac{(P)}{(\Sigma)}$ (3). Καὶ ἂν δλοι οἱ δροι τῆς (1) εἶναι δμοειδεῖς καὶ οἱ δροι τῆς (3) θὰ εἶναι δμοειδεῖς.

"Αν δὲ ἔξαλείψωμεν τοὺς παρονομαστάς ταύτης, εύρισκομεν δτι: $(K) \cdot (\Sigma) = (\Pi) \cdot (P)$. "Ητοι: (4)

β') "Αν οἱ δροι ἀναλογίας εἶναι δλοι δμοειδεῖς, τὸ γινόμενον τῶν μέτρων τῶν ἀκρων εἶναι ὅσον πρὸς τὸ γινόμενον τῶν μέτρων τῶν μέσων.

"Ἄς ύποθέσωμεν ἡδη δτι τὰ μέτρα (K), (Π), (P), (Σ) δμοειδῶν ποσῶν K, Π, P, Σ, εἶναι τοιαῦτα, ὅστε ἀληθεύει ἢ ἴσοτης (4). "Αν τὰ μέλη αὐτῆς διαιρέσωμεν διά τοῦ γινομένου (Π) · (Σ), εύρισκομεν τὴν ἀναλογίαν (2). ἐκ ταύτης προκύπτει καὶ ἢ (1). "Ητοι:

γ') "Αν τὸ γινόμενον τῶν μέτρων τῶν ἀκρων δμοειδῶν ποσῶν K, Π, P, Σ εἶναι ὅσον πρὸς τὸ γινόμενον τῶν μέτρων τῶν μέσων, τὰ ποσὰ ταῦτα συνιστώσιν ἀναλογίαν, καθ' ἥν σειρὰν εἶναι γεγραμμένα.

Σημείωσις. Εἰς τὴν περίπτωσιν ταύτην καὶ εἰς τὴν προηγουμένην τὰ ποσὰ πρέπει νὰ μετρῶνται μὲ τὴν αὐτὴν μονάδα.

"Εστω πάλιν δτι οἱ δροι τῆς ἀναλογίας K : Π = P : Σ εἶναι δλοι δμοειδεῖς.

Κατὰ τὰ προηγούμενα θὰ εἶναι:

$$(K) \cdot (\Sigma) = (\Pi) \cdot (P) \quad (5)$$

"Αν δὲ γράψωμεν τὰ μέτρα τούτων κατὰ τὴν σειρὰν

$$(K), (P), (\Pi), (\Sigma)$$

πάλιν ἀληθεύει ἢ (5), Κατὰ τὴν προηγουμένην ἴδιότητα θὰ εἶναι $(K) : (\Pi) = (\Pi) : (\Sigma)$ καὶ ἐπομένως $K : P = \Pi : \Sigma$. "Ωστε:

δ') "Αν οἱ δροι ἀναλογίας εἶναι δλοι δμοειδεῖς καὶ ἀντιμεταεθῶσιν οἱ μέσοι δροι, προκύπτει πάλιν ἀναλογία.

"Αν εἰς τὰ μέλη ἀναλογίας $\frac{K}{\Pi} = \frac{P}{\Sigma}$ προστεθῇ ἡ 1, προκύπτει

$$\text{ή } \text{ἴσοτης } \frac{K}{\Pi} + 1 = \frac{P}{\Sigma} + 1, \text{ δθεν βλέπομεν δτι:}$$

$\varepsilon')$ "Αν $\frac{K}{\Pi} = \frac{P}{\Sigma}$, θὰ εἰναι καὶ $\frac{K+\Pi}{\Pi} = \frac{P+\Sigma}{\Sigma}$.

"Αν οἱ δροι τῆς ἀναλογίας $\frac{K}{\Pi} = \frac{P}{\Sigma}$ εἰναι δλοι δμοειδεῖς, προκύπτουσιν ἔξι αὐτῆς κατά σειράν αἱ ἀναλογίαι:

$$\frac{K}{P} = \frac{\Pi}{\Sigma}, \quad \frac{K+P}{P} = \frac{\Pi+\Sigma}{\Sigma}, \quad \frac{K+P}{\Pi+\Sigma} = \frac{P}{\Sigma}. \text{ "Ωστε:}$$

$\sigma')$ "Αν οἱ δροι ἀναλογίας $\frac{K}{\Pi} = \frac{P}{\Sigma}$ εἰναι δλοι δμοειδεῖς, θὰ εἰναι καὶ $\frac{K}{\Pi} = \frac{P}{\Sigma} = \frac{K+P}{\Pi+\Sigma}$.

"Η ἰδιότης αὕτη ἀληθεύει δι' δσουσδήποτε ἵσους λόγους, ἀν δλοι οἱ δροι αὐτῶν εἰναι δμοειδεῖς.

Οὕτως, ἀν $\frac{K}{\Pi} = \frac{P}{\Sigma} = \frac{\Lambda}{M}$ θὰ εἰναι $\frac{K}{\Pi} = \frac{P}{\Sigma} = \frac{K+P}{\Pi+\Sigma}$ καὶ ἐπομένως $\frac{\Lambda}{M} = \frac{K+P}{\Pi+\Sigma} = \frac{K+P+\Lambda}{\Pi+\Sigma+M}$. "Ωστε:

$\zeta')$ "Αν $\frac{K}{\Pi} = \frac{P}{\Sigma} = \frac{\Lambda}{M} = \dots = \frac{\Phi}{X}$ θὰ εἰναι

$$\frac{K}{\Pi} = \frac{P}{\Sigma} = \frac{\Lambda}{M} = \dots = \frac{\Phi}{X} = \frac{K+P+\Lambda+\dots+\Phi}{\Pi+\Sigma+M+\dots+X}.$$

Α σ κ ή σ εις

395. "Αν 4 εύθ. τμήματα γεγραμμένα κατά σειράν συνιστῶσιν ἀναλογίαν, νὰ ἀποδείξῃτε ὅτι τὸ δρθογώνιον τῶν ἄκρων εἰναι ίσοδύναμον πρὸς τὸ δρθογώνιον τῶν μέσων. Καὶ ἀντιστρόφως.

396. "Αν τρία εύθ. τμήματα συνιστῶσι συνεχῆ ἀναλογίαν, νὰ ἀποδείξῃτε ὅτι τὸ τετράγωνον τοῦ μέσου ἀναλόγου εἰναι ίσοδύναμον πρὸς τὸ δρθογώνιον τῶν ἄκρων. Καὶ ἀντιστρόφως.

397. Νὰ γράψητε δύο εύθ. τμήματα καὶ ἔπειτα νὰ δρίσητε τὸ μέσον ἀνάλογον αὐτῶν.

§ 214. Ποῖα λέγονται συμμεταβλητὰ ποσὰ καὶ ποῖα συμμεταβλητὰ ποσὰ λέγονται ἀνάλογα. "Αν ἡ πλευρά ἐνδὸς τετραγώνου εἰναι 2 μέτρα, τὸ ἐμβαδὸν αὐτοῦ εἰναι 4 τετ. μέτρα. "Αν μεταβληθῇ ἡ πλευρά καὶ γίνη π.χ. 3 μέτρα, μεταβάλλεται καὶ τὸ ἐμβαδὸν καὶ γίνεται 9 τετ. μέτρα. Διὰ τὸν λόγον τοῦτον ἡ πλευρά καὶ τὸ ἐμβαδὸν τετραγώνου λέγονται συμμεταβλητὰ ποσά. "Ωστε:

Δύο ποσά λέγονται συμμεταβλητά, ἀν μεταβαλλομένου τοῦ ἐνδός μεταβάλληται καὶ τὸ ἄλλο.

Οἱ τρόποι, κατὰ τοὺς δοποίους δύο συμμεταβλητά ποσά ἔξαρτωνται ἀπ' ἀλλήλων εἶναι ποικιλώτατοι.

'Απὸ αὐτοὺς ἀπλούστερος καὶ συνηθέστερος εἶναι ἑκεῖνος, κατὰ τὸν δοποῖον, ἀν τὸ ἐν πολλαπλασιασθῇ ἐπὶ ἔνα ἀριθμὸν καὶ τὸ ἄλλο πολλαπλασιάζεται ἐπὶ τὸν αὐτὸν ἀριθμόν.

Π.χ. ἂν ἡ πλευρά α ἐνδός ισοπλεύρου τριγώνου εἶναι 2 μέτρα, ἡ περίμετρος αὐτοῦ εἶναι $2 \cdot 3 = 6$ μέτρα. 'Αν ἡ πλευρά γίνῃ $2 \cdot 2$ μέτρα, ἡ περίμετρος γίνεται $(2 \cdot 2) \cdot 3 = 6 \cdot 2$ μετ. κ.τ.λ.

Τὰ τοιαῦτα συμμεταβλητά ποσά λέγονται ἀνάλογα ποσά ἢ ἀναλόγως μεταβαλλόμενα ποσά. "Ωστε :

Δύο συμμεταβλητά ποσά λέγονται ἀνάλογα ἢ ὅτι μεταβάλλονται ἀναλόγως, ἀν πολλαπλασιαζόμενης μιᾶς τιμῆς τοῦ ἐνδός ἐπὶ ἔνα ἀριθμόν, πολλαπλασιάζηται καὶ ἡ ἀντίστοιχός τιμὴ τοῦ ἄλλου ἐπὶ τὸν αὐτὸν ἀριθμόν.

3. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΣΥΜΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΠΟΣΩΝ

§ 215. Σχέσις τοῦ λόγου δύο τιμῶν ἐνδός ποσοῦ πρὸς τὸν λόγον τῶν ἀντιστοίχων τιμῶν ἄλλου ἀναλόγου πρὸς αὐτὸν ποσοῦ. "Ας λάβωμεν ὡς παράδειγμα τὴν πλευρὰν α καὶ τὴν περίμετρον Π ισοπλεύρου τριγώνου.

"Αν π.χ. $\alpha = 2$ μέτ., θὰ εἶναι $\Pi = 6$ μέτ.

"Αν δὲ $\alpha' = 4$ μετ., θὰ εἶναι $\Pi' = 12$ μέτ. 'Ο λόγος τῶν δύο τούτων τιμῶν τοῦ πρώτου ποσοῦ εἶναι $\frac{\alpha'}{\alpha} = \frac{4}{2} = 2$. 'Αλλὰ

καὶ $\frac{\Pi'}{\Pi} = \frac{12}{6} = 2$. Εἶναι λοιπὸν $\frac{\alpha'}{\alpha} = \frac{\Pi'}{\Pi}$.

Γενικῶς: "Εστωσαν α καὶ β δύο τιμαὶ ἐνδός ποσοῦ Π καὶ α', β' αἱ ἀντίστοιχοι τιμαὶ ἄλλου ποσοῦ Ρ ἀναλόγου πρὸς τὸ Π.

"Αν $\alpha':\alpha = \lambda$, θὰ εἶναι $\alpha' = \alpha \cdot \lambda$.

'Επειδὴ δὲ τὰ ποσά Π καὶ Ρ ὑπετέθησαν ἀνάλογα, θὰ εἶναι καὶ $\beta':\beta = \lambda$. (§ 214). 'Εκ ταύτης δὲ ἔπειται ὅτι $\beta':\beta = \alpha:\lambda = \alpha':\alpha$. Βλέπομεν λοιπὸν ὅτι:

"Αν δύο συμμεταβλητά ποσά εἶναι ἀνάλογα, δ λόγος δύο τιμῶν τοῦ ἐνδός ισοῦται πρὸς τὸν λόγον τῶν ἀντιστοίχων τιμῶν τοῦ ἄλλου.

Αντιστρόφως: "Αν $\alpha' : \alpha = \beta' : \beta$ καὶ κληθῆ λ ἔκαστος τούτων, θὰ εἶναι $\alpha' = \alpha \cdot \lambda$ καὶ $\beta' = \beta \cdot \lambda$, ἢτοι:

"Αν τυχοῦσα τιμὴ α τοῦ Π πολλαπλασιασθῇ ἐπὶ λ καὶ ἡ ἀντίστοιχος τιμὴ β τοῦ Ρ πολλαπλασιάζεται ἐπὶ λ. Τὰ ποσὰ λοιπὸν Π καὶ Ρ εἶναι ἀνάλογα (§ 214).

§ 216. *Εστωσαν α, α', α'' τυχοῦσαι τιμαὶ ἐνὸς ποσοῦ Π καὶ β, β', β'' αἱ ἀντίστοιχοι τιμαὶ ἄλλου ποσοῦ Ρ ἀναλόγου καὶ δμοειδοῦς πρὸς τὸ Π. Νὰ συγκριθῶσιν οἱ λόγοι $\frac{\alpha}{\beta}, \frac{\alpha'}{\beta'}, \frac{\alpha''}{\beta''}$.*

Λύσις. Ἐπειδὴ τὰ ποσὰ Π καὶ Ρ εἶναι ἀνάλογα, εἶναι $\frac{\alpha}{\alpha'} = \frac{\beta}{\beta'}$ καὶ $\frac{\alpha}{\alpha''} = \frac{\beta}{\beta''}$ κατὰ τὴν προηγουμένην ἰδιότητα.

Ἐπειδὴ δὲ δολοὶ οἱ δροὶ τῶν ἀναλογιῶν τούτων εἶναι δμοειδεῖς, ἐκ τῆς Ἀριθμητικῆς γνωρίζομεν ὅτι ἐκ μὲν τῆς α' προκύπτει ἡ ἀναλογία $\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\alpha'}{\beta'}$, ἐκ δὲ τῆς β' ἡ $\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\alpha''}{\beta''}$.

Εἶναι λοιπὸν $\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\alpha'}{\beta'} = \frac{\alpha''}{\beta''}$. "Ωστε: (1)

"Αν δύο δμοειδῆ ποσὰ μεταβάλλωνται ἀναλόγως, δ λόγος τῶν ἀντίστοιχων τιμῶν αὐτῶν εἶναι σταθερός.

Αντιστρόφως: "Αν ἀληθεύωσιν αἱ ἴσοτητες (1), ἐπειδὴ δολοὶ οἱ δροὶ αὐτῶν εἶναι δμοειδεῖς, θὰ εἶναι καὶ $\frac{\alpha}{\alpha'} = \frac{\beta}{\beta'}$. Κατὰ δὲ τὴν προηγουμένην ἰδιότητα τὰ ποσὰ Π καὶ Ρ εἶναι ἀνάλογα.

§ 217. *Εστωσαν α, β τυχοῦσαι ἀντίστοιχοι τιμαὶ δύο συμμεταβλητῶν ποσῶν Π καὶ Ρ καὶ λ τυχὸν ἀμέραιος ἀριθμός. Αν α · λ καὶ β · λ εἶναι ἀντίστοιχοι τιμαὶ τῶν ποσῶν Π καὶ Ρ, νὰ ἔξετασθῇ, ἂν τὰ ποσὰ ταῦτα εἶναι ἀνάλογα ἡ δχι.*

Λύσις. Κατὰ τὸν δροισμὸν τῶν ἀναλόγων ποσῶν (§ 214) πρέπει νὰ ἔξετάσωμεν, ἂν εἰς τὴν τιμὴν α · μ ἀντιστοιχῇ τιμὴ β · μ, οἰοσδήποτε ἀριθμὸς καὶ ἂν εἶναι ὁ μ. Πρὸς τοῦτο παρατηροῦμεν ὅτι εἰς τὴν τιμὴν

α · 2, α · 3, α · 4, . . . τοῦ Π ἀντιστοιχεῖ τιμὴ

β · 2, β · 3, β · 4, . . . τοῦ Ρ ἐξ ὑποθέσεως.

Εἰς τὴν τιμὴν π.χ. $\alpha \cdot \frac{1}{4}$ τοῦ Π, ἔστω ὅτι ἀντιστοιχεῖ τιμὴ χ τοῦ Ρ. Κατὰ τὴν ὑπόθεσιν εἰς τὴν τιμὴν $(\alpha \cdot \frac{1}{4}) \cdot 4$ ἀντιστοιχεῖ τιμὴ χ·4. Ἐπειδὴ δὲ $(\alpha \cdot \frac{1}{4}) \cdot 4 = \alpha$ καὶ εἰς αὐτὴν ἀντιστοιχεῖ τιμὴ β, πρέπει νὰ εἶναι $\chi \cdot 4 = \beta$ καὶ ἐπομένως $\chi = \beta \cdot \frac{1}{4}$.

Κατὰ ταῦτα εἰς τὴν τιμὴν π.χ. $\alpha \cdot \frac{1}{1000}$ τοῦ Π ἀντιστοιχεῖ τιμὴ β· $\frac{1}{1000}$ τοῦ Ρ. Κατὰ δὲ τὴν ὑπόθεσιν εἰς τὴν τιμὴν $(\alpha \cdot \frac{1}{1000}) \cdot 5167$ ἀντιστοιχεῖ τιμὴ $(\beta \cdot \frac{1}{1000}) \cdot 5167$ ἢ εἰς τὴν τιμὴν $\alpha \cdot 5,167$ ἀντιστοιχεῖ τιμὴ $\beta \cdot 5,167$.

Ἐστω τέλος $\alpha \cdot 3,14144144414\dots$ μία τιμὴ τοῦ Π. Διὰ νὰ εὕρωμεν τὴν ἀντιστοιχὸν τιμὴν τοῦ Ρ σκεπτόμεθα ως ἔξῆς:

Εἰς τὴν τιμὴν $\alpha \cdot 3$	ἀντιστοιχεῖ τιμὴ $\beta \cdot 3$
» » » $\alpha \cdot 3,1$	» » $\beta \cdot 3,1$
» » » $\alpha \cdot 3,14$	» » $\beta \cdot 3,14$
» » » $\alpha \cdot 3,141$	» » $\beta \cdot 3,141$

"Αν ἔξακολουθήσωμεν κατ' αὐτὸν τὸν τρόπον, ἐννοοῦμεν ὅτι εἰς τὴν τιμὴν

$\alpha \cdot 3,14144144414\dots$ τοῦ Π ἀντιστοιχεῖ τιμὴ

$\beta \cdot 3,14144144414\dots$ τοῦ Ρ.

Βλέπομεν λοιπὸν ὅτι:

Εἰς τὴν τιμὴν $\alpha \cdot \mu$ τοῦ Π ἀντιστοιχεῖ τιμὴ $\beta \cdot \mu$ τοῦ Ρ, οἰοσδήποτε ἀριθμὸς καὶ ἀν εἶναι δ. μ. Ἐπομένως τὰ ποσὰ Π καὶ Ρ εἶναι ἀνάλογα (§ 214).

Κατὰ ταῦτα:

Διὰ νὰ βεβαιωθῶμεν ὅτι δύο συμμεταβλητὰ ποσὰ εἶναι ἀνάλογα, ἀρκεῖ νὰ δειξωμεν ὅτι δ πολλαπλασιασμὸς μιᾶς τιμῆς τοῦ ἐνὸς ἐπὶ τυχόντα ἀκέραιον ἀριθμὸν συνεπάγεται πολλαπλασιασμὸν τῆς ἀντιστοιχὸν τιμῆς τοῦ ἄλλου ἐπὶ τὸν αὐτὸν ἀκέραιον ἀριθμόν.

4. ΑΝΑΛΟΓΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

§ 218. Θεώρημα. "Αν δύο εύθειαι AB καὶ $ΓΔ$ τέμνωνται ὑπὸ παραλλήλων εὐθειῶν, τὰ μεταξὺ τῶν αὐτῶν παραλλήλων περιεχόμενα τμήματα αὐτῶν (ἀντίστοιχα) μεταβάλλονται ἀναλόγως (σχ. 160)."

"Απόδειξις. "Ας ύποθέσωμεν
ὅτι $AE \cdot 2 = HI$ καὶ ὅτι Λ εἶναι τὸ
μέσον τοῦ HI . Εἶναι λοιπὸν

$$AE = HL = LI. \quad (1)$$

"Άγομεν ἐκ τοῦ Λ εὐθεῖαν $ΛΜ$
παράλληλον πρὸς τὴν AG καὶ πα-
ρατηροῦμεν ὅτι ἐκ τῶν λιστήτων
(1) προκύπτει:


$$GZ = \Theta M = MK \quad (\S\ 127). \quad "Αρα τὸ
ΘΚ εἶναι διπλάσιον τοῦ GZ .$$

"Ομοίως ἀποδεικνύεται ὅτι εἰς
τμῆμα τῆς AB τριπλάσιον τοῦ AE ἀντίστοιχεῖ τμῆμα τῆς $ΓΔ$
τριπλάσιον τοῦ GZ κ.τ.λ.

"Αρα ($\S\ 217$) τὰ ἀντίστοιχα τμήματα τῶν εὐθειῶν AB καὶ
 $ΓΔ$ μεταβάλλονται ἀναλόγως.

Σημείωσις. Τὸ θεώρημα τοῦτο διφείλεται εἰς τὸν Θαλῆν*.

Πόρισμα I. "Αν δύο εύθειαι τέμνωνται ὑπὸ παραλλήλων




Σχ. 160

* 'Ο Θαλῆς δὲ Μιλήσιος ἦτο εἰς ἐκ τῶν ἔπτα σοφῶν τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδος· ἔζησε δὲ μεταξὺ 627 καὶ 547 π.Χ. Αἱ πληροφορίαι περὶ τοῦ βίου αὐτοῦ εἰναι ἀσαφεῖς καὶ ἀντιφατικαῖ. Εἶναι δημως βέβαιον ὅτι ἐταξίδευσεν δι' ἐμπορικάς ὑποθέσεις εἰς Αἴγυπτον, ἔνθα ἥδυνθην νὰ ἔκμαιεύῃ πολλάς ἐπιστημονικάς γνῶσεις, τὰς δποίας ζηλοτύπως ἐκράτουν μυστικάς οἱ λερεῖς τῆς Αἴγυπτου. 'Ο Πλούταρχος δὲ ἀναφέρει ὅτι δὲ Θαλῆς ἔξεπληξε τὸν βασιλέα 'Αμασιν τῆς Αἴγυπτου μὲ τὸν τρόπον, καθ' ὃν εδρε τὸ ὄψος μιᾶς πυραμίδος μετρῶν τὴν σκιὰν αὐτῆς. Κατά τὸν 'Ιερώνυμον τὸν Ρόδιον ἡ μέτρησις αὕτη ἔγινε τὴν στιγμὴν τῆς ἡμέρας, καθ' ἣν ἡ σκιὰ κατακορύφου ράβδου ἦτο λισμήκης πρὸς τὴν ράβδον ταύτην. 'Επανελθὼν εἰς τὴν πατρίδα του Ἰδρυσε τὴν περίφημον 'Ιώνιον Φιλοσοφικὴν Σχολὴν καὶ ἡσχολεῖτο ἀποκλειστικῶς εἰς Φιλοσοφικάς θεωρίας, εἰς ἀστρονομικάς παρατηρήσεις καὶ εἰς τὰ μαθηματικά.

εύθειῶν, τὰ ὅπ' αὐτῶν δριζόμενα τμήματα τῆς μιᾶς εἶναι ἀνάλογα πρὸς τὰ ἀντίστοιχα τμήματα τῆς ἄλλης.

Κατὰ τὴν Ἰδιότητα τῆς § 216 εἶναι $\frac{AE}{EZ} = \frac{EH}{Z\Theta} = \frac{HI}{\Theta K}$ κ.τ.λ.

Πόρισμα II. "Αν εύθεῖα παράλληλος πρὸς ΖΑΗ μίαν πλευρὰν τριγώνου τέμνῃ τὰς ἄλλας πλευρὰς αὐτοῦ, τὰ τμήματα τῆς μιᾶς εἶναι ἀνάλογα πρὸς τὰ ἀντίστοιχα τμήματα τῆς ἄλλης. Καὶ ἀντιστρόφως.



Σχ. 161

"Αν π.χ. ἡ ΔΕ εἶναι παράλληλος πρὸς τὴν ΒΓ (σχ. 161) καὶ ἀχθῆ ἡ ΖΑΗ παράλληλος πρὸς τὴν ΒΓ, κατὰ τὸ προηγούμενον πόρισμα θὰ εἶναι

$$\frac{AD}{AE} = \frac{DB}{EG}. \quad (1)$$

"Αντιστρόφως: "Αν ἀληθεύῃ ἡ (1), ἡ ΔΕ θὰ εἶναι παράλληλος πρὸς τὴν ΒΓ. Πράγματι ἐκ τῆς (1) προκύπτει ἡ ἀναλογία

$$\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EG}. \quad (2)$$

"Αν δὲ ΔΕ' ἦτο ἡ ἐκ τοῦ Δ ἀγομένη παράλληλος πρὸς τὴν ΒΓ, θὰ ἦτο $\frac{AD}{DB} = \frac{AE'}{EG'}$.

'Εκ ταύτης καὶ τῆς (2) ἔπειται ὅτι $\frac{AE}{EG} = \frac{AE'}{EG'}$ καὶ ἐπομένως $\frac{AE}{EG} + 1 = \frac{AE'}{EG'} + 1$ ἢ $\frac{AG}{EG} = \frac{AG}{EG'}$. 'Εκ ταύτης ἔπειται ὅτι $EG = EG'$, ἢ ΔΕ' συμπίπτει μὲ τὴν ΔΕ.

Άσκήσεις

398. 'Απὸ τὸ κοινὸν σημεῖον τῶν διαμέσων τριγώνου ἀγομεν εύθειῶν παράλληλον πρὸς μίαν πλευράν. Νὰ ἀποδειχθῆ ὅτι αὕτη διαιρεῖ ἔκατέραν τῶν ἄλλων εἰς τμήματα, τῶν δποῖων τὸ ἐν εἶναι διπλάσιον τοῦ ἄλλου.

399. Νὰ ἀποδείξητε ὅτι τὰ κοινὰ σημεῖα τῶν διαμέσων τῶν τριγώνων, εἰς τὰ δποῖα ἐν τετράπλευρον διαιρεῖται ὑπὸ τῶν διαγωνίων του, εἶναι κορυφαὶ παραλληλογράμμου.

400. "Αν Ε εἶναι τὸ μέσον τῆς διαμέσου ΑΔ τριγώνου ΑΒΓ, νὰ ἀποδείξητε ὅτι ἡ ΒΕ διαιρεῖ τὴν ΑΓ εἰς τμήματα ἔχοντα λόγον 1: 2.


5. ΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΑΙ

§ 219. Πρόβλημα I. Νὰ διαιρεθῇ εὐθύγραμμον τμῆμα AB εἰς μέρη ἀνάλογα πρὸς ἄλλα δοθέντα εὐθύγραμμα τμήματα Γ, Δ, E (σχ. 162).

Δύσις. Ὑπόθεται $A\Theta$, ἡ ὅποια σχηματίζει μὲ τὴν AB γωνίαν καὶ δρίζομεν ἐπ' αὐτῆς τμήματα $AZ, ZH, H\Theta$ διαδοχικά, διμόρροπα καὶ ἀντιστοιχῶς ἵσα πρὸς τὰ Γ, Δ, E . Ἐπειτα γράφομεν τὴν εὐθεῖαν ΘB καὶ τὰς ZK, HL παραλλήλους πρὸς τὴν ΘB . Τοιουτοτρόπως τὸ AB διαιρεῖται εἰς τὰ ζητούμενα τμήματα AK, KL, LB .

Απόδειξις. Αἱ εὐθεῖαι AB καὶ $A\Theta$ τέμνονται ύπὸ τῶν παραλλήλων εὐθειῶν $ZK, HL, \Theta B$ καὶ τῆς AN παραλλήλου πρὸς αὐτάς. Ἀρα (§ 218 Πόρ. 1) εἶναι $\frac{AK}{AZ} = \frac{KL}{ZH} = \frac{LB}{H\Theta}$. Ἐπειδὴ δὲ $AZ = \Gamma, ZH = \Delta, H\Theta = E$, αὗται γίνονται $\frac{AK}{\Gamma} = \frac{KL}{\Delta} = \frac{LB}{E}$, ὅ.ἔ.δ.

Σχ. 162



'Α σκήσεις

401. Νὰ διαιρέσητε δοθὲν τμῆμα α εἰς δύο μέρη ἔχοντα λόγον 3 : 4.


402. Νὰ διαιρέσητε δοθὲν τρίγωνον $AB\Gamma$ εἰς τρία μέρη ἀνάλογα πρὸς τοὺς ἀριθμοὺς 2, 3, 4 δι' εὐθειῶν ἀγομένων ἐκ τῆς κορυφῆς A .

403. Νὰ κατασκευάσητε δρθογώνιον τρίγωνον, τὸ δόποιον νὰ ἔχῃ δοθεῖσαν ύποτενούσαν α , ἡ δὲ ἐπ' αὐτὴν προβολὴ τῆς ἀπέναντι κορυφῆς νὰ διαιρῇ αὐτὴν εἰς μέρη ἔχοντα λόγον 2 : 3.

404. Νὰ διαιρέσητε δοθὲν εύθ. τμῆμα α εἰς τμήματα χ, ψ, ω τοιαῦτα, ὥστε νὰ εἴναι $\frac{\chi}{3} = \frac{\psi}{2} = \frac{\omega}{4}$.

405. Εἰς δοθέντα σημεῖα A, B ἐνεργοῦσι δύο δυνάμεις παράλληλοι καὶ διμόρροποι. Ἡ εἰς τὸ A ἐνεργοῦσα ἔχει ἔντασιν 4 χιλιογράμμων, ἡ δὲ ἄλλη 5 χιλιογρ. Νὰ δρίσητε τὸ σημεῖον τῆς ἐφαρμογῆς τῆς συνισταμένης αὐτῶν.

§ 220. Πρόβλημα II. Νὰ κατασκευασθῇ ἡ τετάρτη ἀνάλογος δοθέντων εὐθυγράμμων τμημάτων A, B, Γ (σχ. 163).



Κατασκευάζομεν γωνίαν Δ καὶ εἰς τὴν μίαν πλευράν δρίζομεν τμήματα ΔE καὶ EZ ἀντιστοίχως ἵσα πρὸς τὰ A καὶ B . Εἰς δὲ τὴν ἄλλην πλευράν δρίζομεν τμῆμα ΔH ἵσον πρὸς τὸ Γ . Φέρομεν ἔπειτα τὴν EH καὶ τὴν $Z\Theta$ παράλληλον πρὸς αὐτὴν.

$$\text{Οὕτως εἰναι } \frac{\Delta E}{EZ} = \frac{\Delta H}{H\Theta} \text{ ἢ}$$

$\frac{A}{B} = \frac{\Gamma}{H\Theta}$. Τὸ $H\Theta$ λοιπὸν εἰναι τὸ ζητούμενον τμῆμα.

Α σκήσεις

406. "Αν δοθῶσι τρία εὐθ. τμήματα α, β, γ , νὰ γράψητε ἐν εὐθ. τμῆμα χ τοιοῦτον, ὅστε νὰ εἰναι $(\chi) = \frac{(\beta) \cdot (\gamma)}{(\alpha)}$.

407. Νὰ κατασκευάσητε δρθογώνιον μὲ δοθεῖσαν βάσιν καὶ Ισοδύναμον πρὸς ἄλλο δοθὲν δρθογώνιον.

408. "Αν δοθῶσι δύο εὐθ. τμήματα α καὶ β , νὰ γραφῆ ἄλλο εὐθ. τμῆμα χ τοιοῦτον, ὅστε νὰ εἰναι $(\alpha)^2 = (\beta) \cdot (\chi)$.

6. ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΙΣ ΕΥΘΕΙΑΣ


§ 221. Θεώρημα I. Ἡ διχοτομοῦσα γωνίαν τριγώνου διαιρεῖ τὴν ἀπέναντι πλευρὰν εἰς τμήματα ἀνάλογα πρὸς τὰς προσκειμένας εἰς αὐτὰ πλευράς. Καὶ ἀντιστρόφως.

"Αν δηλ. ἡ Δ διχοτομῇ τὴν γωνίαν A τοῦ τριγώνου $AB\Gamma$ (σχ. 164), θὰ εἰναι

$$\frac{BD}{AB} = \frac{\Delta\Gamma}{A\Gamma}$$

"Α πόδειξε.

Κατὰ τὴν ύποθεσιν μία γωνία τοῦ τριγώνου $AB\Delta$ εἰναι ἵση πρὸς μίαν γωνίαν



τοῦ ΑΔΓ. Κατὰ δὲ τὴν Ἰδιότητα τῆς § 191 θὰ εἰναι

$$\frac{(AB\Delta)}{(A\Delta\Gamma)} = \frac{(AB) \cdot (A\Delta)}{(A\Delta) \cdot (A\Gamma)} = \frac{(AB)}{(A\Gamma)}. \quad (1)$$

*Επειδὴ δὲ τὰ τρίγωνα ταῦτα ἔχουσιν τὸ αὐτὸ ὕψος ΑΘ εἰναι

$$\frac{(AB\Delta)}{(A\Delta\Gamma)} = \frac{(B\Delta)}{(A\Gamma)}. \quad (2)$$

*Ἐκ τῶν ἴσοτήτων (1) καὶ (2) ἐπειταὶ δτι $\frac{(B\Delta)}{(A\Gamma)} = \frac{(AB)}{(A\Gamma)}$, δθεν

$$\frac{(B\Delta)}{(AB)} = \frac{(A\Gamma)}{(A\Gamma)} \text{ καὶ } \frac{B\Delta}{AB} = \frac{A\Gamma}{A\Gamma}, \text{ δ.ε.δ.}$$

*Αντιστρόφως: "Αν $\frac{B\Delta}{AB} = \frac{A\Gamma}{A\Gamma}$, ἡ ΑΔ διχοτομεῖ τὴν Α.

Διότι ἐκ τῆς ἴσοτητος ταύτης προκύπτει δτι

$$\frac{B\Delta}{AB} = \frac{A\Gamma}{A\Gamma} = \frac{B\Gamma}{AB + A\Gamma}. \quad (3)$$

*Αν δὲ διχοτόμος τῆς Α ἥτο ἀλλη εὐθεῖα ΑΔ', θὰ ἥτο

$$\frac{B\Delta'}{AB} = \frac{A'\Gamma}{A\Gamma} = \frac{B\Gamma}{AB + A\Gamma}.$$

*Ἐκ τούτων καὶ τῆς (3) ἐπειταὶ δτι $\frac{B\Delta}{AB} = \frac{B\Delta'}{AB}$, δθεν $B\Delta = B\Delta'$.

Τὰ σημεῖα λοιπὸν Δ καὶ Δ' συμπίπτουσι, διχοτόμος δὲ τῆς Α εἰναι ἡ ΑΔ, δ.ε.δ.

*Εφαρμογή. "Αν $(B\Gamma) = \alpha$, $(A\Gamma) = \beta$, $(AB) = \gamma$ θὰ εἰναι

$$\frac{(B\Delta)}{\gamma} = \frac{(\Delta\Gamma)}{\beta} = \frac{\alpha}{\beta + \gamma} \text{ καὶ ἐπομένως}$$

$$(B\Delta) = \frac{\alpha\gamma}{\beta + \gamma}, (\Delta\Gamma) = \frac{\alpha\beta}{\beta + \gamma}.$$

*Ομοίως δρίζονται καὶ τὰ μήκη τῶν τμημάτων, εἰς τὰ δποῖα ἔκαστη τῶν ἀλλων πλευρῶν διαιρεῖται ύπό τῆς διχοτόμου τῆς ἀπέναντι γωνίας.

§ 222. Θεώρημα II. "Αν ἡ διχοτόμος ἔξωτερης γωνίας Α τριγώνου $AB\Gamma$ τέμνῃ τὴν εὐθεῖαν $B\Gamma$ εἰς σημεῖον E , θὰ εἰναι $\frac{EB}{AB} = \frac{EG}{A\Gamma}$. Καὶ ἀντιστρόφως.

*Απόδειξις. *Επειδὴ $\widehat{E\Lambda\Gamma} + \widehat{E\Lambda Z} = 2$ δρθ. καὶ $\widehat{E\Lambda Z} = \widehat{E\Lambda B}$, ἐπειταὶ δτι $\widehat{E\Lambda\Gamma} + \widehat{E\Lambda B} = 2$ δρθ. Κατὰ δὲ τὴν Ἰδιότητα τῆς § 191, θὰ εἰναι $\frac{(EAB)}{(E\Lambda\Gamma)} = \frac{(AE) \cdot (AB)}{(AE) \cdot (A\Gamma)}$, δθεν $\frac{(EAB)}{(E\Lambda\Gamma)} = \frac{(AB)}{(A\Gamma)}$.

Ἐπειδὴ δὲ τὰ τρίγωνα ταῦτα ἔχουσιν τὸ αὐτὸ ὄψος, εἰναι

$$\frac{(\text{EAB})}{(\text{EAΓ})} = \frac{(\text{EB})}{(\text{EG})}$$

Ἐκ τούτων ἐπειταὶ διτὶ $\frac{\text{EB}}{\text{AB}} = \frac{\text{EG}}{\text{ΑΓ}}$.

Ἀντιστρόφως: "Ἄν εἰναι $\frac{\text{EB}}{\text{AB}} = \frac{\text{EG}}{\text{ΑΓ}}$, ἡ εὐθεῖα ΑΕ διχοτομεῖ τὴν ἔξωτερικὴν γωνίαν ΖΑΒ. Ἡ ἀπόδειξις γίνεται κατὰ τρόπον ὅμοιον πρὸς τὴν ἀπόδειξιν τοῦ ἀντιστρόφου τοῦ προηγουμένου θεωρήματος.

Ασκήσεις

409. Ἐν τρίγωνον ΑΒΓ ἔχει (AB) = 8 ἑκατ., (BΓ) = 10 ἑκατ. καὶ (ΑΓ) = 12 ἑκατ. Νὰ ὑπολογισθῶσι τὰ μῆκη τῶν τμημάτων, εἰς τὰ δυοῖα ἡ πλευρὰ ΒΓ διαιρεῖται ὑπὸ τῆς διχοτομούσης τὴν γωνίαν Α.

410. Εἰς τρίγωνον ΑΒΓ εἰναι $2\alpha = \beta + \gamma$. Νὰ ὑπολογισθῶσι τὰ μῆκη τῶν τμημάτων, εἰς τὰ δυοῖα διαιρεῖται ἡ ΒΓ ὑπὸ τῆς διχοτομούσης τὴν γωνίαν Α συναρτήσει τῶν β καὶ γ .

411. Νὰ διχοτομήσητε τὴν ἔξωτερικὴν γωνίαν Α τοῦ τριγώνου ΑΒΓ τῆς ἀσκήσεως 409 καὶ νὰ ὑπολογίσητε τὰς ἀποστάσεις τῶν κορυφῶν Β καὶ Γ ἀπὸ τὸ κοινὸν σημεῖον τῆς διχοτόμου καὶ τῆς εὐθείας ΒΓ.

412. Ἐν τρίγωνον ΑΒΓ ἔχει (AB) = 6 ἑκατ., (BΓ) = 10 ἑκατ. καὶ (ΑΓ) = 8 ἑκατ. Νὰ ὑπολογίσητε τὴν ἀπόστασιν τῶν σημείων, εἰς τὰ δυοῖα ἡ εὐθεῖα ΒΓ τέμνεται ἀπὸ τὰς διχοτόμους τῆς ἔσωτερικῆς καὶ ἔξωτερικῆς γωνίας Α.

§ 223. Ἀρμονικὰ συζυγῆ σημεῖα. "Εστωσαν ΑΔ καὶ ΑΕ αἱ διχοτόμοι τῆς ἔσωτερικῆς καὶ ἔξωτερικῆς γωνίας Α τριγώνου ΑΒΓ (σχ. 164).

Ἐπειδὴ $\frac{\Delta B}{\text{AB}} = \frac{\Delta \Gamma}{\text{ΑΓ}}, \frac{\text{EB}}{\text{AB}} = \frac{\text{EG}}{\text{ΑΓ}},$ θὰ εἰναι καὶ

$$\frac{\Delta B}{\Delta \Gamma} = \frac{\text{AB}}{\text{ΑΓ}}, \frac{\text{EB}}{\text{EG}} = \frac{\text{AB}}{\text{ΑΓ}}.$$

Ἐκ τούτων δὲ βλέπομεν διτὶ $\frac{\Delta B}{\Delta \Gamma} = \frac{\text{EB}}{\text{EG}}$. Ἡτοι: (1)

"Ο λόγος τῶν ἀποστάσεων τοῦ Δ ἀπὸ τῶν σημείων Β καὶ Γ ἰσοῦται πρὸς τὸν λόγον τῶν ἀποστάσεων τοῦ Ε ἀπὸ τῶν αὐτῶν σημείων Β καὶ Γ.

Τὰ σημεῖα Δ καὶ Ε, τὰ ὅποια ἔχουσι τὴν ἰδιότητα ταύτην, λέγονται ἀρμονικὰ συζυγῆ ἀλλήλων πρὸς τὰ Β καὶ Γ. Ἡ δὲ εὐθεῖα ΒΓ λέγομεν ὅτι διαιρεῖται ἀρμονικῶς ὑπὸ τῶν σημείων Δ καὶ Ε.

Ἐκ τῆς ἀναλογίας (1) προκύπτει εὐκόλως ἡ ἀναλογία $\frac{ΒΔ}{ΒΕ} = \frac{ΓΔ}{ΓΕ}$. Ἐκ ταύτης γίνεται φανερόν ὅτι καὶ τὰ Β, Γ εἰναι ἀρμονικὰ συζυγῆ ἀλλήλων πρὸς τὰ Δ καὶ Ε, ἡ δὲ εὐθεῖα ΔΕ διαιρεῖται ἀρμονικῶς ὑπὸ τῶν Β καὶ Γ.


Τὰ σημεῖα Β, Γ, Δ, Ε εἰς τὴν τοιαύτην θέσιν αὐτῶν ἀποτελοῦσι μίαν ἀρμονικὴν σημειοσειράν.

Σ 224. Πρόβλημα I. Ἀν δοθῶσιν ἐπ' εὐθείας τρία σημεῖα Β, Γ, Δ, νὰ δοισθῇ τὸ ἀρμονικὸν συζυγές τοῦ Δ πρὸς τὰ ἄλλα Β καὶ Γ.

Ἀνάλυσις. α') Ἀν τὸ Δ κεῖται μεταξὺ Β καὶ Γ (σχ. 165), ἀπὸ αὐτὸν θὰ διέρχηται ἡ διχοτόμος τῆς γωνίας Α ἐνὸς τριγώνου ΑΒΓ. Αὐτὴ δημοσίευτη διέρχηται καὶ ἀπὸ τὸ μέσον Η τοῦ ἀντιστοίχου πρὸς τὴν χορδὴν ΒΓ τόξου τῆς περὶ τὸ ΑΒΓ περιγεγραμμένης περιφερείας. Ἀν λοιπὸν δοισθῇ τὸ μέσον Η ἐνὸς τῶν τοιούτων τόξων, δοίζεται ἡ εὐθεῖα ΗΔ καὶ δι' αὐτῆς μία κορυφὴ Α ἐπὶ τῆς ἀντιστοίχου περιφερείας.

Ἄν δὲ Ε εἴναι τὸ ζητούμενον σημεῖον, ἡ ΑΕ θὰ διχοτομῇ τὴν ἔξωτερικὴν γωνίαν Α καὶ θὰ εἴναι κάθετος ἐπὶ τὴν ΑΔ. Διὰ τοῦτο θὰ διέρχηται ἀπὸ τὸ ἄλλο ἄκρον Ζ τῆς διὰ τοῦ Η διερχομένης διαμέτρου.

Σύνθεσις. Γράφομεν τυχοῦσαν περιφέρειαν Κ, ἡ ὅποια νὰ διέρχηται ἀπὸ τὰ σημεῖα Β καὶ Γ καὶ διάμετρον ΖΗ κάθετον ἐπὶ τὴν ΒΓ. Ἐπειτα φέρομεν τὴν εὐθεῖαν ΗΔ. Ἔστω δὲ Α ἡ ἄλλη τομὴ αὐτῆς καὶ τῆς περιφερείας Κ. Ἄγομεν τέλος τὴν ΖΑ, ἥτις τέμνει τὴν εὐθεῖαν ΒΓ εἰς τὸ ζητούμενον σημεῖον Ε.



Σχ. 165

**Α πόδειξις.* Ἐπειδὴ $\widehat{BH} = \widehat{HG}$, ἡ ΑΗ διχοτομεῖ τὴν γωνίαν ΒΑΓ. Ἡ δὲ εὐθεῖα ΖΑΕ ως κάθετος ἐπὶ τὴν ΑΗ διχοτομεῖ τὴν ἔξωτερην γωνίαν Α τοῦ αὐτοῦ τριγώνου ΑΒΓ.

Κατὰ τὰ προηγούμενα λοιπὸν θά εἶναι $\frac{\Delta B}{\Delta G} = \frac{EB}{EG}$ καὶ ἐπομένως τὰ σημεῖα Δ καὶ Ε εἶναι ἀρμονικά συζυγῆ πρὸς τὰ B καὶ Γ.

β') "Αν δοθῇ τὸ Ε ἑκτὸς τῶν B, Γ, ἄγεται ἡ EZ καὶ δρίζεται ἡ κορυφὴ A. Ἐπειτα δὲ ἡ ΑΗ, ἡ ὅποια τέμνει τὴν ΒΓ εἰς τὸ ζητούμενον σημεῖον Δ. Ἡ ἀπόδειξις γίνεται ὅπως προηγουμένως.

§ 225. Ποία εἶναι ἡ ἀμοιβαία θέσις τῶν σημείων ἀρμονικῆς σημειοσειρᾶς. Εἰς τὸ σχ. 165 τὰ Δ καὶ Γ κεῖνται πρὸς τὸ αὐτὸ μέρος τοῦ μέσου Ο τοῦ τμήματος ΒΓ. Ἐπειδὴ δὲ $\widehat{AZO} + \widehat{ZOD} < 2$ δρθ, αἱ εὐθεῖαι ΖΑ καὶ ΒΓ τέμνονται εἰς σημεῖον E πρὸς τὸ μέρος τῶν γωνιῶν τούτων, ἐπομένως καὶ πρὸς τὸ αὐτὸ μὲ τὸ Δ μέρος τῆς ΖΗ ἢ τοῦ Ο. Ωστε:

Τὰ ἀρμονικὰ συζυγῆ Δ καὶ E πρὸς τὰ B καὶ Γ κεῖνται πρὸς τὸ αὐτὸ μέρος τοῦ μέσου τοῦ ΒΓ.

Εἰς τὸ αὐτὸ σχῆμα τὸ Δ κεῖται μεταξὺ Ο καὶ Γ, ἡ δὲ πλευρὰ ΗΔΑ τοῦ δρθ. τριγώνου ΗΑΖ εἶναι χορδὴ τοῦ κύκλου Κ καὶ ἡ ἐπ' αὐτὴν κάθετος ΖΑ τέμνει τὴν ΒΓ εἰς τὸ E ἑκτὸς τοῦ κύκλου. Ωστε:

"Ἀπὸ τὰ δύο ἀρμονικὰ συζυγῆ πρὸς τὰ δύο σημεῖα B καὶ Γ τὸ διανοεῖται μεταξὺ B καὶ Γ, τὸ δὲ ἄλλο ἐπὶ τῆς προεκτάσεως τοῦ τμήματος ΒΓ.

"Αν τὸ Δ συμπίπτῃ μὲ τὸ μέσον Ο, ἡ ΗΔΑ ταυτίζεται μὲ τὴν ΗΟΖ, τὸ A μὲ τὸ Z καὶ ἡ ΖΑ κάθετος ἐπὶ τὴν ΗΔΑ γίνεται κάθετος ἐπὶ τὴν ΗΖ καὶ ἐπομένως παράλληλος πρὸς τὴν ΒΓ. Τὸ E λοιπὸν ἀφανίζεται εἰς τὸ ἄπειρον. Ωστε:

"Ἀρμονικὸν συζυγὲς τοῦ μέσου ἔνδος εὐθ. τμήματος ΒΓ πρὸς τὰ ἀκρα αὐτοῦ εἶναι τὸ ἐπ' ἄπειρον σημεῖον τῆς εὐθείας ΒΓ.

'Α σκήσεις

413. Νά διποδείξητε ότι έκαστον σημείον εύθειας $B\Gamma$ έχει έν μόνον άρμονικὸν συζυγὲς πρὸς τὰ σημεῖα B καὶ Γ αὐτῆς.

414. Ἀπὸ τὰ ἄκρα μιᾶς διαμέτρου AB περιφερείας νὰ φέρηται ἐφαπτομένας εἰς αὐτήν. Ἐπειτα νὰ γράψητε τρίτην ἐφαπτομένην εἰς έν σημεῖον M τῆς αὐτῆς περιφερείας. Ἀν Γ , Δ , E εἶναι σημεῖα, εἰς τὰ δοῦλα αὐτῆς τέμνει τὰς δύο πρώτας ἐφαπτομένας καὶ τὴν εύθειαν AB , νὰ διποδείξητε ότι τὰ σημεῖα Γ καὶ Δ εἶναι άρμονικὰ συζυγῆ πρὸς τὰ M καὶ E .

415. Αἱ διχοτόμοι τῆς ἐσωτερικῆς καὶ ἐξωτερικῆς δρθῆς γωνίας A τριγώνου $AB\Gamma$ τέμνουσι τὴν εύθειαν $B\Gamma$ εἰς σημεῖα Δ καὶ E . Ἀν εἶναι $A\Delta = AB$ καὶ $AE = A\Gamma$, νὰ διποδείξητε ότι $(EB)^2 = (E\Gamma) \cdot (\Delta B)$.

416. Ἀν O εἶναι τὸ μέσον εύθ. τμήματος AB καὶ τὰ σημεῖα Γ , Δ εἶναι άρμονικὰ συζυγῆ πρὸς τὰ A καὶ B , νὰ διποδείξητε ότι:

$$(OA)^2 = (OG) \cdot (OD).$$

§ 226. *Πρόβλημα II. Διδονται δύο ἀνισα ενθύγραμμα τμήματα μ , ν καὶ δρίζονται εἰς Ἐν ἐπιπέδον δύο σημεῖα A καὶ B . Νά δρισθῇ καὶ νὰ γραφῇ δ γεωμετρικὸς τόπος τῶν σημείων M τοῦ αὐτοῦ ἐπιπέδου, διὰ τὰ δοῦλα εἶναι $MA : MB = \mu : \nu$ (σχ. 166).*

Λύσις. Ἐστω M τυχόν σημεῖον τοῦ ζητουμένου τόπου. Ἀν $M\Delta$, ME εἶναι αἱ διχοτόμοι τῆς ἐσωτερικῆς καὶ ἐξωτερικῆς γωνίας M τοῦ τριγώνου AMB ,

Θά εἶναι :

$$\Delta A : \Delta B = MA : MB = \mu : \nu \text{ καὶ}$$


$$EA : EB = MA : MB = \mu : \nu.$$

Ἐπομένως :

$\Delta A : \Delta B = EA : EB = \mu : \nu$, τὰ δὲ σημεῖα Δ καὶ E εἶναι άρμονικὰ συζυγῆ πρὸς τὰ A καὶ B .

Ἐκ τούτων τὸ Δ δρίζομεν καὶ ἀρχικῶς, ἀν διαιρέσωμεν τὸ δοῦλον τμῆμα AB εἰς μέρη ἀνάλογα πρὸς τὰ μ καὶ ν (§ 219). Μετὰ τοῦτο δὲ δρίζομεν καὶ τὸ E (§ 224).

Ωστε τὸ εύθ. τμῆμα ΔE εἶναι τελείως ὠρισμένον κατὰ τὴν θέσιν καὶ τὸ μέγεθος.



Σχ. 166

Ἐπειδὴ δὲ $\widehat{\Delta ME} = 1$ ὁρθ., τὸ Μ κεῖται ἐπὶ τῆς περιφερείας, ἡ ὁποία ἔχει διάμετρον ΔΕ καὶ γράφεται εύκλως.

Ἄν δὲ Μ εἶναι τυχὸν σημεῖον τῆς περιφερείας ταύτης καὶ φέρωμεν τὰς εὐθείας BZ, BH ἀντιστοίχως παραλλήλους πρὸς τὰς ME, MD, θὰ εἶναι $ZBH = \widehat{\Delta ME} = 1$ ὁρθ. καὶ

$$\begin{aligned} \mu : v &= A\Delta : \Delta B = AM : MH \\ \mu : v &= EA : EB = AM : MZ \end{aligned} \quad (1)$$

Ἐκ τούτων ἔπειται ὅτι $MZ = MH$, ἡ δὲ BM εἶναι διάμεσος τοῦ ὁρθ. τριγώνου ZBH καὶ διὰ τοῦτο $BM = MH$ (§ 127 Πόρ. III).

Ἡ α' λοιπὸν τῶν Ισοτήτων (1) γίνεται $\mu : v = AM : BM$, ἥτοι τὸ Μ εἶναι σημεῖον τοῦ ζητούμενου τόπου. Ἐκ τούτων ἔπειται δτι :

Ο ζητούμενος τόπος εἶναι ἡ περιφέρεια, ἡ δποία ἔχει διάμετρον τὸ εὐθ. τμῆμα ΔΕ.

Τοῦτο δὲ δρίζομεν, ὅπως προηγουμένως εἴπομεν.

Σημείωσις. Ἄν μ καὶ ν εἰναι ἀριθμοὶ π. χ. 2 καὶ 3, δρίζομεν εύκλως δύο τμήματα ἔχοντα λόγον 2 : 3 καὶ ἐργαζόμεθα, ὡς προηγουμένως.

§ 227. Πρόβλημα III. Δίδεται εὐθεῖα E, δύο σημεῖα A, B καὶ λόγος $\mu : v$. Νὰ δρισθῶσιν σημεῖα M τῆς E τοιαῦτα, ὥστε νὰ εἶναι $MA : MB = \mu : v$.

Λύσις. Γράφομεν, ὅπως προηγουμένως, τὸν τόπον τῶν σημείων, τῶν δποίων αἱ ἀποστάσεις ἀπὸ τὰ A καὶ B ἔχουσι λόγον $\mu : v$. Προφανῶς τὰ ζητούμενα σημεῖα εἶναι αἱ τομαὶ τοῦ τόπου τούτου καὶ τῆς εὐθείας E. Ἐπομένως οὐδὲν ἢ ἐν ἢ δύο σημείαι τῆς E πληροῦσι τὸ ἐπίταγμα τοῦ προβλήματος.

Ἄν τὰ A, B κεῖνται ἐπὶ τῆς E, τὸ πρόβλημα λύεται καὶ ὡς ἔξῆς : Ὁρίζομεν (§ 219) ἐν σημεῖον M μεταξὺ A καὶ B καὶ ἔπειτα τὸ ἀρμονικὸν συζυγές αὐτοῦ πρὸς τὸ A καὶ B.

Α σκήσεις

417. Νὰ γράψητε τὸν γεωμ. τόπον τῶν σημείων M, διὰ τὰ δποία εἶναι $MA : MB = \frac{2}{3}$. Ἐπειτα δὲ τὸν τόπον τῶν σημείων, διὰ τὰ δποία εἶναι $MB : MA = \frac{2}{3}$.

418. Εἰς μίαν περιφέρειαν νὰ δρίσητε τόξον ΑΒ. 'Επ' αὐτοῦ δὲ νὰ δρίσητε ἐν σημείον Μ τοιοῦτον, ὥστε ἡ χορδὴ ΜΑ νὰ είναι πρὸς τὴν ΜΒ ὡς δοθὲν τμῆμα μ πρὸς ἄλλο δοθὲν ν.

419. Νὰ κατασκευάσητε τρίγωνον ΑΒΓ μὲ βάσιν ΒΓ ἵσην πρὸς 8 ἔκατ., ὅψος 2 ἔκατ. καὶ νὰ είναι ΑΒ:ΑΓ = 3:5.

420. Εἰς δύο σημεῖα Α καὶ Β ἐνεργοῦσι δύο παράλληλοι καὶ ἀντίρροποι δυνάμεις. Ἡ εἰς τὸ Α ἐνεργοῦσα ἔχει ἔντασιν 3 χιλιογρ., ἡ δὲ ἄλλη 2 χιλιογρ. Νὰ δρίσητε τὸ σημείον τῆς ἐφαρμογῆς τῆς συνισταμένης αὐτῶν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'

I. ΟΜΟΙΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΑ ΣΧΗΜΑΤΑ


§ 228. Ποῖα εύθ. σχήματα λέγονται δμοια. "Εστωσαν δύο ισόπλευρα τρίγωνα $AB\Gamma$ καὶ ΔEZ (σχ. 167). Ταῦτα προφανῶς ἔχουσι $A = \Delta$, $B = E$, $\Gamma = Z$. Εἶναι δὲ καὶ

$$\frac{AB}{\Delta E} = \frac{A\Gamma}{\Delta Z} = \frac{B\Gamma}{EZ},$$

διότι οἱ δμώνυμοι δροὶ τῶν λόγων τούτων εἶναι ίσοι.

Διὰ τοὺς λόγους τούτους τὰ δύο ταῦτα τρίγωνα λέγονται δμοια τρίγωνα.

'Ομοίως, ἀν ἐκ τῶν μέσων Δ' καὶ B' τῶν πλευρῶν $A\Delta$ καὶ AB παραλληλογράμμου $AB\Gamma\Delta$ φέρωμεν παραλλήλους πρὸς τὰς AB καὶ $A\Delta$, σχηματίζεται νέον παραλληλόγραμμον $A\Delta'\Gamma'B'$.



Σχ. 167

Τὰ δύο παραλληλόγραμμα $AB\Gamma\Delta$ καὶ $AB'\Gamma'\Delta'$ ἔχουσι τὰς γωνίας αὐτῶν ίσας, μίαν πρὸς μίαν καὶ

$$\frac{AB}{AB'} = \frac{B\Gamma}{B'\Gamma'} = \frac{\Gamma\Delta}{\Gamma'\Delta'} = \frac{A\Delta}{A\Delta'}.$$

Λέγονται δὲ καὶ ταῦτα δμοια σχήματα. "Ωστε :

Δύο εὐθύγραμμα σχήματα λέγονται δμοια, ἀν αἱ πλευραὶ αὐτῶν εἶναι ἀνάλογοι καὶ αἱ γωνίαι ἑκάστου ίσαι, μία πρὸς μίαν, πρὸς τὰς ὑπὸ δμοιόγων πλευρῶν σχηματιζομένας γωνίας τοῦ ἄλλου (§ 211).

Ο λόγος τῶν δμολόγων πλευρῶν δύο δμοίων σχημάτων λέγεται λόγος δμοιότητος αὐτῶν. Π.χ. δ λόγος δμοιότητος τῶν παραπληγογράμμων ΔABC , $\Delta A' B' C'$ εἶναι 2.


Αἱ κορυφαὶ τῶν ἵσων γωνιῶν δύο δμοίων σχημάτων λέγονται δμόδογοι κορυφαῖ.

Αἱ διάμεσοι, διχοτόμοι, ὑψη δμοίων τριγώνων, τὰ δποῖα ἄγονται ἀπὸ δμολόγους κορυφάς, λέγονται δμοίως δμόδογοι διάμεσοι, δμόδογοι διχοτόμοι, δμόδογα ὑψη.

2. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΟΣ ΤΡΙΓΩΝΩΝ

§ 229. Θεώρημα I. "Αν δύο τρίγωνα ΔABC καὶ ΔEFG ξέχωσι τὰς γωνίας ἵσας, μίαν πρὸς μίαν, ταῦτα εἶναι δμοία.

"Αν δηλ. εἶναι $A = \Delta$, $B = E$, $C = G$, τὰ τρίγωνα ΔABC , ΔEFG εἶναι δμοία (σχ. 168).



$$\text{Απόδειξις. } \text{Έπειδὴ } A = \Delta, \text{ εἶναι } \frac{(\Delta AB)}{(\Delta EFG)} = \frac{(\Delta AB)(\Delta AG)}{(\Delta E)(\Delta EZ)} \quad (\S \ 191)$$

$$\gg B = E \quad \gg \quad \frac{(\Delta AB)}{(\Delta EFG)} = \frac{(\Delta AB)(\Delta BG)}{(\Delta E)(\Delta EZ)}$$

$$\text{καὶ } G = Z \quad \gg \quad \frac{(\Delta AB)}{(\Delta EFG)} = \frac{(\Delta BG)(\Delta AG)}{(\Delta EZ)(\Delta AZ)}$$

Από τὰς ισότητας δὲ ταύτας ἔπονται αἱ ισότητες


$$\frac{(\Delta AB)(\Delta AG)}{(\Delta E)(\Delta AZ)} = \frac{(\Delta AB)(\Delta BG)}{(\Delta E)(\Delta EZ)} \text{ καὶ } \frac{(\Delta AB)(\Delta AG)}{(\Delta E)(\Delta AZ)} = \frac{(\Delta BG)(\Delta AG)}{(\Delta EZ)(\Delta AZ)}.$$

Από τὴν α' τούτων προκύπτει δτὶ $\frac{(\Delta AG)}{(\Delta AZ)} = \frac{(\Delta BG)}{(\Delta EZ)}$, ἀπὸ δὲ τὴν β' ἡ ισότης $\frac{(\Delta AB)}{(\Delta E)} = \frac{(\Delta BG)}{(\Delta EZ)}$.

Εἶναι λοιπὸν $\frac{AB}{DE} = \frac{BG}{EZ} = \frac{AG}{AZ}$, ἦτοι τὰ τρίγωνα ταῦτα ἔχουσι τὰς πλευρὰς ἀναλόγους. Έπειδὴ δὲ ἔχουσι καὶ τὰς γωνίας ἵσας, ἔπειται δτὶ εἶναι δμοία ($\S \ 228$).

Σημείωσις. Πρέπει νὰ προσέξωμεν δτὶ δμόδογοι πλευραὶ εἰναι αἱ κείμεναι ἀπέναντι ἵσων γωνιῶν.

Πόρισμα I. "Αν δύο τρίγωνα έχωσι δύο γωνίας ίσας, μίαν πρὸς μίαν, εἶναι δμοια.



Σχ. 169

Πόρισμα II. Τὸ ἐπὶ τὴν ὑποτείνουσαν ψυσ ΑΔ δρθ. τριγώνου $AB\Gamma$ διαιρεῖ αὐτὸν εἰς τρίγωνα δμοια πρὸς ἄλληλα καὶ πρὸς αὐτὸν (σχ. 169).

Πόρισμα III. Ἐκατέρα τῶν καθέτων πλευρῶν δρθογωνίου τριγώνου εἶναι μέση ἀνάλογος τῆς ὑποτείνουσῆς καὶ τῆς προβολῆς τῆς ἐπὶ τὴν ὑποτείνουσαν.

Πόρισμα IV. Τὸ ἐπὶ τὴν ὑποτείνουσαν ψυσ δρθογωνίου τριγώνου εἶναι μέσον ἀνάλογον τῶν τιμημάτων, εἰς τὰ δποῖα διαιρεῖ τὴν ὑποτείνουσαν.

Α σκήσεις

421. Νὰ ἔξετάσητε, ἢν δύο δρθογώνια τρίγωνα μὲ μίαν δξεῖαν γωνίαν ίσην εἶναι ἢ δὲν εἶναι δμοια.

422. Ὁμοίως νὰ ἔξετάσητε, ἢν δύο ίσοσκελῆ τρίγωνα μὲ μίαν γωνίαν ίσην εἶναι πάντοτε δμοια.

423. Νὰ διαιρέσητε τὴν πλευρὰν AB ἐνὸς τριγώνου $AB\Gamma$ εἰς τρία ίσα μέρη $\Delta\Delta$, $\Delta\Gamma$, EB . "Ἐπειτα νὰ φέρητε εύθειαν ΔZ παράλληλον πρὸς τὴν $B\Gamma$, μέχρις οὗ τμῆση τὴν $A\Gamma$ εἰς τι σημεῖον Z . Νὰ εύρητε δὲ τοὺς λόγους $A\Gamma : AZ$ καὶ $\Delta Z : B\Gamma$.

424. "Αν τὸ προηγούμενον τρίγωνον ἔχῃ (AB) = 9 ἑκατ., ($A\Gamma$) = 10 ἑκατ. καὶ ($B\Gamma$) = 15 ἑκατ., νὰ εύρητε τὸ μῆκος τοῦ τμήματος ΔZ . "Αν δὲ φέρητε τὴν ΕΘ παράλληλον πρὸς τὴν $B\Gamma$ καὶ τέμνουσαν τὴν $A\Gamma$ εἰς τὸ Θ, νὰ εύρητε καὶ τὸ μῆκος τοῦ τμήματος ΕΘ.

425. Νὰ κατασκευάσητε ἐν δρθ. τρίγωνον $AB\Gamma$ μὲ καθέτους πλευρᾶς (AB) = 3 ἑκατ. καὶ ($A\Gamma$) = 4 ἑκατ. "Ἐπειτα εἰς τὴν μίαν πλευράν δρθῆς γωνίας Δ νὰ δρίσητε τμῆμα (ΔE) = 6 ἑκατ. καὶ νὰ κατασκευάσητε γωνίαν $\Delta EZ = B$. Νὰ ὑπολογίσητε δὲ τὸ μῆκος τῆς ὑποτείνουσῆς EZ αὐτοῦ.

426. Νὰ ἀποδείξητε τὸ Πυθαγόρειον θεώρημα μὲ τὴν βοήθειαν δμοίων τριγώνων (σχ. 169).

427. Ὁμοίως νὰ ἀποδείξητε τὰ θεωρήματα τῶν §§ 196, 198.

§ 230. Θεώρημα II. "Αν δύο τρίγωνα $AB\Gamma$, ΔEZ έχωσι τὰς πλευρὰς αὐτῶν ἀναλόγους, ταῦτα εἶναι δμοια. "Αν δηλαδὴ


είναι $\frac{AB}{\Delta E} = \frac{BG}{EZ} = \frac{AG}{ZD}$ (1), τὰ τρίγωνα ABG , ΔEZ (σχ. 170) είναι δημοια.

*Α πόδειξις. Ἐπὶ τῆς AB δρίζομεν τμῆμα AH ἴσον πρὸς ΔE καὶ φέρομεν τὴν $H\Theta$ παράλληλον πρὸς τὴν BG . Τὰ τρίγωνα ABG καὶ $AH\Theta$ θὰ είναι δημοια

(§ 229). Θὰ είναι λοιπὸν

$$\frac{AB}{AH} = \frac{BG}{H\Theta} = \frac{AG}{A\Theta}.$$

*Ἐπειδὴ δὲ $AH = \Delta E$, ἐπεταί
δτι $\frac{AB}{\Delta E} = \frac{BG}{H\Theta} = \frac{AG}{A\Theta}$.



Σχ. 170

*Ἐκ τούτων δὲ καὶ τῶν (1)

βλέπομεν δτι $H\Theta = EZ$ καὶ $A\Theta = Z$. Τὰ δὲ τρίγωνα $AH\Theta$ καὶ ΔEZ είναι ἴσαται ἐπομένως $\Delta = A$, $E = H = B$ καὶ $Z = \Theta = G$. Τὰ τρίγωνα λοιπὸν ABG καὶ ΔEZ ἔχουσι καὶ τὰς γωνίας ἴσας, μίαν πρὸς μίαν. *Ἄρα είναι δημοια.

Σημείωσις. *Ἄξιον προσοχῆς είναι δτι ἴσαι γωνίαι είναι αἱ κείμεναι ἀπέναντι δημοιόγων πλευρῶν.

*Α σκήσεις

428. Νὰ δρίσητε τὰ μέσα τῶν πλευρῶν τριγώνου καὶ νὰ σχηματίσητε τὸ τρίγωνον, τὸ δποῖον ἔχει αὐτάς κορυφάς. Νὰ ἔξετάσητε δέ, ἀν τοῦτο είναι δημοιοι ἢ μὴ πρὸς τὸ πρῶτον.

429. *Ἀν δύο τρίγωνα είναι δημοια, νὰ ἀποδείξητε δτι τὰ ὑψη τοῦ ἐνδέ είναι ἀνάλογα πρὸς τὰ ὑψη τοῦ ἄλλου. Νὰ ἔξετάσητε δέ, ἀν ἀληθεύῃ καὶ τὸ ἀντίστροφον.

430. *Εμάθομεν δτι ἀπὸ τὴν Ισότητα τῶν γωνιῶν δύο τριγώνων προκύπτει ἡ ἀναλογία τῶν πλευρῶν καὶ ἀντιστρόφως. Νὰ ἔξετάσητε, ἀν συμβαίνῃ τοῦτο εἰς τετράγωνον καὶ δρθογώνιον μὲ ἀνίσους διαστάσεις. *Ἐπειτα εἰς ρόμβον καὶ τετράγωνον.

§ 231. Θεώρημα III. Κατασκευάζομεν τρίγωνον ΔEZ καὶ γωνίαν A ἴσην πρὸς τὴν Δ . Εἰς δὲ τὰς πλευρὰς τῆς A δρίζομεν τμήματα AB , AG ἀνάλογα πρὸς τὰς πλευρὰς ΔE καὶ ΔZ (π.χ. διπλάσια). Τὰ τρίγωνα ABG καὶ ΔEZ είναι δημοια (σχ. 170).

*Α πόδειξις. *Ἐκ κατασκευῆς είναι $A = \Delta$ καὶ

$$\frac{AB}{\Delta E} = \frac{AG}{\Delta Z} \quad (1)$$

"Αν δὲ δρίσωμεν τμῆμα $AH = \Delta E$ καὶ φέρωμεν τὴν $H\Theta$ παράλληλον πρὸς τὴν $B\Gamma$, θὰ εἶναι $\frac{AB}{AH} = \frac{AG}{A\Theta}$ ἢ $\frac{AB}{AE} = \frac{AG}{A\Theta}$.

'Εκ ταύτης καὶ τῆς (1) ἔπειται δτὶ $A\Theta = \Delta Z$ καὶ ἐπομένως τὰ τρίγωνα $AH\Theta$ καὶ ΔEZ εἶναι ἴσα. Εἶναι λοιπὸν $E = H = B$ καὶ $Z = \Theta = \Gamma$ καὶ τὰ τρίγωνα $AB\Gamma$, ΔEZ εἶναι δμοια (§ 229).

Βλέπομεν λοιπὸν δτὶ:

"Αν μία γωνία τριγώνου εἶναι ὡση πρὸς μίαν γωνίαν ἄλλου τριγώνου καὶ αἱ πλευραὶ τῶν γωνιῶν τούτων εἶναι ἀνάλογοι, τὰ τρίγωνα εἶναι δμοια.

Ασκήσεις.


431. Νὰ κατασκευάσητε δύο δρθ. τρίγωνα μὲ ἀναλόγους καθέτους πλευράς. Νὰ ἔξετασητε δέ, ἂν ταῦτα εἶναι δμοια ἢ μή.

432. Νὰ κατασκευάσητε δύο δμοια τρίγωνα καὶ νὰ γράψητε δύο δμοιών τους διαμέσους αὐτῶν. Νὰ ἀποδείξητε δὲ δτὶ αἰται διαιροῦσι ταῦτα εἰς τρίγωνα δμοια, ἐν πρὸς ἔν.

433. Νὰ γράψητε τὸ ὅψος $A\Delta$ ἐνὸς τριγώνου $AB\Gamma$ καὶ τὰς ΔE , ΔZ ἀντιστοίχως καθέτους ἐπὶ τὰς πλευράς AB , $A\Gamma$. Νὰ ἀποδείξητε δὲ δτὶ τὰ τρίγωνα $AB\Gamma$ καὶ AEZ εἶναι δμοια.

§ 232. Θεώρημα IV. Κατασκευάζομεν τρίγωνον $AB\Gamma$ καὶ ἔπειτα ἄλλο ΔEZ μὲ πλευρὰς παραλλήλους ἢ καθέτους, μίαν πρὸς μίαν, πρὸς τὰς πλευρὰς τοῦ $AB\Gamma$. Τὰ τρίγωνα ταῦτα εἶναι δμοια (σχ. 171).

"Από δειξις. "Εστω δτὶ αἱ AB καὶ ΔE εἶναι παράλληλοι (ἢ κάθετοι) δμοιῶν αἱ $A\Gamma$ καὶ ΔZ καὶ αἱ $B\Gamma$, EZ . Διὰ τοῦτο αἱ γωνίαι π.χ.



Σχ. 171

Α καὶ Δ θὰ εἶναι ἴσαι ἢ παραπληρω-

ματικαὶ (§ 110, 111). Ταῦτα δὲ ἀληθεύουσι καὶ διὰ τὸ ζεύγος τῶν γωνιῶν B , E καὶ τῶν Z , Γ .

Αἱ δυναταὶ λοιπὸν ὑποθέσεις περὶ τῶν γωνιῶν τῶν τριγώνων τούτων εἶναι αἱ ἔξῆς:

$$1\eta. A + \Delta = 2 \text{ δρθ.}, \quad B + E = 2 \text{ δρθ.}, \quad \Gamma + Z = 2 \text{ δρθ.}$$

$$2\alpha. A = \Delta, \quad B + E = 2 \text{ δρθ.}, \quad \Gamma + Z = 2 \text{ δρθ.}$$

$$3\eta. A = \Delta, \quad B = E, \quad \Gamma = Z.$$

"Αν δὲ ἔχωμεν ύπ' ὅψιν δτὶ τὸ ἀθροισμα τῶν 6 τούτων γω-

νιών είναι 4 δρθ, έννοούμεν δτι αί δύο πρωταὶ ύποθέσεις είναι ἀπραγματοποίητοι. Ἀληθεύουσι λοιπὸν αί ισότητες τῆς τελευταῖς σειρᾶς, τὰ δὲ τρίγωνα είναι δμοια (§ 229.)


Σημεῖος. Πρέπει νά προσέξωμεν δτι ἀπέναντι τῶν ίσων γωνιῶν κείνται παράλληλοι (ἢ κάθετοι) πλευραί. Ἐπομένως δμόλογοι πλευραὶ είναι αί παράλληλοι (ἢ αἱ κάθετοι) πλευραί.

"Α σκηνισ

434. Πῶς δυνάμεθα νά εὕρωμεν τὸ κατακόρυφον ὅψος ἐνὸς δένδρου μὲ τὴν χρησιμοποίησιν δμοίων τριγώνων;

3. ΓΕΝΙΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΜΟΙΩΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

§ 233. Θεώρημα I. "Αν φέρωμεν τὰς διαγωνίους δύο δμοίων εὐθύγραμμων σχημάτων $AB\Gamma\Delta E$, $A'B'\Gamma'\Delta'E'$, αἱ δποῖαι διερχονται ἀπὸ δύο δμολόγους κορυφὰς A , A' , τὰ εὐθύγραμμα σχήματα διαιροῦνται εἰς τρίγωνα δμοια, ἐν πρὸς ἐν καὶ δμοίως κείμενα (σχ. 172).



Σχ. 172

Απόδειξις. Κατὰ τὴν ὑπόθεσιν είναι $B = B'$ καὶ

$$\frac{AB}{A'B'} = \frac{BG}{B'G'}.$$

Τὰ τρίγωνα λοιπὸν $AB\Gamma$, $A'B'\Gamma'$ είναι δμοια καὶ ἐπομένως $\varepsilon = \varepsilon'$, $\frac{AG}{A'\Gamma'} = \frac{BG}{B'\Gamma'}$. Ἐπειδὴ δὲ είναι καὶ $\Gamma = \Gamma'$ καὶ $\frac{BG}{B'\Gamma'} = \frac{\Gamma\Delta}{\Gamma'\Delta'}$, θὰ είναι καὶ $\theta = \theta'$, $\frac{AG}{A'\Gamma'} = \frac{\Gamma\Delta}{\Gamma'\Delta'}$.

Ἐκ τούτων ἔπειται δτι τὰ τρίγωνα $A\Gamma\Delta$, $A'\Gamma'\Delta'$ είναι δμοια. Ομοίως ἀποδεικνύομεν δτι καὶ τὰ τρίγωνα $A\Delta E$, $A'\Delta'E'$ είναι δμοια, δ.ἔ.δ.

§ 234. Θεώρημα II. "Αν δύο πολύγωνα ἀποτελοῦνται ἀπὸ τρίγωνα δμοια ἐν πρὸς ἐν καὶ δμοίως κείμενα, ταῦτα είναι δμοια.

"Αν π.χ. τὰ τριγώνα ΑΒΓ, ΑΓΔ, ΑΔΕ είναι άντιστοίχως δμοια πρός τὰ δμοίως κείμενα Α'Β'Γ', Α'Γ'Δ', Α'Δ'Ε', τὰ πολύγωνα ΑΒΓΔΕ, Α'Β'Γ'Δ'Ε' θὰ είναι δμοια.

"Απόδειξις. "Ενεκα τῆς δμοιότητος τῶν τριγώνων ΑΒΓ, ΑΓΔ πρός τὰ Α'Β'Γ', Α'Γ'Δ' είναι $B=B'$, $\epsilon=\epsilon'$, $\theta=\theta'$ καὶ ἐπομένως $\epsilon+\theta=\epsilon'+\theta'$ ή $\Gamma=\Gamma'$. 'Ομοίως ἀποδεικνύομεν ὅτι $\Delta=\Delta'$, $E=E'$, $A=A'$.

"Έχουσι δηλ. τὰ δύο πολύγωνα τάς γωνίας ΐσας, μίαν πρός μίαν.

$$\begin{aligned} \text{Εύκολως ἐπίσης βλέπομεν ὅτι } \frac{\Delta B}{A'B'} &= \frac{B\Gamma}{B'\Gamma'} = \frac{A\Gamma}{A'\Gamma'}, \\ \frac{\Gamma\Delta}{\Gamma'\Delta'} &= \frac{\Delta\Delta}{A'\Delta'} = \frac{A\Gamma}{A'\Gamma'}, \\ \frac{\Delta E}{\Delta'E'} &= \frac{\Delta\Delta}{A'\Delta'} = \frac{AE}{A'E'}. \end{aligned}$$

'Εκ τούτων δὲ ἔπειται ὅτι:

$$\frac{AB}{A'B'} = \frac{B\Gamma}{B'\Gamma'} = \frac{\Gamma\Delta}{\Gamma'\Delta'} = \frac{\Delta E}{\Delta'E'} = \frac{AE}{A'E'},$$

ἥτοι αἱ πλευραὶ τῶν πολυγώνων τούτων είναι ἀνάλογοι. Είναι λοιπὸν ταῦτα δμοια.

§ 235. Σχέσις τοῦ λόγου τῶν περιμέτρων δύο δμοίων εὐθυγράμμων σχημάτων ΑΒΓΔΕ, Α'Β'Γ'Δ'Ε' πρός τὸν λόγον τῆς δμοιότητος αὐτῶν (σχ. 172). "Ενεκα τῆς δμοιότητος τῶν σχημάτων τούτων είναι:

$$\frac{AB}{A'B'} = \frac{B\Gamma}{B'\Gamma'} = \frac{\Gamma\Delta}{\Gamma'\Delta'} = \frac{\Delta E}{\Delta'E'} = \frac{EA}{E'A'}.$$

Κατὰ δὲ τὴν ἴδιότητα (§ 213 ζ') είναι:

$$\frac{AB}{A'B'} = \frac{AB+B\Gamma+\Gamma\Delta+\Delta E+EA}{A'B'+B'\Gamma'+\Gamma'\Delta'+\Delta'E'+E'A'}.$$

Βλέπομεν λοιπὸν ὅτι :

"Ο λόγος τῶν περιμέτρων δύο δμοίων εὐθ. σχημάτων είναι ΐσος πρὸς τὸν λόγον τῆς δμοιότητος αὐτῶν.

Α σκήσεις


435. Αἱ διαστάσεις ἐνὸς δρθιγώνου είναι 5 ἑκατ. καὶ 8 ἑκατ. "Αλλο δὲ δρθιγώνιον δμοιον μὲ αὐτὸ ἔχει δεκαπλασίαν περίμετρον ἀπὸ αὐτό. Νὰ εὕρητε τὰς διαστάσεις τοῦ β' δρθιγώνου.

436. "Εν τριγωνικόν οικόπεδον ἔχει περίμετρον 98 μέτρων καὶ εἰναι δύμοιον πρὸς τρίγωνον μὲ πλευρὰς 3 ἑκατ., 5 ἑκατ., 6 ἑκατ. Νὰ εὕρητε τὰ μῆκη τῶν πλευρῶν τοῦ οικόπεδου τούτου.

437. "Εν λσοσκελές τρίγωνον ἔχει βάσιν 5 μέτ. καὶ περίμετρον 21 μέτρων. Ἀλλο τρίγωνον δύμοιον πρὸς αὐτὸν ἔχει περίμετρον 52,5 μέτ. Νὰ εὕρητε τὸ μῆκος τῆς βάσεως τοῦ τριγώνου τούτου.

§ 236. Πρόβλημα. Νὰ εὑρεθῇ δ λόγος τῶν ἐμβαδῶν δύο δμοίων εὐθ. σχημάτων, ἀν εἶναι γνωστὸς δ λόγος λ τῆς δμοιότητος αὐτῶν.

Λύσις. α') "Εστωσαν πρῶτον δύο δμοία τρίγωνα $AB\Gamma B$ καὶ ΔEZ . (σχ. 173). Ἐπειδὴ ἐνεκα τῆς δμοιότητος αὐτῶν είναι $A = \Delta$, ἐπεται ὅτι




Σχ. 173

$$\frac{(AB\Gamma)}{(\Delta EZ)} = \frac{(AB)(A\Gamma)}{(\Delta E)(\Delta Z)} = \frac{(AB)}{(\Delta E)} \cdot \frac{(A\Gamma)}{(\Delta Z)}.$$

$$\text{'Ἐπειδὴ δὲ } \frac{(AB)}{(\Delta E)} = \frac{(A\Gamma)}{(\Delta Z)} = \lambda, \text{ ἐπεται ὅτι : } \frac{(AB\Gamma)}{(\Delta EZ)} = \lambda^2.$$

β') Τὰ δμοία εὐθ.

σχήματα $AB\Gamma\Delta E$ καὶ $A'B'\Gamma'\Delta'E'$ διαιροῦμεν εἰς τρίγωνα δμοία, ἐν πρὸς ἐν, διὰ τῶν δμολόγων διαγωνίων, τὰς δόποιας ἄγομεν ἀπὸ τὰς δμολόγους κορυφάς A καὶ A' (σχ. 174).



Σχ. 174

Κατὰ δὲ τὴν προηγουμένην περίπτωσιν εἶναι:

$$\frac{(AB\Gamma)}{(A'B'\Gamma')} = \lambda^2, \frac{(A\Gamma\Delta)}{(A'\Gamma'\Delta')} = \lambda^2, \frac{(A\Delta E)}{(A'\Delta'E')} = \lambda^2.$$

$$\text{Εἶναι λοιπὸν } \lambda^2 = \frac{(AB\Gamma)}{(A'B'\Gamma')} = \frac{(A\Gamma\Delta)}{(A'\Gamma'\Delta')} = \frac{(A\Delta E)}{(A'\Delta'E')}.$$

"Αν δὲ ἐφαρμόσωμεν τὴν ίδιότητα (§ 213 ζ'), εύρισκομεν ὅτι :

$$\frac{(AB\Gamma) + (A\Gamma\Delta) + (A\Delta E)}{(A'B'\Gamma') + (A'\Gamma'\Delta') + (A'\Delta'E')} = \lambda^2 \quad \text{ἢ} \quad \frac{(AB\Gamma\Delta E)}{(A'B'\Gamma'\Delta'E')} = \lambda^2.$$

Βλέπομεν λοιπὸν ὅτι :

*Ο λόγος τῶν ἐμβαδῶν δύο δμοίων εὐθ. σχημάτων λσοῦται

πρὸς τὸ τετράγωνον τοῦ λόγου τῆς δμοιότητος αὐτῶν.

Ἐπειδὴ $\lambda = \frac{AB}{A'B'}$, ἡ ἀποδειχθεῖσα ἰσότης γίνεται:

$$\frac{(AB\Gamma\Delta)}{(A'B'\Gamma'\Delta'E')} = \frac{(AB)^2}{(A'B')^2}. \text{ Αὕτη ἐκφράζει ὅτι:}$$

Δύο δμοια εὐθ. σχήματα εἶναι πρὸς ἄλληλα ὡς τὰ τετράγωνα τῶν δμολόγων πλευρῶν αὐτῶν.

Πόρισμα. "Αν αἱ πλευραὶ εὐθ. σχήματος πολλαπλασιασθῶσιν δλαι ἐπὶ λ, αἱ δὲ γωνίαι μείνωσιν δμετάβλητοι, τὸ ἐμβαδὸν αὐτοῦ πολλαπλασιάζεται ἐπὶ λ².

'Α σκήνεις

438. Νὰ κατασκευάσῃς ἐν ἰσόπλευρον τρίγωνον μὲ πλευρὰν 2 ἑκατ. καὶ ἔπειτα ἄλλο ἐννεαπλάσιον αὐτοῦ.

439. Νὰ εὕρητε τὸν λόγον τῆς δμοιότητος ἐνὸς τριγώνου πρὸς ἄλλο διπλάσιον αὐτοῦ.

440. Ἐν δρθογώνιον ἔχει ἐμβαδὸν 24 τετ. μέτρων. Νὰ εὕρητε τὸ ἐμβαδὸν τοῦ τετραπλεύρου, τὸ δποῖον ἔχει κορυφάς τὰ μέσα τῶν ήμίσεων τῶν διαγωνῶν αὐτοῦ.

441. Ἐν τρίγωνον ΑΒΓ ἔχει ἐμβαδὸν 16 τετ. ἑκατ. καὶ $\delta\psi\circs(\Delta\Delta) = 2\sqrt{3}$ ἑκατ. Νὰ δρίσητε ἐπὶ τοῦ ὕψους τούτου ἐν σημείον τοιούτον, δισταῖ, ἀν φέρωμεν ἀπὸ αὐτὸν εὔθεταν παράλληλον πρὸς τὴν βάσιν ΒΓ, νὰ ἀποχωρίζηται τρίγωνον 3 τετ. ἑκατοστομέτρων.

§ 237. Τί εἶναι σχέδιον ἢ σχεδιάγραμμα εὐθυγράμμου σχήματος. "Οταν δ μηχανικὸς θέλῃ νὰ ἀπεικονίσῃ ἐν π.χ. οἰκόπεδον εἰς ἐν φύλλον χάρτου, σχηματίζει εἰς αὐτὸν ἐν σχῆμα πολὺ μικρότερον, δισταῖ, ἀν φέρωμεν ἀπὸ αὐτὸν εὔθεταν παράλληλον πρὸς τὸ φύλλον, ἀλλὰ δμοιον πρὸς τὸ σχῆμα τοῦ οἰκοπέδου.

Αὐτὸν τὸ ἐπὶ τοῦ χάρτου σχῆμα λέγεται σχέδιον ἢ σχεδιάγραμμα τοῦ οἰκοπέδου.

Ο λόγος τῆς δμοιότητος τοῦ σχεδίου πρὸς τὸ ἀπεικονιζόμενον λέγεται ἀριθμητικὴ αλτιμαξ ἢ σμίκρυνσις καὶ ἀναγράφεται πάντοτε εἰς τὸ φύλλον τοῦ σχεδίου. Άι συνηθέστεραι κλιμακες εἶναι κλασματικαὶ μονάδες μὲ παρονομαστὰς δυνάμεις τοῦ 10.

$$\text{Π.χ. } \frac{1}{100}, \frac{1}{1000}, \frac{1}{10000} \text{ κ.τ.λ.}$$

Είναι δὲ φανερὸν δτι ὁ παρονομαστὴς ἔκάστης τοιαύτης κλίμακος φανερώνει πόσας φορὰς ἐν εύθ. τμῆμα τοῦ ἀπεικονιζομένου σχήματος είναι μεγαλύτερον τοῦ ἐν τῷ σχεδίῳ ὅμολόγου. "Αν π.χ. ἡ κλίμαξ είναι $\frac{1}{1000}$, μία δὲ πλευρὰ τοῦ σχεδίου ἔχῃ μῆκος 0,05 μέτ., ἡ ἀντιστοιχὸς πλευρὰ τοῦ ἀπεικονιζομένου ἔχει μῆκος $0,05 \cdot 1000 = 50$ μέτρα.

'Ομοίως, ἀν τὸ ἐμβαδὸν τοῦ σχεδίου είναι ϵ , τὸ δὲ πραγματικὸν E , θά είναι $\frac{E}{\epsilon} = 1000^2$, δθεν $E = \epsilon \cdot 1000^2$. Δηλαδὴ:

Διὰ νὰ εὕρωμεν τὸ ἐμβαδὸν ἀπεικονιζομένου σχήματος, πολλαπλασιάζομεν τὸ ἐμβαδὸν τοῦ σχεδίου ἐπὶ τὸ τετράγωνον τοῦ παρονομαστοῦ τῆς κλίμακος.

Ασκήσεις

442. "Εν δρθιγώνιον οἰκόπεδον ἔχει διαστάσεις 40 μέτ. καὶ 25 μέτ. Νὰ ἀπεικονίσητε αὐτὸν ὑπὸ κλίμακα $\frac{1}{1000}$.

443. Τὸ τρίγωνον ΔEZ (σχ. 173) ἀπεικονίζει ἀγρὸν ὑπὸ κλίμακα $\frac{1}{10000}$. Νὰ εὕρητε τὸ ἐμβαδὸν τοῦ ἀγροῦ τούτου.

444. "Η πλευρὰ ἐνὸς ἴσοπλεύρου τριγώνου ἔχει μῆκος 8 μέτρων. Νὰ ἀπεικονίσητε αὐτὸν μὲ δλλο 10000 φορὰς μικρότερον.


4. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΑΙ ΤΩΝ ΟΜΟΙΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

I. ΔΕΣΜΗ ΕΥΘΕΙΩΝ

§ 238. Θεώρημα. "Αν δύο παράλληλοι εὐθεῖαι E , E' τέμνονται ὑπὸ εὐθειῶν δρχομένων ἐξ ἐνὸς σημείου K , τέμνονται εἰς μέρη ἀνάλογα, δ δὲ λόγος τῶν ἀντιστοιχῶν τμημάτων αὐτῶν εἶναι $\neq 1$. Καὶ ἀντιστρόφως (σχ. 175).

Εἶναι δηλ. $\frac{AB}{A'B'} = \frac{BG}{B'G'} = \frac{GD}{G'D'} \neq 1$.

"Α πόδειξις. Τὰ τρίγωνα KAB καὶ $KA'B'$ ἔχοντα τὰς γωνίας των ἵσας ἀνὰ μίαν εἶναι ὅμοια.



Σχ. 175

"Αρα είναι : $\frac{KA}{KA'} = \frac{AB}{A'B'} = \frac{KB}{KB'} \neq 1.$

*Ομοίως έννοούμεν δτι:

$$\frac{KB}{KB'} = \frac{BG}{B'G'} = \frac{KG}{KG'} \neq 1 \text{ καὶ } \frac{KG}{KG'} = \frac{GD}{GD'} = \frac{KD}{KD'} \neq 1.$$

*Έκ τούτων δὲ συμπεραίνομεν εύκόλως δτι :

$$\frac{AB}{A'B'} = \frac{BG}{B'G'} = \frac{GD}{GD'} = \dots \neq 1. \quad "Ο.ξ.δ.$$

*Αντιστρόφως: "Αν είναι $\frac{AB}{A'B'} = \frac{BG}{B'G'} = \frac{GD}{GD'} = \dots \neq 1$, αι εύθειαι AA', BB', GG' ΔΔ'... διέρχονται διὰ τοῦ αὐτοῦ σημείου.

*Α πόδειξις. Αι εύθειαι AA', BB' τέμνονται εἰς τι σημεῖον K, διότι ἄλλως τὸ σχῆμα AA'B'B θὰ ἦτο παραλληλόγραμμον καὶ $\frac{AB}{A'B'} = 1$, δπερ ἀντίκειται εἰς τὴν ὑπόθεσιν.

"Αν δὲ η KG' τέμνῃ τὴν E εἰς σημεῖον Γ'', ἀποδεικνύομεν εύκόλως δτι $BG = B'G''$, ἀρα τὸ Γ'' συμπίπτει μὲ τὸ Γ.

Τὰ σημεῖα λοιπὸν Γ, Γ', K κείνται ἐπ' εύθειας, ἡτοι η ΓΓ' διέρχεται διὰ τοῦ K. *Ομοίως ἀποδεικνύεται τὸ αὐτὸ καὶ περὶ τῆς ΔΔ'....

Αἱ ἔκ τοῦ αὐτοῦ σημείου K ἀγόμεναι εύθειαι KA, KB, KG, ἀποτελοῦσι δέσμην εύθειῶν.

Αἱ εύθειαι KA, KB, KG.... λέγονται ἀκτῖνες τῆς δέσμης. Τὸ δὲ κοινὸν σημεῖον K τῶν ἀκτίνων λέγεται κέντρον τῆς δέσμης.

*Α σκήσεις

445. Νὰ ἀποδείξητε δτι η ὑπὸ τῶν μέσων τῶν βάσεων τραπεζίου δριζομένη εύθεια διέρχεται ἀπὸ τὸ κοινὸν σημεῖον τῶν μὴ παραλλήλων πλευρῶν αὐτοῦ.

446. Μία εύθεια κινεῖται παραλλήλως πρὸς τὴν πλευρὰν BG τριγώνου AΒG. Νὰ εὕρητε τὸν γεωμ. τόπον τῶν μέσων τῶν τμημάτων αὐτῆς, τὰ δόποια περιέχονται μεταξὺ τῶν ἄλλων πλευρῶν τοῦ τριγώνου τούτου.

§ 239. Πρόβλημα. Νὰ κατασκευασθῇ τετράγωνον ἔχον πρὸς δοθὲν τετράγωνον λόγον ίσον πρὸς τὸν λόγον δύο δοθέντων εὐθ. τμημάτων μ καὶ ν (σχ. 176).

*Ανάλυσις. "Αν ΔZ είναι η πλευρά τοῦ ζητουμένου καὶ α τοῦ δοθέντος τετραγώνου, θὰ είναι $(\Delta Z)^2 : \alpha^2 = \mu : \nu$. (1)

"Αν δὲ κατασκευάσωμεν δρθ. τρίγωνον μὲ καθέτους πλευρᾶς ΔZ καὶ $\Delta E = \alpha$ καὶ φέρωμεν τὸ ἐπὶ τὴν ὑποτείνουσαν ὄψος ΔH , θὰ εἰναι $(\Delta Z)^2 : \alpha^2 = ZH : HE$.

'Εκ ταύτης δὲ καὶ τῆς (1) ἔπειται
ὅτι $ZH : HE = \mu : v$.

"Αν ἔπειτα ἔκ σημείου B τῆς ΔH
φέρωμεν εὐθεῖαν $A\Gamma$ παράλληλον
πρὸς τὴν ZE , θὰ εἰναι $AB : BG = ZH : HE = \mu : v$.

'Εκ τούτων δῆμηούμεθα εἰς τὴν
ἀκόλουθον λύσιν.

Σύνθεσις. 'Ἐπὶ εὐθείας δρίζο-
μεν διαδοχικά καὶ διαρροπα τμήματα AB καὶ BG ἀντιστοίχως
ἴσα πρὸς τὰ δοθέντα μ καὶ v . Μὲ διάμετρον δὲ $A\Gamma$ γράφομεν
ἡμιπεριφέρειαν καὶ ἔκ τοῦ B ὑψοῦμεν κάθετον ἐπὶ τὴν $A\Gamma$ τέ-
μνουσαν τὴν ἡμιπεριφέρειαν εἰς τι σημεῖον Δ .

'Ἐπὶ τῆς εὐθείας δὲ $\Delta\Gamma$ δρίζομεν τμῆμα $\Delta E = \alpha$ καὶ ἕγομεν
τὴν EZ παράλληλον πρὸς τὴν $A\Gamma$. Τὸ τμῆμα ΔZ τῆς εὐθείας
 ΔA εἰναι η πλευρὰ τοῦ ζητουμένου τετραγώνου.

Πράγματι, ἔνεκα τοῦ δρθ. τριγώνου $Z\Delta E$, εἰναι:

$$(\Delta Z)^2 : (\Delta E)^2 = (ZH : HE).$$

'Επειδὴ δὲ $\Delta E = \alpha$ καὶ $ZH : HE = AB : BG = \mu : v$ (\S 238),
ἔπειται ὅτι $(\Delta Z)^2 : \alpha^2 = \mu : v$.

Ασκήσεις

447. Νὰ κατασκευασθῇ τετράγωνον τριπλάσιον δοθέντος τετρα-
γώνου.


448. Νὰ κατασκευασθῇ τετράγωνον ισοδύναμον πρὸς τὰ $\frac{3}{4}$ δοθέν-
τος τετραγώνου.

449. Νὰ κατασκευασθῇ τετράγωνον διπλάσιον δοθέντος δρθογωνίου.

II. ΔΥΝΑΜΙΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΚΥΚΛΟΝ

§ 240. Θεώρημα I. "Αν σημεῖα B, Δ, E, Γ κεῖνται ἐπὶ μιᾶς
περιφερείας, αἱ δὲ χορδαὶ $B\Gamma$ καὶ ΔE τέμνονται εἰς σημεῖον A ,
θὰ εἰναι $(AB)(AG) = (\Delta D)(AE)$. (1)

$$\begin{array}{c} \mu \\ \nu \\ \alpha \end{array}$$



Σχ. 176

Καὶ ἀντιστρόφως: "Αν δὲ θεύη ἡ (1), τὰ σημεῖα B, Γ, Δ, E τῶν εὐθειῶν AB, AD , κεῖνται ἐπὶ τῆς αὐτῆς περιφέρειας (σχ. 177).

Απόδειξις. Εἰς τὰ σχήματα (177 α' καὶ β') βλέπομεν ὅτι $\widehat{A\Gamma\Delta} = \widehat{AEB}$ καὶ $\widehat{\Gamma\Delta\Delta} = \widehat{BAE}$. Τὰ τρίγωνα λοιπὸν ABE καὶ $A\Gamma\Delta$ εἶναι δμοια καὶ ἐπομένως $\frac{AB}{AD} = \frac{AE}{\Gamma A}$. Ἐκ ταύτης δὲ ἐπεταί δι (AB)(AΓ) = (AD)(AE), δ.ξ.δ.

Αντιστρόφως: "Αν δὲ θεύη ἡ (1) καὶ διαιρέσωμεν τὰ μέλη αὐτῆς διὰ τοῦ γινομένου $(A\Gamma)(A\Delta)$, εὑρίσκομεν ὅτι

$$\frac{(AB)}{(AD)} = \frac{(AE)}{(A\Gamma)}.$$


Αἱ πλευραὶ λοιπὸν AB, AE τοῦ τριγώνου ABE εἶναι ἀνάλογοι πρὸς τὰς πλευράς $A\Delta, A\Gamma$ τοῦ τριγώνου $A\Gamma\Delta$. Ἐπειδὴ δὲ αἱ

ὑπὸ αὐτῶν περιεχόμεναι γωνίαι εἶναι ἵσαι, τὰ τρίγωνα ταῦτα εἶναι δμοια καὶ διὰ τοῦτο

$$\widehat{ABE} = \widehat{A\Delta\Gamma},$$

ἄρα $\omega = \phi$ (σχ. 177 β').

Ἡ χορδὴ λοιπὸν ΓE τῆς περιτοῦ τὸ τρίγωνον $B\Gamma E$ περιγε-



Σχ. 177

γραμμένης περιφερείας φαίνεται ἐκ τῶν B καὶ Δ ὑπὸ τὴν αὐτὴν γωνίαν. Ἀρα τὸ Δ κεῖται ἐπὶ τῆς αὐτῆς περιφερείας μὲ τὰ B, Γ, E .

§ 241. Δύναμις σημείου πρὸς κύκλον. Ἀπὸ τὴν προηγουμένην ἰδιότητα ἐπεταί δι, δι' ὧρισμένον σημεῖον A καὶ ὧρισμένην περιφέρειαν K , τὸ γινόμενον $(AB)(A\Gamma)$ εἶναι τὸ αὐτό, οἰσαδήποτε καὶ ἄν εἶναι ἡ τέμνουσα $AB\Gamma$.

Τὸ σταθερὸν τοῦτο γινόμενον λέγεται δύναμις τοῦ A πρὸς τὸν κύκλον K .

"Ἄς παραστήσωμεν διὰ ρ τὴν ἀκτῖνα κύκλου K καὶ διὰ δ τὴν ἀπόστασιν AK δοθέντος σημείου A ἀπὸ τοῦ κέντρου K . Ἡ εὐθεῖα AK τέμνει τὴν περιφέρειαν εἰς δύο σημεῖα Z καὶ H "Αν τὸ A κεῖται ἐκτὸς τοῦ κύκλου K , θά εἶναι

$$AH = AK + KH = \delta + \rho \quad \text{καὶ}$$

$$AZ = AK - KZ = \delta - \rho.$$

"Ἐπομένως $(AB)(AG) = (AZ)(AH) = (\delta - \rho)(\delta + \rho) = \delta^2 - \rho^2$.

"Αν δὲ τὸ A κεῖται ἐντὸς τοῦ κύκλου, διοιώς εὑρίσκομεν δτὶ $(AB)(AG) = \rho^2 - \delta^2$.

"Αν τὸ A κεῖται ἐπὶ τῆς περιφέρειας, εὐκόλως φαίνεται δτὶ $(AB)(AG) = 0$.

Α σκήσεις

450. Ἀπὸ τὸ μέσον χορδῆς μῆκους 0,40 μέτ. ἄγεται ἄλλη χορδὴ, ἡ οποία διαιρεῖται ύπὸ τοῦ μέσου τούτου εἰς δύο μέρη. Τὸ ἐν ἀπὸ αὐτὰ ἔχει μῆκος 0,2 μέτ. Νά εὕρητε τὸ μῆκος τοῦ ἄλλου μέρους τῆς χορδῆς ταύτης.

451. Ἐκ σημείου A ἀπέχοντος τοῦ κέντρου K κύκλου 10 ἑκατ. ἄγεται εὐθεῖα τέμνουσα τὴν περιφέρειαν εἰς τὰ σημεῖα B καὶ G . Νά εὔρεθῇ τὸ μῆκος τῆς χορδῆς BG , ἀν $(AB) = 8$ ἑκατ. καὶ ἡ ἀκτὶς είναι 3 ἑκατοστόμετρα.

452. Ἀν $BΔ$ καὶ $ΓΕ$ εἶναι ὅψη τριγώνου $ABΓ$, νὰ ἀποδείξητε δτὶ $(AB)(AE) = (AG)(AD)$.

453. Ἀν H εἶναι τὸ ὁρόκεντρον τριγώνου $ABΓ$ καὶ $AΔ, BE, ΓΖ$ τὰ ὅψη αὐτοῦ, νὰ ἀποδείξητε δτὶ $(HΔ)(HA) = (HE)(HB) = (HZ)(HG)$.

454. Ἀν τὰ εὐθ. τμήματα $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ συνιστῶσι τὴν ἀναλογίαν $\alpha : \beta = \gamma : \delta$ καὶ εἶναι γνωστὰ τρία οἰδέη ποτε τούτων, νὰ γραφῇ τὸ ὑπολειπόμενον διὰ μεθόδου στηριζομένης ἐπὶ τῆς ιδιότητος § 240.


§ 242. Θεώρημα II. "Αν ἐκ σημείου A ἀχθῇ τέμνονσα $AGΔ$ καὶ ἐφαπτομένη AB δοθέντος κύκλου, θὰ εἶναι

$$(AB)^2 = (AG)(AD).$$

Καὶ ἀντιστρόφως: "Αν ἐπὶ τῆς μιᾶς πλευρᾶς γωνίας A δοι- σθῶσι δύο σημεῖα $G, Δ$, ἐπὶ δὲ τῆς ἄλλης πλευρᾶς ἐν σημείον B οὕτως, ὥστε νὰ εἶναι $(AB)^2 = (AG)(AD)$, ή AB ἐφάπτεται

εις τὸ Β τῆς περιφερείας, ἡ δποία διέρχεται ἀπὸ τὰ σημεῖα B, Γ, Δ (σχ. 178).

*Απόδειξις. Τὰ τρίγωνα $\Delta\Gamma\Delta$ καὶ $\Delta\Gamma\Gamma$ ἔχουσι τὴν γωνίαν A κοινήν καὶ τὴν Δ ἵσην πρὸς τὴν $\Delta\Gamma\Gamma$ (§ 155). Εἶναι λοιπὸν ταῦτα δημοια καὶ ἐπομένως



Σχ. 178

$$\frac{(AB)}{(AB)} = \frac{(AD)}{(AG)},$$

δθεν $(AB)^2 = (AG)(AD)$, δ.ε.δ.

*Ἀντιστρόφως: Διαιροῦντες ἀμφότερα τὰ μέλη τῆς ἴσοτητος $(AB)^2 = (AG)(AD)$ διὰ τοῦ γινομένου $(AB)(AG)$ εύρισκομεν δτι

$$\frac{(AB)}{(AG)} = \frac{(AD)}{(AB)}.$$

*Ἐπειδὴ δὲ τὰ τρίγωνα $\Delta\Gamma\Gamma$ καὶ $\Delta\Gamma\Delta$ ἔχουσι καὶ τὴν γωνίαν A κοινήν, εἶναι δημοια. εἶναι λοιπὸν $\Delta = \widehat{\Gamma}\widehat{B}\Delta$.

"Ἄν δὲ $\Delta\Gamma\Delta$ εἶναι ἐφαπτομένη εἰς τὸ B , θά εἶναι $A = \widehat{\Gamma}\widehat{B}\Delta$ " καὶ ἐπομένως $\widehat{\Gamma}\widehat{B}\Delta = \widehat{\Gamma}\widehat{B}\Delta$, ἡ δὲ $A'B$ συμπίπτει μὲ τὴν AB .

'Ἐφαπτομένη λοιπὸν εἰς τὸ B εἶναι ἡ AB , δ.ε.δ.

Πόροισμα "Ἄν σημεῖον κεῖται ἐκτὸς κύκλου, ἡ δύναμις αὐτοῦ πρὸς τὸν κύκλον τοῦτον ἴσονται πρὸς τὸ τετράγωνον τῆς ἐφαπτομένης, ἣτις ἄγεται ἐξ αὐτοῦ εἰς τὸν κύκλον τοῦτον."

Α σκήσεις

455. Νὰ εὕρητε τὸ μῆκος τῆς ἐφαπτομένης AB κύκλου K ἀκτίνος 8 ἑκατ., ἣτις ἄγεται ἐκ σημείου A ἀπέχοντος τοῦ κέντρου 12 ἑκατ.

456. Ἐπὶ εὐθείας δίδονται τρία σημεῖα A, B, Γ . Νὰ εὕρητε τὸν γεωμ. τόπον τῶν σημείων ἐπαφῆς τῶν ἐφαπτομένων, αἱ δποίαι ἄγονται ἐκ τοῦ Γ εἰς τὰς περιφερείας, αἱ δποίαι διέρχονται διὰ τῶν σημείων A καὶ B .

457. Ἐκ τοῦ σημείου A τῆς περιφερείας K , ἣτις ἔχει ἀκτίνα r , ἄγεται ἐφαπτομένη ταύτης καὶ δρίζεται ἐπ' αὐτῆς τμῆμα AB ἔχον μῆκος $4r$. Νὰ εὕρητε τὴν ἀπόστασιν τοῦ B ἀπὸ ἐκατέρου τῶν σημείων, εἰς τὰ δποίαι ἡ εὐθεία BK τέμνει τὴν περιφέρειαν ταύτην.

458. Νὰ γραφῆ τὸ μέσον ὀνάλογον δύο διθέντων εύθ. τμημάτων α καὶ β διὰ μεθόδου στηριζομένης ἐπὶ τῆς ίδιότητος § 242.

§ 243. Πρόβλημα I. Νὰ κατασκευασθῇ δρθιγώνιον, τοῦ ὅποιον αἱ διαστάσεις ἔχουσι δοθεῖσαν διαφορὰν δ καὶ ίσοδύναμον πρὸς δοθὲν τετράγωνον πλευρᾶς α (σχ. 179).

Λύσις. Μὲ διάμετρον AB ἵσην πρὸς δ γράφομεν περιφέρειον O . Ἐπει-
τα ἄγομεν ἐφαπτομένην ταύτης εἰς τὸ
Α καὶ δρίζομεν ἐπ' αὐτῆς τμῆμα AG τῶν πρὸς α. Μετὰ ταῦτα ἄγομεν τὴν εὐθεῖαν ΓO , ἥτις τέμνει τὴν περιφέρειαν εἰς δύο σημεῖα Δ καὶ E . Τὰ τμήματα $\Gamma\Delta$ καὶ ΓE εἰναι αἱ διαστάσεις τοῦ ζητουμένου δρθιγωνίου.

Διότι προφανῶς εἰναι
 $(AG)^2 = (\Gamma\Delta)(\Gamma E)$ ἢ $\alpha^2 = (\Gamma\Delta)(\Gamma E)$,
ἥτοι τὸ δρθιγώνιον τοῦτο εἰναι ίσοδύ-
ναμον πρὸς τὸ δοθὲν τετράγωνον.

Εἰναι δὲ καὶ $\Gamma E - \Gamma\Delta = \Delta E = AB = \delta$, ἥτοι αἱ διαστάσεις τοῦ αὐτοῦ δρθιγωνίου ἔχουσιν διαφορὰν δ .

"Ηδη ἡ κατασκευὴ τοῦ δρθιγωνίου γίνεται εύκολως.

Μήκη τῶν διαστάσεων. "Αν α καὶ δ εἰναι δοθέντα μήκη, εύ-
ρισκομεν τὰ μήκη τῶν διαστάσεων $\Gamma\Delta$ καὶ ΓE ως ἔξῆς:

'Ἐκ τοῦ δρθ. τριγώνου $O\Gamma A$ ἔπειται δτι:

$$(OG)^2 = (AG)^2 + (OA)^2 = \alpha^2 + \frac{\delta^2}{4} \quad \text{καὶ ἐπομένως}$$

$$(OG) = \frac{1}{2} \sqrt{4\alpha^2 + \delta^2}.$$


$$\text{Ἄρα } (\Gamma\Delta) = (OG) - (OD) = \frac{1}{2} \sqrt{4\alpha^2 + \delta^2} - \frac{\delta}{2}$$

$$\text{καὶ } (\Gamma E) = (OG) + (OE) = \frac{1}{2} \sqrt{4\alpha^2 + \delta^2} + \frac{\delta}{2}.$$

'Α σ κ ή σ εις

459. "Εν δρθιγώνιον ἔχει ἔμβαδὸν 9 τετ. Ἑκατ, αἱ δὲ διαστάσεις τοῦ διαφέρουσι κατὰ 2 ἑκατ. Νὰ εὕρητε τὰ μήκη τῶν διαστάσεων τούτων.

460. Δίδονται δύο εὐθ. τμήματα μὲ μήκη 6 ἑκατ. καὶ 4 ἑκατ. Νὰ κατασκευάσητε τὰς ἀπολύτους τιμάς τῶν ριζῶν τῆς ἔξισώσεως $x^2 - 6x - 16 = 0$.



Σχ. 179

461. Νὰ κατασκευάσητε δρθιογώνιον ἵσοδύναμον πρὸς διοθὲν δρθιογώνιον καὶ αἱ διαστάσεις του νὰ ἔχωσι διοθεῖσαν διαφοράν δ.

§ 244. Πρόβλημα II. (χρονῆ τομῆ).* Νὰ διαιρεθῇ δοθὲν εὐθ. τμῆμα AB εἰς μέσον καὶ ἄκρον λόγον, ήτοι εἰς δύο μέρη, ὃν

A	Γ	B
Σχ. 180		τὸ ἐν εἰναι μέσον ἀνάλογον τοῦ δο-
		θέντος τμήματος καὶ τοῦ ἄλλου μέρους (σχ. 180).

*^Ανάλυσις. ^Αν Γ εἰναι τὸ σημεῖον τῆς διαιρέσεως καὶ θέσωμεν (AB) = α καὶ (AG) = χ , θὰ εἰναι $\alpha : \chi = \chi : (\alpha - \chi)$.

* Ἡ γεωμετρικὴ κατασκευὴ τῆς διαιρέσεως (τομῆς) εύθ. τμήματος εἰς μέσον καὶ ἄκρον λόγον ἐτέθη ὑπὸ τοῦ Εὔκλείδου, δστις ἀσχολεῖται μὲ αὐτὴν εἰς τὸ II καὶ VI βιβλίον τῶν «Στοιχείων» του. Θέτει δὲ τὸ πρόβλημα τοῦτο εἰς τὸ II βιβλίον ὡς ἔξῆς :

Νὰ διαιρεθῇ εὐθ. τμῆμα εἰς δύο μέρη τοιαῦτα, ὥστε τὸ δρθιογώνιον τὸ ἔχον βάσιν τὸ δοθὲν εὐθ. τμῆμα καὶ ὅψιος τὸ ἔτερον τῶν τμημάτων νὰ εἰναι ἵσοδύναμον πρὸς τὸ τετράγωνον τὸ ἔχον πλευρὰν τὸ ἔτερον τμῆμα.

Ο Εύκλειδειος οιδος δρος «εἰς μέσον καὶ ἄκρον λόγον» ἀναφέρεται καὶ ὑπὸ τοῦ Gremona (1114 — 1187) εἰς τὴν ὑπ' αὐτοῦ ἐκδοθεῖσαν μετάφρασιν τῶν ἀραβικῶν σχολίων ἐπὶ τῶν «Στοιχείων» τοῦ Εὐκλείδου, καθὼς καὶ εἰς διάφορα εὐρωπαϊκά σχολικά βιβλία.

Κατὰ τὸ δεύτερον ἡμίσυ τοῦ 13^{ου} αἰώνος δ Novarra εἰς τὴν ὑπ' αὐτοῦ ἐκδοθεῖσαν πλήρη μετάφρασιν τῶν «Στοιχείων» τοῦ Εὐκλείδου θεωρεῖ τὴν διαιρεσιν ταύτην ὡς ἀξιοθαύμαστον γεωμετρικὴν κατασκευὴν καὶ ἀπαραίτητον βοήθημα διὰ τὴν κατασκευὴν τῶν κανονικῶν στερεῶν.

Βραδύτερον (1445 — 1514 περίπου) δ. Luca Pacioli εἰς ἔργον του περὶ κανονικῶν στερεῶν ἔκαμεν εὑρυτάτην χρῆσιν τῆς τομῆς ταύτης καὶ ὀνόμασεν αὐτὴν «θεῖκὴν ἀνάλογίαν».

Ο Ramus, Κέπλερος καὶ ἄλλοι μεταχειρισθέντες τὸν δρον τοῦτον καὶ ἔξ αὐτοῦ πιθανῶς δρμάμενοι προσεπάθησαν νὰ ἀνακαλύψωσιν ἐνυπάρχον τυχὸν μυστήριον εἰς τὴν τομὴν ταύτην.


Απὸ τοῦ 1781 γίνεται χρῆσις καὶ τοῦ δρον «συνεχῆς διαιρεσις». Ο δὲ δρος «χρυσῆ τομῆ» ἔνεφανίσθη τὸ πρῶτον τὸ ἔτος 1835, ὡς ἀναφέρει δ. M. Ohm εἰς σχετικὸν ἔργον του.

Ο Pfeiffer εἰς σχετικὸν ἔργον του ἐκφράζει τὴν ὑπόνοιαν δτι ἡ «χρυσῆ τομῆ» συναντᾶται εἰς τὴν φύσιν (π. χ. εἰς τὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου καὶ τῶν ζώων, εἰς τοὺς κλάδους καὶ τὰ φύλλα τῶν δένδρων κ.τ.λ.) Καὶ ἄλλοι ἐκτὸς τοῦ Pfeiffer διαπιστώσαντες τὴν ὅπαρξιν τῆς χρυσῆς τομῆς θεωροῦσι ταύτην ὡς «βασικὸν δόγμα ὡραιότητος». Τὸ

Ἡ ἔξισωσις δὲ αὕτη εἶναι ἴσοδύναμος πρὸς τὴν ἔξισωσιν
 $\chi^2 + \alpha\chi = \alpha^2$ ή $\chi(\chi + \alpha) = \alpha^2$.

Βλέπομεν λοιπὸν ἐκ ταύτης ὅτι τὸ ἄγνωστον τμῆμα χ εἶ-
 ναι ἡ μικροτέρα τῶν διαστάσεων ὀρθογώνιου ἴσοδυνάμου πρὸς
 τὸ τετράγωνον πλευρᾶς α καὶ τοῦ ὅποιου αἱ διαστάσεις δια-
 φέρουσι κατὰ α . Ἐντεῦθεν
 προκύπτει ἡ ἀκόλουθος
 λύσις.

Σύνθεσις. Ἐκ τοῦ
 ἀκρου B τοῦ δοθέντος τμή-
 ματος AB ὑψοῦμεν κάθετον
 ἐπ' αὐτὸν καὶ ὀρίζομεν ἐπ'
 αὐτῆς τμῆμα BK ἵσον πρὸς
 τὸ ἥμισυ τοῦ AB . Γράφο-
 μεν ἔπειτα τὴν περιφέρειαν
 (K, KB) καὶ ἀγομεν τὴν
 εύθειαν AK (σχ. 181). Αὕτη τέμνει τὴν περιφέρειαν εἰς σημεῖα



Σχ. 181

γεγονὸς ὅτι προκαλεῖται εὐάρεστον συναίσθημα, ὅταν ὁ λόγος τῶν
 διαστάσεων ὀρθογώνιου εἶναι $\frac{8}{13}$ δικαιολογεῖ πως τὴν ἀνωτέρω δύντι-
 ληψιν. Διότι $\frac{8}{13}$ εἶναι κατὰ προσέγγισιν τιμὴ τοῦ ἐνδὸς τῶν μερῶν εὐθ.
 τμήματος μήκους 1 διῃρημένου εἰς μέσον καὶ ἀκρον λόγον.

Ἡ ἀνωτέρω (§ 244) ἔξισωσις $\chi(\chi + \alpha) = \alpha^2$ διὰ $\alpha = 1$ λαμβάνει τὴν
 μορφὴν $\chi = \frac{1}{1+\chi}$ ή τὴν τοῦ συνεχοῦς κλάσματος

$$\chi = \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{\dots}}}}}}$$

ὅθεν εύρίσκονται αἱ διαδοχικῶς καὶ περισσότερον πρὸς τὴν ἀκριβῆ τι-
 μὴν προσεγγίζουσαι τιμαὶ τοῦ χ

$$1, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{5}, \frac{5}{8}, \frac{8}{13}, \frac{13}{21}, \frac{21}{34}, \frac{34}{55}, \dots$$

Δ καὶ Ε, ὃν τὸ α' μεταξὺ Α καὶ Κ. Γράφομεν τέλος τὴν περιφέρειαν (Α, ΑΔ), ἡτις τέμνει τὴν ΑΒ εἰς τὸ ζητούμενον σημεῖον Γ.

³Α πόδειξις. Ἐπειδὴ $(AB)^2 = (AD) \cdot (AE)$ καὶ $AD = AG$, $\Delta E = AB = \alpha$, ἔπειται δτι $\alpha^2 = (AG) \cdot [(AG) + \alpha]$.

³Αν δὲ συγκρίνωμεν ταύτην πρὸς τὴν ἔξισωσιν $\alpha^2 = \chi(\chi + \alpha)$, βλέπομεν δτι $(AG) = \chi$, ἢ δὲ ἀναλογία $\alpha : \chi = \chi : (\alpha - \chi)$ γίνεται $AB : AG = AG : GB$, δ.ε.δ.

³Α σκήσεις


462. Νὰ εὕρητε τὸ μῆκος ἑκατέρου τῶν μερῶν, εἰς τὰ δποῖα εὔθ. τμῆμα μῆκους α διαιρεῖται εἰς μέσον καὶ ἄκρον λόγον.

463. ³Αν εὔθεια ΔΕ παράλληλος πρὸς τὴν πλευρὰν ΒΓ τριγώνου ΑΒΓ διαιρῆται μίαν τῶν ὅπ' αὐτῆς τεμνομένων πλευρῶν εἰς μέσον καὶ ἄκρον λόγον, νὰ ἀποδείξητε δτι θὰ διαιρῇ δμοίως καὶ τὴν ἄλλην πλευράν.

464. ³Απὸ δοθέν σημεῖον Α, τὸ δποῖον κεῖται ἑκτὸς γωνίας ΒΓΔ νὰ φέρηται εὔθειαν, ἢ δποῖα τέμνει πρῶτον τὴν πλευράν ΓΒ εἰς τι σημεῖον Ε καὶ ἔπειτα τὴν ΓΔ εἰς σημεῖον Ζ οὕτως, ώστε τὸ σημεῖον Ε νὰ διαιρῇ τὸ τμῆμα ΑΖ εἰς μέσον καὶ ἄκρον λόγον.

5. ΑΚΤΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙ ΤΡΙΓΩΝΟΝ ΠΕΡΙΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

§ 245. Θεώρημα. Τὸ δρομογώνιον δύο πλευρῶν τριγώνου εἶναι λσοδύναμον πρὸς τὸ δρομογώνιον τοῦ μεταξὺ αὐτῶν περιεχομένου ὑψους καὶ τῆς διαμέτρου τῆς περιγεγραμμένης περιφερείας (σχ. 182).



Σχ. 182

³Α πόδειξις. Ἐκ τῶν δμοίων τριγώνων ΑΒΔ καὶ ΑΓΕ προκύπτει ἢ ἀναλογία $(AB):(AE) = (AD):(AG)$, δθεν $(AB) \cdot (AG) = (AD) \cdot (AE)$, δ.ε.δ.

§ 246. Πρόβλημα. Νὰ ὑπολογισθῇ ἢ ἀκτὶς R τῆς περὶ τρίγωνον ΑΒΓ περιγεγραμμένης περιφερείας ἐκ τῶν πλευρῶν α, β, γ αὐτοῦ.

Λύσις. Κατά τὸ προηγούμενον θεώρημα εἶναι $\beta\gamma = 2Rv$. Ἐκ ταύτης δὲ ἔπειται δτὶ αβγ = 2R αυ. Καὶ ἔπειδὴ αυ = 2E, αὕτη γίνεται $\alpha\beta\gamma = 4RE$. (1)

Ἐκ ταύτης δὲ προκύπτει δτὶ:

$$R = \frac{\alpha\beta\gamma}{4E} \text{ ή } R = \frac{\alpha\beta\gamma}{4\sqrt{\tau(\tau-\alpha)(\tau-\beta)(\tau-\gamma)}}.$$

Ασκήσεις

465. Ἐν τρίγωνον ἔχει πλευράς 4 ἑκατ., 6 ἑκατ., 8 ἑκατ. Νὰ ὑπολογισθῇ τὸ μῆκος τῆς ἀκτίνος τῆς περιγεγραμμένης περιφερείας.

466. Ἐν τὸ δρθογώνιον δύο πλευρῶν τριγώνου εἶναι Ισοδύναμον πρὸς τὸ δρθογώνιον τῆς τρίτης πλευρᾶς καὶ τοῦ ἐπ' αὐτὴν ὅψους, νὰ ἀποδειχθῇ δτὶ τοῦτο εἶναι δρθογώνιον τρίγωνον.

467. Νὰ ἀποδειχθῇ δτὶ διὰ πᾶν τρίγωνον εἶναι

$$Rp = \frac{\alpha\beta\gamma}{4\tau} \text{ καὶ } R Y_\alpha Y_\beta Y_\gamma = 2E^2.$$

Ασκήσεις πρὸς ἐπανάληψιν τοῦ Γ' βιβλίου

468. Ἀπὸ τὸ μέσον μιᾶς καθέτου πλευρᾶς ἐνδὸς δρθ. τριγώνου νὰ φέρητε κάθετον ἐπὶ τὴν ύποτελεύσαν. Νὰ ἀποδείξητε δὲ δτὶ ἡ διαφορὰ τῶν τετραγώνων τῶν δύο τμημάτων, εἰς τὰ δόποια διαιρεῖται ἡ ύποτελεύσα, Ισοῦται πρὸς τὸ τετράγωνον τῆς ἄλλης καθέτου πλευρᾶς.

469. Νὰ γράψητε δύο περιφερείας ἔφαπτομένας ἐκτὸς καὶ μίαν κοινὴν ἔξατερικὴν ἔφαπτομένην αὐτῶν. Νὰ εὕρητε δὲ τὴν ἀπόστασιν τῶν σημείων ἐπαφῆς αὐτῆς συναρτήσει τῶν ἀκτίνων A καὶ α.

470. Ἐν Δ εἶναι ἡ προβολὴ τῆς κορυφῆς A δρθ. τριγώνου ἐπὶ τὴν ύποτελεύσαν BG καὶ A, α, α' αἵ ἀκτίνες τῶν περὶ τὰ τρίγωνα AΒΓ, AΔΒ, AΔΓ περιγεγραμμένων περιφερειῶν, νὰ ἀποδείξητε δτὶ

$$A^2 = \alpha^2 + \alpha'^2.$$

471. Νὰ δρίσητε ἐν σημείον A εἰς μίαν περιφέρειαν K καὶ νὰ φέρητε χορδὴν BG παράλληλον πρὸς τὴν ἀκτίνα KA. Νὰ ἀποδείξητε δὲ $(AB)^2 + (AG)^2 = 4(KA)^2$.

472. Νὰ εὕρητε τὸ ἐμβαδὸν Ισοσκελοῦς τραπεζίου, τοῦ δποίου ἡ. μία βάσις εἶναι 50 μέτ., ἡ ἄλλη 28 μέτ. καὶ ἔκαστη τῶν ἄλλων πλευρῶν 12 μέτρα.

473. Νὰ γράψητε δύο εύθ. τμήματα α καὶ τ. Ἐπειτα δὲ νὰ κατασκευάσητε ἐν δρθογώνιον AΒΓΔ τοιούτον, ώστε νὰ εἶναι

$$(AB\Gamma\Delta) = \alpha^2 \text{ καὶ } AB + BG = \tau.$$

474. Νὰ δρίσητε δύο εύθ. τμήματα AB καὶ ΓΔ. Ἐν $(AB) = 2\alpha$ καὶ

$(\Gamma\Delta) = k$, νά εύρητε τὸν γεωμ. τόπον τῶν σημείων M , διὰ τὰ δποῖα εἰναι $(MA)^2 + (MB)^2 = k^2$.

475. Νά γράψητε μίαν εύθειαν E , ἐν τῷ μῆμα τῷ καὶ νά δρίσητε δύο σημεῖα A, B ἐκτὸς τῆς E κείμενα. Νά δρίσητε ἔπειτα ἐν σημεῖον M τῆς εύθειας E τοιοῦτον, ώστε νά εἰναι $(MA)^2 + (MB)^2 = \tau^2$.

476. Νά γράψητε ἐν εύθ. τῷ μῆμα. "Αν καλέσητε α τὸ μῆκος αὐτοῦ, νά γράψητε ἀλλο εύθ. τῷ μῆμα, τὸ δποῖον νά ἔχῃ μῆκος $\sqrt{12}$ ".

477. Νά κατασκευάσητε δύο ἀνισα τρίγωνα. Ἀπὸ ἐν ὥρισμένον σημεῖον μᾶς πλευρᾶς τοῦ μεγαλυτέρου νά γράψητε εύθειαν, ἡ δποία νά ἀποχωρίζῃ ἀπὸ αὐτὸ τρίγωνον I σοδύναμον πρὸς τὸ μικρότερον.

478. Δίδεται ἐν εύθ. τῷ μῆμα k καὶ δύο σημεῖα A, B εἰς ἀπόστασιν α . Νά εύρητε τὸν γεωμ. τόπον τῶν σημείων M , διὰ τὰ δποῖα εἰναι

$$(MA)^2 - (MB)^2 = k^2.$$

479. Δίδεται εύθεια E , δύο σημεῖα A, B εἰς ἀπόστασιν $(AB) = \alpha$ καὶ ἐκτὸς τῆς E . Νά δρίσητε ἐπ' αὐτῆς σημεῖον M τοιοῦτον, ώστε νά εἰναι $(MA)^2 - (MB)^2 = \frac{\alpha^2}{2}$.

480. Εἰς ἐν τρίγωνον ABC νά ἔγγραψητε κύκλον K . Ἀν δὲ AD εἰναι ἡ διχοτόμος τῆς γωνίας A , νά εύρητε τὸν λόγον $AK : KD$ συναρτήσει τῶν πλευρῶν α, β, γ τοῦ τριγώνου τούτου.

481. Νά γράψητε τὴν διάμεσον AD τριγώνου ABC καὶ νά διχοτομήσῃ τὰς γωνίας ADB ADC . Ἀν E εἰναι ἡ τομὴ τῆς πλευρᾶς AB ἀπὸ τὴν α' διχοτόμον καὶ Z ἡ τομὴ τῆς πλευρᾶς AC ἀπὸ τὴν β' διχοτόμον, νά ἀποδείξητε ὅτι ἡ εύθεια EZ εἰναι παράλληλος πρὸς τὴν BC .

482. Νά διχοτομήσῃ τὴν ἑσωτερικήν καὶ ἑξωτερικήν δρῆται γωνίαιν A ἐνὸς δρῆται τριγώνου ABC . "Εστωσαν δὲ Δ καὶ E ἀντιστοίχως αἱ τομαι τῆς εύθειας BC ὑπὸ τῶν διχοτόμων. Ἀν $AE = AC$, $AD = AB$, νά ἀποδείξητε δτι $(BE)^2 = (EG)(DB)$.

483. "Ἐπὶ εύθειας AB νά δρίσητε δύο σημεῖα G, Δ ἀρμονικὰ συζυγῆ πρὸς τὰ A, B . "Επειτα νά ἀποδείξητε δτι

$$\frac{2}{(AB)} = \frac{1}{(AG)} + \frac{1}{(AD)}.$$

484. Νά γράψητε τὰς διαγωνίους ἐνὸς τραπεζίου $ABCD$ καὶ νά ἀποδείξητε δτι ἡ τομὴ E αὐτῶν διαιρεῖ ἑκάστην εἰς μέρη ἀνάλογα πρὸς τὰς βάσεις.

485. Νά κατασκευάσητε δύο δμοια τρίγωνα καὶ νά γράψητε δύο δμόλογα ὑψη αὐτῶν. Νά ἀποδείξητε δὲ δτι ταῦτα διαιροῦσι τὰ τρίγωνα εἰς μέρη δμοια ἐν πρὸς ἐν καὶ δτι δ λόγος τῶν ὑψῶν τούτων I σοῦται πρὸς τὸν λόγον τῆς δμοιότητος τῶν τριγώνων.

486. Εἰς μίαν περιφέρειαν K ἀκτίνος α νά γράψητε μίαν χορδὴν BC καὶ νά δρίσητε ἐπ' αὐτῆς ἐν σημεῖον A . Νά ἀποδείξητε δὲ δτι

$$(KA)^2 + (AB)(AC) = \alpha^2.$$

487. Νά γράψητε ἐν εύθ. τῷ μῆμα B καὶ νά κατασκευάσητε δρῆται τρί-

γωνον, τοῦ δποίου ή μία κάθετος πλευρά νὰ ἰσοῦται πρὸς τὸ β, ή δὲ ἄλλη νὰ είναι μέση ἀνάλογος τῆς β καὶ τῆς ύποτεινούσης.

488. Εἰς ἐν τρίγωνον νὰ ἔγγράψῃτε τετράγωνον.

489. Νὰ εὕρητε τὸ ἐμβαδὸν τετραγώνου, τὸ δποίον είναι ἔγγεγραμμένον εἰς ἰσόπλευρον τρίγωνον πλευρᾶς α.

490. Νὰ γράψῃτε εὐθεῖαν παράλληλον πρὸς τὰς βάσεις ἐνὸς τριγώνου, ή δποία νὰ διαιρῇ αὐτὸν εἰς δύο μέρη ἀνάλογα πρὸς τὰς ἀντιστοίχους βάσεις αὐτοῦ.

491. Νὰ γράψῃτε τὴν διχοτόμον ΑΔ τῆς γωνίας Α τριγώνου ΑΒΓ καὶ νὰ ἀποδείξητε ὅτι $(AB)(AG) = (AD)^2 + (BD)(DG)$.

492. Στηριζόμενοι εἰς τὴν προηγουμένην ἰσότητα νὰ ἀποδείξητε ὅτι ή AD ἔχει μῆκος $(AD) = \frac{2}{\beta + \gamma} \sqrt{\beta\gamma(\tau - \alpha)}$.

493. Ἐν ή διχοτόμος ΑΔ τριγώνου ΑΒΓ ἰσοῦται πρὸς τὸ τμῆμα BD , νὰ ἀποδείξητε $\alpha^2 = \beta(\beta + \gamma)$.

494. Νὰ γράψῃτε τὴν διχοτόμον ΑΔ τῆς ἔξωτερικῆς γωνίας τριγώνου ΑΒΓ καὶ νὰ ἀποδείξητε ὅτι $(AD)^2 = (DB)(DG) - (AB)(AG)$.

495. Στηριζόμενοι εἰς τὴν προηγουμένην ἰσότητα νὰ ἀποδείξητε ὅτι ή ἔξωτερική διχοτόμος ΑΔ τριγώνου ΑΒΓ ἔχει μῆκος

$$(AD) = \frac{2}{\gamma - \beta} \sqrt{\beta\gamma(\tau - \beta)(\tau - \gamma)}, \text{ ἀν } \gamma > \beta.$$

496. Νὰ γράψῃτε τὰς διχοτόμους ΑΔ, ΑΔ' τῆς ἔσωτερικῆς καὶ ἔξωτερικῆς γωνίας Α τριγώνου ΑΒΓ καὶ ἐπὶ τῶν προεκτάσεων αὐτῶν νὰ λάβητε τμήματα ΔΕ, Δ'E' ἀντιστοίχως ἰσα πρὸς ΑΔ καὶ ΑΔ'. Ἐπειτα δὲ νὰ εὕρητε τὸ ἐμβαδὸν τοῦ τετραπλεύρου ΔΕE'D' συναρτήσει τῶν πλευρῶν τοῦ τριγώνου ΑΒΓ.

497. Εἰς δοθέντα κύκλον νὰ ἔγγράψῃτε τετράπλευρον ΑΒΓΔ καὶ νὰ ἀποδείξητε ὅτι $(AG)(BD) = (AB)(GD) + (BG)(AD)$ (θ. τοῦ Πτολεμαίου).

498. Περὶ δοθέν ἰσόπλευρον τρίγωνον ΑΒΓ νὰ περιγράψῃτε περιφέρειαν καὶ νὰ δρίσητε ἐν σημείον Μ ἐπὶ τοῦ τόξου ΑΓ αὐτῆς. Ἐπειτα δὲ νὰ ἀποδείξητε ὅτι αἱ χορδαὶ ΜΑ, ΜΒ, ΜΓ συνδέονται διὰ τῆς σχέσεως $MB = MA + MG$.

499. Νὰ κατασκευάσητε ἐν ἰσοσκελές τραπέζιον καὶ νὰ ἀποδείξητε ὅτι αἱ διαγώνιοι αὐτοῦ είναι ἰσαι. Ἐπειτα δὲ νὰ ύπολογίσητε τὸ μῆκος τῆς διαγωνίου συναρτήσει τῶν μηκῶν τῶν πλευρῶν τοῦ τραπέζιου.

500. Εἰς μίαν περιφέρειαν ἀκτίνος ρ νὰ δρίσητε διαδοχικά τόξα ΑΒ, ΒΓ. Ἐν αἱ είναι τὸ μῆκος τῆς χορδῆς ΑΒ καὶ β τῆς ΒΓ, νὰ εὕρητε τὸ μῆκος τῆς χορδῆς τοῦ ἀθροίσματος ΑΓ τῶν τόξων ΑΒ καὶ ΒΓ.

501. Ἀπὸ τὸ μῆκος α τῆς χορδῆς ἐνὸς τόξου καὶ ἀπὸ τὴν ἀκτίνα ρ αὐτοῦ νὰ εὕρητε τὸ μῆκος τῆς χορδῆς διπλασίου τόξου.

502. Ἐν τραπέζιον ΑΒΓΔ ἔχει βάσεις ΑΒ καὶ ΓΔ, αἱ δὲ διαγώνιοι

τέμνονται εις σημείον Ε. Νά áποδείξητε ὅτι $(EB\Gamma) = (EA\Delta)$.

503. Εἰς δρθ. τρίγωνον $AB\Gamma$ νὰ ἐγγράψητε κύκλον. "Αν δὲ Δ εἰναι τὸ σημεῖον ἐπαφῆς τῆς ὑποτεινούσης $B\Gamma$, νὰ áποδείξητε ὅτι $(AB\Gamma) = (B\Delta)(\Delta\Gamma)$.

504. Εἰς δοθέντα κύκλον ἀκτίνος ρ νὰ γράψητε δύο καθέτους ἀκτίνας ΟΓ, ΟΔ καὶ νὰ προβάλητε αὐτάς εἰς μίαν διάμετρον. "Αν δὲ ΟΕ, ΟΖ εἰναι αἱ προβολαὶ αὐτῶν, νὰ áποδείξητε ὅτι $(OE)^2 + (OZ)^2 = \rho^2$.

505. Νά γράψητε δύο ἀνίσους περιφερείας Κ, Λ καὶ νὰ φέρητε ἀκτίνας ΚΑ, ΛΒ παραλλήλους καὶ δυμορρόπους. Νά áποδείξητε δὲ ὅτι ἡ τομὴ τῶν εὐθεῶν ΚΛ, ΑΒ εἰναι ἀνεξάρτητος ἀπὸ τὰς ἀκτίνας ταύτας.

506. Τὸ αὐτὸ καὶ ἀν αἱ παραλλήλοι ἀκτίνες εἰναι ἀντίρροποι.

507. "Αν ίσοσκελές τραπέζιον εἰναι περιγεγραμμένον περὶ κύκλον, νὰ áποδείξητε ὅτι ἡ διάμετρος αὐτοῦ εἰναι μέση ἀνάλογος τῶν βάσεων τοῦ τραπεζίου.

508. "Αν ΑΒ καὶ ΓΔ εἰναι αἱ βάσεις τραπεζίου $AB\Gamma\Delta$, νὰ áποδείξητε ὅτι $(AG)^2 + (BD)^2 = (BG)^2 + (AD)^2 + 2(AB)(\Gamma\Delta)$.

509. Νά γράψητε τρεῖς περιφερείας, αἱ ὁποῖαι νὰ τέμνωνται ἀνά δύο. Νά áποδείξητε δὲ ὅτι αἱ κοιναὶ χορδαὶ αὐτῶν διέρχονται ἀπὸ τὸ αὐτὸ σημεῖον.

510. Εἰς ἐν τόξον $B\Gamma$ νὰ δρίσητε σημεῖον Α, νὰ φέρητε τὰς ἀποστάσεις ΑΔ, ΑΗ, ΑΖ τοῦ Α ἀπὸ τὴν χορδὴν $B\Gamma$ καὶ ἀπὸ τὰς ἔφαπτομένας εἰς τὰ σημεῖα Β καὶ Γ. Νά áποδείξητε δὲ ὅτι $(AD)^2 = (AH)(AZ)$.

511. Νά κατασκευάσητε σκαληνὸν τρίγωνον $AB\Gamma$ καὶ ἔπειτα ίσοδύναμον πρὸς αὐτὸ ίσοσκελές τρίγωνον μὲ κοινὴν τὴν γωνίαν Α.

512. Εἰς μίαν εὐθεῖαν νὰ δρίσητε δύο διαδοχικὰ τμήματα $AB, B\Gamma$. "Ἐπειτα νὰ εὕρητε τὸν γεωμ. τόπον τῶν σημείων, ἐξ ἐκάστου τῶν δοποίων ταῦτα φαίνονται ὑπὸ ίσας γωνίας.

513. Νά κατασκευάσητε τρίγωνον $AB\Gamma$ ἀπὸ τὴν πλευρὰν $B\Gamma$, ἀπὸ τὸν λόγον $AB : AG$ καὶ ἀπὸ τὴν διχοτόμον $\Delta\Delta$.

514. Ἐντὸς τριγώνου $AB\Gamma$ νὰ γράψητε εὐθεῖαν παραλλήλον πρὸς τὴν $B\Gamma$, ἡ ὁποία νὰ διαιρῇ αὐτὸ εἰς δύο μέρη ίσοδύναμα.

515. Νά γράψητε περιφέρειαν, ἡ ὁποία νὰ διέρχηται ἀπὸ δύο ὠρισμένα σημεῖα Α, Β καὶ νὰ ἐφάπτηται δοθείσης εὐθείας Ε.

516. Νά γράψητε περιφέρειαν, ἡ ὁποία νὰ διέρχηται ἀπὸ δύο ὠρισμένα σημεῖα Α, Β καὶ νὰ ἐφάπτηται δοθείσης περιφερείας Κ.

517. Νά γράψητε περιφέρειαν, ἡ ὁποία νὰ διέρχηται ἀπὸ δύο δεδομένων εὐθειῶν Ε καὶ Ε'.

BIBLION TETAPTON

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

1. KANONIKA EYTHYGRAMMA SXHMATA

§ 247. Ποῖα λέγονται κανονικὰ εὐθ. σχῆματα. 'Ως γνωστὸν δλαι αἱ πλευραὶ ἐνὸς τετραγώνου εἰναι ἵσαι καὶ δλαι αἱ γωνίαι του εἶναι ἐπίσης ἵσαι. Διὰ τοὺς λόγους τούτους τὸ τετράγωνον λέγεται κανονικὸν σχῆμα.

Διὰ τοὺς αὐτοὺς λόγους ἔν ἰσόπλευρον τρίγωνον εἶναι κανονικὸν σχῆμα. "Ωστε:

"Ἐν εὐθ. σχῆμα λέγεται κανονικόν, ἂν δλαι αἱ πλευραὶ εἶναι ἵσαι καὶ δλαι αἱ γωνίαι αὐτοῦ εἶναι ἐπίσης ἵσαι.

'Ομοιῶς δρίζονται καὶ αἱ κανονικαὶ τεθλασμέναι γραμμαὶ.

'Ασκήσεις

518. "Ἐν κανονικὸν πολύγωνον ἔχει ν πλευράς. Νὰ εὕρητε τὸ μέτρον ἐκάστης γωνίας αὐτοῦ εἰς μέρη δρθῆς.

519. Νὰ εὕρητε τὸ προηγούμενον μέτρον εἰς μοίρας.

2. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ KANONIKΩΝ EYTH. SXHMATΩΝ


§ 248. Θεώρημα I. Πᾶν κανονικὸν εὐθυγραμμον σχῆμα εἶναι ἐγγράψιμον καὶ περιγράψιμον εἰς κύκλον.

'Απόδειξις α') "Εστω ΑΒΓΔΕΖ ἐν κανονικὸν εύθυγρ. σχῆμα (σχ. 183). 'Από τὰς τρεῖς διαδοχικάς κορυφάς Α, Β, καὶ Γ αὐτοῦ διέρχεται μία περιφέρεια. Τὸ κέντρον Κ αὐτῆς δρίζεται, ἂν γραφῶσιν αἱ ΚΛ, ΚΜ ἀντιστοίχως κάθετοι εἰς τὰ μέσα τῶν χορδῶν ΑΒ, ΒΓ.

'Επειδὴ δὲ $KA=KB=KG$ καὶ $AB=BG$, ἔπειται ὅτι $\phi=\epsilon=\rho$.

'Ἐκ τούτων ἔπειται ὅτι $\phi=\epsilon=\frac{B}{2}$.

'Επειδὴ δὲ $B=\Gamma$, θὰ εἰναι καὶ $\rho=\frac{\Gamma}{2}=\sigma$. "Οθεν τὰ τρίγωνα



Σχ. 183

KBG καὶ KGD εἰναι ἵσα καὶ ἐπομένως $KD=KB$. 'Η κορυφὴ λοιπὸν Δ κεῖται ἐπὶ τῆς περιφερείας K . 'Ομοίως ἀποδεικνύομεν τὸ αὐτὸ καὶ διὰ τὰς κορυφάς E καὶ Z . Τὸ σχῆμα λοιπὸν $ABG\Delta EZ$ εἰναι ἐγγράψιμον εἰς κύκλον, δ.ε.δ.

β') 'Επειδὴ αἱ χορδαὶ AB , BG , ..., ZG εἰναι ἵσαι, αἱ ἀποστάσεις KL , KM , ..., τοῦ κέντρου ἀπὸ αὐτὰς εἰναι ἵσαι. Αἱ πλευραὶ λοιπὸν AB , BG κ.τ.λ. ἐφάπτονται τῆς περιφερείας (K, KL), τὸ δὲ σχῆμα $ABG\Delta EZ$ εἰναι περιγεγραμμένον περὶ αὐτήν, δ.ε.δ.

§ 249. Ἀξιοσημείωτα στοιχεῖα κανονικοῦ εύθ. σχήματος.

'Απὸ τὸν τρόπον, κατὰ τὸν ὁποῖον ἔγινεν ἡ ἀπόδειξις τοῦ προηγουμένου θεωρήματος, βλέπομεν ὅτι ἡ ἐγγεγραμμένη καὶ ἡ περιγεγραμμένη περιφέρεια εἰς ἐν κανονικὸν σχῆμα ἔχουσι κοινὸν κέντρον. Τοῦτο λέγεται καὶ *κέντρον* τοῦ κανονικοῦ σχήματος.

Αἱ ἀκτῖνες τῆς περιφερείας, ἡ ὁποία περιγράφεται περὶ ἐν κανονικὸν σχῆμα, λέγονται καὶ *ἀκτῖνες* τοῦ σχήματος τούτου.

'Η ἀπόστασις τοῦ κέντρου ἐνδὸς κανονικοῦ σχήματος ἀπὸ μίαν πλευρὰν αὐτοῦ λέγεται *ἀπόστημα* τοῦ σχήματος τούτου.

Εἶναι δὲ τὸ ἀπόστημα τοῦτο καὶ *ἀκτὶς τῆς ἐγγεγραμμένης περιφερείας*.

'Η γωνία π.χ. AKB τῶν ἀκτίνων KA , KB , αἱ ὁποῖαι καταλήγουσιν εἰς τὰ ἄκρα μιᾶς πλευρᾶς AB , λέγεται *κεντρικὴ* γωνία τοῦ σχήματος $ABG\Delta EZ$.

"Αν δὲ ἐν κανονικὸν σχῆμα ἔχῃ ν πλευράς, περὶ τὸ κέντρον K σχηματίζονται ν ἵσαι κεντρικαὶ γωνίαι. 'Εκάστη λοιπὸν ἔχει μέτρον $\frac{4}{v}$ τῆς δρθῆς γωνίας.

Α σκήσεις

520. Νὰ εὕρητε τὸ μέτρον τῆς κεντρικῆς γωνίας ἐνδὸς ἴσοπλεύρου τριγώνου καὶ ἐνδὸς τετραγώνου.

521. Νὰ εὕρητε τὸ μέτρον τῆς κεντρικῆς γωνίας ἐνδὸς κανονικοῦ ἑξαγώνου καὶ δικταγώνου.


522. Νὰ εὕρητε τὸν ἀριθμὸν τῶν πλευρῶν ἐνδὸς κανονικοῦ σχήματος, τὸ δόποιον ἔχει κεντρικὴν γωνίαν 36° .

§ 250. Θεώρημα II. "Αν περιφέρεια εἶναι διηρημένη εἰς ἵσα τόξα $AB, BG, \dots ZA$, αἱ χορδαὶ τούτων εἶναι πλευραὶ κανονικοῦ ἑγγεγραμμένου σχήματος $ABΓΔΕΖ$ (σχ. 184).

"Α πόδειξις. Αἱ πλευραὶ αὐτοῦ εἶναι προφανῶς ἵσαι. Καὶ αἱ γωνίαι δὲ αὐτοῦ εἶναι ἵσαι, διότι εἶναι ἑγγεγραμμέναι καὶ βαίνουσιν εἰς ἵσα τόξα. Τὸ ἑγγεγραμμένον λοιπὸν σχῆμα $ABΓΔΕΖ$ εἶναι κανονικόν.

§ 251. Θεώρημα III. "Αν περιφέρεια εἶναι διηρημένη εἰς ἵσα τόξα καὶ φέρωμεν ἐφαπτομένας εἰς τὰ σημεῖα τῆς διαιρέσεως, περιγράφεται κανονικὸν εὐθ. σχῆμα.

"Αν π.χ. $\widehat{AB} = \widehat{BG} = \dots = \widehat{ZA}$, τὸ περιγεγραμμένον $HΘΚΙΛΜ$ σχῆμα (σχ. 184) εἶναι κανονικόν.



Σχ. 184


"Α πόδειξις. Γνωρίζομεν (§ 155 Πορ.) δτι $HA = HB$, $θB = θΓ$ κ.τ.λ. Τὰ τρίγωνα λοιπὸν $HAB, θBΓ, IΓΔ$ κ.τ.λ. εἶναι ἴσοσκελῇ μὲν ἵσας βάσεις $AB, BG, ΓΔ$ κ.τ.λ. Αἱ δὲ παρ' αὐτὰς γωνίαι εἶναι ἵσαι. Οὕτω π.χ. $\widehat{HAB} = \omega$, $\widehat{θBΓ} = \phi$. Ἐπειδὴ δὲ $\omega = \phi$, ἔπειται δτι $HAB = θBΓ$. Τὰ ἴσοσκελῇ λοιπὸν ταῦτα τρίγωνα εἶναι ἵσα καὶ ἐπομένως $H = θ = I = K = Λ = M$ καὶ $AH = HB = BG = θΓ$ κ.τ.λ., ἅρα καὶ $HΘ = θI = IK = KΔ = ΔM = MH$. Τὸ σχῆμα λοιπὸν $HΘΙΚΛΜ$ εἶναι κανονικόν.

Σημείωσις. Τὸ περιγεγραμμένον σχῆμα $HΘΙΚΛΜ$ καὶ τὸ ἑγγεγραμμένον $ABΓΔΕΖ$ ἕγγιζουσι τὴν περιφέρειαν εἰς τὰ αὐτὰ σημεῖα. Λέγονται δὲ ταῦτα ἀντίστοιχα σχήματα.

"Ομοίως δρίζονται καὶ αἱ ἀντίστοιχοι τεθλασμέναι γραμμαί.

§ 252. Θεώρημα IV. "Αν δύο κανονικά εύθυγρ. σχήματα έχωσι τὸ αὐτὸ πλήθος πλευρῶν, είναι δμοια. Ὁ δὲ λόγος τῆς δμοιότητος αὐτῶν ισοῦται πρὸς τὸν λόγον τῶν ἀποστημάτων καὶ πρὸς τὸν λόγον τῶν ἀκτίνων αὐτῶν.

"Απόδειξις. α') "Αν τὰ κανονικά εύθυγρ. σχήματα ΑΒΓΔ...Μ, Α'Β'Γ'Δ'...Μ' έχωσιν ἀπὸ ν πλευράς, ἐκάστη γω-



Σχ. 185

$$\text{νία αὐτῶν είναι } \frac{2v - 4}{v}$$

δρθ. (σχ. 185). Είναι λοιπὸν $A = A'$, $B = B'$ κτλ. Ἐπειδὴ δὲ $AB = BG = \Gamma\Delta$ κτλ. καὶ $A'B' = B'\Gamma' = \Gamma'\Delta'$ κτλ., ἔπειται δτι

$$\frac{AB}{A'B'} = \frac{BG}{B'\Gamma'} = \frac{\Gamma\Delta}{\Gamma'\Delta'}$$

κτλ. Είναι λοιπὸν τὰ σχήματα ταῦτα δμοια.

β') Ἐπειδὴ $\widehat{POB} = \frac{\widehat{AOB}}{2} = \frac{2}{v}$ δρθ. καὶ $\widehat{P'O'B'} = \frac{2}{v}$ δρθ, ἔπειται δτι $\widehat{POB} = \widehat{P'O'B'}$, τὰ δὲ δρθ. τρίγωνα $O\Gamma B$, $O'\Gamma' B'$ είναι δμοια. Διὰ τοῦτο δὲ είναι $\frac{OB}{O'B'} = \frac{OP}{O'\Gamma'} = \frac{BP}{\Gamma'B'}$. Είναι δὲ καὶ

$$\frac{PB}{P'B'} = \frac{PB \cdot 2}{P'B' \cdot 2} = \frac{AB}{A'B'}. \text{ "Ωστε:}$$

$$\frac{AB}{A'B'} = \frac{OP}{O'\Gamma'} = \frac{OB}{O'B'}, \quad \delta.\xi.\delta.$$

Ασκήσεις

523. "Αν ἐν κανονικὸν εύθυγρ. σχῆμα ἔχῃ περισσοτέρας ἀπὸ 4 πλευράς, νὰ ἀποδείξῃτε δτι ἐκάστη γωνία του είναι ἀμβλεῖα.

524. "Ἐν κανονικὸν εύθυγρ. σχῆμα ἔχει ἀκτίνα 3 ἑκατ., ἡ δὲ εἰς αὐτὸν ἐγγεγραμμένη περιφέρεια ἔχει ἀκτίνα $\frac{3\sqrt{3}}{2}$. Νὰ εὕρητε τὸ μῆκος τῆς πλευρᾶς αὐτοῦ.

525. "Ο λόγος τῶν ἀκτίνων δύο κανονικῶν ἔξαγώνων είναι 2. Νὰ εὕρητε τὸν λόγον τῶν ἀντιστοίχων περιμέτρων καὶ τὸν λόγον τῶν ἐπιφανειῶν αὐτῶν.

3. ΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΑΙ

§ 253. Πρόβλημα I. Εἰς δοθέντα κύκλον K νὰ ἐγγραφῇ τετράγωνον (σχ. 186).

Λύσις. Κατὰ τὴν ἰδιότητα § 250 πρέπει νὰ διαιρέσωμεν τὴν περιφέρειαν εἰς 4 ἵσα τόξα. Φέρομεν λοιπὸν δύο καθέτους διαμέτρους AB , $ΓΔ$ καὶ τάς χορδάς $ΑΓ$, $ΒΓ$, $ΒΔ$, $ΔΑ$. Οὕτως ἐγγράφεται τὸ τετράπλευρον $ΑΓΒΔ$. Εύκολως δὲ ἀποδεικνύεται δτὶ τοῦτο εἶναι τετράγωνον.

§ 254. Πρόβλημα II. Νὰ εὐρεθῇ τὸ μῆκος τῆς πλευρᾶς τετραγώνου συναρτήσει τῆς ἀκτῖνος τῆς περιγεγραμμένης περιφερείας.

Λύσις. Ἀπὸ τὸ ὁρθ. τρίγωνον $ΑΚΓ$ (σχ. 186) προκύπτει ἡ ἴσσοτης $(ΑΓ)^2 = 2R^2$ καὶ ἐπομένως $(ΑΓ) = R\sqrt{2}$.

'Α σκήσεις

526. Νὰ εὕρητε τὴν περίμετρον καὶ τὸ ἔμβαδὸν τετραγώνου ἀπὸ τὴν ἀκτῖνα τῆς περιγεγραμμένης περιφερείας.

527. Νὰ εὕρητε τὸ ἀπόστημα τετραγώνου ἀπὸ τὴν ἀκτῖνα τῆς περιγεγραμμένης περιφερείας.

528. Ἐν τετράγωνον ἔχει περίμετρον $8\sqrt{2}$ μέτ. Νὰ εὕρητε τὴν ἀκτῖνα τῆς περιγεγραμμένης περιφερείας.


529. Ἐν τετράγωνον ἔχει ἀκτῖνα 3 ἑκατ. Νὰ εὕρητε τὸ ἔμβαδὸν του.

530. Ἐν τετράγωνον ἔχει ἔμβαδὸν 50 τετ. ἑκατοστομέτρων. Νὰ εὕρητε τὴν ἀκτῖνα καὶ τὸ ἀπόστημα αὐτοῦ.


531. Νὰ περιγράψητε τετράγωνον περὶ δοθέντα κύκλον καὶ νὰ εὕρητε τὸ μῆκος τῆς πλευρᾶς του συναρτήσει τῆς ἀκτῖνος τοῦ κύκλου τούτου.

532. Εἰς δοθέντα κύκλον νὰ ἐγγράψητε καὶ νὰ περιγράψητε κανονικὸν ὅκταγωνον.

533. Νὰ ἴχνογραφήσητε τὸ σχῆμα 187 καὶ νὰ χρωματίσητε τὰ μέρη αὐτοῦ κατὰ βούλησιν.




Σχ. 186



Σχ. 187

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής



§ 255. Πρόβλημα III. Εἰς δοθέντα κύκλον K νὰ ἐγγραφῇ κανονικὸν ἔξαγωνον (σχ. 188).

*Ανάλυσις. Ἐστω ὅτι $ABΓΔΕΖ$ εἰναι τὸ ζητούμενον κανονικὸν ἔξαγωνον. Ἡ κεντρικὴ γωνία AKB θὰ εἰναι $\frac{4}{6}$ ἢ $\frac{2}{3}$ δρθ. Αἱ ἄλλαι δὲ γωνίαι τοῦ λοσσκελοῦς τριγώνου AKB θὰ ἔχωσιν ἀθροισμα $2 - \frac{2}{3} = \frac{4}{3}$ δρθ. Ἐκάστη δὲ θὰ εἰναι $\frac{2}{3}$ δρθ.




Τὸ τρίγωνον λοιπὸν AKB εἰναι λογικὸν, ἅρα καὶ λοπλευρον, ἥτοι εἰναι $(AB) = R$.

*Σύνθεσις. Ἐκ τούτων δῆμογούμενοι δρίζομεν διαδοχικὰ τόξα $AB, BG\dots ZA$, δν ἔκαστον ἔχει χορδὴν ἵσην πρὸς τὴν ἀκτῖνα καὶ γράφομεν τὰς χορδὰς ταύτας. Τὸ ύπ' αὐτῶν ἀποτελούμενον σχῆμα $ABΓΔΕΖ$ εἰναι κανονικὸν ἔξαγωνον (§ 250).

Άσκήσεις

534. Νὰ γράψητε ἐν εύθ. τμῆμα καὶ ἔπειτα μὲ πλευρὰν αὐτὸν νὰ κατασκευάσητε κανονικὸν ἔξαγωνον.

535. Εἰς δοθέντα κύκλον νὰ ἐγγράψητε καὶ νὰ περιγράψητε κανονικὸν δωδεκάγωνον.



Σχ. 189

536. Νὰ εὕρητε τὸ ἀπόστημα κανονικοῦ ἔξαγωνου συναρτήσει τῆς πλευρᾶς αὐτοῦ.


537. Τὸ ἀπόστημα ἐνὸς κανονικοῦ ἔξαγωνου εἰναι $3\sqrt{3}$ ἑκατ. Νὰ εὕρητε τὸ μῆκος τῆς πλευρᾶς του.

528. Νὰ εὕρητε τὸ ἐμβαδὸν κανονικοῦ ἔξαγωνου συναρτήσει τῆς πλευρᾶς αὐτοῦ.

539. Νὰ ληνογραφήσητε τὰ σχήματα 189 καὶ νὰ χρωματίσητε τὰ μέρη ἔκαστου κατὰ βούλησιν.

§ 256. Πρόβλημα IV. Εἰς δοθέντα κύκλον νὰ ἐγγραφῇ
Ισόπλευρον τρίγωνον (σχ. 190).

Αὕτις. 'Αφ' οὖ διαιρέσωμεν τὴν περιφέρειαν εἰς 6 ἴσα
τόξα AB, BG, ΓΔ, ΔΕ, EZ, ZA, φέρομεν
τὰς χορδάς τῶν τόξων BΓΔ, ΔEZ καὶ
ΖAB. 'Ἐπειδὴ ἔκαστον τούτων εἶναι $\frac{1}{3}$
τῆς περιφερείας, τὸ τρίγωνον ΔBZ εἶναι
Ισόπλευρον.



Σχ. 190

§ 257. Πρόβλημα V. Νὰ εὑρεθῇ τὸ
μῆκος τῆς πλευρᾶς Ισόπλευρου τριγώνου
συναρτήσει τῆς ἀκτῖνος τῆς περιγεγραμμέ-
νης περιφερείας.

Αὕτις. Τὸ τόξον BΓΔΕ (σχ. 190) εἶναι ἡμιπεριφέρεια, τὸ
δὲ τρίγωνον BΔE δρθογώνιον. Εἶναι λοιπὸν
 $(B\Delta)^2 = (BE)^2 - (\Delta E)^2 = 4R^2 - R^2 = 3R^2$ καὶ ἐπομένως $(B\Delta) = R\sqrt{3}$.

Α σκήσεις

540. Εἰς δοθέντα κύκλον νὰ περιγράψητε Ισόπλευρον τρίγωνον.

541. Νὰ εὕρητε τὸ ἀπόστημα Ισόπλεύρου τριγώνου συναρτήσει
τῆς ἀκτῖνος τῆς περιγεγραμμένης περιφερείας.

542. Νὰ συγκρίνητε τὴν περίμετρον ἐγγεγραμμένου εἰς κύκλον
Ισόπλεύρου τριγώνου πρὸς τὴν περίμετρον τοῦ περὶ τὸν αὐτὸν κύκλον
περιγεγραμμένου Ισόπλεύρου τριγώνου.

543. Νὰ εὕρητε τὴν ἀκτῖνα κύκλου συναρτήσει τῆς πλευρᾶς ἐγγε-
γραμμένου Ισόπλεύρου τριγώνου.

§ 258. Πρόβλημα VI. Εἰς δοθέντα κύκλον νὰ ἐγγραφῇ
κανονικὸν δεκάγωνον.

Ανάλυσις. "Αν ΑΒΔΕΖΗΘΙΛΜ (σχ. 191) εἶναι τὸ ζητού-
μενον, ἡ κεντρικὴ γωνία K θὰ εἶναι $\frac{4}{10}$ δρθ. 'Εκάστη δὲ τῶν
παρὰ τὴν βάσιν γωνιῶν τοῦ Ισοσκελοῦς τριγώνου AKB θὰ εἶναι
 $\frac{8}{10}$ δρθ. "Αν δὲ γράψωμεν τὴν διχοτόμον BΓ τῆς B, θὰ εἶναι

$$\widehat{\Gamma B K} = \widehat{K}, \quad \widehat{A \Gamma B} = \widehat{K} + \widehat{\Gamma B K} = \frac{8}{10} \text{ δρθ.} = \widehat{\Gamma A B}.$$

'Εκ τούτων ἔπειται δτι $K\Gamma = \Gamma B = AB$. 'Αφ' ἐτέρου γνωρίζομεν (§ 221) δτι :

$$KB : AB = K\Gamma : A\Gamma \quad \text{ή} \quad KA : K\Gamma = K\Gamma : A\Gamma.$$

'Εκ ταύτης βλέπομεν δτι τὸ σημεῖον Γ διαιρεῖ τὴν ἀκτῖνα KA εἰς μέσον καὶ ἄκρον λόγον. Εἶναι δὲ $K\Gamma = AB > \Gamma A$, διότι $A\widehat{\Gamma}B > A\widehat{B}\Gamma$. "Ωστε :

"Η πλευρὰ ἐγγεγραμμένου κανονικοῦ δεκαγώνου ἵσοῦται πρὸς τὸ μεγαλύτερον μέρος τῆς ἀκτῖνος διῃρημένης εἰς μέσον καὶ ἄκρον λόγον.

Σύνθετος. Διαιροῦμεν τὴν ἀκτῖνα τοῦ δοθέντος κύκλου εἰς μέσον καὶ ἄκρον λόγον (§ 244). "Επειτα δρίζομεν διαδοχικά τόξα AB, BD, DE κ.τ.λ. ἔκαστον μὲ χορδὴν ἵσην μὲ τὸ μεγαλύτερον μέρος τῆς ἀκτῖνος καὶ συνεχίζομεν εύκόλως.

τὸ μεγαλύτερον μέρος τῆς ἀκτῖνος καὶ συνεχίζομεν εύκόλως.

§ 259. Πρόβλημα VII. Νὰ εὐρεθῇ τὸ μῆκος τῆς πλευρᾶς κανονικοῦ δεκαγώνου συναρτήσει τῆς ἀκτῖνος αὐτοῦ.

Λύσις. "Αν χ εἴναι τὸ ζητούμενον, κατὰ τὰ προηγούμενα θὰ εἴναι $\frac{R}{\chi} = \frac{X}{R - \chi}$. Λύοντες δὲ τὴν ἔξισωσιν ταύτην εύρισκομεν $\chi = \frac{R(-1 + \sqrt{5})}{2}$.

'Από τὰς τιμὰς ταύτας ἡ $\frac{R(-1 - \sqrt{5})}{2}$ είναι ἀπαράδεκτος ως ἀρνητική.


Εἴναι λοιπὸν $\chi = \frac{R}{2} (-1 + \sqrt{5})$.

'Ασκήσεις

544. Νὰ περιγράψητε κανονικὸν δεκάγωνον εἰς δοθέντα κύκλον.

545. Εἰς δοθέντα κύκλον νὰ ἐγγράψητε κανονικὸν πεντάγωνον.

546. Νὰ περιγράψητε κανονικὸν πεντάγωνον εἰς δοθέντα κύκλον.



Σχ. 191

§ 260. Πρόβλημα VIII. Εἰς δοθέντα κύκλου νὰ ἐγγραφῇ
κανονικὸν δεκαπεντάγωνον.

Ἀντίστοιχον τὸ $\frac{1}{6}$ καὶ τὸ $\frac{1}{10}$ τῆς περιφερείας καὶ
παρατηροῦντες ὅτι $\frac{1}{6} - \frac{1}{10} = \frac{1}{15}$ δριζομεν τὸ $\frac{1}{15}$ τῆς περιφε-
ρείας καὶ συνεχίζομεν εύκολως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

ΜΕΤΡΗΣΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΥ

I. ΜΕΤΡΗΣΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ


§ 261. Τί λέγεται μῆκος περιφερείας. "Εστω ΑΒΓ ισό-πλευρον τρίγωνον ἔγγεγραμμένον εἰς κύκλον Ο (σχ. 192). "Αν ἔγγραψωμεν εἰς τὸν κύκλον κανονικὸν ἑξάγωνον, ἐπειτα κανονικὸν δωδεκάγωνον κτλ., παρατηροῦμεν ὅτι ἔκαστον ἔχει περίμετρον μεγαλυτέραν ἀπὸ τὸ προηγούμενον (§ 61). "Ητοι :

'Η περίμετρος ἔγγεγραμμένου εἰς κύκλον κανονικοῦ εὐθ. σχήματος βαίνει ἀπαύστως αὐξανομένη, ἀν δὲ ἀριθμὸς τῶν πλευρῶν αὐτοῦ ἀπαύστως διπλασιάζηται.

Μένει δῆμως ἡ περίμετρος αὕτη πάντοτε μικροτέρα π.χ. ἀπὸ τὴν περίμετρον τοῦ τυχόντος περιγεγραμμένου τριγώνου ΗΘΙ.

Διὰ ταῦτα, ὡς γνωρίζομεν ἀπὸ τὴν "Αλγεβραν, ἡ περίμετρος αὕτη ἔχει ἐν δριον.

'Επειδὴ δὲ αἱ πλευραὶ βαίνουσιν ἀπαύστως ἐλαττού-



Σχ. 192

μεναι καὶ τείνουσι νὰ γίνωσι σημεῖα, ἡ περίμετρος τείνει νὰ συμπέσῃ μὲ τὴν περιφέρειαν. Διὰ τοῦτο :

"Ονομάζομεν μῆκος μιᾶς περιφερείας τὸ δριον, πρὸς τὸ δροῖον τείνει τὸ μῆκος τῆς περιμέτρου κανονικοῦ εὐθ. σχήματος ἔγγεγραμμένου εἰς τὴν περιφέρειαν ταύτην, ἀν δὲ ἀριθμὸς τῶν πλευρῶν αὐτοῦ ἀπαύστως διπλασιάζηται.

Ἡ εὕρεσις τοῦ μήκους μιᾶς περιφερείας στηρίζεται εἰς τὸ ἀκόλουθον θεώρημα τοῦ Ἰπποκράτους τοῦ Χίου*.


§ 262. Θεώρημα. Ὁ λόγος δύο περιφερειῶν *ἴσο* ἔται πεδὸς τὸν λόγον τῶν ἀκτῶν αὐτῶν.

Ἄν δηλ. Γ καὶ γ εἶναι τὰ μήκη δύο περιφερειῶν Κ, κ καὶ R, ρ τὰ μήκη τῶν ἀκτίνων αὐτῶν μετρημένων μὲ τὴν αὐτὴν μονάδα, θά εἶναι $\frac{\Gamma}{γ} = \frac{R}{ρ}$

(σχ. 193).

*Ἀπόδειξις. Καθιστῶμεν τὰς περιφερείας δημοκέντρους καὶ διαιροῦμεν τὴν μίαν εἰς τὰ *ἴσα* ΑΒ, ΒΓ, ΓΔ, ΔΕ, EZ, ΖΑ. Άλις ἀκτίνες ΚΑ, ΚΒ, ..., ΚΖ διαιροῦσι καὶ τὴν ἄλλην περιφέρειαν εἰς *ἴσα* Α'B', B'Γ', ..., Z'A', διότι ἐπ' αὐτῶν βαίνουσιν *ἴσαι* ἐπίκεντροι γωνίας.

Τὰ εύθ. σχήματα ΑΒΓΔΕΖ, Α'B'Γ'Δ'E'Ζ' εἶναι κανονικά καὶ δημοια (§ 250, 252). Ἀν δὲ κληθῶσι Σ καὶ σ αἱ περίμετροι αὐτῶν, θά εἶναι $\frac{\Sigma}{\sigma} = \frac{AB}{A'B'}$.



Σχ. 193

*Ο Ἰπποκράτης ὁ Χίος φέρεται γεννηθεὶς περὶ τὸ ἔτος 470 π.Χ. Κατ' ἀρχὰς ἔξησκει τὸ ἐπάγγελμα τοῦ ἐφοπλιστοῦ. Λέγεται δὲ ὅτι ἡδικήθη ὑπὸ τοῦ ἐν Βυζαντίῳ Ἀθηναϊκοῦ τελωνείου ἢ κατ' ἄλλας πληροφορίας ἐν πλοιόν του συνελήφθη ὑπὸ πειρατῶν. Ἡλθε λοιπὸν εἰς Ἀθήνας, διὰ νὰ διεκδικήσῃ τὸ δίκαιον του. Διήρχετο δὲ τὰς ὥρας τῆς ἀργίας του ἀκούων μαθήματα φιλοσοφίας καὶ τέλος ἰδρυσε καὶ ίδιαν φιλοσοφικὴν σχολήν. Οὕτω δὲ βαθμηδὸν ἔξειλίχθη εἰς ἔνα τῶν ἐνδοξότερων Ἐλήνων γεωμετρῶν.

Τὰ τρία περίφημα προβλήματα, τὸ τοῦ τετραγωνισμοῦ τοῦ κύκλου, τὸ τοῦ διπλασιασμοῦ τοῦ κύβου (Δήλιον πρόβλημα) καὶ τὸ τῆς τριχοτομήσεως τυχούσης γωνίας ἐτέθησαν ἐπὶ τῶν χρόνων τοῦ Ἰπποκράτους. Είναι δὲ γνωστὸν ὅτι ἡ σπουδὴ τῶν προβλημάτων τούτων ὑπῆρξε λίαν γόνιμος εἰς μαθηματικάς ἀνακαλύψεις.

'Επειδὴ δὲ (§ 252) εἶναι καὶ $\frac{R}{\rho} = \frac{AB}{A'B'}$, ἔπειται δτὶ
 $\frac{\Sigma}{\sigma} = \frac{R}{\rho}$. (1)

'Επειδὴ δὲ κατελήξαμεν εἰς τὴν ισότητα ταύτην χωρὶς νὰ λάβωμεν ύπ' ὅψιν τὸν ἀριθμὸν τῶν πλευρῶν τῶν εὐθ. σχημάτων, συμπεραίνομεν δτὶ αὕτη ἀληθεύει καὶ δταν ὁ ἀριθμὸς τῶν πλευρῶν ἀπαύστως διπλασιάζηται.

Εἶναι λοιπὸν $\delta\rho \frac{\Sigma}{\sigma} = \frac{R}{\rho}$ ή $\frac{\delta\rho \cdot \Sigma}{\delta\rho \cdot \sigma} = \frac{R}{\rho}$.

'Επειδὴ δὲ $\delta\rho \Sigma = \Gamma$, $\delta\rho \sigma = \gamma$, ἔπειται δτὶ $\frac{\Gamma}{\gamma} = \frac{R}{\rho}$, δ.ἔ.δ.

Πόρισμα I. 'Ο λόγος περιφερείας πρὸς τὴν διάμετρον αὐτῆς εἶναι σταθερός, ἵτοι δ αὐτὸς δι' ὅλας τὰς περιφερείας.

Πράγματι ἀπὸ τὰς ισότητας $\frac{\Gamma}{\gamma} = \frac{R}{\rho} = \frac{2R}{2\rho}$ προκύπτει ἡ ισότης $\frac{\Gamma}{2R} = \frac{\gamma}{2\rho}$.

'Ο σταθερὸς οὗτος λόγος περιφερείας πρὸς τὴν διάμετρον αὐτῆς παριστάνεται εἰς τὰ συγγράμματα ὅλων τῶν ἔθνῶν μὲ τὸ ἐλληνικὸν γράμμα π (ἀρχικὸν τῆς λέξεως περιφέρεια).*

Πόρισμα II. Τὸ μῆκος τῆς περιφερείας εἶναι γινόμενον τοῦ μῆκους τῆς διαμέτρου αὐτῆς ἐπὶ τὸν ἀριθμὸν π.

Διότι ἐκ τῆς ισότητος $\frac{\Gamma}{2R} = \pi$ προκύπτει δτὶ $\Gamma = 2R\pi$.

'Ασκήσεις

547. Νὰ εὕρητε τὸ μῆκος τῆς περιφερείας ἀκτῖνος 5 μέτρων.

548. Νὰ εὕρητε τὴν ἀκτῖνα περιφερείας, ἡ δποίᾳ ἔχει μῆκος 12,56636 ἑκατοστόμετρα.

* Ιστορικὴ σημείωσις περὶ τοῦ π. Κατὰ τὸ 1761 ὁ μαθηματικὸς Lambert ἀπέδειξεν δτὶ δ π εἶναι ἀσύμμετρος ἀριθμός. Πρῶτος δμως δ μέγας τῆς ἀρχαιότητος μαθηματικὸς Ἀρχιμήδης ὕρισε κατὰ προσέγγισιν τιμὴν αὐτοῦ $\frac{22}{7} = 3,1428$ ἀκριβῶς $3 \frac{10}{71} < \pi < 3 \frac{1}{7}$.

'Ο Πτολεμαῖος εὗρε $\pi = 3,14166\dots$ 'Ο δὲ Ὁλλανδὸς γεωμέτρης L. Me-tius εὗρε $\pi = \frac{325}{115} = 3,1415920$. Διὰ τὰς ἐφαρμογὰς εἶναι ἀρκοῦσα ἡ τιμὴ 3,14159.

549. Νὰ εὕρητε τὸ μῆκος τῆς περιφερείας, ἡ δποία περιγράφεται περὶ κανονικὸν ἔξάγωνον πλευρᾶς 3 ἑκατ.

550. Νὰ εὕρητε τὸ μῆκος τῆς περιφερείας, ἡ δποία ἐγγράφεται εἰς τὸ προηγούμενον ἔξάγωνον.

551. Τὸ μῆκος τῆς περιφερείας, ἡ δποία περιγράφεται περὶ ἔντονον πλευρὸν τρίγωνον, εἰναι 6 π $\sqrt{3}$ παλάμαι. Νὰ εὕρητε τὸ μῆκος τῆς πλευρᾶς αὐτοῦ.

552. Ἐν τετράγωνον ἔχει πλευρὰν 4 $\sqrt{2}$ παλαμῶν. Νὰ εὕρητε τὸ μῆκος τῆς ἐγγεγραμμένης καὶ τῆς περιγεγραμμένης περιφερείας.

553. Νὰ γράψητε δύο περιφερείας καὶ ἔπειτα ὅλην ἵσην πρὸς τὸ ἀθροισμα αὐτῶν.

554. Νὰ γράψητε μίαν περιφέρειαν καὶ ὅλην τριπλασίαν αὐτῆς.

II. ΜΕΤΡΗΣΙΣ ΚΥΚΛΟΥ

§ 263. Τί λέγεται ἐμβαδὸν κύκλου. Ἀν σκεφθῶμεν, ὅπως εἰς τὴν § 261, ἐννοοῦμεν ὅτι:

α') "Αν δ ἀριθμὸς τῶν πλευρῶν ἐγγεγραμμένου εἰς κύκλον κανονικοῦ εὐθ. σχήματος ἀπαύστως διπλασιάζηται, τὸ ἐμβαδὸν αὐτοῦ ἔχει δριον.

β') "Ἡ ἐπιφάνεια τοῦ εὐθ. σχήματος ἀπαύστως αὐξανομένη τείνει νὰ συμπέσῃ μὲ τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ κύκλου.


Διὰ τὸν λόγον τοῦτον δνομάζομεν ἐμβαδὸν κύκλου τὸ δριον, εἰς τὸ δποῖον τείνει τὸ ἐμβαδὸν κανονικοῦ εὐθ. σχήματος ἐγγεγραμμένου εἰς αὐτόν, ἢν δ ἀριθμὸς τῶν πλευρῶν αὐτοῦ ἀπαύστως διπλασιάζηται.

§ 264. Πρόβλημα. Νὰ εὑρεθῇ τὸ ἐμβαδὸν Κ κύκλου συναρτήσει τῆς ἀκτῆς R αὐτοῦ (σχ. 194).

Λύσις. Ἐγγάφομεν εἰς κύκλον Ο κανονικὸν εὐθ. σχῆμα ΑΒΓΔΕΖ καὶ εὐρίσκομεν τὸ ἐμβαδὸν αὐτοῦ.

Πρὸς τοῦτο φέρομεν τὰς ἀκτῖνας εἰς τὰς κορυφὰς του καὶ τὸ ἀπόστημα ΟΠ. Βλέπομεν δὲ ὅτι $(AOB) = \frac{1}{2} (AB)(OP)$, $(BOG) = \frac{1}{2} (BG)(OP)$,

$$\dots, (ZOA) = \frac{1}{2} (ZA)(OP).$$



Σχ. 194

"Αν δὲ προσθέσωμεν ταύτας κατά μέλη, εύρισκομεν δτι
 $(AB\Gamma\Delta EZ) = \frac{1}{2} (\text{ΟΠ}) [(AB) + (B\Gamma) + \dots + (ZA)].$

"Αν δὲ καλέσωμεν Σ τὴν περίμετρον αὐτοῦ, ἡ Ισότης αὕτη γίνεται $(AB\Gamma\Delta EZ) = \frac{1}{2} (\text{ΟΠ}) \cdot \Sigma.$

"Η Ισότης αὕτη ἀληθεύει δσασδήποτε πλευράς καὶ ἀν ἔχῃ τὸ εύθ. σχῆμα. Θά εἶναι λοιπὸν

$$\delta\rho (AB\Gamma\Delta EZ) = \frac{1}{2} \delta\rho (\text{ΟΠ}) \delta\rho \Sigma. \quad (1)$$

"Επειδὴ δὲ $\delta\rho (AB\Gamma\Delta EZ)$ εἶναι τὸ ἐμβαδὸν K τοῦ κύκλου, $\delta\rho \Sigma = \Gamma$ καὶ προφανῶς $\delta\rho (\text{ΟΠ}) = R$, ἡ (1) γίνεται

$$K = \Gamma \cdot \frac{R}{2}. \quad \text{"Ητοι :} \quad (2)$$

Τὸ ἐμβαδὸν κύκλου εἶναι γινόμενον τῆς περιφερείας ἐπὶ τὸ ήμισυ τῆς ἀκτίνος αὐτοῦ.

"Επειδὴ δὲ $\Gamma = 2\pi R$, ἡ Ισότης (2) γίνεται $K = \pi R^2$ (3)
 Βλέπομεν λοιπὸν δτι :

Διὰ νὰ εὑρωμεν τὸ ἐμβαδὸν ἐνδε κύκλου, πολλαπλασιάζομεν τὸ τετράγωνον τῆς ἀκτίνος ἐπὶ π.

Πόρισμα. "Ο λόγος δύο κύκλων ισοῦται πρὸς τὸν λόγον τῶν τετραγώνων τῶν ἀκτίνων αὐτῶν.

Α σκήσεις

555. "Εν κυκλικὸν ἀλώνιον ἔχει ἀκτῖνα 4 μέτρων. Νὰ εὕρητε τὸ ἐμβαδὸν αὐτοῦ.

556. Νὰ εὕρητε τὸ ἐμβαδὸν κύκλου, εἰς τὸν δποῖον ἐγγράφεται κανονικὸν ἑξάγωνον πλευρᾶς 2,5 παλαμῶν.

557. Νὰ εὕρητε τὸ μῆκος τῆς ἀκτίνος κύκλου, δ δποῖος ἔχει ἐμβαδὸν 12,56636 τετ. μέτρα. Νὰ εὕρητε δὲ καὶ τὸ μῆκος τῆς περιφερείας αὐτοῦ.

558. "Εν σημεῖον Α περιφερείας ἀπέχει 6 ἑκατ. ἀπὸ τὸ ξν ἄκρον μιᾶς διαμέτρου $B\Gamma$ καὶ 8 ἑκατ. ἀπὸ τὸ ἄλλο ἄκρον αὐτῆς. Νὰ εὕρητε τὸ ἐμβαδὸν τοῦ κύκλου τούτου.

559. Νὰ σχηματίσητε κύκλον ισοδύναμον πρὸς τὸ ἄθροισμα δύο διθέντων κύκλων.

560. Νὰ σχηματίσητε κύκλον ισοδύναμον πρὸς τὴν διαφορὰν δύο διθέντων κύκλων.

561. Εἰς ἔν τετράγωνον νὰ ἐγγράψητε κύκλον. "Επειτα νὰ εὕρητε

τὸ ἐμβαδὸν τοῦ κύκλου τούτου συναρτήσει τῆς πλευρᾶς α τοῦ τετραγώνου.

562. Νὰ εὕρητε συναρτήσει τῆς πλευρᾶς τοῦ προηγουμένου τετραγώνου τὸ ἐμβαδὸν τῆς ἐπιφανείας αὐτοῦ, ἢ δποίᾳ κεῖται ἔκτὸς τοῦ εἰς αὐτὸ ἐγγεγραμμένου κύκλου.

§ 265. Τὸ πρόβλημα τοῦ τετραγωνισμοῦ τοῦ κύκλου.
'Ονομάζομεν τετραγωνισμὸν ἐνδε κύκλου τὴν κατασκευὴν τετραγώνου ἵσοδυναμον πρὸς τὸν κύκλον τοῦτον.

Απὸ τὴν ἵσοτητα $K = \Gamma \cdot \frac{R}{2}$ ἐννοοῦμεν δτι ἔκαστος κύκλος εἰναι ἵσοδυναμος πρὸς τριγώνον, τὸ δποῖον πρέπει νὰ ἔχῃ βάσιν ἵσομήκη πρὸς τὴν περιφέρειαν καὶ ὑψος ἵσον πρὸς τὴν ἀκτῖνα αὐτοῦ.

"Αν ἐπομένως ἡτο δυνατὴ ἡ κατασκευὴ τοιούτου τριγώνου, θὰ ἡδυνάμεθα νὰ κατασκευάσωμεν δρθογώνιον ἵσοδυναμον μὲ αὐτὸ καὶ ἐπειτα τετράγωνον ἵσοδυναμον πρὸς τὸ δρθογώνιον.

Τὸ πρόβλημα τῆς κατασκευῆς τοιούτου τριγώνου ἀπησχόλησεν ἐπὶ πολλοὺς αἰῶνας τοὺς μαθηματικούς, μέχρις ὅσ τὸ 1882 δ Γερμανὸς μαθηματικὸς Lindemann ἀπέδειξεν δτι ἡ κατασκευὴ αὕτη διὰ τοῦ κανόνος καὶ τοῦ διαβήτου εἰναι ἀδύνατος. "Ο τετραγωνισμὸς λοιπὸν τοῦ κύκλου εἰναι ἀδύνατος.

III. ΜΕΤΡΗΣΙΣ ΤΟΞΟΥ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΩΣ

§ 266. Τί λέγεται μῆκος τόξου. "Αν εἰς ἐν τόξον ἐγγράψωμεν κανονικὴν τεθλ. γραμμήν, ἐπειτα ἄλλην μὲ διπλάσιον ἀριθμὸν πλευρῶν κ.τ.λ, δπως εἰς τὴν § 261, ἐννοοῦμεν δτι τὸ μῆκος τῆς τεθλ. γραμμῆς ἔχει δριον. Τὸ δριον τοῦτο ὀνομάζομεν μῆκος τοῦ τόξου τούτου.

§ 267. *Πρόβλημα.* Νὰ εὑρεθῇ τὸ μῆκος τὸν τόξου μ^ο καὶ ἀκτῖνος R.

Λύσις. "Αν καλέσωμεν Γ τὸ μῆκος τῆς περιφερείας, εἰς τὴν δποίαν ἀνήκει τὸ τόξον, θὰ εἰναι

$$\frac{\tau}{\Gamma} = \frac{\mu}{360} \quad (\S 182 \text{ Πόρ. I}).$$

$$\tau = \Gamma \cdot \frac{\mu}{360} \quad (1)$$

Ἐπειδὴ δὲ $\Gamma = 2\pi R$, ἡ ἰσότης αὕτη γίνεται

$$\tau = \pi R \cdot \frac{\mu}{180} \quad (2)$$

Π. χ. ἐν τόξον 40° καὶ ἀκτῖνος 2 μέτρων ἔχει μῆκος


$$\tau = \pi \cdot \frac{40}{90} = 1,39626 \text{ μέτ.}$$

Ἄσκήσεις

563. Νὰ εὕρητε τὸ μῆκος τόξου 50° καὶ ἀκτῖνος 3 μέτρων.
564. Νὰ εὕρητε τὸ μῆκος τόξου 120° ἀκτῖνος 2 μέτρων.
565. Ἐν τόξον 60° ἔχει μῆκος π ἑκατ. Νὰ εὕρητε τὸ μῆκος τῆς ἀκτῖνος αὐτοῦ.
566. Ἐν τόξον ἀκτῖνος 12 ἑκατ. ἔχει μῆκος 6π ἑκατ. Νὰ εὕρητε τὸ μέτρον αὐτοῦ.
567. Νὰ κατασκευάσητε ἐν ἰσόπλευρον τρίγωνον καὶ μὲ κέντρα τὰς κορυφὰς αὐτοῦ καὶ ἀκτῖνα τὴν πλευράν του νὰ γράψητε τρία τόξα μικρότερα ἡμιπεριφερείας καὶ περατούμενα εἰς δύο κορυφὰς τοῦ τριγώνου ἔκαστον. Νὰ εὕρητε τὸ μῆκος τῆς ὑπ' αὐτῶν ἀποτελουμένης γραμμῆς ἐκ τῆς πλευρᾶς α.

§ 268. Τί λέγεται ἐμβαδὸν κυκλικοῦ τομέως. Ἔστω κυκλικὸς τομεὺς ΟΑΒ καὶ ΑΓΔΒ μία κανονικὴ τεθλ. γραμμὴ ἐγγεγραμμένη εἰς τὸ τόξον τοῦ τομέως τούτου (σχ. 195).

Αὐτὴ ἡ τεθλ.. γραμμὴ καὶ αἱ ἀκτῖνες ΟΑ, ΟΒ ἀποτελοῦσιν ἔνα πολυγωνικὸν τομέα ΟΑΓΔΒ. Ἀν ἐγγράψωμεν εἰς τὸ τόξον τοῦ τομέως ἄλλην τεθλ. γραμμὴν μὲ διπλάσιον ἀριθμὸν πλευρῶν κ.τ.λ, δπως εἰς τὴν § 261, ἐννοοῦμεν δτι ὁ πολυγωνικὸς τομεὺς ἔχει δριον. Τὸ δριον τοῦτο δνομάζομεν ἐμβαδὸν τοῦ κυκλικοῦ τομέως ΟΑΒ.



Σχ. 195

§ 269. Πρόβλημα. Νὰ εὑρεθῇ τὸ ἐμβαδὸν καὶ κυκλικοῦ τομέως μῷ καὶ ἀκτῖνος R.

Λύσις. Ἀν ἐγγράψωμεν εἰς τὴν βάσιν τοῦ τομέως κανονικὴν τεθλ. γραμμὴν καὶ ἐργασθῶμεν, δπως εἰς τὴν § 264, εύρισκομεν δτι : $\kappa = \tau \cdot \frac{R}{2}$. Ἡτοι :

Τὸ ἐμβαδὸν κυκλικοῦ τομέως εἶναι γινόμενον τοῦ μήκους τοῦ τόξου αὐτοῦ ἐπὶ τὸ ἥμισυ τῆς ἀκτῖνος.

$$\text{Ἐπειδὴ δὲ } \tau = \pi R \cdot \frac{\mu}{180}, \text{ ἡ προηγουμένη ἴσοτης γίνεται} \\ \kappa = \pi R \cdot \frac{R}{2} \cdot \frac{\mu}{180} \quad \text{ἢ} \quad \kappa = \pi R^2 \cdot \frac{\mu}{360}. \quad (2)$$

'Α σκήσεις

568. Νὰ κατασκευάσητε κυκλικὸν τομέα 60° καὶ ἀκτῖνος 4 ἑκατ. Νὰ εὕρητε δὲ ἔπειτα τὸ ἐμβαδὸν αὐτοῦ.

569. Μὲ κέντρον τὴν μίαν κορυφὴν ἴσοπλεύρου τριγώνου καὶ ἀκτῖνα τὴν πλευράν αὐτοῦ νὰ γράψητε τόξον περιεχόμενον μεταξὺ τῶν διλλων κορυφῶν καὶ μικρότερον ἥμιπεριφερείας. Νὰ εὕρητε δὲ τὸ ἐμβαδὸν τοῦ σχηματιζομένου τομέως συναρτήσει τῆς πλευρᾶς α τοῦ τριγώνου.

570. Εἰς κυκλικὸς τομεὺς 30° ἔχει ἐμβαδὸν $\frac{3\pi}{4}$ τετρ. παλάμας. Νὰ εὕρητε τὸ μῆκος τῆς ἀκτῖνος καὶ τῆς βάσεως αὐτοῦ.

571. Εἰς κυκλικὸν τομέα 90° καὶ ἀκτῖνος 5 ἑκατ. νὰ φέρητε τὴν χορδὴν τῆς βάσεως αὐτοῦ. Νὰ ὑπολογίσητε δὲ τὸ ἐμβαδὸν τοῦ σχηματιζομένου ἐντὸς αὐτοῦ κυκλικοῦ τμήματος.

572. Εἰς κυκλικὸς τομεὺς ἔχει ἀκτῖνα 3 μέτρων καὶ ἐμβαδὸν $\frac{9\pi}{4}$ τετ. μέτρων Νὰ εὕρητε τὸ μέτρον τῆς γωνίας αὐτοῦ.

'Ασκήσεις πρὸς ἑπανάληψιν τοῦ Δ' βιβλίου

573. Νὰ δρίσητε ποῖον κανονικὸν εύθ. σχῆμα ἔχει γωνίαν $\frac{10}{7}$ δρθ.

574. Ἐν κανονικὸν εύθ. σχῆμα ἔχει ἀκτῖνα R , πλευράν α καὶ ἀπόστημα r . Νὰ ἀποδείξητε δτὶ $4(R^2 - r^2) = a^2$.

575. Ἐντὸς ἑνὸς κανονικοῦ εύθ. σχήματος νὰ δρίσητε ἐν σημεῖον καὶ νὰ ἀποδείξητε δτὶ τὸ ἀθροισμα τῶν ἀποστάσεων αὐτοῦ ἀπὸ τὰς πλευράς είναι σταθερόν.

576. Νὰ εὕρητε τὸ ἀπόστημα καὶ τὸ ἐμβαδὸν κανονικοῦ εύθ. σχήματος ἀπὸ τὴν πλευρὰν καὶ ἀπὸ τὴν ἀκτῖνα αὐτοῦ.

577. Νὰ εὕρητε τὸ μῆκος τῆς πλευρᾶς κανονικοῦ εύθ. σχήματος περιγεγραμμένου εἰς κύκλον ἀκτῖνος R , ἀν δὲ πλευρὰ τοῦ ἀντιστοίχου ἐγγεγραμμένου είναι a . Νὰ ἐφαρμόσητε τὸ ἔξαγόμενον εἰς περιγεγράμμένον κανονικὸν ἔξαγωνον ἢ τρίγωνον.

578. Ἀπὸ τὴν πλευρὰν α κανονικοῦ εύθ. σχήματος καὶ ἀπὸ τὴν ἀκτῖνα R αὐτοῦ νὰ εὕρητε τὴν πλευρὰν τοῦ εἰς τὸν αὐτὸν κύκλον ἐγγε-

γραμμένου κανονικοῦ εύθ. σχήματος, τὸ δποῖον ἔχει διπλάσιον ἀριθμὸν πλευρῶν.

579. Ἀπὸ τὴν πλευρὰν α κανονικοῦ εύθ. σχήματος καὶ ἀπὸ τὴν ἀκτίνα R αὐτοῦ νὰ εὕρητε τὴν πλευρὰν τοῦ εἰς τὸν αὐτὸν κύκλον ἐγγεγραμμένου κανονικοῦ εύθ. σχήματος, τὸ δποῖον ἔχει ἡμισυν ἀριθμὸν πλευρῶν.

580. Νὰ ἐγγράψητε εἰς κύκλον τετράγωνον AΓΒΔ, νὰ προεκτείνητε τὴν πλευράν ΒΓ κατὰ τὴν φοράν Β πρὸς Γ καὶ κατὰ τμῆμα ΓΕ ἵσον πρὸς τὴν πλευράν ΑΓ. Νὰ γράψητε τὴν εὐθείον ΑΕ καὶ νὰ ἀποδείξητε ὅτι αὕτη ἐφάπτεται εἰς τὸ Α τῆς περιγεγραμμένης περιφερείας καὶ ἰσοῦται πρὸς τὴν διάμετρον αὐτῆς.

581. Νὰ ἀποδείξητε ὅτι τὸ ἐμβαδὸν E περιγεγραμμένου ἰσοπλεύρου τριγώνου εἶναι τετραπλάσιον τοῦ ἐμβαδοῦ ε τοῦ ἀντιστοίχου ἐγγεγραμμένου.

582. Νὰ προεκτείνητε τὰς πλευρᾶς AB καὶ ΓΔ κανονικοῦ ἔξαγώνου ABΓΔEZ, μέχρις οὗ συναντηθῶσιν εἰς τι σημεῖον H. Νὰ ἀποδείξητε δὲ ὅτι τὸ τρίγωνον HAΔ εἶναι ἰσόπλευρον.

583. Νὰ εὕρητε τὸ ἀπόστημα KΗ κανονικοῦ δεκαγώνου συναρτήσει τῆς ἀκτίνος αὐτοῦ.

584. Νὰ εὕρητε τὸ ἐμβαδὸν κανονικοῦ δεκαγώνου συναρτήσει τῆς ἀκτίνος αὐτοῦ.

585. Νὰ εὕρητε τὸ μῆκος τῆς πλευρᾶς κανονικοῦ δκταγώνου συναρτήσει τῆς ἀκτίνος αὐτοῦ.

586. Νὰ εὕρητε τὸ ἐμβαδὸν κανονικοῦ δκταγώνου συναρτήσει τῆς ἀκτίνος αὐτοῦ.

587. Νὰ εὕρητε τὸ μῆκος τῆς πλευρᾶς κανονικοῦ δωδεκαγώνου συναρτήσει τῆς ἀκτίνος αὐτοῦ.

588. Νὰ εὕρητε τὸ ἐμβαδὸν κανονικοῦ δωδεκαγώνου συναρτήσει τῆς ἀκτίνος αὐτοῦ.

589. Ἐν τόξον $20^{\circ} 20'$ ἔχει ἀκτῖνα 2 ἑκατ. Νὰ εὕρητε τὸ μῆκος αὐτοῦ.

590. Ἐν τόξον ἔχει ἀκτῖνα 2 ἑκατ. καὶ μῆκος $\frac{41\pi}{180}$ ἑκατ. Νὰ εὕρητε τὸ μέτρον τῆς γωνίας του.

591. Νὰ γράψητε δύο δμοκέντρους περιφερείας καὶ ἐκ σημείου A τῆς ἔξωτερικῆς περιφερείας νὰ φέρητε ἐφαπτομένην AB τῆς ἔσωτερικῆς (Β σημεῖον ἐπαφῆς). Νὰ εὕρητε τὸ ἐμβαδὸν τοῦ μεταξὺ αὐτῶν περιεχομένου δακτυλίου συναρτήσει τοῦ τμήματος AB.

592. Εἰς τὸν αὐτὸν κύκλον εἶναι ἐγγεγραμμένον τετράγωνον καὶ κανονικὸν ἔξαγωνον. Τὸ ἐμβαδὸν τοῦ ἔξαγώνου εἶναι μεγαλύτερον ἀπὸ τὸ ἐμβαδὸν τοῦ τετραγώνου κατὰ $(3\sqrt{3} - 4)$ τετ. ἑκατ. Νὰ εὕρητε τὸ ἐμβαδὸν τοῦ κύκλου τούτου.

593. Αἱ ἀκτῖνες δύο κύκλων διαφέρουσι κατὰ δύο παλάμας. Νὰ εὕρητε τὴν διαφορὰν τῶν περιφερειῶν αὐτῶν.

594. Εἰς ἕνα κύκλον νὰ γράψητε χορδὴν ἵσην πρὸς τὴν ἀκτῖνα. Ἔπειτα νὰ εὕρητε τὸ ἐμβαδὸν ἔκάστου τῶν κυκλικῶν τμημάτων, εἰς τὰ δόποια χωρίζεται δικύκλιος, συναρτήσει τῆς ἀκτῖνος τοῦ κύκλου τούτου.

595. Δύο κύκλοι ἔχουσι ἀκτῖνα R, ἡ δὲ ἀπόστασις KΛ τῶν κέντρων των εἰναι R $\sqrt{3}$. Νὰ ἀποδείξῃτε δὴ αἱ περιφέρειαι αὐτῶν τέμνονται. Ἔπειτα δὲ νὰ εὕρητε τὸ ἐμβαδὸν τῆς κοινῆς ἐπιφανείας τῶν κύκλων τούτων.

596. Νὰ δρίσητε τὸ μέσον H τῆς πλευρᾶς ΓΔ κανονικοῦ ἔξαγώνου ΑΒΓΔΕΖ καὶ νὰ γράψητε τὸ εὐθ. τμῆμα AH. Ἔπειτα δὲ νὰ εὕρητε τὸ ἐμβαδὸν ἔκάστου τῶν μερῶν, εἰς τὰ δόποια χωρίζεται τὸ ἔξαγώνον ὅπο τοῦ AH, συναρτήσει τῆς πλευρᾶς αὐτοῦ.

597. Μὲ κέντρα τὰς κορυφὰς τετραγώνου καὶ ἀκτῖνα τὸ ἡμίσυ τῆς πλευρᾶς αὐτοῦ νὰ γράψητε τόξα περιεχόμενα μεταξὺ τῶν πλευρῶν. Ἔπειτα δὲ νὰ εὕρητε τὸ ἐμβαδὸν τῆς ἐπιφανείας, ἡ δόποια περιέχεται μεταξὺ τῶν τόξων τούτων, συναρτήσει τῆς πλευρᾶς τοῦ τετραγώνου.

598. Τρεῖς ἰσοι κύκλοι K, L, M ἐφάπτονται ἀνά δύο ἑκτός. Νὰ εὔρεθῇ τὸ ἐμβαδὸν τῆς ἐπιφανείας, ἡ δόποια περιέχεται μεταξὺ τῶν περιφερειῶν αὐτῶν, συναρτήσει τῆς ἀκτῖνος R αὐτῶν.

599. Εἰς δοθὲν ἡμικύκλιον νὰ ἐγγράψητε δρθογώνιον τρίγωνον ΑΒΓ. Ἔπειτα νὰ γράψητε ἡμιπεριφερείας ἑκτὸς τοῦ τριγώνου μὲ διαμέτρους τὰς καθέτους πλευρᾶς αὐτοῦ. Νὰ ἀποδείξῃτε δὲ δὴ ἡ ἐπιφάνεια, ἡ δόποια περιέχεται μεταξὺ τῶν τριῶν ἡμιπεριφερειῶν, εἰναι ἰσοδύναμος πρὸς τὸ τρίγωνον ΑΒΓ.

Σημείωσις. Τὰ μέρη, ἀπὸ τὰ δόποια ἀποτελεῖται ἡ ἐπιφάνεια αὕτη, λέγονται μηνίσκοι τοῦ Ἰπποκράτους.

600. Εἰς τὴν διάμετρον AB δοθέντος ἡμικυκλίου νὰ δρίσητε ἐν σημεῖον Γ καὶ ἐντὸς τοῦ ἡμικυκλίου νὰ γράψητε ἡμιπεριφερείας μὲ διαμέτρους AG καὶ GB. Ἔπειτα δὲ νὰ ὑψώσητε εἰς τὸ Γ κάθετον ἐπὶ τὴν AB μέχρι τῆς ἡμιπεριφερείας καὶ νὰ εὕρητε συναρτήσει τῆς καθέτου ταύτης τὸ ἐμβαδὸν τῆς ἐπιφανείας, ἡ δόποια περιέχεται μεταξὺ τῶν τριῶν ἡμιπεριφερειῶν. Νὰ δρίσητε ἐπειτα τὴν θέσιν τοῦ Γ, εἰς τὴν δόποιαν ἀντιστοιχεῖ μεγίστη τοιαύτη ἐπιφάνεια.

601. Νὰ διαιρέσητε δοθέντα κύκλον εἰς 3 ισοδύναμα μέρη μὲ διοκέντρους περιφερείας.

602. Εἰς δοθέντα κύκλον νὰ γράψητε μίαν διάμετρον AB καὶ νὰ δρίσητε εἰς αὐτὴν ἐν σημεῖον Γ, τὸ δόποιον νὰ ἔχῃ τὴν ἔξης ίδιότητα: "Αν μὲ διαμέτρους AG καὶ GB γράψωμεν ἡμιπεριφερείας ἔκατερον τῆς AG, νὰ διαιρῆται ὅπ' αὐτῶν δικύκλιος εἰς δύο μέρη ἔχοντα λόγον 3:2.

ΣΤΕΡΕΟΜΕΤΡΙΑ

ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'


1. ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΩΝ

§ 270. Νὰ ἔξετασθῇ πόσα ἐπίπεδα διέρχονται ἀπὸ δύο τεμνομένας εὐθείας AB καὶ AG (σχ. 196).

Εἰς τυχόν ἐπίπεδον E γράφουμεν μίαν εὐθεῖαν ΔZ . Θέτομεν δὲ αὐτὸν ρῦτως, ὡστε ἡ εὐθεῖα ΔZ νὰ ἐφαρμόσῃ ἐπὶ τῆς AB .

Νοοῦμεν ἔπειτα ὅτι τὸ ἐπίπεδον E στρέφεται περὶ τὴν AB , μέχρις ὅτου καὶ τὸ E εὐθεῆ ἐπ' αὐτοῦ. Εἶναι φανερὸν ὅτι εἰς τὴν θέσιν ταύτην τὸ E περιέχει καὶ τὰς δύο εὐθείας AB καὶ AG . Διέρχεται λοιπὸν δι' αὐτῶν ἐν ἐπίπεδον.

"Ἄν δὲ διήρχετο ἀπὸ αὐτὰς καὶ ἄλλο ἐπίπεδον E' , τὰ δύο ἐπίπεδα E καὶ E' θὰ εἰχον τρία κοινὰ σημεῖα A, B, Γ μὴ κείμενα ἐπ' εὐθείας. Τοῦτο δὲ εἶναι ἀδύνατον (§ 16). Βλέπομεν λοιπὸν ὅτι:



Σχ. 196

Ἀπὸ δύο τεμνομένας εὐθείας διέρχεται ἐν μόνον ἐπίπεδον.

Τὴν ἴδιοτητα ταύτην διατυπώνομεν καὶ ως ἔξῆς:


Δύο τεμνόμεναι εὐθεῖαι δρίζουσι τὴν θέσιν ἐνδὸς ἐπιπέδου.

Πόρισμα I. Τρία μὴ ἐπ' εὐθείας κείμενα σημεῖα δρίζουσι τὴν θέσιν ἐνδὸς ἐπιπέδου.

Πόρισμα II. Μία εὐθεῖα καὶ ἐν σημεῖον ἐκτὸς αὐτῆς κείμενον δρίζουσι τὴν θέσιν ἐνδὸς ἐπιπέδου.

§ 271. Νὰ ἔξετασθῇ πόσα ἐπίπεδα διέρχονται ἀπὸ δύο παραλλήλους εὐθείας AB καὶ $ΓΔ$ (σχ. 197).

Κατὰ τὸν δρισμὸν τῶν παραλλήλων εὐθειῶν (§ 97) αἱ εὐθεῖαι αὖται κεῖνται εἰς ἓν ἐπίπεδον E . Διέρχεται δηλ. ἀπὸ αὐτὰς ἐν ἐπίπεδον.



Σχ. 197

Ἄν δὲ διήρχετο ἀπὸ αὐτὰς καὶ ἄλλο ἐπίπεδον E' , τὰ δύο ἐπίπεδα θὰ εἶχον κοινὰ π.χ. τὰ σημεῖα $A, B, Γ$, τὰ δποῖα δὲν κεῖνται ἐπ' εὐθείας. Τοῦτο δὲ εἶναι ἀδύνατον. "Ωστε:

'Απὸ τὰς παραλλήλους εὐθείας AB καὶ $ΓΔ$ διέρχεται ἐν μόνον ἐπίπεδον. "Ητοι:

Δύο παράλληλοι εὐθεῖαι δρίζουσι τὴν θέσιν ἐνδὸς ἐπιπέδου.

§ 272. Ποῖαι εἶναι αἱ δυναταὶ θέσεις δύο εὐθειῶν πρὸς ἄλλήλας. 'Απὸ τὴν Ἐπιπεδομετρίαν γνωρίζομεν ὅτι:

Δύο εὐθεῖαι τοῦ αὐτοῦ ἐπιπέδου εἶναι παράλληλοι ή τεμνονται.

Προηγουμένως δὲ ἐμάθομεν καὶ τὸ ἀντίστροφον, ἡτοι:


Δύο παράλληλοι ή τεμνόμεναι εὐθεῖαι κεῖνται εἰς τὸ αὐτὸν ἐπίπεδον.

'Η εὐθεία AE τοῦ τοίχου $ABZE$ (σχ. 198) δωματίου διέρχεται ἀπὸ ἐν μόνον σημεῖον A τοῦ πατώματος ή δὲ εὐθεία $ΓΔ$ τοῦ πατώματος δὲν διέρχεται ἀπὸ τὸ A .

Γεννᾶται ἡδη ή ἀπορία, ἀν ἀπὸ τὰς εὐθείας AE καὶ $ΓΔ$ διέρχονται ἐπίπεδα καὶ πόσα.

Διὰ νὰ λύσωμεν τὴν ἀπορίαν ταύτην, σκεπτόμεθα ως ἔξῆς:

"Αν διήρχετο ἀπὸ αὐτὰς ἐν ἐπίπεδον $Π$, τοῦτο θὰ περιεῖχε τὴν $ΓΔ$ καὶ τὸ σημεῖον A τοῦ πατώματος. Κατὰ δὲ τὸ ἀνωτέρω πόρισμα II (§ 270) θὰ συνέπιπτε μὲ τὸ πάτωμα, ή δὲ εὐθεῖα



Σχ. 198

ΑΕ τοῦ Π θὰ ἔκειτο ἐπὶ τοῦ πατώματος. Τοῦτο δημοσίευται εἰς τὴν ὑπόθεσιν. "Ωστε:

Οὐδὲν ἐπίπεδον διέρχεται ἀπὸ τὰς εὐθεῖας ΑΕ καὶ ΓΔ.

Εἴδομεν λοιπὸν ὅτι:

Δύο εὐθεῖαι δύνανται νὰ τέμνωνται ή νὰ εἶναι παράλληλοι ή νὰ μὴ κεῖνται εἰς τὸ αὐτὸν ἐπίπεδον.

Αἱ εὐθεῖαι, αἱ ὁποῖαι δὲν κεῖνται εἰς τὸ αὐτὸν ἐπίπεδον, λέγονται ἀσύμβατοι εὐθεῖαι.

§ 273. Τί λέγεται γωνία δύο ἀσυμβάτων εὐθειῶν. "Εστω-

σαν ΑΒ καὶ ΓΔ δύο ἀσύμβατοι εὐθεῖαι (σχ. 199).

'Απὸ ἐν σημείον Β τῆς μιᾶς φέρομεν εὐθεῖαν ΒΕ παράλληλον πρὸς τὴν ἄλλην ΓΔ.


'Η γωνία ΑΒΕ τῶν εὐθειῶν ΑΒ, ΒΕ λέγεται καὶ γωνία τῶν ἀσυμβάτων εὐθειῶν ΑΒ καὶ ΓΔ.

"Αν δὲ ή γωνία δύο εὐθειῶν εἶναι δρθή, αὐταὶ γενικῶς λέγονται δρθιογώνιοι εὐθεῖαι.

"Αν π.χ. ή ΑΒ εἶναι κάθετος ἐπὶ τὴν ΒΕ, αἱ ΑΒ καὶ ΒΕ εἶναι δρθιογώνιοι εὐθεῖαι. "Αν δὲ ή ΓΔ εἶναι παράλληλος πρὸς τὴν ΒΕ, γωνία τῶν ΑΒ καὶ ΓΔ εἶναι ή δρθή γωνία ΑΒΕ. Καὶ αἱ εὐθεῖαι λοιπὸν ΑΒ, ΓΔ εἶναι δρθιογώνιοι. Βλέπομεν λοιπὸν ὅτι:

Δύο δρθιογώνιοι εὐθεῖαι τέμνονται ή εἶναι ἀσύμβατοι εὐθεῖαι.

Αἱ πρῶται, ως γνωστόν, λέγονται κάθετοι εὐθεῖαι. Πρὸς διάκρισιν αἱ ἄλλαι λέγονται ἀσυμβάτως δρθιογώνιοι ή ἀσυμβάτως κάθετοι.



Σχ. 199

A σκήσεις

603. Μὰ δείξητε εἰς τὴν αἰθουσαν τῆς διδασκαλίας: α') Δύο τεμνομένας εὐθεῖας καὶ τὸ ἐπίπεδον αὐτῶν. β') Δύο παραλλήλους εὐθεῖας καὶ τὸ ἐπίπεδον αὐτῶν. γ') Τρία σημεῖα μὴ κείμενα ἐπ' εὐθείας καὶ τὸ ἐπίπεδον αὐτῶν. δ') Δύο ἀσυμβάτους εὐθείας.

604. Ἐν σημεῖον Α κεῖται εἰς ἐπίπεδον Ε καὶ ἐν σημεῖον Β κεῖται ἔκτὸς τοῦ ἐπιπέδου τούτου. Νὰ ἔξετάσητε πόσα κοινὰ σημεῖα ἔχει ἡ εὐθεῖα AB μὲ τὸ ἐπίπεδον E.

605. Μία εὐθεῖα AB ἔχει μὲ ἐν ἐπίπεδον κοινὸν σημεῖον μόνον τὸ A. Νὰ ἔξετάσητε, ἀν ύπάρχωσιν εὐθεῖαι τοῦ E παράλληλοι πρὸς τὴν AB.

§ 274. Ποῖαι εὐθεῖαι λέγονται τέμνουσαι ἐπιπέδου. Εἴπομεν προηγουμένως δtti ἡ εὐθεῖα AE τοῦ τοίχου T ἐνδὲ δωματίου (σχ. 198) ἔχει μὲ τὸ πάτωμα AΒΓΔ ἐν μόνον κοινὸν σημεῖον τὸ A. Δι' αὐτὸν ἡ εὐθεῖα AE λέγεται τέμνουσα τοῦ πατώματος. "Ωστε:

Μία εὐθεῖα λέγεται τέμνουσα ἐνδὲ ἐπιπέδου, ἢν ἔχῃ μὲ αὐτὸν μόνον κοινὸν σημεῖον.


Τὸ δὲ κοινὸν σημεῖον εὐθείας καὶ ἐπιπέδου λέγεται ποὺς ἡ ἔχνος τῆς εὐθείας ταύτης.

§ 275. Τί λέγεται τομὴ δύο ἐπιπέδων καὶ ποῖον τὸ σχῆμα αὐτῆς. α') Παρατηροῦντες τὰ ἐπίπεδα τοῦ πατώματος, τῆς δροφῆς καὶ τῶν ἐσωτερικῶν ἐπιφανειῶν τῶν τοίχων ἐνδὲ δωματίου βλέπομεν δtti εἰναι δυνατὸν δύο ἐπίπεδα νὰ ἔχωσι πολλὰ κοινὰ σημεῖα.

Ο γεωμετρικὸς τόπος τῶν κοινῶν σημείων δύο ἐπιπέδων λέγεται τομὴ τῶν ἐπιπέδων τούτων.

β') Διὰ νὰ γνωρίσωμεν τὸ σχῆμα τῆς τομῆς δύο ἐπιπέδων E καὶ E', (σχ. 200) σκεπτόμεθα ὡς ἔξης:

Δύο τυχόντα κοινὰ σημεῖα A καὶ B τῶν ἐπιπέδων τούτων δρίζουσι τὴν



Σχ. 200

εὐθεῖαν AB. Γνωρίζομεν δὲ δtti αὕτη κεῖται καὶ ἐπὶ τῶν δύο τούτων ἐπιπέδων.

Πᾶν δὲ ἄλλο κοινὸν σημεῖον Γ τῶν ἐπιπέδων τούτων κεῖται

έπι τῆς ΑΒ. Διότι, ἀν ἔκειτο ἐκτὸς αὐτῆς, τὰ δύο ἐπίπεδα θά
έταυτίζοντο (§ 270 Πόρ. II), διπέρ αντίκειται εἰς τὴν ύποθεσιν.

“Ωστε: Κοινὰ σημεῖα τῶν δύο ἐπιπέδων εἶναι δλα τὰ σημεῖα
τῆς εύθειας ΑΒ καὶ μόνον αὐτά. Ἐπομένως:

‘**Η τομὴ δύο ἐπιπέδων εἶναι εύθεια γραμμή.**

Α σ κ ή σ ε ι ε

606. Νὰ δείξητε εἰς τὴν αἴθουσαν τῆς διδασκαλίας δύο τεμνόμενα
ἐπίπεδα καὶ τὴν τομὴν αὐτῶν.

607. Νοήσατε διάφορα ἐπίπεδα Π, Ρ, Σ κ.τ.λ., τὰ δποῖα νὰ διέρ-
χωνται ἀπὸ μίαν εύθειαν ΑΒ καὶ ἐν ἄλλῳ ἐπίπεδον Ε, τὸ δποῖον νὰ
τέμνηται ὑπὸ τῆς ΑΒ π.χ. εἰς τὸ Α. Νὰ ἀποδείξητε ὅτι αἱ τομαὶ τῶν
ἐπιπέδων Π, Ρ, Σ κ.τ.λ. ὑπὸ τοῦ Ε διέρχονται ἀπὸ τὸ σημεῖον Α.

608. Νὰ ἔξετασθε, ἀν δύο εύθειαι Ε καὶ Ε' μὴ κείμεναι εἰς τὸ
αὐτὸ ἐπίπεδον εἶναι δυνατόν νὰ τμηθῶσιν ὑπὸ δύο παραλλήλων εύθειῶν.

2. ΚΑΘΕΤΟΣ ΚΑΙ ΠΛΑΓΙΑΙ ΠΡΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟΝ ΕΥΘΕΙΑΙ

§ 276. Ποία εύθεια λέγεται κάθετος ἐπὶ ἐπίπεδον. Μὲ
τὴν βοήθειαν τοῦ γνώμονος βε-
βαιούμεθα ὅτι ἡ εύθεια ΑΕ δω-
ματίου εἶναι κάθετος ἐπὶ τὰς
εύθειας ΑΒ καὶ ΑΔ τοῦ πατώ-
ματος ΑΒΓΔ (σχ. 198).


Βλέπομεν δηλ. ὅτι εἶναι δυ-
νατὸν μία εύθεια νὰ εἶναι κά-
θετος ἐπὶ δύο τεμνομένας εύ-
θειας ἐνδὸς ἐπιπέδου εἰς τὸ κοι-
νὸν σημεῖον αὐτῶν.

Οὕτω καὶ ἡ εύθεια ΑΚ εἶναι
κάθετος ἐπὶ τὰς εύθειας ΑΓ καὶ
ΑΒ ἐνδὸς ἐπιπέδου Π (σχ. 201).

Θὰ ἔξετάσωμεν τώρα, ἀν

ἡ ΑΚ εἶναι κάθετος καὶ ἐπὶ τυχοῦσαν ἄλλην εύθειαν ΑΔ τοῦ Π.

Πρὸς τοῦτο γράφομεν εύθειαν ΒΔΓ, ἡ δποῖα τέμνει τὰς
δοθείσας εἰς τὰ σημεῖα Β, Δ, Γ. Προεκτείνομεν ἔπειτα τὴν ΑΚ
κατὰ τμῆμα ΑΚ' ἵσον πρὸς τὸ ΑΚ.



Σχ. 201

Οὕτω τὸ τμῆμα KK' τέμνεται ύπο ἐκατέρας τῶν εύθειῶν AB , AG δίχα καὶ καθέτως. Θά εἶναι λοιπὸν $BK = BK'$ καὶ $HK = HK'$, τὰ δὲ τρίγωνα KBG καὶ $K'BG$ εἶναι ἵσα.

Διὰ τοῦτο δὲ εἶναι καὶ $\widehat{BK} = \widehat{B'K'}$. Τὰ δὲ τρίγωνα $K\Delta G$, $K'\Delta G$ ἔχουσι τὴν $\Gamma\Delta$ κοινήν, $KG = K'G$ καὶ τὰς ύπ' αὐτῶν περιεχομένας γωνίας ἵσας εἶναι λοιπὸν ἵσα καὶ διὰ τοῦτο $\Delta K = \Delta K'$. Τὸ δὲ τρίγωνον $K\Delta K'$ εἶναι ἰσοσκελὲς καὶ ἐπομένως ἡ διάμεσος ΔA αὐτοῦ εἶναι κάθετος ἐπὶ τὴν βάσιν KK' . "Ωστε:

"Αν μία εὐθεῖα διέρχηται ἀπὸ τὴν τομῆν δύο ἄλλων εὐθειῶν καὶ εἶναι κάθετος ἐπ' αὐτάς, θὰ εἶναι κάθετος καὶ ἐπὶ πᾶσαν ἄλλην εὐθεῖαν τοῦ ἐπιπέδου αὐτῶν διερχομένην διὰ τῆς τομῆς των.


Όνομάζομεν δὲ τὴν εύθειαν ταύτην AK κάθετον ἐπὶ τὸ ἐπιπέδον Π . Δηλαδή :

Mία εὐθεῖα τέμνουσα ἐπιπέδον λέγεται κάθετος ἐπ' αὐτό, ἀν εἶναι κάθετος ἐπὶ πάσας τὰς εὐθείας τοῦ ἐπιπέδου τούτου, αἱ δυοῖαι διέρχονται ἀπὸ τὸν πόδα αὐτῆς.

Καὶ τὸ ἐπιπέδον δὲ λέγεται κάθετον ἐπὶ τὴν εὐθεῖαν ταύτην.

Κατὰ ταῦτα ἡ προηγουμένη ἴδιότης διατυποῦται καὶ ὡς ἔξης :

"Αν μία εὐθεῖα διέρχηται ἀπὸ τὴν τομῆν δύο ἄλλων καὶ εἶναι κάθετος ἐπ' ἀμφοτέρας ταύτας, αὕτη εἶναι κάθετος καὶ ἐπὶ τὸ ἐπιπέδον αὐτῶν.



Σχ. 202

§ 277. Γενίκευσις τῆς προηγουμένης ἴδιότητος. "Εστω εὐθεῖα KA ἀσυμβάτως κάθετος πρὸς δύο εύθειας E , E' ἐπιπέδου Π (σχ. 202).

Αἱ ἐκ τοῦ ποδὸς A ἀγόμεναι παράλληλοι πρὸς αὐτάς εύθειαι AB , AG κεῖνται ἐν τῷ ἐπιπέδῳ Π . Γωνία δὲ τῆς KA καὶ τῆς E εἶναι ἡ KAB , τῶν δὲ KA καὶ E' εἶναι ἡ $KA\Gamma$.

Ἐπειδὴ δὲ ἡ KA ὑπετέθη ἀσυμβάτως κάθετος πρὸς τὰς E ,

Ε', αἱ γωνίαι αὐταὶ εἰναι δρθαὶ καὶ ἐπομένως ή ΑΚ εἰναι κάθετος ἐπὶ τὸ ἐπίπεδον Π (§ 276).

"Αν λοιπόν λέγοντες καθέτους εύθείας νοοῦμεν οὐ μόνον τὰς τεμνομένας, ἀλλὰ καὶ τὰς ἀσυμβάτως τοιαύτας, δυνάμεθα νὰ γενικεύσωμεν τὴν προηγουμένην ἰδιότητα ὡς ἔξῆς:

"Αν εὐθεῖα εἰναι κάθετος ἐπὶ δύο τυχούσας εὐθείας ἐπίπεδον, εἰναι κάθετος καὶ ἐπὶ τὸ ἐπίπεδον τοῦτο.

"Αν δὲ ή ΚΑ εἰναι κάθετος ἐπὶ τὸ Π, θά εἰναι κάθετος ἐπὶ τυχοῦσαν εύθειαν Ε τοῦ ἐπίπεδου τούτου. Διότι εἰναι κάθετος ἐπὶ τὴν ΑΒ παράλληλον πρὸς τὴν Ε. "Ωστε :

"Αν εὐθεῖα εἰναι κάθετος ἐπὶ ἐπίπεδον, εἰναι κάθετος ἐπὶ πᾶσαν εὐθεῖαν τοῦ ἐπίπεδου τούτου.

§ 278. Ποῖαι εὐθεῖαι λέγονται πλάγιαι πρὸς ἐπίπεδον.

"Η εὐθεῖα ΚΒ τοῦ ἐπίπεδου ΚΒΑ προφανῶς δὲν εἰναι κάθετος ἐπὶ τὴν ΑΒ (σχ. 201). ἐπειδὴ δὲ ή ΑΒ εἰναι εύθεια τοῦ ἐπίπεδου Π, ή ΚΒ δὲν εἰναι κάθετος ἐπὶ τὸ Π.

Λέγεται δὲ αὕτη πλαγία πρὸς τὸ Π (σχ. 201). "Ωστε :

Mia εὐθεῖα λέγεται πλαγία πρὸς ἐπίπεδον, ἢν τέμνῃ αὐτὸν καὶ δὲν εἰναι κάθετος ἐπ' αὐτό.

'Α σκήσεις



609. Νὰ δείξητε εἰς τὴν αἰθουσαν τῆς διδασκαλίας εύθειας καθέτους ἐπὶ τὸ πάτωμα.


610. Νὰ διαγράψητε δεικνύοντες διὰ τοῦ δακτύλου σας εἰς ἕνα τοῖχον εύθειαν πλαγίαν πρὸς τὸ πάτωμα.

611. "Αν δὲ μελανοπίναξ στηρίζηται ἐπὶ τρίποδος, νὰ δρίσητε, ἢν αἱ μικρότεραι πλευραὶ αὐτοῦ εἰναι κάθετοι ἢ πλάγιαι πρὸς τὸ πάτωμα.

§ 279. Πρόβλημα. Νὰ εὑρεθῇ δὲ γεωμετρικὸς τόπος τῶν εὐθειῶν, αἱ δποῖαι εἰναι κάθετοι ἐπὶ τὴν αὐτὴν εὐθεῖαν ΑΒ εἰς ἓν σημεῖον Γ αὐτῆς (σχ. 203).

Λύσις. 'Απὸ τὰς καθέτους αὐτὰς δύο τυχοῦσαι π.χ. αἱ ΓΔ, ΓΕ κεῖνται εἰς ἓν ἐπίπεδον Π. Κατὰ δὲ τὴν προηγουμέ-

νην ίδιότητα, ή εύθεια AB είναι κάθετος ἐπὶ τὸ Π καὶ ἐπὶ πᾶσαν εύθειαν αὐτοῦ, ή διπολα διέρχεται ἀπὸ τὸ Γ .



Σχ. 203


τὸ Γ είναι δλαι αἱ εὐθεῖαι τοῦ Π , αἱ δποῖαι διέρχονται ἀπὸ τὸ Γ καὶ μόνον αὐταὶ.

*Ἐπομένως δ ζητούμενος τόπος είναι τὸ ἐπίπεδον Π , τὸ δποῖον είναι κάθετον ἐπὶ τὴν AB εἰς τὸ Γ .

§ 280. Νὰ ἔξετασθῇ πόσα ἐπίπεδα κάθετα ἐπὶ εὐθεῖαν AB ἄγονται ἐκ σημείου Γ αὐτῆς ή ἐκτὸς αὐτῆς κειμένου. α') "Αν τὸ Γ είναι σημείον τῆς AB (σχ. 203), ἐμάθομεν προηγουμένως δτὶ δύο εύθειαὶ $\Gamma\Delta$, ΓE κάθετοι ἐπ' αὐτὴν δρίζουσιν ἐπίπεδον Π κάθετον ἐπ' αὐτὴν. "Αν δὲ ἀπὸ τὸ Γ διήρχετο καὶ ἄλλο ἐπίπεδον Π' κάθετον ἐπὶ τὴν AB , τυχοῦσα εύθεια ΓZ αὐτοῦ διάφορος τῆς τομῆς τῶν Π , Π' θὰ ἦτο κάθετος ἐπὶ τὴν

πᾶσαν εύθειαν αὐτοῦ, ή διπολα διέρχεται ἀπὸ τὸ Γ . "Αν δὲ μία ἄλλη ΓZ ἀπὸ τὰς αὐτὰς καθέτους εύρισκετο ἐκτὸς τοῦ Π , τοῦτο θὰ ἐτέμνετο ὑπὸ τοῦ Π ἐπιπέδου P τῶν εύθειῶν ΓA , ΓZ κατὰ μίαν εύθειαν $\Gamma Z'$. Θὰ ἦτο δὲ η ΓA κάθετος ἐπ' αὐτὴν. 'Αλλὰ τότε ἐπὶ τοῦ Π ἐπιπέδου P θὰ ἔγοντο ἐκ τοῦ Γ δύο κάθετοι ΓZ , $\Gamma Z'$ ἐπὶ τὴν AB . Τοῦτο δὲ είναι ἀδύνατον. Κεῖται λοιπὸν η ΓZ εἰς τὸ ἐπίπεδον Π . "Ωστε:

Κάθετοι ἐπὶ τὴν AB εἰς



Σχ. 204

ΑΒ καὶ θὰ ἦτο ἔκτὸς τοῦ Π. Τοῦτο δὲ εἶναι ἀδύνατον (§ 279).

β') "Αν τὸ Γ κεῖται ἔκτὸς τῆς ΑΒ (σχ. 204), δρίζει μὲ αὐτὴν ἐν ἐπίπεδον Ρ. Εἰς αὐτὸν ἄγεται ἐκ τοῦ Γ μία εὐθεῖα ΓΔ κάθετος ἐπὶ τὴν ΑΒ. Κατὰ δὲ τὴν προηγουμένην περίπτωσιν ἀπὸ τὸ Δ ἄγεται ἐν μόνον ἐπίπεδον Π κάθετον ἐπὶ τὴν ΑΒ. Τοῦτο περιέχει τὴν εὐθεῖαν ΔΓ καὶ ἐπομένως διέρχεται ἀπὸ τὸ Γ.

Οὐδέν δὲ ἄλλο ἀπὸ τὰ ἐπίπεδα, τὰ δποῖα διέρχονται ἀπὸ τὸ Γ καὶ τέμνουσι τὴν ΑΒ εἰς τὸ Δ εἶναι κάθετον ἐπὶ τὴν ΑΒ. Διότι ἄλλως θὰ διήρχετο ἀπὸ τὸ Δ, πλὴν τοῦ Π καὶ ἄλλο ἐπίπεδον κάθετον ἐπὶ τὴν ΑΒ. Τοῦτο δὲ ἀπεδείχθη προηγουμένως ἀδύνατον.

"Αν δὲ ἐν ἐπίπεδον Σ διήρχετο ἀπὸ τὸ Γ καὶ ἔτεμνε καθέτως τὴν ΑΒ εἰς ἄλλο σημεῖον Α, ἡ εὐθεῖα ΓΑ αὐτοῦ θὰ ἦτο κάθετος ἐπὶ τὴν ΑΒ. Ἀλλὰ τότε εἰς τὸ ἐπίπεδον ΔΓΑ θὰ ἥγοντο ἐκ τοῦ Γ δύο κάθετοι ΓΑ καὶ ΓΔ ἐπὶ τὴν αὐτὴν εὐθεῖαν ΑΒ. Γνωρίζομεν δὲ ὅτι τοῦτο εἶναι ἀδύνατον (§ 62). Βλέπομεν λοιπὸν ὅτι:

"Εξ ἐκάστου σημείου εὐθείας ἡ ἔκτὸς αὐτῆς κειμένου ἄγεται ἐν μόνον ἐπίπεδον κάθετον ἐπ' αὐτήν.

«Πόρισμα. Δύο ἐπίπεδα κάθετα ἐπὶ τὴν αὐτὴν εὐθεῖαν δὲν τέμνονται. Διὰ τοῦτο δὲ λέγονται παράλληλα ἐπίπεδα.

Α σ κήσεις


~~612.~~ Μία εὐθεῖα ΓΔ τέμνει πλαγίως εἰς σημεῖον Δ ἐν ἐπίπεδον Π. Νὰ ἀποδείξῃτε ὅτι ἀπὸ τὰς εὐθείας τοῦ Π, αἱ δποῖαι διέρχονται ἀπὸ τὸ Δ μία μόνον εἶναι κάθετος ἐπὶ τὴν ΓΔ.

~~613.~~ Μία εὐθεῖα ΒΓ εἶναι κάθετος ἐπὶ ἐπίπεδον Π καὶ Β εἶναι ὁ ποὺς αὐτῆς. Αὕτη καὶ τυχόσσα εὐθεῖα ΒΑ πλαγία πρὸς τὸ Π ὥριζουσιν ἐν ἐπίπεδον ΑΒΓ. Νὰ ἀποδείξῃτε ὅτι ἀπὸ τὰς εὐθείας τοῦ Π, αἱ δποῖαι διέρχονται ἀπὸ τὸ Β, μία μόνον εἶναι κάθετος ἐπὶ τὸ ἐπίπεδον ΑΒΓ.

~~614.~~ Δύο ἐπίπεδοι δψεις μιᾶς δοκοῦ τέμνονται κατὰ εὐθεῖαν ΑΒ. Πως θὰ κόψῃ αὐτὴν ὁ τεχνίτης κατὰ ἐπίπεδον κάθετον ἐπὶ τὴν ΑΒ εἰς ὧρισμένον σημεῖον Γ αὐτῆς;

§ 281. Πρόβλημα II. Νὰ δρισθῇ ὁ γεωμ. τόπος τῶν σημείων, ὃν ἔκαστον ἀπέχει 7σον ἀπὸ δύο δοθέντα σημεῖα A καὶ B (σχ. 205).

Λύσις α') "Αν Μ είναι σημείον τοῦ ζητουμένου τόπου, θά είναι $MA = MB$. Τὸ τρίγωνον λοιπὸν MAB είναι ίσοσκελές καὶ ἡ διάμεσος $M\Gamma$ αὐτοῦ είναι κάθετος ἐπὶ τὴν AB . Διὰ τοῦτο ἡ $M\Gamma$, ἐπομένως καὶ τὸ M κεῖται ἐπὶ τοῦ ἐπίπεδου E , τὸ ὅποιον είναι κάθετον ἐπὶ τὴν εὔθεταν AB εἰς τὸ μέσον τῆς ἀποστάσεως AB .



Σχ. 205

κειμένη εἰς τὸ ἐπίπεδον E είναι κάθετος ἐπὶ τὴν AB εἰς τὸ μέσον Γ τοῦ τιμήματος AB . Θά είναι λοιπὸν $MA = MB$, ἢτοι τὸ M είναι σημείον τοῦ ζητουμένου τόπου. Ἐκ τούτων συμπεραίνομεν ὅτι :

"Ο ζητούμενος τόπος είναι τὸ ἐπίπεδον, ἢ ὅποιον τέμνει δίχα καὶ καθέτως τὸ εὐθ. τιμῆμα AB .


Α σκηνίς

615. Εἰς δοθὲν ἐπίπεδον P γράφομεν εὐθεῖαν E . Ὁρίζομεν δὲ καὶ δύο σημεῖα A, B , ὃν τὸ ἔν τούλαχιστον κεῖται ἐκτὸς τοῦ P . Πῶς είναι δυνάτον νὰ ὀρίσωμεν σημεῖον M τῆς E τοιοῦτον, ώστε νὰ είναι $MA = MB$; Πόσα δὲ τοιαῦτα σημεῖα ὑπάρχουσιν;

§ 282. Νὰ ἔξετασθῇ πόσαι εὐθεῖαι κάθετοι ἐπὶ ἐπίπεδον P ἀγονται ἀπὸ ἔν σημεῖον A αὐτοῦ (σχ. 206).

"Εστω τυχοῦσα εὐθεῖα BG κειμένη ἐκτὸς τοῦ P . Γνωρίζομεν δτὶ ἀπὸ τυχὸν σημεῖον Γ αὐτῆς ἄγεται ἔν ἐπίπεδον P κάθετον ἐπ' αὐτήν.

Νοοῦμεν ἥδη ὅτι τὸ P τίθεται ἐπὶ τοῦ P οὕτως, ώστε τὸ σημεῖον Γ νὰ συμπέσῃ μὲ



Σχ. 206

τὸ Α. Τότε ἡ ΓΒ, μένουσα διαρκῶς κάθετος ἐπὶ τὸ Ρ, θὰ λάβῃ μίαν θέσιν ΑΔ κάθετον ἐπὶ τὸ Π.

"Αγεται λοιπὸν ἀπὸ τὸ Α μία κάθετος ΑΔ ἐπὶ τὸ Π. Αὕτη καὶ τυχοῦσα ἄλλη ΑΔ' διερχομένη ἀπὸ τὸ Α καὶ ἐκτὸς τοῦ Π δρίζουσι τὴν θέσιν ἐνὸς ἐπιπέδου ΔΑΔ'. Τοῦτο τέμνει τὸ Π κατὰ εύθεταν ΑΕ κάθετον ἐπὶ τὴν ΑΔ.

"Αν δὲ καὶ ἡ ΑΔ' ἦτο κάθετος ἐπὶ τὸ Π, θὰ ἦτο κάθετος καὶ ἐπὶ τὴν ΑΕ. 'Ἐν τῷ ἐπιπέδῳ λοιπὸν ΔΑΔ'Ε θὰ ύπηρχον δύο εὐθεῖαι ΑΔ, ΑΔ' κάθετοι ἐπὶ τὴν ΑΕ εἰς τὸ αὐτὸ σημεῖον Α. Τοῦτο δμως εἰναι ἀδύνατον.

Πλὴν τῆς ΑΔ λοιπὸν οὐδέμια ἄλλη εύθετα κάθετος ἐπὶ τὸ Π ἄγεται ἀπὸ τὸ Α. "Ωστε ·

Δι' ἔκαστου σημείου ἐπιπέδου ἄγεται μία μόνον εὐθεῖα κάθετος ἐπ' αὐτό.

§ 283. *Nὰ ἔξετασθῇ πόσαι εὐθεῖαι κάθετοι ἐπὶ ἐπίπεδον Π ἄγονται ἐκ σημείου Α ἐκτὸς αὐτοῦ κειμένου* (*σχ. 207*).

"Αν ΔΕ εἰναι τυχοῦσα εύθετα τοῦ Π, αὕτη καὶ τὸ σημεῖον Α δρίζουσιν ἔν ἐπίπεδον ΑΔΕ. Εἰς αὐτὸ ἄγεται ἐκ τοῦ Α μία εύθετα ΑΒ κάθετος ἐπὶ τὴν ΔΕ. Καὶ εἰς τὸ ἐπίπεδον Π ἄγεται μία εύθετα ΒΓ κάθετος ἐπίσης ἐπὶ τὴν ΔΕ. 'Ομοίως εἰς τὸ ἐπίπεδον ΑΒΓ ἄγεται εύθετα ΑΓ κάθετος ἐπὶ τὴν ΒΓ.


Τὸ τρίγωνον λοιπὸν ΑΒΓ εἰναι δρθιογώνιον καὶ ἐπομένως $(ΑΓ)^2 + (\Gamma B)^2 = (AB)^2$ (1)

"Αν δὲ Δ εἰναι τυχὸν σημεῖον τῆς ΒΕ καὶ τὸ τρίγωνον ΓΒΔ εἰναι δρθιογώνιον. Θὰ εἰναι λοιπὸν $(\Gamma D)^2 - (\Gamma B)^2 = (BΔ)^2$. 'Εκ ταύτης δὲ καὶ τῆς (1) διὰ προσθέσεως κατὰ μέλη εὑρίσκομεν δτι $(ΑΓ)^2 + (\Gamma D)^2 = (AB)^2 + (BΔ)^2$ (2)

'Επειδὴ δὲ καὶ τὸ ΑΔΒ εἰναι δρθιογώνιον τρίγωνον, εἰναι $(ΑΔ)^2 = (AB)^2 + (BΔ)^2$.

'Η (2) τότε γίνεται

$$(ΑΓ)^2 + (\Gamma Δ)^2 = (ΑΔ)^2.$$



Σχ. 207

Ἐκ ταύτης ἔπειται ὅτι ἡ ΑΓ εἶναι κάθετος ἐπὶ τὴν ΓΔ.
Ἐπειδὴ δὲ ἡ ΑΓ εἶναι ἐκ κατασκευῆς κάθετος καὶ ἐπὶ τὴν ΒΓ,
ἔπειται ὅτι εἶναι κάθετος καὶ ἐπὶ τὸ ἐπίπεδον Π αὐτῶν.


"Ἄγεται λοιπὸν ἐκ τοῦ Α μία κάθετος ΑΓ ἐπὶ τὸ ἐπίπεδον Π.

"Αν καὶ ἡ ΑΗ ἦτο κάθετος ἐπὶ τὸ Π, θὰ ἦτο κάθετος καὶ
ἐπὶ τὴν ΓΗ. Θὰ ἤγοντο δὲ ἐκ τοῦ Α δύο εύθεται ΑΓ καὶ ΑΗ
κάθετοι ἐπὶ τὴν ΓΗ καὶ εἰς τὸ αὐτὸ ἐπίπεδον ΑΓΗ. Τοῦτο δμως
εἶναι ἄτοπον. Κατὰ ταῦτα:

"Ἐκ σημείου ἐκτὸς ἐπιπέδου κειμένου ἀγεται μία μόνον εὐ-
θεῖα κάθετος ἐπὶ τὸ ἐπίπεδον τοῦτο.

Αἱ ἄλλαι εύθεται, αἱ δποῖαι ἄγονται ἐκ τοῦ Α εἰς τὸ Π,
λέγονται πλάγιαι πρὸς αὐτό.

§ 284. Ἀπὸ σημεῖον Α, τὸ δποῖον κεῖται ἐκτὸς ἐπιπέδου Π,
ἀγεται ἡ ΑΒ κάθετος ἐπὶ τὸ Π καὶ δσαιδήποτε πλάγιαι. Νὰ συγ-
κριθῶσι: α') Ἡ κάθετος καὶ τυχοῦσα πλάγια. β') Δύο πλάγιαι,
τῶν δποίων οἱ πόδες ἀπέχουσιν ἵσον ἀπὸ τὸν πόδα τῆς καθέτου.
γ') Δύο πλάγιαι, τῶν δποίων οἱ πόδες ἀπέχουσιν ἀνισον ἀπὸ τὸν
πόδα τῆς καθέτου (σχ. 208).



Σχ. 208

α') Τὸ ἐπίπεδον τῆς ΑΒ καὶ τυ-
χούσης πλαγίας ΑΓ τέμνει τὸ
Π κατὰ τὴν εύθεταν ΒΓ. Ἐπειδὴ
δὲ $AB\Gamma = 1$ δρθ. εἶναι $AG > AB$,
ἡτοι :

"Ἡ κάθετος ἐπὶ ἐπίπεδον εἰ-
ναι μικροτέρα πάσης πλαγίας
πρὸς αὐτό, ἡ δποία ἀγεται ἀπὸ
τὸ αὐτὸ σημεῖον.

β') "Αν $BG = BD$, τὰ δρθ.

τρίγωνα ABG , ABD εἶναι ἵσα καὶ ἐπομένως $AG = AD$, ἡτοι :

"Αν οἱ πόδες δύο πλαγίων ἀγομένων ἐκ τοῦ αὐτοῦ σημείου
ἀπέχωσιν ἵσον ἀπὸ τὸν πόδα τῆς καθέτου, αἱ πλάγιαι αὗται
εἶναι ἵσαι.

γ') "Αν εἶναι $BE > BG$ καὶ ληφθῆ ἐπὶ τὴν BE τμῆμα BZ
ἵσον πρὸς BG , θὰ εἶναι $BE > BZ$ καὶ $AG = AZ$. Ἐπειδὴ δὲ ἐν

τῷ ἐπιπέδῳ ΑΒΕ αἱ ΑΖ, ΑΕ εἶναι πλάγιαι πρὸς τὴν ΒΕ κ.τ.λ., θὰ εἶναι ΑΕ > ΑΖ, ἐπομένως καὶ ΑΕ > ΑΓ. "Ωστε :

"*Αν ΒΕ > ΒΓ, εἶναι καὶ ΑΕ > ΑΓ.*

Εύκόλως δὲ ἀποδεικνύονται καὶ αἱ ἀκόλουθοι ἰδιότητες ἀντίστροφοι τῶν προηγουμένων.

α') "Η μικροτέρα δὲ τῶν ἐκ σημείου πρὸς ἐπίπεδον ἀγομένων εὐθεῖῶν εἶναι κάθετος ἐπὶ τὸ ἐπίπεδον τοῦτο.

β') "Αν ΑΒ εἶναι κάθετος ἐπὶ ἐπίπεδον Π καὶ ΑΓ, ΑΔ εἶναι ἵσαι πλάγιαι πρὸς αὐτό, θὰ εἶναι ΒΓ = ΒΔ.

γ') "Αν δὲ ΑΕ > ΑΓ, θὰ εἶναι καὶ ΒΕ > ΒΓ.

§ 285. Τί λέγεται ἀπόστασις σημείου ἀπὸ ἐπίπεδον. Τὸ τμῆμα ΑΒ τῆς καθέτου ἐπὶ ἐπίπεδον Π (σχ. 208) ὡς μικρότερον δὲ τῶν ἄλλων ΑΓ, ΑΔ, ΑΕ κ.τ.λ. λέγεται ἀπόστασις τοῦ σημείου Α ἀπὸ τὸ ἐπίπεδον Π. "Ωστε :

"Ἀπόστασις σημείου ἀπὸ ἐπίπεδον λέγεται τὸ εὐθ. τμῆμα, τὸ δποῖον δρίζεται ἀπὸ τὸ σημεῖον τοῦτο καὶ ἀπὸ τὸν πόδα τῆς καθέτου, ἡ δποῖα ἀγεται ἐξ αὐτοῦ ἐπὶ τὸ ἐπίπεδον.

Α σκήσεις

616. "Αν δύο ἢ περισσότεραι εὐθεῖαι ἀγωνται ἐκ τοῦ αὐτοῦ σημείου πρὸς ἐπίπεδον καὶ εἶναι ἵσαι, νὰ ἔξετασθῇ, ἀν μία ἀπὸ αὐτὰς εἶναι κάθετος ἐπὶ τὸ ἐπίπεδον τοῦτο.


617. "Ἐν σημείον Α ἀπέχει 3 ἑκατ. ἀπὸ ἐπίπεδον Π. Νὰ εὔρητε τὸν γεωμ. τόπον τῶν σημείων Μ τοῦ ἐπιπέδου Π, διὰ τὰ δποῖα εἶναι (ΑΜ) = 5 ἑκατ.

618. Εἰς δοθὲν ἐπίπεδον Π γράφονται τρεῖς εὐθεῖαι ΒΓ, ΒΔ, ΒΖ. Ἀλλῃ δὲ εὐθεῖα ΑΒ οὐδὲν ἄλλο κοινὸν σημεῖον ἔχουσα μὲ τὸ Π εἶναι τοιαύτη, ὥστε $\widehat{ΑΒΓ} = \widehat{ΑΒΔ} = \widehat{ΑΒΖ}$. Νὰ ἔξετάσητε, ἀν αὕτη εἶναι πλάγια ἢ κάθετος πρὸς τὸ Π.

3. ΤΑ ΘΕΩΡΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ

§ 286. Θεώρημα I. *Εὐθεῖα ΑΒ εἶναι κάθετος ἐπὶ ἐπίπεδον Π καὶ ΓΔ εἶναι τυχοῦσσα εὐθεῖα αὐτοῦ. Ἐκ τοῦ ποδὸς Α ἀγεται εὐθεῖα ΑΕ κάθετος ἐπὶ τὴν εὐθεῖαν ΓΔ εἰς τὸ Ε. "Αν*

B είναι τυχὸν σημεῖον τῆς AB , ἢ BE είναι κάθετος ἐπὶ τὴν $\Gamma\Delta$ (σχ. 209).



Σχ. 209

* Από δειξις. Ἐπὶ τῆς $\Gamma\Delta$ δρίζομεν δύο ίσα τμήματα $E\Gamma$, $E\Delta$ καὶ ἄγομεν τὰς εύθειας $B\Gamma$, $B\Delta$, $A\Gamma$, $A\Delta$. Τὸ τμῆμα λοιπὸν $\Gamma\Delta$ τέμνεται δίχα καὶ καθέτως ὑπὸ τῆς AE καὶ διὰ τοῦτο εἶναι $A\Gamma = A\Delta$.

* Εκ ταύτης δὲ ἔπειται ὅτι $B\Gamma = B\Delta$, ἢ δὲ διάμεσος BE τοῦ ισοσκελοῦς τριγώνου $B\Gamma\Delta$


εἶναι κάθετος ἐπὶ τὴν $\Gamma\Delta$, δ.ἔ.δ.

§ 287. Θεώρημα II. Ἐκ τοῦ σημείου B ἐκτὸς ἐπιπέδου Π πειμένου ἀγεται εὐθεῖα BA κάθετος ἐπὶ τὸ Π καὶ ἄλλῃ BE κάθετος ἐπὶ εὐθεῖαν $\Gamma\Delta$ τοῦ Π . Ἡ εὐθεῖα AE , τὴν δύον δρίζοντιν οἱ πόδες τῶν καθέτων τούτων, εἶναι κάθετος ἐπὶ τὴν $\Gamma\Delta$.

* Από δειξις. Ὁρίζομεν, ὡς προηγουμένως, $E\Gamma = E\Delta$ καὶ συμπεραίνομεν ὅτι $B\Gamma = B\Delta$. Ἐκ ταύτης δὲ συμπεραίνομεν ὅτι $A\Gamma = A\Delta$ καὶ προχωροῦμεν ὡς προηγουμένως.

§ 288. Θεώρημα III. Ἐκ σημείου E εὐθεῖας $\Gamma\Delta$ ἄγονται εὐθεῖαι EB , EA κάθετοι ἐπὶ τὴν $\Gamma\Delta$. Ἐκ σημείου δὲ B τῆς EB ἀγεται εὐθεῖα BA κάθετος ἐπὶ τὴν EA . Ἡ BA εἶναι κάθετος καὶ ἐπὶ τὸ ἐπίπεδον Π τῶν εὐθειῶν AE καὶ $\Gamma\Delta$ (σχ. 210).

* Από δειξις. Ἄν ή BA ἦτο πλαγία πρὸς τὸ Π , θὰ ἤγετο ἐκ τοῦ B ἄλλῃ εὐθεῖα BA' κάθετος ἐπὶ τὸ Π . Ο δὲ ποὺς A' αὐτῆς θὰ ἔκειτο ἐκτὸς τῆς AE , διότι ἄλλως θὰ ἤγοντο ἐκ τοῦ B δύο εὐθεῖαι BA , BA' κάθετοι ἐπὶ τὴν EA καὶ ἐν τῷ αὐτῷ μετ' αὐτῆς ἐπιπέδῳ AEB . Τοῦτο δὲ εἶναι ἀδύνατον. Ἐπειδὴ δὲ



Σχ. 210

κατὰ τὸ προηγούμενον θεώρημα ἡ ΕΑ' θὰ ἦτο κάθετος ἐπὶ τὴν ΓΔ, θὰ ἤγοντο ἐκ τοῦ Ε καὶ ἐν τῷ ἐπιπέδῳ Π δύο κάθετοι ἐπὶ τὴν ΓΔ. Τοῦτο δὲ εἶναι ἀδύνατον. Εἶναι λοιπὸν ἡ ΒΑ κάθετος ἐπὶ τὸ ἐπίπεδον Π.

~~Α σκήσεις~~

619. Μία εύθεια ΑΔ εἶναι κάθετος ἐπὶ τὸ ἐπίπεδον ἐνὸς Ισοσκελοῦς τριγώνου ΑΒΓ. "Αν δὲ Ε εἶναι τὸ μέσον τῆς βάσεως ΒΓ αὐτοῦ, νὰ ἀποδείξῃς ὅτι ἡ ΔΕ εἶναι κάθετος ἐπὶ τὴν ΒΓ.

620. Εἰς τὸ προηγούμενον σχῆμα (210) νὰ ἔξετάσῃς, ἂν ἡ βάσις ΒΓ τοῦ Ισοσκελοῦς τριγώνου ΑΒΓ εἶναι κάθετος ἢ πλαγία πρὸς τὸ ἐπίπεδον ΔΑΕ.

621. Εύθεια ΖΕ εἶναι κάθετος ἐπὶ τὸ ἐπίπεδον δρθιογωνίου ΑΒΓΔ καὶ Ε εἶναι ἡ τομὴ τῶν διαγωνίων αὐτοῦ. "Αν Μ εἶναι τὸ μέσον τῆς πλευρᾶς ΒΓ, νὰ ἔξετάσῃς, ἂν αὕτη εἶναι κάθετος ἢ πλαγία πρὸς τὸ ἐπίπεδον ΖΕΜ.

622. Εἰς σημεῖον Α δοθείσης περιφερείας Κ ἄγεται ἐφαπτομένη ΓΔ. "Αν δὲ ΚΒ εἶναι κάθετος ἐπὶ τὸ ἐπίπεδον τοῦ κύκλου, νὰ ἔξετάσῃς, ἂν ἡ ΓΔ τέμνῃ καθέτως ἢ πλαγίως τὸ ἐπίπεδον ΒΚΑ.

623. "Η ἀπόστασις ΑΒ σημείου Α ἀπὸ ἐπίπεδον Π εἶναι 4 ἑκατ. Μὲ κέντρον τὸν πόδα Β καὶ ἀκτῖνα 3 ἑκατ. γράφομεν περιφέρειαν εἰς τὸ ἐπίπεδον Π. Εἰς έν σημεῖον Γ αὐτῆς ἄγομεν ἐφαπτομένην, ἐπὶ τῆς δοποὶας δρίζομεν τμῆμα (ΓΔ) = 2 $\sqrt{6}$ ἑκατ. Νὰ εὕρητε τὴν ἀπόστασιν ΑΔ.


624. "Ἐπὶ ἐπιπέδου Π δρίζεται σημείον Ο καὶ ἔκτὸς αὐτοῦ ἄλλο σημείον Α. Ἀπὸ τὸ Ο διέρχονται ἄπειροι εύθειαι τοῦ Π. Νὰ εὕρητε τὸν γεωμ. τόπον τῶν προβολῶν τοῦ Α ἐπὶ ταύτας.

4. ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΕΥΘΕΙΑΙ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΑ

§ 289. Θεώρημα I. Ἄν ἐπίπεδον Π τέμνῃ εὐθεῖαν ΑΒ, θὰ τέμνῃ καὶ πᾶσαν εὐθεῖαν ΓΔ παραλληλον πρὸς τὴν ΑΒ (σχ. 211).

Ἄποδειξις. Άλ παράλληλοι εύθειαι ΑΒ καὶ ΓΔ δρίζουσιν ἐπίπεδον Ρ. Τοῦτο περιέχει τὸ σημεῖον Β τοῦ Π. Τὰ ἐπίπεδα λοιπὸν ταῦτα τέμνονται κατὰ μίαν εύθειαν ΒΓ.


Αὕτη δὲ τέμνουσα τὴν ΑΒ



Σχ. 211

Θὰ τέμνῃ καὶ τὴν $\Delta\Gamma$ εἰς ἐν σημεῖον Γ , τὸ δόποιον εἶναι καὶ σημεῖον τοῦ Π , ἐφ' οὓ δὲν κεῖται ἡ $\Gamma\Delta$.

§ 290. Θεώρημα II. "Αγδύο εὐθεῖαι AB καὶ $\Gamma\Delta$ εἶναι κάθετοι ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἐπίπεδον Π , αὕται εἶναι παράλληλοι (σχ. 212).



Σχ. 212

**Απόδειξις.* Παρατηροῦμεν πρῶτον ὅτι, ἂν αἱ εὐθεῖαι αὗται εἶχον κοινὸν σημεῖον M , θὰ ἤγοντο ἔξι αὐτοῦ δύο κάθετοι ἐπὶ τὸ Π . Τοῦτο δύναται εἶναι ἀδύνατον (§ 282, 283).

Μένει νὰ ἴωμεν, ἂν αὗται κεῖνται εἰς τὸ αὐτὸ ἐπίπεδον. Πρὸς τοῦτο εἰς τὸ ἐπίπεδον Π γράφομεν τὴν εὐθεῖαν τῶν ἰχνῶν αὐτῶν, τὴν $B\Gamma$, καὶ φέρομεν ἐπ' αὐτὴν κάθετον, τὴν $E\Gamma Z$.

Παρατηροῦμεν δὲ ὅτι ἡ $\Gamma\Delta$ εἶναι κάθετος ἐπὶ τὴν $E\Gamma Z$ ὡς κάθετος ἐπὶ τὸ Π . Κατὰ δὲ τὸ I θεώρημα τῶν τριῶν καθέτων ἡ $E\Gamma Z$ εἶναι κάθετος ἐπὶ τὴν $A\Gamma$. Ἐπομένως ἡ $E\Gamma Z$ εἶναι κάθετος καὶ ἐπὶ τὸ ἐπίπεδον P τῶν εὐθειῶν $A\Gamma$ καὶ $B\Gamma$. Τὸ ἐπίπεδον δὲ τοῦτο περιέχει δλας τὰς καθέτους ἐπὶ τὴν $E\Gamma Z$ εἰς τὸ Γ , ἐπομένως καὶ τὴν $\Gamma\Delta$. Περιέχει δὲ προφανῶς καὶ τὴν AB .

Αἱ εὐθεῖαι λοιπὸν AB καὶ $\Gamma\Delta$ κεῖνται εἰς τὸ αὐτὸ ἐπίπεδον P . Ἐπειδὴ δὲ δὲν τέμνονται, ἔπειται ὅτι εἶναι παράλληλοι.

§ 291. Θεώρημα III. "Αν εὐθεῖα εἶναι κάθετος ἐπὶ ἐπίπεδον καὶ πᾶσα παράλληλος πρὸς αὐτὴν εἶναι κάθετος ἐπὶ τὸ ἐπίπεδον τοῦτο.

"Αν δὴ, αἱ εὐθεῖαι AB καὶ $\Gamma\Delta$ (σχ. 212) εἶναι παράλληλοι, ἡ δὲ AB κάθετος ἐπὶ τὸ ἐπίπεδον Π , καὶ ἡ $\Gamma\Delta$ εἶναι κάθετος ἐπὶ τὸ Π .

**Απόδειξις.* Πρῶτον παρατηροῦμεν ὅτι τὸ Π τέμνει τὴν AB . Θὰ τέμνῃ λοιπὸν καὶ τὴν $\Gamma\Delta$ εἰς τὶ σημεῖον Γ (§ 289). Γνωρίζομεν δὲ ὅτι ἐκ τοῦ Γ ἄγεται εὐθεῖα κάθετος ἐπὶ τὸ Π καὶ ὅτι αὕτη θὰ εἶναι παράλληλος πρὸς τὴν AB (§ 290). Ἐπομένως συμπίπτει μὲ τὴν $\Gamma\Delta$, κατὰ τὸ Εὐκλείδειον αἴτημα.

Πόρισμα. Δύο εύθειαι παράλληλοι πρὸς τρίτην εἶναι καὶ μεταξύ των παράλληλοι.

Ασκήσεις

625. Μία εύθεια ΚΑ εἶναι κάθετος ἐπὶ ἐπίπεδον Π. Εἰς τὸ ἐπίπεδον τοῦτο σχηματίζομεν δρθιογώνιον ΑΒΓΔ. Νὰ ἀποδείξῃς ὅτι ἡ πλευρὰ ΓΔ εἶναι κάθετος ἐπὶ τὸ ἐπίπεδον ΔΑΚ.

626. Εἰς τὴν τομὴν δύο ἐπίπεδων δρίζομεν δύο σημεῖα Γ, Δ. Ἐκτὸς δὲ τῆς τομῆς ταύτης δρίζομεν ἐν σημεῖον Α τοῦ ἐνὸς ἐπίπεδου καὶ ἐν Β τοῦ ἄλλου. Νὰ ἀποδείξῃς ὅτι τὰ μέσα τῶν εὐθ. τμημάτων ΑΓ, ΑΔ, ΒΓ, ΒΔ εἶναι κορυφαῖ παραλληλογράμμου.

§ 292. Θεώρημα IV. *"Ἄν εύθεια κεῖται ἐκτὸς ἐπίπεδου καὶ εἶναι παράλληλος πρὸς εύθειαν αὐτοῦ, οὐδὲν κοινὸν σημεῖον ἔχει μὲ τὸ ἐπίπεδον.*

'Η εύθεια π.χ. ΓΔ κεῖται ἐκτὸς τοῦ ἐπίπεδου Π καὶ εἶναι παράλληλος πρὸς τὴν εύθειαν ΑΒ τοῦ Π. Λέγω ὅτι ἡ ΓΔ καὶ τὸ ἐπίπεδον Π οὐδὲν κοινὸν σημεῖον ἔχουσι (σχ. 213).

Απόδειξις. Αἱ παράλληλοι εύθειαι ΑΒ καὶ ΓΔ κεῖνται εἰς ἐν ἐπίπεδον Ρ, τὸ δοποῖον τέμνει τὸ Π κατὰ τὴν εύθειαν ΑΒ. "Ἄν ἡ ΓΔ ἔτεμνε τὸ Π εἰς ἐν σημεῖον Ε, τοῦτο θά ἦτο κοινὸν σημεῖον τῶν ἐπίπεδων Ρ καὶ Π. Διὰ τοῦτο θὰ ἔκειτο ἐπὶ τῆς ΑΒ. Αἱ δὲ εύθειαι ΑΒ καὶ ΓΔ δὲν θὰ ἔσαν παράλληλοι, ως ὑπετέθη.


Εἶναι λοιπὸν ἀδύνατον νὰ ἔχῃ ἡ εύθεια ΓΔ κοινὸν σημεῖον μὲ τὸ ἐπίπεδον Π.

Διὰ τὸν λόγον τοῦτον ἡ ΓΔ λέγεται παράλληλος πρὸς τὸ Π.
Ωστε :

Μία εύθεια λέγεται παράλληλος πρὸς ἐν ἐπίπεδον, ἀν ἡ εύθεια καὶ τὸ ἐπίπεδον οὐδὲν ἔχωσι κοινὸν σημεῖον.

Πόρισμα I. *"Ἄν δύο ἐπίπεδα τέμνωνται, πᾶσα εύθεια τοῦ ἐνὸς παράλληλος πρὸς τὸ ἄλλο, εἶναι παράλληλος καὶ πρὸς τὴν τομὴν αὐτῶν.*

(503)



Σχ. 213

Πόρισμα II. "Αν εύθεια Ε είναι παράλληλος πρὸς ἐπίπεδον Π, ἡ ἐκ σημείου Α τοῦ ἐπιπέδου Π ἀγομένη παράλληλος πρὸς τὴν Ε κεῖται ἐπὶ τοῦ ἐπιπέδου Π.

Ασκήσεις

627. Δύο ἐπίπεδα είναι παράλληλα πρὸς μίαν εύθειαν Ε καὶ τέμνονται κατὰ διάληγον εύθειαν ΑΒ. Νὰ ἔξετάσητε, ἀν αἱ εύθειαι ΑΒ καὶ Ε είναι παράλληλοι ἢ οὐχι.


628. Ἀπὸ μίαν εύθειαν ΑΒ διέρχονται διάφορα ἐπίπεδα Π, Ρ... "Ἐν δὲ διάλλο ἐπίπεδον Κ είναι παράλληλον πρὸς τὴν ΑΒ. Νὰ ἔξετάσητε, ἀν αἱ τομαὶ τῶν ἐπιπέδων ἐκείνων ὑπὸ τοῦ Κ είναι παράλληλοι ἢ οὐχι.

629. Νὰ ἔξετάσητε πῶς είναι δυνατόν νὰ ὁρισθῇ ἐπίπεδον, τὸ πρὸιον τὰ διέρχηται ἀπὸ δοθεῖσαν εύθειαν Ε καὶ νὰ είναι παράλληλον πρὸς τὴν διάληγον εύθειαν Ε' ἀσύμβατον πρὸς τὴν Ε.

5. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ

§ 293. Ποῖα λέγονται παράλληλα ἐπίπεδα. "Ἐμάθομεν (§ 280 Πόρ.) διτὶ: Δύο ἐπίπεδα κάθετα ἐπὶ τὴν αὐτὴν εύθειαν δὲν τέμνονται. Λέγονται δὲ ταῦτα παράλληλα ἐπίπεδα. "Ωστε:

Δύο ἐπίπεδα λέγονται παράλληλα, ἀν δὲν τέμνονται, δσον καὶ ἀν προεκταθῶσιν.



§ 294. Δύο ἐπίπεδα Π καὶ Ρ είναι παράλληλα. Μία δὲ εύθεια ΒΖ τέμνει τὸ Ρ εἰς ἐν σημεῖον Β. Νὰ ἔξετασθῇ, ἀν αὕτη τέμνῃ ἢ οὐχι καὶ τὸ Π (σχ. 214).

"Ἀπὸ τυχόν σημεῖον Γ τοῦ Π ἄγεται εύθεια ΓΘ παράλληλος πρὸς τὴν ΒΖ. Τὸ ἐπίπεδον Ε τῶν παραλλήλων τούτων τέμνει τὸ Π κατά τινα εύθειαν ΓΗ. "Ἐν δὲ τῷ ἐπιπέδῳ Ε ἡ ΓΗ τέμνει τὴν εύθειαν ΓΘ. "Ἐπομένως θὰ τέμνῃ καὶ τὴν παράλληλον τῆς ΒΖ εἰς τι σημεῖον Α.

"Ἐν δὲ τῷ ἐπιπέδῳ Ε ἡ ΓΗ τέμνει τὴν εύθειαν ΓΘ. "Ἐπομένως θὰ τέμνῃ καὶ τὴν παράλληλον τῆς ΒΖ εἰς τι σημεῖον Α.

Ἐπειδὴ δὲ τοῦτο εἶναι σημεῖον καὶ τοῦ Π, ἡ ΒΖ τέμνει τὸ Π εἰς τὸ Α. Βλέπομεν λοιπὸν ὅτι:

"Ἄν μία εὐθεῖα τέμνῃ ἐν τῶν παραλλήλων ἐπιπέδων, τέμνει καὶ τὸ ἄλλο.

Πόρισμα. "Ἄν ἐπίπεδον Ε τέμνῃ ἐν τῶν παραλλήλων ἐπιπέδων Π καὶ Ρ, θὰ τέμνῃ καὶ τὸ ἄλλο (σχ. 214).

"Ἄν τὸ Ε τέμνῃ τὸ Ρ κατὰ τὴν ΒΔ, ἀρκεῖ νὰ παρατηρήσωμεν ὅτι μία εὐθεῖα ΒΖ τοῦ Ε τέμνουσα τὸ Ρ θὰ τέμνῃ καὶ τὸ Π.

§ 295. Νὰ ἔξετασθῇ ἂν αἱ τομαὶ ΑΔ, ΒΓ δύο παραλλήλων ἐπιπέδων Π, Ρ ὑπὸ ἄλλου Ε εἰναι παράλληλοι ἢ δχι (σχ. 215).


Αἱ τομαὶ ΑΔ καὶ ΒΓ κείνεται εἰς τὸ ἐπίπεδον Ε. Ἐπομένως θὰ εἶναι παράλληλοι ἢ θὰ τέμνωνται.

"Ἄν ἐτέμνοντο εἰς ἐν σημεῖον Μ, τοῦτο θὰ ἥτο κοινὸν σημεῖον τῶν ἐπιπέδων Π καὶ Ρ. Ἐπομένως ταῦτα δὲν θὰ ἥσαν παράλληλα, ὡς ὑπετέθη. Δὲν τέμνονται λοιπὸν αἱ εὐθεῖαι αὗται. "Ωστε:

Αἱ τομαὶ δύο παραλλήλων ἐπιπέδων ὑπὸ ἄλλου εἰναι παράλληλοι εὐθεῖαι.

Πόρισμα I. Παράλληλα εὐθ. τμῆματα, τὰ ὅποια περιέχονται μεταξὺ παραλλήλων ἐπιπέδων, εἰναι ἵσα.

Πόρισμα II. "Ἄν δύο ἐπίπεδα εἰναι παράλληλα, πᾶσα εὐθεῖα τοῦ ἑνὸς εἰναι παράλληλος πρὸς τὸ ἄλλο (§ 292). △



Σχ. 215

§ 296. Νὰ ἔξετασθῇ πόσα ἐπίπεδα παράλληλα πρὸς δοθὲν ἐπίπεδον Π ἀγονται ἀπὸ σημεῖον Α, τὸ ὅποιον κεῖται ἐκτὸς αὐτοῦ (σχ. 216).

"Εστω εὐθεῖα ΒΓ κάθετος ἐπὶ τὸ Π. Γνωρίζομεν ὅτι ἐκ τοῦ Α ἄγεται ἐν ἐπίπεδον Ρ κάθετον ἐπίτὴν ΒΓ. Τὰ δὲ ἐπίπεδα Π καὶ Ρ εἰναι παράλληλα (§ 280 Πόρ.).

"Εστω δὲ Σ ἐν ἄλλο ἐπίπεδον διερχόμενον διὰ τοῦ Α. Τὰ

έπιπεδα Π , P , Σ τέμνονται ύπό του ἐπιπέδου ABG ἀντιστοίχως κατά τὰς εύθειας $\Gamma\Delta$, AE , $\dot{A}Z$.


Ἐπειδὴ τὰ ἔπιπεδα P -καὶ P εἰναι παράλληλα, αἱ εὐθεῖαι $\Gamma\Delta$ καὶ AE εἰναι παράλληλοι.

Ἄν δὲ τὸ Σ ἡτο παράλληλον πρὸς τὸ P καὶ ἡ AZ θὰ ἡτο

παράλληλος πρὸς τὴν $\Gamma\Delta$. Θὰ ἡγοντο λοιπὸν ἐκ τοῦ A δύο παράλληλοι πρὸς τὴν $\Gamma\Delta$. Τοῦτο δὲ ἀντικείται εἰς τὸ Ἑύκλείδειον αἴτημα.
Ἐννοοῦμεν λοιπὸν δτι:

Ἀπὸ σημεῖον, τὸ δόποῖον κεῖται ἑκτὸς ἐπιπέδου, ἅγεται ἐν μόνον ἐπίπεδον παράλληλον πρὸς αὐτό.

Πόρισμα. Δύο ἐπίπεδα παράλληλα πρὸς τοῖτον εἰναι καὶ μεταξύ των παράλληλα.



Σχ. 216

§ 297. Πρόβλημα. Νὰ ενθεῖ
θῇ δι γεωμ. τόπος τῶν εὐθειῶν, αἱ
δόποιαι ἄγονται ἐκ σημείου A , τὸ δόποῖον κεῖται ἑκτὸς ἐπιπέδου
 P , καὶ εἰναι παράλληλοι πρὸς τὸ ἐπίπεδον τοῦτο.


Λύσις. "Εστω P τὸ ἐπίπεδον, τὸ δόποῖον διέρχεται ἀπὸ τὸ A καὶ εἰναι παράλληλον πρὸς τὸ P (σχ. 216).

Γνωρίζομεν δτι τυχοῦσα εύθεια AE τοῦ P διερχομένη ἀπὸ τὸ A εἰναι παράλληλος πρὸς τὸ P (§ 295 Πόρ. II). Καὶ πᾶσα δὲ εύθεια AZ διερχομένη διὰ τοῦ A καὶ παράλληλος πρὸς τὸ P κεῖται ἐπὶ τοῦ P . Διότι ἄλλως τέμνουσα τὸ P θὰ ἔτεμνε καὶ τὸ P , ἡτοι δὲν θὰ ἡτο παράλληλος πρὸς τὸ P . Βλέπομεν λοιπὸν δτι:

Πᾶσα εὐθεῖα τοῦ P εἰναι παράλληλος πρὸς τὸ P καὶ πᾶσα παράλληλος πρὸς τὸ P ἀγομένη ἐκ τοῦ A κεῖται εἰς τὸ P , "Αρα:

"Ο ζητούμενος τόπος εἰναι τὸ ἐπίπεδον P , τὸ δόποῖον διέρχεται ἀπὸ τὸ A καὶ εἰναι παράλληλον πρὸς τὸ P .

§ 298. Δύο ἐπίπεδα P καὶ P εἰναι παράλληλα, μία δὲ εὐ-




Θεῖα AB εἶναι κάθετος ἐπὶ τὸ Π . Νὰ ἔξετασθῇ ἀν αὗτη εἶναι κάθετος ἐπὶ τὸ P ή δχι (σχ. 217).

Ἡ εὐθεῖα AB τέμνουσα τὸ Π εἰς τὸ σημεῖον B θὰ τέμνῃ καὶ τὸ P εἰς σημεῖον A (§ 294). Ἐπειδὴ δὲ ἡ AB εἶναι κάθετος ἐπὶ τὸ Π , εἶναι κάθετος καὶ ἐπὶ τὰς εὐθείας $B\Gamma$ καὶ $B\Delta$ αὐτοῦ. Ἔνεκα δὲ τούτου θὰ εἶναι κάθετος καὶ ἐπὶ τὰς $A\Gamma'$, $A\Delta'$ ἀντιστοίχως παραλλήλους πρὸς αὐτάς. Ἐπειδὴ δὲ αὗται εἶναι παράλληλοι καὶ πρὸς τὸ Π (§ 292), θὰ κεῖνται εἰς τὸ ἐπίπεδον P (§ 297).


Ἐπομένως ἡ AB ως κάθετος ἐπὶ τὰς $A\Gamma'$, $A\Delta'$ εἶναι κάθετος καὶ ἐπὶ τὸ P . Βλέπομεν λοιπὸν δτι:

Πᾶσα κάθετος ἐπὶ ἓν τῶν παραλλήλων ἐπιπέδων εἶναι κάθετος καὶ ἐπὶ τὸ ἄλλο.

Πόρισμα. Τὰ μεταξὺ τῶν δύο παραλλήλων ἐπιπέδων περιεχόμενα κάθετα ἐπ' αὐτὰ εὐθύγραμμα τμῆματα εἶναι ἴσα.



Σχ. 218



Σχ. 217

§ 299. Τί λέγεται ἀπόστασις δύο παραλλήλων ἐπιπέδων. Ἔστω εὐθ. τμῆμα AB κάθετον ἐπὶ τὰ παραλλήλα ἐπίπεδα Π καὶ P (σχ. 218). Γνωρίζομεν δτι $AB \perp A\Gamma$. "Αν δὲ $\Delta\Gamma$ εἶναι τυχὸν εὐθ. τμῆμα πλάγιον πρὸς τὰ ἐπίπεδα, εύκόλως ἀποδεικνύεται δτι $AB \perp \Delta\Gamma$.

Διὰ τοῦτο τὸ AB λέγεται ἀπόστασις τῶν ἐπιπέδων Π καὶ P . Δηλαδὴ:

"Ἀπόστασις δύο παραλλήλων ἐπιπέδων λέγεται εὐθ. τμῆμα, τὸ δποῖον εἶναι κάθετον ἐπ' αὐτὰ καὶ περατοῦται εἰς αὐτά.

§ 300. Πῶς τέμνονται δύο εύθειαι ύπό παραλλήλων ἐπιπέδων (σχ. 219) Κατά τὸ θεώρημα τοῦ Θαλοῦ (§ 218), δύο εύθειαι τέμνονται ύπό παραλλήλων εύθειῶν εἰς μέρη ἀνάλογα. Θά ἔξετάσωμεν τώρα μήπως συμβαίνει τὸ αὐτὸ καὶ ὅταν δύο

εύθειαι τέμνονται ύπό παραλλήλων ἐπιπέδων.

"Εστωσαν λοιπόν δύο εύθειαι ΑΒ, ΓΔ, αἱ δοποῖαι τέμνονται ύπό παραλλήλων ἐπιπέδων.

Φέρομεν εύθειαν ΑΨ τέμνουσαν τὰ παράλληλα ἐπίπεδα εἰς τὰ σημεῖα Ν, Ο, Φ, Χ καὶ παράλληλον πρὸς τὴν ΓΔ. Τὸ ἐπίπεδον ΒΑΨ τέμνει αὐτὰ κατὰ παραλλήλους εύθειας ΕΝ, ΖΟ, ΗΦ, ΘΧ. Κατὰ δὲ τὸ θεώρημα τοῦ Θαλοῦ, εἶναι:


$$\frac{EZ}{NO} = \frac{ZH}{OF} = \frac{HO}{FX} \quad (1)$$

Ἐπειδὴ δὲ $NO = IK$, $OF = KL$, $FX = LM$ (§ 295 Πόρ. I), ἔπειται ὅτι

$$\frac{EZ}{IK} = \frac{ZH}{KL} = \frac{HO}{LM} \quad (2)$$

Βλέπομεν λοιπόν ὅτι:

"Ἄν δύο εύθειαι τέμνονται ύπό παραλλήλων ἐπιπέδων, τέμνονται εἰς μέρη ἀνάλογα.



Α σκήσεις

630. Δίδονται δύο παράλληλα ἐπίπεδα Π, Ρ, τὰ δοποῖα ἀπέχουσιν ἀλλήλων 10 ἑκατ. Ἔν σημείον Α ἀπέχει 5 ἑκατ. ἀπὸ τοῦ Π καὶ κεῖται πρὸς τὸ ἔτερον ἢ τὸ Ρ μερος, ἐν σχέσει πρὸς τὸ Π. Ἔν εὐθ. τμῆμα ΑΒ ἔχει μῆκος 24 ἑκατ. καὶ τέμνει τὸ Ρ εἰς τὸ Β. Νὰ εὕρητε τὰ μήκη τῶν τμημάτων, εἰς τὰ δοποῖα διαιρεῖται τοῦτο ύπό τοῦ ἐπιπέδου Π.

631. Μεταξὺ δύο παραλλήλων ἐπιπέδων Π καὶ Ρ εὑρίσκεται ἄλλο Σ παράλληλον πρὸς αὐτὰ καὶ ἀπέχον 4 ἑκατ. ἀπὸ τὸ Π καὶ 7 ἑκατ. ἀπὸ τὸ Ρ. Ἔν εὐθύγραμμον τμῆμα ἔχει μῆκος 2,2 παλαμῶν καὶ ἔχει τὰ ἄκρα του ἐπὶ τῶν ἐπιπέδων Π καὶ Ρ. Νὰ εὕρεθῶσι τὰ μήκη τῶν τμημάτων, εἰς τὰ δοποῖα τοῦτο διαιρεῖται ύπό τοῦ ἐπιπέδου Σ.

6. ΓΩΝΙΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΜΕ ΠΛΕΥΡΑΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥΣ

§ 301. Νὰ συγκριθῶσι δύο γωνίαι A , D , αἱ ὅποῖαι ἔχουσι πλευράς παραλλήλους καὶ διορθόπους, μίαν πρὸς μίαν, καὶ δὲν κεῖνται εἰς τὸ αὐτὸν ἐπίπεδον (σχ. 220).

Εἰς τὰς πλευράς τῆς γωνίας A δρίζομεν τμήματα AB , AG καὶ εἰς τὰς παραλλήλους πρὸς αὐτὰς πλευράς τῆς D δρίζομεν $\Delta E = AB$ καὶ $\Delta Z = AG$.

Ἐπειδὴ τὰ τετράπλευρα $ABED$, $AGZD$ εἶναι παραλληλόγραμμα, αἱ πλευραὶ BE καὶ GZ εἶναι ἵσαι καὶ παράλληλοι πρὸς τὴν AD . ἄρα εἶναι καὶ μεταξύ τῶν ἵσαι καὶ παράλληλοι.

Διὰ τοῦτο δὲ καὶ τὸ $BGZE$ εἶναι παραλληλόγραμμον καὶ ἑπομένως $BG = EZ$.

Τὰ τρίγωνα λοιπὸν ABG , ΔEZ ἔχουσι $AB = \Delta E$, $AG = \Delta Z$ καὶ $BG = EZ$. Εἶναι ἄρα ταῦτα ἵσα καὶ ἑπομένως $A = \Delta$. “Ωστε:

“Ἄν δύο γωνίαι μὴ κείμεναι εἰς τὸ αὐτὸν ἐπίπεδον ἔχωσι πλευράς παραλλήλους καὶ διορθόπους, μίαν πρὸς μίαν, αἱ γωνίαι αὗται εἶναι ἵσαι.”

Σχ. 220


Παρατηροῦντες δτὶ αἱ εὑθεῖαι ΔE , ΔZ εἶναι παράλληλοι πρὸς τὸ P (§ 292), ἐννοοῦμεν εὐκόλως δτὶ τὸ ἐπίπεδον P αὐτῶν εἶναι παράλληλον πρὸς τὸ P (§ 297). Δηλαδὴ:

Τὰ ἐπίπεδα δύο γωνιῶν, τῶν δποίων αἱ πλευραὶ εἶναι παράλληλοι, μία πρὸς μίαν, εἶναι παράλληλα.

Α σκήσεις

632. Ἀπὸ τὰς κορυφάς τριγώνου ABG νοήσατε ἵσα, παράλληλα καὶ διόρροπα εὐθύγραμμα τμήματα AD , BE , GZ ἐκτὸς τοῦ ἐπιπέδου τοῦ τριγώνου ABG . Νὰ συγκρίνητε τὰ τρίγωνα ABG , ΔEZ καὶ νὰ ἔξετασητε, ἀν τὰ ἐπίπεδα αὐτῶν εἶναι παράλληλα ή ὅχι.

* Ἡ ιδιότης αὗτη εἶναι γενίκευσις τῆς ἐν § 110 ιδιότητος.




633. Δίδονται δύο ἀσύμβατοι εύθειαι AB , GD . Ἐκ σημείου δὲ Z ἐκτὸς αὐτῶν φέρομεν εύθειας ZH , $Z\theta$ ἀντιστοίχως παραλλήλους πρὸς ἑκείνας. Νὰ ἀποδείξητε ὅτι ἡ γωνία $HZ\theta$ εἶναι ἵση πρὸς τὴν γωνίαν $t\delta\eta AB, GD$.

634. Ἐν δὲ AB, GD εἶναι ἀσυμβάτως κάθετοι, ἡ γωνία $HZ\theta$ εἶναι δρθή.

7. ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΣΥΜΒΑΤΩΝ ΕΥΘΕΙΩΝ

§ 302. Δίδονται δύο ἀσύμβατοι εύθειαι AB, GD . Νὰ δεῖξεται ὅτι ἐν ὑπάρχωσι κοιναὶ κάθετοι ἐπ' αὐτὰς καὶ πόσαι (σχ. 221).

Ἄπο δὲ ἐν σημεῖον G τῆς GD φέρομεν εύθειαν GE παράλληλον πρὸς τὴν AB καὶ παρατηροῦμεν ὅτι τὸ ἐπίπεδον Π τῶν GD, GE εἶναι παράλληλον πρὸς τὴν AB (§ 292). Ἐν δὲ ἀπὸ



Σχ. 221

σημεῖον B τῆς AB ἀχθῆ εύθεια BZ κάθετος ἐπὶ τὸ Π , τὸ ἐπίπεδον ABZ τέμνει τὸ Π κατὰ εύθειαν HZ παράλληλον πρὸς τὴν AB , ἐπομένως καὶ πρὸς τὴν GE . Διὰ τοῦτο ἡ HZ τέμνει τὴν GD εἰς τι σημεῖον H .

Ἡ δὲ πρὸς τὴν BZ παράλληλος εύθεια $H\theta$ εἶναι κάθετος ἐπὶ τὸ Π , ἐπομένως κάθετος καὶ ἐπὶ τὰς εύθειας GD καὶ ZH αὐτοῦ.

Ἐπειδὴ δὲ $H\theta$ κεῖται εἰς τὸ ἐπίπεδον $ABZH$, τέμνει καὶ τὴν AB εἰς τι σημεῖον I . Ὡς κάθετος δὲ ἐπὶ τὴν HZ θά εἶναι κάθετος καὶ ἐπὶ τὴν παράλληλὸν τῆς AB . Εἶναι λοιπὸν ἡ IH κοινὴ κάθετος τῶν εύθειῶν AB καὶ GD .

Ἄς ύποθέσωμεν τώρα ὅτι πλὴν τῆς IH ύπάρχει καὶ ἄλλη κοινὴ κάθετος KL τῶν αὐτῶν εύθειῶν AB καὶ GD .

Ἐκ τοῦ L ἄγεται παράλληλος πρὸς τὴν AB ἡ LM , ἥτις κεῖται εἰς τὸ ἐπίπεδον Π .

Ἀν ἡ KL ἦτο, ὡς ύπετέθη, κάθετος ἐπὶ τὴν AB , θά ἦτο κάθετος καὶ ἐπὶ τὴν LM . Ἐπειδὴ δὲ KL ύπετέθη κάθετος καὶ ἐπὶ τὴν GD , θά εἶναι κάθετος καὶ ἐπὶ τὸ ἐπίπεδον Π τῶν GD, LM . Ἔνεκα τούτου αἱ KL καὶ IH θά ἦσαν παράλληλοι, τὸ δὲ

ἐπίπεδον αύτῶν ΙΚΛΗ θά περιεῖχε καὶ τὰς δύο εὐθείας ΑΒ καὶ ΓΔ. Τοῦτο δὲ ἀντίκειται εἰς τὴν ὑπόθεσιν. Δὲν ὑπάρχει λοιπὸν ἄλλη κοινὴ κάθετος τῶν εὐθειῶν ΑΒ καὶ ΓΔ. "Ωστε:

"Ἄν δύο εὐθεῖαι εἶναι ἀσύμβατοι, ὑπάρχει μία μόνον κοινὴ κάθετος αὐτῶν.

§ 303. Τί λέγεται ἀπόστασις δύο ἀσυμβάτων εὐθειῶν. "Εστωσαν ΑΒ καὶ ΓΔ δύο ἀσύμβατοι εὐθεῖαι καὶ ΙΗ ἡ κοινὴ κάθετος αύτῶν δριζομένη διπας προηγουμένων εἴπομεν (σχ. 221).

"Εστω δὲ ἀκόμη τυχόν ἄλλο εύθ. τμῆμα ΚΛ περατούμενον εἰς ταύτας, Ἡ ἐκ τοῦ Κ κάθετος ΚΝ ἐπὶ τὸ ἐπίπεδον Π εἶναι παράλληλος πρὸς τὴν ΙΗ καὶ κεῖται εἰς τὸ ἐπίπεδον ΒΖΗΙ. Εἶναι δὲ πρόφανῶς ΚΝ = ΙΗ. 'Επειδὴ δὲ ΚΝ < ΚΛ, ἔπειται διτι ΙΗ < ΚΛ, ἦτοι :

Τὸ μεταξὺ τῶν εὐθειῶν ΑΒ καὶ ΓΔ περιεχόμενον τμῆμα τῆς κοινῆς καθέτου αὐτῶν εἶναι μικρότερον παντὸς ἄλλου εὐθ. τμήματος, τὸ δποῖον περατοῦται εἰς αὐτάς.

Διὰ τὸν λόγον τοῦτον τὸ τμῆμα ΙΗ λέγεται ἀπόστασις τῶν εὐθειῶν ΑΒ καὶ ΓΔ. "Ωστε:

"Ἀπόστασις δύο ἀσυμβάτων εὐθειῶν λέγεται τὸ τμῆμα τῆς κοινῆς καθέτου αὐτῶν, τὸ δποῖον περιέχεται μεταξὺ αὐτῶν.

Α σκήσεις

635. Μία εὐθεία ΑΒ εἶναι παράλληλος πρὸς ἓν ἐπίπεδον Π. Μία δὲ εὐθεία ΓΔ τοῦ Π δὲν εἶναι παράλληλος πρὸς τὴν ΑΒ. Νὰ ἀποδείξῃτε διτι αἱ ΑΒ καὶ ΓΔ εἶναι ἀσύμβατοι εὐθεῖαι.


636. Μία εὐθεία ΑΒ εἶναι παράλληλος πρὸς ἐπίπεδον Π καὶ τυχούσα εὐθεία ΓΔ τοῦ Π ἀσύμβατος πρὸς τὴν ΑΒ. Νὰ ἀποδείξῃτε διτι ἡ ἀπόστασις τῶν εὐθειῶν ΑΒ καὶ ΓΔ εἶναι σταθερά.

8. ΟΡΘΑΙ ΠΡΟΒΟΛΑΙ ΕΠΙ ΕΠΙΠΕΔΩΝ

§ 304. Τί λέγεται ὁρθὴ προβολὴ σημείου ἢ σχήματος ἐπὶ ἐπίπεδον. "Εστω ἐπίπεδον Π, ἐν σημείον Α ἐκτὸς αύτοῦ καὶ Αα ἡ ἐπὶ τὸ Π κάθετος εὐθεία (σχ. 222).

"Ο ποὺς α τῆς καθέτου ταύτης λέγεται ἰδιαιτέρως δρυθὴ

προβολὴ ἡ ἀπλῶς προβολὴ τοῦ Α ἐπὶ τὸ ἐπίπεδον Π. "Ωστε :
Προβολὴ σημείου ἐπὶ ἐπίπεδον λέγεται δ ποὺς τῆς καθέτου,
ἡ δούλια ἔγεται ἐκ τοῦ σημείου τούτου ἐπὶ τὸ ἐπίπεδον.



Σχ. 222


Αἱ προβολαὶ τυχόντος σχήματος Σ ἐπὶ τὸ αὐτὸ προβολικὸν ἐπίπεδον ἀποτελοῦσι σχῆμα σ. Τοῦτο λέγεται προβολὴ τοῦ Σ . "Ωστε :

Προβολὴ σχήματος ἐπὶ ἐπίπεδον λέγεται δ γεωμ. τόπος τῶν προβολῶν πάντων τῶν σημείων τοῦ σχήματος τούτου ἐπὶ τὸ ἐπίπεδον.

§ 305. Πρόβλημα. Νὰ δρισθῇ ἡ προβολὴ εὐθείας ἐπὶ ἐπίπεδον.

Ἄνσις. "Εστω εὐθεῖα AB πλαγία πρὸς τὸ προβολικὸν ἐπίπεδον Π (σχ. 223). Ἡ προβάλλουσα $A\alpha$ τοῦ σημείου A καὶ ἡ AB ὥριζουσι τὸ ἐπίπεδον $B\Alpha\beta$. Τοῦτο τέμνει τὸ προβολικὸν ἐπίπεδον κατὰ εὐθεῖαν $\alpha\beta$. Ἡ δὲ προβάλλουσα $M\mu$ τυχόντος σημείου M τῆς AB εἶναι παράληλος πρὸς τὴν $A\alpha$. Κεῖται λοιπὸν αὕτη εἰς τὸ ἐπίπεδον $B\Alpha\beta$, δὲ ποὺς μ αὐτῆς κεῖται ἐπὶ τῆς $\alpha\beta$.

"Αντιστρόφως. Ἡ κάθετος ἐπὶ τὸ Π εἰς τυχὸν σημείον μ τῆς $\alpha\beta$ κεῖται ἐπίσης εἰς τὸ ἐπίπεδον $B\Alpha\beta$ καὶ τέμνει τὴν AB εἰς τὸ σημεῖον M . Εἶναι λοιπὸν τὸ μ προβολὴ τοῦ M . "Ωστε :



Σχ. 223

*Η προβολὴ παντὸς σημείου τῆς AB εἶναι σημεῖον τῆς αβ.
Πᾶν δὲ σημεῖον τῆς αβ εἶναι προβολὴ σημείου τῆς AB .*

*Ἐκ τούτων ἐπεται διτὶ προβολὴ τῆς AB εἶναι ἡ εύθεια αβ.
Ἡτοι:*

Η προβολὴ εὐθείας πλαγίας πρὸς τὸ προβ. ἐπίπεδον εἶναι εὐθεῖα.

Εἶναι δὲ φανερὸν διτὶ:

Η προβολὴ αὐτῆς δρίζεται ἀπὸ τὰς προβολὰς α, β δύο σημείων A, B τῆς δοθείσης εὐθείας.

Ἄν ἡ εύθεια εἶναι κάθετος ἐπὶ τὸ προβολικὸν ἐπίπεδον, δλα τὰ σημεῖα αὐτῆς ἔχουσι προβολὴν τὸν πόδα αὐτῆς. Οὗτος δὲ εἶναι προβολὴ τῆς εύθειας. *Ωστε:*


Η προβολὴ εὐθείας καθέτου ἐπὶ τὸ προβολικὸν ἐπίπεδον εἶναι σημεῖον.

§ 306. Τί λέγεται κλίσις εὐθείας πρὸς ἐπίπεδον. "Εστω εύθεια AB πλαγία πρὸς ἐπίπεδον Π , Ba ἡ προβολὴ αὐτῆς ἐπὶ αὐτὸν καὶ BG τυχοῦσσα ἄλλη εύθεια τοῦ Π ἀπὸ τὰς διερχομένας διὰ τοῦ ἔχνους B τῆς AB (σχ. 224). "Αν ἐπὶ τῆς BG δρισωμεν τμῆμα $BG = Ba$, παρατηροῦμεν διτὶ τὰ τρίγωνα ABa , ABG ἔχουσι τὴν AB κοινήν, $BG = Ba$, καὶ $AG > Aa$. *Ἐκ τούτων ἐπεται διτὶ $ABa < ABG$ (§ 76 Πόρ. III), ἥτοι:*

Η δξεῖα γωνία τῆς εὐθείας AB καὶ τῆς προβολῆς τῆς ἐπὶ τὸ ἐπίπεδον Π εἶναι μικροτέρα ἀπὸ τὴν γωνίαν, τὴν δποὶαν σχηματίζει ἡ AB μὲ τυχοῦσαν ἄλλην εὐθεῖαν BG τοῦ Π διερχομένην ἀπὸ τὸ ἔχνος B τῆς AB .

Διὰ τοῦτο ἡ γωνία ABa λέγεται κλίσις τῆς εύθειας AB πρὸς τὸ ἐπίπεδον Π . *Ωστε:*

Κλίσις εὐθείας πρὸς ἐπίπεδον λέγεται ἡ δξεῖα γωνία, τὴν δποὶαν αὐτῆς σχηματίζει μὲ τὴν προβολὴν τῆς ἐπὶ τὸ ἐπίπεδον τοῦτο.



Σχ. 224

~~Ασκήσεις~~

637. Νὰ συγκρίνητε ἐν εὐθ. τμῆμα AB παράλληλον πρὸς ἐπίπεδον παράλληλον αβ αὐτοῦ ἐπὶ τὸ ἐπίπεδον Π.
638. Νὰ συγκρίνητε ἐν εὐθ. τμῆμα AB πλάγιον πρὸς ἐπίπεδον Π μὲ τὴν προβολὴν του εἰς τὸ αὐτὸ ἐπίπεδον.
639. Ἐν δύο εὐθεῖαι εἰναι παράλληλοι, νὰ ἔξετάσητε, ἂν αἱ προβολαι αὐτῶν εἰς τὸ αὐτὸ ἐπίπεδον εἰναι παράλληλοι ή οὐχι.
640. Νὰ συγκρίνητε τὸν λόγον δύο τμημάτων μιᾶς εὐθείας πρὸς τὸν λόγον τῶν προβολῶν αὐτῶν ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἐπίπεδον.
641. Νὰ δρίσητε τὴν προβολὴν τοῦ μέσου ἐνδε εὐθ. τμήματος, ἂν εἰναι γνωσταὶ αἱ προβολαι τῶν ἀκρων αὐτοῦ.
642. Νὰ συγκρίνητε τὸν λόγον δύο παραλλήλων εὐθ. τμημάτων πρὸς τὸν λόγον τῶν προβολῶν αὐτῶν ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἐπίπεδον.
643. Ἡ προβολὴ BA τοῦ εὐθ. τμήματος BA (σχ. 224) ισοῦται πρὸς τὴν προβάλλουσαν Αα αὐτοῦ. Νὰ εὕρητε τὸ μέτρον τῆς κλίσεως τοῦ BA πρὸς τὸ προβ. ἐπίπεδον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

I. ΑΙ ΔΙΕΔΡΟΙ ΓΩΝΙΑΙ

§ 307. Τί λέγεται δίεδρος γωνία καὶ ποῖα τὰ στοιχεῖα αὐτῆς. Τὰ δύο ἐπίπεδα ΔAB καὶ ΓAB (σχ. 225) περατοῦνται εἰς τὴν τομήν AB αὐτῶν. Σχηματίζουσι δὲ ταῦτα ἐν στερεόν σχῆμα. Τοῦτο λέγεται δίεδρος γωνία.

Τὰ ἐπίπεδα ΓAB καὶ ΔAB λέγονται ἔδραι αὐτῆς· ἡ δὲ τομὴ AB αὐτῶν λέγεται ἀκμὴ τῆς διέδρου γωνίας. "Ωστε:

Δίεδρος γωνία εἶναι σχῆμα, τὸ δποῖον σχηματίζεται ἀπὸ δύο ἐπίπεδα, τὰ δποῖα περατοῦνται εἰς τὴν τομήν αὐτῶν. Τὰ ἐπίπεδα, τὰ δποῖα σχηματίζουσι μίαν δίεδρον γωνίαν, λέγονται ἔδραι αὐτῆς.


"Η τομὴ τῶν ἔδρῶν μιᾶς διέδρου γωνίας λέγεται ἀκμὴ αὐτῆς.

Παρατηροῦμεν δτι, ἂν εἰς τοὺς δρισμοὺς τούτους ἀντικαταστήσωμεν τὰ ἐπίπεδα μὲ εύθειας καὶ τὴν τομήν τῶν ἐπίπεδων μὲ τὴν τομήν εύθειῶν, δηλ. μὲ σημεῖον, προκύπτουσιν οἱ δρισμοὶ ἐπιπέδου γωνίας καὶ τῶν στοιχείων αὐτῆς. Καὶ ἀντιστρόφως.

"Οπως δὲ μίαν ἐπίπεδον γωνίαν δνομάζομεν μὲ τὸ γράμμα τῆς κορυφῆς ἡ μὲ τρία γράμματα κ.τ.λ., οὕτω λέγομεν ἡ δίεδρος γωνία AB ἡ ΓABD ἡ ΔABD .

Τὸ ἐπίπεδον, τὸ δποῖον τέμνει τὴν ἀκμὴν AB εἰς ἐν σημεῖον E καὶ εἶναι κάθετος ἐπ' αὐτήν, τέμνει τὰς ἔδρας αὐτῆς κατὰ τὰς εύθειας EZ , EH .

"Η γωνία ZEH τῶν εύθειῶν τούτων λέγεται ἀντίστοιχος ἐπίπεδος γωνία τῆς διέδρου ταύτης γωνίας.



Σχ. 225

Α σκηνικός

644. Νὰ νοήσητε ἐπίπεδα κάθετα ἐπὶ τὴν ἀκμὴν μιᾶς διέδρου γωνίας εἰς δύο διάφορα σημεῖα τῆς ἀκμῆς ταύτης καὶ νὰ συγκρίνητε τὰς σχηματιζομένας ἀντιστοίχους ἐπιπέδους γωνίας.

§ 308. Δίεδροι γωνίαι μὲ κοινὴν ἀκμήν. "Ἄν ἔχωμεν ὑπ' ὅψιν τὴν ἀνωτέρω ἀντιστοιχίαν μεταξὺ τῶν δρισμῶν τῶν στοιχείων διέδρων γωνιῶν καὶ ἐπιπέδων γωνιῶν, ἐνθυμηθῶμεν δὲ καὶ τοὺς δρισμοὺς διαφόρων ἐπιπέδων γωνιῶν μὲ κοινὴν κορυφήν, ἀγόμεθα εύκόλως εἰς τοὺς ἔξι δρισμούς:

α') Δύο δίεδροι γωνίαι λέγονται ἐφεξῆς, ἢν ἔχωσιν ἀκμὴν κοινὴν, μίαν ἔδραν κοινὴν καὶ τὰς μὴ κοινὰς ἔδρας ἐκατέρωθεν τῆς κοινῆς.

Π.χ. αἱ δίεδροι ΓΑΒΔ καὶ ΔΑΒΕ (σχ. 226) εἶναι ἐφεξῆς. Ὁμοίως ἐφεξῆς δίεδροι εἶναι καὶ αἱ ΜΑΒΡ, ΡΑΒΝ (σχ. 227).

β') Δύο δίεδροι γωνίαι λέγονται κατὰ κορυφήν, ἢν ἔχωσι κοινὴν ἀκμὴν, αἱ δὲ ἔδραι ἐκατέρωθεν εἶναι προεκτάσεις τῶν ἔδρῶν τῆς ἀλλης.


Π.χ. αἱ ΜΑΒΡ, ΚΑΒΝ (σχ. 227) εἶναι κατὰ κορυφήν δίεδροι γωνίαι.

γ') Δύο ἐπίπεδα λέγονται κάθετα, ἢν αἱ ὑπὸ αὐτῶν σχηματιζόμεναι δίεδροι γωνίαι εἶναι δλαι λσαι (§ 6).


Π.χ. τὰ ἐπίπεδα ΠΠ' καὶ ΡΡ' εἶναι κάθετα, διότι σχηματίζουσι 4 λσας διέδρους γωνίας (σχ. 228).

δ') Δύο ἐπίπεδα λέγονται πλάγια, ἢν αἱ ὑπὸ αὐτῶν σχηματιζόμεναι δίεδροι γωνίαι δὲν εἶναι δλαι λσαι.

Π.χ. Τὰ ἐπίπεδα ΜΝ καὶ ΚΡ (σχ. 227) εἶναι πλάγια.



Σχ. 226




Σχ. 227

ε') Μία διεδρος γωνία λέγεται δρυθή διεδρος, ἀν αἱ ἔδραι αὐτῆς εἰναι κάθετοι.

Π.χ. ἐκάστη ἀπὸ τὰς διέδρους ΠΑΒΡ, ΡΑΒΠ', Π'ΑΒΡ', Ρ'ΑΒΠ (σχ. 228) εἰναι δρυθή διεδρος γωνία.

στ') Μία διεδρος γωνία λέγεται δξεῖα, ἀν εἰναι μικροτέρα δρυθῆς διεδρου γωνίας, ἀμβλεῖα δέ, ἀν εἰναι μεγαλυτέρα δρυθῆς διεδρου γωνίας.

Π.χ. ἡ ΡΑΒΗ εἰναι δξεῖα, ἡ δὲ ΜΑΒΡ εἰναι ἀμβλεῖα διεδρος γωνία (σχ. 227).



Σχ. 228


Α σκήσεις

645. Νὰ δείξητε εἰς τὴν αἰθουσαν τῆς διδασκαλίας ἐν ἐπίπεδον κάθετον ἐπὶ τὸ πάτωμα καὶ τὴν ἀντίστοιχον ἐπίπεδον τῆς διέδρου γωνίας αὐτῶν.

646. Νὰ δείξητε ἐπίσης μίαν διέδρον γωνίαν μὲ κατακόρυφον ἀκμὴν καὶ τὴν ἀντίστοιχον ἐπίπεδον γωνίαν αὐτῆς.

647. Νὰ ἔξετασητε πῶς δύνανται νὰ δονομασθῶσιν ἐκ τῆς ἀμοιβαίας θέσεώς των αἱ ἀντίστοιχοι ἐπίπεδοι δύο ἐφεξῆς διέδρων γωνιῶν.

648. Όμοιαν ἔξετασιν νὰ κάμητε διὰ τὰς ἀντίστοιχους ἐπίπεδους δύο κατὰ κορυφὴν διέδρων γωνιῶν.



γωνίαι αὐτῶν ἡ μία ἀκριβῶς ἐπὶ τῆς ἄλλης. "Ωστε:

Αἱ ἵσαι διεδροι γωνίαι ἔχουσιν ἵσας ἀντίστοιχους ἐπίπεδους γωνίας.

§ 309. Σχέσις τῶν ἀντίστοιχων ἐπίπεδων γωνιῶν δύο ἵσων διέδρων γωνιῶν καὶ ἀντιστρόφως.

α') "Αν δύο ἵσαι διεδροι γωνίαι ἔφαρμόσωσι καὶ ἀχθῆ ἐπίπεδον κάθετον ἐπὶ τὴν κοινὴν ἀκμὴν αὐτῶν, θὰ σχηματισθῶσιν αἱ ἀντίστοιχοι ἐπίπεδοι

β') "Ας ύποθέσωμεν ότι αἱ δίεδροι γωνίαι AB καὶ $\Gamma\Delta$ ἔχουσιν ἵσας ἀντιστοίχους ἐπιπέδους EBZ καὶ $H\Delta\Theta$ (σχ. 229). "Ας νοήσωμεν δὲ ότι ή δίεδρος $\Gamma\Delta$ τίθεται ἐπὶ τῆς AB οὕτως, ὡστε ή γωνία $H\Delta\Theta$ νὰ ἐφαρμόσῃ ἐπὶ τῆς ἵσης EBZ . Τότε ή ἀκμὴ $\Delta\Gamma$ ὡς κάθετος ἐπὶ τὸ ἐπίπεδον $H\Delta\Theta$ θὰ γίνη κάθετος ἐπὶ τὸ ἐπίπεδον EBZ , ἐπομένως θὰ συμπέσῃ μὲ τὴν AB . Διὰ ταῦτα δὲ ή μὲν ἔδρα $\Gamma\Delta\Theta$ θὰ συμπέσῃ μὲ τὴν ἔδραν ABZ , ή δὲ $\Gamma\Delta\Theta$ μὲ τὴν ABE .

Αἱ δίεδροι λοιπὸν γωνίαι ἐφαρμόζουσιν. "Ωστε:


"Ἄν αἱ ἀντιστοιχοὶ ἐπίπεδοι γωνίαι δύο διέδρων γωνιῶν εἰναι ἵσαι, αἱ δίεδροι αὗται γωνίαι εἰναι ἵσαι.

Πόρισμα I. Αἱ κατὰ κορυφὴν δίεδροι γωνίαι εἰναι ἵσαι.

Πόρισμα II. Τῶν δρυθῶν διέδρων γωνιῶν αἱ ἀντιστοιχοὶ ἐπίπεδοι γωνίαι εἰναι δρυθαῖ.

Πόρισμα III. "Ἄν η ἀντιστοιχος ἐπίπεδος διέδρου γωνίας εἰναι δρυθή, ή δίεδρος αὕτη γωνία εἰναι δρυθή.

§ 310. Πῶς μεταβάλλεται μία δίεδρος γωνία μετὰ τῆς ἀντιστοίχου ἐπιπέδου γωνίας αὐτῆς. Καὶ ἀντιστρόφως. "Εστω $\Gamma A B \Delta$ μία δίεδρος γωνία καὶ $\Gamma A \Delta$ ή ἀντιστοιχος ἐπίπεδος γωνία αὐτῆς (σχ. 230).



Σχ. 230

Εἰς τὸ ἐπίπεδον τῆς γωνίας ταύτης ἔστω γωνία $\Delta A E$ ἵση πρὸς τὴν $\Gamma A \Delta$. Εἶναι φανερὸν ότι $\widehat{\Gamma A E} = \widehat{\Gamma A \Delta} \cdot 2$ καὶ ότι ή μὲν $\widehat{\Delta A E}$ εἰναι ἀντιστοιχος ἐπίπεδος τῆς διέδρου $\Delta A B E$, ή δὲ $\widehat{\Gamma A E}$ τῆς διέδρου $\Gamma A B E$. Ἐπειδὴ δὲ δίεδρος $\Gamma A B \Delta =$ δίεδρος $\Delta A B E$, ἐπεται ότι δίεδρος $\Gamma A B E =$ δίεδρος $\Gamma A B \Delta \cdot 2$.

Ἀντιστρόφως: "Άν δίεδρος $\Gamma A B E =$ δίεδρος $\Gamma A B \Delta \cdot 2$, θὰ εἰναι δίεδρος $\Gamma A B \Delta =$ δίεδρος $\Delta A B E$. Ἐπομένως $\widehat{\Gamma A \Delta} = \widehat{\Delta A E}$ καὶ $\widehat{\Gamma A E} = \widehat{\Gamma A \Delta} \cdot 2$. Ομοίως ἀποδεικνύομεν ότι, ἀν τριπλασιασθῇ ή τετραπλασιασθῇ κ.τ.λ. τὸ ἐν τῶν ποσῶν τούτων, καὶ τὸ ἄλλο τριπλασιάζεται ή τετραπλασιάζεται κ.τ.λ. Συμπεραίνομεν λοιπὸν (§ 217) ότι:

Αἱ δίεδροι γωνίαι εἰναι ἀνάλογοι πρὸς τὰς ἀντιστοίχους ἐπιπέδους γωνίας αὐτῶν.

§ 311. Σχέσις τοῦ μέτρου διέδρου γωνίας πρὸς τὸ μέτρον τῆς ἀντιστοίχου ἐπιπέδου γωνίας αὐτῆς. Κατὰ τὴν προηγουμένην ἰδιότητα εἶναι

$$\frac{\text{δίεδρος } \Gamma\text{ΑΒΕ}}{\text{δίεδρος } \Gamma\text{ΑΒΔ}} = \frac{\widehat{\Gamma\text{ΑΕ}}}{\widehat{\Gamma\text{ΑΔ}}}.$$

"Αν δὲ ἡ $\widehat{\Gamma\text{ΑΔ}}$ εἶναι ἡ μονάς τῶν ἐπιπέδων γωνιῶν, τό β' μέλος τῆς ἴσοτητος ταύτης εἶναι τὸ μέτρον τῆς γωνίας ΓΑΕ. Καὶ ἄν, ως συνήθως, ἡ δίεδρος ΓΑΒΔ ληφθῆ δῶς μονάς τῶν διέδρων γωνιῶν, τὸ α' μέλος τῆς ἴδιας ἴσοτητος εἶναι τὸ μέτρον τῆς διέδρου γωνίας ΓΑΒΕ.

Μὲ τὴν προϋπόθεσιν λοιπὸν ταύτην βλέπομεν ὅτι:

Τὸ μέτρον διέδρου γωνίας ἴσουνται πρὸς τὸ μέτρον τῆς ἀντιστοίχου ἐπιπέδου γωνίας αὐτῆς.

Κατὰ ταῦτα ἡ μέτρησις μιᾶς διέδρου γωνίας ἀνάγεται εἰς τὴν μέτρησιν τῆς ἀντιστοίχου ἐπιπέδου γωνίας αὐτῆς. "Αν π.χ. ἡ ἀντιστοίχος γωνία μιᾶς διέδρου γωνίας εἶναι $\frac{7}{8}$ δρθῆς, ἡ διέδρος γωνία θὰ εἶναι $\frac{7}{8}$ τῆς δρθῆς διέδρου γωνίας.

Α σκήσεις

649. Νὰ ἔξετάσητε, ἂν μία διέδρος γωνία δύναται νὰ διχοτομηθῇ καὶ πόσα διχοτόμα ἐπίπεδα δύναται νὰ ἔχῃ.

650. Νὰ εὕρητε τὸ ἀθροισμα δύο ἐφεξῆς διέδρων γωνιῶν, ἂν αἱ μή κοιναὶ ἔδραι αὐτῶν κείνται εἰς τὸ αὐτὸ ἐπίπεδον.

651. Ἀπὸ μίαν εὔθειαν ἐνὸς ἐπιπέδου νὰ νοήσητε διάφορα ἐπίπεδα πρὸς τὸ αὐτὸ μέρος αὐτοῦ. Νὰ εὕρητε δὲ τὸ ἀθροισμα τῶν σχηματιζομένων διαδοχικῶν διέδρων γωνιῶν.

652. Νὰ εὕρητε τὸ ἀθροισμα τῶν διαδοχικῶν διέδρων γωνιῶν, αἱ δοποῖαι σχηματίζονται ἀπὸ διάφορα ἐπίπεδα διερχόμενα ἀπὸ τὴν αὐτὴν εὔθειαν.


§ 312. Γωνίαι δύο ἐπιπέδων τεμνομένων ὑπὸ τρίτου.
Ἐστωσαν δύο ἐπίπεδα Π'Π, Ρ'Ρ, τὰ δοποῖα τέμνονται ἀπὸ ἄλ-

λο Σ'Σ κατά τάς παραλλήλους εύθειας ΑΒ καὶ ΓΔ (σχ. 231).

Εἶναι φανερὸν δτὶ οὕτω σχηματίζονται 4 διέδροι γωνίαι μὲ ἀκμὴν ΑΒ καὶ ἄλλαι 4 μὲ ἀκμὴν ΓΔ. Ἀπὸ αὐτὰς σχηματίζομεν διάφορα ζεύγη διέδρων γωνιῶν, αἱ δποῖαι χαρακτηρίζονται ἀπὸ τὴν θέσιν αὐτῶν ὡς πρὸς τὰ τεμνόμενα ἐπίπεδα καὶ πρὸς τὸ τέμνον αὐτά. Π. χ. αἱ διέδροι γωνίαι ΣΑΒΠ καὶ ΣΓΔΡ ἔχουσι διαφόρους ἀκμάς, κεῖνται πρὸς τὸ αὐτὸν μέρος τοῦ Σ'Σ καὶ ἡ μία μεταξὺ τῶν Π'Π, Ρ'Ρ, ἡ δὲ ἄλλη ἐκτὸς αὐτῶν. Διὰ ταῦτα δὲ αὗται λέγονται ἐντὸς ἐντὸς καὶ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρῃ.


Ομοίως δρίζομεν καὶ ἄλλα ζεύγη κατ' ἀναλογίαν πρὸς τὰ γνωστὰ ζεύγη τῶν γωνιῶν δύο

εύθειῶν τοῦ αὐτοῦ ἐπιπέδου τεμνομένων ὑπὸ τρίτης.



Σχ. 231

Ασκήσεις



653. Νὰ συγκρίνητε δύο ἐντὸς ἐκτὸς καὶ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη διέδρους γωνίας σχηματιζομένας ὑπὸ παραλλήλων ἐπιπέδων τεμνομένων ὑπὸ τρίτου.

654. Νὰ συγκρίνητε δύο ἐντὸς ἐναλλάξ διέδρους γωνίας σχηματιζομένας ὑπὸ παραλλήλων ἐπιπέδων τεμνομένων ὑπὸ τρίτου.

655. Νὰ εὑρητε τὸ ὅθροισμα δύο ἐντὸς καὶ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη διέδρων γωνιῶν σχηματιζομένων ὑπὸ παραλλήλων ἐπιπέδων τεμνομένων ὑπὸ τρίτου.


2. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ

§ 313. Μία εὐθεῖα ΑΒ εἶναι κάθετος ἐπὶ ἐπίπεδον Π. Ἀλλο δὲ ἐπίπεδον Ρ διέρχεται ἀπὸ τὴν ΑΒ. Νὰ ἐξετασθῇ, ἀν τὰ ἐπίπεδα Π καὶ Ρ εἶναι κάθετα ἢ πλάγια (σχ. 232).

Από τὸν πόδα Β τῆς τομῆς ΓΔ τῶν ἐπιπέδων Π καὶ Ρ γράφομεν εἰς τὸ Π εύθεῖαν ΕΒΖ κάθετον ἐπὶ τὴν ΓΔ. Ἐπειδὴ ή ΓΔ εἶναι κάθετος καὶ ἐπὶ τὴν ΑΒ, τὸ ἐπίπεδον ΑΕΖ εἶναι κάθετον ἐπὶ τὴν ΓΔ. Ἐπομένως αἱ ὁρθαὶ γωνίαι ΑΒΕ, ΑΒΖ εἶναι ἀντίστοιχοι ἐπίπεδοι τῶν διέδρων ΑΓΔΕ καὶ ΑΓΔΖ.

Εἶναι λοιπὸν αὗται ὁρθαὶ δίεδροι γωνίαι, τὰ δὲ ἐπίπεδα Π καὶ Ρ εἶναι κάθετα. Βλέπομεν λοιπὸν δτι:

"Αν μία εὐθεῖα εἶναι πάθετος ἐπὶ ἐπίπεδον, πᾶν ἐπίπεδον διερχόμενον δι' αὐτῆς εἶναι πάθετον ἐπὶ τὸ αὐτὸν ἐπίπεδον."



Σχ. 232

§ 314. Δύο ἐπίπεδα Π καὶ Ρ τέμνονται κατὰ τὴν ΓΔ παθέτως. Μία δὲ εὐθεῖα ΑΒ τοῦ Ρ εἶναι πάθετος ἐπὶ τὴν ΓΔ. Νὰ ἔξετασθῇ, ἂν αὕτη εἶναι πάθετος ή πλαγία πεδὸς τὸ Π.

Εἰς τὸ ἐπίπεδον Π γράφομεν τὴν εύθεῖαν ΕΒΖ κάθετον ἐπὶ τὴν ΓΔ καὶ ἐννοοῦμεν, ὡς προηγουμένως, ὅτι αἱ γωνίαι ΑΒΕ, ΑΒΖ εἶναι ἀντίστοιχοι τῶν διέδρων ΑΓΔΕ καὶ ΑΓΔΖ. Ἐπειδὴ δὲ αὗται εἶναι ὁρθαὶ δίεδροι, καὶ αἱ ΑΒΕ, ΑΒΖ εἶναι ὁρθαὶ, ή δὲ ΑΒ εἶναι κάθετος ἐπὶ τὴν ΕΒΖ. Ἐπειδὴ δὲ ή ΑΒ εἶναι ἔξ ύποθέσεως κάθετος καὶ ἐπὶ τὴν ΓΔ, εἶναι κάθετος καὶ ἐπὶ τὸ ἐπίπεδον Π. Βλέπομεν λοιπὸν δτι:

"Αν δύο ἐπίπεδα εἶναι πάθετα, πᾶσα εὐθεῖα τοῦ ἐνὸς πάθετος ἐπὶ τὴν τομήν των εἶναι πάθετος ἐπὶ τὸ ἄλλο ἐπίπεδον."

Πόρισμα I. *"Αν δύο ἐπίπεδα εἶναι πάθετα, πᾶσα εὐθεῖα πάθετος ἐπὶ τὸ ἐν ἀγομένῃ ἐκ σημείου τοῦ ἄλλου κεῖται εἴθε τὸ δεύτερον τοῦτο ἐπίπεδον."*

Πόρισμα II. *"Η προβολὴ ἐπιπέδου σχήματος παθέτου ἐπὶ τὸ προβ. ἐπίπεδον εἶναι εὐθ. τμῆμα."*


Πόρισμα III. "Αν δύο τεμνόμενα ἐπίπεδα P καὶ S είναι κάθετα ἐπὶ άλλο P , ἡ τομὴ AB αὐτῶν είναι κάθετος ἐπὶ τὸ P .

Ασκήσεις

656. Νὰ γράψητε εἰς ἓν ἐπίπεδον μίαν εύθειαν καὶ νὰ ἔξετάσητε, ὅτι διέρχωνται κάθετα ἐπίπεδα ἐπ' αὐτό καὶ πόσα.

657. Νὰ νοήσητε μίαν εύθειαν πλαγίαν πρὸς δοθὲν ἐπίπεδον καὶ νὰ κάμητε τὴν προηγούμενην ἔξέτασιν.

658. Μία εύθεια AB είναι κάθετος ἐπὶ ἓν ἐπίπεδον P . "Άλλο δὲ ἐπίπεδον P μὴ περιέχον τὴν AB είναι κάθετον ἐπὶ τὸ P . Νὰ ἔξετάσητε, ὅτι ἡ AB τέμνῃ τὸ P .



ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'


1. ΑΙ ΣΤΕΡΕΑΙ ΓΩΝΙΑΙ

§ 315. Ἀμοιβαῖαι θέσεις τριῶν ἐπιπέδων. Ἐμάθομεν εἰς τὰ προηγούμενα δτὶ δύο ἐπίπεδα A καὶ B δύνανται νὰ εἶναι παράλληλα ή νὰ τέμνωνται.

"Ἄν ταῦτα εἶναι παράλληλα, ἐν τρίτον ἐπίπεδον Γ παράλληλον πρὸς τὸ B, θὰ εἶναι παράλληλον καὶ πρὸς τὸ A (§ 296 Πόρ.). Βλέπομεν λοιπὸν δτὶ:

a') *Ἐλναι δυνάτδν τρία ἐπίπεδα νὰ εἶναι παράλληλα* (σχ. 233).

"Ἄν δὲ τρίτον ἐπίπεδον Γ τέμνῃ τὸ ἐν τῶν παραλλήλων ἐπιπέδων, θὰ τέμνῃ καὶ τὸ ἄλλο (§ 294. Πόρ.). Ὡστε:




Σχ. 233

b') *Ἐλναι δυνατὸν δύο ἐπίπεδα νὰ εἶναι παράλληλα, τὸ δὲ τρίτον νὰ τέμνῃ ταῦτα* (σχ. 234).

'Ἐμάθομεν δὲ δτὶ αἱ τομαὶ E καὶ Σ τῶν παραλλήλων ἐπιπέδων A καὶ B ύπὸ τοῦ Γ εἶναι εύθεῖαι παράλληλοι.

"Ἔστωσαν ἡδη A καὶ Γ δύο ἐπίπεδα τεμνόμενα καὶ ἔστω E ή τομὴ αὐτῶν (σχ. 234). Εἰς τὸ ἐπίπεδον Γ φέρομεν εύθεῖαν Σ παράλληλον πρὸς τὴν E καὶ ἀπὸ ἐν σημείον αὐτῆς φέρομεν ἄλλην εύθεῖαν Σ' παράλληλον πρὸς τὸ ἐπίπεδον A. Αἱ εύθεῖαι



Σχ. 234

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Σ καὶ Σ' δρίζουσιν ἐν ἐπίπεδον Β παράλληλον πρὸς τὸ Α (§ 293). Οὕτως ἀγόμεθα εἰς τὴν προηγουμένην περίπτωσιν.

"Αν δημως εἰς ἔκαστον τῶν τεμνομένων ἐπιπέδων Α καὶ Β (σχ. 235) φέρωμεν εύθεῖαν παράλληλον πρὸς τὴν τομὴν Ε αὐτῶν, αἱ εύθεῖαι αὗται Σ καὶ Σ' εἰναι καὶ πρὸς ἀλλήλας παράλληλοι (§ 291 Πόρ.). Ορίζουσιν ἐπομένως αὗται τρίτον ἐπίπεδον Γ τέμνον ταῦτα καὶ παράλληλον πρὸς τὴν τομὴν Ε αὐτῶν. Βλέπομεν λοιπὸν δτι:

γ') *Ἐλναι δυνατὸν δύο ἐπίπεδα νὰ τέμνωνται, τὸ δὲ τρίτον ἐπίπεδον νὰ εἰναι παράλληλον πρὸς τὴν τομὴν των καὶ νὰ τέμνῃ ἀμφότερα ταῦτα.*


Εἰς δλας τὰς προηγουμένας περιπτώσεις τὰ τρία ἐπίπεδα οὐδὲν κοινὸν σημεῖον ἔχουσι.

"Αν τέλος ἀπὸ ἐν σημεῖον Δ (σχ. 236) τῆς τομῆς Ε δύο ἐπιπέδων Α,Β φέρωμεν εύθεῖαν Σ εἰς τὸ Α καὶ ἄλλην Σ' εἰς τὸ Β, δρίζεται ύπ' αὐτῶν τρίτον ἐπίπεδον Γ. Τοῦτο δὲ τέμνει τὰ Α,Β καὶ ἔχει μετ' αὐτῶν κοινὸν σημεῖον τὸ Δ. Καὶ πᾶν ἄλλο ἐπίπεδον τέμνον τὴν Ε εἰς τι σημεῖον Δ τέμνει προφανῶς καὶ τὰ Α,Β κατὰ εύθειας διερχομένας διὰ τοῦ Δ. Βλέπομεν λοιπὸν δτι:

δ') *Ἐλναι δυνατὸν τρία ἐπίπεδα νὰ τέμνωνται ἀνὰ δύο καὶ νὰ ἔχωσιν ἐν κοινὸν σημεῖον. Τοῦτο δὲ εἰναι κοινὸν σημεῖον καὶ τῶν τομῶν αὐτῶν.*


§ 316. Τί εἰναι στερεὰ γωνία καὶ ποῖα τὰ στοιχεῖα αὐτῆς. Εἴδομεν προηγουμένως δτι εἰναι δυνατὸν τρία ἐπίπεδα Α,Β,Γ νὰ τέμνωνται ἀνὰ δύο καὶ νὰ διέρχωνται ἀπὸ ἐν σημεῖον Δ, ἀπὸ τὸ δποῖον διέρχονται καὶ αἱ τομαὶ αὐτῶν (σχ. 236).

"Αν νοήσωμεν μόνον τὰ μεταξὺ τῶν τομῶν αὐτῶν περιεχόμενα μέρη τῶν ἐπιπέδων τούτων, ἀποτελεῖται ύπ' αὐτῶν ἐν στερεόν σχῆμα. Τοῦτο λέγεται στερεὰ γωνία.



Σχ. 235

γ') *Ἐλναι δυνατὸν δύο ἐπίπεδα νὰ τέμνωνται, τὸ δὲ τρίτον ἐπίπεδον νὰ εἰναι παράλληλον πρὸς τὴν τομὴν των καὶ νὰ τέμνῃ ἀμφότερα ταῦτα.*



Σχ. 236

Είναι δὲ δυνατὸν καὶ 4 διάφορα ἐπίπεδα νὰ διέρχωνται ἀπὸ ἐν σημεῖον. Τοῦτο ἐννοοῦμεν εὐκόλως ὡς ἔξῆς:

Εἰς ἐν ἐπίπεδον Π δρίζομεν τὰς κορυφὰς Α,Β,Γ,Δ ἐνὸς τετραπλεύρου χωρὶς νὰ γράψωμεν τὰς πλευρὰς αὐτοῦ. Ἀπὸ ἐν δὲ σημεῖον Κ ἐκτὸς τοῦ Π κείμενον φέρομεν τὰς εὐθείας ΚΑ, ΚΒ, ΚΓ, ΚΔ (σχ. 237).

Τὰ ἐπίπεδα ΚΑΒ, ΚΒΓ, ΚΓΔ, ΚΔΑ διέρχονται προφανῶς διὰ τοῦ σημείου Κ.

Ἄν δὲ νοήσωμεν μόνον τὸ μέρος ἑκάστου, τὸ δποῖον περιέχεται μεταξὺ τῶν τομῶν αὐτοῦ ὑπὸ τῶν δύο παρακειμένων καὶ ἀφαιρέσωμεν τὸ ἐπίπεδον Π, μένει ἐνα στερεὸν σχῆμα ΚΑΒΓΔ.

Καὶ τοῦτο δονομάζεται στερεὰ γωνία.

Ομοίως ἐννοοῦμεν δτι δύναται νὰ σχηματισθῇ στερεὰ γωνία μὲ πέντε, ἔξι κ.τ.λ. ἐπίπεδα. Ωστε:

Στερεὰ γωνία είναι σχῆμα, τὸ δποῖον σχηματίζεται ἀπὸ τρία ἢ περισσότερα ἐπίπεδα, τὰ δποῖα διέρχονται ἀπὸ τὸ αὐτὸ σημεῖον καὶ ἔκαστον περατοῦται εἰς τὰς τομὰς αὐτοῦ ὑπὸ τῶν παρακειμένων.

Τὰ ἐπίπεδα, τὰ δποῖα σχηματίζουσι μίαν στερεὰν γωνίαν, λέγονται ἔδραι αὐτῆς.


Ἐκ τοῦ ἀριθμοῦ δὲ τῶν ἔδρῶν αἱ στερεαι γωνίαι διακρίνονται εἰς τριεδρούς, τετραεδρούς κ.τ.λ.

Τὸ κοινὸν σημεῖον τῶν ἔδρῶν στερεᾶς γωνίας λέγεται κορυφὴ αὐτῆς.


Αἱ τομαὶ τῶν ἔδρῶν μιᾶς στερεᾶς γωνίας λέγονται ἀκμαὶ αὐτῆς.

Αἱ γωνίαι τῶν ἀκμῶν ἑκάστης ἔδρας μιᾶς στερεᾶς γωνίας λέγονται καὶ αὐταὶ ἔδραι ἢ ἐπίπεδοι γωνίαι τῆς στερεᾶς γωνίας.

Ἡ τρίεδρος στερεὰ γωνία ΑΒΔΕ (σχ. 238) ἔχει δρθάς καὶ




Σχ. 237



Σχ. 238

τάς τρεῖς έδρας. Διὰ τοῦτο δὲ λέγεται τρισορθογώνιος στερεά γωνία.

Εἶναι δὲ φανερόν ὅτι ἑκάστη έδρα στερεᾶς γωνίας μὲ τάς ἑκατέρωθεν αὐτῆς έδρας σχηματίζει διέδρους γωνίας.



τούτου. Δι' αὐτὸν αἱ τοιαῦται στερεαὶ γωνίαι λέγονται κυρταὶ.

Ὑπάρχουσι δὲ καὶ μὴ κυρταὶ στερεαὶ γωνίαι, διῶς δὲ οεζηθ (σχ. 239).

Α σκήσεις

659. Νὰ δονομάσητε τάς ἀκμάς, έδρας καὶ διέδρους γωνίας τῆς στερεᾶς γωνίας τοῦ σχ. 237.

660. Νὰ γράψῃς τὴν τομὴν τῆς στερεᾶς γωνίας ΑΒΔΕ (σχ. 238) ὑπὸ τοῦ ἐπιπέδου ΕΒΔ.

661. Οδηγούμενοι ἀπὸ τὸ σχῆμα 239 νὰ διακρίνητε ποία διαφορὰ ὑπάρχει μεταξὺ τῶν ἐπιπέδων τομῶν κυρτῆς καὶ μὴ κυρτῆς στερεᾶς γωνίας, ἢν αἱ τομαὶ αὗται δὲν διέρχωνται ἀπὸ τάς κορυφὰς τῶν στερεῶν γωνιῶν.

§ 317. Τί εἶναι κατὰ κορυφὴν ἡ συμμετρικὴ μιᾶς στερεᾶς γωνίας. "Αν προεκτείνωμεν τάς ἀκμάς τυχούστης στερεᾶς γωνίας ΟΑΒΓΔ ἀπὸ τὸ ἄλλο μέρος τῆς κορυφῆς, σχηματίζεται νέα στερεά γωνία Ο.Α'Β'Γ'Δ' (σχ. 240). Αὕτη λέγεται κατὰ κορυφὴν ἡ συμμετρικὴ τῆς Ο.ΑΒΓΔ.

Εύκόλως δὲ βλέπομεν ὅτι: α') Αἱ έδραι τῆς Ο.Α'Β'Γ'Δ' εἰναι, μία πρὸς μίαν, κατὰ κορυφὴν ἐπίπεδοι γωνίαι τῶν ἔδρων τῆς Ο.ΑΒΓΔ. Εἶναι λοιπὸν $\widehat{AOB} = \widehat{A'OB'}$, $\widehat{BOG} = \widehat{B'OG'}$ κ.τ.λ. "Ητοι:

"Αν νοήσωμεν ὅτι ἑκάστη έδρα τῶν ἀνωτέρω στερεῶν γωνιῶν (σχ. 236, 237, 238) προεκτείνεται κατ' ἀμφοτέρας τάς διαστάσεις, ἐννοοῦμεν ὅτι δὴ διαστάσεις, ἐννοοῦμεν δημόσια μένει ἀπὸ τὸ αὐτὸν μέρος τοῦ ἐπιπέδου

Αἱ ἔδραι τῶν κατὰ κορυφὴν στερεῶν γωνιῶν εἰναι ἵσαι, μία πρὸς μίαν.


β') Όμοιως αἱ διεδροὶ τῆς μᾶς στερεᾶς γωνίας εἰναι, μία πρὸς μίαν, κατὰ κορυφὴν τῶν διέδρων τῆς ἄλλης.

'Εννοοῦμεν λοιπὸν δτι:


Αἱ διεδροὶ γωνίαι τῶν κατὰ κορυφὴν στερεῶν γωνιῶν εἰναι ἵσαι, μία πρὸς μίαν.

Κατόπιν τούτων εἰναι φυσικὸν νὰ ἔξετάσωμεν, ἀν δύο κατὰ κορυφὴν στερεαὶ γωνίαι ἐφαρμόζωσιν ἢ μή.

"Εστωσαν λοιπὸν αἱ τρίεδροι κατὰ κορυφὴν στερεαὶ γωνίαι,



Σχ. 240



Σχ. 241

Κ.ΑΒΓ, Κ.Α'Β'Γ' (σχ. 241) καὶ ἃς ὑποθέσωμεν δτι ἡ ἀκμὴ ΚΒ κεῖται ἔμπροσθεν τοῦ ἐπιπέδου ΑΚΓ· ἡ ΚΒ' τότε θὰ εἰναι ὅπισθεν αὐτοῦ. Ἐπομένως, ἀν ἡ ἔδρα Α'ΚΓ' στρέψηται περὶ τὴν κορυφὴν Κ ἐν τῷ ἐπιπέδῳ αὐτῆς, δύναται νὰ ἐφαρμόσῃ ἐπὶ τῆς ἴσης τῆς ἔδρας ΑΚΓ. Αἱ ἀκμαὶ δμως ΚΒ, ΚΒ' κεῖνται ἐκατέρωθεν τοῦ ἐπιπέδου ΑΚΓ καὶ ἐπομένως αἱ στερεαὶ γωνίαι δὲν ἐφαρμόζουσιν. Ἡ αἰτία αὕτη τῆς μὴ ἐφαρμογῆς τῶν σχημάτων τούτων γεννᾷ τὴν ἰδέαν νὰ κάμωμεν τὴν στροφὴν τῆς στερεᾶς γωνίας Κ.Α'Β'Γ' κατὰ τοιοῦτον τρόπον, ώστε νὰ ἔλθῃ ἡ ἀκμὴ ΚΒ' πρὸς τὸ μέρος τῆς ΚΒ σχετικῶς πρὸς τὴν ἔδραν ΑΚΓ.

Πρὸς τοῦτο γράφομεν τὴν φήμη διχοτόμον τῶν γωνιῶν Γ'ΚΑ, Α'ΚΓ καὶ νοοῦμεν δτι ἡ στερεὰ γωνία Κ.Α'Β'Γ' στρέφεται περὶ

τὴν διχοτόμον ταύτην μέχρις ὅτου ἡ γωνία Α'ΚΓ' ἐφαρμόσῃ ἐπὶ τῆς ἵσης τῆς ΑΚΓ.

Οὕτω δὲ ἡ ΚΓ' πίπτει ἐπὶ τῆς ΚΑ καὶ ἡ ΚΑ' ἐπὶ τῆς ΚΓ. Διὰ νὰ ἐφαρμόσωσι δὲ αἱ στερεαὶ γωνίαι, πρέπει ἡ ἀκμὴ ΚΒ' νὰ συμπέσῃ μὲ τὴν ΚΒ. Τοῦτο δὲ γίνεται μόνον, ἢν τὸ ἐπίπεδον ΚΒ'Γ' συμπέσῃ μὲ τὸ ΚΑΒ καὶ τὸ ΚΑ'Β' μὲ τὸ ΚΒΓ. Διὰ νὰ γίνωσι δὲ ταῦτα, πρέπει καὶ ἀρκεῖ νὰ εἰναι ἡ δίεδρος ΚΓ' ἵση μὲ τὴν ΚΑ καὶ ἡ ΚΑ' μὲ τὴν ΚΓ.

'Ἐπειδὴ δὲ $KA = KA'$ καὶ $K\Gamma = K\Gamma'$, αἱ συνθῆκαι αὗται ἀνάγονται εἰς τὴν $KA = K\Gamma$. Δηλ. πρέπει δύο δίεδροι γωνίαι τῆς ΚΑΒΓ νὰ εἰναι ἵσαι. 'Η τοιαύτη τρίεδρος στερεὰ γωνία λέγεται ἴσοσκελής.

'Ἐκ τούτων βλέπομεν διτι:


α') *Αἱ κατὰ κορυφὴν στερεαὶ γωνίαι δὲν ἐφαρμόζουσι πάντοτε.*

β') *Αἱ κατὰ κορυφὴν τριεδροὶ στερεαὶ γωνίαι ἐφαρμόζουσι μόνον, ἢν εἰναι ἴσοσκελεῖς.*

Πόρισμα. "Ἄν δύο δίεδροι γωνίαι τριεδρού στερεᾶς γωνίας εἰναι ἵσαι, καὶ αἱ ἀπέναντι αὐτῶν ἔδραι αὐτῆς εἰναι ἵσαι.

2. ΠΑΡΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΙ ΓΩΝΙΑΙ

§ 18. *Πρόβλημα.* Ἀπὸ δὲ σημεῖον E τῆς ἀκμῆς διέδρου γωνίας AB ἄγομεν εὐθείας EZ , EH ἀντιστοίχως καθέτους ἐπὶ τὰς ἔδρας Γ , Δ καὶ ἐκάστην πρὸς τὸ μέρος τῆς ἄλλης ἔδρας. Νὰ ενορεθῇ τὸ ἀδροισμα τῆς γωνίας τῶν καθέτων τούτων καὶ τῆς ἀντιστοίχου ἐπιπέδου γωνίας τῆς διέδρου (σχ. 242).



Σχ. 242

Ἄνσις. Τὸ ἐπίπεδον ZEH τῶν εὐθειῶν EZ , EH εἰναι κάθετον καὶ ἐπὶ τὰς δύο ἔδρας Γ , Δ (§ 313). Εἰναι ἄρα κάθετον καὶ ἐπὶ τὴν τομὴν AB αὐτῶν (§ 314 Πόρ. III).

"Ἄν δὲ $E\Theta$, EK εἰναι αἱ τομαὶ τῶν ἔδρῶν Γ καὶ Δ ὑπ' αὐ-

τοῦ, ἡ γωνία ΚΕΘ εἶναι ἡ ἀντίστοιχος ἐπίπεδος τῆς διέδρου ΑΒ.

Πρόκειται λοιπὸν νὰ εὐρεθῇ τὸ ἀθροισμα $\widehat{\text{ΚΕΘ}} + \widehat{\text{ΖΕΗ}}$.
Πρὸς τοῦτο παρατηροῦμεν ὅτι:

$$\widehat{\text{ΚΕΘ}} = \widehat{\text{ΚΕΗ}} + \widehat{\text{ΗΕΘ}} = 1 \text{ δρθ.} + \widehat{\text{ΗΕΘ}}$$

Ἐπομένως $\widehat{\text{ΚΕΘ}} + \widehat{\text{ΖΕΗ}} = 1 \text{ δρθ.} + \widehat{\text{ΖΕΗ}} + \widehat{\text{ΗΕΘ}}$. Ἐπειδὴ
δὲ $\widehat{\text{ΖΕΗ}} + \widehat{\text{ΗΕΘ}} = \widehat{\text{ΖΕΘ}} = 1 \text{ δρθ.}$, ἐπειταὶ ὅτι $\widehat{\text{ΚΕΘ}} + \widehat{\text{ΖΕΗ}} = 2 \text{ δρθ.}$
Αἱ γωνίαι δηλ. αὗται εἶναι παραπληρωματικαὶ.

Ἄσκησεις


662. Ἐάν ἡ ΑΒ εἶναι ἀμβλεῖα διέδρος γωνία, νὰ ἔξετάσῃτε, ἂν αἱ
κάθετοι Ζ, ΕΗ εύρισκωνται ἐντὸς ἡ ἐκτὸς τῆς διέδρου ταύτης γωνίας
(σχ. 242).

663. Νὰ κάμητε τὴν αὐτὴν ἔξετασιν, ἂν ἡ διέδρος ΑΒ εἶναι διεῖα
καὶ ἐπειταὶ ἡ εἶναι δρθή.

§ 319. Θεώρημα. Ἀπὸ τὴν κορυφὴν τριέδρου στερεᾶς γωνίας $O.ABΓ$ ἀγονται εὐθεῖαι OA' , OB' , OG' ἀντίστοιχως κάθετε
τοι ἐπὶ τὰς ἔδρας $BΟΓ$, $AΟΓ$, $AΟΒ$ καὶ ἐκάστη πρὸς τὸ μέρος
τῆς τρίτης ἀκμῆς. Αἱ ἔδραι ἐκατέρ
οας τῶν στερεῶν γωνιῶν $O.ABΓ$
 $O.A'B'G'$ εἶναι παραπληρωματικαὶ
τῶν πρὸς τὰς διέδρους τῆς ἀλληλ
ἀντίστοιχων ἐπιπέδων γωνιῶν
(σχ. 243).

Ἀπόδειξις. α') "Εστωσαν α,
β, γ, α', β', γ' τὰ μέτρα τῶν ἐπιπέδων γωνιῶν, αἱ δόποιαι εἶναι κατὰ
σειράν ἀντίστοιχοι τῶν διέδρων
ΟΑ, ΟΒ, ΟΓ, ΟΑ', ΟΒ', ΟΓ'.

Ἐξ ὑποθέσεως αἱ ΟΑ' ΟΒ' εἶναι ἀντίστοιχως κάθετοι ἐπὶ
τὰς ἔδρας $BΟΓ$, $GΟΑ$ τῆς διέδρου ΟΓ. Ἐπειδὴ δὲ ἡ ΟΑ' φέρεται
πρὸς τὸ μέρος τῆς ΟΑ, ἐπειταὶ ὅτι φέρεται καὶ πρὸς τὸ μέρος
τῆς ἔδρας $AΟΓ$. Ὁμοίως ἡ ΟΒ' φέρεται πρὸς τὸ μέρος τῆς
ΒΟΓ. Θά εἶναι λοιπὸν $A'OB' + \gamma = 2 \text{ δρθ.}$ (§ 318).



Σχ. 243

‘Ομοίως ἀποδεικνύεται δτι $B'\widehat{O}\Gamma' + \alpha = 2\text{ δρθ}$, $A'\widehat{O}\Gamma' + \beta = 2\text{ δρθ}$.

β') 'Επειδὴ αἱ OA' , OB' εἰναι κάθετοι ἐπὶ τὴν $O\Gamma$, αὕτη εἰναι κάθετος ἐπὶ τὴν ἔδραν $A'OB'$ καὶ φέρεται πρὸς τὸ μέρος τῆς $O\Gamma'$. ‘Ομοίως ἡ OB εἰναι κάθετος ἐπὶ τὴν ἔδραν $A'O\Gamma'$ καὶ φέρεται πρὸς τὸ μέρος τῆς OB' , ἡ δὲ OA εἰναι κάθετος ἐπὶ τὴν $B'O\Gamma'$ καὶ φέρεται πρὸς τὸ μέρος τῆς OA' . “Ωστε ἡ $O.AB\Gamma$ σχηματίζεται ἐκ τῆς $O.A'B'\Gamma'$, δπως ἡ $O.A'B'\Gamma'$ ἐσχηματίσθη ἐκ τῆς $O.AB\Gamma$. Κατὰ δὲ τὴν προηγούμενην περίπτωσιν θὰ εἰναι:

$$AOB + \gamma' = 2\text{ δρθ}, B\widehat{O}\Gamma + \alpha' = 2\text{ δρθ}, A\widehat{O}\Gamma + \beta' = 2\text{ δρθ}.$$

§ 320. Ποιαὶ λέγονται παραπληρωματικαὶ τρίεδροι στερεαὶ γωνίαι. Αἱ προηγούμεναι τρίεδροι στερεαὶ γωνίαι $O.AB\Gamma$, $O.A'B'\Gamma'$ λέγονται παραπληρωματικαὶ στερεαὶ γωνίαι, ἔνεκα τῆς προηγούμενης ἰδιότητος αὐτῶν. “Ωστε:

Δύο τρίεδροι στερεαὶ γωνίαι λέγονται παραπληρωματικαὶ, ἢν αἱ ἔδραι ἕκατέραις εἰναι παραπληρωματικαὶ τῶν ἀντιστοίχων ἐπιπέδων τῶν διέδρων τῆς ἄλλης.

Πόρισμα I. Τῶν παραπληρωματικῶν τριέδρων στερεῶν γωνιῶν αἱ κατὰ κορυφὴν στερεαὶ γωνίαι εἰναι παραπληρωματικαὶ.

Πόρισμα II. “Ἄν δύο τρίεδροι στερεαὶ γωνίαι εἶχωσι τὰς ἔδρας ἵσας, μιὰν πρὸς μίαν, αἱ παραπληρωματικαὶ αὐτῶν στερεαὶ γωνίαι θὰ εἶχωσι τὰς διέδρους ἵσας, μιὰν πρὸς μιὰν. Καὶ ἀντιστρόφως.

3. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΓΩΝΙΩΝ

§ 321. Νὰ συγκριθῇ ἐκάστη ἔδρα τριέδρου στερεᾶς γωνίας $K.AB\Gamma$ πρὸς τὸ ἄθροισμα καὶ πρὸς τὴν διαφορὰν τῶν δύο ἄλλων ἔδρῶν αὐτῆς (σχ. 244).

“Εστω δτι ἡ ἔδρα $A\Gamma$ εἰναι μεγαλυτέρα ἐκατέρας τῶν ἄλλων. Δυνάμεθα δθεν νὰ κατασκευάσωμεν ἐντὸς αὐτῆς γωνίαν $\Gamma K\Delta$ ἵσην πρὸς τὴν $B\Gamma\Gamma$. “Αγομεν ἔπειτα τυχοῦσαν εὐθεῖαν $A\Delta\Gamma$ καὶ ἐπὶ τῆς τρίτης ἀκμῆς δρίζομεν τμῆμα KB ἵσον πρὸς $K\Delta$.


Ἐκ δὲ τῶν ἵσων τριγώνων ΚΒΓ, ΚΔΓ συμπεραίνομεν ὅτι
 $\Delta\Gamma = \text{ΒΓ}$

Ἐπειδὴ δὲ $\text{ΑΔ} + \Delta\Gamma < \text{ΑΒ} + \text{ΒΓ}$, ἐπε-
 ται ὅτι $\text{ΑΔ} < \text{ΑΒ}$. Τὰ τρίγωνα λοιπὸν ΑΚΔ,
 ΑΚΒ ἔχουσι τὴν ΚΑ κοινήν, $\text{ΚΔ} = \text{ΚΒ}$
 καὶ $\text{ΑΔ} < \text{ΑΒ}$.

Ἐνεκα τούτων εἰναι $\widehat{\text{ΑΚΔ}} < \widehat{\text{ΑΚΒ}}$. Ἐκ
 ταύτης καὶ τῆς ἴσοτητος $\widehat{\text{ΔΚΓ}} = \widehat{\text{ΒΚΓ}}$ ἐπε-
 ται ὅτι

$$\widehat{\text{ΑΚΔ}} + \widehat{\text{ΔΚΓ}} < \widehat{\text{ΑΚΒ}} + \widehat{\text{ΒΚΓ}}$$

$$\text{ή } \widehat{\text{ΑΚΓ}} < \widehat{\text{ΑΚΒ}} + \widehat{\text{ΒΚΓ}}$$




Σχ. 244

Ἐπειδὴ δὲ ύπετέθη $\widehat{\text{ΑΚΒ}} < \widehat{\text{ΑΚΓ}}$ καὶ $\widehat{\text{ΒΚΓ}} < \widehat{\text{ΑΚΓ}}$, κατὰ μεί-
 ζονα λόγον εἰναι $\widehat{\text{ΑΚΒ}} < \widehat{\text{ΑΚΓ}} + \widehat{\text{ΒΚΓ}}$ καὶ $\widehat{\text{ΒΚΓ}} < \widehat{\text{ΑΚΓ}} + \widehat{\text{ΑΚΒ}}$ (2)

Αἱ ἀνισότητες (1) καὶ (2) ἀληθεύουσι προφανῶς καὶ ἀν-
 αὶ δύο ἡ καὶ τρεῖς ἔδραι εἰναι ἴσαι.

Ἐκ τούτων εύκόλως ἐννοοῦμεν ὅτι: $\widehat{\text{ΑΚΒ}} > \widehat{\text{ΑΚΓ}} - \widehat{\text{ΒΚΓ}}$,
 $\widehat{\text{ΒΚΓ}} > \widehat{\text{ΑΚΓ}} - \widehat{\text{ΑΚΒ}}$, $\widehat{\text{ΑΚΓ}} > \widehat{\text{ΑΚΒ}} - \widehat{\text{ΒΚΓ}}$. "Ωστε:

Ἐνάστη ἔδρα τριέδρου στερεᾶς γωνίας εἰναι μικροτέρα τοῦ
 ἀθροίσματος τῶν ἄλλων καὶ μεγαλυτέρα τῆς διαφορᾶς αὐτῶν.



Σχ. 245

κατὰ κυρτὸν ἐπίπεδον σχῆμα ΑΒΓΔ.

§ 322. Νὰ συγκριθῇ τὸ
 ἀθροίσμα τῶν ἔδρῶν κυρ-
 τῆς στερεᾶς γωνίας πρὸς
 τὰς 4 δροῦσας γωνίας.

Ἐντὸς κυρτῆς στερεᾶς
 γωνίας Κ.ΑΒΓΔ (σχ. 245)
 φέρομεν καταλλήλως εὐ-
 θεῖαν ΚΕ, ὥστε ἐν ἐπίπε-
 δον κάθετον ἐπ' αὐτὴν εἰς
 ἐν σημεῖον Ε αὐτῆς νὰ τέ-
 μη τὴν στερεάν γωνίαν

"Αν είς μίσαν έδραν, π.χ. τὴν ΚΑΔ, φέρωμεν τὴν ΚΖ κάθετον ἐπὶ τὴν ΑΔ, καὶ ἡ EZ θὰ εἶναι κάθετος ἐπὶ τὴν ΑΔ κατὰ τὸ β' θεώρημα τῶν τριῶν καθέτων. 'Επειδὴ δὲ ἡ ΚΖ εἶναι ύποτελεύουσα τοῦ δρόμου KEZ, εἶναι ΚΖ > EZ.

"Αν ἐπομένως νοήσωμεν δτι ἡ έδρα ΚΑΔ στρέφεται περὶ τὴν ΑΔ, ἔως δτου πέσῃ ἐπὶ τοῦ ἐπιπέδου ΑΒΓΔ, ἡ ΚΖ θὰ μένῃ διαρκῶς κάθετος ἐπὶ τὴν ΑΔ καὶ διὰ τοῦτο θὰ λάβῃ τὴν διεύθυνσιν τῆς ZE.

"Ενεκα δὲ τῆς ἀνισότητος ΚΖ > EZ, ἡ κορυφὴ Κ θὰ πέσῃ εἰς ἐν σημεῖον κ τῆς προεκτάσεως τῆς ZE.

Οὕτω δὲ τὸ Ε εὑρίσκεται ἐντὸς τοῦ τριγώνου κΑΔ καὶ ως γνωστὸν (§ 86 Πόρ.) εἶναι $\widehat{\Delta K A} < \widehat{\Delta E A}$ ἢ $\widehat{\Delta K A} < \widehat{\Delta E A}$.

'Ομοιως βεβαιούμεθα δτι $\widehat{\Delta K B} < \widehat{\Delta E B}$, $\widehat{\Delta K G} < \widehat{\Delta E G}$, $\widehat{\Delta K D} < \widehat{\Delta E D}$. 'Εκ τούτων διὰ προσθέσεως κατὰ μέλη εὑρίσκομεν δτι:

$$\widehat{\Delta K D} + \widehat{\Delta K B} + \widehat{\Delta K G} + \widehat{\Delta K D} < 4 \text{ δρόμος. Δηλαδὴ:}$$

Τὸ ἄθροισμα τῶν ἔδρων κυρτῆς στερεᾶς γωνίας εἶναι μικρότερον τῶν 4 δρόμων γωνιῶν.

§ 323. Νὰ εὐρεθῶσι τὰ δρια, μεταξὺ τῶν ὅποιων περιέχεται τὸ ἄθροισμα τῶν διέδρων γωνιῶν τριέδρου στερεᾶς γωνίας.

Σύγκρισις. "Αν δ, δ', δ'' εἶναι τὰ μέτρα τῶν διέδρων γωνιῶν π.χ. εἰς μέρη δρθῆς διέδρου γωνίας, τὰ μέτρα τῶν ἀντιστοίχων ἐπιπέδων θὰ εἶναι δ, δ', δ'' εἰς μέρη δρθῆς ἐπιπέδου γωνίας.

"Αν δὲ Α,Β,Γ εἶναι τὰ μέτρα τῶν ἔδρων τῆς παραπληρωματικῆς στερεᾶς γωνίας εἰς μέρη δρθῆς, θὰ εἶναι (§ 319)

$$\delta + A = 2 \text{ δρόμος}, \delta' + B = 2 \text{ δρόμος}, \delta'' + \Gamma = 2 \text{ δρόμος.}$$

'Εκ τούτων δὲ ἔπειται δτι:

$$\delta + \delta' + \delta'' = 6 \text{ δρόμος. } -(A + B + \Gamma).$$

'Επειδὴ δὲ $0 < A + B + \Gamma < 4 \text{ δρόμος}$, ἔπειται δτι:

$$2 \text{ δρόμος. } < \delta + \delta' + \delta'' < 6 \text{ δρόμος, ἥτοι:}$$

Τὸ ἄθροισμα τῶν διέδρων γωνιῶν τριέδρου στερεᾶς γωνίας εἶναι μεγαλύτερον τῶν δύο δρόμων καὶ μικρότερον τῶν δύο δρόμων.

§ 324. Νὰ συγκριθῇ τὸ ἀδηροῖσμα ἐκάστης διέδρου στερεᾶς γωνίας καὶ τὸ δρῦπαν διέδρων πρὸς τὸ ἀδηροῖσμα τῶν δύο ἄλλων διέδρων τῆς αὐτῆς τριέδρου στερεᾶς γωνίας.

Ἄνσις. Ἀπὸ τὰς προηγουμένας ἵστηταις.

$$\delta + A = 2 \delta \rho \theta, \quad \delta' + B = 2 \delta \rho \theta, \quad \delta'' + \Gamma = 2 \delta \rho \theta.$$

εύρισκομεν δτι $A = 2\delta\rho\theta. - \delta$, $B = 2\delta\rho\theta. - \delta'$, $\Gamma = 2\delta\rho\theta. - \delta''$.

"Ἐνεκα τούτων ἡ Α < B + Γ γίνεται 2 δρθ. — δ < 4 δρθ. — (δ' + δ'')).

Ἐκ ταύτης δὲ ἔπειται δτὶ δ' + δ'' < δ + 2 δρθ. Ομοίως εὑρίσκομεν δτὶ δ + δ'' < δ' + 2 δρθ. καὶ δ + δ' < δ'' + 2 δρθ. Βλέπομεν λοιπὸν δτὶ:


Ἐκάστη διεδρος τριέδρου στερεᾶς γωνίας αὐξηθεῖσα κατὰ 2 δρυ. διεδρους γωνίας ὑπερβαίνει τὸ άθροισμα τῶν δύο δὲ λων.

4. ΑΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΙΣΟΤΗΤΟΣ ΤΩΝ ΤΡΙΕΔΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΓΩΝΙΩΝ

§ 325. Θεώρημα I. "Αν δύο τριεδοί στεγεαὶ γωνίαι
 Κ.ΑΒΓ, Δ.ΔΕΖ ἔχωσιν $\widehat{ΑΚΒ} = \widehat{ΔΔΕ}$, $\widehat{ΒΚΓ} = \widehat{ΕΔΖ}$ καὶ διεδ.
 $ΚΒ = δΔ$. $ΔΕ$, αἱ στεγεαὶ αὗται γω-
 νίαι θὰ ἔχωσιν ὡσαὶ καὶ τὰ ἀλλα δμο-
 ειδῆ στοιχεῖα, ἐν πρὸς ἐν, καὶ εἰναι $Γ'$ B'
 ὡσαι ἢ κατὰ κορυφὴν (σχ. 246). A'

Απόδειξις. "Αν θέσωμεν τάχιστερας ταύτας γωνίας οὕτως, ώστε αι έδραι ΑΚΓ καὶ ΔΛΖ νὰ εύρισκονται εἰς τὸ αὐτὸν ἐπίπεδον, αἱ ἀκμαὶ ΚΒ, ΛΕ θὰ κείνται πρὸς τὸ αὐτὸν μέρος τοῦ ἐπιπέδου τούτου ἢ ἔκατέρωθεν αὐτοῦ.

α') Κατὰ τὴν πρώτην περίπτωσιν νοοῦμεν δτὶ ἡ Λ.ΔΕΖ τίθεται ἐπὶ



Σχ. 246

τῆς Κ.ΑΒΓ οὕτως, ὅστε ἡ κορυφὴ Λ νὰ συμπέσῃ μὲ τὴν Κ, ἡ ἀκμὴ ΛΕ μὲ τὴν ΚΒ καὶ τὸ ἐπίπεδον ΕΛΖ ἐπὶ τοῦ ΒΚΓ. Οὕτω δὲ τὸ ἐπίπεδον ΔΛΕ θὰ συμπέσῃ μὲ τὸ ΑΚΒ ἔνεκα τῆς Ισότητος τῶν διέδρων ΚΒ καὶ ΛΕ. Αἱ δὲ ἀκμαὶ ΛΔ, ΖΤ θὰ ἐφαρμό-

σωσιν ἀντιστοίχως ἐπὶ τῶν ΚΑ, ΚΓ ἔνεκα τῶν ἄλλων ἐξ ὑποθέσεως ἀληθῶν ἴσοτήτων.

Ἄλι στερεαὶ λοιπὸν γωνίαι ἐφαρμόζουσι καὶ ἐπομένως εἰναι ἴσαι.

Ἄπο τὸν τρόπον δὲ τοῦτον τῆς ἐφαρμογῆς αὐτῶν γίνεται ἀμέσως φανερὸν ὅτι :

$$\widehat{\text{ΑΚΓ}} = \widehat{\Delta Z}, \text{ διεδ. } \text{KA} = \text{διεδ. } \text{ΛΔ} \text{ καὶ } \text{διεδ. } \text{ΚΓ} = \text{διεδ. } \text{ΛΖ.}$$

β') "Αν αἱ ἀκμαὶ ΚΒ, ΛΕ κεῖνται ἐκατέρωθεν τοῦ ἐπιπέδου, εἰς τὸ δποῖον ἐτέθησαν αἱ ἔδραι ΑΚΓ, ΔΛΖ, ἐργαζόμεθα ὡς ἔξης.

Σχηματίζομεν τὴν $\widehat{\text{Κ.Α'Β'Γ'}}$ κατὰ κορυφὴν τῆς $\widehat{\text{Κ.ΑΒΓ}}$ καὶ παρατηροῦμεν ὅτι $\widehat{\text{Α'ΚΒ'}} = \widehat{\text{ΑΚΒ}} = \widehat{\text{ΔΛΕ}}, \widehat{\text{Β'ΚΓ'}} = \widehat{\text{ΒΚΓ}} = \widehat{\text{ΕΛΖ}},$ διεδ. $\text{ΚΒ}' = \text{διεδ. } \text{ΚΒ} = \text{διεδ. } \text{ΛΕ.}$

Κατὰ δὲ τὴν προηγουμένην περίπτωσιν ἢ Λ.ΔΕΖ ἐφαρμόζει μὲ τὴν $\widehat{\text{Κ.Α'Β'Γ'}}$ καὶ εἰναι $\widehat{\text{ΔΖ}} = \widehat{\text{Α'ΚΓ'}} = \widehat{\text{ΑΚΓ}}, \text{ διεδ. } \text{ΛΔ} = \text{διεδ. } \text{ΚΑ}' = \text{διεδ. } \text{ΚΑ} \text{ καὶ } \text{διεδ. } \text{ΛΖ} = \text{διεδ. } \text{ΚΓ}' = \text{διεδ. } \text{ΚΓ.}$

§ 326. Θεώρημα II. "Αν δύο τρίεδροι στερεαὶ γωνίαι $\text{Κ.ΑΒΓ}, \text{ Δ.ΔΕΖ}$ ἔχωσιν $\widehat{\text{ΑΚΓ}} = \widehat{\text{ΔΖ}}, \text{ διεδ. } \text{ΚΑ} = \text{διεδ. } \text{ΔΔ}, \text{ διεδ. } \text{ΚΓ} = \text{διεδ. } \text{ΔΖ},$ αἱ στερεαὶ αὗται γωνίαι θὰ ἔχωσιν ἴσαι, ἐν πρὸς ἓν, καὶ τὰ ἄλλα δμοειδῆ στοιχεῖα καὶ θὰ εἰναι ἴσαι ἢ κατὰ κορυφὴν (σχ. 246).

"Απόδειξις. Θέτομεν, δπως προηγουμένως, τὰς ἔδρας ΑΚΓ, ΔΛΖ εἰς τὸ αὐτὸν ἐπίπεδον καὶ διακρίνομεν πάλιν δύο περιπτώσεις, καθ' ὅσον αἱ ἀκμαὶ ΚΒ, ΛΕ κεῖνται πρὸς τὸ αὐτὸν μέρος ἢ ἐκατέρωθεν τοῦ ἐπιπέδου τούτου.

Εἰς τὴν α' περίπτωσιν νοοῦμεν ὅτι ἡ στερεὰ γωνία Λ.ΔΕΖ τίθεται ἐπὶ τῆς ἄλλης οὕτως, ώστε ἡ ἔδρα ΔΛΖ νὰ ἐφαρμόσῃ ἐπὶ τῆς ΑΚΓ μὲ τὴν ἀκμὴν ΛΔ ἐπὶ τῆς ΚΑ.

Εύκόλως δὲ βεβαιούμεθα ὅτι αἱ στερεαὶ γωνίαι ἐφαρμόζουσιν. Εἶναι ἄρα ἴσαι.

Καὶ τὰ ἄλλα δὲ δμοειδῆ στοιχεῖα αὐτῶν ἐφαρμόζουσιν, ἐν πρὸς ἓν, καὶ ἐπομένως εἰναι ἴσα.

Κατὰ τὴν β' περίπτωσιν σχηματίζομεν τὴν $\widehat{\text{Κ.Α'Β'Γ'}}$ κατὰ

κορυφήν τῆς Κ.ΑΒΓ καὶ ἀποδεικνύομεν ὅτι μὲ ἐκείνην ἔφαρμό-
ζει ἡ Λ.ΔΕΖ κ.τ.λ.

§ 327. Θεώρημα III. *"Ἄν δύο τρίεδροι στεγεῖσθαι γωνίαι
Κ.ΑΒΓ, Λ.ΔΕΖ ἔχωσι $\widehat{AKB} = \widehat{\Delta\Lambda E}$, $\widehat{BKG} = \widehat{ELZ}$, $\widehat{AKG} = \widehat{\Delta LZ}$,
θὰ ἔχωσι καὶ $\delta.KG = \delta.LZ$, $\delta.KA = \delta.\Delta\Lambda$, $\delta.KB = \delta.\Delta E$ καὶ
θὰ εἰναι ἵσαι ἡ κατὰ κο-
ευφήν (σχ. 247).*

'Από δειξις. α') *"Ε-
στω ὅτι αἱ ἀκμαὶ KB, LE
κείνται πρὸς τὸ αὐτὸν μέ-
ρος τοῦ ἐπιπέδου, ἐπὶ τοῦ
ὅποιου θέτομεν τὰς ἔδρας
ΑΚΓ, ΔΛΖ.*

*'Ἐπὶ τῶν ἀκμῶν δρί-
ζομεν τμήματα KA, KB,
ΚΓ, ΛΔ, ΛΕ, ΛΖ πάντα*

*ἵσα καὶ παρατηροῦμεν ὅτι τὰ τρίγωνα AKB, BKG, ΓKA εἰναι
ἀντιστοίχως ἵσα πρὸς τὰ ΔΛΕ, ELZ, ΖΔ.*

*Διὰ ταῦτα δὲ εἰναι $AB = \Delta E$, $BG = EZ$, $GA = ZD$. Καὶ τὰ
τρίγωνα λοιπὸν AΒΓ καὶ ΔΕΖ εἰναι ἵσα.*

*"Ἄν δὲ νοήσωμεν τὰς KK, LL ἀντιστοίχως καθέτους ἐπὶ τὰ
ἐπιπέδα AΒΓ, ΔΕΖ παρατηροῦμεν ὅτι: Ἐπειδὴ $KA = KB = KG$,
εἰναι καὶ $\kappa A = \kappa B = \kappa G$. Τὸ κ λοιπὸν εἰναι κέντρον τῆς περὶ τὸ
AΒΓ περιγεγραμμένης περιφερείας.*


*'Ομοίως δὲ βλέπομεν ὅτι καὶ τὸ λ εἰναι κέντρον τῆς περὶ
τὸ ΔΕΖ περιγεγραμμένης περιφερείας.*

*Καὶ ἐπειδὴ τὰ τρίγωνα εἰναι ἵσα καὶ αἱ περιφέρειαι αὗται
εἰναι ἵσαι καὶ $\kappa G = \lambda Z$.*

*Τὰ δρθ. τρίγωνα KKG, LLZ εἰναι λοιπὸν ἵσα καὶ διὰ τοῦτο
εἰναι KK = LL.*

*'Εάν λοιπὸν νοήσωμεν ὅτι τὸ σχῆμα ΛΔΕΖ τίθεται ἐπὶ τοῦ
ΚΑΒΓ οὕτως, ὡστε τὸ τρίγωνον ΔΕΖ νὰ ἔφαρμόσῃ ἐπὶ τοῦ
ΑΒΓ, τὸ λ θὰ συμπέσῃ μὲ κ, ἡ LL μὲ τὴν KK καὶ τὸ Λ μὲ τὸ K.*

Αἱ ἀκμαὶ λοιπὸν ΛΔ, ΛΕ, ΛΖ ἔφαρμόζουσιν ἀντιστοίχως



Σχ. 247

έπι τῶν ΚΑ, ΚΒ, ΚΓ καὶ αἱ στερεαι γωνίαι ἐφαρμόζουσιν.
Εἶναι λοιπὸν αὐται ἴσαι.

Κατὰ τὴν τοιαύτην δὲ σύμπτωσιν τῶν στερεῶν γωνιῶν βλέπομεν δτι αἱ ἀπέναντι ἴσων ἑδρῶν διεδροι γωνίαι αὐτῶν ἐφαρμόζουσι καὶ ἐπομένως εἶναι ἴσαι.

β') "Αν αἱ ἀκμαὶ ΚΒ, ΛΕ κεῖνται ἐκατέρωθεν τοῦ κοινοῦ ἐπιπέδου τῶν ἑδρῶν ΑΚΓ, ΔΛΖ, ἡ στερεά γωνία Λ.ΔΕΖ ἐφαρμόζει μὲ τὴν Κ.Α'Β'Γ' κατὰ κορυφὴν τῆς Κ.ΑΒΓ, διότι αἱ δύο αὐται ἔχουσιν ἴσας τὰς ἑδρας, μίαν πρὸς μίαν. Εἶναι δὲ π.χ. δ. ΛΔ = δ. ΚΑ' = δ. ΚΑ κ.τ.λ.


§ 328. Θεώρημα IV. "Αν δύο τριεδροι στερεαι γωνίαι Κ καὶ Δ ἔχωσι τὰς διέδρους γωνίας ἴσας, μίαν πρὸς μίαν, θὰ ἔχωσι καὶ τὰς ἀπέναντι ἑδρας ἴσας, μίαν πρὸς μίαν, καὶ θὰ εἶναι ἴσαι ἡ κατὰ κορυφὴν.

'Απόδειξις. "Εστωσαν Κ', Λ' αἱ παραπληρωματικαὶ τῶν Κ καὶ Λ. Γνωρίζομεν (§ 320 Πόρ. II) δτι αἱ Κ', Λ' θὰ ἔχωσι τὰς ἑδρας ἴσας, μίαν πρὸς μίαν. "Ενεκα δὲ τούτου θὰ ἔχωσι καὶ τὰς διέδρους ἴσας, μίαν πρὸς μίαν (§ 327).

Αἱ παραπληρωματικαὶ αὐτῶν Κ καὶ Λ θὰ ἔχωσι τὰς ἑδρας ἴσας καὶ θὰ εἶναι ἴσαι ἡ κατὰ κορυφὴν (§ 320 Πόρ. II).

Ασκήσεις

664. "Αν δύο ἑδραι τριέδρου στερεᾶς γωνίας εἶναι ἴσαι, νὰ συγκριθσιν αἱ ἀπέναντι τούτων διέδροι γωνίαι αὐτῆς.

665. "Αν δύο διέδροι τριέδρου στερεᾶς γωνίας εἶναι ἴσαι, νὰ συγκριθσιν αἱ ἀπέναντι τούτων ἑδραι αὐτῆς. ('Εργασία μὴ στηριζούμενη ἐπὶ τῶν κατὰ κορυφὴν στερεῶν γωνιῶν).

666. "Αν δύο διέδροι τριέδρου στερεᾶς γωνίας εἶναι ἄνισοι, νὰ συγκριθσιν αἱ ἀπέναντι αὐτῶν ἑδραι αὐτῆς.

667. "Αν δύο ἑδραι τριέδρου στερεᾶς γωνίας εἶναι ἄνισοι, νὰ συγκριθσιν αἱ ἀπέναντι τούτων διέδροι γωνίαι αὐτῆς.

Ασκήσεις πρὸς ἐπανάληψιν τοῦ Ε' βιβλίου

668. Μία εὐθεῖα ΟΓ κεῖται ἐκτὸς τοῦ ἐπιπέδου δύο ἄλλων εὐθειῶν ΟΑ, ΟΒ. "Εν δὲ σημεῖον Δ κεῖται ἐκτὸς τῶν ΟΑ, ΟΒ, ΟΓ. Νὰ

εύρητε τὸν γεωμ. τόπον τῶν κοινῶν σημείων τῶν ἐπιπέδων ΟΑΔ, ΟΒΔ, ΟΓΔ.

669. Νὰ εύρητε τὸν γεωμ. τόπον τῶν σημείων, ὃν ἔκαστον ἀπέχει ἵσον ἀπὸ τὰς κορυφὰς δοθέντος τριγώνου.

670. Δίδεται ἐπίπεδον Π καὶ ἑκτὸς αὐτοῦ τρία σημεῖα Α, Β, Γ μὴ κείμενα ἐπ' εύθειας. Νὰ ἔξετάσῃτε πῶς εἰναι δυνατὸν νὰ δρισθῇ σημεῖον Μ τοῦ ἐπιπέδου Π τοιοῦτον, ὥστε νὰ εἰναι ΜΑ=ΜΒ=ΜΓ.

671. Εἰς τὸ κέντρον Κ τοῦ ἐγγεγραμμένου κύκλου εἰς τρίγωνον ΑΒΓ ὑφοῦται κάθετος ΚΔ ἐπὶ τὸ ἐπίπεδον τοῦ τριγώνου τούτου καὶ φέρομεν εὐθεῖαν ΔΕ κάθετον ἐπὶ τὴν πλευράν ΑΒ. Νὰ ἀποδείξῃτε ὅτι δ ποὺς Ε εἰναι τὸ σημεῖον ἐπαφῆς τῆς ΑΒ.

672. Νὰ εύρητε τὸν γεωμ. τόπον τῶν σημείων, ὃν ἔκαστον ἀπέχει ἵσον ἀπὸ τὰς πλευράς τριγώνου ΑΒΓ.

673. Δίδεται ἐπίπεδον Π καὶ εὐθεῖα Ε παράλληλος πρὸς αὐτό. Νὰ ἔξετάσῃτε πῶς εἰναι δυνατὸν νὰ δρισθῇ ἐν ἐπίπεδον παράλληλον πρὸς τὸ Π καὶ διερχόμενον διά τῆς Ε.

674. Δίδονται δύο ἀσυμβάτων εὐθεῖαι Ε καὶ Ε'. Νὰ ἔξετάσῃτε πῶς εἰναι δυνατὸν νὰ δρισθῶσι δύο ἐπίπεδα παράλληλα καὶ διερχόμενα ἀνὰ ἐν διὰ τῶν εὐθειῶν Ε καὶ Ε'.

675. Ἐν εὐθ. τμῆμα ΒΑ προβάλλεται ἐπὶ ἐν ἐπίπεδον Π κατὰ τμῆμα Βα, ἵσον πρὸς τὸ ἡμίσιο τοῦ ΒΑ. Νὰ εύρητε τὸ μέτρον τῆς κλίσεως τῆς εὐθείας ΑΒ πρὸς τὸ Π.

676. "Αν ΑΒ εἰναι ἡ ἀπόστασις δύο ἀσυμβάτων εὐθειῶν Ε καὶ Ε' καὶ Π τὸ ἐπίπεδον, τὸ δποῖον τέμνει δίχα καὶ καθέτως τὴν ἀπόστασιν ΑΒ, νὰ ἀποδείξῃτε ὅτι: "Αν Γ, Γ' εἰναι ἀντιστοίχως τυχόντα σημεῖα τῶν Ε, Ε', τὸ τμῆμα ΓΓ' διχοτομεῖται ὑπὸ τοῦ Π.

677. Δύο ἐπίπεδα Π καὶ Ρ τέμνονται κατὰ εὐθείαν ΓΔ. Μία δὲ εὐθεῖα ΑΒ εἰναι κάθετος ἐπὶ τὸ Ρ καὶ προβάλλεται ἐπὶ τὸ Π κατὰ τὴν εὐθείαν αβ. Νὰ ἀποδείξῃτε ὅτι αι εὐθεῖαι αβ καὶ ΓΔ εἰναι κάθετοι.

678. Νὰ εύρητε τὸν γεωμ. τόπον τῶν σημείων, ὃν ἔκαστον ἀπέχει ἵσον ἀπὸ τὰς ἔδρας δοθέσης διέδρου γωνίας.

679. Νὰ ἀποδείξῃτε ὅτι τὰ ἐπίπεδα, τὰ δποῖα διχοτομοῦσι τὰς διέδρους γωνίας μιᾶς τριέδρου στερεᾶς γωνίας, διέρχονται ἀπὸ τὴν αὐτὴν εὐθείαν.

680. Νὰ συγκρίνητε τὰς ἀπόστασεις τῶν ἄκρων τῆς μιᾶς διαγωνίου ΑΓ ἐνὸς παραλληλογράμμου ΑΒΓΔ ἀπὸ τυχὸν ἐπίπεδον Π, τὸ δποῖον διέρχεται ἀπὸ τὴν ἀλλην διαγώνιον ΒΔ τοῦ αὐτοῦ παραλληλογράμμου.

681. "Εστωσαν α, α' αι προβολαι ἐνὸς σημείου Α ἐπὶ τὰς ἔδρας Ε, Ε' μιᾶς διέδρου γωνίας ΕΓΔΕ'. "Αν ἡ αβ εἰναι κάθετος ἐπὶ τὴν ἀκμὴν ΓΔ εἰς τὸ σημεῖον β αὐτῆς, νὰ ἀποδείξῃτε ὅτι καὶ ἡ αβ' εἰναι κάθετος ἐπὶ τὴν ΓΔ.

682. 'Ἐκ σημείου β τῆς ἀκμῆς ΓΔ διέδρου γωνίας ΕΓΔΕ' ἀγονται

εύθειαι βα, βα', κάθετοι ἐπὶ τὴν ΓΔ καὶ κείμεναι ἀντιστοίχως ἐπὶ τῶν ἔδρῶν Ε, Ε'. Νὰ ἀποδείξητε δtti δύο σημεῖα α, α' αὐτῶν εἰναι προβολαὶ ἑνὸς σημείου Α ἐπὶ τὰς ἔδρας ταύτας.

683. "Αν μία τούλαχιστον πλευρά δρθῆς γωνίας εἰναι παράλληλος πρὸς προβολικὸν ἐπίπεδον, νὰ ἀποδείξητε δtti ἡ προβολὴ τῆς δρθῆς ταύτης γωνίας εἰναι δρθή γωνία.

684. Νὰ ἔξετάσητε τί εἴδους γωνία εἰναι ἡ προβολὴ δρθῆς γωνίας ἐπὶ ἐπίπεδον, ἀν αἱ πλευραὶ αὐτῆς τέμνωσι τὸ προβολικόν ἐπίπεδον.

685. Νὰ εὕρητε τὸν γεωμ. τόπον τῶν σημείων, ἀν ἔκαστον ἀπέχει ἵσον ἀπὸ δύο εὐθειῶν τοῦ αὐτοῦ ἐπιπέδου.

686. Νὰ ἀποδείξητε δtti τὰ ἐπίπεδα, τὰ δοποῖα τέμνουσι δίχα καὶ καθέτως τὰς ἔδρας τριέδρου στερεᾶς γωνίας, διέρχονται ἀπὸ μίαν εὐθείαν.

687. Νὰ ἀποδείξητε δtti τὰ ἐπίπεδα, τὰ δοποῖα δρίζονται ἀπὸ τὰς ἀκμὰς καὶ ἀπὸ τὰς διχοτόμους τῶν ἀπέναντι ἔδρῶν τριέδρου στερεᾶς γωνίας, διέρχονται ἀπὸ τὴν αὐτὴν εὐθείαν.

688. "Αν μία διεδρος γωνία τριέδρου στερεᾶς γωνίας εἰναι δρθή, νὰ ἀποδείξητε δtti ἡ τομὴ τῆς στερεᾶς ταύτης γωνίας ὅπδ ἐπιπέδου καθέτου ἐπὶ μίαν ἀκμὴν αὐτῆς εἰναι δρθογώνιον τρίγωνον.

689. "Εστω Κ.ΑΒΓ μία τρισορθογώνιος τρίεδρος στερεὰ γωνία καὶ ΑΒΓ τυχούσα ἐπίπεδος τομὴ αὐτῆς μὴ διερχομένη διὰ τῆς κορυφῆς Κ. "Αν κ εἰναι ἡ προβολὴ τῆς κορυφῆς Κ ἐπὶ τὸ ἐπίπεδον ΑΒΓ, νὰ ἀποδείξητε δtti τὸ κ εἰναι δρθόκεντρον τοῦ τριγώνου ΑΒΓ.

690. "Υπὸ τὰς προηγουμένας προϋποθέσεις νὰ ἀποδείξητε δtti μεταξὺ τῶν τριγώνων ΑΒΓ, ΑΒΚ, ΑΒκ ὑφίσταται ἡ ἀναλογία

$$(ΑΒΓ):(ΑΚΒ)=(ΑΚΒ):(ΑκΒ).$$

691. "Υπὸ τὰς αὐτὰς προϋποθέσεις νὰ ἀποδείξητε δtti:

$$(ΑΒΓ)^2=(ΑΚΒ)^2+(ΑΚΓ)^2+(ΒΚΓ)^2.$$

ΒΙΒΛΙΟΝ ΕΚΤΟΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

1. ΤΑ ΠΟΛΥΕΔΡΑ


§ 329. Τί είναι πολύεδρα καὶ ποῖα είναι τὰ στοιχεῖα αὐτῶν. Παρατηροῦντες τὸ σῶμα ΑΘ (σχ. 248) βλέπομεν ὅτι τοῦτο περικλείεται ἀπὸ ἐπίπεδα ἀπὸ δὲ τὰ μέρη.

Τὸ σῶμα τοῦτο λέγεται πολύεδρον. Διὰ τὸν αὐτὸν λόγον καὶ τὰ σώματα ΑΖ, ΚΛΜΝ (σχ. 249) είναι πολύεδρα. "Ωστε:

Πολύεδρον είναι σῶμα, τὸ δποῖον περικλείεται πανταχόθεν ἀπὸ ἐπίπεδα.

Τὰ ἐπίπεδα, τὰ δποῖα περικλείουσιν ἐν πολύεδρον, λέγονται ἔδραι αὐτοῦ.


Παρατηροῦντες ὅτι τρία ἐπίπεδα διερχόμενα ἀπὸ ἓν σημεῖον σχηματίζουσι στερεάν γωνίαν, ἡ δποία δὲν κλείει τὸν χῶρον ἀπὸ δὲ τὰ μέρη. Χρειάζεται λοιπὸν ἐν τούλαχιστον ἐπίπεδον ἀκόμη, διὰ νὰ σχηματισθῇ πολύεδρον.



Σχ. 248

"Ἐπομένως δὲν ὑπάρχει πολύεδρον μὲν ἔδρας διλιγωτέρας τῶν τεσσάρων.

"Ωστε τὰ πολύεδρα ἐκ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ἔδρῶν διακρίνονται εἰς τετράεδρα, πεντάεδρα, ἑξάεδρα



Σχ. 249

κ.τ.λ. Π.χ. τὸ ΚΛΜΝ είναι τετράεδρον, τὸ ΑΖ είναι ἑξάεδρον (σχ. 249), τὸ ΑΘ ἑπτάεδρον (σχ. 248).

Αι έδραι έκάστου πολυέδρου σχηματίζουσι διέδρους και στερεάς γωνίας. Αὗται ἀνήκουσι προφανῶς καὶ εἰς τὸ πολύεδρον καὶ λέγονται διέδροι καὶ στερεαὶ γωνίαι τοῦ πολυέδρου.

Ἐπίσης αἱ ἀκμαὶ καὶ αἱ κορυφαὶ τῶν στερεῶν γωνιῶν ἐνὸς πολυέδρου λέγονται ἀκμαὶ καὶ κορυφαὶ τοῦ πολυέδρου τούτου.

Αἱ γωνίαι τῶν ἑδρῶν ἐνὸς πολυέδρου λέγονται ἐπίπεδοι γωνίαι αὐτοῦ.

Τὸ εὔθ. τμῆμα BH (σχ. 249) δρίζεται ἀπὸ δύο κορυφᾶς ἐνὸς πολυέδρου, αἱ δόποιαι δὲν κεῖνται εἰς τὴν αὐτὴν ἔδραν. Τοῦτο λέγεται Ἰδιαιτέρως διαγώνιος τοῦ πολυέδρου. Ὁμοίως τὰ τμήματα ΔΕ, ΓΘ εἶναι διαγώνιοι τοῦ αὐτοῦ πολυέδρου διὰ τὸν αὐτὸν λόγον. "Ωστε:

Διαγώνιος πολυέδρου λέγεται πᾶν εὐθ. τμῆμα, τὸ δόποιον δρίζεται ἀπὸ δύο κορυφᾶς αὐτοῦ, αἱ δόποιαι δὲν κεῖνται εἰς τὴν αὐτὴν ἔδραν.

"Αν νοήσωμεν διὰ μία τυχοῦσα ἔδρα τοῦ πολυέδρου ΑΘ (σχ. 248) προεκτείνεται καὶ κατὰ τὰς δύο διαστάσεις αὐτῆς, βλέπομεν διὰ δύο τὸ πολύεδρον μένει πρὸς τὸ αὐτὸ μέρος τοῦ ἐπιπέδου τῆς ἔδρας ταύτης. Διὰ τοῦτο τὸ ΑΘ λέγεται κυρτὸν πολύεδρον.

Διὰ τὸν αὐτὸν λόγον καὶ τὰ σώματα AZ, ΚΛΜΝ (σχ. 249) εἶναι κυρτὰ πολύεδρα. "Ωστε:

"Ἐν πολύεδρον λέγεται κυρτόν, ἢν ἐκάστη ἔδρα αὐτοῦ προεκτεινομένη ἀφήνῃ διάληξον τὸ πολύεδρον πρὸς τὸ αὐτὸ μέρος.

Α σκήσεις

692. Νὰ δονομάσητε τὰς κορυφάς, ἀκμάς καὶ διέδρους γωνίας τοῦ τετράεδρου ΚΛΜΝ (σχ. 249).

693. Νὰ δονομάσητε τὰς διαγωνίους τοῦ ἔξαέδρου ΑΖ (σχ. 249).

694. Τι ἀξιοπαρατήρητον συμβαίνει εἰς τὸ τετράεδρον ΚΛΜΝ σχετικῶς μὲ τὰς διαγωνίους καὶ διατί;

695. Προσπαθήσατε νὰ διακρίνητε ἀντιστοιχίας μεταξὺ πολυγώνων καὶ πολυέδρων καὶ τῶν στοιχείων αὐτῶν.

2. ΕΙΔΗ ΠΟΛΥΕΔΡΩΝ — ΠΡΙΣΜΑΤΑ

§ 330. Ποῖα πολύεδρα λέγονται πρίσματα καὶ ποῖα εἶναι τὰ στοιχεῖα αὐτῶν. Ἐστω τυχὸν κυρτὸν ἐπίπεδον σχῆμα ΑΒΓΔΕ (σχ. 248). Ἄς νοήσωμεν εύθ. τμήματα ΖΗ, ΖΚ, ΚΙ, ΙΘ, ΘΗ, ΕΚ πάντα ἵσα, παράλληλα, διμόρροπα καὶ ἐκτὸς τοῦ ἐπιπέδου ΑΒΓΔΕ.

"Ἄν νοήσωμεν καὶ τὰ εύθ. τμήματα ΖΗ, ΖΚ, ΚΙ, ΙΘ, ΘΗ, σχηματίζονται τὰ παραλληλόγραμμα ΑΒΖΗ, ΒΓΘΗ, ΓΔΙΘ, ΔΕΚΙ, ΑΕΚΖ. Ἀπὸ αὐτὰ ἔννοοῦμεν ὅτι τὰ εύθ. τμήματα ΖΗ, ΗΘ, ΘΙ, ΙΚ, ΚΖ εἶναι ἀντιστοίχως ἵσα καὶ παράλληλα πρὸς τὰ ΑΒ, ΒΓ, ΓΔ, ΔΕ, ΕΑ.

"Ἐπεται λοιπὸν ὅτι $\widehat{A} = \widehat{Z}, \widehat{B} = \widehat{H}$ κ.τ.λ., ὅτι αἱ γωνίαι Ζ, Η, Θ κ.τ.λ. κείνται εἰς ἐπίπεδον παράλληλον πρὸς τὸ ΑΒΓΔΕ καὶ ὅτι αἱ ἔδραι ΑΒΓΔΕ, ΖΗΘΙΚ εἶναι ἵσαι.

Τὸ οὕτω σχηματιζόμενον πολύεδρον λέγεται ίδιαιτέρως πρίσμα. Δηλαδὴ :

Πρίσμα εἶναι πολύεδρον, τοῦ δπολον δύο ἔδραι εἶναι ἵσαι καὶ παράλληλοι, αἱ δὲ ἄλλαι εἶναι παραλληλόγραμμα.

Αἱ ἵσαι καὶ παράλληλοι ἔδραι ἐνὸς πρίσματος λέγονται βάσεις αὐτοῦ. Αἱ δὲ ἄλλαι λέγονται παράπλευρα.

"Ἄν αἱ βάσεις ἐνὸς πρίσματος εἶναι τρίγωνα, τοῦτο λέγεται τριγωνικὸν πρίσμα.


"Ἄν αἱ βάσεις εἶναι τυχόντα τετράπλευρα, τὸ πρίσμα λέγεται τετραγωνικὸν κ.τ.λ.

"Ἄν αἱ παράπλευροι ἔδραι εἶναι δλαι δρθογώνια, τὸ πρίσμα λέγεται δρθόν.


Τὰ μὴ δρθὰ πρίσματα λέγονται πλάγια. Π. χ. τὸ ΑΘ (σχ. 248) εἶναι δρθόν, τὸ δὲ ΡΣ (σχ. 250) εἶναι πλάγιον πρίσμα.

"Ἡ ἀπόστασις τῶν βάσεων ἐνὸς πρίσματος λέγεται ὕψος αὐτοῦ.


Αἱ ἐκτὸς τῶν βάσεων πλευραὶ τῶν παραπλεύρων ἔδρῶν



Σχ. 250



πρίσματος λέγονται ίδαιτέρως *πλευραί* τοῦ πρίσματος. Π.χ. τὰ τμήματα AZ , BH , $\Gamma\Theta$ κ.τ.λ. εἶναι πλευραὶ τοῦ πρίσματος $A\Theta$ (σχ. 248). Ἐπειδὴ δὲ τοῦτο εἶναι ὅρθὸν πρῆσμα, ἐκάστη πλευρά εἶναι καὶ ὄψος αὐτοῦ.



Σχ. 251

Αἱ πλευραὶ π.χ. AZ , ΔI διέρχονται ἀπὸ τὰ ἄκρα τῆς διαγώνου $A\Delta$ τῆς βάσεως. Αὗται ὅριζουσι τὸ ἐπίπεδον $A\Delta IZ$ (σχ. 248).

Πᾶν τοιούτον ἐπίπεδον λέγεται *διαγώνιον ἐπίπεδον* τοῦ πρίσματος.

Ἄποδ ἐν σημεῖον K μιᾶς πλευρᾶς GH πρίσματος φέρομεν ἐπίπεδον κάθετον ἐπὶ τὴν πλευρὰν ταύτην (σχ. 251). Τοῦτο εἶναι κάθετον καὶ ἐπὶ τὰς

ἄλλας πλευράς καὶ τέμνει τὸ πρῆσμα κατὰ τὸ σχῆμα $KLMN$.

Τοῦτο λέγεται *κάθετος τομὴ* τοῦ $A\Theta$ (σχ. 251).

'Α σκήνσεις

~~696.~~ Νὰ ἀποδείξῃς ὅτι ἔκαστον διαγώνιον ἐπίπεδον πρίσματος τέμνει τὰς βάσεις κατὰ διαγώνους αὐτῶν ἵσας καὶ παραπλήλους.

~~697.~~ Ἐκάστη βάσις πρίσματος ἔχει ν πλευράς. Νὰ εῷρητε τὸν κοινόν τῶν διαγώνων ἐπιπέδων αὐτοῦ.

~~698.~~ Ἀν δύο διαγώνια ἐπίπεδα ὅρθοῦν πρίσματος τέμνωνται, νὰ ἀποδείξῃς ὅτι ἡ τομὴ αὐτῶν εἶναι κάθετος ἐπὶ τὰς βάσεις.

~~699.~~ Νὰ ἀποδείξῃς ὅτι πᾶσα κάθετος τομὴ ὅρθοῦν πρίσματος εἶναι παραπλήλος πρὸς τὰς βάσεις αὐτοῦ.

§ 331. Πρόβλημα. Νὰ εὑρεθῇ τὸ ἐμβαδὸν τῆς παραπλεύρου ἐπιφανείας δροῦ πρίσματος ἐκ τοῦ ὄψος καὶ τῆς περιμέτρου τῆς βάσεως αὐτοῦ.

Δύσις. "Εστω $A\Theta$ τυχὸν ὅρθὸν πρῆσμα, E τὸ ζητούμενον ἐμβαδὸν τῆς παραπλεύρου ἐπιφανείας αὐτοῦ καὶ υ τὸ ὄψος AE αὐτοῦ (σχ. 251). Εἶναι λοιπὸν

$$E = (ABZE) + (B\Gamma\Theta Z) + (\Gamma\Delta\Theta H) + (\Delta A\Theta) \quad (1)$$

'Επειδή δέ αἱ παράπλευροι ἔδραι εἰναι ὀρθογώνια, θὰ εἰναι
 $(ABZE) = (AB)(AE) = (AB) \cdot u$, $(B\Gamma\Ζ) = (B\Gamma) \cdot u$,
 $(\Gamma\Δ\Θ) = (\Gamma\Delta) \cdot u$, $(\Delta\Α\Ε\Θ) = (\Delta\Alpha) \cdot u$.

·Η (1) λοιπὸν γίνεται

$$E = [(AB) + (B\Gamma) + (\Gamma\Delta) + (\Delta A)] \cdot u, \text{ ήτοι:}$$

Τὸ ἐμβαδὸν τῆς παραπλεύρου ἐπιφανείας δροῦσ πρόσματος
 εἶναι γινόμενον τῆς περιμέτρου τῆς βάσεως ἐπὶ τὸ ὅψος αὐτοῦ.

·Α σκήσεις

700. "Ἐν δρθὸν πρᾶσμα ἔχει ὅψος 2 μέτ. καὶ βάσιν τετράγωνον μὲ
 πλευρὰν 0,30 μέτρ. Νὰ εὕρητε τὸ ἐμβαδὸν τῆς παραπλεύρου ἐπιφα-
 νείας αὐτοῦ.

701. "Ἐν δρθὸν πρᾶσμα ἔχει ὅψος 2,50 μέτρ. καὶ βάσεις ισόπλευρα
 τρίγωνα μὲ πλευρὰν 0,25 μέτρ. Νὰ εὕρητε τὸ
 ἐμβαδὸν τῆς ἐπιφανείας αὐτοῦ.

702. "Ἐν δρθὸν πρᾶσμα ἔχει ὅψος 0,20 μέτρ.,
 παράπλευρον ἐπιφάνειαν 0,048 τετ. μέτρ. καὶ
 βάσεις ρόμβους. Νὰ εὕρητε τὸ μῆκος τῆς πλευ-
 ρᾶς τῶν ρόμβων τούτων.

3. ΓΕΝΙΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΙΣΜΑΤΩΝ


§ 332. Νὰ συγκριθῶσι δύο παράλ-
 ληλοι τομαὶ αβγδε, ζηθικ πρόσματος ΑΘ
 (σχ. 252).

Αἱ τομαὶ αβ, ζη τῶν παραπλήλων ἐπι-
 πέδων αβγδε, ζηθικ ὑπὸ τοῦ ABZH εἶναι
 παράλληλοι. 'Επειδὴ δέ καὶ αἱ αζ, βη εἰ-
 ναι παράλληλοι, τὸ τετράπλευρον αβηζ
 εἶναι παραλληλόγραμμον. "Ενεκα δέ τού-
 του αἱ πλευραὶ αβ, ζη αὐτοῦ εἶναι ίσαι
 καὶ παράλληλοι.

Όμοίως ἀποδεικνύομεν ὅτι αἱ πλευραὶ
 βγ, γδ, δε, εα εἶναι ἀντιστοίχως ίσαι καὶ παράλληλοι πρὸς τὰς
 ηθ, θι, ικ, κζ.

"Ενεκα δέ τῆς παραλληλίας ταύτης εἶναι

$$\widehat{\alpha} = \widehat{\zeta}, \quad \widehat{\beta} = \widehat{\eta}, \quad \widehat{\gamma} = \widehat{\theta}, \quad \widehat{\delta} = \widehat{\iota}, \quad \widehat{\epsilon} = \widehat{\kappa}.$$



Σχ. 252


Τὰ εύθ. σχήματα λοιπὸν αβγδε καὶ ζηθικ εἶναι ἵσα. Βλέπομεν δηλ. δτι:

Δύο παράλληλοι τομαὶ πρίσματος εἶναι ἵσαι.

Πόρισμα I. Πᾶσα τομὴ πρίσματος παράλληλος πρὸς τὴν βάσιν αὐτοῦ εἶναι ἵση πρὸς τὴν βάσιν.

Πόρισμα II. Αἱ κάθετοι τομαὶ πρίσματος εἶναι ἵσαι.

§ 333. Νὰ συγκριθῶσι δύο δρυθὰ πρίσματα, τὰ δποτα ἔχουσιν ἵσας βάσεις καὶ ἵσα ὑψη (σχ. 253).



"Αν νοήσωμεν δτι τὸ ἐν πρίσμα αι τίθεται ἐπὶ τοῦ ΑΙ οὕτως, ώστε ἡ βάσις αβγδε νὰ ἔφαρμόσῃ ἐπὶ τῆς ΑΒΓΔΕ, ἡ πλευρὰ αζ θὰ γίνῃ κάθετος ἐπὶ τὸ ἐπίπεδον τῆς βάσεως ΑΒΓΔΕ εἰς τὸ σημεῖον Α. Θὰ συμπέσῃ λοιπὸν μὲ τὴν AZ. Ἐπειδὴ δὲ AZ = αζ, ἡ κορυφὴ ζ θὰ συμπέσῃ μὲ τὴν Z.

"Ομοίως ἐννοοῦμεν δτι καὶ ἄλλαι κορυφαὶ η, θ, ι, κ συμπίπτουσιν ἀντιστοίχως μὲ τὰς Η, Θ, Ι, Κ. Τὰ δύο λοιπὸν πρίσματα ἔφαρμόζουσι καὶ ἐπομένως εἶναι ἵσα. "Ωστε:

"Αν δύο δρυθὰ πρίσματα ἔχωσιν ἵσας βάσεις καὶ ἵσα ὑψη, εἶναι ἵσα.

Πόρισμα. "Αν δύο δρυθὰ πρίσματα ἔχωσιν ἵσα ὑψη καὶ ισοδυνάμους βάσεις, εἶναι ισοδύναμα.

§ 334. Νὰ ἔξετασθῇ τὶ πάσχει ἐν δρυθὸν πρίσμα, ἀν ἡ μὲν βάσις μείνῃ ἀμετάβλητος, τὸ δὲ ὑψος πολλαπλασιασθῇ ἐπὶ ἕνα ἀριθμόν.

"Εστω δρυθὸν πρίσμα ΑΒΓΔΕΖ (σχ. 254). "Ἐπὶ τῶν προεκτάσεων τῶν πλευρῶν ΑΔ, ΒΕ, ΓΖ πρὸς τὸ αὐτὸν μέρος τῆς βάσεως ΔΕΖ δριζομεν τμήματα ΔΗ, ΕΘ, ΖΙ ἵσα πρὸς τὸ ὑψος. Τὰ πρίσματα ΑΒΓΔΕΖ, ΔΕΖΗΘΙ εἶναι ἵσα (§ 333). "Ἐπο-


μένως τὸ ΑΒΓΗΘΙ εἶναι διπλάσιον τοῦ ΑΒΓΔΕΖ.

Όμοιώς ἐννοοῦμεν δτὶ, ἀν τὸ ὕψος Η τριπλασιασθῆ καὶ τὸ πρᾶσμα τριπλασιάζεται κ.τ.λ. Ἐπομένως (§ 217) συμπεραίνομεν δτὶ:

"Ἄν τὸ ὕψος πολλαπλασιασθῇ ἐπὶ οὐρδήποτε ἀριθμὸν λ καὶ τὸ πρᾶσμα πολλαπλασιάζεται ἐπὶ τὸν αὐτὸν ἀριθμόν.

Πόρισμα. "Ἄγ δύο δρυθὰ πρᾶσματα ἔχωσιν ἵσας βάσεις, εἶναι ως τὰ ὕψη αὐτῶν.

Τῷ δντι, ἀν $u':u=\lambda$, θὰ εἶναι $u'=u\cdot\lambda$ καὶ ἐπομένως $\Pi'=\Pi\cdot\lambda$ Ἐκ ταύτης δὲ ἐπεται δτὶ $\Pi':\Pi=\lambda=u':u$.



Σχ. 254

§ 335. Ορθὸν πρᾶσμα αὐθ ἔχει ὕψος αζ ἵσον πρὸς τὴν πλευρὰν AZ πλαγίου πρᾶσματος AΘ καὶ βάσιν κάθετον τομὴν αβγδε τοῦ πλαγίου. Νὰ συγκριθῶσι τὰ δύο ταῦτα πρᾶσματα (σχ. 255).


Ἐπειδὴ εἶναι $\alpha\zeta=AZ > \alpha\alpha$, ἡ ἄλλη βάσις ζηθικ τοῦ δρυθοῦ πρᾶσματος κεῖται ἐκτὸς τοῦ πλαγίου. Τὰ πρᾶσματα λοιπὸν ταῦτα ἀποτελοῦνται ἀπὸ κοινὸν μέρος Αγ καὶ ἀπὸ τὰ μὴ κοινὰ μέρη αθ καὶ ζΓ.

Ἐπειδὴ δὲ $\alpha\alpha+\alpha\zeta=\alpha\alpha+\alpha Z$, ἐπεται δτὶ $\alpha\zeta=\alpha Z$.

Όμοιώς ἐννοοῦμεν δτὶ $B\eta=\beta H$, $\Gamma\theta=\gamma\Theta$, $\Delta\iota=\delta I$, $E\kappa=\epsilon K$.

Ἄν δὲ νοήσωμεν δτὶ τὸ ζΓ τίθεται ἐπὶ τοῦ αθ οὕτως, ὥστε ἡ βάσις ζηθικ νὰ ἐφαρμόσῃ ἐπὶ τῆς ἵσης αβγδε, βλέπομεν δτὶ ἡ ζΑ γίνεται κάθετος ἐπὶ τὸ ἐπίπεδον αβγδε καὶ ἐπομένως συμπίπτει μὲ τὴν αΖ καὶ ἡ κορυφὴ Α συμπίπτει μὲ τὴν Ζ.

Όμοιώς δὲ ἐννοοῦμεν δτὶ αἱ κορυφαὶ B, Γ, Δ, E συμπίπτου-



Σχ. 255

σιν ἀντιστοίχως ἐπὶ τῶν Η,Θ,Ι,Κ. Τὰ μὴ κοινὰ μέρη λοιπὸν ζΓ καὶ αΘ ἐφαρμόζουσι καὶ ἐπομένως εἶναι ἵσα. Ἐκ τούτων ἐπεται διτὶ τὰ δύο πρίσματα ἀποτελοῦνται ἀπὸ μέρη ἵσα, ἐν πρὸς ἔν, ἣτοι εἶναι ἰσοδύναμα. Βλέπομεν λοιπὸν διτὶ:

Πᾶν πλάγιον πρῆσμα εἶναι ἰσοδύναμον πρὸς δρθὸν πρῆσμα, τὸ δποῖον ἔχει βάσιν τὴν κάθετον τοῦ πλαγίου καὶ ὑψος ἰσον πρὸς τὴν πλευρὰν αὐτοῦ.

Α σκήσεις




703. "Ἐν δρθὸν πρῖσμα ΑΒΓαβγ ἔχει βάσιν ἐν ἰσοσκελὲς τρίγωνον ΑΒΓ. Ἡ πλευρά τοῦ πρίσματὸς τούτου, ἡ δποῖα διέρχεται ἀπὸ τὴν κορυφὴν Α, καὶ τὸ ὕψος ΑΔ τοῦ τριγώνου ΑΒΓ δρίζουσιν ἐν ἐπίπεδον. Νὰ συγκρίνητε τὰ μέρη, εἰς τὰ δποῖα τοῦτο διαιρεῖ τὸ πρῖσμα.

704. Τρεῖς παράλληλοι εύθειαι δὲν κείνται πᾶσαι ἐπὶ ἐνδὸς ἐπιπέδου. "Ἀν ἐπ' αὐτῶν δρισθῶσι τρία τμήματα ἵσα, νὰ ἀποδειχθῇ διτὶ τὸ πρῖσμα, τὸ δποῖον ἔχει πλευράς ταῦτα, εἶναι ἀνεξάρτητον ἀπὸ τὴν θέσιν τῶν ἐπὶ τῶν παραλλήλων εύθειῶν ἵσων τμημάτων.

4. ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΠΙΠΕΔΩΝ

§ 336. Τί εἶναι παραλληλεπίπεδα καὶ ποῖα εἶναι τὰ εὗδη αὐτῶν. Τοῦ πρίσματος ΡΣ (σχ. 256) αἱ βάσεις εἶναι παρα-



Σχ. 256

ληλόγραμμα. Ἐπομένως διλασι τοῦ πρίσματος ΡΣ αἱ εὔθειαι αὐτοῦ εἶναι παραλληλόγραμμα.

Τὸ πρῖσμα τοῦτο λέγεται ἰδιαιτέρως παραλληλεπίπεδον.

Διά τὸν αὐτὸν λόγον καὶ τὸ πρῆσμα ΑΖ (σχ. 256) λέγεται παραλληλεπίπεδον. "Ωστε:

Παραλληλεπίπεδον εἶναι πρῆσμα, τοῦ δποίου αἱ βάσεις εἶναι παραλληλόγραμμα.

"Αν αἱ παράπλευροι ἔδραι ἐνὸς παραλληλεπιπέδου εἶναι δλαι δρθογώνια παραλληλόγραμμα, τοῦτο λέγεται γενικῶς δρ-
δὸν παραλληλεπίπεδον.

Τοῦ δρθοῦ παραλληλεπιπέδου ΑΖ αἱ βάσις ΑΒΓΔ, ΕΖΘΗ
εἶναι δρθογώνια· ἐπομένως δλαι αἱ ἔδραι αὐτοῦ εἶναι δρθογώνια. Τοῦτο λέγεται
ἰδιαιτέρως δρθογώνιον παραλληλεπίπεδον.
"Ωστε:

*Ορθογώνιον παραλληλεπίπεδον εἶναι
παραλληλεπίπεδον, τοῦ δποίου δλαι αἱ
ἔδραι εἶναι δρθογώνια.


Τρεῖς ἀκμαὶ διερχόμεναι ἀπὸ τὴν αὐ-
τὴν κορυφὴν ἐνὸς δρθογώνιου παραλληλε-
πιπέδου λέγονται διαστάσεις αὐτοῦ. "Η μία
ἀπὸ αὐτὰς λέγεται μῆκος, ἡ ἄλλη πλάτος καὶ ἡ τρίτη ψφος.
Π.χ. τοῦ ΑΖ τὸ μῆκος εἶναι ΑΒ, τὸ πλάτος ΑΔ· καὶ τὸ ύψος ΑΘ
(σχ. 256). Αἱ ἔδραι τοῦ δρθογώνιου παραλληλεπιπέδου ΑΕ
(σχ. 257) εἶναι δλαι τετράγωνα. Λέγεται δὲ τοῦτο ιδιαιτέρως
κύβος ἢ καὶ κανονικὸν ἐξάεδρον." Ωστε:

*Κύβος εἶναι δρθογώνιον παραλληλεπίπεδον, τοῦ δποίου
δλαι αἱ ἔδραι εἶναι τετράγωνα.

Κατὰ τὸν δρισμὸν τοῦτον εἶναι $AB = AG = AD$ καὶ
ἐπομένως :

α') "Ολαι αἱ ἀκμαὶ ἐνὸς κύβου εἶναι ἴσαι.

β') "Ολαι αἱ ἔδραι ἐνὸς κύβου εἶναι ἴσαι.



Σχ. 257


5. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΠΙΠΕΔΩΝ

§ 337. Σχέσις δύο ἀπέναντι ἔδρῶν παραλληλεπιπέδου ΑΘ.

Γνωρίζομεν δτι αἱ βάσεις ΑΒΓΔ, ΕΖΘΗ εἶναι ἴσα καὶ πα-
ράλληλα παραλληλόγραμμα (σχ. 258).

"Ας συγκρίνωμεν ἀκόμη δύο ἄλλα ἀπέναντι παραλληλόγραμμα ΑΔΗΕ, ΒΓΘΖ.

Πρὸς τοῦτο παρατηροῦμεν δτὶ αἱ πλευραὶ ΑΔ καὶ ΒΓ εἰναι ἴσαι καὶ παράλληλοι, διότι εἰναι ἀπέναντι πλευραὶ τοῦ παραλληλογράμμου ΑΒΓΔ. Δι' ὅμοιον λόγον αἱ ΑΕ, ΕΗ, ΗΔ εἰναι ἀντιστοίχως ἴσαι καὶ παράλληλοι πρὸς τὰς ΒΖ, ΖΘ, ΘΓ.



Σχ. 258

δραὶ ΑΒΖΕ, ΔΓΘΗ εἰναι ἴσαι καὶ παράλληλοι. "Ωστε:

Ἄλλα ἀπέναντι ἔδραι παντὸς παραλληλεπιπέδου εἰναι ἴσαι καὶ παράλληλοι.


Πόρισμα I. Δύο τυχοῦσαι ἀπέναντι ἔδραι παραλληλεπιπέδου δύνανται νὰ θεωρηθῶσιν ὡς βάσεις αὐτοῦ.

Πόρισμα II. Πᾶσα τομὴ αβγδ παραλληλεπιπέδου ΑΘ μὴ τέμνουσα τὰς βάσεις του εἰναι παραλληλόγραμμον (σχ. 258).

§ 338. Νὰ ἔξετασθῇ, ἐν ὑπάρχῃ κοινὸν σημεῖον τῶν διαγώνων παραλληλεπιπέδου ΑΗ (σχ. 259).

Τὸ ἐπίπεδον τῶν παραλλήλων ἀκμῶν ΔΘ, ΒΖ τέμνει τὰς παραλλήλους ἔδρας ΑΒΓΔ, ΕΖΗΘ κατὰ τὰς παραλλήλους εὐθείας ΒΔ, ΖΘ. Τὸ τετράπλευρον λοιπὸν ΒΔΘΖ εἰναι παραλληλόγραμμον, αἱ δὲ διαγώνιοι ΔΖ καὶ ΒΘ αὐτοῦ τέμνονται δίχα εἰς τὸ Ο.

Όμοιῶς τὸ ἐπίπεδον τῶν παραλλήλων ἀκμῶν ΔΓ, ΕΖ τέμνει τὰς παραλήλους ἔδρας ΑΔΘΕ, ΒΓΗΖ κατὰ τὰς παραλλή-



Σχ. 259

λους εύθειας $\Delta E, \Gamma Z$. Αἱ διαγώνιοι λοιπὸν $\Delta Z, \Gamma E$ τοῦ παραλληλογράμμου $\Gamma \Delta E Z$ τέμνονται δίχα, ἵτοι καὶ ἡ ΓE διέρχεται ἀπὸ τὸ μέσον Ο τῆς ΔZ καὶ διχοτομεῖται ὑπ' αὐτοῦ.

‘Ομοίως ἀποδεικνύομεν ὅτι καὶ ἡ διαγώνιος AH διέρχεται ἀπὸ τὸ Ο καὶ διχοτομεῖται ὑπ' αὐτοῦ. Βλέπομεν λοιπὸν ὅτι:

Αἱ διαγώνιοι παραλληλεπιπέδου διέρχονται ἀπὸ ἐν σημεῖον καὶ διχοτομοῦνται ὑπ' αὐτοῦ.

Πόρισμα. Πᾶν εὐθ. τμῆμα $K\Lambda$ διερχόμενον ἀπὸ τὸ κοινὸν σημεῖον Ο τῶν διαγώνιων παραλληλεπιπέδου καὶ περατούμενον εἰς τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ διχοτομεῖται ὑπὸ τοῦ Ο.

Διὰ τὸν λόγον τοῦτον τὸ σημεῖον Ο λέγεται κέντρον συμμετρίας ἢ ἀπλῶς κέντρον τοῦ παραλληλεπιπέδου.

§ 339. Σχέσις τῶν δύο μερῶν, εἰς τὰ δποῖα ἐν παραλληλεπιπέδον $A\Theta$ διαιρεῖται ὑπὸ ἐνδεικνυόμενου $A\Gamma\Theta E$ αὐτοῦ (σχ. 260).

Πρῶτον παρατηροῦμεν ὅτι αἱ ἀκμαὶ $AE, BZ, \Gamma\Theta$ εἰναι ἴσαι, παράλληλοι καὶ διμόρροποι. Ἐπομένως τὸ στερεόν $ABGEZ\Theta$ εἰναι τριγωνικὸν πρίσμα. ‘Ομοίως ἔννοοῦμεν ὅτι καὶ τὸ $A\Gamma\Delta\Theta H$ εἰναι τριγωνικὸν πρίσμα.


Διὰ νὰ συγκρίνωμεν δὲ ταῦτα, διακρίνομεν δύο περιπτώσεις:

α') “Αν τὸ $A\Theta$ εἰναι δρόθιον, καὶ τὰ τριγωνικὰ πρίσματα εἰναι δρόθια. Ἐπειδὴ δὲ ἔχουσι προφανῶς ἴσας βάσεις καὶ ἴσα ψῆ, εἰναι ἴσα ($\S 333$).

β') “Αν τὸ $A\Theta$ εἰναι πλάγιον, καὶ τὰ πρίσματα εἰναι πλάγια. “Αν δὲ νοήσωμεν τυχοῦσαν κάθετον τομὴν αβγδ τοῦ $A\Theta$, αὕτη εἰναι παραλληλόγραμμον καὶ διαιρεῖται ὑπὸ τοῦ διαγώνιου ἐπιπέδου $A\Gamma\Theta E$ εἰς δύο ἴσα τρίγωνα αβγ, αγδ.

Τὸ αβγ εἰναι κάθετος τομῇ τοῦ πρίσματος $ABGEZ\Theta$ καὶ ἐπομένως τοῦτο εἰναι ἰσοδύναμον πρὸς δρόθιον πρίσμα Π μὲ βάσιν αβγ καὶ ὕψος ἴσον πρὸς AE ($\S 335$).

‘Ομοίως τὸ πλάγιον πρίσμα $A\Gamma\Delta\Theta H$ εἰναι ἰσοδύναμον



Σχ. 260

πρὸς δρθὸν πρῖσμα Π' μὲ βάσιν αγδ καὶ ὑψος ἵσον πρὸς ΑΕ.
Ἐπειδὴ δὲ τὰ δρθὰ πρίσματα Π,Π' εἶναι ἵσα (§ 333), ἐπεται
δι τὰ ΑΒΓΕΖΘ, ΑΓΔΕΘΗ εἶναι ἵσοδύναμα. Βλέπομεν λοι-
πον διτι:

"Ἐκαστὸν διαγώνιον ἐπίπεδον παραλληλεπιπέδου διαιρεῖ
αὐτὸν εἰς δύο τριγωνικὰ πρίσματα ἵσα ἢ ἵσοδύναμα.

Πόρισμα. Πᾶν τριγωνικὸν πρῆσμα εἶναι τὸ ἥμισυ παρα-
λληλεπιπέδου, τὸ δποῖον ἔχει τὸ αὐτὸν ὑψος καὶ διπλασίαν βάσιν.

Ασκήσεις

705. Ἐν ΑΗ (σχ. 259) εἶναι δρθογώνιον παραλληλεπίπεδον μὲ δια-
στάσεις ΔΑ, ΔΓ, ΔΘ καὶ μίαν διαγώνιον ΔΖ, νὰ ἀποδείξῃς διτι:

$$(ΔΖ)^2 = (ΔΑ)^2 + (ΔΓ)^2 + (ΔΘ)^2$$

706. Νὰ συγκρίνητε τὰς διαγώνιους ἐνδὸς δρθογώνιου παραλληλε-
πιπέδου.

707. Νὰ δρίσητε τὴν διαγώνιον κύβου συναρτήσει τῆς ἀκμῆς αὐτοῦ.

708. Εἰς κύβος ἔχει διαγώνιον 3 παλαμῶν. Νὰ εὕρητε τὸ μῆκος
τῆς ἀκμῆς αὐτοῦ.

709. Τὸ ἐμβαδὸν τῆς ἐπιφανείας ἐνδὸς κύβου εἶναι 24 τετραγωνικὰ
παλάμαι. Νὰ εὕρητε τὸ μῆκος τῆς διαγώνιου αὐτοῦ.

6. ΜΕΤΡΗΣΙΣ ΤΩΝ ΠΡΙΣΜΑΤΩΝ

§ 340. Ποῖαι εἶναι αἱ κυριώτεραι μονάδες δγκου. Εἰδο-
μεν εἰς τὴν Εισαγωγὴν διτι ἔκαστον σῶμα καταλαμβάνει ἐν
μέρος τοῦ διαστήματος, τὸ δποῖον λέγεται δγκος τοῦ σώματος
τούτου.

Διὰ νὰ μετρήσωμεν τὸν δγκον τοῦτον, πρέπει νὰ τὸν συγ-
κρίνωμεν μὲ ἐνα κώνισμένον δγκον, τὸν δποῖον λαμβάνομεν ως
μονάδα.

"Απὸ τὴν σύγκρισιν αὐτὴν προκύπτει εἰς ἀριθμὸς. Οὗτος
φανερώνει ἀπὸ πόσας μονάδας ἡ καὶ μέρη αὐτῆς ἀποτελεῖται
δ μετρηθεὶς δγκος. Αὐτός, δπως γνωρίζομεν, εἶναι τὸ μέτρον
τοῦ μετρηθέντος ποσοῦ. Λέγεται δὲ ἰδιαιτέρως καὶ αὐτὸς δγκος
τοῦ σώματος.

Εἰς τὸ ἔξης, δταν θὰ λέγωμεν δγκον, θὰ ἐννοοῦμεν αὐτὸν
τὸν ἀριθμόν, δηλ. τὸ μέτρον τοῦ σώματος.

Και ἀπό τὴν πρακτικὴν Γεωμετρίαν γνωρίζομεν ὅτι συνήθης μονάς δύκου εἶναι τὸ κυβικὸν μέτρον καὶ τὰ μέρη αὐτοῦ κυβικὴ παλάμη, κυβικὸς δάκτυλος, κυβικὴ γραμμή.

Εἶναι δὲ ταῦτα κύβοι μὲν ἀκμὴν ἀντιστοίχως 1 μέτρου, 1 παλάμης, 1 δακτύλου, 1 γραμμῆς.

§ 341. Πρόβλημα I. Νὰ εὑρεθῇ ὁ δύκος δρθιγώνιου παραλληλεπιπέδου ἐκ τῶν διαστάσεων αὐτοῦ.

Λύσις. "Εστω δρθιγώνιον παραλληλεπίπεδον $\Sigma\Gamma$ καὶ διαστάσεις αὐτοῦ α ($OA = \alpha$), $(OB) = \beta$, $(OG) = \gamma$ (σχ. 261).

"Ἐπὶ τῶν ἀκμῶν OA , OB , OG δρίζομεν τμήματα $O\Theta$, ON , OE ἔκαστον ἵσον πρὸς τὴν μονάδα μήκους. "Ἐπειτα ἄγομεν ἐκ τοῦ E ἐπίπεδον ΔEZ παράλληλον πρὸς τὸ ἐπίπεδον AOB καὶ παρατηροῦμεν ὅτι τὰ δρθ. παραλληλεπίπεδα $OABG$ καὶ $OABE$ ἔχουσι τὴν αὐτὴν βάσιν $OASB$. Εἶναι λοιπὸν

$$\frac{(OABG)}{(OABE)} = \frac{\gamma}{(\Omega E)} \quad (\S 334 \text{ Πόρ.}).$$

"Ἐπειτα φέρομεν ἐκ τοῦ Θ ἐπίπεδον $I\Theta LK$ παράλληλον πρὸς τὴν ἔδραν BOG καὶ εύρισκομεν ὁμοίως ὅτι $\frac{(OABE)}{(O\Theta EB)} = \frac{\alpha}{(\Omega \Theta)}$.


Τέλος ἐκ τοῦ N φέρομεν ἐπίπεδον $N\Gamma P\Gamma M$ παράλληλον πρὸς τὴν ἔδραν AOG καὶ εύρισκομεν ὅτι $\frac{(O\Theta EB)}{(O\Theta EN)} = \frac{\beta}{(\Omega N)}$.

"Αν πολλαπλασιάσωμεν κατὰ μέλη τὰς τρεῖς ταύτας ἴσοτητας, εύρισκομεν εύκόλως ὅτι $\frac{OABG}{O\Theta EN} = \alpha \cdot \beta \cdot \gamma$.

"Ἐπειδὴ δὲ $O\Theta EN$ εἶναι ἡ μονάς τῶν δύκων, τὸ $\alpha \cdot \beta \cdot \gamma$ μέλος εἶναι ὁ δύκος τοῦ ΣG . Εἶναι λοιπὸν $(\Sigma G) = \alpha \cdot \beta \cdot \gamma$ (1). "Ητοι:

"Ο δύκος παντὸς δρθιγώνιου παραλληλεπιπέδου εἶναι γινόμενον τῶν τριῶν διαστάσεων αὐτοῦ.

Πόρισμα I. Ο δύκος παντὸς δρθιγώνιου παραλληλεπιπέδου



Σχ. 261

δου είναι γινόμενον τῆς βάσεως ἐπὶ τὸ θύμος αὐτοῦ.

Πόρισμα II. Ἄντη ἀκμὴ κύβου εἰναι α, δ σγκος αὐτοῦ εἰναι α³.

Οὕτως, ἐπειδὴ ἡ ἀκμὴ τοῦ κυβικοῦ μέτρου ἔχει μῆκος 10 παλαμῶν, τὸ κυβικὸν μέτρον ἔχει $10^3 = 1000$ κυβ. παλάμας. Ὁμοίως εύρισκομεν ὅτι 1 κυβ. παλάμη ἔχει 1000 κυβ. δακτύλους καὶ 1 κυβ. δάκ. ἔχει 1000 κυβ. γραμμάς.

Α σκήσεις

710. Ἐν δωμάτιον ἔχει διαστάσεις 4 μέτ, 3 μέτ, 5 μέτ. Νὰ εὕρητε τὸν δύκον τοῦ περιεχομένου δέρος.

711. "Η αίθουσα τῆς διδασκαλίας ἔνδος σχολείου ἔχει διαστάσεις 9 μέτ., 6 μέτ., 4 μέτ. "Αν εἰς αὐτὴν διδάσκωνται 40 μαθηταί, νὰ εὕρητε πόσον μέρος τοῦ περιεγουμένου ἀέρος ἀναλογεῖ εἰς ἔκστατον μαθητῶν.

712. Μία δεξαμενή έχει σχῆμα δρυθογωνίου παραπλήσιεπιπέδου μὲ διαστάσεις 2,20 μέτ., 2,60 μέτ., 3 μέτ. Νὰ εύρητε τὸ βάρος τοῦ ύδατος, τὸ δοποῖον χωραῖ.


— 713. Εἰς κύβος ἔχει ἀκμήν 5 ἑκατ. Νὰ εὕρητε τὸ ἐμβαδὸν τῆς ἐπιφανείας καὶ τὸ δγκον αὐτοῦ.

— 714. Εις κύβος ἔχει ὅγκον 64 κυβ. ἑκατ. Ήλια εὑρητε τὸ ἐμβαδὸν τῆς ἐπιφανείας του.

715. Το ἔμβαδὸν τῆς ἐπιφανείας κύβου είναι 1,5 τετ. μέτρα. Νὰ εὔρητε τὸ δγκον του.

716. Ή διαγώνιος ένδος κύβου έχει μήκος 1,2 μέτ. Νά ερητε τὸν δύκον αὐτοῦ.

§ 342. Πρόβλημα II. Νὰ εὑρεθῇ ὁ σγηκός δρόμος ἀλλὰ μὴ



Σχ. 262

δρυμογωνίου παραλληλεπιπέδου ἐκ τῆς βάσεως καὶ τοῦ ὕψους αὐτοῦ.

Λύσις. "Αν τὸ παραλληλεπίπεδον ΔΘ (σχ. 262) εἶναι δρθόν, ἀλλὰ μὴ δρθογώνιον, ή βάσις ΑΒΓΔ δὲν ἔναι δερθογώνιον, αἱ δὲ παράπλευροι ἔδραι εἶναι δρθογώνια. "Αν λοιπὸν θεωρήσωμεν ὡς βάσεις αὐτοῦ τὰ δρθογώνια ΑΔΕΖ, ΒΓΗΘ, τοῦτο θὰ εἴηται πλάγιον πρίσμα μὲ πλευρὰν ΑΒ.

"Αγ δὲ νοήσωμεν κάθετον τομήν ΙΚΛΜ, τὸ ΔΘ θὰ εἶναι

Ισοδύναμον πρὸς δρθὸν παραλληλεπίπεδον Π μὲ βάσιν ΙΚΛΜ καὶ ὑψος ΑΒ (§ 335).

Τώρα παρατηροῦμεν ὅτι ἡ ΑΒ, ὡς κάθετος ἐπὶ τὸ ἐπίπεδον ΙΚΛΜ, εἶναι κάθετος καὶ ἐπὶ τὰς εὐθείας ΙΜ καὶ ΙΚ. Ἐπειδὴ δὲ ἡ ΑΒ εἶναι κάθετος καὶ ἐπὶ τὴν ΒΘ, ἔπειται ὅτι ἡ ΙΜ εἶναι παράλληλος πρὸς τὴν ΒΘ, ἐπομένως καὶ ἡ ΜΙ κάθετος ἐπὶ τὴν ἔδραν ΑΒΓΔ. Διὰ τοῦτο δὲ ἡ ΜΙ εἶναι κάθετος καὶ ἐπὶ τὴν ΙΚ. Τὸ παραλληλόγραμμον λοιπὸν ΙΚΛΜ εἶναι δρθογώνιον, τὸ δὲ Π θὰ εἶναι δρθογώνιον παραλληλεπίπεδον.

$$\text{Εἶναι λοιπὸν } (\Delta\Theta) = (\Pi) = (\text{ΙΚΛΜ}) \cdot (\text{ΑΒ}) \quad (1)$$

$$\text{Ἐπειδὴ δὲ } (\text{ΙΚΛΜ}) = (\text{ΙΚ}) \cdot (\text{ΙΜ}), \text{ ἡ (1) γίνεται}$$

$$(\Delta\Theta) = (\text{ΙΚ}) \cdot (\text{ΙΜ}) \cdot (\text{ΑΒ}) = (\text{ΑΕ}) \cdot [(\text{ΑΒ}) \cdot (\text{ΙΚ})] \quad (2)$$

$$\text{Ἐπειδὴ δὲ εἰδούμεν } \text{ὅτι } \text{ἡ } \text{ΑΒ} \text{ εἶναι κάθετος } \text{ἐπὶ } \text{τὴν } \text{ΙΚ}, \\ \text{εἶναι } (\text{ΑΒΓΔ}) = (\text{ΑΒ}) \cdot (\text{ΙΚ}) \text{ καὶ } \text{ἡ } (2) \text{ γίνεται}$$

$$(\Delta\Theta) = (\text{ΑΒΓΔ}) \cdot (\text{ΑΕ}) \quad (3)$$

Συνδυάζοντες τὸ ἔξαγόμενον τοῦτο μὲ τὸ Πόρ. I § 341, βλέπομεν δτι:

‘Ο δγκος παντὸς δρθοῦ παραλληλεπιπέδου εἶναι γινόμενον τῆς βάσεως ἐπὶ τὸ ὑψος αὐτοῦ.

§ 343. Πόρισμα III. Νὰ εὑρεθῇ δ δγκος πλαγίου παραλληλεπιπέδου ἐκ τῆς βάσεως καὶ τοῦ ὑψους αὐτοῦ.

Αὔσις. ‘Αν τὸ παραλληλεπίπεδον $\Delta\Theta$ (σχ. 262) εἶναι πλάγιον καὶ ΙΚΛΜ εἶναι κάθετος τομὴ αὐτοῦ, θὰ εἶναι

$$(\Delta\Theta) = (\text{ΙΚΛΜ}) \cdot (\text{ΑΒ}) \quad (1)$$

‘Αν δὲ ἀχθῆ ἡ ΜΡ κάθετος ἐπὶ τὴν ΙΚ, θὰ εἶναι κάθετος καὶ ἐπὶ τὴν ἔδραν ΑΒΓΔ (§ 314). Θὰ εἶναι λοιπὸν τὸ τμῆμα ΜΡ ὑψος τοῦ ($\Delta\Theta$) καὶ τοῦ ΙΚΛΜ. Διὰ τὸν τελευταῖον τοῦτον λόγον εἶναι

$$(\text{ΙΚΛΜ}) = (\text{ΙΚ}) \cdot (\text{ΜΡ}), \text{ ἡ δὲ (1) γίνεται}$$

$$(\Delta\Theta) = (\text{ΙΚ}) \cdot (\text{ΜΡ}) \cdot (\text{ΑΒ}) = [(\text{ΙΚ}) \cdot (\text{ΑΒ})] \cdot (\text{ΜΡ}).$$

$$\text{Ἐπειδὴ δὲ } (\text{ΙΚ}) \cdot (\text{ΑΒ}) = (\text{ΑΒΓΔ}), \quad \text{ἔπειται } \text{ὅτι}$$

$$(\Delta\Theta) = (\text{ΑΒΓΔ}) \cdot (\text{ΜΡ}), \text{ ἥτοι:}$$

‘Ο δγκος πλαγίου παραλληλεπιπέδου εἶναι γινόμενον τῆς βάσεως ἐπὶ τὸ ὑψος αὐτοῦ.

Γενικὸν συμπέρασμα. Ἐπό τὴν λύσιν τῶν προηγουμένων τριῶν προβλημάτων βλέπομεν γενικῶς δτι:

‘Ο δῆκος παντὸς παραλληλεπιπέδου εἶναι γινόμενον τῆς βάσεως ἐπὶ τῷ ὑψος αὐτοῦ.

Ασκήσεις

717. “Ἐν δρθόν παραλληλεπίπεδον ἔχει ὑψος 8 ἑκατ. καὶ βάσιν ρόμβον μὲ διαγώνιους 6 ἑκατ. καὶ 4 ἑκατ. Νὰ εὕρητε τὸν δῆκον αὐτοῦ.


718. Ἐπό τὸ μέσον Ζ τῆς πλευρᾶς ΑΓ ἐνὸς ισοπλεύρου τριγώνου ΑΒΓ φέρομεν εὐθείας ΖΔ, ΖΕ ἀντιστοίχως παραλλήλους πρὸς τὰς πλευράς ΒΓ καὶ ΑΒ αὐτοῦ καὶ μέχρι τῶν ΑΒ, ΒΓ. Νὰ εὕρητε τὸν δῆκον δρθοῦ παραλληλεπιπέδου, τὸ δποῖον ἔχει ὑψος 1σον πρὸς τὴν πλευράν α ἑκατ. τοῦ τριγώνου καὶ βάσιν τὸ παραλληλόγραμμον ΔΒΕΖ.

719. “Ἐν παραλληλόγραμμον ΑΒΓΔ ἔχει $(AB) = 2$ παλ., $AD = 1$ παλ., $A = 45^\circ$. Ἐν πλάγιον παραλληλεπίπεδον ἔχει βάσιν τὸ ΑΒΓΔ, ἡ δὲ πλευρὰ ΑΕ αὐτοῦ ἔχει προβολὴν ΑΒ καὶ κλίσιν 45° πρὸς τὸ προβολικὸν ἐπίπεδον ΑΒΓΔ. Νὰ εὕρητε τὸν δῆκον αὐτοῦ.

720. “Ἐν πλάγιον παραλληλεπίπεδον ἔχει ὑψος 6 ἑκατ. καὶ βάσιν τετράγωνον μὲ διαγώνιον 6 ἑκατ. Νὰ εὕρητε τὸν δῆκον αὐτοῦ.

721. “Ἐν πλάγιον παραλληλεπίπεδον ἔχει βάσιν τετράγωνον μὲ πλευρὰν 4 ἑκατ. “Ἀν τοῦτο βυθισθῇ εἰς ὅδωρ ἀπεσταγμένον 4° Κ, ὑφίσταται ἄνωσιν 60 γραμμαρίων. Νὰ εὕρητε τὸ ὑψος αὐτοῦ.

§ 344. Πρόβλημα IV. Νὰ εὑρεθῇ δῆκος Θ πρίσματος ἐκ τῆς βάσεως καὶ τοῦ ὑψους αὐτοῦ.



Λύσις. “Ἐστω πρῶτον τριγωνικὸν πρίσμα ΑΒΓΔΕΖ (σχ. 263). “Ἀν σχηματίσωμεν παραλληλεπίπεδον ΑΘ μὲ τὸ αὐτὸ δῆκος καὶ διπλασιαν βάσιν ΑΒΗΓ, γνωρίζομεν (§ 339 Πόρ.) δτι τὸ πρίσμα ΑΒΓΔΕΖ εἶναι τὸ ἥμισυ αὐτοῦ. Ἐπομένως $\Theta = \frac{A\theta}{2}$. Ἐπειδὴ δὲ $(A\theta) = (ABHG) \cdot u$ $= 2(ABG) \cdot u$, ἔπειται δτι: $\Theta = (ABG) \cdot u$ (1)

“Ἐστω ἀκόμη τυχόν πολυγωνικὸν πρίσμα ΑΗ (σχ. 264). Τοῦτο διαιρεῖται εἰς τριγωνικὰ πρίσματα μὲ τὰ διαγώνια ἐπίπεδα ΑΣΓ καὶ ΑΣΔ. Τὰ τριγωνικὰ ταῦτα πρίσματα ἔχουσι τὸ

αύτό ὅψος υ μὲ τὸ ΑΗ καὶ βάσεις τὰ τρίγωνα ΑΒΓ,ΑΓΔ,ΑΔΕ.

“Αν δὲ εἰς ταῦτα ἐφαρμόσωμεν τὴν ἴσοτητα (1), εὑρίσκομεν εὐκόλως δτὶ (ΑΗ) = (ΑΒΓΔΕ)· υ (2)
Βλέπομεν λοιπὸν δτὶ :


“Ο δγκος παντὸς πρίσματος εἶναι γινόμενον τῆς βάσεως ἐπὶ τὸ ὅψος αὐτοῦ.

Τὸ προηγούμενον λοιπὸν διὰ τὰ παραλληλεπίπεδα γενικὸν συμπέρασμα ἀληθεύει διὰ πᾶν ἐν γένει πρίσμα.

Πόρισμα I. “Αν δύο ἴσοϋψη πρίσματα ἔχωσιν ἴσας ή ἴσοδυνάμους βάσεις, εἶναι ἴσοδύναμα.

Πόρισμα II. Δύο ἴσοϋψη πρίσματα είναι ως αἱ βάσεις αὐτῶν.

Πόρισμα III. “Αν δύο πρίσματα ἔχωσιν ἴσας ή ἴσοδυνάμους βάσεις, ταῦτα είναι ως τὰ ὅψη αὐτῶν.



Σχ. 264

Ασκήσεις.

722. “Ἐν δρθὸν πρίσμα ἔχει βάσιν δρθογώνιον τρίγωνον ΑΒΓ μὲ καθέτους πλευρᾶς 3 ἑκατ. καὶ 4 ἑκατ. τὸ δὲ ὅψος αὐτοῦ είναι τὸ ἄκμισυ τῆς ὑποτεινόσης. Νὰ εὕρητε τὸν δγκον αὐτοῦ.

723. “Ἐν ξύλινον πρίσμα ἔχει ὅψος 8 ἑκατ. καὶ βάσιν ἐν τραπέζιον ΑΒΓΔ. Τοῦτο ἔχει $A = \Delta = 1$ δρθ, $AB = 5$ ἑκατ., $\Gamma\Delta = \Delta\Delta = 4$ ἑκατ. Νὰ εὕρητε τὸν δγκον καὶ τὸ βάρος αὐτοῦ, ἂν τὸ ξύλον του ἔχῃ εἰδ. βάρος 0,9.

724. “Ἐν δρθὸν πρίσμα ἔχει βάσιν ἴσοπλευρον τρίγωνον πλευρᾶς 2,5 ἑκατ. καὶ παράπλευρον ἐπιφάνειαν 15 τετ. ἑκατ. Νὰ εὕρητε τὸν δγκον αὐτοῦ.

725. “Ἐν πρίσμα ἔχει ὅψος 0,40 μέτ. καὶ αἱ βάσεις του είναι κανονικὰ ἔξαγωνα μὲ πλευρὰν 0,4 μέτ. Νὰ εὕρητε τὸν δγκον αὐτοῦ.

Ασκήσεις πρὸς ἐπανάληψιν τοῦ Α΄ κεφαλαίου

726. “Ἡ διαγώνιος ἐνδὸς κύβου ἔχει μῆκος 5 ἑκατ. Νὰ εὕρητε τὸν δγκον καὶ τὸ ἐμβαδὸν τῆς ἐπιφανείας αὐτοῦ.

727. “Ἡ διαφορὰ τῶν ἀκμῶν δύο κύβων είναι 0,01 μέτ., τῶν δὲ δγκων αὐτῶν 0,000037 κ. μ. Νὰ εὕρητε τοὺς δγκούς αὐτῶν.

728. "Εν κυβικόν δοχείον ἔχει ἀκμήν $\frac{1}{4}$ μέτ. Νὰ εὕρητε τὸ βάρος τοῦ ἐλασίου, τὸ δποῖον χωρεῖ. (Εἰδ. βάρος ἐλασίου 0,915).

729. Νὰ εὕρητε τὸ ἐμβαδὸν τῆς παραπλεύρου ἐπιφανείας ἐνὸς πλαγίου πρίσματος, ἀνὴ μὲν πλευρὰ αὐτοῦ ἔχῃ μῆκος 2 παλαμῶν, ἡ δὲ κάθετος τομὴ του εἶναι ἵστος πλευρον τρίγωνον μὲ πλευρὰν 5 ἑκατ.

730. Μία αἴθουσα διδασκαλίας ἔχει διαστάσεις 9 μέτ, 6 μέτ, 4 μέτ. "Αν εἰς αὐτὴν διδάσκωνται 40 μαθηταί, νὰ εὕρητε πόσον μέρος τοῦ δξυγόνου τοῦ ἀέρος αὐτῆς ἀναλογεῖ εἰς ἕκαστον μαθητήν.

731. Μία δεξαμενὴ χωρεῖ 30 000 χιλιόγρ. όδατος. Τὸ στόμιον αὐτῆς εἶναι δρθογώνιον μὲ διαστάσεις 3 μέτ. καὶ 2 μέτ. Νὰ εὕρητε τὸ βάθος αὐτῆς.

732. Μία πλάξι σάπωνος ἔχει μῆκος 0,14 μέτ, πλάτος δὲ καὶ πάχος ἀνὰ 0,05 μέτ. Νὰ εὕρητε πόσας τοιαύτας πλάκας χωρεῖ ἐν κιβώτιον, τὸ δποῖον ἔχει ἐσωτερικάς διαστάσεις 22 παλ, 10 παλ, καὶ 7 παλ.

733. "Εν σιδηροῦν πρίσμα ἔχει ὅψος 12 ἑκατ. καὶ βάσιν δρθογώνιον καὶ ἰσοσκελές τρίγωνον μὲ ὑποτείνουσαν $5\sqrt{2}$ ἑκατ. Νὰ εὕρητε τὸ βάρος αὐτοῦ. (Εἰδ. βάρος σιδήρου 7,78).

734. "Εν πρίσμα ΑΒΓΖΕΔ πρόκειται νὰ διαιρεθῇ εἰς 3 ισοδύναμα μέρη μὲ ἐπίπεδα, τὰ δποῖα νὰ διέρχωνται ἀπὸ τὴν πλευρὰν ΑΖ αὐτοῦ. Νὰ δρίσητε τὰ σημεῖα, εἰς τὰ δποῖα ἡ πλευρὰ ΒΓ θὰ τμηθῇ ἀπὸ τὰ ἐπίπεδα ταῦτα.

735. "Εν δρθὸν πρίσμα ἔχει δγκον 1440 κυβ. παλάμας καὶ παραπλευρον ἐπιφάνειαν $480\sqrt{3}$ τετ. παλάμας. "Αν αἱ βάσεις του εἶναι κανονικὰ ἔξαγωνα, νὰ εὕρητε τὸ μῆκος τῆς πλευρᾶς αὐτῶν καὶ τὸ ὅψος τοῦ πρίσματος τούτου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

I. ΑΙ ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ

§ 345. Τί λέγονται πυραμίδες καὶ ποῖα εἶναι τὰ στοιχεῖα αὐτῶν. "Εστω μία κυρτὴ στερεά γωνία K (σχ. 265). "Αν τησσαμεν αὐτὴν μὲ ἐν ἐπίπεδον, τὸ δποῖον τέμνει δλας τὰς ἀκμὰς καὶ δὲν διέρχεται ἀπὸ τὴν κορυφήν της, σχηματίζεται ἐν πολύεδρον $K.ABΓΔEZ$ (σχ. 265).

Τοῦτο λέγεται Ἰδιαιτέρως πυραμίς.

"Αν ἡ στερεά γωνία εἶναι τρίεδρος, σχηματίζεται κατ' αὐτὸν τὸν τρόπον ἐν τετράεδρον $K.ABΓ$. Καὶ τοῦτο λέγεται πυραμίς. "Ωστε:


Πυραμίς εἶναι πολύεδρον, τὸ δποῖον περιέχεται μεταξὺ τῶν ἔδρων κυρτῆς στερεᾶς γωνίας καὶ μιᾶς ἐπιπέδου τομῆς αὐτῆς, ἡ δποία τέμνει δλας τὰς ἀκμὰς καὶ δὲν διέρχεται ἀπὸ τὴν κορυφὴν αὐτῆς.

"Η κορυφὴ K τῆς στερεᾶς γωνίας, ἀπὸ τὴν δποίαν γίνεται μία πυραμίς, λέγεται καὶ κορυφὴ τῆς πυραμίδος ταύτης.

"Η ἀπέναντι τῆς κορυφῆς ἔδρα μιᾶς πυραμίδος λέγεται βάσις αὐτῆς.

Αἱ δὲ ἄλλαι ἔδραι πυραμίδος λέγονται παράπλευροι ἔδραι αὐτῆς. Προφανῶς αὗται εἶναι τρίγωνα μὲ κοινὴν κορυφὴν τὴν κορυφὴν τῆς πυραμίδος. Βάσεις δὲ αὐτῶν εἶναι αἱ πλευραὶ τῆς βάσεως τῆς πυραμίδος.

"Η ἀπόστασις τῆς κορυφῆς μιᾶς πυραμίδος ἀπὸ τὴν βάσιν αὐτῆς λέγεται ὕψος τῆς πυραμίδος ταύτης. Π.χ. KH εἶναι τὸ ὕψος τῆς πυραμίδος $K.ABΓΔEZ$ (σχ. 265).



Σχ. 265

Αι άκματ μιάς πυραμίδος, αι δποῖαι διέρχονται από τὴν κορυφήν, λέγονται πλευραὶ αὐτῆς. Π.χ. ΚΑ, ΚΒ κ.τ.λ. εἶναι πλευραὶ τῆς πυραμίδος Κ.ΑΒΓΔΕΖ.

"Αν ή βάσις πυραμίδος εἶναι τρίγωνον, τυχὸν τετράπλευρον, πεντάγωνον κ.τ.λ., ή πυραμίς λέγεται ἀντιστοίχως τριγωνική, τετραγωνική, πενταγωνική κ.τ.λ.

Μία τριγωνική πυραμίς, π.χ. ή Κ.ΑΒΓ, ἔχει 4 ἔδρας, εἶναι δηλ. τετράεδρον. Οἰαδήποτε δὲ ἔδρα αὐτῆς δύναται νὰ θεωρηθῇ ως βάσις αὐτῆς.

"Η βάσις τῆς πυραμίδος Κ.ΑΒΓΔΕΖ (σχ. 265) εἶναι κανονικὸν ἑξάγωνον ΑΒΓΔΕΖ. Τὸ δὲ ὄψος ΚΗ διέρχεται από τὸ κέντρον τῆς βάσεως. Αὐτὴ λέγεται ίδιαιτέρως κανονικὴ πυραμίς. Δηλαδή :

Μία πυραμίς λέγεται κανονικὴ, ἂν η βάσις αὐτῆς εἶναι κανονικὸν εὐθ. σχῆμα, τὸ δὲ ὄψος τέμνῃ τὴν βάσιν εἰς τὸ κέντρον αὐτῆς.

"Αν μία τριγωνικὴ πυραμίς Κ.ΑΒΓ εἶναι κανονικὴ καὶ δλαι αι ἔδραι αὐτῆς εἶναι ίσαι, αὕτη λέγεται ίδιαιτέρως κανονικὸν τετράεδρον. Δηλαδή :

Κανονικὸν τετράεδρον εἶναι κανονικὴ τριγωνικὴ πυραμίς, τῆς δποῖας δλαι αι ἔδραι εἶναι ίσαι.

Εἶναι εύνότον δτι δλαι αι πλευραὶ κανονικῆς πυραμίδος εἶναι ίσαι (§ 284). "Επομένως αι παράπλευροι ἔδραι αὐτῆς εἶναι ίσα ίσοσκελῆ τρίγωνα.

Τὸ ὄψος ἑκάστης παραπλεύρου ἔδρας κανονικῆς πυραμίδος λέγεται ἀπόστημα αὐτῆς.

'Α σκήσεις

736. Μία κανονικὴ πυραμίς ἔχει ὄψος 8 ἑκατ. "Η δὲ βάσις αὐτῆς ἔχει ἀκτῖνα 6 ἑκατ. Νὰ εὕρητε πόσον μῆκος ἔχει ἑκάστη πλευρά τῆς πυραμίδος ταύτης.

737. Νὰ ἔξετάσητε, ἂν πᾶσα κανονικὴ τριγωνικὴ πυραμίς εἶναι κανονικὸν τετράεδρον.

738. Νὰ συγκρίνητε δλαις τὰς ἀκμὰς ἐνὸς κανονικοῦ τετραέδρου. "Αν δὲ μία ἀκμὴ αὐτοῦ ἔχῃ μῆκος α μονάδων μήκους, νὰ εὕρητε πόσον μῆκος ἔχει τὸ ὄψος αὐτοῦ.

Ι. ΓΕΝΙΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΥΡΑΜΙΔΩΝ

§ 346. Θεώρημα. Πᾶσα τομὴ αβγδ πυραμίδος $K.ABΓΔ$ παραλλήλος πρὸς τὴν βάσιν εἶναι δμοία πρὸς αὐτὴν καὶ τέμνει τὰς πλευρὰς καὶ τὸ ψῆφος εἰς μέρη ἀνάλογα. Ἐν δὲ λ εἶναι κοινὸν σημεῖον τοῦ ψήφους $KΔ$ καὶ τῆς τομῆς αβγδ, θὰ εἶναι

$$(\alpha\beta\gamma\delta) : (AB\Gamma\Delta) = (K\lambda)^2 : (KL)^2 \text{ (οχ. 266).}$$

Ἄπό δε ιξις. α') Αἱ πλευραὶ $\alpha\beta$, $\beta\gamma$, $\gamma\delta$, $\delta\alpha$ δα τῆς τομῆς εἶναι ἀντιστοίχως παράλληλοι πρὸς τὰς πλευρὰς AB , $B\Gamma$, $\Gamma\Delta$, ΔA (§ 295). Τὰ δὲ τρίγωνα $K\alpha\beta$, $K\beta\gamma$, $K\gamma\delta$, $K\delta\alpha$ εἶναι ἀντιστοίχως δμοία πρὸς τὰ KAB , $KB\Gamma$, $K\Gamma\Delta$, $K\Delta A$. Διὰ τοῦτο εἶναι

$$\frac{Ka}{KA} = \frac{\alpha\beta}{AB} = \frac{K\beta}{KB} = \frac{\beta\gamma}{B\Gamma} = \frac{Ky}{KG} = \frac{\gamma\delta}{\Gamma\Delta} = \frac{K\delta}{KD} = \frac{\delta\alpha}{KA} = \frac{\alpha}{KA}.$$

$$\text{Ἐκ τούτων ἔπειται ὅτι: } \frac{Ka}{KA} = \frac{K\beta}{KB} = \frac{Ky}{KG} = \frac{K\delta}{KD} \quad (1)$$

$$\text{καὶ } \frac{\alpha\beta}{AB} = \frac{\beta\gamma}{B\Gamma} = \frac{\gamma\delta}{\Gamma\Delta} = \frac{\delta\alpha}{KA} \quad (2)$$

Ἐπειδὴ τὸ ἐπίπεδον $BK\Lambda$ τέμνει τὴν τομὴν καὶ τὴν βάσιν τῆς πυραμίδος κατὰ παραλλήλους εύθείας $\beta\lambda$, $B\Lambda$, τὰ τρίγωνα $K\beta\lambda$, $KB\Lambda$ εἶναι δμοία καὶ ἐπομένως $\frac{KB}{KB} = \frac{K\lambda}{K\lambda}$. Ἐκ ταύτης καὶ τῶν (1) ἔπειται ὅτι:

$$\frac{Ka}{KA} = \frac{K\beta}{KB} = \frac{Ky}{KG} = \frac{K\delta}{KD} = \frac{K\lambda}{KL}$$

ἥτοι αἱ πλευραὶ καὶ τὸ ψῆφος τέμνονται εἰς μέρη ἀνάλογα.


β') Τὰ εύθ. σχήματα αβγδ, $AB\Gamma\Delta$ ἔχουσιν τὰς γωνίας ἵσας, μίαν πρὸς μίαν (§ 301). Διὰ τοῦτο καὶ διὰ τὴν ἀλήθειαν τῶν ἀνωτέρω ἴσοτήτων (2) ταῦτα εἶναι δμοία.

γ') Ἔνεκα τῆς δμοιότητος δὲ ταύτης εἶναι

$$\frac{(\alpha\beta\gamma\delta)}{(AB\Gamma\Delta)} = \left(\frac{\beta\gamma}{B\Gamma} \right)^2$$

Ἐκ ταύτης δὲ καὶ τῶν $\frac{\beta\gamma}{B\Gamma} = \frac{K\beta}{KB} = \frac{K\lambda}{KL}$ ἔπειται ὅτι:

$$(\alpha\beta\gamma\delta) : (AB\Gamma\Delta) = (K\lambda)^2 : (KL)^2.$$



Σχ. 266


Πόρισμα I. "Αν δύο ισοϋψεις πυραμίδες **Κ.ΑΒΓΔ**, **Λ.ΖΗΘ** τμηθῶσιν ύπο ἐπιπέδων παραλλήλων ἀντιστοίχως πρὸς τὰς βάσεις καὶ εἰς τὴν ἁπόστασιν ἀπὸ τῶν κορυφῶν, αἱ τομαὶ εἰναι ἀγάλογοι πρὸς τὰς βάσεις.

(σχ. 267).
Παρατηροῦμεν δὲ

$$\frac{(\alpha\beta\gamma\delta)}{(\text{ΑΒΓΔ})} = \left(\frac{\text{ΚΕ}}{\text{ΚΕ}}\right)^2,$$

$$\frac{(\zeta\eta\theta)}{(\text{ΖΗΘ})} = \left(\frac{\text{ΛΟ}}{\text{ΛΟ}}\right)^2$$

καὶ λαμβάνομεν ὑπὸ
ὅψιν τὰς ὑποθέσεις.



Σχ. 267

Πόρισμα II. "Αν δύο ισοϋψεις πυραμίδες ἔχωσιν τὰς ἡ ισοδυνάμους βάσεις καὶ τμηθῶσιν ύπο ἐπιπέδων ἀντιστοίχως παραλλήλων πρὸς τὰς βάσεις καὶ εἰς τὴν ἁπόστασιν ἀπὸ τῶν κορυφῶν, αἱ τομαὶ εἰναι τὰς ἡ ισοδύναμοι.

Α σκήσεις

739. "Αν ἡ τομὴ αβγδ πυραμίδος **Κ.ΑΒΓΔ** (σχ. 267.) εἰναι παράλληλος πρὸς τὴν βάσιν καὶ τὴν πρὸς τὸ ἤμισυ αὐτῆς, νὰ εὕρητε τὴν ἀπόστασιν Κα ἐκ τοῦ μήκους τῆς πλευρᾶς ΚΑ.

740. "Αν Κα: ΚΑ = 3: 5, ἡ δὲ τομὴ αβγδ εἰναι παράλληλος πρὸς τὴν βάσιν ΑΒΓΔ, νὰ εὕρητε τὸν λόγον αβγδ: ΑΒΓΔ (σχ. 267).

741. Νὰ εὕρητε τὸ ἐμβαδὸν μιᾶς τομῆς κανονικαῦ τετραέδρου, ἡ δοιοῖς τέμνει τὸ ὅψις αὐτοῦ δίχα καὶ καθέτως, συναρτήσει τῆς ἀκμῆς αὐτοῦ.

742. Τὸ ὅψις ΚΔ κανονικοῦ τετραέδρου **Κ.ΑΒΓ** ἐτμήθη καθέτως ύπο ἐπιπέδου εἰς τὸ σημεῖον Ε τοιοῦτον, ὥστε ΚΕ: ΕΔ = 2: 3. Νὰ εὕρητε τὸ ἐμβαδὸν τῆς σχηματισθείσης τομῆς συναρτήσει τῆς ἀκμῆς αὐτοῦ. Ἐφαρμογὴ διὰ $\alpha = 4$ ἐκατ.

II. ΜΕΤΡΗΣΙΣ ΤΩΝ ΠΥΡΑΜΙΔΩΝ

§ 347. *Πρόβλημα.* Νὰ εὑρεθῇ τὸ ἐμβαδὸν εἰς τῆς παραπλεύρου ἐπιφανείας κανονικῆς πυραμίδος ἐκ τῆς περιμέτρου τῆς βάσεως καὶ τοῦ ἀποστήματος αὐτῆς.

Λύσις. Έστω κανονική πυραμίδα $K.AB\Gamma\Delta$ και KE τὸ ἀπόστημα αὐτῆς (σχ. 268). Εἶναι λοιπόν

$$\epsilon = (KAB) + (KB\Gamma) + (K\Gamma\Delta) + (K\Delta A) \quad (1)$$

'Επειδὴ δὲ $(KAB) = \frac{1}{2} (AB) \cdot (KE)$,

$$(KB\Gamma) = \frac{1}{2} (B\Gamma) \cdot (KE), \quad (K\Gamma\Delta) =$$


$$\frac{1}{2} (\Gamma\Delta) (KE), \quad (K\Delta A) = \frac{1}{2} (\Delta A) (KE),$$

ἡ (1) γίνεται:

$$\epsilon = \frac{1}{2} [(AB) + (B\Gamma) + (\Gamma\Delta) + (\Delta A)] \cdot (KE)$$

"Ητοι:

Τὸ ἐμβαδὸν τῆς παραπλεύρου ἐπιφανείας κανονικῆς πυραμίδος εἶναι τὸ ἥμισυ τοῦ γινομένου τῆς περιμέτρου τῆς βάσεως ἐπὶ τὸ ἀπόστημα τῆς πυραμίδος.



Σχ. 268

~~*Α σκήνεις~~


743. Η βάσις κανονικῆς πυραμίδος εἶναι ισόπλευρον τρίγωνον μὲ πλευρὰν 6 ἑκατ. και τὸ ἀπόστημα αὐτῆς εἶναι 3 ἑκατ. Νὰ εὕρητε τὸ ἐμβαδὸν τῆς παραπλεύρου ἐπιφανείας αὐτῆς.

744. Η βάσις κανονικῆς πυραμίδος εἶναι τετράγωνον μὲ πλευρὰν 8 ἑκατ. Τὸ δὲ ὑψὸς αὐτῆς εἶναι 3 ἑκατ. Νὰ εὕρητε τὸ ἐμβαδὸν τῆς παραπλεύρου ἐπιφανείας αὐτῆς.

~~§ 348. Σχέσις δύο ισουψῶν τριγωνικῶν πυραμίδων, ὅντας βάσεις εἶναι ίσαι ἢ ισοδύναμοι.~~

~~"Εστωσαν δύο τριγωνικούς πυραμίδες $K.AB\Gamma$, $K'.A'B'\Gamma'$, αἱ δύο οἵτινες ἔχουσιν $(AB\Gamma) = (A'B'\Gamma')$, $K\Delta = K'\Delta'$ καὶ Θ, Θ' οἱ δύο οἵτινες αὐτῶν (σχ. 269).~~

~~Νοοῦμεν τὰ ὑψη $K\Delta$, $K'\Delta'$ διηρημένα εἰς 3 π.χ. ίσα μέρη ἔκαστον καὶ ἀπὸ τὰ σημεῖα~~



Σχ. 269

$K\Delta$, $K'\Delta'$ διηρημένα εἰς 3 π.χ. ίσα μέρη ἔκαστον καὶ ἀπὸ τὰ σημεῖα

τῆς διαιρέσεως ἐπίπεδα παράλληλα πρὸς τὰς βάσεις τῶν. Άλ σχηματιζόμεναι τομαὶ εἰναι ἵσαι ἡ ἴσοδύναμοι, μία πρὸς μίαν, ἥτοι $(EZH) = (E'Z'H')$, $(\Theta IL) = (\Theta'I'\Lambda')$.

'Ἐκ τούτων ἔπειται δτι: $(EZH) \cdot \frac{(\kappa\Delta)}{3} = (E'Z'H') \cdot \frac{(\kappa'\Delta')}{3}$ καὶ $(\Theta IL) \cdot \frac{(\kappa\Delta)}{3} = (\Theta'I'\Lambda') \cdot \frac{(\kappa'\Delta')}{3}$, ἥτοι (πρᾶσμα EP) = (πρᾶσμα A'H'), (πρᾶσμα ΘΤ) = (πρᾶσμα E'Λ'). "Ἄς νοήσωμεν καὶ τὸ πρᾶσμα AN, τὸ δποῖον ἔχει βάσιν ABΓ καὶ ὑψος $\frac{\kappa\Delta}{3}$ καὶ ἄς θέσωμεν (πρ. AN) + (πρ. EP) + (πρ. ΘΤ) = Π καὶ (πρ. A'H') + (πρ. E'Λ') = Π'.

'Ἐκ τούτων δι' ἀφαιρέσεως κατὰ μέλη εύρισκομεν δτι:

$$\Pi - \Pi' = (\text{πρ. AN}) = (AB\Gamma) \cdot \frac{(\kappa\Delta)}{3}. \quad (1)$$

'Ἐπειδὴ δὲ εἰναι προφανῶς $\Theta < \Pi$, θὰ εἰναι $\Theta - \Theta' < \Pi - \Theta'$. Καὶ ἐπειδὴ $\Theta' > \Pi'$, θὰ εἰναι $\Pi - \Theta' < \Pi - \Pi'$. 'Ἐκ ταύτης δὲ καὶ ἐκ τῆς $\Theta - \Theta' < \Pi - \Theta'$ ἔπειται κατὰ μείζονα λόγον δτι:

$$\Theta - \Theta' < \Pi - \Pi'$$

καὶ ἔνεκα τῆς (1) εἰναι:

$$\Theta - \Theta' < (AB\Gamma) \cdot \frac{(\kappa\Delta)}{3}.$$

"Ἄς νοήσωμεν τὰ ὑψη διηρημένα εἰς ν ἵσαι μέρη ἔκαστον καὶ ἐργασθῶμεν κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον εὑρίσκομεν δτι:

$$\Theta - \Theta' < (AB\Gamma) \cdot \frac{(\kappa\Delta)}{3}.$$

"Ἄς δὲ $\delta\rho v = \omega$, θὰ εἰναι $\delta\rho (AB\Gamma) \cdot \frac{(\kappa\Delta)}{v} = 0$ καὶ ἐπομένως $\Theta - \Theta' < \epsilon$, ὁσονδήποτε μικρὸς καὶ ἄν εἰναι δ. ε. 'Ἐπειδὴ δὲ διὰ τὰς αὐτὰς δύο πυραμίδας ἡ διαφορὰ $\Theta - \Theta'$ εἰναι σταθερά, διὰ νὰ συμβαίνῃ τοῦτο, πρέπει νὰ εἰναι $\Theta - \Theta' = 0$ καὶ ἐπομένως $\Theta = \Theta'$. Βλέπομεν λοιπὸν δτι:

"Ἄς δύο τριγωνικαὶ πυραμίδες ἔχωσιν ἵσαι ὑψη καὶ ἵσαι ἡ ἴσοδυνάμους βάσεις, αὗται εἰναι ἵσαι ἡ ἴσοδύναμοι.

§ 349. Πρόβλημα II. Νὰ εὑρεθῇ ὁ δγκος τριγωνικῆς πυραμίδος $K.AB\Gamma$ ἐκ τῆς βάσεως καὶ τοῦ ὑψους ν αὐτῆς (σχ. 270).

Λύσις. "Αν φέρωμεν εύθ. τμήματα ΑΔ, ΓΕ παράλληλα, δύο διαστάσεις καὶ ἴσα πρόσθια τὴν πλευράν ΒΚ, τὸ τρίγωνον ΔΚΕ εἶναι ἴσον καὶ παράλληλον πρόσθια τὸ ΑΒΓ. Τὸ στερεόν λοιπόν ΑΒΓΚΔΕ εἶναι τριγωνικὸν πρᾶσμα μὲ βάσιν τὴν βάσιν ΑΒΓ τῆς πυραμίδος καὶ ἴσοϋψες μὲ αὐτήν.

Νοοῦμεν διὰ τοῦ ἐπιπέδου ΑΚΓ ἀποσπῶμεν ἀπὸ αὐτὸν τὴν πυραμίδα Κ.ΑΒΓ. Οὕτω μένει ἡ τετραγωνικὴ πυραμὶς Κ.ΑΓΕΔ.

Αὕτη διὰ τοῦ ἐπιπέδου ΔΚΓ διαιρεῖται εἰς δύο πυραμίδας Κ.ΑΔΓ, Κ.ΔΓΕ. Αὗται ἔχουσι βάσεις τὰ ἴσα τρίγωνα ΑΓΔ, ΓΔΕ καὶ κοινὸν ύψος τὴν ἀπόστασιν τῆς κορυφῆς Κ ἀπὸ τὸ ἐπιπέδον ΑΓΕΔ. Εἶναι λοιπόν :

$$(K.AΔΓ) = (K.ΔΓΕ).$$

'Επειδὴ δὲ $(K.ΔΓΕ) = (Γ.ΚΔΕ) = (K.ΑΒΓ)$, ἐπεταὶ διὰ :



$$(K.ΑΒΓ) = (K.ΔΓΕ) = (K.ΑΔΓ) = \frac{(ΑΒΓΚΔΕ)}{3}$$

Βλέπομεν λοιπόν διὰ :

*Πᾶσα τριγωνικὴ πυραμὶς εἶναι τὸ τρίτον πρᾶσματος, τὸ δοποῖον ἔχει τὴν αὐτὴν βάσιν καὶ τὸ αὐτὸν ύψος.**

'Επειδὴ δὲ $(ΑΒΓΚΔΕ) = (ΑΒΓ) \cdot u$, ἐπεταὶ διὰ $(K.ΑΒΓ) = \frac{1}{3} (ΑΒΓ) \cdot u$, ἢτοι :

Ο δύκος τριγωνικῆς πυραμίδος εἶναι τὸ τρίτον τοῦ γινομένου τῆς βάσεως ἐπὶ τὸ ύψος αὐτῆς.



Σχ. 270

Λύσις. Τὰ διαγώνια ἐπίπεδα ΚΒΔ, ΚΒΕ διαιροῦσι τὴν πυραμίδα ταύτην εἰς τὰς τριγωνικὰς πυραμίδας Κ.ΒΓΔ, Κ.ΒΔΕ, Κ.ΒΕΑ, αἱ ὁποῖαι ἔχουσι τὸ αὐτὸν ύψος ΚΗ. "Αν δὲ εἰς ταύτας

~~§ 350. Πρόβλημα III. Νὰ ενδεθῇ δύκος πολυγωνικῆς πυραμίδος Κ.ΑΒΓΔΕ ἐκ τῆς βάσεως ΑΒΓΔΕ καὶ τοῦ ύψους ΚΗ αὐτῆς (σχ. 271).~~

έφαρμόσωμεν τὴν προηγουμένην ἰδιότητα, εύρίσκομεν εύκολως δτι: $(K.ABΓΔΕ) = \frac{1}{3} (ABΓΔΕ) \cdot (KH)$, "Ητοι:

"Ο δγκος πάσης πυραμίδος είναι τὸ τρίτον τοῦ γινομένου τῆς βάσεως ἐπὶ τὸ ὑψος αὐτῆς.

"Αν λοιπὸν Β είναι τὸ ἐμβαδὸν τῆς βάσεως τυχούσης πυραμίδος, υ τὸ ὑψος καὶ Θ δ ὅγκος αὐτῆς, θὰ είναι:

$$\Theta = \frac{1}{3} B \cdot u$$

Πόρισμα I. Πᾶσα πυραμὶς είναι τὸ τρίτον πρίσματος, τὸ δποιὸν ἔχει τὴν αὐτὴν βάσιν καὶ τὸ αὐτὸν ὑψος.

Πόρισμα II. "Αν ισοϋψετις πυραμίδες ἔχωσιν ἵσας ή ισοδύναμους βάσεις, είναι ἵσαι ή ισοδύναμοι.

Πόρισμα III. Αἱ ισοϋψετις πυραμίδες είναι ὡς αἱ βάσεις αὐτῶν. "Αν δὲ ἔχωσιν ἵσας ή ισοδυνάμους βάσεις, είναι ὡς τὰ ὑψη αὐτῶν.

Α σκήσεις

745. Η βάσις μιᾶς πυραμίδος είναι τετράγωνον μὲ πλευρὰν 4 παλαμῶν, τὸ δὲ ὑψος αὐτῆς είναι 9 παλάμαι. Νὰ εὕρητε τὸν ὅγκον αὐτῆς.

746. Μία ξυλίνη πυραμὶς ἔχει βάσιν ισόπλευρον τρίγωνον μὲ πλευρὰν 3 ἑκατ. καὶ βάρος 37,53 γραμμαρίων. Τὸ δὲ εἰδ. βάρος τοῦ ξύλου αὐτῆς είναι 0,9. Νὰ εὕρητε τὸ ὑψος αὐτῆς.

747. "Εν δρθ. τρίγωνον ΑΒΓ ἔχει καθέτους πλευράς (ΑΒ) = 15 ἑκατ., (ΑΓ) = 20 ἑκατ. Εἰς τὴν κορυφὴν Α ὑψοῦμεν κάθετον ἐπὶ τὸ ἐπίπεδον αὐτοῦ καὶ δρίζομεν ἐπ' αὐτῆς τμῆμα ΑΔ = ΒΓ. Νὰ εὕρητε τὸν ὅγκον τῆς πυραμίδος Δ.ΑΒΓ.

748. Εἰς τὸ κέντρον Κ τετραγώνου ΑΒΓΔ ὑψοῦμεν κάθετον ἐπὶ τὸ ἐπίπεδον αὐτοῦ καὶ δρίζομεν ἐπ' αὐτῆς τμῆμα ΚΕ = ΑΓ. Νὰ εὕρητε τὸν ὅγκον τῆς πυραμίδος Ε.ΑΒΓΔ συναρτήσει τῆς πλευρᾶς α τοῦ τετραγώνου.

749. Νὰ εὕρητε τὸν ὅγκον κανονικοῦ τετραέδρου συναρτήσει τῆς ἀκμῆς α αὐτοῦ.

750. Εἰς τὴν πλευρὰν ΒΓ τῆς βάσεως ΑΒΓ μιᾶς πυραμίδος Κ.ΑΒΓ νὰ δρίσητε δύο σημεῖα Δ καὶ Ε τοιαῦτα, ὥστε τὰ ἐπίπεδα ΚΑΔ, ΚΑΕ νὰ διαιρῶσι τὴν πυραμίδα εἰς ισοδύναμα μέρη.

751. Μία τριγωνικὴ πυραμὶς Κ.ΑΒΓ ἔχει ὑψος 9 ἑκατ., αἱ δὲ πλευραὶ τῆς βάσεως είναι (ΑΒ) = 4 ἑκατ., (ΒΓ) = 6 ἑκατ., (ΑΓ) = 5 ἑκατ. Νὰ εὕρητε τὸν ὅγκον αὐτῆς.

III. ΑΙ ΚΟΛΟΥΡΟΙ ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ

§ 351. Τί είναι κόλουρος πυραμίδης καὶ ποῖα είναι τὰ στοιχεῖα αὐτῆς. Εἰς τυχούσαν πυραμίδα Κ.ΑΒΓΔ φέρομεν ἐπίπεδον παράλληλον πρὸς τὴν βάσιν αὐτῆς. Μεταξὺ τῆς βάσεως καὶ τῆς τομῆς ΕΖΘΗ περιέχεται ἐν μέρος τῆς πυραμίδος.

Τὸ μέρος τοῦτο λέγεται ίδιαιτέρως
κόλουρος πυραμίδης (σχ. 272) "Ωστε:

Κόλουρος πυραμίδης είναι μέρος πυραμίδος, τὸ δποῖον περιέχεται μεταξὺ τῆς βάσεως αὐτῆς καὶ μιᾶς ἐπιπέδου τομῆς παραλλήλου πρὸς τὴν βάσιν.

"Εχει λοιπὸν πᾶσα κόλουρος πυραμίδης δύο παραλλήλους ἔδρας. Αὗται λέγονται βάσεις αὐτῆς. Είναι δὲ αἱ βάσεις αὗται δημοια εὐθ. σχήματα (§ 346).

'Ἐκ τοῦ εἶδους δὲ τῶν βάσεων αἱ κόλ. πυραμίδες διακρίνονται εἰς τριγωνικάς, τε-
τραγωνικάς, πενταγωνικάς κ.τ.λ.

Αἱ ἄλλαι ἔδραι αὐτῆς λέγονται παράπλευροι ἔδραι αὐτῆς. Είναι δὲ αὗται τραπέζια.

'Η ἀπόστασις λλ τῶν βάσεων ΑΒΓΔ, ΕΖΘΗ κολ. πυραμίδος ΒΗ λέγεται ψφος αὐτῆς.


Τὰ μέρη τῶν πλευρῶν τῆς ἀρχικῆς πυραμίδος, τὰ δποῖα περιέχονται μεταξὺ τῶν βάσεων κολ. πυραμίδος, λέγονται πλευραὶ αὐτῆς.

Π.χ. τὰ εὐθ. τμήματα ΑΕ, ΒΖ, ΓΘ, ΔΗ είναι αἱ πλευραὶ τῆς κουλούρου πυραμίδος ΒΗ.

§ 352. Πρόβλημα. Νὰ ενρεθῇ ὁ δγκος κολ. πυραμίδος ἐκ τῶν βάσεων καὶ τοῦ ψφους αὐτῆς.

Λύσις. "Ἐστω Θ ὁ δγκος τῆς ἀνωτέρω κολ. πολυγωνικῆς πυραμίδος ΒΗ, ($\lambda\lambda$) = u τὸ ψφος αὐτῆς καὶ ($AB\Gamma\Delta$) = B , ($EZ\Theta H$) = β τὰ ἐμβαδά τῶν βάσεων αὐτῆς (σχ. 272). Είναι φανερὸν δτι: $\Theta = (K.AB\Gamma\Delta) - (K.EZ\Theta H)$ (1)

$$\text{Έπειδὴ δὲ } (K.AB\Gamma\Delta) = \frac{1}{3} B \cdot (KL) \text{ καὶ } (K.EZ\Theta H) = \frac{1}{3} \beta \cdot (KL),$$



Σχ. 272

$$\text{ή (1) γίνεται } \Theta = \frac{1}{3} [B(K\Lambda) - \beta(K\lambda)] \quad (2)$$

'Επειδή δὲ (§ 346) εἰναι $\frac{B}{\beta} = \left(\frac{K\Lambda}{K\lambda}\right)^2$, ἐπειταὶ κατὰ σειράν διτι

$$\frac{(K\Lambda)}{(K\lambda)} = \frac{\sqrt{B}}{\sqrt{\beta}}, \quad \frac{(K\Lambda)}{\sqrt{B}} = \frac{(K\lambda)}{\sqrt{\beta}} = \frac{(K\Lambda) - (K\lambda)}{\sqrt{B} - \sqrt{\beta}} = \frac{u}{\sqrt{B} - \sqrt{\beta}}.$$

$$'Ἐπομένως (K\Lambda) = \frac{u \cdot \sqrt{B}}{\sqrt{B} - \sqrt{\beta}} \text{ καὶ } (K\lambda) = \frac{u \cdot \sqrt{\beta}}{\sqrt{B} - \sqrt{\beta}}.$$

$$'Ἐνεκα τούτων ή (2) γίνεται \Theta = \frac{1}{3} \frac{B\sqrt{B} - \beta\sqrt{\beta}}{\sqrt{B} - \sqrt{\beta}} \cdot u.$$

"Ἄν δὲ ἔκτελέσωμεν τὴν διαιρεσιν $(B\sqrt{B} - \beta\sqrt{\beta}) : (\sqrt{B} - \sqrt{\beta})$, εὑρίσκομεν πηλίκον $B + \sqrt{B\beta} + \beta$ καὶ ἐπομένως

$$\Theta = \frac{1}{3} (B + \sqrt{B\beta} + \beta) u.$$

'Α σκήσεις

752. Μία κόλουρος πυραμίς ἔχει ὕψος 4 ἑκατ. καὶ βάσεις ισόπλευρα τρίγωνα μὲ πλευρὰν 6 ἑκατ. τὸ ἐν καὶ 4 ἑκατ. τὸ ἄλλο. Νὰ εὕρητε τὸν δγκον αὐτῆς.

753. Μία κόλ. πυραμίς ἔχει ὕψος 2,5 παλ. καὶ βάσεις τετράγωνα μὲ πλευρὰν 3,75 παλ. τὸ ἐν καὶ 25 ἑκατ. τὸ ἄλλο. Νὰ εὕρητε τὸν δγκον αὐτῆς.

754. Μία πυραμίς Κ.ΑΒΓ ἔχει βάσιν ισόπλευρον τρίγωνον μὲ πλευρὰν 5 ἑκατ. καὶ ὕψος 6 ἑκατ. Ἐπὶ τῆς πλευρᾶς ΚΑ δρίζομεν σημεῖον α τοιοῦτον, ὥστε νὰ εἰναι Κα:αΑ = 2:3. Ἀν διὰ τοῦ α ἀχθῆ ἐπίπεδον παράλληλον πρὸς τὴν βάσιν, νὰ εὕρητε τὸν δγκον τῆς ἀποχωριζομένης κολ. πυραμίδος.

755. Ὁ λόγος τῶν διμολόγων πλευρῶν τῶν βάσεων β, Β κολ. πυραμίδος εἶναι ρ καὶ τὸ ὕψος εἶναι u. Νὰ ἀποδείξητε διτι ὁ δγκον αὐτῆς εἶναι

$$\frac{1}{3} B (1 + \rho + \rho^2) u.$$

2. ΤΑ ΚΟΛΟΒΑ ΠΡΙΣΜΑΤΑ

§ 353. Τί εἶναι κολοβὸν πρᾶσμα καὶ ποῖα εἶναι τὰ στοιχεῖα αὐτοῦ. Ἐστω ΑΓ' τυχὸν πρᾶσμα καὶ ΕΖΗΘ μία ἐπίπεδος τομὴ αὐτοῦ, ή δποία δὲν εἶναι παράλληλος πρὸς τὰς

βάσεις τοῦ πρίσματος καὶ τέμνει δλας τὰς πλευράς (σχ. 273).

Μεταξὺ τῆς βάσεως ΑΒΓΔ καὶ τῆς τομῆς ταύτης περιέχεται ἐν μέρος ΑΗ τοῦ πρίσματος Τὸ μέρος τοῦτο λέγεται ἴδιαιτέρως κολοβὸν πρίσμα. Διὰ τούς αὐτούς λόγους καὶ τὸ στερεὸν ΕΓ' εἶναι κολοβὸν πρίσμα. "Ωστε :


Κολοβὸν πρίσμα εἶναι μέρος πρίσματος, τὸ δποῖον περιέχεται μεταξὺ μιᾶς βάσεως καὶ ἐπιπέδου τομῆς αὐτοῦ, η δποὶα δὲν εἶναι παράλληλος πρὸς τὰς βάσεις καὶ τέμνει δλας τὰς πλευράς αὐτοῦ.

"Η βάσις ΑΒΓΔ τοῦ ἀρχικοῦ πρίσματος ΑΓ' λέγεται καὶ βάσις τοῦ κολοβοῦ πρίσματος ΑΗ.

"Αν ἡ βάσις κολοβοῦ πρίσματος εἶναι τρίγωνον, τυχὸν τετράπλευρον, πεντάγωνον κ.τ.λ., τὸ κολοβὸν πρίσμα λέγεται ἀντιστοίχως τριγωνικόν, τετραγωνικόν, πενταγωνικὸν κ.τ.λ.

"Αν τὸ ἀρχικὸν πρίσμα εἶναι δρθὸν ἢ πλάγιον καὶ τὸ κολοβὸν πρίσμα λέγεται δρθὸν ἢ πλάγιον.


Τὰ μέρη ΑΕ, ΒΖ, ΓΗ, ΔΘ τῶν πλευρῶν τοῦ ἀρχικοῦ πρίσματος λέγονται πλευραὶ τοῦ κολοβοῦ πρίσματος.



Αὕτη διαιρεῖται ὑπὸ τοῦ ἐπιπέδου ΖΕΓ εἰς δύο πυραμίδας Ε.ΖΑΓ, Ε.ΓΔΖ. Εἶναι λοιπὸν

$$(ΑΒΓΖΕΔ) = (Ε.ΑΒΓ) + (Ε.ΖΑΓ) + (Ε.ΓΔΖ) \quad (1)$$

'Επειδὴ δὲ ἡ πλευρά ΕΒ ως παράλληλος πρὸς τὴν ΑΖ εἶναι



Σχ. 273

παράλληλος πρὸς τὸ ἐπίπεδον ΖΑΓ, ἡ πυραμὶς Ε.ΖΑΓ εἶναι
ἴσοψής μὲ τὴν Β.ΖΑΓ. Εἶναι λοιπὸν (Ε.ΖΑΓ) = (Β.ΓΑΖ) =
(Ζ.ΑΒΓ). 'Ομοίως ἔννοοῦμεν δτι:

$$(Ε.ΓΔΖ) = (Β.ΓΔΖ) = (Ζ.ΒΓΔ) = (Α.ΒΓΔ) = (Δ.ΑΒΓ).$$

Ἐνεκα τούτων ἡ (1) γίνεται

$$(ΑΒΓΔΕΖ) = (Ε.ΑΒΓ) + (Ζ.ΑΒΓ) + (Δ.ΑΒΓ) \quad (2)$$

Βλέπομεν λοιπὸν δτι:

'Ο δγκος τριγωνικοῦ κολοβοῦ πρίσματος εἶναι ἀθροισμα τῶν
δγκων τριῶν πυραμίδων, αἱ δποῖαι ἔχουσιν κοινὴν τὴν βάσιν
τοῦ κολ. πρίσματος, κορυφὰς δὲ τὰς κορυφὰς τῆς τομῆς.

Ηδη διακρίνομεν δύο περιπτώσεις.

α') "Αν τὸ κολοβὸν πρίσμα εἶναι δρθόν, αἱ πλευραὶ ΕΒ
ΖΑ, ΔΓ εἶναι ἀντιστοίχως ὅψη τῶν πυραμίδων Ε.ΑΒΓ, Ζ.ΑΒΓ,
Δ.ΑΒΓ καὶ ἐπομένως:

$$(Ε.ΑΒΓ) = \frac{1}{3} (ΑΒΓ) \cdot (ΕΒ), (Ζ.ΑΒΓ) = \frac{1}{3} (ΑΒΓ) \cdot (ΖΑ),$$

$$(\Delta.ΑΒΓ) = \frac{1}{3} (ΑΒΓ) \cdot (\DeltaΓ),$$

ἡ δὲ Ισότης (2) γίνεται

$$\Theta = \frac{1}{3} (ΑΒΓ) [(ΑΖ) + (ΒΕ) + (ΓΔ)] \quad (3)$$

Ητοι:


'Ο δγκος δρθοῦ κολοβοῦ τριγωνι-
κοῦ πρίσματος εἶναι τὸ τρίτον τοῦ γυ-
νομένου τῆς βάσεως ἐπὶ τὸ ἀθροισμα
τῶν πλευρῶν αὐτοῦ.

β') "Αν τὸ κολοβὸν πρίσμα εἶναι
πλάγιον (σχ. 275), διαιροῦμεν αὐτὸ
εἰς δύο δρθὰ μὲ μίαν κάθετον τομὴν
ΗΘΙ. "Επειτα εἰς ἔκαστον ἐφαρμόζο-
μεν τὴν ἀνωτέρω Ισότητα (3) καὶ
εύρισκομεν δτι:

$$(ΑΒΓΗΘΙ) = \frac{1}{3} (ΗΘΙ) [(ΑΗ) + (ΒΘ) + (ΓΙ)],$$

$$(ΗΘΙΖΕΔ) = \frac{1}{3} (ΗΘΙ) [(ΗΖ) + (ΘΕ) + (ΙΔ)].$$

Αν δὲ προσθέσωμεν ταύτας κατὰ μέλη, εύρισκομεν δτι:



Σχ. 275

$$(ΑΒΓΔΕΖ) = \frac{1}{3} (ΗΘΙ)[(ΑΖ)+(ΒΕ)+(ΓΔ)], \quad \text{ήτοι:}$$

‘Ο δγκος πλαγίου τριγωνικοῦ κολοβοῦ πρίσματος είναι τὸ τρίτον τοῦ γινομένου τῆς καθέτου τομῆς αὐτοῦ ἐπὶ τὸ ἀνθροισμα τῶν πλευρῶν αὐτοῦ.

§ 355. Πρόβλημα II. Νὰ εὑρεθῇ δ δγκος πολυγωνικοῦ κολοβοῦ πρίσματος.

Λύσις. Διά νὰ εύρωμεν π.χ. τὸν δγκον τοῦ τετραγωνικοῦ κολοβοῦ πρίσματος ΑΗ (σχ. 273) νοοῦμεν τὸ διαγώνιον ἐπίπεδον ΒΒ'Δ'Δ. Τοῦτο διαιρεῖ τὸ ΑΗ εἰς τὰ τριγωνικά κολοβά πρίσματα ΑΒΔΕΖΘ καὶ ΒΔΓΖΘΗ. Εύρισκομεν ἐπειτα τοὺς δγκούς τούτων καὶ προσθέτομεν αὐτούς. Οὕτως, ἂν τὸ ΑΗ είναι δρθόν, θὰ είναι:

$$(ΑΒΔΕΖΘ) = \frac{1}{3} (ΑΒΔ)[(ΑΕ)+(ΒΖ)+(ΔΘ)] \text{ καὶ}$$

$$(ΒΔΓΖΘΗ) = \frac{1}{3} (ΒΔΓ)[(ΒΖ)+(ΔΘ)+(ΓΗ)]$$

$$\begin{aligned} \cdot \text{Επομένως } (ΑΗ) &= \frac{1}{3} (ΑΒΔ)[(ΑΕ)+(ΒΖ)+(ΔΘ)] + \\ &\quad \frac{1}{3} (ΒΔΓ)[(ΒΖ)+(ΔΘ)+(ΓΗ)]. \end{aligned}$$

‘Ομοίως ἔργαζόμεθα δι’ οἰονδήποτε πολυγωνικὸν κολοβὸν πρίσμα.

Α σκήσεις

756. “Ἐν δρθὸν κολοβὸν τριγωνικὸν πρίσμα ἔχει βάσιν ισόπλευρον τρίγωνον μὲ πλευρὰν 30 ἑκατ. καὶ πλευρὰς 15, 20, 25 ἑκατ. Νὰ εύρητε τὸν δγκον αὐτοῦ.

757. “Ἐν πλάγιον τριγωνικὸν κολοβὸν πρίσμα ἔχει πλευρὰς 4,5 ἑκατ., 5 ἑκατ., 6,5 ἑκατ. Η δὲ κάθετος τομὴ αὐτοῦ είναι δρθογώνιον τρίγωνον μὲ ύποτείνουσαν 5 ἑκατ. καὶ μίαν κάθετον πλευρὰν 3 ἑκατ. Νὰ εύρητε τὸν δγκον του.

758. Τὸ δρθὸν κολοβὸν πρίσμα ΑΗ (σχ. 273) ἔχει πλευρὰς (ΑΕ)=3 ἑκατ., (ΒΖ)=5 ἑκατ., (ΓΗ)=3,5 ἑκατ., (ΔΘ)=1 ἑκατ. Η δὲ βάσις ΑΒΓΔ αὐτοῦ είναι τετράγωνον μὲ πλευρὰν 2,5 ἑκατ. Νὰ εύρητε τὸν δγκον του.

'Ασκήσεις πρὸς ἐπαναληψιν τοῦ Β' κεφαλαίου

759. Μία πυραμὶς ἔχει ὅψος 4 ἑκατ. καὶ βάσιν ισόπλευρον τρίγωνον μὲ πλευρὰν 6 ἑκατ. Εἰς πόσην ἀπόστασιν ἀπὸ τὴν κορυφὴν αὐτῆς πρέπει νὰ φέρωμεν ἐπίπεδον παράλληλον πρὸς τὴν βάσιν, ἵνα ἡ τομὴ αὐτῆς ἔχῃ ἐμβαδὸν 13,5 τετ. ἑκατοστόμετρα;

760. Μία πυραμὶς ἔχει βάσιν τετράγωνον καὶ ὅψος 2 ἑκατ. Βυθιζομένη εἰς ἀπεσταγμένον ὅδωρ 4^ο Κ ὑφίσταται ἀνωσιν 6 γραμμαρίων. Νὰ εὕρητε τὸ μῆκος τῆς πλευρᾶς τῆς βάσεως αὐτῆς.

761. Ἡ ἐν Αἰγύπτῳ μεγάλη πυραμὶς τοῦ Χέοπος εἰναι κανονικὴ μὲ βάσιν τετράγωνον πλευρᾶς 230,3 μέτ. Ἐκάστη δὲ πλευρὰ αὐτῆς ἔχει μῆκος 219,1 μέτ. Νὰ εὕρητε τὸ ὅψος καὶ τὸν δγκον αὐτῆς.

762. Ἐν κολοβὸν τριγωνικὸν πρίσμα ἔχει δγκον 48 κυβ. ἑκατοστόμετρα, κάθετον τομὴν 8 τετ. ἑκατοστομέτρων καὶ πλευρὰς ἀναλόγους πρὸς τοὺς ἀριθμοὺς 2,3,4. Νὰ εὕρητε τὰ μῆκη τῶν πλευρῶν τούτων.

763. Ἐν κανονικὸν τετράεδρον Κ.ΑΒΓ ἔχει ἀκμὴν 5 ἑκατ. Ἀν Μ εἰναι τὸ μέσον τῆς ἀκμῆς ΒΓ, νὰ εὕρητε τὸ ἐμβαδὸν τῆς τομῆς ΚΑΜ αὐτῆς καὶ νὰ συγκρίνητε τὰ δύο στερεά, εἰς τὰ δποῖα τοῦτο διαιρεῖται ἀπὸ τὴν τομὴν ταύτην.

764. Αἱ βάσεις μιᾶς κολ. πυραμίδος ἔχουσι ἐμβαδὰ 16 τετ. ἑκατ. καὶ 4 τετ. ἑκατ. Νὰ εὕρητε τὸ ἐμβαδὸν τῆς μέσης τομῆς αὐτῆς.

765. Νὰ εὕρητε τὸν λόγον τῆς προηγουμένης κολ. πυραμίδος πρὸς ἴσοϋψὲς πρίσμα, τὸ δποῖον ἔχει βάσιν τὴν μέσην τομὴν αὐτῆς.

766. Ἡ βάσις πυραμίδος Κ.ΑΒΓ ἔχει ἐμβαδὸν $(3 + \sqrt{5})$ τετ. ἑκατ. Ἐπὶ τῆς πλευρᾶς ΚΑ δρίζομεν σημεῖον α τοιοῦτον, ὥστε νὰ εἰναι ΚΑ : Κα = Κα : αΑ. Νὰ εὕρητε τὸ ἐμβαδὸν τῆς τομῆς αὐτῆς ὅπδ ἐπιπέδου διερχομένου διὰ τοῦ α καὶ παραλλήλου πρὸς τὴν βάσιν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'

ΤΑ ΟΜΟΙΑ ΠΟΛΥΕΔΡΑ

§ 356. Ποια λέγονται δμοια πολύεδρα. Ἐστωσαν δύο κύβοι ΑΕ καὶ αε (σχ. 276). Αἱ ἔδραι ΑΘ, ΘΖ, ΖΗ κ.τ.λ. εἰναι ἀντιστοίχως δμοιαι πρὸς τὰς ἔδρας αθ, ζη, ζη κ.τ.λ. τοῦ ἄλλου, κεῖνται δὲ δμοίως πρὸς αὐτάς. Αἱ δὲ ὑπὸ δμοίων ἔδρῶν σχηματιζόμεναι στερεαι γωνίαι αὐτῶν εἰναι ἵσαι. Π.χ. αἱ στερεαι γωνίαι Θ καὶ θ ἔχουσι τὰς ἔδρας αὐτῶν ἵσας, μίαν πρὸς μίαν· ἀν δὲ αἱ ἔδραι ΑΘ καὶ αθ τεθῶσιν ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ ἐπιπέδου, αἱ ἀκμαὶ ΘΕ, θε θά κεῖνται πρὸς τὸ αὐτὸ μέρος αὐτοῦ. Εἶναι λοιπὸν

$$\theta = \theta (\S\ 327).$$

Διὰ τοὺς λόγους τούτους οἱ δύο οὗτοι κύβοι λέγονται δμοια πολύεδρα.

Κατὰ τὸν ἴδιον τρόπον βλέπομεν ὅτι καὶ δύο κανονικὰ τετράεδρα ἔχουσι τὰς αὐτὰς ἴδιότητας. Εἶναι λοιπὸν καὶ ταῦτα δμοια. Ὡστε:


Δύο πολύεδρα λέγονται δμοια, ἀν αἱ ἔδραι αὐτῶν εἶναι δμοιαι, μία πρὸς μίαν, καὶ κεῖνται δμοίως. Αἱ δὲ ὑπὸ δμοίων ἔδρῶν σχηματιζόμεναι στερεαι γωνίαι εἶναι ἵσαι.

Αἱ δμοιαι ἔδραι δύο δμοίων πολυέδρων λέγονται δμόλογοι ἔδραι.

Αἱ ὑπὸ δμολόγων ἔδρῶν σχηματιζόμεναι διεδροι γωνίαι λέγονται δμόλογοι διεδροι.

Αἱ κορυφαὶ τῶν ἵσων στερεῶν γωνιῶν λέγονται δμόλογοι κορυφαὶ.

Ἐπίσης τὰ ὑπὸ δμολόγων κορυφῶν δριζόμενα εύθ. τμήματα



Σχ. 276

λέγονται δμόλογα. Π.χ. αἱ διαγώνιοι ΔΘ καὶ δθ τῶν ἀνωτέρω κύβων εἶναι δμόλογοι διαγώνιοι.

"Αν νοήσωμεν δτι αἱ στερεαὶ γωνίαι Α καὶ α (σχ. 276) ἔφαρμόζουσιν, βλέπομεν δτι αἱ δίεδροι αβ, αγ, αδ ἔφαρμόζουσιν ἀντιστοίχως ἐπὶ τῶν ΑΒ, ΑΓ, ΑΔ. "Ωστε:

Αἱ δμόλογοι δίεδροι γωνίαι δύο δμοίων πολυνέδρων εἶναι ἴσαι.

'Επειδὴ δὲ αἱ ἔδραι ΑΘ, ΘΖ, ΖΗ κ.τ.λ. εἶναι ἀντιστοίχως δμοίαι πρὸς τὰς αθ, θζ, ζη κ.τ.λ., ἔπειται δτι:

$AB : \alpha\beta = B\theta : \beta\theta = EZ : \varepsilon\zeta = HD : \eta\delta$ κ.τ.λ. Βλέπομεν δηλ. δτι:

Ο λόγος τῶν δμολόγων ἀκμῶν δύο δμοίων πολυνέδρων εἶναι σταθερός.

Λέγεται δὲ οὗτος λόγος τῆς δμοιότητος αὐτῶν.


I. ΔΥΟ ΆΛΛΑ ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΜΟΙΩΝ ΠΟΛΥΕΔΡΩΝ

§ 357. *Παράδειγμα I.* "Εστω τυχοῦσα πυραμὶς Κ.ΑΒΓΔ καὶ αβγδ παράλληλος πρὸς τὴν τομὴν αὐτῆς (σχ. 277).

Γνωρίζομεν (§ 346) δτι αἱ ἔδραι τῶν πυραμίδων Κ.ΑΒΓΔ καὶ Κ.αβγδ εἶναι δμοίαι, μίαν μίαν εἶναι δὲ φανερὸν δτι κεῖνται καὶ δμοίως.

Αἱ στερεαὶ γωνίαι π.χ. β καὶ Β σχηματίζονται ἀπὸ δμοίας ἔδρας. "Έχουσι δὲ αὐταὶ τὰς ἔδρας ἴσας, μίαν πρὸς μίαν. Καὶ ἂν νοήσωμεν δτι π.χ. ή β μετακινεῖται οὕτως, ὅστε ἡ κορυφὴ τῆς νὰ συμπέσῃ μὲ τὴν κορυφὴν τῆς Β καὶ ἡ ἔδρα αβγ νὰ συμπέσῃ μὲ τὴν ἔδραν ΑΒΓ, αἱ ἀκμαὶ βΚ καὶ BK θὰ εύρισκωνται πρὸς τὸ αὐτὸ μέρος τοῦ ἐπιπέδου ΑΒΓ. Αἱ στερεαὶ λοιπὸν γωνίαι εἶναι ἴσαι (§ 327).

"Ομοίως βλέπομεν δτι καὶ αἱ στερεαὶ γωνίαι α, γ, δ εἶναι ἀντιστοίχως ἴσαι πρὸς τὰς Α, Γ, Δ, εἶναι δὲ καὶ ἡ Κ κοινὴ. Αἱ δύο λοιπὸν πυραμίδες Κ.ΑΒΓΔ καὶ Κ.αβγδ εἶναι δμοία πολύεδρα. "Ωστε:



"Αν μία πυραμίς τμηθῇ ύπο διπλέδου παραλλήλου πρὸς τὴν βάσιν τῆς, ἡ ἀποχωριζόμενη πυραμίς εἶναι δμοία πρὸς αὐτήν.

§ 358. Παράδειγμα II. "Εστω τυχὸν τετράεδρον K.AΒΓ καὶ μία τρίεδρος στερεὰ γωνία κ (σχ. 278), ἡ δποία ἔχει

$$\delta.\kappa\beta = \delta.K\beta, \alpha\kappa\beta = \widehat{AKB}, \beta\kappa\gamma = \widehat{BKG}.$$

'Επὶ τῶν ἀκμῶν τῆς κ ἀς λάβωμεν τμῆματα κα, κβ, κγ ἀνάλογα πρὸς τὰς πλευρὰς KA, KB, KG τοῦ τετραέδρου K.AΒΓ.

"Αν φέρωμεν τὰ εύθ. τμῆματα αβ, βγ, γα, σχηματίζεται νέον τετράεδρον κ.αβγ. Τούτου αἱ ἔδραι ακβ, βκγ εἰναι δμοίαι πρὸς τὰς ἔδρας AKB, BKG καὶ κεῖται δμοίως πρὸς αὐτάς. Αἱ δὲ ύπο τῶν δμοίων τούτων ἔδρων σχηματίζομεναι δίεδροι γωνίαι εἶναι ἵσαι.


Θὰ ἔξετάσωμεν, ἂν τὰ τετράεδρα ταῦτα εἶναι δμοία ἢ δχι.

Πρὸς τοῦτο ἐπὶ τῆς KB δρίζομεν τμῆμα Kβ' ἵσον πρὸς κβ καὶ ἔστω β'α'γ' ἐπίπεδος τομὴ τοῦ τετραέδρου K.AΒΓ παράλληλος πρὸς τὴν ἔδραν AΒΓ. Κατὰ τὸ προηγούμενον παράδειγμα αἱ πυραμίδες K.AΒΓ, K.α'β'γ' εἶναι δμοίαι.

Τὰ δὲ τρίγωνα καβ, Kα'β' ἔχουσι $K\beta' = \kappa\beta$, $\alpha'K\beta' = \widehat{\alpha\kappa\beta}$, $\alpha'\beta'K = \widehat{ABK} = \alpha\beta\kappa$. Εἰναι λοιπὸν ταῦτα ἵσαι δι' δμοίους λόγους καὶ τὰ τρίγωνα βκγ καὶ β'Κγ' εἶναι ἵσαι.

"Ας νοήσωμεν τώρα δτι τὸ τετράεδρον κ.αβγ τίθεται ἐπὶ τοῦ K.α'β'γ' οὕτως, ὅστε τὸ τρίγωνον καβ νὰ ἐφαρμόσῃ ἐπὶ τοῦ Kα'β' μὲ τὴν κβ ἐπὶ τῆς Kβ'. Εὔκλως δὲ ἐννοοῦμεν δτι τὸ τρίγωνον κβγ θὰ ἐφαρμόσῃ εἰς τὸ Kβ'γ' καὶ τὸ τετράεδρον κ.αβγ εἰς τὸ K.α'β'γ'. "Ωστε καὶ τὸ κ.αβγ εἶναι δμοίον μὲ τὸ K.ΑΒΓ. Βλέπομεν λοιπὸν δτι:

"Αν δύο τετράεδρα ἔχωσι δύο ἔδρας δμοίας, μίαν πρὸς μίαν,



Σχ. 278

καὶ δμοίως κειμένας, τὰς δὲ ὑπὸ αὐτῶν σχηματιζομένας διέδρους γωνίας ἴσας, ταῦτα εἶναι δμοια.

II. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΜΟΙΩΝ ΠΟΛΥΕΔΡΩΝ

§ 359. Θεώρημα. Δύο δμοια πολύεδρα ἀποτελοῦνται ἀπὸ τετράεδρα δμοια, ἐν πρὸς ἓν, καὶ δμοίως κείμενα.


Ἀπόδειξις. "Εστωσαν ΑΚ καὶ ακ δύο δμοια πολύεδρα (σχ. 279). Τὰ ἐπίπεδα ΕΗΒ καὶ εηβ τῶν κορυφῶν Ε,Η,Β δμολόγων πρὸς τὰς ε,η,β ἀποχωρίζουσι τὰ τετράεδρα Η.ΕΑΒ καὶ η.εαβ.

Ταῦτα ἔχουσι α') δίεδ. ΗΑ = δίεδ. ηα, διότι εἶναι ὁμόλογοι δίεδροι τῶν δμοίων πολυέδρων ΑΚ καὶ ακ

β') τὰς ἔδρας ΕΗΑ, ΑΗΒ, δμοίας καὶ δμοίως κειμένας πρὸς τὰς ἔδρας εηα, αηβ διότι δύο δμοια πολύγωνα (π.χ. τὰ ΑΕΖΗ, αεζη) διαιροῦνται ὑπὸ δμολόγων διαγωνίων εἰς τρίγωνα δμοια, ἐν πρὸς ἓν, καὶ ὁμοίως κείμενα. Κατὰ δὲ τὴν προηγουμένην ἰδιότητα τὰ τετράεδρα ταῦτα εἶναι δμοια.

Διὰ τοῦτο δὲ τὰ μετ' αὐτῶν ἀποχωρισθέντα μέρη τῶν στερεῶν γωνιῶν Η,Ε,Β εἶναι ἴσα πρὸς τὰ ἐπίσης ἀποσπασθέντα μέρη τῶν η,ε,β.

Τὰ μένοντα λοιπὸν πολύεδρα ἔχουσι τὰ μένοντα ἀπὸ τούτων μέρη ἴσα, ἐν πρὸς ἓν, καὶ τὰς ἀμεταβλήτους στερεάς γωνίας ἴσας, μίαν πρὸς μίαν, ἐξ ὑποθέσεως. "Έχουσι δὲ ἀκόμη ταῦτα καὶ τὰς ἔδρας τῶν ἴσων στερεῶν γωνιῶν δμοίας, μίαν πρὸς μίαν, τὰς μὲν ἀμεταβλήτους ἐξ ὑποθέσεως, ἀπὸ δὲ τὰς μεταβληθείσας αἱ μὲν ΕΒΓΔ καὶ εβγδ, διότι εύκόλως βλέπομεν δτι, ἀν φέρωμεν τὰς διαγωνίους ΒΔ, βδ, ἀποτελοῦνται ἀπὸ τρίγωνα δμοια, ἐν πρὸς ἓν, καὶ δμοίως κείμενα· αἱ δὲ ἄλλαι ὡς ἔξηγήσαμεν ἀνωτέρω.



Σχ. 279

Τέλος καὶ αἱ νέαι ἔδραι ΕΗΒ, εηβ εἰναι δμοιαι, διότι εἰναι δμόλογοι ἔδραι τῶν δμοίων τετραέδρων Η.ΕΑΒ, η.εαβ.

Τὰ μένοντα λοιπὸν πολύεδρα εἰναι δμοια. Ἀπὸ αὐτὰ δὲ δμοίως ἀποσπῶμεν ἄλλο ζεῦγος δμοίων τετραέδρων. Ἀπὸ τὰ ὑπολειπόμενα δμοια πολύεδρα ἄλλο ζεῦγος καὶ οὕτω καθ' ἔξῆς, ἔως ὅτου τὰ ὑπολειπόμενα δμοια πολύεδρα γίνωσι τετράεδρα.

Πράγματι λοιπὸν τὰ δμοια πολύεδρα ἀποτελούνται ἀπὸ τετράεδρα δμοια, ἐν πρὸς ἓν, καὶ δμοίως κείμενα.

§ 360. Πρόβλημα I. Νὰ εὑρεθῇ ὁ λόγος δύο δμοίων πυραμίδων ἀπὸ τὸν λόγον τῆς δμοίωτητος αὐτῶν.

Ἄν σις. "Εστωσαν αἱ δμοιαι πυραμίδες Κ.ΑΒΓΔ, κ.αβγδ (σχ. 280). Νοοῦμεν ὅτι ἡ κ.αβγδ τίθεται ἐπὶ τῆς Κ.ΑΒΓΔ οὗτως, ὅστε ἡ στερεὰ γωνία κ νὰ ἐφαρμόσῃ ἐπὶ τῆς Κ, ἡ καβ ἐπὶ τῆς δμοίας ΚΑΒ κ.τ.λ. Οὗτως ἡ πυραμίς κ.αβγδ θὰ ἔλθῃ εἰς τὴν θέσιν Κ.α'β'γ'δ'.

'Ἐπειδὴ δὲ ἡ ἔδρα π.χ. Κα'β' εἰναι ἡ ἴδια καβ εἰς ἄλλην θέσιν, ἔπειται ὅτι αἱ ΔΚΑΒ καὶ Κα'β' εἰναι δμοιαι· ἐπομένως αἱ πλευραὶ α'β' καὶ ΑΒ εἰναι παράλληλοι.


‘Ομοιώς ἐννοοῦμεν ὅτι αἱ β'γ', γ'δ', δ'α' εἰναι ἀντιστοίχως παράλληλοι πρὸς τὰς ΒΓ, ΓΔ, ΔΑ. 'Ἐπομένως τὰ ἐπίπεδα α'β'γ'δ', ΑΒΓΔ εἰναι παράλληλα, τὰ δὲ σχήματα ΑΒΓΔ, α'β'γ'δ' εἰναι δμοια.

"Αν δὲ ἀχθῆ τὸ ὅψος ΚΛ τῆς πυραμίδος Κ.ΑΒΓΔ, τὸ τμῆμα ΚΛ αὐτῆς θὰ εἰναι ὅψος τῆς πυραμίδος Κ.α'β'γ'δ' καὶ ἐπομένως ΚΛ = κμ.

Γνωρίζομεν δὲ (§ 346) ὅτι :

$$\frac{(\text{ΑΒΓΔ})}{(\alpha\beta'\gamma'\delta')} = \left(\frac{\text{ΚΛ}}{\text{κλ}} \right)^2 \text{ καὶ } \text{ἐπομένως } \frac{(\text{ΑΒΓΔ})}{(\alpha\beta\gamma\delta)} = \left(\frac{\text{ΚΛ}}{\text{κμ}} \right)^2.$$

$$'Ἐπειδὴ δὲ (\text{Κ.ΑΒΓΔ}) = \frac{1}{3} (\text{ΑΒΓΔ}) \cdot (\text{ΚΛ}) \text{ καὶ } (\text{κ.αβγδ}) =$$



Σχ. 280

$\frac{1}{3} (\alpha\beta\gamma\delta) \cdot (\kappa\mu)$, έπειται ότι :

$$\frac{(\kappa \cdot \text{ΑΒΓΔ})}{(\kappa \cdot \alpha\beta\gamma\delta)} = \frac{(\text{ΑΒΓΔ})}{(\alpha\beta\gamma\delta)} \cdot \left(\frac{\kappa\lambda}{\kappa\mu} \right) = \left(\frac{\kappa\lambda}{\kappa\mu} \right)^3 \quad (1)$$

Έπειδή δέ $\frac{\kappa\lambda}{\kappa\mu} = \frac{\kappa\lambda}{\kappa\lambda} = \frac{\kappa\alpha}{\kappa\alpha} = \frac{\alpha\beta}{\alpha'\beta'} = \frac{\alpha\beta}{\alpha\beta}$, ή (1) γίνεται
 $\frac{(\kappa \cdot \text{ΑΒΓΔ})}{(\kappa \cdot \alpha\beta\gamma\delta)} = \left(\frac{\alpha\beta}{\alpha\beta} \right)^3$.

Βλέπομεν δηλαδή ότι :

Ο λόγος δύο δμοίων πυραμίδων ισοῦται πρὸς τὸν κύβον τοῦ λόγου τῆς δμοιότητος αὐτῶν.

Πόρισμα. Δύο δμοίαι πυραμίδες εἰναι ὡς οἱ κύβοι τῶν δμολόγων ἀκμῶν αὐτῶν.

§ 361. Πρόβλημα II. Νὰ εὑρεθῇ ὁ λόγος δύο οἰωνδήποτε δμοίων πολυέδρων ἀπὸ τὸν λόγον τῆς δμοιότητος αὐτῶν.

Ἄνσις. Εστωσαν Π , Π' δύο δμοίαι πολύεδρα καὶ λ ὁ λόγος τῆς δμοιότητος αὐτῶν. Γνωρίζομεν (§ 359) ότι ταῦτα ἀποτελοῦται ἐκ τετραέδρων δμοίων, ἐν πρὸς ἐν, καὶ δμοίως κειμένων. Έπειδὴ δὲ ἔκαστον ζεῦγος δμοίων τετραέδρων ἔχει κοινάς δμολόγους ἀκμὰς μὲ τὰ πολύεδρα Π, Π' , δ λόγος τῆς δμοιότητος καὶ τῶν δμοίων τετραέδρων θὰ εἰναι λ.

Αν λοιπὸν $T_1, T_2, T_3, \dots T_v$ εἰναι τὰ τετράεδρα τοῦ ἐνὸς καὶ $T'_1, T'_2, T'_3, \dots T'_v$ τὰ ἀντιστοίχως δμοίαι πρὸς ταῦτα τετράεδρα τοῦ ἄλλου, θὰ εἰναι (§ 360) $\frac{T_1}{T'_1} = \frac{T_2}{T'_2} \dots = \frac{T_v}{T'_v} = \lambda^3$ καὶ ἐπομένως $T_1 = T'_1 \cdot \lambda^3, T_2 = T'_2 \cdot \lambda^3, \dots T_v = T'_v \cdot \lambda^3$. Έκ τούτων δὲ διὰ προσθέσεως κατὰ μέλη εύρισκομεν ότι $\Pi = \Pi' \cdot \lambda^3$ καὶ ἐπομένως $\Pi : \Pi' = \lambda^3$. Δηλαδή :

Ο λόγος δύο δμοίων πολυέδρων ισοῦται πρὸς τὸν κύβον τοῦ λόγου τῆς δμοιότητος αὐτῶν.

Πόρισμα I. Δύο δμοίαι πολυέδρα εἰναι ὡς οἱ κύβοι τῶν δμολόγων ἀκμῶν αὐτῶν.

Πόρισμα II. Άν αἱ ἀκμαὶ πολυέδρου πολλαπλασιασθῶσιν ἐπὶ τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν λ, αἱ δὲ στερεαι γωνίαι αὐτοῦ μείνωσιν ἀμετάβλητοι, τὸ πολυέδρον πολλαπλασιάζεται ἐπὶ λ³.

Α σ κ ή σ εις

767. Εἰς κύβος Κ ἔχει ἀκμὴν διπλασίαν ἀπὸ τὴν ἀκμὴν ὅλου κύβου κ. Νὰ εὕρητε πόσας φοράς δὲ Κ εἶναι μεγαλύτερος ἀπὸ τὸν κ.

768. Εἰς κύβος ἔχει ἀκμὴν $\sqrt[7]{25}$ ἑκατ. Νὰ εὕρητε τὴν ἀκμὴν πενταπλασίου κύβου.

769. Μία ἀκμὴ ΚΑ πυραμίδος Κ.ΑΒΓΔ ἔχει μῆκος 8 ἑκατ. Νὰ δρισθῇ ἐπὶ τῆς ΚΑ σημείον α τοιοῦτον, ὥστε ἡ δι' αὐτοῦ διερχομένη παράλληλος πρὸς τὴν ἔδραν ΑΒΓΔ τομὴ νὰ διαιρῇ τὴν πυραμίδα εἰς δύο μέρη ίσοδύναμα.

770. Μία πυραμὶς Κ.ΑΒΓΔ ἔχει ὅγκον 4 κυβ. παλ. καὶ πλευρὰν (KA) = 3,5 παλάμ. Ὁρίζομεν ἐπὶ τῆς πλευρᾶς ταύτης τμῆμα (Ka) = 2 παλ. καὶ ἄγομεν ἀπὸ τὸ α ἐπίπεδον παραλλήλον πρὸς τὴν ἔδραν ΑΒΓΔ. Νὰ εὑρεθῇ δὲ ὅγκος τῆς σχηματιζομένης κολούρου πυραμίδος.

771. Ἐν δρθογώνιον παραλληλεπίπεδον ἔχει ὅγκον 0,00162 κυβ. μέτρα καὶ διαστάσεις ἀναλόγους πρὸς τοὺς ἀριθμοὺς 3, 4, 5. Νὰ εὕρητε τὰ μῆκη τῶν διαστάσεων αὐτοῦ εἰς ἑκατοστόμετρα.

772. Νὰ εὕρητε τὸν λόγον τῶν ἐπιφανειῶν δύο δμοίων πολυεδρῶν ἀπὸ τὸν λόγον τῆς δμοιότητος αὐτῶν.

773. Εἰς κύβος Κ εἶναι τριπλάσιος ὅλου κύβου κ. Νὰ εὕρητε πόσας φοράς ἡ ἐπιφάνεια τοῦ Κ εἶναι μεγαλυτέρα ἀπὸ τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ κ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'

ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΕΝ ΤΩ ΧΩΡΩ

§ 362. Ποια λέγονται συμμετρικά σημεῖα καὶ σχήματα πρὸς ἐπίπεδον. Ἐμάθομεν διτὶ: "Ἄν μία εὐθεῖα χψ τέμνῃ δίχα καὶ καθέτως ἔν εύθ. τμῆμα ΑΑ', τὰ ἄκρα Α, Α' λέγονται συμμετρικά πρὸς τὴν εὐθεῖαν ἢ τὸν ἄξονα χψ. "Ἄν διὰ τοῦ μέσου ο τοῦ τμήματος ΑΑ' φέρωμεν καὶ ἄλλην εὐθεῖαν ΟΒ κάθετον ἐπὶ τὴν ΑΑ', τὸ ἐπίπεδον Ε τῶν εὐθειῶν χψ καὶ ΟΒ εἶναι ἐπίσης κάθετον ἐπὶ τὸ τμῆμα ΑΑ' καὶ διχοτομεῖ αὐτό. Διὰ τοῦτο τὰ σημεῖα Α, Α' λέγονται συμμετρικά πρὸς τὸ ἐπίπεδον Ε (σχ. 281). Δηλαδή:


Δύο σημεῖα λέγονται συμμετρικά πρὸς ἐπίπεδον, ἢν τοῦτο τέμνῃ δίχα καὶ καθέτως τὴν ἀπόστασιν αὐτῶν.

Τὸ ἐπίπεδον, πρὸς τὸ δόποιον δρίζονται τὰ συμμετρικά σημεῖα, λέγεται ἐπίπεδον συμμετρίας.

Τὰ συμμετρικά τῶν διαφόρων σημείων ἐνὸς σχήματος π.χ. ΑΓ πρὸς τὸ αὐτὸν ἐπίπεδον συμ-

μετρίας Ε ἀποτελοῦσιν ἄλλο σχῆμα Α'Γ'. Τοῦτο δὲ λέγεται συμμετρικὸν τοῦ ΑΓ πρὸς τὸ ἐπίπεδον Ε. Εἶναι δὲ φανερὸν διτὶ καὶ τὰ συμμετρικά τῶν σημείων τοῦ Α'Γ' ἀποτελοῦσι τὸ σχῆμα ΑΓ. Καὶ τοῦτο λοιπὸν εἶναι συμμετρικὸν τοῦ Α'Γ'. Τὰ δύο δὲ σχήματα ΑΓ, Α'Γ' λέγονται συμμετρικά ἀλλήλων πρὸς τὸ ἐπίπεδον Ε. "Ωστε:

Δύο σχήματα λέγονται συμμετρικά πρὸς ἐπίπεδον, ἢν τὰ



Σχ. 281

πρὸς αὐτὸν συμμετρικὰ δὲ τῶν σημείων ἐκατέρου εἶναι σημεῖα τοῦ ἔτερου.

Ομοίως δρίζονται τὰ συμμετρικὰ σχήματα πρὸς κέντρον ἢ ἄξονα (§ 130, 132).

Αν δὲ συμβῇ τὰ πρὸς ἐπίπεδον συμμετρικὰ τῶν σημείων ἐνὸς σχήματος νὰ εἶναι σημεῖα τοῦ αὐτοῦ σχήματος, τὸ σχῆμα τοῦτο εἶναι συμμετρικὸν ἑαυτοῦ. Τὸ δὲ ἐπίπεδον τοῦτο λέγεται ἐπίπεδον συμμετρίας τοῦ σχήματος τούτου.

§ 363. Σχέσις τῶν πρὸς ἄξονα συμμετρικῶν σχημάτων.

Εστωσαν Α, Β δύο τυχόντα σημεῖα ἐνὸς σχήματος Σ καὶ Α', Β' τὰ συμμετρικὰ αὐτῶν πρὸς τὸν αὐτὸν ἄξονα χψ (σχ. 282). Εἶναι φανερὸν δὴ τὰ σημεῖα Α' Β', εἶναι σημεῖα τοῦ σχήματος Σ', τὸ δποῖον εἶναι συμμετρικόν τοῦ Σ πρὸς τὸν αὐτὸν ἄξονα.

Ἄς νοήσωμεν δὴ τὸ σχῆμα Σ στρέφεται περὶ τὸν ἄξονα χψ, ὡς δὴ τὸ ήμιεπίπεδον Αχψ διαγράψῃ διεδρον γωνίαν 180° . Γνωρίζομεν

(§ 133) δὴ τὸ σημεῖον Α θὰ συμπέσῃ μὲ τὸ συμμετρικόν τοῦ Α'. Επειδὴ δὲ ἡ διεδρος γωνία Αχψ μένει κατὰ τὴν στροφὴν ἀμετάβλητος καὶ τὸ Βχψ θὰ διαγράψῃ διεδρον γωνίαν 180° ἐπομένως καὶ τὸ Β θὰ συμπέσῃ μὲ τὸ Β'.


Επειδὴ δὲ δὴ τὰ σημεῖα τοῦ Σ' εἶναι συμμετρικὰ τῶν σημείων τοῦ Σ, ἐπειταὶ δὴ τὰ δύο σχήματα ἐφαρμόζουσιν. Βλέπομεν λοιπὸν δὴ:

Δύο σχήματα συμμετρικὰ πρὸς ἄξονα εἶναι λίσα.

§ 364. Σχέσις τῶν συμμετρικῶν σχημάτων πρὸς κέντρον καὶ ἐπίπεδον δι' αὐτοῦ διερχόμενον.

Εστω Σ τυχόν σχῆμα (σχ. 283) καὶ Σ', Σ'' τὰ συμμετρικὰ αὐτοῦ ἀντιστοίχως πρὸς κέντρον Ο καὶ πρὸς ἐπίπεδον Ε, εἰς τὸ δποῖον κεῖται τὸ Ο.

Αν Α εἶναι τυχόν σημεῖον τοῦ Σ, τὸ μὲν Α' συμμετρικὸν



Σχ. 282

αύτοῦ πρὸς Ο εἶναι σημεῖον τοῦ Σ' , τὸ δὲ A'' συμμετρικὸν τοῦ Α πρὸς τὸ ἐπίπεδον Ε, θὰ εἶναι σημεῖον τοῦ Σ'' .

"Αν Β εἶναι τὸ ἴχνος τῆς AA'' εἰς τὸ ἐπίπεδον Ε, θὰ εἶναι

$AB = BA''$, ἡ δὲ εὐθεῖα ΟΒ δρι-
ζομένη ύπό τῶν μέσων τῶν AA' ,
 AA'' εἶναι παράλληλος πρὸς τὴν
 $A'A''$. "Αν δὲ φέρωμεν τὴν ΟΓ
κάθετον ἐπὶ τὸ Ε, αὕτη ως παράλ-
ληλος πρὸς τὴν AA'' θὰ κεῖται
εἰς τὸ ἐπίπεδον $AA'A''$ καὶ θὰ τέ-
μνῃ δίχα καὶ καθέτως τὸ τμῆμα
 $A'A''$. Εἶναι λοιπὸν τὰ σημεῖα
 A', A'' συμμετρικά πρὸς τὴν ΟΓ.
"Επειδὴ δὲ τοῦτο συμβαίνει δι' ὅλα

τὰ σημεῖα τῶν Σ', Σ'' , ἔπειται διτὶ ταῦτα εἶναι συμμετρικά
πρὸς τὸν ἀξονα ΟΓ. Κατὰ δὲ τὴν προηγουμένην ἰδιότητα εἶναι
 $\Sigma' = \Sigma''$. "Ωστε :

Τὰ συμμετρικὰ σχήματος πρὸς κέντρον καὶ ἐπίπεδον δι'
αὐτοῦ διερχόμενον εἶναι ἴσα.


Πόρισμα I. Τὰ συμ-
μετρικὰ σχήματα πρὸς
δύο κέντρα εἶναι ἴσα.

Πόρισμα II. Τὰ
συμμετρικὰ σχήματα πρὸς
κέντρον καὶ πρὸς τυχὸν
ἐπίπεδον εἶναι ἴσα.


§ 365. Σχέσις τῶν
συμμετρικῶν σχημάτων
πρὸς δύο ἐπίπεδα.

"Εστωσαν πρῶτον
δύο ἐπίπεδα E_1 , E_2 , τε-

μνόμενα κατά τινα εὐθεῖαν $B\Gamma$ (σχ. 284). "Εστωσαν δὲ Σ' , Σ''
τὰ πρὸς αὐτὰ συμμετρικά ἐνὸς σχήματος Σ. "Ας θεωρή-
σωμεν δὲ τυχὸν σημεῖον Α τῆς $B\Gamma$ ως κέντρον συμμετρίας.



Σχ. 283



Σχ. 284

"Αν Σ''' είναι τὸ πρὸς αὐτὸ συμμετρικὸν τοῦ Σ , θὰ είναι $\Sigma''' = \Sigma'$, $\Sigma''' = \Sigma''$ (§ 364). "Επεται λοιπὸν δι $\Sigma' = \Sigma''$.

"Αν τὰ δύο ἐπίπεδα E_1 , E_2 είναι παράλληλα, νοοῦμεν ἄλλο ἐπίπεδον E_3 , τὸ δόποιον νὰ τέμνῃ αὐτά. "Αν δὲ Σ_3 είναι τὸ συμμετρικὸν τοῦ Σ πρὸς αὐτό, κατὰ τὴν προηγουμένην περίπτωσιν θὰ είναι $\Sigma_3 = \Sigma'$, $\Sigma_3 = \Sigma''$ καὶ ἐπομένως $\Sigma' = \Sigma''$. Βλέπομεν λοιπὸν δι $\Sigma_3 = \Sigma$.

Τὰ συμμετρικὰ σχῆματος πρὸς δύο τυχόντα ἐπίπεδα είναι ἵσα.

§ 366. Γενικὸν συμπέρασμα. 'Εξ ὅλων τῶν προηγουμένων ἐπεται δι $\Sigma_3 = \Sigma$:

Τὰ συμμετρικὰ σχῆματα πρὸς διάφορα κέντρα καὶ ἐπίπεδα είναι ἵσα καὶ μόνον κατὰ τὴν θέσιν διαφέρουσι.

Δι' αὐτὸν τὸν λόγον, δσάκις πρόκειται περὶ ἰδιοτήτων τῶν τοιούτων σχημάτων, αἱ δόποιαι δὲν σχετίζονται πρὸς τὴν θέσιν αὐτῶν, δυνάμεθα νὰ ἐκλέγωμεν τὸ προσφορώτερον ἐξ αὐτῶν εἶδος συμμετρίας διὰ τὴν ἀπλοποίησιν τῶν σχετικῶν ἀποδείξεων καὶ μάλιστα πρὸς κέντρον ἡ ἐπίπεδον συμμετρίας οἰονδήποτε.

Χρησιμοποιοῦντες τὴν ἐλευθερίαν ταύτην δυνάμεθα νὰ ἀποδείξωμεν εὐκόλως τὰς ἀκολούθους ἰδιότητας. Εἰς ταύτας λέγοντες συμμετρικὰ σχῆματα νοοῦμεν ἀδιαφόρως συμμετρικὰ πρὸς κέντρον ἡ ἐπίπεδον.

§ 367. Θεώρημα I. Τὸ συμμετρικὸν εὐθ. τμῆματος είναι εὐθ. τμῆμα ἵσον πρὸς αὐτό.

§ 368. Θεώρημα II. Τὸ συμμετρικὸν γωνίας είναι γωνία ἵση μὲ αὐτήν.

§ 369. Θεώρημα III. Τὸ συμμετρικὸν εὐθ. σχῆματος είναι εὐθ. σχῆμα ἵσον μὲ αὐτό.

§ 370. Θεώρημα IV. Τὸ συμμετρικὸν διέδρου γωνίας είναι διεδρος γωνία ἵση μὲ αὐτήν.

§ 371. Θεώρημα V. Τὸ συμμετρικὸν στερεᾶς γωνίας είναι

στερεά γωνία ἔχουσα μὲ αὐτὴν ἵσα, ἐν πρὸς ἐν, δῆλα τὰ δμοειδῆ στοιχεῖα, ἀλλὰ μὴ ἐφαρμόζουσα πάντοτε ἐπ’ αὐτῆς.

Πόρισμα. Τὸ συμμετρικὸν πολυέδρον εἶναι πολύεδρον, τὸ δποτὸν ἔχει μὲ αὐτὸν ἵσας, μίαν πρὸς μίαν, διέδρους καὶ ἐπιπέδους γωνίας.

*Ασκήσεις

774. "Αν ἐν σχῆμα ἔχῃ ἄξονα συμμετρίας καὶ κέντρον συμμετρίας κείμενον ἐπ' αὐτοῦ, νὰ ἀποδείξῃτε ὅτι τοῦτο ἔχει καὶ ἄλλον ἄξονα συμμετρίας κάθετον ἐπὶ τὸν πρῶτον εἰς τὸ κέντρον συμμετρίας.

775. "Αν δύο κάθετοι εύθειαι εἶναι ἄξονες συμμετρίας σχήματος, νὰ ἀποδείξῃτε ὅτι ἡ τομὴ αὐτῶν εἶναι κέντρον συμμετρίας τοῦ αὐτοῦ σχήματος.

776. Νὰ ἀποδείξῃτε ὅτι ἡ εὐθεία, τὴν δποίαν δρίζουσι τὰ κέντρα δύο ἀπέναντι ἑδρῶν δρθογωνίου παραλληλεπιπέδου εἶναι ἄξων συμμετρίας αὐτοῦ.

777. "Αν δύο κάθετα ἐπίπεδα εἶναι ἐπίπεδα συμμετρίας ἐνὸς σχήματος, νὰ ἀποδείξῃτε ὅτι ἡ τομὴ αὐτῶν εἶναι ἄξων συμμετρίας τοῦ σχήματος τούτου.

778. "Αν ἐν σχῆμα ἔχῃ ἐν ἐπίπεδον συμμετρίας καὶ ἔνα ἄξονα συμμετρίας κείμενον ἐπ' αὐτοῦ, νὰ ἀποδείξῃτε ὅτι ἔχει καὶ ἄλλο ἐπίπεδον συμμετρίας.

*Ασκήσεις πρὸς ἐπανάληψιν τοῦ ΣΤ' βιβλίου

779. "Εν δρθὸν πρῖσμα ἔχει βάσεις κανονικὰ ἔξαγωνα μὲ πλευρὰν α ἑκατ. καὶ ἐπιφάνειαν $3\alpha^2 (2 + \sqrt{3})$ τετ. ἑκατ. Νὰ εὕρητε τὸ ὕψος αὐτοῦ.

780. "Εν ἴσοπλευρον τρίγωνον ΑΒΓ ἔχει πλευρὰν α παλαιμῶν. "Εστωσαν δὲ Δ, Ε, Ζ τὰ μέσα τῶν πλευρῶν. Νὰ εὔρεθῇ τὸ ἔμβαδὸν τῆς ἐπιφάνειας δρθοῦ πρίσματος, τὸ δποίον ἔχει βάσιν τὸ τρίγωνον ΔΕΖ καὶ ὕψος ἵσον πρὸς τὴν πλευράν τοῦ ΑΒΓ.

781. Νὰ εὕρητε τὸν δγκον τοῦ προηγουμένου πρίσματος.

782. Μία δρθὴ στήλη ἔχει βάσιν τετράγωνον μὲ πλευρὰν 0,5 μέτ. καὶ ὕψος 2,50 μέτ. Πρόκειται δὲ νὰ καλύψωμεν τὴν παράπλευρον ἐπιφάνειαν αὐτῆς μὲ ὅφασμα πλάτους 0,65 μέτ. Νὰ εὕρητε πόσον ὅφασμα θὰ χρειασθῶμεν.

783. "Εν δρθογώνιον παραλληλεπίπεδον ἔχει διαστάσεις 4 ἑκατ., 6 ἑκατ., 9 ἑκατ. Νὰ εὕρητε τὴν ἀκμὴν κύβου ισοδυνάμου πρὸς αὐτό.

784. Νὰ εὕρητε τὸν δγκον κύβου συναρτήσει τῆς διαγωνίου αὐτοῦ.

785. Ἀν τριπλασιασθῇ ἡ διαγώνιος κύβου, νὰ ἔξετάσητε ποσαπλάσιος γίνεται δὲ σγκος αὐτοῦ.

786. Εἰς κύβος ἔχει ἀκμὴν α. Νὰ εὕρητε κατὰ πόσον πρέπει νὰ αὔξηθῇ ἡ ἀκμὴ του, διὰ νὰ διπλασιασθῇ ἡ ἐπιφάνεια αὐτοῦ.

787. Ἐν δοχείον σχήματος δρθ. παραλληλεπιπέδου ἔχει διαστάσεις 2 ἑκατ., 3 ἑκατ., 4 ἑκατ. Νὰ εὕρητε τὸ βάρος τοῦ ύδραργύρου, τὸν δποῖον χωρεῖ.

788. Νὰ εὕρητε τὴν ἀκμὴν κανονικοῦ τετραέδρου, τὸ δποῖον εἰναι λισοδύναμον μὲ κύβον ἀκμῆς 8 ἑκατ.

789. Ἐν τρίγωνον ΑΒΓ ἔχει πλευράς ($AB = 4$ μέτ., $BΓ = 6$ μέτ., $ΑΓ = 5$ μέτ. Εἰναι δὲ τοῦτο βάσις πυραμίδος Κ.ΑΒΓ. Ἀν ΑΔ εἰναι ἡ διχοτόμος τῆς γωνίας Α αὐτοῦ, νὰ εὕρητε τὸν λόγον τῶν δύο μερῶν, εἰς τὰ δποῖα διαιρεῖται ἡ πυραμὶς αὕτη ὑπὸ τοῦ ἐπιπέδου ΚΑΔ.

790. Μία πυραμὶς ἔχει βάσιν α^2 τετ. ἐκ. καὶ ψφος ($AH = \alpha$ ἐκ.) Ἀν ΑΜ εἰναι τὸ μεγαλύτερον μέρος τοῦ ΑΗ διηρημένου εἰς μέσον καὶ ἄκρων λόγον, νὰ εὕρητε τὸ ἐμβαδὸν τῆς τομῆς αὐτῆς ὑπὸ ἐπιπέδου παραλλήλου πρὸς τὴν βάσιν καὶ διερχομένου διὰ τοῦ Μ.

791. Ἐν κανονικὸν τετράεδρον ἔχει σγκον $\frac{9}{4}\sqrt{2}$ κυβ. ἑκατ. Νὰ εὕρητε τὸ μῆκος τῆς ἀκμῆς αὐτοῦ.

792. Μία πυραμὶς Κ.ΑΒΓΔΕΖ ἔχει βάσιν κανονικὸν ἔξαγωνον πλευρᾶς α ἐκ. καὶ ψφος 2α ἐκ. Νὰ εὕρητε τὸν σγκον ἐκάστου τῶν μερῶν, εἰς τὰ δποῖα διαιρεῖται αὕτη ὑπὸ τῶν ἐπιπέδων ΚΑΓ, ΚΑΕ.

793. Νὰ εὕρητε τὸν σγκον τῆς κολούρου πυραμίδος, ἡ δποία σχηματίζεται, ἀν ἀχθῇ τὸ ἐπίπεδον, τὸ δποῖον τέμνει δίχα καὶ καθέτως τὸ ψφος τῆς προηγουμένης πυραμίδος.

794. Ἐν δρθὸν πρίσμα ΑΒΓΑ'Β'Γ' ἔχει βάσεις ισόπλευρα τρίγωνα πλευρᾶς α ἐκ. καὶ ψφος 2α ἐκ. Ἀν Δ εἰναι τὸ μέσον τῆς πλευρᾶς ΓΓ', νὰ εὕρητε τὸν σγκον τοῦ στερεοῦ ΔΑΒΓ.

795. Νὰ εὕρητε τὸν σγκον τοῦ στερεοῦ ΑΒΔΑ'Β'Γ', τὸ δποῖον εύρισκεται ἐντὸς τοῦ προηγουμένου δρθοῦ πρίσματος.

796. Ἐν πλάγιον πρίσμα ἔχει βάσιν δρθογώνιον τρίγωνον ΑΒΓ μὲ καθέτους πλευρᾶς ($AG = 3$ ἑκατ., $AB = 6$ ἑκατ.) Ἡ πλευρά, ἡ δποία διέρχεται διὰ τῆς κορυφῆς Α ἔχει μῆκος 10 ἑκατ. καὶ προβάλλεται εἰς τὸ ἐπίπεδον ΑΒΓ ἐπὶ τῆς ΑΓ κατὰ τμῆμα ($AE = 4$ ἑκατ.). Νὰ εὕρητε τὸν σγκον αὐτοῦ.

797. Μία πυραμὶς Κ.ΑΒΓ ἔχει βάσιν δρθογώνιον καὶ ισοσκελές τρίγωνον ΑΒΓ καὶ ψφος ($KA = 8$ ἑκατ.) Ἡ ἐκ τῆς κορυφῆς τῆς δρθῆς γωνίας ἀγομένη διάμεσος ΑΔ τοῦ ΑΒΓ ἔχει μῆκος 3 ἑκατ. Νὰ εὕρητε τὸν σγκον τῆς πυραμίδος ταύτης.

798. Άλις έδραι ΑΒΓ, ΚΒΓ ἐνδὸς τετραέδρου Κ.ΑΒΓ εἰναι ισόπλευρα τρίγωνα πλευρᾶς α ἐκ. καὶ σχηματίζουσι δίεδρον γωνίαν 60° . Νὰ εὕρητε τὸν σγκον τοῦ τετραέδρου τούτου.

799. Νά ἀποδείξητε ὅτι τὰ ἐπίπεδα, τὰ ὁποῖα διχοτομοῦσι τὰς διέδρους γωνίας τετραέδρου, διέρχονται διὰ τοῦ αὐτοῦ σημείου.

800. Τὰ ἐπίπεδα, τὰ ὁποῖα τέμνουσι δίχα καὶ καθέτως τὰς ἀκμάς τετραέδρου, διέρχονται διὰ τοῦ αὐτοῦ σημείου.

801. Τὰ εὐθ. τμήματα, τὰ ὁποῖα δρίζονται ἀπὸ τὰ μέσα τῶν ἀπένναντι ἀκμῶν τετραέδρου, διχοτομοῦνται ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ σημείου.

802. Τὸ ἐπίπεδον, τὸ ὁποῖον δρίζεται ἀπὸ μίαν ἀκμὴν τετραέδρου καὶ ἀπὸ τὸ μέσον τῆς ἀπένναντι ἀκμῆς, διαιρεῖ τὸ τετράεδρον εἰς δύο μέρη ίσοδύναμα.

803. Εἰς κύβος ἀκμῆς αἱ ἔκ. τέμνεται ὑπὸ τῶν ἐπιπέδων, τὰ ὁποῖα δρίζονται ἀπὸ τὰ μέσα τῶν ἀκμῶν τῶν στερεῶν γωνιῶν αὐτοῦ. Ἀν ἀφαιρεθῶσιν αἱ πυραμίδες, αἱ ὁποῖαι ἔχουσι κορυφάς τὰς κορυφάς τοῦ κύβου καὶ βάσεις τὰς τομάς ταύτας, νὰ εὕρητε τὸν δύκον τοῦ μένοντος στερεοῦ καὶ τὸ ἐμβαδὸν τῆς ἐπιφανείας αὐτοῦ.

ΒΙΒΛΙΟΝ ΕΒΔΟΜΟΝ

ΣΩΜΑΤΑ ΕΚ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ


ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

ΣΩΜΑΤΑ ΠΕΡΑΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΣ ΜΕΙΚΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΝ

Ι ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ

§ 372. Τί είναι κύλινδρος καὶ ποῖα είναι τὰ στοιχεῖα αὐτοῦ. "Εστω ΑΒΓΔ τυχόν δρθογώνιον (σχ. 285). "Ἄς νόήσω μεν δτι μία πλευρά π. χ. ἡ ΒΓ μένει ἀκίνητος, τὸ δὲ δρθογώνιον στρέφεται περὶ αὐτὴν κατὰ τὴν αὐτὴν φοράν, ἔως δτου ἐπανέλθῃ εἰς τὴν πρώτην θέσιν του.

Τὸ σύνολον τῶν θέσεων, ἀπὸ τὰς ὅποιας διέρχεται τὸ δρθογώνιον τοῦτο, ἀποτελεῖ ἐν στερεόν σχῆμα ΑΔΕΖ.



Τοῦτο λέγεται κύλινδρος. "Ωστε:

Κύλινδρος είναι στερεόν, τὸ δποῖον σχηματίζεται ἀπὸ ἐν δρθογώνιον, ἀν τοῦτο στραφῇ κατὰ τὴν αὐτὴν φορὰν περὶ μίαν ἀκίνητον πλευράν του, ἔως δτου ἐπανέλθῃ εἰς τὴν πρώτην θέσιν του.

"Η ἀκίνητος πλευρά τοῦ δρθογωνίου λέγεται ἄξων ἢ ὑψος τοῦ σχηματιζομένου κυλίνδρου. Π. χ. ἡ πλευρά ΒΓ είναι ὁ ἄξων ἢ τὸ ὑψος τοῦ κυλίνδρου ΑΔΕΖ (σχ. 285).

Αἱ κάθετοι ἐπὶ τὸν ἄξονα πλευραὶ ΑΒ, ΔΓ κατὰ τὴν στροφὴν μένουσι κάθετοι ἐπὶ τὸν ἄξονα καὶ σταθεραὶ κατὰ τὸ μέγεθος. Διὰ τοῦτο γράφουσιν ἵσους κύκλους μὲ κέντρα Β, Γ καὶ καθέτους ἐπὶ τὸν ἄξονα. Οἱ κύκλοι οὗτοι λέγονται βάσεις τοῦ κυλίνδρου.

"Η πλευρά ΑΔ τοῦ δρθογωνίου ΑΒΓΔ, ἡ ὅποια είναι ἀπέ-

ναντι τοῦ ἄξονος, γράφει μίαν καμπύλην ἐπιφάνειαν, ἡ δοια περιέχεται μεταξὺ τῶν βάσεων.

Αὕτη λέγεται **ἴδιαιτέρως κυρτή ἐπιφάνεια** τοῦ κυλίνδρου.
Ἡ δὲ πλευρὰ ΑΔ, ἡ δοια γράφει τὴν κυρτὴν ἐπιφάνειαν,
λέγεται **γενέτειρα αὐτῆς**.

"**Ωστε ἡ ἐπιφάνεια τοῦ κυλίνδρου εἶναι μεικτὴ ἐπιφάνεια.**


§ 373. Δύο ἀξιοσημείωτοι ἐπίπεδοι τομαὶ κυλίνδρου.

α') "Εστω εὐθεῖα EZ τοῦ ἐπιπέδου τοῦ ὁρθογωνίου ΑΒΓΔ
κάθετος ἐπὶ τὴν ἀκίνητον πλευράν ΒΓ αὐτοῦ (σχ. 286).

'Ἐπειδὴ κατὰ τὴν στροφὴν τοῦ ὁρθογωνίου αὐτῇ μένει διαρκῶς κάθετος ἐπὶ τὸν ἄξονα, γράφει ἐπίπεδον κάθετον ἐπ' αὐτὸν καὶ ἐπομένως παραλλήλον πρὸς τὰ ἐπίπεδα τῶν βάσεων. 'Ἐπειδὴ δὲ τὸ τμῆμα EZ μένει A σταθερὸν κατὰ τὸ μέγεθος καὶ ἵσον πρὸς AB, τὸ κοινὸν μέρος τοῦ ἐπιπέδου τούτου καὶ τοῦ κυλίνδρου εἶναι κύκλος μὲν κέντρον E καὶ ἀκτῖνα EZ = AB. Βλέπομεν λοιπὸν ὅτι:

"**Η τομὴ κυλίνδρου ὑπὸ ἐπιπέδου καθέτου**
ἐπὶ τὸν ἄξονα εἶναι **κύκλος παραλλήλος πρὸς**
τὰς βάσεις καὶ ἵσος πρὸς ἐκάστην τούτων.

β') Τυχὸν ἐπίπεδον διερχόμενον διὰ τοῦ ἄξονος κυλίνδρου τέμνει τὰς βάσεις αὐτοῦ κατὰ διαμέτρους IK, ΗΘ παραλλήλους καὶ ἵσας. Τὸν δὲ κύλινδρον κατὰ τὸ παραλληλόγραμμον IKΘΗ.



Σχ. 286

"Οταν κατὰ τὴν στροφὴν τοῦ ΑΒΓΔ ἡ
ἀκτὶς ΓΔ ἐφαρμόσῃ ἐπὶ τῆς ΓΘ, ἡ ΒΑ θὰ ἐφαρμόσῃ ἐπὶ τῆς
παραλλήλου τῆς BK καὶ τὸ ΑΒΓΔ ἐπὶ τοῦ ΓΘΚΒ. "Οταν δὲ ἡ
ΓΔ ἐφαρμόσῃ ἐπὶ τῆς ΓΗ, τὸ ΑΒΓΔ ἐφαρμόζει ἐπὶ τοῦ ΓΗΙΒ.
Τὸ παραλληλόγραμμον λοιπὸν ΗΘΚΙ εἶναι ὁρθογώνιον διπλάσιον τοῦ ΑΒΓΔ. "Ωστε :

"**Η τομὴ κυλίνδρου ὑπὸ ἐπιπέδου, τὸ δποῖον διέρχεται ἀπὸ**
τὸν ἄξονα αὐτοῦ, εἶναι ὁρθογώνιον διπλάσιον τοῦ ὁρθογωνίου,
ἀπὸ τὸ δποῖον ἐσχηματίσθη ὁ κύλινδρος οὗτος.

§ 374. Ποῖα εἶναι ἔγγεγραμμένα καὶ ποῖα περιγεγραμμένα περὶ κύλινδρον πρίσματα." Εστω ἐν πρίσμα ΑΒΓΔΕΖΘ (σχ. 287). Αἱ βάσεις ΑΒΓΔ, ΖΘΗ τού· του εἶναι, ἀνὰ μία, ἔγγεγραμμέναι εἰς τὰς βάσεις Ε Δ Η Θ πέρι τὸ πρίσμα. Βάσεις ἐνὸς κυλίνδρου ΑΘ.

Τὸ πρίσμα τοῦτο λέγεται ἔγγεγραμμένον εἰς τὸν κύλινδρον ΑΘ. Οὗτος δὲ λέγεται περὶ πρίσματος εἶναι ἔγγεγραμμέναι εἰς τὰς βάσεις τοῦ κυλίνδρου.

"Ἐν πρίσμα λέγεται ἔγγεγραμμένον εἰς τὸν κύλινδρον, ἢν αἱ βάσεις τοῦ πρίσματος εἶναι ἔγγεγραμμέναι εἰς τὰς βάσεις τοῦ κυλίνδρου.

Εἰς δὲ κύλινδρος λέγεται περιγεγραμμένος περὶ πρίσμα, ἢν τοῦτο εἶναι ἔγγεγραμμένον εἰς τὸν κύλινδρον.

"Ομοίως ἐννοοῦμεν ὅτι:

"Ἐν πρίσμα λέγεται περιγεγραμμένον περὶ κύλινδρον, ἢν αἱ βάσεις τοῦ πρίσματος εἶναι περιγεγραμμέναι περὶ τὰς βάσεις τοῦ κυλίνδρου.

Ο δὲ κύλινδρος λέγεται ἔγγεγραμμένος εἰς τὸ πρίσμα.


Π. χ. τὸ πρίσμα ΑΒΓΔΕΖΘ (σχ. 288) εἶναι περιγεγραμμένον περὶ τὸν κύλινδρον ΚΛ καὶ οὕτος εἶναι ἔγγεγραμμένος εἰς τὸ πρίσμα τοῦτο.

Εἶναι φανερὸν ὅτι τὰ ἔγγεγραμμένα εἰς κύλινδρον καὶ τὰ περιγεγραμμένα περὶ αὐτὸν πρίσματα εἶναι δρθὰ πρίσματα.


Α σκήσεις

804. Μὰ δρίσητε τὰ κοινὰ μέρη τῆς κυρτῆς ἐπιφανείας ἐνὸς κυλίνδρου καὶ τῆς παραπλεύρου ἐπιφανείας πρίσματος ἔγγεγραμμένου εἰς αὐτόν.

805. Μὰ δρίσητε τὰ κοινὰ μέρη τῆς κυρτῆς ἐπιφανείας ἐνὸς κυλίνδρου καὶ τῆς παραπλεύρου ἐπιφανείας περιγεγραμμένου πρίσματος.



Σχ. 287



Σχ. 288

806. Εἰς κύλινδρος ἔχει ψφος 6 ἑκατ. καὶ ἡ ἀκτὶς τῶν βάσεων εἶναι 4 ἑκατ. Εἰς αὐτὸν δὲ εἴναι ἔγγεγραμμένον πρῆσμα, τοῦ δποίου αἱ βάσεις εἶναι λσόπλευρα τρίγωνα. Νὰ εὔρητε τὸν δγκον τοῦ πρήσματος τούτου.

807. Περὶ τὸν προηγούμενον κύλινδρον εἶναι περιγεγραμμένον πρῆσμα μὲ βάσεις λσόπλευρα τρίγωνα. Νὰ εὔρητε τὸν δγκον αὐτοῦ.

808. Εἰς κύλινδρον ψφος 10 ἑκατ. καὶ βάσεως μὲ ἀκτῖνα 6 ἑκατ. εἶναι ἔγγεγραμμένον πρῆσμα μὲ βάσεις τετράγωνα. Νὰ εὔρητε τὸ ἐμβαδὸν τῆς παραπλεύρου ἐπιφανείας τοῦ πρήσματος τούτου.

809. Νὰ εὔρητε τὸ ἐμβαδὸν τῆς παραπλεύρου ἐπιφανείας πρήσματος, τὸ δποίου εἴναι περιγεγραμμένον περὶ τὸν προηγούμενον κύλινδρον καὶ ἔχει βάσεις τετράγωνα.

ΜΕΤΡΗΣΙΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΑΥΤΟΥ

§ 375. Τί λέγεται ἐμβαδὸν τῆς κυρτῆς ἐπιφανείας κυλίνδρου. "Εστω πρῆσμα ΑΒΓΔΕΖΘ ἔγγεγραμμένον εἰς κύλινδρον ΑΘ (σχ. 287). "Ας ὑποθέσωμεν δὲ δτι αἱ βάσεις αὐτοῦ εἶναι κανονικά εύθ. σχήματα. "Αν νοήσωμεν δτι δ ἀριθμὸς τῶν πλευρῶν τῶν κανονικῶν τούτων σχημάτων ἀπαύστως διπλασιάζεται, εἶναι φανερὸν δτι αἱ μὲν περίμετροι αὐτῶν τείνουσι νὰ συμπέσωσι μὲ τὰς περιφερείας τῶν βάσεων τοῦ κυλίνδρου, ή δὲ παράπλευρος ἐπιφάνεια τοῦ πρήσματος τείνει νὰ συμπέσῃ μὲ τὴν κυρτὴν ἐπιφάνειαν τοῦ κυλίνδρου. Διὰ τὸν λόγον τούτον:

"Ονομάζομεν ἐμβαδὸν τῆς κυρτῆς ἐπιφανείας κυλίνδρου τὸ δριον, πρὸς τὸ δποίον τείνει τὸ ἐμβαδὸν τῆς παραπλεύρου ἐπιφανείας ἔγγεγραμμένον εἰς αὐτὸν πρήσματος μὲ βάσεις κανονικὰ πολύγωνα, ἀν δ ἀριθμὸς τῶν πλευρῶν τῶν βάσεων αὐτοῦ ἀπαύστως διπλασιάζεται.

§ 376. Πρόβλημα I. Νὰ εὑρεθῇ τὸ ἐμβαδὸν ε τῆς κυρτῆς ἐπιφανείας κυλίνδρου ΑΘ ἐκ τοῦ ψφους ν καὶ τῆς περιφερείας Γ τῆς βάσεως αὐτοῦ.

Αύσις. "Ας νοήσωμεν πρῆσμα ἔγγεγραμμένον εἰς τὸν κύλινδρον μὲ βάσεις κανονικά εύθ. σχήματα καὶ δς καλέσωμεν Ε τὸ ἐμβαδὸν τῆς παραπλεύρου ἐπιφανείας αὐτοῦ.

"Εμάθομεν δὲ (§ 331) δτι $E = [(AB) + (BG) + (\Gamma\Delta) + (\Delta A)]u$, δσασδήποτε πλευράς καὶ ἀν ἔχη ἡ βάσις τοῦ πρήσματος. "Επο-

μένως, ἀν δὲ ἀριθμὸς τῶν πλευρῶν τούτων ἀπαύστως διπλασιάζηται, ἡ λιστής αὕτη θὰ ἔξακολουθῇ λισχύουσα. Θὰ εἶναι λοιπὸν
δρ $E = u$. δρ $[(AB) + (BG) + (GD) + (DA)]$.

Ἐπειδὴ δὲ δρ. $E = e$ καὶ δρ $[(AB) + (BG) + (GD) + (DA)] = \Gamma$
(§ 261), ἔπειται ὅτι $e = \Gamma \cdot u$, ἢτοι:

Τὸ ἐμβαδὸν τῆς κυρτῆς ἐπιφανείας κυλίνδρου εἶναι γινόμενον τῆς περιφερείας τῆς βάσεως ἐπὶ τὸ ψηφος αὐτοῦ.

"Αν ἡ ἀκτὶς τῆς βάσεως εἶναι α , ὡς γνωστὸν εἶναι $\Gamma = 2\pi a$
καὶ ἐπομένως $e = 2\pi a u$ (1)

§ 377. Πρόβλημα II. Νὰ εὑρεθῇ τὸ ἐμβαδὸν E τῆς δίλινης ἐπιφανείας κυλίνδρου ἐκ τοῦ ψηφους u καὶ τῆς ἀκτῖνος a τῆς βάσεως αὐτοῦ.

Λύσις. Προφανῶς εἶναι:

$$E = 2\pi au + 2\pi a^2 \quad \text{ἢ} \quad E = 2\pi a (a + u) \quad (1)$$

Ασκήσεις

810. Εἰς κύλινδρος ἔχει ψηφος 8 ἑκατ., ἡ δὲ βάσις του ἔχει ἀκτῖνα 5 ἑκατ. Νὰ εὕρητε τὸ ἐμβαδὸν τῆς κυρτῆς καὶ ὅλης τῆς ἐπιφανείας αὐτοῦ.

811. Μία κυλινδρικὴ στήλη ἔχει ψηφος 2,40 μέτρα, ἡ δὲ βάσις αὐτῆς ἔχει διάμετρον 0,8 μέτ. Νὰ εὕρητε πόσον ψφασμα πλάτους 1,40 μέτ. χρειάζεται, διὰ νὰ καλυφθῇ ἡ κυρτὴ ἐπιφάνεια αὐτῆς.

812. Νὰ συγκρίνητε τὸν λόγον τῶν κυρτῶν ἐπιφανειῶν δύο λισούψῶν κυλίνδρων πρὸς τὸν λόγον τῶν ἀκτίνων τῶν βάσεων αὐτῶν.

813. Νὰ συγκρίνητε τὸν λόγον τῶν κυρτῶν ἐπιφανειῶν δύο κυλίνδρων πρὸς τὸν λόγον τῶν ψφῶν αὐτῶν, ἀν αἱ βάσεις τῶν κυλίνδρων τούτων εἶναι ίσαι.

814. Ἀπὸ τὴν κορυφὴν A λισοσκελοῦς τριγώνου ABG φέρομεν παράλληλον $χψ$ πρὸς τὴν βάσιν BG αὐτοῦ. "Ἄς νοήσωμεν δὲ ὅτι τὸ τριγώνον στρέφεται περὶ τὴν $χψ$, ἔως ὅτου ἐπανέλθῃ εἰς τὴν πρώτην θέσιν του. Νὰ εὕρητε τὸ ἐμβαδὸν τῆς ἐπιφανείας, τὴν δποίαν θὰ γράψῃ ἡ BG , ἀν αὕτη ἔχῃ μῆκος 10 ἑκατ., τὸ δὲ ψφος (AD) = 8 ἑκατ.

§ 378. Τί λέγεται ὅγκος κυλίνδρου. "Αν σκεφθῶμεν, δπως εἰς τὴν § 375, ἐννοοῦμεν ὅτι:

"Αν δὲ ἀριθμὸς τῶν πλευρῶν τῆς βάσεως πρίσματος ἔγγεγραμμένου εἰς κύλινδρον ἀπαύστως διπλασιάζηται, τὸ πρίσμα τείνει γὰ συμπέσῃ μὲ τὸν κύλινδρον. Διὰ τοῦτο:

Όνομάζομεν δύκον κυλίνδρου τὸ δριον, πρὸς τὸ ὅποιον τείνει δὲ δύκος πρίσματος μὲ βάσεις κανονικὰ πολύγωνα ἔγγεγραμμένου εἰς τὸν κύλινδρον, ἀν δὲ ἀριθμὸς τῶν πλευρῶν τῆς βάσεως αὐτοῦ ἀπαύστως διπλασιάζηται.

§ 379. Πρόβλημα III. Νὰ εὑρεθῇ δὲ δύκος K κυλίνδρου ἐκ τοῦ ψφους u καὶ τῆς ἀκτίνος v τῆς βάσεως αὐτοῦ.

Λύσις. Νοοῦμεν πρίσμα ἔγγεγραμμένον εἰς τὸν κύλινδρον, ἔστω δὲ Θ δὲ δύκος καὶ β τὸ ἐμβαδὸν τῆς βάσεως τοῦ πρίσματος τούτου καὶ B τὸ ἐμβαδὸν τῆς βάσεως τοῦ κυλίνδρου.

Γνωρίζομεν δτι $\Theta = \beta \cdot u$, δσασδήποτε πλευρὰς καὶ ἀν ἔχῃ δὲ βάσις τοῦ πρίσματος.

Ἄν λοιπὸν νοήσωμεν δτι δὲ ἀριθμὸς τῶν πλευρῶν τούτων ἀπαύστως διπλασιάζηται, θὰ εἶναι δρ $\Theta = u \cdot \delta \rho \beta$. (1)

Εἶναι δὲ δρ. $\Theta = K$, καὶ ἀν δὲ βάσις τοῦ πρίσματος εἶναι κανονικὸν σχῆμα, θὰ εἶναι δρ $\beta = B$. Ἐπομένως δὲ (1) γίνεται $K = B \cdot u$ (2). Ήτοι:

Ο δύκος κυλίνδρου εἶναι γινόμενον τῆς βάσεως, ἐπὶ τὸ ψφος αὐτοῦ.

Ἐπειδὴ δὲ $B = \pi a^2$, δὲ λογικαὶ (2) γίνεται $K = \pi a^2 \cdot u$ (3)

Α σκήσεις

815. Νὰ εὕρητε τὸν δύκον κυλίνδρου, δὲ ὅποιος ἔχει $u = 1$ μέτ., καὶ $a = 3$ ἑκατ.

816. Εἰς κύλινδρος ἔχει δύκον 10 κυβ. παλάμας καὶ ὕψος 50 ἑκατ. Νὰ εὕρητε τὸ μῆκος τῆς ἀκτίνος τῆς βάσεως.

817. Ἐν κυλινδρικὸν δοχεῖον ἔχει ὕψος 10 ἑκατ. καὶ διάμετρος τῆς βάσεως εἶναι 10 ἑκατ. Νὰ εὕρητε τὸ βάρος ἀπεσταγμένου ὕδατος 4^o K , τὸ ὅποιον χωρεῖ.

818. Νὰ εὕρητε τὸ βάρος τοῦ ἔλαίου εἰδ. βάρους 0,9, τὸ ὅποιον χωρεῖ τὸ προηγούμενον δοχεῖον.

819. Νὰ συγκρίνητε τὸν λόγον δύο λογικῶν κυλινδρῶν πρὸς τὸν λόγον τῶν ἀκτίνων τῶν βάσεων αὐτῶν.

820. Νὰ συγκρίνητε τὸν λόγον δύο κυλινδρῶν πρὸς τὸν λόγον τῶν ὕψων αὐτῶν, ἀν αἱ βάσεις τῶν κυλινδρῶν τούτων εἶναι λοιπές.

II. ΚΩΝΟΣ

§ 380. Τί είναι κώνος καὶ ποῖα είναι τὰ στοιχεῖα αὐτοῦ.
Ἐστω ΑΒΓ ἐν δρθογώνιον τρίγωνον (σχ. 289).

Ἄς νοήσωμεν δὲ ὅτι ἡ μία ἀπὸ τὰς καθέτους πλευράς αὐτοῦ π.χ. ἡ ΑΓ μένει ἀκίνητος, τὸ δὲ τρίγωνον στρέφεται περὶ αὐτὴν κατὰ τὴν αὐτὴν φοράν, ἔως ὅτου ἐπανέλθῃ εἰς τὴν πρώτην θέσιν του.

Τὸ σύνολον τῶν θέσεων, ἀπὸ τὰς ὁποίας διέρχεται τοῦτο, ἀποτελεῖ ἐν στερεόν ΓΒΔ. Τοῦτο δὲ λέγεται κώνος. Ὡστε :

Κῶνος εἶναι στερεόν, τὸ ὄποιον σχηματίζεται ἀπὸ ἐν δρθογώνιον τρίγωνον, ἃν τοῦτο στραφῇ κατὰ τὴν αὐτὴν φορὰν περὶ μίαν ἀκίνητον κάθετον πλευρὰν αὐτοῦ, ἔως ὅτου ἐπανέλθῃ εἰς τὴν πρώτην θέσιν του.

Ἡ ἀκίνητος πλευρά τοῦ δρθ. τριγώνου λέγεται ἄξων ἢ ψυμφορά τοῦ κώνου. Π.χ. ΓΑ εἶναι ὁ ἄξων ἢ τὸ ψυμφόρο τοῦ κώνου ΓΒΔ (σχ. 289).

Ἡ ἄλλη κάθετος πλευρά ΑΒ γράφει κύκλον κάθετον ἐπὶ τὸν ἄξονα. Οὕτος ἔχει κέντρον τὴν κορυφὴν Α τῆς δρθῆς γωνίας.

Ο κύκλος οὗτος λέγεται βάσις τοῦ κώνου.


Ἡ ύποτείνουσα τοῦ στρεφομένου δρθ. τριγώνου γράφει μίαν καμπύλην ἐπιφάνειαν. Αὕτη λέγεται ίδιαιτέρως κυρτὴ ἐπιφάνεια τοῦ κώνου. Ἡ δὲ ύποτείνουσα λέγεται γενέτειρα τῆς κυρτῆς ἐπιφανείας ἢ καὶ πλευρά τοῦ κώνου.

Ἡ ἐπιφάνεια τοῦ κώνου εἶναι λοιπὸν μεικτὴ ἐπιφάνεια.

§ 381. Δύο ἀξιοσημείωτοι ἐπίπεδοι τομαὶ κώνου. Ἄν ἐργασθῶμεν ὅπως εἰς τὴν § 373 διὰ τὸν κύλινδρον, ἐννοοῦμεν εύκόλως τὰ ἔξῆς :

α) *Πᾶσα ἐπίπεδος τομὴ κώνου κάθετος ἐπὶ τὸν ἄξονα αὐτοῦ εἶναι κύκλος.*


β) *Ἡ τομὴ τοῦ κώνου ὑπὸ ἐπιπέδου διερχομένου διὰ τοῦ ἄξονος αὐτοῦ εἶναι ἴσοσκελές τρίγωνον διπλάσιον τοῦ δρθ. τριγώνου, ἀπὸ τὸ ὄποιον ἐσχηματίσθη ὁ κώνος.*




Σχ. 289

§ 382. Ποιαi λέγονται ἑγγεγραμμέναι πυραμίδες εἰς κῶνον καὶ ποιαi περιγεγραμμέναι περὶ κῶνον. Ἡ πυραμὶς Γ.ΑΔΒΕ (σχ. 290) ἔχει τὴν αὐτὴν κορυφὴν Γ μὲ τὸν κῶνον ΓΑΒ. Ἡ δὲ βάσις τῆς πυραμίδος ταύτης εἶναι ἑγγεγραμμένη εἰς τὴν βάσιν τοῦ κώνου.

Ἡ πυραμὶς αὕτη λέγεται ἑγγεγραμμένη εἰς τὸν κῶνον· δὲ κῶνος οὗτος λέγεται περιγεγραμμένος περὶ τὴν πυραμίδα ταύτην.



Σχ. 290



Σχ. 291

Ἄν μία πυραμὶς ἔχῃ κοινὴν κορυφὴν μὲ ἕνα κῶνον, ἡ δὲ βάσις αὐτῆς εἶναι περιγεγραμμένη περὶ τὴν βάσιν τοῦ κώνου, ἡ πυραμὶς λέγεται περιγεγραμμένη περὶ τὸν κῶνον. Ὁ δὲ κῶνος λέγεται ἑγγεγραμμένος εἰς τὴν πυραμίδα ταύτην (σχ. 291).

Ἄσκήσεις

821. Νὰ δρίσητε τὰ κοινὰ μέρη τῆς κυρτῆς ἐπιφανείας κώνου καὶ τῆς παραπλεύρου ἐπιφανείας πυραμίδος ἑγγεγραμμένης εἰς αὐτὸν ἢ περιγεγραμμένης περὶ αὐτόν.

822. Μία πυραμὶς ἑγγεγραμμένη εἰς κῶνον ἔχει βάσιν κανονικὸν εύθ. σχῆμα. Νὰ ἔξετάσητε, ἀν αὐτῇ εἶναι κανονικὴ ἢ ὅχι. Τὴν αὐτὴν ἔξετασιν νὰ κάμητε καὶ διὰ τοιαύτην περιγεγραμμένην εἰς κῶνον πυραμίδα.

823. Πῶς δυνάμεθα νὰ ἑγγράψωμεν κανονικὴν τριγωνικὴν πυραμίδα εἰς διθέντα κῶνον;

ΜΕΤΡΗΣΙΣ ΚΩΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΑΥΤΟΥ

§ 383. Τί λέγεται έμβαδὸν τῆς κυρτῆς ἐπιφανείας κώνου.
Ἐστω δτὶ ἡ βάσις ΑΔΒΕ (σχ. 290) τῆς πυραμίδος Γ.ΑΔΒΕ εἶναι κανονικὸν εύθ. σχῆμα.

"Ἄν δ ἀριθμὸς τῶν πλευρῶν αὐτῆς ἀπαύστως διπλασιάζηται, γνωρίζομεν δτὶ ἡ περίμετρος τῆς βάσεως ταύτης τείνει νὰ συμπέσῃ μὲ τὴν περιγεγραμμένην περιφέρειαν· τότε δὲ ἡ παραπλευρὸς ἐπιφάνεια τῆς πυραμίδος θὰ τείνῃ νὰ συμπέσῃ μὲ τὴν κυρτὴν ἐπιφάνειαν τοῦ κώνου. Διὰ τοῦτο:

'Ονομάζομεν ἔμβαδὸν τῆς κυρτῆς ἐπιφανείας κώνου τὸ δριον, εἰς τὸ δποῖον τείνει τὸ ἔμβαδὸν τῆς παραπλεύρου ἐπιφανείας ἔγγεγραμμένης εἰς αὐτὸν κανονικῆς πυραμίδος, ἀν δ ἀριθμὸς τῶν πλευρῶν τῆς βάσεως αὐτῆς ἀπαύστως διπλασιάζηται.

§ 384. Πρόβλημα I. Νὰ ενδεθῇ τὸ ἔμβαδὸν ε τῆς κυρτῆς ἐπιφανείας κώνου ἐκ τῆς πλευρᾶς λ καὶ τῆς περιφερείας Γ τῆς βάσεως αὐτοῦ.

Λύσις. Νοοῦμεν κανονικὴν πυραμίδα Γ.ΑΔΒΕ ἔγγεγραμμένην εἰς κῶνον ΓΑΒ (σχ. 290). "Ἐστω δὲ ΓΖ τὸ ἀπόστημα καὶ Ε τὸ ἔμβαδὸν τῆς παραπλεύρου ἐπιφανείας αὐτῆς. Ἐμάθομεν (§ 347) δτὶ

$$E = \frac{1}{2} [(A\Delta) + (\Delta B) + (B E) + (E A)] \cdot (\Gamma Z) \quad (1)$$

δσασδήποτε πλευράς καὶ ἀν ἔχῃ ἡ βάσις τῆς πυραμίδος. "Ἀν δὲ δ ἀριθμὸς τῶν πλευρῶν τούτων ἀπαύστως διπλασιάζηται, θὰ εἴναι

$$\delta\rho E = \frac{1}{2} \delta\rho [(A\Delta) + (\Delta B) + (B E) + (E A)] \cdot \delta\rho (\Gamma Z)$$

"Ἐπειδὴ δὲ $\delta\rho E = \epsilon$, $\delta\rho (\Gamma Z) = \lambda$ καὶ

$$\delta\rho [(A\Delta) + (\Delta B) + (B E) + (E A)] = \Gamma,$$

ἔπειται δτὶ: $\epsilon = \frac{1}{2} \Gamma \cdot \lambda$. "Ητοι:

Τὸ ἔμβαδὸν τῆς κυρτῆς ἐπιφανείας κώνου εἴναι τὸ ἥμισυ τοῦ γινομένου τῆς περιφερείας τῆς βάσεως ἐπὶ τὴν πλευρὰν αὐτοῦ.

"Αν α είναι ή ἀκτίς τῆς βάσεως, ἐκ τῆς προηγουμένης Ισότητος εύρισκομεν δτι: $\varepsilon = \pi \alpha \lambda$ (2.)

§ 385. Πρόβλημα II. Νὰ εὑρεθῇ τὸ ἐμβαδὸν Ε τῆς ὀλικῆς ἐπιφανείας κώνου ἐκ τῆς πλευρᾶς καὶ τῆς ἀκτῖνος τῆς βάσεως αὐτοῦ.

Λύσις. Είναι φανερὸν δτι: $E = \pi a^2 + \pi \alpha \lambda$ ή $E = \pi a (a + \lambda)$.

Α σκήσεις

824. Εἰς κῶνος ἔχει λ = 5 ἑκατ. καὶ α = 3 ἑκατ. Νὰ εὕρητε τὸ ἐμβαδὸν τῆς κυρτῆς ἐπιφανείας του.

825. Εἰς κῶνος ἔχει υ = 12 ἑκατ. καὶ α = 9 ἑκατ. Νὰ εὕρητε τὸ ἐμβαδὸν τῆς ἐπιφανείας αὐτοῦ.

826. Εἰς κύλινδρος καὶ κῶνος ἔχουσιν ίσας βάσεις. Τὸ δὲ ὄψος τοῦ κυλίνδρου ισοῦται πρὸς τὴν πλευρὰν τοῦ κώνου. Νὰ συγκρίνητε τὰ ἐμβαδὰ τῶν κυρτῶν ἐπιφανειῶν αὐτῶν.

827. Ἡ ἀκτὶς τῆς βάσεως κυλίνδρου καὶ κώνου είναι 6 ἑκατ. Τὸ ὄψος τοῦ κυλίνδρου είναι 6 ἑκατ. καὶ αἱ κυρταὶ ἐπιφάνειαι αὐτῶν είναι ισοδύναμοι. Νὰ εὕρητε τὸ ὄψος τοῦ κώνου.

§ 386. Τί λέγεται ὅγκος κώνου. "Εστω κανονικὴ πυραμὶς Γ.ΑΔΒΕ ἐγγεγραμμένη εἰς κῶνον (σχ. 290).

"Ἄς νοήσωμεν δτι δ ἀριθμὸς τῶν πλευρῶν τῆς βάσεως αὐτῆς ἀπαύστως διπλασιάζεται. Είναι φανερὸν δτι ή βάσις της τείνει νὰ συμπέσῃ μὲ τὴν βάσιν τοῦ κώνου, ή δὲ πυραμὶς μὲ τὸν κῶνον. Διὰ τοῦτο:

"Ονομάζομεν ὅγκον κώνου τὸ δριὸν τοῦ ὅγκου ἐγγεγραμμένης εἰς αὐτὸν κανονικῆς πυραμίδος, ἢν δ ἀριθμὸς τῶν πλευρῶν τῆς βάσεως αὐτῆς ἀπαύστως διπλασιάζηται.

§ 387. Πρόβλημα III. Νὰ εὑρεθῇ δ ὅγκος Κ κώνου ἀπὸ τὸ ἐμβαδὸν Β τῆς βάσεως καὶ ἀπὸ τὸ ὄψος υ αὐτοῦ.

Λύσις. Νοοῦμεν κανονικὴν πυραμίδα ἐγγεγραμμένην εἰς τὸν κῶνον· ἔστω δὲ Ε τὸ ἐμβαδὸν τῆς βάσεως καὶ Θ δ ὅγκος αὐτῆς. Γνωρίζομεν δτι $\Theta = \frac{1}{3} E \cdot u$, δσασδήποτε πλευράς καὶ ἀν ἔχῃ ή βάσις αὐτῆς.

"Αν λοιπόν νοήσωμεν ότι ούτις αριθμός τῶν πλευρῶν τῆς βάσεως ἀπαύστως διπλασιάζηται, θά είναι

$$\deltaρ \Theta = \frac{1}{3} u \cdot \deltaρ E.$$

'Επειδὴ δὲ δρ Θ = K καὶ δρ E = B, ἔπειται ότι :

$$K = \frac{1}{3} B \cdot u, \text{ ἥτοι :}$$

'Ο δύκος κώνου είναι τὸ τρίτον τοῦ γινομένου τῆς βάσεως ἐπὶ τὸ ψηφος αὐτοῦ.

"Αν δὲ ἀκτὶς τῆς βάσεως κώνου είναι α, ή προηγουμένη λιστῆς γίνεται

$$K = \frac{1}{3} \pi \alpha^2 \cdot u \quad (1)$$

'Ασκήσεις

828. Εἰς κῶνος ἔχει $u = 3$ παλ. καὶ $\alpha = 4$ παλ. Νὰ εὕρητε τὸν δύκον αὐτοῦ.

829. Εἰς κῶνος ἔχει $\alpha = 6$ ἑκατ. καὶ $\lambda = 10$ ἑκατ. Νὰ εὕρητε τὸν δύκον αὐτοῦ.

830. "Ἐν κωνικὸν δοχεῖον ἔχει ἐσωτερικὴν ἀκτίνα βάσεως 9 ἑκατ. καὶ ψηφος 12 ἑκατ. Νὰ εὕρητε τὸ βάρος τοῦ ὄντραργύρου, τὸν δποῖον χωρεῖ.

831. Νὰ συγκρίνητε τὸν λόγον δύο ίσοψῶν κώνων πρὸς τὸν λόγον τῶν ἀκτίνων τῶν βάσεων.

832. Νὰ συγκρίνητε τὸν λόγον δύο κώνων πρὸς τὸν λόγον τῶν ψῶν αὐτῶν, ἀν αἱ βάσεις αὐτῶν είναι ίσαι.

833. Νὰ συγκρίνητε τὸν λόγον τῶν ψῶν πρὸς τὸν λόγον τῶν ἀκτίνων τῶν βάσεων δύο ίσοδυνάμων κώνων.

834. "Ἐν δρθ. τρίγωνον AΒΓ ἔχει (ΑΓ) = 12 ἑκατ. καὶ ὑποτείνουσαν (ΒΓ) = 20 ἑκατ. Νοοῦμεν ότι τοῦτο στρέφεται πρῶτον περὶ τὴν ΑΓ καὶ ἔπειτα περὶ τὴν ΑΒ. Νὰ ύπολογίσητε τὸν λόγον τοῦ πρῶτου παραγομένου στερεοῦ πρὸς τὸ δεύτερον.


III. ΚΟΛΟΥΡΟΣ ΚΩΝΟΣ

§ 388. Τί είναι κόλουρος κώνος καὶ ποῖα είναι τὰ στοιχεῖα αὐτοῦ. Εἰς δοθέντα κῶνον ΕΑΒ ἀς φέρωμεν τομὴν ΓΔ παράλληλον πρὸς τὴν βάσιν ΑΒ αὐτοῦ (σχ. 292).

Μεταξὺ τῆς βάσεως καὶ τῆς τομῆς ταύτης περιέχεται τὸ μέρος ΑΒΔΓ τοῦ κώνου.

Τούτο λέγεται κόλουρος κώνος. "Ωστε:

Κόλουρος κώνος είναι μέρος κώνου, τὸ δποτὸν περιέχεται μεταξὺ τῆς βάσεως καὶ τυχούσης ἐπιπέδου τομῆς αὐτοῦ παραλήγοντος πρὸς τὴν βάσιν.



Σχ. 292

Γνωρίζομεν δὲ δτι ἡ τομὴ αὗτη είναι κύκλος. "Ωστε δὲ κόλ. κώνος περιέχεται μεταξὺ δύο παραλήγοντος κύκλων.

Οὗτοι λέγονται βάσεις τοῦ κολ. κώνου.

Μεταξὺ αὐτῶν περιέχεται ἐν μέρος τῆς κυρτῆς ἐπιφανείας τοῦ ἀρχικοῦ κώνου. Τὸ μέρος τούτο λέγεται ἐπίσης κυρτὴ ἐπιφάνεια τοῦ κολ. κώνου.

"Η ἐπιφάνεια λοιπὸν τοῦ κολ. κώνου είναι μεικτὴ ἐπιφάνεια.

"Η ἀπόστασις Κκ τῶν βάσεων κώνου

λέγεται ὑψος αύτοῦ.


Μεταξὺ τῶν βάσεων κολ. κώνου περιέχεται μέρος π.χ. ΑΓ τῆς πλευρᾶς ΕΑ τοῦ ἀρχικοῦ κώνου. Τὸ μέρος τούτο ΑΓ λέγεται ἐπίσης πλευρὰ τοῦ κολ. κώνου.

Τὸ ὑψος Κκ καὶ τυχούσα πλευρά ΑΓ κολ. κώνου δρίζουσιν ἐπίπεδον, διότι προεκτεινόμεναι διέρχονται ἀπὸ τὴν κορυφὴν Ε.

Τὰ εὐθ. τμήματα Κκ, ΓΑ καὶ αἱ ἀκτῖνες ΚΑ, κΓ τῶν βάσεων σχηματίζουσιν δρθογώνιον τραπέζιον ΚκΓΑ.

"Αν τούτο στραφῇ περὶ τὸ ὑψος Κκ, θὰ γράψῃ τὸν κολ. κώνον ΑΒΓΔ. "Ωστε καὶ δὲ κολ. κώνος είναι στερεόν ἐκ περιστροφῆς.

§ 389. Τί λέγεται ἐμβαδὸν τῆς κυρτῆς ἐπιφανείας καὶ τί ὅγκος κολ. κώνου. Αἱ βάσεις τῆς κολ. πυραμίδος ΑΒΓΔΕαβγδε (σχ. 293) είναι ἔγγεγραμμέναι, ἀνὰ μία, εἰς τὰς βάσεις κολ. κώνου ΑΔδα.



Σχ. 293

‘Η κόλουρος αὕτη πυραμίς λέγεται ἐγγεγραμμένη εἰς τὸν κόλουρον κῶνον κ.τ.λ. ’Αν αἱ βάσεις τῆς κολ. πυραμίδος εἶναι κανονικά εύθ. σχήματα καὶ νοήσωμεν δtti δ ἀριθμὸς τῶν πλευρῶν τῶν βάσεων ἀπαύστως διπλασιάζεται, ἐννοοῦμεν δtti:

‘Η περίμετρος ἔκάστης τῶν βάσεων τείνει νὰ συμπέσῃ μὲ τὴν περιφέρειαν τῆς ἀντιστοίχου βάσεως τοῦ κολ. κώνου. ’Η παράπλευρος ἐπιφάνεια τείνει νὰ συμπέσῃ μὲ τὴν κυρτὴν ἐπιφάνειαν τοῦ κολ. κώνου καὶ ἡ κόλ. πυραμίς μὲ τὸν κόλουρον κῶνον. ’Αγόμεθα λοιπὸν εἰς τοὺς ἔξῆς δρισμούς:

‘Εμβαδὸν τῆς κυρτῆς ἐπιφανείας κολ. κώνου λέγεται τὸ δριον τοῦ ἐμβαδοῦ τῆς παραπλεύρου ἐπιφανείας ἐγγεγραμμένης εἰς αὐτὸν κολ. καν. πυραμίδος, ἢν δ ἀριθμὸς τῶν πλευρῶν τῶν βάσεων αὐτῆς ἀπαύστως διπλασιάζηται.

Εἶναι δὲ φανερὸν (σχ. 292) δtti:

(κυρ. ἐπιφ. ΑΒΓΔ) = (κυρ. ἐπιφ. ΕΑΒ) — (κυρ. ἐπιφ. ΕΓΔ).

‘Ογκος κολ. κώνου λέγεται τὸ δριον τοῦ ὅγκου κολ. κανονικῆς πυραμίδος ἐγγεγραμμένης εἰς αὐτόν, ἢν δ ἀριθμὸς τῶν πλευρῶν τῶν βάσεων αὐτῆς ἀπαύστως διπλασιάζηται.

Εἶναι δὲ φανερὸν δtti:

(κολ. κῶνος ΑΒΔΓ) = (κῶνος ΕΑΒ) — (κῶνος ΕΓΔ).

§ 390. Πρόβλημα I. Νὰ εնρεθῇ τὸ ἐμβαδὸν ε τῆς κυρτῆς ἐπιφανείας κολ. κώνου.

‘Εστω κῶνος ΚΑΔ καὶ ἐγγεγραμμένη εἰς αὐτὸν κανονικὴ πυραμίς Κ.ΑΒΓΔΕ (σχ. 293). ’Αν τμήσωμεν τὰ δύο ταῦτα στερεά δι’ ἐπιπέδου παραλλήλου πρὸς τὸ ἐπίπεδον τῶν βάσεων αὐτῶν, μεταξὺ τούτων καὶ τοῦ τέμνοντος ἐπιπέδου περιέχεται δ κόλουρος κῶνος Αδ καὶ ἡ κόλουρος κανονικὴ πυραμίς ΑΒΓΔΕαβγδε.

‘Εστωσαν δὲ Α καὶ αἱ ἀκτῖνες τῶν βάσεων, λ τὸ μῆκος τῆς πλευρᾶς τοῦ κολ. κώνου καὶ ε ἐμβαδὸν τῆς κυρτῆς ἐπιφανείας αὐτοῦ. Τὸ ἐμβαδὸν Ε τῆς παραπλεύρου ἐπιφανείας τῆς κολ. πυραμίδος ἀποτελεῖται ἀπὸ τὰ ἐμβαδὰ τῶν ἴσων καὶ ἴσοσκελῶν τραπεζίων ΑΒβα, ΒΓγβ, ΓΔδγ, ΔΕεδ, ΕΑαε, ὃν ἔστω λ, τὸ ψῆφος.

$$\begin{aligned} \text{'Επειδή δέ } (AB\beta\alpha) &= \frac{(AB) + (\alpha\beta)}{2} \cdot \lambda_1, \\ (B\Gamma\gamma\beta) &= \frac{(B\Gamma) + (\beta\gamma)}{2} \cdot \lambda_1, \dots, (EA\alpha\epsilon) = \frac{(EA) + (\epsilon\alpha)}{2} \cdot \lambda_1, \text{ έπειται ότι:} \end{aligned}$$

$$E = \frac{1}{2} [(AB) + (B\Gamma) + \dots + (EA)] + [(\alpha\beta) + (\beta\gamma) + \dots + (\epsilon\alpha)] \cdot \lambda_1.$$

Τούτης αὕτη ἀληθεύει δσασδήποτε πλευράς καὶ ἀν ἔχῃ ἑκάστη βάσις τῆς κολ. πυραμίδος. Επομένως εἶναι:

$$\begin{aligned} \delta\rho E &= \frac{1}{2} [\delta\rho ((AB) + (B\Gamma) + \dots + (EA)) + \delta\rho ((\alpha\beta) + (\beta\gamma) + \\ &+ \dots + (\epsilon\alpha))] \delta\rho \lambda_1. \text{'Επειδή δέ } \delta\rho E = \epsilon, \quad \delta\rho ((AB) + (B\Gamma) + \\ &+ \dots + (EA)) = 2\pi A, \quad \delta\rho ((\alpha\beta) + (\beta\gamma) + \dots + (\epsilon\alpha)) = 2\pi\alpha \text{ καὶ} \\ &\delta\rho \lambda_1 = \lambda, \text{ έπειται ότι: } \epsilon = \frac{1}{2} (2\pi A + 2\pi\alpha) \cdot \lambda \text{ (1). "Ωστε:} \end{aligned}$$

Τὸ ἐμβαδὸν τῆς κυρτῆς ἐπιφανείας κολ. κώνου εἶναι γινόμενον τοῦ ἡμιαὐθαίρετος τῶν περιφερειῶν τῶν βάσεων ἐπὶ τὴν πλευρὰν αὐτοῦ.

Ἐκ δὲ τῆς ἴσοτητος (1) προκύπτει εύκόλως ἡ ἴσοτης

$$\epsilon = \pi(A + \alpha)\lambda \quad (2)$$


τὴν δποίαν συνήθως χρησιμοποιούμενην εἰς τὰς ἐφαρμογάς.

§ 391. Δύο ἄλλοι ἀξιοσημείωτοι τύποι διὰ τὸ ἐμβαδὸν τῆς κυρτῆς ἐπιφανείας κολ. κώνου. α)
Ἐστω ZH ἡ διάμεσος τοῦ τραπεζίου BKκΓ
(σχ. 294). Τὸ παράλληλος πρὸς τὰς βάσεις τομή, ἡ δποία ἔχει κέντρον H λέγεται μέση τομῆς τοῦ κολ. κώνου καὶ ἔχει ἀκτῖνα HZ.

Εἶναι δέ $(HZ) = \frac{A + \alpha}{2}$ καὶ ἐπομένως
ἡ ἀνωτέρω ἴσοτης (2) γίνεται
 $\epsilon = 2\pi(HZ)\lambda$ (3). "Ητοι:

Τὸ ἐμβαδὸν τῆς κυρτῆς ἐπιφανείας κολ. κώνου εἶναι γινόμενον τῆς περιφερείας τῆς μέσης τομῆς ἐπὶ τὴν πλευρὰν αὐτοῦ.

β) "Αν φέρωμεν τὴν ΓΕ κάθετον ἐπὶ τὴν KB καὶ τὴν ZΘ



Σχ. 294

κάθετον ἐπὶ τὴν πλευράν ΒΓ, σχηματίζονται τὰ δύοια τρίγωνα ΓΒΕ καὶ ΗΖΘ.

Ἐκ τούτων βλέπομεν ὅτι:

$$\frac{HZ}{GE} = \frac{Z\Theta}{BG} = \frac{Z\Theta}{\lambda}$$

καὶ ἐπομένως (HZ) λ = (GE) $(Z\Theta)$ = $u \cdot (Z\Theta)$. Ἡ λογικής (3) γίνεται λοιπὸν $\epsilon = 2\pi(Z\Theta)u$ (4). Ἡτοι:

Τὸ ἐμβαδὸν τῆς κυρτῆς ἐπιφανείας κολ. κώνου εἶναι γινόμενον τοῦ ὑψους αὐτοῦ ἐπὶ τὴν περιφέρειαν, η δποία ἔχει ἀκτίνα τὴν ἐκ τοῦ μέσου τῆς πλευρᾶς κάθετον ἐπ' αὐτὴν μέχρι τοῦ ἄξονος.

§ 392. Πρόβλημα II. Νὰ εὑρεθῇ τὸ ἐμβαδὸν E τῆς διλικῆς ἐπιφανείας κολ. κώνου.

Δύσις. Προφανῶς $E = \pi A^2 + \pi a^2 + \pi(A + a)\lambda$.

Ἄσκησεις

835. Εἰς κόλ. κώνος ἔχει $\lambda = 10$ ἑκατ., $A = 6$ ἑκατ., $a = 3$ ἑκατ. Νὰ εὕρητε τὸ ἐμβαδὸν τῆς κυρτῆς ἐπιφανείας αὐτοῦ.

836. Εἰς κόλ. κώνος ἔχει $\epsilon = 405$ π. τετ. ἑκατ., $\lambda = 12$ ἑκατ., $A = 18$ ἑκατ. Νὰ εὕρητε τὴν ἀλληλὴν ἀκτίνα α .

837. Νὰ εὕρητε τὸ ἐμβαδὸν E τῆς ἐπιφανείας τοῦ προηγουμένου κώνου.

838. Ἀν τὰ στοιχεῖα A , α ἐνὸς κολ. κώνου διπλασιασθῶσι, νὰ ἔξετάσῃς ποίαν μεταβολὴν ὑφίσταται τὸ ἐμβαδὸν τῆς κυρτῆς ἐπιφανείας αὐτοῦ.

§ 393. Πρόβλημα III. Νὰ εὑρεθῇ δὸγκος Θ κολούρου κώνου.

Δύσις. Ἐστω K δὸγκος κανονικῆς κολούρου πυραμίδος $AB\Gamma\Delta E$ αβγδε ἐγγεγραμμένης εἰς κόλουρον κῶνον $A\delta$ (σχ. 293). Ἐστωσαν δὲ A , α αἱ ἀκτίνες τῶν βάσεων καὶ u τὸ ὑψος τοῦ κολ. κώνου καὶ τῆς κολούρου πυραμίδος. Ἀν $(AB\Gamma\Delta E) = B$, $(\alpha\beta\gamma\delta\epsilon) = \beta$, ἐμάθομεν (§ 352) ὅτι:

$$K = \frac{1}{3}(B + \sqrt{B\beta} + \beta) \cdot u.$$

Ἡ λογικής αὕτη ἀληθεύει, δσασδήποτε πλευρᾶς καὶ ἀν ἔχωσιν αἱ βάσεις τῆς κολ. πυραμίδος.

Θά είναι λοιπόν: $\delta\rho K = \frac{1}{3} (\delta\rho B + \delta\rho \sqrt{B\beta} + \delta\rho \beta) \cdot u.$

*Επειδή δὲ $\delta\rho K = \Theta$, $\delta\rho B = \pi A^2$, $\delta\rho \beta = \pi \alpha^2$, $\delta\rho \sqrt{B\beta} = \sqrt{\delta\rho B \cdot \delta\rho \beta} = \sqrt{\pi A^2 \cdot \pi \alpha^2} = \pi A \alpha$, ξπεται δτι:

$$\Theta = \frac{1}{3} \pi (A^2 + A\alpha + \alpha^2) u.$$

*Ασκήσεις

839. Εἰς κόλ. κώνος ἔχει $A = 4$ παλ., $\alpha = 2$ παλ., $u = 15$ ἑκατ. Νὰ εὕρητε τὸν δγκον αὐτοῦ.

840. Εἰς κόλ. κώνος ἔχει $A = 6$ ἑκατ., $\alpha = 1,5$ ἑκατ., $u = 6$ ἑκατ. Εἰναι δὲ ἐκ ξύλου ειδ. βάρους 0,9. Νὰ εὕρητε τὸ βάρος αὐτοῦ.

841. *Ἐν δοχείον ἔχει σχῆμα κολ. κώνου. Ἡ διάμετρος τῆς μιᾶς βάσεως είναι 24 ἑκατ., τῆς ἀλλής 12 ἑκατ., καὶ τὸ βάθος του 8 ἑκατ. Νὰ εὕρητε τὸ βάρος τοῦ υδατος, τὸ δποίον χωρεῖ.

842. Εἰς κόλ. κώνος ἔχει $u = 10$ ἑκατ., $A = 15$ ἑκατ., $\alpha = 7,5$ ἑκατ. Νοήσατε ἐντὸς αὐτοῦ ισούψη κύλινδρον μὲ βάσιν μίαν βάσιν τοῦ κολ. κώνου. Νὰ εὕρητε τὸν δγκον τοῦ πέριξ αὐτοῦ μέρους τοῦ κολ. κώνου.

*Ασκήσεις πρὸς ἐπανάληψιν τοῦ Α' κεφαλαίου

843. Νὰ ἀποδείξητε δτι δγκοκος κυλίνδρου είναι γινόμενον τῆς κυρτῆς ἐπιφανείας ἐπὶ τὸ ήμισυ τῆς ἀκτίνος τῆς βάσεως.

844. *Ἐν δρθογώνιον $AB\Gamma\Delta$ ἔχει διαστάσεις (AB) = α ἐκ. καὶ (AD) = β ἐκ. Τοῦτο στρέφεται περὶ ἄξονα χψ ἐκτὸς τοῦ δρθογωνίου κείμενον, παράλληλον πρὸς τὴν πλευρὰν AB καὶ ἀπέχοντα αὐτῆς ἀπόστασιν γ ἐκ. Νὰ εὕρητε τὸν δγκον τοῦ γραφομένου στερεοῦ.

845. Τρίγωνον $AB\Gamma$ ἔχει $AB = A\Gamma$. *Εστωσαν δὲ $A\Delta$ καὶ $B\Gamma$ δύο ὑψη αὐτοῦ. *Ἀν τὸ τρίγωνον στραφῇ περὶ τὴν πλευρὰν $A\Gamma$, νὰ ἀποδείξητε δτι τὸ ἐμβαδὸν τῆς ἐπιφανείας, τὴν δποίαν γράφει ἡ $B\Gamma$, είναι $2\pi(A\Delta)(\Gamma E)$.

846. *Ἐν δρθογώνιον τρίγωνον $AB\Gamma$ στρέφεται διαδοχικῶς περὶ τὰς πλευρὰς AB , $A\Gamma$ τῆς δρθῆς γωνίας. Νὰ εὔρεθῇ συναρτήσει τῶν πλευρῶν τούτων δ λόγος τῶν γραφομένων στερεῶν.

847. Εἰς κύλινδρος ἔχει ψηφος u ἐκ. καὶ ἀκτίνα βάσεως A ἐκ. Εἰς κώνος ἔχει κοινὴν μὲ τὸν κύλινδρον βάσιν καὶ κορυφὴν τὸ κέντρον τῆς ἀλλῆς βάσεως τοῦ κυλίνδρου. Νὰ εὕρητε τὸν δγκον τοῦ μέρους ητοῦ κυλίνδρου, τὸ δποίον εύρισκεται πέριξ τοῦ κώνου.

848. *Απὸ τὴν κορυφὴν ισοσκελοῦς τριγώνου $O\Gamma\beta$ φέρομεν εύθειαν

χψ ἐν τῷ ἐπιπέδῳ τοῦ τριγώνου καὶ μὴ τέμνουσαν αὐτό. "Εστω δὲ βγὴ ἐπ' αὐτὴν προβολὴ τῆς βάσεως ΒΓ καὶ ΟΖ τὸ ύψος τοῦ τριγώνου. "Αν τὸ τρίγωνον στραφῇ περὶ τὴν χψ, νὰ ἀποδείξητε ὅτι τὸ ἐμβαδὸν τῆς ἐπιφανείας, τὴν δποίαν γράφει ἡ βάσις ΒΓ, εἶναι 2π(ΟΖ) (βγ).

849. Μία κανονικὴ τεθλ. γραμμὴ στρέφεται περὶ μίαν διάμετρον τῆς περιγεγραμμένης περιφερείας, κτις δὲν τέμνει αὐτήν. Νὰ ἀποδείξητε ὅτι τὸ ἐμβαδὸν τῆς ἐπιφανείας, τὴν δποίαν γράφει αὐτῇ, εἶναι γυνόμενον τῆς ἔγγεγραμμένης περιφερείας ἐπὶ τὴν προβολὴν τῆς τεθλ. γραμμῆς ἐπὶ τὸν ἀξονα στροφῆς.

850. Εἰς κύλινδρος εἶναι ΐσοϋψής πρὸς διθέντα κόλ. κῶνον καὶ ἔχει βάσιν τὴν μέσην τομὴν αὐτοῦ. Νὰ εὕρητε τὴν διαφορὰν τῶν ὅγκων αὐτῶν.

851. Νὰ εὕρητε πόσος λευκοσίδηρος χρειάζεται διὰ τὴν κατασκευὴν κυλίνδρικοῦ δοχείου ύψους 0,30 μέτ. καὶ ἀκτίνος 0,15 μέτ.

852. Νὰ νοήσητε ἐν ἐπίπεδον παράλληλον πρὸς τὸν ἀξονα διθέντος κυλίνδρου, τὸ δποίον τέμνει ἑκάστην βάσιν κατὰ χορδὴν τεταρτομορίου. Νὰ εὕρητε δὲ τὸν λόγον τοῦ μεγαλυτέρου πρὸς τὸ μικρότερον μέρος, εἰς τὰ δποία χωρίζεται δ κύλινδρος.

853. "Εστωσαν Κ,Κ' τὰ κέντρα τῶν βάσεων ἐνὸς κυλίνδρου, ΑΒ μία χορδὴ τῆς βάσεως Κ καὶ Μ τὸ μέσον αὐτῆς. Νὰ εὕρητε τὰ μέτρα τῶν γωνιῶν τῶν εὐθειῶν Κ'Μ καὶ ΑΒ.

854. Δύο σημεῖα Α, Β κείνται ἐπὶ τῆς κυρτῆς ἐπιφανείας κυλίνδρου. "Αν ἡ ἀπόστασις τοῦ ἀξονος τοῦ κυλίνδρου ἀπὸ τὴν εὐθεῖαν ΑΒ τέμνῃ αὐτὴν εἰς σημεῖον Δ, νὰ εὕρητε τὸν λόγον ΔΑ : ΔΒ.

855. Ἡ μέση τομὴ ἐνὸς κώνου ἔχει ἐμβαδὸν 31,4159 τετ. ἑκατ. Νὰ εὕρητε τὸν λόγον τοῦ κώνου τούτου πρὸς ΐσοϋψη κύλινδρον, δ ὁ δποίος ἔχει βάσιν τὴν μέσην ταύτην τομὴν.

856. Εἰς κύλινδρος ἔχει βάσιν ΐσοδύναμον πρὸς τὴν μέσην τομὴν διθέντος κώνου καὶ ύψος ΐσον πρὸς τὴν πλευράν αὐτοῦ. Νὰ συγκρίνητε τὸν ὅγκον αὐτοῦ πρὸς τὸν ὅγκον δευτέρου κώνου, δστις ἔχει ύψος τὰ $\frac{3}{4}$ τῆς ἀκτίνος τῆς βάσεως τοῦ πρώτου καὶ βάσιν ΐσοδύναμον πρὸς τὴν κυρτὴν ἐπιφάνειαν ἑκείνου.

857. Ἡ βάσις ἐνὸς κώνου εἶναι ΐσοδύναμος πρὸς τομὴν αὐτοῦ, κτις διέρχεται ἀπὸ τὸν ἀξονα. Νὰ εὕρητε τὸν λόγον υ : α.

858. Εἰς τὴν βάσιν κώνου ἀγομεν δύο καθέτους ἀκτίνας ΟΑ, ΟΒ καὶ νοοῦμεν τὸ ἐπίπεδον τῆς κορυφῆς Κ καὶ τῶν σημείων Α,Β. Νὰ εὕρητε τὸν ὅγκον τοῦ μικροτέρου τῶν μερῶν, εἰς τὰ δποία χωρίζεται δ κώνος, δν $\alpha = 3$ ἑκατ. καὶ $\upsilon = 4$ ἑκατ.

859. Μία διεδρος γωνία 90° ἔχει ἀκμὴν τὸν ἀξονα διθέντος κολ. κώνου. Νὰ εὕρητε τὸν ὅγκον τοῦ μέρους τοῦ κολ. κώνου, τὸ δποίον περιέχεται μεταξὺ τῶν ἔδρῶν αὐτῆς.

860. Εἰς κολ. κῶνος ἔχει δύκον Θ, ψυχός υ, βάσεις Β, β καὶ μέσην τομήν Β'. Νὰ ἀποδείξῃτε ὅτι $\Theta = \frac{1}{6} \upsilon (B + \beta + 4B')$. Νὰ ἔξετάσῃτε δέ, ἂν ἡ λιστής αὕτη ἀληθεύῃ διὰ κύλινδρον καὶ διὰ κῶνον.

861. Εἰς τὸ ἐπίπεδον τῆς βάσεως ἐνὸς κώνου καὶ ἑκτὸς αὐτῆς δριζομεν ἐν σημεῖον. Πῶς δυνάμεθα νὰ δρίσωμεν ἐπίπεδον, τὸ δποῖον νὰ διέρχηται ἀπὸ αὐτὸν καὶ νὰ ἐφάπτηται τῆς κυρτῆς ἐπιφανείας τοῦ κώνου τούτου; Νὰ ἔξετάσῃτε δὲ πόσα τοιαῦτα ἐπίπεδα ἄγονται.

862. Μία χορδὴ ΑΒ τῆς κυρτῆς ἐπιφανείας κώνου προβάλλεται εἰς τὴν βάσιν του κατὰ τμῆμα αβ εύθείας μὴ διερχομένης ἀπὸ τὸ κέντρον Ο τῆς βάσεως. Νὰ ἀποδείξῃτε ὅτι δ ἀξων καὶ ἡ εύθεία ΑΒ είναι ἀσύμβατοι εύθεῖαι.

866 - 859

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Η ΣΦΑΙΡΑ

§ 394. Τί είναι σφαῖρα καὶ ποῖα τὰ στοιχεῖα αὐτῆς.
Ἐστω ΑΒ ἡ διάμετρος ἐνὸς ἡμικυκλίου ΑΓΒ (σχ. 295). Ἄς νοήσωμεν δὲ διὰ τοῦτο στρέφεται περὶ τὴν ΑΒ κατὰ τὴν αὐτὴν φοράν, ἔως διὰ τοῦτο ἐπανέλθῃ εἰς τὴν πρώτην θέσιν του.

Τὸ σύνολον δὲ τῶν τῶν θέσεων, ἀπὸ τὰς δόποιας διέρχεται τοῦτο, σχηματίζει ἐν στερεόν σῶμα. Τοῦτο λέγεται σφαῖρα.

Ἡ στρεφομένη ἡμιπεριφέρεια γράφει τὴν ἐπιφάνειαν τῆς σφαίρας. Εἶναι δὲ αὕτη καμπύλη ἐπιφάνεια.


Ἐπειδὴ δὲ κατὰ τὴν στροφὴν ταύ-
την ἡ ἀπόστασις τῶν σημείων τῆς
ἡμιπεριφέρειας ἀπὸ τὸ κέντρον Σ αὐ-
τῆς δὲν μεταβάλλεται, ἐπεται διὰ διὰ
τὰ σημεῖα τῆς ἐπιφανείας τῆς σφαί-
ρας ἀπέχουσιν ἵσον ἀπὸ τὸ ἀκίνητον
σημεῖον Σ αὐτῆς. Διὰ τοῦτο ὀρίζομεν
τὴν σφαῖραν ὡς ἔξης :

Σφαῖρα εἶναι στερεόν, τοῦ δ-
ποίου ἐν σημεῖον ἀπέχει ἵσον ἀπὸ
διὰ τὰ σημεῖα τῆς ἐπιφανείας αὐτοῦ.

Τὸ σημεῖον τῆς σφαίρας, τὸ δόποιον ἀπέχει ἵσον ἀπὸ τὰ
σημεῖα τῆς ἐπιφανείας αὐτῆς, λέγεται κέντρον αὐτῆς. Οὕτω Σ
εἶναι τὸ κέντρον τῆς προηγουμένως σχηματισθείσης σφαίρας
(σχ. 295).

Εἶναι εὔκολον νὰ παρατηρήσωμεν τὴν ἀντιστοιχίαν, ἡ
δόποια ὑπάρχει μεταξὺ τοῦ δρισμοῦ κύκλου καὶ σφαίρας, περι-
φερείας κύκλου καὶ ἐπιφανείας σφαίρας.

Ἡ ἀντιστοιχία αὕτη ἐπεκτείνεται καὶ εἰς ἄλλα στοιχεῖα τῶν
σχημάτων τούτων. Οὕτως ἐκάστη σφαῖρα ἔχει ἀκτῖνας καὶ δια-



Σχ. 295

μέτρους, αἱ δποῖαι ὁρίζονται, δπως διὰ τὸν κύκλον, ἀρκεῖ ἡ λέξις περιφέρεια νὰ ἀντικατασταθῇ μὲ τὴν λέξιν ἐπιφάνεια. Π.χ. ΣΑ εἶναι ἀκτὶς καὶ ΑΒ εἶναι διάμετρος τῆς σφαίρας Σ (σχ. 295).


Ασκήσεις

863. Νὰ συγκρίνητε α') Δύο ἀκτῖνας τῆς αὐτῆς σφαίρας. β') Μίαν διάμετρον καὶ μίαν ἀκτῖνα τῆς αὐτῆς σφαίρας. γ') Δύο διαμέτρους τῆς αὐτῆς σφαίρας.

864. Νὰ συγκρίνητε τὴν ἀκτῖνα μιᾶς σφαίρας πρὸς τὴν ἀπόστασιν τοῦ κέντρου αὐτῆς ἀπὸ ἐν σημεῖον, τὸ δποῖον κεῖται ἐκτὸς ἢ ἐντὸς τῆς σφαίρας ταύτης.

865. Δίδεται ἐν σημεῖον Ο καὶ ἐν εὐθ. τμῆμα α. Νὰ δρίσητε τὸν γεωμετ. τόπον τὸν σημείων Μ τοῦ διαστήματος, διὰ τὰ δποῖα εἶναι ΟΜ=α.

§ 395. Διάφοροι θέσεις σφαίρας πρὸς ἐπίπεδον. Ἡ ἀντιστοιχία κύκλου πρὸς σφαῖραν ἐπεκτείνεται καὶ εἰς τὰς θέσεις κύκλου καὶ εὐθείας πρὸς τὰς θέσεις σφαίρας καὶ ἐπιπέδου. Οὕτως, ἀν ΣΑ εἶναι ἡ ἀπόστασις τοῦ κέντρου μιᾶς σφαίρας ἀπὸ ἐν ἐπίπεδον καὶ R ἡ ἀκτὶς αὐτῆς καὶ σκεφθῶμεν, δπως εἰς (§ 134 - 138), ἀποδεικνύομεν δτι:



Σχ. 296

α') "Αν $\Sigma A > R$, ἡ σφαῖρα καὶ τὸ ἐπίπεδον ἔχουσιν ἐν μόνον κοινὸν σημεῖον. Καὶ ἀντιστρόφως (σχ. 296).

β') "Αν $\Sigma A = R$, ἡ σφαῖρα καὶ τὸ ἐπίπεδον ἔχουσιν πολλὰ κοινὰ σημεῖα. Καὶ ἀντιστρόφως (σχ. 297).

γ') "Αν $\Sigma A < R$, ἡ σφαῖρα καὶ τὸ ἐπίπεδον ἔχουσιν πολλὰ κοινὰ σημεῖα. Καὶ ἀντιστρόφως (σχ. 298).

Εἰς τὴν περίπτωσιν ταύτην ὁ ποὺς Α κεῖται μέσα εἰς τὴν σφαῖραν. Ἐπομένως τὸ ἐπίπεδον Π εἰσχωρεῖ μέσα εἰς τὴν σφαῖραν, ἥτοι τέμνει αὐτήν.


§ 396. Ποῖον εἶναι τὸ σχῆμα τῶν ἐπιπέδων τομῶν σφαίρας. "Εστωσαν B, Δ, Γ κ.τ.λ. διάφορα κοινά σημεῖα τῆς ἐπιφανείας σφαίρας Σ καὶ ἐπιπέδου Π , τὸ δοῦλον τέμνει αὐτὴν (σχ. 298).

"Εστω δὲ ΣA ἡ ἀπόστασις τοῦ κέντρου ἀπὸ τὸ Π . 'Ἐπειδὴ $\Sigma B = \Sigma \Delta = \Sigma \Gamma$ κ.τ.λ. ὡς ἀκτίνες τῆς σφαίρας, θὰ εἶναι καὶ $AB = AD = AG$ κ.τ.λ. 'Έκ τούτων ἔπειται εὐκόλως δτι:


Πᾶσα ἐπίπεδος τομὴ σφαίρας εἶναι κύκλος.

Προφανῶς δὲ κέντρον τοῦ κύκλου τούτου εἶναι ὁ ποὺς τῆς καθέτου, ἢ δοῦλο ἀγεται ἐκ τοῦ κέντρου τῆς σφαίρας ἐπὶ τὸ ἐπίπεδον τῆς τομῆς.

"Αν καλέσωμεν α τὴν ἀκτίνα AB τῆς τομῆς ταύτης καὶ πα-



Σχ. 297



Σχ. 298

ρατηρήσωμεν δτι τὸ ΣAB εἶναι δρθιογώνιον τρίγωνον, εύρισκομεν δτι

$$R^2 = \alpha^2 + (\Sigma A)^2 \quad (1)$$

'Έκ ταύτης ἔπονται τὰ ἔξῆς:

α') "Αν $\Sigma A = R$, θὰ εἶναι $\alpha = 0$, ἤτοι ἡ τομὴ γίνεται σημεῖον.


β') "Αν $\Sigma A < R$, θὰ εἶναι καὶ $\alpha < R$.

γ') "Αν $\Sigma A = 0$, θὰ εἶναι $\alpha = R$.

Βλέπομεν λοιπὸν δτι ἡ τομὴ ἔχει τὴν μεγαλυτέραν τιμήν, δταν ὁ ποὺς A συμπίπτῃ μὲ τὸ κέντρον Σ ἤτοι, δταν τὸ ἐπίπεδον τῆς τομῆς διέρχηται ἀπὸ τὸ κέντρον τῆς σφαίρας. Δι' αὐτὸν τὸν λόγον:

Πᾶσα ἐπίπεδος τομὴ σφαίρας, ἢ δοῦλο ἀδέρχεται ἀπὸ τὸ κέντρον αὐτῆς, λέγεται μέγιστος κύκλος τῆς σφαίρας ταύτης.

Πρός διάκρισιν δὲ τῶν ἄλλων ἐπιπέδων τομῶν ἀπὸ ταύτης δνομάζομεν τὰς ἄλλας τομὰς μικροὺς κύκλους. "Ητοι:



Πᾶσα ἐπίπεδος τομὴ σφαιρας, ἡ δποὶα δὲν διέρχεται ἀπὸ τὸ κέντρον αὐτῆς, λέγεται μικρὸς κύκλος τῆς σφαιρας ταύτης.

Π.χ. ὁ κύκλος ΒΓ (σχ. 298) εἶναι μικρὸς κύκλος τῆς σφαιρας Σ. Όμοιως δ ΓΔ εἶναι μικρὸς κύκλος, δ δὲ ΑΒ μέγιστος κύκλος τῆς σφαιρας Σ (σχ. 299).

§ 397. Ιδιότητες τῶν μεγίστων κύκλων σφαιρας. Ἐπειδὴ ἀκτὶς ἔκατον μεγίστου κύκλου σφαιρας εἶναι ἡ ἀκτὶς τῆς σφαιρας ταύτης, ἔπειται δτι:


α') Οι μέγιστοι κύκλοι μιᾶς σφαιρας εἶναι γύσοι.

Εύκολως δὲ ἐννοοῦμεν δτι ἡ τομὴ δύο μεγίστων κύκλων σφαιρας εἶναι διάμετρος αὐτῶν. Ἐπομένως:

β') Οι μέγιστοι κύκλοι σφαιρας διχοτομοῦσιν ἄλληλους.

"Εστω ΓΔ μέγιστος κύκλος σφαιρας Σ καὶ ΓΑΔ, ΓΒΔ τὰ δύο μέρη, εἰς τὰ δποῖα διαιρεῖται ἡ σφαιρα ὑπὸ τοῦ κύκλου τούτου (σχ. 300). "Εστω δὲ Γ'Α'Δ' τὸ α' μέρος ἀντεστραμμένον.

"Ἄς νοήσωμεν δὲ δτι τοῦτο τίθεται ἐπὶ τοῦ ΓΒΔ οὕτως, ώστε ὁ κύκλος Γ'Δ' νὰ ἐφαρμόσῃ ἐπὶ τοῦ ΓΔ. Ἐπειδὴ ἡ ἀπόστασις τυχόντος σημείου Α' τῆς ἐπιφανείας Γ'Α'Δ' ἀπὸ τὸ κέντρον Σ δὲν μεταβάλλεται, τὸ Α' θὰ εὑρεθῇ ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας ΓΒΔ. Τὰ δύο λοιπὸν μέρη ἐφαρμόζουσιν. "Ἐπειται λοιπὸν δτι:



**Πᾶς μέγιστος κύκλος σφαίρας διαιρεῖ αὐτὴν εἰς δύο λόσα μέρη.
Διὰ τοῦτο ταῦτα λέγονται ἡμισφαίρια.**

'Α σκήσεις

866. Μία σφαίρα ἔχει ἀκτῖνα 5 ἑκατ., τὸ δὲ κέντρον ἀπέχει 3 ἑκατ. ἀπὸ μίαν τομὴν αὐτῆς. Νὰ εὕρητε τὸ ἐμβαδὸν τῆς τομῆς ταύτης καὶ τὸ μῆκος τῆς περιφερείας αὐτῆς.

867. Μία ἐπίπεδος τομὴ σφαίρας ἔχει ἐμβαδὸν 36π τετ. ἑκατ. καὶ ἀπέχει ἀπὸ τὸ κέντρον αὐτῆς 8 ἑκατ. Νὰ εὕρητε τὴν ἀκτῖνα τῆς σφαίρας ταύτης.

868. Τὸ μῆκος τῆς περιφερείας μιᾶς ἐπιπέδου τομῆς σφαίρας εἰναι 16π. ἑκατ. Τὸ δὲ κέντρον τῆς σφαίρας ἀπέχει ἀπὸ αὐτὴν 6 ἑκατ. Νὰ εὕρητε τὸ ἐμβαδὸν μεγίστου κύκλου τῆς σφαίρας ταύτης.

✓ **§ 398. Ποιοι λέγονται παράλληλοι κύκλοι σφαίρας.** Τὰ ἐπίπεδα τῶν κύκλων ΓΔ καὶ ΑΒ (σχ. 299) εἰναι παράλληλα. Διὰ τοῦτο δὲ οἱ κύκλοι οὗτοι λέγονται **παράλληλοι κύκλοι.**
"Ωστε:

Αἱ τομαὶ σφαίρας ὑπὸ παραλλήλων ἐπιπέδων λέγονται παράλληλοι κύκλοι αὐτῆς.

'Α σκήσεις

869. Εἰς μικρὸς κύκλος σφαίρας ἔχει ἀκτῖνα 9 ἑκατ. καὶ ἀπέχει 8 ἑκατ. ἀπὸ παράλληλον πρὸς αὐτὸν μέγιστον κύκλον τῆς αὐτῆς σφαίρας. Νὰ εὕρητε τὴν ἀκτῖνα τοῦ μεγίστου τούτου κύκλου.

870. Δίδεται εἰς μέγιστος κύκλος σφαίρας ἀκτῖνος 15 ἑκατ. Νὰ εὕρητε εἰς πόσην ἀπόστασιν ἀπ' αὐτοῦ εὑρίσκεται παράλληλος πρὸς αὐτὸν μικρὸς κύκλος ΐσος πρὸς τὸ $\frac{1}{4}$ αὐτοῦ.

§ 399. Ποῖα λέγονται ἐφαπτόμενα ἐπίπεδα σφαίρας. Εἴπομεν προηγουμένως (§ 395) ὅτι, ἢν $\Sigma A = R$, ἡ σφαίρα καὶ τὸ ἐπίπεδον Π ἔχουσιν ἔν μόνον κοινὸν σημεῖον Α (σχ. 297). Τὸ ἐπίπεδον τοῦτο λέγεται **ἐφαπτόμενον** ἐπίπεδον τῆς σφαίρας.
"Ωστε:

"Ἐν ἐπίπεδον λέγεται ἐφαπτόμενον σφαίρας, ἢν ἔχῃ μὲ αὐτὴν ἐν μόνον κοινὸν σημεῖον.

Τὸ κοινὸν σημεῖον σφαίρας καὶ ἐφαπτομένου εἰς αὐτὴν ἐπιπέδου λέγεται σημεῖον ἐπαφῆς.


Τὰ ἐφαπτόμενα εἰς σφαίραν ἐπίπεδα ἔχουσι ίδιότητας ἀντιστοίχους πρὸς τὰς ίδιότητας τῶν ἐφαπτομένων εἰς κύκλον εὐθειῶν, αἱ δοῦλαι ἀποδεικνύονται καθ' δμοιον τρόπον. Εἶναι δὲ αὗται αἱ ἔξης.

α') Ἡ ἀκτὶς σφαίρας, ἡ δοῦλα καταλήγει εἰς τὸ σημεῖον ἐπαφῆς, εἶναι κάθετος ἐπὶ τὸ ἐφαπτόμενον ἐπίπεδον.

β') Τὸ ἐπίπεδον, τὸ δοῦλον εἶναι κάθετον ἐπὶ μίαν ἀκτῖνα σφαίρας εἰς τὸ ἄκρον αὐτῆς, ἐφάπτεται τῆς σφαίρας ταύτης.

γ') Ἀπὸ Ἑκάστου σημείου τῆς ἐπιφανείας σφαίρας διέρχεται ἐφαπτόμενον ἐπίπεδον εἰς αὐτὴν καὶ μόνον ἐν.

§ 400. Ποῖαι λέγονται ἐφαπτόμεναι εὐθεῖαι σφαίρας.
Ἐστω ἐπίπεδον Π ἐφαπτόμενον σφαίρας Σ καὶ A τὸ σημεῖον ἐπαφῆς (σχ. 301).



Σχ. 301

Μία εὐθεῖα λέγεται ἐφαπτομένη σφαίρας, ἢν ἔχῃ μὲν αὐτὴν ἐν μόνον κοινὸν σημεῖον.

Ασκήσεις

871. Μία εὐθεῖα AA' εἶναι κάθετος ἐπὶ ἐπίπεδον Π , τὸ δοῦλον ἐφαπτεται σφαίρας Σ εἰς τὸ σημεῖον A . Νὰ ἀποδείξητε ὅτι ἡ AA' διέρχεται ἀπὸ τὸ κέντρον τῆς σφαίρας.

872. Ἐν ἐπίπεδον Π ἐφάπτεται σφαίρας Σ εἰς σημεῖον A . Νὰ ἀποδείξητε ὅτι τὸ κέντρον κύκλου τῆς σφαίρας παραλλήλου πρὸς τὸ Π κεῖται ἐπὶ τῆς εὐθείας SA .

Διὰ τοῦ A διέρχονται διάφοροι εὐθεῖαι BAG , ΔAE κ.τ.λ. τοῦ ἐπιπέδου Π . Ὁλα τὰ σημεῖα αὐτῶν (πλὴν τοῦ A) κείνται ἐκτὸς τῆς σφαίρας ὡς σημεῖα τοῦ Π . Ἐκάστη λοιπὸν τούτων ἔχει μὲ τὴν σφαίραν κοινὸν μόνον τὸ σημεῖον A . Διὰ τοῦτο δὲ λέγεται ἐφαπτομένη τῆς σφαίρας.
Ωστε:

873. Νὰ εὕρητε τὸν γεωμ. τόπον τῶν εὔθειῶν, αἱ ὁποῖαι ἐφάπτουν ταὶ σφαίρας εἰς τὸ αὐτὸ σημεῖον.

874. Νὰ ἔξετάσητε πόσα κοινὰ σημεῖα δύναται νὰ ἔχῃ εὔθεῖα καὶ ἐπιφάνεια σφαίρας.

§ 401. Πόσαι καὶ ποῖαι αἱ διάφοροι θέσεις δύο μὴ ὁμοκέντρων σφαιρῶν πρὸς ἀλλήλας. "Εστωσαν δύο ἡμικύκλια Κ, Κ' τοῦ αὐτοῦ ἐπιπέδου καὶ κείμενα πρὸς τὸ αὐτὸ μέρος τῆς διακέντρου ΚΚ'. "Ας νοήσωμεν δὲ ὅτι ταῦτα στρέφονται περὶ τὴν ΚΚ' κατὰ τὴν αὐτὴν φοράν, ἵνα διατηταὶ τῶν σφαιρῶν θέσιν.

Οὕτω θὰ σχηματισθῶσι δύο σφαῖραι, αἱ δποῖαι θὰ ἔχωσι πρὸς ἀλλήλας οἵαν θέσιν ἔχουσι καὶ τὰ ἡμικύκλια Κ, Κ'.

"Αντιστρόφως. "Αν διὰ τῆς διακέντρου δύο σφαιρῶν νοήσωμεν τυχόν ἐπίπεδον, τοῦτο τέμνει αὐτὰς κατὰ μεγίστους κύκλους, τῶν δποίων ἡ ἀμοιβαία θέσις εἶναι οἵα καὶ τῶν σφαιρῶν.

"Ἐκ τούτων ἐννοοῦμεν ὅτι αἱ δυναταὶ θέσεις δύο σφαιρῶν πρὸς ἀλλήλας εἶναι δσαι καὶ οἵαι αἱ θέσεις δύο κύκλων πρὸς ἀλλήλους. Εὔκόλως δὲ ἐννοοῦμεν ὅτι εἰς ἑκάστην θέσιν αὐτῶν ὑφίσταται μεταξὺ τῶν ἀκτίνων καὶ τῆς ἀποστάσεως τῶν κέντρων ἡ αὐτὴ καὶ διὰ τοὺς κύκλους σχέσις.

Οὕτως, ἀν αἱ σφαῖραι Σ, Σ' ούδεν ἔχωσι κοινὸν σημεῖον, θὰ εἶναι $\Sigma\Sigma' > R + R'$ καὶ ἀντιστρόφως κ.τ.λ., ὡς καὶ διὰ δύο κύκλους.

'Α σκήσεις


875. Νὰ δρίσητε τὴν ἀμοιβαίαν θέσιν δύο σφαιρῶν (Σ, R), (Σ', R'), ἀν εἶναι α') ($\Sigma\Sigma' = 25$ ἑκατ, $R = 12$ ἑκατ, $R' = 10$ ἑκατ. $\beta')$ ($\Sigma\Sigma' = 28$ ἑκατ, $R = 12$ ἑκατ, $R' = 16$ ἑκατ).

876. Νὰ δρίσητε τὴν θέσιν δύο σφαιρῶν, ἀν α') ($\Sigma\Sigma' = 18$ ἑκατ, $R = 26$ ἑκατ, $R' = 8$ ἑκατ. $\beta')$ ($\Sigma\Sigma' = 20$ ἑκατ, $R = 16$ ἑκατ, $R' = 12$ ἑκατ).

§ 402. Πρόβλημα. Δύο σφαῖραι (Σ, R), (Σ', R') τέμνονται. Νὰ δρισθῇ ὁ γεωμ. τόπος τῶν κοινῶν σημείων τῶν ἐπιφανεῖῶν αὐτῶν (σχ. 302).

"Επειδὴ αἱ σφαῖραι τέμνονται, εἶναι $R - R' < \Sigma\Sigma' < R + R'$. "Αν δὲ νοήσωμεν τυχόν ἐπίπεδον διερχόμενον διὰ τῆς διακέν-

τρου $\Sigma\Sigma'$, τοῦτο τέμνει τὰς σφαίρας κατὰ μεγίστους κύκλους μὲ κέντρα ἀντιστοίχως Σ, Σ' , τῶν δποίων αἱ περιφέρειαι τέμνονται.



Σχ. 302

Α, στρέφονται περὶ τὴν $\Sigma\Sigma'$, ἔως δτου ἐπανέλθωσιν εἰς τὴν πρώτην θέσιν αὐτῶν. Εἶναι φανερὸν δτι ταῦτα θὰ γράψωσι τὰς δοθείσας σφαίρας.

Ἡ εὐθεῖα $\Gamma\Lambda$ θὰ μένη διαρκῶς κάθετος ἐπὶ τὴν $\Sigma\Sigma'$ καὶ ἐπομένως θὰ γράψῃ τὸ ἐπίπεδον, τὸ δποῖον εἶναι κάθετον ἐπὶ τὴν $\Sigma\Sigma'$ εἰς τὸ σημεῖον Γ .

Ἐπειδὴ δὲ τὸ εύθ. τμῆμα $\Gamma\Lambda$ ἔχει σταθερὸν μέγεθος, τοῦτο γράφει εἰς τὸ προηγούμενον ἐπίπεδον κύκλου μὲ κέντρον Γ . Τὸ δὲ ἄκρον Λ τοῦ τμήματος τούτου γράφει τὴν περιφέρειαν τοῦ κύκλου τούτου.

Κατὰ τὴν στροφὴν ταύτην αἱ ἀποστάσεις $\Sigma\Lambda, \Sigma'\Lambda$ μένουσιν ἀμετάβλητοι. Εἶναι λοιπὸν $\Sigma\Lambda = R, \Sigma'\Lambda = R'$ εἰς πᾶσαν θέσιν τοῦ Λ . Τοῦτο λοιπὸν μένει διαρκῶς εἰς τὴν ἐπιφάνειαν καὶ τῶν δύο σφαιρῶν, ἡ δὲ περιφέρεια, τὴν δποίαν γράφει, εἶναι κοινὴ γραμμὴ τῶν ἐπιφανειῶν τῶν δύο σφαιρῶν.

Ἀν δὲ Λ' εἶναι τυχόν κοινὸν σημεῖον τῶν ἐπιφανειῶν τούτων, θὰ εἶναι $\Sigma\Lambda' = R = \Sigma\Lambda, \Sigma'\Lambda' = R' = \Sigma'\Lambda$ καὶ τὰ τρίγωνα $\Sigma\Sigma'\Lambda, \Sigma\Sigma'\Lambda'$ εἶναι ἴσα. ᘾπειδὴ δὲ ἄξων στροφῆς $\Sigma\Sigma'$ εἶναι κοινὴ πλευρὰ τῶν τριγώνων τούτων, τὸ $\Sigma\Sigma'\Lambda$ κατὰ τὴν στροφὴν του διέρχεται καὶ ἀπὸ τὴν θέσιν $\Sigma\Sigma'\Lambda'$, τὸ δὲ Λ ἀπὸ τὸ Λ' . Εἶναι λοιπὸν καὶ τὸ Λ' σημεῖον τῆς περιφερείας, τὴν δποίαν γράφει τὸ Λ .

Ἐξ δλῶν τούτων ἔπειται δτι κοινὰ σημεῖα τῶν ἐπιφανειῶν τῶν σφαιρῶν τούτων εἶναι δλα τὰ σημεῖα τῆς περιφερείας ($\Gamma, \Gamma\Lambda$) καὶ μόνον αὐτά. "Ωστε:

"Ἄν δὲ A, B εἶναι τὰ κοινὰ σημεῖα αὐτῶν, γνωρίζομεν δτι ἡ χορδὴ AB τέμνεται ὑπὸ τῆς $\Sigma\Sigma'$ εἰς σημεῖον Γ καθέτως καὶ δίχα. Εἶναι δηλ. $\Gamma A = \Gamma B$ καὶ ΓA κάθετος ἐπὶ τὴν $\Sigma\Sigma'$.

"Ἄς νοήσωμεν δὲ δτι τὰ ἡμί-κύκλια, τὰ δποῖα περιέχουσι τὸ

Ο γεωμ. τόπος τῶν κοινῶν σημείων τῶν ἐπιφαγειῶν δύο τεμνομένων σφαιρῶν εἶναι περιφέρεια, τῆς δποίας τὸ κέντρον κεῖται ἐπὶ τῆς διακέντρου αὐτῶν, τὸ δὲ ἐπίπεδον εἶναι κάθετον ἐπὶ τὴν διάκεντρον ταύτην.

Ασκήσεις

877. Δύο σφαῖραι ἔχουσι ἀκτῖνας $R = 12$ ἑκατ., $R' = 9$ ἑκατ., ή δὲ ἀπόστασις τῶν κέντρων εἶναι 15 ἑκατ. Νὰ ἔξετάσῃς, ἀν τέμνωνται αὗται ἢ οχι. Καὶ ἀν τέμνωνται, νὰ εὕρητε τὸ μῆκος τῆς τομῆς αὐτῶν.

878. Τὸ αὐτὸ δήμητρα, ἀν $(\Sigma \Sigma') = 16$ ἑκατ., $R = 12$ ἑκατ. καὶ $R' = 8$ ἑκατ.


№ 403. Τί λέγεται ἄξων καὶ πόλοι κύκλου σφαιρᾶς.
Ἐστω ΓΔ τυχών κύκλος, δστις εἶναι ἐπίπεδος τομὴ μιᾶς σφαιρᾶς Σ (σχ. 303).

Ἡ διάμετρος ΠΠ' τῆς σφαιρᾶς, ἡ δποία εἶναι κάθετος ἐπὶ τὸ ἐπίπεδον τοῦ κύκλου ΓΔ, λέγεται ἄξων τοῦ κύκλου τούτου. Τὰ ἄκρα Π, Π' τοῦ ἄξονος τούτου λέγονται πόλοι τοῦ κύκλου τούτου. "Ωστε:

"Ἄξων κύκλου σφαιρᾶς τινός λέγεται ἡ διάμετρος τῆς σφαιρᾶς, ἡ δποία εἶναι κάθετος ἐπὶ τὸν κύκλον τοῦτον.

Πόλοι κύκλου σφαιρᾶς τινός λέγονται τὰ ἄκρα τοῦ ἄξονος αὐτοῦ.

Γνωρίζομεν δὲ (§ 396) ὅτι ὁ ἄξων κύκλου διέρχεται ἀπὸ τὸ κέντρον αὐτοῦ.



Σχ. 303.

I. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΩΝ ΚΥΚΛΟΥ ΣΦΑΙΡΑΣ

№ 404. Σχέσις τῶν ἀποστάσεων ἐκάστου πόλου κύκλου ἀπὸ τὰ σημεῖα τῆς περιφέρειας αὐτοῦ.

Ἐστωσαν Π καὶ Π' οἱ πόλοι τοῦ κύκλου Κ σφαιρᾶς Σ καὶ Γ, Ε, Δ διάφορα σημεῖα τῆς περιφέρειας αὐτοῦ (σχ. 303).

Ἐπειδὴ $\text{ΚΓ} = \text{ΚΕ} = \text{ΚΔ}$, ἔπειται δτι:

$\text{ΠΓ} = \text{ΠΕ} = \text{ΠΔ}$ καὶ $\text{Π}'\Gamma = \text{Π}'\Ε = \text{Π}'\Δ$. "Ητοι:

"Ἐκαστος πόλος κύκλου ἀπέχει ἵσον ἀπὸ δὲ τὰ σημεῖα τῆς περιφερείας αὐτοῦ.

"Ἄντιστροφως: "Αν εἶναι $\text{ΠΓ} = \text{ΠΕ} = \text{ΠΔ}$, τὸ Π θά κεῖται ἐπὶ τῆς καθέτου εἰς τὸ κέντρον τοῦ κύκλου Κ. Ἐπειδὴ δὲ εἶναι καὶ σημεῖον τῆς ἐπιφανείας τῆς σφαίρας, ἔπειται δτι τὸ Π εἶναι πόλος τοῦ κύκλου Κ. Βλέπομεν λοιπὸν δτι:

"Ἀπὸ τὰ σημεῖα τῆς ἐπιφανείας μιᾶς σφαίρας μόνον ἔμαστος πόλος κύκλου ἀπέχει ἵσον ἀπὸ δὲ τὰ σημεῖα τῆς περιφερείας αὐτοῦ.

"Η ἀπόστασις σημείου περιφερείας κύκλου ἀπὸ τοῦ ἐγγυτέρου πρὸς αὐτὸν πόλου αὐτοῦ λέγεται πολικὴ ἀπόστασις τοῦ κύκλου τούτου

✓ § 405. Σχέσις τῶν τόξων μεγίστων κύκλων σφαίρας, τὰ δποῖα περιέχονται μεταξὺ ὅνδες πόλου κύκλου τινός αὐτῆς καὶ τῶν σημείων τῆς περιφερείας τοῦ κύκλου τούτου.

Γνωρίζομεν δτι οἱ μέγιστοι κύκλοι $\text{ΠΓΠ}'$, $\text{ΠΕΠ}'$, $\text{ΠΔΠ}'$ τῆς αὐτῆς σφαίρας εἶναι ίσοι. Ἐπειδὴ δὲ $\overline{\text{ΠΓ}} = \overline{\text{ΠΕ}} = \overline{\text{ΠΔ}}$, ἔπειται δτι $\widehat{\text{ΠΓ}} = \widehat{\text{ΠΕ}} = \widehat{\text{ΠΔ}}$. "Ητοι:

Τὰ τόξα μεγίστων κύκλων σφαίρας, τὰ δποῖα περιέχονται μεταξὺ πόλου τινός κύκλου σφαίρας καὶ τῶν σημείων τῆς περιφερείας αὐτοῦ, εἶναι ίσα.

"Αν Π εἶναι δὲ ἐγγύτερος πρὸς κύκλον ΓΔ πόλος αὐτοῦ, ἔκαστον τῶν τόξων ΠΓ, ΠΕ, ΠΔ κ.τ.λ. λέγεται σφαιρικὴ ἀκτίς τοῦ κύκλου ΓΔ.

§ 406. Εἰς μέγιστος κύκλος $\text{ΠΗΠ}'$ διέρχεται ἀπὸ τοὺς πόλους Π , $\text{Π}'$ ἄλλου μεγίστου κύκλου ΖΘ . Νὰ εὐρεθῇ πόσον μέρος τῆς περιφερείας εἶναι τὸ τόξον ΠΗ , τὸ δποῖον περιέχεται μεταξὺ τοῦ κύκλου ΖΘ καὶ τοῦ πόλου Π αὐτοῦ.

"Ἐπειδὴ κέντρον τοῦ κύκλου $\text{ΠΗΠ}'$ εἶναι τὸ Σ , ἡ δρθή γωνία ΠΣΗ εἶναι ἐπίκεντρος εἰς αὐτόν. Τὸ τόξον λοιπὸν ΠΗ εἶναι τεταρτημόριον μεγίστου κύκλου.

✓

**Αντιστρόφως. Άν ΠΗ = ΠΖ = $\frac{1}{4}$ περιφερείας μεγίστων κύκλων ΠΗΠ', ΠΖΠ', αι ἐπίκεντροι γωνίαι ΠΣΗ, ΠΣΖ είναι δρθαί. Ή δε διάμετρος ΠΠ' ώς κάθετος ἐπὶ τὰς ἀκτῖνας ΣΗ, ΣΖ είναι κάθετος καὶ ἐπὶ τὸ ἐπίπεδον τοῦ μεγίστου κύκλου ΖΘ. Τὸ Π λοιπὸν είναι πόλος τοῦ ΖΘ. Οὕτω βλέπομεν δτι:*

Τὰ τόξα μεγίστων κύκλων, τὰ δποῖα περιέχονται μεταξὺ τῶν σημείων τῆς περιφερείας ἄλλου μεγίστου κύκλου καὶ ἐνδε πόλου αὐτοῦ, είναι τεταρτημόρια μεγίστων κύκλων.

Άν δὲ δύο τόξα μεγίστων κύκλων σφαίρας, τὰ δποῖα περιέχονται μεταξὺ τῶν σημείων τῆς περιφερείας μεγίστου κύκλου ΖΘ καὶ ἐνδε σημείου Π τῆς ἐπιφανείας τῆς σφαίρας, είναι τεταρτημόρια, τὸ Π είναι πόλος τοῦ ΖΘ.

II. ΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΑΙ


§ 407. Πῶς γράφομεν περιφερείας κύκλου ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας σφαίρας. Ἐπειδὴ ἔκαστος πόλος κύκλου σφαίρας ἀπέχει ἵσον ἀπὸ δλα τὰ σημεῖα τῆς περιφερείας τοῦ κύκλου τούτου, δυνάμεθα νὰ γράψωμεν ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας σφαίρας περιφερείας, δπως καὶ εἰς τὸ ἐπίπεδον.

Χρησιμοποιοῦμεν δὲ πρὸς τοῦτο εἰδικὸν διαβήτην μὲ καμπυλωμένα σκέλη. Οὕτος λέγεται *σφαιρικὸς διαβήτης* (σχ. 304)

Στερεοῦμεν δὲ τὰ σκέλη αὐτοῦ οὕτως, ὥστε τὰ ἄκρα των νὰ ἀπέχωσιν ἀλλήλων τόσον, δσην θέλομεν πολικὴν ἀπόστασιν.

Ἐπειτα στηρίζομεν τὴν αἰχμὴν τοῦ ἐνδε σκέλους εἰς ἐν σημῖον Π τῆς ἐπιφανείας τῆς σφαίρας καὶ περιφέρομεν περὶ αὐτὸ τὸν διαβήτην, ὥστε τὸ ἄκρον τοῦ ἄλλου σκέλους νὰ εύρισκηται συνεχῶς ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας τῆς σφαίρας. Άν δὲ τοῦτο είναι ἐφωδιασμένον μὲ γραφίδα, θὰ γράψῃ ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας τῆς σφαίρας περιφέρειαν κύκλου, τοῦ δποίου εἰς πόλος θὰ είναι τὸ Π.

Είναι φανερὸν δτι πολικὴ ἀπόστασις, εἰς τὴν δποῖαν τίθεν-



Σχ. 304

ται τὰ ἄκρα τῶν σκελῶν τοῦ διαβήτου, πρέπει νὰ εἶναι μικρότερα τῆς διαμέτρου τῆς σφαίρας.

§ 408. Πρόβλημα I. Νὰ εὑρεθῇ ἡ ἀκτὶς δοθείσης σφαίρας.

Λύσις. Ὁρίζομεν ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας τῆς σφαίρας δύο σημεῖα A , B (σχ. 305). Μὲ πόλους δὲ ταῦτα καὶ τὴν αὐτὴν πολικὴν ἀπόστασιν γράφομεν ἐπὶ τῆς σφαίρας δύο τεμνόμενα τόξα· ἔστω δὲ Γ ἐν κοινὸν σημεῖον αὐτῶν.

Ἄλλασσοντες πολικὴν ἀπόστασιν ὁρίζομεν κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ δύο ἄλλα σημεῖα Δ καὶ E .


Οὕτω δὲ ἔκαστον ἀπὸ τὰ σημεῖα Γ, Δ, E καὶ τὸ κέντρον Σ τῆς σφαίρας ἀπέχει ἵσον τῶν A καὶ B . κεῖνται ἄρα ταῦτα ἐπὶ τοῦ ἐπιπέδου, τὸ δποῖον τέμνει δίχα καὶ καθέτως τὸ εύθ. τμῆμα AB .

Τὸ ἐπίπεδον τοῦτο διερχόμενον διὰ τοῦ κέντρου τῆς σφαίρας τέμνει αὐτὴν κατὰ μέγιστον κύκλον. Τούτου δὲ ἡ περιφέρεια διέρχεται ἀπὸ τὰ σημεῖα Γ, Δ, E , ἐπομένως τὸ νοητὸν εύθ. τρίγωνον $\Gamma\Delta E$ εἶναι ἐγγεγραμμένον εἰς αὐτὴν. "Αν δὲ μὲ τὸν σφαιρικὸν διαβήτην δρίσωμεν ἐπὶ ἐπιπέδου τμῆματα $\gamma\delta = \Gamma\Delta$, $\delta\epsilon = \Delta E$, $\epsilon\gamma = E\Gamma$, δυνάμεθα νὰ κατασκευάσωμεν τρίγωνον γδε μὲ πλευράς τὰ τμῆματα ταῦτα καὶ ἐπομένως ἵσον πρὸς τὸ $\Gamma\Delta E$.

"Επειτα περιγράφομεν περὶ τὸ γδε περιφέρειαν αὕτη ὡς ἵση πρὸς τὴν περιφέρειαν $\Gamma\Delta E$ ἔχει ἀκτῖνα ἵσην πρὸς τὴν ζητουμένην ἀκτῖνα τῆς σφαίρας.

Γραφικὴ ἐφαρμογὴ. "Αν τὴν περιφέρειαν διαιρέσωμεν εἰς 4 τόξα, ἔκαστον τούτων εἶναι σφαιρικὴ ἀκτὶς μεγίστου κύκλου τῆς δοθείσης σφαίρας. Ἡ δὲ χορδὴ αὐτοῦ εἶναι πολικὴ ἀπόστασις μεγίστου κύκλου τῆς σφαίρας ταύτης. Θέτοντες ἐπομένως τὰ ἐλεύθερα ἄκρα τῶν σκελῶν τοῦ διαβήτου εἰς τοιαύτην πολικὴν ἀπόστασιν δυνάμεθα νὰ γράψωμεν ἐπὶ τῆς σφαίρας ταύτης περιφερέας μεγίστων κύκλων αὐτῆς.

§ 409. Πρόβλημα II. Εἰς τὴν ἐπιφάνειαν δοθείσης σφαί-



Σχ. 305

ρας δρίζονται δύο σημεῖα *A*, *B*. Νὰ γραφῇ ἐπ' αὐτῆς περιφέρεια μεγίστου κύκλου διερχομένη δι' αὐτῶν (σχ. 306).

Ἄναλυσις. "Αν Π εἶναι δόπολος τῆς ζητουμένης περιφερείας, τὰ μεταξὺ αὐτοῦ καὶ τῶν σημείων *A*, *B* περιεχόμενα τόξα μεγίστων κύκλων εἶναι τεταρτημόρια περιφερείας. Ἐπομένως τὸ Π ἀπέχει ἀπὸ ἕκαστον τῶν σημείων *A*, *B* πολικὴν ἀπόστασιν ἵσην πρὸς τὴν χορδὴν τεταρτημορίου μεγίστου κύκλου, τὴν δόποιαν δρίζομεν, δπως προηγουμένως εἴπομεν.

Σύνθεσις. Γράφομεν, ὡς προηγουμένως (§ 408), περιφέρειαν μεγίστου κύκλου τῆς διοθείσης σφαίρας καὶ δρίζομεν τὴν πολικὴν ἀπόστασιν τῶν μεγίστων κύκλων αὐτῆς.


"Ἐπειτα μὲ πόλους *A* καὶ *B* γράφομεν δύο τόξα μεγίστων κύκλων καὶ δρίζομεν τὸ ἐν κοινὸν σημεῖον Π αὐτῶν. Μὲ πόλον δὲ Π καὶ τὴν αὐτὴν πολικὴν ἀπόστασιν γράφομεν περιφέρειαν κύκλου.

Οὗτος εἶναι μέγιστος κύκλος ἔνεκα τῆς χρησιμοποιηθείσης πολικῆς ἀποστάσεως. Ἡ δὲ περιφέρεια αὐτοῦ διέρχεται προφανῶς ἀπὸ τὰ σημεῖα *A*, *B*. Εἶναι ἐπομένως ἡ ζητουμένη.

"Αν τὰ *A*, *B* εἶναι ἄκρα τῆς αὐτῆς διαμέτρου τῆς σφαίρας, αἱ περιφέρειαι μεγ. κύκλου, αἱ δόποιαι γράφονται μὲ πόλους ταῦτα, ταυτίζονται. Εύκόλως δὲ ἐννοοῦμεν δτὶ ἀπειροὶ μεγ. κύκλοι διέρχονται ἀπὸ αὐτά.


§ 410. Πρόβλημα III. Εἰς τὴν ἐπιφάνειαν δοθείσης σφαίρας γράφεται περιφέρεια *BΓ* μεγίστου κύκλου καὶ δρίζεται σημεῖον *A*. Νὰ γραφῇ περιφέρεια μεγίστου κύκλου διερχομένη διὰ τοῦ *A* καὶ κάθετος ἐπὶ τὸν κύκλον *BΓ* (σχ. 307).

Ἀνάλυσις. "Εστω $\Delta\Lambda\Gamma$ ἡ ζητουμένη περιφέρεια καὶ Π , Π' οἱ πόλοι τοῦ κύκλου αὐτῆς. Ἐπειδὴ τὸ Σ εἶναι εἰς τὴν τομὴν τῶν ἐπιπέδων $\Delta\Gamma$ καὶ $B\Gamma$, δὲ ἄξων $\Pi\Sigma\Pi'$ τοῦ $\Delta\Gamma$ κάθετος ἐπ' αὐτὸν θὰ κεῖται εἰς τὸν κύκλον $B\Gamma$, διότι οὗτος εἶναι ἔξ οποθέσεως κάθετος ἐπὶ τὸ $\Delta\Gamma$. Οἱ πόλοι ἐπομένως Π καὶ Π' θὰ κεῖνται ἐπὶ τῆς περιφερείας $B\Gamma$. Ἐπειδὴ δὲ τὸ εύθ. τμῆμα $\Pi\Lambda$



Σχ. 306

είναι πολική άπόστασις τοῦ μεγ. κύκλου ΔE , θά είναι χορδὴ τεταρτημορίου μεγ. κύκλου τῆς σφαίρας καὶ δρίζεται ἀρχικῶς. Πρέπει λοιπὸν τὸ Π νὰ κεῖται καὶ ἐπὶ τῆς περιφερείας μεγ. κύκλου, ἡτις γράφεται μὲ πόλον A καὶ τὴν ρηθεῖσαν πολικὴν ἀπόστασιν,



Σχ. 307

Σύνθεσις. Ὁρίζομεν πρῶτον τὴν πολικὴν ἀπόστασιν τῶν μεγίστων κύκλων τῆς δοθείσης σφαίρας καὶ γράφομεν περιφέρειαν μεγ. κύκλου μὲ πόλον τὸ δοθὲν σημεῖον A . Οὕτω δὲ δρίζονται τὰ κοινὰ σημεῖα Π, Π' τῆς περιφερείας ταύτης καὶ τῆς ΓB . Ἐπειτα δὲ μὲ πόλον ἐν τούτων, π. χ. τὸ Π , γράφομεν περιφέρειον μεγ. κύκλου. Αὕτη δὲ είναι ἡ ζητουμένη.

Απόδειξις. Ἐπειδὴ ΠA ἴσουται πρὸς τὴν ληφθεῖσαν πολικὴν ἀπόστασιν, ἡ περιφέρεια αὗτη διέρχεται ἀπὸ τὸ A . Ἐπειδὴ δὲ ὁ ἄξων $\Pi\Sigma\Pi'$ αὐτῆς είναι κάθετος ἐπὶ τὸ ἐπίπεδον αὐτῆς καὶ κεῖται εἰς τὸ ἐπίπεδον τοῦ κύκλου $B\Gamma$, οὗτος είναι κάθετος ἐπὶ τὸν κύκλον ΔE .

"Αν τὸ A είναι πόλος τοῦ $B\Gamma$, εὐκόλως ἐννοοῦμεν ὅτι διέρχονται ἀπὸ αὐτὸν ἄπειροι μεγ. κύκλοι κάθετοι ἐπὶ τὸν $B\Gamma$.

Α σκήσεις

879. Νὰ συγκρίνητε τὴν γωνίαν τῶν ἀξόνων δύο μεγίστων κύκλων σφαίρας πρὸς τὴν ἀντίστοιχον ἐπίπεδον τῆς διέδρου γωνίας αὐτῶν.

880. Ἡ πολικὴ ἀπόστασις τῶν μεγίστων κύκλων σφαίρας είναι 12 ἔκατ. Νὰ εύρητε τὸ μῆκος τῆς ἀκτίνος τῆς σφαίρας ταύτης.

881. Ἡ σφαιρικὴ ἀκτίς μεγ. κύκλου σφαίρας ἔχει μῆκος 3π παλάμας. Νὰ εύρητε τὸ μῆκος τῆς ἀκτίνος τῆς σφαίρας ταύτης.

882. Εἰς μέγιστον κύκλον σφαίρας είναι ἐγγεγραμμένον τρίγωνον ΔEZ (σχ. 305) μὲ πλευράς 9, 12, 15 ἔκατ. Νὰ εύρητε τὸ μῆκος τῆς ἀκτίνος τῆς σφαίρας ταύτης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'

ΜΕΤΡΗΣΙΣ ΣΦΑΙΡΑΣ

I. ΜΕΤΡΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΣΦΑΙΡΑΣ

§ 411. Τί είναι σφαιρική ζώνη καὶ τί λέγεται ἐμβαδὸν αὐτῆς, α') "Εστω ΠΓΑΠ'Π τυχόν διμικύκλιον, ΠΠ' ή διάμετρος αὐτοῦ, Γ,Α δύο τυχόντα σημεῖα τῆς ήμιπεριφερείας αὐτοῦ καὶ ΑΕ, ΓΖ αἱ προβάλλουσαι αὐτῶν ἐπὶ τὴν ΠΠ' (σχ. 308).

"Αν τὸ διμικύκλιον τοῦτο στραφῇ περὶ τὴν διάμετρον ΠΠ' κατὰ τὴν αὐτὴν φοράν καὶ ἔως δτου ἐπανέλθῃ εἰς τὴν πρώτην θέσιν του, θά γράψῃ, ὡς γνωστόν, σφαῖραν μὲν κέντρον Σ.

"Η διμιπεριφέρεια αὐτοῦ θά γράψῃ τὴν ἐπιφάνειαν τῆς σφαῖρας. Τὰ εὐθ. τμῆματα ΑΕ, ΓΖ θά γράψωσι


παραλλήλους κύκλους ΑΒ, ΓΔ μὲν κέντρα ἀντιστοίχως Ε καὶ Ζ. Τὸ δὲ τόξον ΑΓ θά γράψῃ ἐν μέρος τῆς ἐπιφανείας τῆς σφαῖρας, τὸ δποῖον περιέχεται μεταξὺ τῶν περιφερειῶν τῶν κύκλων ΑΒ, ΓΔ.

Τὸ μέρος τοῦτο λέγεται σφαιρικὴ ζώνη.

Καὶ τὸ τόξον ΠΓ γράφει σφαιρικὴν ζώνην, ή δποία περιέχει τὸν πόλον Π τοῦ κύκλου ΓΔ. "Αν δὲ θεωρήσωμεν τὸν πόλον Π ὡς κύκλον περιορισθέντα εἰς τὸ κέντρον, λέγομεν γενικῶς δτι :

Σφαιρικὴ ζώνη εἶναι μέρος τῆς ἐπιφανείας σφαῖρας, τὸ δποῖον περιέχεται μεταξὺ δύο παραλλήλων κύκλων αὐτῆς.

Αἱ περιφέρειαι τῶν κύκλων, μεταξὺ τῶν δποίων περιέχεται μία σφαιρικὴ ζώνη, λέγονται βάσεις αὐτῆς. "Η δὲ ἀπόστασις τῶν ἐπιπέδων τῶν βάσεων μιᾶς σφαιρικῆς ζώνης λέγεται ὄψος



Σχ. 308

αύτῆς. Π. χ. αἱ περιφέρειαι τῶν κύκλων ΑΒ, ΓΔ εἰναι αἱ βάσεις καὶ ΖΕ τὸ ὕψος τῆς σφαιρικῆς ζώνης ΑΒΔΓ.

Ἡ δὲ σφαιρικὴ ζώνη ΠΓΔ ἔχει κυρίως μίαν βάσιν τὴν περιφέρειαν τοῦ κύκλου ΓΔ καὶ ὕψος ΠΖ.

β') Εἰς τὸ τόξον ΑΒ ἡμιπεριφερείας ΠΖΠ', ἐστω ἔγγεγραμμένη κανονικὴ τεθλασμένη γραμμὴ ΑΕΖΗΒ (σχ. 309).

Κατὰ τὴν στροφὴν τοῦ ἡμικυκλίου περὶ τὴν διάμετρον ΠΠ' αὐτοῦ, ἡ τεθλ. γραμμὴ αὕτη γράφει μίαν ἐπιφάνειαν. Αὕτη περιβάλλεται ἀπὸ τὴν σφαιρικὴν ζώνην,

τὴν δποίαν γράφει τὸ τόξον ΑΖΒ καὶ ἀπὸ τὰς βάσεις αύτῆς.

"Αν δὲ νοήσωμεν ὅτι ὁ ἀριθμὸς τῶν πλευρῶν τῆς τεθλασ. γραμμῆς ἀπαύστως διπλασιάζεται, ἐννοοῦμεν ὅτι αὕτη τείνει νὰ συμπέσῃ μὲ τὸ τόξον ΑΖΒ, ἢ δὲ γραφομένη ἐπιφάνεια μὲ τὴν σφαιρικὴν ζώνην, τὴν δποίαν γράφει τὸ τόξον τοῦτο. Διὰ τοῦτο :

"Ονομάζομεν ἐμβαδὸν σφαιρικῆς ζώνης τὸ δριον τοῦ ἐμβαδοῦ τῆς ἐπιφανείας, τὴν δποίαν γράφει κανονικὴ τεθλασμένη γραμμὴ ἔγγεγραμμένη εἰς τὸ τόξον τὸ γράφον τὴν ζώνην, ἀν δ ἀριθμὸς τῶν πλευρῶν αὐτῆς ἀπαύστως διπλασιάζεται.


Σχ. 309.

Μετὰ τὸν δρισμὸν τοῦτον προκύπτει τὸ ἀκόλουθον πρόβλημα :

§ 412. Πρόβλημα. Νὰ εὑρεθῇ τὸ ἐμβαδὸν σφαιρικῆς ζώνης.

Δύσις. "Ἐστω ΑΖΒ τὸ τόξον, τὸ δποίον γράφει τὴν σφαιρικὴν ζώνην, καὶ Ζ τὸ ἐμβαδὸν αὐτῆς. "Ἐστω δὲ ΑΕΖΗΒ κανονικὴ τεθλ. γραμμὴ ἔγγεγραμμένη εἰς τὸ τόξον καὶ Γ,Θ,Ι,Κ,Δ αἱ προβολαὶ τῶν κορυφῶν αὐτῆς ἐπὶ τὴν διάμετρον ΠΠ' τῆς ἡμιπεριφερείας, εἰς τὴν δποίαν ἀνήκει τὸ τόξον ΑΖΒ.

Κατὰ τὴν στροφὴν τοῦ ἡμικυκλίου περὶ τὴν ΠΠ' ἐκάστη πλευρά τῆς τεθλ. γραμμῆς γράφει κυρτὴν ἐπιφάνειαν κολούρου κώνου.



Δια νὰ ύπολογίσωμεν δὲ τὸ ἐμβαδὸν ἑκάστης τοιαύτης ἐπιφανείας, παρατηροῦμεν δτὶ αἱ κάθετοι εἰς τὰ μέσα τῶν πλευρῶν ΑΕ, ΖΕ κ.τ.λ. διέρχονται ἀπὸ τὸ κέντρον Σ καὶ δτὶ τοῦτο ἀπέχει 7σον ἀπὸ τὰς πλευράς ταύτας.

"Αν δὲ ἐφαρμόσωμεν τὸν γνωστὸν τύπον (§ 391 β'), εὑρίσκομεν δτὶ:

$$(\text{ἐπιφ. } \text{ΑΕ}) = 2\pi (\Sigma \Lambda) \cdot (\Gamma \Theta), \quad (\text{ἐπιφ. } \text{ΖΕ}) = 2\pi (\Sigma \Lambda) \cdot (\Theta \text{I}), \\ (\text{ἐπιφ. } \text{ΖΗ}) = 2\pi (\Sigma \Lambda) \cdot (\text{ΙΚ}), \quad (\text{ἐπιφ. } \text{ΗΒ}) = 2\pi (\Sigma \Lambda) \cdot (\text{ΚΔ}).$$

"Ἐκ τούτων διὰ προσθέσεως κατὰ μέλη εὑρίσκομεν δτὶ:

$$(\text{ἐπιφ. } \text{ΑΕΖΗΒ}) = 2\pi (\Sigma \Lambda) \cdot (\Gamma \Delta).$$

Αὕτη ἀληθεύει δσασδήποτε πλευράς καὶ ἄν ἔχῃ ἡ τεθλασμένη γραμμή. Θά εἶναι ἐπομένως:

$$\delta\rho (\text{ἐπιφ. } \text{ΑΕΖΗΒ}) = 2\pi (\Gamma \Delta) \quad \delta\rho (\Sigma \Lambda).$$

"Ἐπειδὴ δὲ δρ (ἐπιφ. ΑΕΖΗΒ) = Z καὶ δρ (ΣΛ) = R, ἐπεται δτὶ: Z = 2π R. (ΓΔ) (1) "Ητοι:

Τὸ ἐμβαδὸν σφαιρικῆς ζώνης εἶναι γινόμενον τοῦ ὕψους αὐτῆς ἐπὶ τὴν περιφέρειαν μεγίστου κύκλου τῆς σφαίρας, εἰς τὴν δποίαν ενδίσκεται ἡ ζώνη αὐτῇ.

Πόρισμα I. Άλισοϋψεῖς ζῶναι τῆς αὐτῆς σφαίρας ἡ 7σων σφαιρῶν εἶναι 7σοδύναμοι.

Πόρισμα II. Δύο σφαιρικαὶ ζῶναι τῆς αὐτῆς σφαίρας ἡ 7σων σφαιρῶν εἶναι ὥς τὰ 7ψη αὐτῶν.

Α σκήσεις

883. Νὰ σχηματίσητε ἡμικύκλιον μὲ διάμετρον (ΠΠ') = 8 ἑκατ. καὶ νὰ δρίστε ἐπ' αὐτῆς τμῆμα (ΑΒ) = 5 ἑκατ. Ἀπὸ δὲ τὰ σημεῖα Α,Β νὰ φέρητε καθέτους ΑΓ, ΒΔ ἐπὶ τὴν ΠΠ' μέχρι τῆς ἡμιπεριφερείας. Νὰ εὕρητε δὲ τὸ ἐμβαδὸν τῆς σφαιρικῆς ζώνης, τὴν δποίαν γράφει τὸ τόξον ΓΔ, ἄν τὸ ἡμικύκλιον στραφῇ περὶ τὴν ΠΠ'.

884. "Ἐν ἐπίπεδον ἀπέχει $\frac{R}{2}$ ἀπὸ τὸ κέντρον σφαίρας ἀκτίνος R. Νὰ εὕρητε τὸ ἐμβαδὸν ἑκάστης τῶν σφαιρικῶν ζωνῶν, εἰς τὰς δποίας διαιρεῖται ὑπ' αὐτοῦ ἡ ἐπιφάνεια τῆς σφαίρας. "Ἐφαρμογὴ διὰ R = 12 ἑκατ.

885. Μία σφαιρικὴ ζώνη εἶναι 7σοδύναμος πρὸς μεγίστον κύκλον τῆς αὐτῆς σφαίρας. Νὰ εὕρητε τὸ 7ψος αὐτῆς συναρτήσει τῆς ἀκτίνος τῆς σφαίρας.

886. Νά συγκρίνητε μίαν σφαιρικήν ζώνην μὲν μίαν βάσιν πρὸς κύκλον, δστις ἔχει ἀκτῖνα τὴν πολικὴν ἀπόστασιν τῆς βάσεως τῆς ζώνης ἀπὸ τὸν εἰς αὐτὴν περιεχόμενον πόλον τῆς βάσεως ταύτης.

887. Νά γράψητε εἰς τὴν ἐπιφάνειαν διοθείσης σφαίρας δύο περιφερείας παραλλήλων κύκλων, διὰ τῶν δποίων ἡ ἐπιφάνεια τῆς σφαίρας νά διαιρῆται εἰς τρεῖς ίσοδυνάμους ζώνας.

888. Δύο ίσοδύναμοι σφαιρικαὶ ζῶναι εύρισκονται εἰς ἀνίσους σφαίρας. Νά συγκρίνητε τὸν λόγον τῶν ὑψῶν αὐτῶν πρὸς τὸν λόγον τῶν ἀκτίνων τῶν σφαιρῶν τούτων.

§ 413. Τί λέγεται ἐμβαδὸν τῆς ἐπιφανείας σφαίρας καὶ πῶς ενδρίσκεται τοῦτο. "Εστω ΑΖΒ τυχὸν τόξον, τὸ δποίον στρεφόμενον περὶ τὴν διάμετρον ΠΠ' γράφει σφαιρικὴν ζώνην μὲν ὑψος ΓΔ (σχ. 309). "Αν νοήσωμεν δτι τὸ τόξον τοῦτο βαλνει συνεχῶς αὐξανόμενον ἐκατέρωθεν, εἰναι φανερὸν δτι ἡ γραφομένη ζώνη καὶ τὸ ὑψος βαίνουσι συνεχῶς αὐξανόμενα. "Αν δὲ τὸ τόξον γίνη ἡμιπεριφέρεια, γράφεται ὑπ' αὐτῆς δλη ἡ ἐπιφάνεια τῆς σφαίρας καὶ τὸ ὑψος γίνεται ΠΠ'.

Δυνάμεθα λοιπὸν νά θεωρήσωμεν τὴν ἐπιφάνειαν τῆς σφαίρας ως σφαιρικὴν ζώνην μὲν ὑψος τὴν διάμετρον τῆς σφαίρας. "Επομένως τὸ ἐμβαδὸν αὐτῆς δρίζεται, δπως δρίζεται τὸ ἐμβαδὸν σφαιρικῆς ζώνης (§ 411 β').

Διὰ νά εύρωμεν ἐπομένως τὸ ἐμβαδὸν Ε τῆς ἐπιφανείας σφαίρας, ἀρκεῖ νά ἐφαρμόσωμεν τὸν τύπον (§ 412). Οὕτως εύρισκομεν δτι

$$E = 4\pi R^2.$$

"Ητοι:

Τὸ ἐμβαδὸν τῆς ἐπιφανείας σφαίρας εἶναι ἵσον πρὸς τὸ ἐμβαδὸν τεσσάρων μεγίστων κύκλων αὐτῆς.

Πόρισμα. *Αἱ ἐπιφάνειαι δύο σφαιρῶν εἶναι ὡς τὰ τετράγωνα τῶν ἀκτίνων αὐτῶν.*

Α σ κ ή σ ε ις

889. Μία σφαίρα ἔχει ἀκτῖνα 10 ἑκατ. Νά εύρητε τὸ ἐμβαδὸν τῆς ἐπιφανείας αὐτῆς.

890. "Η ἐπιφάνεια μιᾶς σφαίρας ἔχει ἐμβαδὸν 64π. τετρ. ἑκατ. Νά εύρητε τὸ μῆκος τῆς ἀκτῖνος αὐτῆς.

891. Μία σφαίρα Σ ἔχει εἰκοσιπενταπλασίαν ἐπιφάνειαν ἀπὸ τὴν ἐπιφάνειαν μιᾶς ἄλλης σφαίρας Σ'. Νά εύρητε τὸν λόγον τῆς ἀκτῖνος τῆς Σ πρὸς τὴν ἀκτῖνα τῆς Σ'.


892. Τὸ ἐμβαδὸν τῆς ἐπιφανείας σφαίρας εἶναι τὰ $\frac{8}{9}$ τοῦ ἐμβαδοῦ τῆς ἐπιφανείας κυλίνδρου, δστις ἔχει $υ=6$ ἑκατ. καὶ $\alpha=3$ ἑκατ. Νὰ εὕρητε τὴν ἀκτῖνα τῆς σφαίρας ταύτης.

893. Εἰς κύλινδρος καὶ σφαίρα ἔχουν ἰσοδυνάμους ἐπιφανείας καὶ τὴν αὐτὴν ἀκτῖνα. Νὰ εὔρεθῇ ὁ λόγος τῆς ἀκτῖνος τῆς σφαίρας πρὸς τὸ ὕψος τοῦ κυλίνδρου.

II. ΜΕΤΡΗΣΙΣ ΣΦΑΙΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΑΥΤΗΣ ΕΚ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

§ 414. Θεώρημα (Βοηθητικὸν). Ἐν τρίγωνον $ABΓ$ στρέφεται περὶ ἄξονα χωρὶς τοῦ ἐπιπέδου τοῦ τριγώνου, δστις διέρχεται ἀπὸ τὴν κορυφὴν B καὶ δὲν τέμνει τὸ τρίγωνον. Ὁ δῆκος τοῦ ὑπὸ αὐτοῦ γραφομένου στερεοῦ εἶναι γινομένον τῆς ἐπιφανείας, τὴν δποίαν γράφει ἡ πλευρὰ AG ἐπὶ τὸ τρίτον τοῦ ἐπὸν αὐτὴν ὑψους $BAΔ$.

*Ἀπόδειξις α'). Ἐστω διτὶ τὸ τρίγωνον στρέφεται περὶ τὴν πλευρὰν $BΓ$ (σχ. 310 α'). Ἀν φέρωμεν τὸ ὕψος AE , βλέπο-



μεν διτὶ τὸ γραφόμενον στερεόδν ἀποτελεῖται ἀπὸ τοὺς κώνους, τοὺς δποίους γράφουσι τὰ δρθ. τρίγωνα ABE καὶ AEG . Θὰ εἶναι λοιπὸν $\Theta = \frac{1}{3} \pi (AE)^2 \cdot (BE) + \frac{1}{3} \pi (AE)^2 \cdot (EG) = \frac{1}{3} \pi (AE)^2 \cdot (BG)$. (1)


*Ἐπειδὴ δὲ $(AE)(BG) = (AG)(BD)$, ἡ (1) γίνεται

$$\Theta = \frac{1}{3} \pi (AE)(AG)(BD). \quad (2)$$

*Αλλὰ $\pi (AE)(AG)$ εἶναι τὸ ἐμβαδὸν τῆς κυρτῆς ἐπιφα-

νείας τοῦ κώνου, τὸν δποῖον γράφει τὸ τρίγωνον ΑΕΓ. Ἐπειδὴ δὲ αὕτη γράφεται ύπο τῆς ΑΓ, θέτομεν

$$\pi(AB)(AG) = (\text{ἐπιφ. } AG), \text{ δτε } \text{ἡ } (2) \text{ γίνεται}$$



$$\Theta = (\text{ἐπιφ. } AG) \cdot \frac{B\Delta}{3} \text{ δ.ε.δ.}$$

"Αν τὸ ὅψος ΑΕ εύρισκηται ἐκτὸς τοῦ τριγώνου (σχ. 310 β'), εἶναι $\Theta = \frac{1}{3} \pi (AE)^2 (EG) - \frac{1}{3} \pi (AE)^2 (EB) = \frac{1}{3} \pi (AE)^2 (BG)$. Συνεχίζοντες δέ, ως προηγουμένως, καταλήγομεν πάλιν εἰς

τὸ ἀποδεικτέον.

β') "Εστω δτι ὁ ἄξων χψ καὶ ἡ προέκτασις τῆς πλευρᾶς ΑΓ τέμνονται εἰς τὸ σημεῖον Ε (σχ. 311). Εἰς τὴν περίπτωσιν ταύτην εἶναι φανερὸν δτι $\Theta = (\text{στερ. } ABE) - (\text{στερ. } BGE)$ (3)

Κατὰ δὲ τὴν προηγουμένην περίπτωσιν εἶναι (στερ. $ABE) = (\text{ἐπιφ. } AE) \cdot \frac{B\Delta}{3}$ καὶ (στερ. $BGE) = (\text{ἐπιφ. } GE) \cdot \frac{(B\Delta)}{3}$.

Ἡ (3) λοιπὸν γίνεται:

$$\Theta = [(\text{ἐπιφ. } AE) - (\text{ἐπιφ. } GE)] \cdot \frac{(B\Delta)}{3} = (\text{ἐπιφ. } AG) \cdot \frac{(B\Delta)}{3}, \text{ δ.ε.δ.}$$


γ') "Εστω δτι ὁ ἄξων χψ εἶναι παράλληλος πρὸς τὴν πλευρὰν ΑΓ (σχ. 312). "Αν φέρωμεν τὰς εύθειας ΑΖ καὶ ΓΕ καθέτους ἐπὶ τὴν χψ, βλέπομεν δτι $\Theta = (\text{στερ. } ABZ) + (\text{στερ. } AZEG) - (\text{στερ. } BGE)$ (4)

Ἐπειδὴ δὲ εἶναι:

$$(\text{στερ. } ABZ) = \frac{1}{3} \pi (AZ)^2 \cdot (BZ),$$

$$(\text{στερ. } AZEG) = \pi (AZ)^2 \cdot (ZE),$$

$$(\text{στερ. } BGE) = \frac{1}{3} \pi (AZ)^2 \cdot (BE),$$



$$\text{ἡ (4) γίνεται: } \Theta = \frac{1}{3} \pi (AZ)^2 [(BZ) + 3(ZE) - (BE)] =$$

$$\frac{1}{3} \pi (AZ)^2 \cdot 2(ZE) = \frac{1}{3} (B\Delta) \cdot 2\pi (AZ)(ZE).$$

Αλλά $2\pi(AZ)(ZE)$ είναι τὸ ἐμβαδὸν τῆς κυρτῆς ἐπιφανείας τοῦ κυλίνδρου, τὸν δόποιον γράφει τὸ δρθογώνιον AZΕΓ. Γράφει δὲ ταύτην ἡ πλευρὰ ΑΓ.

"Ωστε $2\pi(AZ)(ZE) = (\text{ἐπιφ. } \text{ΑΓ})$. ἄρα ἡ προηγουμένη λεύκης γίνεται $\Theta = (\text{ἐπιφ. } \text{ΑΓ}) \cdot \frac{(BΔ)}{3}$, δ.ξ.δ.

§ 415. Τί λέγεται σφαιρικὸς τομεὺς καὶ πᾶς ὁρίζεται ὁ δύκος αὐτοῦ. α') "Εστω ΠΔΠ'Π' ἡμικύκλιον μὲ διάμετρον ΠΠ' καὶ ΑΣΒ τυχὸν κυκλικὸς τομεὺς αὐτοῦ (σχ. 313).

"Ἄν τὸ ἡμικύκλιον στραφῇ περὶ τὴν διάμετρον ΠΠ', ἔως ὅτου γράψῃ σφαῖραν, δὲ κυκλικὸς τομεὺς γράφει ἐν μέρος τῆς σφαῖρας ταύτης.

Τοῦτο λέγεται ἰδιαιτέρως σφαιρικὸς τομεὺς. "Ωστε:


Σφαιρικὸς τομεὺς είναι στερεόν, τὸ δποῖον παράγεται ἀπὸ κυκλικὸν τομέα, ἀν οὗτος στραφῇ κατὰ πλήρη στροφὴν περὶ διάμετρον, ήτις δὲν τέμνει αὐτόν.

"Η σφαιρικὴ ζώνη, τὴν δποῖαν γράφει τὸ τόξον τοῦ στρεφομένου κυκλικοῦ τομέως, λέγεται βάσις τοῦ σχηματιζομένου σφαιρικοῦ τομέως.

β') "Εστω ΑΕΔΓΒ κανονικὴ τεθλ. γραμμὴ ἔγγεγραμμένη εἰς τὸ τόξον τοῦ κυκλικοῦ τομέως ΑΣΒ. Αὕτη μὲ τὰς ἀκτῖνας ΣΑ, ΣΒ δρίζει πολυγωνικὸν τομέα ΣΑΕΔΓΒ. Οὗτος ἔχει δριον τὸν κυκλικὸν τομέα ΣΑΔΒ, ἀν διάριθμὸς τῶν πλευρῶν τῆς τεθλ. γραμμῆς ἀπαύστως διπλασιάζεται. Κατὰ δὲ τὴν στροφὴν τοῦ ἡμικυκλίου δ πολυγωνικὸς οὗτος τομεὺς γράφει ἐν στερεόν, τὸ δποῖον ἔχει δριον τὸν σφαιρικὸν τομέα. 'Ἐπομένως:

"Ογκὸς τοῦ σφαιρικοῦ τομέως ΣΑΔΒ είναι τὸ δριον τοῦ στερεοῦ, τὸ δποῖον γράφεται ἀπὸ τὸν πολυγωνικὸν τομέα ΣΑΕΔΓΒ.

Προκύπτει λοιπὸν φυσικῶς πρὸς λύσιν τὸ ἀκόλουθον πρόβλημα.



Σχ. 313

§ 416. Πρόβλημα I. Νὰ εὑρεθῇ δύκος σφαιρικοῦ τομέως.

Λύσις. "Εστω ΑΒ τὸ τόξον τοῦ κυκλικοῦ τομέως, ἀπὸ τὸν ὁποῖον σχηματίζεται ὁ σφαιρικὸς τομεὺς (σχ. 313). Ἐγγράφομεν εἰς τὸ τόξον τοῦτο κανονικὴν τεθλ. γραμμὴν ΑΕΔΓΒ καὶ φέρομεν τὰς ἀκτῖνας εἰς τὰς κορυφὰς αὐτῆς.

Εύκολως δὲ βλέπομεν δτι: (στερ. ΣΑΕΔΓΒΣ) = (στερ. ΣΑΕ) + (στερ. ΣΕΔ) + (στερ. ΣΔΓ) + (στερ. ΣΓΒ).

$$\begin{aligned} \text{'Επειδὴ (§ 414) εἶναι (στερ. ΣΑΕ)} &= \frac{1}{3} (\text{ἐπιφ. ΑΕ}) \cdot (\Sigma\Lambda), \\ (\sigma \text{τερ. ΣΕΔ}) &= \frac{1}{3} (\text{ἐπιφ. ΕΔ}) (\Sigma\Lambda), (\sigma \text{τερ. ΣΔΓ}) = \\ \frac{1}{3} (\text{ἐπιφ. ΔΓ}) (\Sigma\Lambda), (\sigma \text{τερ. ΣΓΒ}) &= \frac{1}{3} (\text{ἐπιφ. ΓΒ}) \cdot (\Sigma\Lambda), \text{ξπεται} \\ \text{δτι } (\sigma \text{τερ. ΣΑΕΔΓΒΣ}) &= \frac{1}{3} (\text{ἐπιφ. ΑΕΔΓΒ}) \cdot (\Sigma\Lambda). \end{aligned}$$

Αὕτη ἀληθεύει δσασδήποτε πλευράς καὶ ἀν ἔχῃ ἡ τεθλ. γραμμὴ καὶ ἐπομένως:

$$\delta\rho. (\sigma \text{τερ. ΣΑΕΔΓΒΣ}) = \frac{1}{3} \delta\rho. (\text{ἐπιφ. ΑΕΔΓΒ}) \cdot \delta\rho. (\Sigma\Lambda).$$

$$\text{'Επειδὴ δὲ } \delta\rho. (\sigma \text{τερ. ΣΑΕΔΓΒΣ}) = \sigma, \quad \delta\rho. (\text{ἐπιφ. ΑΕΔΓΒ}) = (\sigma \text{φ. ζών. ΑΒ}), \quad \delta\rho. (\Sigma\Lambda) = R, \quad \text{ξπεται δτι:}$$

$$\sigma = \frac{3}{1} (\sigma \text{φ. ζών. ΑΒ}) \cdot R \quad (1)$$

Βλέπομεν λοιπὸν δτι:

"Ο δγκος σφαιρικοῦ τομέως εἶναι τὸ τρέτον τοῦ γινομένου τῆς βάσεως ἐπὶ τῇ την ἀκτῖνα αὐτοῦ.

"Επειδὴ δὲ ($\sigma \text{φ. ζών. ΑΒ}$) = $2\pi R \cdot (\text{ΗΘ})$, ἡ προηγουμένη λσότης (1) γίνεται:

$$\sigma = \frac{2}{3} \pi R^2 (\text{ΗΘ}) = \frac{2}{3} \pi R^2 v \quad (2)$$

ἄν υ εἶναι τὸ ὄψος τῆς βάσεως τοῦ σφαιρικοῦ τομέως.

'Α σκήσεις

894. Εἰς κυκλικὸς τομεὺς 90° καὶ ἀκτῖνος 6 ἑκατ. στρέφεται κατά διάμετρον ΠΠ' παράλληλον πρὸς τὴν χορδὴν ΓΔ τῆς βάσεως αὐτοῦ. Νὰ εὕρητε τὸν δγκον τοῦ σχηματίζομένου σφαιρικοῦ τομέως.

895. Η βάσις κυκλικοῦ τομέως 60° ἔχει χορδὴν 12 ἑκατ., ἡ δὲ προβολὴ τῆς χορδῆς ταύτης ἐπὶ τινὰ διάμετρον μὴ τέμνουσαν αὐτὸν ἔχει μῆκος 6 ἑκατ. Νὰ εὕρητε τὸν δγκον τοῦ σφαιρικοῦ τομέως, δ ὁποῖος

σχηματίζεται, ጳν δὲ κυκλικὸς οὗτος τομεὺς στραφῆ περὶ τὴν διάμετρον ταύτην.

896. Μὰ γράψητε περιφέρειαν Ο μὲ ἀκτῖνα 10 ἑκατ. καὶ νὰ γράψητε δύο καθέτους διαμέτρους ΑΒ, ΓΔ. Διὰ τοῦ μέσου τῆς ἀκτῖνος ΟΑ νὰ γράψητε χορδὴν EZ κάθετον ἐπὶ τὴν ΟΑ. Μὰ εὕρητε ἐπειτα τὸν δγκον τοῦ σφαιρικοῦ τομέως, τὸν δποῖον σχηματίζει δ κυκλικὸς τομεὺς ΟEZ στρεφόμενος περὶ τὴν διάμετρον ΓΔ.

§ 417. Πρόβλημα II. Μὰ εὔρηται δ δγκος σφαιρας ἐκ τῆς ἀκτῖνος αὐτῆς.

Λύσις. "Αν σκεφθῶμεν δπως εἰς τὴν § 413 ἐννοοῦμεν εύκόλως δτι ἡ σφαῖρα δύναται νὰ θεωρηθῇ ὡς σφαιρικὸς τομεὺς μὲ βάσιν δλην τὴν ἐπιφάνειαν αὐτῆς καὶ ἐπομένως δγκος Σ αὐτῆς εἶναι δ δγκος τοιούτου τομέως. Ἐπειδὴ δὲ διὰ τοιούτου τομέα εἶναι $u = 2R$, ἔπειται δτι

$$\Sigma = \frac{2}{3} \pi R^3 \cdot 2R \quad \text{ἢ} \quad \Sigma = \frac{4}{3} \pi R^3 \quad (1)$$

Ἐπειδὴ δὲ $\Delta = 2R$, δ πρηγούμενος τύπος γίνεται

$$\Sigma = \frac{1}{6} \pi \Delta^3 \quad (2)$$

Πόρισμα. Δύο σφαιραὶ εἶναι πρὸς δλλήλας, ὡς οἱ κύροι τῶν ἀκτίνων αὐτῶν.

'Α σκήσεις

897. Μὰ εὕρητε τὸν δγκον σφαιρας ἀκτῖνος 4 ἑκατ.

898. Μὰ εὕρητε μὲ ποῖον ἀριθμὸν πρέπει νὰ πολλαπλασιασθῇ ἡ ἀκτὶς σφαιρας, διὰ νὰ δκταπλασιασθῇ δ δγκος αὐτῆς.

899. Μία σφαῖρα εἶναι ισοδύναμος πρὸς κύβον ἀκμῆς $\left(\frac{5}{3} \cdot \sqrt[3]{36\pi}\right)$


ἔκατ. Μὰ εὕρητε τὴν ἀκτῖνα τῆς σφαιρας ταύτης.

900. Αἱ ἔδραι κύβου ἔφαπτονται σφαιρας, κτις λέγεται ἔγγεγραμ- μένη εἰς τὸν κύβον. "Αν ἡ ἀκμὴ τοῦ κύβου εἶναι 6 ἑκατ., νὰ εὕρητε τὸν δγκον τῆς σφαιρας ταύτης.

901. Μία σφαῖρα ἔχει δγκον 36π. κυβ. παλάμας. Μὰ εὕρητε τὸ ἐμβαδὸν τῆς ἐπιφανείας αὐτῆς.

902. "Αν ἡ προηγουμένη σφαῖρα εἶναι ἐκ ξύλου καὶ ἔχῃ βάρος 28,8π χιλιόγραμμα, νὰ εὕρητε τὸ εἰδικὸν βάρος τοῦ ξύλου τούτου.

903. Μία σφαῖρα ἔκ σιδήρου εἰδ. βάρους 7,72 ἀφιεμένη ἐλευθέρα ἐντὸς Ὀδατος κατέρχεται μὲ δύναμιν 8,96π. γραμμαρίων. Νὰ εὕρητε τὴν ἀκτῖνα τῆς σφαῖρας ταύτης.



Σχ. 314

904. Εἰς ἐν δρθογώνιον ΑΒΓΔ εἰναι ἔγγεγραμμένον ἡμικύκλιον ΒΕΓ (σχ. 314). "Αν τὸ σχῆμα τοῦτο στραφῇ περὶ τὴν διάμετρον ΒΓ τοῦ ἡμικυκλίου, τοῦτο μὲν γράφει σφαῖραν, τὸ δὲ δρθογώνιον γράφει περιγεγραμμένον περὶ αὐτὴν κύλινδρον. Νὰ εὕρητε τὸν λόγον τοῦ δγκον τῆς σφαῖρας πρὸς τὸν δγκον τοῦ κυλίνδρου.

§ 418. Τί εἰναι σφαιρικὸς δακτύλιος καὶ πῶς εύρίσκεται ὁ δγ-

κος αὐτοῦ. Εἰς δοθὲν ἡμικύκλιον ΠΑΠ' μὲ διάμετρον ΠΠ' ἔστω κυκλικὸν τμῆμα AZBΓΑ, τὸ δποῖον δὲν τέμνεται ύπο τῆς διαμέτρου ΠΠ' (σχ. 315).


Κατὰ τὴν στροφὴν τοῦ ἡμικυκλίου περὶ τὴν ΠΠ', τὸ κυκλικὸν τμῆμα γράφει ἐν στερεόν. Τοῦτο ἔχει ἔξωτερικὴν ἐπιφάνειαν τὴν σφαιρικὴν ζώνην, τὴν δποίαν γράφει τὸ τόξον AZB, καὶ ἔσωτερικὴν τὴν κυρτὴν ἐπιφάνειαν τοῦ κολούρου κώνου, τὸν δποῖον γράφει τὸ τραπέζιον ΑΒΔΕ.

Τὸ στερεόν τοῦτο λέγεται σφαιρικὸς δακτύλιος. Ὡστε:

Σφαιρικὸς δακτύλιος εἶναι στερεόν, τὸ δποῖον παράγει κυκλικὸν τμῆμα στρεφόμενον περὶ διάμετρον μὴ τέμνουσαν αὐτό, ἔως ὅτου ἐπανέλθῃ εἰς τὴν πρώτην θέσιν του.

Διὰ νὰ εὕρωμεν δὲ τὸν δγκον Δ τοῦ ἀνωτέρω σφαιρικοῦ δακτυλίου, ἀρκεῖ ἀπὸ τὸν δγκον σ τοῦ σφαιρικοῦ τομέως, τὸν δποῖον γράφει δ κυκλικὸς τομεὺς ΣΑΖΒ, νὰ ἀφαιρέσωμεν τὸν δγκον σ' τοῦ στερεοῦ, τὸ δποῖον γράφεται ἀπὸ τὸ τρίγωνον ΣΑΒ.

$$\text{Ἐπειδὴ δὲ (§ 416) } \sigma = \frac{2}{3} \pi (\Sigma B)^2 \cdot (E\Delta),$$



Σχ. 315.

$$\sigma' = \frac{1}{3} (\text{έπιφ. } AB) \cdot (\Sigma \Gamma) \quad (\S\ 414)$$

καὶ $(\text{έπιφ. } AB) = 2\pi(\Sigma \Gamma) \cdot (\text{ΕΔ}). \quad (\S\ 391\ \beta')$

Ἐπειταὶ δτι : $\Delta = \frac{2}{3} \pi(\text{ΕΔ}) [(\Sigma B)^2 - (\Sigma \Gamma)^2] = \frac{2}{3} \pi (\text{ΕΔ}) \cdot (\Gamma B)^2.$

Ἐπειδὴ δὲ $(\Gamma B)^2 = \left(\frac{AB}{2}\right)^2 = \frac{(AB)^2}{4}$, ἡ προηγουμένη ἴσστης γίνεται $\Delta = \frac{1}{6} \pi (AB)^2 \cdot (\text{ΕΔ}) \quad (1)$ "Ωστε :

Ο δύκος σφαιρικοῦ δακτυλίου εἶναι τὸ ήμισυ τοῦ δύκον τοῦ κώνου, δστις ἔχει ἀκτῖνα βάσεως τὴν χορδὴν τοῦ κυκλικοῦ τμήματος, ἀπὸ τὸ δποῖον σχηματίζεται δ δακτύλιος καὶ ὑψος τὴν προβολὴν τῆς χορδῆς ταύτης ἐπὶ τὸν ἀξονα τῆς στροφῆς.

Α σκήσεις


905. Εἰς περιφέρειαν Ο ἀκτῖνος 1 παλάμης νὰ δρίσητε τεταρτημόριον AB καὶ νὰ φέρητε τὴν χορδὴν αὐτοῦ. Νὰ εύρητε ἔπειτα τὸν δύκον τοῦ σφαιρικοῦ δακτυλίου, δ δποῖον παράγεται, ἀν τὸ σχηματιτιθὲν κυκλικὸν τμῆμα στραφῇ περὶ τὴν OB.

906. Ή προβολὴ τῆς χορδῆς κυκλικοῦ τμήματος ἐπὶ διάμετρον μὴ τέμνουσαν αὐτὸ ἔχει μῆκος 3 ἑκατ. "Αν τὸ κυκλικὸν τμῆμα στραφῇ περὶ τὴν διάμετρον ταύτην, δ παραγόμενος δακτύλιος ἔχει δύκον 108π. κυβ. ἑκατ. Νὰ εύρητε τὸ μῆκος τῆς χορδῆς τοῦ κυκλικοῦ τμήματος.

907. Εἰς σφαιρικὸς δακτύλιος ἔχει δύκον 8π κυβ. παλ. καὶ ἡ χορδὴ τοῦ κυκλικοῦ τμήματος, ἀπὸ τὸ δποῖον παράγεται, ἔχει μῆκος 40 ἑκατ. Νὰ εύρητε τὸ μῆκος τῆς προβολῆς τῆς χορδῆς ταύτης ἐπὶ τὸν ἀξονα στροφῆς.

908. Εἰς κύκλον Ο ἀκτῖνος 10 ἑκατ. εἶναι ἔγγεγραμμένον ἴσόπλευρον τρίγωνον AΒΓ. Τὸ κυκλικὸν τμῆμα, τὸ δποῖον ἔχει χορδὴν τὴν πλευρὰν ΑΓ, στρέφεται περὶ τὴν OA. Νὰ υπολογίσητε τὸν δύκον τοῦ σχηματιζομένου σφαιρικοῦ δακτυλίου.

§ 419. Τί εἶναι σφαιρικὸν τμῆμα καὶ πῶς εύρίσκεται ὁ δύκος αὐτοῦ. α') "Εστω ἡμικύκλιον ΠΑΠ' μὲ διάμετρον ΠΠ' (σχ. 316). 'Απὸ δύο σημεῖα Δ, Γ αὐτῆς φέρομεν καθέτους ΔΑ, ΓΒ ἐπὶ τὴν διάμετρον ταύτην μέχρι τῆς ἡμιπεριφερείας. Οὕτω σχηματίζεται τὸ μεικτόγραμμον σχῆμα ΑΔΓΒΕ.



Σχ. 316

Κατά τὴν περιστροφὴν τοῦ ἡμικυκλίου περὶ τὴν ΠΠ' τοῦτο, ὡς γνωρίζομεν, γράφει σφαιραν Σ , τὸ δὲ ΑΔΓΒΕ γράφει ἐν μέρος τῆς σφαιρᾶς ταύτης. Τοῦτο περιέχεται μεταξὺ τῶν παραλλήλων κύκλων, τοὺς δποίους γράφουσι τὰ εὐθ. τμήματα ΔΑ, ΓΒ. Λέγεται δὲ σφαιρικὸν τμῆμα. "Ωστε:

Σφαιρικὸν τμῆμα εἶναι μέρος σφαιρᾶς, τὸ δποῖον περιέχεται μεταξὺ δύο παραλλήλων κύκλων αὐτῆς.

Οἱ κύκλοι, μεταξὺ τῶν δποίων περιέχεται ἐν σφαιρικὸν τμῆμα, λέγονται βάσεις αὐτοῦ. Ἡ δὲ ἀπόστασις τῶν βάσεων ἐνδὸς σφαιρικοῦ τμήματος λέγεται ψφος αὐτοῦ. Π.χ. τὸ προηγουμένως περιγραφὲν σφαιρικὸν τμῆμα ἔχει βάσεις τοὺς κύκλους, οἵτινες γράφονται ἀπὸ τὰ εὐθ. τμήματα ΔΑ, ΓΒ καὶ ψφος ΓΔ.

"Αν θεωρήσωμεν τὸ σημεῖον Π ὡς κύκλον περιορισθέντα εἰς τὸ κέντρον του, ἐννοοῦμεν δτι καὶ τὸ μεικτόγραμμον σχῆμα ΠΒΓ γράφει σφαιρικὸν τμῆμα. Τοῦτο ἔχει μίαν βάσιν, τὸν ὑπὸ τοῦ ΓΒ γραφόμενον κύκλον, καὶ ψφος ΠΓ.

β') "Αν φέρωμεν τὴν χορδὴν ΑΒ, ἐννοοῦμεν ἀμέσως δτι: 'Ο δγκος Τ τοῦ σφαιρικοῦ τμήματος, δπερ γράφεται ὑπὸ τοῦ ΑΔΓΒΕ, εἶναι ἄθροισμα τοῦ δγκου Δ τοῦ δακτυλίου, τὸν δποῖον γράφει τὸ κυκλικὸν τμῆμα ΑΕΒΑ, καὶ τοῦ δγκου Κ τοῦ κολούρου κώνου, τὸν δποῖον γράφει τὸ τραπέζιον ΑΔΓΒ. "Ητοι:

$$T = \Delta + K \quad (1)$$

"Αν δὲ χάριν συντομίας θέσωμεν ($ΑΔ$) = α , ($ΒΓ$) = β καὶ ($ΓΔ$) = $υ$, εύρισκομεν δτι:

$$\Delta = \frac{1}{6} \pi (AB)^2 \cdot u, \quad K = \frac{1}{3} \pi (\alpha^2 + \alpha\beta + \beta^2) u.$$

"Η λεύτης (1) γίνεται λοιπὸν

$$T = \frac{1}{6} \pi [(AB)^2 + 2\alpha^2 + 2\alpha\beta + 2\beta^2] u \quad (2)$$

'Επειδὴ δὲ ἔκ τοῦ δρθ. τριγώνου ΑΒΗ προκύπτει δτι: (AB)² = (AH)² + (BH)² = ($\alpha - \beta$)² + $υ^2$ = $\alpha^2 - 2\alpha\beta + \beta^2 + υ^2$, ἢ (2) γίνεται $T = \frac{1}{6} \pi [3(\alpha^2 + \beta^2) + υ^2] u$, θεν

$$T = \frac{1}{2} \pi (\alpha^2 + \beta^2) u + \frac{1}{6} \pi u^2 \quad (3)$$

Παρατηροῦμεν δὲ ὅτι :

α') $\frac{1}{2} \pi (\alpha^2 + \beta^2) u = \frac{1}{2} (\pi \alpha^2 u + \pi \beta^2 u)$, τὸ β' δὲ τοῦτο μέλος εἶναι τὸ ἡμίσυ τοῦ ἀθροίσματος δύο ἵσοψῶν πρὸς τὸ σφαιρικὸν τμῆμα κυλίνδρων. Τούτων δὲ εἰς ἔχει βάσιν τὴν μίαν βάσιν καὶ δὲ ἄλλος τὴν ἄλλην βάσιν τοῦ σφαιρικοῦ τμήματος.

β') $\frac{1}{6} \pi u^3$ εἶναι δὲ δύκος σφαῖρας, ἡ δοποῖα ἔχει διάμετρον ἵσην πρὸς τὸ ὅψος τοῦ σφαιρικοῦ τμήματος.

Ἄσκήσεις

909. Μία σφαῖρα ἔχει ἀκτῖνα 6 ἑκατ. καὶ τέμνεται ὑπὸ ἐπιπέδου, τὸ δοποῖον ἀπέχει 4 ἑκατ. ἀπὸ τὸ κέντρον. Νὰ εὕρητε τὸν δύκον ἑκάστου τῶν σφαιρικῶν τμημάτων, εἰς τὰ δοποῖα χωρίζεται ἡ σφαῖρα.

910. Μία σφαῖρα ἀκτῖνος 12 ἑκατ. τέμνεται ὑπὸ δύο παραλλήλων ἐπιπέδων, τὰ δοποῖα εὑρίσκονται ἑκατέρωθεν τοῦ κέντρου. Τοῦτο ἀπέχει 6 ἑκατ. ἀπὸ τὸ ἐν ἐπιπέδον καὶ $6\sqrt{3}$ ἑκατ. ἀπὸ τὸ ἄλλο. Νὰ εὕρητε τὸν δύκον τοῦ μεταξὺ αὐτῶν περιεχομένου σφαιρικοῦ τμήματος.

911. Νὰ λύσητε τὸ αὐτὸν πρόβλημα, ἀν τὰ δύο ἐπιπέδα εὑρίσκονται πρὸς τὸ αὐτὸν μέρος τοῦ κέντρου.

912. Ἡ ἀπόστασις πόλου Π ἐνδέσ κύκλου ἀπὸ ἐν σημεῖον τῆς περιφερείας αὐτοῦ ἔχει μῆκος $5\sqrt{2}$ ἑκατ. καὶ κλίσιν 45° πρὸς τὸν κύκλον τοῦτον. Νὰ εὕρητε τὸν δύκον τοῦ σφαιρικοῦ τμήματος, τὸ δοποῖον ἔχει μίαν μόνον βάσιν, τὸν κύκλον τοῦτον καὶ περιέχει τὸν πόλον Π.

913. Νὰ εὕρητε τὸν δύκον σφαῖρας ἀπὸ τὸν τόπον (3 § 419).

914. Ἐν σφαιρικὸν τμῆμα μὲν μίαν βάσιν ὕψος 3 ἑκατ. καὶ δύκον 28,5π κυβ. ἑκατ. Νὰ εὕρητε τὸ μῆκος τῆς ἀκτῖνος τῆς βάσεως αὐτοῦ.

Άσκήσεις πρὸς ἐπανάληψιν τοῦ Ζ' βιβλίου

915. Ἐν ἰσόπλευρον τρίγωνον ΑΒΓ ἔχει βάσιν ($BG = \alpha$ ἑκ. Στρέφεται δὲ τοῦτο περὶ ἀξονας παράλληλον πρὸς τὴν βάσιν καὶ διερχόμενον διὰ τῆς κορυφῆς Α. Νὰ εὕρητε τὸν δύκον τοῦ ὑπ' αὐτοῦ γραφομένου στερεοῦ.

916. Νὰ εὕρητε τὸν δύκον κυλίνδρου, ἀν ἡ κυρτὴ ἐπιφάνεια αὐτοῦ ἔχῃ ἐμβαδὸν $\pi \beta^2$ τετρ. ἑκατ. καὶ ἡ ἀκτὶς τῆς βάσεως εἶναι α ἑκατ.

917. Εἰς κύλινδρος καὶ εἰς κῶνος ἔχουσι βάσεις ἀκτῖνος α ἑκατ.

καὶ Ισοδυνάμους κυρτάς ἐπιφανείας. Ὁ κύλινδρος δὲ ἔχει ψφος υ ἑκατ. Νὰ εὕρητε τὸ ψφος τοῦ κώνου.

918. Νὰ ἀποδείξητε ὅτι: α') Δὲν ὑπάρχει κῶνος ἔχων κυρτὴν ἐπιφάνειαν Ισοδύναμον πρὸς τὴν βάσιν. β') Δὲν ὑπάρχει κῶνος ἔχων κυρτὴν ἐπιφάνειαν Ισοδύναμον πρὸς ἐπίπεδον τομῆν του, ή δποία διέρχεται ἀπὸ τὸν ἄξονα.

919. Δύο Ισοψφεῖς κύλινδροι ἔχουσι κοινὸν ἄξονα καὶ δμοκέντρους βάσεις μὲν ἀκτίνας A καὶ α ἑκατ. ($A > \alpha$). Τὸ δὲ κοινὸν ψφος αὐτῶν εἶναι υ ἑκατ. Νὰ εὕρητε τὸν δγκον τοῦ στερεοῦ, τὸ δποίον περιέχεται μεταξὺ τῶν κυρτῶν ἐπιφανειῶν αὐτῶν.

920. Δύο δμόκεντροι σφαίραι ἔχουσιν ἀκτίνας A καὶ α ἑκατ. ($A > \alpha$). Νὰ εὕρητε τὸ ἐμβαδὸν τομῆς τῆς ἐξωτερικῆς σφαίρας, ήτις ἐφάπτεται τῆς ἐσωτερικῆς.

921. Νὰ ἀποδείξητε ὅτι δύο κύκλοι σφαίρας, Ισον ἀπέχοντες ἀπὸ τὸ κέντρον, εἶναι ίσοι.

922. "Αν δύο κύκλοι σφαίρας εἶναι ίσοι, νὰ ἀποδείξητε ὅτι τὸ κέντρον τῆς σφαίρας ἀπέχει Ισον ἀπὸ αὐτούς.

923. Ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας δοθείσης σφαίρας ἀκτίνος R δρίζεται τόξον AB μεγίστου κύκλου. Νὰ διαιρέσητε τοῦτο εἰς δύο ίσα μέρη.

924. Ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας δοθείσης σφαίρας ἀκτίνος R δρίζονται τρία σημεῖα A, B, G . Νὰ γράψητε περιφέρειαν, ή δποία νὰ διέρχηται ἀπὸ αὐτῶν.

925. Νὰ ἀποδείξητε ὅτι ἀπὸ δύο σημεῖα τῆς ἐπιφανείας σφαίρας μὴ κείμενα ἐπὶ τῆς αὐτῆς διαμέτρου διέρχεται περιφέρεια μεγίστου κύκλου καὶ μία μόνον.

926. Εἰς σφαίραν ἀκτίνος R εἰς κύκλος ἔχει σφαιρικὴν ἀκτίνα 60° . Νὰ εὕρητε τὴν ἀκτίνα τοῦ κύκλου τούτου.

927. Νὰ εὕρητε τὸν δγκον τοῦ κώνου, δ δποίος ἔχει βάσιν τὸν προηγούμενον κύκλον καὶ κορυφὴν τὸν ἔγγυτερον πρὸς αὐτὸν πόλον αὐτοῦ.

928. Νὰ εὕρητε τὸ ἐμβαδὸν τῆς κυρτῆς ἐπιφανείας τοῦ κώνου, δστις ἔχει βάσιν τὸν αὐτὸν προηγούμενον κύκλον καὶ κορυφὴν τὸν ἀλλον πόλον αὐτοῦ.

929. Νὰ γράψητε ἡμιπεριφέρειαν μὲν διάμετρον AB . Νὰ φέρητε δὲ εἰς αὐτὴν μίαν χορδὴν AG τοιαύτην, δστε, ἀν Δ εἶναι ή προβολὴ τοῦ Γ ἐπὶ τὴν AB καὶ στραφῇ τὸ σχῆμα περὶ τὴν AB δλόκληρον στροφήν, τὸ κυκλικὸν τμῆμα AG καὶ τὸ τρίγωνον $AG\Delta$ νὰ γράφωσιν Ισοδύναμα στερεά.

930. "Ολαι αἱ κορυφαὶ κύβου ἀκμῆς α ἔκ. κείνται εἰς τὴν ἐπιφάνειαν σφαίρας. Αὕτη λέγεται περιγεγραμμένη περὶ τὸν κύβον. Νὰ εὕρητε τὸ ἐμβαδὸν τῆς ἐπιφανείας καὶ τὸν δγκον αὐτῆς.

931. "Οταν ἐν δρθογώνιον τρίγωνον στρέφηται περὶ μίαν τῶν καθέτων πλευρῶν καὶ γράφῃ κώνον, τὸ κοινὸν σημεῖον τῶν διαμέσων

γράφει περιφέρειαν κύκλου. Νά αποδείξητε δτι δ ὅγκος τοῦ κώνου τούτου είναι γινόμενον τοῦ ἐμβαδοῦ τοῦ δρθ. τριγώνου ἐπὶ τὸ μῆκος τῆς περιφερείας ταύτης.

932. Νά σχηματίσητε ἡμικύκλιον μὲ διάμετρον 16 ἑκατ. καὶ νὰ φέρητε εἰς αὐτὸν χορδὴν παράλληλον πρὸς τὴν διάμετρον καὶ εἰς ἀπόστασιν 4 ἑκατ. ἀπὸ αὐτήν. Νά εὕρητε τὸ ἐμβαδὸν τῆς ἐπιφανείας, τὴν δοπίαν θὰ γράψῃ ἡ χορδὴ αὐτῆ, ἀν τὸ ἡμικύκλιον στραφῇ περὶ τὴν διάμετρόν του πλήρη στροφήν.

933. Μία σφαῖρα ἔχει ἀκτῖνα α μέτ. Ἐντὸς αὐτῆς εὔρισκεται κῶνος μὲ κορυφὴν τὸ κέντρον τῆς σφαίρας καὶ βάσιν μικρὸν κύκλον αὐτῆς. Ἡ δὲ κυρτὴ ἐπιφάνεια τοῦ κώνου είναι τὸ ἐν δέκατον τῆς ἐπιφανείας τῆς σφαίρας. Νά εὕρητε τὸ ύψος τοῦ κώνου τούτου.

934. Ἐν ἴσοπλευρον τρίγωνον ἔχει πλευρᾶν α μέτ. καὶ στρέφεται περὶ μίαν πλευράν του διλόκληρον στροφήν. Νά εὕρητε τὸ ἐμβαδὸν τῆς ἐπιφανείας τοῦ ὑπ' αὐτοῦ γραφομένου στερεοῦ.

935. Νά εὕρητε τὸν ὅγκον τοῦ προηγουμένου στερεοῦ.

936. Ἐν κανονικὸν ἡμιεξάγωνον πλευρᾶς α ἔκ. στρέφεται περὶ τὴν διάμετρον αὐτοῦ. Νά εὕρητε τὸ ἐμβαδὸν τῆς ἐπιφανείας τοῦ σχηματιζομένου στερεοῦ.

937. Νά εὕρητε τὸν ὅγκον τοῦ προηγουμένου στερεοῦ.

938. Πῶς δυνάμεθα εἰς δοθεῖσαν σφαῖραν ἀκτῖνος R ἔκ. νὰ γράψωμεν περιφέρειαν ἀκτῖνος α ἔκ;

939. Νά κατασκευάσητε ἐν τετράγωνον ΑΒΓΔ πλευρᾶς α ἔκ. καὶ ἐκτὸς αὐτοῦ ἴσοπλευρον τρίγωνον, τὸ δοπίον νὰ ἔχῃ μὲ τὸ τετράγωνον κοινὴν τὴν πλευράν ΑΒ. Νά εὕρητε τὸν ὅγκον τοῦ στερεοῦ, τὸ δοπίον γράφεται ὑπ' αὐτῶν, ἀν στραφῶσι πλήρη στροφὴν περὶ τὴν πλευράν ΓΔ.

940. Ἐν κανονικὸν ἡμιεξάγωνον πλευρᾶς α ἔκ. στρέφεται πλήρη στροφὴν περὶ μίαν πλευράν του. Νά εὕρητε τὸ ἐμβαδὸν τῆς ἐπιφανείας τοῦ παραγομένου στερεοῦ.

941. Ἐν τρίγωνον ΑΒΓ ἔχει πλευρᾶς (ΑΒ) = 6 ἑκατ., (ΒΓ) = 8 ἑκατ., (ΑΓ) = 4 ἑκατ. Νά εὕρητε τὸν ὅγκον τοῦ στερεοῦ, τὸ δοπίον σχηματίζεται, ἀν τοῦτο στραφῇ πλήρη στροφὴν περὶ τὴν ΒΓ.

942. Ἐν δρθογώνιον τρίγωνον ΑΒΓ στρέφεται πλήρη στροφὴν περὶ τὴν ὑποτείνουσαν ΒΓ καὶ ἔπειτα περὶ τὰς πλευρᾶς ΑΒ καὶ ΑΓ. "Αν Θ,Θ',Θ" είναι κατὰ σειράν οἱ ὅγκοι τῶν παραγομένων στερεῶν, νὰ ἀποδείξητε δτι

$$\frac{1}{\theta^2} = \frac{1}{\theta'^2} + \frac{1}{\theta''^2}.$$

943. Νά γράψητε ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας σφαίρας ἀκτῖνος R περιφέρειαν, ἡ δοπία νὰ διαιρῇ τὴν ἐπιφάνειαν αὐτῆς εἰς μέσον καὶ ἄκρων λόγον.

944. Εἰς κύκλον Ο ἀκτῖνος 8 ἑκατ. φέρομεν δύο ἐφαπτομένας ΑΒ, ΑΓ τεμνομένας ὑπὸ γωνίαν 60°. Νά εὕρητε τὸν ὅγκον τοῦ στερεοῦ, τὸ

δποίον αχηματίζεται, ἀν τὸ τρίγωνον ΑΒΓ στραφῆ περὶ τὴν ΑΟ.

945. ὜ En δρθογώνιον ΑΒΓΔ ἔχει διαστάσεις (ΑΒ)=β ἐκ, (ΑΔ), =α ἐκ. Στρέφεται δὲ περὶ ἄξονα χψ διερχόμενον διὰ τῆς κορυφῆς Α καὶ κάθετον ἐπὶ τὴν διαγώνιον ΑΓ. Νὰ εὕρητε τὸν δγκον τοῦ σχηματιζομένου στερεοῦ.

946. Διαιροῦμεν μίαν πλευράν κυλίνδρου εἰς μέσον καὶ ἄκρον λόγον, διὰ δὲ τοῦ σημείου τῆς διαιρέσεως φέρομεν ἐπίπεδον παράλληλον πρὸς τὰς βάσεις αὐτοῦ. Νὰ μποδείξητε ὅτι τὸ ἐπίπεδον τοῦτο διαιρεῖ τὴν κυρτήν ἐπιφάνειαν τοῦ κυλίνδρου καὶ τὸν κύλινδρον εἰς μέσον καὶ ἄκρον λόγον.

947. Ἐν κύκλος Ζ διαιρῆ τὴν ἐπιφάνειαν σφαίρας Σ εἰς μέσον καὶ ἄκρον λόγον, νὰ εὔρεθῇ συναρτήσει τῆς ἀκτίνος Ρ τῆς σφαίρας δγκος τοῦ κώνου, δστις ἔχει βάσιν τὸν κύκλον Ζ καὶ κορυφὴν τὸν πόλον Π' αὐτοῦ, δστις εὔρσκεται εἰς τὸ μεγαλύτερον μέρος τῆς ἐπιφανείας σφαίρας (σχ. 308).

948. Νὰ προεκβάλητε τὴν πλευράν ΒΓ ισοπλεύρου τριγώνου ΑΒΓ κατὰ τμῆμα ΓΔ ίσον πρὸς τὴν πλευράν α αὐτοῦ. Ἀπὸ δὲ τοῦ Δ νὰ φέρητε εύθειαν ΔΧ κάθετον ἐπὶ τὴν ΒΔ. Ἐπειτα δὲ νὰ ὑπολογίσητε συναρτήσει τοῦ α τὸν δγκον τοῦ στερεοῦ, τὸ δποίον γράφει τὸ τρίγωνον ΑΒΓ, ἀν στραφῆ περὶ τὴν ΔΧ πλήρη στροφῆν.

949. Νὰ γράψητε ήμιπεριφέρειαν μὲ διάμετρον ΑΒ καὶ κέντρον Ο. Ἐπειτα νὰ δρίσητε τὸ μέσον Γ τῆς ἀκτίνος ΟΑ καὶ νὰ φέρητε ἐκ τοῦ Γ εύθειαν ΓΔ μέχρι τῆς ήμιπεριφερείας τοιαύτην, δστε αἱ δύο μεικτόγραμμοι ἐπιφάνειαι ΑΓΔ, ΔΓΒ στρεφόμεναι περὶ τὴν ΑΒ νὰ γράφωσιν ίσοδύναμα στερεά.

950. Νὰ γράψητε ήμιπεριφέρειαν μὲ διάμετρον ΑΒ καὶ ἐπὶ τῆς προεκβολῆς τῆς διαμέτρου ταύτης νὰ λάβητε τμῆμα ΒΓ καὶ νὰ φέρητε ἐφαπτομένην ΓΔ. Νὰ δρισθῇ τὸ τμῆμα ΒΓ, ἀν τὸ εύθ. τμῆμα ΓΔ γράφῃ διπλασίαν ἐπιφάνειαν ἀπὸ τὴν γραφομένην ὑπὸ τοῦ τόξου ΒΔ, δταν τὸ σχῆμα στραφῆ περὶ τὴν ΑΓ δλόκληρον στροφῆν.

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΕΩΣ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ

§ 420. Εις τὴν εἰσαγωγὴν εἴδομεν ὅτι αἱ πρῶται πρακτικαὶ γνώσεις τῆς Γεωμετρίας ἀνεύ ἐσωτερικῆς συνοχῆς ἀπετέλουν τέχνην μᾶλλον ἢ ἐπιστήμην. Ἐχειάζετο μέγα δὲλμα, διὰ νὰ φθάσῃ ὁ ἀνθρωπὸς εἰς τὴν σπουδὴν τῶν σχημάτων καθ' ἔαυτά. Τὴν μεγίστην ταύτην πρόσδον πραγματοποίησεν ἡ φιλοσοφικὴ Ἰδιοφυΐα τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων.

Οὕτω, πρῶτος ὁ Θαλῆς ὁ Μιλήσιος (627-547 π.Χ.) ἔδωκε θεωρητικὴν μορφὴν εἰς τὰς γνωστὰς τότε γεωμετρικὰς γνώσεις ἀποδεικνύων λογικῶς τὴν ἀλήθειαν τούτων καὶ νέας ἀνακαλύπτων. Ὅπηρξε λοιπὸν οὗτος πρόδρομος καὶ θεωρεῖται πατήρ τῆς Γεωμετρίας.

Εἰς αὐτὸν ἀποδίδονται τὰ θεωρήματα περὶ τῆς ἴσοτητος τῶν κατὰ κορυφὴν γωνιῶν, τῶν παρὰ τὴν βάσιν ἴσοσκελοῦς τριγώνου γωνιῶν, τῆς διχοτομήσεως κύκλου ὑπὸ διαμέτρου, τῆς διαιρέσεως δύο εύθειῶν εἰς μέρη ἀνάλογα ὑπὸ παραλλήλων εύθειῶν, τὸ ὅτι ἡ εἰς ἡμικύκλιον ἔγγεγραμμένη γωνία εἶναι δρθή.

Μετά τὸν Θαλῆν ἀξιοσημείωτον διθησιν εἰς τὴν ἀνάπτυξιν τῆς Γεωμετρίας ἔδωκεν ὁ Πυθαγόρας καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, οἱ Πυθαγόρειοι καλούμενοι. Πλὴν τοῦ θεωρήματος περὶ τῶν πλευρῶν δρθ. τριγώνου εἰς τὸν Πυθαγόραν ἀποδίδονται καὶ τὰ ἔξῆς: Περὶ τοῦ ἀθροίσματος τῶν γωνιῶν τριγώνου. Ὅτι 6 ἴσοπλευρα τρίγωνα ἡ 4 τετράγωνα ἡ 3 κανονικά ἔξαγωνα καλύπτουσιν ἀκριβῶς τὸ ἐπίπεδον πέριξ ἐνὸς σημείου. Εἰκάζεται ἐκ τούτου ὅτι οὗτος ἔγνώριζε πολλάς Ἰδιότητας τῶν κανονικῶν πολυγώνων. Τοῦτο ἄλλως τε ἐπιμαρτυρεῖ καὶ τὸ σῆμα τῶν Πυθαγορείων, τὸ διποῖον ἥτο ἀστεροειδές κανονικὸν πεντάγωνον.

Πρέπει νὰ δεχθῶμεν ἐπίστης ὅτι οὗτος ἔλυσε καὶ τὸ πρό-

βλημα τῆς χρυσῆς τομῆς, ἐπὶ τοῦ δποίου στηρίζεται ὁ ύπολογισμὸς τῆς πλευρᾶς κανονικοῦ πενταγώνου. Κατὰ τὸν Πρόκλον, ὁ Πυθαγόρας ἔγνωριζε καὶ τὰ 5 κανονικά πολύεδρα, τὰ δποῖα ἑκάλει σχήματα τοῦ κόσμου, διότι ἔφρόνει ὅτι ταῦτα εἶχον σχέσιν μὲν τὸν κόσμον. Ἡ θεωρία τῶν δμοίων σχημάτων ἐσπουδάσθη ἐπιτυχῶς εἰς τὴν Πυθαγόρειον Σχολὴν καὶ τὸ ἀσύμμετρον τῆς πλευρᾶς καὶ τῆς διαγωνίου τετραγώνου εἶναι ἀνακάλυψις τοῦ Πυθαγόρα.

Μὲ τὰ δμοια σχήματα ἡσχολήθη καὶ ὁ Ἰπποκράτης ὁ Χῖος γεννηθεὶς περὶ τὸ 470 π. Χ. Ἀπέδειξε δὲ πολλὰς ίδιότητας αὐτῶν. Εἰς αὐτὸν ὄφελονται τὰ ἔξης: Ἡ ίδιότης τῶν εἰς ἵσα τόξα βαίνουσῶν ἔγγεγραμμένων γωνιῶν. "Οτι αὗται εἶναι δξεῖται, δρθαὶ ἢ ἀμβλεῖται, ἀν τὰ ἀντίστοιχα τόξα εἶναι μικρότερα, ἵσα ἢ μεγαλύτερα ἡμιπέριφερείας. Δύο περιφέρειαι εἶναι ὡς αἱ ἀκτίνες αὐτῶν καὶ δύο κύκλοι ὡς τὰ τετράγωνα τῶν ἀκτίνων τῶν. Εἰς τὸν Ἰπποκράτην ἀποδίδεται ἐπίσης καὶ ἡ ἀποδεικτικὴ μέθοδος τῆς εἰς ἄτοπον ἀπαγωγῆς.

Οὕτος ἡσχολήθη καὶ μὲ τὸ πρόβλημα τοῦ τετραγωνισμοῦ τοῦ κύκλου. Διὰ νὰ παρακάμψῃ δὲ τὴν δυσκολίαν αὐτοῦ ἐπεχείρησε νὰ τετραγωνίσῃ τὸν μηνίσκον. "Οπως ἦτο ἐπόμενον, ἀπέτυχε μὲν εἰς τὸν κύριον σκοπόν του, ἀνεκάλυψεν δμως τὸ θεώρημα τῶν φερωνύμων μηνίσκων (ἄσκ. 599).

Εἰς τὴν Ἀκαδημίαν τοῦ Πλάτωνος (ἀπὸ 387 π. Χ.) ἐκαλλιεργοῦντο μὲ πολὺ ἐνδιαφέρον τὰ μαθηματικά. Εἰς τὸν Πλάτωνα ὄφελεται ἡ ἀνακάλυψις τῆς ἀναλυτικῆς μεθόδου καὶ τῶν γεωμετρικῶν τόπων. Οἱ γεωμέτραι τῆς Ἀκαδημίας διετύπωσαν μὲ ἀκριβολογίαν τοὺς δρισμοὺς σημείου, γραμμῆς, ἐπιφανείας, ὅγκου. Περιώρισαν τὸν ἀριθμὸν τῶν ἀξιωμάτων, ἐβελτίωσαν τὰς ἀποδείξεις πολλῶν προτάσεων καὶ νέας διετύπωσαν. Ἡ Ἀκαδημία αὕτη διελύθη τὸ ἔτος 529 μ. Χ. Ὁ ἀντίζηλος τοῦ Πλάτωνος Εօδοξος δ Κυλδιος (407 — 354 π. Χ.) διετύπωσεν ἀκριβῆ θεωρίαν τῶν ἀναλογιῶν καὶ μὲ ἀκρίβειαν ἐπίσης διετύπωσε καὶ ἀπέδειξε τὰς περὶ τοῦ ὅγκου πυραμίδος καὶ κῶνου προτάσεις.

Τὴν χρυσῆν δμως ἐποχὴν τῆς Γεωμετρίας ἀποτελεῖ ἡ α' περίοδος τῆς ἐν Ἀλεξανδρείᾳ περιφήμου Μαθηματικῆς Σχολῆς.

Κατ' αύτήν εις τὸ διάστημα ἐνδος αἰῶνος διεδέχθησαν ἀλλήλους τρεῖς λαμπρότεροι ἐκπρόσωποι τῆς Γεωμετρίας. Ὁ Εὐκλείδης, δὲ Ἀρχιμήδης, καὶ δὲ Ἀπολλώνιος.

Ο Εὐκλείδης (330 – 270 π.Χ.) ἐκλήθη ὑπὸ τοῦ Πτολεμαίου τοῦ Α' τοῦ Σωτῆρος νὰ διδάξῃ εἰς τὴν ὑπ' αὐτοῦ ἰδρυθεῖσαν καὶ συντηρουμένην Ἑλληνικὴν Μαθηματικὴν Σχολὴν. Τὸ ἔργον τοῦτο ἔξετέλεσε μὲ πολλὴν μεθοδικότητα σχεδὸν μέχρι τοῦ θανάτου του.

Ἐγινεν δμως πασίγνωστος καὶ περιώνυμος διὰ τὴν σύνταξιν κλασσικοῦ ἔργου του μὲ τὸν τίτλον «Στοιχεῖα». Εἰς ταῦτα πλὴν τῶν ἴδιων του ἔργασιων ἐταξινόμησε μεθοδικῶς ὅλας τὰς γνώσεις τῶν προγενεστέρων καὶ ἔδωκεν ἀνεπιλήπτους ἀποδείξεις, εἰς δσας προτάσεις δὲν εἶχον ἐπιτύχει τοῦτο οἱ προγενέστεροι του. Τὰ «Στοιχεῖα» τοῦ Εὐκλείδου ἀποτελοῦνται ἐκ 15 βιβλίων. Ἐκ τούτων δμως μόνον τὰ 13 πρῶτα εἶναι γνήσιον ἔργον τοῦ Εὐκλείδου. Τὸ 14ον ἀποδίδεται εἰς τὸν Ὑψηλῆν, τὸ δὲ 15ον κατὰ πᾶσαν πιθανότητα διφείλεται εἰς Βυζαντινὸν γεωμέτρην τοῦ δου μ.Χ. αἰῶνος.

Τὰ 6 πρῶτα βιβλία πραγματεύονται περὶ τῶν ἐπιπέδων σχημάτων καὶ περὶ ἀναλογιῶν (5ον βιβλίον). Τὰ 7ον, 8ον, 9ον καὶ 10ον πραγματεύονται περὶ ἀριθμῶν. Ταῦτα ἀποτελοῦσι τὴν Ἀριθμητικὴν τοῦ Εὐκλείδου. Τὸ 11ον, 12ον, 13ον ἀποτελοῦσι τὴν Στερεομετρίαν τοῦ Εὐκλείδου. Εἰς τὸ 13ον ἐκ τούτων ἔξετάζει τὰ κανονικὰ πολύεδρα. Τὰ «Στοιχεῖα» τοῦ Εὐκλείδου ἀποτελοῦσιν ἔξαιρετον πρότυπον ἐπιστημονικῆς ἀκριβολογίας. Ἐπὶ 20 αἰῶνας ἀπετέλουν τὸ μοναδικὸν κλασσικὸν ἔργον διὰ τὴν διδασκαλίαν τῆς Γεωμετρίας.

Ο Ἀρχιμήδης (287 – 212 π.Χ.) ἦτο δὲ μεγαλύτερος Ἑλλην μαθηματικὸς τῆς ἀρχαιότητος. Ἐγεννήθη εἰς Συρακούσας καὶ πιθανότατα ἐσπούδασεν εἰς Ἀλεξάνδρειαν. Οὗτος ἦτο λίαν πρωτότυπος εἰς τὰς μεθόδους του· δι' ὃ αἱ ἀποδείξεις του φέρουσιν ἴδιον τύπον. Ἐκ τῶν ἔργων τῆς στοιχειώδους Γεωμετρίας διεσώθη ἐν ἔργον περὶ μετρήσεως τοῦ κύκλου. Εἰς τοῦτο ὑπολογίζει δτι $3 \frac{10}{71} < \pi < 3 \frac{1}{7}$. Διεσώθη ἐπίσης ἐν ἄλλῳ ἔργον περὶ σφαίρας καὶ κυλίνδρου. Εἰς αὐτὸν ἀποδεικνύει δτι

ή ἐπιφάνεια σφαίρας είναι τετραπλασία μεγίστου κύκλου αύτῆς καὶ δι τι ή ἐπιφάνεια καὶ δύκος σφαίρας είναι ἀντιστοίχως πρὸς τὴν ἐπιφάνειαν καὶ τὸν δύκον περιγεγραμμένου κυλίνδρου ὡς 2:3. (Πρβλ. σελ. 370, ἀσκησις 904).

‘Ο Ἀρχιμήδης θαυμάζεται ἐπίσης διὰ τὸν ὑπολογισμὸν τοῦ ἐμβαδοῦ παραβολικοῦ χωρίου διὰ μεθόδου παρεμφεροῦς πρὸς τὴν μετὰ 2000 ἔτη περίπου χρησιμοποιηθεῖσαν ὑπὸ τοῦ Leibnitz καὶ Νεύτωνος μετὰ τὴν ἀνακάλυψιν τῆς Ἀνωτέρας Ἀναλύσεως. Μὲ τὰς ἔργασίας τοῦ Ἀρχιμήδους συμπληροῦται ἡ Στοιχειώδης Γεωμετρία ὑπὸ τὴν σημερινὴν μορφὴν τῆς.

‘Ο μετὰ τὸν Ἀρχιμήδην γνωστότατος γεωμέτρης Ἀπολλώνιος ἔζησεν εἰς τὴν Ἀλεξάνδρειαν περὶ τὰ τέλη τοῦ 3ου π.Χ. αἰῶνος καὶ τὰς ἀρχὰς τοῦ 2ου. Τὸ κυριώτερον ἔργον του «Κωνικά» ἀπετελεῖτο ἀπὸ 8 βιβλία, διν σώζονται τὰ 7. Εἰς τοῦτο πραγματεύεται περὶ ἐλλείψεως, ὑπερβολῆς καὶ παραβολῆς, αἰτινες είναι ἐπίπεδοι τομαὶ κώνου. Ἐκθέτει δὲ τὰς ἐπ’ αὐτῶν ἐρεύνας του μὲ βαθύτητα, ἡ δποία ἐκίνησε τὸν θαυμασμὸν τῶν γεωμετρῶν τῆς Ἀναγεννήσεως, κατὰ τὴν δποίαν μετεφράσθησαν τὰ ἔργα τῶν Ἑλλήνων μαθηματικῶν.

‘Ο Ἑλλην καὶ Ἀλεξανδρινὸς Μενέλαος κατὰ τὸν 1ον μ.Χ. αἰῶνα μὲ τὸ θεώρημα τῶν διατεμνουσῶν καὶ δύπποις κατὰ τὸν 3ον μ.Χ. αἰῶνα μὲ τοὺς ἀναρμονικοὺς λόγους ρίπτουσι τὰ σπέρματα τῆς νεωτέρας Γεωμετρίας.

‘Απὸ τῆς πτώσεως τῆς Ρωμαϊκῆς Αύτοκρατορίας σχεδόν μέχρι τῆς Ἀναγεννήσεως οὐδεμία πρόοδος ἐγένετο εἰς τὴν Γεωμετρίαν. Μετὰ τὴν δλωσιν δημοσίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως οἱ φεύγοντες τοὺς Τούρκους λόγιοι Ἑλληνες κατέφυγον εἰς τὴν Δύσιν καὶ ἐγνώρισαν εἰς αὐτὴν τὰ ἔργα τῶν Ἑλλήνων γεωμετρῶν. Ἐπομένως ἥρχισεν ἔκτοτε ζωηροτάτη κίνησις διὰ τὰς Μαθηματικὰς ἐπιστήμας καὶ διὰ τὴν Γεωμετρίαν. Ἡ κατὰ τὸ 1600 ὑπὸ τοῦ Γάλλου μαθηματικοῦ Fr. Viète εισαγωγὴ τῶν γραμμάτων εἰς τὴν Ἀλγεβρα καὶ ἡ χρησιμοποίησις αὐτῶν εἰς τὴν Γεωμετρίαν συνετέλεσε τὰ μέγιστα εἰς τὴν ἀπλουστέραν καὶ γενικωτέραν διατύπωσιν τῶν γεωμετρικῶν προβλημάτων. Οὗτος δὲ εἰσήγαγε τὴν ἀλγεβρικὴν λύσιν γεωμετρικῶν προβλημάτων, ὡς καὶ τὴν γεωμετρικὴν κατασκευὴν ἀλγεβρικῶν τύπων.

‘Η κατά τὸν 17ον αἰώνα ἀνακάλυψις τῆς Ἀναλυτικῆς Γεωμετρίας ύπό τοῦ Descartes καὶ τοῦ Διαφορικοῦ Λογισμοῦ ύπό τοῦ Νεύτωνος καὶ Leibnitz ἀπερρόφησαν ἐπὶ πολὺ τὴν προσοχὴν τῶν μαθηματικῶν. ’Ἐν τούτοις μεμονωμένοι μαθηματικοὶ ἡσχολοῦντο καὶ μὲ τὴν καθαρὰν Γεωμετρίαν. Καὶ κατὰ τὸ 1794 δὲ Legendre μὲ τὰ «Στοιχεῖα τῆς Γεωμετρίας» του δίδει εἰς τὴν Γεωμετρίαν σχεδόν τὴν μορφήν, τὴν δποίαν ἔχει σήμερον αὕτη.

Σημειούμεν τέλος δτι πρῶτος δ Γερμανὸς Euler (1707-1783) λίαν εὐλήπτως συνεκέντρωσε περὶ τὸν δμῶνυμόν του κύκλον διαφόρους ίδιοτητας. Οὗτω δὲ ἔθεσε τάς βάσεις τῆς Γεωμετρίας τοῦ τριγώνου, τὴν δποίαν θαυμασίως προήγαγον οἱ νεώτεροι μὲ πρωτοπόρος τοὺς Γάλλους γεωμέτρας Lemoine, Brocard καὶ τὸν Βέλγον γεωμέτρην Neuberg.

ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

Σελίς

'Ανάγκαι δημιουργίας τῆς Γεωμετρίας.—Τὸ σημεῖον καὶ αἱ γραμμαὶ.—"Ισα, ίσοδύναμα καὶ ἀνισα σχήματα.—"Άξιώματα περὶ τῆς εὐθείας.—"Αθροισμα καὶ διαφορὰ εὐθ. τυημάτων.	9—16
Τὰ εἰδη τῶν ἐπιφανειῶν καὶ σχημάτων.—Αἱ πρῶται ίδιότητες τῶν ἐπιπέδων.—Διάφοροι ἐν χρήσει δρισμοί.—Τί διδάσκει καὶ εἰς τί διαιρεῖται ἡ Γεωμετρία	16—21

ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΟΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'. Γωνίαι, εὐθ. σχήματα, κύκλος.—"Ασιοσημείωτα μέρη κύκλου καὶ περιφερείας.—Αἱ πρῶται κυκλικαὶ ίδιότητες	23—32
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'. Ἐπίκεντροι γωνίαι καὶ ίδιότητες αὐτῶν.—"Αντίστροφα θεωρήματα.—"Η μέθοδος τῆς εἰς ἄτοπον ἀπαγωγῆς.—Γωνίαι μὲ κοινὴν κορυφὴν	33—38
Κάθετοι καὶ πλάγιαι εὐθεῖαι καὶ γωνίαι αὐτῶν.—Μέτρησις τόξου καὶ γωνίας.—Μοιρογνωμόνιον	38—49
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'. Κάθετοι καὶ πλάγιαι πρὸς εὐθεῖαν ἐκ σημείου ἐκτὸς αὐτῆς.—Χάραξις καθέτων εὐθειῶν διὰ τοῦ κανόνος καὶ τοῦ διαβήτου	50—58
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'. Τρίγωνα, στοιχεῖα καὶ εἰδη αὐτῶν.—Αἱ περιπτώσεις ίσοτήτος τῶν τριγώνων.—"Ιδιότητες τῶν ίσοσκελῶν καὶ ίσοπλεύρων τριγώνων.—"Ανισότητες τῶν στοιχείων τριγώνου."Άλλαι περιπτώσεις ίσοτήτος δρθογνώνων τριγώνων.	59—76
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'. Παραλληλοι εὐθεῖαι.—"Ιδιότητες καὶ χάραξις αὐτῶν.—Γνώρισμα τεμνομένων εὐθειῶν.—"Ἐφαρμογὴ αὐτοῦ εἰς τὰς διχοτόμους καὶ τὰς καθέτους εἰς τὰ μέσα τῶν πλευρῶν τριγώνου.—Γωνίαι μὲ πλευράς παραλλήλους ἢ καθέτους, μίαν πρὸς μίαν.—"Αθροισμα τῶν γωνιῶν εὐθ. σχήματος.	77—93

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'.	Παραλληλόγραμμα, εῖδη καὶ ἰδιότητες αὐτῶν.—Ἐφαρμογὴ τῶν ἰδιοτήτων τῶν παραλληλογράμμων.—Τομὴ τῶν διαμέσων τριγώνου	94—105
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'.	Συμμετρικὰ πρὸς κέντρον καὶ ἀξονα ἐπίπεδα σχήματα	106—110
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'.	Θέσεις εὐθείας πρὸς κύκλον καὶ δύο μὴ δομοκέντρων περιφερειῶν.—Σχέσεις τῆς ἀποστάσεως τῶν κέντρων πρὸς τὰς ἀκτῖνας δύο περιφερειῶν.—Κατασκευὴ τριγώνου ἐκ τῶν πλευρῶν αὐτοῦ	111—121
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ'.	Ἐγγεγραμμέναι γωνίαι.—Ἐγγεγραμμένα καὶ περιγεγραμμένα περὶ κύκλον εὐθ. σχήματα	122—131

BIBLION ΔΕΥΤΕΡΟΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.	Ἡ ἀναλυτικὴ καὶ ἡ συνθετικὴ μέθοδος.—Χρῆσις τῆς ἀναλύσεως εἰς τὴν ἀπόδειξιν θεωρημάτων καὶ εἰς τὴν λύσιν γεωμ. προβλημάτων.—Διάφοροι κατασκευαὶ . .	132—144
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.	Οἱ γεωμ. τόποι καὶ χρῆσις αὐτῶν εἰς τὴν λύσιν γεωμ. προβλημάτων.—Ἐφαρμογαὶ εἰς διάφορα προβλήματα	145—157

BIBLION TRITON

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.	Μέτρησις καὶ μέτρον ποσοῦ.—Ἴδιότητες τῶν μέτρων τῶν ποσῶν.—Μέτρον εὐθ. τμήματος.—Ἐμβαδὸν παραλληλογράμμου, τριγώνου τραπεζίου καὶ τυχόντος εὐθ. σχήματος	158—174
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.	Μετρικαὶ σχέσεις μεταξὺ τῶν πλευρῶν τριγώνων, ἢτοι Πυθαγόρειον θεώρημα καὶ γενικεύσεις αὐτοῦ.—Μετασχηματισμοὶ εὐθ. σχημάτων εἰς ἄλλα Ισοδύναμα.—Θεωρήματα διαμέσων.—Ἐμβαδὸν τριγώνου ἐκ τῶν πλευρῶν του. 175—187	
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.	Ἀνάλογα ποσά.—Ἴδιότητες τῶν ἀναλόγων συμμεταβλητῶν ποσῶν.—Θεώρημα τοῦ Θαλοῦ.—Γραφικαὶ κατασκευαὶ.—Θεωρήματα τῶν διχοτομουσῶν ἔσωτερικὴν ἥξωτερικὴν γωνίαν τριγώνου.—Ἀρμονικὴ διαίρεσις εὐθείας. 188—205	
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'.	Ομοια εὐθ. σχήματα.—Περιπτώσεις ὁμοιότητος τῶν τριγώνων.—Γενικαὶ ἰδιότητες τῶν ὁμοίων εὐθ. σχημάτων.—Δέσμη εὐθείῶν.—Δύναμις σημείου πρὸς κύκλον.—Τὸ πρόβλημα τῆς χρυσῆς τομῆς.—Ἀκτὶς τῆς περὶ τριγώνων περιγεγραμμένης περιφερείας	206—228

ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ

Σελίς

- ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'. Κανονικά εύθ. σχήματα καὶ ίδιότητες αὐτῶν.—'Εγγραφὴ εἰς κύκλον τετραγώνου, κανονικοῦ ἔξαγώνου, ίσοπλεύρου τριγώνου, κανονικοῦ δεκαγώνου.—'Υπολογι-
σμὸς τῶν πλευρῶν αὐτῶν. 229—237
- ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'. Μέτρησις περιφερείας καὶ δ ἀριθμὸς π.—'Ἐμ-
βαδὸν κύκλου.—Μῆκος τόξου καὶ ἐμβαδὸν κυκλικοῦ τομέ-
ως.—'Ο τετραγωνισμὸς τοῦ κύκλου 238—247

ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ

- ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'. Ὁρισμὸς τῆς θέσεως ἐπιπέδου.—'Αμοιβαῖαι
θέσεις δύο εύθειῶν. Κάθετοι καὶ πλάγιαι πρὸς ἐπίπεδον εύ-
θεῖαι.—Θεώρ. τῶν τριῶν καθέτων.—Παράλληλοι εύθεῖαι
καὶ ἐπίπεδα.—'Ασύμβατοι εύθεῖαι, ἀπόστασις αὐτῶν.—
Προβολαὶ ἐπὶ ἐπίπεδον 249—276
- ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'. Διεδροὶ γωνίαι καὶ ίδιότητες αὐτῶν.—Κάθετα
ἐπίπεδα καὶ ίδιότητες αὐτῶν.—Μέτρησις διέδρου γωνίας . 277—284
- ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'. 'Αμοιβαῖαι θέσεις τριῶν ἐπιπέδων.—Στερεαὶ
γωνίαι.—Εἶδη καὶ ίδιότητες αὐτῶν.—Περιπτώσεις Ισότητος
τριέδρων στερεῶν γωνιῶν 285—300

ΒΙΒΛΙΟΝ ΕΚΤΟΝ

- ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'. Πολύεδρα, στοιχεῖα καὶ εἶδη αὐτῶν.—Πρ-
σματα, στοιχεῖα, εἶδη καὶ γενικαὶ ίδιότητες αὐτῶν.—Παραλ-
ληλεπίπεδα, στοιχεῖα, εἶδη καὶ ίδιότητες αὐτῶν.—Μέτρησις
πρισμάτων 301—318
- ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'. Πυραμίδες καὶ ίδιότητες αὐτῶν.—Μέτρησις
πυραμίδος.—Κόλουρος πυραμίς, κολοβὸν πρίσμα, μέτρησις
αὐτῶν. 319—332
- ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'. "Ομοια πολύεδρα. —Διαίρεσις αὐτῶν εἰς
δύμοια τετράεδρα.—Λόγος δύμοιων πολυέδρων 333—339
- ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'. Συμμετρικὰ σημεῖα καὶ σχήματα πρὸς ἐπίπε-
δον.—'Ισότης τῶν πρὸς κέντρα καὶ ἐπίπεδα συμμετρικῶν
σχημάτων 340—346

ΒΙΒΑΙΟΝ ΕΒΔΟΜΟΝ

Σελις

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'. Κύλινδρος καὶ στοιχεῖα αὐτοῦ.—Ἐμβαδὸν ἐπιφανείας καὶ δγκος κυλίνδρου.—Κῶνος, κόλ. κῶνος, στοιχεῖα, ἐμβαδὸν ἐπιφανείας καὶ δγκος αὐτῶν	347—364
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'. Ἡ σφαίρα.—Θέσεις σφαίρας πρὸς ἐπίπεδον.—Θέσεις σφαίρῶν.—Κύκλοι σφαίρας.—Ἄξων καὶ πόλοι κύκλου σφαίρας.—Χάραξις περιφερειῶν ἐπὶ σφαίρας	365—378
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'. Σφαιρικὴ ζώνη, ἐμβαδὸν αὐτῆς καὶ τῆς ἐπιφανείας σφαίρας.—Σφαιρικὸς τομεύς, σφαιρ. δακτύλιος, σφαιρ. τμῆμα, δγκος αὐτῶν.—Ογκος σφαίρας	379—394
Σύντομος ιστορικὴ ἔξέλιξις τῆς Γεωμετρίας	395—399
Πίναξ περιεχομένων	401—404

*Επιμελητὴς ἐκδόσεως δ Καθηγητὴς Δ. ΚΑΡΤΣΩΝΑΣ (ἀπ. Δ.Σ., Ο.Ε.Σ.Β. 7837/15.2.56)


Τὰ ἀντίτυπα τοῦ βιβλίου φέρουσι τὸ κάτωθι βιβλιόσημον εἰς ἀπόδειξιν τῆς γνησιότητος αὐτῶν.

*Αντίτυπογ στερούμενον τοῦ βιβλιοσήμου τούτου θεωρεῖται κλεψίτυπον.
Ο διαθέτων, πωλῶν ἢ χρησιμοποιῶν αὐτὸ διώχεται κατά τὰς διατάξεις τοῦ
ἄρθρου 7 τοῦ νόμου 1129 τῆς 15/21 Μαρτίου 1946 (Ἐφ. Κυβ. 1946, A 108).



ΕΚΔΟΣΙΣ Γ', 1956 (VII) — ΑΝΤΙΤΥΠΑ 60.000

ΕΚΤΥΠΩΣΙΣ & ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ: ΓΡΑΦΙΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ Α ΣΠΙΩ ΤΗ - ΕΛΚΑ Α.Ε.



537
1600

4090
±