

ΧΡΙΣΤΟΥ Α. ΜΠΑΡΜΠΑΣΤΑΘΗ
ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝ ΤΩ Π.Σ.Π.Α.

ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ

ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΤ' ΤΑΞΙΝ ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
1946

796

ΤΡΙΤΩΝΟΜΕΤΡΙΑ



ΕΚΔΟΣΗ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ

ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ

ΧΡΙΣΤΟΥ Α. ΜΠΑΡΜΠΑΣΤΑΘΗ
ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝ ΤΩ Π.Σ.Π.Α.

Αρ. ελσ. 4500

ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ

ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΤ' ΤΑΞΙΝ ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
1946

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΗΣΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΗΣΙΑΣ

ΤΡΙΤΟΝΟΜΕΤΡΙΑ

ΑΝ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΗΣΙΑΣ



ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΗΣΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΗΣΙΑΣ
1994

ΕΙΣΑΓΩΓΗ


Ἐξ ὧν εἶδομεν εἰς τὴν Γεωμετρίαν συνάγομεν, ὅτι αὕτη εἰδικώτερον ἀσχολεῖται μὲ τὰς ἰδιότητες τῶν σχημάτων. Ἄλλ' ἐκ τῶν σχημάτων τὸ ἀπλούστερον εἶναι τὸ τρίγωνον. Αἱ δὲ ἰδιότητες ὄλων τῶν εὐθυγράμμων σχημάτων ἀνάγονται εἰς τὰς ἰδιότητες τοῦ τριγώνου καὶ δι' αὐτοῦ ἀποδεικνύονται.

Ἐκτὸς δὲ τούτου ἡ μέτρησις ὄλων τῶν σχημάτων ἀνάγεται εἰς τὴν μέτρησιν τριγώνου καὶ αἱ πλεῖστοι ἐφαρμογαὶ τῆς Θεωρητικῆς Γεωμετρίας, ὅπως εἰς τὴν Τοπογραφίαν, Γεωδαισίαν, Ναυτικήν, Ἀστρονομίαν, κτλ. ἀνάγονται εἰς τὰς ἐφαρμογὰς τοῦ τριγώνου. Εἶναι λοιπὸν ἀνάγκη, ὅταν μᾶς δίδωνται ἱκανὰ στοιχεῖα τοῦ τριγώνου, νὰ εὐρίσκωμεν τὰ λοιπὰ ἄγνωστα στοιχεῖα αὐτοῦ μετ' ἀκριβείας. Τὰ στοιχεῖα δὲ τοῦ τριγώνου, τὰ ὁποῖα πρέπει νὰ γνωρίζωμεν, διὰ νὰ εὕρωμεν τὰ ἄλλα, εἶναι :

- 1) δύο πλευραὶ καὶ ἡ ὑπ' αὐτῶν περιεχομένη γωνία
- 2) μία πλευρὰ καὶ δύο γωνίαι
- 3) δύο πλευραὶ καὶ ἡ ἀπέναντι τῆς μεγαλύτερας γωνία
- 4) αἱ τρεῖς πλευραὶ.

Ἄλλὰ διὰ νὰ εὕρωμεν τὰ ἄγνωστα στοιχεῖα τοῦ τριγώνου κατασκευάζομεν πρῶτον τοῦτο καὶ κατόπιν ἐπὶ τοῦ σχήματος μετροῦμεν τὰ ζητούμενα στοιχεῖα. Αἱ γεωμετρικαὶ ὁμῶς κατασκευαί, ἕνεκα τῆς ἀτελείας τῶν ὀργάνων ἡμῶν, δὲν εἶναι ἐν τῇ ἐφαρμογῇ ἀκριβεῖς. Ἐπομένως ὑπόκεινται εἰς λάθη, τὰ ὁποῖα εἶναι φανερόν, ὅτι εἶναι σημαντικά, ὅταν ἀναγκαζώμεθα νὰ κατασκευάσωμεν τρίγωνον ὅμοιον πρὸς τὸ ζητούμε-

νον υπό μικροτέραν κλίμακα. Διότι, εάν ή κλίμαξ είναι π. χ. $\frac{1}{10000}$ και επί μιας γραμμής του σχεδίου



συμβή λάθος 0,001 του μέτρου, τὸ ἐπὶ τῆς πραγματικῆς γραμμῆς λάθος θὰ εἶναι 10 μέτρων. Ἐὰν δὲ συμβῆ λάθος ἐπὶ γωνίας, τότε τὰ λάθη, ἐπὶ τῶν γραμμῶν τῶν ἐξαρτωμένων ἐκ τῆς γωνίας αὐτῆς, εἶναι ἀκόμη σημαντικώτερα. Δυνάμεθα δὲ νὰ συμπεράνωμεν τοῦτο ἐκ τοῦ παρατιθεμένου σχήματος, εἰς τὸ ὁποῖον αἱ γωνίαι βγα, βγα καὶ ή πλευρὰ αγ ὑποτίθενται ἀκριβεῖς. Ἐὰν λοιπὸν εἰς τὴν χάραξιν τῶν γωνιῶν αὐτῶν συμβῆ λάθος, ἔστω καὶ ὀλίγων λεπτῶν, αἱ αβ καὶ γβ θὰ τμηθοῦν εἰς σημείον τι β', τοιοῦτον ὥστε αἱ αβ' καὶ γβ' θὰ διαφέρουν σημαντικῶς τῶν αβ καὶ γβ. Ἡ διαφορὰ δὲ μεταξὺ τῶν ἀκριβῶν γραμμῶν αβ, γβ καὶ τῶν αβ', γβ' πολ-

λαπλασιαζομένη ἐπὶ 10000 θὰ γίνῃ ἀκόμη σημαντικώτερα. Ὡστε ή διὰ γεωμετρικῆς κατασκευῆς εὑρεσις τοῦ τριγώνου, τοῦ ὁποῖου δίδονται τρία στοιχεῖα (ἐξ ὧν τὸ ἓν τοῦλάχιστον εἶναι πλευρά), δὲν εἶναι πρακτικῶς ἀκριβῆς. Εἶναι λοιπὸν ἀνάγκη νὰ ζητήσωμεν ἄλλον τρόπον, διὰ τοῦ ὁποῖου τὰ ζητήματα τὰ σχετικὰ μετὸ τὸ τρίγωνον νὰ λύωνται μετὰ τῆς ἀπαιτουμένης ἀκριβείας. Τὸν τρόπον δὲ τοῦτον θὰ τὸν ἐπιτύχωμεν εἰς τὴν εὑρεσιν τῶν ζητούμενων στοιχείων τοῦ τριγώνου, διὰ μεθόδων ἀριθμητικῶν ἤτοι διὰ λογισμοῦ. Εἶναι δυνατόν δὲ τοῦτο, διότι α) δυνάμεθα νὰ μετροῦμεν τὰ γεωμετρικὰ μεγέθη, καὶ ἐπομένως δυνάμεθα νὰ ἐκφράζωμεν τὰς γεωμετρικὰς ιδιότητας δι' ἀριθμητικῶν σχέσεων, καὶ β) μεταξὺ τῶν ἀριθμῶν, οἱ ὁποῖοι μετροῦν τὰ δεδομένα στοιχεῖα τριγώνου καὶ τῶν ἀριθμῶν, οἱ ὁποῖοι μετροῦν τὰ ζητούμενα, ὑπάρχουν κατ' ἀνάγκην σχέσεις τινες ἀριθμητικά, διότι οἱ δεύτεροι οὔτοι ἀριθμοὶ εἶναι ἐντελῶς ὄρισμένοι, ὅταν εἶναι γνωστοὶ οἱ πρῶτοι.

Ἡ ἔρευνα τῶν ἀριθμητικῶν σχέσεων, αἱ ὁποῖαι ὑπάρχουν μεταξὺ τῶν στοιχείων παντὸς τριγώνου, εἶναι ἔργον τῆς τριγωνομετρίας· σκοπὸς δὲ αὐτῆς εἶναι, διὰ δοθούσων τρία ἐκ τῶν στοιχείων τούτων (οὐχὶ αἱ τρεῖς γωνίαι), ἢ διὰ τοῦ λογισμοῦ εὑρεσις τῶν λοιπῶν (1).

Ἄλλὰ πρὶν εἶδομεν, πῶς ἐπιτυγχάνει τοῦ σκοποῦ αὐτοῦ ἡ τριγωνομετρία, θὰ γνωρίσωμεν τὰ ἐπόμενα.

(1) Αἱ πρῶται ἀρχαί τῆς τριγωνομετρίας ἀνευρίσκονται εἰς τοὺς Αἰγυπτίους· ἀνεπτύχθη δὲ αὕτη κατόπιν ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων ἀστρονόμων. Οἱ Ἀραβες ὁμοίως (ἀπὸ τοῦ 10οῦ μέχρι τοῦ 12οῦ αἰῶνος) ἤρχισαν νὰ τὴν συστηματοποιοῦν καὶ νὰ τὴν καλλιεργοῦν ὡς αὐτοτελῆ κλάδον. Εἰς τὴν Εὐρώπην δὲ οἱ κυριώτεροι θεμελιωταί τῆς τριγωνομετρίας ἦσαν ὁ Regiomontanus (περὶ τὸν 15ον αἰῶνα) καὶ ὁ Viète (περὶ τὸν 16ον αἰῶνα).

ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι

ΠΕΡΙ ΑΝΥΣΜΑΤΩΝ

1. Ὅρισμοί.—Τμήμα εὐθείας, τὸ ὁποῖον θεωρεῖται γραφέν ὑπὸ σημείου κινηθέντος ἐπ' αὐτῆς ἀπὸ τοῦ ἑνὸς ἄκρου τοῦ τμήματος πρὸς τὸ ἄλλο, λέγεται *ἄνυσμα*.

Ἐπὶ παντὸς ἀνύσματος, διακρίνομεν τὴν *ἀρχὴν* (τὸ σημεῖον, ἀφ' οὗ ἐξεκίνησε τὸ κινητὸν), τὸ *τέλος* (τὸ σημεῖον, εἰς ὃ κατέληξε τὸ κινητὸν) καὶ τὴν *φορὰν*, ἣτις εἶναι ἢ ἀπὸ τῆς ἀρχῆς πρὸς τὸ τέλος. Ἀπαγγέλλεται δὲ πρῶτον τὸ γράμμα τῆς ἀρχῆς.


Κατὰ ταῦτα τὸ ἄνυσμα AB ἔχει ἀρχὴν τὸ A, τέλος τὸ B, καὶ φορὰν τὴν ἐκ τοῦ A πρὸς τὸ B, τὸ δὲ ἄνυσμα BA ἔχει ἀρχὴν τὸ B, τέλος τὸ A καὶ φορὰν τὴν ἐκ τοῦ B πρὸς τὸ A.

2. Δύο ἀνύσματα, ὧν ἡ ἀρχὴ τοῦ ἑνὸς εἶναι πέρασ τοῦ ἄλλου, λέγονται *ἀντίθετα*. Τοιαῦτα εἶναι τὰ AB καὶ BA.

3. Δύο ἀνύσματα ἐπὶ τῆς αὐτῆς εὐθείας ἢ ἐπὶ παραλλήλων εὐθειῶν κείμενα, ἂν μὲν ἔχουν τὴν αὐτὴν φορὰν, λέγονται *ὁμορροπα*, ἂν δὲ ἀντίθετον, λέγονται *ἀντίρροπα*.

4. Δύο ἀνύσματα παράλληλα (δηλ. κείμενα ἐπὶ τῆς αὐτῆς εὐθείας ἢ ἐπὶ παραλλήλων εὐθειῶν), τὰ ὁποῖα δύνανται νὰ ἐφαρμόσουν, λέγονται *ὁμορρόπως ἴσα*, ἂν ὅμως εἶναι ἀντίρροπα, λέγονται *ἀντιρρόπως ἴσα*.

5. Δύο ἢ περισσότερα ἀνύσματα λέγονται *διαδοχικά*, ὅταν τὸ τέλος τοῦ πρώτου εἶναι ἀρχὴ τοῦ δευτέρου, τὸ τέλος τοῦ δευτέρου ἀρχὴ τοῦ τρίτου κ.ο.κ.



Τοιαῦτα εἶναι τὰ AB, BΓ, ΓΔ, ΔΕ.

6. *Γεωμετρικὸν ἄθροισμα* δοθέντων διαδοχικῶν ἀνυσμάτων λέγεται τὸ ἄνυσμα, τὸ ὁποῖον ἔχει ἀρχὴν τὴν ἀρχὴν τοῦ πρώτου καὶ τέλος τὸ τέλος τοῦ τελευταίου ἀνυσματος. Οὕτω τὸ ΑΕ εἶναι τὸ γεωμετρικὸν ἄθροισμα τῶν ἀνυσμάτων AB, BΓ, ΓΔ, ΔΕ.

7. *Μῆκος ἀνύσματος*.—Ἐστω ἄνυσμα AB κείμενον ἐπὶ εὐθείας $\chi\chi'$: ἐάν ἐπὶ ταύτης (ἢ ἐπὶ ἄλλης εὐθείας παραλλήλου τῇ $\chi\chi'$) λάβωμεν αὐθαίρετως ἄνυσμά τι OM, καὶ θεωρήσω-

μεν τοῦτο ὡς μονάδα, ὁ λόγος $\frac{AB}{OM}$ λέγεται *μῆκος* τοῦ ἀνύσματος AB καὶ παρίσταται συμβολικῶς οὕτω: (AB)· εἶναι δηλαδὴ $\frac{AB}{OM} = (AB)$. Ἐάν τὸ ἄνυσμα AB εἶναι ὁμόρροπον πρὸς τὸ OM, τὸ μῆκος (AB) εἶναι ἀριθμὸς θετικός· εἶναι δὲ ἀρνητικός, ἂν εἶναι ἀντίρροπον. Κατὰ ταῦτα τὰ ὁμορρόπως ἴσα ἀνύσματα παρίστανται ὑπὸ ἀριθμῶν ἴσων, τὰ δὲ ἀντιρρόπως ἴσα ὑπὸ ἀριθμῶν ἀντιθέτων. Ἦτοι εἶναι (AB) = -(BA) καὶ (AB) + (BA) = 0.

Ἐπίσης ἐκ τῶν ἀνωτέρω ἔπεται, ὅτι *πᾶν ἄνυσμα τῆς εὐθείας $\chi\chi'$ (ἢ παραλλήλου πρὸς αὐτὴν) παρίσταται δι' ἀριθμοῦ ἐντελῶς ὠρισμένου* καὶ ἀντιστρόφως *πᾶς πραγματικὸς ἀριθμὸς δύναται νὰ παριστᾷ ἄνυσμα ὠρισμένον κατὰ μέγεθος καὶ φορὰν*.

8. *Θεώρημα*.—*Τὸ μῆκος τοῦ γεωμετρικοῦ ἄθροισματος δύο διαδοχικῶν ἀνυσμάτων AB καὶ BΓ ἐπὶ τῆς αὐτῆς εὐθείας, ἰσοῦται μὲ τὸ ἄθροισμα τῶν μηκῶν τῶν δύο ἀνυσμάτων*.

Ἦτοι εἶναι (AΓ) = (AB) + (BΓ), οἳανδὴποτε θέσιν καὶ ἂν ἔχουν τὰ τρία σημεῖα A, B, Γ ἐπὶ τῆς εὐθείας.

Διότι ἐκ τῶν τριῶν σημείων A, B, Γ ἔν πάντως εὐρίσκε-

A	B	Γ	ται μεταξύ των δύο άλλων· και
A	Γ	B	αν μὲν τὸ B κεῖται μεταξύ των A
B	A	Γ	καὶ Γ, τὰ ἀνύσματα AB, BΓ εἶναι

ὁμόρροπα καὶ ἡ ἰσότης $(AB)+(BΓ)=(AΓ)$ εἶναι προφανής· ἂν δὲ τὸ σημεῖον Γ κεῖται μεταξύ A καὶ B, θὰ εἶναι πάλιν $(AΓ)+(BΓ)=(AB)$ ἢ $(AΓ)+(BΓ)+(AB)=(AB)+(BΓ)$ · ἦτοι $(AΓ)=(AB)+(BΓ)$ · ἂν δὲ τέλος τὸ A κεῖται μεταξύ B καὶ Γ, θὰ εἶναι $(BA)+(AΓ)=(BΓ)$ ἢ $(AB)+(BA)+(AΓ)=(AB)+(BΓ)$ · ἦτοι $(AΓ)=(AB)+(BΓ)$.

“Ὡστε εἰς πᾶσαν περίπτωσιν εἶναι $(AΓ)=(AB)+(BΓ)$.

9. **Τετμημένοι σημείων εὐθείας.**— Ἐὰν ἐπὶ τῆς εὐθείας $\chi\chi$ ἐπ’ ἄπειρον ἐκτεινομένης λάβωμεν ἀνύσματα OA, OA’ OA’’ κτλ. τῆς αὐτῆς ἀρχῆς O, μετρηθοῦν δὲ ταῦτα διὰ τοῦ ἀνύσματος OM, λαμβανόμενου ὡς μονάδος, εἶναι φανερόν, ὅτι οἱ ἀριθμοὶ

χ	A''	O	M	A	A'	χ
--------	-----	---	---	---	----	--------

μοῖ $(OA) = \frac{OA}{OM}$, $(OA') = \frac{OA'}{OM}$, $(OA'') = \frac{OA''}{OM}$ κτλ. παριστοῦν κατὰ μέγεθος καὶ φοράν τὰς ἀποστάσεις τῶν σημείων A, A', A'' κτλ. ἀπὸ τῆς ἀρχῆς O. Οἱ ἀριθμοὶ (OA) , (OA') , (OA'') κτλ. ἢ καὶ τὰ ἀνύσματα OA, OA', OA'' κτλ. λέγονται **τετμημένοι** τῶν σημείων A, A', A'' κτλ. ἀντιστοιχῶς. Τὸ δὲ σταθερὸν σημεῖον O, ἀπὸ τὸ ὁποῖον μετροῦνται τὰ ἀνύσματα OA, OA' κτλ. λέγεται ἀρχὴ τῶν τετμημένων. Εἶναι δὲ φανερόν, ὅτι αἱ τετμημένοι τῶν σημείων, τὰ ὁποῖα κεῖνται πρὸς τὸ μέρος τοῦ O, πρὸς τὸ ὁποῖον κεῖται καὶ τὸ M εἶναι θετικά, καὶ τῶν σημείων, τὰ ὁποῖα κεῖνται πρὸς τὸ ἄλλο μέρος τοῦ O, εἶναι ἀρνητικά. Ἰδιαιτέρως δὲ ἡ τετμημένη τοῦ σημείου O εἶναι 0, καὶ τοῦ M εἶναι +1. “Ὡστε εἰς ἕκαστον σημεῖον τῆς εὐθείας $\chi\chi$ ἀντιστοιχεῖ μίᾳ τετμημένῃ ἐντελῶς ὀρισμένη. Καὶ ἀντιστρόφως, εἰς δοθέντα πραγματικὸν ἀριθμὸν α ἀντιστοιχεῖ ἓν σημεῖον A τῆς εὐθείας $\chi\chi$ καὶ ἓν μόνον, τὸ ὁποῖον ἔχει τετμημένην ἴσην μὲ τὸν ἀριθμὸν τοῦτον· τὸ σημεῖον δὲ τοῦτο κεῖται πρὸς τὸ μέρος τοῦ O, πρὸς ὃ κεῖται

τὸ M , ἂν ὁ ἀριθμὸς α εἶναι θετικὸς, πρὸς τὸ ἄλλο δὲ μέρος τοῦ O , ἂν ὁ α εἶναι ἀρνητικὸς.

Σημειώσεις. Πᾶσα εὐθεΐα, ἐπὶ τῆς ὁποίας ἡ θετικὴ φορά εἶναι ὀρισμένη, λέγεται **ἄξων**.

10. **Εὐθύγραμμοι συντεταγμένοι σημείων ἐπιπέδου.**— Λαμβάνομεν δύο ἄξονας καθέτους πρὸς ἀλλήλους. Ἐστῶσαν δὲ οἱ $\chi'O\chi$, θετικὴ φορά, τοῦ ὁποίου ὀρίζεται ἡ ἐκ τοῦ O πρὸς τὸ χ , καὶ $\psi'O\psi$, τοῦ ὁποίου θετικὴ φορά εἶναι ἡ ἐκ τοῦ O πρὸς τὸ ψ , ἐπὶ ἐκάστου δὲ τούτων λαμβάνομεν ἀντιστοιχῶς ἀνύσματα OA καὶ OB ἴσα πρὸς $+1$, τὰ ὁποῖα χρησιμοποιοῦμεν ὡς μονάδας μήκους.

Ἐὰν ἤδη θέλωμεν νὰ ὀρίσωμεν τὴν θέσιν σημείου τινος M τοῦ ἐπιπέδου τῶν ληφθέντων ἄξόνων, φέρομεν ἐκ τοῦ M τὰς $M\Gamma$ καὶ $M\Delta$ παραλλήλους πρὸς τοὺς ἄξονας $O\psi$ καὶ $O\chi$ ἀντιστοιχῶς, ὁπότε ἐπ' αὐτῶν ὀρίζονται τὰ ἀνύσματα $O\Gamma$ καὶ $O\Delta$.

Ἄντιστρόφως, ἂν δοθοῦν τὰ ἀνύσματα $O\Gamma$ καὶ $O\Delta$, ταῦτα ὀρίζουν ἐντελῶς τὸ σημεῖον M , τὸ ὁποῖον εἶναι τομὴ τῶν παραλλήλων πρὸς τοὺς ληφθέντας ἄξονας, τῶν ἀγομένων ἐκ τῶν σημείων Γ καὶ Δ .

Οἱ ἀριθμοὶ $(O\Gamma)=\chi$ καὶ $(O\Delta)=\psi$ (οἱ ὁποῖοι παριστοῦν τὰ ἀνύσματα $O\Gamma$ καὶ $O\Delta$ μετρηθέντα διὰ τῶν ἄνω μονάδων) ἢ καὶ τὰ ἀνύσματα $O\Gamma$ καὶ $O\Delta$ λέγονται **συντεταγμένοι** τοῦ σημείου M , καὶ ὁ μὲν χ λέγεται **τετμημένη** αὐτοῦ, ὁ δὲ ἄξων $\chi'O\chi$ ἄξων τῶν τετμημένων, ὁ δὲ ψ λέγεται **τεταγμένη** αὐτοῦ καὶ ὁ ἄξων $\psi'O\psi$ ἄξων τῶν τεταγμένων· τὸ δὲ σημεῖον O λέγεται ἀρχὴ τῶν συντεταγμένων.

Ὅστε εἰς ἕκαστον σημεῖον ἐπιπέδου ἀντιστοιχοῦν δύο ἀριθμοὶ παριστῶντες τὰ μήκη τῶν συντεταγμένων ὡς πρὸς δύο ἄξονας· ἀντιστρόφως δὲ εἰς δοθέντας δύο ἀριθμοὺς ἀντιστοιχεῖ ἓν σημεῖον τοῦ ἐπιπέδου, τοῦ ὁποῦτου συντεταγμένα εἶναι οἱ δοθέντες ἀριθμοί.

Ὅταν ἀπαγγέλλωμεν τὰς συντεταγμένας χ, ψ σημείου τινος M ἀπαγγέλλομεν πρῶτον τὴν τετμημένην χ καὶ ἔπειτα τὴν τεταγμένην ψ , γράφομεν δὲ συμβολικῶς $M(\chi, \psi)$.

Ὅσα σημεῖα ἔχουν τὴν αὐτὴν τετμημένην OG κεῖνται ἐπὶ εὐθείας παραλλήλου τῇ $\psi'O\psi'$ · ὅσα δὲ ἔχουν τὴν αὐτὴν τεταγμένην OD κεῖνται ἐπὶ παραλλήλου τῇ $\chi'O\chi$. Τὰ κείμενα ἐπὶ τῆς $\chi'O\chi$ ἔχουν τεταγμένην 0 , τὰ δὲ κείμενα ἐπὶ τῆς $\psi'O\psi$ ἔχουν τετμημένην 0 . Τὸ δὲ σημεῖον O (ἡ ἀρχὴ) ἔχει συντεταγμένας $(0,0)$.

Οἱ δύο ἄξονες $\chi'\chi$ καὶ $\psi'\psi$ σχηματίζουν περὶ τὸ O τέσσαρας γωνίας, τὰ σημεῖα δὲ τῶν συντεταγμένων χ καὶ ψ σημείου τινος M ἐξαρτῶνται ἐκ τῆς γωνίας, ἐν τῇ ὁποίᾳ κεῖται τὸ σημεῖον M , εἶναι δέ,

ἐάν τὸ M κεῖται ἐν τῇ γωνίᾳ	$\chi O\psi$,	χ	θετ.	ψ	θετ.
» » » » » » »	$\chi'O\psi$,	χ	ἀρν.	ψ	»
» » » » » » »	$\chi'O\psi'$,	χ	»	ψ	ἀρν.
» » » » » » »	$\psi'O\chi$,	χ	θετ.	ψ	»


Ὅστε γνωρίζοντες τὴν γωνίαν, ἐντὸς τῆς ὁποίας κεῖται τὸ M , γνωρίζομεν καὶ τὰ σημεῖα τῶν συντεταγμένων αὐτοῦ· ἀντιστρόφως δέ, ἐάν γνωρίζωμεν τὰ σημεῖα τῶν συντεταγμένων σημείου τινος M , γνωρίζομεν καὶ τὴν γωνίαν, ἐντὸς τῆς ὁποίας κεῖται. Οὕτω σημείον τι, οὔ ἀμφότεραι αἱ συντεταγμένα εἶναι ἀρνητικά, κεῖται ἐν τῇ γωνίᾳ $\chi'O\psi'$ κ.ο.κ.

11. Ὄρθη προβολὴ σημείου καὶ ἀνύσματος ἐπὶ ἄξονα.— Ὄρθη προβολὴ σημείου ἐπὶ ἄξονα λέγεται ὁ πούς τῆς καθέτου τῆς ἀγομένης ἐκ τοῦ σημείου ἐπὶ τὸν ἄξονα.

Οὕτω τοῦ σημείου A ἡ ὀρθὴ προβολὴ ἐπὶ τὸν ἄξονα $\chi'\chi$ λέγε-

ται ὁ πούς α τῆς καθέτου Αα ἐπὶ τὸν δοθέντα ἄξονα.


Ἐπιπέδη προβολὴ ἀνύσματος ἐπὶ ἄξονα λέγεται τὸ ἄνυσμα τοῦ ἄξονος τούτου, τὸ ὁποῖον ἔχει ἀρχὴν καὶ πέρασ τὰς προβολὰς τῆς ἀρχῆς καὶ τοῦ πέρατος τοῦ ἀνύσματος.



Οὕτως ὀρθὴ προβολὴ τοῦ ἀνύσματος ΑΒ ἐπὶ τὸν ἄξονα χχ εἶναι τὸ ἄνυσμα α'β'.

12. Θεώρημα.—Ὁ λόγος δύο παραλλήλων ἀνυσμάτων ἰσοῦται μὲ τὸν λόγον τῶν προβολῶν αὐτῶν ἐπὶ τὸν αὐτὸν ἄξονα.

Ἐστώσαν αβ καὶ γδ αἱ προβολαὶ ἐπὶ τὸν αὐτὸν ἄξονα χχ τῶν ἀνυσμάτων ΑΒ καὶ ΓΔ κειμένων ἐπὶ τῆς αὐτῆς εὐθείας ψψ. Αἱ εὐθεῖαι ψψ καὶ χχ τέμνονται εἰς μέρη ἀνάλογα ὑπὸ τῶν παραλλήλων εὐθειῶν Αα, Ββ, Γγ, Δδ κατὰ γνωστὸν θεώρημα τῆς Γεωμετρίας· ὥστε ἔχομεν $\frac{AB}{\Gamma\Delta} = \frac{\alpha\beta}{\gamma\delta}$ τῶν τμημάτων ΑΒ, ΓΔ, αβ, γδ ἀπολύτως θεωρουμένων. Ἐπειδὴ ὁμοίως, ἂν τὰ



ἀνύσματα ΑΒ καὶ ΓΔ εἶναι τῆς αὐτῆς ἢ ἀντιθέτου φοράς, θὰ εἶναι καὶ αἱ προβολαὶ αὐτῶν ἀνύσματα τῆς αὐτῆς ἢ ἀντιθέτου φοράς, ἔπεται

ὅτι $\frac{AB}{\Gamma\Delta} = \frac{\alpha\beta}{\gamma\delta}$ καὶ ὅταν τὰ ΑΒ,

ΓΔ, αβ, γδ εἶναι ἀνύσματα.

Σημείωσις. Ἐὰν τὰ ἀνύσματα ΑΒ καὶ ΓΔ κείνται ἐπὶ παραλλήλων εὐθειῶν, αἱ παράλληλοι Γγ, Δδ, προεκβαλλόμεναι, ὀρίζουν ἐπὶ τῆς εὐθείας, ἐπὶ τῆς ὁποίας κεῖται τὸ ἄνυσμα ΑΒ, ἕτερον ἄνυσμα Γ'Δ', οὗ προβολὴ εἶναι ἡ γδ.

13. Πρόρισμα.—Αἱ προβολαὶ ἐπὶ τὸν αὐτὸν ἄξονα δύο ἀνυσμάτων ὁμορρόπως ἢ ἀντιρρόπως ἴσων εἶναι ἀνύσματα ὁμορρόπως ἢ ἀντιρρόπως ἴσα.

1) Τὸ μήκος ἀνύσματος AB κειμένου ἐπὶ ἄξονος Ox ἰσοῦται μὲ τὴν διαφορὰν τῆς τετμημένης τῆς ἀρχῆς ἀπὸ τῆς τετμημένης τοῦ πέρατος αὐτοῦ.

2) Ἡ τετμημένη τοῦ μέσου δοθέντος ἀνύσματος AB κειμένου ἐπὶ ἄξονος Ox ἰσοῦται μὲ τὸ ἡμιάθροισμα τῶν τετμημένων τῶν ἄκρων αὐτοῦ A καὶ B .

3) Νὰ εὐρεθοῦν τὰ σημεῖα ἐπιπέδου, τῶν ὁποίων συντεταγμένα εἶναι


$$(1,2) \quad (4,-3) \quad (-2,-3) \quad \left(\frac{3}{4}, \frac{3}{2}\right)$$

$$\left(-3\frac{1}{2}, -2\frac{1}{2}\right) \quad (0,5) \quad (-5,0) \quad (0,-6)$$

4) Αἱ συντεταγμένα σημείου M εἶναι $(3,5)$. Ἐκ τοῦ σημείου τούτου M ἄγονται αἱ κάθετοι ἐπὶ τοὺς ἄξονας ὡς καὶ ἡ εὐθεῖα πρὸς τὴν ἀρχήν. Ἐὰν ἐκάστη τούτων προεκταθῇ, κατ' ἴσον μῆμα, ποῖα εἶναι αἱ συντεταγμένα τῶν ἄκρων τῶν προεκτάσεων;

ΤΟΞΑ ΚΑΙ ΓΩΝΙΑΙ

14. Τόξα.—Ἐὰν κινητὸν ἀναχωρήσῃ ἕκ τινος σημείου περιφερείας, δύναται νὰ διατρέξῃ αὐτὴν κατὰ δύο ἀντιθέτους φoράς, ἥτοι τὴν $A\Theta\Gamma\Delta$ καὶ τὴν $A\Delta\Gamma\Theta A$. ἡ πρώτη, τὴν ὁποῖαν



δεικνύει τὸ παρακείμενον βέλος, καὶ ἡ ὁποία εἶναι ἀντίθετος πρὸς τὴν κίνησιν τῶν δεικτῶν τοῦ ὥρολογίου, ἄς λέγεται θετικὴ φορά, ἡ δὲ δευτέρα ἀρνητικὴ.

15. Ἐὰν κινητὸν ἀναχωρήσῃ ἕκ τινος σημείου A περιφερείας καὶ κινούμενον ἐπ' αὐτῆς κατὰ τινὰ φoράν, ἔστω τὴν θετικὴν, σταματήσῃ εἰς τὸ I , λέγομεν, ὅτι ἔγραψεν τὸ τόξον AI , ἔχον ἀρχὴν τὸ

Α, πέρασ τὸ Ι καὶ φορὰν θετικὴν (θετικὸν τόξον)· ἐνῶ ἂν ἐκινήθη κατὰ τὴν ἀντίθετον φορὰν, λέγομεν ὅτι ἔγραψε τὸ τόξον ΑΙ ἔχον ἀρχὴν τὸ Α, πέρασ τὸ Ι καὶ φορὰν ἀρνητικὴν (ἀρνητικὸν τόξον)·

Κατὰ ταῦτα δυνάμεθα νὰ θεωρήσωμεν τόξα θετικὰ καὶ ἀρνητικὰ· ἕκαστον δὲ τόξον ὀρίζεται, ὅταν δοθῆ ἡ ἀρχὴ, τὸ πέρασ τοῦ τόξου καὶ ἡ φορὰ· ἀπαγγέλλεται δὲ πρῶτον τὸ γράμμα τῆς ἀρχῆς.

16. Μέτρησις τόξου.—Προκειμένου νὰ μετρήσωμεν τὸ τόξον ΑΙ, λαμβάνομεν ἐπὶ τῆς αὐτῆς περιφερείας (ἢ ἄλλης ἴσης) αὐθαίρετως τόξον τι ΑΘ, τὸ ὁποῖον λαμβάνομεν ὡς μονάδα μετρήσεως καὶ συγκρίνομεν πρὸς αὐτό, τὸ ΑΙ.

Ὁ λόγος $\frac{\text{τόξ. ΑΙ}}{\text{τόξ. ΑΘ}}$, ὅστις παρίσταται συμβολικῶς διὰ τοῦ (ΑΙ) λέγεται *μέτρον* τοῦ τόξου ΑΙ. Εἶναι δὲ ἀριθμὸς θετικὸς μὲν, ἂν τὰ τόξα ΑΙ καὶ ΑΘ ἔχουν τὴν αὐτὴν φορὰν (ὁμόρροπα τόξα) ἀρνητικὸς δέ, ἂν ἔχουν ἀντιθέτους φορὰς (ἀντίρροπα τόξα).

Ὡς μονάδας τόξου λαμβάνομεν συνήθως α) τὴν *μοῖραν* ἧτοι τὸ 1/360 τῆς περιφερείας, καὶ ἡ ὁποία μοῖρα, ὡς γνωρίζομεν, διαιρεῖται εἰς 60 πρῶτα λεπτὰ, ἐνῶ ἕν πρῶτον λεπτὸν διαιρεῖται εἰς 60 δεύτερα, β) τὸ *ἀκτίδιον*, ἧτοι τὸ τόξον, τοῦ ὁποῖου τὸ μῆκος ἰσοῦται πρὸς τὸ τῆς ἀκτίνος αὐτοῦ, ὅποτε τὸ μὲν μέτρον τῆς περιφερείας εἶναι 2π, τῆς ἡμιπεριφερείας π καὶ τοῦ τεταρτημορίου αὐτῆς π/2 καὶ γ) τὸν *βαθμὸν*, ἧτοι τὸ 1/400 τῆς περιφερείας. Ὁ βαθμὸς διαιρεῖται εἰς 100 πρῶτα λεπτὰ, τὸ δὲ πρῶτον λεπτὸν εἰς 100 δεύτερα λεπτὰ.

Σημείωσις. Πολλάκις εἶναι ἀνάγκη, ἐκ τοῦ μέτρου τόξου τινος εἰς σύστημά τι μονάδων, νὰ εὕρωμεν τὸ μέτρον τοῦ αὐτοῦ τόξου εἰς ἄλλο σύστημα μονάδων. Πρὸς τοῦτο σκεπτόμεθα ὡς ἑξῆς :

Ἐστω τὸ μέτρον τόξου τινος ΑΒ εἰς μοίρας μ, εἰς ἀκτίνια α καὶ εἰς βαθμοὺς β. Ἐπειδὴ δὲ ὁ λόγος δύο ὁμοειδῶν μεγεθῶν ἰσοῦται ὡς γνωστὸν, μὲ τὸν λόγον τῶν παριστάντων αὐτὰ

ἀριθμῶν, ὅταν μετρηθοῦν διὰ τῆς αὐτῆς μονάδος, ἔπεται ὅτι ὁ λόγος τοῦ τόξου AB πρὸς τὴν περιφέρειαν, εἶναι εἰς μοίρας $\frac{\mu}{360}$, εἰς ἀκτίνια $\frac{\alpha}{2\pi}$ καὶ εἰς βαθμοὺς $\frac{\beta}{400}$. εἶναι ἄρα

$$\frac{\mu}{360} = \frac{\alpha}{2\pi} = \frac{\beta}{400} \quad \text{ἢ ἀπλούστερον} \quad \frac{\mu}{180} = \frac{\alpha}{\pi} = \frac{\beta}{200}$$

Ἐὰν ἐπομένως δίδεται τὸ μέτρον α τοῦ τόξου AB εὐρίσκομεν, ὅτι τὰ ἄλλα μέτρα αὐτοῦ εἶναι $\mu = \frac{180\alpha}{\pi}$ καὶ $\beta = \frac{200\alpha}{\pi}$.

17. Δύο τόξα τῆς αὐτῆς περιφερείας λέγονται ἴσα μὲν, ὅταν ἔχουν τὸ αὐτὸ μέτρον, ἀντίθετα δέ, ἂν τὰ μέτρα αὐτῶν εἶναι ἀντίθετα (ἐννοεῖται ὅτι, ὅταν μετρῶνται διὰ τῆς αὐτῆς μονάδος).

18. Διαδοχικὰ λέγονται δύο ἢ περισσότερα τόξα, ὅταν τὸ πέρασ τοῦ πρώτου εἶναι ἀρχὴ τοῦ δευτέρου, τὸ πέρασ τοῦ δευτέρου εἶναι ἀρχὴ τοῦ τρίτου κ.ο.κ.

Ἄθροισμα διαδοχικῶν τόξων τῆς αὐτῆς περιφερείας λέγεται τὸ τόξον, τὸ ὁποῖον ἔχει ἀρχὴν τὴν ἀρχὴν τοῦ πρώτου καὶ πέρασ τὸ πέρασ τοῦ τελευταίου τόξου.

Οὕτως, (σχ. σελ. 14), $(AB) + (BA) = 0$, $(AB) + (BG) = (AG)$.

19. Γωνίαί. — Ἐστω ἡ γωνία EAG, τὴν ὁποίαν ὑποθέτομεν γραφεῖσαν ὑπὸ τῆς εὐθείας AE, περιστροφείσης, περὶ τὴν κορυφὴν A, ἐν τῷ ἐπιπέδῳ τῆς γωνίας, μέχρις οὗ ἐφαρμόσῃ ἐπὶ τῆς AG, κατὰ φορὰν ἀντίθετον τῆς κινήσεως τῶν δεικτῶν ὠρολογίου. Τὴν οὕτω γραφομένην γωνίαν καλοῦμεν θετικὴν, ἀρνητικὴν δὲ καλοῦμεν αὐτήν, ἐὰν ἡ AE περιστραφῇ κατὰ φορὰν ἀντίθετον τῆς προηγουμένης. Ἐπομένως γωνία τις ὀρίζεται ἐντελῶς, ὅταν δοθῇ ἡ ἀρχικὴ θέσις τῆς περιστροφείσης πλευρᾶς, ἡ τελικὴ καὶ ἡ φορὰ, καθ' ἣν περιστράφη.

Ἐὰν γωνία τις καταστῇ ἐπίκεντρος, τὸ μεταξὺ τῶν πλευρῶν αὐτῆς περιεχόμενον τόξον εἶναι θετικὸν ἢ ἀρνητικόν,

καθ' ὅσον ἡ γωνία αὕτη εἶναι θετική ἢ ἀρνητική, ἀντιστρόφως δὲ γωνία τις ἐπίκεντρος εἶναι θετική ἢ ἀρνητική, καθ' ὅσον τὸ εἰς αὐτὴν ἀντιστοιχοῦν τόξον εἶναι θετικὸν ἢ ἀρνητικόν. Ὅστε, ἂν ὡς μονάδα τῶν γωνιῶν λάβωμεν τὴν γωνίαν, ἣτις ἀντιστοιχεῖ εἰς τὸ τόξον, τὸ ὁποῖον λαμβάνομεν ὡς μονάδα τῶν τόξων τοῦ κύκλου, ἢ εἰς τυχὸν τόξον AB αὐτοῦ ἀντιστοιχοῦσα ἐπίκεντρος γωνία AOB, παρίσταται ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ καὶ τὸ τόξον ἀριθμοῦ.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

- 5) Πόσον μοιρῶν εἶναι τόξον ἑνὸς ἀκτινίου ;
- 6) Πόσον μοιρῶν εἶναι τόξον 1 βαθμοῦ ;
- 7) Πόσων ἀκτινίων καὶ πόσων βαθμῶν εἶναι τόξον 45° , 60° , 150° , 330° ;
- 8) Πόσων ἀκτινίων εἶναι τόξον 20° , 30° , -60° , -150° , $138^\circ 45'$, $225^\circ 40'$;
- 9) Ὅμοίως πόσων ἀκτινίων εἶναι τόξον $37^\circ 32' 25''$, $175^\circ 35' 46''$;
- 10) Πόσων μοιρῶν εἶναι τόξον $\frac{\pi}{4}$, $\frac{5\pi}{6}$, $\frac{11\pi}{6}$ ἀκτινίων ;
- 11) Ὅμοίως πόσων μοιρῶν εἶναι τόξον $\frac{2\pi}{3}$, $\frac{2\pi}{5}$, $\frac{7\pi}{8}$ ἀκτινίων ;
- 12) Πόσων βαθμῶν εἶναι τόξον $\frac{2\pi}{3}$, $\frac{2\pi}{5}$, $\frac{7\pi}{8}$ ἀκτινίων ;
- 13) Τριγώνου τινὸς ἢ μίᾳ γωνία εἶναι $48^\circ 37'$, ἢ δὲ ἄλλη $\frac{5\pi}{12}$ ἀκτινίων. Πόσων μοιρῶν ἢ πόσων ἀκτινίων εἶναι ἡ τρίτη γωνία ;
- 14) Τόξον περιφερείας κύκλου ἀκτίνος 5 μέτρων ἔχει μήκος 3,927 μ. Πόσων μοιρῶν καὶ πόσων βαθμῶν εἶναι τὸ τόξον αὐτό ;

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II

ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΟΞΟΥ ἢ ΓΩΝΙΑΣ


20. Εἰς τὴν εἰσαγωγὴν εἶδομεν, ὅτι σκοπὸς τῆς τριγωνομετρίας εἶναι ἡ εὕρεσις τῶν ἀγνώστων στοιχείων τοῦ τριγώνου

διά τοῦ λογιμοῦ. Διὰ νὰ ἴδωμεν δέ, πῶς θὰ ἐπιτύχη αὕτη τοῦ σκοποῦ αὐτοῦ, ἄς λάβωμεν ἓν ὀρθογώνιον τρίγωνον $AB\Gamma$, εἰς τὸ ὁποῖον ὀρθή γωνία εἶναι ἡ A , καὶ εἰς ὃ τὰ μήκη τῶν πλευρῶν του $B\Gamma$, ΓA , AB παρίστανται ἀντιστοιχῶς ὑπὸ τῶν ἀριθμῶν α , β , γ . Ἄλλ' ἐκ τῆς ἐπιπεδομετρίας γνωρίζομεν τὰς ἐξῆς σχέσεις μεταξὺ τῶν ἐξ στοιχείων αὐτοῦ ἦτοι :

$$B + \Gamma = 90^\circ$$

$$\beta^2 + \gamma^2 = \alpha^2$$

Καὶ διὰ μὲν τῆς πρώτης σχέσεως εὐρίσκομεν μίαν τῶν ὀξειῶν γωνιῶν αὐτοῦ, ὅταν δοθῇ ἡ ἄλλη, διὰ δὲ τῆς δευτέρας εὐρίσκομεν μίαν τῶν πλευρῶν αὐτοῦ, ὅταν μᾶς δοθοῦν αἱ δύο ἄλλαι. Ἄλλ' ἐὰν μᾶς δοθοῦν δύο πλευραὶ π. χ. ἡ α καὶ ἡ β , δὲν δυνάμεθα νὰ εὐρώμεν (διὰ τοῦ λογιμοῦ) μίαν τῶν ὀξειῶν γωνιῶν αὐτοῦ π. χ. τὴν B . Θὰ εἶναι ὅμως τοῦτο δυνατόν, ἐὰν εὑρεθῇ τρόπος, ὥστε εἰς ἐκάστην γωνίαν νὰ ἀντιστοιχῇ εἰς ἀριθμὸς ὠρισμένος, ὁπότε, ἐὰν γνωρίζωμεν τὸν ἀριθμὸν τοῦτον, θὰ δυνάμεθα νὰ εὐρίσκωμεν αὐτὴν μετὰ βεβαιότητος. Συνίσταται δὲ ὁ τρόπος οὗτος εἰς τὸ νὰ ἀνάγωμεν τὴν μέτρησιν τῶν γωνιῶν εἰς τὴν μέτρησιν εὐθυγράμμων τμημάτων. Ὅτι δὲ εἶναι δυνατόν τοῦτο φαίνεται ἐκ τῶν ἐξῆς :



Ἐκ τινος σημείου Δ τῆς ὑποτείνουσας $B\Gamma$ φέρομεν κάθετον ἐπὶ τὴν AB τὴν DE . Ἄλλὰ τότε τὸ τρίγωνον $E\Delta$ εἶναι ὅμοιον πρὸς τὸ $AB\Gamma$ καὶ ἐπομένως εἶναι $\frac{A\Gamma}{B\Gamma} = \frac{E\Delta}{B\Delta} = \lambda$. Ἐπειδὴ δὲ καὶ εἰς πᾶν ἄλλο ὀρθογώνιον τρίγωνον ὅμοιον πρὸς τὸ $AB\Gamma$ ὁ λόγος τῆς καθέτου πλευρᾶς τῆς ὁμολόγου τῆς $A\Gamma$ πρὸς τὴν ὑποτείνουσαν ἰσοῦται μὲ λ , ἔπεται ὅτι, ὅταν γνωρίζωμεν τὸν λόγον λ γνωρίζομεν καὶ τὴν γωνίαν B . Διότι ἐκ τοῦ λόγου λ δυνάμεθα νὰ κατασκευάσωμεν τρίγωνα ὅμοια πρὸς τὸ $AB\Gamma$.


Σημειωτέον ὅμως, ὅτι καὶ ἐκ τοῦ λόγου $\frac{AB}{B\Gamma}$ ἢ καὶ ἐκ τοῦ λόγου $\frac{A\Gamma}{AB}$ δύναται νὰ ὀρισθῇ ἡ γωνία B . Εἶναι δὲ φανερόν

κάτωπιν τῶν ἀνωτέρω, ὅτι καὶ ἐκ τῆς τιμῆς τῆς γωνίας ὀρίζονται οἱ τρεῖς λόγοι $\frac{ΑΓ}{ΒΓ}, \frac{ΑΒ}{ΒΓ}, \frac{ΑΓ}{ΑΒ}$.

Ἐκ τούτων λοιπὸν συνάγομεν ὅτι, ὅταν μᾶς δοθοῦν δύο πλευραὶ ὀρθογωνίου τριγώνου, εἶναι δυνατόν νὰ εὑρεθῇ μία τῶν ὀξειῶν γωνιῶν αὐτοῦ διὰ τοῦ λογισμοῦ. Πῶς δὲ γίνεται τοῦτο καὶ πῶς λύονται ὅμοια ζητήματα δι' οἰανδήποτε γωνίαν θὰ ἴδωμεν εἰς τὰ ἐπόμενα.

21. **Τριγωνομετρικὸς κύκλος.**—Τριγωνομετρικὸς κύκλος λέγεται πᾶς κύκλος, ἐπὶ τῆς περιφερείας τοῦ ὁποίου ἡ θετικὴ φορά εἶναι ὠρισμένη καὶ οὐ ἡ ἀκτίς λαμβάνεται ὡς μονὰς μήκους.

22. **Ἡμίτονον, συνημίτονον καὶ ἐφαπτομένη τόξου.**—Ἐστω τριγωνομετρικὸς κύκλος O καὶ τόξον τι αὐτοῦ AM . Φέρομεν τὴν διάμετρον $A'A$ διερχομένην διὰ τῆς ἀρχῆς A τοῦ δοθέντος τόξου, ἐφ' ἧς ὀρίζομεν ὡς θετικὴν φοράν τὴν ἐκ τοῦ



O πρὸς τὸ A . Τὴν διάμετρον ταύτην νοοῦμεν στρεφομένην περὶ τὸ σημεῖον O , ἐν τῷ ἐπιπέδῳ τοῦ κύκλου, κατὰ τὴν θετικὴν φοράν, μέχρις ὅτου διαγράψῃ γωνίαν ὀρθήν, ὅποτε θὰ λάβῃ τὴν θέσιν $B'B$ · ἡ περιφέρεια τότε θὰ εὑρεθῇ διηρημένη εἰς τέσσαρα τεταρτημόρια, τὰ AB , BA' , $A'B'$ καὶ $B'A$, τὰ ὁποῖα ὀνομάζομεν ἀντιστοίχως α' (πρῶτον), β' (δεύτερον), γ' (τρίτον) καὶ δ' (τέταρτον)· τέλος φέρομεν τὴν $\Delta\Delta'$ ἐφαπτομένην τῆς περιφερείας εἰς τὴν ἀρχὴν τοῦ τόξου A καὶ ἧς ὡς θετικὴν φοράν ὀρίζομεν τὴν αὐτὴν μετὰ τὴν θετικὴν φοράν, τῆς $B'OB$, δηλαδή τὴν ἐκ τοῦ A πρὸς τὸ Δ . Κατόπιν τούτων παρατηροῦμεν,

ὅτι συντεταγμένοι τοῦ πέρατος M τοῦ δοθέντος τόξου AM ὡς πρὸς τοὺς ἄξονας $A'OA$ καὶ $B'OB$ εἶναι οἱ ἀριθμοὶ $\frac{OP}{OA} = (OP)$ καὶ $\frac{OP}{OB} = (OP)$ καὶ ἡ μὲν τετμημένη (OP) λέγεται *συνημίτονον* τοῦ τόξου AM , ἡ δὲ τεταγμένη (OP) λέγεται *ἡμίτονον* αὐτοῦ, ἥτοι εἶναι $\text{συν}(AM) = (OP)$ καὶ $\text{ἡμ}(AM) = (OP)$.

Ἦδη, ἐὰν προεκτείνωμεν τὴν OM μέχρις, ὅτου συναντήσῃ τὴν ἐφαπτομένην $\Delta'A\Delta$ εἰς τὸ Σ , ἡ ἀπόστασις τοῦ σημείου Σ ἀπὸ τοῦ A μετρηθεῖσα διὰ τῆς ἀκτίνος OB , ἥτοι ἡ τετμημένη τοῦ Σ , $\frac{A\Sigma}{OB} = (A\Sigma)$ λέγεται *ἐφαπτομένη* τοῦ αὐτοῦ τόξου AM .

Ὅστε εἶναι $\text{εφ}(AM) = (A\Sigma)$. Τὸ $\text{ἡμ}(AM)$ κατὰ τὰ ἐν ἐδαφίῳ 10 λεχθέντα εἶναι θετικὸν μὲν, ἂν τὸ τόξον AM περατοῦται εἰς εἰς τὸ α' καὶ β' τεταρτημόριον καὶ ἀρνητικὸν, ἂν περατοῦται εἰς τὸ γ' καὶ δ' . Ὡς πρὸς τὸ *συνημίτονον* τοῦ τόξου AM παρατηροῦμεν, ὅτι εἶναι θετικὸν μὲν, ἂν τὸ τόξον περατοῦται εἰς τὸ α' καὶ δ' τεταρτημόριον, ἀρνητικὸν δέ, ἂν περατοῦται εἰς τὰ δύο ἄλλα, ἐνῶ ἡ ἐφαπτομένη τοῦ AM εἶναι θετικὴ, ἂν περατοῦται τὸ AM εἰς τὸ α' καὶ γ' καὶ ἀρνητικὴ, ἂν περατοῦται εἰς τὸ β' καὶ δ' τεταρτημόριον.

Ἐπίσης παρατηροῦμεν, ὅτι τὰ τόξα τὰ ἔχοντα τὴν αὐτὴν ἀρχὴν καὶ τὸ αὐτὸ πέρασ, ἔχουν τὸ αὐτὸ ἡμίτονον, τὸ αὐτὸ *συνημίτονον* καὶ τὴν αὐτὴν ἐφαπτομένην.

Ἐχομεν λοιπὸν κατὰ τὰ ἀνωτέρω τὸν ἑξῆς πίνακα:

	α'	β'	γ'	δ'
$\text{ἡμ}(AM)$	+	+	-	-
$\text{συν}(AM)$	+	-	-	+
$\text{εφ}(AM)$	+	-	+	-

Σημείωσις α'. Τὸ ἄνυσμα OP , ὅπερ μετροῦμενον ὡς ἀνωτέρω δίδει τὸ ἡμίτονον τοῦ τόξου AM , λέγεται καὶ αὐτὸ ἡμίτονον τοῦ τόξου AM . Ὁμοίως καὶ τὸ ἄνυσμα OP λέγεται *συνημίτο-*

νον του αὐτοῦ τόξου, ὡς καὶ τὸ ΑΣ λέγεται ἐφαπτομένη αὐτοῦ λέγονται δὲ τὰ ἀνύσματα ταῦτα ΟΡ, ΟΠ, ΑΣ *τριγωνομετρικαὶ γραμμαὶ* τοῦ τόξου ΑΜ, ἐνῶ τὸ ημ(ΑΜ), συν(ΑΜ) καὶ ἐφ(ΑΜ) λέγονται *τριγωνομετρικοὶ ἀριθμοὶ* αὐτοῦ.

Σημείωσις β'. Ἡ ἐπίκεντρος γωνία ΑΟΜ μετρούμενη κατὰ τοὺς ὅρους τοῦ ἐδ. 19 παρίσταται ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ καὶ τὸ τόξον ΑΜ ἀριθμοῦ. Διὰ τοῦτο ὁ ἀριθμὸς (ΟΡ) λέγεται ἡμίτονον καὶ τῆς γωνίας ΑΟΜ, ὁ (ΟΠ) συνημίτονον αὐτῆς καὶ ὁ (ΑΣ) ἐφαπτομένη.

Γενικῶς ἡμίτονον, συνημίτονον καὶ ἐφαπτομένη γωνίας λέγεται τὸ ημ., τὸ συν., καὶ ἡ ἐφ. τοῦ τόξου τοῦ τριγωνομετρικοῦ κύκλου τοῦ ἀντιστοιχοῦντος εἰς τὴν γωνίαν ταύτην.

Σημείωσις γ'. Ἡ διάμετρος Α'Α, ἐφ' ἧς κεῖνται τὰ συνημίτονα τῶν τόξων ἀρχῆς Α, λέγεται συνήθως *ἄξων τῶν συνημιτόνων*, ἡ διάμετρος Β'Β δι' ἀνάλογον λόγον λέγεται *ἄξων τῶν ἡμιτόνων* καὶ ἡ ἐφαπτομένη Δ'ΑΔ *ἄξων τῶν ἐφαπτομένων*.

ΣΧΕΙΣΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ, ΣΥΝΗΜΙΤΟΝΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΗΣ ΠΑΝΤΟΣ ΤΟΞΟΥ

23. Ἐστω τυχὸν τόξον τὸ ΑΜ (σχ. σελ. 19), διὰ τὸ ὁποῖον ἔχομεν (ΑΜ)=α, καὶ τοῦ ὁποῖου εἶναι ημα=(ΟΡ), συνα=(ΟΠ) καὶ ἐφα=(ΑΣ).

α) Ἐκ τοῦ ὀρθογωνίου τριγώνου ΟΜΠ λαμβάνομεν $(ΠΜ)^2 + (ΟΠ)^2 = (ΟΜ)^2$. Ἐπειδὴ δὲ τὰ ἀνύσματα ΠΜ καὶ ΟΡ εἶναι ὁμορρόπως ἴσα, ἔχομεν $(ΟΡ) = (ΠΜ) = ημα$ · ἐπομένως ἡ εὐρεθεῖσα σχέσις γίνεται $(ημα)^2 + (συνα)^2 = 1$ ἢ $ημα^2 + συνα^2 = 1$, ἣτις προδήλως εἶναι ἀληθῆς, εἰς οἷονδήποτε τεταρτημόριον καὶ ἂν περατοῦται τὸ τόξον ΑΜ.

β) Ἦδη ἐκ τῶν ὁμοίων τριγώνων ΟΠΜ καὶ ΟΑΣ λαμβάνομεν, εἰς οἷονδήποτε τεταρτημόριον καὶ ἂν περατοῦται τὸ τόξον ΑΜ,

$$\frac{ΑΣ}{ΠΜ} = \frac{ΟΑ}{ΟΠ} \quad \text{ἢ} \quad \frac{|ΑΣ|}{|ημα|} = \frac{1}{|συνα|}, \quad \text{ἦτοι} \quad |ΑΣ| = \frac{|ημα|}{|συνα|} \cdot \text{ἀλλ' ἐπειδὴ καὶ}$$

τὸ (ΑΣ) καὶ τὸ $\frac{ημα}{συνα}$ εἶναι θετικά, ὅταν τὸ Μ κεῖται ἐν τῷ πρώτῳ ἢ τρίτῳ τεταρτημῳρίῳ, ἀρνητικά δὲ ἀμφότερα, ὅταν τὸ Μ

κεῖται ἐν τῷ δευτέρῳ ἢ τετάρτῳ τεταρτημορίῳ, ἔπεται, ὅτι ἔχομεν πάντοτε $(A\Sigma) = \frac{\eta\mu\alpha}{\sigma\upsilon\nu\alpha}$, ἥτοι $\epsilon\phi\alpha = \frac{\eta\mu\alpha}{\sigma\upsilon\nu\alpha}$.

Ὡστε τὸ ἡμίτονον, τὸ συνημίτονον καὶ ἡ ἐφαπτομένη τῶ-
ξου τινὸς α συνδέονται διὰ τῶν δύο ἐξισώσεων

$$\eta\mu^2\alpha + \sigma\upsilon\nu^2\alpha = 1 \text{ καὶ } \epsilon\phi\alpha = \frac{\eta\mu\alpha}{\sigma\upsilon\nu\alpha}.$$

24. Ἐκτὸς τῶν ἀνωτέρω τριῶν τριγωνομετρικῶν ἀριθμῶν τῶξου τινὸς ἢ γωνίας α , οἵτινες εἶναι θεμελιώδεις, ὑπάρχουν καὶ τρεῖς ἄλλοι τριγωνομετρικοὶ ἀριθμοὶ τοῦ τῶξου α , εἶναι δὲ οὗτοι ἀντίστροφοι τῶν προηγουμένων· λέγεται δέ, ὁ μὲν ἀντίστροφος τῆς ἐφαπτομένης τοῦ α συνεφαπτομένη αὐτοῦ, ὁ ἀντίστροφος τοῦ συνημιτόνου τοῦ τέμνουσα αὐτοῦ καὶ ὁ ἀντίστροφος τοῦ ἡμιτόνου τοῦ συνδιατέμνουσα αὐτοῦ. Ἥτοι εἶναι


$$\sigma\phi\alpha = \frac{1}{\epsilon\phi\alpha} = \frac{\sigma\upsilon\nu\alpha}{\eta\mu\alpha}, \text{ τεμ}\nu\alpha = \frac{1}{\sigma\upsilon\nu\alpha} \text{ καὶ } \sigma\upsilon\nu\delta\alpha = \frac{1}{\eta\mu\alpha}.$$

Ἐκ τῶν νέων τριγωνομετρικῶν ἀριθμῶν ὡς ἴδιος τριγωνομετρικὸς ἀριθμὸς χρησιμοποιεῖται μόνον ἡ συνεφαπτομένη, τῆς ὁποίας δίδομεν κατωτέρω τὴν γεωμετρικὴν παράστασιν.

25. Γεωμετρικὴ παράστασις τῶν συνεφαπτομένων.—

Ἐστω τῶξον τι AM , δι' ὃ ἔχομεν $(AM) = \alpha$, καὶ τοῦ ὁποίου εἶναι $\eta\mu\alpha = (OP)$ καὶ $\sigma\upsilon\nu\alpha = (O\Pi)$.

Φέρομεν ἤδη τὴν ἐφαπτομένην τῆς περιφερείας εἰς τὸ πέρας B τοῦ πρώτου τεταρτημορίου $E'BE$, τῆς ὁποίας ὀρίζομεν ὡς



θετικὴν φοράν τὴν αὐτὴν μετὰ τὴν τοῦ ἄξονος τῶν συνημιτόνων, δηλ. τὴν ἐκ τοῦ B πρὸς τὸ E' · κατόπιν δὲ προεκτείνομεν τὴν ἀκτῖνα OM , ἥτις τέμνει τὴν ἀχθθεῖσαν ἐφαπτομένην εἰς τὸ T , ὅποτε σχηματίζεται τὸ τρίγωνον OBT ὁμοιον πρὸς τὸ OPM · ἐκ τῶν ὁμοίων δὲ τούτων

τριγῶνων λαμβάνομεν $\frac{BT}{PM} = \frac{OB}{OP}$

ἥτοι $\frac{|BT|}{|\sigma\upsilon\nu\alpha|} = \frac{1}{|\eta\mu\alpha|}$ ἢ $|BT| = \frac{|\sigma\upsilon\nu\alpha|}{|\eta\mu\alpha|}$ · ἀλλὰ καὶ τὸ (BT) καὶ τὸ $\frac{\sigma\upsilon\nu\alpha}{\eta\mu\alpha}$

είναι ἀμφότερα θετικά μὲν, ὅταν τὸ M κείται ἐν τῷ πρώτῳ ἢ τρίτῳ τεταρτημορίῳ, ἀρνητικά δέ, ὅταν τὸ M κείται ἐν τῷ δευτέρῳ ἢ τετάρτῳ· ἐπομένως εἰς οἷονδῆποτε τεταρτημόριον καὶ ἂν κείται τὸ M , ἀληθεύει ἡ σχέσις $(BT) = \frac{\sigma\upsilon\nu\alpha}{\eta\mu\alpha}$, ἥτοι $(BT) = \sigma\phi\alpha$.

Οὕτως ὁ ἀριθμὸς $\sigma\phi\alpha$ συμπίπτει μὲ τὸν ἀριθμὸν, ὃν παριστᾷ τὸ ἄνυσμα BT μετρηθὲν διὰ τῆς ἀκτίνος. Ἐκ τούτου καὶ τὸ ἄνυσμα BT λέγεται συνεφαπτομένη τοῦ τόξου α , ἡ δὲ ἐφαπτομένη εἰς τὸ πέρασ τοῦ πρώτου τεταρτημορίου λέγεται συνῆθως ἄξων τῶν συνεφαπτομένων.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

15) Νὰ δειχθῆ, ὅτι δύο τόξα τοῦ αὐτοῦ τριγωνομετρικοῦ κύκλου, τὰ ὁποῖα μετρηθέντα διὰ τῆς αὐτῆς μονάδος, ἔχουν τὸ αὐτὸ μέτρον, ἔχουν ἴσα ἡμίτονα, συνῆμίτονα, ἐφαπτομένας καὶ συνεφαπτομένας.

16) Ἡ ἐφαπτομένη καὶ συνεφαπτομένη τοῦ αὐτοῦ τόξου ἔχουν πάντοτε τὸ αὐτὸ σημεῖον.

Νὰ ἀποδειχθῆ ὅτι :

$$17) (\eta\mu\alpha + \sigma\upsilon\nu\alpha)^2 = 1 + 2\eta\mu\alpha\sigma\upsilon\nu\alpha$$

$$18) \sigma\upsilon\nu^2\alpha(1 + \epsilon\phi^2\alpha) = 1$$

$$19) \eta\mu^2\alpha - \sigma\upsilon\nu^2\alpha = 1 - 2\sigma\upsilon\nu^2\alpha = 2\eta\mu^2\alpha - 1$$

$$20) \sigma\upsilon\nu^2\alpha - \eta\mu^2\alpha = 2\sigma\upsilon\nu^2\alpha - 1 = 1 - 2\eta\mu^2\alpha$$

$$21) \sigma\upsilon\nu^2\alpha - \eta\mu^2\alpha = \sigma\upsilon\nu^2\alpha - \eta\mu^2\alpha$$

$$22) \eta\mu^2\alpha \cdot \sigma\upsilon\nu^2\beta - \sigma\upsilon\nu^2\alpha \cdot \eta\mu^2\beta = \eta\mu^2\alpha - \eta\mu^2\beta$$

$$23) \sigma\upsilon\nu^2\alpha \sigma\upsilon\nu^2\beta - \eta\mu^2\alpha \eta\mu^2\beta = \sigma\upsilon\nu^2\alpha + \sigma\upsilon\nu^2\beta - 1$$

$$24) \frac{1 - \epsilon\phi\alpha}{1 + \epsilon\phi\alpha} = \frac{\sigma\phi\alpha - 1}{\sigma\phi\alpha + 1}$$

$$25) 1 - 2\eta\mu^2\alpha = \frac{1 - \epsilon\phi^2\alpha}{1 + \epsilon\phi^2\alpha}$$

$$\times 26) \frac{1 + \epsilon\phi^2\alpha}{1 + \sigma\phi^2\alpha} = \frac{\eta\mu^2\alpha}{\sigma\upsilon\nu^2\alpha}$$

$$\times 27) (1 + \epsilon\phi\alpha)(1 + \sigma\phi\alpha)\eta\mu\alpha\sigma\upsilon\nu\alpha = (\eta\mu\alpha + \sigma\upsilon\nu\alpha)^2$$

$$\times 28) \epsilon\phi\alpha(1 - \sigma\phi^2\alpha) + \sigma\phi\alpha(1 - \epsilon\phi^2\alpha) = 0$$

26. Ἦδη θὰ ἐξετάσωμεν τὰς μεταβολὰς τῶν τριγωνομετρικῶν ἀριθμῶν γωνίας AM ἢ τόξου AM τριγωνομετρικοῦ κύκλου, ὅταν τὸ πέρασ M ἀναχωροῦν ἀπὸ τοῦ A καὶ κινούμενον κατὰ τὴν θετικὴν φοράν, διαγράφη ὁλόκληρον τὴν περιφέρειαν, δηλαδὴ, ὅταν ἡ γωνία ἢ τὸ τόξον αὐξάνη συνεχῶς ἀπὸ 0° μέχρι 360° .

27. Μεταβολαὶ τοῦ ἡμιτόνου.—“Ὅταν τὸ M εἶναι εἰς τὸ A , ἔχομεν $(AM)=0^\circ$ καὶ τὸ σημεῖον M ἔχει τεταγμένην 0 (§ 10). Εἶναι ἄρα $\eta\mu 0^\circ=0$ · ὅταν τὸ M , ἀναχωροῦν ἐκ τοῦ A καὶ κινούμενον συνεχῶς, διαγράψῃ τὸ πρῶτον τεταρτημόριον ἢ τεταγμένη τοῦ M αὐξάνει ἀπὸ 0 μέχρι τοῦ $+1$. “Ὅστε εἶναι $\eta\mu 90^\circ=1$.


Ἐὰν τὸ M ἐξακολουθήσῃ τὴν κίνησίν του, καὶ φθάσῃ εἰς τὸ πέρασ A' τοῦ δευτέρου τεταρτημορίου, ἢ τεταγμένη τοῦ M ἐλαττοῦται μέχρι τοῦ 0 · ἐπομένως εἶναι $\eta\mu 180^\circ=0$.

Ἐὰν τὸ M διαγράψῃ τὸ τρίτον τεταρτημόριον καὶ φθάσῃ εἰς τὸ πέρασ αὐτοῦ B' , εὐρίσκομεν κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον, ὅτι τὸ ἡμίτονον ἐλαττοῦται μέχρι τοῦ -1 καὶ ὅτι εἶναι $\eta\mu 270^\circ=-1$, ἐνῶ, ὅταν τὸ M διαγράψῃ τὸ τέταρτον τεταρτημόριον καὶ ἐπανέλθῃ εἰς τὸ A , τὸ ἡμίτονον αὐξάνει ἀπὸ -1 μέχρι τοῦ 0 , ἥτοι εἶναι $\eta\mu 360^\circ=0=\eta\mu 0^\circ$.

Ὁ κατωτέρω πίναξ δεικνύει συνοπτικῶς τὰς ἀνωτέρω παρατηρηθεῖσας μεταβολὰς τοῦ ἡμιτόνου.


α	0°	αὐξ	90°	αὐξ	180°	αὐξ	270°	αὐξ	360°
$\eta\mu\alpha$	0	αὐξ	1	ἐλατ.	0	ἐλατ.	-1	αὐξ	0

28. Γραφικὴ παράστασις τῶν μεταβολῶν τοῦ ἡμιτόνου.—Αἱ ἀνωτέρω σημειωθεῖσαι μεταβολαὶ τοῦ ἡμιτόνου τόξου,



δταν τοῦτο αὐξάνηται συνεχῶς ἀπὸ 0° μέχρι 360° , παρίστανται γραφικῶς λαμβάνομεν δὲ τὴν γραφικὴν παράστασιν αὐτῶν ὡς ἑξῆς.

Φέρομεν δύο ἄξονας ὀρθογωνίους, ἔστω τοὺς Αχ καὶ Αψ. Ἐπὶ τοῦ ἄξονος Αχ λαμβάνομεν ἀνύσματα ἀρχῆς Α, ὧν τὰ μήκη εἶναι ἴσα πρὸς τὰ μήκη τῶν ἀντιστοίχων τόξων ἀπὸ




τῶν περάτων δὲ τῶν ἀνυσμάτων τούτων ὑποθίμεν καθέτους καὶ ἐπ' αὐτῶν λαμβάνομεν ἀνύσματα, ἀρχὴν ἔχοντα τὰ πέρατα τῶν προηγουμένων, ὁμορρόπως ἴσα πρὸς τὰ ἀνύσματα τῶν ἡμιτόνων τῶν ἀντιστοίχων τόξων. Τὰ πέρατα τῶν ἀντιστοίχων τούτων ἀνυσμάτων εἶναι τὰ σημεῖα μιᾶς καμπύλης, ἣτις δεικνύει τὰς μεταβολὰς τοῦ ἡμιτόνου, καὶ ἣτις καμπύλη δεικνύεται εἰς τὸ ἀνωτέρω σχῆμα.

29. **Μεταβολαὶ τοῦ συνημιτόνου.**—Αἱ μεταβολαὶ τοῦ συνημιτόνου γωνίας ἢ τόξου, ὅταν τοῦτο αὐξάνηται ἀπὸ 0° μέχρι 360° , εὐρίσκονται εὐκόλως, καθ' ὃν τρόπον εὐρέθησαν καὶ αἱ μεταβολαὶ τοῦ ἡμιτόνου. Συνοψίζονται δὲ εἰς τὸν κάτωθι πίνακα.

α	0°	αὐξ.	90°	αὐξ.	180°	αὐξ.	270°	αὐξ.	360°
συνα	1	ἐλατ.	0	ἐλατ.	-1	αὐξ.	0	αὐξ.	1

30. **Γραφικὴ παράστασις τῶν μεταβολῶν τοῦ συνημιτόνου.**—Ἡ κάτωθι καμπύλη, ἣτις παριστᾷ τὰς ἀνωτέρω μεταβολὰς τοῦ συνημιτόνου, κατασκευάζεται ὁμοίως μὲ τὴν προηγουμένην.



31. Μεταβολαὶ τῆς ἐφαπτομένης καὶ συνεφαπτομένης. — Προκειμένου περὶ τῆς ἐφαπτομένης παρατηροῦμεν ὅτι, ὅταν τὸ M διαγράψῃ τὸ α' τεταρτημόριον, αὕτη αὐξάνεται ἀπὸ 0 μέχρι τοῦ $+\infty$ (διότι, ὅταν τὸ M φθάσῃ εἰς τὸ B , ἡ ἀκτίς OM γίνεται παράλληλος πρὸς τὴν $\Delta'A\Delta$), ἤτοι εἶναι $\epsilon\phi 0^\circ = 0$ καὶ $\epsilon\phi 90^\circ = +\infty$. Ἄλλ' ὅταν τὸ M ὑπερβῇ τὸ B , ἡ ἐφαπτομένη καθίσταται ἀρνητικὴ, οὕσα ὅμως ἀπείρως μεγάλη κατ' ἀπόλυτον τιμὴν· δηλαδή ἡ ἐφαπτομένη μεταπηδᾷ ἀπὸ τοῦ $+\infty$ εἰς τὸ $-\infty$ · αὐξάνει δὲ αὕτη ἀπὸ τοῦ $-\infty$ μέχρι τοῦ 0, ὅταν τὸ M διαγράψῃ τὸ δεύτερον τεταρτημόριον φθάσῃ εἰς τὸ A' .

Ὅταν τὸ M διαγράψῃ τὸ τρίτον καὶ τέταρτον τεταρτημόριον, παρατηροῦνται αἱ αὐταὶ ὡς ἄνω μεταβολαὶ κατὰ τὴν αὐτὴν τάξιν.


Αἱ μεταβολαὶ τῆς συνεφαπτομένης εἶναι ἀνάλογοι πρὸς τὰς μεταβολὰς τῆς ἐφαπτομένης, ἀλλ' ἡ συνεφαπτομένη μεταβάλλεται ἀντιθέτως τῇ ἐφαπτομένη, ἤτοι ἐνῶ ἡ ἐφαπτομένη αὐξάνεται πάντοτε, ἡ συνεφαπτομένη ἐλαττοῦται πάντοτε.

Σημείωσις. Αἱ ἀνωτέρω σημειωθεῖσαι μεταβολαὶ φαίνονται καὶ ἐκ τῶν ἰσοτήτων $\epsilon\phi\alpha = \frac{\eta\mu\alpha}{\sigma\upsilon\alpha}$, $\epsilon\phi\alpha \cdot \sigma\phi\alpha = 1$.

Ὁ κατωτέρω πίναξ δεικνύει συνοπτικῶς τὰς μεταβολὰς τῆς ἐφαπτομένης καὶ τῆς συνεφαπτομένης τῆς γωνίας ἢ τοῦ τόξου α .

α	0°	αύξ.	90°	αύξ.	180°	αύξ.	270°	αύξ.	360°
εφα	0	αύξ.	$\frac{+\infty}{-\infty}$	αύξ.	0	αύξ.	$\frac{+\infty}{-\infty}$	αύξ.	0
σφα	$+\infty$	έλατ.	0	έλατ.	$\frac{-\infty}{+\infty}$	έλατ.	0	έλατ.	$-\infty$

32. Γραφική παράστασις τῶν μεταβολῶν τῆς ἐφαπτομένης.— Διὰ νὰ παραστήσωμεν γραφικῶς τὰς μεταβολὰς τῆς ἐφαπτομένης φέρομεν δύο ἄξονας ὀρθογωνίους Ax καὶ Ay καὶ λαμβάνομεν ἐπὶ τοῦ ἄξονος Ax , ἀρχόμενοι ἀπὸ τοῦ A , ἀνύσματα, ὧν τὰ μήκη εἶναι ἴσα πρὸς τὰ μήκη τῶν τόξων ἀπὸ τῶν περάτων δὲ τῶν ἀνυσμάτων τούτων φέρομεν καθέτους ἐπὶ τὸν ἄξονα Ax , ἐπὶ δὲ τῶν καθέτων τούτων λαμβά-



νομεν ἀνύσματα, ὧν αἱ ἀρχαὶ κεῖνται ἐπὶ τοῦ ἄξονος Ax , ὁμορρόπως ἴσα πρὸς τὰ ἀνύσματα τῶν ἐφαπτομένων τῶν ἀντιστοίχων τόξων· τὰ πέρατα τῶν τελευταίων τούτων ἀνυσμάτων εἶναι σημεῖα τῆς καμπύλης (ἀσυνεχοῦς), ἧτις δεικνύει τὰς μεταβολὰς τῆς ἐφαπτομένης τόξου, ὅταν τοῦτο μεταβάλλεται ἀπὸ 0° μέχρι 360° .

Κατ' ἀνάλογον τρόπον εὐρίσκομεν τὴν καμπύλην, ἧτις δεικνύει τὰς μεταβολὰς τῆς συνεφαπτομένης τόξου, ὅταν τοῦτο μεταβάλλεται ἀπὸ 0° μέχρι 360° .

29) Νά εύρεθοῦν τὸ ἡμίτονον καὶ συνημίτονον ἐκάστου τῶν τόξων -90° , -180° , -270° , -360° .


30) Νά εύρεθοῦν αἱ μεταβολαὶ τοῦ ἡμιτόνου καὶ τοῦ συνημιτόνου τόξου, ὅταν τοῦτο μεταβάλλεται συνεχῶς ἀπὸ 0° μέχρι -360° καὶ νά παρασταθοῦν αὐταὶ γραφικῶς.

31) Νά εύρεθῆ ἡ ἐφαπτομένη καὶ ἡ συνεφαπτομένη ἐκάστου τῶν τόξων -90° , 180° , -270° , -360° .

32) Νά εύρεθοῦν αἱ μεταβολαὶ τῆς ἐφαπτομένης καὶ συνεφαπτομένης τόξου, ὅταν τοῦτο μεταβάλλεται συνεχῶς ἀπὸ 0° μέχρι -360° καὶ νά παρασταθοῦν αὐταὶ γραφικῶς.

ΤΟΞΑ ΚΑΙ ΓΩΝΙΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑΙ ΕΙΣ ΔΟΘΕΝΤΑ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΝ ΑΡΙΘΜΟΝ


33. 1) Ἐστω ὅτι ζητεῖται τόξον, ἔχον δοθὲν ἡμίτονον μ , ἀναγκαίως περιεχόμενον μεταξὺ -1 καὶ 1 .




Πρὸς τοῦτο λαμβάνομεν ἐπὶ τοῦ ἄξονος τῶν ἡμιτόνων ἄνυσμα OK , ὅπερ ἔχει μῆκος $\frac{OK}{OB}$ ἴσον πρὸς μ καὶ ἐκ τοῦ K φέρομεν τὴν χορδὴν $M'M$ παράλληλον πρὸς τὸν ἄξονα $A'A$. Τὰ τόξα AM καὶ AM' εἶναι φανερόν, ὅτι ἔχουν

ἡμίτονον ἴσον πρὸς τὸ δοθέν.


2) Ἐὰν ζητεῖται τόξον, ἔχον δοθὲν συνημίτονον μ , περιεχόμενον ἀναγκαίως μεταξὺ -1 καὶ $+1$ λαμβάνομεν ἐπὶ τοῦ ἄξονος τῶν συνημιτόνων ἄνυσμά τι OL , ὅπερ ἔχει μῆκος $\frac{OL}{OA}$ ἴσον πρὸς μ καὶ ἐκ τοῦ L φέρομεν χορδὴν $M'M$ παράλληλον πρὸς τὸν ἄξονα $B'B$. Τὰ τόξα AM καὶ AM' ἔχουν προδήλως τὸ δοθὲν συνημίτονον.



3) Έστω, ότι ζητείται τόξον ἔχον δοθεῖσαν ἐφαπτομένην μ . Πρὸς τοῦτο λαμβάνομεν ἐπὶ τοῦ ἄξονος τῶν ἐφαπτομένων ἄνυσμα AE ἔχον μῆκος $\frac{AE}{OB}$ ἴσον πρὸς μ καὶ ἐκ τοῦ E φέρομεν εὐθεῖαν διερχομένην διὰ τοῦ κέντρου O , τέμνουσαν τὴν περιφέρειαν εἰς τὰ M καὶ M' . Τὰ τόξα AM καὶ AM' ἔχουν προδήλως τὴν δοθεῖσαν ἐφαπτομένην.



4) Ἐάν ζητῆται τόξον, ἔχον δοθεῖσαν συνεφαπτομένην μ , λαμβάνομεν ἐπὶ τοῦ ἄξονος τῶν συνεφαπτομένων ἄνυσμά τι $B\Sigma$ ἔχον μῆκος $\frac{B\Sigma}{OA}$ ἴσον πρὸς τὸ μ καὶ ἐκ τοῦ Σ φέρομεν εὐθεῖαν διὰ τοῦ κέντρου O τέμνουσαν τὴν περιφέρειαν εἰς τὰ M καὶ M' . Τὰ τόξα AM καὶ AM' εἶναι φανερόν, ὅτι ἔχουν τὴν δοθεῖσαν συνεφαπτομένην.



ΔΙΚΗΣΕΙΣ

33) Νὰ εὑρεθοῦν τὰ τόξα κοινῆς ἀρχῆς, τὰ ὁποῖα ἔχουν ἡμίτονον ἴσον πρὸς τὸ $\frac{3}{5}$ ἢ $-\frac{3}{7}$.

34) Ὅμοίως τὰ ἔχοντα συνημίτονον $\frac{2}{3}$ ἢ $-\frac{3}{4}$.

35) Ὅμοίως τὰ ἔχοντα ἐφαπτομένην 2 ἢ -3.

36) Ὅμοίως τὰ ἔχοντα συνεφαπτομένην 1 ἢ -1.

ΕΥΡΕΣΙΣ ΤΩΝ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΤΟΞΟΥ ΔΟΘΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΕΞ ΑΥΤΩΝ

34. α) Ἐκ τοῦ ἡμιτόνου.—Αἱ εὐρεθεῖσαι ἐξισώσεις $\eta\mu^2\alpha + \sigma\upsilon\nu^2\alpha = 1$, εφα $= \frac{\eta\mu\alpha}{\sigma\upsilon\nu\alpha}$ ὡς καὶ ἡ σφα $= \frac{\sigma\upsilon\nu\alpha}{\eta\mu\alpha}$ (1)

καθιστοῦν δυνατὴν τὴν εὕρεσιν τῶν τριγωνομετρικῶν ἀριθμῶν τόξου ἢ γωνίας, ὅταν δοθῆ εἷς ἐξ αὐτῶν. Διότι, ἐάν δοθῆ τὸ $\eta\mu\alpha$, εὐρίσκομεν ἐκ τῆς πρώτης τῶν ἀνωτέρω ἐξισώσεων τὸ $\sigma\upsilon\alpha$ καὶ κατόπιν ἐκ τῶν δύο ἄλλων τὴν $\epsilon\phi\alpha$ καὶ $\sigma\phi\alpha$ ἔχομεν δὲ οὕτω :

$$\sigma\upsilon\alpha = \pm\sqrt{1 - \eta\mu^2\alpha}, \quad \epsilon\phi\alpha = \frac{\eta\mu\alpha}{\pm\sqrt{1 - \eta\mu^2\alpha}},$$

$$\sigma\phi\alpha = \frac{\pm\sqrt{1 - \eta\mu^2\alpha}}{\eta\mu\alpha}$$

β) Ἐκ τοῦ **συνημιτόνου**.— Ὅταν δοθῆ τὸ $\sigma\upsilon\alpha$, εὐρίσκομεν ἐκ τῶν ἐξισώσεων (1)

$$\eta\mu\alpha = \pm\sqrt{1 - \sigma\upsilon\alpha^2}, \quad \epsilon\phi\alpha = \frac{\pm\sqrt{1 - \sigma\upsilon\alpha^2}}{\sigma\upsilon\alpha}$$

$$\sigma\phi\alpha = \frac{\sigma\upsilon\alpha}{\pm\sqrt{1 - \sigma\upsilon\alpha^2}}$$

Παρατήρησις. Ἐπὶ τῶν ἀνωτέρω παρατηροῦμεν, ὅτι ἐκ τοῦ ἡμιτόνου τόξου τινὸς ἢ ἐκ τοῦ **συνημιτόνου** τοῦ δὲν ὀρίζονται ἐντελῶς οἱ ἄλλοι τριγωνομετρικοὶ ἀριθμοὶ αὐτοῦ· διότι εἰς τὸ ἡμίτονον τοῦ α π. χ. βλέπομεν, ὅτι ἀντιστοιχοῦν δύο σειραὶ τιμῶν τῶν ἄλλων τριγωνομετρικῶν ἀριθμῶν,

$$\eta\mu\alpha + \sqrt{1 - \eta\mu^2\alpha}, \quad \frac{\eta\mu\alpha}{+\sqrt{1 - \eta\mu^2\alpha}}, \quad \frac{+\sqrt{1 - \eta\mu^2\alpha}}{\eta\mu\alpha} \quad \text{καὶ ἢ}$$

$$-\sqrt{1 - \eta\mu^2\alpha}, \quad \frac{\eta\mu\alpha}{-\sqrt{1 - \eta\mu^2\alpha}}, \quad \frac{-\sqrt{1 - \eta\mu^2\alpha}}{\eta\mu\alpha}$$

Ἴνα ὁμοῦς ὀρισθοῦν ἐντελῶς οἱ ζητούμενοι τριγωνομετρικοὶ ἀριθμοί, πρέπει νὰ δοθῆ καὶ τὸ τεταρτημόριον, εἰς τὸ ὁποῖον περατοῦται τὸ τόξον.

35. γ) Ἐκ τῆς **ἐφαπτομένης**.— Ὅταν ἡ ἐφαπτομένη τῶν τόξου δοθῆ καὶ τὸ ἡμίτονον καὶ τὸ **συνημιτόνον** αὐτοῦ εἶναι ὀρισμένα κατὰ τὴν ἀπόλυτον τιμὴν, διότι συνδέονται διὰ τῶν ἐξισώσεων.

$$\eta^2\alpha + \sigma\upsilon\nu^2\alpha = 1$$

$$\frac{\eta\alpha}{\sigma\upsilon\nu\alpha} = \epsilon\phi\alpha.$$

Ἴνα δὲ ἐκ τῶν ἐξισώσεων τούτων εὕρωμεν τὰς τιμὰς τῶν $\eta\alpha$ καὶ τῶν $\sigma\upsilon\nu\alpha$ (ὑποθέτοντες γνωστὴν τὴν $\epsilon\phi\alpha$) λύομεν τὴν δευτέραν ὡς πρὸς τὸ $\eta\alpha$, ὁπότε εὐρίσκομεν $\eta\alpha = \sigma\upsilon\nu\alpha \cdot \epsilon\phi\alpha$ καὶ ἀντικαθιστῶμεν τὴν τιμὴν τοῦ $\eta\alpha$ εἰς τὴν πρώτην· οὕτω προκύπτει

$$(\epsilon\phi\alpha \cdot \sigma\upsilon\nu\alpha)^2 + \sigma\upsilon\nu^2\alpha = 1 \quad \eta$$

$$\epsilon\phi^2\alpha \sigma\upsilon\nu^2\alpha + \sigma\upsilon\nu^2\alpha = 1, \quad \text{ἐξ ἧς}$$

$$(1 + \epsilon\phi^2\alpha) \sigma\upsilon\nu^2\alpha = 1.$$

$$\text{Ὅθεν } \sigma\upsilon\nu^2\alpha = \frac{1}{1 + \epsilon\phi^2\alpha} \quad \text{καὶ } \sigma\upsilon\nu\alpha = \pm \frac{1}{\sqrt{1 + \epsilon\phi^2\alpha}}$$

$$\text{Ἐπειδὴ δὲ } \eta\alpha = \sigma\upsilon\nu\alpha \cdot \epsilon\phi\alpha, \quad \text{ἔπεται } \eta\alpha = \pm \frac{\epsilon\phi\alpha}{\sqrt{1 + \epsilon\phi^2\alpha}} \quad (2).$$

Τὴν τετραγωνικὴν ρίζαν δυνάμεθα νὰ λάβωμεν καὶ θετικῶς καὶ ἀρνητικῶς. Ἄλλ' ὅταν λάβωμεν τὸ ἡμίτονον θετικόν (ἀρνητικόν) πρέπει καὶ τὸ συνημίτονον νὰ τὸ λάβωμεν θετικόν (ἀρνητικόν), διότι ἐκ τοῦ $\eta\alpha$ καὶ $\sigma\upsilon\nu\alpha$ πρέπει νὰ προκύπτῃ

$$\frac{\eta\alpha}{\sigma\upsilon\nu\alpha} = \epsilon\phi\alpha.$$

Ὅτι δὲ τὸ σημεῖον τοῦ ἡμιτόνου καὶ τοῦ συνημιτόνου δὲν δύναται νὰ ὀρισθῇ ἐκ τῆς ἐφαπτομένης, γίνεται φανερόν ἐκ τούτου, ὅτι πρὸς ἐκάστην δοθεῖσαν ἐφαπτομένην ἀντιστοιχοῦν δύο τόξα, περατούμενα εἰς τὰ ἄκρα μιᾶς διαμέτρου καὶ ἔχοντα διὰ τοῦτο ἀντίθετα ἡμίτονα καὶ ἀντίθετα συνημίτονα· οἱ δὲ τύποι (2) πρέπει νὰ δίδουν καὶ τῶν δύο τούτων τόξων τὰ ἡμίτονα καὶ συνημίτονα.

Τὸ σημεῖον τῆς τετραγωνικῆς ρίζης ὀρίζομεν, ἐὰν γνωρίζωμεν εἰς ποῖον τεταρτημόριον περατοῦται τὸ τόξον. Διὰ τόξα π.χ. μικρότερα τῶν 90° , ἡ ρίζα πρέπει νὰ λαμβάνηται θετικῶς, διότι ταῦτα ἔχουν θετικόν συνημίτονον.

Ἡ $\sigma\phi\alpha$ ἐκ τῆς $\epsilon\phi\alpha$ ὀρίζεται ἀμέσως.

Παρατήρησης. Οί τέσσαρες τριγωνομετρικοί ἀριθμοί παντός τόξου εἶδομεν, ὅτι συνδέονται διὰ τῶν κάτωθι τριῶν ἐξισώσεων.

$$\begin{aligned} \eta\mu^2\alpha + \sigma\upsilon\nu^2\alpha &= 1 \\ \epsilon\phi\alpha &= \frac{\eta\mu\alpha}{\sigma\upsilon\nu\alpha} \text{ καὶ } \sigma\phi\alpha = \frac{\sigma\upsilon\nu\alpha}{\eta\mu\alpha} \end{aligned} \quad (3)$$

καὶ ὅτι δοθέντος τοῦ ἑνὸς ἐξ αὐτῶν προσδιορίζονται ἐκ τῶν ἐξισώσεων τούτων καὶ οἱ τρεῖς ἄλλοι (κατὰ τὴν ἀπόλυτον τιμὴν). Πᾶσα δὲ ἄλλη ἐξίσωσις, τοὺς ἀριθμοὺς τοῦ τυχόντος τόξου συνδέουσα, πρέπει ἢ νὰ κατανατᾷ ταυτότητος ἢ νὰ διδῇ τὴν πρώτην $\eta\mu^2\alpha + \sigma\upsilon\nu^2\alpha = 1$, ὅταν ἐν αὐτῇ ἀντικατασταθοῦν αἱ ἐφαπτόμεναι καὶ αἱ συνεφαπτόμεναι ὑπὸ τῶν τιμῶν αὐτῶν, διότι μεταξὺ τοῦ ἡμιτόνου καὶ τοῦ συνημιτόνου τοῦ τυχόντος τόξου αὐτὴ μόνη ἢ ἐξίσωσις ὑπάρχει. Εὐρίσκομεν δὲ ἐξισώσεις τοιαύτας ὅσαοδὴποτε, ἐὰν συνδυάσωμεν κατὰ ποικίλους τρόπους τὰς τρεῖς ἀρχικὰς ἐξισώσεις (3)· ἀναγράφομεν δ' ἐνταῦθα μόνον τὰς πρωτεύουσας ἐξ αὐτῶν·

$$\begin{aligned} \epsilon\phi\alpha \cdot \sigma\phi\alpha &= 1 \\ 1 + \epsilon\phi^2\alpha &= \frac{1}{\sigma\upsilon\nu^2\alpha} \\ 1 + \sigma\phi^2\alpha &= \frac{1}{\eta\mu^2\alpha} \\ \epsilon\phi\alpha + \sigma\phi\alpha &= \frac{1}{\eta\mu\alpha \cdot \sigma\upsilon\nu\alpha} \end{aligned}$$

τῶν ὁποίων ἡ ἀλήθεια εὐκόλως ἀποδεικνύεται διὰ τῆς ἀντικαταστάσεως τῶν $\epsilon\phi\alpha$ καὶ $\sigma\phi\alpha$ διὰ τῶν τιμῶν αὐτῶν.

Α Σ Κ Η Σ Ι Ε Ι Σ

Νὰ εὕρεθοῦν οἱ λοιποὶ τριγωνομετρικοὶ ἀριθμοὶ τοῦ τόξου α , ὅταν τὸ τόξον α

37) περατοῦται εἰς τὸ α' τεταρτημόριον καὶ εἶναι $\eta\mu\alpha = \frac{3}{8}$.

38) » » « β' » » $\eta\mu\alpha = \frac{12}{17}$.

39) περατοῦται εἰς τὸ β' τεταρτημόριον, καὶ εἶναι $\text{ συνα} = -\frac{4}{5}$.

40) » » » γ' » » » $\text{ εφ}\alpha = \frac{9}{11}$.

41) » » » δ' » » » $\text{ εφ}\alpha = \frac{3}{4}$.

42) » » » β' » » » $\text{ εφ}\alpha = -1$.

43) » » » γ' » » » $\text{ συνα} = -\frac{2}{3}$.

44) Ὄταν $\text{ συνα} = -\frac{1}{2}$ καὶ $\eta\mu\alpha$ εἶναι θετικόν.

45) Ὄταν $\eta\mu\alpha = \frac{3}{5}$ καὶ συνα εἶναι ἀρνητικόν.

46) Ἐὰν $\eta\mu\alpha = \frac{3}{5}$ καὶ $\text{ συν}\beta = \frac{40}{41}$ καὶ τὰ τόξα α καὶ β περατοῦνται εἰς τὸ α' τεταρτημόριον, εὑρεῖν τὴν τιμὴν τῆς παραστάσεως $\eta\mu\alpha.\text{ συν}\beta + \eta\mu\beta.\text{ συνα}$.

47) Ἐὰν $\text{ συνα} = \frac{7}{25}$ καὶ $\text{ συν}\beta = \frac{40}{41}$, εὑρεῖν τὴν τιμὴν τῆς παραστάσεως $\text{ συνα. συν}\beta - \eta\mu\alpha.\eta\mu\beta$.

48) Ἐὰν $\text{ εφ}\alpha = \frac{3}{4}$, εὑρεῖν τὴν τιμὴν τῶν παραστάσεων $2\eta\mu\alpha.\text{ συνα}$, $\text{ συν}^2\alpha - \eta\mu^2\alpha$ καὶ $\frac{\sqrt{1-\text{ συνα}}}{2}$.

49) Ὄμοίως, ἐὰν $\text{ εφ}\beta = \frac{11}{60}$, εὑρεῖν τὴν τιμὴν τῶν παραστάσεων $2\eta\mu\beta.\text{ συν}\beta$, $\text{ συν}^2\beta - \eta\mu^2\beta$ καὶ $\frac{\sqrt{1+\text{ συν}\beta}}{2}$.

50) Ἐὰν $\text{ εφ}\alpha = \frac{3}{4}$ καὶ $\text{ εφ}\beta = \frac{60}{61}$ καὶ τὰ τόξα α καὶ β περατοῦνται εἰς τὸ α' τεταρτημόριον, νὰ εὑρεθοῦν αἱ τιμαὶ τῶν παραστάσεων $\eta\mu\alpha.\text{ συν}\beta - \eta\mu\beta.\text{ συνα}$ καὶ $\text{ συνα. συν}\beta + \eta\mu\alpha.\eta\mu\beta$.

51) Νὰ εὑρεθοῦν οἱ τριγωνομετρικοὶ ἀριθμοὶ τοῦ τόξου α ἐκ τῆς συνεφαπτομένης αὐτοῦ.


52) Ἐὰν $\text{ σφ}\alpha = \frac{14}{9}$, νὰ εὑρεθοῦν οἱ λοιποὶ τριγωνομετρικοὶ ἀριθμοὶ τοῦ τόξου α .

53) Ἐὰν $\text{ σφ}\alpha = \frac{8}{15}$ καὶ $\text{ σφ}\beta = \frac{12}{5}$ καὶ τὰ τόξα α καὶ β περατοῦνται εἰς τὸ α' τεταρτημόριον, εὑρεῖν τὴν τιμὴν τῶν παραστάσεων $\eta\mu\alpha.\text{ συν}\beta + \eta\mu\beta.\text{ συνα}$ καὶ $\text{ συνα. συν}\beta - \eta\mu\alpha.\eta\mu\beta$.

Ἡ εὐρεσις τῶν τριγωνομετρικῶν ἀριθμῶν διαφόρων τόξων ἀπαιτεῖ πράξεις πολυπλόκους. Δι' ὠρισμένα ὅμως τόξα ἡ εὐρεσις τῶν τριγωνομετρικῶν ἀριθμῶν τῶν εἶναι εὐκολος, στηρίζεται δὲ αὐτὴ εἰς τὸ κάτωθι θεώρημα.

36. **Θεώρημα.**—*Τὸ ἡμίτονον παντὸς τόξου θετικοῦ καὶ μικρότερου τῶν 90° εἶναι τὸ ἥμισυ τῆς χορδῆς τοῦ διπλασίου τόξου.*

Ἐστω τὸ τόξον AM , τὸ ὁποῖον εἶναι μικρότερον τῶν 90° καὶ OP , OR αἱ συντεταγμέναι τοῦ πέρατος αὐτοῦ M , ὡς πρὸς τοὺς ἄξονας $A'O A$ καὶ $B'O B$. Τὰ ἀνύσματα OP καὶ PM εἶναι ὁμορρόπως ἴσα· ἐπομένως εἶναι καὶ $\eta\mu(AM) = (PM)$. Ἄλλ' ἐὰν τὸ PM προεκταθῆ πέραν τῆς διαμέτρου, ἐφ' ἣν εἶναι κάθετον μέχρις, ὅπου συνταντήσῃ τὴν περιφέρειαν εἰς τὸ M' , τὸ P εἶναι τὸ μέσον τῆς $M'M$ καὶ τὸ A μέσον τοῦ τόξου $M'AM$. Ὡστε ἀπεδείχθη ἡ πρότασις.



Στηριζόμενοι ἤδη εἰς τὸ ἀνωτέρω θεώρημα, εὐρίσκομεν εὐκόλως τοὺς τριγωνομετρικοὺς ἀριθμοὺς τόξων τινῶν ἐπὶ π.δ. τοῦ τόξου 45° . Διότι πρὸς τοῦτο παρατηροῦμεν, ὅτι, ἂν $(AM) = 45^\circ$, τὸ τόξον $M'AM$ εἶναι 90° καὶ ἡ $M'PM$ εἶναι πλευρὰ ἐγγεγραμμένου εἰς τὸν τριγωνομετρικὸν κύκλον τετραγώνου.

Ἐπομένως εἶναι $(M'PM) = \sqrt{2}$ καὶ $(PM) = \frac{\sqrt{2}}{2}$, ἥτοι $\eta\mu 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

Ἦδη οἱ λοιποὶ τριγωνομετρικοὶ ἀριθμοὶ αὐτοῦ εὐρίσκονται εὐκόλως καὶ εἶναι:

$$\sigma\upsilon\nu 45^\circ = \sqrt{1 - \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad \epsilon\phi 45^\circ = 1 \quad \text{καὶ} \quad \sigma\phi 45^\circ = 1.$$

Ἐργαζόμενοι κατὰ τὸν αὐτὸν ὡς ἄνω τρόπον, εὐρίσκομεν εὐκόλως, ὅτι τὰ ἡμίτονα τῶν τόξων 30° , 60° , εἶναι ἀντιστοίχως τὰ ἥμισυ τῶν πλευρῶν κανονικοῦ ἑξαγώνου καὶ ἰσοπλευροῦ

τριγώνου έγγεγραμμένων εις τόν τριγωνομετρικόν κύκλον, δη-
λαδή είναι $\eta\mu 30^\circ = \frac{1}{2}$ και $\eta\mu 60^\circ = \frac{\sqrt{2}}{3}$.

Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ

54) Νά συμπληρωθῆ ὁ κάτωθι πίναξ διὰ τῶν ἔλλιπόντων τριγωνομετρικῶν ἀριθμῶν τοῦ ἄνωθι ἐκάστης στήλης τόξου. (Οἱ τριγωνομετρικοὶ ἀριθμοὶ τῶν τόξων τοῦ πίνακος πρέπει νὰ εἶναι γνωστοὶ ἀπὸ μνήμης).

α	0°	30°	45°	60°	90°	180°	270°	360°
$\eta\mu\alpha$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0	-1	0
$\sigma\upsilon\nu\alpha$	1		$\frac{\sqrt{2}}{2}$					
$\epsilon\phi\alpha$			1					
$\sigma\phi\alpha$			1					

55) Νά εὑρεθοῦν αἱ τιμαὶ τῶν κάτωθι παραστάσεων :

$$\eta\mu^2 30^\circ + \eta\mu^2 45^\circ + \eta\mu^2 60^\circ.$$

καὶ $\eta\mu 30^\circ \cdot \sigma\upsilon\nu 60^\circ + \sigma\upsilon\nu 30^\circ \cdot \eta\mu 60^\circ.$


56) Ὅμοίως νὰ εὑρεθῆ ἡ τιμὴ τῆς παραστάσεως $\sigma\upsilon\nu 45^\circ \cdot \sigma\upsilon\nu 60^\circ + \eta\mu 45^\circ \cdot \eta\mu 60^\circ.$

57) Ὅμοίως νὰ εὑρεθῆ ἡ τιμὴ τῆς παραστάσεως $\epsilon\phi^2 30^\circ + \epsilon\phi^2 45^\circ + \epsilon\phi^2 60^\circ.$

58) Νά εὑρεθῆ τὸ $\eta\mu 18^\circ$ καὶ κατόπιν οἱ ἄλλοι τριγωνομετρικοὶ ἀριθμοὶ αὐτοῦ.

59) Ὅμοίως νὰ εὑρεθῆ τὸ $\eta\mu 36^\circ$ καὶ κατόπιν οἱ ἄλλοι τριγωνομετρικοὶ ἀριθμοὶ αὐτοῦ.

37. Ἐστω τυχόν τόξον AM τοῦ τριγωνομετρικοῦ κύκλου O . Ἐάν λάβωμεν ἐπὶ τῆς περιφερείας αὐτοῦ τὰ σημεῖα M', M'', M''' , συμμετρικὰ τοῦ M ὡς πρὸς τοὺς ἄξονας $A'A, B'B$ καὶ τὸ κέντρον O , παρατηροῦμεν κατὰ πρῶτον, ὅτι τὰ τόξα AM, AM' ἔχουν ἄθροισμα 180° , ἤτοι εἶναι *παραπληρωματικά*· ὅτι τὰ τόξα AM, AM'' διαφέρουν κατὰ 180° , τὰ τόξα AM, AM''' ἔχουν ἄθροισμα 360° , ἐνῶ τὰ τόξα AM καὶ τὸ ἀντίθετου φορᾶς AM''' εἶναι ἀντίθετα· ὅλα δὲ τὰ τόξα ταῦτα, τὰ ὁποῖα ἔχουν τὴν αὐτὴν ἀρχὴν A καὶ πέρατα τὰ οὕτω ληφθέντα σημεῖα M, M', M'', M''' , παρατηροῦμεν, ὅτι ἔχουν τριγωνομετρικοὺς ἀριθμοὺς ἴσους μὲν κατ' ἀπόλυτον τιμὴν, μὲ σημεῖα ὅμως διάφορα, εἰδικῶς δὲ συνάγομεν εὐκόλως ἐκ τοῦ σχήματος, ὅτι



α') διὰ τὰ παραπληρωματικά τόξα ἔχομεν, ἐάν $(AM) = \alpha$, ὁπότε $(AM') = 180^\circ - \alpha$.

$$\eta\mu(180^\circ - \alpha) = \eta\mu\alpha.$$

$$\sigma\upsilon\nu(180^\circ - \alpha) = -\sigma\upsilon\nu\alpha$$

$$\epsilon\phi(180^\circ - \alpha) = -\epsilon\phi\alpha \quad \text{ὥστε καὶ}$$

$$\sigma\phi(180^\circ - \alpha) = -\sigma\phi\alpha$$

β') διὰ τὰ διαφέροντα κατὰ ἡμιπεριφέρειαν $(AM) = \alpha$, $(AM'') = 180^\circ + \alpha$ ἔχομεν

$$\eta\mu(180^\circ + \alpha) = -\eta\mu\alpha$$

$$\sigma\upsilon\nu(180^\circ + \alpha) = -\sigma\upsilon\nu\alpha$$

$$\epsilon\phi(180^\circ + \alpha) = \epsilon\phi\alpha \quad \text{ἄρα καὶ}$$

$$\sigma\phi(180^\circ + \alpha) = \sigma\phi\alpha$$

γ') διὰ τὰ τόξα τὰ ἔχοντα ἄθροισμα ὀλόκληρον περιφέρειαν $(AM) = \alpha$, $(AM''') = 360^\circ - \alpha$, εὐρίσκομεν

$$\eta\mu(360^\circ - \alpha) = -\eta\mu\alpha$$

$$\sigma\upsilon\nu(360^\circ - \alpha) = \sigma\upsilon\nu\alpha$$

$$\epsilon\phi(360^\circ - \alpha) = -\epsilon\phi\alpha \quad \text{ὥστε καὶ}$$

$$\sigma\phi(360^\circ - \alpha) = -\sigma\phi\alpha$$

καὶ δ') διὰ τὸ $(AM) = \alpha$ καὶ τὸ ἀρνητικῆς φορᾶς $(AM'') = -\alpha$, ἦτοι διὰ τὰ ἀντίθετα τόξα ἔχομεν

$$\begin{aligned} \eta\mu(-\alpha) &= -\eta\mu\alpha \\ \sigma\upsilon\nu(-\alpha) &= \sigma\upsilon\nu\alpha \\ \epsilon\phi(-\alpha) &= -\epsilon\phi\alpha && \text{\textasciitilde{ρα καὶ}} \\ \sigma\phi(-\alpha) &= -\sigma\phi\alpha \end{aligned}$$

38. Αἱ ἀνωτέρω εὐρεθεῖσαι σχέσεις ἐπιτρέπουν τὴν ἀναγωγὴν τῶν τριγωνομετρικῶν ἀριθμῶν παντὸς τόξου εἰς τοὺς τριγωνομετρικοὺς ἀριθμοὺς τόξου μικροτέρου τῶν 90° · διότι, ἂν μὲν εἶναι τὸ τόξον μεταξύ 90° καὶ 180° , τὸ παραπληρωματικὸν αὐτοῦ εἶναι μεταξύ 0° καὶ 90° · ἔχουν δὲ ταῦτα ἴσα μὲν ἡμίτονα, ἀντίθετα δὲ τὰ συν., εφ. καὶ σφ.

Ἐὰν δὲ εἶναι μεταξύ 180° καὶ 270° , ἀφαιροῦμεν ἀπ' αὐτοῦ 180° , ὅτε μένει τόξον μικρότερον τῶν 90° · ἔχουν δὲ τὰ τόξα ταῦτα ἡμίτονα καὶ συνημίτονα ἀντίθετα, ἐφαπτομένας δὲ καὶ συνεφαπτομένας ἴσας· ἂν δὲ τέλος εἶναι μεταξύ 270° καὶ 360° τὸ πέρασ τοῦ ἀντιθέτου αὐτοῦ τόξου ἔχει τὸ αὐτὸ πέρασ μετὰ τοῦ τόξου, τὸ ὅποιον εἶναι διαφορά τοῦ δοθέντος ἀπὸ τῶν 360° . Τὸ τόξον δὲ τοῦτο καὶ τὸ δοθὲν ἔχουν συνημίτονα ἴσα, ἀντίθετα δὲ ημ., εφ. καὶ σφ.

Παραδείγματα. 1) 145° · τοῦτου παραπληρωματικὸν εἶναι τὸ τόξον 35° · ὅθεν $\eta\mu 145^\circ = \eta\mu 35^\circ$, $\sigma\upsilon\nu 145^\circ = -\sigma\upsilon\nu 35^\circ$, $\epsilon\phi 145^\circ = -\epsilon\phi 35^\circ$, $\sigma\phi 145^\circ = -\sigma\phi 35^\circ$.

2) 248° . Τοῦτο διαφέρει τοῦ 180° κατὰ 68° .

Ὅθεν $\eta\mu 248^\circ = -\eta\mu 68^\circ$, $\sigma\upsilon\nu 248^\circ = -\sigma\upsilon\nu 68^\circ$ κλπ.

3) 336° . Λαμβάνομεν τὸ τόξον $360^\circ - 336^\circ = 24^\circ$.

39. Τόξα συμπληρωματικά.— Ἄλλὰ καὶ οἱ τριγωνομετρικοὶ ἀριθμοὶ τῶν μεταξύ 45° καὶ 90° περιλαμβανομένων τόξων ἀνάγονται εἰς τοὺς τριγωνομετρικοὺς ἀριθμοὺς τῶν μεταξύ 0° καὶ 45° περιλαμβανομένων, ὡς συνάγεται ἐκ τῶν σχέσεων μεταξύ τῶν τριγωνομετρικῶν ἀριθμῶν τῶν *συμπληρωματικῶν τόξων*, ἦτοι δύο τόξων ἐχόντων ἄθροισμα 90° καὶ τὰς ὁποίας δεῖκνύομεν κατωτέρω.

Ἐστώσαν δύο συμπληρωματικά τόξα τὰ $(AM) = \alpha$ καὶ $(AM') = 90^\circ - \alpha$. Ἐάν φέρωμεν τὴν διχοτόμον $\Delta'O\Delta$ τῆς πρώτης θετικῆς γωνίας AOB καὶ παρατηρήσωμεν, ὅτι τὰ τόξα AM καὶ $M'B$ εἶναι ἴσα (διότι καὶ τὰ AM' καὶ $M'B$ εἶναι συμπληρωματικά), εὐκόλως συνάγεται, ὅτι εἶναι συμμετρικά ὡς πρὸς τὴν διχοτόμον ταύτην $\Delta'O\Delta$. Ἄλλ' εἶναι :



$\eta\mu(AM) = (PM)$, $\eta\mu(AM') = (OP')$, $\sigma\upsilon\nu(AM) = (OP)$ καὶ $\sigma\upsilon\nu(AM') = (OP') = (P'M')$. ἂν δὲ περιστραφῆ τὸ ἐν ἡμικύκλιον περὶ τὴν $\Delta'\Delta$, μέχρις οὗτοῦ ἐφαρμοσθῆ ἐπὶ τοῦ ἄλλου, θὰ πέσῃ τὸ M ἐπὶ τοῦ M' , τὸ A ἐπὶ τοῦ B καὶ τὸ P ἐπὶ τοῦ P' , τὸ δὲ O θὰ

μείνῃ ἀκίνητον. Ἐπομένως οἱ ἀριθμοὶ (OP) καὶ (OP') εἶναι ἴσοι κατ' ἀπόλυτον τιμὴν καὶ κατὰ σημεῖον, ὡς καὶ οἱ (PM) καὶ $(P'M')$ εἶναι ἄρα

$$\begin{aligned} \eta\mu(AM') &= \sigma\upsilon\nu(A.M) \text{ καὶ } \sigma\upsilon\nu(AM') = \eta\mu(AM) \\ \text{ἢτοι} \quad \eta\mu(90^\circ - \alpha) &= \sigma\upsilon\nu\alpha \\ \sigma\upsilon\nu(90^\circ - \alpha) &= \eta\mu\alpha. \end{aligned}$$

Διὰ τὰς $\epsilon\phi\alpha = (A\Sigma)$ καὶ $\epsilon\phi(90^\circ - \alpha) = A\Sigma'$ παρατηροῦμεν, ὅτι τὰ τρίγωνα $AO\Sigma$ καὶ $AO\Sigma'$, τὰ ὁποῖα εἶναι ὀρθογώνια, ἔχουν τὴν γωνίαν $AO\Sigma$ ἴσην τῇ γωνίᾳ $A\Sigma'O$, ἐπειδὴ ἀμφοτέραι εἶναι συμπληρώματα τῆς αὐτῆς γωνίας $AO\Sigma'$. ἄρα τὰ τρίγωνα ταῦτα εἶναι ὁμοία, οἱ δὲ λόγοι $\frac{A\Sigma}{OA}$, $\frac{OA}{A\Sigma'}$ εἶναι ἴσοι καὶ κατ'

ἀπόλυτον τιμὴν καὶ κατὰ σημεῖον· ἔχομεν ἐπομένως $\frac{(A\Sigma)}{(OA)} = \frac{(OA)}{(A\Sigma')}$ ἢτοι $(A\Sigma) \cdot (A\Sigma') = 1$ ἢ $\epsilon\phi\alpha \cdot \epsilon\phi(90^\circ - \alpha) = 1$ ἐξ αὐτῆς δὲ λαμβάνομεν

$$\begin{aligned} \epsilon\phi(90^\circ - \alpha) &= \sigma\phi\alpha \quad \text{καὶ} \\ \sigma\phi(90^\circ - \alpha) &= \epsilon\phi\alpha. \end{aligned}$$

Ὅστε ἀρκεῖ νὰ ἔχωμεν τοὺς τριγωνομετρικοὺς ἀριθμοὺς τῶν τόξων, ἅτινα περιέχονται μεταξὺ 0° καὶ 45° .

40. Τόξα διαφέροντα κατὰ 90° .—Ἐάν εἰς τὰς σχέσεις

$\eta\mu(90^\circ - \alpha) = \sigma\upsilon\nu\alpha$ και $\sigma\upsilon\nu(90^\circ - \alpha) = \eta\mu\alpha$, θέσωμεν $-\alpha$ ἀντί α
 ἔχομεν: $\eta\mu[90^\circ - (-\alpha)] = \sigma\upsilon\nu(-\alpha)$ και
 $\sigma\upsilon\nu[90^\circ - (-\alpha)] = \eta\mu(-\alpha)$ ἤτοι ἔχομεν
 $\eta\mu(90^\circ + \alpha) = \sigma\upsilon\nu\alpha$ και
 $\sigma\upsilon\nu(90^\circ + \alpha) = -\eta\mu\alpha$, ὁπότε εἶναι
 $\epsilon\phi(90^\circ + \alpha) = -\sigma\phi\alpha$
 $\sigma\phi(90^\circ + \alpha) = -\epsilon\phi\alpha$.

41. Τόξα ἔχοντα ἄθροισμα 270° .—Τὰ τόξα $270^\circ - \alpha$ και α ἔχουν ἄθροισμα 270° . Ἄλλ' εἶναι

$\eta\mu(270^\circ - \alpha) = \eta\mu[180^\circ + (90^\circ - \alpha)] = -\eta\mu(90^\circ - \alpha) = -\sigma\upsilon\nu\alpha$ και
 $\sigma\upsilon\nu(270^\circ - \alpha) = \sigma\upsilon\nu[180^\circ + (90^\circ - \alpha)] = -\sigma\upsilon\nu(90^\circ - \alpha) = -\eta\mu\alpha$.
 Ὡστε εἶναι

$$\begin{aligned}
 \eta\mu(270^\circ - \alpha) &= -\sigma\upsilon\nu\alpha \\
 \sigma\upsilon\nu(270^\circ - \alpha) &= -\eta\mu\alpha \\
 \epsilon\phi(270^\circ - \alpha) &= \sigma\phi\alpha && \text{και} \\
 \sigma\phi(270^\circ - \alpha) &= \epsilon\phi\alpha.
 \end{aligned}$$

42. Τόξα διαφέροντα κατὰ 270° .—Ἐὰν εἰς τὰς προηγουμένης σχέσεις θέσωμεν $-\alpha$ ἀντί α εὐρίσκομεν:

$$\begin{aligned}
 \eta\mu(270^\circ + \alpha) &= -\sigma\upsilon\nu\alpha \\
 \sigma\upsilon\nu(270^\circ + \alpha) &= \eta\mu\alpha \\
 \epsilon\phi(270^\circ + \alpha) &= -\sigma\phi\alpha && \text{και} \\
 \sigma\phi(270^\circ + \alpha) &= -\epsilon\phi\alpha.
 \end{aligned}$$

43. Τόξα διαφέροντα κατὰ 360° .—Τὰ τόξα $360^\circ + \alpha$ και α διαφέρουν κατὰ 360° . Ἄλλ' εἶναι φανερόν, ὅτι τὰ τόξα ταῦτα ἔχουν τὴν αὐτὴν ἀρχὴν και τὸ αὐτὸ πέρασ. Ὡθεν εἶναι:

$$\begin{aligned}
 \eta\mu(360^\circ + \alpha) &= \eta\mu\alpha \\
 \sigma\upsilon\nu(360^\circ + \alpha) &= \sigma\upsilon\nu\alpha \\
 \epsilon\phi(360^\circ + \alpha) &= \epsilon\phi\alpha && \text{και} \\
 \sigma\phi(360^\circ + \alpha) &= \sigma\phi\alpha.
 \end{aligned}$$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

60) Νὰ εὐρεθοῦν οἱ τριγωνομετρικοὶ ἀριθμοὶ ἐκάστου τῶν τόξων 120° , 135° , 150° .

61) Νά εύρεθοῦν οἱ τριγωνομετρικοὶ ἀριθμοὶ ἐκάστου τῶν τόξων 210° , 225° , 240° , 300° , 315° , 330° .

62) Ὁμοίως ἐκάστου τῶν τόξων -30° , -45° , -60° .

63) Ὁμοίως ἐκάστου τῶν τόξων -150° , -240° , -315° .

64) Ὁμοίως ἐκάστου τῶν τόξων 72° , 54° , -72° , -54° .

65) Νά δειχθῆ, ὅτι ἐν παντὶ τριγώνῳ $AB\Gamma$ εἶναι $\eta\mu A = \eta\mu(B + \Gamma)$, $\sigma\upsilon\nu B = -\sigma\upsilon\nu(\Gamma + A)$ καὶ $\epsilon\phi\Gamma = -\epsilon\phi(A + B)$.

66) Νά δειχθῆ, ὅτι ἐν παντὶ τριγώνῳ $AB\Gamma$ εἶναι

$$\eta\mu \frac{A}{2} = \sigma\upsilon\nu \frac{B + \Gamma}{2}, \quad \sigma\upsilon\nu \frac{B}{2} = \eta\mu \frac{\Gamma + A}{2}$$

$$\epsilon\phi \frac{\Gamma}{2} = \sigma\phi \frac{A + B}{2}$$

67) Νά δειχθῆ, ὅτι

$$\eta\mu 120^\circ \cdot \sigma\upsilon\nu 330^\circ + \sigma\upsilon\nu(-300^\circ) \cdot \eta\mu(-330^\circ) = 1.$$

68) Ὁμοίως, ὅτι

$$\sigma\upsilon\nu 210^\circ \cdot \eta\mu 150^\circ - \eta\mu 330^\circ \cdot \sigma\upsilon\nu 150^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

69) Ὁμοίως, ὅτι

$$\eta\mu 150^\circ \cdot \sigma\upsilon\nu 240^\circ - \sigma\upsilon\nu 300^\circ \cdot \eta\mu 210^\circ = 0.$$

70) Ὁμοίως, ὅτι

$$\sigma\phi 120^\circ + \epsilon\phi 210^\circ + \epsilon\phi 240^\circ + \epsilon\phi 300^\circ = 0.$$

71) Νά δειχθῆ ὁμοίως, ὅτι

$$\epsilon\phi 225^\circ \cdot \sigma\phi 135^\circ - \epsilon\phi 315^\circ \cdot \sigma\phi 225^\circ = 0.$$

72) Νά εύρεθοῦν αἱ τιμαὶ τῶν παραστάσεων

1) $\sigma\upsilon\nu 120^\circ \eta\mu 30^\circ - \eta\mu 120^\circ \sigma\upsilon\nu 30^\circ$

2) $\eta\mu 300^\circ \sigma\upsilon\nu 60^\circ + \sigma\upsilon\nu 300^\circ \eta\mu 60^\circ$

3) $\frac{\sigma\phi 240^\circ + \sigma\phi 60^\circ}{1 - \sigma\phi 240^\circ \cdot \sigma\phi 60^\circ}$

73) Ποῖον εἶναι τὸ σημεῖον ἐκάστου τῶν ἀθροισμάτων $\eta\mu 160^\circ + \sigma\upsilon\nu 160^\circ$, $\eta\mu 128^\circ + \sigma\upsilon\nu 128^\circ$, $\eta\mu(-310^\circ) + \sigma\upsilon\nu(-210^\circ)$.

74) Ποῖον εἶναι τὸ σημεῖον ἐκάστης τῶν διαφορῶν $\eta\mu 220^\circ - \sigma\upsilon\nu 220^\circ$, $\eta\mu 115^\circ - \sigma\upsilon\nu 115^\circ$, $\eta\mu(-100^\circ) - \sigma\upsilon\nu(-100^\circ)$.

75) Νά δειχθῆ, ὅτι

$$\eta\mu \alpha + \eta\mu(90^\circ - \alpha) + \eta\mu(180^\circ + \alpha) + \eta\mu(270^\circ - \alpha) = 0.$$

76) Ὁμοίως, ὅτι

$$\sigma\upsilon\nu \alpha + \sigma\upsilon\nu(90^\circ + \alpha) + \sigma\upsilon\nu(180^\circ + \alpha) + \eta\mu(270^\circ + \alpha) = 0.$$

77) Νά δειχθῆ ὁμοίως, ὅτι

$$\sigma\upsilon\nu \alpha + \eta\mu(270^\circ + \alpha) - \eta\mu(270^\circ - \alpha) + \sigma\upsilon\nu(180^\circ + \alpha) = 0.$$

78) Όμοιος, διτι
 $\sigma\phi\alpha + \epsilon\phi(180^\circ + \alpha) + (\epsilon\phi 90^\circ + \alpha) + \epsilon\phi(360^\circ - \alpha) = 0.$

79) Η παράσταση $\frac{\epsilon\phi(180^\circ + X)}{\sigma\phi(360^\circ - X)}$ νά έκφρασθῆ συναρτήσῃ τοῦ $\eta\mu\chi$.

80) Νά εὔρεθοῦν τὰ τόξα, μεταξύ 0° καὶ 360° , τὰ ὁποῖα ἔχουν ἡμίτονον $\frac{1}{\sqrt{2}}$, $\frac{1}{2}$.

81) Όμοίως τὰ ἔχοντα συνιμήτονα $-\frac{1}{2}$, $\frac{\sqrt{3}}{2}$.

82) Όμοίως τὰ ἔχοντα ἔφαπτομένης -1 , $\frac{1}{\sqrt{3}}$.

83) Όμοίως τὰ ἔχοντα συνεφαπτομένης $-\sqrt{3}$, $\frac{1}{\sqrt{3}}$.

84) Νά εὔρεθοῦν τὰ ἡμίτονα καὶ τὰ συνημίτονα τῶν τόξων ἀπὸ 0° ἔως 360° , τὰ ὁποῖα ἔχουν ὄλα ἔφαπτομένην ἴσην μὲ συν 135° .

ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΒΡΟΙΣΜΑΤΟΣ
 ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΔΥΟ ΤΟΞΩΝ

44. Πρόβλημα.—Νά εὔρεθῆ τὸ ἡμίτονον καὶ τὸ συνημίτονον τοῦ ἀθροίσματος τῶν δύο τόξων α καὶ β , ἐκάστου τῶν ὁποίων γνωρίζομεν τὸ ἡμίτονον καὶ τὸ συνημίτονον.


Ἐστω ἓν οἰονδήποτε τόξον α , ἀρχῆς A καὶ πέρατος M , δι' ὃ ἔχομεν συνα= (OP) καὶ $\eta\mu\alpha=(OM)$ καὶ ὁμοίως ἔστω ἕτερον τόξον β , ἀρχῆς M καὶ πέρατος N . Ἐὰν ἤδη λάβωμεν δύο ἄξονας ὀρθογωνίους μεταξύ των, τοὺς OM καὶ ON καὶ τοιοῦτους, ὥστε ἡ θετικὴ φορά τοῦ OM νά εἶναι ἡ ἐκ τοῦ O πρὸς τὸ M , θὰ ἔχωμεν συν $\beta=(OS)$ καὶ $\eta\mu\beta=(SN)$, τέλος τὸ $\eta\mu$ τοῦ τόξου $\alpha+\beta$, οὗ ἡ ἀρχὴ εἶναι τὸ A καὶ πέρας τὸ N , εἶναι (TN) καὶ τὸ συν. αὐτοῦ εἶναι (OT) ἤτοι εἶναι

$$\eta\mu(\alpha+\beta)=(TN)$$

$$\text{συν}(\alpha+\beta)=(OT).$$

Ἄλλ' ἐὰν φέρωμεν τὴν ΣK παράλληλον πρὸς τὴν AA' καὶ τὴν $\Sigma\Lambda$ κάθετον ἐπ' αὐτὴν ἔχομεν

$$(TN)=(TK)+(KN) \quad \text{ἤτοι} \quad (TN)=(\Lambda\Sigma)+(KN) \quad (1)$$



καί (ΟΤ) = (ΛΤ) + (ΟΛ) ἤτοι (ΟΤ) = (ΣΚ) + (ΟΛ) (2).

*Ἦδη ἐκ τῶν ὁμοίων τριγῶνων ΟΛΣ καὶ ΟΠΜ λαμβάνομεν κατ' ἀπόλυτον τιμὴν καὶ κατὰ σημεῖον τοὺς ἴσους λόγους

$$\frac{(ΛΣ)}{(ΠΜ)} = \frac{(ΟΣ)}{(ΟΜ)} = \frac{(ΟΛ)}{(ΟΠ)} \quad \text{ἤτοι} \quad \frac{ΛΣ}{\eta\mu\alpha} = \frac{\sigma\upsilon\nu\beta}{1} = \frac{ΟΛ}{\sigma\upsilon\nu\alpha}$$

ἐκ τῶν ὁποίων ἔπεται (ΛΣ) = ημασυνβ καὶ (ΟΛ) = συνασυνβ.

*Ἀλλὰ καὶ τὰ τρίγωνα ΚΣΝ καὶ ΟΜΠ εἶναι ὅμοια, ἀφοῦ αἱ πλευραὶ αὐτῶν εἶναι κάθετοι ἀνά δύο· εἰς αὐτὸ ὅμως οἱ λόγοι $\frac{(ΚΝ)}{(ΟΠ)}$ καὶ $\frac{(ΣΝ)}{(ΟΜ)}$, οἱ ὁποῖοι εἶναι μεταξὺ τῶν ἴσοι καὶ κατ' ἀπόλυτον τιμὴν καὶ κατὰ σημεῖον, εἶναι ἀντίθετοι πρὸς τὸν λόγον $\frac{(ΣΚ)}{(ΠΜ)}$ ἤτοι πρὸς τὸν λόγον $\frac{(ΛΤ)}{(ΠΜ)}$. Κατὰ ταῦτα λοιπὸν ἔχομεν

$$\frac{(ΚΝ)}{(ΟΠ)} = \frac{(ΣΝ)}{(ΟΜ)} = -\frac{(ΛΤ)}{(ΠΜ)}, \quad \text{ἤτοι}$$

$$\frac{(ΚΝ)}{\sigma\upsilon\nu\alpha} = \frac{\eta\mu\beta}{1} = -\frac{(ΛΤ)}{\eta\mu\alpha}, \quad \text{ἐκ τῶν ὁποίων ἔπεται}$$

(ΚΝ) = ημβσυνα καὶ (ΛΤ) = -ημαημβ.

*Ἐάν λοιπὸν εἰς τὰς ἰσότητας (1) καὶ (2) ἀντικαταστήσωμεν τὰ (ΛΣ), (ΚΝ), (ΟΛ) καὶ (ΛΤ) μὲ τὰς εὑρεθείσας τιμὰς τῶν εὑρίσκομεν τοὺς τύπους

$$\eta\mu(\alpha+\beta) = \eta\mu\alpha\sigma\upsilon\nu\beta + \eta\mu\beta\sigma\upsilon\nu\alpha \quad (3)$$

$$\sigma\upsilon\nu(\alpha+\beta) = \sigma\upsilon\nu\alpha\sigma\upsilon\nu\beta - \eta\mu\alpha\eta\mu\beta \quad (4)$$

45. *Ἦδη τὸ ἡμίτονον καὶ τὸ συνημίτονον τῆς διαφορᾶς α-β εὑρίσκεται, ἂν εἰς τοὺς τύπους (3) καὶ (4) ἀντικαταστήσωμεν τὸ β διὰ τοῦ -β, ὁπότε ἔχομεν

$$1\text{ον}) \eta\mu(\alpha-\beta) = \eta\mu\alpha\sigma\upsilon\nu(-\beta) + \eta\mu(-\beta)\sigma\upsilon\nu\alpha \quad \text{ἤτοι ἐπειδὴ}$$

$$\sigma\upsilon\nu(-\beta) = \sigma\upsilon\nu\beta \quad \text{καὶ} \quad \eta\mu(-\beta) = -\eta\mu\beta.$$

$$\eta\mu(\alpha-\beta) = \eta\mu\alpha\sigma\upsilon\nu\beta - \eta\mu\beta\sigma\upsilon\nu\alpha \quad (5) \quad \text{καὶ}$$

$$2\text{ον}) \sigma\upsilon\nu(\alpha-\beta) = \sigma\upsilon\nu\alpha\sigma\upsilon\nu(-\beta) - \eta\mu\alpha\eta\mu(-\beta) \quad \text{ἤτοι}$$

$$\sigma\upsilon\nu(\alpha-\beta) = \sigma\upsilon\nu\alpha\sigma\upsilon\nu\beta + \eta\mu\alpha\eta\mu\beta. \quad (6)$$

46. *Ἐάν οἱ τύποι (3) καὶ (4) διαιρεθοῦν κατὰ μέλη, προκύπτει $\frac{\eta\mu(\alpha+\beta)}{\sigma\upsilon\nu(\alpha+\beta)} = \frac{\eta\mu\alpha\sigma\upsilon\nu\beta + \eta\mu\beta\sigma\upsilon\nu\alpha}{\sigma\upsilon\nu\alpha\sigma\upsilon\nu\beta - \eta\mu\alpha\eta\mu\beta}$ καὶ ἂν τοῦ δευτέρου μέλους τῆς ἰσότητος ταύτης διαιρέσωμεν ἀριθμητὴν καὶ παρονομαστὴν διὰ τοῦ συνασυνβ, προκύπτει

$$\frac{\eta\mu(\alpha+\beta)}{\sigma\upsilon\nu(\alpha+\beta)} = \frac{\frac{\eta\mu\alpha}{\sigma\upsilon\nu\alpha} + \frac{\eta\mu\beta}{\sigma\upsilon\nu\beta}}{1 - \frac{\eta\mu\alpha}{\sigma\upsilon\nu\alpha} \cdot \frac{\eta\mu\beta}{\sigma\upsilon\nu\beta}}$$

καὶ ἂν ἀντικαταστήσωμεν τὰ πηλίκα ὑπὸ τῶν ἴσων πρὸς αὐτὰ ἔφαπτομένων, εὐρίσκομεν τὸν τύπον

$$\epsilon\phi(\alpha+\beta) = \frac{\epsilon\phi\alpha + \epsilon\phi\beta}{1 - \epsilon\phi\alpha \cdot \epsilon\phi\beta} \quad (7)$$

διὰ τοῦ ὁποῦ εὐρίσκομεν τὴν ἔφαπτομένην τοῦ ἀθροίσματος $\alpha + \beta$ τῶν δύο τόξων α καὶ β , ὅταν ἔχωμεν τὰς ἔφαπτομένας αὐτῶν.

Κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον εὐρίσκομεν ἓκ τῶν τύπων 5 καὶ 6 τὸν ἐπόμενον τύπον

$$\epsilon\phi(\alpha - \beta) = \frac{\epsilon\phi\alpha - \epsilon\phi\beta}{1 + \epsilon\phi\alpha \cdot \epsilon\phi\beta} \quad (8)$$

διὰ τοῦ ὁποῦ εὐρίσκομεν τὴν ἔφαπτομένην τῆς διαφορᾶς τῶν δύο τόξων α καὶ β , ὅταν ἔχωμεν τὰς ἔφαπτομένας αὐτῶν.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

85) Ἐὰν $\eta\mu\alpha = \frac{3}{5}$ καὶ $\sigma\upsilon\nu\beta = \frac{9}{41}$ καὶ τὰ τόξα α καὶ β περατοῦνται εἰς τὸ α' τεταρτημόριον, εὐρεῖν τὰ $\eta\mu(\alpha + \beta)$ καὶ $\sigma\upsilon\nu(\alpha - \beta)$.

86) Ὁμοίως εὐρεῖν τὰ $\eta\mu(\alpha - \beta)$ καὶ $\sigma\upsilon\nu(\alpha + \beta)$, ἂν $\eta\mu\alpha = \frac{15}{17}$ καὶ $\sigma\upsilon\nu\beta = \frac{12}{13}$.

87) Ἐὰν τὸ πέρασ τοῦ τόξου α κεῖται εἰς τὸ πρῶτον τεταρτημόριον καὶ εἶναι $\eta\mu\alpha = \frac{5}{13}$, εὐρεῖν τὰ $\sigma\upsilon\nu(60^\circ - \alpha)$ καὶ $\eta\mu(60^\circ + \alpha)$.

88) Νὰ εὐρεθοῦν οἱ τριγωνομετρικοὶ ἀριθμοὶ τοῦ τόξου $75^\circ (75^\circ = 45^\circ + 30^\circ)$.

89) Ὁμοίως νὰ εὐρεθοῦν οἱ τριγωνομετρικοὶ ἀριθμοὶ τοῦ τόξου $15^\circ (15^\circ = 60^\circ - 45^\circ)$.

90) Ν' ἀποδειχθῇ ὅτι,

$$\sigma\upsilon\nu(\alpha + \beta)\sigma\upsilon\nu\beta + \eta\mu(\alpha + \beta)\eta\mu\beta = \sigma\upsilon\nu\alpha$$

91) Ὁμοίως νὰ ἀποδειχθῇ, ὅτι

$$\eta\mu(\alpha + \beta)\eta\mu(\alpha - \beta) = \eta\mu^2\alpha - \eta\mu^2\beta$$

92) 'Ομοίως ν' αποδειχθῆ, ὅτι

$$\sin(\alpha + \beta)\sin(\alpha - \beta) = \sin^2 \alpha + \sin^2 \beta - 1$$

93) Ν' αποδειχθῆ, ὅτι $\eta\mu(45^\circ - \alpha) = \sin(45^\circ + \alpha)$

94) Ν' αποδειχθῆ, ὅτι $\eta\mu(45^\circ + \alpha) = \frac{\eta\mu\alpha + \sigma\upsilon\nu\alpha}{\sqrt{2}}$

95) 'Ομοίως ν' αποδειχθῆ, ὅτι

$$\eta\mu(45^\circ + \alpha)\sin(45^\circ - \alpha) + \sin(45^\circ + \alpha)\eta\mu(45^\circ - \alpha) = 1$$

96) Ν' αποδειχθῆ, ὅτι

$$\sin(45^\circ - \alpha)\sin(45^\circ - \beta) - \eta\mu(45^\circ - \alpha)\eta\mu(45^\circ - \beta) = \eta\mu(\alpha + \beta)$$

97) 'Ομοίως ν' αποδειχθῆ, ὅτι

$$\eta\mu(45^\circ + \alpha)\sin(45^\circ - \beta) + \sin(45^\circ + \alpha)\eta\mu(45^\circ - \beta) = \sin(\alpha - \beta)$$

98) Ν' αποδειχθῆ, ὅτι

$$1) \eta\mu(60^\circ + \alpha) - \eta\mu(60^\circ - \alpha) = \eta\mu\alpha$$

$$2) \sin(30^\circ + \alpha) - \sin(30^\circ - \alpha) = -\eta\mu\alpha$$

99) 'Εάν $\epsilon\phi\alpha = \frac{1}{70}$ καὶ $\epsilon\phi\beta = \frac{1}{99}$ νὰ εὑρεθῆ ἢ $\epsilon\phi(\alpha - \beta)$.

100) 'Εάν τὰ πέρατα τῶν τόξων α καὶ β εἶναι εἰς τὸ α τεταρτημόριον καὶ εἶναι $\epsilon\phi\alpha = \frac{1}{2}$ καὶ $\epsilon\phi\beta = \frac{1}{3}$, νὰ εὑρεθῆ πόσων μοιρῶν εἶναι τὸ τόξον $\alpha + \beta$.

101) 'Εάν $\epsilon\phi\alpha = -\frac{3}{4}$ καὶ $\sin\beta = \frac{12}{37}$ καὶ τὰ τόξα α καὶ β εἶναι ἀμφότερα μικρότερα τῶν 180° νὰ εὑρεθῆ ἢ $\epsilon\phi(\alpha + \beta)$.

102) Ν' αποδειχθῆ, ὅτι

$$\epsilon\phi(\alpha + \beta)\epsilon\phi(\alpha - \beta) = \frac{\epsilon\phi^2 \alpha - \epsilon\phi^2 \beta}{1 - \epsilon\phi^2 \alpha \epsilon\phi^2 \beta}$$

103) 'Ομοίως ν' αποδειχθῆ ὅτι

$$1) \epsilon\phi(45^\circ + \alpha) = \frac{1 + \epsilon\phi\alpha}{1 - \epsilon\phi\alpha} \quad \text{καὶ} \quad 2) \epsilon\phi(\alpha + 45^\circ) = \frac{1 + \sigma\phi\alpha}{1 - \sigma\phi\alpha}$$

104) Ν' αποδειχθῆ, ὅτι ἐν παντὶ τριγώνῳ $AB\Gamma$ εἶναι

$$\eta\mu\Gamma\sigma\upsilon\nu A + \sigma\upsilon\nu\Gamma\eta\mu A = \eta\mu B$$

$$\sigma\upsilon\nu B\sigma\upsilon\nu\Gamma - \eta\mu B\eta\mu\Gamma = -\sigma\upsilon\nu A$$

105) 'Ομοίως ν' αποδειχθῆ, ὅτι ἐν παντὶ τριγώνῳ $AB\Gamma$ εἶναι

$$\eta\mu \frac{B}{2} \sigma\upsilon\nu \frac{\Gamma}{2} + \sigma\upsilon\nu \frac{B}{2} \eta\mu \frac{\Gamma}{2} = \sigma\upsilon\nu \frac{A}{2}$$

$$\sigma\upsilon\nu \frac{A}{2} \sigma\upsilon\nu \frac{B}{2} - \eta\mu \frac{A}{2} \eta\mu \frac{B}{2} = \eta\mu \frac{\Gamma}{2}$$

106) Νά δειχθῆ, ὅτι $\text{συν}70^\circ \text{συν}15^\circ + \text{συν}20^\circ \text{συν}75^\circ = \text{συν}55^\circ$.

107) Νά δειχθῆ, ὅτι εἶναι $\sigma\phi(\alpha+\beta) = \frac{\sigma\phi\alpha \cdot \sigma\phi\beta - 1}{\sigma\phi\alpha + \sigma\phi\beta}$.

108) Νά εὐρεθῆ ἡ $\sigma\phi(\alpha-\beta)$ συναρτήσῃ τῶν $\sigma\phi\alpha$ καὶ $\sigma\phi\beta$.

109) Ἐάν $\sigma\phi\alpha = \frac{3}{2}$ καὶ $\sigma\phi\beta = \frac{5}{4}$, εὐρεῖν τὰς $\sigma\phi(\alpha+\beta)$ καὶ $\sigma\phi(\alpha-\beta)$.

110) Ν' ἀποδειχθῆ, ὅτι $\epsilon\phi\alpha + \epsilon\phi\beta = \frac{\eta\mu(\alpha+\beta)}{\sigma\upsilon\alpha\sigma\upsilon\upsilon\beta}$.

111) Ὅμοίως, ὅτι $\sigma\phi\alpha + \sigma\phi\beta = \frac{\eta\mu(\alpha+\beta)}{\eta\mu\sigma\eta\mu\beta}$.

112) Ὅμοίως, ὅτι $\epsilon\phi\alpha + \sigma\phi\beta = \frac{\sigma\upsilon\upsilon(\alpha-\beta)}{\sigma\upsilon\upsilon\sigma\eta\mu\beta}$.

113) Ὅμοίως, ὅτι $\sigma\phi\alpha - \epsilon\phi\beta = \frac{\sigma\upsilon\upsilon(\alpha+\beta)}{\eta\mu\sigma\sigma\upsilon\upsilon\beta}$.

114) Ὅμοίως, ὅτι $1 + \epsilon\phi\alpha\epsilon\phi\beta = \frac{\sigma\upsilon\upsilon(\alpha \cdot \beta)}{\sigma\upsilon\upsilon\sigma\sigma\upsilon\upsilon\beta}$.

115) Νά δειχθῆ, ὅτι

$$\epsilon\phi(\alpha+\beta+\gamma) = \frac{\epsilon\phi\alpha + \epsilon\phi\beta + \epsilon\phi\gamma - \epsilon\phi\alpha\epsilon\phi\beta\epsilon\phi\gamma}{1 - \epsilon\phi\beta\epsilon\phi\gamma - \epsilon\phi\gamma\epsilon\phi\alpha - \epsilon\phi\alpha\epsilon\phi\beta}$$

ΕΚ ΤΩΝ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΤΟΥ α ΕΥΡΕΙΣ ΤΩΝ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΤΟΥ 2α ΚΑΙ ΤΟΥ $\frac{\alpha}{2}$.

47. Ἐάν ὑποτεθῆ εἰς τοὺς τύπους 3, 4 καὶ 7 $\alpha = \beta$, προκύπτουν οἱ ἐπόμενοι τύποι

$$\begin{aligned} \eta\mu 2\alpha &= 2\eta\mu\alpha\sigma\upsilon\upsilon\alpha \\ \sigma\upsilon\upsilon 2\alpha &= \sigma\upsilon\upsilon^2\alpha - \eta\mu^2\alpha \end{aligned} \quad (9)$$

$$\epsilon\phi 2\alpha = \frac{2\epsilon\phi\alpha}{1 - \epsilon\phi^2\alpha}$$

δι' ὧν εὐρίσκομεν τὸ ἡμίτονον, τὸ συνημίτονον καὶ τὴν ἐφαπτομένην τοῦ διπλασίου τόξου, ὅταν ἔχωμεν τὸ ἡμίτονον, τὸ συνημίτονον καὶ τὴν ἐφαπτομένην τοῦ τόξου.

48. Ὁ δεύτερος τῶν τύπων (9) γράφεται ὡς ἐξῆς

$$\sigma\upsilon\upsilon 2\alpha = \sigma\upsilon\upsilon^2\alpha - (1 - \sigma\upsilon\upsilon^2\alpha) = 2\sigma\upsilon\upsilon^2\alpha - 1 \quad \eta$$

$$\sigma\upsilon\upsilon 2\alpha = (1 - \eta\mu^2\alpha) - \eta\mu^2\alpha = 1 - 2\eta\mu^2\alpha,$$

ἐκ τῶν τελευταίων δὲ τούτων εὐρίσκομεν

$$\begin{aligned}\sigma\upsilon\nu^2\alpha &= \frac{1+\sigma\upsilon\nu 2\alpha}{2} \\ \eta\mu^2\alpha &= \frac{1-\sigma\upsilon\nu 2\alpha}{2}\end{aligned}\quad (10)$$

και έξ αυτών λαμβάνομεν

$$\epsilon\phi^2\alpha = \frac{1-\sigma\upsilon\nu 2\alpha}{1+\sigma\upsilon\nu 2\alpha}$$

ή, εάν θέσωμεν $\frac{\alpha}{2}$ αντί α

$$\sigma\upsilon\nu^2\frac{\alpha}{2} = \frac{1+\sigma\upsilon\nu\alpha}{2} \quad \text{ήτοι} \quad \sigma\upsilon\nu\frac{\alpha}{2} = \pm\sqrt{\frac{1+\sigma\upsilon\nu\alpha}{2}}$$

$$\eta\mu^2\frac{\alpha}{2} = \frac{1-\sigma\upsilon\nu\alpha}{2} \quad \text{»} \quad \eta\mu\frac{\alpha}{2} = \pm\sqrt{\frac{1-\sigma\upsilon\nu\alpha}{2}}$$

$$\epsilon\phi^2\frac{\alpha}{2} = \frac{1-\sigma\upsilon\nu\alpha}{1+\sigma\upsilon\nu\alpha} \quad \text{»} \quad \epsilon\phi\frac{\alpha}{2} = \pm\sqrt{\frac{1-\sigma\upsilon\nu\alpha}{1+\sigma\upsilon\nu\alpha}},$$

εύρισκομεν δέ ούτως έκ του σνημιτόνου του τόξου τὸ ἡμίτονον, τὸ σνημίτονον και τὴν ἐφαπτομένην του ἡμίσεως τόξου.

49. Ἐάν εἰς τοὺς τύπους (9) ἀντικαταστήσωμεν τὸ α διὰ τοῦ $\frac{\alpha}{2}$ λαμβάνομεν

$$\begin{aligned}\eta\mu\alpha &= 2\eta\mu\frac{\alpha}{2}\sigma\upsilon\nu\frac{\alpha}{2} \\ \sigma\upsilon\nu\alpha &= \sigma\upsilon\nu^2\frac{\alpha}{2} - \eta\mu^2\frac{\alpha}{2} \\ \epsilon\phi\alpha &= \frac{2\epsilon\phi\frac{\alpha}{2}}{1 - \epsilon\phi^2\frac{\alpha}{2}}.\end{aligned}$$

Ἄλλ' οἱ δύο πρῶτοι τύποι έκ τούτων δύνανται νά γραφοῦν

$$\eta\mu\alpha = \frac{2\eta\mu\frac{\alpha}{2}\sigma\upsilon\nu\frac{\alpha}{2}}{\sigma\upsilon\nu^2\frac{\alpha}{2} + \eta\mu^2\frac{\alpha}{2}}, \quad \sigma\upsilon\nu\alpha = \frac{\sigma\upsilon\nu^2\frac{\alpha}{2} - \eta\mu^2\frac{\alpha}{2}}{\sigma\upsilon\nu^2\frac{\alpha}{2} + \eta\mu^2\frac{\alpha}{2}},$$

ἐάν δὲ διαιρέσωμεν τοὺς ἀριθμητὰς και τοὺς παρονομαστὰς διὰ $\sigma\upsilon\nu^2\frac{\alpha}{2}$, λαμβάνομεν

$$\frac{2\eta\mu\frac{\alpha}{2}\sigma\upsilon\nu\frac{\alpha}{2}}{\sigma\upsilon\nu^2\frac{\alpha}{2}}, \sigma\upsilon\nu\alpha = \frac{\sigma\upsilon\nu^2\frac{\alpha}{2}}{\sigma\upsilon\nu^2\frac{\alpha}{2}} - \frac{\eta\mu^2\frac{\alpha}{2}}{\sigma\upsilon\nu^2\frac{\alpha}{2}}$$

$$\frac{\sigma\upsilon\nu^2\frac{\alpha}{2}}{\sigma\upsilon\nu^2\frac{\alpha}{2}} + \frac{\eta\mu^2\frac{\alpha}{2}}{\sigma\upsilon\nu^2\frac{\alpha}{2}}$$

$$\frac{\sigma\upsilon\nu^2\frac{\alpha}{2}}{\sigma\upsilon\nu^2\frac{\alpha}{2}} - \frac{\sigma\upsilon\nu^2\frac{\alpha}{2}}{\sigma\upsilon\nu^2\frac{\alpha}{2}}$$

$$\eta\tau\omicron\iota \eta\mu\alpha = \frac{2\epsilon\phi\frac{\alpha}{2}}{1+\epsilon\phi^2\frac{\alpha}{2}}, \sigma\upsilon\nu\alpha = \frac{1-\epsilon\phi^2\frac{\alpha}{2}}{1+\epsilon\phi^2\frac{\alpha}{2}}$$

Διὰ τῶν ἀνωτέρω παρατηροῦμεν, ὅτι εὐρίσκομεν τὴν $\epsilon\phi\frac{\alpha}{2}$, $\eta\mu\alpha$, $\sigma\upsilon\nu\alpha$, συναρτήσῃ τῆς $\epsilon\phi\frac{\alpha}{2}$.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

- 116) Νὰ εὐρεθῆ τὸ ἡμίτονον 2α , ὅταν εἶναι
 1ον) $\sigma\upsilon\nu\alpha = \frac{3}{4}$ καὶ 2ον) $\eta\mu\alpha = \frac{7}{11}$.
- 117) Ὅμοίως νὰ εὐρεθῆ τὸ $\sigma\upsilon\nu 2\alpha$, ὅταν εἶναι
 1ον) $\eta\mu\alpha = \frac{4}{5}$ καὶ 2ον) $\sigma\upsilon\nu\alpha = \frac{15}{17}$.
- 118) Νὰ εὐρεθοῦν οἱ τριγωνομετρικοὶ ἀριθμοὶ τῶν τόξων 60° καὶ 90° ἐκ τῶν τριγωνομετρικῶν ἀριθμῶν τῶν τόξων 30° καὶ 45° .
- 119) Νὰ εὐρεθοῦν οἱ τριγωνομετρικοὶ ἀριθμοὶ τοῦ τόξου 36° ἐκ τῶν τοῦ 18° .
- 120) Νὰ δεიχθῆ, ὅτι εἶναι
 $2\eta\mu 40^\circ \cdot \eta\mu 50^\circ = \eta\mu 80^\circ$
 $\sigma\upsilon\nu^2 20^\circ - \sigma\upsilon\nu^2 70^\circ = \sigma\upsilon\nu 40^\circ$
- 121) Νὰ ἀπλοποιηθοῦν αἱ παραστάσεις
 1) $2\eta\mu\frac{5x}{2}\sigma\upsilon\nu\frac{5x}{2}$
 2) $\sigma\upsilon\nu^2\frac{8x}{3} - \eta\mu^2\frac{8x}{3}$.
- 122) Νὰ εὐρεθοῦν οἱ τριγωνομετρικοὶ ἀριθμοὶ τοῦ τόξου $\frac{45^\circ}{2}$ ἐκ τοῦ $\sigma\upsilon\nu 45^\circ$.

123) Έκ τοῦ συνημιτόνου τῶν $\left(\frac{90^\circ}{4}\right)$ νά εὑρεθοῦν τὰ $\text{συν}\left(\frac{90^\circ}{8}\right)$, $\text{συν}\left(\frac{90^\circ}{16}\right)$, ὡς καί τὰ ἡμίτονα, αἱ ἐφαπτόμεναι καί αἱ συνεφαπτόμεναι αὐτῶν.

124) Νά εὑρεθοῦν οἱ τριγωνομετρικοὶ ἀριθμοὶ ἐκάστου τῶν τῶξων $\frac{30^\circ}{2}$, $\frac{30^\circ}{4}$, $\frac{30^\circ}{8}$.

125) Νά εὑρεθῆ τὸ $\eta\mu 2\alpha$, ὅταν εἶναι $\epsilon\phi\alpha = \frac{15}{63}$.

126) Ὅμοίως νά εὑρεθῆ τὸ $\text{συν} 2\alpha$, ὅταν εἶναι $\epsilon\phi\alpha = \frac{9}{16}$.

127) Ν' ἀποδειχθῆ, ὅτι εἶναι $2\eta\mu(45^\circ - \alpha)\text{συν}(45^\circ - \alpha) = \text{συν} 2\alpha$.

128) Ν' ἀποδειχθῆ, ὅτι εἶναι $2\text{συν}^2(45^\circ - \alpha) - 1 = \eta\mu 2\alpha$.

129) Ὅμοίως, ὅτι $\frac{\eta\mu 2\alpha}{1 + \text{συν} 2\alpha} = \epsilon\phi\alpha$.

130) Ν' ἀποδειχθῆ, ὅτι $\frac{\eta\mu 2\alpha}{1 - \text{συν} 2\alpha} = \sigma\phi\alpha$.

131) Ν' ἀποδειχθῆ, ὅτι $\epsilon\phi\alpha - \sigma\phi\alpha = -2\sigma\phi 2\alpha$.

132) Ὅμοίως, ὅτι $\sigma\phi 2\alpha = \frac{\sigma\phi^2\alpha - 1}{2\sigma\phi\alpha}$.

133) Νά δειχθῆ, ὅτι εἶναι $\eta\mu 3\alpha = 3\eta\mu\alpha - 4\eta\mu^3\alpha$.

134) Ὅμοίως νά δειχθῆ, ὅτι $\text{συν} 3\alpha = 4\text{συν}^3\alpha - 3\text{συν}\alpha$.

135) Ὅμοίως, ὅτι $\epsilon\phi 3\alpha = \frac{3\epsilon\phi\alpha - \epsilon\phi^3\alpha}{1 - 3\epsilon\phi^2\alpha}$.

136) Νά δειχθῆ, ὅτι $\text{συν}^2\alpha - \eta\mu^2\alpha = \text{συν}\alpha\text{συν} 3\alpha$.

137) Ὅμοίως νά δειχθῆ, ὅτι $\frac{\epsilon\phi^2 2\alpha - \epsilon\phi^2\alpha}{1 - \epsilon\phi^2 2\alpha \epsilon\phi^2\alpha} = \epsilon\phi 3\alpha \epsilon\phi\alpha$

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΓΘΡΟΙΣΜΑΤΩΝ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΩΝ
ΑΡΙΘΜΩΝ ΕΙΣ ΓΙΝΟΜΕΝΑ

50. Έκ τῶν θεμελιωδῶν τύπων (3), (5), (4), (6) τῶν ἐδαφίων 44 καί 45

$$\eta\mu(\alpha + \beta) = \eta\mu\alpha\text{συν}\beta + \eta\mu\beta\text{συν}\alpha$$

$$\eta\mu(\alpha - \beta) = \eta\mu\alpha\text{συν}\beta - \eta\mu\beta\text{συν}\alpha$$

$$\text{συν}(\alpha + \beta) = \text{συν}\alpha\text{συν}\beta - \eta\mu\alpha\eta\mu\beta$$

$$\text{συν}(\alpha - \beta) = \text{συν}\alpha\text{συν}\beta + \eta\mu\alpha\eta\mu\beta$$

εὐρίσκομεν εὐκόλως τοὺς ἑξῆς τύπους διὰ προσθέσεως καί ἀφαιρέσεως.

$$\begin{aligned} \eta\mu(\alpha+\beta)+\eta\mu(\alpha-\beta) &= 2\eta\mu\alpha\sigma\upsilon\nu\beta \\ \eta\mu(\alpha+\beta)-\eta\mu(\alpha-\beta) &= 2\sigma\upsilon\nu\alpha\eta\mu\beta \\ \sigma\upsilon\nu(\alpha+\beta)+\sigma\upsilon\nu(\alpha-\beta) &= 2\sigma\upsilon\nu\alpha\sigma\upsilon\nu\beta \\ \sigma\upsilon\nu(\alpha-\beta)-\sigma\upsilon\nu(\alpha+\beta) &= 2\eta\mu\alpha\eta\mu\beta \end{aligned} \quad (1)$$

Διά τῶν ἀνωτέρω τύπων, οἱ ὁποῖοι γράφονται καί ὡς ἑξῆς:

$$\begin{aligned} 2\eta\mu\alpha\sigma\upsilon\nu\beta &= \eta\mu(\alpha+\beta)+\eta\mu(\alpha-\beta) \\ 2\sigma\upsilon\nu\alpha\eta\mu\beta &= \eta\mu(\alpha+\beta)-\eta\mu(\alpha-\beta) \\ 2\sigma\upsilon\nu\alpha\sigma\upsilon\nu\beta &= \sigma\upsilon\nu(\alpha+\beta)+\sigma\upsilon\nu(\alpha-\beta) \\ 2\eta\mu\alpha\eta\mu\beta &= \sigma\upsilon\nu(\alpha-\beta)-\sigma\upsilon\nu(\alpha+\beta) \end{aligned}$$

παρατηροῦμεν, ὅτι δυνάμεθα νά μετασχηματίσωμεν γινόμενα ἡμίτονων καί συνημίτονων εἰς ἀθροίσματα καί διαφοράς ὡς ἐπί π. δ.

$$\begin{aligned} 1) 2\eta\mu 3\alpha\sigma\upsilon\nu\alpha &= \eta\mu 4\alpha + \eta\mu 2\alpha \\ 2) 2\sigma\upsilon\nu 7\alpha\sigma\upsilon\nu 2\alpha &= \sigma\upsilon\nu 9\alpha + \sigma\upsilon\nu 5\alpha \\ 3) 2\eta\mu 5\alpha\eta\mu\alpha &= \sigma\upsilon\nu 4\alpha - \sigma\upsilon\nu 6\alpha. \end{aligned}$$

Ἄλλ' ὁ μετασχηματισμός, τοῦ ὁποῖου γίνεται μεγαλυτέρα χρῆσις, εἶναι ἐκεῖνος διὰ τοῦ ὁποῖου δυνάμεθα νά μετατρέψωμεν ἀθροίσματα ἢ διαφοράς εἰς γινόμενα· καί τοῦτο διότι ὁ μετασχηματισμός οὗτος ἐπιτρέπει εὐκολον ἐφαρμογὴν τοῦ λογισμοῦ διὰ τῶν λογαρίθμων.

Πρὸς τοῦτο δίδομεν εἰς τοὺς ἀνωτέρω τύπους (1) διάφορον μορφήν ὡς ἑξῆς.

Θέτομεν $\alpha+\beta=A$ καὶ $\alpha-\beta=B$, ὁπότε προκύπτει

$$\alpha = \frac{A+B}{2} \quad \text{καὶ} \quad \beta = \frac{A-B}{2},$$

οἱ δὲ ἀνωτέρω τύποι γίνονται

$$\begin{aligned} \eta\mu A + \eta\mu B &= 2\eta\mu \frac{A+B}{2} \cdot \sigma\upsilon\nu \frac{A-B}{2} \\ \eta\mu A - \eta\mu B &= 2\eta\mu \frac{A-B}{2} \cdot \sigma\upsilon\nu \frac{A+B}{2} \\ \sigma\upsilon\nu A + \sigma\upsilon\nu B &= 2\sigma\upsilon\nu \frac{A+B}{2} \cdot \sigma\upsilon\nu \frac{A-B}{2} \\ \sigma\upsilon\nu B - \sigma\upsilon\nu A &= 2\eta\mu \frac{A+B}{2} \cdot \eta\mu \frac{A-B}{2}. \end{aligned}$$

Σημείωσις. Ὁ τελευταῖος τύπος γράφεται ἐνίοτε καί ὡς ἑξῆς:

$$\eta\phi - \frac{(B-A)}{2} = -\eta\phi \frac{B-A}{2}$$

$$\sigma\upsilon\nu A - \sigma\upsilon\nu B = -2\eta\mu \frac{A+B}{2} \eta\mu \frac{A-B}{2} = 2\eta\mu \frac{A+B}{2} \eta\mu \frac{B-A}{2}$$

51. Έκ τῶν δύο πρώτων τύπων προκύπτει ὁ ἑξῆς τύπος διὰ τῆς διαιρέσεως

$$\frac{\eta\mu A - \eta\mu B}{\eta\mu A + \eta\mu B} = \frac{2\eta\mu \frac{A-B}{2} \cdot \sigma\upsilon\nu \frac{A+B}{2}}{2\eta\mu \frac{A+B}{2} \cdot \sigma\upsilon\nu \frac{A-B}{2}} = \varepsilon\phi \frac{A-B}{2} \sigma\phi \frac{A+B}{2},$$

$$\text{ἤτοι } \frac{\eta\mu A - \eta\mu B}{\eta\mu A + \eta\mu B} = \frac{\varepsilon\phi \frac{A-B}{2}}{\varepsilon\phi \frac{A+B}{2}}$$

Σημείωσις. Παραδείγματα μετασχηματισμοῦ ἀθροισμάτων ἢ διαφορῶν ἐφαπτομένων κλπ. εἰς γινόμενα διδουν αἱ ἀσκήσεις 110—113.

Ἐφαρμογή.—Νὰ μετασχηματισθοῦν εἰς γινόμενα τὰ ἀθροίσματα $1 + \sigma\upsilon\nu\alpha$, $1 + \varepsilon\phi\alpha$.

1ον) Ἐπειδὴ $1 = \sigma\upsilon\nu 0^\circ$, ἔχομεν

$$1 + \sigma\upsilon\nu\alpha = \sigma\upsilon\nu 0^\circ + \sigma\upsilon\nu\alpha = 2\sigma\upsilon\nu \frac{\alpha}{2} \sigma\upsilon\nu \frac{\alpha}{2} = 2\sigma\upsilon\nu^2 \frac{\alpha}{2}$$

$$2ον) 1 + \varepsilon\phi\alpha = \varepsilon\phi 45^\circ + \varepsilon\phi\alpha = \frac{\eta\mu(45^\circ + \alpha)}{\sigma\upsilon\nu 45^\circ \sigma\upsilon\nu\alpha} = \frac{2\eta\mu(45^\circ + \alpha)}{\sqrt{2}\sigma\upsilon\nu\alpha}$$

$$= \frac{\sqrt{2}\eta\mu(45^\circ + \alpha)}{\sigma\upsilon\nu\alpha}$$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

✓ 138) Νὰ μετασχηματισθοῦν εἰς ἀθροίσματα τὰ γινόμενα:

$$2\eta\mu 35^\circ \sigma\upsilon\nu 25^\circ$$

$$2\sigma\upsilon\nu 40^\circ \eta\mu 50^\circ$$

$$2\sigma\upsilon\nu 85^\circ \sigma\upsilon\nu 35^\circ$$

$$✓ 2\eta\mu 68^\circ \eta\mu 22^\circ$$

✓ 139) Ὅμοιως τὰ

$$\eta\mu 12^\circ \sigma\upsilon\nu 18^\circ$$

$$\sigma\upsilon\nu 70^\circ \eta\mu 20^\circ$$

$$\sigma\upsilon\nu 22^\circ 45' \cdot \sigma\upsilon\nu 97^\circ 15'$$

$$✓ \eta\mu 78^\circ 40' \cdot \eta\mu 71^\circ 20'$$

✓ 140) Νὰ ἀποδειχθῆ, ὅτι εἶναι

$$2\sigma\upsilon\nu 50^\circ \cdot \eta\mu 10^\circ + 2\eta\mu 5^\circ \cdot \sigma\upsilon\nu 35^\circ = \frac{\sqrt{3}-1}{2}$$

141) Ὅμοιως νὰ ἀποδειχθῆ, ὅτι εἶναι

$$2\eta\mu 40^\circ \sigma\upsilon\nu 20^\circ + 2\eta\mu 50^\circ \eta\mu 20^\circ = \sqrt{3}$$

✓ 142) Νὰ εὑρεθῆ ἡ τιμὴ τῆς παραστάσεως

$$2\eta\mu 52^\circ 30' \cdot \eta\mu 37^\circ 30'$$

† 143) Νά αποδειχθῆ, ὅτι ἐν παντί τριγώνῳ ΑΒΓ εἶναι

$$2\eta\mu\frac{\Gamma}{2}\sigma\upsilon\nu\frac{A-B}{2}=\sigma\upsilon\nu A+\sigma\upsilon\nu B.$$

144) Νά αποδειχθῆ, ὅτι

$$\eta\mu\frac{\alpha}{2}\eta\mu\frac{7\alpha}{2}+\eta\mu\frac{3\alpha}{2}\eta\mu\frac{11\alpha}{2}=\eta\mu 2\alpha\eta\mu 5\alpha.$$

✓ 145) Ὅμοίως νά αποδειχθῆ, ὅτι

$$\eta\mu(45^\circ+\alpha)\eta\mu(45^\circ-\alpha)=\frac{1}{2}\sigma\upsilon\nu 2\alpha.$$

146) Νά μετασχηματισθοῦν εἰς γινόμενα τὰ

$$\eta\mu 30^\circ+\eta\mu 20^\circ \quad \sigma\upsilon\nu 64^\circ+\sigma\upsilon\nu 24^\circ$$

$$\eta\mu 45^\circ-\eta\mu 25^\circ \quad \sigma\upsilon\nu 45^\circ-\sigma\upsilon\nu 105^\circ.$$

147) Ὅμοίως νά μετασχηματισθοῦν εἰς γινόμενα τὰ

$$\sigma\upsilon\nu 66^\circ+\sigma\upsilon\nu 21^\circ \quad \sigma\upsilon\nu 82^\circ 30'+\sigma\upsilon\nu 9^\circ 30'.$$

148) Νά εὑρεθῆ ἡ τιμὴ τοῦ $\eta\mu 75^\circ+\eta\mu 15^\circ$.

✓ 149) Ὅμοίως νά εὑρεθῆ ἡ τιμὴ τοῦ $\frac{\eta\mu 75^\circ-\eta\mu 15^\circ}{\sigma\upsilon\nu 75^\circ+\sigma\upsilon\nu 15^\circ}$.

150) Νά μετασχηματισθοῦν εἰς γινόμενα τὰ

$$1-\sigma\upsilon\nu \alpha, 1+\eta\mu \alpha, 1-\eta\mu \alpha.$$

151) Νά δειχθῆ, ὅτι $\frac{\eta\mu 5\alpha-\eta\mu 3\alpha}{\sigma\upsilon\nu 5\alpha+\sigma\upsilon\nu 3\alpha}=\epsilon\phi \alpha.$

152) Ὅμοίως νά δειχθῆ, ὅτι $\frac{\eta\mu 5\alpha-\eta\mu 3\alpha}{\sigma\upsilon\nu 3\alpha+\sigma\upsilon\nu 5\alpha}=\epsilon\phi \alpha.$

153) Ὅμοίως νά δειχθῆ, ὅτι $\frac{\eta\mu \alpha+\eta\mu 2\alpha}{\sigma\upsilon\nu \alpha-\sigma\upsilon\nu 2\alpha}=\sigma\phi \frac{\alpha}{2}.$

154) Ὅμοίως νά δειχθῆ, ὅτι $\frac{\sigma\upsilon\nu 2\beta-\sigma\upsilon\nu 2\alpha}{\eta\mu 2\beta+\eta\mu 2\alpha}=\epsilon\phi(\alpha-\beta).$

✓ 155) Νά δειχθῆ, ὅτι εἶναι $\eta\mu 50^\circ-\eta\mu 70^\circ+\eta\mu 10^\circ=0.$

156) Ὅμοίως, ὅτι εἶναι

$$\eta\mu 10^\circ+\eta\mu 20^\circ+\eta\mu 40^\circ+\eta\mu 50^\circ=\eta\mu 70^\circ+\eta\mu 80^\circ.$$

157) Νά μετασχηματισθοῦν εἰς γινόμενα τὰ ἀθροίσματα

$$\eta\mu \alpha+2\eta\mu 2\alpha+\eta\mu 3\alpha$$

$$\sigma\upsilon\nu \alpha+2\sigma\upsilon\nu 2\alpha+\sigma\upsilon\nu 3\alpha.$$

158) Νά ἀπλοποιηθῆ ἡ παράστασις

$$\frac{\sigma\upsilon\nu 3x+2\sigma\upsilon\nu 5x+\sigma\upsilon\nu 7x}{\sigma\upsilon\nu x+2\sigma\upsilon\nu 3x+\sigma\upsilon\nu 5x}.$$

159) Νά μετασχηματισθοῦν εἰς γινόμενα τὰ

$$\sigma\phi \alpha-\sigma\phi \beta, \epsilon\phi \alpha-\sigma\phi \beta, 1-\epsilon\phi \alpha.$$

160) Νά μετασχηματισθοῦν εἰς γινόμενα τὰ

$\eta\mu\alpha + \sigma\upsilon\nu\beta, \eta\mu\alpha - \sigma\upsilon\nu\beta$ (θέτομεν $\beta = 90^\circ - \beta'$).

161) Ν' αποδειχθῆ, ὅτι εἶναι

$$\frac{\sigma\upsilon\nu\alpha + \sigma\upsilon\nu\beta}{\sigma\upsilon\nu\beta - \sigma\upsilon\nu\alpha} = \sigma\phi\frac{\alpha + \beta}{2} \sigma\phi\frac{\alpha - \beta}{2}.$$

162) Ν' αποδειχθῆ, ὅτι εἶναι

$$\epsilon\phi 2\alpha - \epsilon\phi\alpha = \frac{\epsilon\phi\alpha}{\sigma\upsilon\nu 2\alpha}.$$

163) Ἐὰν $\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$, νὰ αποδειχθῆ ὅτι

$$\eta\mu\alpha + \eta\mu\beta + \eta\mu\gamma = 4\sigma\upsilon\nu\frac{\alpha}{2}\sigma\upsilon\nu\frac{\beta}{2}\sigma\upsilon\nu\frac{\gamma}{2}.$$

164) Ομοίως, ἐὰν $\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$, ν' αποδειχθῆ, ὅτι

$$\sigma\upsilon\nu\alpha + \sigma\upsilon\nu\beta + \sigma\upsilon\nu\gamma - 1 = 4\eta\mu\frac{\alpha}{2}\eta\mu\frac{\beta}{2}\eta\mu\frac{\gamma}{2}.$$

165) Ἐὰν ἡ γωνία Γ τοῦ τριγώνου $ΑΒΓ$ εἶναι 60° νὰ δειχθῆ, ὅτι $2(\sigma\upsilon\nu Α + \sigma\upsilon\nu Β) = 4\eta\mu\frac{Α}{2}\eta\mu\frac{Β}{2} + 1$.

166) Ν' αποδειχθῆ, ὅτι ἐν παντὶ τριγώνῳ $ΑΒΓ$ εἶναι

$$\eta\mu 2Α + \eta\mu 2Β + \eta\mu 2Γ = 4\eta\mu Α\eta\mu Β\eta\mu Γ.$$

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΙΙ

ΠΕΡΙ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

52. Εἶδομεν εἰς τὴν εἰσαγωγὴν, ὅτι διὰ νὰ ἐπιτευχθῆ ὁ σκοπὸς τῆς τριγωνομετρίας πρέπει, νὰ εὑρεθῆ τρόπος ὥστε, εἰς ἑκάστην γωνίαν ἢ τόξον ν' ἀντιστοιχῆ εἰς ἀριθμὸς, διὰ τοῦ ὁποῦ νὰ δυνάμεθα νὰ εὑρίσκωμεν τὴν γωνίαν ἢ τὸ τόξον μετὰ βεβαιότητος. Εἰς τῶν τρόπων τούτων εἶναι νὰ μετρήσωμεν τὰς χορδὰς τῶν τόξων (ἦτοι τὰ ἡμίτονα διπλα) καὶ νὰ κατασκευάσωμεν διὰ τῶν ἀριθμῶν, τοὺς ὁποῖους θὰ εὑρωμεν, ἓνα πίνακα, λεγόμενον *πίνακα χορδῶν*. Τοιοῦτος πίναξ, περιέχων τὰ μήκη τῶν χορδῶν τῶν τόξων ἀπὸ μοίρας εἰς μοῖραν προχωρούντων, εὑρίσκεται ἤδη ἐν τῇ Μαθηματικῇ Συντάξει τοῦ Ἑλληνος ἀστρονόμου Πτολεμαίου.

53. Ἐκ τῶν τριγωνομετρικῶν πινάκων, οἱ ὁποῖοι εἶναι σήμερον ἐν χρήσει, οἱ μὲν περιέχουν τὰς ἀριθμητικὰς τιμὰς τῶν τριγωνομετρικῶν γραμμῶν τῶν τόξων ἀπὸ $0^\circ - 90^\circ$ καὶ λέγονται πίνακες τῶν *φυσικῶν* τιμῶν τῶν τριγωνομετρικῶν γραμμῶν.

μών, οἱ δὲ περιέχουν τοὺς λογαρίθμους τῶν τριγωνομετρικῶν ἀριθμῶν τῶν τόξων ἀπὸ 0° — 90° καὶ λέγονται *λογαριθμικοὶ τριγωνομετρικοὶ πίνακες*.

Εἶναι δὲ οἱ τελευταῖοι οὗτοι πίνακες συνηθεστάτης χρήσεως εἰς τὰ μαθηματικά, διότι συνήθως οἱ λογιισμοὶ γίνονται διὰ τῶν λογαρίθμων, ἐνῶ οἱ πρῶτοι πίνακες σπανιώτατα χρησιμοποιοῦνται.

Στηρίζεται δὲ ὁ λογιισμὸς τῶν τοιούτων πινάκων (π.χ. τῶν προχωρούντων ἀπὸ λεπτοῦ εἰς λεπτόν) ἐπὶ τῆς θεμελιώδους σχέσεως $\eta\mu^2\alpha + \sigma\upsilon\nu^2\alpha = 1$.

Καὶ πράγματι, ἐὰν εὑρεθῇ τὸ $\eta\mu 1'$, ἐξ αὐτῆς εὐρίσκεται ἀμέσως καὶ τὸ συνημίτονον αὐτοῦ. Ἐξ αὐτῶν δὲ διὰ τῶν ἄλλων θεμελιωδῶν τύπων τοῦ $\eta\mu(\alpha + \beta)$ καὶ τοῦ $\sigma\upsilon\nu(\alpha + \beta)$ εὐρίσκεται τὸ ἡμίτονον καὶ τὸ συνημίτονον τοῦ τόξου $2'$, ἐκ τούτων πάλιν διὰ τῶν αὐτῶν τύπων εὐρίσκεται καὶ τὸ ἡμίτονον καὶ τὸ συνημίτονον τοῦ ἀθροίσματος $2' + 1'$, ἴτοι $3'$. Ἐπειτα τοῦ ἀθροίσματος $3' + 1'$ κ.ο.κ. ἐφ' ὅσον θέλομεν.

Ἐχοντες οὕτω τὰ ἡμίτονα καὶ τὰ συνημίτονα εὐρίσκομεν καὶ τὰς ἐφαπτομένας καὶ τὰς συνεφαπτομένας τῶν αὐτῶν τόξων.

54. Λογαριθμικοὶ τριγωνομετρικοὶ πίνακες ὑπάρχουν μὲ 4, 5 ἢ καὶ 7 δεκαδικὰ ψηφία, ἐκ τῶν ὁποίων τελειότεροι εἶναι οἱ τοῦ Dupuis καὶ τοῦ Callet. Ἡμεῖς θὰ περιγράψωμεν τοὺς πενταψηφίους πίνακας τοῦ Dupuis, οἱ ὁποῖοι περιέχουν τοὺς λογαρίθμους τῶν ἡμιτόνων, συνημιτόνων, ἐφαπτομένων καὶ συνεφαπτομένων ἀπὸ 0° — 90° κατὰ λεπτόν προχωρούντων. Κυρίως ὅμως οἱ τοιοῦτοι πίνακες περιέχουν τοὺς λογαρίθμους τῶν τριγωνομετρικῶν ἀριθμῶν ἀπὸ 0° — 45° , ἔνεκα τῆς γνωστῆς ιδιότητος τῶν τριγωνομετρικῶν ἀριθμῶν τῶν συμπληρωματικῶν τόξων. Οὕτως, ὅταν ἔχωμεν π.χ. τὸν λογαρίθμον τοῦ $\eta\mu 30^\circ$ ἔχομεν συγχρόνως καὶ τὸν λογαρίθμον τοῦ $\sigma\upsilon\nu 60^\circ$, διότι $\eta\mu 30^\circ = \sigma\upsilon\nu 60^\circ$.

55. Διάταξις τῶν πινάκων Dupuis.—Αὕτη φαίνεται ἐκ τοῦ πίνακος τῆς ἐπομένης σελίδος.

Αἱ μοῖραι τῶν τόξων ἀπὸ 0° — 45° εἶναι γραμμῆναι εἰς τὸ ἄνω μέρος τῆς σελίδος, τὰ δὲ πρῶτα λεπτά εἰς τὴν πρὸς τὰ

	Sin.	D	Tang.	D	Cotg.	Cos.	D	
0	1,48998		1,51178		0,48822	1,97821		60
1	9037	39	1221	43	8779	7817	4	59
2	9076	39	1264	43	8736	7812	5	58
3	9115	39	1306	42	8694	7808	4	57
4	9153	38	1349	43	8641	7804	4	56
		39		43			4	
5	9192	39	1392	43	8608	7800	4	55
6	9231	39	1435	43	8565	7796	4	54
7	9269	38	1478	43	8522	7792	4	53
8	9308	39	1520	42	8480	7788	4	52
9	9347	39	1563	43	8437	7784	4	51
		38		43			5	
10	9385	39	1606	42	8394	7779	4	50
11	9424	38	1648	43	8352	7775	4	49
12	9462	38	1691	43	8309	7771	4	48
13	9500	39	1734	42	8266	7767	4	47
14	9539	38	1776	43	8224	7763	4	46
		38		43			4	
15	9577	38	1819	42	8181	7759	5	45
16	9615	39	1861	42	8139	7754	4	44
17	9654	38	1903	43	8097	7750	4	43
18	9692	38	1946	43	8054	7746	4	42
19	9730	38	1988	43	8012	7742	4	41
		38		43			4	
20	9768	38	2031	42	7969	7738	4	40
21	9806	38	2073	42	7927	7734	4	39
22	9844	38	2115	42	7885	7729	5	38
23	9882	38	2157	42	7843	7725	4	38
24	9920	38	2200	43	7800	7721	4	37
		38		42			4	36
25	9958	38	2242	42	7758	7717	4	35
26	1,49996	38	2284	42	7716	7713	4	34
27	1,50034	38	2326	42	7674	7708	5	33
28	0072	38	2368	42	7632	7704	4	32
29	0110	38	2410	42	7590	7700	4	31
		38		42			4	
30	1,50148		1,52452		0,47548	1,97696		30
	Cos.		Cotg.		Tang.	Sin.		

ἀριστερά στήλην ἀυξανόμενα πρὸς τὰ κάτω. Ὁ δὲ λογάριθμος ἐκάστου τῶν τεσσάρων τριγωνομετρικῶν ἀριθμῶν (sinus=ἡμιτόνου, tangente=ἐφαπτομένης, contangente=συνεφαπτομένης καὶ cosinus=συνημιτόνου) εὐρίσκεται γραμμένος ἐκεῖ, ὅπου διασταυροῦνται ἡ ὀριζοντία σειρᾶ, ἡ ὅποια ἔχει τὰ πρῶτα λεπτά μετὰ τῆς στήλης, ἐπὶ τῆς ὅποιας εὐρίσκεται γραμμένον τὸ ὄνομα τοῦ τριγωνομετρικοῦ ἀριθμοῦ.

Ἐπειδὴ δὲ πολλοὶ ἐφεξῆς λογάριθμοι ἔχουν κοινὰ τὰ δύο πρῶτα ψηφία (τὸ χαρακτηριστικὸν καὶ τὰ δέκατα), γράφονται ταῦτα ἄπαξ καὶ νοοῦνται ἐπαναλαμβανόμενα τὰ αὐτά, μέχρις οὗ ἀλλάθοῦν. Ἐπαναλαμβάνονται ὅμως πρὸς εὐκολίαν τῆς εὐρέσεως αὐτῶν εἰς τὴν ἀρχὴν καὶ εἰς τὸ τέλος ἐκάστης σελίδος. Κατὰ τὸν τρόπον τοῦτον βλέπομεν ὅτι εἶναι

$$\text{λογ } \eta\mu(18^\circ 10') = \overline{1,49385}$$

$$\text{λογ } \epsilon\phi(18^\circ 13') = \overline{1,51734}$$

$$\text{λογ } \sigma\phi(18^\circ 0') = 0,48822$$

$$\text{λογ } \sigma\upsilon\nu(18^\circ 30') = \overline{1,97696}$$

Τῶν τόξων τῶν μεγαλυτέρων τῶν 45° αἱ μὲν μοῖραι εὐρίσκονται εἰς τὸ κάτω μέρος τῆς σελίδος, τὰ δὲ πρῶτα λεπτά αὐτῶν εἰς τὴν τελευταίαν στήλην πρὸς τὰ δεξιὰ ἀυξανόμενα πρὸς τὰ ἄνω· ἐγράφησαν δὲ οὕτω τὰ τόξα ταῦτα, ὥστε ἕκαστον νὰ εὐρίσκηται μετὰ τοῦ συμπληρώματος αὐτοῦ εἰς τὴν αὐτὴν σελίδα καὶ οἱ λογάριθμοι τῶν τριγωνομετρικῶν ἀριθμῶν ἀμφοτέρων τῶν συμπληρωματικῶν τόξων νὰ εὐρίσκονται ἐν μιᾷ καὶ τῇ αὐτῇ ὀριζοντία σειρᾷ. Τὸ εἶδος τοῦ ἀριθμοῦ διὰ τὰ τόξα αὐτὰ ἐγράφη ὑποκάτω τῶν στηλῶν, ἐγράφη δὲ cos ὑπὸ τὴν στήλην τῶν sin, sin ὑπὸ τὴν στήλην τῶν cos, cotg ὑπὸ τὴν στήλην τῶν tang καὶ τάνάπαλιν tang ὑπὸ τὴν στήλην τῶν cotg, ἔνεκα τῆς ἰδιότητος τῶν τριγωνομετρικῶν ἀριθμῶν τῶν συμπληρωματικῶν τόξων.

Κατὰ τὸν τρόπον τοῦτον βλέπομεν, ὅτι εἶναι

$$\text{λογ}\sigma\upsilon\nu(71^\circ 50') = \overline{1,49385} = \text{λογ}\eta\mu(18^\circ 10')$$

$$\text{λογ}\sigma\phi(71^\circ 47') = \overline{1,51734} = \text{λογ}\epsilon\phi(18^\circ 13')$$

$$\text{λογ}\epsilon\phi(71^\circ 60') = 0,48822 = \text{λογ}\sigma\phi(18^\circ 0')$$

$$\text{λογ}\eta\mu(71^\circ 30') = \overline{1,97696} = \text{λογ}\sigma\upsilon\nu(18^\circ 30').$$

56. Οἱ λογάριθμοι τῶν ἡμιτόνων καὶ τῶν συνημιτόνων

είναι ἀρνητικοί ἀριθμοί, διότι ταῦτα εἶναι μικρότερα τῆς μονάδος· εἰς τοὺς πίνακας ὅμως ἐτράπησαν εἰς ἄλλους, ἔχοντας τὸ χαρακτηριστικὸν ἀρνητικὸν (Στοιχεῖα Ἀλγέβρας).

Πρὸς τὰ δεξιὰ ἐκάστης στήλης λογαρίθμων ὑπάρχει ἄλλη στήλη, ἐπὶ τῆς κορυφῆς τῆς ὁποίας ὑπάρχει τὸ γράμμα D (Différences) ἐν αὐτῇ εὐρίσκονται γραμμῆναι αἱ διαφοραὶ δύο ἐφεξῆς λογαρίθμων, ἤτοι ἡ αὔξησης ἢ ἡ ἐλάττωσις ἐκάστου λογαρίθμου, ἢ πρὸς τὴν αὔξησιν τοῦ τόξου κατὰ 1' ἀντιστοιχοῦσα. Τὴν χρῆσιν τῶν διαφορῶν τούτων θὰ ἴδωμεν κατωτέρω.

57. Οἱ λογάριθμοι τῶν ἐφαπτομένων καὶ συνεφαπτομένων ἔχουν τὰς αὐτὰς διαφοράς, διότι ἐκ τῆς ἰσότητος εφα. σφα=1 ἔπεται

$$\text{λογεφα} + \text{λογοσφα} = 0 \quad \text{ἢ} \quad \text{λογοσφα} = -\text{λογεφα}$$

ἤτοι οἱ λογάριθμοι τῆς ἐφαπτομένης καὶ τῆς συνεφαπτομένης τοῦ αὐτοῦ τόξου εἶναι πάντοτε ἀντίθετοι ἀριθμοί· ἐπομένως ἐὰν αὐξηθῇ ὁ εἰς ἕξ αὐτῶν κατὰ δ, θὰ ἐλαττωθῇ ὁ ἄλλος κατὰ δ.

ΧΡΗΣΙΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

58. Ἡ χρῆσις τῶν λογαριθμικῶν πινάκων τῶν τριγωνομετρικῶν ἀριθμῶν ἀνάγεται εἰς τὴν λύσιν τῶν ἐπομένων δύο προβλημάτων.

Πρόβλημα 1ον.—*Δοθέντος τόξου νὰ εὐρεθῇ ὁ λογάριθμος ἐνὸς τῶν τριγωνομετρικῶν ἀριθμῶν αὐτοῦ.*

Εἰς τὸ πρόβλημα τοῦτο διακρίνομεν δύο περιπτώσεις :

1) Ἄν τὸ δοθὲν τόξον περιέχῃ μόνον μοίρας καὶ πρῶτα λεπτά, ὁ ζητούμενος λογάριθμος εὐρίσκεται εἰς τοὺς πίνακας ἀμέσως. Οὕτως εὐρίσκομεν

$$\text{λογ ημ}(75^{\circ}18') = \overline{1,98555}$$

$$\text{λογ συν}(83^{\circ}15') = \overline{1,07018}$$

$$\text{λογ εφ}(14^{\circ}16') = \overline{1,40531}$$

$$\text{λογ σφ}(87^{\circ}14') = \overline{2,68417}.$$

2) Ἄν τὸ δοθὲν τόξον περιέχῃ καὶ δεύτερα λεπτά ὡς π.χ. τὸ τόξον $44^{\circ}17'22''$ καὶ θέλωμεν νὰ εὐρωμεν τὸν λογάριθμον τοῦ ἡμιτόνου του ἐργαζόμεθα ὡς ἐξῆς: Κατὰ πρῶτον παρα-

τηρούμεν ὅτι, ὅταν τὸ τόξον αὐξάνη ἀπὸ 0° — 90° τὸ ἡμίτονον αὐξάνει. Ἐπομένως ὁ λογ ημ($44^{\circ}17'22''$) εἶναι μεγαλύτερος τοῦ λογημ($44^{\circ}17'$) καὶ μικρότερος τοῦ λογημ($44^{\circ}18'$)· ἀλλὰ

$$\text{λογ ημ}(44^{\circ}17') = \overline{1,84398}$$

$$\text{λογ ημ}(44^{\circ}18') = \overline{1,84411}.$$

Ἦδη παρατηρούμεν, ὅτι ἡ διαφορά τῶν λογαρίθμων τούτων εἶναι 13 (μονάδες τῆς τελευταίας τάξεως), ἀλλὰ καὶ ἡ διαφορά τῶν δύο ἐπομένων εἶναι πάλιν 13 καὶ ἡ διαφορά αὕτη δύο ἐφεξῆς λογαρίθμων τῶν ἡμιτόνων ἐπὶ πολὺ διατηρεῖται ὥστε δυνάμεθα νὰ παραδεχθῶμεν, ὅτι *ἡ αὐξήσις τῶν λογαρίθμων εἶναι ἀνάλογος τῆς αὐξήσεως τῶν τόξων*, ὅτε σκεπτόμεθα ὡς ἐξῆς :

Δι' αὐξήσιν ἑνὸς λεπτοῦ ἀπὸ τόξου $44^{\circ} 17'$ εἰς τόξον 44° καὶ $18'$ ἠύξηθη ὁ λογάριθμος τοῦ ἡμιτόνου κατὰ 13 (ἐκατοντάκις χιλιοστά)· δι' αὐξήσιν $22''$, ἤτοι $\frac{22}{60}$ τοῦ πρώτου λεπτοῦ ἀπὸ τοῦ τόξου $44^{\circ} 17'$ εἰς τὸ δοθὲν τόξον $44^{\circ} 17'22''$, ὁ ἄνω λογάριθμος θὰ αὐξηθῇ κατὰ $\frac{22}{60} \cdot 13$, ἤτοι κατὰ 5 (περίπου)· ὥστε πρέπει νὰ προσθέσωμεν 5 μονάδας τῆς τελευταίας τάξεως εἰς τὸν λογημ($44^{\circ}17'$), ἵνα εὕρωμεν τὸν λογάριθμον ημ($44^{\circ}17'22''$), ἐπομένως εἶναι

$$\text{λογημ}(44^{\circ}17'22'') = \overline{1,84403}.$$

Κατὰ τὸν τρόπον τοῦτον εὐρίσκονται καὶ οἱ ἐπόμενοι λογάριθμοι

$$1) \text{ λογεφ } 14^{\circ} 38' 40''.$$

$$\text{Ἔχομεν λογεφ}(14^{\circ}38') = \overline{1,41681}, \text{ διαφορά } 52$$

διὰ $40''$ προστίθενται $\frac{40}{60} \cdot 52 = 35$, (διότι αἱ ἐφαπτόμεναι αὐξάνουν, ὅταν τὸ τόξον αὐξάνη).

$$\text{Ἄρα } \text{λογεφ}(14^{\circ} 38' 40'') = \overline{1,41716}$$

$$2) \text{ λογαφ}(8^{\circ} 9' 10'')$$

$$\text{ἔχομεν λογαφ}(8^{\circ} 9') = 0,84402, \text{ διαφορά } 90$$

διὰ $10''$ ἀφαιρῶνται $\frac{10}{60} \cdot 90 = 15$ (διότι αἱ συνεφαπτόμεναι ἐλαττοῦνται, ὅταν τὸ τόξον αὐξάνη).

$$\text{Ἄρα } \text{λογεφ}(8^{\circ} 9' 10'') = 0,84387.$$

3) λογουν(69° 14' 25').

"Έχουμεν λογουν(69° 14')= $\overline{1,54969}$, διαφορά 33
 δια 25'' αφαιρούνται: $\frac{25}{60} \cdot 33 = 14$ (διότι τὸ συνημίτονον ἔλατ-
 τοῦται, ὅταν τὸ τόξον αὐξάνη ἀπὸ 0°—90°).

"Ὅθεν λογουν(69° 14' 25'')= $\overline{1,54955}$.

Πρόβλημα 2ον.—*Ἐκ τοῦ λογαρίθμου ἑνὸς τῶν τριγωνο-
 μετρικῶν ἀριθμῶν, νὰ εὐρεθῇ τὸ ἀντιστοιχοῦν τόξον* (τὸ τόξον
 τοῦτο ὑποτίθεται πάντοτε μικρότερον τῶν 90°).

1) "Ἄν ὁ δοθεὶς λογάριθμος περιέχεται εἰς τοὺς πίνακας
 εἰς τὴν οἰκείαν στήλην, τὸ τόξον εὐρίσκεται ἀμέσως· ἂν π.χ. δοθῇ
 λογουν $\alpha = \overline{1,97615}$

εὐρίσκομεν ἐκ τῶν πινάκων ἀμέσως $\alpha = 18^\circ 49'$.

Ὅμοίως, ἂν δοθῇ λογεφ $\chi = 0,03060$
 εὐρίσκομεν ἐκ τῶν πινάκων $\chi = 47^\circ 1'$.

2) "Ἄν ὁ δοθεὶς λογάριθμος δὲν ὑπάρχη εἰς τοὺς πίνα-
 κας, θὰ περιλαμβάνεται μεταξὺ δύο ἐφεξῆς λογαρίθμων τοῦ
 ρηθέντος ἀριθμοῦ καὶ ἐπομένως τὸ ζητούμενον τόξον θὰ πε-
 ριλαμβάνηται μεταξὺ τῶν πρὸς αὐτοὺς ἀντιστοιχοῦντων τό-
 ξων, τῶν ὁποίων ἡ διαφορά εἶναι 1'.

"Ἄν π. χ. δοθῇ λογημ $\alpha = \overline{1,40891}$
 εὐρίσκομεν εἰς τὴν στήλην τῶν λογαρίθμων τῶν ἡμιτόνων
 $\overline{1,40873} = \text{λογημ}(14^\circ 51')$
 $\overline{1,40921} = \text{λογημ}(14^\circ 52')$

ὁ δοθεὶς λογάριθμος $\overline{1,40891}$ περιλαμβάνεται μεταξὺ τῶν λο-
 γαρίθμων τούτων, οἵτινες διαφέρουν κατὰ 48. Παραδεχόμενοι
 δέ, ὡς καὶ πρὶν, ὅτι ἡ αὐξησης τῶν λογαρίθμων εἶναι ἀνάλο-
 γος τῆς αὐξήσεως τῶν τόξων, σκεπτόμεθα ὡς ἐξῆς· ἂν ὁ λο-
 γάριθμος $\eta\mu(14^\circ 51')$, ὅστις εἶναι $\overline{1,40873}$, αὐξηθῇ κατὰ 48
 (μονάδας τῆς κατωτάτης τάξεως), τὸ τόξον αὐξάνεται κατὰ
 1' ἢτοι 60''· ἂν δὲ ὁ αὐτὸς λογάριθμος αὐξηθῇ μόνον κατὰ 18
 (ὅτε γίνεται ἴσος μὲ τὸν δοθέντα) τὸ τόξον θὰ αὐξηθῇ κατὰ
 $60'' \cdot \frac{18}{48}$ ἢτοι κατὰ 22'' περίπου· ὥστε εἶναι $\alpha = 14^\circ 51' 22''$. (1)

(1) Ἐπειδὴ $\text{λογημ}45^\circ = \overline{1,84949} = \text{λογουν}45^\circ$, ἔπεται ὅτι, ὅταν ὁ
 διδόμενος λογάριθμος εἶναι μικρότερος τοῦ $\overline{1,84949}$ τὸ τόξον εἶναι
 μικρότερον τῶν 45°, ἐὰν δίδεται ὁ λογημ. καὶ μεγαλύτερον τῶν 45°, ἐὰν

Ὁμοίως ἂν δοθῆ λογσυνβ= $\overline{1.89885}$,

εὐρίσκομεν $\overline{1.89888}$ =λογσυν($37^\circ 36'$)

καὶ $\overline{1.89879}$ =λογσυν($37^\circ 37'$),

ἐπειδὴ δὲ ἡ διαφορὰ τῶν λογαρίθμων τούτων εἶναι 9, ὁ δὲ δοθεὶς διαφέρει τοῦ πρώτου κατὰ 3, ἔπεται, ὅτι πρέπει νὰ ἀυξηθῆ τὸ τόξον $37^\circ 36'$ κατὰ $\frac{3}{9}$ τοῦ πρώτου λεπτοῦ, ἦτοι κατὰ $20''$, ἵνα γίνῃ ἴσον τῷ τόξῳ β. Ὡστε εἶναι $\beta=37^\circ 36' 20''$.

Ὁμοίως, ἂν δοθῆ λογεφχ= $1,25849$

εὐρίσκομεν $1,25708$ =λογεφ($86^\circ 50'$)

$1,25937$ =λογεφ($86^\circ 51'$).

Ἐκ τούτων βλέπομεν, ὅτι ἂν ὁ λογάριθμος $1,25708$ ἀυξηθῆ κατὰ 229 (ὅτε γίνεται $1,25937$), τὸ ἀντιστοιχοῦν τόξον $86^\circ 50'$, ἀυξάνει κατὰ $1'$. Ὡστε, ἂν ὁ αὐτὸς λογάριθμος ἀυξηθῆ μόνον κατὰ 141 (ὅτε γίνεται ἴσος μὲ τὸν δοθέντα) θὰ ἀυξηθῆ τὸ τόξον κατὰ $60''$. $\frac{141}{229}$ ἦτοι κατὰ $37''$ περίπου· ὥστε εἶναι $\chi'=86^\circ 50' 37''$.

Ἐστω ἤδη λογσφω= $0,11101$.

Ἐχομεν $0,11110$ =λογσφ($37^\circ 45'$), διαφορὰ 26·

διὰ διαφορὰν 9 (ἐπὶ ἔλαττον) πρέπει νὰ ἀυξηθῆ τὸ τόξον κατὰ $60'' \cdot \frac{9}{26}$, ἦτοι κατὰ $21''$ περίπου· ὥστε εἶναι $\omega=37^\circ 45' 21''$.

59. **Παρατήρησις.** Ἐνίοτε ἀντὶ νὰ δοθῆ ὁ λογάριθμος τριγωνομετρικοῦ τινος ἀριθμοῦ, δίδεται αὐτὸς ὁ ἀριθμὸς καὶ ζητεῖται τὸ ἀντιστοιχοῦν τόξον. Τότε διακρίνομεν δύο περιπτώσεις.

δίδεται ὁ λογσυν. Ὡστε εἰς τὴν πρώτην περίπτωσιν θὰ ἀναγινώσκωμεν εἰς τοὺς πίνακας μας ἐν τῇ οἰκείᾳ στήλῃ, πρὸς ἀνεύρεσιν τοῦ δεδομένου λογαρίθμου, ἐκ τῶν ἄνω πρὸς τὰ κάτω καὶ εἰς τὴν δευτέραν περίπτωσιν θὰ ἀναγινώσκωμεν ἐκ τῶν κάτω πρὸς τὰ ἄνω. Ἀντιστρόφως δὲ θὰ ἀναγινώσκωμεν, ἂν ὁ διδόμενος λογάριθμος εἶναι μεγαλύτερος τοῦ $1,84949$. Ἐὰν ζητῆται τὸ τόξον ἐκ τοῦ λογαρίθμου τῆς ἐφαπτομένης ἢ τῆς συνεφαπτομένης καὶ εἶναι οἷτος ἀρνητικός, τὸ τόξον εἶναι μικρότερον τῶν 45° , ἂν ὁ λογάριθμος εἶναι τῆς ἐφαπτομένης καὶ μεγαλύτερον τῶν 45° , ἂν εἶναι τῆς συνεφαπτομένης· ἀντιστρόφως δὲ συμβαίνει ἂν ὁ διδόμενος λογάριθμος εἶναι θετικός. Κατόπιν τούτων εὐκόλως ἔπεται ἡ φορὰ, καθ' ἣν θὰ ἀναγινώσκωμεν εἰς τοὺς πίνακας εἰς ἐκάστην περίπτωσιν.

1η) Ἄν ὁ δοθεὶς ἀριθμὸς εἶναι θετικὸς, εὐρίσκομεν τὸν λογαριθμὸν αὐτοῦ (ἐκ τοῦ πίνακος, ὅστις περιέχει τοὺς λογαριθμοὺς τῶν ἀριθμῶν) καὶ ἐξ αὐτοῦ τὸ τόξον.

Ἄν π.χ. ζητῆται τὸ τόξον χ , διὰ τὸ ὁποῖον εἶναι $\eta\mu\chi = \frac{1}{5}$,
 ἔχομεν $\log\eta\mu\chi = \log\left(\frac{1}{5}\right) = -\log 5 = \bar{1},30103$ ὅθεν
 $\chi = 11^{\circ}32'13''$.

Ὅμοίως, ἂν ζητῆται τὸ τόξον ϕ , διὰ τὸ ὁποῖον εἶναι

$$\epsilon\phi\phi = \frac{8}{\sqrt{45}}$$

θὰ ἔχωμεν $\log\epsilon\phi\phi = \log 8 - \frac{1}{2} \log 45$
 $\log 8 = 0,90309$

$\log 45 = 1,65321$ $\frac{1}{2} \log 45 = 0,82660$

ὥστε $\log\epsilon\phi\phi = 0,07649$

καὶ $\phi = 50^{\circ} 1' 12''$.

2α) Ἐάν ὁ δοθεὶς ἀριθμὸς εἶναι ἀρνητικὸς, τότε ἀντὶ τοῦ ζητουμένου τόξου, εὐρίσκομεν τὸ παραπλήρωμα αὐτοῦ, ἂν ὁ ἀριθμὸς εἶναι συνημίτονον ἢ ἐφαπτομένη ἢ συνεφαπτομένη διότι τὸ παραπλήρωμα θὰ ἔχη τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν θετικόν· εὐρεθέντος δὲ τοῦ παραπληρώματος αὐτοῦ, εὐρίσκεται ἀμέσως τὸ ζητούμενον τόξον.

Ἐάν π.χ. δοθῆ $\epsilon\phi\omega = -4$,

παριστῶντες τὸ παραπλήρωμα τοῦ ω διὰ ϕ , θὰ ἔχωμεν

$$\epsilon\phi\phi = \epsilon\phi(180^{\circ} - \omega) = 4.$$

Ὅθεν $\log \epsilon\phi\phi = \log 4 = 0,60206$

$$\phi = 75^{\circ} 57' 50'',$$

ἐπομένως

$$\omega = 104^{\circ} 2' 10''$$

Ἐάν ὁ δοθεὶς ἀρνητικὸς ἀριθμὸς εἶναι ἡμίτονον, τὸ ἀντιστοιχοῦν πρὸς αὐτὸν τόξον θὰ ὑπερβαίνει τὰς 180° καὶ ἀφαιρούμενες ἀπ' αὐτοῦ τὰς 180° , θὰ ἔχωμεν τόξον, τοῦ ὁποῖου τὸ ἡμίτονον θὰ εἶναι ἀντίθετον τοῦ δοθέντος. Εὐρόντες δὲ τὸ τόξον τοῦτο, προσθέτομεν εἰς αὐτὸ τὰς 180° καὶ ἔχομεν τὸ ζητούμενον.

Ἐάν π.χ. δοθῆ $\eta\mu\chi = -\frac{1}{8}$,

θέτομεν $\chi = 180^{\circ} + \omega$, ὅτε ἔχομεν $\omega = \chi - 180^{\circ}$

καί	$\eta\mu\omega = \eta\mu(\chi - 180^\circ) = \frac{1}{8},$
ὅθεν	$\log\eta\mu\omega = \log\left(\frac{1}{8}\right) = -\log 8$
ἦτοι	$\log\eta\mu\omega = \overline{1},09691$
ὅθεν	$\omega = 7^\circ 10' 51''$
καί	$\chi = 187^\circ 10' 51''.$

Σημείωσις. Πρὸς ἐκάστην τιμὴν ἑνὸς οἰουδήποτε τῶν τριγωνομετρικῶν ἀριθμῶν ἀντιστοιχοῦν δύο τόξα μικρότερα περιφερείας· ἐκ τούτων τὸ μικρότερον εὐρίσκεται κατὰ τὴν προηγουμένως ἐκτεθεῖσαν μέθοδον, ἐκ δὲ τούτου εὐρίσκεται καὶ τὸ ἄλλο εὐκόλως διὰ τῶν γνωστῶν ἰδιοτήτων τῶν τριγωνομετρικῶν ἀριθμῶν.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Νὰ εὐρεθῆ:

- | | |
|--|---|
| 167) ὁ $\log \eta\mu(29^\circ 14' 32'')$ | 171) ὁ $\log \epsilon\phi(22^\circ 37' 22'')$ |
| 168) ὁ $\log \sigma\upsilon\nu(16^\circ 27' 47'')$ | 172) ὁ $\log \sigma\phi(17^\circ 45'')$ |
| 169) ὁ $\log \eta\mu(57^\circ 45' 28'')$ | 173) ὁ $\log \epsilon\phi(61^\circ 2' 48'')$ |
| 170) ὁ $\log \sigma\upsilon\nu(65^\circ 24' 37'')$ | 174) ὁ $\log \sigma\phi(58^\circ 42' 35'')$ |

Νὰ εὐρεθοῦν τὰ τόξα (τὰ μικρότερα τῶν 90°) δι' ἃ δίδεται

- | | |
|---|--|
| 175) $\log\eta\mu\alpha = \overline{1},41745$ | 180) $\sigma\upsilon\nu\alpha = \frac{5}{9}$ |
| 176) $\log\sigma\upsilon\nu\alpha = \overline{1},25807$ | 181) $\epsilon\phi\alpha = 2\frac{1}{4}$ |
| 177) $\log\epsilon\phi\alpha = 0,31370$ | 182) $\sigma\phi\alpha = 0,875$ |
| 178) $\log\sigma\phi\alpha = \overline{1},05490$ | 183) $\eta\mu\alpha = -\frac{7}{15}$ |
| 179) $\eta\mu\alpha = \frac{3}{8}$ | 184) $\sigma\phi\alpha = -3.$ |

185) Νὰ εὐρεθοῦν αἱ τιμαὶ τῶν κάτωθι παραστάσεων

$\beta = 89,25. \eta\mu 18^\circ 50'$	$\gamma = 112,35. \sigma\upsilon\nu 35^\circ 25' 30''$
$\beta = 5147,8. \epsilon\phi 52^\circ 37' 20''$	$\gamma = 6009,6. \sigma\phi 29^\circ 37' 20''.$

186) Ὅμοίως νὰ εὐρεθοῦν αἱ τιμαὶ τῶν κάτωθι παραστάσεων:

$\alpha = 58. \eta\mu 49^\circ. \sigma\upsilon\nu 27^\circ 45'$
$\beta = 419. \eta\mu 65^\circ 20'. \eta\mu 39^\circ 22' 40''$
$\gamma = 708. \sigma\upsilon\nu 51^\circ 18'. \sigma\phi 19^\circ 32' 35''.$

187) Νά εὑρεθοῦν αἱ τιμαὶ τῶν παραστάσεων

$$E = \frac{1}{2} \cdot 317,5.429. \eta\mu 33^\circ 27'.$$

$$\chi = \frac{4753. \eta\mu 45^\circ 40' \cdot \sigma\upsilon\nu 19^\circ 9'}{91,8}.$$

188) Νά εὑρεθῇ ἡ τιμὴ τῆς παραστάσεως

$$\frac{31,2^2 \eta\mu 73^\circ 10' 30''}{\eta\mu 46^\circ 54' \cdot \eta\mu 30^\circ 28''}.$$

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IV

ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΑΙ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

60. Τριγωνομετρικαὶ ἐξισώσεις.— Ἐξισώσεις περιέχουσα τριγωνομετρικοὺς ἀριθμοὺς ἀγνώστων γωνιῶν ἢ τόξων καλεῖται τριγωνομετρικὴ.

Δύσιν δὲ ταύτης καλεῖται ἡ εὗρεσις τῶν τιμῶν τῶν γωνιῶν ἢ τόξων, αἵτινες τὴν ἐπαληθεύουν.

Παραδείγματα. Ἐστω πρὸς λύσιν ἡ ἐξίσωσις
 $\eta\mu\chi = 0,2664$ ἔχομεν $\log\eta\mu\chi = \bar{1},42553$ καὶ
 $\chi = 15^\circ 27'$ ἢ $164^\circ 33'$

ἐπειδὴ τὰ παραπληρωματικὰ τόξα ἔχουν τὰ αὐτὰ ἡμίτονα, ἢ
 $\chi = -344^\circ 33'$ ἢ $-195^\circ 27'$.

2) Ὅμοίως ἔστω ἡ $2\eta\mu^2\chi - 3\eta\mu\chi - 2 = 0$.

Ἐάν θέσωμεν $\eta\mu\chi = \psi$, ἔχομεν $2\psi^2 - 3\psi - 2 = 0$

ἐκ τῆς λύσεως τῆς ὁποίας λαμβάνομεν $\psi = 2$ ἢ $-\frac{1}{2}$.

ἀλλ' ἡ λύσις $\psi = 2$ προφανῶς ἀπορρίπτεται καὶ μένει ἡ
 $\eta\mu\chi = -\frac{1}{2}$. ἤτοι εἶναι $\chi = -30^\circ$ ἢ 210° , ἢ $\chi = 330^\circ$ ἢ -150° .

3) Ἐστω πάλιν $2\eta\mu\chi - \epsilon\phi\chi = 0$.

Ἐχομεν $2\eta\mu\chi - \frac{\eta\mu\chi}{\sigma\upsilon\nu\chi} = 0$ ἢ $\eta\mu\chi \left(2 - \frac{1}{\sigma\upsilon\nu\chi} \right) = 0$.

ὥστε εἶναι $\eta\mu\chi = 0$ ἢ $\sigma\upsilon\nu\chi = \frac{1}{2}$.

ἐκ τῆς πρώτης λαμβάνομεν $\chi = 0$ ἢ $\pm 180^\circ$ καὶ ἐκ τῆς δευτέρας
 $\chi = \pm 60^\circ$ ἢ $\pm 300^\circ$.

4) Ἐστω ἡ ἐξίσωσις $2\sigma\upsilon\nu\chi^2 + 5\eta\mu\chi - 4 = 0$ εἰς ταύτην θέτομεν $1 - \eta\mu^2\chi$ ἀντὶ $\sigma\upsilon\nu^2\chi$ καὶ ἔχομεν $2\eta\mu^2\chi - 5\eta\mu\chi + 2 = 0$. Λύοντες

ἤδη ταύτην, καθ' ὃν τρόπον ἐλύθη ἡ ἐξίσωσις τοῦ παραδ. 2 εὐρίσκομεν $\eta\mu\chi=2$ ἢ $\frac{1}{2}$. ἄλλ' ἐκ τῶν λύσεων τούτων ἡ $\eta\mu\chi=2$ ἀπορρίπτεται καὶ μένει ἡ $\eta\mu\chi=\frac{1}{2}$, ἐξ ἧς λαμβάνομεν $\chi=30^\circ$ ἢ 150° ἢ $\chi=-330^\circ$ ἢ -210° .

Ἐν τῇ λύσει τῆς ἀνωτέρω ἐξισώσεως παρατηροῦμεν, ὅτι ἡ δοθεῖσα, ἣτις περιέχει δύο τριγωνομετρικούς ἀριθμούς μετεσχηματίσθη εἰς ἄλλην ἰσοδύναμον περιέχουσαν ἓνα τοιοῦτον ἀριθμόν. Αἱ λύσεις, τὰς ὁποίας ἔδωκεν ἡ τελευταία, εἶναι λύσεις καὶ τῆς δοθείσης.

5) Ἐστω ἡ ἐξίσωσις $\alpha \cdot \sigma\upsilon\nu\chi + \beta \cdot \eta\mu\chi = \gamma$.

Ἐὰν διαιρέσωμεν ἀμφότερα τὰ μέλη τῆς ἐξισώσεως ταύτης δι' α , λαμβάνομεν $\sigma\upsilon\nu\chi + \frac{\beta}{\alpha} \eta\mu\chi = \frac{\gamma}{\alpha}$, ἐὰν δὲ τεθῇ $\frac{\beta}{\alpha} = \epsilon\phi\omega$, ἔχομεν $\sigma\upsilon\nu\chi + \epsilon\phi\omega \cdot \eta\mu\chi = \frac{\gamma}{\alpha}$, ἢ $\sigma\upsilon\nu\chi + \frac{\eta\mu\omega}{\sigma\upsilon\nu\omega} \cdot \eta\mu\chi = \frac{\gamma}{\alpha}$ ἥτοι $\sigma\upsilon\nu\chi \cdot \sigma\upsilon\nu\omega + \eta\mu\chi \cdot \eta\mu\omega = \frac{\gamma}{\alpha} \cdot \sigma\upsilon\nu\omega$ ἢ $\sigma\upsilon\nu(\chi - \omega) = \frac{\gamma}{\alpha} \sigma\upsilon\nu\omega$.

Ἄλλ' ἐκ τῆς ἐξισώσεως $\epsilon\phi\omega = \frac{\beta}{\alpha}$ εὐρίσκομεν τὴν ω καὶ συνεπῶς καὶ τὸ $\sigma\upsilon\nu\omega$ καὶ τὸ $\sigma\upsilon\nu(\chi - \omega)$, ἐπομένως καὶ τὴν χ .

Γωνίαι ὡς ἡ ω , αἵτινες εἰσάγονται, ἵνα εὐκολύνουν τὴν λύσιν τῶν τριγωνομετρικῶν ἐξισώσεων, λέγονται βοηθητικά.

61. **Συστήματα.**—Κατωτέρω δίδομεν παραδείγματα λύσεως τριγωνομετρικῶν συστημάτων.

1. Ἐστω τὸ σύστημα $\chi + \psi = 73^\circ$

$$\eta\mu\chi + \eta\mu\psi = 1,182.$$

Ἡ δευτέρα ἐξίσωσις γράφεται $2\eta\mu\frac{\chi+\psi}{2}\sigma\upsilon\nu\frac{\chi-\psi}{2} = 1,182$ ἢ

$$\sigma\upsilon\nu\frac{\chi-\psi}{2} = \frac{1,182}{2\eta\mu 36^\circ 30'}.$$

Ἐπειδὴ δὲ ἐκ τῶν τριγωνομετρικῶν πινάκων εὐρίσκεται $\eta\mu 36^\circ 30' = 0,59483$, ἡ τελευταία ἐξίσωσις γράφεται

$$\sigma\upsilon\nu\frac{\chi-\psi}{2} = 0,99356, \text{ ἐξ ἧς εὐρίσκομεν } \frac{\chi-\psi}{2} = 6^\circ 30'$$

καὶ $\chi - \psi = 13^\circ$ ἢ $\chi - \psi = 347^\circ$.

Ἐκ τῆς λύσεως δὲ τῶν συστημάτων

$$\chi + \psi = 73^\circ$$

$$\chi + \psi = 73^\circ$$

ἢ

$$\chi - \psi = 13^\circ$$

$$\chi - \psi = 347^\circ$$

λαμβάνομεν τὰς τιμὰς τῶν χ καὶ ψ .

2) Ἐστω προσέτι τὸ σύστημα

$$\chi + \psi = \alpha$$

$$\frac{\eta\mu\chi}{\eta\mu\psi} = \beta.$$

Ἡ δευτέρα ἐξίσωσις γράφεται $\frac{\eta\mu\chi - \eta\mu\psi}{\eta\mu\chi + \eta\mu\psi} = \frac{\beta - 1}{\beta + 1}$.

Ἐπειδὴ δὲ εἶναι

$$\frac{\eta\mu\chi - \eta\mu\psi}{\eta\mu\chi + \eta\mu\psi} = \frac{\epsilon\phi\frac{\chi - \psi}{2}}{\epsilon\phi\frac{\chi + \psi}{2}}$$

ἡ τελευταία ἐξίσωσις γράφεται $\epsilon\phi\frac{\chi - \psi}{2} = \frac{\beta - 1}{\beta + 1} \cdot \epsilon\phi\frac{\alpha}{2}$,

ἐκ τῆς ὁποίας εὐρίσκομεν τόξα, ἅτινα ἔχουν ἐφαπτομένην $\frac{\beta - 1}{\beta + 1} \cdot \epsilon\phi\frac{\alpha}{2}$.

Γνωρίζοντες ἐπομένως τὰ $\frac{\chi - \psi}{2}$ καὶ $\frac{\chi + \psi}{2}$ εὐρίσκομεν τὰ χ , ψ .

Α Ε Κ Η Σ Ε Ι Σ

Νὰ λυθοῦν αἱ ἐξισώσεις:

189) $\eta\mu\chi = \frac{\sqrt{3}}{2}$ καὶ $\eta\mu\chi = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.

190) $\sigma\upsilon\nu\chi = \frac{\sqrt{3}}{2}$ καὶ $\sigma\upsilon\nu\chi = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.

191) $\epsilon\phi\chi = -1$ καὶ $\sigma\phi\chi = 1$.

192) $\epsilon\phi^2\chi = \frac{1}{3}$ καὶ $\sigma\phi^2\chi = 3$.

193) $\eta\mu\chi + \eta\mu 5\chi = \eta\mu 3\chi$.

194) $\sigma\upsilon\nu\chi + \sigma\upsilon\nu 3\chi = 2\sigma\upsilon\nu 2\chi$.

195) $(\sigma\upsilon\nu\chi + \eta\mu\chi)^2 = \eta\mu^2\chi$.

196) $\sigma\upsilon\nu\chi + \sigma\upsilon\nu 2\chi + \sigma\upsilon\nu 3\chi = 0$.

197) $2\eta\mu^2\chi - 3\eta\mu\chi + 1 = 0$.

198) $2\eta\mu^2\chi - 5\eta\mu\chi - 3 = 0$.

199) $2\sigma\upsilon\nu^2\chi - (2 + \sqrt{3}) \cdot \sigma\upsilon\nu\chi + \sqrt{3} = 0$.

200) $\frac{\sigma\upsilon\nu\chi}{\eta\mu^2\chi} = \frac{2}{3}$.

201) $2\eta\mu^2\chi + \sqrt{3}\sigma\upsilon\nu\chi + 1 = 0$.

202) $4\sigma\upsilon\nu^2\chi - 4\eta\mu\chi - 1 = 0$.

203) $2\eta\mu\chi = \epsilon\phi\chi$.

204) $6\sigma\upsilon\nu^2\chi - 5\sigma\upsilon\nu\chi + 1 = 0$

205) $2\sqrt{3}\cdot\sigma\upsilon\nu^2\chi - \eta\mu\chi = 0$.

206) $2\eta\mu\chi\eta\mu 3\chi - \eta\mu^2 2\chi = 0$.

207) $\epsilon\phi^2\chi - \epsilon\phi\chi - 2 = 0$.

208) $3\epsilon\phi^2 \frac{\chi}{2} + 2\epsilon\phi \frac{\chi}{2} - 1 = 0$.

209) $\epsilon\phi^2\chi - (1 + \sqrt{3})\epsilon\phi\chi + \sqrt{3} = 0$.

210) $\sqrt{3}\cdot\epsilon\phi\chi + \sqrt{3}\cdot\sigma\phi\chi = 2$.

211) $\epsilon\phi^2\chi + \sigma\phi^2\chi - 2 = 0$.

212) $\epsilon\phi 2\chi \epsilon\phi\chi = 1$.

213) $\alpha\cdot\eta\mu\chi + \beta\cdot\sigma\upsilon\nu\chi = \gamma$.

214) $\alpha\cdot\sigma\upsilon\nu\chi - \beta\cdot\eta\mu\chi = \gamma$.

215) $5\sigma\upsilon\nu\chi - 2\eta\mu\chi = 2$.

216) $\sqrt{3}\cdot\sigma\upsilon\nu\chi + \eta\mu\chi = \sqrt{2}$

217) $(2 + \sqrt{3})\sigma\upsilon\nu\chi = 1 - \eta\mu\chi$.

218) $\eta\mu\chi + \sigma\upsilon\nu\chi = \sqrt{2}$

219) $1 + \eta\mu^2\chi = 3\eta\mu\chi\cdot\sigma\upsilon\nu\chi$.

Νά λυθοῦν τὰ συστήματα

220)
$$\begin{cases} \eta\mu(\chi - \psi) = \frac{1}{2} \\ \sigma\upsilon\nu(\chi + \psi) = \frac{1}{2} \end{cases}$$

221) $\sigma\upsilon\nu(2\chi + 3\psi) = \frac{1}{2}$.

$$\sigma\upsilon\nu(3\chi + 2\psi) = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

222) $\chi + \psi = \alpha$

$$\eta\mu\chi + \eta\mu\psi = \beta$$

223) $\chi + \psi = 75^\circ$.

$$\frac{\eta\mu\chi}{\eta\mu\psi} = \sqrt{2}$$

224) $\chi - \psi = 60^\circ$

$$\frac{\eta\mu\chi}{\eta\mu\psi} = 2$$

225) $\chi + \psi = 45^\circ$

$$\epsilon\phi\chi + \epsilon\phi\psi = 1$$

ΒΙΒΛΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ


ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΩΝ ΤΡΙΓΩΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΥ

62. Θεώρημα.—Τὸ μῆκος τῆς προβολῆς ἀνύσματος ἐπὶ ἄξονα ἰσοῦται μὲ τὸ γινόμενον τοῦ μήκους τοῦ ἀνύσματος ἐπὶ τὸ συνημίτονον τῆς γωνίας, τὴν ὁποίαν σχηματίζει ἡ θετικὴ φορὰ τοῦ ἄξονος προβολῆς μετὰ τῆς θετικῆς φορᾶς τοῦ ἄξονος, ἐφ' οὗ κεῖται τὸ ἀνύσμα.

Ἐστω ψ' ὁ ἄξων, ἐφ' οὗ κεῖται τὸ ἀνύσμα AB καὶ $\alpha\beta$



ἢ προβολὴ αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ἄξονα $\chi'\chi$ ἔστω δὲ θετικὴ φορὰ τοῦ μὲν πρώτου ἢ ἐκ τοῦ ψ' πρὸς τὸ ψ , τοῦ δὲ δευτέρου ἢ ἀπὸ τοῦ χ' πρὸς τὸ χ . ἔστω δὲ τέλος OM ἀνύσμα ἐπὶ τοῦ $\psi'\psi$, δι' ὃ θέτομεν $(OM) = +1$ καὶ οὗ ἡ

προβολὴ ἐπὶ τὸν ἄξονα $\chi'\chi$ εἶναι ἡ $O\Pi$. ἀλλὰ κατὰ τὸ θεώρημα (12) ἔχομεν $\frac{(AB)}{(OM)} = \frac{(\alpha\beta)}{(O\Pi)}$ ἢ $(\alpha\beta) = (AB) \cdot (O\Pi)$. ἀλλὰ πάλιν $(O\Pi)$ εἶναι τὸ συνημίτονον τῆς γωνίας $O\chi, O\psi$ ὥστε εἶναι $(\alpha\beta) = (AB) \text{ συν}(O\chi, O\psi)$.


Σημείωσις. Τὰς γωνίας τριγώνου θὰ παριστῶμεν ἐν τοῖς ἐπομένοις διὰ γραμμάτων A, B, Γ , τὰ δὲ μῆκη τῶν πλευρῶν διὰ τῶν α, β, γ διὰ τοῦ α τὴν ἀπέναντι τῆς γωνίας A πλευράν, διὰ τοῦ β τὴν ἀπέναντι τῆς B καὶ διὰ τοῦ γ τὴν ἀπέναντι τῆς Γ .

63. Θεώρημα. — Ἐν ὀρθογωνίῳ τριγώνῳ μία τῶν πλευρῶν τῆς ὀρθῆς γωνίας ἰσοῦται

1) μὲ τὴν ὑποτείνουσαν πολλαπλασιασθεῖσαν ἐπὶ τὸ ἡμίτονον τῆς ἀπέναντι γωνίας ἢ ἐπὶ τὸ συνημίτονον τῆς προσκειμένης,

ἢ 2) μὲ τὴν ἄλλην πλευρὰν τῆς ὀρθῆς γωνίας πολλαπλασιασθεῖσαν ἐπὶ τὴν ἐφαπτομένην τῆς ἀπέναντι γωνίας ἢ ἐπὶ τὴν συνεφαπτομένην τῆς προσκειμένης.

Ἐστω τὸ ὀρθογώνιον τρίγωνον ΑΒΓ, οὗ ὀρθή γωνία εἶναι ἢ Α' ἂν τὰς πλευρὰς ΒΑ καὶ ΒΓ θεωρήσωμεν ὡς κειμένας ἐπὶ τῶν ἀξόνων Βχ καὶ Βψ, ὧν θετικαὶ φοραὶ εἶναι τοῦ μὲν ἢ ἀπὸ τοῦ Β πρὸς τὸ Α, τοῦ δὲ ἢ ἀπὸ τοῦ Β πρὸς τὸ Γ, τὸ ἄνυσμα ΒΑ εἶναι ἢ προβολὴ τοῦ ἀνύσματος ΒΓ ἐπὶ τὸν ἀξονα Βχ· ἐπομένως, κατὰ τὸ προηγούμενον θεώρημα ἔχομεν $(BA) = (BG) \text{ συν}(B\chi, B\psi)$ ἢ $(BG) \text{ συν} B$, ἥτοι εἶναι $\gamma = \alpha \cdot \text{συν} B$ · ἐπειδὴ δὲ εἶναι $B + \Gamma = 90^\circ$, ἢ προηγούμενη ἰσότης γράφεται $\gamma = \alpha \cdot \eta\mu\Gamma$. Κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον εὐρίσκομεν



$$\beta = \alpha \cdot \text{συν}\Gamma$$

$$\beta = \alpha \cdot \eta\mu B.$$

Ἦδη ἐκ τῶν εὐρεθεισῶν ἰσοτήτων λαμβάνομεν

$$\frac{\beta}{\gamma} = \frac{\alpha \cdot \eta\mu B}{\alpha \cdot \text{συν} B} = \epsilon\phi B, \text{ ἥτοι } \beta = \gamma \cdot \epsilon\phi B \text{ ἢ } \beta = \gamma \cdot \sigma\phi\Gamma.$$

Ὡσαύτως λαμβάνομεν:

$$\frac{\gamma}{\beta} = \frac{\alpha \cdot \eta\mu\Gamma}{\alpha \cdot \text{συν}\Gamma} = \epsilon\phi\Gamma, \text{ ἥτοι } \gamma = \beta \cdot \epsilon\phi\Gamma \text{ ἢ } \gamma = \beta \cdot \sigma\phi B.$$

ΑΙ Κ Η Ι Ε Ι Σ

226) Ἐν τριγώνῳ ΑΒΓ ἄγεται ἡ ΑΔ κάθετος ἐπὶ τὴν ΒΓ καὶ ἡ ΔΕ κάθετος ἐπὶ τὴν ΑΓ. Νὰ ἀποδειχθῇ, ὅτι εἶναι

$$\Gamma E = \beta \cdot \text{συν}^2 \Gamma.$$

227) Ἐὰν ἡ ΑΒ εἶναι διάμετρος κύκλου ἀκτῖνος ρ καὶ Γ σημεῖόν τι τῆς ἡμιπεριφερείας καὶ ἡ ΓΔ κάθετος ἐπὶ τὴν διά-

μετρον AB , ν' ἀποδειχθῆ, ὅτι εἶναι $AG + ΓΔ = 2\rho\eta\mu\omega(1 + \sigma\upsilon\nu\omega)$, ἂν εἶναι γωνία $ABΓ = \omega$.

228) Ἐν ὀρθογωνίῳ τριγώνῳ $ABΓ$ ν' ἀποδειχθῆ, ὅτι εἶναι $\beta^2\eta\mu 2Γ + \gamma^2\eta\mu 2B = 2\beta\gamma$.

229) Ἐν ὀρθογωνίῳ τριγώνῳ $ABΓ$ ν' ἀποδειχθῆ, ὅτι εἶναι

$$1) \frac{\beta}{\alpha + \gamma} = \epsilon\phi \frac{B}{2} \quad 2) \frac{2\beta\gamma}{\gamma^2 - \beta^2} = \epsilon\phi 2B.$$

230) Ὁμοίως, ὅτι εἶναι $\sigma\upsilon\nu 2B = \frac{\gamma^2 - \beta^2}{\alpha^2}$.

231) Ὁμοίως, ὅτι εἶναι $\eta\mu \frac{B - \Gamma}{2} = \frac{\beta - \gamma}{\alpha \sqrt{2}}$.

232) Ὁμοίως, ὅτι εἶναι $\sigma\upsilon\nu \frac{B - \Gamma}{2} = \frac{\beta + \gamma}{\alpha \sqrt{2}}$.

233) Ἐν ὀρθογωνίῳ τριγώνῳ $ABΓ$ ν' ἀποδειχθῆ, ὅτι

$$1) \sigma\upsilon\nu(B - \Gamma) = \frac{2\beta\gamma}{\beta^2 + \gamma^2} \quad 2) \sigma\upsilon\nu 2B = \frac{\gamma^2 - \beta^2}{\gamma^2 + \beta^2}$$

234) Ὁμοίως ν' ἀποδειχθῆ, ὅτι ἐν ὀρθογωνίῳ τριγώνῳ $ABΓ$ εἶναι $\frac{2\beta\gamma}{\beta^2 - \gamma^2} = \frac{\sigma\upsilon\nu(B - \Gamma)}{\sigma\upsilon\nu^2 \Gamma - \sigma\upsilon\nu^2 B} = \frac{\sigma\upsilon\nu(B - \Gamma)}{\sigma\upsilon\nu 2\Gamma}$.

235) Ἐὰν τετράπλευρον $ABΓΔ$ εἶναι περιγεγραμμένον περὶ κύκλον, ν' ἀποδειχθῆ, ὅτι $(AΓ)\eta\mu \frac{A}{2} \cdot \eta\mu \frac{B}{2} = (BΔ)\eta\mu \frac{\Gamma}{2} \cdot \eta\mu \frac{\Delta}{2}$.

236) Τρίγωνον $ABΓ$ μὴ ἰσοσκελές, εἶναι ὀρθογώνιον, ὅταν εἶναι $\frac{\epsilon\phi B}{\epsilon\phi \Gamma} = \frac{\eta\mu^2 B}{\eta\mu^2 \Gamma}$.

237) Τρίγωνον $ABΓ$ εἶναι ὀρθογώνιον ἰσοσκελές, ὅταν εἶναι $1 + \sigma\phi(45^\circ - B) = \frac{2}{1 - \sigma\phi \Gamma}$ καὶ $2\beta\gamma = \alpha^2$.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΙ

ΕΠΙΛΥΣΙΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΩΝ ΤΡΙΓΩΝΩΝ

64. Ἐπίλυσις τριγώνου λέγεται ἡ εὕρεσις τῶν στοιχείων αὐτοῦ διὰ τοῦ λογισμοῦ, ὅταν δοθοῦν ἰκανὰ ἐξ αὐτῶν (ἰδὲ εἰσαγωγήν).

65. Ἐπίλυσις τῶν ὀρθογωνίων τριγώνων. — Διὰ νὰ ἐπιλύσωμεν ἐν ὀρθογώνιον τρίγωνον πρέπει νὰ γνωρίζωμεν μίαν τῶν πλευρῶν αὐτοῦ καὶ μίαν τῶν ὀξείων γωνιῶν του ἢ δύο

πλευράς αὐτοῦ. Διὰ τοῦτο κατὰ τὴν ἐπίλυσιν τῶν ὀρθογωνίων τριγώνων διακρίνομεν τὰς ἐπομένας τέσσαρας περιπτώσεις.

Περίπτωσης 1η.

66. Ἐκ τῆς ὑποτεינוύσης α ὀρθογωνίου τριγώνου καὶ μιᾶς τῶν ὀξείων γωνιῶν αὐτοῦ, ἔστω τῆς B , νὰ εὔρεθῶν τὰ λοιπὰ στοιχεῖα αὐτοῦ.

Πρὸς τοῦτο θὰ χρησιμοποιήσωμεν τοὺς τύπους τῆς § 63

$$\Gamma = 90^\circ - B, \beta = \alpha \eta \mu B, \gamma = \alpha \sigma \upsilon \nu B.$$

Ἐκ τοῦ πρώτου εὐρίσκομεν τὴν γωνίαν Γ ἀμέσως, ἐκ δὲ τῶν ἄλλων, οἱ ὁποῖοι εἶναι λογιστοὶ διὰ τῶν λογαρίθμων εὐρίσκομεν $\log \beta = \log \alpha + \log \eta \mu B$, $\log \gamma = \log \alpha + \log \sigma \upsilon \nu B$. Οὕτω δὲ εὐρίσκομεν τὰς πλευράς β καὶ γ . Τὸ ἔμβαδὸν τοῦ τριγώνου τούτου εἶναι $E = \frac{\beta \gamma}{2}$ καὶ ἐπειδὴ $\beta = \alpha \eta \mu B$, $\gamma = \alpha \sigma \upsilon \nu B$, ἔχομεν $E = \frac{\alpha^2 \eta \mu B \sigma \upsilon \nu B}{2}$.

Παράδειγμα. Ἔστωσαν

δεδομένα $\alpha = 159,8$ μέτρα ζητούμενα Γ
 $B = 32^\circ 18' 30''$. β
 α

Πρὸς εὔρεσιν τῆς Γ ἀφαιροῦμεν τὴν δοθεῖσαν γωνίαν B ἀπὸ 90° καὶ εὐρίσκομεν

$$\begin{array}{r} B + \Gamma = 89^\circ 59' 60'' \\ B = 32^\circ 18' 30'' \\ \hline \Gamma = 57^\circ 41' 30'' \end{array}$$

Λογισμὸς τῆς πλευρᾶς β

$$\beta = \alpha \eta \mu B$$

$\log \alpha$	=	2,20358
$\log \eta \mu B$	=	1,72793
$\log \beta$	=	1,93151
καὶ β	=	85,41

Λογισμὸς τῆς πλευρᾶς γ

$$\gamma = \alpha \sigma \upsilon \nu B$$

$\log \alpha$	=	2,20358
$\log \sigma \upsilon \nu B$	=	1,92695
$\log \gamma$	=	2,13053
καὶ γ	=	135,06

Σημείωσις. Ἐκαστος τῶν λογαρίθμων, τοὺς ὁποίους λαμ-

βάνομεν άμέσως έκ τών πινάκων δύναται νά διαφέρη τοῦ άληθοῦς τό πολὺ κατά ήμίσειαν μονάδα τῆς τελευταίας τάξεως· διὰ τοῦτο ὁ λογάριθμος β, έκ τοῦ συνδυασμοῦ δύο τοιούτων λογαριθμῶν εύρεθείς, δύναται νά διαφέρη τοῦ άληθοῦς τό πολὺ κατά μίαν μονάδα τῆς ρηθείσης τάξεως, τοιαύτη δέ διαφορὰ προξενεῖ (ὡς έκ τών πινάκων βλέπομεν) λάθος ἐπὶ τοῦ ἀριθμοῦ β τό πολὺ $\frac{1}{5}$ τοῦ τελευταίου ψηφίου 1· ὥστε τό ἐπὶ τῆς πλευρᾶς β συμβαῖνον λάθος δέν ὑπερβαίνει τά $\frac{2}{1000}$ τοῦ μέτρου. Ὅμοίως εύρίσκομεν, ὅτι τό ἐπὶ τῆς πλευρᾶς γ συμβαῖνον λάθος δέν εἶναι μεγαλύτερον τῶν $\frac{3}{1000}$ τοῦ μέτρου.

Περίπτωσις 2α.

67. Ἐκ μιᾶς τῶν καθέτων πλευρῶν ὀρθογωνίου τριγώνου, ἔστω τῆς β καὶ μιᾶς τῶν ὀξειῶν αὐτοῦ γωνιῶν, νά εύρεθοῦν τὰ λοιπὰ αὐτοῦ στοιχεία.

Ἐκ τῆς δοθείσης ὀξείας γωνίας εύρίσκεται άμέσως καὶ ἡ ἄλλη, ἐπομένως ἀμφότεραι αἱ ὀξεῖαι γωνίαι δύνανται νά ὑποτεθοῦν γνωσταί. Αἱ ἄγνωστοι πλευραὶ α καὶ γ, θά εύρεθοῦν

ἐκ τῶν τύπων $\alpha = \frac{\beta}{\eta\mu\beta}$ καὶ $\gamma = \beta\sigma\phi\beta = \frac{\beta}{\epsilon\phi\beta}$,

οἱ ὁποῖοι δίδουν $\log\alpha = \log\beta - \log\eta\mu\beta$, $\log\gamma = \log\beta + \log\sigma\phi\beta$.

Τὸ ἐμβαδὸν αὐτοῦ εἶναι

$$E = \frac{\beta\gamma}{2} = \frac{\beta^2\sigma\phi\beta}{2}.$$

Παράδειγμα. Ἐστώσαν

δεδομένα $\beta = 8530,4 \mu.$

$B = 32^\circ 15'$

ζητούμενα Γ

α

γ

$$B + \Gamma = 89^\circ 60'$$

$$B = 32^\circ 15'$$

$$\Gamma = 57^\circ 45'$$

Εὑρεσις τῆς ὑποτείνουσας α

$$\alpha = \frac{\beta}{\eta\mu B}$$

λογβ	= 3,93097
λογημB	= 1,72723
λογα	= 4,20374
καί α	= 15986

Εὑρεσις τῆς πλευρᾶς γ

$$\gamma = \beta \sigma\phi B$$

λογβ	= 3,93097
λογσφB	= 0,20000
λογγ	= 4,13097
καί γ	= 13520.

Περίπτωσις 3η.

68. Ἐκ τῶν δύο καθέτων πλευρῶν ὀρθογωνίου τριγώνου νὰ εὑρεθῇ ἡ ὑποτείνουσα καὶ αἱ δύο ὀξεῖαι γωνίαι αὐτοῦ.

Πρὸς τοῦτο ἔχομεν τοὺς τύπους

$$\epsilon\phi B = \frac{\beta}{\gamma}, \quad \Gamma = 90^\circ - B \quad \text{καὶ} \quad \alpha^2 = \beta^2 + \gamma^2.$$

Ἐκ τοῦ πρώτου ἔπιεται $\log \epsilon\phi B = \log \beta - \log \gamma$.

Ἐκ δὲ τοῦ τύπου τούτου εὑρίσκομεν διὰ τῶν λογαριθμῶν τὴν γωνίαν B, ἐξ ἧς καὶ τὴν Γ. Ὁ τὴν ὑποτείνουσαν δίδων τύπος $\alpha^2 = \beta^2 + \gamma^2$ δὲν εἶναι κατάλληλος διὰ τὴν χρῆσιν τῶν λογαριθμῶν· διὰ τοῦτο ἀφοῦ εὑρεθῇ ἡ γωνία B, προσδιορίζεται ἡ ὑποτείνουσα α ἐκ τοῦ τύπου.

$$\alpha = \frac{\beta}{\eta\mu B}$$

ὅστις δίδει $\log \alpha = \log \beta - \log \eta\mu B$.

Τὸ ἔμβαδὸν αὐτοῦ εἶναι $E = \frac{\beta\gamma}{2}$.

Παράδειγμα. Ἐστώσαν

δεδομένα $\beta = 1593,8 \mu.$

$\gamma = 8907,3 \mu.$

ζητούμενα B

Γ

α

Εὑρεσις τῆς γωνίας B.

$$\epsilon\phi B = \frac{\beta}{\gamma}$$

$$\begin{aligned}
 \log \beta &= 3,20244 \\
 \log \gamma &= 3,94974 \\
 \hline
 \log \epsilon \phi \beta &= 1,25270 \\
 \text{καί } \beta &= 10^\circ 8' 42'' \\
 \acute{\omega}\sigma\tau\epsilon \Gamma &= 79^\circ 51' 18''.
 \end{aligned}$$

Εύρεσις τῆς ὑποτείνουσας.

$$\alpha = \frac{\beta}{\eta \mu \beta}$$

$$\begin{aligned}
 \log \beta &= 3,20244 \\
 \log \eta \mu \beta &= 1,24585 \\
 \hline
 \log \alpha &= 3,95659 \\
 \text{"Οθεν καί } \alpha &= 9048,8 \mu.
 \end{aligned}$$

Περίπτωσις 4η.

69. Ἐκ τῆς ὑποτείνουσας α καὶ μιᾶς τῶν πλευρῶν τῆς ὀρθῆς γωνίας, ἔστω τῆς β , νὰ εὑρεθοῦν ἡ ἄλλη πλευρὰ καὶ αἱ δύο ὀξεῖαι γωνίαι.

Πρὸς εὔρεσιν τῆς πλευρᾶς γ ἔχομεν τὸν τύπον

$$\gamma^2 = \alpha^2 - \beta^2 = (\alpha + \beta)(\alpha - \beta).$$

"Οθεν $2 \log \gamma = \log(\alpha + \beta) + \log(\alpha - \beta)$

καὶ $\log \gamma = \frac{1}{2} [\log(\alpha + \beta) + \log(\alpha - \beta)].$

Πρὸς εὔρεσιν τῶν γωνιῶν B καὶ Γ δυνάμεθα νὰ μεταχειρισθῶμεν τὸν τύπον

$$\eta \mu B = \frac{\beta}{\alpha} \quad \eta \text{ συν} \Gamma = \frac{\beta}{\alpha}.$$

*Ἀλλὰ δυνάμεθα νὰ εὑρωμεν τὴν Γ καὶ ὡς ἐξῆς :

Ἐπειδὴ εἶναι

$$\eta \mu\left(\frac{1}{2} \Gamma\right) = \sqrt{\frac{1 - \text{συν} \Gamma}{2}} \quad \text{καὶ} \quad \text{συν}\left(\frac{1}{2} \Gamma\right) = \sqrt{\frac{1 + \text{συν} \Gamma}{2}},$$

ἀντικαθιστώντες τὴν τιμὴν τοῦ συν Γ εἰς τοὺς τύπους τούτους λαμβάνομεν

$$\eta\mu\left(\frac{1}{2}\Gamma\right) = \sqrt{\frac{\alpha-\beta}{2\alpha}}, \quad \sigma\upsilon\nu\left(\frac{1}{2}\Gamma\right) = \sqrt{\frac{\alpha+\beta}{2\alpha}}$$

$$\text{Ὅθεν καὶ ε}\phi\left(\frac{1}{2}\Gamma\right) = \sqrt{\frac{\alpha-\beta}{\alpha+\beta}}$$

$$\text{καὶ} \quad \lambda\omicron\gamma \varepsilon\phi\left(\frac{1}{2}\Gamma\right) = \frac{1}{2} [\lambda\omicron\gamma(\alpha-\beta) - \lambda\omicron\gamma(\alpha+\beta)].$$

$$\text{Τὸ ἔμβραδόν αὐτοῦ εἶναι} \quad E = \frac{\beta\gamma}{2}.$$

Παράδειγμα. Ἐστωσαν

$$\text{δεδομένα} \quad \alpha = 7450,6 \mu. \quad \text{ζητούμενα} \quad \gamma$$

$$\beta = 2971,8 \mu. \quad \Gamma$$

B

$$\alpha + \beta = 10422,4$$

$$\alpha - \beta = 4478,8$$

Ἐῤυρεῖς τῆς πλευρᾶς γ

$$\begin{aligned} \gamma &= \sqrt{(\alpha+\beta)(\alpha-\beta)} \\ \lambda\omicron\gamma(\alpha-\beta) &= 3,65116 \\ \lambda\omicron\gamma(\alpha+\beta) &= 4,01797 \\ \text{ἄθροισμα} &= 7,66913 \\ \lambda\omicron\gamma\gamma &= 3,83456 \\ \gamma &= 6832,2 \end{aligned}$$

Ἐῤυρεῖς τῆς γωνίας Γ

$$\begin{aligned} \varepsilon\phi \frac{1}{2}\Gamma &= \sqrt{\frac{\alpha-\beta}{\alpha+\beta}} \\ \lambda\omicron\gamma(\alpha-\beta) &= 3,65116 \\ \lambda\omicron\gamma(\alpha+\beta) &= 4,01797 \\ \text{διαφορὰ} &= 1,63319 \\ \lambda\omicron\gamma \varepsilon\phi\left(\frac{1}{2}\Gamma\right) &= 1,81659 \\ \text{καὶ} \quad \frac{1}{2}\Gamma &= 33^\circ 14' 45'' \\ \text{Ὅθεν} \quad \Gamma &= 66^\circ 29' 30'' \\ \text{καὶ} \quad B &= 23^\circ 30' 30''. \end{aligned}$$

Παρατηρήσεις. — Εἰς τὴν προηγουμένην περίπτωσιν ἀντὶ νὰ εὑρωμεν τὴν γωνίαν ἐκ τοῦ ἡμιτόνου ἢ ἐκ τοῦ συνημιτόνου τῆς, τὴν εὑρομεν ἐκ τῆς ἐφαπτομένης τῆς, διότι ἡ γωνία προσδιορίζεται ἀκριβέστερον ἐκ τῆς ἐφαπτομένης. Τοῦτο δὲ συμβαίνει διὰ τὸν ἐξῆς λόγον. Ἡ διαφορὰ Δ δύο ἐφεξῆς λογαριθμῶν τῶν ἐφαπτομένων ὑπερβαίνει πάντοτε τὰς διαφορὰς δ καὶ θ δύο ἐφεξῆς λογαριθμῶν τῶν ἡμιτόνων καὶ τῶν συνημιτόνων

τοῦ αὐτοῦ τόξου. Ἐάν λοιπὸν ὁ δοθεὶς λογάριθμος τῆς ἐφαπτομένης ἔχη σφάλμα ἴσον πρὸς μίαν μονάδα τῆς τελευταίας τάξεως, τὸ ἐπὶ τῆς γωνίας προξενούμενον λάθος θὰ εἶναι $\frac{60''}{\Delta}$ περίπου (διότι εἰς λάθος Δ μονάδων τῆς εἰρημένης τάξεως ἀντιστοιχεῖ λάθος $60''$ ἐπὶ τῆς γωνίας), ἐνῶ τὸ αὐτὸ σφάλμα, ἐάν συμβῆ εἰς τὸν λογάριθμον τοῦ ἡμιτόνου, θὰ προξενήσῃ ἐπὶ τῆς γωνίας λάθος $\frac{60''}{\theta}$ περίπου, ἐάν δὲ συμβῆ εἰς τὸν λογάριθμον τοῦ συνημιτόνου, θὰ προξενήσῃ λάθος ἐπὶ τῆς γωνίας $\frac{60''}{\theta}$ περίπου, ταῦτα δὲ εἶναι μεγαλύτερα· διότι, ὡς εἴπομεν, $\delta < \Delta$ καὶ $\theta < \Delta$. Ὡστε μικρὸν σφάλμα τῆς ἐφαπτομένης προξενεῖ μικρὸν λάθος ἐπὶ τῆς γωνίας, ἐνῶ μικρὸν σφάλμα τοῦ ἡμιτόνου (καὶ μάλιστα, ὅταν ἡ γωνία ὀλίγον ἔαφέρει τῶν $90'$) ἢ τοῦ συνημιτόνου (καὶ μάλιστα, ὅταν ἡ γωνία εἶναι μικρά) δύναται νὰ προξενήσῃ μέγα λάθος ἐπὶ τῆς γωνίας.

Ὁ δὲ λόγος, δι' ὃν αἱ διαφοραὶ Δ τῶν λογαρίθμων τῶν ἐφαπτομένων ὑπερβαίνουν τὰς διαφορὰς τῶν λογαρίθμων τῶν ἡμιτόνων καὶ τῶν συνημιτόνων εἶναι ὁ ἑξῆς:

$$\text{Ἐπειδὴ εἶναι } \epsilon\phi\phi = \frac{\eta\mu\phi}{\sigma\upsilon\nu\phi},$$

ἔπεται $\log\epsilon\phi\phi = \log\eta\mu\phi - \log\sigma\upsilon\nu\phi$.

Ἐάν δὲ ἡ γωνία ἀύξηθῆ κατὰ $1'$, ὁ λογάριθμος τοῦ ἡμιτόνου τῆς θ' ἀύξηθῆ κατὰ δ , τοῦ δὲ συνημιτόνου θὰ ἐλαττωθῆ κατὰ θ , ἐπομένως ὁ λογάριθμος τῆς ἐφαπτομένης (ὅστις εἶναι πάντοτε ἴσος μὲ τὴν διαφορὰν τῶν δύο πρώτων) θὰ ἀύξηθῆ κατὰ $\delta + \theta$ · εἶναι λοιπὸν $\Delta = \delta + \theta$.

Ἐκ τούτων λοιπὸν συνάγεται, ὅτι πρέπει πάντοτε, ὅταν πρόκειται νὰ εὑρεθῆ γωνία τις ἐκ τῶν τριγωνομετρικῶν αὐτῆς ἀριθμῶν, νὰ μεταχειριζώμεθα, εἰ δυνατόν, τὴν ἐφαπτομένην.

70. Ἄλλαι περιπτώσεις.—Εἰς τὴν § 65 εἶδομεν, ὅτι τὸ ὀρθογώνιον τρίγωνον ὀρίζεται ἐντελῶς, ὅταν δοθοῦν ἡ μία πλευρὰ αὐτοῦ καὶ μία τῶν ὀξείων γωνιῶν ἢ δύο πλευραὶ αὐτοῦ. Ἐν τούτοις ὅμως τὸ ὀρθογώνιον τρίγωνον ὀρίζεται ἐντελῶς καὶ ὅταν δοθοῦν δύο γεωμετρικὰ μεγέθη (ὄχι καὶ τὰ δύο γωνίαι) συνδεόμενα στενῶς μὲ τὸ τρίγωνον. Οὕτω π.χ. Ἐν ὀρθογώνιον τρίγω-

νον όρίζεται έντελώς, όταν δοθῆ τó ύψος επί τήν ύποτείνουσαν και μία τών όξειών γωνιών αὐτοῦ ἢ ἡ ύποτείνουσα αὐτοῦ και ἡ διαφορά τών δύο άλλων πλευρών κ. α. Ἐάν έκ τών δύο δεδομένων, τó ένμόνον εἶναι στοιχείον τοῦ τριγώνου, θά έκφράσωμεν τó άλλο συναρτήσει τών στοιχείων τοῦ τριγώνου. Ὅμοίως και ἂν οὐδέν τών δύο δεδομένων εἶναι στοιχείον τοῦ τριγώνου, θά έκφράσωμεν ἀμφότερα συναρτήσει τών αὐτῶν στοιχείων.

Παράδειγμα 1ον.—*Ἐκ τοῦ ύψους υ ὀρθογωνίου τριγώνου ΑΒΓ ἐπὶ τὴν ὑποτείνουσαν και ἐκ μιᾶς τῶν όξειῶν γωνιῶν αὐτοῦ, ἔστω τῆς Β, νὰ ἐπιλυθῆ τó τρίγωνον.*

Ἐστω ὀρθογώνιον τρίγωνον τó ΑΒΓ και ΑΔ τó ύψος αὐτοῦ. Ἄλλ' έκ τοῦ ὀρθογωνίου τριγώνου ΑΒΔ λαμβάνομεν

$$u = (AB)\eta\mu B = \gamma\eta\mu B, \text{ ἤτοι } \gamma = \frac{u}{\eta\mu B} \quad (1).$$

Ἐπειδὴ δὲ γνωρίζομεν, ὅτι $\beta = \gamma\epsilon\phi B$ και $\alpha = \frac{\gamma}{\sigma\upsilon\nu B}$, θά εἶναι

$$\beta = \frac{u}{\eta\mu B} \cdot \epsilon\phi B = \frac{u}{\sigma\upsilon\nu B} \quad (2) \text{ και } \alpha = \frac{u}{\eta\mu B \sigma\upsilon\nu B} \quad (3).$$

Οἱ τύποι (1), (2), (3), μετὰ τοῦ τύπου $\Gamma = 90^\circ - B$ λύουν τó δοθέν πρόβλημα.

Παράδειγμα 2ον.—*Ἐκ τῆς ὑποτείνουσης α ὀρθογωνίου τριγώνου ΑΒΓ και ἐκ τῆς διαφορᾶς δ τῶν πλευρῶν τῆς ὀρθῆς γωνίας αὐτοῦ νὰ ἐπιλυθῆ τó τρίγωνον.*

Γνωρίζομεν, ὅτι $\beta = \alpha\eta\mu B$, $\gamma = \alpha\eta\mu \Gamma$. ὥστε εἶναι $\beta - \gamma = \alpha(\eta\mu B - \eta\mu \Gamma)$ ἤτοι $\delta = \alpha(\eta\mu B - \eta\mu \Gamma)$.

$$\text{Ἄλλ' } \eta\mu B - \eta\mu \Gamma = 2\eta\mu \frac{B-\Gamma}{2} \cdot \sigma\upsilon\nu \frac{B+\Gamma}{2} = 2\eta\mu \frac{B-\Gamma}{2} \sigma\upsilon\nu 45^\circ.$$

$$\text{Ὡστε εἶναι } \delta = \alpha\sqrt{2} \eta\mu \frac{B-\Gamma}{2} \text{ και ἔπομένως } \eta\mu \frac{B-\Gamma}{2} = \frac{\delta}{\alpha\sqrt{2}}.$$

Ἐκ τοῦ τύπου τούτου εὐρίσκομεν τήν ἡμιδιαφορὰν τών γωνιών Β και Γ. Ἐάν δὲ παραστήσωμεν αὐτὴν διὰ Δ ἔχομεν

$$\frac{B-\Gamma}{2} = \Delta. \text{ Ἄλλ' εἶναι και } \frac{B+\Gamma}{2} = 45^\circ.$$

$$\text{Ὅθεν } B = 45^\circ + \Delta \text{ και } \Gamma = 45^\circ - \Delta.$$

Μετὰ τήν εὕρεσιν τών γωνιών Β και Γ εὐρίσκομεν τὰς καθέτους πλευρὰς β και γ έκ τών τύπων

$$\beta = \alpha\eta\mu B \text{ και } \gamma = \alpha\sigma\upsilon\nu B.$$

Παράδειγμα 3ον. — Έκ τῶν δύο τμημάτων μ καὶ ν , εἰς τὰ ὁποῖα διαιρεῖται ἡ ὑποτείνουσα ὀρθογωνίου τριγώνου ὑπὸ τοῦ ὕψους ἐπ' αὐτήν, νὰ ἐπιλυθῇ τὸ τρίγωνον.

Ἐστω AD τὸ ὕψος. Τότε εἶναι $\mu = (AD)\sigma\phi B$ καὶ $\nu = (AD)\epsilon\phi B$. Ἐὰν δὲ διαιρέσωμεν τὰς δύο αὐτὰς ἰσότητας κατὰ μέλη λαμβάνομεν $\epsilon\phi^2 B = \frac{\nu}{\mu}$ ἤτοι $\epsilon\phi B = \sqrt{\frac{\nu}{\mu}}$. Εὐρισκομένης διὰ τοῦ τοῦ αὐτοῦ τῆς B εὐρίσκεται ἀμέσως καὶ ἡ Γ . ἐπειδὴ δὲ $\mu + \nu = \alpha$, ἔχομεν $\beta = \sigma\eta\mu B$ καὶ $\gamma = \sigma\sigma\upsilon\nu B$.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

238) Ἡ ὑποτείνουσα ὀρθογωνίου τριγώνου εἶναι 428,75 μ. καὶ μία τῶν ὀξείων γωνιῶν εἶναι $40^\circ 32' 45''$. Νὰ εὐρεθοῦν τὰ λοιπὰ στοιχεῖα αὐτοῦ.

239) Ὄρθογωνίου τριγώνου ἡ ὑποτείνουσα εἶναι 188 μ. μία δὲ τῶν ὀξείων γωνιῶν εἶναι $18^\circ 14'$. Νὰ εὐρεθοῦν τὰ λοιπὰ στοιχεῖα αὐτοῦ καὶ τὸ ἔμβαδόν.

240) Ὄρθογωνίου τριγώνου μία τῶν καθέτων πλευρῶν εἶναι 1592,8 μ. ἡ δὲ ἀπέναντι αὐτῆς γωνία εἶναι $\frac{7}{10}$ τῆς ὀρθῆς. Νὰ εὐρεθοῦν τὰ λοιπὰ στοιχεῖα τοῦ τριγώνου.

241) Ὄρθογωνίου τριγώνου σὶ δύο πλευραὶ τῆς ὀρθῆς γωνίας εἶναι 587,8 μ. ἡ μία καὶ 798 μ. ἡ ἄλλη. Νὰ εὐρεθοῦν αἱ γωνίαι καὶ ἡ ὑποτείνουσα.

242) Ὄρθογωνίου τριγώνου ἡ ὑποτείνουσα εἶναι διπλασία μιᾶς τῶν ἄλλων πλευρῶν. Νὰ εὐρεθοῦν αἱ γωνίαι αὐτοῦ.

243) Ὄρθογωνίου τριγώνου ἡ ὑποτείνουσα εἶναι τετραπλασία τῆς καθέτου τῆς ἀγομένης ἐπὶ ταύτην ἐκ τῆς κορυφῆς τῆς ὀρθῆς γωνίας. Νὰ εὐρεθοῦν αἱ γωνίαι τοῦ τριγώνου.

244) Ὄρθογωνίου τριγώνου ἡ ὑποτείνουσα εἶναι 404 μ. ἡ δὲ ἑτέρα τῶν καθέτων πλευρῶν 125 μ. Νὰ εὐρεθοῦν τὰ λοιπὰ στοιχεῖα τοῦ τριγώνου τούτου.

245) Ὄρθογωνίου τριγώνου ἡ ὑποτείνουσα εἶναι 580 μ. ὁ δὲ λόγος τῶν ὀξείων γωνιῶν αὐτοῦ εἶναι $\frac{7}{13}$. Νὰ εὐρεθοῦν τὰ λοιπὰ στοιχεῖα τοῦ τριγώνου.

246) Ὄρθογωνίου τριγώνου ἡ ὑποτείνουσα εἶναι 450 μ. ὁ δὲ λόγος τῶν ἄλλων πλευρῶν εἶναι $\frac{3}{4}$. Νὰ ἐπιλυθῆ τὸ τρίγωνον.

247) Χορδὴ τόξου μήκους 173,854 μ. ἀπέχει ἀπὸ τοῦ κέντρου 100 μ. Νὰ εὑρεθῆ τὸ τόξον.

248) Τριγώνου ΑΒΓ εἶναι ΑΒ=25 μ., ΒΓ=34 μ. καὶ τὸ ὕψος ΑΔ=7 μ. Νὰ εὑρεθοῦν αἱ γωνίαι τοῦ τριγώνου καὶ ἡ τρίτη πλευρά.

249) Ἡ πλευρὰ ρόμβου εἶναι 39 μ. καὶ ἡ μεγαλύτερα διαγώνιος 72 μ. Νὰ εὑρεθῆ ἡ ἄλλη διαγώνιος καὶ αἱ γωνίαι τοῦ ρόμβου.

250) Ἴσοσκελές τι τρίγωνον ἔχει τὴν βάσιν ἴσην μὲ τὸ ἕμισυ ἑκατέρας τῶν ἄλλων πλευρῶν. Νὰ εὑρεθοῦν αἱ γωνίαι αὐτοῦ.

251) Ἴσοσκελοῦς τριγώνου ἡ βάσις εἶναι 890 μ., ἡ δὲ γωνία τῆς κορυφῆς εἶναι 18° . Νὰ εὑρεθοῦν τὰ λοιπὰ στοιχεῖα καὶ τὸ ἐμβαδὸν αὐτοῦ.

252) Ἡ γωνία τῆς κορυφῆς ἰσοσκελοῦς τριγώνου εἶναι 50° καὶ τὸ ὕψος, τὸ ἀγόμενον ἐκ τῆς κορυφῆς τῆς γωνίας ταύτης εἶναι 146,75 μ. Νὰ εὑρεθοῦν τὰ λοιπὰ στοιχεῖα αὐτοῦ.

253) Ὄρθογωνίου τριγώνου ΑΒΓ ἡ διχοτόμος τῆς Γ τέμνει τὴν ΑΒ εἰς τὸ Δ. Νὰ εὑρεθοῦν αἱ ἄλλαι πλευραὶ αὐτοῦ, ὅταν γνωρίζωμεν, ὅτι (ΓΑ)=125 μ. καὶ (ΑΔ)=50 μ.

254) Εἰς περιφέρειαν ἀκτῖνος 30 μ. ἄγονται αἱ ἐφαπτόμεναι αὐτῆς ἀπὸ σημείου ἀπέχοντος ἀπὸ τῆς περιφερείας 16 μέτρα. Νὰ εὑρεθῆ ἡ γωνία τῶν ἀχθρισῶν ἐφαπτομένων.

255) Τῆς γωνίας ΑΟΓ ἡ ΟΑ προβάλλεται ἐπὶ τὴν διχοτόμον τῆς γωνίας ταύτης· ἡ δὲ προβολὴ τῆς ΟΑ προβάλλεται ἐπὶ τὴν ΟΓ. Νὰ εὑρεθῆ ἡ γωνία ΑΟΓ, δεδομένου, ὅτι ἡ τελευταία προβολὴ εἶναι τὰ $\frac{2}{3}$ τῆς ΟΑ.

256) Νὰ εὑρεθῆ ἡ προβολὴ εὐθείας γραμμῆς μήκους 35 μέτρων ἐπὶ ἄλλης, μετὰ τῆς ὁποίας σχηματίζει γωνίαν $42^\circ 20'$.

257) Ἡ σκιά ἐνὸς δένδρου εἶναι 3,75 μ. καὶ τὸ ὕψος τοῦ ἡλίου εἶναι $65^\circ 30'$. Νὰ εὑρεθῆ τὸ ὕψος τοῦ δένδρου.

258) Δύο δυνάμεις 9 χιλιογράμμων και 27 χιλιογράμμων έχουσαι τὸ αὐτὸ σημεῖον ἐφαρμογῆς εἶναι κάθετοι μεταξύ των. Νὰ εὑρεθῇ ἡ συνισταμένη αὐτῶν καὶ αἱ γωνίαι, τὰς ὁποίας σχηματίζει μετ' αὐτῶν.

259) Δύναμις 125 χιλιογράμμων νὰ ἀναλυθῇ εἰς δύο συνιστώσας καθέτους μεταξύ των, ὅταν σχηματίζῃ μετὰ μιᾶς τούτων γωνίαν $28^{\circ} 24'$.

260) Εἷς, ὁ ὁποῖος ἀπέχει ἀπὸ ἑνὸς πύργου 75 μέτρα, βλέπει αὐτὸν ὑπὸ γωνίαν $35^{\circ} 40'$. Νὰ εὑρεθῇ τὸ ὕψος αὐτοῦ.

261) Εἷς παρατηρητῆς ἐπὶ ἀεροπλάνου γνωρίζει, ὅτι ἡ ἀπόστασις δύο στόχων ἐπὶ τῆς γῆς εἶναι εἰς ἀπόστασιν 4 χιλιομέτρων. Ὄταν δὲ εὑρεθῇ κατακορύφως ὑπεράνω ἑνὸς τῶν στόχων, βλέπει τὴν ἀπόστασιν τῶν δύο στόχων ὑπὸ γωνίαν $12^{\circ} 30'$. Νὰ εὑρεθῇ τὸ ὕψος τοῦ ἀεροπλάνου ὑπὲρ τὴν γῆν.

262) Εἷς παρατηρητῆς ἐπὶ ἀεροπλάνου, τὸ ὁποῖον ἵπταται εἰς ὕψος ἀπὸ τῆς ἐπιφανείας τῆς θαλάσσης 1000 μέτρων, βλέπει ἕν περισκόπιον ὑποβρυχίου ὑπὸ γωνίαν $24^{\circ} 16'$ (γωνία τῆς ὀριζοντίου διευθύνσεως καὶ τῆς εὐθείας τῆς διερχομένης διὰ τοῦ περισκοπίου καὶ τοῦ παρατηρητοῦ). Νὰ εὑρεθῇ ἡ ὀριζοντία ἀπόστασις τοῦ ὑποβρυχίου ἀπὸ τῆς κατακορύφου τῆς διερχομένης διὰ τοῦ παρατηρητοῦ.

263) Δύο παρατηρηταὶ ἰστάμενοι ἐπὶ ὀριζοντίου ἐδάφους ἀπέχοντος ἀπ' ἀλλήλων 1000 μέτρα βλέπουν συγχρόνως ἕν ἀεροπλάνον ὑπὸ γωνίαν (ἦτοι τὸ ὕψος αὐτοῦ ὑπὲρ τὴν γῆν) 60° καὶ 45° ἀντιστοίχως. Νὰ εὑρεθῇ τὸ ὕψος τοῦ ἀεροπλάνου.

264) Εἷς βλέπει ἕνα ἀπόκρημνον καὶ κατακόρυφον βράχον ὑπὸ γωνίαν 45° , ἐὰν δὲ πλησιάσῃ τὸν βράχον κατὰ 100 μέτρα, βλέπει τοῦτον ὑπὸ γωνίαν 60° . Νὰ εὑρεθῇ τὸ ὕψος τοῦ βράχου καὶ ἡ ὀριζοντία ἀπόστασις τοῦ παρατηρητοῦ ἀπὸ τοῦ βράχου.

265) Εἷς, ὁ ὁποῖος ἴσταται μεταξύ δύο δένδρων καὶ ἐπὶ τῆς διευθύνσεως αὐτῶν, βλέπει τὸ μὲν ἕν ὑπὸ γωνίαν 30° , τὸ δὲ ἄλλο ὑπὸ γωνίαν 60° . Ἐὰν ὁμοίως πλησιάσῃ τὸ πρῶτον κατὰ 60 μέτρα θὰ ἴδῃ καὶ τὰ δύο δένδρα ὑπὸ τὴν αὐτὴν γωνίαν τῶν 45° . Νὰ εὑρεθῇ ἡ ἀπόστασις μεταξύ τῶν δύο δένδρων ὡς καὶ τὸ ὕψος ἐκάστου τούτων.

266) Τὸ ὕψος ὀρθογωνίου τριγώνου ἐπὶ τὴν ὑποτείνουσαν

είναι 915,12 μ. και μία των όξειών γωνιών αυτού είναι $64^{\circ} 20' 40''$. Να έπιλυθῆ τὸ τρίγωνον.

267) Τὰ τμήματα, εις τὰ όποια διαιρείται ἡ ύποτείνουσα όρθογωνίου τριγώνου ύπό τοῦ ύψους έπ' αὐτήν, είναι 896,08 μ. και 616,29 μ. Να έπιλυθῆ τὸ τρίγωνον.

268). Ἡ ύποτείνουσα όρθογωνίου τριγώνου είναι 673,12 μ. ἡ δὲ διαφορά των άλλων πλευρών είναι 412,373 μ. Να έπιλυθῆ τὸ τρίγωνον.

269) Ἡ ύποτείνουσα όρθογωνίου τριγώνου είναι 627,5 μ., τὸ δὲ άθροισμα των άλλων πλευρών είναι 878,5 μ. Να έπιλυθῆ τὸ τρίγωνον.

270) Ὁρθογωνίου τριγώνου τὸ έμβαδόν είναι 30 τ.μ., ἡ δὲ όξειά γωνία $B=67^{\circ} 22' 48''$. Να έπιλυθῆ τὸ τρίγωνον.

271) Ὁρθογωνίου τριγώνου τὸ άθροισμα των δύο καθέτων πλευρών είναι 119 μ., μία δὲ των όξειών γωνιών αυτού $64^{\circ} 40''$. Να έπιλυθῆ τὸ τρίγωνον.

272) Ὁρθογωνίου τριγώνου ABΓ ἡ περίμετρος είναι 120 μ., ἡ δὲ όξειά γωνία $B=22^{\circ} 37' 12''$. Να έπιλυθῆ τὸ τρίγωνον.

273) Ὁρθογωνίου τριγώνου ἡ διαφορά των δύο καθέτων πλευρών αυτού είναι 47 μ., μία δὲ των όξειών γωνιών αυτού $32^{\circ} 46' 45''$. Να έπιλυθῆ τὸ τρίγωνον.

274) Ἡ πλευρά κανονικοῦ δωδεκαγώνου είναι 20 μ. Να εύρεθῆ ἡ άκτις τοῦ περι αὐτὸ περιγεγραμμένου κύκλου, ώς και ἡ άκτις τοῦ έγγεγραμμένου έν αὐτῷ.

275) Τοῦ ώς άνω δωδεκαγώνου νά εύρεθῆ τὸ έμβαδόν.

276) Να εύρεθῆ ἡ περίμετρος κανονικοῦ δωδεκαγώνου, όταν γνωρίζωμεν, ότι ἡ άκτις τοῦ έν αὐτῷ έγγεγραμμένου κύκλου είναι 10 μ.

277) Να εύρεθῆ ἡ περίμετρος κανονικοῦ δωδεκαγώνου, όταν ἡ άκτις τοῦ περι αὐτὸ περιγεγραμμένου κύκλου είναι 1 μέτρον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΙΙ

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΝΤΟΣ ΤΡΙΓΩΝΟΥ

71. Θεώρημα.— *Ἐν παντὶ τριγώνῳ αἱ πλευραὶ εἶναι ἀνάλογοι πρὸς τὰ ἡμίτονα τῶν ἀπέναντι γωνιῶν.*

$$\text{Ἦτοι εἶναι } \frac{\alpha}{\eta\mu A} = \frac{\beta}{\eta\mu B} = \frac{\gamma}{\eta\mu \Gamma}.$$

Ἐστω Ρ ἡ ἄκτις τοῦ εἰς τὸ τρίγωνον ΑΒΓ περιγεγραμμένου κύκλου Ο καὶ ΒΔ διάμετρος τοῦ κύκλου τούτου, ἡ ὁποία ἢ θὰ τέμνη τὸ τρίγωνον (ἐὰν ἡ Α εἶναι ὀξεῖα) ἢ θὰ εἶναι ἐκτὸς αὐτοῦ (ἐὰν ἡ Α εἶναι ἀμβλεία).

Ἐπομένως αἱ γωνίαι Α καὶ Δ ἢ θὰ εἶναι ἴσαι ἢ παραπληρωματικαὶ (Στ. Γεωμ.) ἀλλ' εἰς ἀμφοτέρας τὰς περιπτώσεις θὰ ἔχωμεν $\eta\mu A = \eta\mu \Delta$.

Ἄλλ' ἐκ τοῦ ὀρθογωνίου τριγώνου ΒΓΔ λαμβάνομεν

$$\alpha = 2P\eta\mu \Delta \quad \text{ἢ} \quad \alpha = 2P\eta\mu A, \quad \text{ἦτοι} \quad 2P = \frac{\alpha}{\eta\mu A}.$$

Ὅμοιος ἀποδεικνύεται, ὅτι



$$2P = \frac{\beta}{\eta\mu B} \quad \text{καὶ} \quad 2P = \frac{\gamma}{\eta\mu \Gamma}.$$

$$\text{Ἐπομένως εἶναι } \frac{\alpha}{\eta\mu A} = \frac{\beta}{\eta\mu B} = \frac{\gamma}{\eta\mu \Gamma} \quad (1).$$

72. Θεώρημα.— *Ἐν παντὶ τριγώνῳ τὸ τετράγωνον τῆς τυχούσης πλευρᾶς ἰσοῦται μὲ τὸ ἄθροισμα τῶν τετραγώνων τῶν δύο ἄλλων πλὴν τοῦ διπλασίου γινομένου τῶν πλευρῶν τούτων, πολλαπλασιασθέντος ἐπὶ τὸ συνημίτονον τῆς ὑπ' αὐτῶν περιεχομένης γωνίας.*

Ἐστω τυχὸν τρίγωνον τὸ ΑΒΓ. Ἐὰν ἐκ τῆς κορυφῆς Α φέρωμεν ἐπὶ τὴν ΒΓ τὴν κάθετον ΑΔ καί, ἂν ἡ γωνία Γ εἶναι ὀξεῖα, κατὰ ἓν θεώρημα τῆς Γεωμετρίας εἶναι

$$(AB)^2 = (BG)^2 + (AG)^2 - 2(BG)(\Delta \Gamma).$$




*Αλλ' ἐκ τοῦ ὀρθογωνίου τριγώνου ΑΔΓ λαμβάνομεν
 $(\Delta\Gamma) = (ΑΓ)\sigma\upsilon\upsilon\Gamma$.

*Ὡστε ἡ πρώτη ἰσότης γίνεται

$$(ΑΒ)^2 = (ΒΓ)^2 + (ΑΓ)^2 - 2(ΒΓ)(ΑΓ)\sigma\upsilon\upsilon\Gamma, \text{ ἥτοι}$$

$$\gamma^2 = \alpha^2 + \beta^2 - 2\alpha\beta\sigma\upsilon\upsilon\Gamma.$$



*Ἐὰν ἡ γωνία Γ εἶναι ἀμβλεῖα, ἡ κάθετος ΑΔ πίπτει ἐκτὸς τοῦ τριγώνου καὶ τότε ἔχομεν ἐκ τῶν στοιχείων τῆς Γεωμετρίας τὴν ἰσότητα

$$(ΑΒ)^2 = (ΒΓ)^2 + (ΑΓ)^2 + 2(ΒΓ)(ΓΔ) \quad (1')$$

*Αλλ' ἐκ τοῦ ὀρθογωνίου τριγώνου ΑΓΔ ἔπεται

$(ΓΔ) = (ΑΓ)\sigma\upsilon\upsilon\phi$ καὶ ἐπειδὴ ἡ γωνία φ εἶναι παραπληρωματική τῆς Γ, εἶναι $\sigma\upsilon\upsilon\phi = -\sigma\upsilon\upsilon\Gamma$, ἐπομένως

$(ΓΔ) = (ΑΓ)(-\sigma\upsilon\upsilon\Gamma) = -(ΑΓ)\sigma\upsilon\upsilon\Gamma$ καὶ ἂν ἀντικαταστήσωμεν τὴν τιμὴν ταύτην τῆς ΓΔ εἰς τὴν ἰσότητα (1') εὐρίσκομεν πάλιν.

$$\gamma^2 = \alpha^2 + \beta^2 - 2\alpha\beta\sigma\upsilon\upsilon\Gamma.$$

*Ἐπειδὴ ἡ πρότασις ἐφαρμόζεται ἐφ' ἐκάστης τῶν πλευρῶν ἔπεται ὅτι εἶναι :

$$\begin{aligned} \alpha^2 &= \beta^2 + \gamma^2 - 2\beta\gamma\sigma\upsilon\upsilon\Lambda \\ \beta^2 &= \gamma^2 + \alpha^2 - 2\gamma\alpha\sigma\upsilon\upsilon\Β \\ \gamma^2 &= \alpha^2 + \beta^2 - 2\alpha\beta\sigma\upsilon\upsilon\Gamma \end{aligned} \quad (2)$$

73. Τύποι τῶν ἡμίσεων γωνιῶν τριγώνου. Ἐκ τῶν προηγουμένων τύπων (2) εὐρίσκομεν τὰ συνήμιτονα τῶν γωνιῶν τριγώνου συναρτήσει τῶν πλευρῶν αὐτοῦ, ὅποτε ἔχομεν :

$$\begin{aligned} \sigma\upsilon\upsilon\Lambda &= \frac{\beta^2 + \gamma^2 - \alpha^2}{2\beta\gamma} \\ \sigma\upsilon\upsilon\Β &= \frac{\alpha^2 + \gamma^2 - \beta^2}{2\alpha\gamma} \end{aligned} \quad (2')$$

$$\text{συν}\Gamma = \frac{\alpha^2 + \beta^2 - \gamma^2}{2\alpha\beta}$$

Ἄλλ' ἐπειδὴ $\text{συν}A = 1 - 2\eta\mu^2 \frac{A}{2}$ ἔχομεν

$$1 - 2\eta\mu^2 \frac{A}{2} = \frac{\beta^2 + \gamma^2 - \alpha^2}{2\beta\gamma} \quad \eta$$

$$2\eta\mu^2 \frac{A}{2} = 1 - \frac{\beta^2 + \gamma^2 - \alpha^2}{2\beta\gamma} \quad \eta \text{ τοι } \eta\mu^2 \frac{A}{2} = \frac{2\beta\gamma - \beta^2 - \gamma^2 + \alpha^2}{4\beta\gamma}$$

$$\eta \text{ τοι } \eta\mu^2 \frac{A}{2} = \frac{\alpha^2 - (\beta - \gamma)^2}{4\beta\gamma} = \frac{(\alpha - \beta + \gamma)(\alpha + \beta - \gamma)}{4\beta\gamma} \quad (3)$$

Ὀμοίως ἐπειδὴ εἶναι $\text{συν}A = 2\text{συν}^2 \frac{A}{2} - 1$ ἔχομεν

$$2\text{συν}^2 \frac{A}{2} - 1 = \frac{\beta^2 + \gamma^2 - \alpha^2}{2\beta\gamma} \quad \eta$$

$$2\text{συν}^2 \frac{A}{2} = \frac{\beta^2 + \gamma^2 - \alpha^2 + 2\beta\gamma}{2\beta\gamma} = \frac{(\beta + \gamma)^2 - \alpha^2}{2\beta\gamma} \quad \eta$$

$$\text{συν}^2 \frac{A}{2} = \frac{(\alpha + \beta + \gamma)(-\alpha + \beta + \gamma)}{4\beta\gamma} \quad (4)$$

Ἐὰν δὲ πρὸς συντομίαν θέσωμεν $\alpha + \beta + \gamma = 2\tau$ (ὅτε τ σημαίνει τὴν ἡμιπερίμετρον τοῦ τριγώνου) καὶ ἀφαιρέσωμεν ἀπ' ἀμφοτέρων τῶν μελῶν τῆς τεθείσης ἰσότητος τὸ 2α , ἔπειτα τὸ 2β καὶ τέλος τὸ 2γ , εὐρίσκομεν :

$$\begin{aligned} -\alpha + \beta + \gamma &= 2(\tau - \alpha) \\ \alpha - \beta + \gamma &= 2(\tau - \beta) \\ \alpha + \beta - \gamma &= 2(\tau - \gamma) \end{aligned} \quad (5)$$

καὶ διὰ τῆς βοήθειας τῶν ἰσοτήτων τούτων οἱ τύποι (3) καὶ (4) γράφονται ὡς ἑξῆς.

$$\eta\mu^2 \frac{A}{2} = \frac{(\tau - \beta)(\tau - \gamma)}{\beta\gamma}$$

$$\text{συν}^2 \frac{A}{2} = \frac{\tau(\tau - \alpha)}{\beta\gamma} \quad \delta\theta\epsilon\nu \text{ εἶναι}$$

$$\eta\mu \frac{A}{2} = \sqrt{\frac{(\tau - \beta)(\tau - \gamma)}{\beta\gamma}}$$

$$\text{συν} \frac{A}{2} = \sqrt{\frac{\tau(\tau - \alpha)}{\beta\gamma}}$$

μὲ σημεῖον \pm διότι ἡ γωνία $\frac{A}{2}$ εἶναι πάντοτε ὀξεῖα.

Ἐὰν ἤδη τὰς δύο τελευταίας αὐτὰς ἰσότητας διαιρέσωμεν κατὰ μέλη εὐρίσκομεν

$$\varepsilon\phi \frac{A}{2} = \sqrt{\frac{(\tau-\beta)(\tau-\gamma)}{\tau(\tau-\alpha)}}$$

Κατὰ τὸν ἴδιον τρόπον ἐκ τῆς δευτέρας καὶ τρίτης τῶν ἰσοτήτων (2') εὐρίσκομεν τὰ $\eta\mu \frac{B}{2}$, $\eta\mu \frac{\Gamma}{2}$, $\sigma\upsilon\nu \frac{B}{2}$ καὶ $\sigma\upsilon\nu \frac{\Gamma}{2}$ καὶ ἐξ αὐτῶν τὰς $\varepsilon\phi \frac{B}{2}$, $\varepsilon\phi \frac{\Gamma}{2}$. Ἔχομεν δὲ οὕτω τὰ ἡμίτονα τῶν ἡμίσεων γωνιῶν τριγώνου

$$\begin{aligned}\eta\mu \frac{A}{2} &= \sqrt{\frac{(\tau-\beta)(\tau-\gamma)}{\beta\gamma}} \\ \eta\mu \frac{B}{2} &= \sqrt{\frac{(\tau-\alpha)(\tau-\gamma)}{\alpha\gamma}} \\ \eta\mu \frac{\Gamma}{2} &= \sqrt{\frac{(\tau-\alpha)(\tau-\beta)}{\alpha\beta}}\end{aligned}\quad (6)$$

Διὰ τὰ συνημίτονα τῶν ἡμίσεων γωνιῶν αὐτοῦ

$$\begin{aligned}\sigma\upsilon\nu \frac{A}{2} &= \sqrt{\frac{\tau(\tau-\alpha)}{\beta\gamma}} \\ \sigma\upsilon\nu \frac{B}{2} &= \sqrt{\frac{\tau(\tau-\beta)}{\alpha\gamma}} \\ \sigma\upsilon\nu \frac{\Gamma}{2} &= \sqrt{\frac{\tau(\tau-\gamma)}{\alpha\beta}}\end{aligned}\quad (7)$$

Καὶ διὰ τὰς ἐφαπτομένας τῶν ἡμίσεων γωνιῶν ἔχομεν

$$\begin{aligned}\varepsilon\phi \frac{A}{2} &= \sqrt{\frac{(\tau-\beta)(\tau-\gamma)}{\tau(\tau-\alpha)}} \\ \varepsilon\phi \frac{B}{2} &= \sqrt{\frac{(\tau-\alpha)(\tau-\gamma)}{\tau(\tau-\beta)}} \\ \varepsilon\phi \frac{\Gamma}{2} &= \sqrt{\frac{(\tau-\alpha)(\tau-\beta)}{\tau(\tau-\gamma)}}\end{aligned}\quad (8)$$

Αἱ τετραγωνικαὶ ρίζαι πρέπει εἰς τοὺς τύπους τούτους νὰ λαμβάνωνται θετικῶς· διότι τὰ ἡμίση τῶν γωνιῶν τοῦ τριγώνου, ἦτοι αἱ γωνίαι $\frac{1}{2}A$, $\frac{1}{2}B$, $\frac{1}{2}\Gamma$, εἶναι πάντοτε ὀξεῖαι· ἐπομένως οἱ τριγωνομετρικοὶ ἀριθμοὶ αὐτῶν εἶναι πάντοτε θετικοί.

Σημείωσις. Ἐὰν εἰς τρίγωνον τρέψωμεν τὰ γράμματα τῶν κορυφῶν ἀπὸ A, B, Γ εἰς B, Γ, A (τὸ A εἰς B, τὸ B εἰς Γ,

καὶ τὸ Γ εἰς Α) θὰ τραποῦν ὁμοίως καὶ τὰ γράμματα τῶν πλευρῶν ἀπὸ α, β, γ, εἰς β, γ, α' ἀλλ' οἱ εὐρεθέντες γενικοὶ τύποι (1), (2), (6), (7) καὶ (8), οἱ ἐπὶ τοῦ τυχόντος τριγώνου ἰσχύοντες, πρέπει προφανῶς νὰ ἀληθεύουν καὶ μετὰ τὴν τροπὴν ταύτην· τρέποντες ἄρα τὰ γράμματα ὡς εἶπομεν, δυνάμεθα ἕξ ἑνὸς τῶν τύπων τούτων νὰ εὕρωμεν τοὺς ὁμοίους του·

74. Θεώρημα.—'Εν παντὶ τριγώνῳ ἡ διαφορὰ δύο πλευρῶν ἔχει λόγον πρὸς τὸ ἄθροισμα αὐτῶν, ὃν ἔχει καὶ ἡ ἐφαπτομένη τῆς ἡμιδιαφορᾶς τῶν ἀπέναντι γωνιῶν πρὸς τὴν ἐφαπτομένην τοῦ ἡμιἄθροισματος αὐτῶν.

"Ἦτοι εἶναι

$$\frac{\alpha - \beta}{\alpha + \beta} = \frac{\epsilon\phi \frac{A - B}{2}}{\epsilon\phi \frac{A + B}{2}}$$

Πρὸς τοῦτο ἐκ τῶν σχέσεων (1) $\frac{\alpha}{\eta\mu A} = \frac{\beta}{\eta\mu B} = \frac{\gamma}{\eta\mu \Gamma}$ λαμβάνομεν κατὰ τὴν γνωστὴν ἰδιότητα τῶν ἴσων λόγων τὰς ἰσότητας:

$$\begin{aligned} \frac{\alpha - \beta}{\eta\mu A - \eta\mu B} &= \frac{\gamma}{\eta\mu \Gamma} \\ \frac{\alpha + \beta}{\eta\mu A + \eta\mu B} &= \frac{\gamma}{\eta\mu \Gamma}, \quad \text{ἐκ τῶν ὁποίων προκύπτει ἢ} \\ \frac{\alpha - \beta}{\eta\mu A - \eta\mu B} &= \frac{\alpha + \beta}{\eta\mu A + \eta\mu B} \quad \text{ἢ} \\ \text{ἢ } \frac{\alpha - \beta}{\alpha + \beta} &= \frac{\eta\mu A - \eta\mu B}{\eta\mu A + \eta\mu B} \end{aligned}$$

καὶ κατὰ τὸν τύπον τῆς § 51 ἢ

$$\frac{\alpha - \beta}{\alpha + \beta} = \frac{\epsilon\phi \frac{A - B}{2}}{\epsilon\phi \frac{A + B}{2}} \quad (9)$$

Σημείωσις. Ἐπειδὴ εἶναι $A + B = 180^\circ - \Gamma$ ἔπεται, ὅτι $\frac{A + B}{2} = 90^\circ - \frac{\Gamma}{2}$ καὶ $\epsilon\phi \frac{A + B}{2} = \sigma\phi \frac{\Gamma}{2}$. Διὰ τοῦτο ὁ τύπος (9) γράφεται συνήθως ὡς ἑξῆς:

$$\epsilon\phi \frac{A - B}{2} = \frac{\alpha - \beta}{\alpha + \beta} \sigma\phi \frac{\Gamma}{2}$$

Ὁμοίως εὕρισκομεν, ὅτι

$$\varepsilon\phi \frac{B-\Gamma}{2} = \frac{\beta-\gamma}{\beta+\gamma} \cdot \sigma\phi \frac{A}{2}$$

$$\varepsilon\phi \frac{\Gamma-A}{2} = \frac{\gamma-\alpha}{\gamma+\alpha} \cdot \sigma\phi \frac{B}{2}$$

75. **Παρατήρησις.** Αί έξιώσεις

$$A+B+\Gamma=180^\circ, \frac{\alpha}{\eta\mu A} = \frac{\beta}{\eta\mu B} = \frac{\gamma}{\eta\mu\Gamma} \quad (i)$$

αί όποια συνδέουν τά έξι στοιχεία παντός τριγώνου είναι βασικάί. Διότι πᾶσα ἄλλη έξιώσις συνδέουσα τά έξι αυτά στοιχεία, πρέπει νά καταντᾷ ταυτότητος, όταν έν αὐτῇ ἀντικατασταθοῦν τά Γ, α, β ὑπό τῶν τιμῶν των, τὰς όποίας λαμβάνομεν έκ τῶν έξιώσεων (i) ἤτοι ὑπό τῶν

$$\Gamma=180^\circ-A-B, \alpha=\frac{\gamma\eta\mu A}{\eta\mu(A+B)}, \beta=\frac{\gamma\eta\mu B}{\eta\mu(A+B)}$$

διότι, ἂν δέν συνέβαινε τοῦτο, θά συνέδεε τά έν αὐτῇ περιεχόμενα γ, A, B . Ἀλλά τοῦτο είναι ἄτοπον, διότι ταῦτα οὐδόλως συνδέονται μεταξύ των καί δύνανται νά μεταβάλλωνται αὐθαίρετως. Ὡστε πᾶσα ἄλλη έξιώσις περιέχουσα τά έξι στοιχεία τοῦ τριγώνου προκύπτει μόνον έκ καταλλήλου μετασχηματισμοῦ τῶν έξιώσεων (i).

ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΥ


76. Ἐστω $A\Delta$ τὸ ὕψος τοῦ τριγώνου $AB\Gamma$ τὸ ἀντιστοιχοῦν εἰς τὴν βάσιν $B\Gamma$ αὐτοῦ. Τότε τὸ ἔμβαδὸν αὐτοῦ εἶναι

$$E = \frac{1}{2}(B\Gamma)(A\Delta) = \frac{1}{2}\alpha(A\Delta).$$

Ἄλλ' έκ τοῦ ὀρθογωνίου τριγώνου $A\Delta\Gamma$ εὐρίσκομεν $(A\Delta) = (A\Gamma)\eta\mu\Gamma = \beta\eta\mu\Gamma$. Ὅθεν ἔπεται $E = \frac{1}{2}\alpha\beta\eta\mu\Gamma$. (10)

Ἦτοι τὸ ἔμβαδὸν παντός τριγώνου ἰσοῦται μὲ τὸ ἥμισυ τοῦ γινομένου δύο τῶν πλευρῶν αὐτοῦ ἐπὶ τὸ ἥμίτονον τῆς ὑπ' αὐτῶν περιεχομένης γωνίας.

Ἐάν δέ θέλωμεν νά εὐρωμεν τὸ ἔμβαδὸν τοῦ τριγώνου συναρτήσει μιᾶς πλευρᾶς αὐτοῦ, π.χ. τῆς α καί τῶν παρ' αὐτῇ γωνιῶν B, Γ εἰς τὸν τύπον (10) ἀντικαθιστῶμεν τὸ β διὰ τοῦ ἴσου του $\frac{\sigma\eta\mu B}{\eta\mu A}$, ὁπότε ἔχομεν



$$E = \frac{1}{2} \cdot \frac{\alpha^2 \eta \mu B \eta \mu \Gamma}{\eta \mu A} \quad \text{\textit{\eta}τοι}$$

$$E = \frac{\alpha^2 \eta \mu B \cdot \eta \mu \Gamma}{2 \eta \mu (B + \Gamma)} \quad (11).$$

Ἐάν δὲ πάλιν θέλωμεν νὰ εὐρωμεν τὸ ἐμβαδὸν τοῦ τριγώνου συναρτήσῃ τῶν τριῶν πλευρῶν αὐτοῦ, παρατηροῦμεν, ὅτι $\eta \mu \Gamma = 2 \eta \mu \frac{\Gamma}{2} \text{ συν} \frac{\Gamma}{2}$ ἢ κατὰ τοὺς τύπους (6) καὶ (7)

$$\eta \mu \Gamma = \frac{2}{\alpha \beta} \sqrt{\tau(\tau - \alpha)(\tau - \beta)(\tau - \gamma)}$$

καὶ ἂν ἡ τιμὴ αὕτη τοῦ $\eta \mu \Gamma$ τεθῇ εἰς τὴν ἰσότητα (10) προκύπτει

$$E = \sqrt{\tau(\tau - \alpha)(\tau - \beta)(\tau - \gamma)} \quad (12)$$

Σημείωσις α'. Ἐάν τυχὸν τετράπλευρον διαιρεθῇ εἰς τρίγωνα διὰ τῶν διαγωνίων αὐτοῦ καὶ ἐφαρμοσθῇ ἐπ' αὐτῶν ὁ τύπος (10) εὐρίσκεται ἡ ἐξῆς πρότασις.

Τὸ ἐμβαδὸν παντὸς κυρτοῦ τετραπλεύρου ἰσοῦται τῷ ἡμίσει τοῦ γινομένου τῶν διαγωνίων αὐτοῦ ἐπὶ τὸ ἡμίτονον τῆς ὑπ' αὐτῶν περιεχομένης γωνίας.

Σημείωσις β'. Ἐκ τῆς ἰσότητος


$$2P = \frac{\alpha}{\eta \mu A} \quad \text{\textit{\epsilon}πειτα καὶ} \quad 2P = \frac{\alpha \cdot \beta \cdot \gamma}{\beta \cdot \gamma \cdot \eta \mu A}$$

καὶ ἐπειδὴ εἶναι $\beta \gamma \eta \mu A = 2E$ συνάγεται

$$4 \cdot E \cdot P = \alpha \cdot \beta \cdot \gamma \quad \text{\textit{\eta} ἢ} \quad E = \frac{\alpha \cdot \beta \cdot \gamma}{4P} \quad (13).$$

ΑΚΤΙΣ ΤΟΥ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

77. Ἐστω K τὸ κέντρον τοῦ εἰς τὸ τρίγωνον $AB\Gamma$ ἐγγεγραμμένου κύκλου καὶ ρ ἡ ἀκτίς αὐτοῦ. Ἐάν φέρωμεν τὰς εὐθείας $KA, KB, K\Gamma$, διαιρεῖται τὸ τρίγωνον εἰς τρία, ἔχοντα βάσεις μὲν τὰς πλευράς τοῦ τριγώνου, ὕψη δὲ τὰς ἀκτίνας $K\Delta, KE, KZ$, τοῦ κύκλου, αἱ ὁποῖαι εἶναι κάθετοι ἐπὶ τὰς ἐφαπτομένας. Ἐπομένως τὸ ἐμβαδὸν αὐτῶν εἶναι



$\frac{1}{2} \alpha \rho, \frac{1}{2} \beta \rho, \frac{1}{2} \gamma \rho$. Ὡστε τὸ ἐμβαδὸν τοῦ τριγώνου εἶναι

$$E = \frac{1}{2} \rho (\alpha + \beta + \gamma) = \rho \cdot \tau. \quad \text{\textit{\textcircled{O}}θεν εἶναι} \quad \rho = \frac{E}{\tau}.$$

Ἐὰν δὲ ἀντικαταστήσωμεν τὸ Ε ὑπὸ τῆς τιμῆς αὐτοῦ (12) εὐρίσκομεν.

$$\rho = \sqrt{\frac{(\tau-\alpha)(\tau-\beta)(\tau-\gamma)}{\tau}} \quad (13')$$

Σημείωσις. Ἐὰν εἰς τοὺς τύπους (8) πολλαπλασιάσωμεν τοὺς ἀριθμητάς καὶ τοὺς παρονομαστάς τῶν τριῶν ὑπορρίζων ἀντιστοίχως ἐπὶ $(\tau-\alpha)$, $(\tau-\beta)$, $(\tau-\gamma)$ εὐκόλως εὐρίσκομεν, ὅτι

$$\begin{aligned} \epsilon\phi \frac{A}{2} &= \frac{\rho}{\tau-\alpha} \\ \epsilon\phi \frac{B}{2} &= \frac{\rho}{\tau-\beta} \\ \epsilon\phi \frac{\Gamma}{2} &= \frac{\rho}{\tau-\gamma} \end{aligned} \quad (14)$$

▲ Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ

Ν' ἀποδειχθῆ, ὅτι ἐν παντὶ τριγώνῳ ΑΒΓ εἶναι

$$278) \quad \epsilon\phi B = \frac{\beta \cdot \eta\mu\Gamma}{\alpha - \beta \cdot \sigma\upsilon\nu\Gamma}$$

$$279) \quad \frac{\eta\mu(B-\Gamma)}{\eta\mu(B+\Gamma)} = \frac{\beta^2 - \gamma^2}{\alpha^2}$$

$$280) \quad \frac{\alpha}{\beta + \gamma} = \frac{\eta\mu \frac{A}{2}}{\eta\mu\left(\Gamma + \frac{A}{2}\right)}$$

$$281) \quad \frac{\alpha}{\beta - \gamma} = \frac{\sigma\upsilon\nu \frac{A}{2}}{\sigma\upsilon\nu\left(\Gamma + \frac{A}{2}\right)}$$

$$282) \quad \frac{1}{\beta \cdot \sigma\upsilon\nu\Gamma - \gamma \cdot \sigma\upsilon\nu B} = \frac{\alpha}{\beta^2 - \gamma^2}$$

$$283) \quad \alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 = 2(\beta\gamma \cdot \sigma\upsilon\nu A + \gamma\alpha \cdot \sigma\upsilon\nu B + \alpha\beta \cdot \sigma\upsilon\nu\Gamma)$$

$$284) \quad \frac{\epsilon\phi B}{\epsilon\phi\Gamma} = \frac{\alpha^2 + \beta^2 - \gamma^2}{\alpha^2 - \beta^2 + \gamma^2}$$

$$285) \quad (\alpha - \beta)\epsilon\phi \frac{A+B}{2} + (\beta - \gamma)\epsilon\phi \frac{B+\Gamma}{2} + (\gamma - \alpha)\epsilon\phi \frac{\Gamma+A}{2} = 0$$

286) Ἐὰν αἱ πλευραὶ τριγώνου εἶναι ἐν ἀριθμητικῇ προόδῳ θὰ εἶναι ἐν τοιαύτῃ προόδῳ καὶ αἱ συνεφαπτόμεναι τῶν ἡμίσεων γωνιῶν αὐτοῦ,

$$\text{ἤτοι ἐὰν } \alpha + \gamma = 2\beta, \text{ θὰ εἶναι καὶ } \sigma\phi \frac{A}{2} + \sigma\phi \frac{\Gamma}{2} = 2\sigma\phi \frac{B}{2}.$$

287) *Εάν μ είναι τὸ μήκος τῆς διχοτόμου τῆς γωνίας A τριγώνου $AB\Gamma$, περατουμένης εἰς τὴν ἀπέναντι πλευρὰν $B\Gamma$, ν' ἀποδειχθῆ, ὅτι εἶναι

$$\mu(\beta + \gamma)\eta\mu\frac{A}{2} = \beta\gamma\eta\mu A$$

288) *Εάν αἱ πλευραὶ τριγώνου εἶναι $\alpha=13$, $\beta=14$, $\gamma=15$ νὰ εὐρεθοῦν τὰ $\eta\mu\frac{A}{2}$, $\eta\mu\frac{B}{2}$, $\eta\mu\frac{\Gamma}{2}$

289) *Ομοίως ἐκ τῶν ἄνω δεδομένων νὰ εὐρεθοῦν τὰ

$$\sigma\upsilon\nu\frac{A}{2}, \sigma\upsilon\nu\frac{B}{2}, \sigma\upsilon\nu\frac{\Gamma}{2}$$

290) *Εάν αἱ πλευραὶ τριγώνου εἶναι $\alpha=8$, $\beta=6$, $\gamma=4$, νὰ εὐρεθοῦν τὰ $\sigma\upsilon\nu\frac{A}{2}$, $\sigma\upsilon\nu\frac{B}{2}$, $\sigma\upsilon\nu\frac{\Gamma}{2}$

291) *Εάν αἱ πλευραὶ τριγώνου εἶναι $\alpha=25$, $\beta=52$ καὶ $\gamma=63$, νὰ εὐρεθοῦν αἱ $\epsilon\phi\frac{A}{2}$, $\epsilon\phi\frac{B}{2}$, $\epsilon\phi\frac{\Gamma}{2}$

292) *Ομοίως εὐρεῖν τὰς $\epsilon\phi\frac{A}{2}$, $\epsilon\phi\frac{B}{2}$, $\epsilon\phi\frac{\Gamma}{2}$, ὅταν αἱ πλευραὶ τοῦ τριγώνου $AB\Gamma$ εἶναι $\alpha=287$, $\beta=816$, $\gamma=865$.

293) *Ἡ σχέσηις $\frac{\alpha}{\eta\mu A} = \frac{\beta}{\eta\mu B}$ γράφεται καὶ ὡς ἑξῆς :

$$\eta\mu A = \frac{\alpha}{\beta} \eta\mu B.$$

Αὕτη δὲ εἶναι ἡ ἴδια μὲ τὸν τύπον $\eta\mu\chi = \kappa\eta\mu\psi$ τῆς διαθλάσεως τοῦ φωτός, ὅπου χ εἶναι ἡ γωνία τῆς προσπτώσεως, ψ ἡ γωνία τῆς διαθλάσεως, καὶ κ ὁ δείκτης τῆς διαθλάσεως ἐξαρτώμενος ἐκ τοῦ περιέχοντος. Κατόπιν τούτου, ἐάν μία φωτεινὴ ἀκτίς ἐκ τοῦ ἀέρος εἰσέρχεται εἰς τὸ ὕδωρ ὑπὸ γωνίαν προσπτώσεως 36° νὰ εὐρεθῆ ἡ γωνία τῆς διαθλάσεως τοῦ δείκτου ὄντος $\frac{3}{4}$.

294) *Ὅταν ἡ ἀκτίς μεταβαίνει ἐκ τοῦ ἀέρος εἰς τὸ ὕδωρ ὁ δείκτης τῆς διαθλάσεως, εἶναι $\frac{3}{4}$, ὅταν δὲ μεταβαίνει ἐκ τοῦ ἀέρος εἰς τὴν ὕαλον ὁ δείκτης εἶναι $\frac{3}{2}$. Νὰ εὐρεθῆ α) ὁ δείκτης τῆς διαθλάσεως, ὅταν ἡ ἀκτίς μεταβαίνει ἐκ τοῦ ὕδατος εἰς τὴν ὕαλον καὶ β) ἡ γωνία τῆς προσπτώσεως ἐντὸς τῆς ὕαλου, ὅταν ἡ γωνία τῆς προσπτώσεως ἐντὸς τοῦ ὕδατος εἶναι 40° .

295) Ἡ διαθλαστικὴ γωνία ΒΟΓ πρίσματος εἶναι 36° μία δὲ φωτεινὴ ἀκτίς ΑΒ ἐκ τοῦ ἀέρος προσπίπτει εἰς τὸ Β ὑπὸ γωνίαν 40° , ἐξέρχεται δὲ τοῦ πρίσματος κατὰ τὴν διεύθυνσιν ΓΔ. Νὰ εὑρεθῇ ἡ γωνία τῆς ἐκτροπῆς τῆς ἀκτίνος, ἥτοι ἡ ὀξεῖα γωνία, τὴν ὁποίαν σχηματίζουν αἱ ΑΒ καὶ ΓΔ.

296) Τριγώνου τινος αἱ γωνίαι εἶναι ἀνάλογοι πρὸς τοὺς ἀριθμοὺς 1,2,3. Νὰ εὑρεθῇ ἡ πρὸς ἀλλήλας σχέσις τῶν πλευρῶν τοῦ τριγώνου.

297) Ἐὰν τριγώνου αἱ γωνίαι τῆς βάσεως εἶναι $112^\circ 30'$ καὶ $22^\circ 30'$, ν' ἀποδειχθῇ, ὅτι τὸ ὕψος αὐτοῦ εἶναι τὸ ἡμισυ τῆς βάσεως.

298) Ν' ἀποδειχθῇ, ὅτι ἐν παντὶ τριγώνῳ εἶναι

$$\alpha = \beta \sigma \nu \Gamma + \gamma \sigma \nu \beta$$

$$\beta = \gamma \sigma \nu \alpha + \alpha \sigma \nu \Gamma$$

$$\gamma = \alpha \sigma \nu \beta + \beta \sigma \nu \alpha.$$

299) Ἐὰν Δ εἶναι σημεῖον τι τῆς πλευρᾶς ΒΓ τριγώνου ΑΒΓ, οὗ τὸ ἐμβαδὸν εἶναι Ε, ἡ δὲ γωνία ΑΔΓ παρασταθῇ διὰ τοῦ ω, ν' ἀποδειχθῇ, ὅτι εἶναι $(ΑΔ) = \frac{2Ε}{\alpha \eta \mu \omega}$

300) Ν' ἀποδειχθῇ, ὅτι εἶναι $E = 2P^2 \eta \mu A \eta \mu B \eta \mu \Gamma$

301) Ν' ἀποδειχθῇ, ὅτι εἶναι $E = 4P \rho \sigma \nu \frac{A}{2} \sigma \nu \frac{B}{2} \sigma \nu \frac{\Gamma}{2}$

302) Ν' ἀποδειχθῇ, ὅτι εἶναι $\frac{1}{\alpha \beta} + \frac{1}{\beta \gamma} + \frac{1}{\gamma \alpha} = \frac{1}{2P}$

303) Ἐὰν ρ_1, ρ_2, ρ_3 εἶναι αἱ ἀκτῖνες τῶν εἰς τὸ τρίγωνον ΑΓΒ παρεγγεγραμμένων κύκλων ἔναντι τῶν γωνιῶν Α, Β, Γ ἀντιστοίχως, ν' ἀποδειχθῇ ὅτι

$$\rho_1 = \frac{E}{\tau - \alpha} \quad \rho_2 = \frac{E}{\tau - \beta} \quad \rho_3 = \frac{E}{\tau - \gamma}.$$

304) Ν' ἀποδειχθῇ ὅτι

$$\frac{\rho \rho_1}{\rho_2 \rho_3} = \epsilon \phi^2 \frac{A}{2}$$

Ἐξ ὁμοίως ν' ἀποδειχθῇ, ὅτι $\rho \rho_1 \rho_2 \rho_3 = E^2$

ΕΠΙΛΥΣΙΣ ΤΩΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΩΝ ΤΡΙΓΩΝΩΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ

78. Ἐξ ὧν ἐμάθομεν προηγουμένως συνάγομεν, ὅτι τὸ εὐθύγραμμον τρίγωνον ὀρίζεται ἐντελῶς, ὅταν δοθοῦν :

1) Ἡ μία πλευρὰ αὐτοῦ καὶ δύο γωνίαι (καὶ ἢ πρὸς τὴν πλευρὰν θέσις αὐτῶν).

2) Δύο πλευραὶ καὶ μία γωνία (ἢ ὁποία δύναται νὰ εἶναι ἢ ἡ περιεχομένη ὑπὸ τῶν δύο πλευρῶν ἢ ἡ ἀπέναντι εἰς τὴν μεγαλύτεραν ἐξ αὐτῶν), καὶ

3) Αἱ τρεῖς πλευραὶ αὐτοῦ.

Ὡστε κατὰ τὴν ἐπίλυσιν τῶν τριγώνων διακρίνομεν τὰς ἐπομένους τέσσαρας περιπτώσεις.

Περίπτωσις 1η

79. Ἐκ μιᾶς πλευρᾶς τριγώνου, ἔστω τῆς a , καὶ δύο γωνιῶν αὐτοῦ, ἔστω τῶν B καὶ Γ , νὰ εὑρεθοῦν τὰ λοιπὰ στοιχεῖα αὐτοῦ.

Ἐκ τῶν σχέσεων

$$A + B + \Gamma = 180^\circ, \quad \frac{\alpha}{\eta\mu A} = \frac{\beta}{\eta\mu B} = \frac{\gamma}{\eta\mu \Gamma} \quad \text{εὐρίσκομεν}$$

$$A = 180^\circ - (B + \Gamma) \quad \text{καὶ} \quad \beta = \frac{\alpha \eta\mu B}{\eta\mu A} \quad \gamma = \frac{\alpha \eta\mu \Gamma}{\eta\mu A}$$

Ἐξ αὐτῶν δὲ λαμβάνομεν τοὺς τύπους τοὺς καταλλήλους διὰ τὴν χρῆσιν τῶν λογαρίθμων.

$$\log \beta = \log \alpha + \log \eta\mu B - \log \eta\mu A$$

$$\log \gamma = \log \alpha + \log \eta\mu \Gamma - \log \eta\mu A.$$

Παράδειγμα. — Ἐστωσαν

δεδομένα $\alpha = 752,8 \mu$.

ζητούμενα A

$$B = 67^\circ 33' 10''$$

β

$$\Gamma = 79^\circ 40'$$

γ

Κατὰ πρόωτον εἶναι $B + \Gamma = 147^\circ 13' 10''$, ὅθεν γωνία

$$A = 180^\circ - 147^\circ 13' 10'' = 32^\circ 46' 50''$$

Ἐῤῥεσις τῆς πλευρᾶς β

$$\beta = \frac{\alpha \eta\mu B}{\eta\mu A}$$

$$\log \alpha = 2,87668$$

$$\log \eta\mu B = 1,96578$$

$$\text{ἄθροισμα} = 2,84246$$

$$\log \eta\mu A = 1,73354$$

$$\log \beta = 3,10892$$

$$\text{καὶ } \beta = 1285,06$$

Ἐῤῥεσις τῆς πλευρᾶς γ

$$\gamma = \frac{\alpha \eta\mu \Gamma}{\eta\mu A}$$

$$\log \alpha = 2,87668$$

$$\log \eta\mu \Gamma = 1,99290$$

$$\text{ἄθροισμα} = 2,86958$$

$$\log \eta\mu A = 1,73354$$

$$\log \gamma = 3,13604$$

$$\text{καὶ } \gamma = 1367,84$$

Εύρεσις τοῦ ἔμβαδου

$$E = \frac{\alpha^2 \eta \mu B \eta \mu \Gamma}{2 \eta \mu A}$$

2λογ α	= 5,75336
λογημB	= 1,96578
λογημΓ	= 1,99290
ἄθροισμα	= 5,71204
λογ2	= 0,30103
λογημA	= 1,73354
ἄθροισμα	= 0,03457
	5,71204
	0,03457
λογ E	= 5,67747
E	= 475862,5 τ. μ.

Περίπτωσις 2α

80. Ἐκ δύο πλευρῶν α, β τοῦ τριγώνου καὶ τῆς ὑπ' αὐτῶν περιεχομένης γωνίας εὔρεϊν τὰ λοιπὰ στοιχεῖα αὐτοῦ.

Πρὸς εὔρεσιν τῶν ζητουμένων μεταχειρίζομεθα τὸν τύπον

$$\epsilon\phi \frac{A-B}{2} = \frac{\alpha-\beta}{\alpha+\beta} \cdot \sigma\phi \frac{\Gamma}{2}$$

$$\text{Ὁθεν } \log \epsilon\phi \frac{A-B}{2} = \log(\alpha-\beta) + \log \sigma\phi \frac{\Gamma}{2} - \log(\alpha+\beta).$$

Ἐκ τοῦ τύπου τούτου εὐρίσκομεν τὴν ἡμιδιαφορὰν τῶν γωνιῶν A καὶ B· παριστῶντες δὲ τὴν ἡμιδιαφορὰν ταύτην διὰ Δ θὰ ἔχωμεν

$$\frac{A-B}{2} = \Delta,$$

ἀλλὰ καὶ

$$\frac{A+B}{2} = 90^\circ - \frac{\Gamma}{2}.$$

Ὁθεν

$$A = 90^\circ - \frac{\Gamma}{2} + \Delta$$

καὶ

$$B = 90^\circ - \frac{\Gamma}{2} - \Delta$$

Μετὰ τὴν εὔρεσιν τῶν γωνιῶν A καὶ B εὐρίσκομεν καὶ τὴν πλευρὰν γ ἐκ τοῦ τύπου $\gamma = \frac{\alpha \eta \mu \Gamma}{\eta \mu A}$.

Σημείωσις. Ὑπεθέσαμεν, ὅτι αἱ διδόμεναι πλευραὶ α, β εἶναι ἄνισοι. Ἐὰν εἶναι ἴσαι τὸ πρόβλημα λύεται ἀπλοῦστατα διότι εἶναι

$$A - B = 90^\circ - \frac{\Gamma}{2} \quad \text{καὶ} \quad \gamma = 2\alpha\eta\mu\frac{\Gamma}{2}$$

Παράδειγμα. Ἔστωσαν.

δεδομένα $\alpha = 5897,2 \mu.$ ζητούμενα **A**
 $\beta = 1409,8 \mu.$ **B**
 $\Gamma = 39^\circ 15'$ **\gamma**

$$\alpha + \beta = 7307$$

$$\alpha - \beta = 4487,4$$

$$\frac{\Gamma}{2} = 19^\circ 37' 30''$$

Εὑρεσις τῶν γωνιῶν A καὶ B.

$$\epsilon\phi\frac{A-B}{2} = \frac{\alpha-\beta}{\alpha+\beta} \cdot \sigma\phi\frac{\Gamma}{2}$$

$$\log(\alpha-\beta) = 3,65200$$

$$\log\sigma\phi\frac{1}{2}\Gamma = 0,44785$$

$$\text{ἄθροισμα} = 4,09985$$

$$\log(\alpha+\beta) = 3,86374$$

$$\log\epsilon\phi\frac{A-B}{2} = 0,23611$$

$$\text{ἐξ οὗ} \frac{A-B}{2} = 59^\circ 51' 35''$$

$$\text{ἐπειδὴ δὲ} \frac{A+B}{2} = 70^\circ 22' 30'' = 90^\circ - \frac{\Gamma}{2}$$

$$\text{εὐρίσκομεν} \quad A = 130^\circ 14' 5''$$

$$B = 10^\circ 30' 55''$$

Εὑρεσις τῆς πλευρᾶς \gamma.

$$\gamma = \frac{\alpha\eta\mu\Gamma}{\eta\mu A}$$

$$\log\alpha = 3,77064$$

$$\log\eta\mu\Gamma = 1,80120$$

$$\text{ἄθροισμα} = 3,57184$$

$$\log\eta\mu A = 1,88275$$

$$\log\gamma = 3,68909$$

$$\text{καὶ} \gamma = 4887,56$$

Εὑρεσις τοῦ ἔμβαδοῦ Ε.

$$2E = \alpha\beta\eta\mu\Gamma$$

λογα	= 3,77064
λογβ	= 3,14916
λογημΓ	= 1,80120
λογ(2E)	= 6,72100
2E	= 5260120 τ. μ.
E	= 2630060 τ. μ.

Περίπτωσης 3η.

81. Ἐκ δύο πλευρῶν α καὶ β τοῦ τριγώνου καὶ τῆς γωνίας Α τῆς ἀπέναντι μιᾶς τῶν πλευρῶν τούτων (τῆς α) εὑρεῖν τὰ λοιπὰ στοιχεῖα αὐτοῦ.

Ἐκ τοῦ τύπου $\eta\mu B = \frac{\beta\eta\mu A}{\alpha}$ εὐρίσκομεν τὴν γωνίαν Β. Κατόπιν δὲ εὐρίσκομεν ὅτι $\Gamma = 180^\circ - (A + B)$, τέλος δὲ εὐρίσκομεν τὴν γ ἐκ τοῦ τύπου $\gamma = \frac{\alpha\eta\mu\Gamma}{\eta\mu A}$.

Διερεύνησις. Διὰ νὰ εἶναι τὸ πρόβλημα τοῦτο δυνατόν πρέπει τὸ $\eta\mu B$ νὰ μὴν ὑπερβαίνει τὴν μονάδα 1, ἥτοι πρέπει νὰ εἶναι $\beta\eta\mu A \leq \alpha$ (8). Ἄλλ' ὅταν συμβαίνει τοῦτο θὰ εὐρωμεν εἰς τοὺς πίνακας μίαν γωνίαν Δ μικροτέραν τῶν 90° καὶ τοιαύτην ὥστε $\eta\mu\Delta = \frac{\beta\eta\mu A}{\alpha}$. Ἄλλ' ἐπειδὴ μόνον τὸ ἡμίτονον τῆς γωνίας Β ἐδόθη πρέπει νὰ λάβωμεν ἢ $B = \Delta$ ὁπότε $\Gamma = 180^\circ - A - \Delta$
 » ἢ $B = 180^\circ - \Delta$ » $\Gamma = \Delta - A$.

Ἄλλ' ἵνα αἱ εὐρεθεῖσαι δύο τιμαὶ τῆς γωνίας Γ εἶναι παραδεκταί, πρέπει νὰ εἶναι ἀμφότεραι μικρότεροι τῶν 180° .

1) Ἄλλ' ἂν εἶναι $\beta < \alpha$, ἐπειδὴ $\eta\mu A < 1$ ἔπεται, ὅτι $\beta\eta\mu A < \alpha$. Ὡστε τὸ πρόβλημα εἶναι τότε δυνατόν. Ἄλλ' ἤδη παρατηροῦμεν, ὅτι εἰς τὴν ἰσότητά $\eta\mu\Delta = \frac{\beta}{\alpha} \cdot \eta\mu A$ τὸ $\frac{\beta}{\alpha}$ εἶναι μικρότερον τῆς μονάδος 1 (ἐπειδὴ $\beta < \alpha$). Διὰ νὰ ὑπάρχη λοιπὸν ἡ ἰσότης αὕτη πρέπει νὰ εἶναι $\eta\mu\Delta < \eta\mu A$, ἐξ οὗ ἔπεται, ὅτι $\Delta < A$. Ἄρα ἡ προηγουμένη εὐρεθεῖσα τιμὴ τῆς $\Gamma = \Delta - A$ ὡς ἀρνητικὴ δὲν εἶναι παραδεκτὴ. Ἐνῶ ἡ πρώτη τιμὴ τῆς $\Gamma = 180^\circ - A - \Delta$, ἡ

όποια αντιστοιχεί εις τὴν τιμὴν $B = \Delta$ (ὄξεϊα γωνία) εἶναι παραδεκτὴ, διότι εἶναι θετικὴ καὶ ὅταν ἡ γωνία A εἶναι ἀμβλεῖα. Διότι ἡ ἀνισότης $\beta \eta \mu A < \alpha$ δεικνύει, ὅτι ἡ ὄξεϊα γωνία $180^\circ - A$ εἶναι μεγαλύτερα τῆς Δ .

Ὡστε εἰς τὴν περίπτωσιν, καθ' ἣν $\beta < \alpha$ τὸ πρόβλημα ἔχει μίαν λύσιν.

2) Ἐὰν εἶναι $\alpha = \beta$ θὰ εἶναι καὶ $B = A$ ὥστε $\Gamma = 180^\circ - 2A$ ἡ δὲ λύσις αὕτη εἶναι παραδεκτὴ, ἔὰν ἡ δοθεῖσα γωνία A εἶναι ὄξεϊα.

3) Ἐὰν τέλος εἶναι $\beta > \alpha$ εἶναι ἀνάγκη νὰ ἀληθεύῃ ἡ ἀνισότης $\beta \eta \mu A \leq \alpha$. Ὄταν δὲ συμβαίῃ τοῦτο, παρατηροῦμεν τὰ ἑξῆς :

Εἰς τὴν ἰσότητα $\eta \mu \Delta = \frac{\beta}{\alpha} \cdot \eta \mu A$ (Δγωνία ὄξεϊα) τὸ $\frac{\beta}{\alpha}$ εἶναι μεγαλύτερον τῆς μονάδος 1. Ὡστε διὰ νὰ ἀληθεύῃ ἡ ἰσότης αὕτη πρέπει νὰ εἶναι $\eta \mu \Delta > \eta \mu A$, ἐξ οὗ ἔπεται, ὅτι πρέπει νὰ εἶναι $\Delta > A$. Ὡστε εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν ἡ δεδομένη γωνία A πρέπει νὰ εἶναι ὄξεϊα. Ἀλλὰ τότε ἀμφότεραι αἱ τιμαὶ τῆς Γ ἦτοι αἱ $\Gamma = 180^\circ - A - \Delta$ καὶ $\Gamma = \Delta - A$, αἱ ὁποῖαι ἀντιστοιχοῦν εἰς τὰς τιμὰς $B = \Delta$ καὶ $B = 180^\circ - \Delta$, εἶναι παραδεκταί, διότι εἶναι $A + \Delta < 180^\circ$ καὶ ὡς εἶδομεν $\Delta > A$. Ὡστε εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν τὸ πρόβλημα ἔχει δύο λύσεις.

Παρατήρησις. Ἐὰν εἶναι $\beta \eta \mu A = \alpha$, τότε ἡ γωνία Δ γίνεται ὀρθή· ὥστε αἱ δύο τιμαὶ τῆς B (ἐπομένως καὶ τῆς Γ) γίνονται ἴσαι.

Ὁ περιορισμὸς ὁ ἀπαιτούμενος, ἵνα τὸ πρόβλημα λυθῇ δύναται νὰ ἐρμηνευθῇ γεωμετρικῶς ὡς ἑξῆς.

Ἐστω ἡ γωνία $\Gamma A E$ (σχ. σελ. 16) ἴση τῇ δοθείσῃ A καὶ ἡ $A \Gamma$ ἴση τῇ β καὶ ἐκ τοῦ Γ κάθετος ἐπὶ τὴν $A E$ ἢ ΓK · ἐκ τοῦ ὀρθογωνίου τριγώνου $A \Gamma K$ εὐρίσκομεν

$$(\Gamma K) = (A \Gamma) \eta \mu A = \beta \eta \mu A.$$

Ὡστε ὁ ρηθεὶς περιορισμὸς εἶναι $\Gamma K \leq \alpha$ ἦτοι ἡ πλευρὰ α , ἡ εἰς τὴν δοθεῖσαν γωνίαν ὑποτείνουσα, πρέπει νὰ μὴ εἶναι μικρότερα τῆς καθέτου, ἥτις καταβιβάζεται ἐκ τοῦ πέρατος τῆς μιᾶς πλευρᾶς, ἥτις ἐλήφθη ἴση τῇ β , ἐπὶ τὴν ἄλλην πλευρὰν τῆς δοθείσης γωνίας.

Τὰ ἐξαγόμενα ταῦτα εἶναι γνῶστὰ καὶ ἐκ τῶν στοιχείων τῆς Γεωμετρίας.

Παράδειγμα 1ον. Ἐστῶσαν.

δεδομένα $\alpha = 893,8 \mu.$

ζητούμενα B

$\beta = 697,4 \mu.$

Γ

$A = 58^\circ 13' 20''$

γ

(1 λύσις ἐπειδὴ $\alpha > \beta$)

Εὗρεσις τῆς γωνίας B.

$$\eta\mu B = \frac{\beta\eta\mu A}{\alpha}$$

$$\log \beta = 2,84348$$

$$\log \eta\mu A = 1,92947$$

$$\text{ἄθροισμα} = 2,77295$$

$$\log \alpha = 2,95124$$

$$\log \eta\mu B = 1,82171$$

$$\text{καὶ } B = 41^\circ 33' 8''$$

Εὗρεσις τῆς γωνίας Γ.

$$A = 58^\circ 13' 20''$$

$$B = 41^\circ 33' 8''$$

$$\text{ὅθεν } A + B = 99^\circ 46' 28''$$

$$\Gamma = 80^\circ 13' 32''$$

Εὗρεσις τῆς πλευρᾶς γ.

$$\gamma = \frac{\alpha\eta\mu\Gamma}{\eta\mu A}$$

$$\log \alpha = 2,95124$$

$$\log \eta\mu\Gamma = 1,99365$$

$$\text{ἄθροισμα} = 2,94489$$

$$\log \eta\mu A = 1,92947$$

$$\log \gamma = 3,01542$$

$$\text{καὶ } \gamma = 1036,14 \mu.$$

Εύρεσις τοῦ ἔμβραδου E .

$$2E = \beta \gamma \mu A$$

λογβ	= 2,84348
λογγ	= 3,01542
λογημΑ	= 1,92947
λογ(2E)	= 5,78837

$$2E = 614286 \text{ τ. μ. καὶ } E = 307143 \text{ τ. μ.}$$

Παράδειγμα 2ον. Ἐστωσαν

δεδομένα	$\alpha = 1873,5 \text{ μ.}$	ζητούμενα	B
	$\beta = 2954 \text{ μ.}$		Γ
	$A = 35^\circ 12' 40''$		γ

Εύρεσις τῆς γωνίας B.

$$\eta \mu B = \frac{\beta \eta \mu A}{\alpha}$$

λογβ	= 3,47041
λογημΑ	= 1,76087
ἄθροισμα	= 3,23128
λογα	= 3,27265
λογημB	= 1,95863

ὅθεν $B = 65^\circ 23' 10''$.

Ἐπειδὴ δὲ εἶναι $\beta > \alpha$, δυνάμεθα νὰ λάβωμεν καὶ

$$B = 114^\circ 36' 50''.$$

ἦτοι τὴν παραπληρωματικὴν τῆς προηγουμένης τιμῆς. Ὡστε ἔχομεν δύο λύσεις.

1η λύσις.

$$B = 65^{\circ} 23' 10''$$

$$A = 35^{\circ} 12' 40''$$

$$A+B = 100^{\circ} 35' 50''$$

$$\delta\theta\epsilon\nu \Gamma = 79^{\circ} 24' 10''$$

Εὔρεσις τῆς πλευρᾶς γ.

$$\gamma = \frac{\alpha \eta \mu \Gamma}{\eta \mu A}$$

$$\log \alpha = 3,27265$$

$$\log \eta \mu \Gamma = \overline{1},99253$$

$$\acute{\alpha}\theta\rho\omicron\iota\sigma\mu = \overline{3},26518$$

$$\log \eta \mu A = \overline{1},76087$$

$$\log \gamma = \overline{3},50431$$

$$\kappa\alpha\iota \gamma = 3193,9$$

2α λύσις.

$$B = 114^{\circ} 36' 50''$$

$$A = 35^{\circ} 12' 40''$$

$$A+B = 149^{\circ} 49' 30''$$

$$\delta\theta\epsilon\nu \Gamma = 30^{\circ} 10' 40''$$

Εὔρεσις τῆς πλευρᾶς γ.

$$\gamma = \frac{\alpha \eta \mu \Gamma}{\eta \mu A}$$

$$\log \alpha = 3,27265$$

$$\log \eta \mu \Gamma = \overline{1},70126$$

$$\acute{\alpha}\theta\rho\omicron\iota\sigma\mu = \overline{2},97391$$

$$\log \eta \mu A = \overline{1},76087$$

$$\log \gamma = \overline{3},21304$$

$$\kappa\alpha\iota \gamma = 1633,2$$

Παράδειγμα 3ον. Ἐστῶσαν τὰ δεδομένα.

$$\alpha = 397,5 \mu. \quad \beta = 2549 \mu., \quad A = 58^{\circ} 12'.$$

Εὔρεσις τῆς γωνίας Β.

$$\log \beta = 3,40637$$

$$\log \eta \mu A = \overline{1},92936$$

$$\acute{\alpha}\theta\rho\omicron\iota\sigma\mu = \overline{3},33573$$

$$\log \alpha = 2,59934$$

$$\log \eta \mu B = \overline{0},73639.$$

Ἐπειδὴ ὁ εὔρεθεις λογάριθμος τοῦ ἡμιτόνου τῆς Β εἶναι θετικός (ὅπερ σημαίνει ὅτι ἡ παράστασις $\frac{\beta \eta \mu A}{\alpha}$, ἥτοι τὸ $\eta \mu B$, ὑπερβαίνει τὴν μονάδα), ἡ γωνία Β δὲν ὑπάρχει καὶ τὸ πρόβλημα εἶναι ἀδύνατον.

Περίπτωσις 4η.

82. *Νὰ εὔρεθῶν αἱ γωνίαι τοῦ τριγώνου ἐκ τῶν τριῶν πλευρῶν αὐτοῦ.*

Πρὸς τοῦτο μεταχειριζόμεθα τοὺς τύπους.

$$\epsilon\phi \frac{A}{2} = \sqrt{\frac{(\tau-\beta)(\tau-\gamma)}{\tau(\tau-\alpha)}}, \quad \epsilon\phi \frac{B}{2} = \sqrt{\frac{(\tau-\gamma)(\tau-\alpha)}{\tau(\tau-\beta)}}$$

$$\epsilon\phi \frac{\Gamma}{2} = \sqrt{\frac{(\tau-\alpha)(\tau-\beta)}{\tau(\tau-\gamma)}}.$$

Ἐξ αὐτῶν δὲ λαμβάνομεν τοὺς κάτωθι τύπους καιαλλήλους διὰ τὴν χρῆσιν τῶν λογαρίθμων,

$$\log \epsilon\phi \frac{A}{2} = \frac{1}{2} [\log(\tau-\beta) + \log(\tau-\gamma) - \log \tau - \log(\tau-\alpha)]$$

$$\log \epsilon\phi \frac{B}{2} = \frac{1}{2} [\log(\tau-\gamma) + \log(\tau-\alpha) - \log \tau - \log(\tau-\beta)]$$

$$\log \epsilon\phi \frac{\Gamma}{2} = \frac{1}{2} [\log(\tau-\alpha) + \log(\tau-\beta) - \log \tau - \log(\tau-\gamma)].$$

Ἦδη παρατηροῦμεν, ὅτι ἵνα τὸ πρόβλημα εἶναι δυνατόν, ἀνάγκη καὶ τὰ τρία ὑπόρριζα νὰ εἶναι θετικά· ἐπειδὴ δὲ εἶναι

$$\tau = \frac{1}{2}(\alpha + \beta + \gamma)$$

$$\tau - \alpha = \frac{1}{2}(-\alpha + \beta + \gamma)$$

$$\tau - \beta = \frac{1}{2}(\alpha - \beta + \gamma)$$

$$\tau - \gamma = \frac{1}{2}(\alpha + \beta - \gamma).$$

ἐὰν ἐκ τῶν δοθεισῶν πλευρῶν ἢ α οὐδεμιᾶς τῶν ἄλλων εἶναι μικρότερα, οἱ παράγοντες $(\tau - \beta)$, $(\tau - \gamma)$ καὶ ὁ τ θὰ εἶναι θετικοὶ καὶ τὰ ὑπόρριζα θὰ ἔχουν ἐπομένως τὸ σημεῖον τοῦ παράγοντος $\tau - \alpha$, ὅστις διὰ τοῦτο ἀνάγκη νὰ εἶναι θετικός, ἤτοι $\alpha < \beta + \gamma$. Ἐξ οὗ βλέπομεν ὅτι, ἵνα τὸ πρόβλημα λυθῇ, πρέπει οὐδεμία τῶν δοθεισῶν πλευρῶν νὰ ὑπερβαίῃ τὸ ἄθροισμα τῶν δύο ἄλλων, ὅταν δὲ συμβαίῃ τοῦτο, ἐμάθομεν ἐν τοῖς στοιχείοις τῆς Γεωμετρίας ὅτι τὸ τρίγωνον πάντοτε ὑπάρχει.

Παράδειγμα. Ἔστωσαν

δεδομένα $\alpha = 597,8 \mu.$

ζητούμενα A

$\beta = 398,1 \mu.$

B

$\gamma = 206 \mu.$

Γ

Κατὰ πρότερον εἶναι

$$\alpha + \beta + \gamma = 1201,9$$

$$\delta\theta\epsilon\nu \tau = \frac{1}{2}(\alpha + \beta + \gamma) = 600,95$$

$$\tau - \alpha = 3,15$$

$$\tau - \beta = 202,85$$

$$\tau - \gamma = 394,95$$

καί

$$\log \tau = 2,77883$$

$$\log(\tau - \alpha) = 0,49831$$

$$\log(\tau - \beta) = 2,30718$$

$$\log(\tau - \gamma) = 2,59654$$

Εὑρεσις τῆς γωνίας A.

$$\epsilon\phi \frac{A}{2} = \sqrt{\frac{(\tau - \beta)(\tau - \gamma)}{\tau(\tau - \alpha)}}$$

$$\log(\tau - \beta) = 2,30718$$

$$\log(\tau - \gamma) = 2,59654$$

$$\text{ἄθροισμα} = 4,90372$$

$$\log \tau = 2,77883$$

$$\log(\tau - \alpha) = 0,49831$$

$$\text{ἄθροισμα} = 3,27714$$

$$4,90372$$

$$3,27714$$

$$\text{διαφορὰ} = 1,62658$$

$$\log \epsilon\phi \frac{A}{2} = 0,81329$$

$$\text{καί } \frac{A}{2} = 81^\circ 15' 40'', 7 \text{ προσέγγις } \frac{3''}{4}$$

$$\text{καί } A = 162^\circ 31' 21'', 4 \text{ προσέγγις } 1'' \frac{1}{2}$$

Εὑρεσις τῆς γωνίας B.

$$\epsilon\phi \frac{B}{2} = \sqrt{\frac{(\tau - \gamma)(\tau - \alpha)}{\tau(\tau - \beta)}}$$

$$\log(\tau - \gamma) = 2,59654$$

$$\log(\tau - \alpha) = 0,49831$$

$$\text{ἄθροισμα} = 3,09485$$

$$\log \tau = 2,77883$$

$$\log(\tau - \beta) = 2,30718$$

$$\text{ἄθροισμα} = 5,08601$$

$$3,09485$$

$$5,08601$$

$$\text{διαφορὰ} = 2,00884$$

$$\log \epsilon \phi \frac{B}{2} = \overline{1,00442}$$

$$\text{καί } \frac{B}{2} = 5^{\circ} 46' 7'' \text{ προσέγγισις } \frac{1''}{2}$$

$$\text{καί } B = 11^{\circ} 32' 14'' \quad \gg \quad 1''.$$

Εὑρεσις τῆς γωνίας Γ.

$$\epsilon \phi \frac{\Gamma}{2} = \sqrt{\frac{(\tau-\alpha)(\tau-\beta)}{\tau(\tau-\gamma)}}$$

$$\log(\tau-\alpha) = 0,49831$$

$$\log \tau = 2,77883$$

$$\log(\tau-\beta) = 2,30718$$

$$\log(\tau-\gamma) = 2,59654$$

$$\text{ἄθροισμα} = 2,80549$$

$$\text{ἄθροισμα} = 5,37537$$

$$2,80549$$

$$5,37537$$

$$\text{διαφορὰ} \quad \underline{3,43012}$$

$$\log \epsilon \phi \frac{\Gamma}{2} = \overline{2,71506}$$

$$\text{καί } \frac{\Gamma}{2} = 2^{\circ} 58' 13'' \text{ προσέγγισις } \frac{1''}{3}$$

$$\text{καί } \Gamma = 5^{\circ} 56' 26'' \text{ προσέγγισις } \frac{2''}{3}.$$

Σημείωσις. Τὸ ἄθροισμα τῶν εὐρεθεισῶν τριῶν γωνιῶν εἶναι

$$A = 162^{\circ} 31' 21'', 4$$

$$B = 11^{\circ} 32' 14''$$

$$\Gamma = 5^{\circ} 56' 26''$$

$$\underline{A+B+\Gamma = 180^{\circ} 0' 1'', 4}$$

Ἄλλὰ τὸ ἄθροισμα τοῦτο, τὸ ὅποῖον διαφέρει τῶν 180° κατὰ $1'',4$ φανερώνει, ὅτι αἱ γινόμεναι πράξεις εἶναι ἀκριβεῖς. Διότι κατὰ τὴν εὑρεσιν τῆς A τὸ συμβάν λάθος ἦτο μικρότερον τοῦ $1'' \frac{1}{2}$, τὸ δὲ κατὰ τὴν εὑρεσιν τῆς B μικρότερον τοῦ $1''$, τὸ δὲ κατὰ τὴν εὑρεσιν τῆς Γ μικρότερον τοῦ $\frac{2''}{3}$. Ὡστε τὸ εἰς τὸ ἄθροισμα $A+B+\Gamma$ ὑπάρχον λάθος δὲν πρέπει νὰ ὑπερβαίῃ τὰ $3'' \frac{1}{6}$, ὅπερ ἀληθῶς συμβαίνει.

Ευρεσις τοῦ ἔμβαδοῦ E.

$$\begin{aligned}
 E &= \sqrt{\tau(\tau-\alpha)(\tau-\beta)(\tau-\gamma)} \\
 \log \tau &= 2,77883 \\
 \log(\tau-\alpha) &= 0,49831 \\
 \log(\tau-\beta) &= 2,30718 \\
 \log(\tau-\gamma) &= 2,59654 \\
 \hline
 \text{ἄθροισμα} &= 8,18086
 \end{aligned}$$

$$\log E = 4,09043 \text{ καὶ } E = 12814,8 \text{ τ. μ.}$$

83*. ***Ἄλλαι περιπτώσεις,** — Τὸ εὐθύγραμμον τρίγωνον ὀρίζεται ἔντελῶς ὄχι μόνον κατὰ τὰς περιπτώσεις τῆς § 78, ἀλλὰ καὶ ὅταν δίδονται τρία γεωμετρικὰ μεγέθη (ὄχι καὶ τὰ τρία γωνίαι) ἀνεξάρτητα, συνδεδόμενα στενῶς μὲ τὸ τρίγωνον. Π.χ. ὅταν δίδονται δύο γωνίαι αὐτοῦ καὶ ἡ ἀκτίς τοῦ εἰς αὐτὸ ἐγγεγραμμένου κύκλου, ἢ δύο γωνίαι καὶ ἡ περίμετρος κ. α. Εἰς τὰς περιπτώσεις αὐτὰς ἐκφράζομεν τὰ δεδομένα συναρτήσῃ τῶν στοιχείων τοῦ τριγώνου καὶ προχωροῦμεν εἰς τὴν λύσιν χρησιμοποιοῦντες ἐκ τῶν τύπων, τοὺς καταλλήλους.

Παράδειγμα 1ον. *Νὰ ἐπιλυθῇ τὸ τρίγωνον, οὗ γνωρίζομεν δύο γωνίας αὐτοῦ, ἔστω τὰς A καὶ B καὶ τὴν ἀκτίνα ρ τοῦ εἰς αὐτὸ ἐγγεγραμμένου κύκλου.*

Ἐν πρώτοις ἔχομεν $\Gamma = 180^\circ - (A + B)$. Κατόπιν εὐρίσκομεν ὅτι (σχῆμα σελ. 86) $\alpha = B\Delta + \Delta\Gamma = \rho \left(\sigma\phi \frac{B}{2} + \sigma\phi \frac{\Gamma}{2} \right)$ ἢ

$$\alpha = \frac{\rho \sigma\upsilon\nu \frac{A}{2}}{\eta\mu \frac{B}{2} \eta\mu \frac{\Gamma}{2}}$$

Ἐκ τοῦ τύπου τούτου εὐρίσκομεν τὴν πλευρὰν

α καὶ κατόπιν εὐρίσκομεν τὰς πλευρὰς β καὶ γ διὰ τὰς ὁποίας εἶναι

$$\beta = \frac{\alpha \eta\mu B}{\eta\mu A} = \frac{\rho \sigma\upsilon\nu \frac{A}{2} \eta\mu B}{\eta\mu A \eta\mu \frac{B}{2} \eta\mu \frac{\Gamma}{2}} \quad \text{ἤτοι}$$

$$\beta = \frac{\rho \sigma\upsilon\nu \frac{B}{2}}{\eta\mu \frac{A}{2} \eta\mu \frac{\Gamma}{2}} \quad \text{καὶ}$$

$$\gamma = \frac{\alpha \eta \mu \Gamma}{\eta \mu A} = \frac{\rho \text{ συν } \frac{A}{2} \eta \mu \Gamma}{\eta \mu A \eta \mu \frac{B}{2} \eta \mu \frac{\Gamma}{2}} \quad \text{ήτοι}$$

$$\gamma = \frac{\rho \text{ συν } \frac{\Gamma}{2}}{\eta \mu \frac{A}{2} \eta \mu \frac{B}{2}}$$

Τὸ ἔμβαδὸν εὐρίσκεται ἐκ τοῦ τύπου

$$E = \frac{1}{2} \beta \gamma \eta \mu A = \beta \gamma \eta \mu \frac{A}{2} \text{ συν } \frac{A}{2}$$

Ἐὰν δὲ εἰς τοῦτον ἀντικαταστήσωμεν τὰς πλευρὰς β καὶ γ διὰ τῶν ἄνω εὐρεθεισῶν τιμῶν, εὐρίσκομεν,

$$E = \rho^2 \cdot \sigma\phi \frac{A}{2} \cdot \sigma\phi \frac{B}{2} \cdot \sigma\phi \frac{\Gamma}{2} = \frac{\rho^2}{\epsilon\phi \frac{A}{2} \cdot \epsilon\phi \frac{B}{2} \cdot \epsilon\phi \frac{\Gamma}{2}}$$

Σημείωσις. Οἱ ἄνω εὐρεθέντες τύποι κατάλληλοι διὰ τὴν χρῆσιν τῶν λογαρίθμων λύουν τὸ πρόβλημα τοῦτο, ἐὰν $A+B < 180^\circ$. Διότι αἱ εὐρεθεῖσαι τιμαὶ τῶν πλευρῶν α, β, γ , εἶναι θετικαί. Ἐχει δὲ τοῦτο μίαν λύσιν.

Παράδειγμα 2ον. *Νὰ ἐπιλυθῇ τὸ τρίγωνον, οὗ γνωρίζομεν τὴν περίμετρον 2τ καὶ δύο γωνίας, ἔστω τὰς A καὶ B .*

Ἐν πρώτοις ἔχομεν $\Gamma = 180^\circ - (A+B)$. Κατόπιν ἐκ τῶν σχέσεων $\frac{\alpha}{\eta \mu A} = \frac{\beta}{\eta \mu B} = \frac{\gamma}{\eta \mu \Gamma}$ καὶ ἐκ τῆς γνωστῆς ιδιότητος τῶν ἴσων λόγων, λαμβάνομεν :

$$\frac{\alpha}{\eta \mu A} = \frac{\alpha + \beta + \gamma}{\eta \mu A + \eta \mu B + \eta \mu \Gamma} \quad (1)$$

Ἄλλ' $\alpha + \beta + \gamma = 2\tau$, $\eta \mu A = 2\eta \mu \frac{A}{2} \text{ συν } \frac{A}{2}$ καὶ (ἄσκ. 163) $\eta \mu A + \eta \mu B + \eta \mu \Gamma = 4 \text{ συν } \frac{A}{2} \text{ συν } \frac{B}{2} \text{ συν } \frac{\Gamma}{2}$. Ὡστε ἡ ἐξίσωσις (1) γράφεται ὡς ἑξῆς :

$$\frac{\alpha}{2\eta \mu \frac{A}{2} \text{ συν } \frac{A}{2}} = \frac{2\tau}{4 \text{ συν } \frac{A}{2} \text{ συν } \frac{B}{2} \text{ συν } \frac{\Gamma}{2}}$$

Ἐκ ταύτης δὲ εὐρίσκομεν :

$$\alpha = \frac{\tau \cdot \eta \mu \frac{A}{2}}{\text{συν } \frac{B}{2} \text{ συν } \frac{\Gamma}{2}} \quad \text{ὁμοίως δὲ εὐρίσκομεν, ὅτι}$$

$$\beta = \frac{\tau \cdot \eta \mu \frac{B}{2}}{\sigma \nu \frac{\Gamma}{2} \sigma \nu \frac{A}{2}} \quad \text{καί} \quad \gamma = \frac{\tau \cdot \eta \mu \frac{\Gamma}{2}}{\sigma \nu \frac{A}{2} \sigma \nu \frac{B}{2}}$$

Τὸ ἔμβαδὸν εὐρίσκεται ἐκ τοῦ τύπου.

$$E = \beta \gamma \eta \mu \frac{A}{2} \sigma \nu \frac{A}{2}.$$

Ἐάν δὲ εἰς τοῦτον ἀντικαταστήσωμεν τὰς πλευρὰς β καὶ γ διὰ τῶν ἄνω εὐρεθεισῶν τιμῶν, εὐρίσκομεν

$$E = \tau^2 \cdot \epsilon \phi \frac{A}{2} \cdot \epsilon \phi \frac{B}{2} \cdot \epsilon \phi \frac{\Gamma}{2}.$$

Σημείωσις. Ἐάν $A+B < 180^\circ$, τὸ πρόβλημα τοῦτο εἶναι δυνατὸν, διότι αἱ εὐρεθεῖσαι τιμαὶ τῶν α, β, γ εἶναι θετικά. Ἐχει δὲ τοῦτο μίαν λύσιν.

Παράδειγμα 3ον. *Νὰ ἐπιλυθῇ τὸ τρίγωνον, τοῦ ὁποίου γνωρίζομεν τὰ τρία ὕψη.*

Ἐστώσαν u, u', u'' , τὰ τρία ὕψη τοῦ τριγώνου ἐπὶ τὰς πλευρὰς αὐτοῦ α, β, γ ἀντιστοίχως. Ἀλλὰ τότε τὸ ἔμβαδὸν τοῦ τριγώνου εἶναι $E = \frac{1}{2} \alpha u = \frac{1}{2} \beta u' = \frac{1}{2} \gamma u''$. Ὡστε εἶναι

$$\alpha u = \beta u' = \gamma u'' \quad \text{ἢ} \quad \frac{\alpha}{u} = \frac{\beta}{u'} = \frac{\gamma}{u''}.$$

Αἱ σχέσεις δὲ αὗται φανερόν, ὅτι αἱ πλευραὶ α, β, γ εἶναι ἀνάλογοι πρὸς τὰ ἀντίστροφα τῶν ἀντιστοίχων ὕψων. Ἐπειδὴ δὲ εἶναι αὗται ἀνάλογοι καὶ πρὸς τὰ $\eta \mu A, \eta \mu B, \eta \mu \Gamma$ ἔπεται ὅτι

$$\frac{\eta \mu A}{u} = \frac{\eta \mu B}{u'} = \frac{\eta \mu \Gamma}{u''}.$$

Αἱ τελευταῖαι δὲ αὗται σχέσεις δεικνύουν, ὅτι αἱ A, B, Γ εἶναι αἱ γωνίαι τριγώνου, τοῦ ὁποίου αἱ πλευραὶ εἶναι $\frac{1}{u}, \frac{1}{u'}, \frac{1}{u''}$.

Εὐρίσκονται ἐπομένως αὗται κατὰ τὴν τετάρτην περίπτωσιν (§ 82), ὅποτε, ἐάν θέσωμεν $\frac{1}{u} = \mu, \frac{1}{u'} = \nu, \frac{1}{u''} = \sigma, \mu + \nu + \sigma = 2\lambda$ καὶ παραστήσωμεν διὰ ρ' τὴν ἀκτῖνα τοῦ εἰς τὸ τρίγωνον τοῦτο ἐγγεγραμμένου κύκλου, θὰ ἔχωμεν τοὺς τύπους

$$\rho' = \sqrt{\frac{(\lambda - \mu)(\lambda - \nu)(\lambda - \sigma)}{\lambda}} \quad \text{και}$$

$$\epsilon\phi \frac{A}{2} = \frac{\rho'}{\lambda - \mu}, \quad \epsilon\phi \frac{B}{2} = \frac{\rho'}{\lambda - \nu}, \quad \epsilon\phi \frac{\Gamma}{2} = \frac{\rho'}{\lambda - \sigma} \quad (\S 77, 13, 14).$$

Ἐφοῦ δὲ εὐρωμεν διὰ τῶν τύπων τούτων τὰς γωνίας, εὐκόλως εὐρίσκομεν δι' αὐτῶν καὶ τῶν γνωστῶν ὕψων τὰς πλευρὰς α, β, γ . Ἄλλ' αὐταὶ εὐρίσκονται καὶ ὡς ἐξῆς. Γνωρίζομεν ὅτι τὸ ἔμβασδὸν τοῦ τριγώνου, οὗ πλευραὶ εἶναι α, μ, ν, σ εἶναι $E = \frac{1}{2} \mu \eta \mu \Gamma = \lambda \rho'$. Ὡστε εἶναι $\mu \nu \cdot \eta \mu \Gamma = 2 \lambda \rho'$. Ἐξ ἄλλου ἔχομεν ἐκ τοῦ πρώτου τριγώνου $\nu = \beta \eta \mu \Gamma$ καὶ ἐπειδὴ ἐτέθη $\frac{1}{\nu} = \mu, \frac{1}{\mu} = \beta \eta \mu \Gamma$. ἄρα εἶναι $\beta = \frac{1}{\mu \eta \mu \Gamma} = \frac{\nu}{2 \lambda \rho'}$. Ὁμοίως εὐρίσκομεν, ὅτι $\alpha = \frac{\mu}{2 \lambda \rho'}$ καὶ $\gamma = \frac{\sigma}{2 \lambda \rho'}$.

Διὰ νὰ λυθῇ τὸ πρόβλημα τοῦτο πρέπει καὶ ἀρκεῖ διὰ τῶν πλευρῶν μ, ν, σ νὰ κατασκευάζεται τρίγωνον. Ἐπομένως πρέπει καὶ ἀρκεῖ, ἵνα ἡ μεγαλύτερα τῶν πλευρῶν τούτων εἶναι μικροτέρα τοῦ ἀθροίσματος τῶν δύο ἄλλων ἤτοι, τὸ ἀντίστροφον τοῦ μικροτέρου ὕψους νὰ εἶναι μικρότερον τοῦ ἀθροίσματος τῶν ἀντιστρόφων τῶν δύο ἄλλων ὕψων.

Ἀσκήσεις.

306) Τριγώνου $AB\Gamma$ δίδονται $\alpha = 145 \mu$. $B = 74^\circ 40'$ καὶ $\Gamma = 38^\circ 25'$. Νὰ εὐρεθοῦν τὰ λοιπὰ στοιχεῖα αὐτοῦ.

307) Τριγώνου $AB\Gamma$ δίδονται $B = 76^\circ 43'$, $\Gamma = 85^\circ 20'$ καὶ $\alpha = 475,65 \mu$. Νὰ ἐπιλυθῇ τὸ τρίγωνον.

308) Τρίγωνόν τι ἔχει μίαν πλευρὰν ἴσην μὲ $12,5 \mu$. αὐτὴ δὲ δύο προσκείμεναι γωνίαι εἶναι 18° ἢ μία καὶ $98^\circ 12'$ ἢ ἄλλη. Νὰ εὐρεθοῦν τὰ λοιπὰ στοιχεῖα αὐτοῦ.

309) Τριγώνου τινὸς μία γωνία εἶναι 45° , αὐτὴ δὲ περιέχουσαι αὐτὴν πλευραὶ εἶναι ἢ μία 104μ . καὶ ἢ ἄλλη 892μ . Νὰ εὐρεθοῦν τὰ λοιπὰ στοιχεῖα αὐτοῦ.

310) Τριγώνου τινὸς μία γωνία εἶναι 128° , ἐκ δὲ τῶν πλευρῶν, αἵτινες περιέχουν αὐτὴν, ἢ μία εἶναι διπλασία τῆς ἄλλης. Νὰ εὐρεθοῦν αἱ δύο ἄλλαι γωνίαι τοῦ τριγώνου.

311) Έάν $\alpha=242,5$ μ., $\beta=143,3$ μ. καί $\Gamma=54^\circ 36'$, νά ἐπιλυθῆ τὸ τρίγωνον.

312) Έάν $\beta=130$ μ. $\gamma=63$ μ. καί $B=42^\circ 15' 30''$ νά ἐπιλυθῆ τὸ τρίγωνον.

313) Έάν $\alpha=5374,5$ μ., $\gamma=1586$ μ. καί $B=15^\circ 11'$, νά εὐρεθοῦν αἱ ἄλλαι γωνίαι τοῦ τριγώνου.

314) Τριγώνου τινὸς δίδονται αἱ δύο πλευραὶ $\alpha=1542,7$ μ., $\beta=894,3$ μ. καί ἡ γωνία ἡ ἀπέναντι μιᾶς ἐξ αὐτῶν $A=118^\circ 42'$, Νά εὐρεθοῦν τὰ λοιπὰ στοιχεῖα αὐτοῦ.

315) Τριγώνου τινὸς δίδονται αἱ δύο πλευραὶ $\alpha=16$ μ. καί $\beta=25$ μ. καί ἡ γωνία $A=33^\circ 15'$. Νά εὐρεθοῦν αἱ λοιπαὶ γωνίαι αὐτοῦ.

316) Τριγώνου τινὸς δίδονται αἱ δύο πλευραὶ $\alpha=45$ μ., $\beta=78$ μ. καί $\eta\mu A=\frac{2}{3}$. Νά ἐπιλυθῆ τὸ τρίγωνον.

317) Τριγώνου τινὸς αἱ τρεῖς πλευραὶ εἶναι 56 μ., 65 μ. καί 33 μ. Νά εὐρεθῆ ἡ μικροτέρα γωνία αὐτοῦ.

318) Τριγώνου τινὸς αἱ τρεῖς πλευραὶ εἶναι 15 μ. 12 μ. καί 20 μ. Νά εὐρεθοῦν αἱ γωνίαι αὐτοῦ καί αἱ ἀκτίνες τοῦ ἐγγεγραμμένου καὶ περιγεγραμμένου κύκλου.

319) Αἱ τρεῖς πλευραὶ τοῦ τριγώνου εἶναι 8 μ., 9 μ., $\sqrt{217}$ μ. Νά εὐρεθῆ ἡ μεγαλυτέρα γωνία τοῦ τριγώνου.

320) Τριγώνου τινὸς αἱ τρεῖς πλευραὶ εἶναι $\alpha=1,723$ μ., $\beta=0,985$ μ., $\gamma=816$ μ. Νά εὐρεθοῦν αἱ γωνίαι αὐτοῦ.

321) Αἱ γωνίαι τριγώνου τινὸς εἶναι ἀνάλογοι τῶν ἀριθμῶν 9, 13, 14, ἡ δὲ πλευρά, ἡ ἀπέναντι τῆς μεγαλυτέρας γωνίας εἶναι 150 μ. Νά εὐρεθοῦν αἱ ἄλλαι πλευραὶ.

322) Νά εὐρεθῆ τὸ ἔμβασδὸν τριγώνου τοῦ ὁποῦ αἱ πλευραὶ εἶναι 287 μ., 816 μ. καί 865 μ.

323) Τετραπλεύρου τινὸς αἱ διαγώνιοι εἶναι ἡ μία 840 μ., ἡ δὲ ἄλλη 895 μ., ἡ δὲ ἑτέρα τῶν ὑπ' αὐτῶν περιεχομένων γωνιῶν εἶναι 87° . Νά εὐρεθῆ τὸ ἔμβασδὸν τοῦ τετραπλεύρου τούτου.

324) Τριγώνου τινὸς τὸ ἔμβασδὸν εἶναι 15489 τ.μ. ἡ δὲ περίμετρος 18455 μ. Νά εὐρεθῆ ἡ ἀκτίς τοῦ ἐγγεγραμμένου εἰς αὐτὸ κύκλου.

325) Ἡ βᾶσις τριγώνου εἶναι 20 μ., ἡ περίμετρος αὐτοῦ

42 μ. και η γωνία η απέναντι της βάσεως $126^{\circ} 52'$. Να εύρεθούν αι άλλαι πλευραι του τριγώνου.

326) Έκ τών δύο γωνιών ενός τριγώνου, έξ δων η μία είναι $35^{\circ} 17' 15''$ και η άλλη $62^{\circ} 43' 30''$ και εκ της περιμέτρου αυτού της με 240 μ. να εύρεθούν αι πλευραι και το έμβασδόν.

327) Δίδονται τριγώνου τινός το έμβασδόν E, μία τών γωνιών A και η έτέρα τών περιεχουσών αυτήν πλευρών, η β. Να εύρεθούν τα λοιπα στοιχεια του τριγώνου.

328) Η περίμετρος τριγώνου είναι 20 μ., το έμβασδόν αυτού $10\sqrt{3}$ τ.μ. και μία τών γωνιών 60° . Να εύρεθούν τα μήκη τών πλευρών αυτού.

329) Τριγώνου τινός μία πλευρά α είναι τα $\frac{2}{3}$ μιας άλλης β και η τρίτη γ είναι τα $\frac{5}{6}$ της αυτής πλευράς β. Να εύρεθούν αι γωνιαι αυτού.

330) Τετραπλεύρου τινός είναι γνωσται αι τέσσαρες πλευραι και μία γωνία. Να εύρεθούν αι λοιπαι γωνιαι αυτού και το έμβασδόν του.

331) Τριγώνου ABΓ είναι $A=53^{\circ} 30'$ και $B=98^{\circ} 40'$, η δε ακτις του περι εγγραμμένου κύκλου 43,75 μ. Να έπιλυθῃ το τρίγωνον.

332) Τριγώνου ABΓ η περίμετρος είναι 286 μ., η ακτις του περιεγγραμμένου κύκλου είναι 82 μ., η δε γωνία $A=52^{\circ} 12'$. Να έπιλυθῃ το τρίγωνον.

333) Η ακτις του περι το τρίγωνον ABΓ περιεγγραμμένου κύκλου είναι 10,15 μ., η μία πλευρά αυτού είναι 15,23 μ., και μία τών εις ταύτην προσκειμένων γωνιών 47° . Να έπιλυθῃ το τρίγωνον.

334) Τετραπλεύρου έγγεγραμμένου εις κύκλον είναι γνωσται αι τέσσαρες πλευραι. Να εύρεθούν αι γωνιαι αυτού και το έμβασδόν.

335) Να εύρεθῃ το έμβασδόν τετραπλεύρου, το όποιον δύναται να έγγραφῃ εις κύκλον και ού αι πλευραι είναι 3, 5, 7, 12 μ.

336) Κανονικοῦ δεκαγώνου η πλευρά είναι 2 μ. Εύρειν το έμβασδόν αυτού.

337) Ἐάν $υ$ εἶναι τὸ ὕψος τριγώνου $ΑΒΓ$ ὡς πρὸς τὴν πλευρὰν $α$, ν' ἀποδειχθῆ, ὅτι $υ = \frac{αημΒημΓ}{ημΑ}$.

338) Ἐάν $δ$ εἶναι ἡ διχοτόμος τῆς γωνίας $Α$ τριγώνου $ΑΒΓ$, ν' ἀποδειχθῆ, ὅτι $δ = \frac{2βγ}{β+γ} \cdot \text{συν} \frac{Α}{2} = \frac{αημΒημΓ}{ημ \frac{Α}{2} (ημΒ+ημΓ)}$.

339) Ἐάν $μ$ εἶναι ἡ διάμεσος τριγώνου $ΑΒΓ$ ἡ ἀγομένη ἐκ τῆς κορυφῆς $Α$, ν' ἀποδειχθῆ, ὅτι

$$μ = \frac{1}{2} \sqrt{2β^2 + 2γ^2 - α^2} = \frac{1}{2} \sqrt{β^2 + γ^2 + 2βγ \text{συν} Α}$$

340) Ἐάν $ρ$ εἶναι ἡ ἀκτίς τοῦ εἰς τρίγωνον $ΑΒΓ$, ἐγγεγραμμένου κύκλου, ν' ἀποδειχθῆ ὅτι $ρ = α \cdot \frac{ημ \frac{Β}{2} \cdot ημ \frac{Γ}{2}}{\text{συν} \frac{Α}{2}}$.

341) Νὰ ἐπιλυθῆ τὸ τρίγωνον $ΑΒΓ$, οἷ γνωρίζομεν δύο γωνίας $Α = 64^\circ 45' 28''$ καὶ $Β = 42^\circ 25' 17''$ καὶ τὴν ἀκτίνα $ρ = 2028,2$ μ. τοῦ εἰς αὐτὸ ἐγγεγραμμένου κύκλου.

342) Νὰ ἐπιλυθῆ τὸ τρίγωνον $ΑΒΓ$, οἷ γνωρίζομεν τὴν πλευρὰν $α$, τὴν γωνίαν $Α$ καὶ τὸ ἄθροισμα $β+γ$ τῶν δύο ἄλλων πλευρῶν.

343) Νὰ ἐπιλυθῆ τὸ τρίγωνον $ΑΒΓ$, οἷ γνωρίζομεν τὴν πλευρὰν $α$, τὴν γωνίαν $Α$ καὶ τὴν διαφορὰν τῶν δύο ἄλλων πλευρῶν $β-γ$.

344) Νὰ ἐπιλυθῆ τὸ τρίγωνον, οἷ τὰ τρία ὕψη εἶναι 4 μ., 5 μ., 6 μ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IV

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

345) Δύο δυνάμεις, 50 καὶ 60 χιλιογράμμων ἐνεργοῦσαι ἐπὶ σώματος ἔχουν τὸ αὐτὸ σημεῖον ἐφαρμογῆς καὶ σχηματίζουν γωνίαν 35° . Νὰ εὑρεθῆ ἡ συνισταμένη αὐτῶν.

346) Δύο δυνάμεις ἐκ τῶν ὁποίων ἡ μία εἶναι διπλασιασμένη ἄλλης, ἔχουν τὸ αὐτὸ σημεῖον ἐφαρμογῆς, ἡ δὲ συνισταμένη αὐτῶν εἶναι 5 χιλιογράμμων. Νὰ εὑρεθῆ ἡ γωνία τῶν δύο δυνάμεων.

347) Ἡ συνισταμένη δύο δυνάμεων εἶναι 100 χιλιογράμμων, αἱ δὲ γωνίαι, τὰς ὁποίας σχηματίζουν αὐταὶ μετὰ τῆς συνισταμένης, εἶναι 30° καὶ 45° . Νὰ εὑρεθοῦν αἱ δύο συνιστώσαι αὐτῆς.

348) Δοθεῖσα δύναμις νὰ ἀναλυθῆ εἰς δύο ἴσας δυνάμεις, αἱ ὁποῖαι νὰ σχηματίζουν γωνίαν ἴσην μὲ δοθεῖσαν ω .

349) Νὰ εὑρεθῆ ἡ ταχύτης σημείου κειμένου ἐπὶ τοῦ παραλλήλου τοῦ διερχομένου διὰ τῶν Ἀθηνῶν, τὴν ὁποίαν ἔχει τοῦτο συνεπεῖρα τῆς περιστροφῆς τῆς γῆς περὶ τὸν ἄξονά της (ἄκτις τῆς γῆς = 6366 χιλιόμετρα, πλάτος τῶν Ἀθηνῶν $37^\circ 58' 20''$ Β).

350) Οἱ βραχίονες AB καὶ AG μοχλοῦ ὁμοιογενοῦς σχηματίζουν ὀρθὴν γωνίαν. Νὰ εὑρεθῆ ἡ θέσις ἰσορροπίας αὐτοῦ, ὅταν ἐξαρτᾶται ἐκ τοῦ A καὶ ὅταν $(AB) = 0,3 \mu.$ καὶ $(AG) = 0,2 \mu.$

351) Φωτεινὴ ἀκτὶς προσπίπτουσα ἐπὶ ὑάλου μὲ παραλλήλους ἔδρας ὑπὸ γωνίαν 45° , ἐξέρχεται αὐτῆς παραλλήλως πρὸς τὴν ἀκτῖνα τῆς προσπτώσεως. Ἐὰν τὸ πάχος τῆς ὑάλου εἶναι $0,03 \mu.$ νὰ εὑρεθῆ ἡ ἀπόστασις μετὰξὺ τῆς προσπιπτούσης καὶ τῆς ἐξερχομένης ἀκτῖνος (ὁ δείκτης διαθλάσεως ἀέρος-ὑάλου εἶναι $\frac{3}{2}$).


352) Αἱ ἀποστάσεις μετὰξὺ τριῶν σημείων A, B, Γ εἶναι $(AB) = 1 \mu., (BG) = 10 \mu., (GA) = 18 \mu.$ Ἐν δὲ κάτοπτρον τίθεται εἰς τὸ σημεῖον B οὕτως, ὥστε μία φωτεινὴ ἀκτὶς προσπίπτουσα ἐπὶ τοῦ κατόπτρου κατὰ τὴν διεύθυνσιν AB ἀνακλᾶται κατὰ τὴν διεύθυνσιν ΒΓ. Νὰ εὑρεθῆ ἡ γωνία, τὴν ὁποίαν σχηματίζει ἡ AB μετὰ τοῦ κατόπτρου.

353) AB εἶναι τὸ ὕψος πύργου καὶ ΒΓΔΕ εἶναι εὐθεῖα γραμμὴ κειμένη ἐπὶ ὀριζοντίου ἐδάφους. Τὸ ὕψος τοῦ πύργου φαίνεται ἀπὸ τοῦ σημείου E ὑπὸ γωνίαν ϕ , ἀπὸ τοῦ Δ ὑπὸ γωνίαν 2ϕ καὶ ἀπὸ τοῦ Γ ὑπὸ γωνίαν 3ϕ . Ἐὰν δὲ εἶναι $(ED) = 25$ μέτρα καὶ $(\Delta\Gamma) = 10$ μέτρα, νὰ εὑρεθῆ τὸ ὕψος τοῦ πύργου καὶ ἡ ἀπόστασις ΒΓ.

354) *Εὔρεῖν τὴν ἀπόστασιν σημείου προσιτοῦ ἀπὸ τίνος, ἀπροσίτου, ἀλλ' ὄρατοῦ.*

Ἔστω Γ τὸ ἀπρόσιτον σημεῖον καὶ A τὸ προσίτον, τὸ


ὅποιον κείται μετὰ τοῦ Γ ἐπὶ ὀριζοντίου εὐθείας. Ἐάν λάβω-
μεν ἄλλο προσιτὸν σημεῖον Β, κείμε-
νον μετὰ τῶν Α καὶ Γ ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ
ὀριζοντίου ἐπιπέδου, σχηματίζεται τὸ
τρίγωνον ΑΒΓ. Τοῦ τριγώνου αὐτοῦ
μετροῦμεν μετὰ τῆς μεγαλυτέρας ἀκρι-
βείας τὴν πλευρὰν ΑΒ καὶ διὰ γωνιο-
μετρικοῦ ὄργανου τὰς γωνίας ΓΑΒ καὶ
ΓΒΑ. Ἐχοντες λοιπὸν τοῦ τριγώνου
αὐτοῦ μίαν πλευρὰν γ καὶ τὰς προσ-
κειμέναις γωνίας Α καὶ Β, δυνάμεθα νὰ
εὕρωμεν καὶ τὰ ἄλλα στοιχεῖα αὐτοῦ.



Διὰ τὴν ΑΓ ἔχομεν τὸν τύπον $ΑΓ = ΑΒ \frac{\eta \mu Β}{\eta \mu (Α + Β)}$. Ἐφαρμογή
ὅταν $(ΑΒ) = 400 \mu$, γων. $ΓΑΒ = 60^\circ$ καὶ γωνία $ΓΒΑ = 45^\circ$.

355) *Εὕρεῖν τὴν ἀπόστασιν δύο σημείων Γ καὶ Δ ἀπροσί-
των, ἀλλ' ὄρατων.*

Λαμβάνομεν δύο σημεῖα Α καὶ Β προσιτὰ καὶ κείμενα
μετὰ τῶν Γ καὶ Δ ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ
ὀριζοντίου ἐπιπέδου καὶ κατόπιν
μετροῦμεν μετὰ τῆς μεγαλυτέρας
ἀκριβείας τὴν ἀπόστασιν ΑΒ καὶ
τὰς γωνίας ΔΒΑ, ΓΒΑ, ΓΑΒ καὶ
ΔΑΒ. Ἐχοντες τότε ἐκάστου τῶν
τριγώνων ΔΑΒ καὶ ΓΑΒ μίαν πλευ-
ρὰν ΑΒ καὶ τὰς προσκειμέναις πρὸς
αὐτὴν γωνίας, δυνάμεθα νὰ εὕρω-
μεν τὰς πλευρὰς ΑΔ καὶ ΑΓ· ἐκ
τούτων δὲ καὶ ἐκ τῆς γωνίας ΓΑΔ
ὀρίζεται τὸ τρίγωνον ΑΓΔ ἐντε-
λῶς καὶ εὐρίσκεται ἡ ζητούμενη




ἀπόστασις ΓΔ. Ἐφαρμογή, ὅταν $(ΑΒ) = 1000 \mu$, $ΓΑΒ = 75^\circ$,
 $ΓΒΑ = 30^\circ$, $ΔΒΑ = 60^\circ$ καὶ $ΔΑΒ = 45^\circ$.

Σημείωσις. Ἐάν τὰ τέσσαρα σημεῖα Α, Β, Γ, Δ δὲν κείνται
ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ ἐπιπέδου πρέπει νὰ μετρηθῇ καὶ ἡ γωνία ΓΑΔ,
ἡ ὁποία πλέον δὲν εἶναι ἴση μὲ τὴν διαφορὰν τῶν γωνιῶν
ΓΑΒ καὶ ΔΑΒ.

356) *Εύρειν τὸ ὕψος βουνοῦ, ἥτοι τὴν ἀπόστασιν τῆς κορυφῆς αὐτοῦ Κ ἀπὸ τοῦ ὀριζοντίου ἐπιπέδου, ἐπὶ τοῦ ὁποίου ἰστάμεθα.*

Ἐπὶ τοῦ ὀριζοντίου ἐδάφους, ἐφ' οὗ ἰστάμεθα, καὶ ἐξ οὗ φαίνεται ἡ κορυφή τοῦ βουνοῦ, μετροῦμεν τὴν εὐθεῖαν ΑΒ



κειμένην μετὰ τοῦ Κ ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ κατακορύφου ἐπιπέδου, καὶ τὰς γωνίας ΚΑΒ καὶ ΚΒΑ· εὐρίσκομεν δὲ ἐξ αὐτῶν τὴν ἀπόστασιν ΑΚ. Ἐάν ἤδη νοήσωμεν τὴν κατά-


κόρυφον ἐκ τοῦ Κ, αὕτη θὰ συναντήσῃ τὴν προέκτασιν τῆς ΑΒ εἰς τι σημεῖον, ἔστω τὸ Π. Τοῦ ὀρθογωνίου λοιπὸν τριγώνου ΑΚΠ γνωρίζομεν τὴν ὑποτείνουσιν ΑΚ καὶ τὴν ὀξείαν γωνίαν Α· ὥστε δυνάμεθα νὰ εὕρωμεν τὴν πλευρὰν ΚΠ, ἥτις εἶναι τὸ ὕψος τοῦ βουνοῦ ὑπεράνω τοῦ ὀριζοντίου ἐπιπέδου ἐφ' οὗ ἰστάμεθα.

Ἐφαρμογή, ὅταν $(ΑΒ)=100$ μ. $ΚΑΒ=30^\circ$ καὶ $ΚΒΑ=120^\circ$.

Παρατήρησις. Ἐάν ἡ ΑΒ δὲν κεῖται μετὰ τοῦ Κ ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ κατακορύφου ἐπιπέδου τότε μετροῦμεν τὰς γωνίας ΚΑΒ(= χ), ΚΒΑ(= ψ) καὶ ΚΑΠ(= ω) καὶ εὐρίσκομεν. ὅτι


$$ΚΠ=ΑΒ \cdot \frac{\eta\mu\omega \cdot \eta\mu\psi}{\eta\mu(\chi+\psi)}$$

357) *Ἐπὶ ἐδάφους ἐπιπέδου εὐρεῖν τὴν προεκβολὴν εὐθείας πέραν ἀντικειμένου, ὅπερ ἐμποδίζει νὰ βλέπωμεν τὴν συνέχειαν τῆς εὐθείας.*



Ἐστω ΑΒ ἡ εὐθεῖα, τῆς ὁποίας, πρέπει νὰ εὐρεθῇ ἡ προεκβολὴ ὀπισθεν τοῦ ἐμποδίου Ε. Μετροῦμεν τὸ μῆκος ΑΒ, ἔπειτα ἐκλέγομεν ὡς σταθμὸν σημεῖον τι Μ, ἐξ οὗ φαίνεται ἡ εὐθεῖα ΑΒ καὶ ὁ ὀπισθεν τοῦ ἐμποδίου τόπος, εἰς τὸν ὁποῖον θὰ εὐρίσκηται ἡ προεκβολὴ τῆς εὐθείας. Μετὰ ταῦτα μετροῦμεν τὰς γωνίας

Α και Β τοῦ τριγώνου ΑΒΜ καὶ ἐκ τούτων καὶ ἐκ τῆς ΑΒ προσδιορίζομεν τὴν πλευρὰν ΑΜ. Σύρομεν ἔπειτα ἐπὶ τοῦ ἐδάφους γραμμὴν ἐκ τοῦ Μ πρὸς τὸ μέρος τῆς προεκβολῆς, ἔστω τὴν ΗΜ καὶ μετροῦμεν τὴν γωνίαν αὐτῆς πρὸς τὴν ΜΑ, ἦτοι τὴν ΗΜΑ. Ἐὰν τότε νοήσωμεν τὴν τομὴν Γ τῆς προεκβολῆς καὶ τῆς γραμμῆς ΜΗ, ἔχομεν τοῦ τριγώνου ΓΑΜ μίαν πλευρὰν ΑΜ καὶ τὰς προσκειμένας πρὸς αὐτὴν γωνίας· ὥστε δυνάμεθα νὰ εὕρωμεν τὸ μῆκος ΜΓ, ἐξ



οὗ καὶ τὸ σημεῖον Γ προσδιορίζεται· τέλος ἐκ τοῦ Γ σύρομεν ἐπὶ τοῦ ἐδάφους τὴν γραμμὴν ΓΔ, ἣτις σχηματίζει μετὰ τῆς ΓΜ γωνίαν ἴσην μετὰ τὴν τοῦ τριγώνου ΑΓΜ καὶ ἔχομεν τὴν προεκβολὴν τῆς ΑΕ.

358) Ἐκ τῶν ἄκρων μιᾶς βάσεως τὸ ὕψος ἑνὸς πύργου φαίνεται ὑπὸ τὴν αὐτὴν γωνίαν ω , ἐκ δὲ τοῦ μέσου αὐτῆς φαίνεται ὑπὸ γωνίαν ϕ . Ν' ἀποδειχθῆ ὅτι, ἐὰν 2α εἶναι τὸ μῆκος τῆς βάσεως, τὸ ὕψος τοῦ πύργου εἶναι


$$\frac{\alpha \eta \mu \phi \cdot \eta \mu \omega}{\sqrt{\eta \mu(\phi + \omega) \eta \mu(\phi - \omega)}}$$

359) Εἷς παρατηρητὴς ἐπὶ ἀεροστάτου βλέπει ἐπὶ τοῦ ἐδάφους ἕνα στόχον πρὸς νότον ὑπὸ γωνίαν 33° , διὰ δὲ τὸ ἀερόστατον ἐκινήθη πρὸς ἀνατολὰς κατὰ 5 χιλιόμετρα εἶδεν ἐκ τοῦ αὐτοῦ ὕψους τὸν αὐτὸν στόχον ὑπὸ γωνίαν 21° . Νὰ εὐρεθῆ τὸ ὕψος τοῦ ἀεροστάτου.

360) Ἐν πλοῖον διευθυνόμενον πρὸς βορρᾶν βλέπει πρὸς δυσμὰς δύο φάρους ἐπὶ τῆς αὐτῆς εὐθείας. Ἀλλὰ μετὰ μίαν ὥραν ἐκ τῶν φάρων τούτων ὁ μὲν φαίνεται ΝΔ ὁ δὲ ΝΝΔ. Νὰ εὐρεθῆ ἡ ταχύτης τοῦ πλοίου, γνωστοῦ ὄντος, διὲν ἡ ἀπόστασις τῶν δύο φάρων εἶναι 10 χιλιόμετρα.

361) Νὰ εὐρεθῆ τὸ μῆκος μιᾶς λεωφόρου, ἣς τὸ πλάτος εἶναι γνωστὸν καὶ ἡ γωνία, ὑπὸ τὴν ὁποίαν φαίνεται τὸ πέρασ αὐτῆς ἐκ τῆς ἀρχῆς.

Ἐάν AB εἶναι ἡ ἀρχὴ καὶ ΓΔ τὸ πέρασ τῆς λεωφόρου καὶ Ο τὸ μέσον τῆς AB, ἔχομεν γνωστὰ τὴν ΓΔ(=AB) καὶ τὴν γωνίαν ΔΟΓ· ἐάν δὲ ἀχθῆ καὶ ὁ ἄξων ΟΗ τῆς ὁδοῦ, ἔχομεν ἐκ τοῦ ὀρθογωνίου τριγώνου ΟΔΗ.




$$(OH) = (\Delta H) \sigma\phi \frac{1}{2} (\Delta O\Gamma).$$

Ἐφαρμογή, ὅταν (ΓΔ) = 30 μ., ΔΟΓ = 20°.

362) Ἐκ τῆς ἀποστάσεως δοθέντος σημείου

ἀπὸ σφαίρας καὶ ἐκ τῆς γωνίας, ὑπὸ τὴν ὁποίαν φαίνεται ἡ σφαῖρα ἀπὸ τοῦ σημείου, εὐρεῖν τὴν ἀκτῖνα τῆς σφαίρας.

Ἐάν διὰ τοῦ κέντρου τῆς σφαίρας καὶ διὰ τοῦ σημείου Α νοήσωμεν τυχὸν ἐπίπεδον, τοῦτο τέμνει τὴν σφαῖραν κατὰ μέγιστον αὐτῆς κύκλον, ἔστω τὸν ΜΣΝΡ. Ἐάν δὲ ἐκ τοῦ κύκλου τούτου ἀχθοῦν ἐφαπτόμεναι ἐκ τοῦ Α, αἱ ΑΜ καὶ ΑΝ καὶ αἱ ἀκτῖνες ΚΝ καὶ ΚΜ, γίνονται ὀρθογώνιον τρίγωνον τὸ ΚΜΑ, οὗτινος ἔχομεν τὴν ὑποτείνουσαν ΑΚ καὶ τὴν γωνίαν ΚΑΜ, ἣτις εἶναι τὸ ἥμισυ τῆς δοθείσης ΜΑΝ(=ω), ὑπὸ τὴν ὁποίαν φαίνεται ἡ σφαῖρα ἐκ τοῦ Α.



Ἐκ τοῦ ὀρθογωνίου τούτου τριγώνου εὐρίσκομεν νῦν

$$(KM) = (AK) \eta\mu \left(\frac{1}{2} \omega \right).$$

Σημείωσις. Ἐκ τῆς ἰσότητος ταύτης εὐρίσκομεν τὸν ἀντίστοιχον καὶ τὴν ἀπόστασιν ΑΚ τῆς σφαίρας ἀπὸ τοῦ δοθέντος σημείου, ὅταν ἔχωμεν τὴν διάμετρον τῆς σφαίρας καὶ τὴν γωνίαν ω, ὑπὸ τὴν ὁποίαν φαίνεται ἐκ τοῦ σημείου Α.

Ἐφαρμογή, ὅταν (ΑΚ) = 10 μ. ΚΑΜ = 15°

363) Δύο τόποι τῆς γῆς βορείου πλάτους 52° ἔχουν γεωγραφικὰ μῆκη διαφέροντα κατὰ 30°. Νὰ εὐρεθῆ ἡ ἀπόστασις αὐτῶν.

364) Γνωστού ὄντος τοῦ ὕψους φάρου ὑπὲρ τὴν ἐπιφάνειαν τῆς θαλάσσης, εὑρεῖν ἐπ' αὐτῆς τὴν μεγίστην ἀπόστασιν, ἀπὸ τῆς ὁποίας φαίνεται τὸ φῶς αὐτοῦ.

Γνωστόν, ὅτι ἡ ἐπιφάνεια τῆς θαλάσσης ἀποτελεῖ σφαῖραν, τῆς ὁποίας ὁ μέγιστος κύκλος ἔχει περιφέρειαν 40000000 μέτρων, ἐπομένως ἀκτίνα ἔχει ἴσην τῷ $\frac{40000000}{2\pi}$, ἧτοι 6366198 μέτρα περίπου, τὴν ἀκτίνα δὲ αὐτὴν παριστῶμεν διὰ ρ .

Ἐστω K τὸ κέντρον τῆς σφαίρας ταύτης καὶ Φ τὸ φῶς καὶ ΦA ($=u$) τὸ ὕψος αὐτοῦ εἰς μέτρα ὑπὲρ τὴν ἐπιφάνειαν τῆς σφαίρας. Ἐάν διὰ τῆς ἀκτίνος KA νοηθῇ τυχὸν ἐπίπεδον, θὰ τέμνῃ τὴν σφαῖραν κατὰ μέγιστον κύκλον, ἔστω τὸν ABM : καὶ ἂν ἀχθῇ ἐκ τοῦ Φ ἐφαπτομένη τοῦ κύκλου τούτου ἢ $B\Phi$ καὶ περιστραφῇ ἔπειτα ὁ μέγιστος κύκλος περὶ τὴν $K\Phi$, φανερόν εἶναι, ὅτι ἡ ὑπὸ τοῦ τόξου AB γραφομένη ζώνη περιέχει πάντα τὰ σημεῖα τῆς ἐπιφανείας τῆς σφαίρας, ἀφ' ὧν τὸ φῶς φαίνεται· ὥστε ἡ μεγίστη ἀπόστασις ἀπὸ τῆς ὁποίας φαίνεται τὸ φῶς ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας, εἶναι ἡ AB .

Πρὸς εὑρεσιν τοῦ τόξου AB , ἀρκεῖ νὰ εὑρεθῇ ἡ κεντρικὴ γωνία ω , διότι εἶναι

$$\frac{\text{τοξ. } AB}{40000000} = \frac{\omega}{360} \quad (1)$$

Ἄλλ' ἐκ τοῦ ὀρθογωνίου τριγώνου ΦKB εὐρίσκομεν $(KB) = (K\Phi) \cdot \text{συν}\omega$.

Ὅθεν
$$\text{συν}\omega = \frac{(KB)}{(K\Phi)} = \frac{\rho}{\rho + u}$$

Ἐκ τῆς ἰσότητος ταύτης ἔπεται

$$\text{συν}\left[\frac{1}{2}\omega\right] = \sqrt{\frac{2\rho + u}{2\rho + 2u}}$$

$$\eta\mu\left[\frac{1}{2}\omega\right] = \sqrt{\frac{u}{2\rho + 2u}}$$

$$\epsilon\phi\left[\frac{1}{2}\omega\right] = \sqrt{\frac{u}{2\rho + u}}$$

Διά τοῦ τύπου τούτου εὐρίσκομεν τὴν γωνίαν $\frac{1}{2} \omega$, ὅθεν καὶ τὴν ω ταύτης δὲ εὐρεθείσης, εὐρίσκομεν καὶ τὸ τόξον AB ἐκ τῆς ἰσότητος (ι).

Ἐπειδὴ τὸ ὕψος ν εἶναι συνήθως ἐλάχιστον πρὸς τὴν ἀκτίνα ρ , δυνάμεθα νὰ εὐρωμεν τὸ τόξον AB εὐκολώτερον ὡς ἑξῆς:

Τὸ τόξον AB περιλαμβάνεται μεταξὺ τῆς ἐφαπτομένης ΦΒ καὶ τῆς χορδῆς αὐτοῦ AB· ἐπομένως διαφέρει ἀπὸ τῆς ἐφαπτομένης ΦΒ ὀλιγώτερον ἢ ὅσον διαφέρει ἡ χορδὴ, ἤτοι ὀλιγώτερον ἢ $\Phi B - AB$, ἢ καὶ ὀλιγώτερον τοῦ ὕψους ν (διότι ἐν τῷ τριγώνῳ ΦAB ἡ μία πλευρὰ ΑΦ ὑπερβαίνει τὴν διαφορὰν τῶν ἄλλων).

Ἄλλ' ἐκ τοῦ ὀρθογωνίου τριγώνου ΚΒΦ εὐρίσκομεν τὴν ἐφαπτομένην ΦΒ.

$$(B\Phi) = \sqrt{(K\Phi)^2 - (KB)^2} = \sqrt{(\rho + \nu)^2 - \rho^2} = \sqrt{2\rho\nu + \nu^2}.$$

ὥστε εἶναι (τοξAB) = $\sqrt{2\rho\nu + \nu^2} - \mu\nu$, ἔνθα $0 < \mu < 1$.

Ἄλλ' εἶναι καὶ $\sqrt{2\rho\nu + \mu'\nu} = \sqrt{2\rho\nu + \nu^2}$ ἔνθα $0 < \mu' < 1$.

$$\text{Ὅθεν (τοξ. AB)} = \sqrt{2\rho\nu} + (\mu' - \mu)\nu$$

Ἐπομένως, ἐὰν θέσωμεν (τοξAB) = $\sqrt{2\rho\nu}$, κάμνομεν λάθος μικρότερον τοῦ ὕψους ν .

Ἐκ τούτου βλέπομεν, ὅτι ἡ *μεγίστη ἀπόστασις, ἀπὸ τῆς ὁποίας φαίνεται τὸ φῶς ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας τῆς θαλάσσης, εἶναι περίπου ἀνάλογος τῆς τετραγωνικῆς ρίζης τοῦ ὕψους αὐτοῦ ὑπὲρ τὴν ἐπιφάνειαν τῆς θαλάσσης.*

Διὰ $\nu = 1$ μέτρον, εὐρίσκομεν (τοξ. AB) = 3568 μ . περίπου.


Σημείωσις. Ἐν τῇ λύσει τοῦ προβλήματος τούτου δὲν ἐλήφθη ὑπ' ὄψιν ἡ διάθλασις τοῦ φωτός ἐν τῷ ἀέρι.

365) *Γνωστοῦ ὄντος, ὅτι ἡ γῆ εἶναι σφαῖρα, τῆς ὁποίας ὁ μέγιστος κύκλος ἔχει περιφέρειαν 40000000 μέτρα, εὐρεῖν τὸ μῆκος τοῦ τόξου μιᾶς μοίρας καὶ τὸ μῆκος τῆς χορδῆς αὐτοῦ καὶ τῆς ἐφαπτομένης εἰς τὸ μέσον αὐτοῦ.*

Ἐστω AB ἡ χορδὴ καὶ ΣT ἡ ἐφαπτομένη τοῦ εἰρημένου τόξου. Ἐκ τοῦ ὀρθογωνίου τριγώνου MOI ἔχομεν ἐν πρώτοις

$$(MT) = \rho \cdot \epsilon\phi 30' = \frac{40000000}{2\pi} \epsilon\phi 30'$$

λογ 40000000	= 7,6020599 (')
λογ 2π	= 0,7981798
λογ ρ	= 6,8038801
λογ εφ30'	= 3,9408584
λογ (MT)	= 4,7447385
ὄθεν MT	= 55556,96
καὶ ΣΤ	= 111113,92 μ.



Ἐκ τοῦ ὀρθογωνίου τριγώνου IOB εὐρίσκομεν
 $(IB) = \rho \eta\mu 30'$

λογ ρ	= 6,8038801
λογ ημ30'	= 3,9408419
λογ (IB)	= 4,7447220
ὄθεν (IB)	= 55554,85 μ.
καὶ (AB)	= 111109,70 μ.

Τὸ τόξον AB τῆς μιᾶς μοίρας εἶναι $\frac{40000000}{360} = 111111,11$.

Ἐντεῦθεν, ἔπεται (τοξ AB)—(AB)=1,41
καὶ (ΣΤ)—(τοξ AB)=2,81.

Ὅστε τὸ τόξον τῆς μιᾶς μοίρας τῆς μὲν χορδῆς αὐτοῦ ὑπερέχει κατὰ 1 μέτρον καὶ $\frac{41}{100}$ τοῦ μέτρου περίπου, τῆς δὲ ἐφαπτομένης αὐτοῦ εἶναι μικρότερον κατὰ 2,81 περίπου μέτρα.


366) *Εὐρεῖν τὴν ἀκτῖνα τοῦ παραλλήλου κύκλου τῆς γήινης σφαίρας, οὕτινος τὸ γεωγραφικὸν πλάτος εἶναι γνωστὸν.*

(Εὐρεῖν τοῦ αὐτοῦ κύκλου τὸ μῆκος τοῦ τόξου μιᾶς μοίρας).

Ἐὰν διὰ τοῦ ἄξονος τῆς γῆς ΠΠ' νοήσωμεν ἐπίπεδον, τοῦτο θὰ τέμνη τὴν Γῆν μὲν κατὰ μέγιστον κύκλον αὐτῆς, τὸ δὲ ἐπίπεδον τοῦ ἰσημερινοῦ κατὰ τὴν εὐθείαν Π', τὸ δὲ ἐπί-

1) Ἐν τῷ προβλήματι τούτῳ ἔγινε χρῆσις τῶν ἐπταψηφίων λογαριθμῶν τοῦ Caset διὰ τὴν μεγαλύτεραν ἀκρίβειαν αὐτῶν.

πεδον τοῦ παραλλήλου κατὰ τὴν εὐθεϊαν MM' παράλληλον τῇ $Π'$, θὰ εἶναι δὲ ἡ γωνία MOI ἴση τῷ δοθέντι πλάτει ϕ καὶ ἡ ζητούμενη ἀκτίς τοῦ παραλλήλου κύκλου εἶναι ἡ $MK = \alpha$.



Ἐὰν δὲ ἀχθῇ ἡ ἀκτίς OM , γίνεται ὀρθογώνιον τρίγωνον OKM , ἐξ οὗ εὐρίσκομεν $(KM) = \alpha = \rho \cdot \text{συν}\phi$. Ἡ περιφέρεια τοῦ κύκλου τούτου εἶναι $2\pi \cdot \rho \cdot \text{συν}\phi$ καὶ τὸ τόξον μιᾶς μοίρας τοῦ παραλλήλου τούτου ἔχει μῆκος

$$\frac{2\pi\rho}{360} \text{συν}\phi, \text{ ἢτοι } \frac{40000000}{360} \text{συν}\phi \text{ ἢ } 111111,11 \text{συν}\phi$$

Ὡς παράδειγμα ἔστω $\phi = 38^\circ$.

Διὰ τὴν ἀκτίνα α ἔχομεν $\alpha = \rho \cdot \text{συν}38^\circ$


$$\begin{aligned} \log\rho &= 6,80388 \text{ (ἴδε προηγ. πρόβλημα)} \\ \log\text{συν}38^\circ &= 1,89653 \\ \log\alpha &= 6,70041 \\ \text{καὶ } \alpha &= 5016625 \text{ μέτρα.} \end{aligned}$$

Διὰ τὸ μῆκος τοῦ τόξου 1° ἔχομεν

$$\begin{aligned} \text{μῆκος τόξου } 1^\circ &= \frac{40000000}{360} \text{συν}\phi \\ \log 40000000 &= 7,60206 \\ \log 360 &= 2,55630 \\ \text{διαφορὰ} &= 5,04576 \\ \log\text{συν}38^\circ &= 1,89653 \\ \text{ἄθροισμα} &= 4,94229 \\ \text{καὶ τόξον } 1^\circ &= 87556 \text{ μέτρα} \end{aligned}$$

367) Ὁρθογωνίου παραλληλεπιπέδου, οὕτινος εἶναι γνωσταὶ αἱ τρεῖς ἀκμαὶ AP , AS , AB εὐρεῖν τὴν διαγώνιον AB καὶ τὰς γωνίας αὐτῆς πρὸς τὰς ἀκμάς.

Ἐὰν νοήσωμεν τὴν διαγώνιον AD τῆς ἔδρας $APDR$, εὐρίσκομεν ἐκ τοῦ ὀρθογωνίου τριγώνου ADP (διότι ἡ ἔδρα εἶναι ὀρθογώνιον) $(AD)^2 = (AP)^2 + (PD)^2 = (AP)^2 + (AR)^2$. Ἄλλὰ καὶ τὸ τρίγωνον



ΒΑΔ είναι ὀρθογώνιον, διότι ἡ ΒΔ εἶναι κάθετος ἐπὶ τὴν ἔδραν ΑΠΔΡ· ὥστε ἡ γωνία ΒΔΑ εἶναι ὀρθή, ἐπομένως

$$\text{εἶναι} \quad (ΑΒ)^2 = (ΒΔ)^2 + (ΑΔ)^2 = (ΑΣ)^2 + (ΑΔ)^2$$

$$\text{ὅθεν} \quad (ΑΒ)^2 = (ΑΠ)^2 + (ΑΡ)^2 + (ΑΣ)^2$$

$$\text{ἐξ οὗ} \quad (ΑΒ) = \sqrt{(ΑΠ)^2 + (ΑΡ)^2 + (ΑΣ)^2}$$

Ἐκ τοῦ αὐτοῦ τριγώνου ΑΒΔ εὐρίσκομεν

$$(ΒΔ) = (ΑΒ) \text{συν}(ΑΒΔ)$$

καὶ ἐπειδὴ $(ΒΔ) = (ΑΣ)$ καὶ $\text{γων.} ΑΒΔ = \text{γων.} ΒΑΣ$,

$$\text{ἔχομεν} \quad (ΑΣ) = (ΑΒ) \text{συν}(ΒΑΣ)$$

$$\text{ὅθεν} \quad \text{συν}(ΒΑΣ) = \frac{ΑΣ}{ΑΒ}$$

Ἐκ τοῦ τύπου τούτου εὐρίσκεται ἡ γωνία τῆς διαγωνίου ΑΒ πρὸς τὴν ἀκμὴν ΑΣ.

Ὁμοίως εὐρίσκομεν

$$\text{συν}(ΒΑΠ) = \frac{ΑΠ}{ΑΒ} \quad \text{καὶ} \quad \text{συν}(ΒΑΡ) = \frac{ΑΡ}{ΑΒ}$$

Ἐστω π.χ.

$$(ΑΠ) = 3 \quad (ΑΡ) = 1 \quad (ΑΣ) = 2$$

$$\text{τότε εἶναι} \quad (ΑΒ) = \sqrt{3^2 + 1^2 + 2^2} = \sqrt{14}$$

Ἐξ οὗ (Dupuis σελ. 147) $ΑΒ = 3,74165$.

Εὐρεσις τῆς γωνίας ΒΑΠ.

$$\text{συν}(ΒΑΠ) = \frac{ΑΠ}{ΑΒ} = \frac{3}{\sqrt{14}}$$

$$\log 3 = 0,47712$$

$$\log 14 = 1,14613$$

$$\frac{1}{2} \log 14 = 0,57306$$

$$\log \text{συν}(ΒΑΠ) = 1,90406$$

$$\text{καὶ} \quad ΒΑΠ = 36^\circ 41' 54''$$

Εὐρεσις τῆς γωνίας ΒΑΡ.

$$\text{συν}(ΒΑΡ) = \frac{ΑΡ}{ΑΒ} = \frac{1}{\sqrt{14}}$$

$$\log 1 = 0$$

$$\frac{1}{2} \log 14 = 0,57306$$

$$\log \text{συν}(ΒΑΡ) = 1,42694$$

$$\text{καὶ} \quad ΒΑΡ = 74^\circ 29' 55''$$

Εύρεσις τῆς γωνίας ΒΑΣ.

$$\text{συν}(ΒΑΣ) = \frac{ΑΣ}{ΑΒ} = \frac{2}{\sqrt{14}}$$

$$\log 2 = 0,30103$$

$$\frac{1}{2} \log 14 = 0,57306$$

$$\log \text{συν}(ΒΑΣ) = \overline{1,72797}$$

$$\text{καὶ } ΒΑΣ = 57^{\circ}41'18''.$$

368) Ἐὰν α, β, γ εἶναι αἱ τρεῖς διαστάσεις ὀρθογωνίου παραλληλεπιπέδου καὶ ω ἡ κλίσις τῆς διαγωνίου αὐτοῦ πρὸς τὴν ἔδραν, ἡ ὁποία ἔχει διαστάσεις β, γ , ν' ἀποδειχθῆ, ὅτι


$$\eta\mu\omega = \frac{\alpha}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2}}$$

369) Κανονικὴ πυραμὶς μὲ βάσιν τετράγωνον ἔχει ὕψος u καὶ πλευρὰν τῆς βάσεως αὐτῆς α . Ἐὰν δὲ ω εἶναι ἡ γωνία μιᾶς παραπλευροῦ ἔδρας καὶ τῆς βάσεως καὶ ϕ ἡ γωνία δύο παραπλευρῶν ἐδρῶν αὐτῆς, ν' ἀποδειχθῆ ὅτι

$$\epsilon\phi\omega = \frac{2u}{\alpha} \quad \text{καὶ} \quad \epsilon\phi\frac{\phi}{2} = \sqrt{1 + \frac{\alpha^2}{2u^2}}$$

370) Οἰκοπέδον ἐπὶ τῆς πλευρᾶς λόφου κείμενον ἔχει ὀρθογώνιον σχῆμα μὲ βάσιν ὀριζοντίαν. Ἡ βάση τοῦ ὀρθογωνίου εἶναι β μέτρα, τὸ δὲ ὕψος v , ἡ δὲ κλίσις τοῦ ἐδάφους πρὸς τὸν ὀρίζοντα εἶναι ϕ μοιρῶν. Ζητεῖται πόσων τετραγωνικῶν μέτρων θὰ εἶναι τὸ ὀριζόντιον ἔδαφος αὐτοῦ.

Ἐὰν ἐκ τῆς ὀριζοντίας βάσεως $ΑΒ$ νοήσωμεν ὀριζόντιον



ἐπίπεδον καὶ καταβιβάσωμεν ἐπ' αὐτοῦ τὰς καθέτους $ΓΕ$ καὶ $ΔΖ$ ἀπὸ τῶν κορυφῶν τοῦ ὀρθογωνίου, φανερόν εἶναι, ὅτι τὸ ὀριζόντιον ἔδαφος τοῦ οἰκοπέδου εἶναι ὀρθογώνιον $ΑΒΕΖ$, ἥτοι ἡ προβολὴ αὐτοῦ ἐπὶ τὸ ὀριζόντιον ἐπίπεδον, τὸ δὲ ἐμβαδὸν


τῆς προβολῆς ταύτης εἶναι ἴσον τῷ $(ΑΒ) \cdot (ΑΕ)$ ἥτοι $\beta \cdot (ΑΕ)$. ἄλλ' ἐκ τοῦ ὀρθογωνίου τριγώνου $ΑΕΓ$ ἔχομεν

$$(ΑΕ) = (ΑΓ) \text{συν}\phi = u \text{συν}\phi$$

(διότι ἡ γωνία $ΓΑΕ$ ἰσοῦται τῇ γωνίᾳ τῶν δύο ἐπιπέδων $ΑΒΓΔ$ καὶ $ΑΒΕΖ$, ἥτοι τῇ ϕ).

Ἐντεῦθεν ἔπεται, ὅτι τὸ ἔμβαδὸν τοῦ ὀρθογωνίου $ABEZ$ εἶναι β.υ.συνφ. ἤτοι ἡ προβολὴ τοῦ ὀρθογωνίου $AB\Gamma\Delta$ ἐπὶ τὸ ὀριζόντιον ἐπίπεδον ἰσοῦται τῷ ὀρθογωνίῳ τούτῳ πολλαπλασιασθέντι ἐπὶ τὸ συνημίτονον τῆς γωνίας αὐτοῦ πρὸς τὸν ὀριζόντα.

Σημείωσις. Μὲ προβολὰς ἐπιπέδων σχημάτων καὶ κυρίως τριγώνων ἐπὶ ὀριζοντίου ἐπιπέδου ἐργαζόμεθα, ὅταν θέλωμεν νὰ ἀπεικονίσωμεν ἐπὶ χάρτου, ὑπὸ δεδομένην κλίμακα, ἔκτασιν τινα τῆς Γῆς, μὲ τὰς σπουδαιότερας ἀνωμαλίας τῆς φυσικῆς ἢ τεχνικῆς. Πρὸς τοῦτο ἐκλέγομεν ἐπὶ τοῦ ἐδάφους ἐπαρκῆ ἀριθμὸν σημείων A, B, Γ, Δ, E κλπ. καὶ διὰ τῶν εὐθειῶν, διὰ τῶν ὁποίων ὑποτίθεται, ὅτι συνδέονται, διαιρεῖται τὸ ἔδαφος εἰς τρίγωνα $AB\Gamma, B\Gamma\Delta, \Delta\Gamma E$ κλπ. τοιαῦτα, ὥστε ἐξ ἑκάστης κορυφῆς ἑκάστου τριγώνου νὰ φαίνονται αἱ δύο ἄλλαι κορυφαὶ καὶ ἐξ οἰουδήποτε σημείου ἐντὸς ἑκάστου τριγώνου νὰ φαίνονται αἱ τρεῖς κορυφαὶ αὐτοῦ. Διὰ νὰ προσδιορίσωμεν τὰ στοιχεῖα ἑκάστου τῶν τριγώνων τούτων, (ὁ προσδιορισμὸς δὲ οὗτος λέγεται **τριγωνισμὸς**) ἐκλέγομεν ἐπὶ




ἐδάφους, ὅσον τὸ δυνατόν ὀριζοντίου, μίαν βάσιν AB , τὴν ὁποίαν μετροῦμεν μετ' ἀκριβείας. Ἐπειτα μετροῦμεν καὶ τὰς γωνίας τῶν διαφόρων τριγώνων π.χ. τὰς $\Gamma AB, \Gamma BA, E\Gamma A, E\Gamma B$ κλπ.

Κατόπιν τούτων ἐπιλύοντες πρῶτον τὸ τρίγωνον $AB\Gamma$ εὐρίσκομεν τὰς πλευρὰς $A\Gamma$ καὶ ΓB . Ἐπειτα δὲ ἐπιλύοντες τὰ τρίγωνα $A\Gamma E$ καὶ $B\Gamma\Delta$, εὐρίσκομεν τὰς πλευρὰς $A E, E\Gamma, \Gamma\Delta$ καὶ $B\Delta$. Προχωροῦντες δὲ οὕτω, προσδιορίζομεν τὰ στοιχεῖα ὅλων τῶν τριγώνων. Πρὸς ἐπαλήθευσιν δὲ τῆς ἐκτελεσθείσης ἐργασίας μετροῦμεν ἐπὶ τοῦ ἐδάφους μίαν πλευρὰν π.χ. τὴν $H\Theta$ καὶ συγκρίνομεν τὸ οὕτως εὑρεθὲν μῆκος αὐτῆς μὲ τὸ εὑρεθὲν διὰ τοῦ λογισμοῦ. Ἄλλ' ὥς γίνεται ἐν τῇ

πράξει ὁ τριγωνισμός, μετροῦμεν ὄχι τὰς πλευρὰς AB καὶ $H\Theta$ π. χ. ἀλλὰ τὰς προβολὰς τῶν ἐπὶ τοῦ ὀριζοντίου ἐπιπέδου. Ὡστε ἐν τῇ πραγματικότητι ἐπιλύομεν τὰς ὀριζοντίας προβολὰς τῶν τριγώνων $AB\Gamma$, $A\Gamma E$ κλπ.

371) Δύο τροχοὶ τῶν ὁποίων οἱ ἄξονες εἶναι παράλληλοι πρόκειται νὰ περιβληθοῦν δι' ἱμάντος, ὥστε ἡ κίνησις τοῦ ἐνὸς νὰ μεταδίδεται καὶ εἰς τὸν ἄλλον. Ζητεῖται τὸ μῆκος τοῦ καταλλήλου πρὸς τοῦτο ἱμάντος· εἶναι δὲ γνωσταὶ αἱ ἀκτῖνες τῶν δύο τροχῶν ρ καὶ ρ' καὶ ἡ ἀπόστασις τῶν ἀξόνων αὐτῶν a .

Νοήσωμεν ἐπίπεδον κάθετον ἐπὶ τοὺς ἄξονας τῶν τροχῶν· τοῦτο θὰ τέμνη αὐτοὺς κατὰ δύο κύκλους $A\Gamma E$ καὶ $BZ\Delta$,



τῶν ὁποίων εἶναι γνωσταὶ αἱ ἀκτῖνες καὶ ἡ ἀπόστασις τῶν κέντρων· τὸν δὲ ἱμάντα θὰ τέμνη κατὰ γραμμῆν, ἣτις ἀποτελεῖται ἐκ τῶν δύο κοινῶν ἐφαπτομένων

AB , $\Gamma\Delta$ τῶν κύκλων καὶ ἐκ τῶν τόξων $A\Gamma E$ καὶ $BZ\Delta$ (διότι ὁ ἱμὰς εἶναι τεταμένος, ὥστε εἰς τὰ μέρη ἔνθα χωρίζεται ὑφ' ἑκατέρου τῶν τροχῶν, ἐφάπτεται αὐτοῦ). Πρόκειται λοιπὸν νὰ εὑρεθῇ τὸ μῆκος τοῦ $\xi.A\Gamma E + \xi.BZ\Delta + AB + \Gamma\Delta$.

Ἐκ τῶν κέντρων K καὶ K' ἄς ἀχθοῦν αἱ ἀκτῖνες KA , $K\Gamma$ καὶ $K'B$, $K'\Delta$ καὶ ἐκ τοῦ K' κέντρου τοῦ μικροτέρου κύκλου, ἡ $K'M$ παράλληλος τῇ BA καὶ ἡ $K'N$ τῇ $\Delta\Gamma$. Ἐπειδὴ τὸ σχῆμα $ABMK'$ εἶναι ὀρθογώνιον (ὡς ἔχον ὀρθὰς τὰς γωνίας αὐτοῦ) εἶναι $AM = K'B = \rho'$ ὥστε $KM = \rho - \rho'$ καὶ ἐκ τοῦ ὀρθογωνίου τριγώνου $K'KM$ εὐρίσκομεν

$$\text{συν}\omega = \frac{\rho - \rho'}{a}$$

ἐξ οὗ εὐρίσκεται ἡ γωνία ω .

Τῆς γωνίας ω εὐρεθείσης, εὐρίσκομεν τὸ τόξον $A\Gamma E$ ἐκ τῆς ἰσότητος.

$$\frac{2\pi\rho}{360} = \frac{\text{τοξ.ΑΕΓ}}{360-2\omega}$$

διότι τὰ τόξα παντός κύκλου εἶναι ἀνάλογα τῶν ἐπικέντρων γωνιῶν καὶ εἰς τὸ τόξον ΑΕΓ ἀντιστοιχεῖ ἡ ἐπικέντρος γωνία $360^\circ - 2\omega$.

Ἐκ τῆς ἰσότητος ταύτης εὐρίσκομεν

$$(\text{τοξ.ΑΕΓ}) = \frac{180-\omega}{90} \cdot \pi\rho.$$

Ὁμοίως εὐρίσκομεν (διότι ἡ γωνία ΒΚ'Δ εἶναι ἴση τῇ ΑΚΓ)

$$(\text{τοξ.ΒΖΔ}) = \frac{\omega}{90} \cdot \pi\rho'.$$

Ἀλλὰ καὶ ἐκ τοῦ αὐτοῦ ὀρθογωνίου τριγώνου ΜΚΚ' εὐρίσκομεν

$$(Κ'Μ) = \sqrt{\alpha^2 - (\rho - \rho')^2}$$

εἶναι δὲ

$$Κ'Μ = ΑΒ = ΓΔ.$$

Ὡστε τὸ ζητούμενον μῆκος εἶναι

$$2\sqrt{\alpha^2 - (\rho - \rho')^2} + \frac{180-\omega}{90} \cdot \pi\rho + \frac{\omega}{90} \cdot \pi\rho'.$$

Ἐστω ὡς παράδειγμα:

$$\rho = 0,5 \text{ μέτρα} \quad \rho' = 0,2 \text{ μέτρα} \quad \alpha = 8 \text{ μέτρα.}$$

Ἐχομεν ἐν πρώτοις

$$\text{συν}\omega = \frac{3}{80}$$

$$\text{λογ}3 = 0,47712$$

$$\text{λογ}80 = 1,90309$$

$$\text{λογ}\text{συν}\omega = 2,57403$$

καὶ

$$\omega = 87^\circ 51'$$

$$\text{καὶ } 180^\circ - \omega = 92^\circ 9'$$

$$(\text{τοξ.ΑΕΓ}) = \frac{92 + \frac{9}{60}}{90} \cdot \pi \cdot 0,5 = 1,608$$

$$(\text{τοξ.ΒΖΔ}) = \frac{87 + \frac{51}{60}}{90} \cdot \pi \cdot 0,2 = 0,613$$

$$\sqrt{8^2 - \left(\frac{3}{10}\right)^2} = \frac{1}{10} \sqrt{6400 - 9} = \frac{1}{10} \sqrt{6391} = 7,994.$$

Ὡστε τὸ ζητούμενον μῆκος τοῦ ἱμάντος θὰ εἶναι

$$1,608 = (\text{τοξ. ΑΕΓ})$$

$$0,613 = (\text{τοξ. ΒΖΔ})$$

$$15,988 = (\text{ΑΒ}) + (\text{ΓΔ})$$

$$\text{Τό δλον } 18,209$$

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΤΗΣ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑΣ

Α) Θεμελιώδεις σχέσεις μεταξύ τῶν τριγωνομετρικῶν ἀριθμῶν παντός τόξου.

$$\eta\mu^2\alpha + \sigma\upsilon\nu^2\alpha = 1 \qquad \epsilon\phi\alpha\sigma\phi\alpha = 1$$

$$\epsilon\phi\alpha = \frac{\eta\mu\alpha}{\sigma\upsilon\nu\alpha} \qquad \sigma\phi\alpha = \frac{\sigma\upsilon\nu\alpha}{\eta\mu\alpha}$$

Β) Εὑρεσις ἐκ δοθέντος τριγωνομετρικοῦ ἀριθμοῦ τόξου τῶν τριῶν ἄλλων.

1) Ἐκ τοῦ $\eta\mu\alpha$

$$\sigma\upsilon\nu\alpha = \pm\sqrt{1-\eta\mu^2\alpha}, \quad \epsilon\phi\alpha = \pm\frac{\eta\mu\alpha}{\sqrt{1-\eta\mu^2\alpha}}, \quad \sigma\phi\alpha = \pm\frac{\sqrt{1-\eta\mu^2\alpha}}{\eta\mu\alpha}$$

2) Ἐκ τοῦ $\sigma\upsilon\nu\alpha$

$$\eta\mu\alpha = \pm\sqrt{1-\sigma\upsilon\nu^2\alpha}, \quad \epsilon\phi\alpha = \pm\frac{\sqrt{1-\sigma\upsilon\nu^2\alpha}}{\sigma\upsilon\nu\alpha}, \quad \sigma\phi\alpha = \pm\frac{\sigma\upsilon\nu\alpha}{\sqrt{1-\sigma\upsilon\nu^2\alpha}}$$

3) Ἐκ τῆς $\epsilon\phi\alpha$

$$\eta\mu\alpha = \pm\frac{\epsilon\phi\alpha}{\sqrt{1+\epsilon\phi^2\alpha}}, \quad \sigma\upsilon\nu\alpha = \pm\frac{1}{\sqrt{1+\epsilon\phi^2\alpha}}, \quad \sigma\phi\alpha = \frac{1}{\epsilon\phi\alpha}$$

4) Ἐκ τῆς $\sigma\phi\alpha$

$$\eta\mu\alpha = \pm\frac{1}{\sqrt{1+\sigma\phi^2\alpha}}, \quad \sigma\upsilon\nu\alpha = \pm\frac{\sigma\phi\alpha}{\sqrt{1+\sigma\phi^2\alpha}}, \quad \epsilon\phi\alpha = \frac{1}{\sigma\phi\alpha}$$

Γ) Τριγωνομετρικοὶ ἀριθμοὶ ἀθροίσματος ἢ διαφορᾶς δύο τόξων.

$$\eta\mu(\alpha+\beta) = \eta\mu\alpha\sigma\upsilon\nu\beta + \eta\mu\beta\sigma\upsilon\nu\alpha$$

$$\eta\mu(\alpha-\beta) = \eta\mu\alpha\sigma\upsilon\nu\beta - \eta\mu\beta\sigma\upsilon\nu\alpha$$

$$\sigma\upsilon\nu(\alpha+\beta) = \sigma\upsilon\nu\alpha\sigma\upsilon\nu\beta - \eta\mu\alpha\eta\mu\beta$$

$$\sigma\upsilon\nu(\alpha-\beta) = \sigma\upsilon\nu\alpha\sigma\upsilon\nu\beta + \eta\mu\alpha\eta\mu\beta$$

$$\epsilon\phi(\alpha+\beta) = \frac{\epsilon\phi\alpha + \epsilon\phi\beta}{1 - \epsilon\phi\alpha\epsilon\phi\beta} \qquad \epsilon\phi(\alpha-\beta) = \frac{\epsilon\phi\alpha - \epsilon\phi\beta}{1 + \epsilon\phi\alpha\epsilon\phi\beta}$$

$$\sigma\phi(\alpha+\beta) = \frac{\sigma\phi\alpha\sigma\phi\beta - 1}{\sigma\phi\alpha + \sigma\phi\beta} \qquad \sigma\phi(\alpha-\beta) = \frac{\sigma\phi\alpha\sigma\phi\beta + 1}{\sigma\phi\beta - \sigma\phi\alpha}$$

Δ) Τριγωνομετρικοὶ ἀριθμοὶ τοῦ τόξου 2α ἐκ τῶν τοῦ α .

$$\eta\mu 2\alpha = 2\eta\mu\alpha\sigma\upsilon\nu\alpha \qquad \sigma\upsilon\nu 2\alpha = \sigma\upsilon\nu^2\alpha - \eta\mu^2\alpha$$

$$\epsilon\phi 2\alpha = \frac{2\epsilon\phi\alpha}{1 - \epsilon\phi^2\alpha} \qquad \sigma\phi 2\alpha = \frac{\sigma\phi^2\alpha - 1}{2\sigma\phi\alpha}$$

Ε) Τριγωνομετρικοί αριθμοί του τόξου $\frac{\alpha}{2}$ έκ του $\sigma\upsilon\alpha$.

$$\eta\mu\frac{\alpha}{2} = \pm\sqrt{\frac{1-\sigma\upsilon\alpha}{2}} \quad \sigma\upsilon\upsilon\frac{\alpha}{2} = \pm\sqrt{\frac{1+\sigma\upsilon\alpha}{2}}$$

$$\epsilon\phi\frac{\alpha}{2} = \pm\sqrt{\frac{1-\sigma\upsilon\alpha}{1+\sigma\upsilon\alpha}} \quad \sigma\phi\frac{\alpha}{2} = \pm\sqrt{\frac{1+\sigma\upsilon\alpha}{1-\sigma\upsilon\alpha}}$$

ΣΤ) Τριγωνομετρικοί αριθμοί του τόξου α έκ της $\epsilon\phi\frac{\alpha}{2}$.

$$\eta\mu\alpha = \frac{2\epsilon\phi\frac{\alpha}{2}}{1+\epsilon\phi^2\frac{\alpha}{2}} \quad \sigma\upsilon\alpha = \frac{1-\epsilon\phi^2\frac{\alpha}{2}}{1+\epsilon\phi^2\frac{\alpha}{2}} \quad \epsilon\phi\alpha = \frac{2\epsilon\phi\frac{\alpha}{2}}{1-\epsilon\phi^2\frac{\alpha}{2}}$$

Ζ) Μετασχηματισμοί άθροισμάτων και διαφορών τριγωνομετρικών αριθμών εις γινόμενα και αντίστροφως.

$$1) \quad \eta\mu A + \eta\mu B = 2\eta\mu\frac{A+B}{2}\sigma\upsilon\upsilon\frac{A-B}{2}$$

$$\eta\mu A - \eta\mu B = 2\eta\mu\frac{A-B}{2}\sigma\upsilon\upsilon\frac{A+B}{2}$$

$$\sigma\upsilon\upsilon A + \sigma\upsilon\upsilon B = 2\sigma\upsilon\upsilon\frac{A+B}{2}\sigma\upsilon\upsilon\frac{A-B}{2}$$

$$\sigma\upsilon\upsilon B - \sigma\upsilon\upsilon A = 2\eta\mu\frac{A+B}{2}\eta\mu\frac{A-B}{2}$$

$$2) \quad 2\eta\mu\Gamma\sigma\upsilon\upsilon\Delta = \eta\mu(\Gamma+\Delta) + \eta\mu(\Gamma-\Delta)$$

$$2\sigma\upsilon\upsilon\Gamma\eta\mu\Delta = \eta\mu(\Gamma+\Delta) - \eta\mu(\Gamma-\Delta)$$

$$2\sigma\upsilon\upsilon\Gamma\sigma\upsilon\upsilon\Delta = \sigma\upsilon\upsilon(\Gamma+\Delta) + \sigma\upsilon\upsilon(\Gamma-\Delta)$$

$$2\eta\mu\Gamma\eta\mu\Delta = \sigma\upsilon\upsilon(\Gamma-\Delta) - \sigma\upsilon\upsilon(\Gamma+\Delta)$$

$$3) \quad \frac{\eta\mu A - \eta\mu B}{\eta\mu A + \eta\mu B} = \frac{\epsilon\phi\frac{A-B}{2}}{\epsilon\phi\frac{A+B}{2}}$$

Η) Ήμίτονα και συνημίτονα τόξων πινών.

$$\eta\mu 0^\circ = \sigma\upsilon\upsilon 90^\circ = 0$$

$$\eta\mu 18^\circ = \sigma\upsilon\upsilon 72^\circ = \frac{\sqrt{5}-1}{4}$$

$$\eta\mu 30^\circ = \sigma\upsilon\upsilon 60^\circ = \frac{1}{2}$$

$$\eta\mu 36^\circ = \sigma\upsilon\upsilon 54^\circ = \frac{\sqrt{10-2\sqrt{5}}}{4}$$

$$\eta\mu 45^\circ = \sigma\upsilon\nu 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\eta\mu 54^\circ = \sigma\upsilon\nu 36^\circ = \frac{\sqrt{5}+1}{4}$$

$$\eta\mu 60^\circ = \sigma\upsilon\nu 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\eta\mu 72^\circ = \sigma\upsilon\nu 18^\circ = \frac{\sqrt{10+2\sqrt{5}}}{4}$$

$$\eta\mu 90^\circ = \sigma\upsilon\nu 0^\circ = 1.$$

Θ) Σχέσεις μεταξύ των στοιχείων τριγώνου.

1) Τοῦ ὀρθογωνίου ($A=90^\circ$)

$$\beta = \alpha\eta\mu B = \alpha\sigma\upsilon\nu\Gamma \quad \beta = \gamma\epsilon\phi B = \gamma\sigma\phi\Gamma$$

$$\gamma = \alpha\eta\mu\Gamma = \alpha\sigma\upsilon\nu B \quad \gamma = \beta\epsilon\phi\Gamma = \beta\sigma\phi B$$

2) Παντός τριγώνου

$$\frac{\alpha}{\eta\mu A} = \frac{\beta}{\eta\mu B} = \frac{\gamma}{\eta\mu\Gamma} \quad \alpha^2 = \beta^2 + \gamma^2 - 2\beta\gamma\sigma\upsilon\nu A.$$

1) Ἐπίλυσις τῶν τριγῶνων.

1) Τῶν ὀρθογωνίων.

Δεδομένα Τύποι πρὸς εὔρεσιν τῶν
ζητουμένων

1η περίπτωση

$$\begin{array}{l|l} \alpha & \Gamma = 90^\circ - B \\ & \beta = \alpha\eta\mu B \\ B & \gamma = \alpha\sigma\upsilon\nu B \end{array}$$

$$E = \frac{\alpha^2 \eta\mu B \sigma\upsilon\nu B}{2} = \frac{\alpha^2 \eta\mu 2B}{4}$$

2α περίπτωση

$$\begin{array}{l|l} \beta & \Gamma = 90^\circ - B \\ & \alpha = \frac{\beta}{\eta\mu B} \\ B & \gamma = \beta\sigma\phi B = \frac{\beta}{\epsilon\phi B} \end{array}$$

$$E = \frac{\beta^2 \sigma\phi B}{2}$$

3η περίπτωση

$$\begin{array}{l|l} \beta & \epsilon\phi B = \frac{\beta}{\gamma} \\ \gamma & \Gamma = 90^\circ - B \end{array}$$

$$\alpha = \frac{\beta}{\eta \mu B}$$

$$E = \frac{\beta \gamma}{2}$$

4η περίπτωση α |
 β |

$$\gamma = \sqrt{(\alpha + \beta)(\alpha - \beta)}$$

$$\epsilon \phi \frac{\Gamma}{2} = \sqrt{\frac{\alpha - \beta}{\alpha + \beta}}$$

$$B = 90^\circ - \Gamma$$

$$E = \frac{\beta \gamma}{2} = \frac{\beta \sqrt{(\alpha + \beta)(\alpha - \beta)}}{2}$$

2) Τῶν εὐθυγράμμων τριγῶνων ἓν γένει.

Δεδομένα Τύποι πρὸς εὗρεσιν τῶν ζητουμένων

1η περίπτωση α |
 B |
 Γ |

$$A = 180^\circ - (B + \Gamma)$$

$$\beta = \frac{\alpha \eta \mu B}{\eta \mu A}$$

$$\gamma = \frac{\alpha \eta \mu \Gamma}{\eta \mu A}$$

$$E = \frac{\alpha^2 \eta \mu B \eta \mu \Gamma}{2 \eta \mu A}$$

2α περίπτωση α |
 β |
 Γ |

$$\frac{A+B}{2} = 90^\circ - \frac{\Gamma}{2}$$

$$\epsilon \phi \frac{A-B}{2} = \frac{\alpha - \beta}{\alpha + \beta} \cdot \sigma \phi \frac{\Gamma}{2}$$

$$\frac{A-B}{2} = \Delta$$

$$A = 90^\circ - \frac{\Gamma}{2} + \Delta$$

$$B = 90^\circ - \frac{\Gamma}{2} - \Delta$$

$$\gamma = \frac{\alpha \eta \mu \Gamma}{\eta \mu A}$$

$$E = \frac{\alpha \beta \eta \mu \Gamma}{2}$$

3η περίπτωση	α	$\eta\mu B = \frac{\beta\eta\mu A}{\alpha}$
	β	$\Gamma = 180^\circ - (A + B)$
	A	$\gamma = \frac{\sigma\eta\mu\Gamma}{\eta\mu A}$
		$E = \frac{\beta\gamma\eta\mu A}{2}$

Το πρόβλημα τοῦτο δύναται νά ἔχῃ καί δύο λύσεις.

4η περίπτωση	α	$\epsilon\phi \frac{A}{2} = \sqrt{\frac{(\tau - \beta)(\tau - \gamma)}{\tau(\tau - \alpha)}}$
	β	$\epsilon\phi \frac{B}{2} = \sqrt{\frac{(\tau - \gamma)(\tau - \alpha)}{\tau(\tau - \beta)}}$
	γ	$\epsilon\phi \frac{\Gamma}{2} = \sqrt{\frac{(\tau - \alpha)(\tau - \beta)}{\tau(\tau - \gamma)}}$
		$E = \sqrt{\tau(\tau - \alpha)(\tau - \beta)(\tau - \gamma)}$

Ἄκτις τοῦ εἰς τὸ τρίγωνον περιγεγραμμένου κύκλου

$$P = \frac{\sigma\beta\gamma}{4E} = \frac{\alpha}{2\eta\mu A}$$

Ἄκτις τοῦ εἰς τὸ τρίγωνον ἐγγεγραμμένου κύκλου

$$p = \frac{E}{\tau} = \sqrt{\frac{(\tau - \alpha)(\tau - \beta)(\tau - \gamma)}{\tau}}$$

ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Εισαγωγή	Σελις 5
--------------------	------------

ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ

I

Περὶ ἀνυσμμάτων	8
Τόξα καὶ γωνίαι	14

II

Τριγωνομετρικοὶ ἀριθμοὶ τόξου ἢ γωνίας	17
Σχέσεις μεταξύ ἡμιτόνου, συνημιτόνου καὶ ἐφαπτομένης παντὸς τόξου	21
Μεταβολαὶ τῶν τριγωνομετρικῶν ἀριθμῶν τόξου ἢ γωνίας καὶ γραφικὴ παράστασις αὐτῶν	24
Τόξα καὶ γωνίαι ἀντιστοιχοῦσαι εἰς δοθέντα τριγωνομετρικὸν ἀριθμὸν	28
Εὗρεσις τῶν τριγωνομετρικῶν ἀριθμῶν τόξου δοθέντος τοῦ ἑνὸς ἐξ αὐτῶν	29
Εὗρεσις τῶν τριγωνομετρικῶν ἀριθμῶν τόξων τινῶν ἁπλᾶς σχέσεις μεταξύ δύο τόξων καὶ ἀντιστοιχοῦσαι σχέσεις μεταξύ τῶν τριγωνομετρικῶν ἀριθμῶν αὐτῶν	36
Τριγωνομετρικοὶ ἀριθμοὶ ἄθροίσματος καὶ διαφορᾶς δύο τόξων	41
Μετασχηματισμοὶ ἄθροισμάτων τριγωνομετρικῶν ἀριθμῶν εἰς γινόμενα	48

III

Περὶ τριγωνομετρικῶν πινάκων. Κατασκευὴ τῶν πινάκων	52
--	----

IV

Τριγωνομετρικαὶ ἐξισώσεις καὶ συστήματα	62
---	----

ΒΙΒΛΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΩΝ ΤΡΙΓΩΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΙΣ

I

Σχέσεις μεταξὺ τῶν στοιχείων ὀρθογ. τριγώνου	66
--	----

II

Ἐπίλυσις ὀρθογωνίων τριγώνων	68
--	----

III

Σχέσεις μεταξὺ τῶν στοιχείων παντὸς τριγώνου	80
--	----

Ἐπίλυσις τῶν εὐθυγράμμων τριγώνων ἐν γένει	89
--	----

IV

Προβλήματα	107
----------------------	-----

Συγκέντρωσις τῶν σπουδαιότερων τύπων τῆς τρι- γωνομετρίας	122
--	-----

