

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΟΠΟΥΚΟΥ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ
ΩΜΕΤΡΙΑ

002
ΚΛΣ
ΣΤ2Α
404

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΣΤ/Δ = 19



ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

ΔΩΡΕΑ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΣΤ 89 ΣΧΒ
Σταμαντόπουλος, N.
N. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΠ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΜΑΡΑΣΛΕΙΟΥ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

Διὰ τοὺς μαθητὰς τῆς ΣΤ' τάξεως
τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΑΘΗΝΑΙ 1973

002
ΗΝΣ
ΕΤ2Α
404

Η ΙΤΗΜΘΙΑ ΑΙΓΑΙΟΝ ΩΣ ΤΟ

το τέλος της αρχαίας εποχής
και έως σήμερα στην



ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ

ΣΥΝΟΛΑ

1. "Εννοια τοῦ συνόλου

Παραδείγματα.

1. Τὸ Σάββατον ὅλοι οἱ μαθηταὶ τοῦ σχολείου θὰ ἐκκλησιασθοῦν.
2. Τὴν Τετάρτην ὅλοι οἱ μαθηταὶ τῆς "Ἐκτης (ΣΤ') τάξεως θὰ ἐπισκεφθοῦν τὸ μουσεῖον Μπενάκτη.
3. Τὴν τελευταίαν ὥραν ἡ ὁμάδα τῆς Χορωδίας νὰ συγκεντρωθῇ εἰς τὴν αἴθουσαν Μουσικῆς.
4. Μέσα εἰς τὴν αἴθουσαν τῆς ΣΤ' τάξεως ὑπάρχουν διάφορα ἀντικείμενα (ἔδρα, θρανία, μαυροπίναξ, χάρται, είκόνες κλπ.).
5. Ἐπάνω εἰς τὴν ἔδραν ὑπάρχει μία ἀνθοδέσμη.
6. Εἰς τὴν ἀποθήκην τοῦ σχολείου εύρισκονται τὰ ἐργαλεῖα, μὲ τὰ ὅποια καλλιεργοῦμεν τὸν σχολικὸν κῆπον.
7. Μέσα εἰς τὴν κασετίναν φυλάσσονται δάφορα ἀντικείμενα (μολύβια, χρώματα, γομολάστιχα κλπ.).

Παρατηρήσεις

«Ολοι οἱ μαθηταὶ τοῦ σχολείου» ἀποτελοῦν ἔνα ὅλον, ἔνα σύνολον.
«οἱ μαθηταὶ τῆς ΣΤ' τάξεως» ἀποτελοῦν ἔνα ὅλον, ἔνα σύνολον
«ἡ ὁμάδα τῆς Χορωδίας» ἀποτελεῖ ἔνα ὅλον, ἔνα σύνολον.
«τὰ ἀντικείμενα τῆς αἰθούσης» ἀποτελοῦν ἔνα ὅλον, ἔνα σύνολον.
«ἡ ἀνθοδέσμη» ἀποτελεῖ ἔνα ὅλον, ἔνα σύνολον.
«τὰ ἐργαλεῖα τοῦ κήπου» ἀποτελοῦν ἔνα ὅλον, ἔνα σύνολον.

«τὰ ἀντικείμενα τῆς κασετίνας» ἀποτελοῦν ἔνα δλον, ἔνα σύνολον.
Ἐτσι λέγομεν :

Τὸ σύνολον τῶν μαθητῶν τοῦ σχολείου·
τὸ σύνολον τῶν μαθητῶν τῆς ΣΤ' τάξεως·
τὸ σύνολον τῶν μαθητῶν τῆς Χορωδίας·
τὸ σύνολον τῶν ἀντικειμένων τῆς αἰθούσης μας·
τὸ σύνολον τῶν ἀνθέων τῆς ἀνθοδέσμης μας·
τὸ σύνολον τῶν ἐργαλείων τοῦ σχολικοῦ μας κήπου·
τὸ σύνολον τῶν ἀντικειμένων τῆς κασετίνας μου.

Οἱ μαθηταὶ τοῦ σχολείου ἢ οἱ μαθηταὶ τῆς ΣΤ' τάξεως ἢ οἱ μαθηταὶ τῆς Χορωδίας, ποὺ ἀποτελοῦν σύνολα, διακρίνονται ὁ ἔνας ἀπὸ τὸν ἄλλον μὲ τὸ δνοματεπώνυμόν των. Ἀνήκουν ὅμως εἰς τὸ αὐτὸ σχολεῖον, εἰς τὴν Ιδίαν τάξιν, εἰς τὴν Ιδίαν δμάδα.

‘Ομοίως τὰ ἀντικείμενα τῆς αἰθούσης, τὰ ὅποια ἀποτελοῦν ἔνα σύνολον, διακρίνονται μεταξύ των, διότι ἄλλο πρᾶγμα είναι ἡ ἔδρα, ἄλλο τὰ θρανία, ἄλλο δ μαυροπίναξ, ἄλλο οἱ χάρται, ἄλλο οἱ εἰκόνες. Είναι ὅμως ἀντικείμενα τῆς Ιδίας αἰθούσης.

‘Ἐξ αὐτῶν βλέπομεν δτι τὴν λέξιν «σύνολον» τὴν χρησιμοποιοῦμεν, ὅταν θέλωμεν νὰ ἀναφερθῶμεν εἰς πράγματα ὠρισμένα καὶ διακεκριμένα μεταξύ των, τὰ ὅποια ὅμως θεωροῦμεν ὡς μίαν δλότητα.

“Ωστε : Σύνολον λέγεται μία συλλογὴ πραγμάτων ώριμένων, τὰ ὅποια σαφῶς διακρίνονται μεταξύ των καὶ θεωροῦνται ως ἔν δλον.”

‘Η λέξις πράγματα ἢ ἀντικείμενα ἡμπορεῖ νὰ σημαίνῃ ύλικὰ πράγματα (ἀνθρώπους, ζῶα, φυτά, θρανία κλπ.) ἄλλὰ καὶ ἀφηρημένας ἔννοιας (αἱ ἡμέραι τῆς ἑβδομάδος, οἱ μῆνες τοῦ ἔτους, αἱ 4 πράξεις τῆς Ἀριθμητικῆς κλπ.).

Κάθε ἔνα ἀπὸ τὰ πράγματα ἢ τὰ ἀντικείμενα, τὰ ὅποια ἀποτελοῦν τὸ σύνολον, δνομάζεται στοιχεῖον τοῦ συνόλου ἢ μέλος τοῦ

συνόλου. Π.χ. ή ἔδρα είναι στοιχείον τοῦ συνόλου «άντικείμενα τῆς αἰθούσης», όμοιως τὰ θρανία είναι στοιχείον τοῦ συνόλου αὐτοῦ, καθώς καὶ ὁ μαυροπίναξ, οἱ χάρται, αἱ εἰκόνες.

Tὰ στοιχεῖα ἐνὸς συνόλου δὲν είναι ἀπαραίτητον νὰ είναι ὅμοιοιδῆ. Ἀρκεῖ νὰ ἔχουν ἔνα κοινὸν γνώρισμα, τὸ ὅποιον νὰ ἐπιτρέπῃ τὴν κατάταξίν των εἰς τὴν διάτητα. Π.χ. Τὸ σύνολον τῶν ἀντικείμενων τῆς ΣΤ' τάξεως (μαθηταί, θρανία, ἔδρα, χάρται, εἰκόνες κλπ.) δὲν είναι ὅμοια μεταξύ των, είναι ὅμως **στοιχεῖα** τοῦ συνόλου «ἀντικείμενα τῆς αἰθούσης»· διότι καθένα ἀπ' αὐτὰ ἔχει τὸ κοινὸν χαρακτηριστικὸν γνώρισμα, **ὅτι ἀνήκει** εἰς τὸ αὐτὸ σύνολον.

*Αλλα παραδείγματα συνόλων :

1. Ἡ ἐνωμοτία τῶν Προσκόπων τοῦ σχολείου μας.
2. Ἡ ἀθλητικὴ ὁμάδα τοῦ σχολείου μας.
3. Ἡ ὁμάδα ποδοσφαιριστῶν τοῦ χωρίου.
4. Μία συλλογὴ γραμματοσήμων.
5. "Ολοι οἱ κάτοικοι τῆς γῆς.
6. "Ολοι οἱ κάτοικοι τῆς Ἑλλάδος.
7. Οἱ ποταμοὶ τῆς Μακεδονίας.
8. Τὰ δρη τῆς Ἡπείρου.
9. Αἱ λέξεις.
10. Τὰ γράμματα τοῦ ἀλφαβήτου.
11. Τὰ φωνήεντα.
12. Τὰ σύμφωνα.
13. Οἱ ἀριθμοί.
14. Αἱ ἡμέραι τῆς ἑβδομάδος.
15. Οἱ μῆνες τοῦ ἔτους, κλπ., κλπ.

Ἐργασία. Νὰ ἀναφέρετε 10 παραδείγματα συνόλων ἀπὸ τὰ ἀντικείμενα τῆς οἰκίας σας, τοῦ σχολείου σας κλπ.

2. Τὸ μονομελὲς σύνολον. Τὸ διμελὲς σύνολον. Τὸ κενὸν σύνολον.

α) Ἐάν μᾶς ἐρωτήσουν, πόσα φωνήεντα ἔχει ἡ λέξις «πῦρ», θὰ ἀπαντήσωμεν : ἔνα. Ἀρα τὸ σύνολον τῶν φωνηέντων τῆς λέ-

Ἐεως «πῦρ» ἔχει ἔνα μόνον στοιχεῖον ἢ μέλος (φωνῆν) καὶ δι’ αὐτὸ^ν λέγεται μονομελὲς σύνολον.

Παραδείγματα : Μονομελῆ σύνολα εἰναι :

Τὸ σύνολον τῶν φωνηέντων τῶν λέξεων : γῆ, μήν, φῶς, μῆς.

Τὸ σύνολον τῶν συμφώνων τῶν λέξεων : γῆ, ἔνα, ἄν, ἄς, μή.

Τὸ σύνολον τῶν μηνῶν τοῦ ἔτους, οἱ ὅποιοι ἀρχίζουν ἀπὸ Φ.

Τὸ σύνολον τῶν ἡμερῶν τῆς ἑβδομάδος, οἱ ὅποιαι ἀρχίζουν ἀπὸ Δ.

Τὸ σύνολον τῶν Ἡπείρων τῆς γῆς, οἱ ὅποιαι ἀρχίζουν ἀπὸ Ε. κλπ., κλπ.

β) Ἐάν μᾶς ἐρωτήσουν, πόσα σύμφωνα ἔχει ἡ λέξις «πῦρ» ; θὰ ἀπαντήσωμεν : δύο. Ἀρα τὸ σύνολον τῶν συμφώνων τῆς λέξεως «πῦρ» ἔχει δύο στοιχεῖα ἢ μέλη (σύμφωνα). διὰ τοῦτο λέγεται διμελὲς σύνολον ἢ ζεῦγος στοιχείων.

Παραδείγματα. Διμελῆ σύνολα εἰναι :

Τὸ σύνολον τῶν συμφώνων τῶν λέξεων : ψωμί, νερό, μέλι, τρία, ἑπτά, ὁκτώ, δέκα, φῶς, μήν, μῆς.

Τὸ σύνολον τῶν φωνηέντων τῶν λέξεων : ψωμί, νερό, μέλι, τρία, ἑπτά, ὁκτώ, δέκα, ἔνα, πέννα, χάρτης, ἔτος.

Τὸ σύνολον τῶν μηνῶν, οἱ ὅποιοι ἀρχίζουν ἀπὸ Μ (Μάρτιος, Μάϊος).

Τὸ σύνολον τῶν ἡμερῶν τῆς ἑβδομάδος, οἱ ὅποιαι ἀρχίζουν ἀπὸ Τ (Τρίτη, Τετάρτη).

Τὸ σύνολον τῶν χρωμάτων τῆς σημαίας μας (κυανοῦν, λευκόν).

γ) Εἰναι Σάββατον. "Ολοι οἱ μαθηταὶ τῆς ΣΤ' τάξεως ἐπῆγαν ἐκδρομήν. Ποιον εἰναι κατὰ τὴν ἡμέραν αὔτην τὸ σύνολον τῶν μαθητῶν, οἱ ὅποιοι εὐρίσκονται εἰς τὴν αἵθουσαν ; 'Απαντῶμεν ὅτι ἡ αἵθουσα εἰναι κενὴ (ἀδειανή) ἀπὸ μαθητάς.

"Ἀρα τὸ σύνολον τῶν μαθητῶν τῆς αἵθουσης κατὰ τὴν ἡμέραν αὔτην εἰναι κενὸν σύνολον. Τοῦτο εἰναι ἔνα σύνολον χωρὶς στοιχεῖα. Συνεπῶς, ἔάν ἔνα σύνολον δὲν ἔχῃ στοιχεῖα, δὲν θὰ εἴπωμεν ὅτι δὲν ὑπάρχει σύνολον· θὰ εἴπωμεν ὅτι ὑπάρχει κενὸν σύνολον.

Παραδείγματα κενοῦ συνόλου :

Τὸ σύνολον τῶν μακρῶν φωνηέντων τῶν λέξεων : Θεός, νέος, Σένος, νέφος.

Τὸ σύνολον τῶν βραχέων φωνηέντων τῶν λέξεων : φωνή, ἥχώ, πηγή, τρώγω.

Τὸ σύνολον τῶν ἡμερῶν τῆς ἑβδομάδος, αἱ ὅποιαι ἀρχίζουν ἀπὸ Μ.

Τὸ σύνολον τῶν μηνῶν τοῦ ἔτους, οἱ ὅποιοι ἀρχίζουν ἀπὸ Β. Τὸ σύνολον τῶν μαθητῶν τῆς αἰθούσης τῆς ΣΤ' τάξεως κατὰ τὸ διάλειμμα, ὅταν ὅλοι οἱ μαθηταὶ τῆς τάξεως αὐτῆς εὑρίσκωνται εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ σχολείου.

3. Συμβολισμοὶ τῶν συνόλων

Κάθε σύνολον, χάριν συντομίας, τὸ παριστάνομεν μὲν ἐνα κεφαλαῖον γράμμα τοῦ ἀλφαριθμήτου· π.χ. τὸ σύνολον Α, τὸ σύνολον Β κλπ.

Καὶ κάθε ἀντικείμενον, ποὺ εἶναι στοιχεῖον τοῦ συνόλου, τὸ παριστάνομεν, χάριν συντομίας, μὲν ἐνα μικρὸν γράμμα τοῦ ἀλφαριθμήτου ἢ μὲν ἀριθμητικὰ ψηφία· π.χ. τὸ στοιχεῖον α, τὸ στοιχεῖον β κλπ.

α) Διὰ νὰ δηλώσωμεν ὅτι τὸ ἀντικείμενον α εἶναι στοιχεῖον τοῦ συνόλου Α, χρησιμοποιοῦμεν τὸ σύμβολον \in , τὸ ὅποιον σημαίνει «ἀνήκει εἰς τό» καὶ τὸ γράφομεν συμβολικῶς ἔτσι :

$$\alpha \in A$$

τὸ διαβάζομεν δέ : «τὸ α ἀνήκει εἰς τὸ Α», ἢ «τὸ α εἶναι στοιχεῖον τοῦ Α».

β) Διὰ νὰ δηλώσωμεν ὅμως ὅτι τὸ ἀντικείμενον β δὲν εἶναι στοιχεῖον τοῦ συνόλου Α, τότε χρησιμοποιοῦμεν τὸ σύμβολον \notin , τὸ ὅποιον σημαίνει «δὲν ἀνήκει εἰς τό» καὶ τὸ γράφομεν συμβολικῶς ἔτσι :

$$\beta \notin A$$

τὸ διαβάζομεν δέ : «τὸ β δὲν ἀνήκει εἰς τὸ Α», ἢ «τὸ β δὲν εἶναι στοιχεῖον τοῦ Α».

γ) Διὰ νὰ δηλώσωμεν τὸ κενὸν σύνολον χρησιμοποιοῦμεν τὸ σύμβολον \emptyset .

δ) Διὰ νὰ δηλώσωμεν ὅτι τὰ ἀντικείμενα ἀποτελοῦν ἔνα σύνολον, τὰ γράφομεν μέσα εἰς αὐτὸ τὸ σύμβολον { }, τὸ ὅποιον δινομάζεται ἄγκιστρον.

*Ετσι, διά νὰ δείξωμεν ότι τὸ σύνολον Β ἔχει ώς στοιχεῖα τὰ γράμματα α, β, γ θὰ σημειώσωμεν συμβολικῶς :

$$B = \{ \alpha, \beta, \gamma \}$$

καὶ γράφομεν :

$$\alpha \in B$$

$$\beta \in B$$

$$\gamma \in B$$

διαβάζομεν δέ : «τὸ α εἶναι στοιχεῖον τοῦ B», «τὸ β εἶναι στοιχεῖον τοῦ B», «τὸ γ εἶναι στοιχεῖον τοῦ B».

Παρατήρησις. 1. Τὰ στοιχεῖα τοῦ συνόλου μέσα εἰς τὸ ἀγκίστρον χωρίζονται μεταξύ των μὲ κόμμα, καὶ ἡμποροῦμεν νὰ τὰ γράψωμεν κατὰ οἰανδήποτε σειράν. Π.χ.

$$B = \{ \alpha, \beta, \gamma \} \quad \text{ἢ} \quad B = \{ \beta, \gamma, \alpha \} \quad \text{ἢ} \quad B = \{ \gamma, \alpha, \beta \}.$$

2. Κάθε στοιχεῖον ἐνὸς συνόλου τὸ γράφομεν ἐντὸς τοῦ ἀγκίστρου μίαν μόνον φοράν. Π.χ. τὸ σύνολον Γ τῶν γραμμάτων τῆς λέξεως «χάρακας» γράφεται ἔτσι : $\Gamma = \{ \chi, \alpha, \rho, \kappa, \sigma \}$.

A. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΣΚΗΣΕΙΣ

α) Τί λέγεται σύνολον ; Πότε ἔνα σύνολον λέγεται μονομελές ; πότε λέγεται διμελές καὶ πότε λέγεται κενόν ;

β) Τί σύνολα είναι : τὸ σύνολον τῶν φωνηέντων τῶν λέξεων : «Τρώς, θώς, φλέψ, πᾶς, ένος, μῆλον, ἀστήρ» ;

γ) Τί σύνολον είναι τὸ σύνολον τῶν βραχέων φωνηέντων τῆς λέξεως «πηγή» ;

δ) Τί σύνολον είναι τὸ σύνολον τῶν μακρῶν φωνηέντων τῆς λέξεως «μέλος» ;

ε) Ἀπὸ τὴν αἴθουσαν διδασκαλίας τῆς ΣΤ' τάξεως ἔχουν ἀφαιρεθῆ ὅλοι οἱ χάρται, λόγω ἐλασιοχρωματισμοῦ τῶν τοίχων τῆς. Πῶς θὰ δινομάσωμεν τὸ σύνολον τῶν χαρτῶν τῆς αιθούσης ;

στ) Εἰς τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν είναι παρόντες ὅλοι οἱ μαθηταὶ τῆς τάξεως. Πῶς λέγεται τὸ σύνολον τῶν ἀπόντων μαθητῶν τῆς τάξεως αὐτῆς εἰς τὸ μάθημα αὐτὸ κατὰ τὴν ὥραν αὐτήν :

ζ) Ποιον είναι τὸ σύνολον τῶν ἀκεραίων ἀριθμῶν, οἱ δποῖοι εύρισκονται μεταξύ τοῦ 8 καὶ τοῦ 9 ;

4. Σύνολον μὲ περισσότερα στοιχεῖα

Παράδειγμα 1. Εἰς τὸ πρῶτον θρανίον τῆς ΣΤ' τάξεως κάθονται τρεῖς μαθηταί, οἱ : Βλάστης, Δέδες, Νέγρης.

”Αν παραστήσωμεν μὲ τὸ γράμμα Μ τοὺς μαθητὰς αὐτούς, τότε τὸ σύνολον τῶν μαθητῶν τοῦ πρώτου θρανίου σημειώνεται ἐντὸς τοῦ ἀγκίστρου ἢ μὲ δλόκληρον τὸ ἐπώνυμον τῶν μαθητῶν ἢ μὲ τὰ ἀρχικά των γράμματα· ἔτσι :

$$M = \{ \text{Βλάστης}, \text{Δέδες}, \text{Νέγρης} \}$$

$$\text{ἢ } M = \{ B, \Delta, N \}$$

Παράδειγμα 2. Τὸ σύνολον τῶν γραμμάτων τῆς λέξεως «Πατρίς» είναι :

$$\Pi = \{ \pi, \alpha, \tau, \rho, i, s \}$$

Εἰς τὸ πρῶτον παράδειγμα ἔχομεν σύνολον μὲ τρία στοιχεῖα (τριμελὲς σύνολον). Εἰς τὸ δεύτερον παράδειγμα ἔχομεν σύνολον μὲ , 6 στοιχεῖα.

”Επομένως : Ἐνα σύνολον ἡμπορεῖ νὰ ἔχῃ ἔνα στοιχεῖον (μονο- μελὲς σύνολον) ἢ δύο στοιχεῖα (διμελὲς σύνολον) ἢ περισσότερα στοιχεῖα (σύνολον μὲ πολλὰ στοιχεῖα).

”Εμάθομεν πᾶς γράφομεν τὰ σύνολα. ”Εὰν ἔχωμεν σύνολα μὲ πολλὰ στοιχεῖα, τὰ δποῖα παρουσιάζουν μίαν ώρισμένην σειράν, ὅπως είναι οἱ φυσικοὶ ἀριθμοὶ 1 ἔως 99, θὰ τοὺς γράψωμεν ὅλους ἐν- τὸς τοῦ ἀγκίστρου ;

”Οχι βέβαια. Μέσα εἰς τὸ ἀγκίστρον γράφομεν τὰ δύο ἢ τρία πρῶ- τα ἀπὸ τὰ στοιχεῖα αὐτά, κατόπιν γράφομεν τρεῖς τελείας (στι- γμάς) καὶ τέλος γράφομεν τὸ τελευταῖον στοιχεῖον τοῦ συνόλου. Π.χ.

$$A = \{ 1, 2, 3, \dots, 99 \}$$

Αἱ τρεῖς τελείαι (στιγμαί) σημαίνουν : «καὶ οὕτω καθεξῆς μέ- χρι τοῦ».

Πᾶς ὅμως θὰ γράψωμεν ἔνα σύνολον, ἂν τὰ στοιχεῖα τοῦ δὲν παρουσιάζουν ώρισμένην σειράν ;

Παράδειγμα. "Αν θελήσωμεν νὰ παραστήσωμεν M τὸ σύνολον τῶν μαθητῶν τοῦ Μαρασλείου, δὲν εἶναι εὔκολον νὰ γράψωμεν τὰ δύνοματα ὅλων αὐτῶν τῶν μαθητῶν ἐντὸς τοῦ ἀγκίστρου, ἀλλ' οὕτε καὶ παρουσιάζουν οἱ μαθηταὶ ὡρισμένην σειράν, ὅπως συμβαίνει μὲ τοὺς ἀκεραίους ἀριθμούς.

Δι᾽ αὐτὸν θὰ χρησιμοποιήσωμεν ἔναν ἄλλον τρόπον ἀπλοῦν καὶ σύντομον, ὁ δποῖος θὰ δύναται νὰ χρησιμοποιηθῇ εἰς πᾶσαν περίπτωσιν.

Μὲ τὸ γράμμα X τοῦ ἀλφαριθμοῦ μας παριστάνομεν κάθε στοιχεῖον τοῦ συνόλου. Μέσα εἰς τὸ ἀγκίστρον γράφομεν πρῶτα τὸ X , δεξιὰ αὐτοῦ γράφομεν μίαν μικρὰν διστάσιον γραμμὴν / ἢ δύο τελείας : καὶ τέλος γράφομεν πάλιν τὸ X , μετὰ τὸ δποῖον γράφεται ἡ ίδιότης, τὴν δποῖαν ἔχουν ὅλα τὰ στοιχεῖα τοῦ συνόλου.

"Ετσι τὸ σύνολον M τοῦ παραπάνω παραδείγματος γράφεται :

$$M = \{ X/X \text{ μαθητής τοῦ Μαρασλείου} \}$$

καὶ διαβάζεται ὡς ἔξῆς :

Μ εἶναι τὸ σύνολον τῶν X ὅπου X εἶναι μαθητής τοῦ Μαρασλείου.

"Άλλα παραδείγματα.

1. Τὸ σύνολον $M = \{ \text{'Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάϊος, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος} \}$ γράφεται :

$$M = \{ X/X \text{ μὴν τοῦ ἔτους} \}$$

καὶ διαβάζεται : Μ εἶναι τὸ σύνολον τῶν X μὲ τὴν ίδιότητα : X εἶναι μὴν τοῦ ἔτους.

2. Τὸ σύνολον $H = \{ \text{Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατον, Κυριακή} \}$ γράφεται :

$$H = \{ X/X \text{ ἡμέρα τῆς ἑβδομάδος} \}$$

καὶ διαβάζεται : Η εἶναι τὸ σύνολον τῶν X μὲ τὴν ίδιότητα : X εἶναι ἡμέρα τῆς ἑβδομάδος.

3. Τὸ σύνολον $A = \{ 1,2,3,\dots,99 \}$ γράφεται :

$A = \{ X/X \text{ φυσικὸς ἀριθμὸς μικρότερος τοῦ } 100 \}$ καὶ διαβάζεται : Α εἶναι τὸ σύνολον τῶν X μὲ τὴν ίδιότητα : X εἶναι φυσικὸς ἀριθμὸς μικρότερος τοῦ 100.

B. ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Παραστήσατε συμβολικῶς :

1. Τὸ σύνολον τῶν Ἡπείρων τῆς Γῆς.
2. Τὸ σύνολον τῶν Ὀικεανῶν.
3. Τὸ σύνολον τῶν Κρατῶν τῆς Εὐρώπης.
4. Τὸ σύνολον τῶν ποταμῶν τῆς Ἑλλάδος.
5. Τὸ σύνολον τῶν γραμμάτων τοῦ ἀλφαριθμοῦ.
6. Τὸ σύνολον τῶν φυσικῶν ἀριθμῶν 1 μέχρι 999.

5. "Ισα σύνολα

"Αν παραστήσωμεν τὰ σύνολα $M = \{ 2, 3, 4 \}$ καὶ $N = \{ 4, 3, 2 \}$, βλέπομεν ότι κάθε στοιχεῖον τοῦ συνόλου M είναι καὶ στοιχεῖον τοῦ συνόλου N . Ἀλλὰ καὶ τὸ κάθε στοιχεῖον τοῦ συνόλου N είναι καὶ στοιχεῖον τοῦ συνόλου M . Τὰ δύο αὐτὰ σύνολα M καὶ N λέγονται **ἴσα**.

'Ομοίως τὰ σύνολα $\Delta = \{ \alpha, \beta, \gamma \}$ καὶ $E = \{ \gamma, \beta, \alpha \}$ είνα **ἴσα** μεταξύ των, διότι κάθε στοιχεῖον τοῦ συνόλου Δ είναι καὶ στοιχεῖον τοῦ συνόλου E , ὅπως καὶ κάθε στοιχεῖον τοῦ συνόλου E είναι καὶ στοιχεῖον τοῦ συνόλου Δ .

Αριθμητική: Δύο σύνολα λέγονται **ἴσα**, δταν δλα τὰ στοιχεῖα τοῦ ἐνός ταυτίζωνται ἔνα πρός ἔνα μὲ τὰ στοιχεῖα τοῦ ἄλλου.

Τὰ **ἴσα σύνολα** τὰ σημειώνομεν ως **ξενής** : $M = N$, $\Delta = E$ κλπ.

6. "Ενωσις συνόλων

Παράδειγμα 1. 'Η "Εκτῇ τάξις τοῦ Μαρασλείου ἔχει δύο δμάδας ἐρυθροσταυριτῶν. Τὸ σύνολον τῶν μαθητῶν, ποὺ ἀνήκουν εἰς τὴν μίαν δμάδα, είναι : $A = \{ \text{Παῦλος}, \text{Πέτρος}, \text{Κώστας}, \text{Φωκίων} \}$ καὶ τὸ σύνολον τῶν μαθητῶν, ποὺ ἀνήκουν εἰς τὴν ἄλλην δμάδα, είναι : $B = \{ \text{Κώστας}, \text{Φωκίων}, \text{Φαίδων}, \text{Χρήστος}, \text{Θωμᾶς} \}$.

'Ἐὰν τώρα μᾶς ἔρωτήσουν : ποῖον είναι τὸ σύνολον τῶν ἐρυθροσταυριτῶν τῆς ΣΤ' τάξεως τοῦ Μαρασλείου ; θ' ἀπαντήσωμεν μὲ εύκολίαν :

$M = \{ \text{Παῦλος}, \text{Πέτρος}, \text{Κώστας}, \text{Φωκίων}, \text{Φαίδων}, \text{Χρήστος}, \text{Θωμᾶς} \}$.

Τί έκάμαμεν, διὰ νὰ εῦρωμεν τὸ σύνολον ὅλων τῶν ἐρυθροσταυριῶν τῆς ΣΤ' τάξεως;

"Οπως παρατηροῦμεν, ἐνώσαμεν τὰ δύο σύνολα εἰς ἓνα σύνολον, τὸ δποτὸν ὀνομάζεται ἐνωσις τῶν δύο συνόλων.

Παρατηροῦμεν ἐπίσης, ὅτι δὲ Κώστας καὶ δὲ Φωκίων ἀνήκουν καὶ εἰς τὰς δύο ὅμιλους· εἰς τὴν ἐνωσιν ὅμιλος δὲν λαμβάνονται δύο φοράς, δὲλλα μόνον μίαν, διότι ἡ ἐνωσις τῶν δύο αὐτῶν συνόλων εἶναι σύνολον. Καί, ὅπως γνωρίζομεν, τὰ στοιχεῖα ἐνὸς συνόλου πρέπει νὰ διακρίνωνται σαφῶς μεταξύ των.

Ωστε: "Ἐρωσις δύο συνόλων λέγεται τὸ σύνολον, τὸ δποτὸν ἔχει στοιχεῖα ὅλα τὰ στοιχεῖα τούτων· κάθε στοιχεῖον ὅμιλος λαμβάνεται μίαν μόνον φοράν.

Σύμβολον τῆς ἐνώσεως εἶναι τὸ υ. Ἐτσι ἡ ἐνωσις τῶν δύο ἀνωτέρω συνόλων A καὶ B γράφεται : A ∪ B καὶ διαβάζεται : «A ἐνωσις B».

Παράδειγμα 2. "Αν $A = \{ 2, 5, 6, 7 \}$ καὶ $B = \{ 2, 4, 5, 7 \}$ θὰ εἶναι : $E = A \cup B = \{ 2, 4, 5, 6, 7 \}$

Παράδειγμα 3. "Αν $A = \{ \pi, \rho, \sigma \}$ καὶ $B = \{ \sigma, \tau, \upsilon \}$ θὰ εἶναι : $E = A \cup B = \{ \pi, \rho, \sigma, \tau, \upsilon \}.$

Σημείωσις 1. Τὸ σύνολον, ποὺ προκύπτει ἀπὸ τὴν ἐνωσιν, ἡμποροῦμεν νὰ τὸ ἐνώσωμεν μὲ ἓνα τρίτον σύνολον, δπότε θὰ ἔχωμεν ἐνωσιν τριῶν συνόλων. Όμοιώς τὴν ἐνωσιν αὐτὴν ἡμποροῦμεν νὰ τὴν ἐνώσωμεν μὲ ἓνα τέταρτον σύνολον, δπότε θὰ ἔχωμεν ἐνωσιν 4 συνόλων κ.ο.κ.

2. Διὰ τὴν ἐνώσιν ἐνὸς συνόλου A μὲ τὸ κενὸν σύνολον \emptyset ἔχομεν :

$A \cup \emptyset = A$ (διότι τὸ κενὸν σύνολον δὲν ἔχει κανένα στοιχεῖον).

Διὰ τοῦτο τὸ κενὸν σύνολον \emptyset λέγεται οὐδέτερον στοιχείου διὰ τὴν πρᾶξιν τῆς ἐνώσεως.

Γ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ

α) Νὰ σχηματίσετε τὰς ἔνωσεις τῶν ἔτῆς συνόλων :

1. $A = \{3, 4, 5, 6, 7\}$ καὶ $B = \{1, 2, 3, 5, 7\}$
2. $A = \{\beta, \gamma, \epsilon, \zeta, \eta\}$ καὶ $B = \{\alpha, \beta, \gamma, \delta, \theta\}$
3. $A = \{\alpha, \beta, \gamma, \delta\}$ καὶ $B = \{\gamma, \beta, \alpha, \delta\}$
4. $A = \{1, 2, 3, 4\}$ καὶ $B = \{3, 2, 4, 1\}$
5. $A = \{\alpha, \beta, \gamma\}$, $B = \{\beta, \gamma, \delta\}$ καὶ $\Gamma = \{\gamma, \delta, \epsilon\}$.
6. $A = \{\alpha, \beta, \gamma\}$ καὶ $B = \emptyset$
7. $A = \{1, 2, 3\}$ καὶ $B = \emptyset$

β) Νὰ σχηματίσετε τὴν ἔνωσιν τοῦ συνόλου A τῶν γραμμάτων τῆς λέξεως «μάθημα» καὶ τοῦ συνόλου B τῶν γραμμάτων τῆς λέξεως «βιβλίον».

7. Πλῆθος στοιχείων καὶ πληθικὸς ἀριθμός συνόλου

Ἐμάθομεν προηγουμένως, ὅτι ἔνα σύνολον ἡμπορεῖ νὰ ἔχῃ ἔνα στοιχεῖον καὶ λέγεται μονομελὲς σύνολον· ἢ δύο στοιχεῖα καὶ λέγεται διμελὲς σύνολον· ἢ τρία ἢ περισσότερα στοιχεῖα.

Παραδείγματα. Ἐχομεν τὰ σύνολα :

- | | |
|--|---|
| $A = \{\alpha\}$ | · ἔχει ἔνα 1 στοιχεῖον (μονομελὲς σύνολον). |
| $B = \{\circ, \epsilon\}$ | · ἔχει 2 στοιχεῖα (διμελὲς σύνολον). |
| $\Gamma = \{\alpha, \iota, \upsilon\}$ | · ἔχει 3 στοιχεῖα. |
| $\Delta = \{\alpha, \epsilon, \eta, \iota\}$ | · ἔχει 4 » κ.ο.κ. |

Οἱ ἀριθμοὶ 1, 2, 3, 4 κλπ., οἱ δόποιοι φανερώνουν τὸ πλῆθος τῶν στοιχείων ἐνὸς συνόλου, λέγονται πληθικοὶ ἀριθμοὶ ἢ πληθάριθμοι.
 ‘Ο πληθικός ἀριθμὸς τοῦ μονομελοῦς συνόλου εἶναι ἡ μονάς 1.
 ‘Ο πληθικὸς ἀριθμὸς τοῦ διμελοῦς συνόλου εἶναι δ 2 κ.ο.κ.
 ‘Ο πληθικὸς ἀριθμὸς τοῦ κενοῦ συνόλου \emptyset εἶναι τὸ μηδέν (0).
 Ἀρα : Οἱ ἀκέραιοι ἀριθμοὶ εἶναι πληθικοὶ ἀριθμοὶ συνόλων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

ΠΟΣΑ

1. Τί λέγεται ποσὸν

Παράδειγμα. Ὁ Πέτρος μὲ τὸ ἄνοιγμα τῶν σχολείων ἡγόρασε 4 τετράδια καὶ ἐπλήρωσε 12 δραχμάς. Ἀργότερα ἔχοειάσθη ἄλλα 8 δροια τετράδια καὶ ἐπλήρωσε 24 δραχμάς.

Εἰς τὸ παράδειγμα αὐτὸ βλέπομεν ὅτι τὰ τετράδια ἀπὸ 4 ἔγιναν 8, δηλ. ἐδιπλασιάσθη ὁ ἀριθμὸς τῶν δροίων καὶ αἱ δραχμαὶ ἀπὸ 12 ἔγιναν 24. Δηλ. καὶ ὁ ἀριθμὸς τῶν τετραδίων καὶ αἱ δραχμαὶ ηὔξηθησαν.

Θά ἥτο δυνατὸν νὰ ἀγοράσῃ ὁ Πέτρος καὶ δλιγώτερα τετράδια ἀπὸ τὰ 4, ὅπότε θὰ ἐπλήρωνε καὶ δλιγωτέρας δραχμάς.

Ἐπομένως τὰ τετράδια καὶ αἱ δραχμαὶ εἶναι δυνατὸν νὰ γίνουν περισσότεραι (νὰ αὔξηθοῦν) ἢ καὶ δλιγώτεραι (νὰ ἐλαττωθοῦν).

Τὸ ἵδιον συμβαίνει καὶ μὲ τοὺς μαθητὰς τῆς τάξεως ἢ τοῦ σχολείου : εἶναι δυνατὸν νὰ αὔξηθοῦν, ἢν ἐγγραφοῦν καὶ ἄλλοι μαθηταί, ἢ νὰ ἐλαττωθοῦν, ἢν μερικοὶ ἀπὸ τοὺς φοιτῶντας πάρουν ἀποφοιτήριον.

Ομοίως ἡμπορεῖ νὰ αὔξηθοῦν ἢ νὰ ἐλαττωθοῦν τὰ θρανία, οἱ χάρται, αἱ εἰκόνες, τὰ πρόβατα, οἱ ἐργάται, τὰ ήμερομίσθια κλπ.

"Ολα αὐτὰ δύνομάζονται ποσὰ.

Ποσὸν εἰς τὴν Ἀριθμητικὴν δύνομάζεται κάθε τι, τὸ δποῖον ἡμπορεῖ νὰ αὔξηθῇ ἢ νὰ ἐλαττωθῇ, δηλαδὴ δύναται νὰ λάβῃ μίαν νέαν ἀριθμητικὴν τιμήν.

2. Ποσὰ ἀνάλογα καὶ ποσὰ ἀντίστροφα

α) Ἀνάλογα ποσὰ

Παράδειγμα. Ἔνας ἐργάτης διὰ 2 ήμερομίσθια ἔλαβε 240 δρχ. Ἐν εἰργάζετο διπλασίας ήμέρας, δηλ. $2 \times 2 = 4$ ήμέρας, θὰ ἐλάμβανε καὶ διπλασίας δραχμάς, δηλ. $240 \times 2 = 480$ δρχ. Διὰ τοιπλάσια

ἡμερομίσθια θὰ ἐλάμβανε τριπλασίας δραχμὰς κ.ο.κ. Καὶ διὰ ἓνα ἡμερομίσθιον θὰ ἐλάμβανε 2 φορὰς δὲλιγωτέρας δρχ., δηλ. $240 : 2 = 120$ δρχ.

Εἰς τὸ παράδειγμα αὐτὸν ἔχομεν δύο ἑτεροειδῆ (διαφορετικά) ποσά : ἡμερομίσθια καὶ δραχμάς. Παρατηροῦμεν δὲ ὅτι, ὅταν ἡ τιμὴ 2 τοῦ ἐνὸς ποσοῦ, τῶν ἡμερομισθίων, διπλασιασθῇ, τριπλασιασθῇ, κλπ., καὶ ἡ ἀντίστοιχος τιμὴ 240 δραχμαὶ τῆς ἀμοιβῆς τοῦ ἐργάτου διπλασιάζεται, τριπλασιάζεται κλπ.

‘Ομοίως παρατηροῦμεν ὅτι, ὅταν ἡ τιμὴ 2 τοῦ ποσοῦ τῶν ἡμερομισθίων γίνῃ τὸ ἥμισυ (μισή), καὶ ἡ ἀντίστοιχος τιμὴ 240 δραχμαὶ τῆς ἀμοιβῆς τοῦ ἐργάτου γίνεται τὸ ἥμισυ.

Ἐπίσης, ἂν ἡ τιμὴ τοῦ ποσοῦ τῶν ἡμερομισθίων γίνῃ τὸ τρίτον, τὸ τέταρτον κ.τ.λ. καὶ ἡ ἀντίστοιχος τιμὴ τῶν δραχμῶν θὰ γίνῃ τὸ τρίτον, τὸ τέταρτον κ.τ.λ.

Τὰ ποσὰ αὐτὰ εἰς τὴν ἀριθμητικὴν λέγονται εὐθέως ἀνάλογα ἢ ἀπλῶς ἀνάλογα ποσά.

Δύο ποσὰ λέγονται ἀνάλογα, ὅταν ἔχουν ἀντίστοιχους τιμὰς καὶ πολλαπλασιαζομένης τῆς τιμῆς τοῦ ἐνὸς ποσοῦ ἐπὶ ἓνα ἀριθμόν, πολλαπλασιάζεται καὶ ἡ ἀντίστοιχος πρὸς αὐτὴν τιμὴ τοῦ ἄλλου ποσοῦ ἐπὶ τὸν αὐτὸν ἀριθμόν ἦ, διαιρούμενης τῆς τιμῆς τοῦ ἐνὸς ποσοῦ δι' ἐνὸς ἀριθμοῦ, διαιρῆται καὶ ἡ ἀντίστοιχος πρὸς αὐτὴν τιμὴ τοῦ ἄλλου ποσοῦ διὰ τοῦ αὐτοῦ ἀριθμοῦ.

Σημείωσις. Ἡ ἡλικία ἐνὸς παιδιοῦ καὶ τὸ ἀνάστημα αὐτοῦ, μολονότι συναυξάνονται, δὲν εἶναι ἀνάλογα ποσά· διότι ὅταν διπλασιάζεται, τριπλασιάζεται κλπ. Ἡ ἡλικία τοῦ παιδιοῦ, δὲν διπλασιάζεται, τριπλασιάζεται κλπ. καὶ τὸ ἀνάστημα αὐτοῦ (συμμεταβλητά ποσά).

Παρατήρησις. Εἰς τὴν καθημερινὴν ζωὴν συχνὰ συναντῶμεν ποσὰ ἀνάλογα· λ.χ. Τὰ κιλὰ τῶν πραγμάτων ποὺ ἀγοράζομεν καὶ

τὰ χρήματα ποὺ πληρώνομεν δι' αὐτά. Ὁ ἀριθμὸς τῶν ἐνδυμασιῶν καὶ τὰ μέτρα τοῦ ὑφάσματος, τὰ ὅποια χρειάζονται διὰ τὴν κατασκευὴν των. Αἱ ἀποστάσεις τὰς δόποιας διανύομεν καὶ ὁ χρόνος ποὺ χρειάζεται, διὰ νὰ τὰς διανύσωμεν. Ἡ ἀπόστασις ποὺ διανύει ἔνα αὐτοκίνητον καὶ ἡ ποσότης τῆς βενζίνης, τὴν δόποιαν ἔξοδεύει διὰ τὴν ἀπόστασιν αὐτήν.

Ἡ ἀμοιβὴ τοῦ ἐργάτου καὶ ὁ χρόνος τῆς ἐργασίας του.

β) Ἀντίστροφα ποσά

Παράδειγμα. 4 ἐργάται τραγοῦν ἕνα ἀμπέλι εἰς 12 ἡμέρας. Διπλάσιοι ἐργάται, δηλ. 8 ἐργάται (4×2), θὰ τὸ τραγήσουν εἰς 6 ἡμέρας ($12 : 2 = 6$ ἡμ.). Καὶ μισοὶ ἐργάται, δηλ. 2 ἐργάται ($4 : 2 = 2$ ἐργάται), θὰ τὸ τραγήσουν εἰς διπλασίας ἡμέρας, δηλ. εἰς 24 ἡμέρας ($12 \times 2 = 24$ ἡμ.).

Εἰς τὸ παράδειγμα αὐτὸ ἔχομεν δύο ἑτεροειδῆ ποσά : ἐργάτας καὶ ἡμέρας· δηλ. τὴν ἐργασίαν τοῦ ἐργάτου καὶ τὸν χρόνον ποὺ χρειάζεται διὰ νὰ γίνη ἡ ἐργασία αὐτή.

Καθὼς παρατηροῦμεν, ὅταν οἱ ἐργάται εἶναι 4, τελειώνουν τὴν ἐργασίαν εἰς 12 ἡμέρας. "Οταν οἱ ἐργάται γίνουν διπλάσιοι, χρειάζονται τὸ ἥμισυ τῶν ἡμερῶν, διὰ νὰ τελειώσουν τὴν ίδιαν ἐργασίαν. Καὶ ὅταν οἱ ἐργάται ἀπὸ 4 γίνουν 2, δηλ. 2 φοράς διλιγώτεροι, τότε θὰ χρειασθοῦν δύο φοράς περισσοτέρας ἡμέρας.

Καὶ εἰς τὸ παράδειγμα αὐτὸ βλέπομεν, ὅτι τὰ ποσά ἐργάται καὶ ἡμέραι ἔχουν σχέσιν μεταξύ των, δλλὰ ἀντίθετον ἀπὸ ἔκεινην, τὴν δόποιαν ἔχουν τὰ ἀνάλογα ποσά. Διότι ἐδῶ, ὅταν ἡ τιμὴ 4 τοῦ ποσοῦ τῶν ἐργατῶν διπλασιασθῇ, ἡ ἀντίστοιχος τιμὴ 12 τοῦ ποσοῦ τῶν ἡμερῶν διαιρεῖται διὰ 2. Καὶ ὅταν ἡ τιμὴ 4 τῶν ἐργατῶν διαιρεθῇ διὰ 2, ἡ ἀντίστοιχος τιμὴ 12 τοῦ ποσοῦ τῶν ἡμερῶν πολλαπλασιάζεται ἐπὶ 2.

‘Ομοίως, ἂν ἡ τιμὴ τοῦ ποσοῦ τῶν ἐργατῶν διαιρεθῇ διὰ 3, ἡ ἀντίστοιχος τιμὴ τοῦ ποσοῦ τῶν ἡμερῶν πολλαπλασιάζεται ἐπὶ 3.

Τὸ ποσά αὐτὰ λέγονται ἀντιστρόφως ἀνάλογα ἢ ἀπλῶς ἀντίστροφα ποσά.

Δύο ποσά λέγονται ἀντίστοιχος τιμής καὶ πολλαπλασιαζομένης τῆς τιμῆς τοῦ ἐνδός ποσοῦ ἐπὶ ἓνα ἀριθμόν, διαιρῆται ἡ ἀντίστοιχος πρὸς αὐτὴν τιμὴ τοῦ ἄλλου ποσοῦ διὰ τοῦ αὐτοῦ ἀριθμοῦ ἢ, διαιρούμενης τῆς τιμῆς τοῦ ἐνὸς ποσοῦ δι’ ἐνὸς ἀριθμοῦ, πολλαπλασιάζεται ἡ ἀντίστοιχος πρὸς αὐτὴν τιμὴ τοῦ ἄλλου ποσοῦ ἐπὶ τὸν αὐτὸν ἀριθμόν.

Σημείωσις. "Οταν αὔξάνεται ἐν ποσὸν καὶ τὸ ἄλλο ἐλαττοῦται, δὲν πρέπει νὰ νομίζωμεν ὅτι εἶναι τὰ ποσὰ ἀντίστροφα. Π.χ. Μία ἀμαξοστοιχία μὲ μίαν μηχανὴν διανύει μίαν ἀπόστασιν εἰς 10 ὥρας, ἡ αὐτὴ ἀμαξοστοιχία, ὅταν ἔχῃ δύο μηχανάς, δὲν ἔπειται ὅτι θὰ διανύσῃ τὴν ἀπόστασιν αὐτὴν εἰς 5 ὥρας, ἀλλὰ κατά τι ὀλιγώτερον τῶν 10 ὥρῶν. Τὰ ποσὰ δὲν εἶναι ἀντίστροφα, ἀλλὰ ποσὰ μεταβαλλόμενα ἀνομοίως.

Παρατήρησις. Ἀντίστροφα ποσὰ εἶναι :

‘Η ταχύτης καὶ ὁ χρόνος ποὺ χρειάζεται, διὰ νὰ διανύσωμεν ὥρις μένην ἀπόστασιν.

Αἱ ἡμέραι ποὺ χρειάζονται διὰ μίαν ἐργασίαν καὶ αἱ ὥραι τὰς ὅποιας ἐργαζόμεθα τὴν ἡμέραν, διὰ νὰ τελειώσῃ ἡ ἐργασία.

Τὸ μῆκος καὶ τὸ πλάτος ἐνὸς ὑφάσματος διὰ μίαν ἐνδυμασίαν.

Ἐρωτήσεις

α) Τί λέγεται ποσόν ;

β) Ποια ποσὰ λέγονται ἀνάλογα καὶ ποια ἀντίστροφα ;

γ) Τί παθαίνει ἡ τιμὴ τοῦ ποσοῦ τῶν δραχμῶν, ὅταν αὔξανῃ ὁ ἀριθμὸς τῶν τετραδίων, τὰ ὅποια ἀγοράζομεν ;

δ) Τί ποσὰ εἶναι τὰ χιλιόμετρα, τὰ ὅποια διανύει τὸ αὐτοκίνητον τὴν ὥραν, καὶ αἱ ὥραι ποὺ χρειάζονται, διὰ νὰ διανύσῃ μίαν ἀπόστασιν ;

ε) Διατί κιλὰ καὶ δραχμαὶ εἶναι ποσὰ ἀνάλογα ;

στ) Διατί ὁ ἀριθμὸς τῶν ἐργατῶν καὶ ὁ χρόνος περατώσεως μιᾶς ἐργασίας εἶναι ποσὰ ἀντίστροφα ;

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ (ἀπό μνήμης)

1. Ἀγοράζομεν 5 τετράδια καὶ πληρώνομεν 15 δραχμάς. Πόσον θὰ πληρώσωμεν διὰ διπλάσιον ἀριθμὸν τετραδίων καὶ πόσον διὰ τριπλάσιον ἀριθμὸν αύτῶν ;
2. Μὲ 8 δρχ. ἀγοράζομεν 8 κουλούρια· πόσα κουλούρια θὰ ἀγοράσωμεν μὲ 2 δρχ. καὶ πόσα μὲ μίαν δραχμήν ;
3. Διὰ νὰ γίνῃ μία σχολικὴ ποδιά χρειάζονται 2 μέτρα ὑφασμα πλάτους 1 μέτρου. Πόσον ὑφασμα πρέπει νὰ ἀγοράσωμεν, ἀν ἔχῃ πλάτος διπλάσιον ;
4. Ἐνα αὐτοκίνητον, ποὺ τρέχει μὲ 60 χιλιόμετρα τὴν ὡραν, φθάνει εἰς τὸν πρόορισμόν του μετὰ 2 ὥρας. Μετὰ πόσας ὥρας θὰ φθάσῃ, ἀν τρέχῃ 20 χιλιόμετρα τὴν ὡραν (λόγω βροχῆς) ;
5. Ἀν 6 ἐργάται τελειώνουν μίαν ἐργασίαν εἰς 10 ἡμέρας, πόσοι ἐργάται θὰ τὴν τελειώσουν εἰς 5 ἡμέρας ;
6. Οἱ μαθηταὶ μιᾶς κατασκηνώσεως ἔχουν τρόφιμα διὰ 18 ἡμέρας. Πόσας ἡμέρας θὰ περάσουν μὲ τὰ ἕδια τρόφιμα διπλάσιοι μαθηταὶ καὶ πόσας ἡμέρας οἱ μισοὶ μαθηταί ;

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ

ΜΕΘΟΔΟΙ

1. Ἀπλῆ μέθοδος τῶν τριῶν

α) Μὲ ποσὰ ἀνάλογα

Πρόβλημα. Τὰ 3 κιλὰ πορτοκάλια τιμῶνται 18 δραχμάς. Πόσον τιμῶνται τὰ 8 κιλὰ ἀπὸ τὰ ἴδια πορτοκάλια;

Σκέψις.

Εἰς τὸ πρόβλημα αὐτό, ὅπως βλέπομεν, μᾶς δίδεται ἡ τιμὴ τῶν 3 κιλῶν, δηλ. ἡ τιμὴ τῶν πολλῶν μονάδων, καὶ ζητεῖται ἡ τιμὴ τῶν 8 κιλῶν, δηλ. ἡ τιμὴ τῶν πολλῶν μονάδων πάλιν.

Ἐχομεν μάθει νὰ εύρισκωμεν τὴν τιμὴν τῶν πολλῶν μονάδων, ἀκρεῖ νὰ γνωρίζωμεν τὴν τιμὴν τῆς μιᾶς μονάδος. Ἐδῶ ὅμως δὲν γνωρίζομεν τὴν τιμὴν τῆς μιᾶς μονάδος. Εἶναι λοιπὸν ἀνάγκη νὰ τὴν εὕρωμεν· νὰ εὔρωμεν δηλ. πόσον ἀξίζει τὸ ἔνα κιλὸν καὶ κατόπιν θὰ εὕρωμεν πόσον ἀξίζουν τὰ 8 κιλά. Πρὸς τοῦτο θὰ χρησιμοποιήσωμεν τὴν ἀναγωγὴν εἰς τὴν μονάδα.

Α' Αναστικ. (Μὲ τὴν ἀναγωγὴν εἰς τὴν μονάδα).

Ἄφοῦ τὰ 3 κ. τιμῶνται 18 δρχ.

$$\text{τὸ } 1 \text{ κ. τιμᾶται } \frac{18}{3} \text{ δρχ.}$$

$$\text{τὰ } 8 \text{ κ. τιμῶνται } \frac{18 \times 8}{3} = \frac{144}{3} = 48 \text{ δρχ.}$$

Δὲν εἶναι ὅμως εὔκολον νὰ λύωμεν πάντοτε δλα τὰ προβλήματα μὲ τὴν ἀναγωγὴν εἰς τὴν μονάδα, διότι παρουσιάζονται ἀριθμοὶ δύσκολοι.

Εἶναι ἀνάγκη ἐπομένως νὰ εὕρωμεν ἔνα εὔκολον τρόπον, μίαν μέθοδον, νὰ τὰ λύσωμεν εὔκολα. Ἡ μέθοδος αὗτη εἶναι ἡ μέθοδος τῶν τριῶν.

Εἰς τὸ ἀνωτέρω πρόβλημα μᾶς δίδονται τρεῖς ἀριθμοί, δηλ. αἱ ἀντίστοιχοι τιμαὶ δύο ποσῶν (3 κιλὰ καὶ 18 δραχμαί) καὶ μία ἄλλη

τιμή τοῦ ἐνὸς ἔξι αὐτῶν τῶν ποσῶν (8 κιλά) καὶ ζητεῖται ἡ πρὸς αὐτὴν ἀντίστοιχος τιμὴ τοῦ ἄλλου ποσοῦ. Ἡ μέθοδος αὐτὴ λέγεται ἀπλῆ μέθοδος τῶν τριῶν.

Β' Λύσις. (Μὲ τὴν ἀπλῆν μέθοδον τῶν τριῶν).

Κατάταξις. Τὰ 3 κιλὰ τιμῶνται 18 δρχ.

$$\begin{array}{cccc} \text{»} & 8 & \text{»} & X \\ \hline & & & \text{»} \end{array}$$

Μετὰ τὴν κατάταξιν προσπαθοῦμεν νὰ εὔρωμεν τὴν σχέσιν, τὴν δόποιαν ἔχουν τὰ ποσὰ αὐτὰ μεταξύ των. Θὰ κάμωμεν δηλ. τὴν σύγκρισιν τῶν ποσῶν. Καὶ λέγομεν :

Ἄφοῦ τὰ 3 κιλὰ τιμῶνται 18 δρχ., τὰ διπλάσια κιλὰ τὰ τιμῶνται διπλασίας δραχμάς κ.ο.κ. "Αρα τὰ ποσὰ εἰναι ἀνάλογα. (Διατί ;)

Διὰ τὴν λύσιν τοῦ προβλήματος μὲ τὴν ἀπλῆν μέθοδον τῶν τριῶν θὰ μᾶς βοηθήσῃ ἡ λύσις του μὲ τὴν ἀναγωγὴν εἰς τὴν μονάδα. Ἐκεῖ ηὔραμεν ὅτι τὰ 8 κιλὰ τιμῶνται $\frac{18 \times 8}{3}$ δρχ.

"Αν παρατηρήσωμεν τοὺς ἀριθμούς, ὅπως τοὺς ἔχομεν κατατάξει, βλέπομεν ὅτι, διὰ νὰ εὔρωμεν πόσον τιμῶνται τὰ 8 κιλά, ἐπολλαπλασιάσαμεν τὸν ύπεράνω τοῦ X ἀριθμὸν 18 δρχ. ἐπὶ τὸ κλάσμα (τὸν λόγον) $\frac{3}{8}$, τὸ δόποιον σχηματίζουν αἱ δύο τιμαὶ 3 καὶ 8 τοῦ ἄλλου ποσοῦ (τῶν κιλῶν), ἀντεστραμμένον. "Εχομεν δηλαδή :

$$X = \frac{18 \times 8}{3} = \frac{6 \times 8}{1} = \frac{48}{1} = 48 \text{ δρχ.} \quad (\text{Απλοποιήσαμεν μὲ τὸ } 3).$$

Απάντησις. Τὰ 8 κιλὰ πορτοκάλια τιμῶνται 48 δραχμάς.

Σημείωσις. Λόγος ἐνὸς ἀριθμοῦ πρὸς ἄλλον λέγεται τὸ πηγίκον τῆς διαιρέσεως τοῦ πρώτου ἀριθμοῦ διὰ τοῦ δευτέρου π.χ. ὁ λόγος τοῦ 3 πρὸς τὸν 8 εἶναι $3 : 8$ ή $\frac{3}{8}$.

Συμπέρασμα. Διὰ νὰ λύσωμεν προβλήματα μὲ τὴν ἀπλῆν μέθοδον τῶν τριῶν, ὅταν τὰ ποσὰ εἰναι ἀνάλογα, πολλαπλασιάζομεν τὸν ύπεράνω τοῦ ἀγνώστου X ἀριθμὸν ἐπὶ τὸ κλάσμα, τὸ δόποιον σχηματίζουν αἱ δύο τιμαὶ τοῦ ἄλλου ποσοῦ, ἀντεστραμμένον.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

α) Ἀπό μηνής

7. Τὰ 5 μολύβια κοστίζουν 15 δρχ. Πόσον κοστίζουν 9 μολύβια;

8. Μὲ 4,40 δρχ. ἀγοράζομεν δύο παγωτά. Πόσα παγωτὰ θὰ ἀγοράσωμεν μὲ 11 δρχ.;

9. Διὰ 3 εἰσιτήρια εἰς τὸ λεωφορεῖον ἐπληρώσαμεν 5,40 δρχ. Πόσον θὰ ἐπληρώναμεν διὰ 5 εἰσιτήρια;

10. "Ἐνας ἔργάτης διὰ 2 ἡμερομίσθια λαμβάνει 240 δρχ. Πόσον θὰ λάβῃ διὰ 6 ἡμερομίσθια;

β) Γραπτῶς

11. Τὰ 2 κιλὰ λάδι κοστίζουν 64 δρχ. Πόσον κοστίζουν τὰ 16 κιλὰ λάδι τῆς ίδιας ποιότητος;

12. Διὰ 5 μέτρα ὑφάσματος ἐπληρώσαμεν 280 δρχ. "Ἄν ἀγοράσωμεν ἀκόμη 0,75 μ., πόσον θὰ πληρώσωμεν δι' αὐτό;

13. Οἱ 36^ο Κελσίου ἰσοδυναμοῦν πρὸς 28,8^ο Ρεωμύρου. "Οταν τὸ θερμόμετρον δεικνύῃ 42^ο Κελσίου, εἰς πόσους βαθμοὺς Ρεωμύρου ἀντιστοιχοῦν οὗτοι;

14. Αὐτοκίνητον εἰς 7 ὥρας διέτρεξεν ἀπόστασιν 434 χιλιομέτρων. Εἰς πόσας ὥρας θὰ διατρέξῃ ἀπόστασιν 1426 χιλιομέτρων, ἀντρέχῃ μὲ τὴν ίδιαν ταχύτητα;

15. Μία ὑφάντρα εἰς 3 ὥρας ὑφαίνει 2,50 μ. ὑφάσματος. Εἰς πόσας ὥρας θὰ ὑφάνῃ 17,50 μ. τοῦ ίδιου ὑφάσματος;

16. Εἰς μίαν μαθητικὴν κατασκήνωσιν ἔχειάσθησαν 520 κιλὰ ψωμὸν διὰ 20 ἡμέρας. Πόσα κιλὰ ψωμὶ ἔξωδευον τὴν ἑβδομάδα;

γ) Κάμετε καὶ σεῖς προβλήματα μὲ τὰ ἔντις ποσά :

Μὲ ἡμερομίσθια καὶ δραχμάς.

Μὲ κιλὰ καὶ δραχμάς.

Μὲ μέτρα καὶ δραχμάς.

Μὲ ὥρας καὶ χιλιόμετρα.

Μὲ κτηνοτρόφους : Ζῶα καὶ παραγωγὴ προϊόντων.

β) Μὲ ποσὰ ἀντίστροφα

Πρόβλημα. 3 ἐργάται, διὰ νὰ τρυγήσουν ἔνα ἀμπέλι, χρειάζονται 6 ἡμέρας. Πόσας ἡμέρας θὰ χρειασθοῦν 9 ἐργάται τῆς αὐτῆς ἀποδόσεως, διὰ νὰ τρυγήσουν τὸ ἰδιον ἀμπέλι;

Παρατήρησις: Καὶ εἰς τὸ πρόβλημα αύτὸ μᾶς δίδονται τρεῖς ἀριθμοὶ καὶ ζητεῖται ὁ τέταρτος, ὁ ὄποιος εἶναι ἄγνωστος. Δι’ αὐτὸ λέγομεν, ὅτι τὸ πρόβλημα αύτὸ εἶναι τῆς ἀπλῆς μεθόδου τῶν τριῶν. Διαφέρει ὅμως ἀπὸ τὸ προηγούμενον εἰς τὸ ὅτι τὰ ποσὰ δὲν ἔχουν τὴν αὐτὴν σχέσιν μεταξύ των. Διότι οἱ διπλάσιοι ἐργάται θὰ τελειώσουν τὴν ἴδιαν ἐργασίαν εἰς τὸ δεύτερον τοῦ χρόνου (εἰς μισὰς ἡμέρας), ὅπως τριπλάσιοι ἐργάται θὰ τὴν τελειώσουν εἰς τὸ τρίτον τοῦ χρόνου κ.ο.κ. "Αρα τὰ ποσὰ εἶναι ἀντίστροφα. (Διατί ;)

A' Λύσις. (Μὲ τὴν ἀναγωγὴν εἰς τὴν μονάδα)

Ἄφοῦ οἱ 3 ἐργάται χρειάζονται 6 ἡμέρας

δ 1 ἐργάτης χρειάζεται 6×3 ἡμέρας

καὶ οἱ 9 ἐργάται χρειάζονται $\frac{6 \times 3}{9}$ ἡμ. = $\frac{18}{9}$ = 2 ἡμ.

B' Λύσις. (Μὲ τὴν ἀπλῆν μέθοδον τῶν τριῶν) :

Κατάταξις. 3 ἐργάται χρειάζονται 6 ἡμέρας

9 » » X »

Σύγκρισις τῶν ποσῶν 'Αφοῦ οἱ 3 ἐργάται χρειάζονται 6 ἡμ., οἱ διπλάσιοι ἐργάται θὰ χρειασθοῦν μισὰς ἡμέρας (καὶ οἱ μισοὶ ἐργάται θὰ χρειασθοῦν διπλασίας ἡμέρας). Τὰ ποσὰ εἶναι ἀντίστροφα.

Εἰς τὴν λύσιν τοῦ προβλήματος τούτου μὲ τὴν ἀναγωγὴν εἰς τὴν μονάδα ηὕραμεν ὅτι οἱ 9 ἐργάται θὰ χρειασθοῦν $\frac{6 \times 3}{9}$ ἡμ. Δηλ.

ἐπιολλαπλασιάσαμεν τὸν ὑπεράνω τοῦ X ἀριθμὸν 6 ἡμ. Ἐπὶ τὸ κλάσμα (τὸν λόγον) $\frac{3}{9}$ ὅπως ἔχει, δηλ. ὅχι ἀντεστραμμένον.

Καὶ ἔχομεν :

$$X = 6 \times \frac{3}{9} = \frac{18}{9} = 2 \text{ ἡμέραι}$$

***Απάντησις.** Οἱ 9 ἐργάται θὰ τρυγήσουν τὸ ἀμπέλι εἰς 2 ἡμέρας.

Συμπέρασμα: Διὰ νὰ λύσωμεν προβλήματα μὲ τὴν ἀπλῆν μέθοδον τῶν τριῶν, δταν τὰ ποσὰ εἶναι ἀντίστροφα, πολλα- πλασιάζομεν τὸν ὑπερόνω τοῦ ἀγνώστου Χ ἀριθμὸν ἐπὶ τὸ κλάσμα, τὸ δποῖον σχηματίζονταί δέ ν τιμαὶ τοῦ ἄλλου ποσοῦ, ὅπως ἔχει (καὶ ὅχι ἀντεστραμμένον).

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

α) Ἀπὸ μνήμης.

17. 10 ἐργάται τελειώνουν μίαν ἐργασίαν εἰς 6 ἡμέρας, 5 ἐργά- ται τῆς αὐτῆς ἀποδόσεως εἰς πόσας ἡμέρας θὰ τὴν τελειώσουν;

18. Μία ὑφάντρα, ποὺ ἐργάζεται 8 ὥρας τὴν ἡμέραν, ὑφαίνει ἕνα ὑφασμα εἰς 6 ἡμέρας. Ἐν ἐργάζεται 4 ὥρας τὴν ἡμέραν, εἰς πό- σας ἡμέρας θὰ ὑφάνῃ τὸ αὐτὸν ὑφασμα;

19. 10 στρατιῶται ἔχουν τρόφιμα διὰ 24 ἡμέρας. Τριπλάσιοι στρατιῶται πόσας ἡμέρας θὰ περάσουν μὲ τὰ ἴδια τρόφιμα;

β) Γραπτῶς

20. Διὰ νὰ στρωθῇ τὸ πάτωμα ἐνὸς δωματίου χρειάζονται 26 σανίδες πλάτους 20 δακτύλων (πόντων). Πόσαι σανίδες πλάτους 13 δακτύλων καὶ μὲ τὸ αὐτὸν μῆκος θὰ χρειασθοῦν διὰ τὸν ἴδιον πάτωμα;

21. "Ενας ὀδοιπόρος, βαδίζων 8 ὥρας τὴν ἡμέραν, ἐπῆγεν ἀπὸ ἕνα χωρίον εἰς ἄλλο εἰς 5 ἡμέρας. Ἐν ἦθελε νὰ φθάσῃ μίαν ἡμέραν ἐνωρίτερον, πόσας ὥρας ἔπειτε νὰ βαδίζῃ τὴν ἡμέραν;

22. "Ενα αὐτοκίνητον, τὸ δποῖον τρέχει μὲ $\frac{1}{2}$ χιλιόμετρα

τὴν ὥραν, διέτρεξε μίαν ἀπόστασιν εἰς 3 ὥρας καὶ 20 π. Εἰς πόσας ὥρας θὰ διατρέξῃ τὴν ἴδιαν ἀπόστασιν μὲ ταχύτητα 60 χιλιομέτρων τὴν ὥραν.

23. Διὰ νὰ κατασκευασθῇ ἔνα χαλὶ χρειάζονται $12\frac{8}{10}$ μέτρα

ὑφασμα πλάτους 1 μέτρου. Πόσα μέτρα θὰ χρειασθοῦν διὰ τὸ αὐτὸν χαλὶ ἀπὸ ἄλλο ὑφασμα 0,80 μ. πλάτους;

24. Διὰ γίνη μία ἀνδρικὴ ἐνδυμασία χρειαζόμεθα 3 μ. ὑφα-

σμα πτλάτους 1,6 μ. Πόσα μέτρα θὰ χρειασθοῦν ἀπὸ ἄλλο ὑφασμα πτλάτους 1,2 μ;

25. Εἰς ἔνα φρούριον ὑπάρχουν 24 στρατιῶται καὶ ἔχουν τρόφιμα διὰ 2 μῆνας καὶ 10 ἡμέρας. Πόσον χρόνον θὰ περάσουν μὲ τὰ ἴδια τρόφιμα, ἂν οἱ στρατιῶται ἐλαττωθοῦν κατὰ 8;

26. Βουστάσιον μὲ 16 ἀγελάδας ἔχει τροφάς διὰ 24 ἡμέρας. Ἀν αἱ ἀγελάδες αὐξηθοῦν κατὰ 8, πόσας ἡμέρας θὰ περάσουν μὲ τὰς ἴδιας τροφάς;

Κάμετε καὶ σεῖς προβλήματα μὲ ποσὰ ἀντίστροφα.

γ) Γενικὰ προβλήματα.

27. Διὰ 12 ἀνδρικὰ ὑποκάμισα χρειάζονται 36 μ. ὑφάσματος. Πόσον ὑφασμα θὰ χρειασθῇ διὰ 18 ὅμοια ὑποκάμισα : α) εἰς μέτρα καὶ β) εἰς ὑάρδας ;

28. Τὰ $\frac{3}{4}$ μ. ὑφάσματος κοστίζουν 75 δρχ., πόσον κοστίζουν τὰ 15 μέτρα ;

29. Ἐργάτης, ἐργαζόμενος 8 ὥρας τὴν ἡμέραν, τελειώνει μίαν ἐργασίαν εἰς 20 ἡμέρας. Ἀν είργάζετο 2 ὥρας περισσότερον ἡμερησίως, εἰς πόσας ἡμέρας θὰ ἐτελείωνε τὴν ἐργασίαν αὐτήν ;

30. Μὲ ἡμερησίαν μερίδα ἄρτου 600 γραμμάριων περιοῦν οἱ στρατιῶται ἐνὸς φρουρίου μὲ μίαν ποσότητα ἀλεύρου ἐπὶ ἔνα μῆνα.

α) Ἀν ἡ μερὶς τοῦ ἄρτου ἐλαττωθῇ κατὰ 100 γραμμάρια ἡμερησίως, πόσας ἡμέρας θὰ περάσουν μὲ τὴν ἴδιαν ποσότητα ἀλεύρου;

β) Ἀν παραστῇ ἀνάγκη νὰ περάσουν οἱ στρατιῶται μὲ τὴν ἴδιαν ποσότητα ἀλεύρου $1\frac{1}{2}$ μῆνα, πόσον πρέπει νὰ ἐλαττωθῇ ἀκόμη ἡ ἡμερησία μερὶς τοῦ ἄρτου ἐκάστου στρατιώτου ;

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΙΣ

α) Εἰς τὰ προβλήματα, τὰ ὁποῖα λύονται μὲ τὴν ἀπλῆν μέθοδον τῶν τριῶν, δίδονται αἱ τιμαὶ δύο ποσῶν (ἀναλόγων ἡ ἀντιστρόφων) καὶ μία ἄλλη τιμὴ τοῦ ἐνὸς ἐκ τῶν δύο αὐτῶν ποσῶν καὶ ζητεῖται ἡ ἀντίστοιχος πρὸς αὐτὴν τιμὴ τοῦ ἄλλου ποσοῦ. Ἐπειδὴ εἰς τὰ προβλήματα αὐτὰ δίδονται τρεῖς ἀριθμοί καὶ ζητεῖται τὸ

ταρτος, διὰ τοῦτο ἡ μέθοδος (δ τρόπος), μὲ τὴν δποίαν τὰ λύ-
ομεν, λέγεται ἀπλῆ μέθοδος τῶν τριῶν.

β) Ἡ μέθοδος τῶν τριῶν εἶναι συντόμευσις τῆς ἀναγωγῆς εἰς
τὴν μονάδα.

γ) Διὰ νὰ λύσωμεν τὰ προβλήματα μὲ τὴν μέθοδον τῶν τριῶν,
βοηθούμεθα ἀπὸ τὴν σχέσιν, ἡ δποία ὑπάρχει μεταξὺ τῶν ποσῶν,
καὶ τὴν δποίαν εὐρίσκομεν μὲ τὴν σύγκρισιν.

δ) Ἀφοῦ κατατάξωμεν καὶ συγκρίνωμεν τὰ ποσά, προχωροῦ-
μεν εἰς τὴν λύσιν τοῦ προβλήματος.

ε) Διὰ νὰ λύσωμεν τὰ προβλήματα μὲ τὴν ἀπλῆ μέθοδον τῶν
τριῶν, ἐφαρμόζομεν τὸν ἔξῆς κανόνα :

*Κατατάσσομεν τὰ ποσὰ καὶ τὰ συγκρίνομεν. Κατόπιν πολ-
λαπλασιάζομεν τὸν ὑπεράνω τοῦ X ἀριθμὸν ἐπὶ τὸ κλάσμα, τὸ δ-
ποῖον σχηματίζοντας αἱ δύο τιμαὶ τοῦ ἄλλου ποσοῦ, ἀντεστραμμέ-
νον μὲν ὅταν τὰ ποσὰ εἶναι ἀνάλογα, ὅπως ἔχει δὲ ὅταν τὰ ποσὰ εἰ-
ναι ἀντίστροφα.*

2. ΠΟΣΟΣΤΑ

Γενικά. Ό χαρτοπώλης, δ παντοπώλης, δ ἔμπορος, οἱ δποῖοι
πωλοῦν διάφορα πράγματα, δπως γνωρίζετε, δὲν τὰ κατασκευάζουν
μόνοι των, ἀλλὰ τὰ ἀγοράζουν ἀπὸ ἄλλους· ἀπὸ μεγαλύτερα κατα-
στήματα, ἀπὸ ἀποθήκας ἢ καὶ ἀπ' εύθειας ἀπὸ τὰ ἐργοστάσια. Τὰ
πράγματα αὐτά, ποὺ ἀγοράζουν, τὰ μεταφέρουν εἰς τὰ καταστή-
ματά των καὶ τὰ μεταπωλοῦν.

"Ετσι δ χαρτοπώλης μας ἀγοράζει ἀπὸ τὴν ἀποθήκην τὰ μολύ-
βια 1 δρχ. τὸ ἔνα καὶ τὰ μεταπωλεῖ 1,20 δρχ. τὸ ἔνα. Καθὼς βλέπομεν,
ἀπὸ κάθε μολύβι, τὸ δποῖον κοστίζει 1 δραχμήν, κερδίζει 0,20 δρχ.,

"Εδῶ τὸ ποσὸν τῆς 1 δραχμῆς, τὸ δποῖον δίδει νὰ ἀγοράσῃ κά-
θε μολύβι, λέγεται τιμὴ ἀγορᾶς ἢ κόστος. Τὸ ποσὸν τῶν 1,20 δρχ.
τὸ δποῖον λαμβάνει ὅταν πωλῇ ἔνα μολύβι, λέγεται τιμὴ πωλήσεως.

"Υπάρχει δὲ διαφορά, καθὼς φαίνεται, μεταξὺ τῶν δύο αὐτῶν

τιμῶν. Ή διαφορά αύτη είς τὸ παράδειγμά μας είναι 0,20 δρχ. Αύτὸ τὸ ποσὸν λέγεται κέρδος. Λέγομεν δηλ. ὅτι ὁ χαρτοπώλης κερδίζει 0,20 δρχ. ἀπὸ κάθε μολύβι. Αὐτὸς ἀλλωστε είναι ὁ λόγος, διὰ τὸν δποῖον κάμνει τὴν ἐργασίαν αύτήν.

Σκεφθῆτε ὅτι ὁ χαρτοπώλης, ὅπως καὶ κάθε ἄλλος καταστηματάρχης, διατηρεῖ ἔνα κατάστημα, διὰ τὸ δποῖον πληρώνει ἕνοίκιον· πληρώνει ἀκόμη μεταφορικά, φωτισμὸν κλπ. Ἐργάζεται ὁ ἴδιος εἰς τὸ κατάστημα ἡ πληρώνει καὶ ὑπαλλήλους. Διὰ νὰ ἡμπορέσῃ λοιπὸν νὰ πληρώσῃ ὅλα αύτὰ τὰ ἔξοδα καὶ διὰ νὰ ζήσῃ ὁ ἴδιος καὶ νὰ συντηρήσῃ καὶ τὴν οἰκογένειάν του, προσθέτει εἰς τὴν τιμὴν ἀγορᾶς ἔνσα ποσόν, τὸ δποῖον δνομάζεται, ὅπως εἴπαμεν, κέρδος.

Τὸ ποσὸν τοῦ κέρδους δρίζεται ἀπὸ τὸ Κράτος καὶ δνομάζεται νόμιμον κέρδος. Εἰδικὴ ὑπηρεσία τοῦ Κράτους, ἡ Ἀγορανομία, δρίζει τὸ νόμιμον κέρδος εἰς τὰ διάφορα εἰδη. Εἰς τὸ ψωμὶ λ.χ. ἐπιτρέπει κέρδος 8 δραχμὰς εἰς τὰς 100 δραχμὰς, εἰς τὸ κρέας 15 δρχ. εἰς τὰς 100 δρχ., εἰς τὰ φροῦτα 30 δρχ. εἰς τὰς 100 δρχ., εἰς τὰ ὑφάσματα 20 δρχ. εἰς τὰς 100 δρχ. κλπ. Ὡρισμένα εἰδη, ίδιως τὰ ψιλικά, ἔχουν μεγαλύτερον κέρδος· εἰς αύτὰ τὸ κέρδος φθάνει 100 δρχ. εἰς τὰς 100 δρχ. ἡ καὶ περισσότερον. Ἔτσι μία βελόνα ἀξίας 0,10 δρχ. πωλεῖται 0,20 δρχ.

Ωστε: Κέρδος είναι τὸ ποσόν, τὸ δποῖον προσθέτον οἱ ἔμποροι εἰς τὸ κόστος τῶν ἔμπορευμάτων, ὅταν τὰ πωλοῦν

Τὸ κέρδος αύτὸ δ ἔμπορος δὲν τὸ ὑπολογίζει εἰς ὅλα τὰ χρήματα, τὰ δποῖα δίδει νὰ ἀγοράσῃ διάφορα ἔμπορεύματα. Τὸ ὑπολογίζει εἰς τὰς 100 δρχ. ἡ εἰς τὰς 1000 δρχ., διὰ νὰ γνωρίζῃ πόσον πρέπει νὰ πωλῇ κάθε πρᾶγμα.

Τὸ ποσὸν τῶν 100 δρχ. ἡ τῶν 1000 δρχ., ἐπὶ τοῦ δποίου ὑπολογίζεται τὸ κέρδος είναι 100 ἡ 1000 μονάδες τοῦ ἀρχικοῦ ποσοῦ.

Εἰς τὰ παραδείγματά μας ἀρχικὸν ποσὸν είναι τὸ κόστος καὶ ποσοστὸν είναι τὸ κέρδος.

Εἴπαμεν δητι ὁ ἔμπορος εἰς τὰ ὑφάσματα, ὅταν τὰ πωλῇ, κερδίζει 20 δρχ. εἰς τὰς 100 δρχ. Αὔτὸς εἰς τὴν ἀριθμητικὴν διὰ συντομίαν τὸ γράφουμεν ἔτσι : 20% καὶ τὸ διαβάζομεν 20 τοῖς ἑκατόν.

Όμοιώς τὸ 20 εἰς τὰ 1000 τὸ γράφομεν ἔτσι : 20 %_{₀₀} καὶ τὸ διαβάζομεν 20 τοῖς χιλίοις.

Αὐτὸ τὸ 20% (20 τοῖς ἑκατόν) ή 20 %_{₀₀} (20 τοῖς χιλίοις) δύνομά-
ζεται τόσον τοῖς ἑκατόν (%) ή τόσον τοῖς χιλίοις (%_{₀₀}).

Ο ἐμπορος, ὅπως εἴπαμεν, πωλεῖ τὰ ἐμπορεύματά του, διὰ νὰ
κερδίσῃ. Μερικάς φοράς ὅμως ἀναγκάζεται νὰ πωλήσῃ τὰ ἐμπορεύ-
ματά του εἰς τιμὴν μικροτέραν τῆς ἀγορᾶς (τοῦ κόστους). Π.χ. ἔνας
ἐμπορος φρούτων ἡγόρασε τὰ πεπόνια πρὸς 5 δρχ. τὸ κιλὸν ἐπειδὴ
ὅμως ἔφερον εἰς τὴν ἀγορὰν πάρα πολλὰ πεπόνια καὶ εἰς μικροτέραν
τιμὴν, ἀναγκάζεται νὰ τὰ πωλήσῃ πρὸς 4 δρχ. τὸ κιλόν, διὰ νὰ μὴ
τοῦ μείνουν καὶ χαλάσουν.

Ἐδῶ βλέπομεν ὅτι εἰς κάθε κιλὸν ἔχει ζημίαν 1 δραχμήν.

Ω στε : Ζημία είναι τὸ ποσόν, τὸ ὅποιον χάνει ὁ ἐμπορος,
ὅταν πωλῇ τὰ ἐμπορεύματα εἰς τιμὴν μιջοτέραν ἀπὸ τὸ κόστος.

Καὶ τὴν ζημίαν τὴν ὑπολογίζομεν μὲ βάσιν τὰς 100 δραχμάς.
Ἐπομένως, ἀφοῦ ὁ ἐμπορος εἰς τὰς 5 δρχ. εἶχε ζημίαν 1 δρχ., εἰς τὰς
100 δρχ. εἶχε ζημίαν 20 δρχ. Αὐτὸ τὸ γράφομεν 20% καὶ τὸ διαβάζομεν
20 τοῖς ἑκατόν.

Ἄλλοι ἐμποροι πάλιν εἰς ὥρισμένην ἐποχὴν τοῦ ἔτους πωλοῦν
τὰ ἐμπορεύματά των εἰς τιμὴν μικροτέραν τῆς ὥρισμένης περιορίζουν
δηλ. τὸ κέρδος των. Τότε λέγομεν ὅτι πωλοῦν μὲ ἕκπτωσιν 20%, 25%,
30%.

Τὸ ποσόν, τὸ ὅποιον ἀναλογεῖ ἐπὶ τῆς ὅλης ἀξίας καὶ τὸ ὅ-
ποιον εὑρίσκεται ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ 100 ή τοῦ 1000, λέγεται πο-
σοστὸν.

Ἡ ἔκφρασις «τόσον τοῖς ἑκατόν» ή «τόσον τοῖς χιλίοις» χρησιμο-
ποιεῖται εἰς πολλὰς περιπτώσεις :

α) Πολλοὶ σερβιτόροι εἰς μεγάλα ἔστιατόρια, ζαχαροπλαστεῖα
κλπ. ἐργάζονται μὲ ποσοστὰ ἐπὶ τῶν εἰσπράξεων. Ἐπίσης οἱ εἰσ-
πράκτορες ἐταιρειῶν ή συλλόγων ἐργάζονται καὶ λαμβάνουν ποσο-
στὰ ἐπὶ τῶν χρημάτων, τὰ ὅποια εἰσπράττουν. Αἱ κρατήσεις ἐπὶ

τοῦ μισθοῦ τῶν ἑργαζομένων ὑπολογίζονται ἐπὶ τοῖς ἑκατόντῃ λ.χ. 4%. Οἱ θάνατοι καὶ αἱ γεννήσεις ὑπολογίζονται ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν ἥ ἐπὶ τοῖς χιλίοις.

β) Μερικοὶ ἀνθρώποι προμηθεύουν εἰς ἐμπορευομένους ἐμπορεύματα καὶ λαμβάνουν ὡς ἀμοιβὴν ποσοστά, τὰ δποῖα λέγονται προμήθεια.

γ) Διὰ τὴν ἀγορὰν ἥ πώλησιν οἰκοπέδων ἥ οἰκιῶν, καθὼς καὶ διὰ τὴν ἔνοικίασιν οἰκιῶν ἥ καταστημάτων, χρησιμοποιοῦνται οἱ κτηματομεστίται, οἱ δποῖοι ὡς ἀμοιβὴν λαμβάνουν ποσοστά, τὰ δποῖα λέγονται μεσιτεία.

δ) Τὰ σπίτια ἥ τὰ καταστήματα, καθὼς καὶ τὰ ἐμπορεύματα, ἀσφαλίζονται εἰς Ἀσφαλιστικὰς Ἐταιρείας κατὰ τῆς πυρκαϊδᾶς καὶ δλλων κινδύνων καὶ πληρώνουν ἀσφάλιστρα. Αὐτὰ ὑπολογίζονται ἐπὶ τῶν 1000 δραχμῶν π.χ. 2 % (2 τοῖς χιλίοις). Ἡ ἀσφάλισις σήμερον ἔχει ἀναπτυχθῆ πολύ· ἔτσι γίνεται καὶ ἀσφάλισις πλοίων, αὐτοκινήτων κλπ., καθὼς καὶ ἀσφάλισις ζωῆς.

ε) Τὸ ἀπόβαρον (ἥ διαφορὰ τοῦ καθαροῦ βάρους ἀπὸ τὸ μικτόν) εἰς τὰ ἐμπορεύματα ὑπολογίζεται τόσον τοῖς ἑκατὸν ἐπὶ τοῦ μικτοῦ βάρους.

στ) Οἱ φόροι τοῦ Δημοσίου καθορίζονται τόσον τοῖς ἑκατὸν ἐπὶ τῶν εἰσοδημάτων.

Τὰ προβλήματα, εἰς τὰ δποῖα τὸ κέρδος, ἥ ζημία, ἥ ἔκπτωσις, ἥ προμήθεια, ἥ μεσιτεία, ἥ ἀσφάλεια κλπ. ὑπολογίζονται ἐπὶ 100 ἥ 1000 μονάδων ἐνὸς ποσοῦ, λέγονται προβλήματα ποσοστῶν.

Τὰ προβλήματα τῶν ποσοστῶν εἴναι εὔκολα καὶ λύονται μὲ τὴν ἀπλῆν μέθοδον τῶν τριῶν. Τὰ ποσὰ των εἶναι πάντοτε ἀνάλογα. Πρέπει μόνον νὰ προσέχωμεν κατὰ τὴν κατάταξιν τοῦ προβλήματος, ὅστε τὰ δμοειδῆ ποσὰ νὰ τὰ γράψωμεν εἰς τὴν αὐτὴν κατακόρυφον στήλην.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ (ἀπὸ μνήμης)

31. Νὰ εῦρετε τὸ 1% τῶν 500 δρχ., τῶν 800 δρχ., τῶν 6.000 δρχ.

32. Νὰ εῦρετε τὸ 2% τῶν 400 δρχ., τῶν 1.200 δρχ., τῶν 30.000 δρχ.

33. Νὰ εῦρετε τὸ 5% τῶν 600 δρχ., τῶν 9.000 δρχ., τῶν 40.000 δρχ.

Σημείωσις. Τὸ 1% ἐνὸς ἀριθμοῦ εύρισκεται εὔκολα, ἢν διαιρέσωμεν τὸν ἀριθμὸν αὐτὸν διὰ 100.

Τὸ 2% τὸ εύρισκομεν, ἢν διαιρέσωμεν τὸν ἀριθμὸν διὰ 100 καὶ πολλαπλασιάσωμεν ἐπὶ 2· κ.ο.κ.

Διὰ νὰ εύρωμεν π.χ. τὸ 2% τῶν 5.400, διαιροῦμεν διὰ 100 καὶ τὸ πηγλίκον τὸ πολλαπλασιάζομεν ἐπὶ 2. Δῆλον. $5.400 : 100 = 54 \times 2 = 108$.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ

(Απὸ μνήμης)

34. Ὁ παντοπώλης ἀγοράζει τὴν ζάχαριν 11 δρχ. τὸ κιλὸν καὶ τὴν πωλεῖ 13,30 δρχ. τὸ κιλόν. Πόσον κερδίζει εἰς τὸ κιλόν;

35. Ὁ κρεοπώλης ἀγοράζει τὸ κρέας 32 δρχ. τὸ κιλὸν καὶ τὸ πωλεῖ μὲ κέρδος 5,40 δρχ. κατὰ κιλόν. Πόσον πωλεῖ τὸ κιλόν;

36. Ὁ πωροπώλης ἀγοράζει φροῦτα ἀξίας 1.250 δρχ. καὶ τὰ πωλεῖ 1.150 δρχ. Πόσον ζημιώνεται;

37. Ὁ εμπόρος ἀγοράζει ἐμπορεύματα ἀξίας 2.600 δρχ. καὶ τὰ πωλεῖ μὲ ἔκπτωσιν 260 δρχ. Πόσον τὰ πωλεῖ;

38. Μεσίτης ἐπώλησεν οἰκίαν ἀξίας 300.000 δρχ. μὲ μεσιτείαν 4%. Πόσην μεσιτείαν θὰ λάβῃ;

Περιπτώσεις

α) Δίδεται τὸ τόσον τοῖς ἑκατὸν (%) καὶ ζητεῖται τὸ κέρδος ἢ ἡ ζημία.

Πρόβλημα 1. Ἐνας μικροπωλητὴς πωλεῖ τὰ ἐμπορεύματά του μὲ κέρδος 25%. Ἀν πωλήσῃ ἐμπορεύματα ἀξίας 400 δρχ., πόσον κέρδος θὰ ἔχῃ;

Λύσις: α' Ἀπὸ μνήμης. Ἀν ἡ ἀξία τῶν ἐμπορευμάτων ἦτο 100 δρχ., θὰ κέρδιζεν 25 δρχ. Τώρα, ποὺ ἡ ἀξία των εἶναι 400 δρχ., θὰ κερδίσῃ $25 \times 4 = 100$ δρχ.

β) Μὲ τὴν ἀπλῆν μέθοδον τῶν τριῶν.

Κατάταξις.	Eis	100 δρχ.	κερδίζει	25 δρχ.
	»	400	»	X »

$$X = 25 \times \frac{400}{100} = 100 \text{ δρχ.}$$

*Απάντησις. Θὰ ἔχῃ κέρδος 100 δρχ.

Πρόβλημα 2. "Εμπορος ἐπώλησε ραδιόφωνον ἀξίας 1500 μὲ ἔκπτωσιν 20 %. Πόση ἦτο ἡ ἔκπτωσις ;

Κατάταξις.	Δι'	ἐμπόρευμα	ἀξίας	100 δρχ.	γίνεται	ἴκ/σις	20 δρχ.
	»	»	»	1500	»	»	X »

$$\text{Λύσις. } X = 20 \times \frac{1500}{100} = 300 \text{ δρχ.}$$

*Απάντησις 'Η ἔκπτωσις ἦτο 300 δρχ.

Προβλήματα

39. "Ενας ἔμπορος ἐπώλησεν ἔμπορεύματα ἀξίας 125.000 δρχ. μὲ κέρδος 15%. Πόσας δραχμὰς ἐκέρδισεν ;

40. 'Οπωροπώλης ἤγόρασε φροῦτα ἀξίας 3.750 δρχ. καὶ τὰ μετεπώλησε μὲ ζημίαν 5%. Πόσας δρχ. ἐζημιώθη ;

41. "Εμπορος πωλεῖ τὰ ὑφάσματα μὲ ἔκπτωσιν 25%. Πόσον θὰ πληρώσωμεν διὰ τὸ μέτρον ὑφάσματος, τὸ δποίον ἐπωλεῖτο πρὸς 240 δρχ. ;

42. Εἰσπράκτωρ ἐβδομαδιαίας ἐφημερίδος εἰσπράττει τὰς συνδρομὰς αὐτῆς μὲ ποσοστὰ 20%. Σήμερον εἰσέπραξε 4.500 δρχ. Πόσας δρχ. θὰ κρατήσῃ διὰ ποσοστά ;

43. "Ενας ἡσφάλισε τὴν οἰκίαν του ἀξίας 425.000 δρχ. πρὸς 2,5 %. Πόσον θὰ πληρώσῃ δι' ἀσφάλιστρα ;

β) Δίδεται τὸ ποσὸν τοῦ κέρδους ἢ τῆς ζημίας καὶ ζητεῖται τὸ τόσον τοῖς ἑκατὸν (%) ἢ τοῖς χιλίοις (%) .

Πρόβλημα 1. "Ενας ἔμπορος ἐπώλησεν ὑφασμα, τοῦ δποίον τὸ μέτρον ἐκόστιζεν 300 δρχ., πρὸς 315 δρχ. τὸ μέτρον. Πόσον τοῖς ἑκατὸν ἐκέρδισεν ;

Κατάταξις.

Εις έμπόρευμα	ἀξίας	300 δρχ.	κερδίζει	15 δρχ.	(315 - 300)
»	»	100 »	»	X »	

$$\text{Αύσις. } X = 15 \times \frac{100}{300} = 5 \text{ δρχ.}$$

Απάντησις. Έκέρδισεν 5%.

Πρόβλημα 2. "Εμπορος ήγόρασε φροῦτα ἀξίας 12.000 δρχ., τὰ μετεπώλησε δὲ ἀντὶ 11.400 δρχ. Πόσον τοῖς ἑκατὸν ἐζημιώθη ;

Κατάταξις.

Από έμπόρευμα	ἀξίας	12.000 δρχ.	ἐζημιώθη	600 δρχ.	(12000-11400)
Από	»	100 »	»	X »	

$$\text{Αύσις. } X = 600 \times \frac{100}{12.000} = 5 \text{ δρχ.}$$

Απάντησις. Εζημιώθη 5%.

Προβλήματα

44. Ζωέμπορος ήγόρασεν ἵππον ἀξίας 3.000 δρχ. καὶ τὸν μετεπώλησεν ἀντὶ 3.600 δρχ. Πόσον τοῖς ἑκατὸν ἐκέρδισεν ;

45. "Ενας ήγόρασεν ἔνα αὐτοκίνητον ἀντὶ 90.000 δρχ. Τὸ μετεπώλησεν καὶ ἐζημιώθη 4.500 δρχ. Πόσον τοῖς ἑκατὸν ἐζημιώθη ;

46. "Ενας ἔμπορος αύγῶν ἔφερε διὰ τὸ Πάσχα 12.000 αύγά. Απ' αὐτὰ ἔσπασαν 360 αύγά. Πόσα τοῖς χιλίοις ἔσπασαν ;

47. "Εμπορος ήγόρασεν ύφασμα πρὸς 600 δρχ. τὸ τόπι (40 μέτρων) καὶ τὸ μετεπώλησεν πρὸς 18 δρχ. τὸ μέτρον. Πόσον τοῖς ἑκατὸν κερδίζει ἐπὶ τῆς τιμῆς τῆς ἀγορᾶς ;

γ) Δίδεται τὸ τόσον τοῖς ἑκατὸν καὶ ἡ τιμὴ ἀγορᾶς καὶ ζητεῖται ἡ τιμὴ πωλήσεως.

Πρόβλημα. "Ενα ραδιόφωνον κόστους 800 δρχ. πωλεῖται μὲν κέρδος 12 %. Πόσον πωλεῖται ;

Αύσις α'. Κατάταξις. Εις τὰς 100 δρχ. κερδίζει 12 δρχ.

$$\text{» } \text{» } 800 \text{ » } \text{» } X \text{ » }$$

$$X = 12 \times \frac{800}{100} = 96 \text{ δρχ. (κέρδος)}$$

Τιμή πωλήσεως : $800 + 96 = 896$ δρχ.

Λύσις β'. Κατάταξις. "Οταν άξιζη 100 δρχ. πωλεῖται 112 δρχ.
 $(100 + 12)$ » 800 » X »

$$X = 112 \times \frac{800}{100} = 896 \text{ δρχ. (τιμή πωλήσεως).}$$

***Απάντησις.** Τὸ ραδιόφωνον πωλεῖται 896 δρχ.

Παρατήρησις. Διὰ νὰ εὔρωμεν τὴν τιμὴν πωλήσεως ἢ εύρισκομεν πρῶτον τὸ κέρδος καὶ τὸ προσθέτομεν εἰς τὴν τιμὴν τῆς ἀγορᾶς ἢ εύρισκομεν ἀμέσως εἰς τὴν κατάταξιν τὴν τιμὴν τῆς πωλήσεως τῶν 100 δρχ. καὶ λύομεν κατόπιν τὸ πρόβλημα.

Προβλήματα

48. Ὁ κρεοπώλης ἀγοράζει τὸ κρέας 30 δρχ. τὸ κιλὸν καὶ τὸ πωλεῖ μὲ κέρδος 20%. Πόσον πωλεῖ τὸ κιλόν;

49. Ἐνας ἐργολάβος οἰκοδομῶν ἔκτισε μίαν οἰκίαν, ἡ δποία τοῦ ἔκόστισεν 750.000 δρχ. Τὴν ἐπώλησε μὲ κέρδος 12%. Πόσον τὴν ἐπώλησεν;

50. Ἐμπορος ἀγοράζει ὑφασμα πρὸς 60 δρχ. τὸ μέτρον καὶ τὸ πωλεῖ μὲ ἔκπτωσιν 15%. Πόσον πωλεῖ τὸ μέτρον;

51. Τὰ μολύβια μπίκ κοστίζουν 2 δρχ. τὸ ἕνα καὶ πωλοῦνται μὲ κέρδος 25 %. Πόσον πωλεῖται ἔκαστον;

δ) Δίδεται ἡ τιμὴ τῆς ἀγορᾶς καὶ ἡ τιμὴ πωλήσεως καὶ ζητεῖται τὸ τόσον τοῖς ἑκατὸν (%) ἢ τοῖς χιλίοις (‰).

Πρόβλημα 1. Ἐμπορος ἦγράσεν ὑφασμα πρὸς 64 δρχ. τὸ μέτρον καὶ τὸ πωλεῖ πρὸς 72 δρχ. τὸ μέτρον. Πόσον τοῖς ἑκατὸν κερδίζει;

Κατάταξις. Εἰς ἐμπόρευμα ἄξιας 64 δρχ. κερδίζει 8 δρχ. ($72 - 64$)

$$\text{»} \quad \text{»} \quad \text{»} \quad 100 \quad \text{»} \quad \text{»} \quad \text{X} \quad \text{»}$$

$$X = 8 \times \frac{100}{64} = 12,5 \text{ δρχ.}$$

***Απάντησις.** Τὸ κέρδος του ἥτο 12,5%.

Πρόβλημα 2. Κτηματίας ήγόρασεν κτήμα αντί 88.000 δρχ., τὸ ὄποιον μετεπώλησεν αντὶ 85.800 δραχμῶν. Πόσον νοῖς ἔκατὸν ἡ τιμὴ του;

Κατάταξις

$$\begin{array}{cccccc} \text{'Επὶ} & \text{ἀξίας} & 88.000 & \text{δρχ.} & \text{ἔζημιώθη} & 2200 \text{ δρχ.} \\ \text{»} & \text{»} & 100 & \text{»} & \text{»} & \text{X} \text{ »} \end{array}$$

$$X = 2.200 \times \frac{100}{88.000} = 2,5 \text{ δρχ.}$$

Απάντησις. Η τιμὴ του ἡτο 2,5 %.

Προβλήματα

52. Χαρτοπώλης ἀγοράζει εἰδος τετραδίων τιρὸς 1,25 δρχ. τὸ καθένα καὶ τὰ πωλεῖ πικὸς 1,50 δρχ. ἔκαστον. Πόσον τοῖς ἔκατὸν κερδίζει;

53. Η κατασκευὴ ἑιὸς δρόμου ὑπελογίσθη ὅτι θὰ στοιχίσῃ 275.000 δρχ. Ἐργολάβος Δημοσίων ἔργων ἀναλαμψάει τὴν κατασκευὴν τοῦ δρόμου αὐτοῦ ἀντὶ 233.750 δραχμῶν. Εἰς τινόσον τοῖς ἔκατὸν ἀνῆλθεν ἡ ἔκπτωσις;

54. Ἔνας παντοπώλης ἡγόρασεν ἔνα δοχεῖον λιόνδι ἀντὶ 450 δρχ. καὶ τὸ μετεπώλησεν ἀντὶ 540 δρχ. Πόσον τοῖς ἔκατον ἐκέρδισεν;

55. Ὁπωροπώλης ἀπὸ φροῦτα ἀξίας 1.800 δρχ. εἰσέπραξεν κατὰ τὴν πώλησίν των 1.728 δρχ. Πόσον τοῖς ἔκατὸν ἔζημιώθη;

ε) Δίδεται ἡ τιμὴ πωλήσεως καὶ ζητεῖται ἡ τιμὴ ἀγορᾶς.

Πρόβλημα 1. Ζωέμπορος μετεπώλησεν ἵππον ἀντὶ 4.200 δρχ. καὶ ἐκέρδισεν 20 % ἐπὶ τῆς τιμῆς ἀγορᾶς τούτου. Πόσον εἰχεν ἀγοράσει τὸν ἵππον καὶ πόσον ἐκέρδισε;

Σκέψις. Ἀν ὁ ἵππος ἡτο ἀξίας 100 δρχ., μὲ κέρδος 20% θὰ τὸν ἐπώλει $100 + 20 = 120$ δρχ.

Κατάταξις. 120 δρχ. τιμὴ πωλήσεως 100 δρχ. τιμὴ ἀγορᾶς

$$\begin{array}{cccccc} 4.200 & \text{»} & \text{»} & \text{»} & \text{X} & \text{»} \end{array}$$

$$\text{Λύσις.} \quad X = 100 \times \frac{4.200}{120} = 3.500 \text{ δρχ. (τιμὴ ἀγορᾶς).}$$

Κέρδος = 4.200 (τιμή πωλήσεως) — 3.500 (τιμή ἀγορᾶς) =
= 700 δρχ.

*Απάντησις. Είχεν ἀγοράσει τὸν ἵππον 3.500 δρχ. καὶ ἐκέρδισεν
ἐκ τῆς πωλήσεως 700 δραχμάς.

Πρόβλημα 2. "Ενας ταχυδρομικὸς διανομεὺς μετεπώλησε τὸ πο-
δήλατόν του ἀντὶ 1.800 δρχ. μὲν ζημίαν 20% ἐπὶ τῆς ἀξίας του. Πόσον
είχεν ἀγοράσει τοῦτο καὶ πόσον ἔζημιώθη ;

Σκέψις. "Αν τὸ ποδήλατον τὸ εἰχεν ἀγοράσει 100 δρχ., μετὰ τὴν
ζημίαν (ἢ τὴν ἔκπτωσιν) 20% θὰ τὸ ἐπώλει 100 — 20 = 80 δρχ.

Κατάταξις. 80 δρχ. τιμὴ πωλήσεως 100 δρχ. τιμὴ ἀγορᾶς
1.800 » » » X » » »

Αύστις. X = 100 × $\frac{1800}{80} = 2.250$ δρχ. (τιμὴ ἀγορᾶς).

Ζημία = 2.250 (τιμὴ ἀγορᾶς) — 1.800 (τιμὴ πωλήσεως) =
= 450 δρχ.

*Απάντησις. Τὸ ποδήλατον τὸ εἰχεν ἀγοράσει 2.250 δρχ. καὶ
ἐκ τῆς πωλήσεως ἔζημιώθη 450 δρχ.

Προβλήματα

56. 'Εμπόρευμα ἐπωλήθη ἀντὶ 25.400 δρχ. μὲ κέρδος 25%. Ποία
ἡ ἀξία του καὶ πόσον τὸ κέρδος ;

57. "Ενας ἔμπορος ἐπώλησεν ἐμπόρευμα ἀντὶ 22.000 δρχ. μὲ
ζημίαν 12%. Ποίας ἀξίας ἦτο τὸ ἐμπόρευμα ;

58. Μετεπώλησεν κάποιος οἰκίαν ἀντὶ 360.000 δρχ. μὲ ζημίαν
20%. Πόσον είχεν ἀγοράσει τὴν οἰκίαν καὶ πόσον ἔζημιώθη ;

Διάφορα προβλήματα ποσοστῶν

59. 'Υπαλληλος ἐμπορικοῦ καταστήματος ἐργάζεται μὲ ποσοστὰ
12,5% ἐπὶ τῶν εισπράξεων. Αὐτὸν τὸν μῆνα ἐπώλησεν ἐμπορεύματα
ἀξίας 27.560 δρχ. Πόσα ποσοστὰ θὰ λάβῃ ;

60. "Ενας ἔμπορος ἤγόρασε τυρὶ 'Ολλανδίας πρὸ 35 δρχ. τὸ

κιλόν. Τὰ ἔξοδα μεταφορᾶς ἀνήλθον εἰς 7,5%, τὸ μεταπωλεῖ δὲ μὲ κέρδος 20 %. Πόσον πωλεῖ τὸ κιλόν ;

61. Τὸ μικτὸν βάρος ἐμπορεύματος εἶναι 7.500 κιλά, τὸ δὲ καθαρὸν βάρος του εἶναι $7.312 \frac{1}{2}$ κιλά. Πόσον τοῖς ἑκατὸν ἥτο τὸ ἀπόβαρον;

62. Αἱ κρατήσεις ἐπὶ τοῦ μηνιαίου μισθοῦ ἔνὸς ὑπαλλήλου ἀνέρχονται εἰς 13,5%, λαμβάνει δὲ κατὰ μῆνα καθαρὰ 2.595 δραχμάς. Ποῖος εἶναι ὁ μηνιαῖος μισθός του ;

63. Παραγγελιοδόχος ἀγοράζει διὰ λογαριασμὸν ἐμπόρου ἐμπορεύματα ἀξίας 75.800 δρχ. Πόση εἶναι ἡ προμήθειά του πρὸς 2%;

64. Μεσίτης προμηθεύει εἰς ἐμπορον 1750 κιλὰ λάδι πρὸς 28 δρχ. τὸ κιλόν. Πόση εἶναι ἡ προμήθειά του πρὸς 1,5% ;

65. Τὸ καθαρὸν βάρος ἐμπορεύματος ἥτο 34.435 χιλιόγραμμα (κιλά) μετὰ τὴν ἀφαίρεσιν 3% ποὺ ἥτο τὸ ἀπόβαρον. Πόσον ἥτο τὸ ἀπόβαρον καὶ πόσον τὸ μικτὸν βάρος ;

66. Ἡγοράσαμεν 13 μέτρα ὑφάσματος μὲ ἕκπτωσιν 15% ἀντὶ 552,50 δρχ. Πόσον ἐκόστιζε τὸ μέτρον χωρὶς τὴν ἕκπτωσιν ;

67. "Ενας ἐμπόρος ἐπώλησε τεμάχιον ὑφάσματος μὲ κέρδος 7,25 % ἐπὶ τῆς ἀξίας τῆς ἀγορᾶς του καὶ εἰσέπραξεν ἐκ τῆς πωλήσεώς του 34.320 δρχ. Πόσον τὸ εἶχεν ἀγοράσει ;

68. Ἐμπόρευμα ἐπωλήθη μὲ ζημίαν 15 % ἀντὶ 17.000 δρχ. Ποία ἥτο ἡ ἀξία τοῦ ἐμπορεύματος καὶ πόση ἡ ζημία ;

69. Διαμέρισμα ἐπωλήθη ἀντὶ 320.000 δρχ. μὲ κέρδος 28 %. Ποία ἡ τιμὴ ἀγορᾶς καὶ πόσον τὸ κέρδος ;

70. "Ἐμπόρος πωλῶν τὰ ἐμπορεύματά του μὲ κέρδος 20 % εἰσέπραξε μίαν ἡμέραν ἐκ τῆς πωλήσεως 3.600 δρχ. Πόση ἥτο ἡ ἀξία τῶν πωληθέντων ἐμπορευμάτων καὶ πόσον τὸ κέρδος ;

71. "Ενας ἴδιοκτήτης οἰκίας εἰσπράττει ἀπὸ ἐνοίκια 4.250 δρχ. μηναίως, πληρώνει δὲ διὰ φόρους καὶ ἄλλα ἔξοδα ἐτησίως 30 % ἐπὶ τῶν ἐνοικίων. Πόσον εἶναι τὸ καθαρὸν ἐτήσιον εἰσόδημά του ἐκ τῶν ἐνοικίων ;

72. Τὸ μικτὸν βάρος πωληθέντος ἐλαίου εἶναι 3.560 κιλά. Ἀν τὸ ἀπόβαρον ὑπολογίζεται εἰς 5 % ἐπὶ τοῦ μικτοῦ βάρους, πόσον εἶναι τὸ καθαρὸν βάρος του καὶ ποία ἡ ἀξία του πρὸς 32 δρχ. τὸ κιλόν ;

73. Ἐμπορος ἐπώλησε τὰ $\frac{3}{4}$ ἑνὸς ὑφάσματος πρὸς 40 δρχ. τὸ μέτρον καὶ τὸ ὑπόλοιπον, πιοὺ ἦτο 25 μέτρα, πρὸς 45 δρχ. τὸ μέτρον. Ἐκ τῆς πωλήσεως ἐκέρδισεν 25% τῆς ἀξίας ἀγορᾶς τούτου. Πόσον εἶχεν ἀγοράσει τὸ μέτρον;

74. Ἡγόρασε κάποιος σῖτον ἀντὶ 4.800 δραχμῶν. Ἐπλήρωσε διὰ μεταφορικὰ 12% καὶ διὰ φόρους 3%. Ἀντὶ πόσου πρέπει νὰ πωλήσῃ τὸν σῖτον, διὰ νὰ κερδίσῃ 9,5% ἐπὶ τοῦ κόστους;

3. Σύνθετος μέθοδος τῶν τριῶν

α) Μὲ ποσὰ ἀνάλογα

Πρόβλημα 1. Οἱ 30 μαθηταὶ τῆς α' ὁμάδος κατασκηνώσεως Δροσιᾶς διὰ 20 ἡμέρας χρειάζονται 150 κιλὰ ψωμί. Πόσο ψωμὶ θὰ χρειασθοῦν 45 μαθηταὶ διὰ 16 ἡμέρας;

Παρατήρησις. Τὸ πρόβλημα αὐτὸ ὄμοιάζει, καθὼς βλέπετε, μὲ τὰ προβλήματα τῆς ἀπλῆς μεθόδου τῶν τριῶν. Διαφέρει ὅμως αὐτῆς, διότι ἔδω δίδονται περισσότερα ἀπὸ δύο ποσὰ καὶ πέρισσότεροι ἀπὸ 3 ἀριθμοὶ καὶ ζητεῖται ἡ τιμὴ τοῦ ἀγνώστου. Τὸ πρόβλημα αὐτὸ εἶναι πρόβλημα τῆς συνθέτου μεθόδου τῶν τριῶν.

Τὰ προβλήματα τῆς συνθέτου μεθόδου τῶν τριῶν λύονται α) μὲ τὴν ἀναγωγὴν εἰς τὴν μονάδα καὶ β) συντομώτερα μὲ τὴν σύνθετον μέθοδον τῶν τριῶν.

α) **Λύσις** μὲ τὴν ἀναγωγὴν εἰς τὴν μονάδα :

Οἱ 30 μ. εἰς 20 ἡμ. χρειάζονται 150 κ. ψωμὶ

$$\text{ό } 1 \text{ μ. } \gg 20 \text{ } \gg \text{ χρειάζεται } \frac{150}{30} \text{ κ. ψωμὶ}$$

$$\text{oἱ } 45 \text{ μ. } \gg 20 \text{ } \gg \text{ χρειάζονται } \frac{150 \times 45}{30} \text{ κ. ψωμὶ}$$

$$\text{oἱ } 45 \text{ μ. } \gg 1 \text{ } \gg \text{ } \gg \frac{150 \times 45}{30 \times 20} \text{ κ. ψωμὶ}$$

$$\text{oἱ } 45 \text{ μ. } \gg 16 \text{ } \gg \text{ } \gg \frac{150 \times 45 \times 16}{30 \times 20} \text{ κ. ψωμὶ}$$

$$= \frac{720}{4} = 180 \text{ κιλὰ ψωμὶ.}$$

β) Λύσις μὲ τὴν σύνθετον μέθοδον τὰ ὧν τριῶν :

Διὰ νὰ κατανοήσωμεν τὴν λύσιν αὐτῆ¹, ἀναλύομεν τὸ πρόβλημα εἰς δύο προβλήματα τῆς ἀπλῆς μεθόδου : ὧν τριῶν ὡς ἔξῆς :

α) 30 μ. (εἰς 20 ἡμ.) χρειάζ. 150 κιλὰ ψωμί.

45 μ. (εἰς 20 ἡμ.) χρειάζ. X κιλὰ ψωμί.

$$X = 150 \times \frac{45}{30}$$

β) (45 μ.) εἰς 20 ἡμ. χρειάζ. $150 \times \frac{45}{30}$ κιλὰ ψωμί.

(45 μ.) εἰς 16 ἡμ. χρειάζ. X κιλὰ ψωμί.

$$X = 150 \times \frac{45}{30} \times \frac{16}{20} = 180 \text{ κιλά.}$$

Παρατηρήσεις. 1. Κατὰ τὴν πρώτην κατεύθαξιν δὲ ἀριθμὸς τῶν ἡμερῶν εἶναι ὁ ἴδιος καὶ δὲν λαμβάνεται καθόλει : ὑπ’ ὄψιν. Κατὰ τὴν δευτέραν κατάταξιν δὲν λαμβάνεται ὑπ’ ὄψιν δὲ ςχιθμὸς τῶν μαθητῶν.

2. Ἡ σύγκρισις γίνεται ἀκριβῶς ὅπως καὶ εἰς τὰ προβλήματα τῆς ἀπλῆς μεθόδου τῶν τριῶν.

”Αν ἐνώσωμεν τὰς δύο κατατάξεις εἰς μίαν, θὰ ἔχωμεν :

30 μαθ. εἰς 20 ἡμ. χρειάζονται 150 κιλά

45 » » 16 » » X »

Καὶ ἔδω προσέχομεν τὸ ἀντίτοτε νὰ γρψώμεν τὰ ὅμοες δῆποτε εἰς τὴν ἴδιαν κατακόρυφον στὶ λην. Μετὰ προχωροῦμεν εἰς τὴν σύγκρισιν τῶν ποσῶν. Συγκρίνομεν κίνθι ποσὸν μὲ τὸ ποσὸν τοῦ ὅπες ίου ζητεῖται ή τιμή, ὡς ἔξῆς :

α) **Μαθηταὶ καὶ κιλά:** Ἀφοῦ 30 μαθηταὶ εἰς 20 ἡμέρας χρειάζονται 150 κιλὰ ψωμί, διπλάσιοι μαθηταὶ εἰς τὸ ἴδιον χρονικὸν διάστημα θὰ χρειασθοῦν διπλάσια κιλὰ ψωμί. Τὰ ποσὰ εἶναι ἀνάλογα καὶ δι’ αὐτὸ θὰ πολλαπλασιάσωμεν τὸν ἀριθμὸν 150, δὲ ὅποιος εἶναι ἐτάνω

ἀπὸ τὸν ἀγνωστὸν X, ἐπὶ τὸ κλάσμα $\frac{30}{45}$, τὸ ὅποιον σχηματίζουν

αἱ δύο τιμαὶ 30 καὶ 45 τοῦ ποσοῦ τῶν μαθητῶν, ἀντεστραμμένον.

δηλ. θὰ ἔχωμεν : $150 \times \frac{45}{30}$.

β) Ήμέραι καὶ κιλά. Ἀφοῦ 30 μαθηταὶ εἰς 20 ἡμέρας χρειάζονται 150 κιλὰ ψωμί, οἱ ἕδιοι μαθηταὶ εἰς μισὰς ἡμέρας θὰ χρειασθοῦν μισὰ κιλὰ ψωμί. Καὶ ἐδῶ τὰ ποσὰ εἶναι ἀνάλογα· δι' αὐτὸν θὰ πολλαπλασιάσωμεν τὸν εὑρεθέντα προηγουμένως ἀριθμὸν $150 \times \frac{45}{30}$ ἐπὶ $\frac{16}{20}$, δηλ. ἐπὶ τὸ κλάσμα, τὸ ὅποιον σχηματίζουν αἱ δύο τιμαὶ 20 καὶ 16 τοῦ ποσοῦ τῶν ἡμερῶν, ἀντεστραμμένον.

$$\text{Λύσις. } X = 150 \times \frac{45}{30} \times \frac{16}{20} = 180 \text{ κιλά.}$$

Απάντησις. Οἱ 45 μαθηταὶ εἰς 20 ἡμέρας θὰ χρειασθοῦν 180 κιλὰ ψωμί.

Σημείωσις. α) Κατὰ τὴν σύγκρισιν κάθε ποσοῦ πρὸς τὸ ποσὸν τοῦ ὅποιου ζητεῖται ἡ τιμή, πρέπει νὰ θεωρῶμεν ὅτι τὰ ἄλλα ποσὰ μένουν ἀμετάβλητα.

β) Πρὸ τῆς ἑκτελέσεως τῶν πράξεων πρέπει νὰ γίνωνται πάντοτε αἱ δυναταὶ ἀπλοποιήσεις.

Πρόβλημα 2. "Ἐνα τεμάχιον ὑφάσματος μῆκονς 6 μέτρων καὶ πλάτους 0,64 μ. κοστίζει 480 δραχμάς. Πόσον κοστίζει ἔνα ἄλλο τεμάχιον ὑφάσματος τῆς αὐτῆς ποιότητος μῆκονς 10 μέτρων καὶ πλάτους 0,48 μ. ;

Κατάταξις.

$$\begin{array}{lllllll} \text{Tὰ } & 6 \text{ μ. μῆκ. μὲ } 0,64 \text{ μ. πλ. κοστίζουν } & 480 \text{ δρχ.} \\ \text{» } & 10 \text{ » } & » & 0,48 \text{ » } & » & X & » \end{array}$$

Σύγκρισις. α) **Μῆκος ὑφάσματος μὲ δραχμάς:** Ἀφοῦ τὰ 6 μ. μῆκος τοῦ ὑφάσματος μὲ ὥρισμένον πλάτος κοστίζουν 480 δρχ., τὰ διπλάσια μέτρα μῆκος μὲ τὸ ἕδιον πλάτος θὰ κοστίζουν διπλάσια χρήματα. Τὰ ποσὰ εἶναι ἀνάλογα.

β) **Πλάτος ὑφάσματος μὲ δραχμάς:** "Οταν τὸ πλάτος τοῦ ὑφάσματος εἶναι 0,64 μ. καὶ τὸ μῆκος του εἶναι 6 μ., κοστίζει τὸ ὑφάσμα 480 δρχ. "Οταν τὸ πλάτος εἶναι τὸ μισό, καὶ τὸ μῆκος μένει τὸ ἕδιον, θὰ κοστίζῃ καὶ μισὰ χρήματα. Τὰ ποσὰ εἶναι ἀνάλογα.

$$\text{Λύσις. } X = 480 \times \frac{10}{6} \times \frac{0,48}{0,64} = \frac{480 \times 10 \times 48}{6 \times 64} = 600 \text{ δρχ.}$$

Σημείωσις. Πρὸς εύκολίαν ἐτρέψαμεν τοὺς δεκαδικοὺς εἰς ἀκεράους.

Ἀπάντησις. Τὸ τεμάχιον τοῦ ὑφάσματος κοστίζει 600 δρχ.

Κανών. Διὰ τὰ λόγωμεν προβλήματα τῆς συνθέτου μεθόδου τῶν τριῶν, δταν τὰ ποσὰ εἰναι ἀνάλογα, πολλαπλασίας ομεν τὸν ὑπεράνω τοῦ X ἀριθμὸν ἐπὶ τὰ κλάσματα, τὰ δοια σχηματίζονται τὰ ποσῶν ποσῶν, ἀντεστραμμένα.

Προβλήματα

75. 80 παιδιά μιᾶς κατασκηνώσεως εἰς 20 ἡμέρας ἔξωδευσαν 600 κιλὰ ψωμί. Πόσα κιλὰ ψωμὶ θὰ ἔξοδεύσουν τριπλάσια παιδιά εἰς 15 ἡμέρας;

76. Ἐνα χαλὶ μήκους 3,50 μ. καὶ πλάτους 2,80 μ. κοστίζει 3.500 δρχ. Πόσον κοστίζει ἄλλο χαλὶ τῆς αὐτῆς ποιότητος μήκους 4,20 μ. καὶ πλάτους 3,50 μ.;

77. Πέντε ἐργάται, ἐργαζόμενοι 8 ὥρας τὴν ἡμέραν, λαμβάνουν ἡμερησίως ὅλοι μαζὶ 610 δρχ. Τριπλάσιοι ἐργάται, ἐργαζόμενοι 12 ὥρας τὴν ἡμέραν, πόσον λαμβάνουν ἡμερησίως (ὅλοι μαζὶ);

78. Δεκαπέντε ἵπποι ἔφαγον εἰς 3 ἡμέρας 360 κιλὰ βρώμην. Πόσην βρώμην θὰ χρειασθοῦν 10 ἵπποι εἰς ἓνα μῆνα;

β) Μὲ ποσὰ ἀντίστροφα

Πρόβλημα 1. Ἐνας ὁδοιπόρος διατρέχει 90 χιλιόμετρα εἰς 2 ἡμέρας, ἀν βαδίζῃ 9 ὥρας τὴν ἡμέραν. Εἰς πόσας ἡμέρας θὰ διατρέξῃ ἀπόστασιν 120 χιλιομέτων, ἀν βαδίζῃ 6 ὥρας τὴν ἡμέραν;

Κατάταξις.	90 χλμ.	9 ὥρ.	2 ἡμ.
	120 »	6 »	X »

Σύγκρισις. α) **Χιλιόμετρα μὲ ἡμέρας:** Ἀφοῦ ἀπόστασιν 90 χιλιομέτρων, βαδίζων δὲ δύοιπόρος ὡρισμένας ὥρας τὴν ἡμέραν, τὴν διατρέχει εἰς 2 ἡμέρας, διπλασίαν ἀπόστασιν, βαδίζων τὰς 120 ὥρας τὴν ἡμέραν, θὰ τὴν διατρέξῃ εἰς διπλασίας ἡμέρας. Τὰ ποσὰ εἶναι ἀνάλογα καὶ δι' αὐτό, ὅπως γνωρίζομεν, θὰ πολλαπλασιάσωμεν τὸν

Ùπεράνω τοῦ X ἀριθμὸν 2 ἐπὶ τὴν κλάσμα τοῦ ποσοῦ τῶν χιλιομέτρων ἀντεστραμμένον· δηλ. θὰ ἔχωμεν $X = 2 \times \frac{120}{90}$

β) "Ωραι μὲν ἡμέρας. Ἀφοῦ ὥρισμένην ἀπόστασιν, βαδίζων δόδοιπόρος 9 ὥρας τὴν ἡμέραν, τὸν διατρέχει εἰς 2 ἡμέρας, τὴν ίδιαν ἀπόστασιν, ἃν βαδίζῃ τὰς μισὰς ὥρας τὴν ἡμέραν, θὰ τὴν διατρέξῃ εἰς διπλασίας ἡμέρας. Τὰ ποσὰ εἰναι ἀντίστροφα καὶ δι' αὐτὸν θὰ πολλαπλασιάσωμεν τὸν εύρεθέντα προηγουμένως ἀριθμὸν $2 \times \frac{120}{90}$

ἐπὶ $\frac{9}{6}$, δηλ. ἐπὶ τὸ κλάσμα, τὸ δόπιον γίνεται ἀπὸ τοὺς ἀριθμοὺς τοῦ ποσοῦ τῶν ὥρῶν, ὅπως ἔχει.

$$\text{Αύσις. } X = 2 \times \frac{1.20}{90} \times \frac{9}{6} = 4 \text{ ἡμ.}$$

"Απάντησις. Θὰ διατρέξῃ τὴν ἀπὸ ὥστασιν εἰς 4 ἡμέρας.

Ι) Ιρόβλημα 2. 12 ἐργάται, ἐργαζόμενοι 8 ὥρας τὴν ἡμέραν, ἐτελείωσιν μίαν ἐργασίαν εἰς 15 ἡμέρας. Εἰς πόσας ἡμέρας 20 ἐργάται θὰ τελειώσουν τὴν αὐτὴν ἐργασίαν, ἐὰν ἐργασθοῦν 6 ὥρας τὴν ἡμέραν;

Κατάταξις. 12 ἐργ. 8 ὥρ. 15 ἡμ.
 20 » 6 » X ::

Σύγκρισις. α) Ἐργάται μὲν ἡμέρας : Ἀφοῦ 12 ἐργάται, ἐργαζόμενοι 8 ὥρας τὴν ἡμέραν, τελειώσουν μίαν ἐργασίαν εἰς 15 ἡμέρας, διπλάσιοι ἐργάται, ἐργαζόμενοι τὰς ίδιας ὥρας τὴν ἡμέραν, θὰ τελειώσουν τὴν ίδιαν ἐργασίαν εἰς μισὰς ἡμέρας. Τὰ ποσὰ εἰναι ἀντίστροφα.

β) "Ωραι μὲν ἡμέρας. Ἀφοῦ ὥρισμένωι ἐργάται, ἐργαζόμενοι 8 ὥρας τὴν ἡμέραν, τελειώσουν μίαν ἐργασίαν εἰς 15 ἡμέρας, οἱ ίδιοι ἐργάται, ἐργαζόμενοι τὰς μισὰς ὥρας τὴν ἡμέραν, θὰ τελειώσουν τὴν ίδιαν ἐργασίαν εἰς διπλασίας ἡμέρας. Τὰ ποσὰ εἰναι ἀντίστροφα.

$$\text{Αύσις. } X = 15 \times \frac{12}{20} \times \frac{8}{6} = 12 \text{ ἡμ.}$$

"Απάντησις. Εἰς 12 ἡμέρας θὰ τελειώσουν τὴν ἐργασίαν.

Κανών. Διὰ νὰ λύσωμεν προβλήματα τῆς συνθέτου μεθόδου τῶν τριῶν, δταν τὰ ποσὰ εἶναι ἀντίστροφα, πολλαπλασιάζομεν τὸν ὑπεράνω τοῦ X ἀριθμὸν ἐπὶ τὰ κλάσματα, τὰ δποῖα σχηματίζονται αἱ τιμαὶ τῶν ἄλλων ποσῶν, δπως ἔχουν (καὶ ὅχι ἀντεστραμμένα).

Προβλήματα

79. "Ενας ὁδοιπόρος εἰς 3 ἡμέρας διατρέχει ἀπόστασιν 105 χιλιομέτρων, δταν βαδίζῃ 7 ὥρας τὴν ἡμέραν. Ἐὰν βαδίζῃ 8 ὥρας τὴν ἡμέραν, εἰς πόσας ἡμέρας θὰ διατρέξῃ ἀπόστασιν 200 χιλιομέτρων;

80. Διὰ νὰ στρωθῇ τὸ πάτωμα ἐνὸς δωματίου μὲ σανίδας μήκους 2,80 μ. καὶ πλάτους 0,25 μ. χρειάζονται 40 σανίδες. Πόσαι σανίδες θὰ χρειασθοῦν διὰ τὸ ᾴδιον πάτωμα, ἐὰν ἔχουν μῆκος 2 μ. καὶ πλάτος 0,20 μ.;

81. "Ενα αὐτοκίνητον διανύει ἀπόστασιν 240 χιλιομέτρων εἰς 6 ὥρας μὲ ταχύτητα 40 χιλιομέτρων τὴν ὥραν. Ποίαν ταχύτητα πρέπει νὰ ἔχῃ τὸ αὐτοκίνητον, διὰ νὰ διανύσῃ τριπλασίαν ἀπόστασιν εἰς 12 ὥρας;

82. 9 ἐργάται, ἐργαζόμενοι 8 ὥρας τὴν ἡμέραν, τελειώνουν ἕνα ἔργον εἰς 15 ἡμέρας. Οἱ 15 ἐργάται πόσας ὥρας τὴν ἡμέραν πρέπει νὰ ἐργασθοῦν, διὰ νὰ τελειώσουν τὸ αὐτὸ ἔργον εἰς 12 ἡμέρας;

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΙΣ

α) Εἰς τὰ προβλήματα τῆς συνθέτου μεθόδου τῶν τριῶν δίδονται περισσότερα ἀπὸ δύο ποσά.

β) Τὰ προβλήματα αὐτὰ ἡμπτορεῖ νὰ ἀναλυθοῦν εἰς δύο ἡ περισσότερα προβλήματα τῆς ἀπλῆς μεθόδου τῶν τριῶν διὰ τοῦτο λέγονται προβλήματα τῆς συνθέτου μεθόδου τῶν τριῶν.

γ) Καὶ εἰς τὰ προβλήματα αὐτὰ ἄλλα ποσά εἶναι ἀνάλογα καὶ ἄλλα εἶναι ἀντίστροφα.

δ) Διὰ νὰ λύσωμεν τὰ προβλήματα τῆς συνθέτου μεθόδου τῶν τριῶν γενικῶς, ἐφαρμόζομεν τὸν ἔξης κανόνα :

Διὰ νὰ λύσωμεν προβλήματα τῆς συνθέτου μεθόδου τῶν τριῶν, πολλαπλασιάζομεν τὸν ὑπεράριθμο τοῦ X ἀριθμὸν ἐπὶ ἕκαστον τῶν κλασμάτων, τὰ δόποια σχηματίζονται αἱ τιμαὶ τῶν ἄλλων ποσῶν, ἀντεστραμμένον μέν, ἢν τὰ ποσὰ εἶναι ἀνάλογα, ὅπως ἔχει δέ, ἢν τὰ ποσὰ εἶναι ἀντίστροφα.

Προβλήματα

83. Μὲ 45 κιλὰ νῆμα κατασκευάζομεν ὑφασμα μήκους 22,5 μ. καὶ πλάτους 0,72 μ. Μὲ 60 κιλὰ νῆμα τῆς αὐτῆς ποιότητος πόσα μέτρα ύφασματος θὰ κατασκευάσωμεν, ἢν θέλωμεν τὸ πλάτος του νὰ εἴναι 0,90 μ. ;

84. "Ενας ὁδοιπόρος διέτρεε τὰ $\frac{3}{4}$ μιᾶς ἀποστάσεως εἰς 8 ἡμ., βαδίζων 6 ὥρας τὴν ἡμέραν. "Αν βαδίζῃ δύο ὥρας ἐπὶ πλέον τὴν ἡμέραν, εἰς πόσας ἡμέρας θὰ διατρέξῃ τὸ ὑπόλοιπον τῆς ἀποστάσεως ;

85. Οἰκόπεδον μήκους 16μ. καὶ πλάτους 12,5 μ. ἐπωλήθη ἀντὶ 60.000 δραχμῶν. Πόσον κοστίζει τὸ παραπλεύρως οἰκόπεδον, τὸ δόποιον πωλεῖται μὲ τὴν ἴδιαν τιμὴν καὶ ἔχει μῆκος 17 μ. καὶ πλάτος 12 μ. ;

86. 15 ἐργάται σκάπτουν εἰς ἓνα ὠρισμένον χρονικὸν διάστημα ἓνα δρόμον 30 μ. μήκους καὶ 4 μ. πλάτους, ἢν ἐργάζωνται 8 ὥρας τὴν ἡμέραν. Ἐάν οἱ ἐργάται αὐξῆθοῦν κατὰ 3, τὸ μῆκος τοῦ δρόμου κατὰ 6 μ. καὶ τὸ πλάτος του κατὰ 0,5 μ., πόσας ὥρας πρέπει νὰ ἐργάζωνται ἡμερησίως, διὰ νὰ τελειώσουν τὸν δρόμον εἰς τὸ ἵδιον χρονικὸν διάστημα ;

87. Διὰ νὰ σκάψουν εἰς μίαν ἡμέραν τάφρον μήκους 20 μ., πλάτους 3 μ. καὶ βάθους 0,50 μ. χρειάζονται 24 ἐργάται. Πόσοι ἐργάται θὰ χρειασθοῦν νὰ σκάψουν εἰς μίαν ἡμέραν πάλιν ἄλλην τάφρον μήκους 15 μ., πλάτους 2,5 μ. καὶ βάθους 0,80 μ. ;

88. Διὰ νὰ στρώσωμεν τὸ πάτωμα δωματίου μήκους 5 μ. καὶ πλάτους 4 μ. ἔχρειάσθησαν 100 πλακάκια. Πόσα πλακάκια θὰ χρεια-

σθιούν, διὰ νὰ στρώσωμεν ἄλλο πάτωμα μήκους 6 μ. καὶ πλάτους 4,70 μ. ;

89. Μία ύφαντρα, διὰ νὰ ύφασμα μήκους 45 μ. καὶ πλάτους 0,80 μ. ἔχειάσθη 12 κιλὰ καὶ 500 γραμμάρια νῆμα. Πόσον νῆμα τῆς αὐτῆς ποιότητος θὰ χρειασθῇ, διὰ νὰ ύφαντη ἄλλο ύφασμα μήκους 120 μ. καὶ πλάτους 0,60 μ. ;

90. "Ἐνας ὀδοιπόρος, βαδίζων 9 ὥρας τὴν ἡμέραν, διατρέχει ἀπόστασιν 180 χιλιομέτρων εἰς 4 ἡμέρας. Πόσας ὥρας πρέπει νὰ βαδίζῃ κάθε ἡμέραν, μὲ τὴν αὐτὴν ταχύτητα, διὰ νὰ διατρέξῃ εἰς 6 ἡμέρας 240 χιλιόμετρα ;

ΤΟΚΟΣ

Γενικά: "Οπως δλοι γνωρίζουμεν, οι ανθρωποι πολλάς φοράς εύρισκονται εις οίκονομικήν ἀνάγκην καὶ τότε δανείζονται χρήματα ἀπὸ ἄλλους ποὺ ἔχουν. Οἱ ἔμποροι λ.χ. δανείζονται χρήματα ἀπὸ τὴν Τράπεζαν, διὰ νὰ ἀγοράσουν τὰ ἐμπορεύματά των. Ὁμοίως οἱ κτηματίαι, οἱ γεωργοὶ καὶ οἱ κτηνοτρόφοι δανείζονται χρήματα ἀπὸ τὴν Τράπεζαν ἢ ἀτὶ τοὺς Συνεταιρισμοὺς, διὰ νὰ ἀγοράσουν ἑργαλεῖα, λιπάσματα, ζωοτροφάς. Καί, ὅταν πωλήσουν τὰ προϊόντα των, ἐπιστρέφουν τὲ δάνειον, δηλ. τὰ χρήματα ποὺ είχον δανεισθῆ.

'Άλλα καὶ ὕποιος εύρεθῇ εἰς χρηματικήν ἀνάγκην, δανείζεται ἀπὸ ἄλλον δλίγα τὸ πολλὰ χρήματα, διὰ νὰ διευκολυνθῇ καὶ κατόπιν τὰ ἐπιστρέψῃ. Τὶ δανειζόμενον χρηματικὸν ποσὸν λέγεται **Κεφάλαιον**. 'Η χρωνικὴ διάρκεια τοῦ δανείου λέγεται **Χρόνος**.

'Εκεῖνος ποὺ δανείζει τὰ χρήματα, λέγεται **δανειστής**. 'Εκεῖνος ποὺ δανείζεται, λέγεται **χρεώστης** ἢ **διφειλέτης**.

Εἰς τὴν περίπτωσιν τοῦ δανείου ὃ ίκανον είναι ὁ δανειστής διὰ τὰ χρήματά του, τὰ δποῖα δανείζει, νὰ λαμβάνῃ ἔνα κέρδος ὡς ἐνοίκιον, ὅπερας λαμβάνομεν ἐνοίκιον διὰ τὸ σπίτι μας, ὅταν τὸ ἐνοικιάζωμεν εἰς κάποιον. Τὸ κέρδος αὐτὸν λέγεται τόκος. "Ωστε :

Τόκος λέγεται τὸ κέρδος, τὸ δποῖον λαμβάνει ὁ δανείζων χρήματα.

'Ο τόκος τῶν 100 δραχμῶν εἰς ἔνα ἔτιος λέγεται **Ἐπιτόκιον**.

Τὰ ιτροβλήματα, ποὺ περιέχουν τὰ στοιχεῖα αὐτά, λέγονται **προβλήματα τόκου**.

Σημείωσις. α) Καὶ τὸ ἐπιτόκιον είναι τόκος· ὑπάρχει ὅμως ἡ ἔξτις διαφορά· 'Ο τόκος είναι τὸ κέρδος δι' ὅλα τὰ χρήματα καὶ δι' ὅλην τὴν χρονικὴν διάρκειαν τοῦ δανείου, ἐιδὸ τὸ ἐπιτόκιον είναι ὁ τόκος τῶν 100 διαχρονῶν ε' σ ἔνα ἔτος.

β) Τὸ ὑψος τοῦ ἐπιτοκίου ὁρίζεται μὲν ἴδιαιτέραν συμφωνίαν μεταξύ δανειστοῦ καὶ ὀφειλέτου. Δὲν ἐπιτρέπεται ὅμως νὰ εἶναι ἀνώτερον ἐκείνου, ποὺ καθορίζει ὁ σχετικὸς Νόμος τῆς Πολιτείας. Ἡ παράβασις τοῦ Νόμου τούτου χαρακτηρίζεται ως τοκογλυφία καὶ τιμωρεῖται αὐστηρῶς ὑπὸ τοῦ Νόμου.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΙΣ

1. Εἰς τὰ προβλήματα τοῦ τόκου τὰ ποσὰ εἶναι 4 : Κεφάλαιον, Ἐπιτόκιον, Χρόνος καὶ Τόκος.

2. Τὰ ποσὰ αὐτὰ τὰ γράφομεν πρὸς συντομίαν μὲν τὰ ἀρχικὰ των γράμματα, ἔτσι :

Κεφάλαιον	=	K
Ἐπιτόκιον	=	E
Χρόνος	=	X
Τόκος	=	T

3. Εἰς τὰ προβλήματα τοῦ τόκου ἔχομεν περισσότερα ἀπὸ δύο ποσὰ καὶ δι' αὐτὸ θὰ τὰ λύωμεν μὲ τὴν σύνθετον μέθοδον τῶν τριῶν.

4. Ἐπειδὴ εἰς τὰ προβλήματα αὐτὰ δίδονται συνήθως τὰ τρία ποσὰ καὶ ζητεῖται τὸ τέταρτον, διὰ τοῦτο τὰ προβλήματα τοῦ τόκου τὰ διακρίνομεν εἰς 4 εἴδη.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΚΟΥ

1. Εύρεσις τοῦ τόκου.

α) "Οταν δὲ χρόνος ἐκφράζεται εἰς ἔτη.

Πρόβλημα. Ὁ Παῦλος, μαθητὴς τῆς Ἔκτης τάξεως, ἔλαβεν ὡς δῶρον ἀπὸ τὸν γονεῖς τὸν κατὰ τὰς ἑορτὰς τῶν Χριστογέννων 600 δραχμάς. Τὰ χρήματα αὐτὰ τὰ κατέθεσεν εἰς τὸ Ταμευτήριον πρὸς 5 %. Πόσον τόκον θὰ λάβῃ μετὰ 3 ἔτη ;

Σκέψις. Ἐδῶ ἔχομεν πρόβλημα τόκου μὲν γνωστὰ τὰ ποσά : κεφάλαιον, ἐπιτόκιον καὶ χρόνον καὶ ζητοῦμεν τὸν τόκον.

$K = 600 \text{ δρχ.}$
$E = 5 \%$
$X = 3 \text{ ἔτη}$
$T = ?$

Θά τὸ λύσωμεν τὸ πρόβλημα αὐτὸ μὲ τὴν σύνθετον μέθοδον τῶν τριῶν.

Κατάταξις :

100 δρχ. κεφάλαιον εἰς 1 ἔτος φέρουν	5 δρχ. τόκον
600 δρχ. » 3 ἔτη » X »	

α) Σύγκρισις : Κεφάλαιον μὲ τόκον : Ἐφοῦ αἱ 100 δρχ. κεφάλαιον εἰς 1 ἔτος φέρουν 5 δρχ. τόκον, τὸ διπλάσιον κεφάλαιον εἰς τὸν ἕδιον χρόνον θὰ φέρῃ διπλάσιον τόκον. Τὰ ποσὰ **Κεφάλαιον** καὶ **Τόκος** εἰναι ἀνάλογα.

β) Χρόνος μὲ τόκον. Ἐφοῦ αἱ 100 δρχ. εἰς 1 ἔτος φέρουν 5 δρχ. τόκον, τὸ ἕδιον κεφάλαιον εἰς διπλάσιον χρόνον θὰ φέρῃ διπλάσιον τόκον. Τὰ ποσὰ **Χρόνος** καὶ **Τόκος** εἰναι καὶ αὐτὰ ἀνάλογα.

Δι' αὐτὸ θὰ πολλαπλασιάσωμεν τὸν ἀριθμὸν, ποὺ εἰναι ἐπάνω ἀπὸ τὸν ἄγνωστον, ἐπὶ τὰ κλάσματα, ποὺ σχηματίζουν αἱ τιμαὶ τῶν δύο ὅλων ποσῶν, ἀντεστραμμένα.

$$\text{Αύσις. } X = 5 \times \frac{600}{100} \times \frac{3}{1} = 90 \text{ δρχ.}$$

Απάντησις. Θὰ λάβῃ τόκον ὁ Παῦλος 90 δρχ.

Παρατήρησις. Τὰ ποσὰ **Κεφάλαιον - Τόκος** καὶ **Χρόνος - Τόκος** εἰναι ἀνάλογα. Καὶ, διὰ νὰ εὔρωμεν τὸν τόκον, ἐπολλαπλασιάσαμεν τὸ **Κεφάλαιον** (600 δρχ.) ἐπὶ τὸ **ἐπιτόκιον** (5%) ἐπὶ τὸν χρόνον (3 ἔτη) καὶ τὸ γινόμενον τὸ διαιρέσαμεν διὰ τοῦ 100.

Τὸ ἕδιον θὰ παρατηρήσωμεν ὅσα ὅμοια προβλήματα καὶ ἂν λύσωμεν.

Δηλαδή : Θὰ πολλαπλασιάσωμεν τὰ τρία γνωστὰ ποσά : **Κεφάλαιον** (K), **Ἐπιτόκιον** (E) καὶ **Χρόνον** (X) καὶ τὸ γινόμενον αὐτῶν θὰ τὸ διαιρέσωμεν διὰ τοῦ 100. **Ἐπομένως :**

Διὰ νὰ εῦρωμεν τὸν τόκον, σταυ ὁ χρόνος ἐκφράζεται εἰς ἔτη, πολλαπλασιάζομεν τὸ κεφάλαιον ἐπὶ τὸ ἐπιτόκιον καὶ τὸν χρόνον καὶ τὸ γινόμενον διαιροῦμεν διὰ τοῦ 100.

$$T \nu \pi o \varsigma : T = \frac{K.E.X}{100}$$

Σημείωσις. α) Εἰς τὸν τύπον ὡς σημεῖον τοῦ πολλαπλασια-
σμοῦ χρησιμοποιοῦμεν τὴν τελείαν (στιγμήν), διὰ νὰ ἀποφύγωμεν
τὴν σύγχυσιν.

β) Κατὰ τὴν λύσιν τῶν προβλημάτων πρέπει πάντοτε νὰ ἐκ-
τελοῦμεν τὰς δυνατὰς ἀπλοποιήσεις καὶ κατόπιν νὰ προχωροῦμεν
εἰς τὴν ἔκτελεσιν τῶν πράξεων.

Προβλήματα

91. Πόσον τόκον θὰ μᾶς δώσουν 7.500 δρχ. εἰς 3 ἔτη πρὸς 6 % ;

92. Πόσον τόκον φέρει κεφάλαιον 1200 δρχ. εἰς 4 ἔτη πρὸς 7,5% ;

93. Ἐδανείσθη κάποιος 13.500 δρχ. διὰ 2 ἔτη πρὸς 6,75%. Πό-
σον τόκον θὰ πληρώσῃ ;

94. Κεφάλαιον 1800 δρχ. ἐτοκίσθη πρὸς $8 \frac{1}{2}$ %. Πόσον τόκον
θὰ φέρῃ εἰς 6 ἔτη ;

β) Ὅταν ὁ χρόνος ἐκφράζεται εἰς μῆνας.

Πρόβλημα. Κτηματίας ἐδανείσθη ἀπὸ τὴν Ἀγροτικὴν Τράπεζαν 36.000
δρχ. διὰ 5 μῆνας μὲν ἐπιτόκιον 12%. Πόσον τόκον θὰ πληρώσῃ ;

Σκέψις. Καὶ εἰς τὸ πρόβλημα αὐτὸ τοῦ
τόκου εἰναι γνωστὰ τὰ ποσά : Κεφάλαιον,
ἐπιτόκιον καὶ χρόνος καὶ ζητεῖται ὁ τόκος. Ὁ
χρόνος ἐκφράζεται εἰς μῆνας.

$K = 36.000$	δρχ.
$E = 12\%$	
$X = 5$	μῆνες
$T =$	

Κατάταξις :

100 δρχ. κεφ. εἰς 12 μῆνας φέρουν 12 δρχ. τόκον.
<u>36.000 » » » 5 » » X » »</u>

Λύσις. Ἐπειδὴ τὰ ποσὰ κεφάλαιον - τόκος καὶ χρόνος - τόκος
εἰναι ἀνάλογα, θὰ ἔχωμεν :

$$X = 12 \times \frac{36.000}{100} \times \frac{5}{12} = 1.800 \text{ δρχ.}$$

Απάντησις. Θὰ πληρώσῃ τόκον 1.800 δραχμάς.

Παρατήρησις. Διὰ νὰ εῦρωμεν τὸν τόκον εἰς τὸ πρόβλημα αὐτό, καθὼς καὶ εἰς ὅσα προβλήματα ὁ χρόνος ἐκφράζεται εἰς μῆνας, πολλαπλασιάζομεν τὸ κεφάλαιον ἐπὶ τὸ ἐπιτόκιον καὶ τὸν χρόνον καὶ τὸ γινόμενον διαιροῦμεν διὰ τοῦ 1200. Τὸ 1200 εἶναι τὸ γινόμενον τοῦ 100×12 , ἐπειδὴ ὁ χρόνος ἐκφράζεται εἰς μῆνας καὶ εἰς τὴν κατάταξιν ἀντὶ 1 ἔτος γράφομεν 12 μῆνας. Ἐπομένως :

Διὰ νὰ εῦρωμεν τὸν τόκον, ὅταν ὁ χρόνος ἐκφράζεται εἰς μῆνας, πολλαπλασιάζομεν τὸ κεφάλαιον ἐπὶ τὸ ἐπιτόκιον καὶ τὸν χρόνον καὶ τὸ γινόμενον τὸ διαιροῦμεν διὰ τοῦ 1200.

$$T \nu \pi o s : T = \frac{K.E.X}{1200}$$

Προβλήματα

95. Πόσον τόκον φέρουν 1.300 δρχ. εἰς 6 μῆνας πρὸς 8% ;
96. Κεφάλαιον 32.000 δρχ. ἔτοκίσθη διὰ 9 μῆνας πρὸς 7,5 %. Πόσον τόκον θὰ φέρῃ ;
97. Ἐργολάβος οἰκοδομῶν ἔδανείσθη ἀπὸ τὴν Κτηματικὴν Τράπεζαν 675.000 δρχ. πρὸς $\frac{1}{2}\%$ διὰ 2 ἔτη καὶ 4 μῆνας. Πόσον τόκον θὰ πληρώσῃ ;
98. Πόσον τόκον φέρει κεφάλαιον 3.600 δρχ. πρὸς $6\frac{3}{4}\%$ εἰς 1 ἔτος καὶ 4 μῆνας ;

Προσέχετε : Τὰ ἔτη καὶ οἱ μῆνες νὰ τραποῦν εἰς μῆνας (1 ἔτος = 12 μῆνες).

γ) "Οταν ὁ χρόνος ἐκφράζεται εἰς ἡμέρας.

Πρόβλημα. Πόσον τόκον θὰ πληρώσωμεν, ἂν δανεισθῶμεν 5.000 δρχ. πρὸς 9% διὰ 20 ἡμέρας ;

Σκέψις. Είς τὸ πρόβλημα αύτὸ τοῦ τόκου εἰναι πάλιν γνωστὰ τὰ ποσά : κεφάλαιον, ἐπιτόκιον καὶ χρόνος καὶ ζητεῖται ὁ τόκος. Ὁ χρόνος ἔδω ἐκφράζεται εἰς ἡμέρας.

$$\begin{aligned} K &= 5.000 \text{ δρχ.} \\ E &= 9 \% \\ X &= 20 \text{ ἡμέραι} \\ T &= ; \end{aligned}$$

Κατάταξις.	100 δρχ. κεφ.	εἰς 360 ἡμ. φέρουν	9 δρχ. τόκον
	5.000 » » 20 » »	X » »	

Λύσις. Ἐπειδὴ τὰ ποσὰ κεφάλαιον - τόκος καὶ χρόνος - τόκος εἶναι ἀνάλογα, θὰ ἔχωμεν :

$$X = 9 \times \frac{5.000}{100} \times \frac{20}{360} = 25 \text{ δρχ.}$$

Απάντησις. Θὰ πληρώσωμεν 25 δρχ. τόκον.

Παρατήρησις. Διὰ νὰ εὕρωμεν καὶ εἰς τὸ πρόβλημα αύτὸ τὸν τόκον, ἐπολλαπλασιάσαμεν τὸ κεφάλαιον ἐπὶ τὸ ἐπιτόκιον καὶ τὸν χρόνον καὶ διαιρέσαμεν διὰ τοῦ 36.000. Τὸ 36.000 εἰναι τὸ γινόμενον τοῦ 100×360 , ἐπειδὴ ὁ χρόνος εἰς τὸ πρόβλημα αύτὸ ἐκφράζεται εἰς ἡμέρας καὶ εἰς τὴν Ἀριθμητικὴν τὸ ἔτος ὑπολογίζεται πάντοτε μὲ 360 ἡμέρας.

Ἐπομένως :

Αιὰ νὰ εῦρωμεν τὸν τόκον, ὅταν ὁ χρόνος ἐκφράζεται εἰς ἡμέρας, πολλαπλασιάζομεν τὸ κεφάλαιον ἐπὶ τὸ ἐπιτόκιον καὶ τὸν χρόνον καὶ τὸ γινόμενον τὸ διαιροῦμεν διὰ 36.000.

$$\text{Tύπος : } T = \frac{K \cdot E \cdot X}{36000}$$

Προβλήματα

99. Πόσον τόκον φέρουν 8.000 δρχ. εἰς 20 ἡμέρας πρὸς 4,5% ;
100. Κεφάλαιον 7.400 δρχ. ἐτοκίσθη πρὸς 6,75% διὰ 1 μῆνα καὶ 10 ἡμέρας. Πόσον τόκον θὰ φέρῃ ;

101. "Ενας έμπτορος έδωσε στη διά την Εμπορικήν Τράπεζαν εις τάς 15 Μαΐου 450.000 δρχ. πρὸς 9,5%. Έπεστρεψε δὲ τὰ χρήματα τὴν 1ην Αύγουστου τοῦ ίδιου ἔτους. Πόσον τόκον ἐπλήρωσεν;

102. "Ενας κτηματίας ἐπώλησε τὰ προιόντα του καὶ εἰσέπραξεν 7.500 δρχ., τὰς ὅποιας ἐτόκισεν πρὸς 9 %. Πόσον τόκον θὰ λάβῃ μετὰ 1 ἔτος 1 μῆνα καὶ 10 ἡμέρας ;

Προσέχετε : Οἱ συμμιγῆς νὰ τρέπωνται εἰς ἀκεραίους.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΙΣ

Σύμφωνα μὲ ὅσα εἶδομεν εἰς τὰ προηγούμενα προβλήματα, τὰ προβλήματα τοῦ τόκου τὰ λύομεν μὲ τὴν σύνθετον μέθοδον τῶν τριῶν.

Διὰ συντομίαν δυνάμεθα νὰ χρησιμοποιήσωμεν καὶ τοὺς τύπους.

Γενικός κανὼν : Διὰ νὰ εῦρωμεν τὸν τόκον, πολλαπλασιάζομεν τὸ κεφάλαιον ἐπὶ τὸ ἐπιτόκιον καὶ τὸν χρόνον καὶ τὸ γιγνόμενον διαιροῦμεν διὰ τοῦ 100, ἢν δὲ καρόνος ἐκφράζεται εἰς ἔτη, διὰ τοῦ 1.200, ἢν ἐκφράζεται εἰς μῆνας, καὶ διὰ τοῦ 36.000, ἢν ἐκφράζεται εἰς ἡμέρας.

$$\text{Τύποι : } \alpha) T = \frac{K.E.X}{100}, \beta) T = \frac{K.E.X}{1200}, \gamma) T = \frac{K.E.X}{36000}$$

Σημείωσις. Εἰς ὅλα τὰ προβλήματα τοῦ τόκου, ὅταν ὁ χρόνος διατυπώνεται εἰς συμμιγῆ ἀριθμόν, τρέπομεν τὸν συμμιγῆ εἰς ἀκέραιον, δηλ. εἰς τὴν κατωτέραν μονάδα τὴν ὅποιαν ἀναφέρει τὸ πρόβλημα, ὡς ἔξης :

α) Τὰ ἔτη καὶ μῆνες τρέπονται εἰς μῆνας· (πολλαπλασιάζομεν τὰ ἔτη ἐπὶ 12 καὶ προσθέτομεν καὶ τοὺς μῆνας, ποὺ δίδει τὸ πρόβλημα).

β) Οἱ μῆνες καὶ ἡμέραι τρέπονται εἰς ἡμέρας (πολλαπλασιάζομεν τοὺς μῆνας ἐπὶ 30 καὶ προσθέτομεν τὰς ἡμέρας).

γ) Τὰ ἔτη, μῆνες καὶ ἡμέραι τρέπονται εἰς ἡμέρας· (τρέπομεν τὰ ἔτη εἰς μῆνας καὶ προσθέτομεν καὶ τοὺς μῆνας, ποὺ δίδει τὸ πρόβλημα. Τοὺς μῆνας κατόπιν τοὺς τρέπομεν εἰς ἡμέρας καὶ προσθέτομεν καὶ τὰς ἡμέρας, ποὺ δίδει τὸ πρόβλημα).

δ) Τὰ ἔτη καὶ ἡμέραι τρέπονται εἰς ἡμέρας· (πολλαπλασιάζομεν τὰ ἔτη ἐπὶ 360 καὶ προσθέτομεν καὶ τὰς ἡμέρας, ποὺ δίδει τὸ πρόβλημα).

Προβλήματα

103. Πόσον τόκον φέρουν 6.000 δρχ. πρὸς 8% εἰς 2 ἔτη καὶ 1 μῆνα;

104. Πόσον τόκον φέρει κεφάλαιον 67.500 δρχ. πρὸς 6% εἰς 1 ἔτος 1 μῆνα καὶ 10 ἡμέρας;

105. "Αν δανείσωμεν 7.200 δρχ. πρὸς 7,5%, πόσον τόκον θὰ λάβωμεν μετὰ 1 ἔτος καὶ 20 ἡμέρας;

2. Εύρεσις τοῦ Κεφαλαίου.

α) "Οταν δ χρόνος ἐκφράζεται εἰς ἔτη.

Πρόβλημα. "Ενας κτηνοτρόφος ἐδανείσθη ἀπὸ τὴν Ἀγροτικὴν Τοάπεζαν ἓνα χρηματικὸν ποσὸν πρὸς 8%. Μετὰ 4 ἔτη ἐπλήρωσεν τόκον 4.000 δρχ. Πόσα χρήματα ἐδανείσθη;

Σκέψις. Εἰς τὸ πρόβλημα αὐτὸν εἶναι γνωστὰ τὰ ποσά: Τόκος, χρόνος, καὶ ἐπιτόκιον, ζητεῖται δὲ τὸ κεφάλαιον. Θὰ τὸ λύσωμεν μὲ τὴν σύνθετον μέθοδον τῶν τριῶν.

Κατάταξις:

100 δρχ. κεφ. εἰς 1 ἔτος φέρουν 8 δρχ. τόκον,
 $X \quad \gg \quad \gg \quad 4 \text{ ἔτη } \gg \quad 4.000 \quad \gg$

$$\begin{aligned} K &= ; \\ E &= 8 \% \\ X &= 4 \text{ ἔτη} \\ T &= 4.000 \text{ δρχ.} \end{aligned}$$

Σύγκρισις. α) Τόκος καὶ κεφάλαιον: Ἀφοῦ 8 δραχμὰς τόκον εἰς 1 ἔτος τὸν φέρουν 100 δρχ. κεφάλαιον, τὸν διπλάσιον τόκον εἰς τὸν αὐτὸν χρόνον θὰ τὸν φέρῃ διπλάσιον κεφάλαιον. Τὰ ποσὰ τόκος καὶ κεφάλαιον εἶναι ἀνάλογα.

β) Χρόνος καὶ κεφάλαιον : Ἀφοῦ 8 δραχμὰς τόκον εἰς 1 ἔτος τὸν φέρουν 100 δρχ. κεφάλαιον, τὸν ἴδιον τόκον εἰς διπλάσιον χρόνον θὰ τὸν φέρῃ μισὸς κεφάλαιον. Τὰ ποσὰ χρόνος καὶ κεφάλαιον εἶναι ἀντίστροφα.

Δι' αὐτὸς θὰ πολλαπλασιάσωμεν τὸν ἀριθμόν, ποὺ εἶναι ἐπάνω ἀπὸ τὸν ἄγνωστον, ἐπὶ τὸ κλάσμα τοῦ χρόνου ὅπως ἔχει καὶ ἐπὶ τὸ κλάσμα τοῦ τόκου ἀντεστραμμένον.

$$\text{Λύσις. } X = 100 \times \frac{1}{4} \times \frac{4000}{8} = 12.500 \text{ δρχ.}$$

΄Απάντησις. Ἐδανείσθη 12.500 δραχμάς.

Παρατήρησις. Τὰ ποσὰ χρόνος - κεφάλαιον εἶναι ἀντίστροφα, ἐνῷ τόκος - κεφάλαιον εἶναι ἀνάλογα. Καί, διὰ νὰ εὔρωμεν τὸ κεφάλαιον, ἐπολλαπλασιάσαμεν τὸν τόκον (4.000) ἐπὶ 100 καὶ τὸ γινόμενον τὸ διαιρέσαμεν διὰ τοῦ χρόνου (4 ἔτη) ἐπὶ τὸ ἐπιτόκιον (8%).

Τὸ ἴδιον θὰ παρατηρήσωμεν ὅσα ὅμοια προβλήματα καὶ ἄλλα σωμεν.

΄Επομένως :

Διὰ νὰ εὔρωμεν τὸ κεφάλαιον, δταν ὁ χρόνος ἐκφράζεται εἰς ἔτη, πολλαπλασιάζομεν τὸν τόκον ἐπὶ 100 καὶ τὸ γινόμενον τὸ διαιροῦμεν διὰ τοῦ χρόνου ἐπὶ τὸ ἐπιτόκιον.

$$T \nu \pi o s : K = \frac{T.100}{X.E}$$

Προβλήματα

106. Ποῖον κεφάλαιον πρέπει νὰ τοκίσωμεν πρὸς 5%, διὰ νὰ λάβωμεν μετὰ 3 ἔτη 900 δραχμὰς τόκον ;

107. Ποῖον κεφάλαιον πρέπει νὰ καταθέσωμεν εἰς τὴν Τράππεζαν πρὸς 4,5 %, διὰ νὰ λάβωμεν 7.200 δρχ. τόκον μετὰ 2 ἔτη ;

108. Μία οἰκία ἐνοικιάζεται πρὸς 1.500 δρχ. μηνιαίως. Πόσον πρέπει νὰ ύπολογισθῇ ἡ ἀξία τῆς πρὸς 8 % ; (Νὰ εύρεθῇ τὸ ἐτήσιον ἐνοίκιον).

109. "Ενας ύπαλληλος λαμβάνει μισθὸν 3.250 δρχ. καθαρὰς κατὰ μῆνα. Ποῖον κεφάλαιον ἔπρεπε νὰ εἴχε καταθέσει εἰς τὸ Ταμιευτήριον πρὸς 5 %, διὰ νὰ τοῦ δίδῃ τὰ χρήματα αὐτὰ ὡς ἐτήσιον τόκον;

β) "Οταν ὁ χρόνος ἐκφράζεται εἰς μῆνας

Πρόβλημα. Ποῖον κεφάλαιον πρέπει νὰ τοκίσωμεν πρὸς 6 %, διὰ νὰ λάβωμεν εἰς 8 μῆνας 800 δραχμὰς τόκον;

Σκέψις. Εἰς τὸ πρόβλημα αὐτὸν εἶναι γνωστὰ τὰ ποσά: τόκος, χρόνος καὶ ἐπιτόκιον καὶ ζητεῖται τὸ κεφάλαιον. Ὁ χρόνος ἐδῶ ἐκφράζεται εἰς μῆνας.

$$\begin{aligned} K &= ; \\ E &= 6 \% \\ X &= 8 \text{ μῆνες} \\ T &= 800 \text{ δρχ.} \end{aligned}$$

Κατάταξις:

100 δρχ. κεφ.	εἰς 12 μῆνας φέρουν	6 δρχ. τόκον
X » » 8 » »		800 » »

Λύσις. Ἐπειδὴ τὰ ποσὰ κεφάλαιον - τόκος εἶναι ἀνάλογα, ἐνῷ κεφάλαιον - χρόνος εἶναι ἀντίστροφα, θὰ ἔχωμεν :

$$X = 100 \times \frac{12}{8} \times \frac{800}{6} = 100 \times \frac{12}{8} \times \frac{800}{6} = 20.000. \text{ δρχ.}$$

***Απάντησις.** Πρέπει νὰ τοκίσωμεν 20.000 δραχμάς.

Παρατήρησις. Διὰ νὰ εὔρωμεν τὸ κεφάλαιον εἰς τὸ πρόβλημα αὐτό, καθώς καὶ εἰς ὅσα προβλήματα ὁ χρόνος ἐκφράζεται εἰς μῆνας, πολλαπλασιάζομεν τὸν τόκον ἐπὶ 1200 καὶ τὸ γινόμενον τὸ διαιροῦμεν διὰ τοῦ χρόνου ἐπὶ τὸ ἐπιτόκιον. Τὸ 1200 εἶναι τὸ γινόμενον 100×12 , ἐπειδὴ ὁ χρόνος ἐκφράζεται εἰς μῆνας καὶ ἀντὶ 1 ἔτος γράφομεν 12 μῆνας. ***Ἐπομένως:**

Διὰ νὰ εῦρωμεν τὸ κεφάλαιον, ὅταν ὁ χρόνος ἐκφράζεται εἰς μῆνας, πολλαπλασιάζομεν τὸν τόκον ἐπὶ 1200 καὶ τὸ γινόμενον τὸ διαιροῦμεν διὰ τοῦ χρόνου ἐπὶ τὸ ἐπιτόκιον.

$$T \nu \pi o s : K = \frac{T.1200}{X.E}$$

Προβλήματα

110. Πόσα χρήματα πρέπει νὰ καταθέσωμεν εἰς τὸ Ταμιευτήριον πρὸς 7,5 %, διὰ νὰ λάβωμεν μετὰ 8 μῆνας 60 δρχ. τόκον;

111. Ποῖον κεφάλαιον πρέπει νὰ τοκίσωμεν πρὸς 6%, διὰ νὰ λάβωμεν μετὰ 3 μῆνας 11.250 δρχ. τόκον;

112. Πόσα χρήματα πρέπει νὰ δανείσωμεν πρὸς 6,75%, διὰ νὰ λάβωμεν μετὰ 1 ἔτος καὶ 8 μῆνας 270 δρχ. τόκον;

Κάμετε καὶ ἕνα ἴδικόν σας πρόβλημα καὶ νὰ τὸ λύσετε.

γ) "Οταν ὁ χρόνος ἐκφράζεται εἰς ἡμέρας.

Πρόβλημα. Ποῖον κεφάλαιον πρέπει νὰ καταθέσωμεν εἰς τὴν Τράπεζαν πρὸς 6,5 %, διὰ νὰ λάβωμεν μετὰ 1 ἔτος 1 μῆρα καὶ 10 ἡμέρας 6.500 δραχμὰς τόκον;

Σκέψις. Ό ο χρόνος ἐδῶ ἐκφράζεται εἰς ἔτη, μῆνας καὶ ἡμέρας. Θὰ τὸν τρέψωμεν εἰς ἡμέρας. (Θὰ τρέψωμεν πρῶτον τὸ ἔτος εἰς 12 μῆνας καὶ θὰ προσθέσωμεν καὶ τὸν 1 μῆνα, ὅτε θὰ ἔχωμεν 13 μῆνας· τοὺς μῆνας θὰ τοὺς τρέψωμεν εἰς ἡμέρας: $13 \times 30 = 390$ ἡμέραι καὶ εἰς τὰς ἡμέρας αὐτὰς προσθέτομεν καὶ τὰς 10 ἡμέρας καὶ θὰ ἔχωμεν: $390 \text{ ἡμ.} + 10 \text{ ἡμ.} = 400 \text{ ἡμέραι}$).

Θυμηθῆτε ὅτι κεφάλαιον καὶ τόκος εἰναι ποσὰ ἀνάλογα καὶ κεφάλαιον καὶ χρόνος εἰναι ἀντίστροφα. (Κάμετε καὶ μόνοι σας τὴν σύγκρισιν νὰ τὸ διαπιστώσετε).

$$\begin{aligned} K &= ; \\ E &= 6,5 \% \\ X &= 400 \text{ ἡμ.} \\ T &= 6.500 \text{ δρχ.} \end{aligned}$$

Κατάταξις.

100 δρχ. κεφ. εἰς 360 ἡμ. φέρουν	6,5	δρχ. τόκον
X » » » 400 » »	6.500	» »

$$\begin{aligned} X &= 100 \times \frac{360}{400} \times \frac{6500}{6,5} = 100 \times \frac{360}{400} \times \frac{65000}{65} = \\ &= 90.000 \text{ δρχ.} \end{aligned}$$

Απάντησις. Τὸ ζητούμενον κεφάλαιον εἰναι 90.000 δρχ.

Διὰ νὰ εῖναι μεν τὸ κεφάλαιον, ὅταν δὲ χρόνος ἐκφράζεται εἰς ἡμέρας, πολλαπλασιάζομεν τὸν τόκον ἐπὶ 36.000 καὶ τὸ γινόμενον τὸ διαιροῦμεν διὰ τοῦ χρόνου ἐπὶ τὸ ἐπιτόκιον.

$$T \nu \pi o \varsigma : K = \frac{T.36000}{X.E}$$

Προβλήματα

113. Ποῖον κεφάλαιον πρέπει νὰ τοκίσωμεν πρὸς 8 %, διὰ νὰ λάβωμεν μετὰ 72 ἡμέρας 8.000 δραχμὰς τόκον;

114. Πόσα χρήματα πρέπει νὰ καταθέσωμεν εἰς τὴν Τράπεζαν πρὸς 7,5%, διὰ νὰ λάβωμεν μετὰ 1 μῆνα καὶ 10 ἡμέρας 6.250 δραχμὰς τόκον;

115. "Ενας γεωργὸς ἐδανείσθη ἔνα χρηματικὸν ποσὸν πρὸς 6,75%. Μετὰ 1 ἔτος 1 μῆνα καὶ 10 ἡμέρας ἐπέστρεψε τὸ δάνειον καὶ ἐπλήρωσε τόκον 112,50 δραχμάς. Πόσα χρήματα εἶχε δανεισθῆ ;

Νὰ γράψετε ἔνα ἰδιόν σας πρόβλημα καὶ νὰ τὸ λύσετε.

Γενικός κανὼν εύρεσεως τοῦ κεφαλαίου

Διὰ νὰ εῖναι μεν τὸ κεφάλαιον, πολλαπλασιάζομεν τὸν τόκον ἐπὶ 100, ὅταν δὲ χρόνος ἐκφράζεται εἰς ἔτη, ἐπὶ 1200, ὅταν δὲ χρόνος ἐκφράζεται εἰς μῆνας, ἐπὶ 36.000, ὅταν δὲ χρόνος ἐκφράζεται εἰς ἡμέρας, καὶ τὸ γινόμενον διαιροῦμεν διὰ τοῦ χρόνου ἐπὶ τὸ ἐπιτόκιον.

$$\text{Τύποι: } a) K = \frac{T.100}{X.E}, \quad \beta) K = \frac{T.1200}{X.E},$$

$$\gamma) K = \frac{T.36000}{X.E}$$

3. Εύρεσις τοῦ χρόνου.

Πρόβλημα 1. "Ενας ἐγγολάβος οἰκοδομῶν ἐδανείσθη ἀπὸ τὴν Κτημα-

τικήν Τράπεζαν 250.000 δρχ. πρὸς 8%. Κατὰ τὴν ἐξόφλησιν τοῦ δανείου ἐπλήρωσε τόκον 60.000 δραχμάς. Ἐπὶ πόσον χρόνον εἶχον τοκισθῆναι τὰ χρήματα αὐτά;

Σκέψις. Εἰς τὸ πρόβλημα αὐτὸν εἴναι γνωστὰ τὰ ποσά: Κεφάλαιον, τόκος καὶ ἐπιτόκιον, ζητεῖται δὲ ὁ χρόνος. Θὰ τὸ λύσωμεν μὲ τὴν σύνθετον μέθοδον τῶν τριῶν.

$$\begin{aligned} K &= 250.000 \text{ δρχ.} \\ E &= 8 \% \\ X &= ; \\ T &= 60.000 \text{ δρχ.} \end{aligned}$$

Κατάταξις.

100 δρχ. κεφ. εἰς	1 ἔτος φέρουν	8 δρχ. τόκον
250.000 » » »	X ἔτη »	60.000 » »

Σύγκρισις. a) Κεφάλαιον καὶ χρόνος. Ἀφοῦ 100 δρχ. κεφάλαιον φέρουν ὥρισμένον τόκον εἰς 1 ἔτος, διπλάσιον κεφάλαιον θὰ φέρῃ τὸν ἴδιον τόκον εἰς μισὸν χρόνον. Τὰ ποσὰ κεφάλαιον καὶ χρόνος εἴναι ἀντίστροφα.

b) Τόκος καὶ χρόνος. Ἀφοῦ 8 δραχμὰς τόκον τὸν φέρει ὥρισμένον κεφάλαιον εἰς 1 ἔτος, διπλάσιον τόκον θὰ τὸν φέρῃ τὸ ἴδιον κεφάλαιον εἰς διπλάσιον χρόνον. Τὰ ποσὰ τόκος καὶ χρόνος εἴναι ἀναλογα.

Διὰ τοῦτο θὰ πολλαπλασιάσωμεν τὸν ἀριθμὸν 1, ποὺ εἴναι ἐπάνω ἀπὸ τὸν ἄγνωστον, ἐπὶ τὸ κλάσμα τοῦ κεφαλαίου ὅπως ἔχει καὶ ἐπὶ τὸ κλάσμα τοῦ τόκου ἀντεστραμμένον.

$$\text{Λύσις } X = 1 \times \frac{100}{250.000} \times \frac{60.000}{8} = 3 \text{ ἔτη}$$

Απάντησις. Τὰ χρήματα εἶχον τοκισθῆναι ἐπὶ 3 ἔτη.

Κανών. Διὰ νὰ εῦρωμεν τὸν χρόνον, πολλαπλασιάζομεν τὸν τόκον ἐπὶ 100 καὶ τὸ γινόμενον διαιροῦμεν διὰ τοῦ κεφαλαίου ἐπὶ τὸ ἐπιτόκιον. Τὸ ἐξαγόμενον ἐκφράζει ἔτη.

$$\text{Τύπος : } X = \frac{T \cdot 100}{K.E}$$

Πρόβλημα 2. Εἰς πόσον χρόνον κεφάλαιον 720.000 δρχ., τοκι-

ζόμενον πρὸς 10%, γίνεται μαζὶ μὲ τὸν τόκον τὸν 800.000 δραχμαῖ;

Σκέψις. Καὶ ἐδῶ ζητοῦμεν τὸν χρόνον, ὅπως καὶ εἰς τὸ προηγούμενον πρόβλημα, ἀλλὰ δὲν μᾶς δίδεται καὶ ὁ τόκος. Ἡμποροῦμεν ὅμως νὰ τὸν εὔρωμεν τὸν τόκον, ἂν ἀπὸ τὰς 800.000 (αἱ ὅποιαι εἰναι κεφάλαιον καὶ τόκος μαζὶ) ἀφαιρέσωμεν τὸ 720.000 (κεφάλαιον). Δῆλ. $800.000 - 720.000 = 80.000$ (τόκος).

Τώρα προχωροῦμεν εἰς τὴν λύσιν τοῦ προβλήματος, ὅπως γνωρίζομεν.

Κατάταξις.

$$\begin{aligned} K &= 720.000 \text{ δρχ.} \\ E &= 10\% \\ X &= ; \\ T &= 80.000 \text{ δρχ.} \end{aligned}$$

100 δρχ. κεφ.	εἰς 1 ἔτος φέρουν	10	δρχ. τόκον
720.000 »	»	X ἔτη	» 80.000 »

$$\text{Λύσις. } X = 1 \times \frac{100}{720.000} \times \frac{80.000}{10} = \frac{10}{9} \text{ ἔτη} = 1 \text{ ἔτ. } 1 \text{ μ. } 10 \text{ ἡμ.}$$

Απάντησις. Ο ζητούμενος χρόνος εἶναι 1 ἔτ. 1 μ. 10 ἡμ.

Παρατήρησις. Εὰν ὁ χρόνος εὐρεθῇ εἰς κλάσμα, τότε διαιροῦμεν τὸν ἀριθμητὴν διὰ τοῦ παρονομαστοῦ. Ο πρῶτος ἀριθμὸς τοῦ πηλίκου παριστάνει ἔτη· ἂν μείνῃ ὑπόλοιπον ἢ ἂν δὲν χωρῇ καθόλου ὁ διαιρέτης εἰς τὸν διαιρετόν, τὸ τρέπομεν εἰς μῆνας πολλαπλασιάζοντες ἐπὶ 12. Τὸ νέον πηλίκον παριστάνει μῆνας. Τὸ νέον ὑπόλοιπον τὸ τρέπομεν εἰς ἡμέρας πολλαπλασιάζοντες ἐπὶ 30, τὸ δὲ νέον πηλίκον θὰ παριστάνῃ ἡμέρας.

Προβλήματα

116. Εἰς πόσον χρόνον κεφάλαιον 7.500 δραχμῶν, τοκιζόμενον πρὸς 7,5 %, δίδει τόκον 2.250 δραχμάς;

117. Μετὰ πόσον χρόνον κεφάλαιον 12.000 δρχ., τοκιζόμενον πρὸς 8 %, φέρει τόκον 240 δραχμάς;

118. Εἰς πόσον χρόνον κεφάλαιον 15.000 δρχ., τοκιζόμενον πρὸς $4 \frac{1}{2} \%$, φέρει τόκον 75 δραχμάς;

119. Εις πόσον χρόνον κεφάλαιον 80.000 δρχ., τοκιζόμενον πρὸς 7,5 %, γίνεται μὲ τοὺς τόκους του 95.000 δραχμαῖ ;

120. Ἐπὶ πόσον χρόνον πρέπει νὰ τοκισθοῦν 670.000 δρχ. πρὸς 8 %, διὰ νὰ γίνουν μὲ τοὺς τόκους των 737.000 δραχμαῖ ;

121. Ἔνας μαθητὴς ἐπώλησε τὰ καλύτερα γραμματόσημα τῆς συλλογῆς του καὶ ἔπηρε 2.400 δραχμάς. Τὰ χρήματα αὐτὰ τὰ κατέθεσεν εἰς τὴν Τράπεζαν πρὸς 8 %. Μὲ τοὺς τόκους ὠρισμένου χρόνου ἡγόρασεν ἔνα ραδιόφωνον ἀξίας 1600 δραχμῶν. Πόσον χρόνον ἔμειναν τόκισμένα τὰ χρήματα ;

122. Ἔνας πατέρας, ὅταν ἐγενήθη ἡ κόρη του, κατέθεσε διὰ λογαριασμὸν τῆς εἰς μίαν Τράπεζαν 60.000 δραχμὰς πρὸς 6 %. Ὁταν ἐμεγάλωσεν ἡ κόρη του ἔλαβεν τόκους καὶ κεφάλαιον μαζὶ 135.000 δραχμάς. Εἰς ποίαν ἡλικίαν τὰς ἔλαβεν ;

4. Εὕρεσις τοῦ ἐπιτοκίου

α) Ὁταν ὁ χρόνος ἐκφράζεται εἰς ἔτη.

Πρόβλημα. Κατέθεσέ τις εἰς τὴν Τράπεζαν 35.000 δρχ. καὶ μετὰ 3 ἔτη ἔλαβε τόκον 6.300 δρχ. Ποὺς ποῖον ἐπιτόκιον ἐτοκίσθησαν τὰ χρήματα :

Σκέψις. Εἰς τὸ πρόβλημα αὐτὸν είναι γνωστὰ τὰ ποσά : κεφάλαιον, χρόνος καὶ τόκος καὶ ζητεῖται τὸ ἐπιτόκιον. Ὁ χρόνος ἐκφράζεται εἰς ἔτη. Θὰ τὸ λύσωμεν μὲ τὴν σύνθετον μέθοδον τῶν τριῶν.

$$\begin{aligned} K &= 35.000 \text{ δρχ.} \\ E &= ; \\ X &= 3 \text{ ἔτη} \\ T &= 6.300 \text{ δρχ.} \end{aligned}$$

Κατάταξις.

35.000 δρχ.	κεφ.	εἰς	3	ἔτη	φέρουν	6.300 δρχ.	τόκον
100	»	»	»	1	ἔτος	»	X

Σύγκρισις. α) **Κεφάλαιον καὶ τόκος :** 35.000 δρχ. κεφάλαιον εἰς ὠρισμένον χρόνον φέρουν 6.300 δρχ. τόκον. Μισὸς κεφάλαιον εἰς τὸν ἴδιον χρόνον θὰ φέρῃ μισὸν τόκον. Τὰ ποσὰ κεφάλαιον καὶ τόκος είναι ἀνάλογα.

β) **Χρόνος καὶ τόκος.** Ὡρισμένον κεφάλαιον εἰς 3 ἔτη φέρει 6.300

δρχ. τόκου τὸ ἕδιον κεφάλαιον εἰς μισὸν χρόνον θὰ φέρῃ μισὸν τόκουν.
Τὰ ποσὰ χρόνος καὶ τόκος εἶναι ἀνάλογα.

Διὰ τοῦτο θὰ πολλαπλασιάσωμεν τὸν ἀριθμόν, ποὺ εἶναι ἐπάνω
νω ἀπὸ τὸν ἄγνωστον, ἐπὶ τὰ κλάσματα τῶν δύο ὅλων ποσῶν ἀν-
τεστραμμένα.

$$\text{Λύσις. } X = 6300 \times \frac{100}{35000} \times \frac{1}{3} = 6\%$$

*Απάντησις. Τὰ χρήματα ἐτοκίσθησαν πρὸς 6%.

Κανών. Διὰ νὰ εὑρωμεν τὸ ἐπιτόκιον, δταν ὁ χρόνος ἐκφρά-
ζεται εἰς ἔτη, πολλαπλασιάζομεν τὸν τόκον ἐπὶ 100 καὶ τὸ γινόμε-
νον τὸ διαιροῦμεν διὰ τοῦ κεφαλαίου ἐπὶ τὸν χρόνον.

$$T \nu \pi o \varsigma : E = \frac{T \cdot 100}{K \cdot X}$$

Προβλήματα

123. Πρὸς ποῖον ἐπιτόκιον πρέπει νὰ τοκισθοῦν 1200 δρχ., διὰ
νὰ φέρουν εἰς 4 ἔτη 324 δρχ. τόκου;

124. *Εδανείσθη κάποιος 2.500 δρχ., τὰς ὅποιας ἐπέστρεψε μετὰ
3 ἔτη πληρώνων καὶ 600 δρχ. διὰ τόκους. Πρὸς πόσον τοῖς ἑκατὸν
(%) εἶχε δανεισθῆ τὰ χρήματα;

125. Πρὸς ποῖον ἐπιτόκιον πρέπει νὰ τοκισθοῦν 1500 δρχ.,
διὰ νὰ φέρουν μετὰ 4 ἔτη 380 δρχ. τόκου;

Κάμετε καὶ σεῖς ἓνα πρόβλημα καὶ νὰ τὸ λύσετε.

β) "Οταν ὁ χρόνος ἐκφράζεται εἰς μῆνας.

Πρόβλημα Πρὸς ποῖον ἐπιτόκιον πρέπει νὰ τοκίσωμεν 45.000
δρχ., διὰ νὰ λάβωμεν μετὰ 4 μῆνας 1500 δραχμὰς τόκον;

Σκέψις. Γνωρίζομεν τὰ ποσά : κεφάλαι-
ον, χρόνον καὶ τόκον καὶ ζητοῦμεν τὸ ἐπιτό-
κιον. *Εδῶ ὁ χρόνος ἐκφράζεται εἰς μῆνας.

$K=45.000 \text{ δρχ.}$
$E = ;$
$X = 4 \text{ μῆνας}$
$T = 1500 \text{ δρχ.}$

Κατάταξις :

45.000 δρχ.	κεφ.	είς	4 μήν.	φέρουν	1500 δρχ.	τόκον.
100 » » »			12 » »	X	» »	

Λύσις. Έπειδή τὰ ποσὰ εἰναι ἀνάλογα, ὅπως γνωρίζομεν, θά
ἔχωμεν : $X = 1500 \times \frac{100}{45.000} \times \frac{12}{4} = 10$ δρχ.

Απάντησις. Τὸ ζητούμενον ἐπιτόκιον εἰναι 10%.

Παρατήρησις. Εἰς τὸ πρόβλημά μας δὲ χρόνος ἐκφράζεται εἰς μῆνας. Καί, διὰ νὰ εὕρωμεν τὸ ἐπιτόκιον, ἐπολλαπλασιάσαμεν τὸν τόκον ἐπὶ 1200 (100×12) καὶ διαιρέσαμεν διὰ τοῦ κεφαλαίου ἐπὶ τὸν χρόνον.

Κανών : Αἱὰ νὰ εῦρωμεν τὸ ἐπιτόκιον, ὅταν δὲ χρόνος ἐκφράζεται εἰς μῆνας, πολλαπλασιάζομεν τὸν τόκον ἐπὶ 1200 καὶ τὸ γινόμενον τὸ διαιροῦμεν διὰ τοῦ κεφαλαίου ἐπὶ τὸν χρόνον.

$$T \text{ } \pi \text{ } o \text{ } s : E = \frac{T.1200}{K.X}$$

Προβλήματα

126. Πρὸς ποῖον ἐπιτόκιον πρέπει νὰ τοκισθοῦν 6.000 δρχ., διὰ νὰ φέρουν εἰς 3 μῆνας 120 δρχ. τόκον ;

127. Κεφάλαιον 620.000 δρχ. τοκισθὲν ἔφερε μετὰ 1 ἔτος καὶ 3 μῆνας 58.125 δρχ. τόκον. Πρὸς πόσον τοῖς ἑκατὸν (%) εἶχε τοκισθῆ ;

128. Πρὸς ποῖον ἐπιτόκιον πρέπει νὰ τοκισθῇ κεφάλαιον 12.000 δρχ., διὰ νὰ φέρῃ τόκον 1440 δρχ. μετὰ 1 ἔτος καὶ 6 μῆνας ;

129. Πρὸς πόσον τοῖς ἑκατὸν (%) πρέπει νὰ τοκισθοῦν 900 δρχ., διὰ νὰ γίνουν μετὰ 2 μῆνας μᾶζι μὲ τὸν τόκον των 913,50 δρχ. ;

γ) "Οταν δὲ χρόνος ἐκφράζεται εἰς ἡμέρας.

Πρόβλημα. "Εμπορος ἔδανείσθη 320.000 δρχ. καὶ μετὰ 1 ἔτος 1 μῆνα καὶ 10 ἡμέρας ἐπλήρωσε τόκον 32.000 δρχ. Πρὸς ποῖον ἐπιτόκιον συνῆψε τὸ δάνειον :

Σκέψις. Μᾶς είναι γνωστά τὰ ποσά : Κεφάλαιον, χρόνος καὶ τόκος καὶ ζητεῖται τὸ ἐπιτόκιον. Ὁ χρόνος ἐδῶ ἐκφράζεται εἰς ἔτη, μῆνας καὶ ἡμέρας. Θὰ τρέψωμεν τὸν συμμιγῆ εἰς ἀκέραιον, ὅπως γνωρίζομεν, δηλ. εἰς ἡμέρας.

$$\begin{aligned} K &= 320.000 \text{ δρχ.} \\ E &= ; \\ X &= 400 \text{ ἡμ.} \\ T &= 32.000 \text{ δρχ.} \end{aligned}$$

Κατάταξις.

320.000 δρχ.	κεφ.	εἰς	400	ἡμ.	φέρουν	32.000 δρχ.	τόκον
100	»	»	360	»	»	X	»

Λύσις. Ἐπειδὴ τὰ ποσά είναι ἀνάλογα, ὅταν ζητῆται τὸ ἐπιτόκιον, θὰ ἔχωμεν :

$$X = 32.000 \times \frac{100}{320.000} \times \frac{360}{400} = 9 \text{ δρχ.}$$

Απάντησις. Τὸ ζητούμενον ἐπιτόκιον είναι 9%.

Παρατήρησις. Ἐπειδὴ ὁ χρόνος εἰς τὸ πρόβλημα αὐτὸν ἐκφράζεται εἰς ἔτη, μῆνας καὶ ἡμέρας, ἐτρέψαμεν τὸν συμμιγῆ εἰς ἡμέρας. Καὶ κατόπιν ἐπολλαπλασιάσαμεν τὸν τόκον ἐπὶ 36.000 (100×360) καὶ τὸ γινόμενον τὸ διαιρέσαμεν διὰ τοῦ κεφαλαίου ἐπὶ τὸν χρόνον.

Κανών. Διὰ νὰ εῦρωμεν τὸ ἐπιτόκιον, ὅταν ὁ χρόνος ἐκφράζεται εἰς ἡμέρας, πολλαπλασιάζομεν τὸν τόκον ἐπὶ 36.000 καὶ τὸ γινόμενον τὸ διαιροῦμεν διὰ τοῦ κεφαλαίου ἐπὶ τὸν χρόνον.

$$T \nu o s : E = \frac{T. 36000}{K.X}$$

Προβλήματα

130. Πρὸς ποῖον ἐπιτόκιον κεφάλαιον 8.100 δρχ. φέρει τόκον 54 δρχ. μετὰ 1 μῆνα καὶ 10 ἡμέρας;

131. Πρὸς ποῖον ἐπιτόκιον πρέπει νὰ τοκισθοῦν 3.000 δρχ., διὰ νὰ φέρουν εἰς 1 ἔτος 1 μῆνα καὶ 10 ἡμέρας τόκον 200 δραχμάς;

132. "Ενας γεωργὸς ἐπώλησε 1250 κιλὰ σιτάρι πρὸς 3 δρχ. τὸ κιλόν. Τὰ χρήματα, ποὺ ἐπῆρε, τὰ ἐδάνεισε. Πρὸς ποῖον ἐπιτόκιον

τὰ ἑδάνεισε, διὰ νὰ λάβῃ μετὰ 6 μῆνας καὶ 20 ήμέρας τόκον 250 δραχμάς;

133. Πρὸς ποῖον ἐπιτόκιον πρέπει νὰ τοκίσωμεν 46.800 δρχ., διὰ νὰ λάβωμεν μετὰ 3 μῆνας καὶ 10 ήμέρας τόκους καὶ κεφάλαιον μᾶζη 47.580 δραχμάς;

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΤΟῦ ἘΠΙΤΟΚΙΟΥ

Διὰ νὰ εῖδωμεν τὸ ἐπιτόκιον, πολλαπλασιάζομεν τὸν τόκον ἐπὶ 100, ὅταν ὁ χρόνος ἐκφράζεται εἰς ἑτη, ἐπὶ 1200, ὅταν ὁ χρόνος ἐκφράζεται εἰς μῆνας, καὶ ἐπὶ 36.000, ὅταν ὁ χρόνος ἐκφράζεται εἰς ήμέρας, καὶ τὸ γινόμενον διαιροῦμεν διὰ τοῦ κεφαλαίου ἐπὶ τὸν χρόνον.

$$\text{Τύποι: } \alpha) E = \frac{T \cdot 100}{K \cdot X}, \quad \beta) E = \frac{T \cdot 1200}{K \cdot X}$$

$$\gamma) E = \frac{T \cdot 36000}{K \cdot X}$$

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΚΟΥ

134. "Ενας γεωργός ἐπώλησεν 724 κιλὰ σιτάρι πρὸς 3,25 δρχ. τὸ κιλὸν καὶ 170 κιλὰ λάδι πρὸς 28,50 δρχ. τὸ κιλόν. Τὰ χρήματα, ποὺ εἰσέπραξε, τὰ ἐτόκισε πρὸς 8 % ἐπὶ 1 ἔτος καὶ 3 μῆνας. Πόσον τόκον ἔλαβεν;

135. "Εμπόρος ἡγόρασεν ἐμπορεύματα ἀξίας 75.000 δραχμῶν. Ἐπλήρωσεν εἰς μετρητὰ τὸ $\frac{1}{3}$ τῆς ἀξίας των, τὸ δὲ ὑπόλοιπον ὑπερχρεώθη νὰ πληρώσῃ μετὰ 3 μῆνας πρὸς 8 %. Πόσον τόκον ἐπλήρωσεν;

136. Μετὰ πόσον χρόνον κεφάλαιον 24.000 δρχ., τοκιζόμενον πρὸς 7,5 % γίνεται μὲ τοὺς τόκους του 24.600 δραχμαῖ;

137. Εἰς πόσον χρόνον κεφάλαιον 250.000 δρχ., τοκιζόμενον πρὸς 12,5 %, διπλασιάζεται;

138. Πρὸς ποῖον ἐπιτόκιον πρέπει νὰ τοκισθῇ κεφάλαιον, διὰ νὰ διπλασιασθῇ εἰς 20 ἔτη;

139. Πόσον τόκον θὰ πάρωμεν, ἂν ἀπὸ κεφάλαιον 20.000 δρχ. τοκίσωμεν διὰ 8 μῆνας τὰ μὲν $\frac{3}{5}$ αὐτοῦ πρὸς 6 %, τὸ δὲ ὑπόλοιπον πρὸς 9 %;

140. "Ἐνας ὑπάλληλος λαμβάνει τὸν μῆνα 2.500 δρχ. καθαράς. Ποῖον κεφάλαιον ἔπρεπε νὰ καταθέσῃ εἰς τὴν Τράπεζαν πρὸς 5 %, διὰ νὰ τοῦ δίδῃ τὰ χρήματα αὐτὰ ὡς τόκον;

141. Ἐπὶ πόσον χρόνον πρέπει νὰ καταθέσωμεν εἰς μίαν Τράπεζαν 48.000 δρχ. πρὸς 4,5 %, διὰ νὰ λάβωμεν τόκον καὶ κεφάλαιον μαζὶ 57.180 δραχμάς;

142. Πόσα κιλὰ σίτου πρέπει νὰ πωλήσῃ ἔνας γεωργὸς πρὸς 3,20 δρχ. τὸ κιλόν, διὰ νὰ καταθέσῃ τὴν ἀξίαν των εἰς τὴν Τράπεζαν πρὸς 5 % καὶ νὰ λάβῃ μετὰ 1 ἔτος καὶ 3 μῆνας 300 δρχ. τόκον;

Κάμετε καὶ σεῖς πρόβλήματα τόκου ἀπὸ τὴν ζωήν.

5. Χρῆσις βοηθητικοῦ κεφαλαίου

Πρόβλημα. Ποῖον κεφάλαιον, τοκιζόμενον πρὸς 6 %, μετὰ 3 ἔτη γίνεται μὲ τοὺς τόκους του 9.440 δραχμαί;

Σκέψις. Εἰς τὸ πρόβλημα αὐτὸν τοῦ τόκου ζητεῖται τὸ κεφάλαιον, μᾶς εἰναι ἄγνωστος ὅμως καὶ ὁ τόκος, ὁ ὅποιος εἰναι ἐνωμένος μὲ τὸ κεφάλαιον καὶ δὲν ἡμποροῦμεν νὰ τὸν χωρίσωμεν. Διὰ νὰ λυθῇ τὸ πρόβλημα τοῦτο, πρέπει νὰ χρησιμοποιήσωμεν βοηθητικὸν ποσόν.

$$\begin{aligned} K &= ; \\ E &= 6 \% \\ X &= 3 \text{ ἔτη} \\ T &= ; \\ K+T &= 9440 \text{ δρχ.} \end{aligned}$$

Λαμβάνομεν ὡς βοηθητικὸν ποσὸν τὸ κεφάλαιον τῶν 100 δρχ. καὶ εύρισκομεν τὸν τόκον αὐτοῦ εἰς τὸν χρόνον, τὸν ὅποιον δρίζει τὸ πρόβλημα, καὶ μὲ τὸ ᾄδιον ἐπιτόκιον. Τὸν τόκον αὐτὸν θὰ τὸν προσθέσωμεν εἰς τὸ βοηθητικὸν κεφάλαιον τῶν 100 δραχμῶν καὶ θὰ εύ-

ρωμεν εις τὶ ποσὸν θὰ ἀνέλθῃ τὸ ποσὸν τοῦτο τοκιζόμενον ὑπὸ τοὺς αὐτοὺς δρους.

Λύσις.

α' Κατάταξις: 100 δρχ. κεφ. εἰς 1 ἔτος φέρουν 6 δρχ. τόκον.

$$\begin{array}{ccccccc} 100 & \gg & \gg & \gg & 3 \text{ ἔτη} & \gg & \gg \end{array}$$

Ἐπειδὴ τὰ ποσὰ χρόνος καὶ τόκος εἶναι ἀνάλογα, θὰ ἔχωμεν :

$$X = 6 \times \frac{3}{1} = 18 \text{ δρχ. (τόκος).}$$

Ἐὰν τὸν τόκον αὐτὸν τῶν 18 δραχμῶν τὸν προσθέσωμεν εἰς τὸ κεφάλαιον τῶν 100 δρχ., θὰ εὕρωμεν : $100 + 18 = 118$ δρχ. (κεφάλαιον + τόκος).

β' Κατάταξις. 118 δρχ. Κ + Τ προέρχονται ἀπὸ 100 δρχ. Κ.

$$\begin{array}{ccccccc} 9.440 & \gg & \gg & \gg & \gg & X & \gg \end{array}$$

Ἐπειδὴ τὰ ποσὰ κεφάλαιον καὶ τόκος εἶναι ἀνάλογα, ἔχομεν :

$$X = 100 \times \frac{9.440}{118} = 8.000 \text{ δρχ.}$$

Απάντησις: Τὸ ζητούμενον κεφάλαιον εἶναι 8.000 δρχ.

Παρατήρησις: Οἱ τόκοι θὰ εἶναι ἀνάλογοι πρὸς τὰ κεφάλαια διὰ τὸ αὐτὸν ἐπιτόκιον καὶ τὸν αὐτὸν χρόνον.

Προβλήματα

143. Ποῖον κεφάλαιον πρέπει νὰ τοκίσωμεν πρὸς 8 %, διὰ νὰ λάβωμεν μετὰ 3 μῆνας μᾶζι μὲ τοὺς τόκους του 6120 δραχμάς ;

144. Ποῖον κεφάλαιον, τοκιζόμενον πρὸς 9 %, γίνεται μετὰ 6 μῆνας μὲ τοὺς τόκους του 1881 δραχμαί ;

145. "Ενας πατέρας, ὅταν ἐγεννήθη ἡ κόρη του, κατέθεσε διὰ λογαριασμὸν τῆς εἰς μίαν Τράπεζαν ἔνα κεφάλαιον πρὸς 6 %. "Οταν ἡ κόρη του ἔγινεν 21 ἔτῶν, ἔλαβε τόκους καὶ κεφάλαιον 135.600 δρχ. Ποῖον κεφάλαιον εἶχε καταθέσει ὁ πατέρα τῆς καὶ πόσον τόκον ἔφερε τὸ κεφάλαιον τοῦτο ;

6. 'Υφαίρεσις

α) Δάνειον - Γραμμάτιον - Συναλλαγματική.

Εἰς τὸ κεφάλαιον «περὶ τόκου» εἴπαμεν ὅτι οἱ ἔμποροι, διὰ νὰ ἀγοράσουν τὰ ἔμπορεύματά των, δανείζονται χρήματα ἀπὸ τὴν Τράπεζαν. Τὸ ἴδιον κάμνουν οἱ κτηματίαι, οἱ γεωργοὶ καὶ οἱ κτηνοτρόφοι εἴτε ἀπὸ τὴν Τράπεζαν εἴτε ἀπὸ Συνεταιρισμούς εἴτε ἀπὸ ἴδιώτας. Καὶ εἰς τὸν ὡρισμένον χρόνον ἐπιστρέφουν τὸ δάνειον.

Οἱ ἔμποροι εἰς τὰς συναλλαγάς των διευκολύνονται καὶ κατ' ἄλλον τρόπον. Συνήθως δὲν πληρώνουν ὅλην τὴν ἀξίαν τῶν ἔμπορευμάτων, τὰ ὅποια ἀγοράζουν ἀπὸ ἄλλον μεγαλύτερον ἔμπορον (τὸν χονδρέμπορον) ἢ ἀπὸ τὴν ἀποθήκην ἢ ἀπὸ τὸ ἔργοστάσιον. Πληρώνουν ἔνα μέρος μόνον τῆς ἀξίας, ὑπόσχονται δὲ νὰ πληρώσουν τὰ ὑπόλοιπα μετὰ ἔνα ὡρισμένον χρονικὸν διάστημα. Διὰ τὰ ὑπόλοιπα αὐτὰ ὑπογράφει ὁ ἀγοραστής ἔμπορος (ὁ ὀφειλέτης) μίαν ἀπόδειξιν, ἢ ὅποια δνομάζεται **Γραμμάτιον**.

'Ο συνηθέστερος τύπος τοῦ γραμματίου εἶναι ὁ ἔξῆς :

Γραμμάτιον δρχ. 51.500

Τὴν 30ὴν Σεπτεμβρίου 1969 ὑπόσχομαι νὰ πληρώσω εἰς τὸν Π.Β... ἢ εἰς Διαταγὴν αὐτοῦ τὸ ἄνω ποσὸν τῶν δραχμῶν πεντήκοντα μιᾶς χιλιάδων πεντακοσίων, ἀξίαν ληφθεῖσαν εἰς ἔμπορεύματα.

*'Ἐν 'Αθήναις τῇ 1 'Απριλίου 1969
(Ὑπογρ.) X.P.....
'Οδὸς*

Καθώς βλέπομεν, εἰς τὸ γραμμάτιον ἀναγράφεται τὸ ποσὸν τοῦ χρέους (51.500), εἰς τὸ ὅποιον περιλαμβάνεται τὸ κεφάλαιον καὶ ὁ τόκος τῶν 6 μηνῶν. Ἀναγράφεται ἐπίσης καὶ ἡ ἡμερομηνία ἔξιφλήσεως τοῦ χρέους (30 Σεπτεμβρίου 1969).

Τὸ **Γραμμάτιον** αὐτό, τὸ ὅποιον δνομάζεται καὶ **χρεώγραφον**, τὸ ἔκδιδει καὶ ὑπογράφει ὁ **χρεώστης** (ὅφειλέτης) **X.P.** καὶ τὸ κρατεῖ ὁ **Π.Β.**, δηλ. ὁ **πιστωτὴς** (δανειστής), ὁ ὅποιος λέγεται καὶ **κομιστὴς** τοῦ **χρεωγράφου**.

‘Ο πιστωτής Π.Β. δύναται νὰ ζητήσῃ ἀπὸ τὸν ὄφειλέτην του Χ.Ρ. νὰ τοῦ ὑπογράψῃ ἀντὶ γραμματίου μίαν συναλλαγματικήν. Καὶ ἡ συναλλαγματικὴ εἶναι χρεώγραφον· εἶναι δηλ. μία ἀπόδειξις, ἡ ὅποια ἀποδεικνύει τὴν σύναψιν τοῦ δανείου.

Ἡ διαφορὰ μεταξὺ τοῦ Γραμματίου καὶ τῆς συναλλαγματικῆς εἶναι ἡ ἔξῆς : Τὸ Γραμμάτιον, ὅπως εἴπαμεν, τὸ ἐκδίδει καὶ τὸ ὑπογράφει ὁ χρεώστης (ὁ ὄφειλέτης), ἐνῷ τὴν συναλλαγματικὴν τὴν ἐκδίδει καὶ τὴν ὑπογράφει ὁ πιστωτής (ὁ δανειστής) καὶ τὴν ἀπευθύνει πρὸς τὸν ὄφειλέτην μὲ τὴν ἐντολὴν τῆς πληρωμῆς κατὰ τὴν ἡμέραν τῆς λήξεως. ‘Ο ὄφειλέτης τὴν ἀποδέχεται μὲ τὴν ὑπογραφήν του κάτω ἀπὸ τὴν λέξιν Δεκτή.

*Ιδοὺ ὁ τύπος τῆς συναλλαγματικῆς :

Ληξις τῇ 30/9/69. Συναλλαγματικὴ διὰ δοχ. 51.500.

Τὴν 30ὴν Σεπτεμβρίου 1969 πληρώσατε δυνάμει τῆς παρούσης μόνης συναλλαγματικῆς εἰς Διαταγὴν Π.Β.

.....καὶ εἰς τὸ ἐν Ἀθήναις κατάστημα Ἐμπορικῆς Τραπέζης τὸ ποσὸν τῶν Δραχμῶν πεντήκοντα μιᾶς χιλάδων πεντακοσίων.

**Ἐν Ἀθήναις τῇ 1 Ἀπριλίου 1969*

Πρὸς

Tὸν κ. X.P

**Ο *Ἐκδότης*

**Οδὸς*

(ὑπογρ.) Π. B.

**Ἀθήνας Δεκτὴ*

(‘Υπογραφ.) X. P.

6) Υφαίρεσις

‘Ο κομιστής τοῦ χρεωγράφου σπανίως κρατεῖ τὸ γραμμάτιον ἢ τὴν συναλλαγματικὴν μέχρι τῆς ἡμέρας τῆς λήξεως. Οἱ ἐμπορεύομενοι συνήθως χρειάζονται χρήματα, διὰ νὰ πληρώνουν τὰς ὑποχρεώσεις των. Πρὸς τοῦτο χρησιμοποιοῦν τὸ γραμμάτιον ἢ τὴν συναλλαγματικὴν ὡς χαρτονόμισμα.

Εἰς τὸ παράδειγμά μας : “Ἄσ ύποθέσωμεν ὅτι 4 μῆνας μετὰ τὴν

ύπογραφήν τοῦ γραμματίου ή τῆς συναλλαγματικῆς ὁ πιστωτής Π.Β. ἔχειάσθη χρήματα. Πηγαίνει τότε εἰς τὴν Τράπεζαν ἢ εἰς ἴδιωτην καὶ μεταβιβάζει τὸ εἰς χεῖράς του χρεώγραφον ύπογράφων αὐτὸ εἰς τὸ ὅπισθεν μέρος (ὅπισθογράφησις).

Ἡ Τράπεζα, ἡ ὅποια θὰ πάρῃ τὸ χρεώγραφον, δὲν θὰ δώσῃ ὅλον τὸ ποσόν, ποὺ ἀναγράφεται εἰς αὐτό, ἀλλὰ θὰ κρατήσῃ τὸν τόκον τῶν δύο μηνῶν, οἱ ὅποιοι ύπολείπονται μέχρι τῆς λήξεως τοῦ γραμματίου.

Κάμνουν τὸν λογαριασμὸν καὶ εύρίσκουν, ὅτι ὁ τόκος τῶν 51.500 δρχ. εἰς 2 μῆνας μὲ τὸ καθωρισμένον ἐπιτόκιον 12 % εἶναι 1.030 δραχμαί. Τὸν ἀφαιροῦν τὸν τόκον αὐτὸν ἀπὸ τὸ ποσόν τῶν 51.500 δραχμῶν καὶ τὸ ύπολοιπον παίρνει ὁ Π.Β. Θὰ πάρῃ δηλ. αὐτὸς $51.500 - 1.030 = 50.470$ δραχμάς.

Παρατηρήσεις. 1) τὸ ποσόν 51.500 δρχ., τὸ ὅποιον γράφει ἐπάνω τὸ χρεώγραφον, λέγεται ὀνομαστικὴ ἀξία (Ο.Α.) τοῦ γραμματίου. Τὸ ποσόν 50470 δρχ., τὸ ὅποιον παίρνει ὁ πιστωτής, ὅταν προεξοφλῇ τὸ χρεώγραφον, λέγεται παροῦσα ἀξία ἢ πραγματικὴ ἀξία (Π.Α.) τοῦ γραμματίου.

2) Ἡ Ἑμερομηνία 30 Σεπτεμβρίου 1969, κατὰ τὴν ὅποιαν πρέπει νὰ πληρώσῃ τὰ χρήματα ὁ ὄφειλέτης, λέγεται λῆξις τοῦ γραμματίου.

3) Ὁ χρόνος, ὁ ὅποιος μεσολαβεῖ ἀπὸ τὴν ἡμέραν ποὺ ἡ Τράπεζα πληρώνει τὸν πιστωτὴν μέχρι τῆς ἡμέρας τῆς λήξεως τοῦ γραμματίου, λέγεται χρόνος προεξοφλήσεως τοῦ γραμματίου.

4) Τὸ ποσόν τῶν 1.030 δραχμῶν, τὸ ὅποιον κρατεῖ ἡ Τράπεζα ὡς τόκον, λέγεται ἔξωτερικὴ ὑφαίρεσις.

“Ωστε : ’Εξωτερικὴ ‘Υφαιόρεσις λέγεται ὁ τόκος τῆς ὀνομαστικῆς ἀξίας, τὸν ὅποιον ἀφαιρεῖ ἀπὸ τὴν ὀνομαστικὴν ἀξίαν τοῦ γραμματίου ἐκεῖνος, ποὺ πληρώνει τὸ χρεώγραφον πρὸ τῆς λήξεώς του.

5) Ἡ ἔξωτερικὴ ὑφαίρεσις ύπολογίζεται ἐπὶ τῇ βάσει ἐπιτοκίου, τὸ ὅποιον δὲν εἶναι πάντοτε τὸ ἴδιον. Ὁρίζεται συνήθως ύπο τοῦ Κράτους καὶ ὀνομάζεται ἐπιτόκιον προεξοφλήσεως.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΦΑΙΡΕΣΕΩΣ

a) Εύρεσις της έξωτερικής ύφαιρέσεως (τόκου)

Πρόβλημα. Γραμμάτιον 'Όνομαστικῆς ἀξίας 2.400 δρχ. προεξοφλεῖται 2 μῆνας πρὸ τῆς λήξεώς του πρὸς 12%. Πολὰ εἰναι ἡ έξωτερικὴ ύφαιρεσίς καὶ πολὰ ἡ παροῦσα ἀξία τοῦ Γραμματίου;

Σκέψις. Εἰς τὸ πρόβλημα αὐτὸ τε εἰναι γνωστὰ τὰ ποσά : 'Όνομαστικὴ ἀξία (τὸ κεφάλαιον εἰς τὰ προβλήματα τοῦ τόκου), δ χρόνος προεξοφλήσεως καὶ τὸ ἐπιτόκιον καὶ ζητεῖται ἡ έξωτερικὴ ύφαιρεσίς (ὁ τόκος) καὶ ἡ παροῦσα ἀξία.

Θὰ τὸ λύσωμεν ὅπως καὶ τὰ προβλήματα τοῦ τόκου.

Κατάταξις :

$$\begin{aligned} K &= \text{'Ov. } \alpha\xi. = 2.400 \text{ δρχ.} \\ E &= 12 \% \\ X &= 2 \text{ μ.} \\ T &= \xi\xi. \text{ ύφ.} = ; \\ \text{Π. A. } (K - T) &= ; \end{aligned}$$

100 δρχ.	O.A.	εἰς 12 μῆνας	ἔχουν	12 δρχ.	E.Y.
2.400	»	»	2	»	X

Λύσις. Γνωρίζομεν ἀπὸ τὰ προβλήματα τοῦ τόκου ὅτι τὰ ποσὰ κεφάλαιον - τόκος καὶ χρόνος - τόκος εἰναι ἀνάλογα. Ἐπομένως θὰ ἔχωμεν :

$$X = 12 \times \frac{2.400}{100} \times \frac{2}{12} = 48 \text{ δρχ. έξωτ. ύφαιρεσίς.}$$

$$\text{Παροῦσα ἀξία} = 2.400 - 48 = 2.352 \text{ δρχ.}$$

'Απάντησις: Ἡ έξωτερικὴ ύφαιρεσίς τοῦ γραμματίου εἰναι 48 δρχ. καὶ ἡ παροῦσα ἀξία του 2.352 δρχ.

Παρατήρησις: Ἡ παροῦσα ἀξία εύρισκεται, ὃν ἀφαιρέσωμεν τὴν έξωτ. ύφαιρεσιν ἀπὸ τὴν ὄνομαστικὴν ἀξίαν.

b) Εύρεσις της όνομαστικῆς ἀξίας (κεφαλαίου)

Πρόβλημα. Γραμμάτιον προεξοφλεῖται 3 μῆνας πρὸ τῆς λήξεώς

του πρὸς 12 % μὲ ἐξωτερικὴν ὑφαίρεσιν 1500 δρχ. Ποίᾳ ἡ ὀνομαστικὴ ἀξία τοῦ γραμματίου;

Σκέψις. Ἐδῶ ζητεῖται ἡ εὔρεσις τῆς ὀνομαστικῆς ἀξίας τοῦ Γραμματίου, δηλ. τοῦ κεφαλαίου. Ἐπομένως θὰ τὸ λύσωμεν ὅπως καὶ τὰ προβλήματα τόκου, εἰς τὰ ὄποια ζητεῖται τὸ κεφάλαιον.

$$\begin{aligned} K &= \text{Ov. ax.} = ; \\ E &= 12 \% \\ X &= 3 \mu. \\ T &= \text{εξ. ύφ.} = 1.500 \end{aligned}$$

Κατάταξις:

$$\begin{array}{ccccccccc} 100 \text{ δρχ. O.A.} & \text{εἰς} & 12 & \text{μῆν.} & \text{ἔχουν} & 12 \text{ δρχ.} & \text{εξ.} & \text{ὑφαίρεσιν} \\ X & » & » & » & 3 & » & » & 1.500 & » & » \end{array}$$

Λύσις. Ἐπειδή, ὅπως γνωρίζομεν, χρόνος καὶ κεφάλαιον εἶναι ποσὰ ἀντίστροφα, ἐνῷ τόκος καὶ κεφάλαιον εἶναι ποσὰ ἀνάλογα, θὰ ἔχωμεν :

$$X = 100 \times \frac{12}{3} \times \frac{1.500}{12} = 50.000 \text{ δρχ. (O.A.)}$$

Απάντησις : Ἡ ὀνομαστικὴ ἀξία τοῦ γραμματίου εἶναι 50.000 δραχμαί.

γ) Εὔρεσις τοῦ χρόνου προεξοφλήσεως

Πρόβλημα. Γραμμάτιον Ὀνομαστικῆς ἀξίας 8.000 δραχμῶν προεξοφλήθη πρὸς 9 % μὲ ἐξωτερικὴν ὑφαίρεσιν 450 δρχ. Πρὸ πόσου χρόνου ἔγινεν ἡ προεξοφλήσις;

Σκέψις. Ἐδῶ ζητεῖται ἡ εὔρεσις τοῦ χρόνου προεξοφλήσεως. Θὰ τὸ λύσωμεν ὅπως τὰ προβλήματα τόκου, εἰς τὰ ὄποια ζητεῖται ὁ χρόνος.

$$\begin{aligned} K &= \text{O.A.} = 8.000 \text{ δρχ.} \\ E &= 9 \% \\ X &= ; \\ T &= \text{εξ. ύφ.} = 450 \text{ δρχ.} \end{aligned}$$

Κατάταξις.

$$\begin{array}{ccccccccc} 100 \text{ δρχ. O.A.} & \text{εἰς} & 1 \text{ ἔτος} & \text{ἔχουν} & 9 \text{ δρχ.} & \text{εξ.} & \text{ὑφαίρ.} \\ 8.000 & » & » & » & X \text{ ἔτη} & » & » & 450 & » & » \end{array}$$

Αύσις. Γνωρίζομεν ὅτι κεφάλαιον καὶ χρόνος εἶναι ποσὰ ἀντίστροφα, ἐνῷ τόκος καὶ χρόνος εἶναι ποσὰ ἀνάλογα. Ἐπομένως :

$$X = 1 \times \frac{100}{8.000} \times \frac{450}{9} = \frac{5}{8} \text{ ετ.} = 7 \text{ μήνες } 15 \text{ ήμ.}$$

Απάντησις: Ή προεξόφλησης έγινε πρό 7 μηνῶν καὶ 15 ήμερῶν.

δ) Εύρεσης τοῦ ἐπιτοκίου

Πρόβλημα. Γραμμάτιον 36.000 δραχμῶν προεξοφλεῖται 8 μῆνας πρὸ τῆς λήξεώς του ἀντὶ 34.500 δρχ. Πρὸς ποῖον ἐπιτόκιον έγινεν ἡ προεξόφληση;

Σκέψις: Επειδὴ εἰς τὸ πρόβλημα αὐτὸ ζητεῖται τὸ ἐπιτόκιον, θὰ τὸ λύσωμεν ὅπως τὰ σχετικὰ προβλήματα τόκου. Επειδὴ δὲν μᾶς δίδεται καὶ ἡ ἔξωτερική ὑφαίρεσις (δ τόκος), ταύτην εὑρίσκομεν, ἀν ἀφαιρέσωμεν τὴν παροῦσαν ἀξίαν ἀπὸ τὴν δυνομαστικήν ἀξίαν· ἔτοι : $36.000 - 34.500 = 1.500$.

$K = O.A. = 36.000 \text{ δρχ.}$
$E = ;$
$X = 8 \text{ μ.}$
$T = \xi. \text{ ὑφ.} = 1500 \text{ δρχ.}$
$\Pi.A. = 34.500 \text{ δρχ.}$

Κατάταξις

$$\begin{array}{ccccccccc} 36.000 & \text{δρχ.} & O.A. & \text{εἰς} & 8 & \text{μῆν.} & \text{ἔχουν} & 1.500 & \text{δρχ.} \end{array} \begin{array}{c} \xi. \\ \text{ὑφαίρεσιν} \end{array}$$

$$\begin{array}{ccccccccc} 100 & \gg & \gg & \gg & 12 & \gg & \gg & X & \gg & \gg & \gg \end{array}$$

Λύσις. Επειδὴ, ὅπως γνωρίζομεν, εἰς τὰ προβλήματα ποὺ ζητεῖται τὸ ἐπιτόκιον τὰ ποσὰ εἶναι ἀνάλογα, θὰ ἔχωμεν :

$$X = 1.500 \times \frac{100}{36.000} \times \frac{12}{8} = 6,25 \text{ δρχ.}$$

Απάντησις: Ή προεξόφλησης έγινε πρὸς 6,25 %.

ε) Χρῆσις βοηθητικοῦ ποσοῦ

Πρόβλημα. Γραμμάτιον προεξωφλήθη 45 ήμέρας πρὸ τῆς λήξεώς του πρὸς 10% ἀντὶ 5925 δραχμῶν. Ποία ἦτο ἡ δυνομαστικὴ ἀξία του;

Σκέψις. Διὰ τὴν λύσιν τοῦ προβλήματος αὐτοῦ θὰ χρησιμοποιήσωμεν βοηθητικὸν ποσόν, ὅπως ἐκάμαμεν καὶ εἰς παρόμοια προβλήματα τόκου.

$K = O.A. = ;$
$E = 10 \%$
$X = 45 \text{ ήμ.}$
$T = \xi. \text{ ὑφ.} = ;$
$\Pi.A. = 5.925 \text{ δρχ.}$

Αύσις.

α' Κατάταξις: 100 δρχ. εἰς 360 ἡμ. ἔχουν 10 δρχ. Ε.Υ.,
 100 » » 45 » X » »

Ἐπειδὴ χρόνος καὶ τόκος εἶναι πιοσὰ ἀνάλογα, ἔχομεν :

$$X = 10 \times \frac{45}{360} = 1,25 \text{ δρχ. ἐξ. ύφαίρ.}$$

Ἐάν τὴν ύφαίρεσιν αὔτην τὴν ἀφαιρέσωμεν ἀπὸ τὰς 100 δρχ.,
 θὰ ἔχωμεν : $100 - 1,25 = 98,75$ δρχ. παρ. ἀξία.

β' Κατάταξις : 98,75 δρχ. Π.Α. προέρχονται ἀπὸ 100 δρχ. Ο.Α.
 5.925 » » » X » »

$$X = 100 \times \frac{5.925}{98,75} = 6.000 \text{ δρχ. Ο.Α.}$$

Ἀπάντησις. Ἡ δινομαστικὴ ἀξία τοῦ γραμματίου ήτο 6.000 δρχ.

Γενικά προβλήματα ἔξωτ. Ὑφαιρέσεως

146. Πρὸς ποιὸν ἐπιτόκιον ἐγένετο ἡ προεξόφλησις τῶν ἑξῆς γραμματίων, ἔάν :

α) 3.600 δρχ. προεξωφλήθησαν πρὸ 3 μηνῶν μὲν ἐξ. ύφαίρεσιν 72 δρχ.

β) 1.600 » » » 3 μην. καὶ 10 ἡμ. ἀντὶ 1.560 δραχμῶν.

γ) 3.000 » » » 20 ἡμ. μὲν ἐξ. ύφαίρεσιν 10 δρχ.

147. Ποῖος εἶναι ὁ χρόνος προεξοφλήσεως τῶν ἑξῆς γραμματίων :

α) 3.500 δρχ. ὄν. ἀξίας πρὸς $4 \frac{1}{2} \%$ μὲν ἐξ. ύφαίρεσιν 350 δρχ.

β) 1.800 » » » 9 % » » » 45 »

γ) 1.500 » » » 10 % » » » 30 »

148. Γραμμάτιον δινομαστικῆς ἀξίας 4.800 δρχ. προεξοφλεῖται 2 μῆνας πρὸ τῆς λήξεώς του πρὸς 8 %. Ποία ἡ ἔξωτερικὴ ύφαίρεσις καὶ ποία ἡ παροῦσα ἀξία αὐτοῦ :

149. Γραμμάτιον δινομ. ἀξίας 6.500 δρχ. προεξοφλεῖται 1 μῆνας καὶ 10 ἡμ. πρὸ τῆς λήξεώς του πρὸς 9 %. Ποία ἡ παροῦσα ἀξία του ;

ψηφιστοὶ ιθῆκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

150. Ποία ή όνομαστική δέσια γραμματίου, τὸ ὁποῖον προεξόφλειται 2 μῆνας πρὸ τῆς λήξεώς του πρὸς 10 % μὲ έξωτ. Νφαίρεσιν 60 δραχμάς ;

151. Ἐνας χαρτοπώλης ἡγόρασεν ἀπὸ ἀποθήκην διάφορα σχολικὰ εἴδη δέσιας 5.700 δραχμῶν. Μὲ τὴν παραλαβὴν τοῦ ἐμπορεύματος ἐπλήρωσεν ἀμέσως 3.200 δραχμάς, διὰ δὲ τὸ ὑπόλοιπον ὑπέγραψε γραμμάτιον διὰ 6 μῆνας πρὸς 10 %. Ποία ἦτο ή όνομαστική δέσια τοῦ γραμματίου ;

152. Ἐμπορος προεξώφλησεν εἰς τὴν Τράπεζαν γραμμάτιον 2.625 δρχ. 2 μῆνας πρὸ τῆς λήξεώς του πρὸς 12 %. Τί ποσὸν ἐκράτησεν ή Τράπεζα καὶ πόσα χρήματα ἔλαβεν ὁ ἐμπορος ;

153. Ποία ή ἔξωτερική Νφαίρεσις γραμματίου, τὸ ὁποῖον προεξόφλειται 45 ἡμέρας πρὸ τῆς λήξεώς του πρὸς 10 % ἀντὶ 2.370 δρχ. ;

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ

ΜΕΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣ ΜΕΡΗ ΑΝΑΛΟΓΑ

Πρόβλημα 1. Δέο ἐργάται σινεργώνησαν νὰ σκάψουν ἵνα κτῆμα μὲ τὸ ὕδιον ἡμερομίσθιον. Εἰσιγάσθησαν ὁ ἵνας 4 ἡμέρας καὶ ὁ ἄλλος 6 ἡμέρας. "Ελαύον καὶ οὐ δέο μαζὶ 1.000 δραχμάς. Πόσα χρήματα θὰ πάρῃ ἵκαστος;

Σκέψις. Ἀντιλαμβανόμεθα ὅλοι, ὅτι δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ μοιρασθοῦν τὰ χρήματα ἔξι ἵσου καὶ νὰ πάρῃ ὁ καθένας τὰ μισά, διότι δὲν εἰργάσθησαν ἵσας ἡμέρας. Τὰ χρήματα, ποὺ θὰ πάρῃ ὁ καθένας των, θὰ εἶναι ἀνάλογα μὲ τὰ ἡμερομίσθιά των.

Διὰ τὴν λύσιν τοῦ προβλήματος νοερῶς σκεπτόμεθα ὡς ἔξῆς : Καὶ οἱ δύο ἐργάται μαζὶ εἰργάσθησαν $4 + 6 = 10$ ἡμέρας. "Ἄρα κάθε ἡμερομίσθιον εἶναι $1.000 : 10 = 100$ δραχμαί. Ἐπομένως ὁ πρῶτος θὰ λάβῃ $4 \times 100 = 400$ δρχ. καὶ ὁ δεύτερος $6 \times 100 = 600$ δραχμάς.

Πρόβλημα 2. Τὸ φιλόπτωχον ταμεῖον ἐνὸς Ναοῦ ἐμοίσασεν κατὰ τὰς ἑορτὰς τῶν Χοιστογένεων εἰς 3 οἰκογενείας 1500 δραχμάς ἀνάλογα μὲ τὰ ἄτομα ἐκάστης οἰκογενείας. Ἡ μία οἰκογένεια ἀπετελεῖται ἀπὸ 2 ἄτομα, ἡ ἄλλη ἀπὸ 3 καὶ ἡ ἄλλη ἀπὸ 5 ἄτομα. Πόσα χρήματα ἐπῆρεν ἐκάστη οἰκογένεια;

Σκέψις. Καὶ ἔδω δὲν θὰ μοιράσωμεν τὸ ποσὸν τῶν 1.500 δραχμῶν εἰς τρία ἵσα μέρη. Θὰ τὸ μοιράσωμεν ἀνάλογα μὲ τὰ ἄτομα, τὰ χμῶν εἰς τρία ἵσα μέρη. Θὰ τὸ μοιράσωμεν ἀνάλογα μὲ τοὺς ἀριθμοὺς 2,3,5. δόποια ἔχει ἐκάστη οἰκογένεια δῆλη. ἀνάλογα μὲ τοὺς ἀριθμοὺς 2,3,5.

Καὶ τὸ πρόβλημα αὐτὸ τὸ μπτοροῦμεν νὰ τὸ λύσωμεν νοερῶς, ὅπως καὶ τὸ προηγούμενον. Θὰ διαιρέσωμεν τὸ $1.500 : 10$, διότι 10 εἶναι ὅλα τὰ ἄτομα, καὶ θὰ εὑρώμεν τὸ κάθε ἄτομον θὰ πάρῃ 150 δραχμάς. "Ἐπομένως θὰ πάρουν : ἡ α' οἰκογένεια $2 \times 150 = 300$ δρχ., ἡ β' $3 \times 150 = 450$ δρχ. καὶ ἡ γ' $5 \times 150 = 750$ δραχμάς.

Τὸ πρόβλημα λύεται καὶ γραπτῶς μὲ τὴν ἀναγωγὴν εἰς τὴν μονάδα καὶ μὲ τὴν ἀπλῆν μέθοδον τῶν τριῶν, ποὺ ἔχομεν μάθει.

1. Μὲ τὴν ἀναγωγὴν εἰς τὴν μονάδα.

Τὰ 10 ἄτομα παίρνουν 1.500 δραχμάς.

Τὸ 1 ἄτομον θὰ πάρῃ $\frac{1500}{10}$ δραχμάς.

Τὰ 2 ἄτομα θὰ πάρουν $1.500 \times \frac{2}{10} = 300$ δραχμάς.

Τὰ 3 ἄτομα θὰ πάρουν $1.500 \times \frac{3}{10} = 450$ δρχ.

Τὰ 5 ἄτομα θὰ πάρουν $1.500 \times \frac{5}{10} = 750$ δρχ.

Απάντησις. ‘Η α’ οἰκογένεια ἔπιῆρε 300 δρχ., ἡ β’ 450 δρχ. καὶ τὴ γ’ 750 δρχ.

Παρατήρησις. “Οπως βλέπετε, διὰ νὰ λύσωμεν τὸ πρόβλημα αὐτὸ μὲ τὴν ἀναγωγὴν εἰς τὴν μονάδα, ἐπολλαπλασιάσαμεν τὸ 1500, δῆλ. τὸ ποσὸν τῶν χρημάτων ποὺ εἶχαμεν νὰ μοιράσωμεν, πρῶτον ἐπὶ τὸ 2, ἔπειτα ἐπὶ τὸ 3 καὶ τέλος ἐπὶ τὸ 5 καὶ εἰς ἑκάστην περίπτωσιν διαιρέσαμεν τὸ γινόμενον διὰ 10, τὸ δποῖον εἶναι τὸ ἀθροισμα τῶν ἀτόμων τῶν τριῶν οἰκογενειῶν.

2. Μὲ τὴν ἀπλῆν μέθοδον τῶν τριῶν.

α) Τὰ 10 ἄτομ. ἔλαβον 1.500 δρχ. β) Τὰ 10 ἄτομ. ἔλαβον 1500 δρχ.

»	2	»	»
»	X	»	»
»	3	»	»
»	X	»	»

$$X = 1.500 \times \frac{2}{10} = 300 \text{ δρχ.} \quad X = 1.500 \times \frac{3}{10} = 450 \text{ δρχ.}$$

γ) Τὰ 10 ἄτομα ἔλαβον 1.500 δρχ.

»	5	»	»
»	X	»	»

$$X = 1.500 \times \frac{5}{10} = 750 \text{ δρχ.}$$

Παρατήρησις. 1. Καὶ μὲ τὴν ἀπλῆν μέθοδον, διὰ νὰ εὕρωμεν πόσον θὰ πάρῃ ἑκάστη οἰκογένεια, ἐπολλαπλασιάσαμεν τὸ ποσὸν τῶν 1.500 δραχ. α) ἐπὶ 2, β) ἐπὶ 3 καὶ γ) ἐπὶ 5 καὶ εἰς ἑκάστην περίπτωσιν διαιρέσαμεν διὰ 10.

2. Ό δριθμὸς 1.500, ποὺ εἴχομεν νὰ μοιράσωμεν, λέγεται μεριστέος ἀριθμός.

3. Οἱ ἀριθμοὶ 2,3 καὶ 5, ἀνάλογα πρὸς τοὺς ὅποιους θὰ γίνῃ ἡ μοιρασιὰ ἢ καλύτερα ὁ μερισμός, λέγονται δοθέντες ἀριθμοί.

4. Καὶ ὁ ἀριθμὸς 10 εἶναι τὸ ἄθροισμα τῶν δοθέντων ἀριθμῶν ($2 + 3 + 5 = 10$).

Σημείωσις. Τὸ ἵδιον πρόβλημα ἡμποροῦμεν νὰ τὸ λύσωμεν καὶ μὲ μίαν ἀλληγ μέθοδον, ἡ ὅποια ὀνομάζεται μέθοδος μερισμοῦ εἰς μέρη ἀνάλογα δοθέντων ἀριθμῶν. Διὰ τοῦτο καὶ τὰ προβλήματα, ποὺ λύονται μὲ τὴν μέθοδον αὐτήν, ὀνομάζονται προβλήματα μερισμοῦ εἰς μέρη ἀνάλογα.

3. Μέ τὴν μέθοδον μερισμοῦ εἰς μέρη ἀνάλογα.

Σκέψις. Καὶ μὲ τὴν μέθοδον μερισμοῦ εἰς μέρη ἀνάλογα θὰ μοιράσωμεν τὸ ποσὸν τῶν 1.500 δραχμῶν εἰς μέρη ἀνάλογα τῶν δοθέντων ἀριθμῶν 2,3 καὶ 5. Διὰ τοῦτο εἰς τὰ προβλήματα μερισμοῦ, πρὶν προβῶμεν εἰς τὴν λύσιν των, πρέπει νὰ εὕρωμεν τὸν μεριστέον ἀριθμὸν καὶ τοὺς δοθέντας ἀριθμούς.

Κατάταξις :

	Δοθέντες	
α)	2	ἄτομα
β)	3	»
γ)	5	»

Μεριστέος 1.500 δραχ.

ἄθροισμα 10 »

$$\text{Λύσις. } \text{Ἡ } \alpha' \text{ οἰκογένεια θὰ λάβῃ } \frac{1.500 \times 2}{10} = 300 \text{ δρχ.}$$

$$\text{ἡ } \beta' \quad \text{»} \quad \text{»} \quad \frac{1.500 \times 3}{10} = 450 \quad » \quad \text{καὶ}$$

$$\text{ἡ } \gamma' \quad \text{»} \quad \text{»} \quad \frac{1.500 \times 5}{10} = 750 \quad »$$

Σύνολον 1.500 »

Καὶ ἀπὸ τοὺς τρεῖς τρόπους λύσεως τοῦ προβλήματος αὐτοῦ ἔξ-
άγεται ὁ ἔξῆς κανών :

Αιανά μερίσωμεν ἀριθμὸν εἰς μέρη ἀνάλογα ἄλλων δοθέντων ἀριθμῶν, πολλαπλασιάζομεν τὸν μεριστέον ἀριθμὸν ἐπὶ ἔκαστον τῶν δοθέντων ἀριθμῶν καὶ τὸ γινόμενον τὸ διαιροῦμεν διὰ τοῦ ἀθροίσματος αὐτῶν.

Παρατήρησις. Έάν τοὺς ἀριθμοὺς 2, 3, 5 πολλαπλασιάσωμεν ἐπὶ ἔνα καὶ τὸν αὐτὸν ἀριθμόν, π.χ. τὸν 2, τότε γίνονται 4, 6, 10 καὶ τὰ μερίδια θὰ εἶναι $1500 \times \frac{4}{20}$, $1500 \times \frac{6}{20}$, $1500 \times \frac{10}{20}$, τὰ δποῖα εἶναι τὰ ᾧδια καὶ ὅταν μερίσωμεν τὸν ἀριθμὸν 1.500 εἰς μέρη ἀνάλογα τῶν ἀριθμῶν 2, 3, 5 ἥτοι πρὸς τὰ : $1.500 \times \frac{2}{10}$, $1.500 \times \frac{3}{10}$, $1.500 \times \frac{5}{10}$.

Κατὰ ταῦτα :

Τοὺς ἀριθμούς, ἀναλόγως τῶν δποίων μερίζεται ἔνας ἀριθμός, δυνάμεθα νὰ τοὺς πολλαπλασιάσωμεν ἢ νὰ τοὺς διαιρέσωμεν μὲ τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν (διάφορον τοῦ μηδενός), χωρὶς τὰ μερίδια νὰ μεταβληθοῦν.

Σημείωσις. Εἰς τὸ ἔξῆς διὰ τὴν λύσιν παρομοίων προβλημάτων θὰ χρησιμοποιοῦμεν μόνον τὴν μέθοδον μερισμοῦ εἰς μέρη ἀνάλογα.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ (προφορικῶς)

154. Νὰ μερισθοῦν 10 δρχ. εἰς δύο μαθητὰς ἀναλόγως τῶν ἀριθμῶν 2 καὶ 3.

155. 60 στρέμματα ἀγροῦ νὰ μερισθοῦν εἰς δύο ἄτομα ἀναλόγως τῶν ἀριθμῶν 1 καὶ 3.

156. Νὰ μερισθοῦν 1.400 κιλὰ σιτάρι εἰς δύο οἰκογενείας ἀναλόγως τῶν ἀριθμῶν 3 καὶ 4.

1. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΡΙΣΜΟΥ

157. Τρεῖς μαθηταὶ ἐμοιράσθησαν 750 δραχμὰς ἀναλόγως τῶν ἀριθμῶν 5, 12 καὶ 13. Πόσας δρχ. ἔλαβεν ἔκαστος ;

158. Διὰ τὴν καλλιέργειαν ἐνὸς ἀγροῦ ἔλαφον δύο ἔργαται 900 δραχμὰς. 'Ο α' εἰργάσθη 6 ἡμέρας καὶ ὁ β' 4 ἡμέρας. Πόσον θὰ λάβῃ ἔκαστος;

159. Νὰ μερισθῇ τὸ χρηματικὸν ποσὸν 846.000 δρχ. εἰς δύο πρόσωπα ἔτσι, ὥστε τὸ πρῶτον νὰ λάβῃ ὀκταπλάσιον μερίδιον τοῦ δευτέρου.

160. Διὰ τὴν κατασκευὴν ἐνὸς γλυκοῦ πρέπει νὰ λάβωμεν 5 μέρη ἀλεύρου, 3 μέρη βουτύρου καὶ 2 μέρη ζαχάρεως. Διὰ νὰ κατασκευάσωμεν 8 κιλὰ ἀπὸ τὸ ἴδιον γλυκόν, πόσα κιλὰ πρέπει νὰ λάβωμεν ἀπὸ κάθε εἶδος;

Διάφοροι περιπτώσεις μερισμοῦ.

Πρόβλημα 1. Νὰ μερισθῇ ὁ ἀριθμὸς 2475 εἰς μέρη ἀνάλογα τῶν ἀριθμῶν $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$ καὶ $\frac{2}{5}$.

Σκέψις. Εἰς τὸ πρόβλημα αὐτὸ οἱ δοθέντες ἀριθμοὶ εἰναι ἑτερώνυμα κλάσματα. Διὰ νὰ γίνῃ ὁ μερισμὸς εἰς μέρη ἀνάλογα, πρέπει νὰ τρέψωμεν τοὺς δοθέντας ἀριθμοὺς εἰς ὅμωνυμα κλάσματα. Τοὺς τρέπομεν καὶ εύρισκομεν $\frac{10}{20}$, $\frac{15}{20}$, $\frac{8}{20}$. Παραλείπομεν τοὺς παρονομαστὰς καὶ προκύπτουν οἱ ἀριθμοὶ 10, 15 καὶ 8. Αὔτοι εἰναι οἱ ἀριθμοί, ἀνάλογα πρὸς τοὺς δόποίους θὰ γίνῃ ὁ μερισμός.

Κατάταξις.

	Δοθέντες
Μεριστέος 2.475	α) $\frac{1}{2} \text{ } \frac{10}{20} \text{ } \frac{10}{20}$
	β) $\frac{3}{4} \text{ } \frac{15}{20} \text{ } \frac{15}{20}$
	γ) $\frac{2}{5} \text{ } \frac{8}{20} \text{ } \frac{8}{20}$

ἄθροισμα 33

Λύσις. Πολλαπλασιάζομεν τῷρα τὸν μεριστέον ἀριθμὸν ἐπὶ ἔκα-

στον τῶν διθέντων καὶ διαιροῦμεν διὰ τοῦ ἀθροίσματος τῶν διθέντων.

$$\alpha' \quad 2.475 \times \frac{10}{33} = 750$$

$$\beta' \quad 2.475 \times \frac{15}{33} = 1.125$$

$$\gamma' \quad 2.475 \times \frac{8}{33} = 600$$

$$\Sigma \nu \circ \lambda \circ \nu \quad \overline{2.475}$$

Απάντησις. $\alpha = 750$, $\beta = 1.125$, $\gamma = 600$.

Παρατήρησις. Εάν οἱ διθέντες ἀριθμοὶ εἰναι ἑτερώνυμα κλάσματα, τὰ τρέπομεν εἰς ὅμοιανυμα καὶ προβαίνομεν εἰς τὴν λύσιν τοῦ προβλήματος, ὅπως ἐκάμαμεν εἰς τὸ πρόβλημα ποὺ ἐλύσαμεν.

Εἶναι δυνατὸν οἱ διθέντες νὰ εἰναι μικτοὶ καὶ κλάσματα ἢ μόνον μικτοὶ· τότε θὰ τρέψωμεν τοὺς μικτούς εἰς ἴσοδύναμα κλάσματα καὶ θὰ συνεχίσωμεν ὅπως καὶ προτιγουμένως.

Ἐάν οἱ διθέντες εἰναι ἀκέραιοι καὶ κλάσματα, τότε θὰ τρέψωμεν τοὺς ἀκέραιους εἰς κλάσματα γράφοντες τὸν ἀκέραιον ἀριθμητὴν καὶ τὴν μονάδα παρενομαστὴν καὶ θὰ συνεχίσωμεν ὅπως καὶ προτιγουμένως.

Πρόβλημα 2. "Ἐνας ὥρισε διὰ τῆς διαθήκης του νὰ λάβῃ ἢ σύζυγός του τὰ $\frac{2}{5}$ τῆς περιουσίας του, ἢ κόρη του τὸ $\frac{1}{3}$ τῆς περιουσίας καὶ ἡ ἀνεψιὰ τὸ ὑπόλοιπον. Ἡ περιουσία του ἦτο 600.000 δρχ. Πόσον θὰ λάβῃ ἔκαστος δικαιοῦχος ;

Σκέψις. Οἱ μεριστέοις ἀριθμὸς εἰναι 600.000 δρχ. Οἱ διθέντες εἰναι τὰ $\frac{2}{5}$, τὸ $\frac{1}{3}$ καὶ τὸ ὑπόλοιπον τῆς περιουσίας, τὸ ὅποιον θὰ εὔρεθῇ, ἂν τὸ ἀθροίσμα τῶν δύο πρώτων μεριδῶν (συζύγου καὶ κόρης) ἀφαιρεθῇ ἀπὸ τὴν περιουσίαν δλόκληρον.

Λύσις.

$$\frac{2}{5} + \frac{1}{3} = \frac{6}{15} + \frac{5}{15} = \frac{11}{15} \text{ τῆς περιουσίας (τὰ δύο μερίδια).}$$

Τὸ ἀθροίσμα τοῦτο θὰ τὸ ἀφαιρέσωμεν ἀπὸ δλόκληρον τὴν περι-

ουσίαν, τὴν δόποιαν παριστάνομεν μὲ τὴν ἀκεραίαν μονάδα ή μὲ τὸ δυώνυμον κλάσμα $\frac{15}{15}$ καὶ θὰ ἔχωμεν : $\frac{15}{15} - \frac{11}{15} = \frac{4}{15}$.

"Ωστε ή ἀνεψιὰ θὰ λάβῃ τὰ $\frac{4}{15}$ τῆς περιουσίας.

Τώρα προχωροῦμεν εἰς τὴν λύσιν τοῦ προβλήματος, ὅπως πρίν.

Δοθέντες

Μεριστέος	α'	$\frac{6}{15}$	ἢ	6
	β'	$\frac{5}{15}$	ἢ	5
	γ'	$\frac{4}{15}$	ἢ	4
	ἀθροισμα			<u>15</u>

$$\alpha' \frac{600.000 \times 6}{15} = 240.000$$

$$\beta' \frac{600.000 \times 5}{15} = 200.000$$

$$\gamma' \frac{600.000 \times 4}{15} = 160.000$$

$$\Sigma \nu \lambda \circ \nu \quad \underline{\hspace{2cm}} \quad 600.000$$

*Απάντησις. Θὰ λάβουν : ή σύζυγος 240.000 δρχ., ή κόρη 200.000

δρχ. καὶ ή ἀνεψιὰ 160.000 δραχμάς.

Σημείωσις. Τὸ πρόβλημα αὐτὸ ξτο δυνατὸν νὰ τὸ λύσωμεν καὶ μὲ ἀπλοῦν πολλαπλασιασμὸν ἀκεραίου ἐπὶ κλάσμα, ὅτε :

$$\text{ἢ σύζυγος θὰ λάβῃ } 600.000 \times \frac{2}{5} = 240.000 \text{ δρχ.}$$

$$\text{ἢ κόρη θὰ λάβῃ } 600.000 \times \frac{1}{3} = 200.000 \quad »$$

Διὰ νὰ εὕρωμεν δὲ καὶ τὸ μερίδον τῆς ἀνεψιᾶς, τὸ ἀθροισμα τῶν δύο μεριδίων ($240.000 + 200.000 = 440.000$) τὸ ἀφαιροῦμεν ἀπὸ τὸν μεριστέον δῆλο. $600.000 - 440.000 = 160.000$ δρχ.

Πρόβλημα 3. "Ενας πατέρας ῥωσε διὰ τῆς διαθήκης του νὰ μερισθῇ ἡ περιουσία του εἰς τὰ τρία παιδιά του ἥλικιας 5,8 καὶ 20 ἑτῶν

εἰς μέρη ἀντιστρόφως ἀνάλογα τῆς ἡλικίας των. Ἡ περιουσία του ἀπετελεῖτο ἀπὸ 285 στρέμματα. Πόσον μερίδιον θὰ λάβῃ τὸ κάθε παιδί;

Σκέψις. Μερισμὸς τῆς περιουσίας εἰς μέρη ἀντιστρόφως ἀνάλογα τῆς ἡλικίας τῶν παιδιῶν σημαίνει ὅτι δικρότερος θὰ λάβῃ τὰ περιστότερα καὶ δικαίωτερος τὰ διλιγώτερα. Οἱ ἀντίστροφοι ἀριθμοὶ τῶν ἀριθμῶν 5, 8, 20, ποὺ ἐκφράζουν τὴν ἡλικίαν τῶν παιδιῶν, εἰναι:

$$\frac{1}{5}, \frac{1}{8}, \frac{1}{20}$$

Ἐπομένως ἡ περιουσία θὰ μερισθῇ ἀνάλογα πρὸς τοὺς κλασματικοὺς αὐτοὺς ἀριθμούς, ἀφοῦ πρῶτον τοὺς τρέψωμεν εἰς ὅμωνυμα κλάσματα.

Λύσις. Νὰ προχωρήσετε μόνοι σας εἰς τὴν λύσιν, ὅπως ἐλύσαμεν τὸ πρηγούμενον πρόβλημα.

Πρόβλημα 4. Δύο ὁδηγοὶ αὐτοκινήτων μετέφερον ἄμμον καὶ ἔλαβον 4118 δραχμάς. Ὁ πρῶτος ἔκαμεν 6 διαδρομὰς μὲ φορτίον 5 τόνων τὴν κάθε φορὰν καὶ δεύτερος 7 διαδρομὰς μὲ φορτίον 4 τόνων τὴν κάθε φοράν. Πῶς θὰ μοιρασθοῦν τὰ χρήματα;

Σκέψις. Ἀν τὰ αὐτοκίνητα ἔχωροῦσαν καὶ τὰ δύο τὴν ίδιαν ποσότητα, διμερισμὸς τῶν χρημάτων θὰ ἐγίνετο ἀνάλογα πρὸς τὸν ἀριθμὸν τῶν διαδρομῶν, ποὺ ἔκαμε τὸ καθένα. Τώρα ὅμως, ποὺ διαφέρουν καὶ εἰς τὸ βάρος ποὺ μετέφερε τὸ καθένα καὶ εἰς τὰς διαδρομὰς ποὺ ἔκαμον, πρέπει νὰ εὔρωμεν πόσους τόννους ἄμμον ἐν ὅλῳ μετέφερε τὸ πρῶτον αὐτοκίνητον καὶ πόσους τὸ δεύτερον.

Αύσις,

Τὸ α' αὐτοκίνητον ἔκαμεν 6 διαδρομὰς \times 5 τόνν. = 30 τόνν.
 » β' » » 7 » \times 4 » = 28 »

—

Καὶ τὰ δύο αὐτοκίνητα μετέφερον ἐν ὅλῳ 58 τόνν.
 Τώρα θὰ μερισθῇ δικαίωτερος 4.118 εἰς μέρη ἀνάλογα τῶν ἀριθμῶν 30 καὶ 28.

Συνεχίσατε μόνοι σας τὴν λύσιν.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΡΙΣΜΟΥ

161. Νὰ μερισθῇ ὁ ἀριθμὸς 5.100 εἰς μέρη ἀνάλογα τῶν ἀριθμῶν

$$\frac{2}{3} \text{ καὶ } \frac{3}{4}.$$

162. Τὸ ποσὸν τῶν 350 δρχ. νὰ μερισθῇ εἰς δύο παιδιά καὶ εἰς μέρη ἀντιστρόφως ἀνάλογα τῆς ἡλικίας των. Τὸ ἔνα εἶναι 3 ἑτῶν καὶ τὸ ἄλλο 7 ἑτῶν.

163. Δύο βοσκοὶ ἐνοικίασαν ἕνα λιβάδι καὶ ἔδωσαν 4.200 δρχ. 'Ο α' ἔβόσκησεν εἰς αὐτὸ τὰ πρόβατά του ἐπὶ 3 μῆνας καὶ ὁ β' ἐπὶ 5 μῆνας. Τὰ πρόβατα ὅμως τοῦ α' ἦσαν τριπλάσια ἀπὸ τὰ πρόβατα τοῦ β'. Πόσον θὰ πληρώσῃ ἔκαστος;

164. Εἰς ἔνα ἔργοστάσιον ἔργαζονται 10 ἄνδρες, 12 γυναῖκες καὶ 6 παιδιά καὶ λαμβάνουν τὴν ἡμέραν ὅλοι μαζὶ 1.500 δραχμάς. Τὸ ἡμερομίσθιον ἑκάστου παιδιοῦ εἶναι τὸ ἥμισυ ἀπὸ τὸ ἡμερομίσθιον ἑκάστης γυναικὸς καὶ τὸ τρίτον ἀπὸ τὸ ἡμερομίσθιον ἑκάστου ἀνδρός. Πόσον εἶναι τὸ ἡμερομίσθιον ἑκάστου ἀνδρός, ἑκάστης γυναικὸς καὶ ἑκάστου παιδιοῦ;

165. "Ἐνας ἄφησε κληρονομίαν 150.000 δρχ. εἰς τὴν γυναικά του, τὰ 3 παιδιά του καὶ τὸ σχολεῖον τοῦ χωρίου του. "Ωρισε δὲ νὰ λάβουν κιλὰ κρασί. Τὸ α' εἶναι γεμάτον δλόκληρον, τὸ β' μόνον κατὰ τὸ ἥμισυ, τὸ τρίτον κατὰ τὸ $\frac{1}{3}$ καὶ τὸ δ' κατὰ τὸ $\frac{3}{4}$. Πόσα κιλὰ κρασὶ περιέχει κάθε βαρέλι;

166. 4 βαρέλια, ἵσης χωρητικότητος, περιέχουν ὅλα μαζὶ 1.550 κιλὰ κρασί. Τὸ α' εἶναι γεμάτον δλόκληρον, τὸ β' μόνον κατὰ τὸ ἥμισυ, τὸ τρίτον κατὰ τὸ $\frac{2}{3}$ τοῦ μεριδίου τοῦ α', ὁ γ' τὸ $\frac{1}{4}$ τοῦ

μεριδίου τοῦ β καὶ ὁ δ' τὸ $\frac{2}{3}$ τοῦ μεριδίου τοῦ γ'. Πόσον θὰ λάβῃ

ἕκαστον πρόσωπον;

167. Νὰ μοιρασθῇ τὸ ποσὸν τῶν 1.575 δρχ. μεταξὺ 4 προσώπων ἔτσι, ποὺ ὁ β' νὰ λάβῃ τὰ $\frac{2}{3}$ τοῦ μεριδίου τοῦ α', ὁ γ' τὸ $\frac{1}{4}$ τοῦ μεριδίου τοῦ β καὶ ὁ δ' τὰ $\frac{2}{3}$ τοῦ μεριδίου τοῦ γ'. Πόσον θὰ λάβῃ

168. Εἰς ἔνα σχολεῖον φοιτοῦν 420 μαθηταί. Τὰ ἀγόρια εἶναι

τριπλάσια άπό τὰ κορίτσια. Πόσα είναι τὰ ἀγόρια καὶ πόσα τὰ κορίτσια;

169. "Ενας πατέρας διέθεσεν εἰς τὰ τρία παιδιά του τὴν ἑκατόντα τρεις μάτων περιουσίαν του ώς ἔξης : ὁ β' νὰ λάβῃ τριπλάσια τοῦ α' καὶ ὁ γ' τριπλάσια τοῦ β'. Πόσα θὰ λάβῃ κάθε παιδί;

170. Εἰς μίαν συναναστροφήν ἥσαν 80 ἄτομα (ἀνδρες, γυναῖκες καὶ παιδιά). Οἱ ἄνδρες ἥσαν διπλάσιοι τῶν γυναικῶν καὶ αἱ γυναῖκες τριπλάσιαι τῶν παιδιῶν. Πόσοι ἥσαν οἱ ἄνδρες, πόσαι αἱ γυναῖκες καὶ πόσα τὰ παιδιά;

171. Τρεῖς ἔμποροι ἐκέρδισαν ἀπὸ μίαν ἐργασίαν των 17.900 δρχ. Ἐξ αὐτῶν ὁ α' θὰ λάβῃ 15% περισσοτέρας δρχ. ἀπὸ τὸν β' καὶ ὁ β' θὰ λάβῃ 20 % περισσοτέρας δρχ. ἀπὸ τὸν γ'. Πόσον θὰ λάβῃ ἕκαστος;

172. "Ενας πατέρας διέταξε διὰ τῆς διαθήκης του νὰ μοιρασθῇ ἡ περιουσία του, ἀνερχομένη εἰς 458.000 δραχμάς, ώς ἔξης : 'Ο υἱός του νὰ λάβῃ τὰ $\frac{3}{4}$ τοῦ μεριδίου τῆς θυγατρός του καὶ ἡ σύζυγός του τὰ $\frac{2}{3}$ τοῦ μεριδίου τοῦ υιοῦ. Πρὸ τοῦ μερισμοῦ ὅμως πρέπει νὰ εἰσπράξῃ τὸ Δημόσιον 10% διὰ φόρον κληρονομίας. Πόσον θὰ λάβῃ ἕκαστος κληρονόμος;

173. Τρεῖς οἰκογένειαι ἐμοιράσθησαν 4.340 κιλὰ σίτου. 'Η β' ἔλαβε τὰ $\frac{2}{5}$ τοῦ μεριδίου τῆς α' καὶ ἡ γ' τὸ $\frac{1}{3}$ τῶν ὅσων ἔλαβον αἱ δύο πρῶται. Πόσα κιλὰ σίτου ἔλαβεν ἕκαστη οἰκογένεια;

174. Νὰ μοιρασθοῦν 3.750 κιλὰ σίτου εἰς τρεῖς οἰκογενείας κατὰ τὸν ἔξης τρόπον : ἡ β' οἰκογένεια νὰ λάβῃ τὰ $\frac{2}{3}$ τοῦ μεριδίου τῆς α' καὶ ἡ γ' τὸ $\frac{1}{4}$ τῶν ὅσων ἔλαβον αἱ δύο πρῶται. Πόσα κιλὰ θὰ λάβῃ ἕκαστη οἰκογένεια;

175. Εἰς ἓνα ἔργοστάσιον εἰργάσθησαν τρεῖς ἔργαται· ὁ πρῶτος ἔκαμε 4 ἡμερομίσθια, ὁ β' 5 ἡμερομίσθια καὶ ὁ γ' 6 ἡμερομίσθια." Ελαβον καὶ οἱ τρεῖς μαζὶ 2.250 δρχ. Πόσας δρχ. ἔλαβεν ἕκαστος;

2. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

"Ολοι ἔχετε ἀκούσει τὰς λέξεις «Ἐταιρεία», «συνεταιρισμός», «συνεταιρος». Εἰς κάθε Κράτος αἱ περισσότεραι ἀπὸ τὰς ἐπιχειρήσεις (ἐμπορικαί, βιομηχανικαί, ναυτικαὶ κλπ.) εἰναι Ἐταιρεῖαι. Δύο ἢ πε-ρισσότεροι κεφαλαιοῦχοι ἔνώνουν τὰ χρήματά των καὶ κάμνουν μαζὶ μίαν ἐπιχείρησιν.

Τὰ χρήματα, τὰ ὅποια καταθέτουν, λέγονται **κεφάλαια**, ἢ ἐπι-χειρησίς αὐτὴ λέγεται **ἐταιρεία** καὶ οἱ ἄνθρωποι, οἱ ὅποιοι συνεταιρί-ζονται, λέγονται **συνεταιροί**.

Οἱ συνεταιροί εἰναι δυνατὸν νὰ καταθέσουν ὅλοι ἵσα κεφάλαια. Εἰναι δυνατὸν ὅμως νὰ καταθέσουν καὶ διαφορετικὰ κεφάλαια, δηλ. ἄλλος περισσότερα καὶ ἄλλος ὅλιγότερα.

Τὰ κεφάλαια αὐτὰ μένουν εἰς τὴν ἐπιχείρησιν ἵσον χρονικὸν διά-στημα ἢ καὶ διαφορετικόν· δηλ. ἄλλων συνεταίρων μένουν περισσό-τερον χρόνον καὶ ἄλλων ὅλιγότερον χρόνον.

'Αναλόγως τῶρα τῶν κεφαλαίων, τὰ ὅποια ἔχει καταθέσει ἔκα-στος τῶν συνεταίρων, καὶ ἀναλόγως τοῦ χρόνου, ποὺ μένουν εἰς τὴν ἐπιχείρησιν τὰ χρήματα ἑκάστου τῶν συνεταίρων, γίνεται καὶ ἡ διανομὴ τοῦ κέρδους ἢ τῆς ζημίας.

Τὰ σχετικὰ μὲ τὰς ἐταιρείας προβλήματα λέγονται **Προβλήματα ἐταιρείας** καὶ λύονται ὅπως τὰ προβλήματα μερισμοῦ εἰς μέρη ἀνάλο-γα. Διότι καὶ εἰς τὰ προβλήματα ἐταιρείας γίνεται μερισμὸς τοῦ γα. Κέρδους ἢ τῆς ζημίας μιᾶς ἐπιχειρήσεως μεταξὺ ἑκείνων, οἱ ὅποιοι ἔχουν κάμει τὴν ἐπιχείρησιν.

a) Προβλήματα μὲ διαφορετικὰ κεφάλαια

Πρόβλημα. Τοεῖς συνεταιροὶ κατέθεσαν εἰς μίαν ἐπιχείρησιν τὰ ἔξης ποσά : 'Ο α' 40.000 δρ., ὁ β' 35.000 δρ., καὶ ὁ γ' 25.000 δρ.. Πόσον κέρ-δος θὰ λάβῃ ἑκαστος :

Σκέψις. Εἰς τὸ πρόβλημα αὐτὸν ἔχομεν νὰ μοιράσωμεν τὸ κέρδος τῶν 30.000 δραχμῶν εἰς τρεῖς συνεταίρους ἀνάλογα μὲ τὰ χρήματα, τὰ ὅποια κατέθεσεν ἑκαστος εἰς τὴν ἐπιχείρησιν. Δηλαδὴ θὰ μερισθῇ τὰ χρήματα αὐτὴν τρισημέτρως (μεριστέος ἀριθμός) εἰς μέρη ἀνάλογα πρὸς τὸ κέρδος τῶν 30.000 δρχ. (μεριστέος ἀριθμός)

τούς ἀριθμούς 40.000, 35.000 καὶ 25.000 (κεφάλαια) ἢ πρὸς τοὺς ἀριθμούς 40, 35, 25 (μετὰ τὴν ἀφαίρεσιν ἵσου ἀριθμοῦ μηδενικῶν).

Λύσις.	Δοθέντες.
Μεριστέος 30.000	$\left\{ \begin{array}{l} \alpha' 40.000 \text{ ἢ } 40 \\ \beta' 35.000 \text{ ἢ } 35 \\ \gamma' 25.000 \text{ ἢ } 25 \end{array} \right.$
	Σύνολον 30.000
	Διθροισμα 100
$\alpha'. 30.000 \times \frac{40}{100} = 12.000 \text{ δρχ.}$	
$\beta'. 30.000 \times \frac{35}{100} = 10.500 \text{ »}$	
$\gamma'. 30.000 \times \frac{25}{100} = 7.500 \text{ »}$	
	Σύνολον 30.000 »

Απάντησις. Θὰ λάβουν κέρδος ὁ α' 12.000 δρχ., ὁ β' 10.500 δρχ. καὶ ὁ γ' 7.500 δρχ.

176. Τρεῖς συνεταῖροι ἥρχισαν ἐπιχείρησιν καὶ κατέβαλον ὁ α' 100.000 δρχ., ὁ β' 70.000 καὶ ὁ γ' 40.000 δρχ. Ἐκ τῆς ἐπιχειρήσεως αὐτῆς ἐκέρδισαν 84.000 δραχμάς. Πόσον κέρδος ἀναλογεῖ εἰς τὸν καθένα;

177. Τρία χωρία ἡγόρασαν συνεταιρικῶς μίαν ἀλωνιστικὴν μηχανὴν ἀξίας 45.000 δρχ. Πόσον ἀναλογεῖ νὰ πληρώσῃ ἕκαστον χωρίον, ἂν τὰ στρέμματα τοῦ α' χωρίου ἦσαν 3.500, τοῦ β' 3.750 καὶ τοῦ γ' 4.000;

178. Δύο συνεταῖροι κατέθεσαν εἰς μίαν ἐπιχείρησιν 180.000 δρχ. Ἀπὸ τὸ κέρδος τῆς ἐπιχειρήσεως ἔλαβον ὁ α' 25.200 δρχ. καὶ ὁ β' 37.800 δρχ. Πόσα χρήματα εἶχε καταθέσει ἕκαστος εἰς τὴν ἐπιχείρησιν;

179. Τρεῖς συνεταῖροι εἶχον καταθέσει εἰς μίαν ἐπιχείρησιν τὰ ἔξης ποσά : ὁ α' 120.000 δρχ., ὁ β' τὰ $\frac{2}{3}$ τοῦ ποσοῦ τοῦ α' καὶ

ό γ' τὰ $\frac{3}{4}$ τοῦ ποσοῦ τοῦ β'. Μετὰ τινα χρόνον διελύθη ἡ ἐπιχείρησης μὲν ζημίαν 65.000 δρχ. Πόση ζημία ἀναλόγει εἰς τὸν καθένα;

6) Προβλήματα με διαφορετικούς χρόνους.

Πρόβλημα. "Ενας έμπορος ήρχισε μίαν ἐπιχείρησιν μὲ ἔνα χορ-
ματικὸν ποσόν. Μετὰ 8 μῆνας προσέλαβε συνεταῖρον, ὁ δόποιος κατέ-
θεσε τὸ ἰδιον ποσόν· 5 μῆνας ἀργότερον ἀπὸ τὸν δεύτερον προσέλαβε
καὶ ἄλλον συνεταῖρον, ὁ δόποιος κατέθεσε τὸ ἰδιον πάλιν ποσόν. Δύο
ἔτη ἀπὸ τῆς ἐνάρξεως τῆς ἐπιχειρήσεως ενδρον ὅτι ἐκέρδισαν 102.000
δραχμάς. Πόσον κέρδος ἀναλογεῖ εἰς ἕκαστον έμπορον;

Σκέψις. Ἐπειδὴ καὶ οἱ τρεῖς συνεταῖροι κατέθεσαν τὸ ἕδιον ποσόν, τὸ κέρδος θὰ μοιρασθῇ ἀνάλογα πρὸς τοὺς χρόνους, κατὰ τοὺς ὅποιους ἔμειναν τὰ χρήματα ἐκάστου εἰς τὴν ἐπιχείρησιν. Ἐδῶ δὲν οἱ χρόνοι δὲν δρίζονται σαφῶς καὶ πρέπει νὰ εύρεθοῦν. Ἐφ' ὅσον δὲ ισολογισμὸς ἔγινε 2 ἔτη ἀπὸ τῆς ἐνάρξεως τῆς ἐπιχειρήσεως, τὰ χρήματα τοῦ α' ἔμειναν εἰς τὴν ἐπιχείρησιν 2 ἔτη ἢ 24 μῆνας· τοῦ β' ἔτη 24, 2 · 16 μῆνας καὶ τοῦ γ' 16 - 5 = 11 μῆνας.

‘Επιομένως δὲ μερισμὸς θάγμη γίνεται ἀνάλογα πρὸς τοὺς ἀριθμοὺς 24, 16, 11.

Δύναμις.	Δοθέντες
Μεριστέος 102.000	{
	α' 24
	β' 16
	γ' 11
	<hr/>
διθροισμα	51

$$\alpha' 102.000 \times \frac{24}{51} = 48.000 \text{ } \delta\rho x.$$

$$\beta' \quad 102.000 \times \frac{16}{51} = 32.000 \quad \gg$$

$$Y' \quad 102.000 \times \frac{11}{51} = \quad 22.000 \quad \gg$$

$\Sigma \mu u \otimes \lambda \otimes v$ 102.000 »

Απάντησις. Άναλογει κέρδος είς τὸν α' 48.000 δρχ., είς τὸν β' 32.000 δρχ. καὶ εἰς τὸν γ' 22.000 δρχ.

180. Δύο συνεταῖροι ἔζημιώθησαν ἀπὸ μίαν ἐπιχείρησιν 14.700 δρχ. Καὶ οἱ δύο εἶχον καταθέσει τὸ αὐτὸ χρηματικὸν ποσόν· ἀλλὰ τὰ χρήματα τοῦ α' ἔμειναν εἰς τὴν ἐπιχείρησιν 12 μῆνας καὶ τοῦ β' 9 μῆνας. Πόση ζημία ἀναλογεῖ εἰς τὸν καθένα;

181. Τρεῖς συνεταῖροι ἔκέρδισαν ἀπὸ ἐπιχείρησιν 135.000 δρχ. Καὶ οἱ τρεῖς εἶχον καταθέσει τὸ αὐτὸ χρηματικὸν ποσόν· ἀλλὰ τοῦ πρώτου τὰ χρήματα ἔμειναν εἰς τὴν ἐπιχείρησιν ἐπὶ ἓν ἔτος, τοῦ δευτέρου 10 μῆνας καὶ τοῦ τρίτου 2 μῆνας δλιγώτερον τοῦ δευτέρου. Πόσον κέρδος ἀναλογεῖ εἰς τὸν καθένα;

182. "Ενας ἐπιχειρηματίας ἥρχισεν ἐπιχείρησιν· μετὰ 3 μῆνας προσέλαβε συνεταῖρον, δ ὅποιος κατέθεσε τὸ αὐτὸ χρηματικὸν ποσόν· ἔνα μῆνα μετὰ τὴν πρόσληψιν αὐτοῦ προσέλαβε καὶ τρίτον μὲ τὸ αὐτὸ ποσόν. "Ἐν ἔτος ἀπὸ τῆς ἐνάρξεως τῆς ἐπιχειρήσεως ἐλογαριάσθησαν καὶ εὗρον ὅτι εἶχον κέρδος 116.000 δρχ. Πόσον κέρδος ἀναλογεῖ εἰς τὸν καθένα;

183. "Ενας ἐμπόρος ἥρχισεν ἐμπορικὴν ἐπιχείρησιν. Μετὰ 10 μῆνας προσέλαβε συνεταῖρον, δστις κατέθεσε τὸ αὐτὸ χρηματικὸν ποσόν· 2 μῆνας βραδύτερον προσέλαβε καὶ ἄλλον συνεταῖρον, δ ὅποιος κατέθεσε τὰ ἴδια χρήματα. "Ἐνα ἔτος μετὰ τὴν πρόσληψιν τοῦ τρίτου συνεταῖρου ἐλογαριάσθησαν καὶ εὗρον, ὅτι ἔκέρδισαν 100.000 δραχμάς. Πόσον κέρδος ἀναλογεῖ εἰς τὸν καθένα;

γ) Προβλήματα μὲ διαφορετικά κεφάλαια καὶ διαφορετικούς χρόνους.

Πρόβλημα. Τρεῖς συνεταῖροι ἐκέρδισαν ἀπὸ μίαν ἐμπορικὴν ἐπιχείρησιν 54.000 δρχ. Ὁ πρῶτος εἶχε καταθέσει 30.000 δρχ., δ ὁ δεύτερος 50.000 δρχ. καὶ δ γ' 40.000 δραχμάς. Ἀλλὰ τὰ χρήματα τοῦ πρώτου ἔμειναν εἰς τὴν ἐπιχείρησιν 10 μῆνας, τοῦ δευτέρου 8 μῆνας καὶ τοῦ τρίτου 5 μῆνας. Πόσον κέρδος θὰ λάβῃ ἔκαστος;

Σκέψις. Εἰς τὸ πρόβλημα αὐτὸ ἔχομεν διαφορετικὰς καταθέσεις (κεφάλαια) καὶ διαφορετικούς χρόνους. Ἐπομένως τὸ κέρδος πρέπει νὰ μερισθῇ ἀνάλογα μὲ τὰ γινόμενα τοῦ κεφαλαίου ἐπὶ τὸν χρόνον ἑκάστου συνεταῖρου.

Λύσις.	Δοθέντες
Μεριστέος	$\left\{ \begin{array}{l} \alpha'. \quad 30.000 \times 10 \quad \text{η} \quad 3 \times 10 = 30 \\ \beta'. \quad 50.000 \times 8 \quad \text{η} \quad 5 \times 8 = 40 \\ \gamma'. \quad 40.000 \times 5 \quad \text{η} \quad 4 \times 5 = 20 \\ \hline \end{array} \right.$
54.000	$\ddot{\text{α}}\text{θροισμα}$
	$\underline{90}$

$$\alpha' \quad 54.000 \times \frac{30}{90} = \quad 18.000$$

$$\beta' \quad 54.000 \times \frac{40}{90} = 24.000$$

$$\gamma' \quad 54.000 \times \frac{20}{90} = \frac{12.000}{54.000}$$

Απάντησις. Θὰ λάβουν κέρδος ὁ α' 18.000 δρχ., ὁ β' 24.000
καὶ ὁ γ' 12.000 δρχ.

184. Τρεῖς συνεταῖροι ἐκέρδισαν ἀπὸ μίαν ἐπιχείρησιν 44.517 δρχ. 'Ο α' εἶχε καταθέσει 14.000 δρχ., ὁ β' 17.500 δρχ. καὶ ὁ γ' 20.000 δρχ. Τὰ χρήματα τοῦ α' ἔμειναν εἰς τὴν ἐπιχείρησιν 18 μῆνας, τοῦ β' 15 μῆνας καὶ τοῦ γ' 8 μῆνας. Πόσον κέρδος ἀνάλογε εἰς τὸν καθένα;

εις τὸν καθένα ;
185. "Ενας ἔμπτορος ἤρχισεν ἐπιχείρησιν μὲ κεφάλαιον 40.000
δρχ. Μετὰ 2 μῆνας προσέλαβε συνεταῖρον, ὃστις κατέθεσε 50.000
δρχ., καὶ μετὰ 2 μῆνας ἀπὸ τὴν πρόσληψιν τούτου προσέλαβε καὶ
τρίτον συνεταῖρον μὲ κεφάλαιον 60.000 δραχμῶν. Μετὰ 7 μῆνας ἀπὸ
τῆς ἐνάρξεως τῆς ἐπιχειρήσεως εὗρον, ὅτι ἐκέρδισαν 49.700 δραχμάς.
Πόσον κέρδος θὰ λάβῃ ἕκαστος ;

186. "Εμπόρος ήρχισεν ἐπιχείρησιν μὲ κεφάλαιον 60.000 δρχ.
Μετὰ 3 μῆνας προσλαμβάνει συνεταίρου, ὅστις καταθέτει τὰ $\frac{2}{3}$
τοῦ ποσοῦ τοῦ πρώτου 2 μῆνας βραδύτερον προσλαμβάνει καὶ
τρίτον συνεταίρου, ὅστις καταθέτει 30.000 δρχ. περισσοτέρας τοῦ
δευτέρου. "Εν ἔτος ἀπὸ τῆς προσλήψεως τοῦ τρίτου συνεταίρου
ἔλογαριάσθησαν καὶ εὔρον ὅτι εἶχον κέρδος 96.800 δραχμας. Πόσον
κέρδος ἀναλογεῖ εἰς τὸν καθένα;

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΙΣ

Εις τὰ προβλήματα 'Εταιρείας διακρίνομεν τρεῖς περιπτώσεις : α' περίπτωσις : "Οταν διαφέρουν τὰ κεφάλαια τῶν συνεταίρων καὶ οἱ χρόνοι εἰναι ἴδιοι.

β' περίπτωσις : "Οταν οἱ χρόνοι, ποὺ μένουν τὰ χρήματα ἐκάστου συνεταίρου εἰς τὴν ἐπιχείρησιν, εἰναι διάφοροι καὶ τὰ κεφάλαια εἰναι ἴδια.

γ' περίπτωσις : "Οταν καὶ τὰ κεφάλαια εἰναι διάφορα καὶ οἱ χρόνοι εἰναι διάφοροι.

Διὰ νά λύσωμεν τὰ προβλήματα τῆς 'Εταιρείας

α) "Οταν τὰ κεφάλαια εἰναι διαφορετικὰ καὶ οἱ χρόνοι ἴδιοι, πολλαπλασιάζομεν τὸν μεριστέον ἀριθμὸν (κέρδος ἢ ζημίαν) ἐπὶ τὸ κεφάλαιον ἑκάστου τῶν συνεταίρων καὶ τὸ γινόμενον διαιροῦμεν διὰ τοῦ ἀθροίσματος τῶν κεφαλαίων.

β) "Οταν οἱ χρόνοι διαφέρουν καὶ τὰ κεφάλαια εἰναι ἴδια, πολλαπλασιάζομεν τὸν μεριστέον ἀριθμὸν ἐπὶ τὸν χρόνον παραμονῆς ἑκάστου κεφαλαίου εἰς τὴν ἐπιχείρησιν καὶ τὸ γινόμενον διαιροῦμεν διὰ τοῦ ἀθροίσματος τῶν χρόνων.

γ) "Οταν καὶ τὰ κεφάλαια διαφέρουν καὶ οἱ χρόνοι παραμονῆς των εἰς τὴν ἐπιχείρησιν εἰναι διάφοροι, πολλαπλασιάζομεν τὸ κεφάλαιον ἑκάστου τῶν συνεταίρων ἐπὶ τὸν χρόνον παραμονῆς τῶν χρημάτων ἑκάστου εἰς τὴν ἐπιχείρησιν καὶ εύρισκομεν δι' ἑκαστον νέον ἀριθμόν. Αύτοὶ εἰναι πλέον οἱ δοθέντες ἀριθμοί. 'Οπότε πολλαπλασιάζομεν τὸν μεριστέον ἐπὶ ἑκαστον τούτων καὶ τὸ γινόμενον διαιροῦμεν διὰ τοῦ ἀθροίσματος τῶν δοθέντων.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

187. Τέσσαρες χωρικοὶ ἡγόρασσαν ἀπὸ κοινοῦ ἔνα κτῆμα· δ' α' ἡγόρασε 10 στρέμματα, δ' β' 8 στρέμματα, δ' γ' 7 στρέμματα καὶ δ' δ' 5 στρέμματα. Τὸ ἐκαλλιέργησαν συνεταιρικῶς καὶ ἔλαβον 7.500 κιλὰ σίτου. Πόσα κιλὰ ἀναλογοῦν εἰς τὸν καθένα καὶ πόσα χρήματα, ἃν πωλήσουν πρὸς 3 δρχ. τὸ κιλόν ;

188. Τρεῖς συνεταῖροι ἐκέρδισαν ἐκ τοῦ ἐμπορίου των 60.000 δρχ. 'Ο α' εἶχε καταθέσει τὰ $\frac{3}{8}$ τοῦ δλικοῦ κεφαλαίου των ὁ β' τὸ τρίτον αὐτοῦ (τοῦ δλικοῦ κεφαλαίου) καὶ ὁ γ' τὸ ὑπόλοιπον, τὸ δρποῖον ἦτο 70.000 δρχ. Πόσον εἶχε καταθέσει ἔκαστος καὶ πόσον κέρδος ἔλαβεν;

189. "Ενα κτῆμα τὸ ἔσκαψαν ἀπὸ κοινοῦ εἰς 6 ἡμέρας 7 ἄνδρες καὶ 5 γυναῖκες καὶ ἔλαβον 7.980 δρχ. "Έκαστος τῶν ἀνδρῶν ἐλάμβανε διπλάσιον ἡμερομίσθιον ἔκάστης γυναικός. Πόσον ἦτο τὸ ἡμερομίσθιον ἔκάστου ἀνδρὸς καὶ πόσον ἔκάστης γυναικός;

190. Τρεῖς ἐμπόροι συνειράσθησαν εἰς ἐμπορικήν ἐπιχείρησιν ὁ α' μὲ 150.000 δρχ., ὁ β' μὲ 200.000 δρχ. καὶ ὁ γ' μὲ 250.000 δρχ. 'Ἐκ τῆς ἐπιχειρήσεως προέκυψε κέρδος ἵσον πρὸς τὰ $\frac{3}{4}$ τοῦ συνολικοῦ κεφαλαίου. Πόσον θὰ λάβῃ ἔκαστος τῶν συνεταίρων;

191. Δύο ἀδελφοὶ ἥγορασαν οἰκόπεδον ἀντὶ 100.000 δραχμῶν. 'Ο μεγαλύτερος ἀδελφὸς ἐπλήρωσε τὰ $\frac{3}{5}$ τῆς ἀξίας καὶ ὁ μικρότερος τὸ ὑπόλοιπον. Μετά τινα χρόνον μετεπώλησαν τὸ οἰκόπεδον ἀντὶ 160.000 δρχ. Πόσον κέρδος ἀναλογεῖ εἰς τὸν καθένα;

192. Δύο ἀδελφοὶ ἥρχισαν ἐμπορικήν ἐργασίαν καὶ κατέβαλον ὁ α' 20.000 δρχ. καὶ ὁ β' τὰ διπλάσια τούτου. Μετὰ 6 μῆνας προσέλαβον καὶ γ' συνεταῖρον, ὅστις κατέβαλε 50.000 δρχ. Μετὰ παρέλευσιν 1 $\frac{1}{2}$ ἔτους ἀπὸ τῆς ἐνάρξεως τῆς ἐπιχειρήσεως εἶχον κέρδος 98.000 δραχμάς. Πόσον κέρδος θὰ λάβῃ ἔκαστος συνεταῖρος;

193. Τρεῖς συνεταῖροι ἀπὸ τὸ κέρδος ἐμπορικῆς ἐργασίας ἔλαβον ὁ α' 22.500 δρχ., ὁ β' 13.500 δρχ. καὶ ὁ γ' τὸ ὑπόλοιπον, ποὺ ποτὶ τὸ $\frac{1}{7}$ τοῦ δλικοῦ κέρδους. Ποιὸν κεφάλαιον κατέθεσεν ὁ α' καὶ ἦτο τὸ $\frac{1}{7}$ τοῦ δλικοῦ κέρδους. Ποιὸν κεφάλαιον κατέθεσεν ὁ β', δταν γνωρίζωμεν ὅτι ὁ γ' εἶχε καταθέσει 28.500 δραχμάς;

3. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ

Οι μαθηταί, δταν λάβουν τὸν ἔλεγχόν των μὲ τοὺς βαθμοὺς των ἀναλυτικῶν εἰς ἔκαστον μάθημα, τοὺς προσθέτουν καὶ κατόπιν

διαιροῦν τὸ ἄθροισμά των διὰ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν μαθημάτων. Τὸ πηλίκον, ποὺ εύρισκουν, λέγεται μέσος ὅρος.

Πρόβλημα. "Ενας μαθητής ἔλαβε τὸν ἑξῆς βαθμούς : Θρησκευτικά 10, Ἑλληνικά 9, Μαθηματικά 10, Ἰστορία 9, Φυσ. Ἰστορία 9, Φυσική καὶ Χημεία 9, Γεωγραφία 9, Ἰχνογραφία 8, Καλλιγραφία 8, Χειροτεχνία 8, Ὡδική 9 καὶ Γυμναστική 10. Ποῖος εἶναι ὁ μέσος ὅρος τῆς βαθμολογίας του ;

Αύσις. $10 + 9 + 10 + 9 + 9 + 9 + 8 + 8 + 8 + 9 + 10 = 108.$

Τὸ ἄθροισμα αὐτὸ τῶν μαθημάτων τὸ διαιροῦμεν διὰ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν μαθημάτων, δηλ. διὰ 12, καὶ ἔχομεν : $108 : 12 = 9.$

Απάντησις. Ὁ μέσος ὅρος τῆς βαθμολογίας εἶναι 9.

"Ωστε : Διὰ νὰ εῖναι μέσον τὸν μέσον ὅρον δύο ἢ περισσοτέρων ὁμοειδῶν ἀριθμῶν, προσθέτομεν αὐτοὺς καὶ διαιροῦμεν τὸ ἄθροισμά των διὰ τοῦ ἀριθμοῦ, ὁ ὅποιος φανερώνει τὸ πλῆθος αὐτῶν.

194. "Ενας μικροπωλητὴς ἐκέρδισεν ἀπὸ τὴν ἐργασίαν του τὰ ἑξῆς ποσά : Τὴν Δευτέραν 145 δρχ., τὴν Τρίτην 128 δρχ., τὴν Τετάρτην 117 δρχ., τὴν Πέμπτην 135 δρχ., τὴν Παρασκευὴν 150 δρχ. καὶ τὸ Σάββατον 165 δραχμάς. Πόσον ἐκέρδισε τὴν ήμέραν κατὰ μέσον ὅρον ;

195. "Ενας οἰκογενειάρχης ἔξωδευσεν εἰς μίαν ἑβδομάδα τὰ ἑξῆς ποσά : Δευτέραν 128 δρχ., Τρίτην 145 δρχ., Τετάρτην 117 δρχ., Πέμπτην 125 δρχ., Παρασκευὴν 132 δρχ., Σάββατον 123 δρχ. καὶ Κυριακὴν 140 δραχμάς. Πόσας δρχ. ἔξωδευσε κατὰ μέσον ὅρον τὴν ήμέραν ;

196. "Ενας κτηματίας ἐργάζεται εἰς τὰ κτήματά του κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ ἔτους ως ἑξῆς: 120 ήμέρας ἐπὶ 9 ὥρας τὴν ήμέραν, 135 ήμέρας ἐπὶ 8 ὥρας τὴν ήμέραν καὶ 45 ήμέρας ἐπὶ 12 ὥρας τὴν ήμέραν. Πόσας ὥρας ἐργάζεται κατὰ μέσον ὅρον τὴν ήμέραν ;

197. Εἰς μίαν πόλιν ἡ μέση θερμοκρασία ἦτο : τὴν ἄνοιξιν $15,2^{\circ}$ Κελσίου, τὸ θέρος $26,7^{\circ}$, τὸ φθινόπωρον $14,9^{\circ}$ καὶ τὸν χειμῶνα $6,4^{\circ}$. Ποία ἦτο ἡ μέση θερμοκρασία εἰς τὴν πόλιν αὐτὴν καθ' ὅλον τὸ ἔτος ;

Νὰ εὕρετε τὸν μέσον ὅρον τῆς βαθμολογίας σας τῶν δύο πρώτων διμήνων.

4. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΙΞΕΩΣ

Οι ἔμποροι, κυρίως τροφίμων, ἀναμιγνύουν διαφόρους ποιότητας όμοειδῶν πραγμάτων· π.χ. λάδι α' ποιότητος καὶ λάδι β' ποιότητος, καφέ, ρύζι κλπ. Ἡ ἀναμιγνύουν καὶ μή δόμοειδῆ πράγματα· λ.χ. βούτυρον καὶ λίπος, κρασὶ καὶ νερό, οἰνόπνευμα καὶ νερὸς κλπ.

κλπτ.
Τοῦτο τὸ κάμνουν, διότι δὲν δύνανται νὰ πωλήσουν χωριστά τὰ εἶδη αὐτά, εἴτε διότι εἶναι πολὺ ἀκριβὰ ὡρισμένα τούτων εἴτε διότι ἄλλα εἶναι κατωτέρας ποιότητος. Διὰ τῆς ἀναμίξεως σχηματίζουν ἕνα μίγμα μετρίας ποιότητος, τὸ ὅποιον τὸ πωλοῦν εὔκολώτερα λόγω τῆς μετρίας ἀξίας του.

‘Η πρᾶξις αὐτή, δηλ. ἡ ἀνάμιξις, λέγεται μίξις καὶ τα σχετικά προβλήματα λέγονται προβλήματα μίξεως.

α) Προβλήματα μίξεως πρώτου εἴδους

Πρόβλημα 1. "Ένας παντοπώλης άναμιγνύει 40 κιλά βούτυρου των 50 δρχ. τὸ κιλὸν καὶ 100 κιλὰ λίπος τῶν 22 δρχ. τὸ κιλόν. Πόσον ποέπει γὰ πωλῆ ἡ τὸ κιλὸν τοῦ μήγματος;

Σκέψις. "Αν δὲ παντοπώλης ἐπώλει χωριστὰ τὸ βούτυρον καὶ χωριστὰ τὸ λίπος, θὰ ἐλάμβανεν ἀπὸ τὸ βούτυρον 40 κιλὰ \times 50 δρχ. = 2.000 δρχ. καὶ ἀπὸ τὸ λίπος 100 κιλὰ \times 22 δρχ. = 2.200 δρχ. Καὶ ἀπὸ τὰ δυὸ εἶδη θὰ ἐλάμβανε : $2.000 + 2.200 = 4.200$ δρχ. δρχ. Εάν δὲ τὸ βούτυρον καὶ τὸ λίπος μή λάβῃ καὶ ἀπὸ τὸ μίγμα, δηλ.

Τὰ ἴδια χρήματα δύνανται πρέπει νὰ λάβῃ καὶ απὸ τοῦ μήδα, οὐρανοῦ. Τὰ 140 κιλὰ τοῦ μίγματος θὰ κοστίζουν 4.200 δρχ., τὸ ἔνα κιλὸν θὰ κοστίζῃ 140 φοράς διλιγόντερον δηλ. $4.200 : 140 = 30$ δρχ.

Αύστις.

α) Βούτυρον 40 κ. × 50 δρχ. = 2.000 δρχ.

β) λίπος 100 κ. x 22 » = 2.200 »

Σύν. μίγματος 140 κ. τιμῶνται 4.200 δρχ.
τὸ 1 κ. τιμᾶται $4.200 : 140 = 30$ δρχ.

Απάντησις. Πρέπει νὰ πωλῇ τὸ κιλὸν τοῦ μίγματος πρὸς 30 δρχ.

Παρατήρησις. Προβλήματα α' εἰδους μίξεως ἔχομεν, ὅταν δίδωνται αἱ πρὸς ἀνάμιξιν ποσότητες καὶ ἡ τιμὴ τῆς μονάδος ἐκάστης αὐτῶν καὶ ζητῆται ἡ τιμὴ τῆς μονάδος τοῦ μίγματος. Καὶ :

Αἰὰ νὰ εῦρωμεν τὴν τιμὴν τῆς μονάδος τοῦ μίγματος, ενός-
ακομεν πρῶτον τὴν ἀξίαν τῆς ποιότητος ἐκάστον εἴδους χωριστά.
Προσθέτομεν κατόπιν τὰ γινόμενα καὶ τὸ ἄθροισμα τῆς ἀξίας τὸ
διαιροῦμεν διὰ τὸ πλήθους τῶν μονάδων τοῦ μίγματος.

Πρόβλημα 2. Ἐνας ἀνέμιξε 250 κιλὰ λάδι τῶν 28 δρχ. τὸ κιλὸν μὲ 150 κιλὰ λάδι κατωτέρας ποιότητος καὶ ἐσχημάτισε μίγμα, τὸ
ὅποιον κοστίζει 26,50 δρχ. τὸ κιλόν. Πόσον ἐκάστιζε τὸ κιλὸν τὸ λάδι
τῆς κατωτέρας ποιότητος;

Σκέψις. Εἰς τὸ πρόβλημα αὐτὸ δὲν γνωρίζομεν πόσον κοστίζει
τὸ κιλὸν τὸ λάδι τῆς κατωτέρας ποιότητος, γνωρίζομεν ὅμως πόσον
κοστίζει τὸ κιλὸν τοῦ μίγματος.

Διὰ νὰ λύσωμεν τὸ πρόβλημα αὐτό, α) θὰ εὕρωμεν τὴν ἀξίαν
τῆς ποσότητος τῶν 250 κιλῶν, β) πολλαπλασιάσωμεν τὸ ἄθροι-
σμα τῶν κιλῶν τοῦ μίγματος ἐπὶ τὴν τιμὴν τοῦ ἑνὸς κιλοῦ αὐτοῦ,
γ) ἀπὸ τὸ γινόμενον θὰ ἀφαιρέσωμεν τὴν ἀξίαν τῶν κιλῶν τῆς ἀ-
νωτέρας ποιότητος καὶ δ) τὸ ὑπόλοιπον θὰ τὸ διαιρέσωμεν διὰ τοῦ
ἀριθμοῦ τῶν κιλῶν τῆς κατωτέρας ποιότητος.

Λύσις.

$$\alpha) \quad 250 \text{ κιλ.} \times 28 \text{ δρχ.} = 7.000 \text{ δρχ.}$$

$$\beta) \quad \underline{150 \text{ » } \times ; \quad » = ; \quad »}$$

$$400 \text{ » } \times 26,5 \text{ » } = 10.600 \text{ »}$$

$$10.600 \text{ » } - 7.000 \text{ » } = 3.600 \text{ »}$$

$$3.600 \text{ » } : 150 \text{ » } = 24 \text{ »}$$

Απάντησις. 24 δρχ. κοστίζει τὸ κιλὸν τὸ λάδι τῆς κατωτέρας
ποιότητος.

Προβλήματα

198. "Ενας άνέμιξε 240 κιλά κρασί τῶν 6 δρχ. τὸ κιλὸν μὲ 160 κ. τῶν 5,50 δρχ. τὸ κιλόν. Ποία θὰ είναι ἡ τιμὴ τοῦ κιλοῦ τοῦ μίγματος;

199. "Ενας παντοπώλης άνέμιξε 175 κ. λάδι τῶν 30 δρχ. τὸ κιλὸν μὲ 225 κ. τῶν 26 δρχ. τὸ κιλόν. Πόσον κοστίζει τὸ κιλὸν τοῦ μίγματος καὶ πόσον κερδίζει εἰς τὸ κιλόν, ἀν τὸ πωλῆι πρὸς 28 δραχμάς;

200. 'Ανέμιξε κάππιος 350 κιλά λίπος τῶν 20 δρχ. τὸ κιλὸν μὲ 150 κιλά τῶν 23 δρχ. τὸ κ. Πόσον κοστίζει τὸ κιλὸν τοῦ μίγματος καὶ πόσον πρέπει νὰ τὸ πωλῆι, διὰ νὰ κερδίσῃ 1.100 δρχ. ἀπὸ ὅλον τὸ ποσὸν αὐτοῦ;

201. "Ενας άνέμιξε 300 κιλά λίπος τῶν 20 δρχ. τὸ κ. μὲ 200 κιλὰ ἀνωτέρας ποιότητος καὶ ἐσχημάτισε μίγμα, τὸ ὅποιον κοστίζει 22 δρχ. τὸ κιλόν. Πόσον ἔκόστιζε τὸ κιλὸν τὸ λίπος τῆς ἀνωτέρας ποιότητος;

202. "Ενας ἔμπορος ἔχει δύο βαρέλια κρασί· τὸ ἕνα χωρεῖ 1.000 κ. τῶν 6 δρχ. τὸ κιλόν καὶ τὸ ὄλλο 800 κιλὰ τῶν 5 δρχ. τὸ κιλόν. 'Ανέμιξε τὸ κρασί καὶ μὲ 200 κιλὰ νερὸν (μηδὲν ἢ ἀξία τοῦ νεροῦ). Πόσον κοστίζει τὸ κιλὸν τοῦ μίγματος καὶ πόσον τοῖς ἑκατὸν (%) κερδίζει, ἀν τὸ πωλῆι 5,40 δρχ. τὸ κιλόν;

203. "Ενας ἔχει λάδι τῶν 30 δρχ. τὸ κιλὸν καὶ σπορέλαιον τῶν 20 δρχ. τὸ κιλὸν καὶ τῶν 15 δρχ. τὸ κιλὸν καὶ τὰ ἀναμιγνύει κατὰ τὸν ἔξις τρόπον: Λαμβάνει ἀπὸ τὸ λάδι ποσότητα τριπλασίαν ἀπὸ τὴν ποσότητα τοῦ σπορελαίου τῶν 20 δρχ., καὶ ἀπὸ τὸ σπορέλαιον τῶν 15 δρχ. ποσότητα διπλασίαν ἀπὸ τὸ λάδι. Πόσον κοστίζει τὸ κιλὸν τοῦ μίγματος;

204. "Ἐμπορος ἤγόρασε καὶ ἀνέμιξε 600 κιλὰ φασόλια Καστοριᾶς τῶν 18 δρχ. τὸ κιλὸν καὶ 300 κιλὰ τῶν 14 δρχ. τὸ κιλόν. 'Εξώδευσε διὰ μεταφορικὰ 5 % ἐπὶ τῆς ἀξίας των. Πόσον πρέπει νὰ πωλήσῃ τὸ κιλὸν τοῦ μίγματος, διὰ νὰ κερδίσῃ ἀπὸ ὅλον τὸ μίγμα 2.250 δραχμάς;

205. "Ενας ἀνέμιξε 600 κιλὰ οἰνοπνεύματος 80° μὲ 500 κιλὰ 60° καὶ μὲ 100 κιλὰ νερό. Ποῖος θὰ είναι ὁ βαθμὸς τοῦ μίγματος;

6) Προβλήματα μίξεως δευτέρου είδους

Πρόβλημα 1. "Εμπορος ἀνέμιξε λάδι τῶν 32 δρχ. τὸ κιλὸν μὲ ἄλλο λάδι τῶν 29 δρχ. τὸ κιλὸν καὶ ἔκαμε μίγμα 300 κιλῶν ἀξίας 30 δρχ. τὸ κιλόν. Πόσα κιλὰ ἔλαβεν ἀπὸ κάθε ποιότητα ;

Σκέψις. Διὰ νὰ γίνη τὸ μίγμα, πρέπει νὰ λάβωμεν λάδι καὶ ἀπὸ τὰς δύο ποιότητας. "Αν ἀναμίξωμεν 1 κιλὸν ἀπὸ τὴν α' ποιότητα καὶ 1 κιλὸν ἀπὸ τὴν β' ποιότητα, εἰς τὸ κιλὸν τοῦ μίγματος, ποὺ θὰ πωλῇ πρὸς 30 δρχ., θὰ ἔχῃ ζημίαν 2 δρχ. εἰς τὴν α' ποιότητα καὶ κέρδος 1 δρχ. εἰς τὴν β' ποιότητα. "Αρα εἰς τὰ 2 κιλὰ μίγμα, ποὺ θὰ πωλῇ, θὰ ἔχῃ μίαν δρχ. ζημίαν.

"Εννοοῦμεν συνεπῶς ὅτι, διὰ νὰ μὴ ἔχῃ οὕτε ζημίαν οὔτε κέρδος, πρέπει νὰ ἀναμίξῃ 1 κιλὸν ἀπὸ τὴν α' ποιότητα καὶ 2 κιλὰ ἀπὸ τὴν β' ποιότητα.

Κατ' αὐτὴν τὴν ἀναλογίαν πρέπει νὰ γίνῃ ἡ ἀνάμιξις δηλ. ὁσας φοράς θὰ λαμβάνῃ 1 κιλὸν ἀπὸ τὴν α' ποιότητα, τόσας φοράς θὰ πρέπει νὰ λαμβάνῃ 2 κιλὰ ἀπὸ τὴν β' ποιότητα.

"Επομένως, διὰ νὰ εύρωμεν πόσα κιλὰ πρέπει νὰ λάβῃ ἀπὸ κάθε ποιότητα, διὰ νὰ σχηματίσῃ μίγμα 300 κιλῶν, πρέπει νὰ μερίσωμεν τὰ 300 κιλὰ εἰς μέρη ἀνάλογα τῶν ἀριθμῶν 1 καὶ 2. "Ητοι :

Δοθέντες

Μεριστέος 300	$\left\{ \begin{array}{l} \alpha) 1 \\ \beta) 2 \end{array} \right.$
	ἀθροισμα

3

$$\alpha) 300 \times \frac{1}{3} = 100 \text{ κιλά, } \beta) 300 \times \frac{2}{3} = 200 \text{ κιλά.}$$

Ωστε : "Ελαβεν 100 κιλὰ ἀπὸ τὴν α' ποιότητα καὶ 200 κ. ἀπὸ τὴν β'.

Συνήθως ὅμως διὰ τὴν λύσιν τῶν προβλημάτων τοῦ δευτέρου εἴδους μίξεως¹ χρησιμοποιεῖται ἡ ἔξῆς κατάταξις:

1. Προβλήματα β' είδους μίξεως ἔχομεν, δταν δίδεται ἡ τιμὴ ἐκάστης ποιότητος καὶ ἡ τιμὴ τῆς μονάδος τοῦ μίγματος καὶ ζητοῦνται αἱ ποσότητες.

$$300 \text{ κιλά μίγμα} \left\{ \begin{array}{l} \text{'Αξία} \\ \alpha' 32 \text{ δρχ.} \\ \beta' 29 \text{ δρχ.} \end{array} \right. > 30 < \begin{array}{l} \Delta \text{ιαφ., 'Άναλ. μίξ.} \\ 1 \rightarrow 1 \text{ κιλόν α'.} \\ 2 \rightarrow 2 \text{ κιλά β'.} \\ \hline 3 \quad » \end{array}$$

Σημείωσις. "Οπως βλέπομεν, σχηματίζομεν ἔνα πίνακα, εἰς τὸν δῆποιν γράφομεν τὰς τιμάς τῶν μονάδων τῶν εἰδῶν, τὰ δῆποια ἀναμιγνύομεν (32 δρχ. καὶ 29 δρχ.) τὴν μίαν κάτω ἀπὸ τὴν ἄλλην· μεταξὺ τῶν τιμῶν αὐτῶν καὶ δλίγον δεξιὰ γράφομεν τὴν τιμὴν τῆς μονάδος τοῦ μίγματος (30 δρχ.) Εύρισκομεν κατόπιν τὰς διαφορὰς $32 - 30 = 2$ καὶ $30 - 29 = 1$, τὰς δῆποιας γράφομεν εἰς τὸ ἄκρον τῶν διαγωνίων (δηλ. τοῦ X) καὶ τὰς προσθέτομεν. Κατόπιν κάμνομεν τὸν μερισμὸν μερίζοντες τὸν μεριστέον (τὸ 300 κ.) ἀνάλογα πρὸς τοὺς ἀριθμούς 1 καὶ 2, πιού εὔρομεν ὡς διαφοράς.

$$\text{Λύσις. } \alpha' \frac{300 \times 1}{3} = 100 \text{ κιλά}$$

$$\beta' \frac{300 \times 2}{3} = 200 \text{ κιλά}$$

$$\Sigma \text{ύνολον} \qquad \qquad \qquad 300 \quad »$$

Απάντησις. "Ελαβεν 100 κιλά ἀπὸ τὴν α' ποιότητα καὶ 200 κιλ. ἀπὸ τὴν β'.

Διὰ νὰ λύσωμεν τὰ προβλήματα τοῦ β' εἴδους μίξεως, ενδρόσκομεν τὰς διαφορὰς (ώς εἰς τὸν ἀνωτέρῳ πίνακα) καὶ μερίζομεν τὸ βάρος τοῦ μίγματος ἀναλόγως αὐτῶν.

Πρόβλημα 2. "Ενας παντοπάλης ἔχει δύο εἰδη βοντύρου. Τοῦ ἐνὸς εἴδους τὸ κιλὸν κοστίζει 55 δρχ. καὶ τοῦ ἄλλου 42 δρχ. Προκειμένου νὰ σχηματίσῃ μίγμα, τὸ δῆποιν νὰ κοστίζῃ 46 δρχ. τὸ κιλόν, πόσα κιλά θὰ λάβῃ ἀπὸ τὸ β' εἶδος, ἢν ἀπὸ τὸ α' εἶδος ἔλαβεν 20 κιλά;

Σκέψις. Καὶ τὸ πρόβλημα αὐτὸν εἶναι πρόβλημα β' εἴδους μίξεως.

Κατάταξις :

$$\begin{array}{ccc} \text{Αξία} & & \Delta\text{ιάφ. } \text{Αναλ. μίξ.} \\ \alpha' 55 \text{ δρχ.} & > 46 & 4 \rightarrow 4 \text{ κ. } \alpha' \\ \beta' 42 \text{ δρχ.} & < & 9 \rightarrow 9 \text{ κ. } \beta' \end{array}$$

Λύσις :

$$\begin{array}{ccccccccc} \text{"Όταν } \alpha' \text{ λαμβάνη } & 4 \text{ κ. } \text{ἀπό τὸ } \beta' \text{ λαμβάνει } 9 \text{ κ.} \\ \gg \gg \gg \alpha' \gg & 20 \gg \gg \beta' \gg & X \text{ κ.} \end{array}$$

$$X = 9 \times \frac{20}{4} = 5 \text{ κιλά.}$$

Παρατήρησις : Εις τὸ πρόβλημα αὐτό, ἀφοῦ ηὕραμεν τὴν ἀναλογίαν μίξεως, ἐκάμαμεν ἀπλῆν μέθοδον τῶν τριῶν καὶ ὅχι μερισμόν, διότι δὲν ἔχομεν μεριστέον ἀριθμόν.

Προβλήματα

206. "Ενας ἀνέμιξε λίπος τῶν 24 δρχ. τὸ κιλὸν καὶ τῶν 20 δρχ. τὸ κιλὸν καὶ ἔκαμε μίγμα 240 κιλῶν, τὸ δόποιον πωλεῖ 21 δρχ. τὸ κιλόν. Πόσον ἔλαβεν ἀπὸ κάθε ποιότητα ;

207. Πόσα κιλὰ κρασὶ πρέπει νὰ λάβωμεν ἀπὸ δύο ποιότητας, διὰ νὰ σχηματίσωμεν μίγμα 300 κιλῶν, τὸ δόποιον ἔπωληται πρὸς 5,20 δρχ. τὸ κιλόν, ὃν τιμᾶται τὸ κιλὸν τῆς α' ποιότητος 6 δρχ. καὶ τῆς β' 4,80 δραχμάς ;

208. "Ενας ἀνέμιξε βούτυρον τῶν 50 δρχ. τὸ κιλὸν μὲ λίπος τῶν 20 δρχ. τὸ κιλὸν καὶ ἔσχημάτισε μίγμα 500 κιλῶν, τὸ δόποιον ἔπωλειτο 23 δρχ. τὸ κιλόν. Πόσον ἔλαβεν ἀπὸ κάθε εἶδος ;

209. Κατὰ ποίαν ἀναλογίαν πρέπει νὰ ἀναμίξωμεν λίπος τῶν 20 δρχ. τὸ κιλὸν μὲ βούτυρον τῶν 60 δρχ. τὸ κιλόν, διὰ νὰ σχηματίσωμεν μίγμα τῶν 32 δρχ. τὸ κιλόν ;

210. 'Ανέμιξεν ἔνας λίπος τῶν 24 δρχ. τὸ κιλὸν μὲ βούτυρον τῶν 48 δρχ. τὸ κιλὸν καὶ ἔσχημάτισε μίγμα 150 κιλῶν, τὸ δόποιον ἔπωλει 36 δρχ. τὸ κιλόν. Πόσα κιλὰ ἔξ ἐκάστου εἶδους ἔλαβεν ;

211. Παντοπώλης ἀναμιγνύει βούτυρον τῶν 50 δρχ. τὸ κιλὸν, μὲ λίπος τῶν 19,50 δρχ. τὸ κιλὸν καὶ σχηματίζει μίγμα 1000 κιλῶν, τὸ δόποιον πωλεῖ καὶ εἰσπράττει 25.600 δρχ. Πόσον πρέπει νὰ λάβῃ ἀπὸ κάθε εἶδος ;

212. Ἔμπορος ἀναμιγνύει 100 κιλὰ βούτυρον τῶν 50 δρχ. τὸ κιλὸν μὲ λίπος· τῶν 19,50 δρχ. τὸ κιλόν. Προκειμένου νὰ σχηματίσῃ μίγμα, τὸ δποῖον νὰ κοστίζῃ 25,60 δρχ. τὸ κιλόν, πόσον λίπος θὰ λάβῃ;

Κράματα

Πολλάκις συγχωνεύον διὰ τήξεως χρυσὸν μὲ χαλκόν, διὰ νὰ κάμουν τὸν χρυσὸν στερεότερον. Τὸ μίγμα, τὸ δποῖον λαμβάνουν ἐκ τῆς συγχωνεύσεως αὐτῆς, λέγεται **κράμα**.

Γενικῶς **κράμα** λέγεται τὸ προϊὸν ἐκ τῆς συγχωνεύσεως μετάλλων. Τὸ πιστὸν τοῦ πτλυτίμου μετάλλου (χρυσοῦ ἢ ἀργύρου), τὸ δποῖον περιέχεται εἰς μίχη μονάδας· κράματος, λέγεται **βαθμὸς καθαρότητος ἢ τίτλος τοῦ κράματος**.

Ο τίτλος ἐκφράζεται σ' ὥνθις εἰς **χιλιοστά**. "Οταν λέγωμεν π.χ. ὅτι δ τίτλος χρυσοῦ κοσμήματος εἶναι 0,800 ἐννοοῦμεν, ὅτι εἰς τὰ 1000 μέρη τοῦ κοσμήματος αὔτοῦ τὰ 800 εἶναι καθαρὸς χρυσός καὶ τὰ ὑπόλοιπα 200 εἶναι ἄλλο μέταλλον.

Ο βαθμὸς καθαρότητος τῶν χρισῶν κοσμημάτων ἐκφράζεται καὶ εἰς εἰκοστὰ τέταρτα, τὰ δποῖα λέγονται **καράτια**. "Οταν δ χρυσός εἶναι καθαρός, λέγομεν ὅτι εἶναι 24 κορατίων. "Οταν δμως λέγωμεν ὅτι ἔνα χρυσοῦν κόσμημα εἶναι 18 καριτίων, ἐννοοῦμεν ὅτι μόνον τὰ 18 μέρη του εἶναι καθαρὸς χρυσός, τὰ δὲ ὑπόλοιπα 6 μέρη του εἶναι ἄλλο μέταλλον.

Σημείωσις. Τὰ προβλήματα τῶν κραμάτων λύονται δπως καὶ τὰ προβλήματα μίξεως (α' καὶ β' εἴδιοις).

Πρόβλημα. *"Ενας χρυσοχόος συγχωνεύει 20 γραμμάρια χρυσοῦ τίτλου (βαθμοῦ καθαρότητος) 0,950 μὲ 15 γραμμάρια χρυσοῦ τίτλου 0,600. Ποῖος εἶναι ὁ τίτλος (βαθμὸς καθαρότητος) τοῦ νέου κράματος ;"*

Σκέψις. Τὰ 20 γραμμάρια χρυσοῦ, τίτλου 0,950, περιέχουν $0,950 \times 20 = 19$ γραμμάρια καθαροῦ χρυσοῦ. Τὰ 15 γραμμάρια χρυσοῦ τίτλου 0,600 περιέχουν $0,600 \times 15 = 9$ γραμμάρια καθαροῦ χρυσοῦ. Καὶ τὰ 35 γραμμάρια τοῦ κράματος ($20 + 15$) περιέχουν 28 γραμμάρια ($19 + 9$) καθαροῦ χρυσοῦ.

Αφοῦ τὰ 35 γραμμάρια τοῦ κράματος περιέχουν 28 γραμμάρια

καθαροῦ χρυσοῦ, τὸ ἔνα γραμμάριον τοῦ κράματος θὰ περιέχῃ
 $28:35 = 0,800$ γραμμάρια καθαροῦ χρυσοῦ.

Λύσις.

- α) $20 \text{ γραμμάρ.} \times 0,950 = 19 \text{ γραμμάρ. καθαροῦ χρυσοῦ}$
 β) $15 \quad \text{»} \quad \times 0,600 = 9 \quad \text{»} \quad \text{»} \quad \text{»}$

Τὸ 35 γραμμάρ. τοῦ κράμ. περιέχουν 28 γραμμάρ. καθαροῦ χρυσ.
 τὸ 1 » » » περιέχει $28 : 35 = 0,800$ γρ. καθ. χρυσ.

*Απάντησις. 'Ο τίτλος τοῦ νέου κράματος εἶναι 0,800.

Προβλήματα κραμάτων

213. "Ενας χρυσοχόος ἐσυγχώνευσε 13 γραμμάρ. χρυσοῦ τίτλου 0,900 μὲ 2 γραμμάρ. χαλκοῦ. Πόσος εἶναι ὁ τίτλος τοῦ νέου κράματος; ('Ο τίτλος τοῦ χαλκοῦ εἶναι μηδέν).

214. Συγχωνεύομεν κρᾶμα χρυσοῦ 285 γραμμαρ. τίτλου 0,835 μὲ ἄλλο κρᾶμα χρυσοῦ 325 γραμμαρ. τίτλου 0,920 καὶ μὲ 152 γραμμάρ. καθαροῦ χρυσοῦ. Ποῖος εἶναι ὁ τίτλος τοῦ νέου κράματος;

215. "Ενας χρυσοχόος ἔχει δύο ἀστημένιας πλάκας. 'Η μία ἔχει τίτλον 0,760 καὶ τὴ ἄλλη 0,520. Πόσα γραμμάρια πρέπει νὰ λάβῃ ἀπὸ κάθε πλάκα, διὰ νὰ κάμῃ κρᾶμα 240 γραμμαρίων μὲ τίτλον 0,600;

216. Χρυσοχόος ἔχει δύο εἰδη χρυσοῦ. Τοῦ ἑνὸς ὁ τίτλος εἶναι 0,850 καὶ τοῦ ἄλλου 0,750. Πόσην ποσότητα πρέπει νὰ λάβῃ ἀπὸ κάθε εἶδος, διὰ νὰ σχηματίσῃ κρᾶμα 300 γραμμαρ. καὶ τίτλου 0,800;

217. Χρυσοχόος λαμβάνει 1700 γραμμάρ. καθαροῦ χρυσοῦ καὶ τὰ συγχωνεύει μὲ χαλκόν, διὰ νὰ σχηματίσῃ κρᾶμα χρυσοῦ τίτλου 0,850. Πόσα γραμμάρια χαλκοῦ πρέπει νὰ λάβῃ;

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΚΤΟΝ

ΧΡΗΣΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΙΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

Μέχρι τώρα έμάθομεν νά χρησιμοποιούμεν τὰ ἀραβικὰ σύμβολα (0, 1, 2, 3, 4, 5...), διά νά παραστήσωμεν ἀριθμούς ή ποσότητας.

Είναι δυνατὸν ὅμως διά τὴν τοιαύτην παράστασιν νά χρησιμοποιήσωμεν καὶ τὰ γράμματα τοῦ ἀλφαριθμοῦ. Π.χ. λέγομεν : ἔξωδευσαμεν εἰς τὴν ἐκδρομὴν **α δραχμάς**, ἀντὶ νά ἀναφέρωμεν μὲ ἀριθμὸν τὴν ποσότητα τῶν χρημάτων, πού ἔξωδευσαμεν. Ἐπίστης ἀντὶ νά γράψωμεν 5 μῆλα, γράφομεν **α μῆλα**: ἀντὶ νά γράψωμεν 2 δρχ., γράφομεν **β δραχμαί**: ἀντὶ νά εἴπωμεν 8 μαθηταί, λέγομεν **γ μαθηταὶ κ.τ.λ.**

Διά τὴν παράστασιν ὡρισμένων ἀριθμῶν ή ποσοτήτων δυνάμεθα νά χρησιμοποιήσωμεν οἰονδήποτε γράμμα τοῦ ἀλφαριθμοῦ· τὸ γράμμα ὅμως αὐτό, καθ' ὅλην τὴν ἔξέτασιν τοῦ ζητήματος, θὰ παριστάνῃ τὸν ἴδιον ἀριθμὸν ή τὴν αὐτὴν ποσότητα. Π.χ. "Ἄν μὲ τὸ γράμμα α παραστήσωμεν τὰς 7 ἡμέρας τῆς ἑβδομάδος, κατὰ τὸν ὑπολογισμὸν τῶν ἡμερῶν 4 ἑβδομάδων, πού θὰ τὸν παραστήσωμεν μὲ τὸ **4α**, τὸ α θὰ παριστᾶ 7 ἡμέρας πάλιν. Εἰς ἄλλην περίπτωσιν δυνάμεθα μὲ τὸ α νά παραστήσωμεν ἄλλον ἀριθμὸν ή ἄλλην ποσότητα· λ.χ. $\alpha = 5$ δραχμαί, ή $\alpha = 10$ κιλά κλπ.

Μὲ γράμματα ἡμιποροῦμεν νά παραστήσωμεν ὅχι μόνον ὡρισμένους ἀριθμούς ή ποσότητας ἄλλὰ καὶ ἀγνώστους ἀριθμούς ή ζητουμένας ποσότητας. Συνήθως διά τοὺς ὡρισμένους ἀριθμούς χρησιμοποιοῦμεν τὰ πρῶτα γράμματα τοῦ ἀλφαριθμοῦ (α , β , γ , δ ...) καὶ διά τοὺς ἀγνώστους ή ζητουμένους τὰ τελευταῖα (ϕ , χ , ψ , ω).

"Ἐτσι δυνάμεθα νά χρησιμοποιοῦμεν τὰ γράμματα ἀντὶ ἀριθμῶν εἰς ἀσκήσεις καὶ προβλήματα ὅλων τῶν πράξεων τῆς ἀριθμητικῆς. Καί, διά νά σημειώσωμεν τὰς πράξεις, χρησιμοποιοῦμεν τὰ γνωστά μας σύμβολα: τὸ + (σύν) διά τὴν πρόσθεσιν, τό – (πλήν ή μεῖον) διά τὴν ἀφαίρεσιν τὸ \times ή. (ἐπι) διά τὸν πολλαπλασιασμὸν καὶ τὸ : (διά ή πρὸς) διά τὴν διαιρέσιν.

Παραδείγματα

α) Ἐὰν μία οἰκογένεια ἔχῃ 4 ἀγόρια καὶ β κορίτσια, τότε δ συνολικὸς ἀριθμὸς τῶν παιδιῶν τῆς οἰκογενείας αὐτῆς θὰ εἴναι $4 + \beta$.

β) Ἐὰν α είναι δ ἀριθμὸς τῶν μαθητῶν τῆς τάξεως μας καὶ διπο-
σιάζουν σήμερον 5 μαθηταί, δ ἀριθμὸς τῶν παρόντων μαθητῶν είναι
 $\alpha - 5$.

γ) Ἐὰν εἰς κάθε θρανίον τῆς τάξεως μας κάθονται X μαθηταί καὶ
τὰ θρανία της είναι 8, τότε οἱ μαθηταί τῆς τάξεως μας είναι $8 \cdot X$ ή
 $8X$ (τὸ γινόμενον αὐτῶν).

Σημείωσις. Τὸ γινόμενον συμβολίζεται χωρὶς τὸ σημεῖον τοῦ
πιολλαπλασιασμοῦ.

δ) Ἐὰν β είναι τὸ βάρος ἐνὸς πεπονιοῦ, τὸ δόποιον μοιράζομεν
εἰς 4 ίσα μέρη, τότε τὸ βάρος κάθε τεμαχίου θὰ είναι $\beta : 4$ ή $\frac{\beta}{4}$.

ΕΦΑΡΜΟΓΑΙ

218. Ὁ Νίκος ἔλαβεν ὡς δώρον α δρχ. ἀπὸ τὸν πατέρα του καὶ
3 δρχ. ἀπὸ τὴν μητέρα του. Πόσας δρχ. ἔχει τὸ ὄλον ; (Λύσις : α+3).

219. Ὁ Κώστας ἔχει α δραχμάς· δ Πέτρος ἔχει 253 δρχ. περισ-
στέρας ἀπὸ τὸν Κώσταν. Πόσας δρχ. ἔχει δ Πέτρος καὶ πόσας καὶ
οἱ δύο μαζί ; (Λύσις. Ὁ Πέτρος ἔχει α + 253 δρχ. καὶ οἱ δύο μαζὶ $\alpha + \alpha + 253$ ή $2\alpha + 253$).

220. Ὁ Ἀνδρέας ἔχει 345 δρχ. περισσοτέρας τοῦ Νίκου. Νὰ
εύρεθῇ : α) πόσας δρχ. ἔχει δ Ἀνδρέας καὶ β) πόσας δρχ. ἔχουν καὶ
οἱ δύο μαζί.

221. Ἡ Τροχαία ἐμέτρησε τὰ αὐτοκίνητα, τὰ δόποια ἐπέρασαν
ἀπὸ μίαν διασταύρωσιν, καὶ εὗρεν ὅτι τὸ Σάββατον ἐπέρασαν 185
αὐτοκίνητα περισσότερα ἀπὸ ὅσα ἐπέρασαν τὴν Παρασκευήν. Πόσα
αὐτοκίνητα ἐπέρασαν τὸ Σάββατον ;

222. Ὁ Κώστας ἐπλήρωσε διὰ τὴν ἀγορὰν διαφόρων σχολι-
κῶν εἰδῶν 12 δραχμάς. Ἐὰν πρὸ τῆς ἀγορᾶς αὐτῶν εἶχεν α δραχμάς,
πόσαι δρχ. τοῦ ἔμειναν ;

223. Εἰς τὴν βιβλιοθήκην τῆς τάξεως μας ὑπάρχουν β βιβλία.

Ἐὰν ὁπό αὐτὰ δοθοῦν πρὸς μελέτην 15 βιβλία, πόσα θὰ μείνουν εἰς τὴν βιβλιοθήκην;

224. Ἐὰν τὸ εἰσιτήριον ἐκδρομῆς ἑκάστου μαθητοῦ εἶναι ν δρχ., πόσον θὰ στοιχίσουν τὰ εἰσιτήρια τῶν 28 μαθητῶν τῆς τάξεως;

225. Ἡ ἀπόστασις Ἀθηνῶν - Πατρῶν εἶναι α χιλιόμετρα. Τὸ Κιάτον εύριτκεται εἰς τὸ μέσον τῆς ἀποστάσεως αὐτῆς. Πόσα χιλιόμετρα ἀπέχει τὸ Κιάτον ἀπὸ ἑκάστην τῶν πόλεων αὐτῶν;

226. Ἐνας ὑπάλληλος διαιρεῖ τὸν μισθόν του εἰς 5 ἵσα μέρη καὶ ἀποταμιεύει τὸ ἔνα μέρος ἀπ' αὐτά. Ἐὰν α είναι ὁ μισθός του, τὶ ποσὸν ἀποταμιεύει μηνιάιως;

227. Ἐὰν ἡ βενζίνη τιμᾶται β δρχ. τὸ λίτρον πόσον στοιχίζουν τὰ 9 λίτρα;

Χρῆσις ἐνδός γράμματος διὰ τὴν λύσιν ἀπλῶν ἀσκήσεων καὶ προβλημάτων.

Παράδειγμα 1. Ὁ Νίκος ἀρχικῶς ἔχει α δραχμάς, ἀλλ’ ὅταν λάβῃ ἀκόμη δ δραχμάς, θὰ ἔχῃ δύον καὶ δ Πέτρος, δ ὅποιος ἔχει 12 δρχ. Πόσας δραχμὰς είχεν ἀρχικῶς δ Νίκος;

Λύσις. Τὸ σύνολον τῶν δρχ, τοῦ Νίκου γίνεται α + 5. Τὸ ποσὸν τοῦτο ἰσοῦται μὲ τὸ 12, ἀφοῦ τόσαι είναι αἱ δρχ. τοῦ Πέτρου. Συνεπῶς ἔχομεν δύο ποσά, τὸ α + 5 καὶ τὸ 12, τὰ ὅποια είναι ἵσα μεταξὺ των. Τοῦτο τὸ γράφομεν ὡς ἔξης : α + 5 = 12, ποὺ τὸ διαβάζομεν : α σὺν 5 ἵσον μὲ 12, καὶ ἐκφράζει τὴν ἰσότητα μιᾶς ποσότητος πρὸς μίαν ἄλλην.

Διὰ νὰ εὔρωμεν δὲ πόσας δραχμὰς είχεν ἀρχικῶς δ Νίκος, πρέπει νὰ εὔρωμεν ἕιναν ὡρισμένον ἀριθμόν, δ ὅποιος μαζὶ μὲ τὸν 5 νὰ μᾶς κάμη τὸ 12.

"Αρα δ ζητούμενος ἀριθμὸς είναι δ 7 δηλ. α = 7, ποὺ σημαίνει εἰς τὴν περίπτωσίν μας ὅτι δ Νίκος ἀρχικῶς πρέπει νὰ εἶχε 7 δρχ.

"Αλλὰ πῶς δ ἀριθμὸς 7 προκύπτει ἀπὸ τὸν 12; Μόνον ὅταν ἀφαιρέσωμεν ἀπὸ τὸν 12 τὸν 5.

Συνεπῶς, ἔάν λάβωμεν τὴν ἰσότητά μας α + 5 = 12, θὰ ἔχωμεν : α = 12 - 5 = 7.

Παράδειγμα 2. Ὁ Ἀνδρέας ἔλαβεν ἀπὸ τὸν πατέρα τὸν 100 δρχ.,

ποσὸν ἀκριβῶς ἵσον μὲ τὸ διπλάσιον τοῦ ποσοῦ, τὸ ὅποιον ἔλαβεν ὁ Πέτρος ἀπὸ τὸν ἰδικόν του πατέρα. Πόσα χρήματα ἔλαβεν ὁ Πέτρος;

Λύσις. Ἐν μὲ τὸ γράμμα X παραστήσωμεν τὰ χρήματα τοῦ Πέτρου, τότε τὸ διπλάσιον τῶν χρημάτων του, δηλ. $2X$, θὰ ἴσουται μὲ τὰς 100 δρχ. τοῦ Ἀνδρέα. Τοῦτο τὸ γράφομεν ὡς ἔξῆς : $2X = 100$ καὶ $X = \frac{100}{2} = 50$. Δηλ. ἂν τὰ ἵσα αὐτὰ ποσὰ ($2X = 100$)

τὰ διαιρέσωμεν διὰ τοῦ 2, τότε τὰ νέα ποσὰ ($X = \frac{100}{2}$), ποὺ προκύπτουν, εἶναι μὲν διάφορα ἀπὸ τὰ πρῶτα, ἀλλὰ εἶναι ἵσα μεταξύ των. Διαιροῦντες λοιπὸν διὰ 2 θὰ ἔχωμεν : $\frac{2X}{2} = \frac{100}{2}$. Καὶ μετὰ τὴν ἀπλοποίησιν ἔχομεν $X = 50$.

Αὐτὸ σημαίνει ὅτι τὸ ἄγνωστον ποσὸν τῶν χρημάτων τοῦ Πέτρου εἶναι 50 δραχμαί.

Συμπέρασμα. Ἐπὸ τὴν ἔέτασιν τῶν δύο αὐτῶν παραδειγμάτων καὶ πολλῶν ἄλλων παρομοίων μὲ αὐτὰ συμπεραίνομεν τὰ ἔξῆς : "Οταν εἰς ἓνα πρόβλημα τῆς ἀριθμητικῆς δίδωνται δύο ἢ περισσότερα ποσά, τὰ ὅποια ἔχουν σχέσιν μεταξύ των, καὶ ζητεῖται ἓνα ἄγνωστον ποσόν, δυνάμεθα νὰ εὔρωμεν τοῦτο, ἂν τὸ παραστήσωμεν μὲ ἓνα γράμμα τοῦ ἀλφαριθμοῦ καὶ κάμωμεν τὰς καταλλήλους ἀριθμητικὰς πράξεις.

Τοῦτο δυνάμεθα νὰ πράξωμεν καὶ εἰς ἀσκήσεις μὲ ἓναν ἄγνωστον.

Προβλήματα

228. 'Ο Παῦλος, ποὺ εἶχεν α δραχμὰς, ἔλαβεν ἀπὸ τὸν θεῖον του ἄλλας 35 δραχμὰς καὶ ἔχει ὅσας καὶ ὁ Ἀνδρέας, ὁ ὅποιος ἔχει 68 δρχ. Πόσας δρχ. εἶχεν ὁ Παῦλος ;

229. 'Ο Κώστας εἶχε πενταπλασίους βόλους ἀπὸ τὸν Πέτρον. Καὶ οἱ δύο μαζὶ εἶχον 24 βόλους. Πόσους βόλους εἶχεν ἕκαστος ;

230. 'Η Ἐλένη εἶχε 35 δραχμάς. Διέθεσεν ἀπ' αὐτὰς ἓνα ποσὸν διὰ τὸ ἐργόχειρόν της καὶ τῆς ἐπερίσσευσαν 9 δραχμαί. Πόσας δρχ. ἔδωσεν διὰ τὸ ἐργόχειρόν της ;

231. 'Η Μαρία ἤγόρασε τρόφιμα καὶ ἐπλήρωσε 43 δρχ., ἐπέστρεψε δὲ εἰς τὴν μητέρα της ρέστα 57 δραχμάς. Πόσας δρχ. τῆς εἶχε δώσει ἡ μητέρα της ;

232. "Ενας μαθητής είχεν ώρισμένα χρήματα. Έάν είχε τριπλάσιον ποσόν αυτῶν καὶ ἔξωδευεν 7 δρχ., θὰ τοῦ ἔμεναν 7 δραχμαί. Πόσα χρήματα είχεν ;

233. Τίνος ἀριθμοῦ τὸ τρίτον ἴσοῦται μὲ τὸν ἀριθμὸν 21 ;

234. Τὰ $\frac{3}{4}$ ἐνὸς ἀριθμοῦ εἰναι 75. Ποῖος εἰναι ὁ ἀριθμὸς αὐτός ;

235. Μίαν ράβδον, μήκους 65 ἑκατοστῶν τοῦ μέτρου, τὴν χωρίζομεν εἰς τρία μέρη, ἐκ τῶν ὅποιων τὰ δύο εἰναι ἀκριβῶς ἵσα μεταξύ των, τὸ δὲ τρίτον ἔχει μῆκος 23 ἑκατοστὰ τοῦ μέτρου. Τί μῆκος ἔχει καθένα ἀπὸ τὰ ἵσα μέρη τῆς ράβδου ;

236. 'Ο 'Ανδρέας κατὰ τὴν ἔξετασίν του εἰς τὸ μάθημα τῆς Ἀριθμητικῆς ἀπήντησεν εἰς τὰ $\frac{2}{3}$ τῶν ὑποβληθεισῶν εἰς αὐτὸν ἔρωτήσεων. Δεδομένου ὅτι ἀπήντησεν ὀρθῶς εἰς 4 ἔρωτήσεις, πόσαι ἔρωτήσεις τοῦ ὑπεβλήθησαν ἐν ὅλῳ ;

AΣΚΗΣΕΙΣ

Ποίους ἀριθμοὺς παριστοῦν τὰ γράμματα εἰς τὰς κάτωθι ἀσκήσεις.

$$237. \beta - 4 = 11$$

$$250. 12\alpha - 8\alpha = 40$$

$$238. 5 = \gamma - 2$$

$$251. \frac{\alpha}{2} + \frac{\alpha}{3} = 10$$

$$239. 6 = \delta - 8$$

$$252. \frac{\alpha}{2} - \frac{\alpha}{3} = 10$$

$$240. \epsilon + 2 = 9$$

$$253. 3. \alpha = 15$$

$$241. 12 = \alpha + 5$$

$$254. 15. \alpha = 60$$

$$242. \epsilon + 1,6 = 6,4$$

$$255. 14 = 2. \delta$$

$$243. 2\alpha + 3\alpha = 20$$

$$256. 8 = 4. \epsilon$$

$$244. 6\beta - 2\beta = 36$$

$$257. \alpha : 3 = 6$$

$$245. 2\epsilon + 5 = 79$$

$$258. 12 = \epsilon : 5$$

$$246. 15 + \chi = 19$$

$$259. \frac{\chi}{4} = 4$$

$$247. 15\chi + 3\chi = 54$$

$$248. 35 - \chi = 9$$

$$249. 35\chi - 5\chi = 60$$

$$260. \frac{\beta}{3} = 5$$

$$261. \frac{3\gamma}{4} = 6$$

$$262. \frac{4}{5} = 3x$$

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΤΗΣ Ε' ΤΑΞΕΩΣ

Ἐρωτήσεις

1. Τί διδάσκει ἡ Γεωμετρία; Ποια γεωμετρικά σώματα γνωρίζετε καὶ ποιον εἰναι τὸ σχῆμα ἑκάστου τούτων;
2. Ποία εἰναι ἡ εἰκὼν τῆς εὐθείας γραμμῆς; Ἀναφέρατε παραδείγματα τεθλασμένων καὶ καμπύλων γραμμῶν.
3. Ποίας ιδιότητας ἔχει ἡ εὐθεῖα γραμμή;
4. Τί λέγεται ἡμίευθεῖα καὶ πῶς παριστάνομεν αὐτήν;
5. Ποία διαφορὰ ὑπάρχει μεταξύ εὐθείας καὶ εὐθυγράμμου τμήματος; Σημειώσατε καὶ ἀπαγγείλατε δύο εὐθύγραμμα τμήματα.
6. Τί καλεῖται γωνία καὶ πῶς διαβάζεται;
7. Πῶς βλέπομεν, ὅν δύο γωνίαι εἰναι ἵσαι;
8. Ποία εἶδη γωνιῶν ἔχομεν;
9. Ἐπὶ φύλλου χάρτου σχηματίσατε ἀνὰ μίαν γωνίαν ἀπὸ κάθε εἶδος αὐτῶν καὶ νὰ τὰς ἀπαγγείλετε.
10. Μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ κανόνος γράψατε εἰς τὸ τετράδιόν σας δύο παραλλήλους εὐθείας καὶ μίαν ἄλλην εὐθείαν, ἡ δόποια νὰ τέμνῃ αὐτάς: α) καθέτως καὶ β) πλαγίως. Σημειώσατε γράμματα εἰς τὰς γωνίας ποὺ σχηματίζονται καὶ μετρήσατε μὲ τὸ μοιρογνωμόνιον τὸ μέγεθος ἑκάστης γωνίας χωριστά.
11. Πόσων μοιρῶν εἰναι ἡ ὁρθὴ γωνία; Νὰ κατασκευάσετε ἀνὰ μίαν γωνίαν 60° , 45° , 135° καὶ νὰ δονομάσετε ἑκάστην.
12. Τί λέγεται ἐπίπεδον σχῆμα καὶ ποῖα ἐπίπεδα σχήματα γνωρίζετε;
13. Τί λέγεται τετράγωνον, τί ὁρθογώνιον παραλληλόγραμμον καὶ τί τραπέζιον;

14. Τί λέγεται πολύγωνον ; 'Από ποῦ λαμβάνει τὸ ὄνομά του ;
15. Τί λέγεται τρίγωνον ; Ποία εἴδη τριγώνου ἔχομεν α) βάσει τοῦ εἶδους τῶν γωνιῶν αὐτῶν καὶ β) βάσει τοῦ μεγέθους τῶν πλευρῶν των ;
16. Νὰ ἰχνογραφήσετε εἰς φύλλον χάρτου ἔνα ἴσοπλευρον τρίγωνον καὶ νὰ φέρετε τὸ ὑψος αὐτοῦ. Εἰς τὶ διαιρεῖται τοῦτο ;
17. Νὰ κατασκευάσετε εἰς τὸ πρόχειρόν σας ἔνα ὀρθογώνιον τραπέζιον καὶ νὰ φέρετε μίαν διαγώνιον αὐτοῦ. Τί εἶδους τρίγωνα θὰ προκύψουν ; Πῶς θὰ ἔξακριβώσετε τοῦτο ;
18. Τί λέγεται περίμετρος τοῦ τετραγώνου καὶ πῶς εύρισκεται αὕτη ;
19. Πῶς εύρισκομεν τὸ μῆκος τῆς πλευρᾶς τοῦ τετραγώνου, ὅταν γνωρίζωμεν τὴν περίμετρον αὐτοῦ ;
20. Πῶς εύρισκομεν τὸ ἐμβαδὸν τοῦ τετραγώνου ;
21. Τί κάμνομεν, διὰ νὰ εὔρωμεν τὴν περίμετρον τοῦ ὀρθογωνίου ;
22. Πῶς εύρισκομεν τὸ ἐμβαδὸν τοῦ ὀρθογωνίου ;
23. 'Εὰν γνωρίζωμεν τὸ ἐμβαδὸν ἐνὸς ὀρθογωνίου καὶ τὸ μῆκος τῆς βάσεως του, πῶς εύρισκομεν τὸ ὑψος αὐτοῦ ;
24. Πῶς εύρισκομεν τὸ μῆκος τῆς βάσεως ἐνὸς ὀρθογωνίου, ἐὰν γνωρίζωμεν τὸ ἐμβαδὸν αὐτοῦ καὶ τὸ ὑψος του ;
25. Τί λέγεται περίμετρος τριγώνου καὶ πῶς εύρισκεται αὕτη ;
26. Τί λέγεται ὑψος τοῦ τριγώνου ;
27. Πῶς εύρισκομεν τὸ ἐμβαδὸν τοῦ τριγώνου ;
28. 'Εὰν γνωρίζωμεν τὸ ἐμβαδὸν ἐνὸς τριγώνου καὶ τὴν βάσιν αὐτοῦ, πῶς εύρισκομεν τὸ ὑψος του ;
29. Πῶς εύρισκομεν τὸ μῆκος τῆς βάσεως ἐνὸς τριγώνου, ὅταν γνωρίζωμεν τὸ ἐμβαδὸν αὐτοῦ καὶ τὸ ὑψος του ;
30. Τί λέγεται τραπέζιον καὶ τί λέγεται ὑψος αὐτοῦ ;
31. Πότε τὸ τραπέζιον λέγεται ἴσοσκελὲς καὶ πότε λέγεται ὀρθογώνιον ;
32. Πῶς εύρισκομεν τὴν περίμετρον τοῦ τραπεζίου ;
33. Πῶς εύρισκομεν τὸ ἐμβαδὸν τοῦ τραπεζίου ;
34. Τί λέγεται ἀπόστημα ἐνὸς κανονικοῦ πολυγώνου ;
35. Πῶς εύρισκεται τὸ ἐμβαδὸν τοῦ κανονικοῦ πολυγώνου ;
36. Πότε ἔνα πολύγωνον λέγεται ἐγγεγραμμένον ;
37. Πῶς εύρισκομεν τὸ μῆκος τῆς περιφερείας τοῦ κύκλου ;

38. "Οταν γνωρίζωμεν τὸ μῆκος τῆς περιφερείας ἐνὸς κύκλου, πῶς εύρίσκομεν α) τὴν διάμετρον αὐτοῦ καὶ β) τὴν ἀκτῖνά του ;
39. Πῶς εύρίσκομεν τὸ ἐμβαδὸν τοῦ κύκλου ;
40. Πῶς εύρίσκομεν τὸ ἐμβαδὸν τοῦ κυκλικοῦ τομέως ;

Προβλήματα

1. 'Η αἴθουσα μιᾶς τάξεως είναι τετραγωνικὴ καὶ κάθε πλευρὰ της ἔχει μῆκος 8,50 μέτρα. Νὰ εύρεθῇ ἡ περίμετρός της.
2. 'Ο κῆπος ἐνὸς σχολείου είναι τετραγωνικὸς μὲν μῆκος πλευρᾶς 36,5 μ. Θέλουν νὰ τὸν περιφράξουν μὲ σύρμα, πού τὸ μέτρον κοστίζει 15 δραχμάς. Πόσα μέτρα σύρμα θὰ χρειασθοῦν καὶ πόσας δρχ. θὰ στοιχίσῃ τοῦτο ;
3. "Ενα τετραγωνικὸν οἰκόπεδον ἔχει περίμετρον 876 μέτρα. Πόσον είναι τὸ μῆκος τῆς πλευρᾶς του ;
4. 'Η αὐλὴ τοῦ σχολείου είναι τετραγωνικὴ καὶ ἡ κάθε πλευρὰ της ἔχει μῆκος 36,50 μ. Πόσον είναι τὸ ἐμβαδὸν τῆς αὐλῆς ;
5. "Ενα οἰκόπεδον, σχήματος ὁρθογωνίου, ἔχει μῆκος 145 μ. καὶ πλάτος 8 μ. Πόσον είναι τὸ ἐμβαδόν του ;
6. "Ενα ὁρθογώνιον κτήμα ἔχει διαστάσεις 80 μ. καὶ 160 μ. Τί ἐμβαδὸν ἔχει α) εἰς τ. μέτρα καὶ β) εἰς στρέμματα ;
7. 'Η κατασκευὴ πατώματος ἀπὸ τσιμέντον (μωσαϊκὸν) κοστίζει 110 δρχ. τὸ τ.μ. Πόσον θὰ στοιχίσῃ ἡ κατασκευὴ τοῦ πατώματος μιᾶς αἰθούσης μὲ διαστάσεις 7,5 μ. καὶ 12 μ. ;
8. Διὰ τὴν σπορὰν τοῦ σίτου ἀπαιτοῦνται κατὰ μέσον ὅρον 10 κιλὰ σπόρου κατὰ στρέμμα. Πόσα κιλὰ σπόρου ἀπαιτοῦνται διὰ τὴν σπορὰν κτήματος πλάτους 200 μέτρων καὶ μήκους 350 μέτρων ;
9. Αἱ πλευραὶ τριγωνικοῦ κήπου ἔχουν μῆκος 27,50 μ., 13,50 μ. καὶ 14 μ. Πόσον θὰ στοιχίσῃ ἡ περίφραξί του μὲ σύρμα πρὸς 23,50 δρχ. τὸ μέτρον ;
10. Εἰς ἓνα ἰσοσκελὲς τρίγωνον ἡ βάσις είναι 2,5 ἑκατοστόμετρα καὶ ἡ μία ἀπὸ τὰς πλαγίας πλευράς του είναι 2,95 ἑκατοστόμετρα. Πόση είναι ἡ περίμετρός του ;
11. "Ενας κῆπος είναι τριγωνικός. 'Η βάσις του είναι 58,50 μ. καὶ τὸ ύψος του 26,40 μ. Πόσον είναι τὸ ἐμβαδόν του ;

12. 'Ενδεικοπέδου, σχήματος όρθογωνίου τριγώνου, ή μία από τάς καθέτους πλευράς του είναι 28,25 μ. καὶ ἡ ἄλλη 17,4 μ. Πόσον είναι τὸ ἐμβαδόν του ;

13. 'Από ἕνα όρθογώνιον οἰκοπέδον μήκους 54 μ. καὶ πλάτους 36 μ. ἔπωλήθη τεμάχιον τριγωνικὸν βάσεως 48 μ. καὶ ὑψοῦ 30 μ. Νὰ εύρεθῇ : α) τὸ ἐμβαδὸν τοῦ τριγώνου καὶ β) τὸ ἐμβαδὸν τοῦ τμήματος τοῦ οἰκοπέδου, πού ἀπέμεινεν.

14. 'Η περίμετρος ἔνδεικοπέδου είναι 60 μ. καὶ τὸ ὑψος αὐτοῦ 10 μέτρα. Νὰ εύρεθοῦν : α) αἱ διαστάσεις τοῦ όρθογωνίου καὶ β) τὸ ἐμβαδὸν αὐτοῦ.

15. 'Ενδεικοπέδου, σχήματος ισοσκελοῦ τραπεζίου, αἱ παράλληλοι πλευραὶ ἔχουν μῆκος 35,50 καὶ 17,50 μ., καὶ ἡ μία από τὰς μὴ παραλλήλους πλευρὰς ἔχει μῆκος 12,50 μ. Πόσα μέτρα σύρμα τὰ χρειασθοῦν διὰ τὴν περίφραξίν του καὶ πόσον θὰ στοιχίσῃ τὸ σύρμα . ἂν τὸ μέτρον του κοστίζῃ 16,50 δρχ. ;

16. 'Η στέγη μιᾶς ἀποθήκης ἔχει σχῆμα τραπεζίου μὲ μῆκος μεγάλης βάσεως 16,80 μ. καὶ μικρᾶς βάσεως 7,20 μ. τὸ δὲ ὑψος τοῦ τραπεζίου είναι 4,50 μέτρα. Θέλομεν νὰ σκεπάσωμεν τὴν στέγην αὐτὴν μὲ τσίγκον, τοῦ ὅποιου τὸ τ.μ. ἔχει 25 δρχ. Πόσον θὰ κοστίσῃ ὁ τσίγκος ;

17. 'Η μερίμετρος ἔνδεικοπέδου ισοῦται μὲ τὴν περίμετρον ἔνδεικοπλεύρου τριγώνου, τοῦ ὅποιου ἡ πλευρὰ ἔχει μῆκος 12 μ. Πόσον είναι τὸ μῆκος τῆς πλευρᾶς τοῦ ρόμβου ;

18. "Ενα ἀμπαζούρι ἀποτελεῖται ἀπό 6 ισοσκελῆ τραπέζια, τῶν δύοιων αἱ παράλληλοι πλευραὶ ἔχουν μῆκος 25 ἑκ. καὶ 35 ἑκατοστὰ τοῦ μ. καὶ ἡ μεταξύ των ἀπόστασις είναι 15 ἑκατοστὰ τοῦ μ. Νὰ εύρεθῇ ἡ συνολικὴ ἐπιφάνεια τοῦ ἀμπαζούρι.

19. Γράψατε ἔνα όρθογώνιον τραπέζιον μὲ μῆκος μεγάλης βάσεως 5,5 ἑκ., μικρᾶς βάσεως 4,5 ἑκ. καὶ μὲ ὑψος 3 ἑκ. τοῦ μέτρου. Μετρήσατε τὴν μὴ παράλληλον πλευράν του καὶ ὑπολογίσατε α) τὴν περίμετρόν του καὶ β) τὸ ἐμβαδόν του.

20. 'Η ἀκτὶς τοῦ τροχοῦ ἔνδεικοπέδου είναι 0,35 μ. Πόσον είναι τὸ μῆκος τῆς περιφερείας τοῦ τροχοῦ ; Καὶ πόσα μέτρα θὰ διανύσῃ τὸ ποδήλατον, ἂν οἱ τροχοί του κάμουν 365 στροφάς ;

21. Ότι τροχός ένδος πιο δηλάτου έχει διάμετρον ένδος μέτρου και κάμνει 120 στροφάς είς τὸ πρῶτον λεπτὸν τῆς ὥρας (π). Πόσα χιλιόμετρα θὰ δανύσῃ τὸ πιο δηλάτον εἰς μίαν ὥραν καὶ 20 π ;

22. Οἱ τροχοὶ ένδος αὐτοκινήτου κάμνουν χιλίας στροφάς, ὅταν τὸ αὐτοκίνητον διατρέξῃ 2512 μέτρα. Πόση είναι ἡ ἀκτὶς ἑκάστου τροχοῦ ;

23. Ἡ διάμετρος κυκλικοῦ κήπου είναι 5 μέτρα. Πόσον είναι τὸ μῆκος τόξου 60° ;

24. Ἡ ἀκτὶς κυκλικοῦ ἀλωνιοῦ είναι 7,5 μ. Νὰ εύρεθῇ πόσα μέτρα είναι τὸ μῆκος τόξου 30° .

25. Εἰς τὸ γραφεῖον τοῦ σχολείου μας ὑπάρχει ἔνας κυκλικὸς καθρέπτης ἀκτίνος 28 ἑκατοστῶν τοῦ μ. Νὰ εὕρετε α) τὸ μῆκος τῆς περιφερείας του καὶ β) πόσον θὰ κοστίσῃ ἡ ἐπαργύρωσίς του πρὸς 40 λεπτὰ τῆς δραχμῆς τὸ τετραγ. ἑκατοστόν ;

26. Ἡ πλακόστρωσις μιᾶς κυκλικῆς αὐλῆς, ποὺ ἔχει μῆκος περιφερείας 50,24 μ., ἑκόστισε 5024 δρχ. Πόσον ἑκόστισε τὸ τ. μέτρον ;

ΥΛΗ ΣΤ' ΤΑΞΕΩΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Ἐπιφάνεια

Γνωρίζομεν ὅτι ἐπιφάνεια ἐνὸς σώματος εἶναι τὸ σύνολον τῶν ἄκρων, εἰς τὰ ὁποῖα περατοῦται (τελειώνει) τὸ σῶμα.

Ἡ ἐπιφάνεια ἔχει δύο διαστάσεις, τὸ μῆκος καὶ τὸ πλάτος.

Εἴδη ἐπιφάνειῶν

α) Ἄσ εξετάσωμεν τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ μαυροπίνακος τῆς τάξεως μας, ἐπὶ τῆς ὁποίας γράφομεν. Λαμβάνομεν μίαν τεντωμένην κλωστήν, ἡ ὁποία δίδει τὴν εἰκόνα τῆς εὐθείας γραμμῆς, καὶ τὴν τοποθετοῦμεν ἐπάνω εἰς τὴν ἐπιφάνειαν αὐτῆν. Παρατηροῦμεν ὅτι ἡ τεντωμένη κλωστή (ἡ εὐθεία γραμμή) ἐφαρμόζει τελείως ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας τοῦ πίνακος, διπωσδήποτε καὶ ἀν τοποθετηθῆ, καὶ πρὸς ὅλας τὰς διευθύνσεις. Τὸ ᾴδιον θὰ παρατηρήσωμεν, ἀν ἐπὶ τῆς ἐπιφάνειας αὐτῆς τοποθετήσωμεν τὸν χάρακά μας.

Ἡ ἐπιφάνεια αὐτῇ λέγεται ἐπίπεδος ἐπιφάνεια ἢ ἀπλῶς ἐπίπεδον.

Ἐπομένως : Ἐπίπεδος ἐπιφάνεια λέγεται ἡ ἐπιφάνεια, εἰς τὴν ὁποίαν ἐφαρμόζει τελείως καὶ πρὸς ὅλας τὰς διευθύνσεις ἡ εὐθεία γραμμή.

Ἐπίπεδοι ἐπιφάνειαι εἶναι ἡ ἐπιφάνεια τοῦ πατώματος τοῦ δμαλοῦ τοίχου, τοῦ φύλλου χάρτου ἐπὶ τῆς ὁποίας γράφομεν κ.τ.λ.

β) Ἐὰν τὴν τεντωμένην κλωστήν ἢ τὸν χάρακά μας τοποθετήσωμεν εἰς τὴν ὑδρόγειον σφαῖραν τοῦ σχολείου μας, θὰ ᾴδωμεν ὅτι δὲν ἐφαρμόζει τελείως παρὰ μόνον ἐλάχιστα καὶ εἰς ἓνα μόνον στημεῖόν της. Τοῦτο συμβαίνει, διότι ἡ ἐπιφάνεια αὐτῇ δὲν ἔχει κανένα ἐπίπεδον μέρος. Ἡ ἐπιφάνεια αὐτῇ λέγεται καμπύλη ἐπιφάνεια.

Άρα : Κα μ π ύ λη ἐ πι φά νει α λέγεται ή ἐπιφάνεια, ή δοιά δὲν ἔχει κανένα ἐπίπεδον μέρος.

Καμπύλαι ἐπιφάνειαι είναι ή ἐπιφάνεια τοῦ αύγοῦ, τοῦ πορτοκαλιοῦ, τοῦ τοπιοῦ κ.ἄ.

Σημείωσις : 'Η καμπύλη ἐπιφάνεια διακρίνεται εἰς κυρτὴν καὶ κοῖλην. Κυρτὸν είναι τὸ ἔξωτερικὸν μέρος τῆς καὶ κοῖλον τὸ ἕσωτερικόν.

γ) "Αν παρατηρήσωμεν ἔνα κουτὶ κιμωλίας, θὰ ᾔδωμεν ὅτι η ἐπιφάνεια του ἀποτελεῖται ἀπὸ ἐπίπεδα μέρη, πλὴν ὅμως τὰ μέρη αὐτὰ ὅλα μαζὶ δὲν ἀποτελοῦν ἔνα ἐπίπεδον. 'Η ἐπιφάνεια αὐτὴ δύο-μάζεται τεθλασμένη ἐπιφάνεια.

Όστε : Τεθλασμένη ἐπιφάνεια είναι ή ἐπιφάνεια τοῦ κουτιοῦ τῶν σπίρτων, τῆς πλακὸς σάπωνος κ.ἄ.

δ) 'Η ἐπιφάνεια τῆς γλάστρας, τοῦ ποτηριοῦ, τοῦ κουτιοῦ γάλακτος κ.ἄ. ἀποτελεῖται ἀπὸ καμπύλην ἐπιφάνειαν καὶ ἀπὸ ἐπίπεδον. Δι' αὐτὸν η ἐπιφάνεια αὐτὴ λέγεται μικτὴ ἐπιφάνεια.

Όστε : Μικτὴ ἐπιφάνεια λέγεται η ἐπιφάνεια, η δοιά ἀποτελεῖται ἀπὸ καμπύλα καὶ ἀπὸ ἐπίπεδα μέρη.

2. Στερεὰ σχήματα — Γεωμετρικὰ στερεά

Γνωρίζομεν ὅτι εἰς τὸ τετράγωνον, τὸ δρθυγώνιον, τὸν κύκλον κλπ. ὅλα τὰ σημεῖά των εύρισκονται εἰς τὸ αὐτὸν ἐπίπεδον. Δι' αὐτὸν ονομάσαμεν τὰ σχήματα αὐτὰ ἐπίπεδα σχήματα.

Τὰ σημεῖα ὅμως τοῦ κύβου, τῆς καστίνας μας, τοῦ κουτιοῦ τῆς

κιμωλίας κ.ά. δέν εύρισκονται ὅλα μαζὶ εἰς τὸ αὐτὸ ἐπίπεδον. Δι' αὐτὸ τὸ σχῆμα τῶν σωμάτων αὐτῶν λέγεται στερεὸν σχῆμα.

‘Ο κύβος, τὸ ὄρθογώνιον παραλληλεπίπεδον, ἡ πυραμὶς κ.τ.λ., ποὺ ἀπλῶς ἔγνωρίσαμεν εἰς τὴν Ε' τάξιν, ἔχουν στερεὸν σχῆμα καὶ λέγονται στερεὰ σώματα.

“Οσα στερεὰ σχήματα εἰναι κανονικά, ἔξετάζονται ἀπὸ τὴν Γεωμετρίαν καὶ δι' αὐτὸ λέγονται Γεωμετρικὰ στερεὰ.

Τὰ ἀπλούστερα Γεωμετρικὰ στερεὰ θὰ ἔξετάσωμεν ἐδῶ ἀρχίζοντες ἀπὸ τὸν γνωστόν μας κύβον.

Ἐρωτήσεις

- α. Τί λέγεται ἐπιφάνεια ἐνὸς σώματος ;
- β. Ποῖα εἴδη ἐπιφανείας ἔχομεν ; Δώσατε τὸν ὄρισμὸν κάθε εἴδους χωριστά.
- γ. Ὄντες σώματα, τὰ ὅποια ἔχουν ἐπιφάνειαν ἐπίπεδον, καμπύλην, τεθλασμένην καὶ μικτήν.
- δ. Τὸ στρογγυλὸν μολύβι σας τὶ ἐπιφάνειαν ἔχει ;
- ε. ‘Ο ἔνας τοῖχος τῆς αἰθούσης τῆς τάξεώς σας τί ἐπιφάνειαν ἔχει ; Καὶ τὶ ἐπιφάνειαν ἀποτελοῦν ὅλοι οἱ τοῖχοι μαζὶ ;
- στ. Τί διαφέρει τὸ ἐπίπεδον σχῆμα ἀπὸ τὸ στερεὸν σχῆμα ;

ΚΥΒΟΣ

1. Γεωμετρικὰ στοιχεῖα τοῦ Κύβου.

Τὸ στερεὸν σῶμα, τὸ ὅποιον παριστάνει τὸ σχῆμα 1, λέγεται κύβος.

Εὐκόλως διακρίνομεν ὅτι ὁ κύβος περικλείεται ἀπὸ 6 ἑπτιπέδους ἐπιφανείας, αἱ ὅποιαι λέγονται ἔδραι τοῦ κύβου. Αἱ 6 ἔδραι τοῦ κύβου ὅλαι μαζὶ ἀποτελοῦν τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ. Αἱ γύρω γύρω 4 ἔδραι, αἱ ὅποιαι λέγονται καὶ παράπλευροι ἔδραι, ἀποτελοῦν τὴν παράπλευρον ἐπιφάνειαν τοῦ κύβου. Ἡ ἔδρα, μὲ τὴν ὅποιαν στηρίζεται εἰς τὸ τραπέζι Κ.Τ.Λ. ὁ κύβος, λέγεται βάσις τοῦ κύβου


Αἱ παράπλευροι ἔδραι τοῦ κύβου εἰναι κάθετοι ἐπὶ τὰς βάσεις αὐτοῦ.

Τὰ εὐθύγραμμα τμήματα ΑΒ, ΑΔ, ΑΘ, κ.τ.λ. (σχῆμ.1), τὰ ὅποια σχηματίζονται ἀπὸ τὴν τομὴν δύο γειτονικῶν ἔδρῶν τοῦ κύβου λέγονται ἀκμαὶ αὐτοῦ. Ὁ κύβος ἔχει 12 ἀκμάς.

Ἐάν μὲ τὸ ὑποδεκάμετρον μετρήσωμεν τὰς ἀκμὰς τοῦ κύβου, βλέπομεν ὅτι αἱ ἀκμαὶ τοῦ κύβου εἰναι ἵσαι μεταξύ των.

Ἄλλὰ καὶ αἱ ἔδραι τοῦ κύβου εἰναι ἵσαι μεταξύ των. Τοῦτο τὸ διαπιστώνομεν, ὅν μὲ φύλλον τοῦ τετραδίου μας καλύψωμεν μίαν οἰανδήποτε ἔδραν τοῦ κύβου καὶ κόψωμεν κατόπιν τὸ χαρτί αὐτὸ ἵσον μὲ τὴν ἔδραν αὐτήν. Ἀν μὲ τὸ χαρτί αὐτὸ δοκιμάσωμεν ὅλας τὰς ἔδρας τοῦ κύβου, θὰ ἴδωμεν ὅτι αὐτὸ καλύπτει ἀκριβῶς κάθε ἔδραν τοῦ κύβου.

Κάθε δὲ ἔδρα τοῦ κύβου ἔχει πλευρὰς ἵσας μεταξύ των, ἐπειδὴ



Σχ.1. Κύβος

αῦται εἶναι ἀκμαὶ τοῦ κύβου. Συνεπῶς κάθε ἔδρα τοῦ κύβου εἶναι καὶ ἕνα τετράγωνον.


Αἱ ἀκμαὶ τοῦ κύβου, ὅταν τέμνωνται ἀνὰ δύο, σχηματίζουν μεταξύ των γωνίας. Μὲ τὸν γνώμονα ἔξακριβώνομεν ὅτι αἱ γωνίαι αὗται εἶναι ὁρθαὶ καὶ ὡς ὁρθαὶ εἶναι ἵσαι μεταξύ των.

*Ἐπομένως : Αἱ ἀκμαὶ τοῦ κύβου, αἱ ὁρθαὶ τέμνονται, εἶναι κάθετοι μεταξύ των.

Κορυφαὶ τοῦ κύβου εἶναι αἱ κορυφαὶ τῶν γωνιῶν του. Ὁ κύβος ἔχει 8 κορυφάς.

*Ἀπὸ κάθε κορυφὴν τοῦ κύβου ἀρχίζουν τρεῖς ἀκμαί· π.χ. ἀπὸ τὴν κορυφὴν Α (σχ. 1) ξεκινοῦν αἱ ἀκμαὶ AB, AD, AΘ.

Τὰ μήκη τῶν ἀκμῶν αὗτῶν λέγονται διαστάσεις τοῦ κύβου. Ἡ μία λέγεται **μῆκος**, ἡ ἄλλη **πλάτος** ἢ **πάχος** καὶ ἡ τρίτη **ὕψος** ἢ **βάθος**. Αἱ διαστάσεις τοῦ κύβου, καθὼς καὶ κάθε στερεοῦ σώματος, εἶναι τρεῖς : μῆκος, πλάτος, ὕψος.



Αἱ ἀπέναντι ἔδραι τοῦ κύβου
εἶναι παράλληλοι

αῦται δὲν συναντῶνται, ὅσον καὶ ἂν τὰς προεκτείνωμεν. *Ἐπομένως : αἱ ἀπέναντι ἔδραι τοῦ κύβου εἶναι παράλληλοι.

*Ἐκ τῶν ἀνωτέρω συνάγομεν τὸν ἔχῆς ὁρισμὸν τοῦ κύβου :

Αἱ διαστάσεις τοῦ κύβου εἶναι ἵσαι μεταξύ των.

*Ἄσ εξετάσωμεν τὰς ἀπέναντι ἔδρας τοῦ κύβου, π.χ. τὴν ἀνω καὶ τὴν κάτω ἔδραν (σχ. 2).

Παρατηροῦμεν ὅτι

Κύβος εἶναι τὸ στερεόν σῶμα (στερεόν σχῆμα), τὸ ὃποῖον ἔχει δλας τὰς ἔδρας του ἵσας καὶ τὰς ἀπέναντι παραλλήλους, δλας τὰς γωνίας ὁρθὰς καὶ δλας τὰς ἀκμάς ἵσας.

‘Ο κύβος έχει 6 έδρας, 12 άκμάς, 8 κυρυφάς και 24 δρθάς γωνίας.

2. Πολύεδρον — Δίεδρος γωνία

‘Ο κύβος, καθώς και κάθε στερεόν σώμα πού περικλείεται από όλα τὰ μέρη μὲ έδρας, λέγεται πολύεδρον σώμα. Κάθε πολυέδρου, έπομένως και τοῦ κύβου, δύο γειτονικαὶ έδραι τεμνόμεναι σχηματίζουν μίαν γωνίαν, ἡ δποία ἀποτελεῖται από δύο έδρας. ‘Η γωνία αὐτὴ λέγεται δίεδρος (σχ. 3).

“Ενα μισοανοιγμένον βιβλίον, ἓνα φύλλον χάρτου τσακισμένον εἰς δύο μέρη μᾶς δίδουν τὴν εἰκόνα τῆς διέδρου γωνίας.



Σχ. 3. Δίεδρος γωνία

Διὰ νὰ σχεδιάσωμεν εἰς τὸ χαρτὶ ἡ εἰς τὸν πίνακα ἔνα κύβον και γενικῶς ἔνα στερεόν σώμα, τοῦ ὅποιου δὲν βλέπομεν όλα τὰ γεωμετρικὰ στοιχεῖα του (πλευράς, ἀκμὰς κ.τ.λ.), σχεδιάζομεν μὲ συνεχεῖς γραμμὰς ὅσα στοιχεῖα βλέπομεν, ἐνῷ ὅσα στοιχεῖα δὲν βλέπομεν τὰ σχεδιάζομεν μὲ διακεκομμένας γραμμάς. Εἰς τὸ σχῆμα 1 αἱ διακεκομμέναι γραμμαὶ ΕΔ, ΕΘ, EZ παριστάνουν ἀκμὰς κύβου, τὰς δποίας δὲν βλέπομεν.

Ἐρωτήσεις

- Τί λέγεται κύβος ; ‘Αναφέρατε σώματα μὲ σχῆμα κύβου.
- Ποῖα είναι τὰ γεωμετρικὰ στοιχεῖα τοῦ κύβου ;
- Τί ιδιότητα ἔχουν αἱ έδραι τοῦ κύβου, αἱ ἀκμαὶ αὐτοῦ, αἱ ἀπέναντι έδραι του ;
- Τί λέγεται πολύεδρον και τι λέγεται δίεδρος γωνία ;
- Δείξατε ἐντὸς τῆς αιθούσης τῆς τάξεώς σας διέδρους γωνίας.

3. Ἐμβαδὸν ἐπιφανείας κύβου

a) Ἐμβαδὸν ὀλικῆς ἐπιφανείας κύβου.

Γνωρίζομεν ὅτι ἡ ὀλικὴ ἐπιφάνεια τοῦ κύβου ἀποτελεῖται από

τὰς 6 ἵσας ἔδρας του, κάθε μία τῶν ὁποίων εἶναι καὶ ἕνα τετράγωνον.
Ἐπομένως :

Διὰ νὰ εῦρωμεν τὸ ἐμβαδὸν τῆς ὀλικῆς ἐπιφανείας τοῦ κύρου, πολλαπλασιάζομεν τὸ ἐμβαδὸν τῆς μιᾶς ἔδρας του ἐπὶ 6.

Παράδειγμα. Νὰ εὑρεθῇ τὸ ἐμβαδὸν τῆς ὀλικῆς ἐπιφανείας κύρου, τοῦ ὅποιου ἡ ἀκμὴ ἔχει μῆκος 25 ἑκατ. τοῦ μέτρου.

Λύσις. α) Ἐμβαδὸν μιᾶς ἔδρας κύρου : $25 \text{ ἑκ.} \times 25 \text{ ἑκ.} = 625 \text{ τ.ἑκ.}$
β) Ἐμβαδὸν ὀλικῆς ἐπιφ. κύρου : $625 \text{ τ.ἑκ.} \times 6 = 3750 \text{ τ.ἑκ.}$

6) Ἐμβαδὸν παραπλεύρου ἐπιφανείας κύρου.

Γνωρίζομεν ἐπίσης ὅτι αἱ 4 παραπλευροὶ ἔδραι τοῦ κύρου ἀποτελοῦν τὴν παραπλευρὸν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ. Συνεπῶς:

Διὰ νὰ εῦρωμεν τὸ ἐμβαδὸν τῆς παραπλεύρου ἐπιφανείας τοῦ κύρου, πολλαπλασιάζομεν τὸ ἐμβαδὸν τῆς μιᾶς ἔδρας του ἐπὶ 4.

Παράδειγμα. Ἡ ἀκμὴ ἐνὸς κύρου εἶναι 12 ἑκ. μ. Πόσον εἶναι τὸ ἐμβαδὸν τῆς παραπλεύρου ἐπιφανείας του;

Λύσις. α) Ἐμβ. μιᾶς ἔδρας κύρου : $12 \text{ ἑκ.} \times 12 \text{ ἑκ.} = 144 \text{ τ.ἑκ.}$
β) Ἐμβ. παραπλ. ἐπιφ. κύρου: $144 \text{ τ.ἑκ.} \times 4 = 576 \text{ τ.ἑκ.}$

Προβλήματα

27. Ἡ ἀκμὴ ἐνὸς κυβικοῦ δοχείου εἶναι 45 ἑκ. Νὰ εύρεθῃ : α) τὸ ἐμβαδὸν τῆς ὀλικῆς ἐπιφανείας τοῦ δοχείου καὶ β) τὸ ἐμβαδὸν τῆς παραπλεύρου ἐπιφανείας του.

28. Τὸ ἐμβαδὸν τῆς ὀλικῆς ἐπιφανείας ἐνὸς κύρου εἶναι 124,8 τετρ. παλάμαι. Πόσον εἶναι τὸ ἐμβαδὸν μιᾶς ἔδρας του εἰς τετρ. ἑκατοστόμετρα ;

29. Πόσα τετρ. μέτρα τσίγκου θὰ χρειασθῶμεν, διὰ νὰ κατασκευάσωμεν ἕνα δοχεῖον σχήματος κύρου μὲ ἀκμὴν 18,5 ἑκατ. ;

30. Θέλομεν νὰ χρωματίσωμεν τοὺς 4 τοίχους τῆς αιθούσης τῆς τάξεως μας σχήματος κύβου καὶ ἀκμῆς 4,25 μ. καθὼς καὶ τὴν δροφὴν τῆς. Ἀν ὁ χρωματισμὸς τιμᾶται 16,30 δρχ. τὸ τ.μ., πόσον θὰ κοστίσῃ ὁ χρωματισμὸς τῆς; (Τὰ κουφώματα δὲν ἀφαιροῦνται).

31. Διὰ τὸν χρωματισμὸν τῆς παραπλεύρου ἐπιφανείας κύβου ἀκμῆς 3 μέτρων ἐπληρώσαμεν 540 δρχ. Πόσον ἐστοίχισεν ὁ χρωματισμὸς κατὰ τετρ. μέτρον;

32. Τὸ συνολικὸν μῆκος τῶν ἀκμῶν μιᾶς ἀποθήκης σχήματος κύβου εἴναι 72 μέτρα. Πόσον είναι τὸ ἐμβαδὸν τῆς ὀλικῆς ἐπιφανείας τῆς καὶ πόσον τῆς παραπλεύρου;

4. Μέτρησις τοῦ ὅγκου ἐνὸς σώματος.


Μονάδες ὅγκου

Κάθε σῶμα μέσα εἰς τὴν αἱθουσάν μας (θρανία, τραπέζι, καρέκλα, χάρται, βιβλία κλπ.) καταλαμβάνει ἔνα χῶρον (ἔνα μέρος). Ἄλλὰ καὶ κάθε σῶμα, ποὺ μᾶς περιβάλλει εἰς τὸ ἄπειρον διάστημα, καταλαμβάνει ἔνα χῶρον. Τὸν χῶρον αὐτὸν τὸν ὀνομάζομεν ὅγκον τοῦ σώματος.

Οὐκος ὅμως ἐνὸς σώματος δὲν λέγεται μόνον ὁ χῶρος, τὸν ὅποιον καταλαμβάνει τὸ σῶμα εἰς τὸ διάστημα, ἀλλὰ καὶ ὁ συγκεκριμένος ἀριθμὸς ὁ ὅποιος προκύπτει ἀπὸ τὴν σύγκρισιν τοῦ ὅγκου τοῦ σώματος πρὸς ἔναν ἄλλον

ὅγκον σταθερὸν καὶ ὀρισμένον, τὸν ὅποιον ὀνομάζομεν μονάδα.

Ως ἀρχικὴν μονάδα μετρήσεως τοῦ ὅγκου ἡ τῆς χωρητικότητος ἐνὸς σώματος χρησιμοποιοῦμεν τὸ κυβικὸν μέτρον. Τοῦτο είναι ἔνας κύβος, τοῦ ὅποιου ἡ ἀκμὴ είναι ἵση μὲν ἔνα μέτρον (σχ. 4).



Σχ. 4 Κυβικὸν μέτρον

‘Υποδιαιρέσεις τοῦ κυβικοῦ μέτρου

Διὰ νὰ εὔρωμεν τὰς ύποδιαιρέσεις τοῦ κυβικοῦ μέτρου (κ.μ.) σκεπτόμεθα ὡς ἔξῆς :

‘Η βάσις τοῦ κ. μέτρου, ἡ δποία εἶναι, ὅπως γνωρίζομεν, ἔνα τετραγωνικὸν μέτρον, διαιρεῖται εἰς 100 τετραγωνικὰς παλάμας. ’Εὰν ἐπάνω εἰς ἑκάστην τετραγωνικήν παλάμην τῆς βάσεως θέσωμεν ἀπὸ μίαν κυβικὴν παλάμην, βλέπουμεν ὅτι σχηματίζεται ἔνα στρῶμα ἀπὸ 100 κυβικὰς παλάμας. Καὶ ἐπειδὴ τὸ ὑψος τοῦ κ. μέτρου εἶναι 10 παλάμαι (1 μέτρον), διὰ νὰ γεμίσῃ τὸ κ.μ. θὰ χρειασθοῦν 10 δμοια στρώματα, δηλ. 10 φορᾶς ἀπὸ 100 κυβικαὶ παλάμαι = 1000 κυβικαὶ παλάμαι.

‘Αρα τὸ κυβικὸν μέτρον ύποδιαιρεῖται εἰς 1000 κυβ. παλάμας. ’Ομοιώς σκεπτόμενοι εύρίσκομεν ὅτι κάθε κυβικὴ παλάμη ύποδιαιρεῖται εἰς 1000 κυβικὰ ἑκατοστόμετρα ἢ κυβικούς δάκτυλους καὶ κάθε κυβικὸν ἑκατοστόμετρον εἰς 1000 κυβικὰ χιλιοστόμετρα ἢ κυβικὰς γραμμάς. ’Ετσι ἔχομεν :

$$\begin{aligned} 1 \text{ κυβικὸν μέτρον} &= 1000 \text{ κυβ. παλάμαι}. \\ 1 \text{ κυβικὴ παλάμη} &= 1000 \text{ κυβ. δάκτυλοι}. \\ 1 \text{ κυβ. δάκτυλος} &= 1000 \text{ κυβ. γραμμαῖ}. \end{aligned}$$

$$\text{”Ωστε : } 1 \text{ κ.μ.} = 1000 \text{ κ.π.} = 1.000.000 \text{ κ.δ.} = 1.000.000.000 \text{ κ. γρ.}$$

καὶ

$$\begin{aligned} 1 \text{ κυβ. παλάμη} &= 0,001 \text{ κυβ. μέτρον} \\ 1 \text{ κυβ. δάκτυλος} &= 0,000.001 \text{ κυβ. μέτρον}. \\ 1 \text{ κυβ. γραμμὴ} &= 0,000.000.001 \text{ κυβ. μέτρον}. \end{aligned}$$

’Εδῶ παρατηροῦμεν ὅτι : κάθε μονάς τοῦ ὅγκου εἶναι 1000 φορᾶς μεγαλυτέρα ἀπὸ τὴν ἀμέσως κατωτέραν αὐτῆς μονάδα· ἢ ἀντιστρόφως: εἶναι 1000 φορᾶς μικροτέρα ἀπὸ τὴν ἀμέσως ἀνωτέραν αὐτῆς μονάδα.

5. Πῶς γράφομεν καὶ πῶς διαβάζομεν τοὺς ὅγκους

Τοὺς ὅγκους τοὺς γράφομεν μὲν δεκαδικὸν ἀριθμόν, τὸν ὅποιον διαβάζομεν ὡς ἔξῆς : Διαβάζομεν πρῶτον τὸ ἀκέραιον μέρος τοῦ δεκαδικοῦ ἀριθμοῦ, τὸ ὅποιον φανερώνει κυβικὰ μέτρα. Κατόπιν χωρίζομεν τὸ δεκαδικὸν μέρος αὐτοῦ εἰς τριψήφια τμῆματα ἀπὸ τὰ ἀριστερὰ πρὸς τὰ δεξιά.

Τὸ πρῶτον μετὰ τὴν ὑποδιαστολὴν τριψήφιον τμῆμα παριστᾶ κυβικὰς παλάμας, τὸ δεύτερον κυβικούς δακτύλους καὶ τὸ τρίτον κυβικὰς γραμμάς. Ἐάν ἀπὸ τὸ τελευταῖον τμῆμα τοῦ δεκαδικοῦ μέρους λείπουν ἔνα ἢ δύο ψηφία, γράφομεν εἰς τὰς κενὰς θέσεις ἔνα ἢ δύο μηδενικὰ ἀναλόγως πρὸς συμπλήρωσιν τοῦ τριψηφίου τμήματος.

"Ετσι οἱ παρακάτω ἀριθμοί, ποὺ παριστάνουν ὅγκους, διαβάζονται ὡς ἔξῆς :

α) 5,187235312 κ. μέτρ. διαβάζεται : 5 κ.μ. 187 κ.π. 235 κ.δ. 312 κ.γρ.

β) 0,165811 κ. μέτρ. διαβάζεται : 165 κ.π. 811 κ.δ.

γ) 8,24632171 κ. μέτρ. διαβάζεται : 8 κ.μ. 246 κ.π 321 κ.δ. 710 κ.γρ.

δ) 15,0279136 κ. μέτρ. διαβάζεται : 15 κ.μ. 27 κ.π. 913 κ.δ. 600 κ.γρ.

Καὶ ἀντιστρόφως. "Ενας ὅγκος, ὁ ὅποιος ἐκφράζεται εἰς κ. μέτρα, κυβ. παλάμας, κυβ. δακτύλους καὶ κυβικὰς γραμμάς, δύναται νὰ γραφῇ μὲν δεκαδικὸν ἀριθμὸν" π.χ.

α) 12 κ.μ. 413 κ.π. 625 κ.δ. γράφεται : 12,413625 κ.μ.

β) 136 κ.π. 457 κ.δ. 842 κ.γρ. » : 0,136457842 κ.μ.

γ) 87 κ.δ. 8 κ.γρ. » : 0,000087008 κ.μ.

6. Πῶς τρέπομεν μονάδας ὅγκου κατωτέρας τάξεως εἰς μονάδας τῆς ἀμέσως ἀνωτέρας τάξεως καὶ ἀντιστρόφως.

Αφοῦ κάθε μονὰς ὅγκου εἰναι 1000 φορὰς μεγαλυτέρα ἀπὸ τὴν ἀμέσως κατωτέραν αὐτῆς μονάδα ἢ 1000 φορὰς μικροτέρα ἀπὸ τὴν ἀμέσως ἀνωτέραν αὐτῆς μονάδα, εύκολως ἐννοοῦμεν ὅτι :

Διὰ νὰ τρέψωμεν μονάδας δύκου μιᾶς τάξεως εἰς μονάδας τῆς ἀμέσως κατωτέρας τάξεως, πολλαπλασιάζομεν τὰς μονάδας τῆς ὁρισμένης τάξεως ἐπὶ 1000.

Καὶ διὰ νὰ τρέψωμεν μονάδας δύκου μιᾶς τάξεως εἰς μονάδας τῆς ἀμέσως ἀνωτέρας τάξεως, διαιροῦμεν τὰς μονάδας τῆς ὁρισμένης τάξεως διὰ 1000.

Παράδειγμα 1. Πόσας κυβικὰς παλάμας περιέχουν τὰ 25 κ. μέτρα;

$$\text{Λύσις. } 25 \text{ κ.μ.} \times 1000 = 25.000 \text{ κ.π.}$$

Παράδειγμα 2. Πόσα κυβικὰ μέτρα μᾶς κάμνουν αἱ 25000 κ. παλάμαι;

$$\text{Λύσις. } 25.000 \text{ κ.π.} : 1000 = 25 \text{ κ.μ.}$$

Α σκήσεις

33. Πόσα κυβ. ἑκατοστόμετρα (κυβ. δακτύλους) περιέχουν αἱ 2,5 κ.π.;

34. Τὰ 560 κ. χιλιοστόμετρα (κυβ. γραμμαί) μὲ πόσας κ.π. 1σοδυναμῶν;

35. Τὰ 800.000 κ. χιλιοστόμετρα νὰ τραποῦν εἰς κυβ. παλάμας.

36. Ὁ δύκος ἐνὸς κυβικοῦ δοχείου είναι 5,185 κ.μ. Μὲ πόσας κυβ. παλάμας 1σοδυναμεῖ;

37. Νὰ γραφοῦν μὲ δεκαδικὸν ἀριθμὸν οἱ κάτωθι δύκοι:

- α) 18 κ.μ. 25 κ.π. 142 κ.δ.
- β) 6 κ.μ. 82 κ.π. 279 κ.δ. 63 κ.γρ.
- γ) 362 κ.π. 75 κ.δ.
- δ) 3 κ.π. 9 κ.δ. 8 κ.γρ.
- ε) 15 κ.π. 35 κ.γρ.

7. "Ογκος Κύβου

Πρόβλημα. Ἡ αἴθουσα τῆς τάξεως μᾶς ἔχει σχῆμα κύβου μὲ ἀκμὴν 5 μέτρα. Πόσος είναι ὁ δύκος τῆς;

Σκέψις. Πρῶτον θὰ εύρωμεν τὸ ἐμβαδὸν τοῦ πατώματος, τὸ δῆποιον πάτωμα εἰναι ἔνα τετράγωνον μὲ πλευρὰν 5 μ. Ἐπομένως τὸ ἐμβαδόν του εἰναι 5 μ. \times 5 μ. = 25 τετρ. μέτρα.

Εἰς κάθε τ.μ. τοῦ πατώματος δυνάμεθα νὰ τοποθετήσωμεν ἀπὸ ἔνα κυβικὸν μέτρον, δῆποτε σχηματίζεται ἔνα στρῶμα ἀπὸ 25 κυβικὰ μέτρα ὅψους 1 μέτρου. Καὶ ἐπειδὴ τὸ ὄψος τῆς αἰθούσης (ἢ ἀκμὴ) εἰναι 5 μέτρα, διὰ νὰ γεμίσῃ ἡ αἰθούσα θὰ χρειασθοῦν 5 δμοια στρώματα. Ἐπομένως ἡ αἴθουσα περιέχει :

$$25 \text{ κ.μ.} \times 5 = 125 \text{ κ.μ.}, \text{ τὰ δῆποια ἀποτελοῦν τὸ ὅγκον τῆς.}$$

Ο ἀριθμὸς ὅμως 125 γίνεται ἀπὸ τὸν 5, ποὺ εἰναι ἡ ἀκμὴ τῆς αἰθούσης (τὸ ὄψος), ἀφοῦ πολλαπλασιάσωμεν τοῦτον ἐπὶ τὸν ἑαυτόν του δύο φοράς· δηλ. $5 \times 5 \times 5 = 125$.

Ἐτσι καταλήγομεν εἰς τὸν ἔξης κανόνα ;

Διὰ νὰ εῦρωμεν τὸν ὅγκον ἐνὸς κύβου, πολλαπλασιάζομεν τὸ μῆκος τῆς ἀκμῆς του ἐπὶ τὸν ἑαυτόν της δύο φοράς.

Δηλ. "Ογκος κύβου = ἀκμὴ \times ἀκμὴν \times ἀκμὴν.

Παράδειγμα. Νὰ εὑρεθῇ ὁ ὅγκος κύβου, τοῦ ὄποιου ἡ ἀκμὴ ἔχει μῆκος 1,5 μ.

Λύσις. "Ογκος κύβου = ἀκμὴ \times ἀκμὴν \times ἀκμὴν = $1,5 \times 1,5 \times 1,5 = 3,375$ κ.μ.

Προβλήματα

38. Νὰ εύρεθῇ ὁ ὅγκος κύβου, τοῦ δῆποιου ἡ ἀκμὴ εἰναι 2,30 μ.

39. Μίσα δεξαμενὴ ἔχει σχῆμα κύβου μὲ ἀκμὴν 3,20 μ. Τὴν γεμίζομεν νερὸ καὶ διὰ κάθε κυβικὸν μέτρον νεροῦ πληρώνομεν 4,5 δρχ. Πόσα χρήματα θὰ πληρώσωμεν διὰ τὸ νερό ;

40. Εἰς τὴν αἴθουσαν τῆς τάξεως μας, σχήματος κύβου μὲ ἀκμὴν μῆκους 6 μ., διδάσκονται 40 μαθηταί. Πόσος ὅγκος ἀέρος ἀναλογεῖ εἰς ἔκαστον μαθητήν ;

41. Μία βρύση παρέχει 20 κ.μ. νερό την ώραν. Πόσας ώρας χρειάζεται, διὰ νὰ γεμίσῃ κυβικήν δεξαμενήν μὲ ἀκμήν μήκους 6 μέτρων;

42. "Ενα δοχεῖον κυβικὸν ἔχει ἀκμήν μήκους 0,75 μ. Πόσας λίτρας ύδατος χωρεῖ; (Λίτρα εἶναι ἡ χωρητικότης μιᾶς κυβικῆς παλάμης).

43. Ἡ ἀκμὴ ἐνὸς δοχείου εἶναι 1 μέτρον. Πόσος εἶναι ὁ ὅγκος τοῦ δοχείου καὶ πόσα χιλιόγραμμα (κιλά) λάδι χωρεῖ, ἂν τὸ εἰδικὸν βάρος τοῦ ἑλαίου (λαδιοῦ) εἶναι 0,912; (Βάρος = ὅγκος × εἰδικὸν βάρος).

$$\text{Λύσις. } \text{Όγκος δοχείου} = 1 \times 1 \times 1 = 1 \text{ κ.μ.}$$

$$\text{Βάρος} = \text{ὅγκος} \times \text{εἰδικὸν βάρος} = 1 \times 0,912 = 0,912 \text{ τόννοι.}$$

'Ο 1 τόννος ἔχει βάρος 1000 χιλιόγραμμα (κιλά), τὰ 0,912 τοῦ τόννου θὰ ἔχουν $1000 \times 0,912 = 912$ χιλιόγραμμα.

44. Μία κυβικὴ δεξαμενὴ ἔχει ἀκμήν 7,80 μ. Νὰ εύρεθῇ α) ὁ ὅγκος της καὶ β) πόσους τόννους νερὸν χωρεῖ. (Εἰδικὸν βάρος ύδατος ἀπεσταγμένου 1).

45. Μία ἀποθήκη σχήματος κύβου ἔχει ὕψος 4 μέτρα. Πόσα κυβ. μέτρα σίτου χωρεῖ καὶ πόσον εἶναι τὸ βάρος τοῦ σίτου: α) εἰς τόννους καὶ β) εἰς κιλά, ἂν τὸ εἰδικὸν βάρος τοῦ σίτου εἶναι 1,56;

Σημείωσις. Τὸ βάρος κάθε σώματος εύρισκεται, ἂν πολλαπλασιάσωμεν τὸν ὅγκον του ἐπὶ τὸ εἰδικὸν βάρος του. ("Αν ὁ ὅγκος ἐκφράζεται εἰς κ.μ., τὸ βάρος θὰ φανερώνῃ τόννους· ἂν ὁ ὅγκος ἐκφράζεται εἰς κ. παλάμας, τὸ βάρος θὰ φανερώνῃ κιλά· καί, ἂν ὁ ὅγκος ἐκφράζεται εἰς κ. δακτύλους, τὸ βάρος θὰ φανερώνῃ γραμμάρια).

"Αν τὸ βάρος εἰς τόννους τὸ πολλαπλασιάσωμεν ἐπὶ 1000, εύρισκομεν τὸ βάρος τοῦ σώματος εἰς χιλιόγραμμα (κιλά).

"Αν τὰ κιλά τὰ πολλαπλασιάσωμεν ἐπὶ 1000, εύρισκομεν τὸ βάρος τοῦ σώματος εἰς γραμμάρια.


Πῶς κατασκευάζομεν κύβον

Διὰ νὰ κατασκευάσωμεν ἔνα κύβον μὲ χαρτόνι, σχηματίζομεν εἰς τὸ χαρτόνι τὸ ἀνάπτυγμα τοῦ κύβου, δηλ. τὸ σχῆμα τὸ ὅποιον παρουσιάζει ὁ κύβος, ὅταν ξεδιπλώσωμεν τὰς ἔδρας του καὶ τὰς ἀπλώσωμεν ἐπὶ τῆς ίδιας ἐπιπέδου ἐπιφανείας.

Τὸ ἀνάπτυγμα τοῦ κύβου ἀποτελεῖται ἀπὸ 6 ἵσα τετράγωνα εἰς σχῆμα σταυροῦ (σχ. 5). Κατόπιν μὲ τὸ ψαλίδι κόπτομεν τὸν σταυρὸν αὐτὸν ἀπὸ τὸ χαρτόνι καὶ μὲ ρυαφάκι χαράσσομεν ἐλαφρῶς τὴν περίμετρον τοῦ τετραγώνου 1 καὶ τὴν εὐθεῖαν, ἡ δποία συνδέει τὰ τετράγωνα 5 καὶ 6, ὥστε νὰ κλείουν χωρὶς ὅμως νὰ ἀποκοποῦν.

Μετὰ ταῦτα κρατοῦμεν ἐπάνω εἰς τὸ τραπέζι τὸ τετράγωνον 1 καὶ εἰς τὰς πλευράς του ὑψώνομεν τὰ τετράγωνα 2, 3, 4, καὶ 5, δπότε σχηματίζεται ἔνα κουτὶ ἀνοικτὸν εἰς τὸ ἐπάνω μέρος.

Τὸ κουτὶ αὐτὸ τὸ κλείομεν μὲ τὸ τετράγωνον 6 καὶ ἔχομεν ἔτοιμον τὸν κύβον. Εἰς τὰς ἀκμὰς τοῦ κύβου ἐπικολλῶμεν ταινίας χάρτου, διὰ νὰ συνδεθοῦν.



Σχ. 5


ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΠΙΠΕΔΟΝ

1. Γεωμετρικά στοιχεῖα τοῦ όρθογωνίου παραλληλεπιπέδου

Τὸ στερεὸν σῶμα, τὸ ὅποιον παριστᾶ τὸ σχῆμα 6, λέγεται όρθογώνιον παραλληλεπίπεδον. Τὸ κουτὶ τῶν σπίρτων, τὸ κουτὶ

τῆς κιμωλίας, ἡ καστίνα, αἱ πλάκες μερικῶν εἰδῶν σάπτωνος ἔχουν σχῆμα όρθογωνίου παραλληλεπιπέδου.




Σχ. 6

Όρθογώνιον παραλληλεπίπεδον

λέγονται **ἔδραι** αὐτοῦ.

'Απ' αὐτὰς μόνον αἱ ἀπέναντι ἔδραι εἰναι οἵσαι καὶ παράλληλοι. Τὸ σύνολον τῶν ἔδρῶν ἀποτελεῖ τὴν δλικήν ἐπιφάνειαν τοῦ όρθογωνίου παραλληλεπιπέδου.



Σχ. 7

Ἡ ἔδρα μὲ τὴν ὅποιαν στηρίζεται τὸ όρθογώνιον παραλληλεπίπεδον καὶ ἡ ἀπέναντι αὐτῆς ἔδρα λέγονται βάσεις αὐτοῦ.

Συνήθως ὡς βάσεις λαμβάνονται αἱ δύο μεγαλύτεραι ἔδραι (σχῆμα 7). Αἱ ὑπόλοιποι 4 ἔδραι λέγονται παράπλευροι ἔδραι. Αὗται

είναι κάθετοι ἐπὶ τὰς βάσεις καὶ ἀποτελοῦν τὴν παράπλευρον ἐπιφάνειαν τοῦ ὁρθογωνίου παραλληλεπιπέδου.

Τὰ εὐθύγραμμα τμήματα ΑΒ, ΑΔ, ΑΕ κ.τ.λ., τὰ δποῖα γίνονται ἀπὸ τὴν τομήν δύο γειτονικῶν ἔδρῶν τοῦ ὁρθογωνίου παραλληλεπιπέδου, λέγονται ἀκμαὶ αὐτοῦ (σχ. 7).

Τὸ ὁρθογώνιον παραλληλεπίπεδον ἔχει, ὅπως καὶ ὁ κύβος, 12 ἀκμάς. Μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ γνώμονος διαπιστώμεν, ὅτι οἱ ἀκμαὶ, οἱ δποῖαι τέμνονται, είναι κάθετοι μεταξύ των καὶ ἐπομένως ἡ γωνία, τὴν δποῖαν σχηματίζουν, είναι ὁρθή.

"Ολαι αἱ γωνίαι τοῦ ὁρθογώνιου παραλληλεπιπέδου είναι ὁρθαί. Τοῦτο ἔχει 24 ὁρθὰς γωνίας.

Ωστε : Ὁρθογώνιον παραλληλεπίπεδον λέγεται τὸ ἔξαεδρον, τὸ δποῖον ἔχει τὰς ἀπέναντι ἔδρας τον ἵσας καὶ παραλλήλους καὶ δλας τὰς γωνίας τον ὁρθάς.

Αἱ κορυφαὶ τῶν γωνιῶν τοῦ ὁρθογώνιου παραλληλεπιπέδου είναι καὶ κορυφαὶ αὐτοῦ. Τὸ ὁρθογώνιον παραλληλεπίπεδον ἔχει 8 κορυφάς. Ἀπὸ κάθε κορυφήν του ἀρχίζουν τρεῖς ἀκμαὶ. Π.χ. ἀπὸ τὴν κορυφήν Α (σχ. 7) ἀρχίζουν αἱ ἀκμαὶ ΑΒ, ΑΔ καὶ ΑΕ. Τὰ μήκη τῶν ἀκμῶν αὐτῶν λέγονται διαστάσεις τοῦ ὁρθογωνίου παραλληλεπιπέδου. Ἡ μία ἔξι αὐτῶν, συνήθως ἡ μεγαλυτέρα, λέγεται μῆκος, ἡ ἄλλη πλάτος ἡ πάχος καὶ ἡ τρίτη ὑψος ἡ βάθος.


Ίχνογράφησις τοῦ ὁρθογωνίου παραλληλεπιπέδου

Τὸ ὁρθογώνιον παραλληλεπίπεδον τὸ ίχνογραφοῦμεν δπως καὶ τὸν κύβον. Δηλ. δσα στοιχεῖα (ἔδρας, ἀκμάς, γωνίας) βλέπομεν, τὰ παριστῶμεν μὲ συνεχεῖς γραμμάς, ἐνῷ δσα δὲν βλέπομεν, τὰ παριστῶμεν μὲ διακεκομένας γραμμάς (σχ. 7).


2.) Εμβαδὸν ἐπιφανείας ὁρθογωνίου παραλληλεπιπέδου

a) Εμβαδὸν παραπλεύρου ἐπιφανείας του

Διὰ νὰ εῦρωμεν τὸ ἐμβαδὸν τῆς παραπλεύρου ἐπιφανείας τοῦ



Σχ.8. Κασετίνα

Σχ.9. Παράπλευρος έπιφάνεια
όρθογωνίου παραλληλεπιπέδου

τράδιόν μας και βλέπομεν ότι τοῦτο έχει σχῆμα δρθογωνίου (σχ. 9). Τὸ δρθογώνιον τοῦτο ΑΒΓΔ έχει βάσιν τὴν ΑΒ καὶ ὑψος τὴν ΑΔ.

Διὰ μετρήσεων δὲ μὲ τὸ ὑποδεκάμετρόν μας ἔξακριβώνομεν, ότι ἡ βάσις ΑΒ τοῦ δρθογωνίου ίσοῦται μὲ τὴν περίμετρον τῆς κασετίνας μας, τὸ δὲ ὑψος ΑΔ τοῦ δρθογωνίου ίσοῦται μὲ τὸ ὑψος τῆς κασετίνας μας, δηλ. τοῦ δρθογωνίου παραλληλεπιπέδου.

Ἄρα τὸ ἐμβαδὸν τῆς παραπλεύρου έπιφανείας τῆς κασετίνας, ἡ ὅποια έχει σχῆμα δρθογωνίου παραλληλεπιπέδου, θὰ ίσοῦται μὲ τὸ ἐμβαδὸν τοῦ σχηματιζομένου δρθογωνίου ΑΒΓΔ. Καί, ὅπως γνωρίζομεν, τὸ ἐμβαδὸν τοῦ δρθογωνίου τὸ εύρισκομεν, ὃν πολλαπλασιάσωμεν τὸ μῆκος τῆς βάσεως του ἐπὶ τὸ ὑψος του.

Ἐπομένως : Διὰ νὰ εῦρωμεν τὸ ἐμβαδὸν τῆς παραπλεύρου έπιφανείας ἐνὸς δρθογωνίου παραλληλεπιπέδου, πολλαπλασιάζομεν τὴν περίμετρον τῆς βάσεως αὐτοῦ ἐπὶ τὸ ὑψος του.

Δηλ. Ἐμβ. παραπλ. ἐπιφ. δρθογ. παραλληλεπ. = περίμ. βάσ. × ὑψος.

Παράδειγμα. Μία πλάκα σάπωνος, σχήματος δρθογωνίου παραλλη-

όρθογωνίου παραλληλεπιπέδου, ἐργαζόμεθα ώς ἔξῆς : Μὲ φύλλον χάρτου καλύπτομεν ἀκριβῶς τὰς 4 παραπλεύρους ἔδρας τῆς κασετίνας μας (σχ. 8), ἡ ὅποια έχει σχῆμα δρθογ. παραλληλεπιπέδου. Κατόπιν ἀπλώνομεν τὸ φύλλον αὐτὸν ἐπάνω εἰς τὸ τε-

</

λεπιπέδον, ἔχει μῆκος 20 ἑκ., πλάτος 8 ἑκ. καὶ ὕψος 5 ἑκ. Πόσον είναι τὸ ἐμβαδὸν τῆς παραπλεύρου ἐπιφανείας της;

Λύσις. Περίμετρος βάσεως = $20 + 20 + 8 + 8 = 56$ ἑκ.

Ἐμβ. παραπλ. ἐπιφαν. = περίμ. βάσ. × ὕψος = $56 \times 5 = 280$ τ.ἑκ.

6) Ἐμβαδὸν ὀλικῆς ἐπιφανείας ὄρθογ. παραλληλεπιπέδου

Πρόβλημα. Τὸ κοντὶ τῆς κιμωλίας, σχήματος ὀρθογωνίου παραλληλεπιπέδον, ἔχει μῆκος 25 ἑκ., πλάτος 12 ἑκ. καὶ ὕψος 9 ἑκ. Νὰ εὑρεθῇ τὸ ἐμβαδὸν τῆς ὀλικῆς ἐπιφανείας αὐτοῦ.

Σκέψις. Ἀφοῦ ἡ ὀλικὴ ἐπιφάνεια τοῦ ὄρθογ. παραλληλεπιπέδου ἀποτελεῖται ἀπὸ τὴν παραπλεύρου ἐπιφάνειαν αὐτοῦ καὶ ἀπὸ τὰς δύο βάσεις του, εὔκόλως ἐννοοῦμεν ὅτι θὰ πρέπει νὰ εὕρωμεν : α) τὸ ἐμβαδὸν τῆς παραπλεύρου ἐπιφανείας του, ὅπως εἴδομεν ὀντωτέρω, καὶ β) τὸ ἐμβαδὸν τῶν δύο βάσεών του. Καὶ κατόπιν νὰ προσθέσωμεν τὰ δύο ἐμβαδά. Αἱ βάσεις του ἔχουν σχῆμα ὄρθογωνίου καὶ εἶναι ἴσαι. Ἐπομένως ἀρκεῖ νὰ εὕρωμεν τὸ ἐμβαδὸν τῆς μιᾶς βάσεως.

Καὶ εύρισκομεν τοῦτο, ἀν πολλαπλασιάσωμεν τὸ μῆκος τοῦ ὄρθογωνίου (βάσιν) ἐπὶ τὸ πλάτος του (ύψος).

Λύσις. α) Περίμετρος βάσεως = $25 + 25 + 12 + 12 = 74$ ἑκ.

β) Ἐμβ. παραπλ. ἐπιφ. = Περίμ. βάσ. × ὕψος = $74 \times 9 = 666$ τ.ἑκ.

γ) Ἐμβ. μιᾶς βάσεως = $25 \times 12 = 300$ τ.ἑκ.

Άρα. Ἐμβ. ὀλικῆς ἐπιφανείας = $666 + 300 + 300 = 1266$ τ.ἑκ.

“Ωστε : Διὰ τὰ εὕρωμεν τὸ ἐμβαδὸν τῆς ὀλικῆς ἐπιφανείας ἐνὸς ὀρθογωνίου παραλληλεπιπέδου, προσθέτομεν εἰς τὸ ἐμβαδὸν τῆς παραπλεύρου ἐπιφανείας του τὸ ἐμβαδὸν τῶν δύο βάσεών του.

Δηλ. Ἐμβ. ὀλικ. ἐπιφ. = Ἐμβ. παρ. ἐπιφ. + Ἐμβ. 2 βάσ.

Ἐρωτήσεις

α) Τί λέγεται ὄρθογώνιον παραλληλεπίπεδον ; Ποιὰ είναι τὰ γεωμετρικὰ στοιχεῖα του ;

β) Κατὰ τὶ ὁμοιάζει μὲ τὸν κύβον καὶ εἰς τὶ διαφέρει ἀπ' αὐτὸν ;

γ) Δείξατε ἐπὶ τῆς κασετίνας σας δύο ἵσας καὶ παραλλήλους ἔδρας της, δύο καθέτους ἔδρας πρὸς τὴν βάσιν ὡς καὶ τὰς διαστάσεις τῆς κασετίνας.

δ). Μὲ ἕνα μέτρον μετρήσατε τὰς διαστάσεις τῆς αἱθούστης τῆς τάξεώς σας.

ε) Μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ γνώμονος ἐλέγχατε τί εἴδους γωνίας ἔχει ἡ κασετίνα σας.

στ) Πῶς εύρίσκεται τὸ ἐμβαδὸν τῆς παραπλεύρου ἐπιφανείας τοῦ ὄρθιογωνίου παραλληλεπιπέδου καὶ πῶς τῆς ὀλικῆς ἐπιφανείας αὐτοῦ ;

Προβλήματα

46. ‘Η αἱθουσα τῆς ΣΤ’ τάξεως ἔχει σχῆμα ὄρθιογωνίου παραλληλεπιπέδου μὲ μῆκος 8 μ., πλάτος 5 μ. καὶ ὑψος 3 μ. Νὰ εύρεθῇ τὸ ἐμβαδὸν τῆς παραπλεύρου ἐπιφανείας της.

47. Τὸ μῆκος ἐνὸς δωματίου εἶναι 5 μ., τὸ πλάτος του 4 μ. καὶ τὸ ὑψος του 3 μ. Ποῖον εἶναι τὸ ἐμβαδὸν τῆς ὀλικῆς ἐπιφανείας του ;

48. Μία στήλη (κολώνα), σχήματος ὄρθιογωνίου παραλληλεπιπέδου, ἔχει ὑψος 4 μ. καὶ ἡ βάσις της ἔχει διαστάσεις 0,50 μ. καὶ 0,40 μ. Νὰ εύρεθῃ τὸ ἐμβαδὸν τῆς ὀλικῆς ἐπιφανείας της.

49. Μία ἄλλη στήλη, ιδίου σχήματος, ἔχει βάσιν τετράγωνον μὲ πλευρὰν 0,50 μ. Τὸ ὑψος της στήλης εἶναι 4,5 μέτρα. Νὰ εύρεθῇ α) τὸ ἐμβαδὸν τῆς παραπλεύρου ἐπιφανείας της καὶ β) τὸ ἐμβαδὸν τῆς ὀλικῆς ἐπιφανείας της.

50. ‘Ἐνὸς σιδηροῦ δοχείου (ντεπόζιτου), σχήματος ὄρθιογωνίου παραλληλεπιπέδου, μήκους 2,5 μ., πλάτους 1,20 μ. καὶ ὑψους 0,90 μ. θέλομεν νὰ τοῦ χρωματίσωμεν ἔξωτερικῶς ὅλας τὰς ἔδρας. Πόσον θὰ πληρώσωμεν, ἃν ὁ χρωματισμὸς τιμᾶται 16 δρχ. τὸ τετραγωνικὸν μέτρον ;

3. “Ογκος ὄρθιογωνίου παραλληλεπιπέδου

Πρόβλημα : Ποῖος εἶναι ὁ ὅγκος ἐνὸς δωματίου μήκους 4 μ., πλάτους 2 μ. καὶ ὑψους 3 μ.; (σχ. 10).

Σκέψις. Ἐπειδὴ τὸ δωμάτιον ἔχει σχῆμα ὁρθογωνίου παραλληλεπιπέδου, τὸ δὲ ὁρθογ. παραλληλεπιπέδον δύοιαζει πολὺ μὲ τὸν κύβον, θὰ ἐργασθῶμεν ὅπως καὶ διὰ τὴν εὔρεσιν τοῦ ὄγκου τοῦ κύβου.


Θὰ εὔρωμεν δηλ. τὸ ἐμβαδὸν τῆς βάσεως τοῦ δωματίου. Τοῦτο εἶναι $4 \times 2 = 8$ τ. μέτ.

Ἐάν ἐπὶ ἑκάστου τ.μ.

τῆς βάσεως θέσωμεν ἀνὰ ἓνα κυβικὸν μέτρον, θὰ σχηματισθῇ ἐπὶ τοῦ πατώματος τοῦ δωματίου ἓνα στρῶμα ἀπὸ 8 κυβικὰ μέτρα ὕψους 1 μέτρου (σχ. 10). Καί, διὰ νὰ γεμίσῃ τὸ δωμάτιον, θὰ χρειασθοῦν 3 δύοια στρῶματα, διότι 3 μ. εἶναι τὸ ὕψος τοῦ δωματίου.

Ἐπομένως τὸ δωμάτιον θὰ περιλάβῃ $8 \times 3 = 24$ κ.μ.

Ο ἀριθμὸς 24 κ.μ. ἀποτελεῖ τὸν ὄγκον τοῦ δωματίου ἢ τὸν ὄγκον τοῦ ὁρθογωνίου παραλληλεπιπέδου. Ἐπομένως :



Σχ. 10

Ογκος ὁρθογ. παραλληλ/δου

Διὰ νὰ εὔρωμεν τὸν ὄγκον τοῦ ὁρθογωνίου παραλληλεπιπέδου, πολλαπλασιάζομεν τὸ ἐμβαδὸν τῆς βάσεως αὐτοῦ ἐπὶ τὸ ὕψος του.

Δηλαδή : Ὁγκος ὁρθογ. παραλληλεπιπ. = ἐμβ. βάσ. x ὕψος.

Τὸ ἐμβαδὸν ὅμως τῆς βάσεως εύρισκεται, ἃν πολλαπλασιάσωμεν τὸ μῆκος ἐπὶ τὸ πλάτος της, πού μαζὶ μὲ τὸ ὕψος ἀποτελοῦν τὰς τρεῖς διαστάσεις τοῦ ὁρθογωνίου παραλληλεπιπέδου.

Δι’ αὐτὸ ὁ κανὼν εύρέσεως τοῦ ὄγκου τοῦ ὁρθογωνίου παραλληλεπιπέδου δύναται νὰ διατυπωθῇ καὶ ὡς ἔξῆς :

*Διὸν τὰ εὑρωμένα τὸν ὅγκον τοῦ ὀρθογωνίου παραλληλεπιπέδου, πολλαπλασιάζομεν τὰς τρεῖς διαστάσεις αὐτοῦ.
Δηλ. Ὁγκός ὁρθ. παρ/δου = μῆκος χ πλάτος χ ὕψος.*

Παράδειγμα. Νὰ εὑρεθῇ ὁ ὅγκος δοχείου πετρελαίου, σχήματος ὀρθογωνίου παραλληλεπιπέδου, μὲ διαστάσεις : μῆκος 40 ἑκ., πλάτος 30 ἑκ. καὶ ὕψος 50 ἑκ.

Λύσις. Ὁγκός δοχείου = μῆκος × πλάτος × ὕψος = $40 \times 30 \times 50 = 60.000$ κ.ἑκ. ἢ 60 κυβ. παλάμαι.

Σημείωσις. Υπενθυμίζομεν ὅτι καὶ αἱ τρεῖς διαστάσεις πρέπει νὰ μετρῶνται μὲ τὴν ἴδιαν μονάδα.

Προβλήματα

51. Μετρήσατε τὰς διαστάσεις τῆς αίθουσης τῆς τάξεώς σας, σχήματος ὀρθογ. παραλληλεπιπέδου, καὶ ὑπολογίσατε πόσος ὅγκος ἀέρος ἀναλογεῖ εἰς κάθε μηθητὴν τῆς τάξεώς σας. (Προσέξατε· ἐκτὸς ἀπὸ τὰς διαστάσεις τὶ ἄλλο θὰ σᾶς χρειασθῇ;).

52. Μία αἴθουσα, σχήματος ὀρθογ. παραλληλεπιπέδου, ἔχει μῆκος 6,50 μ., πλάτος 5,40 μ. καὶ ὕψος 3 μ. Πόσος εἶναι ὁ ὅγκος της;

53. Κτίστης κτίζει τοῖχον, σχήματος ὀρθογωνίου παραλληλεπιπέδου, μήκους 56,34 μ., πάχους 0,40 μ. καὶ ὕψους 1,20 μ. Πόσα χρήματα θὰ λάβῃ διὰ τὴν ἔργασίαν του, ἂν κάθε κυβικὸν μέτρον τιμᾶται 84 δραχμάς;

54. Μίαν πλατεῖαν, σχήματος ὀρθογωνίου, μήκους 80 μ. καὶ πλάτους 50 μ. θέλομεν νὰ τὴν στρώσωμεν μὲ χαλίκια εἰς πάχος 0,12 μ. Πόσα κυβικὰ μέτρα χαλίκια χρειαζόμεθα;


55. Διὰ τὴν κατασκευὴν τοῦ πατώματος ἐνὸς δωματίου ἡγοράσαμεν 25 σανίδας, σχήματος ὀρθογων. παραλληλεπιπέδου, μὲ μῆκος 2,65 μ., πλάτος 0,30 μ. καὶ πάχος 0,02 μ. Ἀν ἡ ξυλεία αύτὴ τιμᾶται 8.000 δρχ. τὸ κυβικὸν μέτρον, πόσα χρήματα ἔπληρώσαμεν;

56. "Ενα δοχεῖον (ντεπόζιτον), σχήματος ὀρθογ. παραλληλεπιπέδου, μὲ μῆκος 1,40 μ., πλάτος 0,50 μ. καὶ ὕψος 0,80 μ. εἶναι γεμάτον λάδι. Πόσα κιλὰ λάδι περιέχει; (Ειδικὸν βάρος Ἐλαίου 0,912)

Κατασκευή όρθογωνίου παραλληλεπιπέδου.

Διὰ νὰ κατασκευάσωμεν ἔνα όρθογώνιον παραλληλεπίπεδον ἀπὸ χαρτόνι, ἐργαζόμεθα ὅπως καὶ διὰ τὴν κατασκευὴν τοῦ κύβου.

Σχηματίζομεν εἰς τὸ χαρτόνι τὸ ἀνάπτυγμα τοῦ όρθογωνίου παραλληλεπιπέδου, ὅπως φαίνεται εἰς τὸ σχῆμα 11. Μὲ τὸ ψαλίδι κόπτομεν αὐτὸ ἀπὸ τὸ χαρτόνι. Κατόπιν μὲ ξυραφάκι χαράσσομεν ἐλαφρῶς τὴν περίμετρον τοῦ όρθογωνίου 2 καὶ τὴν εὐθεῖαν, ἡ ὅποια συνδέει τὰ όρθογώνια 3 καὶ 4.



Σχ.11

Ἄναπτυγμα όρθογ. παρ/ δου

γωνίου 2 καὶ τὴν εὐθεῖαν, ἡ ὅποια συνδέει τὰ όρθογώνια 3 καὶ 4. Κατόπιν στηρίζομεν ἐπὶ τῆς τραπέζης τὸ όρθογώνιον 2 καὶ ὑψώνομεν τὰ όρθογώνια 1,3,5,6. Τοιουτορόπως ἔχομεν ἔνα όρθογώνιον παραλληλεπίπεδον ἀνοικτὸν εἰς τὸ ἐπάνω μέρος.

Τοῦτο κλείομεν μὲ τὸ όρθογώνιον 4. Εἰς τὰς ἀκμὰς τοῦ όρθογωνίου παραλληλεπιπέδου ἐπικολλῶμεν χαρτί, διὰ νὰ συνδεθοῦν.


ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ

ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ


1. Γεωμετρικά στοιχεῖα τῆς Πυραμίδος

Τὰς πυραμίδας κατεσκεύασσαν πρῶτοι, ὅπως γνωρίζομεν, οἱ ἀρχαῖοι Αἰγυπτιοὶ διὰ τοὺς τάφους τῶν βασιλέων των. Τοιαῦται πυραμίδες σώζονται εἰς τὴν Αἴγυπτον καὶ σήμερον ἀκόμη.

Ἄλλὰ καὶ ἡμεῖς σήμερον κατασκευάζομεν εἰς σχῆμα πυραμίδος τὰς στέγας τῶν οἰκιῶν, ποὺ είναι σκεπτασμέναι μὲ κεραμίδια, διὰ νὰ φεύγουν τὰ νερά τῆς βροχῆς. Ἐπίσης σχῆμα πυραμίδος ἔχουν τὰ μνημεῖα καὶ αἱ ἀναμνηστικαὶ στῆλαι.



Σχ.12. Τριγωνική πυραμίς



Σχ.13. Τετραγωνική πυραμίς

Τὰ στερεὰ σώματα, ποὺ είκονίζονται ἐδῶ (σχ. 12, 13, 14), εἰναι πυραμίδες. Καθὼς βλέπομεν, κάθε μία ἀπὸ τὰς πυραμίδας αὐτὰς περικλείεται ἀπὸ ἐπιπέδους ἐπιφανείας, αἱ ὅποιαι λέγονται ἔδραι τῆς πυραμίδος. Ἡ ἔδρα, μὲ τὴν ὅποιαν στηρίζεται ἡ πυραμίς, λέγεται βάσις αὐτῆς.


‘Η βάσις τῆς πυραμίδος δύναται νὰ είναι οἰονδήποτε εὐθύγραμμον σχῆμα: τρίγωνον, τετράγωνον, πενταγωνον κλπ. Ἀπὸ τὸ σχῆμα δὲ τῆς βάσεώς της λαμβάνει ἡ πυραμὶς καὶ τὴν ὀνομασίαν της : τριγωνικὴ πυραμὶς, τετραγωνικὴ, πενταγωνικὴ κλπ.

Αἱ ύπόλοιποι ἔδραι τῆς πυραμίδος, πλὴν τῆς βάσεως, λέγονται παράπλευροι ἔδραι καὶ ἀποτελοῦν τὴν παράπλευρον ἐπιφάνειαν τῆς πυραμίδος.

Κάθε παράπλευρος ἔδρα ἔχει σχῆμα τριγώνου μὲ βάσιν μίαν πλευρὰν τῆς βάσεως τῆς πυραμίδος. Ἐπομένως αἱ παράπλευροι ἔδραι κάθε πυραμίδος είναι ὅσαι αἱ πλευραὶ τῆς βάσεως.

Αἱ παράπλευροι ἔδραι τῆς πυραμίδος συναντῶνται ὅλαι εἰς ἕνα σημεῖον, τὸ διποίον εύρισκεται ἔξω ἀπὸ τὴν βάσιν καὶ ἀπέναντι αὐτῆς. Τὸ σημεῖον αὐτὸν λέγεται κορυφὴ τῆς πυραμίδος.

“Ωστε :



Πενταγωνικὴ πυραμὶς

Πυραμὶς λέγεται τὸ πολύεδρον, τὸ ὅποιον ἔχει βάσιν μὲν ἓνα οἰονδήποτε εὐθύγραμμον σχῆμα, παραπλεύρους δὲ ἔδρας τρίγωνα, τὰ διποῖα ἔχοντα βάσιν τὰς πλευρὰς τῆς βάσεως τῆς πυραμίδος καὶ μίαν κοινὴν κορυφήν, ἡ ὅποια ενδισκεται ἔξω τῆς βάσεως καὶ ἀπέναντι αὐτῆς.

‘Η ἀπόστασις τῆς κορυφῆς τῆς πυραμίδος ἀπὸ τὴν βάσιν της λέγεται ὑψος τῆς πυραμίδος.

‘Ακμαὶ τῆς πυραμίδος λέγονται τὰ εὐθύγραμμα τμῆματα, εἰς τὰ διποῖα τελειώνει κάθε ἔδρα της. Διακρίνομεν παραπλεύρους ἀκμὰς τῆς πυραμίδος καὶ ἀκμὰς τῆς βάσεως αὐτῆς.

Αἱ παράπλευροι ἀκμαὶ καὶ αἱ παράπλευροι ἔδραι τῆς πυραμίδος δὲν εἰναι κάθετοι ἐπὶ τὴν βάσιν αὐτῆς.

Κανονικὴ λέγεται μία πυραμίς, ὅταν ἔχῃ βάσιν κανονικὸν πολύγωνον, δηλ. πολύγωνον τὸ ὅποιον ἔχει ὅλας τὰς πλευράς του ἵσας καὶ ὅλας τὰς γωνίας του ἵσας, καὶ ὅταν αἱ παράπλευροι ἀκμαὶ τῆς εἰναι ἵσαι μεταξύ των.

Εἰς τὴν κανονικὴν πυραμίδα τὸ ὑψος περνᾶ ἀπὸ τὸ κέντρον τῆς βάσεως· αἱ ἀκμαὶ, αἱ ὅποιαι συναντῶνται εἰς τὴν κορυφήν της, εἰναι ἵσαι μεταξύ των, αἱ δὲ παράπλευροι ἔδραι εἰναι ἰσοσκελῆ τρίγωνα ἵσα. Ἐτοι ἔχομεν κανονικάς πυραμίδας τριγωνικάς, τετραγωνικάς, πολυγωνικάς.

ΙΧΝΟΓΡΑΦΗΣΙΣ ΠΥΡΑΜΙΔΟΣ

Διὰ νὰ ἴχνογραφήσωμεν πυραμίδα, σχηματίζομεν πρῶτον τὴν βάσιν της· κατόπιν ἀπὸ ἔνα σημεῖον, τὸ ὅποιον εύρισκεται ἔξω ἀπὸ τὴν βάσιν καὶ ἀπέναντι αὐτῆς (κορυφή), φέρομεν εὐθύγραμμα τμήματα, τὰ ὅποια ἔνώνουν τὸ σημεῖον τοῦτο μὲ τὰς κορυφάς τῶν γωνιῶν τῆς βάσεως. Τὰς ἀκμὰς τῶν παραπλεύρων ἔδρων τῆς πυραμίδος, τὰς ὅποιας δὲν βλέπομεν, τὰς σχηματίζομεν μὲ διακεκομένα εὐθύγραμμα τμήματα.

Ἐρωτήσεις

- Τί λέγεται πυραμίς καὶ ποια τὰ γεωμετρικὰ στοιχεῖα αὐτῆς;
- Τί λέγεται βάσις τῆς πυραμίδος, τί κορυφὴ καὶ τί ὑψος αὐτῆς;
- Τί σχῆμα ἔχουν αἱ παράπλευροι ἔδραι τῆς πυραμίδος;
- Τί σχῆμα ἔχει ἡ βάσις τῆς πυραμίδος;
- Απὸ ποῦ παίρνουν τὴν δνομασίαν των αἱ πυραμίδες;
- Τί θέσιν ἔχουν αἱ παράπλευροι ἔδραι μιᾶς πυραμίδος ὡς πρὸς τὴν βάσιν της;
- Τί λέγεται κανονικὴ πυραμίς καὶ ποια τὰ ἴδιαίτερα γνωρίσματά της;

2. Τετραγωνική πυραμίς

Η πυραμίς, τὴν ὅποιαν βλέπομεν ἔδω (σχ. 15), λέγεται **τετραγωνική πυραμίς**, διότι ἔχει βάσιν τετράγωνον.

Η τετραγωνική πυραμίς περικλείεται ἀπὸ 5 ἔδρας, δηλ. ἀπὸ τὴν ἔδραν τῆς βάσεως, ἢ ὅποια εἶναι τετράγωνον, καὶ ἀπὸ τὰς 4 ἔδρας τῆς παραπλεύρου ἐπιφανείας τῆς, αἱ ὅποιαι εἰναι τρίγωνα καὶ συναντῶνται εἰς ἓνα σημεῖον, τὸ ὅποιον λέγεται κορυφὴ τῆς πυραμίδος. Καὶ αἱ 5 ἔδραι μαζὶ ἀποτελοῦν τὴν ἐπιφάνειαν τῆς πυραμίδος.


Εἰς τὴν τετραγωνικὴν πυραμίδα διακρίνομεν τὰς 4 παραπλεύρους ἀκμάς τῆς καὶ τὰς 4 ἀκμάς τῆς βάσεως τῆς. Ἐχει δηλ. αὕτη 8 ἀκμάς, 8 διέδρους γωνίας καὶ 5 κορυφᾶς· δηλ. τὴν κυρίως κορυφὴν τῆς πυραμίδος καὶ τὰς 4 τῆς βάσεως.

Τοιούτης τετραγωνικῆς πυραμίδος λέγεται ἡ ἀπόστασις τῆς κορυφῆς τῆς πυραμίδος ἀπὸ τὴν βάσιν αὐτῆς.

Η τετραγωνική πυραμίς εἶναι **κανονικὴ πυραμίς**, ὅταν 1) ἡ βάσις της εἶναι κανονικὸν πολύγωνον, ἐπειδή, ὡς τετράγωνον ποὺ εἶναι, ἔχει ὄλας τὰς πλευράς του ἴσας καὶ ὄλας τὰς γωνίας του ἴσας, καὶ 2) αἱ παράπλευροι ἀκμαί της εἶναι ἴσαι μεταξύ των. Ως κανονικὴ δὲ πυραμίς ἔχει τὰς παραπλεύρους ἔδρας της τρίγωνα **Ισοσκελῆ** καὶ ἵσα μεταξύ των.

Αἱ παράπλευροι ἔδραι τῆς τετραγωνικῆς πυραμίδος καὶ αἱ παράπλευροι ἀκμαὶ αὐτῆς εἶναι πλάγιαι πρὸς τὴν βάσιν της, ἡ ὅποια εἶναι ὁρίζοντια.

Σημείώσις. Τὸ σχῆμα τῆς τετραγωνικῆς πυραμίδος τὸ βλέπομεν εἰς μηνημεῖα, εἰς ἀναμνηστικὰς στήλας καὶ εἰς κωδωνοστάσια τῶν ἐκκλησιῶν. Εἰς τὴν Αἴγυπτον, εἰς τὴν περιοχὴν τῆς Γκίζης νοτιοδυτικῶς τοῦ Καΐρου, εύρισκεται ἡ μεγάλη πυραμίς τοῦ Χέοπτος· αὕτη ἔχει βάσιν τετράγωνον μὲ μῆκος πλευρᾶς 227 μέτρα καὶ ὕψος 138 μέτρα.



Σχ. 15

α) Ἐμβαδὸν ἐπιφανείας τετραγωνικῆς Πυραμίδος

“Οπως γνωρίζομεν ἡ τετραγωνικὴ πυραμὶς εἶναι κανονικὴ καὶ ὡς τοιαύτη ἔχει τὰς παραπλεύρους ἔδρας τῆς τρίγωνα ἴσοσκελῆ καὶ ἵσα μεταξύ τῶν.

Διὰ νὰ εὔρωμεν ἔπομένως τὸ ἐμβαδὸν τῆς παραπλεύρου ἐπιφανείας τῆς τετραγωνικῆς πυραμίδος, εύρισκομεν τὸ ἐμβαδὸν τοῦ ἐνὸς ἀπὸ τὰ τρίγωνά της καὶ τὸ πολλαπλασιάζομεν ἐπὶ 4, διότι 4 εἶναι τὰ τρίγωνά της. (Γνωρίζομεν ὅτι τὸ ἐμβαδὸν τριγώνου ἴσοῦται μὲ βάσιν × ὑψος).

2

Καὶ ἐπειδὴ τὰ τρίγωνα τῆς παραπλεύρου ἐπιφανείας τῆς τετραγωνικῆς πυραμίδος εἶναι ἵσα μεταξύ τῶν καὶ ἔχουν ἵσην βάσιν καὶ ἵσον ὕψος, δυνάμεθα νὰ εὔρωμεν εὐκολώτερα τὸ ἐμβαδὸν τῆς παραπλεύρου ἐπιφανείας, ἀν πολλαπλασιάσωμεν τὴν περίμετρον τῆς βάσεως της ἐπὶ τὸ ὕψος τῶν τριγώνων καὶ τὸ γινόμενον τὸ διαιρέσωμεν διὰ 2. Τὸ ὕψος τῶν τριγώνων αὐτῶν εἶναι ἡ ἀπόστασις τῆς κορυφῆς τῆς πυραμίδος ἀπὸ τὴν πλευρὰν τῆς βάσεως της, καὶ λέγεται ἀπόστημα τῆς Πυραμίδος.

Ἐάν δὲ εἰς τὸ ἐμβαδὸν τῆς παραπλεύρου ἐπιφανείας προσθέσωμεν καὶ τὸ ἐμβαδὸν τῆς βάσεως, ἡ ὅποια εἶναι τετράγωνον (πλευρὰ X πλευράν), θὰ ἔχωμεν τὸ ἐμβαδὸν τῆς ὁλικῆς ἐπιφανείας τῆς τετραγωνικῆς πυραμίδος. Ἐπομένως :

Διὰ νὰ εὔρωμεν τὸ ἐμβαδὸν τῆς παραπλεύρου ἐπιφανείας τετραγωνικῆς πυραμίδος, πολλαπλασιάζομεν τὴν περίμετρον τῆς βάσεως αὐτῆς ἐπὶ τὸ ἀπόστημά της καὶ τὸ γινόμενον διαιροῦμεν διὰ 2.

Δηλ. Ἐμβαδὸν παραπλ. ἐπιφ. τετραγ. Πυραμίδος
 = περίμ. βάσ. × ἀπόστημα
 2

Καὶ τὸ ἐμβαδὸν τῆς ὁλικῆς ἐπιφανείας τῆς πυραμίδος ἴσονται μὲ Ἐμβαδὸν παραπλεύρου ἐπιφανείας + Ἐμβ. βάσεως.

Παράδειγμα. Κανονική πυραμίς ἔχει βάσιν τετράγωνον μὲ πλευρὰν 3 μ. Ἐὰν τὸ ἀπόστημα τῆς πυραμίδος εἴναι 5 μ., πόσον εἶναι α) τὸ ἐμβαθύτατον τῆς παραπλεύρου ἐπιφανείας της καὶ β) τὸ ἐμβαθύτατον τῆς διακήσης ἐπιφανείας της;

Λύσις. α) Περίμετρος βάσεως = $3 + 3 + 3 + 3 = 12$ μ.

$$\beta) \text{ } 'Εμβαδὸν παραπλ. ἐπιφαν. = \frac{12 \times 5}{2} = \frac{60}{2} = 30 \text{ τ.μ}$$

γ) Ἐμβαδ. βάσεως πυραμ. = $3 \times 3 = 9$ τ.μ.

$$\delta) \text{ } 'Εμβ. όλικης έπιφ. πυρ. = 30 + 9 = 39 \text{ τ.μ.}$$

Προβλήματα

57. Η βάσις κανονικής πυραμίδος είναι τετράγωνον μὲ περίμετρον 8,80 μ. Ἀν τὸ ἀπόστημα τῆς πυραμίδος είναι 3,5 μ., πόσον είναι τὸ ἔμαδὸν τῆς παραπλεύρου ἐπιφανείας της;

58. Τὴν στέγην ἐνὸς πύργου, σχῆματος κανονικῆς τετραγωνικῆς πυραμίδος, μὲ περίμετρον βάσεως 36 μ. καὶ μὲ ἀπόστασιν τῆς κορυφῆς τῆς στέγης ἀπὸ κάθε πλευράν τῆς βάσεώς της 5 μ., θέλομεν νὰ σκεπάσωμεν (καλύψωμεν) μὲ πλάκας τετραγωνικάς πλευρᾶς 40 ἑκ. Πόσας πλάκας θὰ χρειασθῶμεν;


59. Κανονική πυραμίς έχει βάσιν τετράγωνον μὲ πλευρὰν 6,5 μ. καὶ ἀπόστημα 9 μ. Πόσον είναι τὸ ἐμβαδὸν τῆς παραπλεύρου ἐπιφανείας της καὶ πόσον τῆς ὁλικῆς;

60. Τὴν στέγην ἐνὸς πύργου, σχήματος κανονικῆς τετραγωνικῆς πυραμίδος, μὲ πλευρὰν βάσεως 2,5 μ. καὶ ἀπόστημα 4,20 μ. θέλομεν νὰ καλύψωμεν μὲ λαμαρίναν, ποὺ τὸ τ.μ. τιμᾶται 30 δρχ. Πόσον θὰ στοιχίσῃ ἡ λαμαρίνα;

β) "Ογκος τετραγωνικης πυραμιδος.

Διὰ νὰ εὔρωμεν τὸν ὄγκον μιᾶς τετραγωνικῆς πυραμίδος, ἐργάζόμεθα ως ἔφης :

Λαμβάνομεν μίαν κοίλην τετραγωνικήν πυραμίδα και ἓνα δρό-



Σχ. 16

γώνιον παραλληλεπίπεδον (σχ. 16), τὰ ὅποια ἔχουν τὴν αὐτὴν βάσιν καὶ τὸ αὐτὸν ὕψος.

Γεμίζομεν τελείως τὴν πυραμίδα μὲ σῖτον καὶ χύνομεν αὐτὸν ἐντὸς τοῦ ὀρθογώνιου παραλληλεπιπέδου. Παρατηροῦμεν ὅτι πρέπει νὰ ἐπαναληφθῇ τοῦτο τρεῖς φοράς, διὰ νὰ γεμίσῃ τελείως μὲ σῖτον τὸ ὀρθογώνιον παραλληλεπίπεδον. Αὐτὸς μᾶς φανερώνει ὅτι ὁ ὅγκος τῆς πυραμίδος εἶναι 3 φοράς μικρότερος ἀπὸ τὸν ὅγκον τοῦ ὀρθογώνιου παραλληλεπιπέδου, τὸ ὅποιον ἔχει τὴν ίδιαν βάσιν καὶ τὸ ίδιον ὕψος.

Γνωρίζομεν ὅμως ὅτι ὁ ὅγκος τοῦ ὀρθογώνιου παραλληλεπιπέδου εὑρίσκεται, ἃν πολλαπλασιάσωμεν τὸ ἐμβαδόν τῆς βάσεως αὐτοῦ ἐπὶ τὸ ὕψος του.

Ἐπομένως:

Διὰ τὰ εῦρωμεν τὸν ὅγκον τετραγωνικῆς πυραμίδος, πολλαπλασιάζομεν τὸ ἐμβαδὸν τῆς βάσεως ἐπὶ τὸ ὕψος τῆς πυραμίδος καὶ τὸ γινόμενον διαιροῦμεν διὰ 3.

$$\text{Δηλ. Ὁγκος Πυραμίδος} = \frac{\text{ἐμβ. βάσεως} \times \text{ὕψος}}{3}$$

Παράδειγμα. Τὸ ἐμβαδὸν τῆς βάσεως μιᾶς τετρ. πυραμίδος εἶναι 60 τ. ἑκ. καὶ τὸ ὕψος τῆς 25 ἑκ. Πόσος εἶναι ὁ ὅγκος τῆς;

$$\text{Λύσις. Ὁγκος πυραμίδος} = \frac{\text{Ἐμβ. βάσ.} \times \text{ὕψος}}{3} = \frac{60 \times 25}{3} = 50 \text{ κ. ἑκ.}$$

Προβλήματα

61. Η βάσις μιᾶς πυραμίδος είναι τετράγωνον μὲ πλευρὰν 0,09 μ., τὸ δὲ ὕψος τῆς είναι 0,21 μ. Πόσος είναι ὁ ὅγκος τῆς;

62. Ο τάφος τοῦ Χέοπος (Φαραὼ τῆς Αιγύπτου) ἔχει σχῆμα τετραγωνικῆς πυραμίδος μὲ πλευρὰν βάσεως 227 μ. καὶ ὕψος 138 μ. Πόσος είναι ὁ ὅγκος του;

63. Μία μαρμαρίνη ἀναμνηστικὴ στήλη, σχῆματος πυραμίδος, ἔχει βάσιν τετράγωνον μὲ πλευρὰν 75 ἑκ. καὶ ὕψος 3,80 μ. Νὰ εὐρεθῇ τὸ βάρος τῆς, ἂν τὸ εἰδικὸν βάρος τοῦ μαρμάρου είναι 2,7.

64. Μία πυραμὶς ἔχει ὅγκον 75 κ.μ. καὶ ὕψος 9 μ. Πόσον είναι τὸ ἐμβαδὸν τῆς βάσεώς της;


(‘Υπόδειξις: Θὰ πολλαπλασιάσετε τὸν ὅγκον ἐπὶ 3 καὶ τὸ γινόμενον θὰ τὸ διαιρέσετε διὰ τοῦ ὕψους, ποὺ είναι γνωστόν).

65. Μία πυραμὶς ἔχει ὅγκον 75 κ.μ. καὶ ἐμβαδὸν βάσεως 25 τ.μ. Πόσον είναι τὸ ὕψος τῆς; (‘Απάντησις: ὕψος = 9 μ.).

Κατασκευὴ τετραγωνικῆς πυραμίδος

Διὰ νὰ κατασκευάσωμεν τὴν τετραγωνικὴν πυραμίδα ἀπὸ χαρτόνι, γράφομεν ἐνα τετράγωνον, τὸ ὅποιον θὰ είναι ἡ βάσις τῆς πυραμίδος.

Κατόπιν σχεδιάζομεν 4 ἴσοσκελῆ τρίγωνα ἵσα μεταξύ των, ποὺ τὸ καθένα ἔχει βάσιν μὲν ἀπὸ μίαν πλευρὰν τοῦ τετραγώνου, ὕψος δὲ μεγαλύ-



Σχ. 17

τερον τοῦ ἡμίσεος τῆς πλευρᾶς τοῦ τετραγώνου. Ἐτσι ἔχομεν τὸ ἀνάπτυγμα τῆς τετραγωνικῆς πυραμίδος (σχ. 17).

Κατόπιν μὲν ξυραφάκι χαράσσομεν ἐλαφρῶς τὰς πλευρᾶς τοῦ τετραγώνου καὶ ὑψώνομεν καὶ τὰ 4 τρίγωνα. Κολλῶμεν τὰς πλευρᾶς τῶν τριγώνων καὶ ἔχομεν ἔτοιμον τὴν τετραγωνικήν πυραμίδα.


Ἐργασία. Νὰ κατασκευάσετε μὲν χαρτόνι μίαν τετραγωνικήν πυραμίδα μὲν πλευρὰν βάσεως 8 ἑκ. καὶ παραπλεύρους ἀκμὰς διπλασίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ


ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ

1. Γεωμετρικά στοιχεῖα τοῦ κυκλικοῦ κυλίνδρου

"Αν πολλὰ ὅμοια κέρματα (μεταλλικά νομίσματα) τὰ τοποθετήσωμεν τὸ ἔνα ἐπάνω εἰς τὸ ἄλλο, ὥστε τὸ καθένα νὰ συμπίπτῃ μὲ τὸ κάτωθεν αὐτοῦ, τότε σχηματίζεται ἔνα στερεὸν σῶμα (σχῆμα), τὸ δόποιον λέγεται δρθός κυκλικὸς κύλινδρος (σχ. 18). Σχῆμα κυλίνδρου ἔχουν οἱ σωλῆνες τῆς θερμάστρας, τὰ κουτιά γάλακτος, ὡρισμένα κουτιά κονσερβῶν, τὰ στρογγυλὰ μολύβια κ.ἄ.



Σχ.18
Κέρματα



Σχ.19
Κύλινδρος

'Ο κυκλικὸς κύλινδρος περικλείεται ἀπὸ μίαν μικτὴν ἐπιφάνειαν, ἢ δόποια ἀποτελεῖται ἀπὸ δύο κύκλους παραλλήλους καὶ ἵσους, ποὺ λέγονται βάσεις τοῦ κυλίνδρου, καὶ ἀπὸ μίαν καμπύλην (κυρτήν) ἐπιφάνειαν, ποὺ λέγεται κυρτὴ ἐπιφάνεια αὐτοῦ (σχ. 19).

Ωστε : 'Ορθός κυκλικὸς κύλινδρος λέγεται τὸ στερεὸν σῶμα, τὸ δόποιον περικλείεται ἀπὸ δύο κύκλους ἵσους καὶ παραλλήλους καὶ ἀπὸ μίαν κυρτὴν ἐπιφάνειαν, ἐπὶ τῆς δοποὶς ἐφαρμόζει εὐθεῖα καθέτως πρὸς τὰς βάσεις.

‘Η μεταξὺ τῶν δύο βάσεων ἀπόστασις λέγεται ὑψος τοῦ κυλίνδρου ἢ ἄξων αὐτοῦ.

‘Ο κυκλικὸς κύλινδρος δύναται νὰ θεωρηθῇ ὅτι προκύπτει ἀπὸ ἕνα δρθιογώνιον παραλληλόγραμμον, τὸ ὅποιον κάμνει μίαν πλήρη στροφὴν γύρω ἀπὸ μίαν τῶν πλευρῶν του κινούμενον πρὸς τὴν αὐτὴν φορὰν (διεύθυνσιν).

Τοῦτο τὸ βλέπομεν καλύτερα εἰς τὰς περιστρεφομένας θύρας τῶν Τραπεζῶν καὶ ἄλλων Δημοσίων Καταστημάτων. Ἐκεῖ ἡ θύρα (πόρτα) στρεφομένη κατὰ τὴν αὐτὴν φορὰν γύρω ἀπὸ τὰ στηρίγματά της (τὸν ἄξονά της) παράγει κύλινδρον. ‘Ο κύλινδρος αὐτὸς ἔχει τὰς βάσεις του κύκλους καθέτους πρὸς τὸν ἄξονά των καὶ λέγεται κυκλικὸς κύλινδρος ἢ ἐκ περιστροφῆς ἢ δρθὸς κύλινδρος.


Ἐρωτήσεις

- α) Τί λέγεται κυκλικὸς κύλινδρος ;
- β) Ἀναφέρατε σώματα κυλινδρικά.
- γ) Ποιᾶ είναι τὰ γεωμετρικὰ στοιχεῖα τοῦ κυκλικοῦ κυλίνδρου ;


2. Ἐμβαδὸν ἐπιφανείας κυκλικοῦ κυλίνδρου

a) Ἐμβαδὸν κυρτῆς ἐπιφανείας τοῦ κυκλικοῦ κυλίνδρου

‘Αν τὴν κυρτὴν ἐπιφάνειαν ἐνὸς κυκλικοῦ κυλίνδρου (σχ. 20)



Σχ. 20



‘Ανάπτυγμα κυρτῆς ἐπιφανείας κυλίνδρου.

καλύψωμεν ἀκριβῶς μὲν φύλλον χάρτου καὶ κατόπιν ἀπλώσωμεν τοῦτο ἐπάνω εἰς ἐπίπεδον ἐπιφάνειαν (τραπέζι κλπ.), παρατηροῦμεν ὅτι τὸ φύλλον αὐτὸ ἔχει σχῆμα ὁρθογωνίου παραλληλογράμμου (σχ. 21).

Εἶναι φανερὸν ὅτι τὸ ὁρθογώνιον τοῦτο παραλληλόγραμμον ἔχει βάσιν ἵστην μὲ τὸ μῆκος τῆς περιφερείας τῆς μιᾶς βάσεως τοῦ κυλίνδρου, ὕψος ἵστην μὲ τὸ ὕψος τοῦ κυλίνδρου καὶ ἐμβαδὸν ἵστην μὲ τὸ ἐμβαδὸν τῆς κυρτῆς ἐπιφανείας αὐτοῦ.

Ἐπομένως :

Διὰ νὰ εὑρωμεν τὸ ἐμβαδὸν τῆς κυρτῆς ἐπιφανείας τοῦ κυκλικοῦ κυλίνδρου, πολλαπλασιάσομεν τὸ μῆκος τῆς περιφερείας τῆς μιᾶς βάσεως αὐτοῦ ἐπὶ τὸ ὕψος τοῦ κυλίνδρου.

Δηλ. Ἐμβ. κυρτῆς ἐπιφ. κυκλ. κυλ.=Μῆκος περιφ. βάσ. × ὕψος.

Παράδειγμα. Τὸ ὕψος ἐνδεκατοστοῦ κυλίνδρου εἶναι 0,95 μ. καὶ ἡ βάσις του ἔχει ἀκτίνα 0,25 μ. Πόσον εἶναι τὸ ἐμβαδὸν τῆς κυρτῆς ἐπιφανείας τοῦ κυλίνδρου;


Λόγισις: α) Μῆκος περιφερείας βάσεως = Διάμετρος \times 3,14 = 2 \times 0,25 \times 3,14 = 1,57 μ.

β) Ἐμβ. κυρτ. ἐπιφ. = μῆκος περιφ. βάσ. \times ὕψ. = 1,57 \times 0,95 = 1,4915 τ. μ.

6) Ἐμβαδὸν δλικῆς ἐπιφανείας κυκλικοῦ κυλίνδρου

Γνωρίζομεν ὅτι ἡ ἐπιφάνεια τοῦ κυλίνδρου ἀποτελεῖται ἀπὸ τὴν κυρτὴν ἐπιφάνειάν του καὶ ἀπὸ τὴν ἐπιφάνειαν τῶν δύο βάσεών του (σχ. 22). Διὰ νὰ εὕρωμεν λοιπὸν τὸ ἐμβαδὸν τῆς δλικῆς ἐπιφανείας του, πρέπει νὰ εὕρωμεν πρῶτα τὸ ἐμβαδὸν τῆς κυρτῆς ἐπιφανείας του, ὅπως εἴδομεν προηγουμένως, καὶ εἰς αὐτὸ νὰ προσθέσωμεν τὸ ἐμβαδὸν τῶν δύο βάσεών του.

Αἱ βάσεις ἔχουν σχῆμα κύκλου καί, ὅπως γνωρίζομεν, διὰ νὰ εῦ-



Σχ 22. Άναπτυγμα όλης της έπιφανειας κυλίνδρου

ρωμεν τὸ ἐμβαδὸν τοῦ κύκλου, πολλαπλασιάζομεν τὴν ἀκτῖνα ἐπὶ τὸν ἑαυτόν της καὶ τὸ γινόμενον ἐπὶ 3,14.

*Επομένως :

Διὰ νὰ εῖναι μεριμνῶν τὸ ἐμβαδὸν τῆς ὅλης έπιφανείας τοῦ κυλικοῦ κυλίνδρου, προσθέτομεν εἰς τὸ ἐμβαδὸν τῆς κυρτῆς έπιφανείας τοῦ κυλίνδρου καὶ τὸ ἐμβαδὸν τῶν δύο βάσεων αὐτοῦ.

Δηλ. Ἐμβ. δλ. ἔπιφ. κυλίνδρου = Ἐμβ. κυρτ. ἔπιφ. + Ἐμβ. 2 βάσεων.

Παράδειγμα. Τὸ ὕψος μιᾶς κυλινδρικῆς στήλης εἶναι 11,5 μ. καὶ ἡ ἀκτὶς τῆς βάσεώς της 1,25 μ. Πόσον εἶναι τὸ ἐμβαδὸν τῆς ὅλης έπιφανείας τῆς στήλης ;

- α) Διάμετρος βάσεως $= 1,25 \times 2 = 2,50$ μ.
 β) Μήκος περιφ. βάσεως $= 2,50 \times 3,14 = 7,85$ μ.
 γ) 'Εμβ. κυρτ. ἐπιφ. $= 7,85 \times 11,5 = 90,275$ τ.μ.
 δ) 'Εμβ. μιᾶς βάσεως $= 1,25 \times 1,25 \times 3,14 = 4,906250$ τ.μ.
 ε) 'Εμβ. όλικ. ἐπιφ. $= 90,275 + 4,906250 + 4,906250 = 100,0875$ τ.μ.

'Ερωτήσεις

- α) Πώς εύρισκεται τὸ ἐμβαδὸν τῆς κυρτῆς ἐπιφανείας τοῦ κυκλικοῦ κυλίνδρου καὶ πῶς τῆς όλικῆς ἐπιφανείας του ;
 β) Τί σχῆμα ἔχει τὸ ἀνάπτυγμα τῆς κυρτῆς ἐπιφανείας τοῦ κυκλικοῦ κυλίνδρου ;
 γ) Τί σχῆμα ἔχουν αἱ βάσεις τοῦ κυκλικοῦ κυλίνδρου ;

Προβλήματα

66. Προκειμένου νὰ καλύψωμεν μὲ χαρτὶ τὴν κυρτὴν ἐπιφάνειαν ἐνὸς κυκλικοῦ κυλίνδρου ὕψους 15 ἑκ. καὶ μήκους περιφερείας βάσεως 20 ἑκ., τί σχῆμα πρέπει νὰ κόψωμεν ἀπὸ τὸ χαρτὶ καὶ πόσον ἐμβαδὸν πρέπει νὰ ἔχῃ τοῦτο ;

67. Προκειμένου νὰ χρωματίσωμεν ἔξωτερικῶς ἕνα σωλῆνα, τοῦ δποίου ἡ περιφέρεια εἰναι 3,25 μ. καὶ τὸ μῆκος (ὕψος) 13,14 μ., πόσα χρήματα θὰ πληρώσωμεν πρὸς 2,60 δρχ. τὸ τετρ. μέτρον ;

68. 'Υπολογίσατε τὸ ἐμβαδὸν τῆς κυρτῆς ἐπιφανείας κυκλικοῦ κυλίνδρου, ὁ δποῖος ἔχει μῆκος περιφερείας βάσεως 15,7 ἑκ. καὶ ὕψος 70 ἑκατοστόμετρα.

69. Δύο διαμερίσματα ἐνὸς ἐργοστασίου συνδέονται μεταξύ των μὲ κυλινδρικὸν ἀγωγὸν διαμέτρου 1,75 μ. καὶ μήκους 432 μέτρων. Νὰ εύρεθῇ : α) τὸ ἐμβαδὸν τῆς κυρτῆς ἐπιφανείας τοῦ ἀγωγοῦ καὶ β) πόσον κοστίζει ὁ ἔξωτερικὸς χρωματισμὸς αὐτοῦ πρὸς 12 δρχ. τὸ τ. μέτρον.

70. "Ἐνα κυλινδρικὸν μολύβι ἔχει μῆκος (ὕψος) 20 ἑκ. καὶ διάμετρον βάσεως 8 χιλιοστὰ τοῦ μέτρου. Πόσον εἰναι τὸ ἐμβαδὸν τῆς όλικῆς ἐπιφανείας του ;

71. Θέλομεν νὰ κατασκευάσωμεν δοχεῖον κυλινδρικόν, ἀνοικτὸν πρὸς τὰ ἄνω, ὑψους 2 μ. καὶ μὲ ἀκτίνα βάσεως 0,75 μ. Νὰ εύρεθῇ : α) τὸ ἐμβαδὸν τοῦ ἀπαιτουμένου τσίγκου καὶ β) τὸ κόστος τοῦ δοχείου πρὸς 82 δρχ. τὸ τ.μ.

72. Προκειμένου νὰ κατασκευάσωμεν κυλινδρικὸν δοχεῖον μετὰ καλύμματος, ὑψους 0,55 μ. καὶ διαμέτρου βάσεως 0,40 μ., πόσον θὰ κοστίσῃ τοῦτο, ἀν δ τσίγκος τιμᾶται 90 δρχ. τὸ τ.μ. καὶ πληρώσωμεν εἰς τὸν τεχνίτην 25 δρχ. διὰ τὴν ἐργασίαν του ;

73. "Ἐνα ἐργοστάσιον κυτιοποιίας ἔλαβε παραγγελίαν διὰ τὴν κατασκευὴν 5000 δοχείων κυλινδρικῶν. Κάθε δοχεῖον νὰ ἔχῃ ὑψος 1,8 παλάμας καὶ ἀκτίνα βάσεως 6 ἑκ. Πόσα τετρ. μέτρα τσίγκου θὰ χρειασθῇ διὰ τὴν κατασκευὴν των ;

3. "Ογκος κυκλικοῦ κυλίνδρου

Διὰ νὰ εὕρωμεν τὸν ὅγκον τοῦ κυκλικοῦ κυλίνδρου ἐργαζόμεθα ὡς ἔξῆς : Λαμβάνομεν δύο δοχεῖα τοῦ αὐτοῦ ὑψους καὶ τοῦ αὐτοῦ ἐμβαδοῦ βάσεως των. Τὸ ἐνα δοχεῖον ἀπ' αὐτὰ ἔχει σχῆμα ὀρθογωνίου παραλληλεπιπέδου καὶ τὸ ἄλλο κυκλικοῦ κυλίνδρου.

Γειζόμεν τελείως τὰ δοχεῖα αὐτὰ μὲ νερὸν καὶ βλέπομεν ὅτι χωροῦν ἵσον ὅγκον ὕδατος· ἄρα τὰ δοχεῖα αὐτὰ ἔχουν τὸν ἴδιον ὅγκον.

Γνωρίζομεν ὅμως ὅτι ὁ ὅγκος τοῦ ὀρθογωνίου παραλληλεπιπέδου εὑρίσκεται, ἀν πολλαπλασιάσωμεν τὸ ἐμβαδὸν τῆς βάσεως του ἐπὶ τὸ ὑψος του. Ἐπομένως καὶ ὁ ὅγκος τοῦ κυλίνδρου εὑρίσκεται κατὰ τὸν ἴδιον τρόπον. Δηλαδή :

Διὰ νὰ εὕρωμεν τὸν ὅγκον τοῦ κυκλ. κυλίνδρου, πολλαπλασιάζομεν τὸ ἐμβαδὸν τῆς βάσεως αὐτοῦ ἐπὶ τὸ ὑψος του.

Δηλ. "Ογκος κυκλ. κυλίνδρου=ἐμβαδὸν βάσεως × ὑψος.

Σημείωσις : Ἐκ τῶν ἀνωτέρω προκύπτει ὅτι, ὅταν γνωρίζωμεν τὸν ὅγκον ἐνὸς κυλίνδρου καὶ τὸ ὑψος αὐτοῦ, δυνάμεθα νὰ εὕρωμεν τὸ ἐμβαδὸν τῆς βάσεως του, ἀν διαιρέσωμεν τὸν ὅγκον τοῦ κυλίνδρου διὰ τοῦ ὑψους του. Δηλαδή :

$$\text{Έμβαδὸν βάσεως κυκλ. κυλίνδρου} = \frac{\text{ὅγκος κυκλ. κυλίνδρου}}{\text{ύψους}}$$

Ἐφαρμογαὶ :

Παράδειγμα 1. Τὸ ἐμβαδὸν τῆς βάσεως ἐνὸς κυκλ. κυλίνδρου εἶναι 26 τετρ. παλάμαι καὶ τὸ ὕψος του 8,5 παλ. Πόσος εἶναι ὁ ὅγκος τοῦ κυλίνδρου;

Λύσις. Ὁγκος κυκλ. κυλίνδρου = ἔμβ. βάσεως × ὕψος = $26 \times 8,5 = 221$ κ. παλ.

Παράδειγμα 2. Ὁ ὅγκος ἐνὸς κυκλ. κυλίνδρου εἶναι 4,5 κ.μ. καὶ τὸ ὕψος του 1,8 μ. Πόσον εἶναι τὸ ἐμβαδὸν τῆς βάσεώς του;

Λύσις : Ἐμβ. βάσεως κυκλ. κυλίνδρου = $\frac{\text{ὅγκος κυλίνδρου}}{\text{ύψους}} = \frac{4,5}{1,8} = 2,5$ τ.μ.

Ἐρωτήσεις

α) Πῶς εύρισκεται ὁ ὅγκος τοῦ κυκλ. κυλίνδρου;

β) Διατὶ λέγομεν ὅτι ὁ ὅγκος ἐνὸς κυκλ. κυλίνδρου εύρισκεται δπως καὶ ὁ ὅγκος τοῦ δρθιογωνίου παραλληλεπιπέδου;

γ) Πῶς εύρισκεται τὸ ἐμβαδὸν τῆς βάσεως ἐνὸς κυλίνδρου, ὅταν γνωρίζωμεν τὸν ὅγκον τοῦ κυλίνδρου καὶ τὸ ὕψος του;

δ) Εἶναι δυνατὸν νὰ εὔρωμεν τὸ ὕψος ἐνὸς κυλίνδρου; τὶ πρέπει νὰ γνωρίζωμεν καὶ τὶ πρᾶξιν θὰ κάμωμεν;

Προβλήματα

74. Ἔνας κυκλ. κύλινδρος ἔχει ἀκτίνα βάσεως 10 ἑκ. καὶ ὕψος 30 ἑκ. Πόσον ὅγκον ἔχει;

75. Ἡ διάμετος τῆς βάσεως ἐνὸς κυλινδρικοῦ δοχείου εἶναι 0,80 μ. καὶ τὸ ὕψος του 2,50 μ. Πόσος εἶναι ὁ ὅγκος του; Πόσα κ.μ. γάλα χωρεῖ;

76. Ἔνας κύλινδρος ἔχει ὅγκον 3,5 κ.π. καὶ ὕψος 7 ἑκ. Ποιὸν εἶναι τὸ ἐμβαδὸν τῆς βάσεώς του;

77. Ἐργάτης, διὰ νὰ ἀνοίξῃ ἔνα κυλινδρικὸν φρέαρ (πηγάδι), ζητεῖ 185 δρχ. τὸ κυβ. μέτρον. Πόσας δρχ. θὰ λάβῃ διὰ τὸ ἄνοιγμα τοῦ φρέατος, τὸ ὅποιον ἔχει περιφέρειαν βάσεως 6,28 μ. καὶ ὕψος 15,75 μέτρα ;

78. Πόσα κυβικὰ μέτρα χῶμα πρέπει νὰ βγάλωμεν ἐκ τῆς γῆς, διὰ νὰ ἀνοίξωμεν φρέαρ (πηγάδι) κυλινδρικὸν βάθους 12 μ. καὶ διαμέτρου 2,5 μέτρων ;

79. Μία βρύση παρέχει 15 κυβ. παλάμας ὕδατος εἰς ἔνα πρῶτον λεπτὸν τῆς ὥρας. Πόσον χρόνον χρειάζεται ἡ βρύση, διὰ νὰ γεμίσῃ κυλινδρικὸν δοχεῖον, τὸ ὅποιον ἔχει διάμετρον βάσεως 0,8 μ. καὶ ὕψος 75 ἑκατοστόμετρα ;

80. Μία κυλινδρικὴ δεξαμενὴ ἔχει ἐσωτερικὴν ἀκτῖνα βάσεως 1,26 μ. καὶ ὕψος 2,4 μ. Νὰ εύρεθῇ : α) Πόσας κυβ. παλάμας νερὸ (ἀπεσταγμένον καὶ θερμοκρασίας 4°) χωρεῖ καὶ β) πόσα χιλιόγραμμα ζυγίζει τὸ νερό ;

81. Τὸ περιεχόμενον ἐνὸς βαρελίου εἶναι 141,3 κυβ. παλάμαι. Τοῦτο θέλομεν νὰ μεταφέρωμεν εἰς φιάλας κυλινδρικὰς μὲ ἀκτῖνα βάσεως 3 ἑκ. καὶ ὕψος 10 ἑκ. Πόσας φιάλας θὰ χρειασθῶμεν ;

82. Μία μαρμαρίνη κυλινδρικὴ στήλη ἔχει περιφέρειαν βάσεως 9,42 μ. καὶ ὕψος 4 μ. Νὰ εύρεθῇ τὸ βάρος της, ἀν τὸ εἰδ. βάρος τοῦ μαρμάρου εἶναι 2,7.

83. Δύο δεξαμεναὶ εἶναι γεμᾶται μὲ νερό. Ἡ μία εἶναι κυλινδρικὴ ὕψους 4 μ. καὶ ἐμβαδοῦ βάσεως 12 τ.μ. καὶ ἡ ἄλλη εἶναι κυβικὴ μὲ ἀκτῖνὴν 4 μέτρων. Ποία δεξαμενὴ περιέχει περισσότερον νερὸ καὶ πόσον ;

Κατασκευὴ κυκλικοῦ κυλίνδρου

Διὰ νὰ κατασκευάσωμεν κυκλικὸν κύλινδρον ἀπὸ χαρτόνι, σχεδιάζομεν εἰς τὸ χαρτόνι τὸ ἀνάπτυγμα τῆς ὁλικῆς ἐπιφανείας τοῦ κυκλικοῦ κυλίνδρου (σχ. 22), χωριστὰ τὸ δρθογώνιον παραλληλόγραμμον μὲ τὰς διαστάσεις ποὺ θέλομεν καὶ χωριστὰ τοὺς δύο κύκλους. Κολλῶμεν κατόπιν τὰς δύο ἀπέναντι πλευρὰς τοῦ δρθογωνίου (τὰ ὑψη), διπότε ἔχομεν τὴν κυρτήν ἐπιφάνειαν τοῦ κυκλικοῦ κυλίνδρου. Τέλος εἰς τὰ ἀνοικτὰ μέρη αὐτῆς (ἄνω καὶ κάτω) ἐπικολλῶμεν τοὺς δύο κύκλους, ποὺ ἀποτελοῦν τὰς βάσεις τοῦ κυλίνδρου καὶ ἔχομεν ἔτοιμον τὸν κυκλικὸν κύλινδρον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΚΩΝΟΣ

1. Γεωμετρικά στοιχεῖα τοῦ κώνου

Τὸ στερεὸν σῶμα, τὸ δποῖον παριστάνει τὸ σχῆμα 23, λέγεται **Κυκλικὸς Κῶνος**. Σώματα μὲ σχῆμα κυκλικοῦ κώνου εἰναι τὸ χωνί, ἡ σκηνή, ἡ στέγη μερικῶν πύργων, ἡ στέγη ἀνεμομύλων κλπ.



Συνήθως ὁ κυκλικὸς κῶνος ἀπαντᾷ ἡνωμένος μὲ τὸν κύλινδρον, τοῦ δποίου ἀποτελεῖ τὴν στέγην.

‘Ο κυκλικὸς κῶνος περικλείεται ἀπὸ ἓνα κύκλον, ὁ δποῖος λέγεται **βάσις** τοῦ κώνου, καὶ ἀπὸ μίαν καμπύλην ἐπιφάνειαν, ἡ δποία καταλήγει εἰς ἓνα σημεῖον **K** εύρισκόμενον ἔκτος τῆς βάσεως. ‘Η καμπύλη ἐπιφάνεια λέγεται **κυρτὴ ἐπιφάνεια** τοῦ κώνου, τὸ δὲ σημεῖον **K**, εἰς τὸ δποῖον τελειώνει αὐτῇ, λέγεται **κορυφὴ** τοῦ κώνου.

‘Η ἀπόστασις **KO** τῆς κορυφῆς τοῦ κώνου ἀπὸ τὸ κέντρον τῆς βάσεως αὐτοῦ λέγεται **ὕψος** ἢ **ἄξων** τοῦ κώνου. ‘Η ἀπόστασις **KA** τῆς κορυφῆς τοῦ κώνου ἀπὸ οἰονδήποτε σημεῖον τῆς περιφερείας τῆς βάσεως αὐτοῦ λέγεται **πλευρὰ** τοῦ κώνου.

Εἰς τὸν κῶνον ἔχομεν καὶ τὴν **ἀκτίνα** αὐτοῦ, ἡ δποία εἰς τὸ σχῆμα μας εἰναι ἡ **OA**, δηλ. ἡ ἀκτίς τοῦ κύκλου τῆς βάσεως τοῦ κώνου.

Πᾶς προκύπτει ὁ κυκλικὸς κῶνος; ‘Ο κῶνος αὐτὸς προκύπτει ἀπὸ ἓνα δρθιογώνιον τρίγωνον, τὸ δποῖον κάμνει πλήρη στροφήν, κινούμενον πάντοτε κατὰ τὴν αὐτὴν φορὰν (διεύθυνσιν), γύρω ἀπὸ μίαν ἀπὸ τὰς καθέτους πλευράς του, ἡ δποία μένει ὀκίνητος (σχ. 24).




Τότε ή ἀκίνητος πλευρά τοῦ τριγώνου ἀποτελεῖ τὸ ὑψος ἢ τὸν ἄξονα τοῦ κυκλικοῦ κώνου. Ἡ κάθετος πρὸς τὸ ὑψος πλευρὰ τοῦ τριγώνου γράφει τὴν βάσιν τοῦ κώνου καὶ ἡ ὑποτείνουσα τοῦ ὁρθογών. τριγώνου διαγράφει μίαν καμπύλην ἐπιφάνειαν, ἣτις λέγεται παρά-πλευρος ἐπιφάνεια τοῦ κώνου.

2. Ἐμβαδὸν ἐπιφανείας κυκλικοῦ κώνου

α) Ἐμβαδὸν κυρτῆς ἐπιφανείας κυκλικοῦ κώνου

Ἄν τὴν κυρτήν ἐπιφάνειαν ἐνὸς κυκλικοῦ κώνου καλύψωμεν ἀκρι-βῶς μὲ φύλλον χάρτου καὶ κατόπιν ἀπλώσωμεν τοῦτο ἐπάνω εἰς

τὸ τραπέζι, θὰ παρατηρήσωμεν ὅτι τὸ ἀν-πτυγμά της ἔχει σχῆμα κυκλικοῦ τομέως (σχ. 25).



Είναι φανερὸν ὅτι τὸ τόξον AB τοῦ κυκλι-κοῦ τομέως είναι ἵσον μὲ τὸ μῆκος τῆς περι-φερείας τῆς βάσεως τοῦ κώνου, ἡ δὲ ἀκτὶς KA είναι ἵση μὲ τὴν πλευρὰν τοῦ κώνου. Ἐπί-στης τὸ ἐμβαδὸν τοῦ κυκλικοῦ τομέως είναι ἵσον μὲ τὸ ἐμβαδὸν τῆς κυρτῆς ἐπιφανείας τοῦ κώνου.

Τὸ ἐμβαδὸν τοῦ κυκλικοῦ τομέως, ὡς γνωρίζομεν, εύρισκεται, ἀν πολλαπλασιάσωμεν τὸ μῆκος τοῦ τόξου AB ἐπὶ τὸ ἥμισυ τῆς ἀκτῆς KA. Ἐπομένως :

Διὰ νὰ εὑρωμεν τὸ ἐμβαδὸν τῆς κυρτῆς ἐπιφανείας ἐρὸς κυ-κλικοῦ κώνου, πολλαπλασιάζομεν τὸ μῆκος τῆς περιφερείας τῆς βάσεως τοῦ κώνου ἐπὶ τὸ ἥμισυ τῆς πλευρᾶς του.

Δηλ. Ἐμβ. κυρτῆς ἐπιφ. κυκλ. κώνου

$$= \frac{\text{μῆκος περ. βάσ.} \times \text{πλευρ.}}{2}$$

Σημείωσις. Τὸ μῆκος τῆς περιφερείας προκύπτει, ὅπως γνωρί-

ζομεν, αν πολλαπλασιάσωμεν άκτινα $\times 2 \times 3,14$. "Αν έπομένως άναλύσωμεν τὸν τύπον εύρεσεως τοῦ ἐμβαδοῦ τῆς κυρτῆς ἐπιφανείας τοῦ κώνου, θὰ ἔχωμεν :

$$\frac{\text{μῆκος περιφ. βάσεως} \times \text{πλευράν}}{2} = \frac{\alpha \times 2 \times 3,14 \times \text{πλευράν}}{2}$$

Καὶ μετὰ τὴν ἀπλοποίησιν μὲ τὸ 2 ἔχομεν : $\alpha \times 3,14 \times \text{πλευράν}$. "Ωστε δὲ ἀνωτέρω κανῶν δύναται νὰ διατυπωθῇ καὶ ἔτσι:

Διὰ νὰ εῦρωμεν τὸ ἐμβαδὸν τῆς κυρτῆς ἐπιφανείας ἐνὸς κυκλ. κώνου, πολλαπλασιάζομεν τὴν ἀκτῖνα τῆς βάσεως ἐπὶ τὴν πλευράν του καὶ τὸ γινόμενον ἐπὶ 3,14.

Δηλ. Ἐμβ. κυρτῆς ἐπιφανείας κυκλ. κώνου = ἀκτῖς × πλευράν × 3,14.

Παράδειγμα. Τὸ μῆκος τῆς περιφερείας τῆς βάσεως ἐνὸς κυκλ. κώνου είναι 3,20 μ. καὶ ἡ πλευρά του 0,8 μ. Πόσον είναι τὸ ἐμβαδὸν τῆς κυρτῆς ἐπιφανείας του ;


$$\text{Λύσις. } \text{Ἐμβ. κυρτ. ἐπιφ. κώνου} = \frac{\text{μῆκος περιφ. βάσ.} \times \text{πλευράν}}{2} = \\ \frac{3,20 \times 0,8}{2} = \frac{2,56}{2} = 1,28 \text{ τ.μ.}$$

6) Ἐμβαδὸν δλικῆς ἐπιφανείας κυκλ. κώνου

Τὸ σχῆμα 26 παριστάνει τὸ ἀνάπτυγμα τῆς δλικῆς ἐπιφανείας τοῦ κυκλικοῦ κώνου.
Ἐξ αὐτοῦ εὐκόλως συμπεραίνομεν ὅτι :

Διὰ νὰ εῦρωμεν τὸ ἐμβαδὸν τῆς δλικῆς ἐπιφανείας τοῦ κυκλ. κώνου, προσθέτομεν εἰς τὸ ἐμβαδὸν τῆς κυρτῆς ἐπιφανείας τοῦ κώνου καὶ τὸ ἐμβαδὸν τῆς κυκλικῆς βάσεώς του.

Δηλ. Ἐμβ. δλ. ἐπιφ. Κώνου = Ἐμβ. κυρτῆς ἐπιφανείας + Ἐμβ. βάσεως.



Παράδειγμα. Ἡ ἀκτὶς τῆς βάσεως ἐνὸς κυκλ. κώνου εἶναι 0,3 μ. ἡ δὲ πλευρὰ τοῦ κώνου 1 μ. Νὰ εὑρεθῇ τὸ ἐμβαδὸν τῆς ὁλικῆς ἐπιφανείας τοῦ κώνου.

Λύσις. α) Ἐμ. κυρτ. ἐπιφ. κώνου = ἀκτὶς × πλευρὰν × 3,14 = $0,3 \times 1 \times 3,14 = 0,942$ τ.μ. (Εἰς τὸ πρόβλημα αὐτό, ἐπειδὴ γνωρίζομεν τὴν ἀκτῖνα, ἐφαρμόζομεν διὰ τὴν λύσιν του πρὸς εὔκολίαν μας τὸν δεύτερον κανόνα εύρέσεως τοῦ ἐμβαδοῦ τῆς κυρτῆς ἐπιφανείας τοῦ κώνου).

β) Ἐμ. βάσεως = ἀκτ. × ἀκτ. × 3,14 = $0,3 \times 0,3 \times 3,14 = 0,2826$ τ.μ.

γ) Ἐμβ. ὀλ. ἐπιφ. κυκλικοῦ κώνου = $0,942 + 0,2826 = 1,2246$ τ.μ.

*Ἐρωτήσεις

α) Πῶς εύρισκεται τὸ ἐμβαδὸν τῆς κυρτῆς ἐπιφανείας κυκλικοῦ κώνου;

β) Τί σχῆμα ἔχει τὸ ἀνάπτυγμα τῆς κυρτῆς ἐπιφανείας κυκλικοῦ κώνου;

γ) Διατὶ λέγομεν ὅτι τὸ ἐμβαδὸν τῆς κυρτῆς ἐπιφανείας τοῦ κυκλικοῦ κώνου εύρισκεται ὅπως καὶ τὸ ἐμβαδὸν τοῦ κυκλικοῦ τομέως;

δ) Πῶς εύρισκεται τὸ ἐμβαδὸν τῆς ὁλικῆς ἐπιφανείας κυκλικοῦ κώνου;

ε) Νὰ ἀναφέρετε 5 σώματα μὲ σχῆμα κυκλ. κώνου.

Προβλήματα

84. "Ενας κυκλικὸς κῶνος ἔχει ἀκτῖνα βάσεως 0,45 μ. καὶ πλευρὰν 3,2 μ. Νὰ εὕρεθῇ τὸ ἐμβαδὸν τῆς κυρτῆς ἐπιφανείας του.

85. "Ενας τουρίστας θέλει νὰ κατασκευάσῃ ἀπὸ ὄψασμα κωνικὴν σκηνὴν, ἡ ὅποια νὰ ἔχῃ πλευρὰν 2,5 μέτρα καὶ ἀκτῖνα βάσεως 1,65 μ. Πόσον θὰ κοστίσῃ τὸ ὄψασμα, ἀν τὸ τετραγωνικόν του μέτρον τιμᾶται 120 δραχμάς;

86. "Η διάμετρος τῆς βάσεως τῆς κωνικῆς στέγης ἐνὸς πύργου εἶναι 6 μ. καὶ ἡ πλευρά της 9,20 μ. Πόσα τ.μ. λαμαρίνας χρειάζονται, διὰ νὰ καλυφθῇ ἡ στέγη αὐτῆς;

87. "Ενὸς κωνικοῦ δοχείου ἡ πλευρά εἶναι 75 ἑκ. καὶ ἡ περιφέ-

ρεια τῆς βάσεως του 1,35 μ. Πόσον εἶναι τὸ ἐμβαδὸν τῆς ὁλικῆς ἐπιφανείας του;


88. Προκειμένου νὰ κατασκευάσωμεν τέσσαρα κωνικὰ δοχεῖα μὲ πλευρὰν 1,10 μ. καὶ διάμετρον βάσεως 80 ἑκ. τὸ καθένα, πόσα χρήματα θὰ χρειασθῶμεν, ὃν δὲ τοιγκος τιμᾶται πρὸς 92 δρχ. τὸ τετρ. μέτρον καὶ δὲ τεχνίτης θέλει 125 δρχ. δὶ' ὅλην τὴν ἔργασίαν;

89. Πόσον μῆκος ὑφάσματος χρειάζεται, διταν τὸ πλάτος εἶναι 0,60 μ., διὰ νὰ κατασκευασθῇ σκηνὴ κωνικὴ μὲ πλευρὰν 4 μέτρα καὶ περιφέρειαν βάσεως 15 μέτρα; (50 μ.).

Σημείωσις. Διὰ νὰ εὔρωμεν τὸν ὅγκον τοῦ κυκλικ. κώνου, ἔργαζόμεθα ὡς ἔξῆς:

3. "Ογκος κυκλικοῦ κώνου

Διὰ νὰ εὔρωμεν τὸν ὅγκον τοῦ κυκλικ. κώνου, ἔργαζόμεθα ὡς ἔξῆς:



Λαμβάνομεν δύο δοχεῖα, τὸ ἕνα κωνικὸν καὶ τὸ ἄλλο κυλινδρικόν, τὰ διποῖα νὰ ἔχουν ἴσην βάσιν καὶ ἴσον ὑψος (σχ. 27).

"Αν τὸ κωνικὸν δοχεῖον τὸ γεμίσωμεν μὲ νερὸ καὶ χύσωμεν τοῦτο εἰς τὸ κυλινδρικὸν δοχεῖον, θὰ παρατηρήσωμεν ὅτι θὰ χρειασθῇ νὰ ἐπαναλάβωμεν τρεῖς φορὰς τὸ ἴδιον πρᾶγμα μέχρις ὃτου γεμίσῃ τελείως τὸ κυλινδρικὸν δοχεῖον.

Τοῦτο φανερώνει ὅτι δὲ ὅγκος τοῦ κώνου εἶναι τρεῖς φορὰς μικρό-

τερος ἀπὸ τὸν ὅγκον τοῦ κυλίνδρου, ὁ ὅποιος ἔχει ἵσην βάσιν καὶ ἵσον ὑψος μὲ αὐτόν.

Καὶ ἀφοῦ τὸν ὅγκον τοῦ κυλίνδρου εύρισκομεν, ἄν πολλαπλασιάσωμεν τὸ ἐμβαδὸν τῆς βάσεως αὐτοῦ ἐπὶ τὸ ὑψος του καὶ τὸ γινόμενον διαιροῦμεν διὰ 3.

$$\Delta\text{ηλ. ὅγκος κώνου} = \frac{\text{ἐμβ. βάσεως} \times \text{ὑψος}}{3}$$

Παράδειγμα. Νὰ ενδεθῇ ὁ ὅγκος κώνου, ὁ ὅποιος ἔχει ἀκτῖνα βάσεως 0,4 μ. καὶ ὑψος 3 μ.

Λύσις. α) Ἐμβ. βάσ. κώνου = ἀκτῖς × ἀκτῖνα × 3,14 = 0,4 × 0,4 × 3,14 = 0,5024 τ.μ.

$$\beta) \text{ "Ογκος κώνου} = \frac{\text{ἐμβ. βάσ.} \times \text{ὑψος}}{3} = \frac{0,5024 \times 3}{3} = \\ = \frac{1,5072}{3} = 0,5024 \text{ κ.μ.}$$

Προβλήματα

90. "Ενας κώνος ἔχει ἀκτῖνα βάσεως 10 ἑκ. καὶ ὑψος 30 ἑκ. Πόσος εἰναι ὁ ὅγκος του ;

91. "Ενα δοχείον κωνικὸν μὲ ἐμβαδὸν βάσεως 28,26 τ.ἑκ. καὶ ὑψος 12,5 ἑκ. εἰναι πλῆρες ὑδραργύρου. Πόσου εἰναι τὸ βάρος τοῦ περιεχομένου ὑδραργύρου ; (Εἰδικὸν βάρος ὑδραργύρου 13,6).

92. Ἐντὸς μιᾶς κωνικῆς σκηνῆς ὑψους 4,5 μ. καὶ μήκους περιφερίας βάσεως 31,4 μ. διαιμένουν 15 πρόσκοποι. Πόσα κυβικὰ μέτρα ἀέρος ἀναλογοῦν εἰς κάθε πρόσκοπον ;

93. Τεμάχιον σιδήρου σχήματος κώνου ἔχει ἀκτῖνα βάσεως 12,5 ἑκ. καὶ ὑψος τὸ διπλάσιον τῆς ἀκτίνος τῆς βάσεώς του. Πόσον ζυγίζει τοῦτο ; (Εἰδικὸν βάρος σιδήρου 7,8).

94. Τὸ ὑψος ἐνὸς κωνικοῦ δοχείου εἰναι τὰ $\frac{3}{4}$ τῆς διαμέτρου τῆς βάσεώς του καὶ ἡ περιφέρεια τῆς βάσεως 12,56 μέτρα. Νὰ εύρεθῇ : α) ὁ ὅγκος τοῦ δοχείου καὶ β) πόσα κιλὰ πετρέλαιον χωρεῖ τοῦτο. (Εἰδ. βάρος πετρελαίου 0,84).

95. Κωνικὸν δοχεῖον ἔχει μῆκος περιφερείας βάσεως 25,12 μ. καὶ ὑψος 5,40 μ. Πόσος εἰναι ὁ ὅγκος τοῦ δοχείου τούτου καὶ πόσα κιλὰ ὕδατος (ἀπεσταγμένου) χωρεῖ ;

Κατασκευὴ κυκλικοῦ κώνου

Διὸ νὰ κατασκευάσωμεν κυκλικὸν κῶνον μὲ χαρτόνι, σχεδιάζομεν ἐπ' αὐτοῦ τὸ ἀνάπτυγμα τῆς δόλικῆς ἐπιφανείας τοῦ κώνου (σχ. 26). Κόπτομεν κατόπιν τὸν κυκλικὸν τομέα, τὸν τυλίγομεν καὶ τὸν κολλῶμεν μὲ κόλλαν. "Ἐτοι ἔχομεν τὴν παράπλευρον ἐπιφάνειαν τοῦ κυκλικοῦ κώνου. "Ἐπειτα ἐφαρμόζομεν εἰς τὸ ἀνοικτὸν μέρος της τὴν κυκλικήν βάσιν καὶ ἔχομεν ἔτοιμον τὸν κυκλικὸν κῶνον.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ

96. "Ἐνα κτῆμα, σχήματος ὄρθιογωνίου, ἔχει μῆκος 500 μ. καὶ πλάτος 300 μ. Διὸ τοῦ κτήματος αὐτοῦ διῆλθε σιδηροδρομικὴ γραμμή, ἡ ὁποία ἀπέκοψε τριγωνικὸν τεμάχιον εἰς τὴν μίαν γωνίαν του βάσεως 225 μ. καὶ ὕψους 150 μέτρων. Νὰ εύρεθῇ : α)Πόσα στρέμματα ἔχει τὸ ἐμβαδὸν δλοκλήρου τοῦ κτήματος καὶ β) ποιὸν εἰναι τὸ ἐμβαδὸν εἰς στρέμματα τοῦ ἀποκοπέντος τριγωνικοῦ τμήματος τοῦ κτήματος.

97. Ἡ περίμετρος ἐνὸς ἰσοσκελοῦς τραπεζίου εἰναι 93 μ.' Εὰν τὸ μῆκος τῆς μεγάλης βάσεώς του εἰναι 32 μ. καὶ τῆς μικρᾶς 25 μ., πόσον εἰναι τὸ μῆκος ἑκάστης τῶν μῆτ παραλλήλων πλευρῶν του ;

98. Ἐπὸ ἓνα φύλλον λαμαρίνας, σχήματος τετραγώνου, πλευρᾶς 30 ἑκ. ἀπεκόπη ἓνας κύκλος περιφερείας 78,5 ἑκ. Νὰ εύρεθῇ α) ἡ διάμετρος τοῦ κύκλου (κατά προσέγγισιν χιλιοστοῦ),β) τὸ ἐμβαδὸν τοῦ ἀποκοπέντος κύκλου καὶ γ) τὸ ἐμβαδὸν τῆς λαμαρίνας, ποὺ ἀπέμεινε μετὰ τὴν ἀποκοπήν.

99. "Ενα τετραγωνικόν κηπάριον πλευρᾶς 3,60 μ. είναι ἑγγεγραμμένον εἰς κύκλον μὲν ἀκτῖνα 2,70 μ. Νὰ εὐρεθῇ α) τὸ ἐμβαδὸν τοῦ τετραγώνου, β) τὸ ἐμβαδὸν τοῦ κύκλου καὶ γ) τὸ ἐμβαδὸν τῶν 4 τμημάτων τοῦ κύκλου, τὰ δόποια εύρισκονται μεταξὺ τετραγώνου καὶ κύκλου.

100. "Ολαι αἱ ἀκμαὶ ἐνὸς κύβου ἔχουν μῆκος 12,96 μ. Πόσον εἶναι τὸ ἐμβαδὸν τῆς δλικῆς ἐπιφανείας του;

101. 'Η ἀκμὴ ἐνὸς κύβου είναι 1,20 μ. Πόσος εἶναι ὁ ὅγκος του : α) εἰς κυβ. μέτρα, β) εἰς κυβ. παλάμας, γ) εἰς κ. δακτύλους καὶ δ) εἰς κ. γραμμάς ;

102. "Ἐχομεν δύο κύβους· ὁ α' ἔχει ἀκμὴν 60 ἑκ. καὶ ὁ β' 1,8 μ. Πόσας φορὰς ὁ ὅγκος τοῦ β' κύβου είναι μεγαλύτερος τοῦ ὅγκου τοῦ α' κύβου ;

103. "Ἐχομεν δύο κύβους· ὁ α' ἔχει ἀκμὴν 50 ἑκ. καὶ ὁ β' τριπλασίαν τοῦ α'. Πόσας φορὰς ὁ ὅγκος τοῦ β' κύβου είναι μεγαλύτερος τοῦ ὅγκου τοῦ α' κύβου ;

104. "Ἐνα κιβώτιον, σχήματος ὀρθογωνίου παραλληλεπιπέδου, μὲ διαστάσεις $2 \times 1,5 \times 1,20$ μ. ἔχρωματίσθη ἔξωτερικῶς καὶ ἔστοιχισεν 126 δραχμάς. Πόσον ἔστοιχισε τὸ τ. μέτρον ;

105. Κιβώτιον μήκους 2 μ., πλάτους 40 ἑκ. καὶ ὕψους 1,4 μ. είναι πλῆρες σάπωνος, τοῦ δόποίου ἡ κάθε πλάκα ἔχει μῆκος 1,4 παλάμ., πλάτος δὲ καὶ ὕψος ἀνὰ 5 ἑκ. Πόσας πλάκας σάπωνος περιέχει τὸ κιβώτιον ;

106. "Ἐνα δωμάτιον τὸ ἐγεμίσαμεν τελείως μὲ 4.600 χαρτοδέματα, ἔκαστον τῶν δόποίων ἔχει ὅγκον 3,5 κυβ. παλάμας. Νὰ ὑπολογισθῇ ὁ ὅγκος τοῦ δωματίου εἰς κυβ. μέτρα.

107. "Ἐνα κουτὶ σχήματος ὀρθογωνίου παραλληλεπιπέδου ἔχει μῆκος 20 ἑκ., πλάτος 12 ἑκ. καὶ ὕψος 15 ἑκ. Πόσος εἶναι ὁ ὅγκος του ;

108. Μία δεξαμενή, σχήματος ὀρθογωνίου παραλληλεπιπέδου, ἔχει μῆκος 8 μ. καὶ πλάτος 4,5 μ. Πόσον βάθος (ὕψος) πρέπει νὰ ἔχῃ, διὰ νὰ χωρῇ 252 τόννους νερό ;

109. Πόσοι μαθηταὶ είναι δυνατὸν νὰ παραμένουν εἰς μίαν αἴθουσαν μὲ 8 μ. μῆκος, 6 μ. πλάτος καὶ 5 μ. ὕψος, ἃν εἰς ἔκαστον μαθητὴν πρέπει νὰ ἀναλογοῦν 4 κ.μ. ἀέρος ;

110. Μία έκκλησία στηρίζεται εις 6 κίονας (στύλους) άπό σκυρόδεμα (μπετέλων - άρμέ). Ό κάθε κίων ᔹχει σχήμα δρθιογωνίου παραλληλεπιπέδου με ύψος 5,20 μ. και μὲ βάσιν τετράγωνον πλευρᾶς 45 έκ. Νὰ εύρεθῇ α) δ συνολικὸς δγκος τῶν κιόνων καὶ β) πόσον ἐστοίχισεν ἡ κατασκευὴ των, ἃν τὸ σκυρόδεμα τιμᾶται 2000 δραχμ. τὸ κυβικὸν μέτρον.

111. Δεξαμενὴ ἑλαίου, σχήματος δρθιογωνίου παραλληλεπιπέδου, μήκους 6 μ., πλάτους 5 μ. καὶ ύψους 3 μ. περιέχει ἑλαιον ἔως τὰ $\frac{2}{3}$ τοῦ δγκου τῆς. Πόσος εἶναι δ ὅ δγκος τοῦ ἑλαίου, ποὺ περιέχει ;

112. Μία τετραγωνικὴ πυραμὶς ᔹχει πλευρὰν βάσεως 8,5 μ. καὶ ύψος ἐνὸς τῶν τριγώνων τῆς παραπλεύρου ἐπιφανείας της 15,40 μ. Ποιὸν εἶναι τὸ ἐμβαδὸν τῆς δλικῆς ἐπιφανείας της ;

113. Ἡ πλευρὰ τῆς βάσεως μιᾶς τετραγωνικῆς πυραμίδος εἶναι 4,5 μ. καὶ τὸ ύψος τῆς πυραμίδος 3,2 μ. Πόσος εἶναι δ ὅ δγκος της ;

114. Ἡ διάμετρος τῆς βάσεως ἐνὸς κυκλικοῦ κυλίνδρου εἶναι 0,30 μ. καὶ τὸ ύψος του 1,20 μ. Πόσον εἶναι τὸ ἐμβαδὸν τῆς δλικῆς ἐπιφανείας του ;

115. Ἐνὸς κυκλικοῦ κυλίνδρου ἡ περιφέρεια τῆς βάσεως εἶναι 12,56 μ. καὶ τὸ ύψος του 3,50 μ. Πόσον εἶναι τὸ ἐμβαδὸν τῆς δλικῆς ἐπιφανείας του ;

116. Κυλινδρικὸν δοχεῖον (ντεπόζιτον) μὲ διάμετρον βάσεως 1,20 μ. καὶ ύψος 1,80 μ. εἶναι γεμᾶτον λάδι. Πόσα κιλὰ λάδι περιέχει ; (Εἰδικὸν βάρος ἑλαίου 0,912).

117. Πόσας φιάλας δγκου 90 κυβ. ἔκ. δυνάμεθα νὰ γεμίσωμεν μὲ 180 κ. παλάμας οἴνου ;

118. Πόσας φιάλας δγκου 80 κυβ. ἔκ. δυνάμεθα νὰ γεμίσωμεν μὲ $\frac{1}{2}$ κ.μ. οἴνου ;

119. Ἡ διάμετρος τῆς βάσεως ἐνὸς κυκλικοῦ κώνου εἶναι 1,80 μ. καὶ ἡ πλευρά του 3,40 μ. Πόσα τ.μ. εἶναι ἡ κυρτὴ ἐπιφάνειά του ;

120. Θέλομεν νὰ κατασκευάσωμεν κωνικήν σκηνήν, πού νὰ ἔχῃ ἀκτίνα βάσεως 1,20 μ. καὶ πλευρὰν 3,60 μ. Πόσα τ.μ. ύφασμα θὰ χρειασθῇ διὰ τὴν κατασκευὴν τῆς καὶ πόσον θὰ στοιχίσῃ, ἐν τὸ τετρ. μέτρον κοστίζῃ 39,50 δραχμάς;

121. Ἡ περιφέρεια τῆς βάσεως ἔνδεις κυκλικοῦ κώνου ἔχει μῆκος 12,56 μ. Πόσον εἰναι τὸ ἐμβαδὸν τῆς ὁλικῆς ἐπιφανείας του, ὅταν ἡ πλευρά του εἰναι 4,50 μέτρα;

122. "Ενα δοχεῖον κωνικὸν ἔχει μῆκος περιφερείας βάσεως 6,28 μ. καὶ ὑψος 2,40 μ. Νὰ εύρεθῇ α) ὁ ὅγκος, β) πόσους τόνους νερὸν χωρεῖ καὶ γ) πόσα κιλὰ νερὸν χωρεῖ.

ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ

ΣΥΝΟΛΑ

Ἐννοια συνόλου. Τὸ μονομελὲς σύνολον, τὸ διμελὲς σύνολον, τὸ κενὸν σύνολον. Συμβολισμοὶ τῶν συνόλων. Σύνολα μὲ περισσότερα στοιχεῖα. Ἰσα σύνολα. Ἐνωσις συνόλων. Πλῆθος στοιχείων καὶ πληθικὸς ἀριθμὸς συνδλου.	Σελ.	5- 15
---	------	-------

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

ΠΟΣΑ

Τί λέγεται ποσόν. Ποσά ἀνάλογα καὶ ποσά ἀντίστροφα	»	16- 20
--	---	--------

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ

ΜΕΘΟΔΟΙ

Ἄπλῃ μέθοδος τῶν τριῶν.	»	21- 27
Ποσοστά	»	27- 38
Σύνθετος μέθοδος τῶν τριῶν	»	38- 45

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ

ΤΟΚΟΣ. Εὕρεσις τοῦ τόκου. Εὕρεσις τοῦ κεφαλαίου. Εὕρεσις τοῦ χρόνου. Εὕρεσις τοῦ ἐπιτοκίου. Χρῆσις βιοηθητικοῦ κεφαλαίου..	»	46- 66
ΥΦΑΙΡΕΣΙΣ. Εὕρεσις ἔνωτερικῆς ύφαιρέσεως. Εὕρεσις δινομαστικῆς ἀξίας. Εὕρεσις χρόνου προεξοφλήσεως. Εὕρεσις ἐπιτοκίου. Χρῆσις βιοηθητικοῦ ποσοῦ.	»	67- 74

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ

ΜΕΡΙΣΜΟΣ εἰς μέρη ἀνάλογα. Προβλήματα μερισμοῦ.	»	75- 84
Προβλήματα Ἐταιρείας.	»	85- 91

Προβλήματα μέσου όρου.	Σελ.	91- 93
Προβλήματα μίξεως. Κράματα.	»	93-100

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΚΤΟΝ

Χρῆσις γραμμάτων διά τὴν παράστασιν ἀριθμῶν καὶ ποσοτήτων	»	101-106
---	---	---------

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

Σύντομος ἐπανάληψις τῆς ὥλης τῆς Ε' τάξεως.	»	107-111
"Υλη ΣΤ' τάξεως.	»	

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

'Ἐπιφάνειαι. Στερεά σχήματα. Γεωμετρικά στερεά.	»	112-114
---	---	---------

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.

ΚΥΒΟΣ

Γεωμετρικά στοιχεῖα τοῦ κύβου. Πολύεδρον. Δίεδρος γωνία. 'Ιχνογράφησις κύβου. 'Εμβαδὸν ἐπιφανείας κύβου. Μέτρησις δύκου ἐνὸς σώματος.	»	115-125
Μονάδες δύκου. "Ογκος κύβου. Κατασκευὴ κύβου.	»	

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΠΙΠΕΔΟΝ

Γεωμετρικὰ στοιχεῖα τοῦ ὁρθογωνίου παραλληλεπιπέδου. 'Ιχνογράφησις. 'Εμβαδὸν ἐπιφανείας ὁρθογωνίου παραλληλεπιπέδου. "Ογκος ὁρθογωνίου παραλληλεπιπέδου. Κατασκευὴ ὁρθογωνίου παραλληλεπιπέδου	»	126-133
--	---	---------

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.

ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ

Γεωμετρικὰ στοιχεῖα τῆς πυραμίδος. 'Ιχνογράφησις πυραμίδος. ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΗ ΠΥΡΑΜΙΣ. 'Εμβαδὸν ἐπιφανείας τετραγωνικῆς πυραμίδος. "Ογκος τετραγωνικῆς πυραμίδος. Κατασκευὴ τετραγωνικῆς πυραμίδος	»	134-142
--	---	---------

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'.

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ

Γεωμετρικά στοιχεῖα τοῦ κυκλικοῦ κυλίνδρου. Ἐμβαδὸν ἐπιφανείας κυκλικοῦ κυλίνδρου. Ὁγκος κυκλικοῦ κυλίνδρου. Κατασκευή του. Σελ. 143-150

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'.

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΚΩΝΟΣ

Γεωμετρικά στοιχεῖα τοῦ κυκλικοῦ κώνου. Ἐμβαδὸν ἐπιφανείας κυκλικοῦ κώνου. Ὁγκος κυκλικοῦ κώνου. Κατασκευή του. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ » 151-157
» 158-160

'Επιμελητὴς 'Εκδόσεως ΗΛΙΑΣ ΝΤΖΙΩΡΑΣ ('Απ. Δ.Σ. 3489 /29-6-70)

'Εξώρυγγον ΑΡΙΑΣ ΚΟΜΙΑΝΟΥ



0020555955

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΟΥΛΗΣ

ΕΚΔΟΣΙΣ Ε', 1973 (ΠΙ) — ΑΝΤΙΤ. 150.000 — ΣΥΜΒΑΣΙΣ : 2293 /29-1-73
ΕΚΤΥΠΩΣΙΣ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ : Μ. ΠΕΧΑΙΒΑΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ - Α. Ε.



Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής