



# ΦΥΣΙΚΗ

## Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

002  
ΚΛΣ  
ΣΤ2Β  
1505

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ  
ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ  
ΑΘΗΝΑΙ 1970

E

1

9EK

Godier (A.)

ΦΥΣΙΚΗ Β/Γ 2236

# ΦΥΣΙΚΗ

A. GORDON, J. THOMAS, K. MOREAU

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ



ΔΩΡΕΑ  
ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΗΚΙΣΥΦ

Μετάφρασις: Ὑπὸ Γεωργίου Ἀνδρεάδη.

Μεταγλώττισις καὶ ἐπιμέλεια: Ὑπὸ Ἀναργ. Ζενάκου, Θεοφ. Παπαγεωργοπούλου  
καὶ Εὐαγγ. Μιλλεοῦνη.

*E* *Godier (A.)* *1* *95K*

# ΦΥΣΙΚΗ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΥΗ  
ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΩΝ  
Α. GODIER, C. THOMAS, M. MOREAU

Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ



21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΟΥΛΗ  
ΕΔΩΚΗΚΑΤΟ  
*Υφρ. Ευδ. Διδ. Βιβλίου*  
αριθ. υπ. δυν. 339 του έτους 1971

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ  
ΑΘΗΝΑΙ 1970

Ἡ Φυσική εἶναι μία ἀπὸ τὰς ἀρχαιότερας ἐπιστήμας τοῦ κόσμου. Ὁ Ἀριστοτέλης (384-322 π.Χ.) ἐχρησιμοποίησε διὰ πρώτην φοράν τὸν ὄρον Φυσική. Ὁ ὄρος Φυσική, καθὼς καὶ ἡ λέξις δεικνύει, σημαίνει σπουδὴν τῆς Φύσεως.

Εἰς τὴν Φυσικὴν κάθε ἀντικείμενον, τὸ ὁποῖον παρατηροῦμεν ἢ γενικῶς ἀντιλαμβανόμεθα διὰ τῶν αἰσθήσεών μας, τὸ ὀνομάζομεν *φυσικὸν σῶμα* ἢ ἀπλῶς *σῶμα*. Π.χ. τὸ βιβλίον, ὁ λίθος, τὸ ὕδωρ, ὁ ἀήρ, τὸ ἔδαφος κ.τ.λ. εἶναι φυσικὰ σῶματα.

Ἡ οὐσία, ἀπὸ τὴν ὁποῖαν ἀποτελοῦνται τὰ σῶματα, ὀνομάζεται *ὕλη*. Ὁ σίδηρος, τὸ ὕδωρ, ὁ ἀήρ εἶναι διάφοροι μορφαὶ ὕλης. Τὰ σῶματα διακρίνονται μεταξὺ τῶν ὄχι μόνον ἀπὸ τὸ εἶδος, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν ποσότητα τῆς ὕλης, ἀπὸ τὴν ὁποῖαν ἀποτελοῦνται. Οὕτω π.χ. ἡ ψαλὶς περιέχει περισσοτέραν ποσότητα ὕλης ἀπὸ τὴν βελὸννην καὶ τὸ νόμισμα τῶν δύο δραχμῶν περισσοτέραν ἀπὸ τῆς μιᾶς δραχμῆς.

Ὅλας τὰς μεταβολάς, τὰς ὁποίας παρατηροῦμεν εἰς τὴν φύσιν, καλοῦμεν *φυσικὰ φαινόμενα*. Ἐάν ἀφήσωμεν ἐκτεθειμένον εἰς θερμὸν μέρος τεμάχιον πάγου, θὰ παρατηρήσωμεν ὅτι θὰ τακῆ· τὸ ὕδωρ, τὸ ὁποῖον θερμαίνομεν εἰς δοχεῖον, βράζει καὶ μεταβάλλεται εἰς ἀτμὸν· ὁ λίθος, τὸν ὁποῖον ἀφίνομεν ἀπὸ ὑψηλά, πίπτει εἰς τὴν γῆν· τὸ ἠλεκτρικὸν ρεῦμα θερμαίνει τὸ σύρμα, ἀπὸ τὸ ὁποῖον διέρχεται, καὶ δύναται νὰ τὸ ἐρυθροπυρῶσῃ, ὅπως παρατηροῦμεν π.χ. εἰς τὸν ἠλεκτρικὸν λαμπτήρα.

Ἡ τῆξις τοῦ πάγου, ὁ βρασμὸς τοῦ ὕδατος, ἡ πτώσις τοῦ λίθου, ἡ θέρμανσις τοῦ σύρματος, ὁ ἀνεμὸς, ἡ ἀστραπή κ.τ.λ. εἶναι ὅλα φυσικὰ φαινόμενα.

Διὰ νὰ μελετήσωμεν ἕν φυσικὸν φαινόμενον, πρέπει εἰς τὴν ἀρχὴν νὰ τὸ ἐξετάσωμεν προσεκτικῶς ἢ, ὅπως λέγομεν, νὰ τὸ παρατηρήσωμεν. Π.χ., διὰ νὰ μελετήσωμεν τὸ φαινόμενον τῆς πτώσεως τῶν σωμάτων, δὲν ἀρκεῖ μόνον μίαν φοράν νὰ παρατηρήσωμεν πῶς πίπτει ἕν σῶμα. Πρέπει νὰ μάθωμεν ἐὰν ὑπάρχῃ διαφορὰ εἰς τὴν πτώσιν ἐνὸς μεγάλου καὶ ἐνὸς μικροῦ εἰς βάρους σώματος ἢ ἐὰν ἔχη σημασίαν ὁ ὄγκος τοῦ σώματος ἢ τὸ ὕψος, ἀπὸ τὸ ὁποῖον πίπτει τοῦτο. Δι' ὅλα αὐτὰ δυνάμεθα νὰ βεβαιωθῶμεν, ἐὰν παρατηρήσωμεν διαφόρους περιπτώσεις πτώσεως σωμάτων. Ἀντὶ ὅμως νὰ ἀναμένωμεν νὰ πέσῃ ἕν σῶμα, διὰ νὰ κάμωμεν τὰς παρατηρήσεις μας, δυνάμεθα νὰ λάβωμεν ἡμεῖς διάφορα σῶματα καὶ νὰ τὰ ἀφήσωμεν νὰ πέσουν, δηλαδὴ νὰ προκαλέσωμεν οἱ ἴδιοι τὸ φαινόμενον τῆς πτώσεως. Ὅταν ἡμεῖς προκαλοῦμεν ἕν φαινόμενον καὶ τὸ παρατηροῦμεν, τότε ἐκτελοῦμεν *πείραμα*. Διὰ τοῦ πειράματος θέτομεν διαφόρους ἐρωτήσεις εἰς τὴν φύσιν καὶ ἀπὸ τὰ ἀποτελέσματα τοῦ πειράματος λαμβάνομεν τὰς ἀπαντήσεις.

Εἰς τὴν Φυσικὴν ὅμως δὲν ἀρκεῖ μόνον νὰ παρατηρήσωμεν τὴν ἐξέλιξιν τῶν διαφόρων φαινομένων, ἀλλὰ πρέπει καὶ νὰ τὰ ἐξηγήσωμεν. Διὰ νὰ ἐπιτύχωμεν τὸν σκοπὸν μας, εἶναι ἀπαραίτητον νὰ πραγματοποιήσωμεν διαφόρους *μετρήσεις*. Κατὰ τὴν πτώσιν τῶν σωμάτων π.χ. πρέπει νὰ μετρήσωμεν τὸ ὕψος, ἀπὸ τὸ ὁποῖον πίπτει τὸ σῶμα, τὴν ταχύτητα καὶ τὸν χρόνον τῆς πτώσεώς του. Τὸ μῆκος, ἡ ἐπιφάνεια, ὁ ὄγκος, ἡ ταχύτης, ὁ χρόνος κ.τ.λ. εἶναι *φυσικὰ μεγέθη*.

Ἐν *φυσικὸν μέγεθος* δύναται πάντοτε νὰ μετρηθῆ. Μέτρησις ἐνὸς φυσικοῦ μεγέθους εἶναι ἡ σύγκρισίς του πρὸς ἕν ὁμοειδὲς μέγεθος, τὸ ὁποῖον λαμβάνομεν ὡς μονάδα. Διὰ κάθε φυσικὸν μέγεθος ἔχει ὀρισθῆ καὶ μία μονὰς μετρήσεως. Αἱ μονάδες αὗται εἶναι αὐθαίρετοι καὶ διὰ τοῦτο εἰς τὰ διάφορα κράτη διὰ τὸ αὐτὸ μέγεθος ὑπῆρχον ἄλλοτε καὶ ἰδιαίτεροι μονάδες. Τοῦτο ὅμως προκαλεῖ μεγάλας δυσκολίας εἰς τοὺς ὑπολογισμοὺς καὶ εἰς τοὺς τύπους, διότι ἡ Φυσική εἶναι μία παγκόσμιος ἐπιστήμη καὶ ἔπρεπε τὰ σύμβολα καὶ αἱ μονάδες νὰ εἶναι διεθνεῖς. Διὰ τὸν λόγον αὐτὸν ἐπροτάθησαν τὰ συστήματα μονάδων.

## Σημειώσεις σχετικά με το σύστημα μονάδων.

Σύστημα μονάδων είναι σύνολον μονάδων, αί όποιαί επιλέγονται με τρόπον, ώστε να άπλοποιοϋν τούς τύπους τής Φυσικής και να διευκολύνουν τήν χρήςιν τούτων.

Τό σύνολον αυτό περιλαμβάνει :

α) μονάδας αί όποιαί έχουν **έπιλεγή αυθαίρετος** (π.χ. τό έκατοστόμετρον, τό γραμμάριον, και τό δευτερόλεπτον)· αί μονάδες αύται, καλοϋνται θεμελιώδεις.

β) μονάδας **παραγώγους** αί όποιαί καθορίζονται από τας **θεμελιώδεις**.

Είς τό σύστημα π.χ. *έκατοστόμετρον, γραμμάριον, δευτερόλεπτον*, τό όποϊον καλοϋμεν σύστημα C.G.S., ή **μονάς ταχύτητος** καθορίζεται από τό έκατοστόμετρον και από τό δευτερόλεπτον, είναι δέ έκατοστόμετρον κατά δευτερόλεπτον· ή **μονάς τής έπιταχύνσεως** καθορίζεται από τήν μονάδα τής ταχύτητος και από τό δευτερόλεπτον, και ή **μονάς βάρους** από τό γινόμενον τής μονάδος τής έπιταχύνσεως επί τήν μονάδα τής μάζης. Είναι άπαραίτητον **αί θεμελιώδεις μονάδες** να ήμποροϋν να καθορισθοϋν με μεγάλην ακρίβειαν. Τό μέτρον (και τό έκατοστόμετρον), τό χιλιόγραμμον (και τό γραμμάριον) και τό δευτερόλεπτον εκπληρώνουν ακριβώς αύτήν τήν άπαιτήσιν.

Τό **μέτρον** είναι ή άπόστασις είς τήν θερμοκρασίαν των 0° C μεταξύ δύο γραμμών, αί όποιαί είναι χαραγμέναί είς ένα πρότυπον κανόνα, κατεσκευασμένον από ίρίδιον και λευκόχρυσον, ό όποϊός φυλάσσεται είς τό Διεθνές Γραφείον Μέτρων και Σταθμών των Σεβρών (Γαλλία).

Τό **χιλιόγραμμον** είναι ή μάζα ενός προτύπου κυλίνδρου από ίρίδιον και λευκόχρυσον, ό όποϊός φυλάσσεται είς τό αυτό Διεθνές Γραφείον.

Τό **γραμμάριον** είναι τό χιλιοστόν τής μάζης του προτύπου χιλιογράμμου. Τέλος, δια τήν μέτρησιν του χρόνου έχομεν τό **δευτερόλεπτον**, τό όποϊον είναι χρονικόν διάστημα ίσον με τό 1/86.400 τής μέσης ήλιακής ήμέρας.


Αναλόγως προς τας θεμελιώδεις μονάδας, τας όποϊας θα όρίσωμεν, δημιουργοϋμεν και διάφορα συστήματα. Τά κυριώτερα εκτός του C.G.S. είναι :

Τό σύστημα M.T.S., τό όποϊον χρησιμοποιείται είς τας βιομηχανικάς εφαρμογάς και έχει ως θεμελιώδεις μονάδας τό **μέτρον**, τόν **τόνον** και τό **δευτερόλεπτον**.

Τό σύστημα M.K.S.A. με θεμελιώδεις μονάδας τό **μέτρον**, τό **χιλιόγραμμον**, τό **δευτερόλεπτον** και τό **Άμπέρ**. Τό σύστημα τούτο καλεΐται και **σύστημα Giorgi**, από τό όνομα του καθηγητου, ό όποϊός τό έπρότεινε.



**ΣΤΕΡΕΑ - ΥΓΡΑ - ΑΕΡΙΑ**




Σχ. 1. Το σχήμα και ο όγκος του μαρμάρου είναι αμετάβλητα.

**1** Παρατήρησης. 'Εάν λάβωμεν τεμάχιον μαρμάρου (σχ. 1), θά παρατηρήσωμεν ότι τὸ σχῆμα καὶ αἱ διαστάσεις του δὲν μεταβάλλονται, ὅπως καὶ ἐὰν τοποθετήσωμεν αὐτό. Ὁ ὄγκος του καὶ τὸ σχῆμά του εἶναι ἀμετάβλητα.

*Τὸ μάρμαρον εἶναι ἐν στερεὸν σῶμα.*

● Λαμβάνομεν σφαῖραν ἐκ μολύβδου καὶ εὐρίσκομεν τὸν ὄγκον της μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ ὀγκομετρικοῦ κυλίνδρου (σχ. 2). 'Εὰν κτυπήσωμεν τὴν σφαῖραν διὰ σφυρίου ἢ τὴν θραύσωμεν, θά μεταβληθῇ βεβαίως τὸ σχῆμά της, ἀλλὰ ὁ ὄγκος της θά παραμείνῃ ὁ αὐτός.

'Επίσης δυνάμεθα νὰ κάμψωμεν μίαν μεταλλικὴν ράβδον, νὰ θραύσωμεν τὸ μάρμαρον, νὰ τήξωμεν ἐν φύλλον κασιτέρου, νὰ διαλύσωμεν σάκχαριν ἐντὸς τοῦ ὕδατος ἢ καὶ νὰ ἐπιμηκύνωμεν μεταλλικὸν ἔλασμα διὰ θερμάνσεώς του. 'Εν στερεὸν σῶμα δὲν μεταβάλλει σχῆμα παρὰ διὰ μιᾶς ἀναλόγου προσπαθείας ἢ διὰ τῆς ἐπιδράσεως τῆς θερμότητος ἢ διὰ διαλύσεώς του.



Σχ. 2. Τὸ σχῆμα τῆς σφαίρας ἐκ μολύβδου μεταβάλλεται, ἐὰν κτυπήσωμεν αὐτὴν διὰ σφυρίου. Ὁ ὄγκος της ὅμως παραμένει ἀμετάβλητος.


**Συμπέρασμα:** *Ἐκαστον στερεὸν σῶμα ἔχει ἰδιαίτερον σχῆμα καὶ ὄγκον ἀμετάβλητον.*

**2** Ρίπτομεν ὕδωρ εἰς ἓνα ὀγκομετρικὸν κύλινδρον καὶ σημειοῦμεν τὸν ὄγκον του (σχ. 3).

Μεταφέρομεν τὸ ὕδωρ ἀπὸ τὸν κύλινδρον εἰς ὀγκομετρικὸν κωνικὸν ποτήριον καὶ ἐν συνεχείᾳ εἰς δύο βαθμολογημένα δοχεῖα.

Παρατηροῦμεν ὅτι τὸ ὕδωρ λαμβάνει τὸ σχῆμα τοῦ ἐσωτερικοῦ τῶν δοχείων ἀνευ ἰδιαίτερας προσπάθειας, ἐνῶ ὁ ὄγκος του παραμένει ὁ αὐτός.


**Συμπέρασμα:** *Ἐν ὑγρὸν δὲν ἔχει ἰδικὸν τὸν σχῆμα, ἀλλὰ λαμβάνει τὸ σχῆμα τοῦ δοχείου, εἰς τὸ ὁποῖον περιέχεται, ὁ δὲ ὄγκος του παραμένει ἀμετάβλητος.*



Σχ. 3. Τὸ ὕδωρ ρεῖ καὶ λαμβάνει τὸ σχῆμα τοῦ δοχείου, εἰς τὸ ὁποῖον περιέχεται ὁ ὄγκος του παραμένει ἀμετάβλητος.

**3** Σύρομεν πρὸς τὰ ἔξω τὸ ἔμβολον μιᾶς ἀεραντλίας ποδηλάτου, καί, ἀφοῦ τοποθετήσωμεν τὸ στόμιόν της ἐντὸς δοχείου μεθ' ὕδατος, πιέζομεν τὸ ἔμβολον πρὸς τὰ μέσα. Αἱ φυσαλλίδες, αἱ ὁποῖαι ἐξέρχονται ἀπὸ τὸ στόμιον, προέρχονται ἀπὸ τὸν ἀέρα, ὅστις ὑπῆρχεν ἐντὸς τοῦ κυλίνδρου τῆς ἀεραντλίας.

'Εὰν ἐπαναλάβωμεν τὸ πείραμα, ἀφοῦ ὅμως κλείσωμεν διὰ τοῦ δακτύλου μας τὸ στόμιον, παρατηροῦμεν ὅτι πρέπει νὰ καταβάλλωμεν συνεχῶς μεγαλυτέραν δύναμιν, ὅσον περισσότερο ὠθῶμεν τὸ ἔμβολον πρὸς τὰ μέσα, ὅσον δηλ. μικρότερος γίνεται ὁ



Σχ. 4. Τὸ στόμιον κλειστόν. Ἄεραντλιον ποδηλάτου. Ὁ ἀῆρ εἶναι συμπιεστός. Ὁ ἀῆρ εἶναι ἐκτατός.



ὄγκος τοῦ ἀέρος (σχ. 4A καὶ B) ἐντὸς τοῦ κυλίνδρου τῆς ἀεραντλίας.

Δυνάμεθα λοιπὸν νὰ περιορίσωμεν τὸν ὄγκον μιᾶς ποσότητος ἀέρος. Ὁ ἀήρ εἶναι συμπιεστός.

● Ἐὰν ἀφήσωμεν ἐλεύθερον τὸ ἔμβολον, θὰ μετακινηθῆ με ὀρμὴν πρὸς τὰ ἔξω καὶ ὁ ἀήρ ἐντὸς τοῦ κυλίνδρου θὰ λάβῃ τὸν ἀρχικὸν ὄγκον του : Ὁ ἀήρ εἶναι ἐλαστικός (σχ. 4Γ).

● Ἐὰν ἀνοίξωμεν ἐν φιαλίδιον περιέχον αἰθέρα, θὰ διαπιστώσωμεν ἀπὸ τὴν ὁσμὴν ὅτι ἐν ἀέριον, δηλ. ὁ ἀτμὸς τοῦ αἰθέρος, ἔχει διαχυθῆ εἰς ὅλην τὴν αἰθούσαν.

Ὁ ἀτμὸς τοῦ αἰθέρος εἶναι ἑκτατός. Τὸ πείραμα τοῦ σχήματος 5 δεικνύει ὅτι ὁ ἀήρ εἶναι ἑκτατός.



Σχ. 5. Ὁ ἀήρ εἶναι ἑκτατός.

**Συμπέρασμα:** Τὰ διάφορα αἲρια (ἀήρ, ὀξυγόνον, ἄζωτον, ἄμμωνία, διοξειδίου τοῦ ἄνθρακος κ.τ.λ.) δὲν ἔχουν ἰδιαιτέρον σχῆμα καὶ ὄγκον εἶναι συμπιεστά, ἐλαστικά καὶ ἑκτατά.

#### 4 Ἐξήγησις τῶν ἰδιοτήτων τῶν στερεῶν, ὑγρῶν καὶ ἀερίων.

● Ἐὰν γεμίσωμεν ἐν ποτήριον με λεπτὴν ἄμμοι καὶ τὴν μεταγγίσωμεν εἰς ἕν ἄλλο ποτήριον, θὰ παρατηρήσωμεν ὅτι ἡ ἄμμοι ρέει. Ἀπὸ ὠρισμένην ἀπόστασιν μάλιστα δὲν διακρίνομεν τοὺς κόκκους καὶ ἔχομεν τὴν ἐντύπωσιν ὅτι ρεῖ ἐν ὑγρῶν. Ἡ ἄμμοι ἀποτελεῖται ἀπὸ πλῆθος μικρῶν κόκκων, οἱ ὅποιοι δύνανται νὰ ὀλισθαίνουσι ὁ εἰς ἐπὶ τοῦ ἄλλου.

● Τὸ ὕδωρ, ὄπως καὶ ὅλα τὰ ὑγρά, ἀποτελεῖται ἐπίσης ἀπὸ παρόμοια μικρὰ σωματίδια, τὰ ὅποια ὁμως εἶναι τόσον πολὺ μικρὰ (αἱ διαστάσεις των εἶναι τῆς τάξεως τοῦ 0,0001 τοῦ χιλιοστομέτρου), ὥστε καὶ με τὸ ἰσχυρότερον μικροσκόπιον δὲν εἶναι δυνατόν νὰ τὰ διακρίνωμεν.

Τὰ σωματίδια αὐτὰ εἶναι τὰ μόρια τοῦ ὑγροῦ.


● Ἐὰν οἱ κόκκοι τῆς ἄμμοι ἐνωθοῦν μεταξὺ των, θὰ ἀποτελέσουν ἕνα ψαμμίθον (ἀμμόλιθον), ἐν στερεῶν.

● Καὶ τὰ μόρια ὁμως ἐνὸς στερεοῦ δὲν εἶναι σταθερῶς ἠνωμένα τὸ ἐν με τὸ ἄλλο, ἀλλὰ πάλλονται ταχύτατα περὶ εἰς μέσης θέσεως, χωρὶς καὶ νὰ ἴμπορουν νὰ ἀπομακρυνθοῦν ἀπὸ αὐτὴν, διότι ἔλκονται μεταξὺ των διὰ δυνάμεων, αἱ ὅποιοι καλοῦνται δυνάμεις συνοχῆς.

Αἱ δυνάμεις αὗται εἶναι ἐκεῖναι, αἱ ὅποιοι δίδουν τὴν μεγαλύτεραν ἢ μικροτέραν ἀντοχὴν εἰς τὰ στερεὰ σώματα.

● Εἰς τὰ ὑγρά αἱ δυνάμεις συνοχῆς εἶναι μικρότεροι, διότι τὰ μόρια των ἀπέχουν περισσότερον τὸ ἐν ἀπὸ τὸ ἄλλο, με ἀποτέλεσμα νὰ μετατοπιζῶνται με μεγαλύτεραν ἐλευθερίαν.

● Εἰς τὰ αἲρια διὰ τὸν ἴδιον λόγον αἱ δυνάμεις συνοχῆς εἶναι πολὺ μικρότεροι καὶ συνεπῶς τὰ μόρια των μετατοπιζοῦνται με ἀκόμη μεγαλύτεραν ἐλευθερίαν. Τοιοῦτοτρόπως ἐξηγεῖται διατί τὰ αἲρια εἶναι ἑκτατά.



Σχ. 6. Τὰ αἲρια λαμβάνουν τὸ σχῆμα καὶ τὸν ὄγκον τῶν δοχείων, εἰς τὰ ὅποια περιέχονται.

## ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ

1. Τὰ ὑλικά σώματα παρουσιάζονται εἰς τρεῖς καταστάσεις : τὴν στερεάν, τὴν ὑγρὰν καὶ τὴν ἀέριον.

2. Τὰ στερεὰ ἔχουν ἰδιαιτερον σχῆμα καὶ σταθερὸν ὄγκον.

3. Τὰ ὑγρά ἔχουν ἐπίσης σταθερὸν ὄγκον, λαμβάνουν ὅμως τὸ σχῆμα τοῦ δοχείου, εἰς τὸ ὅποιον περιέχονται.

4. Τὰ ἀέρια καταλαμβάνουν ὅλον τὸν διαθέσιμον χῶρον, χωρὶς νὰ ἔχουν ἰδιαιτερον σχῆμα καὶ σταθερὸν ὄγκον.

Τὰ ἀέρια εἶναι συμπιεστά, ἐλαστικά καὶ ἐκτατά.

5. Ἡ ὕλη ἀποτελεῖται ἀπὸ σωματίδια πάρα πολὺ μικρά, τὰ ὅποια καλοῦνται μόρια.

Τὰ στερεὰ ὀφείλουν τὴν ἀντοχὴν των εἰς τὰς δυνάμεις συνοχῆς, αἱ ὅποια συγκρατοῦν τὰ μόρια τὸ ἔν πλησίον τοῦ ἄλλου.

Τὰ μόρια τῶν ὑγρῶν μετατοπίζονται μὲ μεγαλύτεραν ἐλευθερίαν. Τὰ μόρια τῶν ἀερίων μετατοπίζονται μὲ ἀκόμη μεγαλύτεραν ἐλευθερίαν καὶ εἰς ὀλόκληρον τὸν χῶρον τοῦ δοχείου των.

2<sup>ON</sup> ΜΑΘΗΜΑ : Τὰ ἑτερογενῆ μείγματα.

## ΤΟ ΦΥΣΙΚΟΝ ΥΔΩΡ

**1** Τὸ ὕδωρ εἶναι τὸ πλέον διαδεδομένον ὑγρὸν εἰς τὴν φύσιν.

● Ἡ θάλασσα καλύπτει τὰ 3/4 περίπου τῆς ἐπιφανείας τῆς Γῆς. Οἱ ὠκεανοὶ περιέχουν περισσότερον ἀπὸ δύο δισεκατομμύρια κυβικά χιλιόμετρα ἄλμυροῦ ὕδατος. Τὸ μέσον βάθος των εἶναι 3500 m.

● Αἱ ἠπειροὶ διασχίζονται ἀπὸ πολυαριθμοὺς ποταμούς. Τὸ ὕδωρ ρεῖ εἰς τὰς πλαγιάς τῶν ὄρεων ὑπὸ μορφῆν χειμάρρων καὶ καταρρακτῶν. Πηγαὶ ἀναβλύζουσιν ἀπὸ τὴν γῆν.


● Εἶναι ὅμοια αὐτὰ τὰ ὕδατα ; Βεβαίως ὄχι. Τὸ ὕδωρ τῶν θαλασσῶν εἶναι ἄλμυρόν, τὸ ὕδωρ τῶν πηγῶν εἶναι καθαρόν, τὸ ὕδωρ τῶν τελεμάτων εἶναι θολόν.

**2** Γεμίζομεν μὲ ὕδωρ τέλματος ἔν ποτήριον. Διὰ τοῦ γυμνοῦ ὀφθαλμοῦ μας δυνάμεθα νὰ διακρίνωμεν πολλὰ στερεὰ σωματίδια ἐντὸς τοῦ ὑγροῦ.

● Ἐὰν παρατηρήσωμεν διὰ τοῦ μικροσκοπίου μίαν σταγόνα αὐτοῦ τοῦ ὑγροῦ, θὰ ἴδωμεν καὶ ἄλλα σωματίδια, ἀόρατα διὰ τοῦ γυμνοῦ ὀφθαλμοῦ.

Πόθεν προέρχονται καὶ τί εἶναι τὰ σωματίδια ;

● Τὸ ὕδωρ, τὸ ὅποιον ἐξετάζομεν, ἦλθεν εἰς ἔπαφὴν μὲ τὴν γῆν. Παρέσυρε λοιπὸν μαζί του χῶμα, ὑπολείμματα φυτικῆς προελεύσεως (νεκρὰ φύλλα, φλοιοὺς κλπ.), ζωικῆς προελεύσεως (κόπρον, νεκροὺς μικροοργανισμοὺς κλπ.) καὶ ζωντανοὺς μικροοργανισμοὺς. Ὅλα αὐτὰ αἱ στερεαὶ οὐσίαι αἰωροῦνται ἐντὸς τοῦ ὕδατος, καὶ ἔχομεν τοιοῦτοτρόπως ἔν μείγμα ὕδατος καὶ ἄλλων σωμάτων (σχ. 1).



Σχ. 1.

Τὸ ὕδωρ τοῦ τέλματος εἶναι θολόν περιέχει πλῆθος μικρῶν σωματιδίων, τὰ ὅποια αἰωροῦνται.





Τὸ ὕδωρ τοῦ τέλματος παρατηρούμενον διὰ μικροσκοπίου : Τὰ ἀόρατα διὰ γυμνοῦ ὀφθαλμοῦ πολὺ μικρὰ στερεὰ σωματίδια διακρίνονται καλῶς.

**Συμπέρασμα:** Τὸ φυσικὸν ὕδωρ δύναται νὰ περιέχη ἔν αἰωρήσει διαφόρους στερεὰς οὐσίας εἶναι ἔν μείγμα.

● Τὰ διάφορα σωματίδια, τὰ ὅποια ἀποτελοῦν αὐτὸ τὸ μείγμα, διακρίνομεν διὰ τοῦ ὀφθαλμοῦ καὶ τῆ βοθητικῆ φακοῦ ἢ μικροσκοπίου. Τὸ μείγμα αὐτὸ εἶναι ἑτερογενές.

● Ἄλλα ἑτερογενῆ μείγματα : κόνις κιμωλίας μετὰ σακχάρους, καφῆς μετὰ σακχάρους κλπ.

**3** Ἐὰν ἀφήσωμεν αὐτὸ τὸ ὕδωρ ἀκίνητον (σχ. 2), τὰ σωματίδια κατέρχονται καὶ καθιζάνουν εἰς τὸν πυθμένα τοῦ ποτηρίου. Ταχέως δυνάμεθα νὰ παρατηρήσωμεν ἔν ἴζημα, τὸ ὅποιον ἔχει σχηματισθῆ ἀπὸ



Ύδωρ διαυγέστερον

στρώματα τὸ ἓν ἐπὶ τοῦ ἄλλου. Ρίπτομεν μετὰ προφυλάξεως τὸ ὑγρὸν μέρος εἰς ἓν ἄλλο ποτήριον, κάμνομεν δηλ. μετάγγισιν (σχ. 3).

● Τὸ ὕδωρ, τὸ ὁποῖον μετηγγίσασμεν, δὲν εἶναι καθαρὸν, διότι διὰ γυμνοῦ ὀφθαλμοῦ παρατηροῦμεν ἀκόμη αιωρούμενα σωματίδια, πολὺ ὀλιγώτερα ὅμως ἀπὸ ὅσα παρατηρήσαμεν προηγουμένως.

● Ἐὰν παρατηρήσωμεν διὰ τοῦ μικροσκοπίου μίαν σταγόνα αὐτοῦ τοῦ ὑγροῦ, θὰ ἴδωμεν πολλὰς αιωρούμενὰς οὐσίας.

**4 Πῶς θὰ διαχωρίσωμεν ἐξ ὁλοκλήρου τὸ ὑγρὸν ἀπὸ τὰς αιωρούμενὰς οὐσίας.**

● Διηθοῦμεν (φιλτράρομεν) τὸ ὑγρὸν διὰ μέσου πορώδους σώματος, τοῦ ὁποῖου οἱ πόροι νὰ εἶναι πολὺ μικροί, διὰ νὰ ἐμποδίζουσι τὴν διάβασιν τῶν αιωρουμένων σωματιδίων.

Πρὸς τοῦτο χρησιμοποιοῦμεν διηθητικὸν χάρτην, ὃ ὁποῖος ὁμοιάζει μὲ στυπόχαρτον.


● Ρίπτομεν βραδέως τὸ ὑγρὸν ἐντὸς τοῦ διηθητικοῦ χάρτου (φίλτρου) καὶ τὸ ὑγρὸν ρεεῖ ἐντὸς τοῦ δοχείου κατὰ σταγόναν (σχ. 4).

● Διὰ γυμνοῦ ὀφθαλμοῦ δὲν παρατηροῦμεν πλέον κανὲν αιωρούμενον σωματίδιον ἐντὸς τῆς μάζης τοῦ ὑγροῦ.

**5 Τὸ ὕδωρ, τὸ ὁποῖον προορίζεται διὰ κατανάλωσιν εἰς τὰς πόλεις, προέρχεται γενικῶς ἀπὸ ποταμοῦς.**

Τὸ ὕδωρ τοῦτο ἀρχικῶς δὲν εἶναι διαυγές. Διὰ τούτο, προτοῦ δοθῆ εἰς τὴν κατανάλωσιν, διηθεῖται ἐντὸς καταλλήλων δεξαμενῶν, αἱ ὁποῖαι καλοῦνται δεξαμεναὶ διηθήσεως (σχ. 5) (διυλιστήρια).


● Διὰ τῆς συσκευῆς διηθήσεως Chamberland (φίλτρον) δυνάμεθα νὰ λάβωμεν διαυγές ὕδωρ καὶ ὅταν δὲν ἔχωμεν δεξαμενὰς διηθήσεως (σχ. 6).



Σχ. 4. Διηθήσις



Σχ. 5. Τομὴ διυλιστηρίου (δεξαμενῆς διηθήσεως).



Σχ. 6. Διηθητικὴ συσκευὴ Chamberland.

● Αί πηγαί τροφοδοτούνται συχνάκις από ύδατα, διελθόντα προηγουμένως από στρώματα άμμου, τὰ ὅποια εἶναι περίφημα φυσικά διυλιστήρια. Τοιουτοτρόπως τὸ ὕδωρ δύναται νὰ διηθηθῆ φυσικῶς. Δι' αὐτὸ τὸ ὕδωρ πολλῶν πηγῶν διοχετεύεται ἀπ' εὐθείας εἰς τὴν καταβάλωσιν.

**Συμπέρασμα :** Διὰ τῆς μεταγίσεως, δηλ. διὰ τοῦ διαχωρισμοῦ τοῦ ὑγροῦ ἀπὸ τὸ ἴζημα, τὸ ὅποιον σχηματίζεται, καὶ ἐν συνεχείᾳ διὰ τῆς διηθήσεως, κατὰ τὴν ὁποίαν ἐν πορῶδες σῶμα συγκρατεῖ τὰ αἰωρούμενα σωματίδια, ἐπιτυγχάνομεν ὕδωρ τελείως διαγές.

### ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ

1. Τὰ ὕδατα, τὰ ὅποια εἶναι δισκορπισμένα εἰς τὴν ἐπιφάνειαν τῆς γῆς (ὄκεανοί, πηγαί, ὕδατα βροχῆς κλπ.) διαφέρουν μεταξύ των.
2. Τὰ περισσότερα εἶναι ἑτερογενῆ μείγματα, τὰ ὅποια περιέχουν στερεὰς ὕλας ἐν αἰωρήσει.
3. Διὰ τῆς μεταγίσεως δυνάμεθα νὰ διαχωρίσωμεν τὸ ὑγρὸν ἀπὸ τὰ στερεὰ σώματα, τὰ ὅποια καθιζάνουν.
4. Διὰ τῆς διηθήσεως ἐπιτυγχάνομεν ὕδωρ διαγές, ἀπηλλαγμένον ἀπὸ κάθε αἰωρούμενη οὐσίαν.
5. Τὸ ὕδωρ, τὸ ὅποιον καταναλίσκεται εἰς τὰς πόλεις ὡς πόσιμον, εἶναι συνήθως ὕδωρ ποταμοῦ, διηθημένον εἰς δεξαμενάς, καλουμένας δεξαμενάς διηθήσεως.  
Τὸ ὕδωρ τῶν πηγῶν διηθεῖται φυσικῶς, ὅταν διαπερᾷ στρώματα ἄμμου.

3<sup>ON</sup> ΜΑΘΗΜΑ : "Ἐν καθαρὸν σῶμα.


## ΤΟ ΑΠΕΣΤΑΓΜΕΝΟΝ ΥΔΩΡ

### 1 Τὸ διηθημένον ὕδωρ δὲν εἶναι καθαρὸν.

Εἰς μίαν ἀβαθῆ ὑαλίνην λεκάνην, τελείως διαφανῆ, ρίπτομεν διηθημένον ὕδωρ καὶ τὸ θερμαίνομεν ἑλαφρῶς, ἕως ὅτου ἐξατμισθῆ.

● Ἐὰν παρατηρήσωμεν τώρα τὴν λεκάνην, θὰ ἴδωμεν ὅτι δὲν εἶναι τελείως διαφανῆς. Περιέχει ἐν ὑπόλευκον ἴζημα (σχ. 1).

● Τὸ διηθημένον ὕδωρ περιέχει λοιπὸν καὶ ξένας οὐσίας. Δὲν εἶναι τελείως καθαρὸν ὕδωρ.



Σχ. 2. Ἀπόσταξις τοῦ ὕδατος.

## 2 'Απόσταξις.


● Θερμαίνουμε μέχρι βρασμού ύδωρ, τὸ ὁποῖον προήλθεν ἀπὸ διήθησιν, καὶ συλλέγομεν εἰς δοκιμαστικὸν σωλῆνα τὸ ὕδωρ, τὸ ὁποῖον προέρχεται ἀπὸ τὴν συμπύκνωσιν τοῦ ἀτμοῦ του (σχ. 2).

Τὸ ὕδωρ τοῦτο εἶναι **ἀπεσταγμένον**.


● Θερμαίνουμε τὴν σφαιρικὴν φιάλην μέχρι πλῆρους ἐξαερώσεως τοῦ ὕδατος. Παραμένει τότε ἐν ἴζημα, ἀνάλογον πρὸς ἐκεῖνο, τὸ ὁποῖον σχηματίζεται εἰς τὰ ἐσωτερικὰ τοιχώματα τῶν βραστήρων, καὶ ἀποτελεῖται ἀπὸ διαλελυμένα εἰς τὸ ὕδωρ ὑλικά, τὰ ὁποῖα ὀνομάζομεν ἄλατα.

● Ἐὰν διηθῆσωμεν τὸ ἀπεσταγμένον ὕδωρ, κανὲν ἴζημα δὲν παραμένει εἰς τὸ διηθητικὸν μέσον (φίλτρον).

● Ρίπτομεν ὀλίγον ἀπεσταγμένον ὕδωρ εἰς ἀβαθὴ ὑαλίνην λεκάνην, τὸ θερμαίνουμεν καὶ παρατηροῦμεν ὅτι τὸ ὕδωρ ἐξατμίζεται χωρὶς νὰ ἀφήνῃ ἴζημα.



Σχ. 3. Τὸ ἀπεσταγμένον ὕδωρ περιέχει μόνον ὕδωρ. Εἶναι ὕδωρ καθαρὸν.



Σχ. 4. 1 dm<sup>3</sup> καθαρὸ ὕδατος ζυγίζει 1 Kg.

**Συμπέρασμα:** Τὸ ἀπεσταγμένον ὕδωρ εἶναι τελειῶς καθαρὸν. Διὰ τῆς διηθήσεως ἢ διὰ τῆς ἀποστάξεως δὲν δυνάμεθα νὰ λάβωμεν ἀπὸ αὐτὸ παρὰ μόνον ὕδωρ (σχ. 3).

3 **Θὰ ἴδωμεν (36ον μάθημα) ὅτι ἐν λίτρον ἀπεσταγμένου ὕδατος ἔχει τὸ μεγαλύτερον βῆρος, ὅταν ἡ θερμοκρασία εἶναι 4°C.**

● Τὸ βῆρος αὐτὸ εἶναι σχεδὸν ἴσον πρὸς 1 Kg (σχ.4).

**Συμπέρασμα:** Τὸ βῆρος ἐνὸς λίτρον ἀπεσταγμένου ὕδατος εἰς θερμοκρασίαν 4° C εἶναι μία φυσικὴ σταθερὰ (1).


## 4 Μεταβολαὶ Φυσικῶν καταστάσεων.

α) **Στερεοποίησης :** "Ὅταν ἡ θερμοκρασία κατέρχεται ἀρκετὰ τὸν χειμῶνα (ἢ μέσα εἰς ἕνα ψυκτικὸν θάλαμον), τὸ ὕδωρ στερεοποιεῖται (δυνάμεθα τὸν χειμῶνα νὰ παρατηρήσωμεν τὰ διάφορα σχήματα τῶν κρυστάλλων τῆς χιόνος, τὰ ὁποῖα προέρχονται ἀπὸ κανονικὰ ἐξάγωνα).


● Εἰς ποτήριον, εἰς τὸ ὁποῖον ἔχομεν ρίψει τεμάχια πάγου, θέτομεν ἐν ἀβαθμολόγητον θερμομέτρον. Παρατηροῦμεν ὅτι ἡ στάθμη τοῦ θερμομετρικοῦ ὑγροῦ κατέρχεται καὶ μετ' ὀλίγα λεπτά σταθεροποιεῖται (σχ. 5). Σημειῶνομεν τὴν θέσιν τῆς δι' ἐνὸς νήματος, τὸ ὁποῖον ἔχομεν περιτυλίξει εἰς τὸν σωλῆνα τοῦ θερμομέτρου.

Δυνάμεθα τότε νὰ ἐπαληθεύσωμεν ὅτι ἡ θερμοκρασία τοῦ μείγματος ὕδατος - πάγου παραμένει ἀμετάβλητος, ὅσον διαρκεῖ ἡ τῆξις τοῦ πάγου (ἀναδεύομεν τὸ μείγμα ὕδατος - πάγου συνεχῶς). Μετρήσεις ἀκριβεῖς δεικνύουν ὅτι τὸ καθαρὸν σῶμα στερεοποιεῖται πάντοτε εἰς τὴν αὐτὴν θερμοκρασίαν.

(1) Τὸ βῆρος 1l ὕδατος ἀπεσταγμένου καὶ θερμοκρασίας 4°C ἔχει καθορισθῆ συμβατικῶς ὡς μόνος βάρους. Ἀκριβεῖς μετρήσεις δεικνύουν ὅτι 1l ἀπεσταγμένου ὕδατος εἰς τὸ Παρίσι ζυγίζει 0,999972 Kg.



Σχ. 5. Καθ' ὅλην τὴν διάρκειαν τῆς τήξεως τοῦ πάγου ἡ στάθμη τοῦ θερμομετρικοῦ ὑγροῦ παραμένει σταθερὰ. Μολὶς τακὴ ὁλος ὁ πάγος, ἡ στάθμη ἀνέρχεται.



Σχ. 6. Καθ' ὅλην τὴν διάρκειαν τοῦ βρασμοῦ ἡ θερμοκρασία παραμένει σταθερά, ἀνεξαρτήτως τῆς ἐντάσεως τῆς θερμικῆς πηγῆς.

**Συμπέρασμα :** Ἡ θερμοκρασία τήξεως τοῦ πάγου εἶναι σταθερά. Ἡ θερμοκρασία αὕτη ὀρίζεται ὡς ἀρχὴ (τοῦ 0° C) τῆς θερμομετρικῆς κλίμακος Celsius.

β) **Ἐξαέρωσις.** Θερμαίνομεν καθαρὸν ὕδωρ ἐντὸς μιᾶς σφαιρικῆς φιάλης, εἰς τὴν ὅποιαν ἔχομεν τοποθετήσῃ τὸ ὑδραργυρικὸν θερμομετρὸν, τὸ χρησιμοποιοῦμεν προηγουμένως, εἰς τρόπον, ὥστε μόλις νὰ ἐγγίξῃ τὸ δοχεῖον τοῦ θερμομετρικοῦ ὑγροῦ τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ ὕδατος (σχ. 6).

Ἡ στάθμη τοῦ θερμομετρικοῦ ὑγροῦ ἀνέρχεται.

● Σημειοῦμεν αὐτὴν τὴν στάθμην, ὅπως καὶ προηγουμένως, τὴν στιγμὴν κατὰ τὴν ὅποιαν τὸ ὕδωρ ἀρχίζει νὰ βράζῃ.

Παρατηροῦμεν ὅτι καθ' ὅλην τὴν διάρκειαν τοῦ βρασμοῦ ἡ στάθμη τοῦ θερμομετρικοῦ ὑγροῦ δὲν μεταβάλλεται.

● Ἐὰν χαμηλώσωμεν τὴν φλόγα οὕτως, ὥστε ὁ βρασμὸς νὰ ἐξασθενήσῃ, παρατηροῦμεν ὅτι ἡ στάθμη τοῦ θερμομετρικοῦ ὑγροῦ παραμένει καὶ πάλιν ἀμετάβλητος.

● Ἀπομακρύνομεν τὴν φλόγα, ὁ βρασμὸς διακόπτεται καὶ ἡ στάθμη τοῦ θερμομετρικοῦ ὑγροῦ κατέρχεται.

**Συμπέρασμα :** Καθ' ὅλην τὴν διάρκειαν τοῦ βρασμοῦ τοῦ καθαροῦ ὕδατος, ἡ θερμοκρασία τοῦ ἀτμοῦ τὸν παραμένει ἀμετάβλητος. Αὕτῃ ἡ θερμοκρασία εἶναι τὸ δεύτερον σταθερὸν σημεῖον (100° C) τῆς θερμομετρικῆς κλίμακος Celsius.

● Τὸ βάρος 1 l καθαροῦ ὕδατος (περίπου 1 Κρ), ἡ θερμοκρασία τήξεως (ἢ πήξεως) καὶ ἡ θερμοκρασία τοῦ βρασμοῦ εἶναι φυσικαὶ σταθεραὶ τοῦ καθαροῦ ὕδατος.

Γενικῶς καλοῦμεν **καθαρὸν ἐν σῶμα**, ὅταν αἱ ἰδιότητές του (τὸ βάρος τῆς μονάδος τοῦ ὄγκου εἰς ἓνα τόπον, ἡ θερμοκρασία τήξεως καὶ βρασμοῦ) εἶναι σταθεραὶ.

Αὐτὰς τὰς ἀμεταβλήτους ἰδιότητας καλοῦμεν **φυσικὰς σταθεράς**.

## ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ

1. Τὸ διηθημένον ὕδωρ δὲν εἶναι ἀναγκαστικῶς καθαρὸν ὕδωρ.

2. Τὸ ἀπεσταγμένον ὕδωρ προέρχεται ἀπὸ συμπύκνωσιν ὕδατων. Ἀπὸ αὐτὸ

διὰ διηθήσεως ἢ δι' ἀποστάξεως δὲν δυνάμεθα νὰ λάβωμεν παρὰ μόνον ὕδωρ.

Τὸ ἀπεσταγμένον ὕδωρ εἶναι καθαρὸν ὕδωρ.

3. 1 l (dm<sup>3</sup>) καθαροῦ ὕδατος ἔχει σταθερὸν βάρος καὶ ζυγίζει εἰς θερμοκρασίαν 4° C περίπου 1 κρ (1kg\*).

4. Τὸ καθαρὸν ὕδωρ στερεοποιεῖται εἰς σταθερὰν θερμοκρασίαν, ἡ ὅποια καθωρίσθη ὡς 0° C.

Ἐπίσης βράζει εἰς μιάν σταθερὰν θερμοκρασίαν, ἡ ὅποια καθωρίσθη ὡς 100° C.


5. Ὅπως τὸ ἀπεσταγμένον ὕδωρ, τοιοῦτοτρόπως καὶ κάθε καθαρὸν σῶμα χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὰς φυσικὰς σταθεράς του.

4<sup>ON</sup> ΜΑΘΗΜΑ: Τὸ ὕδωρ σχηματίζει μὲ πολλὰ σῶματα ὁμογενῆ μίγματα.

## ΔΙΑΛΥΤΙΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΣ

1 Τὸ ὕδωρ δύναται νὰ διαλύῃ στερεὰς οὐσίας.

● Ἐὰν εἰς ποτήριον πλήρες ὕδατος ρίψωμεν ὀλίγον μαγειρικὸν ἅλας καὶ τὸ ἀναδεύσωμεν, τὸ ἅλας ἐξ-



Σχ. 1.

Τὸ ἅλας καὶ ἡ σάκχαρις διαλύονται εἰς τὸ ὕδωρ.

Τὸ θεῖον καὶ ὁ ἄνθραξ δὲν διαλύονται εἰς τὸ ὕδωρ.

αφανίζεται και το ύδωρ παραμένει διαυγές, χωρίς ορατά ίχνη άλατος.

Έπραξατοποιήσαμεν μίαν **διάλυση** άλατος εις το ύδωρ.

● Έάν θέσωμεν μίαν σταγόνα από αυτό το ύδωρ επί της γλώσσης μας, θα διαπιστώσωμεν διά της γεύσεως την παρουσίαν του άλατος.

● Διηθούμεν αυτήν την διάλυση και δοκιμάζομεν πάλιν το ύγρόν, το όποιον λαμβάνομεν: *Είναι άλμυρόν* (σχ. 2).

● Το άλας διήλθε μετά του ύδατος, αν και ό διηθητικός χάρτης συγκρατεί τας στερεάς ουσίας.

Το άλας έσχημάτισε μετά του ύδατος έν μείγμα, του όποίου δέν δυνάμεθα να διακρίνωμεν τα συστατικά.

Το μείγμα αυτό είναι **όμογενές**.

**Συμπέρασμα:** Το άλας είναι διαλυτόν εις το ύδωρ. Η διάλυσις τούτου εις το ύδωρ είναι έν όμογενές μείγμα.

● Εις σφαιρικήν φιάλην με χλιαρόν ύδωρ διαλύομεν όσον το δυνατόν περισσότερον άλας. Εις κάποιαν στιγμήν το άλας, το όποιον προσθέτομεν, δέν διαλύεται πλέον, αλλά πίπτει εις τόν πυθμένα ώσαν ίζημα.

Το διάλυμα αυτό καλεΐται **κεκορεσμένον**.

● 100 g καθαρού ύδατος εις τους 20° C δέν δύνανται να διαλύσουν περισσότερον από 36 g άλατος.

● Η **διαλυτότης** του μαγειρικού άλατος είναι 36 g εις τα 100 g καθαρού ύδατος εις την θερμοκρασίαν των 20° C.

2) **Έπίδρασις της θερμοκρασίας εις την διαλυτότητα ενός σώματος.**

Έντός σφαιρικής φιάλης, ή όποία περιέχει 1 l καθαρού ύδατος, διαλύομεν νιτρικόν κάλιον, έως ότου έπιτύχωμεν κεκορεσμένον διάλυμα. Θερμαίνομεν την φιάλην και σημειούμεν την θερμοκρασίαν και την ποσότητα του νιτρικού καλίου, την όποιαν προσθέτομεν κάθε φοράν, διά να παραμείνη το διάλυμα κεκορεσμένον.



0°      20°      100°

130 g    270 g    2470 g


● Έάν ψύξωμεν την φιάλην, θα παρατηρήσωμεν ή αρχίξει να κατακάηται υπό μορφήν **κρυστάλλων** έν μέρος του νιτρικού καλίου (σχ. 3)· και αυτό διότι εις χαμηλότεραν θερμοκρασίαν, όπως είδομεν, το ύδωρ θα συγκρατήσει μικροτέραν ποσότητα από την ούσιαν, την όποιαν έχει διαλύσει.

● Έπαναλαμβάνομεν το πείραμα, διαλύοντες αυτήν την φοράν μαγειρικόν άλας. Παρατηρούμεν ότι ή μεγίστη ποσότης του άλατος, την όποιαν δυνάμεθα να διαλύσωμεν, μεταβάλλεται όλίγον με την αύξησιν της θερμοκρασίας του ύδατος.

0°      20°      50°  
36 g    36 g    39 g




Σχ. 3. Η διαλυτότης του νιτρικού καλίου αύξάνεται μετά της θερμοκρασίας του ύδατος.



Σχ. 4. Μετά την εξαΐμισιν μέρους του ύδατος εις τας άλυκάς, το διάλυμα γίνεται κεκορεσμένον και το άλας κρυσταλλοποιείται. Διατι οι σφορι του άλατος καλύπτονται διά κεράμων ή χώματος;





Σχ. 5. Το οινόπνευμα αναμειγνύεται με το ύδωρ. Η βενζίνη όχι.

**Συμπέρασμα:** Η διαλυτότης ώρισμένων ούσιων (νιτρικόν κάλιον, σάκχαρις) αυξάνει πολὺ μετὰ τῆς θερμοκρασίας, ἐνῶ ἡ διαλυτότης τοῦ ἄλατος ἐλάτιστα.

### 3 Περικετικότης ἑνὸς διαλύματος.

Ρίπτομεν εἰς ἓνα ὀγκομετρικὸν κύλινδρον ὕδωρ, εἰς τὸ ὅποιον ἔχομεν διαλύσει 15 g ἄλατος, καὶ συμπληροῦμεν διὰ καθαροῦ ὕδατος ἕως τὴν ὑποδιαίρειν 100 cm<sup>3</sup>.

Ἐχομεν τώρα ἐν διάλυμα 100 cm<sup>3</sup> ὕδατος καὶ ἄλατος, τὸ ὅποιον περιέχει 15 g ἄλατος ἢ 150 g εἰς 1 l διαλύματος.

Ἡ περιεκτικότης αὐτοῦ τοῦ διαλύματος εἶναι 150 g ἄλατος ἀνὰ λίτρον.

Ἡ περιεκτικότης τοῦ θαλασσοῦ ὕδατος εἰς μαγειρικὸν ἄλας εἶναι πολὺ μικροτέρα: 25 g ἕως 30 g ἀνὰ λίτρον.

### 4 Διάλυσις ὑγρῶν ἐντὸς τοῦ ὕδατος.

Ρίπτομεν εἰς ἓνα δοκιμαστικὸν σωλῆνα ὕδωρ καὶ ἐν συνεχείᾳ πολὺ προσεκτικὰ οἰνόπνευμα. Δυνάμεθα νὰ διακρίνωμεν τὰ δύο ὑγρά, τὸ ἐν ἐπὶ τοῦ ἄλλου. Τὸ ὕδωρ εὐρίσκεται εἰς τὸ κατώτερον μέρος.


● Ἐάν μετακινήσωμεν τὸν σωλῆνα, τὰ δύο ὑγρά γίνονται ἐν καὶ δὲν δυνάμεθα νὰ τὰ διαχωρίσωμεν σχηματίζουσα δὴλ. ἐν ὁμογενὲς μείγμα. Τὸ ὕδωρ διαλύει τὸ οἰνόπνευμα.

Ἐπαναλαμβάνομεν τὸ πείραμα μὲ ὕδωρ καὶ βενζίνη. Παρατηροῦμεν ὅτι ἡ βενζίνη παραμένει ἐπάνω ἀπὸ τὸ ὕδωρ, καὶ, ἀν ἀνακινήσωμεν τὸν σωλῆνα, λαμβάνομεν ἐν μελόν μείγμα, εἰς τὸ ὅποιον παρατηροῦμεν αἰωρούμεν τὰς σταγόνας τῆς βενζίνης (σχ. 5).

● Τὸ ἑτερογενὲς αὐτὸ μείγμα εἶναι ἐν γαλάκτωμα. Τὰ σταγονίδια τῆς βενζίνης μετὰ τι χρονικὸν διάστημα ἀνέρχονται εἰς τὴν ἐπιφάνειαν καὶ τὰ δύο ὑγρά διαχωρίζονται.

Τὸ ὕδωρ καὶ ἡ βενζίνη δὲν δύνανται νὰ ἀναμειχθοῦν: Ἡ βενζίνη δὲν εἶναι διαλυτὴ εἰς τὸ ὕδωρ.

Ἡ ἀπαγωγὸς σωλῆν φθάνει ἕως τὴν βασιν τοῦ πάματος.



Σχ. 6. Τὸ φυσικὸν ὕδωρ περιέχει διαλυμένα ἀέρια.

**Συμπέρασμα:** Μερικὰ ὑγρά, ὅπως τὸ οἰνόπνευμα, δύνανται νὰ ἀναμειχθοῦν μὲ τὸ ὕδωρ. Ἄλλα, ὅπως ἡ βενζίνη, δὲν ἀναμειγνύονται.

### 5 Διάλυσις ἀερίων ἐντὸς τοῦ ὕδατος.

● Θερμαίνομεν βραδέως τὴν φιάλην τοῦ σχ. 6 καὶ παρατηροῦμεν ἐντὸς ὀλίγου ὅτι σχηματίζονται φυσαλλίδες εἰς τὰ τοιχώματά της. Αἱ φυσαλλίδες γίνονται διαρκῶς ὀλιγώτεροι καὶ ταχέως ἐξαφανίζονται.

● Τὸ ἀέριον, τὸ ὅποιον συνελέξαμεν εἰς τὸν δοκιμαστικὸν σωλῆνα, ἀποτελεῖται κυρίως ἀπὸ Ἄζωτον καὶ Ὄξυγόνον. Αὐτὰ ὑπῆρσαν προηγουμένως ἐντὸς τοῦ ὕδατος, ἀλλὰ δὲν ἦτο δυνατόν νὰ τὰ παρατηρήσωμεν, διότι ἤσαν διαλυμένα καὶ ἀπετέλουν μετὰ τοῦ ὕδατος ὁμογενὲς μείγμα. Τὰ ἀέρια αὐτὰ προέρχονται κυρίως ἀπὸ διαλυμένον ἀτμοσφαιρικὸν ἀέρα. Τὸ διαλυμένον ὀξυγόνον, τὸ ὅποιον περιέχει τὸ ὕδωρ τῶν ποταμῶν, τῶν λιμνῶν, τῶν θαλασσῶν, ἀναπνέουν καὶ διατηροῦνται οὕτω εἰς τὴν ζωὴν τὰ ὑδρόβια ζῶα καὶ φυτὰ.



Το ύδωρ δύναται νὰ διαλύσῃ καὶ πολλὰ ἄλλα ἀέρια. Τὰ ἀεριοῦχα ποτὰ περιέχουν διοξειδίου τοῦ ἀνθρακος.

Σημείωσις. Τὸ ἀέριον, τὸ ὁποῖον συνελέξαμεν εἰς τὸν δοκιμαστικὸν σωλῆνα, δὲν δύναται νὰ εἶναι ἀτμός, διότι θὰ εἶχε συμπυκνωθῆ εἰς τὸ ὕδωρ τοῦ σωλῆνος.

**Συμπέρασμα :** Τὸ ὕδωρ δύναται νὰ διαλύσῃ ἀέρια.

## ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ

1. Τὸ μαγειρικὸν ἅλας εἶναι διαλυτὸν εἰς τὸ ὕδωρ καὶ σχηματίζει ἓν ὁμογενὲς μείγμα. Εἰς 20°C 1l διαλύματος ἁλατος εἰς ὕδωρ δύναται νὰ περιέχῃ μέχρι 360g διαλελυμένου μαγειρικοῦ ἁλατος. Τὸ διάλυμα αὐτὸ καλεῖται κεκορεσμένον.

Διαλυτότης μᾶς οὐσίας εἰς τὸ ὕδωρ καλεῖται ἡ μεγίστη μᾶσα εἰς g, ἡ ὅποια δύναται νὰ διαλυθῆ εἰς 100g καθαροῦ ὕδατος.

Ἡ διαλυτότης τῶν στερεῶν (νιτρικὸν κάλιον, σάκχαρις) αὐξάνει μετὰ τῆς θερμοκρασίας.

3. Ἡ περιεκτικότης ἐνὸς διαλύματος ἐκφράζεται διὰ τῆς μάζης τῆς διαλελυμένης οὐσίας εἰς ἓν λίτρον τοῦ διαλύματος.

4. Ὁρισμένα ὑγρά, ὅπως τὸ οἶνονπνευμα, εἶναι διαλυτὰ εἰς τὸ ὕδωρ, ἐνῶ ἄλλα, ὅπως ἡ βενζίνη, τὸ ἔλαιον, δὲν εἶναι.

5. Τὸ ὕδωρ δύναται νὰ διαλύσῃ ἀέρια καὶ ἰδιαιτέρως τὸ ὀξυγόνον καὶ τὸ ἄζωτον τοῦ ἀτμοσφαιρικοῦ ἀέρος.

5ον ΜΑΘΗΜΑ : Πρῶτη μελέτη ἐνὸς ἀερίου.

## Ο Α Η Ρ

### 1 Παρουσία τοῦ ἀέρος.

● Βυθίζομεν ἐντὸς τοῦ ὕδατος κενὴν φιάλην μὲ τὸ στόμιον πρὸς τὰ κάτω (σχ. 1). Παρατηροῦμεν ὅτι πολὺ ὀλίγον ὕδωρ εἰσέρχεται ἐντὸς τῆς φιάλης. Διατί; Ἐάν ὁμως κλίνωμεν αὐτὴν πρὸς τὰ κάτω, φουσαλλίδες διαφεύγουν ἀπὸ τὸ στόμιόν της καὶ ἡ φιάλη πληροῦται ὕδατος (Σχ. 1 Β).

Τὸ ὕδωρ ἀντικατέστησεν ἓν σῶμα, τὸ ὁποῖον ὑπῆρχεν εἰς τὴν φιάλην, ἀλλὰ δὲν τὸ ἐβλέπαμεν.

Ἡ φιάλη ἦτο πλήρης ἀέρος.


● Οἱ ἀνεμοὶ, τὰ ἀέρια ρεύματα, ἡ ἀντίστασις, ἡ ὁποία παρουσιάζεται εἰς τὰς ταχείας κινήσεις μας, ἀποδεικνύουν ἐπίσης τὴν παρουσίαν τοῦ ἀέρος.

● Ἡ Γῆ περιβάλλεται ἀπὸ στρώμα ἀέρος, τὴν ἀτμοσφαῖραν, ἡ ὁποία ἔχει πάχος πολλὰς ἑκατοντάδας χιλιομέτρων. Ἀλλὰ τὰ περισσότερα μέρη της εἶναι συγκεντρωμένα εἰς τὰ κατώτερα στρώματα (ἡ μισὰ εἰς τὰ 5 πρῶτα χιλιόμετρα) καὶ ἐλαττοῦνται ὁλοκρῶς καὶ περισσότερον εἰς τὰ ἀνώτερα στρώματα.

Τὰ τελευταῖα μέρη εἶναι δυνατὸν νὰ εὐρίσκωνται καὶ εἰς χιλιάδας χιλιομέτρων ἀπόστασιν ἀπὸ τὴν ἐπιφάνειαν τῆς γῆς (σχ. 2).

### 2 Ἰδιότητες τοῦ ἀέρος.


Τὰ πειράματα, τὰ ὁποῖα ἐγιναν εἰς τὸ πρῶτον μάθημα, μᾶς ἀπέδειξαν τὰς βασικὰς ἰδιότητες τοῦ ἀέρος: τὴν **συμπιεστότητα**, τὴν **ἐλαστικότητα** καὶ τὸ **ἐκτατόν**. Αἱ ἰδιότητες αὐταὶ εἶναι κοινὰ δι' ὅλα τὰ ἀέρια.




Σχ. 1. Εἰς τὴν φιάλην Α εἰσέρχεται πολὺ ὀλίγον ὕδωρ (εἶναι πλήρης ἀέρος). Εἰς τὴν φιάλην Β (πλαγία) ὁ ἀὴρ ἐξέρχεται ὑπὸ μορφήν φουσαλλίδων καὶ τὸ ὕδωρ καταλαμβάνει τὴν θέσιν του.



Σχ. 2.



Εχ. 3. 'Ο αήρ έχει βάρος.



Εχ. 4. Όταν άφαιρεθή ό αήρ, τό φυτόν μαραινείται και νεκρώνεται.



Εχ. 5. Δοχείον Dewar διά τήν διατήρησιν υγρού αέρος.

● 'Ο αήρ έχει βάρος. Διά μιᾶς ἀεραντλίας ἀφαιρούμεν τόν αέρα ἀπό μιαν ὑαλίνην σφαιρικήν φιάλην. Δέν δυνάμεθα νά ἐπιτύχωμεν ἀπόλυτον κενόν. Πάντοτε ἀπομένει ὀλίγος αήρ, ὁ ὅποιος διαχέεται εἰς ὅλον τόν χώρον τῆς φιάλης.

● Τοποθετοῦμεν κατόπιν τήν φιάλην εἰς τόν ἕνα δίσκον ζυγοῦ καί τήν ἰσορροποῦμεν μέ ἀπόβαρον εἰς τόν ἄλλον δίσκον (σχ. 3Α). Ἐάν ἀνοίξωμεν τήν στρόφιγγα, ἡ ἰσορροπία καταστρέφεται καί ὁ ζυγός κλίνει πρὸς τὸ μέρος τῆς φιάλης. Διατί;

Προσθέτοντες σταθμά εἰς τόν δίσκον, εἰς τὸν ὁποῖον ἔχομεν τὸ ἀπόβαρον, δυνάμεθα νά προσδιορίσωμεν κατὰ προσέγγισιν τὸ βάρος τοῦ αέρος, τὸν ὁποῖον περιέχει ἡ φιάλη.

● Ἐν λίτρον αέρος ζυγίζει ὑπὸ κανονικὴν ἀτμοσφαιρικήν πίεσιν καί θερμοκρασίαν 0° C 1,293 g ἢ περίπου 1,3 g.

Σύγκρισις τοῦ βάρους τοῦ ὕδατος πρὸς τὸ βάρος ἴσου ὄγκου αέρος.

Βάρος 1 λίτρον ὕδατος=1 Κρ=1000ρ.

Βάρος 1 λίτρον αέρος=0,0013 Κρ=1,3ρ.

**Συμπέρασμα:** 'Ο αήρ, ὅπως καὶ κάθε ἀέριον, ἔχει βάρος. Ἀλλὰ τὸ βάρος τῶν αερίων εἶναι εἰς ἴσον ὄγκον πολὺ μικρότερον ἀπὸ τὸ βάρος τῶν στερεῶν καὶ τῶν υγρῶν.

**3** 'Ο αήρ εἶναι ἀπαραίτητος διὰ τὰς καύσεις καὶ τὴν ζωὴν.

● Καλύπτομεν δι' ὑαλίνου κώδωνος ἕν ἀναμμένον κηρίον. Παρατηροῦμεν ὅτι ἡ φλόξ του ἐξασθενεῖ καὶ τέλος σβήνει (σχ. 4).

● Ἐάν ἐπαναλάβωμεν τὸ πείραμα καὶ ἀνασηκώσωμεν τὸν κώδωνα, προτοῦ σβῆσῃ ἐντελῶς ἡ φλόξ, παρατηροῦμεν ὅτι ἡ φλόξ δυναμώνει καὶ πάλιν.

● Ἄς προσπαθῆσωμεν νά κρατήσωμεν τὴν ἀναπνοὴν μας. Πόσῃν ὥρᾳ δυνάμεθα νά μὴ ἀναπνέωμεν;

● Νά ἀναφερθοῦν μερικά παραδείγματα θανάτων ἐκ τῆς ἐλλείψεως αέρος (ἀσφυξία).

**Συμπέρασμα:** 'Ο αήρ εἶναι ἀπαραίτητος διὰ τὰς καύσεις. 'Ο αήρ εἶναι ἀπαραίτητος διὰ τὴν ζωὴν.

**4** Σύστασις τοῦ αέρος.

● 'Ο αήρ, ὅταν ψυχθῇ εἰς τοὺς -193° C, γίνετα ἕν ὑγρὸν διαυγές, ἐλαφρῶς κυανοῦ, τὸ ὁποῖον ρεῖ ὡσάν τὸ ὕδωρ. Διὰ νά λάβωμεν ἕν λίτρον ὑγροῦ αέρος, ἀπαιτοῦνται 700 λίτρα αέρος εἰς κατάστασιν αερίωδη.

● Τὸν ὑγρὸν αέρα, διὰ νά μὴ ἐξαεριωθῇ ταχέως, τὸν διατηροῦμεν ἐντὸς μονωτικῶν δοχείων μέ διπλᾶ τοιχώματα καὶ μέ μικρὸν ἀνοίγμα *χωρὶς πῶμα*, ὅπου βράζει καὶ ἐξαερῶνεται βραδέως (σχ. 6).

Ἐάν βυθίσωμεν εἰς τὸ ἀέριον ἓν κηρίον ἀναμμένον, τὸ ὅποιον ἐξέρχεται κατ' ἀρχὰς ἀπὸ τὸν ἀέρα, τὸν μόνον ὑγροποιημένον, παρατηροῦμεν ὅτι τὸ κηρίον σβῆνει. Τὸ ἀέριον αὐτὸ εἶναι ἀζώτον (διότι ἐξαεριοῦται εἰς  $-195^{\circ}\text{C}$ ).

Ἀντιθέτως τὸ ἀέριον, τὸ ὅποιον ἐξέρχεται πρὸς τὸ τέλος, ἐνδυναμώνει τὴν φλόγα τοῦ κηρίου. Τὸ ἀέριον αὐτὸ εἶναι δξυγόνον (διότι ἐξαεριοῦται εἰς  $-183^{\circ}\text{C}$ ).

Δηλαδή κατὰ τὸν βρασμὸν τοῦ ὑγροῦ ἀέρος ἐξέρχονται ἀέρια, τὰ ὅποια ἔχουν διαφορετικὰς ἰδιότητας : Ὁ ὑγρὸς ἀήρ εἶναι μείγμα. Μὲ εἰδικὰ θερμομέτρα διαπιστώνομεν ὅτι κατὰ τὸν βρασμὸν ἢ θερμοκρασίᾳ ἀνέρχεται ἀπὸ  $-195^{\circ}\text{C}$  εἰς  $-183^{\circ}\text{C}$  περίπου. Ὁ ὑγρὸς ἀήρ δὲν ἔχει ὅπως τὸ ἀπεσταγμένον ὕδωρ σταθερὰν θερμοκρασίαν βρασμοῦ· δὲν εἶναι λοιπὸν καθαρὸν σῶμα.

Παρατηροῦμεν ἀκόμη ὅτι ἡ ἀπόστασις τοῦ ὑγροῦ ἀέρος ἐπιτρέπει νὰ διαχωρίσωμεν τὸν ἀέρα εἰς αερίωδη συστατικά, τὰ ὅποια ἔχουν διαφορετικὰς ἰδιότητας.

**Συμπέρασμα :** Ὁ ἀήρ εἶναι μείγμα δύο τὸ ὀλιγότερον ἀερίων: τοῦ ἀζώτου, τὸ ὅποιον ἐξέρχεται πρῶτον καὶ δὲν διατηρεῖ τὴν καύσιν, καὶ τοῦ δξυγόνου, τὸ ὅποιον ἐξερχόμενον εἰς τὸ τέλος διατηρεῖ καὶ ἐνδυναμώνει τὴν καύσιν.

### ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ

1. Ἡ Γῆ περιβάλλεται ἀπὸ στρῶμα ἀέρος, πάχους ἑκατοντάδων χιλιομέτρων, τὸ ὅποιον ἀποτελεῖ τὴν ἀτμοσφαιραν.

Ὁ ἀήρ εἶναι ἀέριον συμπιεστόν, ἐλαστικὸν καὶ ἑκτατόν.

2. 1 l ἀέρος εἰς  $0^{\circ}\text{C}$  καὶ κανονικὴν πίεσιν ζυγίζει 1,3g περίπου.

3. Ὁ ἀήρ εἶναι ἀπαραίτητος εἰς τὰς καύσεις καὶ εἰς τὴν ζωὴν (τόσον τὴν ζωικὴν, ὅσον καὶ τὴν φυτικὴν).

4. Ὅταν ψυχθῇ εἰς τοὺς  $-193^{\circ}\text{C}$  ὁ ἀήρ γίνεται ὑγρὸς. Δι' ἀποστάξεως μεταξὺ  $-195^{\circ}\text{C}$  καὶ  $-183^{\circ}\text{C}$  τὸν διαχωρίζομεν εἰς δύο ἀέρια: τὸ ἀζώτον, τὸ ὅποιον δὲν διατηρεῖ τὰς καύσεις, καὶ τὸ δξυγόνον, τὸ ὅποιον τὰς διατηρεῖ καὶ τὰς ἐνδυναμώνει.


Ὁ ἀήρ δὲν εἶναι καθαρὸν σῶμα, εἶναι μείγμα.

60<sup>Ο</sup> ΜΑΘΗΜΑ: Ὁ ἀήρ εἶναι μείγμα πολλῶν ἀερίων.


### ΣΥΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΑΕΡΟΣ

#### 1 Ἀνάλυσις τοῦ ἀέρος διὰ φωσφόρου.

● Εἰς τὴν κοιλότητα τοῦ σωλήνος τῆς συσκευῆς τοῦ σχ. 1 τοποθετοῦμεν ἓν τεμάχιον λευκοῦ φωσφό-




Σχ. 1. Ἀνάλυσις τοῦ ἀέρος με φωσφόρον



(Α) Πρὸ τῆς καύσεως τοῦ φωσφόρου

(Β) Μετὰ τὴν καύσιν τοῦ φωσφόρου

Ὁ φωσφόρος δὲν καίεται ἐξ ὀλοκλήρου. Ἡ στάθμη τοῦ ὕδατος  $V \rightarrow \frac{1}{5} V$  ἀνέρχεται ἐντός τοῦ σωλήνος.



Σχ. 2. Ἀνάλισις τοῦ ἀέρος «ἐν ψυχρῷ» μετὰ ρινίσματα σιδήρου.

- Α) Εἰς τὴν ἀρχὴν τοῦ πειράματος ἡ στάθμῃ τοῦ ὕδατος ἐντὸς τοῦ σωλήνος εἶναι εἰς τὸ ἴδιον ὕψος μετὰ τὴν σταθμὴν τοῦ ὕδατος τῆς λεκάνης.
- Β) Τὴν δευτέραν ἡμέραν τὸ ὕδωρ ἀνέρχεται ἐντὸς τοῦ σωλήνος.
- Γ) Τὴν τρίτην ἡμέραν ἡ στάθμῃ δὲν μεταβάλλεται.



Σχ. 3. Ἡ λευκὴ κρούστα, ἡ ὁποία σχηματίζεται εἰς τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ ἄσβεστιου ὕδατος, μαρτυρεῖ τὴν παρουσίαν τοῦ διοξειδίου τοῦ ἀνθράκος εἰς τὴν ἀτμοσφαῖραν.



Σχ. 4. Ὁ ἔκπνεόμενος ἀήρ περιέχει πολλοὺς ὑδρατμοὺς.

ρου καὶ βυθίζομεν τὸ ἀνοικτὸν ἄκρον του εἰς τὸ ὕδωρ. Σημειώνομεν τὴν στάθμην τοῦ ὕδατος εἰς τὸν σωλήνα καὶ θερμαίνομεν ἐλαφρῶς τὸν φωσφόρον. Ὁ φωσφόρος ἀναφλέγεται, ὁ σωλήν γεμίζει μετὰ λευκοῦ καπνοῦ καὶ κατόπιν σβήνει. Οἱ λευκοὶ καπνοὶ βραδέως ἐξαφανίζονται, διαλυόμενοι ἐντὸς τοῦ ὕδατος, τοῦ ὁποίου ἡ στάθμῃ ἀνέρχεται ἐντὸς τοῦ σωλήνος. Ὁ φωσφόρος ἐκάη, ἀφοῦ ἠνώθη μετὰ τοῦ ὀξυγόνου τοῦ ἀέρος. Παραμένει τώρα εἰς τὸν σωλήνα ἐν ἀέριον, τὸ ὁποῖον δὲν διατρεῖ τὴν καῦσιν. Τὸ ἀέριον αὐτὸ εἶναι κυρίως ἄζωτον. Τὸ ὕδωρ κατέλαβε τὴν θέσιν τοῦ ὀξυγόνου.

● Ἐὰν μετρήσωμεν τὸν ὄγκον τοῦ ἀέρος ἐντὸς τοῦ σωλήνος πρὸ καὶ μετὰ τὴν καῦσιν τοῦ φωσφόρου, παρατηροῦμεν ὅτι ὁ ὄγκος τοῦ ἀερίου, ὁ ὁποῖος παραμένει, εἶναι περίπου τὰ 4/5 τοῦ ἀρχικοῦ ὄγκου.

**Συμπέρασμα:** Ὁ ἀήρ ἀποτελεῖται κατὰ τὸ 1/5 περίπου τοῦ ὄγκου του ἀπὸ ὀξυγόνου, ἐνῶ τὸ ὑπόλοιπον ἀποτελεῖται κυρίως ἀπὸ ἄζωτον καὶ μικρὰν ποσότητα ἄλλων ἀερίων, τὰ ὁποῖα καλοῦνται ἐγγενῆ ἀέρια (Νέον, Ἀργόν, Κρυπτόν, Ξέον, Ἡλιο).

## 2 Ἄλλα ἀέρια εὐρισκόμενα εἰς τὸν ἀτμοσφαιρικὸν ἀέρα.

● Ἐὰν παρατηρήσωμεν τὴν ἀβαθῆ ὑαλίνην λεκάνην μετὰ τὸ διαυγές ἄσβεστιον ὕδωρ, διὰ τὸ ὁποῖον ἔγινε λόγος εἰς τὸ προηγούμενον μάθημα, θὰ ἴδωμεν ὅτι ἡ ἐπιφάνεια τοῦ ὑγροῦ εἶναι κεκαλυμμένη διὰ λεπτῆς μεμβράνης (σχ. 3). Αὐτὴ ἡ μεμβράνη σχηματίζεται, ὅπως θὰ μάθωμεν, ὅταν τὸ ἄσβεστιον ὕδωρ ἔλθῃ εἰς ἐπαφὴν μετὰ τὸ διοξειδίον τοῦ ἀνθράκος.

Ὁ ἀτμοσφαιρικὸς ἀήρ περιέχει λοιπὸν καὶ διοξειδίον τοῦ ἀνθράκος.

● Ρίπτομεν εἰς ἓν ποτήριον πολὺ ψυχρὸν ὕδωρ. Θὰ παρατηρήσωμεν ἐντὸς ὀλίγου ὅτι ἡ ἐξωτερικὴ ἐπιφάνεια τοῦ ποτηρίου καλύπτεται μετὰ σταγονίδια ὕδατος, τὰ ὁποῖα σχηματίζονται ἀπὸ τὴν συμπύκνωσιν τῶν ὑδρατμῶν τοῦ ἀτμοσφαιρικοῦ ἀέρος. Ὁ ἀτμοσφαιρικὸς ἀήρ περιέχει καὶ ὑδρατμοὺς.

Ὁ ἀτμοσφαιρικὸς ἀήρ περιέχει ἀκόμη καὶ πολλὰ αἰωρούμενα στερεὰ σωματίδια. Εἶναι ἡ κόνις τοῦ ἀέρος, τὴν ὁποῖαν παρατηροῦμεν, ὅταν μία φωτεινὴ δέσμη διασχίξῃ ἐν σκοτεινῶν δωμάτων (περίπου 50.000 τεμαχίδια κόνεως ὑπάρχουν ἀνὰ 1 cm<sup>3</sup> ἀέρος).

**Συμπέρασμα:** Ὁ ἀτμοσφαιρικὸς ἀήρ εἶναι μίγμα ὀξυγόνου, ἄζωτον, ἐγγενῶν ἀερίων, διοξειδίου τοῦ ἀνθράκος καὶ ὑδρατμῶν. Περιέχει ἀκόμη καὶ διάφορα αἰωρούμενα σωματίδια (κόνις).

● Τὴν σύστασιν τοῦ μείγματος τῶν ἀερίων, τὰ ὅποια ἀποτελοῦν τὸν ἀτμοσφαιρικὸν ἀέρα, μᾶς δίδει ὁ κάτωθι πίναξ, ὁ ὁποῖος ἔχει γίνεи κατόπι ἀκριβῶν μετρήσεων:

Ἀζωτον: 78 l Ὁξυγόνον: 21 l Εὐγενῆ ἀέρια: 1 l (περίπου) Διοξειδίου τοῦ ἀνθρ. 0,03 l Ὑδρατμοί: μεταβλητὴ ποσ. Κόνις: μεταβλητὴ ποσότης	100 l καθαροῦ καὶ ξηροῦ ἀέρος	ΑΤΜΟ- ΣΦΑΙ- ΡΙΚΟΣ ΑΗΡ
--	-------------------------------------	--------------------------------



### 3 Σύστασις εἰσπνεόμενου καὶ ἐκπνεόμενου ἀέρος.

● Ἀναπνεόμεν εἰς δύο χρόνους: διὰ τῆς εἰσπνοῆς, ὅπότε ὁ ἀήρ εἰσέρχεται εἰς τοὺς πνεύμονας, καὶ διὰ τῆς ἐκπνοῆς, ὅπότε ἀποβάλλεται ἀπὸ αὐτοῦ.

● Ἐάν ἐκπνεύσωμεν ἐμπροσθεν κατόπτρου, θὰ παρατηρήσωμεν ὅτι ἡ ἐπιφάνεια αὐτοῦ καλύπτεται μὲ ὕδρατμούς. Ὁ ἀήρ ἐπομένως, τὸν ὁποῖον ἐκπνέομεν, περιέχει περισσοτέρους ὕδρατμούς ἀπὸ τὸν ἀέρα, ὁ ὁποῖος μᾶς περιβάλλει (σχ. 4).

● Ἐάν φυσήσωμεν δι' ἑνὸς σωλήνος εἰς ποτήριον, τὸ ὁποῖον περιέχει ἀσβέστιον ὕδωρ (σχ. 5), παρατηροῦμεν ὅτι τοῦτο θολοῦται ταχέως. Ἐάν ἐπαναλάβωμεν τὸ πείραμα διαβιβάζοντες ἀτμοσφαιρικὸν ἀέρα διὰ φουσητήρος, τὸ ἀσβέστιον ὕδωρ θολοῦται καὶ τώρα, ἀλλὰ μὲ πολὺ βραδύτερον ρυθμὸν (σχ. 5 Γ).

Ὁ ἀήρ, τὸν ὁποῖον ἐκπνέομεν, περιέχει περισσότερον διοξειδίου τοῦ ἀνθρακος ἀπὸ αὐτόν, ὁ ὁποῖος μᾶς περιβάλλει.

● Ὁ κάτωθι πίναξ μᾶς δεικνύει τὴν διαφορὰν τῆς συστάσεως τοῦ ἀέρος, τὸν ὁποῖον εἰσπνέομεν, καὶ ἐκεῖνον, τὸν ὁποῖον ἐκπνέομεν.

	Εἰσπνεόμενος ἀήρ 1 l	Ἐκπνεόμενος ἀήρ 1 l
Ἀζωτον (καὶ εὐγενῆ ἀέρια)	0,79 l	0,79 l
Ὁξυγόνον	0,21 l	0,16 l
Διοξειδίου τοῦ ἀνθρακος	ἱχνη ἀσήμαντα	0,04 l
Ὑδρατμοί	μεταβλητὴ ποσότης	μεγάλῃ ποσότης

● Κατὰ τὴν λειτουργίαν τῆς ἀναπνοῆς ἕν μέρος τοῦ ὀξυγόνου, τὸ ὁποῖον εἰσπνέομεν, κρατεῖται ἀπὸ τὸν ὄργανισμὸν.

Ἀποβάλλομεν διὰ τῆς ἐκπνοῆς περισσότερον διοξειδίου τοῦ ἀνθρακος καὶ ὕδρατμούς ἀπὸ δσοὺς εἰσπνέομεν, καὶ ὅλον τὸ ἀζωτον.


### ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ

1. Ὁ ἀήρ εἶναι μείγμα πολλῶν ἀερίων.

2. 100 l ἀέρος περιέχουν 21 l ὀξυγόνου, 78 l ἀζώτου, 1 l εὐγενῶν ἀερίων (Νέον, Ἀργόν, Κρυπτόν, Ξένον, Ἡλίου), ὀλίγον διοξειδίου τοῦ ἀνθρακος καὶ ὕδρατμούς εἰς μεταβλητὴν ποσότητα.

3. Διὰ τῆς ἐκπνοῆς ἀποβάλλομεν ἀέρα, ὅστις περιέχει ὀλιγώτερον ὀξυγόνον ἀπὸ ἐκεῖνον, τὸ ὁποῖον εἰσπνέομεν, καὶ περισσότερον διοξειδίου τοῦ ἀνθρακος καὶ ὕδρατμούς.

4. Ὁ ἀήρ (ὁ ἐκπνεόμενος) περιέχει 16% ὀξυγόνον καὶ 4% διοξειδίου τοῦ ἀνθρακος, ἐνῶ ὁ ἀήρ, τὸν ὁποῖον εἰσπνέομεν, 21% ὀξυγόνον καὶ ἱχνη διοξειδίου τοῦ ἀνθρακος.



Σχ. 5. Ὁ ἐκπνεόμενος ἀήρ περιέχει πολὺ περισσότερον διοξειδίου τοῦ ἀνθρακος ἀπὸ τὸν εἰσπνεόμενον.



Τὰ διυλιστήρια τῆς Ἑλληνικῆς Ἐταιρείας Ὑδάτων εἰς τὴν Ὀμορφοκκλησιά.

## ΑΣΚΗΣΕΙΣ

### Σειρά 1: Τὸ ὕδωρ, ὁ ἀήρ.

#### I. Τὸ ὕδωρ

1. Ὀνομάζομεν περιεκτικότητα ἐνὸς διαλύματος τὴν μάζαν ἄλατος, ἡ ὁποία εἶναι διαλελυμένη εἰς τὴν μονάδα τοῦ ὄγκου του.

Διαλύομεν 18 g μαγειρικοῦ ἄλατος εἰς ὕδωρ καὶ συμπληρώνομεν οὕτως, ὥστε νὰ λάβωμεν 125 cm<sup>3</sup> διαλύματος:

Ποία εἶναι ἡ περιεκτικότης τοῦ διαλύματος; (μονὰς ὄγκου τὸ ἓν λίτρον).

2. Διαλυτότητα μιᾶς οὐσίας καλοῦμεν τὴν μέγιστην μάζαν αὐτῆς, τὴν ὁποίαν δυνάμεθα νὰ διαλύσωμεν εἰς 100 g ὕδατος. Διὰ πολλὰ σώματα ἡ διαλυτότης αὐξάνει μετὰ τῆς θερμοκρασίας. Ὁ κάτωθι πίναξ δίδει τὴν διαλυτότητα τοῦ χλωρικοῦ καλίου (μάζα εἰς γραμμάρια διαλυτῆ εἰς 100 g ὕδατος) διὰ διαφόρους θερμοκρασίας:

Θερμοκρασία	0° C	20° C	40° C	60° C	80° C	100° C
Διαλελυμένον χλωρικόν κάλιον	3g	8g	16g	28g	44g	61g

Νὰ χαραχθῆ εἰς χιλιοστομετρικὸν χάρτην ἡ καμπύλη διαλυτότητος τοῦ χλωρικοῦ καλίου συναρτήσῃ τῆς θερμοκρασίας.

Κλίμαξ: Εἰς τὸν ὀριζόντιον ἀξονα OX τὸ 1 cm θὰ παριστᾷ 10° C. Εἰς τὸν κατακόρυφον ἀξονα OY τὸ 1 cm θὰ παριστᾷ 5 g.

Ἀπὸ αὐτὴν τὴν γραφικὴν παράστασιν νὰ εὑρεθῆ:

α) Ἀπὸ ποίαν θερμοκρασίαν καὶ ἄνω δυνάμεθα νὰ διαλύσωμεν 50 g ἀπὸ αὐτὴν τὴν οὐσίαν εἰς 100 g ὕδατος.

β) Ποία ἡ διαλυτότης τοῦ χλωρικοῦ καλίου εἰς τὴν θερμοκρασίαν 50° C.

3. Ὁ κάτωθι πίναξ δίδει τὴν μάζαν τῆς σακχάρου (g), ἡ ὁποία δύνανται νὰ διαλυθῆ εἰς 100 g ὕδατος διὰ διαφόρους θερμοκρασίας:

Θερμοκρασία	0° C	20° C	40° C	60° C	80° C	100° C
Διαλελυμένη σάκχαρις	180 g	200 g	240 g	290 g	360 g	490 g

Νὰ χαραχθῆ εἰς χιλιοστομετρικὸν χάρτην ἡ καμπύλη διαλυτότητος τῆς σακχάρου συναρτήσῃ τῆς θερμοκρασίας:

Κλίμαξ: Εἰς τὸν ὀριζόντιον ἀξονα OX τὸ 1 cm θὰ τὸ λάβωμεν διὰ 10° C καὶ εἰς τὸν κατακόρυφον OY τὸ 1 cm διὰ 100 g σακχάρου.

Ἐκ τῆς γραφικῆς παραστάσεως νὰ προσδιορισθοῦν:

α) Ἡ διαλυτότης τῆς σακχάρου εἰς τοὺς 50° C.

β) Ἀπὸ ποίαν θερμοκρασίαν καὶ ἄνω δυνάμεθα νὰ διαλύσωμεν 400 g εἰς 100 g ὕδατος.

4. Τὸ μαγειρικὸν ἄλας ἔχει διαλυτότητα 36 g εἰς τὰ 100 g ὕδατος εἰς τοὺς 20° C. Ἡ διάλυσις αὐτὴ εἶναι κεκορεσμένη. Ἀφίνομεν νὰ ἐξατμισθῆ 1 m<sup>3</sup> θαλασσίου ὕδατος, τὸ ὁποῖον περιέχει ἓνα τόνον ὕδατος περίπου καὶ 30 kg μαγειρικοῦ ἄλατος, ἕως ὅτου ἀρχίσῃ τὸ ἄλας νὰ κρυσταλλοῦται.

Πόση μᾶζα ὕδατος εἰς κάθε κυβικὸν μέτρον θαλασσίου ὕδατος θὰ ἔχη ἐξατμισθῆ ἕως τὴν στιγμὴν αὐτὴν;

(Ὑποθέτομεν ὅτι ἡ ἐξάτμισις γίνεται εἰς τοὺς 20° C).

#### II. Ὁ ἀήρ

5. Μία αἰθουσα ἔχει διαστάσεις: 8 m μήκος, 6 m πλάτος καὶ 4 m ὕψος:

Εάν δεχθώμεν ότι εις τὴν θερμοκρασίαν τῆς αἰθούσης 1 l ἀέρος ἔχει μᾶζαν 1,25 γ, ὑπολογισθῆ ἡ μᾶζα τοῦ ἀέρος, ὁ ὁποῖος περιέχεται εἰς τὴν αἰθουσαν ταύτην.

6. Ἐν λίτρῳ ὕγρου ἀέρος ζυγίζει 0,91 kg καὶ ἐν λίτρῳ ἀέρος εἰς ἀερίωδῃ καταστάσει (ὑπὸ πίεσιν 760 mmHg καὶ θερμοκρασίαν 0° C) ζυγίζει 1,293 γ. Νὰ ὑπολογισθῆ ὁ ὄγκος τοῦ ἀέρος, ὁ ὁποῖος προέρχεται ἀπὸ τὴν ἐξάτμισιν 5 l ὕγρου ἀέρος.

7. Ὑπὸ κανονικῆς συνθήκας θερμοκρασίας καὶ πίεσεως 1 l ἀέρος ἔχει μᾶζαν 1,293 γ.

Ἐάν 100 l ἀέρος περιέχουν 78 l ἀζώτου καὶ 21 l ὀξυγόνου, πόση μᾶζα ἐξ ἐκάστου ἀερίου περιέχεται εἰς τὰ 100 l τοῦ ἀέρος; (ὑπὸ κανονικῆς συνθήκας 22,4 l ἀζώτου ἔχουν μᾶζαν 28 γ καὶ 22,4 l ὀξυγόνου 32 γ).

8. Τὸ ὀξυγόνον καὶ τὸ ἀζώτον λαμβάνονται εἰς τὴν Βιομηχανίαν ἀπὸ τὴν ἀπόσταξιν τοῦ ὕγρου ἀέρος. Μὲ τὰ ἀποτελέσματα τοῦ προηγουμένου προβλήματος νὰ ὑπολογισθῆ ἡ ποσοτὴς τῆς μᾶζης τοῦ ἀζώτου καὶ ὀξυγόνου, τὰ ὅποια λαμβάνομεν ἀπὸ 100 l ὕγρου ἀέρος. Μᾶζα 1 l ὕγρου ἀέρος: 0,91 kg.

9. 100 l ἀέρος περιέχουν 78 l ἀζώτου, 21 l ὀξυγόνου καὶ 1 l εὐγενῶν ἀερίων. Ἐάν ἡ μᾶζα 22,4 l ἀζώτου εἶναι 28 γ, 22,4 l ὀξυγόνου εἶναι 32 γ καὶ 22,4 l εὐγενῶν ἀερίων εἶναι 40 γ, νὰ ὑπολογισθῆ ἡ μᾶζα 1 l ἀέρος (χωρὶς ὑδατίους καὶ διοξειδίου τοῦ ἀνθρακός).

10. Τοποθετοῦμεν εἰς τὸν δίσκον ἐνὸς ζυγοῦ ὑαλίνην φιάλην, χωρητικότητος 4 l καὶ τὴν ἰσορροποῦμεν μὲ σταθμᾶ. Ἐάν ἀφαίρεσωμεν τὸν ἀέρα ἀπὸ τὴν φιάλην (ἢ φάλαγγ κλίνει πρὸς τὸ μέρος τῶν σταθμῶν), πρέπει νὰ προσθέσωμεν 4 γ εἰς τὸν δίσκον τῆς φιάλης, διὰ νὰ διατηρηθῆ ἡ ἰσορροπία:

α) Εἶναι πραγματικῶς κενὴ ἡ φιάλη; Διαιτ: (Μᾶζα 1 l ἀέρος ὑπὸ κανονικῆς συνθήκας θερμοκρασίας καὶ πίεσεως: 1,3 γ).

β) Ἐάν ὄχι, πόση μᾶζα ἀέρος παραμένει εἰς τὴν φιάλην; Πόσον ὄγκον καταλαμβάνει; Πόση εἶναι τότε ἡ μᾶζα 1 l ἀέρος, ἡ ὁποία παραμένει εἰς τὴν φιάλην;

11. Ἡ σύστασις τοῦ ἀέρος, τὸν ὁποῖον εἰσπνέομεν, καὶ ἐκείνου, τὸν ὁποῖον ἐκπνέομεν, δεικνύεται εἰς τὸν κάτωθι πίνακα:

100 l	Ἀζώτον Ἀτμοσφαιρικόν	Ὄξυγόνον	Διοξειδίου τοῦ ἀνθρακός
εἰσπνοῆ	79 l	21 l	ἀσήμαντος ποσότης
ἐκπνοῆ	79 l	16 l	4 l

Ὁ ἀνθρώπος, ὅταν κοιμάται, κάμνει 16 ἀναπνευστικὰς κινήσεις ἀνά 1 λεπτὸν καὶ εἰσάγει εἰς τοὺς πνευμονᾶς του 1,5 l ἀέρος εἰς κάθε κίνησιν. Ἐάν ὁ ὕπνος του διαρκῆ 8 ὥρας:

α) Πόσον ὄγκον ὀξυγόνου καταναλίσκει;

β) Πόσον διοξειδίου τοῦ ἀνθρακός ἀποβάλλει, ὅταν κοιμάται;

γ) Ποία μέτρα ὑγιεινῆς πρέπει νὰ ἀκολουθησῆ; 12. Εἰς θερμοκρασίαν 15° C καὶ ὑπὸ κανονικῆν πίεσιν, 1 l ὕδατος διαλύει 34 cm<sup>3</sup> ὀξυγόνου. Ὑπὸ τὰς ἰδίας συνθήκας διαλύει 16 cm<sup>3</sup> ἀζώτου:

α) Νὰ ὑπολογισθῆ ὁ λόγος τῶν ὄγκων τοῦ ὀξυγόνου καὶ ἀζώτου, οἱ ὁποῖοι διαλύονται εἰς 1 l ὕδατος 15° C.

β) Νὰ γίνῃ σύγκρισις τοῦ λόγου αὐτοῦ καὶ τοῦ λόγου  $\frac{\text{ὄγκος ὀξυγόνου}}{\text{ὄγκος ἀζώτου}}$  τοῦ ἀτμοσφαιρικοῦ ἀέρος.

Ποῖος εἶναι πλουσιώτερος εἰς ὀξυγόνον, ὁ ἀτμοσφαιρικός ἀήρ ἢ ὁ ἀήρ, ὁ ὁποῖος εἶναι διαλελυμένος εἰς τὸ ὕδωρ;

## 70Ν ΜΑΘΗΜΑ: Ἡ κατακόρυφος


### ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΠΤΩΣΙΣ ΕΝΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ

#### 1 Παρατηρήσεις:


● Ἐάν ἀφήσωμεν ἕνα λίθον ἀπὸ ὠρισμένον ὕψος, παρατηροῦμεν ὅτι πίπτει ἀκολουθῶν εὐθύγραμμον τροχίαν. Ἐπίσης, ἐάν ἀφήσωμεν ἀπὸ ὑψηλά ἐν φύλλον χάρτου, θὰ ἴδωμεν ὅτι καὶ αὐτὸ πίπτει, ἀλλὰ ἀπαιτεῖται περισσότερον χρονικὸν διάστημα, καὶ ἀκολουθεῖ μίαν τεθλασμένην γραμμὴν.

● Ἐάν συμπίεσωμεν ὁμῶς τὸ φύλλον χάρτου οὕτως, ὥστε νὰ λάβῃ σχῆμα σφαίρας, καὶ τὸ ἀφήσωμεν, πάλιν ἀπὸ ὑψηλά, θὰ ἴδωμεν ὅτι πίπτει ὅπως καὶ ὁ λίθος· δηλ. δὲν θὰ ἀπαιτηθῆ πολὺς χρόνος καὶ θὰ ἀκολουθήσῃ καὶ αὐτὸ κατὰ τὴν πτώσιν του εὐθύγραμμον τροχίαν (σχ. 1).


● Ἡ πτώσις τοῦ χάρτου ἐπιηράζεται πολὺ ἀπὸ τὴν ἀντίστασιν τοῦ ἀέρος. Ἡ ἀντίστασις τοῦ ἀέρος εἰς τὴν πτώσιν τοῦ λίθου ἢ τοῦ πεπιεσμένου χάρτου εἶναι μικρὰ καὶ δυνάμεθα νὰ τὴν θεωρήσωμεν ἀμελητέαν.



Σχ. 1. Ὁ λίθος, ὅταν ἀφίεται ἐλεύθερος, πίπτει. Τὸ ὕδωρ ρεῖ ἀπὸ μίαν ὀπῃν τοῦ πθόμενος τοῦ δοχείου. Ὁ λίθος εἰσέρχει ἐντὸς τῆς ὀπῆς. Ὁ λίθος καὶ τὸ ὕδωρ ἔχουν βάρος.




Σχ. 2. Το σώμα κατά την ελεύθερη πτώσιν του ακολουθεί την διεύθυνσιν του νήματος της στάθμης.




$$\widehat{AOB} = \widehat{AOG} = \widehat{AOD} = 1 \text{ όρθη}$$

Σχ. 3. Το νήμα της στάθμης είναι κάθετον προς την ελεύθεραν επιφάνειαν του ύδατος, εύρισκομένου εν ήρεμιά.



Σχ. 4. Όλοι αί κατακόρυφοι διέρχονται από τό κέντρον της γης.



Σχ. 5. Δύο γειτονίζουσαι κατακόρυφοι είναι παράλληλοι.

Ἡ σφαῖρα ἐκ χάρτου καί ὁ λίθος ἐκτελοῦν μίαν κίνησιν, ἡ ὁποία καλεῖται **ἐλευθέρη πτώσις**.

● Ἡ αἰτία τῆς πτώσεως τῶν σωμάτων εἶναι μία δύναμις, ἡ ὁποία καλεῖται **βάρος**.

Εἰς κάθε σώμα ἐπιδρά αὕτη ἡ **δύναμις**, ἡ ὁποία τό ἔλκει πρὸς τὴν γῆν, καλεῖται δὲ αὕτη **βάρος τοῦ σώματος**.

Ἔλα τὰ σώματα ἔχουν βάρος.

● Γνωρίζομεν ὅτι ὀρισμένα σώματα, ὅπως τὸ ἀερόστατον, ὅταν τὰ ἀφήσωμεν ἐλεύθερα, ἀντὶ νὰ κατέλθουν, ἀνέρχονται. Τοῦτο συμβαίνει, διότι ἐπ' αὐτῶν ἐκτὸς τοῦ βάρους ἐπενεργεῖ καί μία ἄλλη δύναμις, ἀντίθετος πρὸς τὸ βάρος, ἡ ὁποία καλεῖται **ἄνωσις**.

## 2 Τὸ νήμα τῆς στάθμης.

● Ἀποτελεῖται ἐξ ἐνὸς νήματος, εἰς τοῦ ὁποίου τὸ ἐν ἄκρον κρέματα μεταλλικός κύλινδρος καταλήγων εἰς κωνικὴν αἰχμήν. Ἐάν κρατήσωμεν τὸ ἄλλο ἄκρον διὰ τῆς χειρὸς μας, τὸ νήμα, λόγω τοῦ βάρους τοῦ κύλινδρου, λαμβάνει μίαν ὀρισμένην διεύθυνσιν, ἡ ὁποία καλεῖται **κατακόρυφος τοῦ τόπου**.

● Ὑλοποιήσις ἐλευθέρης πτώσεως.

Εἰς τὴν ἄκρον ἐνὸς τραπέζιου ἀναρτῶμεν διὰ λεπτοῦ νήματος ἐπιπέδου σφαῖραν καὶ ἐν συνεχείᾳ τοποθετοῦμεν κάτωθι αὐτῆς καὶ ἐπὶ τοῦ ἐδάφους φύλλον χάρτου.

● Κάομεν τὸ νήμα καὶ ἡ σφαῖρα πίπτει ἐλευθέρως. Ἐάν προηγουμένως ἔχωμεν τοποθετήσει ἐπὶ τοῦ χάρτου φύλλον καρμπόν, τότε ἡ σφαῖρα θὰ ἀφήσῃ τὰ ἴχνη τῆς (ἀποτύπωμα) εἰς τὸ σημεῖον τῆς πτώσεώς της.

● Ἀναρτῶμεν ἐπὶ τὸ ἴδιον ἄκρον τοῦ τραπέζιου τὸ νήμα τῆς στάθμης. Παρατηροῦμεν ὅτι ἡ κάτω ἄκρα του εὑρίσκεται ἀκριβῶς εἰς τὰ ἴχνη τῆς σφαῖρας (σχ. 2).

Τὸ νήμα τῆς στάθμης ὑλοποιεῖ τὴν τροχιάν, τὴν ὁποίαν ἠκολούθησε κατὰ τὴν πτώσιν της ἡ σφαῖρα.

**Συμπέρασμα :** Κάθε σώμα, ὅταν πίπτει ἐλευθέρως, ἀκολουθεῖ τὴν διεύθυνσιν τοῦ νήματος τῆς στάθμης. Ἡ διεύθυνσις αὕτη καλεῖται **κατακόρυφος**. Χαρακτηριστικὸν εἶναι ὅτι ἡ πτώσις γίνεται ἐκ τῶν ἄνω πρὸς τὰ κάτω.

## 3 Ἡ κατακόρυφος.

Κατακόρυφος εἰς ἐν σημεῖον εἶναι ἡ διεύθυνσις, τὴν ὁποίαν λαμβάνει τὸ νήμα τῆς στάθμης, πὸ διέρχεται ἀπὸ τὸ σημεῖον αὐτό.

● Ἰδιότητες τῶν κατακορύφων : Ἀναρτῶμεν τὸ νήμα τῆς στάθμης ὑπεράνω τῆς ἐλευθέρης ἐπιφανείας ὕδατος. Δι' ἐνὸς ὀρθογωνίου τριγώνου δυνάμεθα νὰ ἐπαληθεύσωμεν ὅτι αἱ γωνίαι, αἱ σχηματιζόμεναι μετὰς ἡμιευθείας OA, OB, OG, εἶναι ὀρθαί (σχ. 3).

**Συμπέρασμα :** Ἡ κατακόρυφος διεύθυνσις εἶναι κάθετος πρὸς τὴν ἐλευθέρην ἐπιφάνειαν ἐνὸς ὕγρου, εὑρισκομένου ἐν ἰσορροπία. Ἡ ἐπιφάνεια αὕτη ἀποτελεῖ ὀριζόντιον ἐπίπεδον.



● Γνωρίζομεν ὅτι ἡ γῆ ἔχει περίπου σχῆμα σφαιρικό. Ἡ ἐπιφάνεια τοῦ ἠρεμοῦντος ὕδατος εἰς τι σημεῖον εἶναι ἐν πολὺ μικρὸν τμῆμα τῆς σφαιρικῆς αὐτῆς ἐπιφανείας καὶ ἐπομένως ἡ κατακόρυφος, ἡ ὁποία εἶναι κάθετος πρὸς τὴν ἐπιφάνειαν αὐτήν, θὰ εἶναι ἡ προέκτασις τῆς γήινης ἀκτίνος, ἡ ὁποία καταλήγει εἰς τὸ σημεῖον αὐτό.

● Ἐὰν ἐξετάσωμεν δύο κατακόρυφους, αἱ ὁποῖαι ἀπέχουν μεταξύ των μερικά μέτρα (σχ. 5). Τὸ σημεῖον, εἰς τὸ ὁποῖον τέμνονται, δηλ. τὸ κέντρον τῆς γῆς, εἶναι πολὺ ἀπομακρυσμένον (6370 Km) ἐν συγκρίσει μὲ τὴν ἀπόστασίν των, καὶ ἐπομένως δυνάμεθα νὰ τὰς θεωρήσωμεν παραλλήλους.

**Συμπέρασμα:** Ἡ κατακόρυφος ἐνὸς τόπου διέρχεται ἀπὸ τὸ κέντρον τῆς γῆς. Αἱ κατακόρυφοι γειτνιαζόντων τόπων εἶναι παραλλήλοι.

#### 4 Ἐφαρμογαὶ τοῦ νήματος τῆς στάθμης.

Τὸ νῆμα τῆς στάθμης χρησιμοποιεῖται συχνά, διὰ νὰ ἐλέγξωμεν ἐὰν ἕνας τοῖχος, τὸ πλαίσιον μιᾶς θύρας κλπ., εἶναι κατακόρυφα.

Τὸ ἀλφάδι, τὸ ὁποῖον χρησιμοποιεῖ ὁ κτίστης, φέρει ἐπίσης ἐν νῆμα τῆς στάθμης, μὲ τὸ ὁποῖον ἐλέγχει ἐὰν μία ἐπιφάνεια εἶναι ὀριζοντία (σχ. 6).

#### ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ

1. Τὸ βάρος ἐνὸς σώματος εἶναι ἡ δύναμις, ἡ ὁποία τὸ ἔλκει πρὸς τὴν γῆν.
2. Τὸ νῆμα τῆς στάθμης ὑλοποιεῖ τὴν τροχιάν τῆς ἐλευθέρως πτώσεως τῶν σωμάτων. Ἡ τροχιά αὐτὴ εἶναι εὐθύγραμμος μὲ διεύθυνσιν κατακόρυφον καὶ φορὰν ἐκ τῶν ἄνω πρὸς τὰ κάτω.

3. Ἡ κατακόρυφος διεύθυνσις εἶναι κάθετος πρὸς τὴν ἐπιφάνειαν ἠρεμοῦντος ὕγρου.

Ἄλλαι αἱ κατακόρυφοι διευθύνονται πρὸς τὸ κέντρον τῆς γῆς. Αἱ κατακόρυφοι γειτνιαζόντων τόπων δύνανται νὰ θεωρηθοῦν παραλλήλοι.

4. Χρησιμοποιοῦμεν τὸ νῆμα τῆς στάθμης, διὰ νὰ ἐλέγξωμεν ἐὰν μία διεύθυνσις εἶναι κατακόρυφος, καὶ τὸ ἀλφάδι, ἐὰν μία ἐπιφάνεια εἶναι ὀριζοντία.

**80<sup>ON</sup> ΜΑΘΗΜΑ:** Ἡ ἐπιμήκυνσις ἐνὸς ἐλατηρίου μᾶς δίδει τὴν δυνατότητα νὰ συγκρίνωμεν τὸ βάρος δύο σωμάτων.


#### ΜΕΤΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΕΝΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ

##### 1 Ἐπιμήκυνσις ἐλατηρίου.


● Ἀναρτῶμεν ἐπὶ ὑποστηρίγματος ἐν ἐλατήριον ἐφωδιασμένον δι' ἐνὸς δίσκου καὶ ἐνὸς δείκτην, ὁ ὁποῖος μετακινεῖται ἐμπροσθεν ἠριθμημένου κανόνος (σχ. 1).

● Σημειοῦμεν διὰ λεπτῆς γραμμῆς Α ἐπὶ τοῦ κανόνος τὴν ἀρχικὴν θέσιν τοῦ ἐλατηρίου.


● Τοποθετοῦμεν ἐπὶ τοῦ δίσκου οἰονδήποτε ἀντικείμενον, π.χ. ἕνα λίθον, ὁπότε τὸ ἐλατήριον ἐπιμηκύνεται. Σημειοῦμεν ἐπὶ τοῦ κανόνος μίαν γραμμὴν Β ἐκεῖ, ὅπου εὐρίσκεται ὁ δείκτης. Ἐὰν ἀφαιρέσωμεν τὸν λίθον, ὁ δείκτης ἐπανέρχεται εἰς τὴν ἀρχικὴν του θέσιν. Λέγομεν ὅτι τὸ ἐλατήριον εἶναι τελείως ἐλαστικόν..



Σχ. 6. Τὸ ἀλφάδι. Τὸ νῆμα τῆς στάθμης διέρχεται ἀπὸ τὸ μέσον Μ τῆς βάσεως τοῦ ἰσοσκελοῦς τριγώνου AOB, ὅταν ἡ ΧΥ εἶναι ὀριζοντία.




Σχ. 1. Διὰ τὴν ἐπιμέτρησην τοῦ ἐλατηρίου P ἐπιμηκύνθη κατὰ ΑΒ. Ὅταν ἀφαιρηθῇ τὸ βάρος, τὸ ἐλατήριον ἐπανέρχεται εἰς τὴν ἀρχικὴν του μήκος.



Σχ. 2. Το βάρος του λίθου Α και το βάρος των σφαιριδίων Β εξαναγκάζουν το ελατήριο να λάβη την ίδια επιμήκυνση ΑΒ.


Το βάρος του λίθου Α και το βάρος των σφαιριδίων Β είναι ίσα.

Το βάρος ενός άλλου λίθου Γ προκαλεί επιμήκυνση ΑΓ μεγαλύτερη της ΑΒ. Το βάρος του λίθου Γ είναι μεγαλύτερο από του Α.



Σχ. 3. Το βάρος των σφαιριδίων Μ προκαλεί επιμήκυνση ΑΓ τόσην, όσην και οι δύο λίθοι μαζί.

Βάρος του  $M = \text{Βάρος του } P + \text{βάρος του } \Sigma$



Σχ. 4. Το χιλιόγραμμα από Ιριδιούχον λευκόχρυσον εις φυσικόν μέγεθος (εις τὸ Διεθνές Γραφεῖον Μέτρων και Σταθμῶν).

● Τοποθετούμεν πάλιν τὸν λίθον εἰς τὸν δίσκον. Παρατηροῦμεν ὅτι ὁ δείκτης ἐπανέρχεται εἰς τὸ Β, δηλ. ἡ ἐπιμήκυνσις ἐνὸς ἐλατηρίου ὑπὸ τὴν ἐπίδρασιν ἐνὸς σταθεροῦ βάρους εἶναι πάντοτε ἡ αὐτή.

● Ἀντικαθιστῶμεν τὸν ἀρχικὸν λίθον μὲ ἓνα ἄλλον βαρύτερον. Παρατηροῦμεν ὅτι ἡ ἐπιμήκυνσις εἶναι μεγαλύτερα ἀπὸ τὴν προηγουμένην ἢ ἀκριβέστερον ἡ ἐπιμήκυνσις τοῦ ἐλατηρίου εἶναι ἀνάλογος πρὸς τὸ βάρος, τὸ ὁποῖον προσδιορίζομεν.

## 2 Ἰσότης δύο βαρῶν.

● Ἀντικαθιστῶμεν τὸν λίθον μὲ σφαιρίδια ἐκ μολύβδου (σκάγια), ἕως ὅτου ὁ δείκτης κατέλθῃ εἰς τὴν γραμμὴν Β. Τὸ βάρος τῶν σφαιριδίων προεκάλεσε τὴν αὐτὴν ἐπιμήκυνσιν μὲ τὸ βάρος τοῦ λίθου.

Λέγομεν τότε ὅτι τὸ βάρος τῶν σφαιριδίων εἶναι ἴσον πρὸς τὸ βάρος τοῦ λίθου (σχ. 2).

Παραδεχόμεθα δηλ. ὅτι: *Δύο βάρη εἶναι ἴσα, ὅταν προκαλοῦν τὴν αὐτὴν ἐπιμήκυνσιν εἰς ἓν ἐλατήριο, εἰς τὸ ὁποῖον θὰ ἐπιδράσουν διαδοχικῶς.*

## 3 Ἄθροισμα πολλῶν βαρῶν.

● Τοποθετοῦμεν εἰς τὸν δίσκον ἓν ἀντικείμενον Μ και παρατηροῦμεν μίαν ὠρισμένην ἐπιμήκυνσιν τοῦ ἐλατηρίου.

● Ἀντικαθιστῶμεν τὸ Μ μὲ δύο ἄλλα ἀντικείμενα μαζί, τὸ Ρ και τὸ Σ. Ἐὰν ἡ ἐπιμήκυνσις εἶναι ἡ αὐτὴ μὲ τὴν προηγουμένην, λέγομεν ὅτι τὸ βάρος τοῦ Μ εἶναι ἴσον πρὸς τὸ ἄθροισμα τῶν Ρ και Σ. Διότι παραδεχόμεθα ὅτι: *Ἐν βάρος εἶναι ἴσον πρὸς τὸ ἄθροισμα δύο ἢ περισσοτέρων ἄλλων βαρῶν, ὅταν προκαλῆ μόνον του εἰς ἓν ἐλατήριο τὴν αὐτὴν ἐπιμήκυνσιν μὲ ἐκείνην, τὴν ὁποῖαν προκαλοῦν τὰ δύο ἄλλα μαζί.*

## 4 Μέτρησις τοῦ βάρους ἐνὸς σώματος.

Βάρος ἐνὸς σώματος εἶναι ἡ δύναμις, ἡ ὁποία ἔλκει τὸ σῶμα πρὸς τὴν γῆν.

● Ἐὰν ἀντικαταστήσωμεν εἰς τὸ πείραμα 3 τὸ ἀντικείμενον Μ μὲ τρία ἄλλα ἀντικείμενα Ρ ἴσου βάρους, δυνάμεθα νὰ εἰπῶμεν ὅτι τὸ βάρος τοῦ Μ εἶναι τριπλάσιον τοῦ Ρ· ὁπότε, ἐὰν τὸ βάρος Ρ τὸ λάβωμεν ὡς μονάδα βάρους, θὰ ἔχωμεν τὸ μέτρον τοῦ βάρους τοῦ ἀντικειμένου Μ: Βάρος τοῦ Μ = 3 μονάδες βάρους.

Μέτρησις τοῦ βάρους ἐνὸς σώματος καλεῖται ἡ σύγκρισις τοῦ βάρους του πρὸς τὸ βάρος ἄλλου σώματος, τὸ ὁποῖον λαμβάνομεν ὡς μονάδα.

## 5 Μονὰς βάρους.

Ἡ Ἑλλάς και αἱ χῶραι, αἱ ὁποῖαι ἔχουν δεχθῆ τὸ μετρικὸν σύστημα, χρησιμοποιοῦν ὡς μονάδα βάρους τὸ **Κιλοπόντ** ἢ **χιλιόγραμμα βάρους** ( $\text{Kg}^*$ ).

Τὸ **Κιλοπόντ** ( $\text{Kg}$ ) εἶναι τὸ βάρος, τὸ ὁποῖον ἔχει εἰς τὸ Παρίσι ἡ μάζα ἐνὸς προτύπου κωνίδρου ἐξ ἰριδιούχου λευκοχρυσού, ὅστις φυλάσσεται εἰς τὸ Διεθνές Γραφεῖον Μέτρων και Σταθμῶν τῶν Σεβρῶν (σχ. 4).

Είναι περίπου το βάρος, το όποιον έχει εις τὸ Παρίσι 1 dm<sup>3</sup> ἀπεσταγμένον ὕδατος 4<sup>ο</sup> C.

Τὰ κυριώτερα πολλαπλάσια καὶ ὑποπολλαπλάσια τῆς μονάδος βάρους εἶναι :

Τὸ Πόντ (p) : 1 p=0,001 Kp

Τὸ Μεγαπόντ(Mp): 1 Mp=1000 Kp=1.000.000 p

## 6 Μέτρησις τοῦ βάρους ἐνὸς σώματος τῆ βοηθείᾳ τοῦ ἐλατηρίου.

● Τοποθετοῦμεν εἰς τὸν δίσκον σταθμᾶ, ἕως ὅτου ἡ ἐπιμήκυνσις τοῦ ἐλατηρίου γίνῃ ἴση πρὸς ἐκείνην, τὴν ὅποιαν εἶχομεν εἰς τὸ πρῶτόν μας πείραμα. Ὁ λίθος ἔχει βάρους ἴσον πρὸς τὸ ἄθροισμα τῶν σταθμῶν.

● Διὰ νὰ μετρήσωμεν τὸ βάρους ἐνὸς σώματος δι' ἐνὸς ἐλατηρίου, θὰ ἀντικαταστήσωμεν εἰς τὸν δίσκον τὸ σῶμα διὰ σταθμῶν, ἕως ὅτου ἐπιτύχωμεν τὴν αὐτὴν ἐπιμήκυνσιν.

Τὸ βάρους τότε τοῦ σώματος εἶναι ἴσον πρὸς τὸ ἄθροισμα τῶν βαρῶν τῶν σταθμῶν (σχ. 5).

Θὰ ἴδωμεν εἰς τὸ ἐπόμενον μάθημα ὅτι, διὰ νὰ μετρήσωμεν τὸ βάρους ἐνὸς σώματος, δυνάμεθα νὰ χρησιμοποιήσωμεν ἐλατήριον, τοῦ ὁποίου ὁ δείκτης μετακινεῖται ἔμπροσθεν βαθμολογημένης κλίμακος εἰς μονάδας βάρους.

## ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ

1. Ἐν ἐλαστικὸν ἐλατήριον ἐπιμηκύνεται, ὅταν ἐπιδρῷ ἐπ' αὐτὸ ἐν βάρους, καὶ ἐπανερχεται εἰς τὸ ἀρχικόν του μήκος, ὅταν παύσῃ ἡ αἰτία τῆς παραμορφώσεώς του. Ἡ ἐπιμήκυνσις λαμβάνει πάντοτε τὴν αὐτὴν τιμὴν, ὅταν ἐπιδρῷ τὸ ἴδιον βάρους.


2. Δύο βάρη εἶναι ἴσα, ὅταν προκαλοῦν τὴν αὐτὴν ἐπιμήκυνσιν εἰς ἓν ἐλατήριον, εἰς τὸ ὁποῖον θὰ ἐφαρμοσθοῦν διαδοχικῶς.

3. Ἐν βάρους εἶναι ἴσον πρὸς τὸ ἄθροισμα πολλῶν ἄλλων βαρῶν, ὅταν προκαλῆ μόνον του εἰς ἓν ἐλατήριον τὴν αὐτὴν ἐπιμήκυνσιν, τὴν ὅποιαν προκαλοῦν τὰ ἄλλα μαζί.

4. Μέτρησις τοῦ βάρους ἐνὸς σώματος καλεῖται ἡ σύγκρισις του πρὸς τὸ βάρους ἐνὸς ἄλλου σώματος, τὸ ὁποῖον λαμβάνομεν ὡς μονάδα.

5. Μονὰς βάρους εἶναι τὸ Κιλοπόντ (Kp), εἶναι δὲ τὸ βάρους, τὸ ὁποῖον ἔχει εἰς τὸ Παρίσι ἡ μᾶζα ἐνὸς προτύπου κυλίνδρου ἐξ ἰριδιοῦχου λευκοχρῶσου, ὅστις φυλάσσεται εἰς τὸ Δ.Γ.Μ.κ.Σ.

6. Ἐν ἐλαστικὸν ἐλατήριον δύνανται νὰ χρησιμεύσῃ διὰ τὴν μέτρησιν τοῦ βάρους ἐνὸς σώματος.



Σχ. 5. Ἡ ἐπιμήκυνσις τοῦ ἐλατηρίου ἀπὸ τὸ βάρους τοῦ συνόλου τῶν σταθμῶν εἶναι ἡ αὐτὴ με' ἐκείνην, τὴν ὅποιαν προκαλεῖ τὸ βάρους τοῦ λίθου.

$$P=32 \text{ p.}$$


9<sup>ον</sup> ΜΑΘΗΜΑ: Πλεονεκτήματα καὶ μειονεκτήματα τοῦ ζυγοῦ δι' ἐλατηρίου.

## ΖΥΓΟΣ ΔΙ' ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ


### 1 Βαθμολογία ἐνὸς ἐλατηρίου.

Τοποθετοῦμεν εἰς τὸν δίσκον τοῦ ἐλατηρίου σταθμὰ διαφόρων βαρῶν, ἀρχίζοντες ἀπὸ μικρὰ βάρη, καὶ σημειοῦμεν εἰς ἓνα πίνακα τὰς ἀντιστοίχους ἐπιμήκυνσεις τοῦ ἐλατηρίου (σχ. 1).

Βάρους εἰς p	0	5	10	15	25	40	50	60
Ἐπιμήκυνσις εἰς mm	0	17	33	50	83	135	167	201



Σχ. 1. Βαθμολογίσις ἐλατηρίου



Παρατηρούμεν :

● Ότι τὰ βάρη καὶ αἱ ἐπιμήκυνσις μεταβάλλονται ἀναλόγως.

Όταν τὸ βάρος, τὸ ὁποῖον τοποθετοῦμεν, πολλαπλασιάζεται ἐπὶ 2, 3, 4 κλπ., τότε ἡ ἐπιμήκυνσις πολλαπλασιάζεται περίπου ἐπὶ 2, 3, 4 κλπ.

**Συμπέρασμα :** Αἱ ἐπιμήκυνσις τοῦ ἐλατηρίου εἶναι ἀνάλογοι πρὸς τὰ βάρη, τὰ ὁποῖα τὰς προκαλοῦν.


● Μὲ τὰ πειραματικά ἀποτελέσματα σχηματίζομεν τὴν γραφικὴν παράστασιν τοῦ σχ. 2. Ἡ καμπύλη, ἡ προκύπτουσα ἐκ τῆς βαθμολογήσεως τοῦ ἐλατηρίου, ὁμοιάζει πολὺ μὲ εὐθεῖαν καὶ μᾶς ἐπιτρέπει χωρὶς νὰ κάμωμεν ὑπολογισμὸν νὰ προσδιορίζωμεν τὸ βάρος ἑνὸς σώματος (σχ. 2.).

● Ἔστω ὅτι θέλομεν νὰ προσδιορίσωμεν τὸ βάρος ἑνὸς σώματος, τὸ ὁποῖον προκαλεῖ ἐπιμήκυνσιν 105 mm. Ἀπὸ τὸ σημεῖον τοῦ ἄξονος OY, τὸ ὁποῖον ἀντιστοιχεῖ εἰς τὰ 105 mm, φέρομεν κάθετον πρὸς αὐτόν, συναντῶσαν τὴν καμπύλην βαθμολογήσεως εἰς τὸ σημεῖον M.

Ἡ κάθετος ἀπὸ τὸ M πρὸς τὸν ἄξονα OX τέμνει αὐτόν εἰς τὸ σημεῖον m, τὸ ὁποῖον ἀντιστοιχεῖ εἰς 32 p, ὅπερ εἶναι τὸ βάρος τοῦ σώματος.

**Ζυγὸς δι' ἐλατηρίου (κανταράκι).**

Διαιροῦμεν εἰς 10 ἴσα τμήματα τὸ διάστημα ἐπὶ



Σχ. 3. Τὸ ἐλατήριο P ἔχει ὑπερβῆ τὸ ὄριον ἐλαστικότητός του. Όταν ἀφαιρέσωμεν τὸ βάρος P, τὸ ἐλατήριο διατηρεῖ μίαν ἐπιμήκυνσιν AA'. Εάν θέλωμεν νὰ μεταχειρισθῶμεν αὐτὸ τὸ ἐλατήριο, πρέπει νὰ τὸ ἐπαναβαθμολογήσωμεν.

του κανόνας, το περιλαμβανόμενον μεταξύ της άρχικης θέσεως του ελατηρίου (άνευ βάρους) και εκείνης, την οποίαν λαμβάνει, όταν τοποθετήσωμεν βάρος 50 p.

Τότε κάθε ύποδιαίρεσις ἀντιστοιχεί εἰς μίαν ἐπιμήκυνσιν, ἡ ὁποία προκαλεῖται ἀπὸ βάρος  $50/10 = 5$  p.

Βαθμολογοῦμεν τὰς ὑποδιαίρεσεις ἀνὰ 5 p ἀπὸ 0—50 p. Διὰ νὰ προσδιορίσωμεν τώρα τὸ βάρος ἑνὸς σώματος, τοποθετοῦμεν τοῦτο εἰς τὸν δίσκον τοῦ ελατηρίου καὶ ἀναγινώσκομεν εἰς τὸν βαθμολογημένον κανόνα τὸν ἀριθμὸν, τὸν ὁποῖον μᾶς δεικνύει ὁ δείκτης, ὅταν ἡρεμήσῃ.

Κατ' αὐτὸν τὸν τρόπον κατασκευάζομεν ἕνα ζυγὸν δι' ελατηρίου (κανταράκι) ἢ ἕνα **δυναμόμετρον**.

Τὰ δυναμόμετρα (σχ. 4) κατασκευάζονται συνήθως μὲ τρόπον, ὥστε τὸ ελατήριον νὰ συμπιέζεται ἀπὸ τὸ βάρος τοῦ σώματος, τὸ ὁποῖον ζυγίζομεν.

### 3 Ὅριον ἐλαστικότητος.

Τοποθετοῦμεν εἰς τὸν δίσκον δύο ἀντικείμενα, τῶν ὁποίων τὰ βάρη προσδιωρίσαμεν προηγουμένως κεχωρισμένως καὶ εὐρήκαμεν ὅτι ἔχουν βάρη ἀντιστοίχως 32 p καὶ 48 p. Εἰς τὸ ελατήριον ἐφαρμόζομεν ἕν συνεχεῖς ἕν βάρος  $32 p + 48 p = 80 p$  καὶ παρατηροῦμεν ὅτι ἡ ἐπιμήκυνσις του εἶναι 254 mm. Ἐὰν μεταφέρωμεν τὰς τιμὰς αὐτὰς εἰς τὸ διάγραμμα, παρατηροῦμεν ὅτι τὸ ἀντίστοιχον σημεῖον εὐρίσκεται ἀρκετὰ κάτω ἀπὸ τὴν εὐθείαν βαθμολογήσεως.

Ἐἴ ἄλλου, ἕαν ἀφαιρέσωμεν τὰ βάρη ἀπὸ τὸν δίσκον, ὁ δείκτης δὲν ἐπανέρχεται εἰς τὴν ἀρχικὴν τὸν θέσιν, δηλ. τὸ ελατήριον διατηρεῖ κάποιαν ἐπιμήκυνσιν. Λέγομεν τότε ὅτι ὑπερέβημεν τὸ ὄριον ἐλαστικότητος τοῦ ελατηρίου, καὶ τοῦτο διότι πέραν τῶν 60 p περίπου αἱ ἐπιμήκυνσεις τοῦ ελατηρίου αὐτοῦ δὲν εἶναι πλέον ἀνάλογοι πρὸς τὰ βάρη, τὰ ὁποῖα τὰς προκαλοῦν.

### 4 Τὸ βάρος ἑνὸς Kg δὲν ἔχει τὴν ἰδίαν τιμὴν εἰς ὅλα τὰ σημεῖα τῆς γῆς. Δὲν προκαλεῖ παντοῦ τὴν ἰδίαν ἐπιμήκυνσιν τοῦ δυναμομέτρου.

Ἐπὶ τὰς δυναμόμετρα μεγάλης ἀκρίβειας, μὲ τὰ ὁποῖα δυνάμεθα νὰ ἐξακριβώσωμεν ὅτι τὸ βάρος ἑνὸς σώματος μεταβάλλεται μετὰ τοῦ τόπου, ὅπου ἐκτελεῖται ἡ μέτρησις.

Τὸ βάρος π.χ. τοῦ προτύπου χιλιογράμμου εἶναι μεγαλύτερον, ὅταν ἡ μέτρησις ἐκτελεῖται πλησίον τῶν Πόλων καὶ μικρότερον, εἰς μεγαλύτερον ὕψος.

Οἱ φυσικοὶ ἐδέχθησαν μίαν μονάδα ἀνεξάρτητον ἀπὸ τὸν τόπον, τὸ Newton (N).

Δι' ἀκρίβων μετρήσεων εὐρίσκομεν ὅτι τὸ βάρος τοῦ προτύπου χιλιογράμμου, τὸ ὁποῖον εἰς τὸ Παρίσι, ὅπως ὠρίσθη, εἶναι 1 Kp, εἰς τὸν Ἴσημερινὸν εἶναι 0,997 Kp (9,78 N), ἐνῶ εἰς τοὺς Πόλους 1,002 Kp (9,83 N).

Εἰς ὕψος 1000 m ὑπεράνω τῶν Παρισίων τὸ βάρος τοῦ προτύπου Kg εἶναι 0,997 Kp (9,78 N).

Αἱ μεταβολαὶ ὅμως αὐταὶ εἶναι τόσο μικραὶ, ὥστε εἰς τὴν πρᾶξιν δύνανται νὰ θεωρηθοῦν ἀμελητέαι.


### ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ

1. Αἱ ἐπιμήκυνσεις ἑνὸς ελατηρίου εἶναι ἀνάλογοι πρὸς τὰ βάρη, τὰ ὁποῖα τὰς προκαλοῦν. Ἐὰν σημειώσωμεν εἰς χιλιοστομετρικὸν χάρτην τὰ βάρη καὶ τὰς ἀντιστοίχους ἐπιμήκυνσεις, εὐρίσκομεν τὴν καμπύλην βαθμολογήσεως τοῦ ελατηρίου. Ἡ καμπύλη αὕτη εἶναι εὐθεῖα γραμμὴ, ἡ ὁποία διέρχεται ἀπὸ τὴν τομὴν O τῶν ἀξόνων τῆς γραφικῆς παραστάσεως.

2. Ἐν ἐλαστικὸν ελατήριον βαθμολογημένον καλεῖται ζυγὸς δι' ελατηρίου ἢ δυναμόμετρον.


3. Ἐν δυναμόμετρον δύναται νὰ χρησιμοποιηθῇ, ὅταν τὸ βάρος τοῦ σώματος, τὸ ὁποῖον ἀναρτῶμεν, δὲν ὑπερβαίνει ἕν ὄριον, τὸ ὄριον ἐλαστικότητος. Πέραν αὐτοῦ αἱ ἐπιμήκυνσεις δὲν εἶναι πλέον ἀνάλογοι πρὸς τὰ βάρη, τὰ ὁποῖα τὰς προκαλοῦν.

4. Τὸ βάρος ἑνὸς σώματος ἐλαττοῦται ἐλαφρῶς ἀπὸ τοὺς Πόλους πρὸς τὸν ἰσημερινὸν καὶ ἀπὸ τὰ μικρὰ ὕψη πρὸς τὰ μεγάλα. Τὸ Newton (N) εἶναι μία μονὰς ἀνεξάρτητος τοῦ τόπου καὶ τοῦ ὕψους, καὶ εἰς τὸ Παρίσι τὸ 1Kp ἀντιστοιχεῖ πρὸς 9,81 N.



Σχ. 4. Δυναμόμετρον- (ζυγὸς δι' ελατηρίου).

Διὰ τῆς ἐπιδράσεως τοῦ βάρους τὸ ελατήριον συμπιέζεται. Ὅριον χρήσεως τοῦ δυναμομέτρου εἶναι τὸ βάρος, τὸ ὁποῖον ἀναγκάζει τὰς σπείρας τοῦ ελατηρίου νὰ ἐβλῶν εἰς ἐπαφὴν.



**Ἐφαρμογή τῶν μεταβολῶν τῆς βαρύτητος:** Βαρομέτρησης εἰς τὴν ἀναζήτησιν πετρελαίου. Ἐμάθομεν ὅτι τὸ βάρος ἑνὸς σώματος μεταβάλλεται ἀπὸ τὸν Ἴσημερινὸν πρὸς τοὺς Πόλους. Μεταβάλλεται ἐπίσης κατὰ μερικὰ ἑκατομμυριοστὰ τῆς τιμῆς του ἀναλόγως πρὸς τὴν ὑπαρξιν βαρέων ἢ ελαφρῶν στρωμάτων καὶ ἀπὸ τὴν ἀπόστασίν των ἐκ τῆς ἐπιφανείας τῆς γῆς. Οὕτω ἕνας θόλος (3) ἀπὸ βαρῆα στρώματα (συμπαγῆς ἀσβεστόλιθος, βασάλτης) προκαλεῖ μεγαλύτεραν ἐπιμήκυνσιν τοῦ ἐλατηρίου ἀπὸ ἐκείνην, τὴν ὁποίαν προκαλοῦν ἐλαφρὰ στρώματα, ὡπως ἡ ἄμμος (2).

Κατ' αὐτὸν τὸν τρόπον προσδιορίζομεν τὴν τομὴν τοῦ ὑπεδάφους καὶ τὴν ἐπαληθεύομεν δι' ἄλλων μεθόδων. Ἡ γνῶσις τῆς τομῆς τοῦ ὑπεδάφους εἶναι ἀναγκαία διὰ τὴν ἀναζήτησιν πετρελαίου. Ἡ συσκευὴ μετρήσεως εἶναι ἓν δυναμόμετρον πάρα πολὺ εὐαίσθητον, τὸ ὁποῖον καλεῖται βαρύμετρον (1). Πρὸ τοῦ κατασκευάσωμεν τὸν χάρτην μιᾶς περιοχῆς, πρέπει νὰ γίνων πολλὰ διορθώσεις λόγῳ τῶν παρατηρουμένων ἀνωμαλιῶν.

## Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ

### Σειρὰ 2α: Ἡ κατακόρυφος. Βάρος ἑνὸς σώματος.

#### 1. Ἡ κατακόρυφος

Ἡ ὀρθὴ γωνία εἶναι  $90^\circ$  ἢ 100 βαθμοί.

Ἡ μοίρα εἶναι  $60'$  πρῶτα λεπτὰ ( $'$ ) καὶ τὸ λεπτόν 60 δευτέρα ( $''$ ).

Ὁ βαθμὸς εἶναι 10 δέκατα ἢ 100 ἑκατοστὰ:

1. Νὰ μετατραποῦν εἰς βαθμοὺς:  $40^\circ$ ,  $22^\circ$ ,  $45''$   
 $16^\circ 18' 25''$ .

2. Νὰ μετατραποῦν εἰς μοίρας: 60, 18, 50, 78, 25 βαθμοί.

Διὰ τὴν μέτρησιν γωνιῶν χρησιμοποιοῦμεν ὡς μονάδα καὶ τὸ ἀκτίνιον, ὅπερ εἶναι ἡ ἐπίκεντρος γωνία κύκλου, τῆς ὁποίας τὸ τόξον ἔχει μῆκος ἴσον πρὸς τὴν ἀκτίνα τοῦ κύκλου.

3. Πόσον εἶναι τὸ μῆκος ἑνὸς τόξου, τὸ ὁποῖον ὀρίζει ἡ γωνία 1 ἀκτινίου εἰς ἕνα κύκλον ἀκτίνας 5 cm;

4. Εἰς ἕνα κύκλον ἀκτίνας 8 cm νὰ ὑπολογισθῇ εἰς μοίρας καὶ πρῶτα λεπτὰ ἡ ἐπίκεντρος γωνία, ἡ ὁποία ἔχει μέτρον 1 ἀκτινίου ( $\pi=3,14$ ).

5. Πόσον εἶναι τὸ μῆκος ἑνὸς τόξου μὲ προσέγγισιν 1 mm, τὸ ὁποῖον ὀρίζει ἐπίκεντρος γωνία  $23^\circ$  εἰς ἕνα κύκλον ἀκτίνας 12 cm;

6. Τὸ ναυτικὸν μίλιον εἶναι τὸ μῆκος τοῦ τόξου μεγίστου κύκλου, τὸ ὀριζόμενον ὑπὸ δύο σημείων τῆς ἐπιφανείας τῆς γῆς, τῶν ὁποίων αἱ κατακόρυφοι σχηματίζουν γωνίαν  $1'$  (ἀκτίς τῆς γῆς 6300 km):

7. Πόσον μῆκος ἔχει τὸ ναυτικὸν μίλιον εἰς μέτρα; Πόσον μῆκος ἔχει τὸ τόξον μεγίστου κύκλου, τὸ ὁποῖον ὀρίζεται ἀπὸ δύο σημεία τῆς ἐπιφανείας τῆς γῆς, ἐὰν αἱ κατακόρυφοι τῶν σχηματίζουν γωνίαν ἑνὸς ἑκατοστοῦ τοῦ βαθμοῦ;

8. Ἡ μικρότερα γωνία, τὴν ὁποίαν διακρίνομεν διὰ τοῦ ὀφθαλμοῦ μας, εἶναι  $15''$ . Πόσον εἶναι τὸ τόξον μεγίστου κύκλου, τὸ ὁποῖον ὀρίζεται ἀπὸ δύο σημεία τῆς ἐπιφανείας τῆς γῆς, ἐὰν αἱ κατακόρυφοι τῶν σχηματίζουν γωνίαν  $15''$ ;

9. Ἡ γωνία, ἡ ὁποία σχηματίζεται ἀπὸ τὰς κατακόρυφους τῶν Παρισίων καὶ τῆς Μασσαλίας, εἶναι  $5^\circ 52'$ . Πόσον εἶναι τὸ μῆκος τόξου μεγίστου κύκλου, τὸ ὁποῖον διαχωρίζει αὐτὰς τὰς δύο πόλεις;

10. Ποίαν γωνίαν σχηματίζουν αἱ κατακόρυφοι τῶν Παρισίων καὶ τῆς Ὀρλεάνης, ἐὰν τὸ μῆκος τοῦ τόξου μεγίστου κύκλου μεταξὺ αὐτῶν τῶν δύο πόλεων εἶναι 120 km;

## II. Βάρος ενός σώματος

11. Διά να βαθμολογήσωμεν ἓν ἐλατήριο, προσδιορίσωμεν τὰς ἐπιμήκυνσεις του διά διαδοχικῶν βαρῶν:

50 p	100 p	200 p	500 p
23 mm	46mm	92 mm	230 mm

α) Νά χαραχθῆ ἡ καμπύλη τῆς βαθμολογίας τοῦ ἐλατηρίου.

Κλίμαξ: Εἰς τὸν ἄξονα OX, 1 cm διά βάρος 50 p καί εἰς τὸν OY, 1 cm διά ἐπιμήκυνσιν 20 mm.

β) Νά εὐρεθῆ ἡ ἐπιμήκυνσις συμφῶνως πρὸς τὸ διάγραμμα διά βάρος 280 p.

γ) Ποῖον βάρος προκαλεῖ ἐπιμήκυνσιν 50 mm; Νά ἐπαληθευθοῦν αἱ ἀπαντήσεις διά ὑπολογισμοῦ.

12. Ἐν ἐλατήριον διά τῆς ἐπιδράσεως βάρους 100 p ἔχει μήκος 327 mm καί διά 150 p ἔχει 392 mm. Νά υπολογισθοῦν:

α) Τὸ μήκος τοῦ ἐλατηρίου ἀνευ τῆς ἐπιδράσεως τοῦ βάρους.

β) Τὸ μήκος τοῦ ἐλατηρίου διά τῆς ἐπιδράσεως βάρους 250 p.

γ) Νά χαραχθῆ ἡ καμπύλη τῆς βαθμολογίας τοῦ ἐλατηρίου καί νά ἐπαληθευθῆ ἡ ἀπάντησις (β) μετὰ τὴν βοήθειαν ταύτης.

Κλίμαξ: Εἰς τὸν ἄξονα OX, 1 cm διά 50 p καί εἰς τὸν OY, 1 cm διά ἐπιμήκυνσιν 5 cm.

13. Εἰς ἓν δυναμόμετρον, βαθμολογημένον μέχρι

8 Κρ, ἔχομεν ἐπιμήκυνσιν ἐλατηρίου 12 mm μετὰ τῆς ἐπιδράσιν βάρους 1 Κρ:

α) Πόσον εἶναι τὸ μήκος τῆς κλίμακος;

β) Πόσον μήκος τῆς κλίμακος ἀντιστοιχεῖ εἰς διαφορὰν βάρους 100 p;

14. Τὸ ἐλατήριο ἐνὸς δυναμομέτρον, βαθμολογημένου εἰς Κρ, ἐπιμήκυνεται 60 mm μετὰ τὴν ἐπίδρασιν βάρους 15 Κρ. Νά εὐρεθῆ:

α) Ἡ ἀπόστασις μεταξὺ δύο διαδοχικῶν ὑποδιαίρεσεων.

β) Ἐὰν ἡ μικροτέρα μετακίνησις τοῦ δείκτου, τὴν ὅποιαν δυνάμεθα νὰ διακρίνωμεν, εἶναι 1 mm, ποῖα ἡ μικροτέρα διαφορὰ βάρους, τὴν ὅποιαν δυνάμεθα νὰ ὑπολογίσωμεν διά τῆς συσκευῆς ταύτης;

15. Ἀπὸ ἓν ἐλατήριο μήκους 27 cm ἀναρτώμενον κενὸν δοχεῖον, ὅποτε τὸ ἐλατήριο λαμβάνει μήκος 39 cm. Πληροῦμεν τὸ δοχεῖον διά 3 l ὕδατος καὶ τὸ μήκος του γίνεται 63 cm:

α) Ποῖον τὸ βάρος τοῦ κενοῦ δοχείου;

β) Ποῖον τὸ μήκος τοῦ ἐλατηρίου, ὅταν τὸ δοχεῖον περιεχῆ τὸ ἡμισυ τῆς μάζης τοῦ ὕδατος;

γ) Νά ἐπαληθευθοῦν αἱ ἀπαντήσεις διά γραφικῆς παραστάσεως.

Σημείωσις. Τὴν ἰσοδυναμίαν εἰς τὰς κλίμακας συμβολίζομεν διά  $\cong$  π.χ. ἀντί: 1 cm παριστά 5 Κρ, γράφομεν: 1 cm  $\cong$  5 Κρ ἢ ἀντί: λαμβάνομεν 1 cm διά 2 p, γράφομεν 1 cm  $\cong$  2 p κ.τ.λ.

Τὸν συμβολισμόν τοῦτον δυνάμεθα νὰ ἐφαρμόσωμεν εἰς οἰανδήποτε γραφικὴν παράστασιν.

## 100<sup>Ν</sup> ΜΑΘΗΜΑ :

### Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΕΩΣ

1. Ἀποτελέσματα τὰ ὅποια προκαλεῖ μία δύναμις.

● α) Τὸ ἐλατήριο ἐπιμήκυνεται λόγω τοῦ βάρους τοῦ μεταλλικοῦ κυλίνδρου, τὸν ὅποιον ἔχομεν ἀναρτήσει εἰς τὸ ἐλεύθερον ἄκρον του (σχ. 1 Α).


Τὸ ἴδιον ἀποτέλεσμα δυνάμεθα νὰ ἐπιτύχωμεν, ἔὰν σύρωμεν τὸ ἐλεύθερον ἄκρον διά τῆς χειρὸς μας.

● β) Τὸ ἐλατήριο ἐπανέρχεται εἰς τὴν ἀρχικὴν του θέσιν, ὅταν ἀνασηκώσωμεν τὸν κύλινδρον (σχ. 1 Β).

● γ) Ἐὰν πλησιάσωμεν μαγνήτην κάτωθεν τοῦ κυλίνδρου, τὸ ἐλατήριο ἐπιμήκυνεται περισσότερο (σχ. 1 Γ).

● δ) Τοποθετοῦμεν ἐπὶ πλακός, π.χ. ἐκ χάρτου, μεταλλικὴν σφαιραν. Δυνάμεθα νὰ τὴν μετακινήσωμεν, νὰ μεταβάλωμεν τὴν διεύθυνσιν τῆς κινήσεώς της ἢ νὰ τὴν ἡρεμήσωμεν κλίνοντες καταλλήλως τὴν πλάκα ἢ χρησιμοποιοῦντες μαγνήτην.

● Τὸ βάρος τοῦ σώματος, ἡ μνικὴ προσπάθεια, ἡ ἔλξις τοῦ μαγνήτου ἐπὶ τοῦ σιδήρου, ἡ ὥθησις τοῦ ἀνέμου, ἡ ὥθησις τοῦ ἐλατηρίου καὶ τοῦ ἀτιμοῦ εἰς κατάστασιν συμπίεσεως κλπ., εἶναι **δυνάμεις**.




Σχ. 1. Α. Τὸ βάρος τοῦ κυλίνδρου ἐπενεργεῖ ἐπὶ τοῦ ἐλατηρίου.

Β. Ἡ μνικὴ δύναμις ἐξουδετερώνει τὴν ἐπίδρασιν τοῦ βάρους ἐπὶ τοῦ ἐλατηρίου.


Γ. Ἡ δύναμις ἔλξεως τοῦ μαγνήτου ἀ προκαλεῖ μίαν ἐπιμήκυνσιν τοῦ ἐλατηρίου, προστιθεμένην εἰς ἐκείνην, τὴν ὅποιαν προκαλεῖ τὸ βάρος τοῦ κυλίνδρου.




Σχ. 2. Ο μαγνήτης μετακινεί το τεμάχιο σιδήρου.



Σχ. 3. Διά τῶν δακτύλων μας μεταβάλλομεν τὸ σχῆμα μιᾶς ἐλαστικῆς οὐσίας.



Σχ. 4. Ὄταν ἀφήσωμεν ἐλεύθερον τὸ ἐλατήριο, τὸ ὁποῖόν συνεπιέσαμεν, ἀναγκάζει τὴν σφαῖραν νὰ κινήθῃ.



Σχ. 5. Ὁ κύλινδρος διὰ τῆς ἐπιδράσεως τοῦ βάρους του κυλίνεται ἐπὶ τοῦ κεκλιμένου ἐπιπέδου.

**Συμπέρασμα:** Καλοῦμεν δύναμιν τὴν αἰτίαν, ἢ ὁποῖα δύναται :  
 — νὰ μεταβάλλῃ τὸ σχῆμα ἐνὸς σώματος  
 — νὰ θέσῃ εἰς κίνησιν ἓν σῶμα ἢ νὰ τροποποιήσῃ τὴν κίνησίν του.

## 2 Χαρακτηριστικὰ μιᾶς δυνάμεως.

● Ἐκτείνομεν τὸ ἐλατήριο τῆ βοήθειᾳ νήματος, προσδεδεμένον εἰς τὸ ἐλεύθερον ἄκρον τοῦ Α (σχ. 6). Τὸ σημεῖον αὐτὸ καλεῖται **σημεῖον ἐφαρμογῆς** τῆς δυνάμεως τῆς χειρὸς μας ἐπὶ τοῦ ἐλατηρίου, ἐπειδὴ εἰς τὸ σημεῖον αὐτὸ ἐφαρμόζεται ἡ δύναμίς μας.


● Τὸ ἐλατήριο ἐπιμηκύνεται κατὰ τὴν διεύθυνσιν τοῦ τεταμένου νήματος. Αὕτῃ εἶναι ἡ **διεύθυνσις** τῆς δυνάμεως ἢ ἡ εὐθεῖα, κατὰ τὴν ὁποῖαν ἐπενεργεῖ.

● Χαλαροῦμεν σιγὰ—σιγὰ τὸ νῆμα καὶ τὸ ἐλατήριο ἐπανακτᾷ τὸ σχῆμά του. Ἐξασκεῖ δηλ. τὸ ἐλατήριο ἐπὶ τοῦ νήματος μίαν δύναμιν, ἢ ὁποῖα ἔχει τὴν αὐτὴν διεύθυνσιν μὲ τὴν προηγουμένην.

● Εἰς τὸ σημεῖον Α λοιπὸν ἐπενεργοῦν δύο δυνάμεις, ἡ δύναμις  $F'$  ἐπὶ τοῦ νήματος καὶ ἡ δύναμις  $F''$  τῆς χειρὸς μας ἐπὶ τοῦ ἐλατηρίου διὰ τῆς αὐτῆς διεύθυνσεως ἀλλ' ἀντιθέτου φορᾶς.

● Ἐκτείνομεν περισσότερον τὸ νῆμα, καταβάλλοντες μεγαλυτέραν δύναμιν, ὅποτε τὸ ἐλατήριο ἐπιμηκύνεται περισσότερον. Ἡ ἐπιμήκυνσις τοῦ ἐλατηρίου ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν **ἐντάσιν** τῆς δυνάμεως, ἢ ὁποῖα τὸ ἔλκει.

**Συμπέρασμα:** Τὸ σημεῖον ἐφαρμογῆς, ἡ διεύθυνσις, ἡ φορὰ καὶ ἡ ἐντάσις εἶναι τὰ χαρακτηριστικὰ τῆς δυνάμεως.



Σχ. 6. Συμβολισμὸς δυνάμεως δι' ἐνὸς διανύσματος.

Τὸ διάνυσμα  $AB$  συμβολίζει τὴν δύναμιν, τὴν ὁποῖαν ἐξασκεῖ ἡ χεὶρ μας ἐπὶ τοῦ ἐλατηρίου.

$A$  : Σημεῖον ἐφαρμογῆς τῆς δυνάμεως.

$AX$  : Διεύθυνσις τῆς δυνάμεως.

Διάνυσμα  $AB$  : Φορὰ τῆς δυνάμεως.

Μῆκος τοῦ τμήματος  $AB$  : Ἐντάσις τῆς δυνάμεως.



### 3 Γραφική παράσταση δυνάμεως.

Τὴν δύναμιν συμβολίζομεν δι' ἐνὸς διανύσματος (βέλους). Ἡ ἀρχὴ τοῦ διανύσματος εἶναι τὸ σημεῖον ἐφαρμογῆς τῆς δυνάμεως· διεύθυνσις καὶ φορά αὐτῆς εἶναι ἡ διεύθυνσις καὶ ἡ φορά τοῦ διανύσματος (βέλους). Ἡ ἔντασις εὐρίσκεται ἀπὸ τὸ μήκος τοῦ διανύσματος (σχ. 7).

### 4 Ἡ ἔντασις δυνάμεως εἶναι μέγεθος καὶ δύναται νὰ μετρηθῇ.

● Ἐκτείνομεν ἐν ἐλατήριον διὰ μιᾶς δυνάμεως  $F$  οἰσασθῆποτε διευθύνσεως καὶ σημειώσωμεν τὴν ἐπιμήκυνσιν τοῦ ἐλατηρίου. Δυνάμεθα νὰ ἐπιτύχωμεν τὴν αὐτὴν ἐπιμήκυνσιν, ἐὰν ἐξαρτήσωμεν ἀπὸ τὸ ἐλατήριο ἐν βάρους  $B$ , τὸ ὁποῖον εἶναι καὶ αὐτὸ μία δύναμις, ἀλλὰ μὲ διεύθυνσιν *κατακόρυφον* καὶ φοράν ἐκ τῶν ἄνω πρὸς τὰ κάτω. Ἡ δύναμις αὕτη καὶ τὸ βᾶρος  $B$  ἔχουν τὴν αὐτὴν ἔντασιν.

Δύο δυνάμεις ἔχουν τὴν αὐτὴν ἔντασιν, ὅταν προκαλοῦν τὴν αὐτὴν ἐπιμήκυνσιν, ἐπενεργοῦσαι διαδοχικῶς ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ ἐλατηρίου.

● Τὴν αὐτὴν ἐπιμήκυνσιν δυνάμεθα νὰ ἐπιτύχωμεν, ἐὰν ἐφαρμόσωμεν εἰς τὸ ἐλατήριο δύο δυνάμεις μαζί, τὴν  $F_1$  καὶ  $F_2$ , αἱ ὁποῖαι νὰ ἔχουν τὴν αὐτὴν διεύθυνσιν καὶ φοράν. Ἡ δύναμις  $F$  εἶναι ἴση πρὸς τὸ ἄθροισμα τῶν δύο δυνάμεων  $F_1$  καὶ  $F_2$ .

Μία δύναμις εἶναι ἴση πρὸς τὸ ἄθροισμα δύο ἄλλων δυνάμεων τῆς αὐτῆς διευθύνσεως καὶ φορᾶς, ὅταν ἡ ἐπιμήκυνσις, τὴν ὁποῖαν προκαλεῖ ἐπὶ ἐνὸς ἐλατηρίου, εἶναι ἴση πρὸς αὐτὴν, τὴν ὁποῖαν προκαλοῦν καὶ αἱ δύο μαζί.

● Τὴν ἔντασιν μιᾶς δυνάμεως προσδιορίζομεν ὅπως καὶ τὸ βᾶρος, διὰ τοῦ δυναμομέτρου (σχ. 8).

● Αἱ μονάδες τῆς δυνάμεως εἶναι αἱ αὐταὶ μὲ τὰς μονάδας τοῦ βάρους: τὸ κιλοπόντ, τὸ ὁποῖον συμβολίζεται μὲ τὸ  $Kp$  καὶ τὸ Newton ( $1 Kp = 9,81 N$ ).


#### Τάξεις μεγέθους μερικῶν δυνάμεων

Δύναμις ἑλέως ἐνὸς ἀνθρώπου	20–30 Kp
» » » ἵππου	60–70 Kp
» » μιᾶς ἀτμομηχανῆς σιδηροδρόμου	10–80 Mr
» ὠθήσεως στροβιλοαντιδραστή- ρος Boeing 707	5920 Kp
» » πυραύλου Ἄτλας κα- τὰ τὴν ἐκτόξευσιν	178 Mr.

### ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ

1. Καλοῦμεν δύναμιν κάθε αἰτίαν, ἡ ὁποία δύναται νὰ μεταβάλλῃ τὸ σχῆμα ἐνὸς σώματος, νὰ τὸ θέσῃ εἰς κίνησιν ἢ νὰ τροποποιήσῃ τὴν κίνησιν του.

2. Τὸ βᾶρος ἐνὸς σώματος, ἡ νυκτικὴ δύναμις, ἡ ἑλξις τοῦ μαγνήτου, ἡ δύναμις τοῦ ρέοντος ὕδατος, ἡ ἐλαστικὴ δύναμις τοῦ ἀτμοῦ κλπ., εἶναι αἱ πλέον συνήθεις δυνάμεις, ποὺ χρησιμοποιοῦνται διὰ τὴν κίνησιν τῶν μηχανῶν.




Σχ. 7.

A. Ἡ μονὰς τῆς δυνάμεως συμβολίζεται διὰ τοῦ μήκους τοῦ τμήματος AB.

B.  $F_1$  εἶναι μία ὀριζοντία δύναμις μὲ φοράν ἐκ δεξιῶν πρὸς τὰ ἀριστερά καὶ μὲ ἔντασιν 4 Kp.

Γ.  $F_2$  εἶναι ἐν βάρους 2 Kp.

Δ.  $F_3$  εἶναι μία πλαγία δύναμις ἐκ τῶν ἄνω πρὸς τὰ κάτω μὲ φοράν πρὸς τὰ δεξιὰ.



Σχ. 8. Δυναμόμετρον δι' ἐλάσματος (μέχρι 100 Kp).

Ἐπὶ ὑπάρχουν πολλοὶ τύποι δυναμομέτρων, τῇ βοήθειᾳ τῶν ὁποίων προσδιορίζομεν δυνάμεις πολλῶν τόνων.

3. Μία δύναμις χαρακτηρίζεται από το σημείον εφαρμογής, την διεύθυνσιν, την φοράν και την έντασιν της.

4. Ἡ έντασις μιᾶς δυνάμεως εἶναι μέγεθος, τὸ ὁποῖον δύναται νὰ μετρηθῇ.

Αἱ μονάδες δυνάμεως εἶναι αἱ αὐταὶ μετὰ τὰς μονάδας βάρους: τὸ Κρ (Κιλοπόντ) καὶ τὸ Νewton.

11<sup>ΟΝ</sup> ΜΑΘΗΜΑ: Ἴσορροπία σώματος ὑπὸ τῆν ἐπίδρασιν πολλῶν δυνάμεων.

## ΤΡΟΧΑΛΙΑ

**1** Ἡ τροχαλία μεταβάλλει τὴν διεύθυνσιν μιᾶς δυνάμεως.

Διὰ τοῦ πειράματος (σχ. 2) παρατηροῦμεν ὅτι, ἐνῶ τὸ βᾶρος, τὸ ὁποῖον ἐξαρτῶμεν, εἶναι μία δύναμις μετὰ διεύθυνσιν κατακόρυφον, ἡ δύναμις αὕτη μεταφέρεται εἰς τὸ ἄκρον Α τοῦ δυναμομέτρου μετὰ διεύθυνσιν ΑΧ καὶ έντασιν τὴν αὐτὴν.

Οἰαδήποτε καὶ ἐὰν εἶναι ἡ θέσις τοῦ δακτυλίου Γ, ἡ ένδειξις τοῦ δυναμομέτρου παραμένει ἡ αὐτή.

**Συμπέρασμα:** Ἡ τροχαλία μεταβάλλει τὴν διεύθυνσιν μιᾶς δυνάμεως, χωρὶς νὰ μεταβάλλῃ καὶ τὴν έντασιν της.

**2** Ἴσορροπία δύο ἀντιθέτων δυνάμεων.


Ἡ μικρὴ προσπάθεια ομάδος παιδῶν (σχ. 3) εἶναι μία δύναμις. Τὸ τεταμένον σχοινίον μᾶς δίδει τὴν κοινὴν διεύθυνσιν τῶν δύο δυνάμεων. Ἐὰν τὸ σημεῖον Ο, κοινὸν σημεῖον εφαρμογῆς, εἰς τὴν ὅλην προσπάθειαν τῶν ομάδων, παραμείνῃ εἰς τὴν θέσιν του, τότε αἱ δυνάμεις εἶναι ἴσαι καὶ ἀντίθετοι. Εὐρίσκονται δηλ. εἰς τὴν αὐτὴν εὐθεῖαν, ἔχουν τὴν αὐτὴν έντασιν καὶ ἀντίθετον φοράν.

Μόνον ὅταν αἱ δυνάμεις (τὰ βάρη)  $F_1$  καὶ  $F_2$  (πείραμα 3) εἶναι ἴσαι, ὁ δακτύλιος Ο ἰσορροπεῖ. Ἄλλως θὰ μετακινηθῇ πρὸς τὸ μέρος τῆς μεγαλυτέρας δυνάμεως.


**Συμπέρασμα:** Ὄταν δύο δυνάμεις ἴσαι καὶ ἀντίθετοι ἐπενεργοῦν εἰς ἓν σῶμα, τότε τὸ σῶμα αὐτὸ ἰσορροπεῖ.

**3** Ἴσορροπία δυνάμεων μετὰ κοινὸν σημεῖον εφαρμογῆς (συντρέχουσαι).

● **Παρατήρησις.** Οἱ δύο ὑλοκόπτοι τοῦ σχήματος 4 ἔλκουν ὁ καθέις πρὸς τὸ μέρος του τὸ δένδρον. Εἶναι φανερόν ὅτι καὶ αἱ δύο δυνάμεις ἔχουν κοινὸν σημεῖον εφαρμογῆς. Αἱ δυνάμεις αὐταὶ καλοῦνται *συντρέχουσαι*.



Σχ. 1. Ἡ τροχαλία ἀποτελεῖται ἐξ ἑνὸς δίσκου μετὰ αὐλάκα εἰς τὴν περιφέρειαν. Ὁ δίσκος περιστρέφεται περὶ ἑνὸς ἄξονος, διερχομένου ἐκ τοῦ κέντρου του.



Σχ. 2. Τὸ μήκος τοῦ ἐλατηρίου δὲν μεταβάλλεται, εἰς οἰανδήποτε θέσιν καὶ ἐὰν εὐρίσκειται ὁ δακτύλιος Γ.

Ἡ τροχαλία μεταβάλλει τὴν διεύθυνσιν μιᾶς δυνάμεως χωρὶς νὰ μεταβάλλῃ καὶ τὴν έντασιν της.

● **Πείραμα.** 'Εάν από τὰς ἄκρας τῶν τριῶν νημάτων ἀναρτήσωμεν τὰ βάρη, τὰ ὅποια παρατηροῦμεν εἰς τὸ σχῆμα 5, ὁ δακτύλιος  $O$  εἰς τὴν ἀρχὴν θὰ μετακινηθῆ καὶ κατόπιν θὰ ἰσορροπήσῃ.

Αἱ τρεῖς δυνάμεις  $F_1, F_2, F_3$  ἐπενεργοῦν εἰς ἓν σημεῖον καὶ ἰσορροποῦν. Εἶναι εὐκολόν νά ἀποδείξωμεν ὅτι αἱ διευθύνσεις τῶν τριῶν αὐτῶν δυνάμεων εὐρίσκονται εἰς τὸ αὐτὸ ἐπίπεδον. (Διὰ μιᾶς πλακὸς π.χ. ἐκ χαρτονίου, τὸ ὅποῖον τοποθετοῦμεν ὅπισθεν αὐτῶν).

**Συμπέρασμα:** Καλοῦμεν συντρεχούσας δυνάμεις ἐκεῖνας, τῶν ὁποίων αἱ διευθύνσεις ἔχουν ἓν κοινὸν σημεῖον. Ὄταν τρεῖς συντρεχούσαι δυνάμεις ἰσορροποῦν, τότε αὐταὶ εὐρίσκονται ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ ἐπιπέδου.

#### 4 Συνισταμένη δύο συντρεχουσῶν δυνάμεων.

● Τοποθετοῦμεν ὅπισθεν τῶν νημάτων ἐν λευκὸν χαρτόνιον καὶ σημειώσωμεν τὰ διανύσματα  $OA, OB, OG$ , τὰ ὅποια συμβολίζουν τὰς δυνάμεις  $F_1, F_2$  καὶ  $F_3$ . Αἱ δυνάμεις  $F_1$  καὶ  $F_2$  ἰσορροποῦν τὴν  $F_3$ . Δυνάμεθα νά ἐπιτύχωμεν τὴν αὐτὴν ἰσορροπίαν, ἐάν ἀντικαταστήσωμεν τὰς δυνάμεις  $F_1$  καὶ  $F_2$  μὲ τὴν δύναμιν  $R$ , ἴσην καὶ ἀντίθετον πρὸς τὴν  $F_3$ .

● Τὴν δύναμιν αὐτήν, ἡ ὁποία φέρει τὸ αὐτὸ ἀποτέλεσμα μὲ τὰς δύο δυνάμεις  $F_1$  καὶ  $F_2$ , συμβολίζομεν μὲ τὸ διάνυσμα  $OD$ . Ἡ δύναμις  $R$  καλεῖται συνισταμένη τῶν δυνάμεων  $F_1$  καὶ  $F_2$ .

● 'Εάν κατασκευάσωμεν τὸ τετράπλευρον  $OADB$  (σχ. 5), παρατηροῦμεν ὅτι εἶναι παραλληλόγραμμον. Τὸ διάνυσμα  $OD$  εἶναι ἡ διαγώνιος τοῦ παραλληλογρᾶμου.

**Συμπέρασμα:** Ἡ συνισταμένη δύο συντρεχουσῶν δυνάμεων εἶναι μία δύναμις, ἡ ὁποία, ὅταν ἐπενεργῆ (μόνη της), φέρει τὸ αὐτὸ ἀποτέλεσμα μὲ τὰς δύο ἄλλας δυνάμεις.

Ἡ συνισταμένη παρίσταται διὰ τῆς διαγωνίου τοῦ παραλληλογρᾶμου, τὸ ὅποῖον κατασκευάζεται ἀπὸ τὰ διανύσματα τῶν δύο αὐτῶν δυνάμεων.


#### ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ

1. Ἡ τροχαλία τροποποιεῖ τὴν διεύθυνσιν ἑνὸς μῆκος δυνάμεως, χωρὶς ὅμως νά μεταβάλλῃ καὶ τὴν ἔντασιν αὐτῆς.


2. Ἐν σῶμα ἰσορροπεῖ, ὅταν ἐπενεργοῦν εἰς αὐτὸ δύο δυνάμεις ἴσαι, ἀντίθετοι καὶ τῆς αὐτῆς διεύθυνσεως.

3. Δύο δυνάμεις καλοῦνται συντρεχούσαι, ὅταν αἱ διευθύνσεις των ἔχουν ἓν κοινὸν σημεῖον ἐφαρμογῆς. Αἱ διευθύνσεις τριῶν συντρεχουσῶν δυνάμεων ἐν ἰσορροπίᾳ εὐρίσκονται ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ ἐπιπέδου.


4. Ἡ συνισταμένη δύο συντρεχουσῶν δυνάμεων παρίσταται διὰ τῆς διαγωνίου τοῦ παραλληλογρᾶμου, τὸ ὅποῖον κατασκευάζομεν μὲ τὰ διανύσματα τῶν δύο αὐτῶν δυνάμεων.



Σχ. 3. Ὁ δακτύλιος διὰ τῆς ἐπιδράσεως δύο δυνάμεων ἴσων καὶ ἀντίθετων,  $F_1$  καὶ  $F_2$ , παραμένει ἀκίνητος. Δύο δυνάμεις ἴσαι καὶ ἀντίθετοι (τῆς αὐτῆς διεύθυνσεως) ἰσορροποῦν.



Σχ. 4. Δυνάμεις μὲ κοινὸν σημεῖον ἐφαρμογῆς (συντρεχούσαι)



Σχ. 5. Αἱ συντρεχούσαι δυνάμεις  $F_1$  καὶ  $F_2$  ἰσορροποῦνται ἀπὸ τὴν δύναμιν  $F_3$ . Τὸ διάνυσμα  $OD$  παρίσταται δυνάμιν ἀντίθετον πρὸς τὴν  $F_3$ . Ἡ δύναμις  $R$  φέρει τὸ αὐτὸ ἀποτέλεσμα, τὸ ὅποῖον φέρουσιν καὶ αἱ δύο μάζαι δυνάμεις  $F_1$  καὶ  $F_2$ . Ἡ δύναμις  $R$  εἶναι ἡ συνισταμένη τῶν  $F_1$  καὶ  $F_2$ . Αἱ δυνάμεις  $F_1$  καὶ  $F_2$  εἶναι αἱ συνιστώσαι τῆς συνισταμένης.

## ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ

### 1 Ίσορροπία δύο παραλλήλων δυνάμεων.

● *Παρατήρησης*: Τα δύο βάρη, τα οποία σηκώνει ο άνθρωπος του σχ. 1, είναι δυνάμεις παράλληλοι και της αΐτης φοράς. Αΐ δυνάμεις αΐται εφαρμόζονται εΐς τὰ άκρα τΐς ράβδου, ή όποΐα ΐσορροπεί έπί του ώμου του ανθρώπου εΐς τή ό σημείον Ο.

● *Πείραμα*. Πραγματοποιοΐμεν μεΐ δύο τροχαΐας τΐν διατάειν του σχ. 2. Όταν οΐ δύο δΐσκοι εΐναι κενοΐ, τή σύστημα ΐσορροπεί και τὰ νήματα εΐναι κατακόρυφα. Η ράβδος MN εΐχει μήκος 36 cm.

● Τοποθετοΐμεν εΐς τόν άριστερόν δΐσκον βάρος 100 p και εΐς τόν δεξιόν 50 p. Η ράβδος MN άρχΐζει νά μετακινΐται πρὸς τὰ άνω και, διαΐ νά επιτύχωμεν ΐσορροπΐαν, πρΐπει νά έξαρτήσωμεν άπό τή ό σημείον Ο βάρος 150 p.

Παρατηροΐμεν ότι τή ό σημείον Ο άπέχει άπό τὰ άκρα τΐς ράβδου  $OM = 12$  cm και  $ON = 24$  cm (σχ. 3).


● Έπαναλαμβάνομεν τή ό πείραμα μεΐ διάφορα βάρη και καταρτΐζομεν τόν κάτωθι πίνακα:

$F_1$ (p)	$F_2$ (p)	Ίσορροπΐαν επι- τυγχάνομεν, όταν			$F_1 \times OM$	$F_2 \times ON$
		$F_3 = F_1 + F_2$	OM =	ON =		
100	50	150	12 cm	24 cm	$12 \times 100$	$24 \times 50$
50	50	100	18 cm	18 cm	$18 \times 50$	$18 \times 50$
70	50	120	15 cm	21 cm	$15 \times 70$	$50 \times 21$


**Συμπέρασμα:** Δύο παράλληλοι δυνάμεις  $F_1$  και  $F_2$ , αΐ όποΐαι έχον τΐν αΐτην φοράν και έπενεργοΐν εΐς τὰ σημεία M και N ενός εϋθυγράμμου τμήματος, ΐσορροποΐνται υπό μΐς τρίτης δυνάμεως  $F_3$ , ή όποΐα εΐναι παράλληλος πρὸς τὰς δυνάμεις αΐτὰς άλλ' άντιθέτου φοράς. Η έντασις τΐς  $F_3$  εΐναι ΐση πρὸς τή άθροΐσμη τῶν  $F_1$  και  $F_2$ , εΐναι δηλ.  $F_3 = F_1 + F_2$ . Τή ό σημείον εφαρμογΐς Ο τΐς δυνάμεως  $F_3$  εΐρίσκει-ται έπί του εϋθυγράμμου τμήματος MN και καθορΐζεται άπό τΐν σχέσιν:  $F_1 \times OM = F_2 \times ON$ .

### 2 Συνισταμένη παραλλήλων δυνάμεων.


Τή ό σημείον Ο δέν θά μετακινΐθΐ, και έάν άκόμη



Σχ. 1. Παράλληλοι δυνάμεις



Σχ. 2. Όταν οΐ δΐσκοι εΐναι κενοΐ, ή διατάεις εΐρίσκειται έν ΐσορροπΐα.



Σχ. 3. Αΐ δυνάμεις  $F_1$  και  $F_2$  ΐσορροποΐν υπό τΐν έπίδρασιν τΐς δυνάμεως  $F_3$ , ή όποΐα εΐχει έντασιν ΐσην πρὸς τή άθροΐσμη τῶν έντάσεων τῶν  $F_1$  και  $F_2$ , τΐν αΐτην διεϋθύνειν και άντιθέτου φοράν. Τή ό σημείον εφαρμογΐς τΐς  $F_3$  καθορΐζεται διαΐ τΐς σχέσεως:  $F_1 \times OM = F_2 \times ON$ .

επιπεραγήσουν εις αυτό δύο δυνάμεις ίσαι και αντίθετοι, ή  $F_3$  και ή  $R$  (σχ. 4). Δηλαδή ή  $R$  είναι ισοδύναμος πρὸς τὰς δύο παραλλήλους δυνάμεις  $F_1$  και  $F_2$ , και καλεῖται **συνισταμένη** τῶν δύο αὐτῶν δυνάμεων.

Ἡ συνισταμένη δύο δυνάμεων παραλλήλων και τῆς αὐτῆς φορᾶς, τῶν ὁποίων τὰ σημεῖα ἐφαρμογῆς εὐρίσκονται εις τὰ σημεῖα  $M$  και  $N$ , ἔχει τὴν αὐτὴν διεύθυνσιν και φορᾶν πρὸς τὰς δύο δυνάμεις, ἔντασιν δὲ ἴσην πρὸς τὸ ἄθροισμα τῶν ἐντάσεων τῶν δύο δυνάμεων. Τὸ σημεῖον ἐφαρμογῆς αὐτῆς  $O$  καθορίζεται ἀπὸ τὴν σχέσηιν :

$$F_1 \times OM = F_2 \times ON.$$

### 3 Κέντρον βάρους.

Γνωρίζομεν ὅτι κάθε σῶμα ἔλκεται ἀπὸ τὴν γῆν με μίαν δύναμιν, ή ὁποία καλεῖται βᾶρος τοῦ σώματος. Τὸ βᾶρος ἔχει διεύθυνσιν κατακόρυφον και φορᾶν ἐκ τῶν ἄνω πρὸς τὰ κάτω.

● Ἐὰν ἀφήσωμεν ἐν σῶμα ἐλεύθερον, π.χ. τεμάχιον μαρμάρου, τοῦτο πίπτει κατακόρυφως λόγω τῆς ἐπιδράσεως τοῦ βάρους του. Τὸ αὐτὸ θὰ συμβῆ δι' ὅλα τὰ τεμάχια, τὰ ὁποία θὰ λάβωμεν τεμαχίζοντες ἐν σῶμα, ὅσον μικρὰ και ἔαν εἶναι, ἔαν τὰ ἀφήσωμεν ἐλεύθερα, ἐπειδὴ εις ἕκαστον ἐξ αὐτῶν ἐπιπεραγεῖ ή δύναμις τοῦ βάρους του, ή ὁποία ἔχει διεύθυνσιν κατακόρυφον.


● Δυνάμεθα λοιπὸν νὰ θεωρήσωμεν ὅτι τὸ σῶμα ἀποτελεῖται ἀπὸ μικρὰ τεμαχίδια και ἐπομένως τὸ βᾶρος τοῦ σώματος θὰ εἶναι ή συνισταμένη ὄλων αὐτῶν τῶν στοιχειωδῶν βαρῶν, τὰ ὁποία εἶναι δυνάμεις παράλληλοι και τῆς αὐτῆς φορᾶς.

● Ἡ συνισταμένη τῶν παραλλήλων αὐτῶν δυνάμεων εὐρίσκειται, ἔαν συνθέσωμεν δύο ἀπὸ τὰς δυνάμεις αὐτὰς και τὴν συνισταμένην τούτων με τὴν τρίτην δύναμιν, τὴν νέαν συνισταμένην με τὴν τετάρτην κ.ο.κ., ἔως ὅτου καταλήξωμεν εις μίαν δύναμιν, ή ὁποία εἶναι τὸ βᾶρος τοῦ σώματος.

Τὸ σημεῖον ἐφαρμογῆς τοῦ βάρους τοῦ σώματος καλεῖται **κέντρον βάρους**.

Ἀποδεικνύεται ὅτι, οἰανδήποτε σειρὰν και ἂν ἀκολουθήσωμεν κατὰ τὴν σύνθεσιν τῶν δυνάμεων, εὐρίσκομεν τὸ ἴδιον κέντρον βάρους.

**Συμπέρασμα :** Κέντρον βάρους ἐνὸς σώματος καλεῖται τὸ σημεῖον ἐφαρμογῆς τῆς συνισταμένης τῶν στοιχειωδῶν βαρῶν, τῶν ὁποίων τὸ ἄθροισμα ἀποτελεῖ τὸ βᾶρος τοῦ σώματος.



Σχ. 4. Ἡ συνισταμένη  $R$  φέρει τὸ αὐτὸ ἀποτελέσμα, τὸ ὁποῖον φέρουν και αἱ δύο μαζί δυνάμεις  $F_1$  και  $F_2$ :

$$R = F_1 + F_2$$



και ἔχουν τὴν αὐτὴν διεύθυνσιν και φορᾶν πρὸς αὐτάς:

$$F_1 \times OM = F_2 \times ON$$



Σχ. 5  
Τὸ βᾶρος  $P$   
ὄλου τοῦ  
τεμαχίου

εἶναι ἴσον πρὸς τὸ ἄθροισμα τῶν βαρῶν τῶν τεμαχιδίων, ἐκ τῶν ὁποίων ἀποτελεῖται.



Τὸ βᾶρος  $P$  εἶναι ή συνισταμένη τῶν βαρῶν ὄλων τῶν τεμαχιδίων, τὰ ὁποία ἀποτελοῦν τὸ σῶμα.

## ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ

1. Δύο δυνάμεις  $F_1$  και  $F_2$  παράλληλοι και τῆς αὐτῆς φορᾶς, ἐφηρμοσμένα εις τὰ σημεῖα  $M$  και  $N$  μιᾶς εὐθείας, ἰσορροποῦν ὑπὸ τὴν ἐπιπεραγεῖαν τρίτην

δυνάμεις  $F$ , παράλληλων και αντίθετου φοράς προς τὰς δυνάμεις αὐτὰς καὶ ἐντάσεως ἴσης πρὸς τὸ ἄθροισμα τῶν ἐντάσεων τῶν δύο δυνάμεων. Τὸ σημεῖον ἐφαρμογῆς τῆς  $O$  καθορίζεται ἀπὸ τὴν σχέσιν:  $F_1 \times OM = F_2 \times ON$ .

2. Ἡ συνισταμένη τῶν δύο αὐτῶν παράλληλων καὶ τῆς αὐτῆς φοράς δυνάμεων εἶναι ἡ δύναμις  $R$ , ἴση καὶ ἀντίθετος πρὸς τὴν  $F_3$  (σχ. 4).

3. Κέντρον βάρους ἑνὸς σώματος εἶναι τὸ σημεῖον ἐφαρμογῆς τῆς συνισταμένης ὄλων τῶν στοιχειωδῶν βαρῶν, τῶν ὁποίων τὸ ἄθροισμα ἀποτελεῖ τὸ βάρος τοῦ σώματος.

### 13<sup>ΟΝ</sup> ΜΑΘΗΜΑ : Πειραματικός προσδιορισμός τοῦ κέντρου βάρους.

## ΚΕΝΤΡΟΝ ΒΑΡΟΥΣ

### 1 Κέντρον βάρους μιᾶς πλακῆς.

● Ἀναρτῶμεν μίαν πλάκα, π.χ. ἐκ χαρτονίου, δι' ἑνὸς νήματος, τὸ ὁποῖον ἔχομεν προσδέσει εἰς ἓν σημεῖον  $A$  τῆς περιμέτρου τῆς.

● Ἀπὸ τὸ αὐτὸ σημεῖον ἔχομεν ἀναρτήσει καὶ τὸ νῆμα τῆς στάθμης, τοῦ ὁποίου τὴν κλωστήν ἔχομεν ἐπαλείψει μὲ κιμωλίαν. Αὕτη θὰ ἀφήσῃ ἐπὶ τοῦ χαρτονίου μίαν λευκὴν γραμμὴν. Τὸ νῆμα τῆς στάθμης μαζί μὲ τὸ νῆμα ἀναρτήσεως τοῦ σώματος σχηματίζουν κοινὴν κατακόρυφον. Αὕτη εἶναι ἡ διεύθυνσις τοῦ βάρους τοῦ σώματος.


● Ἐπαναλαμβάνομεν τὸ πείραμα μὲ διάφορα σημεῖα  $B, \Gamma \dots$  τῆς περιμέτρου τῆς πλακῆς καὶ παρατηροῦμεν ὅτι τὰ ἴχνη τῆς κιμωλίας  $BB', \Gamma\Gamma'$  τέμνονται (συντρέχουν) εἰς ἓν σημεῖον  $G$ . Τοῦτο εἶναι τὸ σημεῖον ἐφαρμογῆς τοῦ βάρους ἢ τὸ κέντρον βάρους τῆς πλακῆς (σχ. 1).

**Συμπέρασμα :** Διὰ νὰ προσδιορίσωμεν τὸ κέντρον βάρους μιᾶς πλακῆς, ἀναρτῶμεν αὐτὴν ἀπὸ διάφορα σημεῖα τῆς περιμέτρου τῆς. Αἱ κατακόρυφοι, αἱ ὁποῖαι διέρχονται ἐκ τῶν σημείων τούτων, τέμνονται εἰς ἓν σημεῖον, τὸ ὁποῖον εἶναι τὸ κέντρον βάρους τοῦ σώματος.


**Σημείωσις.** Διὰ νὰ καθορίσωμεν τὸ κέντρον βάρους ἑνὸς σώματος, ἀρκεῖ νὰ τὸ ἀναρτήσωμεν διαδοχικῶς ἀπὸ δύο μόνον σημεῖα τῆς περιμέτρου του, τὰ ὁποῖα νὰ ἀπέχουν μεταξύ των.

### 2 Κέντρον βάρους ὁμογενῶν ἐπιπέδων σωμάτων, γεωμετρικοῦ σχήματος.


● Ἐπαναλαμβάνομεν τὸ προηγουμένον πείραμα μὲ ὁμογενεῖς πλάκας διαφόρων συμμετρικῶν γεωμετρικῶν σχημάτων. Παρατηροῦμεν ὅτι τὸ κέντρον



Σχ. 1. Προσδιορισμός τοῦ κέντρου βάρους ἐπιπέδου σώματος διὰ διαδοχικῶν ἀναρτήσεων



Σχ. 2. Κέντρον βάρους γεωμετρικῶν σχημάτων



Σχ. 3. Καθορισμός τοῦ κέντρου βάρους ἑνὸς σκαμνίου.



Σχ. 4. Ἴσορροπία ράβδου.

βάρους του κύκλου είναι το γεωμετρικόν του κέντρον, του τετραγώνου και παραλληλογράμμου το σημείον τομῆς τῶν διαγωνίων του, καὶ τοῦ τριγώνου τὸ σημείον τομῆς τῶν διαμέσων του (σχ. 2).

### 3 Κέντρον βάρους οἰοῦδήποτε σώματος.

Ἡ μέθοδος τῆς διπλῆς ἐξαρτήσεως, τὴν ὁποίαν ἐφημέσαμεν προηγουμένως, διὰ νὰ καθορίσωμεν τὸ κέντρον βάρους μιᾶς πλακῆς, δὲν δύναται νὰ μᾶς χρησιμεύσῃ διὰ τὸν ἴδιον σκοπὸν, διότι δὲν δυνάμεθα νὰ σημειώσωμεν τὴν προέκτασιν τῆς κατακόρυφου ἀπὸ τὸ σημείον ἐξαρτήσεως τοῦ σώματος· εἰς ὠρισμένας ὁμως περιπτώσεις, ὅπως π.χ. εἰς ἓν σκαμνίον, μίαν ράβδον (σχ. 3, 4) κλπ. δυνάμεθα νὰ τὴν ἐφαρμόσωμεν. Παρατηροῦμεν τότε ὅτι τὸ κέντρον βάρους εἶναι δυνατόν νὰ εὑρίσκηται καὶ ἔξω τοῦ σώματος.

### 4 Κέντρον βάρους στερεῶν σωμάτων γεωμετρικοῦ σχήματος.

Τὸ κέντρον βάρους σωμάτων, τὰ ὁποῖα ἔχουν συμμετρικὸν γεωμετρικὸν σχῆμα, εἶναι δὲ καὶ ὁμογενῆ, συμπίπτει μὲ τὸ γεωμετρικὸν τῶν κέντρον, ἐνῶ εἰς τὴν περίπτωσιν μὴ ὁμογενῶν εὑρίσκηται πρὸς τὸ βαρύτερον μέρος τοῦ σώματος ἢ πλησίον αὐτοῦ.

### 5 Ἴσορροπία.

Ἐάν παρατηρήσωμεν μεταλλικὴν πλάκα, τὴν ὁποίαν ἔχομεν ἀναρτήσῃ εἰς σημείον  $O$ , θὰ διαπιστώσωμεν ὅτι, ὅταν τὴν μετατοπίσωμεν, μετὰ μερικὰς ταλαντώσεις ἰσορροπεῖ εἰς τὴν ἀρχικὴν τῆς θέσιν (σχ. 6).


● Ἐάν τοποθετήσωμεν τὴν πλάκα εἰς τρόπον, ὥστε τὸ κέντρον βάρους νὰ εἶναι ὑπεράνω τοῦ σημείου  $O$  (σχ. 7Α), ἡ πλάξ ἰσορροπεῖ, ὅταν τὸ κέντρον βάρους καὶ τὸ σημείον  $O$  εὑρίσκωνται ἐπὶ τῆς αὐτῆς κατακόρυφου (τοῦτο δυσκόλως ἐπιτυγχάνεται).

● Ἐάν ὁμως μετατοπίσωμεν καὶ ἐλάχιστα τὴν πλάκα, δὲν ἐπανέρχεται εἰς τὴν θέσιν τῆς, ἀλλὰ λαμβάνει τὴν προηγουμένην θέσιν ἰσορροπίας.

● Εἰς τὴν πρώτην περίπτωσιν λέγομεν ὅτι τὸ σῶμα εὑρίσκηται εἰς **εὐσταθῆ** ἰσορροπία, ἐνῶ εἰς τὴν δευτέραν εἰς **ἀσταθῆ**.

● Ἐάν, τέλος, ἀναρτήσωμεν τὴν πλάκα ἀπὸ τὸ κέντρον βάρους τῆς, τότε, οἰανδήποτε θέσιν καὶ ἐάν τῆς δώσωμεν, παρατηροῦμεν ὅτι ἰσορροπεῖ. Εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν λέγομεν ὅτι τὸ σῶμα εὑρίσκηται εἰς **ἀδιάφορον** ἰσορροπία (σχ. 7 Β).

**Παρατήρησις.** Εἰς ὅλας τὰς περιπτώσεις τὸ κέντρον βάρους ἔχει τὴν τάσιν νὰ καταλαμβάνῃ τὴν χαμηλοτέραν θέσιν.




Σφαῖρα ὁμογενῆς.  $G$  καὶ  $O$  συμπίπτουν.

Σφαῖρα ἀνομοιογενῆς.  $G$  καὶ  $O$  δὲν συμπίπτουν.

Μόλυβδος

Σχ. 5.



Σχ. 6. Ἡ πλάξ, ἐάν ἀπομακρυνθῇ ἐκ τῆς θέσεως ἰσορροπίας, μετὰ μερικὰς ταλαντώσεις ἐπανέρχεται εἰς τὴν ἀρχικὴν τῆς θέσιν. Τὸ σῶμα εὑρίσκηται εἰς εὐσταθῆ ἰσορροπία.

$O$  καὶ  $G$  εἰς τὴν αὐτὴν κατακόρυφον. Τὸ  $O$  ὑπεράνω τοῦ  $G$ .



Σχ. 7.

Ἴσορροπία ἀσταθῆς ( $O$  κάτωθεν τοῦ  $G$ ).


Ἴσορροπία ἀδιάφορος ( $O$  καὶ  $G$  συμπίπτουν).



Σχ. 8. Κέντρον βάρους ἀνομοιογενούς σώματος



Σχ. 9. Νὰ ἐξηγηθῇ ἡ ἰσορροπία τοῦ ἀκροβάτου. Εἶναι εὐκόλον νὰ πραγματοποιήσωμεν καὶ ἄλλα παρόμοια πειράματα δι' ἄλλων μέσων.



Σχ. 10. Ίσορροπία σώματος, στηριζομένου εις ἓν ὑποστήριγμα. Ποίαν θέσιν τείνει νά λάβῃ τὸ πρίσμα Β.

## 6 Ίσορροπία σώματος στηριζομένου ἐπὶ ὀριζοντίου ἐπιπέδου.

*Πείραμα.* Τὸ ἀρθρωτὸν παραλληλεπίπεδον ἰσορροπεῖ ἐπὶ τῆς βάσεώς του, μόνον ὅταν ἡ κατακόρυφος, ἢ διερχομένη ἀπὸ τὸ κέντρον βάρους, συναντᾷ τὴν βάσιν στηριζέως του. Εἰς κάθε ἄλλην περίπτωσιν τὸ σῶμα ἀνατρέπεται.

### ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ

1. Δυνάμεθα νά καθορίσωμεν τὸ κέντρον βάρους ἐνὸς σώματος, ἐὰν τὸ ἀναρτήσωμεν διαδοχικῶς ἀπὸ διάφορα σημεῖα του καὶ σημειώσωμεν κάθε φοράν τὴν διεύθυνσιν τῆς κατακόρυφου, ἢ ὁποία διέρχεται ἀπὸ τὰ σημεῖα αὐτά. Ὅλοι τότε αἱ κατακόρυφοι διέρχονται ἀπὸ ἓν σημεῖον, τὸ ὁποῖον εἶναι τὸ κέντρον βάρους τοῦ σώματος.
2. Κέντρον βάρους τοῦ κύκλου τοῦ τετραγώνου, τοῦ παραλληλογράμμου εἶναι τὸ γεωμετρικόν των κέντρον καὶ τοῦ τριγώνου τὸ σημεῖον τομῆς τῶν διαμέσεων του.
3. Κέντρον βάρους τῆς σφαίρας, τοῦ κυλίνδρου καὶ τοῦ κύβου, ἐὰν εἶναι ὁμογενῆ, εἶναι τὸ γεωμετρικόν των κέντρον· εἰς κάθε ἄλλην περίπτωσιν εὐρίσκεται πρὸς τὸ βαρύτερον μέρος τοῦ σώματος ἢ εἰς τὸ πλησιέστερον σημεῖόν του.
4. Ἐν σῶμα, τὸ ὁποῖον ἀναρτᾶται εἰς ὀριζόντιον ἄξονα, εὐρίσκεται εἰς εὐσταθῆ ἰσορροπίαν, ὅταν τὸ κέντρον βάρους του εἶναι ἐπὶ τῆς κατακόρυφου, τῆς διερχομένης ἀπὸ τὸν ἄξονα τοῦτον καὶ κάτωθεν αὐτοῦ.
5. Ἐν σῶμα, στηριζόμενον ἐπὶ ὀριζοντίου ἐπιπέδου ἰσορροπεῖ, ὅταν ἡ κατακόρυφος, ἢ διερχομένη ἀπὸ τὸ κέντρον βάρους τοῦ σώματος, συναντᾷ τὴν βάσιν στηριζέως του.

## ΑΣΚΗΣΕΙΣ

### Σειρά 3: Δύναμις. Δυναμόμετρον.

#### 1. Ἡ ἔννοια τῆς δυνάμεως

1. Διὰ κλίμακος δυνάμεων 2 cm διὰ 1 Κρ νά παρασταθῇ γραφικῶς μὲ σημεῖον εφαρμογῆς τὸ Ο:
  - α) Ἐν βάρος 3 Κρ.
  - β) Μία ὀριζοντία δύναμις μὲ φοράν ἐξ ἀριστερῶν πρὸς τὰ δεξιὰ, ἐντάσεως 2,4 Κρ.
  - γ) Μία πλαγία δύναμις, μὲ φοράν ἐκ τῶν κάτω πρὸς τὰ ἄνω, σχηματίζουσα γωνίαν 60° μὲ τὴν προηγουμένην, ἐντάσεως 4 Κρ.
2. Δύο διανύσματα ἔχουν μῆκος ἀντιστοιχῶς 52 mm καὶ 75 mm. Ποίαν ἔντασιν ἔχουν αἱ δυνάμεις, τὰς ὁποίας παριστάνουν αὐτά, ἐὰν εἰς τὴν κλίμακα λάβωμεν 1 cm διὰ 100 p;
3. Νά παρασταθοῦν γραφικῶς διὰ κλίμακος 1 cm=1 Κρ δύο κάθετοι δυνάμεις ἐφηρμοσμένοι εἰς κοινὸν σημεῖον Ο μὲ ἀντιστοιχῶς ἐντάσεις 3,2 Κρ καὶ 4,8 Κρ.
4. Γνωστοῦ ὄντος ὅτι εἰς τὸ Παρίσι 1 Κρ ἰσοδυναμεῖ πρὸς 9,81 N, νά εὐρεθῇ μὲ πόσα Κρ ἰσοδυναμεῖ ἕκαστὸ 1 N.
5. Νά ὑπολογισθῇ εἰς N ἡ δύναμις, ἢ ὁποία συγ-

κρατεῖ ἓνα ἄνθρωπον εἰς τὴν ἐπιφάνειαν τῆς γῆς, ἐὰν αὐτὸς ζυγίσῃ εἰς τὸ Παρίσι 58 Κρ.

6. Ὄκαθι πιναξὶ δίδει τὴν τάξιν μεγέθους μερικῶν δυνάμεων:

Δύναμις Ἐλξεως ἀνθρώπου (μέση προσπάθεια) 20—30 Κρ.

Δύναμις Ἐλξεως ἵππου (μέση προσπάθεια) 60—70 Κρ.

Δύναμις Ἐλξεως ἀτμομηχανῆς σιδηροδρόμου: 25 Μρ.


Νά ἐκφρασθῇ ἡ ἔντασις αὐτῶν τῶν δυνάμεων εἰς Newtons (1 Κρ=9,81 N).

7. Τὸ ἐλατήριον ἐνὸς δυναμομέτρου ἐπιμηκύνεται κατὰ 2 cm διὰ τῆς ἐπιδράσεως δυνάμεως 5 Κρ. Ὑποθέτομεν ὅτι αἱ ἐπιμηκύνσεις εἶναι ἀνάλογοι πρὸς τὰς δυνάμεις, αἱ ὁποῖαι τὰς προκαλοῦν:

α) Νά ὑπολογισθῇ ἡ ἀπόστασις μεταξὺ δύο διαδοχικῶν ἐνδειξῶν τῆς κλίμακος τοῦ δυναμομέτρου, ἐὰν τοῦτο εἶναι βαθμολογημένον εἰς Κρ.

β) Δυνάμεθα νά διακρίνωμεν μετατόπισιν τοῦ δείκτη, ἴσην πρὸς τὸ 1/10 τῆς ὑποδιαίρεσεως. Ποῖον εἶναι εἰς Κρ τὸ φορτίον, τὸ ὁποῖον ἡμπορεῖ νά προκαλέσῃ αὐτὴν τὴν μετατόπισιν; (Τοῦτο εἶναι τὸ μέτρον τῆς εὐαισθησίας τοῦ δυναμομέτρου).





## II. Ίσορροπία τριών συντρεχουσών δυνάμεων (κοινόν σημείον Ο)

8. α) Νά σχεδιασθῇ ἡ συνισταμένη  $R$  δύο δυνάμεων  $F_1 = 20\text{ Kp}$  καὶ  $F_2 = 40\text{ Kp}$ , συντρεχουσῶν καὶ καθέτων μεταξύ των (Κλίμαξ:  $1\text{ cm} = 5\text{ Kp}$ ).

β) Νά προσδιορισθῇ ἡ μέτρησης τοῦ ἀντιστοίχου διανύσματος καὶ ἡ ἔντασις τῆς  $R$ .

γ) Νά μετρηθῇ ἡ γωνία, τὴν ὁποίαν σχηματίζει αὐτὴ μὲ κάθε μίαν ἐκ τῶν συνιστωσῶν.

9. Εἰς σημεῖον  $O$  ἐφαρμόζονται δύο δυνάμεις,  $F_1 = 12\text{ Kp}$  καὶ  $F_2 = 8\text{ Kp}$ , τῶν ὁποίων αἱ διευθύνσεις σχηματίζουν γωνίαν  $60^\circ$ :

α) Νά παρασταθοῦν γραφικῶς αἱ δύο δυνάμεις (Κλ.:  $1\text{ cm} = 2\text{ Kp}$ ).

β) Νά σχεδιασθῇ ἡ συνισταμένη τῶν  $R$  καὶ νὰ εὑρεθῇ ἡ δυνάμις  $F$ , ἡ ὁποία πρέπει νὰ ἐφαρμοσθῇ εἰς τὸ  $O$ , διὰ νὰ ἰσορροπήσῃ μὲ τὰς  $F_1$  καὶ  $F_2$ . (Ἡ ἔντασις τῆς  $\hat{u}$  εὑρεθῇ μὲ τὴν μέτρησην τοῦ διανύσματος.)

10. Εἰς τὰ ἄκρα νήματος, τὸ ὁποῖον διέρχεται ἀπὸ δύο τροχαλίας, ἀναρτῶμεν ἀνά ἓν βάρους  $1\text{ Kp}$  καὶ εἰς τὸ σημεῖον  $O$  μεταθῶν τὸν δύο τροχαλίας, ἔν βάρους  $P$ . Ἐχομεν δὲ ἰσορροπία, ὅταν ἡ γωνία, τὴν ὁποίαν σχηματίζει τὸ νῆμα εἰς τὸ σημεῖον  $O$ , εἶναι  $60^\circ$ :

α) Τί παριστᾷ ἡ διεύθυνσις τοῦ βάρους  $P$  διὰ τὴν γωνίαν, τὴν σχηματιζομένην ὑπὸ τῶν διευθύνσεων τῶν δυνάμεων  $F_1$  καὶ  $F_2$ , αἱ ὁποῖαι ἐφαρμόζονται εἰς τὸ σημεῖον  $O$ ;

β) Νά γίνῃ τὸ σχῆμα καὶ νὰ προσδιορισθῇ γραφικῶς τὸ μέτρον τῆς ἔντασεως τοῦ βάρους  $P$  (Κλ.:  $1\text{ cm} = 0,5\text{ Kp}$ ).

11. Εἰς τὸ ἄκρον  $B$  ἐνός νήματος, τὸ ὁποῖον εἶναι ἀνηρτημένον εἰς τὸ σημεῖον  $A$  τῆς ὀροφῆς, θέτομεν βάρους  $65\text{ Kp}$  καὶ ἀσκούμεν ἐπὶ πλέον μίαν ὀριζοντιαν ἔλξιν  $50\text{ Kp}$  (σχ. 1):

Νά προσδιορισθῇ γραφικῶς ἡ ἔλξις, ἡ ὁποία ἀσκεῖται εἰς τὸ νῆμα  $AB$ , (τάσις τοῦ νήματος  $AB$ ) (Κλ.:  $1\text{ mm} = 1\text{ Kp}$ ).

12. Δύο δοκοὶ συνδέονται, ὅπως δεῖκνύει τὸ σχ. 2, καὶ φέρουν φορτίον  $500\text{ Kp}$ . Νά προσδιορισθῇ γραφικῶς ἡ ἔντασις τῶν δυνάμεων, αἱ ὁποῖαι ἀσκούνται ὑπ' αὐτῶν ἐπὶ τοῦ ἐδάφους. (Κλ.  $1\text{ cm} = 100\text{ Kp}$ ).

13. Δύο σχοινία  $AB$  καὶ  $AG$  ἀναρτῶνται ἀπὸ τὴν ὀροφήν εἰς τὰ σημεῖα  $B$  καὶ  $G$  καὶ συγκρατοῦν εἰς τὸ  $A$  φορτίον  $70\text{ Kp}$  (σχ. 3).

Νά προσδιορισθῇ γραφικῶς ἡ ἔντασις τῶν δυνάμεων, αἱ ὁποῖαι ἀσκούνται πρὸς τὰς διευθύνσεις  $BA$  καὶ  $GA$  μὲ τιμὰς γωνίων τὰς ἀναγραφόμενας εἰς τὸ σχῆμα (Κλ.  $1\text{ cm} = 10\text{ Kp}$ ).

## III. Παράλληλοι δυνάμεις. Κέντρον Βάρους.

14. Δύο κατακόρυφοι δυνάμεις μὲ φοράν ἐκ τῶν

κάτω πρὸς τὰ ἄνω καὶ ἔντασεως  $20\text{ Kp}$  καὶ  $30\text{ Kp}$  ἐφαρμόζονται εἰς τὰ ἄκρα μίᾳς στερεᾶς ράβδου, μήκους  $1\text{ m}$ :

α) Νά ὑπολογισθῇ ἡ ἔντασις τῆς συνισταμένης τῶν καὶ νὰ προσδιορισθῇ τὸ σημεῖον ἐφαρμογῆς τῆς εἰς τὴν ράβδον.

β) Νά παρασταθοῦν γραφικῶς αἱ δυνάμεις αὐταὶ, καθὼς καὶ ἡ συνισταμένη τῶν  $R$  (Κλ.  $1\text{ cm} = 5\text{ Kp}$ ).

15. Δύο παιδία  $40\text{ Kp}$  καὶ  $60\text{ Kp}$  κάθονται εἰς τὰ ἄκρα μίᾳς σανίδος μήκους  $3\text{ m}$ , στηριζομένης εἰς ἓνα κορμὸν δένδρου, καὶ κáμινον τραμπάαν:

α) Εἰς ποῖαν ἀπόστασιν ἀπὸ τὸ ἐλαφρότερον παιδίον πρέπει νὰ εὑρίσκειται ὁ κορμὸς, διὰ νὰ ὑπάρχη ἰσορροπία;

β) Νά ὑπολογισθῇ ἡ δυνάμις, τὴν ὁποίαν δέχεται ὁ κορμὸς τοῦ δένδρου.

16. Ὁ ἄνθρωπος τῆς εἰκόνας 1 (σελίς 34) μεταφέρει δύο δοχεῖα ὕδατος, βάρους  $F_1 = 12\text{ Kp}$  καὶ  $F_2 = 18\text{ Kp}$ , διὰ μίᾳς ράβδου μήκους  $1,50\text{ m}$ :

α) Πόσον πρέπει νὰ ἀπέχη τὸ ἀριστερὸν ἄκρον τῆς ράβδου ἀπὸ τὸν ὦμον τοῦ ἀνθρώπου, διὰ νὰ ὑπάρχη ἰσορροπία;

β) Ποία δυνάμις ἀσκεῖται ἀπὸ τὴν ράβδον εἰς τὸν ὦμον του;

γ) Ποία δυνάμις ἀσκεῖται εἰς τὸ ἔδαφος, ἐάν ὁ ἄνθρωπος ζυγίζῃ  $72\text{ Kp}$ ;

17. Διὰ τὴν μεταφορὰν βάρους  $160\text{ Kp}$  δύο ἐργάται χρησιμοποιοῦν μεταλλικὴν ράβδον, μήκους  $2\text{ m}$ . Ἐάν τὸ βάρους ἀναρτᾷται εἰς ἀπόστασιν  $1,25\text{ m}$  ἀπὸ τὸν πρῶτον ἐργάτην, πόσον φορτίον ὑποβάττει εἰς ἕκαστος ἐργάτης;

18. Μία δοκὸς ἀμελητέου βάρους, στηριζομένη εἰς δύο τριγωνικὰ πρίσματα  $A$  καὶ  $B$  (σχ. 4), φέρει εἰς τὸ σημεῖον  $\Gamma$  βάρους  $240\text{ Kp}$ . Νά ὑπολογισθῇ τὸ φορτίον, τὸ ὁποῖον δέχεται κάθε ὑποστήριγμα ( $A$  καὶ  $B$ ).

19. Μεταλλικὴ πλάξ σχήματος ἰσοσκελοῦς τριγώνου μὲ πλευρὰς  $B\Gamma = 15\text{ cm}$ ,  $AB = A\Gamma = 18\text{ cm}$ , ζυγίζει  $800\text{ p}$  καὶ ἀναρτᾷται δι' ἐνός νήματος εἰς τὴν κορυφὴν  $A$ :

α) Νά σχεδιασθῇ ἡ πλάξ διὰ κλίμακος  $1/3$ .

β) Νά προσδιορισθῇ γεωμετρικῶς τὸ κέντρον βάρους τῆς.

γ) Νά παρασταθῇ τὸ βάρους τῆς δι' ἐνός διανύσματος καὶ νὰ καθορισθῇ ἡ ἀρχὴ του (Κλ.  $1\text{ cm} = 200\text{ p}$ ).

20. Εἰς ὀρθὸς ὁμογενὴς κύλινδρος, στηριζόμενος μὲ τὴν βάσιν του, διαμέτρου  $8\text{ cm}$ , ἀνατρέπεται, μόλις τὸ ἐπίπεδον στηρίξεως τοῦ σχηματῆται μετὰ τοῦ ὀριζοντιοῦ ἐπιπέδου γωνίαν μεγαλυτέραν τῶν  $30^\circ$ :

α) Νά σχεδιασθῇ τὸ σχῆμά του ὑπὸ κλίμακα  $1/2$  καὶ νὰ προσδιορισθῇ τὸ κέντρον βάρους τοῦ κυλίνδρου.

β) Νά ὑπολογισθῇ γραφικῶς ἐκ τοῦ σχήματος τὸ ὕψος τοῦ κυλίνδρου.

## ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΕΚΛΙΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

## 1 Αντίδρασις τοῦ ὑποστηρίγματος.

α) Τὸ μεταλλικὸν ἔλασμα, τὸ ὁποῖον ἔχομεν τοποθετῆσει εἰς τὰ ὑποστηρίγματα Α καὶ Β, καμπυλοῦται ὑπὸ τὴν ἐπίδρασιν τοῦ βάρους Ρ τοῦ σώματος (σχ. 1).

β) Ἐὰν ἀντικαταστήσωμεν τὸ σῶμα διὰ βαρύτερον, τὸ ἔλασμα καμπυλοῦται περισσότερον, ἐνῶ συγχρόνως ἀντιδρᾷ πρὸς τὸ βᾶρος Ρ τοῦ σώματος διὰ μιᾶς δυνάμεως ἀντιθέτου, ἡ ὁποία καλεῖται *ἀντίδρασις τοῦ ἐλάσματος*. Αὕτη γίνεται ἴση πρὸς τὸ βᾶρος Ρ εἰς τὴν τελικὴν θέσιν ἰσορροπίας.

● Ἐὰν ἀφαιρέσωμεν τὸ βᾶρος Ρ, τὸ ἔλασμα ἐπανέρχεται εἰς τὴν ἀρχικὴν του θέσιν. Ἡ παροδικὴ παραμόρφωσις, τὴν ὁποῖαν ὑφίσταται τὸ ἔλασμα διὰ τῆς ἐπίδρασεως τοῦ βάρους Ρ, καλεῖται *ἐλαστικὴ*.


● Ἡ παραμόρφωσις αὕτη δὲν γίνεται ἀντιληπτὴ διὰ γυμνοῦ ὀφθαλμοῦ, ὅταν τὸ σῶμα εἶναι τοποθετημένον ἐπάνω εἰς τραπέζιον, προκαλεῖ ὁμως μίαν δύναμιν ἀντιδράσεως, ἡ ὁποία, ὅπως καὶ εἰς τὴν προηγούμενην περίπτωσιν, ἰσορροπεῖ τὸ σῶμα.

## 2 Κεκλιμένον ἐπίπεδον.


Τὸ κεκλιμένον ἐπίπεδον εἶναι ἐπίπεδος πλάξ, τὴν ὁποῖαν κρατοῦμεν δι' ἑνὸς ὑποστηρίγματος κεκλιμένην. Ἐὰν μετατοπίσωμεν τὸ ὑποστήριγμα, ἢμποροῦμεν νὰ μεταβάλωμεν τὴν γωνίαν κλίσεως  $U$ , τὴν ὁποῖαν σχηματίζει ἡ πλάξ μὲ τὸ ὀριζόντιον ἐπίπεδον τοῦ τραπέζιου (σχ. 2). Ἡ σφαῖρα, τὴν ὁποῖαν ἀφίνομεν ἐλευθέραν ἐπὶ τοῦ κεκλιμένου ἐπιπέδου, ἀκολουθεῖ εὐθεῖαν τροχίαν  $AB$ , ἣτις καλεῖται *γραμμὴ τῆς μεγαλύτερας κλίσεως* καὶ εἶναι *κάθετος πρὸς ὅλας τὰς ὀριζοντίας εὐθείας τοῦ ἐπιπέδου  $AB$* .

*Πείραμα.* Διὰ νὰ κρατήσωμεν τὸν κύλινδρον εἰς ἰσορροπίαν ἐπὶ τοῦ κεκλιμένου ἐπιπέδου, χρησιμοποιοῦμεν σταθμὰ ἐπὶ τοῦ δίσκου (σχ. 3 Α).


Ἐὰν αὐξήσωμεν τὴν γωνίαν κλίσεως  $U$ , πρέπει νὰ αὐξήσωμεν καὶ τὰ σταθμὰ, καὶ ἀντιστρόφως,




Σχ. 1. Διὰ τῆς ἐπίδρασεως τοῦ βάρους Ρ τὸ ἔλασμα καμπυλοῦται καὶ ἐξασκεῖ τότε ἐπὶ τοῦ σώματος μίαν δυνάμιν ἀντιδράσεως  $F$ , ἡ ὁποία ἰσορροπεῖ τὸ Ρ. Ὄταν τὸ βᾶρος  $P' > P$ , τὸ ἔλασμα καμπυλοῦται περισσότερον καὶ ἡ δυνάμιν ἀντιδράσεως γίνεται  $F'$ . Καὶ εἰς τὰς δύο περιπτώσεις ἡ δυνάμιν ἀντιδράσεως καὶ τὸ βᾶρος εἶναι ἴσα κατ' ἀπόλυτον τιμὴν.



Σχ. 2. Κεκλιμένον ἐπίπεδον: Ἡ σφαῖρα ἐπὶ τοῦ κεκλιμένου ἐπιπέδου κυλᾷ κατὰ τὴν εὐθεῖαν  $AB$  (γραμμὴ τῆς μεγαλύτερας κλίσεως), ἡ ὁποία εἶναι *κάθετος* πρὸς τὴν ὀριζοντίαν εὐθεῖαν ( $XY$ ) ἐπὶ τοῦ ἐπιπέδου.  
 $U$  = γωνία κλίσεως.



Σχ. 3. Τὸ βᾶρος  $p$ , τὸ ὁποῖον ἀκίνητοποιεῖ τὸν κύλινδρον βάρους  $P$ , γίνεται μεγαλύτερον, ὅσον αὐξάνει ἡ γωνία κλίσεως  $U$ . Τὸ  $p$  εἶναι πάντοτε μικρότερον τοῦ  $P$ .



πάντοτε όμως το βάρος των θα είναι μικρότερο του βάρους του κυλίνδρου (σχ. 3 Β, Γ).

● 'Ο κύλινδρος κυλά κατά την γραμμή της μεγαλύτερας κλίσεως, εάν κόψωμεν το νήμα.

### 3 Δυνάμεις αί όποιαί ένεργούν επί του κυλίνδρου.

'Εάν δέν ύπῆρχε τό κεκλιμένον έπίπεδον, τό βάρος Ρ θα προεκάλεε κατακόρυφον πτώσιν του κυλίνδρου. 'Η πλαγία δύναμις  $\vec{O\Gamma}$  ίσορροπεί τόν κύλινδρον επί του κεκλιμένου έπιπέδου· είναι έπομένως ίση και αντίθετος πρὸς τὴν  $\vec{O\Delta}$  (σχ. 4).

● 'Εάν αφήσωμεν τόν κύλινδρον έλευθερον, θα κινηθῆ επί του κεκλιμένου έπιπέδου κατά τὴν γραμμὴν τῆς μεγαλύτερας κλίσεως. 'Η δύναμις, ἡ όποία κινεῖ τόν κύλινδρον, είναι ἡ  $\vec{O\Delta}$ , παράλληλος πρὸς τὴν γραμμὴν αὐτὴν και με φοράν πρὸς τὰ κάτω.

Δυνάμεθα νὰ θεωρήσωμεν τὴν  $\vec{O\Delta}$  ὡς συνιστώσαν του βάρους Ρ ἢ μάλλον τό βάρος Ρ συνιστάμενην τῆς  $\vec{O\Delta}$  και μιᾶς ἄλλης δυνάμεως.

### 4 Διὰ νὰ προσδιορίσωμεν αὐτὴν τὴν δύναμιν:

Σημειοῦμεν επί φύλλου χάρτου τό σχῆμα ΟΔΒ (ΟΔ = ρ, ΟΒ = Ρ) και κατασκευάζομεν τό παραλληλόγραμμον ΟΔΒΕ με διαγώνιον τὴν ΟΒ (σχ. 5).

● Παρατηροῦμεν ὅτι τό παραλληλόγραμμον αὐτό είναι ὀρθογώνιον.

Δυνάμεθα λοιπὸν νὰ θεωρήσωμεν τὴν δύναμιν ΟΒ, ἡ όποία ἔχει έντασιν Ρ, συνισταμένην τῶν δύο δυνάμεων ΟΕ και ΟΔ.

ΟΔ (έντασις ρ) παράλληλος πρὸς τὴν κλίσιν. ΟΕ κάθετος πρὸς τό κεκλιμένον έπίπεδον.


### 5 'Αντίδρασις του κεκλιμένου έπιπέδου.

● 'Όταν ὁ κύλινδρος τοποθετηθῆ επί του κεκλιμένου έπιπέδου, ἡμποροῦμεν νὰ δεχθῶμεν ὅτι ἐπιδρῶν επί αὐτου ἡ τό βάρος Ρ ἢ αἱ δύο συνιστώσαι ΟΔ και ΟΕ (ἡ συνισταμένη τῶν ΟΒ = Ρ).


● 'Η δύναμις ΟΔ ἀναγκάζει τόν κύλινδρον νὰ ὀλισθήσῃ.

● 'Η δύναμις ΟΕ, κάθετος πρὸς τό κεκλιμένον έπίπεδον, πιέζει τόν κύλινδρον επί του έπιπέδου και δημιουργεῖ τὴν ἴσην και αντίθετον δύναμιν ἀντιδράσεως ΟΕ', τὴν όποίαν ἀσκει τό έπίπεδον επί του κυλίνδρου.

'Αφοῦ ἡ ΟΕ ἐξουδετεροῦται ἀπὸ τὴν ΟΕ', επί του κυλίνδρου ἐπενεργεῖ μόνον ἡ δύναμις ΟΔ, ἡ όποία τὸν ἐξαναγκάζει νὰ κινηθῆ πρὸς τὰ κάτω.



Σχ. 4. 'Η δύναμις  $\vec{O\Gamma}$  ίσορροπεί τὴν δύναμιν  $\vec{O\Delta}$ .



Σχ. 5. Τό παραλληλόγραμμον ΟΔΒΕ είναι ἔν ὀρθογώνιον και ΟΒ ἡ διαγώνιος του.

Δυνάμεθα νὰ θεωρήσωμεν ΟΒ = Ρ συνισταμένην τῶν δυνάμεων  $\vec{O\Delta}$  και  $\vec{O\Gamma}$ .

'Η δύναμις  $\vec{O\Gamma}$  ίσορροπείται ἀπὸ τὴν δύναμιν  $\vec{O\Gamma'}$ , ἡ όποία είναι ἡ δύναμις ἀντιδράσεως του κεκλιμένου έπιπέδου.

## ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ

1. Κάθε σώμα, ὅταν ίσορροπῆ επί ενός ὑποστηρίγματος, δέχεται ἀπὸ αὐτό μίαν δύναμιν ἀντιδράσεως, ἴσην και ἀντίθετον πρὸς τό βάρος του.

2. Όταν ἀφήσωμεν μίαν σφαιράν ἐλευθέραν ἐπὶ ἐνὸς κεκλιμένου ἐπιπέδου, θὰ ὀλισθήσῃ κατὰ μῆκος μίαν εὐθείαν, ἢ ὅποια καλεῖται εὐθεῖα τῆς μεγαλυτέρας κλίσεως. Ἡ εὐθεῖα αὕτη εἶναι κάθετος πρὸς ὅλας τὰς ὀριζοντίας εὐθείας τοῦ ἐπιπέδου.

3. Τὸ βάρος τοῦ σώματος, τὸ ὅποιον εὐρίσκεται ἐπὶ κεκλιμένου ἐπιπέδου, δυνάμεθα νὰ τὸ θεωρήσωμεν ὡς συνισταμένην δύο δυνάμεων. Ἡ μία ἀπὸ τὰς δύο αὐτὰς δυνάμεις ἀναγκάζει τὸ σῶμα νὰ κινηθῇ κατὰ τὴν διεύθυνσιν τῆς μεγαλυτέρας κλίσεως, ἢ δὲ ἄλλη πιέζει τὸ σῶμα ἐπὶ τοῦ ἐπιπέδου καὶ εἶναι κάθετος πρὸς αὐτό.


4. Ἡ δευτέρα αὕτη δύναμις ἐξουδετεροῦται ὑπὸ τῆς ἴσης καὶ ἀντιθέτου δυνάμεως ἀντιδράσεως τοῦ κεκλιμένου ἐπιπέδου.

5. Ἐφαρμόζοντες τὸν κανὸνα τοῦ παραλληλογράμμου εὐρίσκομεν γραφικῶς τὸ μέγεθος τῶν δύο δυνάμεων.


15<sup>ON</sup> ΜΑΘΗΜΑ : Ροπή δυνάμεως ὡς πρὸς ἄξονα.

## ΜΟΧΛΟΙ


### 1 Τί εἶναι ὁ μοχλός.



Σχ. 1. Ὁ ἐργάτης ἀνυψώνει χωρίς κόπον τὸν ὀγκώλιον χάρις εἰς τὸν μοχλὸν AB μὲ ὑπομόχλιον τὸ O.



Σχ. 2. Ὁ ἠρῖθμημένος μοχλός ἰσορροπεῖ ὀριζοντίως χωρίς ἐξηρητημένα βάρη.



Σχ. 3. Ὁ ἠρῖθμημένος μοχλός ἰσορροπεῖ καὶ ὅταν φέρῃ ἐξηρητημένα βάρη ἴσα καὶ ἀπέχοντα ἐξ ἴσου ἀπὸ τὸν ἀξονα περιστρεφῆς.

● **Παρατήρησις :** Ὁ ἐργάτης, τὸν ὅποιον παρατηροῦμεν εἰς τὴν εἰκόνα (1), ὅταν πιέξῃ τὸ ἐν ἄκρον τῆς ράβδου, καταβάλλων μικρὰν προσπάθειαν, ἀνασηκῶναι μεγάλο βάρος. Τὸ ἄκρον αὐτὸ τῆς ράβδου μετατοπίζεται κατὰ μίαν ὠρισμένην ἀπόστασιν, τὸ δὲ ἄλλο κατὰ πολὺ μικροτέραν. Ἡ ράβδος αὕτη εἶναι μοχλός.

● **Πείραμα.** Ὁ κανὼν τοῦ σχ. 2 εἶναι καὶ αὐτὸς μοχλός, ὃ ὅποῖος δύναται νὰ περιστρεφῆται περὶ τὸν ἀξονα O. Ὁ μοχλός αὐτός ἰσορροπεῖ ὀριζοντίως, διότι ὁ ἀξὼν διέρχεται ἀπὸ τὸ μέσον του. Ἐάν ἀναρτήσωμεν ἴσα βάρη ἀπὸ τοὺς δύο βραχίονας καὶ εἰς ἴσας ἀποστάσεις ἀπὸ τὸν ἀξονα τοῦ μοχλοῦ, θὰ ἐξακολουθῇ οὗτος νὰ ἰσορροπῇ εἰς τὴν αὐτὴν θέσιν. Τὰ βάρη αὐτά, ὅπως γνωρίζομεν, εἶναι δυνάμεις παράλληλοι καὶ τῆς αὐτῆς φορᾶς (σχ. 3).

Ἐκ τοῦ πειράματος αὐτοῦ καταρτίζομεν τὸν κάτωθι πίνακα :

Βραχίων μοχλοῦ OA		Βραχίων μοχλοῦ OB	
Βάρος	*Αγκιστρον	Βάρος	*Αγκιστρον
200 p	6	200 p	6
150 p	3	150 p	3
250 p	5	250 p	5

Ἐκτελοῦμεν νέαν σειρὰν πειραμάτων καὶ ἔχομεν τὸν δεῦτερον πίνακα (σχ. 4).

Βραχίων μοχλοῦ OA		Βραχίων μοχλοῦ OB	
Βάρος	*Αγκιστρον	Βάρος	*Αγκιστρον
100 p	6	200 p	3
150 p	2	300 p	1
50 p	5	250 p	1
300 p	2	100 p	6

**Συμπέρασμα :** *Ο μοχλός AB ισορροπεί υπό την επενέργειαν δύο δυνάμεων παραλλήλων και της αὐτῆς φορᾶς, ὅταν τὰ γινόμενα τῶν δυνάμεων αὐτῶν ἐπὶ τοὺς ἀντιστοίχους βραχίονας εἶναι ἴσα.*

Τὸ γινόμενον τῆς ἐντάσεως τῆς δυνάμεως ἐπὶ τὴν ἀπόστασιν αὐτῆς ἀπὸ τὸν ἄξονα περιστροφῆς καλεῖται **ροπή** τῆς δυνάμεως ὡς πρὸς τὸν ἄξονα.

$$\text{διὰ τὴν } F_1 : M = F_1 \times OA$$

$$\text{διὰ τὴν } F_2 : M' = F_2 \times OB$$

Μοχλὸς περιστρεφόμενος περὶ τὸν ἄξονά του O ἰσορροπεῖ ὑπὸ τὴν ἐπίδρασιν δύο παραλλήλων δυνάμεων, ὅταν :

$$\left| \begin{array}{l} \text{Ροπή τῆς } F_1 \\ \text{ὡς πρὸς τὸν ἄξονα O} \end{array} \right| = \left| \begin{array}{l} \text{Ροπή τῆς } F_2 \\ \text{ὡς πρὸς τὸν ἄξονα O} \end{array} \right|$$

$$\text{Δηλ. } F_1 \times OA = F_2 \times OB$$

**Σημείωσις.** Τὰ προηγούμενα πειράματα ἐπραγματοποιήθησαν μετὰ τὴν βοήθειαν τοῦ ὀριζοντίου μοχλοῦ.

Ὅταν ὁμοῦ ὁ μοχλὸς εὐρίσκεται ὑπὸ κλίσιν, τότε αἱ ἀποστάσεις τοῦ ἄξονος O ἀπὸ τὰς διευθύνσεις τῶν δύο δυνάμεων εἶναι αἱ κάθετοι OH καὶ OK (σχ. 6).

— Ἡ ροπή τῆς  $F_1$  ὡς πρὸς τὸν ἄξονα O εἶναι :  $F_1 \times OH$ .

— Ἡ ροπή τῆς  $F_2$  ὡς πρὸς τὸν ἄξονα O εἶναι :  $F_2 \times OK$ .

Ἡ γενικὴ συνθήκη ἰσορροπίας εἶναι :  $F_1 \times OH = F_2 \times OK$ .

Ἀποδεικνύεται ἐπίσης ἐκ τῶν ὁμοίων τριγώνων ὅτι

$$F_1 \times OH = F_2 \times OK.$$


Εἰς ὅλας λοιπὸν τὰς περιπτώσεις ἔχομεν ἰσορροπίαν, ὅταν ὡς πρὸς τὸν ἄξονα O ἡ

$$\text{ροπή τῆς } F_1 = \text{ροπή τῆς } F_2.$$

**2** Τὰ βάρη, τὰ ὁποῖα ἀνηρτήσαμε ἀπὸ κάθε βραχίονα τοῦ μοχλοῦ, εἶναι δυνάμεις παράλληλοι καὶ, ὅπως γνωρίζομεν, ἡ συνισταμένη τῶν παραλλήλων δυνάμεων  $F_1$  καὶ  $F_2$ , ἐφηρμοσμένων εἰς τὰ σημεῖα A καὶ B, ἔχει σημεῖον ἐφαρμογῆς τὸ O, τοῦ ὁποῖου ἡ θέσις καθορίζεται ἀπὸ τὴν σχέσιν


$$F_1 \times OA = F_2 \times OB.$$

Δυνάμεθα νὰ ἐξακριβώσωμεν ὅτι, ὅταν αἱ ροπαὶ δύο παραλλήλων δυνάμεων ὡς πρὸς τὸν ἄξονα O ἐνὸς μοχλοῦ εἶναι ἴσαι, ἡ συνισταμένη αὐτῶν διέρχεται ἀπὸ τὸν ἄξονα περιστροφῆς (σχ. 7).




Σχ. 6. Ὁ μοχλὸς εὐρίσκεται ὑπὸ κλίσιν. Ἡ ἰσορροπία πραγματοποιεῖται ὅταν :

$$F_1 \times OH = F_2 \times OK$$




Σχ. 4. Ἡ ἰσορροπία πραγματοποιεῖται ὅταν :  $F_1 \times OA = F_2 \times OB$



Σχ. 5. Αἱ παράλληλοι δυνάμεις  $F_1$  καὶ  $F_2$  ἐπενεργοῦν ἐπὶ τῆς αὐτῆς πλευρᾶς ὡς πρὸς τὸ O. ἔχουν ὁμοῦ ἀντίθετον φορᾶν. Ὁ μοχλὸς εὐρίσκεται εἰς ὀριζοντίαν ἰσορροπίαν ὅταν :

$$F_1 \times OA = F_2 \times OB$$



Σχ. 7. Ὁ ἄξονα περιστροφῆς O εἶναι τὸ σημεῖον ἐφαρμογῆς τῆς συνισταμένης τῶν παραλλήλων δυνάμεων  $F_1$  καὶ  $F_2$ .

## ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ

1. 'Ο μοχλός είναι μία στερεά ράβδος, ή όποια δύναται νά περιστραφή πέ-ριξ ενός άξονος.

2. Ροπή  $M$  μιås δυνάμεως  $F$  ώς πρός τόν άξονα περιστροφής  $O$  είναι τó γινόμενον τής εντάσεως τής επί τήν άπόστασιν του σημείου  $O$  από τήν δύναμιν αυτήν.

$$M = F_1 \times OH$$

3. Μοχλός ίσορροπεί υπό τήν επίδρασιν δύο παραλλήλων δυνάμεων, όταν ή συνισταμένη αυτών διέρχεται από τόν άξονα περιστροφής.

16<sup>ON</sup> ΜΑΘΗΜΑ : Έργαλεία πολλαπλασιάζοντα τήν δύναμιν ή αύξάνοντα τήν μετατόπισιν.

## ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΜΟΧΛΟΙ

1 Μοχλός πρώτου είδους ή με τó υπομόχλιον ένδιαμέσως.

● 'Ο μοχλός, τόν όποίον χρησιμοποιεί ό εργάτης (σχ. 1), είναι μοχλός πρώτου είδους ή με τó υπομόχλιον ένδιαμέσως.

'Ο άξων αυτού του μοχλου εύρσκεται μεταξύ τής αντίστασεως του όγκολίθου  $R$  και τής δυνάμεως του εργάτου  $P$ .

'Εάν τó βάρος του όγκολίθου είναι 200 Κρ και εφαρμόσωμεν τά λεχθέντα προηγουμένως, τότε ή κινητήριος δύναμις, δια νά επιτύχωμεν ίσορροπίαν, προσδιορίζεται από τήν σχέσιν :  $200 \text{ Κρ} \times (OA) = \text{κινητήριος δύναμις} \times 10 (OA)$

κινητήριος δύναμις =  $200 \text{ Κρ} : 10 = 20 \text{ Κρ}$

καί, δια νά άνασηκώσωμεν τόν όγκολίθον, πρέπει ή κινητήριος δύναμις νά είναι όλίγον μεγαλύτερα από 20 Κρ.

'Εάν όμως ό εργάτης μετατοπίση τó σημείον  $B$ , π.χ. κατά 50 cm, ό όγκολίθος εις τó σημείον  $A$  θά άνασηκωθῆ κατά 5 cm.

'Εκείνο, τó όποίον ό εργάτης κερδίζει εις δύναμιν, τó χάνει εις άπόστασιν (χρυσούς κανών τής Μηχανικής).


Εις τó σχήμα 1 παρατηρούμεν ένα γωνιακόν μοχλόν. 'Η συνθήκη ίσορροπίας του είναι :  $R \times OH = P \times OK$ .

● 'Ο μοχλός του εργάτου είναι μοχλός πρώτου είδους με τó υπομόχλιον ένδιαμέσως και είναι πολλαπλασιαστής τής δυνάμεως και ύποπολλαπλασιαστής τής μετατοπίσεως.

● 'Η ένδεικτική βελόνη μερικών όργάνων, όπως π.χ. του αυτογραφικού θερμομέτρου (σχ. 2), είναι μοχλός με τó υπομόχλιον ένδιαμέσως, ό όποίος αύξάνει τός μικρός μετατοπίσεις. Εις τήν περίπτωσην αυτήν ή κινητήριος δύναμις εφαρμόζεται εις τόν μικρόν βραχίονα του μοχλου.


2 Μοχλός δεύτερου είδους ή με τήν αντίστασιν ένδιαμέσως.

'Η χειράμασα, τήν όποίαν παρατηρούμεν εις




Σχ. 1. Συνθήκη ίσορροπίας  
 $R \times OH = P \times OK$

'Ο μοχλός, ό όποίος έχει τó υπομόχλιον μεταξύ δυνάμεως και αντίστασεως (Αον είδος) είναι πολλαπλασιαστής τής δυνάμεως και ύποπολλαπλασιαστής τής μετατοπίσεως.



Σχ. 2. 'Ο δείκτης του αυτογραφικού θερμομέτρου είναι πολλαπλασιαστής τής μετατοπίσεως  $OA < OB$ .



Σχ. 3. Εις ποίαν θέσην πρέπει νά τοποθετήσωμεν τόν σάκκον, ώστε ή δύναμις, τήν όποίαν θά καταβάλωμεν, νά είναι έλαχίστη;

τὸ σχῆμα 3, εἶναι εἰς μοχλὸς δευτέρου εἴδους μετὴν ἀντίστασιν ἐνδιαμέσως καὶ βραχίονας τοὺς OA καὶ OB. Ἡ κινητήριος δύναμις ἐφαρμόζεται εἰς τὴν ἄκρην τοῦ μεγαλύτερου βραχίονος.

Ἐάν  $R = 45 \text{ Kp}$  καὶ  $OB = 1/3 \text{ OA}$ , τότε πρέπει εἰς τὸ σημεῖον A νὰ ἐφαρμοσθῆ μία δύναμις πρὸς τὰ ἄνω  $15 \text{ Kp}$ , διὰ νὰ ἰσορροπήσῃ τὸ φορτίον. Ἐνῶ ὅμως ἡ λαβὴ ἀνασηκώνεται κατὰ  $30 \text{ cm}$ , τὸ σημεῖον B ἀνασηκώνεται μόνον κατὰ  $10 \text{ cm}$  (σχ. 4).

Ἡ χειράμαξα εἶναι μοχλὸς δευτέρου εἴδους μετὴν ἀντίστασιν ἐνδιαμέσως, πολλαπλασιαστῆς τῆς δυνάμεως καὶ ὑποπολλαπλασιαστῆς τῆς μετατοπίσεως.

### 3 Μοχλὸς τρίτου εἴδους ἢ μετὴν δύναμιν ἐνδιαμέσως.


Τὸ πεντάλ τοῦ ἀκονιστηρίου (σχ. 5), τὸ ὁποῖον στηρίζεται εἰς τὸν ἄξονα O, κινεῖται μετὴν βοήθειαν τοῦ ποδὸς τοῦ ἀνθρώπου διὰ μιᾶς κινητηρίου δυνάμεως P, ἡ ὁποία διευθύνεται πρὸς τὰ κάτω καὶ ἐφαρμόζεται εἰς τὸ σημεῖον A. Εἰς τὸ σημεῖον B ἄρθρωται ὁ διωστήρ, μετὴν βοήθειαν τοῦ ὁποίου περιστρέφεται ὁ τροχὸς, ἀντιτάσσων εἰς τὸ σημεῖον τοῦτο μίαν ἀντίστασιν R.

Τὸ πεντάλ τοῦ ἀκονιστηρίου εἶναι εἰς μοχλὸς τρίτου εἴδους, μετὴν κινητήριον δύναμιν ἐνδιαμέσως.

Βραχίονες τοῦ μοχλοῦ εἶναι καὶ ἐδῶ οἱ OA καὶ OB. Ἡ κινητήριος δύναμις ἐφαρμόζεται εἰς τὸ ἄκρον τοῦ μικροτέρου βραχίονος.


Ἐάν  $OA = 1/2 \text{ OB}$ , ὁ ἀκονιστὴς πρέπει νὰ ἐφαρμόσῃ εἰς τὸ σημεῖον A κινητήριον δύναμιν διπλασίαν τῆς ἀντιστάσεως, τὴν ὁποίαν προβάλλει ὁ τροχὸς. Ἐάν ὅμως μετατοπίσῃ τὸν πόδα του κατακόρυφως κατὰ  $10 \text{ cm}$ , ἡ ἄρθρωσις B τοῦ διωστήρος μετατοπίζεται κατὰ  $20 \text{ cm}$ .

Τὸ πεντάλ τοῦ ἀκονιστηρίου εἶναι μοχλὸς τρίτου εἴδους, μετὴν κινητήριον δύναμιν ἐνδιαμέσως, ὑποπολλαπλασιαστῆς τῆς δυνάμεως καὶ πολλαπλασιαστῆς τῆς κινήσεως.




$$\text{Συνθήκη ἰσορροπίας} \\ R \times OH = P \times OK$$

Σχ. 4. Ὁ μοχλὸς μετὴν ἀντίστασιν ἐνδιαμέσως εἶναι πολλαπλασιαστῆς τῆς δυνάμεως καὶ ὑποπολλαπλασιαστῆς τῆς μετατοπίσεως.




Σχ. 5. Τὸ πεντάλ (pedal) τοῦ ἀκονιστηρίου εἶναι μοχλὸς μετὴν κινήσιν ἐνδιαμέσως (Γ' εἶδος)· πολλαπλασιαστῆς τῆς μετατοπίσεως.




Σχ. 6. Ἡ τανάλια. Ποιοῦ εἴδους μοχλὸς εἶναι;

α) Ὁ καρποθραύστης



β) Ἡ λαβὴς



45

γ) Ὁ σκελετὸς τοῦ βραχίονος

Σχ. 7. Εἰς ποῖον εἶδος μοχλῶν ἀνήκουν:

- α) Ὁ καρποθραύστης
- β) Ἡ λαβὴς
- γ) Ὁ σκελετὸς τοῦ βραχίονος

1. Ο μοχλός του έργατου είναι μοχλός πρώτου είδους ή με το ύπομόχλιον ενδιαμέσως και είναι πολλαπλασιαστής της δυνάμεως και ύποπολλαπλασιαστής της μετατοπίσεως.

Ο δείκτης του αυτογραφικού θερμομέτρου είναι επίσης μοχλός με το ύπομόχλιον ενδιαμέσως, αλλά είναι πολλαπλασιαστής της μετατοπίσεως.

2. Η χειράμαξα είναι μοχλός με την αντίστασιν ενδιαμέσως ή δευτέρου είδους. Το σημείον εφαρμογής αντιστάσεως εύρισκεται μεταξύ του σημείου εφαρμογής της κινητηρίου δυνάμεως και του ύπομοχλίου. Ο μοχλός δευτέρου είδους είναι πολλαπλασιαστής της δυνάμεως.

3. Το πεντάλ του άκονιστηρίου είναι μοχλός με την κινητηρίου δυνάμιν ενδιαμέσως ή τρίτου είδους. Το σημείον εφαρμογής της κινητηρίου δυνάμεως εύρισκεται μεταξύ του σημείου εφαρμογής της αντιστάσεως και του ύπομοχλίου.

Ο μοχλός τρίτου είδους είναι πολλαπλασιαστής της κινήσεως.

Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ

**Σειρά 4: Κεκλιμένον επίπεδον - Μοχλοί.**

**I. Κεκλιμένον επίπεδον**

1. Έν μικρόν όχημα βάρους 1 Κρ εύρισκεται επί κεκλιμένου επιπέδου (σχ. 1) και ίσορροπει διά τινος βάρους P, διά μέσου νήματος:

α) Νά σχεδιασθούν αι δυνάμεις, αι όποιαί εφαρμόζονται εις τό όχημα.

β) Νά προσδιορισθί γραφικώς ή έντασις του βάρους P (Κλ. 1 cm=200 p).

2. Το αυτό πρόβλημα, όταν ή γωνία κλίσεως είναι 15°, 45°.

3. Η ύπομετρική διαφορά μεταξύ δύο σταθμών Β και Γ του όδοντωτου σιδηροδρόμου, οι όποιοι απέχουν 520 m, είναι 160 m (σχ. 2):

α) Νά σχεδιασθί ή πλαγία όψις της όδοντωτής τροχιάς (Κλ. 1 cm διά 50 m).

β) Έάν ή μεγίστη έλκτική δύναμις της άτμομηχανής (παράλληλος προς την τροχίαν) είναι 2800 Κρ, νά προσδιορισθί γραφικώς τό όλικόν βάρος P του βαγονίου, τό όποιον δύναται νά μετακινήσθ ή μηχανή προς τά άνω.

**II. Μοχλοί**

4. Άναρτήμεν εις τό έν άκρον μιās ράβδου, μήκους 60 m και περιστρεφομένης περίζ ένός όριζοντίου άξονος εις τό μέσον της, βάρος 100 p:

α) Πόσον βάρος πρέπει νά τοποθετήσωμεν εις απόστασιν 8 cm από τό άλλο μέρος του άξονος, διά νά διατηρηθί ή ράβδος όριζοντία;

β) Η αυτή έρώτησις δι' απόστασιν 20 cm από τον άξονα.

γ) Εις ποίαν απόστασιν από τον άξονα πρέπει νά τοποθετήσωμεν βάρος 200 p, διά νά είναι πάλιν όριζοντία ή ράβδος;

5. Μοχλός AB με άξονα όριζόντιον O, εύρισκόμενον εις απόστασιν 12 cm από τό A, ίσορροπει:



α) Έάν αναρτήσωμεν βάρος 3 Κρ εις τό A, πόσον πρέπει νά αναρτήσωμεν εις απόστασιν 18 cm, από τό O και προς τό μέρος του Β, διά νά τό ίσορροπήσωμεν;

β) Πόσον βάρος πρέπει νά αναρτήσωμεν εις τό A, διά νά ίσορροπήσωμεν δύο βάρη μαζί 1 Κρ και 500 p, τοποθετημένα αντίστοιχως εις απόστάσεις 15 cm και 20 cm από τό O και προς τό μέρος του Β;

6. Εις μοχλός με άξονα τό O ίσορροπει εις όριζοντίαν θέσιν υπό την επίδρασιν βάρους P=240 p και ένός έλατηρίου R (σχ. 3) βαθμολογημένου, τό όποιον έπιμηκύνεται κατά 7,5 cm διά φορτίον 100 p. Ποιαί αι έπιμηκύνσεις του έλατηρίου, όταν:

- α) OA=20 cm                      OB=12 cm;
- β) OA=12 cm                      OB=20 cm;

7. Ποϋ πρέπει νά τοποθετηθί τό ύπομόχλιον ένός μοχλού, ό όποιος έχει μήκος 1,25 m, διά νά άναστηκώσθ εις έργατης με δύναμιν 60 Κρ μιαν μηχανήν





βάρους 450 Κρ (έναν εις τὸ ἓν ἄκρον τοῦ μοχλοῦ εὐρίσκειται ἡ μηχανὴ καὶ εις τὸ ἄλλο ἄκρον ἐφαρμόζεται ἡ δύναμις τοῦ ἐργάτου);

8. Τὸ σχῆμα 4 δεικνύει μιαν βαλβίδα ἀσφαλείας;


α) Εἰς ποῖον εἶδος μοχλοῦ ἀνήκει ἡ διάταξις τῆς;

β) Ἡ βαλβίδα πρέπει νὰ ἀνοίξη, ὅταν ἡ δύναμις, ἡ ὁποία προέρχεται ἀπὸ τὴν πίεσιν τοῦ ἀτμοῦ, φθάσῃ εις τὰ 100 Κρ; Πόσον βᾶρος πρέπει νὰ ἔχη τὸ ἀντίβαρον, τὸ ὁποῖον θὰ χρησιμοποιήσωμεν, διὰ νὰ λειτουργῇ κανονικῶς ἡ βαλβίς;


9. Τὸ σχῆμα 5 δεικνύει πεντάλ φρένου αὐτοκινήτου;

α) Εἰς ποῖον εἶδος μοχλοῦ ἀνήκει ἡ διάταξις τοῦ;


β) Πόση δύναμις μεταδίδεται εις τὸ φρένον, ὅταν ὁ ὀδηγὸς τοῦ αὐτοκινήτου πιέξῃ τὸ «πεντάλ» διὰ δυνάμεως 20 Κρ;




Σχ. 3.



Σχ. 4.




Σχ. 5.




**Καθέλκυσις πλοίου εις τὰ Ἑλληνικά Ναυπηγεῖα Σκαρμαγαγκᾶ.**

Τὸ πλοῖον κατασκευάζεται ἐπὶ ἐνὸς ἐπιπέδου, τὸ ὁποῖον ἔχει κλίσιν περίπου  $3^{\circ}$  ὡς πρὸς τὸ ὀριζόντιον ἐπίπεδον μὲ κατεύθυνσιν πρὸς τὴν θάλασσαν. Τὸ ἐπίπεδον αὐτὸ δύναται νὰ ὀλισθήσῃ ἐπὶ μιᾶς «ὁδοῦ ὀλισθήσεως» μὲ ταχύτητα περίπου 30 km/h. Ὅταν τὸ πλοῖον ἔλθῃ εἰς ἐπαφὴν μὲ τὴν θάλασσαν, ἡ κίνησίς του ἐπιβραδύνεται τῇ βοήθειᾳ σχοινίων, προσδεδεμένων εἰς ἀλύσσους μεγάλου βάρους.


## ΖΥΓΟΣ ΜΕ ΙΣΟΥΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ





Σχ. 1. Ζυγός με δίσκους



Σχ. 2. Περιοχή τοῦ κεντρικοῦ πρίσματος



Σχ. 3. Τό κέντρο βάρους τῶν δίσκων καί τοῦ φορτίου εὐρίσκεται εἰς τήν κατακόρυφον, τήν διερχομένην ἐκ τοῦ ἀξονος ἀναρτήσεως.



Ἄρθρώσεις τοῦ ἀντιβραχίου.

Σχ. 4. Ζυγός τοῦ Roberval. Ο καί Ο' εἶναι τὰ σταθερά σημεῖα.

## 1 Περιγραφή.

● Ὁ ζυγός με ἴσους βραχίονας (σχ. 1) ἀποτελεῖται ἐξ ἑνός μοχλοῦ, τῆς φάλαγγος MN, τῆς ὁποίας ὁ ἄξων εἶναι ἡ ἀκμή (κόψις) ἐνός τριγωνικοῦ πρίσματος, εὐρισκόμενος εἰς τὸ μέσον τῆς. Ἡ ἀκμή αὕτη ἐφάπτεται σκληρᾶς χαλύβδινης ἐπιφανείας (σχ. 2).

● Εἰς κάθε ἄκρον τῆς φάλαγγος M καί N εἶναι προσηρμοσμένον μικρὸν τριγωνικὸν πρίσμα χαλύβδινον, ἀπὸ τὸ ὁποῖον ἀναρτῶνται οἱ δίσκοι.

● Εἰς τὸ μέσον τῆς φάλαγγος καὶ καθέτως πρὸς αὐτὴν εὐρίσκεται ὁ δείκτης (βελόνη), διὰ νὰ παρατηροῦμεν καλύτερον τὰς ταλαντώσεις.

● Ὄταν ἡ φάλαγξ εἶναι ὀριζοντία, ὁ δείκτης εὐρίσκεται εἰς τὸ O τῆς κλίμακος, ἡ ὁποία εἶναι προσηρμοσμένη εἰς τὸ κατακόρυφον ὑποστήριγμα τοῦ ζυγοῦ.

● Ἐὰν παρατηρήσωμεν τὰς ἀκμὰς τῶν τριῶν τριγωνικῶν πρισμάτων τῆς φάλαγγος, βλέπομεν ὅτι εἶναι παράλληλοι, εὐρίσκονται εἰς ἓν κοινὸν ἐπίπεδον καὶ ὅτι αἱ ἀκροαὶ ἀπέχουν ἐξ ἴσου ἀπὸ τὴν κεντρικὴν.

● Ἐκαστος δίσκος, λόγῳ τοῦ τρόπου ἀναρτήσεώς του, λαμβάνει πάντοτε τοιαύτην θέσιν, ὥστε τὸ κέντρον βάρους αὐτοῦ καὶ τοῦ φορτίου του νὰ εὐρίσκται ἐπὶ τῆς κατακόρυφου, τῆς διερχομένης ἀπὸ τὸν ἄξωνα ἀναρτήσεώς του (σχ. 3).

## 2 Ἀρχὴ τοῦ ζυγοῦ με ἴσους βραχίονας.

Ἡ φάλαγξ τοῦ ζυγοῦ εἶναι μοχλὸς πρώτου εἶδους. Ὄταν οἱ δίσκοι εἶναι κενοί, ἡ φάλαγξ ἰσορροπεῖ ὀριζοντίως. Ὁ δείκτης εἶναι εἰς τὴν ἐνδειξιν O τῆς κλίμακος.

● Τοποθετοῦμεν ἓν ἀντικείμενον A εἰς τὸν ἀριστερὸν δίσκον, ὁπότε ἡ ἰσορροπία ἀνατρέπεται καὶ ἡ φάλαγξ κλίνει.

● Ἐὰν τώρα τοποθετήσωμεν σταθμὰ εἰς τὸν ἄλλον δίσκον, ἡ ἰσορροπία ἀποκαθίσταται, ὅταν :

ροπή τοῦ βάρους P' ὡς πρὸς τὸ σημεῖον O = ροπή τοῦ βάρους P ὡς πρὸς τὸ O.

ὅπου P = βάρους σώματος καὶ P' = βάρους σταθμῶν ἢ  $OM \times P = ON \times P'$ .

Ἄλλὰ τὸ O εἶναι τὸ μέσον τοῦ MN, δηλ.  $OM = ON$  καὶ ἐπομένως  $P = P'$ .

**Συμπέρασμα:** Ἡ φάλαγξ τοῦ ζυγοῦ εὐρίσκεται ἐν ἰσορροπίᾳ, ὅταν οἱ δίσκοι φορτίζονται με ἴσα βάρη.

### 3 Ζυγός του Roberval.

Οι δίσκοι του ζυγού Roberval εφίσκονται επί της φάλαγγος και παραμένουν πάντοτε οριζόντιοι, οιαδήποτε και εάν είναι η θέση αυτής. Τοῦτο ἐπιτυγχάνεται χάρις εἰς τὸ ἀρθρωτὸν *παράλληλογράμμον*  $ABB'A'$  (σχ. 5).

Ἡ φάλαγξ  $AB$  καὶ ἡ ἀντιφάλαγξ  $A'B'$  κινουῦνται περίε δύο σταθερῶν σημείων  $O$  καὶ  $O'$ , εὑρισκομένων εἰς τὸ μέσον των. Ἐκ τῆς γεωμετρίας γνωρίζομεν ὅτι αἱ δύο ἀπέναντι πλευραὶ ἐνὸς παραλληλογράμμου εἶναι παράλληλοι πρὸς τὴν διάμεσον τῶν δύο ἄλλων. Αἱ  $AA'$  καὶ  $BB'$  λοιπὸν εἶναι παράλληλοι πρὸς τὴν κατακόρυφον διάμεσον  $OO'$ .


Ὁ ζυγός Roberval καὶ ὁ ζυγός ἴσων βραχίωνων διατηροῦν τὴν ἰσορροπίαν των καὶ ὅταν ἀντιμεταθέσωμεν τὰ φορτία τῶν δύο δίσκων.



Σχ. 5. Οἱ δίσκοι παραμένουν πάντοτε οριζόντιοι.  $OO'$  εἶναι σταθερὰ κατακόρυφος,  $AA'$  καὶ  $BB'$  παραμένουν πάντοτε παράλληλα πρὸς τὸ  $OO'$ .




Σχ. 6. Σχῆμα ζυγοῦ ἐν ἰσορροπίᾳ



Σχ. 7. Σταθμὰ ἐκ χυτοσιδήρου

Σταθμὰ ἐξ ὀρειχαλκού

Σταθμὰ εἰς σχῆμα ἐλασματος



Σχ. 8. Πλήρης σειρά σταθμῶν τῶν 2 kg (σύνολον).


### 4 Χρήσεις τοῦ ζυγοῦ.

Ὁ ζυγός ἔχει κατασκευασθῆ, διὰ νὰ ζυγίσῃ φορτία μέχρις ὠρισμένου βάρους, τὸ ὁποῖον δὲν δυνάμεθα νὰ ὑπερβῶμεν χωρὶς κίνδυνον νὰ τὸν καταστρέψωμεν.


Διὰ τὴν ζύγισιν χρησιμοποιοῦμεν σειρὰς προτύπων βαρῶν (σταθμῶν), τὰ ὁποῖα κατασκευάζονται ἐκ χυτοσιδήρου (50 p ἕως 50 Kp), ἐξ ὀρειχαλκού (1 p ἕως 10 Kp) καὶ ἐκ μεταλλικῶν φύλλων (0,01 p ἕως 0,5 p). Σχ. 7.

Διὰ τῆς σειρᾶς σταθμῶν τοῦ σχήματος 8 δυνάμεθα νὰ ἐκτελέσωμεν ὅλας τὰς ζυγίσεις μὲ ἀκέραιον ἀριθμὸν γραμμαρίων, ἀπὸ 1 p ἕως 2000 p.

Ἡ ζύγισις γίνεται ὡς ἑξῆς : Βεβαιούμεθα πρῶτον ὅτι μὲ κενούς δίσκους ὁ δείκτης παραμένει κατακόρυφος, δεικνύων τὸ 0 τῆς κλίμακος. Τοποθετοῦμεν εἰς τὸν ἕνα δίσκον τὸ σῶμα, τὸ ὁποῖον θέλομεν νὰ ζυγίσωμεν, καὶ ἰσορροποῦμεν τὸν ζυγὸν μὲ τὸν δείκτην εἰς τὸ 0, θέτοντες σταθμὰ εἰς τὸν ἄλλον δίσκον. Τὸ ἀθροῖσμα τῶν σταθμῶν μᾶς δίδει τὸ βάρος τοῦ σώματος.



Σχ. 9 Προσδιορισμὸς τῆς χωρητικότητος 500 200 50 μιάς φιάλης. Βάρος ὕδατος : 750 p Χωρητικότης φιάλης : 750 cm<sup>3</sup>



Σχ. 10. Βαθμολογία φιάλης ἀνά 10 cm<sup>3</sup>.

## ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ

1. Ζυγός ἔχων ἴσους βραχίονας ἀποτελεῖται ἀπὸ τὴν φάλαγγα, τῆς ὁποίας ὁ ἄξων εὐρίσκεται εἰς τὸ μέσον αὐτῆς, καὶ ἀπὸ δύο δίσκους ἀνηρτημένους εἰς τὰ δύο ἄκρα αὐτῆς. Εἶναι μοχλὸς πρώτου εἴδους.



2. Ὄταν οἱ δίσκοι εἶναι κενοὶ ἢ φέρουν ἴσα βάρη, ἡ φάλαγγις ἰσορροπεῖ εἰς ὀριζοντίαν θέσιν.

3. Οἱ δίσκοι εἰς τὸν ζυγὸν Roberval εὐρίσκονται ἄνωθεν τῆς φάλαγγος καὶ διατηροῦνται ὀριζόντιοι λόγῳ τοῦ ἀρθροῦ τοῦ παραλληλογράμμου, τοῦ σχηματιζομένου ἐκ τῆς φάλαγγος καὶ τῆς ἀντιφάλαγγος.


4. Διὰ τὰ ἐκετελέσωμεν μίαν ζυγίσιν, χρησιμοποιοῦμεν τὰ σταθμὰ. Ταῦτα εἶναι κατασκευασμένα ἐκ χυτοσιδήρου (50ρ - 50κρ), ἐξ ὀρειχάλκου (1ρ - 10κρ) ἢ ἐκ μεταλλικῶν φύλλων (0,01ρ-05ρ).

## 180<sup>Ο</sup>Ν ΜΑΘΗΜΑ :

### ΖΥΓΟΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΙ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΙΣΟΙ ἢ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ



Σχ. 1. Δεκαπλασιαστικὸς ζυγός. Βάρος 500 ρ, τοποθετημένον εἰς τὸν δίσκον Α, ἰσορροπεῖ βάρος 50 ρ, τοποθετημένον εἰς τὸν δίσκον Β.



Σχ. 2. Ἀρχὴ τοῦ δεκαπλασιαστικοῦ ζυγοῦ (πλάστιγγις). Διὰ τῆς πλάστιγγος ζυγίζομεν μεγάλα βάρη διὰ μικρῶν σταθμῶν.

#### 1 Κατασκευὴ δεκαπλασιαστικοῦ ζυγοῦ.

● Λαμβάνομεν ἓνα κανόνα AB, τὸν ὅποιον χωρίζομεν εἰς ἴσα τμήματα. Εἰς τὸ σημεῖον O εὐρίσκεται ὁ ἄξων τοῦ κανόνος καὶ εἶναι  $OB = 10 OA$ .

● Εἰς τὰ σημεῖα A καὶ B ἀναρτῶμεν ἀνὰ ἓνα δίσκον καὶ τοποθετοῦμεν εἰς τὸν δίσκον A ἓν ἀντίβαρον οὕτως, ὥστε ἡ φάλαγγις νὰ ἰσορροπεῖ ὀριζοντίως.

● Τοποθετοῦμεν διαδοχικῶς εἰς τὸν δίσκον A βάρη 100 ρ, 200 ρ κλπ. καὶ ἰσορροποῦμεν τὴν φάλαγγα εἰς τὴν ὀριζοντίαν θέσιν διὰ σταθμῶν εἰς τὸν δίσκον Β. Παρατηροῦμεν :

Βάρος εἰς τὸ A : 100 ρ 200 ρ 300 ρ 400 ρ  
Βάρος εἰς τὸ B : 10 ρ 20 ρ 30 ρ 40 ρ

**Συμπέρασμα :** Τὸ βάρος, τὸ ὅποιον ὑπάρχει εἰς τὸν δίσκον B, εἶναι τὸ ἓν δέκατον τοῦ βάρους εἰς τὸν δίσκον A, καὶ ὁ ζυγὸς ἰσορροπεῖ.

Ἐξήγησις : Τὰ βάρη τῶν δίσκων A καὶ B εἶναι δυνάμεις παράλληλοι καὶ τῆς αὐτῆς φορᾶς, αἱ ὁποῖαι ἐφαρμόζονται ἀντιστοίχως εἰς τὰ δύο ἄκρα τοῦ μοχλοῦ. Ὑπολογίζοντες τὴν ροπὴν ἐκάστου βάρους ὡς πρὸς τὸν ἄξονα περιστροφῆς O, εὐρίσκομεν ὅτι :

1η περίπτωση	$100 \times OA = 100 OA$	$10 \times OB = 10 \times 10 OA = 100 OA$
2α περίπτωση	$200 \times OA = 200 OA$	$20 \times OB = 20 \times 10 OA = 200 OA$
3η περίπτωση	$300 \times OA = 300 OA$	$30 \times OB = 30 \times 10 OA = 300 OA$
4η περίπτωση	$400 \times OA = 400 OA$	$40 \times OB = 40 \times 10 OA = 400 OA$

Εἰς κάθε περίπτωσιν ἡ φάλαγξ ἰσορροπεῖ, ἐπειδὴ αἱ ροπαὶ τῶν βαρῶν, τῶν ἐφαρμοζομένων εἰς τὸ Α καὶ Β, ὡς πρὸς τὸν ἄξονα Ο εἶναι ἴσαι.

Ὁ δεκαπλασιαστικὸς ζυγός, ὁ χρησιμοποιούμενος διὰ τὴν ζύγισιν μεγάλων φορτίων (σάκκοι ἀλεύρου, σακχάρους κλπ.) λειτουργεῖ βάσει τῆς αὐτῆς ἀρχῆς καὶ δυνάμεθα νὰ ζυγίσωμεν μεγάλα φορτία (ἕως 200 Κρ) διὰ μικροτέρων σταθμῶν (20 Κρ) (σχ. 2).

## 2 Ζυγὸς διὰ μεταβλητοῦ βραχίονος.

Ὁ Ρωμαϊκὸς ζυγὸς ἀποτελεῖται ἀπὸ μίαν φάλαγγα περιστρεφομένην περὶ ὀριζόντιου ἄξονα (σχ. 3) καὶ διηρημένην εἰς δύο ἀνίσους βραχίονας, ΟΑ καὶ ΟΓ. Ἐπὶ τοῦ μικροτέρου βραχίονος ΟΑ ὑπάρχει ἐν ἄγκιστρον διὰ τὴν ἀνάρτησιν τῶν φορτίων.

Κατὰ μῆκος τοῦ μεγαλύτερου βραχίονος ΟΓ ὀλισθαίνει ἀντίβαρον σταθεροῦ βάρους. Ὁ βραχίον οὗτος φέρει κατὰ μῆκός του καὶ εἰς ἴσας ἀποστάσεις βαθμολογημένας ἔσοχάς διὰ τὴν συγκράτησιν τοῦ ἀντιβάρου.

● Ὃταν τὸ ἄγκιστρον Α δὲν φέρῃ φορτίον, ἡ φάλαγξ ἰσορροπεῖ ὀριζώντιως διὰ τοῦ ἀντιβάρου εἰς τὴν πρώτην ἔσοχὴν καὶ εἰς τὴν θέσιν Ο (σχ. 3 Α).

● Ἀναρτῶμεν εἰς τὸ ἄγκιστρον ἐν φορτίον, ὅποτε, διὰ νὰ ἐπαναφέρωμεν τὴν ἰσορροπίαν, πρέπει νὰ μετατοπίσωμεν τὸ ἀντίβαρον, π.χ. εἰς τὴν θέσιν 3,5 (σχ. 3 Β). Ἡ συσκευή αὕτη εἶναι μοχλὸς πρώτου εἴδους καὶ συνεπῶς, ὅταν ἰσορροπῆ ὀριζώντιως ὑπὸ τὴν ἐπίδρασιν φορτίου Ρ καὶ ἀντιβάρου ρ, ἰσχύει ἡ σχέσις :

ροπή Ρ ὡς πρὸς Ο = ροπή ρ ὡς πρὸς Ο

$$P \times OA = \rho \times OB$$

Ἐάν λοιπὸν τὸ ἀντίβαρον ἔχῃ βάρους 1 Κρ, ΟΑ = 6 cm καὶ ΟΒ = 21 cm, θὰ ἔχωμεν :

$$\rho = \frac{P \times OA}{OB} = \frac{1 \text{ Κρ} \cdot 21 \text{ cm}}{6 \text{ cm}} = 3,5 \text{ Κρ.}$$

Εἰς τὴν πραγματικότητα δὲν ἀπαιτεῖται κανεὶς ὑπολογισμὸς, διότι ἡ φάλαγξ εἶναι βαθμολογημένη καὶ μᾶς δίδει ἀπ' εὐθείας τὴν τιμὴν τοῦ βάρους Ρ διὰ τὰς διαφόρους θέσεις τοῦ ἀντιβάρου.

**Σημείωσις.** Ὁ ρωμαϊκὸς ζυγὸς εἶναι ζυγός, ὁ ὁποῖος ἔχει μεταβλητὸν τὸν ἓνα βραχίονά του.


## 3 Ζυγοὶ οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἀνίσους καὶ τοὺς δύο βραχίονας.

**Ζυγὸς τῶν ἐπιστολῶν** (σχ. 4).

Ὁ δίσκος παραμένει ὀριζόντιος λόγῳ τοῦ ἀρθρωτοῦ παραλληλογράμμου ΑΒΓΟ. Ἡ συσκευή ἰσορροπεῖ, ὅταν αἱ ροπαὶ τοῦ βάρους Χ καὶ τοῦ ἀντιβάρου Ρ ὡς πρὸς ἄξονα Ο εἶναι ἴσαι :


$$X \times ON = P \times OM,$$

ὅπου ΟΝ καὶ ΟΜ εἶναι αἱ ἀποστάσεις τοῦ Ο ἀπὸ τὰς διευθύνσεις τῶν δυνάμεων Χ καὶ Ρ.




Ρωμαϊκὸς ζυγός

Σχ. 3 Α : Ἐάν εἰς τὸ ἄγκιστρον Α δὲν ἔχωμεν κανὲν βάρους, ὁ μοχλὸς εἶναι ὀριζόντιος, ὅταν τὸ ἀντίβαρον εὐρίσκειται εἰς τὴν ὑποδιαίρεσιν 0.




Β : Ἐάν εἰς τὸ ἄγκιστρον Α ἔχωμεν φορτίον βάρους Ρ, ὁ μοχλὸς εἶναι ὀριζόντιος, ὅταν τὸ ἀντίβαρον εὐρίσκειται εἰς τινὰ ὑποδιαίρεσιν, π.χ. ρ = 3,5 Κρ.



Σταθερὸν ἀντίβαρον

Σχ. 4.



Τὴν τιμὴν τοῦ βάρους X ἀναγινώσκομεν ἐπὶ τῆς βαθμολογημένης κλίμακος, ἢ ὅποια εὐρίσκεται εἰς τὸ ὑποστήριγμα τῆς συσκευῆς.

Αἱ διαιρέσεις τῆς κλίμακος εἶναι ἄνισοι.

Ὁ αὐτόματος ζυγός (σχ. 5).

Διὰ τῆς ἐπιδράσεως τοῦ βάρους X ἡ φάλαγγ AB κλίνει, ἐὰν ἄρωμεν τὸ ἀντίβαρον P. Τὸ σύστημα ἰσορροπεῖ εἰς τινὰ θέσιν καὶ ὁ δείκτης δεῖκνυεῖ ἐπὶ τῆς βαθμολογημένης κλίμακος τὴν τιμὴν τοῦ βάρους X.

### ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ

1. Ὁ δεκαπλασιαστικὸς ζυγός εἶναι μοχλὸς μὲ ἄνισους βραχίονας, οἱ ὅποιοι ἔχουν λόγον 1/10. Τοιοῦτου εἶδους ζυγός εἶναι καὶ ἡ πλάστιγγ, ἢ ὅποια χρησιμοποιεῖται διὰ τὴν ζύγισιν μεγάλων φορτίων, ὅπως π.χ. σάκκων ἀλεύρου, σακχάρους κλπ.

2. Ὁ Ρωμαϊκὸς ζυγός εἶναι μοχλὸς πρώτου εἶδους. Ἀντίβαρον σταθεροῦ βάρους δύναται νὰ μετατοπίζεται εἰς τὸν ἓνα ἐκ τῶν δύο βραχίωνων του. Ἀποτελεῖ ζυγὸν μεταβλητοῦ βραχίονος. Ἡ τιμὴ τοῦ βάρους τοῦ σώματος, τὸ ὅποιον ἔχομεν ἀναρτηθεῖ ἐπὶ τοῦ σταθεροῦ βραχίονος, εὐρίσκεται δι' ἀπλῆς ἀναγνώσεως τῶν ὑποδιαίρεσεων τῆς φάλαγγος.

3. Διὰ τοῦ ζυγοῦ τῶν ἐπιστολῶν καὶ τοῦ αὐτομάτου ζυγοῦ δυνάμεθα δι' ἀπλῆς ἀναγνώσεως νὰ λάβωμεν τὸ βάρωσ ἐνὸς ἀντικειμένου.

### 190<sup>Η</sup> ΜΑΘΗΜΑ :

### ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΖΥΓΟΥ



● Δι' ἀπλῆς ζυγίσεως δὲν δυνάμεθα νὰ προσδιορίσωμεν μὲ ἀκρίβειαν τὸ βάρωσ ἐνὸς σώματος, διότι ἡ ζύγισις, ὅπως καὶ κάθε μέτρησις, ἐκτελεῖται κατὰ προσέγγισιν. Διὰ νὰ ἔχωμεν ὅσον τὸ δυνατόν ἀκριβέστερα ἀποτελέσματα, πρέπει ὁ ζυγός, τὸν ὅποιον χρησιμοποιοῦμεν, νὰ εἶναι : ἀκριβής, εὐαίσθητος καὶ πιστός.

#### 1 Ἀκρίβεια τοῦ ζυγοῦ.

● Ἐχομεν ἓνα ζυγὸν εἰς ἰσορροπίαν (ὁ δείκτης εἰς τὴν θέσιν O, σχ. 1).

● Ἐὰν τοποθετήσωμεν εἰς κάθε δίσκον του ἴσα βάρη (π.χ. 1 p) καὶ ἡ ἰσορροπία του διατηρηθῇ, τότε μόνον ὁ ζυγός εἶναι ἀκριβής· ἄλλως δὲν εἶναι (σχ. 1 B).

Ὁ ζυγός εἶναι ἀκριβής, ἐὰν ἡ ἰσορροπία του δὲν μεταβάλλεται διὰ τῆς τοποθετήσεως ἴσων βαρῶν ἐπὶ τῶν δύο δίσκων του.



Σχ. 1. Ἐλεγχος ἀκρίβειας.

● Όταν ο ζυγός ισορροπεί, τα γινόμενα των βαρών, των εύρισκομένων επί των δύο δίσκων και επί των αντίστοιχων βραχιόνων της φάλαγγος, πρέπει να είναι ίσα.

$$P \times OM = P' \times ON \text{ και επειδή } P = P' \\ OM = ON$$

δηλ. διά να είναι ο ζυγός ακριβής, πρέπει τα μήκη των δύο βραχιόνων του να είναι ίσα.

## 2 Πιστότης του ζυγού.

Τοποθετούμε φορτία εις τους δύο δίσκους του ζυγού ούτως, ώστε να επιτύχουμε ισορροπία (δείκτης εις το O).

Αντιμεθετόμεν τα φορτία των δύο δίσκων και, εάν η ισορροπία δέν διαταραχθή, ο ζυγός είναι πιστός.

*Ο ζυγός είναι πιστός, εάν η ισορροπία του δέν μεταβάλλεται δι' αντιμεθέσεως των φορτίων των δύο δίσκων του.*

Διά να είναι ο ζυγός πιστός, πρέπει :

- Να μη έχωμεν παραμόρφωσις των βραχιόνων της φάλαγγος κατά την ζύγισιν.
  - Αί άκμαί των τριγωνικῶν πρισμάτων να είναι παράλληλοι και πολύ λεπταί.
  - Καί τα στηρίγματα των δίσκων να περιστρέφονται εύκόλως περίε του άξονος άναρτήσεως των.
- Πρακτική ύπόδειξις.* Να μη τοποθετῶμεν εις τους δίσκους του ζυγού βάρος μεγαλύτερον άπτό το καθοριζόμενον ύπό του κατασκευαστού.

## 3 Εύαισθησία του ζυγού.


● Τοποθετούμεν φορτίον εις τόν ένα δίσκον του ζυγού και ισορροπούμεν αυτόν (δείκτης εις το O) διά σταθμών 125 p εις τόν άλλον δίσκον. Προσθέτομεν έν συνεχεία διαδοχικῶς εις τόν αυτόν δίσκον σταθμά 0,05 p, 0,06 p, 0,08 p, 0,09 p και παρατηρούμεν ότι ο δείκτης παραμένει άκίνητος.

Εάν τό πρόσθετον βάρος γίνη 0,1 p και ο δείκτης δεικνύη μικράν τινα άπόκλισιν, τότε :



Ο ζυγός έχει εύαισθησίαν δεκάτου του γραμμαρίου :

*Η εύαισθησία ενός ζυγού εκφράζεται διά της τιμής του μικροτέρου βάρους, τό όποιον δύναται να προκαλέση αισθητήν άπόκλισιν του δείκτην του.*

Εις ζυγός είναι τόσοσν περισσότερον εύαισθητος, όσον η εύκίνησία της φάλαγγος και των δίσκων του είναι μεγαλύτερα. Δηλαδή όταν :




(A) Ζυγός πιστός




(B) Ζυγός όχι πιστός

Σχ. 2. Έλεγχος πιστότητας ζυγού



Δέν παρατηρείται μετατόπισις του δείκτη (διά 5-6-7-8-9-cg).



Σχ. 3. Έλεγχος της εύαισθησίας ζυγού. Ο ζυγός αυτός έχει εύαισθησίαν 0,1 g.

- ἡ ἀκμὴ τοῦ κεντρικοῦ πρίσματος εἶναι πολὺ λεπτή,
- ἡ φάλαγγε εἶναι μικροῦ βάρους καὶ
- τὸ κέντρον βάρους (τοῦ κινουμένου συστήματος) εὐρίσκεται πλησίον τοῦ ἀξονος περιστροφῆς.

#### 4 Ἀκριβῆς ζύγισης.

● Ἡ προηγουμένη ζύγιση δεικνύει ὅτι τὸ βάρος ἐνὸς ἀντικειμένου δύναται νὰ μὴ εἶναι ἴσον πρὸς τὰ 125 p, τὰ ὁποῖα τὸ ἰσορροποῦν. Δυναμῶς ὅμως νὰ βεβαιώσωμεν ὅτι εἶναι κατὰ προσέγγισιν τὸ πολὺ 0,1 p μεγαλύτερον ἢ μικρότερον τῶν 125 p.


Τὸ βάρος δηλ. τοῦ ἀντικειμένου αὐτοῦ εἶναι 125 p κατὰ προσέγγισιν 0,1 p καὶ ἡ ἀκρίβεια τῆς ζυγίσεως εἶναι :

$$\frac{0,1 p}{125 p} = 0,0008$$

Κατασκευάζονται ζυγοὶ ἐργαστηριακοὶ εὐαισθησίας 0,00001 διὰ φορτία 100 p, δηλ. μὲ ἀκρίβειαν μετρήσεως  $0,00001/100 = 1/1000000$ .

Ζυγὸς τοῦ Roberval εὐαίσθητος εἰς τὸ 0,1 p διὰ φορτίον 1 Kp ἔχει ἀκρίβειαν μετρήσεως :

$$\frac{0,1}{1000} = \frac{1}{10.000}$$



Ζυγὸς μὲ εὐαισθησίαν 0,1 g  
Τὸ βάρος τοῦ ἀντικειμένου A ἔχει μετρηθῆ  
μὲ ἀκρίβειαν

$$\frac{1 dg}{322 dg} = \frac{1}{300}$$

Σχ. 4. Ἀκρίβεια ζυγίσεως.

Ἡ ἀκρίβεια μᾶς ζυγίσεως ἐκφράζεται διὰ τοῦ λόγου τοῦ μέτρου τῆς εὐαισθησίας τοῦ ζυγοῦ πρὸς τὸ ἀποτέλεσμα τῆς ζυγίσεως.

### ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ

1. Εἰς ζυγὸς εἶναι ἀκριβῆς, ὅταν ἡ ἰσορροπία του δὲν μεταβάλλεται διὰ τοποθέτησιν ἐπὶ τῶν δίσκων του ἴσων βαρῶν. Διὰ νὰ εἶναι ὁ ζυγὸς ἀκριβῆς, πρέπει τὰ μήκη τῶν δύο βραχιόνων νὰ εἶναι ἴσα.

2. Εἰς ζυγὸς εἶναι πιστός, ὅταν ἡ ἰσορροπία του δὲν μεταβάλλεται, οἱ δὴποτε καὶ ἐὰν εἶναι ἡ θέσις τῶν φορτίων εἰς τοὺς δύο δίσκους του.

3. Ἡ εὐαισθησία ἐνὸς ζυγοῦ ἐκφράζεται διὰ τῆς τιμῆς τοῦ μικροτέρου βάρους, τὸ ὁποῖον δύναται νὰ προκαλέσῃ αἰσθητὴν ἀπόκλισιν τοῦ δείκτου.

4. Ἡ ἀκρίβεια τῆς ζυγίσεως ἐκφράζεται διὰ τοῦ λόγου τοῦ μέτρου τῆς εὐαισθησίας τοῦ ζυγοῦ πρὸς τὸ ἀποτέλεσμα τῆς ζυγίσεως.

### 20<sup>ON</sup> ΜΑΘΗΜΑ :

## ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΜΑΖΗΣ

### 1 Διπλῆ ζύγισης.

● Διὰ νὰ προσδιορίσωμεν τὸ πραγματικὸν βάρος ἐνὸς σώματος, πρέπει ὁ ζυγὸς νὰ εἶναι ἀκριβῆς. Εἶναι ὅμως πρακτικῶς ἀδύνατον νὰ κατασκευάσωμεν ζυγόν, τοῦ ὁποῖου οἱ δύο βραχίονες τῆς φάλαγγος νὰ εἶναι ἀπολύτως ἴσοι. Εἰς ἕνα καλὸν ζυγὸν τοῦ ἐμπορίου δυνάμεθα νὰ ἐπιτύχωμεν διαφορὰν μήκους μεταξύ τῶν δύο βραχιόνων 0,2 mm.

● Ἐὰν λοιπὸν ὁ εἰς βραχίον εἶναι 20 cm καὶ ὁ ἄλλος 20,02 cm, τότε ἐν σώμα βάρους 1 Kp, ὅταν τοποθετηθῆ εἰς τὸν πρῶτον δίσκον, θὰ ἰσορροπήσῃ σῶμα βάρους X εἰς τὸν ἄλλον δι-



σκον συμφώνως πρὸς τὴν ἔξισωσιν :


$$1 \times 20,02 = X \times 20$$

$$X = \frac{20,02}{20} = 1,001 \text{ Kp}$$


Ἡ φάλαγγ τοῦ ζυγοῦ εἰς τὴν προηγουμένην περίπτωσιν θὰ ἰσορροπῆ ὀριζοντίως, ὅταν ὑπάρξη διαφορά βάρους 1 p εἰς τὰ δύο σώματα, τὰ ὁποῖα ζυγίζομεν, ἢ γενικῶς διαφορά βάρους ἴση πρὸς τὸ 1/1000 τοῦ φορτίου τοῦ ἐνὸς δίσκου.

● Ἡ διαφορά αὕτη εἶναι ἀσήμαντος, ὅταν δὲν ἀπαιτοῦμεν μεγάλην ἀκρίβειαν εἰς τὴν ζύγισην. Δυναμέθα ὁμῶς νὰ προσδιορίσωμεν τὸ πραγματικὸν βᾶρος ἐνὸς σώματος διὰ ζυγοῦ, ὁ ὁποῖος δὲν εἶναι ἀκριβής, χρησιμοποιοῦντες τὴν μέθοδον τῆς διπλῆς ζυγίσεως τοῦ Borda.

Τὰ κάτωθι σχήματα μᾶς δεικνύουν τὴν μέθοδον αὕτην.



Σχ. 1.



Σχ. 2.

## 2 Μᾶζα ἐνὸς σώματος.


● Ἐὰν προσδιορίσωμεν τὸ βᾶρος σώματος δι' ἐνὸς εὐαισθήτου δυναμομέτρου, π.χ. ἐνὸς λίτρου ὕδατος, θὰ εὐρωμεν : Εἰς τὰς Ἀθήνας 1000 p, εἰς τὸν Ἰσημερινὸν 997 p, εἰς τοὺς Πόλους 1002 p.

Ἡ διαφορά αὕτη παρατηρεῖται, διότι, ὅπως γνωρίζομεν, τὸ βᾶρος ἐνὸς σώματος (ἢ δύναμις δηλ. διὰ τῆς ὁποίας ἔλκεται τὸ σῶμα ὑπὸ τῆς γῆς) αὐξάνει ἐλαφρῶς ἀπὸ τὸν Ἰσημερινὸν πρὸς τοὺς Πόλους καὶ ἐλαττοῦται, ὅσον ἀπομακρυνόμεθα ἀπὸ τὸ κέντρον τῆς γῆς.

Τὸ ἐν λίτρον ὁμῶς ὕδατος περιέχει πάντοτε τὴν ἴδιαν ποσότητα ὕλης, ὅπουδήποτε καὶ ἔαν τὸ ζυγίσωμεν (εἰς τὰς Ἀθήνας, εἰς τοὺς Πόλους, εἰς τὸν Ἰσημερινὸν ἢ εἰς οἰονδήποτε ὕψος).

Τὴν ποσότητα αὕτην τῆς ὕλης, ἢ ὁποῖα καὶ χαρακτηρίζει κάθε σῶμα, καλοῦμεν μᾶζαν τοῦ σώματος τούτου.

● Εἰς τὸ ἐν λίτρον τοῦ ὕδατος δηλ. θὰ κάμωμεν διάκρισιν :



Σχ. 3.

- μεταξύ τοῦ **βάρους** του : 1 Κρ εἰς τὸ Παρίσι, 0,997 Κρ εἰς τὸν Ἰσημερινόν, 1,002 Κρ εἰς τοὺς Πόλους,
- καὶ τῆς **μᾶζης** του, ἡ ὁποία εἶναι ἡ αὐτὴ εἰς ὅλους τοὺς τόπους καὶ εἶναι ἴση πρὸς 1 Κg (ὑπονοεῖται 1 Κg μᾶζης). Πρέπει νὰ προσεξέωμεν πολὺ τὴν διαφορὰν αὐτὴν.

Τὸ βάρος ἐνὸς σώματος εἶναι μία δύναμις, μεταβαλλομένη ἀναλόγως πρὸς τὴν θέσιν, τὴν ὁποίαν ἔχει τὸ σῶμα ὡς πρὸς τὴν γῆν, καὶ τὸ προσδιορίζομεν διὰ τοῦ **δυναμομέτρου**.

Ἡ μᾶζα ἐνὸς σώματος εἶναι ἡ ποσότης τῆς ὕλης, ἡ ὁποία εἶναι ἀνεξάρτητος ἀπὸ τὴν θέσιν, ἣν ἔχει τὸ σῶμα, καὶ προσδιορίζεται διὰ τοῦ **ζυγοῦ**.

- Εἰς τὰς καθημερινὰς ἀνάγκας ταυτίζομεν τὸ **βάρος** καὶ τὴν **μᾶζαν** ἢ μᾶλλον παραλείπομεν αὐτὴν τὴν διακρίσιν.

Ἐὰν ἀγοράζει κανεὶς 1 Κg ἄρτου (ἐνῶ ἔπρεπε νὰ εἶπῃ 1 Κg μᾶζης). Λαμβάνων τὸν ἄρτον πρέπει νὰ ἐξουδετερώσῃ μίαν κατακόρυφον δύναμιν 1 Κg εἰς τὰς Ἀθήνας (ἐνῶ ἔπρεπε νὰ εἴπωμεν 1 Κρ ἢ βάρος 1 Κg\*).

Ἐὰν θέλωμεν νὰ εἴμεθα αὐστηροὶ εἰς τὴν διατύπωσιν, πρέπει νὰ λάβωμεν ὡς **προτύπους μᾶζας** 1 g, 2 g, 5 g, ὅλα ἐκεῖνα τὰ ἀντικείμενα, τὰ ὁποῖα ἐλάβομεν ὡς **πρότυπα βάρη** ἢ **σταθμὰ** 1 p, 2 p, 5 p, 1 Κρ.

## ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ


1. Διὰ τῆς μεθόδου τῆς διπλῆς ζυγίσεως δυνάμεθα νὰ προσδιορίσωμεν τὸ πραγματικὸν βάρος ἐνὸς σώματος καὶ διὰ ζυγοῦ, ὁ ὁποῖος δὲν εἶναι ἀκριβῆς. Θέτομεν εἰς ἰσορροπίαν τὸν ζυγὸν διὰ τῆς τοποθετήσεως σώματος εἰς τὸν ἓνα δίσκον καὶ ἐνὸς ἀντιβάρου εἰς τὸν ἄλλον. Ἀντικαθιστῶμεν τὸ σῶμα διὰ σταθμῶν, ἕως ὅτου ἐπιτύχομεν ἐκ νέου ἰσορροπίαν τοῦ ζυγοῦ. Τὸ βάρος τοῦ σώματος θὰ εἶναι ἴσον πρὸς τὸ σύνολον τῶν σταθμῶν, τὰ ὁποῖα ἐτοποθετήσαμεν.

2. Μᾶζα ἐνὸς σώματος καλεῖται ἡ ποσότης τῆς ὕλης, ἐκ τῆς ὁποίας ἀποτελεῖται τοῦτο εἶναι αὐτὴ δὲ ἀνεξάρτητος τοῦ τόπου, εἰς τὸν ὁποῖον εὐρίσκεται τὸ σῶμα.

Ἡ μᾶζα προσδιορίζεται διὰ τοῦ ζυγοῦ καὶ ἔχει ὡς μονάδα τὸ χιλιόγραμμα, τὸ ὁποῖον προσδιορίζεται διὰ τοῦ Κg ἢ τοῦ γραμμάριον, τὸ ὁποῖον συμβολίζεται διὰ τοῦ g.


3. Βάρος ἐνὸς σώματος καλεῖται ἡ δύναμις, ὑπὸ τῆς ὁποίας ἡ μᾶζα αὐτοῦ τοῦ σώματος ἔλκεται πρὸς τὴν γῆν. Ἡ δύναμις αὕτη μεταβάλλεται μετὰ τοῦ ὕψους καὶ τοῦ γεωγραφικοῦ πλάτους καὶ προσδιορίζεται διὰ τοῦ δυναμομέτρου. Μονὰς βάρους εἶναι τὸ Κρ (Κιλοπόντ).

## ΠΥΚΝΟΤΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΜΑΖΑ) ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΝ ΒΑΡΟΣ



Τὰ σώματα τοῦ ὡς ἄνω σχήματος 1 ἔχουν τὰς αὐτὰς διαστάσεις, ἐπομένως καὶ τὸν αὐτὸν ὄγκον ( $30 \text{ cm}^3$ ). Ἐὰν τὰ ζυγίσωμεν, εὐρίσκομεν : διὰ τὸ ξύλον 23 g, διὰ τὸν σίδηρον 231 g, διὰ τὸ ἀργίλιον 80 g.

Εἰάν ζυγίσωμεν :



Σχ. 2.

Λαμβάνομεν προηγουμένως τὸ ἀπόβαρον τῶν τριῶν δοχείων καὶ ρίπτομεν εἰς τὸ πρῶτον δοχεῖον  $100 \text{ cm}^3$  ὕδατος, εἰς τὸ δεύτερον  $100 \text{ cm}^3$  οἶνονπνεύματος καὶ εἰς τὸ τρίτον  $100 \text{ cm}^3$  ὕδραργύρου, καὶ ζυγίζομεν.

Δυνάμεθα τώρα νὰ ὑπολογίσωμεν τὴν μάζαν τοῦ  $1 \text{ cm}^3$  τῶν σωμάτων αὐτῶν.

$$\text{Διὰ τὸ ξύλον : } \frac{23 \text{ g}}{30 \text{ cm}^3} = 0,76 \text{ g/cm}^3 \quad \text{Διὰ τὸ ὕδωρ } \frac{100 \text{ g}}{100 \text{ cm}^3} = 1 \text{ g/cm}^3$$

$$\text{Διὰ τὸν σίδηρον : } \frac{231 \text{ g}}{30 \text{ cm}^3} = 7,7 \text{ g/cm}^3 \quad \text{Διὰ τὸ οἶνόπνευμα } \frac{80 \text{ g}}{100 \text{ cm}^3} = 0,8 \text{ g/cm}^3$$

$$\text{Διὰ τὸ ἀργίλιον : } \frac{80 \text{ g}}{30 \text{ cm}^3} = 2,66 \text{ g/cm}^3 \quad \text{Διὰ τὸν ὕδραργυρον } \frac{1360 \text{ g}}{100 \text{ cm}^3} = 13,6 \text{ g/cm}^3$$


Πυκνότης (εἰδικὴ μάζα) ἐνὸς σώματος καλεῖται ἡ μάζα τοῦ σώματος, τὴν ὁποῖαν περι- κλείει ἡ μονὰς τοῦ ὄγκου τοῦ σώματος τούτου. Ἐκφράζεται δὲ εἰς γραμμάρια ἀνὰ κυβικὸν ἑκατοστόμετρον  $\text{g/cm}^3$  ἢ εἰς χιλιόγραμμα ἀνὰ κυβικὸν δεκατόμετρον (παλάμη)  $\text{Kg/dm}^3$ .

$$\rho \text{ (g/cm}^3\text{)} = \frac{M \text{ (εἰς g)}}{V \text{ (εἰς cm}^3\text{)}}$$

### 1 Προσδιορισμός της πυκνότητας ενός σώματος.

Διὰ νὰ προσδιορίσωμεν τὴν πυκνότητα ἑνὸς σώματος, πρέπει νὰ γνωρίζωμεν τὸν ὄγκον καὶ τὴν μάζαν του.

Διὰ τῶν σχημάτων 3 Α καὶ 3 Β βλέπομεν πῶς δυνάμεθα δι' ἑνὸς ὀγκομετρικοῦ δοχείου νὰ προσδιορίσωμεν τὸν ὄγκον ἑνὸς σώματος (π.χ. ἑνὸς λίθου) δι' ἀρκετῆς προσεγγίσεως καὶ νὰ προσδιορίσωμεν τὴν πυκνότητά του.




Σχ. 3.

### 2 Μέθοδος τῆς ληκύθου.

Διὰ τῆς μεθόδου αὐτῆς προσδιορίζομεν μετ' ἀκριβείας τὴν πυκνότητα ἑνὸς στερεοῦ ἢ ὑγροῦ. Ὁ ὄγκος τοῦ σώματος προσδιορίζεται διὰ ζυγίσεως.

Σχ. 4.




$$\text{Πυκνότης τοῦ σώματος} = \frac{\text{Μάζα τοῦ σώματος}}{\text{Ὅγκος τοῦ σώματος}} = \frac{75 \text{ g}}{25 \text{ cm}^3} = 3 \text{ g/cm}^3$$

### 3 Εἰδικὸν βάρος ἑνὸς σώματος.

Εἰδικὸν βάρος ἑνὸς σώματος καλοῦμεν τὸ βάρος τῆς μονάδος τοῦ ὄγκου τοῦ σώματος τούτου.

$$\text{Εἰδικὸν βάρος} = \frac{\text{Βάρος τοῦ σώματος (εἰς } \rho \text{ ἢ } \text{Kp)}}{\text{Ὅγκος τοῦ σώματος (εἰς } \text{cm}^3 \text{ ἢ } \text{dm}^3)}$$



### ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ

1. Η πυκνότης ενός σώματος εκφράζεται διά της μάζης της μονάδος του όγκου του σώματος τούτου.

2. Η πυκνότης στερεού ή υγρού σώματος μετρείται εις γραμμάρια ανά κυβικόν εκατοστόμετρον ( $\text{g/cm}^3$ ) ή εις χιλιόγραμμα ανά κυβικόν δεκατόμετρον ( $\text{kg/dm}^3$ ).

$$\text{Πυκνότης} = \frac{\text{μάζα του σώματος (εις g ή kg)}}{\text{όγκος του σώματος (εις cm}^3 \text{ ή dm}^3)}$$

3. Διά της ληκύθου προσδιορίζομεν μετά μεγάλης προσεγγίσεως την πυκνότητα ενός σώματος. Ο όγκος προσδιορίζεται διά ζυγίσεως.

### 22<sup>ON</sup> ΜΑΘΗΜΑ :

## ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΣ

### 1 Σχετική πυκνότης ενός στερεού ή υγρού ως πρὸς τὸ ὕδωρ.

Όταν γνωρίζωμεν την πυκνότητα ενός σώματος, δυνάμεθα νὰ προσδιορίσωμεν την μάζαν οἰουδήποτε ὄγκου τοῦ σώματος τούτου. Δυνάμεθα ὁμως νὰ προσδιορίσωμεν την μάζαν καί ὅταν γνωρίζωμεν την σχετικὴν πυκνότητα, δηλ. την σχέσιν τῆς μάζης ἐνὸς δεδομένου ὄγκου τοῦ σώματος διὰ τῆς μάζης ἴσου ὄγκου ὕδατος.

*Παράδειγμα.* Εἰς ἴσους ὄγκους ἡ μάζα τοῦ μολύβδου εἶναι 11,3 φορές μεγαλύτερα ἀπὸ την μάζαν τοῦ ὕδατος :

$$5\text{ cm}^3 \text{ μολύβδου θὰ ἔχουν μάζαν : } 5\text{ g (ἡ μάζα } 5\text{ cm}^3 \text{ ὕδατος)} \times 11,3 = 56,6\text{ g}$$

Σχετικὴ πυκνότης ἐνὸς σώματος ἐν σχέσει πρὸς τὸ ὕδωρ καλεῖται ὁ λόγος τῆς μάζης τοῦ σώματος πρὸς τὴν μάζαν ὄγκου ὕδατος ἴσου πρὸς τὸν ὄγκον τοῦ σώματος.

Ἐὰν ἡ πυκνότης τοῦ χαλκοῦ εἶναι  $8,9\text{ g/cm}^3$ , ἡ σχετικὴ πυκνότης του θὰ εἶναι :

$$\rho \text{ σχετικὴ} = \frac{8,9\text{ g}}{1\text{ g}} = 8,9 \text{ (διότι } 1\text{ cm}^3 \text{ χαλκοῦ ἔχει μάζαν } 8,9\text{ g καὶ } 1\text{ cm}^3 \text{ ὕδατος } 1\text{ g).}$$



Ἡ πυκνότης εκφράζεται δι' ἐνὸς συγκεκριμένου ἀριθμοῦ.

$$\text{g/cm}^3 \quad \text{Kg/dm}^3 \quad \text{t/m}^3 \quad (\text{t=τόνος})$$

Ἡ σχετικὴ πυκνότης ὡς πρὸς τὸ ὕδωρ εκφράζεται δι' ἐνὸς ἀφηρημένου ἀριθμοῦ.

Ἡ σχετικὴ πυκνότης ὡς πρὸς τὸ ὕδωρ ἀριθμητικῶς ἔχει τὴν αὐτὴν τιμὴν μετὰ τῆς πυκνότητος, διότι ἡ πυκνότης τοῦ ὕδατος εἶναι  $1\text{ g/cm}^3$  ἢ  $1\text{ Kg/dm}^3$  ἢ  $1\text{ t/m}^3$ .

## 2 Σχετική πυκνότης ενός αερίου ως πρὸς τὸν ἀέρα.



Σχ. 1. Διὰ τῆς ἐπιδράσεως τῆς θερμότητος τῶν χειρῶν μας ὁ ὄγκος τοῦ ἀέρος τῆς φιάλης αὐξάνει κατὰ AB.

α) Γνωρίζομεν ὅτι τὰ ἀέρια εἶναι συμπιεστέα καὶ ἐκτατά. Διὰ νὰ καθορίσωμεν λοιπὸν τὴν μᾶζαν ἐνὸς ὄγκου αερίου, π.χ. μιᾶς φιάλης 4 l, πρέπει νὰ ὀρίσωμεν τὴν *πίεσιν τοῦ αερίου*. Διότι εἰς τὸν αὐτὸν ὄγκον, ἐὰν αὐξήσωμεν τὴν πίεσιν, θὰ ἔχωμεν μεγαλύτεραν μᾶζαν αερίου, ἐνῶ, ἐὰν τὴν ἐλαττώσωμεν, θὰ ἔχωμεν μικροτέραν.

● Ἐὰν εἰς μίαν φιάλην (σχ. 1) περιορίσωμεν τὸν ὄγκον τοῦ αερίου καὶ κρατήσωμεν αὐτὴν διὰ τῶν παλαμῶν μας, θὰ παρατηρήσωμεν ὅτι ἡ σταγὼν τοῦ χρωματισμένου ὕδατος, ἡ ὁποία περιορίζει τὸ αἶριον ἐντὸς τῆς φιάλης, μετατοπίζεται πρὸς τὰ ἔξω. Αὐτὸ συμβαίνει, διότι ὁ ὄγκος τοῦ αερίου ὑψήθη λόγῳ τῆς προσληφθείσης θερμότητος ἐκ τῶν παλαμῶν μας, ἐνῶ ἡ πίεσις παραμένει σταθερὰ (ἡ ἐξωτερική).

Διὰ νὰ ἔξη λοιπὸν τὴν πραγματικὴν τῆς ἐννοιας ἡ ἔκφρασις ἐνὸς ὄγκου αερίου, δὲν ἀρκεῖ νὰ ὀρίσῃ ἡ πίεσις, ἀλλὰ καὶ ἡ *θερμοκρασία* του.

● Ἐξ ὧλων αὐτῶν συμπεραίνομεν ὅτι τὸν ὄγκον ἐνὸς αερίου ἢ ἀτμοῦ πρέπει νὰ τὸν ὀρίζωμεν ὑπὸ κανονικῆς συνθήκας θερμοκρασίας (0° C) καὶ πίεσεως (76 cmHg).

β) Ἐπειδὴ τὰ ἀέρια εἰς ἴσον ὄγκον πρὸς τὰ ὑγρά ἢ στερεὰ εἶναι πολὺ ελαφρότερα, ἡ σχετικὴ πυκνότης των ὑπολογίζεται οὐχὶ ὡς πρὸς τὸ ὕδωρ, ἀλλὰ ὡς πρὸς τὸν ἀέρα.

*Ἐφαρμογή.* 22,4 l ἀέρος ὑπὸ κανονικῆς συνθήκας θερμοκρασίας καὶ πίεσεως ἔχουν μᾶζαν 29 g, ἐνῶ ὑπὸ τὰς ἰδίας συνθήκας 22,4 l διοξειδίου τοῦ ἀνθρακος ἔχουν μᾶζαν 44 g. Ἡ σχετικὴ πυκνότης τοῦ διοξειδίου τοῦ ἀνθρακος ὡς πρὸς τὸν ἀέρα θὰ εἶναι :

$$\frac{\text{μᾶζα } 22,4 \text{ l διοξειδ. ἀνθρ.}}{\text{μᾶζα } 22,4 \text{ l ἀέρος}} = \frac{44 \text{ g}}{29 \text{ g}} = 1,5$$

22,4 l ὑδρογόνου ὑπὸ Κ.Σ. ἔχουν μᾶζαν 2 g καὶ 1 l ὑδρογόνου θὰ ἔξη μᾶζαν :

$$\frac{2 \text{ g}}{22,4 \text{ l}} = 0,08 \text{ g/l} \text{ καὶ ἡ σχετικὴ πυκνότης του θὰ εἶναι : } \frac{2 \text{ g}}{29 \text{ g}} = 0,07$$

Παρατηροῦμεν ἐδῶ ὅτι ἡ μᾶζα 1 l αερίου καὶ ἡ σχετικὴ πυκνότης δὲν ἐκφράζονται διὰ τοῦ ἰδίου ἀριθμοῦ, ὅπως εἰς τὰ στερεὰ καὶ ὑγρά.

Σχετικὴ πυκνότης μερικῶν στερεῶν καὶ ὑγρῶν ἐν σχέσει πρὸς τὸ ὕδωρ	
Στερεὰ	Ἵγρὰ
Λευκόχρυσος 21,5	Ἵδράργυρος 13,59
Χρυσός 19,5	Γλυκερίνη 1,26
Μόλυβδος 8,9	Ἵδωρ θαλάσσιον 1,03
Σίδηρος 7,8	Ἵδωρ ἀπεισταγμ. = 1
Ἀργίλιον 2,7	Ἴλαιον 0,9
Μάρμαρον 2,7	Οἰνόπνευμα 0,8
Δρῦς 0,63	Βενζίνη 0,7
Φελλός 0,3	Αἰθέρ 0,7

Σχετική πυκνότης μερικῶν ἀερίων ἐν σχέσει πρὸς τὸν ἀέρα

Βουτάνιον	$\frac{58 \text{ g}}{29 \text{ g}} = 2$	Ὁξυγόνον	$\frac{32 \text{ g}}{29 \text{ g}} = 1,1$
Διοξειδίου τοῦ θείου	$\frac{64 \text{ g}}{29 \text{ g}} = 2,2$	Ἄζωτον	$\frac{28 \text{ g}}{29 \text{ g}} = 0,97$

Φωταέριον περίπου 0,5

## ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ

1. Σχετική πυκνότης ἑνὸς σώματος στερεοῦ ἢ ὑγροῦ ὡς πρὸς τὸ ὕδωρ καλεῖται τὸ πηλίκον τῆς μάζης ἑνὸς ὀρισμένου ὄγκου τοῦ σώματος πρὸς τὴν μάζαν ἴσου ὄγκου ὕδατος.

Ἡ πυκνότης καὶ ἡ σχετική πυκνότης ἑνὸς σώματος ὡς πρὸς τὸ ὕδωρ ἐκφράζονται διὰ τοῦ αὐτοῦ ἀριθμοῦ (ἡ πυκνότης εἰς  $\text{g/cm}^3$ , ἐνῶ ἡ σχετική πυκνότης εἰς καθαρὸν ἀριθμὸν. Π.χ. ἡ πυκνότης τοῦ σιδήρου εἶναι  $7,8 \text{ g/cm}^3$ , ἐνῶ ἡ σχετική πυκνότης αὐτοῦ εἶναι 7,8).

2. Σχετική πυκνότης ἀερίου καλεῖται τὸ πηλίκον τῆς μάζης ὀρισμένου ὄγκου τοῦ ἀερίου πρὸς τὴν μάζαν ἴσου ὄγκου ἀέρος, ὅταν καὶ τὰ δύο εὐρίσκονται ὑπὸ τὰς αὐτὰς συνθήκας θερμοκρασίας καὶ πίεσεως. Πρακτικῶς ἡ σχετική πυκνότης ἑνὸς ἀερίου εὐρίσκεται, ἐὰν διαιρέσωμεν τὴν μάζαν 22,4 l τοῦ ἀερίου ( $0^\circ\text{C}$  καὶ  $76 \text{ cmHg}$ ) διὰ τοῦ 29g ( $1,293 \text{ g/l} \times 22,4 \text{ l} = 28,963 \text{ g}$ ).

## Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ

### Σειρά 5. Ζυγός – Μάζα.

#### 1. Ζυγός

1. Ποία σταθμὰ θὰ χρησιμοποιήσωμεν, διὰ νὰ ζυγίσωμεν: 23 g, 58 g, 76 g, 384 g, 1875 g, 3,47 g

2. Ὁλόκληρος σειρὰ σταθμῶν ἀπὸ 1 cg (0,01 g) ἕως 5 dg (0,5 g) εἰς μορφήν τετραγωνικῶν φύλλων ἀποτελεῖται ἀπὸ ἑνὸς βάρους 1 cg, δύο βάρη 2 cg, ἑνὸς βάρους 5cg, δύο βάρη 1 dg, ἑνὸς βάρους 2 dg καὶ ἑνὸς βάρους 5 dg.

Διὰ νὰ κατασκευάσωμεν αὐτὴν τὴν σειρὰν, κόπτομεν καταλλήλως τεμάχια σύρματος ἐξ ἀργιλίου, τοῦ ὁποίου 1 m ζυγίζει 2 g. Πόσον μῆκος σύρματος πρέπει νὰ κόψωμεν συνολικῶς; Πόσον μῆκος ἀπαιτεῖται διὰ κάθε βάρους;

3. Πόσον μῆκος ἔχει εἰς ρόλος σύρματος, ἐὰν ὅλος ζυγίξη 1,440 Kg ἐνῶ 1 m ἐξ αὐτοῦ ζυγίξη 16,4 g;

4. Πόσα καρφία περιέχονται εἰς 100 g ἐξ αὐτῶν, ὅταν 20 καρφία ἔχουν βάρους 12,5g;

5. Ὅταν εἰς τὸν δίσκον ἑνὸς ζυγοῦ, εἰς τὸν ὁποῖον ζυγίζομεν τεμάχιον ἐκ μετάλλου, τοποθετήσωμεν 72,4 g, ὁ δείκτης σταματᾷ εἰς τὴν δευτέραν ὑποδιαίρεσιν, ἀριστερὰ τοῦ 0, ἐνῶ, ὅταν τοποθετήσωμεν 72,5g, εἰς τὴν τρίτην ὑποδιαίρεσιν, δεξιὰ τοῦ 0.

Ἐὰν αἱ μεταποίσεις τοῦ δείκτη γίνονται ἀσθηταὶ διὰ κάθε ὑποδιαίρεσιν, ποία ἡ μάζα τοῦ σώματος; Ποία ἡ εὐαισθησία τοῦ ζυγοῦ; Ποία ἡ ἀκρίβεια τῆς ζυγίσεως;

6. α) Ὁ δείκτης ἑνὸς ζυγοῦ ἀποκλίνει κατὰ δύο

ὑποδιαίρεσεις διὰ διαφορὰν βάρους 1 dg. Ἐὰν δυνάμεθα νὰ διακρίνωμεν τὴν ἀπόκλισιν κατὰ μίαν ὑποδιαίρεσιν, πόση εἶναι ἡ εὐαισθησία τοῦ ζυγοῦ;

β) Ἐὰν μὲ τὸν ζυγὸν ἐν σῶμα ζυγίξη 127,4 g, πόση εἶναι ἡ ἀκρίβεια τῆς ζυγίσεως καὶ μεταξύ ποίων ὀρίων περιέχεται ἡ ἀκρίβης μάζα τοῦ σώματος;

7. Ὁ εἰς ἕκ τῶν δύο βραχιόνων τῆς φάλαγγος ζυγοῦ μήκους 40 cm εἶναι μακρότερος κατὰ 0,8 mm ἀπὸ τὸν ἄλλον. Πόσον βάρους πρέπει νὰ τοποθετήσωμεν εἰς τὸν ἑνα δίσκον, διὰ νὰ ἔχωμεν ἰσορροπίαν, ὅταν εἰς τὸν ἄλλον θέσωμεν βάρους 1 kg; (δύο περιπτώσεις).

8. Οἱ βραχίονες ἑνὸς ζυγοῦ ἔχουν μῆκος 180 mm καὶ 180,02 mm. Πόσον βάρους πρέπει νὰ τοποθετήσωμεν εἰς τὸν ἑνα δίσκον, διὰ νὰ ἔχωμεν ἰσορροπίαν, ὅταν εἰς τὸν ἄλλον δίσκον ὑπάρχη βάρους 1 Kg; (δύο περιπτώσεις).

Δυνάται ὁ ζυγός αὐτός νὰ θεωρηθῆ ὡς ἀκρίβης;

α) Ἐὰν εἶναι εὐαισθητος εἰς τὸ 2 dg;

β) Ἐὰν εἶναι εὐαισθητος εἰς τὸ 1/2 dg;

9. Ἡ φάλαγξ ἑνὸς ζυγοῦ ἰσορροπεῖ ὀριζοντίως;

α) Ὅταν οἱ δίσκοι εἶναι κενοί.

β) Ὅταν οἱ δίσκοι φέρουν βάρη 500 g καὶ 500,5 g ἀντιστοίχως.

Ἡ ἀπόστασις τῆς ἀκμῆς τοῦ κεντρικοῦ πρίσματος ἀπὸ τὴν ἀκμὴν ἑνὸς τῶν ἀκραιῶν εἶναι 20 cm: Ποῖον τὸ μῆκος τοῦ ἑτέρου βραχίονος τῆς φάλαγγος; (δύο περιπτώσεις).

10. Αἱ ἀκμῆαι τῶν ἀκραιῶν τριγωνικῶν πρίσματος

των της φάλαγγος ζυγοῦ ἀπέχουν 48,1 cm. Ἐάν ὑπάρξη ἰσορροπία, ὅταν οἱ δίσκοι φέρουν ἀντιστοιχῶς βάρη 500 g καὶ 501,2 g, ποῖον εἶναι τὸ μῆκος ἐκάστου βραχίονος τῆς φάλαγγος;

11. Ζυγὸς ἰσορροπεῖ, ὅταν τὰ φορτία τῶν δίσκων εἶναι:

Ἀριστερὸς δίσκος	Δεξιὸς δίσκος.
α) 119,3 g	σῶμα μάζης X
β) σῶμα μάζης X	120,71 g

Ποῖον εἶναι τὸ σφάγμα τοῦ ζυγοῦ καὶ ποῖα ἢ μάζα X τοῦ σώματος;

12. α) Διὰ τὴν ἰσορροπιᾶν μοχλὸς AB μὲ ἄξονα O, πρέπει νὰ ἀναρτήσωμεν εἰς τὸ ἄκρον B μάζαν 80 g, ὅταν εἰς τὸ ἄκρον A ὑπάρξη σῶμα ἀγνώστου μάζης. Ὅταν ὁμοῦ τὸ σῶμα εὐρίσκειται εἰς τὸ ἄκρον B, πρέπει νὰ ἀναρτήσωμεν εἰς τὸ A 500 g. Ποῖα ἢ μάζα τοῦ σώματος;

β) Ἐάν τὸ μῆκος τοῦ μοχλοῦ εἶναι 70 cm, ποῖα ἢ ἀπόστασις τοῦ O ἀπὸ τοῦ A;

13. Τὸ ἀντίβαρον ρωμαϊκοῦ ζυγοῦ ἔχει βάρους 600 g καὶ τὸ ἄγκιστρον, ἀπὸ τοῦ ὁποῦ ἀναρτῶνται τὰ βάρη, ἀπέχει 42 mm ἀπὸ τὸν ἄξονα. Ὁ ζυγὸς ἰσορροπεῖ, ὅταν τὸ ἄγκιστρον εὐρίσκειται εἰς τὴν θέσιν O.

Ἐάν ἀναρτήσωμεν μάζαν X εἰς τὸ ἄγκιστρον, πρέπει νὰ μεταθέσωμεν τὸ ἀντίβαρον κατὰ 91 mm, διὰ τὴν ἔχωμεν ἰσορροπιάν.

α) Ποῖα ἢ μάζα X;

β) Ἐάν ἀναρτήσωμεν μάζαν 2,5 Kg, κατὰ πόσον πρέπει νὰ μετατοπίσωμεν τὸ ἀντίβαρον (ἀπὸ τὸ O);

γ) Ἐάν ὁ ζυγὸς ζυγίζῃ μέχρι 5 Kg, πόσον ἀπέχουν αἱ ἀκραῖαι ἐνδείξεις του;

Ὁ μέγιστος βραχίων ἔχει ἐσοχὰς καὶ ἢ μετατόπισις τοῦ ἀντιβάρου ἀπὸ τὴν προηγουμένην εἰς τὴν ἐπομένην ἐσοχὴν ἀντιστοιχεῖ εἰς μεταβολὴν τοῦ φορτίου κατὰ 50 g. Πόσον ἀπέχουν δύο διαδοχικαὶ ἐσοχαί;

## II. Μάζα-Πυκνότης-Σχετικὴ πυκνότης

14. Ποῖα εἶναι ἡ πυκνότης τοῦ ἱριδιούχου λευκοχρόσου, ἔάν τὸ πρότυπον Kg εἶναι κολιῖνδρος διαμέ-

τροῦ βάσεως 39 mm καὶ ὕψους 39 mm;

15. Προσδιορίζομεν τὴν πυκνότητα ἐνὸς ὑγροῦ διὰ τῆς μεθόδου τῆς ληκύθου:

α) Λήκυθος πλήρης ὕδατος + δείγμα + 12,5 g ἰσορροποῦν τὸ ἀπόβαρον.

β) Λήκυθος πλήρης ὕδατος + 78,2 g ἰσορροποῦν τὸ ἀπόβαρον.

γ) Τὸ δείγμα ἐντὸς τῆς πλήρους φιάλης ὕδατος τῆς ληκύθου + 41,1 g ἰσορροποῦν τὸ ἀπόβαρον.

Ποῖα εἶναι ἡ πυκνότης τοῦ δείγματος καὶ ποῖα ἢ πυκνότης ἐν σχέσει πρὸς τὸ ὕδωρ (σχετικὴ πυκνότης);

16. Ποῖα εἶναι ἡ πυκνότης καὶ ποῖα ἢ σχετικὴ πυκνότης (ἐν σχέσει πρὸς τὸ ὕδωρ) τῆς βενζίνης, ὅταν διὰ τῆς μεθόδου τῆς ληκύθου ἔχωμεν:

α) Λήκυθος κενὴ + 78,3 g ἰσορροποῦν τὸ ἀπόβαρον.

β) Λήκυθος πλήρης ὕδατος + 15,2 g ἰσορροποῦν τὸ ἀπόβαρον.

γ) Λήκυθος πλήρης βενζίνης + 32,8 g ἰσορροποῦν τὸ ἀπόβαρον.

17. Πόσον μάζαν ἔχει δοκὸς δρυῖνης μὲ διαστάσεις 2,70 m, 20 m, 12,5 cm; (σχετικὴ πυκνότης ὡς πρὸς τὸ ὕδωρ 0,7).

18. Πόσον ὄγκον καταλαμβάνει: 1 Kg ἀργιλίου, 1 Kg σιδήρου, 1 Kg χαλκοῦ, 1 Kg μολύβδου, 1 Kg ὑδραργύρου; Αἱ σχετικαὶ πυκνότητες τούτων ὡς πρὸς τὸ ὕδωρ εἶναι ἀντιστοιχῶς: 2,7· 7,8· 8,8· 11,3· 13,6.

19. Ποῖα ἢ πυκνότης καὶ ποῖα ἢ σχετικὴ πυκνότης τοῦ πάγου, ἔάν 1 l ὕδατος στερεοποιούμενον διδῇ 1,09 dm<sup>3</sup>; Πόσον ὄγκον ὕδατος λαμβάνομεν ἐκ τῆς τήξεως τεμαχίου πάγου μὲ διαστάσεις 0,80 m × 150 mm;

20. Εἰς 0<sup>o</sup> C καὶ κανονικὴν ἀτμοσφαιρικὴν πίεσιν 22,4 l ἀέρος ζυγίζουσι 29 g, 22,4 l ὑδατῶν ζυγίζουσι 18 g, 22,4 l προπανίου ζυγίζουσι 44 g, 22,4 l χλωρίου 71 g, 22,4 l ἀμμωνίας ζυγίζουσι 17 g:

Νὰ προσδιορισθῇ ἡ μάζα 1 l ἐκ τῶν ἀνωτέρω ἀερίων, καθὼς καὶ ἡ σχετικὴ πυκνότης των.



## Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ

### 1 Πιέζουσα δύναμις.

Ἐάν παρατηρήσωμεν τὰ ἴχνη, τὰ ὅποια ἀφίνει ἐπάνω εἰς παχὺ στρώμα χιόνος ἓν άτομον, ὅταν μετακινήται μὲ παγοπέδιλα (σκι) καὶ ὅταν χωρὶς αὐτά, πότε τὰ ἴχνη θὰ εἶναι βαθύτερα ; (σχ. 1).

*Πείραμα 1ον.* Μὲ ποῖαν ἀπὸ τὰς τρεῖς ἔδρας τοῦ ἐπὶ τῆς ἄμμου τὸ τεμάχιον ἐκ μαρμάρου (σχ. 2) εἰσχωρεῖ βαθύτερον ;

Ποία δύναμις τὸ ἀναγκάζει νὰ εἰσχωρήσῃ ;

Ποῖαν διεύθυνσιν ἔχει ἡ δύναμις αὕτη ;



*Πείραμα 2ον.* Ἡ Ἐυλίνη πλάξ βυθίζεται περισσό-τερον ἂν τὸς τῆς ἄμμου, ἂν καὶ τὸ βῆρος τῆς παραμένει ἀμετάβλητον, ὅταν τὴν στηρίξωμεν εἰς τὰς αἰχμᾶς τῶν καρφίων (σχ. 3).

Ποῖαν διεύθυνσιν ἔχει ἡ δύναμις, ἡ ὅποια ἀναγκάζει τὴν πιπέζαν νὰ εἰσχωρήσῃ εἰς τὸν τοῖχον, καὶ διατὶ αὕτη δὲν εἰσχωρεῖ εἰς τὸν δάκτυλόν μας ;


Εἰς ὅλας τὰς περιπτώσεις παρατηροῦμεν ὅτι μία δύναμις ἐπενεργεῖ καθέτως ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας τῶν σωμάτων. Τῆς ἐπενεργείας ταύτης τὰ ἀποτελέσματα ἐξαρτῶνται ἀπὸ τὸ ἔμβιαδὸν τῆς ἐπιφανείας αὐτῆς.

Εἰς τὴν περίπτωσιν τῶν παιδιῶν ἐπάνω εἰς τὴν χιόνα, καὶ τὰ δύο ἀσκοῦν πίεσιν μὲ τὴν αὐτὴν δύναμιν, δηλ. μὲ τὸ βῆρος των, ἀλλὰ ἡ ἐπιφάνεια τῆς χιόνος, ἡ ὅποια πιέζεται μὲ τὰ παγοπέδιλα (σκι), εἶναι μεγαλύτερα παρά χωρὶς αὐτά. Τὸ αὐτὸ συμβαίνει καὶ μὲ τὸ τεμάχιον μαρμάρου : Ἡ ἴδια δύναμις εἰς τὰς διαφόρους θέσεις τῆς πιέζει διαφορετικὰς ἐπιφανείας ἄμμου. Ἀλλὰ καὶ ἡ ἐπιφάνεια τῆς πιπέζας καὶ ἡ ἐπιφάνεια τοῦ τοῖχου, εἰς τὸ σημεῖον ὅπου ἐφάπτεται ἡ ἀκίς τῆς, δέχονται τὴν αὐτὴν δύναμιν, τὴν δύναμιν τοῦ δακτύλου.


Τὴν δύναμιν αὐτὴν, ἡ ὅποια ἐνεργεῖ καθέτως πρὸς τὴν ἐπιφάνειαν τῶν σωμάτων, καλοῦμεν *πιέζουσαν δύναμιν*.




Σχ. 1. Ποῖον ἐκ τῶν δύο παιδιῶν μετακινεῖται εὐκολότερον ἐπὶ τῆς μαλακῆς χιόνος καὶ διατὶ;




Σχ. 2. Ἡ πίεσις, τὴν ὅποιαν ἄσκει τὸ τεμάχιον μαρμάρου εἰς καθὲν μίαν ἀπὸ τὰς τρεῖς θέσεις του, εἶναι : 10 p/cm<sup>2</sup>, 20 p/cm<sup>2</sup>, 40 p/cm<sup>2</sup>




Σχ. 3. Ἡ πίεσις ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν ἐπιφάνειαν ἐπαφῆς, ἐπὶ τῆς ὁποίας ἄσκειται ἡ δύναμις πίεσεως.





Σχ. 4. Είς τό Α: ἡ πίεσις εἶναι  $20 \text{ p/cm}^2$ , εἰς τό Β καί εἰς τό Γ: ἡ πίεσις εἶναι  $30 \text{ p/cm}^2$ .



Σχ. 5. Διατί τὰ φορτηγά αὐτοκίνητα, τὰ ὅποια μεταφέρουν βαρῆα φορτία, ἔχουν ὀπλοῦς τροχοῦς μέ ὀγκώδη ἔλαστικά.

Τὸ πηλίκον τῆς δυνάμεως πίεσεως διὰ τῆς πιεζομένης ἐπιφανείας ἐκφράζει τὴν τιμὴν τῆς δυνάμεως, ἡ ὁποία πιέζει τὴν μονάδα ἐπιφανείας, καὶ καλεῖται *πίεσις*.

## 2 Πίεσις.

Ἐὰν παρατηρήσωμεν μέ προσοχὴν τὰ σχήματα 2, 3, θὰ διαπιστώσωμεν ὅτι, ὅσον μικροτέρα εἶναι ἡ ἐπιφάνεια, ἐπὶ τῆς ὁποίας ἐνεργεῖ ἡ δύναμις (πίεσεως), τόσον φανερώτερον γίνεταί τὸ ἀποτέλεσμα, δηλ. τόσον τὸ σῶμα εἰσχωρεῖ βαθύτερον εἰς τὴν ἐπιφάνειαν.

Ἐπολογίζομεν καὶ εἰς τὰς τρεῖς περιπτώσεις τῶν πειραμάτων 2 καὶ 4 τὴν δυνάμιν πίεσεως, ἡ ὁποία ἀσκεῖται εἰς κάθε τετραγωνικὸν ἑκατοστὸν τῆς πιεζομένης ἐπιφανείας, καὶ εὐρίσκομεν :

Διὰ τὸ πείραμα 2 :

$$\frac{2000 \text{ p}}{200 \text{ cm}^2} = 10 \text{ p/cm}^2, \quad \frac{2000 \text{ p}}{100 \text{ cm}^2} = 20 \text{ p/cm}^2$$

$$\frac{2000}{50} = 40 \text{ p/cm}^2$$

Διὰ τὸ πείραμα 4:

$$\frac{4000 \text{ p}}{200 \text{ cm}^2} = 20 \text{ p/cm}^2, \quad \frac{6000 \text{ p}}{200 \text{ cm}^2} = 30 \text{ p/cm}^2$$

$$\frac{6000 \text{ p}}{200 \text{ cm}^2} = 30 \text{ p/cm}^2$$

**Συμπέρασμα:** Ἡ πίεσις, τὴν ὁποίαν ἀσκεῖ ἐν στερεῶν σῶμα ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας ἐπαφῆς του μέ ἐν ἄλλο, ἔχει μέτρον τὸ πηλίκον τῆς ἐντάσεως τῆς πιεζούσης δυνάμεως διὰ τοῦ ἔμβραδου τῆς ἐπιφανείας:

$$P \left( \frac{\text{p}}{\text{cm}^2} \right) = \frac{F \text{ (p)}}{S \text{ (cm}^2)}$$

## 3 Μονάδες πίεσεως.

Ἡ πίεσις ἐκφράζεται διὰ τῶν ἰδίων μονάδων, μετὰ τῶν ὁποίων μετροῦμεν τὴν ἐντασιν τῆς δυνάμεως καὶ τὸ ἔμβραδον τῆς ἐπιφανείας. Π.χ.

Εἰς πόντ κατὰ τετραγωνικὸν ἑκατοστόμετρον  $\text{p/cm}^2$

Εἰς κιλοπόντ κατὰ τετραγωνικὸν ἑκατοστόμετρον  $\text{Kp/cm}^2$

## 4 Ἐφαρμογαί.

α) Ἐὰν τὸ παιδίον, τὸ ὁποῖον βαδίζει ἐπάνω εἰς τὴν χιόνα, ἔχη βάρος 75 Kp καὶ ἡ ἐπιφάνεια ἐπαφῆς εἶναι  $300 \text{ cm}^2$ , τότε ἀσκεῖ πίεσιν :

$$\frac{75000 \text{ p}}{300 \text{ cm}^2} = 250 \text{ p/cm}^2$$

Ἐὐταν ὁμοῦς χρησιμοποιηθοῦν παγοπέδιλα (σκι), τότε ἡ ἐπιφάνεια ἐπαφῆς γίνεταί  $3000 \text{ cm}^2$  καὶ ἡ πίεσις :

$$\frac{75000 \text{ p}}{3000 \text{ cm}^2} = 25 \text{ p/cm}^2$$


Τοιοῦτοτρόπως ἀντιλαμβάνομεθα διατί μέ τὰ σκι βαδίζομεν εὐκολώτερον ἐπάνω εἰς τὴν χιόνα.

**Συμπέρασμα :** Ανάμεθα να ελαττώσωμεν τὴν πίεσιν, τὴν ὁποίαν ἄσκει ἐν σῶμα, ἐὰν αὐξήσωμεν τὴν ἐπιφάνειαν ἐπαφῆς; ἐπὶ τῆς ὁποίας ἀσκείται ἡ πιέζουσα δύναμις.

β) Ἡ πινέζα εἰσχωρεῖ εὐκόλως εἰς τὸ ξύλον, διότι, ἂν ὑποθέσωμεν ὅτι ἀσκούμεν ἐπ' αὐτῆς μίαν ὠθησιν 1 Kp καὶ ἡ ἀκίς αὐτῆς ἔχη ἐπιφάνειαν 0,001 cm<sup>2</sup>, τότε ἡ πίεσις εἰς τὸ ξύλον θὰ εἶναι :

$$\frac{1 \text{ Kp}}{0,001 \text{ cm}^2} = 1000 \text{ Kp/cm}^2 \text{ ἢ } 1 \text{ Mp/cm}^2$$

Τὰ αἰχμηρά ἐργαλεῖα (καρφιά, βελόνοι κλπ.) ἔχουν ἐπίσης ἐπιφάνειαν ἐπαφῆς, εἰς τὴν ὁποίαν ἡ ἀσκούμενη πιέζουσα δύναμις εἶναι πολὺ μικρά. Ἡ πιέζουσα δύναμις, ἡ ὁποία διαβιβάζεται δι' αὐτῶν, δημιουργεῖ πολὺ μεγάλην πίεσιν. Τὸ αὐτὸ συμβαίνει καὶ μὲ τὰ κοπτερά ἐργαλεῖα (μαχαίρας, ψαλλίδας κλπ.). Μία λεπτὴ κόπτει τόσο καλῦτερον, ὅσον λεπτοτέρα εἶναι ἡ κόφισ αὐτῆς.



Σχ. 5. Ὁ δάκτυλος πιέζει τὴν πινέζαν, μὲ δύναμιν 1 Kp, ἀλλ' ἡ πίεσις εἰς τὴν αἰχμὴν αὐτῆς εἶναι 1000 Kp/cm<sup>2</sup>.

**Συμπέρασμα :** Διὰ τὴν αὐξήσωμεν τὴν πίεσιν, τὴν ὁποίαν ἄσκει ἐν στερεόν, ἐλαττοῦμεν τὴν ἐπιφάνειαν ἐπαφῆς του, εἰς τὴν ὁποίαν ἀσκείται ἡ πιέζουσα δύναμις.

### ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ

1. Τὰ στερεὰ ἀσκοῦν πιέζουσαν δύναμιν ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας, εἰς τὴν ὁποίαν στηρίζονται.

2. Ἡ πίεσις, τὴν ὁποίαν ἀσκοῦν τὰ στερεὰ ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας, ἔχει μέτρον τὸ πηλίκον τῆς ἐντάσεως τῆς δυνάμεως, ἡ ὁποία ἐνεργεῖ καθέτως εἰς τὴν ἐπιφάνειαν αὐτὴν πρὸς τὸ ἐμβαδὸν τῆς πιεζομένης ἐπιφανείας.


3. Διὰ τὴν ἐμποδίσωμεν ἐν σῶμα νὰ εἰσέλθῃ ἐντὸς ἐνὸς ἄλλου, ἐλαττοῦμεν τὴν πίεσιν, αὐξάνοντες τὴν ἐπιφάνειαν ἐπαφῆς, εἰς τὴν ὁποίαν ἐνεργεῖ ἡ πιέζουσα δύναμις. Καὶ ἀντιθέτως, διὰ τὴν διευκολύνωμεν ἐν σῶμα νὰ εἰσέλθῃ εἰς ἐν ἄλλο, αὐξάνομεν τὴν πίεσιν, ἐλαττοῦντες τὴν πιεζομένην ἐπιφάνειαν.

### 24<sup>ON</sup> ΜΑΘΗΜΑ :


## ΠΙΕΣΕΙΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΑΙ ΥΠΟ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ

**1 Πειράματα.** α) Παραμορφούμεν ἐν δοχεῖον, ὅπως βλέπομεν εἰς τὸ σχῆμα, καὶ ἀνοίγομεν ὅπας εἰς διάφορα σημεῖα τῆς ἐπιφανείας του. Ἐὰν τὸ γεμίσωμεν μὲ ὕδωρ, παρατηροῦμεν ὅτι τὸ ὕδωρ ἐκτινάσσεται πρὸς τὰ ἔξω διὰ μέσου τῶν ὀπῶν αὐτῶν, καθέτως πρὸς τὸ μικρὸν τμήμα τῆς ἐπιφανείας, εἰς τὸ ὁποῖον εἶναι ἀνοιγμένη ἡ ὀπή.

β) Ἐφαρμόζομεν εἰς τὸ κάτω ἀνοίγμα ὑαλίνου κυλίνδρου ἓνα ἐλαφρὸν δίσκον ἐξ ἀλουμινίου. Ἐὰν βυθίσωμεν τὸν κύλινδρον εἰς τὸ ὕδωρ, παρατηροῦμεν ὅτι ὁ δίσκος μένει εἰς τὴν θέσιν του, εἴτε ὁ κύλινδρος εἶναι κατακόρυφος εἴτε ἔχει κάποιαν κλίσιν (σχ. 2).



Σχ. 1. Τὸ ὕδωρ ἐκτινάσσεται διὰ μέσου τῶν ὀπῶν μὲ διευθύναν καθέτων πρὸς τὸ τοίχωμα τοῦ δοχείου.



Σχ. 2. Είς τὸ Δ ἡ πιέζουσα δύναμις τοῦ ὕδατος ἀσκέεται καὶ εἰς τὰς δύο ἐπιφανείας τοῦ δίσκου. Ὁ δίσκος καὶ μόνον λόγω τοῦ βάρους του πίπτει.

● Τοῦτο συμβαίνει, διότι ἡ δύναμις  $F$ , ἡ ὁποία συγκρατεῖ τὸν δίσκον εἰς τὸ στόμιον τοῦ κυλίνδρου, εἶναι κάθετος πρὸς τὴν ἐπιφανείαν του. Ἄλλως, ἐὰν ἦτο πλαγία, θὰ ἐπρεπε νὰ ὀλισθησῇ ὁ δίσκος πρὸς τὸ στόμιον τοῦ κυλίνδρου.

**Συμπέρασμα:** *Τὰ ὑγρά, ἐπειδὴ ἔχουν βάρος, ἀσκοῦν πιέζουσαν δύναμιν ἐφ' ἐκάστης ἐπιφανείας, μετὰ τῆς ὁποίας ἔρχονται εἰς ἐπαφήν.*

## 2 Πίσεις εἰς ἓν σημεῖον ὑγροῦ.

Τὸ ὄργανον, τὸ ὁποῖον βλέπομεν εἰς τὸ σχῆμα (3), λέγεται **μανομετρικὴ κάψα** καὶ μὰς χρησιμεύει, διὰ νὰ μετῶμεν τὸν πιεστικὰς δυνάμεις, αἱ ὁποῖαι ἀσκοῦνται ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας τῆς μεμβράνης της, καὶ ἐπομένως καὶ τὰς πιέσεις.

Ἀπὸ τὸν τύπον τῆς πίσεως  $P = \frac{F}{S}$  βλέπομεν

ὅτι ἡ πίεσις εἶναι ἀνάλογος πρὸς τὴν δύναμιν, ἡ ὁποία πιέζει τὴν ἐπιφάνειαν.

● Τὸ χρωματισμένον ὑγρὸν εὐρίσκεται καὶ εἰς τὰ δύο σκέλη τοῦ σωλήνος ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ ὕψους, ὅταν ἐπὶ τῆς μεμβράνης οὐδεμία δύναμις ἐφαρμόζεται.


● Ἐὰν διὰ τοῦ δακτύλου μας πιέσωμεν ἐλαφρῶς τὴν μεμβράνην, ὁ ἀήρ, ὁ ὁποῖος εὐρίσκεται εἰς τὴν κάψαν, ἀναγκάζεται τὸ ὑγρὸν νὰ κατέλθῃ εἰς τὸ σκέλος 1 καὶ νὰ ἀνέλθῃ εἰς τὸ σκέλος 2. Ἐὰν πιέσωμεν περισσότερον, ἡ διαφορὰ ὕψους  $h$  εἰς τὰ δύο σκέλη τοῦ σωλήνος γίνεται μεγαλύτερα.

● α) Βυθίζομεν τὴν κάψαν ἐντὸς τοῦ ὕδατος (σχ. 4) καὶ παρατηροῦμεν ὅτι, ὅσον βαθύτερον βυθίζεται, τόσο ἐπὶ τὸ σκέλος 1 τὸ ὑγρὸν κατέρχεται καὶ ἀντιθέτως ἀνέρχεται εἰς τὸ ἄλλο σκέλος. Διατί ;


**Συμπέρασμα:** *Ἡ πίεσις ἐντὸς ἐνὸς ὑγροῦ, τὸ ὁποῖον εὐρίσκεται εἰς ἰσομερίαν, ἀξιάγει ἀναλόγως πρὸς τὸ βάθος.*

β) Χωρὶς νὰ μεταβάλωμεν τὸ βάθος, εἰς τὸ ὁποῖον εὐρίσκεται ἡ κάψα, ἀλλάσωμεν μόνον τὸν προσανατολισμὸν τῆς μεμβράνης της καὶ παρατηροῦμεν ὅτι ἡ διαφορὰ ὕψους τοῦ ὑγροῦ εἰς τὰ δύο σκέλη τοῦ σωλήνος δὲν μεταβάλλεται (σχ. 4).

γ) Τὸ αὐτὸ παρατηροῦμεν καὶ ἐὰν μετατοπίσωμεν τὴν κάψαν ἐντὸς τοῦ ὑγροῦ, εἰς τρόπον ὅμως ὥστε τὸ κέντρον αὐτῆς νὰ εὐρίσκεται πάντοτε εἰς τὸ ἴδιον βάθος (σχ. 4).




Σχ. 3. Μανομετρικὴ κάψα



Σχ. 4. Τὸ κέντρον τῆς μεμβράνης μετατοπίζεται κατὰ τὴν ὀριζόντιον XY. Ἡ διαφορὰ στάθμης  $h$  δὲν μεταβάλλεται.

**Συμπέρασμα:** *Ἡ πίεσις εἰς ἓν σημεῖον τοῦ ὑγροῦ δὲν ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸν προσανατολισμὸν τῆς πιεζομένης ἐπιφανείας καὶ εἶναι ἡ ἴδια εἰς ὅλα τὰ σημεία τῶν, τὰ ὁποῖα εὐρίσκονται εἰς τὸ αὐτὸ ὀριζόντιον ἐπίπεδον.*

δ) Βυθίζομεν με προσοχήν τὴν μανομετρικὴν κἀψαν εἰς ὠρισμένον βάθος, π.χ. 12 cm· εἰς τὰ τρία δοχεῖα τοῦ σχήματος 5, τῶν ὁποίων ἕκαστον περιέχει διαφορετικὸν ὑγρὸν.



Σχ. 5.

Θὰ παρατηρήσωμεν ὅτι  
Ἄλλὰ τὸ εἰδικὸν βάρος εἶναι

διὰ τὸ οἶνονπνευμα : 0,8 p/cm<sup>2</sup>      διὰ τὸ καθαρὸν ὕδωρ : 1 p/cm<sup>2</sup>      διὰ τὸ ἀλατισμένον ὕδωρ : 1,4 p/cm<sup>2</sup>

**Συμπέρασμα :** Ἡ πίεσις εἰς τὸ αὐτὸ βάθος ἐντὸς τῶν διαφόρων ὑγρῶν ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ εἰδικὸν βάρος ἑκάστου ὑγροῦ καὶ εἶναι τόσον μεγαλυτέρα, ὅσον μεγαλύτερον εἶναι τὸ εἰδικὸν βάρος τῶν.

### 3 Βασικὴ ἀρχὴ τῆς ὑδροστατικῆς :

● Ρίπτομεν ὕδωρ μέσα εἰς τὸν κύλινδρον τοῦ πειράματος (2) καὶ παρατηροῦμεν ὅτι, ὅταν ἡ ἐπιφάνειά του φθάσῃ εἰς τὸ ὕψος τῆς ἐξωτερικῆς ἐπιφανείας τοῦ ὕδατος, ὁ δίσκος πίπτει. Τὸ βάρος τοῦ ὕδατος μέσα εἰς τὸν κύλινδρον ἐξουδετερώνει τὴν πιέζουσαν δύναμιν F καὶ ὁ δίσκος πίπτει, ἐπειδὴ ἐνεργεῖ ἐπ' αὐτοῦ μόνον τὸ ἴδιόν του βάρος.

Ἄποδεικνύεται ὅτι :

Ἡ διαφορὰ πιέσεως  $P_A - P_B =$  μεταξὺ δύο σημείων A καὶ B ἐνὸς ὑγροῦ, τὸ ὁποῖον ἡρεμεῖ, εἶναι ἴση μὲ τὸ βάρος μιᾶς στήλης ὑγροῦ, ἡ ὁποία ἔχει τομὴν  $1 \text{ cm}^2$  καὶ ὕψος τὴν ἀπόστασιν h τῶν ὀριζοντίων ἐπιπέδων, τὰ ὁποῖα διέρχονται ἀπὸ αὐτὰ τὰ σημεία.

Ἐὰν τὸ εἰδικὸν βάρος ἐνὸς ὑγροῦ εἶναι ε, τότε ὁ ὄγκος μιᾶς στήλης ὑγροῦ, ἡ ὁποία ἔχει τομὴν  $1 \text{ cm}^2$  καὶ ὕψος h cm, θὰ εἶναι :

$$1 \text{ cm}^2 \times h \text{ cm} = h \text{ cm}^3$$


καὶ τὸ βάρος

$$\epsilon (\text{p/cm}^3) \times h (\text{cm}^3) = \epsilon \times h (\text{p})$$

καὶ ἡ διαφορὰ πιέσεως

$$P_A - P_B = \epsilon \times h$$

$$\text{p/cm}^2 \quad \text{p/cm}^3 \quad \text{cm}$$



Σχ. 6. Μεταξὺ τῶν σημείων A καὶ B ὑπάρχει διαφορὰ πιέσεως ἴση πρὸς τὸ βάρος στήλης ὑγροῦ A'B' τομῆς  $1 \text{ cm}^2$ .


### ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ

1. Ἐν ὑγρῶν ἐν ἰσορροπίᾳ ἄσκει εἰς ἑκάστην ἐπιφάνειαν, μετὴν ὁποῖαν εὐρίσκεται εἰς ἐπαφήν, μιαν πίεσιν, ἡ ὁποία ὀφείλεται εἰς τὸ βάρος του καὶ λέγεται ὑδροστατικὴ.


2. Ἡ ὑδροστατικὴ πίεσις  $p = F/S$  εἰς ἓν σημεῖον ὑγροῦ τινος, τὸ ὁποῖον ἡρεμεῖ, ἀξάνει μετὸ βάθος· δὲν ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸν προσανατολισμὸν τῆς πιεζομένης ἐπιφανείας καὶ εἶναι ἡ αὐτὴ εἰς ὅλα τὰ σημεία τοῦ ὑγροῦ, τὰ ὁποῖα εὐρίσκονται εἰς τὸ ἴδιον ὀριζόντιον ἐπίπεδον.

Ἐντὸς τῶν διαφόρων ὑγρῶν καὶ εἰς τὴν ἴδιαν ἀπόστασιν ἀπὸ τὴν ἐλευθέραν ἐπιφάνειάν των ἡ ὑδροστατικὴ πίεσις ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ εἰδικὸν βάρος των.


3. Ἡ διαφορὰ πιέσεως  $P_A - P_B$  μεταξὺ δύο σημείων A καὶ B ἐνὸς ἡρεμοῦντος ὑγροῦ εἶναι ἴση μὲ τὸ βάρος μιᾶς στήλης ὑγροῦ, ἐχούσης τομὴν  $1 \text{ cm}^2$  καὶ ὕψος τὴν ἀπόστασιν h τῶν ὀριζοντίων ἐπιπέδων, τὰ ὁποῖα διέρχονται ἀπὸ αὐτὰ τὰ σημεία.



Σχ. 1. Συσκευή διά την μελέτην τῆς δυνάμεως, ἣ ὁποία ἀσκεῖται εἰς τὸν πυθμένα τοῦ δοχείου.



Σχ. 2. Ἡ δύναμις, τὴν ὁποίαν ἀσκεῖ ἐν ὑγρὸν εἰς τὸν πυθμένα τοῦ δοχείου, εἶναι ἀνεξάρτητος ἀπὸ τὸ σχῆμα τοῦ.



Σχ. 3. Ἡ δύναμις ἐπὶ πυθμένος μὲ ἐπιφάνειαν S εἶναι :

$$F = \epsilon \times h \times S$$

$$F = \rho \text{ cm}^3 \text{ cm cm}^2$$

Γνωρίζομεν ὅτι ἡ ὑδροστατικὴ πίεσις εἰς τὸν πυθμένα ἐνὸς δοχείου εἶναι ἴση μὲ τὸ γινόμενον τοῦ εἰδικοῦ βάρους τοῦ ὑγροῦ ἐπὶ τὴν ἀπόστασιν h τοῦ πυθμένος ἀπὸ τὴν ἐλευθέραν ἐπιφάνειαν τοῦ ὑγροῦ.

Ἐπομένως ἡ δύναμις F, ἣ ὁποία πιέζει τὸν πυθμένα μὲ ἐπιφάνειαν S (cm<sup>2</sup>), θὰ εἶναι :

$$F(p) = \epsilon (\rho/\text{cm}^3) \times h(\text{cm}) \times S (\text{cm}^2)$$

**Συμπέρασμα :** Ἡ δύναμις F, ἣ ὁποία πιέζει τὸν πυθμένα ἐνὸς δοχείου, εἶναι ἴση πρὸς τὸ βάρος στήλης ὑγροῦ, ἐχούσης βάσιν τὸν πυθμένα τοῦ δοχείου καὶ ὕψος τὴν ἀπόστασιν τὸν ἀπὸ τὴν ἐλευθέραν ἐπιφάνειαν τοῦ ὑγροῦ.  $F = \epsilon \times h \times S$

## ΠΙΕΣΕΙΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΑΙ ΥΠΟ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΕΙΣ ΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΑΥΤΑ

### 1 Πίεσις ἐπὶ τοῦ πυθμένος.

● Μὲ τὸ ὄργανον τοῦ σχήματος 1 μετροῦμεν τὴν πίεσιν, τὴν ὁποίαν ἀσκεῖ ἐν ὑγρὸν εἰς τὸν πυθμένα δοχείου. Τὸ κυλινδρικὸν δοχεῖον τοῦ ὄργανου δύναται νὰ ἀντικατασταθῇ διὰ διαφόρων δοχείων, τὰ ὅποια ἔχουν ὡς πυθμένα τὴν ἐλαστικὴν μεμβράνην τοῦ ὄργανου.

● Ρίπτομεν ὕδωρ εἰς τὸ πρῶτον κυλινδρικὸν δοχεῖον, ἕως ὅτου ἡ ἐλευθέρη ἐπιφάνειά του φθάσῃ εἰς ἐν σημεῖον, τὸ ὁποῖον ὀρίζομεν μὲ τὸν δείκτην A.

Ἐλευθέρη ἐπιφάνειά του φθάσῃ εἰς τὸ σημεῖον B, τὸ ὁποῖον ὀρίζομεν μὲ τὸν δείκτην A. Ὁ ἐλαστικὸς πυθμὴν κυρτοῦται καὶ τὸ ἄκρον τῆς βελόνης σταματᾷ εἰς ὠρισμένην ὑποδιαίρεσιν τοῦ ἡριθμημένου τόξου, ἔστω π.χ. εἰς τὸ 5.

● Ἀπομακρύνομεν τὸν κύλινδρον καὶ παρατηροῦμεν ὅτι ὁ δείκτης ἐπιστρέφει εἰς τὸ 0.

● Ἄν αντικαταστήσωμεν τὸ κυλινδρικὸν δοχεῖον δι' ἐνὸς ἐκ τῶν ἄλλων, θὰ ἴδωμεν, ὅταν ἐπαναλάβωμεν τὸ πείραμα, ὅτι, ὅταν ἡ ἐλευθέρη ἐπιφάνεια τοῦ ὕδατος φθάσῃ εἰς τὸ ἴδιον σημεῖον, τὸ ὁποῖον ὀρίζει ὁ δείκτης A, ἡ βελὸνὴ σταματᾷ καὶ πάλιν εἰς τὴν ὑποδιαίρεσιν 5 (σχ. 2).

Ἄν ἀντὶ ὕδατος ριψώμεν εἰς τὸ κυλινδρικὸν δοχεῖον οἰνόπνευμα, ἕως ὅτου ἡ ἐπιφάνεια φθάσῃ εἰς τὸ ὠρισμένον σημεῖον, παρατηροῦμεν ὅτι ἡ βελὸνὴ σταματᾷ εἰς τὴν ὑποδιαίρεσιν 4. Εἰς τὴν ἴδιαν ὑποδιαίρεσιν θὰ σταματήσῃ, ἐὰν ἐπαναλάβωμεν τὸ πείραμα καὶ μὲ τὰ ἄλλα δοχεῖα μὲ ὑγρὸν πάλιν τὸ οἰνόπνευμα.

**Συμπέρασμα :** Ἡ δύναμις, ἣ ὁποία πιέζει τὸν πυθμένα δοχείου περιέχοντος ὑγρὸν, δὲν ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ σχῆμα τοῦ δοχείου, ἀλλ' ἀπὸ τὸ ἐμβαδὸν τοῦ πυθμένος, τὸ δὲ ὕψος τοῦ πυθμένος ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν ἐλευθέραν ἐπιφάνειαν τοῦ ὑγροῦ καὶ ἀπὸ τὸ εἰδικὸν βάρος τοῦ ὑγροῦ.

### 2 Ὑπολογισμὸς τῆς δυνάμεως, ἣ ὁποία πιέζει τὸν πυθμένα τοῦ δοχείου.

### 3 Πίσεις την οποίαν άσκει έν υγρόν εις τὰ τοιχώματα του δοχείου.

α) Πείραμα. Άνοιγομεν εις τὸ πλευρικόν τοίχωμα ένός δοχείου τρεῖς ὀπές, ὅπως φαίνεται εις τὸ σχῆμα 4.

Έάν γεμίσωμεν τὸ δοχεῖον μὲ ὕδωρ, παρατηροῦμεν ὅτι αὐτὸ ἐκτινάσσεται ἀπὸ τὰς ὀπές εις τόσον μεγαλυτέραν ἀπόστασιν, ὅσον περισσότερον ἀπέχει ἡ ὀπή ἀπὸ τὴν ἐλευθέραν ἐπιφάνειαν τοῦ ὕδατος.

β) Έξήγησις. Έστω ὅτι αἱ τρεῖς ὀπαι A, B, Γ, εὔρισκονται ἐκάστη εις ἀπόστασιν  $h_A$ ,  $h_B$ ,  $h_C$  ἀπὸ τὴν ἐλευθέραν ἐπιφάνειαν τοῦ ὕγρου, τὸ ὅποιον ἔχει εἰδικὸν βάρος  $\epsilon$ . Ἡ πίσις, τὴν ὅποιαν άσκει τὸ ὕγρον, εις τὸ σημεῖον A, θά εἶναι :

$$P_A = h_A \times \epsilon$$

Καὶ ἡ ὄθησις εις μίαν μικρὰν ἐπιφάνειαν S περίε τοῦ σημείου A :

$$F_A = h_A \times \epsilon \times S$$

Μὲ τὸν ἴδιον τρόπον εὔρισκομεν ὅτι ἡ ὄθησις εις τὰ σημεία B καὶ Γ εἶναι :

$$F_B = \epsilon \times h_B \times S \quad F_C = \epsilon \times h_C \times S$$

καὶ ἐπειδὴ  $h_A < h_B < h_C$

ἔχομεν  $F_A < F_B < F_C$

**Συμπέρασμα:** Ἡ δύναμις πίσεως, ἡ άσκομένη ὑπὸ τινος ὕγρου εις διάφορα τμήματα τῶν τοιχωμάτων τοῦ δοχείου, τὰ ὁποῖα ἔχον τὴν αὐτὴν ἐπιφάνειαν, εἶναι τόσον μεγαλυτέρα, ὅσον περισσότερον ἀπέχει τὸ τμήμα αὐτὸ ἀπὸ τὴν ἐλευθέραν ἐπιφάνειαν τοῦ ὕγρου. Ἡ ὄθησις αὐτὴ δὲν ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ σχῆμα τοῦ δοχείου.

γ) Ἐν παραδόξον πείραμα:

Εἰς μικρὸν βαρέλιον πλῆρες ὕδατος (σχ. 5) προσαρμόζομεν κατακόρυφον σωλῆνα, ὕψους 5 m καὶ τομῆς  $4 \text{ cm}^2$ .

Διὰ νὰ γεμίσωμεν τὸν σωλῆνα, ἀπαιτεῖται ποσότης  $4 \text{ cm}^2 \times 500 \text{ cm} = 2000 \text{ cm}^3$  ἢ 2 l ὕδατος.

Αὐτὴ ἡ ποσότης εἶναι ἀρκετὴ, διὰ νὰ διαρραγῇ τὸ βαρέλιον.


Διότι εις κάθε σημεῖον τῶν τοιχωμάτων του ἡ πίσις ἐμεγάλωσε τόσον, ὅσον εἶναι τὸ βάρος στήλης ὕδατος, τὸ ὅποιον ἔχει ὕψος 5 m καὶ τομῆν  $1 \text{ cm}^2$ , δηλ.  $0,5 \text{ Kp/cm}^2$ .

Έάν ἐκάστη σάνις τοῦ βαρελίου ἔχη ἐπιφάνειαν  $10 \text{ dm}^2$  ἢ  $100 \text{ cm}^2$ , τότε ἐξ αἰτίας τοῦ ὕδατος, τὸ ὅποιον ἐχύσαμεν εις τὸν σωλῆνα, θά μεγαλώσῃ ἡ δύναμις, ἡ πιέζουσα τὴν σάνιδα κατὰ


$$0,5 \text{ Kp/cm}^2 \times 1000 \text{ cm}^2 = 500 \text{ Kp}$$

Εἶναι ἐπόμενον ὅτι ἐνθὰ δυνηθῇ νὰ συγκρατήσῃ μίαν τοιαύτην δύναμιν.


4 Ἐφαρμογή. Ὁ ἰδρανλικὸς στρόβιλος τοῦ σχήματος (6) στρέφεται περί τὸν άξονά του, διότι εις τὸ σημεῖον A τοῦ σωλῆνος τὸ ὕγρον άσκει μίαν δύναμιν F, ἡ ὁποία δὲν ἐξουδετερῶνεται ἀπὸ τὴν ἀπέναντι πλευράν, ἐπειδὴ ὁ σωλῆν εἶναι ἀνοικτός. Τὸ αὐτὸ συμβαίνει καὶ εις




Σχ. 4. Ἡ δύναμις εις τὰ τοιχώματα τοῦ δοχείου αὐξάνει μὲ τὴν αὐξάνειν τοῦ βάθους.



Σχ. 5. Πείραμα Pascal



Σχ. 6. Ὑδραυλικὸς στρόβιλος



Σχ. 7. Τομή φράγματος

το σημείον Β. Αι δύο αὔται δυνάμεις F καὶ F' ἀναγκάζουν τὸν στρόβιλον νὰ περιστρέφεται.

Τὸ ὑδραυλικὸν φράγμα (σχ. 7) προορίζεται νὰ συγκρατήσῃ τὸ ὕδωρ μίᾳς τεχνητῆς λίμνης, τῆς ὁποίας τὸ ὕψος φθάνει συνήθως τὰ 100 m. Τὸ φράγμα εἶναι κατεσκευασμένον εἰς τὴν βάσιν του παχύτερον, ἐπειδὴ, ὅπως γνωρίζομεν, αἱ πιεστικαὶ δυνάμεις αὐξάνουν, ὅσον περισσότερο ἀπομακρυνόμεθα ἐκ τῆς ἐλευθέρως ἐπιφανείας τοῦ ὕδατος.

### ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ


1. Ἡ δύναμις, μετὴν ἧς ὕδρον πιέζει τὸν πυθμένα δοχείου, δὲν ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ σχῆμα τοῦ δοχείου.
2. Εἶναι ἰση μετὸ βῆρος στήλης ὕγρου, ἣ ἰσὶα ἔχει τομὴν τὸν πυθμένα τοῦ δοχείου καὶ ὕψος τὴν ἀπόστασίν του ἀπὸ τὴν ἐλευθέραν ἐπιφάνειαν τοῦ ὕγρου.
3. Ἡ δύναμις, μετὴν ἧς ὕδρον πιέζει ἕν τμήμα τοῦ τοιχώματος, εἶναι τόσον μεγαλύτερα, ὅσον περισσότερο ἀπέχει τὸ τμήμα αὐτὸ ἀπὸ τὴν ἐλευθέραν ἐπιφάνειαν τοῦ ὕγρου. Ἡ δύναμις αὐτὴ δὲν ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ σχῆμα τοῦ δοχείου.

260<sup>ON</sup> ΜΑΘΗΜΑ : Ἀρχὴ τοῦ Pascal.

### ΜΕΤΑΔΟΣΙΣ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΥΠΟ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ





Σχ. 1.



**Πείραμα.** Γεμίζομεν μετ' ὕδωρ δοχεῖον, τὸ ὁποῖον ἔχει δύο στόμια, καὶ κλείομεν αὐτὰ μετὰ πώματα Α καὶ Β (σχ. 1).

• Ἄν κτυπήσωμεν ἀποτόμως διὰ τῆς χειρὸς μας τὸ πῶμα Α, τὸ Β ἐκτινάσσεται μετ' ὀρμῆν εἰς τὸν ἀέρα. Τὸ ὕδρον λοιπὸν μεταδίδει εἰς τὴν κάτω ἐπιφάνειαν τοῦ πώματος Β μίαν δύναμιν λόγῳ τῆς δυνάμεως, ἣ ὁποία ἐνήργησεν εἰς τὸ πῶμα Α.



Σχ. 2



● Ἀποδεικνύεται ὅτι τὸ ὕδωρ μεταδίδει εἰς τὸ Β ἀμετάβλητον τὴν πίεσιν, ἣ ὁποία ἀσκεῖται εἰς τὸ Α. Ἡ ἰδιότης αὕτη τῶν ὑγρῶν διατυπῶνται μὲ τὴν ἀρχὴν τοῦ Pascal :


Τὰ ὑγρά, ἐπειδὴ εἶναι ἀσυμπιεστά, μεταδίδουν τὰς πιέσεις ποὺ δέχονται ἀμεταβλήτους πρὸς ὅλας τὰς διευθύνσεις.

**2 Πείραμα.** Ἐάν πιέσωμεν τὴν ἐλαστικὴν σφαιρᾶν, τὴν ὁποῖαν βλέπομεν εἰς τὸ σχῆμα 2, τὸ ὕδωρ ἀνέρχεται ἐντὸς τῶν ὑαλίνων σωληνῶν καὶ φθάνει εἰς ὅλους εἰς τὸ αὐτὸ ὕψος.

Τοῦτο συμβαίνει, διότι αὐξάνει ἡ πίεσις εἰς τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ ὑγροῦ ἐντὸς τοῦ δοχείου καὶ ἡ πίεσις αὕτη μεταδίδεται, ὅπως βλέπομεν, ἀμετάβλητος πρὸς ὅλας τὰς διευθύνσεις. Δηλαδή, ἐνῶ εἰς τὸν ἕνα σωλῆνα ἡ πίεσις ἐνεργεῖ ἐκ τῶν κάτω πρὸς τὰ ἄνω, εἰς τὸν δευτέρου ἐκ τῶν ἄνω πρὸς τὰ κάτω καὶ εἰς τὸν τρίτον ἀπὸ τὰ πλάγια, τὸ ὕδωρ φθάνει εἰς ὅλους τοὺς σωλῆνας εἰς τὸ ἴδιον ὕψος.

**3 Ἐφαρμογή: Τὸ ὑδραυλικὸν πιεστήριον.**

Ἐχομεν δύο κυλινδρῆ καὶ δοχεῖα πλήρη ὕδατος, τὰ ὁποῖα συγκοινωνοῦν διὰ τοῦ κατωτέρου μέρους των. Ἐντὸς αὐτῶν τῶν δύο δοχείων κινουῦνται ἐλευθέρως δύο ἔμβολα, τὰ ὁποῖα ἐφαρμύζουν ὕδατοστεγῶς εἰς τὰ τοιχώματά των (σχ. 3).



Σχ. 3.  
Ἐδραυλικὸν  
πιεστήριον

Συμφώνως πρὸς τὴν ἀρχὴν τοῦ Pascal, ἐκάστη αὐξήσις τῆς πίεσεως εἰς τὴν ἐπιφάνειαν Α μεταδίδεται ἀμετάβλητος εἰς ὅλον τὸ ὑγρὸν καὶ ἐπομένως εἰς ὅλα τὰ σημεῖα τῆς κάτω ἐπιφάνειας τοῦ ἔμβολου Β.

Ἐστω ὅτι ἡ ἐπιφάνεια τοῦ μικροῦ ἔμβολου εἶναι  $s$  καὶ τοῦ μεγάλου  $S$ . Ἐάν ἀσκήσωμεν μίαν δύναμιν  $f$  κάθετον εἰς τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ μικροῦ ἔμβολου, ἡ δύναμις αὕτη θὰ ἐπιφέρει αὐξήσιν τῆς πίεσεως  $P$ , τοιαύτην εἰς ὅλα τὰ σημεῖα τοῦ ὑγροῦ, ὥστε νὰ ἔχωμεν :

$$f = P \times s$$

Ἡ πίεσις αὕτη  $P$  μεταδίδεται ἀμετάβλητος εἰς τὴν κατωτέραν ἐπιφάνειαν τοῦ μεγάλου ἔμβολου, τὸ ὅποιον τότε θὰ δέχεται μίαν δύναμιν :

$$F = P \times S \text{ καὶ ἐπομένως :}$$

$$\frac{F}{f} = \frac{P \times S}{P \times s} \quad \eta \quad \frac{F}{f} = \frac{S}{s} \quad \eta \quad F = f \times \frac{S}{s}$$

**Ἀριθμητικὸν παράδειγμα.** Ἐάν ἡ μία ἐπιφάνεια εἶναι  $20 \text{ cm}^2$  καὶ ἄλλη  $500 \text{ cm}^2$ , καὶ ἐφαρμύσωμεν εἰς τὸ μικρὸν ἔμβολον μίαν κάθετον δύναμιν  $6 \text{ Kp}$ , τότε εἰς τὸ ἔμβολον αὐτὸ θὰ ἀσκηθῇ μία :

$$6 \text{ Kp} / 20 \text{ cm}^2 = 0,3 \text{ Kp/cm}^2$$

Συμφώνως πρὸς τὰ προηγούμενα ἡ πίεσις, τὴν ὁποῖαν θὰ μεταδώσῃ τὸ ὑγρὸν εἰς τὴν κάτω ἐπιφάνειαν τοῦ μεγάλου ἔμβολου, θὰ εἶναι ἡ ἴδια, δηλ.  $0,3 \text{ Kp/cm}^2$  καὶ ἡ δύναμις, ἡ ὁποῖα τὸ πιέζει :

$$F = 0,3 \text{ Kp/cm}^2 \times 500 \text{ cm}^2 = 150 \text{ Kp}$$

Ἀρκεῖ λοιπὸν νὰ ἀσκηθῇ ἐπὶ τοῦ μικροῦ ἔμβολου μία δύναμις  $6 \text{ Kp}$ , διὰ νὰ ἔχωμεν ἐπὶ τοῦ μεγάλου ἔμβολου μίαν δύναμιν :

$$6 \text{ Kp} \times 500/20 \quad \eta \quad 6 \text{ Kp} \times 25 = 150 \text{ Kp}$$


Αν όμως με την ενέργειαν τῆς δυνάμεως τῶν 6 Κρ τὸ μικρὸν ἔμβολον κατέρχεται π.χ. κατὰ 25 cm, τὸ μεγάλο ἀνέρχεται κατὰ 1 cm.

Εἰς μετατόπισιν Δ τοῦ μικροῦ ἐμβόλου ἀντιστοιχεῖ μία μετατόπισις τοῦ μεγάλου ἐμβόλου.

Ἐπειδὴ ὁ λόγος S/s τῶν ἐπιφανειῶν τῶν δύο ἐμβόλων εἶναι ἴσος μετὸν λόγον τῶν τετραγώνων τῶν διαμέτρων των, μετὸ ὑδραυλικὸν πιεστήριον δυνάμεθα νὰ ἐπιτύχωμεν πολὺ μεγάλας πιέσεις.

#### 4 Χρήσις τοῦ ὑδραυλικοῦ πιεστηρίου.

Χρησιμοποιοῦμεν κυρίως τὸ ὑδραυλικὸν πιεστήριον εἰς τὴν βιομηχανίαν, διὰ νὰ πραγματοποιῶμεν πολὺ μεγάλας πιεστικὰς δυνάμεις. Ὅπως π.χ. διὰ νὰ περιορίζωμεν τὸν ὄγκον διαφόρων ὑλικῶν (ἀχύρου, βάμβακος κλπ.), διὰ νὰ δίδωμεν τὸ σχῆμα εἰς μέταλλα ἀντικείμενα, ὅπως τὰ ἐλάσματα τοῦ σκελετοῦ τῶν αὐτοκινήτων, διὰ νὰ ἐξάγωμεν τὸ ἔλαιον ἀπὸ τὸν καρπὸν τῆς ἐλαίας, ἠλιόσπορον, βαμβακόσπορον κλπ.



Σχ. 4. Ὑδραυλικὸν φρένον

Τὰ ὑδραυλικά φρένα τῶν αὐτοκινήτων (σχ. 3) εἶναι ἐπίσης μία ἐφαρμογὴ τῆς Ἀρχῆς τοῦ Pascal. Ὡς ὑγρὸν χρησιμοποιοῦμεν ἓν πολὺ λεπτόρευστον ἔλαιον. Ἡ πίεσις, τὴν ὁποίαν ἀσκούμεν διὰ τοῦ ποδὸς μας εἰς τὸ πεντάλ, μεταδίδεται ἀμετάβλητος εἰς ὅλα τὰ σημεῖα τοῦ ὑγροῦ καὶ ἰδιαιτέρως εἰς τὰ ἔμβολα, τὰ ὁποῖα ἐνεργοῦν ἐπὶ τῶν σιαγόνων τῶν φρένων.

#### ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ

1. Ἀρχὴ τοῦ Pascal. Τὰ ὑγρά, ἐπειδὴ εἶναι ἀσυμπιεστά, μεταδίδουν τὰς πιέσεις, τὰς ὁποίας δέχονται, ἀμεταβλήτους πρὸς ὅλας τὰς διευθύνσεις.

2. Τὸ ὑδραυλικὸν πιεστήριον εἶναι μία ἐφαρμογὴ τῆς ἀρχῆς τοῦ Pascal. Ἀποτελεῖται ἐκ δύο κυλίνδρων, οἱ ὁποῖοι συγκοινονοῦν μεταξύ των ἀπὸ τὴν βάσιν των καὶ εἶναι πλήρεις ὑγροῦ. Ἐντὸς ἐκάστου ἐξ αὐτῶν τῶν κυλίνδρων ἠμπορεῖ νὰ κινῆται ἓν ἔμβολον, τὸ ὁποῖον ἐφαρμόζει ὕδατοστεγῶς εἰς τὰ τοιχώματά των. Ἄν αἰ ἐπιφάνεια τῶν ἐμβόλων εἶναι S καὶ s καὶ μία δύναμις f ἐνεργῆ καθέτως ἐπὶ τοῦ μικροῦ ἐμβόλου, τότε τὸ μεγάλο ἔμβολον θὰ δέχεται μίαν δύναμιν :

$$F = f \frac{S}{s}$$

3. Μετὸ ὑδραυλικὸν πιεστήριον δυνάμεθα νὰ ἐπιτύχωμεν ἀξιολόγους πιεστικὰς δυνάμεις δι' αὐτὸ χρησιμοποιεῖται εἰς τὴν βιομηχανίαν πρὸς περιορισμὸν τοῦ ὄγκου διαφόρων ὑλικῶν (ἀχύρου, βάμβακος κλπ.), καθὼς καὶ διὰ νὰ δίδῃ τὸ σχῆμα εἰς μέταλλα ἀντικείμενα, ὅπως εἶναι τὰ ἐλάσματα τοῦ σκελετοῦ (καρτόσας) τῶν αὐτοκινήτων. Τέλος, μετὸ ἐξάγωμεν τὸ ἔλαιον ἀπὸ τὸν καρπὸν τῆς ἐλαίας, ἀπὸ τὸν ἠλιόσπορον, βαμβακόσπορον κλπ.

## Σειρά 6 : Αί πιέσεις.

## I. Ή έννοια τής πίεσεως

1. Μία πλίνθος με διαστάσεις: 22 cm, 11 cm, 5,5 cm και ειδικόν βάρος 2 p/cm<sup>3</sup> στηρίζεται εις τόν έδαφος. Νά υπολογισθή:

α) Ή πιεστική δύναμις, τήν όποιαν άσκει ή πλίνθος επί του έδαφους.

β) Ή πίεσις εις p/cm<sup>2</sup>, ή όποια άσκειται εις τόν έδαφος, όταν ή πλίνθος στηρίζεται διαδοχικώς εις κάθε μίαν έδραν του.

2. Έν άγαλμα, τó όποιον ζυγίζει 2,4 Μρ, είναι τοποθετημένον εις βάθρον, βάρους 1,8 Μρ, τó όποιον έχει επιφάνειαν βάσεως 1,40 m<sup>2</sup>:

α) Πόσην πιεστικήν δύναμιν άσκει τó συγκρότημα άγαλμα-βάθρον εις τόν έδαφος;

β) Ποία πίεσις άσκειται από τήν βάσιν του βάθρου επί του έδαφους εις Μρ/m<sup>2</sup>; εις Κρ/cm<sup>2</sup>;

3. Ένας άνθρωπος ζυγίζει 65 Κρ:

α) Ποίαν πίεσιν άσκει επί του πάγου, όταν κάμνη «πατινάζ», εάν ή επιφάνεια έπαφής, τήν όποιαν έχουν αι δύο λάμαι τών πατινών του, είναι 20 cm<sup>2</sup>;

β) Έάν φωνή σκί, πράγμα τó όποιον είναι δύο λεπταί σανίδες μήκους 2 m και πλάτους 10 cm, πόση θά είναι τότε ή πίεσις;

γ) Έάν πατή με τά υποδήματα του εις τó χιόνι και ή επιφάνεια έπαφής είναι 250 cm<sup>2</sup>, πόση θά είναι ή πίεσις;

4. Έν βάθρον, τó όποιον ζυγίζει 4 Κρ, στηρίζεται εις όριζόντιον έδαφος με 4 πόδας, τών όποιων έκαστος έχει τετραγωνικήν τομήν με πλευράν 3 cm.

Πόσην πίεσιν δέχεται ή επιφάνεια στηρίξεως, όταν έν άτομον 60 Κρ άναβή εις τόν βάθρον;

5. Δεχόμεθα ότι ή αίχμη ενός καρφιού είναι ένας μικρός κύκλος με διάμετρον 0,08 mm. Ποία πίεσις άσκειται εις τήν επιφάνειαν έπαφής, όταν ή κεφαλή του καρφιού δεχθή έν κύκλιμα σφυριού, τó όποιον προκαλεί πιεστικήν δύναμιν 5 Κρ;

6. Ένας στύλος ζυγίζει 2,5 Μρ και στηρίζεται εις έδαφος, τó όποιον δέν ήμπερι νά δεχθή πίεσιν περισσοτέραν από 0,4 Κρ/cm<sup>2</sup>:

Πόση είναι ή μικροτέρα επιφάνεια, τήν όποιαν ήμπερι νά έχη ή βάσις τής στηρίξεώς του;

7. Ό πύργος του Άιφελ ζυγίζει 7000 Μρ και στηρίζεται επί τεσσάρων όμοίων ύποστηριγμάτων:

α) Ποία είναι ή θεωρητική πιεστική δύναμις, τήν όποιαν δέχεται κάθε ύποστηρίγμα τού, άν δεχθώμεν ότι αυτή ή δύναμις διαμοιράζεται όμοιόμορφως;

β) Διά νά έξουδετερώσωμεν τήν δράσιν του ανέμου, ό όποιος δημιουργεί άνισομερή κατανομήν τών δυνάμεων επί τών ύποστηριγμάτων, λαμβάνομεν τήν πιεστικήν δύναμιν ίσην με 2000 Μρ.

Πόσην επιφάνειαν έχομεν δώσει εις τó ύπόβαθρον τής κατασκευής, εις τó όποιον στηρίζεται κάθε ύποστηρίγμα, ώστε ή πίεσις νά μή ύπερβαίνη τά 0,4 Κρ/cm<sup>2</sup>;

8. Τά δύο έμπρόσθια έλαστικά ενός αυτοκινήτου περιέχουν άερα με πίεσιν 1,3 Κρ/cm<sup>2</sup>, ένθ' τά δύο άλλα με πίεσιν 1,5 Κρ/cm<sup>2</sup>. Κάθε έλαστικόν στηρί-

ζεται εις τόν έδαφος με τετραγωνικήν επιφάνειαν έπαφής, ή όποια έχει πλευράν 0,15 cm:

α) Νά υπολογισθή ή πιεστική δύναμις, ή όποια άσκειται εις τόν έμπρόσθιον μέρος του αυτοκινήτου, και έκείνη, ή όποια άσκειται εις τόν όπίσθιον μέρος αυτού.

β) Νά εύρεθ ή τó βάρος του αυτοκινήτου.

## II. Πίεσεις άσκούμεναι ύπό τών υγρών

9. Τó κέντρον μιάς μανομετρικής κάψης εύρίσκεται 25 cm κάτω από τήν έλευθέραν επιφάνειαν ενός υγρού.

Ποίαν πίεσιν δεικνύει τó όργανον, εάν τó υγρόν είναι:

α) Καθαρόν ύδωρ (ειδικόν βάρος: 1 p/cm<sup>3</sup>).

β) Οινόπνευμα; (ειδικόν βάρος: 0,8 p/cm<sup>3</sup>).

γ) Ύδωρ με άλας; (ειδικόν βάρος: 1,03 p/cm<sup>3</sup>).

10. Εις ποιον βάθος πρέπει νά βυθισώμεν τήν μανομετρικήν κάψαν, διά νά άσκηθ ή εις τήν μεμβράνην αυτής πίεσις 16 p/cm<sup>2</sup>; α) εις καθαρόν ύδωρ; β) εις οινόπνευμα γ) εις ύδωρ με άλας; (ειδικά βάρη του προβλήματος 9).

11. Εις ποιον βάθος ή πίεσις, ή όποια άσκειται ύπό του ύδατος, είναι 1 Κρ/cm<sup>2</sup>;

α) Εις λίμνην γλυκέος ύδατος.

β) Εις θαλάσσαν (ειδικόν βάρος θαλασσίου ύδατος: 1,03 Κρ/dm<sup>3</sup>).

12. Τó πώμα ενός λουτρού έχει διάμετρον 5 cm. Με πόσην δύναμιν πρέπει νά σύρωμεν τó πώμα, διά νά έκκενώσωμεν τó λουτρόν, εάν τó ύδωρ έντός αυτού έχη ύψος 40 cm;

13. Διά νά λειτουργήσ η ένας μικρός υδραυλικός στρόβιλος, πρέπει νά άσκηθ ή πίεσις 250 p/cm<sup>2</sup>. Εις πόσον ύψος από του στρόβιλου αυτού πρέπει νά τοποθετηθ τó δοχείον με τó ύδωρ, τó όποιον τροφοδοτεί τήν συσκευήν, διά νά έξασφαλισώμεν τήν λειτουργίαν αυτής;

14. Ό άνθρωπος δύναται άνευ κινδύνου νά δεχθ ή μεγίστην πίεσιν 3 Κρ/cm<sup>2</sup>. Μέχρι ποίου βάθους λοιπόν δύναται νά κατέλθ η ένας δύτης εις τήν θάλασσαν, όπου τó ύδωρ έχει ειδικόν βάρος 1,034 p/cm<sup>3</sup>.

15. Τó βαθυσκάφος «Τεργέστη» κατέρριψε πρώτον τó ρεκόρ καταδύσεως με τó νά φθάσ η εις τó βάθος τών 5486 m. Αυτό έγινεν εις τήν περιοχην Tranchée de mariannes (Ειρηνικός), όπου τó βαθύτερον σημείον φθάνει εις τά 11.500 m. Νά υπολογισθ ή:

α) Ή πίεσις εις Κρ/cm<sup>2</sup>, ή όποια ήσκηθ ή από τó θαλασσίνιον ύδωρ εις τά τοιχώματα του βαθυσκάφους εις τó βάθος έκείνου.

β) Ή πίεσις, τήν όποιαν έδέχθη αυτό τó τοίχωμα, όταν (22 Ίανουαριου 1960) τó βαθυσκάφος κατήλθεν εις τó βαθύτερον σημείον τής ύποβρυχίου χαράδρας. Δεχόμεθα ότι τó ειδικόν βάρος του θαλασσίου ύδατος είναι σταθερόν (1,03 Κρ/dm<sup>3</sup>).

16. Μία φιάλη με επίπεδον πυθμένα διάμετρον 8 cm περιέχει υδράργυρον έως τó ύψος τών 5 cm.

Προσθέτομεν ύδωρ, έως ότου ή στάθμη του εύρεθ ή εις άπόσταση 20 cm από τήν στάθμη του υδραργύρου. Νά υπολογισθ ή:

α) Ἡ δύναμις ἢ ὅποια ἀσκείται εἰς τὸν πυθμένα τῆς φιάλης.


β) Ἡ πίεσις εἰς  $\rho/\text{cm}^2$ .

17. Τὸ κέντρον ἑνὸς πλευρικοῦ παραθύρου βαθυσκάφους, τὸ ὅποιον ἔχει σχῆμα ὀρθογώνιον με διαστάσεις  $60 \text{ cm} \times 40 \text{ cm}$ , εὐρίσκεται εἰς βάθος  $2500 \text{ m}$ :

α) Πόση πίεσις ἀσκείται ἐπὶ τοῦ παραθύρου αὐτοῦ;

β) Πόση πιεστική δύναμις;

(Σχετική πυκνότης θαλασσίου ὕδατος = 1,03).



18. Τὸ δοχεῖον τοῦ σχήματος 1, τὸ ὅποιον ἔχει χωρητικότητα  $29,6 \text{ l}$ , εἶναι πλήρες ὕγρου σχετικής πυκνότητος 1,25. Πόση πιεστική δύναμις ἀσκείται

ὑπὸ τοῦ ὕγρου αὐτοῦ εἰς τὸν πυθμένα τοῦ δοχείου; 19. Τὸ ἴδιον πρόβλημα διὰ τὸ δοχεῖον τοῦ σχ. 2.

20. Εἰς τὸ μικρὸν ἐμβολὸν ἑνὸς ὑδραυλικοῦ πιεστηρίου ἐφαρμόζομεν δύναμιν  $50 \text{ Kr}$ , διὰ νὰ σηκώσωμεν με τὸ μεγάλο ἐμβολὸν φορτίον  $2000 \text{ Kr}$ .


Ἄν τὸ μικρὸν ἐμβολὸν ἔχη τομὴν  $5 \text{ cm}^2$ , ποία πρέπει νὰ εἶναι ἡ τομὴ τοῦ μεγάλου ἐμβόλου;

21. Αἱ διαμέτροι τῶν δύο ἐμβόλων ἑνὸς ὑδραυλικοῦ πιεστηρίου εἶναι  $4 \text{ cm}$  καὶ  $80 \text{ cm}$ . Ὡθοῦμεν τὸ μικρὸν ἐμβολὸν δι' ἑνὸς μοχλοῦ δευτέρου εἴδους τοῦ ὁποίου ὁ μικρὸς βραχίον, ποῦ ἡ ἄκρη του ἐνεργεῖ ἐπὶ τοῦ μικροῦ ἐμβόλου, εἶναι  $12 \text{ cm}$  καὶ ὁ μέγας  $60 \text{ cm}$ .

Ἐφαρμόζομεν εἰς τὸν μέγαν βραχίονα δύναμιν  $12 \text{ Kr}$  καὶ ζητοῦμεν:

α) Τὴν δύναμιν, ἢ ὅποια ἐφαρμόζεται εἰς τὸ μικρὸν ἐμβολὸν, καὶ τὴν πίεσιν, ἢ ὅποια ἀσκείται τότε εἰς τὸ ὕγρον.

β) Τὴν δύναμιν, ἢ ὅποια ἀσκείται εἰς τὸ μεγάλο ἐμβολὸν, καὶ πόσον μετατοπίζεται αὐτὸ, ὅταν ἡ λαβὴ τοῦ μοχλοῦ κατέλθῃ κατακορυφῶς κατὰ  $20 \text{ cm}$ .



**Φράγμα Κρεμαστῶν Ἀχελώου.**

*Τὸ πάχος τοῦ φράγματος αἰξάνει, ὅσον προχωροῦμεν ἀπὸ τὴν κορυφὴν πρὸς τὴν βᾶσιν του.*

## ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΠΟΥΔΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ

**■ Παρατηρήσεις :** Όταν βυθίσωμεν έντὸς τοῦ ὕδατος φελλὸν καὶ τὸν ἀφήσωμεν ἐλεύθερον, ἀνέρχεται εἰς τὴν ἐπιφάνειαν.

Μεγάλος λίθος, τὸν ὁποῖον εὐκόλως ἀνυψώνομεν έντὸς τοῦ ὕδατος, καθίσταται πολὺ βαρύτερος ἐκτὸς τοῦ ὕδατος.


Κενὸν κλειστὸν δοχεῖον πρέπει νὰ τὸ ὠθήσωμεν, διὰ νὰ βυθισθῇ εἰς τὸ ὕδωρ.

**■ Πειράματα.** Ἐκ δυναμομέτρου ἐξαρτῶμεν λίθον, τοῦ ὁποῖου εὐρίσκομεν τὸ βάρος (σχ. 1).

● Ἀκολουθῶς βυθίζομεν τοῦτον έντὸς ὕδατος καὶ σημειώνομεν τὴν νέαν ἐνδειξὴν τοῦ δυναμομέτρου. Καὶ εἰς τὰς δύο περιπτώσεις βλέπομεν ὅτι τὸ νῆμα ἔχει κατακόρυφον διεύθυνσιν.

● Ἡ διαφορὰ τῶν δύο ἐνδειξεῶν τοῦ δυναμομέτρου μᾶς δίδει τὴν έντασιν τῆς δυνάμεως, ἡ ὁποία ὠθεῖ τὸ σῶμα ἐκ τῶν κάτω πρὸς τὰ ἄνω κατακόρυφως.

Ἡ δύναμις αὕτη ὀνομάζεται **ἄνωσις τοῦ Ἀρχιμήδους**.



Σχ. 1. Τὸ ὕδωρ ἄσκει ἐπὶ τῆς σφαιρᾶς δύναμιν κατακόρυφον, ἐκ τῶν κάτω πρὸς τὰ ἄνω ἴσην πρὸς  $F=32$   $p-20$   $p=12$   $p$


**Συμπέρασμα :** Ἐπὶ ἐκάστον σῶματος, τὸ ὁποῖον βυθίζεται έντὸς τοῦ ὕδατος, ἐνεργεῖ μία δύναμις κατακόρυφον διευθύνσεως καὶ μὲ φοράν ἐκ τῶν κάτω πρὸς τὰ ἄνω.

● Ἐάν ἀντικαταστήσωμεν τὸν λίθον δι' ἑτέρου μεγαλύτερου καὶ ἐπαναλάβωμεν τὸ πείραμα, θὰ ἴδωμεν ὅτι ἡ διεύθυνσις τοῦ νήματος παραμένει κατακόρυφος· ἡ ἄνωσις ὁμως εἶναι μεγαλύτερα.


**Συμπέρασμα:** Ἡ ἄνωσις ἐνὸς σῶματος, βυθισμένου έντὸς ὕδατος, ἐξαρτᾶται ἐκ τοῦ ὄγκου τοῦ ἐκτοπιζομένου ὕδατος.

Ἄντικαταστήσωμεν τὸν αὐτὸν λίθον εἰς ἄλλο ὑγρὸν, π.χ. οἰνόπνευμα ( $\epsilon = 0,8$   $p/cm^3$ ), εὐρίσκομεν ὅτι ἡ ἄνωσις εἶναι μικροτέρα.

**Συμπέρασμα:** Ἡ ἄνωσις ἐνὸς σῶματος, βυθισμένου έντὸς ὑγροῦ, ἐξαρτᾶται ἐκ τοῦ εἰδικοῦ βάρους τοῦ ὑγροῦ.



Σχ. 2. Ὁ λίθος ἔχει μεγαλύτερον ὄγκον ἀπὸ τὴν σφαιρᾶν τοῦ πειράματος 1 καὶ ἡ δύναμις, τὴν ὁποῖαν ἄσκει τὸ ὕδωρ ἐπ' αὐτοῦ, εἶναι ἰσχυροτέρα. Ἐντὸς τοῦ ὕδατος ἡ δύναμις εἶναι :  
 $F = 27$   $p - 9$   $p = 18$   $p$   
 Ἐντὸς τοῦ οἰνοπνεύματος εἶναι :  
 $F = 27$   $p - 13$   $p = 14$   $p$ .



Σχ. 3.

A | B e | A | B | A | B

'Απόβαρον ἰσορροποῦν | 'Ἐξηρημένον λίθον + δοχείον κενόν | 'Απόβαρον | 'Ἡ ἰσορροπία καταστρέφεται | Βυθισμένον λίθος + δοχείον κενόν | 'Απόβαρον ἰσορροποῦν | Βυθισμένον λίθον + ἐκτοπισμένον ὕδωρ.

Εἰς τὸ σχῆμα 3 (I) τὸ ἀπόβαρον ἰσορροπεῖ τὸ βᾶρος τοῦ λίθου, τὸν ὁποῖον ἔχομεν ἑξαρτήσει κάτωθεν τοῦ δίσκου τοῦ ζυγοῦ, καὶ τὸ ποτήριον, τὸ ὁποῖον εὐρίσκεται ἐπὶ τοῦ δίσκου.


Εἰς τὸ σχῆμα 3 (II) ἡ ἰσορροπία καταστρέφεται· τὸ νῆμα ὁμως ἑξαρτήσεως παραμένει κατακόρυφον, ἐπειδὴ τὸ ὑγρὸν ὠθεῖ τὸν λίθον διὰ κατακορύφου δύναμews ἐκ τῶν κάτω πρὸς τὰ ἄνω.

Εἰς τὸ σχῆμα 3 (III) : Προσθέτομεν εἰς τὸ κενὸν ποτήριον τοῦ δίσκου τὸ ὕδωρ, τὸ ὁποῖον ἐξετόπισε τὸ σῶμα. Ἡ ἰσορροπία ἐπανέρχεται, διότι τὸ βᾶρος τοῦ ὑγροῦ, τὸ ὁποῖον ἐξῆύθη, ἔξουδετερῶνει τὴν ἄνωσιν τοῦ Ἀρχιμήδους.

**Ἀρχὴ τοῦ Ἀρχιμήδους:** *Εἰς πᾶν σῶμα, εὐρισκόμενον ἐντὸς ὑγροῦ ἐν ἰσορροπία, ἐνεργεῖ μία δύναμις ἐκ τοῦ ὑγροῦ κατακόρυφος καὶ μετὰ φορὰν πρὸς τὰ ἄνω τῶση, ὅσον εἶναι τὸ βᾶρος τοῦ ἐκτοπιζομένου ὑπὸ τοῦ σώματος ὑγροῦ. Ἡ δύναμις αὕτη ὀνομάζεται ἄνωσις.*

Ἀποδεικνύεται ὅτι τὸ σημεῖον ἐφαρμογῆς τῆς ἄνωσεως, τὸ κέντρον τῆς ἄνωσεως, εἶναι τὸ κέντρον βάρους τοῦ ὑγροῦ, τὸ ὁποῖον ἐκτοπιζεται ὑπὸ τοῦ σώματος.

**3 Ἡ ἄνωσις τοῦ Ἀρχιμήδους μᾶς ἐπιτρέπει νὰ ὑπολογίσωμεν τὴν πυκνότητα καὶ τὸ εἰδικὸν βᾶρος :**



Σχ. 4.

I : Τὸ ἀπόβαρον ἰσορροπεῖ τὸ δείγμα + 17 π.  
 II : Τὸ ἀπόβαρον ἰσορροπεῖ 220 π.  
 III : Τὸ ἀπόβαρον ἰσορροπεῖ τὸ βυθισμένον δείγμα + 40 π.

I : Τὸ ἀπόβαρον ἰσορροπεῖ τὴν σφαῖραν + 120 π.  
 II : Τὸ ἀπόβαρον ἰσορροπεῖ τὴν σφαῖραν + 34 π.  
 III : Τὸ ἀπόβαρον ἰσορροπεῖ τὴν βυθισμένην σφαῖραν + 38 π.

**Συμπέρασμα:** Βάρος του δείγματος:

$$220 \text{ p} - 17 \text{ p} = 203 \text{ p}$$

Βάρος ύδατος το οποίο εξετόπισε το δείγμα :

$$40 \text{ p} - 17 \text{ p} = 23 \text{ p}$$

και επομένως ο όγκος του ύδατος, τον οποίο εξετόπισε το δείγμα του χαλκού =  $23 \text{ cm}^3$ .

**Υπολογισμός:** Ειδικόν βάρος του δείγματος του χαλκού :

$$\frac{203 \text{ p}}{23 \text{ cm}^3} = 8,8 \text{ p/cm}^3$$

Πυκνότης χαλκού :

$$8,8 \text{ g/cm}^3$$

**Συμπέρασμα:** Ωθησις άσκουμένη υπό το υ γρού, δηλ. βάρος εκτοπιζομένου υ γρού:

$$34 \text{ p} - 12 \text{ p} = 22 \text{ p}$$

Ωθησις άσκουμένη υπό του ύδατος η βάρος εκτοπιζομένου ύδατος :

$$38 \text{ p} - 12 \text{ p} = 26 \text{ p}$$

Όγκος του ύδατος και επομένως όγκος του υ γρού  $26 \text{ cm}^3$ .

**Υπολογισμός:** Ειδικόν βάρος αυτού του υ γρού :

$$\frac{22 \text{ p}}{26 \text{ cm}^3} = 0,84 \text{ p/cm}^3$$

Πυκνότης υ γρού :

$$0,84 \text{ g/cm}^3$$

## ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ

1. Αρχή του Αρχιμήδους: Είς πάν σώμα, εύρισκόμενον εντός υ γρού εν ίσορροπία, ενεργεί μία δύναμις εκ του υ γρού κατακόρυφος και με φοράν προς τα άνω τόση, όσον είναι το βάρος του εκτοπιζομένου υπό του σώματος υ γρού. Η δύναμις αυτή όνομάζεται άνωσις.

2. Η άνωσις του Αρχιμήδους μās επιτρέπει να υπολογίσωμεν την πυκνότητα στερεών και υ γρών σωμάτων.

28<sup>ON</sup> ΜΑΘΗΜΑ: Έφαρμογή της αρχής του Αρχιμήδους.

## ΕΠΙΠΛΕΟΝΤΑ ΣΩΜΑΤΑ


**1 Παρατήρησις.** Αν αφήσωμεν ένα λίθον εντός δοχείου πλήρους ύδατος, θα ίδωμεν ότι θα πέσει εις τον πυθμένα του δοχείου.

Γνωρίζομεν ότι επί του λίθου, όταν ούτος εύρισκεται εντός του ύδατος, ενεργούν δύο δυνάμεις αντίθετου φοράς αλλά κατακόρυφου διευθύνσεως: το βάρος του P, το οποίοον έχει φοράν προς τα κάτω, και η άνωσις F με φοράν προς τα άνω. Έπειδή το βάρος είναι μεγαλύτερον από την άνωσιν, ο λίθος πίπτει εις τον πυθμένα του δοχείου  $P > F$  (σχ. 1 Α).

● Έάν ώθήσωμεν ένα φελλόν εντός του ύδατος κα. τον αφήσωμεν ελεύθερον, ο φελλός άνέρχεται, δι. η άνωσις είναι μεγαλύτερα από το βάρος του ( $F > P$ ): έξέρχεται εις την επιφάνειαν και μετά μερικάς ταλαντώσεις παραμένει άκίνητος, επιπλέει (σχ.1 Β, Γ).


Τούτο συμβαίνει, διότι εν μέρος μόνον του σώματος είναι βυθισμένον και η νέα άνωσις F' είναι μικρότερα εκείνης, την όποίαν είχαν η F, όταν όλόκληρον το σώμα ητο βυθισμένον εντός του ύδατος ( $F' < F$ ).

Ένώ λοιπόν η άνωσις καθίσταται μικρότερα, όταν το σώμα έξέρχεται του ύδατος, το βάρος του παραμένει το αυτό· όταν δέ η άνωσις γίνη ίση προς το βάρος, το σώμα θα ίσορροπήση. Η άνωσις και το βάρος θα είναι τότε δύο δυνάμεις ίσαι και αντίθετου φοράς.



Σχ. 1. Είς το Α ο λίθος πίπτει εις τον πυθμένα του δοχείου,  $P > F$ . Είς το Β ο φελλός άνέρχεται εις την επιφάνειαν,  $P < F$ . Είς το Γ ο φελλός ίσορροπει εις την επιφάνειαν,  $P = F$ .

**Συμπέρασμα:** Όταν ο φελλός επιπλέη, η άνωσις είναι ίση με το βάρος του.



Σχ. 2. Ἐπαλήθευσις τῆς ἀρχῆς τῶν ἐπιπλεόντων σωμάτων.

**Πείραμα.** Θέτομεν ἐντὸς τοῦ δοχείου μὲ τὸν πλευρικὸν σωλῆνα σφαίραν ἐπιπλέουσαν εἰς τὸ ὕδωρ (σχ. 2). Τὸ ἐκτοπιζόμενον ὑπὸ τῆς σφαίρας ὕδωρ χύνεται ἐκ τοῦ πλευρικοῦ σωλῆνος εἰς μικρὸν δοχεῖον. Τὸ δοχεῖον αὐτὸ τοποθετοῦμεν εἰς τὸν ἕνα δίσκον τοῦ ζυγοῦ καὶ τὸ ἰσορροποῦμεν δι' ἀπόβαρον, τὸ ὅποσον θέτομεν εἰς τὸν ἄλλον δίσκον. Ἐὰν εἰς τὴν θέσιν τοῦ ὕδατος τοῦ μικροῦ δοχείου τοποθετήσωμεν τὴν σφαίραν, παρατηροῦμεν ὅτι ὁ ζυγὸς ἰσορροπεῖ καὶ πάλιν.

Τὸ βάρος τοῦ ἐκτοπιζομένου ὕδατος ἰσοῦται πρὸς τὸ βάρος τῆς σφαίρας, ἢ ὅποια ἐπιπλέει. Εἰς τὸ αὐτὸ ἀποτέλεσμα καταλήγομεν καὶ ὅταν χρησιμοποιοῦμεν οἰονδήποτε ἄλλο ὑγρὸν.

**Ἀρχὴ τῆς ἰσορροπίας τῶν σωμάτων, τὰ ὅποια αἰωροῦνται ἐντὸς τῶν ὑγρῶν.** Ὅταν ἐν σώμα ἰσορροπῇ ἐντὸς ὑγροῦ ἢ εἰς τὴν ἐπιφάνειαν ἠρεμοῦντος ὑγροῦ, τὸ βάρος τοῦ σώματος ἰσοῦται πρὸς τὸ βάρος τοῦ ἐκτοπιζομένου ὑγροῦ.

## 2 Ἴσορροπία ἐπιπλεόντων σωμάτων.

Ὅταν ἐν σώμα, εὐρισκόμενον ἐν ἰσορροπία, ἐπιπλέῃ, τὸ κέντρον ἀνώσεως  $K$  καὶ τὸ κέντρον βάρους  $G$  εὐρίσκονται ἐπὶ τῆς αὐτῆς κατακορύφου (σχ. 5).

Σχ. 3. Ἐν παιγνίδιον («ὁ κολυμβητής»): Ἄν πιέσωμεν τὴν μεμβράνην, τὸ ὕδωρ εἰσέρχεται εἰς τὸν «κολυμβητήν», ὅστις λόγῳ τοῦ βάρους, τὸ ὅποσον λαμβάνει, πίπτει.


$$P > F$$

Ἄν διακόψωμεν τὴν πίεσιν, τὸ ὕδωρ ἐκτοπίζεται ἀπὸ τὸν «κολυμβητήν», ὁ ὅποιος γίνεται ἑλαφρὸς καὶ, ὡς ἐκ τούτου, ἀνέρχεται:

$$P < F$$



Σχ. 4. Ἐγκαρσία τομῆ ἐνὸς ὑποβρυχίου: Λόγῳ τῆς ποσότητος τοῦ ὕδατος, τὸ ὅποσον εἰσάγεται εἰς τὴν ὕδατοδεξαμενὴν, μεταβάλλεται καὶ τὸ βάρος τοῦ ὑποβρυχίου, ὥστε νὰ δύναται νὰ πλέῃ καὶ εἰς τὴν ἐπιφάνειαν καὶ κάτωθεν αὐτῆς.



(1) Κέντρον ἀνώσεως εἶναι τὸ κέντρον βάρους τοῦ ἐκτοπιζομένου ὑγροῦ.



● Είς τὸ σχῆμα 5 Α τὸ κέντρον βάρους τοῦ σωλῆνος εὐρίσκεται κάτω τοῦ κέντρου ἀνώσεως. Τὸ σῶμα ἔχει εὐσταθῆ ἰσορροπίαν.

● Είς τὸ σχῆμα 5 Β, Γ τὸ κέντρον βάρους εὐρίσκεται ἄνω τοῦ κέντρου ἀνώσεως. Ὅταν ὁμως ἀπομακρύνωμεν τὸ σῶμα ἐκ τῆς θέσεως τῆς ἰσορροπίας του, τὸ σχῆμα τοῦ ἔκτοπιζομένου ὑγροῦ μεταβάλλεται καὶ τὸ κέντρον ἀνώσεως ἀλλάσσει θέσιν.


● Είς τὸ σχῆμα 5 Β ἡ συνδυασμένη δρᾶσις τῶν δύο δυνάμεων F καὶ P αὐξάνει τὴν κλίσιν τοῦ σώματος καὶ τὸ σῶμα πίπτει. Ἡ ἰσορροπία εἶναι ἀσταθής.

● Ἀντιθέτως εἰς τὸ σχῆμα 5 Γ ἡ δρᾶσις τῶν δυνάμεων ἀντιτίθεται εἰς τὴν κλίσιν τοῦ σώματος καὶ τὸ ἐπαναφέρει εἰς τὴν θέσιν ἰσορροπίας. Ἡ ἰσορροπία τοῦ σώματος εἶναι εὐσταθής.

● Εἰς τὸ σχῆμα 5 Δ παρατηροῦμεν, διατί τὸ πλοῖον ἐπανέρχεται εἰς τὴν θέσιν ἰσορροπίας, ὅταν κλίνη, ἂν καὶ τὸ κέντρον βάρους εὐρίσκεται ἄνω τοῦ κέντρου ἀνώσεως.

Διὰ νὰ παραμῆνι σταθερὸν τὸ κέντρον βάρους, τὰ βαρᾶ ἐμπορεύματα τοποθετοῦνται εἰς τὰ κατώτερα διαμερίσματα τοῦ πλοίου. Διὰ τὸν αὐτὸν λόγον τὰ πετρελαιοφόρα μεταφέρουν τὸ πετρέλαιον ἐντὸς χωριστῶν διαμερισμάτων.

Τί θὰ συνέβαινεν εἰς ἀντίθετον περίπτωσιν ;



Σχ. 5. Ἴσορροπία ἐπιπλέοντων σωμάτων.

## ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ

1. Ὅταν ἓν σῶμα εἶναι βυθισμένον ἐξ ὀλοκλήρου ἐντὸς ὑγροῦ, ἐνεργοῦν ἐπ' αὐτοῦ δύο κατακόρυφοι καὶ ἀντιθέτου φοράς δυνάμεις : τὸ βάρος P καὶ ἡ ἀνωσις F.

Ἐὰν  $F < P$ , τὸ σῶμα πίπτει εἰς τὸν πυθμένα (βυθίζεται).

Ἐὰν  $F > P$ , τὸ σῶμα ἀνέρχεται, ἐξέρχεται εἰς τὴν ἐπιφάνειαν καί, ὅταν ἡ ἀνωσις καταστῇ ἴση πρὸς τὸ βάρος του (P), ἰσορροπεῖ (ἐπιπλέει).

2. Ἀρχὴ τῆς ἰσορροπίας τῶν σωμάτων, τὰ ὅποια αἰωροῦνται ἐντὸς τῶν ὑγρῶν: Ὅταν ἓν σῶμα ἰσορροπεῖ ἐντὸς τοῦ ὑγροῦ ἢ εἰς τὴν ἐπιφάνειάν του, τὸ βάρος του εἶναι ἴσον πρὸς τὸ βάρος τοῦ ἔκτοπιζομένου ὑγροῦ.


3. Ὅταν ἓν σῶμα ἐπιπλέη, ἰσορροπεῖ, ἂν τὸ κέντρον βάρους καὶ τὸ κέντρον ἀνώσεως εὐρίσκωνται ἐπὶ τῆς αὐτῆς κατακόρυφου.

Δὲν εἶναι ἀπαραίτητον νὰ εὐρίσκεται τὸ κέντρον βάρους ἐνὸς πλοίου χαμηλότερον τοῦ κέντρου ἀνώσεως: ὅσον ὁμως χαμηλότερον εὐρίσκεται, τόσοσιν σταθερωτέρω εἶναι ἡ ἰσορροπία του.


29<sup>ON</sup> ΜΑΘΗΜΑ: Ἐφαρμογὴ τῆς ἀρχῆς τοῦ Ἀρχιμήδους εἰς τὴν μέτρησιν τῆς πυκνότητος τῶν ὑγρῶν.

## ΠΥΚΝΟΜΕΤΡΑ


1 Πείραγμα. Τοποθετοῦμεν εἰς τὸ ἐσωτερικὸν ὑαλίνου σωλῆνος χαρτίνην ταινίαν, βαθμολογημένην εἰς χιλιοστά, καὶ ρίπτομεν εἰς τὸν σωλῆνα μερικὰ σκάγια (σχ. 1). Ὁ πυθμὴν τοῦ σωλῆνος εἶναι ἐπίπεδος. Ἐὰν θέσωμεν διαδοχικῶς τὸν σωλῆνα ἐντὸς τριῶν κυλινδρικῶν δο-



Εις τὸ καθαρὸν ὕδωρ



Εις τὸ οἶνονπνευμα



Εις τὸ ἀλατισμένον ὕδωρ

Σχ. 1. Πραγματοποιήσεις πυκνόμετρον

χέων, τὰ ὁποῖα περιέχουν ὕδωρ, οἶνονπνευμα καὶ ἄλμη, θὰ παρατηρήσωμεν ὅτι θὰ ἐπιπλέη κατακορύφως ἐντὸς τῶν διαφόρων ὑγρῶν καὶ τὸ ὕψος τοῦ βυθισμένου μέρους του θὰ εἶναι διάφορον εἰς ἕκαστον ὑγρὸν.

● Σημειώσωμεν τὸ ὕψος  $h$  καί, ἂν  $S$  εἰς  $\text{cm}^2$  εἶναι ἡ τομὴ τοῦ σωλήνος, τότε ὁ ὄγκος  $V$  τοῦ βυθισμένου μέρους του θὰ εἶναι :

Διὰ τὸ ὕδωρ

$$h_1 = 4,8 \text{ cm}$$

$$V_1 = (4,8 \times S) \text{ cm}^3$$

διὰ τὸ οἶνονπνευμα

$$h_2 = 6 \text{ cm}$$

$$V_2 = (6 \times S) \text{ cm}^3$$

διὰ τὴν ἄλμη

$$h_3 = 4,5 \text{ cm}$$

$$V_3 = (4,5 \times S) \text{ cm}^3$$

Συμφώνως πρὸς τὴν ἀρχὴν τῆς ἰσορροπίας τῶν σωμάτων εἰς τὰ ὑγρά, τὸ **βάρος τοῦ ἐκτοπιζομένου ὑγροῦ εἶναι ἴσον πρὸς τὸ σταθερὸν βάρος τοῦ σωλήνος.**

Ὁ σωλήν θὰ ἐκτοπίζῃ τὸ αὐτὸ βάρος ὑγροῦ, οἰονδήποτε καὶ ἂν εἶναι τὸ ὑγρὸν τοῦτο, θὰ διαφέρῃ δὲ μόνον ὁ ὄγκος τοῦ ἐκτοπιζομένου ὑγροῦ, δηλαδὴ τὸ ὕψος τοῦ βυθισμένου μέρους τοῦ σωλήνος.

Τὸ βάρος  $(4,8 \times S) \text{ cm}^3$  ὕδατος, ἢ  $(4,8 \times S)p$  εἶναι ἴσον

πρὸς τὸ βάρος  $(6 \times S) \text{ cm}^3$  οἶνονπνεύματος ἢ πρὸς τὸ βάρος  $(4,5 \times S) \text{ cm}^3$  ἄλμης

δηλ.  $\rho_{\sigma} \times (6 \times S) p$

$$\rho_{\sigma} = \frac{4,8 \times S}{6 \times S} = \frac{4,8}{6} = 0,8$$

δηλ.  $\rho'_{\sigma} \times (4,5 \times S) p$

$$\rho'_{\sigma} = \frac{4,8 \times S}{4,5 \times S} = \frac{4,8}{4,5} = 1,07$$

## 2 Πυκνόμετρα.

Δυνάμεθα νὰ βαθμολογήσωμεν τὸν σωλήνα ἀμέσως εἰς **σχετικὴν πυκνότητα**. Πρὸς τοῦτο τὸν θέτομεν ἐντὸς καθαροῦ ὕδατος καὶ ἐκεῖ, ὅπου φθάει ἡ ἐπιφάνεια τοῦ ὕδατος, σημειώσωμεν τὴν ὑποδιαίρεσιν 1. Τὰ ὑγρά, τὰ ὁποῖα ἔχουν πυκνότητα μικροτέραν τοῦ 1, φθάνουν ἄνω τῆς ὑποδιαίρεσως 1, ἐνῶ ἐκεῖνα, τὰ ὁποῖα ἔχουν μεγαλυτέραν τοῦ 1, φθάνουν κάτω τῆς ὑποδιαίρεσως 1.

Διὰ νὰ ἐπιτύχωμεν μεγαλυτέραν προσέγγισιν, πρέπει ὁ σωλήν νὰ εἶναι μικρᾶς τομῆς. Διαιτί ;

● Τὸ πυκνόμετρον εἶναι εἰς πλωτὴν φέρων ἕρμα (σκάγια) καὶ ἐν στέλεχος προσηρμοσμένον εἰς αὐτὸν καὶ βαθμολογημένον εἰς σχετικὴν πυκνότητα.


Ἔγάρχουν δύο εἰδῶν πυκνόμετρα :

— Πυκνόμετρα (ἀραιόμετρα) διὰ ὑγρά μικροτέρας πυκνότητος τοῦ ὕδατος, βαθμολογημένα ἀπὸ 0,6 ἕως 1.

(ἡ ὑποδιαίρεσις 1 εὑρίσκειται εἰς τὸ κατώτερον μέρος τοῦ στελέχους) καὶ

— Πυκνόμετρα διὰ ὑγρά μεγαλυτέρας πυκνότητος τοῦ ὕδατος, βαθμολογημένα ἀπὸ 1—2. (Ἡ ὑποδιαίρεσις 1 εὑρίσκειται εἰς τὸ ἐπάνω μέρος τοῦ στελέχους). —

**Τὸ γαλακτόμετρον**, τὸ ὁποῖον χρησιμεύει διὰ τὴν ἐξακρίβωσιν τῆς καθαρότητος τοῦ γάλακτος, εἶναι ἐν πυκνόμετρον. Τὸ καθαρὸν γάλα ἔχει πυκνότητα περίπου 1,03. Τὸ γάλα, τοῦ ὁποῖου ἡ πυκνότης εἶναι 1,025, ἔχει ἀραιωθῆ δι' ὕδατος.



Σχ. 2. Πυκνόμετρον διὰ ὑγρά πυκνότητος < 1

Πυκνόμετρον διὰ ὑγρά πυκνότητος > 1

Οινόπνευματόμετρον Gay - Lussac

### 3 Οινόπνευματόμετρον - Ἀραιόμετρον.

Γνωρίζομεν ὅτι ἡ πυκνότης ἑνὸς μείγματος ἐξ οἴνου πνεύματος καὶ ὕδατος εἶναι συνάρτησις τῆς περιεκτικότητος τοῦ μείγματος εἰς οἴνου πνευμα καὶ ὕδωρ.

Καταλλήλως βαθμολογημένον πυκνόμετρον δύναται, ὡς ἐκ τούτου, νὰ μᾶς παρέχῃ ἀπ' εὐθείας τὴν περιεκτικότητα ἑνὸς τοιοῦτου μείγματος εἰς οἴνου πνευμα.

Εἰς τὴν θερμοκρασίαν τῶν 15° C τὸ οἴνου πνευματόμετρον τοῦ Gay Lussac δεικνύει 0° εἰς τὸ καθαρὸν ὕδωρ καὶ 100° εἰς τὸ καθαρὸν οἴνου πνευμα. Ὅταν τὸ οἴνου πνευματόμετρον βυθίζεται εἰς τὴν ὑποδιαίρεσιν 60° εἰς ἓν μείγμα οἴνου πνεύματος καὶ ὕδατος, τότε τὸ διάλυμα αὐτὸ ἔχει περιεκτικότητα 60 cm<sup>3</sup> οἴνου πνεύματος εἰς τὰ 100 cm<sup>3</sup> τοῦ μείγματος εἰς τὴν θερμοκρασίαν τῶν 15° C.

Ἄν ἡ θερμοκρασία εἶναι διαφορετικὴ, θὰ πρέπει νὰ διορθώσωμεν τὴν εὐρεθεῖσαν ἐνδειξιν τῆ βοηθεία ἐδικῶν πινάκων, οἱ ὅποιοι συνοδεύουν τὸ οἴνου πνευματόμετρον.

Τὸ οἴνου πνευματόμετρον τοῦ Gay Lussac χρησιμοποιεῖται ἀποκλειστικῶς διὰ μείγματα οἴνου πνεύματος καὶ ὕδατος.


Ἡ πυκνότης ἑνὸς διαλύματος ἐξαρτᾶται μόνον ἐκ τῆς περιεκτικότητος τοῦ διαλύματος.

Τὸ ἀραιόμετρον Baume εἶναι ἓν πυκνόμετρον, τὸ ὅποσον δίδει ἀπ' εὐθείας τὴν περιεκτικότητα ἑνὸς διαλύματος ὀξέος, βάσεως ἢ ἄλατος.

Εἰς τὸ καθαρὸν ὕδωρ τὸ ἀραιόμετρον αὐτὸ βυθίζεται ἕως τὴν ὑποδιαίρεσιν 0° (εἰς τὸ ἄνω μέρος τοῦ στελέχους). Εἰς διάλυμα 15 g μαγειρικοῦ ἄλατος εἰς 85 g ὕδατος (100 g διαλύματος) βυθίζεται ἕως τὴν ὑποδιαίρεσιν 15°. Τὸ διάστημα 0°-15° χωρίζεται εἰς 15 ἴσα μέρη καὶ αἱ ὑποδιαίρεσεις συνεχίζονται καὶ κάτω τοῦ 15° ἕως τὸ 66° (εἰς τὴν βᾶσιν τοῦ στελέχους).

Ἡ ὑποδιαίρεσις αὐτὴ ἀντιστοιχεῖ εἰς ὑγρὸν πυκνότητος 1,84 (καθαρὸν θεϊκὸν ὀξύ).

Τὸ ἀραιόμετρον Baume χρησιμοποιεῖται ἰδιαίτερος πρὸς ἐξακριβῶσιν τῆς περιεκτικότητος τοῦ θεϊκοῦ ὀξέος εἰς τὸν ἠλεκτρολύτην τῶν συσσωρευτῶν.



Σχ. 3. Πυκνόμετρον συσσωρευτῶν

1. Όταν εν σώμα επιπλήη, βυθίζεται τόσον περισσότερο εντός του ύγρου, όσον μικρότερα είναι ή πυκνότης του ύγρου αυτού.

2. Τό πυκνόμετρον είναι εις πλωτήρ με έρμα και βαθμολογημένον εις σχετικήν πυκνότητα στέλεχος, τό όποιον είναι προσηρμοσμένον εις αυτόν.

Υπάρχουν πυκνόμετρα διά ύγρά μικράς πυκνότητος (μικρότερας τής μονάδος) και πυκνόμετρα διά ύγρά μεγάλης πυκνότητος (άνωτέρας του 1).

Τό γαλακτόμετρον είναι έν πυκνόμετρον.

3. Τό οίονπνευματόμετρον του Cay Lussac μάς δίδει άπ' εϋθείας την περιεκτικότητα εις οίονπνευμα μείγματος, τό όποιον άποτελείται μόνον εξ οίονπνεύματος και ύδατος.

4. Τό άραιόμετρον Baume μάς επιτρέπει την εύρεσιν τής περιεκτικότητος ενός διαλύματος όξέος, βάσειωσ ή άλατος.

**ΑΣΚΗΣΕΙΣ**

**Σειρά 7η : 'Αρχή του 'Αρχιμήδους**

**1 "Ανωσις του 'Αρχιμήδους**

1. Νά ύπολογισθ ή άνωσις, ή όποια ένεργεί επί λίθου όγκου 245 cm<sup>3</sup>, όταν βυθίζεται :

α) Εις καθαρόν ύδωρ, και β) εις έλαιον ειδικού βάρος 0,9 p/cm<sup>3</sup>.

2. Νά ύπολογισθ τό φαινόμενον βάρος λίθου, ό όποιος έχει όγκον 150 cm<sup>3</sup> και πραγματικόν βάρος 305 p, όταν βυθίζεται εις οίονπνευμα. (Ειδικόν βάρος οίονπνεύματος 0,8 p/cm<sup>3</sup>).

3. Λίθου βάρος 187 p, όταν βυθισθ εις καθαρόν ύδωρ, φαίνεται νά έχη βάρος 102 p :

α) Νά ύπολογισθ ή άνωσις, ή όποια ένεργεί επί τόου λίθου, β) ό όγκος του και γ) ή πυκνότης του.

4. Ζυγίζομεν μίαν μεταλλικήν σφαιραν :

α) έξηρητημένη εκ του δισκου ενός ζυγού : 45 p  
β) βυθισμένη εντός άλμυρού ύδατος : 39 p

γ) βυθισμένη εις καθαρόν ύδωρ : 40 p

Νά εύρεθουν : α) ό όγκος τής σφαιρας, β) ή άνωσις ή όποια ένεργεί επί αυτής εις τό άλμυρόν ύδωρ και γ) ή πυκνότης του άλμυρού ύδατος.

5. Διά νά εύρωμεν την πυκνότητα ενός κράματος, πραγματοποιούμεν τās εξής ζυγίσεις :

— Τό τεμάχιον του κράματος έξηρητημένον εκ του δισκου + 12,4 g ίσορροπούν τό άπόβαρον.

— Τό τεμάχιον βυθισμένον εντός ύδατος + 48,7 g ίσορροπούν τό άπόβαρον.

— 310 g ίσορροπούν τό άπόβαρον :

α) Ποία είναι ή πυκνότης αυτού του κράματος ;

β) Ποία είναι ή σχετική πυκνότης του κράματος ;

6. Διά νά εύρωμεν την πυκνότητα ενός διαλύματος, εκτελούμεν τās εξής μετρήσεις :

— Η σφαιρα έξηρητημένη εκ του δισκου + 8,2 g ίσορροπούν τό άπόβαρον.

— Η σφαιρα βυθισμένη εις τό διάλυμα + 23,8 g ίσορροπούν τό άπόβαρον.

— Η σφαιρα βυθισμένη εις τό ύδωρ + 21,2 g ίσορροπούν τό άπόβαρον :

α) Ποία είναι ή πυκνότης του διαλύματος ;

β) Ποία ή σχετική του πυκνότης ;

7. Πρός εύρεσιν τής σχετικής πυκνότητος μείγματος ύδατος και οίονπνεύματος κάμομεν ό,τι και εις τό προηγούμενον πείραμα και διά τής ίδιας σφαιρας :

— ή σφαιρα βυθισμένη εις τό μείγμα + 19,5 g ίσορροπούν τό άπόβαρον.

α) Ποία είναι ή πυκνότης του μείγματος ;

β) Ποία είναι ή σχετική του πυκνότης ;

8. Τεμάχιον κράματος χρυσοϋ και χαλκού ζυγίζει 1 Kr. Όταν βυθισθ εις τό ύδωρ, έχει φαινόμενον βάρος 942,4 p. Ποία ή σύστασις αυτού του κράματος ; (Σχετική πυκνότης : χρυσοϋ 19,3, χαλκού 8,9).

9. 'Ορειχαλκίνη σφαιρα ζυγίζει 200 p (σχετική πυκνότης όρειχαλκού 8). Βυθισμένη εντός οίονπνεύματος σχετικής πυκνότητος 0,8 ή ίδια σφαιρα ζυγίζει 112 p :

α) Είναι κενή ή πλήρης ή σφαιρα αυτή ;

Εις την πρώτην περίπτωσηιν ποιος ό όγκος του κενού ;

β) Πόσον θά ήτο τό φαινόμενον βάρος αυτής τής σφαιρας, εάν ήτο πλήρης και έβυθίζετο εις τό οίονπνευμα ;

10. α) 'Ισορροποϋμεν ζυγόν, θέτοντες εις τόν δεξιόν δισκον έν άπόβαρον και εις τόν άριστερόν σταθμά 150 g. Όταν έξαρτήσωμεν εκ του άριστερού δισκου ένα χάλκινον κύβον άκμής 2 cm, πρέπει, διά νά διατηρήσωμεν την ίσορροπιαν, νά κρατήσωμεν εις αυτόν τόν δισκον μόνον 80 g. Ποία είναι ή πυκνότης του χαλκού ;

β) 'Εάν βυθίσωμεν τόν οϋτω έξηρητημένον κύβον εξ όλοκλήρου εις τά διαλύματα θειικού χαλκού σχετικής πυκνότητος 1,1, πρέπει νά προσθέσωμεν σταθμά επί του δισκου του, διά νά διατηρηθ ή ίσορροπια. Ποιον είναι τό όλικόν βάρος τών σταθμών εις τόν δισκον αυτόν ;

11. 'Εάν έξαρτήσωμεν εκ του δισκου ενός ζυγού διά νήματος μάχης 2g τεμάχιον μολύβδου, πρέπει νά

θέσωμεν εις τὸν δεύτερον δίσκον 500 g, διὰ νὰ ἐπιτύχωμεν ἰσορροπίαν. Ἐπαναλαμβάνομεν τὴν πείραμα μὲ τὸν μολύβδον βυθισμένον πρῶτον ἐντὸς καθαροῦ ὕδατος, ὁπότε χρειάζονται 465g εἰς τὸν δεύτερον δίσκον, διὰ νὰ ἐπιτύχωμεν ἰσορροπίαν. Ἐπειτα μὲ τὸν μολύβδον βυθισμένον εἰς τὸ ἄλμυρον ὕδωρ, ὁπότε ἀπαιτοῦνται 449 g :

α) Νὰ παρασταθοῦν δι' ἀντιστοιχῶν σχεδίων τὰ τρία διαδοχικὰ πειράματα, τὰ ὁποῖα ἐξετελέσαμεν.  
β) Νὰ ὑπολογισθοῦν ὁ ὄγκος καὶ ἡ πυκνότης τοῦ μολύβδου.

γ) Νὰ ὑπολογισθῇ ἡ πυκνότης τοῦ ἄλμυροῦ ὕδατος.

12. Χαλκίνη σφαῖρα ὄγκου 20 cm<sup>3</sup> εἰδικοῦ βάρους 8,9 g/cm<sup>3</sup> ἐξαρτᾶται ἐκ τοῦ δίσκου Α ἐνὸς ζυγοῦ. Ἀπόβαρον τιθέμενον εἰς τὸν δίσκον Β ἰσορροπεῖ τὸν ζυγόν. Βυθίζομεν τὴν σφαῖραν ἐντὸς οἰνοπνεύματος εἰδικοῦ βάρους 0,8 g/cm<sup>3</sup> :

α) Πόσα σταθμὰ πρέπει νὰ θέσωμεν καὶ εἰς ποῖον δίσκον πρὸς ἀποκατάστασιν τῆς ἰσορροπίας ;

β) Βυθίζομεν αὐτὴν τὴν σφαῖραν εἰς ὑγρὸν ἀγνώστου πυκνότητος. Ἐάν προσθέσωμεν εἰς τὸν ἴδιον δίσκον 14,6 g, ποῖα εἶναι ἡ πυκνότης τοῦ ὑγροῦ ;

## II. Ἐπιπλέοντα σώματα

13. α) Τεμάχιον πάγου βάρους 1 Kr καὶ εἰδικοῦ βάρους 0,92 g/cm<sup>3</sup> ἐπιπλέει ἐπὶ τοῦ ὕδατος. Πόσον μέρος τοῦ ὄγκου του εἶναι βυθισμένον εἰς τὸ ὕδωρ καὶ πόσον εὐρίσκεται ἐκτὸς τούτου ;

β) Σημειώνομεν διὰ μίαν γραμμῆς τὴν στάθμην τοῦ ὕδατος εἰς τὸ δοχεῖον. Ὅταν τακῆ ὁ πάγος, θὰ μεταβληθῇ ἡ στάθμη τοῦ ὕδατος ; Καὶ διατί ;

14. Λέμβος κενὴ ἔχει βάρους 200 Kr. Ποῖον ὄγκον ὕδατος ἐκτοπίζει ; καὶ πόσον ὅταν ἐντὸς αὐτῆς εὐρίσκωνται δύο ἐπιβάται, οἱ ὁποῖοι μετὰ τῶν ἀποσκευῶν των ζυγίζουν 160 Kr ;

α) Εἰς τὸ καθαρὸν ὕδωρ ;

β) Εἰς τὸ θαλάσσιον ὕδωρ ; (σχετικὴ πυκνότης 1,03).

15. Ξύλινος κυλινδρὸς τομῆς 10 cm<sup>2</sup> ἐρματίζεται εἰς τὸ κάτω μέρος του δι' ἐνὸς μολυβδίνου δίσκου τῆς βάρους 10 g, ὁπότε ἀποκτᾷ ὀλίγον ὕψος 20 cm. Τὸν θέτομεν ἐπὶ τοῦ ὕδατος, ἐνθα ἐπιπλέει, καὶ τὸ βυθισμένον μέρος του ἔχει ὕψος 16 cm.

Πόσον εἶναι τὸ πάχος τοῦ δίσκου ; (σχετικὴ πυκνότης ξύλου 0,7 καὶ μολύβδου 11).

Τὸ ὕψος αὐτὸ ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν τομὴν τοῦ κυλινδρῶν ;

16. Τεμάχιον χαλκοῦ βάρους 242 p ἐπιπλέει εἰς ὑδράργυρον : α) Ποῖος ὁ ὄγκος τοῦ βυθισμένου μέρους ;

β) Ποῖαν δύναμιν πρέπει ν' ἀσκήσωμεν εἰς αὐτὸ τὸ τεμάχιον, διὰ νὰ τὸ βυθίσωμεν ὀλόκληρον ἐντὸς τοῦ ὑδραργύρου ; (σχετικὴ πυκνότης χαλκοῦ 8,8 ὑδραργύρου 13,6).

17. Θέτομεν τεμάχιον μετάλλου ἐντὸς ὄγκομετρικοῦ δοχείου, τὸ ὁποῖον περιέχει ὕδωρ μέχρι τῆς ὑποδιαίρεσως 63 cm<sup>3</sup>. Παρατηροῦμεν ὅτι τὸ μέταλλον βυθίζεται, ἐνθ' ἡ στάθμη τοῦ ὕδατος ἀνέρχεται εἰς τὴν ὑποδιαίρεσιν 77 cm<sup>3</sup>. Τὸ ἴδιον τεμάχιον θέ-

τομεν εἰς ὄγκομετρικὸν δοχεῖον, τὸ ὁποῖον περιέχει ὑδράργυρον μέχρι τῆς ὑποδιαίρεσως 57 cm<sup>3</sup>. Τὸ μέταλλον ἐπιπλέει εἰς τὸν ὑδράργυρον, ἐνθ' ἡ στάθμη τοῦ ὑδραργύρου ἀνέρχεται εἰς τὴν ὑποδιαίρεσιν 65 cm<sup>3</sup> :

α) Ποῖα ἡ πυκνότης τοῦ μετάλλου ;

β) Ποῖα ἡ σχετικὴ τοῦ πυκνότης ;

18. Τεμάχιον φελλοῦ, ὄγκου 120 cm<sup>3</sup> καὶ εἰδικοῦ βάρους 0,25 g/cm<sup>3</sup>, ἐπιπλέει εἰς τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ ὕδατος :

α) Πόσων ἀνωσιν δέχεται ὑπὸ τοῦ ὕδατος ;

β) Πόσος εἶναι ὁ ἐκτὸς ὕδατος ὄγκος τοῦ φελλοῦ ;

γ) Θέτομεν ἐπὶ τοῦ φελλοῦ βάρους 50 p. Πόσος εἶναι τὰρα ὁ ὄγκος τοῦ φελλοῦ, ὅστις δὲν βυθίζεται ; Ποῖον εἶναι τὸ μεγαλύτερον βάρος, τὸ ὅποιον δυνάμεθα νὰ θέσωμεν ἐπὶ τοῦ φελλοῦ ;

19. Κοιλὴ χαλκίνη σφαῖρα βάρους 1320 p ζυγίζεται ἐντὸς τοῦ ὕδατος 1095 p :

α) Νὰ ὑπολογισθῇ ὁ ὄγκος τῆς κοιλότητος.

β) Ἐάν ἡ μάζα τοῦ χαλκοῦ παραμείνῃ ἡ αὐτὴ, ποῖον ὄγκον πρέπει ν' ἀποκτήσῃ διαδοχικῶς ἡ κοιλότης, διὰ νὰ ἰσορροπῇ ἡ σφαῖρα : α) ἐντὸς τοῦ ὕδατος ; καὶ β) ἐντὸς τοῦ οἰνοπνεύματος ;

(Πυκνότητες : χαλκοῦ 8,8 g/cm<sup>3</sup>, οἰνοπνεύματος 0,8 g/cm<sup>3</sup>).

20. Κυλινδρὸς ἐκ φελλοῦ, βάρους 69,3 p, ἔχει διάμετρον 7 cm καὶ ὕψος 6 cm : α) Πόση εἶναι ἡ πυκνότης του ;

β) Ἐάν ὁ κύλινδρος ἐπιπλέῃ εἰς τὸ ὕδωρ καὶ ἡ βάσις του εἶναι ὀριζόντια, πόσον ὕψος ἔχει τὸ ἀναδύμενον μέρος του ;

γ) Πόσον εἶναι αὐτὸ τὸ ὕψος, ὅταν ὁ κύλινδρος ἐπιπλέῃ ἐπὶ οἰνοπνεύματος σχετικῆς πυκνότητος 0,8 ; (π=22/7).

## III. Πυκνόμετρα

21. Σωλὴν ἐντελῶς κυλινδρικός φέρων ἔρμα ἔχει τομὴν ἐμβαδοῦ 4 cm<sup>2</sup> καὶ βάρους 60 p :

α) Πόσον εἶναι τὸ μήκος τοῦ βυθισμένου μέρους τοῦ σωλῆνος ἐντὸς ὑγροῦ πυκνότητος : 0,7 g/cm<sup>3</sup> ; 0,8 g/cm<sup>3</sup> ; 1 g/cm<sup>3</sup> ; 1,2 g/cm<sup>3</sup> ; 1,4 g/cm<sup>3</sup> ; 1,6 g/cm<sup>3</sup> ;

β) Νὰ κατασκευασθῇ ἡ καμπύλη, ἡ ὁποῖα παριστᾷ τὰς μεταβολὰς τοῦ μήκους τοῦ βυθισμένου μέρους συναρτήσει τῶν πυκνοτήτων τῶν χρησιμιοποιουμένων ὑγρῶν. Θέτομεν εἰς τὸν ἀξονα ΟΧ τὰς πυκνότητας, λαμβάνοντες ὡς ἀρχὴν Ο τὸ 0,7 g/cm<sup>3</sup> καὶ 1 cm διὰ 0,1 g/cm<sup>3</sup> καὶ εἰς τὸν ἀξονα ΟΥ τὰ μήκη τοῦ βυθισμένου μέρους, λαμβάνοντες ὡς ἀρχὴν τὸ Ο καὶ 1 cm δι' ἕκαστον 1 cm βυθισμένου μήκους.

22. Πυκνόμετρον βάρους 16,5 p ἀποτελεῖται ἐξ ἐνὸς πλωτήρος, ὄγκου 16 cm<sup>3</sup> φερόντος ἔρμα, καὶ ἐνὸς ὑαλίνου βαθμολογημένου σωλῆνος, τομῆς 0,5 cm<sup>2</sup> :

α) Θέτομεν τοῦτο ἐντὸς καθαροῦ ὕδατος : Εἰς ποῖον ὕψος ἀνωθεν τοῦ πλωτήρος θὰ ἀνέλθῃ ἡ ἐπιφάνεια τοῦ ὕδατος ;

β) Θέτομεν τοῦτο ἐντὸς ὑγροῦ, ἀγνώστου πυκνότητος. Ἡ στάθμη τοῦ ὑγροῦ ἀνέρχεται 23 cm ἀνω τοῦ πλωτήρος. Ποῖα εἶναι ἡ σχετικὴ πυκνότης αὐτοῦ τοῦ ὑγροῦ ;

## Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΙΕΣΙΣ

### 1 Δυνάμεις ασκούνται υπό του ατμοσφαιρικού αέρος.

α) 'Εάν εφαρμόσωμεν επί επιπέδου ύαλου τόν ελαστικόν δίσκον του σχήματος 1 και θελήσωμεν νά τόν άποκολλήσωμεν έλκοντες αυτόν εκ του άγκιστρου, δέν θα τό επιτύχωμεν άνευ δυσκολίας. 'Εάν άνυψώσωμεν όμως ελαφρώς τά χείλη του δίσκου, θα τόν άποκολλήσωμεν άνευ προσπαθείας.

β) Τοποθετούμεν επί του δίσκου άεραντλίας εύρυν κύλινδρον, προσαρμόζοντες επί του έτέρου άνοιγματος ελαστικήν μεμβράνην. 'Εάν αφαιρέσωμεν τόν άέρα εκ του έσωτερικού του κυλίνδρου, παρατηρούμεν ότι ή μεμβράνη κοιλιίνεται και εις τό τέλος θραύεται, οιονδήποτε και άν έχη προσανατολισμόν. Καθίσταται φανερόν ότι επί της έξωτερικής επιφανείας της ένεργεί μία πιεστική δύναμις (σχ. 2).

### 2 'Εξήγησις των δύο πειραμάτων.

α) Δέν δυνάμεθα ν' άποκολλήσωμεν τόν δίσκον εκ της ύαλου, διότι εις τήν έλξιν, τήν όποίαν άσκοϋμεν επ' αυτού, άντιδρά έτέρα δύναμις.

'Η δύναμις αύτη προέρχεται εκ του άτμοσφαιρικού άέρος, άφού ό δίσκος εις τήν έξωτερικήν του επιφανείαν έρχεται εις έπαφήν μόνον μετ' αυτού.

β) Πρό της έναρξεως λειτουργίας της άντλιας ή μεμβράνη είναι επίπεδος, διότι ή δέν ένεργεί επ' αύτης δύναμις ή ένεργούν δύο ίσαι και άντιθετοι δυνάμεις.


"Όταν άρχίσωμεν τήν αφάιρεσιν του άέρος, ή μεμβράνη κοιλιίνεται, διότι μία δύναμις πιέζει τήν έξωτερικήν της επιφανείαν. 'Επειδή ή δύναμις αύτη θα προϋπήρχε, συμπεραίνομεν ότι ή μεμβράνη πιέζεται και εκ των δύο επιφανειών της διά δύο ίσων και άντιθέτων δυνάμεων. "Όσον αφαιρούμεν τόν άέρα, ή έντασις της έσωτερικής δυνάμεως ελαττοϋται, όπότε ή σταθερά έξωτερική δύναμις κοιλιάνει τήν μεμβράνην.

'Επειδή ό άήρ έχει βάρος (1 l άέρος ζυγίζει περίπου 1,3 p), πιέζει, όπως και τά υγρά, τās επιφανείας, με τās όποιας έρχεται εις έπαφήν.

Πλείστα φαινόμενα της καθημερινής ζωής μαρτυροϋν τήν παρουσίαν της άτμοσφαιρικής πίεσεως.


### 3 Μέτρησις της άτμοσφαιρικής πίεσεως : Πείραμα του Torricelli.

Πληροϋμεν δι' υδραργυρου ύάλινον σωλήνα, μήκους 1 m κλείομεν τό άνοιγμά του διά του δακτύλου μας και τόν άναστρέφομεν έντός μικρής λεκάνης με υδράργυρον οϋτως, ώστε τό στόμιον του σωλή-



Σχ. 1. 'Αγκιστρον «βεντοζα».

'Ο ελαστικός δίσκος κρατείται επί της λείας επιφανείας από τήν πιεστικήν δύναμιν του άέρος.




Σχ. 2.


Εις τό Α, ή μεμβράνη δέν παραμορφώνεται.

Εις τό Β, ή μεμβράνη κοιλιίνεται.

Εις τό Γ, τό αποτέλεσμα είναι τό αυτό, όπως και άν στρέψωμεν τήν μεμβράνην.



λεσμα είναι τό αυτό, όπως και άν στρέψωμεν τήν μεμβράνην.



Σχ. 3.

Α: Τό καλαμάκι. Διατί τό υγρόν άνέρχεται εις τόν σωλήνα;

Β: Τό σιφώνιον. Ποία δύναμις έμποδίζει τό υγρόν νά χυθή;

νος να εύρισκεται υπό την έπιφάνειαν του υδραργύρου.

Έαν άποσύρωμεν τον δάκτυλον μας, ο υδράργυρος κατέρχεται και ή στάθμη του σταθεροποιείται εις τό σημειον Γ, τό όποιον εύρισκεται εις ώρισμένον ύψος  $h$  εκ της στάθμης του υδραργύρου της λεκάνης. Τό ύψος αυτό είναι 76 cm (σχ. 4), όταν τό πείραμα εκτελήται εις την έπιφάνειαν της θαλάσσης. Παρατηρούμεν ότι ή στάθμη Γ παραμένει εις τό αυτό όριζόντιον έπίπεδον και όταν κλίνωμεν τον σωλήνα και έαν επαναλάβωμεν τό πείραμα διά σωλήνων διαφόρων σχημάτων (σχ. 4, 5).

**Έξήγησις.** Όταν ο υδράργυρος κατέρχεται έντός του σωλήνος, τότε ο χώρος, τον όποιον κατελάμβανε προηγουμένως ο υδράργυρος μεταξύ της στάθμης Γ και της κορυφής του σωλήνος, παραμένει κενός, διότι ο άήρ δεν δύναται να εισχωρήση.

Συμφώνως προς την θεμελιώδη άρχήν της υδροστατικής, εις τά δύο σημεία Α και Β, τά όποια εύρισκονται εις τό αυτό όριζόντιον έπίπεδον, ένεργεί ή αύτή πίεσις (σχ. 4 και 6) :  $P_A = P_B$ .

Εις τό σημειον Α ένεργεί ή άτμοσφαιρική πίεσις εις τό σημειον Β (εις την προκειμένην περίπτωση) ή πίεσις είναι άριθμητικώς ίση προς τό βάρος στήλης υδραργύρου, ή όποία έχει ύψος 76 cm και τομήν  $1 \text{ cm}^2$  (σχ. 6). Άφου τό ειδικόν βάρος του υδραργύρου είναι  $13,6 \text{ p/cm}^3$ ,


$$P = 13,6 \text{ p/cm}^3 \times 76 \text{ cm} = 1033 \text{ p/cm}^2$$

δεχόμεθα ότι αύτη άποτελεί την μέσην πίεσιν ένός τόπου, ο όποιος εύρισκεται εις τό ύψος της στάθμης της θαλάσσης και εις γεωγραφικόν πλάτος  $45^\circ$ , λέγεται δε πίεσις μιās φυσικής άτμοσφαιρας.

$$\text{Πίεσις μιās φυσικής άτμοσφαιρας} \\ = 1 \text{ Atm} = 1013,3 \text{ millibars}$$


εις την θερμοκρασίαν  $0^\circ \text{ C}$  εις την στάθμην της θαλάσσης και εις γεωγραφικόν πλάτος  $45^\circ$ .

Εις την Μετεωρολογίαν χρησιμοποιείται ή μονάς Bar, ή millibar (mBar) και ή μικρομπάρ (μBar). Η σχέση της mBar προς την πίεσιν μιās φυσικής άτμοσφαιρας είναι :  $1 \text{ Atm} = 1013,3 \text{ mBar}$ .



Σχ. 4. Σωλήν Torricelli.

Η στάθμη του υδραργύρου εις τον σωλήνα κατέρχεται εις ύψος 76 cm περίπου, οιαδήποτε και άν είναι ή κλίσις του σωλήνος.



Σχ. 5. Τό ύψος  $h$  του υδραργύρου δεν εξαρτάται εκ του σχήματος του σωλήνος ούτε εκ του έμβαιου της τομής του.



Σχ. 6. Η στήλη του υδραργύρου ισορροπεί στήλην άέρος της αύτης τομής και ύψους όσον είναι τό πάχος της άτμοσφαιρας.

## ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ

1. Ο άτμοσφαιρικός άήρ άσκει πίεσιν έφ' εκάστης έπιφανείας, μετά της όποιας έρχεται εις έπαφήν.

2. Η δύναμις, ή όποία συγκρατεί τους έλαστικούς δίσκους επί των λειών έπιφανειών και αναγκάζει τά ύγρά ν' άνέρχωνται εις τά σιφώνια, τας σύριγγας, τά σταγονόμετρα κλπ., όφείλεται εις την άτμοσφαιρικήν πίεσιν.

3. Η πίεσις της φυσικής άτμοσφαιρας ισορροπεί στήλην υδραργύρου, τομής  $1 \text{ cm}^2$  και ύψους 76cm κατά μέσον όρον εις την στάθμην της θαλάσσης, ίσούται δε προς  $1033,6 \text{ p/cm}^2$  ή  $1013,3 \text{ mBar}$ .

## ΤΟ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΝ

Είναι όργανον, διὰ τοῦ ὁποῖου μετροῦμεν τὴν ἀτμοσφαιρικὴν πίεσιν.

## 1 Τὸ Ὑδραργυρικὸν βαρόμετρον.

● Τοῦτο (σχ. 1) εἶναι εἰς σωλὴν Torricelli. Ἡ διάμετρος τῆς λεκάνης τοῦ Γ εἶναι πολὺ μεγαλύτερα ἀπὸ τὴν διάμετρον τοῦ σωλήνος καὶ διὰ τοῦτο μετατόπισις ὀλίγων ἑκατοστομέτρων τῆς στάθμης τοῦ ὑδραργύρου εἰς τὸν σωλὴνα ἀντιστοιχεῖ εἰς ἀνεπαίσθητον μετατόπισιν τῆς στάθμης τοῦ ὑδραργύρου τῆς λεκάνης. Τὴν μετατόπισιν αὐτὴν δυνάμεθα νὰ παραβλέψωμεν καὶ νὰ θεωρήσωμεν τὸ Ο τῶν ὑποδιαίρεσεων τῆς πλακὸς ὅτι ἀντιστοιχεῖ πάντοτε εἰς τὴν στάθμην τοῦ ὑδραργύρου τῆς λεκάνης.

Ἐστω ὅτι ἡ στάθμη τοῦ ὑδραργύρου εἰς τὸν σωλὴνα φθάει εἰς τὴν ὑποδιαίρεσιν 752 mm. Εἰς τὰ σημεῖα Α καὶ Β, τὰ ὅποια εὐρίσκονται εἰς τὸ αὐτὸ ὀριζόντιον ἐπίπεδον, τὸ ὀριζόμενον ὑπὸ τῆς ἐλευθέρως ἐπιφανείας τοῦ ὑδραργύρου τῆς λεκάνης, ὅταν ὁ ὑδραργύρος ἰσορροπῆ, ἐνεργεῖ ἴση πίεσις. Δηλ. εἰς μὲν τὸ Β ἐνεργεῖ ἡ ἀτμοσφαιρικὴ πίεσις, εἰς δὲ τὸ σημεῖον Α ἡ πίεσις στήλης ὑδραργύρου 752 mm.

**Συμπέρασμα:** Ἐὰν ἡ ἀτμοσφαιρικὴ πίεσις ἰσορροπῆ στήλῃν ὑδραργύρου, ἕψους 752 mm, λέγομεν ὅτι ἡ ἀτμοσφαιρικὴ πίεσις ἐκεῖνη τὴν στιγμὴν εἶναι 752 mm ὑδραργύρου.

## 2 Τὸ μεταλλικὸν βαρόμετρον.

Τὸ ὑδραργυρικὸν βαρόμετρον παρουσιάζει μεγάλον ὄγκον, εἶναι εὐθραστον καὶ μεταφέρεται δυσκόλως. Διὰ τοῦτο χρησιμοποιοῦμεν τὸ μεταλλικὸν βαρόμετρον, εἰς τὸ ὁποῖον τὴν πιεστικὴν δύναμιν τῆς ἀτμοσφαιρας ἰσορροπεῖ ἡ δύναμις ἐνὸς ἐλατηρίου.


● Τὸ κύριον μέρος τοῦ ὁργάνου τούτου ἀποτελεῖται ἐξ ἐνὸς κυλινδρικοῦ τυμπάνου μὲ μεταλλινὰ ἐλαστικὰ τοιχώματα.

● Τί θὰ συμβῆ, ἐὰν ἐξαχθῇ ὁ ἀήρ ἐξ αὐτοῦ τοῦ τυμπάνου ;


Ἐὰν προηγουμένως προσαρμόσωμεν ἐν ἐλατήριον εἰς τὸ ἐσωτερικόν του, ὅπως βλέπομεν εἰς τὸ σχ. 2, τότε τί θὰ ἐπιτύχωμεν ;

● Ἡ ἀντίδρασις τοῦ ἐλατηρίου εἶναι σταθερὰ καὶ ἀντίθετος πρὸς τὴν πιεστικὴν δύναμιν, ἡ ὁποία ἐνεργεῖ ἐπὶ τοῦ τυμπάνου, καὶ διὰ τοῦτο ἡ ἐλαστικὴ ἐπιφάνεια του παρακολουθεῖ τὰς μεταβολὰς τῆς ἀτμοσφαιρικῆς πίεσεως.


● Αἱ παραμορφώσεις αὐταί, ἀφοῦ ἐνισχυθοῦν, μεταδίδονται εἰς δεικτὴν, ὃ ὁποῖος κινεῖται ἐμπροσθεν πλακὸς μὲ ὑποδιαίρεσεις. Ἡ πλάξ αὐτὴ βαθμολογεῖται ἐν συγκρίσει πρὸς ὑδραργυρικὸν βαρόμετρον.



Σχ. 1. Ὑδραργυρικὸν βαρόμετρον





Μεταλλικὸν βαρόμετρον



Σχ. 2. Ἀρχὴ τοῦ μεταλλικοῦ βαρομέτρου



### 3 Τὸ αὐτογραφικὸν βαρόμετρον.




Σχ. 3 Ἀρχὴ τοῦ αὐτογραφικοῦ βαρομέτρου (Τὰ βέλη δεικνύουν τὴν κίνησιν εἰς τὴν περιπτώσιν αὐξήσεως τῆς πίεσεως).

Τὸ αὐτογραφικὸν βαρόμετρον, διὰ νὰ εἶναι εὐαισθητότερον, ἀποτελεῖται ἐκ πολλῶν βαρομετρικῶν τυμπάνων, τὸ ἐν ἐπὶ τοῦ ἑτέρου, ὥστε νὰ ἀποτελοῦν στήλην.

Τὰς μεταβολὰς τῆς ἀτμοσφαιρικῆς πίεσεως παρακολουθεῖ ἐν στέλεχος, τὸ ὁποῖον καταλήγει εἰς γραφίδα γλυκερινούχου μελάνης.

Τὸ στέλεχος ἀκολουθεῖ τὰς παραμορφώσεις τοῦ τυμπάνου, παλλόμενον εἰς κατακόρυφον ἐπίπεδον, ἐνῶ ἡ γραφίς, ἡ ὁποία ἀπτεται τῆς ἐπιφανείας ἐνὸς κυλίνδρου, ἐκτελοῦντος μίαν πλήρη περιστροφὴν εἰς μίαν ἑβδομάδα, σημειώνει καθ' ἑκάστην στιγμὴν τὴν ἀτμοσφαιρικὴν πίεσιν.



Ὁ κύλινδρος περιβάλλεται διὰ χαρτίνης ταινίας, ἐνθα σημειοῦνται αἱ ἡμέραι καὶ αἱ ὥραι ἐπ' αὐτῆς ἡ γραφίς γράφει μίαν καμπύλην, ἡ ὁποία μᾶς ἐπιτρέπει τὴν παρακολούθησιν τῶν μεταβολῶν τῆς ἀτμοσφαιρικῆς πίεσεως ἐντὸς καθωρισμένου χρονικοῦ διαστήματος.

Τὸ βαρογράφημα αὐτὸ δεικνύει τὰς μεταβολὰς τῆς ἀτμοσφαιρικῆς πίεσεως εἰς τὸν αὐτὸν τόπον καὶ διὰ χρονικὸν διάστημα μῆς ἑβδομάδος.

**Συμπέρασμα :** Ἡ ἀτμοσφαιρικὴ πίεσις μεταβάλλεται καὶ εἰς τὸν αὐτὸν τόπον.

### 4 Ἡ ἀτμοσφαιρικὴ πίεσις ἐλαττοῦται μετὰ τοῦ ὕψους.

Βαρόμετρον, τὸ ὁποῖον δεικνύει 760 mm εἰς τὴν στάθμην τῆς θαλάσσης, θὰ δεικνύη τὴν ἰδίαν στιγμὴν εἰς ὕψος 1000 m τὸ πολὺ 675 mm.

● **Ἐξήγησις:** Ὅταν ἀνερχώμεθα κατὰ 10 m εἰς χαμηλὰ ὕψη, ἡ πίεσις εἰς τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ ὕδραργύρου ἐλαττοῦται τόσον, ὅσον εἶναι τὸ βάρος στήλης ἀέρος, ἡ ὁποία ἔχει τομὴν  $1 \text{ cm}^2$  καὶ ὕψος 10 m.

Ὁ ὄγκος του θὰ εἶναι  $1000 \text{ cm} \cdot 1 \text{ cm}^2 = 1000 \text{ cm}^3$  ἢ  $1 \text{ l}$  ἢ  $1 \text{ dm}^3$ .

Ύψος (εις m)	Πίεσις εις mmHg	Ύψος (εις m)	Πίεσις εις mmHg
—	—	—	—
0	760	8000	267
1000	674,1	9000	230,6
2000	596,2	10000	198,3
3000	525,8	11000	169,7
4000	462,3	12000	145,0
5000	405,2	15000	97,3
6000	353,9	20000	41,0
7000	308	30000	8,5

Τò βάρος ἑνὸς λίτρου ἀέρος γνωρίζομεν ὅτι εἶναι 1,3 ρ καὶ εἶναι ἴσου περίπου πρὸς τὸ βάρος στήλης ὑδραργύρου, ἡ ὁποία ἔχει μήκος 1 mm καὶ τομὴν 1 cm<sup>2</sup>. Δυνάμεθα λοιπὸν νὰ παραδεχθῶμεν ὅτι εἰς τὰ κατώτερα στρώματα τῆς ἀτμοσφαιρας ἡ ἐπιφάνεια τοῦ ὑδραργύρου κατέρχεται κατὰ 1 mm, ὅταν ἀνερχώμεθα 10 m.

#### 5 Ἐφαρμογαὶ τοῦ βαρομέτρου.

● Ἡ κατάστασις τοῦ καιροῦ ἔξαρτᾶται καὶ ἐκ τῶν μεταβολῶν τῆς ἀτμοσφαιρικῆς πίεσεως ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας τῆς γῆς. Ἡ μελέτη τῶν μεταβολῶν αὐτῶν ἐν συνδυασμῷ πρὸς ἄλλους παράγοντας (θερμοκρασίας, διευθύνσεως ἀνέμου, ὑγρασίας κ.τ.λ.) μᾶς ἐπιτρέπει μετὰ μεγάλης πιθανότητος νὰ προβλέψωμεν τὸν καιρὸν.

● Ὅταν γνωρίζωμεν τὴν ἀτμοσφαιρικὴν πίεσιν ἐνὸς τόπου, δυνάμεθα νὰ ὑπολογίσωμεν τὸ ὕψομετρόν του.

Τὰ ὑψομετρικὰ ὄργανα τῶν ἀεροπλάνων εἶναι μεταλλικὰ βαρόμετρα, τῶν ὁποίων ἡ πλάξ εἶναι βαθμολογημένη εἰς μέτρα ὕψους καὶ ὄχι εἰς χιλιοστὰ ὑδραργύρου ἢ μιλιμπάρ.

Ἄλλο πιλότος παρακολουθεῖ τὸ ὕψος τῆς πτήσεώς του εἰς τὸ ὑψομετρικὸν ὄργανον, ἀφοῦ ρυθμίση τοῦτο συμφώνως πρὸς τὴν ἀτμοσφαιρικὴν πίεσιν τοῦ ἐδάφους ἐκείνην τὴν στιγμήν, κατὰ τὴν ὁποίαν τοῦ μεταδίδει ὁ ἀσύρματος.

#### ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ

1. Τὸ ὑδραργυρικὸν βαρόμετρον εἶναι σωλὴν Torricelli, βαθμολογημένον εἰς ἑκατοστὰ καὶ χιλιοστὰ, ὁ ὁποῖος μᾶς ἐπιτρέπει νὰ μετρώμεν τὰς μεταβολὰς τῆς ἀτμοσφαιρικῆς πίεσεως.

2. Εἰς τὸ μεταλλικὸν βαρόμετρον ἡ ἀτμοσφαιρικὴ πίεσις ἐνεργεῖ ἐπὶ τῆς ἐλαστικῆς ἐπιφανείας ἑνὸς κενοῦ μεταλλικοῦ τυμπάνου.

Τὰς παραμορφώσεις τῆς ἐπιφανείας αὐτῆς παρακολουθεῖ εἰς δείκτης, ὁ ὁποῖος κινεῖται ἐμπροσθεν βαθμολογημένης πλακῆς. Ἡ βαθμολόγησις τῆς πλακῆς γίνεται ἐν συγκρίσει πρὸς ὑδραργυρικὸν βαρόμετρον.

3. Τὸ αὐτογραφικὸν βαρόμετρον χαράσσει τὴν καμπύλην τῶν μεταβολῶν τῆς ἀτμοσφαιρικῆς πίεσεως ἐντὸς ὀρισμένου χρονικοῦ διαστήματος.

4. Ἡ ἀτμοσφαιρικὴ πίεσις μεταβάλλεται μετὰ τοῦ ὕψους. Τὸ ὑψομετρικὸν ὄργανον τῶν ἀεροπλάνων εἶναι μεταλλικὸν βαρόμετρον βαθμολογημένον εἰς μέτρα ὕψους.

5. Τὸ βαρόμετρον χρησιμεύει εἰς τὰς μετεωρολογικὰς ὑπηρεσίας διὰ τὴν πρόγνωσιν τοῦ καιροῦ.

## ΠΙΕΣΕΙΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΑΙ ΥΠΟ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

## Τὸ Μανόμετρον

**1 α) Παρατήρησις.** Ἐὰν ἀνοίξωμεν πρὸς στιγμὴν τὴν στρόφιγγα τοῦ φωταερίου ἢ τοῦ ὑγραερίου, θὰ ἀκούσωμεν ὀδὺν συριγμόν, ὁ ὁποῖος φανερώνει ὅτι τὸ ἀέριον ἐξέρχεται ὀρμητικῶς ἐξ αὐτῆς.

● Τὸ αὐτὸ θὰ συμβῆ, ἐὰν ἀνοίξωμεν τὴν βαλβίδα ἐλαστικοῦ ποδηλάτου, ἐνῶ συγχρόνως θὰ ἴδωμεν αὐτὸ ἐκκενούμενον (νὰ ξεφουσκώσῃ).

● Τὰ ἀέρια (φωταερίον, ὑγραερίον) ἐντὸς τῶν σωλῆνων καὶ ὁ ἀήρ ἐντὸς τῶν ἀεροθαλάμων (ἐλαστικῶν) πιέζουν τὰ τοιχώματα, ὑπὸ τῶν ὁποίων περιορίζονται.

“Ὅταν εἰς τὰ τοιχώματα αὐτὰ ὑπάρχῃ ἀνοίγματα, ἐπειδὴ ἡ πίεσις τοῦ ἀερίου εἶναι μεγαλύτερα τῆς ἐξωτερικῆς (ἀτμοσφαιρικῆς), τὸ ἀέριον ἐξέρχεται ἐκ τοῦ ἀνοίγματος.

**β) Μέτρησις.** Συνδέομεν τὴν στρόφιγγα τοῦ φωταερίου εἰς *μανόμετρον δι’ ὕδατος* (σχ. 1) καὶ μετροῦμεν τὸ ὕψος A μεταῦ τῆς στάθμης A καὶ B τοῦ ὑγροῦ ἐντὸς τοῦ σωλῆνος : 8 cm.

● Γνωρίζομεν ὅτι ἡ πίεσις ἐντὸς ρευστοῦ εἶναι ἡ αὐτὴ εἰς ὅλα τὰ σημεῖα τοῦ ὀριζοντίου ἐπιπέδου BB’.

Εἰς τὸ σημεῖον B’ ἡ πίεσις εἶναι ἴση πρὸς τὴν ἀτμοσφαιρικὴν, ἠὺξημένη κατὰ τὸ βᾶρος στήλης ὕδατος, τομῆς 1 cm<sup>2</sup> καὶ ὕψους 8 cm, δηλ. 8 p/cm<sup>2</sup>.

● Ἐπειδὴ ἡ αὐτὴ πίεσις ἀσκεῖται καὶ εἰς τὸ σημεῖον B, ἡ πίεσις τοῦ φωταερίου εἰς τοὺς σωλῆνας ὑπερβαίνει κατὰ 8 p/cm<sup>2</sup> τὴν τιμὴν τῆς ἀτμοσφαιρικῆς πίεσεως.

● Θερμαίνομεν ἐλαφρῶς σφαιρικὴν φιάλην, κλειστὴν διὰ πώματος, ἀπὸ τὸ ὁποῖον διέρχεται ὑάλινος σωλῆν. Ὁ περιεχόμενος εἰς τὴν φιάλην ἀήρ διαστέλλεται καὶ μέρος του ἐκφεύγει. Συνδέομεν τότε τὸν σωλῆνα τῆς φιάλης πρὸς μανόμετρον δι’ ὕδατος καὶ παρατηροῦμεν ὅτι τὸ σημεῖον A αὐτὴν τὴν φεραν εὑρίσκεται χαμηλότερον τοῦ σημείου B (σχ. 2).

Ἐὰν μετρήσωμεν τὴν διαφορὰν ὕψους τῶν δύο σημείων (π.χ. 8 cm) καὶ σκεφθῶμεν ὡς καὶ προηγουμένως, συμπεραίνομεν ὅτι ἡ πίεσις ἐντὸς τῆς φιάλης εἶναι κατὰ 8 p/cm<sup>2</sup> μικροτέρα τῆς ἀτμοσφαιρικῆς.

● Διὰ νὰ ὑπολογίσωμεν τὴν πίεσιν τοῦ ἀερίου καὶ εἰς τὰς δύο περιπτώσεις, πρέπει νὰ γνωρίζωμεν τὴν τιμὴν τῆς ἀτμοσφαιρικῆς πίεσεως ἐκείνην τὴν στιγμὴν (75 cmHg): ἐπομένως :

$$13,6 \text{ p/cm}^2 \times 75 \text{ cm} = 1020 \text{ p/cm}^2.$$


Ἡ πίεσις τοῦ φωταερίου εἰς τὸ ἐσωτερικὸν τῶν σωλῆνων εἶναι :

$$1020 \text{ p/cm}^2 + 8 \text{ p/cm}^2 = 1028 \text{ p/cm}^2.$$


Ἡ πίεσις εἰς τὸ ἐσωτερικὸν τῆς φιάλης εἶναι :

$$1020 \text{ p/cm}^2 - 8 \text{ p/cm}^2 = 1012 \text{ p/cm}^2.$$


**Συμπέρασμα:** Τὰ ἀέρια ἀσκοῦν πίεσιν ἐπὶ τῶν τοιχωμάτων τῶν δοχείων, ἐντὸς τῶν ὁποίων εἶναι περιορισμένα.




Σχ. 1. Ἡ πίεσις τοῦ ἀερίου εἰς τὰς σωλῆνες εἶναι μεγαλύτερα κατὰ 8 p/cm<sup>2</sup> ἀπὸ τὴν ἀτμοσφαιρικὴν.




Σχ. 2. Ἡ πίεσις τοῦ θερμοῦ ἀέρος ἐντὸς τῆς φιάλης εἶναι κατὰ 8 p/cm<sup>2</sup> κατωτέρα τῆς ἀτμοσφαιρικῆς.




Σχ. 3. Η πίεσις του εισερχομένου αέρος εις την ελαστικήν κύστιν ώθει τὰ τοιχώματά της.



Σχ. 4. Ο έγκλεισμένος εις την κύστιν αήρ άσκει πίεσιν καθέτως προς όλα τὰ σημεία τών τοιχωμάτων της.



Σχ. 5. Εις την φιάλην Α ή πίεσις, την όποιαν άσκει τó ύδωρ, αύξάνει μετά του βάθους. Εις την φιάλην Β ή πίεσις, την όποιαν άσκει ó αήρ, είναι ή αύτή εις όλα τὰ σημεία τών τοιχωμάτων της.



Σχ. 6. Μεταλλικόν μανόμετρον.

## 2 Χαρακτηριστικά της πίεσεως την οποίαν άσκούν τὰ άέρια.

● Όταν πληρούμεν άέρος τόν αεροθάλαμον σφαιρικός (μπάλας) ποδοσφαίρου, παρατηρούμεν ότι εις έκάστην κίνησιν του έμβόλου της άντλίας προς τὰ μέσα τὰ τοιχώματά του ώθούνται προς όλας τάς διευθύνσεις. Τελικώς ó αεροθάλαμος λαμβάνει τó σφαιρικό του σχήμα (σχ. 3).

● Εάν βυθίσωμεν τόν πλήρη αεροθάλαμον εις τó ύδωρ ύαλίνου δοχείου και τόν τρυπήσωμεν εις διάφορα σημεία διά βελόνης, παρατηρούμεν φυσαλλίδας άέρος νά έξέρχονται κατ' άρχήν καθέτως προς την έπιφάνειάν του και έπειτα νά διευθύνονται προς τὰ άνω (σχ. 4).

## 3 Σύγκρισις της πίεσεως ένός άερίου προς την πίεσιν ένός ύγρου (σχ. 5).

Τó ύδωρ, τó όποιον εύρίσκεται εις την φιάλην Α, πιέζει διά του βάρους του τόν πυθμένα και τὰ τοιχώματά της.

Η πίεσις δέν είναι ή αύτή εις όλα τὰ σημεία τών τοιχωμάτων της. Καί ó αήρ έπίσης λόγω του βάρους του πιέζει τὰ τοιχώματα της φιάλης Β. Η πίεσις όμως αύτή είναι πολύ μικρά και δυνάμεθα νά την παραβλέψωμεν. Διότι, ένώ  $1 \text{ dm}^3$  ύδατος ζυγίζει  $1 \text{ Kp}$ ,  $1 \text{ dm}^3$  άέρος ζυγίζει  $1,3 \text{ p}$ .

Η πίεσις εις την περίπτωσην αύτην όφείλεται εις την ιδιότητα του έκτατου τών άερίων.

Γνωρίζομεν ότι τὰ μόρια τών άερίων εύρίσκονται εις συνεχή πίεσιν και διά τουτό προσκρούουν έπί τών τοιχωμάτων τών δοχείων, τὰ όποια τὰ περιέχουν.

Αί προσκρούσεις αύται έχουν ως άποτέλεσμα την πίεσιν του άερίου.

**Συμπέρασμα:** Ο περιορισμένος έντός δοχείου αήρ άσκει πλειστικήν δύναμιν έπί τών τοιχωμάτων εκ τών έξω προς τὰ έξω. Η πίεσις έπί τών τοιχωμάτων ένός μικρού ύγρου δοχείου, περιέχοντος άέρα, είναι ή αύτή εις όλα τὰ σημεία.

## 4 Μέτρησις της πίεσεως ένός άερίου.

Διά νά μετρήσωμεν την πίεσιν του φωταερίου, χρησιμοποιούμεν τó μανόμετρον δι' ύδατος. Δι' αύτου δυνάμεθα νά μετρήσωμεν την διαφοράν πίεσεως, κατά μερικά  $\text{p/cm}^2$  μεγαλύτεραν ή μικροτέραν της άτμοσφαιρικής.

Εάν άντικαταστήσωμεν τó ύδωρ του μανομέτρου δι' ύδραργύρου, τότε εις διαφοράν ύψους της μανομετρικής στήλης  $1 \text{ cm}$  θά άντιστοιχή διαφορά πίεσεως  $13,6 \text{ p/cm}^2$ .

Πρὸς μέτρησιν μεγάλων ἢ μικρῶν πιέσεων χρησιμοποιοῦμεν ἐπίσης καὶ τὸ **μεταλλικὸν** **μανόμετρον**.

Τὸ ἀέριον, τοῦ ὁποίου θέλομεν νὰ μετρήσωμεν τὴν πίεσιν, εἰσχωρεῖ ἐντὸς τοῦ ἐλαστικοῦ σωλῆνος τοῦ ὄργανου, ὅπερ ἔχει σχῆμα σπείρας καὶ τείνει νὰ τοῦ ἀλλάξῃ τὸ σχῆμα.

Τὴν ἀλλαγὴν τοῦ σχήματος τοῦ σωλῆνος παρακολουθεῖ μία βελὸν, ἡ ὁποία δεικνύει τὴν πίεσιν ἐπὶ βαθμολογημένης πλακῶς. Ἡ βαθμολόγησις γίνεται συγκριτικῶς εἰς  $\rho/\text{cm}^2$  ἢ εἰς ἀτμοσφαίρας.

### 5 Παραδείγματα πιέσεως ἀερίων.

Ἐπειδὴ τὰ ἀέρια εἶναι συμπιεστά, αἱ πιέσεις, τὰς ὁποίας ἀσκούουν, παρουσιάζουν μεγάλας διαφοράς.

Οἱ ἠλεκτρικοὶ λαμπτήρες περιέχουν ἀέρια ὑπὸ πολὺ μικρὰν πίεσιν (κλάσμα χιλιοστοῦ ὕδραργύρου).

Εἰς τοὺς ἀεροθαλάμους τῶν αὐτοκινήτων ἡ πίεσις εἶναι  $1,5 \text{ Kp/cm}^2$  ἢ  $2 \text{ Kp/cm}^2$ .

Ἡ πίεσις τοῦ ἀτμοῦ ἐπὶ τοῦ ἐμβόλου τῆς μηχανῆς τοῦ σιδηροδρόμου ἀνέρχεται εἰς  $30 \text{ Kp/cm}^2$ .

Τὸ ὕδρογόνον καὶ τὸ ὀξυγόνον, τὰ ὁποία χρησιμοποιοῦμεν εἰς τὰς ὀξυγονοκολλήσεις, εἶναι περιορισμένα εἰς χαλυβδίνια ὀβίδια ὑπὸ πίεσιν  $150 \text{ Kp/cm}^2$ .

Ἐντὸς τῆς κάνης ὄπλου ἡ πίεσις τῶν ἀερίων, τὰ ὁποία παράγονται ἐκ τῆς καύσεως τῆς πυρίτιδος, φθάνει εἰς πολλὰς χιλιάδας  $\text{Kp/cm}^2$ .

### ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ

1. Τὰ ἀέρια εἶναι ρευστά, συμπιεστά, ἐλαστικά καὶ ἔκτατά, ἀσκούν δὲ πιεστικὰς δυνάμεις ἐπὶ τῶν τοιχωμάτων τῶν δοχείων, τὰ ὁποία τὰ περικλείουν.

2. Ἡ πιεστικὴ δύναμις, τὴν ὁποίαν ἀσκεῖ ἓν ἀέριον, ὀφείλεται εἰς τὴν ιδιότητα τοῦ ἔκτατοῦ τοῦ ἀερίου. Ἡ πίεσις εἶναι ἡ αὐτὴ εἰς ὅλα τὰ σημεῖα τῶν τοιχωμάτων ἑνὸς δοχείου, μικροῦ ὕψους.

3. Πρὸς μέτρησιν τῆς πίεσεως ἑνὸς εὐρισκομένου εἰς περιορισμένον χῶρον ἀερίου χρησιμοποιοῦμεν τὸ μανόμετρον.

Τὸ ἀπλοῦστερον μανόμετρον ἀποτελεῖται ἐξ ἐλαστικοῦ μεταλλίνου σωλῆνος, τοῦ ὁποίου αἱ ἀλλαγαὶ τοῦ σχήματος παρακολουθοῦνται ὑπὸ ἐνδεικτικῆς βελόνης.

4. Ἡ πίεσις ἑνὸς ἀερίου δύναται νὰ μεταβάλλεται ἐντὸς μεγάλων περιθωρίων (ἀεροθάλαμοι:  $1,5 - 2 \text{ Kp/cm}^2$  ἀέρια εἰς ὀβίδια:  $150 \text{ Kp/cm}^2$ ).


33ον ΜΑΘΗΜΑ : Πιέσεις ἀσκούμεναι ὑπὸ τῶν ἀερίων.

Ἄνωσις τοῦ Ἀρχιμήδους εἰς τὰ ἀέρια.


**Παρατήρησις.** Αἱ φουσαλλίδες (σαπουνόφουσες), ὅταν εἶναι πλήρεις ἀέρος, ἔξερχομένου ἐκ τῶν πνευμόνων μας, πίπτουν, ἐνῶ, ὅταν εἶναι πλήρεις φωταερίου, ἀνέρχονται (σχ. 1 Α καὶ Β).

Εἰς τὴν πρώτην περίπτωσιν τὸ βῆρος τῆς φουσαλλίδος (P) εἶναι μεγαλύτερον τῆς ἀνώσεως (F) :  $P > F$ , ἐνῶ εἰς τὴν δευτέραν μικρότερον :  $P' < F$ .


Τοῦτο συμβαίνει, διότι ἡ σχετικὴ πυκνότης τοῦ φωταερίου ὡς πρὸς τὸν ἀέρα εἶναι 0,5 καὶ ἐπομένως μία φουσαλλίς ἀέρος θὰ εἶναι διπλασίου βάρους μιᾶς ἴσης ἐκ φωταερίου, ἐνῶ ἡ ἀνωσις τῶν παραμένει ἡ αὐτή.



Σχ. 1. Α: Φουσαλλίδες πλήρεις ἀέρος πίπτουν.




Β: Φουσαλλίδες πλήρεις φωταερίου ἀνέρχονται.



Σχ. 1.

Γ: Φυσαλλίδες πλήρεις αέρος επιπλούν εις τὸ διοξειδίου τοῦ ἀνθρακός τοῦ δοχείου.




Σχ. 2.



Ἀπαιτοῦνται 0,7 g πρὸς ἐξουδετέρωσιν τῆς αὐξήσεως τῆς ἀνώσεως ἐντὸς τοῦ διοξειδίου τοῦ ἀνθρακός.

Διοξειδίου τοῦ ἀνθρακός



Σχ. 3. Τὸ βαροσκόπιον

Ἡ φυσαλλίς, ἂν καὶ εἶναι πλήρης αἵρος, δὲν πίπτει εἰς τὸν πυθμένα τοῦ δοχείου (σχ. 1 Γ), διότι ἡ σχετικὴ πυκνότης τοῦ διοξειδίου τοῦ ἀνθρακός, τὸ ὅποιον περιέχει τὸ δοχεῖον, εἶναι περίπου 1,5 καί, ὡς ἐκ τούτου, ἡ ἀνωσις εἶναι 1,5 φορές μεγαλύτερα τοῦ βάρους τῆς.

Δυνάμεθα νὰ παρομοιάσωμεν τὴν φυσαλλίδα εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν πρὸς φελλὸν ἐντὸς τοῦ ὕδατος.

## 2 Μέτρησις τῆς ἀνώσεως τοῦ Ἀρχιμήδους.

Ἐξαρτῶμεν ἐκ τοῦ δίσκου ζυγοῦ κλειστὴν σφαιρικὴν φιάλην γνωστοῦ ὄγκου: π.χ. 1 l, καὶ τὴν ἰσορροποῦμεν δι' ἀντιβάρου, τιθεμένου εἰς τὸν ἄλλον δίσκον (σχ. 2).

Ἐὰν βυθίσωμεν τὴν φιάλην εἰς δοχεῖον, τὸ ὅποιον περιέχει διοξειδίου τοῦ ἀνθρακός, ἡ ἰσορροπία καταστρέφεται. Διὰ τὸ ἐπαναφέρωμεν τὴν ἰσορροπία, πρέπει νὰ προσθέσωμεν εἰς τὸν δίσκον, ὁ ὅποιος φέρει τὴν φιάλην, βάρους 0,7 p.

Ἐν λίτρον διοξειδίου τοῦ ἀνθρακός ζυγίζει 2 p περίπου.

Ἐν λίτρον αἵρος ζυγίζει 1,3 p.

Τὸ βάρους 0,7 p, τὸ ὅποιον ἐθέσαμεν εἰς τὸν δίσκον, ἀντιστοιχεῖ εἰς τὴν αὐξήσιν τῆς ἀνώσεως, τὴν ὅποιαν ὑπέστη ἡ φιάλη, ὅταν ἐκ τοῦ αἵρος τὴν ἐβυθίσωμεν εἰς τὸ διοξειδίου τοῦ ἀνθρακός.

Ἡ ἀνωσις τοῦ Ἀρχιμήδους F εἰς τὸν αἶρα ἰσούται πρὸς τὸ βάρους 1 l αἵρος, ἥτοι:  $F=1,3 p$ .

Ἐνῶ, ὅταν εὐρίσκεται ἐντὸς διοξειδίου τοῦ ἀνθρακός, ἡ ἀνωσις εἶναι:

$$F'=2 p \text{ καὶ } F'-F=2 p-1,3 p=0,7 p.$$

**Συμπέρασμα:** Πᾶν σῶμα, εὐρισκόμενον ἐντὸς ἰσορροποῦντος αερίου, ὑφίσταται ἄνωσιν ἰσην πρὸς τὸ βάρους τοῦ ἐκτοπιζομένου αερίου.

## 3 Πραγματικὸν βάρους - φαινόμενον βάρους.

Τὸ βαροσκόπιον (σχ. 3) εἶναι ζυγὸς φέρων ἴσους βραχίονας. Εἰς τὰ ἄκρα τῆς φάλαγγος τοῦ ζυγοῦ ἐξαρτῶμεν δύο σφαίρας διαφορετικοῦ ὄγκου, ἀλλ' ἴσου φαινομένου βάρους, καί, ὡς ἐκ τούτου, ἡ φάλαγξ ἰσορροπεῖ ὀριζοντίως.

Ἐὰν τοποθετήσωμεν τὸ ὄργανον ὑπὸ τὸν κώδωνα ἀεραντλίας καὶ ἀφαιρέσωμεν τὸν αἶρα, ἡ φάλαγξ κλίνει πρὸς τὸ μέρος τῆς μεγάλης σφαίρας.

**Ἐξήγησις:** Ἐντὸς τοῦ αἵρος ἡ κενὴ σφαῖρα, ἐπεὶ δὲ ἔχει μεγαλύτερον ὄγκον, ὑφίσταται μεγαλύτεραν ἀνωσιν ἀπὸ τὴν πλήρη καὶ μικροτέραν σφαῖραν. Εἰς τὸ κενὸν ὁμως δὲν ὑφίσταται ἀνωσις. Ἐπὶ τῶν σφαιρῶν ἐνεργεῖ μόνον τὸ πραγματικὸν τῶν βάρους, ὅποτε ἡ φάλαγξ κλίνει πρὸς τὸ μέρος τῆς κενῆς σφαίρας, ἡ ὅποια εἶναι καὶ ἡ βαρυτέρα.

Γενικῶς ἐντὸς τοῦ αἵρος ὑφίσταται σχέσις:

**Φαινόμενον βάρους ἐντὸς σώματος = Πραγματικὸν βάρους τοῦ σώματος - βάρους ἐκτοπιζομένου ὑπὸ τοῦ σώματος αἵρος.**

Ἡ ἄνωσις εἰς τὸν ἀέρα εἶναι ἀμελητέα, ὅταν τὸ σῶμα ἔχει εἰδικὸν βάρος πολὺ μεγαλύτερον τοῦ εἰδικοῦ βάρους τοῦ ἀέρος (στερεὰ καὶ ὑγρὰ σώματα). Πρέπει ὁμως νὰ ὑπολογίζεται, ὅταν τὸ εἰδικὸν βάρος τοῦ σώματος πλησιάσῃ τὸ εἰδικὸν βάρος τοῦ ἀέρος (π.χ. ἐν ἀέριον).

#### 4 Ἀερόστατα.

Τὸ αερόστατον ἀποτελεῖται ἐξ ἐλαστικῆς σφαιρας (μπαλόνι) πλήρους ἐλαφροῦ ἀερίου, π.χ. ὑδρογόνου ἢ ἠλίου (σχ. 4). Οἱ ἐπιβάται του (ἀεροναῦται) εὐρίσκονται ἐντὸς ἐλαφροῦ λέμβου, ἐξηρητημένης διὰ δικτύου ἐκ τοῦ αερόστατου.

Ἐὰν ὁ ὄγκος τοῦ αερόστατου εἶναι  $1000 \text{ m}^3$ , τότε τὸ βάρος τοῦ ἐκτοπιζομένου ἀέρος πλησίον τῆς ἐπιφανείας τῆς γῆς εἶναι :

$$1,3 \text{ Kp/m}^3 \times 1000 \text{ m}^3 = 1300 \text{ Kp}$$

Τὸ ὑδρογόνον, τὸ ὅποιον περικλείει τὸ περίβλημά του, ζυγίζει :

$$0,09 \text{ Kp/m}^3 \times 1000 \text{ m}^3 = 90 \text{ Kp}$$

Ἐστὼ δὲ ὅτι τὸ περίβλημα, οἱ ἐπιβάται, ἡ λέμβος, τὰ ὄργανα καὶ τὰ ὑλικά ζυγίζουν ὅλα μαζί περίπου  $1180 \text{ Kp}$ .

Τὸ αερόστατον λοιπὸν μετὰ τοῦ ὑδρογόνου ζυγίζει :

$$1180 \text{ Kp} + 90 \text{ Kp} = 1270 \text{ Kp},$$

δηλαδή  $1300 \text{ Kp} - 1270 \text{ Kp} = 30 \text{ Kp}$  ὀλιγώτερον τοῦ ἀέρος, τὸν ὅποιον ἐκτοπίζει.


Ἡ δύναμις αὐτὴ τῶν  $30 \text{ Kp}$ , ἡ ὁποία εἶναι ἡ συνισταμένη τοῦ συνολικοῦ βάρους τοῦ αερόστατου καὶ τῆς ἀνώσεως του, λέγεται ἀνυψωτικὴ δύναμις τοῦ αερόστατου.

**Ἀνυψωτικὴ δύναμις = Βάρος ἐκτοπιζομένου ἀέρος (ἄνωσις) — συνολικὸν βάρος αερόστατου.**

Ὅσον ἀνέρχεται τὸ αερόστατον, ἡ ἀτμοσφαιρική πίεσις ἐλαττοῦται, ὁ ἀήρ γίνεται ἀραιότερος καὶ ἡ πυκνότης του μικρότερα. Ἐπειδὴ ἐλαττοῦται ἡ πυκνότης τοῦ ἀέρος, τὸ ἀέριον ἐκφεύγει ἀπὸ ἐν ἄνοιγμα, τὸ ὅποιον εὐρίσκεται εἰς τὸ κατώτερον μέρος του, ἡ ἀνυψωτικὴ δύναμις καθίσταται μικρότερα καὶ τὸ αερόστατον ἀρχίζει νὰ κατέρχεται. Διὰ νὰ ἀνυψωθῇ ἐκ νέου, οἱ ἀεροναῦται ρίπτουν μέρος τῆς ἄμμου ἐκτὸς τῆς λέμβου. Διὰτί ;

Διὰ νὰ ἐρευνησοῦν τὰ ἀνώτερα στρώματα τῆς ἀτμοσφαιρας, αἱ μετεωρολογικαὶ ὑπηρεσίαι χρησιμοποιοῦν αερόστατα—βολίδας, ἄνευ ἐπιβατῶν, τὰ ὅποια μεταφέρουν αὐτογραφικὰ ὄργανα.

Τὰ ὄργανα αὐτὰ εἶναι ἐφωδιασμένα δι' ἀλεξιπτώτων καὶ περισυλλέγονται, ὅταν προσγειωθοῦν.



Σχ. 4. Τὸ Ἀερόστατον

#### ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ

1. Πᾶν σῶμα, εὐρίσκόμενον ἐντὸς ἰσορροποῦντος ἀερίου, ὑφίσταται ἄνωσιν ἰσὴν πρὸς τὸ βάρος τοῦ ἐκτοπιζομένου ἀερίου.

2. Ἡ ἀρχὴ τοῦ Ἀρχιμήδους ἐφαρμόζεται καὶ εἰς τὰ ἀέρια.

3. Ἐντὸς τῆς ἀτμοσφαιρας πρέπει νὰ διακρίνωμεν τὸ πραγματικὸν βάρος ἐνὸς σώματος ἀπὸ τὸ φαινόμενον.


Τὸ φαινόμενον βάρος ἐνὸς σώματος ἰσοῦται πρὸς τὴν διαφορὰν τοῦ πραγματικοῦ βάρους τοῦ σώματος καὶ τοῦ βάρους τοῦ ἀέρος, τὸν ὅποιον ἐκτοπίζει.

4. Τὰ κατευθυνόμενα αερόστατα καὶ τὰ αερόστατα—βολίδες, τὰ ὅποια χρησιμοποιοῦν αἱ μετεωρολογικαὶ ὑπηρεσίαι πρὸς μελέτην τῶν ἀνωτέρων στρωμάτων τῆς ἀτμοσφαιρας, ἀνέρχονται λόγω τῆς ἀνώσεως τοῦ Ἀρχιμήδους, τὴν ὁποίαν ἄσκει ὁ ἀτμοσφαιρικός ἀήρ.

## ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ MARIOTTE

**1 Παρατήρησις.** Κλείομεν τὸ ἀνοίγμα ἀντλίας ποδηλάτου καὶ φθούμεν τὸ ἐμβολὸν τῆς. Ἄν καὶ δὲν δύναται ὁ ἀήρ νὰ ἐξέλθῃ τοῦ κυλίνδρου, ἐν τούτοις ὁ ὄγκος του ἐλαττοῦται. Μάλιστα, ὅσον μεγαλυτέραν δύναμιν ἀσκούμεν ἐπὶ τοῦ ἐμβόλου, τόσον ὁ ὄγκος τοῦ ἀέρος ἐλαττοῦται.

**Συμπέρασμα :** Ὅσον ἐλαττοῦται ὁ ὄγκος τοῦ ἀέρος, ὁ ὁποῖος εὐρίσκεται περιορισμένος εἰς τὸν κύλινδρον τῆς ἀντλίας, τόσον αὐξάνει ἡ πίεσις του.



Σχ. 1. Συσκευὴ Leblanc. Οἱ ὀπίθωνοι σωλήνες A καὶ B δύνανται νὰ κινουῦνται κατὰ μῆκος τοῦ βαθμολογημένου κανόνας καὶ συγκοινωνοῦν μεταξύ των δι' ἐλαστικῶν σωλήνων Γ. Ὁ σωλὴν B ἐπικοινωνεῖ μὲ τὸν ἐξωτερικὸν ἀέρα. Ὁ σωλὴν A εἶναι βαθμολογημένος εἰς cm. Ἡ στρόφιγγὲς R κλείει τὸ ἄνω ἀνοίγμα τοῦ σωλήνος A.

**2 Μέτρησις.** Ἡ συσκευή τοῦ σχήματος 1 (Leblanc) μᾶς ἐπιτρέπει νὰ μελετήσωμεν τὴν μεταβολὴν ἐνὸς ἀερίου, ὅταν μεταβάλλεται ἡ πίεσις του ὑπὸ σταθερὰν θερμοκρασίαν.

Ἔστω ὅτι τὸ πείραμα ἐκτελεῖται ὑπὸ ἀτμοσφαιρικῆν πίεσιν 75 cm Hg.

α) Ὄταν ἡ στρόφιγγὲς R εἶναι ἀνοικτὴ, ἡ στάθμη εἰς τὰ σημεῖα A καὶ B εὐρίσκεται εἰς τὸ αὐτὸ ὀριζόντιον ἐπίπεδον, διότι καὶ εἰς τὰ δύο σημεῖα ἐνεργεῖ ἡ αὐτὴ πίεσις (ἡ ἀτμοσφαιρικὴ).

Ἐὰν κλείσωμεν τὴν στρόφιγγα R, ἡ πίεσις εἰς τὴν στάθμην A μένει ἀμετάβλητος. Ὁ ἀήρ, ὁ ὁποῖος εἶναι περιορισμένος ἀπὸ αὐτὴν, ἔχει πίεσιν ἴσην πρὸς τὴν ἀτμοσφαιρικὴν : 75 cmHg καὶ ὄγκον 45 cm<sup>3</sup>.

β) Μὲ κλειστὴν τὴν στρόφιγγα R μετακινούμεν τοὺς δύο σωλήνας εἰς τρόπον, ὥστε ἡ στάθμη B νὰ εὐρίσκεται εἰς ὕψος  $h_1 = 25$  cm ἀπὸ τὴν στάθμην A.

Τὰ σημεῖα A καὶ A', τὰ ὁποῖα εὐρίσκονται εἰς τὸ αὐτὸ ὀριζόντιον ἐπίπεδον, θὰ ἔχουν τὴν ἴδιαν πίεσιν.

Πίεσις εἰς τὸ A = πίεσις εἰς τὸ A' = πίεσις εἰς τὸ B + 25 cmHg.

Πίεσις περιορισμένου ἀέρος :  $P_1 = 100$  cmHg, δηλ. (75 + 25) cmHg.

Ὅγκος περιορισμένου ἀέρος :  $V_1 = 34$  cm<sup>3</sup>.

γ) Ἐπαναλαμβάνομεν τὸ προηγούμενον πείραμα μὲ κλειστὴν τὴν στρόφιγγα R, ἀλλὰ



ήδη ή στάθμη Β νά εύρίσκεται εις ύψος  $h_2 = 40$  cm άνω τής στάθμης Α.

$$P_2 = 75 \text{ cmHg} + 40 \text{ cmHg} = 115 \text{ cmHg}.$$

Ο όγκος του περιωρισμένου άέρος είναι  $V_2 = 29,5 \text{ cm}^3$ .

δ) Έάν ή στάθμη Β εύρίσκεται 35 cm χαμηλότερον τής Α :  $h_3 = 35$  cm.

Η πίεσις εις τὸ Α είναι :  $P_3 = 75 \text{ cmHg} - 35 \text{ cmHg} = 40 \text{ cmHg}$

καί ὁ όγκος του περιωρισμένου άέρος :  $V_3 = 84,5 \text{ cm}^3$ .

Διά του ίδιου τρόπου έκτελούμεν σειράν πειραμάτων, τὰ άποτελέσματα τῶν ὁποίων γράφομεν εις πίνακα. Άτμοσφαιρική πίεσις  $H = 75 \text{ cmHg}$ .

h cm	0	+ 15	+ 25	+ 40	- 15	- 25	- 35
P H + h	75	90	100	115	60	50	40
V cm <sup>3</sup>	45	37,5	34	29,5	56	68	84,5
P × V	3 375	3 375	3 400	3 392,5	3 360	3 400	3 380


Παρατηρούμεν ὅτι τὸ γινόμενον τής πίεσεως ἐπὶ τὸν ὄγκον προσεγγίζει πάντοτε τὸν ἀριθμὸν 3375.

Η πειραματική αὐτή ἐπαλήθευσις μᾶς ἐπιτρέπει νά διατυπώσωμεν τὸν ἀπλοῦν νόμον τοῦ Mariotte :


*Νόμος τοῦ Mariotte :* Ὑπὸ σταθεράν θερμοκρασίαν τὸ γινόμενον τής πίεσεως ἐπὶ τὸν ὄγκον ὠρισμένης μάζης ἀερίου παραμένει πάντοτε σταθερόν:

$$P \times V = P' \times V' \quad \eta \quad \frac{P}{P'} = \frac{V'}{V}$$

Ὑπὸ σταθεράν θερμοκρασίαν ὁ ὄγκος ὠρισμένης μάζης ἀερίου εἶναι ἀντιστρόφως ἀνάλογος πρὸς τήν πίεσίν του.



Σχ. 2. Ὑπὸ σταθεράν θερμοκρασίαν τὸ γινόμενον τής πίεσεως ἐπὶ τὸν ὄγκον ὠρισμένης μάζης ἀερίου εἶναι πάντοτε σταθερόν.  $PV = P'V'$



Σχ. 3. Ὑπὸ σταθεράν θερμοκρασίαν ὁ ὄγκος ὠρισμένης μάζης ἀερίου εἶναι ἀντιστρόφως ἀνάλογος πρὸς τήν πίεσίν του.

### 3 Μεταβολή τής πυκνότητος ἀερίου συναρτήσει τής πίεσεώς του.

Έάν  $M$  εἶναι ή μάζα ἐνὸς ἀερίου :

α) Ὑπὸ πίεσιν  $P$  ὁ ὄγκος του εἶναι  $V$  καί ή πυκνότης του  $\rho = \frac{M}{V}$

β) 'Υπό πίεσιν  $P'$  ό όγκος του γίνεται  $\rho' = \frac{M}{V'}$

$$\frac{\rho}{\rho'} = \frac{\frac{M}{V}}{\frac{M}{V'}} = \frac{M}{V} \times \frac{V'}{M} \text{ ή } \frac{\rho}{\rho'} = \frac{V'}{V}$$

δηλ. αί πυκνότητες είναι αντίστροφως ανάλογοι πρός τούς όγκους του αέριου.

'Εχομεν όμως έπαληθεύσει πειραματικώς ότι :

$$\frac{P}{P'} = \frac{V'}{V} \text{ και έπομένως } \frac{\rho}{\rho'} = \frac{P}{P'}$$

'Υπό σταθεράν θερμοκρασίαν αί πυκνότητες ενός αέριου είναι ανάλογοι πρός τās πίεσεις του.

**4** 'Εφαρμογή. 'Υπό κανονικήν πίεσιν μάζα 44 g διοξειδίου του άνθρακος κατέχει όγκον 22,4 l.

'Η πυκνότης του αέριου αυτού θά είναι :

$$\frac{44\text{g}}{22,4\text{l}} = 1,96 \text{ g/l}$$

'Υπό πίεσιν 10 atm και σταθεράν θερμοκρασίαν ή ίδια μάζα αέριου (44 g) κατέχει όγκον :

$$\frac{22,4\text{l}}{10} = 2,24\text{l}$$

και ή πυκνότης του διοξειδίου του άνθρακος θά είναι τώρα :

$$\frac{44 \text{ g}}{2,24 \text{ l}} = 19,6 \text{ g/l}$$

'Εάν ή πίεσις ενός αέριου δεκαπλασιασθή, και ή πυκνότης του δεκαπλασιάζεται.

### 5 Σχετική πυκνότης.

'Επειδή ή σχετική πυκνότης ενός αέριου ως πρός τον άέρα είναι ό λόγος μιās μάζης αέριου πρός τήν μάζαν ίσου όγκου άερος, όταν και τά δύο άέρια εύρίσκονται υπό τās αυτās συνθήκας θερμοκρασίας και πίεσεως, διά τούτο ή σχετική πυκνότης ενός αέριου δέν έξαρτάται έκ τής πίεσεως.

## ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ

1. Νόμος του Mariotte. 'Υπό σταθεράν θερμοκρασίαν τó γινόμενον του όγκου ώρισμένης μάζης αέριου επί τήν πίεσιν του παραμένει πάντοτε σταθερόν.

$$PV = P'V'$$

2. 'Υπό σταθεράν θερμοκρασίαν ό όγκος ώρισμένης μάζης αέριου είναι αντίστροφως ανάλογος πρός τήν πίεσιν του.

'Υπό σταθεράν θερμοκρασίαν αί πυκνότητες ενός αέριου είναι ανάλογοι πρός τās πίεσεις και αντίστροφως ανάλογοι πρός τούς όγκους του.

## A Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ

### Σειρά 8η: Πίεσεις άσκούμεναι υπό τών αέριων.

Σημείωσις: Είς όλα τά προβλήματα θά λαμβάνωμεν είδικόν βάρος ύδραργύρου 13,6 p/cm<sup>2</sup>.

#### 1. 'Ατμοσφαιρική πίεσις

1. Νά ύπολογισθοῦν είς p/cm<sup>2</sup> και είς millibars άτμοσφαιρικά πίεσεις, μετρηθεΐσαι διά στήλης ύδραργύρου, ύψους 68 cm, 72,2 cm, 752 mm.

2. Είς τήν κορυφήν όρους ή άτμοσφαιρική πί-

εσις είναι 478 mm ύδραργύρου. Ποία είναι ή τιμή αυτής τής πίεσεως είς mBar (μιλιμπάρ) και είς άτμοσφαιρας;

3. Είς ποίαις τιμάς ύψους τής ύδραργυρικής στήλης αντίστοιχοῦν αί πίεσεις: 538 p/cm<sup>2</sup>; 1 Kp/cm<sup>2</sup>; 1028 mBar; 0,730 atm;

4. 1 Kp ίσοδυναμεί είς τó Παρίσι πρός 9,81 N, τó όποιον είναι μονάς δυνάμεως. Τό 1 N ανά τετραγωνικόν μέτρον είναι μονάς πίεσεως (N/m<sup>2</sup>) τής πιέ-

πως δηλ., ή όποια άσκειται υπό δυνάμεως 1 Ν, όταν αύτη ένεργή καθέτως και όμοιομόρφως επί επιφανείας 1 m<sup>2</sup>. Νά ύπολογισθή είς Ν/m<sup>2</sup> άτμοσφαιρική πίεσις 76 cm ύδραργύρου.

5. Ο δίσκος ένός άγκίστρου-«βεντούζας» έξ ελαστικού έχει διάμετρον 8 cm και είναι τελείως έφηρλοισμένης επί όριζόντιου τοιχώματος. Ποιον μέγιστον βάρος δύναται νά εξαρτηθή έξ αυτού, εάν ή άτμοσφαιρική πίεσις είναι 76 cmHg;

6. Η επιφάνεια του σώματος του ανθρώπου ύπολογίζεται είς 1 m<sup>2</sup> περίπου. Εάν ή άτμοσφαιρική πίεσις είναι 76 cmHg, πόση είναι ή έντασις τής πιεστικής δυνάμεως, τής άσκουμένης έφ' όλοκληρου τής επιφανείας του δέρματος του ανθρώπου; Νά ύπολογισθή ή δύναμις αύτη είς Κρ και είς Ν.

7. Είς τό πείραμα τής κυστορραγίας χρησιμοποιοϋμεν κύλινδρον διαμέτρου 10 cm.

Εάν ή πίεσις είς τό έσωτερικόν του κυλίνδρου, κατά τήν θραύσιν τής μεμβράνης, είναι 5 cmHg, νά εύρεθή ή άσκουμένη επί τής μεμβράνης πιεστική δύναμις (Ατμ. πίεσις 76 cmHg).

8. Τον XVII αιώνα ό δημαρχος του Μαγδεμβούργου Otto de Guericke έπραγματοποίησε τό έξής πείραμα: Κατεσκεύασε δύο ήμισφαίρια διαμέτρου 80 cm, τά όποία έφηρμόζον άεροστεγώς μεταξύ των. Έκ τής σφαιρας ταύτης άφήρσε τόν άέρα, κατορθώσας νά έπιτύχη τοιούτον κενόν, ώστε προς άποχωρισμόν των ήμισφαιρίων έχρειάσθησαν 8 ίπποι.

Αποδεικνύεται ότι ή έφαρμοζόμενη έφ' έκάστου ήμισφαιρίου πιεστική δύναμις είναι ίση προς έκείνην, ή όποία έφαρμόζεται επί κύκλου ίσης διαμέτρου προς τήν σφαιραν.

Εάν δεχθώμεν ότι έχομεν πραγματοποιήσει τέλειον κενόν έντός τής σφαιρας, νά ύπολογισθή ή έντασις έκάστης των πιεστικών δυνάμεων, αί όποίαι άντιδρουν είς τόν άποχωρισμόν των δύο ήμισφαιρίων (Ατμ. πίεσις 75 cmHg).

9. Είς τό σχήμα 1

βλέπομεν τήν τομήν μιάς άναρροφητικής άντλίας. Όταν σύρωμεν προς τά άνω τό έμβολον, είς τόν χώρον Α τής άντλίας δημιουργείται κενόν, όποτε τό ύδωρ άνέρχεται και τόν πληροί:

α) Μέχρι ποίου μέγιστου ύψους δύναται μία τοιαύτη άντλία νά άναβιάση ύδωρ εκ φρέατος, όταν ή άτμοσφαιρική πίεσις είναι 76 cmHg;

β) Μέχρι ποίου με-

γιστου ύψους θ' άνύψωνε θαλάσσιον ύδωρ ειδικού βάρους 1,033 p/cm<sup>3</sup>;

10. Ο κύλινδρος άτμομηχανής συγκοινωνεί έφ' ένός μόν προς τόν λέβητα, ένθα ή πίεσις του άτμου είναι 12 Κρ/cm<sup>2</sup>, άφ' έτέρου δε προς τόν άτμοσφαιρικόν άέρα, ένθα ή πίεσις είναι 1 Κρ/cm<sup>2</sup>. Νά ύπολογισθή ή έφαρμοζόμενη επί του έμβόλου δύναμις, εάν ή διάμετρον του έμβόλου είναι 40 cm.

11. Έκτελοϋμεν τό πείραμα του Τορρικέλλι με διάφορα ύγρα, όταν ή άτμοσφαιρική πίεσις είναι 76 cmHg. Είς ποιον ύψος άνωθεν του ύγρου τής λεκάνης θά εύρίσκειται ή στάθμη του ύγρου έντός του σωλήνος είς έκαστον των κατωτέρω ύγρων:

α) ύδατος; (σχ. πυκν. 1). β) πετρελαίου; (σχ. 0,9). γ) γλυκερίνης; (σχ. πυκν. 1,25). δ) θειτικού οξέος; (σχ. πυκν. 1,84).

## II. Τό βαρόμετρον

12. Βαρόμετρον δεικνύει είς τήν βάσιν του πύργου του Eiffel 756 mmHg. Τι θά έδεικνυε τήν ίδίαν στιγμήν τό αυτό βαρόμετρον είς τήν κορυφήν του πύργου; (ύψος 300 m). Μέσον βάρος ένός λίτρου άέρος 1,25 p.

13. Παρατηροϋμεν ότι ή άτμοσφαιρική πίεσις, τήν όποίαν δεικνύει έν βαρόμετρον, πίπτει κατά 2 cm, όταν τούτο μεταφέρεται εκ των προποδών είς τήν κορυφήν λόφου. Ποία ή διαφορά ύψους μεταξύ των δύο τούτων σημείων του λόφου;

Μέσον βάρος ένός λίτρου άέρος 1,25 p.

14. Είς μετεωρολογικόν σταθμόν έσημειώθησαν αί κατωτέρω τιμái τής άτμοσφαιρικής πίεσεως είς χιλιοστόμετρα ύδραργύρου (mmHg):

ώρα :	0	2	4	6	8	10	12
mmHg :	755	751	747	745	746	750	753
ώρα :	14	16	18	20	22	24	
mmHg :	754	758	762	761	760	758	

Νά κατασκευασθή ή καμπύλη των μεταβολών τής άτμοσφαιρικής πίεσεως συναρτήσει του χρόνου.

Λαμβάνομεν είς τόν όριζόντιον άξονα OX, 1 cm διά δύο ώρας (2 h) και άρχην τό 0. Είς τόν κατακόρυφον άξονα OY, 1 cm διά 2 mm. Αρχή πίεσεων: 745 mmHg.


15. Τό αυτογραφικόν βαρόμετρον ένός άεροστάτου-βολίδος κατέγραψε τάς κατωτέρω πίεσις είς mmHg:

ύψος είς m	0	1000	2000	3000	4000
πίεσις είς mmHg	760	674,1	596,2	525,8	462,3
ύψος είς m	5000	6000	7000	8000	9000
πίεσις είς mmHg	405,2	353,9	308	267	230,6
ύψος είς m	10.000	11.000	12.000	20.000	
πίεσις είς mmHg	198,3	169,7	145	41	

Νά κατασκευασθή ή καμπύλη των μεταβολών τής άτμοσφαιρικής πίεσεως συναρτήσει του ύψους. Λαμβάνομεν είς τόν όριζόντιον άξονα OX, 1 cm διά 2000 m και είς τόν κατακόρυφον άξονα OY, 1 cm διά 10 cmHg και άρχην τό 0.

16. α) Ποία είναι ή ύψομετρική διαφορά δύο σημείων, διά τά όποία παρατηροϋμεν μεταβολήν 3,5 cmHg είς τόν βαρομετρικόν σωλήνα Τορρικέλλι;

β) Ποία θά ήτο ή μεταβολή του ύψους τής στήλης σωλήνος Τορρικέλλι με γλυκερίνης; (Μέσον βάρος ένός λίτρου άέρος: 1,1 p' ειδικόν βάρος ύδραργύρου 13,6 p/cm<sup>3</sup>, γλυκερίνης 1,26 p/cm<sup>3</sup>).



Σχ. 1.


### III. Πιέσεις άσκούνται από τά άέρια. Τό μανόμετρον

17. Το οξυγόνο μεταφέρεται εντός χαλυβιδιών όβιδων, ένθα εύρίσκεται υπό άρχικήν πίεσιν 200 έως 250 Kp/cm<sup>2</sup>. Νά ύπολογισθούσιν αί πιέσεις αύται εις άτμοσφαιράς.

18. Έντός τών ήλεκτρονικών σωλήνων ή πίεσις τού άέριου είναι τής τάξεως τού ένος δεκάκις διασεκατομμυριοστού τής άτμοσφαιράς. Νά ύπολογισθί ή πίεσις αύτή εις mmHg.

19. Περιοριζόμεν ύδρογόνον εντός δοκιμαστικού σωλήνος άνεστραμμένου έντός λεκάνης ύδατος:

Σχ. 2.



α) Η στάθμη τού ύδατος έντός τού σωλήνος φθάνει 5 cm άνω τής στάθμης τού ύδατος τής λεκάνης. Πόση είναι ή πίεσις τού ύδρογόνου, έάν ή άτμοσφαιρική πίεσις είναι ή κανονική;

β) Πόση θα είναι ή πίεσις τού ύδρογόνου, έάν ή στάθμη τού ύδατος έντός τού σωλήνος κατέλθι 2,5 cm κάτω τής στάθμης τού ύδατος τής λεκάνης;

20. Άνοικτόν ύδραργυρικόν μανόμετρον προσαρμόζεται εις ύαλίνην σφαιρικήν φιάλην. Η στάθμη τού ύδραργυρου εις τόν κλάδον, ό όποιος συγκοινωνεί με τήν φιάλην, εύρίσκεται 72 mm ύψηλότερον τής στάθμης του εις τόν έτερον κλάδον.

Πόση είναι εις mmHg ή εις p/cm<sup>2</sup> ή πίεσις τού άέριου έντός τής φιάλης, άν ή άτμοσφαιρική πίεσις είναι 76 cmHg;

21. Άνοικτόν μανόμετρον μεθ' ύδατος προσαρμόζεται εις τόν άγωγόν τού φωταερίου τής πόλεως. Παρατηρούμεν διαφοράν στάθμης 75 mm, ή χαμηλότερα δέ συγκοινωνεί με τόν άγωγόν τού φωταερίου. Νά ύπολογισθί:

α) Εις p/cm<sup>2</sup> ή διαφορά μεταξύ τής πίεσεως τού φωταερίου και τής άτμοσφαιρικής, ήτις άνέρχεται εις 76 cmHg.

β) Η πραγματική πίεσις τού άέριου εις p/cm<sup>2</sup> και εις cmHg.

γ) Η διαφορά στάθμης, ήτις θα ύφίστατο εις άνοικτόν ύδραργυρικόν μανόμετρον.

22. Άνοικτόν μανόμετρον άποτελείται εκ δύο κλάδων 50 cm. Ποίαν μεγίστην πίεσιν άνω ή κάτω τής άτμοσφαιρικής δύναμεισά να μετρήσωμεν, έάν τό μανόμετρον περιέχη: α) ύδωρ; β) ύδράργυρον;

### IV. Άρχή τού Άρχιμήδους

23. Έλαστική σφαίρα πλήρης ύδρογόνου έχει όγκον 7,5 l. Το περίβλημα ζυγίζει 6 p και τό νήμα, διά τό όποιο είναι προδεδεμένη, ζυγίζει 0,1 p άνά μέτρον. Ποιον τό μήκος τού νήματος, όταν ή σφαίρα ίσορροπή εις τόν άέρα; (Ειδικόν βάρος άέρος 1,24 p/l, ύδρογόνου 0,1 p/l).

24. Σφαιρικόν άερόστατον, όγκου 1000 m<sup>3</sup> ζυγίζει μετά τών εξαρτημάτων του 600 Kp, δύναται δέ να μεταφέρη 2 άτομα 140 Kp. Πόσην άμμον πρέπει

να προσθέσωμεν εις τό άερόστατον, διά να έκκινήσθι με μίαν άνυψωτικήν δύναμιν 10 Kp:

α) Έάν είναι πλήρες ύδρογόνου; (Ειδικόν βάρος 0,09 p/l).

β) Έάν είναι πλήρες ήλίου; (Ειδικόν βάρος 0,18 p/l).

γ) Έάν είναι πλήρες φωταερίου; (Ειδικόν βάρος 0,5 p/l).

Ειδικόν βάρος άέρος 1,3 p/l.

25. α) Έν άερόστατον 1800 m<sup>3</sup> ζυγίζει 1600 Kp και άνυψούται άρχικώς διά δύναμεισ 15 Kp. Πόσον είναι τό έρμα του, έάν τό ειδικόν βάρος τού άέρος είναι 1,23 p/l;

β) Έάν τό άερόστατον ίσορροπήσθι εις ύψος, ένθα τό ειδικόν βάρος τού άέρος είναι 1,07 p/l, πόσον έρμα θα έχη ριφή;

### V. Νόμος τού Mariotte

26. Χρησιμοποιούμεν εις τό έργαστήριον μεταλλικά δοχεία, τά όποία περιέχουν 20 l ύδρογόνου υπό πίεσιν 15 atm. Πόσας φιάλας τού 1 l δύναμεισά να πληρώσωμεν υπό κανονικήν πίεσιν διά μιάς τοιαύτης φιάλης ύδρογόνου;

27. Διά τήν πλήρωσιν άερόστατου άπαιτείται μία φιάλη ύδρογόνου τών 20 l και υπό πίεσιν 50 Kp/cm<sup>2</sup>:

α) Ποίος ό όγκος τού άερόστατου, όταν τούτο πληρωθί υπό κανονικήν άτμοσφαιρικήν πίεσιν;

β) Υπό τας συνθήκας τού πειράματος, 22,4 l ύδρογόνου ζυγίζουν 2 p και 22,4 l άέρος 29 p.


Ποίον τό βάρος 1 l ύδρογόνου έντός τής φιάλης, πριν αύτη άνοιχθί;

Ποία είναι ή σχετική του πυκνότης;

28. Έάν υπό πίεσιν 76 cmHg και 0<sup>o</sup> C, 1 l άέρος ζυγίζει 1,3 p, πόσον όγκον καταλαμβάνουν 25 g άέρος 0<sup>o</sup> C υπό πίεσιν 85 cmHg;

29. Εις βαθμολογημένους σωλήν άνεστραμμένους, ως δεικνύεται εις τό σχήμα 3, έντός λεκάνης ύδραργυρου, περιέχει άέριον όγκου V<sub>1</sub> = 190 cm<sup>3</sup>. Η στάθμη τού ύδραργυρου εις τόν σωλήνα είναι 4 cm ύψηλότερον τής στάθμης του εις τήν λεκάνην.

Σχ. 3.



α) Πόση είναι ή πίεσις P τού άέριου εις cmHg;

β) Ποίος θα ήτο ό όγκος V<sub>2</sub> τής ίδιας μάζης τού άέριου υπό τήν αύτήν θερμοκρασίαν και πίεσιν 76cmHg;

30. α) Εισάγομεν εις τόν βαρομετρικόν θαλάμον σωλήνος Τορρικέλλι όλίγον άέρα, όποτε ό ύδράργυρος κατέρχεται και ίσορροπεί εις ύψος 751 mm. Το ύψος τού βαρομετρικού θαλάμου είναι 15 cm. Πόση

είναι ή πίεσις του αέρος έντός του θαλάμου ; (Ατμοσφαιρική πίεσις 756 mmHg).

31. Κλειστόν μανόμετρον σχήματος U, με άνί-σους κλάδους Α και Β τής αυτής τομής, περιέχει υδράρ-γυρον.

Όταν ο κλάδος Β είναι άνοικτός εις τήν άτμο-σφαιραν (H = 76 cmHg), ο υδράργυρος εύρίσκειται

και εις τους δύο κλάδους εις τό αυτό όριζόντιον έπί-πεδον και ο περιωρισμένος εις τόν κλάδον Α άήρ έχει ύψος 20 cm. Έφαρμόζομεν τόν κλάδον Β εις δοχείον άερίου, όποτε παρατηρούμεν ότι ο υδράργυρος κατέρ-χεται 10 cm έντός τούτου. Πόση είναι ή πίεσις του άερίου του δοχείου ;

- 35ον ΜΑΘΗΜΑ : Θερμοκρασία

## ΤΟ ΥΔΡΑΡΓΥΡΙΚΟΝ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟΝ

### 1 Παρατήρησις.

Τά δύο αυτά θερμόμετρα όμοιάζουν πρός έκείνα, τά όποια χρησιμοποιούμεν εις τήν καθημερινήν μας ζωήν, και έχουν :

#### βαθμολογίαν

έπί τής πλακός — 10<sup>0</sup> 50

έπί τής ύάλου — 10<sup>0</sup> 110

Αί γραμμαί τής βαθμολογίας διαιρουν τό βαθμολογημένον τμήμα εις ίσα μέρη.

#### “Ένα πολύ λεπτόν σωλήνα (τριχοειδή)

πλήρη μέχρις ενός σημείου οίνοπνεύματος (I)

πλήρη μέχρις ενός σημείου υδραργύρου



#### “Έν δοχείον

πλήρες οίνοπνεύματος




πλήρες υδραργύρου

θερμόμετρον δωματίου

Υδραργυρικόν θερμόμετρον



Άντιστοιχία των ύποδιαίρέσεων 0<sup>0</sup> και 100<sup>0</sup> του υδραργυρικού θερμομέτρου και των ύποδιαίρέσεων του οίνοπνευματικού :



Έντός του πάγου, ό όποιος τήκεται, ή στάθμη του υδραργύρου και του οίνοπνεύματος σταθεροποιούνται εις τήν ύποδιαίρεσιν 0<sup>0</sup>.

Έντός των άτμών ζέοντος ύδατος ή στάθμη του υδραργύρου σταθεροποιείται εις τήν ύποδιαίρεσιν 100<sup>0</sup>.

Έντός του χλιαρού ύδατος ή στάθμη του υδραργύρου και του οίνοπνεύματος σταθεροποιούνται εις τήν αυτήν ύποδιαίρεσιν : 35<sup>0</sup> π.χ.

1. Εις πολλά θερμόμετρα τό δοχείον περιέχει πετρέλαιον, τολουόλιον ή ακόμη και κρέζοτον (εις τό θερμόμετρον μεγίστου και ελαχίστου).

**Συμπέρασμα :** Αι υποδιαίρεσεις  $0^{\circ}$  και  $100^{\circ}$  του υδραργυρικού θερμομέτρου αντιστοιχούν εις τὰ σημεία, εις τὰ όποία φθάνει ή στάθμη του υδραργύρου, όταν το θερμοόμετρον εύρισκται αντιστοιχώς εντός τηκομένου πάγου και εις τους άτμούς του ζέοντος ύδατος.


Έκάστη υποδιαίρεσις τής βαθμολογήσεως του υδραργυρικού θερμομέτρου ίσοται προς τó έκατοστόν τής άποστάσεως, ή όποία θά χωρήξη τó  $0^{\circ}$  από τó  $100^{\circ}$ .

Διά τόν λόγον αυτόν ή βαθμολογήσις αυτή όνομάζεται εκατονταβάθμιος ή εκατονταβάθμιος κλίμαξ ( $1^{\circ}$ ), επεκτείνεται δέ άνω των  $100^{\circ}$  και κάτω του  $0^{\circ}$ .

Όταν τó υδραργυρικόν θερμοόμετρον ή τó οινόπνευματικόν ή οιονόηποτε άλλο εκατονταβάθμιον θερμοόμετρον εύρισκονται πλησίον άλλήλων, ή στάθμη του ύγρου εντός έκαστου σωλήνος θά φθάη εις τήν ίδίαν υποδιαίρεσιν.



Βαθμολογία θερμομέτρου διά συγκρίσεως προς άλλο.



● Όταν ή στάθμη του ύγρου εις έν θερμοόμετρον φθάη εις τας υποδιαίρεσις :

7 κάτω του 0, 0,25 κ.τ.λ.,  
γράφομεν ότι τó θερμοόμετρον δεικνύει :  
 $-7^{\circ} C$                        $0^{\circ} C$                        $25^{\circ} C$

και αναγινώσκομεν :  
μείον 7 βαθμοί                      0 βαθμοί                      25 βαθμοί  
Κελσίου                      Κελσίου                      Κελσίου

**2 \* Άλλα θερμομετρικά όργανα συγκριτικώς βαθμολογημένα.**

Βαθμολογήσις (συγκριτική) του οινόπνευματικού θερμομέτρου.



● Έντός χλιαρού ύδατος τοποθετούμεν τó έν πλησίον του άλλου βαθμολογημένον υδραργυρικόν θερμοόμετρον και έν οινόπνευματικόν, άβαθμολόγητον. Έάν ή στάθμη του υδραργύρου φθάση εις τήν υποδιαίρεσιν  $32^{\circ}$ , σημειώνομεν και εις τó οινόπνευματικόν εκεί, όπου έφθασεν ή στάθμη του οινόπνεύματος, τήν υποδιαίρεσιν  $32^{\circ} C$ .

● Τοποθετούμεν κατόπιν τó οινόπνευματικόν θερμοόμετρον εντός τηκομένου πάγου και σημειώνομεν τήν υποδιαίρεσιν  $0^{\circ}$  εις τó σημείον, εις τó όποϊον φθάνει ή στάθμη του οινόπνεύματος.

Έάν τó μεταξύ  $0^{\circ}$  και  $32^{\circ}$  διάστημα διαιρέσωμεν εις 32 ίσα μέρη, τότε έκαστη υποδιαίρεσις αντιστοιχεί προς ένα βαθμόν Κελσίου ή ένα βαθμόν εκατονταβάθμιον.

\* Άλλα θερμοόμετρα έν χρήσει :

α) Θερμοόμετρον μεγίστου (ιατρικόν θερμοόμετρον)                      β) Θερμοόμετρον έλαχίστου



Έν στένωμα ή έν βύσμα έμποδίζει τόν υδραργύρον να κατέλθη, όταν ψύχεται.

Έ ή έλευθέρα επιφάνεια του ύγρου παρσύρει τόν δεικτήν, όταν τó ύγρον ψύχεται.

1. Καλείται επίσης και κλίμαξ Κελσίου, από τó όνομα του Σουηδού Φυσικού, ό όποιος τó 1742 κατεσκεύασε τó πρώτον υδραργυρικόν θερμοόμετρον.

**ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ**

1. Το υδραργυρικών θερμομέτρων αποτελείται εξ ενός δοχείου προσηρμοσμένου εις τριχοειδή σωλήνα. Το δοχείον τούτο περιέχει υδράργυρον και το στέλεχος είναι βαθμολογημένον.

2. Το σημείον 0 είναι εκείνο, εις το οποίον φθάνει η στάθμη του υδραργύρου, όταν θέσωμεν το θερμομέτρων εντός τηκόμενου πάγου.

3. Το σημείον 100 είναι εκείνο, εις το οποίον φθάνει η στάθμη του υδραργύρου, όταν θέσωμεν το θερμομέτρων εντός ατμών ζέοντος ύδατος υπό κανονικὴν ἀτμοσφαιρικὴν πίεσιν 76 cmHg.

4. Το διάστημα 0-100 ἀποτελεῖ τὴν ἑκατονταβάθμιον κλίμακα ἢ κλίμακα Κελσίου τοῦ υδραργυρικοῦ θερμομέτρου.

5. Ὑπάρχουν καὶ ἄλλα θερμομέτρα δι' ὑγρῶν, βαθμολογημένα ἐν συγκρίσει πρὸς τὸ υδραργυρικὸν θερμομέτρων. Τὸ ἀκριβέστερον ὄλων τῶν θερμομέτρων εἶναι τὸ υδραργυρικόν.

36<sup>ON</sup> ΜΑΘΗΜΑ : Διαστολή.

## Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ (ΠΟΙΟΤΙΚΑ)

### 1 Ἡ ἔννοια τῆς θερμοκρασίας.

α) *Αὐτὴ ἡ ἔννοια εἶναι τὸ αἶσθημα, τὸ ὁποῖον μᾶς δίδει τὸ αἰσθητήριον τῆς ἀφῆς, καὶ μᾶς ἐπιτρέπει νὰ λέγωμεν :*

—ὅτι ἐν σώμα εἶναι θερμὸν ἢ ὅτι ἡ θερμοκρασία του εἶναι ὑψηλὴ, ἢ

—ὅτι ἐν σώμα εἶναι ψυχρὸν ἢ ὅτι ἡ θερμοκρασία του εἶναι χαμηλὴ.

Διὰ τῆς αἰσθήσεως αὐτῆς δυνάμεθα ἀκόμη νὰ εἴπωμεν :

“Ὅτι ἐν σώμα εἶναι  $\left\{ \begin{array}{l} \text{θερμότερον} \\ \text{ἐξ ἴσου θερμὸν} \\ \text{ψυχρότερον} \end{array} \right\}$  ἐνὸς ἄλλου


ἢ

“Ὅτι ἡ θερμοκρασία του εἶναι  $\left\{ \begin{array}{l} \text{ὑψηλότερα} \\ \text{ἐξ ἴσου ὑψηλὴ} \\ \text{ταπεινότερα} \end{array} \right\}$  τῆς θερμοκρασίας ἐνὸς ἄλλου σώματος.

β) *Ἡ αἴσθησις, ἡ ὁποία δημιουργεῖται ἐκ τῆς ἀφῆς δὲν εἶναι ἀκριβής.*

Τί σημαίνει ἀκριβῶς ἢ ἔκφρασις : θερμὸν ὕδωρ, πολὺ θερμὸν, χλιαρὸν κλπ. ;

γ) *Ἡ αἴσθησις, τὴν ὁποίαν ἔχομεν ἐκ τῆς ἀφῆς, δὲν εἶναι ἀξιόπιστος.*



Σχ. 1.

**A:** Ὑδωρ ψυχρὸν

**B:** Ὑδωρ χλιαρὸν


**G:** Ὑδωρ θερμὸν

● Τὰ τρία δοχεῖα περιέχουν τὴν αὐτὴν ποσότητα ὕδατος.

Βυθίζομεν τὴν δεξιὰν μας χεῖρα εἰς τὸ δοχεῖον Α καὶ τὴν ἀριστερὰν εἰς τὸ δοχεῖον Γ ἢ 2 μν καὶ εὐθὺς ἀμέσως καὶ τὰς δύο μαζί εἰς τὸ δοχεῖον Β. Θὰ παρατηρήσωμεν τότε ὅτι ἡ δεξιὰ μας χεῖρ μᾶς δίδει τὴν αἴσθησιν τοῦ θερμοῦ, ἐνῶ ἡ ἀριστερὰ τὴν αἴσθησιν τοῦ ψυχροῦ.

● Ἐὰν λάβωμεν ἐκ τοῦ ψυγείου φιάλην περιτυλιγμένην διὰ χάρτου, μᾶς φαίνεται ὅτι ἡ φιάλη εἶναι ψυχρότερα τοῦ χάρτου.

● Ἐὰν κρατήσωμεν εἰς τὴν μίαν μας χεῖρα μεταλλικὸν κανόνα καὶ εἰς τὴν ἄλλην ἔυλινον, ὁ μεταλλικὸς κανὼν θὰ μᾶς φανῆ ψυχρότερος τοῦ ἔυλινου, ἐὰν τοὺς λάβωμεν ἐκ τοῦ ἰδίου δροσεροῦ μέρους.



**Συμπέρασμα:** Η αίσθησις της άφης δέν επαρκεί, διά τήν έκτιμήσωμεν τήν θερμοκρασίαν, διότι ούτε ακριβής ούτε αξιόπιστος είναι.

## 2 Πειράματα διαστολής (ποιοτικά).

● Τό όργανον, τό οποίον βλέπομεν εις τό (σχ. 2), είναι έν πυρόμετρον μετά πίνακος. Τό μεταλλικόν στέλεχος AB είναι στερεωμένον διά κοχλίου εις τό άκρον Β και έλεύθερον νά κινήται εις τό έτερον άκρον Α. Τό άκρον Α έρχεται εις έπαφήν μέ τόν μικρόν βραχίονα ένός γωνιακού μοχλού, τού οποίου ό μεγάλος βραχίον καταλήγει εις βελόνην ένδεικτικήν.

● Έάν θερμάνωμεν διά φλογός οινοπνεύματος τό στέλεχος, ή θερμοκρασία του ανέρχεται και τό μήκος του αυξάνει, ύφίσταται διαστολήν.

ΈΗ διαστολή αυτή φαίνεται έκ τής μετατοπίσεως τής βελόνης.

Όταν παύσωμεν νά θερμαίνωμεν τό στέλεχος, ή θερμοκρασία του κατέρχεται και τό στέλεχος επανέρχεται βραδέως εις τό αρχικόν του μήκος, ύφίσταται συστολήν.

Έάν θερμάνωμεν τό ύδωρ σφαιρικής φιάλης (σχ. 3), ή θερμοκρασία του ανέρχεται και ό όγκος του αυξάνει, ύφίσταται διαστολήν.

Έάν διακόψωμεν τήν θέρμανσιν, τό ύδωρ επανέρχεται βραδέως εις τόν αρχικόν του όγκον, ύφίσταται συστολήν.

Παρατηρούμεν ότι εις τήν αρχήν τού πειράματος ή στάθμη τού χρωματισμένου ύδατος πίπτει άποτόμως μέχρι τού σημείου Β και κατοπίν ανέρχεται κανονικώς εις τό Γ.

Κατ' άρχάς διαστελέεται τό ύάλινον δοχείον. Ός έκ τούτου, αυξάνει ό όγκος του και κατέρχεται ή στάθμη τού ύδατος: κατοπίν αρχίζει νά διαστελλεται και τό ύδωρ άλλα πολύ περισσότερον τού δοχείου.

Τά ύγρά λοιπόν διαστελλονται πολύ περισσότερον από τά στερεά, τά οποία περιέχουν αυτά.

● Θερμαίνωμεν διά τών χειρών μας τόν άέρα μιās φιάλης (σχ. 4). Παρατηρούμεν ότι ή θερμοκρασία του ανέρχεται και ό όγκος του αυξάνει, ύφίσταται διαστολήν.

ΈΗ διαστολή φαίνεται έκ τής ταχείας μετατοπίσεως σταγόνος χρωματισμένου ύδατος προς τά δεξιά τού σωλήνος.

Έάν παύσωμεν νά θερμαίνωμεν τήν φιάλην, ό άήρ επανέρχεται εις τόν αρχικόν του όγκον, ύφίσταται συστολήν.

Τούτο φαίνεται έκ τής σταγόνος, ή οποία επανέρχεται εις τήν αρχικήν της θέσιν. Διατί ;

**Συμπέρασμα:** Όταν ή θερμοκρασία ένός σώματος ανέρχεται, τό σώμα διαστελέεται, αντίθετως δέ, όταν ή θερμοκρασία κατέρχεται, τό σώμα συστελέεται.

## 3 Δυνάμεθα τώρα νά αντιληφθώμεν πώς λειτουργεί τό θερμόμετρον.

Όταν θερμόμετρον εύρίσκεται π.χ. επί τής τραπέζης, δεικνύει έστω 15° C. Έάν τό θέσωμεν έντός θερμού ύδατος, συντόμως λαμβάνει λόγω τής κατασκευής του τήν νέαν θερμοκρασίαν. ΈΗ στάθμη τού ύγρου εις τό θερμόμετρον ανέρχεται (διατί ;) και, έάν φθάση εις τήν




υποδιαίρεσιν 45", ή θερμοκρασία του θερμομετρικού υγρού και επομένως και του ύδατος είναι 45°.

● Τα κατωτέρω τέσσαρα δοχεία περιέχουν την αυτήν ποσότητα ύδατος.

Τα δοκιμάζομεν διά της χειρός μας και τα τοποθετούμεν κατά σειράν άρχόμενοι εκ του δοχείου, τὸ ὁποῖον περιέχει τὸ ψυχρότερον ὕδωρ. Ἐπειτα θέτομεν διαδοχικῶς τὸ θερμομετρον εἰς ἕκαστον δοχείον.

Παρατηροῦμεν ὅτι ή θερμοκρασία του ὕδατος είναι π.χ.



**Συμπέρασμα :** Τὸ θερμομετρον δεικνύει μετ' ἀκριβείας καὶ ἀντικειμενικῶς τὴν θερμοκρασίαν ἐνὸς σώματος.

### ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ


1. Ὄταν ή θερμοκρασία ἐνὸς σώματος ἀνέρχεται, τὸ σῶμα διαστέλλεται καί, ὅταν κατέρχεται, συστέλλεται.

2. Ἡ στάθμη, εἰς τὴν ὁποία φθάνει τὸ θερμομετρικὸν ὑγρὸν, ὅταν τοῦτο συστέλλεται ή διαστέλλεται, μᾶς ἐπιτρέπει νὰ ἀναγνώσωμεν ἐπὶ τῆς βαθμολογημένης κλίμακος τὴν θερμοκρασίαν τοῦ σώματος, εἰς τὸ ὁποῖον ἔχομεν τοποθετήσει τὸ θερμομετρον.


### 37<sup>ON</sup> ΜΑΘΗΜΑ :

#### ΧΡΗΣΙΣ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟΥ ΠΡΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΙΝ ΜΕΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ

1. Λέγομεν ὅτι μία θερμοκρασία είναι ἴση πρὸς μίαν ἄλλην θερμοκρασίαν.



2. Δὲν δυνάμεθα ὅμως νὰ εἰπώμεν ὅτι μία θερμοκρασία είναι ἴση πρὸς τὸ ἄθροισμα πολλῶν θερμοκρασιῶν.




3 λίτρα ὕδατος είναι τὸ ἄθροισμα ἐνὸς λίτρου καὶ ἐνὸς λίτρου καὶ ἐνὸς λίτρου ὕδατος.

30° C δὲν είναι τὸ ἄθροισμα 15° C καὶ 50° C καὶ 25°.


**Συμπέρασμα :** Το θερμομέτρον μᾶς ἐπιτρέπει νὰ χαρακτηρίσωμεν τὴν θερμικὴν κατάστασιν ἐνὸς σώματος, δηλαδὴ νὰ ἐκφράσωμεν ταύτην δι' ἐνὸς ὀρισμένου ἀριθμοῦ, ὃ ὁποῖος συμβολίζει τὴν θερμοκρασίαν τοῦ σώματος.

Ἡ θερμοκρασία ἐπομένως εἶναι μέγεθος, τὸ ὁποῖον δὲν μετρεῖται, ἀλλὰ δύναται νὰ ἐκφρασθῆ ἢ νὰ σημειωθῆ δι' ἐνὸς ἀριθμοῦ, ὡς εἶδομεν, διὰ τοῦ θερμομέτρου.

Λέγομεν π.χ. ὅτι ἐν σῶμα ἔχει θερμοκρασίαν  $15^{\circ}$  καὶ ἕτερον  $30^{\circ}$  C· δὲν δυνάμεθα ὁμῶς νὰ εἴπωμεν ὅτι τὸ δεύτερον ἔχει διπλασίαν θερμοκρασίαν τοῦ πρώτου, δηλαδὴ ὅτι εἶναι δύο φορές θερμότερον.



Ἀνάγνωσις θερμοκρασίας



Λήψις θερμοκρασίας ὑγροῦ

### 3 Ἀνάγνωσις μιᾶς θερμοκρασίας.

α) Ὄταν ἐξετάζωμεν μίαν θερμοκρασίαν, ὃ ὀφθαλμὸς μᾶς πρέπει νὰ εὐρίσκειται εἰς τὸ ὀριζόντιον ἐπίπεδον, τὸ ὁποῖον καθορίζει ἡ ἐλευθέρα ἐπιφάνεια τοῦ ὑδραργύρου ἢ τοῦ οἰνοπνεύματος ἐντὸς τοῦ σωλήνος.

● Ἐὰν θέλωμεν νὰ εὐρωμεν τὴν θερμοκρασίαν ἐνὸς ὑγροῦ, πρέπει νὰ τὸ ἀναδεύσωμεν, διὰ νὰ ἐξισώσωμεν τὴν θερμοκρασίαν του.

Τὸ δοχεῖον τοῦ θερμομέτρου πρέπει νὰ βυθίζεται ὀλόκληρον ἐντὸς τοῦ ὑγροῦ.

● Ἐὰν θέλωμεν νὰ εὐρωμεν τὴν θερμοκρασίαν τοῦ ἀτμοσφαιρικοῦ ἀέρος, τοποθετοῦμεν τὸ θερμομέτρον εἰς τὴν σκιάν καὶ εἰς ἀπόστασιν ἐκ τοῦ τοίχου.

β) Σημειώσωμεν μερικὰς θερμοκρασίας :

- ἐντὸς τῆς αἰθούσης
- εἰς τὸ ὑπόστεγον εἰς τὰς 9 h, 12 h, καὶ 15 h
- ὑπὸ τὴν μασχάλην (ἰατρικὸν θερμομέτρον)
- εἰς διαφόρους θέσεις ἐνὸς ψυκτικοῦ θαλάμου κ.τ.λ.

### 4 Μερικαὶ χαρακτηριστικαὶ θερμοκρασίαι

Θερμοκρασία τηκομένου πάγου:  $0^{\circ}$  C

Θερμοκρασία τῶν ἀτμῶν τοῦ ὕδατος, ὅταν βράζη:  $100^{\circ}$

Κανονικὴ θερμοκρασία τοῦ σώματος τοῦ ἀνθρώπου:  $37^{\circ}$

Θερμοκρασία τοῦ σώματος τῶν πτηνῶν:  $42^{\circ}$  C

### 5 Μέση θερμοκρασία

Ἡ μέση θερμοκρασία τῆς πόλεως τῶν Ἀθηνῶν διὰ τὸ ἔτος π.χ. 1965 ἦτο :  $17,41^{\circ}$  C.

Πρὸς εὐρεσιν τῆς μέσης θερμοκρασίας ἐργαζόμεθα ὡς ἑξῆς :

Πρῶτον εὐρίσκομεν τὴν μέσην θερμοκρασίαν τῆς ἡμέρας, τὴν ὁποίαν ὑπολογίζομεν ἐπὶ τῇ βάσει 24 θερμοκρασιῶν, λαμβανομένων καθ' ἐκάστην ὥραν. Ἀκολουθῶς εὐρίσκομεν τὴν μέσην μηνιαίαν θερμοκρασίαν. Ἡ μέση μηνιαία θερμοκρασία μᾶς χρησιμεύει πρὸς καθορισμὸν τῆς μέσης ἐτησίας θερμοκρασίας.


Εἰς τὸν κατωτέρω πίνακα σημειοῦται ἡ μέση θερμοκρασία τῶν 12 μηνῶν τοῦ ἔτους 1965.

Ἰανουάριος	9,6	Ἀπρίλιος	14,1	Ἰούλιος	27,7	Ὀκτώβριος	17,3
Φεβρουάριος	7,8	Μάιος	18,7	Αὔγουστος	25,3	Νοέμβριος	15,4
Μάρτιος	11,5	Ἰούνιος	25	Σεπτέμβριος	24	Δεκέμβριος	12,6

Μὲ βάσιν τὸν πίνακα ὑπολογίζομεν τὴν μέσην θερμοκρασίαν τοῦ ἔτους.

Γενικὸν σύνολον :  $209^{\circ}$  C.

Μέση θερμοκρασία τοῦ ἔτους :  $17,41^{\circ}$  C.



Κατασκευάζομεν γραφικὴν παράστασιν διὰ τῶν μέσων μηνιαίων θερμοκρασιῶν τοῦ ἔτους (προσέγγισις ἡμίσεως βαθμοῦ) καὶ χαράσσομεν ὀριζοντίαν γραμμὴν εἰς τὸ ὕψος τῆς μέσης θερμοκρασίας τοῦ ἔτους.

### ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ

1. Ἡ θερμοκρασία εἶναι μέγεθος, τὸ ὁποῖον δὲν δύναται νὰ μετρηθῆ, ἀλλὰ μόνον νὰ χαρακτηρισθῆ (νὰ σημειωθῆ).

Τὸ θερμοόμετρον μᾶς ἐπιτρέπει νὰ σημειώσωμεν καὶ οὐχὶ νὰ μετρήσωμεν μίαν θερμοκρασίαν.

2. Διὰ νὰ σημειώσωμεν ἀκριβῶς τὴν θερμοκρασίαν ἐνὸς σώματος, πρέπει νὰ φέρωμεν τὸ θερμοόμετρον εἰς ὅσον τὸ δυνατόν καλύτεραν ἐπαφὴν πρὸς τὸ σῶμα, νὰ ἀποφύγωμεν τὰ σφάλματα τῆς ἀναγνώσεως καὶ διὰ τὸν προσδιορισμὸν τῆς θερμοκρασίας τοῦ ἀτμοσφαιρικοῦ ἀέρος νὰ τοποθετώμεν τὸ θερμοόμετρον εἰς τὴν σκιάν.

3. Αἱ μετεωρολογικαὶ ὑπηρεσίαι σημειοῦν τακτικῶς τὴν θερμοκρασίαν τοῦ ἀτμοσφαιρικοῦ ἀέρος καὶ ὑπολογίζουσι τὴν μέσην θερμοκρασίαν τοῦ τόπου.

Ἡ θερμοκρασία εἶναι τὸ κυριώτερον στοιχεῖον τοῦ κλίματος ἐνὸς τόπου.

### ΑΣΚΗΣΕΙΣ

#### Σειρὰ 9: Θερμοκρασία, θερμοόμετρον.

##### I. Τὸ ὑδραργυρικὸν θερμοόμετρον

1. Αἱ ἐνδείξεις  $0^{\circ}$  καὶ  $100^{\circ}$  Κελσίου ἐνὸς ὑδραργυρικοῦ θερμομέτρου ἀπέχουσι 24 cm:

α) Ποῖον μήκος σωλήνος εἰς mm ἀντιστοιχεῖ εἰς  $1^{\circ}$  C;

β) Ἐάν ἡ μικροτέρα, ἀντιληπτὴ διὰ τοῦ ὀφθαλμοῦ, μετατόπισις τῆς στάθμης ὑδραργύρου εἶναι  $1/5$  mm, πόση εἶναι ἡ μικροτέρα μεταβολὴ τῆς θερμοκρασίας εἰς  $^{\circ}$  C, τὴν ὁποίαν δυνάμεθα νὰ διαπιστώσωμεν δι' αὐτοῦ τοῦ θερμομέτρου;

2. Ἐκτὸς τῆς κλίμακος Κελσίου χρησιμοποιεῖται καὶ ἡ κλίμαξ Fahrenheit (Φαρενάιτ). Τὰ σημεῖα 0 καὶ 100 τῆς κλίμακος Κελσίου ἀντιστοιχοῦν εἰς τὰ σημεῖα 32 καὶ 212 τῆς κλίμακος Φαρενάιτ:

α) Νὰ ὑπολογισθῆ ἡ τιμὴ τοῦ βαθμοῦ F ὡς πρὸς τὸν βαθμὸν C.

β) Ὄταν τὸ θερμοόμετρον F δεῖκνῆ 75,2 $^{\circ}$ , ποίαν θερμοκρασίαν δεῖκνυεῖ τὸ θερμοόμετρον C;

γ) Ὄταν τὸ θερμοόμετρον C δεῖκνῆ 18 $^{\circ}$ , ποίαν θερμοκρασίαν δεῖκνυεῖ τὸ θερμοόμετρον F;

##### II. Μεταβολὴ διαστάσεων

3. Εἰς  $0^{\circ}$  C ἔν σύρμα ἐξ ἀλουμινίου ἔχει μήκος 1 m καὶ ἐπιμηκύνεται κατὰ 2,3 mm, ὅταν ὑψώσωμεν τὴν θερμοκρασίαν του εἰς τοὺς  $100^{\circ}$  C.

Πόσον ἐπιμηκύνεται σύρμα ἐκ τοῦ ἰδίου ὕλικου, μήκους 20 m, ὅταν ἡ θερμοκρασία του ὑψωθῆ ἀπὸ  $0^{\circ}$  C εἰς  $75^{\circ}$  C;



4. Το ύψος του Πύργου του Eiffel, ο οποίος είναι κατασκευασμένος εκ σιδήρου, είναι 300 m εις θερμοκρασίαν  $0^{\circ}\text{C}$ . Νά υπολογισθῆ τὸ ὕψος του εἰς  $30^{\circ}\text{C}$ . (Ἐν μέτρον σιδήρου ἐπιμηκύνεται κατὰ 0,612 mm, ὅταν ἡ θερμοκρασία του μεταβάλλεται κατὰ  $1^{\circ}\text{C}$ ).

5. Τὸ μέταλλον invar εἶναι κράμα ἐκ χάλυβος καὶ νικελίου, ἐλάχιστα διαστελλόμενον. Ἐν μέτρον ἐξ αὐτοῦ τοῦ κράματος ἐπιμηκύνεται κατὰ 0,1 mm, ὅταν ἡ θερμοκρασία του ἀπὸ  $0^{\circ}\text{C}$  γίνεται  $100^{\circ}\text{C}$ , ἐνῶ ἐν μέτρον χαλκίνου σύρματος ὑπὸ τὰς αὐτὰς συνθήκας ἐπιμηκύνεται κατὰ 1,6 mm.

Τεῖνομεν συγχρόνως μεταξὺ δύο σημείων Α καὶ Β ἐν σύρμα ἐκ μετάλλου invar καὶ ἐν ἐκ χαλκοῦ, ἕκαστον τῶν ὁποίων ἔχει μῆκος 0,60 m εἰς  $0^{\circ}\text{C}$ , καὶ τὰ θερμαίνομεν εἰς τοὺς  $500^{\circ}\text{C}$ :

α) Ποῖον μῆκος ἔχει τώρα ἕκαστον σύρμα;  
β) Νά σχηματισθῆ ἐν σχέδιον, τὸ ὅποιον νά δεικνύῃ τὴν θέσιν ἑκάστου σύρματος, ἐφ' ὅσον τὰ σημεία Α καὶ Β εἶναι σταθερά.

6. Αἱ σιδηροδρομικαὶ γραμμαὶ ἔχουν μῆκος 800 m. Δεχόμεθα ὅτι τὸ μῆκος τῆς γραμμῆς μεταβάλλεται κατὰ 1,05 mm ἀνά μέτρον διὰ μεταβολῆν θερμοκρασίας  $100^{\circ}\text{C}$  καὶ ὅτι αἱ ἀκραὶ θερμοκρασίαι, αἱ ὁποῖαι σημειώνονται εἰς τὰς γραμμάς, εἶναι  $-20^{\circ}\text{C}$  καὶ  $60^{\circ}\text{C}$ :

α) Ποῖα εἶναι ἡ μεταβολὴ τοῦ μῆκου γραμμῆς 800 m μεταξὺ αὐτῶν τῶν θερμοκρασιῶν;

7) Σύρμα ἐκ σιδήρου, μῆκους 5 m εἰς  $0^{\circ}\text{C}$  δια-

στέλλεται καὶ γίνεται 5,003 m εἰς θερμοκρασίαν  $50^{\circ}\text{C}$ :

α) Πόση εἶναι ἡ μεταβολὴ τοῦ μῆκους του;

β) Πόση θὰ ἦτο ἡ ἐπιμήκυνσις 1 m (εἰς  $0^{\circ}\text{C}$ ) ἐξ αὐτοῦ τοῦ σύρματος δι' ἀνωψωσιν θερμοκρασίας κατὰ  $1^{\circ}\text{C}$ ;

Ἡ ἐπιμήκυνσις αὐτὴ κατὰ μονάδα μῆκους καὶ βαθμὸν θερμοκρασίας ὀνομάζεται συντελεστὴς γραμμικῆς διαστολῆς τοῦ σιδήρου.

8. Ἐν μέτρον χαλκίνου σύρματος, μετρηθέντος εἰς  $0^{\circ}\text{C}$ , ἐπιμηκύνεται κατὰ 1,6 mm, ὅταν ἡ θερμοκρασία του γίνεται  $100^{\circ}\text{C}$ .

Ἐν τοιοῦτον σύρμα διὰ τὴν μεταφορὰν ἠλεκτρικοῦ ρεύματος ἔχει μῆκος 200 m εἰς  $0^{\circ}\text{C}$  καὶ 200,128 m εἰς μίαν ἄλλην θερμοκρασίαν:

α) Ποῖα ἡ ἐπιμήκυνσις του;

β) Ποῖα εἶναι αὐτὴ ἡ θερμοκρασία;


9) Μία ὑαλινὴ σφαιρικὴ φιάλη 1 dm<sup>3</sup> διαστέλλεται καὶ ὁ ὄγκος τῆς αὐξάνει κατὰ 2,7 cm<sup>3</sup>, ὅταν ἡ θερμοκρασία τῆς ὑφῆται ἀπὸ  $0^{\circ}\text{C}$  εἰς  $100^{\circ}\text{C}$ :

α) Πόσος εἶναι ὁ ὄγκος φιάλης 0,500 dm<sup>3</sup>, ὅταν ἡ θερμοκρασία τῆς γίνῃ  $60^{\circ}\text{C}$ ;

β) Ἡ φιάλη (ὄγκος 0,500 dm<sup>3</sup>) εἶναι πλήρης γλυκερίνης, τῆς ὁποίας ὄγκος 1 dm<sup>3</sup> εἰς  $0^{\circ}\text{C}$  αὐξάνει κατὰ 0,500 cm<sup>3</sup> δι' ἀνωψωσιν θερμοκρασίας  $1^{\circ}\text{C}$ .

Πόση εἶναι ἡ αὐξήσις τοῦ ὄγκου τῆς γλυκερίνης, ὅταν ἡ θερμοκρασία τῆς φιάλης γίνῃ  $60^{\circ}\text{C}$ ;

γ) Πόσος ὄγκος γλυκερίνης χύνεται τότε ἐκ τῆς φιάλης;



Ὅταν μετατοπίζεται ὁ ὑδράργυρος, ὠθεῖ πότε τὸν ἕνα καὶ πότε τὸν ἄλλον δείκτην. Τὸ οἰονοπνευματικὸν ὑγρὸν δύνανται νὰ κυκλοφορῇ γύρω ἀπὸ τοὺς δείκτας, ἐνῶ ὁ ὑδράργυρος ὄχι. Οἱ δείκται παραμένουν εἰς τὴν θέσιν τῶν ὅταν ὁ ὑδράργυρος ἀποσύρεται, ἐνῶ ἀντιθέτως μετατοπιζονται, ὅταν ἄφθουται ἀπὸ αὐτὸν.

Τὸ θερμομετρικὸν τοῦ σχήματος δεικνύει θερμοκρασίαν  $20^{\circ}\text{C}$ . Ἡ ἐλάχιστη εἶναι  $10^{\circ}\text{C}$  καὶ ἡ μέγιστη  $25^{\circ}\text{C}$ . Οἱ δείκται εἶναι ἀπὸ σίδηρον καὶ δυνάμεθα νὰ τοὺς μετατοπίσωμεν ἑξωτερικῶς μὲ ἕνα μαγνήτην.

## ΠΟΣΟΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ

### 1 Τί είναι θερμότης.

● Ἐὰν πλησιάσωμεν τὴν χεῖρά μας εἰς μίαν ἠλεκτρικὴν θερμάστρα ἢ εἰς τὴν φλόγα τοῦ ὑγραερίου ἢ τοῦ φωταερίου, θὰ ἔχωμεν τὸ αἴσθημα τῆς θερμότητος.

Ἡ ἠλεκτρικὴ θερμάστρα καὶ ἡ φλόξ εἶναι **πηγαὶ θερμότητος**.

● Τοποθετοῦμεν ἐπὶ τῆς φλογὸς μιᾶς λυχνίας οἰνοπνεύματος ἐν δοχείῳ μεθ' ὕδατος, ἐντὸς τοῦ ὁποῖου θέτομεν ἐν θερμόμετρον. Παρατηροῦμεν ὅτι, ἐνῶ ἡ στάθμη τοῦ θερμομετρικοῦ ὑγροῦ ἀνέρχεται διαδοχικῶς εἰς τοὺς 18° C, 25° C, 35° C κλπ., ἐξακριβώνομεν διὰ τοῦ δακτύλου μας ὅτι τὸ ὕδωρ γίνεται συνεχῶς θερμότερον.

● Ἡ φλόξ τοῦ οἰνοπνεύματος παρέχει συνεχῶς θερμότητα εἰς τὸ ὕδωρ καὶ ἡ θερμοκρασία τοῦ ὕδατος ἀνέρχεται.

● Ἐὰν παύσωμεν νὰ θερμαίνωμεν, τὸ θερμόμετρον κατέρχεται ὀλίγον κατ' ὀλίγον, διότι τὸ ὕδωρ παρέχει θερμότητα εἰς τὸ ἐξωτερικὸν περιβάλλον καὶ ἡ θερμοκρασία του ἐλαττοῦται.

**Συμπέρασμα :** Ἡ θερμότης εἶναι τὸ αἷτιον τῶν μεταβολῶν τῆς θερμοκρασίας.

### 2 Μία ποσότης θερμότητος εἶναι μέγεθος, τὸ ὁποῖον δύναται νὰ μετρηθῇ.

● Θερμαίνομεν διὰ δύο διαφορετικῶν πηγῶν θερμότητος (π.χ. λυχνίας οἰνοπνεύματος καὶ ἠλεκτρικῆς θερμάστρας) δύο σφαιρικές φιάλας, π.χ. τὴν Α καὶ τὴν Β, αἱ ὁποῖαι περιέχουν ἴσας μάζας ὕδατος  $m=600$  g καὶ ἔχουν τὴν αὐτὴν ἀρχικὴν θερμοκρασίαν  $t_1=20^\circ$  C.

● Σημειώομεν ἀνὰ λεπτόν τὴν θερμοκρασίαν ἐκάστου ὑγροῦ τῆ βοηθεῖα τῶν ἐντὸς τῶν φιαλῶν τοποθετημένων θερμόμετρων καὶ καταρτίζομεν τὸν κατωτέρω πίνακα :

χρόνος (mn)	0	1	2	3	4	5	6
θερμοκρασία (°C) Α	20	25	30	35	40	45	50
Β	20	26	32	38	44	50	


● Κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ πειράματος δὲν πρέπει νὰ μεταβάλλωμεν τὴν ἔντασιν τῆς φλογὸς τῶν δύο πηγῶν.

**Συμπέρασμα :** Ἡ ποσότης θερμότητος, τὴν ὁποῖαν ἀπορροφᾷ μία μάζα ὕδατος, εἶναι ἀνάλογος πρὸς τὴν ἀνίρρῳσιν τῆς θερμοκρασίας του.

● Παρατηροῦμεν ὅτι ἡ θερμοκρασία τοῦ ὕδατος εἰς τὴν φιάλην Β ἀνέρχεται ταχύτερον παρὰ εἰς τὴν φιάλην Α.


Τοῦτο συμβαίνει, διότι ἡ ἠλεκτρικὴ ἀντίστασις παρέχει εἰς τὸν αὐτὸν χρόνον μεγαλύτερον ποσὸν θερμότητος ἀπὸ τὴν φλόγα τοῦ οἰνοπνεύματος.

Διακόπτομεν τὴν θέρμανσιν, ὅταν ἡ τελικὴ θερμοκρασία τοῦ ὕδατος γίνῃ καὶ εἰς τὰς δύο φιάλας  $t_2=50^\circ$  C (σχ. 2).




Σχ. 1. Τὸ ὕδωρ τῆς φιάλης Β δέχεται εἰς τὸ ἴδιον χρονικὸν διάστημα περισσοτέραν θερμότητα ἀπὸ τὸ ὕδωρ τῆς φιάλης Α. Ποσότης θερμότητος ἡ ὁποία ἐχορηγήθη παρὰ τῆς λυχνίας Bunsen.

Ποσότης θερμότητος ἡ ὁποία ἐχορηγήθη παρὰ τῆς ἠλεκτρικῆς ἀντίστασεως.




Ποσότης θερμότητος Q τὴν ὁποῖαν ἀπερρόφησεν ἡ φιάλη Α.


Ποσότης θερμότητος Q τὴν ὁποῖαν ἀπερρόφησεν ἡ φιάλη Β.



Σχ. 3. Η ποσότης θερμότητος  $Q$  είναι ίση προς  $Q_1 + Q_2$ .



Σχ. 4. Η ποσότης τῆς θερμότητος, ἡ ὁποία ἐχορηγήθη διὰ τὴν ἴδιαν ἀνύψωσιν τῆς θερμοκρασίας μίας μάζης ὕδατος, εἶναι ἀνάλογος αὐτῆς τῆς μάζης  $Q_2 = 3Q_1$ .



Σχ. 5. Διὰ τὴν ἀνύψωσιν τῆς θερμοκρασίας 1 g ὕδατος, πρέπει νὰ χορηγήσωμεν εἰς αὐτὸ θερμότητα ἴσην πρὸς μίαν θερμίδα.

Θερμαίνωμεν πρῶτον τὴν φιάλην Γ, ἕως δτου ἡ θερμοκρασία φθάσῃ εἰς τοὺς 50° C, καὶ σημειώσωμεν τὸν χρόνον, ὃ ὁποῖος ἐχρείασθη : 2 mn. Χωρὶς νὰ μεταβάλωμεν τὴν ἔντασιν τῆς φλογός, θερμαίνωμεν τὴν φιάλην Δ ἕως τὴν θερμοκρασίαν τῶν 50° C καὶ σημειώσωμεν πάλιν τὸν χρόνον : 6 mn περίπου.

Παρατηροῦμεν ὅτι ὁ χρόνος αὐτὸς εἶναι τριπλάσιος τοῦ πρώτου καὶ ἡ ποσότης θερμότητος, τὴν ὁποῖαν ἀπερρόφησεν ἡ φιάλη Δ, εἶναι τριπλάσια τῆς ποσότητος, τὴν ὁποῖαν ἀπερρόφησεν ἡ φιάλη Γ.

**Συμπέρασμα :** Ἡ ποσότης τῆς θερμότητος, τὴν ὁποῖαν ἀπορροφᾷ μία μᾶζα ὕδατος, διὰ τὴν ἀνύψωσιν τῆς θερμοκρασίας ἀπὸ  $t_1$  ἕως  $t_2$ , εἶναι ἀνάλογος πρὸς τὴν μᾶζαν τοῦ ὕδατος.

### 3 Μονάδες ποσοτήτων θερμότητος :

Ἡ θερμὴς (cal) εἶναι ἡ ποσότης τῆς θερμότητος, ἡ ἀπαιτουμένη διὰ τὴν ἀνύψωσιν τῆς θερμοκρασίας ἐνὸς g ὕδατος κατὰ 1° C.

Πολλαπλασία : Ἡ χιλιοθερμὴς (Kcal) 1 Kcal=1000 cal.

α) Ἐκάστη πηγὴ θερμότητος ἀνύψωσε τὴν θερμοκρασίαν ἴσης μάζης ὕδατος  $m=600$  g ἀπὸ  $t_1 = 20^\circ$  C εἰς  $t_2 = 50^\circ$  C, δηλ.  $t_2 - t_1 = 30^\circ$  C

Βλέπομεν ὅτι :

Ποσότης θερμότητος, τὴν ὁποῖαν ἀπερρόφησε τὸ ὕδωρ τῆς φιάλης A = Ποσότης θερμότητος, τὴν ὁποῖαν ἀπερρόφησε τὸ ὕδωρ τῆς φιάλης B.

Δύο ποσότητες θερμότητος εἶναι ἴσαι, ὅταν ἀνυψώσιν εἰς τὴν αὐτὴν θερμοκρασίαν δύο ἴσας μάζας ὕδατος, αἱ ὁποῖαι εἶχον τὴν ἴδιαν ἀρχικὴν θερμοκρασίαν.

Κατὰ προσέγγισιν δυνάμεθα νὰ δεχθῶμεν ὅτι δύο ποσότητες θερμότητος εἶναι ἴσαι, ὅταν προκαλοῦν εἰς δύο ἴσας μάζας ὕδατος τὴν αὐτὴν μεταβολὴν θερμοκρασίας.

β) Ὄταν ἡ θερμοκρασία ἀνέρχεται ἀπὸ 20° C εἰς 35° C, τὸ ὕδωρ τῆς φιάλης A προσλαμβάνει μίαν ποσότητα θερμότητος  $Q_1$  καὶ ἀπὸ 35° C εἰς 50° C, μίαν ποσότητα θερμότητος  $Q_2$  (σχ. 3).

Ἡ ποσότης τῆς θερμότητος, τὴν ὁποῖαν ἀπερρόφησε τὸ ὕδωρ, διὰ τὴν ἀνύψωσιν τῆς θερμοκρασίας του ἀπὸ 20° C εἰς 50° C, εἶναι ἴση μὲ τὸ ἀθροισμα  $Q_1 + Q_2$ .

Ἄλλὰ  $Q_1 = Q_2$ , ἐπειδὴ ἡ ἀνύψωσις τῆς θερμοκρασίας εἶναι ἡ αὐτὴ : 15° C.

Τὸ ὕδωρ τῆς φιάλης A ἀπερρόφησεν ἀπὸ τοὺς 20° C ἕως τοὺς 50° C μίαν ποσότητα

$$Q_1 + Q_2 = Q$$

Αἱ ποσότητες θερμότητος δύνανται νὰ εἶναι ἴσαι, νὰ προστεθοῦν καὶ νὰ πολλαπλασιασθοῦν ἢ μία ἐπὶ τὴν ἄλλην.

**Συμπέρασμα :** Μία ποσότης θερμότητος εἶναι μέγεθος, τὸ ὅποῖον δύνανται νὰ μετρηθῇ.

γ) Δύο ὁμοῖαι σφαιρικαὶ φιάλαι περιέχουν ἡ μία 200 g καὶ ἡ ἑτέρα 600 g ὕδατος εἰς τὴν αὐτὴν ἀρχικὴν θερμοκρασίαν 20° C (σχ. 4).

Μία άλλη μονάς θερμότητας είναι και η μεγαθερμιά (Mcal), η οποία εκφράζει την άπαιτουμένη θερμότητα, δια να ανυψωθῆ ἡ θερμοκρασία μάζης ἑνὸς τόνου ὕδατος κατὰ 1° C.

### Τύποι.

Ποίαν ποσότητα θερμότητας πρέπει να προσδώσωμεν εἰς μίαν μάζαν ὕδατος 600 g, δια να ἀνέλθῃ ἡ θερμοκρασία του ἀπὸ τοὺς 20° C εἰς τοὺς 50° C;

$$Q = 1 \times 600 \times (50 - 20) = 18000 \text{ cal}$$

$$\text{cal} = \text{cal/g } ^\circ\text{C g } ^\circ\text{C}$$

Γενικώτερον, ἂν  $m$  ἡ μάζα τοῦ ὕδατος,  $t_1$  ἡ ἀρχικὴ θερμοκρασία καὶ  $t_2$  ἡ τελικὴ θερμοκρασία, ἡ ποσότης θερμότητος, τὴν ὁποίαν πρέπει να προσδώσωμεν, εἶναι :

$$Q = 1 \times m \times (t_2 - t_1)$$

$$\text{cal} = \text{cal/g } ^\circ\text{C g } ^\circ\text{C}$$

### ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ

1. Ἡ θερμότης εἶναι τὸ αἷτιον τῶν μεταβολῶν τῆς θερμοκρασίας.
2. Ἡ ποσότης τῆς θερμότητος, τὴν ὁποίαν ἀπορροφᾷ μία μάζα ὕδατος,

ὄστε να ἀνυψωθῆ ἡ θερμοκρασία του, εἶναι ἀνάλογος πρὸς τὴν μάζαν τοῦ ὕδατος καὶ τὴν ἀνύψωσιν τῆς θερμοκρασίας του.

3. Μονάς θερμότητος εἶναι ἡ θερμιά (cal). Θερμιά εἶναι ἡ θερμότης, ἡ ἀπαιτουμένη, δια να ἀνυψωθῆ ἓν g ὕδατος τὴν θερμοκρασίαν του κατὰ 1° C.

4. Ἡ ποσότης θερμότητος  $Q$ , ἡ ὁποία ἀπαιτεῖται, δια να ἀνυψωθῆ ἡ θερμοκρασία μιᾶς μάζης ὕδατος  $m$  ἀπὸ  $t_1$ ° C εἰς  $t_2$ ° C, εἶναι :  $Q = m \times (t_2 - t_1)$ .

### 39ον ΜΑΘΗΜΑ: ΜΕΤΡΗΣΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΟΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ.

#### ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΟΝ ΔΙ' ΥΔΑΤΟΣ

#### 1. Τοιχώματα ἀγωγίμα καὶ τοιχώματα μονωτικά.

α) Ἐντὸς τοῦ δοχείου A, τὸ ὁποῖον περιέχει ὕδωρ 20° C, τοποθετοῦμεν ἕτερον δοχεῖον B ἐξ ἀλουμινίου, τὸ ὁποῖον περιέχει ὕδωρ 60° C (σχ. 1).

Παρατηροῦμεν τότε ὅτι ἡ θερμοκρασία τοῦ ὕδατος εἰς τὸ δοχεῖον B κατέρχεται, ἐνῶ ἀνέρχεται εἰς τὸ δοχεῖον A. Τέλος, ἡ θερμοκρασία καὶ εἰς τὰ δύο δοχεῖα γίνεται ἡ αὐτή. Λέγομεν τότε ὅτι ἀποκατεστάθη **θερμικὴ ἰσορροπία**.

**Ἐξήγησις.** Τὸ ὕδωρ τοῦ δοχείου B ἔδωσε θερμότητα εἰς τὸ ὕδωρ τοῦ δοχείου A καὶ ἡ θερμοκρασία του κατῆλθε.


Τὸ ὕδωρ τοῦ δοχείου A προσέλαβεν αὐτὴν τὴν θερμότητα, ἡ ὁποία διέρχεται ἀπὸ τὸ ἐνδιάμεσον τοίχωμα τοῦ δοχείου B, ὁπότε ἡ θερμοκρασία του ἀνῆλθε.

Τὸ τοίχωμα αὐτὸ εἶναι *καλὸς ἀγωγὸς τῆς θερμότητος*.

β) Ἀντικαθιστῶμεν τὸ δοχεῖον B δι' ἑτέρου, τὸ ὁποῖον ἔχει διπλὰ ὑάλινα ἐπαργυρωμένα τοιχώματα. Ὁ μεταξὺ τῶν δύο τοιχωμάτων χῶρος εἶναι κενὸς ἀέρος.

Τὸ δοχεῖον τοῦτο εἶναι ὅμοιον πρὸς τὸ δοχεῖον θέρμος καὶ ὀνομάζεται δοχεῖον *Dewar*.


Χύνομεν εἰς τὸ δοχεῖον τοῦτο ὕδωρ 60° C καὶ τὸ τοποθετοῦμεν ἐντὸς τοῦ δοχείου A, τὸ ὁποῖον περιέχει ὕδωρ εἰς τὴν θερμοκρασίαν τοῦ δωματίου.




Σχ. 1. Τὸ ὕδωρ τοῦ δοχείου B παραχωρεῖ θερμότητα εἰς τὸ ὕδωρ τοῦ δοχείου A, ἕως ὅτου ἀναμεσα εἰς τὰ δύο δοχεῖα ἀποκατεστάθη θερμικὴ ἰσορροπία.





Σχ. 2. Δοχεῖον Dewar



Σχ. 3. Δεν είναι δυνατή η ανταλλαγή θερμότητας μεταξύ των υγρών των δύο δοχείων. Τα τοιχώματα του δοχείου Dewar αποτελούν ένα θερμικόν μονωτήν.



Σχ. 4. Θερμιδομέτρα  
Α: Θερμιδομέτρον Arsonval-Dewar  
Β: Θερμιδομέτρον άπλοῦν.



Θερμότης ή ό-  
ποια έχορηγήθη  
από τό ύδωρ  
του δοχείου Β

Θερμότης την όποιαν  
απερρόφησε τό ύδωρ  
του θερμιδομέτρου  
+  
Θερμότης την όποιαν  
απερρόφησε τό  
θερμιδομέτρον

Σχ. 5. Μέτρησης του ισοδύναμου εις ύδωρ ενός θερμιδομέτρου.

● Παρατηρούμεν ότι ή θερμοκρασία του ύδατος εις άμφοτέρα τά δοχεία δεν μεταβάλλεται. Έπομένως δεν γίνεται ανταλλαγή θερμότητος. Τά τοιχώματα του δοχείου Dewar άποτελοῦν ένα θερμικόν μονωτήν (σχ. 3).

Ό βάμβαξ, τό ξριον, τά πριονίδια του ξύλου και γενικώς τά σώματα, τά όποια είναι κακοί άγωγοί της θερμότητος, άποτελοῦν τούς θερμικούς μονωτάς.

## 2 Άρχή του Θερμιδομέτρου.

Τό θερμιδομέτρον είναι έν όργανον θερμικώς μεμονωμένον έκ του έξωτερικου περιβάλλοντος. Είναι έφωδιασμένον δι' ενός αναδευτήρος και ενός ευαισθητου θερμιδομέτρου.

Εις τό σχήμα 4 βλέπομεν έν θερμιδομέτρον, τῶν Arsonval - Dewar. Έπειδή τά τοιχώματα του δοχείου Dewar είναι μονωτικά, έχει περιορισθή εις τό ελάχιστον ή ανταλλαγή θερμότητος μεταξύ του έσωτερικου δοχείου (θερμιδομετρικου) και του έξωτερικου περιβάλλοντος.

Χύνομεν έντός του θερμιδομετρικου δοχείου 200 g ύδατος 20° C και έπειτα 100 g ύδατος 50° C και αναδευόμεν διά του αναδευτήρος.

Όταν άποκατασταθή θερμική ίσορροπία, σημειώομεν την τελικήν θερμοκρασίαν του μείγματος : 30° C.

Έξήγησις. Η θερμοκρασία των 200 g ύδατος εις τό δοχείον Dewar άνήλθεν από  $t_1=20^{\circ}C$  εις  $t_2=30^{\circ}C$ .

Τό ύδωρ τουτο άπερρόφησε ποσόν θερμότητος :  $Q_{cal}=m \times (t_2-t_1)=200 \text{ cal/}^{\circ}C \times (30^{\circ}C-20^{\circ}C)=2000 \text{ cal}$ .

Η θερμοκρασία των 100 g ύδατος, τό όποιον προσετέθη, κατήλθεν από  $t_1=50^{\circ}C$  εις  $t_2=30^{\circ}C$ .

Τό ύδωρ τουτο άπέδωσε ποσόν θερμότητος :  $Q' \text{ cal}=(t'_1-t_2) \times m=(50^{\circ}C-30^{\circ}C) \times 100 \text{ cal/}^{\circ}C=2000 \text{ cal}$

$$Q = Q'$$

## Μέθοδος των μειγμάτων και άρχή της ισότητος των ανταλλαγών (των ποσοτήτων θερμότητος).

Όταν θέσωμεν εις έπαφήν δύο σώματα διαφορετικων άρχικων θερμοκρασιων ούτως, ώστε νά δύνανται νά ανταλλάξουν θερμοτήτα μόνον μεταξύ των, τότε θα άποκατασταθή θερμική ίσορροπία και ή ποσότης θερμότητος, την όποιαν άπέδωσε τό έν εκ των σωμάτων, θα είναι ίση με την ποσότητα θερμότητος, την όποιαν άπερρόφησε τό έξτερον.

## 3 Ίσοδύναμον εις ύδωρ (θερμοχωρητικότης) ενός θερμιδομέτρου.

● Έν σύνθεσις θερμιδομέτρον (σχ. 5) περιέχει 300 g ύδατος θερμοκρασίας :-  $t_1=20,8^{\circ}C$ .

Τήν ίδίαν θερμοκρασίαν έχει και τό δοχείον του θερμιδομέτρου.

● Προσθέτομεν εις τό θερμιδομέτρον 200 g ύδα-



τος θερμοκρασίας  $t_1=42,4^\circ \text{C}$ , αναδεύομεν τὸ μείγμα καὶ σημειώομεν τὴν τελικὴν θερμοκρασία  $t_2=29,1^\circ \text{C}$ .

Τὸ ὕδωρ τοῦ θερμοδομέτρου ἀπερρόφησε :

$$Q_{\text{cal}}=300 \text{ cal/}^\circ \text{C} \times (29,1-20,8)^\circ \text{C}=2490 \text{ cal.}$$

Τὸ ὕδωρ, τὸ ὁποῖον προσετέθη εἰς τὸ θερμοδομέτρον, ἀπέδωσε :

$$Q'_{\text{cal}}=200 \text{ cal/}^\circ \text{C} \times (42,4-29,1)^\circ \text{C}=2660 \text{ cal.}$$

Τὰς 2490 cal ἀπερρόφησε τὸ ὕδωρ τοῦ θερμοδομέτρου, τὴν δὲ διαφορὰν :

$$2660 \text{ cal}-2490 \text{ cal}=170 \text{ cal}$$

ἀπερρόφησε τὸ ἴδιον τὸ θερμοδομέτρον (τοιχώματα, ἀναδευτήρ, θερμοόμετρον, κάλυμμα)

καὶ ἡ θερμοκρασία του ἀνήλθε κατὰ  $29,1^\circ-20,8^\circ=8,3^\circ \text{C}$ .

Διὰ νὰ ὑψωθῇ λοιπὸν ἡ θερμοκρασία τοῦ θερμοδομέτρου κατὰ  $1^\circ \text{C}$ , πρέπει τοῦτο νὰ ἀπορροφήσῃ

$$\frac{170 \text{ cal}}{8,3^\circ \text{C}} = 20 \text{ cal/}^\circ \text{C} \text{ περίπου,}$$

δηλαδὴ τὴν ποσότητα θερμότητος, τὴν ὁποῖαν ἀπορροφᾷ μᾶζα ὕδατος 20 g, διὰ νὰ ὑψωθῇ ἡ θερμοκρασία της κατὰ  $1^\circ \text{C}$ .

Τὸ θερμοδομέτρον λοιπὸν κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ πειράματος ἀπορροφεῖ τόσην ποσότητα θερμότητος, ὅσην θὰ ἀπερρόφει μᾶζα ὕδατος 20 g.

Τὸ ἰσοδύναμον εἰς ὕδωρ αὐτοῦ τοῦ θερμοδομέτρου εἶναι 20 g ὕδατος.

Εἰς ἐκάστην μέτρησιν ποσότητος θερμότητος δι' αὐτοῦ τοῦ θερμοδομέτρου πρέπει νὰ ὑπολογίζωμεν καὶ τὸ ἰσοδύναμον εἰς ὕδωρ.

**Συμπέρασμα :** Τὸ ἰσοδύναμον εἰς ὕδωρ ἐνὸς θερμοδομέτρου εἶναι ἡ μᾶζα τοῦ ὕδατος, ἡ ὁποία ἀπορροφᾷ τὸ αὐτὸ ποσὸν θερμότητος μετὰ τοῦ θερμοδομέτρου, διὰ νὰ ὑψωθῇ ἡ θερμοκρασία του ἐξ ἴσου μὲ τὴν θερμοκρασίαν τοῦ θερμοδομέτρου.

## ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ

1. Τὰ δύο ἐπαργρωμένα τοιχώματα, μεταξὺ τῶν ὁποίων ὑπάρχει κενὸν εἰς τὸ δοχεῖον Dewar, ἀποτελοῦν θερμοκὸν μονωτήν.

Τὸ ἔριον, ὁ βάμβαξ, τὰ πριονίδια τοῦ ξύλου εἶναι κακοὶ ἀγωγοὶ τῆς θερμότητος καὶ ἀποτελοῦν ἐπίσης θερμοκοὺς μονωτάς.

Τὸ θερμοδομέτρον εἶναι ἐν ὄργανον θερμοκῶς μεμονωμένον ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ περιβάλλοντος. Εἶναι ἐφοδιασμένον δι' ἐνὸς ἀναδευτήρος καὶ ἐνὸς εὐαισθήτου θερμομέτρου. Χρησιμεύει διὰ τὴν μέτρησιν ποσοτήτων θερμότητος, τὰς ὁποίας ἀποδίδει ἡ ἀπορροφᾷ ἐν σώμα.

2. Ἡ ἀρχὴ τῆς ἰσότητος τῶν ἀνταλλαγῶν (τῶν ποσοτήτων θερμότητος) ὡς εἰς τὴν σελ. 110.

## 40<sup>ON</sup> ΜΑΘΗΜΑ :


### ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΡΜΟΤΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ

#### 1. Παρατήρησις.


● Δύο ὅμοια δοχεῖα περιέχουν : τὸ ἐν 500 g ὕδατος καὶ τὸ ἕτερον 500 g ἐλαίου τῆς ἰδίας θερμοκρασίας  $18^\circ \text{C}$ .

Θερμαίνομεν βραδέως τὸ πρῶτον δοχεῖον διὰ τῆς φλογὸς μιᾶς λυχνίας φωταερίου ἢ οἰνοπνεύματος καὶ ἀναδεύομεν συνεχῶς τὸ ὕδωρ, σημειοῦντες ἀνὰ λεπτόν τὴν θερμοκρασίαν του.


Τὸ αὐτὸ πείραμα ἐκτελοῦμεν καὶ διὰ τοῦ δοχείου, τὸ ὁποῖον περιέχει τὸ ἐλαῖον, ὅποτε καταρτίζομεν τὸν κατωτέρω πίνακα :



Σχ. 1. Ἡ ἴδια πηγὴ θερμότητος ἀνυψᾷ ταχύτερον τὴν θερμοκρασίαν τοῦ ἐλαίου ἀπὸ τὴν θερμοκρασίαν τῆς ἰδίας μᾶζης ὕδατος.



Ίσοδυναμον εις ύδωρ του θερμομέτρου 20 g  
 Σχ. 2. Προσδιορισμός της ειδικής θερμότητας του αλουμινίου.



Σχ. 3: 1 θερμής ανυψώνει κατά 1° C την θερμοκρασίαν 1 g ύδατος ή  $\frac{1 \text{ cal}}{0.27 \text{ cal/g}} = 4.7 \text{ g αλουμινίου}$ .

- Ανασύρομεν το τεμάχιον και το βυθίζομεν άμέσως έντός του ύδατος του θερμομέτρου. Ή θερμοκρασία του θερμομέτρου άνέρχεται και όταν άποκατασταθῆ θερμική ίσορροπία, σημειώομεν την θερμοκρασίαν :  $t_2 = 21,9^\circ \text{C}$ .

**Ήξηγησις.** Το τεμάχιον του αλουμινίου κατά την στιγμήν της εξαγωγῆς του έκ του ύδατος έχει την ίδίαν μετ' αὐτοῦ θερμοκρασίαν:  $99^\circ \text{C}$ .

Όταν το βυθίσωμεν εις το θερμοδόμετρον, ἡ θερμοκρασία του κατέρχεται, διότι παραχωρεῖ θερμότητα εις το ψυχρὸν ύδωρ. Ἐπίσης του ύδατος ἡ θερμοκρασία άνέρχεται, έως ότου αἱ θερμοκρασίαι των ἔξισωθοῦν (θερμική ίσορροπία).

Κατά την άρχήν τῆς ισότητος των ανταλλαγῶν των ποσοτήτων θερμότητας θά ἔχωμεν :

$$\left. \begin{array}{l} \text{Ποσότης θερμότητας, τὴν ὁποίαν} \\ \text{ἀπερρόφησε τὸ ὕδωρ καὶ τὸ θερμοδόμετρον} \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{l} \text{Ποσότης θερμότητας, τὴν ὁποίαν} \\ \text{παρεχώρησε, τὸ αλουμίνιον.} \end{array} \right.$$

Το θερμοδόμετρον περιέχει 400 g ύδατος και τὸ ἰσοδυναμόν του, εις ύδωρ εἶναι 20 g.

Πρέπει λοιπόν νά ὑπολογίσωμεν ὅτι τὴν θερμότητα, τὴν ὁποίαν παραχωρεῖ τὸ τεμάχιον του αλουμινίου, τὴν ἀπορροφᾷ μᾶζα  $400 \text{ g} + 20 \text{ g} = 420 \text{ g}$  ύδατος και ἐπομένως :

Ποσότης θερμότητας, τὴν ὁποίαν ἀπορροφᾷ τὸ ὕδωρ και τὸ θερμοδόμετρον :

$$Q_{\text{cal}} = 420 \text{ cal/}^\circ\text{C} (21,9 - 17,8)^\circ \text{C} = 1722 \text{ cal}$$

Ποσότης θερμότητας, τὴν ὁποίαν παραχωρεῖ τὸ αλουμίνιον = 1722 cal.

Ή θερμοκρασία του αλουμινίου κατέρχεται κατά :

Χρόνος (mn)	0	1	2	3	4	5
ύδατος	18°	22°	26°	30°	34°	38°
Θερμοκρασία						
έλαιου	18°	26°	36°	46°	56°	66°

Παρατηροῦμεν ὅτι ἡ θερμοκρασία του έλαιου άνέρχεται ταχύτερον τῆς θερμοκρασίας του ύδατος.

Διὰ νά ἐπιτύχωμεν τὴν ίδίαν άνύψωσιν τῆς θερμοκρασίας εις δύο ἴσας μᾶζας ύδατος και έλαιου πρέπει νά προσφέρωμεν ὀλιγωτέραν θερμότητα εις τὸ έλαιον ἀπό ὄσῃν προσεφέραμεν εις τὸ ὕδωρ.

**Συμπέρασμα :** Ή άνύψωσις τῆς θερμοκρασίας ενός σώματος, λόγω τῆς ἐπ' αὐτοῦ ἀπορροφουμένης ποσότητος θερμότητος, ἐξαρτᾶται ἀπό τὴν φύσιν του σώματος.

## 2 Προσδιορισμός τῆς ειδικῆς θερμότητος ενός σώματος.

Εἰδικὴ θερμότης ενός σώματος στερεοῦ ἢ ὑγροῦ εἶναι ἡ ποσότης τῆς θερμότητος, τὴν ὁποίαν ἀπορροφᾷ ἢ μονὰς τῆς μᾶζης του σώματος, ὅταν ἡ θερμοκρασία του αὐξηθῆ κατά 1° C.

### A) Προσδιορισμός τῆς ειδικῆς θερμότητος του άργιλιου (άλουμινίου).

- Χύνομεν 400 g ύδατος έντός του θερμομέτρου και ἀναδεύομεν, ὥστε νά ἔξισωθῆ ἡ θερμοκρασία του ύδατος και τῶν ἔξαρθημάτων του θερμομέτρου και σημειώομεν αὐτὴν τὴν θερμοκρασίαν:  $t_1 = 17,8^\circ \text{C}$ .

- Στερεώομεν εις τὸ ἄκρον σύρματος ἐν τεμάχιον αλουμινίου, τὸ ὁποῖον προηγούμενως ἔχομεν ζυγίσει :  $m = 100 \text{ g}$ .

- Βυθίζομεν τὸ τεμάχιον του αλουμινίου εις ὕδωρ, τὸ ὁποῖον βράζει, και σημειώομεν τὴν θερμοκρασίαν του :  $t_1' = 99^\circ \text{C}$ .

$$t_1 - t_2 = 99^\circ\text{C} - 21,9^\circ\text{C} = 77,1^\circ\text{C}$$

καί, όταν ή θερμοκρασία του κατέρχεται κατά  $1^\circ\text{C}$ , τὸ 1 g τοῦ ἀλουμινίου παραχωρεῖ :

$$\frac{1722 \text{ cal}}{77,1^\circ\text{C} \times 100\text{g}} = 0,22 \text{ cal/g}^\circ\text{C}$$

Ἀντιθέτως, διὰ ν' ἀνυψώσωμεν τὴν θερμοκρασίαν 1 g ἀλουμινίου κατά  $1^\circ\text{C}$ , πρέπει νὰ τοῦ παραχωρήσωμεν 0,22 cal.

**Ἡ εἰδική θερμότης τοῦ ἀλουμινίου εἶναι :**

$$0,22 \text{ cal/g}^\circ\text{C}$$

**Β) Προσδιορισμὸς τῆς εἰδικῆς θερμότητος τοῦ πετρελαίου.**

Ἀντικαθιστῶμεν τὸ ὕδωρ τοῦ θερμοδόμετρον διὰ 300 g πετρελαίου, θερμοκρασίας  $t_1 = 18,3^\circ\text{C}$ .

Βυθίζομεν ἐντὸς αὐτοῦ τὸ τεμάχιον τοῦ ἀλουμινίου, τὸ ὅποιον προηγουμένως ἔχομεν θερμάνει εἰς τοὺς  $60^\circ\text{C}$  (ἐντὸς ὕδατος  $60^\circ\text{C}$ ), καί σημειώνομεν τὴν τελικὴν θερμοκρασίαν τοῦ θερμοδόμετρον :  $t_2 = 23^\circ\text{C}$ .

Τὸ ἀλουμίνιον παρεχώρησε ποσὸν θερμότητος :

$$Q_{\text{cal}} = 0,22 \times 100 \text{ g} (60 - 23)^\circ\text{C} = 814 \text{ cal}$$

Ἐκ τοῦ ποσοῦ τούτου τὸ θερμοδόμετρον ἀπερρόφησεν :

$20 \text{ cal/}^\circ\text{C} (23 - 18,3)^\circ\text{C} = 94 \text{ cal}$  ( $20 \text{ cal/}^\circ\text{C}$  τὸ ἰσοδύναμον εἰς ὕδωρ τοῦ θερμοδόμετρον), τὸ δὲ πετρελαίον ἀπερρόφησεν :

$$814 \text{ cal} - 94 \text{ cal} = 720 \text{ cal}$$

Ὅταν λοιπὸν ή θερμοκρασία ἀνέρχεται κατά  $23^\circ\text{C} - 18,3^\circ\text{C} = 4,7^\circ\text{C}$ , τὰ 300 g τοῦ πετρελαίου ἀπορροφῶν 720 cal.

Ὅταν ή θερμοκρασία ἀνέρχεται κατά  $1^\circ\text{C}$ , τὸ 1 g τοῦ πετρελαίου ἀπορροφῶν :

$$\frac{720 \text{ cal}}{4,7^\circ\text{C} \times 300 \text{ g}} = 0,5 \text{ cal/g}^\circ\text{C}$$

**Ἡ εἰδική θερμότης τοῦ πετρελαίου εἶναι :**

$$0,5 \text{ cal/g}^\circ\text{C}$$

### 3 Τύπος.

Ἐάν  $c$  εἶναι ή εἰδική θερμότης ἐνὸς σώματος, τότε, διὰ νὰ ὑψώσωμεν κατά  $1^\circ\text{C}$  τὴν θερμοκρασίαν μάζης  $m$  g τοῦ σώματος, πρέπει νὰ παραχωρήσωμεν :  $c \times m$  cal.

Διὰ νὰ ὑψώσωμεν τὴν θερμοκρασίαν τοῦ σώματος αὐτοῦ ἀπὸ  $t_1^\circ\text{C}$  εἰς  $t_2^\circ\text{C}$ , πρέπει νὰ τοῦ παραχωρήσωμεν :

$$Q = c \times m \times (t_2 - t_1)$$

cal    cal/g<sup>o</sup>C                      g                      °C


**Παρατήρησις.** Ἡ εἰδική θερμότης παντὸς καθυῶστου σώματος ἀποτελεῖ φυσικὴν σταθερὰν τοῦ σώματος τούτου.

Ἡ εἰδική θερμότης τοῦ ὕδατος ἔχει ὀρισθῆ ἴση πρὸς 1 cal/g<sup>o</sup>C.

Ἐξ ὄλων τῶν σωμάτων τὸ ὕδωρ παρουσιάζει τὴν μεγαλυτέραν εἰδικὴν θερμότητα. Διὰ τὴν ἴδιαν δηλ. ἀνύψωσιν θερμοκρασίας καὶ τὴν ἴδιαν μᾶζαν τὸ ὕδωρ ἀπορροφᾷ μεγαλυτέραν ποσότητα θερμότητος ἔξ ὄλων τῶν ἄλλων σωμάτων.

Τὴν θερμότητα αὐτὴν ἀποβάλλει, ὅταν ψύχεται. Διὰ τὸν λόγον αὐτὸν οἱ ὠκεανοί, αἱ θάλασσα, αἱ λίμναι, ρυθμίζουν τὴν θερμοκρασίαν ἐνὸς τόπου.

Διὰ τὸν ὡς ἄνω λόγον χρησιμοποιοῦμεν τὸ ὕδωρ ὡς ἀποθήκην θερμότητος (θερμοφῶραι) ἢ διὰ τὴν μεταφορὰν θερμότητος (Κεντρικὴ θέρμανσις, ψυεῖς κινητήρων κλπ.).



Σχ. 5.

Εἰδική θερμότης κατὰ γραμμάριον καὶ βαθμῶν C		
Μολυβδος	0,03	Ἐδάργουρος 0,033
Κασσίτερος	0,05	Ἐλαίον 0,3
Χαλκός	0,095	Βενζίνη 0,45
Σιδήρως	0,11	Πετρελαίον 0,5
Ἀλουμίνιον	0,21	Οἰνόπνευμα 0,58
Πάγος	0,5	Ἐδωρ 1

## ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ

1. Η αύξησης της θερμοκρασίας ενός σώματος διά του αυτού ποσού θερμότητος εξαρτάται από την φύσιν του σώματος.

2. Ειδική θερμότης ενός σώματος στερεού ή υγρού καλείται ή ποσότης της θερμότητος, την οποίαν απορροφά ή μονάς της μάζης του σώματος, όταν ή θερμοκρασία του ανέλθη κατά  $1^{\circ}\text{C}$ .

Η ειδική θερμότης ενός καθαρού σώματος αποτελεί φυσική σταθεράν του σώματος αυτού.

3. Η ειδική θερμότης του ύδατος είναι  $1\text{cal/g}^{\circ}\text{C}$ . Το ύδωρ είναι το σώμα, το όποιον παρουσιάζει την μεγαλύτεραν ειδικήν θερμότητα.

41<sup>ON</sup> ΜΛΘΗΜΑ :

## ΘΕΡΜΟΤΗΣ ΚΑΥΣΕΩΣ ΕΝΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

### 1 Παρατήρησις.

Διά την παρασκευήν τών φαγητῶν, την θέρμανσιν τών διαμερισμάτων κ.τ.λ. χρησιμοποιούμεν την θερμότητα, την οποίαν παράγει ἕν καύσιμον. Ὑπάρχουν στερεά, ὑγρά καὶ ἀέρια καύσιμα (ἄνθρακες, πετρέλαιον, φωταέριον). Ἀπὸ τὰ καύσιμα, τὰ ὅποια χρησιμοποιοῦμεν, ἄλλα θερμαίνον περισσότερο καὶ ἄλλα ὀλιγώτερον.

Οὕτω διά την ἀνύψωσιν τῆς θερμοκρασίας 50 kg ὕδατος ἀπὸ  $10^{\circ}\text{C}$  εἰς  $60^{\circ}\text{C}$ , ἐντός συνήθους μαγειρικοῦ σκεύους, πρέπει νὰ χρησιμοποιήσωμεν περίπου 1 Kg ἄνθρακος ἢ 2 Kg ξηρῶν καυσοξύλων ἢ 4 Kg ὑγρῶν καυσοξύλων.

Λέγομεν ὅτι ἡ θερμική δύναμις τοῦ ἄνθρακος εἶναι μεγαλύτερα ἀπὸ την τοῦ ξηροῦ καυσοξύλου καὶ τοῦ ξηροῦ καυσοξύλου μεγαλύτερα ἀπὸ την τοῦ ὑγροῦ.

**Θερμότης καύσεως** καλεῖται τὸ ποσὸν τῆς θερμότητος, τὸ ὅποιον ἀποδίδει 1 Kg καύσιμον, ὅταν τοῦτο καῖ ἐντελῶς, ἐὰν αὐτὸ εἶναι στερεόν ἢ ὑγρὸν, ἢ  $1\text{ m}^3$  ἐὰν εἶναι ἀέριον (ὑπὸ κανονικῆς συνθήκας θερμοκρασίας καὶ πιέσεως).

Ἡ θερμότης καύσεως ἢ ἡ θερμική δύναμις ἐκφράζεται εἰς Kcal ἀνὰ χιλιόγραμμον ἢ κυβικόν μέτρον τοῦ καύσιμου. Προκειμένου δὲ περὶ ἀερίου, ἐκφράζεται εἰς Mcal (τονοθεριμίδας).

### 2 Προσδιορισμὸς τῆς θερμότητος καύσεως.

Α) Ἐνὸς στερεοῦ ἢ ὑγροῦ. Πρὸς τὸν σκοπὸν αὐτὸν χρησιμοποιοῦμεν θερμιδόμετρον με ὕδωρ (σχ. 1), ἐντὸς τοῦ ὁποίου βυθίζομεν τὴν *θερμιδομετρικὴν ὀβίδα*. Αὕτη εἶναι δοχεῖον με παχέα τοιχώματα, τὸ ὅποιον κλείει διὰ κοχλιωτοῦ σκεπάσματος.

Περιέχει πεπιεσμένον ὀξυγόνον διὰ τὴν καύσιν καὶ χωνευτήριον, φέρον ἕν γραμμάριον ἐκ τοῦ καύσιμου, τοῦ ὁποίου θέλομεν νὰ προσδιορίσωμεν τὴν θερμότητα καύσεως.


Ἡ ἀνάφλεξις γίνεται τῇ βοηθείᾳ ἡλεκτρικῆς ἀντιστάσεως.

**Παράδειγμα.** Διὰ νὰ προσδιορίσωμεν τὴν θερμότητα καύσεως τοῦ ἄνθρακος, ἐργαζόμεθα κατὰ τὸν ἀκόλουθον τρόπον :

Ζυγίζομεν ἕν γραμμάριον ἐξ αὐτοῦ καὶ τὸ τοποθετοῦμεν εἰς τὸ χωνευτήριον τῆς θερμιδομετρικῆς ὀβίδος.

Ἡ ὀβίς ἀποτελεῖται ἐκ χάλυβος καὶ ζυγίζει 4 Kg. Τὸ θερμιδόμετρον περιέχει 2,5 l ὕδατος καὶ τὸ ἰσοδύναμόν του εἰς ὕδωρ εἶναι 100 g.

Ἡ *ειδική θερμότης τοῦ χάλυβος* εἶναι :  $0,1\text{cal/g}^{\circ}\text{C}$ .



Σχ. 1. Ὀβίς θερμιδομετρικὴ διὰ τὸν προσδιορισμὸν τῆς θερμότητος καύσεως ἑνὸς καύσιμου στερεοῦ ἢ ὑγροῦ.

Ἡ θερμοκρασία ἐντὸς τοῦ θερμομέτρου πρὸ τῆς καύσεως :  $t_1=17,4^\circ\text{C}$ · μετὰ τὴν καύσιν:  $t_2=20,1^\circ\text{C}$  καὶ ἡ ἀνύψωσις τῆς θερμοκρασίας  $t_2-t_1=20,1^\circ\text{C}-17,4^\circ\text{C}=2,7^\circ\text{C}$ .

Ἡ καύσις τοῦ ἀνθρακος ἐντὸς τῆς ὀβίδος ἐδημιούργησε μίαν ποσότητα θερμότητος, ἡ ὁποία ἐπέφερε τὴν ἀνύψωσιν τῆς θερμοκρασίας τοῦ θερμομέτρου.

Τὴν ποσότητα αὐτὴν τῆς θερμότητος τὴν ἀπερρόφησαν :

-ἡ θερμομετρικὴ ὄβις, τῆς ὁποίας τὸ ἰσοδύναμον εἰς ὕδωρ εἶναι :  $4000\text{ g} \times 0,1\text{ cal/g}^\circ\text{C}=400\text{ cal/}^\circ\text{C}$ , τὸ ὅποιον ἰσοδυναμεῖ πρὸς 400 g ὕδατος.

-Τὸ θερμοδόμετρον τοῦ ὁποίου τὸ ἰσοδύναμον εἰς ὕδωρ εἶναι 100 g καὶ

-τὰ 2500 g ὕδατος, δηλ. ἐν σύνολον 3000 g ὕδατος :

$$Q\text{ cal}=m\text{ cal/}^\circ\text{C} \times (t_2-t_1)^\circ\text{C}=3000 \times 2,7\text{ cal}=8100\text{ cal.}$$

Ἡ καύσις ἐνὸς Kg παρέχει :  $8100\text{ cal} \times 1000=8.100.000\text{ cal}$  καὶ ἡ θερμότης καύσεως τοῦ δείγματος εἶναι :

$8.100.000\text{ cal/Kg}$  ἢ  $8100\text{ Kcal/Kg}$ .

Θερμότης καύσεως τῶν σπουδαιοτέρων καυσίμων

Στερεὰ	Kcal/Kg	Ἰγρὰ	Kcal/Kg	Ἀέρια	Kcal/m <sup>3</sup>
Ξύλα ξηρὰ	3000	Βενζίνη αὐτοκινήτου	11000	Φωταέριον	4250
Ἀνθραξ	7500	Πετρέλαιον	10500	Φυσικὸν αέριον	9300
		Μαζοῦτ	10000	Προπάνιον	22500
Κόκ	7000	Οὐλόπνευμα	7000	Βουτάνιον	28000
Ἀνθρακίτης	7860	Βενζόλιον	10000	Ἀσετυλίνη	12000

## Β) Ἐνὸς ἀερίου καυσίμου.

Ἡ ἀξία τοῦ φωταερίου καθορίζεται ἐκ τῆς ποσότητος θερμότητος, τὴν ὁποίαν ἀποδίδει, ὅταν καίεται, δηλ. τῆς θερμότητος καύσεώς του, ἡ ὁποία προσδιορίζεται κατὰ τὴν ἔξοδόν του ἐκ τοῦ ἐργοστασίου παραγωγῆς.

Ἀνάπτομεν τὸ φωταέριον εἰς ἕν εἰδικὸν ἀκροφύσιον (μπέκ), τὸ ὁποῖον περιβάλλεται διὰ μονωτικῶν τοιχωμάτων. Τὴν θερμότητα, ἡ ὁποία δημιουργεῖται ἐκ τῆς καύσεως τοῦ φωταερίου, τὴν ἀπορροφᾷ ἐν ρεῦμα ὕδατος, τὸ ὁποῖον κυκλοφορεῖ εἰς τὰς σωληνώσεις τοῦ ὄργανου.


Σημειώνομεν τὴν θερμοκρασίαν τοῦ ὕδατος εἰς τὴν εἰσοδὸν καὶ εἰς τὴν ἔξοδον τῆς συσκευῆς (σχ. 2).

Ὁ ὄγκος  $V\text{ m}^3$  τοῦ φωταερίου, τὸ ὁποῖον ἔκαη ἐντὸς ὀρισμένου χρόνου, σημειώνεται ἀπὸ ἕνα μετρητὴν.

Μετροῦμεν καὶ τὴν μᾶζαν  $M$  εἰς Kg τοῦ ὕδατος, τὸ ὁποῖον ἐθερμάνθη ἐντὸς τοῦ αὐτοῦ χρονικοῦ διαστήματος.

Ἄν ἡ θερμοκρασία τοῦ ὕδατος εἰς τὴν εἰσοδὸν καὶ εἰς τὴν ἔξοδον τῆς συσκευῆς εἶναι  $t_1$  καὶ  $t_2$ , τὸ ποσὸν τῆς θερμότητος  $Q$  Kcal, τὸ ὁποῖον ἀποβάλλεται κατὰ τὴν καύσιν  $1\text{ m}^3$ , δίδεται ὑπὸ τοῦ τύπου :

$$Q\text{ Kcal} = \frac{M\text{ Kcal/}^\circ\text{C} (t_2^\circ\text{C} - t_1^\circ\text{C})}{V\text{ m}^3}$$



Σχ. 2. Προσδιορισμὸς τῆς θερμότητος καύσεως αἰρίου.

## ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ

1. Θερμότης καύσεως ἐνὸς καυσίμου καλεῖται τὸ ποσὸν τῆς θερμότητος, τὸ ὁποῖον ἀποβάλλεται κατὰ τὴν πλήρη καύσιν  $1\text{ kg}$  ἐξ αὐτοῦ τοῦ καυσίμου, ἂν τοῦτο εἶναι στερεὸν ἢ ὑγρὸν, ἢ ἐξ  $1\text{ m}^3$ , ἂν τοῦτο εἶναι ἀέριον (ὑπὸ κανονικὰς συνθήκας θερμοκρασίας καὶ πίεσεως).

2. Ἡ θερμότης καύσεως ἐνὸς καυσίμου ἐκφράζεται εἰς Kcal ἀνά kg (διὰ τὰ στερεὰ καὶ ὑγρά) ἢ εἰς Kcal ἀνά κυβικὸν μέτρον διὰ τὰ ἀέρια).

## Σειρά 10 : Ποσότης θερμότητας – Θερμιδομετρία.

## I. Ποσότης θερμότητας

1. Θερμαίνουμεν διά σταθεράς πηγής θερμότητος 300 g ύδατος καὶ σημειώνομεν τὴν θερμοκρασίαν του ἀνὰ πᾶν λεπτόν. Ἐκ τῶν τιμῶν, τὰς ὁποίας λαμβάνομεν, καταρτίζομεν τὸν κατωτέρω πίνακα :

mn	0	1	2	3	4	5	6
C°	27°	33°	38°	42°	47°	50°	54°
mn	7	8	9	10	11	12	13
C°	57°	61°	64°	68°	71°	76°	77°

α) Νὰ παρασταθοῦν γραφικῶς αἱ μεταβολαὶ τῆς θερμοκρασίας τοῦ ὕδατος συναρτήσει τοῦ χρόνου. Ὁ χρόνος εἰς τὸν ἄξονα OX : 1 cm 2mn καὶ ἡ θερμοκρασία εἰς τὸν ἄξονα OY : cm 20° C.

β) Πόσῃν θερμότητι προσέλαβε τὸ ὕδωρ, διὰ νὰ ὑψωθῇ ἡ θερμοκρασία του ἀπὸ 27° C εἰς 61° C ;

γ) Ἐὰν ὑποθέσωμεν ὅτι ὁλόκληρος ἡ ποσότης θερμότητος χρησιμοποιεῖται πρὸς ἀνύψωσιν τῆς θερμοκρασίας τοῦ ὕδατος, ποία εἶναι ἡ παροχὴ τῆς θερμικῆς πηγῆς εἰς cal/mn ;

2. 500 g ὕδατος, θερμοκρασίας 22° C, ἀπορροφῶν ποσὸν θερμότητος 12.500 cal. Ποία εἶναι ἡ τελικὴ θερμοκρασία τοῦ μείγματος ;

3. Ἐντὸς θερμιδομέτρου, τὸ ὅποιον περιέχει 1 l ὕδατος 20° C, ρίπτομεν 500 g ὕδατος 70° C : Ποία εἶναι ἡ τελικὴ θερμοκρασία τοῦ μείγματος ;

4. Ποίαν μᾶζαν ὕδατος 18° C πρέπει νὰ ριψώμεν ἐντὸς λουτήρος, περιέχοντος 45 l ὕδατος 60° C, διὰ νὰ λάβωμεν τελικῶς ὕδωρ 36° C ;

5. Ἡ ἀντίστασις ἠλεκτρικοῦ βραστήρος ἀποδίδει 120 cal ἀνὰ δευτερόλεπτον.


Ἐὰν ὁ βραστήρ περιέχῃ 0,75 l ὕδατος ἀρχικῶς θερμοκρασίας 20° C καὶ ἀπορροφᾷ τὰ 80 % τῆς προσφερομένης θερμότητος, πόσος χρόνος ἀπαιτεῖται, διὰ νὰ ὑψωθῇ ἡ θερμοκρασία τοῦ ὕδατος εἰς τοὺς 100° C ;

6. Διὰ νὰ ἔχωμεν 120 l ὕδατος 32° C, ἀναμειγνύομεν ψυχρὸν ὕδωρ 15° C μετὰ θερμῶ 55° C. Πόσον ψυχρὸν καὶ πόσον θερμὸν ὕδωρ πρέπει νὰ λάβωμεν ;

## II. Τὸ θερμιδόμετρον

7. Διὰ νὰ ὑπολογίσωμεν τὴν ἀπώλειαν θερμότητος εἰς ἓν θερμιδόμετρον, ἐκτελοῦμεν τὸ ἑξῆς πείραμα : Ρίπτομεν εἰς τὸ θερμιδόμετρον 500 g ὕδατος 49° C καὶ λαμβάνομεν τὴν θερμοκρασίαν του ἀνὰ ἡμίσειαν ὥραν. Ἐπαναλαμβάνομεν τὸ ἴδιον πείραμα διὰ θερμιδομέτρου, ἐφοδιασμένου διὰ περιβλήματος καὶ καλύμματος. Μὲ τὰς λαμβανόμενας τιμὰς καταρτίζομεν τὸν κατωτέρω πίνακα :

Χρόνος (mn)	Θερμιδόμετρον διὰ περιβλήματος	Θερμιδόμετρον ἀνευ περιβλήματος
0	49° C	49° C
30	38,5° C	44° C
60	31,4° C	40° C
90	27,7° C	37° C
120	25,2° C	33,5° C
150	23,5° C	31,5° C
180	22,3° C	29,8° C
210	21° C	28,8° C



Μετρητῆς θερμιδῶν.

Εἰς τὰς μεγάλας ἐγκαταστάσεις κεντρικῆς θερμάνσεως χρησιμοποιοῦνται «μετρηταὶ θερμιδῶν» (ὅπως οἱ γνωστοὶ μετρηταὶ ἠλεκτρικοῦ ρεύματος, ὕδατος καὶ φωταερίου).

Εἰς τὴν εἰκόνα φαίνονται δύο βαθμολογήσεις. Εἰς τὴν ἐπάνω βαθμολογήσιν ὁ μετρητῆς παροχῆς σημειώνει τὸ ἄβροισμα τῆς καταναλισκομένης θερμότητος εἰς ὠριαία τονοθερμιδᾶς. Ἀντιθέτως, διὰ τῆς βαθμολογήσεως τοῦ κέντρου δυνάμεθα νὰ ἔχωμεν ἀνὰ πάσαν στιγμὴν τὴν τιμὴν τῆς θερμικῆς ροῆς εἰς τονοθερμιδᾶς ἀνὰ ὥραν.

Νά παρασταθῆ γραφικῶς ἡ πτώσις τῆς θερμοκρασίας εἰς ἕκαστον θερμοδόμετρον συναρτησάμεν τοῦ χρόνου (εἰς τὸν ἄξονα ΟΧ :  $1 \text{ cm} = 30 \text{ mn}$  μὲ ἀρχὴν τὸ 0 καὶ ἡ θερμοκρασία εἰς τὸν ΟΥ' :  $1 \text{ cm} = 5^\circ \text{ C}$  καὶ ἀρχὴν  $20^\circ \text{ C}$ ).

Συμφωνῶς πρὸς τὸν πίνακα νά ὑπολογισθῆ εἰς  $\text{cal/g}$  ἡ ἀπώλεια θερμότητος, καθ' ἑκάστην ὥραν, τοῦ ὕδατος τοῦ θερμοδόμετρου: α) ἀνευ καλύμματος καὶ β) μετὰ καλύμματος.

8. Χύτρα (κατασάρζα) ἔχει χωρητικότητά 1,1/. Πληρῶμεν αὐτήν ὕδατος, θερμοκρασίας  $90^\circ \text{ C}$  καὶ ἡ θερμοκρασία ἰσορροπεῖ εἰς τοὺς  $85^\circ \text{ C}$ :

α) Πόσῃν θερμότητᾳ ἀπερρόφησαν ἡ χύτρα, ἀν ἡ ἀρχικὴ θερμοκρασία τῆς ἡτο  $15^\circ \text{ C}$ ;

β) Νά ὑπολογισθῆ τὸ ἰσοδύναμον εἰς ὕδωρ τῆς χύτρας.

γ) Νά ὑπολογισθῆ ἡ ποσότης θερμότητος, ἡ ὅποια ἀποδίδεται, ὅταν ἡ θερμοκρασία τοῦ ὕδατος κατέρχεται ἀπὸ  $85^\circ \text{ C}$  εἰς  $25^\circ \text{ C}$ .

9. Ἐντὸς θερμοδόμετρου, τὸ ὅποιον ἔχει ἰσοδύναμον εἰς ὕδωρ 18 g καὶ περιέχει 200 g ὕδατος  $15^\circ \text{ C}$ , ρίπτομεν 240 g ὕδατος  $45^\circ \text{ C}$ . Ποία εἶναι ἡ τελικὴ θερμοκρασία του;

10. Ἐντὸς θερμοδόμετρου, τὸ ὅποιον ἔχει ἰσοδύναμον εἰς ὕδωρ 20 g καὶ περιέχει 580 g ὕδατος  $12^\circ \text{ C}$ , βυθίζομεν ἐπ' ὀλίγον ηλεκτρικὴν ἀντίστασιν, ὅποτε ἡ τελικὴ θερμοκρασία γίνεται  $20^\circ \text{ C}$ .

Ποίον ποσὸν θερμότητος ἀπέδωκεν ἡ ἀντίστασις;

### III. Εἰδικὴ θερμότης

11. Πόσῃν θερμότητᾳ ἀπαιτεῖ 1 l ὑδαργύρου, διὰ νά ὑψωθῆ ἡ θερμοκρασία του ἀπὸ  $18^\circ \text{ C}$  εἰς  $60^\circ \text{ C}$  : (Πυκνότης ὑδαργύρου:  $13,6 \text{ g/cm}^3$ , εἰδικὴ θερμότης ὑδαργύρου  $0,033 \text{ cal/g}^\circ \text{ C}$ ).

12. Χύτρα (κατασάρζα) εἰς ἀλουμινίου, εἰδικῆς θερμότητος  $0,21 \text{ cal/g}^\circ \text{ C}$ , ζυγίζει 360 g:

α) Ποίον εἶναι τὸ ἰσοδύναμον αὐτῆς εἰς ὕδωρ;

β) Πόσῃν θερμότητᾳ ἀπορροφᾷ, ὅταν ἡ θερμοκρασία τῆς ἀνέλθῃ ἀπὸ  $15^\circ \text{ C}$  εἰς  $100^\circ \text{ C}$ ;

13. Ἡ πλῆξ τοῦ ηλεκτρικοῦ σιδήρου σιδηρώματος ζυγίζει 1 Kg καὶ ἔχει εἰδικὴν θερμότητά  $0,1 \text{ cal/g}^\circ \text{ C}$ .

Πόσος χρόνος ἀπαιτεῖται, διὰ νά ὑψωθῆ ἡ θερμοκρασία τῆς πλῆκός κατὰ  $50^\circ \text{ C}$ , ἐάν ἡ ηλεκτρικὴ

ἀντίστασις παρέχῃ εἰς τὴν πλῆκα  $120 \text{ cal}$  ἀνὰ δευτερόλεπτον:

14. Εἰς κενὸν ὀρειχάλκινον δοχεῖον, μάζης 50 g καὶ θερμοκρασίας  $10^\circ \text{ C}$ , ρίπτομεν 20 g ὕδατος θερμοκρασίας  $50^\circ \text{ C}$ , ὅποτε ἡ τελικὴ θερμοκρασία γίνεται  $42^\circ \text{ C}$ :

α) Πόσῃν θερμότητᾳ ἀπερρόφησαν ὁ ὀρειχάλκος;

β) Ποία εἶναι ἡ εἰδικὴ θερμότης του;

15. Διὰ διπλῆς ζυγίσιας προσδιορίζομεν τὴν μάζαν ἐνὸς σιδήρου τεμαχίου ὡς ἑξῆς: 1. Τὸ σιδηρῶν τεμάχιον + 140 g ἰσορροπεῖ τὸ ἀόβαρον. 2. Τὸ ἀόβαρον ἰσορροπεῖ 220 g:

α) Ποία ἡ μάζα τοῦ σιδήρου τεμαχίου;

β) Βυθίζομεν τὸ τεμάχιον εἰς λεκάνην ὕδατος  $100^\circ \text{ C}$  καὶ ὁμῶς ἐπιτα εἰς θερμοδόμετρον, τοῦ ὁποίου τὸ συνολικὸν ἰσοδύναμι πρὸς 500 g ὕδατος, θερμοκρασίας  $20^\circ \text{ C}$ .

Ἄν ἡ τελικὴ θερμοκρασία εἶναι  $21,4^\circ \text{ C}$ , ποία εἶναι ἡ εἰδικὴ θερμότης τοῦ σιδήρου;

### IV. Θερμότης καύσεως ἐνός καυσίμου

16. 1 Kg ἀνθρακίτου κοστίζει 2 δραχμάς καὶ ἀποδίδει κατὰ τὴν καύσιν 8.000 Kcal. Ὅμως ἡ συσκευή, εἰς τὴν ὅποιαν γίνεται ἡ καύσις, ἔχει ἀπώλειαν ἀνερχομένην εἰς 30% αὐτῆς τῆς θερμότητος. Ἐὰν χρησιμοποιοῦμεν καθ' ἑκάστην ἡμέραν 20 l ὕδατος, τὸ ὅποιον θερμαίνεται αὐτῆ ἡ συσκευὴ ἀπὸ  $12^\circ \text{ C}$  εἰς  $80^\circ \text{ C}$ , ποία εἶναι ἡ καταναλώσις εἰς ἀνθρακίτην καὶ ποσα τὰ ἡμερησία ἐξῆθα:

17. α) Πόσον ὄγκον φωταερίου πρέπει νά καύσωμεν, διὰ νά ὑψώσωμεν τὴν θερμοκρασίαν 800 l ὕδατος ἀπὸ  $15^\circ \text{ C}$  εἰς  $40^\circ \text{ C}$ ;

Ἡ θερμικὴ δύναμις τοῦ φωταερίου εἶναι 5.000 Kcal/m<sup>3</sup>.

β) Ἐὰν εἰς τὴν πραγματικότητά ἀπαιτοῦνται 12 m<sup>3</sup> φωταερίου, ποία εἶναι ἡ ἀπόδοσις τῆς συσκευῆς;

18. Ἐν χαλκίνῳ δοχεῖον μάζης 2 Kg περιέχει 5 l ὕδατος θερμοκρασίας  $10^\circ \text{ C}$ . Θέλομεν νά ἀνυψώσωμεν τὴν θερμοκρασίαν του εἰς τοὺς  $80^\circ \text{ C}$  χρησιμοποιοῦντες φωταερίον. Ποσα m<sup>3</sup> φωταερίου θὰ καταναλώσωμεν ὑπὸ τὴν προϋποθέσιν ὅτι δέν υπάρχουν ἀπώλειαι:

Ἡ εἰδικὴ θερμότης χαλκοῦ:  $0,1 \text{ cal/g}^\circ \text{ C}$ , θερμότης καύσεως φωταερίου: 5.000 Kcal/m<sup>3</sup>.

420N καὶ 430N ΜΑΘΗΜΑ

ΤΗΞΙΣ - ΠΗΞΙΣ

### 1 Παρατήρησις.


Ἐὰν θερμάνωμεν τεμάχιον μολύβδου ἐντὸς σιδηροῦ κοχλιαρίου, παρατηροῦμεν ὅτι ἐντὸς μικροῦ χρονικοῦ διαστήματος ὁ μολύβδος μεταβάλλεται ἀπὸ στερεὸν εἰς ὑγρὸν (σχ. 1).

Τὸ φαινόμενον τοῦτο, δηλ. ἡ μετάβασις ἐνός σώματος ἐκ τῆς στερεᾶς εἰς ὑγρὰν κατάστασιν, καλεῖται τήξις.

Ἐὰν ἀφήσωμεν τὸν ἐν ὑγρᾷ καταστάσει μολύβδον νά ψυχθῆ, παρατηροῦμεν ὅτι γίνεται καὶ πάλιν στερεός, δηλ. πηξίσει. Τὸ φαινόμενον τοῦτο λεγεται πηξίς τοῦ σώματος.


Ἐὰν εἰς τὴν φλόγα μῆδς λυχνίας Bunsen θερμάνωμεν ὑάλινον σωλῆνα, θὰ παρατηρήσωμεν ὅτι ἡ ὑάλος κατ' ἀρχὰς μαλακώνει, ὅποτε δύναται νά μηκυνθῆ ἢ νά λυγίσῃ, ἐφ' ὅσον δὲ ἡ θερμοκρασία αὐξηθῆ, δύναται καὶ νά τακθῆ.

Ἡ τήξις, τὴν ὁποίαν ὑφίσταται ὁ μολύβδος, λέ-




Σχ. 1. Ἡ τήξις τοῦ μολύβδου εἶναι κρυσταλλικῆ.

A) Τήξις B) Στερεοποίησης (πηξίς)



Σχ. 2. Ἡ ὑάλος ὑφίσταται πλαστικὴν τήξις.



Σχ. 3. Τήξις ναφθαλίνης

## 2 Πείραμα.


Α) Πραγματοποιούμεν τὴν διάταξιν τοῦ σχ. 3. Ὁ ἐσωτερικὸς σωλὴν περιέχει ναφθαλίνην εἰς κόνιν, ἐντὸς αὐτοῦ δὲ ἔχομεν τοποθετησὶ καὶ ἓν θερμομετρον.

● Θερμαίνομεν τὸ ὕδωρ τοῦ ἐξωτερικοῦ δοχείου καὶ σημειώνομεν τὴν θερμοκρασίαν τῆς ναφθαλίνης ἀνά 2 mn.


χρόνος εἰς mn	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
θερμοκρασία ναφθαλίνης	18	23	30	38	52	66	75	80	80	80	80	93	98
	σ τ ε ρ ε ὶ ο ν							σ τ ε ρ ε ὶ ο ν + ὑ γ ρ ὶ ο ν τ ῆ ξ ι ς				ὑ γ ρ ὶ ο ν	

● Τοποθετοῦμεν τὴν συσκευὴν ἐντὸς ψυχροῦ ὕδατος καὶ σημειώνομεν τὰς θερμοκρασίας τῆς ναφθαλίνης, ὡς καὶ προηγουμένως.

χρόνος εἰς mn	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
θερμοκρασία ναφθαλίνης	98	95	90	84	80	80	80	80	76	70	65
	ὑ γ ρ ὶ ο ν				ὑ γ ρ ὶ ο ν + σ τ ε ρ ε ὶ ο ν π ῆ ξ ι ς				σ τ ε ρ ε ὶ ο ν		



Σχ. 4. Γραφικὴ παράστασις τήξεως



Γραφικὴ παράστασις πήξεως

Β) Θέτομεν θερμομετρον ἐντὸς θρυμμάτων πάγου, ὁ ὁποῖος τήκεται. Παρατηροῦμεν ὅτι καθ' ὅλην τὴν διάρκειαν τῆς τήξεως τοῦ πάγου ἡ θερμοκρασία του παραμένει σταθερὰ εἰς τοὺς 0° C.



### Νόμοι τῆς τήξεως καὶ πήξεως.

α) Ὑπὸ σταθερὰν πίεσιν ἐν καθαρὸν σῶμα τήκεται εἰς ὠρισμένην θερμοκρασίαν, ἢ ὅποια λέγεται **σημεῖον τήξεως**.

Ἡ θερμοκρασία αὕτη παραμένει σταθερὰ καθ' ὅλην τὴν διάρκειαν τῆς τήξεως τοῦ σώματος.

β) Ὑπὸ σταθερὰν πίεσιν ἐν καθαρὸν σῶμα πήγνυται εἰς ὠρισμένην θερμοκρασίαν, ἢ ὅποια λέγεται **σημεῖον πήξεως**.

Ἡ θερμοκρασία αὕτη παραμένει σταθερὰ καθ' ὅλην τὴν διάρκειαν πήξεως τοῦ σώματος.

Τὸ σημεῖον τήξεως ἐνὸς σώματος εἶναι τὸ αὐτὸ μὲ τὸ σημεῖον πήξεως καὶ ἀποτελεῖ Φυσικὴν σταθερὰν διὰ τὰ καθαρὰ σώματα.

#### Θερμότης τήξεως μερικῶν καθαρῶν σωμάτων :

Ὑδρογόνον στερεόν	- 259°C	Γλυκερίνη εἰς ὑπερτήξιν		Ψευδάργυρος	420°C
Ὄξεινον στερεόν	- 218°C	κάτω ἀπὸ	18°C	Ἄλουμινιον	660°C
Ἄζωτον στερεόν	- 210°C	Φωσφόρος	44°C	Ἄργυρος	960°C
Οἰνόπνευμα	- 114°C	Ναφθαλίνη	80°C	Χαλκός	1080°C
Ὑδράργυρος	- 39°C	Θεῖον	114°C	Χρυσός	1060°C
Πάγος (ἐξ ὀρισμοῦ)	- 0°C	Κασσίτερος	232°C	Σίδηρος	1530°C
Βενζίνη	- 5,4°C	Μόλυβδος	327°C	Ἀσβέστιον	2570°C
				Βολφράμιον	3370°C


### 3 Ὑπερτήξις.

● Ἐντὸς ἀπολύτως καθαροῦ δοκιμαστικοῦ σωλῆνος θέτομεν ἀπεσταγμένον ὕδωρ καὶ θερμομέτρον. Ἀκολουθῶς τοποθετοῦμεν τὸν σωλῆνα ἐντὸς δοχείου, τὸ ὅποιον περιέχει μείγμα θρυμμάτων πάγου καὶ ἄλατος (ψυκτικὸν μείγμα).

● Παρατηροῦμεν ὅτι ἡ θερμοκρασία τοῦ ἀπεσταγμένου ὕδατος κατέρχεται ἀρκετοὺς βαθμοὺς ὑπὸ τὸ 0° C, χωρὶς νὰ ἐπέλθῃ πῆξις τοῦ ὕδατος. Τὸ ὕδωρ εὐρίσκεται εἰς κατάστασιν ὑπερτήξεως.

● Ἐὰν κινήσωμεν τὸν σωλῆνα, τὸ ὕδωρ ἀποτόμωσ πηγνυται καὶ ἡ θερμοκρασία του ἀνέρχεται εἰς 0°C. Ἐν σῶμα εὐρίσκεται ἐν ὑπερτήξει, ὅταν εὐρίσκειται ἐν ὑγρᾷ καταστάσει, ἂν καὶ ἔχῃ θερμοκρασίαν χαμηλοτέραν τοῦ σημεῖον τήξεως.

Ἡ ὑπερτήξις εἶναι μίᾳ ἀσταθῆς κατάστασις.



Σχ. 5. Ὑπερτήξις


### 4 Μεταβολὴ τοῦ ὄγκου κατὰ τὴν τήξιν καὶ τὴν πήξιν.

Α. Ἐὰν ἐντὸς δοκιμαστικοῦ σωλῆνος τήξωμεν ναφθαλίνην, θὰ παρατηρήσωμεν ὅτι, ἐφ' ὅσον διαρκεῖ ἡ τήξις, ἡ στερεὰ ναφθαλίνη παραμένει εἰς τὸν πυθμένα τοῦ σωλῆνος. Τοῦτο συμβαίνει, διότι ὁ ὄγκος ὠρισμένης μάζης στερεᾶς ναφθαλίνης εἶναι μικρότερος τοῦ ὄγκου ἰσῆς μάζης ὑγρᾶς ναφθαλίνης.


● Ὅταν τακῆ ὀλόκληρος ἡ ναφθαλίνη, σημειώσωμεν τὴν στάθμην τοῦ ὑγροῦ εἰς τὸν σωλῆνα καὶ τὸν ἀφίνομεν νὰ ψυχθῇ.

Παρατηροῦμεν ὅτι μετὰ τὴν στερεοποίησιν ὀλοκλήρου τοῦ ὑγροῦ ἡ στάθμη κατέρχεται ὀλίγον ἐντὸς τοῦ σωλῆνος καὶ ἡ ἐπιφάνεια τῆς στερεᾶς ναφθαλίνης καθίσταται κοίλη.

Τοῦτο ἀποδεικνύει ὅτι ὁ ὄγκος τοῦ σώματος ἐμειώθη. Τὴν ἴδιαν παρατήρησιν δυνάμεθα νὰ κάωμεν μὲ πολλὰ ἄλλα σώματα (θεῖον, παραφίνην, μολύβδον κ.τ.λ.).



Σχ. 7.



**Συμπέρασμα :** 'Ο ὄγκος τῶν περισσοτέρων σωμάτων, ὅταν τήκωνται, αὐξάνει, ἐνῶ ἐλαττοῦται, ὅταν ταῦτα πήγνυνται.

Β. Ἐάν θέσωμεν ἐντὸς δοχείου ὕδωρ καὶ τεμάχια πάγου καὶ εἰς ἕτερον δοχεῖον ἔλαιον, τὸ ὅποσον ἐν μέρει ἔχει παγώσει, θὰ παρατηρήσωμεν ὅτι ὁ πάγος εἰς τὸ πρῶτον δοχεῖον εὐρίσκεται εἰς τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ ὕδατος, ἐνῶ τὸ παγωμένον ἔλαιον εὐρίσκεται εἰς τὸν πυθμένα τοῦ ἑτέρου δοχείου. Τοῦτο συμβαίνει, διότι ὠρισμένη μᾶζα πάγου ἔχει μεγαλύτερον ὄγκον ἴσης μᾶζης ὕδατος, ἐνῶ ὠρισμένη μᾶζα παγωμένου ἐλαίου ἔχει μικρότερον ὄγκον ἴσης μᾶζης ὕγρου ἐλαίου.

● Βυθίζομεν φιάλην πλήρη ὕδατος ἐντὸς ψυκτικοῦ μείγματος (ἄλας + πάγος).

Παρατηροῦμεν μετ' ὀλίγον χρόνον ὅτι τὸ ὕδωρ γίνεται πάγος, μέρος τοῦ ὁποίου ἐξέρχεται ἐκ τοῦ στομίου τῆς φιάλης, ἐνῶ ἡ φιάλη θραύεται.

**Συμπέρασμα :** "Ὅταν τὸ ὕδωρ μεταβάλλεται εἰς πάγον, ὁ ὄγκος του αὐξάνει. Δι' ἀκριβῶν μετρήσεων εὐρίσκομεν ὅτι  $1000 \text{ cm}^3$  ὕδατος  $0^\circ \text{ C}$  μᾶς δίδουν  $1090 \text{ cm}^3$  πάγου τῆς αὐτῆς θερμοκρασίας.

**Ἀποτελέσματα.** Ἡ ἑξαίρεσις, τὴν ὁποίαν παρουσιάζει τὸ ὕδωρ, νὰ αὐξάνη δηλ. ὁ ὄγκος του, ὅταν στερεοποιῆται, ἔχει πολλὰς συνεπείας εἰς τὴν καθημερινὴν μας ζωὴν.

Τὸν χειμῶνα π.χ., ὅταν ἐπικρατῆ ψύχος, θραύονται τὰ φυγεῖα τῶν αὐτοκινήτων (ἐάν περιέχουν μόνον καθαρὸν ὕδωρ), αἱ σωληνώσεις τοῦ ὕδατος, τὰ ἀγγεῖα τῶν δένδρων, θρυμματίζονται οἱ βράχοι, οἱ ὁποῖοι ἔχουν πόρους κ.τ.λ. Διὰ τί ;

Ἐπίσης, ἐπειδὴ ὁ πάγος ἐπιπλέει εἰς τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ ὕδατος, τὰ ζῶα καὶ τὰ φυτὰ, τὰ ὁποῖα ζοῦν ἐντὸς τῶν λιμνῶν, τῶν ποταμῶν καὶ τῶν θαλασσῶν, ὄχι μόνον δὲν βλάπτονται ἐκ τοῦ πάγου, ἀλλὰ καὶ προστατεύονται. Διὰ τί ;

Ἐκτὸς τοῦ ὕδατος τοῦτο συμβαίνει καὶ εἰς ἄλλα σώματα. Π.χ. ὁ ὄγκος τοῦ χυτοσιδήρου καὶ τοῦ ἀργύρου αὐξάνει, ὅταν τὰ σώματα αὐτὰ στερεοποιῶνται.

### 5 Ἐπίδρασις τῆς πίεσεως εἰς τὴν τήξιν τοῦ πάγου.

Στηρίζομεν μίαν στήλην πάγου εἰς δύο ὑποστηρίγματα καὶ περιβάλλομεν ταύτην διὰ λεπτοῦ σύρματος, φέροντος εἰς τὰ ἄκρα του βάρη τῶν 5 Κρ (σχ. 8).

Παρατηροῦμεν ὅτι τὸ σύρμα διέρχεται βραδέως τὴν στήλην, ἐνῶ ὁ πάγος δὲν φαίνεται νὰ ἔχη κοπῆν.

**Ἐξήγησις.** Ἡ πίεζουσα δύναμις τῶν 10 Κρ μεταδίδεται ἐκ τοῦ σύρματος εἰς μίαν πολὺ μικρὰν

ἐπιφάνειαν τοῦ πάγου. Διὰ τοῦτο ἡ πίεσις ἐπ' αὐτῆς τῆς ἐπιφανείας εἶναι πολὺ μεγάλη. Ἐνεκα αὐτῆς τῆς πίεσεως ὁ εὐρισκόμενος κάτω τοῦ σύρματος πάγος τήκεται καὶ τὸ σύρμα εἰσχωρεῖ ἐντὸς αὐτοῦ. Τὸ ὕδωρ, τὸ ὅποιον προέρχεται ἐκ τῆς τήξεως, ἐπειδὴ δὲν πιέζεται καὶ ἔχει θερμοκρασίαν μικροτέραν τοῦ  $0^\circ \text{ C}$ , πήγνυται (=πῆξι) καὶ πάλιν ἀμέσως. Τὸ φαινόμενον τοῦτο ὀνομάζεται **ἀνάπηξις**.

**Συμπέρασμα :** Ἀἰξίσις τῆς πίεσεως προκαλεῖ ἐλάττωσιν τοῦ σημείου τήξεως τοῦ πάγου.

**Συνέπεια.** Ὁ παγετὼν σχηματίζεται ἐκ τῆς ἀναπήξεως τοῦ ὕδατος, τὸ ὅποιον προέρχεται ἐκ τῆς τήξεως τῆς χιόνος τῶν κατωτέρων τρωμάτων, ἅτινα πιέζονται ὑπὸ τῶν ἀνωτέρων. Ὁ πάγος τήκεται καὶ τροφοδοτεῖ τοὺς χειμάρρους εἰς τὸ βάθος τοῦ παγετῶνος, ἐπειδὴ δέχεται τὴν πίεσιν ἐκ τοῦ βάρους αὐτοῦ τούτου τοῦ παγετῶνος.

### 6 Θερμότης τήξεως.

Θερμαίνομεν συγχρόνως διὰ δύο λυχνιῶν οἰνοπνεύματος, αἱ ὁποῖα ἔχουν τὴν ἴδιαν φλόγα,




Fig. 9.

μια φιάλη A, περιέχουσαν θρύμματα πάγου, τὰ ὅποια ἀναδεύομεν, ἕως ὅτου τακῆ ὅλος ὁ πάγος, καὶ ἑτέραν φιάλην B καθαροῦ ὕδατος 0° C. Τὰ θρύμματα τοῦ πάγου τῆς μιᾶς φιάλης καὶ τὸ ὕδωρ τῆς ἑτέρας ἔχουν τὴν ἴδιαν μᾶζαν (σχ. 9).

Ὁ πάγος, διὰ τὴν τακῆ, ἀπορροφᾷ θερμότητα ὑπὸ σταθερὰν θερμοκρασίαν.

Προσδιορισμὸς τῆς θερμότητος τήξεως τοῦ πάγου (σχ. 10).

● Τὸ θερμιδόμετρον, τὸ ὁποῖον θὰ χρησιμοποιήσωμεν, ἔχει ἰσοδύναμον εἰς ὕδωρ : 20 g. Περιέχει ὕδωρ : 400 g.

Ἡ θερμοκρασία του εἶναι :  $t_1 = 23,7^\circ \text{C}$ .

● Ἡ συνολικὴ μᾶζα τοῦ θερμιδομέτρου (θερμιδόμετρον, ἔαρτήματα καὶ ὕδωρ) εἶναι : 515,9 g (σχ. 10 A).

● Λαμβάνομεν τεμάχιον πάγου 0° C (ἐκ μείγματος πάγου καὶ ὕδατος), ἀπορροφούμεν διὰ στυποχάρτου τὸ ὕδωρ, τὸ εὐρισκόμενον ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας τοῦ πάγου, καὶ τοποθετοῦμεν ἐντὸς τοῦ θερμιδομέτρου τὸ τεμάχιον τοῦ πάγου.

● Ὁ πάγος θὰ τακῆ καὶ ἡ θερμοκρασία τοῦ ὕδατος θὰ κατέλθῃ (σχ. 10 β).

● Σημειώνομεν τὴν θερμοκρασίαν, ὅταν τακῆ ὁ πάγος :  $t_2 = 18,5^\circ \text{C}$  καὶ ζυγίζομεν τὸ θερμιδόμετρον : 539 g (σχ. 10 Γ).

Υπολογισμὸς.

Ἡ μᾶζα τοῦ πάγου, τὴν ὁποῖαν ἔθεσασμεν ἐντὸς τοῦ θερμιδομέτρου, εἶναι : 539 g - 515,9 g = 23,1 g.

Τὸ ὕδωρ μετὰ τοῦ ἰσοδυναμοῦ εἰς ὕδωρ τοῦ θερμιδομέτρου ἀντιπροσωπεύει μᾶζαν 400 g + 20g = 420 g ὕδατος, τοῦ ὁποῖου ἡ θερμοκρασία κατῆλθε ἀπὸ 23,7° C εἰς 18,5° C. Ἀπέδωσε λοιπὸν θερμότητα :  $Q_{\text{cal}} = 420 \text{ cal}/^\circ\text{C} (23,7 - 18,5)^\circ\text{C} = 2184 \text{ cal}$ .

Τὰς 2184 cal ἀπερρόφησεν ὁ πάγος (23,1 g) :

α) διὰ τὴν τακῆ ὁ πάγος καὶ

β) διὰ τὴν ἀνέλθη ἡ θερμοκρασία τοῦ ὕδατος, τὸ ὁποῖον προῆλθεν ἐκ τῆς τήξεως τοῦ πάγου ἀπὸ 0° C εἰς 18,5° C.

Ποσότης θερμότητος, ἀπορροφηθεῖσα ὑπὸ τοῦ ὕδατος, τὸ ὁποῖον προῆλθεν ἐκ τῆς τήξεως τοῦ πάγου :

$$Q_{\text{cal}} = 23,1 \text{ cal}/^\circ\text{C} \times 18,5^\circ\text{C} = 427 \text{ cal}$$

Ποσότης θερμότητος, τὴν ὁποῖαν ἀπερρόφησεν ὁ πάγος, διὰ τὴν τακῆ :

$$Q_{\text{cal}} = 2184 \text{ cal} - 427 \text{ cal} = 1757 \text{ cal}$$

\* Ἀρα, διὰ τὴν τακῆ 1 g πάγου, ἀπορροφᾷ :

$$\frac{1757 \text{ cal}}{23,1 \text{ g}} = 76 \text{ cal/g}$$




Fig. 10. Προσδιορισμὸς τῆς θερμότητος τήξεως τοῦ πάγου

Εἰς τὴν σειράν τῶν προηγουμένων μετρήσεων δὲν δυνάμεθα νὰ ἀποφύγωμεν ὠρισμένα σφάλματα.

Ἐξ ἀκριβῶν μετρήσεων εὐρέθη ὅτι, διὰ νὰ τακῆ 1 g πάγου θερμοκρασίας 0° C καὶ νὰ γιῆ ὕδωρ ἐπίσης 0° C (ἔνευ δηλ. ἀλλαγῆς τῆς θερμοκρασίας του), δεῖον νὰ τοῦ προσφέρωμεν 80 cal (79,7 ἀκριβῶς).


*Ἡ θερμότης τήξεως τοῦ πάγου εἶναι 80 cal/g.*

Διὰ νὰ τήξωμεν 1 g πάγου, πρέπει νὰ προσφέρωμεν τόσην θερμότητα, ὅσην ἀπαιτεῖ 1 g ὕδατος, διὰ νὰ ἀνυψώσῃ τὴν θερμοκρασίαν του ἀπὸ 0° C εἰς 80° C (σχ. 11).

Ἡ θερμότης τήξεως τοῦ πάγου εἶναι, ὡς ἐκ τούτου, πολὺ μεγάλη.

*Ἐφαρμογαί.* Διὰ τοῦ πάγου διατηροῦμεν τὰ τρόφιμα εἰς τὰ ψυγεῖα, διότι, ὅταν τήκεται, ἀπορροφᾷ μεγάλην ποσότητα θερμότητος ἐκ τοῦ ἀέρος καὶ τῶν τροφίμων τοῦ ψυγείου, ὅποτε ἡ θερμοκρασία των κατέρχεται.

Αἱ χιόνες καὶ οἱ παγετώνες ἀργοῦν πολὺ νὰ τακοῦν, παρὰ τὴν μεγάλην ποσότητα θερμότητος, τὴν ὅποιαν δέχονται ἐκ τῆς ἀκτινοβολίας τοῦ ἡλίου.



Σχ. 11.

Θερμότης τήξεως μερικῶν καθαρῶν σωμάτων (cal/g)			
Θεῖον	10	Μόλυβδος	5,9
Κασσίτερος	14	Ψευδάργυρος	28
		Ἄργυρος	24
		Υδράργυρος	2,7

## ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ

1. Τήξις καλεῖται ἡ μετάβασις ἐνὸς σώματος ἀπὸ τῆς στερεᾶς καταστάσεως εἰς τὴν ὑγρὰν, ὅταν τὸ σῶμα προσλαμβάνῃ θερμότητα. Καὶ πήξις καλεῖται ἡ μετάβασις ἐνὸς σώματος ἀπὸ τὴν ὑγρὰν κατάστασιν εἰς τὴν στερεάν, ὅταν τὸ σῶμα ἀποδίδῃ θερμότητα.

2. Ὑπὸ σταθερὰν πίεσιν ἐν καθαρὸν σῶμα τήκεται εἰς ὠρισμένην θερμοκρασίαν, ἡ ὁποία λέγεται σημεῖον τήξεως. Ἡ θερμοκρασία αὕτη παραμένει σταθερὰ καθ' ὅλην τὴν διάρκειαν τῆς τήξεως. Τὸ σημεῖον τήξεως καὶ τὸ σημεῖον πήξεως ἐνὸς σώματος καθαροῦ εἶναι τὸ αὐτό.

3. Ἐν καθαρὸν σῶμα εὐρίσκεται ἐν ὑπερτήξει, ὅταν εἰς τὴν ὑγρὰν κατάστασιν ἔχῃ θερμοκρασίαν κατωτέραν τοῦ σημείου τῆς πήξεως.

4. Ἡ τήξις συνήθως συνοδεύεται ἀπὸ αὐξησιν τοῦ ὄγκου.

5. Δι' αὐξήσεως τῆς πίεσεως τὸ σημεῖον τήξεως τοῦ πάγου κατέρχεται.

6. Θερμότης τήξεως ἐνὸς σώματος καλεῖται τὸ ποσὸν τῆς θερμότητος, τὸ ὅποιον προσδίδομεν εἰς 1g τοῦ σώματος, ὅταν εὐρίσκεται εἰς τὴν θερμοκρασίαν τῆς τήξεως, διὰ νὰ μεταβῇ εἰς τὴν ὑγρὰν κατάστασιν τῆς αὐτῆς θερμοκρασίας.

Ἡ θερμότης τήξεως τοῦ πάγου εἶναι 80 cal/g.

44<sup>ON</sup> ΜΑΘΗΜΑ : Ἡ ἔννοια τοῦ κεκορεσμένου ἀτμοῦ.

## ΕΞΑΤΜΙΣΙΣ

### 1 Ἐξάτμισις.

Ἐχομεν παρατηρήσει ὅτι ἡ ὑγρὰ αὐλὴ μετὰ τὴν βροχὴν, ὡς καὶ τὰ βρεγμένα ροῦχα, τὰ ὅποια εἶναι ἀπλωμένα εἰς τὸν ἀέρα, στεγνώνουν.

Γνωρίζομεν ἐπίσης ὅτι εἶναι ἐπικίνδυνον νὰ μεταχειριζώμεθα βενζίνη πλησίον φλογὸς πρὸς καθαρισμόν ἐνδυμάτων κλπ.

Τὸ ὕδωρ καὶ ἡ βενζίνη μεταβάλλονται εἰς ἀέρια, τὰ ὅποια ὀνομάζονται ἀτμοί. Δι' αὐτὸ λέγομεν ὅτι ἔξ α ε ρ ι ο ὕ ν τ α ι.

Ἐξαέρωσις ἐνὸς σώματος καλεῖται ἡ μετάβασις ἐκ τῆς ὑγρᾶς εἰς τὴν ἀέριον κατάστασιν.

● Ἐὰν χύσωμεν εἰς ἀνοικτὸν δοχεῖον 2 cm<sup>3</sup> αἰθέρος, μετ' ὀλίγα λεπτά παρατηροῦμεν ὅτι ὁ αἰθὴρ ἔχει ἐξαφανισθῆ καὶ ἡ ὁσμὴ του ὑπάρχει διάχυτος εἰς ὅλοκληρον τὸ δωμάτιον.

“Όπως όλα τα αέρια, ούτω και οι άτμοι του αιθέρου πληρούν ολόκληρον τόν προσφερόμενον χώρον.

● Έάν επαναλάβωμεν τὸ αὐτὸ πείραμα δι’ οἰνοπνεύματος, θὰ παρατηρήσωμεν ὅτι καὶ τοῦτο ἐξαφανίζεται, ἀλλὰ μὲ βραδύτερον ρυθμὸν ἀπὸ ὅσον ὁ αἰθήρ (σχ. 1).

Τὰ ὑγρά αὐτὰ ὀνομάζονται **πητικὰ**.

Τὸ οἰνόπνευμα εἶναι ὀλιγώτερον πητικὸν τοῦ αἰθέρος.

Τέλος, ἐάν χρησιμοποιήσωμεν διὰ τὸ αὐτὸ πείραμα ἔλαιον, θὰ παρατηρήσωμεν ὅτι ἡ ποσότης τοῦ ὑγροῦ παραμένει σχεδὸν ἀμετάβλητος, διότι τὸ ἔλαιον εἶναι ἐλάχιστα πητικόν.

Εἰς τὰ προηγούμενα πειράματα οὐδεμίαν μεταβολὴν παρατηροῦμεν εἰς τὸ ἐσωτερικὸν τοῦ ὑγροῦ. Ἡ ἐξαέρωσις γίνεται μόνον ἐκ τῆς ἐπιφανείας του καὶ ὀνομάζεται **ἐξατμῖσις**.

Ἐξατμῖσις καλεῖται ὁ σχηματισμὸς ἀτμῶν ἐκ μόνῃς τῆς ἐλευθέρως ἐπιφανείας τοῦ ὑγροῦ. Ἡ ἐξατμῖσις αὕτη δὲν εἶναι στιγμιαία.

## 2 Ταχύτης ἐξατμῖσεως.

**Παρατήρησις.** Διὰ νὰ στεγνώσουν γρήγορα τὰ ἀσπρόρροχα, τὰ ἀπλώνομεν ἐπὶ σχοινοῦ.

Αἱ ἀλυκαὶ ἔχουν μεγάλην ἐπιφάνειαν καὶ μικρὸν βάθος.

● Τοποθετοῦμεν εἰς τὸν δίσκον ἐνὸς ζυγοῦ ἀνοικτὸν δοχεῖον, φέρον ὀλίγα  $\text{cm}^3$  αἰθέρος καὶ ἰσορροποῦμεν τὸν ζυγὸν δι’ ἐνὸς βάρους (ἀπόβαρον), τὸ ὁποῖον θέτομεν ἐπὶ τοῦ ἄλλου δίσκου (σχ. 2).

● Παρατηροῦμεν ὅτι ἡ φάλαγξ τοῦ ζυγοῦ ἀρχίζει νὰ κλινῆ πρὸς τὸ μέρος τοῦ βάρους.

Ἐπειτα ἀπὸ 5 μν, διὰ νὰ επαναφέρωμεν τὴν ἰσορροπίαν τοῦ ζυγοῦ, πρέπει νὰ θέσωμεν σταθμὰ εἰς τὸν δίσκον, ὅπου ἔχομεν τὸν αἰθέρα. Π.χ. 1,7 g αἰθέρος. Ἔχουν ἐξατμισθῆ ἐντὸς 5 μν 1,7 αἰθέρος.

Λέγομεν ὅτι ἡ **ταχύτης ἐξατμῖσεως** τοῦ αἰθέρος εἰς τὴν θερμοκρασίαν τοῦ πειράματος εἶναι :  $1,7 \text{ g} : 5 \text{ μν} = 0,34 \text{ g/μν}$ .

● Ἐάν ἀντικαταστήσωμεν τὸ ἀνοικτὸν δοχεῖον δι’ ἑτέρου μεγαλυτέρας ἐπιφανείας καὶ επαναλάβωμεν τὸ πείραμα, θὰ ἴδωμεν ὅτι ἐντὸς 5 μν θὰ ἐξατμισθοῦν 6,8 g αἰθέρος (σχ. 3).

Ἡ ἐπιφάνεια τοῦ αἰθέρος εἰς τὸ πρῶτον δοχεῖον εἶναι  $132 \text{ cm}^2$  καὶ εἰς τὸ δεύτερον  $528 \text{ cm}^2$ .

$$\text{Παρατηροῦμεν ὅτι : } \frac{132}{528} = \frac{1}{4} \quad \frac{1,7}{6,8} = \frac{1}{4}$$

δηλ. ἐάν τετραπλασιάσωμεν τὴν ἐλευθέραν ἐπιφάνειαν τοῦ ὑγροῦ, τότε καὶ ἡ μᾶζα τοῦ ἐξατμιζομένου ὑγροῦ τετραπλασιάζεται.


Ἐπὶ σταθερὰν θερμοκρασίαν ἡ ταχύτης ἐξατμῖσεως εἶναι ἀνάλογος πρὸς τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ ὑγροῦ.

**Παρατήρησις.** Τὰ βρεγμένα ἀσπρόρροχα στεγνώνουν ταχύτερον κατὰ τοὺς θερινοὺς μῆνας.


● Θέτομεν τὴν ἴδιαν μᾶζαν αἰθέρος δύο ὁμοίων δοχείων καὶ τὰ ἰσορροποῦμεν εἰς ἓνα ζυγὸν (σχ. 4).




Σχ. 1. Ὁ αἰθήρ εἶναι περισσότερον πητικὸς ἀπὸ τὸ οἰνόπνευμα.




Σχ. 2. Ἡ ταχύτης ἐξατμῖσεως εἶναι  $1,7 \text{ g} : 5 \text{ μν} = 0,34 \text{ g/μν}$




Σχ. 3. Ἡ ταχύτης ἐξατμῖσεως εἶναι ἀνάλογος πρὸς τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ ὑγροῦ.



Σχ. 4. Ἡ ἀνώφωσις τῆς θερμοκρασίας ἐπιταχύνει τὴν ἐξατμῖσιν.



Σχ. 5. 'Η ελάττωσις τῆς πίεσεως ἐπιταχύνει τὴν ἐξάτμισιν.



Σχ. 6. 'Η ἐξάτμισις εἶναι ταχύτερα εἰς τὴν ἄριστέραν φιάλην.

Μετ' ὀλίγον ἡ ἰσορροπία καταστρέφεται καὶ ἡ φάλαγξ κλίνει πρὸς τὸ μέρος τοῦ ἀντιβάρου. 'Η ἐξάτμισις δηλ. ἀπὸ τὸ δεύτερον φιαλίδιον γίνεται μετὰ μικροτέρας ταχύτητος.

'Εξήγησις. Εἰς τὸ δεύτερον φιαλίδιον οἱ ἄτμοι τοῦ αἰθέρος συσσωρεύονται ἄνωθεν τοῦ ὑγροῦ, ἐνῶ εἰς τὸ πρῶτον δοχεῖον διασκορπίζονται εἰς τὴν ἀτμοσφαῖραν. 'Η συσσωρεύσις αὐτῶν ἀτμῶν δυσχεραίνει τὴν ἐξάτμισιν τοῦ ὑγροῦ καί, ὡς ἐκ τούτου, τὴν ἐπιβραδύνει.

'Η ταχύτης ἐξατμίσεως αὐξάνει, ὅταν ὁ ἀήρ ἀνανεοῦται ἄνωθεν τῆς ἐπιφανείας τοῦ ὑγροῦ.

● Διὰ τὸν λόγον αὐτὸν εἰς μίαν ὀρισμένην θερμοκρασίαν ὁ ἀήρ ἢ τὸ αἴριον, τὸ ὅποιον εὐρίσκεται ἄνωθεν τῆς ἐπιφανείας ἑνὸς πτητικοῦ ὑγροῦ, δὲν δύναται νὰ συγκρατήσῃ ἀπεριόριστον ποσότητα ἐκ τῶν ἀτμῶν τοῦ ὑγροῦ.

"Όταν τὸ ὑγρὸν δὲν ἐξατμίζεται πλέον, οἱ ἄτμοι τοῦ ἔχουν κορεσθῆ καὶ λέγονται κεκορεσμένοι ἄτμοι.

"Έχει εὐρεθῆ ὅτι εἰς τοὺς 0°C 1m<sup>3</sup> αἶρος συγκρατεῖ 4,8 g ὕδατῶν, εἰς τοὺς 20° C 17,3 g καὶ εἰς τοὺς 40° C 49 g.

Παρατηροῦμεν ἐπίσης ὅτι, ὅταν ὁ καιρὸς εἶναι πολὺ ὑγρὸς, τὰ ἀσπρόρρουχα δὲν στεγνώνουν, διότι ὁ ἀήρ εἶναι κεκορεσμένος ὑπὸ ὕδατῶν. "Όταν ὁμως ἡ θερμοκρασία ἀνέλθῃ, ἡ ἐξάτμισις συνεχίζεται. 'Αντιθέτως, ὅταν ἡ θερμοκρασία κατέλθῃ, ἐν μέρος τῶν ὕδατῶν τῆς ἀτμοσφαίρας ὑγροποιεῖται, ὁ ἀτμὸς συμπυκνῶται.

'Η ὀμίχλη, αἱ βροχαί, ἡ δρόσος, ἡ χιών, τὰ σταγονίδια τοῦ ὕδατος, τὰ ὅποια σχηματίζονται εἰς τὴν ἐπιφάνειαν τῆς φιάλης, ὅταν τὴν ἐξάγωμεν τοῦ ψυγείου κ.τ.λ., ὀφείλονται εἰς τὴν συμπύκνωσιν τῶν ὕδατῶν τῆς ἀτμοσφαίρας.

**Συμπέρασμα:** Εἰς ὀρισμένην θερμοκρασίαν ὁ ἀήρ ἢ τὸ αἴριον, τὸ ὅποιον εὐρίσκεται ἄνωθεν τῆς ἐπιφανείας πτητικοῦ ὑγροῦ, δὲν δύναται νὰ συγκρατήσῃ εἰς τὴν μονάδα τοῦ ὄγκου του παρὰ ὀρισμένην μόνον ποσότητα ἐκ τῶν ἀτμῶν τοῦ ὑγροῦ. 'Υφίσταται κορεσμός. 'Η ἐξάτμισις παύει, ἐνῶ ἐξακολουθεῖ νὰ παραμένῃ μία ποσότης ὑγροῦ.

## ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ

1. 'Εξάτμισις καλεῖται ὁ σχηματισμὸς ἀτμῶν ἐκ μόνης τῆς ἐπιφανείας τοῦ ὑγροῦ.

'Η ἐξάτμισις αὐτὴ εἶναι βραδεία καὶ ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν φύσιν τοῦ ὑγροῦ.

2. 'Η ταχύτης ἐξατμίσεως εἶναι ἀνάλογος πρὸς τὴν ἐλευθεράν ἐπιφάνειαν τοῦ ὑγροῦ καὶ αὐξάνεται μετὰ τῆς θερμοκρασίας καὶ τῆς ἀνανεώσεως τοῦ ἀέρος. 'Επιταχύνεται δέ, ὅσον ἡ πίεσις ἄνωθεν τῆς ἐπιφανείας τοῦ ὑγροῦ γίνεται μικροτέρα.

3. 'Ο ατμός είναι κεκορεσμένος, όταν ή εξατμισις παύη, όποτε παραμένει υγρόν, τὸ ὅποιον δὲν εξατμίζεται.

Εἰς ὠρισμένην θερμοκρασίαν ὁ αἰθήρ ἢ τὸ αἲριον, τὸ ὅποιον εὐρίσκεται ἄνωθεν τῆς ἐπιφανείας ἐνὸς πτητικοῦ υγροῦ, δὲν δύναται νὰ συγκρατήσῃ παρὰ ὠρισμένην μόνον ποσότητα ατμῶν τοῦ υγροῦ· τοῦτου.

45ον ΜΑΘΗΜΑ :

## ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΜΩΝ

### 1 Πίεσις ατμοῦ.

● Εἰς τὸ ἐν στόμιον τοῦ δοχείου (σχ. 1) προσαρμύζομεν σύριγγα αἰθέρος καὶ εἰς τὸ ἕτερον σωλῆνα, τοῦ ὁποίου τὸ ἐν ἄκρον βυθίζεται ἐντὸς ὑδραργύρου, εὐρισκομένου εἰς τὸν πυθμένα τοῦ δοχείου.

● Ἡ στάθμη τοῦ ὑδραργύρου ἐντὸς τοῦ σωλῆνος καὶ τοῦ δοχείου εὐρίσκειται εἰς τὸ αὐτὸ ὕψος. Ἡ πίεσις λοιπὸν τοῦ περιορισμένου αἲρος εἶναι ἴση πρὸς τὴν ἀτμοσφαιρικὴν πίεσιν ἐκείνης τῆς στιγμῆς.

● Πιέζομεν τὸ ἔμβολον τῆς σύριγγος, ὥστε νὰ πίπτῃ ὁ αἰθήρ ἐντὸς τοῦ δοχείου κατὰ σταγόνας.

Κατ' ἀρχὰς οὐδὲν ἴχνος υγροῦ παρουσιάζεται, διότι ὁ αἰθήρ εξατμίζεται ταχέως, ἐνῶ ὁ ὑδράργυρος ἀνέρχεται βραδέως ἐντὸς τοῦ σωλῆνος.

'Ο ατμός δηλ. τοῦ αἰθέρος ἀσκει πίεσιν, ἣ ὅποια προστίθεται εἰς τὴν πίεσιν τοῦ περιορισμένου αἲρος.

'Η πίεσις αὕτῃ μετρεῖται διὰ τοῦ ὕψους τοῦ ὑδραργύρου ἐντὸς τοῦ σωλῆνος.

'Εὰν ἐξακολουθήσωμεν νὰ ρίπτωμεν αἰθέρα εἰς τὴν φιάλην, ἕως ὅτου ἐμφανισθοῦν σταγόνες εἰς τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ ὑδραργύρου, θὰ παρατηρήσωμεν ὅτι ἡ στάθμη τοῦ ὑδραργύρου, ὁ ὁποῖος ἀνέρχεται εἰς τὸν σωλῆνα, εὐθύς ὡς ἐμφανισθῇ ἡ πρώτη σταγὼν, παραμένει ἀμετάβλητος, ὅσας σταγόνας αἰθέρος καὶ ἐὰν προσθέσωμεν εἰς τὴν φιάλην.

'Η πίεσις τοῦ ατμοῦ λαμβάνει τότε τὴν μεγίστην τιμὴν τῆς διὰ τὴν θερμοκρασίαν, εἰς τὴν ὅποιαν γίνεται τὸ πείραμα (σχ. 2 Β), π.χ. 23 cmHg.


**Συμπέρασμα :** 'Ο ατμός, ὅπως καὶ τὰ αἲρια, ἀσκοῦν πίεσιν. Ἡ πίεσις αὕτῃ ἀποκτᾷ τὴν μεγίστην τιμὴν, ὅταν ὁ ατμός εἶναι κεκορεσμένος.

'Όταν ἐντὸς τὴν φιάλης ὑπάρχουν σταγόνες αἰθέρος, ἡ στάθμη τοῦ ὑδραργύρου ἐντὸς τοῦ σωλῆνος παραμένει ἀμετάβλητος.


'Εὰν ὁμως θέσωμεν τὴν φιάλην ἐντὸς χλιαροῦ ὕδατος, ὁ ὑδράργυρος ἀνέρχεται εἰς τὸν σωλῆνα, ἕως ὅτου ὁ ατμός καταστῇ κεκορεσμένος, ὅποτε φθάνει εἰς ἐν νέον μέγιστον· π.χ. 40 cm (σχ. 3).




Σχ. 1.



Σχ. 2. Α : 'Ο ατμός τοῦ αἰθέρος ἀσκει μίαν πίεσιν  $h$ .  
Β : Αὕτῃ ἡ πίεσις εἶναι μεγίστη, ὅταν ὁ ατμός εἶναι κεκορεσμένος.



Σχ. 3. Ἡ μεγίστη πίεσις ατμοῦ αὐξάνει μετὰ τὴν θερμοκρασίαν.



Σχ. 4. Ἡ εξάτμισις τοῦ αἰθέρος ψύχει τὸ θερμόμετρον.


**Συμπέρασμα :** Ἡ μεγίστη πίεσις (τάσις) ἐνὸς ἀτμοῦ αὐξάνει μετὰ τῆς θερμοκρασίας.

Ἡ μεγίστη πίεσις τῶν ὑδρατμῶν εἶναι 4,58 mmHg εἰς τοὺς 0° C καὶ 17,53 mmHg εἰς τοὺς 20° C. Εἰς τοὺς 100° C εἶναι ἴση πρὸς τὴν ἀτμοσφαιρικὴν 76 cmHg (περίπου 1 Kp/cm<sup>2</sup>), εἰς τοὺς 200° C, 1,165 cmHg (15 Kp/cm<sup>2</sup>) καὶ εἰς τοὺς 250° C, 3100 cmHg (40 Kp/cm<sup>2</sup>).

Εὐκόλως ἀντιλαμβάνομεθα διατὶ ὁ ὑπέρθερμος ἀτμὸς χρησιμοποιεῖται διὰ τὴν κίνησιν τῶν ἀτμομηχανῶν.

## 2 Ψυχὸς παραγόμενος κατὰ τὴν εξάτμισιν.

● Περιβάλλομεν τὸ δοχεῖον θερμομέτρον δι' ὀλίγον βάμβακος ἐμποτισμένου δι' αἰθέρος. Παρατηροῦμεν ὅτι ἡ θερμομετρικὴ στήλη κατέρχεται ταχέως καὶ δύνανται νὰ φθάσῃ εἰς τοὺς -10° C, ἐὰν ἐπιταχύνωμεν τὴν εξάτμισιν (δι' ἐμφυσήσεως ἀέρος) (σχ. 4).



Σχ. 5. Ἡ εξάτμισις τοῦ ὕδατος ἀπαιτεῖ μεγάλην ποσότητα θερμότητος.

**Συμπέρασμα :** Διὰ τὴν εξάτμισιν τοῦ ὁ αἰθέρος ἀπορροφᾷ θερμότητα ἐκ τοῦ ἀέρος καὶ τῶν σωμάτων, μετὰ τὰ ὁποῖα ἔρχεται εἰς ἐπαφήν.

**Παρατήρησις.** Διὰ νὰ διατηρήσωμεν δροσερὸν ἐν ποτόν, περιβάλλομεν τὸ δοχεῖον δι' ἐνὸς βρεγμένου ὑφάσματος.

Ἡ εξάτμισις ἐνὸς πτητικοῦ ὑγροῦ ἐντὸς τῶν σωληνώσεων τοῦ ἠλεκτρικοῦ ψυγείου δημιουργεῖ τὴν ψύξιν.

Τὰ πορώδη πηλίνα δοχεῖα καθιστοῦν ψυχρὸν τὸ ὕδωρ κατὰ τὸ θέρος, διότι ἐκ τῶν πόρων τῶν ἐξέρχεται ὕδωρ, τὸ ὁποῖον εξάτμιζόμενον ψύχει τὸ ὕδωρ τοῦ δοχείου.

Ὅταν εἴμεθα ἰδρωμένοι, πρέπει νὰ ἀποφεύγωμεν τὰ ρεύματα. Διὰ τὶ ;

Διὰ νὰ εξάτμισθῇ 1 g ὕδατος, πρέπει νὰ ἀπορροφήσῃ 600 cal περίπου εἰς τὴν συνήθη θερμοκρασίαν καὶ 539 cal εἰς τοὺς 100° C (σχ. 5).

## 3 Ὑγρασία τοῦ ἀέρος.

Ἀφοῦ λοιπὸν ἡ εξάτμισις ἐνὸς ὑγροῦ δημιουργεῖ ψῦξιν, δυνάμεθα νὰ χρησιμοποιοῦσωμεν αὐτὴν τὴν ιδιότητα, διὰ νὰ ὑπολογίσωμεν τὸν βαθμὸν τῆς ὑγρασίας τοῦ ἀέρος.


Λαμβάνομεν δύο θερμομέτρα καὶ τὸ δοχεῖον τοῦ ἐνὸς περιβάλλομεν διὰ βρεγμένου ὑφάσματος (σχ. 6).

Ἐὰν ὁ ἀήρ εἶναι κεκορεσμένος ὑπὸ ὑδρατμῶν, ἀμφοτέρω τὰ θερμομέτρα θὰ δεικνύουν τὴν ἴδιαν θερμοκρασίαν, διότι δὲν γίνεται εξάτμισις.

Ἡ σχετικὴ ὑγρασία τοῦ ἀέρος θὰ εἶναι τότε 100.

Ἐὰν ὁ ἀήρ εἶναι τελειῶς ξηρὸς, ἡ εξάτμισις θὰ εἶναι μεγίστη καὶ τὰ δύο θερμομέτρα θὰ δείξουν δύο πολὺ διαφορετικὰς θερμοκρασίας. Ἡ σχετικὴ ὑγρασία τοῦ ἀέρος εἶναι 0.

Τὸ ὄργανον τοῦτο ὀνομάζεται ψυχρόμετρον (σχ. 6).



Σχ. 6. Ψυχρόμετρον



Ἡ ποσότης τῶν ὑδρατμῶν, τοὺς ὁποίους περιέχει ὁ ἀήρ, καθορίζεται ὑπὸ πίνακος, συνοδεύοντος τὸ ὄργανον.

**Σημείωσις.** Πρὸς μέτρησιν τοῦ βαθμοῦ ὑγρασίας τοῦ ἀέρος χρησιμοποιοῦμεν ἐπίσης καὶ τὸ ὑδρόμετρον.

Τὸ κύριον μέρος τοῦ ὄργανου τούτου ἀποτελεῖται ἐκ δέσμης τριχῶν, ἡ ὁποία ἀναλόγως πρὸς τὴν ποσότητα τῶν ὑδρατμῶν τῆς ἀτμοσφαιράς ἐπιμηκύνεται περισσώτερον ἢ ὀλιγώτερον. Ἐτερον ὄργανον προσδιορισμοῦ τῆς ὑγρασίας εἶναι καὶ τὸ ὑγροσκόπιον.

Εἰς τοῦτο ὑπάρχει οὐσία, ἡ ὁποία ἀλλάσσει χρῶμα ἀναλόγως πρὸς τὴν ὑγρασίαν τοῦ ἀέρος.

### ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ

1. Οἱ ἀτμοί, ὅπως καὶ τὰ ἀέρια, ἀσκοῦν πίεσιν. Ἡ πίεσις (τάσις) αὐτῆ εἶναι μεγίστη, ὅταν ὁ ἀτμὸς εἶναι κεκορεσμένος.

Ἡ μεγίστη πίεσις ἐνὸς ἀτμοῦ αὐξάνει μετὰ τῆς θερμοκρασίας.

2. Ἡ ἐξάτμισις ἐνὸς ὑγροῦ ἀπορροφᾷ θερμότητα.

3. Διὰ τοῦ ψυχομέτρου δυνάμεθα νὰ μετρήσωμεν τὴν σχετικὴν ὑγρασίαν τοῦ ἀέρος.

## 46<sup>ON</sup> καὶ 47<sup>ON</sup> ΜΑΘΗΜΑ

### ΒΡΑΣΜΟΣ

**1 Παρατηρήσεις ἐπὶ τοῦ φαινομένου τοῦ βρασμοῦ.**

**Πείραμα.** Θερμαίνωμεν δύο σφαιρικὰς φιάλας, εἰς τὰς ὁποίας ἔχομεν τοποθετηθεὶ ὕδωρ καὶ ἐν θερμόμετρον. Παρατηροῦμεν ὅτι :

α) Ἀπὸ 18° C ἕως 30° C ὑγραίνονται ἐξωτερικῶς, διότι ἐπὶ τῶν τοιχωμάτων των συμπυκνοῦνται οἱ ὑδρατμοί, οἱ ὁποῖοι προέρχονται ἐκ τῆς καύσεως τοῦ οἰνοπνεύματος ἢ τοῦ φωταερίου.

Ἡ ὑγρασία αὐτῆ ἐξαφανίζεται συντόμως.

β) Ἀπὸ τοὺς 40° C ἕως 50° C ἐμφανίζονται φυσαλλίδες εἰς τὰ ἐσωτερικὰ τοιχώματά των, αἱ ὁποῖαι ἀνερχόμεναι ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας διαλύονται.


Ἐντὸς τοῦ ὕδατος εὐρίσκονται διαλελυμένα διάφορα ἀέρια, κυρίως ὀξυγόνον καὶ ἄζωτον. Τὰ ἀέρια αὐτά, ἐπειδὴ ἡ διαλυτότης των ἐλαττοῦται διὰ τῆς αὐξήσεως τῆς θερμοκρασίας τοῦ ὕδατος, δὲν δύνανται νὰ παραμείνουν ἐντὸς αὐτοῦ καὶ διαφεύγουν ὑπὸ μορφῆν φυσαλλίδων.

Ἐάν θέσωμεν ἀναμμένον κηρίον ἐντὸς τῆς φιάλης, θὰ ἐξακολουθῆ νὰ καίῃ. Διὰ τὴν (σχ. 1).


γ) Ἀπὸ τοὺς 50° C ἕως τοὺς 70° C βλέπομεν νὰ ὑγραίνωνται ἐσωτερικῶς ὁ λαίμος καὶ τὸ ἄνω μέρος τῆς φιάλης, καὶ τέλος νὰ σχηματίζωνται μικραὶ σταγόνες ὕδατος. Διὰ τὴν (σχ. 2).

Ἐάν παρατηρήσωμεν τὰ πριονίδια, τὰ ὁποῖα ἔχομεν θέσει εἰς τὴν δευτέραν φιάλην, θὰ ἴδωμεν ὅτι εὐρίσκονται εἰς συνεχῆ κίνησιν. Ἐκ τοῦ πυθμένος τῆς φιάλης ἀνέρχονται πρὸς τὴν ἐπιφάνειαν καὶ ἐκ τῆς ἐπιφανείας ἐπανέρχονται εἰς τὸν πυθμένα.

**Ἐξήγησις.** Τὸ ὕδωρ θερμαίνεται εἰς τὸν πυθμένα τοῦ δοχείου, διαστέλλεται καί, ἐπειδὴ ἐλαττοῦται ἡ πυκνότης του, ἀνέρχεται εἰς τὴν ἐπιφάνειαν. Τὴν θέσιν του καταλαμβάνει τὸ ψυχρότερον ὕδωρ τῆς ἐπιφανείας, τὸ ὁποῖον, ὡς ἐκ τούτου, εἶναι πυκνότερον.



Σχ. 1. Ρεύματα μεταφορᾶς



Σχ. 2. Αἱ φυσαλλίδες τοῦ ἀτμοῦ βρασμοῦ δὲν φθάνουν εἰς τὴν ἐπιφάνειαν.


Τὰ πριονίδια, παρασυρόμενα ὑπὸ τοῦ ὕδατος, μᾶς βοηθοῦν νὰ παρακολουθήσωμεν αὐτὰ τὰ ρεύματα. Τὸ ὕδωρ, ἂν καὶ εἶναι κακὸς ἀγωγὸς τῆς θερμότητος ἔνεκα τῶν ρευμάτων τούτων, τὰ ὁποῖα ὀνομάζονται ρεύματα μεταφορᾶς, θερμαίνεται εἰς ὅλην τὴν μάζαν του.

δ) Εἰς τοὺς  $90^{\circ}\text{C}$  ἐμφανίζονται εἰς τὸν πυθμένα τοῦ δοχείου φυσαλλίδες, αἱ ὁποῖαι ἔρχονται πρὸς τὰ ἄνω· ἀλλὰ, προτοῦ φθάσουν εἰς τὴν ἐπιφάνειαν, ἐξαφανίζονται. Ὅσον περισσότερο ἀνέρχονται, ὁ ὄγκος των ἐλαττοῦται, ἐνῶ συγχρόνως ἀκούεται χαρακτηριστικὸς ἤχος.

Αἱ φυσαλλίδες αὐταὶ τοῦ ἀτμοῦ σχηματίζονται εἰς τὸ θερμότερον μέρος τοῦ ὕδατος (εἰς τὸν πυθμένα). Ὅταν ὁμως πλησιάζουν πρὸς τὴν ἐπιφάνειαν, ὁ ἀτμὸς συμπυκνοῦται, ἔπειδιθ' ἡ θερμοκρασία τοῦ ὕδατος εἶναι μικροτέρα, καὶ αἱ φυσαλλίδες ἐξαφανίζονται.

ε) Αἱ φυσαλλίδες γίνονται πολυπληθέστεραι καὶ φθάνουν τώρα εἰς τὴν ἐπιφάνειαν, ἣ ὁποῖα εὐρίσκειται ἐν ἀναταραχῇ. Τὸ θερμομέτρον δεικνύει τότε  $100^{\circ}\text{C}$ . Τὸ ὕδωρ βράζει. Κατὰ  $1\text{ cm}$  περίπου ἄνω τοῦ στομίου τῆς φιάλης βλέπομεν κάτι ὡσάν ὀμίχλην· ἐάν θέσωμεν ἐντὸς τῆς φιάλης ἀναμμένον κηρίον, σβῆνει ἀμέσως (σχ. 2).

Ἡ φιάλη εἶναι πλήρης ἀτμοῦ, ὁ ὁποῖος ἐξεδίδωκε τὸν ἀέρα. Ὁ ἀτμὸς αὐτὸς εἶναι ἄχρουν καὶ διαφανὲς ἀέριον, τὸ ὁποῖον δὲν δυνάμεθα νὰ ἴδωμεν. Ὅταν ὁμως ἐξέρχεται τῆς φιάλης, συμπυκνοῦται εἰς μικρὰ σταγονίδια, τὰ ὁποῖα σχηματίζουν τὴν ὄρατὴν ὀμίχλην.



Σχ. 3. Ἐφ' ὅσον χρόνον διαρκεῖ ὁ βρασμός, ἡ θερμοκρασία παραμένει σταθερά.


*Βρασμός καλεῖται ἡ ταχεῖα ἐξαέρωσις ἐνὸς ὑγροῦ ὑπὸ μορφῆν φυσαλλίδων, αἱ ὁποῖαι σχηματίζονται καθ' ὅλην τὴν μάζαν τοῦ ὑγροῦ.*

## 2 Σημεῖον ζέσεως (βρασμοῦ).

● Ἐὰν συνεχίσωμεν τὴν θέρμανσιν τῆς φιάλης, τὸ θερμομέτρον ἐξακολουθεῖ νὰ δεικνύῃ τὴν ἴδιαν θερμοκρασίαν τῶν  $100^{\circ}\text{C}$ . Ἐὰν δυναμώσωμεν τὴν φλόγα, ὁ βρασμός γίνεται ζωηρότερος, ἀλλ' ἡ θερμοκρασία παραμένει σταθερά.

● Κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ πειράματος, ἡ πίεσις εἰς τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ ὑγροῦ δὲν μεταβάλλεται καὶ εἶναι ἴση πρὸς τὴν ἀτμοσφαιρικὴν πίεσιν, τὴν ὁποῖαν δεικνύει τὸ βαρόμετρον : π.χ.  $76\text{ cmHg}$ .

**Πρῶτος νόμος :** Ὑπὸ σταθερὰν πίεσιν ὁ βρασμός ἐνὸς ὑγροῦ ἄρχεται πάντοτε εἰς τὴν αὐτὴν θερμοκρασίαν.  
Ἡ θερμοκρασία παραμένει σταθερὰ καθ' ὅλην τὴν διάρκειαν τοῦ βρασμοῦ καὶ λέγεται σημεῖον βρασμοῦ (ζέσεως) τοῦ ὑγροῦ.



Σχ. 4. Βρασμός τοῦ ὕδατος

Τὸ σημεῖον βρασμοῦ τοῦ ὕδατος ὑπὸ πίεσιν  $76\text{ cmHg}$  ἢ τὸ κανονικὸν σημεῖον βρασμοῦ τοῦ ὕδατος εἶναι ἐκεῖνο, τὸ ὁποῖον λαμβάνομεν, διὰ νὰ σημειώσωμεν τὸ  $100^{\circ}$  εἰς τὴν θερμομετρικὴν κλίμακα Κελσίου. Τὸ κανονικὸν σημεῖον βρασμοῦ ἐνὸς καθαροῦ ὑγροῦ ἀποτελεῖ φυσικὴν σταθερὰν τοῦ ὑγροῦ αὐτοῦ.

## 3 Ἐπίδρασις τῆς πίεσεως εἰς τὸν βρασμόν.

**Παρατήρησις.** Ὅταν θερμαίνωμεν τὸ γάλα καὶ ἡ θερμοκρασία του φθάσῃ εἰς ὀρισμένον βαθμόν, τὸ γάλα βράζει ἀποτόμως καὶ χύνεται.

Τοῦτο συμβαίνει, διότι κατ' ἀρχάς σχηματίζεται ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας του μεμβράνης (κρούστα), ἡ ὁποία ἐμποδίζει τὴν ἔξοδον τῶν ἀτμῶν εἰς τὴν ἐπιφάνειαν.

Ἐφ' ὅσον χρόνον ἡ πίεσις τοῦ ἀτμοῦ εἶναι μικροτέρα τῆς ἐξωτερικῆς (ἀτμοσφαιρικῆς), ἡ ὁποία ἐνεργεῖ ἀνω τῆς μεμβράνης (κρούστας), ὁ ἀτμός δὲν δύναται νὰ τὴν ἀνυψώσῃ.

Ὅταν ὁμως ἡ θερμοκρασία φθάσῃ εἰς σημεῖον, ὥστε ἡ πίεσις τοῦ ἀτμοῦ νὰ γίνῃ ἴση μὲ τὴν ἐξωτερικὴν, τότε ὁ ἀτμός ἀνυψώνει ἀποτόμως τὴν «κρούστα» καὶ ἐκφεύγει παρασύρων καὶ τὸ γάλα. Οὕτω καὶ τὸ ὕδωρ ἀρχίζει νὰ βράζῃ τὴν στιγμὴν, κατὰ τὴν ὁποίαν ἡ πίεσις τοῦ ἀτμοῦ του γίνεται ἴση πρὸς τὴν πίεσιν, ἡ ὁποία ἐνεργεῖ ἀνωθεν τῆς ἐπιφανείας του.

● **Πείραμα.** Λαμβάνομεν σωλῆνα εἰς σχ. 5, ὁ ὁποῖος εἰς τὸ μικρὸν καὶ κλειστὸν σκέλος του περιέχει ὑδράργυρον καὶ ὕδωρ, καὶ τὸν τοποθετοῦμεν ἐντὸς τοῦ ὕδατος μίξ φιάλης (σχ. 5).

Ἐὰν θερμάνωμεν τὴν φιάλην, ἕως ὅτου ἀρχίσῃ νὰ βράζῃ τὸ ὕδωρ, παρατηροῦμεν ὅτι ἡ στάθμη A καὶ B τοῦ ὑδραργύρου εἰς τὸν σωλῆνα εὐρίσκεται εἰς τὸ αὐτὸ ὀριζόντιον ἐπίπεδον.

Ἡ πίεσις, ἡ ὁποία ἀσκέεται ἀπὸ τοὺς ἀτμούς τοῦ ὕδατος (εἰς τὸ σκέλος B), εἶναι ἴση πρὸς τὴν ἀτμοσφαιρικὴν πίεσιν (ἡ ὁποία ἀσκέεται εἰς τὸ A).


Τὸ ὕδωρ, τὸ ὁποῖον εὐρίσκεται εἰς τὸ μικρὸν σκέλος τοῦ B σωλῆνος, ἔχει τὴν θερμοκρασίαν τοῦ βρασμοῦ καὶ οἱ ἀτμοὶ του τὴν μεγίστην πίεσιν.

Ἡ μεγίστη πίεσις λοιπὸν τῶν ἀτμῶν τοῦ ὕδατος εἰς τὴν θερμοκρασίαν τῶν 100° C εἶναι 76 cmHg.

**Δεύτερος νόμος:** Τὸ σημεῖον βρασμοῦ ἐνὸς ὑγροῦ εἶναι ἡ θερμοκρασία, εἰς τὴν ὁποίαν ἡ μεγίστη πίεσις τῶν ἀτμῶν εἶναι ἴση πρὸς τὴν ἐξωτερικὴν πίεσιν.

Κανονικὸν σημεῖον βρασμοῦ μερικῶν καθερῶν σωμάτων ὑπὸ πίεσιν 76 cmHg

Ἐδρογόνον	-252 <sup>0</sup>	Αἰθέρ	35 <sup>0</sup>
Ἄζωτον	-195 <sup>0</sup>	Οἰνόπνευμα	78 <sup>0</sup>
Ὄξυγονον	-183 <sup>0</sup>	Βενζίνη	90 <sup>0</sup>
Διοξειδίον		Ἐδράργυρος	357 <sup>0</sup>
τοῦ θείου	-10 <sup>0</sup>	Θεῖον	444 <sup>0</sup>



Σχ. 5. Εἰς τὴν θερμοκρασίαν τοῦ βρασμοῦ ἡ πίεσις τῶν ἀτμῶν τοῦ ὕδατος εἰς τὸ σκέλος B εἶναι ἴση μὲ τὴν ἀτμοσφαιρικὴν, ἡ ὁποία ἀσκέεται εἰς τὴν ἐπιφάνειαν A.


#### 4 Πείραμα τοῦ Φραγκλίνου.

Ἀπομακρύνομεν τὴν φιάλην ἐκ τῆς φλογός, πωματίζομεν αὐτὴν ἀμέσως καὶ τὴν ἀναστρέφομεν (σχ. 6).

● Ὅταν βρέξωμεν τὴν φιάλην, παρατηροῦμεν ὅτι τὸ ὕδωρ, τὸ ὁποῖον εὐρίσκεται ἐντὸς αὐτῆς, ἀρχίζει πάλιν νὰ βράζῃ.

Τὸ ὕδωρ, τὸ ὁποῖον ἐχύσαμεν ἐπὶ τῆς φιάλης, ἀπερρόφησε θερμότητα καὶ ἡ θερμοκρασία τῆς φιάλης κατῆλθε.

Μέρος τοῦ ἀτμοῦ συμπυκνοῦται καὶ ἡ ἐσωτερικὴ πίεσις ἐλαττοῦται. Διὰ τοῦτο τὸ ὕδωρ τῶρα βράζει εἰς μικροτέραν θερμοκρασίαν.



Σχ. 6. Πείραμα Φραγκλίνου

**Συμπέρασμα:** Εἰς πᾶσαν ἐλάττωσιν τῆς πίεσεως ἐνὸς ὑγροῦ τὸ σημεῖον βρασμοῦ του κατεῖχεται.

**Εφαρμογή.** Διὰ νὰ συμπυκνώσωμεν τὸ γάλα, βράζομεν αὐτὸ εἰς τὴν θερμοκρασίαν τῶν  $60^{\circ}\text{C}$  ἐντὸς λεβήτων ὑπὸ ἠλαττωμένην πίεσιν. Διατί;

Τὴν ἴδιαν μέθοδον ἐφαρμόζομεν καὶ εἰς τὴν βιομηχανίαν σακχαρώως πρὸς συμπύκνωσιν τοῦ χυμοῦ τεύτλων.


### 5 Χύτρα πίεσεως (σχ. 7).

● Τὸ ὕδωρ, τὸ ὁποῖον θερμαίνομεν ἐντὸς κλειστῆς χύτρας, δὲν δύναται νὰ βράσῃ, διότι πάντοτε ἡ πίεσις, ἡ ἐνεργοῦσα ἀνωθεν τῆς ἐπιφανείας του, εἶναι μεγαλυτέρα τῆς μεγίστης πίεσεως τῶν ἀτμῶν (μεγίστη πίεσις ἀτμῶν + πίεσις κεκλεισμένου ἀέρος).


Μία βαλβὴς ἀνοίγει, ὅταν ἡ πίεσις φθάσῃ εἰς ὠρισμένον σημεῖον ( $1,5$  ἕως  $2\text{ Kp/cm}^2$  ἀναλόγως πρὸς τὴν ρύθμισιν).

Τὸ ὕδωρ ἔχει τότε θερμοκρασίαν  $120^{\circ}\text{C}$  περίπου, πρᾶγμα τὸ ὁποῖον ἐπιτρέπει ταχύτεραν παρασκευὴν τῶν φαγητῶν.

● Εἰς τὸν λέβητα ἀτμομηχανῆς ἡ θερμοκρασία τοῦ ὕδατος εἶναι  $250^{\circ}\text{C}$  καὶ ἡ πίεσις  $40\text{ Kp/cm}^2$ .



Σχ. 7. Χύτρα πίεσεως



Σχ. 8. Προσδιορισμὸς τῆς θερμοτῆτος ἐξατμίσεως τοῦ ὕδατος εἰς τοὺς  $100^{\circ}\text{C}$

**Συμπέρασμα :** Διὰ πᾶσαν αὔξησιν τῆς πίεσεως ἐνὸς ὑγροῦ τὸ σημεῖον βρασμοῦ του ἀνέρχεται.

**6 Θερμότης βρασμοῦ.** Κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ βρασμοῦ ἡ θερμοκρασία τοῦ ὕδατος δὲν μεταβάλλεται. Ἐὰν ἕως διακόψωμεν τὴν θέρμανσιν, τότε καὶ ὁ βρασμὸς διακόπτεται. Διὰ νὰ συνεχίζεται ὁ βρασμὸς, πρέπει διαρκῶς νὰ προσφέρωμεν θερμότητα εἰς τὸ ὑγρὸν.

Ἡ θερμότης ὁμοίως, τὴν ὁποῖαν ἀπορροφᾷ τὴν ὕδρον, δὲν ἀνυψώνει τὴν θερμοκρασίαν, ἀλλὰ χρησιμεύει πρὸς μεταβολὴν τοῦ ὑγροῦ ἐκ τῆς ὑγρᾶς καταστάσεως εἰς τὴν ἀέριον.

Θερμότης ἐξαερώσεως ἐνὸς ὑγροῦ εἰς ὠρισμένην θερμοκρασίαν καλεῖται τὸ ποσὸν τῆς θερμότητος, τὸ ὁποῖον πρέπει νὰ προσδώσωμεν εἰς  $1\text{ g}$  τοῦ ὑγροῦ, διὰ νὰ μετασηματισθῇ εἰς κεκορεσμένον ἀτμὸν τῆς αὐτῆς θερμοκρασίας.

### Προσδιορισμὸς τῆς θερμοτῆτος ἐξαερώσεως τοῦ ὕδατος.

Πραγματοποιούμεν τὴν διάταξιν τοῦ σχ. 8. Τὸ θερμοδόμετρον εὑρίσκεται εἰς μεγάλην ἀπόστασιν ἀπὸ τὴν φλόγα καὶ χωρίζεται ἀπὸ αὐτὴν δι' ἐνὸς διαφράγματος ἔξ ἀμιάντου.

Το θερμιδόμετρον περιέχει 500 g ύδατος.

Το Ισοδύναμόν του εις ύδωρ είναι 20 g.

Ἀρχικὴ θερμοκρασία τοῦ ὕδατος :  $t_1=16,5^\circ$  C. Μάζα θερμιδομέτρου κ.τ.λ. 636,5 g.

● Θερμαίνομεν τὸ ὕδωρ τῆς φιάλης μέχρι βρασμοῦ καὶ ἀφίνομεν ἐπ' ὀλίγα λεπτὰ ἐλεύθερον τὸν ἀτμὸν νὰ ἐκφεύγη ἐκ τοῦ στομίου τοῦ ἀπαγωγοῦ σωλῆνος.

● Θέτομεν τὸν ἀπαγωγὸν σωλῆνα ἐντὸς τοῦ ὕδατος τοῦ θερμιδομέτρου. Ὁ ἀτμὸς συμπυκνοῦται ἐντὸς αὐτοῦ καὶ ἡ θερμοκρασία τοῦ ὕδατος ἀνέρχεται.

● Μετ' ὀλίγα λεπτὰ ἀποσύρομεν τὸν σωλῆνα καὶ σημειώνομεν τὴν θερμοκρασίαν τοῦ ὕδατος :  $t_2=37,4^\circ$  C.

Ζυγίζομεν κατόπιν τὸ θερμιδόμετρον : 654,7 g

Ἡ μάζα τοῦ ἀτμοῦ, ὁ ὁποῖος συνεπυκνώθη ἐντὸς τοῦ θερμιδομέτρου, εἶναι :

$$m=654,7\text{g}-636,5\text{g}=18,2\text{g}.$$

Τὸ ὕδωρ καὶ τὸ θερμιδόμετρον ἀπρρόφθησαν ποσὸν θερμότητος:

$$Q\text{ cal} = 520\text{ cal/}^\circ\text{C} (37,4-16,5)^\circ\text{C} = 10868\text{ cal}.$$

Τὸ ὕδωρ, τὸ ὁποῖον προήλθεν ἐκ τῆς συμπυκνώσεως τοῦ ἀτμοῦ καὶ τοῦ ὁποῖου ἡ θερμοκρασία κατῆλθεν ἀπὸ  $100^\circ$  C εἰς  $37,4^\circ$  C, ἀπέδωσε :

$$Q_1\text{ cal} = 18,2\text{ cal/}^\circ\text{C} (100-37,4)^\circ\text{C} = 1.135\text{ cal}.$$

Διὰ νὰ μετατραποῦν λοιπὸν εἰς θερμοκρασίαν τῶν  $100^\circ\text{C}$ , 18,2 g ἀτμοῦ, ἀπὸ τὴν ἀέριον εἰς τὴν ὑγρὰν κατάστασιν, παραχωροῦν :

$$10865\text{ cal} - 1135\text{ cal} = 9733\text{ cal}$$

καὶ ἐπομένως 1 g ἀτμοῦ παραχωρεῖ:


$$\frac{9733\text{ cal}}{18,2\text{ g}} = 535\text{ cal/g}$$

Ἀντιθέτως, διὰ νὰ μετασχηματισθῇ εἰς ἀτμὸν  $100^\circ$  C 1g ὕδατος  $100^\circ$  C, ἀπορροφᾷ 535 cal.

Ἡ θερμότης ἐξαερώσεως τοῦ ὕδατος εἰς τοὺς  $100^\circ$  C εἶναι 535 cal/g. Κατὰ τὸ πείραμα αὐτὸ δὲν δυνάμεθα νὰ ἀποφύγωμεν ὀρισμένα σφάλματα.

Δι' ἀκριβῶν μετρήσεων εὑρίσκομεν ὅτι ἡ θερμότης ἐξαερώσεως τοῦ ὕδατος εἶναι 539 cal/g.

Τὸ ὕδωρ παρουσιάζει τὴν μεγαλύτεραν θερμότητα ἐξαερώσεως ἀπὸ ὅλα τὰ ὑγρά.



Σχ. 9. Ἡ θερμότης ἐξαερώσεως τοῦ εἶναι πολὺ μεγάλη.

Θερμότης ἐξαερώσεως μερικῶν ὑγρῶν :

Οινόπνευμα εἰς τοὺς  $78^\circ$  C : 216 cal/g

Βενζίνη εἰς τοὺς  $80^\circ$  C : 94 cal/g

Αἰθέρ εἰς τοὺς  $35^\circ$  C : 90 cal/g

Διοξειδίου τοῦ θείου εἰς τοὺς  $-10^\circ$  C : 95 cal/g

## ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ

1. Βρασμός καλεῖται ἡ ταχεῖα ἐξαέρωσις ἐνὸς ὑγροῦ ὑπὸ μορφὴν φυσαλλίδων, αἱ ὁποῖαι σχηματίζονται καθ' ὅλην τὴν μάζαν τοῦ ὑγροῦ.

2. Ὑπὸ κανονικὴν πίεσιν ὁ βρασμός ἐνὸς ὑγροῦ ἀρχεται πάντοτε εἰς τὴν αὐτὴν θερμοκρασίαν. Ἡ θερμοκρασία τοῦ ὑγροῦ παραμένει ἡ αὐτὴ καθ' ὅλην τὴν διάρκειαν τοῦ βρασμοῦ.

3. Τὸ σημεῖον βρασμοῦ ἐνὸς ὑγροῦ εἶναι ἡ θερμοκρασία, εἰς τὴν ὁποίαν ἡ μεγίστη πίεσις τῶν ἀτμῶν εἶναι ἴση πρὸς τὴν ἐξωτερικὴν πίεσιν.

4. Θερμότης ἐξαερώσεως ἐνὸς ὑγροῦ εἰς ὀρισμένην θερμοκρασίαν εἶναι τὸ ποσὸν τῆς θερμότητος, τὸ ὁποῖον πρέπει νὰ προσφέρωμεν εἰς 1g αὐτοῦ τοῦ ὑγροῦ, διὰ νὰ τὸ μετατρέψωμεν ἐξ ὀλοκλήρου εἰς κεκορεσμένον ἀτμὸν τῆς αὐτῆς θερμοκρασίας.

Ἡ θερμότης ἐξαερώσεως ἐνὸς ὑγροῦ ἐλαττοῦται, ὅσον ἡ θερμοκρασία του ἀνέρχεται.

Ἡ θερμότης ἐξαερώσεως τοῦ ὕδατος εἰς τοὺς  $100^\circ\text{C}$  εἶναι 539cal/g.

## Σειρά 11η: Μεταβολαι καταστάσεως.

## I. Τήξις

1. Είς  $0^{\circ}\text{C}$  ή πυκνότης του πάγου είναι 0,92  $\text{Kg}/\text{dm}^3$  και του ύδατος 1  $\text{Kg}/\text{dm}^3$ . Πόσον όγκον θα έχη ο πάγος, ο όποιος προέρχεται εκ τής στερεοποιη-σεως 50 l ύδατος;

2. Αι στήλαι πάγου του έμπορίου έχουν σχήμα όρθογωνίου παραλληλεπίδου των εξής διαστάσεων: μήκος 98 cm και τομήν 16 cm \* 28 cm. Νά υπολο-γισθούν:

α) Ό όγκος τής στήλης του πάγου.

β) ΈΗ μάζα τής, εάν ή πυκνότης του πάγου είναι 0,92  $\text{Kg}/\text{dm}^3$  εις  $0^{\circ}\text{C}$ .

γ) Ό όγκος του ύδατος, τό όποιον άπαιτείται πρός παρασκευήν 125 όμοίων στηλών πάγου. Πυκνό-της ύδατος εις  $0^{\circ}\text{C}$ : 1  $\text{Kg}/\text{dm}^3$ .

3. Πόσην θερμότητα πρέπει νά προσδώσωμεν εις τεμάχιον πάγου, θερμοκρασίας  $0^{\circ}\text{C}$  μάζης 175 g, πρός τήξιν τούτου και άκολουθώς αύξησιν τής θερμο-κρασίας του ληφθέντος εκ τής τήξεως ύδατος εις τούς  $10^{\circ}\text{C}$ ; Θερμότης τήξεως του πάγου 80 cal/g.

4. Πόση θερμότης άπαιτείται πρός τήξιν 1200 Kg πάγου, θερμοκρασίας  $-12^{\circ}\text{C}$ ; Εϊδική θερμότης πάγου 0,5 cal/g και θερμότης τήξεως 80 cal/g.

5. Θερμιδόμετρον περιέχει 300 g ύδατος και 100 g πάγου  $0^{\circ}\text{C}$ :

α) Ποία είναι ή θερμοκρασία του συστήματος και πόση θερμότης άπαιτείται πρός τήξιν του πάγου και αύξησιν τής θερμοκρασίας του συστήματος εις τούς  $10^{\circ}\text{C}$ ; (Θερμότης τήξεως του πάγου 80 cal/g).

β) Έάν ή άνωτέρω θερμότης παρέχεται υπό μιάς ηλεκτρικής αντίστασεως, ή όποια παρέχει 60 cal ανά δευτερόλεπτον, επί πόσην ώραν διαρκεί τό πείραμα; 6. Τόν χειμώνα μία όδος καλύπτεται διά στρώ-ματος πάγου  $0^{\circ}\text{C}$  και πάχους 2 mm.

Ποίον ύψος ύδατος βροχής, θερμοκρασίας  $8^{\circ}\text{C}$ , πρέπει νά πέση ανά 1  $\text{m}^2$  επιφανείας, διά νά τακή ό πάγος; Θερμότης τήξεως του πάγου 80 cal/g, πυκνό-της πάγου 0,92  $\text{Kg}/\text{dm}^3$ . Υποθέτομεν ότι ό άήρ και τό έδαφος δέν λαμβάνουν μέρος εις τās θερμικάς ανταλ-λαγας.

7. Πόση θερμότης άπαιτείται:

α) Διά νά ύψώσωμεν τήν θερμοκρασίαν 150 l ύδατος από  $12^{\circ}\text{C}$  εις  $34^{\circ}\text{C}$ .

β) Διά νά τακοϋν 10 Kg πάγου  $0^{\circ}\text{C}$ ;

γ) Διά νά τακοϋν 10 Kg πάγου θερμοκρασίας  $-10^{\circ}\text{C}$  και νά ανέλθη ή θερμοκρασία του ύδατος εις  $100^{\circ}\text{C}$ . (Εϊδ. θερμότης πάγου 0,5 cal/g  $^{\circ}\text{C}$ , θερμότης τήξεως πάγου 80 cal/g).

8. Είς 300 g ύδατος  $40^{\circ}\text{C}$  ρίπτομεν τεμάχιον πά-γου  $0^{\circ}\text{C}$  μάζης 60 g:

α) Πόσην θερμότητα άπορροφά ό πάγος, διά νά τακή;

β) Ποία ή τελική θερμοκρασία του ύδατος;

9. Θερμιδόμετρον εξ όρειχάλκου, μάζης 250 g, περιέχει 100 g ύδατος, θερμοκρασίας  $40^{\circ}\text{C}$ :

α) Ποίον τό ίσοδύναμον εις ύδωρ του θερμιδο-

μέτρου, εάν ή ειδική θερμότης του όρειχάλκου είναι 0,1 cal/g  $^{\circ}\text{C}$ ;

β) Θέτομεν εις τό θερμιδόμετρον 20 g πάγου  $0^{\circ}\text{C}$ . Ποία είναι ή τελική θερμοκρασία του θερμιδο-μέτρου;

10. Είς 1500 g ύδατος  $10^{\circ}\text{C}$  θέτομεν τεμάχιον χαλκού 200 g, θερμοκρασίας  $100^{\circ}\text{C}$ , και προσθέτομεν πάγον  $0^{\circ}\text{C}$ :

α) Νά υπολογισθ ή μάζα του πάγου, ή όποια άπαιτείται, διά νά καταστή ή τελική θερμοκρασία  $0^{\circ}\text{C}$ , όταν ό πάγος τακή έντελώς.

β) Έάν ή μάζα του πάγου είναι 500 g, ποία θα είναι ή τελική θερμοκρασία και πόση μάζα πάγου άπο-μένει; Εϊδ. θερμότης χαλκού 0,095 cal/g  $^{\circ}\text{C}$ .

11. Θερμιδόμετρον περιέχει 400 g ύδατος, θερμοκρασίας  $0^{\circ}\text{C}$ . Προσθέτομεν διαδοχικά 20 g πάγου  $0^{\circ}\text{C}$  και 200 g ύδατος  $50^{\circ}\text{C}$ , όποτε, μετ' όλίγον τό όργανον περιέχει μόνον ύδωρ  $20^{\circ}\text{C}$ . Νά υπολογι-σθούν:

α) ΈΗ θερμότης τήν όποιαν άπερρόφησεν ό πά-γος διά νά μεταβληθ ή εις ύδωρ  $20^{\circ}\text{C}$ .

β) ΈΗ θερμότης, τήν όποιαν παρεχώρησαν τά 200 g του ύδατος.

γ) ΈΗ άρχική θερμοκρασία των 400 g ύδατος, (ΈΗ θερμότης, τήν όποιαν άπορροφά τό θερμι-δόμετρον, δέν υπολογίζεται).

12. Είς θερμιδόμετρον, φέρον 400 g ύδατος θερμοκρασίας  $36^{\circ}\text{C}$ , θέτομεν έν τεμάχιον πάγου 67 g, θερμοκρασίας  $0^{\circ}\text{C}$ . Όταν τακή ό πάγος, ή θερμοκρα-σία του ύδατος είναι  $19,5^{\circ}\text{C}$ . Ποία είναι ή θερμότης τήξεως του πάγου; (Τό ίσοδύναμον εις ύδωρ του θερ-μιδομέτρου θεωρείται άμελητέον).

13. Θερμιδόμετρον εξ όρειχάλκου, μάζης 200 g, περιέχει 300 g ύδατος, θερμοκρασίας  $20^{\circ}\text{C}$ . Θέτο-μεν έντός αυτού 100 g πάγου  $0^{\circ}\text{C}$ . Όταν άποκατα-σταθ ή θερμική ίσορροπία, τό θερμιδόμετρον περιέχει ύδωρ και 20 g πάγου:

α) Ποία είναι τότε ή θερμοκρασία του μεί-γματος;

β) Ποία είναι ή θερμότης τήξεως του πάγου εις θερμιδας ανά γραμμάριον; (Εϊδ. θερμ. όρειχάλκου 0,1 cal/g  $^{\circ}\text{C}$ ).

## II. Ήξάτμισις. Κεκορησμένοι άτμοι

14. Είς τήν φιάλην του σχ. 2 του 45ου μαθήμα-τος θέτομεν αιθέρα, όποτε ό υδράργυρος άνέρχεται εις ύψος 20,4 cm εις τόν σωλήνα. Πόση είναι ή πίεσις του αιθέρος (p/cm<sup>2</sup>); Εϊδικόν βόρος υδραργύρου 13,6 p/cm<sup>2</sup>.

15. Είς σωλήνα Τορρικέλλι ή στάθμη του υδραρ-γύρου εύρισκται εις ύψος 70 cm. Εισάγομεν μίαν σταγόνα αιθέρος εις τόν βαρομετρικόν θάλαμον, όποτε τό ύψος τής βαρομετρικής στήλης γίνεται 41 cm:

α) Πόση είναι ή πίεσις του άτμου του αιθέρος εις τόν σωλήνα;

β) Έάν εις τήν θερμοκρασίαν του πειράματος ή μεγίστη πίεσις του άτμου είναι 571,2 p/cm<sup>2</sup>, ό άτμος

του αιθέρος, τόν ὅποιον διαθέτομεν, εἶναι κεκορεσμέ-  
νος ἢ ὄχι ;

16. Νά παρασταθοῦν γραφικῶς αἱ μεταβολαί  
τῆς μεγίστης πίεσεως τοῦ ἀτμοῦ τοῦ αἰθέρος συμφώ-  
νως πρὸς τὰς ἀκολουθοῦσας ἐνδείξεις :

Θερμοκρασία :  $10^{\circ}\text{C}$   $20^{\circ}\text{C}$   $30^{\circ}\text{C}$   $40^{\circ}\text{C}$   $50^{\circ}\text{C}$   $60^{\circ}\text{C}$   
Πίεσις εἰς cmHg 31 44 64 92 128 173

Εἰς τὸν ἄξονα τῶν τετημημένων θά λάβωμεν  $1\text{ cm} =$   
 $10^{\circ}\text{C}$  καί εἰς τὸν ἄξονα τῶν τεταγμένων  $1\text{ cm} = 20$   
cmHg.

17. Αἱ μεταβολαί τῆς μεγίστης πίεσεως τῶν ἄ-  
τμων τοῦ ὕδατος διὰ θερμοκρασίας μεγαλυτέρας τῶν  
 $100^{\circ}\text{C}$  δίδονται εἰς τὸν ἀκόλουθον πίνακα :

Θερμοκρασία :  $100^{\circ}\text{C}$   $120^{\circ}\text{C}$   $150^{\circ}\text{C}$   $180^{\circ}\text{C}$   $200^{\circ}\text{C}$   $225^{\circ}\text{C}$   
Πίεσις Kp/cm<sup>2</sup> 1 2 5 10 16 25

Νά παρασταθοῦν γραφικῶς αἱ μεταβολαὶ αὐταί.  
Εἰς τὸν ἄξονα τῶν τετημημένων  $1\text{ cm} = 20^{\circ}\text{C}$  καί εἰς  
τὸν ἄξονα τῶν τεταγμένων  $1\text{ cm} = 2$  Kp/cm<sup>2</sup>.

(Αἱ πίεσις Kp/cm<sup>2</sup> εἶναι κατὰ πρᾶσέγγισιν).

### III. Βρασμός

18. Πλησίον εἰς τοὺς  $100^{\circ}\text{C}$  ἡ θερμοκρασία  
βρασμοῦ τοῦ ὕδατος πίπτει κατὰ  $0,1^{\circ}\text{C}$ , ὅταν ἡ ἐξω-  
τερικὴ πίεσις ἐλαττοῦται κατὰ  $2,7\text{ mmHg}$ .

Ποία εἶναι ἡ θερμοκρασία βρασμοῦ τοῦ ὕδατος,  
ὅταν ἡ ἀτμοσφαιρικὴ πίεσις εἶναι  $73,2\text{ cmHg}$ ; (Ἡ  
θερμοκρασία βρασμοῦ εἶναι  $100^{\circ}\text{C}$  ὑπὸ πίεσιν  $760$   
mmHg).

19. Ζέομεν ὕδωρ, τὴν ἰδίαν ὥραν, εἰς τοὺς πρό-  
ποδας ἐνὸς ὄρου, ἐνθα ἡ ἀτμοσφαιρικὴ πίεσις εἶναι  
 $76\text{ cmHg}$  καί ἡ θερμοκρασία ζέσεως  $100^{\circ}\text{C}$ , καί εἰς  
τὴν κορυφὴν του, ἐνθα ἡ θερμοκρασία βρασμοῦ εἶναι  
 $97^{\circ}$ . Γνωρίζομεν ὅτι πλησίον τῶν  $100^{\circ}\text{C}$  ἡ θερμοκρα-

σία ζέσεως τοῦ ὕδατος πίπτει κατὰ  $0,10^{\circ}\text{C}$ , ὅταν ἡ  
ἀτμοσφαιρικὴ πίεσις ἐλαττοῦται κατὰ  $2,7\text{ mmHg}$  :

α) Νά προσδιορισθῇ εἰς mmHg τὸ βαρομετρι-  
κὸν ὕψος εἰς τὴν κορυφὴν τοῦ ὄρου.

β) Νά ὑπολογισθῇ ἡ ὑψομετρικὴ διαφορά εἰς  
μέτρα μεταξὺ κορυφῆς καὶ προπόδων τοῦ ὄρου.

Εἰδικὸν βάρος ὑδραργύρου  $13,6\text{ g/cm}^3$ , μέσον  
εἰδικὸν βάρος ἀέρος  $1,2\text{ g/l}$ .

20. α) Πόση θερμότης ἀπαιτεῖται πρὸς ἐξαε-  
ρῶσιν  $1,5\text{ Kg}$  ὕδατος, θερμοκρασίας  $100^{\circ}\text{C}$ ; (Θερμό-  
της ἐξαερώσεως ὕδατος  $539\text{ cal/g}$ ).

β) Ἐάν ἡ θερμότης καύσεως τοῦ ἀνθρακίτου,  
τὸν ὅποιον θά χρησιμοποιοῦσωμεν, εἶναι  $8.000\text{ Kcal/Kg}$   
καὶ ἐκμεταλλεωθήτω μόνον τὸ  $1/4$  τῆς θερμότητος,  
τὸ ὅποιον παρέχεται, πόσον ἀνθρακίτην πρέπει νὰ  
καύσωμεν;

21. Θερμαίνομεν φιάλην, περιέχουσαν  $300\text{ g}$   
ὕδατος  $20^{\circ}\text{C}$ , διὰ φλογός, ἡ ὅποια παρέχει  $4000\text{ cal}$   
ὠφέλιμον ποσὸν θερμότητος ἀνὰ λεπτόν τῆς ὥρας.

α) Ἐντὸς πόσου χρόνου ἡ θερμοκρασία τοῦ  
ὕδατος θά φθάσῃ εἰς τοὺς  $100^{\circ}\text{C}$ ;

β) Πόση ὥρα θά χρειασθῇ ἐπὶ πλέον πρὸς ἐξα-  
ερώσιν τῆς ἡμισείας μάζης τοῦ ὕδατος;

22. Εἰς δοχεῖον, φέρον  $1600\text{ g}$  ὕδατος  $10^{\circ}\text{C}$ , διο-  
χετεύομεν  $50\text{ g}$  ὑδρατμοῦ  $100^{\circ}\text{C}$ . Ποία εἶναι ἡ τελικὴ  
θερμοκρασία τοῦ συστήματος; (Ἡ θερμότης ἐξαερώ-  
σεως (ἢ ὑγροποιήσεως) τοῦ ὕδατος εἶναι  $539\text{ cal/g}$ ).


23. Πόση μᾶζα ὑδρατμῶν  $100^{\circ}\text{C}$  πρέπει νὰ συμ-  
πικνωθῇ ἐντὸς λεκάνης, περιεχοῦσης  $100\text{ l}$  ὕδατος  
 $17^{\circ}\text{C}$ , διὰ νὰ ἔχωμεν τελικὸν μείγμα  $37^{\circ}\text{C}$ ;

Γνωρίζομεν ὅτι  $1\text{ g}$  ὑδρατμῶν  $100^{\circ}\text{C}$ , ὑγροποι-  
ούμενον εἰς  $100^{\circ}\text{C}$ , ἀποβάλλει  $539\text{ cal}$ . (Ἡ θερμότης,  
τὴν ὅποιαν ἀπορροφᾷ ἡ λεκάνη, δὲν ὑπολογίζεται)



Φυσικά σώματα. Μετρήσεις φυσικῶν μεγεθῶν . . . . .	4	22. Σχετική πυκνότης . . . . .	59
		'Ασκήσεις . . . . .	61
<b>I. — Φυσικαὶ καταστάσεις τῆς ὕλης.</b>		<b>V. — Πίσεις. Μανόμετρον. Βαρόμετρον.</b>	
1. Στερεά, ὑγρά, αέρια . . . . .	6	23. Ἡ ἔννοια τῆς πίεσεως . . . . .	63
2. Ἑτερογενῆ μείγματα : Τὸ φυσικὸν ὕδωρ . . . . .	8	24. Πίσεις ἀσκούμεναι ὑπὸ τῶν ὑγρῶν . . . . .	65
3. *Ἐν καθαρὸν σῶμα. Τὸ ἀπεσταγμένον ὕδωρ . . . . .	10	25. Πίσεις ἀσκούμεναι ὑπὸ τῶν ὑγρῶν εἰς τὰ τοιχώματα τῶν δοχείων . . . . .	68
4. Διαλυτικαὶ ιδιότητες τοῦ ὕδατος . . . . .	12	26. Ἀρχὴ τοῦ Pascal. Μετάδοσις τῶν πιέσεων ὑπὸ τῶν ὑγρῶν . . . . .	70
5. Πρώτη μελέτη ἐνὸς αἰρίου. Ὁ ἀήρ . . . . .	15	'Ασκήσεις . . . . .	73
6. Σύστασις τοῦ αἵρος . . . . .	17	27. Πειραματικὴ σπουδὴ τῆς Ἀρχῆς τοῦ Ἀρχιμήδους . . . . .	75
'Ασκήσεις . . . . .	20	28. Ἐπιπλέοντα σώματα . . . . .	77
<b>II. — Βάρος ἐνὸς σώματος. Ζυγὸς δι' ἑλατηρίου.</b>		29. Πυκνόμετρα . . . . .	79
Κατακόρυφος. Ἐλευθέρᾳ πτώσει ἐνὸς σώματος . . . . .	21	'Ασκήσεις . . . . .	82
8. Μέτρησις τοῦ βάρους ἐνὸς σώματος . . . . .	23	30. Ἀτμοσφαιρικὴ πίεσις . . . . .	84
9. Ζυγὸς δι' ἑλατηρίου . . . . .	25	31. Βαρόμετρον . . . . .	86
'Ασκήσεις . . . . .	28	32. Μανόμετρον . . . . .	89
<b>III. — Δύναμις. Δυναμόμετρον.</b>		33. Πίσεις ἀσκούμεναι ὑπὸ τῶν αερίων . . . . .	91
10. Ἐννοια τῆς δυνάμεως. . . . .	29	34. Νόμος Mariotte . . . . .	94
11. Ἴσορροπία σώματος ὑπὸ τῆν ἐπίδρασιν πολλῶν δυνάμεων. Τροχαλία . . . . .	32	'Ασκήσεις . . . . .	96
12. Συνισταμένη δύο παραλλήλων δυνάμεων . . . . .	34	<b>VI. — Θερμοκρασία. Θερμόμετρον.</b>	
13. Κέντρον βάρους . . . . .	36	35. Ὑδραργυρικὸν θερμόμετρον . . . . .	99
'Ασκήσεις . . . . .	38	36. Ἐννοια τῆς θερμοκρασίας. Πείραμα διαστολῆς . . . . .	101
14. Μελέτη τοῦ κεκλιμένου ἐπιπέδου	40	37. Χρήσις τοῦ θερμομέτρου . . . . .	103
15. Ροπὴ δυνάμεως ὡς πρὸς ἄξονα	42	'Ασκήσεις . . . . .	105
16. Ἔργαλεια. Μοχλοὶ . . . . .	44	<b>VII. — Θερμιδόμετρον.</b>	
'Ασκήσεις . . . . .	46	38. Ποσότης θερμότητος . . . . .	107
<b>IV. — Μᾶζα. Ζυγὸς.</b>		39. Θερμιδόμετρον δι' ὕδατος . . . . .	109
17. Ζυγὸς μὲ ἴσους βραχίονας . . . . .	48	40. Εἰδικὴ θερμότης στερεῶν καὶ ὑγρῶν . . . . .	111
18. Ζυγὸς μὲ ἀνίσους βραχίονας	50	41. Θερμότης καύσεως ἐνὸς καυσίμου	114
19. Ἰδιότητες τοῦ ζυγοῦ . . . . .	52	'Ασκήσεις . . . . .	116
20. Ἐννοια τῆς μάζης. Χρήσις τοῦ ζυγοῦ . . . . .	54	<b>VIII. — Μεταβολαὶ καταστάσεων.</b>	
21. Πυκνότης. Εἰδικὸν βᾶρος . . . . .	57	42 & 43. Τῆεις - πῆεις . . . . .	117
		44. Ἐξάτμισις. . . . .	122
		45. Ἰδιότητες τῶν ἀτμῶν . . . . .	125
		46 & 47. Βρασμὸς . . . . .	127
		'Ασκήσεις . . . . .	132





Έξωφυλλον ΠΕΝΑΣ ΜΑΛΑΜΑ



Έκδοσις Δ' 1970 (VI) - Αντίτυπα 90.000 - Σύμβασις 2038/13-4-70  
ΕΚΤΥΠΩΣΙΣ : Ι. ΔΙΚΑΙΟΣ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΞΙΑ : ΟΚΤΩΡΑΤΟΣ - ΚΟΥΚΙΑΣ



