

ΛΕΩΝΙΔΑ ΣΠ. ΛΙΩΚΗ

ΑΝΟΡΓΑΝΟΣ ΧΗΜΕΙΑ

Δ' καὶ Ε' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

XHMEI
= 260



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΕΚΔΟΣΕΩΣ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ
ΒΙΒΛΙΩΝ

002
ΚΛΣ
ΣΤ2Β
1695

8^w

ΣΤ

89

ΣΧΒ

Λιώκης, Λεωνίδας Σ.Π.

ΣΤ:

89

ΣΧΒ

Λιώκος, Λευκίδας Σ.Π.



ΑΝΟΡΓΑΝΟΣ ΧΗΜΕΙΑ

ΔΩΡΕΑ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Τὸ παρὸν βιβλίον δέον νὰ διαφυλα-
χθῇ καὶ διὰ τὴν Ε' τάξιν εἰς τὴν
όποιαν ἐπίσης θὰ χρησιμοποιηθῇ

ΛΕΩΝΙΔΑ Σ.Π. ΛΙΩΚΗ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΟΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
τ. Διευθυντοῦ τῆς Βαρβακείου Προτύπου Σχολῆς



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΟΡΓΑΝΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ

Δ' καὶ Ε' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΑΘΗΝΑΙ 1972

002
ΗΛΕ
ΕΤ2B
1695

Συντομία

- E. B. = ελδικὸν βάρος
Σ. Z. = σημεῖον ζέσεως
Σ. T. = σημεῖον τήξεως
Σ. Π. = σημεῖον πήξεως

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΧΑΝΔΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΑΤΟ

O. E. P. B.

αθ. αριθ. στοιχ. 9174 - 10 θεμ. 1078



ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΥΛΗ — ΕΝΕΡΓΕΙΑ — ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

Φύσις — "Υλη — Ενέργεια. — Τὰ πέριξ ἡμῶν ὑπάρχοντα σώματα, καθὼς καὶ αἱ ποικίλαι μεταβολαὶ αὐτῶν, ἀποτελοῦν ἐνιαῖον τι σύνολον, τὸ ὅποῖον λέγεται φύσις.

Ἡ οὐσία ἐκ τῆς ὁποίας συνίστανται τὰ σώματα γενικῶς λέγεται ὑλη, ἐνῷ ἡ αἰτία, ἡ ὁποίᾳ προκαλεῖ τὰς μεταβολὰς ἢ ἀλλοιώσεις αὐτῶν, δύναμά εσται ἐν ἐργειᾳ. Κύρια χαρακτηριστικὰ τῆς ὑλῆς εἰναι ὁ ὄγκος, ἡ μᾶζα, τὸ βάρος, τῆς δὲ ἐνεργείας ἡ ἴκανότης πρὸς παραγωγὴν ἔργου.

Φαινόμενα. — Φαινόμενα εἰς τὴν ἐπιστημονικὴν γλῶσσαν λέγονται αἱ μεταβολαὶ τῶν σωμάτων, αἱ προκαλούμεναι τῇ ἐπιδράσει διαφόρων αἰτίων. Οὕτως ἡ πτῶσις ἐνὸς λίθου, ὁ βραχμὸς τοῦ ὄρχετος, ἡ μαγνήτισις τοῦ σιδήρου, ἡ καῦσις τοῦ ξύλου, εἰναι διάφορα φαινόμενα.

Ἐκ τούτων ἀλλα μὲν ἔχουν παροδικὸν χαρακτῆρα, οὐδεμίαν δύμας ριζικὴν καὶ μόνιμον ἀλλοιώσιν τῆς ὑλῆς τῶν σωμάτων ἐπιφέρουν. Τοιαῦτα φαινόμενα εἰναι: ἡ μεταβολὴ τοῦ ὄρχετος εἰς πάγον ἢ ὑδρατμούς, διότι διὰ θερμάνσεως τοῦ πάγου ἡ ψύξεως τῶν ὑδρατμῶν ἐπανέρχεται τὸ ὄρχον εἰς τὴν προτέραν του κατάστασιν· ἡ διάλυσις τοῦ ἀλατος εἰς τὸ ὄρχον, διότι δι’ ἔξατμίσεως τοῦ ὄρχετος ἀναλαμβάνομεν τὸ ἀλατον κλπ. Τὰ φαινόμενα ταῦτα λέγονται φυσικὰ φαινόμενα καὶ τὰ ἔξετάζει ἡ ἐπιστήμη, ἡ ὁποίᾳ καλεῖται Φυσική.

"Αλλα δύμας φαινόμενα ἐπιφέρουν μόνιμον ἀποτέλεσμα, διότι προκαλοῦν ριζικὴν μεταβολὴν εἰς τὰ σώματα καὶ οὕτω μεταβάλλονται ταῦτα εἰς ἀλλα ἐντελῶς διαφορετικά. Τοιαῦτα φαινόμενα εἰναι: ἡ καύσις τοῦ ξύλου, μετὰ τὴν ὁποίαν ἀπομένει ποσόν τι τέφρας, ἐκ τῆς ὁποίας εἰναι ἀδύνατον νὰ λάβωμεν ἐκ νέου τὸ ξύλον, ἐξ οὗ προῆλθεν ἡ μετατροπὴ τοῦ γλεύκους εἰς οἶνον καὶ τούτου εἰς δέρος, κλπ. Τὰ φαινόμενα ταῦτα καλοῦνται χρημικὰ φαινόμενα, ἡ δὲ ἐπιστήμη, ἡ ὁποίᾳ τὰ ἔξετάζει, δύναμά εσται Χημεία.

Ίδιότητες. — Συγχρίνοντες τὰ διάφορα σώματα μεταξύ των, π. χ. τὸ ἀλατον, τὸ θεῖον, τὸ σάκχαρον, τὸ ὄρχον, τὸ φωταέριον, κλπ. παρατηροῦμεν ὅτι διαφέρουν μεταξύ των κατὰ τὴν φυσικὴν κατάστασιν, τὸ χρῶμα, τὴν γεῦσιν κλπ. 'Αφ' ἔτερου γνωρίζομεν ὅτι ὅλα τὰ σώματα

έχουν βάρος, θερμαίνομενα δὲ διαστέλλονται. Ἡ φυσικὴ κατάστασις τῶν σωμάτων, τὸ χρῶμα των, ἡ γεῦσις των, ἡ ὀσμή των, ἡ πυκνότης των, τὸ βάρος, τὸ διασταλτὸν κ. ἄ., δηλαδὴ οἱ διάφοροι τρόποι, ὑπὸ τούς ὅποιους τὰ σώματα ὑποπίπτουν εἰς τὰς αἰσθήσεις μας καὶ γίνονται ἀντιληπτὰ ὑφ' ἡμῶν, λέγονται ἵδιοτης τε εἰς τῶν σωμάτων.

Καὶ ἄλλαι μὲν ἔξ αὐτῶν εἶναι κοιναὶ εἰς ὅλα τὰ σώματα ἀνεξαρέτως, ὅπως εἶναι τὸ βάρος καὶ τὸ διασταλτὸν αὐτῶν, λέγονται δὲ γενικαὶ ἵδιοτης τε εἰς τῶν σωμάτων. ἄλλαι ὅμως, ὅπως εἶναι ἡ φυσικὴ κατάστασις, τὸ χρῶμα, ἡ ὀσμή, ἡ γεῦσις, ἡ πυκνότης, διαφέρουν ἀπὸ σώματος εἰς σῶμα καὶ ὀνομάζονται καρακτηριστικαὶ ἵδιοτης τε εἰς τῶν σωμάτων. Αἱ χρακτηριστικαὶ ἰδιότητες τῶν σωμάτων λέγονται καὶ φυσικαὶ ἵδιοτης τε εἰς, καθόσον αἱ μεταβολαὶ των δὲν ἀλλοιώνουν τὴν φύσιν τῶν σωμάτων. Ἐνῷ ἰδιότητες τινές, ὅπως εἶναι ἡ καῦσις κ. ἄ., λέγονται χημικαὶ ἵδιοτης τε εἰς, διότι προκαλοῦν τὴν ριζικὴν μεταβολὴν τῆς φύσεως τῶν σωμάτων.

Σκοπὸς τῆς Χημείας. — Χημεία εἶναι ἡ ἐπιστήμη, ἡ ὅποια ἀσχολεῖται μὲ τὴν ὅλην τῶν διαφόρων σωμάτων, ἔξετάζουσα τὴν σύστασιν αὐτῆς, τὰς ἰδιότητάς της, καθὼς καὶ τὰς ωιζικὰς μεταβολάς, (τὰ χημικὰ φαινόμενα), τὰς ὅποιας ὑφίσταται, ὑπὸ τὴν ἐπιδρασιν διαφόρων αἰτίων. Ἔπι πλέον δὲ ἔξετάζει τὸν τρόπον τῆς παρασκευῆς τῶν διαφόρων σωμάτων καὶ τὰς πρακτικὰς ἐφαρμογὰς αὐτῶν.

ΑΠΛΑ ΣΩΜΑΤΑ "Η ΣΤΟΙΧΕΙΑ

'Ἐκ τῆς πληθύος τῶν περὶ ἡμᾶς ὑλικῶν σωμάτων ὑπάρχουν τινά, τὰ ὅποια δὲν κατέστη δυνατόν, δι' οὐδενὸς τρόπου, νὰ ἀποσυντεθοῦν εἰς ἄλλα ἀπλούστερα συστατικά. Τὰ σώματα αὐτὰ λέγονται ἀπλὰ σώματα ἡ στοιχεῖα.

Τὰ στοιχεῖα εἶναι σχετικῶς πολὺ διάφορα, μόλις ἐκατὸν περίπου καὶ διαιροῦνται εἰς δύο μεγάλας κατηγορίες, τὰ μέταλλα καὶ τὰ ἀμέταλλα. Τὰ μέταλλα εἶναι σώματα στερεά, πλὴν τοῦ ὑδραργύρου, ὃ ὅποιος εἶναι ὑγρός, εἰς τὴν συνήθη θερμοκρασίαν. "Ἔχουν λάχμψιν τινὰ ἰδιαιτέραν, λεγομένην μεταλλικήν, εἶναι καλοὶ ἀγωγοὶ τῆς θερμότητος καὶ τοῦ ἡλεκτρισμοῦ, δύνανται εὐκόλως νὰ μεταβληθοῦν εἰς ἐλάσματα καὶ σύρματα καὶ ἔχουν κατὰ τὸ πλεῖστον μεγάλην πυκνότητα. Τὰ ἀμέταλλα εἶναι σώματα δέρια ἡ στερεά, ἐκτὸς τοῦ βρωμίου, τὸ ὅποιον

είναι ίνγρον· δὲν ἔχουν γενικῶς λάμψιν μεταλλικήν, εἰναι κακοὶ ἀγωγοὶ τῆς θερμότητος καὶ τοῦ ἡλεκτρισμοῦ, δὲν μεταβάλλονται εἰς ἐλάσματα ή σύρματα καὶ ἔχουν μικρὰν πυκνότητα.

ΜΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑΙ ΕΝΩΣΕΙΣ

Διὰ τοῦ συνδυασμοῦ τῶν στοιχείων παράγεται ἄπειρον πλῆθος σωμάτων, τὰ ὅποια δυνατὸν νὰ εἰναι, ἀναλόγως τῶν συνθηκῶν, εἴτε μηχανικὰ μίγματα, εἴτε χημικαὶ ἑνώσεις (σύνθετα σώματα).

Μηχανικὰ μίγματα. — 'Ο σιδήρος καὶ τὸ θεῖον εἰναι δύο στερεὰ στοιχεῖα, τὸ μὲν πρῶτον μέταλλον, τὸ δὲ δεύτερον ἀμέταλλον.

Λάβωμεν ρινίσματα σιδήρου, ἔχοντα χρῶμα τεφρόχρονυν καὶ κόνιν θείου, ἔχουσαν χρῶμα κίτρινον, καὶ ἀναμίξωμεν αὐτὰ καλῶς, ὑπὸ οἰασδήποτε ἀναλογίας. Θὰ ἐπιτύχωμεν σῶμα τι, τὸ ὅποιον ἔχει τὰς ἰδιότητας τόσον τοῦ σιδήρου ὅσον καὶ τοῦ θείου. Εἰς τὸ σῶμα τοῦτο δυνάμεθα νὰ διαχρίνωμεν καλῶς διὰ μεγεθυντικοῦ φακοῦ καὶ τοὺς κόκκους τοῦ σιδήρου καὶ τοὺς κόκκους τοῦ θείου. Εἰναι δὲ εὔκολον νὰ ἀποχωρίσωμεν τὰ συστατικά του, εἴτε δι' ἐνὸς μαγνήτου, ὁ ὅποιος ἔλκει μόνον τὸν σιδήρον, εἴτε διὰ διθειάνθρακος, ὁ ὅποιος διαλύει μόνον τὸ θεῖον. Διαπιστοῦμεν ἐπὶ πλέον ὅτι κατὰ τὴν ἀνάμιξιν τοῦ σιδήρου μετὰ τοῦ θείου, οὐδὲν θερμικὸν φαινόμενον παράγεται. Τὸ ληφθὲν προϊὸν κατὰ τὸ ἀνωτέρω πείραμα λέγεται μηχανικὸν μῆγμα ή ἀπλῶς μῆγμα σιδήρου καὶ θείου.

Χημικαὶ ἑνώσεις. — Εἰσάγομεν ἐντὸς δυστήκτου δοκιμαστικοῦ σωλῆνος μῆγμα 7 γραμμαρίων ρινισμάτων σιδήρου καὶ 4 γραμμαρίων κόνιν θείου καὶ θερμαίνομεν διὰ λύχνου τὸ κάτω ἄκρον τοῦ σωλῆνος, τὸ ὅποιον δὲν θὰ βραδύνῃ νὰ ἐρυθροπυρωθῇ. 'Απομακρύνομεν τότε τὸν σωλῆνα ἀπὸ τὴν φλόγα. Θὰ παρατηρήσωμεν ὅτι ἡ διαπύρωσις μεταδίδεται ταχέως εἰς ὅλην τὴν μᾶζαν τοῦ περιεχομένου τοῦ σωλῆνος, ἐξ οὐ ἀποδεικνύεται ὅτι ἔκλύεται μεγάλη ποσότης θερμότητος. Μετὰ τὴν ἀπόψυξιν λαμβάνομεν προϊὸν τι μέλαν, τὸ ὅποιον ζυγίζει 11 γραμμάρια ($7 + 4$) καὶ εἰναι ὅλως διάφορον τοῦ σιδήρου καὶ τοῦ θείου. Οὕτε διὰ τοῦ φακοῦ δυνάμεθα νὰ διαχρίνωμεν κόκκους σιδήρου ή θείου, οὕτε ὁ μαγνήτης ή διθειάνθραξ ἔχουν καμμίαν ἐπιδρασιν ἐπ' αὐτοῦ, τὰ δὲ συστατικά του δυσκόλως δύνχνται νὰ ἀποχωρίσοῦν δι' ἄλλων μέσων.

'Ἐπὶ πλέον παρατηροῦμεν ὅτι, ἐὰν λάβωμεν ἀναλογίας σιδήρου καὶ θείου διαφόρους τῶν ἀνωτέρω, θὰ ἔχωμεν μετὰ τὸ πείραμα ὑπόλειμμά τι

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

σιδήρου ἢ θείου. Τὸ σῶμα τοῦτο, τὸ ὅποῖον ἐσχηματίσθη, ὑπὸ ἔκλυσιν θερμότητος, ἐκ σιδήρου καὶ θείου, ληφθέντων ὑπὸ ὡρισμένας ἀναλογίας καὶ τὸ ὅποῖον ἔχει ἰδιότητας ἐντελῶς διαφόρους τῶν συστατικῶν του, δύναμά τεται θειοῦ χριστοῦ σίδηρος καὶ εἶναι χημικὴ ἐνώσις σιδήρου καὶ θείου.

Διαφοραὶ μίγματος καὶ χημικῆς ἐνώσεως. — Τὰ ἀνωτέρω δύο πειράματα μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ διακρίνωμεν τὰς διαφορὰς μεταξὺ μίγματος καὶ χημικῆς ἐνώσεως, αἱ ὅποιαι εἶναι αἱ ἔξης :

Ἐἰς τὰ μίγματα τὰ συστατικὰ στοιχεῖα, λαμβανόμενα ὑπὸ οἰασδήποτε ἀναλογίας, διατηροῦν τὰς ἰδιότητάς των καὶ δύνανται νὰ ἀποχωρισθοῦν σχετικῶς εὐκόλως. Ἡ δὲ ἀνάμιξις τῶν συστατικῶν των δὲν συνοδεύεται ὑπὸ θερμικοῦ τίνος φαινομένου.

Αἱ χημικαὶ ἐνώσεις τῶν στοιχείων ἔχουν ἰδιότητας τελείως διαφόρους τῶν συστατικῶν των, τὰ ὅποια λαμβάνονται πάντοτε ὑπὸ ὡρισμένας ἀναλογίας βαρῶν καὶ δυσκόλως δύνανται νὰ ἀποχωρισθοῦν. Ἐπὶ πλέον αἱ χημικαὶ ἐνώσεις συνοδεύονται πάντοτε, εἴτε ἀπὸ ἔκλυσιν, εἴτε ἀπὸ ἀπορρόφησιν θερμότητος. Ἔχουν δὲ σταθερὸν σημεῖον τήξεως, πήξεως, βρασμοῦ, ὑγροποιήσεως, ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὰ μίγματα.

ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Αἱ χημικαὶ ἐνώσεις τῶν στοιχείων γίνονται ἐπὶ τῇ βάσει ὡρισμένων νόμων, οἱ ὅποιοι καθορίζουν τὰς ἀναλογίας τούτων, εἴτε κατὰ βάρος, εἴτε κατ’ ὅγκον. Οἱ νόμοι οὗτοι εἶναι οἱ ἔξης :

Νόμος τῆς ἀφθαρσίας τῆς ὥλης (Lavoisier). — Πρῶτοι οἱ "Ελληνες φιλόσοφοι διετύπωσαν τὸ ἀξίωμα τῆς ἀφθαρσίας τῆς ὥλης, ὑπὸ τὴν ἔννοιαν ὅτι ἡ ὥλη δὲν δύναται οὔτε γὰρ καταστραφῆ, οὔτε νὰ δημιουργηθῇ ἐκ τοῦ μηδενός *". Τὴν ἀλήθειαν τοῦ ἀξιώματος τούτου ἐπεβεβίωσε πειραματικῶς πρῶτος ὁ Lavoisier (1775) διὰ τοῦ ζυγοῦ, βραδύτερον δὲ πολλοὶ ἄλλοι δι' ἀκριβεστάτων πειραμάτων. Οὕτω σήμερον τὸ ἀξίωμα αὐτὸν ἀποτελεῖ νόμον βασικὸν τῆς Χημείας, διατυπούμενον οὕτω : « Εἰς πᾶσαν χημικὴν ἀντίδρασιν (μεταβολήν), τὸ βάρος τῶν ἀντιδρώντων σωμάτων ισοῦται πρὸς τὸ βάρος τῶν προϊόντων τῆς ἀντιδράσεως ». Οὕτως ἐὰν συνθέσωμεν 56 γραμμ. σιδήρου καὶ 32 γραμμ. θείου, λαμβάνομεν 88 γραμμ. θειούχου σιδήρου.

* Δημόκριτος κ. ἄ.

Σημείωσις. — 'Επιπολαίως ἔξεταζόμενος ὁ νόμος οὗτος φαίνεται εύρισκόμενος εἰς ἀντίθεσιν πρὸς τὰ καθημερινὰ γεγονότα, διότι πραγματικῶς εἰς τινας περιπτώσεις ἡ ὥλη φαίνεται ὅτι καταστρέφεται, ὡς π. χ. κατὰ τὴν καῦσιν τοῦ ἄνθρακος. Τοῦτο ὅμως συμβαίνει, διότι κατὰ τὴν καῦσιν ταύτην σχηματίζεται διοξείδιον τοῦ ἄνθρακος, τὸ δποῖον ὃς ἀέριον ἐκφεύγει εἰς τὸν ἀέρα καὶ φαίνεται οὕτως ὅτι ὁ ἄνθραξ κατεστράφη. 'Èαν ὅμως καύσωμεν τὸν ἄνθρακα ἐντὸς κλειστοῦ δοχείου, περιέχοντος ἀνάλογον ποσότητα δξυγόνου ἢ ἀέρος, καὶ ζυγίσωμεν τοῦτο πρὸ καὶ μετὰ τὴν καῦσιν, θὰ εὑρωμεν διτὶ τὸ βάρος του μένει τὸ αὐτό.

Νόμος τῶν σταθερῶν λόγων (Proust). — Εύρεθη πειραματικῶς ὅτι πρὸς παραγωγὴν ὑδατος ἐνοῦνται πάντοτε τὰ στοιχεῖα ὑδρογόνον καὶ δξυγόνον ὑπὸ τὴν ἀναλογίαν 2 μερῶν βάρους ὑδρογόνου πρὸς 16 μέρη βάρους δξυγόνου. Γενικῶς δὲ ἔξηκριβώθη ὅτι εἰς ἐκάστην χημικὴν ἔνωσιν ὑπάρχει πάντοτε σταθερὰ ἀναλογία βαρῶν τῶν στοιχείων, τὰ δποῖα τὴν ἀποτελοῦν. 'Èαν δὲ τυχὸν ἀναμιχθοῦν τὰ στοιχεῖα ὑπὸ ἀναλογίαν διάφορον τῆς ἀπαιτουμένης, τότε τὸ ἐν περισσείᾳ ληφθὲν στοιχεῖον παραμένει μετὰ τὸ τέλος τῆς ἀντιδράσεως ἀδέσμευτον. 'Èκ τῶν παρατηρήσεων αὐτῶν συνάγεται ὁ νόμος τῶν σταθερῶν ἀναλογιῶν βαρῶν, διατυπωθεὶς ὑπὸ τοῦ Γάλλου χημικοῦ Proust, ὡς ἔξης: «Οἱ λόγοι τῶν βαρῶν δύο ἢ περισσοτέρων στοιχείων, τὰ δποῖα ἐνοῦνται μεταξύ των διὰ νὰ σχηματίσουν ὠρισμένην χημικὴν ἔνωσιν, εἶναι σταθεροί ». 'Εκάστη ἔνωσις ἐπομένως, καθ' οίονδήποτε τρόπον καὶ ἀν παρεσκευάσθη, ἔχει πάντοτε τὴν αὐτὴν σύνθεσιν. Οὕτω 18 γραμ. ὑδατος καθαροῦ, εἴτε τοῦτο ἐλήφθη δι' ἀποστάξεως φυσικοῦ ὑδατος, εἴτε διὰ καύσεως ὑδρογόνου εἰς τὸν ἀέρα ἢ τὸ δξυγόνον, ἀποτελοῦνται πάντοτε ἐκ 2 γραμμαρίων ὑδρογόνου καὶ 16 γραμμάρια δξυγόνου.

Νόμος τῶν ἀπλῶν πολλαπλασίων (Dalton). — Πολλάκις δύο στοιχεῖα, ἐνούμενα μεταξύ των, σχηματίζουν περισσοτέρας τῆς μιᾶς ἔνώσεις. Οὕτως ὁ ἄνθραξ καὶ τὸ δξυγόνον σχηματίζουν δύο ἔνώσεις: τὸ μονοξείδιον τοῦ ἄνθρακος καὶ τὸ διοξείδιον τοῦ ἄνθρακος. Καὶ εἰς μὲν τὸ μονοξείδιον ἐνοῦνται 12 γραμμάρια ἄνθρακος πρὸς 16 γραμμάρια δξυγόνου, εἰς δὲ τὸ διοξείδιον ἐνοῦνται 12 γραμμάρια ἄνθρακος πρὸς 32 γραμμάρια δξυγόνου. Βλέπομεν δηλαδὴ ὅτι, εἰς τὰς δύο ταύτας ἔνώσεις, διὰ τὸ αὐτὸν βάρος ἄνθρακος (12 γραμ.), τὰ βάρη τοῦ δξυγόνου εἶναι 16 γραμ. καὶ 32 γραμ., ἥτοι ἔχουν μεταξύ των λόγον 1 : 2. 'Èκ τῆς με-

λέπτης πλείστων ὅσων παρομοίων παραδειγμάτων συνήγαγεν ὁ "Αγγλος χημικός Dalton τὸν νόμον τῶν ἀπλῶν πολλαπλασίων, διατυπούμενον ὡς ἔξῆς : « "Οταν δύο στοιχεῖα ἐνοῦνται πρὸς σχηματισμὸν διαφόρων χημικῶν ἐνώσεων, τὰ βάρη τοῦ ἐνὸς στοιχείου, τὰ ὄποια ἐνοῦνται μετὰ τοῦ αὐτοῦ βάρους τοῦ ἀλλού στοιχείου, ἔχουν σχέσιν ἀπλῶν ἀκεραίων πολλαπλασίων, ήτοι βαίνουν ὡς οἱ ἀριθμοὶ 1, 2, 3, . . . ». »

Νόμος τῶν ἀερίων ὅγκων (Gay - Lussac). — Οἱ ἀνωτέρω ἔξετασθεντες νόμοι ἀφοροῦν εἰς τὰς κατὰ βάρος ἀναλογίας τῶν στοιχείων, ὑπὸ τὰς ὄποιας ἐνοῦνται χημικῶς μεταξύ των. 'Ο Gay - Lussac ἔξετασε τὰς σχέσεις τῶν ὅγκων, ὑπὸ τὰς ὄποιας συντίθενται τὰ ἀέρια στοιχεῖα πρὸς σχηματισμὸν χημικῶν ἐνώσεων, ὑπὸ τὴν προϋπόθεσιν ὅτι οὗτοι ἔχουν μετρηθῆ ὑπὸ τὰς αὐτὰς συνθήκας πιέσεως καὶ θερμοκρασίας. Οὕτως εὑρεν ὅτι :

- 1 ὅγκος ὑδρογόνου + 1 ὅγκος χλωρίου δίδουν 2 ὅγκους ὑδροχλωρίου (1 : 1 : 2)
- 2 ὅγκοι ὑδρογόνου + 1 ὅγκος δεξιγόνου δίδουν 2 ὅγκους ὑδρατμῶν (2 : 1 : 2)
- 3 ὅγκοι ὑδρογόνου + 1 ὅγκος ἀζώτου δίδουν 2 ὅγκους ἀμμωνίας (3 : 1 : 2)

'Εκ τῶν παραδειγμάτων τούτων καὶ ἀλλών πολλῶν παρομοίων συνήγαγεν ὁ Gay - Lussac τὸν νόμον, ὁ ὄποιος φέρει τὸ δινομά του καὶ διατυποῦται ὡς ἔξῆς : « "Οταν δύο ἀέρια στοιχεῖα ἐνοῦνται πρὸς σχηματισμὸν χημικῆς τίνος ἐνώσεως, ἡ σχέσις τῶν ὅγκων των εἶναι ἀπλῆ καὶ σταθερά. Ἐάν δὲ τὸ προϊὸν τῆς ἐνώσεως ταύτης εἶναι ἀέριον, τότε καὶ ὁ ὅγκος αὐτοῦ εὐρίσκεται εἰς σχέσιν ἀπλῆν πρὸς τοὺς ὅγκους τῶν ἐνουμένων ἀερίων στοιχείων, εἶναι δὲ πάντοτε διπλάσιος τοῦ ὅγκου τοῦ ἀερίου, τοῦ εὐρισκομένου ὑπὸ τὴν μικροτέραν ἀναλογίαν ». »

ATOMIKH ΘΕΩΡΙΑ

Άτομα. — 'Υπὸ τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων φιλοσόφων καὶ ἴδιως τοῦ Δημοκρίτου διετυπώθη ἡ ὑπόθεσις ὅτι ἡ ὥλη δὲν εἶναι ἐπ' ἄπειρον διαιρετή, ἀλλ' ἀποτελεῖται ἀπὸ μικρότατα ἀτμῆτα σωμάτια, τὰ ὄποια διὰ τὸν λόγον αὐτὸν ἐκλήθησαν ἄτομα. Τὴν ὑπόθεσιν ταύτην τῶν ἀτομικῶν λεγομένων φιλοσόφων διεμόρφωσε κατὰ τὰς ἀρχὰς τοῦ παρελθόντος αἰώνος ὁ Δάλτων εἰς ἐπιστημονικὴν θεωρίαν — τὴν ἀτομικὴν θεωρίαν — τῆς ὄποιας τὴν ἀλήθειαν ἀπέδειξεν ἔκτοτε ἡ νεωτέρα ἐπιστήμη. Οὕτω σήμερον δεχόμεθα ὅτι ἔχαστον στοιχείον ἀποτελεῖται ἀπὸ ἀπειροελάχιστα σωματίδια — τὰ ἄτομα — μὴ περαιτέρω δικι-

ρετά, ούτε διὰ μηχανιῶν, ούτε διὰ φυσικῶν, ούτε διὰ χημικῶν μέσων καὶ ἐπομένως ἀφθαρτα. Τὰ ἄτομα ἑκάστου στοιχείου εἰναι ὅμοειδῆ καὶ τοῦ αὐτοῦ πάντοτε βάρους, ἐνῷ τὰ ἄτομα τῶν διαφόρων στοιχείων ἔχουν διάφορον βάρος. 'Πάρχουν δὲ τόσα εἴδη ἀτόμων ὅσα εἰναι καὶ τὰ στοιχεῖα.

Μόρια. — Διαιροῦντες τὴν ὥλην διὰ μηχανιῶν ἢ φυσικῶν μέσων φθάνομεν εἰς μικρότατα τεμαχίδια — τὰ μόρια — ἀποτελοῦντα τὴν μικροτέραν μονάδα, ὑπὸ τὴν ὁποίαν στοιχεῖον τι ἡ χημικὴ ἔνωσις δύναται νὰ ὑπάρξῃ εἰς ἐλευθέραν κατάστασιν.

Τὰ μόρια τῶν χημικῶν στοιχείων ἀποτελοῦνται ἐξ ὅμοειδῶν ἀτόμων, τῶν μὲν περισσοτέρων ἀμετάλλων ἐκ δύο, τῶν δὲ εὐγενῶν λεγομένων ἀερίων καὶ τῶν μετάλλων ἐξ ἑνὸς μόνον ἀτόμου. Εἰς τὴν τελευταίαν ταύτην περίπτωσιν κι ἔννοιαι τοῦ ἀτόμου καὶ τοῦ μορίου ταυτίζονται.

Τὰ μόρια τῶν χημικῶν ἔνώσεων ἀποτελοῦνται ἐξ ἀνομοειδῶν ἀτόμων καὶ εἰναι ὅλα ὅμοια μεταξὺ των, ἐνῷ εἰς τὰ μίγματα ὑπάρχουν διαφόρων εἰδῶν μόρια. Οὕτως εἰς τὸ ἀπεσταγμένον ὕδωρ, τὸ ὄποιον εἰναι χημικῶς καθαρόν, ὑπάρχουν μόνον μόρια ὕδατος, ἐνῷ εἰς τὸ θαλάσσιον ὕδωρ, τὸ ὄποιον εἰναι μῆγμα, ὑπάρχουν μόρια ὕδατος καὶ μόρια ἀλάτων.

Νόμος τοῦ Avogadro. — Εἶναι γνωστὸν ἐκ τῆς Φυσικῆς ὅτι, ὅλα τὰ ἀέρια, διὰ μεταβολῆς τῆς πλέσεως καὶ τῆς θερμοκρασίας, μεταβάλλονται κατ' ὅγκον ὁμοιομόρφως, δηλαδὴ κατὰ τὸ αὐτὸ ποσοστόν. 'Εκ τοῦ γεγονότος τούτου παρακινηθεὶς ὁ Ἰταλὸς χημικὸς Avogadro, διετύπωσε τὸ 1811 τὴν ἐξῆς ὑπόθεσιν : « 'Ισοι ὅγκοι ἀερίων, μετρηθέντες ὑπὸ τὰς αὐτὰς συνθήκας πιέσεως καὶ θερμοκρασίας, ἐμπεριέχουν τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν μορίων ». 'Η ὑπόθεσις αὕτη θεωρηθεῖσα λίαν τολμηρὰ ἀρχικῶς, κατεδείχθη βραδύτερον ὅτι ἔχει ἴσχυν νόμου.

'Ἐκ τοῦ νόμου τούτου συνάγεται τὸ συμπέρασμα ὅτι :

« 'Αφοῦ ἵσοι ὅγκοι ἀερίων περιέχουν τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν μορίων, ἔπειται ὅτι ὅλα τὰ μόρια τῶν ἀερίων ἔχουν τὸν αὐτὸν ὅγκον ».

'Ο νόμος τοῦ Avogadro ἴσχυει καὶ διὰ τὰ ἐν ἔξαερώσει εύρισκόμενα σώματα, ἥτοι διὰ τοὺς ἀτμοὺς αὐτῶν.

Ἄτομικὸν καὶ μοριακὸν βάρος. — 'Οσονδήποτε ἐλάχιστα ὡς πρὸς τὸν ὅγκον καὶ ἀν εἰναι τὰ ἄτομα καὶ τὰ μόρια, ὡς ὑλικὰ σώματα, ἔχουν καὶ αὐτὰ ὠρισμένον βάρος. 'Επειδὴ ὅμως τὸ ἀπόλυτον βάρος αὐτῶν εἶναι πάρα πολὺ μικρὸν καὶ δυσκολώτατα προσδιορίζεται, ἡρκέσθησαν νὰ ἀνεύρουν τὸ σχετικὸν βάρος αὐτῶν, λαβόντες κατ' ἀρχὰς ὡς μονάδα τὸ

βάρος τοῦ ἀτόμου τοῦ ὑδρογόνου, τοῦ ἐλαφροτέρου ὅλων τῶν στοιχείων. Βραδύτερον δῆμας εὑρέθη ὅτι εἶναι ἀκριβέστερον νὰ ληφθῇ ὡς μονάς τὸ 1/16 τοῦ βάρους ἐνὸς ἀτόμου ὁξυγόνου, τὸ ὅποῖον ἐλάχιστα διαφέρει ἀπὸ τὸ βάρος ἐνὸς ἀτόμου ὑδρογόνου. Οὕτω σήμερον δίδονται οἱ ἐπόμενοι δρισμοὶ διὰ τὰ σχετικὰ βάρη τῶν ἀτόμων καὶ τῶν μορίων :

« Ἀτομικὸν βάρος ἐνὸς στοιχείου εἶναι ὁ ἀριθμός, ὁ ὅποιος ἐκφράζει πόσας φοράς εἶναι βαρύτερον τὸ ἀτόμον τοῦ στοιχείου τούτου ἀπὸ τὸ 1 / 16 τοῦ βάρους ἐνὸς ἀτόμου ὁξυγόνου ».

« Μοριακὸν δὲ βάρος ἐνὸς στοιχείου ἡ χημικῆς τινος ἐνώσεως εἶναι ὁ ἀριθμός, ὁ ὅποιος ἐκφράζει πόσας φοράς τὸ μόριον τοῦ στοιχείου ἡ τῆς χημικῆς ἐνώσεως εἶναι βαρύτερον ἀπὸ τὸ 1 / 16 τοῦ βάρους ἐνὸς ἀτόμου ὁξυγόνου ».

Μὲ τὴν μονάδα αὐτὴν ὡς βάσιν τὸ ἀτομικὸν βάρος τοῦ ὑδρογόνου εἶναι ἵσον πρὸς 1,008, τὸ δὲ τοῦ ὁξυγόνου ἵσον πρὸς 16.

Τὰ ἀτομικὰ βάρη τῶν στοιχείων ἀναγράφονται εἰς τὸν σχετικὸν πίνακα (σελ. 13).

Γραμμομόριον — Γραμμοάτομον. — Τὸ μοριακὸν βάρος καὶ τὸ ἀτομικόν, ἐκπεφρασμένα εἰς γραμμάρια δίδονται μονάδας μάζης χρησίμους κατὰ τοὺς ὑπολογισμούς.

Γραμμομόριον στοιχείου ἡ χημικῆς ἐνώσεως εἶναι ποσότης τοῦ στοιχείου ἡ τῆς χημικῆς ἐνώσεως εἰς γραμμάρια ἵση πρὸς τὸ μοριακὸν βάρος, συμβολίζεται δὲ διὰ τοῦ Mol.

Γραμμομόριον δὲ στοιχείου εἶναι ποσότης τοῦ στοιχείου εἰς γραμμάρια ἵση πρὸς τὸ ἀτομικόν του βάρος.

Οὕτω τὸ γραμμοάτομον τοῦ ὁξυγόνου εἶναι 16 γραμμάρια, τὸ γραμμομόριόν του 32 γραμμάρια, τὸ δὲ γραμμομόριον τοῦ ὕδατος 18 γραμμάρια περίπου.

Γραμμομοριακὸς δύγκος. — Παρετηρήθη ὅτι τὰ γραμμομόρια ὅλων τῶν στοιχείων ἡ χημικῶν ἐνώσεων εἰς ἀέριον κατάστασιν, ὑπὸ κανονικὰς συνθήκας πιέσεως καὶ θερμοκρασίας, καταλαμβάνουν τὸν αὐτὸν δύγκον, ὁ ὅποῖος λέγεται: γραμμομοριακὸς δύγκος καὶ εἶναι ἵσος πρὸς 22,4 λίτρα περίπου.

Ἀριθμὸς τοῦ Ανογαδροῦ. — Εφόσον ὥρισμένος δύγκος ὅλων τῶν ἀέριων, ὑπὸ τὴν αὐτὴν πίεσιν καὶ θερμοκρασίαν, ἐμπεριέχει τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν μορίων, συμφώνως πρὸς τὸν νόμον τοῦ Ανογαδροῦ, ἔπειται ὅτι καὶ ὁ γραμμομοριακὸς δύγκος οἴουδήποτε ἀερίου σώματος, ὁ ὅποῖος εἶναι

ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (1959)

A _{τομ.} δριψ.	ΣΤΟΙΧΕΙΟΝ	Σύμ- βολον	Άτομι- κον βάρος	Άτομ. δριψ. (Z)	Άτομ. δριψ.	ΣΤΟΙΧΕΙΟΝ	Σύμ- βολον	Άτομι- κὸν βάρος	Άτομ. δριψ. (Z)
1	"Αζωτον	N	14,008	7	52	Μεντελέβιον	Mn	256	101
2	"Αίνστατινον	E	254	99	53	Μόλυβδαίνιον	Mo	95,95	42
3	"Ακτίνιον	Ac	227	89	54	Μόλυβδος	Pb	207,21	82
4	"Αμερίκιον	Am	241	95	55	Μπερκέλιον	Bk	243	97
5	"Ανθραξ	C	12,01	6	56	Νέτριον	Na	22,997	11
6	"Αντιμόνιον	Sb	121,76	51	57	Νέον	Ne	20,183	10
7	"Αργιλλιον	Al	26,97	13	58	Νεοδύμιον	Nd	144,27	60
8	"Αργόν	Ar	39,944	18	59	Νεπτούνιον	Np	239	93
9	"Αργυρος	Ag	167,88	47	60	Νικέλιον	Ni	58,69	28
10	"Αρσενικὸν	As	74,91	33	61	Νιμπέλιον ;	No	:	102
11	"Ασβεστιον	Ca	40,08	20	62	Ξένον	Xe	131,3	54
12	"Αστάτιον	At	210	85	63	"Ολμιον	Ho	164,94	67
13	"Αφνιον	Hf	178,6	72	64	"Οξυγόνον	O	16,000	8
14	Βανάδιον	V	50,95	23	65	"Οσμιον	Os	190,2	76
15	Βάριον	Ba	137,36	56	66	Ούρανιον	U	238,07	92
16	Βηρύλλιον	Be	9,02	4	67	Παλλάδιον	Pd	105,7	46
17	Βισμούθιον	Bi	209,00	83	68	Πλουτώνιον	Pu	239	94
18	Βολφράμιον	W	183,92	74	69	Πολώνιον	Po	210	84
19	Βόριον	B	10,82	5	70	Πρασινοδύμιον	Pr	140,92	59
20	Βρώμιον	Br	79,916	35	71	Προμήθειον	Pm	147	61
21	Γαδολίνιον	Gd	156,9	64	72	Πρωτακτίον	Pa	231	91
22	Γάλλιον	Ga	69,72	31	73	Πυρίτιον	Si	28,06	14
23	Γερμάνιον	Ge	72,60	32	74	Ράδιον	Ra	226,05	88
24	Δημήτριον	Ce	140,13	58	75	Ραδόνιον	Rn	222	86
25	Δυσπρόσιον	Dy	162,46	66	76	Ρήνον	Re	186,31	75
26	"Ερβιον	Er	167,2	68	77	Ρόδιον	Rh	102,91	45
27	Εύρωπιον	Eu	152,0	63	78	Ρουβίδιον	Rb	85,48	37
28	Ζιρκόνιον	Zr	91,22	40	79	Ρουθήνιον	Ru	101,7	44
29	"Ηλιον	He	4,003	2	80	Σαμαρίον	Sm	150,43	62
30	Θάλλιον	Tl	204,39	81	81	Σελήνιον	Se	78,96	34
31	Θεῖον	S	32,066	16	82	Σιδήρος	Fe	55,85	26
32	Θόριον	Th	232,12	90	83	Σκχιδίον	Sc	45,10	21
33	Θούλιον	Tm	169,4	69	84	Στρόντιον	Sr	87,63	38
34	"Ινδιον	In	114,76	49	85	Ταντάλιον	Ta	180,88	73
35	'Ιριδίον	Ir	193,1	77	86	Τελλούριον	Te	127,61	52
36	'Ιώδιον	I	126,92	53	87	Τέρβιον	Tb	159,2	65
37	Κάδμιον	Cd	112,41	48	88	Τεγχήτιον	Tc	99	43
38	Καίσιον	Cs	132,91	55	89	Τιτάνιον	Ti	47,90	22
39	Κάλιον	K	39,096	19	90	"Υδράργυρος	Hg	200,61	80
40	Καλιφόρνιον	Cf	244	98	91	"Υδρογόνον	H	1,008	1
41	Κασσίτερος	Sn	118,70	50	92	"Ττέρβιον	Yb	173,04	70
42	Κιούριον	Cm	242	96	93	"Γττέριον	Y	88,92	39
43	Κοβάλτιον	Co	58,94	27	94	Φέρμιον	Fm	255	100
44	Κολούμβιον	Cb	92,91	41	95	Φόθριον	F	19,00	9
45	Κρυπτόν	Kr	83,7	36	96	Φράγγιον	Fr	223	87
46	Λανθάνιον	La	138,92	57	97	Φωσφόρος	P	30,98	15
47	Λευκόχρυσος	Pt	195,23	78	98	Χαλκὸς	Cu	63,54	29
48	Λίθιον	Li	6,94	3	99	Χλώριον	Cl	35,457	17
49	Λουτέτσιον	Lu	174,99	71	100	Χρυσὸς	Au	197,2	79
50	Μαγγάνιον	Mn	54,92	25	101	Χρώμιον	Cr	52,01	24
51	Μαγνήσιον	Mg	24,32	12	102	Ψευδάργυρος	Zn	65,38	30

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

ίσος πρὸς 22,4 λίτρα, θὰ ἐμπερέχῃ τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν μορίων. Ὁ ἀ-
ριθμὸς αὐτός, καλούμενος ἀριθμὸς τοῦ Avogadro ή Loschmidt καὶ
παριστώμενος διὰ τοῦ γράμματος N, εὑρέθη ὅτι ἔχει τὴν ἑξῆς τιμήν :

$$N = 6,06 \cdot 10^{23}$$

Σχέσις μεταξὺ τοῦ μοριακοῦ βάρους καὶ τῆς σχετικῆς ὡς πρὸς τὸν ἀέρα πυκνότητος ἀερίου τινός. — Γνωρίζομεν ἐκ τῆς Φυσικῆς ὅτι ἡ ὥσ πρὸς τὸν ἀέρα σχετικὴ πυκνότης d ἀερίου τινός, εἶναι ἵση μὲ τὸν λόγον τοῦ βάρους B ἐνδὸς ὅγκου τοῦ ἀερίου τούτου πρὸς τὸ βάρος β ἵσου ὅγκου ἀέρος, (ὑπὸ τὰς αὐτὰς συνθήκας θερμοκρασίας καὶ πιέσεως), ἢτοι ἔχομεν $d = \frac{B}{\beta}$. ‘Τυποθέσωμεν τώρα ὅτι τὸ μοριακὸν βάρος ἐνδὸς ἀερίου εἶναι M. Τοῦτο σημαίνει ὅτι 22,4 λίτρα τοῦ ἀερίου τούτου, ὑπὸ κανονικὰς συνθήκας πιέσεως καὶ θερμοκρασίας, ζυγίζουν M γραμμάρια. ’Αλλ’ ὑπὸ τὰς αὐτὰς συνθήκας πιέσεως καὶ θερμοκρασίας 22,4 λίτρα ἀέρος ζυγίζουν $22,4 \times 1,293 = 28,96$ γραμμάρια, ἐφόσον γνωρίζομεν ὅτι 1 λίτρον ἀέρος ζυγίζει 1,293 γραμμάρια. ‘Επομένως ἡ σχετικὴ πυκνότης τοῦ ἐν λόγῳ ἀερίου θὰ εἴναι : $d = \frac{M}{28,96} \text{ ή } M = 28,96 d$

Διὰ τῶν τύπων αὐτῶν ὑπολογίζομεν (κατὰ προσέγγισιν) τὴν σχετικὴν πυκνότητα ἀερίου τινός, ὅταν γνωρίζωμεν τὸ μοριακὸν του βάρος, ή τὸ μοριακὸν του βάρος, ὅταν γνωρίζωμεν τὴν σχετικὴν πυκνότητά του.

Παράδειγμα. — Τὸ ἀέριον στοιχεῖον ὁξυγόνον ἔχει μοριακὸν βάρος 32, ἐπομένως ἡ σχετικὴ πυκνότης του θὰ εἴναι :

$$d = \frac{32}{28,96} = 1,1 \text{ περίπου.}$$

ΕΞΗΓΗΣΙΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Οἱ νόμοι τῆς Χημείας δύνανται νὰ ἑξηγηθοῦν ἀπλούστατα διὰ τῆς ἀτομικῆς θεωρίας καὶ τοῦ νόμου τοῦ Avogadro, ὡς ἔπειται :

Νόμος τῆς ἀφθαρσίας τῆς ὅλης. — “Οταν γίνεται μία ἀντίδρασις μεταξὺ διαφόρων σωμάτων, μόνον τὰ μόρια αὐτῶν ὑφίστανται μεταβολήν, τὰ ἄτομα δμως τῶν μορίων τούτων μένουν ἀθικτα καὶ ἀνασυντίθενται διὰ νὰ σχηματίσουν νέα μόρια, διάφορα τῶν ἀρχικῶν. ’Εφόσον δὲ τὰ ἄτομα ἔξ ὄρισμοῦ εἴναι ἀδιαίρετα καὶ ἀφθαρτα, ἔπειται ὅτι τὸ ἄθροισμα τῶν ἀτόμων, τὰ ὅποια λαμβάνουν μέρος εἰς μίαν ἀντίδρασιν,

Θὰ εἶναι ἵσον μὲ τὸ ἀθροισμα τῶν ἀτόμων τῶν προϊόντων τῆς ἀντιδράσεως. Τοῦτο ἔξηγεῖ τὸν νόμον τῆς ἀφθαρσίας τῆς ὄλης.

Νόμος τῶν σταθερῶν λόγων. — Ἐφόσον αἱ διάφοροι χημικαὶ ἑνώσεις ἀποτελοῦνται ἐκ μορίων ὅμοιών μεταξύ των, ἔπειται ὅτι αἱ ἀναλογίαι τῶν βαρῶν τῶν στοιχείων, ἐκ τῶν ὅποιων ἀποτελεῖται ἡ ἑνώσις κύτη, θὰ εἶναι αἱ αὐταὶ μὲ τὰς ἀναλογίας τῶν βαρῶν τῶν ἀτόμων, ἐκ τῶν ὅποιων ἀποτελεῖται ἐν μόριον αὐτῆς. Εἶναι δὲ τὰ βάρη τῶν ἀτόμων, ὡς γνωστόν, ἀμετάβλητα. Οὕτως ἐφόσον τὸ μόριον τοῦ ὄδατος ἀποτελεῖται ἐκ 2 ἀτόμων ὑδρογόνου βάρους 2 καὶ ἐξ ἑνὸς ἀτόμου ὁξυγόνου βάρους 16, ὁ λόγος τῶν βαρῶν τῶν στοιχείων τούτων θὰ εἶναι 2 : 16 ἢ 1 : 8. Τὸν λόγον αὐτὸν θὰ ἔχουν ἐπομένως καὶ τὰ βάρη ὑδρογόνου καὶ ὁξυγόνου οἰκαστήποτε ποσότητος ὄδατος, ἀποτελουμένης ἐξ ἀκεράτου ἀριθμοῦ μορίων. Τοῦτο λέγει καὶ ὁ νόμος τῶν σταθερῶν λόγων.

Νόμος τῶν ἀπλῶν πολλαπλασίων. — Προκειμένου νὰ συγκρίνωμεν δύο χημικὰς ἑνώσεις, ἀποτελουμένας ἐκ τῶν αὐτῶν στοιχείων, π. χ. τὸ μονοξείδιον καὶ τὸ διοξείδιον τοῦ ἄνθρακος, ἀρκεῖ νὰ συγκρίνωμεν τὰ μόρια αὐτῶν. Τὸ μόριον τοῦ μονοξείδιου τοῦ ἄνθρακος ἀποτελεῖται ἀπὸ 1 ἀτομον ἄνθρακος βάρους 12 καὶ ἐν ἀτομον ὁξυγόνου βάρους 16. Διὰ νὰ σχηματίσωμεν μίαν ἀληγον ἑνωσιν ἐκ τῶν δύο τούτων στοιχείων, περιέχουσαν περισσότερον ὁξυγόνον, θὰ πρέπει νὰ λάβωμεν τούλαχιστον 1 ἀτομον ἐξ αὐτοῦ ἐπὶ πλέον, ἐφόσον τὰ ἀτομα δὲν τέμνονται. Ἡ προσθήκη ὅμως ἑνὸς ἀτόμου ὁξυγόνου ἐπὶ πλέον, διπλασάζει τὴν ἀναλογίαν τοῦ στοιχείου τούτου, ἐνῷ ἡ ποσότης τοῦ ἄνθρακος μένει σταθερά. Οὕτως αἱ ἀναλογίαι τοῦ ἄνθρακος καὶ τοῦ ὁξυγόνου εἰς τὸ διοξείδιον τοῦ ἄνθρακος θὰ εἶναι 12 : 32 ἢ 12 : 2 × 16. Αὐτὸ ἀκριβῶς ἐκφράζει καὶ ὁ νόμος τῶν ἀπλῶν πολλαπλασίων.

Νόμος τῶν ἀερίων δγκων. — Συμφώνως πρὸς τὸν νόμον τοῦτον, ὅταν ἀερια στοιχεῖα ἀντιδρῶντα σχηματίζουν ἀεριον προϊόν, ἡ σχέσις τῶν δγκων των εἶναι ἀπλῆ, ὁ δὲ δγκος τοῦ ἀερίου προϊόντος εἶναι διπλάσιος τοῦ δγκου τοῦ ὑπὸ μικρότερον δγκον ἀντιδρῶντος ἀερίου. Κατὰ ταῦτα ἔχομεν :

$$\begin{array}{lll} 1 \text{ λίτρον } \text{ὑδρογόνου} + 1 \text{ λίτρον } \text{χλωρίου} & = 2 \text{ λίτρα } \text{ὑδροχλωρίου} \\ 2 \text{ λίτρα } \text{ὑδρογόνου} + 1 \text{ λίτρον } \text{όξυγόνου} & = 2 \text{ λίτρα } \text{ὑδρατμοῦ} \\ 3 \text{ λίτρα } \text{ὑδρογόνου} + 1 \text{ λίτρον } \text{άζωτου} & = 2 \text{ λίτρα } \text{ἀμμωνίας} \end{array}$$

'Αλλὰ κατὰ τὸν νόμον τοῦ Avogadro ἵσοι δγκοι ἀερίων ἐμπεριέχουν

τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν μορίων, ἐπομένως ἡ σχέσις τῶν μορίων τῶν ἀνωτέρω σωμάτων θὰ εἶναι ἡ ἔξῆς :

$$1 \text{ μόριον } \text{ὑδρογόνου} + 1 \text{ μόριον } \text{χλωρίου} = 2 \text{ μόρια } \text{ὑδρογλωρίου}$$

$$2 \text{ μόρια } \text{ὑδρογόνου} + 1 \text{ μόριον } \text{δεξιγόνου} = 2 \text{ μόρια } \text{ὑδρατοῦ}$$

$$3 \text{ μόρια } \text{ὑδρογόνου} + 1 \text{ μόριον } \text{ἄζωτου} = 2 \text{ μόρια } \text{ἀμμωνίας}$$

Γνωρίζομεν ἀφ' ἑτέρου ὅτι τὰ στοιχεῖα ὑδρογόνον, χλώριον, δεξιγόνον, ἄζωτον εἶναι διάτομα, ἵτοι ὅτι τὸ μόριον τῶν ἀποτελεῖται ἐκ 2 ἀτόμων. Ἐπομένως τὰς ἀνωτέρω ἀντιδράσεις δυνάμεθα νὰ παραστήσωμεν γραφικῶς ὡς ἀκολούθως :

1 μόριον



1 μόριον



2 μόρια



⊕ *Ἀτομον χλωρίου*

2 μόρια



1 μόριον



2 μόρια



⊕ *Ἀτομον ὕδρογόνου*

3 μόριο



1 μόριον



2 μόρια



⊕ *Ἀτομον ἄζωτου*



ΧΗΜΙΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

Ορισμοί. — Τὰ διάφορα χημικὰ φαινόμενα λέγονται καὶ γημικαὶ ἀντιδράσεις, κυριώτεραι δὲ ἐξ αὐτῶν εἶναι : ἡ χημικὴ σύνθεσις, ἡ χημικὴ ἀποσύνθεσις καὶ ἡ χημικὴ ἀντικατάστασις.

— Χημικὴ σύνθεσις λέγεται ἡ χημικὴ ἔνωσις δύο ἢ περισσότερων στοιχείων, πρὸς σχηματισμὸν νέου τινὸς συνθέτου σώματος.

— Χημικὴ ἀποσύνθεσις ἡ ἀνάλυσις καλεῖται, ἡ διασπασίς μιᾶς χημικῆς ἔνώσεως εἰς τὰ ἀποτελοῦντα αὐτὴν στοιχεῖα.

— Χημικὴ ἀντικατάστασις δὲ εἶναι τὸ χημικὸν φαινόμε-

νον, κατὰ τὸ ὄποῖον ἐν στοιχεῖον ἀντικαθιστᾶ ἔτερον εἰς μίαν χημικὴν ἔνωσιν.

— Χημική τις ἀντιδρασίς, ἀναλόγως τῶν συνθηκῶν, δύναται νὰ συμβῇ κατὰ δύο ἀντιθέτους διευθύνσεις. Οὕτω τὸ ὑπεροξείδιον τοῦ βαρίου, ἐνῷ εἰς τὴν θερμοκρασίαν τῶν 750° διασπᾶται εἰς δξείδιον βαρίου καὶ δξυγόνον, ἐπανασυντίθεται ἐκ τῶν προϊόντων τῆς διασπάσεως εἰς τοὺς 450° . Αἱ ἀντιδράσεις αὐταὶ ὀνομάζονται ἡ μφίδροι μοι.

Μέσα προκαλοῦντα τὰς ἀντιδράσεις. — Καταλύται. — Διὰ νὰ γίνῃ χημικὴ τις ἀντιδρασίς, ἀλλοτε μὲν ἀρκεῖ ἀπλῆ ἐπαφὴ τῶν σωμάτων, π. χ. τοῦ φωσφόρου καὶ τοῦ λιωδίου. Συνήθως ὅμως ἐπιτυγχάνεται διὰ τῆς ὑψώσεως τῆς θερμοκρασίας ἢ τῆς πιέσεως, διὰ τοῦ ἡλεκτρισμοῦ ἢ διὰ τοῦ φωτός.

Πολλάκις μία ἀντιδρασίς διευκολύνεται διὰ τῆς παρουσίας σώματός τινος, εἰς μικρὰς σχετικῶς ποσότητας, τὸ ὄποῖον δὲν λαμβάνει μέρος εἰς αὐτήν, ἀνευρίσκεται δὲ εἰς τὸ τέλος τῆς ἀντιδράσεως ἀμετάβλητον. Τὰ τοιαῦτα σάματα λέγονται καταλύται.

ΧΗΜΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ. — ΧΗΜΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ

Χημικὰ σύμβολα τῶν στοιχείων. — "Εκαστον στοιχείον παρίσταται γραφικῶς δι' ἐνὸς συμβόλου, τὸ ὄποῖον ἀποτελεῖται, εἴτε ἐκ τοῦ ἀρχικοῦ κεφαλαίου γράμματος τοῦ λατινικοῦ του δόνοματος, εἴτε ἐκ τοῦ ἀρχικοῦ τούτου γράμματος μεθ' ἐνὸς μικροῦ τοιούτου, ὅταν περισσότερα στοιχεῖα ἀρχίζουν ἐκ τοῦ αὐτοῦ γράμματος. Οὕτω τὸ δξυγόνον (Oxygenium) παρίσταται διὰ τοῦ συμβόλου O, τὸ ὑδρογόνον (Hydrogenium) διὰ τοῦ H, τὸ ἄζωτον (Nitrogenium) διὰ τοῦ N, τὸ νάτριον (Sodium) διὰ τοῦ Na, τὸ κάλιον (Kalium) διὰ τοῦ K, τὸ κάδμιον (Cadmium) διὰ τοῦ Cd κ.ο.κ. (Βλ. σχετικὸν πίνακα σελ. 13).

"Εκαστον σύμβολον παρίσταται κατὰ συνθήκην ἐν ἀτομον τοῦ στοιχείου καθὼς καὶ ὥρισμένον βάρος ἐξ αὐτοῦ, ἵσον πρὸς τὸ ἀτομικόν του βάρος. Οὕτω διὰ τοῦ συμβόλου O παρίσταται ἐν ἀτομον δξυγόνου καὶ συγχρόνως 16 μέρη βάρους αὐτοῦ.

"Οταν θέλωμεν νὰ παραστήσωμεν δύο ἢ περισσότερα ἀτομα ἐνὸς στοιχείου γράφομεν πρὸ τοῦ συμβόλου του τὸν ἀριθμὸν τῶν ἀτόμων ὡς συντελεστὴν ἢ μετὰ τὸ σύμβολον ἡς δείκτην. Π. χ. δύο ἀτομα δξυγόνου παρίστανται γραφικῶς διὰ 2O ἢ O_2 .

Χημικοὶ τύποι. — "Οπως τὰ στοιχεῖα παρίστανται γραφικῶς διὰ τῶν χημικῶν συμβόλων, οὕτω καὶ αἱ χημικαὶ ἐνώσεις παρίστανται διὰ τῶν χημικῶν τύπων. Διὰ νὰ γράψωμεν τὸν χημικὸν τύπον μιᾶς χημικῆς ἐνώσεως γράφομεν τὸ ἐν πλησίον τοῦ ὅλου τὰ σύμβολα τῶν στοιχείων, ἐκ τῶν ὅποιων ἀποτελεῖται τὸ μόριον τῆς ἐνώσεως ταύτης, δίδοντες εἰς ἔκαστον σύμβολον καὶ ἕνα δείκτην, ὁ ὅποιος γράφεται δεξιά του ἢνω ἦ κάτω, καὶ δεικνύει τὸν ἀριθμὸν τῶν ἀτόμων τοῦ στοιχείου τούτου. Οὕτως ὁ χημικὸς τύπος τοῦ ὄντος εἶναι H_2O , διότι τὸ μόριόν του ἀποτελεῖται ἀπὸ 2 ἀτομά ὑδρογόνου καὶ 1 ἀτομον ὑδρογόνου.

'Εὰν θέλωμεν νὰ παραστήσωμεν τὸ μόριον στοιχείου τινός, γράφομεν τὸ σύμβολον τοῦ στοιχείου τούτου καὶ πρὸς τὰ δεξιά του κάτω ἔνα δείκτην, δεικνύοντα ἀπὸ πόσα ἀτομα ἀποτελεῖται τὸ μόριόν του. Οὕτω τὸ μόριον τοῦ ὑδρογόνου παρίσταται διὰ O_2 , τοῦ φωσφόρου διὰ P_4 , τοῦ νάτριου διὰ Na .

'Εὰν πρόκειται περὶ περισσοτέρων μορίων ἐνὸς σώματος, γράφομεν πρὸ τοῦ χημικοῦ του τύπου ἕνα ἀριθμητικὸν συντελεστὴν π. χ. $2H_2O$ σημαίνει 2 μόρια ὑδρογόνου, $2O_2$ σημαίνει 2 μόρια ὑδρογόνου κ.ο.κ.

'Ο χημικὸς τύπος ἐνὸς σώματος κατὰ συνθήκην παριστάνει ἐν μόριον αὐτοῦ καὶ συγχρόνως ὥρισμένον βάρος ἢξ αὐτοῦ, ίσον πρὸς τὸ μοριακόν του βάρος. Οὕτω διὰ τοῦ τύπου H_2O παρίσταται ἐν μόριον ὑδρογόνου καὶ συγχρόνως 18 μέρη βάρους αὐτοῦ.

Υπολογισμὸς τοῦ μοριακοῦ βάρους. — 'Εφόσον τὸ μόριον σώματός τυνος ἀποτελεῖται ἀπὸ ἀτομα, ἔπειται ὅτι τὸ μοριακόν του βάρος θὰ εἶναι ίσον πρὸς τὸ ἀθροισμα τῶν βαρῶν τῶν ἀτόμων ἢξ ὡν συνίσταται τοῦτο. Πρὸς ὑπολογισμὸν ἐπομένως τῶν μοριακῶν βαρῶν τῶν ἀπλῶν ἢ συνθέτων σωμάτων, πρέπει νὰ γνωρίζωμεν τὸν μοριακόν των τύπων καὶ τὰ ἀτομικὰ βάρη τῶν στοιχείων, ἐκ τῶν ὅποιων ἀποτελεῖται. Π. χ. δι μοριακὸς τύπος τοῦ ὑδρογόνου εἶναι O_2 , τὸ δὲ ἀτομικὸν βάρος αὐτοῦ 16, ἐπομένως τὸ μοριακόν του βάρος θὰ εἶναι $16 \times 2 = 32$. 'Ο μοριακὸς τύπος τοῦ γλωρικοῦ καλίου εἶναι $KClO_3$, τὰ δὲ ἀτομικὰ βάρη τῶν στοιχείων του τὰ ἓξης : $K = 39$, $Cl = 35,5$, $O = 16$. 'Επομένως τὸ μοριακόν του βάρος θὰ εἶναι $39 + 35,5 + 16 \times 3 = 122,5$.

Υπολογισμὸς τῆς ἑκατοστιαίας συνθέσεως. — 'Εκατοστιαία σύνθεσις μιᾶς χημικῆς ἐνώσεως εἶναι τὸ ποσὸν ἑκάστου τῶν στοιχείων τῆς ἐνώσεως ταύτης εἰς ἔκαστον μέρη ἢξ αὐτῆς. Δυνάμεθα δὲ νὰ τὴν ὑπολογίσωμεν, ὅταν γνωρίζωμεν τὸν χημικὸν τῆς τύπον καὶ τὰ ἀτομικὰ βάρη

τῶν στοιχείων, ἔξ ῶν ἀποτελεῖται, διὰ τῆς μεθόδου τῶν τριῶν. Π. χ. διὰ νὰ εὔρωμεν τὴν ἑκατοστιαίαν σύνθεσιν τοῦ χλωρικοῦ καλίου KClO_3 , τοῦ ὄποιου τὸ μοριακὸν βάρος εἶναι 122,5 ὡς εἴδομεν ἀνωτέρω, σκεπτόμεθα ὡς ἔξης :

Εἰς τὰ 122,5 μ.β. KClO_3 περιέχονται 39 μ.β. K, 35,5 μ.β. Cl καὶ 48 μ.β. O. Εἰς τὰ 100 μ.β. KClO_3 θὰ ἐμπεριέχωνται ἀντιστοίχως X_1 , X_2 , X_3 βάρη τῶν ἀνωτέρω στοιχείων.

$$\text{Έπομένως θὰ ἔχωμεν : } X_1 = \frac{39 \times 100}{122,5} = 31,8 \% \text{ K,}$$

$$X_2 = \frac{35,5 \times 100}{122,5} = 29 \% \text{ Cl καὶ } X_3 = \frac{48 \times 100}{122,5} = 39,2 \% \text{ O.}$$

Αναλόγως δύναται νὰ ὑπολογισθῇ καὶ ἡ ἑκατοστιαία σύνθεσις καὶ ἀλλων σωμάτων, π. χ. τοῦ χλωριούχου νατρίου NaCl , τοῦ θειούχου διξέος H_2SO_4 κ.λ.π.

ΧΗΜΙΚΑΙ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

"Οπως τὰ στοιχεῖα παρίστανται γραφικῶς διὰ τῶν χημικῶν συμβόλων καὶ αἱ χημικαὶ ἐνώσεις διὰ τῶν χημικῶν τύπων, οὕτω καὶ αἱ χημικαὶ ἀντιδράσεις παρίστανται διὰ τῶν χημικῶν ἔξισώσεων. Καὶ εἰς μὲν τὸ ἀριστερὸν, μέλος ἑκάστης ἔξισώσεως γράφομεν τὰ σύμβολα ἢ τοὺς τύπους τῶν ἀλληλεπιδρώντων σωμάτων, εἰς δὲ τὸ δεξιὸν τὰ σύμβολα ἢ τοὺς τύπους τῶν προϊόντων τῆς ἀντιδράσεως.

Οὕτως ἡ παραγωγὴ τοῦ ὑδροχλωρίου ἐκ τῶν στοιχείων ὑδρογόνου καὶ χλωρίου παρίσταται διὰ τῆς ἔξισώσεως : $\text{H} + \text{Cl} = \text{HCl}$.

Ἡ παραγωγὴ τοῦ ὅδατος ἐκ τῶν στοιχείων ὑδρογόνου καὶ διξυγόνου ὑπὸ τῆς ἔξισώσεως : $2\text{H} + \text{O} = \text{H}_2\text{O}$. Καὶ ἡ παραγωγὴ τοῦ θειούχου σιδήρου ἐκ τῶν στοιχείων σιδήρου καὶ θείου ὑπὸ τῆς ἔξισώσεως :



Ἐπειδὴ δὲ τὰ στοιχεῖα ὑδρογόνον, χλώριον καὶ διξυγόνον περιλαμβάνουν εἰς τὴν μᾶζαν των μόρια, ἀποτελούμενα ἐκ δύο ἀτόμων, αἱ δύο πρῶται ἔξισώσεις, ὡς συντελούμεναι μεταξὺ τῶν μορίων τῶν στοιχείων καὶ οὐχὶ τῶν ἀτόμων, γράφονται ἀκριβέστερον οὕτω :



Ἐκάστη χημικὴ ἔξισωσις ἔχει συγχρόνως καὶ ποσοτικὴν σημασίαν, δεικνύουσα καὶ τὰ βάρη τῶν σωμάτων, τὰ ὄποια λαμβάνουν μέρος εἰς

τὴν ἀντίδρασιν. Οὕτως ἡ ἔξισωσις (1) σημαίνει ὅτι 56 γραμ. σιδήρου ἔνοῦνται μετὰ 32 γραμ. θείου, πρὸς σχηματισμὸν 88 γραμ. θειούγου σιδήρου.

Ἐάν δὲ τὰ ἀντιδρῶντα σώματα εἶναι ἀέρια ἢ ἀτμοί, ἡ χημικὴ ἔξισωσις δεικνύει καὶ τοὺς δγκους αὐτῶν. Οὕτως ἡ χημικὴ ἔξισωσις (2) δεικνύει ὅτι 1 δγκος ὑδρογόνου ἔνοῦται μεθ' ἐνὸς δγκου χλωρίου, πρὸς παραγωγὴν 2 δγκων ὑδροχλωρίου.

Θερμοχημικαὶ ἔξισώσεις. — Κατὰ τὰς χημικὰς ἀντιδράσεις, ἐκτὸς τῆς μεταβολῆς τῆς մῆλης τῶν σωμάτων, συμβαίνει πάντοτε καὶ μεταβολὴ τῆς ἐγκλειομένης χημικῆς ἐνέργειας αὐτῶν, οὕτως ὥστε τὰ προκύπτοντα νέα σώματα εἶναι συνήθως μὲν πτωχότερα, σπανιώτερον δὲ πλουσιώτερα εἰς ἐνέργειαν.

Ἡ διαφορὰ αὕτη τῆς ἐνέργειας τοῦ συστήματος, πρὸ καὶ μετὰ τὴν χημικὴν ἀντίδρασιν, μετατρέπεται εἰς θερμότητα, μετρουμένην εἰς θερμότητα (Cal.). Καὶ ἐὰν μὲν ἐλευθεροῦται ἐνέργεια, αἱ ἀντιδράσεις λέγονται ἐξ ὧθερμοι μοι καὶ ἡ ἐκλυομένη τότε θερμότης προστίθεται, ἐὰν δὲ ἀπορροφᾶται ἐνέργεια, αἱ ἀντιδράσεις λέγονται ἐνδόθερμοι μοι καὶ ἡ προσφερομένη ἔξωθεν ἐνέργεια ὑπὸ μορφὴν θερμότητος, ἀφαιρεῖται.

Αἱ τοιαῦται ἀντιδράσεις παριστῶνται δι' εἰδικῶν ἔξισώσεων, αἱ ὅποιαι καλοῦνται θερμόχημικαὶ εἰς ὥστεις.

Ἡ σύνθεσις τοῦ մծατος εἶναι μία ἔξωθερμος ἀντίδρασις καὶ σημειοῦται ὑπὸ τῆς θερμοχημικῆς ἔξισώσεως.



Ἐνῷ ἡ σύνθεσις τοῦ ὀκετυλενίου εἶναι ἐνδόθερμος ἀντίδρασις καὶ παρίσταται ὑπὸ τῆς θερμοχημικῆς ἔξισώσεως :



Σημείωσις. — Συνήθως τὸ σημεῖον τῆς ἰσότητος (=) εἰς τὰς χημικὰς ἔξισώσεις, ἀντικαθίσταται δι' ἐνὸς βέλους (→), τὸ ὅποῖον δεικνύει τὴν κατεύθυνσιν τῆς ἀντιδράσεως.

ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ — ΣΘΕΝΟΣ — PIZAI

Χημικὴ συγγένεια. — Χημικὴ συγγένεια λέγεται ἡ ἐντὸς τῶν στοιχείων ἐνυπάρχουσα ἐκλεκτικὴ τάσις πρὸς ἔνωσιν αὐτῶν μετ' ἄλλων στοιχείων, πρὸς σχηματισμὸν νέων σωμάτων.

Ἀναλόγως τῆς ζωηρότητος τῆς ἀλληλεπιδράσεως τῶν στοιχείων

δίδομεν καὶ ὡρισμένας διαβαθμίσεις εἰς τὴν χημικὴν συγγένειαν. Οὕτω λέγομεν ὅτι ὁ φωσφόρος ἔχει μεγαλυτέραν χημικὴν συγγένειαν μετὰ τοῦ ἰωδίου, μετὰ τοῦ ὄποιου ἐνοῦται ἀμα τῇ ἐπαφῇ, παρὰ μετὰ τοῦ θείου, πρὸς τὸ ὄποιον ἐνοῦται μόνον κατόπιν θερμάνσεως.

"Ἄλλα πάλιν στοιχεῖα πρὸς οὐδὲν ἄλλο στοιχεῖον ἐνοῦνται, διότι πρὸς οὐδὲν στοιχεῖον ἔχουν χημικὴν συγγένειαν. Τοιαῦτα εἶναι τὰ. εὑρίσκεν ἡ ἀέρια ἀργόν, νέον, ἥλιον κ.ἄ. τὰ ὄποια διὰ τὸν λόγον αὐτὸν γαρακτηρίζονται ὡς ἀδρανῆ στοιχεῖα.

Σθένος τῶν στοιχείων. — Σθένος τῶν στοιχείων λέγεται ὁ ἀριθμὸς τῶν ἀτόμων τοῦ ὑδρογόνου, τὰ ὄποια ἐνοῦνται μεθ' ἐνὸς ἀτόμου τοῦ στοιχείου· τούτου. Θεωρήσωμεν π.χ. τὰς ὑδρογονούχους ἐνώσεις: ὕδρογλώριον HCl , ὕδωρ H_2O , ἀμμωνίαν NH_3 , μεθάνιον CH_4 .

Εἰς τὴν πρώτην 1 ἀτόμον χλωρίου ἐνοῦται μὲν 1 ἀτόμον ὑδρογόνου εἰς τὴν δευτέραν 1 ἀτόμον δξυγόνου ἐνοῦται μὲν 2 ἀτομα ὑδρογόνου εἰς τὴν τρίτην 1 ἀτόμον ἀξώτου ἐνοῦται μὲν 3 ἀτομα ὑδρογόνου καὶ εἰς τετάρτην 1 ἀτόμον ἀνθρακος ἐνοῦται μὲν 4 ἀτομα ὑδρογόνου.

Λέγομεν εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν ὅτι: τὸ χλώριον εἶναι μονοσθενές, τὸ δξυγόνον δισθενές, τὸ ἀξωτον τρισθενές καὶ ὁ ἀνθραξ τετρασθενές.

'Ἐὰν στοιχεῖον τι δὲν ἐνοῦται ἀπ' εὐθείας μετὰ τοῦ ὑδρογόνου, προσδιορίζομεν τὸ σθένος του ἐκ τῆς ἐνώσεως του πρὸς ἄλλο στοιχεῖον γνωστοῦ σθένους, π.χ. πρὸς τὸ γλώριον.'

Τὸ σθένος δὲν ἀποτελεῖ σταθερὰν καὶ ἀμετάβλητον ίδιοτητα τῶν στοιχείων. Πλεῦστα στοιχεῖα εἰς τὰς διαφόρους ἐνώσεις των ἀπαντοῦν μετὰ διαφόρου σθένους. Τὸ θεῖον π.χ. εἰς ἄλλας μὲν ἐνώσεις εἶναι δισθενές (H_2S), εἰς ἄλλας τετρασθενές (SO_2) καὶ εἰς ἄλλας ἑξασθενές (SO_3).

Τὸ σθένος τῶν στοιχείων ὑποδηλοῦται διὰ ρωμαϊκῶν ἀριθμῶν, ἀναγραφομένων συνήθως ἀναθεν τοῦ συμβόλου αὐτῶν.


I	II	III	IV
Cl,	O,	N,	C,

κ.λ. π.

Παρίσταται δὲ γραφικῶς διὰ κεραιῶν, αἱ ὄποιαι τίθενται γύρω ἀπὸ τὸ σύμβολον τοῦ στοιχείου καὶ δοιαίζονται μονάδες συγγενείας.

Οὕτω γράφομεν: H —, O —, — N —, — C — | — x. λ. π.

Ἐπὶ τῇ βάσει τῆς γραφικῆς ταύτης παραστάσεως τοῦ σθένους τῶν στοιχείων, παρίσταται γραφικῶς ὁ τρόπος τῆς συνδέσεως τῶν διαφόρων ἀτόμων πρὸς ἄλλα πρὸς σχηματισμὸν τοῦ μορίου χημικῆς τινὸς ἐνώσεως ὡς κάτωθι :



Οἱ τοιοῦτοι χημικοὶ τύποι τῶν διαφόρων χημικῶν ἐνώσεων λέγονται συντακτικοὶ τύποι, ἐνῷ οἱ συνήθως χρησιμοποιούμενοι ἐν τῇ πράξει καλοῦνται μοριακοὶ τύποι. Π.χ. διὰ τὴν ἀμμω-

νίαν ὁ τύπος NH_3 εἶναι μοριακός, ὁ δὲ $\begin{array}{c} \text{H} \\ | \\ \text{H}-\text{N}-\text{H} \end{array}$ εἶναι συντακτικός.

Ρίζαι. — Ρίζαι εἰς τὴν Χημείαν λέγονται τὰ ἀκόρεστα ἑκεῖνα συμπλέγματα τῶν ἀτόμων διαφόρων στοιχείων, τὰ ὅποια ἀπομένουν ἀπὸ τὸ μόριον μᾶς κεκορεσμένης χημικῆς ἐνώσεως, μετὰ τὴν ἀφαίρεσιν ἐνὸς ᾧ περισσοτέρων ἀτόμων ἔξ αὐτῆς. Αἱ ρίζαι αὗται συμπεριφέρονται, ὡς ἐν μόνον ἀτομον, ἔχουν ΐδιον σθένος καὶ σπανιώτατα μόνον καὶ δι' ἐλάχιστον χρόνον δύνανται νὰ ὑπάρξουν εἰς ἐλευθέραν κατάστασιν. Αἱ περισσότερον γνωσταὶ ρίζαι εἶναι τὸ ὑδροξύλιον OH , τὸ ἀμμώνιον NH_4 , κ.λ.π.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ

Συστατικὰ τῶν ἀτόμων. — Τὸ χημικὸν ἀτομον, τὸ ἐλάχιστον ἀδιαιρέτον τμῆμα τῆς ὕλης, ἀπεδείχθη κατὰ τὴν μελέτην τῶν φαινομένων τῆς ραδιενέργειας, ὅτι δὲν ἀποτελεῖ ἐνιαῖον τι ὑλικὸν σωμάτιον, ἀλλ' ὅτι συντίθεται καὶ τοῦτο ἔξ ὀλίγων τινῶν ἀπλουστέρων ὑλικῶν συστατικῶν, κοινῶν εἰς δλα τὰ εἴδη τῶν ἀτόμων.

Τὰ κυριώτερα κοινὰ συστατικὰ τῶν ἀτόμων εἶναι τὰ ἔξης ἀπειροελάχιστα σωματίδια : α) Τὰ ἡλεκτρικά, τὰ ὅποια ἔχουν ἐλαχίστην μᾶζαν καὶ εἶναι ἀρνητικῶς ἡλεκτρισμένα. β) Τὰ πρωτόνια, τὰ ὅποια ἔχουν μᾶζαν 1850 φορᾶς μεγαλυτέραν τῆς τοῦ ἡλεκτρονίου καὶ εἶναι θετικῶς ἡλεκτρισμένα. Φέρει δὲ ἔχαστον πρωτόνιον φορτίον θετικοῦ ἡλεκτρισμοῦ ΐσον, κατ' ἀπόλυτον τιμήν, πρὸς τὸ ἀρντ-


τικὸν φορτίον ἡλεκτρισμοῦ ἐνὸς ἡλεκτρονίου. γ) Τὰ νετρόνια, τὰ ὅποια ἔχουν μᾶζαν ἵσην περίπου πρὸς τὴν τῶν πρωτονίων, ἀλλ' εἰναι ἡλεκτρικῶς οὐδέτερα.

Δομὴ τῶν ἀτόμων. — "Ἐκαστον ἀτομον στοιχείου τινὸς ἀποτελεῖται ἀπὸ ἕνα κεντρικὸν πυρῆνα, ὁ ὅποιος συνίσταται ἀπὸ πρωτόνια καὶ νετρόνια, τρόπον τινὰ συγχεκολλημένα μεταξύ των, (πλὴν τοῦ ὑδρογόνου, ὁ πυρὴν τοῦ ὅποιου δὲν περιέχει νετρόνιον) καὶ ἀπὸ ἀριθμόν τινα ἡλεκτρονίων, τὰ ὅποια περιφέρονται πέριξ τοῦ πυρῆνος, ὅπως οἱ πλανῆται περὶ τὸν ἥλιον, ἐπὶ μιᾶς ἡ περισσότερων ἐλλειπτικῶν τροχιῶν (στιβάδων), τὰς ὅποιας χάριν ἀπλότητος παραδεχόμεθα ὡς κυκλικὰς καὶ διμοκέντρους.

Αἱ στιβάδες εἰναι τὸ πολὺ 7 καὶ χαρακτηρίζονται ἐκ τῶν ἕσω πρὸς τὰ ἔξω μὲ τὰ λατινικὰ γράμματα K, L, M, N, O, P, Q. Ἡ στιβάς K δὲν δύναται νὰ περιλάβῃ περισσότερα τῶν 2 ἡλεκτρονίων, ἡ L περισσότερα τῶν 8, ἡ M περισσότερα τῶν 18. Αἱ ἐπόμεναι στιβάδες δύνανται νὰ περιλάβουν καὶ μεγαλύτερον ἀριθμόν. Ἡ ἔξωτάτη στιβάς ἔκαστου ἀτόμου εἰναι ἡ πλέον σημαντική, διότι καθορίζει τὴν χημικὴν συμπεριφορὰν τοῦ στοιχείου, δνομάζεται δὲ στιβάς σθένους.

Ο ἀριθμὸς τῶν πρωτονίων τοῦ πυρῆνος ἔκαστου ἀτόμου εἰναι ἵσος πρὸς τὸν ἀριθμὸν τῶν περιφερομένων ἡλεκτρονίων, ὡς ἐκ τούτου τὰ ἀτομα εἰναι ἡλεκτρικῶς οὐδέτερα. Εἰς τὸ σύστημα τοῦτο ὑπάρχει ἴσορροπία, διότι ἡ φυγόκεντρος δύναμις τῶν περιφερομένων ἡλεκτρονίων εἰναι ἵση πρὸς τὴν ἡλεκτροστατικὴν ἔλξιν μεταξύ τῶν ἔτερωνύμων ἡλεκτρισμένων πυρῆνος καὶ ἡλεκτρονίων.

Σύστασις τῶν διαφόρων ἀτόμων. — Τὸ ἀπλούστερον τῶν ἀτόμων εἰναι τὸ τοῦ ὑδρογόνου, τοῦ ὅποιου ὁ πυρὴν ἀποτελεῖται ἐξ ἐνὸς μόνον πρωτονίου, πέριξ τοῦ ὅποιου περιφέρεται ἐν ἡλεκτρόνιον ἐπὶ τῆς στιβάδος K. (Σχ. 1). Κατόπιν ἐρχεται τὸ ἀτομον τοῦ ἥλιου, μὲ πυρῆνα ἐκ 2 πρωτονίων καὶ 2 νετρονίων καὶ μὲ 2 ἡλεκτρόνια, περιφερόμενα ἐπὶ τῆς κύτης στιβάδος K (Σχ. 1).



$\ominus = \text{πλεκτρόνιον}$ $\oplus = \text{πρωτόνιον}$

$\ominus = \text{νετρόνιον}$

Σχ. 1. "Ατομα τῶν στοιχείων ὑδρογόνου καὶ ἥλιου.

Τὰ ἀτομα τῶν ἄλλων στοιχείων ἔχουν πολυπλοκωτέραν δομήν.

Τὸ πολυπλοκώτερον ὅλων τῶν ἀτόμων, τῶν εἰς τὴν φύσιν ἀπαντώντων στοιχείων, εἶναι τὸ τοῦ οὐρανίου, τοῦ ὁποίου ὁ μὲν πυρὴν ἀποτελεῖται ἀπὸ 92 πρωτόνια καὶ 146 νετρόνια, πέριξ δὲ αὐτοῦ περιφέρονται, ἐπάνω εἰς 7 συγκεντρικὰς στιβάδας, 92 ἡλεκτρόνια.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΙΣ — ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΑΙ — IONTA

Ορισμοί. — 'Η λεκτρόλυση σις λέγεται ἡ διὰ τοῦ ἡλεκτρικοῦ ρεύματος (συνεχοῦς) διάσπασις συνθέτου τινὸς σώματος: 'Η λεκτρολύτης δὲ καλοῦνται τὰ σύνθετα σώματα, τὰ δύναμενα νὰ ἀποσυντεθῶσι διὰ τοῦ ἡλεκτρικοῦ ρεύματος, καὶ τοιαῦτα εἶναι μόνον τὰ δέξια, αἱ βάσεις καὶ τὰ ἀλατα, ὅταν εἶναι διαλελυμένα ἐντὸς ὕδατος ἢ εύρισκωνται εἰς ὑγρὰν κατάστασιν διὰ τῆξεως.

Οἱ ἀγωγοί, οἱ ὅποιαι βυθίζονται ἐντὸς τοῦ πρὸς ἡλεκτρόλυσιν ὑγροῦ καὶ δι' ὃν διαβιβάζεται τὸ ἡλεκτρικὸν ρεῦμα, δημοάζονται ἡ λεκτρολύτης, εἶναι δὲ συγήθως ἐλάσματα λευκοχρύσου ἢ ραβδία συμπαγοῦς ἄνθρακος.

Καὶ τὸ μὲν ἡλεκτρόδιον, τὸ συνδεόμενον μετὰ τοῦ θετικοῦ πόλου τῆς ἡλεκτρικῆς πηγῆς, λέγεται θετικὸν ἡλεκτρόδιον ἢ ἀν ο δ ο c, ἐνῷ τὸ ἡλεκτρόδιον τὸ συνδεόμενον μετὰ τοῦ ἀρνητικοῦ πόλου, καλεῖται ἀρνητικὸν ἡλεκτρόδιον ἢ κάθ ο δ ο c.

Κατὰ τὰς ἡλεκτρολύσεις παρατηροῦνται τὰ ἔξης φαινόμενα:

α) Τὰ προϊόντα τῆς ἀποσυνθέσεως ἀναφαίνονται μόνον ἐπὶ τῶν ἡλεκτροδίων καὶ οὐδέποτε ἐντὸς τῆς μάζης τοῦ ὑγροῦ.

β) Τὰ μέταλλα καὶ τὸ ὑδρογόνον ἐμφανίζονται πάντοτε ἐπὶ τῆς καθόδου (τοῦ ἀρνητικοῦ ἡλεκτροδίου), τὸ δὲ ὑπόλοιπον τῆς ἀποσυνθέσεως (ἀμέταλλα ἢ συμπλέγματα αὐτῶν) ἐπὶ τῆς ἀνόδου (τοῦ θετικοῦ ἡλεκτροδίου). Διὰ τὸν λόγον αὐτὸν χαρακτηρίζονται τὰ μὲν μέταλλα καὶ τὸ ὑδρογόνον ὡς ἡλεκτροθετικά, τὰ δὲ ἀμέταλλα ὡς ἡλεκτραρνητικά στοιχεῖα.

Θεωρία τῆς ἡλεκτρολυτικῆς διαστάσεως τοῦ Arrhenius ἢ **Θεωρία τῶν Ιόντων.** — 'Ο Σουηδὸς χημικὸς Arrhenius, διετύπωσε τὸ 1887 τὴν γνώμην, ἐπιβεβαιωθεῖσαν πλήρως ἔκτοτε, ὅτι εἰς τὰ ἀραιὰ ὕδατικὰ διαλύματα τῶν ἡλεκτρολυτῶν (ὕξεων, βάσεων, ἀλάτων), τὰ περισσότερα τῶν μορίων των διασπῶνται εἰς δύο μέρη, τὰ ὅποια λέ-

γονται ιόντα και είναι ήλεκτρικῶς φορτισμένα διὰ ποσότητος ήλεκτρισμοῦ ίσης και ἀντιθέτου, εἰς τρόπον ὥστε τὸ σύνολον είναι ήλεκτρικῶς οὐδέτερον. Και τὰ μὲν ιόντα, τὰ φορτισμένα διὰ θετικοῦ ήλεκτρισμοῦ, κκλούνται κατιόντα και συμβολίζονται διὰ τοῦ σὺν (+), τὰ δὲ φορτισμένα διὰ ἀρνητικοῦ ήλεκτρισμοῦ λέγονται ἀνιόντα και συμβολίζονται διὰ τοῦ πλήν (-).

Οὕτως εἰς ἀραιόν τι οὐδατικὸν διάλυμα χλωριούχου Νατρίου NaCl , τὰ περισσότερα μόρια αὐτοῦ είναι διεσπασμένα εἰς κατιόντα νατρίου (Na^+) και ἀνιόντα χλωρίου (Cl^-). Εἰς οὐδατικὸν διάλυμα οὐδρογλωρικοῦ δέξεος, τὰ μόριά του είναι διεσπασμένα εἰς κατιόντα οὐδρογόνου (H^+) και ἀνιόντα χλωρίου (Cl^-). Και εἰς οὐδατικὸν διάλυμα κκυστικοῦ νατρίου NaOH , τὰ μόριά του είναι διεσπασμένα εἰς κατιόντα νατρίου (Na^+) και ἀνιόντα οὐδροξυλίου (OH^-).

Ἡ διάστασις αὗτῇ τῶν μορίων τῶν ήλεκτρολυτῶν, κατὰ τὴν διάλυσίν των ἐντὸς οὐδατος, λέγεται ἡ λεκτρολυτικὴ διάστασις. Ἡ δὲ θεωρία τοῦ Arrhenius καλεῖται και θεωρία τῆς ήλεκτρολυτικῆς διαστάσεως ἢ θεωρία τῶν ιόντων.

Μηχανισμὸς τῆς ήλεκτρολύσεως. — Εντὸς τοῦ οὐδατικοῦ διαλύματος τῶν ήλεκτρολυτῶν, τὰ ἀνιόντα και τὰ κατιόντα τῶν διεσπασμένων μορίων των κινοῦνται ἀτάκτως ἐντὸς αὐτοῦ. Μόλις δύμας διέλθῃ διὰ τοῦ διαλύματος ήλεκτρικὸν ρεῦμα συνεχές, τότε προσανατολίζονται τὰ ιόντα καί:

1) Τὰ μὲν κατιόντα (+), φορτισμένα διὰ θετικοῦ ήλεκτρισμοῦ, κατευθύνονται πρὸς τὴν κάθιδον, δηλαδὴ πρὸς τὸ ἀρνητικὸν ηλεκτρόδιον, μεθ' οὐ ἐρχόμενα εἰς ἐπαφήν καθίστανται ήλεκτρικῶς οὐδέτερα και ἀποβάλλονται εἰς ἑλευθέραν κατάστασιν.

2) Τὰ δὲ ἀνιόντα (-), φορτισμένα διὰ ἀρνητικοῦ ήλεκτρισμοῦ, κατευθύνονται πρὸς τὴν ἄνοδον, δηλαδὴ πρὸς τὸ θετικὸν ηλεκτρόδιον, μεθ' οὐ ἐρχόμενα εἰς ἐπαφήν, καθίστανται και αὐτὰ ήλεκτρικῶς οὐδέτερα και ἀποβάλλονται εἰς ἑλευθέραν κατάστασιν.

ΕΞΗΓΗΣΙΣ ΤΟΥ ΣΘΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ

Ἐξήγησις τοῦ σθένους. — Τὸ σθένος θεωρεῖται σήμερον ὡς ήλεκτρικὸν φαινόμενον, ἔξηγεῖται δὲ διὰ τῆς ήλεκτρονικῆς δομῆς τῶν ἀτόμων. Ἡ ἔρευνα ἔδειξεν ὅτι εἰς τὴν ήλεκτρονικὴν δομὴν ἔκάστου ἀτόμου, ἡ

σταθερωτέρα διάταξις είναι έκεινη, εις τὴν ὅποιαν ἡ ἔξωτερικὴ στιβάς τῶν ἡλεκτρονίων είναι συμπεπληρωμένη. Θεωρεῖται δὲ συμπεπληρωμένη ἡ ἔξωτερικὴ στιβάς ἐνὸς ἀτόμου, ὅταν περιλαμβάνῃ 8 ἡλεκτρόνια, δπως συμβαίνει τοῦτο εἰς τὰ εὐγενῆ δέρια, νέον, ἀργόν, κρυπτόν, ζένον, καὶ ραδόνιον: Ἐξαίρεσιν ἀποτελεῖ ἡ στιβάς K, ἡ ὅποια ὅταν είναι ἔξωτερικὴ θεωρεῖται συμπεπληρωμένη ὅταν περιλαμβάνῃ 2 μόνον ἡλεκτρόνια, δπως τοῦτο συμβαίνει εἰς τὸ εὐγενὲς ἀέριον ἥλιον. Τὰ στοιχεῖα τῶν ὅποιων ἡ ἔξωτερικὴ στιβάς δὲν είναι συμπεπληρωμένη τείνουν νὰ τὴν συμπληρώσουν διὰ προσλήψεως ἢ δι᾽ ἀποβολῆς ἡλεκτρονίων.

Τὸ σθένος ἐνὸς στοιχείου είναι ὁ ἀριθμὸς τῶν ἡλεκτρονίων, τὰ ὅποια τὸ ἀτομόν του προσλαμβάνει ἢ ἀποβάλλει πρὸς συμπλήρωσιν τῆς ἔξωτερικῆς στιβάδος.

Οὕτω τὸ χλώριον, τοῦ ὅποιου τὸ ἀτομον περιέχει 7 ἡλεκτρόνια εἰς τὴν ἔξωτερικὴν στιβάδα, είναι μονοσθενές, διότι εἰς κατάλληλον εύκαιριον προσλαμβάνει 1 ἡλεκτρόνιον, διὰ νὰ ἀποκτήσῃ σταθερὰν δομήν.


Τὸ νάτριον ἀφ' ἑτέρου, τοῦ ὅποιου τὸ ἀτομον περιέχει 1 ἡλεκτρόνιον εἰς τὴν ἔξωτάτην του στιβάδα, είναι καὶ αὐτὸ μονοσθενές, διότι εἰς κατάλληλον εύκαιριον ἀποβάλλει 1 ἡλεκτρόνιον, διὰ νὰ ἀποκτήσῃ σταθερὰν δομήν.

Ἡ πρόσληψις ὅμως ἐνὸς ἡλεκτρονίου ὑπὸ τοῦ ἀτόμου τοῦ χλωρίου συνεπάγεται τὴν φόρτισιν αὐτοῦ δι᾽ ἐνὸς στοιχειώδους ἀρνητικοῦ φορτίου, ὡς ἐκ τούτου, ἐνῷ ἡτο ἡλεκτρικῶς οὐδέτερον μετατρέπεται τότε εἰς μονοσθενὲς ἡλεκτραρνητικὸν ἴὸν (ἀνιόν). Ἀντιθέτως τὸ ἀτομον τοῦ νατρίου, τὸ ὅποιον ἡτο ἐπίσης ἡλεκτρικῶς οὐδέτερον, διὰ τῆς ἀποβολῆς ἐνὸς ἡλεκτρονίου ἀπομένει μὲν ἐν στοιχειῶδες θετικὸν φορτίον, προερχόμενον ἀπὸ τὸ πλεονάζον πρωτόνιον τοῦ πυρῆνος του. Μετατρέπεται οὕτως εἰς μονοσθενὲς ἡλεκτροθετικὸν ἴὸν (κατιόν).

Γενικῶς τὰ μὲν μέταλλα, δπως τὸ νάτριον, καὶ ἐπὶ πλέον τὸ ὄδρογόνον, ἔχουν τὴν τάσιν νὰ ἀποβάλλουν ἡλεκτρόνια καὶ νὰ μεταβάλλωνται εἰς ἡλεκτροθετικὰ ἴόντα καὶ τὸ σθένος των χαρακτηρίζεται ὡς θετικόν. Τὰ δὲ ἀμέταλλα (πλὴν τοῦ ὄδρογόνου), ἔχουν τὴν τάσιν νὰ προσλαμβάνουν ἡλεκτρόνια καὶ νὰ μεταβάλλωνται εἰς ἡλεκτραρνητικὰ ἴόντα, δι᾽ ὃ τὸ σθένος των χαρακτηρίζεται ὡς ἀρνητικόν.


Ἐξήγησις τῆς χημικῆς συγγενείας. — Ἐκ τῶν ἀνωτέρω καταφαίνεται ὅτι ἡ μεταξὺ δύο στοιχείων τάσις πρᾶς ἔνωσιν, ἡ χημικὴ συγγένεια, θὰ ἐκδηλοῦται μεταξὺ στοιχείων ἔτερωνύμου σθένους.

Καὶ ἐκ τῶν στοιχείων θὰ εἶναι δραστικώτερα ἔκεινα τὰ ὅποῖα εύκολώτερον ἀποβάλλουν ἢ προσλαμβάνουν ἡλεκτρόνια, δῆτας εἶναι τὸ κάλιον καὶ τὸ νάτριον ἀπὸ τὰ μέταλλα, τὸ φθόριον καὶ τὸ χλώριον ἀπὸ τὰ ἀμέταλλα κ.λ.π. Ὁλιγώτερον δραστικὰ εἶναι τὰ δισθενῆ στοιχεῖα ἀσβέστιον καὶ δεξυγόνον, ἀκόμη δὲ ὀλιγώτερον τὰ τρισθενῆ στοιχεῖα ἀργύριον καὶ ἄζωτον. Γενικῶς δὲ ἡ χημικὴ δραστικότης τῶν στοιχείων εἶναι ἀντιστρόφως ἀνάλογος τοῦ ἀριθμοῦ, τῶν ἡλεκτρονίων, τὰ ὅποῖα ἀποβάλλουν ἢ προσλαμβάνουν, πρὸς σταθεροποίησιν τῆς ἑξωτάτης στιβάδος τοῦ ἀτόμου των.



Ἄτομον νατρίου


Σχ. 2



Ἄτομον χλωρίου

Σχ. 3

Πῶς ἐνοῦνται τὰ στοιχεῖα. — "Ας ἔξετάσωμεν τώρα τὴν ἔνωσιν ἑνὸς ἀτόμου χλωρίου μεθ' ἑνὸς ἀτόμου νατρίου, πρὸς σχηματισμὸν ἑνὸς μορίου χλωριούχου νατρίου. Τὸ μοναδικὸν ἡλεκτρόνιον τῆς ἑξωτάτης στιβάδος τοῦ ἀτόμου τοῦ νατρίου (Σχ. 2) μεταπηδᾶ ἐπὶ τοῦ ἀτόμου τοῦ χλωρίου (Σχ. 3), διὰ νὰ συμπληρώσῃ εἰς 8 τὸν ἀριθμὸν τῶν ἡλεκτρονίων τῆς ἑξωτερικῆς του στιβάδος. Ως ἐκ τούτου δημιως τὸ μὲν ἄτομον τοῦ νατρίου μετατρέπεται εἰς ἡλεκτροθετικὸν ἴὸν (κατίὸν), τὸ δὲ ἄτομον τοῦ χλωρίου εἰς ἡλεκτραρνητικὸν ἴὸν (ἀνιὸν). Τὰ δύο ταῦτα ἴοντα, ὡς ἑτερωνύμιας ἡλεκτρισμένα, ἐνοῦνται τότε πρὸς σχηματισμὸν



Μόριον χλωριούχου νατρίου

Σχ. 4

ἑνὸς μορίου χλωριούχου νατρίου, ἡλεκτρικῶς οὐδετέρου (Σχ. 4)

Κατ' ἀνáλογον τρόπον σχηματίζονται καὶ ἐνώσεις τῶν ἄλλων στοιχείων.

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΙΣ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

ΟΞΕΑ — ΒΑΣΕΙΣ — ΑΛΑΤΑ — ΟΞΕΙΔΙΑ

Αἱ πολυαριθμοὶ χημικαὶ ἐνώσεις τῶν διαφόρων στοιχείων ταξινομοῦνται εἰς ὄμάδας ἔχουσας κοινὰς ἴδιότητας. Σπουδαιότεραι τῶν ὄμάδων τούτων ἡ τάξεων τῆς Ἀνοργάνου Χημείας εἶναι: τὰ ὁξέα, αἱ βάσεις, τὰ ἀλατα, τὰ ὁξεῖδια.

ΟΞΕΑ. — Τὰ ὁξέα εἶναι ἡλεκτρολύται, οἱ ὅποιοι εἰς ὄδατικὸν διάλυμα περιέχουν ὡς κοινὸν συστατικὸν κατιὸν ὑδρογόνον, ὡς ἀνιὸν δὲ ἡλεκτραρνητικόν τι στοιχεῖον (ἀμέταλλον) ἢ ἡλεκτραρνητικὴν ρίζαν (σύμπλεγμα στοιχείου τινός μετὰ τοῦ ὁξυγόνου). Εἶναι δὲ τὸ κατιὸν τοῦτο ὑδρογόνον, ἐκεῖνο τὸ ὅποιον προσδίδει εἰς τὰ ὁξέα τὰς κοινὰς αὐτῶν ἴδιότητας. Καθόσον πᾶσα ὑδρογονοῦχος ἔνωσις δὲν εἶναι ὁξύ. Οὕτω τὸ μεθάνιον CH_4 δὲν εἶναι ὁξύ, διότι εἰς ὄδατικὸν διάλυμα δὲν παρέχει κατιὸν ὑδρογόνον. Σπουδαιότερα τῶν ὁξέων εἶναι τὸ ὑδροχλωρικὸν HCl , τὸ νιτρικὸν HNO_3 , τὸ θειικὸν H_2SO_4 — κ. ἢ.

'Αναλόγως τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ἀτόμων τοῦ ὑδρογόνου, τῶν περιεχομένων εἰς τὸ μόριον ὁξέος τινός, χαρακτηρίζεται τοῦτο ὡς μονοδύναμον (HNO_3), ὡς διδύναμον (H_2SO_4) κλπ.

Γενικαὶ ἴδιότητες τῶν ὁξέων. — Αἱ κοιναὶ ἴδιότητες τῶν ὁξέων, ἐμφανιζόμεναι μόνον ὅταν εὑρίσκωνται ταῦτα διαλελυμένα ἐντὸς ὄδατος, εἶναι αἱ ἔξης: α) "Ἐχουν γεῦσιν ὁξινον καὶ τὴν ἴκανότητα τῆς μεταβολῆς τοῦ χρώματος ὥρισμένων ὀργανικῶν οὐσιῶν, αἱ ὅποιαι καλοῦνται δεικταὶ. Οὕτω μετατρέπουν τὸ κυανοῦν βάλμια τοῦ ἡλιοτροπίου εἰς ἐρυθρόν, τὸ πορτοκαλλόχρουν διάλυμα τῆς ἡλιανθίνης εἰς ἐρυθρὸν κλπ. β) Ἐπιδρῶντα ἐπὶ τῶν μετάλλων ἡ ἐπὶ τῶν βάσεων σχηματίζουν ἀλατα, ὑπὸ ἔκλυσιν ὑδρογόνου ἢ τὸν σχηματισμὸν ὄδατος, κατὰ τὰς ἔξισώσεις:

'Οξὺ + Μέταλλον = "Αλας + Ὅδρογόνον

'Οξὺ + Βάσις = "Αλας + Ὅδωρ


Τὸ σύγολον τῶν ἴδιοτήτων τῶν χαρακτηρίζουσῶν τὰ ὁξέα, λέγεται ὁξινοὶς ἀντιδρασίες.

ΒΑΣΕΙΣ. — Αἱ βάσεις εἶναι ἡλεκτρολύται, οἱ ὅποιοι εἰς ὄδατικὸν διάλυμα περιέχουν ὡς κοινὸν συστατικὸν τὴν μονοσθενῆ ρίζαν ὑδροξύλιον OH ὡς ἀνιόν, ὡς κατιὸν δὲ μέταλλόν τι ἢ ἡλεκτροθετικὴν ρίζαν. Αἱ κοιναὶ ἴδιότητες τῶν βάσεων ὀφείλονται εἰς τὴν ρίζαν ὑδροξύλιον,

μόνον ὅταν αὕτη ἐμφανίζεται ως ἀνιόν. Διότι ὑπάρχουν καὶ ἐνώσεις περιέχουσαι τὴν ρίζαν ὑδροξύλιον, ὥπως εἶναι ἡ μεθυλικὴ ἀλκοόλη CH_3OH , αἱ ὅποιαι ὅμως δὲν εἶναι βάσεις.

Τὰ ὄνόματα τῶν βάσεων σχηματίζονται διὰ τῆς λέξεως ὑδροξείδιον, ἀκολουθουμένης ὑπὸ τοῦ ὄνόματος τοῦ περιεχομένου μετάλλου. Π. χ. ὑδροξείδιον νατρίου NaOH , ὑδροξείδιον ἀσβεστίου $\text{Ca}(\text{OH})_2$ κλπ.

Γενικαὶ ἴδιοτήτες τῶν βάσεων. — Τὰ ὑδατικὰ διαλύματα τῶν βάσεων ἔχουν τὰς ἔξης κοινὰς ἴδιοτήτας : α) Ἐχουν γεῦσιν σαπωνοειδῆ καὶ τινες ἔξι αὐτῶν καυστικὴν ἐπίδρασιν ἐπὶ τοῦ δέρματος, ἐπαναφέρουν δὲ εἰς τὸ κυανοῦν τὸ ὑπὸ τῶν ὀξέων ἐρυθρανθὲν βάμμα τοῦ ἡλιοτροπίου, ἢ ἐρυθραίνουν τὸ ἄχρουν διάλυμα τῆς φαινολοφθαλεῖνης. β) Ἀντιδροῦν μετὰ τῶν ὀξέων, σχηματίζοντα ἄλατα καὶ ὕδωρ, κατὰ τὴν ἔξιστωσιν :



Τὸ σύνολον τῶν ἴδιοτήτων τῶν χαρακτηριζουσῶν τὰς βάσεις λέγεται βασικὴ ἢ ἀλκαλικὴ ἢ ντιδραστική.

ΑΛΑΤΑ. — "Αλατα εἶναι οἱ ἡλεκτρολύται ἔκεινοι, οἱ ὅποιοι εἰς ὑδατικὸν διάλυμα περιέχουν ως κατίδιν μὲν μέταλλόν τι ἢ ἡλεκτροθετικήν τινα ρίζαν, ως ἀνιόν δὲ ἀμέταλλον ἢ ἡλεκτραρνητικήν ρίζαν ὀξέων. Θεωροῦνται δὲ ως προκύπτοντα δι' ἀντικαταστάσεως τοῦ ὑδρογόνου τῶν ὀξέων ὑπὸ τινος μετάλλου ἢ ἡλεκτροθετικῆς ρίζης, ἢ δι' ἀντικαταστάσεως τοῦ ὑδροξυλίου μιᾶς βάσεως ὑπὸ ἀμετάλλου ἢ ἡλεκτραρνητικῆς ρίζης.

Διακρίνονται τρία εἰδή ἄλατων : οὐδέτερα, ὅξινα, βασικά.

Ο ὑδροξείδιον είναι τὰ ἄλατα, τὰ μὴ περιέχοντα ὑδρογόνον εἰς τὸ μόριόν των, δξινα δὲ ὅσα ἐμπεριέχουν τοιοῦτον. Ἐὰν π. χ. εἰς τὸ θειϊκὸν ὀξύ H_2SO_4 , ἀντικατασταθῇ μόνον ἐν ἐκ τῶν δύο ἀτόμων ὑδρογόνου τοῦ μορίου του, δι' ἐνὸς ἀτόμου τοῦ μονοσθενοῦς μετάλλου καλίου K , τότε προκύπτει τὸ ἄλας KHSO_4 , τὸ ὅποιον λέγεται δξινον θειϊκὸν κάλιον. "Αν δημως ἀντικατασταθοῦν καὶ τὰ 2 ἀτομα τοῦ ὑδρογόνου τοῦ μορίου του, τότε λαμβάνομεν τὸ ἄλας K_2SO_4 , τὸ ὅποιον λέγεται οὐδέτερον θειϊκὸν κάλιον. Ἐννοεῖται εὐκόλως ὅτι μόνον τὰ πολυδύναμα ὀξέα δύνανται νὰ δώσουν ἄλατα ὅξινα.

Βασικὰ ἄλατα καλοῦνται, τὰ προκύπτοντα διὰ μερικῆς ἀντικαταστάσεως τοῦ ὑδροξυλίου τοῦ μορίου τῶν βάσεων ὑπὸ τινος ρίζης ὀξέος. Διὰ τῆς ἀντικαταστάσεως π. χ. εἰς τὸ μόριον τοῦ ὑδροξείδιου τοῦ μολύβδου $\text{Pb}(\text{OH})_2$, ἐνὸς ὑδροξυλίου ὑπὸ τῆς μονοσθενοῦς ρίζης NO_3

τοῦ νιτρικοῦ δέσμου, προκύπτει τὸ ἄλας $\text{Pb} < \text{NO}_3^{\text{HO}}$ ή $\text{Pb(OH)}\text{NO}_3$, τὸ δόποιον λέγεται βασικὸς νιτρικὸς μόλυβδος.


Συνήθως τὰ διαλύματα τῶν οὐδετέρων ἀλάτων δὲν ἔχουν καμμίαν ἐπίδρασιν, οὔτε ἐπὶ τοῦ χυανοῦ βάχματος τοῦ ἡλιοτροπίου, οὔτε ἐπὶ τοῦ ἐρυθρανθέντος. Δὲν παρουσιάζουν δηλαδή, οὔτε δέσμινον ἀντίδρασιν, οὔτε βασικήν. Λέγομεν εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτῆν, ὅτι ἔχομεν ἀντίδρασιν δε τέραν.

ΟΞΕΙΔΙΑ.—'Οξείδια λέγονται αἱ χημικαὶ ἑνώσεις τῶν διαφόρων στοιχείων μετὰ τοῦ δέσμου, διακρίνονται δὲ εἰς δέσμογόνα, βασεογόνα καὶ οὐδέτερα.

'Οξειδία καλοῦνται τὰ δέσμεια τῶν ἀμετάλλων, τὰ ὅποια διαλυόμενα εἰς τὸ ὑδωρ, ἀντιδροῦν μετ' αὐτοῦ, σχηματίζοντα δέσμα. Τοιοῦτον εἶναι τὸ τριοξείδιον τοῦ θείου SO_3 , τὸ δόποιον μεθ' ὑδατος παρέχει τὸ θειϊκὸν δέσμον H_2SO_4 :



'Επειδὴ τὰ δέσμεια ταῦτα δύνανται νὰ προκύψουν ἐκ τῶν δέσμυον χων δέσμων δι' ἀφαιρέσεως ὑδατος ἐκ τοῦ μορίου των, λέγονται καὶ ἀνυδρῖται δέσμοι. Διὰ τὸν λόγον αὐτὸν τὸ τριοξείδιον τοῦ θείου λέγεται καὶ ἀνυδρίτης τοῦ θειϊκοῦ δέσμου:



Βασεογόνα δόνομάζονται τὰ δέσμεια τῶν μετάλλων, τὰ ὅποια ἔνούμενα μεθ' ὑδατος, σχηματίζουν βάσεις. Τοιοῦτον εἶναι π. χ. τὸ δέσμιον τοῦ ἀσβεστίου CaO , παρέχον μεθ' ὑδατος τὸ ὑδροξείδιον τοῦ ἀσβεστίου Ca(OH)_2 :



'Επειδὴ δὲ τὰ δέσμεια ταῦτα δύνανται νὰ προκύψουν ἐκ τῶν βάσεων δι' ἀφαιρέσεως ἐκ τοῦ μορίου των ὑδατος, λέγονται καὶ ἀνυδρῖται δέσμοι. Οὕτω τὸ δέσμειον τοῦ ἀσβεστίου CaO εἶναι ἀνυδρίτης τῆς βάσεως Ca(OH)_2 διότι:



Οὐδέτερα τέλος λέγονται τὰ δέσμεια, τὰ ὅποια δὲν ἀντιδροῦν μετὰ τοῦ ὑδατος. Τοιοῦτον εἶναι π. χ. τὸ μονοξείδιον τοῦ ἀνθρακος CO κ. ἄ.

ΙΣΧΥΣ ΟΞΕΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ — ΕΝΕΡΓΟΣ ΟΞΥΤΗΣ

Ίσχυς δξέων καὶ βάσεων. — ‘Η ίσχυς τῶν διαφόρων δξέων ἔξαρταται ἀπὸ τὸν βαθμὸν τῆς ἡλεκτρολυτικῆς αὐτῶν διαστάσεως, ἢτοι ἀπὸ τὸν ἀριθμὸν τῶν ιόντων οὐδρογόνου, τὰ ὅποια παρέχουν ἐν οὐδατικῷ διαλύματι. Οὕτως εἰς διάλυμα οὐδροχλωρικοῦ δξέος, περιέχον ἐν γραμμομόριον οὐδροχλωρίου εἰς 10 λίτρα ὕδατος, ἔχουν οὐδοστῆ διάστασιν τὰ 95 % τῶν μορίων του, ἐνῷ εἰς διάλυμα ἑνὸς γραμμομορίου δξεικοῦ δξέος εἰς τὸ αὐτὸν ποσὸν ὕδατος, ἔχουν οὐδοστῆ διάστασιν μόνον 5 % τῶν μορίων του. “Ενεκα τούτου λέγομεν δτι τὸ μὲν οὐδροχλωρικὸν δξέν εἶναι ἵ σχυρὸν δξέν, τὸ δὲ οὐδεικὸν δτι εἶναι ἀσθενὲς δξέν.

Κατ’ ἀνάλογον τρόπον καθορίζεται καὶ ἡ ίσχυς τῶν βάσεων. Τόσον ίσχυροτέρα εἶναι μία βάσις, δσον μεγαλύτερα εἶναι ἡ διάστασίς της, ἢτοι δσον μεγαλύτερος εἶναι ὁ ἀριθμὸς τῶν ιόντων οὐδροξυλίου, τὰ ὅποια παρέχει ἐν οὐδατικῷ διαλύματι. Οὕτω π.χ. τὸ καυστικὸν νάτριον NaOH καὶ τὸ καυστικὸν κάλι KOH εἶναι ἵ σχυραὶ βάσεις, ἐνῷ ἡ καυστικὴ ἀμμωνία NH₄OH εἶναι ἀσθενὲς βάσις.

Ἐνεργός δξύτης P_H. — Εἰς τὸ ἀπεσταγμένον οὐδωρὸν ἡ διάστασίς τῶν μορίων του εἶναι ἐλαχίστη, ἐξ οὐ συνάγεται ἡ ἐντὸς τῆς μάζης αὐτοῦ οὐπαρξίας ἐλαχίστης ποσότητος ιόντων οὐδρογόνου καὶ οὐδροξυλίου. Οὕτως εὑρέθη δτι ἡ διάσπασίς τοῦ καθαροῦ οὐδατος εἰς ιόντα οὐδρογόνου εἶναι ἵση πρὸς $\frac{1}{10.000.000}$ ἡ 10^{-7} γραμμοϊόντα κατὰ λίτρον. Τοῦτο σημαίνει δτι 1 λίτρον οὐδατος ἐμπειρίζει $\frac{1}{10.000.000}$ τοῦ γραμμαρίου ιόντα οὐδρογόνου.


Κατὰ τὴν προσθήκην ὅμως εἰς τὸ οὐδωρὸν δξέος τινὸς αὐξάνεται ἡ συγκέντρωσις τῶν ιόντων οὐδρογόνου, ἐνῷ κατὰ τὴν προσθήκην βάσεώς τινος ἐλαττούται. Οὕτω διάλυμα ίσχυροῦ δξέος δυνατὸν νὰ ἔχῃ συγκέντρωσιν ιόντος οὐδρογόνου 10^{-2} , τὸ ὅποιον σημαίνει δτι ἐμπειρίζει εἰς 1 λίτρον οὐδατος $\frac{1}{100}$ τοῦ γραμμαρίου ιόντα οὐδρογόνου, ἐνῷ ἀντιθέτως μία βάσις δυνατὸν νὰ ἐμπειρίζῃ μόνον 10^{-19} ἢτοι $\frac{1}{1.000.000.000.000}$ τοῦ γραμμαρίου ιόντα οὐδρογόνου εἰς τὸ λίτρον.

Πρὸς ἀπλοποίησιν τῆς γραφῆς τῶν τιμῶν τῶν συγκέντρωσεων ιόντων οὐδρογόνου εἰσήχθη τὸ σύμβολον P_H (Potentia Hydrogenii). Οὕτω διὰ τὸ καθαρὸν οὐδωρὸν λέγομεν δτι ἔχει P_H = 7, διὰ τὸ ίσχυρὸν δξέν δτι ἔχει P_H = 2 καὶ διὰ τὴν ίσχυρὰν βάσιν, δτι ἔχει P_H = 12.

Γενικῶς διὰ μὲν τὰ δέξα τὸ P_H ἡ ἡ ἐν εργὸς δέξυτης αὐτῶν εἶναι ἀριθμὸς μικρότερος τοῦ 7, τείνων πρὸς τὸ 0, διὰ δὲ τὰς βάσεις εἶναι ἀριθμὸς μεγαλύτερος τοῦ 7, τείνων πρὸς τὸ 14. Τὸ ὑδροχλωρικὸν δέξι π. χ., τὸ ὁποῖον εἶναι ἴσχυρὸν δέξι, ἔχει $P_H = 3 \frac{1}{2}$ ή 4, ἐνῷ τὸ καυστικὸν νάτριον, πὸ ὁποῖον εἶναι ἴσχυρὰ βάσις, ἔχει $P_H = 12 \frac{1}{2}$ ή 13 ή 14.

Βλέπομεν δηλαδὴ ὅτι, ὅταν τὸ $P_H = 7$ πρόκειται τότε περὶ καθαροῦ ὕδατος "Οταν $P_H < 7$ (ἀπὸ 7 ἕως 0), πρόκειται περὶ δέξιος καὶ δὴ τόσον ἴσχυροτέρου, ὅσον ὁ ἀριθμὸς εἶναι μικρότερος. "Οταν δὲ τὸ $P_H > 7$ (ἀπὸ 7 ἕως 14), τότε πρόκειται περὶ βάσεως καὶ τόσον ἴσχυροτέρας, ὅσον ὁ ἀριθμὸς εἶναι μεγαλύτερος.

'Η προσδιοριζομένη ἐπομένως τιμὴ τοῦ P_H ἀποδίδει ἐπανιριβῶς τὴν ἀντίδρασιν τῶν ὑδατικῶν διαλυμάτων, καθόσον $P_H = 7$ ἀντιστόιχεῖ πρὸς τὴν οὐδετέραν ἀντίδρασιν, τιμὴ $P_H < 7$ εἰς τὴν δέξινον ἀντίδρασιν καὶ τιμὴ $P_H > 7$ εἰς τὴν ἀλκαλικὴν ἀντίδρασιν, ὡς δείκνυται εἰς τὸ κατωτέρω διάγραμμα.



ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ταξινόμησις τῶν στοιχείων. — Πολλαὶ προσπάθειαι ταξινομήσεως τῶν στοιχείων ἐγένοντο κατὰ καιρούς, ἐκ τῶν ὁποίων ἐπιτυχεστέρα ὑπῆρξεν ἡ κατὰ τὸ 1869 γενομένη ὑπὸ τοῦ Ρώσου χημικοῦ Μεντελέεφ, ἡ ὁποίᾳ βασίζεται ἐπὶ τῆς παρατηρήσεως, ὅτι αἱ ἰδιότητες τῶν στοιχείων ἀποτελοῦν περιοδικὰ συναρτήσεις τῶν ἀτομικῶν των βαρῶν.

Κατεδείχθη πράγματι ὅτι, ἐὰν τοποθετήσωμεν τὰ στοιχεῖα κατ' αὐξον ἀτομικὸν βάρος, αἱ ἰδιότητες ἑκάστου στοιχείου διαφέρουν ἀπὸ τὰς τοῦ προηγουμένου καὶ τοῦ ἐπομένου· ἀλλ' ἔπειτα ἀπὸ 8 στοιχεῖα ἐμφανίζεται εἰς τὴν σειρὰν στοιχεῖον, τοῦ ὁποίου αἱ ἰδιότητες εἶναι ἀνάλογοι πρὸς τὰς τοῦ πρώτου.

Βλέπομεν δηλαδὴ ὅτι αἱ ἰδιότητες τῶν στοιχείων ἐπαναλαμβάνονται

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Περίοδος	'Ομάξ I α β	'Ομάξ II α β	'Ομάξ III α β	'Ομάξ IV α β	'Ομάξ V α β	'Ομάξ VI α β	'Ομάξ VII α β	'Ομάξ VIII α β	'Ομάξ O
I	1H								
II	3Li	4Be	5B	6C	7N	8O	9F		2He
III	11Na	12Mg	13Al	14Si	15P	16S	17Cl		10Ne
V	19K	20Ca	21Sc	22Ti	23V	24Cr	25Mn	26Fe	27Co28Ni
	29Cn	30Zn	31Ga	32Ge	33As	34Se	35Br		36Kr
V	37Rb	38Sr	39V	40Zr	41Nb	42Mo	43Te	44Ru45Rh46Pd	
	47Ag	48Cd	49In	50Sn	51Sb	52Tc	53J		54Xe
VI	55Cs	56Ba	57-71 σκάνουσα γενικά γελατίνη 81Tl	72Hf	73Ta	74W	75Re	76Os77Ir78Pt	
	79Au	80Hg		82Pb	83Bi	84Po	85At		86Rn
VII	87Fr	88Ra	89Ac	90Th	91Pa	92U			

Ψηφιοποιηθήκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

*Υπόγουστα στοιχεία : 93Np, 94Pu, 95Am, 96Cm, 97Bk, 98Cf, 99Ec, 100Fm, 101Mv, 102No.

περιοδικῶς, δὶ' αὐτὸν καὶ τὸ τοιοῦτον σύστημα κατατάξεως αὐτῶν ἐκλήθη περιοδικὸν σύστημα.

Πίναξ τοῦ περιοδικοῦ συστήματος. — Ἐπὶ τῇ βάσει τῶν ἀνωτέρω καὶ ἔπειτα ἀπὸ πολλὰς τροποποιήσεις καὶ βελτιώσεις, κατηρτίσθη πίναξ τοῦ περιοδικοῦ συστήματος τῶν στοιχείων, εἰς τὸν ὄποιον ταῦτα κατατάσσονται εἰς 7 ὁριζόντους σειράς, δύνομαζομένας περιοδικόν, ἔκαστη τῶν ὄποιων περιλαμβάνει διάφορον ἀριθμὸν στοιχείων.

Διατάσσοντες δὲ τὰς περιόδους ταύτας τὰς μὲν ὑπὸ τὰς δέ, ἐπιτυγχάνομεν 8 στήλας κατακορύφους, καλουμένας, ὁ μάδας ἢ οἱ κογενεῖαι, χαρακτηρίζομένας ὑπὸ λατινικῶν ἀριθμῶν (I, II, III, κλπ.) καὶ διαιρουμένας εἰς δύο ὑποδύμαδας (α καὶ β).

Τύπαρχει καὶ μία ἀκόμη κατακόρυφος στήλη, χαρακτηρίζομένη διὰ τοῦ ἀριθμοῦ Ο, ἡ ὅποια περιλαμβάνει τὰ εὖ γενῆ ἀέρια.

Διὰ τῆς ταξινομήσεως ταύτης εἰς ἔκαστην κατακόρυφον στήλην, ητοι εἰς ἔκαστην ὑποδύμαδα, συμπίπτουν στοιχεῖα ἔχοντα ἀναλόγους ἰδιότητας.

Εἰς τὰς πρώτας ὄμάδας τοῦ περιοδικοῦ συστήματος (I, II, III), περιλαμβάνονται κυρίως μέταλλα, ἐνῷ εἰς τὰς τελευταίας (V, VI, VII) περιέχονται κυρίως ἀμέταλλα.

Άτομικὸς ἀριθμός. — Ὁ αὕτων ἀριθμὸς τῆς θέσεως, τὴν ὄποιαν κατέχει στοιχεῖον τι εἰς τὸν πίνακα τοῦ περιοδικοῦ συστήματος, λέγεται ἀτομικὸς ἀριθμὸς αὐτοῦ καὶ παρίσταται διὰ τοῦ γράμματος Z. Εὑρέθη δὲ ὅτι ὁ ἀριθμὸς οὗτος εἶναι ἵσος πρὸς τὸν ἀριθμὸν τῶν πρωτονίων τοῦ πυρῆνος τοῦ ἀτόμου του, καὶ ἐπομένως ἵσος καὶ πρὸς τὸν ἀριθμὸν τῶν πέριξ τοῦ πυρῆνος περιφερομένων ἡλεκτρονίων.

Αφ' ἑτέρου τὸ ἀτομικὸν βάρος στοιχείου τινός, παριστώμενον διὰ τοῦ γράμματος A, εἶναι ἵσος πρὸς τὸ ἀθροισμα τῶν πρωτονίων (Z) καὶ τῶν νετρονίων τοῦ πυρῆνος τοῦ ἀτόμου του, παριστωμένων διὰ τοῦ γράμματος N. Κατ' ἀκολουθίαν θὰ ἔχωμεν : A = Z + N. Ἐκ τοῦ τύπου τούτου εύρισκομεν δὲ : N = A - Z, ητοι ὁ ἀριθμὸς τῶν νετρονίων ἔκαστου στοιχείου εἶναι ἵσος μὲ τὴν διαφορὰν τοῦ ἀτομικοῦ του βάρους καὶ τοῦ ἀτομικοῦ του ἀριθμοῦ. Οὕτω προκειμένου περὶ τοῦ στοιχείου νατρίου, τὸ ὄποιον ἔχει ἀτομικὸν βάρος 23 καὶ ἀτομικὸν ἀριθμὸν 11, ὁ ἀριθμὸς τῶν νετρονίων τοῦ πυρῆνος τοῦ ἀτόμου του θὰ εἶναι ἵσος πρὸς 23 - 11 = 12.

Ισότοπα. — Τύπαρχουν στοιχεῖα τινά, τῶν ὄποιων τὰ ἀτομα δὲν εἶναι

όμοια. Ἐχουν μὲν δλα τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν ἡλεκτρονίων, καὶ πρωτονίων, διάφορον ὅμως ἀριθμὸν νετρονίων. Ἐπειδὴ ὅμως ἔχουν τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν ἡλεκτρονίων, ἔχουν τὸν αὐτὸν ἀτομικὸν ἀριθμόν, ἐπομένως κατέχουν εἰς τὸν περιοδικὸν πίνακα τῶν στοιχείων τὴν αὐτὴν θέσιν, τὸν αὐτὸν τόπον, διὰ τοῦτο καλοῦνται ἵστοπα, ἔχουν δὲ δλα τὰς αὐτὰς χημικὰς ιδιότητας.

Οὕτω, ἔκτὸς τοῦ συνήθους ὑδρογόνου, τοῦ ὁποίου τὸ ἀτομον ἀποτελεῖται ἀπὸ 1 πρωτόνιον εἰς τὸν πυρῆνα καὶ 1 περιφερικὸν ἡλεκτρόνιον, ὑπάρχει καὶ δλλο εἶδος ὑδρογόνου, τοῦ ὁποίου ὁ πυρὴν ἀποτελεῖται ἀπὸ 1 πρωτόνιον καὶ 1 νετρόνιον, ἐπομένως ἔχει ἀτομικὸν βάρος 2, καλεῖται δὲ δευτέριον ἢ βαρύν ὑδρογόνον καὶ παρίσταται διὰ τοῦ συμβό-



Ὑδρογόνον



Δευτέριον



Τρίτιον

● Ηλεκτρόνιον
⊕ Πρωτόνιον
○ Νετρόνιον

Σχ. 5. Ἰσότοπα τοῦ ὑδρογόνου.

λου D. Ὑπάρχει ἀκόμη καὶ ἐν τρίτον εἶδος ὑδρογόνου, μὲ πυρῆνα ἀποτελούμενον ἀπὸ 1 πρωτόνιον καὶ 2 νετρόνια, ἐπομένως μὲ ἀτομικὸν βάρος 3, τὸ ὁποῖον λέγεται τρίτιον ἢ ὑπέρβαρυ ὑδρογόνον καὶ παρίσταται διὰ τοῦ συμβόλου T. Τὸ δευτέριον καὶ τὸ τρίτιον λέγονται ἴσοτοπα τοῦ ὑδρογόνου. (Σχ. 5). Τὸ σύνηθες ὑδρογόνον εἶναι μῆγμα 2 ἴσοτόπων, ἐξ ὃν τὸ ἐν ἔχει ἀτομικὸν βάρος 1 καὶ τὸ δλλο 2. Ἡ ἀναλογία τοῦ πρώτου πρὸς τὸ δεύτερον εἶναι περίπου 6.000 : 1. Ἐπειδὴ δὲ ἡ ἀναλογία τοῦ δευτέρου εἶναι ἐλαχίστη, διὰ τοῦτο τὸ ἀτομικὸν βάρος τοῦ συνήθους ὑδρογόνου εἶναι 1,008.

ΔΙΑΙΡΕΣΙΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Ἡ Χημεία, ἀναλόγως τῆς φύσεως τῶν οὐσιῶν, τὰς ὁποίας ἔξετάζει, διαιρεῖται εἰς δύο μεγάλους κλάδους, τὴν Ὀργανικὴν καὶ τὴν Ἀνόργανον.

Καὶ ἡ μὲν Ὀργανικὴ Χημεία ἔξετάζει τὰς πολυαριθμους οὐσίας, τὰς ἐμπεριεχομένας εἰς τὰ φυτὰ καὶ τὰ ζῶα ἢ παρασκευαζομένας

διὰ τῆς τέχνης, καὶ αἱ ὁποῖαι εἰναι ὅλαι ἐνώσεις τοῦ ἀνθρακοῦ.

Ἡ δὲ Ἀνόργανος Χημεία ἐρευνᾷ ὅλα τὰ χημικὰ στοιχεῖα καὶ τὰς ἐνώσεις αὐτῶν, πλὴν τῶν τοῦ ἀνθρακοῦ, αἱ ὁποῖαι ἀπαρτίζουν τὰ δρυκτά, δηλαδὴ τὸν ἀνόργανον κόσμον ἢ παρασκευάζονται τεχνητῶς ἐξ αὐτῶν. Εἰς τὴν Ἀνόργανον Χημείαν θὰ περιγράψωμεν πρῶτον τὰ ἀμέταλλα στοιχεῖα καὶ κατόπιν τὰ μέταλλα.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

ΑΜΕΤΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Γενικά. — Τὰ ἀμέταλλα στοιχεῖα εἶναι πολὺ δλίγα (22). Ἐκ τούτων δὲ μὲν εἶναι ἀέρια εἰς τὴν συνήθη θερμοκρασίαν, δὲ μόνον ἐν εἶναι ὑγρόν, τὸ βρώμιον.

Γενικῶς τὰ ἀμέταλλα στεροῦνται τῆς μεταλλικῆς λεγομένης λάμψεως (πλὴν τοῦ ἰωδίου καὶ τοῦ γραφίτου) καὶ εἶναι κακοὶ ἀγωγοὶ τῆς θερμότητος καὶ τοῦ ἡλεκτρισμοῦ (πλὴν τοῦ γραφίτου). Ἐπὶ πλέον δὲ εἶναι στοιχεῖα ἡλεκτραρνητικὰ (ἔκτὸς τοῦ ὑδρογόνου) καὶ σχηματίζουν δξείδια δξεογόνα.

Ἐκ τῶν ἀμετάλλων θὰ περιγράψωμεν πρῶτον τὸ δξυγόνον καὶ τὸ ὑδρογόνον, ὡς τὰ σπουδαιότερα δλῶν, κατόπιν δὲ τὰ δὲ μόνα.

ΟΞΥΓΟΝΟΝ — ΥΔΡΟΓΟΝΟΝ

ΟΞΥΓΟΝΟΝ

Σίνιβολον Ο

Ατομικὸν βάρος 16

Σθένος II

Προέλευσις. — Τὸ δξυγόνον εἶναι τὸ μᾶλλον διαδεδομένον εἰς τὴν γῆν στοιχεῖον. Ἀπαντᾶται ἐλεύθερον μὲν εἰς τὸν ἀέρα, τοῦ ὅποιου ἀποτελεῖ τὸ 1 / 5 τοῦ δγκου του, ἡνωμένον δὲ εἰς τὸ ὕδωρ, καὶ εἰς πλεῖστα δρυκτά, καθὼς καὶ εἰς τὰς φυτικὰς καὶ ζωϊκὰς ούσιας.

Τὸ πολογίζεται δτι ἀποτελεῖ τὸ ἡμισυ περίπου τοῦ βάρους τοῦ εἰς τὸν ἄνθρωπον προσιτοῦ μέρους τῆς γῆς (ξηρᾶς, θαλάσσης, ἀτμοσφαίρας).


Παρασκευή. — Εἰς τὰ ἐργαστήρια τὸ δξυγόνον παρασκευάζεται συνήθως :

α) Διὰ θερμάνσεως τοῦ χλωρικοῦ καλίου $KClO_3$, ἐν μίγματι μετὰ μικρᾶς ποσότητος πυρολουσίτου MnO_2 (διοξειδίου τοῦ μαγγανίου *). Κατὰ τὴν ἀντίδρασιν ταύτην τὸ χλωρικὸν κάλιον διασπᾶται εἰς χλωριοῦχον κάλιον KCl καὶ εἰς δξυγόνον :




* Τὸ MnO_2 δὲν εἶναι ὑπεροξείδιον, καθ' δοσον εἰς τὴν ἔνωσιν αὐτὴν τὸ Mn εἶναι τετρασθενές. Ἐπιδράσει δὲ δξέων δὲν δίδει ὑπεροξείδιον τοῦ ὑδρογόνου H_2O_2 , δπως τὰ ὑπεροξείδια BaO καὶ Na_2O_2 (σελ. 58).

Τὸ προστιθέμενον ποσὸν τοῦ πυρολουσίτου ἐνεργεῖ ὡς κατὰ λύτης, διευκολῦν τὴν ἀντίδρασιν, εἰς τρόπον ὥστε ἡ ἔκλυσις τοῦ δξυγόνου νὰ γίνεται εἰς ταπεινοτέραν θερμοκρασίαν καὶ εἶναι διμαλωτέρα. Τὸ μῆγμα τῶν δύο σωμάτων εἰσάγεται ἐντὸς φιάλης, ἐφωδιασμένης




Σχ. 6. Παρασκευὴ δξυγόνου δι' ἀποσυνθέσεως τοῦ χλωρικοῦ καλίου.

ξεως ὄδατος ἐπὶ δξυλίθου, ἐντὸς καταλλήλου συσκευῆς (Σχ. 7). Εἶναι δὲ ὁ δξυλίθος ὑπεροξείδιον τοῦ νατρίου Na_2O_2 , ἐμπεριέχον μικρὰν ποσότητα ἀλατός τινος τοῦ χαλκοῦ, δρῶντος ὡς καταλύτου:




γ) Δύναται ἐπίσης νὰ παρασκευασθῇ τὸ δξυγόνον, καὶ κατὰ πολλοὺς ἄλλους τρόπους, εἴτε διὰ θερμάνσεως ὑπεροξείδιων, π. χ. τοῦ ὑπεροξείδιου τοῦ βαρίου BaO_2 , εἴτε δι' ἐπιδράσεως θειϊκοῦ δξέος H_2SO_4 , ἐν θερμῷ, ἐπὶ δξυγονύχων ἀλάτων, π. χ. τοῦ ὑπερμαγγανικοῦ καλίου KMnO_4 :



δι' ἀπαγωγοῦ σωλῆνος (σχ. 6) καὶ θερμαίνεται κατ' ἀρχὰς ἡπίως, ἔπειτα δὲ ἐντονώτερον. Ἐκλύεται τότε δξυγόνον, τὸ ὅποῖον συλλέγεται ἐντὸς ὑαλίνων κυλίνδρων πλήρων ὄδατος, ἀνεστραμμένων ἐντὸς λεχάνης ὄδατος, ἢ ἐντὸς ἀεριοφυλακίου.

β) Δι' ἐπιστά-



Σχ. 7. Παρασκευὴ δξυγόνου δι' ἐπιδράσεως ὄδατος ἐπὶ δξυλίθου.

Είς τὴν βιομηχανίαν τὸ δέξυγόνον παρασκευάζεται :

α) 'Εκ τοῦ ἀτμοσφαιρικοῦ ἀέρος, ὁ δόποῖος εἶναι μῆγμα κυρίως δέξυγόνου καὶ ἀζώτου, δι' ὑγροποιήσεως αὐτοῦ, δι' ισχυρᾶς πιέσεως καὶ ψύξεως καὶ ἐν συνεχείᾳ δι' ἔξατμίσεως τοῦ ὑγροῦ ἀέρος. 'Αφίπταται τότε πρῶτον τὸ εἰς ταπεινοτέραν θερμοκρασίαν ζέον ἀζώτον (Σ. Ζ. — 195⁰ C.), παραμένει δὲ τὸ δέξυγόνον (Σ. Ζ. — 183⁰ C.), μὲ πρόσμιξιν 3 % ἀργοῦ.

β) 'Εκ τοῦ ὅδατος, τὸ δόποῖον εἶναι ἔνωσις δέξυγόνου καὶ ὑδρογόνου, δι' ἡλεκτρολύσεως αὐτοῦ. Πρὸς τοῦτο προστίθεται εἰς τὸ καθαρὸν ὕδωρ μικρὰ ποσότης θειϊκοῦ δέξιος ἢ καυστικοῦ νατρίου, διὰ νὰ καταστῇ ἡλεκτραγωγόν, κατόπιν δὲ διαβιβάζεται δι' αὐτοῦ ἡλεκτρικὸν ρεῦμα συνεχὲς (Βλ. σελ. 50). 'Αποσυντίθεται τότε τὸ ὕδωρ εἰς τὰ συστατικά του : $2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{H}_2 + \text{O}_2$.

Διὰ τῆς μεθόδου ταύτης λαμβάνεται χημικῶς καθαρὸν δέξυγόνον.

Φυσικαὶ ίδιότητες. — Τὸ δέξυγόνον εἶναι ἀέριον ἄχρουν, ἀσμόν καὶ ἄγευστον. Εἶναι δὲ λίγον βαρύτερον τοῦ ἀέρος (ώς ἔχον πυκνότητα 1,105) καὶ ἐλάχιστα διαλυτὸν εἰς τὸ ὕδωρ. Εἰς θερμοκρασίαν — 183° μετατρέπεται εἰς ὑγρὸν ἀνοικτοῦ κυανοῦ χρώματος, τὸ δόποῖον εἰς — 218°,4 στερεοποιεῖται, πρὸς ὑποκύανον μᾶζαν.

Χημικαὶ ίδιότητες. — Τὸ δέξυγόνον εἶναι στοιχεῖον διάτομον, δι' ὃ καὶ παρίσταται συμβολικῶς διὰ O₂. 'Η πλέον χαρακτηριστική του ίδιότητος εἶναι ἡ τάσις πρὸς ἔνωσιν μετὰ τῶν περισσοτέρων ἐκ τῶν ἄλλων στοιχείων.

Οξείδωσις - Καῦσις. — 'Η ἔνωσις τοῦ δέξυγόνου μετά τίνος στοιχείου λέγεται δέξιεις σις, τὰ δὲ προϊόντα τῆς ἔνώσεως ταύτης δέξιεις. "Οταν ἡ δέξιδωσις εἶναι ζωηρὰ καὶ γίνεται ὑπὸ ἔκλυσιν μεγάλης ποσότητος θερμότητος καὶ φωτὸς λέγεται καὶ σις, ἐνῷ δταν γίνεται βραδέως καὶ χωρὶς αἰσθητὴν ἔκλυσιν θερμότητος λέγεται καὶ βραδεῖα καὶ σις. Διὰ νὰ ἀρχίσῃ ἡ καῦσις στοιχείου τινὸς ἢ ἄλλου σώματος, πρέπει νὰ θερμανθῇ τοῦτο προηγουμένως μέχρις ὥρισμένης θερμοκρασίας, χαρακτηριστικῆς δι' ἔκαστον σῶμα, ἢ δόποία καλεῖται θερμοκρασίας.

Τὰ σώματα τὰ δόποία παρέχουν εύκόλως δέξυγόνον καὶ δύνανται ως ἐκ τούτου νὰ προκαλέσουν δέξιδωσεις, δπως εἶναι τὸ χλωρικὸν κάλιον KClO₃, τὸ ὑπεροξείδιον τοῦ νατρίου Na₂O₂ καὶ πολλὰ ἄλλα, λέγονται δέξιειδωτικὰ σώματα.

Καῦσις ἀμετάλλων καὶ μετάλλων. — Τὰ στοιχεῖα μετὰ τῶν ὄποιών δὲν ἔνοῦται τὸ δέσυγόνον εἶναι τὰ εὐγενῆ ἀέρια καὶ τὰ εὐγενῆ μέταλλα, ἐνῷ μετὰ τῶν ἀλατογόνων ἔνοῦται δυσκόλως Ζωηρότερον ἔνοῦται μετὰ τῶν ἑξῆς στοιχείων, κατόπιν προθερμάνσεως αὐτῶν :




1) Μετὰ τοῦ ἄνθρακος C, πρὸς διοξείδιον τοῦ ἄνθρακος CO₂, τὸ ὄποῖον εἶναι ἀέριον ἀχρούν, ἔχον τὴν ἴδιότητα νὰ θολώνῃ τὸ διαυγές ἀσβέστιον ὅδωρ :



2) Μετὰ τοῦ θείου S,


Σχ. 8. Καῦσις ἀπὸ τοῦ θείου S, πρὸς διοξείδιον τοῦ θείου SO₂, τὸ ὄποῖον εἶναι ἀέριον ὁσμῆς ἀποπνικτικῆς :



3) Μετὰ τοῦ φωσφόρου P, πρὸς πεντοξείδιον τοῦ φωσφόρου P₂O₅, τὸ ὄποῖον εἶναι κόνις λευκή :




4) Μετὰ τοῦ μετάλλου μαγνησίου Mg, μὲν ἐκθαμβωτικὸν φῶς λευκόν, πρὸς διείδιον τοῦ μαγνησίου MgO, τὸ ὄποῖον εἶναι κόνις λευκή :



Σχ. 10. Καῦσις σιδήρου.

5) Ἀλλὰ καὶ ὁ σίδηρος Fe δύναται νὰ καῆ ζωηρῶς, πρὸς ἐπιτεταρτοξείδιον τοῦ σιδήρου Fe₃O₄, ὅταν λεπτὸν σύρμα ἡ ἐλατήριον σιδήρου φέρον εἰς τὸ ἄκρον αὐτοῦ τεμάχιον ἴσκας προαναφλεγέν, εἰσαγθῆ ἐντὸς φιάλης περιεχούσης δέσυγόνον.



Ἀναπνοή. — Ἡ ἀναπνοὴ τοῦ ἄνθρωπου καὶ τῶν ἄλλων ζώων, εἶναι βραδεῖα καῦσις, ἔχουσα ὡς ἀποτέλεσμα τὴν ζωὴκὴν θερμότητα. Κατὰ τὴν ἀναπνοὴν τὸ δέσυγόνον, τοῦ εἰσπνεομένου ἀέρος, εἰσέργομενον εἰς τὸ αἷμα καὶ συγχρατούμενον ὑπὸ τῶν ἐρυθρῶν αἵμο-



Σχ. 9. α) Καῦσις θείου.
β) Καῦσις φωσφόρου.

σφαιρίων του, μεταφέρεται δι' αύτοῦ εἰς ὅλα τὰ μέρη τοῦ σώματος, δῆποι αἱ ἀνθρακοῦχοι οὐσίαι τῶν ίστῶν καίονται βραδέως. Σχηματίζονται τότε διοξείδιον τοῦ ἀνθρακος καὶ ὑδρατμός, τὰ δόποια, μεταφερόμενα ὑπὸ τοῦ αἴματος εἰς τοὺς πνεύμονας, ἔξερχονται εἰς τὴν ἀτμόσφαιραν κατὰ τὴν ἐκπνοήν. "Οτι δητως ἐνυπάρχει, εἰς τὸν ἐκπνεόμενον ἀέρα, διοξείδιον τοῦ ἀνθρακος καὶ ὑδρατμός ἀποδεικνύεται ως ἔξης: α) Προφυσῶμεν ἀέρα ἐκ τῶν πνευμόνων μας, διὰ τινος σωλῆνος, ἐντὸς διαυγοῦς ἀσβεστίου ὕδατος ποτηρίου τινός. Ἀμέσως τοῦτο θολώνει ὑπὸ τοῦ διοξειδίου τοῦ ἀνθρακος. β) Προφυσῶμεν ἀπ' εὔθειας ἀέρα ἐκ τῶν πνευμόνων μας, ἐπὶ τῆς ψυχρᾶς ἐπιφανείας καθρέπτου. Ἀμέσως αὕτη θαμπώνει, λόγῳ τῆς συμπυκνώσεως τῶν περιεχομένων ὑδρατμῶν. Ἀνάλογος πρὸς τὴν ἀναπνοήν τῶν ζώων εἶναι καὶ ἡ ἀναπνοὴ τῶν φυτῶν.

Ανίχνευσις. — Τὸ δέξυγόνον ἀνιχνεύεται συνήθως διὰ τῆς ἐπαναφλέξεως παρασχίδος ξύλου, διατηρούσης σημεῖα τινὰ διάπυρα.


Χρήσεις. — Τὸ δέξυγόνον φερόμενον εἰς τὸ ἐμπόριον ἐντὸς χαλυβδίνων φιαλῶν, ὑπὸ πίεσιν πολλῶν ἀτμοσφαιρῶν (Σχ. 11), χρησιμοποιεῖται εὑρύτατα σήμερον πρὸς ἐπίτευξιν ὑψηλῶν θερμοκρασιῶν, διὰ καύσεως ἐντὸς εἰδικῶν συσκευῶν (Σχ. 16), μίγματος αὐτοῦ μετὰ φωταερίου (1800°), ὑδρογόνου (2000°), ἀκετυλενίου (2500°). Εἰς τὰς ὑψηλὰς αὐτὰς θερμοκρασίας συγκολλῶνται αὐτογενῶς μέταλλα, ἀποκόπτονται ἐλάσματα σιδήρου, τήκονται δύστηκτα σώματα, ὡς ὁ λευκόχρυσος, ὁ χαλαζίας κ.λ.π.

'Ἐπίσης χρησιμοποιεῖται τὸ δέξυγόνον εἰς τὴν ἰατρικὴν δι' εἰσπνοὰς εἰς ἀσθενείας τῶν πνευμόνων καὶ δι' ἀναπνευστικὰς συσκευὰς πρὸς χρῆσιν τῶν ἀεροπόρων, τῶν δυτῶν, τῶν πυροσβεστῶν, τῶν ὀρειβατῶν κ.λ.π.

O Z O N

Σύμβολον O_3

Μοριακὸν βάρος 48



Σχ. 11. Χαλυβδίνη φιάλη δέξυγόνου ὑπὸ πίεσιν.

Προέλευσις. — Τὸ δέξυγόνον, ὑπὸ τὴν ἐπίδρασιν ἡλεκτρικῶν ἐκκενώσεων, συστέλλεται κατὰ τὰ $1/3$, καθιστάμενον οὕτω πυκνότερον, καὶ μεταβάλλεται εἰς ἀέριον μεγάλης δέξιειδωτικῆς ίκανότητος, τὸ δόποιον Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

καλεῖται ὅζον, λόγω τῆς χαρακτηριστικῆς του δσμῆς. Τὸ μόριόν του ἀποτελεῖται ἐκ 3 ἀτόμων καὶ διὰ τοῦτο ἀποδίδεται διὰ τοῦ συμβόλου Ο₃. Ἀπαντᾶται κατ' ἐλάχιστα ποσά εἰς τὴν ἀτμόσφαιραν, ίδιως εἰς τὰ ἀνώτερα στρώματα αὐτῆς, ἀφθονώτερον δὲ ἔπειτα ἀπὸ καταιγίδας.

Τὸ φαινόμενον τοῦτο, κατὰ τὸ ὅποῖον χημικόν τι στοιχεῖον ἐμφανίζεται εἰς περισσοτέρας τῆς μιᾶς μορφάς, μὲν διαφόρους ίδιότητας, λέγεται ἀλλοτροπία, αἱ δὲ μορφαὶ καλοῦνται ἀλλοτροπικά. Εἶναι ἑπομένως τὸ ὅζον μία ἀλλοτροπικὴ μορφὴ τοῦ δξυγόνου.

Παρασκευή. — Τὸ ὅζον παρασκευάζεται κατὰ τὰς ἡλεκτρικὰς ἐκκενώσεις, ίδιως τὰς σκοτεινάς, ἐντὸς δέρος ή δξυγόνου, διὰ συσκευῶν, αἱ ὅποιαι λέγονται ὅζονιστηρες, συμφώνως πρὸς τὴν ἔξιστασιν :



Φυσικαὶ ίδιότητες. — Τὸ ὅζον εἶναι ἀέριον ἀσθενῶς κυανοῦ χρώματος καὶ δσμῆς χαρακτηριστικῆς. Ἔχει πυκνότητα 1,6575 ήτοι 1,5 φοράς μεγαλύτεραν τῆς τοῦ δξυγόνου καὶ εἶναι εύδιαλυτότερον αὐτοῦ εἰς τὸ ೦δαρ.

Χημικαὶ ίδιότητες. — Ὡς προκύπτον ἐκ τοῦ δξυγόνου τὸ ὅζον, δι' ἀπορροφήσεως ἐνεργείας, εἶναι οὔσια ἐν δοθερμικῇ, ὡς ἐκ τούτου λίαν ἀσταθές, μεταπτυπτὸν εύχερῶς εἰς δξυγόνον. Κατὰ τὴν διάσπασίν του τρύπην ἐλευθεροῦται ἐξ ἑκάστου μορίου ὅζοντος, ἐν μόριον δξυγόνου καὶ ἐν ἐλεύθερον ἀτομον αὐτοῦ : O₃ → O₂ + O. Εἰς τὴν ὑπαρξίαν τοῦ ἐλευθέρου τούτου ἀτόμου τοῦ δξυγόνου, δρεῖλεται ἡ ἔντονος δξειδωτικὴ δρᾶσις τοῦ ὅζοντος. Οξειδώνει πράγματι ὅλα τὰ μέταλλα, πλὴν τοῦ γρυσοῦ καὶ τοῦ λευκοχρύσου ἀποσυνθέτει δὲ διάλυμα ιωδιούχου καλίου KJ, πρὸς ὑδροξείδιον τοῦ καλίου KOH καὶ ίώδιον, τὸ ὅποῖον μετατρέπει εἰς κυανοῦν τὸ ἄχρονυ διάλυμα ἀμύλου :



Ἡ ἀντίδρασις αὕτη χρησιμοποιεῖται πρὸς ἀνίχνευσιν τοῦ ὅζοντος, διὰ τοῦ ὅζοντοσκοπικοῦ χάρτου, ήτοι χάρτου ἐμποτισθέντος διὰ διαλύματος ιωδιούχου καλίου καὶ ἀμύλου ἐν ೦δατι. Ὁ χάρτης οὗτος καθίσταται μᾶλλον ἡ ἥπτον κυανοῦς, ἀναλόγως τῆς ποσότητος τοῦ ὑπάρχοντος ὅζοντος.

Εφαρμογαί. — Λόγω τῶν δξειδωτικῶν του καὶ μικροβιοκτόνων ίδιοτήτων, χρησιμοποιεῖται τὸ ὅζον πρὸς ἀπολύμανσιν τοῦ ἀέρος κλειστῶν χώρων (νοσοκομείων, θεάτρων κ.λ.π.) καὶ διὰ τὴν ἀποστείρωσιν τοῦ ೦δατος. Χρησιμεύει ἐπίσης πρὸς λεύκανσιν τῆς κυτταρίνης, τῶν ἀ-

χύρων, τῶν πτίλων κλπ., καθὼς καὶ πρὸς παλαιώσιν τοῦ οἴνου καὶ τῶν ἀποσταγμάτων του.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Γενικαὶ δδηγίαι.— Εἰς τὰ προβλήματα τοῦ βιβλίου τούτου, ἀναφερόμενα εἰς ἀντιδράσεις ἀναγραφομένας ἐντὸς τοῦ κειμένου, οἱ δγκοι τῶν ἀερίων θεωροῦνται μετρηθέντες ὑπὸ κανονικᾶς συνθήκας θερμοκρασίας καὶ πιέσεως (0°C καὶ 760 mm στήλης ὑδραργύρου). Πρὸς λύσιν αὐτῶν τὰ ἀτομικὰ βάροι τῶν στοιχείων δέοντα λαμβάνονται ἐκ τοῦ Πίνακος τῆς σελ. 17 εἰς στρογγυλοὺς ἀριθμούς, διὰ τὴν ἀπλούστευσιν τῶν ἀριθμητικῶν πράξεων. Οὕτω τοῦ ὑδρογόνου λαμβάνεται ὅσον πρὸς 1 ἀντὶ τοῦ ὁρθοῦ $1,008$ τοῦ νατρίου 23 ἀντὶ $22,997$ κ.λ.π. Οἱ τύποι τῆς Φυσικῆς καὶ αἱ ἔννοιαι τῆς Χημείας, ποὺ εἶναι χρήσιμοι διὰ τὴν λύσιν τῶν προβλημάτων τούτων, καθὼς καὶ ὁ τρόπος τῆς λύσεως αὐτῶν, δίδονται εἰς τὸ τέλος τοῦ βιβλίου.

1) Ἀποσυντίθενται διὰ θερμάνσεως $24,5$ γραμ. χλωρικοῦ καλίου, τῇ προσθήκῃ 20 γραμ. πυρολουσίτου. Νὰ ενδεθῇ τὸ βάρος καὶ δγκος τοῦ λαμβανομένου δξυγόνου, καθὼς καὶ τὸ βάρος τοῦ στερεοῦ ὑπολείμματος.

2) Πόσον βάρος δξυλίθου καθαροῦ πρέπει νὰ κατεργασθῶμεν δι? ὄδατος διὰ νὰ λάβωμεν 28 λίτρα δξυγόνου; Ποῖον δὲ τὸ βάρος τοῦ ὑπολείμματος;

3) Καίμεν θεῖον ἐντὸς 2 λίτρων δξυγόνου, μέχοι τελείας ἔξατλήσεως αὐτοῦ. Νὰ ενδεθῇ τὸ βάρος τοῦ καέντος θείου καὶ τὸ βάρος τοῦ παραχθέντος διοξειδίου τοῦ θείου.

ΥΔΡΟΓΟΝΟΝ

Σύμβολον H


Ἀτομικὸν βάρος $1,008$

Σθένος I


Προέλευσις. — Τὸ ὑδρογόνον ἀπαντᾶται ἐλεύθερον μὲν μόνον εἰς τὰ ἀνώτατα στρώματα τῆς ἀτμοσφαίρας καὶ εἰς τὰ ἀέρια, τὰ ἀναδιδόμενα ἀπό τινας πετρελαιοπηγὰς ἢ ἀπὸ ἡφαίστεια. Ήνωμένον δὲ ἐνυπάρχει εἰς τὸ ὄδωρ, ἀποτελοῦν τὸ $1/9$ τοῦ βάρους του, εἰς δλας τὰς ὀργανικὰς ἔνώσεις καὶ εἰς πολλὰς ἀνοργάνους (δξέα, βάσεις).

Παρασκευή. — Εἰς τὰ ἐργαστήρια παρασκευάζεται τὸ ὑδρογόνον δι? ἐπιδράσεως ἀραιοῦ ὑδροχλωρικοῦ δξέος HCl ἢ ἀραιοῦ θειού δξέος H_2SO_4 , ἐπὶ ψευδαργύρου Zn , δόπτε σχηματίζεται χλωριούχος ἢ θειούχος ψευδαργύρος ἐκλύεται δὲ ὑδρογόνον:

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής




Πρὸς τοῦτο εἰσάγομεν εἰς δίλαιμον φιάλην (Βούλφειον) (Σχ. 12), ἐφωδιασμένην μὲ ἀπαγωγὴν σωλῆνα α τεμάχια ψευδαργύρου μὲ ὄλιγον ὕδωρ, κατόπιν δὲ χύνομεν ἐπ' αὐτῶν τὸ ἀραιὸν ὑδροχλωρικὸν ηθειώκόν δξέν διὰ χοανοειδοῦς σωλῆνος β. Ἀμέσως ἀρχίζει τότε νὰ ἔκλυεται μετ' ἀναβρασμοῦ ὑδρογόνον, τὸ ὄποῖον συλλέγομεν ἐντὸς κυλίνδρων ὑαλίνων πλήρων ὕδατος γ, ἀνεστραμένων ἐντὸς λεκάνης ὕδατος.



Σχ. 12. Παρασκευὴ ὑδρογόνου δι' ἐπιδράσεως δξέος ἐπὶ ψευδαργύρῳ.

τῶν ὄποιων δροῦν εἰς τὴν συνήθη θερμοκρασίαν, ὡς τὸ νάτριον Na, ἀλλα δὲ εἰς ὑψηλὴν θερμοκρασίαν, ὡς ὁ σίδηρος Fe :



Εἰς τὴν βιομηχανίαν παρασκευάζεται τὸ ὑδρογόνον :

α) Δι' ἡλεκτρολύσεως τοῦ ὕδατος. ('Ως περιγράφομεν κατωτέρῳ εἰς σελ. 50), κατὰ τὴν ἀντίδρασιν : $2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{O}_2 + 2\text{H}_2$.

β) Διὰ διοχετεύσεως ὑδρατμῶν ὑπεράνω διαπύρων ἀνθράκων, κατὰ τὴν ἀντίδρασιν : $\text{C} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{CO} + \text{H}_2$

Λαμβάνεται τότε μῆγμα δύο ἀερίων καυσίμων, τοῦ μονοξειδίου τοῦ ἀνθρακος CO καὶ τοῦ ὑδρογόνου, τὸ ὄποῖον λέγεται ὑδραερίον καὶ χρησιμοποιεῖται, εἴτε ὡς καύσιμον ἀέριον, εἴτε πρὸς παραγωγὴν μεγάλων ποσοτήτων ὑδρογόνου, δι' ἀπομακρύνσεως τοῦ μονοξειδίου τοῦ ἀνθρακος.

Φυσικαὶ ίδιότητες. — Τὸ ὑδρογόνον εἶναι ἀέριον ἄχρουν, ἀσμον καὶ ἄγευστον, ἐλάχιστα διαλυτὸν εἰς τὸ ὕδωρ. Εἶναι τὸ ἐλαχφρότερον πάν-

των τῶν ἀερίων, 14,4 δὲ φοράς ἐλαφρότερον τοῦ ἀέρος, ως πρὸς τὸν ὅποιον ἡ σχετική του πυκνότης εἶναι 1 : 14,4, ἥτοι ἵση πρὸς 0,0695. "Ἐν λίτρον αὐτοῦ ζυγίζει 0,0898 γραμμ., ὑπὸ κανονικὰς συνθήκας, ἐνῷ ἐν λίτρον ἀέρος ζυγίζει 1,293 γραμμ.

Μετὰ τὸ ἀέριον στοιχεῖον ἥλιον, εἶναι τὸ δυσκολώτερον ὑγροποιούμενον ἀέριον, παρέχον διαυγές ἄχρουν ὑγρόν, μὲ σημεῖον ζέσεως — 252,78°. Εἶναι καλὸς ἀγωγὸς τῆς θερμότητος καὶ τοῦ ἡλεκτρισμοῦ.


Διαπίδυσις. — Χαρακτηριστικὴ φυσικὴ ἰδιότης τοῦ ὑδρογόνου εἶναι ἡ μεγάλη του ἴκανότης διεισδύσεως διὰ μέσου τῶν πόρων τῶν στερεῶν σωμάτων, ἰδιότης ἡ ὅποια λέγεται διαπίδυσις. Αὕτη καταδεικνύεται διὰ τοῦ ἔξης πειράματος: Πορώδες δοχεῖον ἐκ πορσελλάνης κλείεται ἀεροστεγῶς διὰ πώματος, διὰ τοῦ ὅποιου διέρχεται μακρὸς ὑάλινος σωλήν, οὗτινος τὸ ἔτερον ἄκρον βυθίζεται ἐντὸς ὕδατος (Σχ. 13). Τὸ πόρωδες δοχεῖον περιβάλλεται δι' ὑαλίνου ποτήριου ἀνεστραμμένου, ἐντὸς τοῦ ὅποιου διοχετεύεται ὑδρογόνον. Τοῦτο, ως διαπιδυτικώτερον τοῦ ἀέρος, εἰσδύει ἐντὸς τοῦ πορώδους δοχείου πολὺ ταχύτερον, ἀφ' ὅ,τι ὁ ἀὴρ ἔξερχεται ἐξ αὐτοῦ· καὶ μετὰ τόσης ὀρμῆς εἰσέρχεται, ὥστε συμπιέζει τὸν ἀέρα καὶ τὸν ἀναγκάζει νὰ ἔξελθῃ διὰ τοῦ κάτω ἄκρου τοῦ σωλήνος, διὰ μέσου τοῦ ὕδατος, ὑπὸ μορφὴν φυσαλλίδων. Ἐάν κατόπιν ἀπομακρύνωμεν τὸ ὑάλινον ποτήριον, τότε τὸ ἐντὸς τοῦ πορώδους δοχείου ὑδρογόνον ἔξερχεται ἐξ αὐτοῦ πρὸς τὴν δυνηθῆ νὰ ἀντικατασταθῇ ὑπὸ ἵσου ὅγκου ἀέρος, τείνει ως ἐκ τούτου νὰ σχηματισθῇ κενόν, ως ἐκ τοῦ ὅποιου ἀνυψοῦται ἐν τῷ σωλήνι τὸ ὕδωρ ὑπὸ τῆς ἀτμοσφαιρικῆς πιέσεως.

Χημικαὶ ἰδιότητες. — Τὸ ὑδρογόνον, ἀναφλεγόμενον εἰς τὸν ἀέρα, καίεται μὲν ὑποκύανουν ἀλαμπῆ φλόγα, λίαν θερμήν, καθόσον ἐνοῦται μετὰ τοῦ ὁξυγόνου αὐτοῦ· πρὸς ὑδρατμόν :



Οὔτως ἐὰν ἀναφλέξωμεν ἔηρὸν ὑδρογόνον καὶ ὑπεράνω τῆς φλογός του κρατήσωμεν ψυχρὸν ὑάλινον κώδωνα, τότε εἰς τὰ ἐσωτερικὰ τοιχώματα αὐτοῦ ἐπικάθηνται σταγονίδια ὕδατος, τὰ ὅποια διέγονταν κατ' ὅλην


Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής




Σχ. 13. Ἀπόδειξις τῆς διαπιδυτικότητος τοῦ ὑδρογόνου.

γον συνενοῦνται πρὸς μεγαλυτέρας σταγόνας καὶ ρέουν πρὸς τὰ κάτω. (Σχ. 14). "Ἐνεκα τῆς ἴδιότητός του ταύτης ἔλαβε καὶ τὸ ὄνομά του (ὄδωρ γεννᾶν).

Μετὰ τοῦ καθαροῦ δξυγόνου ἐνοῦται ὑπὸ καταλλήλους συνθήκας ζωηρῶς, ὑπὸ ἔκλυσιν μεγάλης ποσότητος θερμότητος. Οὕτω




Σχ. 14. Κατὰ τὴν καῦσιν τοῦ ὄδρογόνου σχηματίζεται ὄδωρ.



Σχ. 15. Κροτοῦν δέριον

μῆγμα 2 ὅγκων ὄδρογόνου καὶ 1 ὅγκου δξυγόνου, ἐντὸς μικροῦ ὄντα τοῦ κυλίνδρου μὲ παχέα τοιχώματα, ἀναφλεγόμενον ἐκρήγνυται, λόγῳ τῆς ἀποτόμου διαστολῆς τῶν δέριων, ὑπὸ τῆς ἔκλυσιμῆς θερμότητος (Σχ. 15). Τὸ μῆγμα τοῦτο καλεῖται κροτοῦν ἀέριον.

Κατὰ τὴν καῦσιν μίγματος ὄδρογόνου καὶ δξυγόνου, ὑπὸ τὴν ἀναλογίαν 2 : 1, εἰς κατάλληλον συσκευήν, παράγεται φλὸς θερμοτάτη, θερμοκρασίας 2000°, ἡ ὅποια λέγεται δξυγόδρικὴ φλόξ.



Σχ. 16. Συσκευὴ Daniell.

Ἡ πρὸς τοῦτο χρησιμοποιουμένη συσκευὴ Daniell (Σχ. 16), ἀποτελεῖται ἐκ δύο συγκεντρικῶν σωλήνων, ἐκ τῶν ὅποιων

ὁ ἔξωτερικός, διὰ τοῦ ὅποιου διαβιβάζεται τὸ ὄδρογόνον, εἰναι διπλασίας παροχῆς τοῦ ἔσωτερικοῦ, δι’ οὗ διαβιβάζεται τὸ δξυγόνον.

Ἐφόσον δὲ τὰ ἀέρια διαβιβάζονται ὑπὸ πίεσιν καὶ δὲν ἀναμιγνύονται παρὰ μόνον εἰς τὸ στόμιον τῆς συσκευῆς, οὐδεὶς κίνδυνος ἔκρηξεως ὑφίσταται.

Τὸ ὑδρογόνον ἐνοῦται ὑπὸ καταλλήλους συνθήκας μετὰ πλείστων στοιχίων, ὡς τοῦ φθορίου, τοῦ χλωρίου, τοῦ θείου, τοῦ ἀζώτου, τοῦ ἀνθρακος, τῶν ἐλαφρῶν μετάλλων κλπ.

Ἀναγωγὴ.—Τὸ ὑδρογόνον δεικνύει τάσιν πρὸς ἔνωσιν, δχι μόνον μετὰ τοῦ ἐλευθέρου ὁξυγόνου, ἀλλὰ καὶ τοῦ ἡνωμένου μετ' ἄλλων στοιχίων. Οὕτω διοχετευόμενον ὑπεράνω ὁξειδίου τοῦ χαλκοῦ CuO , θερμανομένου ἐντὸς δυστήκτου σωλήνος (Σχ. 17), ἀποσπᾷ ἐξ αὐτοῦ τὸ ὁξυγόνον, μετὰ τοῦ ὅποιου παράγει ὕδωρ, παραμένει δὲ τελικῶς ὁ χαλκός εἰς μεταλλικὴν κατάστασιν :



Τὸ φαινόμενον τοῦτο, κατὰ τὸ ὅποιον, διὰ τῆς ἐπιδράσεως τοῦ ὑδρογόνου, ἀφαιρεῖται τὸ ὁξυγόνον ὁξυγονούχου ἐνώσεως, λέγεται ἀναγωγὴ. Πλὴν τοῦ ὑδρογόνου καὶ πολλὰ ἄλλα σώματα, ἔχοντα χημικὴν συγγένειαν πρὸς τὸ ὁξυγόνον, δροῦν ἀναλόγως, ἀποσπῶντα τὸ ὁξυγόνον ἐκ τῶν ἐνώσεων του. Τὰ σώματα ταῦτα καλοῦνται ἀναγωγικά.

Υδρογόνον ἐν τῷ γεννᾶσθαι.—Κατὰ τὴν στιγμὴν τῆς παρασκευῆς του τὸ ὑδρογόνον, ὅταν προέρχεται ἀπὸ ἐξώθερμον ἀντίδρασιν, ὅπως π. χ. κατὰ τὴν ἐπίδρασιν τοῦ θειοκοῦ ὁξέος ἐπὶ τοῦ φευδαργύρου, εἶναι λίαν δραστικὸν καὶ ὀνομάζεται ὑδρογόνον ἐν τῷ γεννᾶσθαι. Τοῦτο ὀφείλεται εἰς τὸ γεγονός ὅτι τὸ ὑδρογόνον κατὰ τὴν στιγμὴν τῆς παραγωγῆς του εὑρίσκεται ὑπὸ μορφὴν ἀτόμων, τὰ ὅποια εἶναι περισσότερον δραστικὰ ἀπὸ τὰ μόρια.

Ανίχνευσις.—Τὸ ὑδρογόνον ἀναγνωρίζεται ἐκ τῆς καύσεως αὐτοῦ δι᾽ ἀλαμποῦς θερμῆς φλογὸς πρὸς ὕδωρ. "Οταν εἶναι ἀναμεμιγμένον μετὰ μικρᾶς ποσότητος ὁξυγόνου ἢ ἀέρος ἐντὸς δοκιμαστικοῦ σωλήνος, παράγει κατὰ τὴν προσέγγισιν φλογὸς μικρὸν χαρακτηριστικὸν κρότον.



Σχ. 17. Ἀναγωγὴ τοῦ ὁξειδίου τοῦ χαλκοῦ δι᾽ ὑδρογόνου.

Χρήσεις. — Αἱ χρήσεις τοῦ ὑδρογόνου εἶναι πολλαὶ καὶ ποικίλαι. Οὕτω χρησιμοποιεῖται : Πρὸς πλήρωσιν τῶν ἀεροστάτων, λόγῳ τῆς μεγάλης του ἐλαφρότητος· πολλάκις δὲ μᾶς ἀντικαθίσταται διὰ τοῦ ἀερίου ἥλιου, τὸ δόποῖον εἶναι μὲν βαρύτερον, ἔχει δὲ μᾶς τὸ πλεονέκτημα νὰ μὴ ἀναφλέγεται. Εἰς τὴν δέξιοδρικὴν φλόγα, διὰ τὴν κοπῆν καὶ τὴν αὐτογενῆ συγκόλλησιν μετάλλων καὶ τὴν τῆξιν δυστήκτων οὐσιῶν. Ὡς ἀναγωγικὸν μέσον κυρίως δέξιειδῶν μετάλλων τινῶν. Πρὸς συνθετικὴν παρασκευὴν τῆς ἀμμωνίας, τοῦ ὑδροχλωρίου, τῆς μεθυλικῆς ἀλκοόλης καὶ πολλῶν ἄλλων οὐσιῶν. Διὰ τὴν καταλυτικὴν ὑδρογόνωσιν τῶν ὑγρῶν ἐλαίων πρὸς στερεὰ λίπη, διὰ τὴν παραγωγὴν τεχνητῶν πετρελαίων κλπ.

Υ Δ Ω Ρ H₂O

Προέλευσις. — Τὸ ὕδωρ εἶναι λίαν διαδεδομένον ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ὑπὸ τὰς τρεῖς φυσικὰς καταστάσεις : ὡς στερεὸν ἀποτελεῖ τοὺς παγετῶνας τῶν πολυκῶν χωρῶν καὶ τῶν ὑψηλῶν ὁρέων· ὡς ὑγρὸν εὑρίσκεται εἰς τὰς θαλάσσας, τὰς λίμνας, τοὺς ποταμούς, τὰς πηγάς· ὡς ἀερίον τέλος ἐμπεριέχεται πάντοτε εἰς τὸν ἀέρα, ὑπὸ μορφὴν ὑδρατμῶν. "Τῷδε ἐπίσης ἐμπεριέχει εἰς μεγάλην ἀναλογίαν τὸ σῶμα τῶν ζώων καὶ τῶν φυτῶν.

Φυσικὰ ὕδατα. — Τὰ φυσικὰ ὕδατα τῶν θαλασσῶν, τῶν λιμνῶν, τῶν ποταμῶν, τῶν πηγῶν κλπ., εἶναι μίγματα χημικῶς καθαροῦ ὕδατος καὶ διαφόρων ἄλλων οὐσιῶν, ἀερίων ἢ στερεῶν, τὰς δόποίας παρέλαβον, εἴτε ἐκ τῆς ἀτμοσφαίρας, εἴτε ἐκ τῶν πετρωμάτων, διὰ μέσου τῶν δόποίων διηλθον. Ἐκ τῶν στερεῶν τούτων οὐσιῶν, ἄλλαι μὲν αἰωροῦνται, ἄλλαι δὲ εἶναι διαλελυμέναι ἐντὸς αὐτῶν.


Αἰωρούμεναι οὐσίαι. — **Διήθησις.** — Διὰ νὰ ἀπομακρύνωμεν τὰς ἐντὸς τῶν φυσικῶν ὕδατων αἰωρούμενας ἀδιαλύτους οὐσίας, ὑποβίλλομεν ταῦτα εἰς διήθη σιν. Πρὸς τοῦτο ἀναγκάζομεν αὐτὰ νὰ διέλθουν διὰ μέσου πορωδῶν οὐσιῶν, αἱ δόποίαι κατακρατοῦν τὰς αἰωρούμενας οὐσίας, ἐνῷ τὸ διερχόμενον ὕδωρ καθίσταται διαυγές. Καὶ δταν μὲν πρόκειται περὶ μικρῶν ποσοτήτων ὕδατος ἡ διήθησις γίνεται τῇ βοηθείᾳ ἐνὸς ἡθμοῦ ἐκ πορώδους χάρτου, τὸν δόποῖον τοποθετοῦμεν ἐντὸς χωνίου, δταν δὲ πρόκειται διὰ μεγάλας ποσότητας χρησιμοποιοῦνται εἰδικαὶ συσκευαί, αἱ δόποίαι καλοῦνται διεύλιστήρια καὶ

έμπεριέχουν ἀλλεπάλληλα στρώματα ἄκμου χονδρῆς, ἄκμου ψιλῆς, κό-
νεως ἔξιανθράκων κλπ.

Διαλελυμέναι ούσιαι. — Έκ τῶν διαλελυμένων εἰς τὰ φυσικὰ ὕδατα
ούσιῶν, αἱ μὲν ἀέριοι ἀποτελοῦνται κυρίως ἀπὸ ὁξυγόνον, ἀζωτον, διο-
ξειδίον τοῦ ἄνθρακος, αἱ δὲ στερεάι, ἀπὸ ἄνθρακικὸν ἀσβέστιον, θεικὸν
ἀσβέστιον κλπ. Διὰ τὰ ὕδατα τὰ ἐμπεριέχοντα μεγάλην ποσότητα στε-
ρεῶν οὐσιῶν λέγομεν ὅτι εἶναι σκληρότητα, ἐνῷ διὰ τὰ ἐμπεριέχοντα μικρὰν ποσότητα λέγομεν ὅτι εἶναι
μαλακά, ἢ ὅτι ἔχουν μικρὰν σκληρότητα. Τὰ σκληρὰ ὕδατα εἶναι
ἀκατάλληλα πρὸς πόσιν καὶ διὰ τὸ βράσιμον τῶν ὁσπρίων, καθὼς καὶ
διὰ τὸ πλύσιμον τῶν ἀσπρορρούχων, διότι δυσκόλως διαλύεται ἐντὸς
αὐτῶν ὁ σάπων.

Ιαματικὰ ὕδατα. — Φυσικά τινα ὕδατα πηγαῖα, προερχόμενα ἐκ
μεγάλου βάθους τῆς γῆς, εἶναι θερμὰ καὶ ἐμπεριέχουν μεγάλας ποσό-
τητας μεταλλικῶν ἀλάτων. Τὰ ὕδατα ταῦτα λέγονται μεταλλικά
ἢ ιαματικά, διότι ἔχουν συνήθως ιαματικὰς ιδιότητας. Τοιαῦτα
ὕδατα ἐν Ἑλλάδι εἶναι τὰ τοῦ Λουτρακίου, τῶν Μεθάνων, τῆς Αιδηψοῦ,
τῆς Υπάτης, Λαγκαδᾶ, Ικαρίας κλπ.

Πόσιμα ὕδατα. — Διὰ νὰ εἶναι κατάλληλον πρὸς πόσιν φυσικόν τι
ὕδωρ, πρέπει νὰ ἔχῃ τὰς ἔξης ιδιότητας : α) Νὰ εἶναι διαυγές, δρο-



Σχ. 18. Συσκευὴ ἀποστάξεως τοῦ ὕδατος.

σερόν, ἀοσμὸν καὶ νὰ ἔγῃ εὐχάριστον γεῦσιν. β) Νὰ ἐμπεριέχῃ ἀρκετὴν
ποσότητα ἀέρος (20 — 50 κ. ἑ. κατὰ λίτρον) καὶ μικρὰν ποσότητα

στερεῶν οὐσιῶν ($0,1 - 0,5$ γραμ. κατὰ λίτρον). γ) Νὰ μὴ ἐμπεριέχῃ ὅργανικάς οὐσίας ἐν ἀποσυνθέσει, οὔτε παθογόνα μικρόβια.

Πρὸς ἀπαλλαγὴν τοῦ ὄργανου ἀπὸ τὰ ἐνυπάρχοντα τυχὸν μικρόβια, ὑποβάλλεται τοῦτο εἰς ἀπόσταξιν. Πρὸς τοῦτο εἴτε βράζεται ἐπ' ἀρκετόν, εἴτε ρίπτονται ἐντὸς αὐτοῦ μικροβιοκτόνοι οὐσίαι (χλώριον κλπ.) εἰς μικρὰν ποσότητα.

Χημικῶς καθαρὸν ὄργανον. — 'Απόσταξις. — Διὰ νὰ ἀπομακρύνωμεν τὰς διαλελυμένας ἐντὸς φυσικοῦ τινος ὄργανος στερεὰς οὐσίας, ὑποβάλλομεν τοῦτο εἰς ἀπόσταξιν. Πρὸς τοῦτο θερμαίνομεν αὐτὸν ἐντὸς καταλλήλου φιάλης μέχρι βρασμοῦ, τοὺς δὲ ἀτμούς του διοχετεύομεν διὰ μέσου ἐνδὸς ψυχρῆς, δηλαδὴ ἐνδὸς μακροῦ σωλῆνος, ψυχομένου ἔξωτερικῶς διὰ ρέοντος ψυχροῦ ὄργανος. Συμπυκνοῦνται οὕτω οἱ ὄργαντα πρὸς ὑγρὸν ὄργανο, τὸ δόποιον ρέει καὶ συλλέγεται εἰς δοχεῖον τι, τὸν ὑπόδοχα (Σχ. 18).


Τὸ οὕτω λαμβανόμενον ὄργανο λέγεται ἀπεσταγμένον, εἶναι δὲ χημικῶς καθαρόν.

Σύστασις τοῦ ὄργανος. — Τὸ ὄργανον ἀποτελεῖ χημικὴν ἔνωσιν τῶν ἀερίων στοιχείων ὄργανον καὶ δέσμων, τῶν δόποιων ἢ ἀναλογία τῶν δικαιων των ἢ τῶν βαρῶν των προσδιορίζεται ὡς ἀκολούθως:

a) **Σύστασις τοῦ ὄργανος κατ' ὅγκον.** —

'Ηλεκτρόλυσις. — 'Η κατ' ὅγκον σύστασις τοῦ ὄργανος εὑρίσκεται δι' ἡλεκτρολύσεως αὐτοῦ, ἢ δόποια γίνεται ἐντὸς μιᾶς συσκευῆς, καλουμένης βολτάμετρον (Σχ. 19).

Τὸ βολτάμετρον εἶναι δοχεῖον ὑάλινον, διὰ τοῦ πυθμένος τοῦ δόποιον διέρχονται δύο σύρματα ἐκ λευκοχρύσου, λεγόμενα ἡλεκτρόδια, συνδεόμενα μὲ τοὺς δύο πόλους μιᾶς πηγῆς ἡλεκτρικοῦ ρεύματος συνεχοῦς. Καὶ τὸ μὲν ἡλεκτρόδιον τὸ συνδεόμενον μετὰ τοῦ θετικοῦ πόλου λέγεται ἀνοδός, τὸ δὲ συνδεόμενον μετὰ τοῦ ἀρνητικοῦ πόλου κάθοδος.




Σχ. 19. Συσκευή ηλεκτρολύσεως τοῦ ὄργανος
(Βολτάμετρον).

Πληροῦμεν τὸ βολτάμετρον διὰ καθαροῦ ὕδατος (ἀπεσταγμένου) καὶ παρατηροῦμεν διὰ τὸ ἡλεκτρικὸν ρεῦμα δὲν διέρχεται, διότι τὸ καθαρὸν ὕδωρ εἶναι κακὸς ἀγωγὸς τοῦ ἡλεκτρισμοῦ. Προσθέτομεν τότε ἐντὸς αὐτοῦ μικρὰν ποσότητα θειίκου ὅξεος, διὰ νὰ καταστῇ ἡλεκτραγωγὴν καὶ ἀναστρέφομεν ἐπὶ τῶν ἡλεκτροδίων δύο ὄμοιούς βαθμολογημένους σωλῆνας, πλήρεις καθαροῦ ὕδατος. Βλέπομεν τότε διὰ ἀναφαίνονται εἰς τὰ ἄκρα τῶν ἡλεκτροδίων ἀφθονοὶ φυσαλίδες ἀερίων, αἱ ὅποιαι ἀνερχόμεναι γεμίζουν βαθμηδὸν τοὺς ἄνωθεν αὐτῶν σωλῆνας. Εἶναι δὲ ὁ ὅγκος τοῦ ἀερίου, τὸ ὅποῖον συλλέγεται εἰς τὸν ἄνωθεν τῆς καθόδου σωλῆνα B, διπλάσιος τοῦ ὅγκου τοῦ ἀερίου τοῦ συλλεγομένου εἰς τὸν ἄνωθεν τῆς ἀνόδου σωλῆνα A.

Ἐὰν ἔξετάσωμεν κατόπιν τὸ περιεχόμενον τῶν σωλήνων, θὰ ἴδωμεν διὰ τὸ μὲν ἀέριον τοῦ σωλῆνος B εἶναι καύσιμον, καίμενον δι' ἀλαμποῦς ὑποκυάνου φλογός, ἥρα εἶναι ὁ δρόγονος ἐνῷ τὸ ἀέριον τοῦ σωλῆνος A δὲν εἶναι καύσιμον ἀλλ' ἐπαναφλέγει ἡμιεσβεσμένην παρασχίδσην, ἔπομένως εἶναι ὁ -
ἔνθετός τον.

Συμπεραίνομεν λοιπὸν ἐκ τοῦ πειράματος τούτου διὰ τὸ ὕδωρ εἶναι σῶμα σύνθετον ἐκ τῶν ἀερίων στοιχείων ὑδρογόνου καὶ ὅξυγόνου, καὶ διὰ ὁ ὅγκος τοῦ ὑδρογόνου εἶναι διπλάσιος τοῦ ὅγκου τοῦ ὅξυγόνου.

β) Σύστασις τοῦ ὕδατος κατὰ βάρος. — 'Η κατὰ βάρος σύστασις τοῦ ὕδατος προσδιορίζεται διὰ τῆς διαβιβάσεως ξηροῦ ὑδρογόνου ὑπεράνω γνωστοῦ βάρους ὅξειδίου τοῦ χαλκοῦ CuO, θερμαινομένου ἐντὸς δυστήκτου ὑαλίνου δοχείου A (Σχ. 20). 'Ανάγεται τότε τὸ διείδιον τοῦ χαλκοῦ πρὸς μεταλλικὸν χαλκόν, ἐνῷ συγχρόνως σχηματίζεται, ὑδρατμός, κατὰ τὴν ἀντίδρασιν : $CuO + H_2 \rightarrow Cu + H_2O$. Τοῦ ὑδρατμοῦ τούτου μέρος μὲν συμπυκνοῦται ἐντὸς τοῦ δοχείου B, Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής




Σχ. 20. Σύνθεσις τοῦ ὕδατος δι' ἀναγωγῆς τοῦ διείδιου τοῦ χαλκοῦ δι' ὑδρογόνου.

τὸ δὲ ὑπόλοιπον συγκρατεῖται ἐντὸς τοῦ σωλῆνος Γ, περιέχοντος ὑγρο-σκοπικήν τινα οὐσίαν.

‘Η διαφορὰ τοῦ βάρους τοῦ δοχείου Α, τοῦ περιέχοντος τὸ δξειδίον τοῦ χαλκοῦ, πρὸ τοῦ πειράματος καὶ μετ’ αὐτό, δίδει τὸ βάρος τοῦ δξυγόνου. ‘Η δὲ διαφορὰ τοῦ βάρους τῶν δοχείων Β καὶ Γ, ἐντὸς τῶν δποίων συλλέγεται τὸ ὑδωρ, πρὸ τοῦ πειράματος καὶ μετ’ αὐτό, δίδει τὸ βάρος αὐτοῦ. Τέλος ἡ διαφορὰ τοῦ βάρους τοῦ ὑδατος καὶ τοῦ δξυγόνου, δίδει τὸ βάρος τοῦ ὑδρογόνου.

Μὲ τὰ δεδομένα αὐτὰ εύρισκεται δι’ ὑπολογισμοῦ ὅτι τὸ ὑδρογόνον καὶ τὸ δξυγόνον ἔνοῦνται χημικῶς πρὸς σχηματισμὸν ὑδατος, ὑπὸ τὴν ἀναλογίαν βάρους 2 : 16 ή 1 : 8.

Σύνθεσις τοῦ ὑδατος. — ‘Η σύστασις τοῦ ὑδατος ἐξ ὑδρογόνου καὶ δξυγόνου δύναται νὰ ἀποδειχθῇ καὶ διὰ συνθέσεως αὐτοῦ ἐκ τῶν συστατικῶν του στοιχείων, ἡ ὁποία γίνεται ἐντὸς εὑδιομέτρου (σχ. 21).



Σχ. 21. Σύνθεσις τοῦ ὑδατος διὰ τοῦ εὑδιομέτρου. Ηρακλείου διαφορά εύρισκονται ἀπέναντι ἀλλήλων εἰς ἐλαχίστην ἀπόστασιν.

Πληροῦμεν τὸ εὑδιόμετρον δι’ ὑδραργύρου, τὸ ἀναστρέφομεν ἐντὸς λεκάνης πλήρους ὑδραργύρου καὶ εἰσάγομεν ἐντὸς αὐτοῦ διαδοχικῶς 20 κ. ἑ. ὑδρογόνου καὶ 20 κ. ἑ. δξυγόνου. Συνδέοντες κατόπιν τὰ σύρματα τοῦ λευκοχρύσου μὲ τοὺς δύο πόλους ἡλεκτροστατικῆς μηχανῆς ἡ πηγὴν Ruhmkorff, προκαλοῦμεν ἡλεκτρικὸν σπινθῆρα μεταξὺ τῶν ἐντὸς τοῦ σωλῆνος δικρων τῶν συρμάτων τοῦ λευκοχρύσου.

Συμβαίνει τότε μία μικρὰ ἔκρηξις ἐντὸς τοῦ εὐδιομέτρου καὶ ὁ ὑδράργυρος ἀνέρχεται ἐντὸς αὐτοῦ, ἐνῷ συγχρόνως παρατηροῦνται σταγόνες τινὲς ὕδατος ἐπὶ τῆς ἐσωτερικῆς του ἐπιφανείας.

"Οταν ψυχθῇ ὁ σωλὴν διαπιστοῦμεν ὅτι εἰς τὸ ἀνώτερον μέρος αὐτοῦ ἔμεινεν ἀδεριόν τι, τοῦ ὁποίου ὁ ὅγκος, ὅταν μετρηθῇ ὑπὸ τὴν ἀτμοσφαιρικὴν πίεσιν, εἶναι ἵσος πρὸς 10 κ. ἑ. Τὸ ἀδεριόν τοῦτο βεβαιούμεθα ὅτι εἶναι ὀξυγόνον, διότι ἀπορροφᾶται τελείως ὑπὸ φωσφόρου.

Βλέπομεν ὅτι οὕτω τὸ ὑδρογόνον καὶ τὸ ὀξυγόνον ἡγάθησαν χημικῶς πρὸς σχηματισμὸν ὕδατος, ὑπὸ τὴν κατ' ὅγκον ἀναλογίαν 20 κ. ἑ.: 10 κ. ἑ. ἥτοι 2 : 1.

Ιδιότητες τοῦ ὕδατος φυσικαί. — Τὸ χημικῶς καθαρὸν ὕδωρ, εἰς τὴν συνήθη θερμοκρασίαν, εἶναι ὑγρὸν διαφανές, ἄχρουν ὑπὸ μικρὸν πάχος, ἀσμον καὶ ἀγενυστον. Εἰς τὴν θερμοκρασίαν 4° ἔχει τὴν μεγαλύτερον του πυκνότητα, ἡ ὁποία λαμβάνεται ὡς μονάς, πρὸς μέτρησιν τῆς πυκνότητος τῶν στερεῶν καὶ ὑγρῶν σωμάτων, ἐπομένως εἶναι ἵση πρὸς 1. Τὸ πολὺ κανονικὴν ἀτμοσφαιρικὴν πίεσιν βράζει εἰς 100°, μεταβαλλόμενον εἰς 0°, μεταβαλλόμενον εἰς πάγον.

Οἱ ὕδρατμοί, ὑπὸ κανονικὰς συνθήκας πιέσεως καὶ θερμοκρασίας ἔχουν πυκνότητα 0,622, ὅ δε πάγος, κρυσταλλούμενος εἰς ἔξαγωγικὰ πρίσματα, ἔχει πυκνότητα 0,917, ἥτοι εἶναι ἐλαφρότερος τοῦ ὕδατος, διὸ καὶ ἐπιπλέει ἐπ' αὐτοῦ. Τὸ ὕδωρ ἔχει μεγάλην διαλυτικὴν ἴκανότητα, ὡς διαλῦν τὰ περισσότερα σώματα. Εἶναι δὲ κακὸς ἀγωγὸς τοῦ ἥλεκτρισμοῦ.

Χημικαὶ ιδιότητες. — Τὸ ὕδωρ εἶναι ἔνωσις λίαν σταθερά, δύναται ὅμως νὰ ἀποσυντεθῇ ὑπὸ τινας συνθήκας καὶ δή : α) διὰ τοῦ ἥλεκτρικοῦ ρεύματος, ὡς εἴδομεν ἀνωτέρῳ· β) διὰ θερμάνσεως τῶν ὕδρατμῶν του εἰς πολὺ ὑψηλὴν θερμοκρασίαν· γ) διὰ τῆς ἐπιδράσεως σωμάτων τινῶν, τὰ ὁποῖα ἀποσποῦν τὸ ὀξυγόνον του, ἐνούμενα μετ' αὐτοῦ, ὡς εἶναι τὸ νάτριον, τὸ κάλιον, τὸ ἀσβέστιον, ὁ ἀνθρακός, ὁ σίδηρος κλπ.

Βαρὺ ὕδωρ. — "Οταν τὸ ἰσότοπον τοῦ ὑδρογόνου δευτέριον ἡ βαρὺ ὑδρογόνον ἡγάθη μετ' ὀξυγόνου, σχηματίζεται τὸ δεξείδιον τοῦ δευτερίου D₂O ἡ βαρὺ ὕδωρ, τὸ ὁποῖον παρουσιάζει διαφοράς τινας εἰς τὰς φυσικὰς του ιδιότητας ἀπὸ τὸ κοινὸν ὕδωρ, ἀπὸ χημικῆς δὲ ἀπόψεως εἶναι ὀλιγώτερον ἀδρανές.

Χρήσεις τοῦ ὕδατος. — Τὸ ὕδωρ ἀποτελεῖ τὴν σπουδαιοτέραν ἀπὸ ὅλας τὰς χημικὰς ἐνώσεις, εἶναι δὲ ἀπαραίτητον διὰ τὴν ζωὴν τῶν

φυτῶν καὶ τῶν ζώων. Χωρὶς ὕδωρ δὲν δύναται νὰ ὑπάρξῃ ζωή, ἐλάχισται δὲ εἶναι αἱ χημικαὶ ἀντιδράσεις, αἱ ὅποῖαι δύνανται νὰ συντελεσθοῦν ἀνευ αὐτοῦ.

Εἰς τὴν βιομηχανίαν χρησιμοποιεῖται ὡς διαλυτικὸν μέσον, πρὸς κατασκευὴν τοῦ πάγου, πρὸς τροφοδότησιν τῶν ἀτμομηχανῶν καὶ διὰ πλείστους ἄλλους σκοπούς.

ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟΝ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ H_2O_2

Ἐκτὸς τοῦ ὕδατος, τὰ στοιχεῖα ὑδρογόνον καὶ δξυγόνον σχηματίζουν καὶ δευτέραν χημικὴν ἔνωσιν, τὸ ὑπεροξείδιον τοῦ ὑδρογόνου ή δξυγονοῦ ἢ δξυγονοῦ ὕδωρ, τοῦ τύπου H_2O_2 .

Προέλευσις. — Τὸ ὑπεροξείδιον τοῦ ὑδρογόνου ἀπαντᾶ κατὰ μίκρας ποσότητας, ὑπὸ μορφὴν ἀτμῶν, εἰς τὰ κατώτατα στρώματα τῆς ἀτμοσφαίρας.

Παρασκευή. — Παρασκευάζεται διὰ τῆς ἐπιδράσεως ψυχροῦ ἀραιοῦ θειού δξέος ἐπὶ ὑπεροξείδιου τοῦ βαρίου ή ὑπεροξείδιου τοῦ νατρίου.



Τὸ οὕτω λαμβανόμενον ὑπεροξείδιον τοῦ ὑδρογόνου εἶναι πολὺ ἀραιόν. Δι’ ἐπανειλημμένων ἀποστάξεων τούτου ἐν τῷ κενῷ λαμβάνεται χημικῶς καθαρὸν προϊόν.

Φυσικαὶ ίδιότητες. — Τὸ καθαρὸν ὑπεροξείδιον τοῦ ὑδρογόνου εἶναι ὑγρὸν σιροπιῶδες, E.B. 1,465 εἰς 0°. Ἐπειδὴ δμως ἀποσυντίθεται εὐκόλως φέρεται εἰς τὸ ἐμπόριον εἰς ὑδατικὰ διαλύματα, τὰ ὅποια εἶναι εὐσταθέστερα, περιεκτικότητος συνήθως 3 % κατὰ βάρος, σπανιώτερον δὲ 30 % ὅπότε δνομάζεται τὸ διάλυμα τοῦτο Perhydrrol.

Χημικαὶ ίδιότητες. — Εἶναι σῶμα λίαν ἀσταθές, ἀποσυντίθέμενον εἰς μὲν τὴν συνήθη θερμοκρασίαν βραδέως, κατόπιν δὲ θερμάνσεως ταχέως, πρὸς ὕδωρ καὶ δξυγόνον : $H_2O_2 \rightarrow H_2O + [O]$.

Ἡ ἀποσύνθεσις αὕτη εἶναι τόσον ταχυτέρα δσον ἢ πυκνότης του εἶναι μεγαλυτέρα, διεκολύνεται δὲ διὰ τῆς προσθήκης διαφόρων καταλυτῶν, ὡς λευκοχρύσου, πυρολουσίτου κ. ἄ., καθὼς καὶ ὑπὸ σωμάτων ἀνώμαλου ἐπιφανείας.

Ἐχει δξειδωτικὰς ἄμα καὶ ἀναγωγικὰς ίδιότητας. Οξειδωτικὰς μὲν λόγῳ τοῦ ἐνεργοῦ δξυγόνου (ἀτομικοῦ), τὸ δποῖον ἐλευθερώνεται κατὰ

τὴν διάσπασίν του, ἀναγωγικὰς δὲ χάρις εἰς τὸ ὑδρογόνον του, τὸ ὅποῖον παράγεται κατὰ τὴν διάσπασιν τοῦ μορίου του, συμφώνως πρὸς τὴν ἔξισωσιν :



Οὕτως δὲ εἰδώντες τὸν μέλανα θειοῦχον μόλυβδον PbS πρὸς λευκὸν θειοῦχὸν μόλυβδον PbSO_4 :



* Ανάγει δὲ τὸ δέξιειδιον τοῦ ἀργύρου Ag_2O πρὸς μεταλλικὸν ἀργυρον καὶ μοριακὸν δέξιγόνον :



Συμπεριφέρεται ἐπίσης καὶ ὡς ἀσθενὲς δέξι, διότι διασπᾶ τὰ ἀνθρακικὰ ἄλατα τῶν ἀλκαλίων :



Χρήσεις. — Λόγῳ τῆς δέξιειδωτικῆς του ἐνεργείας χρησιμοποιεῖται εἰς τὴν ἴατρικὴν πρὸς ἀποστείρωσιν τῶν πληγῶν καὶ ἀπολύμανσιν τοῦ στόματος διὰ γαργαρισμῶν. Εἰς τὴν βιομηχανίαν δὲ πρὸς λεύκανσιν τῆς μετάξης, τοῦ ἔριου, τῶν πτερῶν, τοῦ ἐλέφαντοςτοῦ καὶ διὰ τὰς τρίχας τῆς κεφαλῆς, εἰς τὰς ὅποιας προσδίδει χρῶμα ξανθόν.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

4) Πόσον βάρος ὑδατος καθαροῦ πρέπει νὰ ἀποσυντεθῇ δι' ἥλεκτρολύσεως, διὰ νὰ ληφθοῦν 5,60 λίτρα ὑδρογόνου, μετρηθέντος ὑπὸ κανονικὰ συνθήκας;

5) Κατεργαζόμεθα 15 γραμ. ψευδαργύρου καθαροῦ διὰ περισσείας ἀραιοῦ θειοῦχον δέξιος. Νὰ ενδεθῇ: α) *Ο δύκος τοῦ παραγομένου ἀερίου. β) *Εάν δὲ ψευδάργυρος περιέχῃ ξένας οὐσίας, μὴ προσβαλλομένας ὑπὸ τοῦ θειοῦχον δέξιος καὶ παραχθοῦν τότε 4 λίτρα ἀερίου, ποία ἡ ἐκατοσταία σύνθεσις τοῦ ψευδαργύρου τούτου ;

6) Πόσον βάρος ψευδαργύρου καθαροῦ πρέπει νὰ κατεργασθῶμεν δι' ἀραιοῦ ὑδροχλωρικοῦ δέξιος, διὰ νὰ παραχθῇ ἀερίον τόσον ὥστε διαβιβαζόμενον ἄνωθεν θερμανομένου δέξιειδίου τοῦ χαλκοῦ, νὰ ἐλευθερώσῃ 31,5 γραμ. χαλκοῦ ;

7) Ποῖον εἶναι τὸ ποσόν τοῦ ὑδρογόνου, κατ' ὅγκον καὶ κατὰ βάρος, τὸ περιεχόμενον εἰς ἓν λίτρον ὑδατος χημικῶς καθαροῦ ;

8) Ελογεται εἰς ἓν εὐδιόμετρον μῆγμα δέξιγόνον καὶ ὑδρογόνον καταλαμβάνον ὅγκον 70 κ. ἐκ. Προκαλεῖται ἡ ἔκρηξις ἥλεκτρικοῦ

σπινθήρος καὶ μετὰ τὴν ψῦξιν ἀπομένει ὅγκος 10 κ. ἔ. ὑδρογόνου. Ποίᾳ ἡ ἀρχικὴ σύνθεσις τοῦ μίγματος;

Ο ΜΑΣ ΤΩΝ ΑΛΟΓΟΝΩΝ

‘Αλογόνα ἡ ἀλατογόνα λέγονται τὰ στοιχεῖα φθόριον, χλώριον, βρώμιον, λάδιον, διότι λόγω τῆς μεγάλης χημικῆς συγγενείας των πρὸς τὰ μέταλλα, ἐνοῦνται ἀμέσως μετ’ αὐτῶν, σχηματίζοντα ἄλατα.

‘Αποτελοῦν τυπικὸν παράδειγμα οἶκογενείας στοιχείων, τῆς ὁποίας τὰ μέλη παρουσιάζουν μεγάλας δμοιότητας εἰς τὰς ιδιοτητάς των, φυσικὰς καὶ χημικάς, μεταβαλλομένας βαθμιαίως μετὰ τοῦ ἀτομικοῦ των βάρους.

Είναι λίαν ἐνεργὰ στοιχεῖα, ἡλεκτραρνητικά, διάτομα, μονοσθενῆ μὲν εἰς τὰς μετὰ τοῦ ὑδρογόνου καὶ τῶν μετάλλων ἐνώσεις, διαφόρου δὲ σθένους εἰς τὰς μετὰ τοῦ δξυγόνου.

Φ Θ Ο Ρ Ι Ο Ν

Σύμβολον F

Ατομικὸν βάρος 19

Σθένος I

Προέλευσις. — Τὸ φθόριον ἀπαντᾶ ἡνωμένον εἰς τὰ δρυκτὰ φθορίτης ἡ ἀργυραδάμας CaF_2 καὶ κρυστάλλιος Na_3AlF_6 . ‘Αποτελεῖ ἐπίσης εἰς ἔχην συστατικὸν τῶν δόδοντων καὶ τῶν ὅλλων ιστῶν τῶν ζώων.


Παρασκευή. — Παρασκευάζεται δι’ ἡλεκτρολύσεως τετηγμένου δξίνου φθοριούχου καλίου KHF_2 , ἐντὸς συσκευῆς ἀπὸ εἰδικὸν χάλυβα καὶ ἡλεκτρόδια ἀπὸ γραφίτην.

Φυσικαὶ ιδιότητες. — Είναι ἀέριον, χρώματος ἀνοικτοῦ κιτρινοπρασίνου, δσμῆς δηκτικῆς, πυκνότητος 1,265. Υγροποιεῖται δυσκόλως εἰς — 187°.

Χημικαὶ ιδιότητες. — Είναι τὸ δραστικώτερον πάντων στοιχείων, ἐνοῦμένων μεθ’ ὅλων τῶν ὅλλων στοιχείων, πλὴν τῶν εὔγενῶν ἀερίων. Ενοῦται ὀρμητικῶς μετὰ τοῦ ὑδρογόνου, ἀκόμη καὶ εἰς τὸ σκότος, πρὸς ὑδροφθόριον, τὸ ὅποιον διασπᾶται εἰς ὑψηλοτέρας θερμοκρασίας εἰς 2HF :



‘Αποσυνθέτει δὲ τὸ ὄδωρο ζωηρῶς, σχηματίζομένου δξυγόνου καὶ ὅ-



Προσβάλλει τὴν ὕαλον καὶ τὰ πυριτικὰ ἄλατα καθὼς καὶ τὰς ὄργανικὰς ἔνώσεις.

Χρήσεις. — Διατηρούμενον ἐντὸς δοχείων ἐξ εἰδικῶν ἀπροσβλήτων χαλύβων, χρησιμοποιεῖται σήμερον πρὸς παρασκευὴν φθοριωμένων ὑδρογονανθράκων, ἐκ τῶν δοποίων λαμβάνονται πλαστικαὶ ὕλαι ἐκτάκτου ἀντοχῆς εἰς τὴν θερμότητα καὶ τὰ χημικὰ ἀντιδραστήρια. Παρασκευάζεται ἐπίσης ἐξ αὐτοῦ τὸ ἀέριον, τὸ χρησιμοποιούμενον εἰς τὰ ἡλεκτρικὰ ψυγεῖα, ὑπὸ τὸ ἐμπορικὸν ὄνομα φρεόν, ἔχον τὸν τύπον CF_2Cl_2 .

ΥΔΡΟΦΘΟΡΙΟΝ H_2F_2

Παρασκευή. — Τὸ ὑδροφθόριον παρασκευάζεται ἐκ τοῦ φθορίου CaF_2 , δι' ἐπιδράσεως θειικοῦ δξέος, ἐντὸς συσκευῶν ἐκ μολύβδου, μὴ προσβαλλομένου ὑπὸ αὐτοῦ :



Ίδιότητες. — Τὸ καθαρὸν ὑδροφθόριον εἶναι ἄχρουν, λίαν πτητικόν, ζέον εἰς $19,5^{\circ}$. Ἀτμίζει ἴσχυρῶς εἰς τὸν ἀέρα καὶ προσβάλλει τοὺς δρθαλμούς, τὰ ἀναπνευστικὰ δργανα καὶ τὴν ἐπιδερμίδα.

Εἰς τὴν συνήθη θερμοκρασίαν εἶναι διμοριακόν, ἀποδιδόμενον ὑπὸ τοῦ τύπου H_2F_2 , εἰς ὑψηλοτέραν δμως θερμοκρασίαν ἀποτελεῖται ἀπὸ ἀπλᾶ μάρια. τοῦ τύπου HF.

Διαλύεται ἀφθόνως εἰς τὸ ὕδωρ, τὸ δὲ διάλυμά του καλεῖται ὑδροφθορικὸν δξύ, κατὰ πολὺ ἀσθενέστερον τοῦ ὑδροχλωρικοῦ δξέος. Προσβάλλει τὴν ἄμμον (SiO_2) καὶ τὴν ὕαλον, ἡ δποία ἀποτελεῖται ἀπὸ πυριτικὰ ἄλατα (Na_2SiO_3 κ. ἄ.) :



Διὰ τὸν λόγον αὐτὸν εύρισκει ἐφαρμογὴν εἰς τὴν χάραξιν τῆς ὕαλου.

Διάφοροι δργανικαὶ ούσιαι προσβάλλονται ὑπὸ αὐτοῦ, δχι δμως καὶ ἡ παραφίνη, διὰ τοῦτο τὸ ὑδροφθόριον φυλάσσεται ἐντὸς δοχείου ἀπὸ τὴν ούσιαν ταύτην.

Χρήσεις. — Τὸ ὑδροφθόριον χρησιμοποιεῖται κυρίως εἰς τὴν ὑαλουργίαν, πρὸς διάβρωσιν τῆς ὕαλου, ἀλλὰ καὶ ὡς ἀντισηπτικόν, πρὸς προφύλαξιν τῶν ἔγκων ἀπὸ τοὺς διαφόρους μικροοργανισμούς.

Χ Λ Ω Ρ Ι Ο Ν


Σύμβολον Cl

Ατομικὸν βάρος 35,47

Σθένος I, III, IV, VII

Προέλευσις. — Τὸ χλώριον οὐδέποτε ἀπαντᾶται ἐλεύθερον εἰς τὴν φύσιν, ἀλλὰ πάντοτε ἡγωμένον, ὑπὸ μορφὴν χλωριούχων ἀλάτων, ιδίως


ώς χλωριοῦχον νάτριον NaCl, τὸ ὅποιον εὔρισκεται εἴτε διαλελυμένον εἰς τὸ θαλάσσιον ὕδωρ (2 - 3,5%) περίπου), εἴτε ως ὄρυκτὸν ἀλκας εἰς τὰ ἀλατωρυχεῖα. Λίαν διαδεδομένη ἐπίσης εἶναι τὸ χλωριοῦχον κάλιον KCl καὶ τὸ χλωριοῦχον μαγνήσιον MgCl₂.



Σχ. 22. Παρασκευὴ τοῦ χλωρίου δι' δέξιδώσεως τοῦ ὑδροχλωρίου ὑπὸ πυρολουσίτου.

γεται δὲ τὸ ἔκλυσμενον ἀέριον χλώριον χλώριος, ἀπὸ τὸν ὅποιον εἶναι βαρύτερον, καὶ οὐχὶ ὑπὸ τὸ ὕδωρ, διότι εἰναι εὐδιάλυτον ἐντὸς αὐτοῦ.

Δύναται νὰ παρασκευασθῇ εὐκόλως καὶ ἐκ τῆς χλωρασβέστου CaOCl₂, δι' ἐπιδράσεως ὑδροχλωρικοῦ δέξιος ἐν ψυχρῷ :




Εἰς τὴν βιομηχανίαν παρασκευάζεται σήμερον σχεδόν ἀποκλειστικῶς δι' ἡλεκτρολύσεως ὑδατικοῦ διαλύματος

Παρασκευὴ. — Εἰς τὰ ἐργαστήρια, τὸ χλώριον, παρασκευάζεται δι' δέξιδώσεως τοῦ ὑδροχλωρίου HCl, ὑπὸ πυρολουσίτου MnO₂:




Πρὸς τοῦτο θερμαίνεται τὸ μῆγμα ἐντὸς φιάλης (Σχ. 22), συλλέ-



Σχ. 23. Βιομηχανικὴ παρασκευὴ τοῦ χλωρίου δι' ἡλεκτρολύσεως διαλύματος χλωριούχου νάτριου.

χλωριούχου νατρίου (Σχ. 23), δόποτε έκλινεται εἰς μὲν τὴν ἄνοδον ἐκ συμπαγοῦς ἀνθρακούς χλώριον, εἰς δὲ τὴν κάθοδον ἐκ σιδήρου ὑδρογόνον, προερχόμενον ἐκ τῆς ἀντιδράσεως τοῦ ὕδατος ἐπὶ τοῦ ἔκει καὶ ἀρχὰς ἀποβαλλομένου νατρίου, συμφώνως πρὸς τὴν ἔξισωσιν :



Ἐπειδὴ δὲ τὸ ἐλευθερούμενον χλώριον δύναται νὰ ἐπιδράσῃ ἐπὶ τοῦ καυστικοῦ νάτρου NaOH καὶ νὰ σχηματίσῃ ἐνώσεις χλωριούχους, διὰ τοῦτο εἰς τὰς ηλεκτρολυτικὰς συσκευὰς διαχωρίζονται τὰ δύο ηλεκτρόδια διὰ πυρώδους διαφράγματος.

Φυσικαὶ Ιδιότητες. — Τὸ χλώριον εἶναι ἀέριον κιτρινοπράσινον, ὁσμῆς ἀποπνικτικῆς. Εἰσπνεόμενον προσβάλλει τὰ ἀναπνευστικὰ δργανα, διὸ προκαλεῖ βῆχα καὶ δυσφορίαν, εἰς μεγαλυτέρας δὲ δόσεις ἐπιφέρει αἴμόπτυσιν καὶ αὐτὸν τὸν θάνατον. Εἶναι πολὺ βαρύτερον τοῦ ἀέρος, ἔχον πυκνότητα 2,45 καὶ ὑγροποιεῖται εὔκόλως εἰς ὑγρὸν κιτρινοπράσινον, ζέον εἰς — 34,6°.


Εἶναι εὐδιάλυτον εἰς τὸ ὕδωρ, τοῦ ὅποίου 1 ὅγκος διαλύει 3 ὅγκους χλωρίου περίπου, παρέχον διάλυμα καλούμενον χλωριοῦ χονδρόν καὶ δυνάμενον νὰ χρησιμοποιηθῇ ἀντὶ τοῦ χλωρίου, δταν εἶναι πρόσφατον.

Χημικαὶ Ιδιότητες. — Εἶναι τὸ μᾶλλον ἐνεργὸν στοιχεῖον, μετὰ τὸ φθόριον, προσβάλλον ὅλα τὰ μέταλλα καὶ ἐνούμενον μετὰ τῶν περισσοτέρων ἀμετάλλων, ἐκτὸς τῶν εὐγενῶν, ἀερίων.

Μῆγμα χλωρίου καὶ ὑδρογόνου, εἰς μὲν τὸ σκότος ἐνοῦται βραδέως, εἰς δὲ τὸ ἄμεσον ἡλιακὸν φῶς ή τὸ φῶς καιομένου μαγνησίου ἐνοῦται μετ' ἐκρήξεως (Σχ. 24), πρὸς ἀέριον ὑδροχλώριον : $\text{H}_2 + \text{Cl}_2 \rightarrow 2\text{HCl}$.

Ἡ τάσις πρὸς ἐνωσιν τοῦ χλωρίου μετὰ τοῦ ὑδρογόνου εἶναι τοσαύτη, ὥστε νὰ προκαλῆται ὑπὸ τοῦ χλωρίου ἀπόσπασις τοῦ ὑδρογόνου, πλείστων δργανικῶν ἐνώσεων π. χ. τοῦ τερεβινθελαίου $\text{C}_{10}\text{H}_{16}$, κ. ἄ.

Μερικὰ στοιχεῖα, ὡς ὁ φωσφόρος, τὸ ἀρσενικόν, τὸ ἀντιμόνιον, ἔ-



Σχ. 24. Ἐνωσις χλωρίου καὶ ὑδρογόνου εἰς τὸ φῶς καιομένου μαγνησίου.

νοῦνται μετὰ τοῦ χλωρίου εἰς τὴν συνήθη θερμοκρασίαν δρμητικῶς, ὑπὸ σύγγρονον ἔκλυσιν θερμότητος καὶ φωτός. Ἀλλα δὲ στοιχεῖα, ὡς τὸ θεῖον, τὸ νάτριον, ὁ χαλκὸς κ.ἄ., ἔνοῦνται μετ' αὐτοῦ μόνον κατόπιν προθερμάνσεώς των.

Παρουσίᾳ ὕδατος τὸ χλώριον ἔχει ισχυρὰν λευκαντικήν καὶ ἀπολυμαντικήν ἐνέργειαν, ὁφειλομένην εἰς τὸ κατὰ τὴν ἀντίδρασιν αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ ὕδατος ἔκλυσμενον ἀτομικὸν δξυγόνον:



Τὸ οὕτω παραγόμενον δξυγόνον καταστρέφει δι' ὁξειδώσεως τὰς χρωστικὰς ούσίας, ὡς τὸ βάρμα τοῦ ἡλιοτροπίου, τὴν μελάνην, τὸ ἴνδικόν, τὰ χρώματα τῶν ἀνθέων. Ἐπίσης προσβάλλει καὶ καταστρέφει τοὺς μικροοργανισμούς.

Παρομοίαν ἀλλοιώσιν ὑφίσταται βραδέως ὑπὸ τοῦ φωτὸς καὶ τὸ χλωριούχον ὕδωρ, διὰ τοῦτο φυλάσσεται ἐντὸς χρωματιστῶν φιαλῶν.

Χρήσεις. — Τὸ χλώριον χρησιμοποιεῖται πρὸς παρασκευὴν διαφόρων χλωριούχων ἐνώσεων, πρὸς ἀποστείρωσιν τοῦ ὕδατος καὶ πρὸ παντὸς ὡς λευκαντικὸν τῆς χαρτομάζης καὶ τῶν ἐκ κυτταρίνης ὑφανσίμων ὑλῶν, κυρίως τοῦ βάμβακος καὶ τοῦ λίνου. Διὰ τὸν τελευταῖον τοῦτον σκοπὸν χρησιμοποιεῖται οὐχὶ τὸ ἐλεύθερον χλώριον, ἀλλ' ἡ χλωράσβεστος, ὡς μᾶλλον εὔχρηστος καὶ εὐθηνή.

ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΟΝ ή ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟΝ ΟΞΥ ΗCl

Τὸ ὑδροχλώριον εἶναι ἀέριον, τοῦ ὄποιου τὸ ἐν ὕδατι διάλυμα λέγεται ὑδροχλωρικὸν ὁξύ.

Προέλευσις. — Τὸ ὑδροχλώριον ἀπαντᾶ εἰς τὰ ἀναφυσώμενα ἐκ τῶν ἡφαιστείων ἀέρια, ἢ διαλελυμένον εἰς τὰ ὕδατα, τὰ προερχόμενα ἐκ τινῶν ἡφαιστειακῶν περιοχῶν. Εύρισκεται ἐπίσης εἰς ἐλαχίστην ποσότητα εἰς τὸ ὑγρὸν τοῦ στομάχου τῶν θηλαστικῶν ζώων.


Παρασκευὴ. — Εἰς τὰ ἐργαστήρια παρασκευάζεται διὰ θερμάνσεως χλωριούχου νάτριου μετὰ πυκνοῦ θειέκου ὁξέος. (Σχ. 25), ὅπότε παράγεται καὶ δξινον θειέκον νάτριον NaHSO_4 :




Τὸ ἔκλυσμενον ἀέριον ὑδροχλώριον, ὡς λίαν εὐδιάλυτον εἰς τὸ ὕδωρ συλλέγομεν ὑπὸ τὸν ὑδράργυρον, ἢ δι' ἐκτοπίσεως τοῦ ἀέρος, ἀπὸ τὸν ὄποιον εἶναι βαρύτερον.

Εἰς τὴν βιομηχανίαν παρασκευάζεται : 1) Δι' ἐπιδράσεως

πυκνοῦ θειϊκοῦ δξέος ἐπὶ χλωριούχου νατρίου, ὡς ἀνωτέρω. Ἐπειδὴ ὅμως ἡ θέρμανσις γίνεται ἐντὸς καμίνων καὶ εἶναι ἐντονωτέρα, παράγεται κατὰ τὴν ἀντίδρασιν οὐδέτερον θειϊκὸν νάτριον :



Τὸ ἔκλυσμενον ἀέριον ὑδροχλώριον διοχετεύεται ἐντὸς σειρᾶς σφαιρικῶν φιάλων, συγκοινωνουσῶν μεταξύ των καὶ περιεχουσῶν ὕδωρ, ἐντὸς τοῦ ὄποιου διαλυσμένον παρέχει τὸ ὑδροχλωρικὸν δξὺ τοῦ ἐμπορίου.




Σχ. 25. Παρασκευὴ ὑδροχλώριου εἰς τὰ ἐργαστήρια.

2) Δι' ἀμέσου ἐνώσεως τοῦ ὑδρογόνου καὶ τοῦ χλωρίου, λαμβανομένων ἀμφοτέρων κατὰ τὴν ἡλεκτρόλυσιν τοῦ διαλελυμένου ἐν ὕδατι χλωριούχου νατρίου :



Ἡ ἐνωσις τοῦ ὑδρογόνου καὶ τοῦ χλωρίου γίνεται ἐντὸς σωλήνων ἐκ χαλαζίου, τῇ βοηθείᾳ καταλύτου, τὸ δὲ παραγόμενον ὑδροχλώριον φέρεται εἰς πύργους, ὅπου κατατωνίζεται ὕδωρ, πρὸς διάλυσίν του καὶ σχηματισμὸν ὑδροχλωρικοῦ δξέος.



Σχ. 26. Σχηματισμὸς πίδακος λόγῳ τῆς μεγάλης διαλυτότητος τοῦ ὑδροχλωρίου ἐντὸς τοῦ ὕδατος.

Φυσικαὶ ἴδιότητες.—Τὸ ὑδροχλώριον εἶναι ἀέριον ἄχρουν, δηκτικῆς δσμῆς, βαρύτερον τοῦ ἀέρος, πυκνότητος 1,26, εὐκόλως ὑγροποιούμενον. Εἶναι λίαν εὐδιάλυτον εἰς τὸ ὕδωρ, τοῦ ὄποιου 1 δγκος εἰς 0° διαλύει 500 δγκους ὑδροχλωρίου. Τὸ ὑδατικὸν τοῦτο διάλυμά του λέγεται ὑδροχλωρικὸν δξύ (κ. σπίρτο τοῦ ὕδατος) * Διὰ νὰ δείξωμεν τὴν μεγάλην διαλυτότητα τοῦ ὑδροχλωρίου ἐντὸς τοῦ ὕδατος, ἔκτελοῦμεν τὸ ἔξης πείραμα : Λαμβάνομεν σφαιρικὴν φιάλην (Σχ. 26), πλήρη ἔντονο ὑδροχλωρίου, κλεισμένην διὰ πώματος, διὰ μέσου τοῦ ὄποιου διέρχεται

* Τὸ ὑδροχλωρικὸν δξύ τοῦ ἐμπορίου, περιέχον 36,5 %, κατὰ βάρος HCl, ἔχει εἰδικὸν βάρος 1,19.

λεπτός ύάλινος σωλήνη έχων, τὸ μὲν ἐντὸς τῆς φιάλης ἄκρον του ἀνοικτόν, τὸ δὲ ἔκτὸς αὐτῆς ἄκρον κλειστὸν καὶ αἰχμηρόν. Τὴν φιάλην ταύτην ἀναστρέφομεν ἐντὸς λεκάνης πλήρους ὕδατος, οὕτως ὥστε τὸ κλειστὸν ἄκρον τοῦ σωλῆνος νὰ βυθίζεται ἐντὸς αὐτοῦ.³ Εὰν τότε θραύσωμεν τὸ κλειστὸν τοῦτο ἄκρον τοῦ σωλῆνος διὰ λαβίδος, θὰ παρατηρήσωμεν ὅτι τὸ ὕδωρ τῆς λεκάνης εἰσέρχεται μὲ δρμήν ἐντὸς τῆς φιάλης, ὑπὸ μορφὴν πίδακος. Τοῦτο συμβαίνει διότι τὸ ὑδροχλώριον τῆς φιάλης διάλυεται ὅλον εἰς τὰς πρώτας σταγόνας τοῦ εἰσερχομένου ὕδατος καὶ σχηματίζεται οὕτω ἐντὸς αὐτῆς κενόν, συνεπείᾳ τοῦ ὅποιου σχηματίζεται πῖδαξ ὑπὸ τῆς ἀτμοσφαιρικῆς πιέσεως.

Χημικαὶ ίδιότητες. — Τὸ ὑδροχλώριον εἶναι ἔνωσις λίαν σταθερά, λόγῳ τῆς μεγάλης χημικῆς συγγενείας τῶν στοιχείων ἐκ τῶν ὅποιων ἀποτελεῖται.

Τὸ ξηρὸν δέριον δὲν ἔμφανίζει δέξινους ίδιότητας, τὸ ἐν ὕδατι ὅμως διάλυμα αὐτοῦ, τὸ ὑδροχλωρικὸν δέξιον, εἶναι τὸ ισχυρότερον τῶν δέξιων, παρουσιάζον ἐντόνως ὅλας τὰς χαρακτηριστικὰς ίδιότητας αὐτῶν. Οὕτω προσβάλλει πλεῖστα μέταλλα, σχηματίζον χλωριούχα ἀλατα τα αὐτῶν καὶ ὑδρογόνον :



Ἐπιδρᾶ, ἐπίσης ἐπὶ τῶν δέξιειδίων καὶ ὑδροξειδίων τῶν μετάλλων :



Μετὰ τῆς δέριου ἀμμωνίας NH_3 ἔνοῦται πρὸς παραγωγὴν χλωριούχου ἀμμωνίου, τὸ ὅποιον εἶναι ὅλας λευκόν :



Διὰ τοῦτο ἐὰν πλησιάσωμεν τὰ πώματα δύο φιαλῶν, ἐκ τῶν ὅποιων ἡ μὲν μία περιέχει ὑδροχλωρικὸν δέξιον, ἡ δὲ ἄλλη ἀμμωνίαν, σχηματίζονται λευκοὶ ἀτμοὶ χλωριούχου ἀμμωνίου.

Χρήσεις. — Εἰς τὴν βιομηχανίαν χρησιμοποιεῖται τὸ ὑδροχλωρικὸν δέξιον πρὸς παρασκευὴν τοῦ χλωρίου, τῶν χλωριούχων ἀλάτων, τῆς ζωϊκῆς κόλλας, διαφόρων χρωμάτων, πρὸς καθαρισμὸν τῆς ἐπιφανείας τῶν μετάλλων κ.λ.π. Εἰς τὰ ἐργαστήρια πρὸς παρασκευὴν ὑδρογόνου, χλωρίου, διοξειδίου τοῦ ἄνθρακος, ὑδροθείου κ.λ.π. Εἰς δὲ τὴν οἰκιακὴν οἰκονομίαν πρὸς καθαρισμὸν τῶν λεκανῶν, τῶν νεροχυτῶν, τῶν φιαλῶν.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

9) Θερμαίνονται 10 γραμ. διοξειδίου τοῦ μαγγανίου μεθ' ὑδροχλωρικοῦ δξέος. Νὰ εὑρεθῇ τὸ βάρος τοῦ παραγομένου χλωριούχου μαγγανίου καὶ δ ὅγκος τοῦ ἐκλυομένου χλωρίου.

10) Χλωριοῦχον ὑδωρ, περιέχον 3 λίτρα χλωρίου, ὑφίσταται ἀλλοίωσιν ὑπὸ τοῦ φωτός. Πόσος δ ὅγκος τοῦ ἐλευθερουμένου δξυγόνου καὶ πόσον τὸ βάρος τοῦ παραγομένου ὑδροχλωρίου;

11) Πόσα λίτρα ἀερίου ὑδροχλωρίου δύναται νὰ ληφθοῦν ἐξ ἐνὸς χιλιογράμμου χλωριούχου νατρίου καθαροῦ; Ἐὰν δὲ τὸ ἀερίου τοῦτο διαλυθῇ εἰς τὸ ὑδωρ, πόσον βάρος ὑδροχλωρικοῦ δξέος, περιεκτικότητος 35% κατὰ βάρος, θὰ παρασκευασθῇ;

12) Ἐὰν εἰς ἀραιὸν ὑδροχλωρικὸν δξὺ προσθέσωμεν περίσσειαν διαλύματος νιτρικοῦ ἀργύρου AgNO_3 , σχηματίζεται ἵζημα λευκὸν ἐκ χλωριούχου ἀργύρου AgCl , βάρους 2,85 γραμ. Νὰ εὑρεθῇ τὸ βάρος καὶ δ ὅγκος τοῦ ἀερίου ὑδροχλωρίου, τοῦ περιεχομένου εἰς τὸ ἀραιὸν ὑδροχλωρικὸν δξύ.

ΒΡΩΜΙΟΝ


Σύμβολον *Br*

²Αισμικὸν βάρος 79,9

Σθένος I, V

Προέλευσις. — Τὸ βρώμιον δὲν ἀπαντᾶ ἐλεύθερον εἰς τὴν φύσιν, ἀλλ' ἡνωμένον μετὰ μετάλλων, ὑπὸ μορφὴν ἀλάτων, κυρίως τοῦ καλίου, τοῦ νατρίου, τοῦ μαγνησίου, τὰ δποῖα συνοδεύουν πάντοτε τὰ ἀντίστοιχα ἀλατα τοῦ χλωρίου, εἰς πολὺ μικρὰν ἀναλογίαν, εἰς τὸ θαλάσσιον ὑδωρ, εἰς τὰς ἀλατοπηγὰς καὶ πρὸ πάντων εἰς τὰ ἀλατωρυχεῖα τῆς Στασφούρτης (Γερμανία). Ἐμπεριέχεται ἐπίσης εἰς τὰ θαλάσσια φυτὰ καὶ ζῶα.

Παρασκευή. — Εἰς τὰ ἐργαστήρια παρασκευάζεται διὰ θερμάνσεως μίγματος βρωμιούχου καλίου, πυρολουσίτου καὶ πυκνοῦ θειικοῦ δξέος.



Οἱ ἐκλυόμενοι ἀτμοὶ βρωμίου ψυχόμενοι συμπυκνοῦνται ἐντὸς ὑποδοχέος, ὡς βαρύ, σκοτεινῶς ἐρυθρὸν ὑγρόν.

Εἰς τὴν βιομηχανίαν λαμβάνεται ἀπὸ τὰ ἀλμόλοιπα τῶν ἀλατωρυχείων, τὰ δποῖα ἐμπεριέχουν βρωμιοῦχον μαγνήσιον MgBr_2 ,

διὰ τῆς ἐπιδράσεως χλωρίου, τὸ δποῖον, ὡς δραστικώτερον τοῦ βρωμίου, τὸ ἀντικαθιστᾷ εἰς τὰς ἐνώσεις του:



Φυσικαὶ ἴδιότητες. — Τὸ βρώμιον εἶναι σκοτεινῶς ἔρυθρὸν ὑγρόν, τρεῖς φορᾶς βαρύτερον τοῦ ὄδατος, E.B. 3,187, δυσαρέστου ὀσμῆς, ἔξ οὖ καὶ τὸ ὄνομά του. Εἶναι ὀλίγον διαλυτὸν εἰς τὸ ὄδωρ, εὐδιαλυτότερον δὲ μως εἰς τὸν διθειάνθρακα, τὸν αἰθέρα, τὸ χλωροφόριον καὶ βράζει εἰς 58,8°. Ἀποδίδει εἰς τὴν συνήθη θερμοκρασίαν ἀρθρόνους ἀτμούς καστανερύθρους, βαρυτέρους τοῦ ἀέρος, οἱ δποῖοι εἰσπνεόμενοι προσβάλλουν τὰ ἀναπνευστικὰ ὅργανα.

Χημικαὶ ἴδιότητες. — Ἡ χημικὴ συμπεριφορὰ τοῦ βρωμίου εἶναι τελείως ἀνάλογος πρὸς τὴν τοῦ χλωρίου, ἀλλ’ ἀσθενεστέρα. Ὡς ἐκ τούτου ἡ λευκαντικὴ του ἱκανότης ὑπολείπεται αἰσθητῶς τῆς τοῦ χλωρίου.

Χρήσεις. — Τὸ βρώμιον χρησιμοποιεῖται πρὸς παρασκευὴν βρωμιούχου καλίου KBr, τὸ δποῖον εἶναι χρήσιμον ὡς φάρμακον καταπραϋντικόν, καὶ τοῦ βρωμιούχου ἀργύρου AgBr, χρησιμοποιουμένου εἰς τὴν φωτογραφικήν. Ἐπίσης χρησιμεύει διὰ τὴν παρασκευὴν χρωμάτων τινῶν.

ΥΔΡΟΒΡΩΜΙΟΝ HBr

Παρασκευὴ. — Τὸ ὄδροβρώμιον παρασκευάζεται εύκόλως εἰς τὰ ἔργαστήρια, ἐὰν ἐπιστάξωμεν βρώμιον ἐπὶ ἔρυθρου φωσφόρου, εύρισκομένου ὑπὸ τὸ ὄδωρ, ὁπότε σχηματίζεται βρωμιούχος φωσφόρος PBr₃, ὃ δποῖος ἀποσυντίθεται ἀμέσως, ἐπιδράσει τοῦ ὄδατος, εἰς φωσφορῶδες δέξι H₃PO₃ καὶ εἰς ὄδροβρώμιον HBr :



Δύναται νὰ παρασκευασθῇ καὶ ἐκ τῶν στοιχείων του, παρουσίᾳ καταλύτου, εἰς θερμοκρασίαν 150° - 200°.



Ίδιότητες. — Τὸ ὄδροβρώμιον εἶναι ἀέριον ἄχρουν, πυκνότητος 3,64, δηκτικῆς ὀσμῆς, ἵσχυρῶς ἀτμίζον εἰς τὸν ἀέρα. Διαλύεται ἀρθρονώτατα εἰς τὸ ὄδωρ, τὸ δὲ διάλυμά του ἀποτελεῖ τὸ ὄδροβρωμίκον δέξιον, τὸ δποῖον εἶναι ἀνάλογον τοῦ ὄδροχλωρικοῦ δέξιος, ἀλλ’ ὀλιγώτερον ἵσχυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀσταθές.

ΙΩΔΙΟΝ

Σύμβολον J

² Ατομικὸν βάρος 126,92

Σθένος I, III, V, VII

Προσέλευσις. — Τὸ ἵώδιον ἀπαντᾶ, κυρίως ὑπὸ μορφὴν ἐνώσεων, εἰς τὸ θαλάσσιον ὕδωρ, εἰς τὰ θαλάσσια φυτά, ιδίως εἰς τὰ φύκη, εἰς τὸν θυρεοειδῆ ἀδένα τοῦ ἀνθρώπου, εἰς τὰ ἰχθυέλαια. Εἰς μεγαλύτερα ποσά εύρισκεται εἰς τὸ νήτρον τῆς Χιλῆς, ὑπὸ μορφὴν ἰωδικοῦ νατρίου NaJO₃.

Παρασκευή. — Εἰς τὰ ἐργαστήρια τὸ ἵώδιον παρασκευάζεται, ὅπως καὶ τὸ βρώμιον, διὰ θερμάνσεως ἰωδιούχου ἀλατος, μετὰ διοξειδίου τοῦ μαγγανίου καὶ ἀραιοῦ θειεύκοῦ δέξεος :



Οὕτω ἐὰν ὑπεράνω κάψης, ἐντὸς τῆς ὁποίας θερμαίνεται τὸ ἀνωτέρῳ μῆγμα, κρατήσωμεν ποτήριον ψυχροῦ ὕδατος, θὰ παρατηρήσωμεν ὅτι τὸ ἵώδιον ἐπικάθηται ἐπὶ τῆς ἔξωτερικῆς του ἐπιφανείας, ὑπὸ μορφὴν κρυστάλλων.

Εἰς τὴν βιομηχανίαν τὸ ἵώδιον λαμβάνεται ἀπὸ τὸ ἀλμόλοιπον τοῦ νήτρου τῆς Χιλῆς, διὰ διοχετεύσεως διοξειδίου τοῦ θείου SO₂. τὸ ὄποιον ἀνάγει τὸ ἐντὸς αὐτοῦ περιεχόμενον ἰωδικὸν νάτριον :




Ιδιότητες. — Τὸ ἵώδιον εἶναι σῶμα στερεόν, κρυσταλλικόν, E.B. 4,94, χρώματος βαθέως ἰώδους ἔως τεφρομέλανος, λάμψεως μεταλλικῆς καὶ δομῆς χαρακτηριστικῆς. Θερμαινόμενον ἐλαφρῶς ἐξ αὐτοῦ ταῖ, ἀποδίδον ἀτμοὺς ἰώδεις, βαρυτέρους τοῦ ἀέρος (πυκνότητος 8,7). Εἶναι ἐλάχιστα διαλυτὸν εἰς ὕδωρ, διαλύεται δὲ μᾶς εὔκολώτερον εἰς διάλυμα ἰωδιούχου καλίου ἐντὸς ἀλκοόλης, παρέχον οὕτω τὸ γνωστὸν βάρμα τοῦ ἰωδίου. Διαλύεται ἐπίσης εἰς τὸν αἴθερα, τὸν διθειάνθρακα, τὸ χλωροφόρμιον.

Χημικῶς δρᾷ ὅπως καὶ τὰ ἄλλα ἀλατογόνα στοιχεῖα, ἀλλὰ πολὺ ἀσθενέστερον ὅλων. Τὸ ἐλεύθερον ἰώδιον, καὶ εἰς ἔχνη ἀκόμη, ἀνιχνεύεται ἐκ τῆς κυανῆς χροιᾶς, τὴν ὁποίαν δίδει εἰς διάλυμα ἀμύλου.

Χρήσεις. — Η κυριωτέρα χρῆσις του συνίσταται εἰς τὴν παρασκευὴν τοῦ ἀντισηπτικοῦ βάρματος τοῦ ἰωδίου. Χρησιμοποιεῖται ἐπίσης τὸ ἵώδιον εἰς τὴν φωτογραφικήν, καθὼς καὶ πρὸς παρασκευὴν πολλῶν φαρμάκων καὶ τινῶν χρωμάτων.

Υ ΔΡΟΙΩΔΙΟΝ ΗΙ

Παρασκευή. — Τὸ ὑδροϊῶδιον παρασκευάζεται, εἴτε δι' ἐπιδράσεως ἵωδίου ἐπὶ ἔρυθροῦ φωσφόρου, εύρισκομένου ἐντὸς ὕδατος, εἴτε δι' ἀπ' εὐθείας ἐνώσεως ὑδρογόνου καὶ ἀτμῶν ἵωδίου, παρουσίᾳ καταλύτου ὑπὸ θερμοκρασίαν 450° :



Ίδιότητες. — Τὸ ὑδροϊῶδιον εἶναι ἀέριον ὅχρουν, καπνίζον εἰς τὸν ἀέρα, ἐρεθιστικὸν τῶν βλεννογόνων ὑμένων. Εἶναι λίαν εύδιάλυτον εἰς τὸ ὕδωρ, σχηματίζον τὸ ὑδροϊῶδικὸν δξύ, ἀνάλογον πρὸς τὸ ὑδροχλωρικὸν καὶ τὸ ὑδροβρωμικόν, ἀλλὰ λίαν ἀσταθές. Λόγῳ τῆς εὐκόλου ἀποσυνθέσεώς του χρησιμοποιεῖται ως ἀναγωγικὸν εἰς τὴν Ὀργανικὴν Χημείαν.

ΟΞΕΙΔΩΣΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΩΓΗ

Καθωρίσαμεν ἥδη ὅτι δξείδωσις μὲν εἶναι ἡ προσθήκη εἰς σῶμα τι δξυγόνου, ἀναγωγὴ δὲ ἡ ἀφαίρεσις ἐξ αὐτοῦ δξυγόνου. Ἐξετάσωμεν τώρα λεπτομερέστερον τὰ δύο ταῦτα φαινόμενα.

Ἡ δξείδωσις ἐνὸς μετάλλου, π.χ. τοῦ χαλκοῦ, παρίσταται ὑπὸ τῆς ἔξισώσεως :



Εἰς τὴν ἔξισωσιν ταύτην παρατηροῦμεν ὅτι ὁ μεταλλικὸς χαλκός, εύρισκόμενος εἰς οὐδετέραν ἡλεκτρικὴν κατάστασιν, μὲ σθένος μηδέν, ἀπέβαλε δύο ἡλεκτρόνια καὶ μετετράπη εἰς δισθενὲς ίόν. Ἐπομένως ηὔξηθη τὸ θετικόν του σθένος.

Τὸ αὐτὸ δύμας δύναται νὰ συμβῇ καὶ ἐπιδράσει χλωρίου ἐπὶ μεταλλικοῦ χαλκοῦ κατὰ τὴν ἔξισωσιν :



Καὶ εἰς τὴν περίπτωσιν ταύτην ὁ χαλκός, ἀποβαλὼν δύο ἡλεκτρόνια, μετετράπη εἰς δισθενὲς ίόν, αὐξηθέντος οὕτω τοῦ θετικοῦ σθένους. Θὰ χαρακτηρίσωμεν ἐπομένως καὶ τὴν ἀντίδρασιν ταύτην ως δξείδωσιν.

Ἡ ἀναγωγὴ ἀφ' ἑτέρου ἐνὸς μεταλλικοῦ δξειδίου π.χ. τοῦ δξειδίου τοῦ χαλκοῦ, ἐπιδράσει ὑδρογόνου, παρίσταται ὑπὸ τῆς ἔξισώσεως :



Είς τὴν ἔξισωσιν αὐτὴν παρατηροῦμεν ὅτι ὁ χαλκὸς τοῦ ὀξειδίου τοῦ χαλκοῦ μὲ σθένος δύο, ἥτοι φορτισμένος μὲ δύο θετικὰ φορτία, προσ-
λαμβάνει δύο ἡλεκτρόνια ἀπὸ δύο ἄτομα τοῦ ὑδρογόνου καὶ μεταπί-
πτει εἰς οὐδετέραν κατάστασιν Ἐπομένως τὸ θετικὸν σθένος τοῦ χαλ-
κοῦ ἀπὸ δύο ἔγινε μηδέν, ἥτοι ἡλαττώθη.

Κατὰ ταῦτα δυνάμεθα νὰ εἴπωμεν γενικώτερον ὅτι : ὁ ξεῖδωσις
μὲν καλεῖται ἡ αὔξησις τοῦ θετικοῦ σθένους στοιχείου τινός, δι' ἀπω-
λείας ἡλεκτρονίων· ἀναγωγὴ δὲ ἡ ἐλάττωσις τοῦ θετικοῦ σθένους
διὰ προσλήψεως ἡλεκτρονίων.

ΟΜΑΣ ΤΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Εἰς τὴν ὁμάδα ταύτην ὑπάγονται τὰ στοιχεῖα ὁξυγόνον,
θεῖον, σελήνιον, τελλούριον καὶ πολώνιον, ἔχοντα
ἀναλόγους ἴδιοτητας. Εἰς τὰς ἑνώσεις των μετὰ τοῦ ὑδρογόνου ἀπαντοῦν
κατὰ κανόνα ὡς δισθενῆ, εἰς δὲ τὰς μετὰ τοῦ ὁξυγόνου ὡς τετρασθενῆ ἢ
ἔξασθενῆ. Σπουδαιότερα δὲ λων εἶναι τὰ δύο πρῶτα καὶ ἐφόσον περιε-
γράφη ἥδη τὸ ὁξυγόνον, ἐνταῦθα θὰ περιγράψωμεν τὸ θεῖον.

ΘΕΙΟΝ

Σύμβολον S

Ατομικὸν βάρος 32,066

Σθένος II. IV. VI


Προέλευσις. — Τὸ θεῖον ἀπαντᾶ εἰς τὴν φύσιν ἐλεύθερον μὲν εἰς
ἡφαιστειογενεῖς περιοχάς, δῆπας εἰς Σικελίαν, Ἰαπωνίαν, Λουιζιάναν
καὶ Τέξας τῶν Ἕνωμ. Πολιτειῶν τῆς Ἀμερικῆς καὶ ἐν Ἑλλάδι εἰς τὸ
Σουσάκι, τὴν Μῆλον, τὴν Θήραν. Ἕνωμένον δέ, εἴτε ὑπὸ μορφὴν
θειούχων δρυκτῶν, ὡς ὁ σιδηροπυρίτης FeS_2 , ὁ γαληνίτης PbS , ὁ
σφαλερίτης ZnS , εἴτε ὑπὸ μορφὴν θειϊκῶν ἀλάτων, δῆπας ἡ γύψος
 $CaSO_4 \cdot 2H_2O$.

Ἐξαγωγὴ. — Τὸ ἐλεύθερον θεῖον εὑρίσκεται συνήθως ἀναμεμι-
γμένον μετὰ γαιωδῶν οὐσιῶν καὶ ἀποτελεῖ τὰ λεγόμενα θειοχώ-
ματα. Ἐὰν θερμάνωμεν ταῦτα ἡπίως, περὶ τοὺς 120° , τότε τήκεται
τὸ θεῖον καὶ ἀποχωρίζεται ἀπὸ τὰς γαιωδεις προσμίξεις, αἱ δόποικι εἶναι
ἄτηκτοι.

Θειον τῆς Σικελίας. — Εἰς τὴν Σικελίαν ἡ ἔξαγωγὴ τοῦ θείου γί-
νεται ὡς ἔξης: Τὰ θειοχώματα τοποθετοῦνται ἐπὶ ἐπικλινοῦς δαπέδου

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

κατὰ σωροὺς (Σχ. 27), κατὰ τοιοῦτον τρόπον, ὥστε νὰ μένουν διάκενα πρὸς κυκλοφορίαν τοῦ ἀέρος, καλύπτονται δὲ διὰ χώματος καὶ ἀναφρέγονται εἰς τὶ σημεῖον.




Σχ. 27. Ἐξαγωγὴ τοῦ θείου ἐκ τῶν θειοχωμάτων ἐν Σικελίᾳ.

εἰς ὑπόσταξιν θερμαινόμενον ἐντὸς χυτοσιδηρῶν κεράτων (Σχ. 28), οἱ δὲ ἀτμοὶ του διοχετεύονται ἐντὸς ψυχροῦ θαλάμου, ὃπου συμπυκνοῦνται εἰς λεπτοτάτην κόνιν, γνωστὴν ὑπὸ ὅνομα ἡ ν θ ε ἰ ο υ, ἐφόσον ἡ θερμοκρασία εἶναι κατωτέρα τῶν 112°. Εἰς ἀνωτέραν δημαρχίας θερμοκρασίαν τὸ ἀποσταζόμενον θεῖον τήκεται καὶ τότε συλλέγεται ὡς ὑγρὸν εἰς τὸν πυθμένα τοῦ θαλάμου, ὃπόθεν φέρεται ἐντὸς κυλινδρικῶν ξυλίνων τύπων καὶ λαμβάνεται οὕτω τὸ λεγόμενον ραβδόμορφον θεῖον.

Θεῖον τῆς Ἀμερικῆς.—

Εἰς τὴν Λουιζιάναν καὶ τὸ Τέξας τῆς Ἀμερικῆς, ὃπου ἀπαντῶσιν εἰς βάθος 150 - 350 μέτρων ὀσβεστολιθικὰ πετρώματα πλουσίως ἐμποτισμένα διὰ θείου, ἔξαγεται τοῦτο ὡς ἔξης : 'Ἐνεργοῦνται γεωτρήσεις ἐντὸς




Σχ. 28. Κάθαρσις τοῦ θείου δι' ἀποστάξεως.

τῶν ὅποίων εἰσάγεται σύστημα ἐκ 3 ὁμοκέντρων σωλήνων (Σχ. 29). Διὰ τοῦ ἔξωτερικοῦ σωλῆνος ἀποστέλλεται ὑπὸ πίεσιν ὑπέρθερμος ὑδρατμὸς θερμοκρασίας 150° , ὃ ὅποῖος τήκει τὸ θεῖον. Διὰ τοῦ κεντρικοῦ σωλῆνος εἰσάγεται ἀὴρ ὑπὸ πίεσιν, ὃ ὅποῖος βοηθεῖ τὴν ἄνοδον τοῦ τετηγμένου θείου, διὰ τοῦ μεσαίου σωλῆνος, μέχρι τῆς ἐπιφάνειας τοῦ ἐδάφους. Τὸ οὔτω λαμβανόμενον θεῖον εἶναι καθαρὸν ($99,5\%$) καὶ ἐπομένως δὲν ἔχει ἀνάγκην καθάρσεως.

Φυσικαὶ ίδιότητες.—Τὸ θεῖον εἶναι στοιχεῖον στερεὸν κίτρινον εὔθραυστον, ἀσμον καὶ ἄγευστον. Εἶναι ἀδιάλυτον εἰς τὸ ὕδωρ, εὐδιάλυτον ὅμως εἰς τὸν διθειάνθρακα. Εἶναι κακὸς ἀγωγὸς τῆς θερμότητος καὶ τοῦ ἡλεκτρισμοῦ, διὰ τριβῆς δὲ ἡλεκτρίζεται.

Τὸ θεῖον ἐμφανίζεται ὑπὸ δύο κρυσταλλικὰς ἀλλοτροπικὰς μορφάς: α) ὡς ρομβικὸν θεῖον ($\delta\kappa\tau\alpha\epsilon\delta\rho\iota\kappa\sigma$), καὶ τοιοῦτον εἶναι τὸ φυσικὸν θεῖον, λαμβάνεται δὲ καὶ δι' ἔξατμίσεως τοῦ διαλευμένου εἰς διθειάνθρακα θείου. "Εχει E.B. 2,06 καὶ τίκεται εἰς $112,8^{\circ}$. β) 'Ως μονοχλινὲς θεῖον ($\pi\rho\iota\sigma\mu\alpha\tau\iota\kappa\sigma$), λαμβανόμενον διὰ βραδείας ἀποψύξεως τοῦ τετηγμένου θείου. 'Αποτελεῖται ἀπὸ βελονοειδεῖς κρυστάλλους, ἔχει E.B. 1.96 καὶ τίκεται εἰς 119° . Διὰ τοῦ χρόνου μετατρέπεται εἰς ρομβικὸν θεῖον, τὸ ὅποῖον ἀποτελεῖ τὴν σταθεροτέραν μορφὴν τοῦ θείου.

'Ἐὰν θερμάνωμεν θεῖον ἐντὸς ὑαλίνου δοχείου, παρατηροῦμεν τὰ ἔξης φαινόμενα: Περὶ τοὺς 113° τὸ θεῖον τίκεται πρὸς λεπτόρρευστον κίτρινον ὑγρόν. Εἰς ὑψηλοτέραν θερμοκρασίαν τὸ ὑγρὸν γίνεται σκοτεινότερον καὶ πυκνόρρευστον. Εἰς τοὺς 220° καθίσταται σχεδὸν μέλαν καὶ τόσον πυκνόρρευστον, ὥστε ἐὰν ἀνατρέψωμεν τὸ δοχεῖον δὲν χύνεται. Εἰς τοὺς 330° τὸ θεῖον γίνεται καὶ πάλιν ὀλίγον ρευστότερον, διατηρεῖ



Σχ. 29. Εξαγωγὴ τοῦ θείου εἰς Λουζιάναν τῆς Αμερικῆς.

δύμας τὸ σκοτεινὸν χρῶμα. Τέλος εἰς τοὺς 445⁰ ἀρχίζει νὰ βράζῃ, παρέχον ἀτμοὺς βαθέως ἐρυθρούς. Αἱ κατὰ τὴν θέρμανσιν τοῦ τετηγμένου θείου παραπηρούμεναι ἀνωμαλίαι ὀφείλονται εἰς τὸ δτὶ τοῦτο, εἰς διαφόρους θερμοκρασίας, σχηματίζει μόρια μὲ διάφορον ἀριθμὸν ἀτόμων.

Ἐάν τὸ τετηγμένον θεῖον, περὶ τοὺς 330⁰, δτε καθίσταται κάπως ρευστότερον, τὸ χύσωμεν ἐντὸς ψυχροῦ ὄρθος, τότε στερεοποιεῖται ὑπὸ μορφὴν νήματος ἐλαστικοῦ. Τὸ θεῖον τοῦτο λέγεται πλαστικὸν θεῖον, εἶναι ἀδιάλυτον εἰς τὸν διθειάνθρακα καὶ διὰ τοῦ χρόνου μετατρέπεται καὶ τοῦτο εἰς ρομβικόν.

Ἐπειδὴ τὸ θεῖον ἐμφανίζεται ὑπὸ διαφόρους μορφάς, λέγομεν ὅτι εἶναι σῶμα πολύμορφον.

Χημικαὶ ίδιότητες. — 'Η μᾶλλον χαρακτηριστικὴ χημικὴ ίδιότης τοῦ θείου εἶναι ἡ καῦσις αὐτοῦ εἰς τὸν ἀέρα ἢ τὸ δξυγόνον διὰ κυανῆς φλογός, πρὸς ἀέριον διοξείδιον τοῦ θείου : $S + O_2 \rightarrow SO_2$.

Εἰς ὑψηλὴν θερμοκρασίαν ἔνουται ζωηρῶς μετὰ τῶν περισσοτέρων μετάλλων πρὸς θειούχους ἔνώσεις :

$Fe + S \rightarrow FeS$ θειούχος σίδηρος, $Zn + S \rightarrow ZnS$ θειούχος ψευδάργυρος, $C + 2S \rightarrow CS_2$ διθειάνθραξ κ.λ.π.

Χρήσεις. — Τὸ θεῖον χρησιμοποιεῖται κατὰ μεγάλας ποσότητας, ὑπὸ μορφὴν κόνεως, πρὸς καταπολέμησιν τῆς νόσου τῶν ἀμπέλων, ἢ ὅποιας λέγεταις ὡτδιον, εἰς δὲ τὴν θεραπευτικήν, ὑπὸ μορφὴν ἀλοιφῶν, ἐναντίον δερματικῶν νόσων. Εἰς τὴν βιομηχανίαν χρησιμεύει πρὸς παρασκευὴν τοῦ διοξείδιου τοῦ θείου, τοῦ διθειάνθρακος, τῶν πυρείων, τῆς μαύρης πυρίτιδος, τὴν θείωσιν τοῦ καουτσούκ καὶ τὴν παρασκευὴν τοῦ ἔβονίτου.

ΕΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ

ΥΔΡΟΘΕΙΟΝ H_2S


Προέλευσις. — Τὸ ὑδρόθειον εὑρίσκεται μεταξὺ τῶν ἀερίων, τὰ ὅποια ἔχερχονται ἀπὸ τὰ ἡφαίστεια, ἢ εἶναι διαλευμένον εἰς τὰ ὄρθα τῶν θειούχων λαμπτικῶν πηγῶν (Μεθάνων). Σχηματίζεται ἐπίσης κατὰ τὴν σῆψιν λευκωματωδῶν ζωικῶν ούσιῶν, ἔχον τὴν χαρακτηριστικὴν δυσάρεστον δσμὴν τῶν ἀποσυντεθειμένων ὥδων.

Παρασκευή. — Εἰς τὰ ἐργαστήρια τὸ ὑδρόθειον παρασκευάζεται δι' ἐπιδράσεως ὑδροχλωρικοῦ δξέος ἐπὶ θειούχου σιδήρου (Σχ. 30) :



Τὸ παραγόμενον ἀέριον συλλέγεται ἐντὸς κενῶν φιαλῶν δι' ἔκτοπίσεως τοῦ ἀέρος, ὡς βαρύτερον τούτου.

Φυσικαὶ Ιδιότητες. — Τὸ ὑδρόθειον εἶναι ἀέριον, δσμῆς δυσαρέστου (ἀποσυντεθειμένων ὧῶν). Ἐχει πυκνότητα 1,19 καὶ εἶναι ἀρκετὰ εὐδιάλυτον εἰς τὸ ὕδωρ, τοῦ ὅποιου 1 ὅγκος εἰς 15° διαλύει 3 ὅγκους ὑδροθείου. Εἶναι λίαν δηλητηριώδες, διὸ εἰσπνέομενον εἰς σγηματικὴν πυσότητα δύναται νὰ ἐπιφέρῃ θάνατον. Ὡς ἀντίδοτον δίδεται χλώριον πρὸς εἰσπνοήν.



Σχ. 30. Παρασκευὴ τοῦ ὑδροθείου.

Χημικαὶ Ιδιότητες. — Τὸ ὑδρόθειον καίεται εἰς τὸ καθαρὸν ὁξυγόνον πρὸς ὑδρατμὸν καὶ διοξείδιον τοῦ θείου :



Ἐὰν δμως καῇ εἰς τὸν ἀέρα, περιέχοντα δλίγον δξυγόνον, τότε καίεται κατὰ προτίμησιν τὸ ὑδρογόνον του καὶ σχηματίζεται μόνον ὑδρατμός, ἀποβάλλεται δὲ τὸ θεῖον :



Ἐγεκα τῆς μεγάλης εύκολίας, μὲ τὴν ὅποιαν διασπᾶται, παρέχον ὑδρογόνον, ἐνεργεῖ ὡς ἀναγωγικὸν μέσον. Οὕτω ἀνάγει τὸ θειεκὸν δξὺ πρὸς διοξείδιον τοῦ θείου :




Ἐπιδράσει δὲ τοῦ χλωρίου, παρέχει ὑδροχλώριον καὶ θεῖον :



Ἡ ἀντιδρασις αὕτη ἔχηγε τὴν χρῆσιν τοῦ χλωρίου ὡς ἀντιδότου εἰς τὰς ἐκ τοῦ ὑδροθείου δηλητηριάσεις.

Τὸ διάλυμα τοῦ ὑδροθείου εἰς τὸ ὕδωρ, τὸ ὑδροθεῖον διαλύο, δρᾶ ὡς ἀσθενὲς δξύ, σχηματίζον μετὰ τῶν βάσεων ἄλατα θειούχα. Οὕτω μετὰ τοῦ κχυστικοῦ νάτρου σχηματίζει δύο ἄλατα, τὸ ὑδροθειοῦχον νάτριον NaHS καὶ τὸ θειοῦχον νάτριον Na_2S :



Ἐπιδρῶν τὸ ὑδρόθειον ἐπὶ τῶν διαλυμάτων πολλῶν μεταλλικῶν ἀλάτων, παρέχει ἀδιάλυτα θειοῦχα ἄλατα διαφόρων χρωμάτων, ἐκ τῶν ὅποιών ἀναγνωρίζεται τὸ εἶδος τοῦ μετάλλου τοῦ διαλύματος. Οὕτω ἐπιδρῶν ἐπὶ διαλύματος νιτρικοῦ μολύβδου $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$, παρέχει μέλανα θειοῦχον μόλυβδον PbS :




Χρήσεις. — Τὸ ὑδρόθειον χρησιμοποιεῖται κυρίως εἰς τὴν Ἀναλυτικὴν Χημείαν, πρὸς ἀναγνώρισιν καὶ διαχωρισμὸν τῶν διαφόρων μετάλλων. Ὡς συστατικὸν δὲ τῶν θειοῦχων ίαματικῶν πηγῶν, χρησιμεύει πρὸς θεραπείαν νοσημάτων τινῶν τοῦ δέρματος.

ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΝ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ SO_2

Προέλευσις. — Τὸ διοξείδιον τοῦ θείου εἰς τὴν φύσιν ἀπαντᾶται μόνον μεταξὺ τῶν ἀερίων, τὰ ὅποια ἀναφυσῶνται ἐκ τῶν ἡφαιστείων.

Παρασκευή. — Εἰς τὰ ἐργαστήρια παρασκευάζεται εἰς μικρὰς ποσότητας εὐκόλως δι' ἐπιστάξεως πυκνοῦ θειούχου δέξιος ἐπὶ διαλύματος δέξιου θειώδους νατρίου (Σχ. 31):



Ἐπίσης λαμβάνεται δι' ἀναγωγῆς πυκνοῦ καὶ θερμοῦ θειούχου δέξιος ὑπὸ τινῶν μετάλλων, ὡς ὁ χαλκός, ὁ ἄργυρος, ὁ ὑδράργυρος. Συνήθως χρησιμοποιεῖται ὁ χαλκός (Σχ. 32):




Ἡ ἀναγωγὴ τοῦ θειούχου δέξιος δύναται νὰ γίνῃ ἐν θερμῷ καὶ ὑπὸ τοῦ ἀνθρακοῦ ἢ τοῦ θείου:




Βιομηχανικῶς παρασκευάζεται τὸ διοξείδιον τοῦ θείου διὰ

καύσεως εἰς τὸν ἀέρα, εἴτε καθαροῦ θείου, εἴτε θειούχων ὀρυκτῶν, συνηθέστερον τοῦ σιδηροπυρίτου FeS_2 :



Φυσικαὶ ιδιότητες. — Τὸ διοξείδιον τοῦ θείου εἶναι ἀέριον ἄχρουν, δριμείας καὶ πυνγηρᾶς ὀσμῆς, προκαλοῦν ἴσχυρὸν ἐρεθισμὸν τῶν ἀναπνευστικῶν ὀργάνων. "Εἶχε πυκνότητα 2.26, διαλύεται ὀφθόνως εἰς τὸ οὐδώρ, τοῦ διποίου 1 ὅγκος εἰς 0° διαλύει 80 ὅγκους αὐτοῦ, καὶ ὑγρο-



Σχ. 32. Παρασκευὴ τοῦ διοξειδίου τοῦ θείου δι' ἀναγωγῆς τοῦ θειϊκοῦ δέξιος ὑπὸ χαλκοῦ.

ποιεῖται εὔκόλως, δι' ἀπλῆς ψύξεως ἢ πιέσεως, ὅπως ὅλα τὰ εὐδιάλυτα εἰς τὸ οὐδώρ ἀέρια.

Χημικαὶ ιδιότητες. — Τὸ διοξείδιον τοῦ θείου εἶναι ἔνωσις σταθερά. Δὲν καίεται εἰς τὸν ἀέρα, οὔτε συντελεῖ εἰς τὴν καῦσιν, ἔναντι δὲ δέξιειδωτικῶν σωμάτων ἐνεργεῖ ἀναγωγικῶς. Οὕτως ἀνάγει τὸ νιτρικὸν δέξιο HNO_3 , μετατρεπόμενον ὑπὸ αὐτοῦ εἰς θειϊκὸν δέξιο:



Λόγω τῶν ἀναγωγικῶν του, ιδιοτήτων καταστρέφει χρωστικάς τινας οὐσίας, διὸ ἀποχρωματίζει τὰ ἀνθη κ. λ. π. Προσβάλλει ἐπίσης τοὺς μικροοργανισμούς.

Τὸ ἐν οὐδαί τι διάλυμα αὐτοῦ ἔχει δέξιους ιδιότητας, διφειλομένας εἰς τὸν σχηματισμὸν τοῦ θειϊδους δέξιος H_2SO_3 , τοῦ διποίου εἶναι ὁ ἀνυδρίτης:



Τὸ ἐλεύθερον θειϊδες δέξιο δὲν κατέστη δύνατὸν νὰ ἀπομονωθῇ.

Χρήσεις. — Τὸ διοξείδιον τοῦ θείου χρησιμοποιεῖται κατὰ μεγάλας ποσότητας εἰς τὴν βιομηχανίαν πρὸς παρασκευὴν τοῦ θειώκου δξέος. Χρησιμοποιεῖται ἐπίσης ὡς ἀποχρωστικόν, διὰ τὴν λεύκανσιν ὑλῶν καταστρεφομένων ὑπὸ τοῦ χλωρίου, ὅπως εἶναι τὸ ἔριον, ἢ μεταξά, οἱ φάθινοι πῦλοι κλπ. Ἐπὶ πλέον χρησιμοποιεῖται ὡς ἀπολυμαντικὸν τῶν οἰνοβαρελίων καὶ τῶν οἰκιῶν, ὡς ἀντιζυμωτικὸν τοῦ γλεύκους, ὡς μυιοκτόνον εἰς τὰ πλοῖα καὶ τὰς ὑπονόμους τῶν πόλεων.

ΤΡΙΟΞΕΙΔΙΟΝ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ SO_3


Παρασκευή. — Εἰς τὰ ἐργαστήρια τὸ τριοξείδιον τοῦ θείου παρασκευάζεται διὰ θερμάνσεως τοῦ θειώκου δξέος μετὰ πεντοξειδίου τοῦ φωσφόρου :



Βιομηχανίας δὲ παρασκευάζεται ἐκ τοῦ διοξείδιου τοῦ θείου, δι’ δξειδώσεως αὐτοῦ ὑπὸ δξυγόνου τοῦ ἀέρος :




Πρὸς τοῦτο διοχετεύεται τὸ μῆγμα τῶν δύο ἀερίων διὰ μέσου σωλήνων θερμαινομένων, ἐμπειρεγόντων σπογγώδη λευκόχρυσον ἢ πεντοξειδίον τοῦ βαναδίου ὡς καταλύτην (Σχ. 33).



Σχ. 33. Παρασκευὴ SO_3 βιομηχανικῶς.

κὸν δξύ, τοῦ δποίου εἶναι ὁ ἀνυδρίτης :



Ἐνεκα τούτου διαλύεται ἐντὸς τοῦ նδατος μὲ συρίζοντα ἥχον, ἀνάλογον πρὸς τὸν τοῦ σβεννυμένου δι’ նδατος πεπυρακτωμένου σιδήρου.

Εἶναι σῶμα ἀσταθές, ἀποσυντιθέμενον διὰ θερμάνσεως πέρχν τῶν 500° , πρὸς διοξείδιον τοῦ θείου καὶ δξυγόνον.


Χρησιμοποιεῖται ἀποκλειστικῶς πρὸς παρασκευὴν θειώκου δξέος.

ΘΕΙΙΚΟΝ ΟΞΥ H_2SO_4



Προέλευσις. — Έλευθερον τὸ θειϊκὸν δέξαντα σπανιώτατα εἰς τὰ ὕδατα θερμῶν τινῶν πηγῶν. Εἶναι όμως λίαν διαδεδομένον ύπό μορφὴν θειϊκῶν ἀλάτων, ὡς ή γύψος $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, ο βαρυτίτης BaSO_4 κ.ἄ.

Παρασκευή. — Βιομηχανικός τὸ θειέκὸν δέξι παρασκευάζεται ἐκ τοῦ διοξειδίου τοῦ θείου, λαμβανομένου κυρίως διὰ καύσεως τοῦ σιδηροπυρίτου (σελ. 73), κατὰ τὰς ἔξης δύο μεθόδους :

1) Μέθοδος τῶν μολυβδίνων θαλάμων.—Κατὰ τὴν μέθοδον ταύτην, τὴν παλαιοτέραν, διοχετεύεται ἐντὸς μεγάλων θαλάμων, ἐπενδεδουμένων ἐσωτε-



Σχ. 34.



Τὸ ἀέριον μονοξείδιον τοῦ ἀζώτου προσλαμβάνον εύθυνς ἀμέσως ὁζυγόνον, ἐκ τοῦ συνδιοχετευομένου ἀέρος, μετατρέπεται καὶ πάλιν εἰς ὑπεροξείδιον :



Τὸ ὑπεροξείδιον τοῦ ἀζώτου ἐπιδρᾶ ἐπὶ νέας ποσότητος διοξείδιου τοῦ θείου καὶ ὑδρατμῶν, πρὸς σχηματισμὸν θειϊκοῦ ὅξεος, κ. ο. κ. Τοῦτο ἐπαγαλακιζόνται συνεχῶς, μὲ τὸν αὐτὸν κύκλον ἀντιδράσεως.

Τὸ ἀπαιτούμενον ὑπεροξείδιον τοῦ ἀζώτου λαμβάνεται ἀρχικῶς δι’ ἐπιδράσεως θερμοῦ διοξειδίου τοῦ θείου ἐπὶ νιτρικοῦ δέξιος:



Δὲν εἶναι δὲ ἀνάγκη κατόπιν ν' ἀνανεωθῆ, διότι διαρκῶς ἀναπαράγεται.

Τὸ διὰ τῆς μεθόδου ταύτης λαμβανόμενον θειέκὸν δέξιν εἶναι περιε-

κτικότητος 65 - 70 % περίπου, χρησιμοποιεῖται δὲ κυρίως πρὸς παρασκευὴν θειέκῶν ἀλάτων ἢ χημικῶν λιπασμάτων.

2) Μέθοδος τῆς ἐπαφῆς.— Κατὰ τὴν μέθοδον ταύτην τὸ διοξείδιον τοῦ θείου, καταλαήλως καθαρισθέν, μετατρέπεται κατ' ἀρχὰς εἰς τριοξείδιον τοῦ θείου (σελ. 74), τὸ δόποιον διαλύεται κατόπιν ἐντὸς ἀραιοῦ θειέκου δξέος, δόποτε σχηματίζεται πυροθειέκον ἢ ατμῖζον θειέκον δξὺ H₂S₂O₇:



Τὸ δξὺ τοῦτο, διαλυόμενον ἐντὸς ὑπολογισμένης ποσότητος ὕδατος, παρέχει πυκνὸν θειέκον δξύ:



Φυσικαὶ ίδιότητες. — Τὸ πυκνὸν θειέκον δξύ (κ. βιτριόλι) εἶναι ὑγρὸν ἄχρουν, ἐλαιωδὲς, E.B. 1,844, ζέον εἰς 338°. Μεθ' ὕδατος ἀναμιγνύεται εἰς πᾶσαν ἀναλογίαν, ὑπὸ ἔκλυσιν μεγάλης ποσότητος θερμότητος. Ἡ ἀνάμιξις αὕτη πρέπει νὰ γίνεται διὰ τῆς προσθήκης τοῦ θειέκου δξέος εἰς τὸ ὕδωρ κατὰ μικρά ποσά, ὑπὸ συνεχῆ ἀνάδευσιν, οὐχὶ δὲ ἀντιστρόφως, διότι τότε, ἔνεκα τῆς ἀποτόμου ἀνυψώσεως τῆς θερμοκρασίας, ἔκλυονται ἀφθονοὶ ὑδρατμοί, ἐκτινάσσοντες σταγονίδια τοῦ δξέος, τὰ δόποια δύνανται νὰ προκαλέσουν ἐπικίνδυνα ἐγκαύματα.

Τὸ πυκνὸν θειέκον δξύ ἀπορροφᾷ ἀφθόνως ὑδρατμούς, ὡς ἐκ τούτου εἶναι ἴσχυρὸν ὑγροσκοπικὸν σῶμα, χρησιμοποιούμενον πρὸς ξήρανσιν διαφόρων ἀερίων. Ἐπὶ τοῦ δέρματος προκαλεῖ βαθέα ἐγκαύματα, ἐσωτερικῶς δὲ λαμβανόμενον ἐνεργεῖ ὡς δηλητήριον.


Χημικαὶ ίδιότητες. — Τὸ θειέκον δξύ εἶναι ἴσχυρὸν δξὺ διδύναμον, σχηματίζον μετὰ τῶν βάσεων δύο σιεράς ἀλάτων, οὐδέτερα καὶ δξινα:



Προσβάλλει καὶ διαλύει ὅλα σχεδὸν τὰ μέταλλα, ἐκτὸς τοῦ χρυσοῦ καὶ τοῦ λευκοχρύσου, σχηματίζον θειέκα ἄλατα. Καὶ τὰ μὲν εὔξείδωτα μέταλλα (σίδηρος, ψευδάργυρος κ.ἄ.), προσβάλλονται ὑπὸ τοῦ ἀραιοῦ δξέος ἐν ψυχρῷ, ὑπὸ ἔκλυσιν ὑδρογόνου :



Ἐνῷ τὰ ἄλλα μέταλλα, ὡς ὁ χαλκός, ὁ ὑδράργυρος, ὁ ἀργυρος, κ.ἄ. προσβάλλονται μόνον ὑπὸ τοῦ πυκνοῦ καὶ θερμοῦ θειέκου δξέος ὑπὸ ἔκλυσιν διοξειδίου τοῦ θείου :



‘Ως δέν ίσχυρὸν καὶ μὴ πτητικόν, ἐκτοπίζει ἐκ τῶν ἀλάτων των τὰ πτητικὰ δέξα κατὰ τὴν ἀντίδρασιν :




“Ενεκα τούτου χρησιμεύει πρὸς παρασκευὴν τοῦ ὑδροχλωρικοῦ δέξεος, τοῦ νιτρικοῦ κ. ἢ. ἐκ τῶν ἀλάτων των :



Λόγω τῆς μεγάλης τάσεως αὐτοῦ πρὸς ἔνωσιν μετὰ τοῦ ὕδατος, ὑπὸ ἔκλυσιν μεγάλης ποσότητος θερμότητος, καταστρέφει καὶ μαυρίζει πολλὰς δργανικὰς ούσιας, ὡς τὸ σάκχαρον, τὸ ξύλον κ.ἄ., καθόσον ἀφαιρεῖ ἐξ αὐτῶν τὰ στοιχεῖα ὑδρογόνον καὶ δέξυγόνον, ἐνυπάρχοντα ἐντὸς αὐτῶν ὑπὸ τὴν ἀναλογίαν τοῦ ὕδατος, ἀπομένει δὲ ἐλεύθερος δέκανθραξ. Διὰ τὸν λόγον αὐτὸν προσβάλλει τοὺς ζωϊκοὺς ἰστούς, προκαλοῦν βαθέα ἐγκαύματα.

Θερμαϊνόμενον εἰς ὑψηλὴν θερμοκρασίαν τὸ πυκνὸν θειϊκὸν δέξι, ἀποσυντίθεται εἰς διοξείδιον τοῦ θείου, ὑδρατμούς καὶ δέξυγόνον :



‘Ως ἐκ τούτου δρᾶ δέξειδωτικῶς διά τινα σώματα, ὡς τὸ θεῖον, δέκανθραξ κ.ἄ., δταν συνθερμανθῶσι μετ’ αὐτοῦ :



Ανίχνευσις. — Τὸ θειϊκὸν δέξι καὶ τὰ εὐδιάλυτα θειϊκὰ ἀλατα ἀνιχνεύονται ἐκ τοῦ λευκοῦ, δυσδιαλύτου ιζήματος τοῦ θειϊκοῦ βαρίου, τὸ ὅποῖον παρέχουν, κατόπιν τῆς προσθήκης διαλύματος χλωριούχου βαρίου :



Χρήσεις. — Τὸ θειϊκὸν δέξι εὑρίσκει ἀναριθμήτους ἐφαρμογὰς καὶ διὰ τοῦτο παρασκευάζεται εἰς τεραστίας ποσότητας. Χρησιμοποιεῖται κυρίως πρὸς παρασκευὴν τῶν χημικῶν λιπασμάτων, τῶν ἐκρηκτικῶν ὑλῶν καὶ τῶν χρωμάτων· τῶν σπουδαιοτέρων δέξεων (ὑδροχλωρικοῦ, νιτρικοῦ). τῶν θειϊκῶν ἀλάτων καὶ πλείστων ἄλλων σωμάτων. Ἐπίσης, γρησιμεύει πρὸς πλήρωσιν τῶν ἡλεκτρικῶν συσσωρευτῶν.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

13) Καίομεν εἰς τὸν ἀέρα 40 γραμ. θείου. Νὰ εὑρεθῇ: α) Ποῖον σῶμα σχηματίζεται καὶ πόσον εἶναι τὸ βάρος του. β) Πόσος δύκος ἀέρος χρειάζεται πρὸς τελείαν καῦσιν τοῦ θείου τούτου. (΄Αγαλογία τοῦ δξυγόνου εἰς τὸν ἀέρα 1/5).

14) Πόσον βάρος θειούχον σιδήρου, πρέπει νὰ κατεργασθῶμεν δι' ὑδροχλωρικοῦ δξέος, διὰ νὰ λάβωμεν 10 γραμ. ὑδροθείου;

15) Ἐντὸς ἥαλινον κυλίνδρου περιέχοντος 1 λίτρον χλωρίου, χύνομεν περισσειαν ὑδροθειούχον ὕδατος. Σχηματίζεται τότε ἶζημα ὑποκίτρινον. Νὰ γραφῇ ἡ χημικὴ ἔξισωσις τῆς ἀντιδράσεως καὶ νὰ καθορισθῇ τὸ εἶδος καὶ τὸ βάρος τοῦ ἶζήματος.

16) Πόσος δύκος διοξειδίου τοῦ θείου ἐκλύεται κατὰ τὴν ἀποσύνθεσιν 147 γραμ. θειεϊκοῦ δξέος διὰ χαλκοῦ; Καὶ πόσον εἶναι τὸ βάρος τοῦ παραγομένου θειεϊκοῦ χαλκοῦ;

17) Πόσος εἶναι ὁ δύκος τοῦ ἀπαιτούμενου ἀέρος πρὸς τελείαν καῦσιν ἐνὸς τόντου σιδηροπυρούτον, περιέχοντος 10 % ξένας οὐσίας; Πόσος δὲ εἶναι ὁ δύκος ἐκάστου τῶν ἀερίων, τὰ δποῖα ἔξερχονται ἐκ τῆς καμίνου;

18) Κατεργαζόμεθα 25 γραμ. χαλκοῦ, καθαρότητος 96 %, διὰ πυκνοῦ καὶ θερμοῦ θειεϊκοῦ δξέος. Πόσον εἶναι τὸ βάρος τοῦ παραγομένου θειεϊκοῦ χαλκοῦ καὶ πόσος εἶναι ὁ δύκος τοῦ ἐκλυομένου διοξειδίου τοῦ θείου;

19) Ἐάν θερμάνωμεν 30 γραμ. ἄνθρακος μετὰ πυκνοῦ θειεϊκοῦ δξέος, πόσος εἶναι ὁ δύκος ἐκάστου τῶν παραγομένων ἀερίων, ὑπὸ κανονικὴν πίεσιν καὶ θερμοκρασίᾳ;

Ο ΜΑΣ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ

Εἰς τὴν ὄμάδα ταύτην ὑπάγονται τὰ στοιχεῖα: ἀζωτον, φωσφόρος, ἀρσενικόν, ἀντιμόνιον καὶ βισμούθιον. Ἐκ τούτων τὸ ἀζωτον καὶ ὁ φωσφόρος ἔχουν δλας τὰς χαρακτηριστικὰς ἰδιότητας τῶν ἀμετάλλων, τὸ ἀρσενικόν καὶ τὸ ἀντιμόνιον ἐμφανίζουν ἰδιότητας ἐπαμφοτερικούσας μεταξὺ ἀμετάλλων καὶ μετάλλων, ἐνῷ τὸ βισμούθιον ἔχει ἰδιότητας μεταλλικάς.

Εἰς τὰς ἐνώσεις των μετὰ τοῦ ὑδρογόνου τὰ στοιχεῖα ταῦτα εἶναι

τρισθενή, εἰς δὲ τὰς μετά τοῦ δξυγόνου εἶναι τρισθενή καὶ πεντασθενή.


A Z Ω T O N

Σύμβολον *N*

Άτομικὸν βάρος 14,008

Σθένος *III*, *V*

Προέλευσις. — Ἐλεύθερον ἀπαντᾶ τὸ ἄζωτον εἰς τὸν ἀτμοσφαιρικὸν ἀέρα, τοῦ ὁποίου ἀποτελεῖ τὰ 78 % τοῦ ὅγκου του καὶ εἶναι ἀναμεμιγμένον κυρίως μετά τοῦ δξυγόνου. Ἕνωμένον δὲ εὑρίσκεται εἰς τὰ νιτρικά, τὰ νιτρώδη καὶ τὰ ἀμμωνιακά ἄλατα τοῦ ἐδάφους καὶ εἰς πολυαριθμούς ζωϊκάς καὶ φυτικάς οὐσίας, ἵδιως δὲ εἰς τὰ λευκώματα.




Σχ. 35. Παρασκευὴ καθαροῦ ἄζωτου.

ἀμμωνίου χρησιμοποιεῖται μῆγμα νιτρώδους νατρίου καὶ χλωριούχου ἀμμωνίου :



Δύναται νὰ παρασκευασθῇ καὶ ἐκ τοῦ ἀτμοσφαιρικοῦ ἀέρος, δι’ ἀπομακρύνσεως τοῦ δξυγόνου. Πρὸς τοῦτο διαβιβάζεται ρεῦμα καθαροῦ ἀέρος, ἀπηλλαγμένου τῶν
ὑδρατμῶν καὶ τοῦ διοξειδίου τοῦ ἀνθρακοῦ, διὰ μέσου θερμαινομένου ισχυρῶς σωλῆνος, περιέχοντος τορνεύματα χαλκοῦ (Σχ. 36).

Τὸ δξυγόνον τότε τοῦ ἀέρος ἐνοῦται μετὰ τοῦ χαλκοῦ, πρὸς δξείδιον τοῦ χαλκοῦ CuO , τὸ δόποιον παρασκένει ἐντὸς τοῦ σωλῆνος, ὃς μὴ πτητικόν, ἐνῷ τὸ ἔξερχόμενον ἐκ τοῦ ἄλλου ἕκρου τοῦ σωλῆνος ἀέριον εἶναι ἄζωτον, οὐχὶ δύμας χημικῶν




Σχ. 36. Παρασκευὴ τοῦ ἄζωτου ἐκ τοῦ ἀέρος.

καθαρόν, διότι ἐμπεριέχει καὶ τὰ ἐνυπάρχοντα πάντοτε εἰς τὸν ἀέρα εὔγενη ἀέρια.

Βιομηχανικῶς λαμβάνεται τὸ ἄζωτον, κατὰ μεγάλα ποσά, διὰ κλασματικῆς ἀποστάξεως τοῦ ὑγροῦ ἀέρος, διόπτε ἔξαεροῦται πρῶτον τὸ ἄζωτον, ὡς πτητικώτερον (Σ. Ζ. — 196⁰), καὶ συλλέγεται ἴδιαιτέρως. Τὸ οὕτω λαμβανόμενον ἄζωτον ἐμπεριέχει καὶ τὰ συνυπάρχοντα εὐγενῆ ἀέρια, τὰ ὅποια δύμως δὲν βλάπτουν εἰς τὰς περισσοτέρας ἐφαρμογάς του.

Φυσικαὶ ίδιότητες. — Τὸ ἄζωτον εἶναι ἀέριον ἄχρουν, ἀσμον, ἀγευστὸν, δὲν γίνεται ἐλαφρότερον τοῦ ἀέρος (πυκνότητος 0,967). Διαιλύεται ἐλάχιστα εἰς τὸ ὑδρον, καὶ ὑγροποιεῖται δυσκόλως, πρὸς ὑγρὸν ἄχρουν, ζέον εἰς — 196⁰. Εἶναι διάτομον στοιχεῖον, τρισθενὲς καὶ πεντασθενές.

Χημικαὶ ίδιότητες. — Τὸ ἄζωτον δὲν καίεται, οὔτε συντηρεῖ τὰς καύσεις, εἶναι δὲ ἀκατάλληλον πρὸς ἀναπνοήν. Οὕτω κηρίον ἀνημμένον σβέννυται ἐντὸς ἄζωτου, τὰ δὲ ζῶα ἐντὸς αὐτοῦ ἀποθνήσκουν ἐξ ἀσφυξίας, διὰ τοῦτο μάλιστα καὶ ἀνομάσθη ἄζωτον ὑπὸ τοῦ Lavoisier. Εἰς τὴν συνήθη θερμοκρασίαν εἶναι στοιχεῖον ἀδρανές, λόγω τῆς σταθερότητος τοῦ συνδέσμου τῶν δύο ἀτόμων του ἐν τῷ μορίῳ. Εἰς ὑψηλὴν δύμως θερμοκρασίαν, λόγω τῆς διασπάσεως τοῦ μορίου του εἰς ἐνεργά ἀτομα, ἐνοῦται ἀπ' εὐθείας μετὰ πολλῶν μετάλλων πρὸς ἐνώσεις, οἷς ὅποιαι καλοῦνται νιτρούδια:



Ἐπίσης ἐνοῦται ἀπ' εὐθείας μετὰ τοῦ ὑδρογόνου, καταλυτικῶς. πρὸς ἀμμωνίαν (NH_3) καὶ μετὰ τοῦ ὁξυγόνου, ἐπιδράσει ἡλεκτρικῶν σπινθήρων, πρὸς ὁξείδιον τοῦ ἄζωτου (NO):



Σημασία τοῦ ἄζωτου διὰ τὰ ζῶα καὶ τὰ φυτά. — Τὸ ἄζωτον, τὸ ὅποιον ἀρχικῶς ἐθεωρήθη ἀκατάλληλον διὰ τὴν ζωήν, ὡς μὴ ἀναπνεύσιμον, εὐρέθη βραδύτερον ὅτι εἶναι τούναντίον τὸ μᾶλλον ἀπαραίτητον στοιχεῖον διὰ τὴν ἀνάπτυξιν τῶν φυτῶν καὶ τῶν ζώων, ὡς ἀποτελοῦν βασικὸν συστατικὸν τοῦ πρωτοπλάσματος τῶν κυττάρων τοῦ σώματός των. Καὶ τὰ μὲν ζῶα προμηθεύονται τὸ ἄζωτον ἐκ τῶν ἄζωτούχων ζωϊκῶν ἡ φυτικῶν τροφῶν των, τὰ δὲ φυτὰ τὸ λαμβάνουν διὰ τῶν ριζῶν των, ἐκ τῶν ἄζωτούχων οὐσιῶν τοῦ ἐδάφους (νιτρικῶν ἀλάτων κ. λ. π.). Τὸ ἄζωτον τῆς ἀτμοσφαίρας δὲν δύναται γενικῶς νὰ τὸ χρη-

σιμοποιήσουν ἀπ' εύθειας, οὕτε τὰ ζῶα οὕτε τὰ φυτά. 'Υπάρχουν ἐν τούτοις μικροοργανισμοὶ τινὲς (ἀζωτοβακτήρια), οἱ δποῖοι ἀναπτύσσονται ἐπὶ τῶν ριζῶν ψυχανθῶν τινῶν φυτῶν (φασόλια, κουκιά, μπιζέλια κ. ἄ.) καὶ ἔχουν τὴν ἕκανότητα νὰ ἀφομοιώνουν τὸ ἀτμοσφαιρικὸν ἀζωτον.

Χρήσεις. — Εύρυτάτη εἶναι ἡ χρησιμοποίησις τοῦ ἀζώτου ὑπὸ τῆς βιομηχανίας, κυρίως πρὸς παρασκευὴν τῆς ἀμμωνίας καὶ τοῦ νιτρικοῦ δξέος, χρησίμων πρὸς παρασκευὴν τῶν ἐκρηκτικῶν ὄλῶν καὶ τῶν ἀζωτούχων λιπασμάτων. Χρησιμοποιεῖται ἐπίσης, ὡς ἀδρανὲς ἀέριον, πρὸς πλήρωσιν τῶν ἡλεκτρικῶν λαμπτήρων.

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΗΡ

Όρισμδς — Ιδιότητες. — 'Ατμοσφαιρικὸς ἀήρ λέγεται τὸ ἀέριον, τὸ ὅποῖον περιβάλλει τὴν γηνῆν σφαῖραν, εἰς ὕψος πολλῶν χιλιομέτρων. Εἶναι ἄχρους εἰς μικρὸν πάχος καὶ 773 φορᾶς ἐλαφρότερος τοῦ ὄνδρος. 'Υπὸ κανονικὰς συνθήκας πιέσεως καὶ θερμοκρασίας ἡ πυκνότης του λαμβάνεται ὡς μονὰς πρὸς μέτρησιν τῆς πυκνότητος τῶν ἄλλων ἀερίων, ἐπομένως εἶναι ἵση πρὸς 1. "Εν δὲ λίτρον ἀέρος, ὑπὸ τὰς συνθήκας αὐτάς, ζυγίζει 1,293 γραμμάρια. Διαλύεται ἐλαφρῶς εἰς τὸ ὄνδωρ καὶ εἶναι κακὸς ἀγωγὸς τῆς θερμότητος καὶ τοῦ ἡλεκτρισμοῦ.

Σύστασις τοῦ ἀέρος. — 'Ο ἀήρ εἶναι μῖγμα διαφόρων ἀερίων, κυρίως ἀζώτου εἰς ἀναλογίαν 78 % κατ' ὅγκον καὶ δξυγόνου εἰς ἀναλογίαν 21 %.

'Εκτὸς αὐτῶν περιέχει, εἰς πολὺ μικρὰς ποσότητας ὄνδρατμούς, δισείδιον τοῦ ἄνθρακος καὶ εὐγενῆ ἀέρια. 'Εξαιρέσει τῶν ὄνδρατμῶν, τῶν ὅποιων τὸ ποσοστὸν ποικίλλει μεταξὺ μεγάλων ὅρίων, τὰ ἀλλα συστατικὰ τοῦ ἀέρος εἶναι σχετικῶς σταθερὰ εἰς ποσότητα. Οὕτως ἡ μέση σύστασις ξηροῦ ἀέρος, δηλαδὴ ἀέρος ἀπηλλαγμένου τῶν ὄνδρατμῶν, κατ' ὅγκον καὶ κατὰ βάρος, εἰς τὴν ἐπιφάνειαν τῆς θαλάσσης, εἶναι ἡ ἔξης :

Σύστασις τοῦ ἀέρος	Κατ' ὅγκον	κατὰ βάρος
"Αζωτον	78,00 %	75,50 %
"Οξυγόνον	21,00 %	23,20 %
Εὐγενῆ ἀέρια	0,97 %	1,25 %
Διοξείδιον τοῦ ἄνθρακος	0,03 %	0,05 %
	100,00	100,00

‘Ο ἀήρ εἶναι μῆγμα. — “Οτι δὲ ἀήρ δὲν εἶναι χημικὴ ἔνωσις δέυγονος καὶ ἀζώτου, ἀλλ’ ἀπλῶς μηχανικὸν μῆγμα αὐτῶν, ἀποδεικνύεται ἐκ τῶν ἔξης:

1) **Ἐκαστον τῶν συστατικῶν του διατηρεῖ τὰς ἴδιαιτέρας του ἴδιότητας.** Π.χ. τὸ δέυγόνον διατηρεῖ τὴν ἴδιότητα νὰ συντελῇ εἰς τὴν καυσιν τῶν σωμάτων.

2) **‘Ακριβεῖς ἀναλύσεις διαφόρων δειγμάτων ἀέρος δεικνύουν ὅτι ἡ σύστασίς του ποικίλει.** ‘Ως ἐκ τούτου δὲν εἶναι ἔνωσις, ἀφοῦ δὲν ἴσχυει ὁ νόμος τῶν σταθερῶν ἀναλογιῶν βαρῶν.

3) **‘Ο διαλεύμένος εἰς τὸ ὑδωρ ἀήρ ἀποτελεῖται ἀπὸ πολλὰς ἀναλογίας δέυγονος (35 %) καὶ ἀζώτου (65 %).**


4) **‘Ο ύγρὸς ἀήρ δὲν ἔχει σταθερὸν σημεῖον ζέσεως, ὅπως τὸ ὑδωρ, ἀλλ’ ἔρχεται ζέων εἰς —196° (Σ. Z. ἀζώτου). Βιθμιαίως δὲ ἀνυψοῦται ἡ θερμοκρασία ἕως —181° (Σ. Z. δέυγόνου).**

5) **Τὰ συστατικά του δύνανται νὰ ἀποχωρισθοῦν διὰ φυσικῶν μέσων.**

Πείραμα. — Διὰ νὰ δεῖξωμεν προχείρως, ὅτι δὲ ἀήρ εἶναι μῆγμα κυρίως δέυγόνου καὶ ἀζώτου, ἐκτελοῦμεν τὸ ἔξης πείραμα: ’Ἐπὶ τεμαχίοις φελλοῦ, ἐπιπλέοντος εἰς τὸ ὑδωρ λεκάνης, τοποθετοῦμεν μικρὰν κάψαν καὶ ἐντὸς αὐτῆς τεμάχιον κιτρίνου φωσφόρου, τὸν ὄποιον ἀναφλέγομεν, ἐγγίζοντες αὐτὸν διὰ σύρματος μεταλλικοῦ, προθερμανθέντος (Σχ. 37)

Μόλις ἀναφλεγῇ ὁ φωσφόρος καλύπτομεν αὐτὸν ταχέως δι’ ὑαλίνου κάρδωνος, φέροντος στόμιον, τὸ ὄποιον κλείομεν διὰ πώματος. Θὰ παρατηρήσωμεν τότε ὅτι, ἐνόσῳ καίεται ὁ φωσφόρος, σχηματίζονται ἀφθονοὶ λευκοὶ καπνοί, ἐκ πεντοκειδίου τοῦ φωσφόρου (P_2O_5), διαλυόμενοι μετά τινα χρόνον εἰς τὸ ὑδωρ τῆς λεκάνης, τὸ ὄποιον ἀνέρχεται ἐντὸς τοῦ κάρδωνος, κατὰ τὸ 1/5 τοῦ δγκού του. ’Εὰν μετά τινα χρόνον ἀφαιρέσωμεν τὸ πῶμα τοῦ κάρδωνος καὶ εἰσαγάγωμεν ἐντὸς αὐτοῦ ταχέως διὰ τοῦ στομίου του κηρίον ἀνημμένον, ἐστηριγμένον εἰς τὸ δάκρυον σύρματος, θὰ լ̄δωμεν ὅτι τοῦτο σβέννυται.

‘Ἐκ τοῦ πειράματος τούτου συμπεραίνομεν ὅτι δὲ ἀήρ δὲν εἶναι σῶμα ἀπλοῦν, ἀλλ’ ὅτι ἀποτελεῖται ἀπὸ δύο κύρια συστατικά: πρῶτον



Σχ. 37. Παρασκευὴ ἀτμοσφαιρικοῦ ἀζώτου διὰ καύσεως φωσφόρου.

ἀπὸ ἐκεῖνο, τὸ δόπιον συνετέλεσεν εἰς τὴν καῦσιν τοῦ φωσφόρου, δηλαδὴ τὸ ὁξυγόνον, ἀποτελοῦν τὸ 1 / 5 τοῦ ὅγκου τοῦ ἐγχλεισθέντος ὑπὸ τὸν κώδωνα ἀέρος, καὶ δεύτερον ἀπὸ ἐκεῖνο, τὸ δόπιον δὲν συντηρεῖ τὴν καυσιν τοῦ κηρίου, δηλαδὴ τὸ ἄζωτον, ἀποτελοῦν τὰ ὑπόλοιπα 4 / 5 τοῦ ὅγκου τοῦ ἀέρος.

‘Υγρὸς ἀήρ. — “Ολα τὰ ἀέρια εἶναι δυνατὸν νὰ ὑγροποιηθοῦν διὰ πιέσεως καὶ διὰ ψύξεως. Τινὰ ἔξ αὐτῶν ὑγροποιοῦνται εἰς τὴν συνήθη θερμοκρασίαν δι’ ἀπλῆς πιέσεως, ὅλα ὅμως εἶναι ἀνάγκη συγχρόνως νὰ ψυχθοῦν ἵσχυρῶς. Τοῦτο συμβαίνει, διότι δι’ ἕκαστον ἀέριον ὑπάρχει μία ὡρισμένη θερμοκρασία, ἡ καλουμένη κρίσιμος θερμοκρασία, ὑπεράνω τῆς ὁποίας τὸ ἀέριον τοῦτο εἶναι ἀδύνατον νὰ ὑγροποιηθῇ, ὁσονδήποτε καὶ ἀν πιεσθῇ. Ἡ πίεσις δὲ εἰς τὴν ὁποίαν πρέπει νὰ ὑποβληθῇ τὸ ἀέριον, κατὰ τὴν κρίσιμην θερμοκρασίαν του, διὰ νὰ ὑγροποιηθῇ, λέγεται κρίσιμος πίεσις τοῦ ἀέριου τούτου.

Ούτω διὰ τὸ ὁξυγόνον ἡ μὲν κρίσιμος θερμοκρασία του εἶναι -118° , ἡ δὲ κρίσιμος πίεσίς του 50 ἀτμόσφαιραι, διὰ τὸ ύδρογόνον -240° καὶ 13 ἀτμόσφαιραι, διὰ τὸ ἄζωτον -1470 καὶ 34 ἀτμόσφαιραι κ.λ.π.

'Εκ τῶν ἀνωτέρω καταφαίνεται ὅτι πρὸς ὑγρο-
ποίησιν τοῦ ἀέρος δὲν ἀρκεῖ νὰ ἔξασκηθῇ ἐπ' αὐτοῦ
ἰσχυρὰ πίεσις μόνον, ὅλλ' ἀπαιτεῖται καὶ ταπε-
νωσις τῆς θερμοκρασίας κάτω τῶν - 147°, τῆς κρι-
σίμου θερμοκρασίας τοῦ ἀζώτου.

‘Ο δι’ ισχυροτάτης ψύξεως καὶ πιέσεως λαμβανόμενος ύγρος ἀήρ εἶναι ἐλαφρῶς ὑποκύανος καὶ ἔχει πυκνότητα 0,91. Φυλάσσεται δὲ ἐντὸς εἰδικῶν δοχείων, ἀνοικτῶν, τῶν καλουμένων δοχείων Dewar (Σχ. 38), τὰ δόποια ἔχουν διπλᾶ τοιχώματα ὑάλινα, ἐπηργυρωμένα ἐσωτερικῶς, μεταξὺ τῶν δόποιων διχώρος εἶναι κενὸς ἀέρος. Ἐντὸς τῶν δοχείων τούτων, τὰ δόποια εἶναι λίαν δυσθερμαγγάχα, διύγρος ἀήρ, δεχόμενος πολὺ μικρὰν ποσότητα θερμότητος ἐκ τοῦ περιβάλλοντος, ἔχαται μίζεται ἐλάχιστα, ώς ἐκ τούτου δύναται νὰ διατηρηθῇ ἐπ’ ἀρκετὸν χρόνον.

Παρόμοια δοχεῖα φέρονται εἰς τὸ ἐμπόριον, ὑπὸ τὸ δίνομα δοχεῖα Thermos, καὶ χρησιμεύουν διὰ τὴν ἐπὶ πολλὰς ὥρας διατήρησιν τῶν ἐν αὐτοῖς εἰσαγομένων ὑγρῶν, ἀναλόγως ψυχρῶν ἢ θερμῶν.



Σχ. 38. Δοχεῖον
Dewar πρὸς δια-
τήρησιν τοῦ ύ-
γροῦ ἀέρος.

Διάφορα σώματα ἀποκτοῦν περιέργους ίδιότητας εἰς τὴν θερμοκρασίαν τοῦ ήγρου ἀέρος. (—195^η). Οὕτω τὸ καυτσούκ, τὸ χρέας, τὰ ἄνθη κ.λ.π. ἐμβαπτιζόμενα ἐντὸς ήγρου ἀέρος, καθίστανται σκληρά καὶ εὔθραυστα, ὡς ἡ ὄντος ὁ δὲ ὑδράργυρος πήγνυται καὶ γίνεται σκληρὸς καὶ εὐηχος, ὡς σίδηρος. Λόγῳ δὲ τῆς περιεκτικότητος εἰς δέξιγόνον τοῦ ήγρου ἀέρος, μίγματα αὐτοῦ μετ' εὐφλέκτων ὑλῶν, ὡς βάμβακος ἢ κόνεως ἄνθρακος, ἀναφλεγόμενα ἐκρήγνυνται ἵσχυρῶς.

ΕΥΓΕΝΗ ΑΕΡΙΑ

Τενικά. — Τὸ ἔκ τοῦ ἀτμοσφαιρικοῦ ἀέρος λαμβανόμενον ἀζωτὸν εἶχε παρατηρηθῆ ὅτι ἡ το βαρύτερον τοῦ ἔκ τῶν χημικῶν αὐτοῦ ἐνώσεων παρασκευαζόμενου. Τοῦτο ὀφείλεται εἰς τὸ γεγονός ὅτι τὸ ἀζωτὸν τοῦ ἀτμοσφαιρικοῦ ἀέρος δὲν εἶναι χημικῶς καθαρόν, ἀλλ᾽ ἐμπεριέχει ἀναμεμιγμένα μετ' αὐτοῦ καὶ πέντε ἄλλα ἀέρια στοιχεῖα, ἔχοντα τὰς αὐτὰς περίπου ίδιότητας μετ' αὐτοῦ. Τὰ ἀέρια ταῦτα στοιχεῖα εἶναι: τὸ ηλιον, τὸ νέον, τὸ ἀργόν, τὸ κρυπτόν, τὸ ξένον.

Τὰ στοιχεῖα ταῦτα, ἐπειδὴ εἶναι χημικῶς ἀδρανῆ, ἐκλήθησαν εὐγενῆ ἀέρια, κατ' ἀναλογίαν πρὸς τὰ εὐγενῆ μέταλλα. Πράγματι δὲν ἀντιδροῦν μετ' οὐδενὸς στοιχείου, διὸ καὶ θεωροῦνται ὅτι ἔχουν σθένος ἴσον πρὸς τὸ μηδέν. Τὸ μόριόν των ἀποτελεῖται ἐξ ἑνὸς μόνον ἀτόμου. Ἐν συγκρίσει δὲ πρὸς τὰ ἄλλα ἀέρια, δεικνύουν ποιάν τινα ἡλεκτρικὴν ἀγωγιμότητα. Παρασκευάζονται διὰ κλασματικῆς ἀποστάξεως τοῦ ἀέρος, εἰς τὸν ὅποιον ἐμπεριέχονται συνοικῶς κατ' ἀναλογίαν 0,97 % κατ' ὅγκον.

ΤΟ ΗΛΙΟΝ (He = 4,003). — Ὁφείλει τὸ ὄνομά του εἰς τὸ ὅτι εὑρέθη τὸ πρῶτον φασματοσκοπικῶς εἰς τὸν "Ηλιον." Απαντᾶται ἐπίσης εἰς σημαντικὴν ποσότητα ὡς κανονικὸν συστατικὸν τῶν ἀερίων πετρελαιοφόρων τινῶν πηγῶν τοῦ Τέξας τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν τῆς Αμερικῆς. Εἶναι τὸ δυσκολώτερον ήγροποιούμενον ἀέριον (Σ. Z. —268,87^ο) καὶ τὸ ἐλαφρότερον, μετά τὸ ὑδρογόνον. Προτιμᾶται συνήθως τοῦ ὑδρογόνου πρὸς πλήρωσιν τῶν ἀεροστάτων, διότι δὲν ἀναφλέγεται, ὥπως αὐτό.

ΤΟ NEON (Ne = 20,183). — Δίδει ὡραῖον πορτοκαλλόχρουν φῶς, ὅταν εὑρίσκεται ἐντὸς ὑαλίνων σωλήνων, ὑπὸ ἡλιαττωμένην πίεσιν,

διὰ μέσου τῶν δποίων γίνονται ἡλεκτρικαὶ ἐκκενώσεις. Διὰ τοῦτο χρη-
σιμοποιεῖται πολὺ εἰς τὰς φωτεινὰς διαφημίσεις.

ΤΟ ΑΡΓΟΝ ($Ar = 93,944$). — Εἶναι τὸ εἰς μεγαλυτέραν ποσό-
τητα ἐμπεριεχόμενον εἰς τὸν ἀέρα εύγενὲς ἀέριον ($0,96\%$). Χρησι-
μοποιεῖται πολὺ πρὸς πλήρωσιν τῶν ἡλεκτρικῶν λυχνιῶν διαπυρώ-
σεως.

ΤΟ ΚΡΥΠΤΟΝ ($Kr = 83,7$) καὶ **ΤΟ ΞΕΝΟΝ** ($Xe = 131,3$). —
Απαντῶνται εἰς ἔλαχίστην ποσότητα εἰς τὸν ἀτμοσφαιρικὸν ἀέρα
καὶ οὐδεμίαν σχεδὸν εὑρίσκουν πρακτικὴν ἐφαρμογὴν.

ΕΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ


ΑΜΜΩΝΙΑ NH_3

Προέλευσις. — Ἡ ἀέριος ἀμμωνία ἀπαντᾶται ἐλευθέρᾳ κατ' ἐλά-
χιστα ποσὰ εἰς τὸν ἀ-
τμοσφαιρικὸν ἀέρα. Ἡ-
νωμένη δέ, ὑπὸ μορφὴν
ἀμμωνιακῶν ἀλάτων, εἰς
τὸ ἔδαφος, προερχομένη
ἐκ τῆς ἀποσυνθέσεως ἀ-
ζωτούχων φυτικῶν καὶ
ζωϊκῶν οὐσιῶν.

Παρασκευή. — Εἰς
τὰ ἐργαστήρια πα-
ρασκευάζεται ἡ ἀμμω-
νία δι' ἐπιδράσεως ἀσβέ-
στου CaO , ἐπὶ ἀμμω-
νιακοῦ τινος ἀλατος, συ-
νήθως τοῦ χλωριούχου
ἀμμωνίου NH_4Cl , κατὰ τὴν ἔξισωσιν :



Πρὸς τοῦτο θερμαίνομεν ἐντὸς φιάλης (Σχ. 39) τὸ μῆγμα τῶν
δύο τούτων στερεῶν οὐσιῶν κονιοποιημένων καὶ συλλέγομεν τὴν ἐκλυο-
μένην ἀμμωνίαν, οὐχὶ ὑπὸ τὸ unction, ὡς διαλυομένην ἀφθόνως ἐντὸς



Σχ. 39. Παρασκευή ἀμμωνίας διὰ θερμάνσεως
μίγματος χλωριούχου ἀμμωνίου καὶ ἀσβέστου.

χύτοῦ, ἀλλ' ὑπὸ τὸν ὄδράργυρον, ἢ δι' ἐκτοπίσεως τοῦ ἀέρος, ἐντὸς φιαλῶν ἀνεστραμμένων, ὡς ἐλαφροτέραν τοῦ ἀέρος.

·Εἰς τὴν βιομηχανίαν λαμβάνεται ἀπὸ τὰ ὄδατα τῆς ἐκπλύσεως τοῦ φωταερίου, ἐντὸς τῶν δόποιων εὑρίσκεται διαλελυμένη, καθόσον σχηματίζεται ὡς παραπροΐον, κατὰ τὴν ξηρὰν ἀπόσταξιν τῶν λιθανθράκων. Τὰ ὄδατα ταῦτα θερμαίνονται, δόποτε ἡ ἀμμωνία ἐκφεύγει ὡς ἀέριος καὶ εἴτε παραλαμβάνεται ὡς τοιαύτη, εἴτε διοχετεύεται ἐντὸς ἀραιοῦ θειϊκοῦ δέξιος, μετὰ τοῦ δόποιου ἀντιδρῶσα σχηματίζει τὸ ἄλας θειϊκὸν ἀμμώνιον ($\text{NH}_4\text{}_2\text{SO}_4$, χρησιμοποιούμενον ὡς λίπασμα).

Παρασκευάζεται ἐπίσης σήμερον εἰς τὴν βιομηχανίαν ἡ ἀμμωνία συνθετικῶς, δι' ἀπὸ εὐθείας ἐνώσεως τοῦ ἀζώτου λαμβανομένου ἐκ τοῦ ὄγροποιηθέντος ἀέρος, καὶ τοῦ ὄδρογόνου, λαμβανομένου δι' ἡλεκτρολύσεως τοῦ ὄδατος, κατὰ τὴν ἔξισωσιν :



·Η ἔνωσις τῶν δύο τούτων στοιχείων ἐπιτυγχάνεται κατὰ διαφόρους μεθόδους, ὑπὸ πολὺ μεγάλην πίεσιν (200 - 1000 ἀτμοσφαιρῶν) καὶ ὑψηλὴν θερμοκρασίαν (500° - 600°), παρουσίᾳ καταλυτῶν.

Φυσικαὶ ἴδιότητες. — ·Η ἀμμωνία εἶναι ἀέριον ἄχρουν μὲν χαρακτηριστικὴν δριμεῖαν δομήν, προκαλοῦσαν δάκρυα καὶ ἐπίσησειν τῆς ἀναπνοῆς, εἶναι δὲ ἐλαφροτέρα τοῦ ἀέρος, πυκνότητος 0,60. Διαλύεται ἀφθονώτατα εἰς τὸ ὄδωρ, τοῦ δόποιου 1 ὅγκος εἰς 0° διαλύει 1150 ὅγκους ἀμμώνιας. ·Η μεγάλη διαλυτότης τῆς ἀμμωνίας δεικνύεται διὰ πειράματος ἀναλόγου πρὸς τὸ τοῦ ὄδροχλωρίου (σελ. 61). ·Τὸ ὄγροποιεῖται εὐκόλως καὶ εἰς τὴν συνήθη θερμοκρασίαν, δι' ἀπλῆς πιέσεως 7 ἀτμοσφαιρῶν, διότι ἡ κρίσιμος θερμοκρασία τῆς εἶναι ὑψηλὴ ($132,5^{\circ}$). ·Η ὄγρα ἀμμωνία, ἔξατμιζομένη εὐκόλως, προκαλεῖ ἔντονον φῦξιν, διὰ τοῦτο χρησιμοποιεῖται πολὺ εἰς τὴν βιομηχανίαν παρασκευῆς τοῦ πάγου.

Χημικαὶ ἴδιότητες. — ·Η ἀμμωνία δὲν καίεται εἰς τὸν ἀέρα, οὔτε διατηρεῖ τὴν καῦσιν. Δύναται δικαῖος νὰ καῇ ἐντὸς ἀτμοσφαιρᾶς, δέξιον, πρὸς ὄδρατμὸν καὶ ἀζωτὸν, κατὰ τὴν ἔξισωσιν :



Μῆγμα δὲ ἀμμώνιας καὶ ἀέρος, διαβιβαζόμενον ὑπὸ καταλήκους συνθήκας διὰ συσκευῆς, ἡ δόποια περιέχει ὡς καταλύτην σπόργην λευκοχρύσου, παρέχει μονοξείδιον τοῦ ἀζώτου :




Ἐπὶ τῆς ἀντιδράσεως ταύτης στηρίζεται ἡ βιομηχανικὴ μέθοδος παρασκευῆς νιτρικοῦ δξέος ἐκ τῆς ἀμμωνίας, ὡς θὰ ὕδωμεν κατωτέρω.

Τὸ χλώριον, ὡς ἔχον μεγάλην χημικὴν συγγένειαν πρὸς τὸ ὑδρογόνον, ἀποσυνθέτει εὐκόλως τὴν ἀμμωνίαν. Παράγεται τότε χλωριοῦχον ἀμμώνιον καὶ ἄζωτον :




Καυστικὴ ἀμμωνία. NH_4OH .—Τὸ ἐν ὕδατι διάλυμα τῆς ἀμμωνίας δεικνύει βασικὴν ἀντίδρασιν, ὡς μετατρέπον εἰς κυανοῦν τὸν ἐρυθρὸν χάρτην τοῦ ἥλιοτροπίου καὶ σχηματίζον μετὰ τῶν δξέων ἄλατα. Τοῦτο δφείλεται εἰς τὸ δτι κατὰ τὴν διάλυσιν ταύτην τῆς ἀμμωνίας, ἀντιδρᾶ αὕτη μετὰ τοῦ ὕδατος, σχηματίζουσα μίαν βάσιν, ἡ ὅποια λέγεται ὑδροξείδιον τοῦ ἀμμωνίου ἢ καυστικὴ ἀμμωνία NH_4OH :




Εἰς τὸ σῶμα τοῦτο ἡ ρίζα NH_4 λέγεται ἀμμώνιον καὶ δρᾶ ὡς μονοσθενὲς μέταλλον.

Ἀμμωνιακὰ ἄλατα. — ‘Ως βάσις ἡ καυστικὴ ἀμμωνία σχηματίζει μετὰ τῶν δξέων μίαν σειρὰν σημαντικωτάτων ἄλατων, ἐκ τῶν ὅποιων σπουδαιότερα εἶναι τὰ σχηματίζόμενα ἐπιδράσει τῶν δξέων ὑδροχλωριοῦ, θειεύκοντος καὶ νιτρικοῦ :



Τὰ ἀμμώνιακὰ ἄλατα ταῦτα δύνανται νὰ σχηματισθοῦν καὶ δι’ ἀπ’ εὐθείας ἐπιδράσεως τῆς ἀερίου ἀμμωνίας ἐπὶ τῶν δξέων :



Τὰ ἀμμωνιακὰ ἄλατα εἶναι δλαχα λευκά, κρυσταλλικὰ καὶ εὐδιάλυτα εἰς τὸ ὕδωρ, εύρισκον δὲ ποικίλας ἐφαρμογάς. Σπουδαιότερον ἔξ αὐτῶν εἶναι τὸ θειεύκον ἀμμώνιον, χρησιμοποιούμενον ὡς λίπασμα εἰς τὴν γεωργίαν.

Χρήσεις τῆς ἀμμωνίας. — Εἰς τὴν βιομηχανίαν ἡ ἀμμωνία μετατρέπεται, εἴτε εἰς ἀμμωνιακὰ ἄλατα, χρησιμοποιούμενα ὡς ἀζωτοῦχα γημικὰ λιπάσματα, εἴτε εἰς νιτρικόν δξύ, χρησιμοποιούμενον πρὸς πα-

ρασκεύην ἐκρηκτικῶν ὄλῶν, χρωμάτων, κλπ. Χρησιμοποιεῖται ἐπίσης ἡ ἀμμωνία πρὸς παρασκευὴν τῆς σόδας, κατὰ τὴν μέθοδον Solvay, πρὸς ἀπολίπανσιν τῶν ἔριων κ.λ.π. Εἰς ὑγρὰν κατάστασιν εὑρίσκει ἐκτεταμένην ἐφαρμογὴν εἰς τὰς ψυκτικὰς μηχανάς. Τὰ ὄντατικὰ διαλύματα τῆς ἀμμωνίας ἀποτελοῦν πολύτιμον ἀντιδραστήριον τῶν χημικῶν ἐργαστηρίων, χρησιμοποιούμενα ἐπίσης εἰς τὴν ἴατρικὴν ἐναντίον νηγμάτων τῶν μελισσῶν, ὡς ἀναληπτικὸν ἐκ τῆς μέθης κ.λ.π.

ΟΞΕΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ


ΥΠΟΞΕΙΔΙΟΝ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ N_2O . — Εἶναι ἀέριον ἄχρουν, μὲ εὐχάριστον δσμὴν καὶ ὑπογλυκίζουσαν γεῦσιν, ὀλίγον διαλυτὸν εἰς τὸ ὄντωρ, βαρύτερον τοῦ ἀέρος. Εἰσπνεόμενον μετ' ὀξυγόνου προκαλεῖ ἀναισθησίαν καὶ νευρικὸν γέλωτα, διὸ ἀπεκλήθη ἡ λαρυντικὸν ἀέριον. Χρησιμοποιεῖται ὡς ἀναισθητικόν. Παρασκευάζεται δὲ διὰ θερμάνσεως νιτρικοῦ ἀμμωνίου εἰς $200^\circ - 240^\circ$.



ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟΝ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ NO . — Εἶναι ἀέριον ἄχρουν, ἐλαφρῶς βαρύτερον τοῦ ἀέρος, ἐλάχιστα διαλυτὸν εἰς τὸ ὄντωρ. Εργάζομενον εἰς ἐπαφὴν μὲ τὸν ἀέρα δεξιεύδοιται ἀμέσως ὑπὸ τοῦ ὀξυγόνου κυτοῦ, μετατρεπόμενον εἰς καστανόχρουν διοξείδιον τοῦ ἀζώτου :



Παρασκευάζεται εἰς τὰ ἐργαστήρια δι' ἐπιδράσεως νιτρικοῦ δέξιος ἐπὶ μετάλλων, κυρίως τοῦ χαλκοῦ :



Χρησιμοποιεῖται πρὸς παρασκευὴν τοῦ νιτρικοῦ δέξιος καὶ τοῦ θειικοῦ δέξιος, κατὰ τὴν μέθοδον τῶν μολυβδίνων θαλάμων.

ΤΡΙΟΞΕΙΔΙΟΝ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ N_2O_3 . — Λαμβάνεται ὡς ὑγρὸν βαθέως κυανοῦν, διὰ ψύξεως εἰς -21° μίγματος μονοξείδιου καὶ ὑπεροξείδιου τοῦ ἀζώτου : $\text{NO}_2 + \text{NO} \rightarrow \text{N}_2\text{O}_3$. Εἰς ἀνωτέραν θερμοκρασίαν διεκπατται εἰς τὰ συστατικά του. Μετὰ τοῦ ὄντατος ἀντιδρᾶ σχηματίζον τὸ νιτρῶδες δέξιο HNO_2 , τοῦ ὅποίου εἶναι ὁ ἀνυδρίτης :



ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΝ ή ΤΕΤΡΟΞΕΙΔΙΟΝ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ NO_2 ή N_2O_4 . — Σχηματίζεται δι' ἀπ' εύθειας ἐνώσεως τοῦ μονοξειδίου τοῦ ἀζώτου μετά τοῦ ὀξυγόνου τοῦ ἀέρος : $2\text{NO} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{NO}_2$. Παρασκευάζεται δὲ εἰς τὰ ἔργαστήρια διὰ θερμάνσεως νιτρικοῦ μολύβδου : $2\text{Pb}(\text{NO}_3)_2 \rightarrow 2\text{PbO} + \text{O}_2 + 4\text{NO}_2$.

Εἰς θερμοκρασίαν 22° εἶναι ὑγρὸν ἀνοικτοκίτρινον, ἔχον τὸν μοριακὸν τύπον N_2O_4 . Εἰς θερμοκρασίαν ὅμως ἀνωτέρων τῶν 150° εἶναι ἀέριον τοῦ τύπου NO_2 . Εἰς τὴν συνήθη θερμοκρασίαν τὸ ὑγρὸν διοξείδιον τοῦ ἀζώτου ἀναδίδει ἀτμούς, οἱ δόποιοι καλοῦνται νιτρώδεις ἢ τυμοὶ καὶ προσβάλλουν ισχυρῶς τὰ ἀναπνευστικὰ ὅργανα.

ΠΕΝΤΟΞΕΙΔΙΟΝ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ N_2O_5 . — Εἶναι ὁ ἀνυδρίτης τοῦ νιτρικοῦ ὀξέος : $\text{N}_2\text{O}_5 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{HNO}_3$. Διὰ τοῦτο παρασκευάζεται ἐξ αὐτοῦ δὲ ἀφυδατώσεως, τῇ βοηθείᾳ πεντοξειδίου τοῦ φωσφόρου :



Εἶναι σῶμα στερεόν, λευκόν, κρυσταλλικόν, διασπώμενον διὰ θερμάνσεως εἰς δξείδια ἀζώτου καὶ ὀξυγόνου. Ως ἐκ τούτου εἶναι σῶμα δξειδωτικόν.

N I T R I K O N Ο Ξ Y HNO_3

Προέλευσις. — Τὸ νιτρικὸν ὀξὺ εἰς τὴν φύσιν ἀπαντᾶται μόνον ὑπὸ μορφὴν νιτρικῶν ἀλάτων, εἰς τὸ ἔδαφος θερμῶν καὶ ξηρῶν κυρίως χωρῶν, ὡς τὸ νιτρικὸν νάτριον NaNO_3 εἰς τὴν Χιλῆν (νίτρον τῆς Χιλῆς) καὶ τὸ νιτρικὸν κάλιον KNO_3 εἰς τὰς Ἰνδίας (νίτρον τῶν Ἰνδιῶν). Παρεσκευάζθη τὸ πρῶτον κατὰ τὸν 9ον αἰώνα ὑπὸ τοῦ ἀλχημιστοῦ Geber, ὑπὸ τὸ δνομα aqua forte.

Παρασκευή. — Εἰς τὰ ἔργα στήρια παρασκευάζεται τὸ νιτρικὸν δξὺ δι' ἐπιδράσεως πυκνοῦ θειούκοῦ ὀξέος ἐπὶ νιτρικοῦ νατρίου :




Πρὸς τοῦτο θερμάνεται τὸ μῆγμα ἐντὸς ὑαλίνου κέρατος (Σχ. 40), οἱ δὲ ἀτμοὶ τοῦ παραχομένου νιτρικοῦ δξέος συμπυκνοῦνται διὰ ἀποψύξεως ἐντὸς φιάλης.

Βιομηχανικῶς παρασκευάζεται :

α) Ἐκ τοῦ νιτρου τῆς Χιλῆς, διὰ μεθόδου ἀναλόγου πρὸς


τὴν τῶν ἐργαστηρίων, ἥνιοι διὰ θερμάνσεως μίγματος νιτρικοῦ νατρίου (νίτρου τῆς Χλῆς) καὶ πυκνοῦ θειούκοῦ δξέος ἐντὸς καταλλήλου καμίνου.

β) Δι' δξειδώσεως τῆς ἀμμωνίας, κατὰ τὴν μέθοδον Ostwald. — Πρὸς τοῦτο διοχετεύεται μῆγμα ἀμμωνίας καὶ ἀτμοσφαιρικοῦ ἀέρος διὰ μέσου σπογγώδους λευκοχρύσου, δρῶντος ὡς καταλύτου,




Σχ. 40. Παρασκευὴ τοῦ νιτρικοῦ δξέος εἰς τὰ ἐργαστήρια.

τρέπεται εἰς διοξείδιον τοῦ ἀζώτου, τὸ ὅποῖον μεθ' ὑδατος δίδει νιτρικὸν δξέν καὶ μονοξείδιον τοῦ ἀζώτου :



Τὸ μονοξείδιον τοῦτο τοῦ ἀζώτου μετατρέπεται πάλιν διὰ τοῦ δξυγόνου τοῦ ἀέρος εἰς διοξείδιον κ.ο.κ. μέχρις δου ἡ δλη ποσότης μετατραπῆ εἰς νιτρικὸν δξέν.

γ) Ἐκ τοῦ ἀτμοσφαιρικοῦ ἀέρος, κατὰ τὴν μέθοδον Birkeland — Eyde. — Πρὸς τοῦτο προσφυσᾶται ἀήρ εἰς βολταϊκὸν τόξον μεγάλης ἐπιφανείας, θερμοκρασίας 3000° , ὅπτε ἐνοῦται μερικῶς τὸ ἀζωτόν του μετὰ τοῦ δξυγόνου πρὸς μονοξείδιον τοῦ ἀζώτου :



Πρὸς ἀποφυγὴν ἀποσυνθέσεως, τὸ μονοξείδιον τοῦ ἀζώτου ψύγεται ταχέως καὶ φέρεται εἰς ἕνα πύργον, ὃπου μετὰ τοῦ δξυγόνου τοῦ ἀέρος καὶ καταιωνιζομένου ὑδατος σχηματίζεται νιτρικὸν δξέν :



Τὸ λαμβανόμενον νιτρικὸν δξέν κατὰ τὴν μέθοδον ταύτην, ἡ ὅποια ἐφαρμόζεται κυρίως εἰς Νορβηγίαν, ὅπου ἡ ἡλεκτρικὴ ἐνέργεια εἶναι εὐθηνή, ὡς προερχομένη ἐξ ὑδατοπτώσεων, εἶναι λίαν ἀραιόν. Διὰ τὸν λόγον τοῦτον μετατρέπεται ἐπὶ τόπου, δι' ἐπιδράσεως ἐπὶ ἀνθρακικοῦ ἀσβεστίου CaCO_3 (ἀσβεστολίθου), εἰς νιτρικὸν ἀσβέστιον $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$,

τὸ ὄποῖον ὑπὸ τὸ ὅνομα νορβηγικὸν νίτρον, χρησιμοποιεῖται ὡς ἀζωτοῦχον λίπασμα :



Φυσικαὶ ιδιότητες. — Τὸ καθαρὸν νιτρικὸν δέξιν εἶναι ὑγρὸν ἄχρουν E.B. 1,56, ζέον εἰς 86° καὶ μιγνύσμενον μεθ' ὕδατος εἰς πᾶσαν ἀναλογίαν. Ἐπειδὴ ὅμως ἀποσυντίθεται μερικῶς ὑπὸ τοῦ ἥλιακοῦ φωτὸς ἀναδίδει νιτρώδεις ἀτμούς, ἀπὸ τούς ὄποιους λαμβάνει χρῶμα καστανέρυθρον, καλεῖται δὲ καπνίζον νιτρικὸν δέξιν, διότι καπνίζει εἰς τὸν ἀέρα. Εἰς τὸ ἐμπόριον φέρεται νιτρικὸν δέξιν ἄχρουν ἡ ὑποκίτρινον, περιεκτικότητος 67 %, ἔχον E.B. 1,42 καὶ ζέον εἰς 120°.

Χημικαὶ ιδιότητες. — Τὸ νιτρικὸν δέξιν ἀποτελεῖ ίσχυρὸν δξειδωτικὸν μέσον, λόγῳ τῆς εὐκολίας μὲν τὴν ὄποιαν διασπᾶται πρὸς δξειδια τοῦ ἀζώτου, ὕδρατμὸν καὶ δξυγόνον, κατὰ τὴν ἔξισωσιν :




Ἐνεκα τούτου δξειδοῦ τὸ θεῖον πρὸς θειέκὸν δέξιν, τὸν φωσφόρον πρὸς φωσφορικὸν δέξιν, τὸν ἀνθρακα πρὸς διοξείδιον τοῦ ἀνθρακος, κ.λ.π.



Προσβάλλει πολλὰς ὁργανικὰς οὐσίας καὶ ἀλλας μὲν ἀπλῶς δξειδώνει καὶ κατακαίει, ἀλλας δὲ μετατρέπει εἰς νιτροενώσεις. Οὕτω τὸ τερεβινθέλαιον (νέφτι) ἀναφρέγεται καὶ καίεται ὑπὸ τοῦ πυκνοῦ νιτρικοῦ δέξιος. Ἐνῷ ἡ γκυκερίνη μεταβάλλεται εἰς νιτρογλυκερίνην. Ζωϊκαὶ δὲ οὐσίαι, ὅπως τὸ δέρμα, τὰ πτερά, ἡ μέταξα, τὸ ἔριον, προσβαλλόμενα ὑπὸ τοῦ νιτρικοῦ δέξιος, κατ' ἀρχὰς μὲν κιτρινίζουν, κατόπιν δὲ παρατεταμένης ἐπιδράσεως ἀποσυντίθενται.

Προσβάλλει καὶ διαλύει δλα σχεδὸν τὰ μέταλλα, πλὴν τοῦ χρυσοῦ καὶ τοῦ λευκοχρύσου. Σχηματίζονται τότε νιτρικὰ δλατα, ἐκλύονται δὲ δξειδια ἀζώτου καὶ οὐχὶ ὑδρογόνου :



‘Ωρισμένα μέταλλα, ὅπως τὸ χρώμιον καὶ ὁ σίδηρος, ἐπιδράσει πυκνοῦ νιτρικοῦ δέξιος δξειδοῦνται μόνον ἐπιφανειακῶς, χωρὶς νὰ προσβάλλωνται περαιτέρω. Λέγομεν τότε ὅτι μεταπίπτουν εἰς παθητικὴν κατάστασιν.

Βασιλικὸν ὅδωρ. — Μῆγμα πυκνοῦ νιτρικοῦ καὶ ὑδροχλωρικοῦ δέξιος λέγεται βασιλικὸν ὅδωρ, διότι προσβάλλει καὶ διαλύει

τὸν χρυσόν, τὸν βασιλέα τῶν μετάλλων. Τοῦτο δφεύλεται εἰς τὸ χλώριον ἐν τῷ γεννᾶσθαι, τὸ δποῖον ἐκλύεται κατὰ τὴν ἀληλεπίδρασιν τῶν δύο τούτων δξέων :



Τὸ χλώριον τοῦτο προσβάλλον τὸν χρυσὸν τὸν μετατρέπει εἰς χλωριοῦχον χρυσὸν AuCl_3 , ὁ δποῖος εἶναι διαλυτὸς εἰς τὸ ὑδωρ. Καθ' ὅμοιον τρόπον προσβάλλει καὶ τὸν λευκόχρυσον, μετατρέπον αὐτὸν εἰς τετραχλωριοῦχον λευκόχρυσον PtCl_4 .

Χρήσεις. — Πολὺ μεγάλαι ποσότητες νιτρικοῦ δξέος χρησιμοποιοῦνται κυρίως πρὸς παρασκευὴν ἔκρηκτικῶν ὑλῶν καὶ χρωμάτων, καθὼς καὶ νιτρικῶν λιπασμάτων διὰ τὴν γεωργίαν. Χρησιμεύει ἐπίσης πρὸς καθορισμὸν τῶν μετάλλων, τὴν χαρακτικὴν ἐπὶ χαλκοῦ καὶ διὰ τὴν παρασκευὴν βασιλικοῦ ὕδατος.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

20) Ἀποσυντίθεται διὰ θερμάνσεως 20 γραμ. νιτρώδους ἀμμώνιου. Πόσος δγκος ἀξώτου παράγεται ;

21) Αἱ διαστάσεις ἐνὸς δωματίου εἰραι $8m \times 5m \times 3,50m$. Νὰ ὑπολογισθῇ : a) Τὸ βάρος τοῦ περιεχομένου εἰς τὸ δωμάτιον τοῦτο ἀέρος. b) Ὁ δγκος καὶ τὸ βάρος τοῦ δξυγόνου καὶ τοῦ ἀξώτου (1 λίτρον ἀέρος = 1,293 γραμ.).

22) Ἀποσυνθέτομεν 53,5 γραμ. χλωριοῦχον ἀμμωνίου δι' ἀσβέστου. Νὰ ενδεθῇ : a) Πόσον βάρος ἀσβέστου ἀπαιτεῖται πρὸς τοῦτο. b) Πόσον βάρος καὶ πόσος δγκος ἀμμωνίας ἐκλύεται.

23) Διοχετεύομεν ἀέριον ἀμμωνίαν ἐν περισσείᾳ εἰς φιάλην περιέχονσαν 2 λίτρα χλωρίου. Νὰ ενδεθῇ τὸ βάρος τοῦ παραγομένου χλωριοῦχον ἀμμωνίου καὶ δ δγκος τοῦ ἐκλυομένου ἀξώτου.

24) Πόσον βάρος νιτρικοῦ δξέος καθαροῦ δύναται νὰ ληφθῇ ἐξ ἐνὸς τόννου νίτρου τῆς Χιλῆς, καθαρότητος 96 %. Εὰν δὲ τὸ χρησιμοποιούμενον θειεκόν δξὲν περιέχῃ 1,5 % ὕδατος, πόσον βάρος τοῦ δξέος τούτου θὰ χρειασθῇ;

25) Τὸ νιτρικὸν δξὲν προσβάλλει τὸν ἄργυρον, ὅπως καὶ τὸν χαλκόν. Νὰ γραφῇ ἡ σχετικὴ ἐξίσωσις, λαμβανομένου ὑπὸ δψιν δτι δ ἄργυρος εἰραι μέταλλον μονοσθενές, ἐνῷ δ χαλκὸς εἰραι μέταλλον δισθενές.

Φ Ω Σ Φ Ο Ρ Ο Σ

Σύμβολον P

Ατομικὸν βάρος 30,98

Σθένος III, V


Προέλευσις. — 'Ο φωσφόρος δὲν ἀπαντᾷ εἰς τὴν φύσιν ἐλεύθερος, ἀλλὰ μόνον ἡνωμένος εἰς ὅρυκτά τινα, ἐκ τῶν ὅποιων σπουδαιότερα εἶναι ὁ φωσφορίτης $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ καὶ ὁ ἀπατίτης $3\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2 \cdot \text{CaF}_2$. Ἐνυπάρχει ἐπίσης, ὡς ἀπαραίτητον συστατικόν, εἰς τὸ σῶμα τῶν ζώων καὶ τῶν φυτῶν, κυρίως εἰς τὰ δοτᾶ, τὰ ὅποια ἐμπεριέχουν περίπου 58 % φωσφορικοῦ ἀσβεστίου.

Παρασκευή. — Παλαιότερον ὁ φωσφόρος ἐλαμβάνετο ἐκ τῶν ὁστῶν, τὰ ὅποια ἐμπεριέχουν περίπου 12 % ἐξ αὐτοῦ. Σήμερον ἔξαγεται ἀποκλειστικῶς ἐκ τοῦ

ὅρυκτοῦ φωσφορίτου.

Πρὸς τοῦτο μῆγμα φωσφορίτου, ἄμμου (SiO_2) καὶ ἄνθρακος, θερμαίνεται ἴσχυρῶς ἐντὸς ἡλεκτρικῆς καμίνου (Σχ. 41). Εἰς τὴν ὑψηλὴν θερμοκρασίαν τῆς καμίνου ἀποσυντίθεται ὁ φωσφορίτης, σχηματίζονται δὲ πυριτικὸν ἀσβέστιον CaSiO_3 ,


μονοξείδιον τοῦ ἄνθρακος καὶ ἀτμοὶ φωσφόρου, οἱ δόποιοι διοχετεύονται ἐντὸς ψυχροῦ ὄδατος, διόπου καὶ συμπυκνοῦνται :



'Ο οὔτω λαμβανόμενος ἀκάθαρτος φωσφόρος ἀποστάζεται πρὸς καθαρισμὸν ἐντὸς σιδηρῶν κεράτων καὶ χύνεται εἰς τύπους, φέρεται δὲ εἰς τὸ ἐμπόριον ὑπὸ μορφὴν ραβδίων, φυλασσομένων ἐντὸς φιαλῶν ὑπὸ τὸ ὄδατο.

Φυσικαὶ Ιδιότητες. — 'Ο φωσφόρος ἐμφανίζεται ὑπὸ δύο κυρίως ἀλλοτροπικὰς μορφάς, ὡς κίτρινος καὶ ὡς ἐρυθρός.

'Ο κίτρινος φωσφόρος εἶναι σῶμα στερεὸν ὑποκίτρινον, ἡμιδιαφανές, μαλακὸν ὡς ὁ κηρός, δσμῆς χαρακτηριστικῆς. Ἔγει-



Σχ. 41. Ηλεκτρικὴ κάμινος παραγωγῆς τοῦ φωσφόρου.

Ε.Β. 1,83, τήκεται εις 44° καὶ ζέει εις 287°. Είναι ἀδιάλυτος εις τὸ οὐδωρί, διαλυτὸς δόμως εις τὸν διθειάνθρακα. Εἰς τὸ σκότος φωσφορίζει, ἔξι οὖ καὶ τὸ όνομά του. Τοῦτο ὀφείλεται εις βραδυτάτην ὀξείδωσιν αὐτοῦ ὑπὸ τοῦ ὀξυγόνου τοῦ ἀέρος. Είναι λίαν δηλητηριώδης, ἐπὶ τοῦ δέρματος δὲ προκαλεῖ σοβαρὰ καὶ δυσίατα ἐγκαύματα, διὰ τοῦτο ὁ χειρισμός του πρέπει νὰ γίνεται μετὰ πολλῆς προσοχῆς. Δὲν πρέπει νὰ λαμβάνεται διὰ τῆς χειρός, ἀλλὰ διὰ λαβίδος καὶ νὰ κόπτεται πάντοτε ὑπὸ τὸ οὐδωρί.

Εἰς τὴν συνήθη θερμοκρασίαν τὸ μόριον τοῦ φωσφόρου ἀποτελεῖται ἐκ τεσσάρων ἀτόμων, ἀποδίδεται δὲ ὑπὸ τοῦ τύπου P_4 , εις ὑψηλοτέραν δόμως θερμοκρασίαν ἐπέρχεται διάσπασις αὐτοῦ, εις ἀπλούστερα μόρια τοῦ τύπου P_2 .

‘Ο ἐρυθρὸς φωσφόρος παρασκευάζεται διὰ θερμάνσεως τοῦ κιτρίνου φωσφόρου ἐπὶ πολλὰς ἡμέρας εις θερμοκρασίαν 260°, ἐντὸς κλειστῶν δοχείων, περιεχόντων ἀδρανὲς ἀέριον, π.χ. ἄζωτον. ’Αποτελεῖ μίαν μᾶζαν, ἔχουσαν χρῶμα βαθὺ ἐρυθρὸν πρὸς τὸ ἴωδες, είναι ἀσυμμορία καὶ ἔχει Ε.Β. 2,3. Δὲν είναι δηλητηριώδης, δὲν φωσφορίζει εις τὸ σκότος, δὲν διαλύεται εις τὸν διθειάνθρακα καὶ ἔξαχνοῦται θερμαινόμενος, χωρὶς νὰ ταχῇ.

Χημικαὶ ίδιοτητες. — ‘Ο κίτρινος φωσφόρος ἔχει μεγάλην χημικὴν συγγένειαν πρὸς τὸ ὀξυγόνον, διὸ καὶ ἐὰν θερμανθῇ εις τὸν ἀέρα μέχρις 60° ἀναφλέγεται καὶ καίεται μὲ φλόγα λαμπροτάτην πρὸς πεντεξίδιον τοῦ φωσφόρου P_2O_5 , τὸ δόποιον είναι κόνις λεπτοτάτη λευκή :



Λόγῳ τῆς μεγάλης του χημικῆς συγγένειας πρὸς τὸ ὀξυγόνον ὁ φωσφόρος είναι ἀριστον ἀναγωγικὸν μέσον. ‘Ενοῦται ἐπίσης ζωηρότατα μετὰ τῶν ἀλατογόνων στοιχείων, ἀναφλεγόμενος ἐντὸς ἀτμοσφαίρας χλωρίου ἢ ἐπαφῇ μετὰ τοῦ στερεοῦ ἴωδίου. ‘Ενοῦται ἐπίσης μετὰ τοῦ θείου καὶ πολλῶν μετάλλων.

‘Ο ἐρυθρὸς φωσφόρος ἔχει τὰς αὐτὰς χημικὰς ίδιοτητας μὲ τὸν λευκόν, ἀλλ’ εις πολὺ μικρότερον βαθμόν. Οὕτως ἀναφλέγεται μόνον εις ὑψηλὴν θερμοκρασίαν (260°) καὶ καίεται πρὸς πεντεξίδιον τοῦ φωσφόρου.

Χρήσεις. — ‘Ο κίτρινος φωσφόρος χρησιμοποιεῖται πρὸς παρασκευὴν χειρομηχανῶν καὶ ἐμπρηστικῶν βομβῶν, καθὼς καὶ ὡς δηλητηρίον κατὰ τῶν ποντικῶν, κατὰ διαφόρων παρασίτων κ.λ.π. Τὸ μεγαλύ-

τερον ποσὸν αὐτοῦ μετατρέπεται, εἴτε εἰς ἐρυθρὸν φωσφόρον, εἴτε εἰς θειούχους ἐνώσεις του, πρὸς τὸν σκοπὸν τῆς παρασκευῆς τῶν πυρειῶν.

ΠΥΡΕΙΑ

Παλαιότερον τὰ πυρεῖα κατασκευάζοντο διὰ κιτρίνου φωσφόρου. Λόγῳ δὲ τῆς δηλητηριώδους ἐνεργείας τοῦ κιτρίνου φωσφόρου καὶ ἐπειδὴ τὰ ἔξ αὐτοῦ πυρεῖα ἥσαν λίαν εὐανάφλεκτα, ἀπηγορεύθη εἰς τὰ περισσότερα κράτη ἡ χρῆσις τῶν πυρειῶν αὐτῶν, ἀντεκατεστάθησαν δὲ διὰ τῶν λεγομένων πυρείων ἀσφαλείας, τὰ ὅποια χρησιμοποιοῦμεν καὶ ἡμεῖς σήμερον ἐν Ἑλλάδι.

Τὰ πυρεῖα ἀσφαλείας κατασκευάζονται ἀπὸ μικρὰ ἔυλάρια, τῶν ὅποιων τὸ ἄκρον ἐμβαπτίζεται κατ' ἀρχὰς ἐντὸς παραφίνης τετηγμένης, ἕπειτα δὲ εἰς εὑφλεκτόν τι μῆγμα, ἀποτελούμενον ἐκ θειούχου ἀντιμονίου Sb_2S_3 , χλωρικοῦ καλίου KClO_3 , καὶ συνδετικῆς τινος unctionis (ἰχθυοκόλλας). Ἀναφλέγεται δὲ διὰ προστριβῆς ἐπὶ τῶν πλευρῶν τῶν κυτίων των, αἱ ὅποιαι ἔχουν καλυφθῆ διὰ μίγματος ἐρυθροῦ φωσφόρου, πυρολουσίτου καὶ λεπτῆς κόνεως ὑάλου.

ΟΞΕΙΔΙΑ ΤΟΥ ΦΩΣΦΟΡΟΥ

Σπουδαιότερα τῶν ὀξειδίων τοῦ φωσφόρου εἶναι τὸ τριοξείδιον τοῦ φωσφόρου P_2O_3 καὶ τὸ πεντοξείδιον τοῦ φωσφόρου P_2O_5 . Καὶ τὸ μὲν πρῶτον παράγεται κατὰ τὴν βραδεῖαν ὀξειδωσιν τοῦ κιτρίνου φωσφόρου, τὸ δὲ δεύτερον κατὰ τὴν καῦσιν τοῦ φωσφόρου, κιτρίνου ἢ ἐρυθροῦ : $\text{P}_4 + 3\text{O}_2 \rightarrow 2\text{P}_2\text{O}_3$.



Εἶναι ἀμφότερα τὰ ὀξειδία ταῦτα σώματα στερεά, λευκὰ καὶ εἶναι ἀνυδρῖται δξέων, τὸ μὲν τριοξείδιον τοῦ φωσφορώδους δξέος, τὸ δὲ πεντοξείδιον τῶν φωσφορικῶν δξέων.

ΟΞΕΑ ΤΟΥ ΦΩΣΦΟΡΟΥ

Εἰς τὸ τριοξείδιον τοῦ φωσφόρου, ὡς εἴπομεν, ἀντιστοιχεῖ τὸ φωσφορῶδες δξέος :



Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Εἰς δὲ τὸ πεντοξείδιον τοῦ φωσφόρου ἀντιστοιχοῦν τρία δξέα ἀναλόγως τῶν προσλαμβανομένων μορίων οὕτως :



* Εκ τῶν τριῶν τούτων δξέων σπουδαιότερον εἶναι τὸ δρόθο - φωσφορικὸν ἢ ἀπλῶς φωσφορικὸν δξέα.

ΦΩΣΦΟΡΙΚΟΝ ΟΞΥ Η₃PO₄


Τὸ δξέα τοῦτο παρασκευάζεται βιομηχανικῶς διὰ τῆς ἐπιδράσεως θειέκοῦ δξέος ἐπὶ τοῦ δρυκτοῦ φωσφορίτου :



Τὸ χημικῶς καθαρὸν καὶ ξηρὸν δξέα εἶναι στερεόν, κρυσταλλικόν, E.B. 1,88, τηκόμενον εἰς 42°. Εἶναι λίαν ύγροσκοπικόν καὶ ως ἐκ τούτου διαρρέει εἰς τὸν ἐλεύθερον ἀέρα πρὸς σιροπιῶδες ύγρόν. Εἶναι μετρίως ισχυρὸν δξέα, τριδύναμον, δίδον τρία εῖδη ἀλάτων, δύο δξίνα καὶ ἐν οὐδέτερον. Οὕτω μετὰ τοῦ νατρίου δίδει τὰ ἔξης ἄλατα :



Μετὰ δὲ τοῦ δισθενοῦς ἀσβεστίου τὰ ἔξης :



ΦΩΣΦΟΡΙΚΑ ΑΛΑΤΑ

* Εξ ὅλων τῶν φωσφορικῶν ἀλάτων, σπουδαιότερον εἶναι τὸ δισόδξινον φωσφορικὸν ἀσβέστιον CaH₄(PO₄)₂, τὸ δόποιον χρησιμοποιεῖται ως λίπασμα, διότι εἶναι διαλυτὸν εἰς τὸ θέρμαντον φυτῶν. Παρασκευάζεται βιομηχανικῶς δι' ἐπιδράσεως ὑπολογισμένης ποσότητος θειέκοῦ δξέος ἐπὶ τοῦ φωσφορίτου :



Τὸ προκύπτον μῆγμα τοῦ δισοδξίνου φωσφορικοῦ ἀσβεστίου καὶ τοῦ θειέκοῦ ἀσβεστίου, φέρεται εἰς τὸ ἐμπόριον ὑπὸ τὸ ὄνομα ὑπερφωσφορικόν ἀλατι, ἀποτελεῖ δὲ τὸ σπουδαιότερον φωσφοροῦχον λίπασμα.

ΑΡΣΕΝΙΚΟΝ

Σύμβολον As

Άτομικὸν βάρος 74,91

Σθένος III, V

Προέλευσις. — Εἰς τὴν φύσιν τὸ ἀρσενικὸν ἀπαντᾶται κυρίως ἡγωμένον, ὑπὸ μορφὴν ὀρυκτῶν, ἐκ τῶν ὁποίων σπουδαιότερα εἶναι ὁ ἀρσενικὸν πυρίτης FeAsS, ἢ κιτρίνη σανδαράχη As₂S₃ καὶ ἡ ἐρυθρὰ σανδαράχη As₂S₂.

Παρασκευή. — Παρασκευάζεται διὰ θερμάνσεως τοῦ ἀρσενοπυρίτου, διασπωμένου εἰς θειούχον σίδηρον καὶ ἀρσενικόν, τὸ ὅποιον ἔξαχνοῦται :



Συνηθέστερον λαμβάνεται δι’ ἀναγωγῆς ὑπὸ ἀνθρακος τοῦ τριοξείδου τοῦ ἀρσενικοῦ As₂O₃, τὸ ὅποιον προκύπτει ὡς παραπροϊόν, κατὰ τὴν φρῦξιν θειούχων τινῶν ὀρυκτῶν :



Ιδιότητες. — Τὸ ἀρσενικὸν ἐμφανίζεται ὑπὸ δύο ἀλλοτροπικὰς μορφὰς : ὡς ἄμμορφον, ἔχον χρῶμα κίτρινον καὶ ὡς κρυσταλλικόν, ἔχον χρῶμα σκοτεινῶς τεφρόν. Τὸ κρυσταλλικόν, ἀποτελοῦν τὴν σταθερωτέραν του μορφήν, ἔχει λάμψιν μεταλλικήν, ἀλλ’ εἶναι ἐσθραυστόν. "Εγει E.B. 5,7, θερμαινόμενον δὲ ἔξαχνοῦται, χωρὶς νὰ τακῇ. Καὶ ὑπὸ τὰς δύο μορφὰς εἶναι ισχυρὸν δηλητήριον, δπως δηλητηριώδεις εἶναι καὶ ὅλαι αἱ ἐνώσεις του. Χημικῶς ὁμοιάζει πρὸς τὸν φωσφόρον.

Χρήσεις. — Τὸ ἀρσενικὸν χρησιμοποιεῖται εἰς διάφορα κράματα μετάλλων, εἰς τὰ ὅποια προσδίδει σκληρότητα. Οὕτω προστιθέμενον εἰς τὸν μόλυβδον, ὑπὸ ἀναλογίαν 0,5 - 1,0 % σχηματίζει κράμα σκληρόν, εἰς τὸν σύμβολον, οὐδὲν δροι (σκάρι).

ΑΝΤΙΜΟΝΙΟΝ

Σύμβολον Sb

Άτομικὸν βάρος 121,76

Σθένος III, V

Προέλευσις — Παρασκευή. — Τὸ ἀντιμόνιον ἀπαντᾷ πρὸ πάντων ὑπὸ τὴν μορφὴν ὀρυκτῶν. Σπουδαιότερον τούτων εἶναι ὁ ἀντιμόνιος Sb₂S₃, ἐκ τοῦ ὅποιου καὶ παρασκευάζεται διὰ συνθερμάνσεως μετ’ ἀπορριμμάτων σιδήρου :



Ίδιότητες — Χρήσεις. — Τὸ καθαρὸν ἀντιμόνιον εἶναι στιλπνόν, ἀργυρόλευκον, εὔθραυστον, κρυσταλλικόν. Ἐχει E.B. 6,7 καὶ τήκεται εἰς 630°. Εἶναι ἀσθενῶς εὐθερμαγωγὸν καὶ εὐηλεκτραγωγόν. Εἰς τὴν συνήθη θερμοκρασίαν δὲν ἀλλοιοῦται εἰς τὸν ἀέρα, εἰς ὑψηλὴν ὅμως θερμοκρασίαν καίεται, μὲν κυανίζουσαν φλόγα, πρὸς λευκὸν τριοξείδιον τοῦ ἀντιμονίου Sb_2O_3 . Δὲν προσβάλλεται ὑπὸ τῶν ἀραιῶν δέξιων, διαλύεται ὅμως εὐκόλως ὑπὸ τοῦ βασιλικοῦ ὄξους, πρὸς πενταχλωριούχον ἀντιμόνιον $SbCl_5$ καὶ δυσκολώτερον ὑπὸ τοῦ πυκνοῦ καὶ θερμοῦ θειϊκοῦ δέξιος πρὸς θειϊκὸν ἀντιμόνιον $Sb_2(SO_4)_3$.

Χρησιμοποιεῖται κυρίως πρὸς κατασκευὴν μεταλλικῶν κραμάτων, εἰς τὰ ὁποῖα προσδίδει σκληρότητα. Τὰ σπουδαιότερα κράματα εἶναι τὸ τῶν τυπογραφικῶν στοιχεῖων (μόλυβδος, ἀντιμόνιον, κασσίτερος) καὶ τὸ κρᾶμα ἀντιτριβῆς (κασσίτερος, ἀντιμόνιον, χαλκός). Χρησιμοποιεῖται ἐπίσης πρὸς παρασκευὴν χρωμάτων τινῶν.

ΒΙΣΜΟΥΘΙΟΝ

Σύμβολον Bi

Ατομικὸν βάρος 209

Σθένος III, V

Προέλευσις — Παρασκευή. — Τὸ βισμούθιον ἀπαντᾶ εἰς τὴν φύσιν καὶ ὡς αὐτοφυές, συνήθως ὅμως ὑπὸ τὴν μορφὴν δρυκτῶν, ἐκ τῶν ὁποίων σπουδαιότερον εἶναι ὁ βισμούθιτης Bi_2S_3 . Παρασκευάζεται δὲ εἴτε διὰ τήξεως τοῦ αὐτοφυοῦς βισμούθιου, εἴτε διὰ φρύξεως τοῦ βισμούθιτου, ὅπότε προκύπτει δέξιεδιον βισμούθιον, τὸ δόποιον ἀνάγεται τελικῶς δι' ἀνθρακος.

Ίδιότητες — Χρήσεις. — Εἶναι στοιχεῖον μὲν ἰδιότητας μᾶλλον μεταλλικάς. Ἐχει χρῶμα ἀργυρόλευκον καὶ λάμψιν μεταλλικήν. Εἶναι σκληρόν, εὔθραυστον καὶ κρυσταλλικόν. Ἐχει E.B. 9,8 καὶ τήκεται εἰς 270°. Θερμαινόμενον εἰς τὸν ἀέρα, καίεται, μετ' ἀσθενοῦς λευκοκούάνου φλογός, πρὸς δέξιεδιον. Διαλύεται εἰς τὸ νιτρικὸν καὶ τὸ πυκνὸν θειϊκὸν δέξιον.

Χρησιμοποιεῖται σχεδὸν ἀποκλειστικῶς πρὸς παρασκευὴν τῶν λεγομένων εὐτήκτων κραμάτων, ὃν σπουδαιότερον εἶναι τὸ κρᾶμα τοῦ W o o d (βισμούθιον, μόλυβδος, κασσίτερος, κάδμιον) ($4 : 2 : 1 : 1$), ἔχον σημεῖον τήξεως 71°. Μερικαὶ ἐνώσεις τοῦ βισμούθιου χρησιμοποιοῦνται εἰς τὴν ἴατρικὴν ὡς φάρμακα.

Ο ΜΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΟΣ

Η δύμας αὕτη περιλαμβάνει τὰ στοιχεῖα ἀνθρακα καὶ πυρί-
τιον, τὰ δόποια εἶναι ἀμφότερα τετρασθενῆ.

ΑΝΘΡΑΞ

Σύμβολον C

Ατομικὸν βάρος 12,01

Σθένος IV

Προέλευσις. — Εἰς ἐλευθέραν κατάστασιν δὲ ἄνθραξ ἀπαντᾷ εἰς τὴν φύσιν καθαρὸς μὲν ὡς ἀδάμας καὶ ὡς γραφίτης, ἀναμεμιγμένος δὲ μετ' ἄλλων οὐσιῶν εἰς τοὺς γαιάνθρακας. Ἡνωμένος εὑρίσκεται, ὑπὸ μορφὴν διοξειδίου τοῦ ἄνθρακος, ὡς συστατικὸν τοῦ ἀτμοσφαιρικοῦ ἀέρος, ὑπὸ τὴν μορφὴν δὲ ἀνθρακιῶν ἀλάτων, ἀποτελεῖ ἐκτεταμένα πετρώματα τῆς γῆς ἐκ τῶν δόποιων σπουδαιότερα εἶναι δὲ ἀσβεστόλιθος καὶ τὸ μάρμαρον. Ἐπίσης ἀπαντᾶται ἡνωμένος μετὰ τοῦ ὑδρογόνου εἰς τὰ φυσικὰ ἀέρια καὶ τὰ πετρέλαια. Τέλος ἀποτελεῖ τὸ κύριον καὶ ἀπαραίτητον συστατικὸν τοῦ σώματος τῶν φυτῶν καὶ τῶν ζώων.

Ἀλλοτροπικαὶ μορφαί. — 'Ο ἄνθραξ εἶναι στοιχεῖον ἀλλότροπον, ἐμφανιζόμενον εἴτε ὡς κρυσταλλικός, εἴτε ὡς ἄμορφος. Καὶ ὡς κρυσταλλικός μὲν ἀποτελεῖ τὸν ἀδάμαντα καὶ τὸν γραφίτην, ὡς ἄμορφος δὲ ἀπαντᾶται εἰς τοὺς γαιάνθρακας, τοὺς ξυλάνθρακας κ.λ.π.

ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΝΘΡΑΚΟΣ

ΑΔΑΜΑΣ. — 'Ο ἀδάμας εἶναι σῶμα στερεόν, κρυσταλλικόν, ἀποτελεῖται δὲ ἀπὸ ἄνθρακα σχεδὸν καθαρόν. Ἀπαντᾶται ὡς ὄρυκτὸν ἐν τῷ ὑδατογενῶν πετρωμάτων εἰς τὴν N. Ἀφρικήν, τὴν Βραζιλίαν, τὴν Βόρεο κ. ἄ. Κρυσταλλοῦται κατὰ τὸ κυβικὸν σύστημα καὶ εἶναι συνήθως ἄχρους, ὑπάρχουν δὲ μάρμαντες μὲν ἐλαφρὰς ἀποχρώσεις πρὸς τὸ ρόδινον, τὸ κίτρινον, τὸ κυανοῦν, ὡς καὶ μέλανες. Ἐχει μεγάλην φωτοθλαστικήτην καὶ εἶναι τὸ σκληρότερον τῶν γνωστῶν σωμάτων, χράσσοντας ὅλα τὰ ἄλλα σώματα. Εἶναι κακὸς ἀγωγὸς τῆς θερμότητος καὶ τοῦ ἡλεκτρισμοῦ καὶ ἔχει E.B. 3,50. Δὲν προσβάλλεται ὑπὸ τῶν δέξιων καὶ καίεται μόνον κατόπιν ἐντόνου θερμάνσεως εἰς 800°, ἐντὸς καθαροῦ δεξιγόνου, πρὸς διοξειδίου τοῦ ἄνθρακος. Οἱ φυσικοὶ ἀδάμαντες φέρουν πάντοτε ἀλιχφανὲς περίβλημα, ἀφαιρούμενον διὰ κατεργασίας.

Ἐκ τῶν ἀδαμάντων οἱ μέλανες καὶ ἀδιαφανεῖς χρησιμοποιοῦνται πρὸς κοπὴν τῆς ὑάλου ἢ πρὸς διάτρησιν σκληρῶν πετρωμάτων, οἱ διαφανεῖς δὲ ὡς πολύτιμοι λίθοι, εἰς τὴν κοσμηματοποιίαν, λόγῳ τῆς ἔξαιρετικῆς των λάμψεως. Πρὸς τὸν σκοπὸν τοῦτον ἐπεξεργάζονται τοὺς ἀδάμαντας διὰ τῆς ἴδιας των κόνεως, εἰς τρόπον ὥστε νὰ σχηματισθοῦν δόσον τὸ δυνατὸν περισσότεραι ἔδραι, ἵνα οὕτω ἡ λάμψις των γίνῃ μεγαλυτέρᾳ. Οἱ πολύεδροι ἀδάμαντες λέγονται ἔκ λαμπροῦ (brillants). Ἡ ἀξία τῶν ἀδαμάντων ἔξαρταται ἐκ τοῦ τρόπου τῆς κατεργασίας των, ἐκ τῆς διαφανείας των καὶ ἐκ τοῦ βάρους των, τὸ δποῖον ἐκφράζεται εἰς καράτια (ἐν καράτιον = 0,20 γραμ.).

Ἡ τεχνητὴ κατασκευὴ τῶν ἀδαμάντων ἐπετεύχθη τὸ 1893, ὑπὸ τοῦ Γάλλου χημικοῦ Moissan, εἰς μικροσκοπικοὺς κρυστάλλους, ἄνευ ἐμπορικῆς ἀξίας.

ΓΡΑΦΙΤΗΣ. — Ἀπαντᾶ εἰς τὴν φύσιν εἰς τὴν ἔξαγωνικὰ φυλλίδια ἢ κατὰ μάζας κρυσταλλικὰς ἴνωδεις, εἰς Βαυαρίαν, Σιβηρίαν, Κεϋλάνην, Μαδαγασκάρην καὶ ἀλλαχοῦ. Δύναται νὰ παρασκευασθῇ καὶ τεχνητῶς, διὰ θερμάνσεως ἀμόρφου ἄνθρακος, εἰς τὴν ὑψηλὴν θερμοκρασίαν τῶν ἡλεκτρικῶν καμίνων, τῇ προσθήκῃ ἅμμου κατὰ τὴν μέθοδον τοῦ Acheson. Εἶναι τεφρομέλας καὶ ἀδιαφανής, μὲν ζωηρὰν μεταλλικὴν λάμψιν καὶ λιπαρὸς τὴν ἀφήν. Εἶναι μαλακός, συρόμενος δὲ ἐπὶ τοῦ χάρτου ἀφίνει ἔχην τεφρομέλανα. Ἐγειρεῖ E.B. 2,25 καὶ εἶναι καλὸς ἀγωγὸς τῆς θερμότητος καὶ τοῦ ἡλεκτρισμοῦ. Διὰ νὰ καῆ πρέπει νὰ θερμανθῇ εἰς ὑψηλὴν θερμοκρασίαν. Ὁ γραφίτης χρησιμεύει πρὸς κατασκευὴν μολυβδοκονδύλων ἐν μίγματι μετ' ἀργίλου καθὼς καὶ πυριμάχων χωνευτηρίων, πρὸς τῆξιν τῶν μετάλλων. Ἀναμιγνύόμενος δὲ μετ' ἑλαίου χρησιμοποεῖται διὰ τὴν ἐπάλειψιν σιδηρῶν ἀντικειμένων πρὸς προφύλαξιν αὐτῶν ἀπὸ τῆς δέξειδώσεως. Ὡς ἡλεκτραγωγὸς τέλος χρησιμεύει πολὺ εἰς τὴν γαλβανοπλαστικήν.

ΑΜΟΡΦΑ ΕΙΔΗ ΑΝΘΡΑΚΟΣ

Οἱ ἅμορφοι ἄνθρακες ἐμπεριέχουν συνήθως καὶ ἄλλας οὐσίας. Ἐχουν χρῶμα μέλαν καὶ χρησιμοποιοῦνται ὡς καύσιμοι ὄλαι, διότι καίονται εὔκόλως, ἀποδίδυντες μεγάλην ποσότητα θερμότητος. Διακρίνονται εἰς φυσικοὺς καὶ τεχνητοὺς ἄνθρακας.

ΦΥΣΙΚΟΙ ΑΝΘΡΑΚΕΣ — ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΕΣ. — Φυσικοί άνθρακες είναι οι λεγόμενοι δρυκτοί άνθρακες ή γαιάνθρακες, ώς έξαγόμενοι ἐκ τῆς γῆς. Προέρχονται ἐκ φυτῶν, τὰ δόποια ἔζησαν πρὸ ἐκατομμυρίων ή χιλιάδων ἑτῶν, κατεχώσθησαν ἔκτοτε εἰς μέγα βάθος καὶ ἐκεῖ, ὑπὸ τὴν ἐπιδρασιν τῆς θερμότητος τῆς γῆς, τὴν μεγάλην πίεσιν τῶν ὑπερκειμένων στρωμάτων καὶ τὴν ἐπίδρασιν ἀναεροφίων μικροοργανισμῶν, ἀπηνθρακώθησαν βραδέως. Ός ἐκ τούτου ὅσον ἀρχαιότερος είναι ὁ γαιάνθραξ, τόσον πλουσιώτερος είναι εἰς ἄνθρακα, συμπαγέστερος καὶ πυκνότερος.

Οι γαιάνθρακες, ἐκτὸς τοῦ καθαροῦ ἄνθρακος, ἐμπεριέχουν καὶ ἔνώσεις αὐτοῦ μεθ' ὑδρογόνου, δξυγόνου, ἀζώτου καὶ θείου. Διακρίνονται δὲ κυρίως 4 εἰδη αὐτῶν : ὁ ἄνθρακίτης, ὁ λιθάνθραξ, ὁ λιγνίτης, ἡ τύρφη.

Ο ἄνθρακίτης είναι ὁ ἀρχαιότερος τὴν ἡλικίαν γαιάνθραξ, ἐνέχων 90 - 95 % ἄνθρακος. Είναι μέλας, στιλπνὸς καὶ σκληρός. Ανάπτει δυσκόλως καὶ καίεται ἀνευ φλογὸς καὶ καπνοῦ, ἀποδίδων μεγάλην ποσότητα θερμότητος (8000 - 9000 χιλιοθερμίδας κατὰ χιλιόγραμμον) καὶ ἀφίνων δλίγην τέφραν. Χρησιμοποιεῖται κυρίως εἰς τὰς θερμάστρας συνεχοῦς καύσεως τῶν οἰκιῶν καὶ εἰς μεταλλουργικάς τινας ἐργασίας. Ο λιθάνθραξ είναι νεώτερος τὴν ἡλικίαν γαιάνθραξ, περιέχων 75 - 90 % ἄνθρακος. Καίεται μὲ φλόγα φωτεινὴν καὶ αἰθαλίζουσαν, ἀποδίδει δὲ εἰς ξηρὰν κατάστασιν 7000 - 8000 χιλιοθερμίδας κατὰ χιλιόγραμμον. Χρησιμοποιεῖται πολὺ ὡς καύσιμος ὑλη εἰς τὰ ἐργοστάσια, τοὺς σιδηροδρόμους, τὰ ἀτμόπλοια καὶ ὡς πρώτη ὑλη πρὸς παρασκευὴν τοῦ φωταερίου καὶ τοῦ κώκ.

Ο λιγνίτης είναι ἀκόμη νεώτερος τὴν ἡλικίαν γαιάνθραξ, ἐμπεριέχων 60 - 70 % ἄνθρακος. Είναι καστανόχρους ἔως μέλας, εὔθραυστος, ἀλαπτής, διατηρεῖ δὲ πολλάκις τὴν ὑφὴν τοῦ ἔυλου, ἐξ οὗ προῆλθεν. Καίεται εὐχερῶς μὲ φλόγα μεγάλην καὶ αἰθαλίζουσαν καὶ δυσάρεστον ὄσμήν, ἀποδίδων εἰς ξηρὰν κατάστασιν 6000 - 7000 χιλιοθερμίδας κατὰ χιλιόγραμμον. Είναι τὸ μόνον εἶδος γαιάνθρακος, τὸ δόποιον ἀπαντᾶται δὲν Ἐλλάδι (Ὀρωπός, Ἀλιβέριον, Μεγαλόπολις, Πτολεμαῖς τῆς Μακεδονίας κ.λ.π.).

Η τύρφη είναι γαιάνθραξ τῶν νεωτάτων γεωλογικῶν διαστρώσεων, σχηματιζόμενος πολλαχοῦ καὶ σῆμερον, δι' ἀποσυνθέσεως φυτικῶν ὑστιῶν ὑπὸ τὸ ὑδωρ, εἰς ἐλώδη μέρη. Περιέχει μικρὰ ποσότητα ἄνθρακος (55 - 60 %), είναι πορώδης, καίεται βραδέως μὲ αἰθαλίζουσαν

φλόγα και ἀποδίδει μικράν ποσότητα θερμότητος, διὸ τοῦτο χρησιμοποιεῖται ἐλάχιστα και μόνον ἐπιτοπίως, ὡς καύσιμον.

"Ολα τὰ εἰδὴ γαιανθρακος περιέχουν ἐπὶ πλέον και ἀνοργάνους οὐσίας, αἱ ὅποιαι μετὰ τὴν καῦσιν τοῦ ἄνθρακος, καταλείπονται ὑπὸ μορφὴν τέ φρας.

ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΑΝΘΡΑΚΕΣ. — Κυριώτεροι τεχνητοὶ ἄνθρακες εἰναι τὸ κώκ, ὁ ἄνθραξ τῶν ἀποστακτήρων, ὁ ξυλάνθραξ, ὁ ζωϊκὸς ἄνθραξ, και ἡ αιθάλη.


Τὸ κώκ εἰναι ὑπόλειμμα τῆς ξηρᾶς ἀποστάξεως τῶν λιθανθράκων, οἵτοι τῆς θερμάνσεως αὐτῶν ἐντὸς κλειστῶν δοχείων, μακρὰν τοῦ ἀέρος. Εἶναι πορώδες, περιέχει 90-95% ἄνθρακος, ἀνάπτει δυσκόλως και καίεται ἀνευ φλογός, παρέχον 8000 χιλιοθερμίδας κατὰ χιλιόγραμμον. Χρησιμοποιεῖται ὡς καύσιμος ὕλη και ὡς ἀναγωγικὸν μέσον εἰς τὴν μεταλλουργίαν.

'Ο ἄνθραξ τῶν ἀποστάκτηρων εἰναι σχεδὸν καθαρὸς ἄνθραξ, ἀποτιθέμενος εἰς τὸ ἐσωτερικὸν τοίχωμα τῶν δοχείων, ἐντὸς

τῶν ὅποιων γίνεται ἡ ἀπόσταξις τῶν λιθανθράκων, πρὸς παρασκευὴν τοῦ φωταερίου. "Εγει χρῶμα τεφρομέλαν και εἰναι πολὺ σκληρός, συμπαγής και εὐλεκτραγωγός. Χρησιμοποιεῖται πρὸς κατασκευὴν ἡλεκτροδίων, εἰς τὰ ἡλεκτρικὰ στοιχεῖα, κ.λ.π.

'Ο ξυλάνθραξ εἰναι τὸ ὑπόλειμμα τῆς ἀπανθρακώσεως τῶν ξύλων. Παρασκευάζεται δὲ κατὰ δύο μεθόδους. Κατὰ τὴν παλαιοτέραν

μέθοδον τὰ ξύλα διατίθενται κατὰ σωρούς, καλυπτομένους διὰ πηλοῦ. Εἰς τὸ μέσον ἐκάστου σωροῦ ἀφίεται ὅπή, ἐν εἴδει καπνοδόχου, διὰ τῆς ὅποιας ρίπτονται ἀναμμένοι ἄνθρακες πρὸς ἀνάρλεξιν τῶν ξύλων, ἐνῷ



Σχ. 42. Παρασκευὴ ξυλανθράκων.

παρὰ τὴν βάσιν ἀνοίγονται δύοι τινες κατὰ τόπους πρὸς ρύθμισιν τῆς κυκλοφορίας τοῦ ἀέρος. (Σχ. 42). Ἐπειδὴ ὑπὸ τοὺς ὄρους αὐτοὺς ἡ καῦσις τῶν ξύλων γίνεται ἀτελής, ἐπιτυγχάνεται τελικῶς ἡ ἀπανθράκωσις αὐτῶν. Ἡ ἀπόδοσις τῆς μεθόδου ταύτης εἶναι πολὺ μικρά, φθάνουσα μόλις τὰ 25 % τοῦ βάρους τῶν ξύλων. Κατὰ νεωτέραν μέθοδον τὰ ξύλα ὑποβάλλονται εἰς ξηρὰν ἀπόσταξιν, τῆς ὁποίας, τὸ μὲν ὑπόλειμμα ἀποτελεῖ τὸν ξυλάνθρακα, τὸ δὲ ἀπόσταγμα συνίσταται ἀπὸ ξυλόπισσαν, ὁξεικὸν ὁξύ, μεθυλικὴν ἀλκοόλην (ξυλόπινευμα), ἀκετόνην κ.ἄ.

Ο ξυλάνθραξ διατηρεῖ τὸ σχῆμα τοῦ ξύλου, ἐκ τοῦ ὁποίου προϊῆλθεν, εἶναι εὔθραυστος καὶ χρησιμοποιεῖται κυρίως ὡς καύσιμος ὅλη εἰς τὰς οἰκίες. Ἐπὶ πλέον εἶναι πορώδης καὶ ὡς ἐκ τούτου ἔχει τὴν ίδιότητα νὰ ἀπορροφᾷ ἀέρια, ἀτμούς καὶ διαφόρους χρωστικάς ούσιας, διὸ καὶ χρησιμοποιεῖται πρὸς διμίλισιν τοῦ ποσίμου ὕδατος, πρὸς ἀποχρωματισμὸν ὑγρῶν κ.λ.π.

Ο ξυλάνθραξ ἔνθροπος ἀπανθράκωσεως ζωϊκῶν ούσιῶν (ծτῶν, αἴματος κ.λ.π.), διὰ θερμάνσεως αὐτῶν ἐντὸς κλειστῶν δοχείων. Ἐνέχει μικρὰν ποσότητα ἄνθρακος, ἀλλ' εἶναι λίαν πορώδης, ἔχει δὲ ὡς ἐκ τούτου μεγάλην ίκανότητα ἀπορροφήσεως χρωστικῶν ἢ ὁσμηρῶν ούσιῶν, διὸ χρησιμοποιεῖται πρὸς ἀποχρωματισμὸν τοῦ σιροπίου τῶν σακχαροποιείων, καθὼς καὶ διαφόρων ἄλλων ούσιων.

Η αἱθάλη (κ. φοῦμο) εἶναι κόνις μέλαινα, λίαν ἐλαφρά, ἀποτελουμένη ἔξι ἄνθρακος ἐν λεπτοτάτῳ διαμερισμῷ. Λαμβάνεται κατὰ τὴν ἀτελῆ καῦσιν πλουσίων εἰς ἄνθρακα ούσιῶν (πίσσα, ρητίνη, τερεβινθέλαιον, λίπη κ.λ.π.). Χρησιμεύει δὲ πρὸς παρασκευὴν τῆς σινικῆς καὶ τυπογραφικῆς μελάνης, μελανῶν ἐλαιοχρωμάτων, κ.λ.π.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΟΣ

Φυσικαί. — Ο ἄνθραξ εἶναι σῶμα στερεόν, ξοσμον, ἀγευστον, ἔχει δὲ χρῶμα μέλαν, πλὴν τοῦ ἀδάμαντος. Εἶναι ἀτηκτος καὶ ἀδιάλυτος εἰς ὅλα τὰ γνωστὰ ἥιστατικά μέσα, δυνάμενος μόνον νὰ διαλυθῇ κατὰ πολὺ μικρὰ ποσὰ εἰς τετηγμένα μέταλλα, ιδίως εἰς τὸν σίδηρον.

Χημικαί. — Δέν προσβάλλεται ἀπὸ τὰ δέξα καὶ τὰς βάσεις. Εἰς τὴν συνήθη θερμοκρασίαν εἶναι λίαν ἀδρανής, εἰς ὑψηλὴν ὅμως θερμοκρασίαν καλεται εἰς τὸν ἀέρα ἢ ἐντὸς καθαροῦ ὁξυγόνου, πρὸς διοξείδιον τοῦ ἄνθρακος, ἐνοῦται δὲ μετά τινων στοιχείων, π.χ. μετὰ τοῦ ἀσβεστίου

πρὸς ἀνθρακασβέστιον (CaC_2), μετὰ τοῦ πυρίτου πρὸς ἀνθρακοπυρίτιον (SiC), μετὰ τοῦ θείου πρὸς διθειάνθρακα (CS_2). Εἰς ὑψηλὴν ἐπίστης θερμοκρασίαν ἔχει τὴν ἴκανότητα νὰ ἀφαιρῇ τὸ δέξιγόν τῶν μεταλλικῶν δέξιδίων, ἀποτελῶν οὕτω ἄριστον ἀναγωγικὸν μέσον.

X R H S E I S

Πέραν τῶν ἰδιαιτέρων χρήσεων τῶν διαφόρων ποικιλιῶν τοῦ ἀνθρακοῦ, τὰς ὁποίας περιεγράψαμεν ἡδη, ὁ ἀνθραξ ἔχει ἔξαιρετικὴν σημασίαν διὰ τὰς ἔξης μεγάλας ἐφαρμογάς του εἰς τὴν βιομηχανίαν : Εἶναι ἡ κυριωτέρα καύσιμος ὅλη εἰς τὰς παντὸς εἰδους ἀτμομηχανάς, ὡς ἀνθρακίτης, λιθάνθραξ, λιγνίτης, κώκ. Εἶναι ἡ καύσιμος καὶ ἀναγωγικὴ συγχρόνως ὅλη εἰς τὴν μεταλλουργίαν, ὑπὸ μορφὴν κώκ. Εἶναι ἡ πρώτη ὅλη (ώς λιθάνθραξ) ἐκ τῆς ὁποίας παρασκευάζεται τὸ φωταέριον, λαμβάνονται δὲ συγχρόνως παντὸς εἰδους ἀποστάγματα (πίσσα κ. ά.), χρησιμεύοντα ὡς ἀφετηρία παρασκευῆς ποικιλωτάτων ὄργανικῶν καὶ ἄλλων οὐσιῶν.

ΕΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΟΥ

Αἱ ἑνώσεις τοῦ ἀνθρακοῦ ἀποτελοῦν τὸ περιεχόμενον τῆς Ὀργανικῆς Χημείας. Εἰς τὴν Ἀόργανον Χημείαν ἔξετάζονται μόνον τὰ δέξια τοῦ ἀνθρακοῦ, τὸ ἀνθρακικὸν δέξιον καὶ τὰ ἀνθρακικὰ ἄλλα.

ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΟΣ CO

Προέλευσις. — Τὸ μονοξείδιον τοῦ ἀνθρακοῦ δὲν ἀπαντᾷ ἐλεύθερον εἰς τὴν φύσιν, ἀλλὰ παράγεται κατὰ τὴν ἀτελῆ καῦσιν τοῦ ἀνθρακοῦ ἐντὸς ἀνεπαρκοῦς ποσότητος δέξιγόνου : $\text{C} + \text{O} \rightarrow \text{CO}$. Ἐπίσης παράγεται κατὰ τὴν ξηρὰν ἀπόσταξιν τῶν λιθανθράκων, διὰ τοῦτο ἀποτελεῖ συστατικὸν τοῦ φωταερίου (5 - 10 %).

Παρασκευή. — Εἴς τὰ ἐργαστήρια παράγεται καθαρὸν μονοξείδιον τοῦ ἀνθρακοῦ δι' ἀποσυνθέσεως τοῦ μυρμηκικοῦ δέξιος (H_2COOH) ὑπὸ τῆς θερμότητος, παρουσίᾳ πυκνοῦ θεικοῦ δέξιος τὸ δόποιον χρησιμεύει πρὸς κατακράτησιν τοῦ ὅδατος : (Σχ. 43).



Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Φυσικαὶ ἴδιότητες. — Τὸ μονοξείδιον τοῦ ἀνθρακος εἶναι ἀέριον ἄχρουν, ἀσμον καὶ ἀγευστὸν. Ἐγειρι πυκνότητα 0,97 ἡτοι ὡσην περίπου πρὸς τὴν τοῦ ἀζώτου. Τγροποιεῖται δυσκολώτατα καὶ εἶναι ἐλάχιστα διαλυτὸν εἰς τὸ ὕδωρ.

Χημικαὶ ἴδιότητες. — Ἐπειδὴ τὸ μονοξείδιον τοῦ ἀνθρακος ἔχει τὴν τάσιν νὰ προσλαμβάνῃ ἐν ἀκόμη ἀπομον ὁξυγόνου, διὰ τοῦτο ἀναφλεγόμενον καίεται εἰς τὸν ἀέρα πρὸς διοξείδιον τοῦ ἀνθρακος, ὑπὸ ἔκλυσιν σημαντικῆς ποσότητος θερμότητος :



Διὰ τὸν αὐτὸν λόγον δρᾶ ὡς ἰσχυρὸν ἀναγωγικὸν μέσον. Οὕτως ἀνάγει πολλὰ ὁξείδια μετάλλων :




Ἐνεκα τῆς ἴδιότητός του ταύτης χρησιμοποιεῖται εἰς τὴν μεταλλουργίαν.

Φυσιολογικαὶ ἴδιότητες. — Τὸ μονοξείδιον τοῦ ἀνθρακος εἶναι ἰσχυρότατον δηλητήριον, ἀκόμη καὶ εἰς μικρὰν ποσότητα. Τοῦτο δφείλεται εἰς τὸ δτι, εἰσερχόμενον διὰ τῆς ἀναπνοῆς εἰς τὸ αἷμα, ἐνοῦται μετὰ τῆς αἵμοσφαιρίνης αὐτοῦ πρὸς σταθερὰν ἔνωσιν, τὴν ἀνθρακοξυαίμοσφαιρίνην. Οὕτω τὰ ἐρυθρὰ αἵμοσφαιρία χάνουν πλέον τὴν ίκανότητα νὰ προσλαμβάνουν ὁξυγόνον, διὰ νὰ τὸ μεταφέρουν εἰς τὰ διάφορα μέρη τοῦ σώματος. Εἰς τὸ ἀέριον τοῦτο δφείλονται αἱ δηλητηριάσεις, αἱ προεργόμεναι ἀπὸ τὸ φωταέριον, τὰ μαγγάλια καὶ τὰς ἀτελῶς κλεισμένας θερμάστρας.

Χρήσεις. — Τὸ μονοξείδιον τοῦ ἀνθρακος χρησιμοποιεῖται πολὺ εἰς τὴν βιομηχανίαν ὡς καύσιμον, ἀποτελοῦν τὸ κύριον συστατικὸν τοῦ ἀνθρακαερίου, τοῦ ὑδραερίου καὶ τοῦ μικτοῦ ἀερίου.

Τὸ ἀνθρακαέριον παρασκευάζεται ἐντὸς καταλλήλων ἀεριογόνων συσκευῶν (*gazogènes*), διὰ διοχετεύσεως ἀέρος διὰ μέσου τοῦ σωροῦ διαπύρων ἀνθράκων. Παράγεται τότε κατ' ἀρχὰς διοξείδιον τοῦ ἀνθρακος, τὸ δποῖον ὅμως περαιτέρω ἀνάγεται ὑπὸ τοῦ ἀνθρακος πρὸς μονοξείδιον :



Σχ. 43. Παρασκευὴ μονοξείδιου τοῦ ἀνθρακος.

Ούτως έξέρχεται ἐκ τῆς συσκευῆς μῆγμα μονοξειδίου τοῦ ἀνθρακος (25 %) καὶ τοῦ ἀζώτου τοῦ ἀέρος (70 %), ἐμπεριέχον καὶ μικρὰν ποσότητα διοξειδίου τοῦ ἀνθρακος (5 %). Τὸ μῆγμα τοῦτο, τὸ ἀνθρακέριον, ἔχει μικρὰν θερμαντικὴν δύναμιν καὶ διὰ τοῦτο λέγεται καὶ πτωχὸν ἀέριον.

Τὸ ὑδραέριον, ἀποτελεῖται κυρίως ἐκ μίγματος μονοξειδίου τοῦ ἀνθρακος καὶ ὑδρογόνου, εἰς ἵσους ὅγκους, λαμβάνεται δὲ διὰ διοχετεύσεως ὑδρατμῶν διὰ μέσου διαπύρων ἀνθράκων :



Ἡ θερμαντική του δύναμις εἶναι πολὺ μεγαλυτέρα τῆς του ἀνθρακερίου, λόγῳ τῆς παρουσίας τοῦ ὑδρογόνου.

Τὸ μικρὸν ἀέριον λαμβάνεται διὰ ταυτοχρόνου διαβιβάσεως ἀέρος καὶ ὑδρατμῶν διὰ μέσου διαπύρων ἀνθράκων (κάκ), ἀποτελεῖται δὲ συνήθως ἐκ μονοξειδίου τοῦ ἀνθρακος (30 %), ὑδρογόνου (15 %), ἀζώτου (50 %) καὶ διοξειδίου τοῦ ἀνθρακος (5 %).

ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΟΣ CO

Προέλευσις. — Τὸ διοξείδιον τοῦ ἀνθρακος ἐλεύθερον ἀπαντᾶ εἰς τὸν ἀτμοσφαιρικὸν ἀέρα, εἰς ἀναλογίαν 0,03% κατ' ὅγκον, προέρχεται δὲ ἀπὸ τὴν ἀναπνοὴν τῶν ζώων καὶ τῶν φυτῶν, τὰς καύσεις, τὰς ζυμώσεις, τὰς σήψεις, κ.λ.π. Ἐκλύεται ἐπίσης ἀπὸ ρωγμάτων τοῦ ἐδάφους ἡρακιστειογενῶν μερῶν καὶ εἶναι διαλελυμένον ἐντὸς τῶν φυσικῶν ὑδάτων. Ἕνωμένον σχηματίζει τὰ ἀνθρακικὰ ὄρυκτά, ἐκ τῶν ὁποίων σπουδαιότερα εἶναι τὸ ἀνθρακικὸν ἀσβέστιον CaCO_3 , τὸ ἀνθρακικὸν μαγνήσιον MgCO_3 , ὁ ἀνθρακικὸς σίδηρος FeCO_3 , κ.ἄ.

Παρασκευή. — "Αφθονον παράγεται τὸ διοξείδιον τοῦ ἀνθρακος κατὰ τὴν τελείαν καῦσιν τοῦ ἀνθρακος εἰς περίσσειαν δξυγόνου ἢ ἀέρος : $\text{C} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2$.

Ἐπίσης κατὰ τὴν διαπύρωσιν ἀνθρακικοῦ τινος ἀλατος :



Κατὰ τοὺς δύο τούτους τρόπους μάλιστα παρασκευάζεται τοῦτο βιομηχανικῶς.

— Εἰς τὰ ἐργαστήρια παρασκευάζεται δι' ἐπιδράσεως ἀραιοῦ ὑδρογλωρικοῦ δξέος ἐπὶ τεμαχίων μαρμάρου (CaCO_3), ἐντὸς διλαίμου φιάλης, ἐν ψυχρῷ (Σγ. 44) :




Τὸ ἀρθρόνως ἐκλυόμενον τότε ἀέριον διοξείδιον τοῦ ἄνθρακος συλλέγεται ὑπὸ τὸ ὕδωρ ἢ δὶ' ἔκτοπίσεως τοῦ ἀέρος.

Φυσικαὶ Ιδιότητες. — Τὸ διοξείδιον τοῦ ἄνθρακος εἶναι ἀέριον ἄχρουν, ἀσμούν, γεύσεως ἐλαφρῶς ὁξίνου. "Εχει πυκνότητα 1,57, εἶναι ἐπομένως 1 ½ φορὰν περίπου βαρύτερον τοῦ ἀέρος. Διαιλύεται σημαντικῶς εἰς τὸ ὕδωρ, εἰς τὸ ὅποιον προσδίδει γεῦσιν ἀναψυκτικήν, διὸ καὶ γρησιμοποιεῖται εἰς τὴν βιομηχανίαν τῶν ἀφρωδῶν ποτῶν. "Τὸ διοξείδιον τοῦ ἄνθρακος ὑπὸ πίεσιν, ἐντὸς φιλῶν μὲ παχέα τοιχώματα, λέγεται ὕδωρ τοῦ Seltz. 'Ως ἔχον κρίσιμον θερμοκρασίαν 31,5°, ὑγροποιεῖται εἰς τὴν συνθηθῆ θερμοκρασίαν διὰ πιέσεως καὶ φέρεται εἰς τὸ ἐμπόριον ἐντὸς χαλυβδίνων φιαλῶν. 'Εὰν ἀνοίξωμεν τὴν στρόφιγγα μιᾶς τοιαύτης φιάλης καὶ ἀφήσωμεν νὰ ἔξατμισθῇ ἀποτόμως τὸ ὑγρὸν διοξείδιον τοῦ ἄνθρακος, παράγεται τότε τόσον ἐντονον ψῦχος, ὥστε μέρος αὐτοῦ στερεοποιεῖται, ὑπὸ μορφὴν χιόνος, Τὸ στερεὸν διοξείδιον τοῦ ἄνθρακος, ἔχον θερμοκρασίαν —80°, χρησιμοποιεῖται πρὸς διατήρησιν τροφίμων καὶ λέγεται ξηρὸς πάγος, διότι ἔξαροῦται χωρὶς προηγουμένως νὰ ὑγροποιηθῇ (ἔξαχνοῦται).

Χημικαὶ Ιδιότητες. — Τὸ διοξείδιον τοῦ ἄνθρακος εἶναι σταθερώτατη ἔνωσις, δυσκόλως διασπωμένη. Δὲν εἶναι καύσιμον, οὔτε συντηρεῖ τὴν καῦσιν, διὰ τοῦτο πυρεῖον ἀνημμένον εἰσαγόμενον ἐντὸς αὐτοῦ σβέννυται, χρησιμοποιεῖται δὲ διὰ τὸν λόγον αὐτὸν πρὸς κατάσβεσιν τῶν πυρκαϊῶν. Δὲν συντηρεῖ ἐπίσης τὴν ἀναπνοήν, εἶναι ἐπομένως ἀέριον ἀσφυκτικόν, ὅχι ὅμως καὶ δηλητηριῶδες.

Ανίχνευσις. — Τὸ διοξείδιον τοῦ ἄνθρακος ἀναγνωρίζεται ἀπὸ τὴν ιδιότητα ποὺ ἔχει νὰ σβύνῃ τὴν φλόγα καὶ ἰδίως νὰ θολώνῃ τὸ διαυγὲς ἀσβέστιον ὕδωρ τὸ ὅποιον εἶναι διάλυμα ὑδροξείδιον τοῦ ἀσβέστιου Ca(OH)_2 . Τοῦτο συμβαίνει διότι σχηματίζεται ἀδιάλυτον ἄνθρακικὸν ἀσβέστιον :



Σχ. 44. Παρασκευὴ τοῦ διοξείδιον τοῦ ἄνθρακος εἰς τὰ ἐργαστήρια.


Σημασία τοῦ διοξείδιου τοῦ ἀνθρακος τῆς ἀτμοσφαιρίας. — Ή περιεκτικότης τοῦ ἀτμοσφαιρικοῦ ἀέρος εἰς διοξείδιον τοῦ ἀνθρακος μέ ει σταθερά, κυρίως διότι χρησιμεύει ὡς τροφὴ τῶν φυτῶν. Πράγματι καὶ τὴν διάρκειαν τῆς ἡμέρας, τὰ ἐνέχοντα χλωροφύλλην πράσινα φύλλα τῶν φυτῶν, διὰ τῆς ἐπιδράσεως τοῦ ἥλιου φωτός, ἀποσυνθέτουν τὸ διοξείδιον τοῦ ἀνθρακος, εἰς ἄνθρακα, τὸν δποῖον κρατοῦν καὶ εἰς δέσμον, τὸ δποῖον ἀφίνουν ἐλεύθερον (ἀφομοίωσις τῶν φυτῶν). Ἐκ τοῦ ἀνθρακος τούτου συντίθενται αἱ διάφοροι ἀνθρακούχοι οὐσίαι τῶν φυτῶν, αἱ δποῖαι χρησιμεύουν, ὅχι μόνον πρὸς ἀνάπτυξιν αὐτῶν, ἀλλὰ καὶ ὡς τροφὴ τῶν ζώων. Μέρος ἐπίσης τοῦ διοξείδιου τοῦ ἀνθρακος τοῦ ἀέρος, διαλύεται ὑπὸ τοῦ ὕδατος τῆς βροχῆς, τῶν ποταμῶν, τῶν θαλασσῶν. Τὰ φυτὰ ἀφ' ἑτέρου καὶ τὰ ζῶα διὰ τῆς ἀναπνοῆς των, κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ζωῆς των, καὶ διὰ τῆς ἀποσυνθέσεως των, μετὰ τὸν θάνατόν των, ἀποδίδουν πάλιν διοξείδιον τοῦ ἀνθρακος εἰς τὴν ἀτμόσφαιραν.

Συμπληροῦται κατ' αὐτὸν τὸν τρόπον ὁ κύκλος τῆς κυκλοφορίας τοῦ ἀνθρακος εἰς τὴν φύσιν.

Χρήσεις. — Τὸ διοξείδιον τοῦ ἀνθρακος χρησιμοποιεῖται πρὸς παρασκευὴν τῶν ἀνθρακικῶν ἀλάτων, ιδίως τοῦ ἀνθρακικοῦ νατρίου (σόδας), καθὼς καὶ τῶν ἀφρωδῶν ποτῶν. Ἐπίσης χρησιμοποιεῖται πρὸς πλήρωσιν τῶν πυροσβεστήρων. Τέλος χρησιμεύει πρὸς παραγωγὴν τεχνητοῦ ψύχους, εἴτε ὡς ὑγρόν, εἴτε ὡς στερεόν, ὑπὸ τὸ διοξείδιον.

ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΝ ΟΞΥ Η₂CO₃

Τὸ διοξείδιον τοῦ ἀνθρακος, διαλυόμενον εἰς τὸ ὕδωρ, ἀντιδρᾷ μετ' αὐτοῦ, σχηματίζον τὸ ἀνθρακικὸν δέξι, τοῦ δποίου εἶναι ὁ ἀνυδρίτης, διὸ καὶ λέγεται συνήθως, κακῶς, ἀνθρακικὸν δέξι :




Τὸ ἀνθρακικὸν δέξι εἶναι ἀσθενέστατον δέξι, μόλις ἔρυθραινον τὸ κυανοῦν βάρμα τοῦ ἥλιοτροπίου. Εἶναι δὲ καὶ λίαν ἀσταθές, διασπώμενον ἐκ νέου εἰς διοξείδιον τοῦ ἀνθρακος καὶ ὕδωρ :



Διὰ τοῦτο εἶναι γνωστὸν μόνον εἰς ἀραιὰ διαλύματα, παρέχον, ὡς διδύναμον δέξι, δύο σειρὰς ἀλάτων, δέξια καὶ οὐδέτερα.

Τὰ δὲ νθρακικά καὶ διλατά παρασκευάζονται διὰ διοχετεύσεως
χερίου διοξειδίου τοῦ ἄνθρακος εἰς διαλύματα βάσεων :



ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

26) Πόσος βάρος διοξειδίου τοῦ ἄνθρακος παράγεται, ὅταν τὸ
δειγμόνον τὸ περιεχόμενον εἰς ἐν κυβικὸν μέτρον ἀριθμῷ μετ' ἄν-
θρακος ;

27) Κατεργαζόμεθα 0,8 γραμ. ἀσβεστολίθου μὲ περίσσειαν ὑδρο-
χλωδικοῦ δξέος καὶ λαμβάνομεν 80 κ. ἔ. διοξειδίου τοῦ ἄνθρακος. Νὰ
εὑρεθῇ : α) Τὸ βάρος τοῦ ἄνθρακικοῦ ἀσβεστίου, τοῦ περιεχομένου
εἰς τὸ ποσόν τοῦτο τοῦ ἀσβεστολίθου. β) Ἡ ἕκατοστιαία περιεκτικό-
της εἰς ἄνθρακικὸν ἀσβέστιον τοῦ ἀσβεστολίθου τούτου.

28) Θέλουμεν νὰ καίσωμεν τελείως 10 λίτρα μονοξειδίου τοῦ ἄν-
θρακος. Νὰ εὑρεθῇ : α) Πόσος δγκος δειγμόνον χρειάζεται. β) Πό-
σος εἶναι δ δγκος τοῦ παραγομένου διοξειδίου τοῦ ἄνθρακος. γ) Πό-
σον εἶναι τὸ βάρος τοῦ ιζήματος, τὸ δποῖον σχηματίζεται κατὰ τὴν
ἀπορρόφησιν τοῦ διοξειδίου τοῦ ἄνθρακος τούτου ὑπὸ ἀσβεστίου
ὅδατος.

29) Διαβιβάζομεν διὰ μέσον διαπύρων ἄνθρακων ὑδρατμούς,
προερχομένους ἐκ τοῦ βρασμοῦ 1,8 γραμ. ὕδατος. Νὰ ὑπολογισθῇ :
α) Ὁ δγκος τῶν ἀερίων τῶν παραγομένων κατὰ τὴν ἀντίδρασιν ταύ-
την. β) Ὁ δγκος τοῦ ἀπαιτούμενου ἀριθμού πρὸς τελείαν καῦσιν τῶν
ἀερίων τούτων. γ) Ἡ ἐλάττωσις τοῦ βάρους τοῦ χοησιμοποιηθέντος
ἄνθρακος.

ΠΥΡΙΤΙΟΝ

Σύμβολον Si

Ατομικὸν βάρος 28,06

Σθένος IV

Προέλευσις. — Τὸ πυρίτιον εἶναι, μετὰ τὸ δειγμόνον, τὸ μᾶλλον δια-
δεδομένον στοιχεῖον ἐπὶ τῆς γῆς, ἀποτελοῦν τὰ 27 % τοῦ στερεοῦ φλοιοῦ
αὐτῆς. Δὲν ἀπαντᾷ ἐλεύθερον εἰς τὴν φύσιν, ἀλλὰ πάντοτε ἡνωμένον,
κυρίως ὑπὸ τὴν μορφὴν τοῦ διοξειδίου τοῦ πυριτίου καὶ τῶν ἐξ αὐτοῦ
προερχομένων πολυσυνθέτων πυριτικῶν ἀλάτων, ἀποτελούντων συστα-

τικὸν λίαν ἔκτεταμένων πετρωμάτων. Σπουδαιότερα τῶν πετρωμάτων τούτων εἰναι ὁ γρανίτης, ὁ γνεύσιος, ὁ μαρμαρυγίας ὁ σχιστόλιθος, κ.ἄ.

Παρασκευή. — Παρασκευάζεται εἰς μικρὰ μὲν ποσὰ δι' ἀναγωγῆς τοῦ διοξειδίου τοῦ πυριτίου ὑπὸ μαγνησίου, εἰς ὑψηλὴν θερμοκρασίαν :



Βιομηχανικῶς δὲ εἰς μεγαλύτερα ποσά, διὰ θερμάνσεως διοξειδίου τοῦ πυριτίου (ἄμμου), μετὰ περισσείας κώκ., ἐντὸς ἡλεκτρικῆς καμίνου :



Φυσικαὶ ἰδιότητες. — Τὸ πυρίτιον ἐμφανίζεται ὑπὸ δύο ἀλλοτροπικὰς μορφάς, ὡς ἄμορφον καὶ ὡς κτρυσταλλικόν. Τὸ ἄμορφον εἰναι κόνις καστανόχρους, ἀποβάφουσα ὅπως ὁ ἄνθραξ, E.B. 2,35. Τὸ κρυσταλλικὸν εἰναι μολυβδόχρους, μεταλλικῆς λάμψεως, E.B. 2,42 καὶ τόσον σκληρόν, ὥστε χαράσσει τὴν ὑαλον.

Χημικαὶ ἰδιότητες. — Εἰναι ἀδρανὲς στοιχεῖον, μόνον εἰς ὑψηλὴν θερμοκρασίαν καιόμενον ἀτελῶς, πρὸς διοξειδίου τοῦ πυριτίου. Προσβάλλεται ἐν τούτοις ὑπὸ τοῦ φθορίου, μετατρεπόμενον εἰς τετραφθοριούχον πυρίτιον SiF_4 . Εἰς τὴν θερμοκρασίαν τῆς ἡλεκτρικῆς καμίνου ἐνοῦται μετὰ τοῦ ἄνθρακος, πρὸς ἀνθρακικὸν CSi , τὸ δόποιον εἰναι σῶμα σκληρότατον.

Χρήσεις. — Χρησιμοποιεῖται εἰς τὴν παρασκευὴν διαφόρων μεταλλοκραμάτων, ίδιως τοῦ σιδήρου, τὰ δόποια εἰναι ἀπρόσβλητα ὑπὸ τῶν δξέων. Τὸ ἐξ αὐτοῦ παρασκευαζόμενον ἄνθρακοπυρίτιον (*carborundum*) χρησιμεύει ὡς λειαντικὸν μέσον, λόγῳ τῆς σκληρότητός του. Τελευταίως παρεσκευάσθησαν ἐνώσεις τοῦ πυρίτου μετὰ ὀργανικῶν ριζῶν, λεγόμεναι σιλικόναι καὶ εύρισκουσαι πολλὰς ἐφαρμογάς.

ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΝ ΤΟΥ ΠΥΡΙΤΙΟΥ SiO_2

Προέλευσις. — Τὸ διοξείδιον τοῦ πυριτίου ἀπαντᾶται, εἴτε ὡς κρυσταλλικόν, εἴτε ὡς ἄμορφον. Ὡς κρυσταλλικός εἰναι λευκός. Κυριώτεραι δὲ ποικιλίαι του εἰναι ἡ ὁρεία κρύσταλλος, ἄχρους καὶ διαφανῆς καὶ ὁ ἀμέθυστος, ἔχων χρῶμα λιῶδες. Ὡς ἄμορφον τὸ διοξείδιον τοῦ πυριτίου ἀποτελεῖ τὸν λασπιν, τὸν ἀχάτην, τὸν ὄπαλιον καὶ ὅλας παραλλαγάς, διλγώτερον καθαράς. Ἡ

άμμος ἀποτελεῖται ἀπὸ ἀκάθιτρον χαλαζίαν, εἰς μικρὰ ἀκανόνιστα τεμάχια. Ἐνυπάρχει ἐπίσης εἰς τινα δργανα φυτῶν ἡ ζώων, π.χ. τοὺς στάχεις καὶ τὸν κάλαμον τῶν δημητριακῶν, τὰς τρίχας, τὰ πτερά, τοὺς ὄνυχας. Ἔξ ἀμόρφου διοξειδίου τοῦ πυριτίου ἀποτελεῖται καὶ ἡ λεγομένη γῆ τῶν διατόμων, ἡ ὁποία συνίσταται ἀπὸ τὰ κελύφη μικροσκοπικῶν ἐγχυματικῶν ζώων τῆς θαλάσσης.

Φυσικαὶ ίδιότητες. — Τὸ διοξειδίον τοῦ πυριτίου εἶναι πολὺ σκληρόν, γχράσσον τὴν υάλον. Εἶναι ἀδιάλυτον εἰς τὰ συνήθη διαλυτικὰ ὑγρά, ἔχει E.B. 2,6 καὶ τίκτεται εἰς πολὺ ὑψηλὴν θερμοκρασίαν (1800°), μεταβαλλόμενον εἰς ὑγρὸν ἴξωδες.

Χημικαὶ ίδιότητες. — Δὲν προσβάλλεται ὑπὸ τῶν δέξεων, εἰμὴ μόνον ὑπὸ τοῦ ὑδροφθορικοῦ δέξεος, μετατρεπόμενον εἰς τετραφθοριούχον πυρίτιον :



Εἶναι ὁ ἀνυδρίτης τοῦ μὴ ἀπομονωθέντος πυριτικοῦ δέξεος H_2SiO_3 καὶ διὰ τοῦτο λέγεται πολλάκις, κακῶς, πυριτικὸν δέξι. Ὡς ἀνυδρίτης σχηματίζει εἰς ὑψηλὴν θερμοκρασίαν μετὰ τῶν βάσεων πυριτικὰ ἀλάτων. Οὕτω συντηκόμενον μετὰ στερεοῦ καυστικοῦ νάτρου σχηματίζει πυριτικὸν νάτριον :



Χρήσεις. — Αἱ διάφοροι ποικιλίαι τοῦ πυριτίου εὑρίσκουν πολυαρίθμους ἐφαρμογάς. Οὕτω χρησιμοποιοῦνται : ἡ ὀρεία κρύσταλλος πρὸς κατασκευὴν διπτικῶν δργάνων, καθόσον ἐμφανίζει τὸ φαινόμενον τῆς διπλῆς διαθλάσσεως· ὁ ἀμέθυστος, ὁ ὀπάλιος καὶ ἄλλαι ἐγχρωμοὶ ποικιλίαι, ὡς πολύτιμοι λίθοι· ἡ ἄμμος, εἰς τὴν υάλουργίαν, τὴν κεραμευτικὴν, καὶ τὴν οἰκοδομικὴν· ὁ τετρηγμένος χαλαζίας διὰ τὴν κατασκευὴν σκευῶν, καὶ τὰ ὁποῖα ἀντέχουν εἰς ἀποτόμους μεταβολὰς τῆς θερμοκρασίας, καὶ εἶναι ἀπρόσβλητα ὑπὸ τῶν δέξεων.

Υ Α Λ Ο Σ

Σύστασις — Ἡ υάλος εἶναι μῆγμα διαφόρων πυριτικῶν ἀλάτων, ἰδίως τοῦ ἀσβεστίου καὶ τοῦ νατρίου ἡ καλίου. Παρασκευάζεται δὲ διὰ συντήξεως, ἐντὸς εἰδικῶν καρμίνων, καθαρᾶς χαλαζιακῆς ἄμμου, ἀνθρακικοῦ νατρίου ἡ καλίου καὶ ἀνθρακικοῦ ἀσβεστίου.

Ιδιότητες. — Εἶναι σῶμα στερεόν, ἀμορφόν, διαφανές, σκληρὸν καὶ

ενθραυστον. Ἔχει μίαν ίδιαιτέραν λάμψιν, ή ὅποια λέγεται ύαλωδης. Εἶναι κακός ἀγωγὸς τῆς θερμότητος καὶ τοῦ ἡλεκτρισμοῦ, ἀδιάλυτος καὶ δύστηκτος. Πρὶν τακῇ καθίσταται ἵξωδης καὶ πλαστική, διευκολύνουσα οὕτω τὴν κατεργασίαν της, εἴτε δι' ἐγχύσεως εἰς τύπους, εἴτε δι' ἔμφυσήσεως ἀέρος. Εἶναι ἀπρόσβλητος ὑπὸ τῶν συνήθων χημικῶν ἀντιδραστηρίων καὶ μόνον ὑπὸ τοῦ φθορίου καὶ τοῦ ὑδροφθορίου προσβάλλεται. Εἰς τὴν ίδιότητα αὐτὴν βασίζεται ἡ χάραξις τῆς ύαλου διὰ τῶν μέσων τούτων. Ἔχει E.B. 2,5 καὶ εἶναι ἄχρους ἢ χρωματιστή.

Εἶδη ύαλου. — Ἡ ποιότης τῆς ύαλου ἔξαρτᾶται ἐκ τοῦ εἰδους καὶ τῆς καθαρότητος τῶν ύλικῶν, ἔξ δὲ κατασκευάζεται. Διαχρίνονται συνήθως τὰ ἔξης εἶδη ύαλου: α) Ἡ ὕαλος διὰ κατρίου. Εἶναι ἡ κοινὴ ύαλος, ἡ ὅποια συνίσταται ἐκ πυριτικοῦ νατρίου καὶ πυριτικοῦ ἀσβεστίου. Χρησιμοποιεῖται δὲ πρὸς παρασκευὴν ύαλοπινάκων, φιαλῶν, ποτηρίων κ.λ.π. β) Ἡ ὕαλος διὰ καλίου ἢ βοημίκης. Συνίσταται ἐκ πυριτικοῦ καλίου καὶ πυριτικοῦ ἀσβεστίου. Εἶναι δὲ δυστηκτοτέρα, σκληροτέρα καὶ διαφανεστέρα τῆς κοινῆς ύαλου. Χρησιμεύει πρὸς κατασκευὴν κατόπτρων, εἰδῶν πολυτελείας, δυστήκτων χημικῶν σκευῶν κ.λ.π. γ) Ἡ ὕαλος διὰ μολύβδου ἢ κρύσταλλος. Ἀποτελεῖται ἐκ πυριτικοῦ καλίου καὶ πυριτικοῦ μολύβδου, παρασκευάζεται δὲ διὰ συντήξεως ἀμμου, ἀνθρακικοῦ καλίου καὶ δξειδίου τοῦ μολύβδου (μινίου). Εἶναι βαρεῖα, εὔηχος, εὔτηκτος καὶ λίαν φωτοθλαστική. Χρησιμεύει δὲ πρὸς κατασκευὴν δπτικῶν εἰδῶν καὶ διαφόρων ύαλινων σκευῶν πολυτελείας.

Ἡ ύαλος χρωματίζεται διὰ τῆς προσμίξεως εἰς τὴν τετηγμένην μᾶξαν τῆς διαφόρων μεταλλικῶν δξειδίων, ἀναλόγως τοῦ ἐπιδιωκομένου χρωματισμοῦ. Οὕτω τὸ δξειδίον τοῦ χρωμάτου προσδίδει πράσινον χρῶμα, τὸ τοῦ κοβαλτίου κυανοῦν, τὸ τοῦ σιδήρου κίτρινον κ.ο.κ.

B O R I O N

Σύμβολον B

Ατομικὸν βάρος 10,8

Σθέρνος III

Προέλευσις. — Τὸ βόριον, ἀποτελοῦν ίδίαν δμάδα τῶν ἀμετάλλων στοιχείων, ἀπαντᾷ εἰς τὴν φύσιν μόνον ὑπὸ μορφὴν ἐνώσεων, εἴτε ὡς βορικὸν δξὲ H_3BO_3 , εἴτε ὡς βόραξ $Na_2B_4O_7 \cdot 10H_2O$ κ. λ. π.

Παρασκευή — Ιδιότητες. — Παρασκευάζεται δι' ζναγωγῆς τοῦ δέξειδίου τοῦ βορίου B_2O_3 ύπο μαγνησίου :



Τὸ οὕτω λαμβανόμενον βόριον εἶναι ἄμορφον. Διὰ διαλύσεως τούτου εἰς τῆγμα ἀργιλίου ἀποβάλλεται κατὰ τὴν ψυξιν ὡς κρυσταλλικόν.

Τὸ ἄμορφον βόριον εἶναι κόνις καστανόχρους, ἐνῷ τὸ κρυσταλλικὸν εἶναι μέλαν, δύστηκτον καὶ σκληρότατον, ἔχει δὲ λάμψιν μεταλλικήν. Θερμαινόμενον τὸ ἄμορφον βόριον εἰς τὸν ἀέρα εἰς 700° καίεται διὰ πρασίνης φλογὸς πρὸς τριοξείδιον τοῦ βορίου. Προσβάλλεται ἐπίσης ύπο τοῦ νιτρικοῦ δέξεος, μετατρεπόμενον εἰς βορικὸν δέξι :



Τὸ κρυσταλλικὸν βόριον εἶναι ἀδρανέστερον τοῦ ἄμορφου.

BOPIKON OΣΥ H_3BO_3

Τὸ βορικὸν δέξι παρασκευάζεται ἐκ τοῦ βόρακος, δι' ἐπιδράσεως ὑδροχλωρικοῦ δέξεος :



Αποτελεῖ λευκούς, μαλακούς, στιλπνούς, λεπιδοειδεῖς κρυστάλλους λιπαροὺς τὴν ἀφήν, διαλυτοὺς εἰς τὸ ὕδωρ. Τὸ διάλυμα τοῦτο δεικνύει ἀσθενεστάτας δέξινος ἰδιότητας, χρησιμοποιεῖται δὲ εἰς τὴν θεραπευτικὴν ὡς ἥπιον ἀντισηηπτικὸν καὶ ἀντιφλογιστικόν. Εἰς τὸ οἰνόπνευμα διαλύεται περισσότερον, δίδει δὲ διάλυμα, τὸ δόποῖον ἀναφλεγόμενον καίεται διὰ πρασίνης φλογὸς, ἐξ ἣς συμπεραίνεται ἡ παρουσία τοῦ βορίου.

BOPAΞ $Na_2B_4O_7 \cdot 10H_2O$

Ο βόραξ, ἥτοι τὸ τετραβορικὸν νάτριον, ἀπαντᾶ ὡς δρυκτὸν ἐντὸς ἀπεξηραμένων λιμνῶν εἰς ἡφαιστειογενεῖς περιοχάς, εἰς τὸ Θιβέτ, τὰς Ἰνδίας, τὴν Καλιφορνίαν. Δι' ἀνακρυσταλλώσεως τοῦ δρυκτοῦ τούτου βόρακος λαμβάνεται ὁ καθαρὸς βόραξ, ὁ δόποῖος ἀποτελεῖ ἀχρόους κρυστάλλους, εὐδιαλύτους εἰς τὸ ὕδωρ. Εἰς ὑψηλὴν θερμοκρασίαν τήκεται εἰς διαφανῆ μᾶζαν ὑαλώδη, εύρισκων οὕτω ἐφαρμογὴν εἰς τὴν κεραμευτικὴν, διὰ τὴν κατασκευὴν ὑαλωμάτων. Χρησιμοποιεῖται ἐπίσης ὡς λευκαντικόν, ἐν μίγματι μετὰ σάπωνος, ὡς ἀντισηηπτικὸν κ. λ. π.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

Μ Ε Τ Α Λ Λ Α

ΓΕΝΙΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Διάκρισις μετάλλων καὶ ἀμετάλλων. — Τὰ μέταλλα εἶναι σώματα στερεά, πλὴν τοῦ ὑδραργύρου, δὲ ὅποῖς εἰς τὴν συνήθη θερμοκρασίαν εἶναι ὑγρός. Διακρίνονται δὲ τῶν ἀμετάλλων ἀπὸ τὴν χαρακτηριστικὴν λάμψιν, τὴν ὅποιαν ἀποκτοῦν στιλβούμενα καὶ ἡ ὅποια λέγεται μεταλλική. Προσέτι εἶναι καλοὶ ἀγωγοὶ τῆς θερμότητος καὶ τοῦ ἡλεκτρισμοῦ, ἀνθεκτικά, ἐλατὰ καὶ δλκιμα. Κυρίως διακρίνονται τῶν ἀμετάλλων, ἀπὸ χημικῆς ἀπόψεως. Διότι τὰ μὲν μέταλλα, ἔνούμενα μετὰ τοῦ δξυγόνου, σχηματίζουν τούλαχιστον ἐν δξείδιον βασικόν, ἐνῷ τὰ ἀμέταλλα σχηματίζουν γενικῶς δξείδια δξεογόνα. Ἐπὶ πλέον τὰ μέταλλα κατὰ τὰς ἡλεκτρολύσεις τῶν ἀλάτων καὶ τῶν βάσεων, ἀποβάλλονται πάντοτε εἰς τὴν κάθιδον, ὡς ἡλεκτροθετικὰ στοιχεῖα, ἐνῷ τὰ ἀμέταλλα ἀποβάλλονται εἰς τὴν ἄνοδον, ὡς ἡλεκτραρνητικά, ἔξαιρέσει τοῦ ὑδρογόνου. Τέλος τὰ μόρια τῶν μετάλλων, εἰς κατάστασιν ἀτμοῦ, ἀποτελοῦνται ἔξι ἐνὸς μόνον ἀτόμου.

Φυσικαὶ ίδιότητες. — Τὰ περισσότερα τῶν μετάλλων ἔχουν χρῶμα ἀργυρόλευκον ἢ τεφρόν, πλὴν τοῦ χαλκοῦ, δὲ ὅποῖς εἶναι ἐρυθρὸς καὶ τοῦ χρυσοῦ, δὲ ὅποῖς εἶναι κίτρινος. Εἶναι βαρύτερα τοῦ ὑδατος, πλὴν ἐλαχίστων. Καὶ δσα μὲν ἔχουν εἰδικὸν βάρος μικρότερον τοῦ 5 λέγονται ἐλατάρα, δσα δὲ ἔχουν μεγαλύτερον τοῦ 5 λέγονται βαρέα. Τήκονται εἰς λίαν διαφορετικὰς θερμοκρασίας. Οὔτως δέ μόλυβδος τήκεται εἰς 330°, δίδηρος εἰς 1.500°, δὲ λευκόχρυσος εἰς 1.750° κ.λ.π.

Μηχανικαὶ ίδιότητες. — Πολύτιμοι διὰ τὰς τέχνας εἶναι αἱ μηχανικαὶ ίδιότητες τῶν μετάλλων, ἥτοι τὸ ἐλατόν, τὸ δλκιμον, ἡ ἀνθεκτικότης, ὄφειλόμενα εἰς τὴν μεγάλην συνοχὴν τῶν μορίων των.

Ἐλατὸν λέγεται ἡ ίδιότης τῶν μετάλλων νὰ μεταβάλλονται εἰς ἐλάσματα, εἴτε διὰ σφυρηλασίας, εἴτε διὰ τοῦ ἐλάστρου. Τοῦτο ἀποτελεῖται ἐκ δύο κυλίνδρων ἐκ χάλυβος, ἀντιθέτως περιστρεφομένων, μεταξὺ τῶν ὅποιων ἔξαναγκάζεται νὰ διέλθῃ τὸ μέταλλον.

"Ο λοιμον δὲ καλεῖται ἡ ιδιότης τῶν μετάλλων νὰ μεταβάλλωνται εἰς σύρματα, δι' ἔλξεως διὰ μέσου τῶν ὅπῶν πλακός ἐκ χάλυβος, ἡ δόποια λέγεται συρματοσύρτης.

Τὸ μᾶλλον ἐλατὸν καὶ ὅλκιμον μέταλλον εἶναι ὁ χρυσός, ἔπειτα δὲ ἔρχονται κατὰ σειρὰν ὁ ἀργυρος, ὁ λευκόχρυσος, τὸ ἀργίλιον, ὁ σίδηρος, ὁ χαλκός κ. ἄ.

Χημικαὶ ιδιότητες. — 'Απὸ χημικῆς ἀπόψεως ιδιαιτέρων σημασίαν διὰ τὰ μέταλλα ἔχει ἡ ἐπ' αὐτῶν ἐπίδρασις τοῦ δξυγόνου τοῦ ἀέρος. Καὶ ἀλλὰ μὲν μέταλλα δξειδοῦνται εὔκόλως εἰς τὸν ἀέρα, ὡς ὁ σίδηρος, ἐνῷ μερικὰ ἔξ αὐτῶν μένουν ἀνοξείδωτα καὶ διατηροῦν τὴν μεταλλικήν των λάμψιν, ὡς ὁ χρυσός, ὁ λευκόχρυσος, ὁ ἀργυρος, τὰ δόποια ἐκλήθησαν διὰ τὸν λόγον αὐτὸν εὑργενῆ μέταλλα.

ΚΡΑΜΑΤΑ

Κράματα λέγονται τὰ μίγματα διαφόρων μετάλλων, τὰ δόποια λαμβάνονται διὰ συντήξεως τῶν συστατικῶν των, ὑπὸ διαφόρους ἀναλογίας, ἐντὸς χωνευτήριων. Πολλάκις τὰ κράματα ἐμπεριέχουν καὶ ἀμέταλλόν τι στοιχεῖον, ἀλλὰ εἰς πολὺ μικράν ποσότητα, π. χ. συνθρακα, πυρίτιον κ. ἄ. "Οταν ἐν τῶν συστατικῶν τοῦ κράματος εἶναι ὁ ὑδράργυρος, τότε λέγεται τοῦτο ἀμάλγαμα.

Τὰ κράματα εἶναι πολυτιμότατα διὰ τὰς τέχνας, διότι δύνανται νὰ θεωρηθοῦν ὡς νέα μέταλλα, ἔχοντα ιδιότητας τὰς δόποιας δὲν ἔχουν τὰ μέταλλα, ἔξ ὧν ἀποτελοῦνται. Συνήθως εἶναι σκληρότερα, ἀνθεκτικώτερα καὶ εὐτηκτότερα τῶν συστατικῶν των. Χημικῶς δὲ ὀλιγώτερον εὐπρόσβλητα ὑπὸ τοῦ δξυγόνου τοῦ ἀέρος καὶ τῶν δξέων.

ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ


Μεταλλεύματα. — 'Ολίγα μέταλλα ἀπαντῶσιν εἰς τὴν φύσιν εἰς καθαρὰν κατάστασιν, ὡς ὁ χρυσός, ὁ λευκόχρυσος κ. ἄ. Συνήθως εἶναι χημικῶς ἡνωμένα μετ' ἄλλων στοιχείων, ὑπὸ μορφὴν ὀρυκτῶν, τὰ δόποια λέγονται μεταλλεύματα καλοῦνται. Εἰδικώτερον μεταλλεύματα καλοῦνται ἐκεῖνα τὰ ὀρυκτά, τὰ δόποια ἐμπεριέχουν χρήσιμόν τι μέταλλον εἰς ίκανήν ποσότητα, ὥστε νὰ συμφέρῃ οίκονομικῶς ἡ ἔξαγωγή του. Τὰ κυριώ-

τερα μεταλλεύματα είναι ή δξείδια, ή θειούχοι ένώσεις, ή άνθρακικά δόλατα τῶν μετάλλων.


Μεταλλουργία. — Τὸ σύνολον τῶν μηχανικῶν καὶ χημικῶν διεργασιῶν, δἰ' ᾧ ἔξαγονται τὰ μέταλλα ἐκ τῶν μεταλλευμάτων των, λέγεται μεταλλουργία. Τὰ μεταλλεύματα είναι σχεδὸν πάντοτε ἀναμεμιγμένα μετὰ γαιωδῶν οὐσιῶν, ἀπὸ τὰς ὁποίας ἀπαλλάσσονται διὰ κονιοποίησεως καὶ πλύσεως, δἰ' ἀφθόνου ρέοντος ὕδατος, παρασύροντος αὐτάς, ὡς εἰδικῶς ἐλαφροτέρας. Κατόπιν ἐπακολουθεῖ ἡ χημική των κατεργασία. Καὶ ἐκνῦν μὲν τὸ μεταλλεύμα είναι δξείδιον, ὑποβάλλεται εἰς τὴν ἐπίδρασιν ἀναγωγικοῦ τινος μέσου, τὸ ὄποιον ἀποσπᾷ τὸ δξυγόνον του καὶ ἐλευθερώνει τὸ μέταλλον. Τὸ σύνηθες ἀναγωγικὸν σῶμα τῆς μεταλλουργίας είναι ὁ ἄνθραξ (κάκω), μετὰ τοῦ ὄποιού συνθερμαίνεται τὸ δξείδιον, ἐντὸς καταλλήλου καμίνου. Οὕτως ἐκ τοῦ δξείδιου τοῦ σιδήρου Fe_2O_3 , λαμβάνεται ὁ σιδηρος, κατὰ τὴν ἀντίδρασιν :



'Ἐὰν τὸ μεταλλεύμα είναι ἀνθρακικόν τι ἀλας τοῦ μετάλλου, ὑποβάλλεται πρῶτον εἰς ἴσχυρὰν πύρωσιν, ὅπότε μεταβάλλεται εἰς δξείδιον, τὸ ὄποιον ἔπειτα ἀνάγεται δἰ' ἄνθρακος, ὡς ἀνωτέρῳ : π. χ.



'Εὰν τέλος τὸ μεταλλεύμα είναι θειούχος ἔνωσις τοῦ μετάλλου, ὑποβάλλεται τοῦτο εἰς φρύξιν, ἥτοι θερμαίνεται ἴσχυρῶς ἐντὸς ἀνοικτῆς καμίνου, ὅπότε ὑπὸ τὴν ἐπίδρασιν τοῦ δξυγόνου τοῦ ἀέρος, τὸ μέταλλον μεταβάλλεται καὶ πάλιν εἰς δξείδιον, ἀναγόμενον ὡς ἀνωτέρῳ :



'Υπάρχουν περιπτώσεις κατὰ τὰς ὁποίας τὸ μέταλλον ἔξαγεται ἐκ τοῦ μεταλλεύματός του ἡλεκτρολυτικῶς.

Ο ΜΑΣ ΤΩΝ ΑΛΚΑΛΙΩΝ

Εἰς τὴν ὁμάδα τῶν ἀλκαλίων περιλαμβάνονται τὰ μονοσθενῆ μεταλλα λίθιον, νάτριον, κάλιον, ρουβίδιον, καίσιον. 'Εκ τούτων σπουδαιότερα είναι τὸ νάτριον καὶ τὸ κάλιον.

N A T R I O N

*Σύμβολον Na*** Ατομικόν βάρους 22,997**Σθένος I*

Προέλευσις. — Τὸ νάτριον εἶναι λίαν διαδεδομένον εἰς τὴν φύσιν, ὅχι ὅμως ἐλεύθερον, ἀλλὰ πάντοτε ἡνωμένον, κυρίως ὡς χλωριοῦχον νάτριον NaCl , τὸ ὄποῖον εὑρίσκεται, εἴτε διαλελυμένον ἐντὸς τοῦ θαλασσίου ὄδατος, εἴτε ὡς ὀρυκτόν. Ἀλλα ὀρυκτὰ τοῦ νατρίου εἶναι τὸ νίτρον τῆς Χιλῆς NaNO_3 , ὁ βόραξ $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ κ.ἄ.

Παρασκευὴ — Ἰδιότητες. — Βιομηχανικῶς τὸ νάτριον παρασκευάζεται δι’ ἡλεκτρολύσεως τοῦ τετηκότος χλωριοῦχου νατρίου (Σχ. 45):



Εἶναι μέταλλον μὲν ἀργυρό-λευκον μεταλλικὴν λάμψιν, εἰς πρόσφατον τομήν. Εἶναι ἐλαφρότερον τοῦ ὄδατος (Ε.Β. 0,97), τήκεται δὲ εἰς 97,5°. Ἐχον μεγάλην χημικὴν συγγένειαν πρὸς τὸ δέξιγόνον, δέξειδοῦται ταχέως εἰς τὸν ἀέρα θερμαινόμενον δὲ καιεται μὲν ὀντίαν κιτρίνην φλόγα, χαρακτηριστικὴν τοῦ νατρίου. Ἀντιδρᾷ ζωηρῶς μετὰ τοῦ ὄδατος, τὸ ὄποῖον ἀποσυνθέτει, ὑπὸ παραγωγὴν ὑδροξειδίου τοῦ νατρίου καὶ ὑδρογόνου:




Ἐνοῦται ἐπίσης ζωηρῶς μετὰ τοῦ φθορίου καὶ τοῦ χλωρίου.

Ἐφαρμογαί. — Τὸ μεταλλικὸν νάτριον, φυλασσόμενον ἐντὸς πετρελαίου, χρησιμοποιεῖται εἰς τὰ χημικὰ ἔργαστήρια ὡς ἰσχυρότατον ἀναγωγικὸν μέσον. Ἐπίσης χρησιμοποιεῖται πρὸς παρασκευὴν τοῦ ὑπεροξειδίου τοῦ νατρίου, τοῦ κυανιούχου νατρίου καὶ ὡς ἀμάλγαμα, μεθ’ ὑδροχρυσού.

ΕΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ

Ὑπεροξείδιον τοῦ νατρίου. — Na_2O_2 . — Τὸ ὑπεροξείδιον τοῦ νατρίου παρασκευάζεται διὰ καύσεως τοῦ νατρίου εἰς ἀτμόσφαιραν δέξιαν



Σχ. 45. Βιομηχανικὴ παρασκευὴ τοῦ νατρίου δι’ ἡλεκτρολύσεως τοῦ τετηκότος χλωριοῦχου νατρίου.

γόνου :



Αποτελεῖ κόνιν κιτρίνην, λίαν ύγροσκοπικήν. Δι' έπιστάξεως θύματος ἐπ' αὐτοῦ διασπᾶται, ἀποδίδον καθαρὸν δέιγμόν τοῦ :



Ἡ ἀντίδρασις αὕτη χρησιμοποιεῖται διὰ πρόχειρον παρασκευὴν δέιγμάτων, ἐπίσης πρὸς καθαρισμὸν τοῦ ἀέρος κλειστῶν χώρων (ὑποβρύχια, καταφύγια), διότι παρουσιάζει τὸ πλεονέκτημα ὅτι παρέχει. ἐκτὸς τοῦ δέιγμάτου καὶ ὑδροξείδιον τοῦ νατρίου, τὸ ὄποιον συγκρατεῖ τὸ ὑπὲρ τῶν ἀνθρώπων ἐκπνεόμενον διοξείδιον τοῦ ἀνθρακος :




Προσέτι χρησιμοποιεῖται ὡς δέξιειδωτικὸν καὶ ὡς λευκαντικὸν μέσον.

Υδροξείδιον τοῦ νατρίου NaOH. — Τὸ ὑδροξείδιον τοῦ νατρίου ἔχει στιχὸν νάτριον (κ. καυστικὴ σόδα), παρασκευάζεται δι' ἐπιδράσεως ὑδροξείδιον τοῦ ἀσβεστίου ἐπὶ διαλύματος ἀνθρακικοῦ νατρίου :



Βιομηχανικῶς λαμβάνεται δι' ἡλεκτρολύσεως διαλύματος χλωριούχου νατρίου. Κατὰ τὴν μέθοδον ταύτην εἰς μὲν τὴν ἄνοδον ἐκλύεται χλώριον, ἐνῷ τὸ εἰς τὴν κάθοδον ἀποβαλλόμενον μεταλλικὸν νάτριον, ἀντιδρᾷ μετὰ τοῦ θύματος τοῦ διαλύματος, ὑπὸ παραγωγὴν καυστικοῦ νάτρου καὶ ὑδρογόνου, τὸ ὄποιον ἐκλύεται. Αἱ συμβαίνουσαι ἀντιδράσεις δύνανται νὰ παρασταθῶσιν οὕτω :



Ἐπειδὴ ὅμως τὸ ἐκλύσμαν εἰς τὴν ἄνοδον χλώριον εἶναι δυνατὸν νὰ ἐπιδράσῃ ἐπὶ τοῦ καυστικοῦ νάτρου, τοῦ σχηματίζομένου εἰς τὴν κάθοδον, καὶ νὰ παραχθοῦν ἄλλαι ἐνώσεις, διὰ τοῦτο χωρίζονται τὰ δύο ἡλεκτρόδια διὰ πορώδους διαφράγματος (Σχ. 23).

Τὸ ὑδροξείδιον τοῦ νατρίου εἶναι σῶμα στερεόν, λευκόν, τηκόμενον εἰς 320° καὶ ἔχον E.B. 2,15. Εἶναι λίαν ύγροσκοπικόν, διαλύεται δὲ εἰς τὸ θερμότερα, ὑπὸ ἐκλυσιν θερμότητος. Τὸ διάλυμά του ἀποτελεῖ μίαν ἀπὸ τὰς ἴσχυροτέρας βάσεις, ἀπορροφᾷ δὲ ἀπλήστως τὸ διοξείδιον τοῦ ἀνθρακος τοῦ ἀέρος, μετατρεπόμενον σὺν τῷ χρόνῳ εἰς ἀνθρακικὸν νάτριον :



Χρησιμοποιεῖται εύρυτατα, εἰς μὲν τὰ ἔργα στήρια ὡς ἰσχυρὰ βάσις, εἰς δὲ τὴν βιομηχανίαν πρὸς παρασκευὴν τοῦ σάπωνος, καθηρισμὸν τῶν πετρελαίων, κατεργασίαν τοῦ βάμβακος κ. λ. π.

Χλωριοῦχον νάτριον. NaCl. — Τὸ γλωριοῦχον νάτριον, κοινῶς μαγειρικὸν ἄλας, ἀπαντᾶ ἀφθονον εἰς τὴν φύσιν, εἴτε διαλελυμένον εἰς τὸ θαλάσσιον ὅδωρ, εἰς ἀναλογίαν 2,7 % κατὰ μέσον ὅρον, εἴτε ὡς ὁρυκτὸν ἄλας εἰς διάφορα ἀλατωρυγεῖα. Ἀποτελεῖ ἐπίσης ἀπαραίτητον συστατικὸν τοῦ αἵματος.

Ἐξάγεται ἡ ἐκ τῶν ἀλατωρυγείων δι' ἔξορυξεως ἢ ἐκ τοῦ θαλασσίου ὅδατος, εἰς τὰς μεσημβρινὰς κυρίως χώρας, δι' ἔξατμίσεως αὐτοῦ ὑπὸ τῆς ἡλιακῆς θερμότητος, ἐντὸς ἀβαθῶν δεξαμενῶν, εἰς τὰς ἀλυκάς. Αἱ κυριώτεραι ἐλληνικαὶ ἀλυκαὶ εὑρίσκονται εἰς τὴν Ἀττικὴν ('Ανάβυσσος), τὴν Μυτιλήνην, τὸ Μεσολόγγιον, τὴν Λευκάδα.

Εἶναι σῶμα στερεόν, λευκόν, ἀσφυμένον καὶ ἔχει γεῦσιν ἀλμυρὸν εὐγάριστον.

Κρυσταλλοῦται εἰς μικροὺς κύβους, περικλείοντας συνήθως μαγγικικῶς ὅδωρ, τὸ ὅποιον ἔξατμιζόμενον, διτανοῦται θερμανθῶσι, προκαλεῖ μικρὰς ἐκρήξεις. 'Εχει E.B. 2,16 καὶ τήκεται εἰς 795°. Εἶναι ἀρκετὰ εὐδιάλυτον εἰς τὸ ὅδωρ, ἡ δὲ διαλυτότητα του ἐλάχιστα μόνον ἐπιτρέαζεται ἀπὸ τὴν αὐξῆσιν τῆς θερμοκρασίας. Οὔτω ἐντὸς 100 γραμ. ὅδατος εἰς 20° διαλύονται 36 γρ. ἄλατος, εἰς 100° δὲ 39 γρ. ἐξ αὐτοῦ. Κεκορεσμένον διάλυμα ἄλατος ζέει εἰς 110° καὶ πήγνυται εἰς —22°.

Τὸ ἐκ τῆς θαλάσσης λαμβανόμενον μαγειρικὸν ἄλας τοῦ ἐμπορίου ἐμπεριέχει καὶ μικρὰν ποσότητα ἀλάτων μαγνησίου, τὰ ὅποια τὸ καθιστοῦν ὑγροσκοπικόν, ἐνῷ τὸ χημικῶς καθαρὸν δὲν εἶναι τοιοῦτον.

Χρησιμοποιεῖται κατὰ μεγάλα ποσά πρὸς παρασκευὴν τῶν φαγητῶν μας, διατήρησιν τροφίμων καὶ παρασκευὴν ψυκτικοῦ μήγματος μετὰ πάγου. Ἐπὶ πλέον, ὡς πρώτη ὅλη τῆς βιομηχανίας διὰ τὴν παρασκευὴν τοῦ χλωρίου, τοῦ νατρίου καὶ τῶν ἐνώσεων αὐτοῦ. Διάλυμα δὲ γλωριοῦχου νατρίου 0,95 % ἐντὸς ἀπεσταγμένου ὅδατος, χρησιμοποιεῖται εἰς τὴν ιατρικὴν ὡς φυσιολογικὸς δρός, δυνάμενος νὰ εἰσαγθῇ εἰς τὴν κυκλοφορίαν τοῦ αἵματος.

Ανθρακικὸν νάτριον ή **Σόδα** Na₂CO₃. — Ἀπαντᾶ εἰς τὰ ὅδατα λιμνῶν τινῶν τῶν θερμῶν χωρῶν καὶ ὡς συστατικὸν τῆς τέφρας πολλῶν

θαλασσίων φυκῶν, ἐκ τῶν ὅποιων ἐλαφράνετο ἄλλοτε. Σήμερον βιο-
μηχανικῶς παρασκευάζεται κατὰ τρεῖς μεθόδους:

1) Κατὰ τὴν μέθοδον Le blane, ἡ ὅποία περιλαμβάνει τὰ
έξης στάδια: α) Τὸ χλωριοῦχον νάτριον ἐπιδράσει θειούχοι ὀξέοις μετα-
τρέπεται εἰς θειούχον νάτριον:



β) Τὸ οὕτω ληρθὲν θειούχον νάτριον ἀνάγεται πρὸς θειοῦχον νάτριον,
διὰ πυρώσεως μετ' ἀνθρακος:



γ) Τὸ θειοῦχον νάτριον τέλος πυροῦται μετ' ἀνθρακικοῦ ἀσβεστίου,
μετατρεπόμενον οὕτως εἰς ἀνθρακικὸν νάτριον καὶ θειοῦχον ἀσβέστιον:



Τὸ σχηματιζόμενον ἀνθρακικὸν νάτριον, ὡς εὐδιάλυτον, ἀποχωρί-
ζεται εύκόλως ἀπὸ τὸ θειοῦχον ἀσβέστιον, δι' ἐκπλύσεως μεθ' ὕδατος,
συμπυκνώσεως καὶ κρυσταλλώσεως.

2) Κατὰ τὴν μέθοδον Solvay, καθ' ἥν ἡ σόδα παρασκευά-
ζεται διὰ διοξετεύσεως διοξείδου τοῦ ἀνθρακος, λαμβανομένου διὰ πυ-
ρώσεως ἀσβεστολίθου CaCO_3 , ἐντὸς πυκνοῦ διαλύματος χλωριοῦχου
νατρίου, κεκορεσμένου προηγουμένως δι' ἀμμωνίας. Ἀποβάλλονται
τότε κρύσταλλοι τοῦ δυσδιαλύτου δξίνου ἀνθρακικοῦ νατρίου, σχηματί-
ζεται συγχρόνως χλωριοῦχον ἀμμώνιον, τὸ δόποιον μένει ἐν διαλύσει:



Καὶ τὸ μὲν δξίνον ἀνθρακικὸν νάτριον διὰ πυρώσεως μετατρέπεται
εἰς οὐδέτερον ἀνθρακικὸν νάτριον καὶ διοξείδιον τοῦ ἀνθρακος, χρήσιμον
διὰ νέαν ἀντίδρασιν.



Τὸ δὲ χλωριοῦχον ἀμμώνιον μήνυνται μετ' ἀσβέστου CaO καὶ δι'
ἐλαφρᾶς θερμάνσεως ἀποδίδει ἀμμωνίαν, ἐπίσης χρήσιμον διὰ νέαν
ἀντίδρασιν:



Ἡ μέθοδος αὕτη εἶναι πολὺ οἰκονομικωτέρα καὶ παρέχει προϊόν
σχεδόν χημικῶς καθαρόν, ὡς ἐκ τούτου ἔκτοπίζει βαθμηδόν τὴν προη-
γουμένην μέθοδον.

3) Κατὰ τὴν ἡλεκτρολυτικὴν μέθοδον, κατὰ τὴν
ὅποιαν διοχετεύεται διοξείδιον τοῦ ἀνθρακος, προερχόμενον ἐκ πυρώσεως

λόσβεστολίθου, εἰς τὸ κατὰ τὴν ἡλεκτρόλυσιν διαιλύματος χλωριούχου νάτριου λαμβανόμενον ὑδροξείδιον τοῦ νατρίου :



Ἡ σόδα φέρεται εἰς τὸ ἐμπόριον εἴτε ὡς κόνις λευκή, ἔχουσα τὸν τύπον Na_2CO_3 , εἴτε εἰς μεγάλους κρυστάλλους λευκούς, μετὰ 10 μορίων κρυσταλλικοῦ ὕδατος, τοῦ τύπου $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$.

Εἰς τὸ ὕδωρ εἶναι λίαν εὐδιάλυτος, τὸ δὲ διάλυμά της τοῦτο ἔχει ἀντίδρασιν ἀλκαλικήν, διότι κατὰ τὴν διάλυσιν τὸ ἀνθρακικὸν νάτριον ὑφίσταται ὑδρόλυσιν, ἥτοι μερικὴν ἀποσύνθεσιν ὑπὸ τοῦ ὕδατος, εἰς ἐν ἀσθενὲς ὅξεν καὶ μίαν ἴσχυρὰν βάσιν, τῆς ὁποίας ἡ ἀντίδρασις ἐπικρατεῖ :



Χρησιμοποιεῖται εἰς τὴν ὑαλουργίαν, τὴν σαπωνοποίησαν, τὴν ἀποσκλήρυνσιν τοῦ ὕδατος, τὴν πλύσιν τῶν νημάτων τῆς ὑφαντουργίας κ.λ.π.

"Οξινὸν ἀνθρακικὸν νάτριον NaHCO_3 . — Τὸ ἄλας τοῦτο, καλούμενον καὶ δισανθρακικὸν νάτριον, λαμβάνεται ὡς ἐνδιάμεσον προϊὸν κατὰ τὴν βιομηχανικὴν παρασκευὴν τῆς σόδας κατὰ τὴν μέθοδον Solvay. Εἶναι κόνις λευκή, κρυσταλλική, μᾶλλον δυσδιάλυτος εἰς τὸ ὕδωρ. Τὸ διάλυμά της, λόγῳ ὑδρολύσεως, ἔχει ἀντίδρασιν ἀσθενῶς ἀλκαλικήν. Χρησιμοποιεῖται εἰς τὴν ιατρικὴν πρὸς ἔξουδετέρωσιν τῶν ὅξεων τοῦ στομάχου (σόδα τῶν φαρμακείων), πρὸς παρασκευὴν ἀφρωδῶν ποτῶν καὶ εἰς τὴν ζαχαροπλαστικήν, λόγῳ εὐκόλου ἀποδόσεως διοξειδίου τοῦ ἀνθρακος, διὰ θερμάνσεως ἢ τῇ ἐπιδράσει ἀραιῶν ὅξεων.

Νιτρικὸν νάτριον NaNO_3 . — Ἀπαντᾶ ὡς ὀρυκτὸν εἰς τὸ Περού καὶ τὴν Χιλῆν, διὸ καὶ νίτρον τῆς Χιλῆς ἀποκαλεῖται, ἐσχηματίσθη δὲ ἐκεῖ δι' ἀποσυνθέσεως δργανικῶν οὐσιῶν. Τὸ ἔξορυσσόμενον νίτρον ἐμπεριέχει 60 % καθαροῦ νιτρικοῦ νατρίου. Τὸ καθαρὸν ἄλας εἶναι λευκόν, κρυσταλλικόν, ὑγροσκοπικόν καὶ λίαν διαλυτὸν εἰς τὸ ὕδωρ. Τήκεται εἰς 730° , ὑπὸ ταυτόχρονον διάσπασιν καὶ ἔκλυσιν δέξυγόνου :



Χρησιμοποιεῖται πρὸς παρασκευὴν νιτρικοῦ δέξιος καὶ ἀζωτούχων λιπασμάτων διὰ τὴν γεωργίαν.

Σύμβολον Κ

Αιγαίνη βάρος 390,96

Σθένος Ι

Τὸ κάλιον ἀπαντᾶται πάντοτε ἡνωμένον, ὑπὸ μορφὴν δρυκτῶν, ἐκ τῶν ὅποιών σπουδαιοτέρα εἰναι ὁ συλβῖνης KCl καὶ ὁ καρνιλίτης $KCl \cdot MgCl_2 \cdot 6H_2O$. Εὑρίσκεται ἐπίσης εἰς μικρὰν ποσότητα εἰς τὸ θαλάσσιον ὄδωρ καθὼς καὶ εἰς τὴν τέφραν τῶν φυτῶν τῆς ἔηρᾶς.

Παρασκευάζεται καθ' ὃν τρόπον καὶ τὸ νάτριον, ἔχει δὲ ἀναλόγους πρὸς αὐτὸν ἰδιότητας. Εἰναι μαλακὸν καὶ ἀργυρόλευκον, ἐπὶ προσφάτου τομῆς, ἔχει E.B. 0,86 καὶ τήκεται εἰς 62,5°. Χημικῶς εἰναι δραστικώτερον τοῦ νατρίου, ὡς ἐκ τούτου, κατὰ τὴν ἀντίδραστίν του ἐπὶ τοῦ ὄδατος, ἐκλύεται τοσαύτη θερμότης, ὥστε τὸ ἐκλυόμενον ὄδρογόνον ἀναφλέγεται καὶ καίεται μὲ τὸ χαρακτηριστικὸν τοῦ καλίου ἵδως χρῶμα. Ἐπειδὴ δὲ εἰδοῦται εἰς τὸν ἀέρα καὶ δύναται νὰ αὐταναφλεγῇ, φυλάσσεται ὑπὸ τὸ πετρέλαιον, ὅπως καὶ τὸ νάτριον. Ἐφαρμογὰς εὑρίσκει ἐλαχίστας.

ΕΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΛΙΟΥ

Αἱ ἑνώσεις τοῦ καλίου εἰναι καθ' ὅλα ἀνάλογοι τῶν τοῦ νατρίου.

Ύδροξείδιον τοῦ καλίου KOH. — Τὸ ὄδροξείδιον τοῦ καλίου ἡ καυστικὸν κάλι, παρασκευάζεται κατὰ τρόπον ἀνάλογον πρὸς τὸ ὄδροξείδιον τοῦ νατρίου, εἴτε ἐκ τοῦ ἀνθρακικοῦ καλίου K_2CO_3 , ἐπιδράσει καυστικῆς ἀσβέστου $Ca(OH)_2$, εἴτε δὲ ἡ λεκτρολύσεως ὄδατικοῦ διαλύματος χλωριούχου καλίου KCl . Εἰναι σῶμα λευκόν, κρυσταλλικὸν καὶ λίαν ὑγροσκοπικόν. Ἀπὸ χημικῆς ἀπόψεως θεωρεῖται ὡς ἡ ἴσχυροτέρα βάσις. Χρησιμοποιεῖται πρὸς κατασκευὴν τῶν μαλακῶν σαπώνων.

Ἀνθρακικὸν κάλιον ἡ Ποτάσσα K_2CO_3 . — Ἀπαντᾶ εἰς τὴν τέφραν τῶν φυτῶν τῆς ἔηρᾶς καὶ παρασκευάζεται, εἴτε ἐκ τοῦ χλωριούχου καλίου κατὰ τὴν μέθοδον Leblanc, ὅπως τὸ ἀνθρακικὸν νάτριον, εἴτε διὰ διοχετεύσεως διοξειδίου τοῦ ἀνθρακος εἰς διάλυμα ὄδροξείδιου τοῦ καλίου, λαμβανόμενον δὲ ἡλεκτρολύσεως ὄδατικοῦ διαλύματος χλωριούχου καλίου.

Ἡ ποτάσσα ἀποτελεῖ λευκὴν κρυσταλλικὴν μᾶζαν, διαρρέουσαν εἰς τὸν ἀέρα καὶ λίαν εύδιάλυτον εἰς τὸ ὄδωρ. Χρησιμοποιεῖται πρὸς παρ-

σκευήν τῆς βοημικῆς θάλου καὶ τῶν μαλακῶν σαπώνων, καθὼς καὶ διὰ τὴν πλύσιν τῶν ἀσπρορρούχων.

Νιτρικὸν κάλιον ή **Νίτρον** KNO_3 . — Ἀπαντᾶται εἰς τινας θερμάς χώρας, κυρίως τὰς Ἰνδίας (νίτρον τῶν Ἰνδῶν). Παρασκευάζεται δὲ δι' ἀναμίξεως κεκορεσμένων θερμῶν διαλυμάτων νιτρικοῦ νατρίου καὶ χλωριούχου καλίου, δόποτε σχηματίζονται χλωριούχον νάτριον καὶ νιτρικὸν κάλιον :



Καὶ τὸ μὲν χλωριούχον νάτριον, ὡς δυσδιάλυτον ἀποβάλλεται, μένει δὲ ἐν διαλύσει τὸ νίτρον, τὸ δόποιον λαμβάνεται διὰ κρυσταλλώσεως.

Εἶναι σῶμα κρυσταλλικόν, ἄχρουν, μὴ ὑγροσκοπικόν, λίαν εὐδιάλυτον εἰς τὸ ὕδωρ. "Ἐχει ἴδιότητας ὀξειδωτικάς, διότι θερμαινόμενον διασπᾶται, ἀποδίδον δέξυγόνον :



Χρησιμοποιεῖται ὡς ὀξειδωτικὸν πρὸς παρασκευὴν τῆς μαύρης πυρίτιδος, ἡ δόποια εἶναι μῆγμα λεπτῶς κονιοποιημένου νίτρου, ξυλάνθρακος καὶ θείου, εἰς ἀναλογίαν κατὰ μέσον ὅρον 75 : 15 : 10. Διὰ τὸν σκοπὸν τοῦτον τὸ νιτρικὸν κάλιον προτιμᾶται τοῦ νιτρικοῦ νατρίου, διότι δὲν εἶναι ὑγροσκοπικόν.

Χλωρικὸν κάλιον. KClO_3 . — Παρασκευάζεται διὰ διοχετεύσεως χλωρίου ἐντὸς πυκνοῦ καὶ θερμοῦ διαλύματος ὑδροξειδίου τοῦ καλίου :



Εἶναι σῶμα λευκόν, κρυσταλλικόν. Θερμαινόμενον διασπᾶται, ἀποδίδον δέξυγόνον, ὡς ἐκ τούτου εἶναι ἰσχυρὸν ὀξειδωτικὸν μέσον :



Χρησιμοποιεῖται εἰς τὰ ἔργα στήρια πρὸς παρασκευὴν τοῦ δέξυγόνου καὶ εἰς τὴν βιομηχανίαν διὰ τὴν παρασκευὴν πυρείων, ἐκρηκτικῶν ὄλων, πυροτεχνημάτων.

Ο ΜΑΣ ΤΩΝ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΓΑΙΩΝ

"Η δύμας αὗτη περιλαμβάνει τὰ μέταλλα βηρύλλιον, μαγνήσιον, στροβίστιον, στρόντιον, βάριον, ράδιον, ἐκ τῶν δόποίων θάλαττας περιγράψωμεν ἐνταῦθα μόνον τὸ μαγνήσιον καὶ τὸ ἀσβέστιον.

ΜΑΓΝΗΣΙΟΝ

Σύμβολον *Mg*

'Αιτομικόν βάρος 24,32

Σεθένος II

Προέλευσις. — Τὸ μαγνήσιον ἀπαντᾶ εἰς τὴν φύσιν ὑπὸ μορφὴν δρυκτῶν, σπουδαιότερα τῶν ὅποιων εἶναι δὲ μαγνησίτης ἢ λευκόλιθος $MgCO_3$, δὲ διολομίτης $MgCO_3 \cdot CaCO_3$ καὶ δὲ καρναλίτης $KCl \cdot MgCl_2 \cdot 6H_2O$. Εἰς τὸ ὑδωρ τῆς θαλάσσης καθὼς καὶ πηγῶν τινῶν εὑρίσκονται διαλελυμένα ἄλατα τοῦ μαγνησίου, προσδιδοντα εἰς αὐτὸν πικράν γεῦσιν. Τέλος τὸ μαγνήσιον ἀποτελεῖ συστατικὸν τῆς χλωροφύλλης.

Παρασκευὴ — Ιδιότητες. — Τὸ μαγνήσιον παρασκευάζεται ἀποκλειστικῶς δὲ ἡλεκτρολύσεως τήγματος χλωριούχου μαγνησίου, τὸ ὅποιον λαμβάνεται ἢ ἐκ τοῦ θαλασσίου ὕδατος ἢ ἐκ τοῦ δρυκτοῦ καρναλίτου.

Εἶναι μέταλλον ἀργυρόλευκον, ἐλαφρόν, E.B. 1,75 καὶ σημείου τήξεως 650° .

Εἰς χαμηλὴν θερμοκρασίαν δέξειδοῦται βραδέως, εἰς ὑψηλὴν θερμοκρασίαν δύμας καίεται πρὸς δέξειδιον τοῦ μαγνησίου, ἐκπέμπον λαμπρότατον λευκὸν φῶς, πλούσιον εἰς ὑπεριώδεις ἀκτῖνας, διὸ καὶ χρησιμοποιεῖται πρὸς φωτογράφησιν κατὰ τὴν νύκτα. Λόγῳ τῆς μεγάλης του χημικῆς συγγενείας πρὸς τὸ δέξιγόν τον εἶναι ἄριστον ἀναγωγικὸν μέσον, ἀποσυνθέτον τὸ ὑδωρ καὶ πολλὰ δέξειδια.

Χρήσεις. — Χρησιμοποιεῖται πρὸς παρασκευὴν ἐλαφρῶν καὶ ἀνθεκτικῶν κραμάτων, ἐκ τῶν ὅποιων σπουδαιότερα εἶναι τὸ μαγνάλιον (μαγνήσιον καὶ ἀργίλιον) καὶ τὸ ντουραλούμινιον (μαγνήσιον, ἀργίλιον, χαλκός, μαγγάνιον). Χρησιμοποιεῖται ἐπίσης εἰς τὴν πυροτεχνουργίαν, τὴν φωτογραφικὴν καὶ ὡς ἀναγωγικὸν εἰς τὴν μεταλλουργίαν.

ΕΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ

'Οξείδιον τοῦ Μαγνησίου ἢ Μαγνησία MgO . — Λαμβάνεται διὰ πυρώσεως τοῦ ἀνθρακικοῦ μαγνησίου : $MgCO_3 \rightarrow MgO + CO_2$.

'Αποτελεῖ δὲ κόνιν λευκήν, ἐλαφράν, λίαν δύστηχτον, ἐλάχιστα διαλυτὴν εἰς τὸ ὑδωρ. Χρησιμοποιεῖται πρὸς κατασκευὴν πυριμάγων πλίνθων καὶ εἰς τὴν θεραπευτικὴν ὡς ἐλαφρὸν καθαρτικόν.

Θειεῖκὸν μαγνήσιον. — 'Απαντᾶ εἰς τὴν φύσιν εἴτε ὡς δρυκτὸν

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

νπὸ τὸ δνομα κισερὶ της $MgSO_4 \cdot H_2O$, εἴτε διαλελυμένον εἰς τινας ίαματικὰς πηγὰς ώς πικρὸν ἄλας $MgSO_4 \cdot 7H_2O$, προσδίδον εἰς τὸ ύδωρ αὐτῶν πικρὰν γεῦσιν καὶ καθαρικάς ίδιότητας. Χρησιμοποιεῖται εἰς τὴν θεραπευτικὴν ώς καθαρικὸν καὶ εἰς τὴν κατεργασίαν τοῦ βάμβακος.

Ανθρακικὸν μαγνήσιον $MgCO_3$. — Ἀπαντᾶ εἰς τὴν φύσιν ώς δρυκτὸν μαγνησίτης, παρ' ἡμῖν δέ, εἰς καθαρωτάτην κατάστασιν, εἰς τὴν Εύβοιαν, ώς λευκόλιθος. Μετὰ τοῦ ἀνθρακικοῦ ἀσβεστίου ἀποτελεῖ τὸ δρυκτὸν δολομίτην, καταλαμβάνοντα ἐνιαχοῦ μεγάλας ἐκτάσεις. Χρησιμοποιεῖται πρὸς παρασκευὴν τῶν ἀλλων ἐνώσεων τοῦ μαγνησίου.

ΑΣΒΕΣΤΙΟΝ

Σύμβολον Ca

Άτομικὸν βάρος 40,08

Σύνος II

Προέλευσις. — Τὸ ἀσβέστιον εἶναι λίκιν διαδεδομένον εἰς τὴν φύσιν, ὑπὸ τὴν μορφὴν διαφόρων ἀλάτων αὐτοῦ, ἐκ τῶν διοίων σπουδαιότερα εἶναι τὸ ἀνθρακικὸν ἀσβέστιον, ἀποτελοῦν τὸν ἀσβέστιον, τὴν κιμωλίαν, τὸ μάρμαρον· τὸ θειεύκὸν ἀσβέστιον, ἀποτελοῦν τὴν γύψον· τὸ φωσφορικὸν ἀσβέστιον, ἀποτελοῦν τὸν φωσφορίτην καὶ τὸν ἀπατίτην κλπ. Ἀποτελεῖ ἐπίσης συστατικὸν τοῦ σώματος τῶν ζώων καὶ τῶν φυτῶν (δστᾶ, δδόντες, κελύφη ὠῶν, ὅστρακα κλπ.).

Παρασκευὴ — **Ιδιότητες.** — Τὸ ἀσβέστιον παρασκευάζεται δι' ἡλεκτρολύσεως τοῦ τετηκότος χλωριούχου ἀσβεστίου, ἐν μίγματι μετὰ φθοριούχου ἀσβεστίου. Εἶναι μέταλλον ἀργυρόλευκον, ἐλαφρόν, E.B. 1,55, τηκόμενον εἰς 810° , σχετικῶς μαλακόν. Ὁξειδοῦται βραδέως εἰς τὸν ἀέρα καὶ ἀποσυνθέτει τὸ ύδωρ, ὑπὸ ἔκλυσιν ὑδρογόνου:



Χρήσεις. — Χρησιμοποιεῖται ώς ἀναγωγικὸν μέσον εἰς τὰ ἐργαστήρια καὶ πρὸς παρασκευὴν ὡρισμένων τινῶν κραμάτων, ιδίως μετὰ τοῦ μολύβδου.

ΕΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ


Οξείδιον τοῦ ἀσβεστίου ή **"Ασβεστος** CaO . — Παρασκευάζεται δι' ἐντόνου πυρώσεως ἀσβεστολίθου ἐντὸς εἰδικῶν καμίνων, αἱ δόποιαι λέγονται ἀσβεστοκάμινοι:



Αναλόγως τῆς ποιότητος τοῦ χρησιμοποιουμένου ἀσβεστολίθου λαμβάνεται προὶὸν μᾶλλον ἢ ἡ ττον καθαρόν.

Ἡ καθαρὰ ἀσβεστος, λαμβανομένη διὰ πυρώσεως μαρμάρου, εἶναι λευκή, ἀμορφος καὶ πορώδης, E.B. 3,40, τηκομένη μόνον εἰς τὴν θερμοκρασίαν τοῦ βολταϊκοῦ τόξου (2570°). Χρησιμοποιεῖται πρὸς παρασκευὴν τῶν πυριμάχων χωνευτήρων καὶ πρὸ πάντων, κατὰ μέγιστα ποσά, πρὸς παρασκευὴν τῆς ἐσβεσμένης ἀσβέστου.

Ύδροξείδιον τοῦ ἀσβεστίου ἢ ἐσβεσμένη ἀσβεστος Ca(OH)_2
 Εάν ραντίσωμεν τὴν ἀσβεστον διὰ μικρᾶς ποσότητος ὕδατος, παρατηροῦμεν ὅτι αὕτη θερμαλνεται, ἔξογκοῦται καὶ τέλος διαρρήγνυται, μετατρεπομένη εἰς κόνιν. Ἡ κόνις αὕτη εἶναι ὑδροξείδιον τοῦ ἀσβεστίου, σχηματισθὲν ἐκ τῆς ἀντιδράσεως τοῦ ὕδειδίου τοῦ ἀσβεστίου μετὰ τοῦ ὕδατος, ὑπὸ ἔκλυσιν μεγάλου ποσοῦ θερμότητος :



Ἡ ἐσβεσμένη ἀσβεστος εἶναι δυσδιάλυτος εἰς τὸ ὕδωρ. Ἀναμιγνυομένη μετὰ μικρᾶς ποσότητος ὕδατος δίδει ἔνα πολτόν, ὃ ὄποιος μετὰ περισσοτέρου ὕδατος μετατρέπεται εἰς γαλακτῶδες ὑγρόν, τὸ γάλα τῆς ἀσβέστου. Εάν εἰς τοῦτο προσθέσωμεν καὶ ἄλλο ὕδωρ καὶ διηθήσωμεν, λαμβάνομεν τὸ ἀσβέστιον ὕδωρ (ἀσβεστόνερο), τὸ ὄποιον εἶναι ἄχρουν καὶ διαυγές, περιέχον ἐν διαλύσει μικρὰν ποσότητα ὑδροξείδιου τοῦ ἀσβεστίου. Ἀφιέμενον τοῦτο εἰς τὸν ἀέρα θολοῦται μετά τινα χρόνον, λόγῳ τοῦ σχηματισμοῦ ἀδιαλύτου ἀνθρακικοῦ ἀσβεστίου, προερχομένου ἐκ τῆς ἐπιδράσεως ἐπ' αὐτοῦ τοῦ διοξειδίου τοῦ ἀνθρακος τοῦ ἀέρος :



Τὸ ὑδροξείδιον τοῦ ἀσβεστίου εἶναι βάσις ἴσχυρά, ἀνάλογος πρὸς τὸ ὑδροξείδιον τοῦ νατρίου ἢ καλίου. Εύρισκει δὲ εύρυτάτην χρῆσιν, κυρίως εἰς τὴν οίκοδομικὴν πρὸς παρασκευὴν τῶν κονιαμάτων.

Κονιάματα. — Κονιάματα λέγονται τὰ μίγματα, τὰ χρησιμοποιούμενα εἰς τὰς οίκοδομάς ὡς συνδετικαὶ ὄλαι τῶν λίθων, πλίνθων κλπ. Ταῦτα σκληρύνονται διὰ τοῦ χρόνου, εἴτε τῇ ἐπιδράσει τοῦ ἀέρος, ὥποτε λέγονται ἀεροπαγῆ, εἴτε ἐπιδράσει τοῦ ὕδατος, ὅτε λέγονται ὑδατοπαγῆ.

Τὸ εἰς τὴν οίκοδομικὴν χρησιμοποιούμενον κοινὸν κονίαμα,

είναι πολτώδες μῆγμα ἐσβεσμένης ἀσβέστου, ἄμμου (1 : 3) καὶ τοῦ ἀναλόγου ὕδατος. Σκλήρυνόμενον τοῦτο διὰ τοῦ χρόνου, συνδέει στερεῶς τοὺς λίθους ἢ τὰς πλίνθους τῶν οἰκοδομῶν. Ἡ σκλήρυνσις ὀφείλεται εἰς τὴν ἐπίδρασιν τοῦ διοξειδίου τοῦ ἄνθρακος τοῦ ἀέρος ἐπὶ τῆς ἐσβεσμένης ἀσβέστου, ἢ ὅποιᾳ μειατρέπεται εἰς ἀνθρακικὸν ἀσβέστιον, συγχρόνως δὲ ἀποβάλλεται ὕδωρ, εἰς τὸ ὅποῖον ὀφείλεται ἡ ὑγρασία τῶν νεοδμήτων οἰκοδομῶν :



Διὰ τῆς παρόδου τοῦ χρόνου ἐπιτελεῖται καὶ ἄλλη τις χημικὴ ἀντίδρασις βραδυτάτη, μεταξὺ τοῦ διοξειδίου τοῦ πυριτίου τῆς ἄμμου καὶ τῆς ἀσβέστου, ὅποτε σχηματίζεται πυριτικὸν ἀσβέστιον :



Ἐὰν διαπυρωθοῦν ἐντὸς εἰδικῶν καμίνων, εἰς ὑψηλὴν θερμοκρασίαν, ἀσβεστόλιθοι ἀργιλλομιγεῖς ἢ μίγματα ἀσβεστολίθου καὶ ἀργίλλου, λαμβάνονται προϊόντα, τὰ ὅποια λέγονται ὑδραυλικαὶ ἀσβεστοὶ ἢ τσιμέντα. Ἀναμιγνύομενα ταῦτα μετ' ἄμμου καὶ ὕδατος ἀποτελοῦν τὰ ὑδραυλικαὶ ἢ ὑδραυλικὰ κονιάματα, τὰ ὅποια σκληρύνονται ταχύτατα, δύνανται δὲ νὰ χρησιμοποιηθοῦν καὶ δι' ὑποβρυχίους ἔργασίας. Διὰ τῆς προσθήκης σκυρων (χαλικίων) εἰς τὸ ἀνωτέρω μῆγμα λαμβάνεται τὸ καλούμενον ὑδραυλικὸν σκυρόδεμα (beton), ἐὰν δὲ προστεθοῦν καὶ σιδηραῖ ράβδοι προκύπτει τὸ σιδηροπαγῆς σκυρόδεμα (beton armé), τὸ ὅποῖον ἔχει ἐκτεταμένην ἐφαρμογὴν εἰς τὴν σύγχρονον κατασκευὴν οἰκοδομῶν καὶ δημοσίων ἔργων (γεφυρῶν, κ.λ.π.). Ἡ σκλήρυνσις τῶν ὑδραυλικῶν κονιαμάτων ὀφείλεται εἰς τὸν σχηματισμὸν διπλοῦ ἐνύδρου ἀλατος ἐκ πυριτικοῦ ἀργιλίου καὶ πυριτικοῦ ἀσβεστίου, τὸ ὅποῖον εἶναι σκληρότατον, συμπαγές καὶ ἀδιάλυτον εἰς τὸ ὕδωρ, διὰ τοῦ χρόνου δὲ λαμβάνει καὶ κρυσταλλικὴν μορφήν.

Ἀνθρακικὸν ἀσβέστιον CaCO_3 . — Εἶναι λίαν διαδεδομένον εἰς τὴν φύσιν, ὡς κρυσταλλικόν, κρυσταλλοφυὲς καὶ ἀμορφὸν.

‘Ως κρυσταλλικὸν ἀποτελεῖ τὸν ἀσβεστίην, τοῦ ὅποίου καθαρώτατη μορφὴ εἶναι ἡ ἴσλανδικὴ κρύσταλλος, ἥτις εἶναι διαφανής καὶ ἔχει τὴν ἰδιότητα τῆς διπλῆς διαθλάσσεως τοῦ φωτός. ‘Ως κρυσταλλοφυὲς ἀποτελεῖ τὸ μάρμαρον, τὸ ὅποῖον εἶναι εἴτε λευκόν, εἴτε ἔγχρωμον. ‘Ως ἀμορφὸν τέλος ἀποτελεῖ τὸν ἀσβεστό-

λιθον καλύπτοντα μεγάλας έκτάσεις τῆς γῆς καὶ τὴν κρητίδα ἡ κιμωλία, ἡ δοιά εσχηματίσθη εἰς παρωχημένην γεωλογικὴν ἐπογήν, ἐκ τῆς συσσωρεύσεως τεραστίου ἀριθμοῦ κελυφῶν μικροσκοπικῶν θιαλασσίων δργανισμῶν. Εἶναι λευκή, εύθρυπτος, πορώδης καὶ ἀφίνει λίγη ἐπὶ τοῦ μαυροπίνακος.

Τὸ ἀνθρακικὸν ἀσβέστιον εἶναι λίκην δυσδιάλυτον εἰς τὸ καθαρὸν ὄνδρῳ, διαλύεται διμως εἰς ὄνδρῳ ἐμπεριέχον διοξείδιον τοῦ ἀνθρακος, διότι τότε σχηματίζεται δξεινὸν ἀνθρακικὸν ἀσβέστιον $\text{CaH}_2(\text{CO}_3)_2$, τὸ ὅποιον εἶναι διαλυτὸν εἰς τὸ ὄνδρῳ :



Τὸ τὴν μορφὴν αὐτὴν εύρισκεται ἐν διαλύσει εἰς ὅλα τὰ φυσικὰ ὄνδρα. Διὰ βρασμοῦ ἡ βραδείας ἔξατμίσεως τῶν φυσικῶν ὄνδρων, ἀποσυντίθεται τὸ δξεινὸν ἀνθρακικὸν ἀσβέστιον, εἰς διοξείδιον τοῦ ἀνθρακος, ὄνδρατμοὺς καὶ οὐδέτερον ἀνθρακικὸν ἀσβέστιον, τὸ ὅποιον ὡς ἀδιάλυτον καθιζάνει :



Καθ' ὅμοιον τρόπον σχηματίζονται καὶ οἱ σταλακτῖται καὶ σταλαγμῖται τῶν σπηλαίων, ἀποτελούμενοι ἐξ ἀνθρακικοῦ ἀσβεστίου.

Τὸ ἀνθρακικὸν ἀσβέστιον χρησιμοποιεῖται ὡς ἀσβεστόλιθος εἰς τὴν οἰκοδομικήν, τὴν ὑαλουργίαν, τὴν μεταλλουργίαν, τὴν παρασκευὴν τῆς ἀσβέστου καὶ τῶν τσιμέντων κ.λ.π., ὡς μάρμαρον εἰς τὴν γλυπτικὴν καὶ ὡς κιμωλία πρὸς γραφὴν ἐπὶ τοῦ μαυροπίνακος.

Θειϊκὸν ἀσβέστιον. — Ἀπαντᾶ εἰς τὴν φύσιν ὑπὸ δύο μορφάς, ὡς ἀνυδροὶ γύψοις ἡ ἀνυδρίτης CaSO_4 καὶ ὡς ἔνυδροις γύψοις $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, τῆς δοιάς καθαρωτάτη μορφὴ εἶναι δὲ λάβαστρος.

'Η γύψος εἶναι δυσδιάλυτος εἰς τὸ ὄνδρῳ, ἀποτελεῖ δὲ κανονικὸν στατικὸν τῶν φυσικῶν ὄνδρων. Θερμαινομένη ἡ ἔνυδρος γύψος ἐντὸς καμίνων εἰς $130^{\circ} - 170^{\circ}$ ἀποβάλλει τὸ μεγαλύτερον μέρος τοῦ κρυσταλλικοῦ της ὄνδατος καὶ μεταβάλλεται εἰς τὴν λεγομένην πλαστικὴν γύψον, ἡ δοιά κονιοποιεῖται διὰ μύλων. 'Η γυψόκονις αὕτη ἀναμιγνυομένη μεθ' ὄνδατος μεταβάλλεται εἰς μᾶζαν πλαστικήν, ἡ δοιά σκληρύνεται ταχέως, διαστελλομένη δλιγόν, καθόσον προσλαμβάνουσα τὸ ἀπολεσθὲν ὄνδρῳ, μεταβάλλεται ἐκ νέου εἰς κρυσταλλικὴν ἔνυδρον γύψον. 'Ἐὰν διμως ἡ γύψος θερμανθῇ πέραν τῶν 500° χάνει δλον τῆς τὸ

χρυσταλλικὸν ὕδωρ καὶ μετατρέπεται εἰς τὴν νεκρὰν γύψον, ἡ δόποια δὲν ἔχει πλέον τὰς ἴδιότητας τῆς πλαστικῆς γύψου. Ἡ γύψος χρησιμοποιεῖται εὐρύτατα πρὸς παρασκευὴν ἐκμαγείων, χειρουργικῶν ἐπιδέσμων, εἰς τὴν οἰκοδομικήν, εἰς τὴν γεωργίαν ὡς λίπασμα, κ.λ.π.

Χλωριοῦχον ἀσβέστιον CaCl_2 . — Παρασκευάζεται δι’ ἐπιδράσεως ὑδροχλωρικοῦ δέξιος ἐπὶ ἀνθρακικοῦ ἀσβέστιου :



Λαμβάνεται δὲ καὶ ὡς ὑποπροϊὸν τῆς βιομηχανίας τῆς σόδας κατὰ τὴν μέθοδον Solvay. Εἶναι σῶμα λίαν ὑγροσκοπικόν, διὸ καὶ χρησιμοποεῖται πρὸς ξήρανσιν ἀερίων κλπ.

Χλωράσβεστος CaOCl_2 . — Παρασκευάζεται διὰ διοχετεύσεως γλωρίου εἰς γαλάκτωμα ἀσβέστου :



Εἶναι κόνις λευκή, ὀλίγον διαλυτὴ εἰς τὸ ὕδωρ, ἀναδίδουσα δσμὴν γλωρίου, λόγῳ τῆς ἀποσυνθέσεώς της ὑπὸ τοῦ διοξειδίου τοῦ ἀνθρακοῦ τοῦ ἀέρος :



Χλώριον ἐπίσης ἐκλύεται ἐξ αὐτῆς κατὰ τὴν ἐπίδρασιν δέξιων



Χρησιμοποιεῖται εὐρύτατα, ἀντὶ τοῦ ἀερίου γλωρίου, ὡς λευκαντικὸν τοῦ βάζματος, τοῦ λίνου, τοῦ χάρτου καὶ ὡς ἀπολυμαντικόν.

Ἄλλαι σπουδαῖαι ἐνώσεις τοῦ ἀσβέστιου εἶναι : τὸ ἀνθρακασβέστιον CaC_2 , χρησιμοποιούμενον πρὸς παρασκευὴν τοῦ ἀκετυλενίου (ἀσετυλίνης), ἡ κυαναμίδη τοῦ ἀσβέστιου CaCN_2 καὶ τὸ φωσφορικὸν ἀσβέστιον, ἀποτελοῦν τὸ κυριώτερον φωσφορικὸν λίπασμα τῆς γεωργίας.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

30) Πόσον βάρος καυστικοῦ νάτρου, γλωρίου καὶ ὑδρογόνου δυνάμεθα νὰ λάβωμεν διὰ τῆς ἡλεκτρολύσεως 100 χιλιογράμμων γλωριούχου νατρίου καθαροῦ, διαλελυμένου ἐντὸς ὕδατος ;

31) Πόσον βάρος μαγειρικοῦ ἄλατος, περιεκτικότητος 85% εἰς

χλωριούχον νάτριον, πρέπει νὰ κατεργασθῶμεν διὰ νὰ λάβωμεν δ τόρνους κρυσταλλικοῦ ἀνθρακικοῦ νατρίου τύπου $Na_2CO_3 \cdot 10H_2O$;

32) Ἀσβεστόλιθός τις περιέχει 75% ἀνθρακικοῦ ἀσβεστίου καθαροῦ. Πόσον βάρος ἀσβέστου θὰ ληφθῇ διὰ διαπυρώσεως ἐνὸς τόρνου τοῦ ἀσβεστολίθου τούτου;

ΑΡΓΙΛΙΟΝ—ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ

ΑΡΓΙΛΙΟΝ

Σύμβολον Al

* Ατομικὸν βάρος 26,97

Σθένος III

Προέλευσις. — Τὸ ἀργίλιον ἡ ἀλουμίνιον εἶναι μετὰ τὸ ὁξυγόνον καὶ τὸ πυρίτιον τὸ μᾶλλον διαδεδομένον στοιχεῖον ἐπὶ τῆς γῆς. Δὲν ἀπαντᾶται ὅμως ἐλεύθερον, ἀλλὰ πάντοτε ἡνωμένον. Κυριώτερα δρυκτὰ αὐτοῦ εἶναι τὸ κορούνδιον Al_2O_3 , ὁ βωξίτης $Al_2O_3 \cdot 2H_2O$, ὁ κρυστάλλιθος $AlF_3 \cdot 3NaF$, ὁ ἀστριος, ὁ μαρμαρυγίας κ. ἄ.

Μεταλλουργία. — Σήμερον τὸ ἀργίλιον λαμβάνεται ἀποκλειστικῶς δι' ἡλεκτρολύσεως μίγματος δέξειδίου τοῦ ἀργιλίου, ἔξαγομένου ἐκ τοῦ βωξίτου * καὶ κρυστάλλου, προστιθεμένου πρὸς διευκόλυνσιν τῆς τήξεως τοῦ δέξειδίου τοῦ ἀργιλίου, τὸ ὄποιον εἶναι λίαν δύστηκτον. Κατὰ τὴν ἡλεκτρόλυσιν ταύτην τελικῶς τὸ δέξειδιον τοῦ ἀργιλίου ἀποσυντίθεται εἰς ἀργίλιον καὶ ὁξυγόνον : $2Al_2O_3 \rightarrow 4Al + 3O_2$.

Καὶ τὸ μὲν ἀργίλιον συγκεντροῦται εἰς τὸν πυθμένα τῆς ἡλεκτρολύτικῆς συσκευῆς ἐκ συμπαγοῦς ἄνθρακος, ἀποτελοῦντα τὴν κάθιδον, ἐνῷ τὸ ὁξυγόνον φέρεται εἰς τὴν ὁμοίως ἐκ συμπαγοῦς ἄνθρακος ἄνοδον, τὴν ὅποιαν βραδέως κατακαίει (Σχ. 46).

Ιδιότητες. — Τὸ ἀργίλιον εἶναι μέταλλον ἀργυρόλευκον, στιλπνὸν καὶ εὐηχον. Εἶναι τὸ ἐλαφρότερον ἐκ τῶν συνήθων μετάλλων, ώς ἔχον E.B. 2,7, ἥτοι τρεῖς φορὰς περίπου μικρότερον τοῦ σιδήρου. Τήκεται εἰς 660° καὶ εἶναι λίαν ἐλατὸν καὶ ὅλκιμον, μεταβαλλόμενον εὐκόλως εἰς λεπτότατα φύλλα καὶ σύρματα. Ἐπίσης εἶναι λίαν εὐηλεκτραγωγόν.

* Εἶχει μεγάλην χημικὴν συγγένειαν πρὸς τὸ ὁξυγόνον. Ἐν τούτοις εἰς τὴν συνήθη θερμοκρασίαν οὐδεμίαν ὑφίσταται φαινομενικῶς ἀλλοίωσιν

* Βωξίτης ἐν 'Ελλάδι ἀνευρέθη ἀφθονος καὶ καλῆς ποιότητος εἰς Παρνασσόν, Ελικώνα, Οίτην, Εύβοιαν. *Αμοργόν, Μακεδονίαν κ. ἄ.

εἰς τὸν ἀέρα, διότι καλύπτεται ἐπιφανειακῶς ὑπὸ ἀδιοράτου προστατευτικοῦ ἐπιστρώματος ἐξ ὁξειδίου τοῦ ἀργιλίου. Ἐὰν δὲ θερμάνωμεν ἔλασμά τι ἡ σύρμα ἀργιλίου τήκεται μέν, ἀλλὰ δὲν καίεται. Ἐὰν ὅμως ρίψωμεν εἰς τὴν φλόγα φωταερίου κόνιν ἀργιλίου, τότε αὕτη καίεται μὲν ἀγρότην λευκὸν φῶς, ὑπὸ ἔκλυσιν μεγάλης ποσότητος θερμότητος:



Λόγω τῆς μεγάλης του χημικῆς συγγενείας πρὸς τὸ ὄξυγόνον εἶναι ἥριστον ἀναγωγικὸν μέσον, ἀνάγον τὸ ὁξείδιον τοῦ σιδήρου κ.ἄ.



Κατὰ τὴν ἀντίδρασιν ταύτην ἔκλυεται τόσον μεγάλη ποσότης θερμότητος, ὥστε ἡ θερμοκρασία φθάνει τοὺς 2500° , εἰς τὴν ὅποιαν τήκονται καὶ τὸ ὁξείδιον τοῦ ἀργιλίου καὶ ὁ σίδηρος, μὲν τὸν ὅποιον δυνάμεθα νὰ συγκολλήσωμεν σιδηροδοκούς, σιδηροδρομικὰς ράβδους, κ.λ.π. Ἡ μέθοδος αὕτη τῆς συγκολλήσεως μετάλλων λέγεται ἀργιλο-

θερμική, τὸ δὲ χρησιμοποιούμενον μῆγμα ἐξ ὁξειδίου τοῦ σιδήρου καὶ κό-

νεως ἀργιλίου λέγεται θερμική.

*Ἐκ τῶν συνήθων δέξεων προσβάλλεται τὸ ἀργίλιον κυρίως δπὸ τοῦ ὑδροχλωρικοῦ δέξεος, ὑπὸ ἔκλυσιν ὑδρογόνου.




Προσβάλλεται ἐπίσης ὑπὸ τῶν ισχυρῶν βάσεων, π.χ. ὑπὸ τοῦ ὑδροξειδίου τοῦ καλίου, παραγομένου καλιοξειδίου τοῦ ἀργιλίου καὶ ἔκλυσιμένου ὑδρογόνου:



Χρήσεις. — Τὸ ἀργίλιον εἶναι ἐν ἐκ τῶν περισσότερον χρησιμοποιουμένων σήμερον μετάλλων, ἐκτοπίζον διονὲν τὸν σίδηρον καὶ τὸν χαλκόν. Οὔτω χρησιμοποιεῖται εἰς τὴν κατασκευὴν οἰκιακῶν σκευῶν, βιομηχανικῶν συσκευῶν, ἡλεκτροφόρων ἀγωγῶν, καθὼς καὶ εἰς τὴν βιομηχανίαν τῶν αὐτοκινήτων καὶ τῶν ἀεροπλάνων, ιδίως ὑπὸ τὴν μορφὴν τῶν διαφόρων αὐτοῦ κραμάτων.

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής



Σχ. 46. Ἡλεκτρολυτικὴ παρασκευὴ τοῦ ἀργιλίου.

Σπουδαιότερα κράματα τοῦ ἀργιλίου εἶναι ὁ μπροστὸς ζῶς διὸ ἀργιλίου, κρᾶμα χαλκοῦ καὶ ἀργιλίου, μὲν ὥραῖον χρυσοκήτρινον χρῶμα· τὸ ντουραλούμινον, κρᾶμα ἀργιλίου, χαλκοῦ, μαγνησίου καὶ μαγγανίου, λίαν ἀνθεκτικόν· τὸ μαγνάλιον, κρᾶμα ἀργιλίου καὶ μαγνησίου, πολὺ ἐλαφρόν κ.ἄ.

ΣΤΥΠΤΗΡΙΑΙ

Αἱ στυπτηρίαι εἶναι διπλᾶ θειϊκὰ ἄλατα τοῦ γενικοῦ τύπου:

$M_2SO_4 \cdot M_2(SO_4)_3 \cdot 24H_2O$, δῆπον M εἶναι μονοσθενές τι μέταλλον (κάλιον, νάτριον ἢ ἡ ρίζα ἀμμώνιον), M δὲ μέταλλόν τι τρισθενές (ἀργίλιον, σίδηρος, μαγγάνιον, χρώμιον).

"Ολαι αἱ στυπτηρίαι εἶναι ἵσομορφοι, δηλαδὴ ἔχουν τὸ αὐτὸν κρυσταλλικὸν σχῆμα, καὶ αἱ μὲν διὸ ἀργιλίου εἶναι ἄχροοι, αἱ δὲ ἄλλαι ἔγχρωμοι.

Ἐκ τῶν στυπτηριῶν σπουδαιοτέρα εἶναι ἡ κοινὴ στυπτηρία (κ. στύψη), ἐκ καλίου καὶ ἀργιλίου, τοῦ τύπου: $K_2SO_4 \cdot Al_2(SO_4)_3 \cdot 24H_2O$.

Παρασκευάζεται διὰ κρυσταλλώσεως μίγματος διαλυμάτων τῶν δύο συστατικῶν τῆς θειϊκῶν ἀλάτων, ὑπὸ καταλήγους ἀναλογίας. Εἶναι ἄχρους ἢ λευκή, μὲν γεῦσιν στύφουσαν, εὐδιάλυτος εἰς τὸ ὅδωρ. Χρησιμόποιεῖται εἰς τὴν βαφικήν, τὴν βυρσοδεψίαν, τὴν θεραπευτικήν.

ΑΡΓΙΛΟΣ – ΚΕΡΑΜΕΥΤΙΚΗ

Ἡ ἀργιλος, ἡ ὁποία εἶναι ἀφθόνως διαδεδομένη εἰς τὴν φύσιν, ἀποτελεῖται κυρίως ἀπὸ πυριτικὸν ἀργίλιον. Καθαρωτέρα μορφή τῆς εἶναι ὁ καολίνης, κατώτερον δὲ εἰδος αὐτῆς, λόγω προσμίξεως δέξειδίων τοῦ σιδήρου καὶ ἄλλων συστατικῶν, εἶναι ὁ πηλός.

Τὰ διάφορα εἰδη τῆς ἀργίλου, ἀναμιγνύμενα μεθ' ὅδατος, παρέχουν μᾶκαν πλαστικήν, δυναμένην νὰ διαμορφωθῇ διὰ τῆς χειρὸς ἢ διὸ ἄλλων μέσων πρὸς διάφορα ἀντικείμενα (κέραμοι, πλίνθοι, ἀγγεῖα, δοχεῖα). Ταῦτα ἀφίενται κατ' ἀρχὰς πρὸς ἔργανσιν, κατόπιν δὲ ὑποβάλλονται εἰς ἔψησιν, διὰ τηρμάνσεως ἐντὸς εἰδικῶν καμίνων. Κατὰ ταύτην ἔκφεύγει τὸ προστεθὲν ὅδωρ, καθὼς καὶ τὸ χημικῶς ἡνωμένον, ὑπὸ συστολὴν τῆς

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

μάζης αύτῶν καὶ δημιουργίαν λεπτῶν πόρων. Ἀναλόγως τῆς θερμοκρασίας τῆς διαπυρώσεως, τὰ παραγόμενα ἀντικείμενα παραμένουν τελικῶς εἴτε πορώδη, ἀπορροφῶντα ὕδωρ καὶ προσφυόμενα εἰς τὴν γλῶσσαν, εἴτε συμπαγῆ καὶ οὐαλώδη, ἐφόσον ἡ μᾶζα αύτῶν ἔθερμάνθη μέχρις ἀρχομένης τήξεως.

Κατὰ ταῦτα τὰ εἰδη τῆς κεραμικῆς, δηλαδὴ τῆς τέχνης τῆς ἀσχολουμένης μὲ τὴν κατασκευὴν τῶν διαφόρων ἐξ ἀργίλου πλαστικῶν ἀντικειμένων, διακρίνονται εἰς δύο μεγάλας κατηγορίας: εἰς συμπαγῆ καὶ εἰς πορώδη. Εἰς τὰ συμπαγῆ προϊόντα ὑπάγονται τὰ εἰδη τῆς πορσελάνης, ἡ δοπία κατασκευάζεται μὲ πρώτην ὑλὴν τὸν καολίνην. Εἰς τὰ πορώδη δὲ ἀνήκουν οἱ κέραμοι, οἱ πλίνθοι, τὰ ἀνθοδοχεῖα κλπ., κατασκευαζόμενα ἐκ πηλοῦ.

Τὰ ἀνωτέρω ἀντικείμενα, συμπαγῆ ἢ πορώδη, μετὰ τὴν ἔψησιν ἐπικαλύπτονται ἐπιφανειακῶς δι' ἀστρίου ἢ ἄλλων ὑλῶν καὶ ὑποβάλλονται εἰς δευτέραν ἔψησιν, δόποτε σχηματίζεται ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας των ὑαλώδες ἐπίχρισμα ἐξ ἀργιλοπυριτικῶν ἀλάτων.

ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ


Σύμβολον Zn

* Ατομικὸν βάρος 65,38

Σθένος II

Προέλευσις. — 'Ο ψευδάργυρος ἀπαντᾶται κυρίως ὑπὸ τὴν μορφὴν τῶν δύο σπουδαιοτέρων του δρυκτῶν, τοῦ σφαλέρι του ZnS καὶ τοῦ σμιθσωνίτου $ZnCO_3$ (κ. καλαμίνα). Ἀμφότερα τὰ δρυκτὰ ταῦτα ἀπαντῶσιν ἐν 'Ελλάδι, εἰς τὸ Λασύριον καὶ τὴν νῆσον Θάσον.

Μεταλλουργία. — Τὸ ἐμπλουτισθὲν μετάλλευμα τοῦ ψευδαργύρου, ἐὰν μὲν εἶναι θειούχον θερμαίνεται ἵσχυρῶς παρουσίᾳ πολλοῦ ἀέρος (φρύσσεται), ἐὰν δὲ εἶναι ἀνθρακικόν, πυροῦται ἐντόνως, δόποτε τελικῶς λαμβάνεται δξείδιον ψευδαργύρου, τὸ δόπιον ἀνάγεται εἰς μεταλλικὸν ψευδάργυρον δι' ἄνθρακος:



Εἰς τὴν ὑψηλὴν θερμοκρασίαν τῆς καμίνου δὲ ψευδάργυρος ἐξαερούται, διὸ συλλέγεται ἐντὸς καταλλήλων ἀποστακτήρων.

'Εξάγεται ἐπίσης σήμερον δὲ ψευδάργυρος καὶ ἡλεκτρολυτικῶς. Πρὸς τοῦτο τὸ ὅς δικαίων λαμβανόμενον δξείδιον, ἐπιδράσει θειικοῦ δξέος,

μετατρέπεται εἰς εύδιάλυτον θειϊκὸν ψευδάργυρον $ZnSO_4$, ὁ ὅποῖος τελικῶς ἡλεκτρολύεται.

Ίδιότητες. — 'Ο ψευδάργυρος (κ. τσίγκος) εἶναι μέταλλον λευκόν, ὑποκυανίζον, κρυσταλλικῆς ὑφῆς, E.B. 7,15, σημείου τήξεως 420° καὶ σημείου ζέσεως 910° .

Εἰς τὴν συνήθη θερμοκρασίαν εἶναι σκληρὸν καὶ σχετικῶς εὔθραυστον, εἰς 100° - 150° γίνεται ἐλατός καὶ δλκιμος, ἀνω δὲ τῶν 200° καθίσταται τοσοῦτον εὔθραυστος, ἀστε δύναται νὰ κονιοποιηθῇ.

Εἰς τὸν ἄρα ὁ ψευδάργυρος καλύπτεται κατ' ἐπιφάνειαν ὑπὸ λεπτοῦ τινος στρώματος ἐκ βασικοῦ ἀνθρακικοῦ ψευδαργύρου $ZnCO_3 \cdot 3Zn(OH)_2$ προφυλάσσοντος τὸ μέταλλον ἀπὸ περαιτέρω δξείδωσιν. Εἰς ὑψηλὴν θερμοκρασίαν, πρὸ πάντων εἰς κατάστασιν κόνεως ἢ ἀτμῶν, καίεται μετὰ λαμπρᾶς ὑποκυάνου φλογός, πρὸς δξείδιον, διασκορπιζόμενον ὑπὸ μορφὴν μεγάλων λευκῶν νιφάδων.

Προσβάλλεται εὐκόλως ὑπὸ τῶν ἀραιῶν δξέων, ὑπὸ ἔκλυσιν ὑδρογόνου :



Χρήσεις. — 'Ο ψευδάργυρος χρησιμοποιεῖται κυρίως ὑπὸ τὴν μορφὴν ἐλασμάτων, πρὸς κάλυψιν ὑποστέγων, κατασκευὴν λουτήρων, ὑδρορροῶν, μικρῶν δεξαμενῶν κ.λ.π. Ἐπίσης χρησιμεύει πρὸς ἐπιψευδαργύρωσιν τοῦ σιδήρου, δι' ἐμβαπτίσεως του ἐντὸς τετηγμένου ψευδαργύρου, διὰ νὰ τὸν προφυλάξῃ ἀπὸ τὴν δξείδωσιν (σίδηρος γαλβανισμός). Ἀποτελεῖ ἐπίσης συστατικὸν πολλῶν κραμάτων, ἐκ τῶν δποίων σπουδαιότερον εἶναι ὁ δρεῖχαλκος (ψευδάργυρος, χαλκός).

ΕΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ

Οξείδιον τοῦ ψευδαργύρου ZnO . — Παρασκευάζεται διὰ καύσεως τοῦ ψευδαργύρου εἰς τὸν ἄρα ἢ διὰ πυρώσεως τοῦ ἀνθρακικοῦ ψευδαργύρου. Ἀποτελεῖ ὄγκωδη λευκὴν κόνιν, ἀδιάλυτον εἰς τὸ ὄδωρο. Εἶναι ἡ σπουδαιοτέρα ἔνωσις τοῦ ψευδαργύρου, χρησιμοποιεῖται δέ, ὑπὸ τὸ ὄνομα λευκὸν τοῦ ψευδαργύρου, ὡς λευκὸν ἐλαιοχρωματικόν, ἀντὶ τοῦ λευκοῦ τοῦ μολύβδου, διέτι δὲν ἀμαυροῦται ὑπὸ τοῦ ὑδροθείου.

Θειϊκὸς ψευδάργυρος $ZnSO_4$. — Εἶναι τὸ συνηθέστερον ἄλας τοῦ ψευδαργύρου, παρασκευάζεται δὲ δι' ἐπιδράσεως θειϊκοῦ δξέος ἐπὶ ψευ-

δαργύρου. Κρυσταλλοῦται μὲ 7 μόρια ύδατος καὶ εἶναι εύδιάλυτος εἰς τὸ ύδωρ. Χρησιμοποιεῖται εἰς τὴν τυποβαφικὴν τῶν ύφασμάτων καὶ εἰς τὴν ιατρικὴν ὡς ἀντισηπτικὸν τῶν δόφθαλμῶν (κολλύριον).

ΣΙΔΗΡΟΣ—ΝΙΚΕΛΙΟΝ—ΚΟΒΑΛΤΙΟΝ

ΣΙΔΗΡΟΣ

Σύμβολον *Fe*

²Ατομικὸν βάρος 55,85

Σθένος *II, III*

Προέλευσις. — Όσιδηρος εἶναι τὸ περισσότερον διαδεδομένον ἐκ τῶν βαρέων μετάλλων ἐπὶ τῆς γῆς. Χημικῶς καθαρὸς ἀπαντᾶ εἰς τοὺς μετεωρίτας.

Τὰ σπουδαιότερα ὄρυκτά του εἶναι: ὁ αἰματίτης Fe_2O_3 , ὁ μαγνητίτης Fe_3O_4 , ὁ λειμωνίτης $Fe(OH)_3$, ὁ σιδηροπυρίτης FeS_2 , ὁ σιδηροκορίτης $FeCO_3$. Ἀπαντᾶ ἐπίσης εἰς τὴν ζῶσαν οὐλην, ὡς ἀπαραίτητον συστατικὸν τῆς αίμοσφαιρίνης τοῦ αἵματος καὶ ὑποβοηθεῖ εἰς τὴν σύνθεσιν τῆς χλωροφύλλης τῶν φυτῶν.

Εἰδη σιδήρου. — Ο χημικῶς καθαρὸς σίδηρος καὶ δύσκολον εἶναι νὰ παραχθῇ καὶ ἀκατάλληλος εἶναι διὰ τὰς τέχνας, ὡς δύστηκτος καὶ σχετικῶς μαλακός. Ἀντ' αὐτοῦ εἰς τὰς τέχνας χρησιμοποιοῦνται εἰδὴ σιδήρου περιέχοντα καὶ ἄλλα συστατικὰ εἰς μικρὰν ποσότητα, κυρίως δὲ ἄνθρακα.

Τὰ εἰδὴ ταῦτα εἶναι: ὁ σφυρήλατος ἢ μαλακὸς σιδηρος, ἐμπεριέχων τὸ ἔλαχιστον ποσὸν ἄνθρακος (0,05 - 0,50 %), ὁ χάλυψ (ἀτσάλι), περιέχων μέσον τι ποσὸν ἄνθρακος, συνήθως 0,50 - 1,50 % καὶ ὁ χυτοσίδηρος (μαντέμι), ἐνέχων 2 - 5 % ἄνθρακος καὶ ἄλλα στοιχεῖα, ὡς πυρίτιον, μαγγάνιον.

Μεταλλουργία. — Ή μεταλλουργία τοῦ σιδήρου περιλαμβάνει δύο φάσεις: α) τὴν παρασκευὴν τοῦ χυτοσιδήρου, ὃ ὅποιος λαμβάνεται κυρίως δι' ἀμέσου ἀνχρωγῆς δι' ἄνθρακος τῶν δξειδίων του, καθότι καὶ τὰ ἄνθρακικὰ καὶ τὰ θειοῦχα ὄρυκτὰ μετατρέπονται εἰς δξείδια, τὰ μὲν πρῶτα διὰ πυρώσεως, τὰ δὲ δεύτερα διὰ φρύξεως· β) τὴν μετατροπὴν τοῦ χυτοσιδήρου εἰς χάλυβα ἢ μαλακὸν σιδήρον, ἢ ὅποια γίνεται δι' ἀπομακρύνσεως μέρους τοῦ ἐμπεριεχομένου εἰς αὐτὸν ἄνθρακος.

Παρασκευὴ τοῦ χυτοσιδήρου. — Αὕτη γίνεται ἐντὸς εἰδίκῶν καμί-

νων υψους 25 μέτρων, τῶν λεγομένων ὑψικάμινον (Σχ. 47). Πρὸς ἔναρξιν τῆς λειτουργίας τῆς ὑψικαμίνου ρίπτονται ἐντὸς αὐτῆς πρῶτον ὁ ἄνθραξ (κώκ), κατόπιν δὲ ἐναλλάξ στρώματα μεταλλεύματος, ἀναμεμιγμένου μετὰ συλλιπάσματος* καὶ ἄνθρακος (κώκ) μέχρι πληρώσεως αὐτῆς. Ἀνάπτεται κατόπιν ὁ εἰς τὴν βάσιν ἄνθραξ, πρὸς τὸν ὁποῖον προσφυσᾶται θερμὸς ἀὴρ ὑπὸ πίεσιν, πρὸς ἐπίτευξιν ὑψηλῆς θερμοκρασίας. Καιομένου οὕτω ζωηρῶς τοῦ ἄνθρακος παράγεται κατ' ἀρχὰς διοξείδιον τοῦ ἄνθρακος :



Τὸ διοξείδιον τοῦτο τοῦ ἄνθρακος, ἀνέρχεται ἐντὸς τῆς καμίνου καὶ συναντᾷ ὑψηλότερον ἄνθρακα, ὑπὸ τοῦ ὁποίου ἀνάγεται πρὸς μονοξείδιον τοῦ ἄνθρακος :




Τὸ μονοξείδιον τέλος τοῦ ἄνθρακος, ἐρχόμενον εἰς ἐπαφὴν μὲ τὸ ἔξ διξειδίων τοῦ σιδήρου μετάλλευμα, ἀνάγει τοῦτο εἰς σιδηρον, ἐνῷ συγχρόνως σχηματίζεται πάλιν διοξείδιον τοῦ ἄνθρακος :



Καὶ τὸ μὲν διοξείδιον τοῦ ἄνθρακος, ἀνεργόμενον ὑψηλότερον,

ὅπου συναντᾷ νέον στρῶμα ἄνθρακος, ἀνάγεται πάλιν ὑπὸ αὐτοῦ πρὸς μονοξείδιον, ἐνῷ ὁ σιδηρος εἰς ὕγραν κατάστασιν, ἔνεκα τῆς ἐπικρατούσης εἰς τὴν κάμινον ὑψηλῆς θερμοκρασίας (1500°), ρέει πρὸς τὴν βάσιν καὶ συγκεντροῦται εἰς τὸ κυλινδρικὸν μέρος αὐτῆς. Ἐπειδὴ δὲ διέρχεται διὰ μέσου τοῦ διαπύρου ἄνθρακος διαλύει μέρος τι αὐτοῦ. Συγχρόνως, ὁ προστεθεὶς ἀρχικῶς εἰς τὸ μεταλλεύμα ὡς συλλίπασμα ἀσβε-

* Συλλιπάσματα εἰς τὴν μεταλλουργίαν λέγονται αἱ οὐσίαι, αἱ ὁποῖαι προστίθενται ἐπὶ τῷ σκοπῷ νὰ σχηματίσουν μετὰ τῶν γαιωδῶν προσμίξεων εὔτηκτον τινὰ ἔνωσιν, καλουμένην σκωρίαν, ἡ ὁποία εύκόλως ἀπομακρύνεται.



Σχ. 47. Υψικάμινος.

στόλιθος, εἰς τὴν ὑψηλὴν θερμοκρασίαν τῆς καμίνου διασπώμενος, μετατρέπεται εἰς ἀσβεστον :




Ἡ ἀσβεστος αὕτη ἐνοῦται μὲ τὰς γαιώδεις προσμίξεις τοῦ μεταλλεύματος, κυρίως μὲ τὸ διοξείδιον τοῦ πυριτίου, καὶ σχηματίζει σκωρίαν ἥκ πυριτικοῦ ἀσβεστίου :



Ἡ σκωρία αὕτη, εἰς ρευστὴν κατάστασιν, λόγῳ τῆς ὑψηλῆς θερμοκρασίας τῆς καμίνου, ρέει καὶ αὕτη πρὸς τὴν βάσιν τῆς καμίνου καὶ ἐπιπλέει τοῦ τετηγμένου σιδήρου, ὡς εἰδικῶς ἐλαφροτέρα. Ἐκεῖ εἰς τὴν βάσιν τῆς καμίνου, ἡ μὲν ἐπιπλέουσα σκωρία ἀπομακρύνεται καταλήλως διὰ πλαγίας ὅπης, ἐνῷ ὁ τετηγμένος σίδηρος, ἀνοιγομένης κατὰ διαστήματα τῆς παρὰ τὸν πυθμένα ὁπῆς, χύνεται εἰς τύπους. Ὁ σίδηρος οὗτος, ὡς περιέχων ποσότητα ἄνθρακος, εἶναι χυτὸς οὐδηρος.

Ἡ ὑψικάμινος λειτουργεῖ συνεχῶς καὶ σταματᾷ τότε μόνον ὅταν ὑποστῇ βλάβην καὶ ἔχει ἀνάγκην ἐπισκευῆς.

Παρασκευὴ τοῦ μαλακοῦ σιδήρου καὶ τοῦ χάλυβος. — Διὰ νὰ λάβωμεν τὰ ἄλλα εἰδη τοῦ σιδήρου ἐκ τοῦ χυτοσιδήρου, ἀρχεῖ νὰ ἀπαλλάξωμεν αὐτὸν μέρους τοῦ ἄνθρακος, τὸν ὅποιον ἐμπεριέχει. Τοῦτο γίνεται κατὰ διαφόρους μεθόδους, ἐκ τῶν ὅποιων καλυτέρα εἶναι ἡ μέθοδος Bessemer. Κατὰ τὴν μέθοδον ταύτην ἡ διεργασία διεξάγεται ἐντὸς ἀπιοειδῶν δοχείων ἐκ σιδήρου, μετὰ διπλοῦ πυθμένος, ἐπενδεδυμένων ἐσωτερικῶς διὰ πυριμάχων πλίνθων καὶ στηριζομένων ἐπὶ ὁρίζοντίου ἀξονος, περὶ τὸν ὅποιον δύνανται νὰ περιστραφοῦν (Σχ. 48). Ἔντὸς τῶν δοχείων



Σχ. 48. Τὸ ἀπιοειδὲς δοχεῖον τοῦ Bessemer.

τούτων χύνεται άνάλογος ποσότης τετηγμένου χυτοσιδήρου, δηπως έξαγεται ούτος ἐκ τῶν ὑψικαμίνων, καὶ ἀμέσως προσφυσᾶται, διὰ τοῦ διατρήτου δευτέρου πυθμένος τοῦ δοχείου, ρεῦμα θερμοῦ ἀέρος ὑπὸ πίεσιν, ὃ ὀποῖος, διερχόμενος διὰ μέσου τῆς ὑγρᾶς μάζης τοῦ χυτοσιδήρου, κατακαίει δὲν τὸν ἄνθρακα αὐτοῦ. Ἡ ἐκ τῆς καύσεως ταύτης τοῦ ἄνθρακος ἔκλιομένη θερμότης, διατηρεῖ τὴν θερμοκρασίαν ἀρκετὰ ὑψηλήν, ὥστε ὁ σίδηρος νὰ μὴ στερεοποιεῖται κατὰ τὴν διεργασίαν ταύτην, ἡ ὅποια διαρκεῖ 15 - 20 λεπτὰ τῆς ὥρας. Κατακαιομένου οὕτω δὲν τοῦ ἄνθρακος τοῦ χυτοσιδήρου, λαμβάνεται ὡς τελικὸν προϊὸν μαλακὸς σίδηρος. Προκειμένου νὰ ληφθῇ χάλυψ, προστίθεται κατόπιν εἰς αὐτὸν τόση ποσότης τετηγμένου χυτοσιδήρου, ὥστε τὸ δὲν μῆγμα νὰ ἔγῃ τὴν ἀνάλογον πρὸς ἐπιτυχίαν χάλυβος ποσότητα ἄνθρακος. Διὰ τῆς εὐφυεστάτης καὶ ταχυτάτης ταύτης μεθόδου, κατὰ τὴν ὅποιαν ὡς καύσιμος ὅλη γρηγοριοποιεῖται, ὡς εἰδομεν, ὃ ἐν τῷ χυτοσιδήρῳ περιεγόμενος ἄνθραξ, κατωρθώθη νὰ παρασκευαστῇ χάλυψ εἰς μεγάλας ποσότητας καὶ εἰς χαμηλὴν τιμήν.

Ειδικοὶ χάλυβες. — Διὰ τῆς προσθήκης εἰς τὸν χάλυβα μικρῶν ποσοτήτων διλλῶν τινῶν μετάλλων, μαγγανίου, νικελίου, χρωμίου κ.λ.π. λαμβάνονται οἱ λεγόμενοι εἰδικοὶ χάλυβες, ἔχοντες ιδιαιτέρως τινὰς ιδιότητας. Οὕτω τὸ μαγγάνιον αὔξανε τὴν συνεκτικότητα τοῦ χάλυβος, τὸ νικέλιον καὶ χρώμιον τὴν σκληρότητα αὐτοῦ κ.λ.π.

Φυσικαὶ ιδιότητες

Τοῦ μαλακοῦ σιδήρου. — Ὁ μαλακὸς σίδηρος ἔχει χρῶμα τεφρόλευκον, E.B. 7,8 καὶ τήκεται περὶ τοὺς 1500⁰. Εἶναι λίαν ἐλατός, δλκιμος καὶ ἀνθεκτικός. Θερμαινόμενος ἴσχυρῶς καθίσταται ἀρκετὰ μαλακός, ὥστε νὰ δύνηται διὰ σφυρηλασίας νὰ λάβῃ τὸ ποθούμενον σχῆμα, ἢ νὰ δύνηται νὰ συγκολλῶνται δύο τεμάχια αὐτοῦ. Ἔχει ἐπὶ πλέον τὴν ιδιότητα νὰ μαγνητίζεται μόνον ἐχόσον εύρισκεται ἐντὸς μαγνητικοῦ πεδίου, νὰ χάνῃ δμως τὸν μαγνητισμὸν του μόλις εύρεθῇ ἐκτὸς αὐτοῦ.

Τοῦ χυτοσιδήρου. — Ὁ χυτοσιδήρος (μαντέμι) ἐμπεριέχει ἐκτὸς τοῦ ἄνθρακος καὶ μικρὰς ποσότητας πυριτίου, μαγγανίου, φωσφόρου, θείου. Εἶναι τεφρόχρους, σκληρὸς καὶ εὐθραυστος, ἔχων E.B. 7,0 - 7,5. Τηγόμενος περὶ τοὺς 1100⁰ - 1200⁰ δίδει ὑγρὸν λεπτόρρευστον, διὸ εἰναι κατάληλος πρὸς κατασκευὴν χυτῶν ἐντικειμένων, ἐξ οὗ καὶ τὸ ὄνομά του.

Τοῦ χάλυβος. — 'Ο χάλυψ (ἀτσάλι) ἔχει χρῶμα κατά τι βαθύτερον τοῦ μαλακοῦ σιδήρου καὶ τὸ αὐτὸν E.B. 7,8 περίπου. Εἶναι σκληρότερος καὶ ὀνθεκτικώτερος αὐτοῦ, ἐπὶ πλέον δὲ ἔχει μεγάλην ἐλαστικότητα. Εἶναι καὶ αὐτὸς ἐλατὸς διὰ σφυρηλασίας καὶ συγκολλᾶται πρὸς ἑαυτὸν εἰς ὑψηλὴν θερμοκρασίαν, τήκεται δὲ εἰς 1300⁰ - 1400⁰. Μαγνητίζεται δυσκολώτερον τοῦ μαλακοῦ σιδήρου, διατηρεῖ δύμας τὸν μαγνητισμόν του καὶ δταν εὐρεθῆ ἐκτὸς τοῦ μαγνητικοῦ πεδίου, ὡς ἐκ τούτου εἶναι κατάληλος πρὸς κατασκευὴν μονίμων μαγνητῶν.

'Εκείνη δύμας ἡ ἴδιότης ἡ δποία κυρίως χαρακτηρίζει τὸν χάλυβα εἶναι ἡ βαφὴ ἡ στόμωσις αὐτοῦ, ἥτοι ἡ ἵκανότης τὴν δποίαν ἔχει, διαπυρούμενος καὶ κατόπιν ψυχόμενος ἀποτόμως, δι' ἐμβαπτίσεως του ἐντὸς ψυχροῦ ὅδατος ἡ ἄλλου τινὸς ὑγροῦ (ἐλαίου κ.ἄ.), νὰ σκληρύνεται εἰς μέγαν βαθμόν. Συγχρόνως δύμας τότε καθίσταται εὐθραυστος. 'Εὰν τὸν οὕτω σκληρυνθέντα χάλυβα θερμάνωμεν ἐκ νέου καὶ τὸν ἀφήσωμεν νὰ ψυχθῇ βραδέως, καθίσταται καὶ πάλιν ἐλατὸς καὶ εὐκατέργαστος (ἀνόπτησις).

Τοῦ καθαροῦ σιδήρου. — 'Ο χημικῶς καθαρὸς σιδήρος, λαμβανόμενος δι' ἡλεκτρολύσεως τοῦ χλωριούχου σιδήρου, εἶναι μέταλλον ἀργυρόλευκον, μαλακὸν ἔχον E.B. 7,86 καὶ τηκόμενον εἰς 1535⁰. Αἱ ἄλλαι του φυσικαὶ ἴδιότητες προσομοιάζουν πρὸς τὰς τοῦ μαλακοῦ σιδήρου.

Χημικαὶ ἴδιότητες

Αἱ χημικαὶ ἴδιότητες ὅλων τῶν εἰδῶν τοῦ σιδήρου εἶναι περίπου αἱ αὐταί.

Εἰς τὸν ἔηρὸν ἀέρα ὁ σιδηρός μένει ἀναλλοίωτος εἰς τὴν συνήθη θερμοκρασίαν, δταν δύμας θερμανθῆ ἵσχυρῶς καίεται, ἐντὸς καθαροῦ ὅξυγόνου, πρὸς μαγνητικὸν δξείδιον τοῦ σιδήρου :




Εἰς τὸν ὑγρὸν ἀέρα καλύπτεται ὑπὸ ἐρυθροφαίου στρώματος πορώδους οὐσίας, τῆς σκωρίας, ἡ δποία ἀποτελεῖται κυρίως ἐξ ὑδροξειδίου τοῦ σιδήρου Fe(OH)_3 . 'Η σκωρία αὕτη δὲν περιορίζεται μόνον εἰς τὴν ἐπιφάνειαν ἀλλ' εἰσχωρεῖ καὶ εἰς τὸ βάθος τοῦ μετάλλου καὶ διὰ τοῦ χρόνου τὸ διαβιβρώσκει. Διὰ νὰ προφυλάξωμεν τὸν σιδήρον ἐκ τῆς σκωρίας τὸν ἐπικαλύπτομεν διὰ λεπτοῦ στρώματος ἐκ μετάλλου μὴ ἀλλοιουμένου εὐκόλως, δπως εἶναι ὁ ψευδάργυρος (σὶ δη-

ρος γαλβανισμένος), δικαστήρος (λευκόσιδηρος), τὸ νικέλιον, τὸ χρώμιον κ.ἄ.

Ἐκ τῶν δέξεων διδηρος προσβάλλεται εύκόλως, ἀκόμη καὶ ἐν ψυχρῷ, ὑπὸ τοῦ ἀραιοῦ ὑδροχλωρικοῦ καὶ τοῦ ἀραιοῦ θειϊκοῦ δέξεος, ὑπὸ ἔκλυσιν ὑδρογόνου:



Ἐπίσης προσβάλλεται ὑπὸ τοῦ ἀραιοῦ νιτρικοῦ δέξεος, ὅπότε ὅμως ἔκλυονται νιτρώδεις ἀτμοὶ καὶ οὐχὶ ὑδρογόνον:



Ἐὰν ὅμως διδηρος ἐμβαπτισθῇ ἐπὶ τινα χρόνον ἐντὸς πυκνοῦ νιτρικοῦ δέξεος γίνεται τότε παθητικός, ἥτοι δὲν προσβάλλεται πλέον ὑπὸ τῶν ἀραιῶν δέξεων. ᘾπίσης δὲν προσβάλλεται διδηρος ὑπὸ τοῦ πυκνοῦ καὶ ψυχροῦ θειϊκοῦ δέξεος.

Ἐφαρμογαὶ

Ο σιδηρος εἶναι τὸ σπουδαιότερον τῶν μετάλλων, αἱ δὲ ἐφαρμογαὶ του εἶναι ἄπειροι. Ποικίλα ἔργαλεῖα καὶ μηχανήματα, ἀτμομηχαναῖ, σκεύη πάσης χρήσεως, σιδηραῖ ράβδοι καὶ δοκοί, σύρματα καὶ ἐλάσματα παντὸς εἴδους, πυροβόλα ὅπλα καὶ πυρομαχικά κ.λ.π., ἀποτελοῦν τὰς κυριωτέρας του ἐφαρμογάς. ᘾπὶ πλέον χρησιμοποιεῖται εἰς τὴν οἰκοδομικήν, πρὸς κατασκευὴν τοῦ σιδηροπαγοῦς κονιάματος ἢ πρὸς ἀντικατάστασιν τοῦ ξύλου. Ὡς ἐκ τούτου ἡ κατανάλωσις τοῦ σιδήρου εἰς τὸν κόσμον εἶναι τεραστία.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

33) Γνωρίζομεν ὅτι 3200 χιλιόγραμμα σιδηρομεταλλεύματός τινος παράγονται 1 τόννον χυτοσιδήρου περιεκτικότητος 4% εἰς ἄνθρακα. Νὰ εὑρεθῇ ποία ἡ περιεκτικότης εἰς σιδηρον τοῦ μεταλλεύματος τούτου.

34) Θέλομεν νὰ μετατρέψωμεν εἰς καθαρὸν σιδηρον 1 τόννον χυτοσιδήρου, περιεκτικότητος 5% εἰς ἄνθρακα. Πόσον βάρος δισυγόνου θὰ χρειασθῇ καὶ πόσος εἶναι διγκος τοῦ μονοξειδίου τοῦ ἄνθρακος, τὸ διποτον θὰ σχηματισθῇ; (Δὲν λαμβάνονται ὑπὸ δψιν αἱ ἄλλαι οὐσίαι τοῦ χυτοσιδήρου).

ΝΙΚΕΛΙΟΝ

Σύμβολον *Ni*

*Ατομικὸν βάρος 58,69

Σθένος *II, III*

Προέλευσις. — 'Ελεύθερον τὸ νικέλιον ἀποτελεῖ συστατικὸν πολλῶν μετεωριτῶν. 'Εκ τῶν δρυκτῶν του σπουδαιότερα εἶναι ὁ νικελίτης NiAs, ὁ νικελιοπυρίτης NiS, ὁ γαρνιερίτης (πυριτικὸν ἄλας), κ.λ.π. Παρ' ἡμῖν ἀπαντῶνται νικελιοῦχα σιδηρομεταλλεύματα εἰς τὴν Λάρυμναν (παρὰ τὴν Ἀταλάντην).

Μεταλλουργία — 'Ιδιότητες. — 'Η μεταλλουργία τοῦ νικελίου γίνεται διὰ μερικῆς φρύξεως τῶν δρυκτῶν του καὶ ἀναγωγῆς τοῦ προκύπτοντος δξειδίου ἐντὸς εἰδικῶν καμίνων, τῇ προσθήκῃ καταλλήλων συλλιπασμάτων. Τὸ λαμβανόμενον ἀκάθαρτον νικέλιον ἀποκαθίσταται διὰ ἡλεκτρολύσεως.

Τὸ νικέλιον εἶναι μέταλλον ἀργυρόλευκον, λισχυρᾶς μεταλλικῆς λάμψεως, σκληρὸν ἀλλ' ἐλατὸν καὶ ὅλκιμον, E.B. 8,9, τηκόμενον εἰς 145⁰. Εἰς τὴν σύνηθη θερμοκρασίαν δὲν δξειδοῦται εἰς τὸν ἀέρα, προσβάλλεται δὲ ἀσθενῶς ὑπὸ τῶν δξέων. 'Υπὸ τοῦ πυκνοῦ νιτρικοῦ δξέες, λαμβάνει τὴν παθητικὴν κατάστασιν.

Έφαρμογαί. — 'Ως μὴ ἀλλοιούμενον εἰς τὸν ἀέρα, χρησιμοποιεῖται εὐρύτατα πρὸς ἐπινικέλωσιν τοῦ σιδήρου καὶ ἄλλων μετάλλων. Χρησιμένει ἐπίσης πρὸς κατασκευὴν πολλῶν κραμάτων, ὡς ὁ νεάργυρος (χαλκός, νικέλιον, ψευδάργυρος) καὶ οἱ νικελιοχάλυβες, οἱ δόποιοι εἶναι λίαν σκληροὶ καὶ ἀνθεκτικοί, χρησιμοποιοῦνται δὲ πολὺ εἰς τὴν βιομηχανίαν αὐτοκινήτων καὶ ἀεροπλάνων.

ΚΟΒΑΛΤΙΟΝ

•Σύμβολον *Co*

*Ατομικὸν βάρος 58,94

Σθένος *II, III*

Τὸ κοβάλτιον ἀπαντᾶται ἐλεύθερον εἰς μικρὰς ποσότητας εἰς τοὺς μετεωρίτας, ὡς καὶ τὸ νικέλιον. Κυρίως δόμως εὑρίσκεται εἰς τὴν φύσιν ὑπὸ μορφὴν δρυκτῶν, ὃν σπουδαιότερα εἶναι ὁ κοβαλτίτης CoAs₂ καὶ ὁ σμαλτίτης CoAs₂.

'Η μεταλλουργία καὶ αἱ ιδιότητές του εἶναι ἐντελῶς ἀνάλογοι πρὸς τὰς τοῦ νικελίου. 'Εχει E.B. 8,9 καὶ τήκεται εἰς 1480⁰.

Παρόμοιαι πρὸς τὰς τοῦ νικελίου εἶναι καὶ αἱ ἔφαρμογαί του.

Χρησιμοποιεῖται δηλονότι πρὸς ἐπικάλυψιν τοῦ σιδήρου καὶ προφύλαξίν του ἀπὸ τῆς δέξειδώσεως καὶ πρὸς κατασκευὴν κραμάτων σκληρῶν καὶ ἀνθεκτικῶν ἔναντι τῶν χημικῶν ἀντιδραστηρίων *

ΧΡΩΜΙΟΝ — ΜΑΓΓΑΝΙΟΝ

ΧΡΩΜΙΟΝ

Σύμβολον Cr

* Αιτιολικὸν βάρος 52,01

Σθένος II, III, V, VI

Προέλευσις — Μεταλλουργία. — Τὸ χρώμιον ἀπαντᾶ εἰς τὴν φύσιν μόνον ὑπὸ τὴν μορφὴν δρυκτῶν ἐκ τῶν ὅποιων σπουδαιότερα εἶναι, ἡ ωχρὰ τοῦ χρωμίου Cr_2O_3 , ὁ χρωμίτης $\text{FeO} \cdot \text{Cr}_2\text{O}_3$ καὶ ὁ κροκοττηγός PbCrO_4 .

Τὸ μεταλλικὸν χρώμιον λαμβάνεται ἐκ τοῦ δέξειδίου του, δι᾽ ἀναγωγῆς τούτου δι᾽ ἀργιλίου, κατὰ τὴν λεγομένην ἀργιλιοθερμικὴν μέθοδον



Ἐὰν ἀντὶ τοῦ δέξειδίου τοῦ χρωμίου χρησιμοποιηθῇ πρὸς ἐξαγωγὴν τοῦ χρωμίου ὁ χρωμίτης, τότε λαμβάνεται, διὰ τῆς ἀργιλιοθερμικῆς πάλιν μεθόδου, κρᾶμα σιδήρου καὶ χρωμίου, τὸ σιδηρόχρωμιον, χρησιμοποιούμενον ἀπὸ εὐθείας πρὸς παρασκευὴν χρωμίοχάλυβος.

Εἰς χημικῶς καθαρὰν κατάστασιν λαμβάνεται τὸ γρώμιον διὰ ἡλεκτρολύσεως τοῦ χλωριούχου χρωμίου.

Ιδιότητες — Εφαρμογαί. — Τὸ χρώμιον εἶναι μέταλλον λευκόν, λίαν σκληρόν, ἔχον E.B. 6,90 καὶ τηκόμενον εἰς 1615⁰. Εἰς τὴν συνήθη θερμοκρασίαν δὲν δέξειδοῦται, προσβάλλεται δὲ δυσκόλως ὑπὸ τῶν δέξεων.

Χρησιμοποιεῖται πρὸς παραγωγὴν τοῦ λίαν σκληροῦ καὶ ἀνθεκτικοῦ χρωμίοχάλυβος καὶ δι᾽ ἐπιχρωμιώσεις τοῦ σιδήρου καὶ δλλῶν μετάλλων, πρὸς προφύλαξιν αὐτῶν ἀπὸ τῆς δέξειδώσεως. Ἀποτελεῖ τὸ συστατικὸν πολλῶν κραμάτων, δν κυριώτερον εἶναι ὁ χρωμίονικελίνης (χρώμιον καὶ νικέλιον), γρησιμοποιούμενον πρὸς κατασκευὴν ἡλεκτρικῶν ἀντιστάσεων.

* Μεγάλην σπουδαιότητα παρουσιάζει ἐν ραδιενέργον τεχνητὸν Ισότοπον τοῦ κοβαλτίου, ἀτομικοῦ βάρους 60. Τοῦτο εἶναι πηγὴ Ισχυρᾶς ἀκτινοβολίας γ., πολὺ Ισχυροτέρας τῆς τοῦ ραδίου, χρησιμοποιεῖται δὲ διὰ τὴν θεραπείαν τοῦ καρκίνου, ὑπὸ τὸ δηνομα φόμβα τοῦ κοβαλτίου (Νοσοκομεῖον Ἀλεξάνδρας — Ἀγηνῶν).

Διχρωμικὸν κάλιον $K_2Cr_2O_7$. — Εἶναι ἡ σπουδαιότερα τῶν ἐνώσεων τοῦ χρωμίου. Ἀποτελεῖ ὠραίους πορτοκαλερύθρους κρυστάλλους, εὐδιαλύτους εἰς τὸ ০δωρ, χρησιμοποιεῖται δὲ κυρίως ὡς ἴσχυρὸν δξειδωτικὸν μέσον, ἐπιδράσει θειϊκοῦ δξέος, κατὰ τὴν ἀντιδρασιν :

$$K_2Cr_2O_7 + 4H_2SO_4 \rightarrow K_2SO_4 + Cr_2(SO_4)_3 + 4H_2O + 3O.$$

ΜΑΓΓΑΝΙΟΝ

Σύμβολον Mn Ατομικὸν βάρος 54,93 Σθένος II, III, IV, VI, VII

Προέλευσις — Μεταλλουργία. — Τὸ σπουδαιότερον ὄρυκτὸν τοῦ μαγγανίου, μὴ ἀπαντῶντος εἰς ἐλευθέρων κατάστασιν, εἶναι ὁ πυρολογιστής MnO_2 . Ἀλλα δὲ ὄρυκτὰ αὐτοῦ εἶναι : ὁ βραυνίτης Mn_2O_3 , ὁ ἀουσμανίτης Mn_3O_4 , ὁ μαγγάνιτης $Mn_2O_3 \cdot H_2O$, ὁ ροδοχροτής $MnCO_3$.

Τὸ μεταλλικὸν μαγγάνιον λαμβάνεται δι’ ἀναγωγῆς δξειδίου τινὸς κύτου, διὰ τῆς ἀργιλοθερμικῆς μεθόδου :



Πρὸς παρασκευὴν τῶν σπουδαιότερων κραμάτων αὐτοῦ μετὰ σιδήρου, ὑποβάλλεται εἰς ἐκκαμίνευσιν μῆγμα ὄρυκτῶν σιδήρου καὶ μαγγανίου, ὅπότε λαμβάνεται δι’ ἀναγωγῆς δι’ ἀνθρακος τὸ σιδήρο μαγγάνιον, περιέχον σίδηρον, μαγγάνιον καὶ δλίγον ἀνθρακα.

Ιδιότητες — Χρήσεις. — Τὸ μαγγάνιον εἶναι μέταλλον τεφρόλευκον, σκληρὸν καὶ εὔθραυστον. Ἐχει E.B. 7,20 καὶ τίκεται εἰς 1260°. Εἰς τὸν ὑγρὸν ἀέρα δξειδοῦται βραδέως, προσβάλλεται δὲ ὑπὸ τῶν ἀραιῶν δξέων.

Χρησιμοποιεῖται κυρίως πρὸς παρασκευὴν μαγγανιούχων χάλύβων, οἱ ὅποιοι εἶναι ἀνθεκτικοὶ καὶ πολὺ σκληροί. Ἀποτελεῖ ἐπίσης συστατικὸν δλλῶν κραμάτων, κυρίως τοῦ μαγγανιού χού μπρούντζου (χαλκός, φευδάργυρος, μαγγάνιον).

Ἐνώσεις τοῦ μαγγανίου. — Σπουδᾶι ἐνώσεις τοῦ μαγγανίου εἶναι δι πυρολογιστής καὶ τὸ ὑπερμαγγανικὸν κάλιον.

Ο πυρολογιστής MnO_2 , θερμαινόμενος ἴσχυρῶς ἀποδίδει μέρος τοῦ δξυγόνου του, ὡς ἐκ τούτου δρᾶ δξειδωτικῶς :



Τὸ ὑπερμαγγανικὸν κάλιον $KMnO_4$, κρυσταλλοῦται

εἰς ιωδιομέλανα πρίσματα, μεταλλικῆς λάμψεως, εύδιάλυτα εἰς τὸ ὕδωρ, ὑπὸ ἐρυθροϊώδη χροιάν. Ἀποτελεῖ ἐν τῶν Ισχυροτέρων δξειδωτικῶν σωμάτων, διὸ χρησιμοποιεῖται ὡς ἀπολυμαντικὸν καὶ μικροβιοκτόνον. Ἐπιδράσει θειίκου δξέος ἀποδίδει εὐκόλως δξυγόνον, κατὰ τὴν ἔξισωσιν



ΜΟΛΥΒΔΟΣ—ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΣ

ΜΟΛΥΒΔΟΣ

Σύμβολον Pb

*Ατομικὸν βάρος 207,21

Σθένος II, IV

Προέλευσις. — Σπουδαιότερον δρυκτὸν τοῦ μολύβδου εἶναι ὁ γαληνίτης PbS , ὁ ὅποῖος εἶναι ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἀργυρομιγής, ἀπαντᾶ δὲ καὶ παρ' ἡμῖν ἐν Λαυρίῳ. Μικροτέρας σημασίας δρυκτά του εἶναι: ὁ ἀγγλεσίτης $PbSO_4$, ὁ ψιμυθίτης $PbCO_3$, ὁ κροκοΐτης $PbCrO_4$.

Μεταλλουργία. — Ο μόλυβδος ἔξαγεται κυρίως ἐκ τοῦ γαληνίτου. Πρὸς τοῦτο οὗτος ὑποβάλλεται εἰς πλήρη φρῦξιν, μὲν ἀποτέλεσμα τὴν μετατροπήν του εἰς δξείδιον, ἀναγόμενον ἔπειτα ἐν θερμῷ δι' ἄνθρακος:



Ο λαμβανόμενος μόλυβδος ἔμπειριχεὶ πάντοτε μικρὰς ποσότητας ἀντιμονίου, κασσιτέρου, χαλκοῦ κ.λ.π. Πρὸς καθαρισμὸν τήκεται ἐντὸς εἰδικῶν ἀβαθῶν προσφλογοβόλων καμίνων, ὅπότε αἱ προσμίξεις δξειδοῦνται ταχύτερον τοῦ μολύβδου καὶ συγκεντρούμεναι ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας του ὑπὸ μορφὴν ἀφροῦ ἀπομακρύνονται. Ο τελικῶς λαμβανόμενος μόλυβδος, ἐὰν ἔμπειριχη σημαντικὴν ποσότητα ἀργύρου, ὑποβάλλεται εἰς εἰδικὴν ἔπειζεργασίαν, πρὸς παραλαβὴν τοῦ πολυτίμου τούτου μετάλλου.

Ιδιότητες. — Ο μόλυβδος εἶναι τόσον μαλακός, ὥστε χαράσσεται διὰ τοῦ ծυγχος, τέμνεται δὲ εὐκόλως διὰ μαχαιριδίου. Ἐπὶ προσφάτου τομῆς εἶναι κυανόλευκος καὶ λίαν στιλπνός. Ἐχει E.B. 11,35 καὶ τήκεται εἰς 327°. Εἶναι εὔκαμπτος, ἐλατός καὶ ὅλκιμος, παρέχει ὅμως ἐλάσματα καὶ σύρματα μικρᾶς ἀντοχῆς. Συρόμενος ἐπὶ τοῦ χάρτου ἀφίνει ἔχην τεφρόχροα.

Εἰς τὸν ξηρὸν ἀέρα ἐπικαλύπτεται διὰ λεπτοῦ στρώματος ἔξ ύπειδίου τοῦ μολύβδου Pb_2O , εἰς τὸν ὑγρὸν ὅμως ἀέρα σχηματίζεται διὰ

τοῦ χρόνου ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας του προστατευτικὸν ἐπίστρωμα ἐκ βασικοῦ ἀνθρακικοῦ μολύβδου $PbCO_3 \cdot Pb(OH)_2$. Θερμαϊνόμενος καλύπτεται ὑπὸ κιτρίνου στρώματος ἐξ ὁξείδιου τοῦ μολύβδου PbO .

Τὸ χημικῶς καθαρὸν ὄδωρ (ἀπεσταγμένον ἢ βρόχινον), ὑπὸ τὴν σύγχρονον ἐπίδρασιν τοῦ ὁξυγόνου τοῦ ἀέρος, διαλύει ἐν μέρει τὸν μόλυβδον, διότι σχηματίζεται τότε διαλυτὸν ὄνδροξείδιον τοῦ μολύβδου :



Τὰ πηγαῖα ὅμως καὶ τὰ φρεάτια ὄδατα, λόγῳ τῶν περιεχομένων ἀνθρακικῶν καὶ θειϊκῶν ἀλάτων, προκαλοῦν τὸν σχηματισμὸν ἐπὶ τοῦ μολύβδου στρώματος ἀπὸ τὰ ἀντίστοιχα ἀλατά του, τὰ ὄποια ὡς ἀδιάλυτα προστατεύουν αὐτὸν ἀπὸ τῆς περαιτέρω ἐπιδράσεώς των. Ἐπειδὴ δὲ αἱ ἐνώσεις τοῦ μολύβδου εἰναι δηλητηριώδεις, ἔπειται ὅτι οἱ μολυβδοσωλῆνες δύνανται μὲν νὰ χρησιμοποιηθοῦν ἀκινδύνως διὰ τὴν διοχέτευσιν πηγαίων ἢ φρεατίων ὄδατων, οὐχὶ ὅμως καὶ ὄδατος τῆς βροχῆς.

Ἐκ τῶν ὁξέων τὸ νιτρικὸν προσβάλλει καὶ διαλύει εὔκόλως τὸν μόλυβδον, μετατρέπον αὐτὸν εἰς νιτρικόν $Pb(NO_3)_2$. Ἐπίσης τὸν προσβάλλει τὸ πυκνὸν καὶ ζέον θειϊκόν δέξ, ἀλλὰ βραδέως. Τὸ ὄνδροχλωρικόν καὶ τὸ ἀραιόν θειϊκόν δέξ δὲν προσβάλλουν αἰσθητῶς τὸν μόλυβδον.


Χρήσεις. — 'Ο μόλυβδος χρησιμοποιεῖται εἰς τὴν κατασκευὴν σωλήνων πρὸς διοχέτευσιν τοῦ ὄδατος καὶ τοῦ φωταερίου, σωλήνων ἐπενδύσεως τῶν ἡλεκτροφόρων ἀγωγῶν, πρὸς κατασκευὴν τῶν ἡλεκτρικῶν συσσωρευτῶν, πρὸς ἐπένδυσιν τῶν μολυβδίνων θαλάμων τῆς βιομηχανίας τοῦ θειϊκοῦ δέξεος κ.λ.π. 'Αποτελεῖ ἐπίσης ὁ μόλυβδος συστατικὸν πολλῶν κραμάτων, ἐκ τῶν ὁποίων σπουδαιότερα εἰναι : τὸ μετ' ἀντιμονίου, πρὸς κατασκευὴν τῶν τυπογραφικῶν στοιχείων· τὸ μετὰ κασσιτέρου, πρὸς συγκόλλησιν τῶν μετάλλων· τὸ μετ' ἀρσενικοῦ, πρὸς κατασκευὴν χόνδρων (σκαγίων), διὰ τὰ κυνηγετικὰ ὄπλα.

ΕΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΟΛΥΒΔΟΥ

Όξείδιον τοῦ μολύβδου ἢ Λιθάργυρος PbO . — Παρασκευάζεται διὰ παρατεταμένης θερμάνσεως τοῦ μολύβδου εἰς τὸν ἀέρα, ὡς κιτρίνη ἀκμορφος κόνις. Εἶναι γνωστὴ καὶ ἐτέρα μορφὴ χρώματος ἐρυθροῦ. Χρησιμοποιεῖται εἰς τὴν ὑαλουργίαν, τὴν κεραμευτικήν, τὴν παρασκευὴν χρωμάτων τῆς ζωγραφικῆς, ὡς στεγνωτικὸν τῶν ἐλαιοχρωμάτων καὶ πρὸς παρασκευὴν ἀλάτων τοῦ μολύβδου.

Ἐπιτεταρτοξείδιον τοῦ μολύβδου ἢ Μίνιον Pb_3O_4 .— Παρασκευάζεται διὰ παρατεταμένης θερμάνσεως τοῦ λιθαργύρου εἰς 500° . Εἶναι κόνις ἐρυθρά, χρησιμοποιεῖται δὲ εὐρύτατα, ἐν ἀναμίξει μετὰ λινελαίου, πρὸς ἐπάλειψιν τῶν σιδηρῶν ἀντικειμένων πρὸς προφύλαξιν αὐτῶν ἀπὸ τῆς σκωριάσεως.

Διοξείδιον τοῦ μολύβδου PbO_2 .— Λαμβάνεται δι’ ἐπιδράσεως νιτρικοῦ δέξεος ἐπὶ μινίου :



Εἶναι κόνις καστανή, ἀδιάλυτος εἰς τὸ ০δωρ, ἢ ὅποια διὰ θερμάνσεως ἀποδίδει δέξυγόνον : $2PbO_2 \rightarrow 2PbO + O_2$. Διὰ τὸν λόγον αὐτὸν χρησιμοποιεῖται εἰς πολλὰς περιστάσεις ὡς δέξειδωτικὸν μέσον.

Ἀνθρακικὸς μόλυβδος $PbCO_3$.— Ἀπαντᾶ εἰς τὴν φύσιν ὡς δρυκτὸν ψιμυθίτης. Εἰς τὴν βιομηχανίαν παρασκευάζεται ὁ βασικὸς ἀνθρακικὸς μόλυβδος, τῆς συνθέσεως $2PbCO_3$. $Pb(OH)_2$, διὰ διοχετεύσεως διοξειδίου τοῦ ἀνθρακος εἰς διάλυμα βασικοῦ δέξεικου μολύβδου. Ἀποτελεῖ βαρεῖαν λευκὴν ἄμορφον κόνιν, χρησιμοποιουμένην ὑπὸ τὸ ০νομα λευκὸν τοῦ μολύβδου (στοιχέτω), ὡς ἀριστον λευκὸν ἐλαιόχρωμα, μεγάλης ἐπικαλυπτικῆς δυνάμεως. Ἐχει δύμας τὸ μειονέκτημα νὰ ἀμαυροῦται ὑπὸ τοῦ ০δροθείου, διὰ τοῦτο ἀντικαθίσταται συνήθως ὑπὸ ἄλλων λευκῶν χρωμάτων, ὅπως εἶναι τὸ δέξειδιον τοῦ ψευδαργύρου κ.ἄ.

ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΣ

Σύμβολον Sn

Ατομικὸν βάρος $118,70$

Σθήρος II, IV

Προέλευσις — Μεταλλουργία.— Τὸ σπουδαιότερὸν του δρυκτὸν εἶναι ὁ κασσιτερίτης SnO_2 , ἀπαντῶν κυρίως εἰς τὴν Μαλακὴν χερσόνησον.

Πρὸς ἔξαγωγὴν τοῦ κασσιτέρου ἐκ τοῦ κασσιτέρίτου ὑποβάλλεται οὗτος, κονιοποιηθεὶς, εἰς πλύσιν, διὰ πολλοῦ ρέοντος ০δατος, πρὸς ἀπομάκρυνσιν τῶν γαιωδῶν προσμίξεων, ἔπειτα εἰς φρῦξιν, πρὸς ἀπομάκρυνσιν τοῦ θείου καὶ τοῦ ἀρσενικοῦ καὶ τέλος εἰς θέριμνσιν μετ’ ἀνθρακος, ἐντὸς καταλλήλων καμίνων, πρὸς ἀναγωγὴν :



Τὸ οὕτω λαμβανόμενον ἀκάθαρτον προϊὸν καθαίρεται δι’ ἀνατίξεως

εἰς χαμηλὴν θερμοκρασίαν, ὅπότε τήκεται μόνον ὁ καθαρὸς κασσίτερος, ὡς εὔτηκτος, καὶ καταρρέει, ἐνῷ αἱ ξέναι προσμίξεις μένουν, ὡς δυστήκτοτεραι.

Ίδιότητες. — 'Ο κασσίτερος εἶναι μέταλλον ἀργυρόλευκον, στιλπνόν, μαλακὸν καὶ λίαν ἐλατόν, μὲν χαρακτηριστικὴν ὁσμὴν καὶ ὑφὴν κρυσταλλικήν, εἰς τὴν ὅποιαν ὀφείλεται ὁ τριγμός του, ὅταν κάμπτεται, διότι τότε θραύσονται οἱ κρύσταλλοι. ⁷Έχει E.B. 7,29 καὶ τήκεται εἰς 232°. Εἰς τὸν ἀέρα καὶ τὸ ὄδωρ διατηρεῖται ἀναλλοίωτος ἐπὶ μακρόν, θερμαινόμενος δῆμας περὶ τοὺς 2000° δξειδοῦται κατ' ἐπιφάνειαν, εἰς ὑψηλὴν δὲ θερμοκρασίαν καίεται μετὰ λαμπρᾶς φλογὸς πρὸς διοξείδιον SnO_2 . Διαλύεται εὐκόλως εἰς πυκνὸν καὶ θερμὸν ὑδροχλωρικὸν δξύ, μετ' ἔκλυσεως ὑδρογόνου, καὶ εἰς θερμὸν καὶ πυκνὸν θειικὸν δξύ, μετ' ἔκλυσεως διοξείδιου τοῦ θείου :



'Υπὸ τοῦ πυκνοῦ νιτρικοῦ δξέος δξειδοῦται πρὸς μετακασσιτερικὸν δξύ H_2SnO_3 , τὸ ὅποιον εἶναι κόνις λευκή, ἀδιάλυτος.

Χρήσεις — 'Ως δυσοξείδωτος, χρησιμοποιεῖται πρὸς ἐπικασσιτέρωσιν χαλκίνων δοχείων καὶ σκευῶν, σωλήνων, συρμάτων, πρὸς προφύλαξιν ἀπὸ τῆς δξειδώσεως, κυρίως δὲ πρὸς παρασκευὴν τοῦ λευκοσιδήρου (κ. τενεκέ). Πρὸς τοῦτο λεπτὰ ἐλάσματα σιδήρου ἐμβαπτίζονται ἐντὸς τετηγμένου κασσιτέρου. Χρησιμοποιεῖται ἐπίσης διὰ τὴν κατασκευὴν φύλων περιτυλίξεως διαφόρων τροφίμων (σοκολάτας, τυροῦ κ.λ.π.). ⁸Αποτελεῖ προσέτι ὁ κασσίτερος συστατικὸν πολλῶν χρησίμων κραμάτων, δπως εἶναι ὁ μπροστὸς (χαλκός, κασσίτερος), τὸ συγκολλητικὸν κρᾶμα (κ. καλάϊ) (μόλυβδος, κκσίτερος), τὸ κρᾶμα τῶν τυπογραφικῶν στοιχείων (μόλυβδος, κασσίτερος, ἀντιμόνιον) κ.λ.π.

ΧΑΛΚΟΣ — ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ — ΑΡΓΥΡΟΣ

ΧΑΛΚΟΣ

Σύμβολον Cu


Ατομικὸν βάρος 63,54

Σθίρος I, II

Προέλευσις. — 'Ο χαλκὸς ἀπαντᾶ ἐνίστε καὶ ὡς αὐτοφυής, κυρίως δημως εὑρίσκεται ὑπὸ μορφὴν δρυκτῶν, σπουδαιύτερα τῶν ὅποιων εἶναι :

ό κυπρίτης Cu_2O , διχαλκοσίνης ή χαλκολαμπρίτης Cu_2S , διχαλκοπυρίτης CuFeS_2 , διμαλαχίτης $\text{CuCO}_3 \cdot \text{Cu(OH)}_2$, διάζουρίτης $2\text{CuCO}_3 \cdot \text{Cu(OH)}_2$.

Μεταλλουργία. — Η μεταλλουργία του χαλκού έχει πάταξη από τους είδους των δρυκτών. Εάν το δρυκτό είναι διείδιον, άναγεται σε θερμή ίνπο άνθρακος· έτσι δε είναι άνθρακικόν πυρούται πρώτον ίνα μετατραπή εἰς διείδιον, σπέρα κατόπιν άναγεται ως άνωτέρω:




Εάν δημιουργείται περὶ θειούχων δρυκτῶν, τὰ διποῖα είναι καὶ τὰ περισσότερα, τότε ἡ μεταλλουργία των είναι ἀρκετά πολύπλοκος, διότι ἐμπειρέχονται σε αὐτοὺς πολλαὶ ζέναι προσμίξεις, κυρίως σιδήρου, ἀρσενικοῦ, άντιμονίου κ. ξ., αἱ διποῖαι πρέπει νὰ ἀπομακρυνθοῦν. Διὰ τοῦτο ἡ μεταλλουργία τῶν θειούχων δρυκτῶν περιλαμβάνει τὰς ἔξης διεργασίας:

α) Τὸ δρυκτὸν φρύσσεται ἐντὸς καμίνων, διπότε τὰ μὲν ἀρσενικὸν καὶ ἀντιμόνιον ἐκφεύγουν ως πτητικὰ διείδια, καθὼς καὶ μέρος τοῦ θείου ως διοξείδιον, ἐνῷ δὲ σιδήρος μεταβάλλεται εἰς διείδιον, δὲ χαλκὸς ἐν μέρει μεταπίπτει εἰς διείδιον, ἐν μέρει δὲ ἀπομένει ως θειούχος.

β) Τὸ προϊὸν τοῦτο τῆς φρύξεως θερμαίνεται κατόπιν μετ' ἀνθρακοῦ καὶ ἄμμου, διπότε τὸ μὲν διείδιον τοῦ σιδήρου μετατρέπεται εἰς πυριτικὸν σιδήρον, δὲ διποῖος ἐπιπλέει ως σκωρία καὶ ἀπομακρύνεται, τὸ δὲ διείδιον τοῦ χαλκοῦ άναγεται εἰς μεταλλικὸν χαλκόν. Απομένει οὕτω τελικῶς μία μᾶζα ἐκ μεταλλικοῦ χαλκοῦ καὶ θειούχου χαλκοῦ, περιεκτικότητος 30 - 40 % εἰς χαλκόν, ἡ διποία λέγεται χαλκόλιθος.


γ) Ο χαλκόλιθος οὗτος ὑποβάλλεται εἰς φρύξιν, διπότε μέρος τοῦ θειούχου χαλκοῦ μετατρέπεται εἰς διείδιον, τὸ διποῖον ἀντιδρᾷ μὲ τὸν ἀπομένοντα θειούχον χαλκὸν πρὸς μεταλλικὸν χαλκὸν καὶ διοξείδιον τοῦ θείου:



Λαμβάνεται οὕτω προϊὸν περιεκτικότητος 90 - 95 % εἰς χαλκόν, τὸ διποῖον λέγεται μέλας χαλκός, διότι ἔχει χρῶμα σκοτεινόν, λόγω τῆς συνυπάρξεως διλίγου διείδιου τοῦ χαλκοῦ. Οὗτος, ὑποβαλλόμενος τελικῶς εἰς ήλεκτρόλυσιν, παρέχει καθαρὸν χαλκόν.

Ιδιότητες. — Ο χαλκὸς είναι μέταλλον ἐρυθρόν, ισχυρᾶς μετα-

λικής λάμψεως, λίαν έλατὸν καὶ δλκιμον, ἔχον Ε.Β. 8,9 καὶ τηκόμενος εἰς 1085°. Εἶναι δὲ καλύτερος ἀγωγὸς τῆς θερμότητος καὶ τοῦ ἡλεκτρισμοῦ, μετὰ τὸν ἄργυρον. Ἐπειδὴ κατὰ τὴν τῆξιν του σχηματίζονται φυσαλίδες, εἶναι ἀκατάλληλος διὰ χυτὰ ἀντικείμενα, διὸ κατεργάζεται κυρίως διὰ σφυρηλασίας. Εἰς τὸν ἀέρα ἐπικαλύπτεται βραδύτατα ὑπὸ πρασίνου προστατευτικοῦ ἐπιστρώματος ἐκ βασικοῦ ἀνθρακικοῦ χαλκοῦ [Cu(OH)₂]CO₃. Θερμαίνομενος δὲ ἵσχυρῶς μετατρέπεται κατ' ἀρχὰς μὲν εἰς ἐρυθρὸν ὑποξείδιον τοῦ χαλκοῦ Cu₂O, ἐπειτα δὲ εἰς μέλαν ὁξείδιον τοῦ χαλκοῦ CuO. Προσβάλλεται κυρίως ὑπὸ τοῦ νιτρικοῦ ὁξέος καθὼς καὶ ὑπὸ τοῦ θερμοῦ καὶ πυκνοῦ θειικοῦ ὁξέος :



Προσβάλλεται ἐπίσης ὑπὸ τινῶν δργανικῶν ὁξέων, τὰ δοποῖα καίτοι ἀσθενῆ, ὡς τὸ ὁξεικόν, τὸ ἔλατικόν, τὸ βουτυρικόν, ὑπὸ τὴν σύγχρονον ἐπίδρασιν τοῦ ὁξυγόνου καὶ τοῦ ἀέρος, σχηματίζονται ἄλατα χαλκοῦ εὐδιάλυτα καὶ δηλητηριώδη. Ἐντεῦθεν δὲ κίνδυνος τῆς παρασκευῆς ή διατηρήσεως τροφίμων ἐντὸς χαλκίνων σκευῶν καὶ ή ἀνάγκη τῆς ἐπικαστιτερώσεως αὐτῶν.


Χρήσεις. — Ο χαλκὸς εὔρισκει ἔκτεταμένην ἐφαρμογὴν εἰς τὴν ἡλεκτροτεχνίαν, πρὸς κατασκευὴν ἡλεκτροφόρων συρμάτων καὶ ἡλεκτρικῶν δργάνων καὶ μηχανῶν, ἐπίσης πρὸς κατασκευὴν ἀμβύκων, λεβήτων, ψυκτήρων καὶ ἄλλων ποικίλων συσκευῶν. Τὸ μεγαλύτερον μέρος τοῦ χαλκοῦ μετατρέπεται εἰς κράματα, τὰ δοποῖα εύρισκουν μεγίστην ἐφαρμογὴν εἰς τὰς τέχνας, ἔνεκα τῶν πολυτίμων μηχανικῶν ἴδιοτήτων, τῶν, αἱ δοποῖαι εἶναι : ή στερεότης, ή σκληρότης, τὸ εὐκατέργαστον καὶ εὔχυτον αὐτῶν, καὶ ή στιλπνότης. Τὰ σπουδαιότερα κράματα τοῦ χαλκοῦ εἶναι : δὲ μπροστὶ τζος, ἐκ χαλκοῦ καὶ κασσιτέρου· δὲ ρείχαλκος, ἐκ χαλκοῦ καὶ ψευδαργύρου, μὲ ὥραιον κίτρινον χρῶμα· δὲ εάργυρος, ἐκ χαλκοῦ, νικελίου καὶ ψευδαργύρου, μὲ λευκὸν χρῶμα, ἀργυρίζον καὶ διάφορα ἄλλα κράματα ἐκ χαλκοῦ καὶ ἀργιλίου, μὲ ὥραιον χρυσοκίτρινον χρῶμα.

ΕΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ

Εἰς τὰς ἐνώσεις του δὲ χαλκὸς συμπεριφέρεται κυρίως ὡς δισθενής, τὰ δὲ ἐκ τοῦ δισθενοῦς χαλκοῦ προερχόμενα ἄλατα δεικνύουν ἐν διαλύσει

κυανούν χρῶμα. Ἐκ τῶν ἀλάτων τούτων σπουδαιότερον εἶναι ὁ θειϊκός χαλκός.

Θειϊκός χαλκός $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$. — Ὁ θειϊκός χαλκός, κοινῶς γαλαζίος πετρασκευάζεται δι' ἐπιδράσεως ἐπὶ ἀπορριμμάτων χαλκοῦ, πυκνοῦ καὶ θερμοῦ θειϊκοῦ δξέος ἢ οἰκονόμικώτερον διὰ κατεργασίας μετ' ἀραιοῦ καὶ ζέοντος θειϊκοῦ δξέος, ὑπὸ σύγχρονον διοχέτευσιν ἀέρος:



Κρυσταλλοῦται μετὰ 5 μορίων үδατος εἰς μεγάλους διαφανεῖς κρυσταλλους κυανοῦ χρώματος, οἱ δόποιοι εἶναι εὐδιάλυτοι εἰς τὸ үδωρ, εἰς δὲ τὸν ἀέρα ἀποσαθροῦνται μερικῶς. Διὰ θερμάνσεως εἰς 100° ἔκφεύγουν τὰ 4 μόρια τοῦ κρυσταλλικοῦ үδατος, εἰς θερμοκρασίαν δὲ ἀνωτέραν τῶν 200° ἔκφεύγει καὶ τὸ πέμπτον μόριον, ἀπομένει δὲ τὸ ἄλας ڏνυδρον, ὡς λευκὴ κόνις, ἴσχυρῶς ὑγροσκοπική. Δι' ἵχνῶν үδατος, δ ڏνυδρος λευκὸς θειϊκός χαλκός χρώνυται καὶ πάλιν κυανοῦς. Χρησιμοποιεῖται πρὸς καταπολέμησιν τοῦ περονοσπόρου τῆς ἀμπέλου, εἰς τὴν κατασκευὴν ἡλεκτρικῶν τινῶν στοιχείων, ὡς ἀντισηπτικὸν τῶν ξύλων κ.λ.π.

ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ

Σύμβολον Hg

Ατομικὸν βάρος 200,61

Σθένος I, II

Προέλευσις. — Εἰς μικρὰς ποσότητας ἀπαντᾷ ὁ үδράργυρος ἐλεύθερος, ὑπὸ μορφὴν σταγόνων, ἐντὸς πετρωμάτων τινῶν. Τὸ σπουδαιότερόν του үμως δρυκτὸν εἶναι τὸ κιννάβαρι, τὸ δόποιον, ἐμπλουτισθὲν καταλλήλως, ὑποβάλλεται εἰς φρῦξιν, ἐντὸς προσφλογοβόλων καμίνων:



Οἱ παραγόμενοι τότε ἀτμοὶ τοῦ үδραργύρου διοχετεύονται εἰς πήλινα δοχεῖα ἢ σωλῆνας πρὸς συμπύκνωσιν.

Ιδιότητες. — Εἶναι τὸ μόνον ὑγρὸν μέταλλον, ἔχον χρῶμα ἀργυρόλευκον, ἴσχυρὰν μεταλλικὴν λάμψιν, E.B. 13,55, σημεῖον πήξεως— $38,90^{\circ}$ καὶ σημεῖον ζέσεως 357° . Εἰς πᾶσαν θερμοκρασίαν ἀναδίδει ἀτμούς, οἱ

όποιοι είσαγόμενοι εἰς τὸν δργανισμὸν τοῦ ἀνθρώπου δροῦν δηλητηριωδῶς.


Εἰς τὸν ἀέρα παραμένει ἀναλλοίωτος, εἰς ὑψηλοτέραν ὅμως θερμοκρασίαν μετατρέπεται εἰς ἐρυθρὸν ὁξείδιον ὑδραργύρου HgO , τὸ ὄποιον ὅμως ἀνα τῶν 400° διασπᾶται εἰς τὸν συνιστῶντα αὐτὸν στοιχεῖα. Προσβάλλεται ὑπὸ τοῦ νιτρικοῦ καὶ ὑπὸ τοῦ πυκνοῦ καὶ θερμοῦ θειϊκοῦ ὁξεός. Διαλύει πλεῖστα μέταλλα, σχηματίζων μετ' αὐτῶν ἀμαλγάματα.

Χρήσεις. — Εὑρυτάτη εἶναι ἡ χρησιμοποίησις τοῦ ὑδραργύρου εἰς τὴν κατασκευὴν θερμομέτρων, βαρομέτρων, ἀεραντλιῶν καὶ πλείστων ὅσων δργάνων Φυσικῆς. Ἐπίσης χρησιμοποιεῖται πρὸς κατασκευὴν τῶν δι' ὑδραργύρου ἡλεκτρικῶν λυχνιῶν, αἱ ὄποιαι ἐκπέμπουν φῶς πλούσιον εἰς ὑπεριώδεις ἀκτῖνας. Ὑπὸ μορφὴν ἀμαλγαμάτων χρησιμεύει εἰς τὴν ὁδοντοϊατρικὴν πρὸς σφράγισιν τῶν ὁδόντων. Χρησιμοποιεῖται προσέτι πρὸς παραλαβὴν τοῦ χρυσοῦ καὶ τῶν ἄλλων εὐγενῶν μετάλλων ἐκ τῶν ὀρυκτῶν.

ΕΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ

Ο ὑδράργυρος σχηματίζει δύο σειρὰς ἐνώσεων, εἰς τὰς ὄποιας συμπεριφέρεται ὡς μονοσθενής καὶ ὡς δισθενής. Ἐκ τούτων σπουδαιότεραι εἶναι ὁ μονοχλωριοῦχος ὑδράργυρος καὶ ὁ διγλωριοῦχος ὑδράργυρος.

Μονοχλωριοῦχος ὑδράργυρος ἢ Καλομέλας Hg_2Cl_2 . — Παρασκευάζεται δι' ἐπιδράσεως χλωριούχου νατρίου ἐπὶ διαλύματος μονιτρικοῦ ὑδραργύρου :



Εἶναι ἄλλας κρυσταλλικόν, λευκόν, ἀσμόν, ἐλάχιστα διαλυτὸν εἰς τὸ ὕδωρ. Δὲν εἶναι δηλητήριον, ἀντιθέτως χρησιμοποιεῖται ὡς ἐλαφρὸν καθαρτικὸν καὶ ἀντισηπτικὸν φάρμακον.

Διχλωριοῦχος ὑδράργυρος $HgCl_2$. — Ο διγλωριοῦχος ὑδράργυρος, κοινῶς ἄχνη ὑδραργύρου, παρασκευάζεται διὰ θερμάνσεως μίγματος θειϊκοῦ ὑδραργύρου καὶ χλωριούχου νατρίου :



Εἶναι σῶμα, στερεόν, λευκόν, διαφανές, ἔξαχνούμενον, δλίγον διαλυτὸν εἰς τὸ ψυχρὸν ὕδωρ, περισσότερον δὲ εἰς τὸ θερμόν. Εἶναι σφοδρότατον δηλητήριον, χρησιμοποιεῖται δὲ εἰς ἀρχιοτάτην διάλυσιν ὡς ἀριστον ἀντισηπτικόν.

ΑΡΓΥΡΟΣ

Σίμιβολον Ag

Ατομικὸν βάρος 107,88


Σθένος I

Προέλευσις. — 'Ο ἄργυρος ἀπαντᾷ εἰς τὴν φύσην καὶ ὡς αὐτοφυής, κυρίως ὅμως εὔρισκεται ὑπὸ τὴν μορφὴν τοῦ δρυκτοῦ ἀργυρίου Ag₂S ὁ ὄποιος συνήθως ἀποτελεῖ πρόσμιξιν τοῦ γαληνίου. Μικροτέρας σημασίας δρυκτά του είναι ὁ κερασογύριτης AgCl, ὁ πυραργυρίτης Ag₃ShS₃, ὁ προύστητης Ag₃AsS₃.

Μεταλλουργία. — 'Η μεταλλουργία τοῦ ἄργυρου συνδέεται μετὰ τῆς τοῦ μολύβδου, τὰ δρυκτά τοῦ δόποιου είναι συνήθως ἀργυρομιγῆ. Ἐπειδὴ συνήθως ἡ περιεκτικότης εἰς ἄργυρον τοῦ ἐκκαμινευθέντος μολύβδου είναι μικρά, ὑποβάλλεται οὕτος εἰς ἐμπλούτισμὸν εἰς ἄργυρον κατὰ διαφόρους μεθόδους. Κατόπιν ὁ ληφθεὶς πλούσιος εἰς ἄργυρον μόλυβδος, ὑποβάλλεται εἰς εἰδικὴν κατεργασίαν πρὸς παραλαβὴν τοῦ μολύβδου, ἡ ὄποια δνομάζεται κυπέλλωσις.

Κατὰ ταύτην τήκεται τὸ κρᾶμα μολύβδου καὶ ἄργυρου ἐντὸς εἰδικῶν καμίνων ἔξι εἰδικοῦ πορώδους ὑλικοῦ, ὑπὸ ταυτόχρονον διοχέτευσιν ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας του ἵσχυροῦ ρεύματος ἀέρος, δόποτε δὲ μόλυβδος δεξειδοῦται πρὸς λιθάργυρον, ὁ ὄποιος ἐπιπλέει τοῦ τήγματος καὶ ἀποχύνεται συνεχῶς ἐκ τῆς ἐπιφανείας του, τὰ τελευταῖα δὲ τοῦ λιθαργύρου ὑπολείμματα ἀπορροφῶνται ὑπὸ τοῦ πορώδους ὑλικοῦ τῆς καμίνου. Μετὰ τὴν πλήρη ἀπομάκρυνσιν τοῦ μολύβδου ἐμφανίζεται εἰς τὸν πυθμένα ἡ στίλβουσα μεταλλικὴ ἐπιφάνεια τοῦ τετηγκότος καθαροῦ ἄργυρου, ὁ καλούμενος βασιλίσκος.

"Αλλῃ μέθοδος μεταλλουργίας τοῦ ἄργυρου είναι ἡ δι' ὑγρᾶς ὁδοῦ, κατὰ τὴν ὄποιαν τὰ λειοτριβηθέντα ἄργυροῦχα δρυκτὰ ὑποβάλλονται εἰς κατεργασίαν μετὰ διαλύματος κυανιούχου νατρίου NaCN, ὑπὸ σύγχρονον διοχέτευσιν ἀέρος, δόποτε σχηματίζεται διπλοῦν ἀλας κυανιούχου ἄργυρου καὶ νατρίου NaAg(CN)₂, διαλυτὸν ἐν ὕδατι. Τῇ προσθήκῃ κατόπιν μεταλλικοῦ ψευδαργύρου ἀποβάλλεται ὁ ἄργυρος ὡς μεταλλικός :



'Ο καθ' οἰανδήποτε μέθοδον λαμβανόμενος ἄργυρος, ἐπειδὴ ἐμπεριέχει πάντοτε ξένας προσμίξεις, ὑποβάλλεται πρὸς καθαρισμὸν εἰς ἡλεκτρόλουσιν.

Ιδιότητες. — 'Ο ἄργυρος είναι τὸ λευκότερον τῶν μετάλλων, ἵσχυρᾶς μεταλλικῆς λάμψεως, μαλακόν, εύηχον, ἔχον E.B. 10,5 καὶ τηκόμενος εἰς 960°.

Είναι τὸ ἀγωγιμότερον ἔξ δλων τῶν μετάλλων καὶ τὸ μᾶλλον ἐλατὸν καὶ ὅλκιμον, μετὰ τὸν χρυσόν. Τηκόμενος ἔχει τὴν ἴδιότητα νὰ ἀπορροφᾷ ὁξυγόνον, τὸ δόπιον ἀποβάλλεται κατὰ τὴν ψῦξιν, συμπαρασῦρον σταγονίδια ἀργύρου, διὸ καὶ εἶναι ἀκατάλληλος διὰ κατασκευὴν χυτῶν ἀντικειμένων. Εἶναι μέταλλον εὐγενές, ὡς μὴ δξειδούμενον εἰς τὸν ἀέρα, οὔτε εἰς ὑψηλὴν θερμοκρασίαν. Προσβάλλεται δικαὶος ὅποιος εἶναι μέλας. Προσβάλλεται εὐκόλως ὑπὸ τοῦ νιτρικοῦ δξέος, δυσκολώτερον δὲ ὑπὸ τοῦ πυκνοῦ καὶ θερμοῦ θειικοῦ δξέος.

Χρήσεις. — 'Ο ἀργυρος, ἔνεκα τοῦ ὥραίου του λευκοῦ χρώματος, τῆς μεγάλης του στιλπνότητος καὶ τῆς ἴδιότητός του νὰ μὴ δξειδοῦται εἰς τὸν ἀέρα, χρησιμοποιεῖται πολὺ πρὸς κατασκευὴν νομισμάτων, κοσμημάτων, ἐπιτραπεζίων σκευῶν καὶ εἰδῶν πολυτελείας. 'Επειδὴ δικαὶος εἶναι μαλακός, χρησιμοποιεῖται πάντοτε εἰς κράματα μετὰ χαλκοῦ (5 - 20 %), δόπιος τὸν καθιστᾶ σκληρότερον, μᾶλλον εύηχον, εύτηκτότερον καὶ εύχυτον. Χρησιμοποιεῖται ἐπίσης δι' ἐπαργυρώσεις, εἰς τὴν κατασκευὴν τῶν κατόπτρων κ.λ.π.

ΕΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ

Νιτρικὸς ἀργυρος AgNO_3 . — Εἶναι τὸ κυριώτερον ἄλας τοῦ ἀργύρου. Παρασκευάζεται δι' ἐπιδράσεως νιτρικοῦ δξέος ἐπὶ ἀργύρου :



Εἶναι σῶμα κρυσταλλικόν, λίαν διελυτὸν εἰς τὸ նδωρ. Προσβάλλεται ὑπὸ τοῦ φωτός, ἀναγόμενος εἰς μεταλλικὸν ἀργυρον, ἰδίως παρουσίᾳ δργανικῶν οὐσιῶν, διὸ καὶ φυλάσσεται ἐντὸς σκοτεινῶν φιαλῶν. Πηγνύει τὸ λεύκωμα καὶ ἀφίνει μελανὰς κηλῦδας ἐπὶ τοῦ δέρματος. Χρησιμοποιεῖται ὡς καυτήριον εἰς τὴν Ιατρικήν, ἐν προσμίξει μετὰ νιτρικοῦ καλίου, ὑπὸ τὴν μορφὴν ραβδίων, ὑπὸ τὸ δνομα πέτρα κολάσεως. Προσέτι χρησιμεύει πρὸς παρασκευὴν ἀνεξιτήλου μελάνης καὶ πρὸς παρασκευὴν τῶν ἄλλων ἀλάτων τοῦ ἀργύρου.

Άλατα τοῦ ἀργύρου μετὰ τῶν ἀλατογόνων: AgCl , AgBr , AgJ . Εἶναι λίαν δυσδιάλυτα εἰς τὸ նδωρ καὶ παρασκευάζονται διὰ διπλῆς ἀντικαταστάσεως, κατὰ τὴν ἐπίδρασιν διαλύματος ἀλογονούχων ἀλάτων τοῦ καλίου ή νατρίου, ἐπὶ διαλύματος νιτρικοῦ ἀργύρου :

$\text{AgNO}_3 + \text{NaCl} \rightarrow \text{NaNO}_3 + \text{AgCl}$ (ἀργυρος χλωριούχος), ίζημα λευκόν, εύδιάλυτον εἰς ἀμμωνίαν.

$\text{AgNO}_3 + \text{NaBr} \rightarrow \text{NaNO}_3 + \text{AgBr}$ (ἀργυρος βρωμιούχος), ίζημα λευκοκίτρινον, δυσδιάλυτον εἰς ἀμμωνίαν.

$\text{AgNO}_3 + \text{KJ} \rightarrow \text{KNO}_3 + \text{AgJ}$ (ἀργυρος ιωδιούχος), ίζημα κίτρινον, ἀδιάλυτον εἰς ἀμμωνίαν.

Τῇ ἐπιδράσει τοῦ φωτὸς τὰ ἄλλα ταῦτα διασπῶνται βραδέως εἰς τὰ συστατικά των, χρωνύμενα κατ' ἀρχὰς λόχροα, ἔπειτα ίώδη, τέλος δὲ μελανά, ἐκ τοῦ εἰς μεταλλικὴν κατάστασιν ἀποβαλλομένου ἀργύρου. Διὰ τὸν λόγον αὐτὸν χρησιμοποιοῦνται πολὺ εἰς τὴν φωτογραφικήν, ίδιως ὁ βρωμιούχος ἀργυρος, ὡς μᾶλλον εύαίσθητος εἰς τὸ φῶς.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

35) Κατεργαζόμεθα διὰ πυκνοῦ καὶ θερμοῦ θειϊκοῦ δξέος 12,8 γραμ. χαλκοῦ. Νὰ εὑρεθῇ ποῖος εἶναι ὁ δγκος τοῦ παραγομένου ἀερίου. Ἐὰν δὲ τὸ ἀερίον τοῦτο διοχετευθῇ εἰς διάλυμα κανοτικοῦ νάρτου, ποία θὰ εἶναι ἡ αὔξησις τοῦ βάρους τοῦ διαλύματος τούτου.

36) Εἰς μῆγμα 12,5 γραμ. θειούχου ἀργύρου Ag_2S καὶ χλωριούχου ἀργύρου AgCl , διαβιβάζομεν ρεῦμα ὑδρογόνου, τὸ δποῖον μετατρέπει τὸ θεῖον τοῦ θειούχου ἀργύρου εἰς ὑδρόθειον H_2S καὶ τὸ χλωριον τοῦ χλωριούχου ἀργύρου εἰς ὑδροχλώριον. Ἀποβάλλεται οὕτω τὸ ίζημα 10 γραμ. ἀργύρου. Νὰ υπολογισθῇ τὸ βάρος ἐκάστου συστατικοῦ τοῦ μήγματος.

ΧΡΥΣΟΣ — ΛΕΥΚΟΧΡΥΣΟΣ

ΧΡΥΣΟΣ

Σύμβολον Au

*Αιτιακὸν βάρος 197,20

Σθέρος I, III

Προέλευσις. — 'Ο χρυσός, κατ' ἔξοχὴν εὐγενὲς μέταλλον, ἀπαντᾷ εἰς τὴν φύσιν αὐτοφυής, κυρίως εἰς λεπτότατα ϕήγματα, εἴτε ἐντὸς χαλαζιαῶν πετρωμάτων, εἴτε ἐντὸς τῆς ἀμμου ποταμῶν, προελθούσης ἐξ ἀποσαθρώσεως χρυσοφόρων πετρωμάτων. Εύρισκεται εἰς πολλὰ μέρη, τῆς γῆς, κυρίως ὅμιλος εἰς τὸ Τράνσβαλ τῆς Νοτίου Αφρικῆς, τὸ δποῖον παρέχει τὸ 1/3 περίπου τῆς παγκοσμίου παραγωγῆς.

Μεταλλουργία. — 'Η έξαγωγή τοῦ χρυσοῦ γίνεται κυρίως κατά δύο μεθόδους :

α) Δι' ἀμαλγαμώσεως. — Κατὰ τὴν μέθοδον ταύτην ἡ χρυσοφόρος ἄκμας ἡ τὸ χρυσοφόρον πέτρωμα κονιοποιηθέν, ὑποβάλλονται εἰς ἐπιμελῆ κατεργασίαν μεθ' ὑδραργύρου, δόπτε ὁ χρυσὸς μετατρέπεται εἰς ἀμάλγαμα, ἐκ τοῦ ὅποιου δι' ἀποστάξεως, ἀφίπταται ὁ ὑδραργύρος, ἀπομένει δὲ ὁ χρυσὸς εἰς μεταλλικὴν κατάστασιν.

β) Διὰ διαλύσεως καὶ καθιζήσεως. — "Οταν τὸ πέτρωμα ἐμπειρίχει χρυσὸν εἰς κατάστασιν λεπτοτάτου διαμερισμοῦ, τότε κονιοποιεῖται καὶ ἡ κόνις του κατεργάζεται μετὰ διαλύματος κυανιούχου νατρίου, τὸ ὅποιον, παρουσίᾳ τοῦ ἀέρος, διαλύει τὸν χρυσόν, σχηματίζομένου συμπλόκου ἄλατος αὐτοῦ :



Κατόπιν ἔκ τοῦ διαλύματος τοῦ ἄλατος τούτου λαμβάνεται ὁ χρυσός, εἴτε δι' ἡλεκτρολύσεως, εἴτε διὰ καθιζήσεως ὑπὸ ψευδαργύρου :



Ίδιότητες. — 'Ο χρυσὸς ἔχει ὠραῖον κίτρινον χρῶμα, στιλβούμενος δὲ ἀποκτᾷ ἔξαιρετικὴν λάμψιν. Εἶναι μαλακός, ἔχει E.B. 19,3 καὶ τήκεται εἰς 1063°. Εἶναι τὸ περισσότερον ἀλατὸν καὶ ὄλκιμον μέταλλον, δυνάμενον νὰ μεταβληθῇ εἰς φύλλα πάχους 0,0001 τοῦ χιλιοστομέτρου διὰ μέσου τῶν ὅποιων διέρχεται τὸ φῶς, μετὰ πρασινωπῆς χροιᾶς.

'Ως μέταλλον εὐγενὲς εἶναι ἀνοξείδωτος καὶ ἀπρόσβλητος ὑπὸ τῶν δξέων. Προσβάλλεται μόνον ἀπὸ τὰ ἀλατογόνα στοιχεῖα, τὰ τήγματα τῶν καυστικῶν ἀλκαλίων, τοῦ κυανιούχου νατρίου ἡ καλίου καὶ τοῦ βασιλικοῦ ὅδατος (μίγματος ὑδροχλωρικοῦ καὶ νιτρικοῦ δξέος 3 : 1), τὸ ὅποιον διαλύει τὸν χρυσόν, μετατρέπον αὐτὸν εἰς χλωριοῦχον.

Χρήσεις. — 'Ο χρυσὸς χρησιμοποιεῖται κυρίως πρὸς κατασκευὴν νομισμάτων καὶ κοσμημάτων, διὰ τὴν σφράγισιν τῶν δδόντων καὶ δι' ἐπιχρυσώσεις.

'Επειδὴ εἶναι μαλακός, ἀναμιγνύεται συνήθως μετὰ χαλκοῦ ἡ ἀργύρου, τὰ ὅποια τὸν καθιστοῦν σκληρότερον. 'Ο χαλκὸς προσδίδει εἰς τὸν χρυσὸν ἐρυθρωπὴν ἀπόχρωσιν, ἐνῷ δὲ ἀργυρος ἀλατώνει τὴν ἔντασιν τοῦ κίτρινου του χρώματος. 'Η εἰς χρυσὸν περιεκτικότης χράματός τινος ὑπολογίζεται ἐμπορικῶς εἰς καράτια ἡ εἰκοστὰ τέταρτα. Κατὰ ταῦτα χρῆμα τὸ χρυσοῦ 20 καρατίων ἐμπειρίχει 20 24 χρυσοῦ, ὃ δὲ καθαρὸς χρυσὸς εἶναι 24 καρατίων. 'Επιστημονικῶς ἡ περιεκτικό-

της τοῦ χρυσοῦ ὑπολογίζεται εἰς χιλιοστά. Οὕτω τὰ χρυσᾶ νομίσματα περιέχουν 800/1000 χρυσοῦ (22 καράτια), τὰ κοσμήματα 750/1000 (18 καράτια) κ.λ.π.

* Η περιεκτικότης τῶν κραμάτων εἰς χρυσὸν ἀνευρίσκεται ἐμπειρικῶς διὰ παρατηρήσεως τῆς ἐπιδράσεως νιτρικοῦ δξέος (E.B. 1,36) ἐπὶ τῆς γραμμῆς, τὴν ὅποιαν ἀφίνει τὸ ὑπὸ ἔξετασιν ἀντικείμενον, προστριβόμενον ἐπὶ εἰδικοῦ σκληροῦ λίθου, τῆς λυδίας λίθου. Προκειμένου περὶ καθαροῦ χρυσοῦ ἡ γραμμὴ αὕτη μένει ἀναλλοίωτος, καθίσταται δὲ ἐπὶ τοσοῦτον λεπτοτέρα, δσον ἡ περιεκτικότης εἰς ξένα μέταλλα εἶναι μεγαλυτέρα.

ΛΕΥΚΟΧΡΥΣΟΣ


Σύμβολον Pt

* Ατομικὸν βάρος 195,23

Σθένος II, IV

Προέλευσις. — 'Ο λευκόχρυσος εύρισκεται πάντοτε αὐτοφυής, ἀλλὰ κατὰ μικρὰ ποσά, ἐντὸς ἄμμων, προελθουσῶν ἐξ ἀποσαθρώσεως ἀρχαιοτάτων πετρωμάτων. Συνοδεύεται πάντοτε ὑπὸ ἄλλων τινῶν σπανίων μετάλλων, ὡς τὸ ἱρίδιον, τὸ παλλάδιον, τὸ δσμιον. Ἀπαντᾶται εἰς δλίγα μέρη τῆς γῆς, κυρίως εἰς τὰ Οὐράλια ὅρη, τὰ δποῖα παρέχουν τὰ 90% τῆς παγκοσμίου παραγωγῆς.

Μεταλλουργία. — Πρὸς ἐξαγωγὴν τοῦ λευκοχρύσου ἐκ τοῦ μετάλλευματός του, ὑποβάλλεται τοῦτο εἰς πλῦσιν δι' ὕδατος, πρὸς ἀπομάκρυνσιν τῆς ἄμμου, ὡς εἰδικῶς ἐλαφροτέρας καὶ ἐν συνεχείᾳ, δι' ἐπιδράσεως ἀραιοῦ βασιλικοῦ ὕδατος, ἀπομακρύνονται ὁ χρυσὸς καὶ ὁ σίδηρος. Κατόπιν δι' ἐπιδράσεως πυκνοῦ βασιλικοῦ ὕδατος διαλύεται ὅλος ὁ λευκόχρυσος, σχηματίζομένου λευκόχρυσον διαλύεται στον H_2PtCl_6 . 'Εξ αὐτοῦ ἀκολούθως, δι' ἐπιδράσεως χλωριούχου ἄμμωνίου, σχηματίζεται ἵζημα κίτρινον ἐκ χλωριολευκοχρυσοῦ ἀμμώνιου, ἐκ τοῦ δποίου τελικῶς λαμβάνεται διὰ θερμάνσεως ὁ μεταλλικὸς λευκόχρυσος :



Ιδιότητες. — 'Ο λευκόχρυσος ἡ πλατίνα εἶναι μέταλλον λευκόν, ισχυρᾶς μεταλλικῆς λάμψεως, λίγην ἐλατὸν καὶ ὅλκιμον, σκληρότερον τοῦ χρυσοῦ, ἔχει E.B. 21,5 καὶ τήκεται εἰς 1775°. Εἶναι μέταλλον εὔγενες ἀπρόσβλητον ὑπὸ τοῦ δξυγόνου καὶ τῶν δξέων. Προσβάλλεται μόνον

ύπὸ τοῦ πυκνοῦ καὶ θερμοῦ βασιλικοῦ ὕδατος καὶ ὑπὸ τῶν τετηγμένων καυστικῶν ἀλκαλίων.

Εἰς κατάστασιν λεπτοτάτου διαμερισμοῦ ἀποτελεῖ τὸ μέλαν
τοῦ λευκοχρόου σου, τὸ ὅποῖον εἶναι κόνις μέλαινα, βαρεῖα, ἔχουσα
τὴν ἰδιότητα νὰ ἀπορροφᾷ μεγάλας ποσότητας ἀερίων καὶ νὰ δρᾶ κατα-
λυτικῶς, κατὰ τὰς μεταξὺ τῶν ἀερίων ἀντιδράσεις. Τὰς αὐτὰς ἰδιότητας
ἔχει καὶ ὁ σποργάδης λευκόχρυσος, ὁ ὅποῖος εἶναι μᾶλα
τεφρὰ καὶ σποργώδης.

Χρήσεις. — ‘Ως μέταλλον λίαν δύστηκτον καὶ ἀπρόσβλητον ὑπὸ¹
τῶν δξέων, ὁ λευκόχρυσος χρησιμοποιεῖται πρὸς κατασκευὴν πολλῶν καὶ
ποικίλων ἐπιστημονικῶν ὀργάνων (ἡλεκτροδίων, καψῶν, χωνευτηρίων
κ.λ.π.). Τὸ μετ’ ἵριδίου (10 %) χρᾶμα τοῦ λευκοχρύσου εἶναι σκληρό-
τερον καὶ δυστηκτότερον τοῦ λευκοχρύσου, ἐπὶ πλέον δὲ σχεδὸν ἀνεπη-
ρέαστον ὑπὸ τῶν συνήθων μεταβολῶν τῆς θερμοκρασίας, διὸ χρησιμο-
ποιεῖται πρὸς κατασκευὴν προτύπων μέτρων καὶ σταθμῶν.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ

ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ραδιενέργεια.— Ό Γάλλος φυσικός Becquerel παρετήρησε τὸ 1896 δτι τὰ ἄλατα τοῦ οὐρανίου ἐκπέμπουν συνεχῶς ἀκτῖνας ἀφανεῖς, δυναμένας νὰ διαπεράσουν μέλανα διαφανῆ χάρτην καὶ νὰ προσβάλουν φωτογραφικάς πλάκας ἢ νὰ προκαλέσουν τὴν ἐκκένωσιν φορτισμένου ἡλεκτροσκοπίου. Τὸ φαινόμενον τοῦτο ἐκλήθη ραδιενέργεια (ἀκτινενέργεια) καὶ εύρεθη δτι ἡ ἔντασίς του εἶναι ἀνάλογος πρὸς τὴν περιεκτικότητα τῶν ἀλάτων εἰς οὐράνιον, ἀλλὰ δὲν ἐξαρτᾶται, οὕτε ἀπὸ τὸ εἶδος των, οὕτε ἀπὸ τὰς ἔξωτερικὰς συνθήκας, εἰς τὰς ὅποιας ὑπὸβάλλονται. Εἶναι μία ἰδιότης τοῦ ἀτόμου τοῦ οὐρανίου. Βραδύτερον ἡ Marie Curie μετὰ τοῦ συζύγου της Pierre Curie παρετήρησαν δτι ὁ πισσούρα φανίτης, τὸ δρυκτὸν ἐκ τοῦ ὅποιου ἐξάγεται τὸ οὐράνιον, παρουσιάζει ἀκτινοβολίαν πολὺ μεγαλυτέραν ἀφ' ὅσην δικαιολογεῖ ἡ περιεχομένη εἰς αὐτὰ ποσότης οὐρανίου. Συνεπέραναν δθεν δτι εἰς τὸ δρυκτὸν τοῦτο ἐνυπάρχουν στοιχεῖα μὲν ραδιενέργειαν πολὺ ἴσχυροτέραν τῆς τοῦ οὐρανίου. Πράγματι, ὑποβαλόντες εἰς συστηματικὴν ἀνάλυσιν τὸν πισσούραντην, ἀνεκάλυψαν τὸ 1898 δύο νέα ραδιενέργα στοιχεῖα, τὸ πολώνιον καὶ τὸ ράδιον, ἐκ τῶν ὅποιων τὸ δεύτερον εἶχε ραδιενέργειαν κατὰ πολὺ ἴσχυροτέραν τῆς τοῦ οὐρανίου.

Ἀκτινοβολία τῶν ραδιενεργῶν στοιχείων. — Ή ἔρευνα ἀπέδειξεν δτι ἡ ἀκτινοβολία τοῦ ραδίου καὶ τῶν ἄλλων ραδιενεργῶν στοιχείων δύναται ν' ἀναλυθῇ εἰς τρία εἰδή ἀκτίνων, αἱ ὅποιαι διακρίνονται διειθνῶς μὲ τὰ ἑλληνικὰ γράμματα α, β, γ. Αἱ ἀκτῖνες α εἶναι θετικῶς φορτισμέναι καὶ ἀποτελοῦνται ἀπὸ πυρῆνας τοῦ στοιχείου ἥλιου. Αἱ ἀκτῖνες β εἶναι ἀρνητικῶς ἡλεκτρισμέναι, ἀποτελοῦνται δὲ ἀπὸ ἡλεκτρόνια. Αἱ ἀκτῖνες γ δὲν εἶναι ὑλικαί, ἀλλὰ φύσεως ἀναλόγου πρὸς τὸ φῶς ἢ πρὸς τὰς ἀκτῖνας Ραίντγκεν, μὲ μῆκος δύμας κύματος πολὺ μικρότερον. Αἱ ἀκτῖνες αὗται ἔχουν μεγάλην διεισδυτικὴν δύναμιν (ἐμβέλειαν), διαπερῶσαι μεταλλικὰ στρώματα ἀρκετοῦ πάχους.

Μεταστοιχείωσις. — 'Η ραδιενέργεια είναι άποτέλεσμα τής αύτομάτου διασπάσεως της ύλης, κατά τὴν ὅποιαν τὰ ἄτομα τῶν ραδιενεργῶν στοιχείων μετατρέπονται αὐτομάτως εἰς ἄτομα ἄλλων στοιχείων, ύφεστανται δηλαδὴ μεταστοιχείων. Οὕτω τὸ ράδιον, ἔχον ἀτομικὸν βάρος 226, ἐκπέμπον ἀκτῖνας α, αἱ ὅποιαι είναι εἰναι πυρῆνες τοῦ στοιχείου ἡλίου, ἀτομικοῦ βάρους 4, μετατρέπεται εἰς ἐν ἀέριον στοιχεῖον, τὸ ραδίον A, ἀτομικοῦ βάρους 222. Τὸ ραδόνιον, ἐκπέμπον καὶ αὐτὸν ἀκτῖνας α, δίδει ὑπόλειμμά τι στερεόν, τὸ ραδίον A, μὲ ἀτομικὸν βάρος 218. Νέα ἐκπομπὴ ἀκτίνων α, μετατρέπει τὸ ράδιον A εἰς ραδίον B, τὸ ὅποιον δι' ἐκπομπῆς ἀκτίνων β μετατρέπεται εἰς ραδίον C κ.ο.κ. Η μεταστοιχείωσις αὕτη συνεχίζεται ἕως ὅτου σχηματισθῇ τελικῶς ἐν στοιχείον σταθερόν, τὸ ὅποιον ἔχει ἀτομικὸν βάρος 206 καὶ εἶναι ισότοπον τοῦ μολύβδου. Ἐκάστη τῶν μεταστοιχειώσεων τούτων είναι άποτέλεσμα τῆς αὐτομάτου διασπάσεως τῶν ἀτομικῶν πυρήνων τοῦ ραδιενεργοῦ στοιχείου καὶ εἶναι ἀδύνατον νὰ ἐπιδράσωμεν ἐπὶ τῆς ταχύτητος τῶν μετασχηματισμῶν αὐτῶν, διὰ τῆς αὐξήσεως τῆς θερμοκρασίας, τῆς πιέσεως κ.λ.π. "Ἐκκστον στοιχείον ραδιενεργὸν ἔχει ίδικήν του ταχύτητα μεταστοιχειώσεως. Συνήθως ὑπολογίζουν δι' ἔκκστον ραδιενεργὸν στοιχείον τὸν χρόνον, διὰ τῆς αὐξήσεως τῆς θερμοκρασίας, τῆς πιέσεως κ.λ.π. "Ο χρόνος αὐτὸς λέγεται ἡ μιτερίδος ζωῆς καὶ εἶναι λίαν διάφορος εἰς τὰ διάφορα ραδιενεργά στοιχεῖα. Οὕτως η ἡμιπερίοδος ζωῆς τοῦ οὐρανίου είναι 4.600.000.000 ἔτη, τοῦ ραδίου 1.590 ἔτη, τοῦ ραδονίου 4 ἡμέραι κ.λ.π.

Τεχνητή μεταστοιχείωσις. — ‘Ως είδομεν άνωτέρω ή αύτόματος διάσπασις τῶν ἀτόμων τῶν ραδιενεργῶν στοιχείων ἔχει ώς ἀποτέλεσμα τὴν φυσικὴν μεταστοιχείωσιν αὐτῶν, τὴν μετατροπήν των δηλαδὴ εἰς ἄλλο εἶδος στοιχείων. Τοιαύτη μεταστοιχείωσις ἐπέτευχθη καὶ τεχνητῶς, πρῶτος δὲ ὁ Rutherford ἐπέτυχε μεταστοιχείωσιν τοῦ δέσμου τὸ 1919, βομβαρδίσας τὰ ἀτομα αὐτοῦ μὲ ἀκτῖνας α, ἐκπεμπομένας ὑπὸ τίνος ραδιενεργοῦ στοιχείου. Κατὰ δὲ τὸ 1934 τὸ ζεῦγος τῶν Γάλλων ἐπιστημόνων Irène Curie καὶ F. Joliot κατέδειξαν δτι, κατά τινας τεχνητὰς μεταστοιχείωσεις, σχηματίζονται στοιχεῖα ἀσταθῆ, τὰ δόποια εἶναι ἀληθῆ ραδιενεργά στοιχεῖα τεχνητά, μὲ ἡμιπερίοδον ζωῆς δύμας σχετικῶς βραχεῖαν. Τὰ

νέα ταῦτα στοιχεῖα εἶναι ἰσότοπα ἄλλων στοιχείων, λέγονται δὲ ραδιοσύντοπα καὶ παρίστανται μὲ τὰ γνωστὰ σύμβολα τῶν στοιχείων αὐτῶν, φέροντα δῆμας ἔνα ἀστερίσκον, ὃ ὅποιος δεικνύει ὅτι τὸ στοιχεῖον τοῦτο εἶναι ραδιενεργόν. Οὕτως ἔχομεν τὰ στοιχεῖα : ραδιοάνθραξ, ραδιοφωσφόρος, ραδιοἄζωτον, παριστάμενα διὰ τῶν συμβόλων C*, P* N*. Τὰ στοιχεῖα ταῦτα χρησιμοποιοῦνται πολὺ σήμερον ὑπὸ μὲν τῶν ἱατρῶν διὰ θεραπευτικούς σκοπούς, π. χ. ἐναντίον τοῦ καρκίνου, ὑπὸ δὲ τῶν βιολόγων, ὡς δεῖκται διὰ τὴν παρακολούθησιν τῆς κυκλοφορίας διαφόρων στοιχείων εἰς τὸν δργανισμὸν τῶν ζώων ἢ τῶν φυτῶν.

ΔΙΑΣΠΑΣΙΣ — ΣΧΑΣΙΣ — ΣΥΝΤΗΕΙΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διάσπασις — Σχάσις τῶν ἀτόμων.— Εἰς τὸ ράδιον καὶ τὰ ἄλλα ἀκτινεργὰ στοιχεῖα, τὸ ἀτομον αὐτῶν διασπᾶται εἰς δύο ἄλλα ἀτομα, τὸ ἐν τῶν ὁποίων εἶναι μικροῦ καὶ τὸ ἄλλο μεγάλου ἀτομικοῦ βάρους. Οὕτω τὸ ράδιον, τὸ ὅποιον ἔχει ἀτομικὸν βάρος 226, διασπᾶται εἰς τὸ ραδόνιον ἀτομικοῦ βάρους 222 καὶ τὸ ἥλιον ἀτομικοῦ βάρους 4. Συγγρόνως παράγονται καὶ ἀκτινοβολίαι, ὡς εἶναι αἱ ἀκτινοβολίαι, α, β, καὶ γ εἰς τὴν περίπτωσιν τοῦ ραδίου, ἐλευθεροῦται δὲ καὶ μέγα ποσὸν ἐνεργείας. Τὸ φαινόμενον τοῦτο δνομάζεται διάσπασις τοῦ ἀτόμου.

Τὸ ἔτος 1939 παρετηρήθη ὅτι τὸ ἀτομον τοῦ ἰσοτόπου στοιχείου οὐρανίου 235 διασπᾶται, εἰς ἐλάχιστον βαθμόν, εἰς δύο ἀτομα, περίπου ⅔ του ἀτομικοῦ βάρους, μὲ σύγχρονον ἀπώλειαν μικροῦ μέρους τῆς μάζης του (περίπου τὸ ἐν χιλιοστὸν αὐτῆς), ὑπελογίσθη δὲ ὅτι εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν τὸ ἐλευθερούμενον ποσὸν ἐνεργείας εἶναι τεράστιον. Τὸ φαινόμενον τοῦτο τῆς διασπάσεως τοῦ ἀτόμου εἰς δύο ἄλλα ἀτομα, ⅔ του ἀτομικοῦ βάρους περίπου, ὠνομάσθη σχάση τοῦ ἀτόμου (fission). Τὴν σχάσιν ταύτην τοῦ ἀτόμου ἡδυνήθησαν εἰς τὰς 'Ηνωμένας Πολιτείας τῆς 'Αμερικῆς νὰ τὴν ἀναπτύξουν τεχνητῶς' διὰ τῆς λεγομένης ἀλυσωτῆς ἀντιδράσεως καὶ νὰ κατασκευάσουν τὴν ἀτομικὴν βόμβαν. Δύο τοιαῦται βόμβαι ριψεῖσαι εἰς δύο 'Ιαπωνικὰς μεγαλοπόλεις (Χιροσίμα, Ναγκασάκι) τὰς ἔξηφάνισαν σχεδὸν ἀπὸ τοῦ προσώπου τῆς γῆς ἐν ριπῇ δρθαλμοῦ, μὲ 200.000 καὶ

πλέον ἀνθρώπινα θύματα. 'Η Ιαπωνία τότε, τρομοκρατηθεῖσα, ἐσυνθηκολόγησεν τὴν ἑπομένην (Αὔγουστος 1945).

Άτομική ἑνέργεια. — 'Η τεραστία ἑνέργεια, ἡ ὅποια ἐλευθεροῦται κατὰ τὴν σχάσιν τοῦ ἀτόμου καὶ ἐπροκάλεσε τὰς ἀνωτέρω ἀνευθεροῦται γούμένου καταστροφάς, ὁνομάζεται ἀ το μική ἐνέργεια. 'Ἐκ τῶν ἐν τῇ φύσει στοιχείων, σχάσιν ὑφίσταται μόνον ἐν λιστοπον τοῦ οὐρανίου, τὸ οὐράνιον 235 (ἀτομικοῦ βάρους 235), τὸ διποτοῦ ἀποτελεῖ μόνον τὰ 0,7 % τοῦ φυσικοῦ οὐρανίου. Τεχνητῶς ὅμως παρεσκευάσθησαν ἄλλα δύο σχάσιμα στοιχεῖα, τὸ πλούτων (Z = 94) καὶ τὸ οὐράνιον 233.

Μετὰ τὸν πόλεμον κατώρθωσαν νὰ χαλιναγγήσουν τὴν τεραστίχην ἑνέργειαν, ἡ ὅποια ἐλευθεροῦται κατὰ τὴν ἀτομικὴν σχάσιν (δηλαδὴ τὴν δύναμιν τῆς ἀτομικῆς βόλβας), διὰ τῆς λεγομένης ἀ το μικής στήλης ἡ ὅπως τῷρα καλεῖται διὰ τοῦ ἀ το μικοῦ ἀντιδραστῆρος, καὶ σήμερον παράγεται βιομηχανικὴ ἑνέργεια εἰς Ἀγγλίαν, 'Ηνωμένας Πολιτείας τῆς Ἀμερικῆς καὶ Ρωσίαν, διὰ τῆς χρησιμοποίησεως τῆς ἀτομικῆς σχάσεως. 'Η χρησιμοποίησις τῆς ἑνεργείας αὐτῆς μέλλει νὰ ἀντικαταστήσῃ τὴν ἑνέργειαν, τὴν διποίαν λαμβάνομεν σήμερον ἀπὸ τὴν καῦσιν τοῦ ἀνθρακος καὶ τοῦ πετρελαίου, διότι τὰ καύσιμα ταῦτα μελλοντικῶς θὰ ἔκλειψουν.

Σύντηξις τῶν ἀτόμων — Θερμοπυρηνικὴ ἑνέργεια. — 'Ακόμη μεγαλύτερον ποσὸν καὶ τῆς κατὰ τὴν σχάσιν τοῦ ἀτόμου παραγομένης ἀτομικῆς ἑνεργείας ἐλευθεροῦται κατὰ τὴν λεγομένην σύντηξιν (fusion) τῶν ἀτόμων τοῦ ὑδρογόνου ἡ ἀκριβέστερον τὴν σύντηξιν τῶν πυρήνων τῶν ἀτόμων τοῦ ὑδρογόνου. Κατὰ τάύτην τέσσαρες πυρήνες ὑδρογόνου, εἰς θερμοκρασίας δεκάδων ἐκατομμυρίων βαθμῶν, συντήκονται (συγχωνεύονται) πρὸς σχηματισμὸν τοῦ στοιχείου ἥλιου, μὲ ἀτομικὸν βάρος τετραπλάσιον σχεδὸν τοῦ ὑδρογόνου. Κατὰ τὴν σύντηξιν αὐτὴν μέρος της μάζης μετατρέπεται εἰς ἑνέργειαν, τῆς ὅποιας ἡ ποσότης εἶναι κολοσσαία. 'Η ἑνέργεια αὕτη ὀνομάζεται θερμοπυρηνική ἑνέργεια.

'Η σύντηξις τοῦ ὑδρογόνου ἐπετεύχθη εἰς τὴν βόμβαν τοῦ ὑδρογόνου (πρώτη ἔκρηκτις 1 Νοεμβρίου 1952 ὑπὸ τῶν 'Ηνωμένων Πολιτειῶν τῆς Ἀμερικῆς) μὲ ἀσυγκρίτως καταστρεπτικώτερα ἀποτελέσματα τῆς ἀτομικῆς βόλβας.

Σήμερον γίνονται ἔρευναι διὰ τὴν χαλιναγγησιν τῆς δυνάμεως τῆς

ύδρογονικής βόμβας. "Οταν τοῦτο ἐπιτευχθῇ, τότε ή βιομηχανική ἐνέργεια θὰ είναι τόσον ἀφθονος, ώστε θὰ ἀλλάξῃ ή δψις τοῦ κόσμου καὶ εὐημερία ἀφάνταστος θὰ ἔξασφαλισθῇ διὰ τὸν ἀνθρωπον. "Αν ὅμως γρηγοριοποιηθῇ διὰ πολεμικοὺς σκοποὺς ὑπάρχει κίνδυνος ἔξασφανισμοῦ τῆς ἀνθρωπότητος.

ΡΑΔΙΟΝ — ΟΥΠΑΝΙΟΝ — ΥΠΕΡΟΥΡΑΝΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΡΑΔΙΟΝ

Σύμβολον *Ra*

*Αιτομικὸν βάρος 226,05

Σθένος *II*

Προέλευσις — Παρασκευή. — Τὸ ράδιον ἐνυπάρχει εἰς πολὺ μικρὰ πιστὰ εἰς τὰ δρυκτὰ τοῦ ούρανού, κυρίως εἰς τὸν πισσούραντην, ἀπαντῶντα εἰς τὴν Βοημίαν, τὸ Βελγικὸν Κογκό, τὸν Καναδᾶν, καὶ εἰς τὸν καρνοτίτην, ἀνευρισκόμενον εἰς τὸ Κολοράδον.

Παραλαμβάνεται ἐκ τῶν δρυκτῶν αὐτοῦ διὰ πολυπλόκου χημικῆς διεργασίας, παρεσκευάσθη δὲ τὸ πρῶτον εἰς μεταλλικὴν κατάστασιν τὸ 1900 ὑπὸ τῆς Marie Curie, δι' ἡλεκτρολύσεως τοῦ χλωριούχου ραδίου.

***Ιδιότητες — Χρήσεις.** — Τὸ ράδιον εἶναι μεταλλον ραδιενεργόν, λευκόν, τηρόμενον εἰς 960°, E.B. 6, ταχέως ἀλλοιούμενον εἰς τὸν ἀέρα.

'Ομοιάζει πολὺ πρὸς τὸ βόριον, ἀλλ' εἶναι περισσότερον δραστικὸν αὐτοῦ, διασπᾶ δὲ τὸ ὄντωρ, ὑπὸ ἔκλυσιν ὑδρογόνου. Αἱ ἀκτινοβολίαι του, περὶ τῶν ὁποίων ὡμιλήσαμεν ἀνωτέρω, διευκολύνουν τὰς χημικὰς ἀντιδράσεις, ὡς τὴν ἐνωσιν τοῦ χλωρίου μετὰ τοῦ ὑδρογόνου κ.λ.π. 'Ἐπὶ πλέον προκαλοῦν τὸν φθορισμὸν πολλῶν οὔσιῶν, διὸ χρησιμοποιοῦνται μικραὶ ποσότητες ἀλάτων τοῦ ραδίου πρὸς κατασκευὴν φθοριζόντων χρωμάτων, π.χ. διὰ πλάκας ὠρολογίων κ.λ.π.

Τὸ ράδιον χρησιμοποιεῖται κυρίως εἰς τὴν θεραπείαν τοῦ καρκίνου καὶ ἄλλων σχετικῶν ἀσθενειῶν.

ΟΥΠΑΝΙΟΝ

Σύμβολον *U*

*Αιτομικὸν βάρος 238,07

Σθένος *IV, V, VI*

Προέλευσις — Παρασκευή. — Τὰ σπουδαιότερα δρυκτὰ τοῦ ούρανού εἶναι ὁ πισσούραντης, ὁ καρνοτίτης καὶ ὁ ού-

ρανινίτης, ἀπαντῶντα ως εἴπομεν ηδη εἰς τὴν Βοημίαν, τὸ Βέλγικὸν Κογκό, τὸν Καναδᾶν κ.ἄ. Εἰς δλα τὰ ὄρυκτὰ αὐτὰ τὸ ούρανιον ἀπαντᾷ ως ὁξείδιον, ἐκ τοῦ ὅποιου ἔξαγεται τὸ μεταλλικὸν ούρανιον δι' ἀναγωγῆς δι' ὑδρογόνου ἢ ἀνθρακος.

Ιδιότητες — Χρήσεις. — Τὸ ούρανιον εἶναι τὸ ἔχον τὸ μεγαλύτερον ἀτομικὸν βάρος τῶν ἐν τῇ φύσει στοιχείων καὶ τὸ τελευταῖον ἔξι αὐτῶν εἰς τὸ περιοδικὸν σύστημα, ἔχον ἀτομικὸν ἀριθμὸν 92. Εἶναι ἀργυρόλευκον μέταλλον ραδιενεργόν, στιλπνόν, δλκιμον, ἐλατόν, μαλακώτερον τοῦ χάλυβος. "Εχει E.B. 18,7 καὶ τήκεται εἰς 1689^o. Εἰς συμπαγῆ κατάστασιν εἶναι σταθερὸν εἰς τὸν ἀρέρα καὶ ἀπρόσβιλητον ὑπὸ τῶν δέξιων ἐν ψυχρῷ. Χρησιμοποιεῖται εἰς τὴν κατασκευὴν εἰδικῶν χαλύβων. Αἱ δὲ ἐνώσεις του εύρισκουν ἐφαρμογὴν πρὸς χρῶσιν τῆς πορσελάνης καὶ τῆς ὑάλου, εἰς τὴν φωτογραφικὴν καὶ ως ἀντιδραστήρια τῶν χημικῶν ἐργαστηρίων.

ΥΠΕΡΟΥΡΑΝΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δι' ἐφαρμογῆς ἀντιδράσεων μεταστοιχειώσεως ἐπὶ τοῦ βαρυτέρου ἐν τῇ φύσει στοιχείου, τοῦ ούρανίου, παρεσκευάσθησαν τεχνητῶς καὶ ἐμελετήθησαν στοιχεῖα ἀτομικοῦ ἀριθμοῦ μεγαλυτέρου τοῦ 92. Τὰ στοιχεῖα ταῦτα, ως ἐγγραφόμενα εἰς τὸ περιοδικὸν σύστημα πέραν τοῦ ούρανίου, ἐκλήθησαν ὑπερουράνια ἢ τρανσουράνια στοιχεῖα. Τοιαῦτα στοιχεῖα γνωστά μέχρι σήμερον εἶναι δέκα: τὸ ποσειδώνιον ἢ νεπτούνιον Np, μὲ ἀτομικὸν ἀριθμὸν 93, τὸ πλούσιον Pu, μὲ ἀτομικὸν ἀριθμὸν 94, τὸ ἀμερίκιον Am, ἀτομικοῦ ἀριθμοῦ 95, τὸ κούριον ἢ κιούριον Cm, ἀτομικοῦ ἀριθμοῦ 96, τὸ βερκέλιον Bk, ἀτομικοῦ ἀριθμοῦ 97, τὸ καλιφόρνιον Cf, ἀτομικοῦ ἀριθμοῦ 98, τὸ Αϊνσταΐνιον E, ἀτομικοῦ ἀριθμοῦ 99, τὸ Φέρμιον Fm, ἀτομικοῦ ἀριθμοῦ 100, τὸ Μεντελέβιον Mv, ἀτομικοῦ ἀριθμοῦ 101, καὶ τὸ Νομπέλιον No, ἀτομικοῦ ἀριθμοῦ 102.

Π ΑΡΤΗΜΑ

ΤΥΠΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΑΙ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΛΥΣΙΝ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΣΧΕΣΙΣ ΟΓΚΟΥ, ΠΙΕΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

"Οταν οι όγκοι τῶν ἀερίων δίδονται ὑπὸ συνθήκας πιέσεως καὶ θερμοκρασίας διαφόρους τῆς κανονικῆς, τότε ἀνάγομεν αὐτοὺς εἰς τὴν θερμοκρασίαν 0° καὶ τὴν πίεσιν τῶν 760 mm στήλης ὑδραργύρου, χρησιμοποιοῦντες τὴν γνωστὴν ἐκ τῆς Φυσικῆς ἔξισωσιν τῶν τελείων ἀερίων :

(I) $P.V. = Po \cdot Vo (1 + \alpha \theta)$, εἰς τὴν ὁποίαν :

P = ἡ πίεσις ὑπὸ τὴν ὁποίαν ἐμετρήθη ὁ όγκος τοῦ ἀερίου.

V = ὁ όγκος τοῦ ἀερίου ὑπὸ τὴν πίεσιν P .

Po = ἡ κανονικὴ πίεσις τῶν 760 mm στήλης ὑδραργύρου.

Vo = ὁ όγκος τοῦ ἀερίου εἰς τὴν θερμοκρασίαν 0° .

θ = ἡ θερμοκρασία ὑπὸ τὴν ὁποίαν ἐμετρήθη ὁ όγκος τοῦ ἀερίου.

α = $\frac{1}{273}$, ὁ συντελεστὴς τῆς διαστολῆς τῶν ἀερίων.

Παράδειγμα. — 'Ο όγκος ἀερίου τινος είναι ἵσος πρὸς 600 cm^3 ὑπὸ πίεσιν 750 mm στήλης ὑδραργύρου καὶ θερμοκρασίαν 15° . Ποῖος θὰ είναι ὁ όγκος τοῦ ἀερίου τούτου ὑπὸ κανονικὰς συνθήκας πιέσεως καὶ θερμοκρασίας :

Αὕτης — Θέτομεν εἰς τὸν ἀνωτέρῳ τύπον (I) :

$P = 750 \text{ mm}, \quad V = 600 \text{ } cm^3, \quad \theta = 15^{\circ}, \quad Po = 760 \text{ mm},$

$\alpha = \frac{1}{273}$, ὅποτε θὰ ἔχωμεν :

$750.600 = 760 \cdot Vo \left(1 + \frac{15}{273} \right).$ Λύοντες δὲ ὡς πρὸς Vo , εὑρίσκομεν : $Vo = \frac{750 \cdot 600 \cdot 273}{760(273+15)} = 561,15 \text{ } cm^3$.

"Ητοι ὁ όγκος τοῦ ἀερίου ὑπὸ κανονικὰς συνθήκας πιέσεως καὶ θερμοκρασίας θὰ είναι ἵσος πρὸς 561,15 cm^3 .

ENNOIAI TINEΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Γραμμοάτομον = ποσότης τις τοῦ στοιχείου εἰς γραμμάρια, ἵση πρὸς τὸ ἀτομικόν του βάρος.

Γραμμούριον = ποσότης τις στοιχείου τινὸς ἡ χημικῆς ἐνώσεως εἰς γραμμάρια, ἵση πρὸς τὸ μοριακόν των βάρος.

Γραμμοριά = δὸγκος τὸν ὅποιον καταλαμβάνει ἐν γραμμομόριον στοιχείου τινὸς ἡ χημικῆς ἐνώσεως, εἰς ἀέριον κατάστασιν, ὑπὸ κανονικὰς συνθήκας πιέσεως καὶ θερμοκρασίας καὶ ὁ ὅποιος εἶναι ἵσος (κατὰ προσέγγισιν) πρὸς 22,4 λίτρα.

ΣΧΕΣΙΣ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΕΡΑ ΠΥΚΝΟΤΗΤΟΣ ΑΕΡΙΟΥ ΤΙΝΟΣ

Μεταξὺ τοῦ μοριακοῦ βάρους M ἀερίου τινὸς στοιχείου ἡ ἀερίου χημικῆς ἐνώσεως καὶ τῆς ὡς πρὸς τὸν ἀέρα σχετικῆς πυκνότητος αὐτοῦ d , ὑπάρχει ἡ ἔξης σχέσις :

$$M = 28,96 d \quad \text{ἢ} \quad d = \frac{M}{28,96}.$$

Διὰ τῶν τύπων αὐτῶν ὑπολογίζομεν (κατὰ προσέγγισιν) ἡ τὸ μοριακὸν βάρος ἀερίου τινός, ὅταν γνωρίζομεν τὴν σχετικὴν του πυκνότητα, ἡ τὴν σχετικὴν του πυκνότητα, ὅταν γνωρίζομεν τὸ μοριακόν του βάρος.

ΤΡΟΠΟΣ ΛΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

‘Η γένικὴ μέθοδος τὴν ὄποιαν πρέπει νὰ ἀκολουθήσωμεν πρὸς λύσιν τῶν προβλημάτων τῆς Χημείας εἶναι ἡ ἔξης :

Γράφομεν τὴν χημικὴν ἔξιστωσιν, ἐπὶ τῆς ὄποιας στηρίζεται τὸ ὅλον πρόβλημα, κάτωθι δὲ τῶν στοιχείων ἡ χημικῶν ἐνώσεων, τὰ ὄποια ἀλμβάνουν μέρος εἰς αὐτό, σημειώνομεν τὰ ἀτομικὰ ἡ μοριακά των βάρη ἡ τοὺς μοριακούς των ὅγκους.

Προβαίνομεν κατόπιν εἰς τὴν λύσιν τοῦ προβλήματος, συνήθως μὲν διὰ τῆς ἀπλῆς μεθόδου τῶν τριῶν, ἐνίστε δὲ ἀλγεβρικῶς.

Κατωτέρω παρέχομεν τρία παραδείγματα λύσεως τοιούτων προβλημάτων.

Παράδειγμα 1ον. — Πόσον εἶναι τὸ βάρος καὶ πόσος ὁ ὅγκος τοῦ

ύδρογόνου, τὸ ὅποῖον λαμβάνεται, κατὰ τὴν ἐπίδρασιν ἀραιοῦ θειέκοῦ δξέος ἐπὶ 13 γραμμαρίων ψευδαργύρου.

Λύσις. — Ἡ ἐπίδρασις τοῦ θειέκοῦ δξέος ἐπὶ τοῦ ψευδαργύρου παρίσταται διὰ τῆς ἐξισώσεως :



$$65 \text{ γρ.} \quad 2 \text{ γρ. ή } 22,4 \text{ λίτρα.}$$

Ἡ ἐξισώσις αὕτη δεικνύει δτὶ ἡ ἐπίδρασις θειέκοῦ δξέος ἐπὶ 65 γρ. ψευδαργύρου παράγει 2 γρ. ύδρογόνου, καταλαμβάνοντα δγκον 22,4 λιτρῶν (ὑπὸ κανονικὰς συνθήκας).


Ἐπομένως μὲ 13 γρ. ψευδαργύρου θὰ ἔχωμεν :

$$\frac{2 \times 13}{65} = 0,4 \text{ γρ. ύδρογόνου, καταλαμβάνοντα δγκον :}$$

$$\frac{22,4 \times 13}{65} = 4,48 \text{ λίτρων.}$$

Παράδειγμα 2ον. — Μῆγμα ύδρογόνου καὶ δξυγόνου εἰσάγεται ἐντὸς εὐδιομέτρου ύδραργύρου καὶ καταλαμβάνει δγκον 60cm^3 . Προκαλοῦμεν τότε τὴν ἔκρηξιν ἡλεκτρικοῦ σπινθήρος ἐντὸς αὐτοῦ. Μετὰ τὴν συμπύκνωσιν τοῦ σχηματισθέντος ὄδατος, τὸ ἀπομένον ἀέριον, ἐπαναφερόμενον εἰς τὴν ἀρχικὴν πίεσιν καὶ θερμοκρασίαν, καταλαμβάνει δγκον 12cm^3 , εἶναι δὲ δυνατὸν νὰ ἀπορροφηθῇ τοῦτο καθ' ὀλοκληρίαν ύπὸ φωσφόρου. Ζητεῖται νὰ εύρεθῇ ἡ σύνθεσις τοῦ μίγματος.

Λύσις. — Ἡ ἐξισώσις τῆς χημικῆς ἐνώσεως τοῦ ύδρογόνου μετὰ τοῦ δξυγόνου εἶναι :




Ἐφόσον τὸ ἀπομένον ἀέριον ἐντὸς τοῦ εὐδιομέτρου ἀπορροφᾶται καθ' ὀλοκληρίαν ύπὸ φωσφόρου, συμπεραίνομεν δτὶ τοῦτο εἶναι δξυγόνον. Ἐπομένως τὰ $60 - 12 = 48\text{cm}^3$ τοῦ δγκου, τὰ ὅποια ἐξηφανίσθησαν, θὰ ἀποτελοῦνται ἐκ μίγματος ύδρογόνου καὶ δξυγόνου, ύπὸ τὴν ἐν τῷ ὄδατι ἀναλογίᾳ $2 : 1$, ἥτοι τὰ $\frac{2}{3}$ θὰ εἶναι ύδρογόνον καὶ τὸ $\frac{1}{3}$ θὰ εἶναι δξυγόνον. Ἐπομένως τὸ εὐδιόμετρον περιεῖχεν :

$$48 \times \frac{2}{3} = 32 \text{ cm}^3 \text{ ύδρογόνου καὶ } 60 - 32 = 28 \text{ cm}^3 \text{ δξυγόνον.}$$

Παράδειγμα 3ον. — Κατεργαζόμεθα κρᾶμα ἀργύρου καὶ χαλκοῦ βάρους 2,8 γρ. διὰ θειέκοῦ δξέος πυκνοῦ καὶ θερμοῦ. Τὸ συλλεγόμενον


άέριον καταλλήλως ἀποξηρανθέν, καταλαμβάνει ύπεδο κανονικάς συνθήκας
όγκον 448 cm³. Νὰ εύρεθῇ ἡ σύνθεσις τοῦ κράματος.

Λύσις. — Ἐστω χ τὸ βάρος τοῦ ἀργύρου καὶ ψ τὸ τοῦ χαλκοῦ.
Ἐχομεν οὕτω κατ' ἀρχὰς τὴν ἔξισωσιν : $\chi + \psi = 2,8$ (1).



δεικνύει ὅτι κατεργαζόμενοι χ γρ. ἀργύρου διὰ πυκνοῦ καὶ θερμοῦ θειῆ-
κοῦ δέξιος συλλέγομεν :

$$\frac{22400\chi}{216} \text{ cm}^3 \text{ διοξειδίου τοῦ θείου.}$$



δεικνύει ὅτι κατεργασία ψ γρ. χαλκοῦ παράγει $\frac{22400\psi}{64} \text{ cm}^3$ διοξειδίου
τοῦ θείου.

Ἐφόσον ὁ ὀλικὸς ὄγκος τοῦ διοξειδίου τοῦ θείου εἴναι 448 cm³ θὰ
ἔχωμεν τὴν ἔξισωσιν :

$$\frac{22400 \chi}{216} + \frac{22400 \psi}{64} = 448 \quad (2)$$

Λύοντες τὸ σύστημα τῶν ἔξισώσεων (1) καὶ (2) εύρισκομεν :
 $\chi = 2,16$ καὶ $\psi = 0,64$.

Τὸ κρᾶμα ἐπομένως περιέχει 2,16 γρ. ἀργύρου καὶ 0,64 γρ. χαλκοῦ.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
ΣΥΜΒΑΛΟΝΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟΝ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ (469 - 369 π.Χ.). — Μέγας "Ελλην φιλόσοφος τῆς ἀρχαιότητος, πρῶτος διατυπώσας τὴν θεωρίαν τῆς ἐξ ἀτόμων συστάσεως τῆς ὕλης. Ἐγεννήθη καὶ ἔζησεν εἰς τὴν πόλιν Ἀβδηρα τῆς Θράκης, ὑπῆρξε δὲ μαθητής τοῦ Λευκίππου.

LAVOISIER (1743 - 1794). — Περιώνυμος Γάλλος χημικός. Ἀνήκων εἰς εὕπορον οίκογένειαν, ἔτυχεν ἔξαιρετικῆς μορφώσεως, ἐγένετο δὲ νεώτατος Ἀκαδημαϊκός. Εἶναι δὲ πρῶτος, δὲ ὁποῖος ἔδωσε τὴν ἐξήγησιν τῆς καύσεως, τοῦ σπουδαιοτέρου ἐκ τῶν χημικῶν φαινομένων καὶ ἀνεκάλυψε τὴν σύστασιν τοῦ ἀέρος. Διὰ τῶν πειραμάτων τούτης, εἰς τὰ δόποια πρῶτος αὐτὸς εἰσήγαγε τὴν χρῆσιν τοῦ ζυγοῦ, ἀνεῦρε καὶ ἀπέδειξε τὸ ἀξιωμα τῆς ἀφθαρσίας τῆς ὕλης. Λόγω τῶν ἔργασιῶν του αὐτῶν θεωρεῖται ὡς ὁ πατήρ τῆς νεωτέρας Χημείας.

DALTON (1766 - 1844). — Διάσημος "Αγγλος φυσικός καὶ χημικός. Ἐμελέτησε τὰ τῆς διαστολῆς καὶ τῆς μίξεως τῶν ἀερίων. Ἡ σπουδαιοτέρα του δημοσία ἐργασία, διὰ τῆς δόποιάς συνετέλεσεν εἰς τὴν προσγωγὴν τῆς Χημείας, εἶναι ἡ σύγχρονος διατύπωσις τῆς ἀτομικῆς θεωρίας καὶ τοῦ Νόμου τῶν πολλαπλῶν ἀναλογιῶν.

PROUST (1754 - 1826). — Γάλλος χημικός, γνωστὸς κυρίως διὰ τὸν Νόμον τῶν ὀρισμένων ἀναλογιῶν, ὁ ὁποῖος φέρει τὸ ὄνομά του.

GAY — LUSSAC (1778 - 1850). — Γάλλος φυσικός καὶ χημικός. Ἀνεκάλυψε τὸν νόμον τῆς διαστολῆς τῶν ἀερίων καὶ τὴν καθ' ἄπλαξ ἀναλογίας δικού ἐνωσιν τῶν ἀερίων στοιχείων πρὸς ἄλληλα. Ἐξετέλεσε καὶ πλείστας ἄλλας ἔργασίας εἰς τὴν Χημείαν καὶ τὴν Φυσικήν.

AVOGADRO (1776 - 1856). — Ιταλός φυσικός, γνωστὸς κυρίως

διὰ τὴν φερώνυμον μόριακήν ὑπόθεσιν, καθ' ἥν ὅλα τὰ ἀέρια, ὑπὸ τὰς αὐτὰς συνθήκας πιέσεως καὶ θερμοκρασίας λαμβανόμενα, περιέχουν εἰς ἵσους ὅγκους τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν μορίων.

RUTHERFORD (1871 - 1937). — Νεοζηλανδὸς ἐπιστήμων ἐργασθεὶς ἐν Ἀγγλίᾳ. Εἶναι κυρίως γνωστὸς διὰ τὰς ἐργασίας του ἐπὶ τῆς ἐσωτερικῆς κατασκευῆς τοῦ ἀτόμου.

MENDELEEFF (1834 - 1907). — Ρῶσσος χημικός, γνωστὸς πρὸ πάντων διὰ τὸ ὑπὸ αὐτοῦ ἐπινογθὲν περιοδικὸν σύστημα τῶν στοιχείων, διὰ τοῦ ὄποιον ἐπῆλθε νέα καὶ δρθή ἐπιστημονικὴ ταξινόμησις αὐτῶν.

PRISTLEY (1733 - 1804). — Ἄγγλος χημικός, ἀνακαλύψας τὸ δξυγόνον (1774) καὶ διάφορα ἄλλα ἀέρια, ἀσχοληθεὶς δὲ καὶ μὲ τὴν ἀνάλυσιν τοῦ ἀτμοσφαιρικοῦ ἀέρος.

SCHEELE (1742 - 1786). — Σουηδός χημικός. Εἶναι γνωστὸς διὰ τὰς ἐργασίας του ἐπὶ τοῦ δξυγόνου, τὸ ὄποιον ἀνεκάλυψε συγχρόνως μετὰ τοῦ PRISTLEY. Θεωρεῖται ἀπὸ τοὺς μεγάλους χημικοὺς τοῦ κόσμου.

CAVENDISH (1731 - 1810). — Ἄγγλος φυσικὸς καὶ χημικός. Αἱ σπουδαιότεραι ἐργασίαι του εἰς τὴν Χημείαν εἶναι: ἡ ἀκριβής ἀνάλυσις τοῦ ἀτμοσφαιρικοῦ ἀέρος, ἡ μελέτη τῶν ιδιοτήτων τοῦ ὑδρογόνου, τὸ ὄποιον εἶχε παρασκευασθῆ ὑπὸ τῶν ἀλχημιστῶν, καὶ ὁ καθορισμὸς τῆς συνθέσεως τοῦ ὕδατος.

MOISSAN (1852 - 1907). — Γάλλος χημικός, διάσημος διὰ τὰς ἐργασίας του ἐπὶ τῆς ἡλεκτρικῆς καρμίνου καὶ διὰ τὴν παρασκευὴν μικροσκοπικῶν κρυστάλλων ἀδάμαντος. Ἀλλῃ ὀνομαστὴ ἐργασία του εἶναι ἡ ἀπομόνωσις τοῦ φθορίου (1886).

RAMSAY (1852 - 1916). — Ἄγγλος χημικός, καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Λονδίνου. Ἀνεκάλυψε μετὰ τοῦ φυσικοῦ RAYLEIGH τὰ εὐγενῆ ἀέρια.

DAVY (1778 - 1828). — 'Επιφανής "Αγγλος χημικός, μελετήσας τὴν ἐπίδρασιν τοῦ ἡλεκτρικοῦ ρεύματος ἐπὶ τῶν χημικῶν ἐνώσεων, διὸ θεωρεῖται ὁ πατήρ τῆς ἡλεκτροχημείας. 'Ανεκάλυψε τὸ νάτριον, τὸ κάλιον καὶ ἄλλα στοιχεῖα. Εἶναι δὲ καὶ ὁ ἐφευρέτης τῆς φερωνύμου ἀσφαλιστικῆς λυχνίας τῶν ἀνθρακωρυχείων.

CURIE (1867 - 1934). — 'Η MARIE SKLODOWSKA CURIE ἐγεννήθη εἰς Βαρσοβίαν τῆς Πολωνίας, ἐσπούδασε δὲ εἰς Παρισίους, ὅπου ἐνυμφεύθη τὸν Γάλλον καθηγητὴν PIERRE CURIE. Εἶναι περιώνυμος διὰ τὴν ἀνακάλυψιν μετὰ τοῦ συζύγου της, τοῦ στοιχείου ραδίου, τὸ ὅποῖον παρουσιάζει εἰς μέγαν βαθμὸν τὸ φαινόμενον τῆς ραδιενεργείας.

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΝ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΝ

(Οἱ ἀριθμοὶ παραπέμπουν εἰς τὰς σελίδας)

Α

'Αγγλεσίτης		'Ανθρακοπυρίτιον	110
'Αδάμας	144	'Ανθρακος διοξείδιον	106
'Αζουρίτης	99	'Ανθραξ μονοξείδιον	104
'Αζωτον	148	'Ανθραξ ἀποστακτήρων	99
'Αζώτου μονοξείδιον	79	'Ανθραξ ζωνεδς	102
'Αζώτου διοξείδιον	88	'Ανόπτησις χάλυβος	103
'Αζώτου πεντοξείδιον	89	'Αντιδρασις ἀλκαλική	139
'Αζώτου τετροξείδιον	89	'Αντιδρασις ἀμφιδρομος	29
'Αζώτου τριοξείδιον	89	'Αντιδρασις βασική	17
'Αζώτου ύποξείδιον	88	'Αντιδρασις δξινος	29
'Άηρ ἀτμοσφαιρικιδς	88	'Αντιδρασις ούδετέρα	28
Αιθέλη	81	'Αντιδραστήρ	30
Αιματίτης	103	'Αντιμόνιον	161
'Αϊνστατνιον	135	'Απατίτης	97
'Ακτῖνες α, β, γ.	163	'Απόσταξις	93
'Αλαβάστρος	158	'Αποσύνθεσις χημική	50
'Αλατα	128	'Αργιλιοθερμική μέθοδος	16
'Αλατογόνα ἢ ἀλογόνα στοιχεῖα	29	'Αργίλιον	131
'Αλκάλια	56	'Αργιλος	130
'Αλκαλικαλ γαῖαι	116	'Αργόν	132
'Αλλοτροπία	123	'Αργυροδάμας	84, 85
'Αμερίκιον	42	'Αργυρος	56
'Αμέταλλα στοιχεῖα	163	'Αργυρος βρωμιοῦχος	152
'Αμμος	37	'Αργυρος λαδιοῦχος	154
'Αμμωνία	111	'Αργυρος νιτρικός	154
'Αμμωνία καυστική	85	'Αργυρος χλωριοῦχος	153
'Αμμωνιακὰ ἀλατα	87	'Αργυρίτης	154
'Αναγωγὴ	87	'Αρσενικόν	152
'Αναγωγικὰ σώματα	47, 66	'Αρσενοπυρίτης	97
'Ανάλυσις χημική	47	'Ασβέστιον	97
'Αναπνοὴ	16	'Ασβέστιον ἀνθρακικὸν	125
'Ανθρακαέριον	40	'Ασβέστιον θεικόν	127
'Ανθρακασβέστιον	105	'Ασβέστιον φωσφορικόν	128
'Ανθρακικόν δξι	129	'Ασβέστιον χλωριοῦχον	129
'Ανθρακίτης	108	'Ασβέστιον ψδωρ	126
	101	'Ασβεστίου δξείδιον	125

		Δ
'Ασβεστίου ίδιον	126	
"Ασβεστος	125	
'Ασβεστόλιθος	127	Δευτέριον
"Αστριος	130	Διαπίδυσις
"Άτομα	10	Διάσπασις ἀτόμου
'Άτομική ἐνέργεια	161	Διήθησις
'Άτομική στήλη	161	Δολομίτης
'Άτομικός ἀριθμός	34	Δομή ἀτόμων
'Άτομικόν βάρος	11	
Avogadro ἀριθμός	12	
Avogadro νόμος	11	
"Άχνη ίδραφγύρου	151	
		Ε
Bάμμα ήλιοτροπίου	28	'Ενδόθερμοι ἀντιδράσεις
Bάμμα λαδίου	65	'Ενέργεια
Bαρύ ίδρογόνον	35	'Ένεργής δέξιτης
Bαρύ ίδωρ	53	'Εξώθερμοι ἀντιδράσεις
Bάσεις	28	'Εξισώσεις χημικαλ
Bάσεων Ισχύς	31	Εύγενη ἀέρια
Bάρος ἀτομικὸν	11	
Bάρος μοριακὸν	11	
Bασιλικὸν ίδωρ	91	
Bασιλίσκος ἀργύρου	152	Zωϊκὸς ἄνθραξ
Bερκέλιον	163	
Bισμούθιον	98	'Ηλεκτρόλυσις
Bόραξ	113	'Ηλεκτρολύται
Bορικὸν δέξι	112	'Ηλεκτρόνια
Bόριον	63	'Ηλιον
Bρώμιον	130	
Bωξίτης		
		Θ
Γαιάνθρακες	101	Θεῖον
Γαλαζόπετρα	150	Θείου διοξείδιον
Γαληνίτης	144	Θείου τριοξείδιον
Γαρνιερίτης	141	Θειεικὸν δέξι
Γραμμοάτομον	12	Θερμίτης
Γραμμομοριακὸς ίγκος	12	Θερμοπυρηνική ἐνέργεια
Γραμμομόριον	12	Θερμοχημικαλ ἔξισώσεις
Γραφίτης	100	
Γύψος	128	
		Ι
Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής		

'Ισλανδική κρύσταλλος	127	Λ
'Ισότοπα	34	
'Ιώδιον	65	Λειμωνάτης
'Ιωδίου βάζμα	65	Λευκόλιθος
		Λευκοχρυσικὸν δέξι
		Λευκόχρυσος
		Λευκόχρυσος σπογγώδης
		Λευκοχρύσου μέλαν
Κ		Λιγνίτης
Καλαμίνα	133	Λιθάνθραξ
Κάλιον	122	Λιθάργυρος
Κάλιον ἀνθρακικὸν	122	Λυδία λίθος
Κάλιον διχρωμικὸν	143	
Κάλιον νιτρικὸν	123	
Κάλιον χλωρικὸν	123	
Κάλιον ὑπερμαγγανικὸν	143	
Καλίου ὄρδοξείδιον	122	Μ
Καλιφόρνιον	163	
Καλομέλας	151	Μαγγάνιον
Καολίνης	132	Μαγνάλιον
Καρναλίτης	124	Μαγνησία
Καρνοτίτης	162	Μαγνήσιον
Κασσιτερίτης	146	Μαγνήσιον ἀνθρακικὸν
Κασσίτερος	146	Μαγνήσιον θεικόν
Καταλύται	17	Μαγνησίου δέξείδιον
Καῦσις	39	Μαγνησίτης
Καυστικὸν κάλι	122	Μαγνητίτης
Καυστικὸν νάτριον	118	Μαλαχίτης
Κεραμευτικὴ	132	Μάρμαρον
Κέραμοι	132	Μαρμαρυγίας
Κεραργυρίτης	152	Μεντελέβιον
Κιμωλία	128	Μέταλλα
Κιννάβαρι	150	Μεταλλεύματα
Κοβάλτιον	141	Μεταλλουργία
Κοβάλτιτης	141	Μεταστοιχείωσις
Κονιάματα	126	Μετεωρῖται
Κορούνδιον	130	Μίγματα
Κούριον ἢ Κιούριον	163	Μικτὸν ἀέριον
Κράματα	115	Μίνιον
Κροκοΐτης	142	Μόλυβδος
Κροτοῦν ἀέριον	46	Μόλυβδος ἀνθρακικὸς
Κρυστόθιος	56, 130	Μολύβδου διοξείδιον
Κρυπτὸν	85	Μολύβδου ἐπιτεταρτοξείδιον
Κυπέλλωσις	152	Μολύβδου δέξείδιον
Κώκ	102	Μόρια

Μοριακὸν θάρος

11 Ὁξύτης ἐνεργός
Οὐράνιον31
162

Ν

- Νάτριον
Νάτριον ἀνθρακικὸν
Νάτριον νιτρικὸν
Νάτριον δξίνον ἀνθρακικὸν
Νάτριον χλωριοῦχον
Νατρίου ὑδροξειδίον
Νατρίου ὑπεροξειδίον
Νεάργυρος
Νέον
Νεπτούνιον
Νετρόνια
Νικέλιον
Νικελιοπυρίτης
Νικελίτης
Νιτρικὸν δξύ
Νίτρον
Νίτρον τῆς Χλῆς
Νόμοι Χημείας
Νομπέλιον
Νόμων Χημείας ἔξήγησις
Ντουραλουμίνιον

Ξ

- Ξένον
Ξυλάνθραξ

- 117 Περιοδικὸν σύστημα τῶν στοιχείων
119 Πέτρα κολάσεως
121 Πηλὸς
121 Πίναξ τῶν στοιχείων
119 Πισσόυρανίτης
118 Πλουτώνιον
117 Πολώνιον
141 Πορσελάνη
84 Ποσειδώνιον
163 Πότασσα
23 Πρωτόνια
141 Πυραργυρίτης
141 Πυρεῖα
141 Πυριτικὸν δξύ
89 Πυρίτιον
123 Πυριτίου διοξειδίον
121 Πυρολουσίτης
- 163
14
124, 132
- Ραδιενέργεια
Ραδιοισότοπα
Ράδιον
Ραδόνιον
Ρίζαι

Π

Ο

- “Οζον
’Οξέα
’Οξεία
’Οξειδωσις
’Οξειδωτικὰ σώματα
’Οξέων Ισχὺς
’Οξυγόνον
’Οξυγονοῦχον ὕδωρ
’Οξύλιθος
’Οξυδρικὴ φλόξ

- 41
28
30
39, 66
39
31
37
54
38
46
- Σανδαράχη
Σθένος τῶν στοιχείων
Σθένους τῶν στοιχείων ἔξήγησις
Σιδηρίτης
Σιδηρομαγγάνιον
Σιδηροπυρίτης
Σίδηρος
Σμαλτίτης
Σμιθσωνίτης
Σδᾶ
Σταλαγμῖται
Σταλακτῖται

Σ

Στοιχεῖα	6	Φέρμιον	163
Στουπέται	146	Φθόριον	56
Στυπτηρίαι	132	Φθορίτης	56
Σύντηξις ἀτόμου	161	Φρεδν	57
Σφαλερίτης	133	Φωσφορικὰ ἔλατα	96
Σχάσις ἀτόμου	160	Φωσφορικά δέξα	95
Σώματα ἀπλᾶ	6	Φωσφορίτης	93
Σώματα σύνθετα	7	Φωσφόρος	93
		Φωσφόρου δέξειδια	95
		Φύσις	5
T			
Τρίτιον	35		X
Τύποι χημικοί	18	Χαλαζίας	110
Τσιμέντα	127	Χαλκολαμπρίτης	148
Τύρφη	101	Χαλκοπυρίτης	148
		Χαλκοσίνης	148
		Χαλκός	147
Y			
"Γάλος	111	Χαλκός θειένδες	150
'Γδραέριον	106	Χάλυψ	135, 138, 139
'Γδράργυρος	150	Χημεία	6, 35
'Γδράργυρος μονοχλωριούχος	151	Χημικαὶ ἀντιδράσεις	16
'Γδράργυρος διχλωριούχος	151	Χημικαὶ ἐνώσεις	7
'Γδροβρώμιον	64	Χημικαὶ ἔξισώσεις	19
'Γδρογόνον	43	Χημικοὶ τύποι	18
'Γδρογόνου ὑπεροξείδιον	54	Χημικὴ συγγένεια	20
'Γδρόθειον	70	Χημικῆς συγγενείας ἐξήγγισις	26
'Γδροϊώδιον	66	Χλωράσθεστος	129
'Γδρόλυστις	121	Χλώριον	58
'Γδροφθόριον	57	Χλωροιλευκοχρυσικὸν ἀμμώνιον	156
'Γδροχλώριον	60	Χρυσός	154
'Γδροχλωρικὸν δέξι	60	Χρώμιον	142
"Γδωρ	48	Χρωμίτης	142
"Γδωρ ἀπεσταγμένον	50	Χρωμιονικελίνιος	142
"Γδωρ βαρύ	53	Χυτοσίδηρος	135, 138
"Γδωρ βασιλικὸν	91		
"Γλη	5		Ψ
'Γπερουράνια στοιχεῖα	163	Ψευδάργυρος	133
		Ψευδάργυρος θειένδες	134
		Ψευδαργύρου δέξειδιον	134
Φ			
	5	Ψιμμυθίτης	144, 146

Φαίνομενα

Επιμελητής ἐκδόσεως I. ΜΟΣΧΟΣ (ἀπόφ. Α.Σ. ΟΕΣΒ 5999 | 17-10-62)

ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

Σελίς
5 - 6

"Υλη - Ἐνέργεια - Φαινόμενα
Φύσις — "Γλη — Ἐνέργεια — Φαινόμενα — Ἰδιότητες 5. — Σκοπός τῆς Χημείας 6.	5 - 6
"Απλᾶ καὶ σύγχρeta σώματα	6 - 8
· Απλᾶ σώματα ἢ στοιχεῖα 6.— Μίγματα καὶ Χημικά ένώσεις 7.— Διαφορά μίγματος καὶ χημικῆς ένώσεως 8.
Θεμελιώδεις νόμοι τῆς Χημείας	8 - 10
Νόμος τῆς ἀφθαρσίας τῆς ὕλης (Lavoisier) 8.— Νόμος τῶν σταθερῶν λόγων (Proust).— Νόμος τῶν ἀπλῶν πολλαπλασίων (Dalton) 9.— Νόμος τῶν δερίων ӯγκων (Gay - Lussac) 10.
"Ατομική θεωρία	10 - 14
· Ατομα 10.— Μόρια. — Νόμος τοῦ Avogadro. — Ατομικὸν καὶ μοριακὸν βάρος. 11.— Γραμμομόριον.— Γραμμοόπτομον.— Γραμμομοριακὸν βάρος. 12.— Πίναξ, τῶν στοιχείων ριακὸς δύγκος.— Αριθμὸς τοῦ Avogadro 12.— Πίναξ, τῶν στοιχείων 13.— Σχέσις μεταξὺ μοριακοῦ βάρους καὶ τῆς σχετικῆς ὡς πρὸς τὸν δέρρα πυκνότητος δέρρου τινὸς 14.
"Εξήγησις τῶν νόμων τῆς Χημείας	14 - 16
Νόμος τῆς ἀφθαρσίας τῆς ὕλης 14.— Νόμος τῶν σταθερῶν λόγων.— Νόμος τῶν ἀπλῶν πολλαπλασίων. — Νόμος τῶν δερίων ӯγκων 15.
Νόμος τῶν τόπων τῶν στοιχείων 17. — Καταλίται	16 - 17
Χημικὰ ἀντιδράσεις - Καταλίται	17 - 19
· Ορισμοὶ 16.— Μέσα προκαλοῦντα τὰς ἀντιδράσεις.— Καταλύται 17.
Χημικὰ σύμβολα - Χημικοὶ τύποι	19 - 20
Χημικὰ σύμβολα τῶν στοιχείων 17. — Χημικοὶ τύποι. — Ὅπολογι- Χημικὰ σύμβολα τῶν στοιχείων 17. — Χημικοὶ τύποι. — Ὅπολογι- σμὸς τοῦ μοριακοῦ βάρους.— Ὅπολογισμὸς τῆς ἑκατοστιαίας συν- θέσεως 18.
Χημικαὶ ἔξισώσεις	20 - 22
Γενικὰ 19. — Θερμοχημικαὶ ἔξισώσεις 20.
Χημικὴ συγγένεια — Σθένος — Ρίζαι	22 - 24
Χημικὴ συγγένεια 20. — Σθένος τῶν στοιχείων 21. — Ρίζαι 22.
· Εσωτερικὴ κατασκευὴ τῶν ἀτόμων	24 - 25
Συστατικὰ τῶν ἀτόμων 22. — Δομὴ τῶν ἀτόμων. — Σύστασις τῶν διαφόρων ἀτόμων 23.
· Ηλεκτρόσύνης — "Ηλεκτρολύται — Ιόντα
· Ορισμοὶ. — Θεωρία τῆς ἡλεκτρολυτικῆς διαστάσεως τοῦ Arrhenius

Ραδιενέργεια. — Ἀκτινοβολία τῶν ραδιενεργῶν στοιχείων 158.	—
Μεταστοιχείωσις — Τεχνητή μεταστοιχείωσις 159.	
Λιάσπασις — Σχάσις — Σύντηξις τῶν ἀτόμων — Ἀτομικὴ καὶ θερμοπον- θητικὴ ἐνέργεια	160 - 162
Διάσπασις. — Σχάσις τῶν ἀτόμων 160. — Ἀτομικὴ ἐνέργεια. — Σύντηξις τῶν ἀτόμων. — Θερμοπυρηνικὴ ἐνέργεια 161.	
Ράδιον — Οὐράνιον — Ὑπερουράνια στοιχεῖα	162 - 163
Ράδιον. — Οὐράνιον 162. — Ὑπερουράνια στοιχεῖα 163.	

**ΤΥΠΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΑΙ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΛΥΣΙΝ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ**

165 - 168

Σχέσις δγκου, πιέσεως καὶ θερμοκρασίας τῶν ἀερίων 165. — Ἔννοιαι
τινὲς τῆς Χημείας. — Σχέσις μοριακοῦ βάρους καὶ τῆς σχετικῆς
ώς πρὸς τὸν ἀέρα πυκνότητος ἀερίου τινός. — Τρόπος τῆς λύ-
σεως τῶν προβλημάτων τῆς Χημείας 166.

Βιογραφίαι τῶν μεγάλων ἐπιστημόνων συμβαλόντων εἰς τὴν πρόοδον τῆς Χημείας	169 - 171
Βοηθητικὰ βιβλία διὰ τὸν μαθητὰς	171
Ἀλφαριθμητικὸν εὑρετήριον	173 - 177
Πίναξ περιεχομένων	179 - 182



ΕΞΩΦΥΛΛΟΝ : ΤΑΣΟΥ ΧΑΤΖΗ



ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΑ. 1972 (VII) — ΑΝΤΙΤΥΠΑ 157.000 — ΣΥΜΒΑΣΙΣ 2255/18-4-72

ΕΚΤΥΠΩΣΙΣ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ Ι. ΚΑΜΠΑΝΑΣ Α.Ε.



Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής