


ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΑΒΡΕΣΕΑ



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ  
ΦΥΤΟΛΟΓΙΑΣ

Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΑΘΗΝΑΙ 1971

E 8 ΦΣΔ

Fabosias (F.)

ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Α/Γ =

254

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΦΥΤΟΛΟΓΙΑΣ





E 8 φ71  
Γαβρεσίαι(θ.)  
(ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ) ΓΑΒΡΕΣΕΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ  
ΦΥΤΟΛΟΓΙΑΣ  
Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ



21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΙΘΗΡΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣ

ΕΑΩΡΗΣΑΤΟ

O. E. A. B.

αντ. μουθ. εισαγ. 2095 του έτους 1971

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΑΘΗΝΑΙ 1971

002  
ΗΝΕ  
ΕΤ2Β  
1805

## ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Τὸ μάθημα τῆς Φυτολογίας, κατ' ἔξοχὴν εύχαριστον καὶ ἀποδοτικόν, ὅταν γίνεται μὲν ἔξέτασιν ἀπ' εὐθείας τῶν διαφόρων φυτῶν, είναι ἀνιαρὸν καὶ δύσκολον, ὅταν καταντῷ μία μηχανική καὶ μόνον ἀπομνημόνευσις τῶν εἰς τὸ βιβλίον ἐκτιθεμένων. Τοιαύτη διδασκαλία τῆς Φυτολογίας τὸ μόνον τὸ ὄποιον ἐπιτυγχάνει εἶναι τὸ νὰ μιστήσουν οἱ μαθηταὶ τὸ μάθημα τοῦτο. Αἱ φυτολογικαὶ γνώσεις είναι κατ' ἔξοχὴν αἱ γνώσεις αἱ ὄποιαι πρέπει νὰ προσκτῶνται δι' ἀπ' εὐθείας παρατηρήσεων καὶ ὅπου τοῦτο καθίσταται ἀδύνατον μὲν παραστατικὰς εἰκόνας τῶν ἔξεταζομένων φυτῶν. Τὰ ἄνθη καὶ τὰ διάφορα μέρη των, οἱ καρποὶ καὶ τὰ σπέρματά των, τὰ φύλλα, οἱ βλαστοὶ καὶ οἱ μασχαλιαῖοι ὄφθαλμοι, αἱ ρίζαι τὰ ριζώματα κ.λ.π. πρέπει νὰ ἔξετάζωνται πάντοτε ἐκ τοῦ φυσικοῦ. Τοῦτο εἶναι εὔκολώτατον ἀκόμη καὶ διὰ τὰ σχολεῖα τὰ μὴ ἔχοντα σχολικὸν κῆπον, ἀκόμη καὶ διὰ τὰ ὑπὸ τὰς πλέον δυσμενεῖς συνθήκας λειτουργοῦντα σχελεῖα, ἀρκεῖ ὁ διδάσκων νὰ προνοήσῃ δι' αὐτὸ ἀπ' ἀρχῆς τοῦ σχελικοῦ ἔτους καὶ ἀφήσῃ πρωτοβουλίαν εἰς τὰ παιδιὰ καθοδηγῶν ταῦτα σχετικῶς. Πρὸς τοῦτο ἀπαιτεῖται :

1) Νὰ προτιμᾶται ἕκαστοτε ἡ ἔξέτασις τοῦ φυτοῦ, τὸ ὄποιον κατὰ τὰς διαφόρους περιόδους είναι προσιτώτερον καὶ δύνανται οἱ μαθηταὶ νὰ τὸ προμηθευθῶσι. καὶ τὸ φέρωσιν, δλόκληρον ἢ μέρη του, εἰς τὴν τάξιν, νὰ μὴ ἀκολουθῆται δὲ κατὰ τὴν ἔξέτασιν τῶν διαφόρων φυτῶν ἡ σειρὰ κατὰ τὴν ὄποιαν ἀναγράφονται ταῦτα εἰς τὸ βιβλίον.

2) Νὰ χωρισθῶσιν οἱ μαθηταὶ ἀπὸ τῆς ἐνάρξεως τοῦ σχελικοῦ ἔτους εἰς ὁμάδας, ἐκ 3 - 4 μαθητῶν ἕκαστη. 'Ἐκάστη ὁμάς θὰ ἀναλαμβάνῃ οἰκειοθελῶς τὴν ἔξέτασιν μιᾶς οἰκογενείας φυτῶν ἢ θὰ ἐπιφορτίζεται πρὸς τοῦτο ἀπὸ τὸν διδάσκοντα, ὅταν δὲν θὰ παρουσιάζεται ὁμάς, ἡ ὄποια οἰκειοθελῶς νὰ ἀναλάβῃ τὴν ἔξέτασιν μιᾶς οἰκογενείας φυτῶν. Θὰ προπαρασκευάζεται πρὸς τοῦτο (φυσικὰ ὑπὸ τὴν καθοδήγησιν καὶ μὲν ὑποδείξεις τοῦ διδάσκοντος ποῦ καὶ πῶς είναι δυνατὸν νὰ ἀνεύρῃ τὸ ἀπαραίτητον ύλικὸν) ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τοῦ σχολικοῦ ἔτους, θὰ εἰδοποιῆται δὲ τούλαχιστον πρὸ 10ημέρου ἀπὸ τῆς ἡμέρας κατὰ τὴν ὄποιαν θὰ ἔλθῃ πρὸς ἔξέτασιν ἡ οἰκογένεια τῶν φυτῶν, τὴν ὄποιαν, ἔχει ἀναλάβει. 'Ἡ ὁμάς, ἡ ἔχουσα ἀνα-

λάβει τὴν ἔξετασιν μιᾶς οἰκογενείας φυτῶν, θὰ εἶναι ύποχρεωμένη νὰ φέρῃ εἰς τὴν τάξιν φύλλα, κλάδους, ἄνθη, καρπούς κ.λ.π., δηλ. πᾶν τὸ σχετικὸν μὲ τὰ φυτὰ τῆς οἰκογενείας αὐτῆς. Οἱ ἄλλοι μαθηταὶ θὰ φέρωσι καὶ αὐτοὶ δημοια ὑλικά, ἀλλὰ προαιρετικῶς. Εἶναι ἀφάνταστον τὸ πόσα πράγματα φέρουσιν εἰς τὴν τάξιν κατ' αὐτὸν τὸν τρόπον οἱ μαθηταὶ καὶ σπανιώτατα θὰ παρουσιασθῇ ἡ ἀνάγκη νὰ ἔχετασθῇ ἐν φυτὸν μόνον ἀπὸ εἰκόνας του.

3) Οἱ μαθηταὶ θὰ κρατῶσιν ἐν τετράδιον εἰς τοῦτο θὰ ἀναγράφωσιν, ἐπὶ τῆς μιᾶς σελίδος αὐτοῦ, μικρὰς περιλήψεις μὲ τὰ κυριώτερα χαρακτηριστικὰ κάθε οἰκογενείας φυτῶν καὶ τὴν χρησιμότητα τούτων. Εἰς τὴν ἄλλην σελίδα θὰ ζωγραφίζωσι σχέδια καὶ εἰκόνας φύλλων, ἀνθέων δλοκλήρων, κεχωρισμένως τῶν διαφόρων μερῶν τοῦ ἄνθους κ.λ.π., κατὰ τὸ δυνατὸν ἐγχρώμους. Δύνανται ἐπίσης (καὶ θὰ προτρέπωνται πρὸς τοῦτο) νὰ εἰκονογραφῶσι τὸ τετράδιον τῶν ἐπικολλῶντες εἰς αὐτὸν διαφόρους εἰκόνας, σχετικάς μὲ κάθε ἔξεταζόμενον φυτόν, τὰς ὅποιας τυχὸν ἀνευρίσκουσιν εἰς βιβλία, περιοδικά κ.λ.π. Εἰς τὸ αὐτὸν τετράδιον καλὸν εἶναι νὰ κάμνωσιν εἰς τὸ τέλος τῆς ἔξετάσεως κάθε τάξεως, ὁμοταξίας κ.λ.π. φυτῶν, συνοπτικὸν πίνακα περιλαμβάνοντα τὰ ἔξετασθέντα φυτὰ καὶ τὰ κοινὰ χαρακτηριστικά των.

4) Ἐκτὸς τοῦ τετραδίου ἀπαραιτήτως πρέπει νὰ καταρτίζωσι, μὲ τὸν τρόπον τὸν ὅποιον θὰ τοὺς ὑποδείξῃ ὁ διδάσκων, συλλογάς, δεόντως ταξινομημένας ἀπὸ τὰ ἔξετασθέντα φυτά. Ἀπὸ τὰς συλλογὰς αὐτὰς θὰ δωρίζωνται εἰς τὴν τάξιν αἱ καλύτεραι διὰ νὰ χρησιμοποιῶνται ὡς ὑλικὸν κατὰ τὰ ἐπόμενα ἔτη. Οὕτως ἐντὸς σχετικῶς βραχέος χρονικοῦ διαστήματος τὸ σχολεῖον θὰ ἔχῃ ἐπιβοτηθητικῶς πρὸς ἑκεῖνα, τὰ ὅποια ἀπαραιτήτως πρέπει νὰ προσκομίζουν οἱ μαθηταὶ καὶ ἄλλα ἴδικά του μέσα ἐποπτείας, τὰ ὅποια θὰ προστίθενται ἔκαστοτε καὶ ἔνιοτε θὰ συμπληρώνουν ἐλλείψεις. Καὶ

5) Λίαν ἐπωφελής εἶναι καὶ πρέπει νὰ ἐπιζητῆται ἡ ἀνταλλαγή, μεταξὺ τῶν μαθητῶν τῶν σχολείων διαφόρων περιφερειῶν, φυτῶν τὰ ὅποια ὑπάρχουν εἰς τὴν περιοχὴν ἐνὸς σχολείου, δὲν ὑπάρχουν ὅμως εἰς τὴν περιοχὴν ἄλλου, καθὼς καὶ σχετικῶν μὲ τὰ φυτὰ αὐτὰ πληροφοριῶν (ἔδαφος καὶ ὑψός εἰς τὸ ὅποιον εὔδοκιμοϋσι, τρόπος καλλιεργείας των ἀν ταῦτα εἶναι καλλιεργήσιμα κ.λ.π.).

II. Γαβρεσέας

## ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τὰ ἐπὶ τῆς γῆς ὅντα τὰ διαιροῦμεν εἰς τὰ μὴ ἔχοντα ζωήν καὶ εἰς τὰ ἔχοντα ζωήν.

Τὰ μὴ ἔχοντα ζωήν, είναι τὰ διάφορα ὄρυκτὰ καὶ πετρώματα· ταῦτα ὡς μὴ ἔχοντα ζωήν δὲν ἔχουν οὔτε ὅργανα, τὰ ὅποια είναι ἀπαραίτητα διὰ νὰ διατηρηθῇ ἐν ὃν εἰς τὴν ζωήν· τὰ λέγομεν διὰ τοῦτο ἀνόργανα.

Τὰ ἔχοντα ζωήν ἔχουν καὶ τὰ ἀπαραίτητα διὰ ταύτην ὅργανα καὶ διὰ τοῦτο τὰ λέγομεν ὅντα ὄργανικά.

Οργανικὰ ὅντα είναι τὰ Φυτά, τὰ Ζῷα καὶ ὁ Ανθρώπος.

Τὰ φυτὰ τὰ ἔξετάζει ἡ Φυτολογία, τὰ ζῷα ἡ Ζῷολογία καὶ τὸν ἀνθρωπὸν ἡ Ανθρώπολογία. Καὶ αἱ τρεῖς αὗται ἐπιστῆμαι, ἐπειδὴ μᾶς ὁμιλοῦν δι' ὅντα ἔχοντα ζωήν (βίον), λέγονται Βιολογικαὶ Ἐπιστήμαι.

Ἡ Φυτολογία λοιπὸν είναι ἕνας κλάδος τῶν Βιολογικῶν Ἐπιστημῶν, ὁ ὅποιος μᾶς ὁμιλεῖ διὰ τὰ φυτά.



ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ



## 1η ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΙΣ: ΦΑΝΕΡΟΓΑΜΑ

### 1η ΣΥΝΟΜΟΤΑΞΙΑ: ΦΥΤΑ ΑΓΓΕΙΟΣΠΕΡΜΑ

#### 1η ΟΜΟΤΑΞΙΑ: ΦΥΤΑ ΔΙΚΟΤΥΛΗΔΟΝΑ

1η ΤΑΞΙΣ: ΔΙΚΟΤΥΛΗΔΟΝΑ ΧΩΡΙΣΤΟΠΕΤΑΛΑ

#### 1η Οίκογένεια: Ψυχανθή

#### ΦΑΣΙΟΛΟΣ

Πείραμα. Λαμβάνομεν σπέρματα φασιόλου, τὰ ὅποια νὰ ἔχουν μείνει 24 ώρας εἰς ὄδωρ θερμοκρασίας  $15^{\circ}$ - $20^{\circ}$ . Νὰ διαχωρίσουν οἱ μαθηταὶ εἰς δύο μέρη τὰ σπέρματα. Νὰ παρατηρήσουν τὸ περίβλημα, τὰς δύο κοτυληδόνας, τὸ φυτικὸν ἔμβρυον. Νὰ παρατηρήσουν μὲ φακὸν τὸ ριζίδιον, τὸν βλαστόν, τὸ φύτρον τοῦ φυτικοῦ ἔμβρυου.

Μέρη σπέρματος. Εἰς κάθε σπέρμα φασιόλου διακρίνομεν ἐν ἔξωτερικὸν περίβλημα, τὸ περισπέρμιον, τὸ ὅποῖον περικλείει δύο ὠσειδῆ λευκωπά τεμάχια, τὰς κοτυληδόνας. Μεταξὺ τῶν κοτυληδόνων παρατηροῦμεν ἐν μικρὸν φυτόν, τὸ ὅποῖον λέγομεν φυτικὸν ἔμβρυον (σχ. 1). Τοῦτο εἶναι φυτὸν ἐν συμφρογραφίᾳ. Μὲ τὴν βοήθειαν φακοῦ διακρίνομεν εἰς αὐτὸ μίαν μικρὸν ρίζαν, ἔνα μικρὸν βλαστόν, καὶ εἰς τὴν κορυφὴν ἔνα μικρὸν δοφθαλμόν. Ἐν ἔξετάσωμεν μὲ προσοχὴν τὸν δοφθαλμὸν αὐτόν, θὰ ἴδωμεν ὅτι ἀποτελεῖται ἀπὸ λευκὰ περγαμηνοειδῆ φυλλίδια περικεκλεισμένα τὸ ἐν ἐντὸς τοῦ ἄλλου.

Αἱ κοτυληδόνες εἶναι δύο τὸν ἀριθμόν, δι' αὐτὸ ὁ φασιόλος λέγεται φυτὸν δικοτυλήδονον δικοτυλήδονα θὰ λέγωμεν καὶ ὅλα τὰ ἄλλα φυτά, εἰς τὰ ὅποια θὰ εὑρίσκωμεν σπέρματα μὲ δύο κοτυληδόνας.



Σχ. 1. Σπέρμα φασιόλου ἀνοιγμένον εἰς τὰ δύο. 1 περισπέρμιον  
2 κοτυληδόνες. 3, 4 καὶ 5 φυτικὸν ἔμβρυον (3 ριζίδιον. 4 βλαστός. 5 κορυφὴ).

Τὸ περισπέρμιον εἶναι σκληρὸν καὶ ἀνθεκτικόν, περιβάλλει δὲ τὰς δύο κοτυληδόνας καὶ τὸ φυτικὸν ἔμβρυον καὶ οὕτω τὰ προφυλάσσει.

"Α σκηνισις. Νὰ σχεδιασθῇ φασίολος μὲ ἀνοικτὰς τὰς κοτυληδόνας καὶ διακρινόμενον τὸ μεταξὺ αὐτῶν ἔμβρυον.

### ΒΛΑΣΤΗΣΙΣ

Τὸ ἔμβρυον, τὸ ὅποῖον εὔρισκεται μεταξὺ τῶν δύο κοτυληδόνων, εἶναι ἕνας μικρὸς φασίολος, ὁ ὅποῖος ζῆι καὶ ἀναπνέει ἀσθενέστατα. Ἡ ζωὴ του δμοιάζει μὲ βαθὺν ὑπνον. "Οταν ὅμως εὔρεθῇ ύπὸ καταλλήλους συνθήκας, τότε διακόπτει τὸν ὑπνον, ἀναπνέει καλῶς καὶ ἀρχίζει νὰ αὐξάνῃ. Λέγομεν ὅτι μεταβαίνει ἀπὸ τὴν κατάστασιν τοῦ ὑπνου, εἰς τὴν ὅποιαν εὔρισκετο, εἰς τὴν ἐνεργὸν ζωὴν, ἡ ὅτι τὸ σπέρμα βλαστάνει.

ΠΟΙΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΣΥΝΘΗΚΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΒΛΑΣΤΗΣΙΝ

Πείραμα. Γεμίζομεν τρία δοχεῖα, τῶν ἴδιων διαστάσεων, μὲ ὅχι πεπιεσμένον, ἀφρῦτο δηλαδή, χῶμα (τὸ ἴδιον καὶ διὰ τὰ τρία δοχεῖα). Φυτεύομεν 2 - 3 σπέρματα εἰς κάθε δοχεῖον καὶ εἰς βάθος δύο ἑκατοστομέτρων μόνον, διὰ νὰ ἔχασφαλίσωμεν τὸν ἀερισμὸν τῶν σπερμάτων, ὁ ὅποῖος εἶναι ἀναγκαῖος. Τοποθετοῦμεν τὸ ἐν δοχεῖον εἰς ψυχρὸν μέρος καὶ τὸ ποτίζομεν, ὥστε τὸ χῶμα νὰ εἶναι ὑγρόν. Τὸ δεύτερον καὶ τὸ τρίτον δοχεῖον τὸ τοποθετοῦμεν εἰς τὸν ἥλιον ἡ εἰς μέρος θερμόν· ἀπὸ τὰ δύο αὐτὰ δοχεῖα, τὸ ἐν τὸ ποτίζομεν, ἐνῷ τὸ ἄλλο τὸ ἀφήνομεν χωρὶς νὰ τὸ ποτίζωμεν. Μετὰ 10 - 12 ἡμέρας θὰ ἴδωμεν ὅτι ἀρχίζουν νὰ φυτρώνουν μόνον τὰ σπέρματα τοῦ δοχείου, τὸ ὅποῖον ἡ το εἰς θερμὸν μέρος καὶ τὸ ὅποῖον ἐποτίζαμεν τακτικά. Τὰ σπέρματα τῶν ἄλλων δοχείων δὲν θὰ φυτρώσουν.

Συμπέρασμα. Αραγκαῖα λοιπὸν διὰ τὴν βλάστησιν τοῦ σπέρματος εἶναι ὑγρασία καὶ ἀνάλογος θερμοκρασία.

Διὰ τὴν βλάστησιν τοῦ φασιόλου, ἡ θερμοκρασία δὲν πρέπει νὰ εἶναι κατωτέρα τῶν 12°. Ἐπομένως ἡ καταλληλοτέρα ἐποχὴ διὰ τὴν σπορὰν τοῦ φασιόλου εἶναι τὸ φινόπωρον καὶ ἡ ἀνοικτικότητα.

Πείραμα. Λαμβάνομεν μίαν φιάλην μὲ πλατὺ στόμα καὶ μέ-

σα είς αὐτὴν θέτομεν ἐν στρῶμα ἀπὸ πριονίδια ἢ πίτυρα καὶ εἰς αὐτὰ φυτεύομεν ἕως 50 σπέρματα φασιόλου. Πωματίζομεν τὴν φιάλην καὶ τὴν θέτομεν ἐπὶ τινας ἡμέρας εἰς μέρος θερμόν. "Οταν ἀρχίσῃ ἡ βλάστησις, ἀνοίγομεν τὴν φιάλην προσεκτικά, θέτομεν ἐντὸς αὐτῆς ἀσβέστιον ὅδωρο καὶ τὴν πωματίζομεν πάλιν. 'Αναταράσσοντες τώρα τὴν φιάλην καλῶς βλέπομεν ὅτι τὸ ἀσβέστιον ὅδωρ θολοῦται· τὸ θόλωμα τοῦτο ὁφεῖται εἰς τὸ ὅτι τὰ σπέρματα, ἀναπνέοντα, ἔλαβον τὸ ἐντὸς τῆς φιάλης δέξυγον καὶ ἀπέβαλον διοξείδιον τοῦ ἄνθρακος, τοῦ ὅποίου ἡ παρουσία προδίδεται μὲ τὸ θόλωμα τοῦ ἀσβεστίου ὅδατος.

*Συμπέρασμα.* Τὸ σπέρμα λοιπὸν κατὰ τὴν βλάστησίν του ἀναπνέει.


*Πείραμα.* Λαμβάνομεν δύο δοχεῖα τοῦ αὐτοῦ μεγέθους καὶ σχήματος καὶ τὰ γεμίζομεν μὲ τὸ ΐδιον ύγρὸν χῶμα· εἰς τὸ ἐν δοχεῖον ἀφήνομεν τὸ χῶμα ἀσυμπίεστον, ἐνῷ εἰς τὸ ἄλλο τὸ συμπιέζομεν πολὺ καὶ φυτεύομεν καὶ εἰς τὰ δύο δοχεῖα σπέρματα φασιόλου, βαθύτερον εἰς τὸ δοχεῖον μὲ τὸ συμπεπιεσμένον χῶμα. Θά ΐδωμεν ὅτι εἰς τὸ πρῶτον δοχεῖον τὰ σπέρματα θά βλαστήσουν, ἐνῷ εἰς τὸ δεύτερον οὐχί, διότι τὰ ἐφυτεύσαμεν βαθέως καὶ τὸ ὑπεράνω αὐτῶν συμπεπιεσμένον χῶμα δὲν ἀφήνει τὸν ἀέρα νὰ φθάσῃ μέχρις αὐτῶν· ἀποθνήσκουν δηλ. εἰς τὸ δεύτερον δοχεῖον τὰ ἐντὸς τῶν σπερμάτων φυτικὰ ἔμβρυα ἐξ ἀσφυξίας.

*Συμπέρασμα.* Λιὰ νὰ ἐκβλαστήσῃ λοιπὸν τὸ σπέρμα ἀπαραίτητος εἶναι ἡ ἔπαρξις ἀέρος. Λιὰ τοῦτο τὰ σπέρματα δὲν πρέπει νὰ φυτεύονται βαθέως καὶ τὸ ὑπεράνω αὐτῶν χῶμα πρέπει νὰ εἶναι ἐσκαμμένον, διὰ νὰ δύναται ὁ ἀὴρ νὰ εἰσχωρήσῃ μέχρις αὐτῶν, ἄλλως τὰ ἐντὸς αὐτῶν φυτικὰ ἔμβρυα ἀποθνήσκουν ἐξ ἀσφυξίας.

#### ΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΕΩΣ

*Πείραμα.* Ἐντὸς τεμαχίου βάμβακος ύγροῦ, ἢ μεταξὺ δύο φύλλων ύγροῦ στυπόχαρτου, ἢ εἰς βρεγμένα πριονίδια ἢ πίτυρα, τοποθετοῦμεν μερικὰ σπέρματα φασιόλου. Μετὰ 15 ἡμέρας θά ἔχωμεν δλας τὰς φάσεις τῆς αὐξήσεώς των. Θά ΐδωμεν δηλ. ὅτι τὸ σπέρμα κατ' ἀρχὰς ἀπορροφᾷ ὅδωρ, ἔξογκοῦνται αἱ κοτυληδόνες του καὶ θραύσουν τὸ

περισπέρμιον, τὸ ὅποῖον τὰς περιβάλλει. Ἐπείτα τὸ ριζίδιον ἀρχίζει νὰ μεγαλώῃ διευθυνόμενον πρὸς τὰ κάτω· ἐπακολουθεῖ ἡ αὔξησις τοῦ βλαστοῦ, ὅστις, κατ' ἀρχὰς κυρτός, μετὰ τὴν βλάστησιν εὐθύνεται, διεύθυνεται πρὸς τὰ ἄνω καὶ συμπαρασύρει μαζὶ του καὶ τὰς δύο κοτυληδόνας. Ἡ αὔξησις τοῦ βλαστοῦ κατόπιν, καθὼς θὰ ἔδωμεν κατωτέρω, σταματᾷ καὶ ἀρχίζει μὲ τὴν σειρὰν



**Σχ. 2. Φάσεις τῆς βλαστήσεως τοῦ φασιόλου.**

1. Τὸ ριζίδιον αὔξανεται διευθυνόμενον πρὸς τὰ κάτω καὶ δίδει τὴν ρίζαν.
2. Μετὰ τὴν ρίζαν αὔξανεται ὁ βλαστός, ὅστις κατ' ἀρχὰς εἰναι κυρτός.
3. Τέλος ἀύξανεται ἡ κορυφὴ δίδουσα τὸν ὑπόλοιπον βλαστόν· αἱ κοτυληδόνες εἰναι πλέον μαραμέναι, διότι δὲν ἔχουν θρεπτικὰ συστατικά.

τῆς νὰ αὔξανῃ ἡ κορυφή, ἡ ὅποια μὲ τὴν αὔξησίν της δίδει τὸν βλαστὸν μὲ τὰ φύλλα του (σχ. 2).

#### ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΣ ΤΩΝ ΚΟΤΥΛΗΔΟΝΩΝ

Τὸ φυτὸν ἔχει τώρα ρίζαν, βλαστὸν καὶ φύλλα, ἀλλὰ αἱ κοτυληδόνες τοῦ σπέρματος εἰναι μαραμέναι, διότι ἔχασαν τὰ θρεπτικὰ συστατικά, τὰ ὅποια εἶχον. Τί ἔγιναν αὐτά;

Πείραμα. Διὰ νὰ τὸ ἐννοήσωμεν, ἀς λάβωμεν τρία νεαρὰ φυ-

τὰ φασιόλου. Εἰς τὸ ἐν ἀποκόψωμεν τὰς κοτυληδόνας, εἰς τὸ δεύτερον τὴν κορυφὴν καὶ εἰς τὸ τρίτον τὴν ρίζαν. Θά λέωμεν ὅτι τὸ πρῶτον, ἀπὸ τὸ ὄποιον ἀπεκόψαμεν τὰς κοτυληδόνας, ἀποθνήσκει, ἐνῷ εἰς τὸ δεύτερον καὶ τρίτον γίνονται καὶ πάλιν ἡ ρίζα καὶ ἡ κορυφὴ. Ἀποθνήσκει ὁ ἄνευ κοτυληδόνων νεαρὸς φασιόλος, διότι δὲν ἔχει τὰς κοτυληδόνας, αἱ ὄποιαι τοῦ δίδουν θρεπτικὰ συστατικά, μέγρις ὅτου ἀποκτήσῃ ρίζας καὶ φύλλα, διότε δύναται νὰ ζήσῃ μόνος του.

*Συν μι ερασμα. Αἱ κοτυληδόνες περιέχουν θρεπτικὰ συστατικά, τὰ ὄποια χρησιμοποιεῖ ὁ φασιόλος διὰ νὰ σχηματίσῃ ρίζας καὶ φύλλα, διότε δύναται νὰ τρέφεται μόρος του.*

Τὰ πρῶτα λοιπὸν θρεπτικὰ συστατικὰ ὁ φασιόλος τὰ εὔρίσκει εἰς τὰς κοτυληδόνας καὶ δι’ αὐτὸ πρέπει αἱ κοτυληδόνες νὰ εἶναι ὅσον τὸ δυνατὸν παχύτεραι, δηλ. πλήρεις ἀπὸ θρεπτικὰ συστατικά. Θὰ εἶναι πλήρεις, ὅτι ἀφήσωμεν τὸ σπέρμα νὰ ώριμάσῃ καλῶς. Ἄωρα σπέρματα δὲν βλαστάνουν, διότι οὔτε τὰ ἀπαραίτητα θρεπτικὰ συστατικὰ ἔχουν οὔτε τὸ ἔμβρυον εἶναι τελείως ἀνεπτυγμένον. Ἐπίσης τὰ πολὺ παλαιὰ σπέρματα, τὰ σπέρματα τὰ φαγωμένα ἀπὸ ἔντομα, καθώς καὶ τὰ διατηρημένα εἰς μέρος μὴ καλῶς ἀεριζόμενον, δὲν βλαστάνουν, διότι εἰς ὅλας τὰς περιπτώσεις αὐτὰς τὸ ἔμβρυον ἔχει ἀποθάνει. Ἀπαραίτητα λοιπὸν διὰ τὴν βλάστησιν τοῦ σπέρματος εἶναι ὑγρασία καὶ θερμοκρασία ἀνάλογος, εὐρωστία τοῦ σπέρματος, ὥστε αἱ κοτυληδόνες νὰ εἶναι πλήρεις ἀπὸ θρεπτικὰ συστατικά, ἀποθήκευσις τῶν σπερμάτων εἰς μέρος ἀεριζόμενον, ὥστε τὸ ἔμβρυον νὰ δύναται νὰ ἀναπνέῃ καὶ νὰ μὴ ἔχῃ ἀποθάνει ἀπὸ ἀσφυξίαν καὶ ἐκλογὴ σπερμάτων οὐχὶ πολὺ παλαιῶν, ὥστε τὸ ἔμβρυον νὰ εύρισκεται ἐν τῇ ζωῇ.

Τὰ ἐντὸς τῶν κοτυληδόνων τοῦ φασιόλου θρεπτικὰ συστατικὰ χρησιμοποιεῖ καὶ ὁ ἄνθρωπος ὡς τροφήν. Ταῦτα ἔχουσι, καθώς κατωτέρω θά λέωμεν, θρεπτικὴν ἀξίαν ἵσην πρὸς τὸ κρέας.

## ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΦΑΣΙΟΛΟΥ

### 1. Ρίζα


Ἐὰν ἔξετάσωμεν τὴν ρίζαν τοῦ φασιόλου τρεῖς ἐβδομάδας μετὰ τὴν βλάστησιν του, διακρίνομεν εἰς αὐτὴν τὰ ἔξης μέρη:

α) Τὴν κεντρικὴν ἡ κυρίως φίλαν καὶ τὰ παράφριζα (σχ. 3, 1). Εἰς τὰ ἄκρα τούτων διακρίνομεν ἐν ἑξόγκωμα σκληρότερον εἰς σχῆμα Δ, τὸ 2, τὸ ὁποῖον λέγεται καλύπτρα καὶ χρησιμεύει διὰ νὰ δύνανται αἱ φίλαι νὰ εἰσχωροῦν ἐντὸς τοῦ χώματος χωρὶς νὰ καταστρέψωνται.

β) Ὑπεράνω τῆς καλύπτρας ὑπάρχει ἐν μικρὸν μέρος μὲ τριγίδια, τὰ ὁποῖα λέγονται φιλικὰ ἢ ἀπορροφητικὰ τριγίδια (3). Η φίλα λοιπὸν ἀποτελεῖται ἀπὸ τὴν κυρίως φίλαν, τὰ παράφριζα, τὴν καλύπτραν καὶ τὰ φιλικὰ λεγόμενα τριγίδια.

### Αὐξησις τῆς φίλης

Πείραμα. Λαμβάνομεν τὴν φίλαν νεαροῦ φασιόλου καὶ γαράσσομεν, ἀργόμενοι ἀπὸ τὸ ἄκρον, μὲ μελάνην ἐρυθράν, γραμμὰς εἰς ἀπόστασιν ἐνὸς ἑκατοστομέτρου τὴν μίαν ἀπὸ τὴν ἄλλην (σχ. 4).



Σχ. 3. Φίλα τοῦ φασιόλου.

1. Κυρίως φίλα καὶ παράφριζα.
2. Καλύπτρα.
3. Φιλικὰ ἢ ἀπορροφητικὰ τριγίδια.

Σχ. 4. Κατὰ μῆκος αὐξησις τῆς φίλης.

('Η φίλα αὐξάνεται μόνον κατὰ τὸ πρῶτον ἑκατοστόμετρόν της, δηλαδὴ εἰς τὸ ἄκρον της').

Παρακολουθοῦμεν ἐπί τι διάστημα τὴν αὐξησιν τῆς φίλης καὶ βλέπομεν ὅτι μόνον τὸ πρῶτον ἑκατοστὸν ταύτης αὐξάνεται.


'Αρκεῖ λοιπὸν νὰ κόψωμεν τὸ ἄκρον μᾶς φίλης διὰ νὰ σταματήσῃ τελείως ἡ αὔξησίς της.

### Διεύθυνσις τῆς ρίζης


Πείραμά. Γεμίζομεν μικρὸν δοχεῖον μὲ χῶμα καὶ φυτεύομεν εἰς αὐτὸ σπέρμα φασιόλου. Σκεπάζομεν τὸ ἄνοιγμα τοῦ δοχείου μὲ μετάλλινον πλέγμα καὶ τὸ ἔξαρτωμεν ἀνεστραμμένον. Θὰ παρατηρήσωμεν ὅτι μετὰ τὴν βλάστησιν ἡ ρίζα διευθύνεται πρὸς τὰ κάτω καὶ ἐξέρχεται ἀπὸ τὸ χῶμα εἰς τὸν ἀέρα, ἐνῷ ὁ βλαστός, διευθυνόμενος πρὸς τὰ ἄνω, εἰσχωρεῖ ἐντὸς τοῦ χώματος τοῦ δοχείου (σχ. 5). Ἡ ρίζα λοιπὸν διευθύνεται πάντοτε πρὸς τὰ κάτω. Τὸ φαινόμενον τοῦτο διφέλεται εἰς τὴν ἐπιδρασιν τῆς βαρύτητος καὶ εἰς τὴν Φυτολογίαν τὸ λέγομεν θετικὴ γεωτροπίαν.

### Ἐσωτερικὴ διασκευὴ τῆς ρίζης

Ἄν κόψωμεν μὲ ἐν ἔν δυράφιον μίαν ποιὸν λεπτὴν φέταν τῆς ρίζης εἰς τὸ ὕψος τῶν ἀπορροφητικῶν τριχιδίων καὶ τὴν ἐξετάσωμεν μὲ ἔνα μεγεθυντικὸν φακόν, θὰ διακρίνωμεν τὰ ἔξης:



**Σχ. 5.** Ἡ ρίζα τοῦ φασιόλου, ὁ ὅποιος ἐφύτεωσεν εἰς τὸ ἀνεστραμμένον δοχεῖον, διευθύνεται πρὸς τὰ κάτω καὶ ἐξέρχεται ἐκ τοῦ χώματος τοῦ δοχείου εἰς τὸν ἀέρα.



**Σχ. 6. Λεπτὴ τομὴ ρίζης.**

1. τριχοφόρος στιβάς μὲ τὰ ἀπορροφητικὰ τριχίδια.
2. φλοίος.
3. κεντρικὸς κύλινδρος.
4. ἐντεριώνη ἡ ψύχα.

α) Ἐξωτερικῶς ἐν στρῶμα λεπτὸν (σχ. 6, 1), τὴν ἐπιδρυμίδα, ἀπὸ τὴν ὅποιαν ἐκρύονται τὰ ἀπορροφητικὰ τριχίδια καὶ ἡ ὅποια διὰ τοῦτο λέγεται τριχοφόρος στιβάς.

β) Πρὸς τὸ ἐσωτερικὸν ἐν παχύτερον στρῶμα (2) τὸν φλοιόν.

γ) Πρὸς τὸ κέντρον τὸν κεντρικὸν κύλινδρον (3). Εἰς τοῦτον μὲ τὸ μικροσκόπιον δυνάμεθα νὰ διακρίνωμεν δύο εἴδη σωλήνων, ἀπὸ τοὺς ὅποιους οἱ ἐσωτερικοὶ λέγονται ἔυλώδεις σωλῆνες, οἱ δὲ ἄλλοι, οἱ πρὸς τὰ ἔξω, λέγονται ἥθμώδεις σωλῆνες. Θὰ ἴδωμεν κατωτέρω τὴν χρησιμότητα τῶν σωλήνων τούτων. Καὶ

δ) Εἰς τὸ κέντρον τοῦ κεντρικοῦ κυλίνδρου παρατηροῦμεν ἐν τυμῆμα μαλακώτερον, τὸ ὅποῖον λέγομεν ἐντεριώην ἢ ψύχαν.

### Λειτουργίαι τῆς ρίζης

Ἄπὸ δοχεῖον, εἰς τὸ ὅποῖον ἔχουν φυτρώσει φυτὰ φασιόλου, ἀποσπῶμεν ἐν φυτόν· κατὰ τὴν ἀπόσπασιν συναντῶμεν κάποιαν δυσκολίαν, καὶ τόσον μεγαλυτέραν, ὅσον μεγαλύτεραι εἰναι αἱ ρίζαι τοῦ φυτοῦ. Μετὰ τὴν ἀπόσπασιν παρατηροῦμεν ἐπὶ τῶν ριζῶν του τεμάχια χώματος προσκεκολλημένα τόσον στερεὰ ὡστε, ἂν προσπαθήσωμεν νὰ τὰ ἀποσπάσωμεν, τὰ ριζίδια κόπτονται.

Αἱ ρίζαι λοιπὸν εἰναι στερεὰ προσκεκολλημέναι εἰς τὸ χῶμα καὶ συγκρατοῦσιν οὕτως ἐκεῖ στερεῶς τὸ φυτόν.


Πλὴν τούτου ὅμως διὰ τῆς ρίζης τὸ φυτὸν παραλαμβάνει ἀπὸ τὸ ἔδαφος τὸ ὄδωρο μὲ τὰ συστατικὰ ποὺ εἰναι διαλελυμένα μέσα εἰς αὐτὸν καὶ τὰ ὅποια λέγομεν ἄλατα.

Πείραμα. Λαμβάνομεν τρία δοχεῖα μὲ πῶμα ἀπὸ φελλὸν διάτρητον (σχ. 7). Γεμίζομεν τὰ δοχεῖα μὲ ὄδωρο, εἰς τὸ ὅποῖον ἔχομεν διαλύσεις ἄλατα καὶ διὰ μέσου τῆς ὅπης τοῦ πώματος κάμνομεν νὰ διέλθουν αἱ ρίζαι τριῶν νεαρῶν φασιόλων, εἰς τρόπον ὡστε τοῦ πρώτου νὰ εὑρίσκωνται μέσα εἰς τὸ ὄδωρο τὰ ἀπορροφητικὰ τριχίδια, τοῦ δευτέρου μόνον ἡ καλύπτρα τῆς κεντρικῆς ρίζης, καὶ τοῦ τρίτου τὸ ἄνωθι τῶν ριζικῶν τριχιδίων μέρος τῆς ρίζης. "Ἐπειτα ἀπὸ δλίγας ἡμέρας θὰ ἴδωμεν ὅτι οἱ δύο τελευταῖοι φασιόλοι θὰ ἔχουν ἔηρανθῆ, ἐνῷ ὁ πρῶτος θὰ ἔξακολουθῇ νὰ διατηρῆται ἐν τῇ ζωῇ.

"Ἐπομένως τὸ φυτὸν παραλαμβάνει τὸ ὄδωρο καὶ τὰ θρεπτικὰ συστατικά, τὰ ὅποια εὑρίσκονται διαλελυμένα εἰς αὐτὸν (ἄλατα), διὰ τῆς ρίζης καὶ μάλιστα διὰ τῶν ἀπορροφητικῶν τριχιδίων τῆς ρίζης.

Ποῦ πηγαίνει τὸ ὅδωρ, τὸ δποῖον παίρνει ή ρίζα μὲ τὰ ἀπορροφητικά της τριχίδια; "Αν τὸ ὅδωρ, εἰς τὸ δποῖον ἔχομεν βαθίσει τὸν πρῶτον φασίολον, τὸ χρωματίσωμεν δι' ἐρυθρᾶς μελάνης καὶ ὑστερα ἀπὸ δλίγον χρόνον κόψωμεν διὰ ξυραφίου ἐν λεπτὸν στρῶμα ἀπὸ τὴν ρίζαν, εἰς τὸ μέρος τὸ εὑρισκόμενον ὑπεράνω τῶν ριζικῶν τῆς τριχιδίων, θὰ ἔδωμεν χρωματισμένους μόνον τοὺς ξυλώδεις σωλήνας, τοὺς δποίους εὔρομεν ὑπάρχοντας εἰς τὸν κεντρικὸν κύλινδρον.

"Ἐπει μέν τὸ ὅδωρ (καὶ τὰ εἰς αὐτὸ διαλελυμένα ἄλατα) παραλαμβάνεται μὲ τὰ ἀπορροφητικὰ τριχίδια τῶν ριζῶν καὶ ἀνέρχεται



**Σχ. 7.** 1 Ὁ φασίολος, δ δποῖος ἔχει τὰ ἀπορροφητικὰ τριχίδια τῶν ριζῶν του ἐντὸς τοῦ ὅδατος, εἰς τὸ δποῖον ὑπάρχουν ἐν διαλύσει ἄλατα, ἀναπτύσσεται κανονικῶς ὡσὰν νὰ εὐρίσκετο φυτευμένος εἰς τὸ χῶμα. 2 καὶ 3 Οἱ φασίολοι, οἱ δποῖοι ἔχουν ἐντὸς τοῦ ὅδατος μὲ τὰ ἄλατα μόνον τὸ κάτω τῶν ριζικῶν τριχιδίων μέρος των (2), η τὸ ἄνω τούτων, (3) ξηραίνονται.


πρὸς τὰ ἄνω διὰ τῶν ξυλωδῶν σωλήνων, οἱ δποῖοι εὐρίσκονται εἰς τὸν κεντρικὸν κύλινδρον.

"Η ρίζα ἐκκρίνει ἐν εἶδος δξέος. Πείραμα. Λαμβάνομεν ἐν δοχεῖον, τὴν βάσιν τοῦ δποίου ἔχομεν καλύψει μὲ τεμάχιον μαρμάρου, τὸ δποῖον ἔχει λείαν ἐπιφάνειαν. Ὑπεράνω θέτομεν χῶμα καὶ καλλιεργοῦμεν ἐντὸς τοῦ δοχείου ἕνα φασίολον, εἰς τρόπον ὡστε αἱ ρίζαι του νὰ ἐφάπτωνται τῆς ἐκ λείου μαρμάρου βάσεως τοῦ δοχείου. Εἳν μετά τινα χρόνον ἐκριζώσωμεν τὸ φυτὸν καὶ χύσωμεν

τὸ γῶμα, θὰ ἔδωμεν ἐπὶ τοῦ μαρμάρου τὰ ἀποτυπώματα τῆς ρίζης (σχ. 8). Τὸ μάρμαρον δηλ. ἐφαγάθη ἀπὸ τὰς ρίζας. Τοῦτο γίνεται χάρις εἰς ἐν εἴδος δέέος, τὸ ὅποῖον ἐκκρίνουν αἱ ρίζαι καὶ τὸ ὅποῖον διαλύει τὸ μάρμαρον.

Αἱ ρίζαι λοιπὸν ἐκκρίνουν ἐν εἴδος δέέος, διὰ τοῦ ὅποίου δύναται νὰ διαλύνουν τὸ μάρμαρον καὶ τὰ διάφορα πετρώματα.

Ἡ ρίζα ἀναπνέει πνέει. Πλὴν τῶν ὡς ἄνω ἡ ρίζα ἀναπνέει, δηλαδὴ λαμβάνει διογόνον καὶ ἀποβάλλει διοξείδιον τοῦ ἄνθρακος. Τοῦτο δυνάμεθα νὰ διαπιστώσωμεν εὐκολώτερον, ἢν λάβωμεν, ἀντὶ τῆς ρίζης φασιόλου, ρίζας ἀπὸ καρῶτα ἢ ραδίκια. Ἐκριζώνομεν καρῶτα ἢ ραδίκια, κόπτομεν τὰς ρίζας τῶν, τὰς πλύνομεν καλῶς καὶ τὰς θέτομεν



Σχ. 8. Αἱ ρίζαι τοῦ φασιόλου, μὲ τὰ δέέα τὰ ὅποια ἐκκρίνουν, τρώγοντας τὴν μαρμαρίνην βάσιν τοῦ δοχείου καὶ χαράσσουν ἐπ' αὐτῆς τὰς γραμμάς, τὰς ὅποιας βλέπομεν εἰς τὸ ἄνωτέρω σχῆμα.

(καὶ τὸ ὕδωρ). Ἀν λάβωμεν δοχεῖον μὲ νεαρὸν φασιόλον καὶ συμπιέσωμεν ἴσχυρῶς τὸ γῶμα τοῦ δοχείου, θὰ ἔδωμεν μετὰ παρέλευσιν ἡμερῶν τινῶν, ὅτι ὁ φασιόλος γίνεται καρκετικὸς καὶ τέλος ἀποθνήσκει, διέτι δὲν δύναται νὰ φθάσῃ μέχρι τῶν ριζῶν του ὁ ἄηρ καὶ τὸ ὕδωρ.

Οὕτω βλέπομεν ὅτι ἡ ρίζα :

α) Στερεώνει τὸ φυτόν. β) Παραλαμβάνει ἐκ τοῦ ἐδάφους τὸ ὕδωρ μὲ τὰ διαλελυμένα εἰς αὐτὸν ἄλατα καὶ γ) ἀναπνέει.

## 2. Βλαστὸς τοῦ φασιόλου

Βλαστὸν λέγομεν τὸ μέρος τοῦ φυτοῦ, τὸ ὅποῖον φέρει τὰ φύλλα, τὰ ἄνθη καὶ τοὺς καρπούς. Εἰς κάθε βλαστὸν παρατηροῦμεν (σχ. 9):

α) Τὸ μέρος ἀπὸ τὸ ὄποῖον ἐκφύονται τὰ φύλλα καὶ τὸ ὄποῖον εἶναι ἔξωγκωμένον· λέγεται τοῦτο γόρατον (1).

β) Τὸ μεταξὺ δύο γονάτων διάστημα (2), τὸ ὄποῖον λέγεται μεσογονάτιον διάστημα.

γ) Εἰς τὴν κορυφὴν τοῦ βλαστοῦ ἐν ἔξογκωμα (3), τὸ ὄποῖον λέγεται κορυφὴ ἢ ἀκραῖος ὀφθαλμός. Εἴσταζοντες προσεκτικὰ



**Σχ. 9α.** Παράστασις βλαστοῦ μὲς ἀποκεκομμένην τὴν κορυφὴν (3), τοῦ δποίου ἀρχεται αἵξινῶν ὁ πλησιέστερος πρὸς τὴν κορυφὴν μασχαλιαῖος ὀφθαλμός, (4), δστις ἀνέλαβε τὴν κατὰ μῆκος αὔξησιν τοῦ βλαστοῦ, ἀντικαθιστῶν τὸν ἀποκόπεντα ἀκραῖον ὀφθαλμὸν (κορυφὴν 3).


**Σχ. 9. Ο βλαστός.** 1 γόνατον, μασχάλη, καὶ μασχαλιαῖος ὀφθαλμός. 2 μεσογονάτιον διάστημα. 3 ἀκραῖος ὀφθαλμός.

τὸν ἀκραῖον ὀφθαλμὸν βλέπομεν ὅτι οὗτος ἀποτελεῖται ἀπὸ λευκωπὰ περγαμηνοειδῆ φυλλίδια, περικλειόμενα τὸ ἐν ἐντὸς τοῦ ἄλλου. Καὶ

δ) Τὸ μέρος τὸ μεταξὺ τῆς ἐκφύσεως τοῦ φύλλου καὶ τοῦ βλαστοῦ (εἰς τὸ μέρος ὃπου εἴδομεν τὸ γόνατον), τὸ ὄποῖον καλεῖται μασχάλη (1). Εἰς ταῦτη ἀναφαίνονται ἀργότερον ἄλλοι ὀφθαλμοί, λεγόμενοι μασχαλιαῖοι, οἱ ὄποιοι ἀναπτυσσόμενοι δίδουν κλάδους. Τὰ πληρίσιον τοῦ ἀκραίου ὀφθαλμοῦ μεσογονάτια διαστήματα εἶναι μικρότερα.

## Αὐξησις τοῦ βλαστοῦ

Πείραμα. Λαμβάνομεν δύο νεαροὺς φασιόλους· τοῦ ἑνὸς ἀποκόπτομεν τὴν κορυφὴν (σχ. 9α), εἰς τὸν ἄλλον χαράζσομεν, ἀρχόμενοι ἀπὸ τῆς κορυφῆς, δι’ ἐρυθρᾶς μελάνης, γραμμὰς εἰς




Σχ. 10. Αὐξησις βλαστοῦ.

Ο βλαστὸς θὰ αὐξηθῇ ὅχι καθ’ ὅλον τὸ μῆκος αὐτοῦ, ἀλλὰ μόνον κατὰ τὸ ἄκρον, δηλαδὴ κατὰ τὸ τμῆμα α ἔως β.

ἀπόστασιν ἑνὸς ἐκατοστομέτρου τὴν μίαν ἀπὸ τῆς ἄλλης (σχ. 10). Θὰ ἰδωμεν ὅτι

τοῦ φασιόλου τοῦ ὅποίου ἐκόψαμεν τὴν κορυφὴν (σχ. 9α, 3) σταματᾷ ἡ αὔξησις, ἐνῷ ἀρχίζει νὰ αὔξανεται ὁ μασχαλιαῖος ὀφθαλμὸς (σχ. 9α, 4), ὁ ὅποῖος εὑρίσκεται πλησιέστερα πρὸς τὸν ἄκραῖον (κορυφήν). Εἰς τὸν ἄλλον φασιόλον, εἰς τὸν ὅποῖον ἔχομεν χαράζει τὰς γραμμὰς, θὰ ἰδωμεν (σχ. 10 καὶ 10α) ὅτι αὔξανει μόνον τὸ τμῆμα τὸ πλησίον τῆς κορυφῆς, δηλ. τὸ αβ, αἱ δὲ ἄλλαι γραμμαὶ παραμένουν εἰς τὴν ἀπόστασιν, εἰς τὴν ὅποίαν τὰς ἔχομεν χαράζει.




Σχ. 10α. Σχηματικὴ παράστασις αὐξησεως βλαστοῦ (ὑπὸ μεγέθυνσιν) δεικνύουσα τὴν ἐπιτελεσθεῖσαν αὔξησιν τοῦ ἄκραίου ὀφθαλμοῦ (α) μετὰ τοῦ ἀκραίου τμήματος α ἔως β τοῦ βλαστοῦ.

Συμπέρασμα. Ο βλαστός λοιπὸν ανέκανε ἀπὸ τὴν κορυφὴν ἥ τὸν ἀκραῖον δφθαλμόν, ἂν δὲ ὁ ἀκραῖος δφθαλμὸς δὶ' οἰοδίηποτε λόγον καταστραφῆ, τὴν ανέκησιν ἀναλαμβάνει ὁ πλησιέστερον πρὸς τὴν κορυφὴν ενδισκόμενος μασχαλαιτοῦς δφθαλμός.

### Διεύθυνσις τοῦ βλαστοῦ

Πείραμα. Λαμβάνομεν δύο δοχεῖα μὲν νεαροὺς φασιόλους· τὸ ἐν τῷ κρεμῶμεν ἀνεστραμμένον, μὲ τὴν κορυφὴν δηλαδὴ τοῦ φασιόλου πρὸς τὰ κάτω, καὶ τὸ ἄλλο τὸ θέτομεν πλησίον ἀνοικτοῦ παραθύρου. Μετ' ὅλιγας ἡμέρας θὰ ἰδωμεν (σχ. 11), ὅτι ἡ κορυφὴ τοῦ ἀν-



Σχ. 11. Τὸ φυτὸν διευθύνει τὴν κορυφὴν τοῦ πρὸς τὰ ἄνω καὶ πρὸς τὸ φῶς.

A. Τὸ ἀνεστραμμένον φυτὸν στρέφει τὴν κορυφὴν τοῦ πρὸς τὰ ἄνω. B. Τὸ πλησίον τοῦ παραθύρου φυτὸν διευθύνει τὴν κορυφὴν τοῦ πρὸς τὸ φῶς τοῦ παραθύρου.


εστραμμένου φασιόλου γυρίζει καὶ διευθύνεται πρὸς τὰ ἄνω, ἀντιθέτως δηλ. τῆς ρίζης, ἣτις διευθύνεται πρὸς τὰ κάτω (βλ. σχ. 5). Τὸ φαινόμενον τοῦτο, τὸ ὃποῖον ὀφείλεται ( ὅπως ἔμάθομεν καὶ διὰ τὴν ρίζαν ) εἰς τὴν ἐπίδρασιν τῆς βαρύτητος, τὸ λέγομεν ἀρνητικὴν γεωτροπίαν, διότι ἐδῶ ἡ βαρύτητος φέρει ἀντίθετον ἀποτέλεσμα.

Ἡ κορυφὴ τοῦ ἄλλου φασιόλου θὰ ἰδωμεν ὅτι στρέφεται πρὸς

τὸ φῶς τοῦ παραθύρου, ἀναζητοῦσα νὰ εὕρῃ ὅσον τὸ δυνατὸν περισσότερον φῶς.

### Ἐσωτερικὴ κατασκευὴ τοῦ βλαστοῦ

Κόπτομεν μὲν ἐν ξυράφιον μίαν πολὺ λεπτὴν φέταν τρυφεροῦ βλαστοῦ καὶ τὴν ἔξετάξομεν εἰς τὸ μικροσκόπιον. Διακρίνομεν δύο μέρη : α.) "Εν μέρος πρὸς τὰ ἔξω ἄγρουν, τὴν ἐπιδερμίδα, ἡ ὁποίᾳ φέρει μικρὰς ὀπάσις, τὰ στόματα. β.) Τὸν φλοίον, γεμάτον ἀπὸ πρασίνους κόκ-



Σχ. 12. Τομὴ βλαστοῦ τοῦ φασιόλου.

κους, τοὺς ὄποιούς λέγομεν κόκκους χλωροφύλλης. γ.) Τὸ ἐσωτερικὸν μέρος ἡ κεντρικὸν κύλινδρον, ὃστις σχηματίζεται ἀπὸ σωλήνας ξυλώδεις, τοὺς πρὸς τὰ μέσα, καὶ ἄλλους πρὸς τὰ ἔξω, μαλακούς, τοὺς ηθυμώδεις. Οἱ ξυλώδεις καὶ ηθυμώδεις σωλήνες τοῦ βλαστοῦ εἰναι προεκτάσεις τῶν δμοίων των σωλήνων τῆς φίλης καὶ δ.) Εἰς τὸ μέσον, ἐν τμῆμα κυλινδρικόν, μαλακὸν καὶ σποριγγώδες, τὴν ἐντεριώνην ἡ ψύχαν. (σχ. 12).

### Χρησιμότης τῶν ξυλωδῶν σωλήνων τοῦ βλαστοῦ

Πείραμα. Λαμβάνομεν βλαστὸν φασιόλου καὶ τὸν βυθίζομεν ἐντὸς ποτηρίου μὲ ῦδωρ, τὸ ὄποῖον προηγουμένως ἐγρωματίσαμεν μὲ δλίγην μελάνην ἐρυθράν, τὴν ὄποιαν προσεθέσαμεν εἰς αὐτό· ἂν μετ'

διλήγον κόρψωμεν ἐκ τοῦ βλαστοῦ λεπτήν φέταν καὶ τὴν ἐξετάσωμεν εἰς τὸ μικροσκόπιον, θὰ ἴδωμεν ὅτι οἱ ξυλώδεις σωλῆνες εἶναι ἔρυθροι. Ἐκ τούτου βεβαιούμεθα ὅτι τὸ ὄδωρ μὲ τὴν ἔρυθράν μετάλλην ἀνέρχεται εἰς τὸν βλαστὸν ἐκ τοῦ πατηρίου διὰ τῶν ξυλωδῶν σωλήνων τοῦ βλαστοῦ. Οἱ ξυλώδεις λοιπὸν σωλῆνες τοῦ βλαστοῦ φέρουσι πρὸς τὰ ἄνω τὸ ὄδωρ, τὸ ὄποιον λαμβάνουσιν αἱ ρίζαι ἐκ τοῦ ἐδάφους.

Τὸ ξύλον τούτων εἶναι ἑκεῖνο, τὸ ὄποιον συγκρατεῖ τὸν βλαστὸν ὄρθιον. Ἐπειδὴ εἰς τὸν φασιόλον οἱ ξυλώδεις σωλῆνες εἶναι πολὺ διλήγοι, διὰ τοῦτον ἀδύνατος καὶ δὲν δύναται νὰ συγκρατηθῇ ὄρθιος, χωρὶς ὑποστήριγμα. Λέγεται βλαστὸς ποώδης, καὶ τὸν φασιόλον, καθὼς καὶ κάθε φυτὸν ποὺ θὰ ἔχῃ τοιοῦτον βλαστόν, τὸν λέγομεν πόναν. Ἡ βλαστησίς του ἀρχεται τὸ ἕαρ καὶ τὸ φυτὸν ἔγραψεται τὸ φινόπωρον. Ἐπομένως διὰ φασιόλος εἶναι φυτὸν μονοετές ή ἐτήσιον.


Ἡ ἐπιδερμίδα καὶ διὰ τοῦ φλοιοῦ διατίθεται ἐπιδερμίδαν ἀπὸ τὴν ἐξάτμισιν τὸ ὄδωρ, τὸ ὄποιον εὐρίσκεται ἐντὸς τῶν ξυλωδῶν καὶ θυμωδῶν σωλήνων. Ἀν ἀφαιρέσωμεν τὸν φλοιὸν καὶ τὴν ἐπιδερμίδαν καὶ ἐκθέσωμεν τὸ φυτόν εἰς τὸν ἥλιον, τὸ ἐντὸς τῶν σωλήνων τούτων ὄδωρ ἐξατμίζεται καὶ τὸ φυτόν ἀποθνήσκει· διὰ νὰ τὸ προφυλάξωμεν, πρέπει νὰ σκεπάσωμεν τὸ ἀποκαλυφθὲν μέρος ἐγκαίρως μὲ ἔνα προφυλακτικόν, π.χ. μὲ ὄφασμα βρεγμένον, ὥστε νὰ ἐμποδίσωμεν τὴν ἐξάτμισιν. Κατὰ τὸν χειμῶνα ἐπίσης ή ἐπιδερμίδας καὶ διὰ τοῦ φλοιοῦ προφυλάσσουν ἀπὸ τὸ ψῦχος τὸ ἐντὸς τοῦ φυτοῦ ὄδωρ καὶ δὲν τὸ ἀφήνουν νὰ παγώσῃ. Εἰς πολλὰ εἰδη φασιόλων διὰ τοῦ βλαστοῦ γίνεται ἀρκετὰ ἐπιμήκης καὶ ἐπειδὴ εἶναι μαλακός, δὲν δύναται νὰ συγκρατηθῇ μόνος του· γρειάζεται νὰ τοῦ θέσωμεν ἐν ὑποστήριγμα ἐπὶ τοῦ ὄποιού τότε ἀναρριγᾶται. Λέγεται διὰ τοῦτο, διὰ φασιόλος αὐτός, φυτὸν ἀναρριγώμενον.

### 3. Φύλλον τοῦ φασιόλου

#### Ἐξωτερικά χαρακτηριστικά

Εἰς ἔκαστον φύλλον παρατηροῦμεν ἐν πλατύ μέρος, τὸ ἔλασμα (σγ. 13, 1) καὶ μίαν οὐράν, ή ὄποια συνδέει τοῦτο μὲ τὸν βλαστὸν καὶ ή ὄποια λέγεται μίσχος (3). Ο μίσχος περιβατοῦται πρὸς τὸ μέρος τοῦ βλαστοῦ εἰς μικρὰν θήκην, τὸν κολεόν (5), διὰ τοῦτον περιβάλλει κατά τι τὸν βλαστόν. Εἰς τὴν βάσιν ἔκαστου μίσχου εὑρίσκομεν δύο

μικρὰ φύλλα, τὰ ὅποια λέγομεν παράφυλλα (4). Τὸ ἔλασμα διασχίζεται ἀπὸ νεῦρα (2), τὰ ὅποια εἶναι διακλαδώσεις τοῦ μίσχου· εἰς τὸ κέντρον ἐν νεῦρον χονδρότερον· ἀπὸ αὐτὸῦ ἔξερχονται ἄλλα λεπτότερα, τὰ ὅποια διασχίζουν τὸ ἔλασμα πρὸς ὅλας τὰ διευθύνσεις. Ἡ νεύρωσις αὕτη, ἐπειδὴ ὁμοιάζει μὲ πτερόν, λέγεται πτεροδόφος. Τὰ δύο πρῶτα φύλλα βλέπομεν ὅτι ἐκφύονται ἀπὸ τὸ αὐτὸῦ γόνατον, τὸ ἐν ἀπέναντι τοῦ ἄλλου (ἐκφυσίς ἀντίθετος); τὰ ἄλλα ἐκφύονται ἀνὰ ἐν εἰς ἐκαστον γόνατον καὶ ἡ ἐκφυσίς αὕτη λέγεται ἐκφυσίς μεμονωμένη ἢ κατ' ἐναλλαγὴν (σχ. 14). Τὰ ὑπόλοιπα, πλὴν τῶν δύο πρώτων, φύλλα ἀποτελοῦνται ἐκαστον ἀπὸ τρία μικρὰ φυλλάρια, ἐκ τῶν ὅποιων τὸ μὲν ἐν εὐρίσκεται εἰς τὸ ἄκρον τοῦ κυρίως μίσχου, τὰ δὲ ἄλλα δύο ἐκφύονται ἀπὸ τὸν κυρίως μίσχον μὲ βραχεῖς μίσχους δευτερεύοντας. Τὰ τρία ταῦτα φυλλάρια ἀποτελοῦν ἐν φύλλον. Τὸ φύλλον τοῦτο τὸ λέγομεν σύνθετον φύλλον, διότι συγματίζεται ἀπὸ πολλὰ φυλλάρια καὶ ἔχει πολλὰ ἐλάσματα, ἐνῷ τὰ δύο πρῶτα τὰ λέγομεν φύλλα ἀπλᾶ καὶ ἔχουν ἐν μόνον ἔλασμα ἐκαστον.



**Σχ. 13. Σύνθετον φύλλον φασιόλου.**


1. ἔλασμα.
2. νεῦρα.
3. μίσχος.
4. παράφυλλα.
5. κολεός.

φυλλάρια καὶ ἔχει πολλὰ ἐλάσματα, ἐνῷ τὰ δύο πρῶτα τὰ λέγομεν φύλλα ἀπλᾶ καὶ ἔχουν ἐν μόνον ἔλασμα ἐκαστον.

\*Εσωτερικὴ κατασκευὴ τοῦ φύλλου

Κόπτομεν διὰ ξυραφίου λεπτήν φέταν φύλλου καὶ τὴν ἐξετάζομεν μὲ πολὺ ισχυρὸν φακὸν ἢ μικροσκόπιον. Παρατηροῦμεν εἰς τὸ ἄνω καὶ κάτω μέρος δύο μεμβράνας, αἱ ὅποιαι ἀποτελοῦν τὴν ἄνω καὶ κάτω ἐπιδερμίδα τοῦ φύλλου (σχ. 15,1 καὶ 2) καὶ μεταξὺ τῶν ἐπιδερμίδων τούτων τὸ δίκτυον τῶν νεύρων, τὸ ὅποιον ἀποτελεῖ τὸν σκελετὸν τοῦ φύλλου. Εἰς τοὺς βρόχους τοῦ δικτύου τούτου παρατηροῦμεν ἔνα ίστόν, ὃ ὅποιος εἶναι πράσινος, διότι φέρει κόκκους πρασίνους, τοὺς κόκκους τῆς χλωροφύλλης ἢ χλωροφυλλοκόκκους (3). Ἡ ἄνω ἐπιφάνεια τοῦ φύλλου ἔχει χρῶμα βαθύτερον πράσινον παρὰ ἡ κάτω, διότι

δύπο τὴν ἄνω ἐπιδερμίδα ἵστος ἔχει περισσοτέρους κόκκους χλωροφύλλης. Εἰς τὴν ἐπιδερμίδα τῆς κάτω ἐπιφανείας τοῦ φύλλου παρατηροῦμεν ἐπίσης πλῆθος μικρῶν ὀπῶν, τὰς ὁποίας λέγομεν στόματα (4). Τὰ στόματα ταῦτα εἰναι διὰ τὸν φασίολον, ὅτι δι' ἡμᾶς οἱ πόροι τοῦ




**Σχ. 14. Νεαρὰ φυτὰ φασιόλου.**

1 φυλλάρξια. 2 νεῦρα. 3 γόνατον. 4 ἀπλοῦν φύλλον. 5 μίσχος τοῦ φύλλου καὶ εἰς τὸν βλαστὸν τὸ μεσογονάτιον διάστημα. 6 τὸ μέρος διοπῆρχον αἱ κατυληδόνες. 7 ριζικὰ τριχίδια. 8 ακλύπτρα.

δέρματός μας καὶ θὰ ιδωμεν κατωτέρω τὴν χρησιμότητά των. Ἐντὸς τοῦ φύλλου παρατηροῦμεν ἐπίσης τοὺς ξυλώδεις (5) καὶ τοὺς ἡθμώδεις (6) σωλήνας, τοὺς ὁποίους ἔχομεν ἀνεύρει καὶ εἰς τὸν βλαστὸν καὶ εἰς τὴν ρίζαν.

Πῶς γίνονται οἱ κόκκοι τῆς χλωροφύλλης

Πείραμα. Λαμβάνομεν νεαρὸν φυτὸν φασιόλου καὶ τὸ θέτομεν εἰς μέρος σκοτεινὸν ἐπὶ τινὰς ἡμέρας. Θὰ παρατηρήσωμεν ὅτι τὰ φύλλα του, τὰ ὅποια πρότερον ἦσαν πράσινα, γίνονται σὺν τῷ χρόνῳ μικρότερα, κιτρινα, καὶ τέλος τὸ χρῶμα των κλίνει πρὸς τὸ λευκόν, ἐνῷ συγχρόνως ὁ βλαστὸς αὐξάνεται πολὺ καθ' ὑψος καὶ γίνεται λεπτότερος καὶ μὲ μεγάλα μεσογονάτια διαστήματα (σχ. 16). "Αν λάβωμεν τώρα λεπτὴν τομὴν τοῦ φύλλου καὶ τὴν ἔξετάσωμεν εἰς τὸ μικροσκόπιον,



Σχ. 15. Λεπτὴ τομὴ τοῦ φύλλου.

1 καὶ 2 ἄνω καὶ κάτω ἐπιδερμίς τοῦ φύλλου. 3 κόκκοι χλωροφύλλης. 4 στόματα τῆς κάτω ἐπιδερμίδος τοῦ φύλλου. 5 καὶ 6 ἔντλαδεις καὶ θήμωδεις σωλήνες.


δὲν θὰ ἀνεύρωμεν κόκκους χλωροφύλλης. "Αν ἐπαναφέρωμεν τὸ φυτὸν εἰς τὸ φῶς, θὰ ἴδωμεν ὅτι ἀνακτᾶ τὸ πρὶν πράσινον χρῶμα του, ἀνευρίσκουμεν δὲ πάλιν μὲ τὸ μικροσκόπιον τοὺς κόκκους τῆς χλωροφύλλης.

Διὰ τὴν κατασκευὴν λοιπὸν τῶν χλωροφυλλοκόκκων εἶναι ἀναγκαῖον νὰ ὑπάρχῃ φῶς. Εἰς τοὺς πρασίνους κόκκους τῆς χλωροφύλλης τὰ φυτὰ δρεῖλουν τὸ πράσινον χρῶμα των. Διὰ τὴν κατασκευὴν τῆς χλωροφύλλης εἶναι ἐπίσης ἀπαραίτητος ὁ σίδηρος· ὅταν τὸ φυτὸν δὲν εύρισκῃ σίδηρον εἰς τὸ χῶμα τότε κιτρινίζει.

### Λειτουργίαι τοῦ φύλλου

α) Διαπνοή. Τὸ φύλλον ἀποβάλλει ὕδωρ ἐν εἴδει ἀτμοῦ εἰς τὸν ψέρα.

Πείρα μα 1. Λαμβάνομεν μίαν γλάστραν, εἰς τὴν ὅποιαν ἔχει ἐκβλαστήσει νεαρὸς φασίολος· τὸ χῶμά της τὸ σκεπάζομεν μὲ μίαν πλάκαν ὑαλίνην ποὺ ἔχει εἰς τὸ μέσον τῆς μικρὰν ὄπὴν καὶ σχισμὴν πρὸς τὸ ἐν ἡμισύ της (σχ. 17), διὰ τῆς ὅποιας νὰ διέρχεται ὁ βλα-



Σχ. 16. 1. Φασίολος αὐξηθεὶς εἰς τὸ σκότος. 2. φασίολος αὐξηθεὶς εἰς τὸ φῶς. τοῦ δοχείου, δὲν δύναται νὰ ἔχει τοῦ φασιόλου. Κατὰ τὸν τρόπον αὐτὸν τὸ ὕδωρ, τὸ ὅποῖον εὑρίσκεται εἰς τὸ χῶμα

ποῖον εὑρίσκεται εἰς τὸ χῶμα τοῦ δοχείου, δὲν δύναται νὰ προσέρχεται παρὰ μόνον ἀπὸ τὰ φύλλα τοῦ φασιόλου καὶ μάλιστα ἂν ταῦτα ἀποβάλλωσιν ὕδωρ ἐν εἴδει

ἀτμοῦ. Διότι τότε μόνον οἱ ἀποβαλλόμενοι αὐτοὶ ἀτμοί, ἐρχόμενοι εἰς ἐπαφὴν μὲ τὴν ψυχρὰν ὕαλον τοῦ κάθαρος, ψύχονται καὶ συμπυκνοῦνται εἰς μικρὰ σταγονίδια ὕδατος, τὰ ὅποια ἐπικάθηνται ἐπὶ τοῦ ἐσωτερικοῦ τοῦ ὕαλίνου κάθαρος.

Πείραμα 2. Τὸ αὐτὸ δοχεῖον θέτομεν ἐπὶ τοῦ ἑνὸς μέρους ζυγοῦ, καὶ ἐπὶ τοῦ ἄλλου θέτομεν σταθμὰ μέχρις ἵσορροπήσεως. Μετὰ τινα χρόνον ἡ ἵσορροπία διαταράσσεται καὶ ὁ ζυγὸς κλίνει πρὸς τὸ μέρος τῶν σταθμῶν (σχ. 18). Τοῦτο διότι ἀπὸ τὸ δοχεῖον ἔχαθη βάρος τόσον, ὃσον τὸ βάρος τοῦ ὕδατος, τὸ ὅποιον ἀπεβλήθη ἀπὸ τὰ φύλλα τοῦ φασιόλου ἐν εἴδει ἀτμοῦ.




**Σχ. 18.** Ὁ ζυγὸς μετά τινα χρόνον κλίνει πρὸς τὸ μέρος τῶν σταθμῶν, διότι ὁ φασιόλος ἀπέβαλεν ὕδωρ διὰ τῆς διαπνοῆς καὶ ἔγινεν ἐλαφρότερος.

Ο φασιόλος λοιπὸν ἀποβάλλει ἀπὸ τὰ φύλλα του ὕδωρ ἐν εἴδει ἀτμοῦ· τὸ ὕδωρ τοῦτο τὸ ἀποβάλλει διὰ τῶν στομάτων, τὰ ὅποια εὑρίσκονται πολλὰ εἰς τὴν κάτω κυρίως ἐπιφάνειαν τοῦ φύλλου καὶ ἡ ἀποβολή του εἶναι μεγαλύτερα κατὰ τὰς θερμὰς καὶ ἔηρας ἡμέρας. Τὸ φαινόμενον τοῦτο καλεῖται διαπνοή.

β) Ἀφομοίωσις. Πείραμα 1. Λαμβάνομεν ἔνα εύρυν δοκιμαστικὸν σωλῆνα καὶ ἐντὸς αὐτοῦ θέτομεν βλαστοὺς μὲ φύλλα, τοὺς ὅποιους ἔχομεν κόψει προσφάτως (κατὰ προτίμησιν ἀπὸ φυτῶν ὑδρόβιων). Γεμίζομεν τὸν σωλῆνα τοῦτον μὲ ὕδωρ, τὸ ὅποιον περιέχει ἐν διαλύσει διοξείδιον τοῦ ἀνθρακος (λέγεται τοῦτο ὕδωρ Σέλτς). Κατόπιν κρατοῦντες τὸ ἀνοικτὸν ἄκρον τοῦ σωλῆνος κλειστὸν μὲ τὸν ἀντίχειρα, ἀναστρέφομεν τοῦτον εἰς δοχεῖον πλῆρες ὕδατος· ἀποσύρομεν τώρα τὸν ἀντίχειρα καὶ ὁ ἀνεστραμμένος σωλήν, ἐντὸς τοῦ ὅποιου ὕ-

πάρχει ὁ βλαστὸς μένει πλήρης ὑδατος Σέλτς (σχ. 19). Τὸ δὲ τὸ ἐκθέτομεν εἰς τὸ φῶς. Μετά τινας ὥρας βλέπομεν νὰ σκεπάζωνται τὰ φύλλα μὲ φυσαλλίδας, αἱ ὅποιαι ἀποχωριζόμεναι τῶν φύλλων, συναθροίζονται εἰς τὸ ἐπάνω μέρος τοῦ σωλῆνος ἐκδιώκουσαι τὸ ὕδωρ. "Θαν συλλεγῇ ἀρκετὸν ἀέριον ἀπὸ τὰς φυσαλλίδας αὐτάς, κλείομεν πάλιν τὸ ἀνοικτὸν μέρος τοῦ σωλῆνος μὲ τὸν δάκτυλόν μας, ἔξαγομεν τὸν σωλῆνα ἐκ τοῦ δοχείου καὶ τὸν ἀναστρέφομεν. Λαμβάνομεν τώρα πυρεῖον μόλις ἀνημμένον καὶ ἀποσύροντες τὸν δάκτυλον τὸ εἰσάγομεν ἐντὸς τοῦ σωλῆνος. Βλέπομεν ὅτι τὸ πυρεῖον καίεται μὲ φλόγα ζωηράν. Ἐπο-



**Σχ. 19.** (α) Διὰ τῆς ἀφομοιώσεως τὸ φυτὸν λαμβάνει μὲ τὰ πράσινα μέρη του (1) ἐιωξείδιον τοῦ ἄνθρακος καὶ ἀποβάλλει δξυγόνον τὸ ὅποιον συλλέγεται εἰς τὸ ἐπάνω μέρος (2) (β) Πυρεῖον μόλις ἀνημμένον καίεται μέσα εἰς τὸ δξυγόνον αὐτὴ μὲ λαμπρὰν φλόγα.


μένως τὸ ἐντὸς τοῦ σωλῆνος ἀέριον εἶναι δξυγόνον, διύτι μόνον τὸ δξυγόνον, καθὼς γνωρίζομεν, ἔχει τὴν ἰδιότητα αὐτήν.

Συμπέρασμα. Τὰ φύλλα εἰς τὸ γῶς χωρίζονται διοξείδιον τοῦ ἄνθρακος (ποὺ ὑπῆρχε διαλελυμένον εἰς τὸ ὕδωρ τοῦ σωλῆνος) εἰς τὰ συστατικά του, δηλαδὴ τὸν ἄνθρακα καὶ τὸ δξυγόνον, ἀπὸ τὰ ὅποια ἀποτελεῖται τοῦτο καὶ τὸ μὲν δξυγόνον ἀφήνονται ἐλεύθερον καὶ τὸ ενρύσκομεν ἐντὸς τοῦ σωλῆνος, τὸν δὲ ἄνθρακα κρατοῦν. Τοῦτο γίνεται μόνον εἰς τὸ φῶς καὶ ὅταν ὑπάρχῃ χλωροφύλλη. Διότι :

Πείραμα 2. "Αν τὸ αὐτὸν πείραμα ἐκτελέσωμεν εἰς τὸ σκότος, ἢ εἰς τὸ φῶς, ἀλλὰ μὲ φυτὸν τὸ ὅποιον ἀφήσαμεν ἀρκετὰς ἡμέρας εἰς

λαδή μέρος, είναι μικροτέρα, καί, ἀν τὸ ψῦχος εἶναι ἀρκετόν, ὁ φασίο-λος, ὁ ἔκτὸς τοῦ παραθύρου, θὰ ξηρανθῇ. Ἐπομένως ἡ θερμότης εἶναι ἀναγκαία διὰ τὴν αὔξησιν τοῦ φασιόλου.

**Πείραμα 2.** Λαμβάνομεν δύο δοχεῖα, ἕκαστον τῶν ὅποιων περιέχει ἀπὸ ἕνα φασιόλον τῆς αὐτῆς ἀναπτύξεως. Τὰ δοχεῖα ταῦτα το-ποθετοῦμεν εἰς μέρος μὴ βρεχόμενον, καὶ τὸ μὲν ἐν ποτίζομεν τακτικά, ἐνῷ τὸ ἄλλο τὸ ἀφήνομεν ἀπότιστον. Θὰ ἔδωμεν ὅτι ἡ ἀνάπτυξις τοῦ φασιόλου, ποὺ εἶναι εἰς τὸ ποτίζόμενον δοχεῖον, εἶναι πολὺ μεγαλυτέρα τῆς τοῦ ἄλλου, ὁ δόποιος, ἀν ἀφεθῇ ἐπὶ πολὺ ἀπότιστος, ἀποθνήσκει.



**Σχ. 20.** Ὁ εἰς τὸ ἑσωτερικὸν τοῦ παραθύ-ρου φασιόλος (2) ἀναπτύσσεται δλιγώτερον ἀπὸ τὸν φασιόλον (1) ὁ δόποιος εύρισκεται εἰς τὸ ἑσωτερικὸν τοῦ παραθύρου, δηλ. ἐντὸς τοῦ δωματίου εἰς μέρος θερμότερον ὃπου νὰ ὑπάρχῃ καὶ ἀρκετὸν φᾶς.

τικὰ καὶ εἶναι διὰ τοῦτο μαραμέναι. Ἡ τροφὴ τοῦ φυτοῦ εἶναι, ὡς καὶ ἀνωτέρω εἴπομεν, τὸ ὕδωρ μὲ τὰ εἰς αὐτὸ διαλελυμένα ἄλατα καὶ ὁ ἀνθραξ.

*Ποῖα ὅμως εἶναι τὰ κύρια συστατικὰ τῆς τροφῆς αὐτῆς τοῦ φυτοῦ;* Τὰ συστατικὰ ταῦτα πρέπει νὰ εἶναι βεβαίως τὰ αὐτὰ μὲ ἐκεῖνα, τὰ δόποια περιέχει τὸ φυτὸν καὶ διὰ νὰ ἔδωμεν ποῖα εἶναι, ἀρκεῖ νὰ ἔδωμεν ποῖα συστατικὰ περιέχει τὸ σῶμα τοῦ φυτοῦ. Διὰ νὰ ἔδωμεν ποῖα συ-στατικὰ περιέχει τὸ σῶμα τοῦ φυτοῦ κάμνομεν τὸ ἑξῆς:

Πείραμα. Λαμβάνομεν βλαστούς φασιόλου και τοὺς ζυγίζομεν· τοὺς ἀφήνομεν νὰ ἔχρανθοῦν εἰς τὸν ἥλιον και τοὺς ζυγίζομεν ἐκ νέου. Βλέπομεν ὅτι τὸ βάρος των ἡλαττώθη. Τοῦτο προέρχεται ἐκ τοῦ ὅτι τὸ ἐντὸς αὐτῶν ὄντος ἔξητμίσθη ἀπὸ τὴν θερμότητα τοῦ ἥλιου. Τοὺς ξηρούς αὐτοὺς βλαστούς τοὺς θέτομεν εἰς πυράν· θὰ ἰδωμεν ὅτι καίονται δίδοντες φλόγα και καπνὸν· ἂν σταματήσωμεν ἐγκαίρως τὴν καῦσιν, λαμβάνομεν τότε ἄνθρακα· ἐάν ἀφήσωμεν νὰ καῆ ὅλος ὁ βλαστός, τότε ἀπομένει ἡ τέφρα. Ἡ φλόξ και ὁ καπνὸς προέρχονται ἀπὸ ὑλικὰ τὰ ὄποια καίονται και δὲ' αὐτὸ τὰ λέγομεν καύσιμα, ἐνῷ ἡ τέφρα προέρχεται ἀπὸ ὑλικὰ τὰ ὄποια δὲν καίονται, διότι δὲν εἶναι καύσιμα. Οὕτω βλέπομεν ὅτι ὁ φασιόλος ἀποτελεῖται ἀπὸ ὄντος, ὑλικὰ καύσιμα και ὑλικὰ μὴ καύσιμα ἡ τέφρα. Μὲ χημικὴν ἀνάλυσιν δυνάμεθα νὰ εὑρωμεν ὅτι τὰ καύσιμα ὑλικὰ εἶναι κυρίως ἄνθρακς και ἄζωτον, και τὰ μὴ καύσιμα, τὰ ὄποια δίδουν τὴν τέφραν, κυρίως ἄλατα φωσφόρου, καλὸν και ἀσβεστίον.

Ἐκτὸς ἀπὸ τὰ ἀνωτέρω ἐπὶ τὰ στοιχεῖα, δηλαδὴ τὸ ὄντος γόνον και τὸ ὄξυγόνον ( ποὺ ἀποτελοῦν τὸ ὄντος ), τὸν ἄνθρακα και τὸ ἄζωτον, τὰ ὄποια καίονται και ἀπὸ τὰ ἀνευρισκόμενα εἰς τὴν τέφραν εἰς ἀρκετὴν ποσότητα φωσφόρου, κάλιον και ἀσβέστιον, ἀνευρίσκομεν πάντοτε εἰς τὴν τέφραν, εἰς μικροτέραν ὅμως ποσότητα, και ἄλλα τρία στοιχεῖα. Ταῦτα εἶναι τὸ θεῖον, τὸ μαγνήσιον και ὁ σιδηρος, ὁ ὄποιος εἶναι ἀπαραίτητος διὰ τὴν κατασκευὴν τῆς χλωροφύλλης. Βλέπομεν οὕτως, ὅτι τὰ πάντοτε ἀνευρισκόμενα εἰς τὸν φασιόλον ( καθὼς και οἰονδήποτε ἄλλο φυτὸν ) στοιχεῖα, τὰ ὄποια ἐπομένως χρειάζεται ὁ φασιόλος ( καθὼς και οἰονδήποτε ἄλλο φυτὸν ) ἀπαραιτήτως διὰ νὰ ζήσῃ, εἶναι δέκα. Διὰ νὰ παραλάβῃ ὅμως τὰ στοιχεῖα ταῦτα τὸ φυτόν, πρέπει νὰ εύρισκωνται εἰς τὸ ἕδαφος ( ἐκτὸς ἀπὸ τὸν ἄνθρακα, τὸν ὄποιον λαμβάνει τὸ φυτὸν ἀπὸ τὸ διοξείδιον τοῦ ἄνθρακος τῆς ἀτμοσφαίρας διὰ τῆς ἀφομοιώσεως ). Και πρέπει νὰ εύρισκωνται ὑπὸ μορφὴν τοιαύτην, ὥστε νὰ διαλύωνται ἐντὸς τοῦ ὄντος, δηλαδὴ ὑπὸ μορφὴν ἀλάτων. Διότι, ἀν δὲν εἶναι ὑπὸ μορφὴν ἀλάτων, τότε δὲν διαλύονται εἰς τὸ ὄντος. Ἐπομένως τὰ ἄλατα τῶν στοιχείων τούτων, τὰ διαλειμμένα ἐντὸς τοῦ ὄντος, παραλαμβάνει τὸ φυτὸν μὲ τὰ ἀπορροφητικὰ τριχίδια τῶν ριζῶν του και τρέφεται.

Δυνάμεθα νὰ βεβαιωθῶμεν περὶ αὐτοῦ κάμνοντες τὸ ἔξης πείραμα :  
Πείραμα. Λαμβάνομεν ἐν νεαρὸν φυτόν και μίαν φιάλην πλα-

τύστομον, τὴν γεμίζομεν μὲ ἀπεσταγμένον ὅδωρ, τὴν πωματίζομεν μὲ διάτρητον ἐκ φελλοῦ πῶμα καὶ διὰ τῆς ὁπῆς τοῦ φελλοῦ κάμνομεν νὰ δέλθῃ ἡ ρίζα τοῦ νεαροῦ φυτοῦ. Τὸ φυτὸν ζῆ ἐπὶ τινας ἡμέρας, ὥστερον ὅμως μαραίνεται καὶ τέ̄ς αἱ ἀποθηγήσκει. Ἐὰν ὅμως ἐντὸς τοῦ ὕδατος τῆς φιάλης προσθέσωμεν ἄλατα τῶν ὡς ἂνω ἀναφερομένων δέκα στοιχείων, θὰ ίδωμεν ὅτι τὸ φυτὸν αὐξάνεται κανονικῶς (σχ. 21) καὶ



**Σχ. 21.** Νεαρὸν φυτὸν ἀραβοσίτου αὐξάνεται κανονικῶς, ὅταν ἔχῃ τὰς ρίζας του μέσα εἰς ὅδωρ, εἰς τὸ ὄποιον ἔχομεν διαλύσει ἄλατα.

περιέχουσι κυρίως τὰ στοιχεῖα ἐκεῖνα, τὰ ὄποια χρειάζεται καὶ καταναλίσκει περισσότερον τὸ φυτόν· δηλαδὴ ἄζωτον, φωσφόρον καὶ κάλιον (διότι ἀσβέστιον ὑπάρχει σχεδὸν πάντοτε ἀφθονον εἰς τὸ χῶμα). Διὰ τοῦτο τὰ λιπάσματα ταῦτα περιέχουσι κυρίως ἄλατα καλίου, φωσφόρου καὶ ἀζώτου.

Τὰ τεχνητὰ λιπάσματα ἢ περιέχουσι τὸ ἐν μόνον ἀπὸ τὰ τρία αὐτὰ συστατικά, ὅπότε λέγονται ἀπλὰ λιπάσματα, ἢ περιέχουσι περισ-

ήμπορεῖν νὰ ἔχωμεν ἀπὸ αὐτὸ ἄνθη, ἀκόμη καὶ καρπούς, ἀρκεῖ ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρὸν νὰ προσθέτωμεν ἄλατα, διότι ἄλλως αὐτὰ ἔξαντλοῦνται καὶ τὸ φυτὸν ἀποθηγήσκει. Τὸ αὐτὸ συμβαίνει καὶ διὰ τὸ φυτὸν ποὺ ζῆ εἰς τὸ ἔδαφος· δῆλο. τὰ ἄλατα τὰ ὄποια εύρισκονται ἐντὸς τοῦ ἔδαφους ἔξαντλοῦνται σύν τῷ χρόνῳ καὶ τὸ φυτὸν δὲν ἀναπτύσσεται κανονικῶς ἀν δὲν προσθέσωμεν εἰς τὸ ἔδαφος νέα ἄλατα. Ταῦτα προσθέτομεν μὲ τὰ λιπάσματα. Τὰ λιπάσματα εἶναι δύο εἰδῶν, τεχνητὰ ἢ χημικὰ καὶ φυσικά. Τὰ χημικὰ λιπάσματα κατασκευάζονται εἰς ἐργοστάσια καὶ εἶναι διαφόρου ἔκαστον συνθέσεως, ἀνάλογα μὲ τὰ φυτὰ διὰ τὰ ὄποια θὰ τὰ χρησιμοποιήσωμεν. Τὰ φυσικὰ λιπάσματα εύρισκονται ἔτοιμα εἰς τὴν φύσιν, ὅπως π.χ. ἡ κόπρος καὶ τὰ οὐραζώνων, σάπια ὀστᾶ, σάπια δργανικαὶ οὐσίαι, αἷμα, τέφρα, κ.λ.π.

Τὰ τεχνητὰ ἢ χημικὰ λιπάσματα

σότερα τοῦ ένδις θρεπτικὰ συστατικὰ καὶ λέγονται τότε σύνθετα λίπασματα. "Ολα τὰ λιπάσματα δὲν περιέχουσι τὴν αὐτὴν ποσότητα ἀπὸ τὸ θρεπτικὸν συστατικόν, τὸ ὁποῖον εὑρίσκεται ἐντὸς αὐτῶν. Ἀναλόγως τῆς ποσότητος τῶν θρεπτικῶν συστατικῶν, τὰ ὅποια περιέχουσι καὶ τοῦ εἰδούς τούτων ἔχομεν διαφόρους τύπους λιπασμάτων· ὁ τύπος τοῦ λιπασμάτος ἀναγράφεται ἐπὶ τοῦ σάκκου ἐντὸς τοῦ ὅποιου εὑρίσκεται τὸ λίπασμα. Οὕτω π. χ. ἂν ἔξωθι τοῦ σάκκου ἴδωμεν ἀναγεγραμμένον 8 - 4 - 3, αὐτὸς σημαίνει ὅτι ὁ σάκκος περιέχει ἐν σύνθετον λίπασμα·



Σχ. 22. Φασίολοι καλλιεργούμενοι εἰς γλάστραν.

1 χωρὶς λίπασμα, 2 μὲ πλῆρες λίπασμα.

ἐν λίπασμα δῆλαδὴ εἰς τὸ ὁποῖον ὑπάρχει καὶ ἄζωτον καὶ φωσφόρος καὶ κάλιον, καὶ μάλιστα εἰς τὰ 100 κιλά του περιέχονται 8 ἄζωτοι, 4 φωσφόρου καὶ 3 καλίου· διότι ἀπὸ τοὺς τρεῖς ἀριθμοὺς ὁ πρῶτος μᾶς δεικνύει τὸ περιεχόμενον ἄζωτον, ὁ δεύτερος τὸν φωσφόρον καὶ ὁ τρίτος τὸ κάλιον. Λέγεται τοῦτο καὶ πλήρες λίπασμα. Σάκκος, εἰς τὸ ἔξωτερικὸν τοῦ ὅποιου ἀναγράφεται 15 - 0 - 0, περιέχει ἀπλοῦν λίπασμα, μὲ ἄζωτον μόνον καὶ κατ' ἀναλογίαν 15 κιλῶν ἄζωτου εἰς τὰ 100 κιλά τοῦ λιπασμάτος. "Οταν ἀναγράφεται 8 - 6 - 0, σημαίνει ὅτι περιέχει σύνθετον λίπασμα· μὲ ἄζωτον 8 κιλὰ εἰς τὰ 100 κιλὰ λιπασμάτος καὶ φωσφόρον 6 κιλὰ ἀλλὰ χωρὶς κάλιον.

Γίνονται διάφοροι τύποι λιπασμάτων, διότι κάθε φυτὸν ἔχει δια-

φόρους ἀξιώσεις ως πρὸς ἔκαστον τῶν τριῶν τούτων θρεπτικῶν συστατικῶν· ἄλλα φυτὰ θέλουν μόνον ἄζωτον καὶ δὲ αὐτὸς πρέπει νὰ τοὺς δώσωμεν ἀπλοῦν λίπασμα, τὸ ὅποῖον νὰ περιέχῃ μόνον ἄζωτον· ἄλλα θέλουν καὶ ἄζωτον καὶ φωσφόρον, καὶ μάλιστα περισσότερον φωσφόρον καὶ πρέπει νὰ τοὺς δώσωμεν σύνθετον λίπασμα μὲ ἄζωτον καὶ περισσότερον φωσφόρον, ἀλλὰ χωρὶς κάλιον, λίπασμα π.χ. τοῦ τύπου 6 - 9 - 0 καὶ οὕτω καθὼς ἔξης:

Σὴμεὶος εἰσιθεῖται τὸ φυτόν τοῦ μαθητᾶς διάφοροι τέποι λίπασμάτων· νὰ καλλιεργηθοῦν εἰς τὸν κῆπον ἢ εἰς γλάστρας φυτὰ μὲ πλήρη καὶ ἐλλιπῆ λίπασμαν καὶ νὰ παρατηρηθοῦν αἱ διαφοραί.

Σὲ μηπέρ ασματικός. Ὁ φασίολος διὰ τὰ ζήση, χρειάζεται ὕδωρ περιέχον ἐν διαλύσει ἄλατα· χρειάζεται ἐπίσης καὶ ἄνθρακα· τὸν ἄνθρακα ενρίσκει ἄρθρον εἰς τὸν ἀέρα· τὸ ὕδωρ καὶ τὰ ἄλατα τὰ ενρίσκει εἰς τὸ ἔδαφος. Τὰ ἄλατα ὅμως μὲ τὴν πάροδον τοῦ χρόνου ἔξαντλοῦνται ἀπὸ τὸ ἔδαφος καὶ πρέπει νὰ τὰ ἀντικαθιστῶμεν. Τοῦτο πράττομεν προσθέτοντες λίπασματα εἴτε τεχνητὰ ἢ χημικὰ εἴτε φυσικά.

### Τί χρειάζεται τὸ χῶμα εἰς τὸ φυτόν

Εἴδομεν ὅτι καὶ χωρὶς χῶμα δυνάμεθα νὰ ἐπιτύχωμεν τὴν αὔξησιν καὶ τὴν καρποφορίαν ἐνὸς φυτοῦ, ἀρκεῖ νὰ προσθέτωμεν εἰς τὸ ὕδωρ τῆς φιάλης ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρὸν τὰ ἀπαραίτητα ἄλατα.

Τί χρειάζεται ἐπομένως τὸ χῶμα εἰς τὸ φυτόν; Εἴδομεν ἀνωτέρω ὅτι χρειάζεται διὰ νὰ συγκρατῇ καὶ νὰ στερεώνῃ τὸ φυτόν. Πλὴν τούτου ὅμως τὸ χῶμα ἔχει καὶ ἄλλας χρησιμότητας.

Πείραμα. Γεμίζομεν μὲ χῶμα κοινὸν ἐν δοχεῖον τοῦ ὅποίου ὁ πυθμὴν νὰ φέρῃ ὅπας. Χύνομεν εἰς τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ δοχείου ὕδωρ, κάτωθεν θέτομεν πινάκιον καὶ συλλέγομεν τὸ ὕδωρ τὸ ὅποῖον θὰ ἔξελθῃ. Θὰ ἴδωμεν ὅτι ἡ ποσότης τούτου εἶναι κατὰ πολὺ μικροτέρα ἐκείνης, τὴν ὅποίαν ἔχύσαμεν εἰς τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ δοχείου. Δηλαδὴ τὸ χῶμα συνεκράτησε ἀρκετὴν ποσότητα ἐκ τοῦ ὕδατος, τὸ ὅποῖον ἔχύσαμεν.

Ἐπομένως τὸ χῶμα χρειάζεται διὰ νὰ συγκρατῇ τὸ ὕδωρ τῆς βροχῆς, ὥστε νὰ τὸ εύρισκῃ τὸ φυτόν, ὅταν τὸ ἔχῃ ἀνάγκην. Καὶ κατὰ τὴν μεγάλυτέραν ἔηρασίαν τὸ χῶμα συγκρατεῖ ἀρκετὴν ποσότητα ὕδατος, τὸ ὅποῖον παραλαμβάνει τὸ φυτόν μὲ τὰ ἀπορροφητικὰ τριχίδια τῶν ριζῶν του. Παραλαμβάνει ἐπίσης μαζὶ μὲ τὸ ὕδωρ καὶ τὰ ἄλατα


τὰ ὅποια εύρίσκονται διαλελυμένα εἰς αὐτό. Τὸ ὕδωρ δηλαδὴ διευκολύνει τὸ φυτὸν νὰ παραλάβῃ τὰ ἄλατα, διότι ταῦτα μόνον διαλελυμένα εἰς τὸ ὕδωρ δύναται νὰ τὰ παραλάβῃ.

### Ποῖα εἰναι τὰ συστατικὰ τοῦ χώματος

Τὸ χῶμα δὲν εἶναι παντοῦ τὸ ἔδιον. Μὲ ἀπλῆγν παρατήρησιν ἀντιλαμβανόμεθα τὴν διαφορὰν ποὺ ὑπάρχει εἰς τὸν χρωματισμόν, εἰς τὸ μέγεθος τῶν κόκκων του καὶ εἰς τὴν σκληρότητα ποὺ παρουσιάζει τὸ χῶμα, ἀν τὸ τρίψωμεν ἀνάμεσα εἰς τοὺς δακτύλους μας.

Πειραματίζομεν ποτήριον μὲ ὕδωρ, ἔνα τεμάχιον λαμαρίνας καὶ λύχνου οἰνοπνεύματος (σχ. 23). Ἐπίσης ὅλιγον χῶμα, ἀπὸ ἕνα κῆπον, τὸ ὅποῖον νὰ ἔχῃ χρῶμα μελανωπόν. Τὸ θέτομεν ἐπὶ τῆς λαμαρίνας καὶ τὸ θερμαίνομεν κάτωθεν· μετά τινα χρόνον θὰ παρατηρήσωμεν ἀτμούς προερχομένους ἀπὸ τὸ εἰς τὸ χῶμα ὑπάρχον ὕδωρ καὶ καπνόν, ὅστις προέρχεται ἀπὸ τὴν καῦσιν ὑλικῶν καυσίμων ποὺ ὑπάρχουν εἰς τὸ χῶμα (σχ. 23, α.). "Οταν σταματήσῃ νὰ ἀναδίδεται καπνός, λαμβάνομεν τὸ χῶμα καὶ τὸ θέτομεν ἐντὸς ποτηρίου μὲ ὕδωρ· παρατηροῦμεν ὅτι τὸ ὕδωρ θολοῦται, ὥπως καὶ τὸ ὕδωρ τῶν ρυακίων καὶ τῶν χειμάρρων ἔπειτα ἀπὸ ραγδαίων βροχὴν (σχ. 23, β).

Τὸ ὅλωμα τοῦτο προέρχεται ἀπὸ τὴν ἄργιλον, ἡτις εύρισκεται εἰς τὸ χῶμα. Χύνομεν τὸ ὕδωρ προσεκτικά, ὥστε νὰ χυθῇ ἡ ἄργιλος, ὅχι ὅμως καὶ τὰ ἄλλα συστατικά, τὰ ὅποια ἔχουν ἀποτεθῆ εἰς τὸν πυθμένα τοῦ ποτηρίου καὶ πληροῦμεν καὶ πάλιν τὸ ποτήριον ὕδατος. Χύνομεν ἐκ νέου καὶ ἐπαναλαμβάνομεν τὸ αὐτὸ μέχρις ὅτου τὸ ὕδωρ τοῦ ποτηρίου ἀνταρραπσύμενον νὰ μὴ θολοῦται. Οὕτως ἐκδιώκομεν ἀπὸ τὸ χῶμα τὴν ἄργιλον.



Σχ. 23. (α) Τὸ χῶμα θερμαίνομεν πολὺ ἀναδίδει καπνὸν ἀπὸ τὰς ὅργανικὰς οὐσίας, τὰς ὅποιας ἔχει καὶ αἱ ὅποιαι καίονται. (β) Τὸ ὕδωρ τοῦ ποτηρίου θολοῦται, ἀν προσθέσωμεν εἰς αὐτὸ χῶμα περιέχον ἄργιλον.

Εἰς τὸ ὑπόλειμμα, τὸ ὅποῖον παραμένει εἰς τὸν πυθμένα τοῦ ποτηρίου χύνομεν μίαν ποσότητα ὑδροχλωρικοῦ δέξεος· βλέπομεν τότε ἀθρόαν παραγωγὴν φυσαλλίδων. Ή παραγωγὴ αὕτη ὀφείλεται εἰς τὴν ὑπαρξίαν εἰς τὸ χῶμα ἀσβεστολίθου, ὃστις διαλύεται ἀπὸ τὸ ὑδροχλωρικὸν δέξιον. Χύνομεν τώρα ἐντὸς τοῦ ποτηρίου ποσότητά τινα ὕδατος, ἀναταράσσομεν καὶ χύνομεν προσεκτικῶς, ἀφοῦ ἀφήσωμεν νὰ κατασταλάξῃ ὅτι εἰς τὸ ποτήριον ἀπομένει ἔξετάζοντες τὸ ὑπόλειμμα βλέπομεν ὅτι τοῦτο εἶναι ἄμμος.

Τὸ χῶμα λοιπὸν ἀποτελεῖται ἀπὸ ὁργανικὰς οὐσίας, ἄργιλον, ἀσβεστόλιθον καὶ ἄμμον.

Τὰ τρία συστατικὰ τοῦ χώματος, δηλαδὴ ἡ ἄργιλος, ὁ ἀσβεστόλιθος καὶ ἡ ἄμμος, δὲν ἔχουσι τὰς αὐτὰς ιδιότητας. "Ἐκαστον μόνον του δὲν εἶναι κατάληγον, ὡς κατωτέρω θὰ ἴδωμεν, διὰ τὴν ἀνάπτυξιν τῶν φυτῶν, τὸ καλύτερον δέ, διὰ τὰ περισσότερα φυτά, χῶμα, εἶναι ἐκεῖνο, τὸ ὅποῖον ἀποτελεῖται ἀπὸ μῆγμα εἰς καλὴν ἀναλογίαν καὶ τῶν τριῶν τούτων συστα-



**Σχ. 24.** Ἀπὸ τὴν ἄμμον (1) διέρχεται σχεδὸν ὅλον τὸ ὕδωρ, ἀπὸ τὸν ἀσβεστόλιθον (2) διέρχεται ὀλιγάτερον ὕδωρ καὶ ἀπὸ τὴν ἄργιλον (3) δὲν διέρχεται σχεδὸν καθόλου ὕδωρ· τὸ καλλιεργήσιμον χῶμα (4) συγκρατεῖ ἀρκετὴν ποσότητα ὕδατος.

τικῶν. Τὸ ἐννοοῦμεν αὐτὸν ἀν κάμωμεν τὸ ἔξης πείραμα.

Πείραμα. Λαμβάνομεν τέσσαρας φιάλας (σχῆμα 24) καὶ ἐφαρμόζομεν εἰς τὸ στόμιον ἑκάστης ἐξ αὐτῶν ἀνὰ ἐν χωνίον· εἰς τὸ χωνίον τῆς πρώτης φιάλης θέτομεν ἄμμον λεπτήν, τῆς δευτέρας κόνιν ἀσβεστολίθου (μαρμαρόσκυρη), τῆς τρίτης ἄργιλον, καὶ εἰς τὸ χωνίον τῆς τετάρτης φιάλης θέτομεν μῆγμα ἀπὸ ἀσβεστόλιθον, ἄμμον καὶ ἄργιλον. Χύνοντες ἐπὶ τῶν χωνίων ὕδωρ θὰ παρατηρήσωμεν ὅτι ἡ ἄμμος δὲν συγκρατεῖ διόλου ὕδωρ· ἀφήνει ὅλον τὸ ὕδωρ νὰ διέλθῃ δι' αὐτῆς. Τὸ ἀμμῶδες χῶμα ἐπομένως θὰ εἶναι διαρκῶς ξηρόν. 'Ο ἀσβεστόλιθος συγκρατεῖ ὕδωρ, ἀλλὰ ὀλίγον, πρέπει ἐπομένως νὰ ξηραίνεται γρήγορα.

‘Η ἄργιλος ἀφήνει ἐλάχιστον ὕδωρ νὰ διέλθῃ δι’ αὐτῆς· τὸ περισσότερον μέρος εἰς τὴν ἄνω ἐπιφάνειαν αὔτῆς, ἡ ὅποια λασπώνει· τὸ ὕδωρ ἔκει ἔξατμίζεται ἀπὸ τὸν ἄνεμον καὶ ἀπὸ τὸν ἥλιον καὶ εἰς τὴν ἐπιφάνειαν τῆς ἄργιλου σχηματίζεται ἐν λεπτὸν στερεὸν στρῶμα, μία κρούστα, καθὼς τὴν λέγομεν, ἡ ὅποια ἐμποδίζει τὸν ἀέρα νὰ εἰσχωρήσῃ ἐντὸς τοῦ τοιούτου χώματος. Καὶ τὰ τρία ἐπομένως εἰδὴ αὐτὰ τῶν χωμάτων εἰναι ἀκατάλληλα διὰ καλλιέργειαν.’ Ἐνῷ τὸ τέταρτον, τὸ ὄποιον ἐκάμα- μεν μὲ μῆγμα ἀνάλογον τῶν τριῶν αὐτῶν εἰδῶν χώματος καὶ ὕδωρ ἀρ- κετὸν συγκρατεῖ καὶ τὸν ἀέρα ἀφήνει νὰ εἰσχωρήσῃ ἐντὸς αὐτοῦ. Αὐτὸς εἶναι τὸ καλλιεργήσιμον χῶμα, τὸ ὄποιον εἶναι καλύτερον διὰ καλλιέρ- γειαν, ὅταν περιέχῃ καὶ ἀρκετάς ὀργανικάς οὐσίας (λιπάσματα).’ Εν- νοεῖται ὅτι ἡ ἀναλογία ἀπὸ ἄργιλον, ἄμμον καὶ ἀσβεστόλιθον, τὴν ὅ- ποιαν πρέπει νὰ περιέχῃ τὸ καλλιεργήσιμον χῶμα, ποικίλει μετὰ τῶν φυτῶν, τὰ ὄποια θὰ καλλιεργήσωμεν εἰς τὸ χῶμα αὐτό· διότι ἄλλα φυτά εὐδοκιμοῦν εἰς ἐδάφη περιέχονται περισσοτέραν ἄμμον (ἄμμώδη), ἄλ- λα εἰς ἐδάφη περιέχοντα περισσοτέραν ἄργιλον (ἄργιλώδη) καὶ ἄλλα εἰς ἐδάφη περιέχοντα περισσότερον ἀσβεστόλιθον (ἀσβεστολιθικά).

#### 4. Ἀνθος τοῦ φασιόλου


Τὰ ἄνθη ἀναφαίνονται εἰς τὰς μασχάλας τῶν φύλλων καὶ εἶναι πολλὰ ὁμοῦ, σχηματίζοντα ἐν σύνολον, ταξιαρθίαν, ἡ ὅποια λέγεται βό- τρυς. Ἐκφύονται δηλαδὴ ἀπὸ ἔνα ἄξονα πολλὰ ἄνθη, καθένα ἀπὸ τὰ ὄποια συνδέεται μὲ τὸν ἄξονα αὐτὸν μὲ ἔνα μικρὸν ποδίσκον. Οἱ ποδί- σκοι εἶναι ὅλοι ἵσοι κατὰ τὸ μῆκός των καὶ ἀπέχουν ἴσακις ὁ εἰς τοῦ ἄλλου.

Τὰ διάφορα μέρη τοῦ ἄνθους. Κάθε ποδίσκος κατα- λήγει εἰς πλάτυσμα ἐν εἴδει ἀβαθοῦς κυπέλλου, ἐπὶ τοῦ ὄποιον στη- ρίζονται τὰ διάφορα μέρη τοῦ ἄνθους καὶ τὸ ὄποιον καλεῖται ἀνθοδό- χη (σχ. 25). Εἰς τὸ ἔξωτερικὸν τοῦ ἄνθους παρατηροῦμεν ἐν εἰδος σωλῆνος πρασίνου, τὸν κάλυκα. Σχηματίζεται ἀπὸ πέντε τεμάχια ἡνω- μένα εἰς τὴν βάσιν των, τὰ σέπαλα.

Ἐπειτα ἔχομεν πέντε τεμάχια μεγαλύτερα, λευκά, τὰ πέταλα, τὰ ὄποια εἶναι ἐλεύθερα, ἀνισα καὶ τὸ μεγαλύτερον ἐκ τούτων σκεπάζει τὰ ἄλλα· ἀπὸ τὰ ὑπόλοιπα, τὰ δύο ὁμοιάζουν μὲ πτέρυγας καὶ τέλος τὰ δύο ἄλλα, τὰ ἔσωτερικά, ὁμοιάζουν μὲ καρῆναν πλοίου. Τὸ σύνο-

λον τῶν πετάλων ἀποτελεῖ τὴν στεφάνην ἡ στεφάνη ὁμοιάζει πολὺ μὲ πεταλούδαν (ψυχήν), ἡ ὅποια ἔχει ἀνοιγμένα τὰ πτερά της, ἐξ αὐτοῦ δὲ ὁ φασίολος ὀνομάσθη φυτὸν ψυχαρθές.

Στήματα. Εἰς τὸ ἐσωτερικὸν τῶν δύο πετάλων, τὰ ὅποια ὁμοιάζουν μὲ καρπίναν πλοίου, εὔρισκομεν δέκα ἐπιμήκη τεμάχια, τοὺς στήμονας. "Εκαστος στήμων ἀποτελεῖται ἀπὸ ἓνα πολὺ λεπτὸν νῆμα, τὸ ὅποιον εἰς τὸ ἄκρον καταλήγει εἰς ἓν κίτρινον ἔξογκωμα, τὸν ἀν-



Σχ. 25. "Ανθη φασιόλου.

Α ἄνθος ὀλόκληρον. Β οἱ στήμονες (9 ἡνωμένοι καὶ 1 ἐλεύθερος).

καὶ ὁ ὑπερος. Γ ὁ ὑπερος. Δ τομὴ τῆς ὠθήκης τοῦ ὑπέρου καὶ

τὸ ἔντος γύρτος ὥρια.

θῆρα. Μὲ τὴν βοήθειαν φακαῦ βλέπομεν ὅτι κάθε ἄνθηρ σχηματίζεται ἀπὸ τέσσαρας σάκκους γεμάτους ἀπὸ μίαν κόνιν κιτρίνην, τὴν γερινήν. Τὰ λεπτὰ νήματα τῶν 9 στημάτων εἰναι ἡνωμένα τὸ νήμα τοῦ δεκάτου εἰναι ἐλεύθερον. Οἱ στήμονες προσκολλῶνται διὰ τοῦ κάτιον ἄκρου τῶν ἐπὶ τῆς ἀνθοδόχης.

"Υπερος. Εἰς τὸ ἐσωτερικὸν τοῦ ἄνθους εὑρίσκεται ὁ ὑπερος ὃντος διαλεῖται ἀπὸ πράσινον καὶ ὄχριν ἔξωγκωμένον τημῆμα. Τοῦ θώρηκην. Λύτη συνένται μὲ ἓν νῆμα καταναλώτων, τὸν σύλλημα τοῦ ἔλματος, τὸ στρογγυλόν.

φει εἰς τὴν ἐπιφάνειάν του πολυαρίθμους τρίχας, ἐφωδιασμένας μὲ μίαν κολλώδη οὐσίαν. Ἐὰν σχίσωμεν τὴν ὡσθήκην μὲ μίαν βελόνην, θὰ ἔδωμεν ὅτι αὕτη εἶναι κατασκευασμένη ἀπὸ ἓν φύλλον, τὸ ὄποιον λέγεται καρπόφυλλον (εἰς ἄλλους καρπούς, ὡς θὰ ἔδωμεν κατωτέρω, τὰ καρπόφυλλα εἶναι περισσότερα). Τὰ δύο χείλη τούτου ἔχουσιν ἑνωθῆ, καὶ εἰς τὸ ἐσωτερικόν του ἀνευρίσκομεν δύο σειράς ἀπὸ μικροὺς κόκκους, τὰ ωάρια.

Οὔτω τὰ μέρη τοῦ ἄνθους τοῦ φασιόλου εἶναι τὰ ἔξης :

ὁ ποδίσκος,

ἡ ἀνθοδόχη,

ὁ κάλυξ μὲ τὰ σέπαλά του,

ἡ στεφάνη μὲ τὰ πέταλά της,

οἱ στήμονες μὲ τοὺς ἀνθηράς εἰς τὸ ἄνω ἄκρον των καὶ ἐντὸς τῶν ἀνθήρων τὴν γῆραν,

οἱ ὑπερος μὲ τὴν ὡσθήκην, τὸν στῦλον, μὲ τὸν ὄποιον προεκτείνεται αὕτη καὶ τὸ στύγμα, εἰς τὸ ὄποιον τελειώνει ὁ στῦλος καὶ τὸ ὄποιον φέρει τρίχας ἐφωδιασμένας μὲ κολλώδη οὐσίαν,

τὰ ἐντὸς τῆς ὡσθήκης ωάρια.

Λειτούργια τοῦ ἄνθους. "Οταν ὀριμάσουν οἱ στήμονες, ἀνοίγουν τοὺς ἀνθηράς των καὶ ἀφήνουν ἐλευθέρων τὴν ἐντὸς αὐτῶν γῆραν. Οἱ κόκκοι τῆς γύρεως πίπτουν κατ' εὐθεῖαν ἐπὶ τοῦ πλησίον εὑρισκομένου στίγματος καὶ διὰ δακτυλιοειδῶν προβολῶν κατέρχονται κατὰ μῆκος τοῦ στύλου καὶ φθάνουν εἰς τὴν ὡσθήκην αὕτη ἀποτελεῖ τὰ θήλεα ὅργανα τοῦ φασιόλου καὶ μέσα εἰς αὐτὴν ὑπάρχουν τὰ ωάρια διέρχονται, αἱ δακτυλιοειδεῖς προβολαί, ἀπὸ τὸ καρπόφυλλον τῆς ὡσθήκης καὶ εἰσέρχονται, ἀνὰ μία προβολὴ κόκκου γύρεως εἰς κάθε ωάριον, τὸ ὄποιον οὔτω γονιμοποιεῖται καὶ δίδει ἐν σπέρμα φασιόλου. Τὰ κυριώτερα δηλαδὴ μέρη τοῦ ἄνθους εἶναι, καθὼς βλέπομεν, ἡ ὡσθήκη μὲ τὰ ωάρια (θήλεα ὅργανα τοῦ ἄνθους) καὶ οἱ στήμονες μὲ τοὺς ἀνθηράς καὶ τὴν γῆραν των (ἀρρενα ὅργανα τοῦ ἄνθους). Ἐὰν ἡ γῆρας μεταβαίνῃ μόνη της εἰς τὸν ὑπερον τοῦ αὐτοῦ ἄνθους καὶ γονιμοποιῇ τὰ ἐντὸς αὐτοῦ ωάρια, τότε τὴν γονιμοποίησιν αὐτὴν τὴν λέγομεν αὐτεπικονίασιν.


"Πάρχουν ὅμως καὶ φυτὰ τῶν ὄποιών τὰ ωάρια τῶν ἀνθέων γονιμοποιοῦνται μὲ τὴν γῆραν ὃχι τοῦ αὐτοῦ, ἀλλ' ἄλλου ἄνθους καθὼς θὰ μάζωμεν κατωτέρω.

## 5. Καρπός τοῦ φασιόλου

Μετὰ τὴν γονιμοποίησιν τῶν ὡριμάσης διὰ τῆς γύρεως ἡ ὀιστήκη αὔξανεται ταχέως διὰ νὰ μετασχηματισθῇ εἰς καρπόν.

Ο καρπὸς τοῦ φασιόλου, ὁ ὄποῖος λέγεται λοβὸς ἢ ὅσπριον, ἔχει σγῆμα σάκκου ἐπιμήκους· διατηρεῖ εἰς τὸ κατώτερόν του ἄκρον (σχ. 26) ὑπολείμματα τοῦ κάλυκος καὶ περατοῦται εἰς ἐν ὅξῳ ἄκρον, τὸ ὄποῖον εἶναι ὁ ἄλλοτε στῦλος. Κατ' ἀρχὰς εἶναι πράσινος καὶ μαλακός· ὅταν ὠριμάσῃ γίνεται λευκωπός καὶ περγαμηνοειδής.

Ἐὰν ἔξετάσωμεν τὸν καρπόν, παρατηροῦμεν εἰς τὴν μίαν του πλευρὰν μίαν χονδρὴν καὶ προεξέχουσαν νεύρωσιν καὶ ἀπέναντί της μίαν αὐλακα, ἡ ὄποια ἀντιστοιχεῖ εἰς τὴν ἔνωσιν τῶν δύο χειλέων τοῦ καρποφύλλου.



Ἐντὸς αὐτῆς πρέπει νὰ εἰσαγάγωμεν τὸν ὄνυχά μας, ὅταν θέλωμεν νὰ ἀνοίξωμεν τὸν καρπὸν πρὶν νὰ ὠριμάσῃ· ὅταν ὁ καρπὸς ὠριμάσῃ, τότε τὰ δύο χείλη τοῦ καρποφύλλου ἀποκολλῶνται, ἡ προεξέχουσα νεύρωσις σχίζεται καὶ τὸ καρποφύλλον ἀνοίγει εἰς δύο ἵσα ἡμίση· τότε τὰ ἐντὸς τοῦ καρποῦ, εἰς δύο σειρὰς ἐντὸς κολπίσκων, σπέρματα πίπτουσι μόνα των ἐπὶ τοῦ ἐδάφους ὅπου βλαστάνουν δίδοντα νέα φυτά.

Σχ. 26. Καρπὸς τοῦ φασιόλου.  
(λοβὸς ἢ ὅσπριον)

Χρησιμότης. Ο φασιόλος σπείρεται κυρίως διὰ τὰ σπέρματά του (φασόλια). Ἀλλὰ καὶ ὀλόνκληρος ὁ λοβὸς (πρὶν ὠριμάσῃ) τρώγεται μαγειρευόμενος καταλλήλως. Τὰ σπέρματα εἶναι θρεπτικώτατα, ἔχοντα ἴσην σχεδὸν πρὸς τὸ κρέας θρεπτικὴν ἀξίαν, ἀλλὰ εἶναι δύσπεπτα.

Τὸ πάρχουν 60 εἰδῶν παραλλαγὴν φασιόλων, ἐκ τῶν ὄποιων ἄλλαι εἶναι ἀναρριχώμεναι καὶ ἄλλαι οὐχί. Θέλουν, διὰ νὰ εύδοκιμήσουν, ἔδαφος τὸ ὄποῖον νὰ κρατῇ ὑγρασίαν, ἢ νὰ εἶναι ποτιστικόν· δὲν πρέπει ὅμως νὰ εἶναι πολὺ ὑγρόν. Ἀρκεταὶ ποσότητες φασιόλων παράγονται εἰς τὴν Θεσσαλίαν, Μεσσηνίαν, Ἡλείαν, Λακεδαίμονα, Φλώριναν καὶ

Θράκην. Ή εντοπία μας δύμας παραγωγή δὲν καλύπτει τὴν κατανάλωσιν καὶ ἀρκεταὶ ποσότητες εἰσάγονται ἔξωθεν.

Φυτὰ δύμοια πρὸς τὸν φασίολον εἶναι :

**Τριφύλλιον τὸ ἀρουραῖον** (τριφύλλι). Φυτὸν ποῶδες, πολυετές, μὲ φύλλα σύνθετα ἀποτελούμενα ἀπὸ τρία φυλλάρια, ἐξ οὗ καὶ τὸ ὄνομα. Χρησιμοποιεῖται, εἴτε χλωρὸν εἴτε ξηρόν, ὡς τροφὴ τῶν οἰκιακῶν ζώων.

**Λούπινον.** Εὔδοκιμεῖ εἰς τὰ ἄγονα καὶ ὅχι ἀσβεστολιθικὰ ἐδάφη. Παρ’ ἡμῖν καλλιεργεῖται κυρίως εἰς τὴν Λακωνίαν.

**Ἄραχις ἡ ὑπόγειος** (φυστικά) (σχ. 27). Ἔγει τὴν περιεργὸν ἰδιότητα, μετὰ τὴν ἄνθησιν καὶ τὸν σχηματισμὸν τοῦ καρποῦ, ὁ ποδίσκος τοῦ ἄνθους, ὅστις βαστάζει τὸν καρπόν, νὰ στρέφεται πρὸς τὰ κάτω καὶ νὰ ὀθῇ τὸν μικρὸν ἀκόμη καρπὸν ἐντὸς τοῦ χώματος, ὅπου γίνεται ἡ ὥριμανσις.

Ο καρπὸς περιέχει συνήθως δύο σπέρματα καὶ λέγεται δι’ αὐτὸν καρπὸς δίχωρος. Σπανιότερον εἶναι μονόχωρος ἢ τρίχωρος, περιέχει δηλαδὴ ἐν ἢ τρία σπέρματα. Τὰ σπέρματα εἶναι λίαν ἐλαϊώδη, περιέχοντα 30 - 35 τοῖς ἑκατὸν ἔλαιον, ἀραχιδέλαιον ἐκλεκτῆς ποιότητος. Τοῦτο χρησιμοποιεῖται πρὸς κατασκευὴν τεχνητοῦ βουτύρου καὶ σάπωνος. Οἱ καρποὶ φέρονται καὶ ἐψημένοι εἰς τὸ ἐμπόριον ὑπὸ τὸ ὄνομα φυστίκια ἀράπικα.

Αλλὰ φυτὰ δύμοια εἶναι :

**Ο ἀστράγαλος, ὁ ἐρέβινθος** (κοιν. ρεβίθι).

**Τὸ σπάρτον.** Τὸ σπάρτον εἶναι θάμνος (δηλαδὴ φυτὸν μὲ βλαστὸν ξυλώδη, τοῦ ὅποιου δύμας τὸ ὄψις δὲν ὑπερβαίνει τὰ δύο μέτρα), τὰ φύλλα τοῦ ὅποιου, ἐπιμήκη καὶ κυλινδρικά, καταλήγοντα εἰς τὸ ἄκρον τῶν εἰς ἄκανθαν.

**Πίσον τὸ ήμερον** (κοιν. μπιζέλι). Ο βλαστός του εἶναι ἀδύνα-



Σχ. 27. **Άραχις ἡ ὑπόγειος.**  
(φυστικά)

τος καὶ διὰ νὰ στηρίζεται ἔχει μεταβεβλημένα τὰ τελευταῖα φυλλάρια τῶν συνθέτων φύλλων εἰς ἑλικας ( σχ. 28 ), διὰ τῶν ὅποιων ὑποβαστάζεται ἐπὶ στηριγμάτων καὶ ἀναρριχᾶται ( φυτὸν ἀναρριχώμενον ).

**Φακῆ** ( σχ. 29 ). Τὰ φύλλα ταύτης καταλήγουν εἰς ἑλικας. Εὐδοκιμεῖ εἰς ἐδάφη μετρίας γονιμότητος καὶ σπέρεται παντοῦ τῆς Ἑλλάδος. Εἶναι ὄσπριον θρεπτικώτατον, διότι περιέχει μεγάλην ποσότητα ἀζώτου καὶ σιδήρου.

**Κύαμος ὁ κοινὸς** ( κουκιά ). "Εἶχει θρεπτικά, ἀλλὰ πολὺ δύσπεπτα σπέρματα.

"Ολα τὰ ὡς ἔνω φυτά, πλὴν τοῦ σπάρτου, εἶναι φυτὰ ποώδη, τὰ



Σχ. 28. Πίσον τὸ ἥμερον ( μικέλι ).



Σχ. 29. Φακῆ.

ὅποια ἔχουν τὴν ἴκανότητα, ὅταν δὲν εύρισκουν εἰς τὸ ἔδαφος ἀρκετὸν ἀζώτου ὑπὸ μορφὴν ἀλάτων ( ώστε νὰ τὸ λαμβάνουν μὲ τὰς ρίζας τῶν ), νὰ λαμβάνουν ἀζώτου ἀπὸ τὴν ἀτμόσφαιραν, ὅπου τοῦτο ὑπάρχει ἀφθονον ( 79 τοῖς ἑκατὸν κατ' ὅγκον ).

Τὰ ψυχανθῆ τὸ κατορθώνουν αὐτὸ μὲ τὴν βοήθειαν μικροτάτων μονοκυττάρων φυτῶν, τὰ ὅποια ἀνήκουσιν εἰς τὴν τάξιν τῶν φυκῶν ( θὰ ἔδωμεν δὲν αὐτὰ εἰς τὸ περὶ φυκῶν ) καὶ λέγονται βακτήρια. "Εν τοιοῦτον βακτήριον ζῆ εἰς τὰς ρίζας τῶν ψυχανθῶν λέγεται *Pizobium* τῶν ψυχανθῶν. Αὐτὸ λαμβάνει τὸ ἀζώτου ἀπὸ τὴν ἀτμόσφαιραν καὶ τὸ ἐναποθηκεύει εἰς μικρὰ ἔξογκώματα, τὰ ὅποια σχηματίζονται εἰς

τὰς ρίζας τῶν ψυχανθῶν καὶ τὰ λέγομεν φυμάτια. Τὰ ψυχανθῆ χρησιμοποιοῦσι τὸ εἰς τὰ φυμάτια αὐτὰ τῶν ριζῶν των ἀποθηκευμένον ἄζωτον μόλις θέλουν νὰ κάμουν καρπόν.

Δι’ αὐτό, ἂν παραχώσωμεν τὰ ψυχανθῆ εἰς τὸ ἔδαφος ( δργώνοντες π.χ. τοὺς ἀγρούς εἰς τοὺς ὄποιους ὑπάρχουσι ψυχανθῆ ) μόλις ταῦτα ἀρχίσουν νὰ κάμουν καρπόν, τὸ ἄζωτον μένει εἰς τὸν ἀγρόν, ὁ ὄποιος πλουτίζεται εἰς ἄζωτον. Τὸ λέγομεν τοῦτο χλωρὰν λίπανσιν πολλάκις ἐφαρμόζεται ἡ λίπανσις αὕτη εἰς ἀγρούς πτωχούς εἰς ἄζωτον, ἀντὶ ἄλλης λιπάνσεως.

### Ψυχανθῆ ἢ ὀσπριοειδῆ

Ο φασίολος, τὸ μπιζέλι, ἡ φακῆ, ἡ κουκιά, τὸ τριφύλλι, τὸ λούπινον, ὁ ἐρέβινθος, ὁ ἀστράγαλος, τὸ σπάρτον παρουσιάζουν κοινὰ χρακτηριστικά· τὸ ἄνθιος τῶν ἀποτελεῖται ἀπὸ 5 σέπαλα· ἔχουν 5 πέταλα ἄνισα, 10 στήμονας, τοὺς ἐννέα ἡγωμένους διὰ τῶν νημάτων των καὶ τὸν ἕνα χωριστὸν καὶ μίαν ὠσθήκην ἀποτελουμένην ἀπὸ ἕνα καρπόφυλλον, ἡ ὄποια μεταβάλλεται εἰς λοβὸν ἢ ὀσπριον· διὰ τοῦτο λέγονται ὀσπριοειδῆ. Ἐχουν ἄνθη μὲ πέταλα ἄνισα ( ἄνθη ὅχι κανονικὰ ) ὁμοιάζοντα μὲ ψυχῆν ( πεταλούδαν ), ἡ ὄποια ἔχει τὰ πτερά της ἀνοιγμένα καὶ διὰ τοῦτο λέγονται καὶ ψυχανθῆ.

Σχηματίζουσι μίαν οίκογένειαν φυτῶν, τὴν οίκογένειαν τῶν ψυχανθῶν ἢ ὀσπριοειδῶν.

Ομοια φυτὰ μὲ τὰ ἀνωτέρω ὡς πρὸς τὸν καρπόν των, τῶν ὄποιων δηλαδὴ ὁ καρπὸς εἶναι λοβὸς ἢ ὀσπριον, ἀλλὰ τὰ ἄνθη των δὲν ὁμοιάζουσι πρὸς ψυχήν, εἴναι :

**Ακακία** ἡ κοινή, δένδρον φθάνον εἰς ὕψος τὰ 10 μέτρα μὲ φύλλα σύνθετα ἀπὸ πολλὰ φυλλάρια καὶ ἀκάνθας εἰς τὴν βάσιν των. Τὴν χρησιμοποιοῦμεν ὡς φυτὸν στολισμοῦ εἰς δενδροστοιχίας.

**Αραβίαν**, Σενεγάλην καὶ γενικῶς τὰς στεππώδεις ἐκτάσεις τῆς Αφρικῆς. Εξ αὐτῆς ἔξαγεται τὸ ἀραβικὸν κόρμι.

**Μιμόζη** ἡ αἰσχυντηλή ( κοιν. μή μου ἅπτου ). Είναι φυτὸν τῶν θερμῶν χωρῶν, τὸ ὄποιον κατακλίνει τὰ φύλλα του ~~εἰς~~ αχίστην κάκωσιν ἢ καὶ ἀπλῆν ἐπαφῆν.

Σημείωσις. Λογότην ἦ δοσπριον λέγομεν τὸν ξηρὸν καρπὸν δόσποιος, διανούμενος τὸν εἰς δύο, ἀφήνων ἐλεύθερα τὰ ἄνθη αὐτοῦ σπέρματα. Βότρυν λέγομεν τὴν ταξιανθίαν, εἰς τὴν ὅποιαν τὰ ἄνθη ἐκφύονται πολλὰ δύο ἀπὸ ἕνα ἔξοντα μὲ ποδίσκους ἵσοντας κατὰ τὸ μέγεθος καὶ ἴσακις ἀπέχοντας ἀλλήλων (σχ. 30).



Σχ. 30. Ταξιανθία βότρυν

Ἐρωτήσεις. Ποία εἶναι τὰ μέρη τοῦ σπέρματος; Τί χρειάζεται ἐν σπέρματι διὰ νὰ ἐκβλαστήσῃ; Κατὰ τὴν ἐκβλάστησιν ποῖον μέρος τοῦ σπέρματος αὐξάνεται ποδτόν;

Τί χρειάζονται αἱ κοτυληδόνες;

Πῶς αὐξάνεται ἡ ρίζα καὶ ποία τὰ μέρη τῆς; Τί καλοῦμεν θετικὴν γεωτροπίαν; Ποία εἶναι ἡ ἐσωτερικὴ διασκενὴ τῆς ρίζης; Ποία ἡ χρησιμότης τῆς καλύπτρας, τῶν ἀπορροφητικῶν τριχιδίων καὶ γενικῶς τῆς ρίζης διὰ τὸ φυτόν;

Πῶς αὐξάνεται ὁ βλαστός; Ποία τὰ μέρη τοῦ καὶ ποία ἡ ἐσωτερικὴ διασκενὴ τοῦ; Ποία ἡ σημασία τοῦ βλαστοῦ διὰ τὸ φυτόν; Ποία ἡ χρησιμότης τῶν ξυλωδῶν σωλήνων τοῦ βλαστοῦ;

Ποία ἡ χρησιμότης τοῦ φλοιοῦ;

Ποία τὰ κυριώτερα μέρη τοῦ φύλλου καὶ ποία εἶναι ἡ ἐσωτερικὴ διασκενὴ τούτου; Τί χρειάζεται τὸ φυτόν διὰ νὰ ἀποκτήσῃ χλωροφύλλην; Τί χρειάζεται ἡ χλωροφύλλη διὰ τὸ φυτόν; Τί χρειάζονται τὰ στόματα τῶν φύλλων διὰ τὸ φυτόν;

Τί εἶναι ὁ θρεπτικὸς χυμός, ποῦ παράγεται οὗτος καὶ πῶς κυκλοφορεῖ εἰς τὸ σῶμα τοῦ φυτοῦ;

Διατί εἰς τὴν ἔξοχὴν ὑπάρχει, κατὰ τὴν ἡμέραν, ἄφθονον δεξιγόνον; Διατί εἰς τὰ δωμάτιά μας δὲν πρέπει κατὰ τὴν νύκτα νὰ ἀφήνωμεν φυτὰ ὀλόκληρα ἢ κλάδους των, ἢ καὶ ἄνθη των;

Ποία εἶναι τὰ ἀπαραίτητα διὰ τὴν διατροφὴν τῶν φυτῶν στοιχεῖα; Άπο ποῦ καὶ πῶς παραλαμβάνει τὸ φυτόν τὸν ἄνθρακα; Τί λέγομεν λιπάσματα καὶ ποία συστατικὰ πρέπει κυρίως νὰ περιέχωσι ταῦτα; Τί λέγομεν χλωρὰν λίπανσιν καὶ μὲ αὐτὴν ποῖον θρεπτικὸν συστατικὸν τοῦ φυτοῦ προσθέτομεν εἰς τὸ ἔδαφος;

Ποία εἶναι ἡ χρησιμότης τοῦ χώματος διὰ τὰ φυτά; Ποῖον χῶ-

μα είναι καταλληλότερον διὰ καλλιέργειαν ; Διατί τὸ χῶμα δὲν πρέπει νὰ είναι συμπαγές, ἀλλὰ ἐσκαμμένον, ὥστε νὰ είναι ὅσον τὸ δυνατὸν ἀφράτον ;

Ποῖα είναι τὰ κνοιώτερα μέρη τοῦ ἄνθους ; Πότε λέγομεν ὅτι γίνεται αὐτεπικονίασις ; Ποῖον μέρος τοῦ ἄνθους μεταβάλλεται εἰς σπέρμα καὶ τί χρειάζεται πρὸς τοῦτο ; Εἰς τὸν φασίολον ποῖα μέρη τοῦ ἄνθους μεταβάλλονται εἰς καρπόν ; Ποῖα είναι τὰ σπουδαιότερα μέρη τοῦ ἄνθους ;

## 2α Οἰκογένεια : Ρ ο δ ώ δ η

### α) Μ η λ ε ω δ η

#### Α Π Ι Δ Ε Α

( ἀγριοαχλαδιά ἢ γκορτσιά )

Ἐξωτερικὰ γνωρίσματα. Ἡ ἀγρία ἀπιδέα, τῆς ὁποίας τὸ ὄψις δύναται νὰ φθάσῃ ἔως δέκα μέτρα, είναι ἐκείνη ἀπὸ τὴν ὁποίαν προέρχονται ὅλαι αἱ παραλλαγαὶ τῶν καλλιεργουμένων ἀπιδεῶν. Φύεται εἰς ξηροὺς τόπους καὶ ἀναπτύσσεται βραδέως, ζῆ δὲ πολλὰ ἔτη. Φέρει ἀκάνθας ὡς προφυλακτικὸν κατὰ τῶν φυτοφάγων ζώων εἰς τὰς καλλιεργουμένας αἱ ἀκάνθαι ἔχουσιν ἔξαφανισθῆ. Ἐγει πολλὰς καὶ βαθείας ρίζας. Ο φλοιός της, λεῖος δταν τὸ φυτὸν είναι μικρόν, σκληρύνεται ἔπειτα καὶ σχηματίζει βαθείας σχισμάς. Τὸ ξύλον της πρὸς τὸ ἔξω μέρος είναι λευκόν ἐσωτερικῶς ( ἡ καρδία ) είναι σκληρόν, ἐρυθρωπὸν καὶ περιζήτητον, διότι ἀπὸ αὐτὸν κατασκευάζουν λεπτούργηματα καὶ μουσικὰ ὅργανα.

Φύλλα. Τὰ φύλλα της ἐκφύονται ἀνὰ ἔν. Ο μίσχος των είναι μικρὸς καὶ λεπτός, πρᾶγμα ποὺ τὰ καθιστᾷ εὐκίνητα. Τὸ ἔλασμά των είναι ὠσειδές ἢ στρογγύλον, φέρει εἰς τὰ χείλη του ὅδόντας καὶ ἡ νεύρωσίς του είναι πτερόμορφος.


Άνθος. Τὰ ἀνθη ἀναφίνονται ὁμοῦ μετὰ τῶν φύλλων κατὰ τὴν ἀνοιξιν. Ἐκφύονται πολλὰ μαζί, τὴν τοιαύτην δὲ ἐκφυσιν τὴν λέ-

γομεν ἔκφυσιν κατὰ κορύμβους, διότι τὰ ἄνθη ἐκφύονται μὲ ποδίσκους ἀνίσους ἀπὸ ἕνα ἄξονα, ἐν τμῆμα δηλαδὴ βλαστοῦ ( σχ. 31 ).



Σχ. 31. Ἀνθοφόρος κλάδος ἀπιδέας. Ἔκφυσις ἀνθέων κατὰ κορύμβους.

σέπαλα, τὰ ὅποια παραμένουν καὶ εἰς τὸν καρπόν, καὶ στεφάνην μὲ 5 λευκὰ πέταλα, πολυχρίθμους δὲ ( πλέον τῶν 30 ) στήμονας προσκε-



Σχ. 32. Ἀνθη ἀπιδέας.

Α. ἄνθος ὀλόκληρον. Β. τομὴ ἄνθους. 1. ἀνθίστρεις τὴν κορυφὴν τῶν στημάνων. 2. ὑπερος. 3. ὀδούληρος.

κολλημένους ἐπὶ τῆς ἀνθοδάκης ( σχ. 32 ). Τὰ ἄνθη παρουσιάζονται εἰς τὰ ἄκρα βραχέων κλαδίων ἡλικίας 2 - 4 ἑτῶν.

"Ἐκαστον ἄνθος παρουσιάζει μίαν ἀνθοδόχην μὲ σχῆμα κυπέλλου, εἰς τὰ χείλη τῆς ὁποίας φαίνονται προσκεκολλημένα ὁ κάλυξ, ἡ στεφάνη καὶ οἱ στήμονες· εἰς τὴν πραγματικότητα ὅμως ταῦτα εἰσχωροῦν ἐντὸς τῆς ἀνθοδόχης, μετὰ τῆς ὁποίας συνδέονται μὲ τὴν βάσιν των.

"Ἐκαστὸν ἄνθος ἔχει κάλυκα μὲ 5

‘Ο υπερος σχηματίζεται άπο πέντε καρπόφυλλα ( εἰς τὸν φασί-  
ολον ἀνεύρομεν μόνον ἐν καρπόφυλλον ) ἡνωμένα μεταξύ των καὶ μὲ  
τὰ τοιχώματα τῆς ἀνθοδόχης εἰς τρόπον, ὥστε σχηματίζεται μία ώο-  
θήκη μὲ πέντε χώρους ( διαμερίσματα )· ἔκαστος τούτων περιέχει δύο  
ώάρια. ‘Τπεράνω τῆς ώοθήκης ὑπάρχουν πέντε στῦλοι, ἐλεύθεροι καθ’  
ὅλον τὸ μῆκος των, τελειώνοντες ἔκαστος εἰς ἐν στίγμα. ‘Η γῦρις μὲ  
τὸ ἄνοιγμα τῶν ἀνθήρων πίπτει ἐπὶ τῶν στιγμάτων καὶ διὰ μέσου τῶν



Σχ. 33. A. κλάδος ἀπιδέας μὲ ἄνθη καὶ όώρους καρπούς.  
1 τὰ ἐντὸς τοῦ καρποῦ σπέρματα.

στύλων κατέρχεται καὶ γονιμοποιεῖ τὰ ἐν τῇ ώοθήκῃ ωάρια, τὰ διόπτα  
μεταβάλλονται εἰς σπέρματα.

**Κ αρ π ó c.** Μετὰ τὴν γονιμοποίησιν ἡ ώοθήκη καὶ ἡ ἀνθοδόχη  
αὔξάνονται συγχρόνως διὰ νὰ δώσουν τὸν καρπὸν ( ἀχλάδι ) ἐντὸς τοῦ  
διπίοιν εὐρίσκονται τὰ σπέρματα ( σχ. 33, 1 ).


‘Ο καρπός, ἐπειδὴ διὰ τὸν σχηματισμόν του, πλὴν τῆς ώοθήκης,  
λαμβάνει μέρος καὶ ἡ ἀνθοδόχη, λέγεται ψευδῆς καρπός. Παρουσιάζει  
εἰς τὴν κορυφήν του μίαν ἐσοχήν, πέριξ τῆς διπίας παραμένει ὁ κάλυξ,  
εἰς δὲ τὸ ἄλλο ἄκρον ἐτέραν ἐσοχήν, εἰς τὴν διπίαν εἰσχωρεῖ ἡ ούρα.  
‘Ἐκ τῆς ἀγρίας ἀπιδέας ὁ ἄνθρωπος, διὰ τῆς βελτιώσεως καὶ τῆς καλ-

λιεργείας, έπειτα όλας τάξ σήμερον οπαρχούσας ποικιλίας της ήμέρου, αἱ ὄποιαι οπερβαίνουν τάξ 3000.

Ἡ ήμερος εὐδοκιμεῖ εἰς ἐλαφρὸν καὶ γόνιμον ἔδαφος, καὶ διὰ νὰ μᾶς δώσῃ καλοὺς καὶ πολλοὺς καρποὺς πρέπει νὰ τὴν κλαδεύωμεν κάθε χειμῶνα· μὲ τὸ κλάδευμα δυνάμεθα νὰ τῆς δώσωμεν καὶ διάφορα σχήματα. Διὰ νὰ ἐννοήσωμεν διατί πρέπει νὰ κλαδεύσωμεν τὴν ἀπιδέαν, ἀρκεῖ νὰ ἔξεταπωμεν ἔνα ἀπὸ τοὺς κλάδους τῆς τὸν χειμῶνα· ἐπ’ αὐτοῦ

ἢ παρατηρήσωμεν τριῶν εἰδῶν ὁφθαλμούς:

α ) Ὁφθαλμοὺς μικροὺς καὶ ὀλίγον ὀξεῖς· αὐτοὶ θὰ δώσουν κατὰ τὴν ἄνοιξιν νέους κλάδους ( σχ. 34, 1 ).



Σχ. 34. 1 ὁφθαλμοὶ, οἱ ὄποιαι θὰ δώσουν κλάδους. 2 ὁφθαλμοὶ, ποὺ θὰ δώσουν φύλλα, καὶ 3 ὁφθαλμοὶ, ποὺ θὰ δώσουν ἄνθη καὶ καρπούς.

β ) Ὁφθαλμοὺς πολὺ ὀξεῖς, τοὺς ὄποίους φέρουν κλαδίσκοι μικροὶ καὶ ἐρυθριδωμένοι· αὐτοὶ θὰ δώσουν τὴν ἄνοιξιν ἔνα μπουκέτο ἀπὸ 5 - 6 φύλλα ( σχ. 34, 2 ) καὶ

γ ) Χονδροὺς καὶ στρογγύλους ὁφθαλμούς, οἱ ὄποιοι θὰ δώσουν ἄνθη καὶ καρπούς ( σχ. 34, 3 ).

Ἡ παρατήρησις ἔχει δεῖξει ὅτι οἱ πρῶτοι ὁφθαλμοὶ μεταβάλλονται εἰς τοὺς δευτέρους, ἀν κόψωμεν τὰ ἄκρα τῶν κλάδων, οἱ ὄποιοι τοὺς φέρουν· οἱ δεύτεροι πάλιν μεταβάλλονται μετὰ 2 - 3 ἔτη εἰς τοὺς καρποφόρους ὁφθαλμούς. Πρέπει λοιπόν :

α ) Κάθε χειμῶνα νὰ ἀφήνωμεν εἰς ἔκαστον κλάδον μόνον τοὺς ὁφθαλμούς 2 καὶ 3, καὶ ἀπὸ τοὺς 1 δύο ἔως τέσσαρες. β ) Τὸ θέρος νὰ κόπτωμεν, εἰς ἀπόστασιν 6 - 7 φύλλων ἀπὸ τῆς βάσεως τοὺς νέους κλάδους, διὰ νὰ ἀναγκάσωμεν τοὺς ὁφθαλμούς 1 νὰ μεταβληθοῦν εἰς τοὺς ὁφθαλμούς 2, οἱ ὄποιοι, μὲ τὴν σειράν των, θὰ μεταβληθοῦν εἰς τοὺς ἀνθοφόρους ὁφθαλμούς 3.


Πολλαπλασιασμός. Οὗτος δύναται νὰ γίνη διὰ σπερμάτων ἀλλὰ ἀπὸ τὰ σπέρματα δὲν θὰ ἔχωμεν ποτὲ δένδρα μὲ καρποὺς ὄμοιούς πρὸς τοὺς καρποὺς τῶν δένδρων, ἐκ τῶν ὄποιων τὰ σπέρματα προέρχονται. Θὰ ἔχωμεν καρποὺς χειροτέρας ποιότητος, σχεδὸν ὄμοιούς μὲ τοὺς καρποὺς τῆς ἀγρίας ἀπιδέας. Διὰ νὰ ἔχωμεν τῆς αὐτῆς ποι-

ότητος καρπούς, πρέπει τὸ ἐκ τῆς σπορᾶς προελθὸν δένδρον νὰ τὸ ἐμβολιάσωμεν.

Χρησιμό της. Ἡ ἡμερος ἀπιδέα εἶναι χρήσιμος κυρίως διὰ τοὺς καρπούς της, τὰ ἀχλάδια, τὰ ὄποια εἶναι πολὺ νόστιμα καὶ θρεπτικά, διότι περιέχουν ἀρκετὸν σάκχαρον. Οἱ καλύτεροι καρποὶ εἶναι τὰ ἀχλάδια τὰ λεγόμενα κοντοποδαροῦσες, ζαχαρᾶτα, σκοπελίτικα, βουτυρᾶτα κ.λ.π.

Φυτὰ ὅμοια πρὸς τὴν ἀπιδέαν εἶναι :

**Μηλέα ἡ κοινή.** Ἐχει τὴν αὐτὴν κατασκευὴν φύλων καὶ ἄνθους μὲ τὴν ἀπιδέαν μόνον ὁ καρπός της (σχ. 35) διαφέρει κατὰ τὸ



Σχ. 35. Τομὴ καρποῦ μηλέας.

- 1 ὠσιθήκη, 2 σπέρματα, 3 σάρξ τοῦ καρποῦ, 4 φλοίσς,  
5 κάλυξ, ὃστις παραμένει καὶ εἰς τὸν καρπόν.

σχῆμα. Ἀγαπᾶ κλίματα μέτρια καὶ ὄμιχλώδη καὶ δι' αὐτὸν εὐδοκιμεῖ περισσότερον εἰς μέρη ὁρεινὰ καὶ βόρεια. Ὑπὸ συνθήκας εύνοικὰς φθάνει εἰς ὕψος 25 μέτρων, διάμετρον βάσεως 1,70 καὶ ζῆ πλέον τῶν 100 ἑτῶν. Προέρχεται ἀπὸ τὴν ἀγρίαν μηλέαν, ὑπάρχουν δὲ σήμερον πολλαὶ παραλλαγαὶ της. Μία τοιαύτη εἶναι ἡ παρ' ἡμῖν εἰς τὰ μέρη τοῦ Βόλου εὐδοκιμοῦσα, τῆς ὄποιας τοὺς καρποὺς τοὺς λέγομεν φυρίκια. Οἱ καρποὶ τῆς μηλέας εἶναι νόστιμοι καὶ συντελοῦν εἰς τὴν πέψιν, ἀπὸ τοὺς καρπούς δὲ μιᾶς παραλλαγῆς μηλέας ἔξαγουν οἶνον, τὸν λεγόμενον μηλίτην οἶνον.

**Ἡ κυδωνέα.** Τοὺς καρποὺς τῆς μετὰ σακχάρου χρησιμοποιοῦν διὰ τὴν κατασκευὴν γλυκισμάτων, ὅπως π.χ. τὸ κυδωνόπαστον. Εἶναι

χονδροί, χνουδωτοί, ώραίου κιτρίνου χρώματος και ἀρωματικοί, ζάλλα στυφοί τὴν γεῦσιν.

‘Η ἀπιδέα, ἡ μηλέα, ἡ κυδωνέα, παρουσιάζουν κοινὰ χαρακτηριστικά: Ὁ κάλυξ, ἡ στεράνη, καὶ οἱ στήμονες εἰναι ἡνωμένα διὰ τῆς βάσεώς των μὲ τὴν ἀνθοδόχην, ἡ ὠιθήκη διαιρεῖται εἰς 5 χώρους, ἔκαστος τῶν ὅποίων περιέχει δύο ὥραια. Ὁ καρπὸς εἰναι σαρκώδης καὶ εἰς τὸν σχηματισμὸν του συμμετέχει καὶ ἡ ἀνθοδόχη (ψευδής καρπός). Συνενοῦνται ὑπὸ τὸ δνομικα τῶν Μηλεωδῶν.

Σημείωσις. Ψευδὴς καρπὸς λέγεται ὁ σαρκώδης καρπός, εἰς τὸν σχηματισμὸν τοῦ ὅποιου συμμετέχει καὶ ἡ ἀνθοδόχη. Κόρυφος λέγεται ἡ ταξιανθία εἰς τὴν ὅποιαν τὰ ἄνθη, πολλὰ δόμοι, ἐκφύονται ἀπὸ ἕνα ἄξονα μὲ ποδίσκους ἀνίσους.

### β) Ἀμυγδαλίδαι ἢ Προυμνίδαι

#### ΠΡΟΥΜΝΗ Η ΕΜΒΟΛΙΑΖΟΜΕΝΗ


( ἀγριοδαμασκηνιά ἢ ἀγριοκαρομηλιά ἢ καὶ ἀγριομπουρνελιά )

Εἶναι δενδρύλλιον μὲ ἀκάνθας, τὸ ὅποιον κατὰ τὸν Ἀπρίλιον καλύπτεται ἀπὸ λευκὰ ἄνθη (προτοῦ φανοῦν φύλλα). Οἱ καρποὶ του ὠριμάζουσι τὸ φθινόπωρον εἰναι κατ’ ἀρχὰς ἴωδεις καὶ ὅταν ὠριμάσουν τελείως γίνονται μαῦροι, ἔχουσι δὲ γεῦσιν κάπως στυφήν.

‘Απὸ αὐτὴν ὁ ἄνθρωπος διὰ τῆς καλλιεργείας ἐπέτυχε τὴν ἡμέραν ἡ καλλιεργουμένην δαμασκηνιάν. Λύτη ἔχει φύλλα ωοειδῆ, ὀδοντωτά· ἄνθη λευκά, τὰ ὅποια ἀναφαίνονται πρὸ τῶν φύλλων, κάλυκα μὲ 5 σέπαλα, στεφάνην μὲ 5 πέταλα ἐλεύθερα, καὶ πολυαρίθμους στήμονας στερεωμένους ἐπὶ τοῦ κάλυκος, τῶν ὅποίων οἱ ἀνθῆρες ἀνοίγουν πρὸς τὰ μέσα. Ὁ ὑπερος ἀποτελεῖται ἀπὸ μίαν ὠιθήκην, ἡτις ἔχει δύο ὥραια· ἡ ὠιθήκη προεκτείνεται μὲ ἔνα στῦλον.

Καρπός. Ὁ καρπὸς εἰναι δρύπη (σγ. 36). Οὕτω λέγεται κάθις σαρκώδης καρπός, δὲ ὅποιος ἀποτελεῖται ἀπὸ ἔνα λεπτὸν φλοιόν, κάτωθεν τοῦ ὅποιου ὑπάρχει ἐν σαρκῶδες στρῶμα καὶ ἐσωτερικῶς τούτου ἐν μέρος σκληρὸν καὶ ξυλῶδες, δὲ πυρήνη. Ἐντὸς τοῦ πυρῆνος εὑρίσκεται τὸ σπέρμα. Ἀπὸ τὰ δύο ὥραια τῆς ὠιθήκης εἰς τὴν δαμασκηνέαν

γονιμοποιεῖται μόνον τὸ ἔν καὶ διὰ τοῦτο ὁ πυρὴν δὲν περιέχει παρὰ μόνον ἔν σπέρμα. Οἱ καρποὶ ἔχουν χρῶμα μελανὸν ἢ ἐρυθρὸν καὶ λέγονται δαμασκηνα ἢ κορόμηλα ἢ καὶ μπουρνέλες καὶ τζάνερα. Ἡ δαμασκηνιὰ ἐκαλλιεργεῖτο ἀπὸ τοὺς παλαιοτάτους χρόνους εἰς τὴν Συρίαν καὶ ἰδίως εἰς τὰ περὶ τὴν Δαμασκὸν μέρη, ἐξ οὗ καὶ τὸ ὄνομά της. Οἱ καρποὶ τῆς φέρονται εἰς τὸ ἐμπόριον κυρίως ξηροί. Μεγάλην παραγω-



Σχ. 36. Τοιχαὶ ἀπὸ διαφόρους καρπούς, τοὺς ὄποιους λέγομεν δρύπη.

γῆν δαμασκήνων ἔχει ἡ Αύστρια, ἡ Σερβία, ἡ Βοσνία καὶ Ἐρζεγοβίνη, ἢ Καλιφορνία. Εἰς τὴν Ἑλλάδα ἔχομεν παραγωγὴν εἰς τὰς νήσους τοῦ Αιγαίου, ἰδίως εἰς τὴν Νάξον καὶ τὴν Σκόπελον.

### ΑΜΥΓΔΑΛΗ Η KOINH

( μυγδαλὰ )

Προέρχεται ἀπὸ τὴν ἀγρίαν, ἡ ὅποια εἶναι δένδρον ιθαγενὲς τῆς Ασίας καὶ τῆς Ἑλλάδος.

Ἐχει φύλλα λογχοειδῆ καὶ ἀνθη λευκὰ ἢ λευκορρόδινα, τὰ ὅποια ἀρχίζουν νὰ ἀναφαίνωνται ἀπὸ τοῦ Ἰανουαρίου, πρὶν φανοῦν τὰ φύλλα· δι’ αὐτὸν καὶ ἡ λαϊκὴ μοῦσα λέγει: ‘Εσὸν τρελλὴ ἀμυγδαλιά, ποὺ ἀνθίζεις τὸν Γενάρη’ ( σχ. 37 ).

Ο καρπός τῆς εἶναι δρύπη, καὶ ἔχει πυρῆνα μὲ χονδρὸν φλοιούν, δόστις περικλείεις ἐν καρπῷ σπανιώτερον δύο σπερματά τὰ ἐλαιώδη. Εἰς τινας παραλίας τοῦ πυρῆνος εἶναι λεπτὸς καὶ εύθραυστος, εἰς ἄλ-

λας χονδρότερος. Μεγάλην παραγωγήν ἀμυγδάλων ἔχει ἡ Ἰταλία, ἡ Ἰσπανία καὶ ἡ Γαλλία. Εἰς τὴν Ἑλλάδα ὑπάρχουν εἰς πολλὰς περιφέρειας ἀμυγδαλαῖ, μεγάλη παραγωγὴ ὅμως ἀμυγδάλων γίνεται κυρίως εἰς τὴν Χίον καὶ τὴν Κρήτην.

’Απὸ τὰ πικρὰ τῆς ἀγρίας ἀμυγδαλῆς ἀμύγδαλα ἔξαγεται εἶδος ἐλαίου, τὸ πικραμυγδέλαιον, χρήσιμον εἰς τὴν μυροποιίαν καὶ σαπωνοποίειν.

Ἡ ἀμυγδαλῆ εὐδοκιμεῖ εἰς ὅλα τὰ ἐδάφη, πλὴν τῶν συμπαγῶν καὶ καθύγρων.

’Α σθένεια. Προσβάλλεται ἀπὸ πολλὰς ἀσθενείας, ἀπὸ τὰς ὄποιας σπουδαιότεραι εἰναι ἡ σῆψις τῶν φιλῶν (ἰδίως διὰ τὰς ἀμυγδαλᾶς ποὺ ζοῦν εἰς ἐδάφη ποτιστικά) καὶ ἡ κομιμώσις. Κομιμώσις εἰναι ἡ ἔκκρισις κόμμεος ἀπὸ τὸν κορμὸν καὶ τοὺς κλάδους, πολλάκις καὶ ἀπὸ τοὺς καρπούς, ἡ ὄποια, ἐν ἀφεθῇ ἀνευ θεραπείας, ἐπιτείνεται καὶ τὸ δένδρον ξηραίνεται. Πρὸς θεραπείαν διαχθετεῖ τὸ πότισμα, περιλακκοῦνται καὶ ἀποκαλύπτονται αἱ ρίζαι καὶ εἰς τὸν λάκκον ποὺ σχηματίζεται, ἐναποτίθενται 2 - 3 κιλὰ τετριμμένου θειέκου σιδήρου καὶ 4 - 8 κιλὰ ἀσβέστου.

Πολλαπλασιάζεται μὲ σπέρματα. Τὰ οὔτως ὅμως φυόμενα δένδρα, ὅπως εἴδομεν καὶ διὰ τὴν ἀπιδέαν, δὲν παράγουν καρποὺς ὅμοιους πρὸς ἐκείνους, τοὺς ὄποιους παράγουν τὰ δένδρα, ἐκ τῶν ὄποιών προέρχονται τὰ σπέρματα, ἀλλὰ καρποὺς σχεδὸν ὅμοιους μὲ τοὺς τῆς ἀγρίας ἀμυγδαλῆς. Διὰ τοῦτο πρέπει ὄπωσ-δήποτε νὰ τὰ ἐμβολιάσωμεν μὲ τὴν παραλλαγήν, τῆς ὄποιας θέλομεν νὰ



Σχ. 37. Κλάδοι ἀμυγδαλῆς μὲ καρπούς καὶ ἄνθη.

ἐπιτύχωμεν τοὺς καρπούς, μεταφέροντες ἐξ ἑνὸς δένδρου τῆς παραλλαγῆς ταύτης δρυθαλμούς εἰς τὸ δένδρον, τὸ ὅποῖον θέλομεν νὰ ἐμβολιάσωμεν.


Ἐ μ β ο λ ι α σ μ ó c. Ἐμβολιασμοῦ ὑπάρχουσι διάφορα εἰδη.

Ο ἀπλούστερος ἐξ αὐτῶν εἶναι ὁ λεγόμενος ἐνοφθαλμισμός. Ἀποσπῶμεν δηλαδὴ μὲ προσοχήν, τὸν Μάιον ἢ Ιούνιον, ἕνα φυλλοφόρον δρυθαλμὸν (ἀπὸ ἐκείνους οἱ δόποιοι ἀναπτυσσόμενοι δίδουν τοὺς κλάδους) μαζὶ μὲ τεμάχιον φλοιοῦ (σχ. 38). Κόπτομεν ὅλους τοὺς κλάδους τῆς ὑπὸ ἐμβολιασμὸν ἀμυγδαλῆς, καὶ ἀφήνομεν ἔνα, τὸν εὐρωστότερον, ἂν τὸ φυτὸν εἶναι μικρόν, ἢ περισσοτέρους, ἂν εἶναι μεγαλύτερον· χαράσσομεν εἰς τὸν φλοιὸν τῶν κλάδων τούτων μὲ μαχαιρίδιον δύο σχισμάς, μίαν ὅριζοντιαν καὶ μίαν κάθετον ἐν εἰδει Τ κεφαλαίου.

Αποχωρίζομεν τὰ χείλη τῶν σχισμῶν μὲ προσοχὴν καὶ εἰσάγομεν ἐντὸς αὐτῶν τὸν ἀποσπασθέντα δρυθαλμὸν εἰς τρόπον, ὥστε ὁ φλοιός του νὰ προσκολληθῇ ἐπὶ τοῦ ξύλου τοῦ ἐμβολιαζομένου κλάδου. Δένομεν τὴν σχισμὴν μὲ πλατεῖαν λωρίδα (ταύτην λαμβάνομεν κυρίως ἀπὸ τὸν φλοιὸν ἄλλου δένδρου, ιδίως μορέας) καὶ χρίουμεν μὲ χῶμα ἢ μὲ εἰδικῶς πρὸς τοῦτο παρασκευαζόμενον βάλσαμον, ὥστε νὰ προφυλάξωμεν ἀπὸ τὴν ὑγρασίαν ἢ ξηρασίαν, ἀφήνοντες ἐξω μόνον τὸν δρυθαλμόν. Κόπτομεν ἔπειτα τὸν ἐμβολιασθέντα κλάδον 3 - 5 ἑκατοστὰ ὑπεράνω τοῦ μέρους, ὅπου ἔθέσαμεν τὸν δρυθαλμόν ἀπὸ τὸν δρυθαλμὸν τοῦτον θὰ προέλθῃ κλάδος ὅστις, ἀργότερον, αὐξανόμενος θὰ δώσῃ διακλαδώσεις, δηλαδὴ νέον δένδρον, τὸ ὅποῖον θὰ παράγῃ καρποὺς δόμοιους μὲ τοὺς καρποὺς τοῦ δένδρου, ἀπὸ τὸ ὅποῖον προέρχεται τὸ ἐμβόλιον (ὁ δρυθαλμός).

Φυτὰ δόμοια πρὸς τὴν ἀμυγδαλῆν εἶναι :

Η ροδακινέα, ἡ δόποια εὔδοκιμεῖ εἰς θερμὰ κλίματα, διότι τὸ ψῦχος καὶ οἱ παγετοὶ ξηραίνουσι τοὺς κλάδους της. Εἶναι δένδρον τὸ ὅποῖον ἀναπτύσσεται ταχέως ἀλλὰ ζῆ διλίγον. Εὔδοκιμεῖ εἰς ἐδάφη γύ-



Σχ. 38. ἐνοφθαλμισμός.

νιμα ποτιστικά ή νοτερά. 'Ο καρπός της είναι άπό τους νοστιμωτέρους καρπούς.

**Η βερυκοκκιά.** Καλλιεργεῖται εἰς τὴν Ἑλλάδα, Συρίαν, Ἰταλίαν, Γαλλίαν, Ἰσπανίαν, Καλιφορνίαν, Αὐστρίαν, αἵτινες ἔξαγον μεγάλας ποσότητας κατ' ἔτος εἴτε χλωρῶν εἴτε ξηρῶν καρπῶν.

**Η κερασέα ή κοινή.** Εύδοκιμεῖ εἰς πολλὰ μέρη τῆς Ἑλλάδος, ιδίως εἰς τὰ δρεινά καρποφορεῖ ἀπὸ τοῦ 4ου ἔτους καὶ οἱ καρποὶ της είναι νόστιμοι καὶ οὐρανοί, ἔξαγεται δὲ ἐξ αὐτῶν καὶ εἶδος οἰνοπνευματώδους ποτοῦ.

**Η κερασέα ή δέξικαρπος (κοιν. βυσσινιά).** Μικροτέρα τῆς κοινῆς κερασέας καὶ μὲ γλυκοξύνους καρπούς μὲ αὐτοὺς παρασκευάζουν ἐν εἶδος γλυκοῦ καὶ ποτόν, τὴν βυσσινάδαν.

**Η δαμασκηνιά, ή ἀμυγδαλιά, ή ροδακινέα, ή βερυκοκκιά, ή κερασέα ή κοινή καὶ ή κερασέα ή δέξικαρπος παρουσιάζουν κοινὰ χαρακτηριστικά : "Εχουσι φύλλα ἀπλᾶ. Τὰ ἄνθη των ἔχουσι κάλυκα μὲ 5 σέπαλα, στεφάνην μὲ 5 πέταλα χωρισμένα, πολυαριθμούς στήμονας στερεωμένους εἰς τὸν κάλυκα, ὑπερον ἀπὸ ἓν καρπόφυλλον μὲ ωθήκην, ητις ἔχει δύο ὠάρια καὶ προεκτείνεται μὲ ἔνα στῦλον. 'Ο καρπός των είναι δρύπη.**

Ἐνοῦνται ὑπὸ τὸ δόνομα τῶν Ἀμυγδαλιδῶν η Προσμυνιδῶν.

### γ) Ρ ο δ ο ε ει δ η

#### ΡΟΔΗ Η ΑΓΡΙΑ

(ἀγριοτριανταφυλλιά)

Είναι θάμνος μὲ ἀκάνθας καμπυλωτάς. Θάμνον λέγομεν κάθε πολυετὲς φυτόν, τὸ ὅποῖον ἔχει βλαστὸν ξυλώδη, ἀλλὰ μὴ ὑπερβαίνοντα εἰς ὕψος τὰ 2 μέτρα.

Τὰ φύλλα της είναι σύνθετα (σχ. 39, A) καὶ τὰ φυλλάρια τῶν συνθέτων αὐτῶν φύλλων ὀδοντωτά. Προτιμῷ ἐδάφη οὐρανὸς καὶ ζῆ ἔως 30 ἔτη.

"Ανθος. 'Ο ποδίσκος τοῦ ἄνθους περατοῦται εἰς μίαν κοίλην ἀνθοδόχην σχήματος φιάλης, εἰς τὸ ἄνω μέρος τῆς ὅποιας είναι ἐνσφηνωμένα δύο κάλυξ, ή στεφάνη καὶ οἱ στήμονες. 'Ο κάλυξ ἔχει 5 λεπτὰ σέπαλα καὶ ή στεφάνη 5 ἐλεύθερα καὶ ροδίνου χρώματος πέταλα. "Εγεί


πολυαρίθμους στήμονας ήνωμένους μὲ τὰ σέπαλα, τῶν ὑποίων οἱ ἀνθῆρες ἀνοίγουν πρὸς τὸ μέσα μέρος τοῦ ἄνθους. Ὁ ὑπερος ἀποτελεῖται ἀπὸ μέγαν ἀριθμὸν καρποφύλλων, προσκεκολλημένων εἰς τὰ ἐσωτερικὰ τοιχώματα τῆς φιαλοειδοῦς ἄνθοδόχης. Κάθε καρπόφυλλον περιέχει ἐν ὀάριον καὶ προεκτείνεται εἰς ἔνα στῦλον, τοῦ ὅπου τὸ στίγμα εὑρίσκεται πλησίον τῶν ἀνθήρων (σχ. 39).

**Κ α ρ π ó c.** Εἰς καρπὸν μεταβάλλεται ἡ ἀνθοδόχη, ἡ ὅποια κατὰ τὴν ὥριμαν σιν λαμβάνει χρῶμα ἐρυθρόν· εἶναι σαρκώδης καὶ διατηρεῖ εἰς τὴν κορυφὴν τῆς τὰ ὑπόλειμματα τῶν σεπάλων, περιέχει δὲ πολυάριθμα σπέρματα (σχ. 40). Διὰ τῆς καλλιεργείας κατωρθώθη νὰ μεταβληθοῦν εἰς πέταλα πολλοὶ ἀπὸ τοὺς στήμονας τῆς ἀγρίας ροδῆς καὶ οὕτως ἔχομεν τὰς διαφόρους παραλλαγὰς τῆς καλλιεργουμένης ἡμέρου ροδῆς (σχ. 41).



Σχ. 39. Α σύνθετον φύλλον ροδῆς.

Β τομὴ ἄνθους ροδῆς.



Σχ. 40. Γ καρπὸς ροδῆς. Δ τομὴ καρποῦ, εἰς τὴν ὅποιαν φαίνονται τὰ ἐντὸς αὐτοῦ σπέρματα.

‘Απρίλιον. Ἀπὸ τὰ ἄνθη αὐτῆς κυρίως ἔξαγεται τὸ ροδέλαιον καὶ ρο-

δόσταγμα. Ἡ ροδῆ καλλιεργεῖται πολὺ εἰς τὴν Περσίαν, Γαλλίαν, Ἰνδίας καὶ τὴν Ἀνατολικὴν Ρωμυλίαν. Ἀπὸ τρεῖς τόνους ἀνθέων ἡμπορεῖ νὰ ἔξαχθῇ ἐνα χιλιόγραμμον ροδοστάγματος.



**Σχ. 41.** 1 ἄνθος, 2 κλάδος καὶ ἄνθος ροδῆς τῆς καλλιεργουμένης.

Πολλαπλασιάζωμεν διὰ σπερμάτων, διότι τὰ ἐκ τούτων προερχόμενα φυτὰ παράγουν ἄνθη προσόμοια μὲ τὰ ἄνθη τῆς ἀγρίας ροδῆς. Διὰ τοῦτο πολλαπλασιάζομεν αὐτὴν διὰ μοσχευμάτων καὶ διὰ παραφυάδων.

α) Διὰ μοσχευμάτων. Πρὶν ἀναπτυχθοῦν οἱ ὄφθαλμοὶ τῆς ροδῆς, δηλ. κατὰ τὸ φθινόπωρον ἡ καὶ βραδύτερον, ἀποκόπτομεν ἀπὸ τοὺς εὐρωστοτέρους καὶ ὑγιεστέρους κλάδους τῆς ροδῆς, τὴν ὅποιαν θέλομεν νὰ πολλαπλασιάσωμεν, τυμάτα μήκους 30 - 40 ἑκατοστομέτρων, τὰ ὅποια φυτεύομεν εἰς χῶμα καλῶς ἐσκαμμένον καὶ λιπασμένον· τοῦτο καλοῦμεν φυτώριον. Οἱ κλάδοι οὗτοι θὰ δώσουν κατὰ τὴν ἄνοιξιν ἀπὸ τοὺς ἐντὸς τοῦ χώματος ὄφθαλμοὺς ρίζας, ἀπὸ δὲ τοὺς ἔξω τοῦ χώματος ὄφθαλμοὺς θὰ δώσουν βλαστοὺς καὶ οὕτω θὰ ἔχωμεν νέας ροδᾶς. Μόλις αὗται ἀναπτυχθοῦν ἀρκετά, τὰς ἐκριζοῦμεν, προσέχοντες νὰ μὴ καταστραφοῦν αἱ ρίζαι των, καὶ τὰς μεταφυτεύομεν ὅπου θέλομεν. Ὁ τρόπος αὐτὸς τοῦ πολλαπλασιασμοῦ καλεῖται πολλαπλασιασμὸς διὰ μοσχευμάτων.

β) Διὰ παραφυάδων. Ἡ ροδῆ εἶναι φυτὸν μὲ πολλοὺς κλάδους· ἀπὸ τοὺς κλάδους τῆς πολλοὶ σχηματίζουν ρίζας εἰς τὴν βάσιν των, ἡ ὅποια εἶναι χωμένη εἰς τὸ χῶμα, καὶ τοὺς κλάδους αὐτοὺς τοὺς λέ-

γομεν παραφνάδας. Οὗτοι ἔχουσι λεπτὰς ρίζας, ἀν δὲ τοὺς ἀποσπάσωμεν μετὰ προσοχῆς, διὰ νὰ μὴ καταστραφοῦν αἱ ρίζαι καὶ τοὺς μεταφυτεύσωμεν, θὰ ἔχωμεν νέον φυτόν. Ὁ δεύτερος αὐτὸς τρόπος τοῦ πολλαπλασιασμοῦ λέγεται πολλαπλασιασμὸς διὰ παραφνάδων καὶ εἶναι πλεονεκτικώτερος τοῦ πρώτου, διότι κατ' αὐτὸν τὰ φυτὰ ἀναπτύσσονται συντομώτερον.

Βλέπομεν δηλαδή, ὅτι τὰ φυτὰ δυνάμεθα νὰ τὰ πολλαπλασιάσωμεν διὰ σπερμάτων, διὰ μοσχευμάτων, διὰ παραφνάδων καὶ νὰ τὰ μεταβάλωμεν ἀπὸ ἄργια εἰς ἡμερά η νὰ τὰ κάμωμεν νὰ δίδονται καλυτέρους καρποὺς διὰ τοῦ ἐμβολιασμοῦ.

Α σ θένειαι τῆς ροδῆς. Ἡ σπουδαιοτέρα ἀπὸ τὰς ἀσθενείας τῆς ροδῆς εἶναι ἡ λεγομένη μελίγκρα. Αὐτὴ προέρχεται ἀπὸ μικρὰ ἔντομα, φυτοφθείλας, τὰ ὅποια ἔχουσιν δέξιν καὶ ἴσχυρὸν ρύγχος. Μὲ αὐτὸν ἀπομιζοῦν τὸν χυμὸν τῆς ροδῆς καὶ συντελοῦν εἰς τὴν ἐξασθενησιν καὶ ξήρανσίν της. Καταπολεμοῦνται μὲραντισμα διὰ διαλύματος σάπωνος εἰς ὕδωρ, εἰς τὸ ὅποῖον προστίθεται πετρέλαιον (3 κιλ. σάπωνος, 3 κιλ. πετρελαίου καὶ 150 κιλ. ὕδατος) η μὲ διάφορα ὑγρὰ καὶ κόντεις ἐντομοκοτόνους, τὰ ὅποια πωλοῦνται εἰς τὸ ἐμπόριον.

"Ολα τὰ εἰδη τῆς ροδῆς παρουσιάζουν κοινὰ χαρακτηριστικά : "Εχουσι φύλλα σύνθετα, καμπυλωτὰς ἀκάνθας, ἄνθη μὲ 5 σέπαλα, 5 πέταλα καὶ πολυαρίθμους στήμονας ἡνωμένους μὲ τὰ πέταλα. Οἱ καρποὶ εἶναι καρποὶ ξηροί, καὶ δὲν ἀνοίγουν μόνοι τῶν, ὥστε τὸ σπέρμα νὰ ἐλευθεροῦται, διποτες εἰδομενεν ὅτι γίνεται μὲ τοὺς καρποὺς τοῦ φασιόλου. "Ανοίγουν μόνον κατὰ τὴν ἐκβλάστησιν τοῦ σπέρματος· τότε τὸ σπέρμα βλαστάνον θραύει τὸ περικάρπιον, τὸ ξηρὸν δηλαδὴ περιβλημα, τὸ διποτες ὑπάρχει πέριξ τοῦ καρποῦ, καὶ ἐλευθεροῦται. Τοὺς τοιούτους καρποὺς τοὺς λέγομεν ἡ καίνια. Τὰ ἀχαίνια παραμένουν κλεισμένα ἐντὸς τῆς ἀνθοδόχης, ητις γίνεται ἐρυθρὰ καὶ σαρκώδης (συγκάρπιον).

Συνενοῦνται ὑπὸ τὸ ὄνομα ροδοειδῆ.

### δ) Χαμαικερασώδη

#### ΧΑΜΑΙΚΕΡΑΣΟΣ

(κν. φράσουλα)

Αγαπᾶτο ὑγρὰ καὶ σκιερὰ μέρη· διὰ τοῦτο αὐτοφυὲς εύρισκομεν τὸ φυτὸν τοῦτο μέσα εἰς τὰ δάση. Καλλιεργεῖται δημως εὔρεως καὶ εἰς

τούς κήπους, διότι οἱ καρποί, φράσουλες, εἶναι γλυκεῖς καὶ εὐωδίαζοντες. Εἶναι φυτὸν ποῶδες, μὲ ἐν βραχὺ ρίζωμα, ἀπὸ τὸ ὄποιον φυτρώνει μίᾳ τούφᾳ ἀπὸ μεγάλα σύνθετα φύλλα καὶ κλάδοι λεπτοί, οἱ ὄποιοι ἔρπουν



Σχ. 42. Φράσουλα μὲ τοὺς ἔρποντας κλάδους τῆς, ἀπὸ τοὺς ὀφθαλμοὺς τῶν ὄποιων ἐκφύονται νέα φυτά.

εἰς τὸ χῶμα καὶ φέρουν πολυαρίθμους ἵνωδεις ρίζας. Οἱ ἔρποντες αὐτοὶ κλάδοι ἐπιμηκύνονται σὺν τῷ χρόνῳ καὶ ἀπὸ κάθε ὀφθαλμὸν τῶν παράγονται ρίζαι καὶ φύλλα. Ἀργότερα ὁ ἔρπων κλάδος ἔγραψεται καὶ μένει ἀπὸ κάθε ὀφθαλμὸν ἐν νέον φυτὸν τελείως ἀνεξάρτητον· οὕτως ἡ φράσουλα πολλὰ πλασιαζεται μόνη τῆς μὲ τοὺς ἔρποντας κλάδους τῆς (σχ. 42).

"Ανθος. Τὸ ἄνθος (σχ. 43) ἔχει κάλυκα μὲ πέντε χωριστὰ σέπαλα, στεφάνην μὲ πέντε πέταλα λευκὰ καὶ ἐλεύθερα, εἴκοσι στήμονας, τῶν ὄποιων τὰ νήματα εἶναι προσκεκολλημένα εἰς τὸν κάλυκα καὶ οἱ ἀνθητέρες τῶν ἀνοίγουσι πρὸς τὸ μέσα μέρος τοῦ ἄνθους. Πρὸς τὸ




Σχ. 43. Τομὴ ἄνθους φράσουλας.  
1. ἀνθήρ. 2. ὑπερος. 3. ὀωθήκη.

κέντρον ή ώσθήκη είναι έξωγκωμένη καὶ φέρει πλέον τῶν 200 καρπούς πύλων, ἔκαστον τῶν ὅποιων περιέχει ἀνὰ ἐν ὥστριον.

Καὶ πότε. Ἡ φράουλα, τὴν ὅποιαν ἡμεῖς λέγομεν καρπὸν τῆς φραουλιᾶς, προέρχεται κυρίως ἀπὸ τὴν ἔξωγκωσιν τῆς ἀνθοδόχης, ἡ ὅποια γίνεται ἐρυθρωπή καὶ σαρκώδης, ὅπως τῆς ροδῆς, ἀλλὰ σακχαροῦχος (σχ. 44).

Οἱ πραγματικοὶ καρποὶ τῆς φράουλας εἰναι οἱ μικροὶ κίτρινοι σπόροι, τοὺς ὅποιους ἀνευρίσκομεν ἐντὸς τοῦ σαρκώδους καὶ σακχαρούχου μέρους. Διὰ τοῦτο, ἐπειδὴ δηλαδὴ ἔχομεν πολλοὺς καρποὺς ὁμοῦ ἐντὸς τοῦ σαρκώδους τμήματος τοῦ καρποῦ τῆς φράουλας, λέγομεν τὸν



Σχ. 44. Καρπὸς φράουλας (συγκάρπιον) καὶ τομὴ καρποῦ φράουλας.

1. οἱ κίτρινοι σπόροι,
- 2 καὶ 3 τὸ σαρκώδες μέρος,
- 4 τὰ παραμένοντα σέπαλα.

καρπὸν τῆς φράουλας, ὅπως καὶ τὸν καρπὸν τῆς ροδῆς συγκάρπιον. Οἱ καρποὶ τῆς φράουλας, οἱ μικροὶ δηλαδὴ κίτρινοι σπόροι, τοὺς ὅποιους ἀνευρίσκομεν ἐντὸς τοῦ σαρκώδους καὶ σακχαρούχου μέρους, (τοὺς λέγομεν ἡμεῖς σπόρους, ἐνῷ εἰς τὴν πραγματικότητα δὲν εἰναι σπόροι ἀλλὰ καρποί), εἰναι παρόμοιοι πρὸς τοὺς καρποὺς τῆς ροδῆς, δηλαδὴ ἀχαίνια.

Τὸ χρῶμα καὶ τὸ σαρκώδες καὶ σακχαροῦχον τῆς ἀνθοδόχης βοηθεῖ τὸ φυτὸν διὰ τὴν διασπορὰν τῶν σπερμάτων του· διότι πτηνὰ διάφορα ἐλκυόμενα ἐκ τοῦ χρώματος τῆς ἀνθοδόχης, πλησιάζουσι, τὴν τρώγουσι λόγῳ τῆς γλυκείας τῆς γεύσεως καὶ μαζὶ μὲ αὐτὴν καὶ τὰ ἐν-

τὸς αὐτῆς ἀχαίνια. Ταῦτα, ὡς ἀπεπτα, ἀποβάλλονται μὲ τὰ ἀπορρίμματα τοῦ πτηγοῦ καὶ, ἀν εὕρωσιν ἔδαφος κατάληκον, φύονται δίδοντα νέον φυτόν. Οὕτω γίνεται, μὲ τὴν μεσολάβησιν τῶν πτηγῶν, ἡ μεταφορὰ ἀπὸ τοῦ ἐνὸς εἰς ἄλλο μέρος καὶ διασπορὰ τῶν σπερμάτων τοῦ φυτοῦ τούτου καὶ ἡ διάδοσίς του.

"Ομοιον πρὸς τὴν φράσουλαν φυτὸν εἶναι :

'Η βάτος. 'Η βάτος εἶναι θάμνος κοινότατος εἰς τὴν Ἑλλάδα. Φέρει ἀκάνθας ὡς προφυλακτικὰ κατὰ τῶν φυτοφάγων ζώων. 'Ο βλαστός του εἶναι ἐσωτερικῶς ἀρκετὰ κοῦλος καὶ τὸ κοῦλον τοῦτο μέρος εἶναι πλῆρες ἀπὸ ἐντεριώνην (ψύχαν), διὰ τοῦτο εἶναι εὔθραυστος καὶ χρειάζεται πάντοτε ὑποστήριγμα διὰ νὰ στηρίζεται. Τὰ φύλλα του εἶναι σύνθετα ἐκ 3 ἢ 5 φυλλαρίων, τὰ ὅποια εἰς τὴν κάτω ἐπιφάνειάν των φέρουν ἀρκετὸν χροῦν. Τοῦτο ἐμποδίζει τὴν μεγάλην διαπνοήν, δεδομένου ὅτι ἡ βάτος πολλάκις φύεται εἰς μέρη ἔηρα (θράχους, τοίχους) ὅπου δὲν εὑρίσκει πολλὴν ποσότητα ὄδατος.

Τὸ ἄνθος εἶναι ὅμοιον πρὸς τὸ τῆς φράσουλας, ὁ καρπός, μοῦρον ἢ σμένιον, ἐπίσης. Ἐκεῖνο, τὸ ὅποιον ἡμεῖς λέγομεν καρπόν, τὸ μοῦρον δηλαδή, προέρχεται ἀπὸ τὴν ἐξόγκωσιν τῆς ἀνθοδόχης. Εἶναι κατ' ἀρχὰς πρασινωπὸν γινόμενον κατόπιν ἐρυθρὸν καὶ ὅταν ὠριμάσῃ τελείως, μέλαν, χυμῶδες καὶ γλυκύ. Οἱ πραγματικοὶ καρποὶ (ἀχαίνια) εἶναι τὰ εἰς τὸ ἐσωτερικὸν τοῦ χυμῶδους καὶ γλυκοῦ μέρους εὐρισκόμενα σκληρὰ σπέρματα. Τὸ μοῦρον τρώγεται ἀπὸ τὰ πτηγά μαζὶ μὲ τοὺς ἐντὸς αὐτοῦ καρπούς, οἱ ὅποιοι, ὡς ἀπεπτοι, ἀποβάλλονται μετὰ τῶν περιττωμάτων τοῦ πτηγοῦ· οὕτω διαδίδονται τὰ σπέρματα ἀπὸ ἐνὸς μέρους εἰς ἄλλο.

'Η φράσουλα καὶ ἡ βάτος συνενοῦνται ὑπὸ τὸ δνομα τῶν Χαμαικερασωδῶν.

### Ρ ο δ ώ δ η

Τὰ μηλεώδη, οἱ ἀμυγδαλίδαι, τὰ ροδοειδῆ καὶ τὰ χαμαικερασώδη παρουσιάζουν κοινὰ χαρακτηριστικά, τὰ ἔξης :

Κάλυκα πεντασέπαλον καὶ στεφάνην πενταπέταλον μὲ χωρισμένα τὰ πέταλά της.

Πολυαρίθμους στήμονας στερεωμένους ἐπὶ τοῦ κάλυκος καὶ τῶν ὅποιών οἱ ἀνθῆρες ἀνοίγουν πρὸς τὸ μέσα μέρος τοῦ ἀνθους.

'Αποτελοῦσι διὰ τοῦτο τὴν οἰκογένειαν τῶν Ροδωδῶν.

Διαφοράς παρουσιάζουν ως πρὸς τὰ φύλλα καὶ τὸν καρπόν των.

Τὰ ροδώδη ἔχουν ἄνθη μὲ πέντε πέταλα, πέντε σέπαλα, πολυαρίθμους στήμονας στερεωμένους ἐπὶ τοῦ κάλυκος· οἱ ἀνθῆρες ἀνοίγουν πρὸς τὸ μέσα μέρος τοῦ ἄνθους.

<i>Μηλεώδη</i>	<i>Ψευδὴς καρπός</i>	<i>Φύλλα ἀπλᾶ</i>
<i>Αμυγδαλίδαι</i>	<i>Καρπός δρύπη</i>	
<i>Ροδοειδῆ</i>	<i>Πολλαπλασιασμὸς μὲς παραφυάδας</i>	<i>Φύλλα σύνθετα</i>
	<i>Πολλαπλασιασμὸς μὲς βλαστοὺς ἔρποντας</i>	
<i>Χαμαικερασώδη</i>		<i>Καρπὸς συγκάρπιον</i>

### 3η Οίκογένεια : Μηκωνοειδῆ

#### ΜΗΚΩΝΗ ΡΟΙΑΣ

(κν. παπαρούνα)


Εἰναι φυτὸν ποδῶδες, μονοετές, μὲ βλαστόν, ὁ ὅποῖος διακλαδίζεται εὐθὺς μετὰ τὴν φίλαν. Τὰ φύλλα τῆς, βαθέος πρασίνου χρώματος, ἔκφύονται ἀνὰ ἔν, μεμονωμένα, καὶ εἰναι βαθέως ἐσχισμένα. Ὁ βλαστός, τὰ φύλλα τῆς καὶ ὁ ποδίσκος τῶν ἀνθέων σκεπάζονται ἀπὸ τρίχας σκληρᾶς ως μέσα προφυλακτικὰ κατὰ τῶν φυτοφάγων ζῷων.

"Ανθος. Τὰ ἄνθη ἔκφύονται ἀνὰ ἔν, μεμονωμένα. "Ἔχουσι κάλυκα μὲ 2 σέπαλα πράσινα καὶ χρυσοῦντα, τὰ ὅποῖα περιβάλλουσι τὸ ἄνθος πρὸ τοῦτο εἰσέτι ἀνοίξῃ (μπουμπούκι), πίπτουν δὲ εὐθὺς ως τοῦτο ἀνοίξῃ. Στεφάνην μὲ 4 ἑλεύθερα πέταλα, χρώματος λαμπροῦ ἐρυθροῦ μὲ μαύρην κηλεῖδα εἰς τὴν βάσιν των. Πολυχρίθμους στήμονας προσκεκολημένους ἐπὶ τῆς ἀνθοδόχης. "Εκαστος στήμων ἀποτελεῖται ἀπὸ λεπτὸν νῆμα, τὸ ὅποῖον τελειώνει εἰς χονδρὸν μαῦρον ἀνθηρα, ὅστις ἀνοίγει πρὸς τὸ ἐσωτερικὸν μέρος τοῦ ἄνθους.

"Ο ὑπερος ἀποτελεῖται ἀπὸ πολλὰ συνδεόμενα μεταξύ των καρπόφυλλα σχηματίζοντα ἐντὸς τοῦ καρποῦ διαφράγματα· τὰ διαφράγματα ὅμως ταῦτα δὲν προχωροῦν μέχρι τοῦ κέντρου (σχ. 45, Δ) εἰς τρόπον, ὥστε ἡ ἀωθήκη σχηματίζει ἔνα μόνον χῶρον (διαμέρισμα). Στῦλοι δὲν ὑπάρχουσι, τὸ δὲ στίγμα, πεπλατυσμένον, εὑρίσκεται εἰς τὸ ἐπάνω μέρος τῆς ἀωθήκης.

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Καρπός. Ὁ καρπός εἶναι ἔηρος, περιέχει πολλὰ σπέρματα καὶ ὅταν ὀριμάσῃ, ἀνοίγει καὶ ἀφίνει τὰ σπέρματα ἐλεύθερα. Λέγεται ὁ καρπός αὐτὸς καὶ ψυα, τὰ δὲ σπέρματα ἔξερχονται διὰ τῶν ὄπων, αἱ ὄποιαι ἀνοίγουσιν εἰς τὸ ἐπάνω μέρος τῆς κάψης. Ἡ παπαρούνα φύεται παντοῦ, προτιμᾶς ὅμως καὶ εὐδοκιμεῖ πολὺ εἰς ἐδάφη ἀσβεστολιθικά· διὰ τοῦτο παντοῦ τῆς Ἐλλάδος δυνάμεθα νὰ εὑρωμεν ἄφθονον



Σχ. 45. "Ανθος καὶ καρπός παπαρούνας.

Α ἄνθη, κλειστὸν καὶ ἀνοικτόν. Β τομὴ ἄνθους. 1 πέταλα. 2 στήμονες καὶ ἀνθήρες. 3 ὑπερος μὲ τὴν ὠθήκην. Γ καρπός. Δ τομὴ τοῦ καρποῦ.

τὸ φυτὸν τοῦτο, καθ' ὅσον τὸ ἐδαφος τῆς Ἐλλάδος εἰς τὴν μεγαλυτέρων του ἔκτασιν εἶναι ἀσβεστολιθικόν.

Χρησιμότης. Ἐὰν προστρίψωμεν ἐπὶ χάρτου ἡ τῆς χειρός μας πέταλα ἐκ τοῦ ἄνθους παπαρούνας, θὰ ἴδωμεν ὅτι ὁ χάρτης ἡ ἡ χειρός μας βάφονται ἐρυθρά. Τὰ πέταλα δηλαδὴ περιέχουσι χρωστικὴν οὐσίαν ἐρυθράν, ἥτις ἔξαγεται καὶ χρησιμοποιεῖται εἰς τὴν ζωγραφικὴν ἔξαγεται ἐπίσης ἀπὸ αὐτὰ ἔνα εῖδος σιροπίου, τὸ ὃποῖον εἶναι κατευναστικὸν τῶν πόνων.

Φυτὰ ὅμοια πρὸς τὴν παπαρούναν εἶναι :

**Μήκων ἡ ὑπνοφόρος.** Τὰ ἄνθη τῆς εἶναι λευκά. "Αν κάμωμεν εἰς τὸν καρπὸν τῆς, ὁ ὄποιος εἶναι ὅμοιος μὲ τὸν τῆς παπαρούνας πρὸ τῆς ὠριμάνσεώς του, τομὴν διὰ μαχαιριδίου, θὰ ἔδωμεν ὅτι ἔξερχεται ἀπὸ αὐτὸν ἐν γαλακτοῦχον ὑγρόν, τὸ ὄποιον στερεοποιεῖται εἰς τὸν ἀ-έρα. Τοῦτο λέγεται ὅπιον. Τὸ ὅπιον χρησιμοποιεῖται εἰς τὴν ἱατρικὴν ὡς κατευναστικὸν τῶν πόνων· ἡ χρῆσις του ὅμως πρέπει νὰ γίνεται μὲ προφύλαξιν, διότι εἰς μεγάλην δόσιν εἶναι δηλητήριον δραστικώτατον. Ἀπὸ τὸ ὅπιον ἔξαγεται ἐπίσης τὸ λαύδανον τῶν φαρμακείων, τὸ ὄποιον χρησιμοποιεῖται ὡς κατευναστικὸν τῶν πόνων, καὶ ἡ μορφίνη, ἥτις μὲ ἐνέσεις κάτω ἀπὸ τὸ δέρμα χρησιμοποιεῖται ὡς κατευναστικὸν μεγά- λων πόνων. Δυστυχῶς ὅμως συχνὴ χρῆσις ταύτης συνηθίζει τὸν δργα- νισμὸν τοῦ ἀσθενοῦς ὅστις, καὶ μετὰ τὴν ἀνάρρωσιν, θέλει νὰ χρησιμο- ποιῇ μορφίνην, γίνεται μορφινομανῆς καὶ καταλήγει σὺν τῷ χρόνῳ ἀπὸ τὴν χρῆσιν τῆς μορφίνης, εἰς ράκος σωματικῶς καὶ διανοητικῶς.

Εἰς τὴν Ἀνατολήν, καὶ ἴδιας εἰς τὴν Κίναν, καπνίζουν τὸ ὅπιον, ὅπως εἰς ἡμᾶς τὸν καπνόν· τοῦτο ὅμως, ὡς καὶ ἡ χρῆσις τῆς μορφίνης, ἔχουσιν ὡς ἀποτέλεσμα νὰ δημηγήσουν εἰς βέβαιον θάνατον, ἀφοῦ μετα- βάλουν πρῶτον τὸν ἄνθρωπον εἰς ράκος ἡθικῶς καὶ σωματικῶς.

"Η μήκων ἡ ὑπνοφόρος καλλιεργεῖται εἰς τὴν Μικρὰν Ἀσίαν, Περσίαν, Αἴγυπτον, Κίναν καὶ Ἰνδίας. Ἡ εἰσαγωγὴ τοῦ ὅπιου εἰς τὴν Ἑλλάδα (καὶ διαφόρους ἄλλας χώρας), λόγω τῶν καταστρεπτικῶν ἴ- διοτήτων του, καθὼς καὶ ἡ τῆς μορφίνης, εἶναι ἀπηγορευμένη καὶ ἡ πώ- λησις καὶ χρῆσις των (ἐκτὸς διὰ λόγους ἱατρικούς) τιμωρεῖται μὲ αὐ- στηρὰς ποινάς.

**Χελιδόνιον τὸ μέγα.** Φύεται ἐν Ἑλλάδι εἰς τὴν Αἰτωλίαν, τὴν Ἀκαρνανίαν καὶ τὴν Ἡπειρον. Λέγεται χελιδόνιον ἐκ τοῦ ὅτι ἀνθίζει μὲ τὴν ἄφιξιν τῶν χελιδόνων. Ἀπὸ τὸν καρπὸν καὶ τὰ φύλλα, ἀν τὰ χαράξωμεν, ἐκρέει ἄφθονος κίτρινος χυμός, ὁ ὄποιος θεραπεύει μίαν ἀσθένειαν τῶν ὀφθαλμῶν, τὴν ἀδενώδη βλεφαροφθαλμίαν· ἐπίσης ἔξα- λείφει καὶ τὶς κρεατοειδιές.

### Μηκωνοειδῆ

"Η μήκων ἡ ροιάς, ἡ μήκων ἡ ὑπνοφόρος, τὸ χελιδόνιον τὸ μέγα παρουσιάζουν κοινὰ χαρακτηριστικά, τὰ ἔξης :

Είναι φυτὰ ποώδη, μὲ γυμὸν γαλακτώδη, ἄνθη κανονικά, κάλυπτα δισέπαλον, στεφάνην τετραπέταλον μὲ ἵσα καὶ ἐλεύθερα πέταλα, πολυαριθμους στήμονας προσκεκοιλημένους ἐπὶ τῆς ἀνθοδόχης, οἱ ὄποιοι ἀνοίγουν πρὸς τὸ ἐσωτερικὸν τοῦ ἄνθους, καὶ καρπὸν καὶ ψανθόν.

’Αποτελοῦσι τὴν οἰκογένειαν τῶν Μηκωνοειδῶν.

#### 4η Οἰκογένεια : Μαλαχοειδῆ

##### ΜΑΛΑΧΗ Η ΑΓΡΙΑ

(κν. ἀγριομολόχα)


Είναι φυτὸν ποῶδες, μὲ βαθεῖαν ρίζαν, κυλινδρικὸν κορμὸν καὶ φύλλα μονήρη καὶ μακρόβιμα. Τὰ φύλλα ἔχουσι στρογγύλον ἔλασμα ἐσγισμένον εἰς 5 - 7 λοβούς καὶ πολυαριθμους τρίχας ιδίως ἐπὶ τῶν νεύρων των (σχ. 46).

”Ανθη. Τὰ ἄνθη τῆς εἶναι κανονικά, εύρισκονται δὲ εἰς τὴν μασχάλην τῶν φύλλων. Ἐχουσι κάλυκα μὲ 5 σέπαλα ἡνωμένα, τὰ ὄποια περιβάλλονται ἀπὸ μικρότερον κάλυκα ἐκ 3 φυλλαρίων· στεφάνην ἀπὸ 5 ἐλεύθερα πέταλα, συνήθως ἀνοικτοῦ ροδίνου χρώματος· πολυαριθμους στήμονας συνηγωμένους διὰ τῶν νημάτων των οὔτως, ὥστε νὰ ἀποτελοῦν ἔνα σωλῆνα, ἀπὸ τὸ μέσον τοῦ ὄποιου διέρχονται οἱ στῦλοι. Εἰς τὴν κορυφὴν τοῦ σωλῆνος τὰ νήματα διαχωρίζονται καὶ καταλήγουν ἐκαστον εἰς γονδρὸν κιτρινωπὸν ἀνθηρά (σχ. 46, Γ). Οἱ στήμονες προσκοιλλῶνται μὲ τὸ κάτω ἄκρον των εἰς τὴν ἀνθοδόχην. Οἱ ὑπερος ἔχει μίαν μόνον ἀσθήκην σχήματος στέμματος, ἡ ὄποια διαιρεῖται εἰς δώδεκα τελείως διαχωρισμένα διαμερίσματα. Οἱ στῦλοι εἶναι πολλοί, ἀλλὰ ἡνωμένοι καὶ αὐτοὶ οὔτως, ὥστε σχηματίζουν μίαν στήλην, ἡ ὄποια διέρχεται διὰ μέσου τοῦ σωλῆνος, τὸν ὄποιον σχηματίζουν οἱ στήμονες.

”Η κατ’ εὐθεῖαν γονιμοποίησις, ἡ αὐτεπικονίασις δηλαδή, εἰς τὴν μαλάχηγην καθίσταται ἀδύνατος, διότι οἱ ἀνθηρές ὀριμάζουν πρὸς ἐκδιπλωθῆν τὰ στήγματα. Διὰ τοῦτο ἡ μεταφορὰ τῆς γύρεως (ἐπικονίασις) γίνεται ἀπὸ τοῦ ἑνὸς ἄνθους εἰς τὸ ἄλλο διὰ τῶν ἐντόμων. Ταῦτα προσελκύονται ὑπὸ τοῦ ὀραίου καὶ ζωηροῦ χρώματος τῶν πετάλων τῶν ἀνθέων τῆς μαλάχηγης καὶ τὰ ἐπισκέπτονται διὰ νὰ φαγήσουν τὸ νέ-

κταρ· τὴν ἐπικονίασιν τοῦ εἰδους αὐτοῦ τὴν λέγομεν διασταυρωτὴν ἐπικονίασιν ( εἰδομεν ἀνωτέρω, σελ. 44, τὴν αὐτεπικονίασιν ).

**Κ αρ π ó ζ.** Ὁ καρπὸς εἶναι ἐν πολλαπλοῦ ἀχαίνιον ( μεριστόκαρπος ) καὶ περιέχει τόσα ἀχαίνια ὃσα χωρίσματα ἔχει ἡ ὠοθήκη· ὁ κάλυξ παραμένει εἰς τὴν βάσιν τοῦ καρποῦ ( σχ. 47 ).



**Σχ. 46. Μαλάχη ἡ ἀγρία.** Α Βλαστός. Β τομὴ ἄνθους. 1 σέπαλα, 2 ὠοθήκη, 3 στήμονες ἡνωμένοι ἀφήνουν νὰ διέλθωσι δι' αὐτῶν οἱ στῦλοι, τὰ στίγματα τῶν ὅποιων βλέπομεν εἰς τὴν κορυφήν. Δ οἱ στῦλοι οἱ ὅποιοι καταλήγουσιν εἰς τὴν ὠοθήκην, πέριξ αὐτῆς τὰ 5 ἡνωμένα σέπαλα καὶ γύρω ἀπὸ αὐτὰ τὰ 3 μικρότερα φυλλάρια τοῦ δευτέρου κάλυκος. Ε ὁ κάλυξ μὲ τὰ 5 ἡνωμένα σέπαλα.

Χρησιμότης. Τὰ ἄνθη καὶ τὰ φύλλα τῆς χρησιμοποιοῦνται, βραζόμενα, εἰς τὸ συνάχι καὶ τὴν βρογχίτιδα ὡς μαλακτικά.

"Ομοια φυτὰ εἶναι :

**Μαλάχη ἡ ἀλθαία** ( δενδρομολόχα ). Εἶναι φυτὸν ποῶδες μὲ ἀπλᾶ φύλλα, μαλακὰ καὶ χνουδωτὰ καὶ εἰς τὰς δύο των ὅψεις. "Εχει



Σχ. 47. Όλόκληρον άνθος και καρπός μαλάχης (μεριστόκαρπος).

Καλλιεργεῖται εἰς τὰς Ἰνδίας, Ἡνωμένας Πολιτείας, Αἴγυπτον. Παρ' ἡμῖν καλλιεργεῖται εἰς διάφορα μέρη, χυρίως δύμως εἰς Λεβάδειαν. Οἱ καρποὶ του εἶναι κάρπαι καὶ ἀνοίγουν εἰς τὰ πέντε. Περιέχουν ἀρκετοὺς σπόρους, ἔκαστος τῶν ὅποιών ἔχει ἵνας λευκὰς μήκους 5 ἐκατοστομέτρων. Ἀπὸ αὐτάς, ἀποχωριζόμενος μὲ εἰδικὰς μηχανάς, κατασκευάζεται ὁ βάμβαξ. Τὸ σπέρμα του περιέχει 15 - 18 τοῦς ἑκατὸν παχὺ ἔλαιον (βαμβακέλαιον). ἀπὸ ὃ, τι ἀπομένει μετά τὴν ἔξαγωγὴν τοῦ ἔλαιου τούτου κατασκευάζουν πλακοῦντας χρησιμοποιουμένους πρὸς διατροφὴν τῶν ζώων (βαμβακόπιτες).

ρίζαν μακρὰν καὶ σαρκώδην αὔτη, κοποτομένη εἰς τεμάχια, ἀποφλοιουμένη καὶ ξηραινομένη πωλεῖται εἰς τὰ φαρμακεῖα, χρησιμοποιεῖται δὲ διὰ γαργαρισμούς κ.λ.π. ὑπὸ τὸν ὄνομα ἀλθαία.

**Βάμβαξ** (σχῆμα 48). Φυτὸν τῶν θερμῶν καὶ ὑγρῶν χωρῶν.



Σχ. 48. Κλάδος βάμβακος μὲ ἄνθη καὶ καρπούς. Δεξιὰ ἐν σπέρμα βάμβακος μὲ τὰς ἵνας ποὺ τὸ περιβάλλουν.

’Ιβίσκος δέ έδωδιμος ( κν. μπάμια ). Ο καρπός της είναι κάψα φέρουσα πέντε χωρίσματα.

### Μ α λ α χ ο ει δ η

Η μαλάχη ή ἀγρία, ή ἀλθαία, ή βάμβαξ καὶ δὲ ιβίσκος παρουσιάζουν κοινὰ χαρακτηριστικά, τὰ ἔξης :

Φύλα μεμονωμένα μὲν νεύρωσιν ἀκτινωτήν.

Κάλυκα πεντασέπαλον, στεφάνην πενταπέταλον μὲ ἐλεύθερα πέταλα, πολυαρίθμους στήμονας ἡνωμένους κατὰ τὸ πλεῖστον μέρος τῶν διὰ τῶν νημάτων τῶν εἰς σωλῆνα.

Καρπὸν μεριστόκαρπον η κάψαν.

Αποτελοῦσι τὴν οίκογένειαν τῶν Μαλαχοειδῶν.

### 5η Οίκογένεια : Σ κι α δ α ν θ η

#### Δ Α Υ Κ Ο Σ Ο Κ Α Ρ Ω Τ Ο Σ

Ἐχομεν τὸ αὐτοφυὲς φυτὸν ( ἀγριοκαρπό ) καὶ τὸ καλλιεργούμενον ( σχ. 49 ). Η ρίζα τοῦ καλλιεργουμένου καρώτου, προχωροῦσα βαθέως ἐντὸς τοῦ χώματος, είναι χονδρή καὶ σαρκώδης ( σχ. 49 ). Τὰ φύλα είναι βαθέως ἐσχισμένα καὶ ἀντίθετα, ἐκφύονται δηλαδὴ ἀνὰ δύο, τὸ ἐν ἀπέναντι τοῦ ἄλλου.

Ο βλαστὸς είναι βραχύς κοῦλος καὶ φέρει αὐλακας εἰς τὴν ἐπιφάνειάν του ( ραβδωτός ). Τὰ φύλα καὶ οἱ βλαστοὶ ἔχουσι χυμὸν ἀρωματικόν.

Α ν θ η . Τὰ ἄνθη είναι λευκά, μικρὰ καὶ πολλὰ μαζί. Ο κύριος ποδίσκος, ἀπὸ τοῦ ὅποιου ἐκφύονται ὅλα τὰ ἄνθη, διαιρεῖται εἰς πολυαρίθμους δευτερεύοντας, οἱ ὅποιοι πάλιν διαικλαδίζονται εἰς μίαν τεσσαρακοντάδα διαικλαδώσεων ( ἀκτίνων ), ἐκάστη τῶν ὅποιων φέρει ἐν ἄνθοις ( σχ. 50 ). Τὸ σύνολον τῶν εἰς ἔκαστον ἐκ τῶν δευτερευόντων ποδίσκων διαικλαδώσεων ἀποτελεῖ ἐν σκιάδιον ( ὅμβρέλλαν ) ( σχ. 51 ), ἐξ αὐτοῦ δὲ καὶ τὸ ὅνομα τῶν φυτῶν. Τὰ ἄνθη είναι τόσον μικρά, ὥστε διὰ νὰ τὰ ἔξετάσῃ κανεὶς πρέπει νὰ τὰ παρατηρήσῃ μὲ φακόν. Ἐχουσι κάλυκα μὲ 5 σέπαλα ἡνωμένα κατὰ τὴν βάσιν των, στεφάνην μὲ 5 πέταλα ἐλεύθερα, ἐπίσης 5 στήμονας κατ' ἐναλλαγὴν μὲ τὰ πέταλα. Ο


ύπερος ἔχει μίαν ώσθήκην ( τελείως ἡνωμένην μὲ τὸν κάλυκα καὶ τὴν στεφάνην ) ἀποτελουμένην ἀπὸ δύο ἡνωμένα καρπόφυλλα, δύο στύ-




Σχ. 49. Δαῦκος ὁ καρῶτος  
( καρῶτο )



Σχ. 50. Λανθιοφόρος βλαστὸς  
καρώτου



Σχ. 51. Σκιάδιον  
( σχηματικὴ παράστασις )



Σχ. 52. Καρπὸς καρώτου  
( διαχαίνειν )

λους, οἱ δόποῖοι τελειώνουν εἰς δύο στίγματα στρογγύλα, καὶ δύο χώρους μὲ ἐν δάριον εἰς ἔκαστον χῶρον.

Καρπός. Ὁ καρπὸς ( σχ. 52 ) ἀποτελεῖται ἀπὸ δύο ἀχαίνια ( διαχαίνιον ) κροσσωτά, προσκεκολημένα εἰς ἐν ὑποστήριγμα σχήματος Υ.

"Ομοια πρὸς τὸν δαῦκον φυτὰ εἶναι :

**Τὸ μάραθον.** "Εχει ἄνθη κίτρινα καὶ ἀρωματικὰ σπέρματα ( μαραθόσπορος ).

Τὸ ἄνισον ( κν. γλυκάνισον ). Τὰ σπέρματά του, πολὺ ἀρωματικά, χρησιμοποιοῦνται εἰς τὴν ἀρωματοποίην καὶ τὴν κατασκευὴν γλυκισμάτων καὶ ποτῶν ( ίδιως τίθενται εἰς τὸ ρακί ). Ἀπὸ αὐτὰ ἔξαγεται εἶδος ἐλαίου, τὸ λεγόμενον ἀνισέλαιον.

Τὸ πετροσέλινον ( κν. μαΐντανδος ) καὶ τὸ σέλινον.

### Σ κι α δ α ν θ ᾧ

"Απαντα τὰ ὡς ἄνω φυτὰ ἔχουσι χυμὸν ἀρωματικόν, φύλλα βαθέως ἐσχισμένα, ἐκφυόμενα μεμονωμένως, καὶ πολυάριθμα μικρὰ κανονικὰ ἄνθη, σγηματίζοντα ἐν σύνθετον σκιάδιον. "Εχουσι κάλυκα μὲ πέντε ἡνωμένα σέπαλα καὶ στεφάνην μὲ πέντε ἐλεύθερα πέταλα. Ἀποτελοῦσι τὰ φυτὰ ταῦτα τὴν οἰκογένειαν τῶν Σκιαδανθῶν.

Εἰς τὰ σκιαδανθῆ ἀνήκει καὶ τὸ κώνειον, τὰ φύλλα καὶ ὁ βλαστὸς τοῦ ὄποιού ἔχουσιν ὡς προφυλακτικὸν κατὰ τῶν φυτοφάγων ζώων ἵσχυρότατον δηλητήριον.

### 6η Οἰκογένεια : Καρυοφυλλάδη


#### ΔΙΑΝΘΟΣ Ο ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΟΣ

( κν. γαρυφαλλιά )

'Ο δίανθος εἶναι φυτὸν ποῶδες, πολυετές, μὲ βλαστὸν ἔξογκωμένον εἰς τὰ γόνατα καὶ φύλλα ἀντίθετα ( φύσμενα δηλ. ἀνὰ δύο, τὸ ἐν ἀπέναντι τοῦ ἄλλου ), στενά, ἡνωμένα μὲ τὰς βάσεις των, αἱ ὄποιαι περιβάλλουν τὸν βλαστόν. Τὰ φύλλα εἶναι στενά, ὥστε ἡ διαπνοὴ νὰ μὴ εἶναι μεγάλη. "Εχει ρίζας, αἴτινες προχωροῦν βαθέως, διὰ νὰ εύ-

ρίσκουν οὐδωρ ἐντὸς τοῦ χώματος, καὶ ἄλλας εἰς τὴν ἐπιφάνειαν, διὰ νὰ ἀπορροφοῦν τὴν ὑγρασίαν ἀπὸ τὴν ἀτμόσφαιραν. Αἱ βαθεῖαι ρίζαι του καὶ τὰ στενά του φύλλα κάμνουσι τὸν δίανθον νὰ δύναται νὰ ἀντέχῃ εἰς τὴν ἔηρασίαν.

"Ανθη. Τὰ ἄνθη ἔχουν συνήθως χρῶμα λευκόν, ἐρυθρὸν ἢ πορφυροῦν, ἀλλὰ καὶ διάφορα ἄλλα χρώματα, τὰ ὅποια ἡ ἀνθρωπος κατώρθωσε νὰ ἐπιτύχῃ διὰ τῆς καλλιεργείας. "Έχουσι κάλυκα μὲ πέντε σέπαλα ἡνωμένο εἰς τρόπον, ὥστε ἀποτελοῦν σωλῆνα. Στεφάνην ἀπὸ πέντε ἐλεύθερα πέταλα, τὰ ὅποια εἰς τὴν βάσιν των ἐπιμηκύνονται καὶ



**Σχ. 53.** Τομὴ ἄνθους διάνθου. 1 καὶ 4 στῦλοι. 2 πέταλον. 3 στήμονες. 5 κάλυξ. 6 ὠθήκη μὲ τὰ ἐντὸς αὐτῆς ωάρια

**Σχ. 54.** Ἀριστερά, ἄνθος διάνθου. Εἰς τὸ μέσον, ὑπερος μὲ τοὺς δύο στῦλους καὶ τὴν ὠθήκην μὲ τὰ ἐντὸς αὐτῆς ωάρια. Δεξιὰ καρπός.

στενοῦνται (σχ. 53). Δέκα στήμονας προσκεκολημένους εἰς τὴν ἀνθοδόχην. "Τερον ἀπὸ δύο καρπόφυλλα, τὰ ὅποια ἡνωμένα σγηματίζουν ὠθήκην μὲ ἔνα χῶρον καὶ δύο στῦλους κεκαμμένους εἰς τὸ ἄνω μέρος των πρὸς τὰ ἔξω.

Καρπός. Ὁ καρπός, κάψα, ἀνοίγει εἰς τὸ ἄνω του μέρος μὲ ἔν ανοιγμα ὁδοντωτόν, ἀπὸ τὸ ὅποιον ἔξερχονται τὰ σπέρματα (σχ. 54).

Ο δίανθος ὁ καρυόφυλλος καλλιεργεῖται εἰς τοὺς κήπους ἢ εἰς

τὰς γλάστρας διὰ τὸ ἄρωμα καὶ τὸ χρῶμα τῶν ἀνθέων του. Μὲ τὴν καλλιέργειαν κατωρθώθη νὰ πολλαπλασιασθῶσι τὰ πέταλά του καὶ νὰ λάβουν πολυποικίλα χρώματα. Ἀπὸ τὰς λαϊκὰς τάξεις καλλιεργεῖται κυρίως ἡ παραλλαγή, ἡ ὅποια ἔχει αἰματόγροα, πολυπέταλα, εὐσμούτατα ἄνθη. "Ομοια πρὸς τὸν δίανθον τὸν καρυόφυλλον φυτὰ εἶναι :

**Αγρόστεμμα τὸ κοινὸν** ( κν. γόγγολη ἢ κόκολη ). Ποῶδες φυτόν, ἄφθονον εἰς τοὺς σιταγρούς. "Εχει ἄνθη ώραίου ροδίου χρώματος μὲ κάλυκα ἀπὸ 5 σέπαλα ἡνωμένα εἰς τὴν βάσιν καὶ ἐπικηρυκόμενα πρὸς τὰ ἄνω μὲ μικρὰς προεξοχάς· τὸ σπέρμα εἶναι μικρόν, σφαιροειδὲς καὶ ὑπομέλαν.

**Σαπωναρία ἡ φαρμακευτικὴ** ( κν. σαπουνόχορτο ). Τὰ φύλλα καὶ ἡ ρίζα τῆς περιέχουσι μίαν ούσιαν καλουμένην σαπωνίην καὶ χρησιμοποιοῦνται διὰ τὴν πλύσιν μαλλίνων καὶ μεταξωτῶν ὑφασμάτων. Αἱ ρίζαι τῆς φέρονται εἰς τὸ ἐμπόριον ὑπὸ τὸ ὄνομα τσουένι.

### Κ α ρ υ ο φ υ λ λ ω δ η

"Ο δίανθος ὁ καρυόφυλλος, τὸ ἀγρόστεμμα, ἡ σαπωναρία παρουσιάζουν κοινὰ χαρακτηριστικά, τὰ ἔξης :

Βλαστὸν μὲ ἔξογκωμένα γόνατα, φύλλα ἀντίθετα, ἄνθη κανονικὰ μὲ κάλυκα ἀπὸ 5 πέταλα, δέκα στήμονας, ώθηκην μὲ μίαν θέσιν καὶ καρπὸν κάψαν.

'Αποτελοῦσι τὴν οίκογένειαν τῶν *Καρυοφυλλωδῶν*.

### 7η Οίκογένεια : Γ ε ρ α ν ι ω δ η

#### Γ E R A N I O N T O E Y O S M O N

( κν. ἀρμπαρόρριζα )

Εἶναι τὸ κοινότερον εἰς τὴν Ελλάδα ἐκ τῆς οίκογενείας τῶν γερανιωδῶν, τὰ ὅποια εἶναι φυτὰ τῶν θερμῶν χωρῶν. Καλλιεργεῖται εἰς γλάστρας καὶ εἰς κήπους διὰ τὰ φύλλα του τὰ ὅποια πεντάλοβα ἢ τρί-

λοιβα, ὀδοντωτὰ καὶ βαθέως κολπωτά, εἶναι λίγη εὔσημα. Τὰ ἄνθη του ἔχουσι κάλυκα μὲ 5 σέπαλα ἐλεύθερα, στεφάνην μὲ 5 πέταλα ἐλεύθερα, δέκα στήμονας, ὅπερον ἀπὸ πέντε καρπόφυλλα διακρινόμενα ἀπ' ἀλλήλων ἔξωθεν, μίαν ὀσθήκην μὲ πέντε θέσεις καὶ πέντε στύλους ἡνωμένους μεταξύ των.

Ο καρπός εἶναι κάψα.

Φυτὰ ὅμοια πρὸς τὸ γεράνιον, εἶναι τὸ **Πελαργόνιον** καὶ ἡ **Οξαλίς** (κν. ξυνόχορτο), ζιζάνιον κοινότατον εἰς τοὺς ἀγροὺς καὶ δυσεξόντωτον.

Τὰ ἀνωτέρω φυτὰ ἀποτελοῦσι τὴν οἰκογένειαν τῶν *Γερανιωδῶν*.

"Ομοια πρὸς τὰ γερανιώδη εἶναι τὰ **Λινώδη**. Σπουδαιότερον ἐκ τούτων εἶναι τὸ **Λίνον** (κν. λινάρι) (σχ. 55). Εἶναι φυτὸν ποῶδες καὶ ἑτήσιον. Ἐχει ἄνθη κυανᾶ, διατεταγμένα κατὰ κορύμβους, μὲ 5 σέπαλα, 5 πέταλα καὶ 5 στήμονας ἔκαστον· τὰ καρπόφυλλα εἶναι 5 τὸν ἀριθμὸν (ὅπως καὶ εἰς τὰ Γερανιώδη). Ο βλαστός του εἶναι λινώδης καὶ ἐκ τῶν ἴνῶν του, διὰ καταλλήλου ἐπεξεργασίας, ἔξαγονται νήματα, ἐκ τῶν ὅποιων κατασκευάζονται λινὰ ἐνδύματα. Ο καρπός του εἶναι κάψα, τὰ δὲ ἐντὸς αὐτοῦ σπέρματα (ό κοινὸς λιναρόσπορος) δίδουν εἰδος ἐλαίου, τὸ λεγόμενον λινέλαιον, χρήσιμον διὰ τὴν κατασκευὴν σαπώνων, τυπογραφικῆς μελάνης, χρωμάτων καὶ βερνικίων. Τὰ



Σχ. 55. Λίνον (λινάρι)

σπέρματα κοπανιζόμενα χρησιμοποιοῦνται εἰς τὴν ἰατρικὴν διὰ τὴν κατασκευὴν καταπλασμάτων.

8η Οίκογένεια : 'Ιώδη  
ΙΟΝ ΤΟ ΕΥΟΣΜΟΝ


( κν. γιούλι, ή μενεζές )

Τὸ ἵον κοινὸν εἰς τοὺς ἀγροὺς ὡς ἄγριον, καλλιεργεῖται ὡς ἥ-  
μερον εἰς τοὺς κήπους ( σχ. 56 ). Τὰ ἄνθη του εἶναι συνήθως κυανᾶ,  
ἰώδη ή λευκά, ὁ ἄνθρωπος ὅμως ἐπέτυχε διὰ τῆς καλλιεργείας ἄνθη μὲ  
πέταλα διαφόρων χρωματισμῶν. Εἶναι φυτὸν ποῶδες καὶ πολυετές, φέ-  
ρον παχύν καὶ σκληρὸν ὑπόγειον βλαστόν, βλαστὸν δηλαδὴ ὁ ὄποιος εύ-



Σχ. 56. "Ιον τὸ ευοσμον ( μενεζές )

ρίσκεται ἐντὸς τοῦ χώματος καὶ τὸν ὄποιον λέγομεν ρίζωμα. Ἐκ τού-  
του κατ' ἔτος καὶ κατὰ τὴν ἄνοιξιν ἐκφύονται φύλλα καὶ ἄνθη. Τὰ ἄνθη  
εἶναι μεμονωμένα· ἔχουσι κάλυκα ἀπὸ 3 ἵσα σχεδὸν μεταξύ των σέπα-  
λα, στεφάνην ἀκανόνιστον ἀπὸ 5 ἄνισα, ἀλλὰ ἐλεύθερα πέταλα, καὶ 5  
στήμονας· ἀπὸ τούτους οἱ δύο κατώτεροι προεκτείνονται καὶ σχηματί-  
ζουν οὐράν, ἥτις εἰσχωρεῖ εἰς καιλότητα σχήματος κέρατος, τὴν ὄποιαν  
σχηματίζει τὸ κατώτερον πέταλον. Ἐντὸς τοῦ κέρατος αὐτοῦ συλλέγε-  
ται τὸ νέκταρ, τὸ ὄποιον ἐκχρίνουσιν οἱ δύο στήμονες· οὕτω τὸ νέκταρ  
προφυλάσσεται ἀπὸ τὴν βροχὴν ( σχ. 57 ). Μὲ τὸ χρῶμα των καὶ τὴν  
ἴσμήν των τὰ ἄνθη προσελκύουσι τὰ ἔντομα, ιδίως τὰς μελίσσας, τὰ  
ὄποια παραλαμβάνοντα εἰς τὰς τρίχας τῶν ποδῶν των καὶ τὴν πρ-



**Σχ. 57.** 1 καὶ 2 ἄνθη τοῦ τοῦ εὐόσμου εἰς ταῦτα φαίνεται τὸ κέρας, ἐντὸς τοῦ ὁποίου συλλέγεται τὸ νέκταρ. 3 καρπὸς ἀνοιγμένος εἰς τὰ τρία· εἰς ἔκαστον τῶν

ἀνοιγμάτων φαίνονται τὰ σπέρματα.

βιοσκίδα των γῦριν ἔξ ἑνὸς ἄνθους, τὴν μεταφέρουσιν εἰς ἄλλο ἄνθος, εἰς τὸ ὅποιον θὰ μεταβοῦν πρὸς ἀναζήτησιν νέκταρος καὶ τὸ ὅποιον οὕτω γονιμοποιοῦσι ( διασταυρωτὴ ἐπικονίασις ).

Ο ὕπερος ἔχει μίαν ὠθήκην μὲ 3 καρπόφυλλα καὶ ἔνα στῦλον, ὅστις εἰς τὸ ὄκρον του κυρτοῦται.

Ἐκ τῆς ὠθήκης σχηματίζεται καρπὸς κάψα, μικρός, ἔηρός, ἔξωθι τοῦ ὁποίου διακρίνονται κατὰ μῆκος τρεῖς ραφαί, προερχόμεναι ἀπὸ τὴν σύνθεσιν τῶν τριῶν καρποφύλλων. Κατὰ μῆκος τῶν χειλέων τῶν καρποφύλλων στερεώνονται, μὲ βραχεῖς ίμάντας, πολυάριθμα σπέρματα. Οταν ὁ καρπὸς ὡριμάσῃ, τὰ καρπόφυλλα σχίζονται κατὰ τὴν θέσιν τῶν ραφῶν καὶ τὰ σπέρματα ἐκ τῶν τριῶν σχισμῶν ἐκτινάσσονται μακρὰν καὶ οὕτω διαδίδεται τὸ φυτόν.

"Ομοιον φυτὸν εἶναι τὸ **"Ιον τὸ τρίχρουν** ( κν. πανσές ).

Τὸ ἵον τὸ εὔσομον καὶ τὸ ἵον τὸ τρίχρουν εἶναι φυτὰ ποώδη, πολυετῆ, χάρις εἰς τὸ φίλωμα τὸ ὁποῖον ἔχουν. "Εχουσιν ἄνθη μὲ 5 πέταλα, 5 στήμονας, ὕπερον ἀπὸ 3 καρπόφυλλα καὶ καρπὸν κάψαν.


"Αποτελοῦσι τὴν οἰκογένειαν τῶν **'Ιωδῶν**.

9η Οικογένεια : Σ τα υρανθή

ΚΡΑΜΒΗ Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗ

Τυπάρχουν διάφοροι παραλλαγαί κράμβης, τὰς ὁποίας ἐπέτυχεν ὁ ἀνθρωπὸς μὲ τὴν καλλιέργειαν. Προέρχονται ὅλαι ἀπὸ τὴν κράμβην τὴν ἀγρίαν, ἡ οἱ φύεται αὐτοφυῆς εἰς τὰς ἀκτὰς τῆς μεσημβρινῆς Εὐρώπης. Τοιαῦται παραλλαγαὶ εἶναι :

**Κράμβη ἡ κεφαλωτὴ** (κν. λάχανο) (σχ. 58). Εἶναι φυτὸν ποδῶν, διετές. Ἡ ρίζα του ἔχει ἀναρίθμητα ριζίδια· ὁ κορμὸς εἶναι βρα-



Σχ. 58. Κράμβη ἡ κεφαλωτὴ (λάχανο) καὶ Ἀνθοκράμβη (κουνουπίδιο)

χύς, στερεός, καταλήγει δὲ εἰς τὸ ἄκρον του εἰς ἔνα ὀφθαλμὸν ἀκραῖον, ὃ ὁποῖος ἔχει πολλὰ καὶ μεγάλα φύλλα, περικλειόμενα τὸ ἐν ἐντὸς τοῦ ἄλλου· τὰ ἐσωτερικὰ φύλλα εἶναι λευκὰ καὶ τρυφερά, ἐνῷ τὰ ἔξωτερικὰ εἶναι πράσινα καὶ φέρουσιν ἔξωθεν μίαν οὔσιαν κηρώδη διὰ νὰ προφύλασσον τὰ ἐσωτερικὰ φύλλα ἀπὸ τὸ ὄδωρο καὶ τὴν ὑγρασίαν. Τὰ φύλλα τῆς κράμβης εἶναι σαρκώδη, διότι τὸ φυτὸν ἐναποθέτει εἰς αὐτὰ κατὰ τὸ πρῶτον ἔτος θρεπτικὰ συστατικά, τὰ ὁποῖα χρησιμοποιεῖ κατὰ τὸ δεύτερον ἔτος διὰ τὴν κατασκευὴν ἀνθέων καὶ καρπῶν.

Τὰ σπέρματά του σπείρονται κατὰ τὸν Μάρτιον ἢ Σεπτέμβριον ἐντὸς εἰδικῶν χώρων, καλῶς ἐσκαμμένων καὶ λιπασμένων, οἵτινες καλοῦνται πρασιά. Μόλις φυτρώσουν καὶ ἀποκτήσουν 3-4 φύλλα γίνεται ἡ μεταφύτευσις. Τοποθετοῦνται κατὰ σειρὰν εἰς ἀπόστασιν 12 ἑκατοστομ. τὸ ἐν φυτὸν ἀπὸ τοῦ ἄλλου, καὶ 45 ἑκατοστομ. ἡ μία σειρὰ ἀπὸ τῆς ἄλλης. Τὰ τακτικὸν πότισμα βοηθεῖ πολὺ τὴν ἀνάπτυξίν των.

Ἐκεῖ αὐξάνονται κατὰ τὴν φίλαν, τὸν βλαστὸν καὶ ιδίως τὸν ἀκραῖον ὀφθαλμόν, τοῦ ὁποίου τὰ φύλλα γίνονται μεγάλα καὶ παχέα λόγῳ τῶν θρεπτικῶν συστατικῶν, τὰ ὄποια ἐναποθηκεύει εἰς αὐτὰ τὸ φυτόν. Σχηματίζεται οὕτω κατὰ τὸ πρῶτον ἔτος ἔνας ἀκραῖος ὀφθαλμὸς ἀπὸ παχέα φύλλα διατεταγμένα τὸ ἐν ἐντὸς τοῦ ἄλλου ἐν εἰδεῖ κεφαλῆς, τὸ κοινῶς λεγόμενον λάχανο, ὁ ὄποιος χρησιμοποιεῖται ως τροφὴ ἀπὸ τὸν ἄνθρωπον.

"Αν ἀφήσωμεν τὸ φυτὸν χωρὶς νὰ τὸ κόψωμεν, τότε τὴν ἑπομένην ἄνοιξιν ἐκ τοῦ ἀκραίου ὀφθαλμοῦ, ὁ ὄποιος εὐρίσκεται εἰς τὸν κέντρον τῶν φύλλων, βλαστάνει βλαστὸς ὕψους 60 - 70 ἑκατοστομέτρων, μὲ νέα φύλλα, ἐναλλάξ διατεταγμένα. Τὰ παλαιὰ φύλλα μαραίνονται καὶ πίπτουν.



Σχ. 59. Καρπὸς κράμβης (ἀριστερά) καὶ βλαστὸς κράμβης μὲ ἄνθη καὶ καρποὺς (δεξιά).

"Αν θη. Απὸ τὴν μασχάλην τῶν φύλλων τοῦ βλαστοῦ τούτου βλαστάνουν ἄνθη κιτρίνου χρώματος, πολλὰ ὅμοι, ὡστε νὰ σχηματίζουν ἔνα βότρυν. "Εχουσι κάλυκα μὲ 4 ἐλεύθερα σέπαλα, στεφάνην μὲ 4 ἐλεύθερα πέταλα, διατεταγμένα εἰς σχῆμα σταυροῦ ( ἐξ οὗ καὶ τὸ ὄνομα σταυρανθῆ ), ἐξ στήμονας, ἀπὸ τοὺς ὄποιους οἱ 4 εἰναι μεγάλοι καὶ οἱ 2 μικροί, καὶ ὑπερον ἀπὸ 2 καρπόφυλλα, ἡνωμένα πρὸς μίαν ὠθήκην ἔχουσαν 2 χώρους, οἱ ὄποιοι χωρίζονται μὲ ἐν διάφραγμα.

Καρπός. Ο καρπὸς εἶναι ὅμοιος μὲ τὸν καρπὸν τοῦ φασιόλου, ἀλλὰ φέρει εἰς τὸ ἐσωτερικόν του ἐν χωρισμα, τὸ ὄποιον τὸν χωρίζει κατὰ μῆκος εἰς δύο· λέγεται διὰ τοῦτο κερατίον. "Οταν ὀριμάσῃ, σχίζεται ἐκ τῶν κάτω πρὸς τὰ ἄνω εἰς δύο καὶ τὰ σπέρματα φαίνονται προσκεκολλημένα δεξιὰ καὶ ἀριστερὰ τοῦ χωρίσματος ( σχ. 59 ).


Ανθοκράμβη (κουνουπίδι). Αποθηκεύει θρεπτικὰ συστατικὰ εἰς τοὺς ἀνθοφάρους ὀφθαλμοὺς καὶ τοὺς πιοδίσκους ἐκ τῶν ὄποιων οὗτοι

έκφύονται. Διὰ τοῦτο τοὺς ποδίσκους καὶ τοὺς ἀγθοφόρους ὀφθαλμοὺς τοὺς τρώγομεν (σχ. 58).

**Γογγυλοκράμβη** (γογγύλιον), ητὶς ἔχει ὡς ἀποθήκην τὸν βλαστόν, ὁ ὄποιος λόγῳ τῆς εἰς αὐτὸν ἐναποθηκεύσεως τῶν θρεπτικῶν συστατικῶν, ἔξογκοῦται καὶ γίνεται σαρκώδης καὶ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον στρωγγύλος (σχ. 60).

### Κράμβη ἡ ραπυοφόρος (ρέβα).

Ἐγθρὸιν τῆς κράμβης εἶναι ἡ πιερὶς τῆς κράμβης (λευκὴ πεταλούδα). Αὕτη γεννᾷ τὰ ὡὰ τῆς ἀπὸ τοῦ Ἀπριλίου, 400 - 500 τὸν ἀριθμόν, ἐπάνω εἰς τὰ φύλλα τῆς κράμβης ἀπὸ τὰ ὡὰ αὐτὰ ἔξερχονται σκώληκες τριχωτοί, κάμπται, αἱ ὄποιαι κατατρώγουν τὰ φύλλα τῆς κράμβης.



Σχ. 60. Γογγυλοκράμβη  
(γογγύλιον)

Σχ. 61. Ραφανίς  
(ραπάνι)

Ἐγθρὸς τῆς κράμβης εἶναι ἐπίσης ὁ γυμνοσάλιαγκας, ὁ ὄποιος κατατρώγει τὰ φύλλα τῆς.

Φυτὰ ὅμοια πρὸς τὴν κράμβην εἶναι :

### Ραφανίς ἡ ἥμερος (κν. ραπάνι) (σχ. 61).

Τὸ σινάπι τὸ λευκὸν καὶ τὸ σινάπι τὸ μέλαν (κν. σινάπια). Καλλιεργοῦνται ὡς λαχανικά, κυρίως ὅμως διὰ τὰ σπέρματά των, τὰ ὄποια κονιοποιούμενα καὶ ἀναμιγνυόμενα μὲ δῆσος δίδουν τὴν γνωστὴν μουστάρδαν (λευκὸ σινάπι). Τὰ σπέρματα τοῦ μέλανος σινάπεως χρησιμοποιοῦνται διὰ τὴν κατασκευὴν σιναπισμῶν εἰς τὴν ιατρικήν, διότι λόγῳ τῆς ἐρεθιστικῆς των ἰδιότητος προσελκύουν τὸ αἷμα πρὸς τὸ δέρμα.

**Τὸ κάρδαμον.** Φύεται μόνον του εἰς ὑγροὺς τόπους περιέχει ἱώδιον, σίδηρον καὶ φωσφόρον καὶ διὰ τοῦτο ἔχει ἰδιότητας καθαρικὰς καὶ ἀντισκορβουτικάς. (Τὸ σκορβοῦτον εἶναι μία ἀσθένεια, ἡ ὄποια προσβάλλει τοὺς ἐπὶ μακρὸν χρόνον τρεφομένους μὲ διατηρημένας τροφὰς ναυτικούς, ἔξερευνητάς, κ.λ.π.: εἶναι νόσος ὀδυνηρὰ καὶ ἐπικινδυνος).

## Σ τ α ν ρ α ν θ ḡ

Τὰ διάφορα εἰδη τῶν κραμβῶν, ἡ ραφανίς, τὸ σπανάκι καὶ τὸ κάρδαμον ἔχουσι καὶνὰ χαρακτηριστικά, τὰ ἑξῆς:

"Ἐχουσιν ἄνθος κακνοικὸν μὲ 4 σέπαλα καὶ 4 πέταλα ἐλεύθερα καὶ διατεταγμένα ἐν εἴδει σταυροῦ, 6 στήμονας ( 4 μεγάλους καὶ 2 μικρούς ), μίαν ὠσθήκην μὲ 2 θέσεις χωριζομένας διὰ διαφράγματος, καὶ καρπὸν κεράτιον.

'Αποτελοῦσι τὴν οίκογένειαν τῶν Σταυραθῶν ( ἐκ τῶν πετάλων τοῦ ἄνθους των, τὰ ὅποια σχηματίζουν σταυρόν ).

### 10η Οίκογένεια : Ἀ μ π ε λ ι δ ὀ δ η

#### Α Μ Η Ε Λ Ο Σ

'Αμπέλου ὑπάρχουν ὑπὲρ τὰς 2000 παραλλαγαὶ ( εἰς τὴν Ἑλλάδα ἐμετρήθησαν ὑπὲρ τὰς 480 ), αἱ ὅποιαι διακρίνονται μεταξύ των ἐκ τοῦ μεγέθους καὶ τοῦ χρώματος τῶν φύλλων, ἀλλ᾽ ίδιως ἐκ τοῦ σχήματος καὶ τοῦ χρώματος τῶν ραγῶν τῆς σταφυλῆς. Κοινότεραι διὰ τὴν Ἑλλάδα παραλλαγαὶ εἰναι ὁ φοδίτης, τὸ φιλέρι, τὸ μοσχᾶτο, τὸ ἐφτάκιλο, τὸ ραζακί, ἡ φράουλα, τὸ ἀετονύχι, τὸ αὐγονήλατο, τὸ σαββατιανὸν κ.λ.π.

Αἱ παραλλαγαὶ τῆς ἀμπέλου διαιροῦνται κυρίως εἰς δύο ὄμάδας· εἰς ἑκείνας τῶν ὅποιων αἱ σταφυλαὶ δι' ἐκθλίψεως δίδουν γλεῦκος καὶ ἐκ τούτου σχηματίζεται διὰ ζυμώσεως οἶνος, ἄμπελος ἡ οἰνοφόρος· καὶ ἑκείνας ἐκ τῆς ἀποξηράνσεως τῶν σταφυλῶν τῶν ὅποιων προέρχεται ἡ σταφίς, σταφιδάμπελος.

'Η ἄμπελος ἐκαλλιεργεῖτο ἀνὰ τὴν Μεσημβρινὴν Εὐρώπην καὶ εἰς πολλὰ μέρη τῆς Ἀσίας καὶ τῆς Β. Ἀφρικῆς ἀπὸ παλαιοτάτων χρόνων. Εἰς τὴν Αἴγυπτον ἀπὸ τῆς 5ης π.Χ. χιλιετηρίδος. "Ηδη καλλιεργεῖται καὶ εἰς τὴν Ἀμερικήν, τὴν Αὐστραλίαν καὶ τὴν Ν. Ἀφρικήν. Εἰς τὴν Ἑλλάδα εἰσήγητη ἡ καλλιέργεια τῆς ἀμπέλου ἀπὸ τοὺς προϊστορικοὺς χρόνους, ἐλαττερένετο δὲ ἀπὸ τοὺς ἀρχαίους "Ελληνας καὶ θεοὺς τοῦ οἴνου, ὁ Διόνυσος.

Σήμερον εἰς τὴν Ἑλλάδα ἡ ἄμπελος κατέχει ἔκτασιν 1.500.000

στρεμμάτων, άπό τὰ ὅποια 700.000 εἶναι σταφιδάμπελοι. Τὰ διακερίσματα, εἰς τὰ ὅποια αὔτη εύδοκιμεῖ περισσότερον εἶναι ἡ Μεσσηνία, ἡ Ἀγασία, ἡ Ἡλεία, ἡ Κορινθία, ἡ Κρήτη καὶ μέροι τινὰ τῆς Θεσσαλίας.

Απὸ τὰς πολυαριθμους παραλλαγὰς τῆς ἀμπέλου ἄλλαι εύδοκιμοῦν εἰς θερμὰς χώρας, ἄλλαι εἰς τὰς εὐκράτους καὶ ἄλλαι εἰς ψυχράς. Δὲν εύδοκιμοῦν μόνον εἰς πολὺ θερμὰς καὶ πολὺ ψυχρὰς χώρας.

Ἡ ἀμπελος καλλιεργεῖται εἴτε κατὰ ἀναδενδράδας ( κληματιλίες ), διὰ τὰ μεμονωμένα φυτά, εἴτε κατὰ μικρὰ κλήματα ( κούρβουλα κν. λεγόμενα ), τὰ ὅποια φυτεύονται εἰς σειρὰς καὶ εἰς ἀπόστασιν, τὸ ἐν φυτὸν τοῦ ἄλλου, ἀπὸ 50 ἑκατοστόμετρα μέχρι 1,50 μέτρου ἀναλόγως τῆς φύσεως τοῦ ἐδάφους.

Ἐξωτερικά γνωρίσματα. Εἶναι φυτὸν πολυετές μὲ σαρκώδη κατ' ἀρχὰς βλαστόν, ὁ ὅποιος ἀργότερον ἀποξυλοῦται.

Ρίζα. Ἡ ρίζα τῆς ἀμπέλου εἰσχωρεῖ βαθέως ( μέχρι 3 μ. ) ἐντὸς τοῦ ἐδάφους, ὥστε τὸ φυτὸν νὰ εὑρίσκῃ τὸ ἀναγκαῖον ὕδωρ· διότι εἰς τὰς χώρας εἰς τὰς ὅποιας φύεται, κατὰ τὴν ἐποχὴν τῆς καρποφορίας, ὅποτε τὸ φυτὸν χρειάζεται περισσότερον ὕδωρ, δὲν βρέχει σχεδὸν καθόλου.

Βλαστός. Ὁ βλαστὸς τῆς ἀμπέλου εἶναι πολύκλαδος καὶ οἱ κλάδοι του εἶναι κατ' ἀρχὰς σαρκώδεις καὶ περιβάλλονται ἀπὸ πράσινον φλοιόν. Ἀργότερον ἀποξυλοῦνται, ἀποξηραίνεται δὲ καὶ ὁ φλοιὸς των, ὁ ὅποιος λαμβάνων χρῶμα καστανόφαιον, σχίζεται κατὰ ταίνιας ἐπιμήκεις, αἵτινες πολλάκις ἀποπίπτουσι μόναι των. Μετὰ τὸν φλοιὸν ἔχομεν τὸν κεντρικὸν κύλινδρον μὲ τοὺς ξυλώδεις καὶ ἡθμώδεις σωλῆνας, καὶ εἰς τὸ κέντρον ἀρκετὸν μέρος κοῦλον, πλῆρες ἀπὸ τὴν μαλακὴν καὶ σποργιώδη ἑκείνην οὐσίαν, τὴν λεγομένην ἐντεριώην ἡ ψύχαν.

Φύλλα. Τὰ φύλλα εἶναι ἀπλᾶ, μεμονωμένα καὶ ἐκφύονται κατ' ἐναλλαγὴν ἀπὸ τὰ γόνατα τοῦ βλαστοῦ.

Τὸ ἔλασμά των εἶναι πλατύ, πεντάλιθον, ὁ μίσχος εἶναι μακρὸς καὶ προεκτείνεται διὰ νεύρων, τὰ ὅποια διακλαδίζονται εἰς κάθε λοβὸν τοῦ φύλλου· τὸ εἶδος τοῦτο τῆς νευρώσεως ὅμοιάζει πρὸς παλάμην καὶ τὰ φύλλα τὰ ὅποια ἔχουσι τοικύτην νεύρωσιν τὰ λέγομεν παλαμόνενα. "Εκαστος λοβὸς φέρει εἰς τὰ γείλη του ὀδόντας. Ἡ κατ' ἐναλλαγὴν ἔκφυσις τῶν φύλλων γίνεται ἐπειδὴ τὰ φύλλα τῆς ἀμπέλου εἶναι μεγάλα καὶ θὰ ἐσκίαζεν ἄλλως τὸ ἐν τῷ ἄλλῳ. Μὲ τὴν κατ' ἐναλλαγὴν ἔκφυσιν των δὲν σκιάζει τὸ ἐν τῷ ἄλλῳ καὶ οὕτω διευκολύνεται ἡ ἀφομοίωσις

( σχ. 62 ). Κατὰ τὸ φθινόπωρον τὰ φύλλα γίνονται ἐρυθρὰ καὶ πίπτουν ( φυτὸν φυλλοβόλον ).

"Ε λικες. Ἡ ἄμπελος ἔχει κατ' ἀργάς ακλάδους σαρκώδεις καὶ μαλακούς, οἱ ὅποιοι δὲν δύνανται νὰ στερεωθοῦν μόνοι των. Πρέπει νὰ εὔρωσιν ἐν ὑποστήριγμα, εἰς τὸ ὁ-  
ποῖον στερεοῦνται μὲ τὴν βοήθειαν  
τῶν ἑλίκων των καὶ ἀναρριγῶνται  
ἐπ' αὐτοῦ. Ἡ ἄμπελος δηλαδὴ εἶναι  
φυτὸν ἀναρριγώμενον μὲ τὴν βοή-  
θειαν τῶν ἑλίκων τῆς. Αἱ ἔλικες εἰ-




**Σχ. 62. Βλαστός ἄμπελου.**

1 ἔλιξ. 2 ὑποστήριγμα εἰς τὸ ὁποῖον  
ἔχει περιτυλιχθῆ μία ἔλιξ. 3 σταφυλὴ  
( σύνθετος βότρυς ).

αὐτό, ἄλλοτε μὲν πρὸς τὰ δεξιὰ ἄλλοτε  
λοῦνται καὶ συγκρατοῦσι τὸ φυτόν. Πολλάκις  
τοῦ μέσου των καὶ ἄνω, εἰς δύο καὶ γίνονται δικρανωτά· οὕτως ἡ ὑπο-  
στήριξις εἶναι ἀσφαλεστέρα.

"Α ν θ η. Τὰ ἄνθη φύονται πολλὰ μαζὶ καὶ σχηματίζουν ταξια-  
θίαν, ἥτις καλεῖται βότρυς. Τὰ ἄνθη εἶναι μικρά, μὲ μακροὺς ἀλλὰ ἴ-  
σους ποδίσκους· ὁ ποδίσκος των προσκολλᾶται εἰς ἔνα λεπτὸν ἄξονα  
καὶ σχηματίζεται οὕτως ὁ βότρυς, ὁ ὅποιος λέγεται τσαμπί· ὁ λεπτὸς



**Σχ. 63. Λ ἄνθος ἀπὸ τὸ ὁποῖον  
ἔχει πέσει ἡ καλύπτρα του. Β το-  
μὴ ἄνθους φέροντος ἀκόμη τὴν κα-  
λύπτραν· διακρίνονται εἰς τοῦτο οἱ  
οἱ δύο χῶραι τῆς ἀνθήκης.**

ναι μετασχηματισμένοι ἀνθοφόροι  
ακλάδοι καὶ διὰ τοῦτο πολλάκις συν-  
ναντῶμεν ἐπὶ τῶν ἑλίκων μικρὰς  
σταφυλὰς ( τὰ λεγόμενα κν. κου-  
δούνια ). "Οταν αἱ ἔλικες εὔρωσιν  
ὑποστήριγμα, περιστρέφονται περὶ

ἄξων ἑκάστου βότρυος προσκολλᾶται εἰς ἄλλον χονδρότερον ἄξονα καὶ τὸ σύνολον ἀποτελεῖ τὴν σταφυλήν. Ἡ ταξιανθία αὕτη, κατὰ τὴν ὅποιαν φύονται τὰ ἄνθη τῆς ἀμπέλου, λέγεται σύνθετος βότρυς. "Εκαστον ἄνθος ἀποτελεῖται ἀπὸ κάλυκα μὲ πέντε ὀδόντας καὶ στεφάνην μὲ πέντε πέταλα. Τὰ πέταλα εἶναι χωρισμένα εἰς τὴν βάσιν των, ὀλλὰ ἡνωμένα εἰς τὴν κορυφήν των, εἰς τρόπον ὥστε σχηματίζουν ἐν σῶμα προσομοιώζον μὲ καλύπτραν μοναχοῦ (σχ. 63). "Εκαστον ἄνθος ἔχει πέντε στήμονας καὶ μίαν ὠοθήκην μὲ δύο χώρους, ἣτις προεκτείνεται εἰς στῦλον καταλήγοντα εἰς δίλοβον στίγμα· ἔκαστος ἀπὸ τοὺς δύο χώρους τῆς ὠοθήκης περιέχει δύο ὡρία. "Οταν οἱ ἀνθήρες ὠριμάσουν, οἱ στήμονες προεκτείνονται πρὸς τὰ κάτω καὶ ἀπορρίπτουσι τὴν καλύπτραν, ταυτοχρόνως δὲ ἀποπίπτουσι καὶ τὰ πέταλα. Ἡ γῦρις τότε πίπτει ἀπὸ τοὺς ἀνθήρας εἰς τὰ στίγματα καὶ τὰ γονιμοποιεῖ.

'Επικονίασις γίνεται καὶ διὰ τῶν ἐντόμων, τὰ ὅποια ὅμως δυσκόλως προσελκύονται ἀπὸ τὴν ὁσμὴν καὶ τὸ χρῶμα τῶν ἀνθέων. Διότι τὰ πέταλα τῶν ἀνθέων ἀφ' ἐνὸς μὲν στεροῦνται ἐντόνου χρώματος καὶ ἀρώματος, ἀφ' ἑτέρου δὲ πίπτουν εὐθὺς ὡς ὠριμάσῃ τὸ ἄνθος. Τὰ ἄνθη στερούμενα ἐντόνου χρώματος εἶναι δύσκολον νὰ προσελκύσουν ἔντομα, ὡς ταῦτα μεταφέρουν τὴν γῦριν. Διὰ τοῦτο ἡ διάταξις τῶν ἀνθέων εἶναι τοιαύτη, ὥστε νὰ διευκολύνεται ἡ ἐκ τῶν ἀνθήρων εἰς τὰ στίγματα ἄλλων ἀνθέων μεταφορὰ τῆς γύρεως διὰ τοῦ ἀνέμου καὶ νὰ ἐπιτυγχάνεται ἡ γονιμοποίησις τῶν ὡρίων καὶ μὲ τὴν ἐλαχίστην ἀκόμη πνοὴν τοῦ ἀνέμου.

Καρπός. 'Ο καρπὸς τῆς ἀμπέλου εἶναι σαρκώδης καὶ λέγεται ράξ (κν. ρόγα). Προέρχεται ἐκ τοῦ μετασχηματισμοῦ τῆς ὠοθήκης, εἶναι σφαιρικὸς ἢ ἐπικήκης καὶ περιβάλλεται ὑπὸ φλοιοῦ κιτρινωποῦ ροδόχρου, μέλανος ἢ ἄλλως κεχρωσμένου. Περικλείει 2 - 4 σπέρματα (κούκουτσα) προερχόμενα ἀπὸ τὴν γονιμοποίησιν τῶν ὡρίων τῆς ὠοθήκης. Τὸ ἔξωτερικὸν τῶν σπερμάτων εἶναι σκληρὸν καὶ ξυλῶδες. 'Ο τοιοῦτος σχηματισμὸς τοῦ καρποῦ διευκολύνει τὴν διάδοσιν τοῦ φυτοῦ, διότι πτηγὰ τρώγουν τὰς ράγας καὶ ἀποβάλλουν μὲ τὰ περιττώματά των τὰ ἀχώνευτα ἀπομένοντα σπέρματα, τὰ ὅποια οὕτω δίδουν νέα φυτά. 'Ο ἀνθρωπὸς μὲ τὴν καλλιέργειαν κατώρθωσε νὰ ἐπιτύχῃ παραλλαγὰς σταφυλῶν, αἱ ὅποιαι νὰ ἔχωσιν διάφορα ἢ καθόλου σπέρματα.

Πολλαπλασιασμός. Οὗτος δύναται νὰ γίνῃ διὰ σπερμά-

των τὰ δι' ἐκβλαστήσεως ὅμως σπερμάτων προερχόμενα φυτὰ ὅμοι-  
άζουσι πολὺ μὲ τὴν ἀγρίνην ἀμπελον καὶ δὲν μᾶς δίδουν τοὺς αὐτοὺς  
καρποὺς μὲ ἑκένους, ἀπὸ τοὺς ὁποίους προέρχονται τὰ σπέρματα, ἀλ-  
λὰ καρποὺς πολὺ κατωτέρας ποιότητος. Διὰ νὰ ἐπιτύχωμεν τοὺς αὐτοὺς  
καρπούς, πρέπει τὰ ἐκ τῶν σπερμάτων προελθόντα φυτὰ νὰ τὰ ἐμβο-  
λιάσωμεν. Διὰ τοῦτο ὁ πολλαπλασιασμὸς τῆς ἀμπέλου γίνεται κυρίως  
ώς ἔξης : Ἀποκόπτομεν αλάδους κατὰ τὸν Ἰανουάριον ἢ Φεβρουάριον



Σχ. 64. Πολλαπλασιασμὸς διὰ καταβολά-  
δων. 1 εἰς τὸ μέρος τοῦτο τοῦ βλαστοῦ  
σχηματίζονται ρίζαι. 2 ἀπὸ τὸ ἔξω τοῦ  
ἐδάφους τμῆμα σχηματίζεται βλαστός, δη-  
λαδὴ νέον φυτόν.


ρισμένον δι' ἄλλην ἐργασίαν ( δηλ. ἀπὸ ὀφθαλμοὺς προωρισμένους νὰ  
δώσωσι αλάδους, βλέπομεν νὰ σχηματίζωνται ρίζαι ). 'Ο τρόπος οὗ-  
τος τοῦ πολλαπλασιασμοῦ λέγεται πολλαπλασιασμὸς διὰ μοσχευμάτων  
( τὸν εἴδομεν καὶ εἰς τὴν ροδῆν ).

"Αλλο εἶδος πολλαπλασιασμοῦ εἶναι ὁ διὰ καταβολάδων ( σχ. 64 ).  
Λαμβάνομεν δηλ. ἐπιμήκη βλαστὸν καὶ χώνομεν τμῆμά του ἐντὸς τοῦ  
ἐδάφους εἰς ἀρκετὸν βάθος. Μετά τινα χρόνον ( 1 - 2 ἔτη ) εἰς τὸ ἐντὸς  
τοῦ ἐδάφους μέρος τοῦτο τοῦ βλαστοῦ θὰ σχηματισθοῦν ρίζαι καὶ δυ-  
νάμεθα, ἀποκόπτοντες τὸν βλαστὸν ἐκ τοῦ μητρικοῦ φυτοῦ, νὰ ἔχωμεν  
νέον φυτόν.

"Αλλο εἶδος πολλαπλασιασμοῦ εἶναι ὁ δι' ἐμβολιασμοῦ. Λαμβάνο-  
μεν ἔνα βλαστὸν ὄλόκληρον ( καὶ ὅχι ἔνα μόνον ὀφθαλμόν, ὅπως εἴδομεν  
διὰ τὸν ἐνοφθαλμισμὸν εἰς τὴν ἀμυγδαλῆν ) καὶ κάμνομεν μίαν τομὴν  
( σχ. 65 ) εἰς ἔνα αλάδον τοῦ φυτοῦ, τὸ ὄποιον θέλομεν νὰ ἐμβολιά-  
σωμεν· εἰς τὴν τομὴν αὐτὴν εἰσάγομεν τὸν αλάδον, τὸν ὄποιον ἔχομεν  
τάχει ἀπὸ τὸ φυτόν, μὲ τὸ ὄποιον θέλομεν νὰ ἐμβολιάσωμεν καὶ κατό-

πιν περιδένομεν καλῶς μὲ λωρίδας καὶ χρίσμεν διὰ νὰ προφυλάξωμεν ἀπὸ τὴν ὑγρασίαν καὶ τὴν ἔηρασίαν. Ἡ πληγὴ μετά τινα χρόνον κλείει καὶ ὁ βλαστὸς ἀναπτύσσεται, τρεφόμενος ἀπὸ τὸ νέον φυτόν, διατηρεῖ ὅμως ὅλα τὰ χαρακτηριστικὰ καὶ τὰς ιδιότητας τοῦ φυτοῦ, ἀπὸ τὸ ὅποιον προέρχεται. Δυνάμεθα ὅμως νὰ κάμωμεν ἐμβολιασμὸν καὶ μὲ ὄφθαλμὸν μόνον, δηλαδὴ ἐνορθαλμισμὸν ( ὅπως εἴδουμεν καὶ εἰς τὴν ἀμυγδαλῆν ).

Καλλιέργεια. Ἡ ἄμπελος εὐδοκιμεῖ εἰς παντὸς εἴδους ἐδάφη πλὴν τῶν καταξήρων καὶ καθύγρων. Μετὰ τὸν τρυγητὸν καὶ πρὶν ἀρχίσουν αἱ χειμεριναὶ βροχαὶ γίνεται ἡ λεγομένη περιλάκκωσις ( ξελάκκωση, ξελάκκωμα ). Δηλαδὴ ἀνασκάπτεται τὸ γῆμα καὶ συλλέγε-



**Σχ. 65.** Ἐμβολιασμὸς μὲ ὄλοκληρα τμῆματα βλαστοῦ, ἐν ἣ περισσότερα. 1 ὁ βλαστὸς σχίζεται εἰς τὸ μέσον του. 2 Τεμάχιον βλαστοῦ, μὲ τὸ ὅποιον θὰ γίνῃ ὁ ἐμβολιασμός, ὅπως φάνεται εἰς τὸ 3. Δεξιάτερα ἐμβολιασμὸς μὲ περισσότερα ἀπὸ ἐν τεμάχια βλαστοῦ.

ται περὶ τὴν βάσιν τῆς ἀμπέλου εἰς σωρούς. Οὕτω τὸ ὄδωρ τῆς βροχῆς συγκρατεῖται πλησίον τῆς ρίζης, ἐνῷ διὰ τῆς σκαφῆς καταστρέφονται τὰ παράρριζα καὶ αἱ τυχὸν παραφυάδες.

Απὸ τὰ μέσα τοῦ μηνὸς Δεκεμβρίου γίνεται ἡ κλάδευσις, κατὰ τὴν ὅποιαν ἀποκόπτονται οἱ ἐπιμήκεις κλάδοι ( κληματίδες κν. λεγόμενοι ) πλησίον τοῦ κορμοῦ τῆς ἀμπέλου ἀφήνεται μόνον μικρὸν τμῆμα μὲ ὄλιγους ὄφθαλμους ( ἀναλόγως τῆς εὐρωστίας τῆς ἀμπέλου ), διότι οἱ παλαιοὶ κλάδοι δὲν παράγουν ἄνθη καὶ καρπούς. Μετὰ τὴν κλάδευσιν γίνεται βαθεῖα σκαφή, συλλέγεται δὲ πάλιν τὸ γῆμα εἰς σωρούς ( κουτρούλια ) μεταξὺ τῶν ρίζῶν τῆς ἀμπέλου. Ἀκολουθεῖ ἡ χαράκωσις,

ιδίως εἰς τὰς ἀμπέλους, αἴτινες φύονται εἰς τοὺς γονίμους ἄγρους καὶ ἡ ισοπέδωσις τῶν σωρῶν τοῦ χώματος. Εἰς τὸ τέλος ἔρχεται ἡ βλαστολογία· μόλις δὴ. γονιμοποιηθοῦν τὰ ἄνθη καὶ μεταβληθοῦν εἰς καρπούς, σχηματισθῶσι δὲ οὕτω σταφυλά, ἀποκόπτονται οἱ καρποφόροι κλάδοι ὀλίγον ὑπεράνω τῆς σταφυλῆς, οὕτως ὥστε ὅλος ὁ χυμὸς νὰ δαπανηθῇ διὰ τὸν σχηματισμὸν καρπῶν καὶ ὅχι διὰ τὴν κατασκευὴν βλαστῶν.

’Α σ θέν εις αι. Αἱ σπουδαιότεραι ἀσθένειαι τῆς ἀμπέλου εἶναι:

α) Τὸ ωίδιον τῆς ἀμπέλου. Τοῦτο εἶναι φυτὸν ἀνήκον εἰς τὴν τάξιν τῶν μυκήτων (διὰ τοὺς ὄποιους θὰ ὀμιλήσωμεν εἰς τὸ περὶ τούτων κεφάλαιον). Τρέφεται εἰς βάρος τῶν φύλλων καὶ τῆς σταφυλῆς, τῶν ὄποιών ἀπομιζῷ τὸν χυμὸν καὶ τὰ ξηραίνει· καταπολεμεῖται διὰ θειώσεως μὲ κόνιν θείου.

β) Ἡ φυλλοξήρα. Εἶναι ἔντομον τὸ ὄποιον ζῆται ἰδίως εἰς τὰς ρίζας τῆς ἀμπέλου, κατὰ ἐκατομμύρια· ἀπομιζῷ μὲ τὴν προβοσκίδα του τὸν χυμὸν καὶ ξηραίνει τὴν ἀμπέλον. Εἰς τὴν Ἑλλάδα ἡ ἀσθένεια αὐτῆς ὑπάρχει μόνον εἰς τὴν Μακεδονίαν καὶ τὴν Θεσσαλίαν ὀλοὲν ἐπεκτεινομένη καὶ εἰς τὴν ὑπόλοιπον χώραν. Οὐδὲν φάρμακον πρὸς καταπολέμησίν της εἶναι γνωστόν, πλὴν τοῦ ἐμβολιασμοῦ μὲ ποικιλίας ἀμερικανικῆς ἀμπέλου, ἡ ὄποια ἀντέχει εἰς τὴν φυλλοξήραν.

γ) Ὁ περονόσπορος. Καὶ αὐτὸς εἶναι μύκης· ἀναπτύσσεται ἐπὶ τῶν φύλλων καὶ μὲ τὰ νήματά του, τὰ ὄποια εἰσχωροῦν ἐντὸς τοῦ φύλλου, ἀπομιζῷ τὸν χυμὸν του καὶ τὸ φύλλον ξηραίνεται. Καταπολεμεῖται διὰ ψεκασμοῦ μὲ διάλυμα περιέχον 3 κιλὰ θεικοῦ χαλκοῦ (γκαλαζόπετρας) καὶ 2 κιλὰ ἀσβέστου εἰς 150 κιλὰ ὄδατος.

Ἐπίσης βλάβες προξενοῦν ἐπὶ τῶν τρυφερῶν ἀκόμη βλαστῶν τῆς ἀμπέλου, κατὰ τὴν ἄνοιξιν, οἱ ἄνεμοι καὶ οἱ ὄψιμοι παγετοί, σπάνιοι μὲν διὰ τὴν Πατρίδα μας, ἀλλὰ καταστρεπτικοί διὰ τοὺς νεαροὺς βλαστούς, ἀν τυχὸν καὶ παρουσιασθοῦν. Διότι μὲ αὐτοὺς παγώνει τὸ ἐντὸς τῶν τρυφερῶν βλαστῶν ὑπάρχον ἀφθονον κατὰ τὴν ἐποχὴν ταύτην ὅδωρ (χυμός), τὸ ὄποιον, μεταβαλλόμενον οὕτως εἰς πάγον, διαστέλλεται καὶ θραύσει ὅλους τοὺς σωλῆνας τῶν βλαστῶν (ξηλώδεις καὶ ἡθμώδεις)· ὁ βλαστὸς τότε ξηραίνεται (καίεται, καθὼς λέγουν οἱ χωρικοί).

Κατὰ τὴν ἐποχὴν ταύτην καταστροφὰς ἐπίσης προξενεῖ εἰς τοὺς νεαροὺς βλαστούς καὶ τὰς μικρὰς σταφυλὰς ἡ Ηνδαλίς τῆς ἀμπέλου. Λίγη εἶναι ἔντομον, αἱ κάμπαι τοῦ ὄποιού κατατρώγουσι τὰς νεαρὰς σταφυλάς.

‘Ω φελιμότης τῆς ἀμπέλου. Ή ἀμπελος καλλιεργεῖται διὰ τὸν καρπὸν τῆς οὗτος τρώγεται νωπὸς (σταφύλη), τῆς δὲ σταφιδαμπέλου ξηρὸς (σταφίς). Ή σταφύλὴ εἶναι μία τῶν νοστιμωτέρων καὶ θρεπτικωτέρων ὀπωρῶν, περιέχουσα μεγάλην ποσότητα σακχάρου. Διὰ τῆς ἐκθλίψεως τῆς ἔξαγεται τὸ γλεῦκος (μοῦστος), διὰ ζυμώσεως τοῦ ὄποιου (ἐπιδράσεως δηλαδὴ εἰδους τινὸς μύκητος, τοῦ λεγομένου σακχαρομύκητος τοῦ ἐλλειψοειδοῦς) παράγεται ὁ οἶνος. Διότι ὁ μύκης οὗτος ἔχει τὴν ἰδιότητα, τρώγων τὸ σάκχαρον τοῦ γλεύκους, νὰ τὸ μεταβάλῃ εἰς οἰνόπνευμα.

Ο οἶνος εἶναι ποτὸν οἰνοπνευματοῦχον· ἡ ποσότης τοῦ εἰς αὐτὸν περιεχομένου οἰνοπνεύματος ἔξαρταται ἐκ τοῦ εἰδους τῶν σταφυλῶν καὶ τοῦ εἰς αὐτὰς περιεχομένου σακχάρου, καθὼς καὶ ἐκ τοῦ τρόπου τῆς παρασκευῆς του. Βρασμένοι οἶνοι ἡ οἶνοι προερχόμενοι ἐκ τῆς ἐκθλίψεως ξηρῶν σταφυλῶν περιέχουσι μεγαλυτέραν ποσότητα οἰνοπνεύματος, διότι τὸ ἐκ τούτων προερχόμενον γλεῦκος περιέχει περισσότερον σάκχαρον.

Μετρία χρῆσις τοῦ οἴνου εἶναι μᾶλλον ὠφέλιμος, χορηγοῦσα εἰς τὸ σῶμα θερμότητα, ἐπιταχύνουσα τὴν κυκλοφορίαν τοῦ αἷματος· καὶ διευκολύνουσα τὴν πέψιν· συχνὴ δόμως χρῆσις τούτου εἶναι καταστρεπτική, διότι δηλητηριάζει τὸν δργανισμόν, προκαλοῦσα ἐν τέλει παράλυσιν τελείαν, τὴν δόπιαν λέγομεν τρομώδη παράλυσιν τῶν μεθύσων.

Η Ἐλλάς (ἰδιως ἡ Πελοπόννησος, ἡ Ἀττική, ἡ Κρήτη, ἡ Σάμος καὶ ἄλλαι τινὲς νῆσοι ὀλιγώτερον) εἶναι χώρα οἰνοπαραγωγὸς καὶ σταφιδοπαραγωγός, ἔξαγουσα εἰς τὸ ἐξωτερικὸν οἶνον, νωπὰς σταφύλας καὶ σταφίδα.

Απὸ τὴν περισσεύουσαν καὶ μὴ ἐξαγομένην ποσότητα σταφίδος, μέρος μὲν καταναλίσκεται εἰς τὸ ἐσωτερικόν, ἀπὸ τὴν ὑπόλοιπον δὲ ποσότητα παράγεται οἰνόπνευμα, καθὼς καὶ οἶνος, σταφιδίτης λεγόμενος.


Καίτοι ὥρισμένα εἴδη σταφίδος ἐλληνικῆς, ιδιως ἡ κορινθιακή, εἶναι ἄριστα, ἐν τούτοις προτιμῶνται εἰς τὸ ἐξωτερικὸν ποιότητες κατώτεραι ἄλλων χωρῶν, διότι, λόγῳ τῆς ὑπὸ τῶν ἐξαγωγέων πλημμελοῦς συσκευασίας τοῦ προϊόντος, γεμίζει τοῦτο ἀπὸ σκάληκας, προερχομένους ἐκ τῶν ὀδῶν ἐντόμου τινὸς λεπιδοπτέρου. Άλλα καὶ ὡς πρὸς τὴν καθαριότητα καὶ τὴν ἐμφάνισιν δέον νὰ ληφθῇ φροντίς, ὥστε ἡ ἐλληνικὴ σταφίς νὰ ὑπερτερῇ (ὡς πρὸς τὴν συσκευασίαν τῆς) τῆς τῶν ἄλλων σταφίς.

γωρῶν, ὅπως ὑπερτερεῖ καὶ ὡς πρὸς τὴν ποιότητα τοῦ προιόντος. Ἐσχάτως ἐλήφθησαν μέτρα, ἀτινα, ἀποσκοποῦντα εἰς τὴν βελτίωσιν τῆς καθηριότητος καὶ συσκευασίας τῆς σταφίδος, θέλουσιν ἀνυψώσει αὐτὴν εἰς τὴν θέσιν, ἥτις τῆς ἀνήκει, λόγῳ τῆς ἐξαιρετικῆς της ποιότητος.

### 11η Οἰκογένεια : Βατραχιώδη

ΑΝΕΜΩΝΗ

Ἄνεμώντες ἔχομεν διάφορα εἴδη, τὰ ὄποια λέγομεν ἀγριοπαπαροῦντες ἢ ἀγριολαλέδες. Συνηθέστερα εἴδη ἀνεμώνης εἶναι ἡ ἀνεμώνη ἢ ἀλσόφιλος (σχ. 66) καὶ ἡ ἀνεμώνη τῶν ἀγρῶν. Κατὰ τὸν γειμῶνα



Σχ. 66. Ἀνεμώνη  
ἢ ἀλσόφιλος.

Σχ. 67. Κληματίς (ἀγριάμπελη)  
Ἄνθος καὶ καρπὸς μὲ τὸν πτερωτὸν θύσανὸν του


παραμένουν ἀπὸ τὰ φυτὰ αὐτὰ ἐντὸς τοῦ χώματος ἢ ρίζα των καὶ μέρος τοῦ βλαστοῦ, τὸ ὄποιον λέγεται ὑπόγειος βλαστὸς ἢ ρίζωμα.

Ρίζωμα. Ἐκ τούτου παράγεται κατὰ τὴν ἐπομένην ἄνοιξιν ὀφθαλμός, διτις δίδει νέον βλαστὸν ὑπέργειον, δηλαδὴ νέον φυτόν· οὕτως ἡ ἀνεμώνη, χάρις εἰς τὸν ὑπόγειον βλαστὸν ἢ ρίζωμά της, εἶναι φυτὸν πολυετές. Τὰ φύλλα τῆς περιέχουσι δηλητήριον, ὃς προφύλακτι-

κόν κατὰ τῶν φυτοφάγων ζώων. Τὰ ἄνθη τῆς ἀναπτύσσονται ἀπὸ τοῦ Ἀπριλίου μέχρι τοῦ Σεπτεμβρίου στεροῦνται στεφάνης, ἀλλὰ εἶναι γρωματισμένα μὲ διαφόρους χρωματισμοὺς τὰ 4. ( ἐνίστε καὶ περισσότερα ) μεγάλα σέπαλα, ἀπὸ τὰ ὅποια ἀποτελεῖται ὁ κάλυξ. Εἶναι ἄνθη ὡραῖα εἰς τὴν ἐμφάνισιν, ἀλλὰ χωρὶς ὀσμήν. Ὁ καρπὸς εἶναι ἀχαίνιον.

Φυτὰ ὅμοια μὲ τὴν ἀνεμώνη.

Ἡ κληματίς ( κν. ἀγριάμπελη ἢ ἀγιόκλημα ). Ἡ κληματίς εἶναι θάμνος μὲ φύλλα ἐκφυόμενα ἀνὰ δύο, ἀντιθέτως, καὶ βλαστὸν περιελισσόμενον εἰς τὰ γειτονικὰ δένδρα, εἰς τὰ ὅποια στηρίζεται καὶ ἐπὶ τῶν ὅποιων ἀναρριγγάται. Τὸ ἄνθος στρεῖται στεφάνης, ὁ δὲ κάλυξ ἔχει 4 λευκὰ σέπαλα: ὁ καρπός, ἀχαίνιον, φέρει θύσανον πτερωτὸν ( σγ. 67 )



Σχ. 68. "Ανθη βατραχίου. 1 στήμανες. 1 ὑπερος. 3 πέταλα. 4 σέπαλα.

διευκολύνοντα τὴν διάδοσιν τῶν σπερμάτων, τὰ ὅποια ὁ ἀνεμός παρασύρει εὐκόλως καὶ τὰ μεταφέρει ἀπὸ ἐν μέρος εἰς ἄλλο.

Τὸ βατράχιον. Τούτου ὑπάρχουσι 42 παραλλαγαί, αἱ πλεῖσται τῶν ὅποιων εἶναι, ἐν καταστάσει γλωρᾶ, δηλητηριώδεις. Ὑδρύβια κατὰ τὸ πλεῖστον φυτά, ἔξ οὖ καὶ τὸ δημότικό των, ἔχουσι στεφάνην μὲ πέντε πέταλα κίτρινα ( σγ. 68 ).

### Βατραχιώδη

Ἡ ἀνεμώνη, ἡ κληματίς καὶ τὰ βατράχια παρουσιάζουν κοινὰ χαρακτηριστικά, τὰ ἔξης:

"Ἔχουσιν ὑπερόν μὲ πολλὰ ἐλεύθερα καρπόφυλλα, ἔκαστον τῶν ὅποιών σχηματίζει μίαν δωθῆκην μὲ ἐν ὠάριον, πολυαριθμοὺς στήμανας, ἐλευθέρους, μὲ ἀνθῆρας ἀνοίγοντας πρὸς τὰ ἔξω, καὶ καρπὸν ἀχαίνιον.

'Αποτελοῦσι τὴν οἰκογένειαν τῶν *Batrachiodῶν*.

## 12η Οίκογένεια : Κακτώδη

Εἰς τὰς ἑρήμους ἐκτάσεις τῆς Ἀμερικῆς, ιδίως εἰς τὸ Μεξικόν, ζοῦν φυτὰ σχήματος παραδόξου. Ταῦτα λόγῳ τῆς παραδοξότητός των, χρησιμοποιοῦνται ώς φυτὰ στολισμοῦ, καλλιεργούμενα ἐντὸς τῶν οἰ-



Σχ. 69. Φραγκοσυκῆ. 1 ἄνθος.  
2 βλαστός. 3 φύλλα, τὰ ὅποια  
ἔχουσι μεταβληθῆ εἰς ἀκάνθα.

ώστε ἔχουν μεταβληθῆ εἰς ἀκάνθας διαπνέουν οὕτως ἐλάχιστα καὶ τὸ φυτὸν ἀντέχει εἰς τὴν ἔηρασίαν. Τὰ ἄνθη εἶναι μεγάλα καὶ ζωηρῶς χρωματισμένα.

Ἡ φραγκοσυκῆ ζῆ εἰς πολλὰ μέρη τῆς Ἐλλάδος ( ιδίως θερμά ), εὐδοκιμεῖ δὲ καὶ εἰς πετρώδη καὶ ἄγονα ἐδάφη, διότι στερουμένη φύλλων, δὲν διαπνέει πολὺ καὶ οὕτως ἀντέχει εἰς τὴν ἔηρασίαν. Πολλάκις φυτεύεται πέριξ τῶν ἀγρῶν χρησιμοποιούμενη οὕτως ὡς φράκτης.

Τὰ κακτώδη μὲ τὴν διασκευὴν τοῦ βλαστοῦ καὶ τῶν φύλλων τῶν μᾶς δεικνύουν περισσότερον παντὸς ἄλλου φυτοῦ τὴν προσαρμογὴν τοῦ φυτοῦ τούτου διὰ ζωὴν εἰς ἔηρα καὶ ἄγονα ἐδάφη.


## 13η Οίκογένεια : Πορτοκαλεώδη ἡ Ἐσπεριδοειδῆ

Τὰ Πορτοκαλεώδη ἡ Ἐσπεριδοειδῆ εἶναι φυτὰ ιθαγενῆ τῶν Ἰν-

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

διῶν, τῆς Κίνας καὶ τῆς Ἰαπωνίας καὶ εὐδοκιμοῦν εἰς θερμὰ κλίματα εἰς τὰ όποια οἱ παγετοὶ εἶναι σπάνιοι· διὰ τοῦτο εἰς τὴν Εὐρώπην καλλιεργοῦνται κυρίως εἰς τὰ παράλια τῆς Πορτογαλίας, Ἰσπανίας, Μεσογειωνῆς Γαλλίας, Ἰταλίας, Δαλματίας, Ἐπτανήσου, εἰς πολλὰ μέρη τῆς Πελοποννήσου, ίδιως τὰς Καλάμας, Σπάρτην καὶ τὰ πρὸς τὸν Κορινθιακὸν κόλπον παράλια, καθὼς καὶ εἰς τὰς νήσους ίδιως Κρήτην, Σάμον, Χίον, Εύβοιαν, εἰς τὴν "Αρταν κ.λ.π.

Τὰ κοινότερα εῖδη εἶναι: Ἡ πορτοκαλέα, ἡ λεμονέα, ἡ μανδαρέα, ἡ κιτρέα, ἡ νερατζέα.



**Πορτοκαλέα.** Λύτη καλλιεργεῖται πολλαχοῦ τῆς Ἑλλάδος, περισσότερον εἰς "Αρταν, Βόλον, Καλάμας, Σπάρτην, Κρήτην, Κέρκυραν, διὰ τοὺς καρπούς τῆς. Οὗτοι εἶναι εὔγευστοι καὶ ύγιεινοὶ καὶ ἐκ τούτων κατασκευάζονται καὶ διάφορα ποτὰ ( πορτοκαλάδα ) καὶ οἶνος ἀκόμη ( πορτοκαλίτης οἶνος ). Δι' ἀποστάξεως παράγεται ἐκ τῶν ἀνθέων βαρύτιμον ἔλαιον ( τὸ πορτοκαλέλαιον ).

Ἡ πορτοκαλέα εἶναι δένδρον, τοῦ ὅποιου ὁ βλαστός, φθάνων πολλάκις εἰς ὕψος 12 μέτρων, φέρει ἀκάνθας ὡς προφυλακτικὸν κατὰ τῶν φυτοφάγων ζώων.

Εἰς τοὺς κλάδους τῆς φέρει καθ' ὅλον τὸ ἔτος φύλλα ( φυτὸν ἀειθαλές ), ὅπως καὶ ἄλλα φυτά, τὰ ὅποια ζοῦν εἰς χώρας εἰς τὰς ὅποιας ὁ χειμῶν δὲν εἶναι δριμύς. Τὰ φύλλα, ὅπως καὶ οἱ καρποί, τὰ ἄνθη καὶ οἱ τρυφεροὶ βλαστοὶ ἔχουσιν ἀδένας πλήρεις ἀπὸ ἀρωματικὸν αἴθεριον ἔλαιον. Διὰ νὰ μὴ διαπνέωσι πολύ, ἐπειδὴ ἡ πορτοκαλέα ζῆ εἰς θερμὰ μέρη, εἰς τὰ ὅποια κατὰ τὸ θέρος τὸ ὄδωρ σπανίζει, τὰ φύλλα φέρουσι χονδράν ἐπιδερμίδα. Τὰ ἄνθη ἔχουσιν ἔξωτερικῶς ἔνα κάλυκα, ὃστις προφυλάσσει τὴν στεφάνην ἀποτελουμένην ἀπὸ πέντε λευκὰ καὶ ἐλεύθερα πέταλα· οἱ στήμονες εἶναι πολυάριθμοι. Ὁ ὑπερος ἀποτελεῖται ἀπὸ πολλὰ καρπόφυλλα, τὰ ὅποια μεταβάλλονται εἰς φέτας· ἐντὸς αὐτῶν ὑπάρχουσι τὰ σπέρματα, περιβαλλόμενα ἀπὸ δγκωδεις τρίχας σαρκώδεις, πλήρεις χυμοῦ γεύσεως γλυκείας, ὅταν ὁ καρπός ὥριμάσῃ ( σχ. 70 ).

Σχ. 70. Τομὴ ὥριμου καρποῦ πορτοκαλέας.

‘Ο καρπός ἔχει φλοιόν μὲ χρῶμα πράσινον, τὸ ὅποῖον κατὰ τὴν ὡρίμανσιν μεταβάλλεται εἰς παρτοκαλόχρουν ἀποτελεῖται ἀπὸ τρία μέρη, τὸν ἐξωτερικὸν χρωματιστὸν φλοιόν, περιέχοντα ἀδένας πλήρεις ἀπὸ αἰθέριον ἔλαιον, τὸ ὅποῖον ἐκρέει μόλις πιέσωμεν τὸν φλοιόν· τὸ μέσον μέρος, χρώματος κιτρινολεύκου καὶ τὸ ἐσωτερικὸν μὲ τὰ σπέρματα καὶ τὰς γύρω των χυμάδεις τρίχας.

**Λεμονέα.** Καλλιεργεῖται διὰ τοὺς καρπούς της, οἱ δόποιοι χρησιμοποιοῦνται ὡς ἄρτυμα καὶ πρὸς παρασκευὴν δροσιστικοῦ ποτοῦ ( τῆς λεμονάδας ). Ὁ ὅπός των ἔχει ἴδιότητας μικροβιοκτόνους ( λόγῳ τοῦ κιτρικοῦ δέξιος τὸ ὅποῖον περιέχει ), συντελεῖ δὲ καὶ εἰς τὴν βελτίωσιν παθήσεων ἀρθριτικῶν καὶ ρευματικῶν.

**Μανδαρινέα.** Μικροτέρα τῆς παρτοκαλέας μὲ μικροτέρους, ἀλλὰ εὐγευστοτέρους καὶ εύκόλως ἀποφλοιουμένους καρπούς.

**Κιτρέα.** Οἱ καρποί τῆς εἶναι ὅγκωδεις καὶ παχύφλοιοι. Ὁ φλοιός των χρησιμοποιεῖται διὰ τὴν κατασκευὴν γλυκισμάτων.

**Νεραντζέα.** Ἐκ τοῦ φλοιοῦ καὶ τοῦ ἐσωτερικοῦ τῶν καρπῶν της, καθὼς καὶ ἐκ τῶν ζώρων καρπῶν, κατασκευάζονται γλυκὰ καὶ μαρμελάδες.

Οἱ χυμοὶ τῶν καρπῶν ὅλων τῶν ὡς ἄνω φυτῶν περιέχουσι μίαν πολύτιμον οὖσίαν, τὴν βιταμίνην Α, η̄τις προφυλάσσει ἀπὸ μίαν νόσον λεγομένην σκορβοῦτον, ἡ ὅποία ὡς καὶ ἄλλοτε εἴπομεν ( κάρδαμον, σελ. 81 ) προσβάλλει ἄτομα στερούμενα ἐπὶ πολὺ νωπῶν τροφῶν ( ὅπως π.γ. οἱ νυκτικοί ).

Ἐρωτήσεις. Τί λέγομεν μοσχεύματα καὶ τί παραφνάδας ; Πῶς γίνεται ὁ πολλαπλασιασμός μὲ καταβολάδας ; Πότε λέγομεν τὸν ἐπόγειον βλαστὸν ρίζωμα καὶ τί ἐπιτυγχάνει τὸ φυτὸν διὰ τούτον ; Πῶς γίνεται ὁ πολλαπλασιασμός μὲ βλαστοὺς ἔρποντας ; Ἀναφέρατε φυτὸν ἔχον ἔρποντας βλαστούς. Τί ἐπιτυγχάνομεν διὰ τοῦ ἐμβολιασμοῦ ; Ἀναφέρατε τρόπους ἐμβολιασμοῦ.

Τί λέγομεν πόαν, τί θάμνον καὶ τί δένδρον ;

Ποῖα φύλλα λέγομεν ἀπλᾶ καὶ ποῖα σύνθετα ; Ποίαν ἔκφυσιν τῶν φύλλων λέγομεν ἀντίθετον, ποίαν κατ’ ἐναλλαγήν, καὶ εἰς τί ὀφείλεται ἡ τοιαύτη ἔκφυσις τῶν φύλλων ; Ὁρομάστε φυτὰ μὲ φύλλα σύνθετα.

Αραφέρατε φύλλα μὲ διάφορα σχήματα καὶ διαφορετικὴν τεύχωσιν, καθὼς καὶ τὴν ὄνομασίαν τον.

Ηοίαν ταξιαρθίαν λέγομεν κόδονμβον, ποίαν σκιάδιον, ποίαν βότρων καὶ ποίαν σύρθετον βότρων;

Τί λέγομεν αὐτεπικονίασιν καὶ τί διασταυρωτὴν ἐπικονίασιν;

Αραφέρατε προφυλακτικὰ κατὰ τῶν φυτοφάγων ζώων, τὰ δέοπα ἀνεύδομεν εἰς διάφορα ἐξετασθέντα μέχρι τοῦδε φυτά.

Ονομάσατε φυτὰ ἀναρριχώμενα καὶ φυτὰ προσημοσμένα διὰ ζωὴν εἰς ξηρὰ καὶ πετρώδη ἐδάφη. Ηοῖα τὰ χαρακτηριστικὰ γνωρίσματα τῶν τοιούτων φυτῶν;

Αραφέρατε τὰ καλλωπιστικὰ φυτὰ μεταξὺ τῶν μέχρι τοῦδε ἐξετασθέντων φυτῶν ὅμοιως φυτὰ καλλιεργούμενα διὰ τὰ φύλλα τον, διὰ τὴν φύσιν των, τὸν καρπούς, τὰ σπέρματά των.

Διατί πρέπει νὰ τὰ κλαδεύωμεν; Ήδη πρέπει νὰ τὰ ἐμβολιάζωμεν καὶ ποῖα πρέπει νὰ ἐμβολιάζωμεν;

Ηοῖα φυτὰ λέγομεν ἀειθαλῆ καὶ ποῖα φυλλοβόλα; Ονομάσατε φυτὰ ἀειθαλῆ μεταξὺ τῶν μέχρι τοῦδε ἐξετασθέντων.

### ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΙΣ

#### 1η ΤΑΞΙΣ: ΔΙΚΟΤΥΛΗΔΟΝΑ ΧΩΡΙΣΤΟΠΕΤΑΛΛΑ

Οίκογένεια	Κοινὰ χαρακτηριστικὰ	Τάξις
1. Ψυχαρθῆ ἢ Ὀσπριοειδῆ		
2. Ροδώδη		
3. Μηκωνοειδῆ		
4. Μαλαχοειδῆ		
5. Σκιαδανθῆ		
6. Καρνοφυλλώδη		
7. Γερανιώδη καὶ τὰ ὅμοιά των Αινώδη	Στεφάνη μὲ πέταλα χωρισμένα ἀπ' ἀλλήλων.	
8. Ιώδη		
9. Στανδαρθῆ		
10. Αμπελιδώδη		
11. Βατραχιώδη		
12. Κακτώδη καὶ		
13. Ποστοκαλεώδη ἢ Εσπεριδοειδῆ		

Δικοτυλήδονα χωριστοπεταλλα

## 2α ΤΑΞΙΣ : ΔΙΚΟΤΥΛΗΔΟΝΑ ΣΥΜΠΕΤΑΛΑ

### 1η Οίκογένεια : Σ α λ α ν ώ δ η ἢ Σ τ ρ υ χ ν ώ δ η

### ΣΤΡΥΧΝΟΣ Ο ΚΟΝΔΥΛΟΡΡΙΖΟΣ

( κν. γεώμηλον ἢ πατάτα )

Είναι φυτόν ποωδες καὶ πολυετές. Κατάγεται ἀπὸ τὸ Περοῦ καὶ εἰσήχθη εἰς τὴν Εὐρώπην τὸ 1586 ἀπὸ τὸν "Αγγλον ναυτικὸν Drake, ὁ ὄποιος τὸ ἔφερεν ἀπὸ τὴν Ν. Ἀμερικήν. Ἡ καλλιέργειά του διεδόθη ταχέως εἰς τὴν Εὐρώπην, ιδίως εἰς τὴν Ἀγγλίαν καὶ τὴν Γερμανίαν. Εἰς τὴν Ἑλλάδα εἰσήχθη ἀπὸ τὸν Καποδίστριαν, ἀλλὰ μόλις ἀπὸ τοῦ 1880 ἥρχισεν ἡ καλλιέργειά του εἰς κάπως εύρυτέραν κλίμακα.



**Σχ. 71. Γεώμηλον**

1 ὑπόγειοι βλαστοὶ ἢ κόνδυλοι ( πατάτες )

στοὺς τοὺς λέγομεν κονδύλους ( κν. πατάτες ). Τοὺς κονδύλους τοῦ γεωμήλου τοὺς τρώγομεν.

'Ἐὰν λάβωμεν ἔνα τοιοῦτον ὑπόγειον βλαστὸν καὶ τὸν παρατηρή-

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

"Ο ὑπέργειος βλαστὸς τοῦ γεωμήλου φθάνων εἰς ὕψος τὰ 80 ἑκατοστ. ( σχ. 71 ), φέρει φύλλα σύνθετα μὲ φυλλάρια ἀνίσα μεταξύ των. Τὰ φύλλα, ὁ καρπὸς καὶ οἱ ὑπέργειοι βλαστοὶ ἔχουν ὡς προφυλακτικὸν κατὰ τῶν φυτοφάγων ζῶων, ἐν ἴσχυρὸν δηλητήριον, τὴν σὸλανήνην.

Τὸ γεώμηλον καλλιέργεται διὰ τοὺς ὑπογείους βλαστούς του, οἱ ὄποιοι εἰναι σαρκώδεις, διότι εἰναι ἐναποθηκευμένα εἰς αὐτοὺς ἀπὸ τὸ φυτὸν θρεπτικὰ συστατικά.


Τοὺς τοιούτους ὑπογείους βλαστοὺς τοὺς γεωμήλους τοὺς παρατηρή-

σωμεν μὲ προσοχήν, θὰ ἔδωμεν ὅτι φέρει ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας του μικρὰς ἐσοχάς ( γουβίτσες ) εἰς ἑκάστην τῶν ὅποίων παρατηροῦμεν ἔνα δφθαλ-  
μὸν ( μάτι )· τοῦτο δεικνύει ὅτι οἱ κόνδυλοι εἰναι ὑπόγειοι βλαστοί. "Αν  
ἀφαιρέσωμεν ἀπὸ ἔνα τοιοῦτον ὑπόγειον βλαστὸν τὸ ὑπεράνω του γῶ-  
μα, ὥστε μέρος του νὰ ἔλθῃ εἰς τὴν ἐπιφάνειαν, τὸ μέρος τοῦτο θὰ ἔδω-  
μεν ὅτι πρασινίζει, δηλ. ὑπὸ τὴν ἐπιδρασιν τοῦ φωτὸς ἀποκτᾷ χλωρο-  
φύλλην ( ὅπως θὰ συνέβαινε μὲ ἔνα οιονδήποτε βλαστόν ).

"Οταν ὁ ὑπέργειος βλαστὸς σχηματίσῃ τοὺς ὑπογείους βλαστούς,  
ξηραίνεται, οἱ τελευταῖοι ὅμως μένουν ἐντὸς τοῦ ἐδάφους καὶ κατὰ τὴν  
ἐπομένην ἄνοιξιν οἱ δφθαλμοί των ἀναπτύσσονται καὶ δίδουν νέα φυτά.  
Οὕτω βλέπομεν ὅτι τὸ γεώμηλον ἀναπτύσσεται καὶ πολλαπλασιάζεται  
μόνον του, μὲ τοὺς ὑπογείους βλαστούς τοὺς ὅποίους παράγει, εἰς τρό-  
πον ὥστε τὰ σπέρματα γίνονται  
ἄχρηστα δι' αὐτό· διὰ τὸν λόγον  
αὐτὸν καὶ πολλαὶ παραλλαγαὶ γε-  
ωμήλων δὲν ἀνθίζουν κάν.

Πῶς δίδουν νέα φυτὰ  
οἱ ὑπόγειοι βλαστοὶ ( κόν-  
δυλοι ); "Αν λάβωμεν κονδύλους  
καὶ τοὺς θέσωμεν εἰς θερμὸν καὶ  
ὑγρὸν μέρος, παρατηροῦμεν μετ'  
δλίγας ἡμέρας ὅτι ἔκαστος δ-  
φθαλμὸς ἀναπτύσσεται καὶ δίδει  
ἔνα βλαστὸν λευκόν, ὅστις φέρει  
μικρὰ περγαμηνοειδῆ φύλλιδα.  
μετ' δλίγας ἀκόμη ἡμέρας οὗτος  
πρασινίζει, ἀποκτᾷ τὰ πρῶτα του  
πράσινα φύλλα καὶ εἰς τὸ κάτω  
του μέρος μικρὰ λεπτὰ νήματα ( σχ. 72 ), τὰ ὅποια εἰναι ρίζαι καὶ δι-  
ειθύνονται πρὸς τὰ κάτω. Κατὰ τὸ χρονικὸν τοῦτο διάστημα ρικνοῦται  
( ζαρώνει ), καὶ τοῦτο διότι ὁ κόνδυλος ἔχασε τὰ θρεπτικὰ συστατι-  
κά, τὰ ὅποια περιεῖχε τὰ θρεπτικὰ αὐτὰ συστατικὰ τὰ ἔλαβον οἱ δ-  
φθαλμοὶ τοῦ κονδύλου, οἱ δποῖοι ἔδωσαν νέα φυτά.

"Εγχομεν οὕτως ἐξ ἔκαστου δφθαλμοῦ ἐν νεαρὸν γεώμηλον τὸ δ-  
ποῖον, ἢν θέλωμεν νὰ αὔξηθῃ περαιτέρω, πρέπει νὰ τὸ φυτεύσωμεν εἰς




**Σχ. 72.** 2 ὑπόγειος βλαστὸς ἡ κόνδυλος ( πατάτα ) γεωμήλου. 1 καὶ 3 δφθαλμοὶ τοῦ κονδύλου ἀναπτυσσόμενοι ἀποκτοῦν ἔκαστος ρίζας καὶ βλαστόν, δίδοντες οὕ-  
τως ἐν νέον φυτόν.

τὴν γῆν, διὰ νὰ εῦρωσιν αἱ ρίζαι του τὰ ἀναγκαῖα διὰ τὴν περαιτέρω αὔξησίν του θρεπτικὰ συστατικά.

"Α ν θ ο ζ. Τὰ ἄνθη τοῦ γεωμήλου εἶναι λευκὰ ἢ κυανᾶ καὶ συνηνωμένα πολλὰ μαζὶ (ταξιανθία) κατὰ κορύμβους (σχ. 73). "Εχουν κάλυκα μὲ πέντε σέπαλα ἡνωμένα εἰς τὴν βάσιν των, στεφάνην μὲ πέντε πέταλα ἡνωμένα εἰς σχῆμα τροχοῦ καὶ πέντε στήμονας μὲ βραχέα νήματα στερεωμένα ἐπὶ τῆς στεφάνης.

Οἱ ἀνθηρες συνενοῦνται καὶ σχηματίζουν κοῦλον κῶνον, διὰ μέσου τοῦ ὁποίου διέρχεται ὁ στῦλος τοῦ ὑπέρου. "Ἐντομα σπανίως δυνάμεθα νὰ εὕρωμεν ἐπὶ τῶν ἀνθέων τοῦ γεωμήλου, διότι ταῦτα δὲν ἔχουσι νέκταρ. 'Η ἐπικονίασις γίνεται ἀφ' ἑαυτῆς (αὐτεπικονίασις). 'Ο ὑπερος σχη-



**Σχ. 73.** Α ἄνθος γεωμήλου καὶ Β πολλὰ ἄνθη σχηματίζοντα κόρυμβον. Γ τοιμὴ καρποῦ γεωμήλου· ἐντὸς τοῦ καρποῦ φαίνονται τὰ σπέρματα.

ματίζεται ἀπὸ δύο καρπόφυλλα ἡνωμένα πρὸς μίαν ὠθήκην σφαιρικὴν μὲ δύο χώρους, ἢ ὅποια περιέχει πλεῖστα ωάρια εἰς ἔκαστον χῶρόν της.

"Ο ὑπερος ἔχει ἀκόμη ἕνα μακρὸν στῦλον μὲ ἐν στρογγυλὸν στίγμα. 'Ο καρπὸς εἶναι ράξ. Τὰ σπέρματα εὑρίσκονται ἐντὸς τοῦ καρποῦ, ὁ ὅποιος εἶναι πράσινος ἢ μέλαχς καὶ σαρκώδης. 'Ο κάλυξ παραμένει πέριξ τοῦ καρποῦ καὶ κατὰ τὴν ὥριμανσιν τούτου.

Π οικιλίαι γεωμήλων. Γεωμήλων ὑπάρχουν πολλαὶ ποικιλίαι διαφέρουσαι κατὰ τὸ σχῆμα, τὸ μέγεθος καὶ τὸ χρῶμα τῶν κονδύλων των ἄλλων ἀπὸ τὰς ποικιλίας αὐτὰς οἱ ὑπόγειοι βλαστοί, γεύ-

σεως καλῆς, χρησιμεύουν ώς τροφή του ἀνθρώπου, ἄλλων, κατωτέρας ποιότητος, ώς τροφή τῶν ζώων, καὶ ἀπὸ ἄλλους, διὰ καταλλήλου ἐπεξεργασίας, ἔξαγουν, ἀπὸ τὸ ἄμυλον τὸ ὅποιον οὗτοι περιέχουν, οἰνόπνευμα.

"Οτι οἱ κόνδυλοι ( πατάτες ) περιέχουσιν ἄμυλον, δυνάμειθα νὰ τὸ διαπιστώσωμεν ώς ἔξης : Μὲ τρίφτην τρίβομεν ἕνα κόνδυλον εἰς μικρὰ τεμάχια· ταῦτα θέτομεν ἐπὶ χονδροῦ ὑφάσματος, ὑποκάτω τούτου θέτομεν ἐν δοχεῖον καὶ χύνομεν ἀνωθεν θερμὸν ὕδωρ. Τὸ ὕδωρ, τὸ ὅποιον θὰ διέλθῃ διὰ τοῦ ὑφάσματος τὸ ἀφήνομεν ἐν ἡρεμίᾳ ἐπὶ 10 λεπτά· τὸ ἄμυλον τότε κατασταλάζει εἰς τὸν πυθμένα τοῦ δοχείου καὶ τὸ συλλέγομεν χύνοντες τὸ ὑπεράνω ὕδωρ καὶ ξηραίνοντες τὸ ὑπόλειμμα εἰς τὸν ἥλιον ἢ εἰς ἐλαφράν φωτιὰν ( σχ. 74 ).

Καλλιέργεια. Τὸ γεώμηλον ἀναπτύσσεται εἰς ἐλαφρά, καλῶς ἐσκαμμένα καὶ λιπασμένα ἐδάφη. Δύναται νὰ πολλαπλασιασθῇ διὰ σπερμάτων, ἀλλὰ τὰ ἐκ τῶν σπερμάτων ἐκβλαστάνοντα φυτὰ δὲν εἰναι ὅμοια μὲ ἐκεῖνα, ἐκ τῶν ὅποιων τὰ σπέρματα προέρχονται καὶ δίδουν κονδύλους κατωτέρας ποιότητος. Διὰ νὰ ἐπιτύχωμεν τὰ ἴδια φυτὰ κάμνομεν τὸ ἔξης :

Λαμβάνομεν μικρὰ γεώμηλα, εἴτε ἀρκετὰ μεγάλα τεμάχια ἀπὸ μεγάλα γεώμηλα ( μεγάλα τεμάχια διὰ νὰ ἔχουν ἀρκετὰ θρεπτικὰ συστατικά, μὲ τὰ ὅποια θὰ τραφῇ τὸ νεαρὸν γεώμηλον, ἔως ὅτου ἀποκτήσῃ ρίζας καὶ φύλλα καὶ δυνηθῇ νὰ τρέφεται μόνον του ). Τὰ τεμάχια ταῦτα πρέπει νὰ ἔχωσιν ἔνα ἔως δύο δρυμαλμούς ἔκαστον. Τὰ φυτεύομεν εἰς ἀπόστασιν 40 - 45 ἑκατοστῶν τοῦ μέτρου τὸ ἐν ἀπὸ τὸ ἄλλο καὶ εἰς γραμμάς, αἱ διαστάσεις οἵ τις 45 - 50 ἑκατοστά. "Οταν τὰ φυτὰ μεγαλώσουν καὶ ἀποκτήσουν ὕψος 10 - 15 ἑκατ., τὰ σκα-



Σχ. 74. Ἐξαγωγὴ ἀπὸ γεώμηλον τοῦ ἄμυλου, τὸ ὅποιον τοῦτο περιέχει.

λίζομεν, τὰ ἀπαλλάσσομεν ἀπὸ τὰ ἐπιβλαβῆ χόρτα ( ζιζάνια ) καὶ ποτίζομεν τακτικά, ὅπου τὸ ἔδαφος δὲν εἶναι ἀρκετὰ ὑγρόν. Περὶ τὸ τέλος τοῦ θέρους ( ἐνωρίτερον ἢ ἀργότερον, ἀναλόγως τοῦ κλίματος, τοῦ τόπου καὶ τῆς ἐποχῆς ποὺ ἔγινεν ἡ φύτευσις ) εἰς τοὺς ὑπογείους βλαστούς ἔχουν συλλεγῆ ὅλα τὰ θρεπτικὰ συστατικὰ καὶ ἔχουν λάβει οὕτω τὸ μεγαλύτερόν των μέγεθος. Ἐκριζοῦμεν τότε τὸ φυτὸν καὶ συλλέγομεν τοὺς κονδύλους· ἡ συλλογὴ γίνεται μὲν ἔηρὸν καιρόν, διότι οὕτω διατηροῦνται οἱ κόνδυλοι καλύτερον. Φυλάσσονται εἰς μέρος ξηρὸν καὶ δροσερόν, διὰ νὰ μὴ ἐκβλαστάνουν καὶ μακρὰν τοῦ φωτὸς διὰ νὰ μὴ πρασινίζουν. Διότι πρασινίζοντες ἀφομοιοῦν τὸ διοξείδιον τοῦ ἄνθρακος τοῦ ἀέρος ( μὲν τὴν χλωροφύλλην τὴν ὅποιαν ἀποκτοῦν ) καὶ σχηματίζουν σολανίην, οὓσιαν δηλητηριώδη, ὡς εἴπομεν, ἡ ὅποια τοὺς καθιστᾷ ἀκαταλήκτους πρὸς βρῶσιν. "Οταν οἱ κόνδυλοι εἶναι προσκεκολημένοι εἰς τὸ φυτόν, πρέπει νὰ τοὺς παραχώνωμεν ( σκεπάζομεν μὲν χῶμα ), ὥστε νὰ μὴ εἶναι ἐκτεθειμένοι εἰς τὸ φῶς, διότι τότε πρασινίζουν, ἀποκτῶσι σολανίην ( δηλητηρίουν ) καὶ εἶναι δυνατὸν νὰ μᾶς βλάψουν, ἀν τοὺς φάγωμεν.

'Εχθροὶ τοῦ γεωμήλου εἶναι :

'Ο περονόσπορος. Μικροσκοπικὸς μύκης ( θὰ ὅμιλήσωμεν δι' αὐτὸν εἰς τὸ περὶ μυκήτων ), δ ὅποῖος ἀπομιζῇ τὸν χυμὸν τῶν φύλλων.



Σχ. 75. Πρασοκουρίς ἡ γρυπλάσπαλαξ  
( κν. κολοκυθοκόφτης )

νόσπορος καταπολεμεῖται διὰ ραντισμάτων μὲ τὸ λεγόμενον βορδιγάλειον ὕγρον, τὸ ὅποιον παρασκευάζομεν διαλύοντες δύο χιλιόγραμμα θειϊκοῦ χαλκοῦ ( γαλαζόπετρας ) καὶ ἐν χιλιόγραμμον ἀσβέστου εἰς 100 χιλιόγραμμα μῆδατος.

Τὰς ρίζας τοῦ γεωμήλου τὰς καταστρέφει ἐν ἔντομον, ἡ πρασοκουρίς ( κν. κολοκυθοκόφτης ) ( σχ. 75 ). Αὕτη μὲ τοὺς ἐμπροσθίους πόδας τῆς ἀνασκάπτει τὸ ἔδαφος, διὰ νὰ εύρῃ σκώληκας, μὲ τοὺς ὅποιους τρέφεται καὶ οὕτω καταστρέφει τὰς ρίζας τοῦ φυτοῦ, τὰς ὅποιας συναντῷ σκάπτουσα. Πρὸς ἐξόντωσίν της χύνομεν ὅδωρ μὲ 10 % πετρέλαιον εἰς τὰς φωλεὰς τῶν πρασοκουρίδων ( τὰς ὅποιας εύρισκομεν

ἀπὸ τὰς ὄπας ποὺς ὑπάρχουν εἰς τὸ ἔδαφος ), ὅπότε αὗται ἐξέρχονται καὶ τὰς φονεύουμεν.

Φυτὰ ὄμοια πρὸς τὸ γεώμηλον εἶναι :

**Στρύχνον τὸ λυκοπερσικὸν ή Λυκοπερσικὸν τὸ Ἐδώδιμον** (κν. ντομάτα). Εἶναι φυτὸν ποῶδες, ἐτήσιον (εἰς τινας θερμὰς χώρας διετές) μὲν ἀνθὴ ὀχροκίτινα καὶ καρπὸν ράγα. Καλλιεργεῖται πανταχοῦ τῆς Ἑλλάδος διὰ τὸν καρπὸν του, ὁ ὄποιος νωπός, διατηρημένος ἡ μεταβεβλημένος εἰς πολτὸν (πελτέν), χρησιμοποιεῖται εἰς τὴν μαγειρικήν.

**Στρύχνος ὁ ἐδώδιμος** (κν. μελιτζάνα). Οἱ καρποὶ, ἥωροις ἡ νηπερώριμος, περιέχει ἀρκετὴν ποσότητα σολανίνης καὶ εἶναι βλαβερός.

**Στρύχνος ὁ μέλας** (κν. στύφνος ἡ μαυρόχορτο). Φυτὸν κοινότατον· τὸ εὑρίσκομεν ἀφθονον εἰς τοὺς κήπους καὶ τοὺς ἀγρούς.

**Κάψιμον τὸ ἐτήσιον** (κν. πιπεριά). Οἱ καρποὶ του, βαθέος πρασίνου χρώματος, ὅταν εἶναι ἥωροι, γίνονται ἐρυθροὶ ἡ κιτρινωποί, ὅταν ώριμάσσουν. Μερικοὶ ἀπὸ αὐτοὺς εἶναι πολὺ κκυστικοί. Τοὺς ἔντονος, τοὺς τρίβουν καὶ τοὺς κάμνουν κόνιν, ἡ ὄποια εἶναι τὸ κοκκινοπίπερο.

'Η μπελλαντόνα (σχ. 76). Ἀπὸ αὐτὴν ἐξάγεται ἡ ἀτροπίνη.

Ἡ ἀτροπίνη εἶναι δηλητήριον· εἰς μικρὰν ὅμως δόσιν χρησιμοποιεῖται ως φάρμακον (ἐναντίον τῶν σπασμῶν, τῆς ἐπιληψίας, τοῦ ἄσθματος κ.λ.π.).

**Στραμώνιον τὸ κοινὸν** (κν. βρωμόχορτο) (σχ. 77). Τὰ φύλλα του ἔχουν δυσάρεστον ὄσμήν· ἔντονος χρησιμόποιοι οὐταὶ διὰ τὴν κατασκευὴν σιγαρέττων κατὰ τοῦ ἄσθματος.


**Νικοτιανὴ** (κν. καπνὸς) (σχ. 78). Εἶναι φυτὸν ποῶδες, ἐτήσιον, μὲ μεγάλα ἀμισχα φύλλα φύδμενα ἀνὰ ἓν κατ' ἐναλλαγήν. Τὰ ἀνθη του εἶναι λευκά, κιτρινά, ἡ ἐρυθρά, καὶ ὁ καρπός του κάψιμος. Κατάγεται ἀπὸ τὴν Ἀμερικήν, ὅπου τὸ πρῶτον τὸ εὔρεν ὁ Κολόμβος τὸ 1492. Εἰσήχθη κατ' ἀρχὰς εἰς τὴν Ἰσπανίαν καὶ τὴν Πορτογαλίαν, καὶ ἀπὸ



Σχ. 76. Μπελλαντόνα  
(ἀνθη καὶ καρπὸς)

έκει εἰς τὴν Γαλλίαν, ἀφ' ὃτου ὁ πρέσβυς τῆς Γαλλίας εἰς τὴν Λισσα-  
βῶνα Nicot ἔστειλεν εἰς τὴν βασίλισσαν τῆς Γαλλίας Αἰκατερίνην τῶν  
Μεδίκων ἐν κυτίον μὲ κόνιν καπνοῦ, ἵτις ἐλαμβάνετο διὰ τῆς ρινὸς ( πρέ-  
ξα ἡ ταμπάκο )· ἀπὸ αὐτὸν δὲ ἔλαβεν ὁ καπνὸς καὶ τὸ ὄνομα νικοτιανή.

Ο καπνὸς περιέχει ἐν δηλητήριον, τὴν νικοτίνην, καὶ ἡ συχνή  
του χρῆσις καταστρέφει τὴν μνήμην καὶ προσβάλλει τοὺς δρθαλμούς



Σχ. 77. Στραμώνιον τὸ κοινὸν  
(κν. βρωμόχορτο)

καὶ τὴν καρδίαν. Εἶναι συνεπῶς ἐ-  
πιβλαβέστατος διὰ τὴν ὑγείαν, ἴδι-  
ας ὅταν ὁ καπνιστὴς εἴναι νέος· διὰ  
τὴν κάτω τῶν 20 ἑτῶν ἥλικιαν τὸ κάπνισμα εἴναι αὐτόχρημα κατα-  
στρεπτικόν.

Τὸ κάπνισμα σήμερον ἔχει γίνει μία ἀρκετὰ προσοδοφόρος πηγὴ  
διὰ τὰ διάφορα κράτη, τὰ ὅποια ἔχουν ἀναλάβει μονοπωλιακῶς τὴν πώ-  
λησιν τοῦ καπνοῦ. Εἰς τὴν Ἑλλάδα ἐκ τοῦ φόρου τοῦ καταναλισκομέ-  
νου καπνοῦ εἰσπράττονται ἐτήσιοι μεγάλα ποσά. Η Ἑλλάς ἐπίσης ὡς  
γύρω καπνοπαραγωγός, εἰσπράττει καὶ ἀπὸ τὸν εἰς τὸ ἔξωτερικὸν ἐξ-  
αγόμενον καπνόν.

Ο καπνὸς καλλιεργεῖται κυρίως εἰς τὴν Ἀργολίδα, Αιτωλίαν,  
Φθιώτιδα, Θεσσαλίαν, Μακεδονίαν καὶ Θράκην· τῆς τελευταίας, καὶ ἴ-  
διως τῶν περὶ τὴν Ξάνθην μερῶν, ὁ καπνὸς εἴναι ἀρίστης ποιότητος.  
Ἐκ τῶν ἄλλων γυωρῶν, ἐκτὸς τῆς Ἀμερικῆς ὅπου ἐκαλλιεργεῖτο ἀνέ-

καθεν, ὁ καπνὸς καλλιεργεῖται πολὺ σήμερον εἰς τὴν Τουρκίαν, τὴν Βουλγαρίαν καὶ τὴν Γιουγκοσλαβίαν, αἵτινες παράγουσιν ἀρκετὰς ποσότητας ἐτησίως.

Τὸ γεώμηλον, ἡ ντομάτα, ἡ μελιτζάνα, ὁ στρύχνος ὁ μέλας, ἡ πιπεριά, ὁ καπνὸς κ.λ.π., παρουσιάζουν κοινὰ χαρακτηριστικά :

"Εχουν ἄνθη κανονικὰ μὲ πέντε πέταλα ἡνωμένα, πέντε στήμονας προσκεκολλημένους ἐπὶ τῆς στεφάνης, ὀσθήκην μὲ δύο χώρους, ἔνα στῦλον καὶ ἐν στίγμα.

'Ο καρπός των εἶναι ράξ ( γεώμηλον, ντομάτα, πιπεριά ) ἢ κάψα ( καπνός ).

Περιέχουν δηλητήριον ( σολανίνην, νικοτίνην, ἀτροπίνην ).

'Αποτελοῦν τὴν οίκογένειαν τῶν Σολανωδῶν, ὀνομασθεῖσαν οὕτως ἀπὸ τὴν σολανίνην, ἢ ἄλλως Στρυχνωδῶν.

## 2α Οίκογένεια : Ἡ ρανθῆ

### ΚΥΚΛΑΜΙΝΟΝ

Τὸ κυκλάμινον εἶναι φυτὸν πολυετές. 'Ο βλαστός του, βραχύς, ἔχει περιορισθῆ σχεδὸν εἰς ἕνα ὑπόγειον βλαστόν, κόνδυλον, ὃ ὅποιος φέρει ἐν μπουκέτῳ ἀπὸ φύλλα ( σχ. 79 ) μὲ κηληδας λευκὰς μὲν εἰς τὴν ἄνω ἐπιφάνειάν των, ἐρυθρωπάς δὲ εἰς τὴν κάτω, καὶ ὅψιν βελούδου.

"Ανθος. "Εχει κάλυκα μὲ πέντε σέπαλα, τὰ ὅποια ἔνουνται εἰς σωλῆνα σφαιροειδῆ, ὅστις παραμένει πέριξ τοῦ καρποῦ. Στεφάνην ἐν εἰδει σωλῆνος, ὃ ὅποιος σχίζεται εἰς τὸ ἄνω μέρος του σχηματίζων πέντε λοβούς. Πέντε στήμονας στερεωμένους εἰς τὸν σωλῆνα τῆς στεφάνης, ὑπέρον μὲ μίαν ὀσθήκην μονόχωρον, ἀπὸ τὸ βάθος τῆς ὅποιας ἐξέρχεται ὁ στῦλος. Πέριξ τῆς βάσεως τῆς ὀσθήκης εὑρίσκονται προσκεκολλημένα πολυάριθμα ωάρια.

Καρπός. 'Ο καρπὸς εἶναι κάψα καὶ ἀνοίγει διὰ 5 ὄπων σχηματιζομένων κατὰ τὸ ἄνω μέρος του. Διὰ τῆς καλλιεργείας οἱ κηπουροὶ ἀπέκτησαν διαφόρους παραλλαγὰς κυκλαμίνων μὲ μεγάλα καὶ πολύγρωμα πέταλα, τὰ ἄνθη τῶν ὅποιων χρησιμοποιοῦνται πρὸς στολισμόν.

"Ομοια φυτὰ εἶναι :

'Ηρανθές τὸ εύσημον, κοινῶς λούκούδι τῆς Λαμπρῆς λέγεται οὕτω διέτι ἡ ἄνθησίς του συμπίπτει μὲ τὰς ἑορτὰς τοῦ Πάσχα.

Ἡ μυοσωτίς (κν. μὴ μὲ ληγμόνει)· αὕτη ἔχει μικρά, λεπτά, κυανᾶ ἄνθη.

Τὸ λυσιμάχιον μὲ ἄνθη κίτρινα καὶ φύλλα φυσμένα ἀντιθέτως.

Τὰ ὡς ἔνω φυτά, καλλιεργούμενα ὡς φυτὰ καλλωπιστικά, ἔχουν κοινὰ χαρακτηριστικά:

Ἐχουν ἄνθη κανονικά μὲ κάλυκα ἐκ πέντε ἡνωμένων σεπάλων,



Σχ. 79. Κυκλάμινον : Α ἄνθος, Β κόνδυλος.

στεφάνην σωληνώδη πεντάλοβον, πέντε στήμονας, ὡθήκην μονόχωρον καὶ καρπὸν κάψαν.

Αποτελοῦσι τὴν οἰκογένειαν τῶν Ἡρανθῶν.

### 3η Οἰκογένεια: Ἐλαῖωδη

Τὸ κυριώτερον φυτὸν τῆς οἰκογενείας αὐτῆς εἶναι ἡ ἐλαῖα. "Τ- πάρχουσι περὶ τὰς 30 παραλλαγὰς ἐλαῖας, αἱ ὅποιαι προέρχονται ὅλαις ἀπὸ τὴν ἀγρίαν ἐλαῖαν, φυτὸν ἰθαγενὲς τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, Συρίας καὶ Ἑλλάδος. Εἶναι φυτὰ δειθαλῆ καὶ μακρόβια. Κοινότερον ἐκ τούτων εἶναι ἡ Ἐλαία ἡ Εύρωπαϊκή.

## Ε Λ Α Ι Α Η Ε ΥΡΩΠΑΙΚΗ

Είναι δένδρον φθάνον εἰς ὕψος τὰ 10 μέτρα. Φύεται εἰς τὰς Μεσογειακὰς χώρας, ἀλλὰ ὅχι εἰς πολὺν ὄρεινά μέρη, διότι δὲν ἀντέχει εἰς μεγάλας διαφορὰς θερμοκρασίας, οὔτε εἰς μεγάλα ψύχη. Εύδοκιμεῖ εἰς ὅλα τὰ ἐδάφη καὶ εἰς αὐτὰ ἀκόμη τὰ ἔηρά καὶ πετρώδη, διότι αἱ ρίζαι τῆς προγωροῦν εἰς βάθος ἐντὸς τῆς γῆς καὶ οὕτως εὑρίσκουν τὴν ἀναγκαῖον σαν εἰς αὐτὰ ποσότητα ὕδατος. Τοιωται ρίζαι εἰναι ἀναγκαῖαι καὶ διὰ τὴν συγκράτησιν τόσον μεγάλου δένδρου κατὰ τὰς θυελλώδεις ἡμέρας καὶ τὴν προφύλαξιν του ἀπὸ ἐκρίζωσιν. Ἡ ζωτικότης ἐπίσης τῶν ριζῶν εἰναι μεγίστη, διότι εἰναι δυνατὸν νὰ καταστραφῇ ὁ κορμὸς ἀπὸ φωτιάν, ἀπὸ ψυχῆς, ἀπὸ ἔντομα καὶ παράσιτα, ἢ νὰ κοπῇ, ἢ ρίζα ὅμως διατηρεῖται καὶ μᾶς δίδει νέους βλαστούς, οἱ ὄποιοι παράγουν νέα φυτά.

Ἡ ἐλαΐς εἰναι δένδρον μακρόβιον πολλαὶ ἐλαῖαι μερικῶν ἀπὸ τοὺς καὶ σήμερον ὑπάρχοντας ἐλαιῶνας ἐφυτεύθησαν πρὸ χιλιάδων ἑτῶν. Π.χ. ἐλαῖαι τοῦ ἐλαιῶνος τῆς Ἀττικῆς ἀπὸ τῆς ἐποχῆς τοῦ Περικλέους καὶ τοῦ ἐλαιῶνος τῶν Ἱεροσολύμων ἀπὸ τῆς ἐποχῆς τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ο κορμὸς τῶν νεαρῶν φυτῶν εἰναι λεῖος, ὅταν ὅμως ταῦτα μεγαλώσουν γίνεται δέρματος ( φέρει δηλαδὴ μεγάλους κόμβους ἢ ἔξογκωματα κατὰ μῆκός του ) εἰς μεγάλην ἡλικίαν κοιλαίνεται, γίνεται δηλαδὴ ἐσωτερικῶς κούφιος, εἰς δὲ τὰ πολὺν γηραῖα δένδρα ὀλόκληρος ὁ κορμὸς εἰναι ἐσωτερικῶς κοιλος ( κουφάλες τῶν γέρικων ἐλιῶν ).

Τὰ φύλλα τῆς εἰναι λογγισειδῆ, βραχύμισχα, χρώματος πρασινωποῦ εἰς τὴν ἄνω καὶ ἀνοικτοτέρου, κλίνοντος πρὸς τὸ λευκόν, εἰς τὴν κάτω ἐπιφάνειάν των. Περιβάλλονται ἀπὸ παχεῖαν ἐπιδερμίδα μὲ τρίχας εἰς τὴν κάτω ἐπιφάνειάν των, ἵνα μὴ δικτυνέωσι πολὺ τοῦτο διότι ἡ ἐλαΐς ζῇ εἰς ἔηρούς τόπους. Τὰ φύλλα φύονται ἀνὰ δύο ἀντιθέτως καὶ σταυρωτὰ εἰς τρόπον, ὥστε, ἀν καὶ πολλά, νὰ μὴ σκιάζουν τὸ ἐν τὸ ἄλλῳ καὶ νὰ προσβάλλωνται ὅλα ἀπὸ τὰς ἡλιακὰς ἀκτῖνας. Διατηροῦνται καὶ κατὰ τὸν χειμῶνα ( φυτὸν ἀειθαλές ) ( σχ. 80 ).

“Α ν θη. Τὰ ἄνθη εἰναι λευκὰ καὶ φύονται πολλὰ μαζὶ ( 15-20 ) ἀπὸ τὰς μασχάλας τῶν φύλων. Ἀπὸ αὐτὰ ὅμως μόνον 4 - 5 γονιμοποιοῦνται καὶ μεταβάλλονται εἰς καρπούς τὰ λοιπὰ πίπτουν. Ἀναφαίνονται κατ’ Ἀπρίλιον - Μάϊον καὶ ἔχουν κάλυκα μὲ τέσσαρας λοβούς, δύο στήμονας στερεωμένους ἐπὶ τοῦ σωλῆνος τῆς στεφάνης, ὡσθήκην

μὲ δύο χώρους καὶ εἰς ἔκαστον χῶρον δύο ὡάρια, ἐπίσης ἕνα στῦλον ὁ  
ὅποιος καταλήγει εἰς στίγμα δικρανωτόν.

Καρπός τῆς ἐλαίας (χοινώς επικ.) εἶναι εὔωδες· πάλιος δὲ  
σαρκώδης καὶ ἐλαιοῦχος, ἐσωτερικῶς ἔγρος καὶ ξυλώδης (πυρήν) καὶ  
περιέχει ἐν μόνον σπέρμα, διότι τὰ τρία ἄλλα ὀάρια (ἀπὸ τὰ τέσσαρα  
τὰ ὅποῖα περιέχει ἡ ωθήκη) δὲν γονιμοποιοῦνται. Ο τοιούτου εἴδους  
σαρκώδης καρπός λέγεται, καθὼς εἰδομεν (ἀμυγδαλῆ κ.λ.π.), δρύπη.  
Περιλαμβάνει τρία μέρη, τὸ ἐξωτερικὸν ὑμενῶδες (ἐξωκάρπιον), τὸ



**Σχ. 80. Ἐλαῖα.**

1. ἀγθοφόρος κλάδος, 2 ἄνθος, 3 καὶ 4 κλάδοι μὲ καρπούς.

μέσον σαρκῶδες καὶ ἐλαιοῦχον (ἐσωκάρπιον) καὶ τὸ ἐσωτερικὸν ἔν-  
λῶδες (ἐνδοκάρπιον). "Αωρος εἶναι πράσινος, ὅταν ὥριμάσῃ (ἀπὸ  
τοῦ Σεπτεμβρίου) γίνεται μέλας καὶ στιλπνός.

Καλλιέργεια και χρησιμότης. Αι ἑλαιίαι φυτεύονται πολλαὶ ὅμοι εἰς τόπους καλουμένους ἑλαιῶνας. Τοιούτους ἔχει ἡ Ἰ- σπανία, Μεσημβρινὴ Γαλλία, Ἰταλία, Δακιατία, Πορτογαλία, Μι- χρὰ Ἀσία, Συρία και Ἑλλάς. Εἰς τὴν Ἑλλάδα ἡ ἑλαιία καλλιεργεῖται πολὺ εἰς Λακωνίαν, Κρήτην, Μυτιλήνην, Κέρκυραν. Ἀπό τινων ἐτῶν

ήρχισε νὰ καλλιεργῆται καὶ εἰς τὴν Καλιφορνίαν καὶ Αὐστραλίαν, εἰς δὲς ὅμως τὰς χώρας ταύτας οὐδέποτε εἰς ὕψος ἀνά τῶν 700 μέτρων.

Εἶναι φυτόν, τὸ ὄποῖον δὲν εἶναι ἀπαιτητικὸν εἰς φροντίδας. Ξελάκκωμα γύρω απὸ τὰς ρίζας, διὰ νὰ διατηρῇ τὸ χῶμα ὑγρασίαν, λίπανσις καὶ κλάδευμα ἀπαξ τοῦ ἔτους ( πρὸ τῆς ἀνθοφορίας ) πρὸς ἀποκοπὴν τῶν περιττῶν κλάδων καὶ ἵνα ὁ χυμὸς χρησιμοποιῆται διὰ τὴν κατασκευὴν καρπῶν καὶ ὅχι ἔνδον, εἶναι ἀρκετὰ διὰ τὴν ἐλαίαν ( μαζὶ μὲ τὴν καταπολέμησιν τῶν διαφόρων νόσων τῆς καὶ τῶν καταστρεπτικῶν διὰ τὴν ἐσοδείαν ἐντόμων, ὅπως ὁ δάκος καὶ ὁ πυρηνοτρήτης ).

Καλλιεργεῖται διὰ τὸ ἐλαιον, τὸ ὄποῖον ἔξαγεται ἀπὸ τοὺς καρποὺς τῆς δι᾽ ἐκθλίψεως. Οἱ καρποὶ τρώγονται καὶ νωποί, ἀφοῦ προγονουμένως διὰ καταλλήλου ἐπεξεργασίας ἀφαιρεθῇ ἡ πικρὰ γεῦσίς των. Τὸ μετὰ τὴν ἔξαγωγὴν τοῦ ἐλαίου ὑπόλειμμα, οἱ ἐλαιοπυρῆνες, χρησιμοποιοῦνται πρὸς διατροφὴν ζῴων, ἰδίως χοίρων καὶ πουλερικῶν ( ἀνακατωμένοι μὲ πίτυρα ) ἢ πρὸς θέρμανσιν ἢ ὑφίστανται κατεργασίαν κατὰ τὴν ὄποιαν δι᾽ ἐνὸς ὑγροῦ ( διθειάνθρακος ἢ βενζίνης ) καὶ διὰ καταλλήλων μηχανημάτων ἀφαιρεῖται τὸ καὶ μετὰ τὴν ἐκθλιψίν παραμένον ἐντὸς αὐτῶν ἐλαιον ( πυρηνέλαιον ). Τοῦτο, ὡς μὴ κατάλληλον πρὸς βρῶσιν, χρησιμοποιεῖται διὰ τὴν κατασκευὴν σαπώνων. Οἱ ἀπομένοντες ἐλαιοπυρῆνες χρησιμοποιοῦνται ὡς καύσιμος ὕλη. Ἡ Ἑλλάς ὡς χώρα ἐλαιοπαραγωγός, δὲν δύναται νὰ καταναλώσῃ εἰς τὸ ἐσωτερικόν της δῆλην τὴν ποσότητα τοῦ παραγομένου ἐλαίου καὶ ἔξαγει ἀρκετὸν ἐλαιον εἰς τὸ ἐξωτερικόν.

Τὸ ἔνδον τῆς ἐλαίας χρησιμοποιεῖται ὡς καύσιμος ὕλη· χρησιμοποιεῖται ἐπίσης εἰς τὴν τορνευτικήν, διότι στιλβοῦται εὔκολως. Οἱ χλωροὶ κλάδοι τῆς ἀποτελοῦν ἀρίστην τροφὴν διὰ τὰ ζῷα, ἰδίως τὰς αἴγας.

Οἱ κλάδοι τῆς ἐλαίας εἶναι τὸ σύμβολον τῆς εἰρήνης· ἡ περιστερά, μετὰ τὸν Κατακλυσμόν, ἔφερεν εἰς τὸν Νῶν κλάδον ἐλαίας καὶ διὰ κλάδου ἀγρίας ἐλαίας ( κότινος ) ἐστεφανοῦντο εἰς τὴν ἀρχαίαν Ἐλάδα οἱ Ὀλυμπιονῖκαι.

Πολλαπλασιάζεται διὰ σπερμάτων· τὰ δένδρα ὅμως, τὰ ὄποια προέρχονται ἐκ τούτων ὅμοιάζουν μὲ τὴν ἀγρίαν ἐλαίαν καὶ πρέπει νὰ τὰ ἐμβολιάσωμεν. Διὰ τοῦτο χρησιμοποιοῦνται ἄλλοι τρόποι πολλαπλασιασμοῦ, ὡς εὔκολώτεροι. Τοιούτοι εἶναι :

α) Διὰ παραφυάδων. Αἱ παραφυάδες ( καθὼς εἰδομεν καὶ εἰς

τὴν ροδῆν) εἶναι κιλάδοι, οἱ ὄποῖοι ἐκφυόμενοι ἀπὸ τὴν ρίζαν τῆς ἐλαί-  
ας, ἔγουσι καὶ διέγχας ρίζας. Ἀποσπώμενοι οὗτοι μὲ προσοχήν, διὰ νὰ  
μὴ καταστραφοῦν αἱ ρίζαι τῶν, δύνανται νὰ μεταφυτευθοῦν καὶ νὰ δώ-  
σουν νέα φυτά.

β) Διὰ μοσχευμάτων. Τεμάχια κιλάδων μάκους 25 - 30 ἑκατο-  
σταμέτρων ἀποσπῶνται ἀπὸ τὴν μασχάλην των (ξεμασχαλίζονται)  
καὶ γώνονται εἰς ἔδαφος ἐσκαμμένον καὶ λιπασμένον καλῶς (ἐλαιοπε-  
ρίβολον κοινῶς λεγόμενον). Ἐκεῖ ἀποκτῶσι ρίζας καὶ μεταβάλλονται  
εἰς νεαρὰ φυτά, τὰ ὄποια ὅταν μεγαλώσουν ἀρκετά (γροθάρια κοινῶς  
εἰς νεαρὰ φυτά), ἐκριζώνονται μὲ προσοχὴν διὰ νὰ μὴ καταστραφοῦν αἱ ρί-  
ζαι τῶν καὶ μεταφυτεύονται ὅπου χρειάζεται. (Τοιοῦτον εἶδος πολλα-  
πλασιασμοῦ εἴδομεν καὶ εἰς τὴν ροδῆν).

Α σθένειαι τῆς ἐλαίας ὀφείλονται κυρίως εἰς  
ἔντομα. Ταῦτα εἶναι:

α) Ο δάκος. "Εντομον δίπτερον, ὅπως ἡ κοινὴ μυῖα, ἀλλὰ μι-  
κρότερον κατὰ τὸ  $\frac{1}{2}$ , ταύτης (σχ. 81).



Σχ. 81. Δάκος ἐπάνω εἰς καρπὸν  
ἐλαίας.


Η καταστροφὴ αὐτὴ δὲν εἶναι  
ἐκπληκτική, δεδομένης τῆς ταχύτη-

τος, μὲ τὴν ὄποιαν τὸ ἔντομον πολλαπλασιάζεται. Διότι ἐν ἔντομον,  
τὸ ὄποιον ἀρχίζει νὰ γεννᾶ κατὰ 'Ιούλιον, φθάνει νὰ δώσῃ μέχρι τοῦ  
τέλους τοῦ θέρους, μὲ τοὺς ἀπογόνους του πολλαπλασιάζομένους καὶ αὐ-  
τούς, περὶ τὰ 3 ἑκατομμύρια ἐντόμων. Καταπολεμεῖται διὰ τῆς καταστρο-  
τούς, περὶ τὰ 3 τελείουν ἔντομου, τὸ ὄποιον τρέφεται μὲ γλυκεράς ούσιας. Πρὸς

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

τοῦτο ψεκάζουν τὰ δένδρα μὲ τοιαύτας οὐσίας, εἰς τὰς ὁποίας ἔχουν προσθέσει δηλητήριον, ἢ κρεμοῦν εἰς τὰς ἐλαίας δοχεῖα μὲ γλυκεράς οὐσίας δηλητηριασμένας, τὰς ὁποίας τὸ ἔντομον τρώγει καὶ δηλητηριάζεται.

β) πυρηνοτρήτης (σχ. 82). Ὁλιγώτερον ἐπιζήμιος τοῦ δάκου ὁ πυρηνοτρήτης εἶναι ἔντομον λεπιδόπτερον. Κάμνει τρεῖς γενεάς κατ' ἕτος. Ἡ πρώτη ἐμφανίζεται κατὰ Φεβρουάριον καὶ προσβάλλει τὰ φύλλα, ἡ δευτέρα κατὰ Μάϊον καὶ προσβάλλει τὸ ἄνθος, καὶ ἡ τρίτη κατὰ Ἰούνιον καὶ Ἰούλιον αὕτη γεννᾷ ὡά, ἀνὰ ἐπὶ ἑκάστου καρποῦ. Ἀπὸ τὰ ὡά ἐξέρχεται σκώληξ, ὃστις διατρυπᾷ τὸν καρπὸν καὶ εἰσδύει εἰς τὸν



Σχ. 82. Πυρηνοτρήτης. (ἀριστερὰ τέλειον ἔντομον, εἰς τὸ μέσον κάμπη πυρῆτη νοτρήτου, δεξιὰ ὡάν του).

μὴ ἀποξυλωθέντα ἀκόμη πυρῆνα, τὸν ὁποῖον κατατρώγει. Μόλις ἡ ἐλαία ἀρχίσῃ νὰ ὠριμάζῃ, δηλαδὴ περὶ τὰς ἀρχὰς Σεπτεμβρίου, ἐξέρχεται ὁ σκώληξ διὰ μιᾶς ὀπῆς, τὴν ὁποίαν κάμνει πλησίον τοῦ καρποῦ, ὃστις διὰ τοῦτο εἰς τὸν ἐλάχιστον ἀνεμον πίπτει, ἐνῷ ἀκόμη δὲν ἔχει ὠριμάσει. Καταπολεμεῖται, ἀν τὸ βράδυ ἀνάψωμεν, εἰς διαφόρους θέσεις τοῦ ἐλαιῶνος καὶ ἐπὶ 1 - 2 ὥρας, φανούς, τὸ φῶς τῶν ὁποίων προσελκύει τὰ ἔντομα καὶ οὗτα ταῦτα καίονται καὶ καταστρέφονται, διότι ἡ συλλογὴ καὶ καῦσις τῶν προσβεβλημένων κλάδων εἶναι πολὺ δύσκολος.

γ) Ἡ βαμβακίασις. Ἡ ἀσθένεια αὕτη ὀφείλεται εἰς μικρὸν ἡμίπτερον ἔντομον τὸ ὁποῖον μετατοπίζεται μὲ πηδήματα, διπλῶς ὁ ψύλλος, καὶ δι' αὐτὸν λέγεται ψύλλα. Εἰς τὸ μέρος ὃπου τὸ ἔντομον τοῦτο ἐναπο-

θέτει τὰ ὡρά του ( τοὺς τρυφερωτέρους κλάδους ) βλέπομεν μίαν βαμβακώδη οὐσίαν. Τὸ ἔντομον τοῦτο τρώγει καὶ ξηραίνει τὰ ἄνθη.

"Ομοια πρὸς τὴν ἐλαίαν φυτὰ εἶναι τὰ ἑξῆς :

"Ιασμός ὁ φαρμακευτικὸς ( κν. γιασεμί ). Φυτὸν θαμνῶδες, ιθαγενὲς τῶν Ἰνδιῶν, μὲ φύλλα σύνθετα καὶ ἀντίθετα. "Εχει ἄνθη πολὺ εὔσομα, ἀπὸ τὰ ὅποια διὰ καταλήκου ἐπεξεργασίας ἐξάγουν εὔσομώτατον ἔλαιον, τὸ ἰασμέλαιον.

**Μελία ἡ κοινὴ** ( κν. μελιά ). Μέγα δένδρον ὕψους μέχρι 30 μέτρων. Απαντᾶται εἰς ὀρεινοὺς τόπους, ίδιως εἰς Αἰτωλίαν, Ἡπειροντραν. Ἀπαντᾶται εἰς ὀρεινοὺς τόπους, ίδιως εἰς Αἰτωλίαν, Ἡπειροντραν. "Εχει ἔύλον ἀρίστης ποιότητος, συμπαχές καὶ ἐλαστικόν, τὸ ὅποιον χρησιμοποιεῖται εἰς τὴν ἐπιπλοποίην καὶ τὴν ἀμαζοποίην.

**Πασχαλιά.** "Εχει ὕψος 3 - 4 μέτρων, εὐδοκιμεῖ εὐκόλως, ἀλλὰ ζῆ μόνον 30 - 40 ἔτη. Υπάρχουν πολλαὶ παραλλαγαὶ τῆς μὲ ἄνθη ιόχροι, ροδόχροι, ἐρυθρὰ καὶ λευκά, τὰ ὅποια εἶναι εὔσομα. "Η ἐλαία, τὸ γιασεμί, ἡ μελία, ἡ πασχαλιά, παρουσιάζουν κοινὰ χαρακτηριστικά :

"Εχουσιν ἄνθη κανονικὰ μὲ δύο στήμονας ἡνωμένους μὲ τὴν στεφάνην, ἡ ὅποια ἀποτελεῖται ἀπὸ 4 ἢ 5 πέταλα ἡνωμένα ὀδοθήκην μὲ φάνην, τὰ ὅποια αὐτοφύεστα εἰναὶ τὸ πέταλον τοῦ πεπτού, διάφανον, καὶ δύο ὀάρια εἰς ἔκαστον γῷρον, καὶ φύλλα ἀντίθετα.

"Αποτελοῦσι τὴν οἰκογένειαν τῶν Ἐλαιωδῶν.

#### 4η Οἰκογένεια : Χειλανθῆ

Εἰς τὴν οἰκογένειαν αὐτὴν ἀνήκουσι πολλὰ φυτὰ κοινότατα εἰς τὴν Ἑλλάδα. "Ἐν ἀπὸ τὰ κοινότερα εἶναι τὸ

#### ΛΑΜΙΟΝ ΤΟ ΛΕΥΚΟΝ


( κν. λαβρόχορτο )

Τὸ λάμιον εἶναι φυτὸν ποωδεῖς καὶ πολυετές, τὸ ὅποιον ἀνευρίσκεται αὐτοφύὲς παντοῦ ( εἰς κήπους, ἀγρούς, δάση κλπ. ). Ο βλαστός του, ὕψους 60 ἑκατοστῶν τοῦ μέτρου, εἶναι τετράγωνος, χρουδωτὸς

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

( σχ. 83 ), μὲ γόνατα πλήρη καὶ κενὰ ( κούφια ) τὰ μεσογονάτια διαστήματα. Οὕτως ὁ βλαστός του ἀποτελεῖται ἀπὸ πολλοὺς μικροὺς κοίλους σωλῆνας, πρᾶγμα, τὸ ὅποιον τὸν καθιστᾷ στερεώτερον.

Φύλλα. Ταῦτα φύονται ἀνὰ δύο καὶ ἀντιθέτως· εἶναι ὀδοντωτά, τριχωτὰ καὶ ὄμοιάζουν πολὺ μὲ τὰ φύλλα τῆς κνίδης· μὲ τὴν ὄμοιότητά των αὐτὴν προφυλάσσουν τὸ φυτὸν ἀπὸ τὰ φυτοφάγα ζῷα. Τὸ φαινόμενον τοῦτο, κατὰ τὸ ὅποιον ἐν φυτὸν ὄμοιάζει πρὸς ἄλλο, τὸ ὅποιον ἀποφεύγουν τὰ φυτοφάγα ζῷα καὶ οὕτω προφυλάσσεται, τὸ λέγομεν ἀμιητισμόν. Τὰ ὑπεράνω μὲ τὰ ἀμέσως ὑποκάτω τούτων φύλλα ἔκ-



Σχ. 83. Λάμιον τὸ λευκόν

"Ανθος

Καρπὸς


Τομὴ ἄνθους

φύονται κατὰ τρόπον, ὡστε νὰ σχηματίζουν σταυρὸν καὶ οὕτω νὰ μὴ σκιάζουν τὰ μὲν τὰ δέ. Αἱ τρίχες τῶν φύλλων εἰς τὸ ἄνω μέρος των εἶναι ἔξωγκωμέναι καὶ φέρουν ἀδένας μὲ οὔσιαν μᾶλλον εὐχαρίστου ὀσμῆς.

"Ανθη. Τὰ ἄνθη τοῦ λαμίου ἐκφύονται πολλὰ μαζὶ εἰς τὰς μασχάλας τῶν ἀνωτέρων ( τῶν πλησίον πρὸς τὴν κορυφὴν ) φύλλων του, ἀπὸ τοῦ Ἀπριλίου μέχρι τοῦ Ἰουνίου, καὶ δὲν εἶναι κανονικά. "Εχουσι καλύπτραν ἐν εἰδεί σωλῆνος, ὁ ὅποιος εἰς τὸ ἐπάνω μέρος ἀφήνει 5 ὀξεῖς ὀδόντας. 'Η στεφάνη, σωληνωτὴ ἔξ ἀρχῆς, σχηματίζει εἰς τὸ ἄνω μέρος τῆς δύο χειλῶν τὸ ἀνώτερον σχηματίζεται ἀπὸ 2 πέταλα ἡνωμένα καὶ τὸ κατώτερον ἀπὸ 3. Εἰς τὸ βάθος τῆς στεφάνης σχηματίζεται νέκταρ,

τὸ ὄποιον ἔρχονται καὶ ἀπομυζοῦν ἔντομα μὲ μεγάλην προβοσκίδα ( διὰ νὺ φθάσουν τὸ νέκταρ, ἐπειδὴ ὁ σωλήνη εἶναι βαθύς ). Ταῦτα παραλαμβάνουν τὴν γυρῖν εἰς τοὺς πόδας καὶ τὰς τρίχας των καὶ τὴν μεταφέρουν εἰς ἄλλα ἄνθη. Τὸ ἄνθος ἔχει 4 στήμονας, 2 μεγάλους καὶ 2 μικρούς, προσκεκολλημένους εἰς τὸν σωλῆνα τῆς στεφάνης. Ὁ ὑπερος ἀποτελεῖται ἀπὸ μίαν ὠσθήκην μὲ 4 χώρους ( τετράχωρον ), ἐκαστος δὲ χῶρος περιέχει ἀνὰ ἓν ὡάριον· ὑπάρχει καὶ ἔνας στῦλος, ὁ ὄποιος καταλήγει εἰς διχαλωτὸν στίγμα ( σγ. 83 ).

Καρπός. Ὁ καρπὸς ἀποτελεῖται ἀπὸ 4 ἀγαίνια ( τετραγαί-



Σχ. 84. Λάμιον τὸ λευκόν. 1 ριζωμα, 2 βλαστὸς ὑπέργειος,  
3 ριζωμα, 4 νέοι ὑπόγειοι βλαστοί, 5 φυλλίδια.

νιον ), μένει δὲ κλεισμένος ἐντὸς τοῦ κάλυκος καὶ παραμένει ἐπὶ τοῦ φυτοῦ καὶ μετὰ τὴν ὡρίμανσίν του.

Πολλαπλασιασμός. Τὰ ἀγαίνια τοῦ λαμίου, πίπτοντα ἐπὶ τοῦ ἐδάφους, φυτρώνουν καὶ δίδουν νέα φυτά. Τὰ φυτὰ ταῦτα ἀναπτύσσουν ὑπογείους βλαστούς, ριζώματα ( σχ. 84 ), οἵτινες ἀπὸ τὰ ἄκρα των, κατὰ τὴν ἐπομένην ἄνοιξιν, δίδουν νέους βλαστούς αὐτοί, μὲ τὴν σειράν των, θά ἀναπτύξουν ριζώματα, τὰ ὅποια θὰ δώσουν ἄλλους βλαστούς κ.ο.κ. Μὲ τὴν πάροδον τοῦ χρόνου, τὰ παλαιότερα μέρη τοῦ ριζώματος σήπονται καὶ μένουν οἱ νέοι βλαστοί ἀνεξάρτητοι, συγματίζοντες οὕτω νέα φυτά. Τὸ φθινόπωρον, δὲν τὸ ἔκτὸς τοῦ ἐδάφους φυτὸν ξηραίνεται, μένει ὅμως τὸ ριζωμα, τὸ ὄποιον κατὰ τὴν ἐπομένην

ἀνοιξιν θὰ δώσῃ νέον φυτόν. Τοῦτο φαίνεται καλύτερον εἰς ἐν ἄλλῳ,  
ὅμοιον μὲ τὸ λάμιον φυτόν, τὸ ὅποῖον εἶναι :

‘**Η μίνθη ἡ πιπερώδης ἡ ἡδύοσμος** (κν. δυόσμος).’ Εάν ἐκρι-  
ζώσωμεν ἔνα ἡδύοσμον, θὰ ἴδωμεν ἐντὸς τοῦ χώματος, ἐκτὸς τῆς ρίζης,  
καὶ μέρος τοῦ φυτοῦ ἀπὸ τὸ ὅποῖον ἐκφύεται ὁ ὑπέργειος βλαστός,  
καὶ τὸ ὅποῖον ἐκ πρώτης ὅψεως ἐκλαμβάνομεν ὡς ρίζαν. Προσεκτικω-  
τέρα ὅμως παρατήρησις μᾶς πείθει, ὅτι δὲν πρόκειται περὶ ρίζης, ἀλλὰ  
περὶ ὑπόγειου βλαστοῦ (ριζώματος), διότι ἐπ’ αὐτοῦ εὑρίσκομεν μικρὰ  
περγαμηνοειδῆ λευκωπὰ φυλλίδια (μικρὰ φύλλα) (σχ. 84, 5). ‘Ο  
ὑπόγειος οὗτος βλαστὸς διακλαδίζεται ἐντὸς τοῦ ἐδάφους, ὅπως ὁ ὑπέρ-  
γειος ἐκτὸς αὐτοῦ, καὶ δίδει ἀπὸ διαστήματος εἰς διάστημα ὑπεργείους  
βλαστούς, οἱ δόποι οἱ ἀποτελοῦν νέους ἡδύοσμους εὐθὺς ὡς τὸ ἀρχικὸν  
φυτὸν ξηρανθῆ. Τὰ φύλλα τοῦ ἡδύοσμου ἔχουν εἰς τὴν κάτω ἐπιφάνειάν  
των ἀδένα μὲ νύγρῳ λιδαζούσης ἥδείας (εὐχαρίστου, γλυκείας) ὀσμῆς  
ἔξ οὖ καὶ τὸ ὄνομά του. ’Εκ τοῦ ὑγροῦ τούτου ἔξαγεται τὸ μινθέλαιον  
(ἔλαιον τῆς μέντας).

“Αλλα φυτὰ ὅμοια μὲ τὸ λάμιον εἶναι :

**Μίνθη ἡ πολιὰ** (κν. φλισκούνι). ’Εξ αὐτῆς παράγεται ἡ μιν-  
θόνη τῶν φαρμακείων.

**Λιβανωτὴ ἡ γνησία** (κν. λεβάντα) (σχ. 85). Κάμνει ἀνθη κυα-  
νᾶς ἡ λόχροα, διατεταγμένα κατὰ μικροὺς στάχεις. Καλλιεργεῖται ὡς  
φυτὸν στολισμοῦ καὶ διὰ τὸ ἀρωμάτης. ’Ο λαὸς τὴν χρησιμοποιεῖ πρὸς  
ἀρωματισμὸν τῶν ἐνδυμάτων καὶ προφύλαξιν τῶν μαλλίνων εἰδῶν ἀπὸ  
τὸν σκόρον (ἐντομον, αἱ κάμπαι τοῦ ὅποιου τρώγουσι τὰ μάλλινα ἐν-  
δύματα).

**Λιβανωτὴ ἡ φαρμακευτικὴ** (κν. δενδρολίβανο). Εἶναι θάμνος  
μὲ ὀσμὴν εὐάρεστον καὶ φύλλα τραχέα καὶ χνουδωτά, διὰ νὰ μὴ δια-  
πνέουν πολύ, ἐπειδὴ τὸ φυτὸν ζῆ εἰς ξηρὰ καὶ θερμὰ μέρη. Χρησιμοποι-  
εῖται εἰς τὴν μαγειρικὴν διὰ νὰ ἀρωματίζῃ ώρισμένα φαγητά, ὅπως π.χ.  
τὸ στυφάδο.

**Μέλισσα ἡ ιατρικὴ** (κν. μελισσόχορτο). ’Ελελίφασκος δὲ εύ-  
χρους (κν. φασκομηλιὰ) (σχ. 86). **Σιδερίτης δὲ τείοσμος** (κν. τσάι  
τοῦ βουνοῦ), δὲ ὅποιος φύεται ἐπὶ τῶν ὑψηλῶν ὄρέων τὸ ἀφέψημα τῶν  
δύο τούτων τελευταίων φυτῶν πίνεται. **Θύμος δὲ κεφαλωτὸς** (κν. θυ-  
μός τούτων τελευταίων φυτῶν πίνεται).

μάρι ). Ὁρίγανον τὸ κοινὸν ( κν. ρίγανη ). "Ωκιμον τὸ βασιλικὸν ( βασιλικός ). Ὁρίγανον τὸ σάμψυχον ( μαντζουράνχ ). "Απαντα τὰ φυτὰ ταῦτα ἔχουσιν ἀρωματικὸν αἰθέριον ἔλαιον εἰς τὰ φύλλα των καὶ τὸν βλαστὸν των, ἔχουσι δὲ ἄνθη ὅμοια πρὸς τὰ τοῦ λαχίου. Τὰ περισσότερα τῶν ὡς ἄνω φυτῶν χρησιμοποιοῦνται εἰς τὴν ἀρωματοποΐαν.

Τὸ λάμιον τὸ λευκόν, ὁ ἥδυοσμος, τὸ φλισκούνι, ἡ λεβάντα, τὸ



Σχ. 85. Λιβανωτὴ ἡ γνησία  
( λεβάντα ).



Σχ. 86. Ἐλελίφασκος ὁ εὐ-  
χρους ( φασκομήλια ).

μελισσόχορτο, ἡ φασκομηλιά, τὸ τσάι τοῦ βουνοῦ, τὸ θυμάρι, ἡ ρίγανη, ὁ βασιλικός καὶ ἡ μαντζουράνχ, παρουσιάζουν κοινὰ χαρακτηριστικά :

"Ἔχουσιν ἀδένας μὲν ἀρωματικὸν ἔλαιον, φύλλα ἀπλᾶ καὶ ἀντίθετα, κάλυκα τῶν ἀνθέων σωληνοειδῆ μὲν χείλη σχιζόμενα εἰς πέντε ὀδόντας, ὁ ὄπιος παραμένει ἐπὶ τοῦ καρποῦ. "Ἔχουσι στεφάνην ἀκανόνιστον σχηματίζουσαν δύο χείλη, τέσσαρας στήμονας, ὑπερον ἀπὸ δύο καρπόφυλλα ἡγνωμένα, μίαν ὀσθήκην μὲν τέσσαρας χώρους ( τετράχωρον ) καὶ ἀνὰ ἓν ὀλίγῳ εἰς ἕκαστον γῶρον. Καρπὸς ἀπὸ 4 ἀγαίνια ( τετραγαίνιον ).

"Αποτελοῦν τὴν οἰκογένειαν τῶν χειλανθῶν ( διέτι τὸ ἄνθος των φέρει δύο χείλη ).

## 5η Οίκογένεια : Ὁροβάγχωδη

### ΟΡΟΒΑΓΧΗ

( κν. λύκος )

Είναι φυτόν ποιῶδες, μονοετές, τὸ όποιον δυνάμεθα νὰ εὔρωμεν κυρίως εἰς ἀγρούς φυτευομένους μὲ κυάμους ( κουκιὰ ) ἢ εἰς μέρη ὅπου φύεται θυμάρι. Ὁ βλαστός του είναι ἄνευ κλάδων, σαρκώδης, ἐρυθρὸς ἢ κιτρινωπός, μὲ μικρὰ κοκκινωπὰ σκληρὰ φυλλάρια.

"Αν σκάψωμεν τὸ χῶμα γύρω απὸ τὴν βάσιν τοῦ βλαστοῦ μὲ προσοχήν, ὥστε νὰ μὴ καταστρέψωμεν τὸ ἐντὸς τοῦ χώματος μέρος τοῦ φυτοῦ, θὰ εὕρωμεν ἐν ὑπόγειον τυμῆμα, δηλαδὴ ρίζωμα, βραχὺ. Ἀπὸ τὴν κάτω ἐπιφάνειαν τοῦ ριζώματος θὰ παρατηρήσωμεν, ὅτι ἐκφύονται ρίζαι, αἱ ὅποιαι δημιῶσ δὲν εἰσχωροῦν εἰς τὸ χῶμα ἀλλὰ προσκολλῶνται στερεῶς ἐπὶ τῶν ριζῶν ἐνὸς κυάμου ἢ καὶ ἄλλων φυτῶν, ὅπως π.χ. τοῦ θυμαριοῦ ( σχ. 87 ). Αἱ ρίζαι αὐτοῖς δὲν χρησιμεύουν εἰς τὸ φυτόν διὰ νὰ λαμβάνῃ ὕδωρ καὶ ἄλλατα ἀπὸ τὸ ἔδαφος, ἀλλὰ διὰ νὰ ἀπομυζᾶσθαι δι' αὐτῶν τὸν ἔτοιμον θρεπτικὸν χυμόν, ὁ ὄποιος κυκλοφορεῖ εἰς τὰς ρίζας τοῦ κυάμου, τοῦ θυμαριοῦ κλπ.



Σχ. 87. Ὁροβάγχη ( κν. λύκος ) ἐπὶ ριζῶν θύμου τοῦ κεφαλωτοῦ ( θυμαριοῦ ).

Διατί ζῇ οὕτως ἡ ὄροβάγχη; Εἴδομεν ἀνωτέρω ὅτι ἡ ὄροβάγχη δὲν ἔχει χρῶμα πράσινον. Τοῦτο, διότι στερεῖται χλωροφύλλης· ἐπομένως δὲν δύναται νὰ ἀφομοιώσῃ καὶ κατασκευάσῃ θρεπτικὸν χυμὸν μόνη της. Πρέπει νὰ εὔρῃ αὐτὸν ἔτοιμον καὶ τὸν εύρισκει εἰς τὰς ρίζας τοῦ κυάμου ( ἀλλὰ καὶ ἄλλων φυτῶν, π.χ. τοῦ θύμου, φασιόλου, τριφυλλίου, καπνοῦ κ.λ.π. ) ἀπὸ ὅπου τὸν ἀπομυζᾶ. Αἱ ρίζαι τοῦ κυάμου, θύμου κ.λ.π. μὴ λαμβάνουσαι τὸν θρεπτικὸν χυμόν, ὁ ὄποιος τοὺς χρειάζεται διὰ νὰ αὐξηθῶσι, γίνονται ἀτροφικαὶ καὶ ἀτροφικὸν γί-

νεται και δλόκληρον τὸ φυτόν, τὸ ὄποῖον εἰς τὸ τέλος πολλάκις ξηραί-  
νεται. Μόλις τοῦτο ξηρανθῇ, ξηραίνεται και ἡ δροβάγχη, προφθάνει  
ὅμως νὰ κάμη ἄνθη και καρπούς, τὰ σπέρματα τῶν ὄποίων, πίπτοντα ἐπὶ<sup>τοῦ</sup> ἐδάφους, δίδουν τὸ ἐπόμενον ἔτος νέα φυτό.

Τὰ φυτὰ ὅπως ἡ δροβάγχη, τὰ ὄποια δηλαδὴ τρέφονται εἰς βάρος  
ἄλλων φυτῶν, μὲ θρεπτικὰ συστατικὰ ἔτοιμα, τὰ ὄποια παραλαμβά-  
νουν ἀπὸ τὰ φυτὰ αὐτά, τὰ λέγομεν παράσιτα.

Τὰ ἄνθη τῆς δροβάγχης εἶναι ἀκανόνιστα· ἔχουν πέντε σέπαλα  
και πέντε πέταλα ἡνωμένα, ὥστε νὰ σχηματίζουν ἔνα κιτρινωπὸν σω-

λῆνα, σχισμένον κατὰ τὴν κο-  
ρυφήν του εἰς πέντε λοβούς  
( ὅσα εἶναι και τὰ πέταλα ).  
‘Ο καρπὸς εἶναι κάψα· ὑπάρ-  
χουν ἐντὸς αὐτοῦ πολλὰ σπέρ-  
ματα, τὰ ὄποια εἶναι πολὺ<sup>μικρὰ</sup> και παρασύρονται εὐ-  
κόλως ὑπὸ τοῦ ἀνέμου διαδί-  
δοντα τὸ φυτὸν ἀπὸ τόπου εἰς  
τόπον.

‘Ο ἀγρός ἀπαλλάσσεται  
ἀπὸ τὸ παράσιτον αὐτό, ἀν  
ἐπὶ μίαν διετίαν τὸν φυτεύ-  
σωμεν μὲ σιτηρά, ὀπότε τοῦ-  
το, μὴ εύρεσκον τὰ φυτά, ἐπὶ<sup>τῶν</sup>  
ὄποίων παρασιτεῖ ( ἀπὸ<sup>τὰ</sup> ὄποια δηλ. δύναται νὰ  
τραφῇ ) καταστρέφεται.



Σχ. 88. Δακτυλίς

του και τὸν καρπὸν του, φυτὸν εἶναι :

‘Η Δακτυλίς ( σχ. 88 ), ποιῶδες φυτὸν μὲ μεγάλα πορφυρόχρονα  
ἄνθη· ἐξ αὐτῆς ἐξάγεται ἡ ντιζιταλίη, χρησιμοποιουμένη ὡς φάρμα-  
κον εἰς τὰς καρδιακὰς παθήσεις.

‘Η δροβάγχη και ἡ δακτυλίς μὲ ἄλλα ὅμοιά των φυτὰ ἔχοντα  
ἄνθη ἀκανόνιστα ἀπὸ 5 σέπαλα, 5 πέταλα ἡνωμένα εἰς πεντάλοβον

“Ομοιον πρὸς τὴν δρο-  
βάγχην, ὡς πρὸς τὸ ἄνθος

σωλῆνα, φύλλα ἀντίθετα καὶ καρπὸν κάψαν, ἀποτελοῦσι τὴν οἰκογένειαν τῶν Ὀροβαγχωδῶν.

### 6η Οἰκογένεια : Ἐρυθροδανοντοβαφίκον

(κν. ριζάρι)

Φυτὸν πολυετές, φέρον ρίζωμα, ἐκ τοῦ ὄποίου κατ' ἔτος ἐκφύεται νέος βλαστός.

Ἐκαλλιεργεῖτο ἀλλοτε διὰ τὰς ρίζας του, αἱ ὄποιαι ἐχρησιμοποιοῦντο διὰ τὴν κατασκευὴν βαφῆς ἐρυθρᾶς· ἡ καλλιέργειά του ὅμως ἐγκατελείφθη, ἀφ' ἣς ἀνεκαλύφθη ἡ βαφὴ διὰ χημικῶν μέσων (τὰ χρώματα τῆς ἀνιλίνης).

**Καφέα** (κν. καφές). Εἶναι θάμνος ἀειθαλής, μὲ φύλλα ἀντίθετα καὶ ἀνθη ευοσμα, ἐκφυόμενα ἀνὰ 3 - 5 ἀπὸ τὴν μασχάλην τῶν πλησίον τῆς κορυφῆς φύλλων (σχ. 89). Ὁ καρπὸς δμοιάζει πρὸς κεράσιον καὶ περικλείει δύο μικροὺς κόκκους, τὰ σπέρματα. Ἡ ἄνω ἐπιφάνεια τῶν σπερμάτων εἶναι κυρτή, ἡ δὲ κάτω ἐπίπεδος, διασχιζομένη ἀπὸ αὐλακα. Καθουρδιζόμενα καὶ μεταβαχλόμενα εἰς κόνιν τὰ σπέρματα, ἀποτελοῦν τὸν κοινῶς λεγόμενον καφέν, τὸ ἀφέψημα τοῦ ὄποίου εἶναι ποτὸν τονωτικόν, ὅταν δὲν γίνεται κατάχρησίς του· διότι διεγέρει τὸ νευρικὸν σύστημα, εἶναι δυναμωτικός καὶ καρδιοτονωτικός, λόγῳ μιᾶς οὐσίας, τῆς καφεΐνης, τὴν ὄποίαν περιέχει. Κατάχρησίς του ὅμως βλάπτει διότι προκαλεῖ ταχυκαρδίαν, ἀρρυθμίαν εἰς τοὺς σφυγμούς, ἀ-



Σχ. 89. Καφέα

'Ανθοφόρος κλάδος, τομὴ καρποῦ καὶ καρπός.

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

πνίας καὶ κεφαλαλγίας. Ἡ καφέα κατάγεται ἀπὸ τὴν Ἀβησσουνίαν, ἐκεῖθεν δὲ εἰσήχθη εἰς τὴν Ἀραβίαν, Ἰνδίας, Ἰάβαν καὶ Νότιον Ἀμερικήν. Ἡ Βραζιλία εἶναι σήμερον ἡ μεγαλύτερα παραγωγὸς τοῦ καφὲ κήγη.

**Κιγχόνη** (κν. κίνα) (σχ. 90). Φυτὸν ἀειθαλές μὲ φύλλα ἀντίθετα. Εἶναι αὐτοφυὲς τῶν Ἀγδεων τῆς Ν. Ἀμερικῆς, ὅπου φύεται εἰς ἀρκετὸν ὄψος. Ἐνεκλιματίσθη καὶ καλλιεργεῖται σήμερον εἰς Κεϋλάνην, Ἰάβαν, Ἰνδίας κ.λ.π. Οἱ Ὁλανδοὶ ἐφύτευσαν τοιαῦτα δένδρα εἰς τὴν Ἰάβαν, ὅπου ἔκχυμαν ὄλόκληρα δάση ἀπὸ αὐτά. Τὸ ἐσωτερικὸν μέρος τοῦ φλοιοῦ καὶ τὸ ξύλον, τριβόμενα καὶ μεταβαλλόμενα εἰς κόνιν, ἀποτελοῦν ἄριστον φάρμακον ἀντιπυρετικὸν καὶ τονωτικόν. Ἀπὸ αὐτὰ γίνεται τὸ κινίν, ἐπίσης ἀπὸ αὐτά, μαζὶ μὲ οἴνον, παρασκευάζεται ἐν τονωτικόν, τὸ κρασὶ τῆς κίνας.



Σχ. 90. Κιγχόνη (κν. κίνα)  
1 ἄνθος, 2 καρπός.

Τὸ ἐρυθρόδανον, ἡ καφέα, ἡ κιγχόνη, παρουσιάζουν κοινὰ χαρακτηριστικά :  
Ἐγουσὶ φύλλα ἀντίθετα, ἄνθη μὲ

στεφάνην ἀπὸ πέντε πέταλα ἥνωμένα, πέντε στήμονας προσκεκολημένους εἰς τὴν στεφάνην, ὠθήκην, μὲ δύο χώρους καὶ ἀνὰ ἐν ὀάριον εἰς ἔκαστον γῦρον.

Ἀποτελοῦσι τὴν οἰκογένειαν τῶν *Erythroxylacearum*.

## 7η Οἰκογένεια : Κολοκυνθώδη

### ΚΟΛΟΚΥΝΘΗ

Εἶναι φυτὸν ποώδεις, ἑτήσιον, τὸ δόποιον εὔδοκιμεῖ εἰς ἐδάφη ὑγρὰ ἢ ποτιστικά. Ἀν λάβωμεν ἐν φυτὸν κολοκύνθης καὶ τὸ ἐκριζώσωμεν μετὰ προσοχῆς, εἰς τρόπον ὥστε νὰ μὴ καταστραφοῦν αἱ ρίζαι του, θὰ

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

παρατηρήσωμεν ὅτι ἔχει πολλὰς λεπτὰς καὶ μακροτάτας ρίζας, αἵτινες ὅμως δὲν προχωροῦν κατὰ βάθος, ἀλλὰ μόνον πλαγίως, εἰς τὴν ἐπιφάνειαν δηλαδὴ τοῦ ἐδάφους. Δι’ αὐτὸν καὶ ἐπειδὴ καὶ τὰ φύλλα τῆς εἶναι μεγάλα καὶ ἐπομένως τὸ φυτὸν διαπνέει πολὺ, ἡ κολοκύνθη δὲν ἀντέγει εἰς τὴν ξηρασίαν.

Οὐ βλαστὸς τῆς κολοκύνθης εἶναι σαρκώδης καὶ δὲν δύναται νὰ στηριγθῇ μόνος του, διὰ τοῦτο ἀναρριχᾶται ἐπὶ ἄλλων φυτῶν ἢ στηρι-



Σχ. 91. Φυτὸν καὶ ἄνθη κολοκύνθης, α ἄνθος ἄρρεν,  
β ἄνθος θῆλυ, γ σπέρμα.

γμάτων, τὰ ὅποια συναντᾶ (βλαστὸς ἀναρριχώμενος) ἐπὶ τούτων συγκρατεῖται μὲν μικρὰς ἔλικας, διὰ τῶν ὅποιων ὑποστηρίζεται (σχ. 91). "Αν δὲν εὕρῃ ὑποστήριγμα, τότε ἔρπει ἐπὶ τοῦ ἐδάφους.

Τὰ φύλλα τῆς κολοκύνθης εἶναι παχέα μὲν πλατύ ἔλασμα, τὸ ὅποιον ἔχει νεύρωσιν παρομοίαν μὲν παλάμην (παλαμόνευρα), φέρουσι δὲ μακρόν, κοῖλον καὶ δυνάμενον νὰ περιστραφῇ μίσχον. Χάρις εἰς τοῦτον δύνανται τὰ φύλλα νὰ στρέφουν ἐκάστοτε τὴν ἐπιφάνειάν των πρὸς

τὸ μέρος τοῦ ἡγίου εἰς τρόπον, ὥστε νὰ δέχωνται περισσότερον φᾶς ( διὰ τὴν ἀφομοίωσιν ).

"Α ν θη . Ταῦτα εἶναι χωριστὰ τὰ ἄρρενα ἀπὸ τὰ θήλεα. Φέρουσι καὶ τὰ ἄρρενα καὶ τὰ θήλεα ἄνθη 5 σέπαλα καὶ 5 πέταλα ἡνωμένα, τὰ ὅποια εἰς τὴν κορυφὴν των ἀφήνουν ἐλευθέρους 5 δόδόντας εἰς τρόπον, ὥστε νὰ σχηματίζεται ἐν εἴδος χωνίου. "Έχουσι χρῶμα κίτρινον. Τὰ ἄρρενα ἔχουσι μόνον τὰ ἄρρενα ὅργανα τοῦ ἄνθους, δηλ. ἔνα στήμονα ἐλεύθερον καὶ δύο ὄμάδας ἀπὸ δύο στήμονας εἰς ἑκάστην ὄμάδα ἡνωμένους. Τὰ θήλεα φέρουν τὰ θήλεα ὅργανα, δηλ. τὴν ὀῳθήκην μὲ τὸν στῦλον καὶ τὸ στίγμα, καὶ ἐντὸς τῆς ὀῳθήκης πολλὰ ωάρια. Τὰ ωάρια τῶν θηλέων ἀνθέων γονιμοποιούμενα μὲ τὴν γῦριν τῶν ἀρρένων δίδουν τὰ σπέρματα, ἀτινα εὐρίσκονται ἐκτὸς τοῦ καρποῦ ( εἰς τὸν ὅποιον μεταβάλλεται ὠριμάζουσα ἡ ὀῳθήκη ) κατὰ σειρὰς καὶ περὶ τὸ κέντρον του.

Μέχρι τοῦδε συνηντήσαμεν ἄνθη, τὰ ὅποια ἔφερον καὶ στήμονας μὲ ἀνθῆρας καὶ ὑπερον μὲ ωάρια, δηλαδὴ τὰ ἄρρενα ( στήμονας μὲ τοὺς ἀνθῆρας ) καὶ τὰ θήλεα ( ὀῳθήκην μὲ τὰ ωάρια καὶ τὸν στῦλον ) ὅργανα εὐρίσκομεν ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ ἄνθου. Εἰς τὴν κολοκύνθην βλέπομεν ὅτι τὰ ἄνθη εἶναι εἴτε ἄρρενα ( μὲ στήμονας ) εἴτε θήλεα ( μὲ ὀῳθήκην ). Τὰ ἄνθη ταῦτα τὰ λέγομεν ἄνθη δίκλινα. Τὰ δίκλινα αὐτὰ ἄνθη φέρονται εἰς τὴν κολοκύνθην ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ φυτοῦ, τὸ ὅποιον διὰ τοῦτο λέγεται φυτὸν μόνοικον. Ἡ κολοκύνθη δηλαδὴ εἶναι φυτὸν μόνοικον καὶ ἔχει ἄνθη δίκλινα.

Κολοκύνθης ἔχομεν διαφόρους παραλλαγάς, διαφερούσας ἀλλήλων κατὰ τὸ σχῆμα, τὸ μέγεθος καὶ τὴν γεῦσιν τοῦ καρποῦ. Μία παραλλαγὴ ταύτης, ἡ γλυκοκολοκύνθη, δίδει γλυκεῖς καρποὺς ( γλυκοκολόκυθα κοινῶς καλουμένους ). Ἀπὸ τὰ σπέρματα τῆς κολοκύνθης παρασκευάζεται τὸ πασατέμπο.

Φυτὰ ὄμοια πρὸς τὴν κολοκύνθην εἶναι :

**Σικυδεὶς δὲ ἥμερος** ( κν. ἀγγουριά ). Οἱ καρποί του, ἐπιμήκεις, εἶναι ἡδύτεροι τὴν γεῦσιν ἀπὸ τοὺς τῆς κολοκύνθης καὶ τρώγονται ώμοι. Μικροὶ παρασκευάζονται ἐντὸς ὁξους ( τουρσί ).

**Μηλοπέπων** ( κν. πεπονιά ). **\*Υδροπέπων** ( κν. καρπουζιά ). Εἶναι φυτὰ ὄμοια πρὸς τὰ ἀνωτέρω μὲ καρποὺς γλυκεῖς καλλιεργούμενα διὰ τούτους. Οἱ καρποί των δὲν εἶναι πολὺ θρεπτικοί, λόγῳ τῆς μεγάλης ποσότητος ὄδατος τὸ ὅποιον περιέχουν.

**Βρυωνία** (κν. χούμελη). Είναι φυτόν κοινότατον εἰς τοὺς ἀγροὺς καὶ τοὺς φράκτας, ἀναρριχώμενον μὲ τὴν βοήθειαν τῶν ἑλίκων, τὰς ὄποιας φέρει ( ὅπως καὶ ἡ κολοκύνθη ). Κάμνει ἄνθη ὑπόλευκα καὶ καρποὺς ἐρυθρούς τὰ φύλλα τῆς προστριβόμενα διὰ τῶν δακτύλων ἀναδίδουσιν ὀσμὴν δυσάρεστον προξενοῦσαν ναυτίαν. "Εχει χονδρὸν καὶ ἀμυλοῦχον ὑπόγειαν βλαστὸν (ρίζωμα), ὁ ὄποῖος περιέχει οὐσίαν τινά, τὴν βρυωνίην, ἥτις εἶναι ἰσχυρὸν καθαρτικόν.

Τὰ ὡς ἄνω φυτὰ ὁμοιάζουν ως πρὸς τὸν βλαστόν, τὰ ἄνθη καὶ τοὺς καρποὺς των. Διὰ τοῦτο ἀποτελοῦν μίαν οἰκογένειαν, τὴν οἰκογένειαν τῶν *Κολοκυνθωδῶν*.



Σχ. 91α. Ἀνθυσφόρος βλαστὸς βρυωνίας (κν. χούμελης) μετὰ τῶν ἑλίκων, διὰ τῶν ὄποιων ἀναρριχᾶται.

## 8η Οἰκογένεια : Αἰγοκληματώδη

### ΑΙΓΟΚΛΗΜΑ

Είναι γνωστότατον φυτόν, πολυετές, μὲ βλαστὸν ξυλώδη, ἀναρριχώμενον καὶ φύλλα ἀντίθετα. "Εχει ἄνθη μεγάλα, εὔσομα, λευκοκίτρινα, ἐκφυόμενα πολλὰ μαζὶ. Ἡ στεφάνη τῶν ἀνθέων, ἀποτελουμένη ἀπὸ πέταλα ἡνωμένα, σχηματίζει ἔνα μακρὸν σωλῆνα. Εἰς τὸ βάθος τοῦ σωλῆνος ὑπάρχει μία σταγῶν νέκταρος" τὰ ἔντομα προσελκύονται ἀπὸ τὸ χρῶμα καὶ τὴν ὀσμὴν τῶν ἀνθέων, ἔρχονται νὰ ἀπορροφήσουν τὸ νέκταρ καὶ μεταφέροντα εἰς τοὺς πόδας καὶ τὰς τρίχας των γύρων ἐξ ἐνὸς ἄνθους εἰς ἄλλο, τὰ γονιμοποιοῦν. Ἡ ὠθήκη ὠριμάζουσα μεταβάλλεται εἰς καρπόν, ἐντὸς τοῦ ὄποιου εύρισκονται τὰ σπέρματα, προεργάμενα ἐκ τῶν ὑπὸ τῆς γύρεως γονιμοποιηθέντων ὀλείων.

Τὸ αἰγόκλημα ἀνήκει εἰς τὴν οἰκογένειαν τῶν *Aigoklematodōn*.

## 9η Οἰκογένεια : Σύνθετα ἢ Συνάνθηρα

### ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

Λέγεται καὶ χρυσάνθεμον τῶν λιβαδιῶν. Εἶναι φυτὸν πιῶδες καὶ πολυετές, φυόμενον εἰς τοὺς ἀγροὺς καὶ τὰ λιβάδια.

Οὐ βλαστός, δὲ λίγον διακλαδισμένος, φθάνει εἰς ὅψος τὸ ἐν μέτρον καὶ φέρει τρίχας.

Τὰ φύλλα εἶναι σποράδην ( δῆλον καὶ ἐκεῖ ) διατεταγμένα ἐπὶ τοῦ βλαστοῦ καὶ φέρουν καὶ αὐτὰ τρίχας, διλιγωτέρας ὅμως τοῦ βλαστοῦ ( σχ. 92 ). Τὰ κατώτερα φύλλα ἔχουν μίσχουν καὶ ἔλασμα ὠοειδές, δοδοντωτόν, μὲ ἀνίσους δόδοντας. Τὰ ἀνώτερα στεροῦνται μίσχου καὶ περιβάλλουν τὸν βλαστὸν μὲ τὴν βάσιν των, ἡ ὅποια ἔχει πλατυνθῆ, εἶναι δὲ τόσον βαθέως ἐσχισμένα, ὥστε νὰ φαίνωνται ὡς φύλλα σύνθετα.



Σχ. 92. Ἀνθοφόρος κλάδος τῆς μεγάλης μαργαρίτας. Ἀριστερά ταύτης ἄνθος περιφερίας ( ἀνω ) καὶ ἄνθος κέντρου ( κάτω ).

σκου ὁ ὅποιος περιβάλλεται ἀπὸ μίαν στεφάνην λευκήν. Ή διάμετρος τοῦ συνόλου φθάνει πολλάκις τὰ 5 ἑκατοστόμετρα. Ἀν παρατηρήσωμεν τὸν κιτρινωπὸν δίσκον, βλέπομεν ὅτι εἰς τοῦτον ὑπάρχουν ἄνθη κίτρινα, εἰς ἕκαστον τῶν ὅποιων βλέπομεν μίαν στεφάνην σωληνοειδῆ μὲ πέντε δόδοντας, πέντε στήμονας συνηγματέους διὰ τῶν πλευρῶν τῶν ἀνθήρων των, μίαν ὀσθήκην μὲ ἐν μόνον δάριον καὶ ἔνα στῦλον μὲ δύο στίγματα. Ο στῦλος εἶναι κατ' ἀρχής βραχύς, ὅταν ὅμως Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς

"Ανθος. Εἰς τὸ

ἄκρον τοῦ βλαστοῦ καὶ τῶν κλάδων βλέπομεν ἐν εἶδος κιτρινωποῦ δί-

τὸ ἄνθος ἀνοίξῃ ἐπιμηκύνεται καὶ διέρχεται διὰ μέσου τοῦ σωλῆνος, τὸν ὅποῖον σχηματίζουν οἱ ἀνθῆρες· κατὰ τὴν δίοδον ταύτην τοῦ στύλου, γυρὶς ἐπικαθήται ἐπὶ τῶν στιγμάτων καὶ γονιμοποιεῖ τὰ ἐντὸς τῆς ὁσθήκης ωάρια.

Ἐπειδὴ ὅμως πολλάκις οἱ στήμονες ὠριμάζουν πρὸ τοῦ ὑπέρου, εἶναι δύνατὸν ὁ στῦλος, διερχόμενος διὰ τοῦ σωλῆνος, τὸν ὅποῖον σχηματίζουν οἱ ἀνθῆρες, νὰ μὴ εὕρῃ γυρὶν, δόποτε τὰ ωάρια πρέπει νὰ γονιμοποιηθοῦν μὲ γῦριν ἀπὸ ἄλλο ἄνθος· τὴν γῦριν ταύτην μεταφέρουσιν ἔντομα καὶ ιδίως μέλισσαι· αὗται προσελκύονται ὑπὸ τοῦ χρώματος καὶ τοῦ μεγέθους τοῦ δίσκου καὶ ἐπισκέπτονται τὰ ἄνθη διὰ τὸ νέκταρ τῶν, τὸ ὅποῖον ἐκκρίνεται ὑπὸ εἰδίκου ἀδένος. Εἰς τὴν περιφέρειαν τοῦ δίσκου εὑρίσκομεν λευκὰ ἄνθη σχήματος γλωσσίδος μὲ τρεῖς ὀδόντας. Ταῦτα ἔχουσιν ὑπερον, ἄλλα μὲ ὡσθήκην συρρικνωμένην καὶ δὲν μεταβάλλονται εἰς καρπόν χρησιμεύουν μόνον διὰ νὰ προσελκύουν μὲ τὸ χρῶμά των τὰ ἔντομα ( σχ. 92 ).

**Καρπός.** Ο καρπός εἶναι ἀχαίνιον κυλινδρικόν, μικρὸν καὶ ἐλαφρόν, λαμπροῦ μελανοῦ χρώματος. Λόγῳ τῆς ἐλαφρότητός του δύναται νὰ παρασυρθῇ ἀπὸ τὸν ἄνεμον καὶ νὰ μεταφερθῇ ἀπὸ ἐνδὸς μέρους εἰς ἄλλο, οὕτω δὲ νὰ διαδοθῇ τὸ φυτόν.

Φυτὰ ὅμοια μὲ τὴν μαργαρίταν εἶναι :

**‘Ηλίανθος ὁ ἐτήσιος** ( κν. ἥλιος ). Δύναται νὰ φθάσῃ εἰς ὕψος τα 2,50 μ. "Εχει φύλλα μεγάλα, καρδιόσχημα, μακρόβιμισχα, διὰ νὰ δύνανται νὰ κινοῦνται εὐκολα, καὶ οὕτω νὰ προφυλάσσουν τὸ φυτὸν ἀπὸ τὴν πίεσιν τοῦ ἀέρος ( διότι, ἄλλως, ὡς πολὺ ὑψηλὸν καὶ μὲ μεγάλα φύλλα, θὰ ἐκινδύνευε τοῦτο νὰ σπάσῃ ἢ νὰ ἐκριζωθῇ ἀπὸ τὸν ἄνεμον ). Ο δίσκος, τὸν ὅποῖον σχηματίζουν τὰ ἄνθη του, εἶναι μέγας καὶ δύναται νὰ φθάσῃ εἰς διάμετρον τὰ 25 ἑκατοστόμετρα.

Ο ἥλιανθος καλλιεργεῖται ὡς φυτὸν στολισμοῦ, ἄλλα καὶ διότι τὰ σπέρματά του, τὰ ὅποῖα εἶναι ἀρκετὰ μεγάλα καὶ μὲ στήλων περίβλημα, περιέχουν ἀμυλον. Διὰ τοῦτο χρησιμοποιοῦνται ὡς τροφὴ τῶν ζώων ( ιδίως τῶν ὄρνιθων, τῶν ὅποιων αὐξάνουν τὴν ὡστοκίαν ). Περιέχουν ἐπίσης καὶ ἔλαιον βρώσιμον, τὸ ὅποῖον ἐξάγεται δι' ἐκθλίψεως τῶν σπερμάτων.

Ο ἥλιανθος ἔχει τὴν χαρακτηριστικὴν ιδιότητα νὰ στρέφῃ πρὸς Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

τὴν διεύθυνσιν τοῦ ἡλίου τὸν δίσκον τῶν ἀνθέων του. Εἶναι φυτὸν περιζήτητον ἀπὸ τὰς μελίσσας, διὰ τὴν γῆριν καὶ τὸ νέκταρ τῶν ἀνθέων του.

**Λευκάνθεμον** (κν. ἀσπρολόγιον). Μικρὸν φυτόν, ποιῶδες, κοινὸν εἰς τοὺς ἀγρούς. "Εἶχε ἄνθη εἰς τὸ μέσα μέρος τοῦ δίσκου κίτρινα καὶ εἰς τὸ ἔξωτερικὸν λευκά.

**Χαμαίμηλον** (κν. χαμομῆλον) (σχ. 93). Φύεται εἰς τόπους ξηρούς καὶ πετρώδεις καὶ τὰ ἄνθη του ἀναδίδουν εὐχάριστον δσμήν. Ἡ γεῦσίς του εἶναι πικρὰ καὶ βραζόμενον δίδει ζωμόν, ὅστις συντελεῖ εἰς τὴν πέψιν.

**Πύρεθρον** (κν. καριοφύλλι). Καλλιεργεῖται εἰς τοὺς κήπους διὰ στολισμόν. Χλωρὰ τὰ ἄνθη του εἶναι ἀσματικά, ξηραινόμενα καὶ μεταβαλλόμενα εἰς κόρνιν ἀφήνουσιν ἴσχυρὰν δσμήν, ἡ ὥποια ἀποδιώκει τὰ ἔντομα καὶ ιδίως τοὺς ψύλλους καὶ τὰς φθείρας.

**Χρυσάνθεμον τοῦ φθινοπώρου.** Φυτὸν πολυετὲς λόγχη φ τῶν ὑπογείων βλαστῶν του, ἐνῷ οἱ ὑπέργειοι βλαστοί του ξηραίνονται κάθε χειμῶνα. Διὰ τῆς καλλιεργείας κατωρθώθη νὰ ἀποκτήσῃ ὁ δίσκος τῶν ἀνθέων του μαρφάκις καὶ χρώματα διάφορα, ὥραιότατα, ἐνεκα τῶν ὥποιων εἶναι τὸ ὥραιότερον καλλωπιστικὸν φυτὸν τῶν κήπων κατὰ Νοέμβριον καὶ Δεκέμβριον (σχ. 94), εἶναι ὅμως ἀσματικόν. Χρυσάνθεμα πολλὰ καλλιεργοῦνται κυρίως ἐν Ἰαπωνίᾳ, ἡ ὥποια διὰ τοῦτο καὶ χώρα τῶν χρυσανθέμων καλεῖται.

Σχ. 94. "Ανθος χρυσανθέμου.



**'Αρτεμισία ἡ δενδρώδης** (κν. ἀψιθιά). Φυτὸν ποιῶδες μὲ ἀρωματικὴν δσμήν καὶ ἄνθη κατὰ δίσκους μικρούς, σφαιρικούς, χρώματος κιτρινοπρασίνου. Ἡ δσμή του δφείλεται εἰς αιθέριον ἔλαιον, τὸ ὥποιον περιέχει καὶ Ψηφιοποίηθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς




Σχ. 93. Χαμαίμηλον

τὸ ὄποῖον εἶναι ἀρωματικόν, προκαλεῖ ὅμως σπασμούς καὶ εἶναι ἐπικινδυνωδέστατον καὶ εἰς μικρὰν ἀκόμη δόσιν.

Ἐγρησμοποιεῖτο ἄλλοτε διὰ τὴν παρασκευὴν ποτοῦ, τὸ ὄποῖον ἐκαλεῖτο ἀγέντι. Ή παρασκευὴ τοῦ ποτοῦ τούτου εἶναι σήμερον ἀπηγορευμένη, διότι τὸ ἀψέντι ἀποτελεῖ αὐτόχθονα δηλητήριον καὶ ὁδηγεῖ εἰς τὴν βαρυτέραν μορφὴν τοῦ ἀλκοολισμοῦ.

**Ντάλια.** Ἀπλῆ καὶ διπλῆ, ἀναλόγως τῆς μορφῆς τῶν ἀνθέων της. Ἐχει ρίζας κονδυλώδεις (σχ. 95). Μὲ τὴν καλλιέργειαν ἐπετεύχθη-



Σχ. 95. Ἀνθοφόρος κλάδος καὶ κονδυλώδεις ρίζαι ντάλιας.

σαν διάφοροι ποικιλίαι· εἰς τινας τούτων τὰ ἔξωτερικὰ γλωσσοειδῆ ἔγονα ἄνθη τόσον πολὺ ἐπολλαπλασιάσθησαν μὲ τὴν καλλιέργειαν, ὥστε τὰ ἔσωτερικὰ (γόνιμα) ἄνθη τοῦ δίσκου καθίστανται ἀδρατα.

Ἡ μεγάλη μαργαρίτα, ὁ ἡλίανθος, τὸ ἀσπρολούλουδο, τὸ χαμαιμῆλον, τὸ πύρεθρον, τὸ χρυσάνθεμον τοῦ φθινοπώρου, ἡ ἀψιθιά καὶ ἡ ντάλια παρουσιάζουν τὰ ἔξης κοινὰ χαρακτηριστικά:

Τὰ ἄνθη των εἶναι διατεταγμένα οὕτως, ὥστε νὰ σχηματίζουν ἕνα δίσκον. Εἰς τὸ κέντρον τοῦ δίσκου εἶναι ἄνθη σωληνοειδῆ καὶ εἰς τὴν περιφέρειαν ἄνθη σχήματος γλωσσίδος μὲ τρεῖς ὀδόντας, διατετα-

γμένα κατ' ἀκτῖνας. Ἐπειδὴ τὰ ἄνθη τῶν ὡς ἄνω φυτῶν εἶναι διατετα-  
γμένα εἰς τὸν δίσκον, τὸν ὅποιον σχηματίζουσι κατ' ἀκτῖνας, λέγονται  
τὰ φυτὰ ταῦτα Ἀκτινωτά.

Εἰς τινα, ὅμοια πρὸς τὰ ἀνωτέρω, φυτὰ ἡ στεφάνη τῶν ἀνθέων  
των σχηματίζει εἰδος σωλῆνος. Διὰ τοῦτο τὰ φυτὰ ταῦτα λέγονται Σω-  
ληναριθῆ.

Τοιαῦτα φυτὰ εἶναι :

‘Ο **Κύανος**. Φυτὸν ποιῶντας ἐτήσιον ἢ διετὲς καὶ ἀφθονον εἰς τοὺς  
ἀγροὺς τῶν σιτηρῶν. ‘Ο βλαστός του εἶναι εὐθύς καὶ φθάνει εἰς ὕψος



Σχ. 96. Κύανος.

60 ἑκατοστομ., εἶναι χρώματος κυα-  
νοῦ καὶ διακλαδίζεται ἀπὸ διάφορα  
μέρη του (σχ. 96). Τὰ φύλλα του,  
ῶχροπράσινα εἰς τὴν ἄνω ἐπιφάνειάν  
των καὶ λευκωπὰ εἰς τὴν κάτω, εἶναι  
μεμονωμένα καὶ στεροῦνται μίσχου·  
τὰ τῆς βάσεως εἶναι στενὰ καὶ λοβω-  
τά, τὰ ἀνωτέρα στενοῦνται ἀκόμη πε-  
ρισσότερον ὅμοιαζοντα πρὸς βελόνας.

‘Ο κύανος εἶναι φυτόν, τὸ ὅποιον  
φύεται εἰς ἔηρά, ίδιας ἀσβεστολιθικὰ  
ἐδάφη καὶ δι' αὐτὸν εύρισκομεν  
ἀφθόνως εἰς τὴν Ἑλλάδα, τῆς ὅποιας  
τὸ ἔδαφος, ὡς καὶ εἰς τὸ περὶ παπα-  
ρούνας κεφάλαιον εἴπομεν (σελ. 66),  
εἶναι κατὰ τὸ πλεῖστον ἀσβεστολιθικόν.

‘Η μικρὰ ἐπιφάνεια τῶν φύλλων του καὶ ἡ σκληρὰ ἐπιδερμίς των ἐπι-  
τρέπουν εἰς τὸ φυτὸν τοῦτο νὰ ζῇ καὶ εἰς ἔηρά ἐδάφη, διότι καθιστοῦν  
ἐλαχίστην τὴν διαπνοήν του.

‘Ανθη. Τὰ ἄνθη τοῦ κυάνου εἶναι προσκεκολημένα μὲ τοὺς  
πολὺ μικροὺς μίσχους των εἰς μίαν πλατεῖαν ἀνθοδόχην, σχηματίζοντα  
οὖτω (ὅπως εἴδομεν καὶ εἰς τὰ ἀκτινωτὰ) δίσκον κυανοῦ χρώματος.  
‘Ἐχουν στεφάνην ἐν εἴδει μακροῦ σωλῆνος, τοῦ ὅποίου τὸ ἄνω μέρος,  
χονοειδές, διαιρεῖται εἰς πέντε λοβούς.

**Σκόλυμος.** (κν. γαϊδουράγκαθο). Ζιζάνιον, τὸ ὅποιον πολλαπλα-  
σιάζεται μὲ μεγάλην εὔκολίαν. Τὰ φύλλα του, καθὼς καὶ τὰ φυλλάρια  
Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

τοῦ κάλυκος, φέρουν ἀκάνθας ὡς προφυλακτικὰ κατὰ τῶν φυτοφάγων ζῷων. Οἱ καρπός του, ἀχαίνιον, φέρει στεφάνην ἀπὸ τρίχας, αἵτινες διευκολύνουν τὴν διὰ τοῦ ἀνέμου διάδοσιν. (Αἱ τρίχες μὲ τὸν καρπὸν μαζὶ ἀποτελοῦν ὅτι κοινῶς λέγεται κλέψης).

**Κινάρα** (κν. ἄγκινάρα, σγ. 97). Τὰ ἄνθη τῆς ἀποτελοῦν δίσκου, ὁ ὥποιος περιβάλλεται ἀπὸ φύλλα σαρκώδη κατὰ τὴν βάσιν των. Η ἀνθοδόχη εἶναι ἐπίσης σαρκώδης· αὕτη καθὼς καὶ ἡ βάσις τῶν φύλλων, τρώγονται πρὶν νὰ ἀνθίσουν τὰ ἄνθη (διότι ὅταν ἀνοίξουν τὰ ἄνθη, τὸ σαρκώδες αὐτὸ τμῆμα γίνεται ἔηρόν).



Σχ. 97. Ἀνθοφόρος βλαστός καὶ τομὴ ἄνθους κινάρας. 1 ἄνθη, 2 ἐξωτερικὸς κάλυξ.



Σχ. 98. Κιχώριον (ραδίκι). Α καρπός, Β ρίζα.

Γλωσσίδος. Λέγονται διὰ τοῦτο τὰ φυτὰ ταῦτα Γλωσσανθῆ.

Τα πρὶν νὰ ἀνθίσουν τὰ ἄνθη (διότι ὅταν ἀνοίξουν τὰ ἄνθη, τὸ σαρκώδες αὐτὸ τμῆμα γίνεται ἔηρόν).

Ο κύκνος, τὸ γαϊδουράγκαθο καὶ ἡ ἄγκινάρα, καθὼς καὶ ἄλλα δμοιά των φυτά, λέγονται, ὡς εἴπομεν, Σωληναριθῆ, διότι ἡ στεφάνη τῶν ἀνθέων των δμοιάζει πρὸς σωλῆνα. Άλλ' εἰς μερικά, δμοια πρὸς τὰ ἀνωτέρω, φυτὰ ὃ σωλὴν αὐτὸς τῆς στεφάνης τῶν ἀνθέων των σχηματίζει εἰς τὸ ἐπάνω μέρος προεξοχὴν ἐν εἴδει

Τοιαῦτα φυτὰ εἶναι :

Τὸ κιχώριον ( κν. ραδίκι, σχ. 98 ). Ἀπαντᾶ εἰς ἀγρίαν κατάστασιν, καθὼς καὶ καλλιεργούμενον. Εἶναι φυτὸν πολυετές· τὰ κατώτερα φύλλα του εἶναι βαθέως ἐσχισμένα ( ἐνῷ τὰ ἀνώτερα εἶναι ὄλόκληρα ) καὶ ἀποτελοῦν τούφαν προσκεκολλημένην εἰς βραχὺν βλαστόν.

Τὰ φύλλα καὶ ὁ βλαστός περιέχουσι γαλακτώδη οὐσίαν. Τὰ ἔνθη του, κυανᾶ, ἀποτελοῦν δίσκουν ἡ στεφάνη τῶν ἀνθέων σχηματίζει βραχὺν σωλῆνα, ὃ ὅποιος ἐπεκτείνεται διὰ γλωσσίδος ( ἐξ οὗ καὶ τὸ ὄνομα τῶν ἀνθέων ). Οἱ καρπός, ἀχαίνιον, φέρει τρίχας, αἴτινες διευκολύνουν τὴν διὰ τοῦ ἀνέμου διάδοσιν τῶν σπερμάτων.

Τὸ ραδίκι καλλιεργεῖται διὰ τὰ φύλλα του, τὰ ὅποια τρώγονται, ἔχουν ὅμως γεῦσιν πικράν, λόγῳ μιᾶς οὐσίας, κιχωρίνης καλουμένης, τὴν ὅποιαν περιέχουν καὶ ἡ ὅποια τὰ καθιστᾶ τονωτικά.

**Θρίδαξ ὁ ἥμερος** ( κν. μαρούλι ). Υπάρχουν διάφοροι παραλλαγαὶ του, ἀναλόγως τοῦ σχήματος ποὺ ἔχουν τὰ φύλλα του, τὰ ὅποια τρώγονται κυρίως ὡς σπλάτα.

Τὰ ἀκτινωτά, τὰ σωληνανθῆ καὶ τὰ γλωσσανθῆ παρουσιάζουν κοινὰ χαρακτηριστικά :

Τὰ ἔνθη των εἶναι διατεταγμένα οὕτως, ὥστε ἀποτελοῦν δίσκουν, ὃ ὅποις περιβάλλεται ἀπὸ φυλλάρια ποὺ σχηματίζουν ἐν εἶδος κάλυκος· ὁ κάλυξ τῶν ἀνθέων εἶναι ὀλίγον ἀνεπτυγμένος.

Η στεφάνη σχηματίζεται ἀπὸ πέντε πέταλα ἡνωμένα: ἔχει πέντε στήματας, τῶν ὅποιων οἱ ἀνθήρες ἐνοῦνται καὶ σχηματίζουν σωλῆνα, διὰ μέσου τοῦ ὅποίου διέρχεται ὁ στῦλος.

Οἱ ὑπερός των ἀποτελεῖται ἀπὸ ὀισθήκην μὲν ἐν ὠάριον καὶ ἔνα στῦλον μὲ διχαλωτὸν στίγμα.

Οἱ καρπός εἶναι ἀχαίνιον.

Τὰ φυτὰ ταῦτα ἀποτελοῦν μίαν οἰκογένειαν, τὴν οἰκογένειαν τῶν *Συντετρίφων* ή *Συνταρθήρων* ( καλουμένων οὕτω λόγῳ τῆς εἰς δίσκουν διατάξεως τῶν ἀνθέων των ), κατατάσσονται δὲ εἰς ίδιαν τάξιν, τὴν τῶν δικοτυληδόνων συμπετάλων, ἐπειδὴ ἔχουσι τὰ πέταλά των ἡνωμένα· Ψηφιοποίηθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Τ Α Σ ΙΝ Ο Μ Η Σ Ι Σ

2η ΤΛΕΙΣ : ΔΙΚΟΤΥΛΗΔΟΝΑ ΣΥΜΗΤΑΛΛΑ.

Οίκογένεια	Κοινά χαρακτηριστικά	Τάξις
1. Σολανώδη ή Στρυχνώδη		
2. Ἡραθῆ	Στεφάνη μὲ 4 ή 5 πέταλα ( καὶ ισαρίθμους συνήθως στήμονας ) ή-	
3. Ἐλαιώδη	νωμένα μεταξύ των. Ὁ-	
4. Νειλανθῆ	οιήκη μὲ ἔνα ή συνη-	
5. Ὀροβαγχώδη	θέστερον δύο χώρους.	
6. Ἐρεθιδανώδη		
7. Κολοκυνθώδη		
8. Λιγοκληματώδη		
9. Σύρθετα ή Συνάρθηρα		

3η ΤΛΕΙΣ : ΔΙΚΟΤΥΛΗΔΟΝΑ ΛΗΤΑΛΛΑ


1η Οίκογένεια : Κνιδώδη

ΚΝΙΔΗ Η ΜΙΚΡΑ

( κγ. τσουκνίδα )

Η κνίδη είναι φυτὸν πιῶδες, ἐτήσιον, τοῦ ὄποιον ὁ βλαστὸς 3 - 8 ἑκκτοστομέτρων ὕψους, διακλαδίζεται ἀπὸ τῆς βάσεώς του. Ἔχει φύλλα ἀντιθέτως φυόμενα, διατεταγμένα εἰς τρόπον ὥστε τὰ ὑπεράνω μὲ τὰ ὑποκάτω νὰ σχηματίζουν σταυρόν· τὰ φύλλα ἔχουν ἔλασμα δωειδὲς καὶ ὀδοντωτὸν καὶ ἀρκετὰ ἐπικήκη μίσχον ( σχ. 99 ). Ὁ βλαστὸς καὶ τὰ φύλλα φέρουν τρίχας· τὸ ἄνω μέρος ἐκάστης τριχὸς είναι ὅξει καὶ σκληρόν, τὸ δὲ κάτω φέρει ἐξόγκωμα φιαλοειδές, πλῆρες ἀπὸ ὄνυγρόν, τὸ δὲ ὄποιον είναι καυστικόν, λόγῳ ἐνδές ὅξεος, τὸ ὄποιον περέχει, τοῦ μιρημηκοῦ ὅξεος. Τὸ ἐσωτερικὸν τῆς τριχὸς είναι κοῦλον καὶ φέρει αὐλακα. Κατὰ τὴν ἐπαφὴν μὲ τὴν σάρκα μας, τὸ ἄκρον τῆς τριχὸς εἰσχωρεῖ ἐντὸς τῆς σαρκὸς καὶ θραύεται, ἀφῆνον οὕτω νὰ ἐκρεύσῃ τὸ καυστικὸν ὄνυγρόν. Τοῦτο σχηματίζει εἰς τὸ μέρος ἐκεῖνο φλυκταίνας καὶ προκαλεῖ κνισμὸν καὶ πόνους. Λί τρίχες αὗται είναι προφυλακτικὰ τῆς κνίδης κατὰ τῶν φυτοφάγων ζώων.

"Αν θη. Ἀπὸ τοῦ Ματου μέχρι τοῦ Ὁκτωβρίου ἐκφύονται ἀπὸ τὰς μασχάλας τῶν φύλλων τὰ ἄνθη. Ταῦτα ἐκφύονται κατὰ βότρεις· ἀνὰ δύο βότρεις ἀπὸ ἑκάστην μασχάλην. Τὰ ἄνθη δὲν ἔχουσι στεφάνην καὶ πέταλα καὶ εἶναι δύο εἰδῶν, ἅρρενα δηλαδὴ καὶ θήλεα χωριστὰ (ἄνθη δίκλινα), φέρονται ὅμως ἀμφότερα ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ φυτοῦ (φυτὸν



**Σχ. 99.** Κνιδή ή μικρά. Α ἄνθισθρός βλαστός. Β ἄνθος ἅρρεν.  
Γ μία θρέξ κνιδῆς. Δ ἄνθος θῆλυ.

μόνοικον). Τὰ ἅρρενα εἶναι ὀλίγα καὶ εὑρίσκονται εἰς τὸ ἄκρον κάθε βότρυος, τὰ ἄλλα εἶναι θήλεα.


Τὰ ἅρρενα ἔχουν κάλυκα ἀπὸ 4 πράσινα σέπαλα καὶ 4 στήμονας, ἀνὰ ἔνα ἀπέναντι κάθε σεπάλου (σχ. 100).

Τὰ θήλεα ἔχουν κάλυκα διηγημένον εἰς 4 ἄνισα μέρη καὶ ὠσθήκην μὲν ἐν ὡάριον, ἡ ὁποίᾳ τελειώνει εἰς στίγμα σχήματος λαβίδος.

Ἡ γῦρις τῶν ἀρρένων ἄνθεών μεταφέρεται εἰς τὸ στίγμα τῶν θηλέων διὰ τοῦ ἀνέμου, διότι τὰ ἄνθη τῆς κνιδῆς οὔτε χρῶμα οὔτε δσμὴν ἔχουν, ὡστε νὰ προσελκύουν τὰ ἔντομα· δι' αὐτὸν ἔχουν πολλὴν γῦριν.

**Καρπός.** Ἡ ὠσθήκη ὠριμάζουσα μεταβάλλεται εἰς καρπόν, ὃστις εἶναι ἀγχίνιον μεγέθους μέγχρι 1 χιλιοστομέτρου.

**Κνίδη ή μεγάλη.** Ὁ βλαστὸς τῆς κνίδης τῆς μεγάλης εἶναι εὐ-  
θύς, χωρὶς πολλὰς διακλαδώσεις καὶ φθάνει εἰς ὕψος τὸ 1,50 μέτρον.  
Τὰ ἄνθη τῆς εἶναι ἄρρενα ἢ θήλεα, δὲν εύρισκονται ὅμως ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ  
φυτοῦ, ὥπως εἰς τὴν κνίδην τὴν μικράν, ἀλλὰ εἰς δύο διάφορα φυτά ( φυ-  
τὸν δίοικον ). Ἔχομεν δηλαδὴ εἰς τὴν κνίδην τὴν μεγάλην ἄνθη δίκλινα,  
διότι εἶναι ἄρρενα ἢ θήλεα, καὶ φυτὸν δίοικον. διότι τὰ ἄρρενα ἄνθη εύ-  
ρισκονται εἰς ἄλλο φυτόν, τὰ δὲ θήλεα εἰς ἄλλο. Ἐνῷ ἡ κνίδη ἡ μικρά



**Σχ. 100.** "Ανθη κνίδης  
α, α ἄρρενα ἄνθη ( μὲ τὰ  
σέπαλα καὶ στοὺς στήλου-  
νας ), β θῆλη ἄνθος.

ἔχει μὲν ἄνθη δίκλινα, ἀλλὰ εἶναι φυτὸν μόροι-  
κον, διότι καὶ τὰ ἄρρενα καὶ τὰ θήλεα ἄνθη εύ-  
ρισκονται ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ φυτοῦ.

Ἡ μεγάλη κνίδη ζῆ ὅχι ἐν μόνον ἔτος, ὥπως ἡ κνίδη ἡ μικρά, ἀλ-  
λὰ πολλὰ ἔτη· τοῦτο χάρις εἰς τὰ ριζώματα τὰ ὄποια ἔχει καὶ τὰ ὄποια,  
παραμένοντα ἐντὸς τοῦ ἐδάφους, δίδουν κατὰ τὴν ἐπομένην ἄνοιξιν νέα  
φυτά.

"Ομοια φυτὰ εἶναι :

**Συκῆ ή κοινὴ** ( σχ. 101 ). Ἡ συκῆ εἶναι φυτὸν τῶν θερμῶν  
χωρῶν καὶ δύναται νὰ φθάσῃ εἰς ὕψος τὰ 8 μέτρα. Ὁ φλοιός τῆς εἶναι  
λεῖος, τὰ φύλλα τῆς μεγάλα, τραχέα, πεντάλοβα, καὶ περιέχουν ( ὥπως  
καὶ ὁ βλαστὸς ) ὑγρὸν γχαλκτῶδες.

Τὰ ἄνθη εύρισκονται ἐντὸς ἀνθοδόχης συκῆματος ἀπίου ( ἄωρον σῦκον ). Τὰ ἄρρενα ἄνθη εύρισκονται εἰς τὰ χείλη τῆς ἀνθοδόχης, τὰ δὲ θήλεα εἰς τὸ βάθος ταύτης. Τὰ ἄρρενα ἔχουσι κάλυκα μὲ πέντε λοβούς καὶ τρεῖς στήμονας· τὰ θήλεα ἔχουσι κάλυκα μὲ πέντε ὀδόντας, μίαν ὀωθήκην μὲ ἐν ὠάριον καὶ ἕνα στῦλον μὲ διχαλωτὸν στίγμα.

Ἡ γονιμοποίησις γίνεται εἴτε ἀπ' εὐθείας εἴτε δὲ ὡρισμένου εἴδους ἐντόμων, τὰ ὅποια εύρισκονται ἐντὸς τῶν σύκων τῆς ἀγρίας συκῆς. Ἀπ' εὐθείας γονιμοποίησις γίνεται ἐκεὶ ποὺς ὑπάρχουν εἰς τὴν αὐτὴν ἀνθοδόχην καὶ ἄρρενα καὶ θήλεα ἄνθη. Υπάρχουν ὅμως παραλλαγαὶ συκῶν, εἰς τὰς ὅποιας αἱ ἀνθοδόχαι φέρουσιν εἰς τὸ ἐσωτερικόν των θήλεων ἄνθη καὶ εἰς τὴν κορυφήν των ἄρρενα, ἀλλὰ ἀτροφικά, τὰ ὅποια δηλ. δὲν δίδουν γῦριν πρὸς γονιμοποίησιν τῶν θηλέων ἀνθέων· εἰς ταύτας ( ἀν δὲν τὰς βοηθήσωμεν διὰ τὴν ἐπικονίαστιν τῶν ), τὰ θήλεα ἄνθη δὲν γονιμοποιοῦνται καὶ ὁ καρπὸς πίπτει πρὸ τῆς ὡριμάνσεώς του. Τοιαῦται παραλλαγαὶ εἰναι ιδίως ἡ Σμυρναϊκὴ καὶ ἡ Μεσσηνιακὴ συκῆ.

Διὰ τὴν γονιμοποίησιν τῶν θηλέων ἀνθέων τῶν παραλλαγῶν τούτων πρέπει νὰ γίνη τὸ ἔξης:

Ἐπὶ ἑκάστης συκῆς κρεμῶμεν ὄρμαθὸν ἐκ 4 - 5 ἀγριοσύκων, εἰς τὸ ἐσωτερικὸν τῶν ὅποιων ὑπάρχει πληθὺς σκωλήκων. Οὗτοι εἰναι κάμπαι αἱ ὅποιαι ἀναπτυσσόμεναι δίδουν ἔντομον μικρόν, μελανὸν τὸ χρῶμα, ὅμοιον πρὸς πολὺ μικρὰν ἐπιμήκη μυῖαν, τὸ ὅποῖον λέγεται ψῆλη τῆς συκῆς. Τὸ ἔντομον τοῦτο ἔξερχεται διὰ τῆς δπῆς, ἡ ὅποια εύρισκεται εἰς τὸ ἐπάνω μέρος τοῦ σύκου καὶ ἡ ὅποια στεφανοῦται ὑπὸ ἀρρένων ἀνθέων, ἡ δὲ ἔξοδός του συμπίπτει μὲ τὴν ὡριμανσιν τῶν ἀνθέων τούτων.

Οὔτως ἔξερχόμενον παραλαμψάνει μὲ τὸ σῶμά του γῦριν ἀπὸ τὰ ἄρρενα ἄνθη τῆς ἀγρίας συκῆς. Ἀναζητεῖ κατόπιν τὸ ἔντομον τοῦτο νὰ εὕρῃ ἄωρα σῦκα, διότι ἐντὸς αὐτῶν γεννᾶ τὰ ὡά του· ἐπισκέπτεται πρὸς τοῦτο πλεῖστας συκᾶς, ἐντὸς τῶν σύκων τῶν ὅποιων προσπαθεῖ νὰ εἰσέλθῃ. Τὰ σῦκα ὅμως τῶν ἄλλων συκῶν ( ἐκτὸς τῆς ἀγρίας ) ἔχουσι θήλεα ἄνθη μὲ στύλους ἐπιμήκεις, οἱ ὅποιοι ἐμποδίζουσι τὸ ἔντομον νὰ εἰσέλθῃ ἐντὸς αὐτῶν. Ἐπισκέπτεται οὔτω πλεῖστα σῦκα ἡμέρων συκῶν ( μέχρις ὅτου εὕρῃ σῦκα ἀγρίας συκῆς ). Οὔτω μεταφέρει γῦριν εἰς τὰ ἄνθη τῆς ἡμέρου συκῆς, τὰ ὅποια ἐπισκέπτεται καὶ τὰ γονιμοποιεῖ. Τὸ σῦκον μόνον μετὰ τὴν γονιμοποίησιν τῶν θηλέων ἀνθέων του ὡριμάζει, ἄλλως ἀποπίπτει τῆς συκῆς ἄωρον.

Βλέπομεν οὔτως, ὅτι ἡ γονιμοποίησις τῶν ἀνθέων τῶν παραλλαγῶν

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

τούτων τῆς συκῆς γίνεται διὰ γύρεως ἀρρένων ἀνθέων τῆς ἀγρίας συκῆς καὶ ὅτι ἡ μεταφορὰ τῆς γύρεως ταύτης γίνεται μὲν τὴν βοήθειαν τοῦ ἐντόμου, τὸ ὅποῖον λέγεται ψήν τῆς συκῆς· αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος διὰ τὸν ὅποῖον σχηματίζουν ὄρμαθοὺς ἀγριοσύκων καὶ τοὺς κρεμοῦν εἰς διάφορα μέρη τοῦ συκεῶνος (ἀγριοσύκιασμα).

**Καρπός.** Μετὰ τὴν γονιμοποίησιν τῶν θηλέων του τὸ ἄρωρον σῦκον γίνεται σαρκῶδες καὶ σακχαροῦχον, καὶ τόσον περισσότερον, ὃσον ὀριμώτερον εἶναι. Καρπὸν τῆς συκῆς λέγομεν ἡμεῖς τὸ σῦκον· πραγματικῶς ὅμως καρποὶ εἶναι τὰ μικρά, ἔηρὰ καὶ κιτρινωπὰ ἀχαίνια, τὰ ὅποια εὐρίσκονται ἐντὸς τοῦ σαρκώδους μέρους τοῦ σύκου καὶ τὰ ὅποια ἡμεῖς λέγομεν κοινῶς σπόρους, τοῦ σύκου (σχ. 102). Τὸ σῦκον δηλαδὴ εἶναι ἐν συγκάρπιον (ὅπως καὶ ἡ φράσουλα). Δυνάμεθα νὰ τὸ εἴπωμεν καὶ φευδῆ καρπόν, διότι εἰς τὸν σχηματισμὸν του μετέχει καὶ ἡ ἀνθοδόχη.

Ἡ συκῆ κατάγεται ἀπὸ τὴν Ἀνατολήν, (ἴσως ἀπὸ τὰς πρὸς νότον τῆς Κασπίας θαλάσσης χώρας τῆς Περσίας), ἀπὸ τὴν ὅποιαν μετεφέρθη καὶ ἐνεκλιματίσθη εἰς τὰς παρὰ τὴν Μεσόγειον χώρας.

Εἶναι φυτὸν τῶν θερμῶν χωρῶν καὶ δυσκόλως ἀντέχει εἰς θερμοκρασίας κάτω τοῦ 0°, εὐδοκιμεῖ ὅμως εἰς ὅλα τὰ ἐδάφη, ἀκόμη καὶ τὰ πετρώδη καὶ ἔηρά.

Τὸ σῦκον τρώγεται εἴτε νωπὸν εἴτε ἔηρὸν καὶ εἶναι θρεπτικὸν λόγῳ τοῦ σακχάρου, τὸ ὅποῖον περιέχει. Τὸ σῦκον τῆς λεγομένης Μεσονιακῆς συκῆς κόπτεται μόλις δῷμάσῃ καὶ ἔηραίνεται ἐκτιθέμενον εἰς τὸν ἥλιον ἐπὶ 4-5 ἡμέρας. Κατὰ τὴν ἔηρανσίν του ὅμως ἐν εἶδος ἐντόμου γεννᾷ ἐπάνω εἰς αὐτὸν τὰ ὡά του καὶ ἔξ αὐτῶν ἀναπτύσσονται ἀργότερον κάμπαι (ἡμεῖς τὰς λέγομεν σκώληκας), αἱ ὅποιαι καθιστοῦν τὰ ἔηρὰ σῦκα ἀκατάλληλα πρὸς βρῶσιν. Λέγομεν τότε ὅτι τὰ σῦκα σκουληκιάζουν. Τὸ λεγόμενον αὐτὸν σκουλῆκι (εἰς τὴν πραγματικότητα εἶναι ἡ κάμπη τοῦ ἐντόμου), τὸ ἀποφεύγομεν ἄν, μετὰ τὴν ἔηρανσίν των, ἀποστειρώσωμεν τὰ σῦκα εἴτε ἐμβαπτίζοντες αὐτὰ εἰς βράζον



**Σχ. 102.** 1 τομὴ σύκου. 2 σπέρμα σύκου (ἀχαίνιον).

ύδωρ, είτε, καλύτερον, μὲ εἰδικὰ ἀποστειρωτικὰ μηχανηματα, ὅπότε καταστρέφονται τὰ ώξ τοῦ ἐντόμου καὶ παρεμποδίζεται οὕτως ἡ παραγὴ καμπῶν.

Ἡ Ἑλλὰς παράγει ἀρκετὴν ποσότητα σύκων ( ίδιας ἡ Μεσσηνία καὶ ἡ Λακωνία ), μέρος τῶν ὁποίων ἔξαγεται εἰς τὸ ἔξωτερικόν.

Ἐσχάτως μάλιστα, ἀφ' ὅτου ἀπὸ τὸν ἰδρυθέντα Αὐτόνομον Συκικὸν Ὁργανισμὸν ἐλήφθησαν μέτρα, ἀτινα ἐβελτίωσαν τὴν συσκευασίαν καὶ διατήρησιν τῶν σύκων, ἡ κατανάλωσις καὶ ἡ τιμὴ των εἰς τὸ ἔξωτερικὸν ηὔξηθησαν· θὰ γίνη οὕτω δυνατὸν νὰ ἀποτελέσουν τὰ σῦκα ( λόγῳ τῆς ἀρκετῆς ποσότητος καὶ τῆς ἔξαιρετικῆς ποιότητος τῶν σύκων, τὰ ὁποῖα παράγει ἡ χώρα μας ) ἀρκετὰ προσοδοφόρον πηγὴν διὰ τὸν τόπον μας.

**Μορέα** ( κν. μουριά ). Εἶναι δένδρον, τὸ ὁποῖον περιέχει, ὅπως



Σχ. 103. Μορέα. α ἀνθοφόρος κλάδος. β καρπὸς ( μοῦρο ).

καὶ ἡ συκῆ, ὑγρὸν γαλακτῶδες. Κατάγεται ἀπὸ την Ἀσίαν ( Κίναν, Ἰνδίας ). Ἀντέχει τόσον εἰς χαμηλὴν ὅσον καὶ εἰς ὑψηλὴν θερμοκρασίαν, φθάνει τὸ ὄψος 10 μέτρων καὶ εἶναι φυτὸν φυλλοβόλον.

Τὰ ἄρρενα ἀνθη, πολλὰ μαζὶ ἐπὶ μαλακῆς ἐπιμήκους ράχεως, σχηματίζουσιν ἔνα ἱουλὸν οὗτος ἀποπίπτει μετὰ τὴν ὥριμαντν τῶν ἀνθέων. Τὰ θήλεα ἀνθη εἶναι ὀλιγώτερα καὶ σχηματίζουν καὶ αὐτὰ ἱουλὸν, ἀλλὰ πλατύτερον καὶ πολὺ βραχύτερον ἀπὸ τὸν ἱουλὸν τῶν ἀρρένων. Ὁ κάλυξ παραμένει καὶ μετὰ τὴν γονιμοποίησιν, γινόμενος σαρκώδης καὶ σακχαροῦχος· οὕτω σχηματίζεται ὅ,τι λέγομεν κοινῶς μοῦρο, ἐντὸς τοῦ ὁποίου εὑρίσκονται τὰ ἀχαίνια ( σχ. 103 ). Τὸ μοῦρον δηλαδὴ εἶναι ἐν συγκάρδιον.

Ἡ μορέα καλλιεργεῖται κυρίως, διὰ τὰ φύλλα της ( τὰ ὁποῖα χρη-Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

σιμεύουν ώς τροφή εἰς τοὺς μεταξοσκώληκας) παντοῦ τῆς Ἑλλάδος, ίδιως εἰς τὴν Θράκην (Σουφλί). Τὰ καλύτερα πρὸς διατροφὴν τῶν μεταξοσκωλήκων φύλλα εἶναι τὰ τῆς λευκῆς μορέας (οὗτω λεγομένης, ἐπειδὴ τὰ φύλλα τῆς ἔχουσι χρῶμα ἀνοικτότερον), ἥτις παράγει καρποὺς λευκοὺς ἢ ωχροῦ χρώματος, ἐνῷ ἡ μέλαινα μορέα (λεγομένη οὕτω διότι τὰ φύλλα τῆς ἔχουσι βαθὺ πράσινον χρῶμα) ἔχει φύλλα μικρὰ καὶ τραχέα. Διὰ τῆς καλλιεργεία ἐπετεύχθησαν παραλλαγαὶ μὲν μεγάλα καὶ μαλακὰ φύλλα.

"Εβεα ἢ Συκῆ ἢ ἐλαστικὴ τῶν Ἰνδιῶν (κν. καουτσουκόδεν-



**Σχ. 104.** Συλλογὴ τοῦ γαλακτώδους χυμοῦ τῆς ἔβεας ἀπὸ τῶν ὄποιον γίνεται τὸ καουτσούκ.



**Σχ. 105.** Κάνναβις

δρον). Ἡ ἔβεα εἶναι δένδρον μὲν μεγάλα ἐλλειπτικὰ καὶ ἅμισχα φύλλα, παχέα καὶ λάμποντα. Φθάνει εἰς ὕψος τὰ 40 μέτρα. Ἀπὸ τὸν κορμὸν του, ἐὰν κάμωμεν τομάς, ἐκρέει ἐν εἰδος γάλακτος, ἀπὸ τὸ ὄποιον διὰ καταλλήλου ἐπεξεργασίας κατασκευάζεται τὸ καουτσούκ (σχ. 104).

Ἡ κάνναβις (κν. καναθουριά ἢ κανναβιά, σχ. 105). Εἶναι φυτὸν ποωδεῖς ἑτήσιον, καταγόμενον ἀπὸ τὴν Ἀσίαν. Ὁ βλαστὸς τοῦ φυτοῦ τούτου εἶναι ἴνωδης, καὶ αἱ ἵνες του, ἔξαγρόμεναι διὰ καταλλήλου ἐπεξεργασίας, χρησιμοποιοῦνται διὰ τὴν κατασκευὴν σχοινίων καὶ ὑ-

φασμάτων. Τὰ σπέρματά του, τὸ κοινὸν καναβούρι, χρησιμοποιοῦνται ώς τροφὴ διὰ πτηνά· ἀπὸ τὰ φύλλα καὶ τοὺς ἀνθοφόρους κλάδους μιᾶς παραλλαγῆς κάνναβεως κατασκευάζεται εἰς τὴν Ἀνατολὴν τὸ χασίσι, τὸ ὄποιον καπνιζόμενον ( ὅπως καὶ τὸ ὄπιον ), προκαλεῖ ἐν εἴδος μέθης· εἶναι ἔξ ΐσου μὲ τὸ ὄπιον, ἐπικινδυνὸν διὰ τὴν ὑγείαν καὶ ἀπαγορεύεται τὸ ἐμπόριόν του, καθὼς καὶ ἡ καλλιέργειά του, τιμωρούμενα αὐστηρῶς,

**Λυκίσκος** ( κν. μπυρόχορτο, σχ. 106 ). Οἱ καρποί του, ἀχαίνια, περιβάλλονται ἀπὸ φυλλάρια, ἀτινα σχηματίζουν πέριξ τῶν καρπῶν ἔνα

κῶνον· τὰ φυλλάρια ταῦτα φέρουσι μικρὰς καὶ ἀμβλείας τρίχας, αἱ ὄποιαι εἶναι γεμάται μὲ ἐν πικρὸν ὑγρόν, μὲ



Σχ. 106. Λυκίσκος ( κν. μπυρόχορτο ).



Σχ. 107. Καρπός πτελέας.

τὸ ὄποιον προσδίδουν εἰς τὸν ζῦθον ( μπύραν ) τὴν χαρακτηριστικὴν δσμὴν καὶ γεῦσιν τῆς, εἰς τοῦτο δὲ διείλεται καὶ ἡ καλλιέργεια τοῦ φυτοῦ.

**Πτελέα** ( κν. φτελιά ). Ὁ καρπός της, ἀχαίνιον, ἔχει πέριξ του πτέρυγα μεμβρανώδη, διὰ νὰ διευκολύνεται ἡ μεταφορά του ὑπὸ τοῦ ἀνέμου καὶ οὕτω νὰ διαδίδεται τὸ φυτόν· ὁ καρπός οὗτος λέγεται σαμάριον ( σχ. 107 ).

Τὰ φυτά, τὰ ὄποια ἀνωτέρω εἴδομεν, δηλ. ἡ κνίδη, ἡ συκῆ, ἡ ἔβεα, ἡ μορέα, ἡ κάνναβις, ὁ λυκίσκος, ἡ πτελέα, παρουσιάζουν κοινὰ χαρακτηριστικά :

Τὰ ἄνθη των εἶναι χωριστὰ τὰ ἄρρενα καὶ χωριστὰ τὰ θήλεα ( δίκλινα )· ἔχουσι μόνον κάλυκα καὶ οἱ στήμονες εἶναι τόσοι, ὅσα καὶ τὰ

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

σέπαλα. Τὰ ἄνθη εἶναι διατεταγμένα κατὰ ἰούλους καὶ ὁ καρπὸς εἶναι ἀχαίνιον.

Σχηματίζουν μίαν οἰκογένειαν φυτῶν, τὴν οἰκογένειαν τῶν *Kri-dωδῶν*.

## 2α Οἰκογένεια : Κυπελλοφόρα

### ΔΡΥΣ

( xv. βελανιδιά )

Ἡ δρῦς εἶναι δένδρον φυλλοβόλον, μὲ κύριον βλαστὸν ( κορμὸν ) ὅξῳδη ( μὲ χονδρὰ ἔξογκώματα δηλαδὴ ) καὶ χονδρόν. Τὰ φύλλα τῆς ἀπλᾶ, μικρόμισχα, φυόμενα κατ' ἐναλλαγήν, ἔχουν σχῆμα ὀφειδές καὶ εἶναι βαθέως ἐσχισμένα· εἶναι στενώτερα εἰς τὴν βάσιν καὶ πλατύτερα εἰς τὴν κορυφήν των. Συγκεντροῦνται κυρίως εἰς τὰ ἄκρα τῶν κλάδων, ὡς θύσανοι. Ὁ φλοιός της μένει λεῖος μέχρι τοῦ 20οῦ ἔτους καὶ ἔχει χρῶμα φαιόν. ἔπειτα σχίζεται καὶ λαμβάνει χρῶμα μελανόφαιον.

Ἡ δρῦς ζῇ πολλὰ ἔτη, πλέον τῶν 2000, καὶ ὁ κορμός της δύναται νὰ λάβῃ διαστάσεις μεγάλας, καθὼς καὶ οἱ κλάδοι της, οἵτινες διευθύνονται πρὸς ὅλα τὰς διευθύνσεις. Οὕτως ἡ δρῦς γίνεται τὸ μεγαλύτερον δένδρον τοῦ δάσους — βασιλεὺς τοῦ δάσους — καὶ ἔχωρίζει μακρόθεν ἀπὸ ὅλα τὰ ἄλλα δένδρα, λογω τοῦ μεγέθους της ( σχ. 108 ).



Σχ. 108. Δρῦς

"Ινα συγχρατῆται καὶ ἀντέχῃ εἰς τὸν ἄνεμον, ἔχει βαθυτάτας ρίζας ( προχωρούσας εἰς βάθος ἀπὸ 2 - 8 μ. ) καὶ πρὸς τὰ πλάγια παράρριζα καὶ διαχλαδώσεις, αἵτινες προχωροῦσιν εἰς ἀρκετὴν ἀπὸ τῆς κυρίας ρίζης ἀπόστασιν.

"Α ν θη . 'Η δρῦς ἀρχίζει νὰ δίδῃ ἄνθη καὶ καρποὺς εἰς τὰ 60 τῆς ἔτη. Τὰ ἄνθη εἶναι δύο εἰδῶν, ἄρρενα καὶ θήλεα, καὶ φύονται ἀμφότερα ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ φυτοῦ ( δίκλινα ἄνθη, μόνοικον φυτόν ). Τὰ ἄρρενα εἶναι πολλὰ μαζὶ ἐπὶ μαλαχῆς ράχεως, ἡ ὅποια πίπτει μετὰ τὴν ὥριμανσιν καὶ ἀποτελοῦν σύνολον, τὸ ὅποῖον δονομάζεται ἴουλος.

Οι ἴουλοι φύονται εἰς τὰς μασχάλας τῶν νέων φύλλων, ἔκαστος



**Σχ. 109.** Δρῦς. 1 κλάδος μὲ ἄρρενα ἄνθη. 2 ἄρρενα ἄνθη μὲ τοὺς στήμονάς των, μεγεθυσμένα, 3 θῆλυ ἄνθης. 4 φύλλα καὶ καρποί.

δὲ ἔχει ἄνθη 12, ἀτινα, στερούμενα πετάλων, ἔχουν κάλυκα μὲ 6 - 19 σέπαλα, καὶ 5 - 8 στήμονας ( σχ. 109 ).

Τὰ θήλεα ἄνθη φύονται, εἰς τὸ ἄκρον μικρῶν κλαδίσκων, ἀνὰ 2 ἔως 5. Κάθε ἐν ἀπὸ αὐτὰ ἔχει ἐν ἐξόγκωμα, τὸ ὅποῖον σκεπάζεται ἀπὸ λεπιδοειδῆ φυλλάρια, διατεταγμένα ὡς αἱ κέραμοι τῆς στέγης, καὶ τὸ ὅποῖον, αὐξανόμενον, θὰ ἀποτελέσῃ μελλοντικῶς τὸ κύπελλον. ἔχει στίγμα τρίλοβον, τὸ ὅποῖον μὲ βραχύτατον στῦλον συνδέεται μὲ ὠδήθην, ἢ τις ἔχει 3 χώρους καὶ 2 ὀάρια εἰς ἔκαστον χῶρον. Ἀπὸ αὐτούς, εἰς μόνον χῶρος ἀναπτύσσεται καὶ ἐν μόνον ὀάριον μεταβάλλεται εἰς σπέρμα.

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής


Καρπός ὁ νομάζεται βάλανος (κν. βελανίδι). Εγει σχῆμα ώστε καὶ περιβάλλεται ἀπὸ περικάρπιον δερματῶδες· εἰς τὴν βάσιν του φέρει ἐν ἡμισφαιρικὸν κύπελλον (τὸ ὅποῖον εἴδομεν ἀπὸ ποῦ προέρχεται, ὅταν ἔξητάσαμεν τὸ θῆλυ ἄνθος). Κάτωθεν τοῦ περικαρπίου εὑρίσκονται δύο κοτυληδόνες πλούσιαι εἰς ἄμυλον καὶ μεταξὺ τούτων εὑρίσκεται τὸ μικρὸν φυτικὸν ἔμβρυον.

Ἐκ βλάστησις. "Οταν ἡ βάλανος εὐρεθῇ ὑπὸ τὴν κατάλληλον ὑγρασίαν καὶ θερμοκρασίαν, ἀφήνει νὰ ἐκβλαστήσῃ τὸ νεαρὸν φυτόν, τὸ ὅποῖον περικλείει. Κατ' ἀρχὰς ἡ βάλανος ἀπορροφῶσα ὕδωρ ἔξογκοῦται καὶ οὕτω θραύσεται τὸ περικάρπιον. Κατόπιν αὐξάνεται ἡ ρίζα, ἡ ὅποια διευθύνεται πρὸς τὰ κάτω καὶ εἰσχωρεῖ ἐντὸς τοῦ ἐδάφους· ἔπειτα ἀναφίνεται ὁ βλαστός, ὅστις φέρει τὰ φύλλα καὶ διευθύνεται πρὸς τὰ ἄνω (σχ. 110.).

Βλέπομεν δὴ.


ἔδω, εἰς τὴν δρῦν, ἡ ὅποια εἶναι ἐν μέγχα καὶ πολυετὲς δένδρον, δητὶ ἔχομεν ἔδει καὶ εἰς τὸν φασίολον, ὅστις εἶναι φυτὸν ποῶδες καὶ μονοετές. Δηλ. καὶ ἡ δρῦς εἰς τὰς ἀρχὰς τῆς αὐξήσεως της, δὲν εἶναι παρὰ μία πόσα, ἡ ὅποια θὰ δώσῃ, ἀναπτυσσομένη, δενδρύλιον κατ' ἀρχὰς καὶ δένδρον ὑστερον.

Τὰ φύλλα τῆς κατὰ τὸ τέλος τοῦ φυτινοπάρου ξηραίνονται, δὲν



Σχ. 110. Αἱ διάφοροι φάσεις τῆς βλαστήσεως σπέρματος δρυός. 1 τὸ ριζίδιον αὐξανόμενον δίδει τὴν ρίζαν R, ἡ δὲ ρίζα R αὐξάνεται καὶ ἀναφίνονται τὰ παράρριζα r καὶ τὰ ἀπορροφητικὰ τριχίδια. 3 ἡ ρίζα R καὶ τὰ παράρριζα r αὐξάνονται ἔτι πλέον ἐνῷ αἱ κοτυληδόνες ἀνοίγουν καὶ ἔξερχεται ἐξ αὐτῶν ἡ κορυφὴ τοῦ φυτοῦ.

πίπτουν ὅμως ἀμέσως, ἀλλὰ μένουν ἐπὶ τοῦ δένδρου καὶ πίπτουν δλίγον  
κατ' δλίγον. Οἱ δφθαλμοὶ δύνανται νὰ ἀνθέξουν εἰς τὸ ψῦχος, διότι περι-  
βάλλονται ἀπὸ δρφνὰ (κιτρινωπὰ) περγαμηνοειδῆ σκληρὰ φυλλίδια,




Σχ. 111. Οφθαλμοὶ δρυός.  
1 φυλλίδια.

Ξηρανθῇ καὶ οὗτος μὲ τὴν σειράν, του καὶ οὕτω καθ' ἔξῆς, εἰς τρόπον  
ῶστε ὁ βλαστὸς τῆς δρυός τελικῶς γίνεται δζώδης καὶ ὄχι λεῖος καὶ  
εὔθυς.

**Κηκίδες.** Μία  
ἀπὸ τὰς σπουδαιοτέρας  
ἀσθενείας τῆς δρυός εί-  
ναι αἱ κηκίδες, εἰς τὰς  
όποίας μεταβάλλονται τὰ  
φύλλα τῆς (σχ. 112).

Ἐὰν μίαν τουαύτην κη-  
κίδα τὴν ἀνοίξωμεν, εύ-  
ρισκομεν ἐντὸς αὐτῆς ἔ-  
να λευκὸν σκώληκα· οὗ-  
τος δὲν είναι σκώληξ,  
ἀλλὰ ἡ κάμπη ἐντόμου,  
ἡ δούια ἐξερχομένη ἀπὸ τὴν κηκίδα, θὰ κατέληθη εἰς τὸ ἔδαφος, ἵνα δια-  
χειμάσῃ ἐντὸς αὐτοῦ· ἐκεῖ θὰ μεταβληθῇ εἰς χρυσαλλίδα, ἀπὸ τὴν ὄποιαν  
θὰ ἐξέληθῃ τὸ ἐντόμον, ὁ ψήν ὁ δρυόφιλος. Οὗτος θὰ κάμη μίαν ὄπὴν εἰς  
ἐν φύλλον τῆς δρυός καὶ ἐκεῖ θὰ γεννήσῃ ἐν ὕδε, συγχρόνως δὲ θὰ



Σχ. 112. Κηκίδες δρυός. α κηκίδα εἰς τὴν ὄποιαν  
φαίνεται ἡ ὄπή, ἀπὸ ὅπου ἐξῆλθε τὸ ἐντόμον. β τοιμὴ  
κηκίδος. γ ἡ κάμπη τοῦ ἐντόμου (σκώληξ) ἐντὸς  
τῆς κηκίδος. δ τὸ τέλειον ἐντόμον.

ρίψη και μίαν σταγόνα ύγρου καυστικοῦ· ίπδ τὴν ἐπίδρασιν τοῦ τραύματος και τοῦ καυστικοῦ ύγρου γίνεται εἰς τὸ μέρος ἐκεῖνο τοῦ φύλλου ἐν ἔξοιδημα, τὸ ὄποῖον, σὺν τῷ χρόνῳ, μεγαλώνει, ἔξαπλοῦται εἰς ὅλον τὸ φύλλον και τὸ φύλλον μεταβάλλεται εἰς κηκίδα αἱ κηκίδες λοιπὸν εἶναι φύλλα, ἔνεκα τοῦ λόγου τούτου, μετασχηματισμένα. "Οταν αἱ κηκίδες γίνουν πολλαὶ, τότε δὲν μένουν εἰς τὸ φυτὸν ἀρκετὰ φύλλα διὰ τὴν ἀφομοίωσιν, ἢ δρῦς γίνεται καχεκτική και εἶναι δυνατὸν και νὰ ξηρανθῇ ἀκόμη.

Χρησιμότης. Ό φλοιὸς τῆς δρυός, τὰ κύπελλα και αἱ κηκίδες περιέχουσι μίαν οὐσίαν, ταρνίνην καλουμένην, ἡ ὥποια χρησιμοποιεῖται εἰς τὴν βυρσοδεψίαν, τὴν βαφικήν και διὰ τὴν κατασκευὴν μαύρης μελάνης. Τὸ ξύλον τῆς δρυός, σκληρότατον και διαρκείας, χρησιμοποιεῖται διὰ τὴν κατασκευὴν ἐπίπλων, εἰδῶν καρροποιίας, ξυλανθράκων κ.λ.π. Οἱ κλάδοι τῆς χρησιμεύουν εἰς τὴν κατασκευὴν φραγμῶν ( διὰ τοῦτο οἱ φραγμοὶ οὗτοι δρύφρακτα καλοῦνται ). Οἱ καρποὶ ἀποτελοῦν ἀρίστην τροφὴν τῶν ζώων, ιδίως τῶν χοίρων, λόγῳ τοῦ ἀμύλου τὸ ὄποῖον περιέχουν.



Σχ. 113. Κύπελλον και καρπὸς καστανέας.

Τύπαρχουσι διάφορα εἴδη δρυῶν. "Ενὸς εἴδους, τῆς δρυὸς τῆς φελοφλοίου, ὁ φλοιὸς μεταβαλλόμενος εἰς φελὸν φθάνει εἰς πάχος τὰ 40 ἑκατοστόμετρα και χρησιμοποιεῖται διὰ τὴν κατασκευὴν πωμάτων.

"Αλλα εἴδη εἶναι ἡ Δρῦς ἡ σμίλαξ ( κν. ἀριά ), δένδρον μέγα και αὐτό, και ἡ Δρῦς ἡ κοκκοφόρος ( κν. πρῖνος ἢ πουρνάρι ) μικρότερα κατὰ πολὺ εἰς τὸ μέγεθος. "Αμφότεραι ἔχουσι σκληρότατον και ἀνθεκτικώτατον ξύλον.

Φυτὰ ὄμοια πρὸς τὴν δρῦν εἶναι :

"Η καστανέα ( κν. καστανιά ). Μέγα δένδρον φυόμενον εἰς τὰς παρὰ τὴν Μεσόγειον χώρας. Οἱ καρποὶ τῆς εύρισκονται ἀνὰ τρεῖς συνήθως μέσα εἰς κύπελλον, τὸ ὄποῖον, σαρκῶδες κατ' ἄρχας, σκληρύνεται ἔπειτα και φέρει ἀκάνθιας. Πολλάκις τὸ κύπελλον φέρει 2 μόνον κάστανα ( ὅσα ὡάρια δηλ. ἐγονιμοποιήθησαν )· τότε τὰ κάστανα ἔχουν σχῆμα

ήμισφαιρικὸν ( σχ. 113 ). Τὸ ἔύλον τῆς εἶναι εὔκαμπτον, βαρύ, εὔσχιστον, ὀλλὰ σαπίζει γρήγορα καὶ διὰ τοῦτο δὲν γίνεται μεγάλη χρῆσίς του.

Ἡ καστανέα δὲν εὐδοκιμεῖ εἰς ἐδάφη περιέχοντα πλέον τῶν δύο ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν ἀσβέστου. Εἰς τὴν Ἑλλάδα παραλαγαὶ τῆς μὲ τοὺς καλυτέρους καρποὺς φύονται εἰς τὸν Βόλον καὶ τὴν Κρήτην.

**Λεπτοκαρυὰ** ( κν. φουντουκιά ). 'Ο καρπὸς ( κν. φουντούκι ) ἔχει ἔξιλαδες περιβληγμα καὶ ἔξωθεν τούτου κύπελλον ἐσχισμένον· τὸ σπέρμα εἶναι ἐλαιοῦχον. Ἡ φουντουκιὰ καλλιεργεῖται πολὺ εἰς τὸ "Αγιον" Ὄρος, οἱ δὲ ἐλαιοῦχοι καρποὶ τῆς εἶναι νόστιμοι καὶ θρεπτικοί.

**Οξύα** ( κν. ὁξύα ). Τὸ ἔύλον τῆς, εὐκατέργαστον καὶ δυσκόλως σηπόμενον, χρησιμοποιεῖται πολλαχῶς.

Τὰ διάφορα εἴδη τῶν δρυῶν, ἡ καστανέα, ἡ φουντουκιὰ καὶ ἡ ὁξύα παρουσιάζουσι κοινὰ χαρακτηριστικά :

"Ἔχουσι καρπόν, ὃ ὅποῖος περιβάλλεται ἀπὸ ἐν εἴδος κάλυκος μὲ σκληρὸὰ φυλλίδια, τὸ κύπελλον.

"Ἔχουσι χωριστὰ καὶ κατὰ ιούλους τὰ ἄρρενα καὶ χωριστὰ τὰ θήλεα ἀνθη ( ἀνθη δίκλινα ), ὀλλὰ καὶ τὰ ἄρρενα καὶ τὰ θήλεα ἀνθη εύρισκονται ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ φυτοῦ ( φυτὸν μόνοικον ).

'Αποτελοῦσι τὴν οἰκογένειαν τῶν *Κυπελλοφόρων*.

### Διασκευὴ καὶ χρησιμότης τοῦ βλαστοῦ

"Αν κάμωμεν τομὴν ὄριζοντίαν εἰς τὸν βλαστὸν νεαροῦ φυτοῦ, π.χ. δρυὸς ἢ μορέας, θὰ παρατηρήσωμεν τὰ ἔξης μέρη ( σχ. 114 ) :

α ) 'Εξωτερικῶς ἐν λεπτὸν στρῶμα πρασίνου χρώματος· τὸ πράσινον χρῶμα ὀφείλεται εἰς τοὺς κόκκους τῆς χλωροφύλλης, τοὺς ὅποιους περιέχει. Εἰς τοῦτο παρατηροῦμεν καὶ στόματα ὅμοια μὲ τὰ στόματα, τὰ ὅποια ἀνευρίσκομεν εἰς τὴν κάτω κυρίως ἐπιφάνειαν τῶν φύλλων, τὸ λεπτὸν τοῦτο στρῶμα τὸ λέγομεν ἐπιδερμίδα.

β ) Κάτωθεν τῆς ἐπιδερμίδος ἀνευρίσκομεν ἐν παχύτερον στρῶμα, τὸ ὅποιον λέγομεν φλοιὸν ( σχ. 114, 1 ). Εἰς τὰ ἡλικιωμένα φυτὰ ὁ φλοιὸς γίνεται παχύτερος καὶ σκληρότερος. 'Ο φλοιὸς καὶ ἡ ἐπιδερμίς χρησιμεύουν κυρίως διὰ νὰ προφυλάσσουν τὸ κάτωθέν των τμῆμα τοῦ βλαστοῦ ἀπὸ τὰς καιρικὰς μεταβολὰς ( ψῦχος καὶ θερμότητα ).

γ ) Τὸ κάτωθεν τοῦ φλοιοῦ μέρος τοῦ βλαστοῦ, τὸ ὅποιον λέγομεν κεντρικὸν κύλινδρον. "Αν θελήσωμεν νὰ κόψωμεν μὲ μαχαιρίδιον τὸν

κεντρικὸν τοῦτον κύλινδρον, θὰ παρατηρήσωμεν, ὅτι εἶναι μαλακὸς καὶ χυμώδης πρὸς τὸ ἔξωτερικόν του μέρος, καὶ γίνεται σκληρότερος καὶ ζηρός, ὅσον προχωρεῖ τὸ μαχαιρίδιον εἰς βάθος.


Ἐξετάζοντες τὴν τομὴν τοῦ βλαστοῦ παρατηροῦμεν κατὰ σειρὰν τὰ ἔξης :

α) Εἰς τὸ ἀμέσως κάτωθεν τοῦ φλοιοῦ τμῆμα παρατηροῦμεν λεπτοτάτους κύκλους ἀπὸ πολὺ λεπτὰ στρῶμα τα ὁμοιάζοντα πρὸς φύλλα βιβλίου, τεθειμένα τὸ ἐν ἐπὶ τοῦ ἄλλου. Τὸ τμῆμα τοῦτο τὸ λέγομεν διὰ τοῦτο βίβλον (σχ. 114, 2). Εἰς αὐτὴν εὑρίσκονται οἱ μαλακοὶ σωλῆνες, οἱ μεταφέροντες τὸν θρεπτικὸν χυμόν, τοὺς ὅποίους ὠνομάσαμεν ἡθμώδεις σωλῆνας.

β) Κάτωθεν τῆς βίβλου παρατηροῦμεν ἐν στρῶμα, τὸ ὅποῖον λέγεται γενέτειρα στιβάς ἢ κάμβιον (3).

γ) Κάτωθεν τῆς στιβάδος ταύτης εὑρίσκεται τὸ σκληρὸν ξύλον τοῦ βλαστοῦ καταλαμβάνον τὸ μεγαλύτερον μέρος τοῦ κεντρικοῦ κυλίνδρου. Σχηματίζεται τοῦτο ἀπὸ κύκλους ἐναλλάξ σκοτεινοῦ καὶ ἀνοικτοτέρου χρώματος, διασχιζομένους ἀπὸ ἀκτῖνας.

"Αν κόψωμεν ὄριζοντίως τοὺς βλαστοὺς φυτῶν διαφόρου ἡλικίας, θὰ ἴδωμεν ὅτι οἱ κύκλοι εἶναι τόσον περισσότεροι, ὅσον περισσότερον ἡλικιωμένον εἶναι τὸ φυτόν. Τοῦτο, διότι ἡ γενέτειρα στιβάς παράγει κατ' ἔτος πρὸς τὰ ἔξω μὲν ἐν λεπτὸν στρῶμα, σχηματίζον λεπτὸν κύκλον εἰς τὴν βίβλον, πρὸς τὰ μέσα δὲ ἐνα κύκλον παχύτερον. Αὐτὸς ἀρχίζει κατὰ τὴν ἀνοιξίν καὶ τελεώνει μὲ τὸ τέλος τοῦ φυινοπώρου· κατὰ τὸν χειμῶνα δηλαδὴ ἡ γενέτειρα στιβάς δὲν σχηματίζει κύκλους. Καθὼς ὅμως, κατὰ τὴν ἀνοιξίν, οἱ χυμοὶ τοῦ φυτοῦ εἶναι ἄφθονοι, τὸ τμῆμα τοῦ κύκλου τὸ σχηματίζόμενον τότε εἶναι παχύτερον καὶ ἀνοικτοῦ χρώματος, ἐνῷ τὸ σχηματίζόμενον κατὰ τὸ φυινοπώρον εἶναι λεπτότερον καὶ σκοτεινοῦ χρώματος.



**Σχ. 114. Τομὴ βλαστοῦ δρυδὸς ἡλικίας 3 ἑτῶν.** 1 φλοιός.  
2 βίβλος. 3 κάμβιον.  
4 ξύλον παλαιόν. 5 φύλλον τῆς τελευταίας ἀνοιξεως. 6 ξύλον τοῦ τελευταίου φυινοπώρου. 7 ἐντεριώνη.

Βλέπομεν οὕτως ὅτι ἡ γενέτειρα στιβάδας παράγει κατ' ἔτος ἔνα λεπτὸν κύκλου πρὸς τὰ ἔξω, πρὸς τὴν βίβλον δηλαδή, καὶ ἔνα παχύτερον ἀνοικτότερου χρώματος πρὸς τὰ μέσα (σχ. 115). Μετροῦντες ἐπομένως εἴτε τοὺς κύκλους τοῦ σκοτεινότερου χρώματος, εἴτε ὅλους τοὺς κύκλους (ὅπότε ὅμως πρέπει νὰ διαιρέσωμεν τὸν ἀριθμόν των διὰ τοῦ 2), δυνάμεθα ἐκ τοῦ ἀριθμοῦ τούτων νὰ γνωρίσωμεν τὴν ἡλικίαν τοῦ φυτοῦ.

Εἰς τοὺς κύκλους τούτους εύρισκονται, καθὼς καὶ ἀνωτέρω εἴπομεν, οἱ ξυλώδεις σωλῆνες, διὰ τῶν ὅποιων μεταφέρεται εἰς τὰ φύλλα τὸ

ündωρ μὲ τὰ ἐν αὐτῷ διαλελυμένα ἄλατα. Μὲ τὴν πάροδον τοῦ χρόνου καὶ τὸν συγματισμὸν νέων κύκλων οἱ παλαιοὶ κύκλοι ἀπομακρύνονται ἀπὸ τὴν γενέτειραν στιβάδα, οἱ ξυλώδεις σωλῆνες των ἀποξυλουνται τελείως καὶ δὲν χρησιμοποιοῦνται πλέον διὰ τὴν μεταφορὰν τοῦ ὕδατος καὶ τῶν ἀλάτων, ἀλλὰ μόνον διὰ νὰ στηρίζωσι τὸ φυτόν. Δύνανται καὶ νὰ λείψωσι τελείως, χωρὶς τὸ φυτὸν νὰ ξηρανθῇ (ὅπως εἰς τὴν ἑλαίαν, πλάτανον, κλπ.). Εἰς τὰ φυτὰ ταῦτα οἱ ξυλώδεις σωλῆνες σήπουνται καὶ οἱ βλαστοί των κοιλαίνονται ἐντελῶς (κουφάλες), χωρὶς ὅμως τὸ φυτὸν νὰ ξηραίνεται. Διὰ τὸν ἔδιον λόγον καὶ τὸ πρὸς τὸ ἐσωτερικὸν τοῦ κεντρικοῦ κυλίνδρου ξύλον εἶναι σκληρότερον (καρδία).

Σχ. 115. Τομὴ βλαστοῦ δρυδὸς ἡλικίας 6 ἑτῶν.



Μὲ ὅσα ἀνωτέρω εἴπομεν, δυνάμεθα τώρα νὰ ἔξηγγήσωμεν καλύτερον διατί, ἀν γύρω ἀπὸ ἐν μέρος τοῦ κορμοῦ ἔνδος φυτοῦ ἀφαιρεθῆ ὅλος ὁ φλοιός, τότε πρέπει νὰ σκεπάσωμεν τὸ μέρος ἐκεῖνο, διότι ἄλλως τὸ φυτὸν κινδυνεύει νὰ ξηρανθῇ. Τοῦτο, ἐπειδὴ ἀμέσως κάτωθεν τοῦ φλοιοῦ ὑπάρχουσιν οἱ ἡθμώδεις σωλῆνες μὲ τὸν θρεπτικὸν χυμὸν καὶ οἱ ξυλώδεις μὲ τὸ ὕδωρ καὶ τὰ ἄλατα· ὅταν ἀφαιρεθῇ ὁ φλοιός, τότε, τόσον ὁ θρεπτικὸς χυμός, ὃσον καὶ τὸ ὕδωρ μὲ τὰ ἄλατα ἔξατμίζονται, διότι ὁ φλοιός δὲν τὰ προφυλάσσει ἀπὸ τὴν ἔξωτερην θερμότητα· τότε τὸ φυτὸν δὲν δύναται νὰ διατραφῇ καὶ ξηραίνεται.


## 3η Οίκογένεια: Κ α ρ υ ω δ η

### ΚΑΡΥΑ Η ΚΟΙΝΗ

( κν. καρυδιά )

Ἡ καρυδιά εἶναι ἐν δένδρον μακρόβιον, φθάνον εἰς ὕψος τὰ 30 μέτρα καὶ πολύκλαδον· εὐδοκιμεῖ εἰς ὑγρὰν ἢ ἀρδευομένην γῆν καὶ προτιμᾷ ἀσβεστοῦχα ἐδάφη καὶ ὑγρὰς χαράδρας. Καλλιεργεῖται πανταχοῦ, ἐκτὸς τῶν πολὺ θερμῶν καὶ τῶν κατεψυγμένων χωρῶν.

Τὰ φύλλα τῆς φύουνται κατ' ἐναλλαγὴν καὶ εἶναι σύνθετα, μὲ φυλ-



**Σχ. 116. Καρυδέα.** 1 βλαστός μὲ ἄρρενα ἄνθη α., καὶ θήλεα β. 2 ἄρρενα ἄνθη. 3 θήλη ἄνθος. 4 καρπὸς χωρὶς τὸ ἔξωτερικὸν σαρκῶδες μέρος του ( πυρήν ). 5 σπέρμα.

λάρια ὠσειδῆ τὸ σχῆμα καὶ πτερόμορφα τὴν νεύρωσιν ( σχ. 116 ). Τριβόμενα διὰ τῶν δακτύλων μας τὰ φύλλα ἀφήνουν μίαν ὀσμὴν ἴσχυρὰν καὶ εὐχάριστον.

**Ἄνθη.** Τὰ ἄνθη εἶναι ἄρρενα ἢ θήλεα, ἀλλὰ φέρονται ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ φυτοῦ. Τὰ ἄρρενα εἶναι κατὰ ιούλους καὶ ἔχουν κάλυκα μὲ 4 σέπαλα καὶ ποικίλοντα ἀριθμὸν στημόνων. Τὰ θήλεα, ἀνὰ 2 ἢ 3 συνήθως, ἔχουν μίαν ὀσθήκην καὶ ἐν ὀάριον καὶ ὑπεράνω ταύτης διστιβδῆ στῦλον.

Καρπός. Ό καρπός, δρύπη, λέγεται κάρυον (κν. καρύδι) καὶ ἔχει ἐν πράσινον καὶ σαρκῶδες περίβλημα, τὸ ὅποιον σχίζεται καὶ ἀποπίπτει μόνον του.

Ἐντὸς τοῦ καρποῦ εύρισκεται τὸ σπέρμα μὲν περίβλημα ἀποξυλωμένον.

Τὸ σπέρμα χωρίζεται εἰς 2 μέρη, τὰ ὅποια εἶναι δύο κοτυληδόνες, αἵτινες πάλιν χωρίζονται εἰς ἄλλα δύο μέρη ἑκάστη δι’ ἐνὸς εἴδους μεμβράνης. Ή μεμβράνη αὐτὴ εἶναι μαλακή, ὅταν ὁ καρπὸς εἶναι ἀρρώσ, σκληρούνεται ὅμως, ὅταν οὗτος ὡριμάσῃ. Τὰ δύο μέρη τοῦ σπέρματος εἶναι ἡνωμένα κατὰ τὸ κέντρον των, καὶ εἰς τὸ ἐν ἄκρον των εύρισκεται τὸ μικρὸν φυτικὸν ἔμβρυον. Εἶναι πλούσια εἰς ἔλαιον καὶ ἀντιλαμβανόμεθα τοῦτο, ἃν ξηρὰς κοτυληδόνας συμπιέσωμεν μεταξὺ τῶν δακτύλων μας, ὅπότε βλέπομεν τὴν ἔλαιωδη ταύτην οὔσιαν. Δυνάμεθα ἐπίσης νὰ προσαρμόσωμεν ἐντὸς τῶν κοτυληδόνων τὸ ἄκρον μικροῦ φυτιλίου· ἀφ’ οὗ τὸ ἀφήσωμεν ὀλίγον διὰ νὰ διαποτισθῇ ὑπὸ τοῦ ἔλαιού τῶν κοτυληδόνων, ἀνάπτομεν τὸ ἐλεύθερον ἄκρον του, τὸ ὅποιον βλέπομεν νὰ καίεται (σχ. 117) μὲν φλόγα καὶ καπνόν, λόγῳ τοῦ ἐντὸς τῶν κοτυληδόνων ὑπάρχοντος ἔλαιου.

**Σχ. 117.** Τὸ ἔλαιον τοῦ καρύου καίμενον ἀναδίδει φλόγα καὶ καπνόν.

Χρησιμότης. Ή καρυδιὰ καλλιεργεῖται διὰ τοὺς καρπούς της, ἀπὸ τοὺς ὅποιους κατασκευάζονται διάφορα γλυκίσματα καὶ ἔξαγουν ἔλαιον (καρυδέλαιον) ἔξαριτον διὰ φαγητόν. Τὸ σαρκῶδες περίβλημα τῶν καρύων, ὀσμῆς ὀρωματικῆς, χρησιμοποιεῖται διὰ τὴν κατασκευὴν εἴδους ἥδυπότου λικέρ, τὸ ὅποιον βοηθεῖ τὴν πέψιν. Τριβόμενον τὸ περίβλημα τοῦτο ἐντὸς ὅδατος, δίδει χρῶμα φαιόν, χρησιμοποιούμενον διὰ τὴν βαφὴν λευκοῦ ξύλου.

Τὸ ξύλον τῆς καρυδιᾶς, ἔλαφρὸν καὶ σκληρότατον, ἵδιως τὸ περὶ τὸ κέντρον (ἡ καρδιά), εἶναι περιζήτητον, χρησιμοποιούμενον ἀπὸ τὴν τορνευτικὴν καὶ καρροποιίαν, καθὼς καὶ διὰ τὴν κατασκευὴν ἐπίπλων.

Ἡ καρυὰ ἀνήκει εἰς τὴν οἰκογένειαν τῶν *Kaρυωδῶν*.




4η Οἰκογένεια : Ἰτεάδη

ΙΤΕΑΗΛΕΥΚΗ

( xv. Ιτιά )

Ἡ ιτέα είναι δένδρον ὕψους 10 - 15 μέτρων, τὸ ὅποῖον φύεται εἰς τόπους ὑγρούς· τὰ φύλλα τῆς, στενὰ καὶ ἐπιμήκη, είναι εἰς τὴν κάτω ἐπιφάνειάν των σκεπασμένα μὲ χρυσῦ λευκόν, ὅταν δὲ τὰ σείη ὁ ἄνεμος φαίνονται λευκά, ἐξ οὗ καὶ τὸ ὄνομα τοῦ δένδρου.

"Ἄνθη." Ἐχει ἀνθη δίκλινα καὶ είναι φυτὸν δίοικον. Οἱ στήμονες τῶν ἀρρένων ἀνθέων είναι ὀρατοὶ ἀπὸ μακράν, παράγουσι δὲ καὶ νέκταρ.



Σχ. 118. Ἰτέα. "Ἄνθη κατὰ ιούλους, α ἄρρενα, β θῆλεα,  
γ ἄρρεν καὶ δ θῆλη ἄνθος ὑπὸ μεγέθυνσιν.

Διὰ τοῦτο προσελκύουν τὰ ἔντομα, μὲ τὰ ὅποῖα γίνεται ἡ ἐπικονίασις, ( ἐνῷ εἰς τὰ προηγουμένως ἔξετασθέντα ἀπέταλα φυτὰ αὕτη γίνεται διὰ τοῦ ἀνέμου ). Τὰ ἀνθη προσκολλῶνται πολλὰ μαζὶ εἰς ἔνα κεντρικὸν ἄξονα ἀπ' εὐθείας, δηλ. ἀνευ ποδίσκων, συγματίζοντα ιούλους ( σχ. 118 ).

Καρπός. Ὁ καρπὸς είναι κάψα, ἡ ὅποια ἀνοίγει εἰς δύο καὶ ἀφήνει ἐλεύθερα τὰ σπέρματα. Ταῦτα πολυάριθμα, είναι μικρὰ καὶ ἐφωδιασμένα εἰς τὴν βάσιν των μὲ μακρὰς βαμβακώδεις τρίχας, διὰ νὰ διευκολύνεται ἡ ὑπὸ τοῦ ἀνέμου μεταφορά των καὶ διάδοσις τοῦ φυτοῦ.

Είναι ἀξιοπαρατήρητος ἡ ζωτικότης τοῦ φυτοῦ τούτου· ὅχι μόνον κλάδοι φυτεύμενοι παράγουν εἰς τὴν βάσιν των ρίζας καὶ δίδουν νέα

φυτά, ἀλλὰ καὶ αἱ ρίζαι τοῦ φυτοῦ, ἔξερχόμεναι τοῦ ἐδάφους, σχηματίζουν ὄφθαλμοὺς καὶ δίδουν νέα φυτά.

Οἱ κλάδοι τῆς, εὔκαμπτοι καὶ δυνάμενοι εὔκόλως νὰ πλεχθοῦν, χρησιμοποιοῦνται διὰ τὴν κατασκευὴν καλαθίων. Τὸ ξύλον της δίδει ἑλαφρὸν κάρβουνον, τὸ ὅποιον χρησιμοποιεῖται εἰς τὴν κατασκευὴν μαύρης πυρίτιδος.

Ἐκτὸς τῆς ἴτεας τῆς λευκῆς ἔχομεν καὶ διάφορα ἄλλα εἴδη ἴτεας ἐν τούτων, μὲ τοὺς κλάδους κρεμασμένους πρὸς τὰ κάτω, λέγεται **Ίτέα ἡ κλαίουσσα**.

**Ἡ λεύκη.** Εἶναι δένδρον, τὸ ὅποιον φθάνει εἰς ὕψος τὰ 30 μέτρα. Υπάρχουν διάφορα εἴδη τῆς, τὰ ὅποια καλλιεργοῦνται διὰ τὴν ὡραιότητά των, τὴν σκιάν τὴν ὅποιαν δίδουν, καὶ τὸ ξύλον των. Φύονται εἰς ὑγρὰ μέρη, ίδιας εἰς τὰς ὄχθας ποταμῶν, αὐξάνονται δὲ ταχύτατα. Μεταξὺ τῶν παραλλαγῶν τῆς λεύκης αἱ συνηθέστεραι εἶναι :

**Ἡ λευκή,** μὲ φύλλα ὠοειδῆ στίλβοντα εἰς τὴν ἄνω ἐπιφάνειάν των καὶ ἀργυρόχροα εἰς τὴν κάτω. **Ἡ μέλαινα,** μὲ τριγωνικὰ φύλλα, λάπμοντος ὡραίου χρώματος εἰς ἀμφοτέρας τὰς ἐπιφανείας των. **Ἡ τρέμουσσα,** μὲ φύλλα μακρόμισχα καὶ ἔχοντα σχεδὸν στρογγύλον ἔλασμα, τὰ ὅποια εύρίσκονται εἰς διαρκῆ κίνησιν, ἐξ οὗ καὶ τὸ ὄνομα.

Εἰς ὅλα τὰ φυτὰ ταῦτα τὰ ἄρρενα ἄνθη εύρισκονται εἰς ἄλλο δένδρον καὶ τὰ θήλεα εἰς ἄλλο (φυτὰ δίοικα).

Τὸ ξύλον τῆς λεύκης χρησιμοποιεῖται διὰ τὴν κατασκευὴν πυρείων καὶ χάρτου.

"Ολα τὰ εἴδη τῶν **Ίτεῶν** καὶ τῶν Λευκῶν παρουσιάζουν κοινὰ χαρακτηριστικά :

"Ἔχουσι φύλλα ἀπλᾶ, τὰ ἄρρενα καὶ τὰ θήλεα ἄνθη δὲν εύρισκονται ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ φυτοῦ, ὁ καρπὸς εἶναι κάψα καὶ τὰ σπέρματα εἶναι σκεπασμένα μὲ βαμβακώδεις τρίχας.

Σχηματίζουσι τὴν οἰκογένειαν τῶν **Ίτεωδῶν**.

## 5η Οἰκογένεια: Πλατανώδη


Εἰς τὴν οἰκογένειαν αὐτὴν ἀνήκουσιν οἱ πλάτανοι, φυτὰ μεγάλα μὲ κλάδους ἀρκετὰ ἀνεπτυγμένους καὶ διευθυνομένους πρὸς ὅλας τὰς Ψηφιοποίηθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

διευθύνσεις. Φυτεύονται, ώς φυτά στολισμοῦ καὶ διὰ τὴν σκιάν των, εἰς τοὺς δρόμους, τὰς δημοσίας πλατείας καὶ τοὺς κήπους.

Αὐτοφυῆ ἀπαντῶνται εἰς τὰς χαράδρας κυρίως καὶ περισσότερον ἔκει, ὅπου ὑπάρχει ὕδωρ.

Οἱ πλάτανοι ἔχουν βαθείας ρίζας μὲ παράρριζα μεγάλα καὶ διευθυνόμενα πρὸς ὅλας τὰς διευθύνσεις, κορμὸν ὄγκωδη, ὁ φλοιὸς τοῦ ὅποιοῦ ἀποσπᾶται κατὰ πλάκας καὶ ἀποπίπτει. Τὰ φύλλα τῶν πλατάνων εἶναι μεγάλα καὶ παλαμοειδῆ.

Τὰ ἄνθη, χωρισμένα εἰς ἄρρενα καὶ θήλεα, ἀλλὰ ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ φυ-



Σχ. 119. Τομὴ βλαστοῦ πλατάνου.

1 φλοιός, 2 ἐτήσιος κύκλος, 3 φύλλα,  
4 ἄνθη θήλεα.

Σχ. 120. Πλάτανος.

Α ἄνθη θήλεα. Β ἄνθη ἄρρενα.  
Γ καρπός.

τοῦ, κρέμανται κατὰ ιούλους ἀπὸ μικρὸν μίσχον, κατ' εὐθεῖαν προσκεκολλημένον εἰς τοὺς κλάδους (σχ. 119 καὶ 120).

Οἱ ἰουλοὶ μὲ τὰ θήλεα ἄνθη παράγουν ἔνα σωρὸν ἀπὸ ἀχαίνια σχήματος ροπάλου, ἡ βάσις δὲ ἐκάστου ἀπὸ τὰ ἀχαίνια περιβάλλεται ἀπὸ μίαν τούφαν τριχῶν. Ἡ εἰς τὸ ἄκρον ἐκάστου ἀχαίνιου εὑρισκομένη τούφα ἐκ τριχῶν διευκολύνει τὸν ἄνεμον εἰς τὸ νὰ παρασύρῃ τοῦτο μακρὰν καὶ οὕτω τὸ φυτὸν διαδίδεται μόνον του. Τὸ ἐσωτερικὸν τοῦ κορμοῦ τῶν γηραιῶν πλατάνων σηπόμενον ἀφήνει ὑπερμεγέθεις κοιλότητας (κουφάλες).

Σημείωσις: Τὰ κυπελλοφόρα, τὰ καρνάδη, καὶ τὰ πλατανώδη, τὰ ὅποια ἐξητάσαμεν ἀνωτέρω, τὰ λέγομεν φυτὰ Ἰούλιον θῆ, ἐπειδὴ τὰ ἄνθη των σχηματίζοντο ιούλους.

### 6η Οἰκογένεια: Δαφνώδη

ΔΑΦΝΗ

(κν. βάγια ή βαγίτσα)

Δενδρύλλιον, τὸ ὅποιον ἀναγνωρίζεται εὐκόλως ἀπὸ τὰ ἀρωματικὰ φύλλα του, τὰ ὅποια παραμένουν ἐπὶ τοῦ δένδρου καὶ κατὰ τὸν χειμῶνα (φυτὸν ἀειθαλές). Οἱ κλάδοι τῆς δάφνης ἔχρησιμοποιοῦντο κατὰ τὴν ἀρχαιότητα, διὰ νὰ στεφανοῦνται μὲν αὐτοὺς οἱ νικηταὶ τῶν ἀγώνων.

Τὰ ἄνθη τῆς φύονται καθ' ὅμαδας, χωριστὰ τὰ ἄρρενα ἀπὸ τὰ θηλεὰ καὶ στεροῦνται πετάλων. Οἱ καρποὶ τῆς εἶναι σάρκωδεις. Τὰ φύλλα τῆς προστίθενται ὡς ἄρτυμα εἰς μερικὰ εἴδη φαγητοῦ, τὰ ὅποια ἀρωματίζονται, ἐξάγοντα δὲ ἐξ αὐτῶν καὶ ἀρωματικὸν ἔλαιον, τὸ δαφνέλαιον.

### 7η Οἰκογένεια: Τεῦτλα

Τεύτλων (κοκκινογουλιῶν ή παντζαριῶν) ὑπάρχουσι διάφοροι παραλλαγαί. "Απασαι περιλαμβάνουσι κατὰ τὸ πλεῖστον φυτὰ διετῆ (συναντῶνται καὶ ἐλάχιστα μονοετῆ).


Κατὰ τὸ πρῶτον ἔτος τὰ φυτὰ ταῦτα συλλέγουν τὰ θρεπτικὰ συστατικὰ εἰς τὴν ρίζαν των καὶ τὰ χρησιμοποιοῦν κατὰ τὸ ἐπόμενον ἔτος διὰ τὴν παραγωγὴν ἀνθέων καὶ καρπῶν.

Διακρίνονται μεταξύ των ἀπὸ τὸ χρῶμα καὶ τὸ μέγεθος τῶν ριζῶν των, αἱ ὅποιαι, διαφόρων σχημάτων (σχ. 121) καὶ χρώματος λευκοῦ ή ἐρυθροῦ, χρησιμοποιοῦνται εἴτε ὡς τροφὴ κτηνῶν εἴτε, αἱ περιέχουσαι σάκχαρον, καὶ ὡς τροφὴ τοῦ ἀνθρώπου.

Μιᾶς παραλλαγῆς μὲ πολὺ σάκχαρον γίνεται βιομηχανικὴ χρησιμοποίησις πρὸς ἐξαγωγὴν τῆς ἐντὸς τῶν ριζῶν αὐτῆς σακχάρεως (σακχαρότευτλα). Ή καλλιέργεια σακχαροτεύτλων έρχεται εἰς τὴν Ελλάδα (Θεσσαλίαν) καὶ λειτουργεῖ ἐργοστάσιον παραγωγῆς σακχάρεως εἰς Λάρισαν.

Τὰ φυτὰ ταῦτα σχηματίζουσι κατὰ τὸ πρῶτον ἔτος ρίζαν, ή ὅποια εἰσγγεῖται βιούμεως καὶ γίνεται σακχάρδης ἀπὸ τὰ θρεπτικὰ συστατικά, τὰ

όποια ἐναποθηκεύει ἔκει τὸ φυτόν εἰς τὸ ἄνω μέρος τῆς φέρει βραχὺν βλαστὸν μὲ τούφαν φύλλων. Κατὰ τὸ δεύτερον ἔτος ἀναπτύσσεται ἐπιμήκης βλαστός, ἐπὶ τοῦ ὅποιου σχηματίζονται τὰ ἄνθη καὶ οἱ καρποί.



Σχ. 121. Ρίζαι τεύτλων (διαφόρων σχημάτων καὶ μεγεθῶν).

Τὰ ἄνθη εἶναι ἀρρενοθήλεα καὶ φέρουν 5 σέπαλα (στεροῦνται πετάλων), 5 στήμονας καὶ ἕνα ὅπερον ὁ καρπὸς εἶναι ἀχαίνιον.

"Ομοιον μὲ τὰ τεῦτλα φυτὸν εἶναι τὸ **Σπανάκι**, τὸ ὅποιον καλλιεργεῖται ὡς λαχανικόν.

### 8η Οἰκογένεια: Ἰξώδη


ΙΞΟΣ

(κν. μελιός ἢ μελάς ἢ γκύ)

‘Ο ἵξδς εἶναι φυτὸν πολυετές, τὸ ὅποιον σχηματίζει ἐπὶ τῶν κλάδων διαφόρων δένδρων (ἰδίως τῆς ἐλάτης, τῆς μυλέας, τῆς λεύκης) τούφας ἀπὸ κλάδους χρώματος πρασινωποῦ (σχ. 122), αἱ ὅποιαι προσκολλῶνται στερεῶς ἐπὶ τῶν κλάδων τῶν δένδρων μὲ ρίζας ἀπομυζητικάς. Τὰς ρίζας ταύτας προεκτείνουν ἐντὸς τοῦ κλάδου, ἀπὸ τὸν ὅποιον ἀπομυζοῦν χυμὸν καὶ τρέφονται. Εἶναι δηλαδὴ ὁ ἵξδς φυτόν, τὸ ὅποιον, ἐνῷ ζῇ παρασιτικῶς, ἔχει χρῶμα πράσινον, δηλ. ἔχει χλωροφύλλην. Ἐπομένως τὸ φυτὸν τοῦτο ἀφομοιοῦ, δηλ. τρέφεται καὶ μόνον του· διὰ τοῦτο τὸ λέγομεν ἡμιπαράσιτον.

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Τὰ φύλλα τοῦ ἵξου, παραμένοντα καὶ κατὰ τὸν χειμῶνα, εἶναι παχέα, σαρκώδη καὶ φύονται ἀνὰ δύο, τὸ ἐν ἀπέναντι τοῦ ἄλλου, εἶναι δὲ στενώτερον βάσιν γραν. Οἱ κλάδοι, οἱ ὅποιοι φαίνονται ώς νὰ εἶναι



Σχ. 122. Ἰξός (γκ) ἐπὶ κλάδου δρυός.

καὶ ἔχει μίαν ἵξωδη κολλητικὴν οὐσίαν, τὴν ὅποιαν ἀντιλαμβανόμεθα, ἐν τὸν συμπιέσωμεν μεταξὺ τῶν δακτύλων μας. Τὸν ἀγαποῦν πολὺ διάφορα πτηνά, ίδιως οἱ τσίγλες, τὰ ὅποια τὸν τρώγουν, καὶ μὲ τὰ περιττώματά των ἀποθέτουν τὸ ἐντὸς τοῦ καρποῦ σπέρμα, τὸ ὅποῖον μέγει ἀγώνευτον, ἐπὶ τυνος κλάδου μηλέας, ἑλάτης, λεύκης ἢ ἄλλων δένδρων. Τὸ σπέρμα τότε φυτρώνει ἐπὶ τοῦ κλάδου καὶ διδει ἔκει νέον φυτόν. Οὕτω γίνεται ἡ διασπορὰ τοῦ ἵξου.

Ο ἵξος ἀποτελεῖ ίδίαν οἰκογένειαν, τὴν οἰκογένειαν τῶν Ἰξωδῶν.

### ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΙΣ 3η ΤΑΞΙΣ : ΔΙΚΟΤΥΛΗΔΟΝΑ ΑΙΓΕΤΑΛΑ

Οἰκογένεια	κοινὰ χαρακτηριστικὰ	τάξις
1. Κνιδώδη		
2. Κυπελλοφόρα		
3. Καρνώδη		
4. Ἰτεώδη		
5. Πλατανώδη		
6. Λαφνώδη		
7. Τεῦτλα		
8. Ἱξώδη		
	"Ανθη χωρὶς στεφάνη, δηλ. χωρὶς πέταλα	Δικοτυληδονα ἀπειγάζ

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

"Εως τώρα έξητάσαμεν τρεῖς τάξεις δικοτυληδόνων φυτῶν, τὰ Χωριστοπέταλα, τὰ Συμπέταλα καὶ τὰ Ἀπέταλα.

Αἱ τρεῖς αὗται τάξεις ἀποτελοῦν, ὅμοι λαμβανόμεναι, μίαν μεγαλυτέραν ὁμάδα φυτῶν καλουμένην Ὁμοταξίαν ἀποτελοῦν τὴν ὁμοταξίαν τῶν δικοτυληδόνων φυτῶν.

### 1η ΟΜΟΤΑΞΙΑ : ΦΥΤΑ ΔΙΚΟΤΥΛΗΔΟΝΑ

Τάξις

Κοινὰ χαρακτηριστικά

‘Ομοταξία

- 1. Χωριστοπέταλα
- 2. Συμπέταλο
- 3. Ἀπέταλα

{	Σπέρματα μὲ δύο κοτυληδόνας	}

Φυτὰ  
δικοτυλήδονα

### 1η ΟΜΟΤΑΞΙΑ : ΦΥΤΑ ΜΟΝΟΚΟΤΥΛΗΔΟΝΑ

#### 1η Οἰκογένεια : Ἄγρωστά δη


ΣΙΤΟΣ

‘Ο σῖτος εἶναι ποῶδες μονοετές φυτόν, τὸ ὄποιον κατάγεται ἀπὸ τὴν Ἀσίαν. ‘Η καλλιέργειά του ἥρχισεν ἀπὸ τῶν ἀρχαιοτάτων χρόνων, αἱ δὲ σήμερον ὑπάρχουσαι παραλλαγαὶ του ἀριθμοῦνται κατὰ ἑκατοντάδας. “Ο, τι εἰς τὸν σῖτον λέγομεν σπέρματα, εἰς τὴν πραγματικότητα εἶναι καρποί. ‘Ο καρπὸς εἶναι ἐν εἴδος ἀχαινίου, τὸ ὄποιον καλεῖται, ὡς θὰ ἔδωμεν καὶ κατωτέρω, καρύνοψις, ἐπειδὴ τὸ περικάρπιον δὲν ἀποχωρίζεται τοῦ καρποῦ, δπως εἰς τὰ ἀχαίνια, τὰ ὄποια ἐγνωρίσαμεν μέχρι τοῦδε. ”Εἶχει χρῶμα ἀνοικτὸν ξανθὸν καὶ ἡ μία ἀπὸ τὰς ἐπιφανείας του, εἶναι πεπλατυσμένη καὶ φέρει αὐλακα.

Διακρίνομεν ἔξωτερικῶς ἐν περίβλημα, τὸ περικάρπιον, ἐπειτα μίαν κιτρινωπὴν σκληρὰν οὐσίαν ἀζωτοῦχον καὶ εἰς τὸ ἐσωτερικὸν μίαν λευκὴν μᾶζαν πλήρη ἀμύλου. “Οτι τὸ λευκὸν τοῦτο μέρος τοῦ καρποῦ περιέχει ἄμυλον, δυνάμεθα νὰ τὸ διαπιστώσωμεν, ἢν ἐπιδράσωμεν ἐπ’ αὐτοῦ μὲ ἵδιον, ὅπότε λαμβάνει χρῶμα κυανοῦν ( ἀντίδρασις χαρακτηριστικὴ τοῦ ἀμύλου ). Εἰς τὴν βάσιν τοῦ αὐλακοῦ εὑρίσκεται τὸ φυτικὸν ἔμβρυον, τὸ ὄποιον εἶναι πολὺ μικρὸν καὶ δυνάμεθα νὰ τὸ ἔξετάσωμεν μόνον μὲ μικροσκόπιον. Τότε διακρίνομεν εἰς αὐτὸ ( σχ. 123, α ) τὴν κορυ-

φὴν ( ἀκραῖον ὁφθαλμὸν ) ( 1 ), ἐν μικρὸν ριζίδιον, ἐνα μικρὸν βλαστόν, καὶ παραπλεύρως μίαν μόνον πολὺ λεπτήν κοτυληδόνα ( 2 ). Διὰ τοῦτο δ σῖτος λέγεται φυτὸν μονοκοτυλήδονον.

Τὰ θρεπτικὰ συστατικά, τὰ ὅποῖα θὰ χρησιμοποιήσῃ τὸ νεαρὸν φυτὸν κατὰ τὴν πρώτην ἀνάπτυξιν, μέχρις ὅτου δηλ. ἀποκτήσῃ ρίζαν καὶ φύλλα, διὰ νὰ δύναται νὰ ζήσῃ μόνον, δὲν εὑρίσκονται εἰς τὴν κοτυληδόνα, ὅπως εἰς τὸν φασίλον, ἀλλὰ ἔκτὸς ταύτης ( εἰς τὴν λευκὴν ἀμυλούχην οὐσίαν καὶ τὴν ἀζωτούχην οὐσίαν του ). Ἡ κοτυληδόνων χρειάζεται, διότι κατὰ τὴν ἐκβλάστησιν παράγει οὐσίας ( φυράματα ), αἱ ὅποιαι καθιστοῦν τὸ ἄμυλον καὶ τὰς ἀζωτούχους οὐσίας τοῦ καρποῦ ὑγρὰς καὶ διευκολύνουν τὸ νεαρὸν φυτὸν εἰς τὴν ἀπορρόφησίν των.



Σχ. 123. Φάσεις τῆς βλαστήσεως σπέρματος σίτου. α τομὴ τοῦ σπέρματος. 1 φυτικὸν ἔμβρυον, 2 κοτυληδόνων, 3 τριχίδια εἰς τὴν κορυφὴν τοῦ σπέρματος.

σιν του· εἰς τὸ μέρος αὐτὸν ἐμφανίζονται πολλὰ λευκὰ νημάτια, τὰ ὅποῖα διευθύνονται πρὸς τὰ κάτω ( σχ. 124 ) καὶ τὰ ὅποῖα εἶναι αἱ ρίζαι. Ἐπειτα αὔξάνεται ὁ βλαστός, ἀλλ’ ὅχι ὅπως εἰς τὸν φασίλον, ὅπου αἱ κοτυληδόνες παρασύρονται ἕξω τοῦ χώματος· ἐδῶ ἡ κοτυληδόνων παραμένει εἰς τὸ χῶμα, διότι αὔξάνεται μόνον ἡ κορυφή, ἡ ὅποια δίδει τὸν βλαστόν.


Βλαστός. Ὁ βλαστός τοῦ σίτου ὄνομάζεται κάλαμος καὶ εἶναι ἐσωτερικῶς κοῖλος, φέρει ὅμως ἀπὸ διαστήματος εἰς διάστημα γρήνατα πλήρη, ἀπὸ τὰ ὅποῖα ἐκφύονται τὰ φύλλα ( σχ. 125 ). Ἡ κατασκευὴ Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

του αὐτὴ τὸν βοηθεῖ νὰ ἀντέχῃ εἰς τὸν ἄνεμον καὶ νὰ μὴ θραύσεται. Δὲν δικκλαδοῦται· ἀπὸ τὴν βάσιν του ὅμως ἐκφύονται ἄλλοι βλαστοί, σχεδὸν ἀνεξάρτητοι ἀπὸ τὸν ἀρχικόν.

**Ριζαί.** Αἱ ρίζαι τοῦ σίτου δὲν ἐκφύονται ἀπὸ μίαν κυρίαν ρίζαν ( ὅπως εἴδομεν εἰς ἄλλα φυτά ), ἀλλὰ κατ’ εὐθεῖαν ἀπὸ τὸν βλαστὸν ἐν εἴδει θυσάνου ( ρίζα θυσανώδης ). Δὲν προχωροῦν κατὰ βάθος, ἀλλὰ ἐξαπλοῦνται ἐπιπολαίως εἰς τὴν ἐπιφάνειαν, καὶ διὰ τοῦτο τὸ φυτὸν τοῦτο ( καθὼς καὶ ὅσα φυτά ἔχουσι τοιαύτας ρίζας ) λέγεται ἐπιπολαιόρριζον φυτόν.

**Φύλλα.** Ταῦτα εἰς τὸ κάτω μέρος τῶν σχηματίζουν θήκην, κολεόν, ἡ ὅποια περιβάλλει τὸν κάλαμον εἰς μεγάλην ἔκτασιν καὶ τὸν καθιστᾷ οὕτω περισσότερον στερεόν. Ἡ θήκη αὕτη πρὸς τὸ ἐν μέρος τῆς εἶναι ἐσχισμένη καὶ συνεχίζεται πρὸς τὰ ἄνω μὲ ἔλασμα ἐπίμηκες, τὸ ἄκρον τοῦ ὅποιού πίπτει πρὸς τὰ κάτω. Τὸ ἔλασμα τοῦτο φέρει παραλλήλους νευρώσεις ( φύλλον παραλληλό-νευρον ), καὶ εἰς τὸ κάτω μέρος του ἐν γλωσσίδιον ἄχρουν, τὸ ὅποιον ἐμποδίζει τὸ ὄδωρο τῆς βροχῆς νὰ εἰσέλθῃ ἐντὸς τοῦ κολεοῦ καὶ νὰ σαπίσῃ τὸν βλαστόν.

**Ανθη.** Τὰ ἄνθη τοῦ σίτου εἶναι πολλὰ μαζί, κατὰ στάχεις. "Ἐκαστος στάχυς ἀποτελεῖται ἀπὸ μικροτέρους στάχεις, οἱ ὅποιοι λέγονται σταχνίδια. Ταῦτα φέρουν 3 ἢ 4 ἄνθη ἔκαστον, προφύλαξσόμενα ἀπὸ δύο πράσινα φύλλα, τὰ ὅποια λέγονται λέπινα. Κάθε ἐν πάλιν ἀπὸ τὰ ἄνθη αὐτὰ προφύλασσεται ἀπὸ δύο πράσινα φυλλίδια, τὰ ὅποια τὸ σκεπάζουν ὀλόκληρον, ὅταν εἶναι νέον καὶ ἐν μέρει ἀργότερον. Ἐντὸς τῶν φυλλίδιων τούτων εύρισκονται τρεῖς στήμονες μὲ λεπτὰ καὶ εὐκίνητα νήματα ( σχ. 126 ), τὰ ὅποια εἰς τὸ ἄκρον των φέρουσιν ἀνθηρας σχήματος X· εἰς τὸ κέντρον εύρισκεται ὁ ὑπερος, ὁ ὅποιος σχηματίζεται ἀπὸ μίαν σφαιρι-



**Σχ. 124.** Ἐκβλάστησις σπέρματος σίτου. 1 σπέρμα, 2 τὰ τριχίδια τῆς κορυφῆς τοῦ σπέρματος, 3 ἡ κοτυληδών, 4 ὁ βλαστὸς ἀρχίζει νὰ ἐμφανίζεται, 5 ἡ ρίζα, ἣ τις ἔχει ἀναπτυχθῆ ἀρκετά, 6 ἡ τομὴ τοῦ βλαστοῦ, 7 τομὴ τῆς κοτυληδόνος, 8 ρίζαι, 9 βλαστός, ὁ ὅποιος ἔχει αὐξηθῆ ἀρκετά, 10 ρίζαι θυσανώδεις μὲ τὰ ριζικά των τριχίδια.

κήγη ώσθήκην. ἔχουσαν ἐν μόνον δάριον καὶ ἀπὸ δύο στίγματα σχήματος πτεροῦ. Ἀπὸ τὰ δύο φυλλίδια τὸ ἐν εὐρίσκεται πρὸς τὸ ἄξονα· τὸ ἄλλο εὐρίσκεται εἰς τὸ ἀπέναντι τοῦ ἄξονος μέρος καὶ ἐπιμηκυνόμενον περισσότερον ἢ διλιγώτερον, ἀναλόγως τῆς παραλλαγῆς τοῦ σίτου, σχηματίζει ὅ,τι κοινῶς λέγεται ἄγανον ἢ γένειον τοῦ σίτου.




Σχ. 125. Βλαστός, ριζα καὶ στάχυς σίτου. 1 κάλαμος, 2 φύλλον, 3 στάχυς σίτου.

καὶ ἀπὸ τὸν ἀνεμον, νὰ σχηματίζῃ μικρὸν νέφος κιτρίνης κόνεως.

#### Καταγωγὴ καὶ καλλιέργεια τοῦ σίτου.

Ο σῖτος ἐκαλλιεργεῖτο εἰς τὴν Μεσοποταμίαν ὑπὸ τῶν Χαλδαίων ἀπὸ τῆς 5ης π.Χ. χιλιετρίδος. Ἀπὸ ἐκεῖ ἡ καλλιέργειά του διεδόθη εἰς ὅλας τὰς παραμεσογείους χώρας καὶ ἐκεῖθεν εἰς τὴν Κεντρικὴν Εὐρώπην.

Η σπορά του γίνεται κατὰ Σεπτέμβριον συνήθως (μερικῶν παραλλαγῶν, αἱ ὅποιαι δίδουν καρποὺς εἰς διάλιγον διάστημα χρόνου, ἡ σπορά γίνεται πολὺ ἀργότερον) μὲ τὴν χεῖρα ἡ καλύτερον μὲ μηχανάς, εἰς ποσοστὸν 150 - 200 χιλιογράμμων κατὰ ἑκτάριον (τὸ ἑκτάριον εἶναι 10.000 τετραγωνικὰ μέτρα, δηλαδὴ 10 στρέμματα) καὶ εἰς ἔδαφος, ποὺ πρέπει



126. Σχ. "Ανθη σίτου. 1 λεπτορού, 2 κροσσωτὰ στίγματα, 3 ὅπερος, 4 ἀνθήρες.

καὶ εἶναι βαθέως ὡργωμένον καὶ βωλοκοπημένον. Ἡ ποσότης ὅμως αὕτη ἔξαρταται ἀπὸ τὴν παραλλαγὴν τοῦ σίτου, ποὺ σπείρεται, ἀπὸ τὸ εῖδος τοῦ ἐδάφους, τὸ κλῖμα τοῦ τόπου καὶ τὴν ποιότητα τῶν σπερμάτων.

Καλὸν εἶναι πρὸ τῆς σπορᾶς νὰ γίνεται ἐπιλογὴ καλοῦ σπόρου, μὲ καρποὺς ὥριμους (έπομένως πλήρεις ἀπὸ θρεπτικὰ συστατικὰ) καὶ ὅχι φαγωμένους ἀπὸ ἔντομα. Τὴν ἐπιλογὴν ταύτην ἐπιτυγχάνομεν, ἢν θέσωμεν τὰ σπέρματα ἐντὸς ὄδατος, δόπτε τὰ ἄωρα (ζαρωμένα) σπέρματα, καθὼς καὶ ἐκεῖνα, τὰ ὅποια ἔχουν φαγωθῆ ἀπὸ ἔντομα, ὡς ἐλαφρότερα, ἐπιπλέουν καὶ τὰ ἀποχωρίζομεν. Δὲν πρέπει ὅμως τὰ σπέρματα νὰ χώνωνται βαθύτερον ἀπὸ 3 - 8 ἑκατοστόμετρα (ἀναλόγως τοῦ ἐδάφους), διότι κινδυνεύουν νὰ μὴ φυτρώσουν, ἐπειδὴ δὲν δύναται ἡ κορυφὴ των, ἀναπτυσσομένη, νὰ διαπεράσῃ τὸ ὑπεράνω αὐτῆς χῶμα.

Ο σῖτος δὲν ἔχει πολλὰς καὶ μεγάλας ρίζας διὰ νὰ ἀναζητήσῃ εἰς μεγάλην ἔκτασιν τὴν τροφήν του, διὰ τοῦτο τὸ ἔδαφος, εἰς τὸ ὅποῖον θὰ τὸν σπείρωμεν, πρέπει νὰ εἶναι γόνιμον καὶ καλὰ λιπασμένον. Ἡ λίπανσις γίνεται εἴτε μὲ φυσικὰ λιπάσματα, κυρίως κόπρον ζώων, εἴτε μὲ τεχνητὰ λιπάσματα (εἰδικὰ διὰ τὸν σῖτον). Ἐπειδὴ αἱ ρίζαι του εἶναι εἰς τὴν ἐπιφάνειαν, δο σῖτος θὰ ἐκινδύνευε καὶ ἀπὸ τὴν ξηρασίαν. ἀπὸ αὐτὴν ὅμως προστατεύεται, διότι τὸ ἐν φυτὸν φύεται πολὺ πλησίον τοῦ ἄλλου εἰς τρόπον, ὥστε αἱ ρίζαι του εὑρίσκονται διαρκῶς εἰς τὴν σκιάν.

Κατὰ τὸν Φεβρουάριον ἡ Μάρτιον ὁ σῖτος βοτανίζεται, δηλαδὴ ἀφαιροῦνται τὰ ἐπιβλαβῆ χόρτα, τὰ ζιζάνια, τὰ ὅποια, φυόμενα πλησίον αὐτοῦ, ἀπειλοῦν νὰ τὸν πνίξουν καὶ ἐμποδίζουν τὴν ἀνάπτυξίν του. Ἡ συγκομιδὴ γίνεται κατὰ Ιούνιον - Ιούλιον ἡ καὶ ἀργότερον, ἀναλόγως τοῦ κλίματος καὶ τῆς παραλλαγῆς τοῦ σίτου, καὶ λέγεται θερισμός. Μετὰ τὸν θερισμόν, δοστις γίνεται εἴτε διὰ τῆς χειρός, εἴτε καλύτερον καὶ εὐκολώτερον μὲ θεριστικὰς μηχανάς, ἀκολουθεῖ τὸ ἀλώνισμα καὶ ὁ ἀποχωρισμὸς τῶν καρπῶν ἀπὸ τὰ τεμάχια τῶν βλαστῶν, δηλ. τὰ ἄχυρα. Καλὴ συγκομιδὴ δίδει περὶ τὰ 30 ἑκατόλιτρα σπέρματα κατὰ ἑκάτειον. Τὰ σπέρματα φυλάσσονται εἰς μέρη ξηρὰ καὶ καλῶς ἀεριζόμενα.

Ο σῖτος κινδυνεύει ἀπὸ τὸ πέσιμον ἡ πλάγιασμα, τὸ ὅποῖον γίνεται κατὰ τὴν ἐποχὴν τῆς ὥριμάνσεως τοῦ καρποῦ· τότε τὸ βάρος τοῦ στάχυος αὔξανει, δο κάλαμος κυρτοῦται καὶ πλησιάζει πρὸς τὸ ἔδαφος, μὲ τὸ ὅποῖον ἔρχεται εἰς ἐπαφὴν ὁ στάχυς καὶ σήπεται.

Οἱ γεωργοὶ συνηθίζουν νὰ εἰσάγουν εἰς ἀγρούς μὲ σιτηρά, τὰ ὅποια ἔχουν αὐξηθῆ ὑπερβολικά, ζῶα, ιδίως πρόβατα, τὰ ὅποια ἀφήνουν ἐπ' Ψηφιοποιήθηκε από τὸ Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

διλίγον, ὅστε νὰ φάγουν μόνον τὰ φύλλα, χωρὶς νὰ βλάψουν τὸν εἰς τὸ κέντρον τῶν φύλλων μικρὸν βλαστὸν ( τρώγουν τὴν πεσάδα, καθὼς κοινῶς λέγεται )· οὕτως ἐπιβραδύνεται ἡ αὔξησις τοῦ φυτοῦ καὶ προλαμβάνεται τὸ πέσιμον του

"Αλλον κίνδυνον διὰ τὸν σῖτον ἀποτελοῦν οἱ ἀρουραῖοι, οἱ ὄποιοι καταστρέφουν τὰς ρίζας μὲ τὰς ὑπογείους στοάς, τὰς ὄποιας ἀνοίγουν. Οὗτοι πληθύνονται πολλάκις τόσον πολύ, ὅστε νὰ ἀπειλοῦν ὅλόκληρον τὴν συγκομιδήν. Καταπολεμοῦνται, ἀν θέσωμεν πλησίον τῶν φωλεῶν των, τὰς ὄποιας εὑρίσκομεν ἐκ τῶν ἐπὶ τοῦ ἐδάφους ὅπῶν καὶ τῶν γύρω ἀπὸ τὰς διπλὰς σωρᾶν τοῦ χώματος, σίκαλιν, ποιισμένην μὲ δηλητήριον ( στρυχνίνην, ἀρσενικόν ), τὴν ὄποιαν οἱ ἀρουραῖοι τρώγουν καὶ δηλητηριάζονται.

'Επικίνδυνος ἐπίσης εἶναι ὁ νοτιοδυτικὸς ξηρὸς καὶ θερμὸς ἄνεμος, ὁ λίθιας, ὃστις πνέει κατὰ τὴν ἄνοιξιν, δηλ. πρὶν ἀκόμη ὁ σῖτος ὠριμάσῃ ( ὅταν εὑρίσκεται εἰς τὸ γαλάκτωμα ) καὶ τὸν ξηραίνει ( τὸν κάμνει νὰ ὠριμάσῃ πρὶν ἀπὸ τὴν ὥραν του, πρὶν δηλαδὴ ἀποθηκευθοῦν εἰς τὰ σπέρματα ἀρκετὰ θρεπτικὰ συστατικά· δίδει τότε ὁ σῖτος σπέρματα μικρὰ καὶ ζαρωμένα, κατὰ συνέπειαν διλίγην ἐσοδείαν ). Μὲ τὴν σπορὰν παραλλαγῶν σίτου, αἱ ὄποιαι ὠριμάζουσιν ἐνωρίτερον, ὁ κίνδυνος αὐτὸς ἀποφεύγεται.

#### • Ασθένειαι τοῦ σίτου

Αἱ κυριώτεραι τῶν ἀσθενειῶν τοῦ σίτου εἶναι :

α) *'Η σκωρίασις*. Αὕτη ὀφείλεται εἰς μικροσκοπικὸν μύκητα, ὃστις ζῆ ἐπὶ τῶν φύλλων καὶ τρέφεται εἰς βάρος των. Κατὰ τὸν Ιούνιον ὁ μύκης διαπερᾶ τὴν ἐπιδερμίδα τῶν φύλλων καὶ ἀφήνει ἐκεῖ τὰ σπόριά του, τὰ ὄποια σχηματίζουν ἐπὶ τῶν φύλλων κηλῖδας χρώματος σκωρίας, ἔξ οὐ καὶ τὸ δνομα τῆς ἀσθενείας. Τὰ φύλλα τότε ἀφομοιοῦσι κακῶς καὶ τὸ φυτόν, μή τρεφόμενον ἐπαρκῶς, παράγει μικροὺς σπόρους καὶ ἔχει μικρὰν ἀπόδοσιν.

β) *'Ο ἄνθραξ* ( xv. δαυλίτης ). Καὶ ἡ ἀσθένεια αὐτὴ ὀφείλεται εἰς ἕνα μύκητα μικροσκοπικόν, ὁ ὄποιος ἀναπτύσσεται ἐπὶ τοῦ στάχυος· ὁ στάχυς τότε γεμίζει μὲ μίαν μαύρην κόνιν, ἡ ὄποια εἶναι τὰ σπόρια τοῦ μύκητος. Κατὰ τὴν συγκομιδὴν τὰ σπόρια ταῦτα προσκολλῶνται ἐπὶ τῶν σπερμάτων, παραμένουσιν ἐκεῖ μέχρι τῆς σπορᾶς καὶ μεταδίδουσιν εἰς τὰ φυτά, τὰ ὄποια θὰ προέλθουν ἔξ αὐτῶν, τὴν νόσον. Δυνάμεθα νὰ

προφυλάξωμεν τὸν σῖτον ἀπὸ τὴν νόσον ταύτην δι' ἀπολυμάνσεως τοῦ σπόρου. Διὰ νὰ ἐπιτύχωμεν τὴν ἀπολύμανσιν, ἐμβαπτίζομεν τὸν σπόρον ἐπὶ 5 λεπτὰ ( πρὸς τῆς σπορᾶς ) εἰς διάλυμα περιέχον 1 μέρος θειοκοῦ χαλκοῦ ( γαλαζόπετρας ) εἰς 100 μέρη ὅδατος.

### Χρησιμότης καὶ γεωγραφικὴ διάδοσις τοῦ σίτου

Ο σῖτος εἶναι ἡ βάσις τῆς διατροφῆς εἰς ὅλας τὰς ὑπὸ τῆς λευκῆς φυλῆς κατοικουμένας χώρας. Περιέχει 70 τοῖς ἑκατὸν ὄγκους καὶ 12 τοῖς ἑκατὸν ἀζωτούχους οὐσίας. Ἀλέθεται, δηλαδὴ τρίβεται καὶ μεταβάλλεται εἰς κόνιν, τὸ ἄλευρον. Γίνεται χώρισμὸς τῶν πιτύων, εἰς τὰ ὅποια μεταβάλλεται τὸ περικάρπιον, τοῦ σιμιγ'δαλίου, εἰς τὸ ὅποιον μεταβάλλεται τὸ ἀζωτοῦχον μέρος τοῦ καρποῦ, καὶ τῆς φαρίνας, εἰς τὴν ὅποιαν μεταβάλλεται τὸ ἀμύλοῦχον, λευκόν, μέρος του. Μὲ τὴν φαρίναν αὐτὴν κατασκευάζεται ὁ ἄρτος.


Αἱ μεγαλύτεραι σιτοπαραγωγοὶ χῶραι εἶναι αἱ Ἡνωμέναι Πολιτεῖαι τῆς Ἀμερικῆς, ἡ Ρωσία, ἡ Ἀργεντινή, ὁ Καναδᾶς, καὶ ἡ Αὐστραλία. Ἡ Ἑλλὰς παράγει σῖτον, ὀλίγον, εἰς ὅλα τὰ μέρη της καὶ περισσότερον εἰς Θεσσαλίαν, Μακεδονίαν καὶ Θράκην. Διὰ τῶν κατὰ τὴν τελευταίαν δεκαετίαν γενομένων ἀποστραγγιστικῶν καὶ ἀποξηραντικῶν ἔργων ηγεζόθη κατὰ πολὺ ἡ διὰ σίτου καλλιεργουμένη ἔκτασις. Ἡ καλλιέργεια ἐπίσης τοῦ σίτου γίνεται σήμερον μὲ μηχανάς· ἥρχισεν ἡ χρησιμοποίησις εἰς εὐρεῖαν κλίμακα τῶν λιπασμάτων καὶ σπείρονται σήμερον ἀποδοτικώτεραι ποικιλίαι σίτου. Διὰ τοῦτο ἡ παραγωγὴ ηγεζόθη σημαντικῶς καὶ ἀπὸ τοῦ 1958 αὔτη ὑπερέβη τὸ 1.700.000 τόν. ἐτησίως, ποσότης ἡ ὅποια ὅχι μόνον καλύπτει τὰς ἀνάγκας τῆς καταναλώσεως, ἀλλὰ παρουσιάζει καὶ πλεονάσματα. Διὰ τοῦτο ἀπὸ τοῦ 1959 οἱ ἀγρόται παρατρύνονται πρὸς ἄλλας καλλιεργείας καὶ ιδίως τὴν καλλιέργειαν τοῦ βάμβακος καὶ τῶν ὄπωροφόρων δένδρων.

Φυτὰ ὅμοια πρὸς τὸν σῖτον εἶναι :

**Ἡ κριθή.** Ο στάχυς ταύτης φέρει σταχύδια συνηγωμένα ἀνὰ τρία καὶ λαμβάνει οὕτω σχῆμα τριγωνικὸν ( σχ. 127, β ). Τὰ φύλλα της εἶναι πλατύτερα τῶν φύλλων τοῦ σίτου. Τὰ σπέρματά της περιέχουσιν ὀλιγώτερον ὄγκους καὶ τὸ ἄλευρόν των δὲν δίδει καλὸν ἄρτον. Χρησιμοποιοῦνται τὰ σπέρματα τῆς κριθῆς ὡς τροφὴ τῶν ζώων, καὶ κυρίως διὰ τὴν παρασκευὴν τοῦ ζύθου. Εἴς τινας ὁρεινάς περιοχάς τῆς Ἐλλάδος τὸ ἄ-

λευρον τῆς κριθῆς ἀνακατωμένον μὲ ἄλευρον σίτου, χρησιμοποιεῖται καὶ διὰ τὴν παρασκευὴν ἄρτου. Ἀντέχει πολὺ εἰς τὸ ψῦχος.

**Ἡ σίκαλις** (σχ. 127, α). Αὕτη δὲν εἶναι τόσον ἀπαιτητική, ὅσον ὁ σῖτος· ἀντέχει καὶ αὐτὴ εἰς τὸ ψῦχος καὶ εὔδοξιμεῖ καὶ εἰς ἐδάφη ἀμμώδη καὶ ἄγονα. Τὸ ἄλευρόν της δίδει ἄρτον μέλανα, διηγώτερον θρεπτικὸν ἀπὸ τὸν τοῦ σίτου, ὁ ὄποιος ὅμως διατηρεῖται μαλακὸς ἐπὶ πολὺ. Ὁ κάλαμος τῆς λεπτός, μακρὸς καὶ στενώτατος, χρησιμοποιεῖται διὰ τὴν κατασκευὴν στεγῶν εἰς ἀγροτικὰς καλύβας, κυψελῶν, ψαθίνων πίλων,




Σχ. 127. α στάχυς σικάλεως, β στάχυς κριθῆς, γ βλαστὸς μὲ καρποὺς καὶ καρπὸς βρώμης.

κανίστρων, ψαθῶν, χονδροῦ χάρτου (στράτσου), καλυμμάτων δι' ὕαλίνιας φιάλας, κ.λ.π. Ἡ σίκαλις καλλιεργεῖται περισσότερον εἰς τὰς Βορείους χώρας.

**Ἡ βρώμη.** Εὔδοξιμεῖ εἰς παντὸς εἴδους ἐδάφη, ἔστω καὶ εἰς μὴ λιπασμένα, διότι ἔχει μεγάλας καὶ πολυαριθμούς ρίζας καὶ δύναται νὰ ἀναζητήσῃ τὴν τροφήν της εἰς περισσότερον ἔδαφος. Ὁ καρπὸς τῆς (σχ. 127, γ) χρησιμοποιεῖται ὡς τροφὴ τῶν ζώων, ιδίως ἵππων, καὶ τὴν κατασκευὴν ἐνὸς εἴδους σούπας καὶ ἄρτου διὰ τοὺς διαβητικούς.

**Ο ἀραβόσιτος** (κν. ἀραποσίτι, σχ. 128). Ὁ ἀραβόσιτος εἶναι ωυτὸν ποώδεις, ἐτήσιον, μὲ εὐρύν, κυλινδρικὸν καὶ πλήρη εἰς τὸ ἐσωτερι-

κόν του βλαστόν· τὰ φύλλα του εἶναι ἐπιμήκη, πλατέα καὶ μὲ μακρὸν κολεόν. Τὰ στημονοφόρα, δηλ. τὰ ἄρρενα ἀνθη, εἶναι διατεταγμένα καθ' ὁμάδας εἰς τὴν κορυφὴν τοῦ βλαστοῦ, τὰ δὲ μὲ ὑπερον, δηλ. τὰ θήλεα, ἀποτελοῦν στάχυν καὶ εὑρίσκονται εἰς τὰ γόνατα τοῦ βλαστοῦ· αἱ ὀωθῆκαι φέρουσι μακρὰ στίγματα, τὰ διοῖα ἔξερχονται τοῦ στάχυος καὶ σχηματίζουν ἐν εἶδος θυσάνου μὲ ἐρυθρὰ νήματα. Οἱ καρποὶ τοῦ ἀραβισίτου σχηματίζουσι 8 - 12 ἐπιμήκεις σειράς καὶ εἶναι προσκεκολλημένοι εἰς βαθείας ἐσογάς, τὰς διοίας φέρει τὸ σαρκῶδες περιβλῆμα τοῦ ἄξονος τοῦ



Σχ. 128. Ἀραβόσιτος. 1 ἀνθη ἄρρενα, 2 ἀνθη θήλεα,  
δ στάχυς μὲ σπέρματα, ε στάχυς ὅρυζας.

στάχυος ( σχ. 128, δ ). Ἀποτελοῦν τόσον αὐτοί, δσον καὶ δ χλωρὸς βλαστὸς καὶ τὰ φύλλα τοῦ φυτοῦ, ἀρίστην τροφὴν διὰ τὰ οἰκιακὰ ζῶα. Τὸ ἄλευρόν των ὅμως δὲν ζυμοῦται, δηλαδὴ δὲν δύναται νὰ κατασκευασθῇ μὲ αὐτὸ ἄρτος ἔνζυμος· κατασκευάζονται μὲ τοῦτον μόνον γλυκεῖς ἄζυμοι ἄρτοι ( μπομπότα ), τοὺς διοίους χρησιμοποιοῦσιν οἱ χωρικοὶ κατὰ τὸν χειμῶνα εἰς πλεῖστα ὀρεινὰ μέρη τῆς Ἐλλάδος. Κατασκευάζονται ἐπίσης ἔξ αὐτοῦ καὶ γλυκίσματα, ἔξαγεται δὲ ἀπὸ τὰ σπέρματα τοῦ ἀραβισίτου καὶ ἀλκοόλ. Ὁ ἀραβόσιτος εὐδοκιμεῖ ιδίως εἰς ἀμμοαργιλώδη, ὑγρὰ ἦ ἀρδευόμενα ἐδάφη.

**Ἡ ὅρυζα.** Ἡ ὅρυζα εἶναι ποῶδες, ἐτήσιον φυτὸν ( σχ. 128, ε )

Καλλιεργεῖται εἰς τὰς Ἰνδίας, Ἰνδοκίναν, Σιάμ, Βιρμανίαν, Ἰνδονησίαν, Κίναν, Ἰαπωνίαν, καθὼς καὶ τὴν Αἴγυπτον, Ἰταλίαν καὶ Ἰσπανίαν καὶ εἰς ἐδάφη, τὰ ὅποια σκεπάζονται τούλαχιστον ἐπὶ 2 - 3 μῆνας κατ' ἕτος ἀπὸ ὄδωρ. Εἰς τὰς ἑπτὰ πρώτας χώρας ἡ ὅρυζα ἀντικαθιστᾷ τὸν ἄρτον, ἀποτελοῦσα τὴν βάσιν τῆς διατροφῆς τῶν κατοίκων των, ὅπως εἰς ἡμᾶς ὁ σῖτος. Παρ' ἡμῖν ἥρχισε νὰ καλλιεργήται ἡ ὅρυζα εἰς ἀρχετὰ μέρη καὶ ὁ σῖτος. Παρ' ἡμῖν ἥρχισε νὰ καλλιεργήται ἡ ὅρυζα εἰς ἀρχετὰ μέρη καὶ ὁ σῖτος. Παρ' ἡμῖν ἥρχισε νὰ καλλιεργήται ἡ ὅρυζα εἰς ἀρχετὰ μέρη καὶ ὁ σῖτος.

**Τὸ σακχαροκάλαμον.** Τοῦτο εἶναι φυτὸν πολυετές, τοῦ ὄποιου ὁ



Σχ. 129. Φυτεία σακχαροκαλάμου.

ἐλαττοῦται ἡ ποσότης τοῦ σακχάρου, τὸ ὄποιον περιέχουν. Πρὸς ἔξαγωγὴν ἔλαττοῦται ἡ ποσότης τοῦ σακχάρου οἱ βλαστοὶ κόπτονται εἰς τεμάχια, ἀλέθονται, ἀναμιγνύονται μὲν ὄδωρ, τὸ ὄποιον παραλαμβάνει τὸ σάκχαρόν των, καὶ ἀπὸ τὸν σακχαροῦχον αὐτὸν χυμὸν ἐξάγεται διὰ καταλήλου ἐπεξεργασίας τὸ σάκχαρον. Τὸ ὑπόλειμμα, τὸ ὄποιον λέγεται μελάσσα, χρησιμοποιεῖται σάκχαρον. Τὸ ὑπόλειμμα, τὸ ὄποιον λέγεται μελάσσα, χρησιμοποιεῖται διὰ τὴν παρασκευὴν οἰνοπνεύματος καὶ ἐνὸς ποτοῦ, τοῦ ρουμίου.

**Τὸ βαμβοῦσα** (χν. μπαμποῦ, σχ. 130). Φυτόν, τὸ ὄποιον συντῷ κανεὶς εἰς ὅλας τὰς θερμὰς χώρας. Η αὔξησίς του εἶναι ταχυτάτη

καὶ ὁ κορμός του δύναται νὰ αὐξηθῇ εἰς ὕψος ἑνὸς μέτρου εἰς μίαν μόνον ἡμέραν, φθάνει δὲ εἰς ὕψος 20 μέτρων καὶ διάμετρον 20 ἑκατοστομέτρων. Σχηματίζει δάση δόλοκληρα, δὲν δίδει ὅμως παρὰ μίαν φοράν, ὕστερα ἀπὸ μερικὰ ἔτη, ἀφ' ὅτου ἐφύτρωσεν, ἄνθη καὶ καρποὺς καὶ ἔπειτα ἔγραινεται, καὶ δόλοκληρον τὸ δάσος ἐξαφανίζεται εἰς ἐλάχιστον χρόνον. Τὸ μπαμποῦ εἶναι ἐν ἀπὸ τὰ ὠφελιμώτερα φυτά· οἱ βλαστοί του κοῖλοι, ἐλαφροὶ καὶ στερεοί, χρησιμεύουν διὰ τὴν κατασκευὴν δοχείων, ὑδροσωλήνων, ἐπίπλων, πασσάλων, βυτίων, κάδων, κλιμάκων, καλάμων ἀλιείας, ἵστων πλοιών κ.λ.π. Οἱ νεαροὶ βλαστοὶ τρώγονται ὅπως τὰ σπα-



Σχ. 130. Βαμβοῦσα (μπαμποῦ).



Σχ. 131. Ηρα.

ράγγια, τὰ φύλλα χρησιμεύουν διὰ τὴν κατασκευὴν στεγῶν καλυβῶν, ἀπὸ τὸν βλαστὸν δὲ ἐκρέει ἔνας χυμὸς σαχχαροῦχος, ἀπὸ τὸν ὃποῖον κατασκευάζεται εὐχάριστον τὴν γεῦσιν ποτόν.

**Ο κάλαμος δοκονδόλος** (κν. καλάμι). Ἀγαπᾷ νὰ εύρισκωνται αἱ ρίζαι του διαρκῶς ἐντὸς τοῦ ὅδατος. Διὰ τοῦτο τὸν κάλαμον τὸν εύρισκομεν φυόμενον ἰδίως εἰς τὰς ὅχθας τῶν ποταμῶν καὶ τῶν ρυακίων. Οἱ βλαστοὶ του χρησιμοποιεῖται διὰ τὴν κατασκευὴν στεγῶν, ἀφοῦ κοπῆ ἀπὸ τῆς βάσεώς του καὶ ἀφεθῇ νὰ ἔγρανθῇ· κατὰ τὸ ἐπόμενον ἔτος ἐκ-

φύονται νέοι βλαστοί ἀπὸ τὸ ὑπόγειον μέρος τοῦ φυτοῦ (ρίζωμα), τὸ ὄποιον παραμένει ἐντὸς τοῦ ἐδάφους.

**Ἡ ήρα** (σχ. 131). Φυτὸν ποῶδες, ἐτήσιον. Φύεται εἰς ἄγρους σιτηρῶν, ὅπου εἶναι εὔκολώτατον νὰ τὸ ἀνεύρωμεν. Τὰ σπέρματά του ἀναμιγνύονται μὲ τὰ σπέρματα τοῦ σίτου κατὰ τὴν συγκομιδὴν πρέπει ὅμως νὰ ἀποχωρίζωνται ἀπὸ αὐτά, διότι, τρωγόμενα, προξενοῦν νευρικὰς ἀνωμαλίας, ιδίως τρόμον τῶν ἄκρων.

### Ἄγρωστώδη ἢ δημητριακὰ

(<sup>1</sup>) σῖτος, ἡ κριθή, ἡ σίκαλις, ἡ βρώμη, ὁ ἀραβόσιτος, ἡ ὅρυζα, τὸ σακχαροκάλαμον, τὸ μπαμποῦ, ὁ κάλαμος καὶ ἡ ήρα, παρουσιάζουν κοινὰ χαρακτηριστικά:

"Ἔχουν ρίζας πολυαριθμους, λεπτὰς καὶ ἐπιπολαίς<sup>2</sup> βλαστὸν κοῦλον κατὰ τὰ μεσογονάτια διαστήματα, σπανίως πλήρη μαλακῆς ούσίας μὲ τὸν ὄποιον περιβάλλουσι τὸν βλαστόν, ἀνθη κατὰ σταχύδια μὲ τρεῖς μὲ τὸν ὄποιον περιβάλλουσι τὸν βλαστόν, ἀνθη κατὰ σταχύδια μὲ τρεῖς στήμονας καὶ ἀνθῆρας εἰς σχῆμα Χ, μίαν ἐλευθέραν ὀθήκην μὲ ἐν ὀστριον, ἐφωδιασμένον μὲ δύο πτεροειδῆ στίγματα, καὶ καρπὸν καρύοψιν.

'Εκτὸς τῶν ὑψηλῶν εἰδῶν τῶν τροπικῶν (σακχαροκάλαμον, μπαμποῦ), τὰ ἄγρωστώδη εἶναι φυτὰ μετρίου μεγέθους. Τόση ὅμως εἶναι ἡ ἀντοχὴ των καὶ ἡ ἀντίστασις, τὴν ὄποιαν παρουσιάζουν πρὸς ὅλας τὰς εικόσεις, τὰς ἀσθενείας καὶ τὰς βλάβες ἐν γένει, ὥστε ἔχουν γίνει τὰ τέλον διαδεδομένα φυτὰ ἐπὶ τῆς γῆς.

'Αποτελοῦν, μαζὶ μὲ ἄλλα προσόμοια φυτά, τὴν οἰκογένειαν τῶν Ἀγρωστώδων λέγονται δὲ καὶ δημητριακὰ ἢ δημητριακοὶ καρποὶ ἀπὸ τὴν Δήμητραν, ἥτις ὑπὸ τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων ἐθεωρεῖτο ὡς θεὰ τῆς γεωργίας.

### 2α Οἰκογένεια: Λειριώδη


#### ΛΕΙΡΙΟΝ ΤΟ ΛΕΥΚΟΝ

(κν. κρίνος)

Εἶναι φυτὸν ποῶδες, τὸ ὄποιον καλλιεργεῖται ἀπὸ ἀρχαιοτάτων γράντων διὰ τὰ ὥραῖς λευκὰ ἀνθη του (σύμβολα τῆς ἀγροτικοῦ).

Ψηφιοποήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Είναι πολυετές φυτόν λόγω τοῦ χονδροῦ ὑπογείου βλαστοῦ, τὸν ὄποιον φέρει καὶ ὁ ὄποιος ἀποτελεῖται ἀπὸ σαρκώδη λευκὰ φύλλα, χιτῶνας λεγόμενα, τοποθετημένα τὸ ἐπὶ τοῦ ἄλλου, ὅπως αἱ κέραμοι τῆς στέγης. Ὁ ὑπόγειος βλαστὸς λέγεται βολβός ἢ κρόμμυον (σχ. 132). Ἀπὸ αὐτὸν ἐκφύεται μία τούφα ἀπὸ φύλλα μὲν νευρώσεις παραλλήλους, ἀπὸ τὸ κέντρον τῶν ὄποιων ἔξερχεται εὐθύς βλαστὸς ὑπέργειος, ὕψους



ΣΧ. 132. Κρίνος


μέχρις ἐνὸς μέτρου· ὁ βλαστὸς οὗτος καταλήγει εἰς ἄνθη λευκά, στίλβοντα, γυνόμενα μεμονωμένα ἢ καθ' ὅμαδας.

Τὰ ἄνθη ἀναφένονται κατὰ τὸ θέρος, ἔχουσι κάλυκα μὲ τρία λευκὰ σέπαλα, μὲ πρασινωπὰς κηλεῖδας εἰς τὴν ἐξωτερικήν των ἐπιφάνειαν· τὰ σέπαλα αὐτὰ εἶναι ἵσα μεταξύ των (ἄνθη κανονικά). ἔχει ἐπίσης τὸ ἄνθος στεφάνην μὲ τρία ὀλόλευκα πέταλα καὶ 6 στήμονας εἰς 2 κύκλους, τρεῖς εἰς τὸν ἔσω καὶ τρεῖς εἰς τὸν ἔξω· οἱ ἐξωτερικοὶ ἀντιστοιχοῦν

εις τὰ σέπαλα καὶ οἱ ἐσωτερικοὶ εἰς τὰ πέταλα. Οἱ στήμονες ἔχουσιν ἀνθῆρας μεγάλους, χρώματος κιτρίνου χρυσίζοντος. Ὁ ὑπερος ἀποτελεῖται τοι τριῶν καρπόφυλλα μὲ μίαν ὠθήκην χωρισμένην εἰς 3 χώρους καὶ

ἔνα στῦλον καταλήγοντα εἰς

στύγμα



στύλος


ώοθήκη

**Σχ. 133.** Καρπὸς καὶ μέρη τοῦ ἄνθους κρίνου. Ὁ καρπὸς εἶναι κάψα, ἡ ὁποίᾳ κατὰ τὴν ὠρίμανσιν ἀνοίγει μὲ τρεῖς ἐπιμήκεις σχισμάς, ἀντιστοιχούσας εἰς τὰς συνδέσεις τῶν τριῶν καρποφύλλων (σχ. 133). Τὸ σπέρμα ἔχει μίαν μόνον κοτυληδόνα.

Οἱ κρίνοις καλλιεργεῖται ὡς φυτὸν στολισμοῦ καὶ μὲ τὴν καλλιέργειαν ἐπετεύχθησαν πλεῖσται ποικιλίαι του μὲ ἄνθη διαφόρων χρωμάτων.

"Ομοια πρὸς τὸν κρίνον φυτὰ εἶναι :

**Τὸ κρόμμυον τὸ κοινὸν** (κν. κρεμμύδι, σχ. 134, α). Φυτὸν συνήθως διετές μὲ κυλινδρικὰ κοῦπα φύλλα καὶ κοῦπον βλαστὸν συρρικνωμένον εἰς τὸ μέσον του καὶ τελειώνοντα εἰς σφαιροειδές, ἐν εἴδει ὅμβρέλλας, ἐξέργκωμα. Ὁ ὑπόγειος βλαστός του, ὃ ὀπαῖος λέγεται βολβὸς ἢ κορόμμιον, φέρει σαρκώδη φύλλα ἐν εἴδει κιτώνων, τὰ ὄποια καλύπτουν τελείως τὸ ἐν τῷ ἄλλῳ. Παρ' ἡμῖν τὸ κρόμμυον καλλιεργεῖται ὡς φυτὸν διετές. Τὸ πρῶτον ἔτος γίνεται ἡ σπορὰ τῶν σπερμάτων κατὰ τὸν Μάρτιον καὶ ἐπιτυγχάνεται τὸ λεγόμενον κοκκάρι (μικρὸς βολβός), τὸ δέποτε φυτεύμενον τὸ ἐπόμενον ἔτος διδεῖ μεγαλυτέρους βολβούς.



Σχ. 134. α χρόμμιον, β σκόρδον, γ πράσον.



Σχ. 135. ἀνθοφόρος κλάδος τουλίπης,  
β κολχικὸν τοῦ φθινοπώρου.

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Σχ. 136. Τάκινθος

**Τὸ σκόροδον** (κν. σκόρδο, σχ. 134, β). Φυτὸν καὶ αὐτὸ ποῶδες, πολυετές, μὲ βολβούς. Οἱ βολβοί του δὲν εἶναι ὅπως τοῦ κρομμού, ἀλλὰ σύγκεινται ἐκ πολλῶν τεμαχίων τὰ ὅποια λέγομεν σκελίδας. Ἐχει δσμὴν χαρακτηριστικήν, λόγῳ τοῦ σκορδελαίου τὸ ὅποιον περιέχει.

**Τὸ πράσον**, τὸ ὅποιον τρώγεται ὡς λαχανικὸν (σχ. 134, γ).

**Ἡ τουλίπη** (σχ. 135, α). Καὶ αὕτη φέρει βολβόν, τοῦ ὅποιου τὰ φύλλα σκεπάζουν τελείως τὸ ἐν τῷ ἄλλῳ. Καλλιεργεῖται ἰδίως εἰς τὴν Ὀλλανδίαν διὰ τὰ ἄνθη τῆς, τὰ ὅποια εἶναι περιζήτητα διὰ τὴν ὥραιότητά των, δὲν ἔχουσιν δμῶς δσμῆν.

**Τὸ κολχικὸν τοῦ φθινοπώρου**, τὸ ὅποιον ἀνθίζει εἰς τοὺς ἄγρους κατὰ τὰς ἀρχὰς τοῦ φθινοπώρου, μετὰ τὰς πρώτας βροχὰς (σχ. 135, β).

**Οὐάκινθος** (κν. ζουμπούλι, σχ. 136).

**Οὐασφόδελος** (κν. σφερδούλι).

**Οὐασπάραγγος** (κν. ὀσπαράγγια). Φυτὸν παράδοξον, πολυετές, φθάνον εἰς ὕψος τὰ 1,50 μ. Οἱ τρυφεροί του βλαστοί, μαλακοί καὶ σαρκώδεις, τὰ λεγόμενα σπαράγγια, τρώγονται καὶ εἶναι νοστιμώτατοι. Διαφέρει ἀπὸ τὰ προηγούμενα κατὰ τὸν καρπόν, δστις εἶναι ράξ.

### Δειριώδη

Ο κρίνος, τὸ κρόμμιον, τὸ σκόρδον, ἡ τουλίπη, ὁ ὀάκινθος, ὁ ὀσφόδελος καὶ ὁ ὀσπάραγγος ἔχουσι κοινὰ χαρακτηριστικά :

Εἶναι ἀπαντα ἐφωδιασμένα μὲ βολβόν, περὶ τὸ κέντρον τοῦ ὅποιου ὑπάρχει ὁ βλαστός. Πέριξ τοῦ βλαστοῦ βλέπομεν, τὸ ἐν σκεπασμένον μέσα εἰς τὸ ἄλλο, φύλλα λευκά, χιτῶνας καλούμενα, παχύτερα εἰς τὸ ἐσωτερικόν, λεπτότερα πρὸς τὰ ἔξω τὰ τελευταῖα πρὸς τὰ ἔξω εἶναι λεπτότατα, περγαμηνοειδῆ, χωρὶς θρεπτικὰ συστατικὰ καὶ χρησιμεύουν διὰ νὰ προστατεύουν τοὺς λοιποὺς χιτῶνας. Τὰ παχέα φύλλα εἶναι πλήρη ἀπὸ θρεπτικὰ συστατικά.

Τὰ φυτὰ ταῦτα ἔχουν φύλλα μὲ παραλλήλους νευρώσεις ἄνθη ἀπὸ τρία σέπαλα, τρία πέταλα, ἔξι στήμονας, καὶ μίαν διοθήκην μὲ τρεῖς χώρους. Καρπὸν ἔχουσι κάψαν ἢ ρᾶγα.

Σχηματίζουν τὴν οἰκογένειαν τῶν Λειριωδῶν.


### 3η Οίκογένεια : Φοινικώδη

#### ΦΟΙΝΙΞ

( κν. χουρμαδιά )

‘Ο φοῖνιξ εἶναι φυτὸν πολυετές· ζῆι εἰς κλίματα θερμὰ καὶ ὑγρὰ καὶ εἶναι τὸ κατ’ ἔξοχὴν φυτὸν τῶν δάσεων τῶν ἐρήμων.

Ἐχει βλαστὸν κυλινδρικόν, χωρὶς διακλαδώσεις, καὶ ἴσοπαχῆ, ὁ ὅποῖος δύναται νὰ φθάσῃ εἰς ὕψος τὰ 15 μέτρα. Ἀπὸ τὴν βάσιν του ἐξέρχονται ἀπ’ εὐθείας πολυαριθμοὶ ρίζαι, αἱ ὅποιαι τὸν στερεώνουν καλῶς. Καθ’ ὅλον τὸ μῆκός των παραμένουν αἱ βάσεις τῶν παλαιῶν φύλλων ( σχ.



Σχ. 138. α ταξιανθία φοίνικος μετὰ τοῦ περιβλήματός της, β ἄρρεν ἄνθος, γ θῆλυ ἄνθος, δ τομὴ καρποῦ.

137 ), αἱ ὅποιαι ἐνίστε σχίζονται εἰς πολυαριθμοὺς ἵνας καὶ ἀποτελοῦν, γύρω ἀπὸ τὸν βλαστόν, εἰδος στυπίου· τοῦτο προφυλάσσει τὸν βλαστὸν ἀπὸ τὴν σῆψιν. Ό τοιοῦτος βλαστὸς λέγεται βλαστὸς στυπώδης ἢ στύπος.

Εἰς τὴν κορυφὴν τοῦ βλαστοῦ εὑρίσκεται στεφάνη φύλλων, τὰ ὅποια δύνανται νὰ φθάσουν εἰς μῆκος τὰ 3 - 4 μέτρα· ταῦτα σχίζονται εἰς λεπτὰ ἐλάσματα παράλληλα, εἰς σχῆμα φύλλου συνθέτου, πτερούμρ-

φου. Εἰς τὸ κέντρον τῶν εὐρίσκεται ὁ ἀκραῖος ὄφθαλμός, ὃστις δίδει δι-  
αρκῶς νέα φύλλα, ἐνῷ τὰ παλαιὰ ἀποπίπτουν.

Τὰ ἄνθη ἔκφύονται ἀπὸ ἕνα κεντρικὸν μίσχον ἀποτελοῦντα μίαν  
πολὺ μεγάλην σύνθετον ταξιανθίαν, ἡτις περιβάλλεται ἀπὸ ἐν περγα-  
μηνοειδὲς ἀπλοῦν φύλλον, χρώματος κιτρίνου πρὸς τὸ πορτοκαλόχρουν.  
Τοῦτο κατ' ἀρχὰς περιβάλλει ὀλόκληρον τὴν ταξιανθίαν, ἀλλὰ βραδύ-  
τερον σχίζεται καὶ ἀφήνει τὰ ἄνθη ἐλεύθερα.

Τὰ ἄνθη εἶναι δύο εἰδῶν, ἅρρενα καὶ θῆλεα χωριστὰ ( δίκλινα ἄν-  
θη ), καὶ εἰς χωριστὰ φυτὰ ( δίοικον φυτόν ). Τὰ θῆλεα φέρουν τρία σέ-  
παλα, τρία πέταλα καὶ μίαν ὀῳθήκην, μὲ τρεῖς χώρους καὶ τρία ωάρια,  
ἀπὸ τὰ ὄποια γονιμοποιεῖται μόνον τὸ ἔν.

Διὰ τὴν ἐπικονίασιν κόπτουν τοὺς κλάδους μὲ τὰ ἅρρενα ἄνθη,  
ὅταν ταῦτα ὠριμάσσουν, καὶ τοὺς κρεμοῦν ὑπεράνω τῶν κλάδων μὲ τὰ  
θῆλεα ἄνθη, ἀφοῦ τοὺς τεμαχίσουν, εἰς τρόπον ὥστε ἐν φυτὸν μὲ ἅρρενα  
ἄνθη ἀρκεῖ διὰ νὰ γονιμοποιήσῃ πολλὰ φυτὰ μὲ θῆλεα ἄνθη. Τοῦτο διότι  
εἰς κάθε ὅστιν τὰ φυτὰ μὲ τὰ ἅρρενα ἄνθη εἶναι ἐλάχιστα. Ἡ κατὰ τοι-  
οῦτον τρόπον ἐπικονίασις λέγεται τεχνητὴ ἐπικονίασις.

Ο καρπὸς ( χονδρᾶς κοινῶς λεγόμενος ) εἶναι σαρκώδης, μὲ σάρ-  
κα μαλακήν καὶ σακχαροῦχον, περικλίνουσαν σπέρματα σκληρόν, αὐλακω-  
τὸν εἰς τὴν μίαν του ἐπιφάνειαν.

"Ομοιον πρὸς τὸν φοίνικα φυτὸν εἶναι :

**Ο κοκκοφοῖνιξ** ( σχ. 139 ). Μεγαλοπρεπὲς δένδρον, τὸ ὄποιον  
δύναται νὰ ὑπερβῇ εἰς ὕψος τὰ 25 μέτρα καὶ τοῦ ὄποιον ἡ κορυφὴ στε-  
φανοῦται ἀπὸ μεγάλα πτερόμορφα φύλλα. Φύεται εἰς τὰ παραθαλάσσια  
μέρη ὅλων τῶν τροπικῶν χωρῶν.

Ο καρπὸς σφαιρικός, μεγέθους μέχρι κεφαλῆς ἀνθρώπου, εἶναι τὰ  
λεγόμενα ἴνδικὰ καρύδια ἡ καρύδες ( σχ. 140 ), τὰ ὄποια περιβάλλονται  
ἀπὸ ἐν ἴνδης περίβλημα, αἱ ἵνες τοῦ ὄποιον χρησιμοποιοῦνται, ἀποχω-  
ριζόμεναι, διὰ τὴν κατασκευὴν σχινίων καὶ ψαθῶν ( σχ. 140, 5 ). "Α-  
ωρος ὁ καρπὸς εἶναι γεμάτος ἀπὸ γαλακτῶδες ὑγρὸν ὀνομαζόμενον γά-  
λα τοῦ κοκού, τὸ ὄποιον ἀποτελεῖ ἔχαρτον δροσιστικὸν ποτόν" τὸ ὑπό-  
λοιπον τοῦ καρποῦ, λευκὸν τὸ χρῶμα, τρώγεται.


Τὸ λευκὸν αὐτὸ μέρος τοῦ ἴνδικου καρύου κόπτεται εἰς τεμάχια,  
τὰ ὄποια ἔγραψανται καὶ ἀποτελοῦν τὸ λεγόμενον κόπρα. Ἀπὸ αὐτὸ δὲ

έκθλιψεως ἔξαγεται τὸ ἔλαιον, τὸ ὅποῖον περιέχει καὶ τὸ ὅποῖον λέγεται φοινικέλαιον· χρησιμοποιεῖται τοῦτο εἰς τὴν σαπωνοποίην.

Τὰ ὡς ἄνω φυτὰ ( καθὼς καὶ ἄλλα ὄμοια τῶν τροπικῶν χωρῶν ) ἔχουσι βλαστὸν χωρὶς κλάδους, ίσοπαχῆ, στεφανούμενον ἀπὸ φύλλων ἔχουσι τὰ δόρενα καὶ τὰ θήλεα ἄνθη των εἰς χωριστὰ φυτά, συνηνωμένα



Σχ. 139. Κοκκοφοινίξ



Σχ. 140. Τομὴ ίνδικοῦ καρύου ( καρύδας ).

1 γάλα τοῦ κοκὸ ( εὐρίσκεται εἰς τὸ μέσον τοῦ καρποῦ ), 2 τὸ σαρκῶδες μέρος, 3 τὸ ξυλῶδες μέρος τοῦ πυρῆνα, 4 τὸ φυτικὸν ἔμβρυον. Γύρω ἀπὸ τὸν πυρῆνα εὑρίσκονται αἱ ἴνες 5 αἱ ὄποιαι τὸν περιβάλλουν.

κατὰ ταξιανθίας καὶ καλυπτόμενα ἔξωτερικῶς ὑπὸ μεγάλου περγαμηνοειδοῦς φύλλου· ἔκαστον ἀπὸ τὰ ἄνθη αὐτὰ ἔχει τρία μὲν πέταλα καὶ 6 στήμονας τὸ δόρεν, μίαν δὲ δωδέκανην μὲ τρεῖς χώρους τὸ θήλου.

Σχηματίζουσι τὴν οἰκογένειαν τῶν Φοινικωδῶν.

"Ομοιαι πρὸς τὰς ἀνωτέρω οἰκογενείας εἰναι ἡ οἰκογένεια τῶν Ὀρχεωδῶν καθὼς καὶ ἡ τῶν Ἰοιδωδῶν.

#### 4η Οίκογένεια : Ὁ ρ̄χ ε ώ δη

Τὰ κυριώτερα τῶν εἰς τὴν οίκογένειαν ταύτην ἀνηκόντων φυτῶν εἴναι :

**‘Ο όρχις ὁ στικτὸς** ( κν. σαλέπι, σχ. 141 ). Εἶναι φυτὸν ποῶδες, ὅφους 60 ἐκατοστομέτρων περίπου· ὁ βλαστός του εὐθὺς καὶ χωρὶς διακλαδώσεις, καταλήγει εἰς ἔνα στάχυν ἀνθέων ροδίνου, λευκοῦ ἢ λιώδους χρώματος. “Εκαστον ἄνθος ἔχει τρία σέπαλα, τὸ διάμεσον τῶν ὅποιων συγηματίζει, μετὰ τῶν δύο ἄλλων πετάλων του, σῶμα ὅμοιαζον πρὸς κάσκαν. Τὸ τρίτον πέταλον ἐπιμηκυνόμενον συγηματίζει σωληνίσκον, ὃστις πληροῦται νέκταρος.

Ἡ ἐπικονίασις γίνεται διὰ τῶν ἐντόμων, τὰ ὅποια προσελκύονται ἀπὸ τὸ χρῶμα, τὴν ὁσμὴν καὶ τὸ νέκταρ τῶν ἀνθέων.

Εἰς τὸ ἐντὸς τοῦ χρώματος ἄκρον του τὸ φυτὸν ἔχει ἑξογκώματα ( κονδύλους ) πλήρη ἀπὸ μίαν οὐσίαν, ἡτις κοινῶς λέγεται σαλέπι καὶ χρησιμοποιεῖται διὰ τὴν παρασκευὴν ποτοῦ θερμαντικοῦ.

**‘Η βανίλλη** ( σχ. 142 ). Εἶναι φυτὸν πολυετές, ἀναρριχώμενον ἐπὶ ἄλλων φυτῶν μὲ τὴν βοήθειαν ἐναερίων ριζῶν. Ὁ καρπός του εἴναι κάψα ἐπιμήκης, εἰς τὰ τοιχώματα τῆς ὅποιας ἀναπτύσσονται κατὰ τὴν ὠριμότητα μερικοὶ λευκοὶ ἴνώδεις κρύσταλλοι, ἡ κοινῶς λεγομένη βανίλλια, ἡ ὅποια χρησιμοποιεῖται εἰς τὴν φαρμακευτικήν, διὰ τὸν ἀρωματισμὸν τῆς σοκολάτας, τῆς κρέμας, τῶν ποτῶν κλπ.


Τὰ ὡς ἄνω φυτά, ἔχοντα φύλλα μὲ παραλλήλους νευρώσεις, ἄνθη μὲ 3 σέπαλα καὶ 3 πέταλα λίγαν ἀκανόνιστα, ἔνα στήμονα ἥνωμένον μὲ τὸ στήγμα καὶ καρπὸν κάψαν, ἀποτελοῦσιν τὴν οίκογένειαν τῶν Ὁρχεωδῶν.

‘Ορχεωδῶν ὑπάρχουσι διάφοροι ποικιλίαι, πᾶσαι μὲ ὥραῖα καὶ εὐοσμικά ἄνθη, διὰ τὰ ὅποια καὶ καλλιεργοῦνται.


Οἱ γνωστότατοι βιορθοί ( οἱ ὅποιοι βραχόμενοι τρώγονται ) εἴναι καὶ αὐτοὶ φυτὰ τῆς οίκογενείας τῶν Ὁρχεωδῶν.



Σχ. 141. "Ορχις ὁ στικτός, μὲ τὰ ἄνθη εἰς τὴν κορυφὴν τοῦ βλαστοῦ του, τὰ φύλλα του καὶ τὸς κονδύλους ἐντὸς τοῦ ἐδάφους.



Σχ. 142. Βανίλλη ἀναρριχωμένη ἐπὶ κλάδου ἀλλου φυτοῦ. α ἐναέριοι ριζαι, β βλαστὸς βανίλλης. Ἀριστερὰ τῶν ἐναερίων ριζῶν κρεμάμενος ὁ καρπὸς τῆς βανίλλης.



Σχ. 143. "Ανθος ἱριδος. 1 κεραῖαι τοῦ ἐντόμου πλήρεις γύρεως, 2 στίγμα, 3 στήμων, 4 ἀνθήρες, 5 ὠσιθήκη, 6 νέκταρ.




Σχ. 144. Ιρις



Σχ. 145. Βανανέα μὲ τὰ μεγάλα φύλλα καὶ  
τοὺς καρπούς της.



Σψ. 146. Αγανάκ  
ηφιοποίηθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής



Σχ. 147. Νάρκισσος

## 5η Οίκογένεια: Ἰριδώδη

Εἰς τὰ Ἱριδώδη ἀνήκουσι διάφορα ποώδη φυτά, Ἱριδες ὄνομαζόμενα (σχ. 144) καὶ καλλιεργούμενα κυρίως διὰ τὰ ἄνθη των.

Ταῦτα ἔχουσι κίτρινον, ἵδης ἡ λευκὸν χρῶμα, κάλυκα ἀπὸ 3 σέπαλα χρωματιστά, στεφάνην ἀπὸ 3 πέταλα, 3 στήμονας καὶ ὑπερον μὲ μίαν ὀῳθήκην καὶ ριζομένην εἰς τρεῖς θέσεις, ἐκάστη τῶν ὅποιων περικλείει πολυάριθμη καὶ ὀάρια (σχ. 143, 5). "Ἔχουσιν ἐπίσης ἕνα στῦλον μὲ τρία πλατέα καὶ χρωματιστὰ στίγματα, τὰ ὅποια καλύπτουν τοὺς στήμονας." Απαντα ἔχουσι ρίζωμα διακλαδισμένον καὶ φύλλα ἀμισχα καὶ λογχοειδῆ. Τὸ ρίζωμα τῆς "Ιριδος τῆς Φλωρεντίας εἶναι ἀρωματικὸν καὶ χρησιμοποιεῖται διὰ τὴν κατασκευὴν τῆς πούδρας τῆς Ἱριδος. Αἱ Ἱριδες ἀποτελοῦσι τὴν οἰκογένειαν τῶν Ἱριδώδων.

Φυτὰ ἀνήκοντα εἰς συγγενεῖς πρὸς τὰ Ἱριδώδη οἰκογενείσις εἶναι:

'**Η βανανέα** (σχ. 145). Καλλιεργεῖται εἰς τὰς Ἀντίλλας, τὴν Τροπικὴν Ἀμερικὴν, τὴν Γουϊνέαν, τὸ Ἀλγέριον κ.λ.π., καθὼς καὶ εἰς τινὰ θερμὰ μέρη τῆς Ἐλλάδος (Μεσσηνίαν).

'Ο βλαστός της φέρει εἰς τὴν κορυφήν του μεγάλα φύλλα, ἀπὸ τὸ κέντρον τῶν ὅποιων ἔξερχεται μακρὸς βότρυς, στρεφόμενος πρὸς τὸ ἔδαφος· οὗτος ἔχει καθ' ὅλον τὸ μῆκός του ἄνθη, ἀπὸ τὰ ὅποια γονιμοποιοῦνται μόνον τὰ εἰς τὸ κάτω του μέρος φύσμενα (σχ. 145). "Ἐκαστος βότρυς φέρει ἔως 150 βανάνας καὶ ζυγίζει ἔως 40 χιλιόγρ. Αἱ βανάναι περιέχουσιν ἀμυλον, σάκχαρον καὶ ἀζωτούχους οὐσίας· εἶναι θρεπτικώτεραι ἀπὸ τὸ κρέας.

'**Ο ἀνανάς**, φυτὸν τῶν Τροπικῶν χωρῶν (σχ. 146), καλλιεργούμενος κυρίως διὰ τοὺς σαρκώδεις καρπούς του, οἵτινες τρώγονται εἴτε νωποὶ εἴτε ὡς κομπόσται.

Οι νάρκισσοι, μὲ τὰ εὔσομα ἄνθη των (σχ. 147).

'**Η ἀγαύη ή ἀμερικανικὴ** (κν. ἀθάνατος), ἔχει φύλλα σαρκώδη καὶ ἐπιμήκη, φθάνοντα εἰς μῆκος τὰ 3 μ. καὶ καταλήγοντα εἰς δέξειαν μελανωπήν βελόνην εἰς τὸ ἄκρον των. Κατάγεται ἀπὸ τὴν Ἀμερικὴν. Εἶναι διαφόρων εἰδῶν καὶ τὰ φύλλα τῆς ἔχουσιν ἴνας χρησιμοποιουμένας διὰ τὴν κατασκευὴν πίλων, ταπήτων, σχοινίων, χονδρῶν ὑφασμάτων κ.λ.π.

## ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΙΣ

### 2. ΟΜΟΤΑΞΙΑ: ΦΥΤΑ ΜΟΝΟΚΟΤΥΛΗΔΟΝΑ

Τὰ φυτά, τὰ ὅποια ἔξητάσαμεν, δηλ. τὰ ἀγρωστώδη ή δημητριακά, τὰ ὄρχεωδη, τὰ λειριώδη, τὰ φαινικώδη, τὰ ἱριδώδη κλπ., παρουσιάζουσι τὰ ἔξῆς κοινὰ χαρακτηριστικά:

"Ἔχουσι μίαν μόνον κοτυληδόνα καὶ φύλλα ἐστεργμένα μίσχου καὶ μὲ νευρώσεις παραλλήλους.

'Ο κάλυξ καὶ ἡ στεφάνη τῶν ἀνθέων των ὁμοιάζουν μεταξύ των καὶ ὁ ἀριθμὸς τῶν πετάλων καὶ σεπάλων εἶναι 3 η πολλαπλάσιον τοῦ 3.

'Αποτελοῦν μίαν ὁμοταξίαν φυτῶν, τὴν ὁμοταξίαν τῶν μονοκοτυληδόνων φυτῶν, δηλ. τῶν φυτῶν, τὰ ὅποια ἔχουσι μίαν μόνον κοτυληδόνα εἰς τὸ σπέρμα των.

### 1η ΣΥΝΟΜΟΤΑΞΙΑ: ΦΥΤΑ ΑΓΓΕΙΟΣΠΕΡΜΑ

Τὰ μέχρι τοῦδε ἔξετασθέντα φυτά, δηλαδὴ τὰ Δικοτυλήδονα καὶ τὰ Μονοκοτυλήδονα φυτά, παρουσιάζουν ἀπαντὰ κοινὰ χαρακτηριστικά:

Περιλαμβάνουν φυτά, τῶν ὅποιων τὰ εἰς σπέρματα μεταβαλλόμενα μετὰ τὴν γονιμοποίησίν των ὡρία τοῦ ὑπέρου εἶναι ἔγκεκλεισμένα μέσα εἰς τὰς κλειστὰς κοιλότητας, τὰς ὀῳθήκας, αἱ ὅποιαι μεταβάλλονται εἰς κλειστοὺς καρποὺς φέροντας ἔξωτερικῶς, ὡς προστατευτικόν, τὸ περικάρπιον· τὸ σπέρμα δηλαδὴ τῶν φυτῶν αὐτῶν εἶναι προφυλαγμένον κάτω ἀπὸ τὸ περικάρπιον, ὥσταν νὰ εύρισκετο μέσα εἰς ἀγγεῖον. Διὰ τοῦτο τὰ φυτὰ αὐτὰ συνενοῦνται ὑπὸ τὸ κοινὸν ὄνομα τῶν Ἀγγειοσπέρμων φυτῶν.

Μὲ τὴν ὁμοταξίαν τῶν δικοτυληδόνων φυτῶν καὶ τὴν ὁμοταξίαν τῶν μονοκοτυληδόνων φυτῶν σχηματίζεται μία μεγαλυτέρα ὁμάς φυτῶν, τὴν ὅποιαν λέγομεν Συνομοταξίαν, η Συνομοταξία τῶν Ἀγγειοσπέρμων φυτῶν.

# ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΙΣ

## ΦΥΤΑ ΑΓΓΕΙΟΣ ΠΕΡΜΑ

Όμοταξία	Κοινὰ χαρακτηριστικά	Συνομοταξία
1. Δικοτυλήδονα	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Ωάρια ἐντὸς θήκης κλει-} \\ \text{στῆς, τῆς ὀωθήκης.} \\ \text{Σπέρματα ἐγκεκλεισμένα} \\ \text{ἐντὸς τοῦ περικαρπίου,} \\ \text{ώς ἐντὸς ἀγγείου.} \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Φυτὰ} \\ \text{ἀγγειό-} \\ \text{σπερμα} \end{array} \right.$
2. Μονοκοτυλήδονα		

---

## 2α ΣΥΝΟΜΟΤΑΞΙΑ : ΦΥΤΑ ΜΕ ΣΠΕΡΜΑΤΑ ΓΥΜΝΑ

### "Η ΓΥΜΝΟΣΠΕΡΜΑ

#### 1η Οίκογένεια : Κωνοφόρα


##### ΠΕΥΚΗ Η ΧΑΛΕΠΙΟΣ "Η ΡΗΤΙΝΟΦΟΡΟΣ

Είναι κοινὸν ἐν Ἑλλάδι εἶδος πεύκης καὶ συναντᾶται ἐν Ἀττικῇ, Μεγαρίδι, Βοιωτίᾳ, Λοκρίδι, Πελοποννήσῳ, Σαλαμῖνι, Εύβοιᾳ, Σκοπέλῳ, Κεφαλληνίᾳ κ.λ.π., ἀπὸ τῆς ἐπιφανείας τῆς θαλάσσης μέχρις ὑψους καὶ 1200 ἀκόμη μέτρων. Προτιμᾷ ἀσβεστώδη ἐδάφη καὶ δύναται νὰ ζήσῃ καὶ εἰς ἐδάφη ἔηρά, ἀμμώδη καὶ πετρώδη.

"Έχει μεγάλας καὶ βαθείας ρίζας, διὰ νὰ δύναται νὰ ἀναζητήσῃ εἰς περισσότερον ἔδαφος τὸ διὰ τὴν ζωήν της ἀπαραίτητον ὄδωρο, καὶ φύλλα βελονοειδῆ, μὲ μικρὰν δηλαδὴ ἐπιφάνειαν καὶ ἐπομένως δλίγα στόματα, ώστε νὰ διαπνέωσιν ἐλάχιστα. 'Ο βλαστός της καλύπτεται ὑπὸ καστανοχρόου φλοιοῦ, δστις, λεῖος ὅταν τὸ φυτὸν είναι νεαρόν, χωρίζεται ἔπειτα κατὰ πλάκας, γινόμενος πολὺ παχύς· περιέχει ρητίνην, ἥτις είναι ὑγρὰ εἰς τὸ μαλακὸν ξύλον τῆς περιφερείας καὶ δυνάμεθα νὰ τὴν συλλέξωμεν, ἀν κάμωμεν μίαν τομὴν εἰς αὐτό. Κάμνουν, εἰς δένδρα ἡλικίας ἀπὸ 30 ἑτῶν καὶ ἀνω, τοιαύτας τομάς, πλάτους μέχρι 15 ἑκατοστομέτρων καὶ συλλέγουν τὴν ἐκρέουσαν ρητίνην εἰς εἰδικὰ δογκεῖα, καταλήλως τοποθετημένα κάτωθεν τῆς τομῆς. Εἰς τὸ ἐσωτερικὸν ξύλον ἡ ρητίνη είναι στερεά.


Ἐκ τοῦ κορμοῦ ἔξερχονται κλάδοι, οἱ ὅποῖοι παραμένουσι πάντες, ὅταν τὸ δένδρον ζῇ μεμονωμένως· ὅταν δὲ μως, ὅπως συνήθως συμβαίνει, τοῦτο εύρισκεται μετ' ἄλλων καὶ ἀποτελῇ δάσος, τότε οἱ κατώτεροι κλάδοι ἔηραινόμενοι ἀποπίπτουν ( ἐπειδὴ ὁ θύλιος δὲν φθάνει μέχρις αὐτῶν, ἐπομένως τὰ φύλλα των δὲν δύνανται νὰ ἀφομοιώσουν καὶ εἶναι ἀγρηστοι διὰ τὸ φυτὸν ) καὶ μένουσι μόνον οἱ ἀνώτεροι κλάδοι.

Τὰ βελονοειδῆ φύλλα ἔκφύονται ἀνὰ 2 - 3 ὁμοῦ ἐκ μιᾶς θήκης, τὴν ὅποιαν φέρουσιν εἰς τὴν βάσιν των παραμένουσι τὰ φύλλα ἐπὶ τοῦ φυτοῦ ἀπὸ 2 - 7 ἔτη, κατόπιν ἀποπίπτουν καὶ ἔξερχονται νέα φύλλα.



**Σχ. 148. Κλάδος πεύκης.**  
α ἄρρενα ἄνθη, β θήλεα, γ κουκουνάρα,  
δ πτερόν, ε σπέρμα.


χεῖν καὶ στενήν· εἰς τὸ ἐπάνω μέρος του φέρει τὸν ἀνθῆρα. Ὁ ἀνθῆρος ἔχει δύο ἔξογκάματα ἐν εἴδει σάκκων ( τοὺς λεγομένους σάκκους τῆς γύρεως ), πλήρη ἀπὸ γύρων ( σχ. 149, γ ). "Ἐκαστος κόκκος γύρεως, παρατηρούμενος εἰς τὸ μικροσκόπιον παρουσιάζει δύο μικρὰ σφαίρας ἐν εἴδει μπαλονίων ( σχ. 151, γ ) προσκεκολλημένας εἰς σύτόν, αἱ ὅποια τὸν καθιστοῦν ἐλαφρόν, ὥστε νὰ δύναται νὰ τὸν παρασύρῃ ὁ ἀνεμος καὶ οὕτω νὰ διευκολύνεται ἡ γονιμοποίησις, ἡ ὅποια γίνεται διὰ τοῦ ἀνέμου.



**Σχ. 149.** α κῶνος μὲ κόρενα ἄνθη, β τομὴ ἐνὸς κώνου μὲ κόρενα ἄνθη, γ σάκκος πλήρης γύρεως.



**Σχ. 150.** Κῶνος μὲ θήλεα ἄνθη πεύκης. 1 ἔξωτερικὸν φύλλον, 2 ώάριον.



**Σχ. 151.** α θεωρητικὴ τομὴ κώνου (κουκουνάρας), β στήμων, γ κόκκος γύρεως, δ λέπιον ὅριμον φέρον δύο σπέρματα, ε σπέρμα.

Παρατηροῦντες κατά τὴν ἄνοιξιν δάσους πεύκων, ὅταν πνέῃ ἄνεμος, βλέπομεν τὴν γῦριν ἐν εἰδει κόνεως κιτρίνης παρασυρομένην ὑπὸ τοῦ ἀνέμου πολλάκις εἰς μεγάλην ποσότητα καὶ εἰς μακρὰς ἀποστάσεις. Τόση εἶναι ἡ ὑπὸ τοῦ ἀνέμου παρασυρομένη ποσότης τῆς γύρεως, ὥστε πολλάκις σχηματίζει αὔτη, πίπτουσα, βροχὴν κιτρίνης κόνεως, τὴν ὅποιαν οἱ χωρικοὶ καλοῦν βροχὴν θείου.

Οἱ κῶνοι τῶν θηλέων ἀνθέων φύονται εἰς τὴν κορυφὴν μικρῶν κλάδων (σχ. 148, β καὶ 150), εἴτε μεμονωμένως, εἴτε ἀνὰ 2 - 3. "Εκαστον θῆλυ ἄνθος φέρει ξυλῶδες λέπιον, ἐσωτερικῶς τοῦ ὅποιου ὑπάρχει καρπόφυλλον, τὸ ὅποιον συγχρατεῖ δύο ωάρια εἰς τὴν βάσιν του. Τὰ χείλη τοῦ καρποφύλλου οὐδέποτε συνενοῦνται εἰς τρόπον, ὥστε ωθήκη κλειστὴ δὲν ὑπάρχει καὶ τὰ ωάρια μένουν γυμνὰ (σχ. 151). Δὲν ὑπάρχει ἐπίσης στῦλος καὶ στίγμα.

Γονιμοποιίησις. Οἱ κόκκοι τῆς γύρεως πίπτουν διὰ τῆς ἀνοικτῆς ωθήκης εἰς εῖδος χωνίου, τὸ ὅποιον σχηματίζει τὸ ωάριον, τὸ γονιμοποιοῦσι καὶ τότε τοῦτο μεταβάλλεται εἰς σπέρμα. Τὸ σπέρμα, διὰ νὰ δριμάσῃ, χρειάζεται 2 - 3 ἔτη. "Οταν τὰ σπέρματα δριμάσουν, τότε τὰ λέπια ἀνοίγουν καὶ τὰ σπέρματα μένουν ἐλεύθερα νὰ πέσουν εἰς τὴν γῆν, οἱ κῶνοι ὅμως (κν. λεγόμενοι κουκουνάρρες), ἀνευ σπερμάτων πλέον, δύνανται νὰ παραμείνωσιν ἐπὶ μακρῷ ἐπὶ τοῦ φυτοῦ. "Εκαστον σπέρμα φέρει μεγάλην ὑμενώδη πτέρυγα, διὰ νὰ δύναται νὰ παρασύρεται ὑπὸ τοῦ ἀνέμου, καὶ οὕτω τὸ φυτὸν νὰ διαδίδεται ἀπὸ τόπου εἰς τόπον (σχ. 148, δ, ε καὶ σχ. 151, ε).

Τὰ φύλλα τῆς πεύκης παραμένουν καὶ κατὰ τὸν χειμῶνα, εἶναι δηλαδὴ ἡ πεύκη φυτὸν ἀειθαλές.

"Ως προφυλακτικὸν κατὰ τοῦ ἀνέμου καὶ τῶν θυελλῶν ἔχει τὸν στερεὸν καὶ ἐλαστικὸν κορμόν της καὶ τὰς βαθυτάτας ρίζας της· κατὰ τῶν πληγῶν ἔχει τὴν ρητίνην, κατὰ τῆς ξηρασίας τὴν διασκευὴν τῶν φύλλων καὶ τῆς ρίζης.

Τὰ μόνα ποὺ τὴν ἀπειλοῦν, εἶναι τὰ διάφορα ἔντομα, καὶ ίδιως αἱ κάμπαι ἐνὸς ἐντόμου λεπιδοπτέρου, τὸ ὅποιον λέγεται γαστρόπαχα. Αἱ κάμπαι αὐτῆς κατατρώγουν τὰ φύλλα τῆς πεύκης καὶ δύνανται νὰ ἀφήσωσι χωρὶς φύλλα τὰ πεῦκα μεγάλων ἐκτάσεων δὲν ξηραίνονται ὅμως τὰ πεῦκα καὶ βγάζουν νέα φύλλα πάλιν ἔπειτα ἀπὸ διάγονον χρόνον. οὕτως ὅμως παρεμποδίζεται ἡ ἀνάπτυξίς των.

Τὰς κάμπας αὐτὰς δινάμεθα νὰ τὰς ἀνεύρωμεν κατὰ τὴν ἄνοιξιν

ἐντὸς εἴδους φωλεῶν ἀπὸ βαμβακώδη οὐσίαν, καθὼς καὶ κατὰ σειρὰς ἐπὶ τοῦ ἑδάφους. Εἶναι πολύχρωμοι καὶ τριγωταί. Τὰς καταπολεμοῦμεν, ἂν συλλέξωμεν τὰς φωλεῖς κατὰ τὴν ἄνοιξιν, ὅτε αὗται εἶναι πλήρεις ἀπὸ κάμπας καὶ τὰς καύσωμεν, καθὼς ἐπίσης προφυλάσσοντες καὶ ὑποστηρίζοντες τὰ ἐντομοφάγα πτηνά, καὶ ιδίως τὸν δρυοκολάπτην, ὁ ὁποῖος εἶναι τὸ πτηνὸν τὸ κατ' ἔξοχὴν καθαρίζον τὰ δάση ἀπὸ τὰ διάφορα ἐπιβλαβῆ εἰς αὐτὰ ἔντομα.

Χρησιμότης. Ἡ πεύκη μᾶς παρέχει τὴν ξυλείαν της καὶ τὴν ρητίνην, ἀπὸ τὴν ὁποίαν διὰ καταλλήλου ἐπεξεργασίας ἔξαγεται τὸ τερεβινθέλαιον (κν. νέφτι) καὶ τὸ κολοφώνιον. Τὸ ξύλον της καὶ οἱ κῶνοι τῆς χρησιμοποιοῦνται ὡς καύσιμος ὕλη καὶ διὰ θέρμανσιν (ἄν καὶ καίνονται γρήγορα καὶ ἀναδίδουν πολὺν καπνόν).

Ἡ πεύκη εἶναι γενικῶς φυτόν, τὸ ὅποιον σπανίως ἀνευρίσκεται μονῆρες. Ζῇ μετ' ἄλλων, ἀποτελοῦν ἐκεῖνο τὸ ὅποιον λέγομεν δάσος.

### Τὸ Δάσος

Δένδρα, τὰ ὅποια χαρακτηρίζονται ἀπὸ τὸ μέγεθός των καὶ τὴν ἀντοχὴν των εἰς τοὺς ἀνέμους καὶ εἰς αὐτὰς ἀκόμη τὰς θυέλλας, συνενοῦνται πολλάκις εἰς ἀληθεῖς κοινότητας σχηματίζονται ὅ,τι λέγομεν δάσος. Ἀπὸ τὴν κοινὴν αὐτὴν ζωήν των ἔχουσι πολλὰ ὀφέλη. Προστατεύει τὸ ἐν τῷ ἄλλῳ ἀπὸ τοὺς ἀνέμους, οἱ κλάδοι των πολλάκις ἀποτελοῦν φραγμούς ἀδιαπεράστους διὰ τὰ μεγάλα φυτοφάγα ζῶα, τὰ ὅποια, ἄλλως, θάκητέρων τὰς κορυφὰς καὶ τοὺς τρυφερούς βλαστούς των· μὲ τὰς κρύπτας, τὰς ὅποιας σχηματίζουν, παρέχουν καταφύγιον εἰς σαρκοφάγα ζῶα, τὰ ὅποια διώκουν τὰ φυτοφάγα, καὶ οὕτω καὶ αὐτὰ μὲ τὴν σειράνων, προστατεύουν τὸ δάσος, τὸ ὅποιον τοὺς δίδει καταφύγιον.

### Σημασία τοῦ δάσους διὰ τὸν ἀνθρώπον

Ἡ σημασία τοῦ δάσους διὰ τὴν ζωήν μας εἶναι μεγίστη. Διότι, πλὴν τῶν ἀμέσων ὀφελειῶν τὰς ὅποιας μᾶς παρέχει, μὲ τὴν ξυλείαν του κ.λ.π., μᾶς προσφέρει καὶ ἐμμέσους ὀφελείας.

Χορηγεῖ εἰς τὴν ἀτμόσφαιραν τὸ ἀναγκαῖον διὰ τὴν ἀναπνοὴν τοῦ ἀνθρώπου δέξιγόνον. "Οπου δένδρα (ἔξοχή), ἐκεῖ καὶ περισσότερον δέξιγόνον (ωμιλήσαμεν διὰ τοῦτο εἰς τὸ περὶ ἀφομοιώσεως).

Τὸ δάσος ἀπορρριφᾷ τὰς ἡλιακὰς ἀκτῖνας καὶ δὲν ἀφήνει νὰ εἶναι

τὸ θέρος καυστικόν διαιμερίσματα τῆς Ἑλλάδος ἀσκεπῆ, δηλαδὴ ἀκάλυπτα ἀπὸ δένδρα, ὅπως π.χ. αἱ περὶ τὰς Ἀθήνας περιοχές, ὑπαφέρουν κατὰ τὸ θέρος περισσότερον ἀπὸ τὸν καύσωνα.

Τὰ δένδρα μὲ τὸ ὄδωρ τῶν, τὸ διὰ τῶν φύλλων τῶν διαπνεόμενον, προκαλοῦσι βροχάς καὶ καθιστῶσι τὸ θέρος δροσερόν. Συγκρατοῦσι τὸ ὄδωρ τῆς βροχῆς, τὸ ὄποιον, ἀντὶ νὰ κατέρχεται εἰς τὰς χαράδρας καὶ νὰ σχηματίζῃ τοὺς τόσους καταστρεπτικοὺς εἰς τὴν Ἑλλάδα κατὰ τὸ φυινόπωρον ( κατὰ τὰς πρώτας ραγδαίας βροχάς ) χειμάρρους, ἀπορροῦσσαται ἀπὸ τὸ παχὺ στρῶμα τῶν φύλλων καί, εἰσδύονται ἐντὸς τοῦ ἐδάφους, σχηματίζει πηγάς. "Οπου δάση, ἔκει καὶ πηγὴ καὶ ὑγεία.

'Εκτὸς ὅλων τῶν ἀνωτέρω, τὰ δάση ἀποτελοῦν ἀκόμη στολισμὸν ἄριστον διὰ κάθε χώραν, δίδοντα εἰς τὰ τοπία ὅψιν εὐχάριστον εἰς τοὺς δρθαλμούς.

Διὰ τοὺς ἄνω λόγους ὀφείλομεν νὰ ἀγαπῶμεν καὶ προστατεύωμεν τὰ δάση, ίδιως ἡμεῖς οἱ "Ἐλληνες, διότι ἡ Ἑλλάς δὲν δύναται νὰ καυχηθῇ διὰ τὰς δασικὰς τῆς ἐκτάσεις. Σήμερον μάλιστα μὲ τὰς καταστροφάς, αἱ ὄποιαι ἐγένοντο εἰς τὰ δάση τῆς χώρας μας κατὰ τὴν Κατοχὴν τοῦ 1941 - 1945 ὑπὸ βαρβάρων ἐπιδρομέων, ταῦτα εἶναι οὐσιαστικῶς ἀνύπαρκτα καὶ πρέπει ἐντατικαὶ καὶ σύντονοι φροντίδες νὰ ληφθοῦν συντόμως διὰ τὴν ἀναδάσωσιν τῆς πατρίδος μας.

"Αλλὰ εἴδη πεύκης εἶναι :

**Η πεύκη ἡ λαρικοειδής.** Δένδρον εὐθυτενές, δυνάμενον νὰ φύξη τὴν ύψος τῶν 30 - 40 μέτρων. Φύεται εἰς τὰ δρεινὰ μέρη, Πίνδον, Οἴτην, "Ολυμπον, Παρνασσόν, Ταῦγετον καὶ εἰς ὅλα τὰ ὄλλα ὑψηλὰ ὄρη τῆς Ἑλλάδος.

**Η πεύκη ἡ παραθαλάσσιος,** ἡ ὄποια εὐδοκιμεῖ καὶ εἰς τὰ ἀμμώδη ἐδάφη τῶν παραλίων, καὶ διὰ τοῦτο φυτεύεται ἔκει, ἵνα ἐμποδίζῃ τὸν σχηματισμὸν ὑπὸ τοῦ πνέοντος ἀνέμου, κινουμένων λόφων ἄμμου, τῶν λεγομένων θινῶν. Ο βλαστὸς καὶ αὐτῆς περιέχει ἀρκετὴν ρητίνην καὶ εἰς τινας χώρας π.χ. τὴν Γαλλίαν, δι' ἐντομῶν γινομένων εἰς τὸν βλαστὸν τῆς πεύκης αὐτῆς συλλέγεται ρητίνη.

**Η πεύκη ἡ πίτυς** ( κν. κουκουναριά ), μὲ σπέρματα μεγάλα, ὡς ἐκ τῶν περισσοτέρων θιεπτικῶν συστατικῶν, τὰ ὄποια περιέχουν καὶ ἐλαιοῦχα ( κουκουνάρια ).

‘Η πεύκη ή δασική, ή όποια, ἀντέχουσα εἰς τὸ ψύχος, σχηματίζει τὰ βορειότερα δάση τῶν κανοφόρων.

“Ομοια πρὸς τὴν πεύκην φυτὰ εἶναι

‘Η ἐλάτη. Δένδρον σχήματος πυραμίδος: δύναται νὰ φθάσῃ εἰς ὕψος τὰ 40 μέτρα καὶ σχηματίζει ἑκτεταμένα δάση εἰς τὰς ὁρεινὰς χώρας, εἰς τὰς όποιας κυριαρχεῖ μέχρις ὕψους 900 - 1100 μέτρων. Οἱ κλάδοι τῆς ὁριζόντιοι, εἶναι τοποθετημένοι ἐπὶ τοῦ κορμοῦ, ὅπως οἱ ὄροφοι μιᾶς οἰκίας: τὰ φύλλα τῆς, βελονοειδῆ, ἐκφύονται ἀπὸ τοὺς κλάδους, ὅπως οἱ ὀδόντες εἰς ἐν καένιον (σχ. 152).

Τὸ ξύλον τῆς ἐλάτης εἶναι τρυφερὸν καὶ εὔσχιστον, δὲν ἀντέχει ὅμως εἰς τὴν ὑγρασίαν. Κατασκευάζουν κυρίως ἐξ αὐτοῦ (διὰ τὸ εὔσχιστόν του) βαρέλια (νεροβόρελα). Ή ρητίνη τῆς, κοινῶς ἐλατόπισσα καλούμενη, ἔχει θεραπευτικὰς ιδιότητας. Τίθεται ὑπὸ τῶν χωρικῶν ἐπὶ νωπῶν τραχυμάτων καὶ εἶναι ἀποτελεσματικωτάτη παρεμποδίζουσα τὴν μόλυνσιν, ἀν πρότερον καθαρισθῇ καλῶς ἡ πληγή.

‘Ο κέδρος. Κατάγεται κυρίως ἀπὸ τὰ ὅρη τῆς Συρίας Λιβανον καὶ τῆς Μ. Ασίας Ταύρου· δύναται ἐκεῖ νὰ ἔχῃ ἀρκετὸν ὕψος, νὰ εἶναι δηλ. μέγα δένδρον, ἐνῷ εἰς τὴν χώραν μας φύεται ὡς θάμνος. Εἶναι δένδρον μακροβιώτατον, δυνάμενον νὰ ζήσῃ πλέον τῶν 2.500 ἑτῶν.

Τὸ ξύλον τοῦ κέδρου εἶναι εὐῶδες, χρησιμοποιεῖται δὲ παρ’ ἡμῖν διὰ τὴν κατασκευὴν κοχλιαρίων, μικρῶν βυτίων ὅδατος καὶ ἀλλων ἀντικειμένων.

Τὰ ὡς ἄνω φυτά, ἥτοι τὰ διάφορα ειδη πεύκης, ἡ ἐλάτη καὶ ὁ κέδρος, ἀποτελοῦσι μίαν οἰκογένειαν, τὴν οἰκογένειαν τῶν Κωνοφόρων, δυναμιζομένην οὕτως, ἐπειδὴ τὰ ἄνθη τῶν φυτῶν αὐτῶν σχηματίζουσι κάνους.



Σχ. 152. Ἐλάτη

## 2α Οίκογένεια : Κυπαρισσώδη

ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΣ Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗ

( κν. κυπαρίσσι )

"Εχει φύλλα λεπιδοειδῆ, ἀντιθέτως φυόμενα, καὶ κλάδους, οἵτινες ἐκφύονται συνήθως κατὰ μῆκος τοῦ χυρίου βλαστοῦ καὶ κατευθυνόμενοι πρὸς τὰ ἄνω συνωθοῦνται περὶ τὸν κορμὸν δίδοντες εἰς τὸ δένδρον τοῦτο τὴν μορφὴν πυραμίδος ( ἐνῷ εἰς τὴν ἀγρίαν κυπάρισσον οἱ κλάδοι διευθύνονται πλαγίως καὶ δὲν ἔχει αὕτη σχῆμα πυραμοδοειδές ). Οἱ κῶνοι ( κυπαρισσόμηλα ) εἶναι σφαιρικοί καὶ ἀποτελοῦνται ἀπὸ χονδρὸς λέπια.

"Η κυπάρισσος, μὲ τὸ σκιερὸν φύλλωμά της καὶ τὴν διαρκῶς κινουμένην ἀπὸ τὸν ἄνεμον κορυφὴν της, ἀποτελεῖ τὸ κατ' ἔξοχὴν δένδρον τῶν κοιμητηρίων. Εἶναι φυτὸν μακροβιώτατον.

"Ομοιον μὲ τὴν κυπάρισσον φυτὸν εἶναι ἡ ἀροκαρία, ἡ ὁποία καλλιεργεῖται ὡς φυτὸν καλλωπισμοῦ.

"Η διαφορὰ τῶν φυτῶν τούτων ἀπὸ τὰ κωνοφόρα εἶναι ὅτι οἱ κῶνοι εἰς τὰ κυπαρισσώδη εἶναι στρογγύλοι καὶ μὲ δόλιγα μόνον, ἀλλὰ παχύτερα λέπια, τὰ δὲ φύλλα των δὲν εἶναι βελονοειδῆ.

Τὰ φυτὰ ταῦτα ἀποτελοῦσιν ιδίαν οίκογένειαν, τὴν οίκογένειαν τῶν Κυπαρισσώδων.

## ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΙΣ

### 2α ΣΥΝΟΜΟΤΑΞΙΑ : ΦΥΤΑ ΓΥΜΝΟΣΠΕΡΜΑ

Αἱ δύο ὡς ἄνω οίκογένειαι τῶν κωνοφόρων καὶ τῶν κυπαρισσωδῶν εἶναι αἱ μόναι ἀντιπροσωπεύουσαι εἰς τὴν χώραν μας μίαν συνομοταξίαν φυτῶν, τὰ ὁποῖα παρουσιάζουσι κοινὰ χαρακτηριστικά :

Εἶναι φυτὰ ἀειθαλῆ, μὲ ἄνθη χωριστὰ τὰ ἄρρενα καὶ χωριστὰ τὰ θήλεα. Τὰ θήλεα ἄνθη δὲν ἔχουν στῦλον καὶ στίγμα· τὰ ωάρια δὲν περικλείονται εἰς ωθήκην, ἀλλὰ εἶναι ἀπλῶς προσκεκολλημένα εἰς τὸ καρπόφυλλον, τὸ ὁποῖον ἔχει λάβει μορφὴν λεπιδοειδοῦς φυλλαρίου· εἶναι δῆλο. τὰ σπέρματα γυμνά.

Τὰ φυτὰ ταῦτα ἀποτελοῦν τὴν συνομοταξίαν τῶν Γυμνοσπέρμων φυτῶν, τῶν φυτῶν δῆλο. μὲ σπέρματα γυμνά.

## ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΙΣ

### 1η ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΙΣ : ΦΥΤΑ ΦΑΝΕΡΟΓΑΜΑ

Αἱ δύο συνομοταξίαι τῶν φυτῶν, τὰς ὁποίας ἔξητάσαμεν, δηλαδὴ τὰ Ἀγγειόσπερμα καὶ τὰ Γυμνόσπερμα φυτά, παρουσιάζουσι κοινὰ χαρακτηριστικά :

Εἰς τὰς συνομοταξίας ταύτας ἀνήκουσι φυτά φέροντα ἄνθη· τὰ ὡάρια τῶν θηλέων ἀνθέων, γονιμοποιούμενα ἀπὸ τὴν γῦριν τῶν ἀρρένων ἀνθέων, μεταβάλλονται εἰς σπέρματα, ἔκαστον τῶν ὁποίων περικλείει ἐν μικρὸν φυτικὸν ἔμβρυον καὶ τὰ ἀναγκαῖα διὰ τὴν πρώτην του ἀνάπτυξιν θρεπτικὰ συστατικά.

Ἐπειδὴ δλα τὰ φυτὰ ταῦτα ἔχουν ἄνθη, εἶναι δὲ φανερὸς εἰς αὐτὰ ὁ τρόπος, κατὰ τὸν ὁποῖον πολλαπλασιάζονται, διὰ τοῦτο τὰ φυτὰ ταῦτα συνενοῦνται εἰς μίαν μεγαλυτέραν ἀπὸ τὴν συνομοταξίαν διάδα, τὴν ὁποίαν καλοῦμεν *Υποδιαιρέσιν*, τὴν ὑποδιαιρέσιν τῶν φυτῶν μὲ ἄνθη, ἢ *Φανερογάμων* φυτῶν.

Τὰ φυτὰ ταῦτα ἔχουσιν ἀγγεῖα, χλωροφύλλην, ρίζας, φυλλοφόρουν βλαστὸν καὶ καρπούς, οἵτινες περιβάλλουν τὰ σπέρματα, περικλείοντες ταῦτα τελείως ἢ ἀτελῶς.

**1η ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΙΣ : ΦΑΝΕΡΟΓΑΜΑ**

Οικογένειαι	Τάξεις	Όμοταξίαι	Συνομοταξίαι	Υποδιαιρέσις
I. 1. Ψυχαρθῆ ἡ Ὀσπριοειδῆ. 2 Ροδῶδη. 3 Μήκωνειδῆ. 4 Μαλαζοειδῆ. 5 Σκιαδαρθῆ. 6 Καρνοφύλλωδη. 7 Γερανιώδη. 8 Λινώδη. 9 Ιώδη. 10 Κατώδη. 11 Πορτοκαλεώδη ἡ Ἐσπεριδοειδῆ. 12 Σταραρθῆ 13 Ἀμπελιώδη. 14 Βατραχώδη.	1η Τάξις : Χωριστοπέταλα	1η Ομοταξία Διασταύληδονα	1η Συνομοταξία : Αγειρέα σ περιανα	1η Υποδιαιρέσις : Φυτά η Αγειρέα σ περιανα
II. 1. Σολανώδη ἡ Στρογγυώδη. 2 Ἡρανθῆ. 3 Ἐλαιώδη. 4 Χειλανθῆ. 5 Ὀροβαγχώδη. 6 Αλγοκληματώδη. 7 Σύνθετα ἡ Συνάνθηρα.	2η Τάξις : Συμπέταλα	2η Ομοταξία Διασταύληδονα	2η Συνομοταξία : Φυτά η Αγειρέα σ περιανα	2η Υποδιαιρέσις : Φυτά η Αγειρέα σ περιανα
III. 1. Κνιδώδη. 2 Κυπελλοφόρα. 3 Καρυώδη. 4 Ιτεώδη. 5 Πλατανώδη. 6 Δαρνώδη. 7 Τεῦτλα. 8 Ιξώδη.	3η Τάξις : 'Απέταλα	3η Ομοταξία Μονοκοτόληγδονα	3η Συνομοταξία : Φυτά η Αγειρέα σ περιανα	3η Υποδιαιρέσις : Φυτά η Αγειρέα σ περιανα
I. Ἀγρωστώδη. 2 Λειοιώδη. 3 Φοινικώδη. 4 Οοζεώδη. 5 Ιριδώδη.	—	—	—	—
1. Κωνοφόρα	—	—	—	—
2. Κυπαρισσώδη	—	—	—	—

**2α ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΙΣ : ΚΡΥΠΤΟΓΑΜΑ ( ΧΩΡΙΣ ΑΝΘΗ )**

1η ΤΑΞΙΣ : ΠΤΕΡΙΔΕΣ


ΠΤΕΡΙΣ Η ΚΟΙΝΗ

( κν. φτέρη )

Είναι φυτόν κοινότατον, συναντώμενον εἰς τὰ δάση, τὰς χαράδρας καὶ διὰ τὰ σύσκια καὶ ὑγρὰ μέρη, ὅπου καλύπτει μεγάλας ἐκτάσεις. "Εχει τριγωνικά φύλλα, τὰ ὅποια δύνανται νὰ φέρουν εἰς ὕψος τὰ δύο μέτρα, καὶ ὑπόγειον βλαστὸν ἡ ρίζωμα, ἐκ τοῦ ὅποιου ἐκφύονται πολυάριθμοι μελανωπαῖ φίλαι. Ἀπὸ τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ ριζώματος ἐκ-

φύονται φύλλα πολυσύνθετα· ἀπὸ τῶν κυρίως μίσχον των ἐκφύονται πράσινα ἑλάσματα, ὅμοια μὲν φυλλάρια τὰ ὄποια καὶ αὐτὰ σχίζονται εἰς μικρότερα. Τὸ δέκαρον τῶν νεαρῶν φύλλων εἶναι περιεστραμμένον περὶ ἔχυτὸν (σχ. 156), γίνεται ὅμως εὔθυ, δταν τὸ φύλλον μεγαλώσῃ.

Πολλαὶ πλαστικαὶ συμόσιες. "Αν κατὰ τὰ τέλη τοῦ θέρους παρατηρήσωμεν τὴν κάτω ἐπιφάνειαν ἑκάστου ἐκ τῶν μικρῶν φυλλαρίων, εἰς τὰ ὄποια σχίζονται τὰ φύλλα τῆς πτέριδος, θὰ διακρίνωμεν ἐπ' αὐτῆς ἀπὸ 4 - 12 μικρά, σχήματος φασιόλου, ἐρυθρωπά ἔξογκώματα, τὰ ὄποια καλύπτονται ἀπὸ μίαν ἀναδίπλωσιν τῆς κάτω ἐπιδερμίδος τοῦ φύλλου. "Εὰν ἀναστρκώσωμεν τὴν ἀναδίπλωσιν ταῦτην καὶ παρατηρήσωμεν μὲν ἰσχυρὸν φακόν, θὰ ἔδωμεν μικροὺς κιτρίνους σάκκους, οἵτινες συγκρα-




Σχ. 153. Σποριάγγειον, ὅπως φαίνεται εἰς τὸ μικροσκόπιον (ἀπὸ τὸ ἄνοιγμά του ἐκφεύγοντα τὰ σπόρια 3). 1 ποὺς τοῦ σποριάγγειον, 2 φύλλον πτέριδος μὲ τὰ ἐπ' αὐτοῦ σποριάγγεια.

τοῦνται ἀπὸ ἕνα ποδίσκον· οἱ σάκκοι οὗτοι λέγονται σποριάγγεια (σχ. 153).

"Οταν τὰ σποριάγγεια ὡριμάσουν καὶ ἔηρανθοῦν, σχίζονται καὶ ἀφήνουν ἐλευθέραν μίαν κόνιν φαιάν, ἡ ὄποια ἀποτελεῖται ἀπὸ μικροσκοπικούς κόκκους, τὰ σπόρια· μετὰ τὴν ὡρίμανσιν τῶν σποριάγγειων τὸ ὑπέρ τὸ ἔδαφος μέρος τοῦ φυτοῦ ἔηραίνεται, παραμένει ὅμως τὸ ὑπόγειον ρίζωμα, τὸ ὄποιον θὰ δώσῃ νέα φύλλα κατὰ τὴν ἄνοιξιν (σχ. 154). Τὰ σπόρια πίπτουν ἐπὶ τοῦ ἔδαφους, καὶ δταν ὑπάρχῃ ἡ κατάλληλος θερμοκρασία βλαστάνουν καὶ δίνουν πράσινον ἔλασμα, ἐπιφανείς ἡμίσεος τετραγωνικοῦ ἑκατοστομέτρου. Τοῦτο φέρει εἰς τὴν βάσιν του τρικοσιδῆ ρίζεις, διὰ τῶν ὄποιών τρέφεται καὶ συγκρατεῖται, καλεῖται δὲ


προθάλλιον ( σχ. 155, 1 ). Εἰς τὴν κατωτέραν ἐπιφάνειαν τοῦ προθαλ-



Σχ. 154. Ἐκβλάστησις τῆς πτέριδος.

Εἰς τὸ κέντρον τὸ προθάλλιον ( τὸ χωρὶς γράμματα σχῆμα )

λίου ἀναφαίνονται δύο εἶδη ὄργάνων, τὰ ἀνθηρίδια καὶ τὰ ἀρχεγόνια ( σχ. 157, 158 καὶ 159 ).



Σχ. 155. 1 προθάλλιον, 2 νεαρὰ πτέρις ἀναπτυσσόμενη ἐκ τοῦ προθαλλίου.

χουσι σχῆμα φιάλης ( σχ. 157 καὶ 158 ), εἰς τὸ ἔξογκωμένον μέρος τῆς ὅποιας ὑπάρχει μικρὸν στρογγύλον σῶμα, τὸ ὀσφαίριον, εἰς τὸν

Τὰ ἀνθηρίδια εἰναι μικροὶ σάκκοι, οἰτινες περικλείουν μικρὰ σωμάτια περιεστραφμένα σπειροειδῶς καὶ ἐφωδιασμένα μὲ εἶδος βλεφαρίδων, διὸ τῶν ὅποιων δύνανται νὰ μετακινοῦνται ἐνδὸς τοῦ ὄδατος. Τὰ σωμάτια ταῦτα λέγονται ἀνθηροζωίδια.

Τὰ ἀρχεγόνια ἔ-


λαιμὸν δὲ κομμιώδης οὐσία, ἡ ὅποια προσελκύει τὰ ἀνθηροζωίδια.  
Ἐν ἀπὸ αὐτά, κολυμβῶν ἐντὸς τῆς δρόσου, φθάνει εἰς τὴν κορυφὴν τοῦ  
φιλοειδοῦς ἀρχεγονίου, κατέρχεται κατὰ μῆκος τοῦ λαιμοῦ του καὶ,  
φθάνον εἰς τὸ ὠσφαίριον, συγχωνεύεται μετ' αὐτοῦ· μετὰ τὴν συγχώ-



**Σχ. 156.** Πτέρις νεαρὰ καὶ πτέρις ἀνεπτυγμένη. Εἰς τὴν κάτω ἐπιφάνειαν τῶν φύλλων τῆς δευτέρας φαίνονται, ὡσὰν στίγματα, τὰ σποριάγγεια.

μεν, μὲ λιχυρὰν μεγέθυνσιν μικροσκοπίου, τοὺς αὐτοὺς ξυλώδεις καὶ ἡθιώδεις σωλῆνας, τοὺς ὅποιους ἔχομεν εὑρεῖ εἰς τὸν βλαστὸν ὅλων τῶν φυτῶν, τὰ ὅποια ἔξητάσαμεν μέχρι τοῦδε. Δηλ. ἡ πτέρις εἶναι φυτὸν τὸ ὅποιον ἔχει ἀγγεῖα.

Πτερίδων ὑπάρχουσι διάφορα εἰδη διαφέροντα μεταξύ των μόνον




**Σχ. 157.** 1 ἀρχεγόνιον, 2 ἀνθηρίδιον,  
3 ἀνθηροζωίδιον.

νευσιν ταύτην σχηματίζεται ἐν ὧν, τὸ ὅποιον, ἀναπτυσσόμενον, δίδει τὸ φυτικὸν ἔμβρυον· μετὰ τοῦτο τὸ προθάλλιον ξηραίνεται.

Διὰ τὸν πολλαπλασιασμὸν εἶναι ἀνάγκη νὰ ὑπάρχῃ ὄδωρ ἡ ὑγρασία, διότι ἄλλως εἶναι ἀδύνατον νὰ κινηθῇ τὸ ἀνθηροζωίδιον καὶ νὰ φθάσῃ τὸ ὠσφαίριον. Διὰ τοῦτο αἱ πτέριδες φύονται κυρίως εἰς ὑγροὺς καὶ συσκίουσ τόπους.


"Αν κάμωμεν μίαν τομὴν εἰς τὸν βλαστὸν μιᾶς πτέριδος, παρατηροῦ-

κατά μέγεθος. "Εν τοιούτον είδος, ή Πτέρις ή δενδρώδης, φθάνει τὸ ύψος τῶν 8 μέτρων καὶ τελειώνει εἰς μακρότατα ( μέχρι 4 μ. μήκους )



Σχ. 158. Ἀρχεγόνιον

Εὑρίσκεται εἰς τὴν κάτω ἐπιφάνειαν τοῦ προθαλλίου. "Εχει σχῆμα φιάλης. Εἰς τὸ βάθος τὸ ὀσφαίριον 1 ( θῆλυ κύτταρον ), τὸ ὄποῖον συγχωνεύμενον μὲν ἐν ἀνθροζῷδιον ( ἔρεν κύτταρον ), δίδει τὸ ὄόν. Τὸ ἀνθροζῷδιον εἰσέρχεται διὰ τοῦ λαχιοῦ τῆς φιάλης 2.



Σχ. 159. Ἀνθηρίδιον

Εὑρίσκεται ἐπὶ τῆς κάτω ἐπιφανείας τοῦ προθαλλίου καὶ παράγει τὰ ἀνθηροζῷδια ( α, α' ), τὰ ὄποῖα κινούμενα μεταβαίνουσι καὶ συναντῶσι τὸ ἀρχεγόνιον, εἰσέρχονται διὰ τοῦ λαχιοῦ τῆς φιάλης καὶ συγχωνεύονται μὲν τὸ ὀσφαίριον πρὸς ἀποτέλεσιν τοῦ ὄόν.

φύλλα, βαθέως ἐσχισμένα. "Η πτέρις κύττη ζῆ κυρίως εἰς τὴν Αὐστραλίαν καὶ εἶναι τὸ μόνον δένδρον, τὸ ὄποῖον πολλαπλασιάζεται χωρὶς ἁνθη.



Σχ. 160. Πολυπόδιον

γίνεται διὰ σπορίων, τὰ ὄποῖα δίδουσι προθαλλίουν ἐπὶ τούτου ἀναπτύσ-

"Ομοιον πρὸς τὰς πτέριδας φυτὸν εἶναι :

**Τὸ πολυπόδιον** ( σχ. 160 ).

"Απαντᾶται κυρίως εἰς ὑπόσκια μέρη καὶ ὑγροὺς βράχους.

"Ολαι αἱ πτέριδες παρουσιάζουσι κοινὰ χαρακτηριστικά :

"Ἐχουσιν ἀγγεῖα, δὲν ἔχουσιν ὅμως ἁνθη καὶ ὁ πολλαπλασιασμός τῶν

σονται τὰ ἀνθηρίδια καὶ τὰ ἀρχεγόνια, τὰ ὅποια δίδουσι τὰ ἀνθηροζωτῖα καὶ τὰ ὀωσφαιρία. Διὸ τῆς συγγωνεύσεως ἐνὸς ἀνθηροζωτίδιου καὶ ἐνὸς ὀωσφαιρίου γίνεται τὸ δῶν καὶ ἐξ αὐτοῦ τὸ ἔμβρυον, ποὺ θὰ δώσῃ νέον φυτόν.


’Αποτελοῦν ιδίαν τάξιν φυτῶν, τὴν τάξιν τῶν Πτεριδών.

## 2<sup>η</sup> ΤΑΞΙΣ : Ι Η Η Ο Υ Ρ Ι Δ Ε Σ

( κν. πολυκόμπικα )

Αἱ ἵππουρίδες εἶναι πολυετῆ φυτὰ τῶν ἀγρῶν καὶ φέρουν ἔρποντα ὑπόγειον βλαστόν, ρίζωμα, μεγαλύτερον τοῦ 1 μέτρου.

’Απὸ τὸ ρίζωμα αὐτὸ ἐκφύονται κατὰ Μάρτιον βλαστοὶ ὄρθιοι, κοῖλοι, ἀποτελούμενοι ἀπὸ τμήματα ( ἄρθρα ), τὰ ὅποια εἰσχωροῦν τὸ ἐν εἰς τὸ ἄλλο, καὶ χωρίζονται ἀπὸ γόνατα, γύρω ἀπὸ τὰ ὅποια ὑπάρχει θύσανος φύλλων ( σχ. 161 ) φυλλιδοειδῶν, ἐσχισμένων εἰς πολυαριθμούς δόδοντας. Εἰς τὴν κορυφὴν ὀρισμένων βλαστῶν, γονίμων καλούμενων, σγηματίζεται εἰδος στάχυος ἀπὸ μετασγηματισμένα φύλλα· εἰς τὴν κάτω ἐπιφάνειαν τούτων ὑπάρχουν τὰ σπόρια, διὰ τῶν ὅποιων τὰ φυτὰ ταῦτα πολλαπλασιάζονται ὅπως καὶ αἱ πτέριδες.




Σχ. 161. ’Ιππουρίς. ’Αριστερὰ κλάδος στειρος καὶ δεξιὰ κλάδος γόνιμος.

## 3<sup>η</sup> ΤΑΞΙΣ : ΛΥΚΟΠΟΔΙΑ

Τὰ λυκοπόδια εἶναι φυτὰ κοινὰ εἰς σκιεροὺς τόπους καὶ ὁμοιάζουν μὲ βρύα. Ἐχουν βλαστὸν ἔρποντα, ἐκ τοῦ ὅποιου ἐκφύονται κλάδοι ( σχ. 162 ) διακλαδιζόμενοι δικρανοειδῶς.

Τὰ σπόρια τοῦ λυκοποδίου, ἐπειδὴ ἀναφλέγονται πολὺ εύκολα, χρησιμοποιοῦνται διὰ τὴν κατασκευὴν πυροτεχνημάτων.

Αἱ πτέριδες, αἱ ἵππουρίδες, τὰ λυκοπόδια ἀποτελοῦν τρεῖς τάξεις φυτῶν, αἵτινες ἔχουν κοινὰ χαρακτηριστικά :



Σχ. 162. Λυκοπόδιον. 1 στάχυς μὲ  
σποριάγγεια, 2 καὶ 3 σποριάγγειον.

"Ἐχουν ρίζας, βλαστόν, φύλλα καὶ ἀγγεῖα. Δὲν ἔχουν ἄνθη καὶ διπλασιασμός των γίνεται διὰ σπορίων, τὰ ὅποια δίδουσι προθάλλιον, ἐπὶ τοῦ ὅποιου ἀναπτύσσονται τὰ ἄρρενα καὶ τὰ θήλεα ὅργανα. Ταῦτα παράγουσιν ἀνθηροζωίδια καὶ ὠσφαίρια, διὰ συγχωνεύσεως τῶν ὅποιών θὰ προκύψῃ ὡὸν καὶ ἐκ τούτου ἀκολούθως τὸ νέον φυτόν.

Αἱ τρεῖς αὗται τάξεις συνενοῦνται καὶ ἀποτελοῦσι τὴν 2αν ὑποδιαιρέσιν τοῦ φυτικοῦ κόσμου, τὴν ὑποδιαιρέσιν τῶν φυτῶν χωρὶς ἄνθη ἢ Κρυπτογάμων φυτῶν μὲρίας καὶ ἀγγεῖα.

## ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΙΣ

### 2α ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΙΣ : ΦΥΤΑ ΚΡΥΠΤΟΓΑΜΑ

Τάξεις	Κοινὰ χαρακτηριστικά	Ὑποδιαιρέσις
Πτέριδες	Διακλάδωσις πλαγία	
Ἴππουρίδες	Διακλάδωσις σπονδυλώδης	
Λυκοπόδια	Διακλάδωσις διχαλωτὴ ἢ κατὰ δίκρανα	Φυτὰ χωρὶς ἄνθη, ἀλλὰ ἔχοντα ρίζαν καὶ ἀγγεῖα, ἢ Κρυπτόγαμα φυτὰ μὲριανα καὶ ἀγγεῖα.

## 3η ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΙΣ: ΚΡΥΠΤΟΓΑΜΑ ΦΥΤΑ

(ΧΩΡΙΣ ΑΝΘΗ, ΡΙΖΑΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΑ)  
ΒΡΥΑ

### ΠΟΛΥΤΡΙΧΟΝ ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ

(κν. μούσκλια)

Τὸ βρύον τοῦτο, κοινότατον εἰς τοὺς ἀγροὺς καὶ τοὺς δασῶδεις τόπους, ὃπου ἀποτελεῖ μεγαλοπρεπεῖς πρασίνους τάπητας, συναντᾶται ἐπίσης ἐπὶ τῶν βράχων, τῶν τοίχων καὶ τῶν κορμῶν δένδρων. Φθάνει εἰς ὕψος 0,20 μ. περίπου (σχ. 163).

Εἰς ἔκαστον φυτὸν διαχρίνομεν εὐθὺν  
βλαστόν, ὃστις στερεοῦται εἰς τὸ ἔδαφος μὲ  
πολυαρίθμους τρίχας καὶ φέρει σκληρὰ καὶ  
στενὰ φύλλα.

Τὸ πολύτριχον εἶναι φυτὸν προσηρ-  
μοσμένον διὰ νὰ ζῆ καὶ εἰς τὰ ἔηρότερα  
ἐδάφη καὶ ἐπάνω εἰς τοὺς τοίχους ἢ καὶ τοὺς  
βράχους ἀκόμη. Εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν  
τὰ φύλλα του διπλώνονται σχηματίζοντα ἔνα  
κύλινδρον, μὲ τὴν ἄνω ἐπιφάνειαν τοῦ φύλ-  
λου εἰς τὸ ἐσωτερικὸν μέρος τοῦ κυλίνδρου,  
ὅπως θὰ ἐδιπλώναμεν ἐν φύλλον χάρτου  
ἀπὸ τὴν μίαν καὶ τὴν ἄλλην πλευρὰν συγ-  
χρόνως, μέχρις ὅτου τὰ δύο διπλωνόμενα ἡ-  
μίση του συναντηθοῦν εἰς τὸ μέσον των.  
Τοῦτο ἐλαττώνει κατὰ τὸ ἥμισυ τὴν ἐπιφά-  
νειαν τοῦ φύλλου, ἀφῆνον πρὸς τὰ ἔξω μό-  
νον τὸ κάτω μέρος του, τὸ ὄπιον, ὡς τρα-  
χύτερον, διαπνέει διληγότερον. Εἰς τοιαύτην  
κατάστασιν τὸ φυτὸν δύναται νὰ ἀνθέξῃ καὶ  
εἰς τὴν μεγαλυτέραν ἔηρασίαν.

Τὰ φύλλα παραμένουν καθ' ὅλον τὸ ἔτος· κατὰ τὴν ἔηραν ὅμως  
ἐποχὴν χάνουν ὅλον τὸ ὄπιον των καὶ μᾶζαι ὀλόκληροι ἀπὸ αὐτὰ λαμ-  
βανόμεναι εἰς τὴν χεῖρα φαίνονται ἐλαφρόταται. Μόλις ὅμως βρεξῃ,  
ἔξαπλώνουν πάλιν τὴν ἄνω ἐπιφάνειαν τῶν φύλλων των καὶ αὐξάνουν



Σχ. 163. Πολύτριχον.  
Α κλάδος ἄρρην, Β κλάδος  
θηλυκός, Γ σποροιογόνων μὲ  
τὴν καλύπτραν του.

ποιὸν κατὰ βάρος, διότι ἀπορροφοῦν τὸ ὄδωρό ως σπόγγοι. Ἡ ἀπορρόφησις τοῦ ὄδατος γίνεται δι’ ὅλης τῆς ἐπιφανείας τῶν φύλλων.


Ἐξετάζοντες τομὴν βλαστοῦ εἰς τὸ μικροσκόπιον δὲν εὑρίσκομεν ξυλώδεις καὶ ἡθμώδεις σωλήνας οὔτε φίλας. Ἡ ἀπουσία φίλων καὶ ἀγγέων εἶναι χαρακτηριστικὴ διὰ τὰ φυτὰ ταῦτα, τῶν ὁποίων οὕτως ἡ διασκευὴ γίνεται ἀπλουστάτῃ.

Πολλὰ πλασιασμάτων. Κατὰ τὸ θέρος ἐκ τῆς κορυφῆς τοῦ βλαστοῦ ἀνυψοῦται νῆμα ἐρυθρωπόν, τὸ ὄποῖον καταλήγει εἰς ἔξογκωμα σκεπασμένον μὲν καλύπτραν, τὸ σποριογόνιον (σχ. 164). Ὄταν τὸ σποριογόνιον ὠριμάσῃ, γίνεται βαρὺ καὶ κλίνει πρὸς τὰ κάτω· οὕτω πίπτει ἡ καλύπτρα καὶ ἀναφαίνεται εἰδος ὑμενώδους ὀδοντωτοῦ πώματος, τοῦ ὄποίου οἱ δόδοντες ἀπομακρύνονται ἀλλήλων καὶ ἀφήνουν δίδον εἰς μίαν κιτρίνην κόνιν, τὴν ὁποίαν παρεστάει ὁ ἄνεμος. Ἡ κόνις αὕτη εἶναι τὰ σπόρια· ταῦτα, πίπτοντα εἰς ὑγρὰν γῆν, βλαστάνουν καὶ δίδουν ἐν νῆμα πράσινον, τὸ λεγόμενον πρωτόημα (σχ. 165), ἐκ τοῦ ὄποίου ἐκφύονται νέα βρύα. Εἰς τὰς κορυφὰς μερικῶν ἐκ τῶν βλαστῶν τῶν νέων τούτων βρύων ἀναφαίνονται ὅργανα σχήματος φιάλης μὲν μακρὸν λαιμόν, τὰ ἀρχεγόνια ἔκαστον περικλείει ἐν θῆλῳ κύτταρον, τὸ ώσπαριόν (σχ. 164).


Εἰς ἄλλους βλαστούς ἀναφαίνονται τὰ ἀνθηρίδια, τὰ ὄποια εἶναι γεμάτα ἀπὸ κύτταρα ἄρρενα, τὰ ἀνθηροζωίδια (σχ. 164)· ταῦτα, σχήματος σπειροειδοῦς, ἔχουσι 2 βλεφαρίδια διὰ τῶν ὁποίων κινοῦνται. Ἐκκαστον ἀνθηρίδιον ἀφήνει νὰ πέσῃ ἀπὸ αὐτὸν σταγονίδιον γλοιωδές, πληρεῖς ἀπὸ ἀνθηροζωίδια. Ταῦτα, κολυμβῶντα μὲ τὰ δύο κινητικὰ βλεφαρίδιά των, ἀνευρίσκουν τὸ ἀρχεγόνιον, τὸ ὄποῖον καὶ αὐτὸν ἔχει πέσει ἀπὸ τὸ φυτόν. Εἰσέρχονται τότε διὰ τοῦ λαιμοῦ του, κατέρχονται εἰς τὸ βάθος καὶ ἔκει εὑρίσκουν τὸ ώσπαριόν, τὸ ὄποῖον περικυλλώνουν. Ἐν ἀπὸ τὰ ἀνθηροζωίδια διαπερᾶ τὸ περίβλημα τοῦ ώσπαριού καὶ συγχωνεύεται μετ’ αὐτοῦ· τὰ λοιπὰ ἀποθηκάσκουν. Ἀπὸ τὴν συγχώνευσιν αὐτὴν προέργεται ἐν ὀδὸν καὶ τουτοῦ δίδει νέον φυτόν, ἐπὶ τοῦ ὄποίου θὰ σχηματισθοῦν σποριογόνια ἐκ νέου, καὶ οὕτω καθ’ ἔξης.

Οὕτω βλέπομεν, ὅτι οἱ βλαστοὶ τῶν βρύων σχηματίζουσι κύτταρα ἄρρενα καὶ κύτταρα θήλεα, τὰ ὄποια συγχωνεύμενα σχηματίζουν ὡά, ἐκ τῶν ὁποίων θὰ προέλθῃ νέον φυτόν. Ἐπὶ τοῦ φυτοῦ τούτου θὰ σχηματισθοῖ τὰ σποριογόνια, ἔκαστον σπόριον τῶν ὁποίων θὰ δώσῃ πρωτόνημα, καὶ ἐκ τούτου πάλιν θὰ βλαστήσουν νέα φυτά.

Αλλὰ βρύα εἶναι :



Σχ. 164. Πώς πόλλα πλάσιαζεται το πολύτριχον.



Σχ. 165. Εκβλάστησις σπορίου βρύου.

Τὸ σφάγνον ( σχ. 166 ). Φύεται κυρίως εἰς τὰς βορείους χώρας, εἰς πολλὰς τῶν ὁποίων ( εἰς τὰς τούνδρας τῶν βορείων χωρῶν ) ἀποτελεῖ

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

τὴν μόνην βλάστησιν. Ἐπίσης συναντᾶται καὶ ἐντὸς τοῦ ὄδατος, βλαστάνονταν ἵδιως ὅταν ἡ θερμοκρασία τούτου δὲν ὑπερβαίνῃ τοὺς +6° ἔως

+8° K. Τότε φύεται ἀφθόνως, οἱ βλαστοί του χώνονται ἐντὸς τῆς ἰλύος καὶ ἀποτελοῦν, ἀπανθρακούμενοι μὲ τὴν πάροδον τοῦ χρόνου, εἶδος σποργώδους καὶ εὐθρύπτου ἀνθρακος, τὴν τύρφην ἡ ποάνθρακα, ὅστις περιέχει 40-50% ἀνθρακος καὶ χρησιμοποιεῖται ὡς καύσιμος ὕλη, ὅχι δῆμως μεγάλης ἀξίας.

Κοινὸν εἰς τὴν Ἑλλάδα βρύον είναι καὶ

**Ο ὑπνος.** Ἐχει πολύκλαδον βλαστὸν καὶ χῶμα ἐντόνως πράσινον. Χρησιμοποιεῖται διὰ τὴν κατασκευὴν τεχνητῶν ἀνθέων καὶ διὰ νὰ σκεπάζουν τὸ χῶμα τῶν γλαστρῶν, εἰς τὰς ὁποῖας είναι φυτρωμένα φυτά.

Σχ. 166. Σφάγνον

Τὸ πολύτριχον, τὸ σφάγνον, ὁ ὑπνος ἀνήκουσιν εἰς τὴν τρίτην ὑποδιαιρεσιν, τὴν ὑποδιαιρεσιν τῶν *Kρυπτογάμων* φυτῶν χωρὶς ἄνθη, φλίζας καὶ ἀγγεῖα.

#### 4η ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΙΣ: ΦΥΤΑ ΘΑΛΛΟΦΥΤΑ

##### 1. ΦΥΚΗ

Ὑπάρχουσι διαφόρων εἰδῶν φύκη, τὰ ὁποῖα, ἀναλόγως τοῦ χρωματισμοῦ των, ὀνομάζονται:


**α) Φαιά φύκη** ἡ φαιοφύκη. Ταῦτα συναντῶνται εἰς τὸ ὄδαρ, κυρίως τῆς θαλάσσης, καὶ μέχρι βάθους 100 μέτρων.

Ἐν ἐκ τούτων είναι τὸ καλούμενον φῦκος τὸ κυστοειδές, τὸ ὁποῖον ὀφείλει τὸ ὄνομά του εἰς τὰς πλήρεις ἀξώτου κύστεις ποὺ ἔχει, καὶ διὰ τῶν ὁποίων δύναται νὰ ἐπιπλέῃ. Περιπατοῦντες εἰς τὰς ἀκτὰς ἀνοικτῆς θαλάσσης τὰς βλέπομεν κεκαλυμμένας ἀπὸ πληθὺν φαιῶν τὸ χρῶμα τακινῶν, ἔκαστη τῶν ὁποίων είναι ἐν ὄλοκληρον κυστοειδὲς φῦκος ἡ τεμάχια τούτου.




‘Ολόκληρον τὸ φῦκος δυνάμεθα νὰ τὸ εῦρωμεν ἐπὶ τῶν βράχων τῆς ἀκτῆς, ὅταν ἡ θάλασσα ἀποσύρεται. Ἀποτελεῖται ἀπὸ στενὰς ταινίας φαιοῦ χρώματος, αἴτινες διακλαδίζονται εἰς διαδοχικὰ δίκρανα (σχ. 167) καὶ φθάνουν εἰς μῆκος τὸ ἔν μέτρον. “Οταν εἶναι τριχυμίχ, τὰ κύματα ποὺ κτυποῦν εἰς τοὺς βράχους μὲ δύναμιν, καταλήγουν νὰ ἀποσπάσουν πολλὰς ἀπὸ τὰς ταινίας αὐτάς, τὰς ὁποίας ρίπτουν εἰς τὴν ἀκτήν, ὅπου τὰς ἀνευρίσκομεν.

Εἰς τὸ ἄνω μέρος τῶν ταινιῶν τούτων, εύρισκομεν σαρκώδῃ ἔξογκωματα ἐντὸς τῶν ὁποίων σχηματίζεται εἰς ἄλλα μὲν μέγας ἀριθμὸς κυττάρων ἀρρένων, ἀνθηροζωϊδίων δηλ., εἰς ἄλλα δὲ 8 χονδρὰ ὠσφαίρια (δηλαδὴ κύτταρα θήλεα, σχ. 168). Πιέζοντες δυνάμεθα νὰ συλλέξωμεν ἀνθηροζωϊδία καὶ ὠσφαίρια ἐπὶ μιᾶς ύάλου ὥρολογίου. “Αν τὰ ἔξετάσωμεν εἰς τὸ μικροσκόπιον, βλέπομεν ὅτι τὰ ἀρρενα ἔχουσι χρῶμα κίτρινον πρὸς τὸ πορτοκαλόχρουν καὶ σχῆμα φασιόλου, εἶναι δὲ ἐφωδιασμένα μὲ δύο κινητικὰ βλεφαρίδια· ἐνῷ τὰ θήλεα καὶ μίαν φαιάν, εἶναι σφαιρικὰ καὶ παραμένουν ἀκίνητα.



Σχ. 167. Φῦκος τὸ κυστοειδές.



Σχ. 168. Πολλαπλασιασμὸς φύκους

“Αν μὲ τὸ ἄκρον ύαλίνης ράβδου λάβωμεν μίαν σταγόνα ἀπὸ τὸ ὑγρόν, τὸ ὁποῖον περιέχει τὰ θήλεα κύτταρα καὶ μίαν ἀπὸ τὸ ὑγρόν, τὸ

όποιον περιέχει τὰ ἄρρενα, τὰς ἀναμίξωμεν καὶ παρατηρήσωμεν εἰς τὸ μικροσκόπιον, βλέπομεν ἐκατοντάδας ἀνθηροζωιδίων νὰ συναθροίζωνται γύρω ἀπὸ κάθε ὡσφαιρίου, τὸ ὅποιον, μὲ τὰς κινήσεις τῶν δύο κινητικῶν βλεφαρίδων των, θέτουσιν εἰς περιστροφικὴν κίνησιν. Τέλος, ἐν τῶν ἀνθηροζωιδίων διαπερᾶς τὴν μεμβράνην τοῦ ὡσφαιρίου, εἰσέρχεται ἐντὸς αὐτοῦ καὶ συγχωνεύεται μὲ κύτο. Τὰ ἄλλα ἀνθηροζωιδία ἀποθηκεύονται.

Ἄπὸ τὴν συγχώνευσιν αὐτὴν σχηματίζεται ἐν ὕδων. Τὸ ὕδων τοῦτο σκεπάζεται ἀπὸ μίαν παχεῖαν μεμβράνην, ἥτις τὸ προφυλάσσει. Παραμένει εἰς λαχθάνουσαν ζωὴν ( ὕπνον ), μέχρις ὅτου ἀργότερον, ὅταν εὑρῇ τὰς καταλλήλους συνθήκας, ἐκβλαστήσῃ καὶ δώσῃ γένον φυτόν.

Τὸ σῶμα τοῦ φύκος τὸ κυστοειδοῦς, εἰς τὸ ὅποιον δὲν διακρίνονται οὔτε ρίζα, οὔτε βλαστός, οὔτε φύλα, λέγεται θάλλιον. Ύποκάτω τῆς φαιδρᾶς οὐσίας, εἰς τὴν ὅποιαν ὁφεῖται τὸ χρῶμά του, ὑπάρχουσι κόκκοι χλωροφύλλης, διὰ τῶν ὅποιων δύναται νὰ ἀφομοιώνη.

Τὰ φυτά, ὅπως τὸ φῦκος τὸ κυστοειδές, τῶν ὅποιων τὸ σῶμα ἀποτελεῖται μόνον ἀπὸ θάλλιον καὶ τὰ ὅποια ἔχουσι χλωροφύλλην, τὰ καλούμεν φύκη. "Οσα δέ, πλὴν τῆς χλωροφύλλης, ἔχουσι καὶ χρωστικὴν οὐσίαν φαιάν, τὰ καλούμεν φαιοφύκη.

"Αλλα φαιοφύκη εἶναι :

**Τὸ σάργασον** ( σγ. 169 ). Τὸ φῦκος τοῦτο φύεται κυρίως εἰς τὸν πυθμένα τῶν Τροπικῶν θαλασσῶν. Ἀποσπώμενον ἀπὸ τὸν πυθμένα, παρασύρεται ἀπὸ τὸ θερμὸν θαλάσσιον φεῦμα τοῦ κόπου μέχρι τῶν Ἀζορῶν, ὅπου σκεπάζει θαλασσίαν ἔκτασιν ἐπτάκις μεγαλυτέραν τῆς Ἐλάσδος, ἥτις καλεῖται Θάλασσα τῶν Σαργάσων.

**Τὰ διάτομα.** Μικροσκοπικὰ φύκη, τὰ ὅποια ἀποτελοῦνται ἀπὸ ἐν μόνον κύτταρον ( μονοκύτταρα ). Τὸ κύτταρον τοῦτο περιβάλλεται ἀπὸ μίαν οὐσίαν, κυτταρόην καλουμένην, ἥτις εἶναι διαποτισμένη μὲ πυρίτιον κατὰ τρόπον, ὥστε νὰ σχηματίζεται πέριξ τοῦ διατόμου ἐν εἰδος κελύφους ( σγ. 171 ).

Τὰ διάτομα, τρεφόμενα μὲ ἄλατα καὶ ἀνθρακικὸν δέξ, τὰ ὅποια ἀφθόνως εὐρίσκουσι διαλέλυμένα ἐντὸς τοῦ θαλασσίου ὅδατος, αὐξάνονται καταπληκτικῶς, ἀποθηκεύοντας δὲ καλύπτουν, μὲ τὰ κελύφη των, τὰ ὅποια κατασταλάζουν εἰς τὸν πυθμένα τῆς θαλάσσης, ὀλοκλήρους ἐκτάσεις, σχηματίζοντα ἐν πέτρωμα, τὸ ὅποιον λέγεται τροπολίτις γῆ ἢ καὶ στιλβωτικὸς λίθος, διότι γρηγοριοποιεῖται πρὸς στίλβωσιν.

β) Τὰ ἐρυθροφύκη ἢ ἐρυθρὰ φύκη. Ζῶσιν ἐντὸς τῆς θαλάσσης, μέχρι βάθους καὶ 500 ἀκόμη μέτρων. Εἶναι τὰ συνήθως ἐπὶ τῶν βράχων τῶν ἀκτῶν μαζὶ ἀπαντώμενα φύκη, φθάνοντα εἰς τὸν βόρειον μέχρι 5 ἑ-




Σχ. 169. Σάργασον



Σχ. 170. Κλάδος σαργάσου μὲ τοὺς πλωτῆράς του.

κατοστομέτρων. Ἀναλόγως τοῦ εἴδους των σχηματίζουν εἴτε ἐλάσματα εἴτε νήματα μὲ διακλαδώσεις (σχ. 172) γράμματος ἐρυθροῦ, λόγῳ τῆς ἐρυθρᾶς οὐσίας, τὴν δόποιαν ἔχουν. Αὕτη, φυκοερυθρίνη καλουμένη, χρησιμεύει, ἵνα διευκολύνῃ τὴν κάτωθέν της ὑπάρχουσαν χλωροφύλλην εἰς τὴν ἀπορρόφησιν τοῦ ἥλιακοῦ φωτός, τὸ δόποιον λόγῳ τοῦ βάθους, φθάνει ἐκεῖ μὲ τὰς ἐρυθρᾶς μόνον ἀκτινάς του.

Εἴδη τινὰ ἐρυθροφύκων ἔχουσι θάλλιον σκληρόν, διότι περιέχουσιν ἀσβέστιον. "Ἐν εἴδος ἔχει τὴν ἴδιότητα, τρωγόμενον, νὰ συντελῇ εἰς τὴν ἀποβολὴν ἐκ τοῦ Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής




Σχ. 171. Διάφορα εἴδη διατόμων

πεπτικοῦ συστήματος τοῦ ἀνθρώπου ἐνὸς εῖδους σκωλήκων, τῶν ἑλμύθων, οἵτινες κοινῶς λέγονται λεβίθες.

γ) Τὰ χλωροφύκη ἢ πράσινα φύκη. Ζῶσι καὶ εἰς τὴν θάλασσαν πολὺ πλησίον τῆς ἀκτῆς, κυρίως ὅμως εἰς τὰ γλυκέα καὶ ἡρεμοῦντα ὄδατα. Περιέχουσι μόνον χλωροφύλλην, καὶ διὰ τοῦτο τὸ χρῶμά των εἶναι πράσινον.

Τὰ ἐντὸς τῶν γλυκέων ὄδατων ζῶντα χλωροφύκη συσσωρεύονται εἰς τὴν ἐπιφάνειαν καὶ ἀποτελοῦσι πρασίνην σπουγγώδη μᾶξαν. Τοιοῦτον εἶδος εἶναι :

\***Η βορυχερία.** Αὕτη ἀποτελεῖται ἀπὸ νῆμα πράσινον (ώς ἐκ τῶν κοκκίνων τῆς χλωροφύλλης, τὰ ὅποια περιέχει), τὸ ὅποῖον εἶναι κατὰ




Σχ. 172. Διάφορα εῖδη ἐρυθροφυκῶν

τὸ μᾶλλον ἢ ἡττον διακλαδισμένον· εἰς τὸ τέλος ἐνὸς νεαροῦ νήματος ἐμφανίζεται ἐν χώρισμα (σχ. 173), διὰ τοῦ ὅποιου ἀπομονώνεται συμπυκνούμενη μία ποσότης πρωτόπλασματος. Τὸ πρωτόπλασμα ἔκφεύγει ἀπὸ ἐν μικρὸν ἀνοιγμά, σχηματιζόμενον ἐπὶ τῆς μεμβράνης τοῦ νεαροῦ νήματος, καὶ ἀποτελεῖ ἐν χονδρὸν σπόριον, τὸ ζωοσπόριον (σχ. 173 ζ) μὲ κινητὰ βλεφαρίδια, διὰ τῶν ὅποιων τοῦτο κινεῖται ἐπὶ τινα χρόνον ἐντὸς τοῦ ὄδατος. Μετά τινα χρόνον προσκολλᾶται εἰς τὶ μέρος (σχ. 173), 1) καὶ τότε κάνει τὰ κινητικὰ βλεφαρίδια, ἀποκτᾶ ἄγκιστρον, μὲ τὸ ὅποιον στερεοῦται καὶ αἰξάνεται δίδον νέον φυτὸν (2, 3).


Βλέπομεν ἐδῶ ὅτι ὁ πολλαπλασιασμὸς τῶν φυτῶν αὐτῶν γίνεται ἀπὸ αὐτὸ τοῦτο τὸ πρωτόπλασμά των, τὸ ὅποῖον ὅμως προηγουμένως συμπυκνοῦται. Μὲ τὴν συμπυκνωσιν αὐτὴν τὸ πρωτόπλασμα ἐνδυναμώνεται (ξανανεώνει)· ἀπὸ ἡλικιωμένον καὶ κουρασμένο ποὺ ἦτο, γίνεται νέον καὶ ζωηρόν, εἰς τρόπον ὅστε νὰ δύναται νὰ δώσῃ νέον φυτόν.

"Αλλο πράσινον φύκος είναι :

**Η σπυρογύρα.** Αποτελεῖται καὶ αὐτη ἀπὸ νήματα πράσινα. Δύο γειτονικὰ νήματα πλησιάζουν, ἐφάπτονται ἀλλήλων καὶ εἰς τὴν μεμβράνην τῶν δύο τούτων κυττάρων σχηματίζεται ἐν μικρὸν ἄνοιγμα, διὰ τοῦ ὅποιου τὸ πρωτόπλασμά των δύναται νὰ συγκοινωνῇ κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον τὸ πρωτόπλασμα ἔκαστου κυττάρου συμπυκνοῦται καὶ τὸ ἐν τούτων δέρχεται διὰ τῆς ὁπῆς τῆς συγκοινωνίας, συγχώνευσόμενον μὲ τὸ πρωτόπλασμα τοῦ ἄλλου κυττάρου (σχ. 174). Αποτελεῖται οὕτω, ἀπὸ τὴν συγχώνευσιν τῶν δύο πρωτόπλασμάτων, ἐν κυττάρον μὲ ἐνδυναμωμένον, ἀνανεωμένον πλέον πρωτόπλασμα· είναι τοῦτο ἐν ὡόν, προελθόν ἀπὸ τὴν σύζευξιν (συγχώνευσιν) δύο κυττάρων ὅμοιων. Απὸ τὸ ὡόν τοῦτο θὰ προέλθῃ νέον φυτόν.



Σχ. 173. Πολλαπλασιασμὸς τῆς βουκερίας: Ζ σχηματισμὸς τῶν ζωοσπορίων, 1, 2 καὶ 3 ἐκβλάστησις τούτων.




Σχ. 174. Σπυρογύρα: α ὡόν, β καὶ γ νέα φυτά.

Ἐὰν τὰς μάζας αὐτὰς παρατηρήσωμεν εἰς τὸ μικροσκόπιον, θὰ ἴδωμεν ὅτι ἀποτελοῦνται ἀπὸ κυανᾶς σφαίρας, αἴτινες είναι συνηρμοσμέναι ἐν εἶδει κομβολογίου καὶ ἄλλαι μὲν είναι μικρότεραι, ἄλλαι δὲ μεγαλύ-

"Απαντα τὰ ὡς ἄνω φύκη ἔχουσι μόνον χλωροφύλλην ὡς χρωστικὴν οὐσίαν καὶ διὰ τοῦτο καλοῦνται χλωροφύκη.

δ) Τὰ κυανᾶ φύκη ἢ κυανοφύκη. Πολλάκις μετὰ τὴν βροχὴν εύρισκομεν εἰς μὴ πεπατημένην γῆν ζελατινώδεις κυανωπάς μάζας.


τεραι, ὅλαι δὲ περιβάλλονται ἀπὸ μίαν ζελατινώδη ούσιαν ( σχ. 175 ). "Οταν τὸ ἔδαφος ἔγρανθῇ, αἱ μικραὶ αὐτὰ σφαῖραι, αἱ ὁποῖαι εἰναι κύτταρα, ἀποχωρίζονται καὶ αἱ περισσότεραι καταστρέφονται· παραμένουν αερικαὶ, αἱ μεγαλύτεραι, αἱ ὁποῖαι μεταβάλλονται εἰς σπόρια καὶ, ὑπὸ καταλλήλους συνθήκας, δίδουν νέα φυτά.



Σχ. 175. Κυανοοῦν φῦκος

μὲ τὸ μικροσκόπιον. "Εχουσι σχῆμα εἴτε ράβδων εὐθεῖῶν ( βακτηριῶν ), ἐξ οὗ ἔλαβον καὶ τὸ σηματικόν της φυτῆς, εἴτε ράβδων κεκαμμένων ἢ σπειροειδῶν, ὄπότε λέγονται σπειρίλλια, ἢ ἔχουσι σχῆμα κόκκων, δηλ. στρογγύλον καὶ ζῶσι μεμονωμένα, ἢ συνηνημένα κατὰ νήματα, ὄπότε λέγονται μικρόκοκκοι. "Εχομεν λοιπὸν βακτήρια, σπειρίλλια, μικροκόκκους. Τὸ μῆκος ὅλων αὐτῶν τῶν φυτῶν δὲν ὑπερβαίνει, δι' ἔκαστον ἐκ τούτων, τὰ δύο χιλιοστά τοῦ χιλιοστομέτρου.

Τὰ μικροσκοπικὰ αὐτὰ φυτὰ πολλαπλασιάζονται εἴτε μὲ σπόρια εἴτε καὶ δι' ἀπλῆς διαιρέσεως. Δι' ἀπλῆς διαιρέσεως πολλαπλασιάζονται, ὅσα εύρισκονται ὑπὸ εύνοϊκάς συνθήκας, δηλαδὴ κατάλληλον περιβάλλον καὶ ἀρκετὴν τροφήν· τότε χωρίζονται εἰς δύο τεμάχια καὶ ἔκαστον τεμάχιον δίδει νέον φυτόν. "Αν δημάρτιος εύρισκωνται εἰς ξηρὸν μέρος καὶ στεροῦνται τροφῆς, τότε τὸ σῶμά των συσφαιροῦται καὶ ἀποτελεῖ σπόριον, τὸ ὁποῖον ἀντέχει καὶ ὑπὸ τὰς δυσμενεστέρας συνθήκας καὶ δίδει νέον φυτόν, ὅταν εὑρεθῇ ὑπὸ συνθήκας καταλλήλους διὰ τὴν ζωήν του. Τὸ σπόριον τοῦτο, πᾶπτον εἰς τὸ ἔδαφος, ἀνακινηγνύεται μὲ κονιορότον, παρασυρόμενον δὲ μετ'




Σχ. 176. Βάκιλλος τοῦ ἄνθρακος: 1 βάκιλλος, 2 ἐρυθρὰ αἷμοσφαίρια.


αύτοῦ ύπὸ τοῦ ἀνέμου διαδίδεται παντοῦ. Διὰ τοῦτο σπόρια βακτηρίων ὑπάρχουν πανταχοῦ εἰς τὸν ἀέρα, τὸ ὕδωρ, τὸ χῶμα, τὰς τροφάς. Τὰ βακτηρία εἰναι ἔκεινα, ποὺ κάμνουν τὰς δργανικὰς οὐσίας νὰ σήπωνται ἢ προκαλοῦν τὴν μεταβολὴν μερικῶν ύγρῶν, π.χ. κάμνουν τὸ γάλα νὰ ξινίζῃ, μεταβάλλουν τὸν οἶνον εἰς οξος κ.λ.π.

**Τὰ παθογόνα βακτήρια** ή βάκιλλοι. Πολλὰ βακτηρία ή βάκιλλοι εἰναι παθογόνα. Εἰς ταῦτα δέρθονται αἱ μεταδοτικαὶ νόσοι, ὅπως π.χ. ὁ τυφοειδῆς πυρετὸς (σχ. 177, 1), ἡ χολέρα (σχ. 177, 2), ἡ πνευμονία

(σχ. 178, 1), ἡ φυματίωσις (βάκιλλοι τοῦ Κώχ, σχ. 179). Ἀπὸ τὰς ἀσθενεῖας αὐτὰς προφύλασσόμεθα ἄν, ὅταν ὑπάρχουν ἐπιδημίαι, βράζωμεν καλῶς καὶ μάλιστα ύπὸ πίεσιν (διότι τὰ σπόρια τῶν βακτηρίων ἀντέχουν καὶ εἰς τὴν θερμοκρασίαν τῶν  $120^{\circ}$  K.) τὰς τροφάς, τὸ



Σχ. 177. Μικρόβια: 1 τυφοειδοῦς πυρετοῦ, 2 χολέρας.



Σχ. 178. Μικρόβια: 1 πνευμονίας, 2 μικρόβια προκαλοῦντα τὰς φλεγμονάς (ἀφορμίζουν μίαν πληγήν).



Σχ. 179. Βάκιλλος τοῦ Κώχ (φυματιώσεως)

ὕδωρ, τὰ μαγειρικὰ σκεύη καὶ ἀπολυμαίνωμεν τὰ μέρη, ὅπου ὑπάρχουν ἀσθενεῖς, διὰ κατάλληλων βακτηριοκτόνων ύγρῶν, ὅπότε φονεύονται τὰ βακτηρία.

Αἱ ήλιαικαὶ ἀκτῖνες εἰναι ἐπίσης ἀπολυμαντικὸν ἄριστον, φονεύουσαι τὰ βακτηρία ἐντὸς ἐλαχίστων ώρῶν διὰ τοῦτο εἰναι ἀπαραίτητον, ὅπως αὗται εἰσέρχωνται ἐντὸς τῶν οἰκιῶν μας, ύγιεινοτέρα δὲ κατοικία

είναι έκείνη ήτις δέχεται έπι περισσότερον χρόνον τής ήμέρας τάς ήλιακάς άκτινας. "Οποιο σπίτι δέν τὸ βλέπει ὁ ἥλιος, τὸ βλέπει ὁ γιατρός, λέγει μιὰ λαϊκὴ παροιμία.

Είδη τινά βακτηρίων συμβιοῦσι μετὰ τῶν ψυχανθῶν ( λούπινα, ρεβίθια, φασόλια κ.λ.π. ), ζῶντα εἰς τὰς ρίζας αὐτῶν. Τὰ βακτήρια ταῦτα, δύναμαζόμενα φιλοβακτήρια τῶν ψυχανθῶν, ἀφομοιοῦσι, καθὼς εἴπομεν εἰς πò περὶ ψυχανθῶν κεφάλαιον ( σελ. 46 ), ἀπ' εὐθείας τὸ ἄζωτον τῆς ἀτμοσφαίρας, σχηματίζοντα εἰς τὰς ρίζας τῶν φυτῶν τούτων ἔξογκώματα ( φυμάτια ). Ἐκεῖ ἐναποθηκεύεται ἄζωτον ἀπὸ τὰ βακτήρια αὐτά, τὸ ὅποιον παραλαμβάνει τὸ φυτόν, ὅταν τὸ χρειασθῇ διὰ νὰ κάμῃ τὰ σπέρματά του.

Τὰ φύκη ὅλων τῶν χρωματισμῶν, τὰ ὅποια εἴδομεν ἀνωτέρω ( ἑκτὸς ἀπὸ τὰ βακτήρια ) παρουσιάζουν κοινὰ χαρακτηριστικά :

Τὸ σῶμά των ἀποτελεῖται ἀπὸ ἐλάσματα ἢ νήματα, τὰ ὅποια καλοῦμεν θάλλιον.

Είναι λοιπὸν φυτά μὲθάλλιον ( χωρὶς ρίζαν, βλαστόν, φύλλα, κ.λ.π. ). Περιέχουσι χλωροφύλλην, ἡ ὅποια εἰς πολλὰ ἐξ αὐτῶν, καλύπτεται ὑπὸ δευτέρας χρωστικῆς ούσιας, ἡτις διευκολύνει τὴν χλωροφύλλην εἰς τὴν ἀπορρόφησιν τοῦ ἡλιακοῦ φωτὸς ( ἀφομοίωσιν ). Πολλαπλασιάζονται διὰ σπορίων, ὡῶν, ἢ διγοτομήσεως ( βακτήρια, κ.λ.π. ) καὶ είναι ὑδρόβια ἢ ζῶσιν εἰς πολὺ ὑγρὰ μέρη. Εἰς τὰ κυανᾶ φύκη κατατάσσονται καὶ τὰ μονοκύτταρα βακτήρια.

Συνενοῦνται ὑπὸ τὸ ὄνομα τῶν φυκῶν.

### Φυτικὸν κύτταρον

Εἰς τὰ φύκη συνηντήσαμεν φυτά, τὰ βακτήρια, τὰ ὅποια καλοῦμεν μονοκύτταρα ἢ δργανισμούς μονοκυττάρους, διότι ἀποτελοῦνται ἀπὸ ἐν μόνον κύτταρον.

Τί είναι ὅμως τὸ κύτταρον καὶ ἀπὸ ποῖα μέρη ἀποτελεῖται τοῦτο ;

Τὸ κύτταρον είναι ἡ ἀρχὴ καὶ ἡ βάσις κάθε ζωῆς καὶ δὲν δύναται νὰ νοηθῇ ζωὴ χωρὶς κύτταρα.

Τὸ σῶμα, τόσον τῶν ζφων, δσον καὶ τῶν φυτῶν, ἀποτελεῖται ἀπὸ τοιαῦτα κύτταρα ( ζωικὰ κύτταρα διὰ τὰ ζῶα, φυτικὰ διὰ τὰ φυτά ), τὰ ὅποια παρουσιάζουν διαφοράς τινας μεταξύ των.

Εἰς κάθε φυτικὸν κύτταρον διακρίνομεν, ὅταν παρατηρήσωμεν μὲν μικροσκόπιον, ἔξωτερικῶς μίαν μεμβράνην, ἡτις τὸ περιβάλλει, τὴν λεγομένην κυτταρικὴν μεμβράνην (σχ. 180, 3). Αὕτη διαποτίζεται ἀπὸ μίαν ἀνθεκτικὴν οὐσίαν, τὴν κυτταρίνην· ἡ ἀπὸ κυτταρίνην μεμβράνη εἶναι χαρακτηριστικὴ τῶν φυτικῶν κυττάρων καὶ τὰ κάμνει νὰ διακρίνωνται ἀπὸ τὰ ζωϊκὰ κύτταρα, τὰ ὅποια δὲν ἔχουσι περίβλημα ἐκ κυτταρίνης. Εἶναι ἡ οὐσία, ἡτις παραμένει καὶ μετὰ τὸν θάνατον τοῦ κυττάρου· αἱ ἵνες τοῦ βάμβακος, τοῦ λίνου, τὰ λινὰ καὶ βαμβακερὰ ὄφασματα, ὁ χάρτης κ.λ.π., συνίστανται κυρίως ἀπὸ τὴν οὐσίαν αὐτῆν.

Ἐσωτερικῶς τῆς κυτταρικῆς μεμβράνης εὑρίσκομεν μίαν πηκτωματώδη οὐσίαν προσομοίαν πρὸς τὸ λεύκωμα (ἀσπράδι) τοῦ ὡσοῦ, τὴν ὅποιαν λέγομεν πρωτόπλασμα (σχ. 180, 1). Τοῦτο εἶναι τὸ οὐσιωδέστερον μέρος τοῦ κυττάρου καὶ ἀποτελεῖται ἀπὸ ἄζωτον, ὄντρογόνον, δέξιγόνον, ἀνθρακα καὶ μικρὰν ποσότητα θείου καὶ φωσφόρου. Ἐντὸς τοῦ πρωτόπλασματος τούτου διαχρίνομεν ἐν μέρος ἀπὸ πυκνότερον πρωτόπλασμα, τὸν πυρῆνα (2).

Τὸ κύτταρον δανείζεται συνεχῶς ἀπὸ τὸν ἔξωτερικὸν κόσμον τὰς οὐσίας, αἱ ὅποιαι τοῦ εἶναι ἀναγκαῖαι διὰ νὰ ζήσῃ καὶ αὔξηθῇ. Αἱ οὐσίαι αὗται διαλελυμέναι μέσα εἰς τὸ ὄντρο, περνοῦν ἀπὸ τὴν μεμβράνην τοῦ κυττάρου εἰς τὸ πρωτόπλασμά του καὶ τὸ κύτταρον οὕτω τρεφόμενον αὔξανται μέχρις ἐνὸς ὥρισμένου ὅρίου, ὅπότε πολλαπλασιάζεται.

Ἡ αὔξησις καὶ ὁ πολλαπλασιασμὸς ὅλων τῶν κυττάρων, εἰς τὰ φυτὰ τὰ ἀποτελούμενα ἐκ περισσοτέρων τοῦ ἐνὸς κυττάρων, συνεπάγεται καὶ τὴν αὔξησιν τοῦ φυτοῦ.

Εἰς τὰ μονοκύτταρα φυτὰ τὸ αὐτὸ κύτταρον κάμνει ὅλας τὰς λειτουργίας τὰς σχετικὰς μὲ τὴν διατροφὴν του, τὴν αὔξησίν του καὶ τὴν ἀναπαραγωγὴν του. Εἴς τοὺς πολυκυττάρους ὅμως ὄργανισμοὺς παρατηρεῖται καταμερισμὸς τῆς ἐργασίας μεταξὺ τῶν διαφόρων κυττάρων· δηλαδὴ δὲλλαι ὄμάδες ὄμοιων κυττάρων ἀναλαμβάνουν τὴν διατροφὴν τοῦ φυτοῦ (ἀφομοίωσιν, μεταφορὰν θρεπτικοῦ χυμοῦ κ.λ.π.) καὶ ἀλλαι




Σχ. 180. Κύτταρον. 1 πρωτόπλασμα, 2 πυρήνη, 3 μεμβράνη τοῦ κυττάρου.

τὴν ἀναπαραγωγήν. Αἱ ὁμάδες αὐταὶ τῶν ὁμοίων κυττάρων σχηματίζουσι τὰ διάφορα δργανα τοῦ φυτοῦ. "Οσον μεγαλύτερος εἶναι ὁ μεταξὺ τῶν κυττάρων καταμερισμὸς τῆς ἐργασίας, τόσον καὶ τὸ φυτὸν εἶναι τελειότερον καὶ τὰ δργανά του πολυπλοκώτερα.

## II. ΜΥΚΗΤΕΣ

"Πάρχουσι πολλὰ εἴδη μυκήτων· ἀπαντα στεροῦνται χλωροφύλλης καὶ διὰ τοῦτο δὲν δύνανται νὰ ἀφομοιώσουν, δηλαδὴ νὰ λάβουν τὸν ἄνθρακα ἐκ τοῦ διοξειδίου τοῦ ἄνθρακος τῆς ἀτμοσφαίρας καὶ νὰ τρα-



Σχ. 181. Πολλαπλασιασμὸς τοῦ μύκητος.

1 πῦλος καὶ 2 τὸ κάτω μέρος τοῦ πύλου τοῦ μύκητος εἰς τὸ δόποιν σχηματίζονται τὰ σπόρια, 3 ὁ ποῦς καὶ 3 τὸ μυκήλλιον τοῦ μύκητος, 5 τὰ σπόρια πίπτοντα ἀπὸ τὸ κάτω μέρος τοῦ πύλου τοῦ μύκητος εἰς τὸ ἔδαφος, 6 ἐν σπόριον βλαστάνον, 8 καὶ 9 νέοι μύκητες βλαστάνοντες ἐκ τοῦ μυκηλλίου.

φοῦν. Πρέπει, ἐπομένως νὰ εὔρουν δργανικὰς οὐσίας ἔτοιμους καὶ δι' αὐτὸ ζῶσιν εἴτε ἐπὶ δργανικῶν οὐσιῶν σηπομένων, ὅτε λέγονται σαπρόφυτα, εἴτε ἐπὶ ζώντων (ζώων, ἡ φυτῶν), ὅπότε λέγονται παράσιτα.

Οἱ βασιδιομύκητες. "Ἐνας ἀπὸ τοὺς συνηθεστέρους ἐκ τῶν μυκήτων εἶναι τὸ ἀγαρικὸν τὸ πεδινὸν (σχ. 181).

Φύεται παντοῦ ὅπου ὑπάρχει κάπορος, ἡ φυτικὴ οὐσία ἐν ἀποσυνθέσει. Παρουσιάζει ἔξω τοῦ γχώματος ἔνα στῦλον, εἰς τὸ ἄνω μέρος τοῦ ὑπάρχει κάλυμμα ἐν εἶδει πύλου. "Αν κάτωθεν τοῦ στύλου ἀνασκάψωμεν τὸ γχώμα, θὰ παρατηρήσωμεν πολυάριθμα καὶ πολύπλοκα νήματα λευκά, τὰ ὅποια ἀποτελοῦσι τὸ λεγόμενον μυκήλλιον. Τὰ νήματα

ταῦτα χρησιμεύουσι διὰ νὰ τρέφωσι τὸ ὑπὲρ τὸ ἔδαφος μέρος τοῦ μύκητος, τὸ λεγόμενον καρπικὸν σῶμα, διὰ τοῦ ὅποίου τὸ φυτὸν πολλαπλασιάζεται.

Διότι, ἃν παρατηρήσωμεν τὴν κάτω ἐπιφάνειαν τοῦ πίλου, εὑρίσκομεν πολυάριθμα ἀκτινοειδῶς διατεταγμένα ἐλάσματα ( μεμβράνας ), κατ’ ἀρχὰς ριδίνου χρώματος, ἀργότερον μελανοῦ. "Οταν ὁ μύκης εἶναι μικρός, ταῦτα εἶναι κεκαλυμμένα διὰ μᾶς μεμβράνης, ητις ἐνώνει τὸν στῦλον μὲ τὰ χείλη τοῦ πίλου καὶ ἡ ὅποια ἀργότερον ἀποσύρεται. 'Ἐὰν τὰ ἐλάσματα ταῦτα τὰ ἔξετάσωμεν εἰς τὸ μικροσκόπιον, ὅταν λάβωσι χρῶμα μέλαν, θὰ ἴδωμεν ὅτι φέρουσιν ἐπὶ τῶν νημάτων ἔξογκώματα, βασίδια καλούμενα, ἔκαστον τῶν ὅποίων περατοῦται εἰς δύο σπόρια. 'Απὸ τὰ βασίδια ταῦτα, τὰ φέροντα τὰ σπόρια, οἱ μύκητες οὗτοι ἐκλήθησαν βασιδιομύκητες.

Τὰ σπόρια ταῦτα, τὰ ὅποῖα εὐκόλως δυνάμεθα νὰ συλλέξωμεν τινάσσουντες τὸν πῖλον τοῦ μύκητος ἐπὶ λευκοῦ χάρτου, πίπτοντα εἰς τὸ ἔδαφος βλαστάνουσι καὶ δίδουσιν εἶδος νημάτων, ἐκ τῶν ὅποίων κατόπιν παράγεται τὸ μυκήλιον. 'Ἐκ τοῦ μυκήλιον παράγεται κατόπιν τὸ ὑπεράνω τοῦ ἔδαφους μέρος τοῦ φυτοῦ, τὸ ὅποῖον φέρει τοὺς καρποὺς ( δηλαδὴ τὰ σπόρια ) καὶ διὰ τοῦτο λέγεται καρπικὸν σῶμα. "Οταν τὰ σπέρματα ὡριμάσουν, τὸ καρπικὸν σῶμα ἔγραίνεται ( ἐντὸς δλίγων ἐθδομάδων ), τὸ μυκήλιον ὅμως παραμένει καὶ δύναται νὰ δώσῃ νέον καρπικὸν σῶμα. Τὸ κυρίως φυτὸν εἶναι δηλ. τὸ μυκήλιον, τὸ δὲ καρπικὸν σῶμα χρησιμεύει, ἵνα φέρῃ καὶ προφυλάσσῃ τὰ σπέρματα, ἔγραινόμενον καὶ ἔξαρφανιζόμενον εὐθύնς ὡς ταῦτα ὡριμάσουν.

Εἰς τὴν Ἐλλάδα τὸ ἀγαρικὸν τὸ πεδινὸν εἶναι αὐτοφυές, καλλιεργεῖται δὲ ἐλάχιστα εἰς ἄλλα ὅμως μέρη γίνεται ἐντατικὴ καλλιέργεια του, διὰ τὴν εὐγενεστὸν τροφήν, τὴν ὅποίαν παρέχει. Καλλιεργεῖται εἰς εἰδικῶς παρασκευαζόμενα μέρη, μυκητοτροφεῖα καλούμενα, εἰς τὰ ὅποῖα διατηρεῖται θερμοκρασία μεταξὺ  $10^{\circ}$  ἕως  $25^{\circ}$  K., κατάλληλος διὰ νὰ εύδοκιμήσῃ τὸ φυτόν. Εἰς τὰ μυκητοτροφεῖα θέτουσι κόπρον, ίδιως ἵππων, κατὰ σωρούς, καὶ ἐπὶ τούτων σπείρουσι μύκητας καὶ συλλέγουν τὰ καρπικὰ σώματα.

"Ἐν εἶδος ἀγαρικοῦ εἶναι τὸ κοινῶς λεγόμενον **ὔσκα**, τὸ δόποιον εὐρίσκομεν ἐπὶ τοῦ κορμοῦ διαφύρων δένδρων, ίδιως μορεῶν.

'Εκτὸς τῶν ἀνωτέρω εἰδῶν μυκήτων ὑπάρχουσι καὶ πολλὰ ἄλλα

όμοια είδη, ἐκ τῶν ὅποιων ἄλλα μὲν τρώγονται, ἄλλα δὲ εἶναι δηλητηριώδη (σχ. 182). Ή διάκρισίς των εἶναι δύσκολος καὶ χρειάζεται



**Σχ. 182. Μύκητες.** Ὁ πρῶτος μὴ δηλητηριώδης,  
ὅ δεύτερος δηλητηριώδης.

**Σχ. 183. Βωλίτης  
δέδωδιμος.**

μεγάλην ἐμπειρίαν, διότι ἔκαστον εἶδος ἔχει ἀντίστοιχον ἄλλο, σχεδὸν ὅμοιον, δηλητηριώδες, ἀπὸ τὸ ὅποῖον δυσκόλως διακρίνεται.



**Σχ. 184. Φῦλλον ἀμπέλου καὶ σταφύλη προσβεβλημένα ἀπὸ ωίδιουν.**

**Οἱ ἀσκομύκητες.** Οἱ μύκητες οὗτοι φέρουσι τὰ σπόρια των εἰς ἔξογκωμάτα ὄμοια πρὸς ἀσκόν, ἐξ οὗ καὶ ἡ ὄνομασία των.

Τοιοῦτοι μύκητες εἶναι :

**‘Ο βωλίτης δέδωδιμος** (σχ. 183). Εἶναι ὁ πλέον εὐγευστος ἀπὸ τοὺς μύκητας καὶ φύεται τὴν ἄνοιξιν.

**Τὸ ωίδιον τῆς ἀμπέλου.** Ζῆ παρασιτικῶς εἰς τὴν ἀμπέλον· τὰ προσβεβλημένα φύλλα τῆς ἀμπέλου, τὰ νεαρὰ ιδίως, σχηματίζουν λευκάς ἢ τεφράς κηλῖδας, αἱ δὲ ράγες προσβαλλόμεναι ἀνοίγουν πρὶν ὠριμάσουν καὶ καταστρέφονται (σχ. 184). Καταπολεμεῖται διὰ θειώσεως (θειαρίσιματος).

Εἰς τοὺς ἀσκομύκητας κατατάσσουν καὶ τοὺς Σχιζομύκητας. Οὗ-

τοι είναι οι μύκητες, οίτινες προκαλοῦσι τὰς λεγομένας ζυμώσεις· τοιούτοι είναι:

**‘Ο σακχαρομύκης δέλλειψοειδής.** Οὗτος προκαλεῖ τὴν ζύμωσιν τοῦ γλεύκους (μούστου) καὶ τὴν μεταβολὴν του εἰς οἶνον (σχ. 186).

**‘Ο σακχαρομύκης τοῦ ζύθου.** Μετατρέπει τὸ σάκχαρον τῆς βύνης (ἥτοι τῆς εἰδικῶς διὰ τὴν κατασκευὴν ζύθου παρεσκευασμένης



Σχ. 185. Μύκης εύ-ρισκόμενος εἰς τὴν μαγιάν (προζύμι).



Σχ. 186.  
Σακχαρομύκης δέλλειψοειδής.  
τοῦ ζύθου.  
(ὅπως φαίνεται εἰς τὸ μικροσκόπιον)

κριθῆς) εἰς οἰνόπνευμα, καὶ τὸ πρὶν σακχαροῦχον ὑγρὸν εἰς ζύθον (σχ. 186).

“Ομοιος μύκης εύρισκεται εἰς τὴν μαγιάν ἢ προζύμι, τὸ ὄποιον γρηγοριμοποιοῦν κατὰ τὴν ζύμωσιν τοῦ ἀλεύρου εἰς τὴν ἀρτοποιίαν (σχ. 185).


Μερικοὶ ἀπὸ τοὺς μικροὺς αὐτοὺς μύκητας, οίτινες λέγονται σχιζομύκητες, διέτι πολλαπλασιάζονται διὰ μερισμοῦ ἢ σχίσεως, εύρισκονται εἰς διάφορα ὅργανα φυτῶν, ζώων καὶ τοῦ ἀνθρώπου, προκαλοῦντες διαφόρους ἀσθενείας. Οἱ μύκητες οὗτοι ἔχουσι τὰς αὐτὰς ίκανότητας, τὰς ὄποιας ἔχουσι καὶ τὰ βακτήρια, νὰ μεταβάλλουν δηλ. διαφόρους ὅργανηκὰς οὐσίας εἰς ἄλλας τοιαύτας οὐσίας καὶ νὰ προκαλοῦν ἀσθενείας. Διὰ τοῦτο οἱ σχιζομύκητες καὶ τὰ βακτήρια, φυτὰ κατώτερα, μονοκύτταρα, χωρὶς χλωροφύλλην καὶ τόσον μικρά, ὥστε ἡ ἐξέτασίς των ν' ἀπαιτῇ τὴν βούθειαν τοῦ μικροσκοπίου, μαζὶ μὲν μερικὴ κατώτερα ζῶα, τὰ ὄποια ἔχουν τὰς αὐτὰς ίκανότητας καὶ τὸ αὐτὸν μέγεθος, λέγονται *Μικρόβια*. Τὴν σπουδὴν τῶν μικροβίων ἔχει ἀνάλαβει ιδίᾳ ἐπιστήμη, ἡ *Μικροβιολογία*, ἥτις παρέχει σπουδαίας ὑπηρεσίας εἰς τὸν ἀνθρωπὸν.

**Οι ωομύκητες.** Μύκητες επίσης είναι καὶ οἱ διάφοροι εὐρῶτες (κν. μούχλες), κυριώτεροι τῶν ὄποιων είναι :

**‘Ο εύρως ὁ λευκός.** “Αν ὑγρὸν ἄρτον ἀφήσωμεν ἐκτεθειμένον ἐπὶ χρονικόν τι διάστημα εἰς τὸν ἀέρα, θὰ ἔδωμεν τὴν ἐπιφάνειάν του καλυπτομένην ἀπὸ λευκὰ νήματα, χιονώδη, ἀτινα είναι τὸ μυκήλιον τοῦ εὐρῶτος τοῦ λευκοῦ (σχ. 187). Τὸ αὐτὸ παρατηρεῖται καὶ εἰς ἄλλα τρόφιμα καὶ λέγομεν τότε ὅτι τὰ τρόφιμα μονχλιάζουν.

**‘Ο πράσινος εύρως,** ὅστις ἀναπτύσσεται εἰς τὴν ἐπιφάνειαν τῶν γλυκισμάτων.

“Ἄλλοι εὐρῶτες ἀναπτύσσονται εἰς τὸ γάλα, τὸν τυρόν, τὰ διάφορα φυτά κ.λ.π., ὅπως είναι ὁ περονόσπορος τῆς ἀμπέλου, ὅστις ζῆ ἐπὶ



Σχ. 187. Λευκός εύρως τοῦ ἄρτου. (μούχλα τοῦ φωμιοῦ).

α σπόρια, β ἐκβλάστησις τῶν σπορίων, γ σποριάγγειον,  
δ σποριάγγειον πλήρες σπορίων, ε μυκήλιον. ζ σποριάγγειον.

τῶν φύλλων τῆς ἀμπέλου, καὶ ἄλλα εἰδῆ τούτου, τὰ ὄποια ζοῦν ἐπὶ τῶν φύλλων τοῦ γεωμήλου, τῆς κράμβης, τοῦ μαρουλιοῦ καὶ ἄλλων ἀκόμη φυτῶν.


Οἱ εὐρῶτες πολλαπλασιάζονται ὡς ἔξης :

‘Τὸ εύνοικὰς συνθήκας ἐπὶ τῶν νημάτων τῶν σγηματίζονται σποριάγγεια πλήρη σπορίων (σχ. 188), ἀπὸ ἔκαστον τῶν ὄποιων θὰ προέλθῃ νέος μύκης. “Οταν δέμως αἱ συνθῆκαι δὲν είναι εύνοικαι, τότε τὰ ἄκρα δύο γειτονικῶν νημάτων τοῦ εὐρῶτος χωρίζονται διὰ διαφράγματος εἰς δύο τεμάχια ἔκαστον. Μόλις χωρισθῶσι τὰ νήματα πλησιάζουσιν, ἔρχονται εἰς ἐπαφήν καὶ τὰ εἰς τὰ ἄκρα τῶν τεμάχια ἐνώνονται ἀνὰ δύο (σχ.

189). Ούτω διὰ τῆς συγχωνεύσεώς των παράγονται δάκτυλα περιβάλλονται ἔξωτερικῶς μὲ χονδρήν μεμβράνην καὶ ἀντέχουν εἰς τὴν ἔηρασίαν καὶ τὰς δυσμενεῖς συνθήκας. "Οταν δόμας εὔρουν εύνοικάς συνθήκας, βλαστάνουν, δίδοντα ἔκαστον νέον μύκητα. Οἱ μύκητες οὗτοι, ἐπειδὴ πολλαπλασιάζονται δι' ὕδων, λέγονται Ὡρομύκητες.

Οἱ μύκητες παρουσιάζουν κοινὰ χαρακτηριστικά:

Δὲν διακρίνομεν εἰς αὐτοὺς ρίζαν, βλαστόν, φύλλα κ.λ.π. "Ολον τὸ σῶμά των ἀποτελεῖται ἀπὸ νήματα ἢ πλάκας (μυκήλιον, καρπικὸν



Σχ. 188. Σποριάγγειον τοῦ λευκοῦ εύρωτος τοῦ ἄρτου. Σπόρια, ἔκαστον τῶν ὅποιῶν, πῖπτον εἰς τὸ ἔδαφος, δίδει νέον μύκητα.

Η πούς τοῦ σποριάγγειού  
Ρ νήματα τοῦ μύκητος.

Σχ. 189. Πολλαπλασιασμὸς τοῦ λευκοῦ εύρωτος τοῦ ἄρτου: Α εἰς τὸ ἀκρον δύο νημάτων (τῶν 1 καὶ 2) ἀπομονοῦνται δύο κύτταρα τὸ α καὶ α'. Β τὰ δύο ταῦτα κύτταρα συγχωνεύμενα δίδουν τὸ ὄντο O, τὸ δόπιον πῖπτον εἰς τὸ ἔδαφος, δίδει, ὅταν εὕρῃ εύνοικάς συνθήκας, νέον μύκητα.


σῶμα). Στεροῦνται γλωροφύλλης, ἐπομένως δὲν δύνανται νὰ ἀφομοιώσουν ἀλλὰ ζοῦν εἴτε ὡς σαπρόφυτα, λαμβάνουν δηλ. ἐτοίμους ὄργανικὰς οὔσιας ἀπὸ ὄργανικὰ σώματα ἐν σήψει διατελοῦντα, εἴτε ζοῦν ἐπὶ ἄλλων ὄργανικῶν ὄντων, ὡς παράσιτα, τρεφόμενα ὑπὸ τούτων.

Πολλοὶ μύκητες παρουσιάζουσι μικροβιοκτόνους ιδιότητας καὶ χρησιμοποιοῦνται διὰ τὴν παρασκευὴν φαρμάκων, διὰ τῶν ὅποιων προλαμβάνονται, καταπολεμοῦνται καὶ θεραπεύονται διάφοροι νόσοι, διειλόμενοι εἰς παθογόνα μικρόβια. Τοιαῦτα φάρμακα εἶναι ἡ Πενικιλίνη,

παραχθεῖσα ( τὸ 1939 ) ἀπὸ τὸν "Αγγλον καθηγητὴν Φλέμινγκ ἐκ μυκήτων τοῦ εἰδους τῶν εὐρώτων ἀπὸ ἄλλα εἴδη μυκήτων παρασκευάζονται ἡ στρεπτομυκίνη, ἡ χρυσομυκίνη, ἡ τερραμυκίνη κ.λ.π., φάρμακα καταστάντα χρησιμώτατα σήμερον, διότι διὰ τῆς χρήσεώς των ἀποφεύγουσι τὸν θάνατον, τὸν προκαλούμενον ἀπὸ νόσους δρειλομένας εἰς παθογόνα μικρόβια, πλεῖστοι ἀνθρωποι ἐτησίως. Τὰ φάρμακα ταῦτα λέγονται γενικῶς ἀντιβιωτικά.

### III. ΛΕΙΧΗΝΕΣ

Πολυάριθμα εἰδη λειχήνων τὰ εύρισκομεν ζῶντα ἐπὶ ξηρῶν ξύλων, ἐπὶ κλάδων καὶ κορμῶν δένδρων ( ίδιως δένδρων ποὺ ζοῦν εἰς ψυχρὰ μέρη, τὰ ὅποια οὔτως οἱ λειχῆνες τὰ προστατεύουν ἀπὸ τὸ ψῦχος ), ἐπὶ τοῦ ἐδάφους τῶν δασῶν, εἰς τοὺς τοίχους, ἀκόμη καὶ ἐπάνω εἰς καταξήρους βράχους. Εἰς τὰ βόρεια μέρη οἱ λειχῆνες ἀποτελοῦν τὴν μόνην φυτείαν ὀλοκλήρων ἐκτάσεων καὶ τὴν μοναδικὴν τροφὴν τῶν ταράνδων, ποὺ ζοῦν ἔκει.



Σχ. 190. Διάφορα εἰδη λειχήνων

Τὰ νήματα ταῦτα εἶναι μύκητες, τὰ δὲ ἐλάσματα, ἢ σωλῆνες, εἶναι φύκη· δηλαδὴ εἰς κάθε λειχῆνα ἔχομεν συμβίωσιν ἐνὸς φύκους καὶ ἐνὸς μύκητος. Ἀπὸ τὴν συμβίωσιν αὐτὴν ἀμφότερα τὰ φυτὰ ἔχουσι κοινὰ δρέλη· διότι ὁ μὲν μύκης στερεώνει τὸ φύκος καὶ ἀπορροφᾷ ὄδωρον καὶ ἄλατα ἀπὸ τὸ ἐδάφος, τὸ δὲ φύκος ἀφομοιοῦ μὲ τὴν χλωροφύλλην του. Οὕτω βιογθοῦσιν ἄλληλα εἰς τὴν διατροφὴν των.

Τὰ φύκη, οἱ μύκητες καὶ οἱ λειχῆνες παρουσιάζουν κοινὰ χαρακτηριστικά :

Δὲν διακρίνομεν εἰς αὐτὰ ρίζαν, βλαστὸν καὶ φύλλα, ἀλλὰ τὸ σῶμά των ἀποτελεῖται ἀπὸ νήματα, ἐλάσματα ἢ σωλῆνας, τὰ ὅποια λέγονται θάλλια· διὰ τοῦτο εἰς τοὺς μύκητας, τὰ φύκη καὶ τοὺς λειχῆνας δίδεται τὸ ὄνομα τῶν φυτῶν μὲν θάλλιον ἢ Θαλλοφύτων.

### ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΙΣ

#### Φυτὰ μὲ θάλλοις ἢ θαλλόφυτα

Τάξεις	Κοινὰ χαρακτηριστικά	Τ' ποδιαίρεσις
Φύκη	Δὲν παρουσιάζουν ρίζας, βλαστὸν καὶ φύλλα, ἀλλὰ τὸ σῶμά των σύγκειται ἀπὸ θάλλοιν.	Θαλλόφυτα
Μύκητες		
Λειχῆνες		

### ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΙΣ ΤΩΝ 2ας 3ης ΚΑΙ 4ης ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΕΩΝ ΦΥΤΑ ΚΡΥΠΤΟΓΑΜΑ

Τάξεις	Τ' ποδιαίρεσις
I. Πτέριδες 2. Ἰππονορίδες 3. Αυκοπόδια	2α 'Τποδιαίρεσις : Κρυπτόγαμα φυτὰ χωρὶς ἄνθη, ρίζαν καὶ ἀγγεῖα ἢ πτεριδόφυτα
Βρύα	3η 'Τποδιαίρεσις : Κρυπτόγαμα φυτὰ χωρὶς ἄνθη, ἀλλὰ μὲ ρίζαν καὶ ἀγγεῖα
I. Φύκη II. Μύκητες III. Λειχῆνες	4η 'Τποδιαίρεσις : Φυτὰ μὲ θάλλοιν ἢ θαλλόφυτα

### Φ Υ Τ Α

Αἱ τέσσαρες μεγάλαι ὑποδιαιρέσεις τῶν φυτῶν, τὰς ὅποιας ἔξητάσαμεν, δῆλον ἡ τῶν Φανερογάμων, ἢ τῶν Κρυπτογάμων μὲ ρίζας καὶ

ἀγγεῖα ἡ Πτεριδοφύτων, ἡ τῶν Βρύσων καὶ ἡ τῶν Θαλλοφύτων παρουσιάζουσι κοινὰ χαρακτηριστικά :

Τὸ σῶμά των ἀποτελεῖται ἀπὸ κύτταρα ἔχοντα ἐξωτερικὸν περίβλημα ἀπὸ κυτταρίνην. Ἡ κυτταρίνη αὕτη δὲν ἐμποδίζει μὲν τὴν δι' αὐτῆς δίοδον τοῦ ὕδατος μὲ τὰ ἄλατα καὶ τὸν θρεπτικὸν χυμόν, ἐμποδίζει δὲν φυτὸν νὰ μεταβῇ ( ὅπως τὰ ζῷα ) ἀπὸ τόπου εἰς τόπον πρὸς ἀναζητήσιν τῆς τροφῆς του. Οὕτω τὸ φυτὸν εἶναι ἡναγκασμένον νὰ ἀναζητῇ τὴν τροφήν του ἐπὶ τόπου καὶ νὰ τρέφεται μὲν ύλικὰ, τὰ διοῖα κατασκευάζει μόνον του ἀπὸ οὔσιας ἀνοργάνους μὲ τὴν βοήθειαν τῆς γλωριοφύλλης καὶ τοῦ ἡλιακοῦ φωτός, ἡ τὰ ὅποια εὑρίσκει ἔτοιμα, εἴτε εἰς δραγανικὰς οὔσιας ἐν ἀποσυνθέσει ( φυτὰ σαπρόφυτα ), εἴτε εἰς τὰ ζῶντα ὄντα, ζῷα ἡ φυτὰ ( φυτὰ παράσιτα ).

Τὰ ζῶντα ὄντα, τὰ ὅποια παρουσιάζουσι τὰ κοινὰ αὐτὰ χαρακτηριστικὰ λέγονται φυτά.

#### ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΙΝΗΣ ΣΦΑΙΡΑΣ

Τὴν γηίνην σφαῖραν κλιματολογικῶς χωρίζομεν εἰς πέντε ζώνας : τὴν Βόρειον καὶ τὴν Νότιον Κατεψυγμένας, τὴν Βόρειον καὶ τὴν Νότιον Εύκρατους καὶ τὴν περὶ τὸν Ἰσημερινὸν ἡ Διακεκαυμένη ζώνην.

Τὸ κλῖμα εἰς τὰς δύο πρώτας ζώνας εἶναι ψυχρὸν καὶ ἡ ἐπιφάνεια τῆς γῆς κατὰ τὸ πλείστον κεκαλυμμένη ἀπὸ χιόνας καὶ πάγους. Εἰς τὰς δύο ἄλλας ζώνας τὸ κλῖμα εἶναι κατὰ τὸ μᾶλλον ἡ ξηρότον γλυκὺν καὶ εἰς τὴν Διακεκαυμένην θερμόν.

Ἀνάλογος πρὸς τὸ κλῖμα εἶναι καὶ ἡ διανομὴ τῶν φυτῶν εἰς τὰς ζώνας αὐτὰς καὶ τὸ εἶδος τῶν ἀποτελούντων τὰ δάση των δένδρων.

Ἡ Βόρειος Εὔκρατος ζώνη εἰς τὸ βόρειον μέρος της, ὅπου τὸ θέρος εἶναι ὑγρὸν καὶ ὁ χειμὼν ψυχρός, εἶναι σκεπασμένη μὲν δάση. Τὸ δασῶδες τοῦτο μέρος τῆς δυνάμεθα νὰ χωρίσωμεν εἰς δύο ζώνας : α) ἐκείνην ποὺ εύρισκεται εἰς τὸ νότιον τμῆμα, ὅπου ἡ καλὴ ἐποχὴ εἶναι ἀρκετὰ μακρᾶς διαρκείας καὶ ὅπου ἐπικρατοῦν δένδρα φυλλοβόλα, μὲ δρυθαλμούς φέροντας πρὸς προστασίαν των κατὰ τὸν χειμῶνα περγαμηνοειδῆ φυλλίδια ( ἀγριοκαστανέα, ἀγριοκερασέα κ.λ.π. ) καὶ β) ἐκείνην ποὺ εύρισκεται εἰς τὸ βόρειον τμῆμα, εἰς τὸ ὅποιον ἡ καλὴ ἐποχὴ τοῦ ἔτους εἶναι μακρᾶς διαρκείας καὶ ἐπομένως, ἀν ξσαν φυλλοβόλα τὰ δένδρα, δὲν θὰ είχον ἀρκετὸν καιρὸν διὰ νὰ ἀνανεώσουν τὸ φύλ-

λωμά των διὰ τοῦτο ἐπικρατοῦν ἐκεῖ δένδρα ἀειθαλῆ ( κωνοφόρα ).

Εἰς τὸ νότιον μέρος τῆς Βορείου Εὐκράτου ζώνης, τὸ ὅποιον εἶναι ξηρότερον, ἐπικρατοῦν αἱ στέπαι, ἐκτάσεις δηλαδὴ σκεπασμέναι μὲν χαμηλὴν χλόην, ἡτις ξηραίνεται κατὰ τὸ θέρος. Εἰς τὰς παρὰ τὴν θάλασσαν χώρας τοῦ μέρους αὐτοῦ τῆς Βορείου εὐκράτου ζώνης, ὅπου ὁ χειμὼν εἶναι γλυκὺς καὶ τὸ κλῖμα ὅχι πολὺ ξηρὸν λόγῳ τῆς γειτνίασεως τῆς θαλάσσης, ἀντὶ τῶν στεππῶν ὑπάρχουν ἐκτάσεις δασῶδεις μὲν δένδρα ἀειθαλῆ.

Τὰ αὐτὰ παρατηροῦνται καὶ εἰς τὴν Νότιον Εὐκρατον ζώνην.

Εἰς τὰς Κατεψυγμένας ζώνας, Βόρειον καὶ Νότιον, τὰ δένδρα εἶναι καχεκτικὰ καὶ ἔρποντα ( ἐπικρατεῖ ἐκεῖ κυρίως ἡ ἴτεα ἡ νάνος ) μέχρις ἐνὸς ὡρισμένου σημείου, πέραν τοῦ ὅποιου ἐξαφανίζονται τελειωτικῶς, διὰ νὰ μείνῃ ἐλαχίστη βλάστησις ἀπὸ εἰδὴ τινὰ ποωδῶν φυτῶν ( λειχήνων καὶ βρύων ), τὰ ὅποια σχηματίζονται τὰς τούνδρας. Ἀλλὰ καὶ αὐτὰ μὲ τὴν σειράν των ἐξαφανίζονται καὶ φθάνομεν εἰς τὰς περιοχὰς τῶν αἰωνίων πάγων.

Τὰ αὐτὰ παρατηροῦμεν καὶ καθ' ὅσον ἀνερχόμεθα εἰς ἐν ὅρος. Εἰς τὰ χαμηλότερα μέρη του συναντῶμεν φυτὰ ἀειθαλῆ, ὑψηλότερον, μέχρις 900 - 1.100 μέτρων, ἐπικρατεῖ ἡ ἐλάτη καὶ ἡ πεύκη καὶ ὑψηλότερον μέχρι τῶν 1.500 μέτρων, ἡ πεύκη. "Ανω τοῦ ὑψους τούτου συναντῶμεν ποώδη τινὰ φυτά, τὰ ὅποια ἀντέχουν εἰς τὸ ψῦχος καὶ τέλος μόνον χλόην ( εἶναι τὰ καλούμενα Ἀλπικὰ λειβάδια ): εἰς ἀκόμη ὑψηλότερα μέρη σταματᾷ κάθε βλάστησις καὶ φθάνομεν τέλος εἰς ὑψη, ποικίλλοντα ἀναλόγως τοῦ γεωγραφικοῦ πλάτους εἰς τὸ ὅποιον εὑρίσκεται τὸ ὅρος, ὅπου τὸ ἔδαφος εἶναι διαρκῶς σκεπασμένον ἀπὸ χιόνας καὶ πάγους ( αἰωνία χιών ).

. Εἰς τὴν Διακεκαμένην ζώνην, ἡ ὅποια ἀπλώνεται ἐκατέρωθεν τοῦ Ισημερινοῦ καὶ εἰς ἀπόστασιν 15 - 22 μοιρῶν ἀπὸ αὐτόν, συναντῶμεν ἐκτάσεις ἀμμώδεις, σκεπασμένας μὲ καίουσαν ἄμμον, χωρὶς βλάστησιν, εἰς τὰς ὅποιας κατὰ μακρινὰ διαστήματα καὶ γύρω ἀπὸ πηγὰς ὑδατος συναντᾶ κανεὶς μικρὰς ἐκτάσεις μὲ φοίνικας, τὰς λεγομένας δάσεις ( σχ. 191 ). Τὰς χωρὶς βλάστησιν ἀμμώδεις ταύτας ἐκτάσεις, τὰς κεκαλυμμένας μὲ καίουσαν ἄμμον, καλοῦμεν ἐρήμους.

'Εκτὸς τῶν ἐρήμων αὐτῶν εὐρίσκομεν ἀκόμη εἰς τὴν Διακεκαμένην ζώνην, καθ' ὅσον πλησιάζομεν πρὸς τὸν Ισημερινόν, ἐκτάσεις σκεπασμένας μὲ ὀλίγην κατ' ἀρχὰς καὶ ἐν συνεχείᾳ μὲ ἄφθονον καὶ

ύψηλὴν χλόην καὶ μεμονωμένα φυτὰ ἡ συστάδας τούτων, ἐνίστε τοι-  
αῦτα ἀντέχοντα εἰς τὴν ξηρασίαν· εἶναι αἱ λεγόμεναι στέπαι καὶ σα-  
βάναι.

Πλησίον τοῦ Ἰσημερινοῦ (εἰς ἀπόστασιν μέχρι 10 μοιρῶν ἀπὸ  
αὐτὸν) εὑρίσκεται ἡ ἀπέραντος Τροπικὴ ἢ Ἰσημερινὴ ἔκτασις τῶν δα-  
σῶν, δηλ. μέρος τῆς ἐπιφανείας τῆς γῆς, ὅπου τὸ δάσος ἔχει τὴν μεγα-  
λυτέραν του ἀνάπτυξιν. Δένδρα πανύψηλα, πελώρια, φυόμενα τόσον πλη-  
σίον τὸ ἐπὶ τοῦ ἄλλου καὶ μὲ τοὺς κλάδους των τόσον συμπλεκομένους,  
ῶστε οὐδὲ οἱ διφειρεῖς διὰ μέσου αὐτῶν δύνανται νὰ διέλθωσιν. Εἶναι αἱ λε-  
γόμεναι ζοῦγκλαι. Τὴν ἔξαιρετικὴν αὐτὴν αὔξησιν τῶν δένδρων τῆς ζώ-



Σχ. 191. "Ο ασις

νης ταύτης προκαλεῖ ἡ καθ' ὅλον τὸ ἔτος ύφισταμένη ύψηλὴ θερμοκρασία  
καὶ αἱ ἀκατάπτουσται βροχαί.

Τὰ δάση τῆς ἔκτασεως ταύτης, δὲν ἀποτελοῦνται ἀπὸ ὀλίγα μό-  
νον εἰδη δένδρων, ὅπως τὰ ἴδια μας δάση. Εἰς τὴν Ἰάβαν π.χ. ἐμέρτρη-  
σαν πλέον τῶν 1200 εἰδῶν δένδρων εἰς τὸ αὐτὸ δάσος καὶ ἡ ἀπουσία  
τοῦ χειμῶνος ἀπὸ τὸ τμῆμα αὐτὸ τῆς γηίνης σφαίρας κάμνει νὰ ἐπικρα-  
τοῦν εἰς τὰ δάση του φυτά, ἀειθαλῆ κυρίως.

Εἰς τὰς περὶ τὴν Μεσόγειον χώρας, αἱ ὅποιαι ἔχουσιν ἴδιον κλῖμα,  
τὸ λεγόμενον **Μεσογειακὸν κλῖμα**, μὲ παρατεταμένα ξηρὰ καὶ δρο-  
σερὰ μέρη καὶ γλυκεῖς καὶ βροχεροὺς χειμῶνας, ἔχουμε τὴν λεγομένην  
Μεσογειακὴν βλάστησιν ἀπὸ φυτὰ ἀντέχοντα εἰς τὴν παρατεταμένην  
θερινὴν ξηρασίαν (ἐλαῖαν, συκῆν, ἑσπεριδοειδῆ, ἄμπελον κ.λ.π.).

Σημείωσις. Οὕτως ἀρχιζοντες π.χ. ἀπὸ τὸν Β. Πόλον τῆς Γῆς ἀνευρί-  
σκομεν :

Κατ' ἀρχάς, πλησίον τοῦ Πόλου, ἐκτάσεις καλυπτομένας διαρκῶς ἀπὸ πάγους, ὅπου οὐδεμία βλάστησις ὑπάρχει.

Κατόπιν, νοτιώτερον, ὡς μόνην βλάστησιν βρύα καὶ λειχῆνας μὲν ἔδω καὶ ἔκει ( εἰς τὰ νοτιώτερα μέρη ) νανώδη τινὰ δένδρα ( ίδιας ιτέας καὶ σημύδας ). Είναι ἡ ζώνη τῆς Ταύνου δρας.

Νοτίως ταύτης ἄρχεται τὸ δάσος ἀπὸ φυτὰ ἀειθαλῆ ἀντέχοντα εἰς τὸ ψῦχος, ίδιας κανοφόρα. Είναι ἡ ζώνη τῶν κανοφόρων.

Νοτιώτερον ἄρχεται μία ζώνη, ὅπου ἀνευρίσκομεν δάση, εἰς τὰ ὥποια ἐπικρατοῦν τὰ φυλλοβόλα δένδρα καὶ ἐν συνεχείᾳ τὴν Στέπην ανατέλλει, κατόπιν ἐρήμους ἐκτάσεις, νοτιώτερον τούτων τὴν Στέπαν αν μὲν ψύχλην γλάρην καὶ συστάδας δένδρων ἔδω καὶ ἔκει ( ίδιας κατά μήκος τῶν δικθῶν τῶν ποταμῶν ), μέχρις ὅπου φθάσωμεν εἰς Β. Γεωγραφικὸν πλάτος  $8^{\circ}$  -  $10^{\circ}$ . Ἐκεῖ ἀρχίζει, συνεχιζόμενον μέχρι τοῦ Ισημερινοῦ καὶ  $8^{\circ}$  -  $10^{\circ}$  νοτίως τούτου, τὸ παρθένον καὶ ἀδιαπέραστον Ισημερινὸν δάσος, ἡ Ζούγκλα.

Νοτίως τοῦ Ισημερινοῦ ἐπαναλογιζόμενονται τὰ αὐτά, κατ' ἀντίστροφον φυσικὰ σειράν. Η διαδυγὴ δύμως αὐτὴ δὲν ἀποτελεῖ κανόνα, διότι τροποποιεῖται εἰς τινας περιοχὰς τῆς Γῆς, λόγῳ τῶν ἔκει ἐπικρατουσῶν εἰδικῶν συνθηκῶν ( γειτνίασις θαλάσσης, ἡ μεγάλου ὅγκου ἡηρᾶς, ἡ ἐρήμων, ψύχρων ἡ θερμῶν θαλασσίων ρευμάτων, ἐπικρατούντων ἀνέμων, κ.τ.λ. ), αἱ ὅποιαι τροποποιοῦνται τὸ κλῖμα καὶ συνεπῶς καὶ τὴν ἀπ' αὐτὸν ἔξαρτωμένην βλάστησιν. Παράδειγμα τούτων ἔχομεν π.χ. τὴν καλουμένην Μεσογειακὴν βλάστησιν, διειλογιζόμενην εἰς τὴν ἐπίδρασιν τῆς Μεσογείου θαλάσσης.



ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

## ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΙΣ



## ΤΑ ΦΥΤΑ

"Εκαστον φυτὸν εἶναι ἐν δύ, τὸ ὄπειον ζῆ. Γεννᾶται, τρέφεται, αὔξανεται, πολλαπλασιάζεται εἰς ὡρισμένην ἡλικίαν καὶ τέλος ἀποθνήσκει καὶ ἀποσυντίθεται, μεταβαλλόμενον εἰς ὑλικὰ στερεά, τὰ ὅποια μένουν εἰς τὴν γῆν, καὶ εἰς ὑλικὰ δέρια, τὰ ὅποια μεταβαίνουν εἰς τὴν ἀτμόσφαιραν.

Αἱ κυριώτεραι λειτουργίαι, τὰς ὅποιας κάθε φυτὸν ἔκτελεῖ κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ζωῆς του, εἶναι δύο εἰδῶν :

α) Αἱ ἀποσκοποῦσαι εἰς τὴν διατροφὴν τοῦ ἀτόμου, δηλαδὴ τὴν διατήρησιν τοῦ ἀτόμου εἰς τὴν ζωὴν καὶ

β) Αἱ ἀποσκοποῦσαι εἰς τὴν ἀναπαραγωγὴν τοῦ ἀτόμου, δηλ. τὴν διαιώνισιν τοῦ εἰδοῦς, εἰς τὸ δόποῖον τὸ ἀτομον ἀνήκει.

Αἱ δύο αὗται λειτουργίαι, ή τῆς διατροφῆς καὶ ή τῆς ἀναπαραγωγῆς, εἶναι κοιναὶ δι' ὅλα τὰ φυτά, εἴτε μονοκύτταρα εἶναι ταῦτα εἴτε πολυκύτταρα. Δὲν γίνονται ὅμως αἱ λειτουργίαι αὗται εἰς ὅλα τὰ φυτά κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον.

Εἰς τὰ μονοκύτταρα φυτὰ (π.χ. διάτομα, βακτήρια) τὸ αὐτὸν κύτταρον, καθὼς εἰδομεν, ἔκτελεῖ ἀμφοτέρας τὰς λειτουργίας ταύτας.

Εἰς τὰ πολυκύτταρα φυτὰ ἔχομεν ὅμαδας κυττάρων, αἱ ὅποιαι ἀναλαμβάνουν, αἱ μὲν τὰς λειτουργίας τῆς διατροφῆς, αἱ δὲ τὰς λειτουργίας τῆς ἀναπαραγωγῆς. Αἱ ὅμαδες αὗται, συγκείμεναι ἀπὸ κύτταρα σχεδὸν ὅμοια μεταξύ των, ἀποτελοῦν δι τι λέγομεν ὅργανα τοῦ φυτοῦ : "Οργανα διατροφῆς" (ρίζαν, βλαστόν, φύλλα), καὶ ὅργανα ἀναπαραγωγῆς (στήμονας, ὑπερον, κ.λ.π.).

Εἰς τὰ πολυκύτταρα δηλαδὴ φυτὰ ἔχομεν καταμερισμὸν ἐργασίας ὅμαδες δηλ. ὅμοιων κυττάρων ἔχουσιν ἀναλάβει ἐργασίας ἀποσκοπούσας εἰς τὴν διατροφὴν τοῦ φυτοῦ, ἐνῷ ἄλλαι ὅμαδες ἔχουσιν ἀναλάβει ἐργασίας ἀποσκοπούσας εἰς τὴν ἀναπαραγωγὴν, τὸν πολλαπλασιασμὸν τοῦ φυτοῦ.

Τὰς ὅμαδας ταύτας, τὰς ὅποιας, ως εἴπομεν, καλοῦμεν ὅργανα (ἐξ οὗ καὶ τὸ φυτόν, ως ἔχον ὅργανα, λέγεται ὅργανικὸν ὄν), ἀρχίζομεν νὰ εὑρίσκωμεν ἀπὸ τὰ βρύα· εἰς ταῦτα παρατηροῦμεν βλαστὸν καὶ φύλ-

λα διὰ τὴν διατροφήν των, ἀνθηρίδια καὶ ἀρχεγόνια διὰ τὴν ἀναπαραγωγήν των.

‘Η διάκρισις αὐτὴ γίνεται καταφανεστέρα εἰς τὰς πτέριδας, εἰς τὰς όποιας ὑπάρχουσι, πλὴν τοῦ βλαστοῦ καὶ τῶν φύλλων, φίλαι καὶ ἀγγεῖα, καταντῷ δὲ πλήρης εἰς τὰ ἀνώτερα φυτά, τὰ φανερόγαμα, ὅπου ἔχομεν φίλας, βλαστόν, φύλλα καὶ ἀγγεῖα, ὡς ὅργανα διατροφῆς, καὶ στήμονας, γῦριν, ὀσθήκην, ὀάρια κ.λ.π., ὡς ὅργανα ἀναπαραγωγῆς.

### ΠΙΝΑΞ 1. — ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙ

- α) Λειτουργίαι διατροφῆς. Σκοπός : ‘Η διατήρησις τοῦ ἀτόμου.
- β) Λειτουργίαι ἀναπαραγωγῆς. Σκοπός : ‘Η διαιώνισις τοῦ εἴδους.

### ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

#### I. Καταμερισμὸς ἐργασίας διὰ τὴν διατροφήν.

- α) Μονοκύτταρα φυτὰ ( διάτομα, βακτήρια κ.λ.π. ). Οὐδεὶς καταμερισμός.
- β) Πολυκύτταρα φυτά :

  - 1) Σπυρογύρα : Ἐλάχιστος καταμερισμὸς ( ἔνωσις δύο κυττάρων πρὸς ἀποτέλεσμαν ὁσοῦ ).
  - 2) Ἀγαρικόν : Περισσότερος καταμερισμὸς ( μυκήλαιον καὶ καρπικὸν σῶμα ).
  - 3) Βρύα : “Ετι περισσότερος καταμερισμὸς ( φύλλα καὶ βλαστός ).
  - 4) Πτέριδες : Ἀκόμη περισσότερος καταμερισμὸς ( φύλλα, βλαστός, φίλα ).
  - 5) Κρυπτόγαμα φυτὰ μὲ  
ἀγγεῖα καὶ  
6) Φανερόγαμα φυτὰ      {      Πλήρης καταμερισμὸς  
βλαστός, φύλλα, φίλα, ἄνθη,  
καρποὶ καὶ σπέρματα.

#### II. Καταμερισμὸς ἐργασίας διὰ τὴν ἀναπαραγωγὴν.

Θαλλόφυτα :	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Δι’ ἀπλῆς διαιρέσεως</td><td style="width: 50%;">Πλήρης καταμερισμὸς</td></tr> <tr> <td>Διὰ σπορίων</td><td>βλαστός, φύλλα, φίλα, ἄνθη,</td></tr> <tr> <td>Δι’ ὄῶν</td><td>καρποὶ καὶ σπέρματα.</td></tr> </table>	Δι’ ἀπλῆς διαιρέσεως	Πλήρης καταμερισμὸς	Διὰ σπορίων	βλαστός, φύλλα, φίλα, ἄνθη,	Δι’ ὄῶν	καρποὶ καὶ σπέρματα.	‘Αναλόγως τῶν περιστάσεων
Δι’ ἀπλῆς διαιρέσεως	Πλήρης καταμερισμὸς							
Διὰ σπορίων	βλαστός, φύλλα, φίλα, ἄνθη,							
Δι’ ὄῶν	καρποὶ καὶ σπέρματα.							
Βρύα καὶ Πτέριδες :	Δι’ ὄῶν καὶ σπορίων	Eἰς κανονικὴν διαδοχὴν						

**Φανερόγαμα :** { Διὰ γυμνῶν σπερμάτων ( Γυμνόσπερμα )  
Διὰ σπερμάτων παραγομένων εἰς κλειστὴν  
ώσθικην ( Ἀγγειόσπερμα )

Απὸ τὸν ἀνωτέρῳ πίνακα ἐννοοῦμεν ὅτι, ὅσον τελειότερον εἶναι  
ἐν φυτόν, τόσον καὶ ὁ καταμερισμὸς τῆς ἐργασίας, μεταξὺ τῶν κυττάρων,  
ἀπὸ τὰ ὅποια τὸ σῶμά του ἀποτελεῖται, εἶναι μεγαλύτερος.

### I. ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΥ

#### "Οργανα καὶ λειτουργίαι διὰ τὴν διατροφὴν

Τὰ κυριώτερα ὅργανα, διὰ τῶν ὅποιων τὸ φυτὸν τρέφεται, εἶναι  
ἡ ρίζα, ὁ βλαστός, καὶ τὰ φύλλα. Ἡ ρίζα καὶ ὁ βλαστὸς ἀποτελοῦσι  
συνήθως ἄξονα, ἐκ τοῦ ὅποιον ἐκφύονται σὺν τῷ χρόνῳ πλάγιοι βλαστοί  
ἢ κλάδοι καὶ πλάγιαι ρίζαι.

#### α) P I Z A

Ρίζας ἔχουσι τὰ φανερόγαμα φυτὰ καὶ τὰ κρυπτόγαμα μὲ ἀγ-  
γεῖα.

Αἱ ρίζαι διευθύνονται πάντοτε πρὸς τὰ κάτω καὶ ἔχουν ὡς ἐργα-  
σίαν νὰ ἀναπνέουν, νὰ στερεώνουν τὸ φυτόν, νὰ διαλύουν τὰ πετρώματα  
μὲ τὰ δέξια, τὰ ὅποια ἐκκρίνουν, νὰ ἀπορροφοῦν ὕδωρ καὶ τὰ ἐν αὐτῷ  
διατελευμένα ἄλατα μὲ τὰ ριζικά των τριχίδια καὶ νὰ εἰσχωροῦν εἰς τὸ  
ἔδαφος μὲ τὴν βοήθειαν τῆς καλύπτρας, τὴν ὅποιαν ἔχουσιν.

"Υπάρχουσι διάφορα εἰδη ριζῶν ( σχ. 192 ).


"Ἐχουμεν ρίζας, αἴτινες ἀποτελοῦν προέκτασιν τοῦ βλαστοῦ, ἐκφύ-  
ουσαι ἄλλας ρίζας πλαγίως καὶ αἴτινες προχωροῦν βαθέως : Φυτὰ βα-  
θύρριζα ( ἀπιδέα, δρῦς, μαλάχη κ.λ.π. ).

"Ἐχουμεν ρίζας, αἴτινες ἐκφύονται ὡς θύσανος ἀπὸ τὸν βλαστόν,  
χωρὶς νὰ προχωροῦν βαθέως : Φυτὰ ἐπιπολαιόρριζα ( σῖτος, κριθή, κο-  
λοκύνθη ). "Οσον πλέον βαθύρριζον εἶναι ἐν φυτόν, τόσον καλύτερον  
συγκρατεῖται καὶ ἀντέχει εἰς τὴν ξηρασίαν.

"Ἐχουμεν ἐπίσης ρίζας, αἴτινες ἐκφύονται ἀπὸ τὸν ὑπέργειον βλα-  
στὸν ( ἐναέριοι ρίζαι, σχ. 193 ) καὶ γρηγοριεύουν διὰ νὰ συγκρατοῦν, ὅ-  
πως π.γ. τοῦτο συμβαίνει εἰς τὰ ἀναρριχώμενα φυτὰ ( βανίλη ).

Μερικὰ φυτὰ χρησιμοποιοῦν τὰς ρίζας των, διὰ νὰ ἐναποθηκεύ-

σουν εἰς αύτὰς θρεπτικά συστατικά, όπότε αὗται ανέξανονται πολὺ κατά πάχος ( π.χ. ραδίκι, τεῦτλα ).



Σχ. 193

Ἐναέριοι ρίζαι εἰς βλαστὸν κισσοῦ, διὰ τῶν ὁποίων ὁ βλαστὸς οὗτος συγκρατεῖται καὶ μὲ τὴν βοήθειαν τῶν ὁποίων δύναται νὰ ἀναρριχῆται ἐπὶ τοῦ ὑποστροφῆματος ( π.χ. τοῦ τοίχου ).

## ΠΙΝΑΞ 2. — ΡΙΖΑ

Ρίζες ἔχουσι τὰ φανερόγαμα φυτὰ καὶ ἐκ τῶν κρυπτογάμων ὅσα ἔχουσιν ἀγγεῖα.

Εἴδη ριζῶν:	<div style="display: inline-block; vertical-align: middle;"> <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; margin-right: 10px;">           Ρίζα βαθεῖα ὡς προέκτασις τοῦ βλαστοῦ ( φυτὰ βαθύρριζα, δῆρες )         </div> <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;">           Ρίζα φυομένη ὡς θύσανος ( φυτὰ ἐπιπολαιόρριζα, σῖτος )         </div> <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;">           Ρίζα ἐναέριος ( φυτὰ ἀναρριχώμενα, βανίλη )         </div> </div>
-------------	--

Mέρη τῆς ρίζης :	Κυρίως ρίζα Παράρριζα Ἀπορροφητικὰ τριχίδια Καλύπτρα
Χρησιμότης τῆς ρίζης :	Στερεώνει τὸ φυτὸν Ἀπορροφᾷ τὸ ῦδωρ καὶ τὰ ἄλατα Διανοίγει τὸ ἔδαφος καὶ διαλύει τὰ πε- · τρώματα Ἀναπνέει Χρησιμεύει ὡς ἀποθήκη θρεπτικῶν συ- · στατικῶν.

β) ΒΛΑΣΤΟΣ

Βλαστὸν ἔχουσιν ὅλα τὰ φυτὰ πλὴν τῶν θαλλοφύτων.

Οἱ βλαστοὶ εἶναι ξυλώδεις, δηλ. στερεοί, ἢ πιοώδεις, δηλ. μαλακοί, ἀναλόγως τοῦ πλήθους τῶν εἰς τὸν κεντρικὸν κύλινδρον ξυλωδῶν σωλήνων· οἱ τελείως ἀποξυλωμένοι σωλῆνες ἀποτελοῦνται ἀπὸ κύτταρα νεκρά.

Ὑπάρχουσι βλαστοί, οἵτινες εἶναι ὑπὲρ τὸ ἔδαφος καὶ λέγονται βλαστοὶ ὑπέργειοι· καὶ δίλοι, οἵτινες εὑρίσκονται ἐντὸς τοῦ ἔδαφους καὶ λέγονται βλαστοὶ ὑπόγειοι (σχ. 194).

α) Τὸ πέργειον βλαστόν. Τοιούτων βλαστῶν ὑπάρχουσι διάφορα εἴδη, ἐκ τῶν ὅποιων τὰ κυριώτερα εἶναι:

Οἱ εὐθεῖς οἵτινες ἀνύψωσινται κανονικῶς, δυνάμενοι νὰ στηρίξουν μόνοι των τὸ φυτὸν (π.χ. πεύκη, ἐλαῖα).

Οἱ ἔρποντες, οἵτινες ἔρπουσιν ἐπὶ τοῦ ἔδαφους (π.χ. φράσουλα).

Οἱ ἀναρριχώμενοι. Οὗτοι ἀναρριχῶνται εὐθὺς ὡς εὔρουν ὑποστήριγμα, εἴτε μόνοι (π.χ. φασίολος, λυκίσκος) εἴτε μὲ τὴν βοήθειαν ἐλίκων (μπιζέλι, ἄμπελος, κολοκύνθη) (σχ. 195).

β) Τὸ πόργειον βλαστόν. Τὸ πόργειον λέγονται οἱ βλαστοί, οἱ ὅποιοι εὑρίσκονται κάτωθι τῆς ἐπιφανείας τοῦ ἔδαφους· οὗτοι ἔὰν μὲν προχωρῶσι, καθ' ὃσον αὐξάνονται, ἐντὸς τοῦ ἔδαφους, λέγονται ριζώματα (π.χ. ἥδύοσμος, λίρις) ἔὰν δὲ αὐξάνωνται μόνον κατὰ πάχος εἰς ἣν θέσιν εὑρίσκονται, λέγονται βοβλοί (κρόμμιον, τουλίπη), ἢ κόνδυλοι (γεώμηλον). Η αὐξήσις αὕτη προέρχεται ἐκ τῆς εἰς αὐτοὺς ἐνα-

ποθηκεύσεως, ἀπὸ τὸ φυτόν, θρεπτικῶν συστατικῶν. Βλέπουμεν οὖτο, ὅτι πολλὰ φυτά, ἔνα μέρος τοῦ βλαστοῦ των, τὸ ὄποῖον εὑρίσκεται μέσα



**Σχ. 194.** Ὑπόγειος βλαστὸς ἢ ρίζωμα  
(ἐντὸς τοῦ χώματος) καὶ ὑπέργειος βλα-  
στὸς (ὑπεράνω τοῦ χώματος).

**Σχ. 195.** Ἀναρριχώ-  
μενος βλαστὸς λυκί-  
σκου.

εἰς τὸ χῶμα, τὸ χρησιμοποιοῦν ὡς ἀποθήκην θρεπτικῶν συστατικῶν (βολβοῖ, κόνδυλοι).

### Δειτούργια τοῦ βλαστοῦ

Οἱ βλαστὸι χρησιμεύει, ὡς εἶδομεν, διὰ νὰ συγκρατῇ τὸ φυτόν· ἐπίσης ὁ βλαστὸς ἀναπνέει, διαπνέει μὲ τὰ στόματα ποὺ φέρει εἰς τὴν ἐπιδερμίδα του καὶ ἀφομοιοῦ, ίδιως εἰς νεαρὰν ἥλικιαν, ὅπότε ἔχει περισ-  
στέραν γλωφοφύλλην.

Μεταφέρει ἐπίσης, μὲ τοὺς ἔνλαβεις σωλῆνάς του, ὕδωρ καὶ ἄλα-  
τα ἐκ τῶν ριζῶν εἰς τὰ φύλλα (ἀνοδικὸν ρεῖμα) καὶ μὲ τοὺς ἥθμάδεις  
σωλῆνας τὸν θρεπτικὸν χυμὸν ἐκ τῶν φύλλων πρὸς ὅλα τὰ μέρη τοῦ φυ-  
τοῦ.

Οἱ βλαστὸι χρησιμοποιεῖται ἐνίστε καὶ πρὸς ἐναποθήκευσιν θρε-  
πτικῶν συστατικῶν.

### ΠΙΝΑΞ 3. — ΒΛΑΣΤΟΣ

Βλαστὸς ὑπάρχει εἰς ὅλα τὰ φυτὰ πλὴν τῶν θαλλοφύτων

#### Εἴδη βλαστῶν

Βλαστὸς ἐναέριος :	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Κορμὸς δένδρων} \\ \text{”Ορθιος : } \left\{ \begin{array}{l} \text{Στύπος ( φοῖνιξ )} \\ \text{Κάλαμος ( σιτηρὰ )} \end{array} \right. \\ \text{”Ερπων ( φράσουλα )} \\ \text{”Αναρριχώμενος ( καλοκύνθη, φασίο-} \\ \text{λος κ.λ.π. ).} \end{array} \right.$
Βλαστὸς ὑπόγειος :	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Ρίζωμα ( ἵρις, ἀνεμώνη, ἥδυνοσμος, κ.λ.π. )} \\ \text{Βολβὸς ( κρόμμυον, τουλίπη κ.λ.π. )} \\ \text{Κόνδυλος ( γεωμῆλον )} \end{array} \right.$
Μέρη τοῦ βλαστοῦ :	$\left\{ \begin{array}{l} \text{”Ακραῖος ὀφθαλμὸς} \\ \text{Γόνατα ( ἔκψυσις φύλλων καὶ πλαγίων } \\ \text{ὀφθαλμῶν )} \\ \text{Μεσογονάτια διαστήματα} \end{array} \right.$
Σύστασις τοῦ βλαστοῦ :	$\left\{ \begin{array}{l} \text{”Επιδερμίς : } \left\{ \begin{array}{l} \text{Τρίχες} \\ \text{Στόματα} \end{array} \right. \\ \text{Φλοιὸς} \\ \text{Βίβλος ἡθμώδεις σωλῆνες} \\ \text{Γενέτειρα στιβάς ἢ κάμβιον} \\ \text{Κεντρικὸς κύλινδρος καὶ ξυλώδεις σωλῆνες.} \end{array} \right.$

#### Αὔξησις τοῦ βλαστοῦ

Αὔξησις κατὰ μῆκος :	$\left\{ \begin{array}{l} \text{”Ακραῖα ( ἀπὸ τὸν ἀκραῖον ὀφθαλμὸν )} \\ \text{”Ενδιάμεσος ( κατὰ τὰ μεσογονάτια } \\ \text{διαστήματα ).} \end{array} \right.$
Αὔξησις κατὰ πλάτος :	’Απὸ τὰς γενετηρίους στιβάδας.

Τὰ φύλλα ἐλλείπουσι μόνον ἀπὸ τὰ θαλλόφυτα.

"Εκαστον φύλλον ἀποτελεῖται ἀπὸ τρία κυρίως μέρη ( σχ. 196 ), τὸ ἔλασμα, τὸν μίσχον καὶ τὸν κολεόν. Εἰς δὲ ὅμως τὰ φύλλα δὲν ὑπάρχουσι πάντοτε καὶ τὰ τρία αὐτὰ μέρη. Τὸ ἔλασμα σπενίως ἐλλείπει, ὅταν δὲ ἐλλείπῃ, ἀντικαθίσταται ἀπὸ τὸν πλατυνόμενον μίσχον ἢ τὸν κολεόν ( π.χ. Ιρις ). 'Ο μίσχος ἐλλείπει ἀπὸ τὰ σιτηρά, ἐπίσης ἀπὸ μέγαν ἀριθμὸν σκιαδανθῶν· ὅταν ἐλλείπῃ ὁ μίσχος, τότε τὸ ἔλασμα προσκολλᾶται ἀπ' εὐθείας εἰς τὸν βλαστὸν σχηματίζον κολεόν ( σχ. 197 ). "Αλλοτε τὸ ἔλασμα ἐκφύεται ἀπ' εὐθείας ἀπὸ τὸν βλαστὸν ( κρίνος, αἰγόκλημα ) χωρὶς νὰ σχηματίζῃ κολεόν.

### Ἐξωτερικὴ διασκευὴ τοῦ φύλλου

Τὸ ἔλασμα εἶναι λεπτὸν εἰς τὰ φύλλα τῶν περισσοτέρων φυτῶν, εἰς τινα φυτὰ ὅμως παχύνεται τοῦτο καὶ γίνεται χονδρόν.

Εἰς κάθε ἔλασμα διακρίνομεν τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω μέρος του· τὸ κάτω μέρος ἔχει χρῶμα ἀνοικτότερον φθάνοντες εἰς τὸ λευκόν, λόγῳ τοῦ πλήθους τῶν τριχῶν, αἱ όποιαι ὑπάρχουν εἰς αὐτὸ διὰ νὰ ἐμποδίζουν τὴν διαπνοήν. 'Αμφότερα τὰ μέρη ταῦτα εἶναι σκεπασμένα ἀπὸ ἐπιδερμίδαν κατώθεν ταύτης ὑπάρχει τὸ παρέγχυμα μὲ τοὺς κόκκους τῆς χλωροφύλλης, διαπερώμενον ἀπὸ τὰ νεῦρα, ἀτινα ἀποτελοῦν συνέχειαν τῶν ξυλωδῶν καὶ ήθμωδῶν σωλήνων. Τὰ νεῦρα ταῦτα σχηματίζονται εἰδος δικτύου μέ τινα κύρια νεῦρα χονδρότερα καὶ ἄλλα λεπτότερα. Τὸ δίκτυον τοῦτο παραμένει καὶ μετὰ τὴν πτῶσιν τοῦ φύλλου, ὅταν τὸ παρέγχυμα σαπίσῃ ( σχ. 198 ).

Τὰ χονδρότερα νεῦρα, τὰ όποια καλοῦνται καὶ κύρια νεῦρα, δὲν εἶναι διατεταγμένα ὁμοίως εἰς δὲλα τὰ φύλλα.


"Άλλα φύλλα ἔχουν ἐν μόνον νεῦρον, μονόνευρα ( πεύκη, ἐλάτη ).

Εἰς δὲλα ἡ νεῦρωσις εἶναι παράλληλος, παραλληλόνευρα ( σίτος ).

Εἰς δὲλα σχηματίζεται νεῦρωσις ὁμοία πρὸς πτερόν, πτερόνευρα ( ἀπιδέα, μαλάχη ).

Εἰς δὲλα τέλος φύλλα ἡ νεῦρωσις εἶναι ὁμοία πρὸς παλάμην, παλαμόνευρα ( πλάτανος, ἄμπελος ).

Τὰ φύλλα ἐπίσης λέγονται ἀπλᾶ, ὅταν τὸ ἔλασμά των, δὲν χωρίζεται εἰς φυλλάρια, καὶ σύνθετα, ὅταν τοῦτο χωρίζεται εἰς φυλλάρια.



**Σχ. 196.** Φύλλον:  $\alpha$  ἔλασμα· 1 γόνατον, 2 μασχάλη καὶ μασχαλιαῖς ὀφθαλμός, 3 μίσχος, 4 νεῦρα τοῦ φύλλου, 5 ὀδόντες τῆς περιφερείας τοῦ φύλλου.



**Σχ. 197.** Βλαστὸς καὶ φύλλον σίτου.



**Σχ. 198.** Άλι νευρώσεις τοῦ φύλλου, ὅπως φαίνονται ὅταν τὰ λοιπὰ μέρη τοῦ φύλλου σαπίσουν.



**Σχ. 199.** Διάφορα εἰδή φύλλων ἀπλῶν.

Τὸ ἔλασμα δύναται ἡ νὰ φέρῃ ὀδόντας κατὰ τὴν περιφέρειάν του ( ἔλασμα ὀδοντωτόν, π.χ. λεύκη, πτελέα, ἀπιδέα, δαμασκηνέα ), ἢ νὰ εἶναι χωρισμένον εἰς λοβούς ( δρῦς, ἄμπελος, μαλάχη ), ἡ νὰ εἶναι βαθέως ἐσχισμένον ( κάνναβις, μήκων ), ἢ τέλος, νὰ εἶναι ὅλοκληρον ( σχ. 199 ).

Τὰ φυλλάρια τῶν συνθέτων φύλλων δύνανται νὰ εἶναι διατεταγμένα ὡς αἱ τρίχες ἐνὸς πτεροῦ ( φακῆ, ροδῆ ), ἡ ὡς οἱ δάκτυλοι τῆς παλάμης ( δέξαλίς, σχ. 200 ).

Φύλλα τινὰ μετασχηματίζονται διακρινόμενα τῶν λοιπῶν. Οὕτω π.χ. τὰ πρῶτα φύλλα, τὰ ὄποια παράγει ὁ φασίολος εἶναι ἀπλᾶ,



Σχ. 200. Φύλλα σύνθετα



Σχ. 201. Κλάδος εἰς τὸν ὄποιον φάίνεται ἡ ἔκφυσις τῶν φύλλων κατὰ σπουδύλους.

ἐνῷ ἄλλα εἶναι σύνθετα. Μερικὰ φύλλα πληροῦνται ἀπὸ θρεπτικὰ συστατικὰ καὶ ἀποτελοῦν τοὺς χιτῶνας τῶν βολβῶν ( κρόμμιον, κρῖνος, τουλίπη, ὑάκινθος κ.λ.π. ). "Ἄλλα μεταβάλλονται εἰς τὰ περγαμηνοειδῆ φυλλίδια, ποὺ καλύπτουν καὶ προφυλάσσουν τοὺς ὄφθαλμούς ( κωνοφόρα ). Αἱ ἔλικες ἐπίσης, τὰς ὄποιας εύρισκομεν εἰς μερικὰ φύλλα σύνθετα, μὲ τὰ φυλλάριά των διετεταγμένα ἐν εἴδει πτεροῦ ( π.χ. μπιζέλι ), δὲν εἶναι παρὰ μετασχηματισμένα φύλλα. Εἰς τινὰ πάλιν φυτὰ τὰ φύλλα μεταβάλλονται εἰς ἀκάνθας ( κακτώδη ). Ἐπίσης τὰ διάφορα μέρη, ἀπὸ τὰ ὄποια ἀποτελεῖται τὸ ἄνθος, προέργονται ἀπὸ φύλλα μετασχηματισμένα.

Τὰ φύλλα ἔκφύονται ἀπὸ ἔκαστον γόνατον ἡ ἀνὰ δύο ( ἀντίθετα ), ὡς π.χ. εἰς τὸ καρῶτον, τὸν δίανθον τὸν καρυόφυλλον ( σπανίως πλείονα τῶν δύο κατὰ σπουδύλους, σχ. 201 ), ἡ ἀνὰ ἐν ( ἔκφυσις κατ' ἐναλλαγήν ).

Τῶν πλείστων ἀπὸ τὰ φύλλα ἡ ζωὴ εἶναι πολὺ περιωρισμένη. Φύονται κατὰ τὰς ἀρχὰς τῆς ἀνοίξεως καὶ πίπτουν εἰς τὸ τέλος τοῦ φθινοπώρου, ἢ καὶ ἐνωρίτερον ( φυτὰ φυλλοβόλα ).

"Αλλὰ φύλλα παραμένουσι περισσότερον χρόνον ( πεύκη, ἐλάτη, ἐλαΐς ) καὶ αὐτὰ ὅμως πίπτουν μετὰ 2 ἔως 7 ἔτη, ἀντικαθίστανται ὅμως ἀμέσως ἀπὸ ἄλλα, ὥστε τὸ φυτὸν εὑρίσκεται διαρκῶς μὲ φύλλα ( φυτὰ ἀειθαλῆ ).

Τὸ φύλλον πρὶν πέσῃ, ὑφίσταται διαφόρους μεταβολάς: ἡ χλωροφύλλη ἔξαρφανίζεται ἀπορρίφωμένη καὶ ὅλα τὰ θρεπτικὰ συστατικά, τὰ ὅποια ἔχει τὸ φύλλον, μεταφέρονται εἰς τοὺς βλαστούς ( τοὺς ὑπεργείους ἢ τοὺς ὑπογείους ), ὅπου μένουν ἐναποθηκευμένα κατὰ τὸν χειμῶνα. Τὸ φύλλον καθίσταται τότε κίτρινον, ἢ φαιὸν καὶ εἴτε πίπτει ἀμέσως ( καστανέα, λεύκη κ.λ.π. ) ἀφῆνον ἐνα σημεῖον ἐπὶ τοῦ βλαστοῦ, εἴτε παραμένει ἔηρδν ἐπὶ τούτου καθ' ὅλον σχεδὸν τὸν χειμῶνα ( δρῦς ). Φύλλα τινὰ πίπτουν ἀφήνοντα ἐπὶ τοῦ βλαστοῦ τὴν βάσιν τοῦ μίσχου των ( φοινιξ, πτέρις ἢ δενδρώδης ).

### Λειτουργίαι τοῦ φύλλου


Εἰς τὸ περὶ φασιόλου κεφάλαιον εἴδομεν ὅτι τὸ φύλλον ἀναπνέει, διαπνέει, ἀφομοιοῦ. Ἡ διαπνοὴ καὶ ἡ ἀφομοίωσις ἐπηρεάζονται, ἢ μὲν διαπνοὴ ἀπὸ τὴν ἔηρδν καὶ τὴν θερμότητα, μὲ τὰς ὅποιας αὐξάνει, ἢ δὲ ἀφομοίωσις ἐπηρεάζεται ἀπὸ τὸ φῶς καταπαύουσα εἰς τὸ σκότος ( κατὰ τὴν νύκτα ).

Ἡ ἀφομοίωσις γίνεται ἀπὸ τὰ πράσινα μόνον μέρη τοῦ φυτοῦ καὶ μόνον κατὰ τὴν ἡμέραν, ἐνῷ ἡ ἀναπνοὴ γίνεται ἀπὸ ὅλα τὰ μέρη τοῦ φυτοῦ καὶ διαρκῶς, δῆλον ἡμέραν καὶ νύκτα. Ἡ ἀφομοίωσις εἶναι περὶ τὰς 40 φορὰς ἐντονωτέρα τῆς ἀναπνοῆς, διὰ τοῦτο, ὅπου ὑπάρχουν πολλὰ φυτά, ἐκεῖ καὶ τὸ δέηγόν τον εἶναι ἀφθονον κατὰ τὴν ἡμέραν.

Ἡ διάταξις τῶν φύλλων εἶναι τοιαύτη ( σχ. 202 ), ὥστε νὰ διευκολύνῃ τὸ φυτὸν εἰς τὴν ἐπιτέλεσιν τῶν διαφόρων λειτουργιῶν του.

Οὕτω τὰ φύλλα διατάσσονται κατὰ τρόπον, ὥστε αἱ ἀκτῖνες τοῦ ἡλίου νὰ πίπτουν καθέτως ἐπ' αὐτῶν, ἐπομένως ταῦτα νὰ δέχωνται περισσότερον φῶς καὶ οὕτω ἀφομοιοῦν περισσότερον, ὅπως π.χ. εἰς τὴν σταυρωτὴν διάταξιν τῶν ἀντιθέτων φυμένων φύλλων ( λάμιον, κνίδη ), ὅπου τὰ μέν, δὲν σκιάζουν τὰ δέ.

Ἐνίστε τὰ φύλλα κυρτοῦνται κατὰ τὴν ἄνω ἐπιφάνειάν των ( φύλλα μαραμένα ) κατὰ τρόπον, ὥστε νὰ κλείσουν τὰ στόματα τῆς κάτω ἐπι-



'Αντίθετος

Κατ' ἐναλλαγήν  
Σχ. 202. Ἐκφρασις φύλλων

Κατὰ σπονδύλους

φανείας τοῦ φύλλου ( ὅπως θὰ ἔκλειε μία πληγὴ εἰς τὴν παλάμην μας, ἀν ἔκλεισαμεν ταύτην ) καὶ νὰ ἐλαττοῦνται σύτῳ ἢ διαπνοή· τὴν τοιαύτην θέσιν τῶν φύλλων λέγομεν ὕπνον ἢ κατάκλισιν τῶν φύλλων ( σχ. 203 ).

Πολλὰ ἀπὸ τὰ μέρη τῶν φυτῶν, τὰ ὁποῖα ἐξητάσαμεν ἔως τώρα, ὅπως οἱ χιτῶνες τῶν βολβῶν, αἱ κοτυληδόνες, αἱ ἔλικες, αἱ ἄκανθαι, τὰ διάφορα μέρη τοῦ ἄνθους ( στήματα, πέταλα, σέπαλα κ.λ.π. ) εἶναι φύλλα μετασχηματισμένα.



Σχ. 203. Κατάκλισις τῶν φυλλαρίων τῶν συνθέτων φύλλων τῆς καστανέας.

#### ΠΙΝΑΞ 4. — ΦΥΛΛΟΝ

Φύλλα ἔχουσιν ὅλα τὰ φυτὰ πλὴν τῶν θαλλοφύτων.

Μέρη τοῦ φύλλου :	<table border="0"> <tr> <td rowspan="3">Φύλλα ως πρὸς τὸν μίσχον :</td><td>"Ελασμα</td></tr> <tr><td>Μίσχος</td></tr> <tr><td>Κολεὸς περιβάλλων τὸν βλαστόν.</td></tr> </table>	Φύλλα ως πρὸς τὸν μίσχον :	"Ελασμα	Μίσχος	Κολεὸς περιβάλλων τὸν βλαστόν.
Φύλλα ως πρὸς τὸν μίσχον :	"Ελασμα				
	Μίσχος				
	Κολεὸς περιβάλλων τὸν βλαστόν.				
	<table border="0"> <tr> <td rowspan="2"></td><td>"Αμισχα</td></tr> <tr><td>"Εμμισχα</td></tr> </table>		"Αμισχα	"Εμμισχα	
	"Αμισχα				
	"Εμμισχα				
	Mὲ κολεὸν				

Νεύρωσις τοῦ φύλλου :	<table border="0"> <tr><td>Φύλλα μονόνευρα</td></tr> <tr><td>» παραληγόνευρα</td></tr> <tr><td>» πτερόνευρα</td></tr> <tr><td>» παλαιμόνευρα</td></tr> </table>	Φύλλα μονόνευρα	» παραληγόνευρα	» πτερόνευρα	» παλαιμόνευρα		
Φύλλα μονόνευρα							
» παραληγόνευρα							
» πτερόνευρα							
» παλαιμόνευρα							
Εἴδη ἐλάσματος :	<table border="0"> <tr><td>Ολόκληρον</td></tr> <tr><td>Οδοντωτὸν</td></tr> <tr><td>Λαβωτὸν</td></tr> <tr><td>Ἐσχισμένον</td></tr> </table>	Ολόκληρον	Οδοντωτὸν	Λαβωτὸν	Ἐσχισμένον		
Ολόκληρον							
Οδοντωτὸν							
Λαβωτὸν							
Ἐσχισμένον							
Φύλλα ὡς πρὸς τὸν σχηματισμόν :	<table border="0"> <tr><td>Απλᾶ</td></tr> <tr><td>Σύνθετα ( δηλ. μὲ φυλλάρια )</td></tr> </table>	Απλᾶ	Σύνθετα ( δηλ. μὲ φυλλάρια )				
Απλᾶ							
Σύνθετα ( δηλ. μὲ φυλλάρια )							
Διάταξις φυλλαρίων :	<table border="0"> <tr><td>Πτερόμορφος</td></tr> <tr><td>Παλαιμόρφος</td></tr> </table>	Πτερόμορφος	Παλαιμόρφος				
Πτερόμορφος							
Παλαιμόρφος							
Μετασχηματισμὸς φύλλων εἰς :	<table border="0"> <tr><td>Φυλλίδια ὀφθαλμῶν</td></tr> <tr><td>Χιτῶνας βολβῶν</td></tr> <tr><td>Κοτυληδόνας</td></tr> <tr><td>Ἐλικας καὶ ἀκάνθας</td></tr> <tr><td>Τὰ διάφορα μέρη τοῦ ἄνθους</td></tr> <tr><td>Παράνθια φύλλα</td></tr> </table>	Φυλλίδια ὀφθαλμῶν	Χιτῶνας βολβῶν	Κοτυληδόνας	Ἐλικας καὶ ἀκάνθας	Τὰ διάφορα μέρη τοῦ ἄνθους	Παράνθια φύλλα
Φυλλίδια ὀφθαλμῶν							
Χιτῶνας βολβῶν							
Κοτυληδόνας							
Ἐλικας καὶ ἀκάνθας							
Τὰ διάφορα μέρη τοῦ ἄνθους							
Παράνθια φύλλα							
Σύστασις τοῦ φύλλου :	<table border="0"> <tr><td>Ξυλώδεις καὶ ἥθιμώδεις σωλῆνες, παρέγχυμα, κόκκοι χλωροφύλλης</td></tr> </table>	Ξυλώδεις καὶ ἥθιμώδεις σωλῆνες, παρέγχυμα, κόκκοι χλωροφύλλης					
Ξυλώδεις καὶ ἥθιμώδεις σωλῆνες, παρέγχυμα, κόκκοι χλωροφύλλης							
Ἐπιδερμίς :	<table border="0"> <tr><td>Εἰς τὸ ἄνω μέρος της ὀλίγα στόματα</td></tr> <tr><td>Εἰς τὸ κάτω μέρος της πολλὰ στόματα</td></tr> <tr><td>Τρίχες</td></tr> </table>	Εἰς τὸ ἄνω μέρος της ὀλίγα στόματα	Εἰς τὸ κάτω μέρος της πολλὰ στόματα	Τρίχες			
Εἰς τὸ ἄνω μέρος της ὀλίγα στόματα							
Εἰς τὸ κάτω μέρος της πολλὰ στόματα							
Τρίχες							
Τρόπος ἐκφύσεως τῶν φύλλων :	<table border="0"> <tr><td>Κατ' ἐναλλαγὴν ( ἐν ἀπὸ κάθε γόνατον )</td></tr> <tr><td>Ἀντιθέτως ( ἀνὰ δύο )</td></tr> <tr><td>Πλέον τῶν δύο ( σπανίως )</td></tr> </table>	Κατ' ἐναλλαγὴν ( ἐν ἀπὸ κάθε γόνατον )	Ἀντιθέτως ( ἀνὰ δύο )	Πλέον τῶν δύο ( σπανίως )			
Κατ' ἐναλλαγὴν ( ἐν ἀπὸ κάθε γόνατον )							
Ἀντιθέτως ( ἀνὰ δύο )							
Πλέον τῶν δύο ( σπανίως )							
Κινήσεις τῶν φύλλων :	<table border="0"> <tr><td>Περιοδικαὶ ( ὅπνος καὶ ἔγερσις )</td></tr> <tr><td>Προκαλούμεναι ἐξ ἑρεθισμοῦ ( μιμόζα )</td></tr> </table>	Περιοδικαὶ ( ὅπνος καὶ ἔγερσις )	Προκαλούμεναι ἐξ ἑρεθισμοῦ ( μιμόζα )				
Περιοδικαὶ ( ὅπνος καὶ ἔγερσις )							
Προκαλούμεναι ἐξ ἑρεθισμοῦ ( μιμόζα )							
Αειτουργίαι τοῦ φύλλου :	<table border="0"> <tr><td>Ἀναπνοὴ καὶ διαπνοὴ ( ἡμέραν καὶ νύκτα )</td></tr> <tr><td>Αφομοίωσις ( μόνον τὴν ἡμέραν ).</td></tr> </table>	Ἀναπνοὴ καὶ διαπνοὴ ( ἡμέραν καὶ νύκτα )	Αφομοίωσις ( μόνον τὴν ἡμέραν ).				
Ἀναπνοὴ καὶ διαπνοὴ ( ἡμέραν καὶ νύκτα )							
Αφομοίωσις ( μόνον τὴν ἡμέραν ).							

‘Η σκληρά έπιεδερμίς, ή έλάττωσις τής έπιφανείας του φύλλου και τὸ ἄφθονον χνούδι εἰς τὴν κάτω έπιφάνειάν του κάμνουν τὴν διαπνοὴν μικρὰν καὶ εύνοοῦν τὴν ζωὴν τοῦ φυτοῦ εἰς ξηρὰ μέρη.

### Διατροφὴ τοῦ φυτοῦ

Κάθε ζῶν ὃν μὲ τὴν ζωὴν φθείρεται καὶ διὰ νὰ ἀναπληρώσῃ τὴν φθορὰν αὐτὴν καὶ αὐξηθῇ, ἔχει ἀνάγκην τροφῆς.

Τὴν τροφὴν ταῦτην τὸ φυτὸν τὴν εὔρισκει ἀφ' ἐνὸς εἰς τὸ ἔδαφος ( ὕδωρ καὶ ἄλατα διαλελυμένα εἰς αὐτό ), ἀπὸ τὸ ὄποῖον τὴν παραλαμβάνει μὲ τὰ ἀπορροφητικὰ τριγλίδια τῶν ριζῶν του, ἀφ' ἑτέρου δὲ εἰς τὴν ἀτμόσφαιραν ( ἄνθρακα ), ἀπὸ τὴν ὄποιαν τὴν παραλαμβάνει μὲ τὰ πράσινά του μέρη ( χλωροφύλλην ) τῇ βοηθείᾳ τοῦ φωτός.

΄Απαραίτητα διὰ τὴν ζωὴν τοῦ φυτοῦ, πλὴν τοῦ ἄνθρακος, εἶναι τὰ στοιχεῖα ὑδρογόνον, ὀξυτον, θειον καὶ γωσφόρος, στοιχεῖα, τὰ ὄποια περιέχει τὸ πρωτόπλασμα, τὸ ὄποιον εἶναι τὸ κύριον συστατικὸν κάθε κυττάρου. Άπαραίτητα ἐπίσης ( ἀλλὰ εἰς μικροτέραν ποσότητα ) στοιχεῖα εἶναι τὸ πυρότιον, τὸ χλώριον, τὸ κάλλιον, τὸ ἀσβέστιον, τὸ μαγνήσιον καὶ ὁ σίδηρος, ὁ ὄποιος συντείνει εἰς τὴν παραγωγὴν τῆς χλωροφύλλης καὶ ἀνευ τοῦ ὄποίου τὸ φυτὸν κιτρινίζει.

Εἰς τὸ σῶμα μερικῶν ἀπὸ τὰ φυτὰ εὑρέθησαν ἀκόμη τὰ στοιχεῖα νάτριον, βρώμιον, ιώδιον ( ίδιως εἰς τὰ φύκη ), φευδάργυρος, μαγγάνιον, χαλκὸς κ.λ.π., τὰ ὄποια ὅμως δύνανται καὶ νὰ λείψουν χωρὶς βλάβην τοῦ φυτοῦ.

Τὰ ὡς ἄνω ὄλικά, πλὴν τοῦ ἄνθρακος, τὸ φυτὸν τὰ παραλαμβάνει διὰ τῶν ριζῶν του ὡς ἄλατα διαλελυμένα ἐντὸς τοῦ ὕδατος καὶ ἐκ τῶν ριζῶν μεταφέρονται ταῦτα πρὸς τὰ ἄνω διὰ τῶν ξυλωδῶν σωλήνων φθάνοντα μέχρι τῶν φύλλων.


Ποῖαι εἶναι αἱ δυνάμεις, αἱ ὄποιαι προκαλοῦν τὸ πρὸς τὰ ἄνω φεῦμα τοῦτο τοῦ ὕδατος μετὰ τῶν εἰς αὐτὸ διαλελυμένων ἀλάτων;

Αἱ δυνάμεις αὗται εἶναι δύο κυρίως, ἐκτὸς τῆς ὀφειλομένης εἰς τὰ τριχοειδῆ φαινόμενα ( γνωστὰ ἐκ τῆς Πειραματικῆς Φυσικῆς ).

΄Η μία, ὀφειλομένη εἰς τὰς ριζας, καλεῖται ριζικὴ πίεσις. Αὕτη εἶναι ἡ πίεσις τοῦ μόλις ἀπορροφηθέντος ὑγροῦ πρὸς ἐκεῖνο, τὸ ὄποιον ὑπάρχει ἥδη ἐντὸς τῶν ξυλωδῶν σωλήνων. Τὸ νέον δηλ. ἀπορροφώμενον ὑγρόν, ὀθεῖ πρὸς τὰ ἄνω τὸ ἐντὸς τῶν σωλήνων προϋπάρχον ὑγρόν.

Τὴν ὑπαρξίν τῆς πιέσεως ταύτης δυνάμεθα νὰ διαπιστώσωμεν μὲ τὸ κάτωθι πείραμα :


Πείραμα. Ἐκ νεαροῦ φυτοῦ ἀμπέλου ἀποκόπτομεν τὸν βλαστὸν διάλιγον ἄνωθεν τῶν ριζῶν του καὶ εἰς τὸ κοπὲν μέρος ἐφαρμόζομεν δοχεῖον ὑάλινον μὲ ὅπην εἰς τὰ πλάγια (σχ. 204), διὰ τῆς ὁποίας συγκοινωνεῖ τοῦτο μὲ ἀνοικτὸν μανόμετρον. Βλέπομεν τὸν ὑδράργυρον τοῦ μανομέτρου, ὑπὸ τὴν πίεσιν τοῦ ὑπὸ τῆς ριζῆς ἀπορροφωμένου ὕδατος,



Σχ. 204. Διὰ τῆς ριζικῆς πιέσεως τὸ ὕδωρ ἀνυψοῦται εἰς τὸν σωλῆνα αἱ μοιωὶς εἰς τὸν σωλῆνα β ὁ ὑδράργυρος ἀνυψοῦται μέχρι τοῦ γ δεικνύων πίεσιν ἵσην πρὸς τὴν πίεσιν μιᾶς ἀτμοσφαῖρας.

τὸ ὄποιον ἀφθόνως ἔκρεει ἐκ τοῦ ἀποκοπέντος βλαστοῦ ἐντὸς τοῦ σωλῆνος, νὰ ἀνέρχεται μετροῦντες τὴν πίεσιν αὐτὴν τὴν εὑρίσκομεν ἵσην πρὸς μίαν ἀτμόσφαιραν. "Αν δὲν ἔχωμεν μανόμετρον, δυνάμεθα νὰ ἐφαρμόσωμεν ὑάλινον ἀνοικτὸν σωλῆνα μὲ ὕδωρ, ὅτε βλέπομεν νὰ ἀνέρχεται τὸ ὕδωρ τοῦ σωλῆνος.

"Η ἀλλη δύναμις εἶναι ἡ προκαλούμένη ἀπὸ τὴν διαπνοήν. Μὲ τὴν διαπνοήν φεύγει ἀπὸ τὰ φύλλα ὕδωρ, καὶ τὴν θέσιν του ἔρχεται νὰ κατα-



Σχ. 205. Πείραμα δεικνύον τὴν διαπνοὴν τῶν φύλλων. 1 πῶμα ἀπὸ φελόν, 2 ὕδωρ, 3 τὸ ὕψος εἰς τὸ ὄποιον ἀνῆλθεν ὁ ὑδράργυρος ἐντὸς τοῦ σωλῆνος καταλαμβάνων τὴν θέσιν τοῦ ὑπὸ τοῦ φυτοῦ ἀπορροφηθέντος ὕδατος τοῦ σωλῆνος, τὸ ὄποιον ἐν συνεχείᾳ ἀπεβλήθη διὰ τῆς διαπνοῆς τοῦ φυτοῦ.

λάβηγ ξέλιο ἀνερχόμενον ἐκ τῶν κάτω. Τοῦτο δυνάμεθα νὰ διαπιστώσωμεν διὰ τοῦ ἔξῆς πειράματος :

Πεὶ ραμφα. Λαμβάνομεν ἕνα σωλῆνα ( ὅπως φαίνεται εἰς τὸ σχ. 205 ) ἀνοικτὸν καὶ κατὰ τὰ δύο ἄκρα του. Τὸ κάτω ἄκρον του τὸ φράσσομεν διὰ τοῦ δακτύλου μας, γεμίζομεν τὸν σωλῆνα μὲ ὄδωρ καὶ τὸν ἀναστρέφομεν ἐντὸς λεκάνης ὑδραργύρου, ἀποσύροντες συγχρόνως τὸν δάκτυλόν μας. Λόγῳ τῆς ἀτμοσφαιρικῆς πιέσεως τὸ ὄδωρ παραμένει ἐντὸς τοῦ σωλῆνος. Ἀπὸ τὸ ἄνω ἄκρον του εἰσάγομεν ἐντὸς τοῦ ὄδατος τοῦ σωλῆνος τὸ ἄκρον μόλις ἀποκοπέντος βλαστοῦ καὶ φράσσομεν καλῶς τὴν διάτην διὰ κηροῦ, ὥστε νὰ μὴ δύναται νὰ ἔχεται θῆρη τὸ ἐντὸς τοῦ σωλῆνος ὄδωρ. Μετά τινα χρόνον θὰ παρατηρήσωμεν, ὅτι ὁ ὑδραργύρος ἀνηγγίθειν ἐκ τῆς λεκάνης εἰς τὸ κάτω μέρος τοῦ σωλῆνος, ὅπου πρὸς ὑπῆρχεν ὄδωρ. Τοῦτο συνέβη διότι ἀπὸ τὰ φύλλα τοῦ βλαστοῦ ἀπεβλήθη, διὰ τῆς διαπνοῆς, ὄδωρ εἰς τὸν ἀέρα ( ὄδωρ, τὸ ὄποιον ἐλήφθη ἀπὸ τὸ ὑπάρχον ἐντὸς τοῦ σωλῆνος )· τὴν θέσιν τοῦ ἀποβληθέντος ὄδατος αὐτοῦ κατέλαβεν ἀνελθὼν ὁ ὑδραργύρος τῆς λεκάνης ( σχ. 205 ).

Τὸπὸς τὴν ἐπίδρασιν τῶν δύο τούτων πιέσεων τὸ ὄδωρ μὲ τὰ ἄλατα φθάνει εἰς τὰ φύλλα. Ἐκεῖ συμπυκνοῦται, ἀποβαλλομένων λόγῳ τῆς διαπνοῆς ὄδατος, μὲ τὰ ἄλατα δὲ τὰ ὄποια εἶναι διαλελυμένα εἰς τὸ ὄδωρ καὶ μὲ τὸν ἄνθρακα, τὸν ὄποιον διὰ τῆς χλωροφύλλης του λαμβάνει τὸ φυτὸν ἀπὸ τὴν ἀτμοσφαιραν ( μὲ τὴν βούρθειαν τοῦ ἡλιακοῦ φωτός ), κατασκευάζονται διάφορα ὄντικά καὶ τελικῶς ὁ λεγόμενος θρεπτικὸς χυμός, ὃστις μὲ τοὺς ἡθικάδεις σωλῆνας μεταβαίνει εἰς τὰ διάφορα μέρη τοῦ φυτοῦ καὶ οὕτω τὸ φυτὸν τρέφεται.

Οὕτω βλέπομεν, ὅτι τὸ φυτὸν ἔχει τὴν ἴκανότητα νὰ παραλαμβάνῃ ἀνρόγανα ὄντικά καὶ νὰ τὰ μετατρέπῃ εἰς ὁργανικὰ τοιαῦτα.

Σαπρόφυτα — Παράσιτα. "Εχομεν ὅμως καὶ φυτά, τὰ ὄποια στεροῦνται χλωροφύλλης καὶ δὲν δύνανται νὰ ἀφομοιώσουν. Δὲν δύνανται ἐπομένως νὰ μεταβάλλουν ἀνρόγανα ὄντικά εἰς ὄργανηκα τοιαῦτα. Τὰ φυτὰ ταῦτα ἀνευρίσκουν ὄργανηκά ὄντικά εἴτε εἰς σεσηπιάς ὄργανηκάς ούσιας ἐπὶ τῶν ὄποιων ζοῦν καὶ ἐκ τῶν ὄποιων τρέφονται ( σαπρόφυτα, μύκητες ), εἴτε εἰς ζῶντα ὄντα, ἐπὶ τῶν ὄποιων ζοῦν ὡς παράσιτα, ὅπως π.χ. ἡ ὄροβαλγχη.

Εἰδὴ τινὰ φυτῶν ζοῦν παρασιτικῶς, ἔχουσιν ὅμως καὶ χλωροφύλλην

μὲ τὴν ὄποιαν ἀφομοιοῦσι ( π.γ. ιεός )· τὰ φυτὰ ταῦτα λέγονται ἡμί-  
παράσιτα.

Συμβέσις. Ἀντίθετος πρὸς τὸν παρασιτισμόν, ὅστις εἶναι  
ἀληθῆς πάλη μεταξὺ δύο ὄργανισμῶν διὰ τὴν ἐπικράτησιν καὶ τὴν δια-  
τήρησιν των εἰς τὴν ζωήν, εἶναι ἡ λεγομένη συμβίωσις. Κατὰ ταῦτην  
δύο φυτὰ ζῶσιν ἀπὸ κοινοῦ, ἔχοντα διφέλη ἀπὸ τὴν κοινὴν ζωήν των.  
Τὸ πλέον ἀξιοπα κτήρητον φαινόμενον συμβιώσεως μᾶς παρέχουν οἱ λει-  
χῆνες ( μύκητες καὶ φύκη ).

Ἐναποθήκευσις θρεπτικῶν συστατικῶν εἰς τὰ φυτὰ

Τὰ ὄργανικὰ συστατικά, τὰ ὄποια κατασκευάζει τὸ φυτὸν μὲ ὑλικὴ  
ἀνόργανη, δὲν χρησιμοποιοῦνται ὅλα πρὸς διατροφήν του· ἐν μέρος τῶν  
συστατικῶν τούτων περισσεύει.

Τὰ περισσεύοντα αὐτὰ  
θρεπτικὰ συστατικὰ τὰ ἐνα-  
ποθηκεύει τὸ φυτὸν διὰ νὰ  
τοῦ χρησιμεύσουν εἰς ἄλλην  
ἐποχὴν ἢ διὰ νὰ χρησιμεύ-  
σουν εἰς τοὺς ἀπογόνους του,  
δηλ. τὰ νεαρὰ φυτά, τὰ ὄποια  
θὰ προέλθωσιν ἀπὸ αὐτό, ὅπως  
π.γ. εἶναι τὰ ἐντὸς τῶν σπερ-  
μάτων θρεπτικὰ συστατικά.

‘Ως ἀποθήκας πρὸς τὸν σκοπὸν τοῦτον τὸ φυτὸν χρησιμοποιεῖ:  
α) Τὰ φύλλα, τοὺς ὑπεργείους βλαστούς καὶ τοὺς ἀνθοφόρους  
ὅφθαλμους ( π.γ. κράμβη ἢ κεφαλωτή, κουνουπίδι, μαρούλι καὶ πολλὰ  
ἄλλα φυτά ).

β) Τοὺς ὑπογείους βλαστούς, δηλαδὴ τοὺς βολβοὺς ( κρόμμιον,  
κ.λ.π. ), τὰ ριζώματα ( ἡδύοσμος κ.λ.π. ), τοὺς κοινδύλους ( γεώμηλον ),  
καὶ τέλος

γ) Τὰ σπέρματα καὶ τοὺς καρπούς, ὅπου συνήθως ἐναποθηκεύ-  
ονται τὰ περισσότερα θρεπτικὰ συστατικά.

Αἱ ὄργανικαι οὖσι, ἀπὸ τὰς ὄποιας κυρίως ἀποτελοῦνται τὰ ἀπο-  
ταμιεύομενα ὑλικά, εἶναι:

“Λυμαλον. Ὅπάρχει εἰς τὰ γεώμηλα, τὰ δημητριακά, τὰ κά-



Σχ. 206. α κόκκοι ἀλμύλου ἐντὸς ἐνός  
κυττάρου. β κόκκος ἀλμύλου.

στανα κ.λ.π. Ἀποτελεῖται ἀπὸ κόκκους, τοὺς ὅποίους δυνάμεθα νὰ ἴδωμεν ἔξετάζοντες λεπτὴν τομὴν γεωμήλου εἰς τὸ μικροσκόπιον ( σχ. 206 ).

Σάκχαρον. Τοῦτο ὑπάρχει εἰς τὰ τεῦτλα, τὰ καρῶτα, τὸ σακχαροκάλαμον, τοὺς χιτῶνας τῶν βολβῶν τοῦ κροιμού, εἰς πλείστους καρποὺς κ.λ.π.

Διάφορα ἔλαια καὶ αἴθέρια ἔλαια. Ταῦτα ἀνεύρισκονται κυρίως εἰς τὰ ἄνθη, τὰ σπέρματα καὶ τοὺς καρποὺς ( κάρυα, ἥλιανθος, ἀραχίς, μίνθη, λίνον, μήκων, ἐλαία, σινάπι κ.λ.π. ).

Λίπη. Ὁπως π.χ. εἰς τὰ ἱνδικὰ καρύδια, εἰς τὰ σπέρματα τοῦ κακάου κ.λ.π.

Λευκωματοῦ χοιρίου οὐσίαι. Υπάρχουν εἰς τὸν φασίολον, τὸ λούπινον, τὸν κύαμον κ.λ.π.

Οξέα. Ταῦτα περιέχονται εἰς τοὺς ὅποὺς διαφόρων ὅπωρῶν ὡς π.χ. εἰς τὸν δόπον τοῦ λεμονίου, τοῦ κίτρου κ.λ.π.

## ΠΙΝΑΞ 5. — ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΥ

Ἡ διατροφὴ εἶναι ἀναγκαία διὰ κάθε ζῶν ὅν.

Τὰ χρήσιμα διὰ τὸ φυτὸν ὕλικὰ δύνανται νὰ προσδιορισθῶσιν εἴτε ἀναλυτικῶς, δηλαδὴ διὰ χημικῆς ἀναλύσεως τοῦ φυτοῦ, εἴτε συνθετικῶς, δι’ ἀναζητήσεως δηλ. τῶν θρεπτικῶν διαλυμάτων, μὲ τὰ ὅποῖα τὸ φυτὸν δύναται νὰ τραφῇ καὶ νὰ αὔξηθῃ.

Ἀνάλυσις :  
( Μὲ τὴν ἀνάλυσιν ἀνευρίσκονται εἰς τὸ σῶμα τοῦ φυτοῦ ἀπαραίτητως )

‘Γλικὰ περιέχοντα ἀνθρακα, ὑδρογόνον, διευγόνον, ἄζωτον καὶ ἀνόργανα ἄλατα. Ἀνευρίσκονται δηλαδὴ : “Αμυλον, σάκχαρον ἔλαια καὶ αἴθέρια ἔλαια, λίπη, λευκώματοῦχοι οὐσίαι καὶ φυτικὰ δέξα.

Σύνθεσις :  
( Στοιχεῖα, τὰ ὅποῖα χρειάζεται τὸ φυτόν, διὰ νὰ κατασκευάσῃ τὰ διάφορα μέρη τοῦ σώματός του )

Στοιχεῖα ἀπαραίτητα : “Ανθραξ, διευγόνον, ὑδρογόνον, ἄζωτον, φωσφόρος.  
Στοιχεῖα ἀπαραίτητα, ἀλλὰ εἰς μικρὰν ποσότητα : Πυρίτιον, χλώριον, κάλλιον, ἀσβέστιον, μαγνήσιον, σίδηρος.  
Στοιχεῖα μὴ ἀπαραίτητα : Νάτριον, βρώμιον, λάδιον, ψευδάργυρος, χαλκός, μαγγάνιον κ.λ.π.  
“Εχουσιν ἀνευρεθῆ πλέον τῶν 40 στοιχείων εἰς τὸ σῶμα τοῦ φυτοῦ.

Τὰ ὑλικὰ ταῦτα πρέπει νὰ δοθῶσιν εἰς τὸ φυτὸν διαλελυμένα εἰς τὸ οὐδωρ, δηλ. ὡς ἄλατα.

Τρόπος παραλαβῆς ὑπὸ τῶν φυτῶν τῶν θρεπτικῶν συστατικῶν καὶ διάθεσις τούτων.

<p>1. Φυτὰ μὲ χλωροφύλλην :</p>	<p>Τὸν ἄνθρακα παραλαμβά- νουν τὰ φυτὰ ἀπὸ τὴν ἀτμόσφαιραν μὲ τὰ πράσι- να μέρη των.</p> <p>Τὰ λοιπὰ ὑλικὰ παραλαμ- βάνουν ἀπὸ τὸ ἔδαφος μὲ τὰ ἀπορροφητικὰ τριχί- δια τῶν ριζῶν των.</p>	<p>Απὸ τὰ ἀνόργανα αὔτη ὑλικὰ κατασκευάζουν ὑλικὰ δργανικά</p>
<p>2. Φυτὰ χωρίς χλωροφύλλην :</p>	<p>Παραλαμβάνουν έτοιμους δργανι- κὰς οὐσίας</p>	<p>Σαπρόφυτα ( ζῶσιν εἰς σεσηπυίας ( οὐσίας ) Παράσιτα ( ζῶσιν ἐπὶ ζώντων ὄντων )</p>
<p>Ἐναποθήκευσις περισσευμάτων :</p>	<p>Εἰς ὑπεργείους βλαστούς καὶ φύλλα Εἰς ὑπογείους βλαστούς ( ριζώματα, βολβούς κονδύλους ) Εἰς σπέρματα Εἰς καρπούς</p>	<p>"Αμυλον Σάκχαρον "Ἐλαια Λίπη Λευκόματα Οξέα φυτικά Πυρίτιον Ασβέστιον Μαγνήσιον</p>
<p>Ἐναποθηκευμένα ὑλικά :</p>	<p>'Οργανικά :  'Ανόργανα :</p>	<p>"Αμυλον Σάκχαρον "Ἐλαια Λίπη Λευκόματα Οξέα φυτικά Πυρίτιον Ασβέστιον Μαγνήσιον</p>

## II. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΥ

Οι διάφοροι τρόποι πολλαπλασιασμοῦ τῶν φυτῶν

Κάθε φυτὸν εἰς μίαν ὥρισμένην ἐποχὴν τῆς ζωῆς του πολλαπλασιάζεται, ἐπιτυγχάνον οὕτω τὴν διαιώνισιν τοῦ εἰδους του.

‘Ο πολλαπλασιασμὸς αὐτὸς γίνεται κατὰ δύο τρόπους :

“Η μὲν ἔνα σίνοδή ποτε τεμάχιον τοῦ φυτοῦ, ὅπως π.χ. μὲ καταβολάδας (ἄμπελος) μοσχεύματα (ἄμπελος, ἐλαία κ.λ.π.) ἡ μὲ τὴν βοήθειαν εἰδικῶν στοιχείων, τὰ ὅποια παράγει τὸ φυτόν, δηλ. σπορίων, ὡῶν καὶ σπερμάτων.

Καταβολάδες. Αὗται εἶναι μέρος τοῦ φυτοῦ, βλαστὸς συνήθως, ὡς ὅποιος γίνεται εἰς τὸ ἄδαφος καὶ ἀποκτᾷ, εἰς τὸ μέρος ἐκεῖνο, ρίζας, χωρὶς νὰ παύσῃ νὰ εἶναι συνδεδεμένος μὲ τὸ μητρικὸν φυτόν. Μένει οὕτως ἐκεῖ μέχρις ὅτου ἀποκτήσῃ ρίζας ἀρκετὰς διὰ νὰ τρέφεται μόνος του, χωρὶς τὴν βοήθειαν τοῦ μητρικοῦ φυτοῦ, ὅπότε ἀποκόπτεται ἀπὸ τοῦτο καὶ ἀποτελεῖ νέον φυτόν.

Παραφυάδες. Αὗται εἶναι κλάδοι ἐκφύσιμενοι ἐκ τῆς βάσεως τοῦ βλαστοῦ τοῦ φυτοῦ, οἵτινες φέρουσιν, εἰς τὸ ἐντὸς τοῦ γίγματος μέρος των, διλύγας ρίζας. Ἀποσπώμενοι μὲ προσοχὴν διὰ νὰ μὴ καταστραφοῦν αἱ ρίζαι των καὶ φυτευόμενοι οἱ κλάδοι οὗτοι δίδουσι νέα φυτά.

Μισχεύματα. Ταῦτα εἶναι τμήματα βλαστῶν, τὰ ὅποια γίνονται εἰς τὸ ἄδαφος μὲ τὸ ἐν ἄρρεν των εἰς τὸ ἐντὸς τοῦ ἄδαφους μέρος των ἀποκτοῦν ρίζας καὶ δίδουν οὕτω νέα φυτά.

Σπόρια. Τὸ σπόριον εἶναι ἐν τεμάχιον τοῦ φυτοῦ, ἀποτελούμενον ἀπὸ ἓν καὶ μόνον κύτταρον μὲ συμπεπυκνωμένον πρωτόπλασμα. Τὸ τεμάχιον τοῦτο, τὸ σπόριον δηλαδή, εἶναι ίκανὸν νὰ δώσῃ νέον φυτόν.

Ωάδες. Τὸ ὡδὸν προέρχεται ἀπὸ τὴν συγγάνευσιν δύο κυττάρων, τὰ ὅποια συνήθως εἶναι τὸ ἔν ἄρρεν, τὸ δὲ ἄλλο θῆλυ. Ἐκ τούτων τὸ ἄρρεν εἰς τὰς περισσοτέρας περιπτώσεις δύναται νὰ μετακινηθῇ, εἴτε μόνον του (μὲ τὴν βοήθειαν κινητικῶν βλεφαρίδων, τὰς ὅποιας φέρει), εἴτε μεταφερόμενον διὰ τοῦ ἀνέμου, τῶν ἐντόμων κ.λ.π. Μεταβαίνει καὶ συναντᾷ τὸ θῆλυ μετὰ τοῦ ὅποιου συγγάνευεται. Λέγομεν δτι γονιμο-

ποιεῖ τὸ θῆλυ κύτταρον καὶ ἀπὸ τὴν γονιμοποίησιν αὐτὴν προέρχεται ἐν ὥρᾳ, τὸ ὄποῖον θὰ δώσῃ νέον φυτόν.

Σ πέρ ματα. Τὸ σπέρμα σχηματίζεται ἀπὸ τὸ ὥραν, τὸ ὄποῖον προῆλθεν ἀπὸ τὸ γονιμοποιηθὲν θῆλυ κύτταρον ( ὡάριον ) καὶ περιέχει τὸ φυτικὸν ἔμβρυον καὶ τὰ ἀναγκαῖα θρεπτικὰ συστατικὰ διὰ τὴν πρώτην ἀνάπτυξιν τοῦ μικροῦ φυτοῦ.

Δηλαδὴ τὸ ὥραν προέρχεται ἀπὸ δύο κύτταρα συγχωνευόμενα, ἐνῷ τὸ σπόριον προέρχεται ἀπὸ ἐν κύτταρον, τοῦ ὄποίου ἔχει συμπυκνωθῆ<sup>τη</sup> τὸ πρωτόπλασμα ( ἀνανεωμένον κύτταρον ).

Εἰς τὴν περίπτωσιν τοῦ πολλαπλασιασμοῦ διὰ σπερμάτων ἡ κληρονομικότης δὲν εἶναι πάντοτε πλήρης, δηλαδὴ τὰ νέα φυτὰ δὲν ὁμοιάζουν πάντοτε πρὸς τὰ φυτά, ἐξ ὧν τὰ σπέρματα προέρχονται, ἀλλὰ τείνουν νὰ ὁμοιάσουν πρὸς τοὺς ἀγρίους προγόνους, ἐξ ὧν προῆλθον διὰ τῆς καλλιεργείας οἱ γονεῖς των ( ἀπιδέα, ἀμυγδαλῆ, ἐλαΐα κ.λ.π. ). Εἰς τὴν περίπτωσιν ταύτην ἐπεμβαίνομεν, ὡς εἴδομεν, διὰ τοῦ ἔμβολιασμοῦ, διὰ νὰ ἀποκτήσωμεν τὰς ποικιλίας ἔξευγενισμένων φυτῶν, τὰς ὄποιας ἐπιθυμοῦμεν.

#### ΠΙΝΑΞ 6. — ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ

Διὰ τεμαχίων :	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Καταβολάδες} \\ \text{Παραφυάδες} \\ \text{Μοσχεύματα} \end{array} \right\}$	Κληρονομικότης πλήρης
----------------	--	-----------------------

Διὰ σπορίων :	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Κύτταρα ἀνανεωμένα ( συμπύκνωσις πρωτόπλασματος ). \end{array} \right.$
---------------	---

Δι' ὥραν :	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Συγχώνευσις δύο κυττάρων πρὸς ἀποτέλεσμα τοῦ ὥρου. Μετέπειτα παραγωγὴ σπέρματος, δηλ. φυτικοῦ ἔμβρυου μετὰ θρεπτικῶν συστατικῶν διὰ τὴν πρώτην ἀνάπτυξιν τοῦ φυτοῦ. \\ \text{Κληρονομικότης ὡχι πάντοτε πλήρης. ("Οταν αὕτη δὲν εἶναι πλήρης, γίνεται ἐπεμβασίς δι' ἔμβολιασμοῦ). } \end{array} \right.$
------------	--

Α'. Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΣ ΤΑ ΦΑΝΕΡΟΓΑΜΑ


I. Ἡ ἀναπαραγωγὴ εἰς τὰ ἀγγειόσπερμα

α) "Α ν θ ο ζ

Εἰς τὰ ἀγγειόσπερμα φυτὰ τὰ ὅργανα ἀναπαραγωγῆς εἶναι τὰ ἄνθη. Ταῦτα φύονται εἴτε μεμονωμένως, δηλαδὴ εἰς κάθε ποδίσκον φέρεται ἐν ἄνθος (π.χ. πανσές), εἴτε κατὰ ταξιανθίας, δηλαδὴ ὡς ποδίσκος χωρίζεται εἰς ἄλλους μικροτέρους, περισσοτέρους ἢ διλιγωτέρους, εἰς τὸ ἄκρον ἐκάστου τῶν ὅποιων ὑπάρχει ἐν ἄνθος. Λέγομεν τότε, ὅτι τὰ ἄνθη φύονται κατὰ ταξιανθίας.

Ἐνίστε καὶ οἱ ποδίσκοι οὗτοι χωρίζονται εἰς ἄλλους μικροτέρους ποδίσκους, ὥποτε ἔχομεν σύνθετον ταξιανθίαν.

Εἰς τὰς ταξιανθίας, τὰ ἄνθη δύνανται νὰ εἶναι εἴτε κατὰ βότρεις (λίνον, κρῖνος, καπνός), ἢ κατὰ στάχεις (σῖτος, κριθή), ἢ κατὰ κορύμ-



Σχ. 207. Σχηματικὴ παράστασις ταξιανθιῶν  
α βότρυς, β στάχυς, γ κύρυμβος, δ δίσκος, ε σκιάδιον.

βους (μηλέα, γεώμηλον)· εἴτε νὰ σχηματίζουν δίσκον (ἀγκινάρα, κύανος, ἡλίανθος), ἢ σκιάδιον (καρῶτον) ἢ ιούλους (καστανέα, καρυά) (σχ. 207 καὶ 208).

Μέρη τοῦ ἄνθους καὶ προέλευσις αὐτῶν

Τὰ μέρη ἐξ ὧν ἀποτελεῖται τὸ ἄνθος εἶναι :

α) Ὁ κάλυξ μὲ τὰ σέπαλα. Εἰς ἔκαστον σέπαλον, ἐν τῷ ἐξετάσωμεν, εὑρίσκομεν ὅλα τὰ γνωρίσματα τοῦ φύλλου δηλ. ἔλασμα μὲ δύο ἐπιδερμίδας, στόματα καὶ τρίχας, παρέγγυμα καὶ νευ-

ρώσεις ἀπὸ ξυλώδεις καὶ ἡθικώδεις σωλῆνας. Τὰ σέπαλα δηλαδὴ εἶναι φύλλα μετασχηματισμένα.

β) Ἡ στεφάνη μὲ τὰ πέταλα. Καὶ ταῦτα εἶναι φύλλα περισσότερον ὅμως τροποποιημένα, ὥστε ἡ ὁμοιότης των μὲ πραγματικὰ φύλλα νὰ εἶναι μικροτέρα.

"Αλλως τε, διὰ τῆς καλλιεργείας δυνάμεθα νὰ μεταβάλωμεν σέπαλα εἰς πέταλα.

γ) Οἱ στήμονες μὲ τοὺς ἀνθηράς των.

δ) Ὁ ὑπερος μὲ ὠθήκην ἀπὸ καρπόφυλλα, στῦλον, στίγμα καὶ ἐντὸς τῆς ὠθήκης τὰ ὥαρια.

Εἰς ὅλα τὰ ἀνωτέρω μέρη τοῦ ἄνθους, ἀν ἐξετάσωμεν μίαν τομήν των εἰς τὸ μικροσκόπιον, εύρισκομεν τὴν αὐτὴν ἐσωτερικὴν διασκευὴν μὲ τὴν τῶν φύλλων. Μὲ τὴν καλλιέργειαν ἄλλως τε καὶ ἐδῶ ἐγένετο ἐπιτευκτὴ ἡ μεταβολὴ π.χ. στημόνων (διάνθος ὁ καρυόφυλλος) εἰς πέταλα. Δηλαδὴ ὅλα τὰ μέρη ταῦτα τοῦ ἄνθους εἶναι φύλλα μετασχηματισμένα.

Τὰ οὐσιωδέστερα μέρη τοῦ ἄνθους είναι οἱ στήμονες καὶ ὁ ὑπερος, διότι ταῦτα κυρίως ἔχουν ἀναλάβει τὴν ἀναπαραγωγὴν τοῦ φυτοῦ.

Τὰ λοιπὰ μέρη, δηλ. ὁ κάλυξ καὶ ἡ στεφάνη, χρησιμεύουν ὡς προφυλακτικὰ καὶ ἐπιβοηθητικά· προσελκύουν μὲ τὴν ὄσμήν καὶ τὸ χρῶμά των τὰ ἔντομα, στερεώνουν τὸ ἄνθος, σχηματίζουν τὸν καρπόν, ἐντὸς τοῦ ὄποιου προφυλάσσονται τὰ σπέρματα κ.λ.π.

### Εἰδη ἀνθέων

Εἰς πολλὰ ἄνθη ὑπάρχουν ὅλα τὰ ὡς ἄνω μέρη, ὅπως π.χ. εἰς τὰ χωριστοπέταλα καὶ τὰ συμπέταλα ἐκ τῶν δικοτυληδόνων φυτῶν.

Ὑπάρχουν ἄνθη, τὰ ὄποια ἔχουν καὶ στήμονας καὶ ὑπερον, εἶναι δηλαδὴ ἀρρενοθήλεα, καὶ ἄλλα ἄνθη, ποὺ ἔχουν μόνον στήμονας (ἄρ-



Σχ. 208. "Ανθη κατὰ Ιούλους.

χερα ) ἡ μόνον ὑπερον ( θύλεα ), δηλ. τὰ ἀτελῆ ἡ δίκλινα ἄνθη. Τὰ ἄνθη ταῦτα ἡ φέρονται ἀμφότερα ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ φυτοῦ φυτὰ μόνοικα ( κνίδη ἡ μικρά, ἀραβίσιτος, καρυά ), ἡ φέρονται ἐπὶ διαφόρων φυτῶν, φυτὰ δίοικα ( κνίδη ἡ μεγάλη, κάνναβις, φοῖνιξ ).

Τὰ πέταλα τῶν ἀνθέων ἡ εἶναι ἡ νωμένα ( φυτὰ συμπέταλα, π.χ. κολοκύνθη, γεώμηλον ), ἡ χωριστὰ ( φυτὰ χωριστοπέταλα, π.χ. φασίολος ), ἡ ἐλλείπουσι τελείως ( ἀπέταλα ).

Οἱ στήμονες ἡ εἶναι χωρισμένοι ( δίανθος ὁ καρυόφυλλος, λάμιον, βατράχιον ), ἡ εἶναι ἡ νωμένοι διὰ τῶν νημάτων των ( εἴτε ὅλοι χωρίς νὰ μένῃ κανεὶς ἐλεύθερος π.χ. μαλάχη, βάμβαξ, εἴτε μένουν μερικοὶ ἐλεύθεροι, ὅπως π.χ. εἰς τὸν φασίολον, εἰς τὸν ὄποιον εἶναι δύτῳ ἡ νωμένοι καὶ ἔνας ἐλεύθερος ), ἡ ἀποτελοῦν διάδακτος ( πορτοκαλέα ), ἡ εἶναι ἡ νωμένοι μὲ τοὺς ἀνθηράς των ( κύαμος, φαδίκη, μαργαρίτα ).

Τὰ καρπόφυλλα. Ταῦτα εἶναι συνήθως ἡ νωμένα καὶ σχηματίζουν διάφορα χωρίσματα. Υπάρχουν ὅμως καὶ διοθῆκαι, εἰς τὰς ὄποιας τὰ καρπόφυλλα δὲν εἶναι ἡ νωμένα ( φράσινδα ).

Εἰς τὰ δικοτυλήδονα φυτὰ τὰ τεμάχια τῶν ἀνθέων ( σέπαλα-πέταλα κ.λ.π. ) εἶναι 2 ἢ 5, ἡ ὁ ἀριθμὸς αὐτῶν εἶναι πολλαπλάσιον τοῦ 2 ἢ τοῦ 5. Λέγομεν τότε διὰ τὰ ἄνθη εἶναι τοῦ τύπου 2 ἢ 5.

Τοῦ τύπου 5 εἶναι π.χ. τὰ ψυχανθῆ, τὰ ροδώδη, τὰ μαλαχοειδῆ, τὰ σκιαδανθῆ, τὰ καρυοφυλλώδη κ.λ.π.

Τοῦ τύπου 2, δηλ. μὲ 2 τεμάχια ἡ μὲ 4 κ.λ.π., εἶναι ἡ κράμβη, ἡ κληματίς, ἡ ἐλαία κ.λ.π.

Τὰ μονοκοτυλήδονα εἶναι τοῦ τύπου 3, δηλ. τὰ τεμάχια ἐξ ὅν ἀποτελεῖται τὸ ἄνθος αὐτῶν εἶναι 3 ἢ πολλαπλάσιον τοῦ 3, ὅπως π.χ. εἰς τὴν ἵριδα, τὸν κρίνον, τὸν ὄφχιν τὸν στικτὸν κ.λ.π.

## ΠΙΝΑΞ 7. — ΑΝΘΟΣ

Ἐκφυσις ἀνθέων :	Μεμονωμένη	Βότρυς Στάχυς Κόρυμβος Δίσκος Σκιάδιον "Ιουλος
	Κατὰ ταξιανθίας :	

Περιάνθιον :	Kάλυξ : σέπαλα	{ Προφυλάσσουν τὸ ἄνθος καὶ προσελκύουν τὰ ἔντομα
	Στεφάνη : πέταλα	
Μέρη τοῦ ἄνθους : Τὸ χυρίως ἄνθος :	Στήμονες :	{ Νῆμα 'Ανθῆρες Γῦρις
	"Υπερος :	{ Καρπόφυλλα 'Ωδηκη 'Ωάρια Στίγματα Στῦλος

Προέλευσις τῶν μερῶν τοῦ ἄνθους : Φύλλα μετασχηματισμένα

Εἰδη ἀνθέων :	Μὲ κάλυκα καὶ στεφάνην :	{ Χωριστοπέταλα Συμπέταλα
	Χωρὶς στεφάνην : 'Απέταλα 'Αρρενοθήλεα	
Εἰδη ἀνθέων :	"Αρρενα { Δίκλινα Θήλεα	{ Χωριστοπέταλα Συμπέταλα
	Μὲ ἡνωμένους ή χωριστοὺς στήμονας	
Εἰδη ἀνθέων :	Μὲ ἡνωμένους ή χωριστοὺς ἀνθῆρας	{ Χωριστοπέταλα Συμπέταλα
	Μὲ ἡνωμένα ή ὅχι καρπόφυλλα.	

### Ἐπικονίασις καὶ γονιμοποίησις

#### β) Καρπὸς καὶ σπέρμα

"Οταν οἱ ἀνθῆρες τοῦ ἄνθους ὥριμάσουν, ἀνοίγουν καὶ ἀφήνουν τὴν γῦριν ἐλευθέραν· αὕτη εἴτε ἐπικάθηται μόνη της, χωρὶς δηλ. τὴν βοήθειαν π.χ. ἐντόμων, ἐπὶ τοῦ στίγματος τοῦ αὐτοῦ ἄνθους ( αὔτεπι-βοήθειαν π.χ. ἐντόμων, ἐπὶ τοῦ στίγματος τοῦ αὐτοῦ ἄνθους ), εἴτε μεταφέρεται εἰς ἄλλο ἄνθος, μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ ἀνέμου κονίασις ), εἴτε μεταφέρεται εἰς ἄλλο ἄνθος, μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ ἀνέμου κονίασις ).

Αὔτε πικονίασις. Αὕτη γίνεται εἰς τὰ ἀρρενοθήλεα ἄνθη, τῶν ὄποιών οἱ στήμονες καὶ ὁ ὑπερος ὥριμάζουν ταυτοχρόνως. Γίνεται τῶν ὄποιών οἱ στήμονες καὶ ὁ στήμονες διατίθενται ἀκριβῶς ἄνω τῶν στύλων, ὅστε μόνης της, δηλ. οἱ στήμονες διατίθενται ἀκριβῶς ἄνω τῶν στύλων, ὅστε

ή γῆραις νὰ πέσῃ ἐπὶ τῶν στιγμάτων. Ἐνίστε γίνεται καὶ τῇ βοήθειᾳ τοῦ ἀνέμου.

Διασταυρωτὴ ἐπικονίασις. Αὕτη γίνεται κυρίως εἰς τὰ δικλινά ἄνθη, δηλαδὴ εἰς ἔκεῖνα, τὰ ὅποια εἶναι χωριστὰ τὰ ἄρρενα καὶ χωριστὰ τὰ θήλεα ( προπάντων εἰς τὰ ἄνθη τῶν διοίκων φυτῶν ). Ἀπὸ τὰ ἄρρενοθήλεα ἄνθη διασταυρωτὴ ἐπικονίασις γίνεται εἰς ἔκεῖνα, εἰς τὰ ὅποια δὲν ὠριμάζουν συγχρόνως ὁ ὑπερος καὶ οἱ στήμονες· εἰς τὰς περιπτώσεις αὐτὰς ἡ ἐπικονίασις γίνεται μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ ἀνέμου ἢ τῶν ἐντόμων. Τὴν τοιαύτην ἐπικονίασιν τὴν προτιμῶμεν πάντοτε, καθ' ὅσον τὰ διὰ ταύτης παραγόμενα σπέρματα καὶ καρποὶ εἶναι καλύτερα καὶ ἀφθονώτερα.

Καθ' οίονδήποτε τρόπον ὅμως, δηλαδὴ εἴτε διὰ τῆς αὐτεπικονιάσεως εἴτε διὰ τῆς διασταυρωτῆς ἐπικονίασεως, φθάσουν οἱ κόκκοι τῆς γύρεως ἐπὶ τοῦ στίγματος τοῦ στύλου, ἐπικοιλῶνται ἐπ' αὐτοῦ ( διότι τὸ στίγμα, καθὼς γνωρίζομεν, ἔχει μίαν οὐσίαν κοιλώδη ), ἀποστέλλουσι διὰ μέσου τοῦ στύλου προεκβολὰς πρὸς τὰ ἐντὸς τῆς ὀωθήκης τοῦ ὑπέρρου ὀάρια καὶ τὰ γονιμοποιοῦν. Κάθε γονιμοποιηθὲν ὀάριον μεταβάλλεται εἰς σπέρμα, τὸ ὅποιον εἴτε εύρισκεται ἐντὸς ακειστοῦ καρποῦ, ὥσπαν νὰ ἥτο ἐντὸς ἀγγείου ( ἀγγειόσπερμα ), εἴτε εἶναι γυμνὸν ( γυμνόσπερμα ). Εἰς καρπὸν μεταβάλλεται ἡ ὀωθήκη, αἱ παρειαὶ τῆς ὅποιας σχηματίζουσι τὸ περίβλημα τοῦ καρποῦ, δηλαδὴ τὸ περικάρπιον. Ἐνίστε εἰς τὸν σχηματισμὸν τοῦ καρποῦ συμμετέχει καὶ ἡ ἀνθοδόχη.

Σ πέρι μα. Εἰς ἔκαστον σπέρμα παρατηροῦμεν τὸ περισπέρμιον καὶ τὸ φυτικὸν ἔμβρυον, ἀποτελούμενον ἀπὸ ριζίδιον καὶ βλαστόν.

Ο βλαστὸς φέρει εἰς τὸ ἄκρον του τὴν κορυφήν, εἰς δὲ τὰ πλάγια τὰς κοτυληδόνας, δύο εἰς τὰ δικοτυλήδονα καὶ μίαν εἰς τὰ μονοκοτυλήδονα φυτά. Ἐντὸς τῶν κοτυληδόνων ( φασίολος ), ἡ ἔξω τούτων ( σῖτος ), συναθροίζονται θρεπτικά συστατικά, τὰ ὅποια θὰ χρησιμοποιήσῃ τὸ φυτικὸν ἔμβρυον κατὰ τὴν πρώτην του ἐκβλάστησιν.

Εἰς τὰ ἀγγειόσπερμα ἡ ὀωθήκη ἀναπτύσσεται μεταβάλλομένη εἰς καρπόν, δόστις περικλείει ἐντὸς τοῦ περικαρπίου, ὡς μέσα εἰς ἀγγεῖον, τὰ σπέρματα καὶ τὰ προφυλάσσει ( ἐξ οὗ καὶ ἀγγειόσπερμα καλοῦνται τὰ φυτὰ ταῦτα ).

Αἱ παρειαὶ τῆς ὀωθήκης ἀποτελοῦν τὰς παρειὰς τοῦ καρποῦ ἢ τὸ περικάρπιον.

### Ειδη καρπων

Τοὺς καρποὺς διακρίνομεν εἰς ἔηροὺς καὶ σαρκώδεις.

α) Ξηροὺς ὃνομάζομεν τοὺς καρπούς, εἰς τοὺς ὄποιους τὸ περικάρπιον εἶναι λεπτὸν καὶ σχηματίζεται ἀπὸ ἔηρά, νεκρά, κύτταρα.

Ο ἔηρός καρπὸς λέγεται:

1) Ἀχαίνιον. "Οταν ἐντὸς τοῦ περικαρπίου ( τὸ ὄποιον δὲν ἀποχωρίζεται τοῦ σπέρματος παρὰ μόνον κατὰ τὴν ἐκβλάστησιν τούτου ) ὑπάρχῃ ἐν μόνον σπέρμα ( κνίδη, κύανος κ.λ.π. ) ἢ σπανιώτερον δύο ( διαχαίνιον, π.γ. καρῶτον, σχ. 209 ) ἢ τέσσαρα ( τετραχαίνιον, π.γ. μαλάχη ).

2) Καρύογις. "Οταν τὸ περικάρπιον εἶναι ἀδιαχωρίστως συνήνωμόν μὲ τὸ κάτωθέν του σπέρμα ( σῖτος ).

3) Κάψα. "Οταν ὁ καρπὸς περιέχῃ πολλὰ σπέρματα καὶ ἀνοίγει συνήθως μὲ ὅπας, διὰ τῶν ὄποιων ταῦτα ἐκφεύγουσι ( π.γ. μήκων, σχ. 209 ).

4) Λοβός ἢ ὅσπιον. "Οταν ὁ καρπὸς εἶναι ἐπιμήκης, χωρὶς ἐσωτερικὸν χώρισμα καὶ ἀνοίγει εἰς δύο, ἐλευθερώνων τὰ ἐντὸς αὐτοῦ σπέρματα ( σχ. 209 ).

5) Κερατίον. "Οταν ὁ καρπὸς ἔχῃ ἐσωτερικῶς χώρισμα, ἐπὶ τοῦ ὄποιου βλέπομεν, ὅταν ἀνοίξῃ, προσκεκολλημένα τὰ σπέρματα ( σχ. 209 ).

β) Σαρκώδεις καρπὸς εἶναι σαρκώδεις.

Ο σαρκώδης καρπὸς λέγεται:

1) Λρύπη. "Οταν ἐντὸς τοῦ σαρκώδους τμήματος ὑπάρχῃ ἔντλωδης πυρὴν καὶ ἐντὸς αὐτοῦ συνήθως ἐν σπέρμα ( σχ. 209 ).

2) Ράξ. "Οταν τὰ σπέρματα, συνήθως πολλά, περιέχωνται ἐντὸς τοῦ σαρκώδους μέρους χωρὶς νὰ-ὑπάρχῃ πυρὴν ( σχ. 209 ).

3) Ψευδῆς καρπός σιγκάρπιον. "Οταν εἰς τὸν σχηματισμὸν αὐτοῦ λαμβάνῃ μέρος καὶ ἡ ἀνθοδόχη, γινομένη συνήθως σαρκώδης καὶ σακχαροῦχος ( σχ. 209 ).

### Διάδοσις τῶν σπέρματων

Αὕτη γίνεται διὰ τοῦ ἀνέμου, ὅταν τὰ σπέρματα εἶναι μικρὰ καὶ παρασύρωνται εύκόλως ἀπὸ τὸν ἀνέμον, ἢ ὅταν ἔχουν καταλλήλως πρὸς




Κάψα




Απλοῦν  
ἀχαίνιον



Διπλοῦν  
ἀχαίνιον



Λοβδός ή δσπριον




Πλεύ




Δρύπη



Κεράτιον



Ψευδής καρπός



Ψευδής καρπός



Συγκάρπιον

Σχ. 209. Διάφορα είδη καρπῶν

τοῦτο διασκευασθῆ, ὅπως π.χ. εἰς τὸν κύανον, βάμβακα ( σχ. 210 ), ραδίκι ( σχ. 211 ) κ.λ.π., ὅπου ὁ καρπὸς περιβάλλεται ἀπὸ τρίχας. Διὰ τῶν μέσων τούτων εὑνοεῖται ἡ διάδοσις τοῦ φυτοῦ.

Διὰ τοὺς σαρκώδεις καρποὺς μέσον διαδόσεως τῶν σπερμάτων ἀποτελοῦσι τὰ ζῷα, ἵδιας τὰ πτηνά, ὡς καὶ ὁ ἄνθρωπος. Διότι τὰ ζῷα, τρώγοντα τοὺς καρπούς, ἀποβάλλουσι διὰ τῶν περιττωμάτων των τὰ ἐντὸς τοῦ πεπτικοῦ σωλήνος αὐτῶν παραμένοντα ἀπεπτα σπέρματα, τὰ ὃποια μεταφέρονται οὕτω ἀπὸ τόπου εἰς τόπον καὶ διαδίδουσι τὸ φυτόν.

Αὐτὸς δὲ εἶναι ὁ λόγος διὰ τὸν ὄποιον τὸ περικάρπιον πολλῶν



Σχ. 210. Σπέρμα  
βάμβακος μετὰ τῶν  
περὶ αὐτὸν λευκῶν  
νημάτων.



Σχ. 211. Σπέρματα ραδικιῶν ( σηματίζοντα δύο σφαίρας ) μὲ τὰς πέριξ αὐτῶν τρίχας, μὲ τὴν βοήθειαν τῶν ὄποιων μεταφέρονται διὰ τοῦ ἀνέμου.

καρπῶν εἶναι σακχαροῦχον, διὰ νὰ προσελκύωνται τὰ πτηνὰ καὶ τρώγωσι τὸ σαρκώδες μέρος τοῦ καρποῦ, ἀλλὰ μαζὶ μὲ αὐτὸν καὶ τὰ ἐντὸς σπέρματα. Ταῦτα παραμένοντα ἀπεπτα ἀποβάλλονται ἐδῶ καὶ ἔκει καὶ κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπον συντελοῦσι τὰ πτηνὰ εἰς τὴν διάδοσιν τοῦ φυτοῦ.


#### Ἐκβλάστησις τοῦ σπέρματος

Εἴπομεν εἰς τὰ περὶ φασιόλου κεφάλαιον, ὅτι εἰς κάθε σπέρμα ὑπάρχει ἐν φυτικὸν ἔμβρυον, δηλ. ἐν νεαρὸν φυτὸν ἐν σμικρογραφίᾳ. Τοῦτο ζῆ, ἀλλὰ ἡ ζωὴ του ὁμοιάζει μὲ βαθὺν ὕπνον. Ἐπίσης ἀναπνέει, ἀλλ’ ἀσθενέστατα. Δύναται νὰ εἰσέλθῃ εἰς τὴν ἐνεργὸν ζωὴν, δηλ. νὰ ἐκβλαστήσῃ, ἀκόμη καὶ μετὰ μακρότατον χρόνον ( ἐξεβλάστησαν σπέρματα στην οικογένεια της φύτευσης ).


ματα φασιόλου μετά 100 έτη και σικάλεως μετά 140 έτη ), μόλις εύρεθη ίνπο καταλλήλους συνθήκας, δηλ. ίνπο άνάλογον άγρασίαν και θερμοκρασίαν.

## II. Ἡ ἀναπαραγωγὴ εἰς τὰ γυμνόσπερμα

Καὶ εἰς τὰ γυμνόσπερμα ἡ ἀναπαραγωγὴ γίνεται δι’ ἀνθέων. Ἡ διαφορὰ ἀπὸ τὰ ἀγγειόσπερμα είναι ὅτι ἡ ὀωθήκη εἰς τὰ γυμνόσπερμα δὲν είναι κλειστή, ἐπομένως τὰ ὀωθήκη καὶ τὰ σπέρματα, εἰς τὰ ὄποια ταῦτα μεταβάλλονται, μένουν γυμνά.



**Σχ. 212.** 1 κῶνος ἀρρένων ἀνθέων πεύκης. 2 κῶνος μὲ τὰ θήλεα ἀνθη, ὁ δόποιος θὰ δώσῃ τὸν καρπὸν (κουκουνάραν). 3 στήμων ἀρρενος ἀνθους μὲ κλειστοὺς τοὺς ἀνθῆράς του, 4 ὁ αὐτὸς στήμων μὲ ἀνοικούς τοὺς ἀνθῆρας ἀπὸ τοὺς δόποιους ἐκφεύγει ἡ γύρις, 5 6 ἡ ὀωθήκη μὲ τὰ ἐντὸς αὐτῆς δύο ὀώθια.



**Σχ. 213.** "Ανω, ἀνθήρ ἀρρενος ἀνθους πεύκης μὲ τὴν ἐντὸς αὐτοῦ γύριν. Κάτω, τμῆμα θήλεος κώνου πεύκης, διποι φαίνεται τὸ ὀώθιον.

"Αλλὰ χαρακτηριστικὰ τῶν γυμνοσπέρμων είναι: ὅτι τὰ ἀνθητῶν είναι χωριστὰ τὰ ἄρρενα καὶ χωριστὰ τὰ θήλεα, δὲν ἔχουσι στί-

γματά καὶ ἔχουν ἀφθονον γῆραν ( σάκκοι γύρεως ), οἱ κόκκοι τῆς ὥποιας φέρουσι θαλάμους ἀέρος, διὰ νὰ γίνωνται ἐλαφρότεροι καὶ διευκολύνεται οὕτως ἡ μεταφορά των διὰ τοῦ ἀνέμου. Τὰ ἄνθη εἰναι διατεταγμένα κατὰ κώνους. Ἡ γῆρας μεταφέρεται μὲ τὸν ἀνεμον εἰς τοὺς κώνους τῶν θηλέων ἀνθέων καὶ γονιμοποιεῖ τὰ εἰς τὸ ἐσωτερικὸν τῶν περγαμηνοειδῶν φυλλαρίων τῶν κώνων ὡάρια. Ταῦτα μεταβάλλονται εἰς σπέρματα γυμνά, ἐφωδιασμένα μὲ πλείστας κοτυληδόνας ( 6 - 10 εἰς τὴν πεύκην ) καὶ φέρουν περγαμηνοειδεῖς προεξοχές, διὰ νὰ διευκολύνεται ἡ διὰ τοῦ ἀνέμου μεταφορά των ( σχ. 212 καὶ 213 ).

#### ΠΙΝΑΞ 8. — ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΣ ΤΑ ΦΑΝΕΡΟΓΑΜΑ

'Αγγειόσπερμα :	{ Στήμονες μὲ ἀνθῆρας καὶ γῆραν "Υπερος ἀπὸ καρπόφυλλα	'Ωσθήκη κλειστή : ὡάρια, στῦλος, στίγματα
Γυμνόσπερμα :	{ Πολυυάριθμοι στήμονες καὶ περίσσεια γύρεως. Καρπόφυλλα ὡς περγαμηνοειδῆ φυλλίδια ἀποτελοῦντα κῶνον. Ἀνοικτὴ ὡσθήκη μὲ τὰ ὡάρια γυμνά. "Ελλειψίς στιγμάτων.	Ρόλος ἀνέμου καὶ ἐντόμων
'Επικονίασις :	{ Κατ' εὐθεῖαν ( αὔτεπικονίασις ) Διασταυρωτὴ	Ρόλος ἀνέμου καὶ ἐντόμων
Μεταβολὴ ὡαρίου εἰς ὡόν :	{ Γονιμοποίησις ὡαρίου ὑπὸ τῆς γύρεως	Παραγωγὴ φυτικοῦ ἐμβρύου, συγκέντρωσις θρεπτικῶν συστατικῶν.

## Μεταβολή της ώρης εἰς καρπόν

Ξηρὸς ἀδιάρρηκτος :	{	'Αγκίνιον Κάρυον Καρύοψις
Ξηρὸς σχιζόμενος :	{	Κάψα "Οσπριον Κεράτιον
Καρπός :	{	Μὲ πυρῆνα καὶ ἐν συνήθως σπέρμα ( δρύπη ), ἢ χωρὶς πυρῆνα καὶ μὲ πολλὰ σπέρ- ματα ( ράξ ).
Σαρκώδης :	{	
Ψευδὴς σαρκώδης :	{	Συγκάρπιον ( συμμετοχὴ τῆς ἀνθοδόχης καὶ τῆς ώρης εἰς τὸν σγηματισμὸν του ).

"Οροι ἀπαραίτητοι διὰ τὴν ἐκβλάστησιν

'Εσωτερικῶς : { Τὸ σπέρμα νὰ εῖναι ὡριμον, νὰ μὴ εῖναι φαγω-  
μένον ἀπὸ ἔντομα καὶ νὰ μὴ ἔχῃ ἀποθάνει τὸ  
ἔμβριον.

'Εξωτερικῶς : Κατάλληλος ὑγρασία καὶ θερμοκρασία.

Φυινόμενα ἐκβλαστήσεως : { 'Ανάπτυξις ριζιδίου  
'Ανάπτυξις τοῦ βλαστοῦ, ὅστις παρα-  
σύρει ἢ δχι τὰς κοτυληδόνας ἔξω  
τοῦ χώματος ( π.χ. φασίολος, σῖτος  
κ.λ.π. ).  
'Ανάπτυξις τῆς κορυφῆς.

## Β'. Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΣ ΤΑ ΚΡΥΠΤΟΓΑΜΑ

Γενικὸν χαρακτηριστικὸν τῶν κρυπτογάμων εἶναι ἡ ἔλλειψις ἀνθέων.

Ἡ ἀναπαραχγωγὴ εἰς τὰ φυτὰ ταῦτα γίνεται ἢ διὰ σπορίων ( πτέριδες, βρύα, φύκη, μύκητες ), ἢ δι' ὄων, ἢ δι' ἀπλῆς μόνον διαφέρεσσεως, ὅπως π.χ. εἰς τοὺς σχιζομύκητας.

### ΠΙΝΑΞ 9. — ΚΡΥΠΤΟΓΑΜΑ

Κρυπτόγαμα :	Mὲ ρίζαν, βλαστόν, φύλλα καὶ ἄγρια:	
	Πτέριδες	
	Mὲ βλαστόν καὶ φύλλα, χωρὶς ρίζαν καὶ αργιτά:	
	Bρύα	
Mὲ θάλλους:	Mὲ χλωροφύλλην καὶ πολλάκις καὶ μὲ δευτέραν χρωστικὴν οὐσίαν: Φύκη.	
	Xωρὶς χλωροφύλλην ( σαπρόφυτα παράσιτα ): Μύκητες.	
	Συμβίωσις φυκῶν καὶ μυκήτων: Λειχήνες.	

### ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΔΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ

Αἱ ὀφέλειαι, τὰς ὁποίας τὰ φυτὰ παρέχουσιν εἰς τὸν ἄνθρωπον ἐκδηλοῦνται κατὰ δύο τρόπους, ἥτοι ἀμέσως ἢ ἐμμέσως.

“Α με σοι ὡφέλειαι!. Τὰ φυτὰ πλουσιώζουν τὴν ἀτμόσφαιραν μὲ δένυγόνον. Τροφοδοτοῦν τὰς πηγὰς καὶ τὰς ὑπογέίους δεξαμενὰς προκαλοῦντα βροχὰς καὶ ἐμποδίζοντα, διὰ τῆς διαπνοῆς των, τὴν μεγάλην ἔηρασίαν εἰς τοὺς ἔηρους τόπους. Ός δάση ἀποτελοῦν στόλισμα διὰ κάθε χώραν.

“Η κυρία ὅμως σημασία τῶν φυτῶν ἔγκειται εἰς τὸ γεγονός, ὅτι ἀποτελοῦν τὸν μεσάζοντα μεταξὺ τοῦ ἀνοργάνου καὶ τοῦ ζωικοῦ κόσμου, μετατρέποντα τὰ ἀνόργανα ὑλικά εἰς ὑλικά ὄργανα. “Ανευ τῶν φυτῶν οὐδὲν φυτοφάγον ζῷον ( ἐπομένως καὶ σαρκοφάγον ) θὰ ἡδύνα-

το νὰ ζήσῃ, ἐπειδὴ τὰ ζῶα δὲν εἶναι ίκανα νὰ τραφοῦν μὲν ύλικὰ ἀνόργανα. Τὰ φυτὰ ἐπομένως ἀποτελοῦν τὸν τροφοδότην ὅλων τῶν ἄλλων ζώντων ὄντων, μεταβάλλοντα τὰ ἀνόργανα ύλικὰ εἰς ύλικὰ ὄργανικά, διὰ τῶν ὄποίων καὶ μόνον τρέφονται τὰ ζῶα.

Ἐμμεσοὶ ὡφέλιαι εἰσι. Τὰ φυτὰ παρέχουν τὸ ξύλον τῶν ὡς καύσιμον ψληνῶν καὶ οἱ ἐκ τῆς γῆς ἔξαγόμενοι ἄνθρακες ( ὀρυκτοὶ ἄνθρακες ) προέρχονται ἀπὸ τὰ δάση, τὰ ὄποια πρὸ χιλιάδων ἑτῶν κατεχώσθησαν ἐντὸς τῆς γῆς καὶ ἐκεῖ ἀπηγνθρακώθησαν.

Τὸ ξύλον τῶν φυτῶν χρησιμοποιεῖται ὡς ξυλεία δι' οἰκοδομάς, ἐπιπλώσεις, ἐπιστρώσεις ὁδῶν, καὶ ὡς πρώτη ψληνὴ διὰ τὴν κατασκευὴν χάρτου καὶ εἰδῶν ἀπὸ πεπίσμένον χάρτην, πυρείων κ.λ.π.

Ίνες τῶν βλαστῶν διαφόρων φυτῶν ἡ τρίχες τῶν σπερμάτων τῶν ( π.χ. Ἰνες τοῦ λίνου καὶ τῆς καννάβεως, τρίχες τῶν σπερμάτων τοῦ βάμβακος ) χρησιμοποιοῦνται εἰς τὴν ὑφαντουργίαν, τὴν σχοινιοποιίαν κ.λ.π.

Ἐκ τῶν φυτῶν ἔξι ἄλλου παράγονται:

α) Διάφορα ἔλαια εἴτε βρώσιμα, εἴτε χρήσιμα διὰ τὴν κατασκευὴν σαπωνῶν ( π.χ. ἀπὸ τοὺς καρποὺς τῆς ἔλαιας, τοῦ ἥλιανθου, τοῦ βάμβακος, τοῦ σινάπεως κ.λ.π. ), εἴτε χρήσιμα εἰς τὴν ιατρικήν, π.χ. κικινέλαιον ( ρετσινόλαδον ) ἡ τὴν βαρικήν ( π.χ. λινέλαιον ).

β) Λιθέρια ἔλαια ὑπάρχουν εἰς τὰ φύλλα, εἰς τὰ ἄνθη καὶ εἰς τοὺς φλοιοὺς τῶν βλαστῶν καὶ τῶν καρπῶν, ἀκόμη καὶ εἰς τὰς ρίζας πλείστων φυτῶν. Ἐξάγονται ἐκεῖθεν καὶ χρησιμοποιοῦνται διὰ τὴν κατασκευὴν διαφόρων ἀρωμάτων. Οὕτως ἔξαγονται ἐκ τῶν ἀνθέων καὶ ἐκ τῶν φλοιῶν διαφόρων καρπῶν ( ὡς π.χ. τῆς πορφοκαλέας, τῆς λεμονέας, τῆς νερατζέας κ.λ.π. ), ἡ ἐκ τῶν φύλλων διαφόρων φυτῶν ( π.χ. τῆς δάφνης ), ἡ ἐκ τῶν φύλλων καὶ τοῦ βλαστοῦ ἄλλων φυτῶν ( π.χ. τοῦ δριγάνου, τῆς κυπαρίσσου, τοῦ βασιλικοῦ ), ἡ ἐκ τῶν ἀνθέων πολλῶν φυτῶν ( π.χ. τῆς ροδῆς κ.λ.π. ).

γ) Ρητῖναι. Ὡς εἶναι π.χ. ἡ ρητίνη τῶν κωνοφόρων, ἐκ τῆς ὄποιας ἔξαγεται τὸ τερεβινθέλαιον ( νέφτι ). Ἡ ρητίνη αὗτη προστίθεται ἐπίσης εἰς εἰδός τι οἴνου, τὴν ρετσίναν.

δ) Γαλακτοῦχοι οὐσίαι ἔχουσι πλεῖστα φυτά, ίδιως οἱ βλαστοί των ἐκ τῶν γαλακτούχων τούτων οὐσιῶν παράγονται πλεῖστα χρήσιμα διὰ τὸν ἄνθρωπον προϊόντα, ίδιως ἐκ τῶν γαλακτούχων οὐσιῶν δύο κυρίως φυτῶν, τῆς ἔβεας ( καυτσουκοδένδρου ), ἀπὸ τὸν γαλακτοῦχον χυμὸν τῆς ὄποιας παράγεται τὸ καου-

τσούκι καὶ τῆς μήκωνος, ἀπὸ τὸν γαλακτοῦχον χυμὸν τῆς ὁποίας παράγεται τὸ ὅπιον καὶ ἐξ αὐτοῦ τὸ λαύδανον τῶν φαρμακείων, ἡ μορφίνη κ.λ.π.

Τὰ φυτὰ μᾶς δίδουσι τὰ εἰς τὰ φύλλα των, τοὺς ὑπεργείους καὶ τοὺς ὑπογείους βλαστούς των, τὴν ρίζαν, τὰ σπέρματα καὶ τοὺς καρπούς των ἐναποτιθέμενα παρ' αὐτῶν θρεπτικὰ συστατικά, τὰ ὁποῖα χρησιμοποιοῦνται ὡς τροφὴ ἀπὸ τὸν ἄνθρωπον ἢ τὰ ζῶα. Τοιαῦτα θρεπτικὰ συστατικὰ περιέχουσι:

Τὰ ξηρὰ σπέρματα, ὡς, π.γ. τοῦ σίτου, τοῦ φασιόλου, τῆς φακῆς κ.λ.π.

Οἱ σακχαροῦχοι καρποὶ νωποί, ξηροί, ἢ διατηρημένοι π.χ. σῦκα, σταφυλαί, σταφίς, μῆλα, κάστανα, βανάναι, χουρμάδες κ.λ.π.

Τὰ φύλλα διαφόρων λαχανικῶν τὰ φύλλα καὶ οἱ ἀνθοφόροι βλαστοὶ τῆς ἀνθοκράμβης, τὰ φύλλα τῆς κράμβης τῆς κεφαλωτῆς κ.λ.π.

'Απὸ διαφόρους καρπούς ἔξαγονται, δι' ἐκθλίψεώς των, ὑγρὰ σακχαροῦχα ταῦτα ζυμούμενα δίδουσι ποτὲ οἰνοπνευματώδη.

Οὔτω παράγεται ὁ οἶνος ἐκ τῆς ζυμώσεως τοῦ γλεύκους, τὸ ὄποιον λαμβάνεται διὰ τῆς ἐκθλίψεως τῶν σταφυλῶν. 'Ομοίως ὁ μηλίτης οἶνος διὰ ζυμώσεως τοῦ γλεύκους, τὸ ὄποιον παράγεται ἀπὸ τὴν ἐκθλίψιν τῶν μήλων. 'Επίσης τὸ λεγόμενον κίρσ, τὸ ὄποιον παράγεται κατάπιν ζυμώσεως τοῦ ὑγροῦ, τὸ ὄποιον λαμβάνομεν ἐκ τῆς ἐκθλίψεως τῶν κερασίων κ.λ.π.

Οἰνόπνευμα παράγεται ἀπὸ τὰ ξηρὰ σῦκα, τὴν σταφίδα, τοὺς κονδύλους γεωμήλων, τὴν βύνην τῆς κριθῆς (μπύραν), τὴν σίκαλιν (οὔτσι) κ.λ.π., διὰ καταλλήλου ἐπεξεργασίας των.

'Ἐκ τῶν σακχαροτεύτλων καὶ τοῦ σακχαροκαλάμου διὰ καταλήλου ἐπεξεργασίας, ἔξαγεται ἡ σάκχαρις.

'Εξ ἄλλου ἐκ τῶν φύλλων, τῶν ριζῶν, ἡ τῶν φλοιῶν διαφόρων φυτῶν παρασκευάζονται ἀφεψήματα, χρησιμοποιούμενα εἰς τὴν ιατρικὴν διὰ στομαχικὰς ἢ ἄλλας παθήσεις (χαμαίμηλον, φασκομηλιά κ.λ.π.), ἡ ὡς μηλακτικὰ διὰ γαργαρισμούς (μαλάχη).

Τὰ σπέρματα τοῦ σινάπεως χρησιμοποιοῦνται εἰς τὴν κατασκευὴν ἐμπλάστρων.



# ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

---

## ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

5  
7

## ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

1η ΤΠΟΔΙΑΙΡΕΣΙΣ : ΦΑΝΕΡΟΓΑΜΑ	11
1η ΣΥΝΟΜΟΤΑΞΙΑ : ΦΥΤΑ ΑΓΓΕΙΟΣ ΠΕΡΜΑ	
1η ΟΜΟΤΑΞΙΑ : ΦΥΤΑ ΔΙΚΟΤΥΛΙΔΟΝΑ	11
1η Τάξις : Δικοτυλήδονα χωριστοπέταλα	
1η Οίκογένεια : Ψυχανθή ή 'Οσπριοειδῆ	11

### Φασίδος

Βλάστησις. Κατάλληλοι συνθήκαι διὰ τὴν βλάστησιν. Φάσεις τῆς βλαστήσεως. Χρησιμότης τῶν κοτυληδόνων . . . . .	12 - 15
---	---------

### Μέρη τοῦ φασιδόου :

1. Ρίζα . . . . .	15 - 20
2. Βλαστός . . . . .	20 - 25
3. Φύλλον . . . . .	25 - 33
Συνθῆκαι διὰ τὴν ἀνάπτυξιν τοῦ φασιδόου . . . . .	33 - 41
4. "Άνθος . . . . .	41
5. Κερπός . . . . .	44

Τριφύλλιον. Λούπινον. 'Αραχίς. Σπάρτον. Ηίσον. Φακῆ.	
Κύαμος. — Ακακία. Μιμόζη . . . . .	45 - 49

2α Οίκογένεια : Ροδώδη . . . . .	49 - 65
----------------------------------	---------

α) Μηλεώδη : 'Απιδέα. Μηλέα ή κοινή. Κυδωνέα. . . . .	49 - 54
β) 'Αμυγδαλίδαι ή Προυμινίδαι : Προύμνη. 'Αμυγδαλῆ. Ροδακινέα. Βερυκοκκιά. Κέρασέα. . . . .	54 - 58
γ) Ροδοειδῆ : Ροδῆ ή ἀγρία . . . . .	58
δ) Χαμαικερασώδη : Χαμαικέρασος. Βάτος . . . . .	61 - 64

17

	Σελίς
<b>3η Οίκογένεια: Μηκωνοειδῆ . . . . .</b>	<b>65</b>
Μήκων ἡ ροιάς. Μήκων ἡ ὑπνοφόρος. Χελιδόνιον τὸ μέγα . . . . .	65 - 68
<b>4η Οίκογένεια: Μαλαχοειδῆ . . . . .</b>	<b>68</b>
Μαλάχη ἡ ἀγρία. Μαλάχη ἡ ἀλθαία. Βάζμβαξ. Ἰβίσκος . . . . .	68 - 71
<b>5η Οίκογένεια: Σκιαδανθῆ . . . . .</b>	<b>71</b>
Δαῦκος. Μάραθον. Ἀνίσον. Πετροσέλινον. Σέλινον . . . . .	71 - 73
<b>6η Οίκογένεια: Καρυοφυλλώδη . . . . .</b>	<b>73</b>
Δίανθος ὁ καρυόφιλος. Ἀγρόστεμπα. Σαπωναρία . . . . .	73 - 75
<b>7η Οίκογένεια: Γερανιώδη . . . . .</b>	<b>75</b>
Γεράνιον τὸ εὔσομον. Πελαργόνιον. Ὁξαλίς. . . . .	75
Οίκογένεια: Δινώδη Λίνον . . . . .	75
<b>8η Οίκογένεια: Ἰώδη . . . . .</b>	<b>77</b>
Ἴον τὸ εὔσομον. Ἴον τὸ τρίχρουν . . . . .	77 - 78
<b>9η Οίκογένεια: Σταυρανθῆ . . . . .</b>	<b>79</b>
Κράμβη. Ἀνθοκράμβη. Γογγυλοκράμβη. Ραρανίς. Σινάπι.	79
Κάρδαμον . . . . .	81 - 82
<b>10η Οίκογένεια: Ἄμπελιώδη . . . . .</b>	<b>82</b>
Ἄμπελος. Ἀσθένειαι. Ὄφελιμότης . . . . .	82 - 90
<b>11η Οίκογένεια: Βατραχιώδη . . . . .</b>	<b>90</b>
Ἀνεμώνη. Κληματίς. Βατράχιον. . . . .	90 - 91
<b>12η Οίκογένεια: Κακτώδη . . . . .</b>	<b>92</b>
Φραγκοσυκῆ. . . . .	92
<b>13η Οίκογένεια: Πορτοκαλεώδη ἢ Ἐσπεριδοειδῆ . . . . .</b>	<b>92</b>
Πορτοκαλέα. Λεμονέα. Μανδαρινέα. Κιτρέα. Νεραντζέα. . . . .	93 - 94
<b>2α Τάξις: Δικοτυλήδονα συμπέταλα</b>	
<b>1η Οίκογένεια: Σολανώδη ἢ Στρυχνώδη . . . . .</b>	<b>96</b>
Στρύχνος ὁ κονδυλόρριζος . . . . .	96
Στρύχνον τὸ λυκοπερσικόν. Στρύχνος. Κάψιμον. Μπελλαντόνα.	
Στραμώνιον. Νικοτιανή . . . . .	100 - 103
<b>2α Οίκογένεια: Ἡρανθῆ . . . . .</b>	<b>103</b>
Κυκλάμινον. Ἡρανθές. Μυοσωτίς. Λυσιμάχιον . . . . .	103 - 104

	Σελίς
<b>3η Οίκογένεια : 'Ελαιώδη . . . . .</b>	<b>104</b>
'Ελαιά. Καλλιέργεια. Χρησιμότης. 'Ασθένειαι . . . . .	104 - 110
'Ιασμός. Μελία. Πασχαλιά. . . . .	110
<b>4η Οίκογένεια : Χειλανθή . . . . .</b>	<b>110</b>
Λάμιον . . . . .	112
Μίνθη. Λιβανωτή. Μέλισσα. 'Ελελίφασκος ὁ εὐχρούς. Σιδερί- της ὁ τεῖσμος. Θύμος. 'Οριγάνον. "Ωκυμον. . . . .	113 - 114
<b>5η Οίκογένεια : 'Οροβαγχώδη . . . . .</b>	<b>115</b>
'Οροβάγχη. Δακτυλίς . . . . .	115 - 117
<b>6η Οίκογένεια : 'Ερυθροδανώδη . . . . .</b>	<b>117</b>
'Ερυθρόδανον τὸ βαφικόν. Καφέα. Κιγγόνη . . . . .	117 - 118
<b>7η Οίκογένεια : Κολοκυνθώδη . . . . .</b>	<b>118</b>
Κολοκύνθη. Σικυός ὁ ἥμερος. Μηλοπέπων. 'Υδροπέπων. Βρυω- νία . . . . .	118 - 121
<b>8η Οίκογένεια : Αλγοκληματώδη . . . . .</b>	<b>121</b>
Αλγόκλημα. . . . .	121
<b>9η Οίκογένεια : Σύνθετα ἢ Συνάνθηρα. . . . .</b>	<b>122</b>
Μεγάλη μαργαρίτα. 'Ηλίανθος. Λευκάνθεμον. Χαμαίμηλον. Πύρεθρόν. Χρυσάνθεμον. 'Αρτεμισία. Ντάλια. Κύανος. Σκόλυμος. Κινάρια. Κιγώνιον. Θρίδαξ . . . . .	122 - 128
<b>3η Τάξις : Δικοτυλήδονα ἀπέταλα</b>	
<b>1η Οίκογένεια : Κνιδώδη . . . . .</b>	<b>129</b>
Κνίδη. Συκῆ. Μορέα. Συκῆ ἡ ἐλαστική. Κάνναβις. Λυκίσκος. Πτελέα . . . . .	129 - 137
<b>2η Οίκογένεια : Κυπελλοφόρα . . . . .</b>	<b>137</b>
Δρῦς. Καστανέα. Λεπτοκρυά. 'Οξυά . . . . .	137 - 142
Διασκευὴ καὶ χρησιμότης τοῦ βλαστοῦ . . . . .	142 - 144
<b>3η Οίκογένεια : Καρυώδη . . . . .</b>	<b>145</b>
Καρυά ἡ κουνῆ . . . . .	145
<b>4η Οίκογένεια : 'Ιτεώδη . . . . .</b>	<b>147</b>
'Ιτέα ἡ Λευκή. Λεύκη . . . . .	147 - 148
<b>5η Οίκογένεια : Πλατανώδη . . . . .</b>	<b>148</b>

	Σελίς
	150
<b>6η Οικογένεια : Δαφνώδη . . . . .</b>	<b>150</b>
Δάφνη . . . . .	150
<b>7η Οικογένεια : Τεῦτλα . . . . .</b>	<b>150</b>
Σπανάκι . . . . .	151
<b>8η Οικογένεια : Ἰξώδη . . . . .</b>	<b>151</b>
Ίξος . . . . .	151
<b>2α ΟΜΟΤΑΞΙΑ : ΦΥΤΑ ΜΟΝΟΚΟΤΥΛΗΔΟΝΑ</b>	
	153
<b>1η Οικογένεια : Ἀγρωστώδη . . . . .</b>	<b>153</b>
Σῖτος. Καταγωγή. Καλλιέργεια. Ἀσθένειαι. Χρησιμότητας . . . . .	153 - 159
Κριθή. Σίκαλις. Βράμη. Ἀραβόσιτος. Ὄφυζα. Σακχαροκάλαμον. Βαμβούσα. Κάλαμος ὁ κοινός. Ἡρα. . . . .	159 - 164
<b>2α Οικογένεια : Λειριώδη . . . . .</b>	<b>164</b>
Λειρίου τὸ λευκόν. Κρόμμυον. Σκόρδον. Πράσον. Τουλίπη. Κολχικόν. Ὑάκινθος. Ἀσφόδελος. Ἀσπάραγγος . . . . .	164 - 168
<b>3η Οικογένεια : Φοινικώδη . . . . .</b>	<b>169</b>
Φοινιξ. Κοκκοφοινιξ . . . . .	169 - 171
<b>4η Οικογένεια : Ὁρχεώδη . . . . .</b>	<b>172</b>
Ὦρχις ὁ στικτός. Βανίλλη. . . . .	172
<b>5η Οικογένεια : Ἰριδώδη . . . . .</b>	<b>175</b>
Ἴρις. Βανανέα. Ἀνανάς. Νάρκισσος. Ἀγαύη. . . . .	175
<b>2α ΣΥΝΟΜΟΤΑΞΙΑ : ΦΥΤΑ ΓΥΜΝΟΣΠΕΡΜΑ</b>	
	177
<b>1η Οικογένεια : Κωνοφόρα . . . . .</b>	<b>177</b>
Πεύκη ἡ φρτινοφόρος . . . . .	177
Δάσος. Σημασία τοῦ δάσους διὰ τὸν ἄνθρωπον . . . . .	181
Ἐλάτη. Κέδρος. . . . .	183
<b>2α Οικογένεια : Κυπαρισσώδη . . . . .</b>	<b>184</b>
Κυπάρισσος. Ἀροκαρία. . . . .	184
Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής	

	Σελίς
<b>2α ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΙΣ : ΚΡΥΠΤΟΓΑΜΑ . . . . .</b>	<b>186</b>
1η Τάξις: Ή τέριδες . . . . .	186
Πτέρις ή κοινή . . . . .	186
Πολυπόδιον . . . . .	190
2η Τάξις: 'Ιππονέριδες . . . . .	191
3η Τάξις: Λυκοπόδια. . . . .	191
<b>3η ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΙΣ : ΒΡΓΑ . . . . .</b>	<b>193</b>
Πολύτριχον τὸ κοινόν. Σφάγνον. "Υπνος. . . . .	193 - 196
<b>4η ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΙΣ : ΘΑΛΛΟΦΥΤΑ. . . . .</b>	<b>196</b>
I. Φύκη . . . . .	196
Φαιοφύκη. Φῦκος τὸ κυστοειδές. Σάργασον. Διάτομα . . . . .	196 - 199
'Ερυθροφύκη. . . . .	199
Χλωροφύκη. Βουχερία. Σπυρογύρα . . . . .	200 - 201
Κυανοφύκη. Βακτήρια ή βάκιλλοι. Παθογόνα βακτήρια . . . . .	201 - 203
Φυτικὸν κύτταρον . . . . .	204
II. Μύκητες . . . . .	206
Βασιδιομύκητες. 'Αγαρικὸν τὸ πεδινόν. "Τσκα. . . . .	206 - 207
'Ασκομύκητες. Βωλίτης ὁ ἐδώδιμος. 'Ωδιον τῆς ἀμπέλου .	208
Σχιζομύκητες. Σακχαρομύκης ὁ ἐλλειψοειδής. Σακχαρομύκης τοῦ ζύθου . . . . .	208 - 209
'Ωομύκητες. . . . .	210
Εύρως ὁ λευκός. Πράσινος εύρως. Περονόσπορος. . . . .	210 - 212
III. Λειχήνες . . . . .	212
<b>Φυτά</b>	
Διανομὴ τῶν φυτῶν ἐπὶ τῆς γηίνης σφαίρας . . . . .	213

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΙΣ

Τὰ φυτά

Πίναξ 1.	— Λειτουργίαι . . . . .	220
	Καταμερισμὸς ἐργασίας . . . . .	222 - 223

**I. Διατροφὴ τοῦ φυτοῦ**

"Οργανα καὶ λειτουργίαι διὰ τὴν διατροφὴν	
	α) Ριζα

Πίναξ 2.	— Ριζα . . . . .	224
	β) Βλαστός. Λειτουργίαι τοῦ βλαστοῦ	

Πίναξ 3.	— Βλαστός . . . . .	227
	Εἴδη βλαστῶν. Αὔξησις τοῦ βλαστοῦ . . . . .	227
	γ) Φύλλων. Ἐξωτερικὴ διασκευή. Λειτουργίαι	

Πίναξ 4.	— Φύλλων . . . . .	232
	Διατροφὴ τοῦ φυτοῦ . . . . .	234
	Ἐναποθήκευσις θρεπτικῶν συστατικῶν εἰς τὰ φυτά . . . . .	237

Πίναξ 5.	— Διατροφὴ τοῦ φυτοῦ . . . . .	238
----------	--------------------------------	-----

**II. Ἀναπαραγωγὴ τοῦ φυτοῦ**

Οἱ διάφοροι τρόποι πολλαπλασιασμοῦ τῶν φυτῶν

Πίναξ 6.	— Ἀναπαραγωγὴ τῶν φυτῶν . . . . .	240
----------	-----------------------------------	-----

**A'. Ἀναπαραγωγὴ εἰς τὰ Φανερόγαμα**

I. Ἡ ἀναπαραγωγὴ εἰς τὰ Ἀγγειόσπερμα	
	α) Ἀνθος

Πίναξ 7.	— Ἀνθος . . . . .	244
	Ἐπικονίασις καὶ γονιμοποίησις	
	β) Καρπὸς καὶ σπέρμα	

II. Ἡ ἀναπαραγωγὴ εἰς τὰ Γυμνόσπερμα	
Πίναξ 8.—Ἀναπαραγωγὴ εἰς τὰ φανερόγαμα . . . . .	251
Μεταβολὴ τῆς ὀοθήκης εἰς καρπὸν . . . . .	252
Οροι ἀπαραιτητοι διὰ τὴν ἐκβλάστησιν . . . . .	252
<b>B'. Ἀναπαραγωγὴ εἰς τὰ κρυπτόγαμα</b>	
Πίναξ 9.—Κρυπτόγαμα . . . . .	253
Χρησιμότης τῶν φυτῶν διὰ τὸν ἄνθρωπον	
Πίναξ τῶν περιεχομένων . . . . .	257

*\*Η φιλοτέχνησις τοῦ ἔξωφύλλου ὀφείλεται εἰς τὸν ζωγράφον κ. T. XATZHN*  
*\*Η εἰκονογράφησις τοῦ βιβλίου ὀφείλεται εἰς τὸν ζωγράφον κ. K. ΘΕΤΤΑΛΟΝ*

Τὰ ἀντίτυπα τοῦ βιβλίου φέρουν τὸ κάτωθι βιβλιόσημον εἰς ἀπόδειξην τῆς γνησιότητος αὐτῶν.

‘Αντίτυπον στερούμενον τοῦ βιβλιοσήμου τούτου θεωρεῖται κλεψίτυπον. ‘Ο διαθέτων, πωλῶν ἢ γρηγοριοποιῶν αὐτὸ διώκεται κατὰ τάς διατάξεις τοῦ ἅρθρου 7 τοῦ νόμου 1129 τῆς 15/21 Μαρτίου 1946 (‘Εφημ. Κυβερν. 1946, Α' 108).



0020557902  
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΟΥΛΗΣ

ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΒ'. 1971 (V) ANTITYPA 118.000 — ΣΥΜΒΑΣΙΣ 2092 / 5 - 4 - 1971  
Έκτυπωσις: Χ. Παλούμπα - Δ. Χέλμη Βιβλιοδεσία Π. Όκτωράτος - Κ. Κουκιᾶς



