



ΕΥΑΓΟΡΑ Μ. ΠΑΝΤΕΛΟΥΡΗ

ΑΝΔΡΟΠΟΛΟΓΙΑ Β/Γ

Άνδρωπολογία

Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ



002
ΚΛΣ
ΣΤ2Β
1845

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ - ΑΘΗΝΑΙ 1971

E 6^A 130T
Ταντελούρης (Παντελός. Μ.)
ΕΥΑΓΟΡΑ Μ. ΠΑΝΤΕΛΟΥΡΗ

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΑΘΗΝΑΙ 1971

002
ΛΙΣ
ΕΤΟΣ
1845

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η


Τὸ κύτταρον. Εἰς τὴν Φυσικὴν Ἰστορίαν τοῦ προηγουμένου ἔτους ἐμελετήσαμεν γενικῶς τὰ φυτά καὶ τὰ ζῷα, δηλ. τὰ φυσικὰ σώματα, τὰ ὅποια ἔχουν ζωὴν (ἔμβια ὄντα). Χαρακτηριστικὸν τῆς κατασκευῆς τῶν ἐμβίων ὄντων εἶναι, ὅτι ἀποτελοῦνται ἀπό κύτταρα, καὶ μάλιστα ἄλλα μὲν ἀπὸ ἓν μόνον (μονοκύτταροι ὄργανισμοί), ἄλλα δὲ ἀπὸ πολλὰ (πολυκύτταροι ὄργανισμοί).

Εἰς τὸ μικροσκόπιον διακρίνομεν εὐθὺς ἀμέσως τρία μέρη εἰς τὸ κύτταρον: τὴν κυτταρικὴν μεμβράνην, ἥ ὅποια τὸ περιβάλλει, τὸ κυτταρόπλασμα καὶ τὸν πυρῆνα (εἰκ. 1).

Τὸ κυτταρόπλασμα καὶ ὁ πυρήνας ἀποτελοῦν ὡς πρὸς τὴν σύστασιν δύο μορφὰς τοῦ πρωτοπλάσματος. Τὸ πρωτόπλασμα δὲν ἔχει ἀπλῆν σύνθεσιν, ἄλλα συνίσταται κυρίως ἀπὸ ποικίλα λευκώματα, λίπη, ύδατάνθρακας καὶ υδωρ (80%).

Τὸ λευκὸν τοῦ ὡσοῦ εἶναι κοινὸν παράδειγμα ούσιας ἀποτελουμένης ἐκ λευκωμάτων. Ἡ κυτταρικὴ μεμβράνη εἰς τοὺς ζωϊκοὺς ὄργανισμοὺς εἶναι καὶ αὐτῇ λεπτή στοιβάς πυκνοτέρου πρωτοπλάσματος, ἥ ὅποια προστατεύει τὸ κύτταρον.

Ἐντὸς τοῦ κυτταροπλάσματος διακρίνονται εἰς τὰ μικροσκοπικὰ παρασκευάσματα διάφορα σωματίδια, τὰ ὅποια ἐπιτελοῦν εἰδικάς λειτουρ-



Εἰκ. 1. Σχηματικὴ παράστασις κυττάρου. Π. Πυρήνη. Πρ.—Πυρηνίσκος.—πΜ. Πυρηνικὴ μεμβράνη.—κΜ. Κυτταρικὴ μεμβράνη.—Μχ. Μιτοχόνδρια.—Κπ. Κυτταρόπλασμα.—Κ. Κενοτόπιον. Εἰς τὸ σχῆμα τούτο, πλήν τῶν ἀνωτέρω, παρίστανται καὶ διάφορα δῆλα μορφολογικὰ στοιχεῖα τῶν ζωϊκῶν κυττάρων.

γίας, ὅπως τὸ κεντροσωμάτιον, τὰ ἴνιδια, τὰ μιτοχόνδρια, τὰ χυμοτόπια, οἱ κρύσταλλοι, τὰ ἐκκριτικὰ κοκκία, τὰ κοκκία χρωστικῆς καὶ ἄλλα.

Τὸ κύτταρόπλασμα ζῶντος κυττάρου εύρισκεται εἰς μίαν διαρκῆ ροήν ἐντὸς αὐτοῦ. Ἡ κίνησις αὕτη τοῦ πρωτοπλάσματος δύναται νὰ παρατηρηθῇ καλῶς εἰς κινηματογραφικάς ταινίας, αἱ ὅποιαι ἔχουν ληφθῆ ἀπὸ τὴν ζωὴν μονοκυττάρων ὄργανισμῶν, ὡς εἶναι ἡ ἀμοιβάς κ.ἄ.

Ἐντὸς τοῦ πυρῆνος εύρισκεται ἕνας ἀπλοῦς ἢ πολλαπλοῦς πυρηνίσκος, ἢ λινίνη, ὃ πυρηνικός ὅπτος καὶ τὰ χρωματικὰ κοκκία. Ὁ πυρῆν εἶναι τὸ σπουδαιότερον συστατικὸν τοῦ κυττάρου, εἰναι τὸ κέντρον τῆς ἀνταλλαγῆς τῆς ὑλῆς καὶ ὁ φορεὺς τῶν κληρονομικῶν ἰδιοτήτων. Ὅταν τὸ κύτταρον πρόκειται ‘νὰ διαιρεθῇ, τὰ χρωματικὰ κοκκία σχηματίζουν ἐν νῆμα (σπείρα μα), τὸ ὅποιον τελικῶς τέμνεται εἰς τμήματα καλούμενα χρωματοσώματα. Τὰ κύτταρα κάθε εἰδους ζώου χαρακτηρίζονται ἀπὸ ὥρισμένον ἀριθμὸν χρωματοσωμάτων, τὰ ὅποια εἶναι ἀνὰ δύο ὅμοια. Ὁ ἄνθρωπος π.χ., ὅπως ἀπεδείχθη τελευταίως, ἔχει 23 τοιαῦτα ζεύγη χρωματοσωμάτων εἰς κάθε κυττάρον τοῦ σώματός του.

Τὰ συστατικὰ τοῦ ζῶντος κυττάρου, μὲ τὴν ἐπίδρασιν κυρίως τοῦ ὀξυγόνου, διασπῶνται εἰς ἀπλουστέρας ἐνώσεις καὶ οὔτω ἀπελευθεροῦνται ἐνέργεια ύπό μορφὴν κινήσεως, θερμότητος κτλ. (ἀνάλυσις). Ἐξ ἀλλου τὸ κύτταρον προσλαμβάνει θρεπτικάς ούσιας, τὰς ὅποιας μετατρέπει εἰς ούσιας, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, ὅμοιας πρὸς τὰ συστατικά του (ἀφομοίωσις). Οὕτως αύξανεται καὶ ἀναπληρώνει τὰς διασπωμένας ούσιας (ἀνταλλαγὴ τῆς ὑλῆς).

Ἐντὸς τοῦ κυττάρου τελοῦνται ὅλαι αἱ λειτουργίαι, αἱ ὅποιαι χαρακτηρίζουν τοὺς ζῶντας ὄργανισμούς, ἥτοι ἡ ἀνταλλαγὴ τῆς ὑλῆς καὶ τῆς ἐνεργείας, ἡ κίνησις, ἡ διεγερσιμότης καὶ τέλος ἡ ἀναπαραγωγή.

Οἱ ιστοί. Εἰς τοὺς πολυκυττάρους ὄργανισμούς τὰ κύτταρα δὲν ἐκτελοῦν ὅλα τὰς ἴδιας ἐργασίας. Εἰς τοὺς ὄργανισμούς τούτους αἱ ἐργασίαι εἶναι καταμερισμέναι. Ἐκ τῶν διαφόρων κυττάρων ἀλλα π.χ. ἀναλαμβάνουν τὴν προστασίαν τοῦ ὄργανισμοῦ ἀπὸ τὰς ἐπιδράσεις τοῦ περιβάλλοντος (κύτταρα τοῦ δέρματος), ἄλλα τὴν

παραγωγήν ώρισμένων ούσιῶν (κύτταρα τῶν ἀδένων) κ.ο.κ. "Ολα τὰ κύτταρα, τὰ ὄποια ἔχουν διαμορφωθῆ κατὰ τοιοῦτον τρόπον, νὰ ἐκτελοῦν τὴν αὐτὴν ἐργασίαν, ἀποτελοῦν ἔνα ἵστον. Π.χ. τὰ κύτταρα, τὰ ὄποια καλύπτουν τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ σώματος, ἀποτελοῦν τὸν ἐπιθήλιον. Ἀλλα εἴδη ἴστῶν εἰναι δὲ ἐρειστικός (συνδετικός, χονδρικός, δόστιτης, αἷμα, λέμφος), δὲ μυϊκός καὶ δὲ νευρικός ἴστός.

"Εκαστος ἴστός, ἐκτὸς τῶν ζώντων κυττάρων του, δύναται νὰ περιλαμβάνῃ καὶ κύτταρα ἡλλοιωμένα (ἐπιδερμίς), ή καὶ νεκρὰ κύτταρα, καθώς καὶ διαφόρους ούσιας μεταξύ τῶν κυττάρων (ἄλατα τῶν δοτῶν).

Εἰς τὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου, ως καὶ τῶν ἀνωτέρων ζώων καὶ φυτῶν, δυνάμεθα νὰ διακρίνωμεν μέρη, τὰ ὄποια περιλαμβάνουν διάφορα εἴδη ἴστῶν, καὶ εἰναι κατάλληλα δι' ὡρισμένην ἐργασίαν. Τὰ τμήματα αὐτὰ καλοῦνται ὅργανα (στόμαχος, καρδία, ὀφθαλμὸς κτλ.). Ἀθροίσματα ὁργάνων συνεργαζομένων πρὸς ἐκτέλεσιν μιᾶς φυσιολογικῆς λειτουργίας ἀποτελοῦν τὰ ὄργανα τικὰ συστήματα (πεπτικὸν σύστημα, νευρικὸν σύστημα κ.ο.κ.).

Ο ἀνθρωπος. Ἐφέτος θὰ μελετήσωμεν ἰδιαιτέρως τὸν ὄργανισμὸν τοῦ ἀνθρώπου. Μέσα ἀπὸ ὅλον τὸν ἔμβιον κόσμον δὲ ἀνθρωπος ξεχωρίζει μὲ τὰς ἱκανότητάς του, τὴν νόησιν καὶ τὸν πολιτισμόν, τὸν ὄποιον ἔδημοιούργησε.

Εἰς τὰς γενικὰς γραμμὰς δὲ ὄργανισμὸς τοῦ ἀνθρώπου ὄμοιάζει πρὸς τὸν ὄργανισμὸν τῶν λοιπῶν Θηλαστικῶν, καὶ μάλιστα τῶν ἀνωτέρων ἔξ αὐτῶν, τῶν Πρωτεύοντων. Παρουσιάζει δῆμως τὴν κατασκευὴν τοῦ σώματος του καὶ σημαντικὰς διαφορὰς πρὸς αὐτά, αἱ ὄποιαι ἔχουν μεγάλην σπουδαιότητα διὰ τὴν ἔξαιρετικὴν ἔξελιξιν, τὴν ὄποιαν ἡκολούθησεν δὲ ἀνθρωπος. Εἰς τὴν περιγραφὴν τῶν διαφόρων συστημάτων τοῦ ἀνθρωπίνου ὄργανισμοῦ θὰ μᾶς διοθῇ ἡ εὐκαιρία νὰ παρατηρήσωμεν ὡρισμένας ἐκ τῶν διαφορῶν τούτων καὶ νὰ ἀντιληφθῶμεν τὴν σημασίαν των.

Τὸ βιβλίον αὐτὸν θέλει νὰ συντροφεύσῃ τὸ 'Ελληνόπουλον τῆς Β' Γυμνασίου κατὰ τὴν ὥραν τῆς μελέτης του. "Εχει σκοπὸν να βοηθήσῃ τὸν μαθητήν, διὰ νὰ ἐπαναλάβῃ καὶ νὰ ἀφομοιώσῃ δὲ τις ἐδιδάχθη εἰς τὴν τάξιν. Οὕτω θὰ ἀποκτήσῃ δὲ μαθητής μίαν σαφή ἰδέαν τοῦ ἀνθρωπίνου ὄργανισμοῦ.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ


ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ

Ο ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

1. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΦΗ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ

Τά μαλακά μέρη τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος, ὅπως καὶ τοῦ σώματος τῶν ἄλλων Σπονδυλωτῶν, στηρίζονται ἐπάνω εἰς σκληρά μέρη, τὰ ὅποια καλοῦνται ὁ στᾶ. Τὰ ὄστα χρησιμεύουν ἀκόμη καὶ διὰ νὰ περικλείουν ὡρισμένα εύπαθῃ ὄργανα καὶ νὰ ἐκτελοῦν, ἐλκό- μενα ὑπὸ τῶν μυῶν, διαφόρους κινήσεις.

Τὸ κύριον συστατικὸν τῶν ὄστων εἶναι ὁ ὄστίτης ίστος, ἐνῷ ἡ μεσοκυττάριος ούσια αὐτῶν εἶναι ἐμπεποτισμένη ὑπὸ ἀνοργάνων ἀλάτων, τὰ ὅποια προσδίδουν σκληρότητα καὶ στερεότητα. Οὔτως ἡ σύστασις τῶν ὄστων εἶναι 35% ὄργανικαὶ καὶ 65% ἀνόργανοι ούσιαι.



Εἰκ. 2. Μικροσκοπική τομη
όστου.

Τὰ ὄστα τοῦ ἐμβρύου εἶναι ἀρχικῶς ὑμενώδη. Κατόπιν ἄλλα μὲν ἐξ αὐτῶν μετατρέπονται εἰς χόνδρινα καὶ ἐν συνεχείᾳ λαμβάνουν τὴν τελικὴν σκληρὰν μορφὴν ἐξ ὄστίτου ίστοῦ, ἄλλα δὲ (τὰ ὄστα τοῦ κρανίου) λαμβάνουν ἀπ' εύθειας τὴν τελικὴν αὐτὴν σκληρὰν μορφὴν. Τὰ πρῶτα καλοῦνται χονδρογενῆ καὶ τὰ δεύτερα ὑμε- νογενῆ ἢ δερματογενῆ ὄστα.

Κατὰ τὴν ἐμβρυϊκὴν ἡλικίαν μερικὰ κύτταρα τῶν ὑμένων καὶ τῶν χόνδρων

διαφοροποιοῦνται εἰς εἰδικὰ κύτταρα, τοὺς δόστεοβλάστας, οἱ ὁ-
ποῖοι ἐκκρίνουν μίαν μαλακήν δργανικήν οὐσίαν, τὴν δόστει-
νην. Διὰ τοῦτο τὰ δόστα τῶν μικρῶν παιδιῶν εἶναι μαλακὰ καὶ
εὔκαμπτα. Ὅστον δῆμος προχωρεῖ ἡ ἡλικία τὸ αἷμα προσκομίζει
καὶ ἀποθέτει διάφορα ἄλατα. Οὕτω τὰ δόστα καθίστανται
σκληρότερα, συγχρόνως δῆμος καὶ περισσότερον εὔθραυστα. Μέχρι
τοῦ εἰκοστοῦ περίπου ἔτους τῆς ἡλικίας ἡ ἀποστέωσις αὗτη συμπλη-
ρώνεται καὶ ἡ αὔξησις τῶν δόστῶν σταματᾷ πλέον.



*Ωστε, ἀν παρατηρήσωμεν εἰς τὸ μικροσκόπιον μίαν τομὴν
δόστοῦ (εἰκ. 2), θὰ διακρίνωμεν ἐδῶ καὶ ἐκεῖ διαφόρους ὅπας, αἱ ὁποῖαι
εἶναι αἱ τομαὶ τῶν αἱμοφόρων ἀγγείων. Περὶ αὐτὰς θὰ παρατηρή-
σωμεν, συγκεντρωτικῶς τοποθετημένας, πολλὰς μικροτέρας ὅπας,
αἱ ὁποῖαι εἶναι αἱ θέσεις τῶν κυττάρων. Ὁ λοιπὸς χῶρος κατέχεται
ἀπὸ τὴν δόστεινην, ἡ ὁποία ἔχει σκληρυνθῆ διὰ τῆς ἀποθέσεως τῶν
ἀλάτων ἀσβεστίου, μαγνησίου καὶ ἄλλων.

Τὰ μέρη τῶν δόστῶν ἄλλα μὲν εἶναι συμπαγῆ, ἄλλα δὲ σ π ο γ-
γωδη. Γενικῶς εἶναι συμπαγῆ τὰ τοιχώματα τῶν μακρῶν κοίλων
δόστῶν, ἐνῷ τὰ μικρὰ καὶ πλατέα δόστα, καθὼς καὶ τὰ ἀκραῖα τμή-
ματα τῶν μακρῶν δόστῶν, εἶναι σπογγώδη.

Εἰς τὰ διάκενα τῶν σπογγώδῶν δόστῶν καὶ εἰς τὰς κοιλότητας
τῶν μακρῶν δόστῶν εὑρίσκεται ἔνας μαλακὸς ύπερυθρος ίστός, ὁ
μυελὸς τῶν δόστων. Κατὰ τὴν γεροντικὴν ἡλικίαν, λόγω
τῆς ἀποθέσεως λίπους, ὁ μυελὸς τῶν δόστῶν ἀποκτᾷ ύποκίτρινον
χρῶμα. Ἡ ἐπιφάνεια τῶν δόστῶν καλύπτεται ἀπὸ ἐν λεπτὸν ύμε-
νωδες περιόστεον μὲν πολλὰ αἱμοφόρα ἀγγεῖα καὶ νεῦρα. Ἐπὶ
τῆς ἐπιφανείας πολλῶν δόστῶν διακρίνομεν ὅπας, διὰ τῶν ὁποίων
διέρχονται αἱμοφόρα ἀγγεῖα, καλούμενα τρῆματα, διαφόρους
ἔξογκωσεις, καλουμένας φύματα, καὶ διαφόρους προεκτάσεις,
καλουμένας ἀποφύσεις, ἀκάνθας κτλ.

2. ΣΥΝΔΕΣΙΣ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ


Σχεδὸν δλα τὰ δόστα τοῦ σώματος εἶναι συνηρμολογημένα με-
ταξύ των, ώστε νὰ ἀποτελοῦν ἔνιαῖον σύνολον, τὸν σκελετόν
(εἰκ. 3 καὶ 4). Ἡ σύνδεσις δύο δόστων δύναται νὰ γίνῃ κατὰ δύο
τρόπους. Ὁ πρῶτος καλεῖται συνάρθρωσις καὶ δὲν ἐπιτρέπει



Εἰκ. 4. Ἀκτινογραφία ὅλοκλήρου τοῦ σκελετοῦ.

Εἰκ. 3. Ὁ σκελετός τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος.— 1. Κεφαλή. — 2. Σπονδυλική στήλη. — 3. Τὸ στέρνον. — 5. Βραχιόνιον δόστοιν. — 6. Ἡ λεκάνη. — 7. Κερκίς. — 8. Ὡλένη. — 9. Ὁστᾶ τῆς ἄκρας χειρός. — 10. Μηριασίον δόστοιν. — 11. Περόνη. — 12. Κνήμη. — 13. Ἐπιγονατίς. — 14. Ὁστᾶ τοῦ ἄκρου ποδός. — 15. Τροχιλία. — 16. Κόνδυλος. — 17. Ἀκρώμιον.

τὴν κίνησιν τῶν συνδεομένων ὀστῶν. Ὁ δεύτερος ἐπιτρέπει τὴν κίνησιν καὶ καλεῖται διάρθρωσις. Εἰς τὴν διάρθρωσιν (εἰκ. 5) αἱ ἐφαπτόμεναι ἐπιφάνειαι τῶν ὀστῶν καλύπτονται μὲν ἐν στρῶμα ἀρθρικοῦ χόνδρου. "Ολὴ ἡ διάρθρωσις περιβάλλεται ἀπὸ ἵνῳδη σάκκον, σχηματιζόμενον ὑπὸ τοῦ περιοστέου καὶ ταινιῶν συνδετικοῦ ἴστοῦ. Ὁ σάκκος οὗτος καλεῖται ἀρθρικὸς θύλακος καὶ χρησιμεύει διὰ τὴν συγκράτησιν τῶν ὀστῶν τῆς διαρθρώσεως. Οἱ ἀρθρικοὶ χόνδροι διαβρέχονται ἀπὸ ἐν ὑγρόν, καλούμενον ἀρθρικὸν ύγρον, τὸ ὅποιον διευκολύνει τὴν ὀλίσθησιν τῶν ὀστῶν.



Εἰκ. 5. Διάρθρωσις τοῦ ὠμού.
4. Τομὴ τῆς ώμοπλάτης.—5. Τομὴ τοῦ βραχιονίου ὀστοῦ. — Ἀρθρικὸς θύλακος.

3. ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ

Εἰς τὸν σκελετὸν διακρίνομεν τὰ ἔξης τμήματα: τὸν σκελετὸν τῆς κεφαλῆς, τὸν σκελετὸν τοῦ κορμοῦ καὶ τὸν σκελετὸν τῶν ἄκρων.

I. Ο ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ

Ο σκελετὸς τῆς κεφαλῆς ἀποτελεῖται ἀπὸ δύο ὁμάδας ὀστῶν: τὰ ὀστᾶ τοῦ κρανίου καὶ τὰ ὀστᾶ τοῦ προσώπου.

Τὰ ὀστᾶ τοῦ κρανίου εἶναι λεπτὰ καὶ πλατέα καὶ σχηματίζουν μίαν κλειστὴν κοιλότητα, τὴν κρανιακὴν κοιλότητα.

Τὰ ὀστᾶ τοῦ προσώπου σχηματίζουν τὰς δύο ὀφθαλμικὰς κόγχας, τὴν ρινικὴν κοιλότητα καὶ τὴν στοματικὴν κοιλότητα.


Ἐξ ὅλων τῶν ὀστῶν τῆς κεφαλῆς μόνον τὸ ὀστοῦν τῆς κάτω σιαγόνος εἶναι κινητόν, συνδεόμενον διὰ διαρθρώσεως πρὸς τὰ ἄλλα.

Λεπτομερέστερον, ή όνομασία, ή μορφή καὶ ἡ θέσις τῶν ὀστῶν τῆς κεφαλῆς (εἰκ. 6 καὶ 7) ἔχουν ὡς ἔξης:

A') ΟΣΤΑ ΤΟΥ ΚΡΑΝΙΟΥ

1) **Τὸ μετωπιαῖον.** Τοῦτο κατέχει τὸ πρόσθιον καὶ ἄνω τοίχωμα τῆς κρανιακῆς κοιλότητος καὶ σχηματίζει ἐπάνω ἀπὸ κάθε ὀφθαλμὸν μίαν ἐλαφρὰν ὑπέγερσιν, τὸ ὑπερόφρυνον τόξον.

2) **Τὰ δύο βρεγματικὰ** (ἀριστερὸν καὶ δεξιόν). Ταῦτα ἀποτελοῦν τὸ μεγαλύτερον μέρος τοῦ θόλου τῆς κρανιακῆς κοιλότητος καὶ συναρθροῦνται κατὰ τὸ μέσον πρὸς ἄλληλα, ἐμπρὸς πρὸς τὸ μετωπικόν, ὅπιστα πρὸς τὸ ἴνιακόν καὶ πλαγίως πρὸς τὸ σφηνοειδὲς καὶ τὸ κροταφικόν.




Εἰκ. 6. Ὁ σκελετὸς τῆς κεφαλῆς.

- 1. Μετωπικόν. — 2. Βρεγματικόν. — 3. Κροταφικόν. — 4. Σφηνοειδές. — 5. Ἰνιακόν. — 6. Ζυγωματικόν. — 7. Ἀνω γναθικόν. — 8. Κάτω γναθικόν. — 9. Ρινικόν. — 10. Μαστοειδὴς ἀπόφυσις τοῦ κροταφικοῦ. — 11. Βελονοειδὴς ἀπόφυσις τοῦ κροταφικοῦ. — 12. Ἀκουστικὸς πόρος.

3) **Τὸ ἴνιακόν.** ·Τοῦτο συμπληρώνει τὸν θόλον τοῦ κρανίου πρὸς τὰ. ὅπιστα καὶ, καμπτόμενον, ἀποτελεῖ προσέτι μέρος· τῆς βάσεως τοῦ κρανίου. Τὸ τμῆμά του τὸ ἀνῆκον εἰς τὴν βάσιν τοῦ κρανίου φέρει τὸ ἴνιακόν τρῆμα, διὰ τοῦ ὅποιου ἐπικοινωνεῖ ἡ κρανιακὴ κοιλότης μετὰ τοῦ σπονδυλικοῦ σωλήνος. Ἐκατέρωθεν τοῦ τρήματος ὑπάρχει ἀνὰ ἐν ἔξογοις, καλούμενον ἴνιακὸς κόνδυλος. Διὰ τῶν ἴνιακῶν κονδύλων στηρίζεται ἡ κεφαλὴ ἐπὶ τῆς σπονδυλικῆς στήλης.

4) **Τὰ δύο κροταφικὰ** (ἀριστερὸν καὶ δεξιόν). Ταῦτα σχηματίζουν μετὰ τοῦ



Eik. 7. Τὰ δοτά τῆς κεφαλῆς.

- 1. Μετωπικόν.— 2. Βρεγματικόν.— 3. Ἰνιακόν.— 4, 5. Κροταφικόν.—
- 6. Σφηνοειδές.— 7. Ἡθμοειδές.— 8. Ζυγωματικόν.— 9. Ἀνω γναθικόν.—
- 10. Κάτω γναθικόν.— 11. Ὑνις.— 12. Ρινικόν.— 13. Δακρυϊκόν.

σφηνοειδοῦς τὰς πλευρὰς τῆς κρανιακῆς κοιλότητος. Ἐκαστον κροταφικὸν συναρθροῦται ὅπισω πρὸς τὸ Ἰνιακόν, ἐπάνω μὲ τὸ ἀντίστοιχον βρεγματικὸν καὶ ἐμπρὸς μὲ τὸ σφηνοειδές. Πρὸς τὰ κάτω παρουσιάζει μίαν ἑλευθέραν ἀπόφυσιν, τὴν μαστοειδῆ ἀπόφυσιν, μίαν ἀπόφυσιν συνδεομένην μὲ τὸ ζυγωματικόν, τὴν ζυγωματικὴν ἀπόφυσιν, καὶ μίαν μικρὰν κοῖλην ἐπιφάνειαν, πρὸς τὴν ὅποιαν ἀρθροῦται ἡ κάτω γνάθος. Κατὰ τὴν βάσιν καὶ πρὸ τῆς μαστοειδοῦς ἀποφύσεως, φέρει ἔκαστον κροταφικὸν τὴν κοιλότητα, ἐντὸς τῆς ὅποιας εὐρίσκονται τὰ ὄργανα τῆς ἀκοῆς.

5) Τὸ σφηνοειδές. Εἶναι ἐσφηνωμένον εἰς τὴν βάσιν τοῦ κρανίου, ἔχον ὅπισθεν αὐτοῦ τὴν βάσιν τοῦ Ἰνιακοῦ δόστοῦ, καὶ ἐμπροσθεν τὸ ἥθμοειδές. Ἀποτελεῖται ἀπὸ ἓν δοριζόντιον τμῆμα, τὸ ὅποιον κατέχει τὸ μέσον τῆς βάσεως τοῦ κρανίου καὶ δύο πτέρυγας, αἱ δποῖαι συμμετέχουν εἰς τὸν σχηματισμὸν τῶν πλευρικῶν τοιχωμάτων τῆς κρανιακῆς κοιλότητος.

6) **Τὸ ἡθμοειδές.** Τοῦτο ἀποτελεῖται κυρίως ἀπὸ ἐν ὅριζόντιον καὶ τρία κάθετα πρὸς τὰ κάτω τμήματα. Ἐκ τούτων τὸ ὅριζόντιον συμπληρώνει πρὸ τοῦ σφηνοειδοῦς τὴν βάσιν τῆς κρανιακῆς κοιλότητος, τὴν ὅποιαν χωρίζει ἀπὸ τὴν ρινικήν. Τὰ δύο ἀκραῖα κάθετα πέταλα μαζὶ μὲ τὰς δύο ρινικὰς κόγχας ἀποτελοῦν τὰ πλάγια τοιχώματα τῆς ρινικῆς κοιλότητος (εἰκ. 7), τὴν ὅποιαν χωρίζουν ἀπὸ τὴν ἀντίστοιχον ὀφθαλμικὴν κόγχην. Τὸ μεσαῖον πέταλον συμμετέχει εἰς τὸν σχηματισμὸν τοῦ ρινικοῦ διαφράγματος.

Β') ΤΑ ΟΣΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

1) **Ἡ ὔνις.** Αὕτη εἶναι ἐν τετράπλευρον ὀστεῖον πέταλον, τὸ ὅποιον, μαζὶ μὲ τὸ κάθετον μεσαῖον τμῆμα τοῦ ἡθμοειδοῦς, σχηματίζει τὸ ρινικὸν διάφραγμα. Μὲ τὸ ἄνω καὶ τὸ ὄπισθιον χεῖλος του συναρθροῦται πρὸς τὸ ἡθμοειδές, καὶ τὸ σφηνοειδές μὲ τὸ κάτω χεῖλος ἀκουμβᾶξ εἰς τὴν ὁροφὴν τῆς στοματικῆς κοιλότητος.

2) **Τὰ δύο ρινικά.** Ταῦτα εἶναι μικρὰ τετράπλευρα πετάλια, τὰ δόποια σχηματίζουν τὴν ράχιν τῆς ρινός.

3) **Αἱ δύο κάτω ρινικαὶ κόγχαι.** Λεπτὰ ὑπόκυρτα ὀστεῖνα πέταλα εύρισκονται εἰς τὰ πλάγια τοιχώματα τῆς κοιλότητος τῆς ρινός.

4) **Τὰ δύο δακρυϊκά.** Καὶ αὐτὰ εἶναι μικρὰ πετάλια, τὰ δόποια εύρισκονται ἀνὰ ἐν εἰς τὸ ἐσωτερικὸν τοίχωμα ἑκάστης ὀφθαλμικῆς κόγχης.

5) **Τὰ δύο ζυγωματικὰ** (δεξιὸν καὶ ἀριστερόν). "Ἐκαστον σχηματίζει ἀπὸ τοῦ κροταφικοῦ μέχρι τοῦ ἄνω γναθικοῦ ἐν ὀστεῖον τόξον παράλληλον πρὸς τὸ πλευρικὸν τοίχωμα τῆς κρανιακῆς κοιλότητος. Τὰ τόξα ταῦτα, καλούμενα ζυγωματικὰ τόξα, σχηματίζουν τὰ λεγόμενα μῆλα τοῦ προσώπου, τὰ δόποια ἔξεχουν περισσότερον εἰς τὰς μογγολικὰς φυλάς.

6) **Αἱ δύο ἄνω γνάθοι.** Ἔνούμεναι εἰς τὸ μέσον ἀποτελοῦν τὸ κυριώτερον μέρος τοῦ σκελετοῦ τοῦ προσώπου καὶ συμπληρώνουν τὰ τοιχώματα τοῦ στόματος, τῆς κοιλότητος τῆς ρινός, τῶν ὀφθαλμικῶν κογχῶν καὶ φέρουν τὰ φατνία διὰ τὴν στερέωσιν τῶν ὀδόντων.

7) **Τὰ δύο ὑπερώια.** Ταῦτα εἶναι δύο ὀστεῖνα πέταλα, τὰ δόποια εύρισκονται εἰς τὸ ὄπισθιν μέρος τῆς ρινός καὶ παρεμβάλλονται

μεταξὺ τῆς ἄνω γνάθου καὶ τοῦ σφηνοειδοῦς ὀστοῦ, συμβάλλουν δὲ εἰς τὴν διαμόρφωσιν τοῦ ἔξω τοιχώματος τῆς ρινικῆς κοιλότητος, τῆς ὀπισθίας ὀστείνης ὑπερώφας καὶ τῶν ὀφθαλμικῶν κογχῶν.

8) **Ἡ κάτω γνάθος.** Τοῦτο εἶναι τὸ ἴσχυρότερον καὶ τὸ μόνον κινητὸν ὀστοῦ τῆς κεφαλῆς. Διακρίνομεν εἰς αὐτὸν ἀφ' ἐνὸς ἐν πεταλοειδές σῶμα, τὸ ὅποιον εἰς τὸ ἄνω χειλός του φέρει ἐπίσης σειρὰν φατνίων, καὶ ἀφ' ἑτέρου δύο κλάδους. Οἱ κλάδοι οὗτοι κατευθύνονται πρὸς τὰ ἄνω καὶ διχάζονται ἕκαστος εἰς δύο ἀποφύσεις, διὰ τῶν ὅποίων γίνεται διάρθρωσις τῆς κάτω γνάθου πρὸς τὰ ὀστᾶ τῆς κεφαλῆς.

9) **Τὸ ὑοειδές ὀστοῦν.** Τοῦτο δὲν συνδέεται πρὸς τὰ ἄλλα ὀστά καὶ εύρισκεται κατὰ τὴν βάσιν τῆς γλώσσης, ἐπάνω ἀπὸ τὸν θυρεοειδῆ χόνδρον τοῦ λάρυγγος. Ἐχει σχῆμα ἀνοικτοῦ ὕψιλον.

II. Ο ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΡΜΟΥ

‘Ο σκελετὸς τοῦ κορμοῦ (εἰκ. 8) περιλαμβάνει τὴν σπιονδυλικὴν στήλην καὶ τὰς πλευρὰς μετὰ τοῦ στέρνου.


A') ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ

Ἡ σπονδυλικὴ στήλη εἶναι μία σειρὰ μικρῶν ὀστῶν, τῶν σπιονδύλων, ἡ ὅποια ἀρχίζει ἀπὸ τὴν βάσιν τοῦ κρανίου καὶ διατρέχει κατὰ τὸ μέσον τῆς ράχεως τὸν κορμόν. Ἀποτελεῖται ἀπὸ 33 σπονδύλους, ἐκ τῶν ὅποίων οἱ πρῶτοι ἐπτὰ καλοῦνται αὔχενικοί, οἱ ἐπόμενοι δώδεκα θωρακικοί καὶ οἱ ἐπόμενοι πέντε ὀσφυϊκοί. Ἐκ τῶν ὑπολοίπων, οἱ πέντε συνενοῦνται καὶ σχηματίζουν ἐν πλατύτριγωνικὸν ὀστοῦν, τὸ ἱερὸν ὀστοῦν, οἱ δὲ τελευταῖοι τέσσαρες εἶναι ἀτροφικοί, ἀποτελοῦντες ἐν ὀστάριον, τὸν κόκκυγα, ὃ ὅποιος κατέχει τὸ ἄκρον τῆς σπονδυλικῆς στήλης (εἰκ. 13). Μεταξὺ τῶν σωμάτων τῶν σπονδύλων παρεμβάλλονται λεπταὶ πλάκες χόνδρου, οἱ μεσοσπιονδύλιοι χόνδροι, προσδίδοντες εύκαμψίαν καὶ ἐλαστικότητα.

Εἰς κάθε σπόνδυλον (εἰκ. 9) διακρίνομεν ἐν κυλινδρικὸν σῶμα καὶ ἐν τόξον, μεταξὺ δὲ τούτων παραμένει διάκενον, καλούμενον τρῆμα τοῦ σπονδύλου. Τὸ τόξον φέρει διαφόρους ἀποφύσεις,

αἱ ὅποιαι χρησιμεύουν ἄλλαι μὲν διὰ τὴν στήριξιν τῶν σπονδύλων μεταξύ των, ἄλλαι δὲ διὰ τὴν πρόσφυσιν μυῶν καὶ τὸν περιορισμὸν τῶν κινήσεων τῆς σπονδυλικῆς στήλης. Εἰς τοὺς πλείστους σπονδύλους μεγαλύτερα ἀπόφυσις εἶναι ἡ ἀκανθώδης, ἡ δὲ ὅποια εύρισκεται εἰς τὸ μέσον τοῦ τόξου καὶ κατευθύνεται πρὸς τὰ ὄπιστα.

“Ολοὶ οἱ σπόνδυλοι δὲν εἶναι ἀπολύτως ὅμοιοι μεταξύ των. Π.χ. οἱ δύο πρῶτοι (ὁ ἀτλας καὶ ὁ ἐπιστροφεύς) δὲν ἔχουν ἀνεπτυγμένον σῶμα καὶ ὁμοιάζουν πρὸς δακτυλίους (εἰκ. 11).



Εἰκ. 8. Ὁ σκελετός τοῦ κορμοῦ καὶ τῶν ὀπών ἄκρων.

Αἱ ἀποφύσεις των εἶναι διαμορφωμέναι κατὰ τοιοῦτον τρόπον, ὥστε νὰ διευκολύνουν τὴν στήριξιν καὶ περιστροφὴν τῆς κεφαλῆς. Ὁ ἐπιστροφεύς φέρει ἵσχυρὰν ὁδοντοειδῆ ἀπόφυσιν, περὶ τὴν ὅποιαν στρέφεται ὁ ἀτλας μετὰ τῆς κεφαλῆς. Εἰς τοὺς θωρακικοὺς σπονδύλους πάλιν παρατηροῦμεν, ὅτι αἱ ἀκανθώδεις ἀποφύσεις κατευθύνονται ὅχι μόνον πρὸς τὰ ὄπίσω, ὀλλά καὶ πρὸς τὰ κάτω, παρεμποδίζουσαι οὕτω τὴν ἐκτασιν τῆς σπονδυλικῆς στήλης πέραν ἐνὸς ὄριου.

“Οσον προχωροῦμεν πρὸς τοὺς τελευταίους ὁσφυϊκούς, συναντῶμεν σπονδύλους ὄλοءν ἵσχυροτέρους, καταλλήλους διὰ νὰ βαστάσουν μεγαλύτερον βάρος.


Τὰ τρήματα τῶν σπονδύλων εύρισκονται τὸ ἐν κάτωθεν τοῦ ἄλλου καὶ ἀποτελοῦν ἑνα συνεχῆ νωτιαῖον σωλῆνα, ἐντὸς τοῦ ὅποίου εύρισκεται ὁ νωτιαῖος μυελός.

Η σπονδυλική στήλη δὲν είναι εύθεια, ἀλλὰ κυρτοῦται εἰς μὲν τὴν αὐχενικὴν καὶ ὁσφικὴν μοῖραν πρὸς τὰ ἐμπρός, εἰς δὲ τὴν θωρακικὴν καὶ ιερὰν πρὸς τὰ ὄπισω. Τὰ δύο πρῶτα κυρτώματα δὲν υπάρχουν ἐξ ἀρχῆς, ἀλλὰ διαμορφώνονται, ὅταν ἀρχίζῃ τὸ βρέφος νὰ βαδίζῃ καὶ νὰ κάθηται, ἐνῶ τὰ δεύτερα διαμορφοῦνται κατὰ τὴν ἐμβρυϊκὴν ἡλικίαν διὰ τὴν στήριξιν τῶν σπλάγχνων.


B') Ο ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΤΟΥ ΘΩΡΑΚΟΣ

Πρὸς τὰς πλαγίας ἀποφύσεις τῶν θωρακικῶν σπονδύλων ἀρθροῦνται αἱ πλευραί. Αὗται, 12 ἐν ὅλῳ ζεύγη, ἥτοι ἔν ζεῦγος δι' ἕκαστον θωρακικὸν σπόνδυλον, είναι ἐπιμήκη τοξοειδῆ ὄστα, τὰ ὄποια μετὰ τῶν σπονδύλων καὶ τοῦ στέρνου περικλείουν τὴν θωρακικὴν κοιλότητα. Τὰ πρῶτα ἐπτὰ ζεύγη συνεχίζονται ἐμπρὸς μὲ χόνδρινα τμήματα,

παταγία, τὰ ὄποια ἔνώνονται μὲ τὸ στέρνον. Τοῦτο είναι ξιφοειδὲς ὄστον, τὸ ὄποιον εύρισκεται εἰς τὸ μέσον τοῦ προσθίου τοιχώματος τοῦ θώρακος. Τὰ χόνδρινα τμήματα τῶν ἐπομένων τριῶν ζευγῶν δὲν φθάνουν μέχρι τοῦ στέρνου, ἀλλὰ πολλαγοῦν εἰς τὸ χόνδρινον τμῆμα τοῦ ἔβδομου ζεύγους (νόθοι πλευραί). Τέλος, τὰ δύο τελευταῖα ζεύγη πλευρῶν



Εἰκ. 10. Οἱ δύο πρῶτοι αὐχενικοὶ σπόνδυλοι. Ἀνω ὁ ἀτλας, κάτω ὁ ἐπιστροφεύς.



Εἰκ. 9. Σχῆμα σπονδύλων.

1. Σῶμα τοῦ σπονδύλου.
2. Τόξον τοῦ σπονδύλου.
3. Τρέμα τοῦ σπονδύλου.
4. Ἀκανθώδης ἀπόφυσις.
5. Μεσοσπονδύλιος χόνδρος.

είναι άτροφικά καὶ δὲν ἔχουν χόνδρινα τμήματα (νόθοι ἀσύντακτοι πλευραί).

III. Ο ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΤΩΝ ΑΚΡΩΝ

Θὰ ἔξετάσωμεν ἵδιαιτέρως τὸν σκελετὸν τῶν ἄνω ἄκρων καὶ τῶν ὕμων καὶ τὸν σκελετὸν τῶν κάτω ἄκρων καὶ τῆς λεκάνης.


A') Ο ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΤΩΝ ΩΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΩ ΑΚΡΩΝ (ΧΕΙΡΩΝ)

"Ἐκαστὸν ἐκ τῶν δύο ἄνω ἄκρων ἀρθροῦται πρὸς τὰ ὀστᾶ τοῦ ἀντιστοίχου ὕμου. Τὰ ὀστᾶ ταῦτα εἰναι δύο, ἡ κλεὶς καὶ ἡ ὡ μοπλάτη.

"Ἡ κλεὶς εἰναι ἐπίμηκες ὀστοῦν, τὸ ὅποιον ἐκτείνεται ὁρίζοντις ἀπὸ τὸ ἄνω ἄκρον τοῦ στέρνου μέχρι τῆς ὡμοπλάτης.

"Ἡ ὡμοπλάτη (εἰκ. 11) εἰναι πλατὺ ὀστοῦν, τὸ ὅποιον κατέχει τὸ ἄνω καὶ ἔξω ἄκρον τῆς ραχιαίας ἐπιφανείας τοῦ θώρακος. "Ἐχει σχῆμα τριγώνου, τοῦ ὅποιου ἡ βάσις εἰναι σχεδὸν παράλληλος πρὸς τὴν δευτέραν πλευράν, ἡ δὲ κορυφὴ φθάνει τὴν ἐβδόμην πλευράν. Πρὸς τὰ ἔξω σχηματίζει ἡ ὡμοπλάτη μίαν ἀπόφυσιν, καλουμένην ἀκρῷ μιον, πρὸς τὴν δόποιαν ἀρθροῦται τὸ ἄκρον τῆς κλειδόσ.

"Ἐκαστὸν ἄνω ἄκρον περιλαμβάνει τρία τμήματα: τὸν βραχίονα, τὸν πηχυνὴν ἡντιβραχίονα καὶ τὴν ἄκραν ἡ κυρίως χειρά (εἰκ. 3, 4, 8).



Εἰκ. 11. Ἡ ὡμοπλάτη
(ἐκ τῶν ὅπισθεν).
1. Τὸ ἄκρωμιον.

"Ο σκελετὸς τοῦ βραχίονος ἀποτελεῖται ἀπὸ ἐν μακρὸν ὀστοῦν, τὸ βραχίονα. Τοῦτο εἰναι κοῖλον ἐσωτερικῶς καὶ εἰς τὸ ἄνω ἄκρον του ἀπολήγει εἰς μίαν σφαιρικὴν κεφαλήν, ἡ ὅποια χρησιμεύει διὰ τὴν ἀρθρωσιν εἰς μίαν κοιλότητα τῆς ὡμοπλάτης, καλουμένην ὡμογλήνη καὶ κειμένην πλησίον τοῦ ἄκρωμίου. Εἰς τὸ κάτω ἄκρον τὸ βραχιόνιον ἀπολήγει εἰς δύο ὄγκωματα, ἐκ τῶν ὅποιων τὸ ἐν πρὸς τὰ ἔξω εἰναι μικρότερον καὶ καλεῖται κόνδυλος, τὸ δὲ πρὸς τὰ ἔσω εἰναι μεγα-

λύτερον καὶ καλεῖται τροχιλία.
Τὰ ὄγκώματα αὐτά χρησιμεύουν διὰ
τὴν διάρθρωσιν τοῦ βραχιονίου πρὸς
τὰ δύο ὀστᾶ τοῦ πήχεως.

‘Ο σκελετὸς τοῦ πήχεως περιλαμβάνει δύο ὀστᾶ, τὴν κερκίδαν καὶ τὴν ὠλένην ν. Ταῦτα ἀρθροῦνται ἀφ’ ἐνὸς μὲν πρὸς τὸ βραχιόνιον (ἡ κερκίς διὰ τοῦ κονδύλου καὶ ἡ ὠλένη διὰ τῆς τροχιλίας), ἀφ’ ἔτερου δὲ πρὸς τὴν ἄκραν χεῖρα. Τὸ κάτω ἄκρον τῆς ὠλένης εἶναι λεπτότερον τοῦ ἀνωτέρου καὶ ἀντιστοιχεῖ εἰς τὸν μικρὸν δάκτυλον τῆς χειρός. Ἀντιστρόφως, εἰς τὴν κερκίδα τὸ κατώτερον ἄκρον εἶναι ὄγκωδέστερον τοῦ ἀνωτέρου καὶ ἀντιστοιχεῖ εἰς τὸν μέγαν δάκτυλον. Ἡ ὠλένη εἶναι ὄλιγον μακροτέρα τῆς κερκίδος.

‘Ο σκελετὸς τῆς κυρίως χειρὸς σχηματίζεται ἀπὸ τρεῖς διάδασις ὀστῶν: τὰ ὀστᾶ τοῦ καρποῦ, τοῦ μετακαρπίου καὶ τῶν δακτύλων (εἰκ. 12).


Τὰ ὀστᾶ τοῦ καρποῦ εἶναι ὀκτὼ μικρὰ ὀστάρια, περίπου στρογγύλα, διατεταγμένα εἰς δύο στοίχους ἀνὰ τέσσαρα, τὰ ἄνω καὶ τὰ κάτω.

Τὰ ὀστᾶ τοῦ μετακαρπίου ἡ μετακάρπια εἶναι πέντε, ἐπιμήκη, διαρθρούμενα ἀφ’ ἐνὸς μὲ τὰ ὀστᾶ τοῦ καρποῦ καὶ ἀφ’ ἔτερου μὲ τὰς φάλαγγας τῶν δακτύλων.


‘Ο σκελετὸς ἑκάστου δακτύλου ἀποτελεῖται ἀπὸ τρία διαδοχικὰ ἐπιμήκη ὀστάρια, τὰς φάλαγγας, πλὴν τοῦ ἀντίχειρος, ὃ δύποτος περιλαμβάνει δύο φάλαγγας.

Β') Ο ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ (ΠΟΔΩΝ)

Τὰ ὀστᾶ τῆς λεκάνης (εἰκ. 13) χρησιμεύουν ἀφ’ ἐνὸς διὰ τὴν στερέωσιν τῶν κάτω ἄκρων καὶ ἀφ’ ἔτερου διὰ τὴν ὑποστήριξιν



Εἰκ. 12. ‘Ο σκελετὸς τῆς ἄκρας χειρός. 1. Ὁστᾶ τοῦ καρποῦ.—2-6. Ὁστᾶ τοῦ μετακαρπίου.—7-20. Άι φάλαγγες τῶν δακτύλων.



Εἰκ. 13. 'Ο σκελετός τῆς λεκάνης.

1. Ἱερὸν ὁστοῦν.—5. Κόκκυς.—2. Ἀνώνυμον ὁστοῦν.—3. Ἡβικὴ σύμφυσις.—6. Στόμιον τῆς λεκάνης.—4. Θυρεοειδές τρῆμα.—7. Κοτύλη.


φυσιν. Μεταξὺ τῶν ὁστῶν τῆς λεκάνης παραφένει ἐν εὐρύ διάκενον, τὸ στόμιον τῆς λεκάνης. "Ἐκαστον ἀνώνυμον ὁστοῦν φέρει κατὰ τὸ πρόσθιον ἄκρον του ἐν τρῆμα, τὸ ὅποιον καλεῖται θυρεοειδές τρῆμα. Τοῦτο εἰς μὲν τὸν ἄρρενα εἶναι ωρειδές εἰς δὲ τὸ θῆλυ τριγωνικόν. Παρὰ τὸ θυρεοειδές τρῆμα ὑπάρχει ἐν κοίλωμα εἰς τὴν ἔξωτερικὴν ἐπιφάνειαν ἐκάστου ἀνωνύμου ὁστοῦ. Τὸ κοίλωμα τοῦτο, καλούμενον κοτύλη, χρησιμεύει διὰ τὴν ἄρθρωσιν τοῦ μηριαίου ὁστοῦ.

Εἰς ἐκαστον πόδα διακρίνομεν τρία τμήματα: τὸν μηρόν, τὴν κνήμην καὶ τὸν ἄκρον πόδα (εἰκ. 3).

'Ο σκελετὸς τοῦ μηροῦ σχηματίζεται ἀπό ἐν μακρὸν ὁστοῦν, τὸ μηριαῖον. Τοῦτο ἔχει μῆκος ὅσον ὁ πῆχυς καὶ ἡ ἄκρα χείρ ὁμοῦ καὶ εἶναι τὸ μακρότερον ὁστοῦν τοῦ σώματος. Εἰς τὸ ἀνώτερον ἄκρον του ἀπολήγει εἰς μίαν κεφαλήν, ἡ ὅποια διαρθροῦται πρὸς τὴν κοτύλην τοῦ ἀνωνύμου ὁστοῦ, πρὸς τὰ κάτω δὲ συνδέεται μετὰ τῆς κνήμης.

'Η κνήμη περιλαμβάνει δύο μακρὰ ὁστᾶ: πρὸς τὰ ἔσω καὶ ἔμπρος τὴν κνήμην καὶ ἔκτος καὶ ὅπίσω τὴν περόνην. Ἐκ τούτων ἡ κνήμη εἶναι τὸ ἰσχυρότερον καὶ διὰ μὲν τοῦ ἀνωτέρου ἄκρου τῆς

τῶν σπλάγχνων. 'Η κοιλότης τῆς λεκάνης σχηματίζεται ἀπὸ τὸ Ἱερὸν ὁστοῦν καὶ ἀπὸ τὰ δύο ἀνώνυμα ὁστᾶ. Ταῦτα εἶναι πλατέα καὶ ἰσχυρὰ καὶ συνενοῦνται ἀκινήτως μὲτοἱερὸν ὁστοῦν. Πρὸς τὰ ἔμπρος συνενοῦνται μεταξύ των καὶ σχηματίζουν τὴν ἡβικὴν σύμμετρην



Εἰκ. 14. Ὁ σκελετός τοῦ ἄκρου πιδός. 1—7. Ὁστᾶ τοῦ ταρσοῦ. — 8—12. Ὁστᾶ τοῦ μεταταρσίου. — 13—26. Φάλαγγες τῶν δακτύλων.

ἀρθροῦται πρὸς τὸ μηριαῖον ὄστοῦ διὰ δὲ τοῦ κατωτέρου πρὸς τὸν ἀστράγαλον. Ἡ περόνη εἶναι ὄστοῦ λεπτότερον καὶ τὸ ἄκρον αὐτῆς δὲν φθάνει μέχρι τοῦ μηροῦ, ἀλλὰ εἶναι προσκεκολλημένον ἐπὶ τῆς κνήμης. Μὲ τὸ κατώτερον ἄκρον τῶν ἀρθροῦνται πρὸς τὸν ἀστράγαλον.

Ἐμπροσθεν τῆς ἀρθρώσεως τοῦ γόνατος ὑπάρχει ἐν μικρὸν φακοειδὲς ὄστοῦν, ἡ ἐπιγονατίς.

Ο σκελετὸς τοῦ ἄκρου πιδός ἀποτελεῖται ἐξ 26 ὄστῶν καὶ περιλαμβάνει, ὅπως καὶ τῆς ἄκρας χειρός, τρία τμήματα: τὰ ὄστα τοῦ ταρσοῦ, τοῦ μεταταρσίου καὶ τῶν δακτύλων (εἰκ. 14 καὶ 15).



Εἰκ. 15. Ἀκτινογραφία τοῦ ἄκρου πιδός.

‘Ο ταρσός ἀποτελεῖται ἀπὸ ἑπτὰ ὁστάρια, τοποθετημένα εἰς τρεῖς σειράς. Ή πρώτη σειρὰ περιλαμβάνει δύο ἵσχυρὰ ὁστάρια, ἐκ τῶν δύοιών τὸ ἐσωτερικὸν είναι δὲ στράγγαλος, τὸ δὲ ἄλλο ἡ πτέρυνα, ἡ ὁποία προεκτείνεται πρὸς τὰ ὅπιστα καὶ ἀκουμβᾶ ἐπὶ τοῦ ἐδάφους.

Τὸ μετατάρσιον, ὅπως καὶ τὸ μετακάρπιον, περιλαμβάνει πέντε ἐπιμήκη ὁστάρια, ἀρθρούμενα ἀφ’ ἐνὸς μὲ τὰ ὁστά τοῦ ταρσοῦ καὶ ἀφ’ ἐτέρου μὲ τὰς φάλαγγας τῶν δακτύλων.

Ἐκαστος τῶν πέντε δακτύλων περιλαμβάνει τρεῖς φάλαγγας, πλὴν τοῦ μεγάλου, δὲ ὅποιος περιλαμβάνει δύο μόνον.

‘Ο ἄκρος ποὺς στηρίζεται ἐπὶ τοῦ ἐδάφους ἀφ’ ἐνὸς μὲ τὴν πτέρυναν καὶ ἀφ’ ἐτέρου μὲ τὸ ἄκρον τοῦ μετατάρσιου καὶ τοὺς δακτύλους.

Τὸ ὑπόλοιπον μέρος δὲν ἀκουμβᾶ ἐπὶ τοῦ ἐδάφους, ἀλλὰ σχηματίζει ἐλαφρὸν κύρτωμα, τὴν καμάραν τοῦ ἄκρου πιστός.

4. ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ

Τὰ ὁστά τοῦ σκελετοῦ πρὸ τῆς στερεοποιήσεως είναι ἄλλα μὲν χόνδρινα, ἄλλα δὲ μεμβρανώδη, σκληρύνονται δὲ δι’ ἐναποθέσεως ἀνοργάνων ἀλάτων. Διακρίνομεν:
α’) τὸν σκελετὸν τοῦ κορμοῦ (σπονδυλικὴ στήλη, πλευραί, στέρνον).
β’) τὸν σκελετὸν τῆς κεφαλῆς (κρανίον, πρόσωπον).
γ’) τὸν σκελετὸν τῶν ἄκρων (ῶμοι καὶ χειρεῖς)· καὶ
δ’) τὸν σκελετὸν τῶν κάτω ἄκρων (λεκάνη καὶ πόδες).

5. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1) ‘Ο λόγος τοῦ μεγίστου πλάτους πρὸς τὸ μέγιστον μῆκος τοῦ κρανίου καλεῖται κεφαλικὸς δείκτης. Π.χ. ἂν τὸ μῆκος τοῦ κρανίου είναι 20 ἑκ. καὶ τὸ πλάτος 15 ἑκ., ὁ κεφαλικὸς δείκτης είναι 15/20 ή 0,75 ἢ ἀπλῶς: 75. Οἱ ἔχοντες ἐπίμηκες κρανίον (δηλ. μικρὸν δείκτην κάτω τοῦ 75) καλοῦνται δολιχοκέφαλοι, οἱ δὲ ἔχοντες μεγάλον δείκτην (ἄνω τοῦ 83) καλοῦνται βραχυκέφαλοι (εἰκ. 16). Μεταξὺ τούτων ὑπάρχουν καὶ ἄλλαι ἐνδιάμεσοι κατηγορίαι.

2) Ἀποχωρισμὸς τῆς ὄργανικῆς ούσιας καὶ τῶν ἀνοργάνων ἀλάτων τῶν ὁστῶν.

Πείραμα. — Χρειάζονται δύο τεμάχια ὁστῶν ζώου τινός, ἐν δοχείον μὲ νδροχλωρικὸν ὀξύ, εἰς λύχνος καὶ συρμάτινον πλέγμα.

’Αφήνομεν τὸ ἐν τεμάχιον ὀστοῦ ἐντὸς τοῦ ὄξεος ἐπὶ 1 - 2 ἡμέρας καὶ παρατηροῦμεν, ὅτι ἀπομένει μία μᾶλακὴ μᾶζα. Αὕτη εἶναι ἡ ὄργανικὴ ούσια τοῦ ὀστοῦ, ἐνῷ τὰ ἀνόργανα ἄλατα διελύθησαν.

’Επίσης διαπυροῦμεν ἐπὶ τοῦ πλέγματος τὸ ἄλλο τεμάχιον καὶ παρατηροῦμεν, ὅτι ἀπομένει τέφρα. Αὕτη ἀποτελεῖται ἀπὸ τὰ ἀνόργανα ἄλατα, ἐνῷ ἡ ὄργανικὴ ούσια ἔχει καῆ.

3) Ἀποχώρισε τὸ περιόστεον ἀπὸ ἐν ὀστοῦν ζῶου. ’Επίσης, παρατήρησε ἔνα ἀρθρικὸν θύλακον καὶ τὸν ἀρθρικὸν χόνδρον.

4) Σχεδίασε τὰς κάμψεις τῆς σπονδυλικῆς στήλης τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἐνὸς τετραπόδου.

5) Σχεδίασε τὴν φορὰν τῶν μηρῶν καὶ τῶν κνημῶν διαφόρων ἀτόμων.


6) Ἀνυπόδητος καὶ μὲ βρεγμένον πόδα πάτησε τὸ πάτωμα. Κάμε τὸ ἴδιον καθήμενος, καθὼς καὶ ὅρθιος καὶ κρατῶν ἐν βάρος. Σύγκρινε τὰ ἵχνη τοῦ ποδός σου εἰς τὸ πάτωμα.

7) Παρατήρησε ὅτι οἱ δάκτυλοι τῶν ποδῶν σου δὲν ἀκουμβοῦν δλόκληροι εἰς τὸ ἔδαφος, ἀλλὰ σχηματίζουν καὶ αὐτοὶ μίαν μικράν καμάραν.

8) Παρακολούθησε εἰς τὸν ἀντιβραχίονα τὴν φορὰν τῆς κερκίδος καὶ τῆς ὥλενης, ὅταν ἡ παλάμη εἶναι ὑπτία καὶ ὅταν εἶναι πρηνής. Πρόσεξε, ὅτι εἰς τὴν πρηνή θέσιν τὰ δύο ὀστᾶ διασταυροῦνται. (Μνημονικὸς κανὼν: ‘Η κερ-κὶς ἀπολίγει εἰς τὸν μέγαν δάκτυλον, ἔχοντα δύο φάλαγγας. ‘Η ὡ-λέ-νη εἰς τὸν μικρόν, ὁ δόποιος ἔχει τρεῖς φάλαγγας).

9) Καθόρισε εἰς τὸ σῶμα τὴν θέσιν τῶν κυριωτέρων ὀστῶν.

10) Εἶναι πολὺ σπουδαῖον τὸ γεγονός τῆς ὄρθιας στάσεως



Εἰκ. 16. Ὁ κεφαλικὸς δείκτης. $(\frac{\gamma\delta}{\alpha\beta})$

Δεξιά: δολιχοκέφαλος.

Αριστερά: βραχυκέφαλος.

τού ἀνθρώπου ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὴν στάσιν τῶν λοιπῶν Πρωτευόντων. Ποία ὁμοταξία Σπουνδυλωτῶν παρουσιάζει ἐπίσης στήριξιν ἐπὶ τῶν ὀπισθίων μόνον ἄκρων;

11) Σύγκρινε τὸ σχῆμα τῆς τομῆς τοῦ ἀνθρωπίνου θώρακος καὶ ἑνὸς ἄλλου θηλαστικοῦ. Ἐπίσης σύγκρινε τὴν φορὰν τῶν πλευρῶν. Ποία εἶναι ἡ αἵτια τῶν παρατηρουμένων διαφορῶν;

12) Πῶς χρησιμοποιοῦν οἱ πίθηκοι τὰ πρόσθια ἄκρα των καὶ πῶς ὁ ἀνθρωπος; Ποῖον εἶναι τὸ μέγεθος τῶν προσθίων ἄκρων εἰς τὰς ἀνωτέρα κατηγορίας ἐν σχέσει πρὸς τὸ σῶμα;

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

ΟΙ ΜΥΕΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

1. ΟΙ ΜΥΕΣ. ΆΙ ΜΥ·Ι·ΚΑΙ ΙΝΕΣ


Μύες είναι τὰ ὄργανα, διὰ τῶν ὅποιων γίνονται αἱ κινήσεις τῶν διαφόρων μερῶν τοῦ σώματος. Οἱ μύες ἐφαρμόζουν ἐπὶ ὅστῶν ἡ εὐρίσκονται εἰς τὰ τοιχώματα τῶν μαλακῶν ὄργάνων τοῦ σώματος. Ἀνέρχονται εἰς 300 περίπου καὶ ἀποτελοῦν σχεδὸν τὸ ἥμισυ τοῦ βάρους τοῦ σώματος.

Τὰ μυϊκὰ κύτταρα είναι σχετικῶς μακρὰ καὶ ἔλαστικὰ καὶ καλοῦνται μυϊκαὶ Ἰνες, ἔχουν δὲ τὴν ἱκανότητα νὰ συστέλλωνται. Πολλαὶ μυϊκαὶ Ἰνες συνενοῦνται μεταξύ των μὲ τὸ ἐνδομύϊον (συνδετικὸς ἴστος) καὶ ἀποτελοῦν μίαν μυϊκὴν δέσμην. "Εκαστος μῆς ἀποτελεῖται ἀπὸ πολλὰς τοιαύτας μυϊκὰς δέσμας. Διὰ τῆς συστολῆς τῶν μυϊκῶν ἵνῶν ὅλος ὁ μῆς βραχύνεται, ἐνῷ κατὰ τὸ μέσον αὐτοῦ (γαστήρ τοῦ μυὸς) διογκοῦται. Διακρίνουν γραμμωτοὺς καὶ λείους μῆς.

2. ΓΡΑΜΜΩΤΟΙ ΜΥΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΥΤΩΝ

Οἱ γραμμωτοὶ μύες καλοῦνται οὔτω, διότι μέγα μέρος τοῦ πρωτοπλάσματός των ἀποτελεῖται ἀπὸ λεπτὰ ἵνιδια (μυϊκὰ ἵνιδια), εἰς τὰ ὅποια ὑπὸ τὸ μικροσκόπιον διακρίνονται γραμμώσεις. Λόγω τῆς ἀφθονίας τῶν αἵμοφόρων ἀγγείων, οἱ γραμμωτοὶ μύες παρουσιάζουν ζωηρὸν ἐρυθρωπὸν χρῶμα.

Οἱ μύες οὗτοι καταφύονται ἐπὶ τῶν ὅστῶν καὶ, συστελλόμενοι, ἔλκουν αὐτά. Τὰ ἄκρα των, διὰ τῶν ὅποιων στερεοῦνται ἐπὶ τῶν ὅστῶν, συνίστανται ἀπὸ σκληρὸν λευκὸν ἴστὸν καὶ καλοῦνται τένοντες τῶν μυῶν. Αἱ κινήσεις τῶν γραμμωτῶν μυῶν τελοῦνται κατὰ τὰς ἐπιταγὰς τῆς βουλήσεως.



Εικ. 17. Μοχλοί σχηματίζομενοι ύπο τῶν ὀστῶν καὶ τῶν μυῶν, οἱ ὅποιοι προσφύονται εἰς αὐτά.


Οἱ μύες σχηματίζουν μετὰ τῶν ὀστῶν, ἐπὶ γῶν ὅποίων προσφύονται, μοχλούς (εἰκ. 17). Π.χ. οἱ μύες τοῦ τραχήλου, οἱ ὅποιοι συγκρατοῦν τὴν κεφαλήν, καὶ ἡ κεφαλή, ἀποτελοῦν μοχλὸν πρώτου εἰδούς μὲ ὑπομόχλιον τὴν σπονδυλικὴν στήλην. Ὁμοίως, οἱ μύες τῆς κυνήμης, οἱ καταφυόμενοι εἰς τὴν πτέρναν καὶ οἱ ὅποιοι ὑψώνουν τὸν πόδα, ἀνήκουν εἰς μοχλὸν δευτέρου εἰδούς. Οἱ μύες τοῦ βραχίονος, οἱ προσφύομενοι εἰς τὸν ἀντιβραχίονα, ἀνήκουν εἰς μοχλὸν τρίτου εἴδούς.

3. ΟΙ ΛΕΙΟΙ ΜΥΕΣ

Ἄντιθέτως πρὸς τοὺς γραμμωτούς, οἱ λεῖοι μύες δὲν καταφύονται ἐπὶ ὀστῶν, ἀλλ’ εύρισκονται εἰς τὰ τοιχώματα τῶν σπλάγχνων καὶ τῶν ἀγγείων. Τὰ μοῦκὰ ἵνδια αὐτῶν δὲν παρουσιάζουν ύπο τὸ μικροσκόπιον γραμμώσεις. Λειτουργοῦν ἀνεξαρτήτως τῆς βουλήσεως καὶ ἐκτελοῦν τὰς κινήσεις τῶν σπάγχων καὶ τῶν ἀγγείων. Οἱ μύες τῆς καρδίας ἐνεργοῦν καὶ αὐτοὶ ἀνεξαρτήτως τῆς βουλήσεως, εἰναι ὅμως, κατ’ ἔξαίρεσιν, γραμμωτοί.

4. Ο ΜΥΙΚΟΣ ΤΟΝΟΣ

Ἐγνωρίσαμεν ἀνωτέρω δύο ἰδιότητας τῶν μυῶν, τὴν συσταλτικότηταν καὶ τὴν ἐλαστικότηταν αὐτῶν. Μία ἄλλη σπουδαία ἰδιότης των είναι ὁ μυϊκὸς τόνος. Οὕτω καλεῖται ἡ ἰδιότης τῶν μυῶν νὰ μὴ χαλαροῦνται τελείως, ἀλλὰ νὰ παραμένῃ ἰδιότης τῶν μυῶν.



Εἰκ. 18. Αἱ διαδοχικαὶ φάσεις τῆς βαδίσεως.

νουν διαρκῶς εἰς μίαν μετρίαν ἢ πολὺ μικρὰν σύσπασιν. Λόγω τοῦ μυϊκοῦ τόνου, ὁ στόμαχος π.χ., καὶ ὅταν δὲν περιέχῃ τροφάς, δὲν εἶναι συρρικυμένος, ὡς ἔνας κενὸς ἀσκός. Ὄμοίως κρατεῖται ἡ κεφαλὴ ὀρθία, κλίνει δὲ μόνον, ὅταν ἀποκοιμηθῇ κανείς. Γενικῶς, ὁ τόνος δίδει εἰς τὸ σῶμα μίαν ὅψιν ζωηράν, ἢ ὅποια ἐρχεται εἰς ἀντίθεσιν μὲ τὴν ὅψιν τοῦ νεκροῦ σώματος.

5. ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ

Οἱ μύες περιλαμβάνουν μυϊκὰς δέσμας, αἱ ὅποιαι ἀποτελοῦνται ἀπὸ μυϊκὰς ίνας. Χαρακτηριστικαὶ ίδιότητες τῶν μυῶν εἰναι ἡ συσταλτικότης, ἡ ἐλαστικότης καὶ ὁ μυϊκὸς τόνος. Διακρίνομεν γραμμωτούς καὶ λείους μύς. Οἱ πρῶτοι καταφύονται ἐπὶ τῶν ὀστῶν καὶ κινοῦν αὐτά κατὰ τὴν θέλησίν μας. Οἱ λεῖοι εύρισκονται εἰς τὰ τοιχώματα τῶν σπλάγχνων καὶ τῶν ἀγγείων καὶ ἐνεργοῦν ἀνεξαρτήτως τῆς βουλήσεως.

6. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

- 1) Καθόρισε μερικά παραδείγματα μοχλῶν εἰς τὸ ἀνθρώπινον σῶμα.
- 2) Μέτρησε μὲ ἔνα δυναμόμετρον τὴν δύναμιν τοῦ δεξιοῦ καὶ τοῦ ἀριστεροῦ χεριοῦ καὶ σύγκρινε τὰς δύο μετρήσεις.
- 3) Παρατήρησε εἰς τὸ βρασμένο κρέας τὰς μυϊκὰς δέσμας, αἱ ὅποιαι ἀποτελοῦν ἔνα μῦν.
- 4) Ἡ ἐργασία ἐνὸς μυὸς δύναται νὰ γίνῃ ἐντονωτέρα, ὅταν τὸ ὄστον, ἐπὶ τοῦ ὅποιου οὗτος καταφύεται, μένη ἀκίνητον. Διὰ τοῦτο, διὰ νὰ ἀνυψώσωμεν μέγα βάρος «κρατοῦμε τὴν ἀναπνοή μας», ὥστε τὰ ὄστα τοῦ κορμοῦ (ῷμοπλάτη, πλευραὶ κλπ.) νὰ παραμείνουν ἀκίνητα.
- 5) Παρακολούθησε καὶ καθόρισε, βοηθούμενος καὶ ἀπὸ τὴν εἰκόνα 18, τὰς διαφόρους φάσεις τοῦ βαδίσματος.
- 6) Καθόρισε πῶς κινεῖται κατὰ τὴν βάδισιν ὁ κορμὸς (ἄν ἀνυψοῦται καὶ πότε, ἄν κλίνῃ, πότε καὶ πρὸς ποιὸν σκέλος, ἄν στρέφεται καὶ πότε). Ἐπίστης, πῶς κινοῦνται αἱ χεῖρες. Δοκίμασε νὰ βαδίσῃς ταχέως μὲ ἀκίνητους χεῖρας.
- 7) Κατὰ τὴν βάδισιν πάντοτε τὸ ἔνα πόδι ἀκουμβᾶ ἐπὶ τοῦ ἐδάφους. Κατὰ τί διαφέρει, ὡς πρὸς τοῦτο, ἡ βάδισις ἀπὸ τὸ ἄλμα καὶ τὸν δρόμον;

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ

ΑΙ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑΙ ΥΠΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΟΥΣΙΑΙ.
ΑΙ ΚΑΥΣΕΙΣ. ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.

1. ΑΙ ΘΡΕΠΤΙΚΑΙ ΟΥΣΙΑΙ

Έκ πείρας γνωρίζομεν, ότι, όπως καὶ οἱ ἄλλοι ζῶντες ὄργανισμοί, οὕτω καὶ ὁ ἀνθρώπινος ὄργανισμός, διὰ νὰ συντηρηθῇ καὶ νὰ ἀναπτυχθῇ, καταναλίσκει ώρισμένας ύλας, τὰς ὅποιας λαμβάνει ἀπὸ τὸν ἔξωτερικὸν κόσμον, τὰς τροφάς. Αἱ χρησιμοποιούμεναι ὑπὸ τοῦ ἀνθρώπου τροφαὶ προέρχονται κυρίως ἀπὸ τὸ ζωϊκὸν καὶ φυτικὸν βασίλειον καὶ μόνον τὸ ὕδωρ καὶ ώρισμένα ἄλατα ἀπὸ τὴν ἀνόργανον φύσιν.

Εἰς τὰς τροφὰς εὐρίσκει ὁ ἀνθρώπινος ὄργανισμὸς χρησίμους δι’ αὐτὸν ούσιας, ἐκ τῶν ὅποιών ἄλλαι μὲν εἶναι ἀνόργανοι, ἄλλαι δὲ ὄργανικαί. Ἀν ὁ ρ γ α ν ο i μὲν καλοῦνται αἱ ούσιαι, αἱ ὅποιαι δὲν ἔχουν τὸν ἀνθρακαὶ ώς κύριον στοιχεῖόν των, ὁ ρ γ α ν i κ a i δὲ ἀντιθέτως ὄσαι ἔχουν τὸν ἀνθρακαὶ ώς τὸ κύριον στοιχεῖόν των. Αἱ χρήσιμοι αὗται θρεπτικαὶ ούσιαι εἶναι ὕδωρ καὶ ἀνόργανα αἱ λαταρια., ύδατά ν θ ρ α κ ε s, λιπαραὶ ούσιαι καὶ λευκώματα. Τέλος εἶναι ἀπαραίτητοι καὶ αἱ βιταμίναι, τὰς ὅποιας ἐπίσης ἀνευρίσκει ὁ ὄργανισμὸς εἰς τὰς τροφάς.

2. ΥΔΩΡ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΛΑΤΑ

Τὸ ὕδωρ εἶναι συστατικὸν τῶν ιστῶν τοῦ σώματος εἰς μεγάλην ἀναλογίαν καὶ ἀποτελεῖ τὸ μέγιστον μέρος τοῦ αἷματος (90%). Ἐπίσης, ἐντὸς τοῦ ὄργανισμοῦ τὸ ἐλεύθερον ὕδωρ εἶναι ἀπαραίτητον διὰ τὰς χημικὰς μεταβολὰς τῶν ούσιῶν, αἱ ὅποιαι γίνονται κατὰ τὰς λειτουργίας τοῦ ὄργανισμοῦ. Υπολογίζουν, ότι τὰ 60 % τοῦ βάρους τοῦ σώματος ἀποτελοῦνται ἐξ ὕδατος. Τὸ ὕδωρ πίνεται αὐτούσιον,

ἀλλὰ μεγάλαι ποσότητες αὐτοῦ είσαγονται καὶ διὰ τῶν τροφίμων. Τὰ χόρτα π.χ. περιέχουν 85% ύδωρ, τὸ κρέας 70%, ὁ ἄρτος 36%.

Διάφορα ἀνόργανα ἀλατά είναι ἐπίσης ἀπαραίτητα, εἰς μικρὰς ὅμις ποσότητας, διὰ τὸν ὄργανισμόν. Τὸ αἷμα π.χ. περιέχει 0,6% μαγειρικὸν ἄλας, τὰ δὲ ὀστᾶ είναι σκληρά, λόγῳ τῶν ἀλάτων ἀσβεστίου, τὰ δποῖα περιέχουν. Συνήθως αἱ τροφαὶ καὶ τὸ ύδωρ περιέχουν ἐπαρκῆ ποσότητα ἀλάτων. Αὐτούσιον προσθέτει εἰς τὰς τροφὰς ὁ ἄνθρωπος τὸ μαγειρικὸν ἄλας.

3. ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΣ

Οἱ ὑδατάνθρακες είναι μία κατηγορία ὄργανικῶν ούσιῶν ἔξεκείνων, αἱ δποῖαι περιέχουν ἄνθρακα ἡνωμένον μὲ ὀξυγόνον καὶ ύδρογόνον. Σπουδαιότεροι ὑδατάνθρακες είναι τὰ σάκχαρα καὶ τὸ ἄμυλον. Τροφαὶ μὲ πολλὰ σάκχαρα είναι οἱ καρποί, τὸ μέλι, τὰ γλυκύσματα. Τροφαὶ μὲ πολὺ ἄμυλον είναι τὰ γεώμηλα, τὰ ἄλευρα, τὰ ὄσπρια κλπ.

Οἱ ὑδατάνθρακες ἔχουν τὴν ἰδιότητα νὰ ἐνοῦνται μὲ τὸ ὀξυγόνον ἐντὸς τοῦ ὄργανισμοῦ. Τὸ ὀξυγόνον είναι ἐν ἀέριον, τὸ δποῖον προσλαμβάνει δ ἄνθρωπος ἀπὸ τὴν ἀτμόσφαιραν διὰ τῆς ἀναπνοῆς. Ἡ ἐνωσις μιᾶς ούσιας μὲ ὀξυγόνον καλεῖται καῦσις καὶ προκαλεῖ τὴν παραγωγὴν θερμότητος. "Οταν, ὅπως συμβαίνει εἰς τὸν ὄργανισμόν, ἡ καιομένη ούσια περιέχῃ ἄνθρακα, τότε παράγεται καὶ τὸ ἀέριον διοξείδιον τοῦ ἀνθρακούς.

Μὲ τοὺς ὑδατάνθρακας λοιπὸν καὶ τὸ ὀξυγόνον γίνονται ἐντὸς τοῦ σώματος καύσεις. Ἡ παραγομένη θερμότης χρησιμοποιεῖται διὰ τὰς κινήσεις τῶν μυῶν καὶ διὰ τὴν διατήρησιν τῆς θερμοκρασίας τοῦ σώματος (ζωϊκὴ θερμότης).

4. ΑΙ ΛΙΠΑΡΑΙ ΟΥΣΙΑΙ

Αἱ λιπαραὶ ούσιαι, αἱ δποῖαι περιέχονται εἰς τὰς τροφὰς, είναι διάφορα λίπη καὶ ἔλαια. Χρησιμοποιοῦνται καὶ αὐταὶ ὑπὸ τοῦ ὄργανισμοῦ, ὅπως καὶ οἱ ὑδατάνθρακες, διὰ τὰς καύσεις. "Οταν πλεονάζουν, ἀποτίθενται ὑπὸ μορφὴν λίπους κάτωθεν τοῦ δέρματος καὶ μεταξὺ τῶν ιστῶν. Τὰ 12% τοῦ βάρους μέσου ἀνθρώπου ἀποτελοῦνται ἀπὸ λίπος, τὸ δποῖον ἀποδίδεται κατὰ τὴν ἀστίαν.

5. ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ

Τὰ λευκώματα είναι όργανικαί ἔνώσεις, αἱ ὅποιαι περιέχουν πάντοτε καὶ ἄζωτον, ἀποτελοῦν δὲ συστατικὰ τοῦ πρωτοπλάσματος τῶν ζωϊκῶν καὶ φυτικῶν κυττάρων Τροφαὶ μὲν πολλὰ λευκώματα είναι τὰ κρέατα, τὰ ώά, τὸ γάλα, τὰ ὅσπρια κλπ.

Μετὰ τὴν διάσπασιν τῶν λευκωμάτων τὸ μεγαλύτερον τμῆμά των μετατρέπεται ἐντὸς τοῦ ἡπατος εἰς ὑδατάνθρακας διὰ τὴν παραγωγὴν ἐνεργείας ἕνα δὲ μικρὸν μέρος ἀφομοίωνται πρὸς τὰ συστατικὰ τοῦ κυττάρου.

6. ΒΙΤΑΜΙΝΑΙ

Βιταμίναι είναι ώρισμέναι όργανικαί ἔνώσεις, τὰς ὅποιας εύρισκει ὁ όργανισμὸς εἰς τὰς τροφάς, εἰς ἐλαχίστας ποσότητας. Ἐν τούτοις, είναι ἀπαραίτητοι διὰ τὴν κανονικὴν θρέψιν τοῦ όργανισμοῦ καὶ ἡ Ἐλλειψις αὐτῶν προκαλεῖ διαφόρους ἀσθενείας, καλουμένας ἀβιταμίνωσης.

Αἱ ἀβιταμινώσεις θεραπεύονται διὰ τῆς χρήσεως τροφῶν, αἱ ὅποιαι περιέχουν τὴν κατάλληλον βιταμίνην, ἡ διὰ τῆς χρήσεως βιταμινῶν, τὰς ὅποιας παρασκευάζουν σήμερον οἱ χημικοί. Ἀπὸ τὸ ἥπαρ π.χ. ἐνὸς ἵχθυος, τοῦ ὀνίσκου, ἔξαγεται τὸ γνωστόν μας μουρουνέλαιον. Τοῦτο περιέχει κυρίως δύο βιταμίνας, αἱ ὅποιαι καλοῦνται βιταμίνη Α ἡ ἀντιξηροφθαλμικὴ καὶ βιταμίνη Δ ἡ ἀντιρραχιτική.

Ἐλλειψις τῆς βιταμίνης Α ἐλαττώνει τὴν ἀντοχὴν τοῦ όργανισμοῦ, δύναται δὲ νὰ προκαλέσῃ τὴν νόσον ξηροφθαλμίαν, ἡ ὅποιας καταστρέφει τὸν κερατοειδῆ χιτῶνα τοῦ ὀφθαλμοῦ. Ἡ βιταμίνη Α δὲν εἰσάγεται πάντοτε ἐτοίμη εἰς τὸν όργανισμόν. Πολλάκις εἰσάγεται διὰ τῶν τροφῶν (λαχανικὰ κλπ.) μία ἄλλη ούσια, ἡ ὅποια είναι, ὡς λέγουν, ἡ προβιταμίνη Α. Ἐχει δηλαδὴ ἡ ούσια αὕτη τὴν ἰδιότητα νὰ μετατρέπεται ἐντὸς τοῦ όργανισμοῦ εἰς βιταμίνη Α.

Ἡ βιταμίνη Ι) διευκολύνει τὴν πρόσληψιν ἀνοργάνων ούσιῶν καὶ τὴν χρησιμοποίησίν των διὰ τὴν ἀνάπτυξιν τῶν ὀστῶν. Καὶ ἡ βιταμίνη αὕτη παρασκευάζεται, καὶ ἐντὸς τοῦ όργανισμοῦ, ἀπὸ μίαν ἀντίστοιχην προβιταμίνην, τὴν ἐργοστερίνην, διὰ τῆς ἐπιδράσεως τῶν ἡλιακῶν ἀκτίνων. Διὰ τοὺς λόγους τούτους καὶ τὸ μουρουνέ-

λαιον καὶ αἱ ἡλιακαὶ ἀκτίνες ἔχουν μεγάλην χρησιμότητα ὡς προφυ-
λακτικὰ καὶ θεραπευτικὰ μέσα κατὰ τῆς ραχίτιδος.

Μὲ τὸ γράμμα Β χαρακτηρίζουν ὄλοκληρον ὅμαδα βιταμινῶν,
αἱ ὅποιαι ἀφθονοῦν κυρίως εἰς τοὺς φλοιούς τῶν δημητριακῶν. ‘Η
ἔλλειψις τῆς βιταμίνης Β προκαλεῖ τὴν νόσον Beri - beri.
(διαταραχὴ τοῦ νευρικοῦ συστήματος, τῆς κυκλοφορίας, διάρροια
κλπ.). ‘Η νόσος αὕτη ἔξεδηλώθη πολὺ εἰς τὴν “Απω Ανατολήν,
ὅταν εἰσήχθη ἐκεῖ ἡ συνήθεια νὰ ἀποφλοιώνεται τὸ ρύζι.

‘Η βιταμίνη Κ ἀφθονεῖ εἰς τὰ γεώμηλα, τὴν σταφίδα, τὸ γάλα,
τὰ νωπά λαχανικὰ καὶ εἰς τοὺς χυμοὺς τῶν ἐσπεριδοειδῶν. ‘Η ἐλ-
λειψις της προκαλεῖ τὸ σκορβοῦτον. ‘Η πάθησις αὕτη ἡτο συνή-
θης ἄλλοτε εἰς τοὺς ναυτικούς, οἱ ὅποιοι ἐπὶ μακρὸν ἐτρέφοντο μὲ
διατηρημένα τρόφιμα. Τὸ σκορβοῦτον χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὰς
συχνὰς καὶ ἐπωδύνους αίμορραγίας τοῦ δέρματος, τοῦ στόματος
καὶ τῶν ἐσωτερικῶν μερῶν τοῦ σώματος.

Πλὴν τῶν ἀνωτέρω βιταμινῶν ὑπάρχουν καὶ ἄλλαι, ὅπως ἡ
Ε (ἀντιστειρωτική), ἡ Η (βιοτίνη), ἡ Κ (ἀντιαιμορραγική) κ.ἄ.

7. ΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙ ΤΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ

‘Η συντήρησις καὶ ἡ αὔξησις τοῦ ὄργανισμοῦ ἔξασφαλίζεται χάρις
εἰς μίαν μεγάλην λειτουργίαν, ἡ ὅποια καλεῖται ἀνταλλαγὴ τῆς ὕ-
λης καὶ περιλαμβάνει τὰς ἔξης ἐπὶ μέρους λειτουργίας:

α') Τὴν ἀναπνοήν, κατὰ τὴν ὅποιαν τὸ αἷμα δεσμεύει δξυ-
γόνον ἀπὸ τὸν ἀτμοσφαιρικὸν ἀέρα. Συγχρόνως τὸ αἷμα ἀποδίδει
εἰς τὴν ἀτμόσφαιραν τὸ ἀέριον διοξείδιον τοῦ ἄνθρακος, τὸ ὅποιον
προῆλθεν ἀπὸ τὰς καύσεις καὶ εἶναι ἐπιβλαβές διὰ τὸν ὄργανισμόν.

β') Τὴν πέψιν, κατὰ τὴν ὅποιαν ὁ ὄργανισμὸς ἀποχωρίζει
ἀπὸ τὰς τροφὰς καὶ διασπᾷ τὰς θρεπτικὰς ούσιας.

γ') Τὴν ἀπομύζησιν καὶ ἀφομοίωσιν, κατὰ τὰς ὅ-
ποιας ὁ ὄργανισμὸς ἀπορροφᾷ τὰ προϊόντα τῆς πέψεως καὶ συνθέτει
ἕξ αὐτῶν τὰς χρησίμους διὰ τὰς ἀνάγκας του ούσιας.

δ') Τὴν κυκλοφορίαν τοῦ αἵματος, διὰ τῆς ὅποιας αἱ
θρεπτικαὶ ούσιαι καὶ τὸ δξυγόνον μεταφέρονται εἰς τοὺς ίστούς.

ε') Τὴν ἀπέκρισιν, διὰ τῆς ὅποιας τὰ ἀχρηστά προϊόντα
τῶν καύσεων ἀπομακρύνονται ἀπὸ τὸν ὄργανισμόν.

Τὰς ἀνωτέρω λειτουργίας καὶ τὰ ὅργανα τοῦ σώματος, διὰ τῶν τῶν δόποίων αὗται τελοῦνται, θὰ γνωρίσωμεν λεπτομερέστερον εἰς ἐπόμενα κεφάλαια.

8. ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ

Αἱ θρεπτικαὶ ούσιαι, τὰς ὁποίας ὁ ὄργανισμὸς ἀνευρίσκει εἰς τὰς τροφάς, εἶναι ὕδωρ, ἀνόργανα ἄλατα, ὕδστάνθρακες, λιπαραὶ ούσιαι καὶ λευκώματα. Ἀπαραίτητοι εἶναι ἀκόμη καὶ αἱ βιταμῖναι, εἰς μικροτάτας ποσότητας (ἀβίτα-μινώσεις).

Ἡ μεγάλη λειτουργία, διὰ τῆς ὁποίας ἔξασφαλίζεται ἡ συντήρησις καὶ ἡ ἀνάπτυξις τοῦ ὄργανισμοῦ, εἶναι ἡ ἀνταλλαγὴ τῆς ὥλης καὶ περιλαμβάνει ώρισμένας ἄλλας ἐπὶ μέρους λειτουργίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΙΣ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΟΣ. ΟΙ ΟΔΟΝΤΕΣ


1. Η ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΣ

Η κοιλότης αύτη περικλείεται άπό τὰ δύτα τῆς κάτω γνάθου, τῆς ἄνω γνάθου καὶ τὰ ύπερώϊα. Συγκοινωνεῖ πρὸς τὰ ἔξω διὰ τῆς στοματικῆς σχισμῆς, ἢ ὅποια φράσσεται ὑπὸ τῆς δόδοντοστοιχίας καὶ τῶν χειλέων. Τὸ δάπεδον τῆς κοιλότητος κατέχεται ὑπὸ τῆς μυώδους καὶ εὐκίνήτου γλώσσης. Τὸ

πρόσθιον ἄκρον τῆς γλώσσης εἶναι ἐλεύθερον, τὸ δὲ ὀπίσθιον στερεοῦται ἐπὶ τοῦ δαπέδου καὶ τοῦ ὑοειδοῦς δόστοῦ. Διὰ τῶν κινήσεών της καὶ διὰ τῶν αἰσθητικῶν σωματίων, τὰ ὅποια φέρει, ἔχει περιβετεῖ ἡ γλώσσα τὴν γεῦσιν, τὴν μάστιξιν καὶ τὴν ὁμιλίαν.

Ἡ ὁροφὴ τοῦ στόματος καλεῖται ὑπερώϊα καὶ χωρίζει τοῦτο ἀπὸ τὴν ρινικήν κοιλότητα. Τὸ πρόσθιον καὶ τὸ μεγαλύτερον μέρος τῆς ύπερώας σχηματίζεται ἀπὸ τὸ ἄνω γναθικὸν καὶ τὰ ύπερώϊα δύτα, καλεῖται δὲ σκληρὸς ἢ περιφερειας. Τὸ ὀπίσθιον τμῆμα εἶναι σαρκώδες (μαλακὴ ὑπερώϊα) καὶ ἀπολήγει εἰς μίαν προεξοχήν, τὴν σταυρούλην ἡ κιονίδα.

Εἰς τὸ βάθος τοῦ στόματος ύπαρχει ἄνοιγμα, ὁ ἰσθμὸς τοῦ φάρυγγος, διὰ τοῦ ὀποίου φέρεται τὸ φαγητὸν εἰς τὸν φάρυγγα κατὰ τὴν κατάποσιν. Ὁ φάρυγξ




Εἰκ. 19. Τομὴ, διὰ τοῦ προσώπου. 1. Ρινική κοιλότης. — 4. Σκληρὰ ύπερώα (ύπερώϊον δόστοῦ). — 3. Μαλακή ύπερώα ἀπολήγουσα εἰς τὴν κιονίδα. — 2. Ή γλώσσα. — 5. Ή ἐπιγλωττίς. — 6. Τὸ ὑοειδές δόστον. — 7. Ο θυρεοειδής χόνδρος τοῦ λάρυγγος. — 8. Κρικοειδής χόνδρος. — 9. Λάρυγξ. — 10. Αρυταινοειδής. — 11. Οισοφάγος. — 12. Φάρυγξ.


ἐπικοινωνεῖ μετὰ τῆς ρινὸς διὰ τῶν χο-
ανῶν, μετὰ τοῦ μέσου ὡτὸς διὰ τῶν ἀ-
κουστικῶν ἢ εὔσταχιανῶν σαλπίγγων
καὶ πρὸς τὰ κάτω μετὰ τοῦ οἰσοφάγου,
διὰ τοῦ ὅποιου κατέρχονται αἱ τροφαὶ
καὶ τοῦ λάρυγγος, διὰ τοῦ ὅποιου διέρ-
χεται δὲ ἄτηρ.

Κατὰ τὴν κατάποσιν τοῦ βλωμοῦ
ἢ ρινική κοιλότης φράσσεται ὑπὸ τοῦ
ὑπερώφου ίστιού καὶ δὲ λάρυγξ ὑπὸ τῆς
ἐπιγλωπτίδος. Κατὰ τὴν εἰσπνοήν, ἀντι-
θέτως, ἡ ἐπιγλωπτίς ἀφήνει ἀνοικτὸν τὸν λάρυγγα, δὲ φάρυγξ δὲν
εἶναι ἀνάγκη νὰ ἀποφραχθῇ, καθ' ὅσον δὲν δημιουργεῖται πρὸς αὐ-
τὸν ρεῦμα ἀέρος.

Εἰς τὸ στόμα χύνεται δὲ σίαλος ἀπὸ τρία ζεύγη βοτρυοειδῶν
δργάνων, τὰ ὅποια καλοῦνται σιαλογόνοι ἀδένες. Ἐκ τού-
των τὸ ἐν ζεύγος εύρισκεται εἰς τὰς παρειὰς (παρωτίδες),
τὰ δὲ δύο ἄλλα εύρισκονται κάτωθεν τῆς γλώσσης (ὑπογλώσσιοι
καὶ ὑπογνάθιοι) (εἰκ. 20).



Εἰκ. 20. Οἱ σιαλογόνοι ἀδέ-
νες. 1. Παρωτίδες. 2. — 'Υπο-
γλώσσιοι. — 3. 'Υπογνάθιοι.




Εἰκ. 21. Τομὴ ὀδόντος.
1. Ἀδαμαντίνη. — 2. Ο-
δοντίνη. — 3. Πολφική κοι-
λότης. — 4. Οστείνη. —
5. Γναθικὸν ὀστοῦν.

2. ΟΙ ΟΔΟΝΤΕΣ

Οὗτοι εἶναι μικρὰ ὀστᾶ στερεούμενα
ἐντὸς μικρῶν κοιλοτήτων τῶν γναθικῶν
ὅστῶν, τῶν φατνίων. Εἰς ἕκαστον ὀ-
δόντα διακρίνομεν τὰ ἔξης τμῆματα: α') τὴν
μύλην, δηλαδὴ τὸ ἐλεύθερον τμῆμα,
β') τὸν αύχενα, περιβαλλόμενον ἀπὸ
τὰ οὖλα, γ') τὴν ρίζαν, ἡ ὅποια εἰσδύει
ἐντὸς τοῦ φατνίου, καὶ δ') τὴν πολφι-
κὴν κοιλότητα, εἰς τὸ ἐσωτερικὸν
τοῦ ὀδόντος. Ἡ πολφική κοιλότης περι-
λαμβάνει ἀγγεῖα καὶ νεῦρα, πληροῦται δὲ
ὑπὸ μαλακοῦ ιστοῦ, καλουμένου πολφοῦ.

Εἰς μίαν τομὴν ὀδόντος παρατηροῦμεν,
ὅτι οὗτος δὲν ἀποτελεῖται ἀπὸ μίαν μόνον



Εἰκ. 22. Ἡ δόδοντοστοιχία τῆς ἀνω γυνάθου. 1, 2. Τομεῖς. — 3. Κυνόδονος. — 4, 5. Προγόμφιοι. — 6, 7, 8. Γομφίοι (8. Σωφρονιστήρ).

διακρίνονται εἰς τὰς ἔξης κατηγορίας:


α') Το μεῖς. Οὗτοι παρουσιάζουν μίαν ρίζαν καὶ ἀπολήγουν εἰς λεπτήν ἐπιμήκη μύλην· β') Κυνόδοντες. Χαρακτηρίζονται ἀπὸ μίαν ρίζαν καὶ ἀπὸ τὸ κωνικὸν σχῆμα τῆς μύλης· γ') Προγόμφιοι. *Έχουν μίαν ρίζαν καὶ πλατεῖαν μύλην μὲ δύο φύματα· δ) Γομφίοι ή τραπεζίται. Ἡ ρίζα των εἶναι διπλῆ ή τριπλῆ, ή δὲ πλατεῖα ἐπιφάνειά των φέρει τέσσερα φύματα.

Κατὰ τὴν νηπιακὴν ἡλικίαν ἐκφύεται ἡ πρώτη δόδοντοφυΐα, ἀποτελουμένη ἐξ εἰκοσιν δόδοντων, καλουμένων νεογιλῶν. Οἱ νεογιλοὶ δόδοντες εἶναι τοποθετημένοι ἀνὰ δέκα εἰς κάθε γνάθον ὡς ἔξης: Τέσσαρες τομεῖς εἰς τὸ μέσον τῆς γνάθου, ἀνὰ εἰς κυνόδονος δεξιὰ καὶ ἀριστερὰ τῶν τομέων καὶ δύο προγόμφιοι ὅπισθεν ἐκάστου κυνόδοντος.

Κατὰ τὴν παιδικὴν ἡλικίαν

ούσίαν (εἰκ. 21). Ἡ πολφική κοιλότης περιβάλλεται ὑπὸ στρώματος σκληρᾶς ούσιας, τῆς ὁ δοντίνη καλύπτεται εἰς μὲν τὸν αὐχένα καὶ τὴν ρίζαν ὑπὸ ὁστείνης, εἰς δὲ τὴν μύλην ὑπὸ στρώματος τῆς σκληροτάτης ἀδαμαντίνης.

Εἰς τὸν ἄνθρωπον ἡ ἀνωτέρα ἐπιφάνεια ὅλων τῶν δόδοντων εύρισκεται σχεδὸν εἰς τὸ ἴδιον ὕψος. Διαφέρουν ὅμως οἱ δόδοντες μεταξύ των κατὰ τὸ σχῆμα καὶ τὸ μέγεθος (εἰκ. 22) καὶ



Εἰκ. 23. Ἀκτινογραφία δόδοντων. Διακρίνονται οἱ μόνιμοι δόδοντες, οἱ ὅποιοι ἀναπτύσσονται καὶ θάντικαταστήσουν τοὺς νεογιλούς.

οἱ νεογιλοὶ ἀντικαθίστανται ὑπὸ τῶν μονίμων ὁδόντων (εἰκ. 23). Οὗτοι περιλαμβάνουν ἐπὶ πλέον τῶν νεογιλῶν ὅκτὼ γομφίους, ἀνὰ δύο ὅπισθεν τῶν προγομφίων. Τέλος, μετὰ τὸ 19ον ἔτος, ἐκφύονται καὶ οἱ τέσσαρες τελευταῖοι γομφίοι, οἱ ὅποιοι καλοῦνται σωφρονιστὴρες. Οὕτω συμπληροῦνται ἡ μόνιμος ὁδοντοφυΐα, ἀποτελουμένη ἐκ τριάκοντα δύο ὁδόντων.

Σημείωσις. Εἰς τὴν βάσιν τῆς γλώσσης καὶ εἰς τὸ ὅπισθιον καὶ τὰ πλάγια τοιχώματα τοῦ φάρυγγος εύρισκονται ἀθρίσματα λεμφαδένων, τὰ ὅποια καλοῦνται ἀμυγδάλαι μετὰ γδαλαί. Αἱ εύρισκόμεναι εἰς τὰ πλάγια τοιχώματα τοῦ φάρυγγος φαρυγγικαὶ ἀμυγδάλαι εἶναι γνωστότεραι, διότι συχνά ἐρεθίζονται.

3. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1) Ἐπανάλαβε τὴν κίνησιν τῆς καταπόσεως πολλάκις καὶ πρόσεξε τὴν θέσιν τῆς γλώσσης καὶ τὴν κίνησιν τοῦ λάρυγγος.

2) Παρατήρησε εἰς τὸν καθρέπτην (καθαρὰ χέρια!) τὰ διάφορα εἴδη τῶν ὁδόντων σου. Εἰς ἔξαχθέντας ὁδόντας παρατήρησε τὴν ρίζαν καὶ τὴν πολφικήν κοιλότητα. Γράψε τὸν ὁδοντικὸν τύπον τοῦ ἀνθρώπου (παιδίου ἢ ἐνηλίκου).

3) Παρατήρησε εἰς τὸν καθρέπτην τὸ ὑπερώϊον ίστιον καὶ τὴν κιονίδα, εἰς τὴν ὄποιαν τοῦτο ἀπολήγει.

4) Παρατήρησε ἀνὰ κατὰ τὴν σύγκλεισιν τῶν ὁδόντων οἱ ἄνω τομεῖς εύρισκονται πρὸ τῶν κάτω ἢ ὅπισθεν αὐτῶν. Παρατήρησε τὸ ἴδιον καὶ εἰς ἄλλα ἀτομα.

4. ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ


Ἡ στοματικὴ κοιλότης συγκοινωνεῖ πρὸς τὸν φάρυγγα διὰ τοῦ ισθμοῦ. Ὁ φάρυγξ ἐπικοινωνεῖ μὲ τὴν κοιλότητα τῆς ρινός, μὲ τὸ ἔσω σύσ, μὲ τὸν οἰσοφάγον καὶ μὲ τὸν λάρυγγα. Ἡ γλῶσσα, τὰ χείλη καὶ οἱ ὁδόντες ἔχουν πηρετοῦν τόσον τὴν μάσησιν ὅσον καὶ τὴν ὄμιλίαν. Ἡ στοματικὴ σχισμὴ φράσσεται ὑπὸ τῶν χειλέων καὶ τῶν ὁδόντων. Οἱ ὁδόντες τῆς μὲν πρώτης ὁδοντοφυΐας (νεογιλοὶ) εἶναι εἴκοσι, τῆς δὲ δευτέρας ὁδοντοφυΐας (μόνιμοι) τριάκοντα δύο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ

ΠΕΨΙΣ, ΑΠΟΜΥΖΗΣΙΣ ΚΑΙ ΑΦΟΜΟΙΩΣΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟ·Ι·ΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΨΕΩΣ

1. Η ΠΕΨΙΣ. Ο ΠΕΠΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝ

Η πέψις είναι μία σειρά μηχανικῶν καὶ χημικῶν μεταβολῶν, τὰς ὅποιας ύφιστανται αἱ τροφαὶ ἐντὸς τοῦ ὄργανισμοῦ. Διὰ τῶν μεταβολῶν τούτων ὁ ὄργανισμὸς ἀποχωρίζει τὰς θρεπτικὰς οὐσίας καὶ τὰς διασπᾶ ἐις ἀπλουστέρας ἐνώσεις, αἱ ὅποιαι είναι εὐδιάλυτοι, δύνανται ν' ἀπορροφηθοῦν καὶ νὰ ἀφομοιωθοῦν.



Εἰκ. 24. Τὸ πεπτικὸν σύστημα.

1. Οἰσοφάγος. — 2. Στόμαχος.—
3. Δωδεκαδάκτυλον. — 4. Πλάγκρεας.—
- 5, 6, 7, 8, 9. Παχὺ ἔντερον. — 11. λεπτὸν ἔντερον. — 12. Σκωληκοειδῆς ἀπόφυσις.— 13. Ἡπαρ. — 14. Χολη-
- δόχος κύστις.

Η πέψις τῶν τροφῶν ἀρχίζει εἰς τὸ στόμα καὶ συμπληρώνεται εἰς τὰ διάφορα τμήματα τοῦ πεπτικοῦ σωλήνος. Ο πεπτικὸς οὔτος σωλήνη περιλαμβάνει τὰ ἔξης κατὰ σειρὰν τμήματα: Τὴν στοματικὴν κοιλότητα, τὸν φάρυγγα, τὸν οἰσοφάγον, τὸν στόμαχον, καὶ τὸ ἔντερον (εἰκ. 24). Κατωτέρω θὰ γνωρίσωμεν τὴν κατασκευὴν τῶν τμημάτων τούτων καὶ τὰς μεταβολάς, τὰς ὅποιας ύφιστανται αἱ τροφαὶ ἐντὸς ἐκάστου ἔξ αὐτῶν.

2. ΣΤΟΜΑ. ΜΑΣΗΣΙΣ. ΣΙΑΛΟΣ. ΚΑΤΑΠΟΣΙΣ ΤΟΥ ΒΛΩΜΟΥ

Εἰς τὸ στόμα ἡ τροφὴ κατατεμαχίζεται καὶ κατατρίβεται διὰ

τῶν ὁδόντων. Ἡ κατεργασία αὕτη τῆς τροφῆς καλεῖται μάσησις. Προσέτι εἰς τὸ στόμα ύφισταται ἡ τροφὴ καὶ τὴν ἐπίδρασιν τοῦ σιάλου, ὁ ὅποιος μεταβάλλει τὸ ἄμυλον εἰς σάκχαρον. Διὰ τοῦτο αἱ ἄμυλώδεις τροφαὶ ἀποκτοῦν εἰς τὸ στόμα γλυκεῖαν γεῦσιν. Ὁ σίαλος χύνεται εἰς τὴν στοματικὴν κοιλότητα ἀπὸ τὰ γνωστά μας τρία ζεύγη σιαλογόνων ἀδένων (εἰκ. 20).

Ἄφοῦ ὑποστῇ τὰς ἀνωτέρω κατεργασίας, λαμβάνει ἡ τροφὴ διὰ τῶν κινήσεων τῆς γλώσσης τὸ σχῆμα μιᾶς μικρᾶς σφαίρας, ἡ ὅποια καλεῖται βλωμὸς (μπουκιά). Ὁ βλωμὸς οὗτος διὰ τῆς καταπόσεως εἰσέρχεται εἰς τὸν φάρυγγα.

3. ΦΑΡΥΓΞ ΚΑΙ ΟΙΣΟΦΑΓΟΣ. ΣΤΟΜΑΧΟΣ ΚΑΙ ΓΑΣΤΡΙΚΟΝ ΥΓΡΩΝ

‘**Ο φάρυγξ** εἶναι, ὡς εἴπομεν, χῶρος διὰ τοῦ ὅποίου διέρχονται αἱ τροφαὶ καὶ ὁ ἀρόρ διὰ νὰ κατανεμηθοῦν κατόπιν εἰς τὸν οἰσοφάγον καὶ τὸν λάρυγγα. Ὁ βλωμὸς μετὰ τὸν φάρυγγα διατρέχει τὸν οἰσοφάγον. Οὗτος εἶναι μυώδης σωλήν, ὁ ὅποιος διαπερᾶ τὸν θώρακα ἔμπρὸς ἀπὸ τὴν σπονδυλικὴν στήλην καὶ ἀπολήγει εἰς τὸν στόμαχον.

‘**Ο στόμαχος** εἶναι μυώδης ἀσκός, ὁ ὅποιος εύρισκεται εἰς τὸ ἀριστερὸν μέρος τῆς κοιλίας. Τὸ ἐσωτερικὸν στρῶμα τοῦ τοιχώματός του, τὸ ὅποιον καλεῖται βλεννογόνος χιτών, περιλαμβάνει ἀδένας, οἱ ὅποιοι ἐκκρίνουν βλέψιν καὶ γαστρικὸν ύγρον. Διὰ τῶν κινήσεων τοῦ μυώδους τοιχώματος ἡ τροφὴ ἀναμιγνύεται καλῶς μὲ τὸ γαστρικὸν ύγρον. Τοῦτο ἔχει τὴν ίδιότητα νὰ προσβάλῃ τὰ λευκώματα τῆς τροφῆς καὶ νὰ τὰ διασπᾷ εἰς ἀπλουστέρας ἐνώσεις.

Τὸ γαστρικὸν ύγρὸν περιέχει ὑδροχλωρικὸν ὀξύ (0,4%—0,5%), πεψίνην, πυτίαν καὶ λιπαστήν, διὰ τῆς ὅποιας διασπᾶ τὰ λίπη.

4. ΛΕΠΤΟΝ ΕΝΤΕΡΟΝ. ΠΑΓΚΡΕΑΣ. ΗΠΑΡ. ΧΟΛΗΔΟΧΟΣ ΚΥΣΤΙΣ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΙΣ ΤΗΣ ΠΕΥΕΩΣ

Τὸ **ἔντερον** εἶναι μακρὸς σωλήν ($8 \frac{1}{2}$ μ. περίπου) «κουλουριασμένος» ἐντὸς τῆς κοιλιακῆς κοιλότητος. Τὸ πρῶτον τμῆμά του, τὸ ὅποιον περιλαμβάνει τὰ $\frac{3}{4}$ περίπου τοῦ ὅλου μήκους του, καλεῖται λεπτὸν ἔντερον καὶ ἔχει διάμετρον 3—5 ἑκ. Συνέχεια αὐτοῦ εἶναι τὸ παχύ ἔντερον, τὸ ὅποιον εἶναι χονδρότερον καὶ ἀπολήγει εἰς τὸν πρωκτόν.

Τὸ ἀρχικὸν τμῆμα τοῦ λεπτοῦ ἐντέρου εἶναι κεκαμμένον πεταλοειδῶς καὶ στερεοῦται ἐπὶ τοῦ ὀπισθίου τοιχώματος τῆς κοιλιάκης κοιλότητος. Τὸ τμῆμα τοῦτο καλεῖται δωδεκάκτυον.

Εἰς τὸ δωδεκαδάκτυλον εἰσέρχεται ἡ τροφὴ διὰ συστολῶν τοῦ κατωτέρου στομίου τοῦ στομάχου, τὸ ὄποιον καλεῖται πυλωρός.

Εἰς τὸ ἐντερον συνεχίζεται ἡ πέψις τῆς τροφῆς διὰ τῶν ὑγρῶν, τὰ ὄποια χύνονται εἰς αὐτό. Ἐξ αὐτῶν τὸ μὲν παγκρεατικὸν ὑγρὸν καὶ ἡ χολὴ χύνονται εἰς τὸ δωδεκαδάκτυλον, τὸ δὲ ἐντερικὸν ὑγρὸν εἰς τὸ ὑπόλοιπον ἐντερον.

α') **Τὸ παγκρεατικὸν ὑγρόν.** Τοῦτο παράγεται ἀπὸ τὸ πάγκρεατον. Οἱ ἐπιμήκης οὔτος ἀδὴν ἔκτείνεται δριζοντίως ἀπὸ τοῦ δωδεκαδακτύλου μέχρι τοῦ σπληνός. Μὲ τὴν προσθίαν ἐπιφάνειαν ἀκουμβᾶ ἐπὶ τοῦ στομάχου καὶ μὲ τὴν ὀπισθίαν ἐπὶ τῆς σπονδυλικῆς στήλης καὶ τοῦ ἀριστεροῦ νεφροῦ. Ἐκβάλλει εἰς τὸ δωδεκαδάκτυλον μὲ δύο ἐκφορητικοὺς ἀγωγούς. Ἐκ τούτων ὁ εἰς ἐνώνεται μὲ τὸν ἀγωγὸν τῆς χολῆς. Ἡ ἡμεροσία παραγωγὴ τοῦ παγκρεατικοῦ ὑγροῦ ἀνέρχεται εἰς 1,2–1,5 λίτρα. Τοῦτο συμβάλλει εἰς τὴν πέψιν τῶν λευκωμάτων διὰ τῆς θρεψίνης καὶ τῶν ὑδατανθράκων διὰ τῆς ἀμυλάσης.

β') **Τὸ ἐντερικὸν ὑγρόν.** Τοῦτο παράγεται ἀπὸ τοὺς ἀδένας τοῦ βλεννογόνου χιτῶνος τοῦ ἐντέρου καὶ συμπληρώνει τὴν πέψιν τῶν λευκωμάτων, τῶν λιπῶν καὶ τῶν ὑδατανθράκων.

γ') **Ἡ χολὴ.** Αὕτη εἶναι ἐν κιτρινοπράσινον ὑγρόν, τὸ ὄποιον παράγεται εἰς τὸ ἥπαρ (συκώτι) καὶ συναθροίζεται εἰς τὴν χολὴν κύστιν. Ἀπὸ τὴν χοληδόχον κύστιν ἡ χολὴ χύνεται εἰς τὸ δωδεκαδάκτυλον καὶ εἶναι ἀπαραίτητος διὰ τὴν πέψιν τῶν λιπῶν.

Τὸ ἥπαρ εἶναι ὁ μεγαλύτερος ἀδὴν τοῦ σώματος, φθάνων μέχρι βάρους 2 χλγ. Ἀποτελεῖται ἀπὸ δύο λοβούς καὶ εύρισκεται, ἰσούψως μὲ τὸν στόμαχον, εἰς τὴν δεξιὰν πλευρὰν τῆς κοιλίας.

Μὲ τὴν ἐπίδρασιν τῶν ἀνωτέρω ὑγρῶν συμπληρώνεται εἰς τὸ λεπτὸν ἐντερον ἡ διάσπασις ὅλων τῶν θρεπτικῶν ούσιῶν τῶν τροφῶν, δηλ. τῶν λευκωμάτων, τῶν ὑδατανθράκων καὶ τῶν λιπῶν. Αἱ ἀπλούστεραι ἐνώσεις, αἱ ὄποιαι προκύπτουν καὶ τὰς ὄποιας θὰ καλοῦμεν προϊόντα τῆς πέψεως, εἶναι εύδιάλυτοι εἰς τὸ ὕδωρ καὶ δύνανται νὰ ἀπορροφηθοῦν ὑπὸ τοῦ ἐντέρου.


5. ΑΠΟΜΥΖΗΣΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟ·Ι·ΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΥΕΩΣ ΔΙΑ ΤΩΝ ΛΑΧΝΩΝ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ

Ἡ ἀπορρόφησις τῶν προϊόντων τῆς πέψεως γίνεται διὰ τοῦ τοιχώματος πολυπληθῶν, μικρῶν, μικροτάτων προεξόχῶν τοῦ βλεννογόνου τοῦ λεπτοῦ ἐντέρου, αἱ ὅποιαι καλοῦνται λάχνης. Αἱ λάχναι εἶναι εὔκινητοι, ἔχουν λεπτότατον τοίχωμα καὶ περιλαμβάνουν αἷμοφόρα καὶ λεμφικὰ ἄγγεια (εἰκ. 25). Τὰ προϊόντα τῆς πέψεως διέρχονται τὸ τοίχωμα τῶν λαχνῶν τούτων καὶ εἰσέρχονται εἰς τὰ ἄγγεια. Τὰ μὲν λευκώματα καὶ οἱ ύδατάνθρακες εἰσέρχονται εἰς τὰ αἷμοφόρα ἄγγεια καὶ διὰ τῆς πυλαίας φλεβὸς ἔρχονται εἰς τὸ ἡπαρ, τὰ δὲ λίπη εἰς τὰ λεμφικὰ ἢ λεμφοφόρα ἄγγεια. Τὰ ἄγγεια ταῦτα ἐνώνονται καὶ σχηματίζουν ἐν ἄγγειον, τὸν θωρακικὸν πόρον, ὁ ὅποιος χύνει τὸ λίπος εἰς τὴν κυκλοφορίαν τοῦ αἵματος.

6. ΑΦΟΜΟΙΩΣΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟ·Ι·ΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΥΕΩΣ

Ἄπὸ τὰ προϊόντα αὐτὰ τῆς πέψεως, τὰ ὅποια ἀπορροφᾶ, σχηματίζει ὁ ὄργανισμὸς τὰ λίπη, τὰ λευκώματα καὶ τοὺς ύδατάνθρακας τοῦ ἴδικοῦ του σώματος. Τὰ συστατικὰ αὐτὰ τοῦ σώματός του διαφέρουν ἀπὸ τὰ ἀντίστοιχα συστατικὰ τοῦ σώματος ζώου ἄλλου εἴδους. Πρὸ παντὸς τὸ λεύκωμα τοῦ ἀνθρώπου, ὅπως καὶ παντὸς ζώου, παρουσιάζει σημαντικὴν διαφορὰν ἀπὸ τὸ λεύκωμα ζώου, ἄλλου εἴδους.

Ο σχηματισμὸς τῶν συστατικῶν τῶν ιστῶν ἀπὸ τὰ προϊόντα τῆς πέψεως καλεῖται ἀφομοίωσις. Αὕτη πραγματοποιεῖται διὰ μὲν τὰ λίπη κυρίως εἰς τὸ τοίχωμα τοῦ ἐντέρου, διὰ δὲ τοὺς ύδατάνθρακας κυρίως εἰς τὸ ἡπαρ. Διὰ τὰ λευκώματα ἡ ἀφομοίωσις τελεῖται ἐν μέρει μὲν εἰς τὸ ἡπαρ, κυρίως ὁμως εἰς τὰ ἴδια τὰ κύτταρα τῶν ιστῶν. Δηλαδὴ τὰ διάφορα κύτταρα ἐκλέγουν ἀπὸ τὸ αἷμα τὰ ἀ-



Εἰκ. 25. Σχῆμα ἐντερικῆς λάχνης.

1. Βλεννογόνος.
2. Λεία μυϊκή στοιβάς.
3. Ἀρτηρία.
4. Φλέψ.
5. Λεμφικὸν ἄγγειον.

ναγκαϊα προϊόντα τῆς πέψεως καὶ ἐξ αὐτῶν παρασκευάζουν μόνα τὰ λευκώματά των.

7. ΠΑΧΥ ΕΝΤΕΡΟΝ. ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ. ΠΕΡΙΤΤΩΜΑΤΑ

Μετὰ τὴν ἀπορρόφησιν τῶν θρεπτικῶν ούσιῶν μένουν εἰς τὸ ἔντερον τὰ στερεὰ ύπολείμματα τῶν τροφίμων, ὅδωρ καὶ πεπτικὰ ὑγρά. "Ολα αὐτὰ διὰ τῶν συστολῶν τοῦ ἔντερου προχωροῦν εἰς τὸ τελευταῖον τμῆμά του, τὸ παχύ ἐν τερον. Ἐδῶ γίνεται ἀκόμη μία μικρὰ ἀπορρόφησις, ίδιως ὕδατος, καὶ τέλος τὰ ύπολείμματα περιβάλλονται ἐκ τῆς ἔδρας ὡς περιττά. Εἰς τὸ παχύ ἀποβάλλονται καὶ ὠρισμένα εἶδη μικροοργανισμῶν (βακτηριδίων). Τὰ βακτηρίδια ταῦτα δὲν προξενοῦν βλάβην εἰς τὸν ὄργανισμόν. Ἀντιθέτως μάλιστα τὸν ὥφελον, διότι παρεμποδίζουν τὴν ἀνάπτυξιν ἐντὸς τοῦ ἔντερου ἄλλων μικροβίων, παθογόνων. Μέρος τῶν βακτηριδίων τούτων ἔχερχεται ἐκάστοτε μετὰ τῶν περιττωμάτων.

8. ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ ΞΕΝΩΝ ΛΕΥΚΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Ως εἶδομεν, τὰ λευκώματα ἐκάστου ζώου καὶ τοῦ ἀνθρώπου διαφέρουν ἀπὸ τὰ λευκώματα ζώου ἄλλου εἴδους. Δι' αὐτὸ ὁ ὄργανισμὸς δὲν δέχεται ξένα λευκώματα, τὰ ὅποια εἰσάγονται εἰς αὐτὸν ἀπ' εὐθείας, χωρὶς δηλ. νὰ διασπασθοῦν εἰς τὸν πεπτικὸν σωλῆνα. Ἐὰν τοιαῦτα λευκώματα εἰσχωρήσουν εἰς τοὺς ιστούς, ὁ ὄργανισμὸς βλάπτεται καὶ παρουσιάζει συμπτώματα δηλητηριάσεως.

Τοῦτο π.χ. συμβαίνει, ὅταν ὁ ὄργανισμὸς μολυνθῇ, ὅταν δηλαδὴ ἀναπτυχθοῦν ἐντὸς τῶν ιστῶν του μικρόβια. Ἀπὸ τὰ καταστρεφόμενα μικροβιακὰ κύτταρα ἐλευθερώνονται μέσα εἰς τὸ αἷμα λευκώματα, τὰ ὅποια είναι ξένα διὰ τὸν ὄργανισμόν.

Εἰς τοῦτο ὄφείλονται ἐν μέρει τὰ συμπτώματα, τὰ ὅποια παρατηροῦνται μετὰ τὴν μόλυνσιν (πυρετός κλπ.).

9. ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ

Ο πεπτικός σωλήνη περιλαμβάνει κατά σειράν ἀπό τοῦ στόματος τὸν φάρυγγα, τὸν οἰσοφάγον, τὸν στόμαχον, τὸ λεπτόν καὶ τὸ παχύ ἔντερον. Εἰς τὸν πεπτικὸν σωλῆνα χύνονται α') ἡ βλέννα καὶ τὸ γαστρικὸν ύγρὸν εἰς τὸν στόμαχον, β') τὸ παγκρεατικὸν ύγρὸν καὶ ή χολὴ εἰς τὸ δωδεκαδάκτυλον καὶ γ') τὸ ἔντερικὸν ύγρὸν εἰς τὸ ὑπόλοιπον ἔντερον. Ή πέψις ἀρχίζει ἀπό τὸ στόμα (μάσησις, σίαλος) καὶ συμπληροῦται μὲ τὴν ἐπίδρασιν τῶν ἀνωτέρω ύγρῶν.

Τὰ προιόντα τῆς πέψεως ἀπομζῶνται διὰ τῶν λαχνῶν τοῦ λεπτοῦ ἔντερου καὶ ἀφομοιώνονται πρὸς τὰ συστατικὰ τῶν ἀνθρωπίνων ιστῶν.


ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΚΤΩΝ

Η ΑΝΑΠΝΟΗ

1. ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ

Έμάθομεν ότι δύο όργανοι προσλαμβάνει άπό τὸν ἀτμοσφαιρικὸν ἀέρα τὸ δίξυγόνον, τὸ δόποιον χρειάζεται διὰ τὰς καύσεις. Ή δέσμευσις τοῦ δίξυγονου γίνεται ύπὸ τοῦ αἵματος εἰς τοὺς πνεύμονας, τὰ κυριώτερα ὄργανα τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος.

Όλοκληρὸν τὸ ἀναπνευστικὸν σύστημα περιλαμβάνει δύο τμήματα: α') τὴν ἀναπνευστικὴν ὁδόν, διὰ τῆς δόποιας κυκλοφορεῖ μέχρι τῶν πνευμόνων ὁ ἀτρ., καὶ β') τοὺς πνεύμονας (εἰκ. 26).



Εἰκ. 26. Τὸ ἀναπνευστικὸν σύστημα.

1. Οὐθρεοειδῆς χόνδρος τοῦ λάρυγγος. —
2. Θυρεοειδῆς ἀδήν. — 3. Τραχεία. — 4. Βρόγχοι. —
5. Τομὴ διὰ τοῦ πνεύμονος. — 6. Οἰσοφάγος. —
7. Διάφραγμα. — α. Ἀριστερὸς πνεύμων. — δ. Δεξιὸς πνεύμων.

Η ἀναπνευστικὴ ὁδὸς εἶναι ἔνας σωλήν, δύο ποιοῖς ἀρχίζει ἀπὸ τὴν ρινικὴν κοιλότητα καὶ προχωρεῖ κατὰ μῆκος τῆς προσθίας ἐπιφανείας τοῦ λαιμοῦ. Ο σωλήν οὗτος σχηματίζεται ἀπὸ ἀλλεπαλτήλους χονδρίνους δακτυλίους καὶ ἐσωτερικῶς καλύπτεται ἀπὸ βλεφαριδῶτὸν βλεννογόνον. Τὸ πρόσθιον μέρος τοῦ σωλήνος τούτου εἶναι ἴδιαιτέρως διαμορφωμένον διὰ

τὴν παραγωγὴν τῆς φωνῆς καὶ καλεῖται λάρυγξ. Τὸ ὑπόλοιπον τμῆμα, τὸ τραχεῖα, ὅταν φθάσῃ εἰς τὸ ὕψος τοῦ στέρνου, διχάζεται εἰς δύο κλάδους, οἱ ὄποιοι καλοῦνται βρόγχοι καὶ οἱ ὄποιοι εἰσέρχονται ἀνὰ εἴς εἰς ἕκαστον πνεύμονα.

Οἱ πνεύμονες κατέχουν τὸ μεγαλύτερον μέρος τῆς θωρακικῆς κοιλότητος. Ἐντὸς αὐτῶν οἱ βρόγχοι διακλαδίζονται εἰς ἀπειρίαν μικρῶν κυστίδων, τὰς κυψελίδας. Εἰς τὰ τοιχώματα τῶν κυψελίδων τούτων διακλαδίζονται τριχοειδῆ αίμοφόρα ἀγγεῖα. "Ωστε ἡ μᾶζα τῶν πνευμόνων ἀποτελεῖται ἀπὸ τὰ βρόγχια, τὰ ἀγγεῖα, τὰς κυψελίδας καὶ ἀπὸ συνδετικὸν ίστόν. 'Ο δεξιὸς πνεύμων εἶναι τρίλοβος, ὁ δὲ ἀριστερὸς εἶναι μικρότερος (δίλοβος), ἀφήνων χῶρον καὶ διὰ τὴν καρδίαν εἰς τὸ ἀριστερὸν ἥμισυ τοῦ θώρακος.

"Οπως θὰ ἴδωμεν καὶ ἀργότερον, ἀπὸ τὴν καρδίαν (καὶ μάλιστα τὴν δεξιὰν κοιλίαν αὐτῆς) ἀρχίζει ἐν μεγάλῳ ἀγγεῖον, ἡ πνευμονικὴ ἀρτηρία. Αὕτη διχάζεται εἰς ἐν ἀγγεῖον διὰ κάθε πνεύμονα καὶ τοῦτο διακλαδίζεται περατιέρω καὶ δίδει τὰ τριχοειδῆ ἀγγεῖα τῶν πνευμόνων. Διὰ τῆς πνευμονικῆς ταύτης ἀρτηρίας προσάγεται ἀπὸ τὴν καρδίαν αἷμα εἰς τοὺς πνεύμονας. 'Εδῶ τοῦτο συναντᾶται μὲ τὸν ἀτμοσφαιρικὸν ἀέρα, ὁ ὄποιος διὰ τῆς ἀναπνευστικῆς ὁδοῦ εἰσέρχεται εἰς τοὺς πνεύμονας καὶ πληροῖ τὰς κυψελίδας.

Διὰ μέσου τῶν λεπτοτάτων τοιχωμάτων τῶν τριχοειδῶν τὸ ὀξυγόνον τοῦ ἀέρος διεισδύει (διαπιδύει) εἰς τὰ ἀγγεῖα καὶ δεσμεύεται ὑπὸ τοῦ αἵματος. 'Αντιστρόφως, ἐκ τοῦ αἵματος διαπιδύει εἰς τὸν ἀέρα τῶν κυψελίδων τὸ διοξείδιον τοῦ ἄνθρακος. "Ωστε γίνεται μία ἀνταλλαγὴ ἀερίων μεταξὺ αἵματος καὶ ἀέρος. Δι' αὐτῆς τὸ αἷμα πλουτίζεται εἰς ὀξυγόνον καὶ καθαρίζεται ἀπὸ τὸ διοξείδιον τοῦ ἄνθρακος, τὸ ὄποιον προκύπτει ἐκ τῶν καύσεων. Μετὰ τοῦτο τὸ αἷμα ἐπιστρέφει εἰς τὴν καρδίαν (τὸν ἀριστερὸν κόλπον αὐτῆς) διὰ τῶν πνευμονικῶν φλεβῶν. 'Εξ ἄλλου ὁ φορτισμένος μὲ διοξείδιον τοῦ ἄνθρακος καὶ πτωχὸς πλέον εἰς ὀξυγόνον ἀήρ τῶν κυψελίδων ἐκδιώκεται ἀπὸ τοὺς πνεύμονας.

Αἱ πολυπληθεῖς κυψελίδες παρέχουν, ὅλαι μαζί, μίαν μεγάλην ἐπιφάνειαν, εἰς τὴν ὄποιαν τὸ αἷμα καὶ ὁ ἀήρ ἔρχονται εἰς ἐπαφήν. 'Υπολογίζουν, ὅτι ἡ ἐπιφάνεια αὗτη ἀνέρχεται περίπου μέχρι τῶν 130 τ.μ.

2. ΑΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ

‘Η είσοδος τοῦ ἀέρος μέχρι τῶν πνευμόνων καὶ κατόπιν ἡ ἔξοδος αὐτοῦ ἔξασφαλίζονται διὰ τῶν ἀναπνευστικῶν κινήσεων. Αὗται τελοῦνται εἰς δύο χρόνους: πρῶτον, αἱ πλευραὶ κινοῦνται πρὸς τὰ ἔξω καὶ τὸ διάφραγμα πρὸς τὰ κάτω. Οὕτως ἡ θωρακικὴ κοιλότης εύρυνεται καὶ οἱ πνεύμονες, διογκούμενοι, ἀποκτοῦν μεγαλυτέραν χωρητικότητα. Τότε ρεῦμα ἀέρος διὰ τῆς ρινὸς ἢ τοῦ στόματος εἰσέρχεται εἰς τὴν ἀναπνευστικὴν δόδὸν καὶ φθάνει μέχρι τῶν κυψελίδων (εἰσπνοή). Δεύτερον, διὰ χαλαρώσεως τῶν μυῶν τῶν πλευρῶν καὶ τοῦ διαφράγματος ἡ θωρακικὴ κοιλότης ἐπανακτᾶ τὸν προηγούμενον ὅγκον τῆς. Οὕτως οἱ πνεύμονες πιέζονται καὶ ὁ ἀήρ, ὃς ποτοῖς εἰσῆλθε κατὰ τὴν εἰσπνοήν, ἐκδιώκεται ἐξ αὐτῶν (ἐκπνοή). ‘Η συμπίεσις ὅμως τῶν πνευμόνων δὲν εἶναι τελεία καὶ πάντοτε παραμένει ἐντὸς αὐτῶν μικρὰ ποσότης ἀέρος.

Σημείωσις. Κατὰ τὴν ἀναπνοήν ὁ δργανισμὸς ἀποδίδει, πλὴν τοῦ διοξειδίου τοῦ ἀνθρακος, καὶ μίαν ποσότητα ύδρατμῶν. Διὰ τοῦ τρόπου τούτου ἀποβάλλεται καὶ μέρος τῆς θερμότητος τοῦ σώματος.

3. ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ


Χάρις εἰς τὰς ἀναπνευστικὰς κινήσεις κυκλοφορεῖ διὰ τῆς ἀναπνευστικῆς ὁδοῦ μέχρι τῶν πνευμόνων ὁ ἀτμοσφαιρικὸς ἀήρ. Ἐξ ἄλλου, διὰ τῶν ἀγγείων φέρεται μέχρις αὐτῶν τὸ αἷμα. Διὰ μέσου τῶν τοιχωμάτων τῶν τριχειδῶν γίνεται ἀνταλλαγὴ ἀερίων, διὰ τῆς ὁποίας τὸ αἷμα πλουτίζεται εἰς ὀξυγόνον καὶ καθαρίζεται ἀπὸ τὸ διοξείδιον τοῦ ἀνθρακος.

4. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1) Ἡ ἐπιφάνεια τῶν κυψελίδων ὑπολογίζεται μέχρι 130 τ.μ. Παρατήρησε ἐπὶ τοῦ ἐδάφους μίαν ἵστην ἐπιφάνειαν.

2) Κατὰ τὴν ἥρεμον ἀναπνοήν ὁ ἀνθρωπος εἰσάγει 500 κυβ. ἑκ. ἀέρος εἰς τοὺς πνεύμονας. Δεδομένου ὅτι εἰς κάθε 1' ἐκτελεῖ 16 ἀναπνοάς, πόσον ὅγκον ἀέρος εἰσπνέει εἰς μίαν ὥραν, εἰς ἓν ἡμερονύκτιον; Κατὰ τὴν παιδικὴν ἡλικίαν αἱ ἀναπνοαὶ εἶναι περισσότεραι, ἀνερχόμεναι εἰς 25–30 κατὰ 1'.

3) ‘Ο εἰσπνεόμενος ἀήρ, διερχόμενος διὰ τῆς ρινὸς, ὅχι μόνον



Εἰκ. 27. Οι τρεις ἀναπνευστικοὶ τύποι.

καθαρίζεται, ἀλλὰ καὶ θερμαίνεται. Παρατήρησε τοῦτο εἰσπνέων μίαν φορὰν διὰ τῆς ρινὸς καὶ μίαν διὰ τοῦ στόματος.

4) Εἰς τὴν ρινικὴν κοιλότητα ὁ εἰσπνεόμενος ἀήρ καθαρίζεται ἀπὸ τὴν σκόνην καὶ τὰ μικρόβια. Ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν τραχεῖαν αἱ βλεφαρίδες τοῦ ἐπιθηλίου τῆς, διὰ τῶν κινήσεών των, ἀναγκάζουν κάθε μόριον σκόνης, τὸ δόποιον τυχόν εἰσέδυσε, νὰ ἔξελθῃ. ‘Υπολογίζουν, ὅτι εἰς τὸ ὑπαιθρὸν αἴωροῦνται 1000 μικροσκοπικὰ μόρια σκόνης εἰς 1 κυβ. ἑκατοστ., εἰς δὲ τὰς πόλεις 100.000—500.000.

5) Παρατήρησε κατὰ τὴν ἡρεμον ἀναπνοὴν τοὺς ἔξῆς τρεῖς «ἀναπνευστικοὺς τύπους»: α') Κατωτέρα πλευρική (διαφραγματική) ἀναπνοή, συνήθης εἰς τοὺς ἄνδρας· β') Ἀνωτέρα πλευρική (θωρακική) ἀναπνοή, συνήθης εἰς τὰς γυναικας· γ') Κοιλιακή ἀναπνοή, συνήθης εἰς τὰ παιδία (εἰκ. 27).


ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΒΔΟΜΟΝ

Ο ΛΑΡΥΓΞ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ

1. Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΛΑΡΥΓΓΟΣ. ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ

Ἐξετάζοντες τὴν κατασκευὴν τοῦ ἀναπνευστικοῦ σωλῆνος, παρατηροῦμεν, ὅτι τὸ ἀνώτερον μέρος του, ὁ λάρυγξ, σχηματίζεται ἀπὸ χόνδρινα τμήματα, παρουσιάζοντα ἴδιαίτερον σχῆμα καὶ μέγεθος (εἰκ. 19, 26). Ἐκ τῶν χόνδρων τούτων μεγαλύτερος εἶναι ὁ θυρεός, δύο μικρότεροι χόνδροι, οἱ ἀρταῖνοι εἰδεῖς. Κάτωθεν τοῦ ψυρεοειδοῦς εύρισκεται ὁ κρικόειδης χόνδρος. Τέλος ὁ λάρυγξ δύναται νὰ κλεισθῇ ὑπὸ ἐνὸς ἄλλου χόνδρου, τῆς ἐπιφάνειαν τοῦ λαρυγγοῦ εύρισκονται δύο μικρότεροι χόνδροι, οἱ ἀρταῖνοι εἰδεῖς. Κάτωθεν τοῦ ψυρεοειδοῦς εύρισκεται ὁ κρικόειδης χόνδρος. Τέλος ὁ λάρυγξ δύναται νὰ κλεισθῇ ὑπὸ ἐνὸς ἄλλου χόνδρου, τῆς ἐπιφάνειαν τοῦ λαρυγγοῦ εύρισκονται δύο μικρότεροι χόνδροι, οἱ ἀρταῖνοι εἰδεῖς.

Μεταξὺ τοῦ ψυρεοειδοῦς χόνδρου καὶ τῶν ἀρυταινοειδῶν ἐκτείνονται δύο ζεύγη σαρκωδῶν πτυχῶν, αἱ ὁποῖαι καλοῦνται φωνητικαὶ χορδαὶ. Ἐκ τούτων μόνον αἱ κατώτεραι ἔχουν σημασίαν διὰ τὴν παραγωγὴν τῆς φωνῆς καὶ κυρίως αὐτὰς θὰ ἐννοοῦμεν ὡς φωνητικὰς χορδάς. Αὗται ἀφήνουν μεταξὺ τῶν τῆς φωνητικῆς σχισμῆς, διέρχεται ὁ ἀήρ (εἰκ. 28).



Εἰκ. 28. Τομὴ διὰ τοῦ λαρυγγοῦ.—1. Ἀνώτεραι φωνητικαὶ χορδαὶ.—2. Κατώτεραι φωνητικαὶ χορδαὶ.—3. Φωνητικὴ σχισμή.—5. Θυρεοειδής.—4. Κρικοειδής.

Διὰ τῶν διαφόρων μυῶν εἶναι δυνατὸν αἱ δύο κατώτεραι φωνητικαὶ χορδαὶ νὰ ἐκταθοῦν καὶ ἡ φωνητικὴ σχισμὴ νὰ ἀποστενωθῇ. Ο ἐκπνεόμενος τότε ἀήρ, διερχόμενος διὰ τῆς στενῆς σχισμῆς, θέτει εἰς παλμικὰς κινήσεις τὰς δύο χορδάς, καὶ οὕτω παράγεται ἡ φωνή.

2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ. ΑΡΘΡΩΣΙΣ ΑΥΤΗΣ ΕΙΣ ΦΘΟΓΓΟΥΣ. ΛΟΓΟΣ

“Οπως εις κάθε ἥχον, διακρίνομεν καὶ εἰς τὴν ἀνθρωπίνην φωνὴν τρεῖς χαρακτῆρας: τὸ ὑψός (βαρειὰ ἡ ψιλὴ φωνή), τὴν ἐν τασιν (δυνατὴ ἡ ἀσθενής) καὶ τέλος τὸ ποιὸν τῆς φωνῆς. Διὰ τοῦ ποιοῦ τῆς φωνῆς ἀναγνωρίζομεν τὸ πρόσωπον, τὸ διποίον παράγει αὐτήν, ἔστω καὶ ἂν δὲν βλέπομεν αὐτό.

Τὸ ὑψός τῆς φωνῆς ἔξαρτᾶται ἀπὸ τὴν τάσιν τῶν χορδῶν καὶ ἀπὸ τὸ μῆκος τοῦ λαιμοῦ. Ἡ ἔντασις ἔξαρτᾶται ἀπὸ τὴν δύναμιν τῆς ἐκπνοῆς. Τὸ ποιὸν τέλος ἔξαρτᾶται ἀπὸ τὴν ιδιαιτέραν κατασκευὴν τοῦ λάρυγγος καὶ τῆς στοματικῆς κοιλότητος ἑκάστου ἀτόμου.

Ἡ φωνή, ἡ διάφορα παράγεται εἰς τὸν λάρυγγα, φθάνει εἰς τὸ στόμα, ὅπου ἀρθροῦται, δηλ. μετατρέπεται εἰς φθόγγον. Οἱ διάφοροι φθόγγοι προκύπτουν ἀναλόγως τῆς θέσεως, τὴν διάποιαν λαμβάνει ἡ γλῶσσα, οἱ δόδοντες καὶ τὰ χείλη. Διὰ τῶν φθόγγων σχηματίζονται αἱ λέξεις.

‘Ο λόγος εἶναι ἔξαιρετικὸν προνόμιον τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἐν ἀπὸ τὰ σπουδαιότερα μέσα, τὰ διποία ἔκαμαν δυνατήν τὴν διανοητικήν ἀνάπτυξιν αὐτοῦ.

3. ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ

Ἡ φωνὴ παράγεται, ὅταν αἱ κυρίως φωνητικαὶ χορδαὶ ἐκταθοῦν καὶ ὁ ἐκπνεόμενος ἀπὸ τὴν θέσην αὐτὰς εἰς παλμικὴν κίνησιν. Εἰς τὸ στόμα ἡ φωνὴ ἀρθροῦται εἰς φθόγγον, ἐκ τῶν διποίων σχηματίζονται αἱ λέξεις.

4. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1) Κατὰ τὸ 12ον ἔτος περίπου τῆς ἡλικίας παρατηρεῖται μία ταχυτέρα αὔξησις τοῦ λάρυγγος καὶ τοῦτο προκαλεῖ τὴν ἀλλαγὴν τῆς φωνῆς κατὰ τὴν ἡλικίαν ταύτην (μετάπλασις τῆς φωνῆς). Ἐπειδὴ τὸ ἀτομὸν δὲν συνθίζει ἀμέσως εἰς τὰς νέας συνθήκας, παρατηροῦνται κατὰ τὴν περίοδον ταύτην δυσκολίαι εἰς τὴν προφοράν.

2) Πρόσεξε καὶ καθόρισε τὴν θέσιν τῆς γλώσσης κατὰ τὴν προφορὰν τῶν ἔξης φθόγγων: 1) π, 2) φ, β, 3) θ, δ, 4) τ, 5) κι, χι, 6) κα, χα, 7) α, 8) ι, καὶ 9) ου.

3) Ἐκτὸς τοῦ ἀνθρώπου ποία κατηγορία ζώων ἔχει ἀνεπτυγμένην φωνητικήν συσκευήν; Πῶς χρησιμοποιεῖ ἡ κατηγορία αὕτη τὰ πρόσθια ἄκρα, πῶς δὲ ἀνθρωπος καὶ πῶς τὰ ἄλλα τετράποδα;

4) Εἰς τὸν ἄνδρα τὸ μῆκος τοῦ λάρυγγος εἶναι μεγαλύτερον παρὰ εἰς τὴν γυναικα. Ὁμοίως αἱ φωνητικαὶ χορδαὶ εἶναι μακρότεραι. Ποία διαφορὰ εἰς τὴν φωνὴν παρατηρεῖται διὰ τοῦτο;

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΟΓΔΟΟΝ

Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΜΦΟΥ.

Η ΑΠΕΚΚΡΙΣΙΣ

1. ΤΟ ΑΙΜΑ



Εις δλα τὰ μέρη τοῦ σώματος διακλαδίζονται λεπτά σωληνάρια μὲ ίνωδη, ἐλαστικὰ καὶ συσταλτικὰ τοιχώματα, τὰ αἱ μοφόρα ἀγγεῖα, ἐντὸς τῶν ὅποιων κυκλοφορεῖ τὸ αἷμα.

Τὸ αἷμα ἀποτελεῖται ἀπὸ ἐν ὑγρόν, καλούμενον πλάσμα, καὶ ἀπὸ κύτταρα, τὰ ὅποια αἰωροῦνται μέσα εἰς τὸ ὑγρὸν αὐτό, καλούμενα αἱ μοσφαίρια. Τὸ πλάσμα ἔχει χρῶμα ἀνοικτοκίτρινον καὶ ἀποτελεῖται ἀπὸ ὕδωρ (90%) καὶ οὔσιας διαλελυμένας ἐντὸς αὐτοῦ. Αἱ οὔσιαι εἶναι διάφοροι ἐνώσεις ἀνόργανοι καὶ ὄργανοι.

Τὸ αἷμα τοῦ ἀνθρώπου 70 κιλῶν εἶναι 4—5 λίτρα.

Τὰ αἱμοσφαίρια διακρίνονται εἰς ἑρυθρόν, καὶ λευκόν.

Τὰ ἐρυθρὰ αἱμοσφαίρια εἶναι κύτταρα, τὰ ὅποια ἔχασαν τὸν πυρῆνά των, τὰ μιτοχόνδρια καὶ τὸ κεντροσωμάτιον, δὲν πολλαπλασιάζονται καὶ ζοῦν μέχρι τὸ πολὺ 120 ἡμέρας, καταστρεφόμενα εἰς τὸν σπλήνα ἢ τὸ ήπαρ. Εἶναι ἀμφίκοιλα δισκία, μαλακά, ἐλαστικὰ καὶ εὔκαμπτα διὰ νὰ διέρχωνται εὐκόλως ἀπὸ τὰ τριχοειδῆ ἀγγεῖα. Περιέχουν αἱμοσφαίρινη, μίαν ἐνωσιν σιδηροῦχον, ἢ ὅποια προσδίδει εἰς αὐτὰ καὶ τὸ ἐρυθρὸν χρῶμα. Τὰ ἐρυθρὰ αὐτὰ αἱμοσφαίρια, φθάνοντα εἰς τὰ τριχοειδῆ ἀγγεῖα τῶν πνευμόνων, ἔρχονται εἰς ἐπαφὴν μὲ τὸν ἀτμοσφαιρικὸν ἀέρα. Τότε ἡ αἱμοσφαίρινη δεσμεύει τὸ δύσυγόνον, τὸ ὅποιον διατιθέται διὰ τῶν τοιχωμάτων τῶν τριχοειδῶν ἀπὸ τὸν ἀέρα καὶ μετατρέπεται εἰς μίαν χαλαρὰν ἐνωσιν, τὴν δξαιμοσφαίρινην. Τὸ δύσυγόνον, τοῦτο διὰ τῆς κυκλοφορίας, μεταφέρεται εἰς τοὺς ιστούς.


Τὰ λευκὰ αἱμοσφαίρια, ἀντιθέτως πρὸς τὰ ἐρυθρά, διατηροῦν τὸν πυρῆνά των καὶ ἔχουν σχῆμα σφαιρικόν. Ἰδιαιτέραν σημασίαν

ἔχει μίαν κατηγορία λευκῶν αίμοσφαιρίων, τὰ λευκά κύτταρα αριθμοί, τὰ όποια φέρονται ύπο τοῦ ρεύματος τοῦ αἵματος, ἀλλὰ δύνανται νὰ κινοῦνται καὶ μόνα των ἐπὶ τῶν τοιχωμάτων τῶν ἀγγείων. "Οταν τυχὸν εἰσέλθουν μικρόβια, τὰ λευκοκύτταρα προστρέχουν, τὰ περικλείουν καὶ τὰ διαλύουν ἐντὸς τοῦ κυτταρικοῦ των σώματος, ὅπως ἡ ἀμοιβής τὴν τροφήν της. Τὰ λευκοκύτταρα δύνανται νὰ εἰσέρχων-

ται καὶ διὰ τοῦ τοιχώματος τῶν ἀγγείων καὶ οὕτω π.χ. ἀνευρίσκονται εἰς τὸ πύον.

"Ἐν κυβ. χιλιοστόμετρον αἵματος ύγιοῦς ἀνθρώπου περιέχει περίπου $4\frac{1}{2}$ —5 ἑκατομμ. ἐρυθρὰ αίμοσφαιρία καὶ μόνον 6—8 χιλ. λευκά.

'Ἐὰν τὸ αἷμα ἔξελθῃ ἀπὸ τὰ ἀγγεῖα διὰ τινος πληγῆς, πάγγυνται συντομώτατα καὶ δημιουργεῖ τὸν πλακατελεῖται ἀπὸ τὰ αίμοσφαιρία καὶ ἀπὸ ἕνα δίκτυον καλούμενον ἵνῳδες. 'Ἐπάνω ἀπὸ τὸν πλακατελεῖται μένει ἐν κιτρινωπὸν ύγρόν, ὃρος ἀποτελούμενον κυρίως ἀπὸ τὸ πλάσμα.



Εἰκ. 29. Σχῆμα τῆς καρδίας. 1 καὶ 2. Ἀνωτέρω καὶ κάτω κοιλαι φλέβες — 3. Τριγλῶχιν βαλβίδα. — 4. Νήματα συγκρατοῦντα τὴν βαλβίδα, ὥστε αὐτῇ νὰ μὴ δύνανται νὰ ἀντιστραφῇ. — 5. Μηνοειδεῖς βαλβίδες. — 6. Πνευμονική ἀρτηρία. — 7, 8, 9, 10. Αἱ τέσσαρες πνευμονικαὶ φλέβες, ἀπολήγουσαι εἰς τὸν ἀριστερὸν κόλπον. — 11. Διγλῶχιν βαλβίδα. — 12. Μηνοειδεῖς βαλβίδες. — 13. Ἀνιοῦσα ἀορτή.

2. Η ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΓΓΕΙΑ

Η καρδία είναι τὸ κεντρικὸν ὄργανον, τὸ ὅποιον, διὰ τῶν κινήσεών του, κανονίζει τὴν ροήν τοῦ αἵματος. Εύρισκεται εἰς τὴν κοιλότητα τοῦ θώρακος, μεταξὺ τῶν δύο πνευμόνων καὶ ἀριστερὰς


τοῦ στέρνου. Ἔχει μέγεθος πυγμῆς καὶ τὸ τοίχωμά της ἀποτελεῖται ἀπὸ γραμμωτούς μῆσ.

Ἡ καρδία (εἰκ. 29 καὶ 30) χωρίζεται εἰς τέσσαρας χώρους. Οἱ δύο ἀνώτεροι χῶροι καλοῦνται κόλποι, οἱ δύο δὲ κατώτεροι κοιλία. Ὁ ἀριστερός κόλπος καὶ ἡ ἀριστερὰ κοιλία συγκοινωνοῦν δι' ἐνὸς πόρου, ὁ ὅποιος ἀνοιγοκλείει μὲν μίαν βαλβίδα (μιτροειδής ἡ διγλῶχιν βαλβίς).

Κατὰ τὸν ἕδιον τρόπον συγκοινωνεῖ καὶ ὁ δεξιὸς κόλπος μὲ τὴν δεξιὰν κοιλίαν (μηνοειδής ἡ τριγλῶχιν βαλβίς).

Αἱ κοιλίαι ἔχουν ισχυρότερον τοίχωμα παρὰ οἱ κόλποι, καὶ τοῦτο διότι, ὡς θὰ ἴδωμεν, ἀποστέλλουν τὸ αἷμα εἰς μακρὰν ἀπόστασιν. Ἀντιθέτως, οἱ κόλποι τὸ διοχετεύουν ἀπλῶς ἔκαστος εἰς τὴν ἀντίστοιχον κοιλίαν. Ἐκ δὲ τῶν κοιλιῶν ισχυρεστέρα εἶναι ἡ ἀριστερά, ἡ ὅποια ἀποστέλλει τὸ αἷμα εἰς ὅλα τὰ μέρη τοῦ σώματος, ἐνῷ ἡ δεξιὰ τὸ ἀποστέλλει μόνον εἰς τοὺς πλησίους πνεύμονας.


Ἄπὸ τὴν καρδίαν ἀρχίζουν μεγάλα ἀγγεῖα, τὰ ὅποια ἔχαπλουνται εἰς ὅλα τὰ μέρη τοῦ σώματος καὶ διακλαδίζονται τελικῶς εἰς λεπτότατα τριχοειδῆ. Ὅσα ἀγγεῖα ἀρχίζουν ἀπὸ τὰς δύο κοιλίας τῆς καρδίας καλοῦνται ἀρτηρίαι καὶ ἐντὸς αὐτῶν τὸ αἷμα κινεῖται κατευθυνόμενον πρὸς τὴν καρδίαν. Εἰς τὸν ἀριστερὸν κόλπον, διὰ τεσσάρων φλεβῶν, καλούμενων πνευμονικῶν φλεβῶν, προσάγεται τὸ αἷμα ἀπὸ τοὺς πνεύμονας, ἐμπλουτισμένον εἰς δύξυγόνον. Ἐκ τοῦ




Εἰκ. 30. Ἡ καρδία καὶ τὰ ἔξ αύτῆς ἀρχίζοντα ἀγγεῖα.
1. Ἀριστερός κόλπος. — 2. Πνευμονικὴ ἀρτηρία. — 3. Ἀνιούσα ἀορτή. — 9. Δεξιὰ κοιλία. — 10. Ἀριστερὰ κοιλία. — 8. Δεξιὸς κόλπος. — 5, 7. Πνευμονικαὶ ἀρτηρίαι.

κόλπου τούτου τὸ αἷμα μεταβαίνει εἰς τὴν ἀριστερὰν κοιλίαν καὶ κατόπιν εἰσέρχεται εἰς μίαν μεγάλην ἀρτηρίαν, ἡ ὅποια ὄνομάζεται ἀνιοῦσα ἀρτηρία. Αὕτη διακλαδίζεται εἰς μικρότερα ἀγγεῖα καὶ τελικῶς εἰς λεπτότατα τριχοειδῆ, τὰ ὅποια ἀποδίδουν εἰς τοὺς ίστοὺς τὸ πλούσιον εἰς ὁξυγόνον καὶ θρεπτικάς ούσιας αἷμα.

Τὸ αἷμα διέρχεται διὰ τῶν τριχοειδῶν ἀγγείων, δίδει εἰς τοὺς



Εἰκ. 31. Τὸ ἀπεκκριτικὸν σύστημα.
 1. Νεφρός.—3. Τομὴ οὐροφόρων σωληναρίων.—5. Φλέψ.—6. Ἀρτηρία.—
 7. Ούρητήρ.—8. Ούροδόχος κύστις.—
 2. Ἐπινεφρίδιον.



Εἰκ. 32. Ἀκτινογραφία,
 εἰς τὴν ὄποιαν διακρίνονται οἱ οὐρητήρες καὶ αἱ
 πύελοι τῶν νεφρῶν.

ιστοὺς θρεπτικὰς ούσιας καὶ ὁξυγόνον καὶ παραλαμβάνει τὰ πρειόντα τῶν καύσεων. Ἔξ αὐτῶν αἱ μὲν διαλυταὶ ούσιαι παραλαμβάνονται ἀπὸ τὸ πλάσμα, τὸ δὲ διοξείδιον τοῦ ἄνθρακος ἀπὸ τὰ ἐρυθρὰ αἷμοσφαίρια. Κατόπιν τὸ αἷμα παραλαμβάνεται ἀπὸ τῆς φλέβας, αἱ ὅποιαι ἐνώνονται εἰς δύο μεγάλας, τὴν ἄνω καὶ τὴν κάτω κοιλην φλέβα, καὶ ἐπανέρχεται εἰς τὸν δεξιὸν κόλπον τῆς καρδίας.

Τὸ ἐπιστρέψαν εἰς τὴν καρδίαν αἷμα κατέρχεται ἀπὸ τὸν δεξιὸν κόλπον εἰς τὴν δεξιὰν κοιλίαν. Ἔξ αὐτῆς εἰσέρχεται εἰς τὴν πνευμονικὴν ἀρτηρίαν, ἡ ὅποια τὸ ὀδηγεῖ εἰς τοὺς πνεύμονας. Εἰς τοὺς πνεύμονας τὸ αἷμα, διὰ μέσου τῶν λεπτοτάτων τοιχωμάτων τῶν τριχοειδῶν ἀγγείων ἔρχεται.

ται εἰς ἐπαφήν μὲ τὸν ἀτμοσφαιρικὸν ἀέρα, ἀποδίει τὸ διοξείδιον τοῦ ἄνθρακος καὶ δεσμεύει νέον ὀξυγόνον. Μετὰ τὸν καθαρισμὸν τοῦτον ἐπιστρέφει πάλιν εἰς τὸν ἀριστερὸν κόλπον κ.ο.κ.

Εἰς τὰς ἀρχὰς τῶν ἀρτηριῶν ὑπάρχουν αἱ μῆνοι δεῖς βαλβίδες διὰ νὰ ἐμποδίζουν τὴν ἐπιστροφὴν τοῦ αἷματος εἰς τὰς κοιλίας ὅταν διαστέλλονται αὗται διὰ νὰ δεχθοῦν τὸ αἷμα ἐκ τῶν κόλπων.

3. ΔΙΟΔΟΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΔΙΑ ΤΩΝ ΝΕΦΡΩΝ. ΑΠΕΚΚΡΙΣΙΣ

Τὸ αἷμα κατὰ τὴν διαδρομὴν του διέρχεται διὰ τῶν νεφρῶν (εἰκ. 31 καὶ 32). Οὗτοι εἰναι δύο ὅργανα, τὰ δποῖα ἔχουν σχῆμα φασολιοῦ καὶ μέγεθος 10 ἑκατοστῶν περίπου (εἰκ. 31), εὐρίσκονται δὲ ἀμέσως πρὸ τοῦ ὀπισθίου τοιχώματος τῆς κοιλίας, ἀνὰ εἰς δεξιὰ καὶ ἀριστερὰ τῶν πρώτων ὀσφυϊκῶν σπονδύλων. ‘Η ἀρτηρία, ἡ δποία εἰσέρχεται εἰς ἕκαστον νεφρόν, διακλαδίζεται ἐντὸς αὐτοῦ εἰς λεπτότατα τριχοειδῆ. Διὰ τοῦ τοιχώματος τούτων ἔξερχονται ἀπὸ τὸ αἷμα ὕδωρ καὶ ώρισμέναι ἀχρηστοὶ οὐσίαι. Ἐξέρχονται ἀπό την ταῦτα πλεονάζουν εἰς τὸν ὄργανισμόν.

Μετὰ τὸν καθαρισμὸν τοῦτον, τὸ αἷμα συναθροίζεται ἐξ ἕκαστου νεφροῦ εἰς μίαν φλέβα, ἡ δποία ἀπολήγει εἰς τὴν κάτω κοιλην φλέβα. νεφροῦ εἰς μίαν φλέβα, ἡ δποία ἀπολήγει εἰς τὴν κάτω κοιλην φλέβα.

“Ολαι αἱ κατακρατηθεῖσαι εἰς τὸν νεφρὸν οὐσίαι συναθροίζονται εἰς λεπτὰ σωληνάρια, τὰ δποῖα περιέχει δ νεφρός, καὶ οὕτω σχηματίζονται τὰ οὖρα. “Ἐνας μακρὸς σωλὴν ἐξ ἕκαστου νεφροῦ, σκαλούμενος οὐρὴ τὴν ρ., φέρει τὰ οὖρα κατὰ σταγόνας εἰς τὴν οὐρὸν δόχον κύστιν, ἡ δποία εύρισκεται εἰς τὸ πρόσθιον μέρος τῆς λεκάνης. “Οταν ἡ κύστις πληρωθῇ, τὰ οὖρα ἀποβάλλονται τοῦ σώματος.

Εἰς 24 ὥρας 1500 λίτρα αἷματος διέρχονται διὰ τῶν νεφρῶν καὶ ἀποβάλλονται ἐξ αὐτῶν 1,5 λίτρα οὔρων περίπου.


‘Η ἀνωτέρω λειτουργία, διὰ τῆς δποίας οἱ νεφροὶ συγκρατοῦν ἀπὸ τὸ αἷμα ἀχρήστους οὐσίας καὶ τὰς ἀποβάλλουν τοῦ σώματος, καλεῖται ἀπεκκριτικὰ ὄργανα.

‘Ως ἐμάθομεν, ἀπεκκριτικὴν λειτουργίαν ἔκτελοῦν καὶ οἱ πνεύμονες, οἱ δποῖοι ἀπομακρύνουν τὸ διοξείδιον τοῦ ἄνθρακος. Τέλος

θὰ ἴδωμεν ἀργότερον. ὅτι καὶ ὅπὸ τὸ δέρμα ἀποβάλλονται, εἰς μικράν ὅμως ποσότητα, μερικαὶ ἄχρηστοι διὰ τὸ σῶμα ὃνσίαι.

4. ΔΙΟΔΟΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΔΙΑ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ

"Οπως ἐμάθομεν εἰς τὸ κεφάλαιον περὶ πέψεως, τὰ προϊόντα τῆς



Εἰκ. 33. Σχηματική παράστασις τῆς κυκλοφορίας. π. Πνεύμονες. — α, β, γ. 'Οδοὶ τῆς μεγάλης κυκλοφορίας: διὰ τοῦ ἐντέρου καὶ τοῦ ἡπατοῦ, διὰ τῶν νεφρῶν καὶ διὰ τῶν Ιστῶν.

πέψεως, διερχόμενα τὸ τοίχωμα τοῦ ἐντέρου, εἰσδύουν εἰς τὰ ἀγγεῖα τοῦ ἐντέρου. Τὰ αἱ μοφόρα ἀγγεῖα παραλαμβάνουν κυρίως τοὺς ὑδατάνθρακας καὶ τὰ λευκώματα. Τὰ λίπη παραλαμβάνονται πρὸ παντὸς ἀπὸ τὰ λεμφικὰ ἀγγεῖα, τὰ δόποια θὰ γνωρίσωμεν ἀργότερα.

'Απὸ τὸ ἐντέρον τὰ αἱμοφόρα ἀγγεῖα δὲν ἔρχονται ἀπ' εὐθείας εἰς τὴν κοίλην φλέβα, ἀλλὰ προηγουμένως διέρχονται ἀπὸ τὸ ἡπατ (συκώτι). Ἐντὸς αὐτοῦ γίνεται ἡ ἀφομοίωσις ἐν μέρει μὲν τῶν λευκωμάτων, πρὸ παντὸς ὅμως τῶν ὑδατανθράκων.

Κατὰ τὴν ἀφομοίωσιν αὐτὴν σχηματίζεται εἰς σύνθετος ὑδατάνθραξ, καλούμενος γλυκόν ον. Τοῦτο ἀποθηκεύεται εἰς τὸ ἡπατ καὶ, ἀναλόγως τῶν ἀναγκῶν, ἀποστέλλεται διὰ τῆς κυκλοφορίας εἰς τοὺς μῆνας, ὅπου ἔξοδεύεται μαζὶ μὲ τὸ ὀξυγόνον διὰ τὰς καύσεις.

Οἱ πλεονάζοντες ὑδατάνθρακες μετατρέπονται εἰς λίπη, τὰ δόποια ἀποθηκεύονται εἰς διάφορα μέρη τοῦ σώματος διὰ νὰ ἀποδοθοῦν κατὰ τὴν ἀσιτίαν διὰ τὰς καύσεις.

'Η ίκανότης τοῦ ὀργανισμοῦ νὰ ἀποθηκεύῃ ὑδατάνθρακας ὑπὸ μορφὴν γλυκογόνου εἰς τὸ ἡπατ εἶναι περιωρισμένη (400 γραμ.). Ἀντιθέτως εἶναι ἀπεριόριστος ἡ ποσότης λίπους, ἡ δόποια δύναται νὰ ἐναποτεθῇ εἰς τὸ σῶμα.

Διὰ τῆς πυλαίας ἐπίστης φλεβὸς ἔρχεται εἰς τὸ ἡπαρ καὶ τὸ αἷμα τοῦ στομάχου, τοῦ παγκρέατος καὶ τοῦ σπληνός.

Εἰς τὸ ἡπαρ τὸ αἷμα ἀπαλλάσσεται ἐν μέρει καὶ ἀπὸ διάφορα μικρόβια καὶ δηλητηριώδεις ούσιας. Τὸ ἡπαρ παράγει, ὡς ἐμάθομεν, καὶ τὴν χολήν.

Ἄφοῦ διέλθουν ἀπὸ τὸ ἡπαρ, τὰ αίμοφόρα ἀγγεῖα συναθροίζονται εἰς μίαν φλέβα, τὴν ἡπατικήν φλέβα, ἡ ὁποία ἀπολήγει εἰς τὴν κάτω κοίλην φλέβα.

5. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΙΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (εἰκ. 33)

Κατὰ τὰ προηγούμενα, διακρίνομεν τὴν μικρὰν καὶ τὴν μεγάλην κυκλοφορίαν τοῦ αἵματος. Μικρὰ κυκλοφορία καλεῖται ἡ διαδρομὴ ἀπὸ τὴν δεξιὰν κοιλίαν τῆς καρδίας εἰς τοὺς πνεύμονας καὶ ἡ ἐπάνοδος εἰς τὸ ἀριστερὸν κόλπον. Μεγάλη δὲ κυκλοφορία καλεῖται ἡ διαδρομὴ ἀπὸ τὴν ἀριστερὰν κοιλίαν εἰς τὰς διάφορας κατὰ τὴν μεγάλην κυκλοφορίαν ὑπάρχουν τρεῖς ὄδοι, τὰς ὁποίας ἀκολουθεῖ τὸ αἷμα: α') διέρχεται ἀπὸ τὸ τοίχωμα τῶν ἐντέρων καὶ ἀπὸ τὸ ἡπαρ, ἐμπλουτισμένον εἰς θρεπτικὰς ούσιας, β') διέρχεται ἀπὸ τοὺς νεφρούς, ὅπου καθαρίζεται ἀπὸ ἀχρήστους ούσιας, καὶ γ') διασκορπίζεται εἰς τοὺς ιστούς τοῦ σώματος καὶ τρέφει τὰ ἀκίνητα καὶ εἰδικευμένα κύτταρα τῶν ιστῶν.

Δυνάμεθα νὰ συνοψίσωμεν τὰς ἐργασίας, τὰς ὁποίας ἐκτελεῖ τὸ αἷμα, ως ἔξῆς:

α') Μεταφέρει τὰς θρεπτικὰς ούσιας καὶ τὰς διαμοιράζει εἰς τοὺς ιστούς.

β') Μεταφέρει τὸ διξυγόνον εἰς τοὺς ιστούς.

γ') Ἀποκομίζει τὰς ἀχρήστους ούσιας, αἱ ὁποῖαι παράγονται κατὰ τὰς καύσεις. Ἐκ τῶν ούσιῶν τούτων τὸ μὲν ἀέριον διοξείδιον τοῦ ἄνθρακος τὸ ἀποδίδει διὰ τῶν πνευμόνων, τὰς δὲ λοιπὰς διὰ τῶν νεφρῶν.

δ') Καταπολεμεῖ τὰ μικρόβια διὰ τῶν λευκοκυττάρων του.

Πλὴν τῶν ἀνωτέρω, τὸ αἷμα ἐκτελεῖ καὶ ἄλλας ἐργασίας. Μεταφέρει π.χ. τὰς όρμονας, ὥρισμένας δηλ. ούσιας ἀπαραιτήτους διὰ τὴν λειτουργίαν τοῦ ὄργανισμοῦ, αἱ ὁποῖαι παράγονται ὑπὸ

εἰδικῶν ἀδένων. Τέλος, διὰ τῆς κυκλοφορίας του συντελεῖ τὸ αἷμα καὶ εἰς τὴν όμοιόμορφον κατανομήν τῆς θερμότητος εἰς τὸ σῶμα.

6. Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ

‘Η ἀδιάκοπος ροὴ τοῦ αἵματος ἐντὸς τῶν ἀγγείων, ἀκόμη καὶ ἀντιθέτως πρὸς τὴν διεύθυνσιν τῆς βαρύτητος, ἔξασφαλίζεται διὰ τῶν ρυθμικῶν συστολῶν καὶ διαστολῶν τῆς καρδίας.

Εἰς τὰς κινήσεις αὐτὰς διακρίνομεν δύο χρόνους. Κατὰ τὸν πρῶτον χρόνον διαστέλλονται αἱ κοιλίαι καὶ δέχονται τὸ αἷμα ἐκ τῶν κόλπων. Πρὸς τοῦτο ὀλίγον συμβάλλει καὶ ἡ συστολὴ τῶν κόλπων.

Κατὰ τὸν δεύτερον χρόνον συστέλλονται αἱ κοιλίαι καὶ ὀθοῦν τὸ αἷμα πρὸς τὴν ἀρτηρίαν (ἢ ἀριστερὰ κοιλία) καὶ πρὸς τὴν πνευμονικήν ἀρτηρίαν (ἢ δεξιὰ κοιλία) καὶ ἐνῷ συγχρόνως εἰς τοὺς κενωθέντας κόλπους εἰσέρχεται νέον αἷμα ἀπὸ τὰς φλέβας.

‘Ἀκολουθῇ μία στιγμὴ ἡρεμίας καὶ μετ’ αὐτὴν ἐπαναλαμβάνονται αἱ ἴδιαι κινήσεις τῆς καρδίας κ.ο.κ. ’Απὸ τὰς κοιλίας τὸ αἷμα δὲν δύναται νὰ ἐπιστρέψῃ εἰς τοὺς κόλπους, διότι ἐμποδίζεται ὑπὸ τῶν κολποκοιλιακῶν βαλβίδων. Μία διαστολὴ τῶν κοιλιῶν, μία συστολὴ τούτων καὶ μία παῦλα ἀποτελοῦν ἔνα καρδιακὸν παλμόν.

Εἰς πᾶσαν συστολὴν τῆς ἀριστερᾶς κοιλίας ἔξακοντίζεται τὸ αἷμα εἰς τὰς ἀρτηρίας, αἱ ὅποιαι, λόγῳ τῆς ἐλαστικότητός των, ἔξογκοῦνται εἰς τὸ σημεῖον εἰς τὸ ὅποιον ἔρχεται τὸ αἷμα. Κατόπιν παύει ἡ πίεσις καὶ τὰ τοιχώματα τῶν ἀρτηριῶν, λόγῳ τῆς ἐλαστικότητός των, κατέρχονται καὶ πιέζουν τὸ αἷμα, τὸ ὅποιον ὠθεῖται πρὸς τὰ ἐμπρὸς (ἢ ὅπισθιορόμησις εἶναι ἀδύνατος λόγῳ τῶν βαλβίδων). ’Εκεὶ πάλιν ἔξογκοῦνται τὰ τοιχώματα τῶν ἀρτηριῶν, τὰ ὅποια ἐν συνεχείᾳ συστέλλονται. Οὕτω διὰ κυμάτων διατηρεῖται συνεχὴς ἡ ροὴ τοῦ αἵματος. Τὰ κύματα γίνονται αἰσθητὰ εἰς τὰς ἀρτηρίας διὰ τῆς ἀφῆς καὶ λέγονται σφυγμοί. Εἶναι προφανὲς ὅτι οἱ σφυγμοὶ κατὰ λεπτὸν εἶναι ὄσοι καὶ οἱ παλμοὶ (75 περίπου).

‘Η κίνησις τοῦ αἵματος ἐντὸς τῶν ἀγγείων γίνεται μὲ τόσην ταχύτητα, ὥστε τοῦτο νὰ ἐπανέρχεται εἰς τὴν καρδίαν, ἀνὰ 8–9'' ἀπὸ τοὺς πνεύμονας καὶ ἀνὰ 23'' περίπου ἀπὸ τὴν μεγάλην κυκλοφορίαν. Μὲ τὴν ταχύτητα αὐτὴν προφθάνουν οἱ ίστοι τοῦ σώματος νὰ ἀνεφοδιάζωνται ἐπαρκῶς μὲ ὀξυγόνον καὶ νὰ ἀπαλλάσσωνται

άπό τὰς ἀχρήστους οὐσίας. "Οταν οἱ μύες ἐργάζωνται ἐντατικῶς καὶ ἐπομένως αἱ ἀνάγκαι εἰς δξυγόνον εἶναι μεγαλύτεραι, ἡ κυκλοφορία καὶ ἡ ἀναπνοὴ ἐπιταχύνονται (λαχάνιασμα). 'Ἐὰν μ' ὅλα ταῦτα αἱ ἀχρηστοὶ οὐσίαι παραμείνουν εἰς τοὺς μῆς, προκαλεῖται ὁ καὶ μακρυνθοῦν.

7. Η ΛΕΜΦΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΛΕΜΦΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ

Πλὴν τοῦ αἵματος, καὶ ἐν ἄλλῳ ὑποκίτρινον ύγρόν, ἡ λέμφης, κυκλοφορεῖ ἐντὸς ἴδιαιτέρων ἀγγείων, τὰ ὅποια ἐπίσης διακλαδίζονται εἰς ὅλον τὸ σῶμα. Τὰ λέμφητα ἀγγεῖα ταῦτα ἡ γενεῖα βαίνουν παραλλήλως πρὸς τὰς φλέβας, ἡ λέμφης κινεῖται ἐντὸς αὐτῶν βραδέως καὶ κατευθύνεται μόνον πρὸς τὸ κέντρον, δηλ. τὴν καρδίαν.

'Ἐκ τῶν τριχοειδῶν ἀγγείων τοῦ αἵματος ἔξερχεται τὸ πλάσμα, τὸ ὅποιον περιλούει τὰ κύτταρα καὶ προσφέρει εἰς αὐτὰ θρεπτικὰς οὐσίας. Μετὰ τὰς καύσεις καὶ τὴν ἀφομοίωσιν, ἔνα μέρος τοῦ πλάσματος καὶ τῶν προϊόντων τῆς καύσεως παραλαμβάνεται ὑπὸ τῶν αἷμοφόρων ἀγγείων, ἐνῷ τὸ ὑπόλοιπον παραλαμβάνεται ὑπὸ τῶν λεμφοφόρων ἀγγείων καὶ ἀποτελεῖ τὴν λέμφον. Κατὰ τὴν ἐπιστροφήν των τὰ λεμφοφόρα ἀγγεῖα διέρχονται διὰ τῶν λεμφαδένων καὶ λεμφογαγγλίων, ἀπὸ τὰ ὅποια παραλαμβάνουν τὰ λεμφοκύτταρα. 'Εκεī γίνεται ἐπίσης κατακράτησις γηρασμένων λεμφοκυττάρων καὶ ξένων σωματίων παραγόντων μολύνσεως.

Τελικῶς τὰ ἀγγεῖα ἐνώνονται εἰς ἔνα μεγαλύτερον ἀγγεῖον, καλούμενον θωρακικὸν πόρον, τὸ ὅποιον χύνεται εἰς τὴν ἄνω κοιλῆν φλέβα. "Ωστε ἡ λέμφης κινεῖται ἐντὸς τῶν λεμφαγγείων μόνον ἀπὸ τὴν περιφέρειαν πρὸς τὸ κέντρον καὶ διὰ τοῦ θωρακικοῦ πόρου χύνεται εἰς τὸ κυκλοφοροῦν αἷμα.

Οὕτως εἰσάγονται εἰς τὸ αἷμα νέα λεμφοκύτταρα. Προσέτι τὰ λεμφοφόρα ἀγγεῖα παραλαμβάνουν ἀπὸ τὸ τοίχωμα τοῦ ἐντέρου τὰ λίπη καὶ, χωρὶς νὰ διέλθουν ἀπὸ τὸ ἡπαρ, τὰ φέρουν εἰς τὴν κυκλοφορίαν. Αὔτῃ ἡ λέμφης τοῦ ἐντέρου εἶναι δύο περίπου λίτρα κατὰ είκοσιτετράωρον.

8. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΩΝ

‘Ως ειδομεν ἀνωτέρω, τὰ λεμφοκύτταρα παράγονται εἰς τοὺς λεμφατίδες. Τὰ ἄλλα λευκὰ αἷμασφαίρια, καθὼς καὶ τὰ ἐρυθρά, παράγονται κυρίως εἰς τὸν μυελόν των ὀστών. Κατὰ τὴν νεαρὰν ἡλικίαν, καθὼς καὶ τὴν ἐμβρυϊκήν, ἐρυθρὰ αἷμασφαίρια παράγονται ἐπίσης εἰς τὸν σπλήναν καὶ τὸ ξηπάρ.

‘Ο σπλήν **ἔχει** διαστάσεις περίπου $12 \times 8 \times 3$ ἑκ. καὶ βάρος 150 – 300 γραμμαρίων. Εύρισκεται ὅπισθεν τοῦ στομάχου καὶ ἀνωθεν τοῦ ἀριστεροῦ νεφροῦ. ‘Ο σπλήν εἶναι ἐπίσης δεξαμενὴ αἷματος, τὸ ὅποιον ἀποδίδεται εἰς ὥραν ἀνάγκης.

Τὰ αἷμασφαίρια διακρῶς φθείρονται. Συχνὰ π.χ. καταστρέφονται λεμφοκύτταρα εἰς τὸν ἀγῶνα των κατὰ τῶν μικροβίων. Τὸ πλασμώδιον τῆς ἐλονοσίας καὶ ἄλλα μικρόβια καταστρέφονται τὰ ἐρυθρὰ αἷμασφαίρια. Ἐκτὸς ὅμως τῶν τοιούτων περιπτώσεων, τὰ αἷμασφαίρια καταστρέφονται καὶ φυσιολογικῶς, ὅταν φθάνουν εἰς ὀρισμένην ἡλικίαν. ‘Η ἡλικία αὕτη εἶναι π.χ. διὰ τὰ ἐρυθρὰ αἷμασφαίρια 3–8 ἔβδομάδες. ‘Η καταστροφὴ τῶν αἷμασφαιρίων γίνεται κυρίως εἰς τὸν σπλήναν καὶ εἰς τὸ ξηπάρ.

Τὰ φθειρόμενα αἷμασφαίρια ἀντικαθίστανται ἀπὸ ἄλλα σχηματιζόμενα εἰς τὰ προαναφερθέντα αἵμοποιητικὰ ὅργανα, δηλ. κυρίως τὸν μυελὸν τῶν ὀστῶν καὶ τοὺς λεμφικούς ἀδένας.

9. ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ

Τὸ αἷμα, ἀποτελούμενον ἀπὸ τὸ πλάσμα καὶ τὰ αἷμασφαίρια (ἐρυθρὰ καὶ λευκά), διατρέχει δύο κυκλοφορίας α'). Μεγάλη κυκλοφορία: ἀπὸ τὴν ἀριστερὰν κοιλίαν διὰ τῆς ἀροτῆς εἰς τοὺς ιστούς τοῦ σώματος (τρεῖς δρόμοι!) καὶ ἐπιστροφὴ διὰ τῆς ἄνω καὶ κάτω κοιλης φλεβός εἰς τὸν δεξιὸν κόλπον καὶ β') καὶ μικρά κυκλοφορία: ἀπὸ τὴν δεξιὰν κοιλίαν διὰ τῆς πνευμονικῆς ἀρτηρίας εἰς τοὺς πνεύμονας καὶ ἐπιστροφὴ, διὰ τῶν τεσσάρων πνευμονικῶν φλεβῶν, εἰς τὸν ἀριστερὸν κόλπον.

Ἐντὸς ιδιαιτέρων ἀγγείων, τὰ ὄποια κατευθύνονται μόνον πρὸς τὸ κέντρον καὶ ἀπολήγουν εἰς τὰ αἱμοφόρα, κυκλοφορεῖ καὶ ἡ λέμφος. Αὗτη περιλούει ἐπίσης καὶ ὅλα τὰ κύτταρα τῶν ιστῶν.

10. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1) Παρατήρησε εις πηγμένον αἷμα ζώου τὸν πλακοῦντα καὶ τὸν δρρόν.

2) Μέτρησε τοὺς σφυγμούς σου ἐν τὴρεμίᾳ καὶ ἔπειτα ἀπὸ ἔντονον μυϊκήν ἐργασίαν.

3) Ὁ σφυγμὸς μετρεῖται διὰ πιέσεως μιᾶς ἀρτηρίας (οὐχι φλεβός). Διὰ νὰ γίνῃ αἰσθητός, πρέπει ἡ ἀρτηρία αὕτη νὰ εύρισκεται πλησίον τῆς ἐπιφανείας τοῦ δέρματος. Δοκίμασε τοῦτο εἰς τὸν καρπὸν καὶ εἰς τὸν λαιμόν.

4) Ἡ ὄρθια στάσις τοῦ ἀνθρώπου καθιστᾷ δυσκολωτέραν ἢ εύκολωτέραν τὴν λειτουργίαν τῆς καρδίας καὶ τῶν ἀγγείων ἀπὸ τῶν λοιπῶν θηλαστικῶν καὶ διατί;

5) Ἡ κίνησις τοῦ αἵματος ἐντὸς τῶν φλεβῶν πρὸς τὴν καρδίαν ὑποβοηθεῖται σημαντικῶς καὶ ἀπὸ τὴν πίεσιν, τὴν ὅποιαν ἀσκοῦν ἐπ' αὐτῶν οἱ μύες. Π.χ. ἡ βάδισις ὑποβοηθεῖ τὰς φλέβας τῶν κάτω ἄκρων, αἱ δόποιαι πρέπει ν' ἀναβιβάσουν τὸ αἷμα μέχρι τοῦ ὕψους τῆς καρδίας. Ἀντιθέτως, ἡ ὄρθοστασία ἢ ἡ βραδυτάτη βάδισις προκαλοῦν στάσιν τοῦ αἵματος εἰς τὰς φλέβας τῶν κάτω ἄκρων καὶ ἐπιφέρουν κούρασιν.


ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΝΑΤΟΝ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΙΣ
ΤΗΣ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΟΣ


Ο κορμός περιλαμβάνει δύο μεγάλας κοιλότητας, τήν θωρακικήν και τήν κοιλιακήν, ἐντὸς τῶν ὅποιων εύρισκονται τὰ σπλάγχνα (εἰκ. 34, 35).

Η θωρακικὴ κοιλότης περικλείεται ἀπὸ τὰς πλευρὰς καὶ χωρίζεται ἀπὸ τὴν κοιλιακήν δι' ἐνὸς μυϊκοῦ πετάλου, τοῦ διαφράγματος. Εἰς τὴν κοιλότητα ταύτην περιέχονται οἱ πνεύμονες, ἡ καρδία καὶ ὁ οἰσοφάγος. Εἰς διπλοῦς ὑμήν, ὁ πετάλου του ἐπενδύει τὰ θωρακικὰ τοιχώματα, διὰ τοῦ ἄλλου δὲ καλύπτει τὴν ἐπιφάνειαν τῶν πνευμόνων. Μεταξὺ τῶν δύο πετάλων τοῦ ὑπεζωκότος ὑπάρχει ἔν ύγρον, τὸ ὅποιον ἐμποδίζει τὴν τριβὴν τῶν πνευμόνων ἐπὶ τῶν τοιχωμάτων. Η καρδία δὲν περιβάλλεται ὑπὸ τοῦ ὑπεζωκότος, ἀλλ' ὑπὸ ιδιαιτέρου ὑμένος, τοῦ περικαρδίου.

Η κοιλιακὴ κοιλότης περιλαμβάνεται μεταξὺ τοῦ διαφράγματος, τῆς λεκάνης καὶ τῶν κοιλιακῶν τοιχωμάτων. Ἐντὸς αὐτῆς συναντῶνται



Εἰκ. 34. Σχηματικὴ παράστασις τῆς θωρακικῆς καὶ κοιλιακῆς κοιλότητος. 1. Έγκέφαλος.—2. Παρεγκεφαλίς.—3. Προμήκης.—4. Λάρυγξ.—5. Φάρυγξ.—6. Πνεύμονες.—7. Καρδία.—8. Στέρνον.—9. Διάφραγμα.—10. Ήπαρ.—11. Στόμαχος.—12. Σπλάνχνη.—13. Νεφρός.—14. Τόπεντλουν.—15. Μεσοντέριον.—16. Τομή τοῦ λεπτοῦ έντερου.—17. Ούρητήρ.—18. Τομή τοῦ παχέος έντερου.—19. Κύστις.



Εἰκ. 35. Ἡ θωρακική και ἡ κοιλιακή κοιλότης. 1. Πνεύμονες.—2. Καρδία.—3. Θυρεοειδής χόνδρος.—4. Θυρεοειδής ἀδήνη.—5. Τραχεῖα.—6. Διάφραγμα.—7. Στόμαχος.—8. Σπλήν.—9. Ήπαρ.—10. Χοληδόχος κύστις.—11, 12, 13. Παχύ ἔντερον.—14. Σκωληκοειδής ἀπόφυσις τοῦ παχέος ἔντερου.—15. Ούροδόχος κύστις.—16. Λεπτόν ἔντερον.

δ στόμαχος, τὸ ήπαρ, τὸ πάγκρεας, ὁ σπλήν, τὸ ἔντερον, οἱ νεφροὶ καὶ τὸ γεννητικὸν σύστημα. Τὰ σπλάγχνα, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ πάγκρεας, τοὺς νεφροὺς καὶ τὸ γεννητικὸν σύστημα, περιβόλλονται ἀπὸ ἕνα ὑμένα, καλούμενον περιτόναιον. Τοῦτο δίδει δύο πέταλα, ἐκ τῶν δποίων τὸ ἔξωτερικὸν ἐπενδύει τὰ τοιχώματα τῆς κοιλιακῆς κοιλότητος. Τὸ περιτόναιον σχηματίζει προσέτι τὸ μεσεντέριον, τὸ δποίον συγκρατεῖ τὸ ἔντερον. Τέλος τὸ ἐπιπλον καλύπτει τὴν προσθίαν ἐπιφάνειαν τῆς ὅλης μάζης τῶν ἔντερων ὡς μία ποδιά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΚΑΤΟΝ

ΑΙ ΕΚΚΡΙΣΕΙΣ

1. ΑΔΕΝΕΣ. ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

’**Αδένες** καλοῦνται ώρισμένα ὄργανα τοῦ σώματος, τὰ ὅποια παρασκευάζουν, μέσα εἰς τὰ κύτταρά των, ώρισμένας ούσιας, τὰς ὅποιας ἀποδίδουν εἰς τὸν ὄργανισμόν. Μέχρι τώρα ἐγνωρίσαμεν, τοὺς σιαλογόνους καὶ ἄλλους ἀδένας τοῦ πεπτικοῦ συστήματος (πάγκρεας, ἀδένας τοῦ στομάχου κλπ.). ’Ολοι αὐτοὶ ἀποδίδουν τὰς ούσιας τὰς ὅποιας παράγουν, δι’ ἐνὸς ἐκφορητικοῦ ἀγωγοῦ, εἰς τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ πεπτικοῦ σωλῆνος. ’Αργότερον θὰ γνωρίσωμεν καὶ ἀδένας, τῶν ὅποίων τὰ ἐκκρίματά ἀποδίδονται εἰς τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ δέρματος (ἰδρωτοποιοὶ κλπ.).

’Υπάρχουν ὅμως καὶ ἀδένες στερούμενοι ἐκφορητικοῦ ἀγωγοῦ, τῶν ὅποίων τὸ ἐκκρίμα παραλαμβάνεται ὑπὸ τοῦ αἷματος. Οὗτοι καλοῦνται ἐνδοκρινεῖς ἢ ἐσωτερικές ἀδένες, τὰ δὲ ἐκκρίματά των ὁρμόνας.


Κάθε ἐνδοκρινής ἀδήνη παράγει, εἰς ἐλαχίστας ποσότητας, ώρισμένας ὄρμόνας, αἱ ὅποιαι εἶναι ούσιαι ἀπαραίτητοι διὰ τὴν κανονικὴν λειτουργίαν τοῦ ὄργανισμοῦ. ’Εκάστη ὄρμόνη ἔχει τὴν ἴδιότητα νὰ ἔνισχύῃ ἢ νὰ ἔξασθενῃ ώρισμένην λειτουργίαν ἢ ώρισμένα ὄργανα, ὡστε ὅλαι μαζὶ αἱ ὄρμόναι ρυθμίζουν τὴν λειτουργίαν καὶ ἀνάπτυξιν ὀλοκλήρου τοῦ ὄργανισμοῦ.

’Εὰν ἔνας ἐνδοκρινής ἀδήνη ὑπολειτουργῇ ἢ ὑπερλειτουργῇ, παρουσιάζονται διάφοροι παθήσεις.

’Η ἐκκρισις ἐκάστης ὄρμόνης ἐπηρεάζεται ἀπὸ τὰς ὄρμόνας ἄλλων ἀδένων, ὡστε ὅλοι οἱ ἐνδοκρινεῖς ἀδένες εύρισκονται εἰς στενὴν συνεργασίαν καὶ λειτουργικὴν ἀλληλεξάρτησιν. Δι’ αὐτὸν ὅταν πάσχῃ ἔνας ἀδήνη συμπάσχουν καὶ οἱ ἄλλοι.

Μερικοὶ ἀδένες εἶναι συγχρόνως ἐνδοκρινεῖς καὶ ἔξωκρινεῖς. Τὸ πάγκρεας π.χ. δὲν παράγει μόνον τὸ παγκρεατικὸν ὑγρόν, τὸ ὄποιον χύνεται εἰς τὸ ἔντερον, ἀλλὰ προσέτι παράγει καὶ μίαν ὄρμόνην, ἡ ὅποια χύνεται εἰς τὸ αἷμα. ’Η ὄρμόνη αὕτη, καλούμενη

În seoul în nă, există o răsuflare a căreia intensitate variază de la unul la altul. Această răsuflare este cunoscută sub numele de "răsuflare a sănătății". În unele cazuri, ea poate fi provocată de o boală sau de un accident vascular cerebral. În altele, poate fi provocată de o boală sau de un accident vascular cerebral.



Eik. 36. Schematică parastatică a sistemelor endocrină și neuroendocrină. În seoul în nă, există o răsuflare a căreia intensitate variază de la unul la altul. Această răsuflare este cunoscută sub numele de "răsuflare a sănătății". În unele cazuri, ea poate fi provocată de o boală sau de un accident vascular cerebral. În altele, poate fi provocată de o boală sau de un accident vascular cerebral.

2 ΑΔΕΝΕΣ ΕΣΩ ΕΚΚΡΙΣΕΩΣ

Ένδοκρινεῖς ἀδένες είναι οἱ έξῆς κυρίως (εἰκ. 36):

α') **Ο θυρεοειδής ἀδήνη.** Ούτος εύρισκεται δίλιγον κάτωθεν τῆς προσθίας ἐπιφανείας του θυρεοειδοῦς χόνδρου. Έκκρινει ήμερησίως ἐν ἑκατοστὸν του γραμμαρίου θυροξίνης. Η ύπερλειτουργία του ἀδένος τούτου προκαλεῖ τὴν ἐμφάνισιν τῆς λεγομένης νόσου τοῦ Basse de l'œil. Έξωτερικὰ συμπτώματα χαρακτηριστικὰ τῆς νόσου είναι ή ἔξωφθαλμία, ή βρογχοκήλη και ή ταχυκαρδία. Η νόσος αὕτη προκαλεῖ νευρικότητα και έξαντλησιν του ἀσθενοῦς. Αντιστρόφως ή ύπολειτουργία του θυρεοειδοῦς προκαλεῖ πτῶσιν τῆς θερμοκρασίας, βραδύτητα εἰς τὰς λειτουργίας του ὄργανου και σταμάτημα τῆς ἀναπτύξεως, τόσον τῆς σωματικῆς ὥσον και τῆς πνευματικῆς. Κρετινίσμὸς (εἰκ. 37) είναι μία ἀσθένεια, τῆς διποίας ἐν τῶν αἰτίων θεωρεῖται ή ύπολειτουργία του θυρεοειδοῦς ἀδένος.



Εικ. 37. Κακή άναπτυξίς λόγω κρετινισμοῦ.

νεαράν ήλικίαν είναι άπαραίτητος διὰ τὴν κανονικήν άνάπτυξιν τοῦ σώματος. Κατὰ τὴν ὥριμον, τέλος, ήλικίαν, ὅταν ἡ άνάπτυξις ἔχῃ συντελεσθῆ, ὁ θύμος συρρικνοῦται καὶ ἔξαφανίζεται.

ε') **Η ἐπίφυσις.** Αὕτη εύρισκεται εἰς τὸν ἐγκέφαλον καὶ κατὰ τὴν νεαράν ήλικίαν συνεργάζεται μὲ τὸν θύμον. Μετὰ τὸ δέκατον ἔτος ἔκφυλίζεται βαθμιαίως.

ζ') Εἰς τὸν ἐγκέφαλον ἐπίστης εύρισκεται ἡ **ὑπόφυσις**, ἡ ὅποια συντελεῖ εἰς τὴν ρύθμισιν τῆς άναπτύξεως τοῦ σώματος, τῆς ἀνταλλαγῆς τῆς ὕλης καὶ τῆς ὥριμάνσεως τῶν γεννητικῶν ἀδένων. Εἶναι ὁ σπουδαιότερος τῶν ἐνδοκρινῶν ἀδένων, διότι δι' αὐτοῦ ρυθμίζεται ἡ κανονικὴ λειτουργία τῶν λοιπῶν ἀδένων. Αἱ παραγόμεναι ὑπὸ αὐτῆς ὄρμόναι είναι πιολλαί.

3. ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ

Διακρίνομεν ἀδένας ἐν δοκρινεῖς, οἱ ὅποιοι παράγουν ὄρμόνας, τὰς ὅποιας παραλαμβάνει τὸ αἷμα, καὶ ἀδένας ἐξ ὡκρινεῖς. Οἱ ἔξωκρινεῖς ἀποδίδουν τὰραχὴ τῆς λειτουργίας τῶν ἐνδοκρινῶν ἀδένων προκαλεῖ σαβαράς ἀνωμαλίας εἰς τὴν άναπτυξιν καὶ λειτουργίαν τοῦ ὄργανισμοῦ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΝΔΕΚΑΤΟΝ

ΤΟ ΝΕΥΡΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ

1. ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΑ. ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ. ΤΑ ΝΕΥΡΑ. ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Η ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ


Εις τὸν ἔξωτερικὸν κέσμον διαρκῶς συμβαίνουν διάφοροι παροδικαὶ μεταβολαῖ. Π.χ. διάφορα ἀντικείμενα κινοῦνται, ἀλλάσσει ὁ φωτισμὸς ἢ ἡ θερμοκρασία, τὸ σῶμά μας ψαύει διάφορα ἀντικείμενα κ.ο.κ. Προσέτι καὶ ἐντὸς τοῦ σώματός μας συμβαίνουν τοιαῦται μεταβολαῖ, ὡς π.χ. μετακινήσεις τῶν σπλάγχνων κ.ἄ.

“Ολαι αὐταὶ αἱ μεταβολαὶ ἐπιδροῦν ἐπὶ εἰδικῶν κυττάρων τοῦ ὄργανισμοῦ καὶ παράγουν τὰ ἐρεθίσματα. Τὰ κύτταρα αὗτά, τὰ ὅποια δέχονται τὰ ἐρεθίσματα, καλοῦνται αἱ σθητικὰ κύτταρα καὶ ἀνήκουν εἰς ἓν σύστημα ὄργάνων, τὸ ὅποιον καλεῖται νευρικὸν σύστημα.

Εἰς τὰ ἐρεθίσματα ἀπαντᾶ δόργανισμὸς μὲ κινήσεις κυρίως, τὰς ὅποιας ἔκτελεῖ κατὰ βούλησιν ἢ καὶ ἀνεξαρτήτως τῆς βουλήσεως. Π.χ. ἂν κινήσωμεν πρὸ τῶν βλεφάρων ἐν ἀντικείμενον, προκαλεῖται ἀκούσιον κλείσιμον τῶν βλεφάρων, ἂν ἐγγίσωμεν ἐν καίον σῶμα, αὐτομάτως τότε ἀποσύρεται τὸ χέρι μας κ.ο.κ. Αἱ ἐνέργειαι αὐταὶ καλοῦνται ἀντιδράσεις εἰς τὰ ἐρεθίσματα.

Αἱ ἀντιδράσεις ρυθμίζονται ἀπὸ τὰ κεντρικὰ τμήματα τοῦ νευρικοῦ συστήματος, ὡς π.χ. εἶναι ὁ ἐγκέφαλος. Εἰς τὰ κεντρικὰ αὐτὰ τμήματα ἔρχονται τὰ ἐρεθίσματα διὰ τῶν νεύρων.

Τὰ νεύρα ὁμοιάζουν πρὸς λεπτὰ λευκὰ νήματα, τὰ ὅποια διακλαδίζονται εἰς ὅλον τὸ σῶμα. “Ἐκαστὸν νεῦρον ἀποτελεῖται ἀπὸ μικρὰς πρωτοπλασματικὰς ἀποφυάδας νευρικὰς ίνας, δηλ. μικρὰς πρωτοπλασματικὰς ἀποφυάδας νευρικῶν κυττάρων. ‘Ἐκάστη νευρικὴ ἵς περιβάλλεται ἀπὸ λευκὸν νευριβλημα, καλούμενον μυελικὴ θήκη. ’Ἐπίσης ὅλον τὸ νεῦρον περιβάλλεται ἀπὸ ἄλλο περιβλημα, τὸ νευρείλημα. Διὰ τῶν περιβάλλεται ἀπὸ ἄλλο περιβλημα, τὸ νευρείλημα. Διὰ τῶν νεύρων συνδέονται τὰ αἰσθητικὰ κύτταρα μὲ τὸ κεντρικὸν νεύρον νεύρων συνδέονται τὰ αἰσθητικὰ κύτταρα μὲ τὸ κεντρικὸν νεύρον



Εικ. 38. Σχηματική τομή διὰ τοῦ ἔγκεφάλου.

η. Ἡμισφαίρια τοῦ ἔγκεφάλου.—γ. Τρίτη κοιλία.—δ. Τετάρτη κοιλία.—πα. Παρεγκεφαλίς.—πι. Προμήκης.—μ. Νωτιαῖος μυελός.—α. Ἔγκεφαλικὰ νεύρα.

ἐδημιούργησεν ἀνθρωπος τὸν πολιτισμόν, δόποιος τόσον τὸν διακρίνει ἀπὸ τὸ ὑπόλοιπον ζωϊκὸν βασίλειον. Πῶς ὅμως τελοῦνται αἱ νοητικαὶ λειτουργίαι εἰς τὸν ἔγκεφαλον, δὲν εἶναι, σήμερον τούλαχιστον, γνωστόν.

‘Ολόκληρον τὸ νευρικὸν σύστημα τοῦ ἀνθρώπου διακρίνεται εἰς τὰ ἔξης τμῆματα: α') τὸ ἐγκεφαλικὸν υπόστημα καὶ β') τὸ φυτικὸν νευρικὸν σύστημα.

2. ΤΟ ΕΓΚΕΦΑΛΟΝΩΤΙΑΙΟΝ ΝΕΥΡΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ

Τοῦτο περιλαμβάνει ἐν κεντρικὸν καὶ ἐν περιφερικὸν τμῆμα:

α') **Τὸ κεντρικὸν τμῆμα.** Τοῦτο ἀποτελεῖται ἀπὸ τὸν ἐγκέφαλον καὶ τὸν νωτιαῖον μυελὸν (εἰκ. 38).

‘Ο ἔγκεφαλος περικλείεται ἐντὸς τοῦ κρανίου, δὲ νωτιαῖος μυελὸς εἶναι συνέχεια τοῦ ἔγκεφάλου καὶ περικλείεται ἐντὸς τοῦ νωτιαίου σωλήνος τῆς σπονδυλικῆς στήλης, φθάνων μέχρι τῶν πρώτων ὀσφυϊκῶν σπονδύλων.

Εἰς τὸν ἔγκεφαλον διακρίνομεν τρία τμῆματα. Οὕτω τὸ πρόσθιον τμῆμά του είναι ὄγκωδες καὶ χωρίζεται μὲν βαθεῖαν πτυχὴν εἰς

ρικὸν σύστημα καὶ τοῦτο μὲ τοὺς μῆνας, οἱ ὅποιοι πραγματοποιοῦν τὰς ἀντιδράσεις εἰς τὰ ἐρεθίσματα.

‘Ωστε διὰ τοῦ νευρικοῦ συστήματος, ὁ ἀνθρωπός λαμβάνει γνῶσιν τῶν μεταβολῶν, αἱ ὅποιαι γίνονται εἰς τὸν ἔξωτερικὸν κόσμον ἥ καὶ εἰς τὸ σῶμά του, καὶ ἀντιδρᾶ εἰς αὐτάς.


‘Ιδιαιτέραν σπουδαιότητα ἔχει τὸ πρόσθιον τμῆμα τοῦ νευρικοῦ συστήματος, ὁ ἐγκέφαλος, διότι εἰς αὐτὸν γίνονται ὅλαι ἐκεῖναι αἱ κατεργασίαι, αἱ ἀπαραίτητοι διὰ τὸν συνειρμὸν τῶν λαμβανομένων παραστάσεων, διὰ τὰς λειτουργίας τῆς νοήσεως καὶ τὴν ἐκδήλωσιν τῶν ψυχικῶν φαινομένων. Διὰ τῆς νοήσεως

διακρίνεται τὸ νευρικὸν σύστημα τοῦ ἀνθρώπου διακρίνεται

δύο μέρη, καλούμενα ἡ μισφαίρη
και τοῦ ἐγκεφάλου. Ἀμέσως μετά
τὰ ἡμισφαίρια συναντῶμεν τὴν
παρεγκεφαλίδα καὶ μετ'
αὐτὴν τὸν προμήκη μυελόν.
Οὗτος φθάνει μέχρι τοῦ ἴνιακοῦ
τρήματος, ἀπὸ τὸ ὅποιον ἀρχεται
ὁ νωτιαῖος μυελός. Εἰς τὸ ἐσωτε-
ρικὸν τοῦ ἐγκεφάλου ὑπάρχει ἔνας
αύλος, ὁ ὅποιος χωρίζεται εἰς διά-
φορα τμήματα, καλούμενα καὶ λί-
λια. Ὁ αύλος οὗτος συνεχί-
ζεται καὶ εἰς τὸν νωτιαῖον μυελόν.
Ὁ ἐγκέφαλος τοῦ ἀνθρώπου πα-
ρουσιάζει πλῆθος ἐλικοειδῶν αὔ-
λων, διὰ τῶν ὅποιών ἐπαυ-
ξάνεται ἡ ἐπιφάνεια του. Τὸ ἔξω-
τερικὸν στρῶμα τοῦ ἐγκεφάλου ἀ-
ποτελεῖται ἀπὸ νευρικὰ κύτταρα
καὶ βραχείας ἀποφυάδας αύτῶν,
λόγω δὲ τοῦ χρώματός του κα-
λεῖται φαίνεσθαι σία. Τὸ ἐσωτε-
ρικὸν ἀντιθέτως ἀποτελεῖται ἀπὸ
τὰς μακρὰς ἀποφυάδας, τὰ δένδρα,
τὰ ὅποια περιβάλλονται ἀπὸ λευ-
κὸν νευρείλημα. Διὰ τοῦτο τὸ
στρῶμα τοῦτο καλεῖται λευκὴ
οὐσία.

Εἰς τὸν νωτιαῖον μυελὸν ἀντι-
θέτως ἡ φαιὰ οὐσία εἶναι εἰς τὸ
κέντρον, περὶ τὸν κεντρικὸν αύλον, ἡ δὲ λευκὴ περιβάλλει τὴν φαιάν.

Διὰ νὰ μὴ προσκρούουν ἐπὶ τῶν ὀστῶν, ὁ ἐγκέφαλος καὶ ὁ νω-
τιαῖος μυελός, περιβάλλονται ἀπὸ τρεῖς ύμένας, οἱ ὅποιοι καλοῦνται
μήνιγγες. Ἡ ἐξωτερικὴ εἶναι ἡ σκληρὰ μήνιγξ, ἡ με-
σαία εἶναι ἡ ἀρχνοειδής, ἡ ὅποια σχηματίζει δύο πέταλα,



Εἰκ. 39. Ἀπομονωμένον περιφ. νευρικὸν
σύστημα καὶ νωτιαῖος μυελός.

καὶ ἡ ἐσωτερικὴ εἶναι ἡ χοριοειδής, ἡ ὅποια φέρει αίμοφόρα ἀγγεῖα.

Ἐντὸς τῶν κοιλιῶν τοῦ ἐγκεφάλου καὶ τοῦ κεντρικοῦ αὐλοῦ καὶ μεταξὺ τῆς ἀραχνοειδοῦς καὶ τῆς χοριοειδοῦς μήνιγγος ὑπάρχει τὸ ἐγκεφαλονωτιαῖον ὑγρόν.

β') **Τὸ περιφερικὸν νευρικὸν σύστημα (ἐγκεφαλικὰ καὶ νωτιαῖα νεῦρα)** (εἰκ. 39). Τοῦτο ἀποτελεῖται ἀπὸ τὰ νεῦρα, τὰ ὁποῖα ἔξερχονται ἀπὸ τὸν ἐγκέφαλον καὶ τὸν νωτιαῖον μυελὸν καὶ διακλαδίζονται εἰς τὸ σῶμα. Τὰ νεῦρα, τὰ ὁποῖα ἔξερχονται ἀπὸ τὸν ἐγκέφαλον, καλοῦνται ἐγκεφαλικὰ καὶ εἶναι δώδεκα ζεύγη, ἑκεῖνα δὲ τὰ ὁποῖα ἔξερχονται ἀπὸ τὸν νωτιαῖον μυελὸν καλοῦνται νωτιαῖα καὶ εἶναι τριάκοντα καὶ ἑννέα ζεύγη. Ἐκ τῶν νεύρων τούτων ὠρισμένα μεταφέρουν τὰ ἐρεθίσματα ἐκ τῶν αἰσθητικῶν κυττάρων εἰς τὸ κεντρικὸν νευρικὸν σύστημα καὶ καλοῦνται αἱ σθητικά, ἀλλὰ δὲ προκαλοῦν τὴν ἀντίδρασιν τῶν μυῶν καὶ καλοῦνται κινητικά. Τέλος, ὑπάρχουν καὶ νεῦρα, τὰ ὁποῖα ἐκτελοῦν καὶ τὰς δύο αὐτὰς λειτουργίας, καλούμενα διὰ τοῦτο μικτά. Τὰ νωτιαῖα νεῦρα εἶναι ὅλα μικτά.

γ') **Ἡ διαδρομὴ τοῦ ἐρεθίσματος.** Τὸ ἐρεθίσμα παράγεται εἰς τὰ αἰσθητικὰ κύτταρα, τὰ ὁποῖα εύρισκονται εἰς τὰ αἰσθητήρια ὅργανα ἢ εἶναι διεσκορπισμένα εἰς τὸ δέρμα. Τὰ νεῦρα, τὰ ὁποῖα ἀπολήγουν εἰς τὰ αἰσθητικὰ αὐτὰ κύτταρα, παραλαμβάνουν τὸ ἐρεθίσμα καὶ τὸ μεταφέρουν εἰς τὸ κεντρικὸν σύστημα. Καὶ τὰ μὲν ἐγκεφαλικὰ νεῦρα μεταφέρουν τὸ ἐρεθίσμα ἀπ' εύθειας εἰς τὸν ἐγκέφαλον, τὰ δὲ νωτιαῖα μεταφέρουν αὐτὸ πρῶτον εἰς τὸν νωτιαῖον μυελόν, ἔξ αὐτοῦ δὲ κατόπιν τὸ ἐρεθίσμα διαβιβάζεται πάλιν εἰς τὸν ἐγκέφαλον. Τοῦτο ὅμως δὲν συμβαίνει πάντοτε. Ὅπαρχουν ἐρεθίσματα, τὰ ὁποῖα, καταφθάνοντα εἰς τὸν νωτιαῖον μυελὸν ἢ ἔνα κέντρον τοῦ ἐγκεφάλου, διαβιβάζονται ἀμέσως ἔξ αὐτῶν διὰ τῶν κινητηρίων νεύρων εἰς περιφερικὸν ἐκτελεστικὸν ὅργανον (μῆς, ἀδένας). Αἱ προκαλούμεναι οὕτω κινήσεις καλοῦνται ἀντανακλαστικῶς πλέον (κολύμβησις, βόδισις, παιίσιμον ὄργάνων κλπ.).

Εἰς τὸν ἐγκέφαλον, ὅπου καταφθάνουν τὰ διάφορα ἐρεθίσματα,


δημιουργοῦνται αἱ ἐντυπώσεις ἐκ τοῦ ἔξωτερικοῦ κόσμου, συνδυάζονται αὗται καὶ γενικῶς τελεῖται ἡ λειτουργία τῆς σκέψεως. Τέλος, γεννᾶται ἡ ἀντίδρασις εἰς τὰ ἐρεθίσματα, ἡ ὅποια ρυθμίζεται ὑπὸ τῶν κινητικῶν καὶ μικτῶν νεύρων. Ταῦτα ἀπολήγουν εἰς τοὺς γραμμωτοὺς μῆς, τῶν ὅποιων τοιουτοτρόπως αἱ κινήσεις διέπονται ὑπὸ τῆς βουλήσεως.

Εἰς τὸν φλοιὸν τοῦ ἐγκεφάλου εύρισκονται τὰ κέντρα τῶν ἐνσυνειδήτων καὶ ψυχικῶν φαινομένων (παραστάσεις, μνήμη, σκέψις, βιούλησις). Εἰς τὴν παρεγκεφαλίδα εύρισκονται τὰ κέντρα τῆς ἰσορροπίας καὶ τῆς κινητικότητος. Εἰς τὸν προμήκη μυελὸν τέλος εὐρίσκονται τὰ κέντρα τῆς ἀναπνοῆς καὶ τῆς κυκλοφορίας καὶ τὰ ἀντανακλαστικὰ κέντρα τοῦ βηχός, τοῦ πταρμοῦ, τῆς συγκλίσεως τῶν βλεφάρων, τῆς ἐκκρίσεως τῶν δακρύων, τῆς καταπόσεως, τοῦ θηλασμοῦ (εἰς τὰ βρέφη), τῆς ἐκκρίσεως τοῦ σιάλου, τοῦ ἐμέτου καὶ ἄλλα.

3. ΤΟ ΦΥΤΙΚΟΝ ΝΕΥΡΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ

α') Τὸ συμπαθητικόν. Τοῦτο ἀποτελεῖται ἀπὸ τοῦ νεύρα, τὰ ὅποια ἀρχίζουν ἀπὸ τὸν ἐγκέφαλον καὶ τὸν νωτιαῖον μυελὸν καὶ ἀπολήγουν εἰς τοὺς λείους μῆς τῶν σπλάγχνων, τῶν ἀγγείων, τῶν ἀδένων, τῆς καρδίας κτλ. Πριν ὅμως φθάσουν εἰς αὐτούς, διακόπτονται εἰς τὰ συμπαθητικὰ γάγγλια, ἀπὸ τὰ ὅποια ἄρχονται νέα νεύρα, διὰ τῶν ὅποιων αἱ διεγέρσεις φέρονται εἰς τὰ ὄργανα τῆς φυτικῆς ζωῆς. Ἐκατέρωθεν τῆς γανακής φυτικῆς ζωῆς, 22-23 σπονδυλικῆς στήλης ὑπάρχουν τὰ 22-23 παρασπονδυλικὰ γάγγλια, τὰ ὅποια συνδέονται καταλλήλως μεταξύ των διὰ νεύρων καὶ ἀποτελοῦν τὰ συμπαθητικὰ στερεῶν καὶ ἀποτελοῦν τὰ συμπαθητικὰ στελέχη (εἰκ. 40). Ολίγα ἐν τούτοις συμπαθητικὰ γάγγλια δὲν περιλαμβάνονται εἰς τὰς σειρὰς αὐτὰς καὶ εύρισκονται μακρότερον εἰς ὥρισμένα μέρη τῆς κοιλίας.

“Ωστε τὸ συμπαθητικὸν συνδέεται μὲ τὸ



Εἰκ. 40. Σχῆμα τῶν συμπαθητικῶν γαγγλίων. — v.v. Νωτιαῖον νεύρον. — γ. Συμπαθητικὰ γάγγλια. — S. Σπονδυλικὴ στήλη.

κεντρικὸν νευρικὸν σύστημα στενῶς.

β') **Τὸ παρασυμπαθητικόν.** Τὰ γάγγλια τοῦ παρασυμπαθητικοῦ νευρικοῦ συστήματος εύρισκονται ἐγγὺς τῶν δργάνων τῶν νευρουμένων ὑπ' αὐτῶν καὶ διὰ τοῦτο αἱ ἀντιδράσεις τούτων εἰναι ἐντοπισμέναι, ἐνῷ τῶν συμπαθητικῶν εἰναι ἐκτεταμέναι.

Τὰ νεῦρα τοῦ παρασυμπαθητικοῦ συστήματος ἀρχίζουν ἀπὸ τὸν ἐγκέφαλον καὶ ἀπὸ τὸ κάτω ἄκρον τοῦ νωτιαίου μυελοῦ. Μὲ τὰ νεῦρα αὐτὰ τοῦ παρασυμπαθητικοῦ συστήματος συνεργάζεται καὶ ἐν ἐγκεφαλικὸν νεῦρον, τὸ πνευμονικόν τικόν, τὸ δόποιον διακλαδίζεται εἰς τὸν θώρακα, τὸν στόμαχον κλπ. Δι' αὐτὸν καλεῖται τοῦτο καὶ παρασυμπαθητικὸν νεῦρον. Ἀλλὰ καὶ ἄλλα ἐγκεφαλικὰ νεῦρα περιλαμβάνουν καὶ παρασυμπαθητικὰς ἴνας.

Τὰ συμπαθητικὰ καὶ παρασυμπαθητικὰ νεῦρα ρυθμίζουν τὰς κινήσεις τῶν σπλάγχνων καὶ ἀνταγωνίζονται πρὸς ἄλληλα. Π.χ. ἐνῷ τὰ συμπαθητικὰ νεῦρα ἐπιταχύνουν τὰς κινήσεις τῆς καρδίας καὶ ἐπιβραδύνουν τὰς κινήσεις τοῦ ἐντέρου, ἀντιθέτως τὰ παρασυμπαθητικὰ ἐπιβραδύνουν τὰς κινήσεις τῆς καρδίας καὶ ἐπιταχύνουν τὰς κινήσεις τοῦ ἐντέρου. Διὰ τοῦ ἀνταγωνισμοῦ τούτου ἔξασφαλίζεται ἡ ἀναγκαία ἰσορροπία διὰ τὴν κανονικὴν λειτουργίαν τῶν σπλάγχνων.

Τὰ συμπαθητικὰ καὶ παρασυμπαθητικὰ νεῦρα λαμβάνουν τὰς διεγέρσεις ἀπὸ τὰ γάγγλια καὶ διὰ τοῦτο δροῦν ἀνεξαρτήτως τῆς βουλήσεως. Διὰ τὸν λόγον αὐτὸν αἱ κινήσεις τῶν λείων μυῶν καὶ τῆς καρδίας γίνονται ἀσυναισθήτως. Ἐν τούτοις ὅμως, ἐπειδὴ τὰ νεῦρα αὐτὰ συνδέονται, ὡς εἴδομεν, καὶ μὲ τὸν ἐγκέφαλον, σύμβασιν ὥστε νὰ συνδυάζωνται, νὰ συντονίζωνται, ὡς λέγουν, αἱ κινήσεις τῶν λείων μυῶν καὶ σπλάγχνων, καθὼς καὶ τῶν μυῶν τῆς καρδίας, μὲ τὰς κινήσεις τῶν γραμμωτῶν μυῶν. Οὕτω λ.χ., ὅταν διὰ τῆς βουλήσεως θέτῃ τις εἰς ἐντατικὴν ἐργασίαν τοὺς γραμμωτοὺς μῆτον σώματος (δρόμος, ἐργασία κλπ.), τότε καὶ ἡ καρδία καὶ τὰ ἀναπνευστικὰ ὅργανα ἐργάζονται ἐντατικώτερον, ἃν καὶ νευροῦνται ἀπὸ τὸ συμπαθητικὸν καὶ παρασυμπαθητικὸν νευρικὸν σύστημα.

4. Ο ΥΠΝΟΣ

‘Ο ὑπνος εἰναι μία κατάστασις, εἰς τὴν ὅποιαν διέρχεται ὁ ἄνθρωπος τὸ ἐν τρίτον καὶ πλέον τῆς ζωῆς του. Κατὰ μέσον ὄρου, τὸ βρέφος κοιμᾶται κατὰ τὸ πρῶτον ἔτος τῆς ζωῆς του ἐπὶ 18 ὥρας

τὸ εἰκοσιτετράωρον, τὸ παιδίον κατὰ τὸ 2ον—5ον ἔτος κοιμᾶται ἐπὶ 14 ὥρας, κατὰ τὸ 5ον—6ον ἔτος ἐπὶ 12 ὥρας καὶ κατὰ τὸ 7ον—14ον ἔτος ἐπὶ 10 ὥρας. Κατὰ τὴν ἐφηβικὴν καὶ ὡριμὸν ἡλικίαν συνήθως ἔτος ἐπὶ 10 ὥρας. Κατὰ τὸ γῆρας αἱ ὥραι τοῦ ὑπνου ἀναγνωρίζονται διὰ τὸν ὑπνον 8 ὥραι. Κατὰ τὸ γῆρας αἱ ὥραι τοῦ ὑπνου ἐλαττούνται περισσότερον.

Κατὰ τὸν ὑπνον οἱ μύες, οἱ ἔξαρτώμενοι ἐκ τῆς βουλήσεως γενικῶς, δὲν ἐργάζονται, καθ' ὃσον δὲν διαβιβάζονται εἰς αὐτοὺς ἐκ τοῦ ἐγκεφάλου ἐρεθίσματα. Οἱ μύες τῶν σπλάγχνων ὅμως, καθὼς καὶ μερικοὶ ἄλλοι (ὡς οἱ κλείοντες τὰ βλέφαρα), συνεχίζουν τὴν ἐργασίαν των. Εἰς τινα ζῶα μάλιστα κατὰ τὸν ὑπνον ἐργάζονται πλεῖστοι μύες, ως οἱ τῶν ποδῶν εἰς τὰ ζῶα τὰ κοιμώμενα ὅρθια (ἴππος κλπ.). Ἡ κρατούμενα ἐπὶ κλάδων (πτηνὰ κλπ.).

Οἱ ἐρεθισμοὶ ἐπὶ τοῦ ὄργανισμοῦ εἶναι κατὰ τὸν ὑπνον περιωρισμένοι, διότι τὰ βλέφαρα εἶναι κλειστά, ὁ τόπος συνήθως ἡσυχος καὶ τὸ προσοχὴ δὲν διεγείρεται πλέον ἀπὸ τὸ περιβάλλον. Ἀλλὰ καὶ τὰ ἐρεθίσματα, τὰ ὅποια παρ' ὅλα αὐτὰ τυχὸν παράγονται, δὲν δημιουργοῦν ἐντυπώσεις εἰς τὸν ἐγκέφαλον, παρὰ μόνον ἂν εἶναι, ἀναλόγως καὶ τῆς βαθύτητος τοῦ ὑπνου, ἀρκετὰ ἔντονα. Ἀκριβῶς τοῦτο χαρακτηρίζει τὸν ὑπνον, ὅτι ὁ ἐγκέφαλος ἐν μέρει ἀδρανεῖ καὶ δὲν ἐπεξεργάζεται τὰ ἐρεθίσματα, τὰ ὅποια τυχὸν καταφθάνουν εἰς αὐτόν. Οὕτως ὁ ὑπνος ἐπιφέρει τὴν ἀνάπτασιν τοῦ ἐγκεφάλου καὶ γενικῶς τοῦ νευρικοῦ συστήματος.

Οἱ ἐπαρκῆς ὑπνος εἶναι ἀπαραίτητος διὰ τὸν ὄργανισμόν, ἡ δὲ στέρησις αὐτοῦ εἶναι βλαβερά. Πειραματικῶς παρετηρήθη ἐπὶ ζώων, ὅτι ἡ στέρησις τοῦ ὑπνου προκαλεῖ, μετά τινας ἡμέρας ἀυτηνίας, τὸν θάνατον.

5. ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ

Τὸ νευρικὸν σύστημα περιλαμβάνει: α') τὸ ἐγκεφαλονωτιαῖον σύστημα (κεντρικὸν τμῆμα ὁ ἐγκέφαλος καὶ ὁ νωτιαῖος μυελός, περιφερικὸν τὰ 12 τῶν ἑγκεφαλικῶν νεύρων καὶ τὰ 31 τῶν νωτιαίων). β') τὸ φυτικὸν νευρικὸν σύστημα (τὸ συμπαθητικόν καὶ παρασυμπαθητικόν). τὸ συμπαθητικὸν ἀποτελεῖται ἀπὸ Ἰνας, αἱ ὅποιαι ἐκφύονται ἀπὸ τὸν νωτιαῖον μυελὸν καὶ, θητικὸν ἀποτελεῖται ἀπὸ τὰ σπλάγχνα, ἐκατέρωθεν τῆς σπονδυλικῆς στήλης, διέρχονταί ἀπὸ τὰ συμπαθητικὰ γάγγλια, τὸ δὲ παρασυμπαθητικὸν ἀποτελεῖται ἀπὸ Ἰνας ἐκφυομένας ἐπίσης ἐκ τοῦ ἐγκεφάλου καὶ τοῦ νωτιαίου μυελοῦ καὶ ἀπὸ τοῦ πνευμονογαστρικοῦ κυρίως ἐγκεφαλικοῦ νεύρου. τὸ συμπαθητικὸν καὶ τὸ παρασυμπαθητικὸν ἀνταγωνίζονται πρὸς ἄλληλα.

Διὰ τὴν ἀνάπτασιν τοῦ ἐγκεφάλου εἶναι ἀπαραίτητος ὁ ὑπνος, μία κατάστασις, κατὰ τὴν ὅποιαν οὕτος μερικῶς ἀδρανεῖ.⁴


ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΩΔΕΚΑΤΟΝ

ΑΙ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ

1. ΑΙΣΘΗΣΙΣ. ΑΙΣΘΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ


Εἰς τὸ κεφάλαιον περὶ τοῦ νευρικοῦ συστήματος ἐμάθομεν, ὅτι τὰ ἔρεθίσματα προσλαμβάνονται ἀπὸ εἰδικὰ αἱ σθητικὰ κύτωτα ρα, εἰς τὰ ὅποια ἀπόληγουν τὰ αἰσθητικὰ νεῦρα. Ἐκεῖθεν μεταφέρονται εἰς τὸ κεντρικὸν νευρικὸν σύστημα καὶ οὕτως ἀντιλαμβάνεται τὰς μεταβολάς, αἱ ὅποιαι τὰ προκαλοῦν. Ἡ λειτουργία αὕτη, νόμεθα τὰς διάφορα αἰσθητικά νεῦρα, καλεῖται αἱ σθητικές. Τὰ ὄργανα τοῦ σώματος, τὰ ὅποια περιλαμβάνουν τὰ αἰσθητικὰ κύτταρα καὶ είναι καταλλήλως διαμορφωμένα διὰ τὴν ύποδοχὴν τῶν ἔρεθισμάτων, καλοῦνται αἱ σθητήρια ὥργανα.

Εἰς τὸ δέρμα είναι διεσκορπισμένα διάφορα τοιαῦτα ἀπλᾶ ὄργανα (αἱ σθητικὰ σωμάτια), χρησιμεύοντα διὰ τὴν αἴγανα (αἱ σθητικὰ σωμάτια), χρησιμεύοντα διὰ τὴν αἴσθησιν τῆς θερμότητος, τοῦ ψύχους, τοῦ πόνου καὶ τῆς πιέσεως (ἀφή). "Ἐκαστον τοιοῦτον αἰσθητικὸν σωμάτιον ἀποτελεῖται ἀπὸ (ἀφή)."



Εἰκ. 41. Σχῆμα μιᾶς θηλῆς φερούσης γευστικούς κάλυκας.

1. Γευστικὸς κάλυξ. — 2. Νευρικὴ ἴσ.




Εἰκ. 42. Γευστικὸς κάλυξ
ἐν μεγεθύνσει.

2. ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΓΕΥΣΕΩΣ


Τὴν γεῦσιν μιᾶς ούσίας ἀντιλαμβανόμεθα, ἃν ἡ ούσία αὐτὴ ἔλθῃ, ἐν διαλύσει, εἰς ἐπαφὴν καὶ ἐρεθίσῃ τὰ αἰσθητικὰ σωμάτια τῆς γεύσεως. Τὰ σωμάτια αὗτὰ καλοῦνται γευστικοὶ καὶ λυκεῖς καὶ εύρισκονται εἰς τὴν ἐπιφάνειαν τῆς γλώσσης, ιδίως εἰς τὸ πρόσθιον καὶ ὀπίσθιον μέρος αὐτῆς (εἰκ. 41 καὶ 42).

3. ΤΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΟΣΦΡΗΣΕΩΣ

Τὴν ὄσμὴν μιᾶς ούσίας ἀντιλαμβανόμεθα, ἐὰν λεπτότατα μόρια αὐτῆς παρασυρθοῦν ὑπὸ τοῦ εἰσπνεομένου ἀέρος εἰς τὴν ρινικὴν κοιλότητα.



Εἰκ. 43. Τομὴ ἐγκαρσίᾳ διὰ τοῦ προσώπου. 1,2, Άι δύο ἀνώτεραι ρινικαὶ κόγχαι. — 8. Κάτω ρινικὴ κόγχη. — 6. Ρινικὸν διάφραγμα. — 5. Ὀφθαλμικὴ κόγχη. — 7. "Υνις.



Εἰκ. 44. Ὁσφρητικὰ κύτταρα.

1. Ινίδια τῶν αἰσθητικῶν κυττάρων.
2. Ἐπιθηλιακὰ κύτταρα τῶν βλεννογόνων.
3. Νευρικαὶ ἴνες.

λότητα καὶ ἐρεθίσουν τὰ αἰσθητικὰ κύτταρα τῆς ὁσφρήσεως. Τὰ κύτταρα αὐτὰ εύρισκονται ἐπὶ τοῦ βλεννογόνου τῆς ρινικῆς κοιλότητος καὶ ιδίως εἰς τὴν ἀνωτέραν κόγχην (εἰκ. 43 καὶ 44)

4. ΤΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΟΡΑΣΕΩΣ

Διὰ τῆς ὄρασεως ἀντιλαμβανόμεθα τὰς φωτεινὰς ἀκτῖνας, τὰς ὅποιας ἐκπέμπουν τὰ διάφορα ἀντικείμενα, τὴν ἀπόστασιν, τὴν μορφὴν καὶ τὸ σχῆμα τῶν ἀντικειμένων τούτων.

Τὰ δύο αἰσθητικὰ νεῦρα, τὰ ὅποια χρησιμεύουν διὰ τὴν ὄρασιν (όπτικὰ νεῦρα), ἀπολήγουν εἰς τὸ ἐσωτερικὸν τῶν αἰσθητηρίων

όργανων της όράσεως, δηλ. τῶν δύο ὁφθαλμῶν. Τὸ ἀριστερὸν ὄπτικὸν νεῦρον ἀπολήγει εἰς τὸν δεξιὸν ὄφθαλμὸν καὶ τὸ δεξιὸν εἰς τὸν ἀριστερὸν ὄφθαλμόν.


Κατασκευὴ τῶν ὄφθαλμῶν. "Ἐκαστος ὄφθαλμος ὁμοιάζει μὲν σφαιρικὸν θάλαμον, ὃ ὅποιος ἔχει ἀδιαφανῆ τοιχώματα καὶ καλεῖται βολβός. Εἰς τὸ πρόσθιον μόνον μέρος τὰ τοιχώματα τοῦ βολβοῦ γίνονται διαφανῆ καὶ ἀφήνουν τὰς φωτεινὰς ἀκτῖνας νὰ εἰσέλθουν.

Τὸ τοιχώμα τοῦ βολβοῦ ἀποτελεῖται ἀπὸ τρία τοιχώματα, τὰ ὅποια καλούνται χιτῶνες (εἰκ. 45). 'Ο ἔξωτερικὸς χιτών καλεῖται σκληρωτικός. Εἶναι ἀδιαφανής καὶ λευκός καὶ εὔκολα δυνάμεθα νὰ τὸν παραστηρήσωμεν (ἀσπράδι τοῦ ματιοῦ). Εἰς τὸ ἐμπρόσθιον μόνον μέρος τοῦ βολβοῦ, ἐν κυκλικὸν τμῆμα τοῦ σκληρωτικοῦ σθίον μόνον μέρος τοῦ βολβοῦ, ἐν κυκλικὸν τμῆμα τοῦ σκληρωτικοῦ χιτῶνος εἶναι διαφανές. Τὸ τμῆμα τοῦτο καλεῖται κερατοειδῆς χιτών καὶ εἶναι κυρτότερον ἀπὸ τὸν σκληρωτικόν.

Κάτω ἀπὸ τὸν σκληρωτικὸν εἶναι ὁ χοριοειδῆς χιτών. Οὗτος εἶναι μέλας καὶ ἀγγειοβριθής, ἀφήνει δὲ ἀκάλυπτον τὸ μέρος κάτω ἀπὸ τὸν κερατοειδῆ.

Τέλος, μέσα ἀπὸ τὸν χοριοειδῆ εὑρίσκεται ὁ ἀμφιβλητὸς χιτών, εἰς τὸν ὅποιον εἶναι διακλαδισμένον τὸ ὄπτικὸν νεῦρον. Καὶ αὐτὸς διακόπτεται κάτω ἀπὸ τὸν κερατοειδῆ.

Κάτω ἀπὸ τὸν κερατοειδῆ καὶ χωρὶς νὰ ἀκουμβᾷ ἐπ' αὐτοῦ εὑρίσκεται ἐν διάφραγμα μυῶδες, ἡ Ἱρίς. Τὸ διάφραγμα τοῦτο ἀφήνει εἰς τὸ κέντρον μίαν ὄπήν, ἡ ὅποια καλεῖται κόρη τοῦ ὄφθαλμοῦ. Ἀμέσως ὅπισθεν τῆς Ἱρίδος ὑπάρχει ὁ διαφανῆς ἀμφίκυρτος φακός. Οὗτος συγκρατεῖται καὶ συσφίγγεται ἀπὸ μίαν μυϊκὴν ζώνην, ἡ ὅποια τὸν περιβάλλει.



Εἰκ. 45. Σχῆμα τοῦ ὄφθαλμοῦ.

1. Σκληρωτικὸς χιτών.— 2. Χοριοειδῆς.— 3. Ἀμφιβλητροειδῆς.— 4. Ὁχρὰ κηλίς.— 5. Ὁπτικὸν νεῦρον.— 6. Κερατοειδῆς χιτών.— 7. Ἱρίς.— 8. Φακός.— 9. Χῶρος κατεχόμενος ἀπὸ τὸν μυῶδες ὑγρόν.— 10. Χῶρος κατεχόμενος ἀπὸ τὸ ναλῶδες σῶμα.

‘Ο χῶρος μεταξύ τοῦ κερατοειδοῦς καὶ τῆς ἵριδος εἶναι πλήρης ἐνὸς διαφανοῦς ρευστοῦ, τὸ ὅποιον καλεῖται ύδατος γρόνι. Οἱ ὅπισθεν τῆς ἵριδος καὶ τοῦ φακοῦ χῶρος τοῦ βολβοῦ εἶναι πλήρης ἀπὸ ἔν αλλο διαφανές ρευστόν, τὸ ὅποιον καλεῖται ύδωμα ματιάς.

Τὸ ὅπτικὸν νεῦρον εἰσέρχεται εἰς τὸν βολβὸν ἀπέναντι τῆς κόρης καὶ διακλαδίζεται ἐπὶ τοῦ ἀμφιβληστροειδοῦς. Πλησίον τῆς εἰσόδου τοῦ ὅπτικοῦ νεύρου εὑρίσκεται τὸ πλέον εὐαίσθητον σημεῖον τοῦ ἀμφιβληστροειδοῦς. Τὸ σημεῖον τοῦτο καλεῖται ωχρὰ καὶ λίστα.

Τὸ σημεῖον τῆς εἰσόδου τοῦ νεύρου δὲν ἔχει εὐαίσθησίαν καὶ λέγεται τυφλὴ καὶ λίστα.


‘Ο βολβὸς κινεῖται δι’ ἔξ μυῶν, οἱ ὅποιοι ἐφαρμόζουν ἐπ’ αὐτοῦ.

Σχηματισμὸς τοῦ εἰδώλου. Αἱ φωτείναι ἀκτίνες, αἱ ὅποιαι ἀναχωροῦν ἀπὸ τὰ διάφορα ἀντικείμενα, διέρχονται τὸν κερατοειδῆ χιτῶνα, τὸ ύδατον τοῦ φακοῦ καὶ τὸ ύαλον τοῦ σῶματος (εἰκ. 46).

Ως εἶναι γνωστὸν ἐκ τῆς Φυσικῆς, ἐὰν ἀκτίνες, αἱ ὅποιαι προέρχονται ἀπὸ ἔν σημεῖον, συναντήσουν ἔνα φακὸν ἀμφίκυρτον, θὰ συγκεντρωθοῦν ὅλαι εἰς ἔν αλλο σημεῖον, ὅπισθεν τοῦ φακοῦ. Τοῦτο γίνεται δι’ ὅλα τὰ σημεῖα ἐνὸς ἀντικειμένου καὶ οὕτω σχηματίζεται ὅπισθεν τοῦ φακοῦ τὸ εἰδώλον τοῦ ἀντικειμένου τούτου.

Τὸ εἰδώλον τοῦτο, ἀναλόγως τῆς ἀποστάσεως αὐτοῦ, εἶναι μικρότερον ἢ μεγαλύτερον.

Τὸ ᾄδιον γίνεται καὶ μὲ τὸν φακὸν τοῦ ὀφθαλμοῦ. Οὕτω σχηματίζεται εἰς τὸ βάθος τοῦ βολβοῦ ἐπὶ τοῦ ἀμφιβληστροειδοῦς τὸ εἰδώλον τῶν ἔξωτερικῶν ἀντικειμένων (εἰκ. 46). Τὸ εἰδώλον αὐτὸν εἶναι



Εἰκ. 46. Πορεία τῶν ἀκτίνων καὶ σχηματισμὸς τοῦ εἰδώλου ἀνεστραμμένου.

μικρὸν καὶ ἀνεστραμμένον καὶ σχηματίζεται συγχρόνως καὶ εἰς τοὺς δύο ὄφθαλμούς.

Τὰ φωτεινὰ εἶδωλα, τὰ ὅποια οὕτω σχηματίζονται, ἐρεθίζουν τὰ ὄπτικὰ νεῦρα καὶ τὰ ἐρεθίσματα αὐτὰ μεταβιβάζονται εἰς τὸν ἐγκέφαλον. 'Εφ' ὅσον οἱ δύο ὄφθαλμοι εύρισκονται εἰς τὴν κανονικήν των θέσιν, τὰ δύο εἶδωλα γίνονται ἀντιληπτὰ ὡς ἔν. 'Εὰν δῆμως πιέσωμεν τὸν ἔνα βολβόν, ὥστε οὗτος νὰ μετατοπισθῇ ὀλίγον, τότε τὰ ἀντικείμενα μᾶς φαίνονται διπλά.


Προσαρμογὴ τοῦ ὄφθαλμοῦ. 'Η μυϊκὴ ζώνη, ἡ ὅποια περιβάλλει τὸν φακόν, δύναται νὰ χαλαρωθῇ, ὅποτε ὁ φακὸς γίνεται κυρτότερος καὶ ἐπομένως σχηματίζει τὸ εἶδωλον πλησιέστερον. Τοῦτο γίνεται, ὅταν παρατηροῦμεν ἀντικείμενα εύρισκόμενα πολὺ πλησίον, τῶν ὅποιων τὸ εἶδωλον, ἄλλως, θὰ ἐσχηματίζετο πολὺ μακράν τοῦ φακοῦ. Οὕτως ἐπιτυγχάνεται νὰ σχηματίζεται τὸ εἶδωλον πάντοτε φακοῦ. Οὕτως ἐπιτυγχάνεται νὰ ἐρεθίζεται τὸ ὄπτικὸν νεῦρον. 'Η ἐπὶ τοῦ ἀμφιβληστροειδοῦς καὶ νὰ ἐρεθίζεται τὸ ὄπτικὸν νεῦρον. 'Η ἄλλαγὴ τῆς κυρτότητος τοῦ φακοῦ καλεῖται προσαρμογὴ τοῦ ὄφθαλμοῦ. 'Ο ὄφθαλμὸς δὲν δύναται νὰ προσαρμοσθῇ διὰ νὰ ἴδῃ ἀντικείμενα εύρισκόμενα πλησιέστερον τῶν 25–30 ἑκ.

Προστασία τοῦ ὄφθαλμοῦ. 'Ο ὄφθαλμὸς εἴναι εὔπαθες ὅργανον καὶ ἔχει ἀνάγκην προστασίας. Πρὸς τοῦτο οἱ βολβοὶ εύρισκονται εἰς κοιλώματα, σχηματιζόμενα ὑπὸ τῶν ὄστῶν τοῦ προσώπου, τὰς ὄφθαλμικὰς κόγχας. 'Επάνω ἀπὸ αὐτὰς τὸ μετωπικὸν ὀστοῦν παρουσιάζει δύο ἐπάρματα, τὰ ὑπερόφρυνα τόξα. Εἰς τὴν ἴδιαν θέσιν φύονται ἐπὶ τοῦ δέρματος τὰ «φρύδια». 'Εμπρὸς ἀπὸ τὴν ἐλευθέραν ἐπιφάνειαν τοῦ βολβοῦ κινοῦνται τὰ βλεφάρα. Ταῦτα ἐσωτερικῶς καλύπτονται ἀπὸ ἔνα βλεννογόνον, τὸν ἐπιπλέοντα φυκότα, μὲ ἀφθόνους ἀδένας, καὶ εἰς τὰ χείλη των φέρουν τὰς βλεφαρίδας.

'Η ἐλευθέρα ἐπιφάνεια τοῦ βολβοῦ διατηρεῖται λεία καὶ καθαρὰ μὲ τὸ δάκρυ, τὸ ὅποιον ἐκκρίνεται ἀπὸ ἔνα δακρυγόνον ἀδένα, εύρισκόμενον ὅπισθεν τοῦ ἄνω βλεφάρου. Τὸ περισσεῦον δάκρυον ἔρχεται εἰς τὴν ρινικὴν κοιλότητα διὰ τῶν δακρυϊκῶν ἀγωγῶν, εἰς τὴν τριηδίην της προσώπου.

Ἀνωμαλίαι τῆς ὄράσεως. Αἱ κυριώτεραι ἀνωμαλίαι τῆς ὄράσεως εἴναι αἱ ἔξῆς:

α) Ἀλλοι θωρισμοί. 'Αλλοίθωροι καλοῦνται οἱ ὄφθαλμοὶ



Εἰκ. 47. Ἀνωμαλία τῆς δράσεως.

β. Κανονικὸς ὀφθαλμὸς πρὸς σύγκρισιν.

ένὸς ἀτόμου, ὅταν αἱ κόραι δὲν βλέπουν καὶ αἱ δύο ἀκριβῶς παραλλήλως. Τοῦτο ὀφείλεται εἰς τὸ ὅτι ὥρισμένοι μένει ἔξ ἐκείνων, οἱ ὅποιοι συγκρατοῦν καὶ κινοῦν τὸν βολβόν, εἶναι ἀσθενέστεροι τῶν ἄλλων. Οἱ ἀλλοίθωροι θὰ ἔπρεπε νὰ βλέπουν διπλὰ τὰ ἀντικείμενα, ἀλλὰ ἔχουν συνηθίσει νὰ προσέχουν τὸ ἐν μόνον εἶδωλον.

β') Πρεσβύτεροι. Αὕτη εἶναι μία ἀνωμαλία παρουσιαζομένη συνήθως κατὰ τὸ γῆρας. Ὁφείλεται εἰς τὸ ὅτι ὁ φακὸς δὲν δύναται πλέον νὰ κυρτωθῇ ἀρκετὰ διὰ τὰ πλησίον του ἀντικείμενα καὶ τὸ εἶδωλον αὐτῶν σχηματίζεται μακρύτερα ἀπὸ τὸν ἀμφιβληστροειδῆ (εἰκ. 47, α). Οἱ πρεσβύτερες βοηθοῦνται μὲν ὀμματούλια ἀποτελούμενα ἀπὸ ἀμφικύρτους φακούς, οἱ ὅποιοι συγκεντρώνουν πλησιέστερα τὰς ἀκτίνας καὶ οὕτω βλέπουν εὔκρινῶς τὰ πλησίον εύρισκόμενα ἀντικείμενα. Εἰς ἄλλας περιπτώσεις ὁ σχηματισμὸς τοῦ εἶδώλου δημιουργεῖται ὅχι εἰς τοῦ ἀμφιβληστροειδοῦς ὀφείλεται ὅχι εἰς

ἐλάττωμα τοῦ φακοῦ, ἀλλ' εἰς τὸ ὅτι ὁ βολβὸς εἶναι βραχύτερος τοῦ κανονικοῦ (ύπερμετρωπία) (εἰκ. 47, γ).

γ) Μυωπία. Ἡ ἀνωμαλία αὕτη ὑπάρχει, ὅταν τὸ εἶδωλον τῶν μακρὰν ἀντικειμένων σχηματίζεται πρὸ τοῦ ἀμφιβληστροειδοῦς, διόπτε πάλιν τὸ ὅπτικὸν νεῦρον δὲν ἐρεθίζεται. Ὁφείλεται εἰς τὸ ὅτι ὁ φακὸς δὲν δύναται νὰ προσαρμοσθῇ ἢ εἰς τὸ ὅτι ὁ βολβὸς εἶναι μεγαλύτερος τοῦ κανονικοῦ. Οἱ μύωψ, διὰ νὰ ἴδῃ τὰ μακρὰν ἀντικείμενα, βοηθεῖται μὲν ὀμματούλια μὲν ἀμφικοίλους φακούς. Οἱ φακοὶ οὗτοι, ἀντιθέτως πρὸς τοὺς ἀμφικύρτους, φέρουν τὸ εἶδωλον, ὡστε νὰ σχηματίζεται τοῦτο ἀκριβῶς ἐπὶ τοῦ ἀμφιβληστροειδοῦς.

δ) Ἀστιγματισμός. Κατ' αὐτὸν τὸ εἶδωλον σημείου δὲν εἶναι σημεῖον, ἀλλ' ἔχει σχῆμα ἐπίμηκες. Ὁφείλεται εἰς ἀνωμαλίαν κυρίως τοῦ κερατοειδοῦς χιτῶνος.


Αἰσθησις τῆς ἀκοῆς εἶναι ἔκείνη, διὰ τῆς ὁποίας ἀντιλαμβανόμεθα τοὺς ἥχους. Ὡς εἶναι γνωστὸν ἐκ τῆς Φυσικῆς, οἱ ἥχοι παράγονται, ὅταν ἐν σῶμα τεθῇ εἰς παλμικὴν κίνησιν, καὶ μεταδίδονται διὰ κυμάνσεων τοῦ ἀέρος.

Αἰσθησιν τοῦ χώρου καλοῦμεν ἔκείνην, διὰ τῆς ὁποίας συναίσθιανόμεθα τὴν στάσιν τοῦ σώματος καὶ τηροῦμεν κατὰ τὴν κίνησιν τὴν ἴσορροπίαν.


Τὰ αἰσθητήρια ὅργανα τῆς ἀκοῆς καὶ τοῦ χώρου εἶναι τὰ ὄτα, τὰ ὁποῖα εύρισκονται ἐντὸς κοιλοτήτων τῶν κροταφικῶν ὀστῶν. Εἰς ἔκαστον οὓς διακρίνομεν τρία τμήματα, τὸ ἔξω, τὸ μέσον καὶ τὸ ἔσω οὖς (εἰκ. 48).

Ἐξω οὖς. Τοῦτο ἀποτελεῖται ἀπὸ τὸ πτερύγιον καὶ τὸν ἀκουστικὸν πόρον. Τὸ πτερύγιον εἶναι χόνδρινον καὶ φέρει διαφόρους πτυχάς. Οἱ ἀκουστικὸι πόροι εἶναι ἔνας σωλήνη ἐντὸς τοῦ κροταφικοῦ ὀστοῦ, ὃ ὁποῖος ἀρχίζει ἀπὸ τὸ πτερύγιον καὶ εἰς τὸ βάθος φράσσεται ἀπὸ μίαν μεμβράνην τύμπανον (εἰκ. 48).

Μέσον οὖς. Τοῦτο εἶναι συνέχεια τῆς κοιλότητος τοῦ κροταφικοῦ ὀστοῦ καὶ συγκοινωνεῖ μὲ τὴν στοματικὴν κοιλότητα δι' ἐνὸς στενοῦ σωλῆνος, τῆς εὐσταχιανῆς σάλπιγγος. Ἀπὸ τὸν στενοῦ σωλῆνος, τῆς εὐσταχιανῆς σάλπιγγος, ἡ κοιλότης τοῦ μέσου οὖς χωρίζεται διὰ τῆς μεμβράνης τοῦ τυμπάνου. Ἡ κοιλότης τοῦ μέσου ωτὸς συγκοινωνεῖ μὲ τὴν κοιλότητα τοῦ ἔσω ωτοῦ διὰ δύο μικρῶν ὀπῶν τῶν ὀστῶν, τῆς στρογύλης καὶ τῆς φραγμού, τὸν ἄκμονα καὶ τὸν ἀναβολέα (εἰκ. 49).



Εἰκ. 48. Σχῆμα τοῦ ὄργανου τῆς ἀκοῆς.
1. Πτερύγιον τοῦ ωτοῦ. — 2. Τύμπανον.
— 3. Ἐξω ἀκουστικὸς πόρος. — 4. Κοιλότης τοῦ μέσου ωτοῦ. — 5. Εύσταχιανὴ σάλπιγξ. — 6. Ἐσω οὖς.



Εἰκ. 50. Τομή διά τοῦ κοχλίου.
1. Δάπτεδον τοῦ ύμενώδους κοχλίου.—2. Νεύρον.—6. Αισθητικά κύτταρα

έκαστος παρουσιάζει μίαν διεύρυνσιν, τὴν λήκυθον ἢ λάγηνον.

γ') Τὸν κοχλίαν. Οὗτος είναι τυφλὸς σωλήν τριγωνικῆς τομῆς, περιελιγμένος εἰς $2\frac{1}{2}$ σπείρας ἐντὸς ἀντιστοίχου σωλήνος τοῦ κροταφικοῦ ὅστοῦ, ὁ ὅποῖος καλεῖται ὀστείνος κοχλίας. Ό κοχλίας συγκοινωνεῖ μὲ τὸ σφαιρικὸν κυττάραν τῆς ἀκοῆς εύρισκονται εἰς τὸ δάπτεδον τοῦ ύμενώδους κοχλίου (εἰκ. 50).


Τὰ ἀνωτέρω ύμενώδη ὄργανα, τὰ ὅποια, ὡς εἴδομεν, συγκοινωνοῦν μεταξύ τῶν, πληροῦνται ὑπὸ ύγρου, καλουμένου ἐν δολύμφῃ. Τὰ αἰσθητικά κύτταρα τῆς ἀκοῆς εύρισκονται εἰς τὸ δάπτεδον τοῦ ύμενώδους κοχλίου (εἰκ. 50).

"Οταν τὰ ἡχητικὰ κύματα φθάσουν εἰς τὴν μεμβράνην τοῦ τυμπάνου, μεταδίδουν εἰς αὐτὴν παλμικήν κίνησιν. Ἡ κίνησις αὕτη διά τῶν ὀσταρίων τοῦ μέσου ὥτος μεταδίδεται εἰς τὴν μεμβράνην τῆς ὠοειδοῦς θυρίδος. Ἐξ αὐτῆς, περατιέρω, διὰ τῆς ἔξωλύμφης, μεταδίδεται εἰς

"Εσω οὖς. Εἰς τὴν κοιλότητα τοῦ ἔσω ὥτος (εἰκ. 49), ἡ ὅποια είναι πλήρης ἐνὸς ύγρου, τῆς ἐξωλύμφης, παρατηροῦμεν:

α') Δύο καὶ στιδια συγκοινωνοῦνται καὶ καλούμενα ἐλλειπτικὸν καὶ σφαιρικὸν κυττάραν.

β') Τρεῖς ἡ μικροκλίους σωλήνας. Οὗτοι ἀρχίζουν ἀπὸ τὸ ἐλλειπτικόν κυττάραν καὶ ἐπιστρέφουν πάλιν εἰς αὐτό, εύρισκονται δὲ ἐπὶ τριῶν καθέτων ἐπιπέδων. Εἰς τὴν ἀρχήν του



Εἰκ. 49. Τομὴ διά τοῦ ὥτος.

1. Τύμπανον.—2. Σφύρα.—3. Ἀκμῶν.—4. Ἀναβολεὺς ἀκουμβῶν ἐπὶ τῆς μεμβράνης τῆς ὠοειδοῦς θυρίδος.—5. Στρογγύλη θυρίς.—6. Ἐλλειπτικὸν κυττάραν.—7. Λήκυθος.—8. Ἡμικύκλιοι σωλήνες.—9. Σφαιρικὸν κυττάραν.—10. Κοχλίας.—11. Εύσταχιανή σάλπιγξ.—12. Ἔξω ἀκουστικὸς πόρος.

τὰ τοιχώματα τῶν κυστιδίων καὶ εἰς τὴν ἐνδολύμφην. Αἱ κυμάνσεις, τέλος, τῆς ἐνδολύμφης ἔρεθίζουν τὰ αἰσθητικὰ κύτταρα, τῶν ὅποιών τὸ ἔρεθισμα παραλαμβάνεται ὑπὸ τοῦ ἀκουστικοῦ νεύρου.

Ἡ κίνησις τῆς ἔξωλύμφης ἐντὸς τοῦ κλειστοῦ ὁστείνου χώρου θὰ ἥτο ἀδύνατος ἐάν δὲν ὑπῆρχεν ἡ στρογγύλη θυρίς, τῆς ὅποιας ἡ μεμβράνη ὑποχωρεῖ πρός τὰ ἔξω ὅταν ἡ ἔξωλύμφη πιέζεται ὑπὸ τοῦ ἀναβολέως εἰς τὴν φοειδῆ θυρίδα.

Ἡ αἰσθησις τοῦ χώρου ἔξασφαλίζεται μὲ τοὺς τρεῖς ἡμικυκλίους σωλῆνας. Ἀναλόγως τῆς στάσεως τοῦ σώματος ἡ ἐνδολύμφη φθάνει ἐντὸς αὐτῶν εἰς διάφορον σημεῖον καὶ τοῦτο προκαλεῖ ἀνάλογα ἔρεθισματα, τὰ ὅποια μεταβιβάζονται εἰς τὸν ἐγκέφαλον δι' ἐνός νεύρου (τοῦ αἰθουσαίου).

6. ΤΟ ΑΙΣΘΗΜΑ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ

"Ολοι γνωρίζομεν τὸ ἴδιάζον τοῦτο δυσάρεστον αἴσθημα. Συνήθως προκαλεῖται εἰς τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ σώματος μαζὶ μὲ ἰσχυρὰ ἔρεθισματα θερμότητος, πιέσεως κλπ. Ἐν τούτοις τὸ αἴσθημα τοῦ πόνου προκαλεῖται ὅχι εἰς τὰ γνωστά μας αἰσθητικὰ σωμάτια, ἀλλὰ εἰς ἄλλα σημεῖα τοῦ δέρματος. Εἰς τὰ σημεῖα ταῦτα ἀπολήγουν ἵνες τῶν αἰσθητικῶν νεύρων, χωρὶς νὰ ὑπάρχουν εἰδικὰ αἰσθητικὰ κύτταρα. Δέχονται δηλαδή, ὅτι ὁ πόνος προκαλεῖται ἀπὸ τὸν ἔρεθισμὸν ἐλευθέρων ἀπολήξεων τῶν αἰσθητικῶν νεύρων. Πόνος προκαλεῖται ὅχι μόνον εἰς τὸ δέρμα, ἀλλὰ καὶ εἰς ἐσωτερικὰ ὅργανα (στόμαχος, μύες κλπ.). Χαρακτηριστικὸν διὰ τὸν πόνον, ἴδιως τὸν προκαλούμενον εἰς τὸ ἐσωτερικὸν τοῦ σώματος, εἶναι, ὅτι δὲν δυνάμεθα πάντοτε νὰ καθορίσωμεν τὸ μέρος, ἐκ τοῦ ὅποιου προέρχεται. Συχνὰ νομίζομεν, ὅτι ὁ πόνος προέρχεται ἀπὸ ἄλλα μέρη τοῦ σώματος, τὰ ὅποια εύρισκονται μακράν, εἰς τὰ ἄκρα τῶν ἀντιστοίχων νεύρων. Οὕτω συμβαίνει π.χ. ἀτομα, τῶν ὅποιών ἀπεκόπη ἐν ἄκρον, νὰ αἰσθάνωνται μετὰ τὴν ἔγχειρησιν πόνον καὶ νὰ νομίζουν, ὅτι οὗτος προέρχεται ἀπὸ τὸ μέρος, ὃπου εύρισκετο τὸ ἀποκοπέν ἄκρον.

'Ο πόνος εἶναι χρησιμωτάτη αἴσθησις, διότι εἰδοποιεῖ τὸν ἄνθρωπον περὶ βλαβερῶν ἐπιδράσεων καὶ παθήσεων. Ἐκτὸς τούτου ὁ ἄνθρωπος, φοβούμενος τὸν πόνον, προφυλάσσεται ἀπὸ τοιαύτας βλαβεράς ἐπιδράσεις.

7. ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ

Κάθε αίσθησις πραγματοποιείται διὰ τοῦ ἐρεθισμοῦ τῶν αἰσθητικῶν κυττάρων. Ταύτα εύρισκονται διεσκορπισμένα ἢ συγκεντρωμένα εἰς τὰ αἰσθητήρια ὅργανα. Περιεγράψαμεν τὰ αἰσθητικὰ σωμάτια τοῦ δέρματος, τοὺς γευστικοὺς κάλυκας, τὰ αἰσθητικὰ τῆς ὀσφρήσεως κύτταρα, τοὺς ὀφθαλμούς, τὰ ὄτα. Ὁ πόλος τέλος προκαλεῖται ἀπὸ ἐρεθισμὸν ἐλευθέρων ἀπολήξεων τῶν αἰσθητικῶν νευρικῶν ἴνῶν.

8. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1) Τὰ διάφορα αἰσθητικὰ σωμάτια εἶναι ἀνίσως διαμοιρασμένα εἰς τὰ διάφορα μέρη τοῦ δέρματος. Διὰ τοῦτο ὡρισμένα μέρη εἶναι περισσότερον εὐαίσθητα ἀπὸ ἄλλα διὰ τὸ αὐτὸ ἐρέθισμα. Π.χ. διὰ τὴν ἀφήν εἶναι ἰδιαιτέρως εὐαίσθητα τὰ ἄκρα τῶν δακτύλων. (Πῶς δοκιμάζεις τὴν ὑφὴν τοῦ χαρτιοῦ, τοῦ ὑφάσματος κλπ. :). Παρατήρησε, ὅτι μερικαὶ γυναικὲς συνηθίζουν νὰ δοκιμάζουν τὴν θερμοκρασίαν τοῦ ὕδατος μὲ τὸν ἀγκῶνα ἢ τοῦ σιδήρου, κατὰ τὸ σιδέρωμα, πλησιάζουσαι αὐτὸ εἰς τὰς παρειάς.

2) Παρατήρησε εἰς τὸν καθρέπτην (καθαρὰ χέρια!) τὴν ἐπιφάνειαν τῆς γλώσσης. Εἰς ὅλην τὴν ἄνω ἐπιφάνειαν θὰ ἔδῃς πολλὰς μικρὰς θηλάς, αἱ ὅποιαι χρησιμεύουν διὰ τὴν αἰσθησιν τῆς θερμότητος, τῆς πιέσεως κλπ. καὶ προσδίδουν χνοώδη ὄψιν εἰς τὴν γλῶσσαν. Εἰς τὸ ὄπισθιον τμῆμα ὑπάρχουν αἱ θηλαὶ μὲ τοὺς γευστικοὺς κάλυκας, αἱ ὅποιαι εἶναι μεγαλύτεραι καὶ σχηματίζουν ἔνα Λ (γευστικὸν λάμβδα). Πλὴν αὐτῶν καὶ εἰς ἄλλα τμήματα τῆς γλώσσης ὑπάρχουν θηλαὶ μὲ γευστικοὺς κάλυκας.

3) Δοκίμασε μὲ διαφόρους ούσιας εἰς ποῖα σημεῖα ἢ γλῶσσα εἶναι περισσότερον εὐαίσθητος εἰς τὰ διάφορα ἐρεθίσματα.

4) Σχεδίασε ἀπὸ πλησίον ἔνα κύβον, ὅπως ἀκριβῶς τὸν βλέπεις μὲ τὸ ἔνα μάτι, κατόπιν μὲ τὸ ἄλλο, καὶ τέλος καὶ μὲ τὰ δύο. Σύγκρινε τὰ σχέδια.

5) Παρατήρησε (μὲ καθαρὰ χέρια!) εἰς τὸν καθρέπτην τοὺς δακρυϊκοὺς πόρους. "Οταν κλαίῃ κανεὶς πολύ, πρόσεξε, ὅτι κάθε λίγο «ρουφᾶ τὴ μύτη του». Διατί;

6) "Αν ἐρεθισθῇ ὁ ὀφθαλμός ὅχι μὲ φῶς, ἀλλὰ μὲ ἄλλο ἐρέθισμα (πίεσιν π.χ.), προκαλεῖται πάλιν φωτεινὸν αἰσθημα. Δι' αὐτοῦ

τὸ λέγουν ὅτι ἀπὸ ἔνα κτύπημα «ἄστραψον τὰ μάτια μου». Τὸ ἀνάλογον συμβαίνει καὶ μὲ τὰ ἄλλα αἰσθητήρια.

7) Πρόσεξε ὅτι τὸ βράδυ (λυκόφως) δὲν διακρίνει κανεὶς χρώματα, ἀλλὰ μόνον λευκὸν καὶ μαῦρο.

8) Γνωρίζεις διατὶ «τρίβομε τὰ μάτια μας» τὸ πρωΐ; Διὰ νὰ πιέσωμεν τοὺς δακρυϊκοὺς ἀδένας, οἱ ὅποιοι ἀδρανοῦν κατὰ τὸν ὕπνον, ὥστε μὲ τὸ δάκρυ νὰ ὑγράνουν τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ βολβοῦ.

9) "Οπισθεν τοῦ βολβοῦ τοῦ ὀφθαλμοῦ ὑπάρχει λίπος, τὸ ὅπιον συμπληρώνει τὸν χῶρον τῆς ὀφθαλμικῆς κόγχης. "Οταν ἀδυνατίσῃ κανείς, τὸ λίπος αὐτὸ ἔξαντλεῖται καὶ τότε τὰ μάτια «μπαίνουν μέσα στὶς κόγχες τους».

10) Κάποτε θὰ ἔτυχε νὰ παρουσιασθῇ εἰς τὸ μάτι σου «κριθαράκι». Τοῦτο σχηματίζεται, ὅταν οἱ ἀδένες τοῦ ἐπιπεφυκότος ἀποφραχθοῦν.

11) Ο βλεννογόνος τῆς ρινὸς διατηρεῖ πάντοτε μίαν ὑγρασίαν, χωρὶς τὴν ὅποιαν δὲν εἶναι δυνατὴ ἡ ὄσφρησις. Διὰ νὰ προκληθῇ ἡ αἰσθησις μιᾶς ὄσμῆς, πρέπει τὰ λεπτότατα τεμάχια τῆς ούσιας, τὰ ὅποια ἔφθασαν εἰς τὴν ρινικὴν κοιλότητα, νὰ διαλυθοῦν.




ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΤΟΝ

ΤΟ ΔΕΡΜΑ

1. ΣΤΟΙΒΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ. ΥΠΟΔΟΡΙΟΣ ΙΣΤΟΣ. ΠΕΡΙΤΟΝΙΑ

Τὸ δέρμα, τὸ ὅποιον καλύπτει τὸ σῶμα ἔξωτερικῶς, προστατεύει τούς λοιπούς ιστούς ἀπὸ τὴν ἄμεσον ἐπίδρασιν τοῦ περιβάλλοντος (ψῦχος κλπ.). Ὅπο τὸ μικροσκόπιον, εἰς μίαν κάθετον τομὴν τοῦ δέρματος διακρίνονται αἱ ἑξῆς στοιβάδες (εἰκ. 51):

α') **Ἡ ἐπιδερμίς**, ἀποτελουμένη ἀπὸ πολλὰ στρώματα κυττάρων. Ἐκ τούτων τὰ ἔξωτερικά ἔχουν ὑποστῆ κερατινοποίησιν, δηλ. ἀπεξηράνθησαν, καὶ τὸ πρωτόπλασμά των ἀντικατεστάθη διὰ κερατίνης. Ὡστε ἡ ἐπιδερμίς περιλαμβάνει δύο μικροτέρας στοιβάδας: 1) τὴν κερατίνην στοιβάδα, ἡ ὅπεια ἀποτελεῖται ἀπὸ κύτταρα κερατινοποιημένα καὶ νεκρά, καὶ 2) τὴν κατωτέραν μαλπιγιανήν στοιβάδα, ἡ ὅποια περιλαμβάνει ζῶντα καὶ ἀνανεούμενα διαρκῶς κύτταρα. Ἡ κερατίνη στοιβάς συνεχῶς ἀποπίπτει κατὰ μικρὰ λέπια, ἀντικαθίσταται δὲ ἐν τῷ μεταξύ ἀπὸ τὰ ἀνώτερα στρώματα τῆς μαλπιγιανῆς, τὰ ὅποια βαθμηδόν καὶ αὐτὰ κερατινοποιοῦνται.



Εἰκ. 51. Σχηματικὴ τομὴ διὰ τοῦ δέρματος. 1. Κερατίνη στοιβάς.— 2. Μαλπιγιανή στοιβάς.— 3. Χόριον.— 4, 5. Ἰδρωτοποιός ἀδήν.— 6. Λιπώδης ιστός.— 7. Ἀρτηρία.— 8. Φλέψ.— 9. Τομὴ τριχός.— 10. Συμηγματογόνος ἀδήν.— 11. Μυϊκὴ ἵς τῆς τριχός.— 12. Ἀπτικὸν σωμάτιον.

β') **Τὸ χόριον**. Τοῦτο εύρισκεται κάτωθεν τῆς ἐπιδερμίδος καὶ εἰσδύει ἐντὸς αὐτῆς ὑπὸ μορφὴν θηλῶν. Εἰς κάθε θηλὴν ἀπολήγουν λεπτὰ αίμοφόρα ἀγγεῖα. Τὸ χόριον περιλαμβάνει μεταξύ τῶν κυττάρων του ἐλαστικὰ ἴνδια.

γ') 'Ο **ύποδόριος ιστός**. Οὗτος εύρισκεται κάτωθεν του χορίου και ἀποτελεῖται ἀπὸ ἐν στρῶμα ἀπὸ συνδετικὸν ιστόν, ὁ ὅποιος δύναται νὰ περιλαμβάνῃ καὶ λίπος. Κάτωθεν του στρώματος τούτου συναντῶνται τὰ μεμβρανώδη περιβλήματα τῶν μυῶν. Ταῦτα εἰναι ἡ περιτονία, ἡ ὅποια καλύπτει δλην τὴν μυϊκὴν μάζαν, καὶ τὸ περιμύιον ἑκάστου μυός.

2. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ. ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΧΩΝ

Αἱ τρίχες ἔχουν τὴν ρίζαν τῶν εἰς τὸ χόριον καὶ, διερχόμεναι τὴν ἐπιδερμίδα, φθάνουν εἰς τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ σώματος. Εἰς τὴν ρίζαν ἑκάστης τριχὸς ἀπολήγει εἰς λεῖος μῆς, ὁ ὅποιος κινεῖ αὐτήν. Αἱ τρίχες σχηματίζονται ἀπὸ τὸ δέρμα διὰ κερατινοποιήσεως καὶ δι' αὐτό, εἰς μίαν κάθετον τομὴν τριχός, διακρίνονται ὑπὸ τὸ μικροσκόπιον στρώματα ἀντίστοιχα πρὸς τὰς στοιβάδας τοῦ δέρματος.

Εἰς τὸ δέρμα συναντῶμεν καὶ τοὺς ἄρωτοποιούς καὶ τοὺς σμηγματογόνους ἀδένας. Οἱ πρῶτοι εἰναι συνεσπειρωμένοι καὶ ἀπολήγουν εἰς τὴν ἐπιφάνειαν. Οἱ δεύτεροι γενικῶς ἀπολήγουν εἰς τὰς ρίζας τῶν τριχῶν καὶ ἀποδίδουν τὸ λιπαρὸν σμῆγμα, τὸ ὅποιον διατηρεῖ τὴν ἐλαστικότητα τοῦ δέρματος καὶ τῶν τριχῶν. Ἀλλοι ἀδένες τοῦ δέρματος εἰναι οἱ κυψελιδοποιοί τοῦ ὥτος καὶ οἱ γαλακτικοί ἀδένες τῶν θηλαστικῶν.

Οἱ ὄνυχες εἰναι πλάκες κεράτινοι, προερχόμεναι ἀπὸ τὴν ἐπιδερμίδα καὶ καλύπτουσαι τὸ ἄκρον τῆς ἀνω ἐπιφανείας τῶν δακτύλων. Εἰς ἕκαστον ὄνυχα διακρίνομεν: 1) τὴν κορυφὴν, ἡ ὅποια εἰναι ἐλευθέρα· 2) τὸ σῶμα, τὸ ὅποιον εἰναι προσκολλημένον εἰς τὸ χόριον καὶ δι' αὐτὸ φαίνεται ροδόχρουν, καὶ 3) τὴν ρίζαν, ἡ ὅποια εἰναι λευκὴ καὶ ἀπὸ τὴν ὅποια αὐξάνεται ὁ ὄνυξ.

Τὸ δέρμα περιλαμβάνει ἀκόμη διάφορα αἰσθητικὰ σωμάτια διὰ τὴν ἀφὴν καὶ τὴν θερμότητα.

Τὸ χρῶμα τοῦ δέρματος καὶ τῶν τριχῶν, καθὼς καὶ τῆς ἱρίδος τοῦ ὄφθαλμοῦ, ὀφείλεται εἰς μίαν χρωστικήν, ἡ ὅποια ὑπάρχει ἐντὸς ἦ καὶ μεταξὺ τῶν κυττάρων τῆς ἐπιδερμίδος. Ἡ ἀπόχρωσις τοῦ δέρματος, ίδιας ὅταν τοῦτο εἰναι λεπτὸν καὶ ἐπομένως μᾶλλον διαφανές, ἔξαρταται ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὰ αίμοφόρα ἀγγεῖα καὶ τὸ ὑποδέ-

ριον λίπος. "Οταν ἡ ἀνωτέρω χρωστική εύρισκεται εἰς τὰς τρίχας ἄφθονος αὗται παρουσιάζουν χρῶμα μαῦρον. "Οταν εύρισκεται εἰς μικροτέραν πιοσότητα, καστανὸν καὶ κατόπιν ξανθόν, καὶ ὅταν τέλος είναι ἐλαχίστη, αἱ τρίχες ἔχουν χρῶμα πυρρόν. Κατὰ τὸ γῆρας αἱ τρίχες τῆς κεφαλῆς λευκαίνονται, λόγῳ καταστροφῆς τῆς χρωστικῆς.

3. ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ.

Τὸ δέρμα περιλαμβάνει: α') τὴν ἐπιδερμίδα (κερατίνη καὶ μαλπιγιανὴ στοιβάς). β') τὸ χόριον καὶ γ') τὸν ύποδόριον ιστόν. Ἐκ τοῦ δέρματος ἐκφύονται διάφορα ἔξαρτήματα (τρίχες καὶ δυυχες). Ἐπίσης περιλαμβάνει τὸ δέρμα ἀδένας (σμηγματογόνους, ιδρωτοποιούς, γαλακτικούς, κυψελιδοποιούς) καὶ αίσθητικά σωμάτια (ἀφή, θερμοκρασία).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΚΑΤΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ

Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

1. Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ. Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΙΣΥΜΒΑΙΝΟΥΣΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΑΣ

(Παραδείγματα αιμορραγίας και διατηρήσεως της θερμοκρασίας).

Διὰ νὰ μελετήσωμεν τὸν ἀνθρώπινον ὄργανισμόν, ἔξητασσαμεν
ξεχωριστὰ εἰς προηγούμενα κεφάλαια κάθε λειτουργίαν του καὶ κάθε
σύστημα ὄργάνων του. Εἰς τὴν ζωὴν ὅμως τοῦ ὄργανισμοῦ τὰ διά-
φορα συστήματα συνεργάζονται μεταξύ των καὶ κάθε λειτουργία
ἔξαρτᾶται καὶ ἀπὸ τὰς ὑπολοίπους. Π.χ. διὰ τὴν λειτουργίαν τῆς
πέψεως ἀπαιτεῖται ἡ συνεργασία: α') τοῦ νευρικοῦ συστήματος
(αὐτονόμου καὶ συμπαθητικοῦ), β') τοῦ μυϊκοῦ συστήματος (λείων
καὶ γραμμωτῶν μυῶν), γ') διαφόρων αἰσθητικῶν σωματίων (γεῦ-
σις, πείνα κλπ.) καὶ δ') τῶν διαφόρων ἀδένων τοῦ πεπτικοῦ συστή-
ματος κ.ο.κ. Ὁμοίως, ἡ ὅλη θρέψις ἔξασφαλίζεται πάλιν διὰ τῆς
συνεργασίας διαφόρων συστημάτων τοῦ ὄργανισμοῦ.

"Ἄσ παρακολουθήσωμεν μίαν περίπτωσιν συνεργασίας διαφόρων
συστημάτων πρὸς ἀντιμετώπισιν ἐνὸς τυχαίου γεγονότος, π.χ.
μιᾶς αἱμορραγίας. Λόγῳ τῆς αἱμορραγίας, ὁ ὅγκος τοῦ αἵματος καὶ ὁ
ἀριθμὸς τῶν αἱμοσφαίριων μειοῦνται. Θ' ἀνέμενε κανεὶς ἐκ τούτου,
ὅτι ἡ πίεσις τοῦ αἵματος θὰ καταπέσῃ καὶ ὅτι τὰ ἐρυθρὰ αἱμοσφαίρια
δὲν θὰ ἐπαρκοῦν πλέον, διὰ νὰ δεσμεύουν ἀρκετὸν ὄξυγόνον. Τὰ βλα-
βερὰ ὅμως αὐτὰ ἀποτελέσματα τῆς αἱμορραγίας ἀποτρέπονται διὰ
τῆς συνεργασίας διαφόρων συστημάτων. Τὸ νευρικὸν σύστημα
συστέλλει τὰ ἀγγεῖα καὶ ἐπομένως ἡ πίεσις τοῦ αἵματος, παρὰ τὴν
ἐλάττωσιν τοῦ ὅγκου, διατηρεῖται σταθερά. Μετὰ τὴν ἐπείγουσαν
αὐτὴν τακτοποίησιν, ὁ ὄργανισμὸς φροντίζει, ὥστε νὰ ἐπανέλθῃ ὁ
ὅγκος καὶ ἡ σύστασις τοῦ αἵματος εἰς τὸ κανονικόν. Πρὸς τοῦτο
λέμφος εἰσδύει εἰς τὰ ἀγγεῖα ἀπὸ τοὺς ιστούς, ἀποθηκευμένον αἷμα

εἰσέρχεται ἀπὸ τὸν σπλῆνα καὶ τὸ ἡπαρ εἰς τὰ ἀγγεῖα καὶ ὁ ἀσθενής, αἱσθανόμενος μεγάλην δίψαν, πίνει πολὺ ὕδωρ. Ὁ μυελὸς τῶν ὀστῶν, ἔξ ἄλλου, παράγει μεγάλας ποσότητας ἐρυθρῶν αἵμοσφαιρίων πρὸς ἀντικατάστασιν τῶν ἀπολεσθέντων διὰ τῆς αἵμορραγίας.

Εἰς τὸ ἀνωτέρω παράδειγμα, συνέβη μία μεταβολὴ (ἀπώλεια ἐνὸς ὅγκου αἵματος), ἡ ὅποια θὰ ἡδύνατο νὰ διαταράξῃ τὴν λειτουργίαν τοῦ ὄργανισμοῦ. Διότι, ἐὰν ἡ πίεσις τῶν ἀγγείων κατέπιπτε πολύ, θὰ διεκόπτετο ἡ κίνησις τοῦ αἵματος. Ἐπίσης, ἂν ὁ ἀριθμὸς τῶν αἵμοσφαιρίων παρέμενε μικρός, δὲν θὰ ἐπήρκει διὰ νὰ δεσμεύσῃ τὴν ἀναγκαίαν ποσότητα ὁξυγόνου. Ὁ ὄργανισμὸς ἐν τούτοις κατέβαλεν ὠρισμένας προσπαθείας καὶ κατώρθωσε νὰ συνεχίσῃ τὴν λειτουργίαν του.

Ἡ τοιαύτη προσπάθεια, τὴν ὅποιαν καταβάλλει ὁ ὄργανισμὸς διὰ νὰ ἔχασφαλίσῃ τὴν λειτουργίαν του, παρὰ τὰς τυχὸν συμβαινούσας μεταβολάς, αἱ ὅποιαι δύνανται νὰ διαταράξουν αὐτήν, καλεῖται προσαρμοστικὴ λειτουργία. Μεταβολαὶ ὡς αἱ ἀνωτέρω δύνανται νὰ συμβοῦν ἐντὸς τοῦ ὄργανισμοῦ (π.χ. ἐλάτωσις τοῦ αἵματος) ἢ εἰς τὸ περιβάλλον (π.χ. ἀλλαγὴ κλίματος).

Αναφέρομεν ἀκόμη ἐν παράδειγμα, εἰς τὸ ὅποιον διαφαίνεται ἡ προσαρμοστικὴ ίκανότης τοῦ ὄργανισμοῦ.

Είναι γνωστὸν ὅτι ἡ θερμοκρασία τοῦ ἀέρος μεταβάλλεται. Ἐπίσης ἐντὸς τοῦ σώματος διὰ τῶν καύσεων παράγεται διάφορον ἑκάστοτε ποσὸν θερμότητος. Παρ’ ὅλα αὐτά, ἡ θερμοκρασία τοῦ ὑγιοῦς ἀνθρώπου διατηρεῖται σταθερά. Τοῦτο ἐπιτυγχάνεται ὡς ἔξης:

“Οταν ἡ ποσότης τῆς θερμότητος, ἐκ τῶν καύσεων καὶ ἐκ τοῦ περιβάλλοντος, τείνῃ νὰ αὔξῃσῃ τὴν θερμοκρασίαν τοῦ σώματος, παρατηροῦνται ὠρισμένα φαινόμενα ἀποτρέποντα τὸ ἀποτέλεσμα τοῦτο. Αἱ ἀναπνευστικαὶ κινήσεις ἐπιταχύνονται, ἥτοι γίνεται μεγαλυτέρα ἔξατμισις ὕδατος καὶ συχνοτέρα ἐπαφὴ τοῦ αἵματος πρὸς τὸν ἀέρα εἰς τοὺς πνεύμονας. Τὰ ἀγγεῖα τοῦ δέρματος διαστέλλονται καὶ ἐπομένως περισσότερον αἷμα κυκλοφορεῖ εἰς αὐτὰ καὶ ἔρχεται εἰς ἐπαφὴν μὲ τὸν ἀέρα. (Λέγουν τότε «κοκκίνισα ἀπὸ τὴν ζέστη»). “Ολα αὐτὰ προκαλοῦν μίαν ἀπώλειαν θερμότητος ἀπὸ τὸ αἷμα. Τέλος καὶ ὁ ιδρώς, ὁ ὅποιος ἐκκρίνεται, ἔξατμιζόμενος, ἀφαιρεῖ θερμότητα ἀπὸ τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ σώματος.

Ἐὰν ἀντιθέτως ἡ θερμοκρασία τοῦ περιβάλλοντος πέσῃ σημαντικῶς παρατηροῦνται φαινόμενα ἐμποδίζοντα τὴν πτῶσιν τῆς θερμοκρασίας τοῦ σώματος. Τὰ ἀγγεῖα τοῦ δέρματος συστέλλονται, ὥστε δλιγώτερον αἷμα νὰ ἔρχεται εἰς ἐπαφήν μὲ τὸν ψυχρὸν ἀέρα. (Λέγουν τότε «κιτρίνισα ἀπὸ τὸ κρύο»). Ἀντιθέτως, εἰς τὰ ἐσωτερικὰ ὅργανα κυκλοφορεῖ περισσότερον αἷμα καὶ οὕτω ἀφ' ἐνὸς μὲν διαφυλάσσει τὴν θερμότητά του, ἀφ' ἑτέρου δὲ αὔξανει τὰς καύσεις. Ἐπίστης διάφοροι μύες τίθενται εἰς κίνησιν μὲ σκοπὸν πάλιν τὴν αὔξησιν τῶν καύσεων. Τοιαῦται εἰναι π.χ. οἱ μύες τῶν τριχῶν (λέγουν τότε «ἀνατρίχιασσα ἀπὸ τὸ κρύο»), καθὼς καὶ οἱ μύες οἱ κινοῦντες τὴν γνάθον («κτυποῦν τὰ δόντια μου ἀπὸ τὸ κρύο»). Ἀκριβῶς διὰ νὰ αὐξήσωμεν τὰς καύσεις, θέτομεν εἰς λειτουργίαν καὶ ἔκουσίως τοὺς μῆς «γιὰ νὰ ζεσταθοῦμε».

Μετὰ τὰ προηγούμενα παραδείγματα κατανοοῦμεν καλύτερον, ὅτι αἱ διάφοροι μεταβολαὶ εἰς τὸ σῶμα ἢ τὸ περιβάλλον προκαλοῦν, διεγείρουν, ὡς λέγομεν, τὴν προσαρμοστικὴν λειτουργίαν τοῦ ὅργανισμοῦ. Ἡ λειτουργία αὕτη τελεῖται ύφ' ὅλου τοῦ ὅργανισμοῦ, δηλ. διάφορα συστήματα ἐργάζονται πρὸς ἀντίμετώπισιν ἀπὸ κοινοῦ τῶν ἀποτελεσμάτων κάθε μεταβολῆς.

Ἡ προσαρμοστικὴ λειτουργία ἐπιτυγχάνει τὸν σκοπὸν της, ἐφ' ὅσον αἱ συμβαίνουσαι μεταβολαὶ δὲν ὑπερβοῦν ωρισμένα ὅρια.

2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΧΝΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. ΣΚΛΗΡΑΓΩΓΙΑ.

(Παράδειγμα ζωῆς εἰς ὑψηλὰ μέρη).

Ἡ ἀνάγκη τῆς προσαρμογῆς ὑποχρεώνει διάφορα συστήματα νὰ ἐργάζωνται ζωηρότερον καὶ ἐντατικότερον. Ἡς ὑποθέσωμεν π.χ., ὅτι εἰς ἀνθρώπινος ὅργανισμὸς πρέπει νὰ ζήσῃ εἰς μέγα ὕψος ἐπὶ τίνος ὑψηλοῦ ὅρους. Ὁ ἀτμοσφαιρικὸς ἀτὴρ εἰς τὸ ὕψος τοῦτο εἶναι ἀραιός, ἐπομένως, διὰ νὰ δεσμεύῃ ὁ ὅργανισμὸς τὸ ἀναγκαῖον ὀξυγόνον, πρέπει νὰ εἰσάγῃ εἰς τοὺς πνεύμονας μεγαλύτερον ὄγκον ἀέρος. Πρὸς τοῦτο ἡ ἀναπνοὴ γίνεται βαθυτέρα, οἱ μύες τοῦ θώρακος ἐργάζονται περισσότερον, ἡ θωρακικὴ κοιλότης εὔρυνεται. Ἐξ ἄλλου παράγονται περισσότερα ἐρυθρὰ αἵμοσφαίρια. Ἐὰν ἀργότερον ὁ ἴδιος ὅργανισμὸς ἐπιστρέψῃ εἰς τὴν πεδιάδα, ὁ ἀριθμὸς τῶν αἱ-

μοσφαιρίων κατέρχεται καὶ πάλιν, ὅπερασδήποτε ὅμως ἡ ζωὴ εἰς τὸ ὑψηλὸν ὅρος ἀφήνει τὰ ἵχνη της. Ἡ ἀναπνοὴ παραμένει βαθεῖα, δὲ θώραξ καλύτερον ἀνεπτυγμένος, τὸ μυϊκὸν σύστημα, τὸ κυκλοφορικὸν καὶ τὰ αίμοποιητικὰ ὄργανα ἔχουν συνηθίσει νὰ ἐργάζωνται καλύτερον. Ἀποτέλεσμα τῆς ἔξασκήσεως αὐτῆς εἶναι, ὅτι τὰ διάφορα συστήματα ἐνδυναμώνονται καὶ ὅλος ὁ ὄργανισμὸς τονώνεται καὶ ἀποκτᾷ μεγαλυτέραν ἀντοχὴν.

Ἐὰν λοιπὸν ὑποβάλλωμεν τὸν ὄργανισμὸν εἰς ἐντατικὴν ἐργασίαν καὶ τὸν ἀφήνωμεν ν' ἀντιμετωπίσῃ μὲ τὰς ἴδιας του δυνάμεις τὰς μεταβολὰς τοῦ περιβάλλοντος, διεγείρεται ἡ προσαρμοστικὴ λειτουργία καὶ αὔξανεται ἡ ἀντοχὴ καὶ ἡ ζωηρότητα του. Τοιαύτη. εἶναι ἡ ἐπίδρασις π.χ. τῆς ἀγροτικῆς καὶ τῆς στρατιωτικῆς ζωῆς.

Εἶναι ὅμως φανερόν, ὅτι ἡ σκληραγωγία δὲν δύναται νὰ ὑπερβαίνῃ ὥρισμένα ὅρια. Τὰ ὅρια αὐτὰ εἶναι διάφορα δι' ἕκαστον ὄργανισμόν. Εἶναι γνωστόν, ὅτι ἄλλοι ἀντέχουν εἰς ἐντατικὴν προσπάθειαν ἡ εἰς τὰς ἀσθενείας, ἐνῷ ἄλλοι κουράζονται ἡ ἀσθενοῦν εὐκόλως. Ἰδιαιτέρα μάλιστα προσοχὴ ἀπαιτεῖται κατὰ τὴν νεαρὰν ήλικιαν, κατὰ τὴν ὁποίαν ἔξακολουθεῖ ἡ ἀνάπτυξις τοῦ σώματος καὶ ὁ ὄργανισμὸς εἶναι εύπαθής.

3. ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ

Εἰς τὴν κατάστασιν τοῦ σώματος καὶ τοῦ περιβάλλοντος ἐπέρχονται ἐνίστε μεταβολαί, αἱ ὁποῖαι θὰ ἡδύναντο νὰ δυσκολεύσουν τὴν ὁμαλὴν λειτουργίαν τοῦ ὄργανισμοῦ. Ἄλλὰ τὰ διάφορα ὄργανικά συστήματα ἔχουν τὴν ἰκανότητα νὰ συνεργάζωνται καὶ διὰ κοινῆς προσπαθείας ν' ἀντιμετωπίζουν τὰς νέας συνθήκας ζωῆς. Τοῦτο ἀποτελεῖ τὴν προσαρμοστικὴν λειτουργίαν τοῦ ὄργανισμοῦ. Ὁταν τὰ ὄργανικά συστήματα ὑποβάλλωνται συχνά εἰς τὴν προσπάθειαν τῆς προσαρμογῆς εἰς δυσκολωτέρους ὅρους, τὰ συστήματα ταῦτα ἔξασκοῦνται καὶ ἐνδυναμώνονται καὶ ὁ ὄργανισμὸς ἀποκτᾷ μεγαλυτέραν ἀντοχὴν καὶ ζωηρότητα (σκληραγωγία).

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

ΓΕΝΕΣΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΖΩΑ

Εις τὴν Φυτολογίαν ἐμάθομεν, ὅτι, γενικῶς, διὰ νὰ σχηματισθῇ ἐν νέον φυτόν, πρέπει νὰ ἔνωθοῦν δύο διάφορα γεννητικὰ κύτταρα. Τὸ ἐν ἔξ αὐτῶν, καλούμενον σπερματοζωάριον, εύρισκεται εἰς τὸν κόκκον τῆς γύρεως, τὸ δὲ ἄλλο, καλούμενον ωάριον, εύρισκεται ἐντὸς τῆς ωοθήκης. "Οταν ὁ κόκκος τῆς γύρεως πέσῃ ἐπὶ τοῦ ὑπέρου, τὰ δύο αὐτὰ κύτταρα, συναντώμενα, ἔνωνται (γονιμοποιούμενα) πλέον ωάριον ἔχει τὴν ικανότητα νὰ τμηθῇ καὶ νὰ σχηματίσῃ δύο κύτταρα, τὰ ὅποια δμοίως τέμνονται καὶ δίδουν τέσσαρα, δκτῷ κ.ο.κ. Τὰ δημιουργούμενα τοιουτότροπως κύτταρα σχηματίζουν τὸ ἐμβρύον τοῦ νέου φυτοῦ. Τὸ ἐμβρυον τοῦτο μένει ἐντὸς τοῦ σπόρου ἐν ἡρεμίᾳ ἐπὶ μῆνας ἥ καὶ ἔτη. Τέλος, ὅταν εύρεθῇ εἰς καταλλήλους συνθήκας, αὔξανεται σχηματίζει ρίζας καὶ ἀναπτύσσεται εἰς τὸ νέον φυτὸν (βλ. ἀστησις).

Αναλόγως καὶ εἰς τὰ ζῶα, μετὰ τὴν συνένωσιν τῶν δύο γεννητικῶν κυττάρων, σχηματίζεται πάλιν τὸ ἐμβρυον. Τοῦτο ἀναπτύσσεται εἰς ἄλλα μὲν ζῶα ἐκτὸς τοῦ σώματος τῆς μητρὸς (ωοτόκα), εἰς ἄλλα δὲ ἐντὸς αὐτοῦ (ζωοτόκα).

2. ΕΜΒΡΥΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ

Εις τὰ θηλαστικά, τὰ ὅποια, ὡς γνωστόν, είναι ζωοτόκα, ἡ ἀνάπτυξις τοῦ ἐμβρύου τελεῖται ἐντὸς τοῦ μυώδους, ἀσκοειδοῦς ὀργάνου, τῆς μήτρας. Αὕτη εύρισκεται εἰς τὴν κοιλότητα τῆς λεκάνης καὶ συγκοινωνεῖ πρὸς τὰς ωοθήκας. Τὸ ἐμβρυον συγκρατεῖται ὑπὸ τῶν λαχνῶν τοῦ βλεννογόνου τῆς μητρὸς, αἱ ὅποιαι ἀποτελοῦν τὸν πλακοῦντα. Αἱ λάχναι αὗται είναι πλούσιαι εἰς αἷμοφόρα ἀγγεία, τὰ ὅποια προσάγουν θρεπτικὰς ούσιας ἀπὸ τὴν κυκλοφορίαν τῆς μητρὸς πρὸς διατροφὴν τοῦ ἐμβρύου. Διὰ νὰ προστα-


τεύεται καὶ τὸ ἔμβρυον καὶ ἡ μήτηρ ἀπὸ ἀποτόμους μετατοπίσεις τοῦ ἔμβρυου, τοῦτο εύρισκεται ἐντὸς σάκκου πλήρους ύγρου. "Οταν ἡ ἀνάπτυξις τοῦ ἔμβρυου συμπληρωθῇ, τὸ ἔμβρυον ἔξερχεται ἀπὸ τὸ μητρικὸν σῶμα (τοκετὸς) καὶ ἀρχίζει τὴν ἀνεξάρτητον ζωήν του.

Εἰς τὸν ἄνθρωπον, ὁ ὅποιος ἀνήκει ἐπίστης εἰς τὰ Θηλαστικά, ἡ ἔμβρυϊκὴ ἀνάπτυξις, ἀπὸ τῆς στιγμῆς κατὰ τὴν ὅποιαν ἀρχίζει τὸ ὡάριον νὰ τέμνεται μέχρι τοῦ τοκετοῦ, διαρκεῖ περίπου 280 ἡμέρας. "Οσον προχωρεῖ ἡ ἀνάπτυξις, τόσον τὸ ἔμβρυον τελειοποιεῖται καὶ τέλος φθάνει εἰς τὴν μορφὴν τοῦ ἄνθρωπίνου νεογνοῦ.

3. ΑΙ ΗΛΙΚΙΑΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Τὸ νεογνὸν τοῦ ἄνθρωπου, τὸ ὅποιον ἔχει μέγεθος περίπου 50 ἔκ., μόλις ἔξελθη τοῦ μητρικοῦ σώματος ἀρχίζει νὰ ἀναπνέῃ καὶ νὰ κραυγάζῃ. Κατὰ τὸ πρῶτον ἔτος τῆς ἡλικίας του τὸ βρέφος τρέφεται διὰ τοῦ θηλασμοῦ, αὔξανει δὲ περίπου κατὰ 25 ἔκ. Κατὰ τὸ τέλος τοῦ πρώτου ἔτους ἀναφαίνονται οἱ πρῶτοι τομεῖς ὁδόντες Τὸ 2ον καὶ 3ον ἔτος τῆς ζωῆς ἀποτελοῦν τὴν νηπιακὴν ἡλικίαν, κατὰ τὴν ὅποιαν ὁ ἄνθρωπος ἀρχίζει νὰ βαδίζῃ, νὰ κάθηται καὶ νὰ ὅμιλῃ. Κατὰ τὸ 2ον ἔτος παρατηρεῖται αὔξησις κατὰ 10 περίπου ἔκ., συμπληροῦται δὲ καὶ ἡ πρώτη ὁδοντοφυΐα ἐξ 20 νεογιλῶν ὁδόντων. Κατὰ τὴν νηπιακὴν ἡλικίαν τὰ ὁστᾶ τοῦ κρανοῦ ἀφένουν μεταξύ των μεμβρανώδη διάκενα, καλούμενα πηγάσι, διὰ νὰ μὴ ἐμποδίζεται ἡ αὔξησις τοῦ ἐγκεφάλου (εἰκ. 52.) Γενικῶς δὲ τὰ ὁστᾶ τοῦ νηπίου είναι πολὺ εὔπλαστα.

Τὴν νηπιακὴν διαδέχεται ἡ παιδικὴ ἡλικία. Ἔνω γενικῶς




Εἰκ. 52. Αἱ πηγαὶ τοῦ κρανοῦ: α') νεογνοῦ, β') εἰς ἡλικίαν 9 μηνῶν, γ') εἰς ἡλικίαν ἑνὸς ἔτους, δ') εἰς ἡλικίαν τριῶν ἔτων.

ἡ ἐτησία αὔξησις τοῦ σώματος φθάνει τὰ 5 ἔκ., ὑπάρχουν δύο περίοδοι τῆς παιδικῆς ἡλικίας, κατὰ τὰς ὅποιας ἡ ἀνάπτυξις τελεῖται γοργότερον. Ἡ πρώτη τοιαύτη περίοδος συμπίπτει μὲ τὸ δον ἡ 7ον ἔτος, ἡ δὲ δευτέρα μὲ τὸ τέλος τῆς παιδικῆς ἡλικίας. Κατὰ τὴν παιδικὴν ἡλικίαν ἀποπίπτουν βαθμιαίως οἱ νεογιλοὶ ὀδόντες, ἐκφύονται δὲ οἱ μόνιμοι, πλὴν τῶν τρίτων γομφίων.

Ἐκ τῶν ἐνδοκρινῶν ἀδένων λειτουργοῦν ἐντατικώτερον ὁ θύμος, ἡ ὑπόφυσις καὶ ἡ ἐπίφυσις. Ἐκ τούτων ἡ ἐπίφυσις μετὰ τὸ 10ον ἔτος καταστρέφεται. Ἀπὸ τοῦ 12ου μέχρι τοῦ 14ου ἔτους τὰ θήλεα, δύο δὲ περίπου ἔτη ἀργότερον τὰ ἄρρενα, εἰσέρχονται εἰς τὴν ἐφικτὴν ἡλικίαν. Κατ’ αὐτὴν τὰ θήλεα δὲν αὔξανουν σχεδὸν καθόλου, ἐνῷ τὰ ἄρρενα ἔξακολουθοῦν νὰ αὔξανουν μέχρι τοῦ 21ου ἔτους. Ὁ σκελετὸς καὶ τὸ μυϊκὸν σύστημα ἴσχυροποιοῦνται. Ἔνῳ ὑποχωρεῖ ἡ λειτουργία τοῦ θύμου καὶ τῆς ἐπιφύσεως, ἐντείνεται ἡ λειτουργία ἄλλων ἐνδοκρινῶν ἀδένων, ώς π.χ. τοῦ θυρεοειδοῦς. Γενικῶς ἡ ἐφηβικὴ ἡλικία είναι τὸ στάδιον, κατὰ τὸ ὅποιον ὁ ἀνθρωπός τείνει νὰ φθάσῃ εἰς τὴν κατάστασιν τοῦ ὥριμου ἀνδρὸς ἡ τῆς ὥριμου γυναικός.

Κατὰ τὴν ὥριμον ἡλικίαν, ἡ ὅποια διαδέχεται τὴν ἐφηβικήν, δὲν γίνεται πλέον αὔξησις καθ’ ὑψος τοῦ σώματος, τὸ ὅποιον ἀποκτᾷ τὴν ὀριστικήν του ἀνάπτυξιν, καὶ τὰς ὀριστικάς του ἀναλογίας (εἰκ. 53). Τέλος, τὴν ὥριμον ἡλικίαν ἀκολουθεῖ τὸ γῆρας, τὸ ὅποιον δύναται νὰ παραταθῇ ἐπὶ πολλὰ ἔτη. Κατ’ αὐτὸν διάφορα ὅργανα ἀρχίζουν νὰ ἀτροφοῦν καὶ γενικῶς ὁ ἔργανισμὸς ἔχει σθενεῖ.



Εἰκ. 53. Ἡ μεταβολὴ τῶν ἀναλογιῶν τοῦ σώματος. α') "Ἔμβρυον. β') Παιδίον, γ') "Ωριμός ἀνήρ.

4. ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ

‘Ο ἄνθρωπος γεννᾶται, ἔπειτα ἀπὸ κύησιν 280 ἡμερῶν. Κατὰ τὴν διάρκειαν αὐτῆς τρέφεται δι’ οὓσιῶν, τὰς ὅποιας παραλαμβάνει ἀπὸ τὸ κυκλοφορικὸν σύστημα τῆς μητρός. Τὸν 1ον ἔτος ἀπὸ τῆς γεννήσεως ἀνήκει εἰς τὴν βρεφικὴν ἡλικίαν, τὸ 2ον καὶ 3ον εἰς τὴν νηπιακήν. Ἀκολουθεῖ ἡ παιδικὴ ἡλικία μέχρι τοῦ 12ου—14ου ἔτους, διτε τὴν ἐφηβικήν, τὴν ὅποιαν πάλιν διαδέχεται ἡ ὥριμος ἡλικία. Ἀπὸ τῆς γεννήσεως, ἡ αὔξησις τοῦ σώματος ἔξακολουθεῖ μέχρι τῆς ἐφηβικῆς ἡλικίας εἰς τὰ θήλεα, εἰς τὰ ἀρρενα δὲ συνεχίζεται καὶ μέχρι τῆς ὥριμου.

5. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1) Κάμνε κάθε χρόνο τὴν ἴδιαν ἡμέραν (π.χ. τῶν γενεθλίων) μίαν ἀκριβῆ μέτρησιν τοῦ ἀναστήματος καὶ τοῦ βάρους σου καὶ σημείωνε τί εύρισκεις. Κάμνε τὸ ἴδιο καὶ εἰς τοὺς ἀδελφούς σου.

2) Λόγω ὥρισμένων μικρῶν διαφορῶν μεταξὺ τοῦ δεξιοῦ καὶ τοῦ ἀριστεροῦ μέρους τοῦ σώματος, είναι ἀδύνατον νὰ βαδίσῃ κανεὶς μὲ κλειστούς ὀφθαλμούς κατ’ εύθειαν γραμμήν. Δοκίμασέ το εἰς μίαν ὁμαλήν ἔκτασιν, προσπαθῶν νὰ φθάσης, μὲ κλειστούς ὀφθαλμούς, κατ’ εύθειαν ἀπὸ ἐν σημείον εἰς ἄλλο.

3) Καὶ τὸ πρόσωπον παρουσιάζει γενικῶς μίαν μικρὰν ἀσυμμετρίαν εἰς τὰς διαστάσεις καὶ τὴν «μιμικήν» τῶν δύο τμημάτων του. Παρατήρησε εἰς μίαν φωτογραφίαν τὸ ἀριστερὸν μέρος ἐνὸς προσώπου, καλύπτων τὸ δεξιόν, καὶ ἀντιστρόφως.

4) Μέτρησε καὶ σύγκρινε τὰς ἔξης διαδοχικὰς ἀποστάσεις: κορυφὴ κρανίου—ἄκρον ρινός—άρχη στέρνου—τέλος τοῦ στέρνου—ὅμφαλος—ἡβικὴ σύμφυσις—πέλμα.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ

ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

1. ΦΥΣΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Κάθε ἄνθρωπος ζῆται εἰς ἓνα τόπον τῆς γῆς, ὁ διόποιος παρουσιάζει ώρισμένα γεωγραφικά γνωρίσματα, ώρισμένον κλῖμα καὶ ώρισμένον φυτικὸν καὶ ζωϊκὸν κόσμον. Αὐτὰ ὅλα ἀποτελοῦν τὸ φυσικὸν περιβάλλον. Ἐξ ἄλλου, κάθε ἄνθρωπος εἶναι καὶ μέλος μιᾶς κοινωνίας, ἡ διόποια ἔχει ώρισμένον πολιτισμὸν καὶ ἡ διόποια ἀποτελεῖ τὸ κοινωνικὸν περιβάλλον.

Μὲ τὸ φυσικὸν περιβάλλον ὁ δργανισμὸς ἔρχεται εἰς ἐπικοινωνίαν διὰ τῆς ἐπιφανείας τοῦ σώματος, τόσον τῆς ἔξωτερικῆς ὅσον καὶ τῆς ἐσωτερικῆς. Καὶ ἡ μὲν ἔξωτερικὴ ἐπιφάνεια ἀποτελεῖται ἀπὸ τὸ δέρμα, ἡ δὲ ἐσωτερικὴ ἀπὸ τούς βλεννογόνους, οἱ διόποιοι ὑπενδύουν τὰς κοιλότητας τοῦ σώματος καὶ τοῦ πεπτικοῦ καὶ ἀναπνευστικοῦ σωλῆνος. Ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὸ δέρμα, οἱ βλεννογόνοι στεροῦν ται κερατίνης στοιβάδος καὶ ἐπομένως δύνανται ούσιαι ἐκ τοῦ περιβάλλοντος νὰ διέλθουν δι' αὐτῶν. Τέλος, ὁ δργανισμὸς ἐπικοινωνεῖ μὲ τὸ περιβάλλον καὶ διὰ τῶν αἰσθητηρίων του δργάνων.

Δυνάμεθα νὰ συνοψίσωμεν τὰς σχέσεις, εἰς τὰς διόποιας ἔρχεται διὰ τῶν ἀνωτέρω ἐπιφανειῶν ὁ δργανισμὸς πρὸς τὸ περιβάλλον, ὡς ἔξης:

α') Μεταξὺ δργανισμοῦ καὶ περιβάλλοντος γίνεται ἀνταλλαγὴ διαφόρων οὐσιῶν.

β') Τὸ σῶμα ὑφίσταται διὰ τῆς ἐπιφανείας του τὴν ἐπίδρασιν τῶν φυσικῶν ὅρων τοῦ περιβάλλοντος (θερμοκρασία, φῶς κλπ.).

γ') Ο δργανισμὸς ἔρχεται εἰς βιολογικὰς σχέσεις μὲ τὸν ἄλλον

όργανικὸν κόσμον. Ἰδίως διάφοροι μικροοργανισμοὶ ἀσκοῦν σπουδαιοτάτην ἐπίδρασιν ἐπ’ αὐτοῦ.

δ') Διὰ τῶν αἰσθητηρίων καὶ τοῦ νευρικοῦ συστήματος δέχεται δόργανισμὸς διαρκῶς ἐκ τοῦ ἔξωτερικοῦ κόσμου ἐρεθίσματα καὶ δημιουργεῖ ἐν τῷ πώσεις.

2. ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΣ ΟΥΣΙΩΝ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ἐκ τῆς ἀτμοσφαίρας ὁ δόργανισμὸς προσλαμβάνει τὸ δέξιγόνον. Τοῦτο εἰς τὸ κατώτερον λεπτὸν στρῶμα τῆς ἀτμοσφαίρας, ἐντὸς τοῦ ὅποιου ζῇ ὁ ἄνθρωπος, ὑπάρχει ύπο σταθερὰν ἀναλογίαν (21%). Διὰ τοπικοὺς λόγους (ἔλη, πόλεις, σπήλαια κλπ.) είναι δυνατὸν δότημασφαιρικὸς ἀήρ νὰ περιέχῃ διαφόρους ἐπιβλαβεῖς προσμίξεις εἰς μίαν μικρὰν περιοχὴν (σκόνη, διάφορα ἀέρια κλπ.).

Κατὰ τὰς λειτουργίας τῆς θρέψεως δόργανισμὸς προσλαμβάνει ὕδωρ καὶ θρεπτικάς ούσιας. Ἡ σύστασις τοῦ ὕδατος καὶ τὸ εἶδος τῶν τροφῶν ἔχει τοπικά διαφορά τοῦ σταθερού περιβάλλοντος, διότι οἱ διάφοροι πληθυσμοὶ χρησιμοποιοῦν κυρίως τρόφιμα παραγόμενα εἰς τὸν τόπον των. Τοῦτο ισχύει περισσότερον διὰ τοὺς ἀγροτικοὺς πληθυσμούς, οἱ ὅποιοι είναι οἱ ιδιοί παραγωγοί, καὶ δι' ἀπομεμονωμένους πληθυσμούς. Διὰ τοῦτο συμβαίνει εἰς τινας τόπους ἡ διατροφὴ τοῦ μεγαλυτέρου μέρους τοῦ πληθυσμοῦ νὰ είναι μονομερής. Π.χ. εἰς τὴν "Απωλετὴν" ή κυρία τροφὴ μεγάλων μαζῶν είναι τὸ ρύζι, οἱ δὲ Ἐσκιμῶοι τρέφονται σχεδὸν ἀπὸ φάρια καὶ κυνήγιον.

Είναι φανερόν, ὅτι διὰ τοῦ τρόπου τούτου τὸ ἀμεσον φυσικὸν περιβάλλον ἐπιδρᾷ ἐπὶ τῆς ἀναπτύξεως καὶ τῆς ὑγείας τοῦ ἀνθρώπου.

'Ἐν τούτοις, ἡ ἐπίδρασις αὕτη τοῦ περιβάλλοντος ἔχει ἐλαττωθῆδιὰ τοῦ πολιτισμοῦ. Διότι, χάρις εἰς τὸ ἐμπόριον, τὰ προϊόντα τῶν διαφόρων χωρῶν κυκλοφοροῦν εἰς ὅλον τὸν κόσμον, αἱ δὲ συνήθειαι τῶν ἀνθρώπων τείνουν νὰ ἔχομοιωθοῦν.

3. ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ἡ θερμοκρασία μεταβάλλεται εἰς ἓν τόπον ἀναλόγως τῆς ἐποχῆς, τῆς ὥρας τοῦ ἡμερονυκτίου, τῆς νεφώσεως κλπ. Ἐπίσης ἀπὸ

τόπου εἰς τόπον διαφέρει ή θερμοκρασία ἀναλόγως τῆς γεωγραφικῆς θέσεως.

Γνωρίζομεν ἡδη, πῶς ὁ ύγιης ὄργανισμὸς κατορθώνει, παρ' ὅλο αὐτά, νὰ διατηρῇ σταθερὰν τὴν θερμοκρασίαν του. Ἐὰν ἐν τούτοις ἡ θερμοκρασία τοῦ περιβάλλοντος ἔξελθῃ ἀπὸ τὰ ὅρια τῆς ἀντοχῆς του, ή λειτουργία τοῦ ὄργανισμοῦ διαταράσσεται καὶ παρουσιάζονται διάφοροι παθήσεις (θερμοπληξία).

Αἱ ἡλιακαὶ ἀκτῖνες ὥφελοῦν τὸν ὄργανισμόν. Διὰ τοῦτο μάλιστα καὶ χρησιμοποιοῦνται πρὸς ἐνδυνάμωσίν του καὶ πρὸς θεραπείαν ὠρισμένων παθήσεων, ἵδια τῶν ὀστῶν καὶ τοῦ δέρματος (ἡλιοθεραπεία). Εἰς τὴν ἐπίδρασιν τῶν ἀκτίνων τούτων ἀπαντᾷ ὁ ὄργανισμὸς διὰ τοῦ σχηματισμοῦ χρωστικῆς εἰς τὸ δέρμα. Ἡ χρωστικὴ αὔτη δυσκόλως σχηματίζεται εἰς τὰ ξανθὰ καὶ ἀνοικτόχρωμα ἄτομα. Διὰ τοῦτο οἱ ἡλιακαὶ ἀκτῖνες προκαλοῦν εἰς τὸ ἀπροστάτευτον δέρμα τῶν ἀτόμων τούτων εὐκόλως ἐγκαύματα (φυσαλίδες, ξεφλούδισμα).

Εἰς τοὺς διαφόρους τόπους τῆς γῆς ἡ ἡλιοφάνεια δὲν εἶναι ἡ αὐτὴ καὶ τοῦτο ἔχει ἐπίσης σημασίαν διὰ τὸν ὄργανισμόν. Εἰς τὴν Ἀγγλίαν π.χ., ὅπου ἐλάχισται ἡμέραι ἡλιοφανείας ὑπάρχουν, εἶναι συχνὴ ἡ ραχίτις (ἀγγλικὴ νόσος).

'Εκ τῶν ἄλλων φυσικῶν ὅρων τοῦ περιβάλλοντος μεγάλην ἐπίδρασιν ἔπι τοῦ ὄργανισμοῦ ἀσκεῖ ἡ ἀτμοσφαιρικὴ ὑψος, ἐλαττοῦται, λόγῳ τῆς ἀραιώσεως τοῦ ἀτμοσφαιρικοῦ ἀέρος. Ἔνῷ εἰς μικρὰς μεταβολὰς τῆς πιέσεως ὁ ὄργανισμὸς προσαρμόζεται, αἱ μεγάλαι μεταβολαὶ προκαλοῦν εἰς αὐτὸν σοβαρὰς βλάβας. Διάφοροι τοιαῦται παθήσεις παρατηροῦνται εἰς τοὺς ὀρειβάτας καὶ τοὺς ἀεροπόρους, οἱ ὅποιοι ἀνέρχονται εἰς μεγάλα ὑψη, καθὼς καὶ εἰς τοὺς δύτας, οἱ ὅποιοι ὑφίστανται ἐντὸς τοῦ ὕδατος ἰσχυροτάτας πιέσεις.

4. ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Διάφοροι μικροοργανισμοὶ ἐπιζητοῦν νὰ ἐγκατασταθοῦν εἰς τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος καὶ νὰ τρέφωνται ἀπὸ τοὺς ιστούς του. Τοιοῦτοι ὄργανισμοὶ εἶναι διάφορα ἔντομα καὶ ἀκάρεα

(ψώρα κλπ.). Ἀλλα ἔντομα ἀπομυζοῦν αἷμα καὶ μάλιστα δύνανται διὰ τοῦ τρόπου τούτου νὰ μεταδώσουν καὶ διαφόρους ἀσθενείας (κώνωπτες κλπ.).

Μερικοὶ ὄργανισμοὶ ἐγκαθίστανται ἐντὸς τοῦ πεπτικοῦ σωλῆνος τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἀπορρέφοῦν θρεπτικάς ούσιας. Τοιαῦτα παράσιτα εἰναι ἡ ταινία, αἱ ἀμοιβάδες κλπ. Τέλος, ἄλλοι μικροοργανισμοὶ εἰσδύουν ἐντὸς τῶν ιστῶν τοῦ σώματος, ἀναπτύσσονται ἐκεῖ καὶ προκαλοῦν τὰς μολυσματικὰς ἀσθενείας. Οἱ ὄργανισμοὶ οὗτοι ὑπάγονται εἰς τὰ βακτήρια ἢ τὰ πρωτόζωα ἢ τοὺς μύκητας, ἐνίοτε ὅμως εἰναι καὶ ἀνώτερα ζῶα, ὡς ὁ ἔχινοκοκκος.

Κατὰ τῶν ἀνωτέρω παθογόνων μικροοργανισμῶν ἀμύνεται ὁ ἀνθρώπινος ὄργανισμὸς διὰ τῶν λευκῶν αἵμοσφαιρίων, διὰ διαφόρων ούσιῶν (ἀντιοξείαι), τὰς όποιας πρὸς τοῦτο παράγει, καὶ δι’ ἄλλων μέσων. Ἡ ἔξετασις τοῦ τρόπου, μὲ τὸν ὅποιον δύναται νὰ ἐνισχυθῇ δ ὄργανισμὸς εἰς τὸν ἀγῶνά του τοῦτον, ἀποτελεῖ θέμα τῆς Ἱατρικῆς.

5. ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ

Τὸ φυσικὸν περιβάλλον ἐπιδρᾷ ἐπὶ τοῦ ὄργανισμοῦ τοῦ ἀνθρώπου κατὰ τοὺς ἔξης τρόπους: α’) διὰ τῆς ἀνταλλαγῆς ούσιῶν, ἡ ὅποια γίνεται μεταξύ τούτου καὶ τοῦ ὄργανισμοῦ (ἀήρ, τροφαί)· β’) διὰ τῶν φυσικῶν συνθηκῶν τοῦ περιβάλλοντος (ἡλιακαὶ ἀκτῖνες, πτίεσις κλπ.)· καὶ γ’) διὰ τῶν ὄργανισμῶν, οἱ ὅποιοι ἔρχονται εἰς σχέσεις μὲ τὸ ἀνθρώπινον σῶμα (παράσιτα, μικρόβια).

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ

ΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑΙ ΦΥΛΑΙ


1. ΠΟΙΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΙΜΕΥΟΥΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΡΙΣΙΝ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΦΥΛΩΝ. ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ

Έκ πείρας διακρίνομεν τούς ἀνθρώπους εἰς φυλάς, στηριζόμενοι εἰς διάφορα σωματικά γνωρίσματα, τὰ δποῖα παρουσιάζουν οὗτοι. Εἶναι ὅμως δυνατὸν νὰ παρατηρήσωμεν σημαντικὰς διαφορὰς μεταξὺ ὡρισμένων ἀτόμων καὶ ἐν τούτοις νὰ μὴ τὰς λάβωμεν ύπ' ὄψιν, διὰ νὰ κατατάξωμεν τὰ ἄτομα εἰς διαφόρους φυλάς. Τοιαῦται διαφοραὶ εἰναι ὅσαι ὁφείλονται εἰς τὸ φῦλον καὶ τὴν ἡλικίαν (σύγκρισις ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν, νεαρῶν καὶ ἐνηλίκων ἀτόμων τῆς αὐτῆς φυλῆς). Έπίσης δὲν λαμβάνονται ύπ' ὄψιν ὅσα σωματικὰ γνωρίσματα ἔδημιουργήθησαν ἀπὸ τὸν τρόπον τῆς ζωῆς (ἐπάγγελμα κλπ.). Ἡ ἀπὸ τυχαία γεγονότα (ἀσθένεια κλπ.).

Διαφοραὶ ὡς αἱ ἀνωτέρω ύπάρχουν ἐντὸς κάθε φυλῆς. Διὰ νὰ διακρίνωμεν ἐπομένως τὰς φυλάς, πρέπει νὰ στηριχθῶμεν εἰς ἄλλα γνωρίσματα, τὰ δποῖα νὰ παρουσιάζωνται ὁμοιομόρφως ἐντὸς ἑκάστης φυλῆς. Ἀκόμη πρέπει τὰ γνωρίσματα αὐτὰ νὰ εἶναι κληρονομικά. Βεβαίως τὰ γνωρίσματα αὐτὰ δὲν θὰ παρουσιάζωνται κατὰ τὸν αὐτὸν ἀκριβῶς βαθμὸν ἀνεπτυγμένα εἰς ὅλα τὰ ἄτομα, αἱ παρατηρούμεναι ὅμως διαφοραὶ θὰ εἶναι μικραί.

Ἐὰν ἔχωμεν ύπ' ὄψιν τ' ἀνωτέρω, δυνάμεθα νὰ καθορίσωμεν μὲν μεγαλυτέραν ἀκριβειαν τί ἐννοοῦμεν μὲ τὸν ὄρον φυλή. Φυλὴ εἶναι μία μεγάλη συνήθως ὁμάς ἀνθρώπων, τὴν δποίαν διακρίνομεν ἀπὸ τὰς ἄλλας, διότι παρουσιάζει ἐν σύνολον ἴδικῶν της γνωρίσμάτων, τὰ γνωρίσματα δὲ αὐτὰ εἶναι κληρονομικά καὶ παρουσιάζονται μὲν μικρὰς μόνον διαφορὰς μεταξὺ τῶν ἀτόμων τῆς φυλῆς.

Πολλοὶ ἐπιστήμονες ἐπρότειναν διαφόρους διακρίσεις τῶν ἀν-



Εικ. 54. Οι τρεις μεγάλαι περιοχαὶ τῆς Εύρωποσίας.

θρωπίνων φυλῶν. Π.χ. ὁ Blumenbach διέκρινε 5 μεγάλας φυλάς, τὰς ἔξης: 1) τὴν Λευκὴν ἢ Καυκασίαν φυλήν, 2) τὴν Μογγολικὴν ἢ Κιτρίνην, 3) τὴν Αἰθιοπικὴν ἢ Μαύρην, 4) τὴν Ἀμερικανικὴν ἢ Ἐρυθρόδερμον καὶ 5) τὴν Μαλαιϊκὴν φυλήν.

Κατωτέρω θὰ περιγράψωμεν τὰς σημερινὰς ἀνθρωπίνας φυλὰς συμφώνως πρὸς νεωτέρας διακρίσεις.

2. ΑΙ ΤΡΕΙΣ ΜΕΓΑΛΑΙ ΠΕΡΙΟΧΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΑΣΙΑΣ. ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΜΕΓΑΛΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΦΥΛΩΝ

“Ας φέρωμεν μίαν γραμμήν διά τῶν Ἰμαλαῖων ὁρέων καὶ, διαγωνίως πρὸς αὐτήν, μίαν ἄλλην διά τῆς ὁροσειρᾶς τοῦ Γιὲν Σὰν καὶ τῶν Ἀλταίων μέχρι τοῦ Βεριγγείου πορθμοῦ. Αἱ γραμμαὶ αὗται ἔχωρίζουν τρεῖς μεγάλας περιοχὰς εἰς τὴν Εύρωποασίαν. Ἡ βόρειος περιοχὴ περιλαμβάνει τὴν Εύρωπην καὶ τὴν Βόρειον Ἀσίαν, ἡ ἀνατολικὴ περιλαμβάνει τὴν Κεντρικὴν Ἀσίαν καὶ τὰς γειτονικὰς νήσους καὶ ἡ νότιος περιοχὴ περιλαμβάνει τὰς νοτίους χερσονήσους τῆς Ἀσίας καὶ τὰς πλησίους νήσους. Εἰς τὰς ἀρχὰς τῆς σημερινῆς γεωλογικῆς ἐποχῆς, ὅταν ἥρχισε νὰ ἀναπτύσσεται ὁ ἀνθρωπος, αἱ τρεῖς αὗται περιοχαὶ ἔχωρίζοντο μεταξύ τῶν, περισσότερον παρὰ στήμερον, ἀπὸ τὰ ὅρη καὶ τὰς θαλάσσας, καθὼς καὶ τοὺς παγετῶνας καὶ τὰς ἐρήμους τῆς ἐποχῆς ἐκείνης (εἰκ. 54).

Οὕτως, εἰς ἑκάστην τῶν ἀνωτέρω περιοχῶν ἀνεπτύχθησαν φυλαί, αἱ ὁποῖαι ὁμοιάζουν μεταξύ τῶν, διαφέρουν δὲ πολὺ ἀπὸ τὰς φυλὰς τῶν ἄλλων περιοχῶν. Τὰ τρία αὗτά μεγάλα ἀθροίσματα τῶν φυλῶν, τὰ ὅποια ἀνεπτύχθησαν εἰς τὰς περιοχὰς αὗτάς, καλοῦνται κλάδοι φυλῶν.

3. Ο ΜΟΓΓΟΛΟΕΙΔΗΣ ΚΛΑΔΟΣ. ΑΙ ΦΥΛΑΙ ΤΑΣ ΟΠΟΙΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

‘Ο κλάδος οὗτος περιλαμβάνει τὰς φυλάς, αἱ ὅποιαι ἀνεπτύχθησαν εἰς τὴν ἀνατολικὴν περιοχήν, ἀργότερα δὲ ἔξηπλώθησαν καὶ εἰς τὴν Ἀμερικήν.

Γενικῶς τὰ σωματικὰ γνωρίσματα τῶν φυλῶν τοῦ κλάδου τούτου (εἰκ. 55) εἶναι τὰ ἔξης: βραχυκεφαλία καὶ ἀνάστημα μέτριον ἢ μικρόν. Ἡ κόμη εἶναι μαύρη, λεία καὶ ἀραιά, τὸ δὲ τρίχωμα εἰς τὸ σῶμα εἶναι σπάνιον. Τὸ δέρμα ἔχει χρῶμα κιτρινωπόν, οἱ ὀφθαλμοὶ



Εἰκ. 55. Ἀτομον με ἔντονα τὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ μογγολειδοῦς κλάδου. Γυνὴ ἐκ Μαντζουρίας.



Εἰκ. 56. Κινέζος.

είναι λοξοί καὶ στενοί, ἀπέχουν πολὺ μεταξύ των καὶ τὰ βλέφαρα εύρισκονται ὑψηλά. Τὸ πρόσωπον εἶναι ἐπίπεδον καὶ τὸ μέτωπον λοξόν. Ὡς ὅμως θὰ ἴδωμεν, τὰ χαρακτηριστικά αὐτά δὲν παρουσιάζονται εἰς ὅλας τὰς φυλὰς τοῦ κλάδου τούτου μὲ τὴν ἴδιαν ζωηρότητα.

Αἱ κύριαι φυλαί, τὰς ὁποίας διακρίνουν εἰς τὸν κλάδον τοῦτον, εἶναι αἱ ἔξης:

1) **Σιβηρίδαι.** Οὗτοι ζοῦν εἰς τὰ δάση τῆς Σιβηρίας καὶ ἔχουν ἔλθει εἰς ἐπαφὴν μὲ τὸν εὐρωποειδῆ κλάδον. Διὰ τοῦτο δὲν παρουσιάζουν πολὺ ἔντονα τὰ μογγολοειδῆ χαρακτηριστικά.

2) **Τουγκίδαι.** Οὗτοι εἶναι οἱ γνωστοὶ ὡς κυρίως Μογγόλοι. Ζοῦν νομαδικῶς

εἰς τὰς ἑρήμους τῆς Κεντρικῆς Ἀσίας. Παρουσιάζουν τὰ μογγολοειδῆ χαρακτηριστικά ἐντόνως ἀνεπτυγμένα. Ἀλλοτε ἐσάρωναν ὡς ἐπιδρομεῖς ὅλην τὴν Εύρωπην καὶ τὴν Ἀσίαν. (Τσεγγίς Χὰν—ΙΓ' αἰών, Ταμερλάνος—ΙΔ' αἰών).

3) **Σινίδαι** (εἰκ. 56). Εἰς αὐτοὺς ὑπάγονται οἱ Κινέζοι, οἱ ὁποῖοι οἱ δομοιάζουν πρὸς τοὺς Εύρωπαίους περισσότερον ἀπὸ κάθε ἄλλην μογγολοειδῆ φυλήν. Παρουσιάζουν τὴν μεγαλυτέραν ἀναλογίαν ἀτόμων μὲ δύκωδες κρανίον (1400 κυβ. ἑκατ. καὶ ἄνω). Ἀνέπτυξαν τὸν ἀρχαιότερον πολιτισμὸν καὶ ἡ ιστορία τῆς αὐτοκρατορίας των ἀρχίζει εἴκοσι δύο αἰώνας π.Χ.

Οἱ Ἰάπωνες εἶναι ἔθνος, τὸ ὁποῖον προῆλθεν ἐκ τῆς ἀναμίξεως διαφόρων γειτονικῶν φυλῶν.

4) **Παλαιομογγολίδαι.** Οὗτοι εἶναι οἱ νεώτεροι τοῦ μογγολοειδοῦς κλάδου καὶ ζοῦν εἰς τὸ Σιάμ καὶ τὰς νοτιοανατολικὰς νήσους τῆς Ἀσίας.

5) **Ἰνδιανίδαι.** Είναι τὸ τμῆμα τοῦ μογγολοειδοῦς κλάδου, τὸ ὁποῖον ἐπέρασεν εἰς τὴν Ἀμερικήν. Ἀλλοτε εἶχον ἀναπτύξει ἐκεῖ Ισχυρὰ κράτη, τὰ ὁποῖα κατεστράφησαν τελειωτικῶς ὑπὸ τῶν ἀποικιῶν τῆς Ἀμερικῆς. Σήμερον βαίνουν οἱ Ἰνδιανίδαι πρὸς τὴν ἔξακτην ποφάνισιν, μὴ δυνάμενοι νὰ προσαρμοσθοῦν εἰς τὸν εὐρωπαϊκὸν πο-

λιτισμόν. Εἰς τὴν Βόρειον Ἀμερικὴν καλοῦνται συνήθως Ἐρυθρόδερμοι (εἰκ. 57) καὶ ζοῦν ἀκόμη νομαδικῶς.

Σημεῖος. Δευτερεύουσα φυλὴ τοῦ μογγολοειδοῦς κλάδου θεωροῦνται καὶ οἱ Ἐσκιμῶοι, οἱ ὅποιοι κατοικοῦν εἰς τὴν βόρειον ἀρκτικὴν περιοχὴν (εἰκ. 58).

4. Ο ΝΕΓΡΟΕΙΔΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΑΙ ΦΥΛΑΙ ΤΑΣ ΟΠΟΙΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

‘Ο κλάδος οὗτος περιλαμβάνει φυλάς, αἱ ὅποιαι ἀνεπτύχθησαν εἰς τὴν νοτίαν μεγάλην περιοχὴν τῆς Εύρωποασίας. Σήμε-



Εἰκ. 57. Ἐρυθρόδερμος.



Εἰκ. 58. Ἐσκιμῶος.

ρον εἶναι ἔξηπλωμένος ὁ κλάδος οὗτος εἰς τὴν Ἀφρικὴν καὶ τὴν Μελανησίαν.

Εἰς τὸν κλάδον τοῦτον παρουσιάζονται ποικίλα ἀναστήματα. Οὕτως ώρισμέναι φυλαὶ τῆς Ἀφρικῆς παρουσιάζουν τὸ ὑψηλότερον ἀνάστημα, ἐνῷ ἄλλαι τὸ βραχύτερον (Πυγμαῖοι κάτω τῶν 140 ἑκ.). Χαρακτηρίζουν τὸν νεγροειδῆ κλάδον (εἰκ. 59) τὸ μαῦρον χρῶμα τοῦ δέρματος, τὰ χονδρὰ προέχοντα χείλη κλπ.

Αἱ κύριαι φυλαὶ τοῦ κλάδου τούτου εἶναι αἱ ἔξης:

1) **Αἰθιοπίδαι.** Ἡ φυλὴ αὕτη ἀποτελεῖ τὸν κύριον πληθυσμὸν



Εικ. 59. "Ατομα νεγρικής φυλής.

λίας. Αἱ ἀνωτέρω δύο φυλαὶ χαρακτηρίζονται ὡς δευτερεύουσαι φυ-
λαὶ τοῦ νεγροειδοῦς κλάδου.

5. Ο ΕΥΡΩΠΟΕΙΔΗΣ ΚΛΑΔΟΣ. ΑΙ ΦΥΛΑΙ ΤΑΣ ΟΠΟΙΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ


‘Ο Εύρωποειδής τέλος κλάδος περιλαμβάνει τὰς φυλάς, αἱ ὄποιαι
ἀνεπτύχθησαν εἰς τὴν βορειοδυτικὴν περιοχὴν τῆς Εύρωποασίας.
Πρὸς τὴν Εύρωπην ἔξηπλώθη διὰ δύο διευθύνσεων: διὰ μέσου τῆς
Σιβηρίας καὶ διὰ μέσου τῆς Πρόσω Ασίας. Εἰς τοὺς νεωτέρους χρό-
νους ἔξηπλώθη εἰς τὴν Ἀμερικὴν καὶ τὰς ἄλλας ἡπείρους καὶ πρωτο-
στατεῖ εἰς τὸν πολιτισμόν.

τῆς Ἀβησσουνίας. Λόγω τῆς μα-
κρᾶς ἐπαφῆς τῆς μὲ τὸν εὐρωποει-
δῆ κλάδον, μέσω τῆς Ἀραβίας καὶ
τῆς Αἰγύπτου, δὲν παρουσιάζει
έντονα τὰ νεγροειδῆ χαρακτηρι-
στικά.

2) **Φυλαὶ τῶν σαβαννῶν.**
Είναι ἔξηπλωμέναι εἰς τὴν ζώνην
τῶν σαβαννῶν, μεταξὺ τῶν ἐρή-
μων τῆς Βορείου Αφρικῆς καὶ τοῦ
τροπικοῦ δάσους.

3) **Παλαινεγρίδαι.** Οὗτοι ζοῦν
εἰς τὴν τροπικὴν ζώνην.

4) **Μελανησίδαι.** Οὗτοι κα-
τοικοῦν ἐκτὸς τῆς Ἀφρικῆς, εἰς
τὰς νήσους ΝΑ τῆς Ασίας. Προσέ-
τι εἰς τὸν νεγροειδῆ κλάδον τάσ-
σονται καὶ δύο ἀκόμη φυλαί, αἱ
ὄποιαι παρουσιάζουν τὰ ἀτελέ-
στερα χαρακτηριστικὰ καὶ τείνουν
νὰ ἐκλείψουν, οἱ Πυγμαῖοι καὶ οἱ
Αὔστραλίδαι. Οἱ πρῶτοι διατη-
ροῦνται ἀκόμη εἰς τὸ ἐσωτερικὸν
τῶν τροπικῶν δασῶν καὶ οἱ δεύ-
τεροι εἰς τὰς ἐρήμους τῆς Αὔστρα-



Εἰκ. 60. Σχηματική παράστασις τῶν τριῶν ζωνῶν ἔξαπλώσεως τῶν φυλῶν τοῦ εύρωποειδοῦς κλάδου. Α. Βόρειος ζώνη: 1. Βόρειος φυλή, 2. Ἀνατολικοευρωπαϊκή.—Β. Κεντρική ζώνη: 3. Ἀλπική φυλή, 4. Διναρική, 5. Ἀρμενική, 6. Τουρανική.—Γ. Νοτία ζώνη: 7. Μεσογειακή φυλή, 8. Ἀνατολική 9. Ἰνδική φυλή.

Διακρίνομεν τρεῖς ζωνας φυλῶν τοῦ κλάδου τούτου (εἰκ. 60):
Α') τὴν **ζώνην τῶν ἀνοικτοχρώμων βορείων φυλῶν**. Αὕτη περιπεριλαμβάνει δύο φυλάς: α') τὴν Βόρειον φυλήν καὶ β') τὴν Ἀνατολικοευρωπαϊκήν.

Β') Τὴν **κεντρικὴν ζώνην τῶν βραχυκεφάλων**. Αὕτη περιλαμβάνει τέσσαρας φυλάς: α') τὴν Ἀλπικήν, β') τὴν Διναρικήν, γ') τὴν Ἀρμενικήν καὶ δ) τὴν Τουρανικήν.

Γ') Τὴν **ζώνην τῶν νοτίων Εύρασιατικῶν φυλῶν**. Αὕτη περιλαμβάνει τρεῖς φυλάς: α') τὴν Μεσογειακήν, β') τὴν Ἀνατολικήν καὶ γ') τὴν Ἰνδικήν.

A') Η ΖΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΧΡΩΜΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΦΥΛΩΝ

α') **Βόρειος φυλή**. Τὰ χαρακτηριστικὰ τῆς φυλῆς αὐτῆς είναι τὰ ἔξης: Δέρμα καὶ κόμη πτωχὰ εἰς χρωστικήν, ὥστε τὸ δέρμα είναι λευκὸν καὶ ἡ κόμη ξανθὴ ἢ πυρρόχρωμος καὶ οἱ ὄφθαλμοι γαλανοί.

Πρόσωπον ὡοειδές καὶ μύτη εὔθεια καὶ στενόμακρος. Ἡ σιαγών προεξέχει καὶ τὸ μέτωπον κυρτοῦται κανονικῶς. Κρανίον δολιχοκέφαλον καὶ ἀνάστημα ὑψηλόν.

Διακρίνομεν ἐντὸς τῆς φυλῆς ταύτης τρεῖς τύπους: τὸν Τευτοβόρειον, ἵσχνὸν μὲν ἔσανθήν κόμην, τὸν Δανο-βόρειον, μὲν βαρὺ σῶμα, πυρρὰν κόμην καὶ πλατύτερον πρόσωπον καὶ τέλος τὸν Φιννο-βόρειον, λεπτόν, μὲν πυρρὰν κόμην καὶ πολὺ ἀνοικτοχρώμους ὄφθαλμούς.

Ἡ Βόρειος φυλὴ εἰναι ἔξηπλωμένη κυρίως εἰς τὴν Βόρειον Εὐρώπην καὶ ἀνέκαθεν, λόγῳ τῆς ἀγονίας τοῦ ἐδάφους, παρουσίαζε μετακινήσεις. Εἶναι γνωσταὶ ἐκ τῆς Ἰστορίας αἱ πολλαὶ ἐπιδρομαὶ τῶν βορείων πρὸς τὴν Νότιον Εὐρώπην. Οὕτω π.χ. κατῆλθον τὰ Ἰνδογερμανικὰ ἔθνη μέχρι τῆς Βαλκανικῆς καὶ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας δῶδεκα περίπου αἰῶνας π.Χ. Ἐν τοιοῦτον φῦλον ἤσαν οἱ Δωριεῖς. Τὸν δον αἰῶνα π.Χ. κατέρχονται οἱ Κέλται εἰς τὴν Ἰβηρικὴν Χερσόνησον. Τὸν 3ον καὶ 4ον αἰῶνα μ.Χ. βόρεια ἔθνη κατέρχονται μέχρι τῆς Βαλκανικῆς, τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καὶ τῆς Ἰταλίας (Γότθοι).

Εἰς τούς νεωτέρους χρόνους τὰ βόρεια ἔθνη ἰδρυσαν τὰς μεγαλυτέρας ἀποικίας καὶ ἔξηπλώθησαν εἰς τὴν Βόρειον Ἀμερικήν, τὴν Αὔστραλίαν, τὴν Νέαν Ζηλανδίαν κλπ.

β') **'Ανατολικοευρωπαϊκὴ φυλὴ.** Κύρια χαρακτηριστικά τῆς φυλῆς αὐτῆς εἰναι: Ἀνάστημα συνήθως μέτριον, χρῶμα στακτό-ξανθον εἰς τὴν κόμην καὶ πολὺ ἀνοικτὸν εἰς τὸ δέρμα καὶ τοὺς ὄφθαλμούς, ἡ ρίς εἰναι μικρά καὶ ἀνεγείρεται κατὰ τὸ ἄκρον, τὸ δὲ στόμα εἰναι σχετικῶς μεγάλον καὶ τὸ ὅλον πρόσωπον στρογγύλον. Εἰς τὴν αὐτὴν φυλὴν ἀνήκουν τὰ Σλαβικὰ ἔθνη, τὰ ὅποια κατοικοῦν τὴν Ἀνατολικὴν Εὐρώπην καὶ τὴν Βόρειον Ἀσίαν, δηλαδὴ μίαν περιοχὴν εύφορον, πεδινὴν καὶ πλουσίαν εἰς δάση καὶ ἔλη.

Ἡ Ἀνατολικοευρωπαϊκὴ εἰναι ἡ γονιμωτέρα φυλὴ τοῦ εὐρωποειδοῦς κλάδου, ἀριθμοῦσα σήμερον περίπου 230 ἑκατομμύρια ψυχῶν.

B') Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΒΡΑΧΥΚΕΦΑΛΩΝ

α') **'Αλπικὴ φυλὴ.** Κύρια χαρακτηριστικά τῆς φυλῆς ταύτης εἰναι τὰ ἔξῆς: ἀνάστημα μέτριον, σῶμα συχνὰ παχύ, κεφαλὴ στρογγύλη. Ἡ ρίς εἰναι μικρά, ἡ ἀπόστασις δὲ μεταξὺ τῶν ὄφθαλμῶν

μεγάλη. Κρανίον βραχυκέφαλον καὶ χρῶμα κόμης ὄρφνόν.

‘Η’ Αλπικὴ φυλὴ κατοικεῖ εἰς τὴν ὄρεινήν καὶ δασώδη Κεντρικήν Εύρωπην. Τμῆμα τῆς φυλῆς ταύτης εἶναι καὶ οἱ Λάπποι εἰς, οἱ ὅποιοι, ἀποχωρισθέντες αὐτῆς, ζοῦν νομαδικῶς εἰς τὴν Βόρειον Σκανδιναվίαν (εἰκ. 61).

β’) Διναρικὴ φυλὴ. Αὕτη εἶναι ἔξηπλωμένη ἀνατολικῶς τῆς προηγουμένης, κυρίως εἰς τὰς ὄρεινάς περιοχὰς τῶν Διναρικῶν Ἀλπεων. Χαρακτηρίζεται ἀπὸ ὑψηλότατον ἀνάστημα καὶ ἰσχυρὰν βραχυκεφαλίαν. Τὸ κρανίον πρὸς τὰ ὅπιστα εἶναι ἐπίπεδον καὶ ἡ ρίς κυρτή. Τὸ χρῶμα τῶν τριχῶν καὶ τοῦ δέρματος εἶναι βαθύ (εἰκ. 2).

γ’) Ἀρμενικὴ φυλὴ. Αὕτη παρουσιάζει ὁμοιότητα μὲ τὴν Διναρικήν καὶ μὲ τὴν ἐπομένην Τουρανικήν φυλήν. Παρουσιάζει ἀνάστημα μέτριον, μέτωπον ἀπότομον καὶ ρίνα μεγάλην καὶ κεκαμένην.

δ’) Τουρανικὴ φυλὴ. Αὕτη εἶναι ἔξηπλωμένη εἰς τὴν περιοχὴν τῆς Ἀνατολίας. Παρουσιάζει ἀνάστημα μέτριον, βραχυκεφαλίαν, μέτωπον ἀπότομον. Τὰ ζυγωματικὰ τόξα προεξέχουν. Τρίχωμα ἰσχυρὸν καὶ χείλη στενά.

Γ') Η ΖΩΗ ΤΩΝ ΝΟΤΙΩΝ ΕΥΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΦΥΛΩΝ



Εἰκ. 62. *Ατομον τῆς Διναρικῆς φυλῆς.



Εἰκ. 61. Λαππωνίς.

α’) Μεσογειακὴ φυλὴ (εἰκ. 63). Παρουσιάζει ἀνάστημα μέτριον ἡ μικρόν, πρόσωπον ὥσειδες καὶ κρανίον δολιχοκέφαλον. Δέρμα μελαχροινὸν καὶ κόμη ἔλαφρῶς κυματοειδῆς. Σωματικαὶ ἀναλογίαι ὁμοιάζουσαι μὲ τὰς τῆς Βορείου φυλῆς.

‘Η φυλὴ αὗτη εἶναι ἔξηπλωμένη εἰς τὰς νοτίους χερσονήσους τῆς Εύρωπης, ιδίως εἰς τὴν Ἰβηρικήν. Συναντᾶται ἐπίσης καὶ εἰς πολλὰς ἄλλας περιοχὰς, χωρὶς ὅμως συνοχήν.

Τοιαῦται περιοχαὶ εἶναι ἡ Ἰρλανδία, ἡ Οὐαλλία, ἡ Ρουμανία, ἡ Νότιος Γαλλία, ἡ Βόρειος Ἀφρική. Διὰ τῶν Ἰσπανικῶν καὶ Πορτογαλικῶν ἀποικιῶν ἔξηπλώθη εἰς τὴν Νότιον καὶ Κεντρικήν Ἀμερικήν. Εἰς τὴν Ἀνατολικήν Μεσόγειον ἔχει ἀναμιχθῆ μὲν πλείστας φυλάς.

β) Ἀνατολικὴ φυλή. Αὕτη εἶναι κυρίως ἔξηπλωμένη εἰς τὰς ξηρὰς περιοχὰς τῆς Πρόσω Ασίας (Ἀραβία, Μεσοποταμία, Συρία κλπ.). Εἰς τὴν αὐτὴν φυλὴν ἀνήκουν καὶ οἱ Ἀραβεῖς καὶ οἱ Ἐθραῖοι.

γ) Ἰνδικὴ φυλή. Αὕτη εἶναι ἔξηπλωμένη εἰς τὸ Ἀφγανιστάν καὶ τὰς Ἰνδίας. Μερικὰ ἐκ τῶν χαρακτηριστικῶν της εἶναι: χρῶμα δέρματος βαθὺ καὶ ἐνίστε ἀραβοσιτόχρουν, μέτωπον στενόν, κνῆμαι καὶ ἀντιθραχίονες λεπτοί.

Σημείωσις. Εἰς τὸν εύρωποιδῆ κλάδον τάσσονται καὶ ὡρισμέναι δευτερεύουσαι φυλαί. Ἐκ τούτων ἀνοφίρομεν τὴν φυλὴν Ἀϊνώ, ἡ ὅποια ζῇ εἰς τὰς βορείους νήσους τῆς Ἰαπωνίας.

6. ΦΥΛΑΙ ΚΑΙ ΕΘΝΗ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΙΞΙΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Ἄνωτέρω ἀναφέραμεν τοὺς τρεῖς κλάδους ἀνθρωπίνων φυλῶν καὶ εἴδομεν • ὅτι ἔκαστος ἔξ αὐτῶν περιλαμβάνει ὡρισμένας κυρίας φυλάς, τὰς ὅποιας περιεγράψαμεν, καὶ ἔγνωρίσαμεν τὰς γενικὰς γραμμὰς τῆς γεωγραφικῆς κατανομῆς των. Πλὴν τούτων ἔκαστος κλάδος εἴδομεν ὅτι περιλαμβάνει καὶ ὡρισμένας δευτερευούσας φυλάς, αἱ ὅποιαι γενικῶς εἶναι ἀριθμητικῶς μικραί. Ἐκ τῶν δευτερευουσῶν τούτων φυλῶν μερικαὶ ἀποτελοῦν διαμέσους τύπους μεταξὺ τῶν διαφόρων κλάδων.

Τὰς ἀνωτέρω περιγραφείσας φυλάς δὲν συναντῶμεν μόνον εἰς τὰς ἀντιστοίχως ἀναφερθείσας περιοχάς. Ἀντιθέτως σήμερον καὶ ἐκτὸς τῶν περιοχῶν τούτων ἀνευρίσκομεν πολυπληθεῖς ὄμάδας τῶν διαφόρων φυλῶν. Ἀπὸ τὰς ἀρχικὰς περιοχάς τῶν διαφόρων φυλῶν



Εἰκ. 63. Ἀτομον τῆς Μεσογειακῆς φυλῆς.

μέγας ἀριθμὸς ἀτόμων ἔχει μεταφερθῆ ἀλλοῦ. 'Ως διδάσκει ἡ 'Ι-
στορία, ἡ ἐπικοινωνία μεταξὺ τῶν διαφόρων φυλῶν εἶναι ζωηρὰ
καὶ γίνεται εἴτε δι' εἰρηνικούς σκοπούς (μεταναστεύσεις κλπ.), εἴτε
διὰ πολεμικούς (ἐπιδρομαί, κατακτήσεις κλπ.).

Οὕτω π.χ. εἰς τὴν Βόρειον Ἀμερικὴν ύπαρχουν σήμερον ἑκατομ-
μύρια Κινέζων καὶ Νέγρων, οἱ δὲ Εὐρωπαῖοι εἶναι ἔξηπλωμένοι εἰς
τὰ περισσότερα μέρη τῆς γῆς.

'Η ἐπικοινωνία μεταξὺ τῶν διαφόρων φυλῶν ἐπέφερε τὴν μῆ-
ξιν αὐτῶν. Τοιουτοτρόπως ἐδημιουργήθησαν ποικίλοι ἀνθρωπολο-
γικοὶ τύποι, ἐκτὸς τῶν τυπικῶν φυλῶν.

Διὰ τοῦτο γενικῶς εἰς μίαν χώραν, ίδιως ἔχουσαν μακράν 'Ιστο-
ρίαν, ὁ πληθυσμὸς δὲν παρουσιάζει πλήρη φυλετικὴν δόμοιομορφίαν.
'Επομένως τὰ ἔθνη δὲν περιλαμβάνουν ἄτομα ἐνὸς καὶ τοῦ αὐτοῦ
μόνον ἀνθρωπολογικοῦ τύπου.

7. ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ

Διακρίνομεν τὰς φυλὰς μεταξύ των, διότι ἐκάστη παρουσιάζει ἐν σύνολον
γνωρισμάτων, τὰ ὅποια είναι κληρονομικὰ καὶ ἐμφανίζονται εἰς ὅλα τὰ ἄτομα
τῆς φυλῆς, μὲν μικρὰς διαφοράς.

Εἰς ώρισμένον τόπον δὲν κατοικοῦν πάντοτε ἄτομα καταγόμενα ἀπὸ γονεῖς
οἱ ὅποιοι ἀνήκουν καὶ οἱ δύο εἰς τὴν αὐτὴν φυλήν. Διὰ τοῦτο ὁ πληθυσμὸς ἐνὸς
τόπου δὲν παρουσιάζει, γενικῶς, φυλετικὴν δόμοιομορφίαν.

Γενικωτάτῃ διαίρεσις δύναται νὰ γίνη εἰς τρεῖς κλάδους : α') τὸν Εὐρωποειδῆ·
β') τὸν Μογγολοειδῆ καὶ γ') τὸν Νεγροειδῆ. "Ἐκαστος κλάδος περιλαμβάνει ώρι-
σμένας κυρίας φυλάς, αἱ ὅποιαι δύνανται πάλιν καὶ περαιτέρω νὰ ὑποδιαιρεθοῦν.



ΠΙΝΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τὸ κύτταρον—Οἱ ιστοι—Ο ἀνθρωπός 5

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Κεφ. Α'.—**Ο σκελετός τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος** 8

1.—Σχηματισμὸς καὶ ύψὴ τῶν ὄστῶν.—2. Σύνδεσις τῶν ὄστῶν.—3. Μέρη τοῦ σκελετοῦ. I. 'Ο σκελετὸς τῆς κεφαλῆς: α') 'Οστᾶ τοῦ κρανίου, β') Τὰ ὄστᾶ τοῦ προσώπου. II. 'Ο σκελετὸς τοῦ κορμοῦ: α) Σπονδυλική στήλη, β') 'Ο σκελετὸς τοῦ θώρακος III. 'Ο σκελετὸς τῶν ἄκρων: α') 'Ο σκελετὸς τῶν ὥμων καὶ τῶν ἄνω ἄκρων (χειρῶν); β') 'Ο σκελετὸς τῆς λεκάνης καὶ τῶν κάτω ἄκρων (ποδῶν) 4. Περιληψις.—5. Διάφοροι παρατηρήσεις καὶ ἀσκήσεις.

Κεφ. Β'.—**Οι μύες τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος** 25

1. Οἱ μύες, αἱ μυϊκαὶ ἵνες.—2. Γραμμωτοὶ μύες καὶ τρόπος τῆς ἐργασίας αὐτῶν.—3. Οἱ λειοὶ μύες.—4. 'Ο μυϊκὸς τόνος.—5. Περιληψις.—6. Διάφοροι παρατηρήσεις καὶ ἀσκήσεις.

Κεφ. Γ'.—**Αἱ προσλαμβανόμεναι ὑπὸ τοῦ ὁργανισμοῦ οὐσίαι. Αἱ καύσεις. Ἀνταλλαγὴ τῆς ὕλης καὶ ἐνεργείας.** 29

1. Αἱ θρηπτικαὶ οὐσίαι.—2. 'Υδωρ καὶ ἀνόργανα ἄλατα.—3. 'Υδατάνθρακες καὶ καύσις.—4. Αἱ λιπαραὶ οὐσίαι.—5. Λευκώματα.—6. Αἱ Βιταμῖναι.
7. Αἱ λειτουργίαι τῆς ἀνταλλαγῆς τῆς ὕλης.—8. Περιληψις.

Κεφ. Δ'.—**Μορφολογικὴ ἐπισκόπησις τῆς στοματικῆς κοιλότητος. Οἱ ὁδόντες** 34

1. 'Η στοματικὴ κοιλότης.—2. Οἱ ὁδόντες.—3. Διάφοροι παρατηρήσεις καὶ ἀσκήσεις.—4. Περιληψις.

Κεφ. Ε'.—**Πέψις. Απομύζησις καὶ ἀφομοίωσις τῶν προϊόντων τῆς πέψεως** 38

1. 'Η πέψις, ὁ πεπτικὸς σωλήν.—2. Στόμα, μάσησις, σίαλος, κατάποσις

των βλωμοῦ.—3. Φάρυγξ καὶ οἰσοφάγος. Στόμαχος καὶ γαστρικὸν ύγρον.—4. Λεπτὸν ἐντερον, πάγκρεας, ἡπαρ, χοληδόχος κύστις. Συμπλήρωσις τῆς πέψεως.—5. Ἀπομόζησις τῶν προιόντων τῆς πέψεως διὰ τῶν λαχινῶν τοῦ ἐντέρου.—6. Ἀφομοίωσις τῶν προιόντων τῆς πέψεως.—7. Παχὺ ἐντερον, βακτηρίδια τοῦ ἐντέρου, περιττώματα.—8. Ἐπίδρασις ἔνων λευκωμάτων ἐπὶ τοῦ ὄργανισμοῦ.—9. Περιληψις.	44
Κεφ. Σ'.—Ἡ ἀναπνοὴ	44
1. Τὸ ἀναπνευστικὸν σύστημα.—2. Αἱ ἀναπνευστικαὶ κινήσεις.—3. Περιληψις.—4. Διάφοροι παρατηρήσεις καὶ ἀσκήσεις.	
Κεφ. Ζ'.—Ο λάρυγξ καὶ ἡ παραγωγὴ τῆς φωνῆς	48
1. Ἡ κατασκευὴ τοῦ λάρυγγος. Τρόπος παραγωγῆς τῆς φωνῆς. 2. Χαρακτῆρες τῆς φωνῆς. Ἀρθρωσις αὐτῆς εἰς φθόγγους. Λόγος.—3. Περιληψις.—4. Διάφοροι παρατηρήσεις καὶ ἀσκήσεις.	
Κεφ. Η'.—Ἡ κυκλοφορία τοῦ αἷματος καὶ τῆς λέμφου. Ἡ ἀπέκκρισις	51
1. Τὸ αἷμα. —2. Ἡ καρδία καὶ τὰ ἀγγεῖα.—3. Διόδος τοῦ αἵματος διὰ τῶν νεφρῶν. Ἀπέκκρισις.—4. Διόδος τοῦ αἵματος διὰ τοῦ ἡπατοῦ.—5. Ἀνασκόπησις τῆς μικρᾶς καὶ τῆς μεγάλης κυκλοφορίας.—6. Ἡ κίνησις τοῦ αἵματος ἐντὸς τῶν ἀγγείων.—7. Ἡ λέμφος καὶ τὸ λεμφικὸν σύστημα.—8. Σχηματισμός καὶ καταστροφὴ τῶν αἷμασφαιρίων.—9. Περιληψις.—10. Διάφοροι παρατηρήσεις καὶ ἀσκήσεις.	
Κεφ. Θ'.—Μορφολογικὴ ἀνασκόπησις τῆς θωρακικῆς καὶ τῆς κοιλιακῆς κοιλότητος	62
Κεφ. Ι'.—Αἱ ἔκκρισεις	64
1. Ἀδένες. Ἐνδοκρινεῖς ἀδένες. Ἀδένες διπλῆς λειτουργίας.—2. Αδένες ἐσωέκκρισεως.—3. Περιληψις.	
Κεφ. ΙΑ'.—Τὸ νευρικὸν σύστημα	67
1. Ἐρεθίσματα, ἀντιδράσεις. Τὰ νεῦρα. Τὰ τμῆματα τοῦ νευρικοῦ συστήματος. Ἡ ιδιαιτέρα σημασία τοῦ ἐγκεφάλου.—2. Τὸ ἐγκεφαλονωτιαῖον νευρικὸν σύστημα: α') τὸ κεντρικὸν τμῆμα, β') τὸ περιφερικὸν τμῆμα, γ') ἡ διαδρομὴ τοῦ ἐρεθίσματος.—3. Τὸ φυτικὸν νευρικὸν σύστημα.—4. Ὁ ὑπνος.—5. Περιληψις.	
Κεφ. ΙΒ'.—Αἱ αἰσθήσεις	75
1. Αἰσθησις. Αἰσθητικὰ σωμάτια τοῦ δέρματος.—2. Αἰσθητήριον τῆς γεύσεως.—3. Τὸ αἰσθητήριον τῆς δισφρήσεως.—4. Τὸ αἰσθητήριον δργανῶν τῆς ὁράσεως. Κατασκευὴ τῶν ὀφθαλμῶν. Σχηματισμὸς τοῦ εἰδῶλου. Προσαρμογὴ τοῦ ὀφθαλμοῦ. Προστασία τοῦ ὀφθαλμοῦ. Ἀνωμαλίαι τῆς ὁράσεως.—5. Τὸ αἰσθητήριον τῆς ἀκοῆς καὶ τοῦ χώρου. Ἔξω οὖς. Μέσον οὖς. Ἐσω οὖς.—6. Τὸ αἰσθημα τοῦ πόνου.—7. Περιληψις.—8. Διάφοροι παρατηρήσεις καὶ ἀσκήσεις.	

ΕΞΩΦΥΛΛΟΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΗΛΙΩΝΗ



0020557946
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΟΥΛΗΣ

ΕΚΔΟΣΙΣ Κ', 1971 (V) — ANTIT. 88.000 — ΣΥΜΒΑΣΙΣ 2111/10-4-1971

Κοινωνραξία 'Έκτύπωσις: ΓΡΑΦΙΣ Ο.Ε. — Βιβλιοδ.: ΟΚΤΩΡΡΑΤΟΣ ΚΟΥΚΙΑΣ Ο.Ε.

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

